
小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【凌泉】卽黃環之古籍別名。典見本經。詳『黃環』條。

【凌霄】卽凌霄花之簡稱。詳『凌霄花』條。

【凌霄花】原名 紫葳花。

命名 本品附木而莖生延上。高達數丈。故名。其花色赤。又有紫葳之稱。

古籍別名 陵苕。芠華。(本經)陵時花。(郭璞)女葳花。(甄權)武威花。翌陵花。鬼目花。(吳普)

基本 屬紫葳科紫葳之花。

產地 陳仁山藥物生產辨云。凌霄花各省均有產。但以江蘇鎮江爲多出。



凌霄花

形態 凌霄花爲自生山中或栽植庭園之蔓生木本莖生氣根。(植物根由莖之上部發生。不入於地內。而生於空中。取空氣中之水分以爲生活者。曰氣根。)攀登他樹。其葉對生。爲羽狀複葉。小葉作尖卵圓形。邊緣有粗鋸齒。七八月間開黃赤色不整齊之大花。有五瓣花冠。花後結長三寸許之莢果。

採取 六七月採之。

製法 採得陰乾入藥。

性質 酸。微寒。無毒。

效能 瀉血熱。破血瘀。專作通經藥。

主治 婦人產乳餘疾。崩中。癥瘕。血閉。寒熱羸瘦。養胎。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論凌霄花曰。產後奔血不定。淋瀝。主熱風風癇。大小便不利。腸中結實。【宋】大明諸家本草論凌霄花曰。酒齇熱毒風。刺風。婦人血瘕。遊風。崩中帶下。【明】繆希雍本草經疏論凌霄花曰。紫葳。卽凌霄花也。其味酸。氣微寒。無毒。花開於夏而色赤。味應帶苦。入肝行血之峻藥。故主婦人產乳餘疾。及崩中癥瘕。血閉寒熱羸瘦諸證。至於養胎。決非其性之所宜。用者愼之。【清】黃宮繡本草求眞。論凌霄花曰。肝經血分藥也。味甘而酸。氣寒無毒。凡人火伏血[illegible]風。崩帶瘀瘕。一切由於血熱而成者。所當用此調治。蓋此專主瀉熱。熱去而血自活也。是以肺癰之藥。多有用此爲君。妊娠用此克安者。以其內有瘀積。瘀去而胎卽安之意也。所云孕婦[illegible]恐其瘀血既無。妄用恐生他故。此爲女科必用之藥。但當相[illegible]治耳。藤生。花開五瓣。黃赤可近。鼻聞傷腦。【清】張[illegible]崇原論凌霄花曰。紫葳。主通經脈。氣味酸微寒。主故本經主治如此。近時用此經下胎之藥。仲景鼈甲煎丸[illegible]紫葳。以消癥瘕。必非安胎之品明矣。本經養胎二字。當是墮胎之譌耳。【清】楊時泰本草述鉤元論凌霄花曰。氣寒。其味鹹。先而勝。苦後而殺。知其入血而散熱結。無疑。第丹溪云。補陰甚捷。瀕湖又言。能去血中伏火。似其性不專於通行。且此味長於鹹。以鹹多傷血之理推之。則知長傷血者。必非峻於行血者也。又卽其治熱毒風言之。大血[illegible]之[illegible]而爲[illegible]風治[illegible]無毒。凡人火伏血[illegible]風。崩帶瘀瘕。一切由於血熱而成者。所當用此調治。蓋此專主瀉熱。熱去而血自活也。是以肺癰之藥。多有用此爲君。妊娠用此克安者。以其內有瘀積。瘀去而胎卽安之意也。所云孕婦[illegible]恐其瘀血既無。妄用恐生他故。此爲女科必用之藥。但當相[illegible]治耳。藤生。花開五瓣。黃赤可近。鼻聞傷腦。【清】張[illegible]崇原論凌霄花曰。紫葳。主通經脈。氣味酸微寒。主故本經主治如此。近時用此經下胎之藥。仲景鼈甲煎丸[illegible]紫葳。以消癥瘕。必非安胎之品明矣。本經養胎二字。當是墮胎之譌耳。【清】楊時泰本草述鉤元論凌霄花曰。氣寒。其味鹹。先而勝。苦後而殺。知其入血而散熱結。無疑。第丹溪云。補陰甚捷。瀕湖又言。能去血中伏火。似其性不專於通行。且此味長於鹹。以鹹多傷血之理推之。則知長傷血者。必非峻於行血者也。又卽其治熱毒風言之。大血[illegible]之[illegible]而爲[illegible]風治[illegible]

[illegible]風。崩帶瘀瘕。一切由於血熱而成者。所當用此調治。蓋此專主瀉熱。熱去而血自活也。是以肺癰之藥。多有用此爲君。妊娠用此克安者。以其內有瘀積。瘀去而胎卽安之意也。所云孕婦[illegible]恐其瘀血既無。妄用恐生他故。此爲女科必用之藥。但當相[illegible]治耳。藤生。花開五瓣。黃赤可近。鼻聞傷腦。【清】張[illegible]崇原論凌霄花曰。紫葳。主通經脈。氣味酸微寒。主故本經主治如此。近時用此經下胎之藥。仲景鼈甲煎丸[illegible]紫葳。以消癥瘕。必非安胎之品明矣。本經養胎二字。當是墮胎之譌耳。【清】楊時泰本草述鉤元論凌霄花曰。氣寒。其味鹹。先而勝。苦後而殺。知其入血而散熱結。無疑。第丹溪云。補陰甚捷。瀕湖又言。能去血中伏火。似其性不專於通行。且此味長於鹹。以鹹多傷血之理推之。則知長傷血者。必非峻於行血者也。又卽其治熱毒風言之。大血[illegible]之[illegible]而爲[illegible]風治[illegible]

[illegible]以助陰抑陽爲主。正與晚近庸俗之見。產後妄用溫補。耗爍陰液。兩得其反。又治崩中則專以元陽妄行。不能自攝。崩中而言非謂可以統治血虛。守之崩漏。血閉。蓋亦爲血熱太甚。均[illegible]淤者言之。亦非陰寒凝結之癥閉塞可知。又曰寒熱羸瘦。則又血虛內熱。形消羸瘠者耳。其又能養胎者。以胎元既結之時。元陰凝聚於下。往往虛陽升浮於上。而此能養之。蘇助陰潤陽之要旨也。

[illegible]疾。正[illegible]已虛孤陽[illegible]直入血分。[illegible]元陰而收攝浮[illegible]近[illegible]見古人之治產後皆[illegible]

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

閉用凌霄花、當歸、紅花、川芎、牛膝、地黃、延胡索、桃仁、蘇枋木、五靈脂。

㊁治婦人血崩。凌霄花爲末。每酒服二錢。後服四物湯（丹溪方）

㊂治黨後下血。凌霄花浸酒頻飲之（普濟方）

㊃治消渴飲水。凌霄花一兩。搗碎。水一盞半。煎一盞。分二服。（聖濟方）

㊄治嬰兒不乳。百日內小兒無故口青。不飲乳。用凌霄花、大藍葉、芒硝、大黃等分爲末。以羊髓和丸。梧子大。每服一丸。以乳送下。便可喫乳。熱者可服。寒者勿服。昔有人休官後。雲遊湖湘。修合此方。救危甚多（普濟方）

㊅治久近風癇。凌霄花或根葉爲末。每服三錢。溫酒下。服畢。解髮。不住手梳。口噙冷水。溫則吐去。再噙再梳。至二十口乃止。如此四十九日。絕根。百無所忌。（方賢奇效方）

㊆治通身風痒。凌霄花爲末。酒服一錢。（醫學正傳方）

㊇治大風瘡疾。凌霄花五錢。地龍焙。飛鹽炒。全蠍炒。各七箇爲末。每服二錢。溫酒下。先以藥湯浴過。服此出臭汗爲效。儒門事親。加蟬蛻五品各九箇。作一服。（潔古家藏方）

㊈治鼻上酒齇。用凌霄花、山梔子等分爲末。每茶服二錢。日二服。數日除根。臨川曾子仁用之有效。（百一選方）又用凌霄花半兩。硫黃一兩。胡桃四箇。膩粉一錢。研膏生絹包搽。（楊氏家藏方）

㊉治走皮趨瘡。滿頰滿頂。浸淫。瀋爛。延及兩耳。痒而出水。發歇不定。用凌霄花并葉。煎湯日日洗之。（直指方）

㊊治婦人陰瘡。紫葳爲末。用鯉魚腦或膽調搽。（摘玄方）

㊋治耳卒聾閉。凌霄葉杵取自然汁滴之。（斗門方）

㊌治女經不行。凌霄花爲末。每服二錢。食前溫酒下。（徐氏胎產方）

用法 錢半至三錢。

施用宜忌 凡血虛陰虧。及無瘀滯者禁用。畏鹵鹹。

參攷資料 ㊀花不可近鼻。聞傷腦。花上露入目。令人昏朦。（李時珍）㊁凌霄花蓮蓬用。詩云。苕之華。云其黃矣。爾雅云。陵苕黃華。蔉白華。菉也。中亦有白花者。（蘇頌）㊂今處處皆有。多生山中人家園圃。亦或栽之。初作蔓生。依大木。久延至巔。其花黃赤。夏中乃盛。今醫家多採花乾之。入女科藥用。（蘇頌）㊃凌霄野生蔓纏數尺。得木而上。即高數丈。年久者藤大如杯。春初生枝。一枝數葉。尖長有齒。深青色。自夏至秋開花。一枝十餘朵。大如牽牛花。而頭開五瓣。赭黃色。有細點。秋深更赤。八月結莢。如豆莢。長三寸許。其子輕薄如榆仁。馬兜鈴仁。其根長亦如兜鈴根狀。秋後採之陰乾。（李時珍）

【凌霄花蓝葉】

性質 苦。平。無毒。

主治 痿躄。益氣。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草。論凌霄花蓝葉。曰。熱風身痒。遊風風癮。瘀血帶下。花和根功同。【明】李時珍本草綱目。論凌霄花蓝葉。曰。治喉痺。熱痛。涼血生肌。

【凌霄草】即女

【凍青】即冬青之古籍別名。典見綱目。詳『冬青』條。

【凍瓊脂】即石花菜膠之古籍別名。詳『石花菜』條。

【剛子】即巴豆之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『巴豆』條。

【剛前】即涅羊藿之古籍別名。典見本經。詳『淫羊藿』條。

【剛鬣肉】即豬肉之古籍別名。典見禮記。詳『豬肉』條。

【原寸香】即麝香之處方用名。詳『麝香』條。

【原生地】即大生地之處方用名。詳『大生地』條。

【原油香】即大茴香之處方用名。詳『大茴香』條。

【原金鈒】即石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【原扁斛】即石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【原紅花】即紅花之處方用名。詳『紅花』條。

【原滑石】即

『滑石』條。

『麝香』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【原蠶沙】命名 本品一名晚蠶沙。蓋原也晚也。再養之義也。即藥用須以夏蠶之糞沙故名。

處方用名 二蠶沙。

古籍別名 晚蠶沙。晚蠶矢。（方書）蠶屎。（俗名）原蠶糞。（別名）

基本 屬昆蟲類中鱗翅族。爲夏蠶排泄之糞。

產地 凡養蠶區域多有。

形態 蠶沙爲鐵黑色之橢圓顆粒。入藥須用夏蠶之糞。

製法 蘇頌曰。凡使蠶沙蠶蛾。皆用晚出者。佳。李時珍曰。蠶沙須晒乾。淘淨再晒。可久收不壞。

性質 甘。辛。溫。無毒。

效能 祛風。澀。治目疾。化血瘀。療頑痺。用治眼瞼糜爛藥。又或以治淋疾及爲風痺藥。

主治 腸鳴。熱中消渴。風痺癱瘓。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論蠶沙曰。炒黃袋盛。浸酒去風。緩諸節不遂。皮膚頑痺。腹內宿冷。冷血瘀血。腰腳冷疼。炒熱袋盛熨偏風筋骨癱緩。手足不遂。腰腳軟。皮膚頑痺。【明】李時珍本草綱目論蠶沙曰。治消渴癥結。及婦人血崩頭風。風赤眼去風除濕。【明】繆希雍本草經疏論蠶沙曰。原蠶沙即晚蠶所出屎也。其味辛甘氣溫無毒。腸鳴者。水火相觸也。甘以和之。消渴者。中氣燥熱也。辛以調之。蠶屬火。其性燥。燥能勝濕去風。故其沙主療風濕之病。如陳藏器以之炒黃袋盛。浸酒去風。緩諸節不遂。皮膚頑痺。腹內宿冷。瘀血腰腳冷疼。炒熱熨偏風筋骨癱緩。手足不遂等證。【清】黃宮繡本草求眞。論蠶沙曰。蠶砂即晚蠶所出之屎也。玩書所著治功。多有祛風除濕之能。所謂治症。多是肢節不遂。皮膚頑痺。腰膝冷痛。冷血瘀血。腸鳴消渴。燗弦風眼。絲蠶食而不飲。其食出則氣燥。燥則可以勝濕去風。凡一切皮膚等症。因於風濕而至者。無不得此以爲調治。且味辛而兼甘。故凡水火相激而見腸鳴。得此甘以和之。燥熱而見消渴不止。得此辛以潤之。是以用此炒黃袋盛浸酒。以去風緩不遂。皮膚頑痺。瞽燗弦風眼。用此油浸塗患即愈。昔史國公用此浸酒。以治風痺。義多根此。然惟晚者爲良。早蠶者不堪入藥。以倘火烘。故有毒也。

配合應用 ㈠治半身不遂。蠶沙二碗。以二袋盛之。蒸熱。更互熨患處。仍以羊肚糢米麥粥。日食一枚。十日即止。

㈡治風瘙癮瘕。作痒成瘡。用蠶沙一升。水五斗。麥取一斗二升。去滓。洗浴避風。（聖惠方）

㈢治頭風白屑作癢。蠶沙燒灰。淋汁洗之。（聖惠方）

㈣治眯目不出。蠶沙揀淨。空心以新汲水吞下十枚。勿嚼破。（聖惠方）

㈤治消渴飲水。用晚蠶沙焙乾爲末。每用冷水下二錢。不過數服。（斗門方）

㈥治婦人血崩。蠶沙爲末。酒服三五錢。（儒門事親方）

㈦治月經久閉。蠶沙四兩。砂碗炒。半黃色。入無灰酒一壺。麥沸。澄去沙。每溫服一盞。即通。

㈧治轉女爲男。婦人始覺有孕。用原蠶屎一枚。井華水服之。日三。（千金方）

㈨治跌撲傷損。扭閃出骨痰等證。蠶沙四兩。炒黃。豨豆粉四兩。黃枯礬二兩。四錢爲末。絹包縛定。換三四次即愈。近之。（邵眞人經驗方）

㈩治男婦心痛。不可忍者。晚蠶沙一兩。滾湯泡過。濾淨。取清水服。即止。（瑞竹堂方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無濕痺而有血燥者。禁用。

參攷資料 ㈠蠶屎飼牛。可以代穀。用三升醇酒。拌蠶沙五斗。甑蒸於暖室中。鋪油單上。令患風冷氣痺及近感癱瘓人。就以患處一邊。臥沙上。厚蓋取汗。苦虛人須防大熱昏悶。令露頭面。若未全愈。間日再作。（寇宗奭）㈡陳氏經驗方。一抹青。治燗弦風眼。以眞麻油浸蠶沙二三宿。研細。以筆子塗患處。不問新舊。隔宿即愈。同桑柴灰淋汁。麥麩肉作丸。治腹中癥結。李九華云。蠶沙麥酒。色味清美。又能療疾。（李時珍）㈢蠶沙壁酒罈上泥好。色清味美。昔史國公用此浸酒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以治風痺。相得益彰矣。(盧飛鵬)

【原蠶沙酒】 製法 用原蠶沙炒黃袋盛浸酒飲。 主治 風緩頑痺。諸節不遂。腹內宿痛。

【原蠶蛾】 古籍別名 晚蠶蛾。(日華)魏蠶蛾。(廣志)熱蠶蛾。(綱目) 採取 以雄者入煎。 製法 餘之才曰。凡使炒去翅足用。 性質 鹹。溫。無毒。 主治 益精氣。強陰道。交接不倦。亦止精。 歷代記述考證 【明】李時珍本草綱目論原蠶雄蛾曰。壯陽事。止泄精尿血。暖水臟。治暴風。金瘡凍瘡。湯火瘡。滅瘢痕。 參考資料 (一)蠶蛾用第二番。取其敏於生育也。(寇宗奭)(二)蠶蛾性淫。出繭即媾。至於枯槁乃已。故強陰益精用之。(李時珍)

【原蠶糞】 即原蠶沙之別名。詳『原蠶沙』條。

【員實】 即雲實之古籍別名。典見別錄。詳『雲實』條。

【唐小豆】 即相思子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『相思子』條。

【唐夷】 基本 唐夷爲雜草類之一種。可供藥用。 性質 苦。無毒。 主治 療蹉折。

【唐青子】 即萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊菔子』條。

【唐柿】 即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳『無花果』條。

【唐苯】 即皐蘆之日本別名。詳『皐蘆』條。

【唐婆饑】 即鬼臼之古籍別名。典見綱目。詳『鬼臼』條。

【唐棣】 即扶移之古籍別名。典見爾雅。詳『扶移』條。

【唐梨】 即楔檀之日本名。詳『楔檀』條。

【唐菜】 即白菜之日本名。詳『白菜』條。

【唐秋子】 即胡桃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡桃』條。

【唐蒙】 即菟絲子之古籍別名。典見爾雅。詳『菟絲子』條。

【唐橘】 即枸橘之古籍別名。詳『枸橘』條。

【唐蕷】 即番薯之日本名。詳『番薯』條。

【唐撫】 即地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地膚子』條。

【唧唧鳥】 即鸐鵴之古籍別名。典見廣雅。詳『鸐鵴』條。

【塞葸】 即天名精之古籍別名。典見別錄。詳『天名精』條。

【埋光烏藥】 即高良薑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『高良薑』條。

【埋頭蛇】 即蝮蛇之古籍別名。典見綱目。詳『蝮蛇』條。

【城裏赤柱】 即淮木之古籍別名。典見綱目。詳『淮木』條。

【城頭菊】 產地 生浙江杭城石龍閘。 形態 城頭菊爲菊類之一種。枝葉極瘦。九月開花如豆。小於菜菊。氣香而味甘。其花可供藥用。枝葉詳見該條。 性質 甘。寒。無毒。 主治 明目祛頭風。喉痺。涼血解癍毒。

【城頭菊枝葉】 主治 鮮者生搗。罨疔瘡。

井服其汁。兼治蛇咬。瘰癧。梅瘡。眼瘜。煎洗天泡瘡亦效。

【夏瓜】 即西瓜瓤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『西瓜瓤』條。

【夏生】 即萊菔之古籍別名。典見王禎農書。詳『萊菔』條。

【夏石】 即鐘乳石之古籍別名。典見別錄。詳『鐘乳石』條。

【夏冰】 命名 本品爲夏季所製之冰。故名。但天然者俱在邊荒之區。殊不易得耳。 古籍別名 凌。(綱目) 性質 甘。冷。無毒。 主治 去煩熱。熨人乳石發熱腫。 歷代記述考證 【明】吳瑞日用本草論夏冰曰。解煩渴。消暑毒。【明】李時珍本草綱目論夏冰曰。傷寒陽毒。熱盛昏迷者。以冰一塊。置於臍中。良亦解燒酒毒。 參考資料 (一)夏暑盛熱。應與氣候相反。如非宜人。腹冷熱相激。卻致諸疾也。食凡夏用冰。止可臨映飲食。令無爾。不可食之。雖當時暫快。久皆成疾也。(陳藏器)(二)宋徽宗食冰太

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

過。病脾疾。國醫不效。召楊介診之。介用大理中丸上曰。服之屢矣。介曰。疾因食冰。臣因以冰煎此藥。是治受病之原也。服之果愈。若此可謂活機之士矣。(李時珍)

【夏芥】 卽芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【夏枯花】 卽夏枯草之處方用名。詳『夏枯草』條。

【夏枯草】

命名 本品夏至後卽枯。故名。

處方用名 夏枯花。

古籍別名 夕句乃東(本經)燕面(別錄)鐵色草(綱目)血見愁。豬屎草。(雲南)靈蜜。靈矣。蜜筋骨草。四牛。鼠草。(和漢藥考)

外國名稱 Herba Brunellae Herb. Brunell.(拉丁)

基本 屬唇形科夏枯草之葉莖。

產地 凡山野原澤間。多有生焉。陳仁山藥物生產辨云。夏枯草產廣東北江、星子、樂昌、連州等。江浙各省均有出產。

形態 夏枯草爲山野自生之宿根草。莖作方形。高五六寸。葉對生。作長橢圓形。前端尖。邊緣有鋸齒。葉腋多毛茸。於莖頂葉腋叢生淡紫色或白色唇形花。後結實。此草至夏枯死。故有夏枯草之名。尙有滁州夏枯草。爲山野自生之唇形科植物。穗輪草 Brunnellae Vulgaris, L. 莖方形。高一尺許。葉對生。類薄荷而稍尖。葉莖俱生毛茸。莖頂列生淡紫色或白色唇形花。作穗狀。如矢鏃。故名。藥用混充夏枯草。



夏枯草

採取 四月間採之。

製法 採得陰乾。取葉莖用。亦有用其花者。

性質 苦。辛。寒。無毒。

效能 清肝火。散鬱結。消癭。明目。用治瘰癧。解凝藥。又爲解除子宮及陰戶黏膜炎及眼病藥。

主治 寒熱瘰癧。鼠瘻頭瘡。破癥散癭。結氣。脚腫。溼痺。輕身。

歷代記述攷證 【明】繆希雍本草經疏論夏枯草曰。夏枯草味苦辛而性寒無毒。爲治瘰癧鼠瘻之要藥。入足厥陰少陽經。丹溪謂其補厥陰肝家之血。又辛能散結。苦寒能下泄除熱。故治一切寒熱。及消瘰癧鼠瘻。破癥散癭。結氣頭瘡。皆由於熱。腳腫溼痺。無非溼熱所成。熱消結散。溼去。則三證自除。而身亦輕矣。【明】李士材本草圖解論夏枯草曰。夏枯草苦辛微寒。獨入厥陰。消瘰癧散結氣。止目珠痛。此草補養厥陰血脈。又能疎通結氣。目痛瘰癧。皆係肝症。故建神功。然久用亦防傷胃。與參朮同用。方可久服無弊。【清】黃宮繡本草求眞論夏枯草曰。夏枯草辛苦微寒。按書所論治功。多言散結解熱。能治一切癭癧溼痺。目珠夜痛等症。似得以寒清熱之義矣。若屬內火。治不宜用。又業何以枯名。以其冬生而夏枯也。莖葉同用。

近人學說 張山雷曰。夏枯草之性。本經言苦辛。並無寒字。孫氏間經堂本可證。而自千金以後。皆加一寒字於辛字之下。然此草特夏至自枯。故得此名。丹溪謂其稟純陽之氣。得陰氣而卽死。觀其主瘰癧破癥散結。腳腫溼痺。皆以宣通泄化見長。必具有溫和之氣。方能消釋堅凝。疎通壅滯。不當有寒涼之作用。石頑逢原收爲苦辛。自有至理。苦能泄降。辛能疎化。汎能流通。善於宣泄肝胆。木火之鬱壅而順利。氣之血運行。凡癭瘿結氣。風寒痺着。皆其專職。丹溪謂治瘰癧。散結氣。大有補養厥陰血脈之功。樸全善謂治目珠痛夜甚點以苦寒藥。尤甚者。神效。蓋目珠係於厥陰。夜甚而遇寒藥反甚。是厥陰陰火鬱蒸不疎。自不宜直折以寒涼。反致遏郁愈劇。夏枯草能疎通肝胆之氣。木鬱達之。亦以稟純陽之氣。而散陰中結滯之熱耳。石頑謂本經言輕身者。能除腳腫溼痺。而無重着之患也。又能解內熱。緩肝火。治肝熱目赤。皆疎通厥陰氣滯之功用。久服亦傷胃。以善於宣泄反助厥陰肝木之氣也。

配合應用 ㊀明目補肝。肝虛目睛痛。冷淚不止。血脈痛羞明怕日。夏枯草半兩。香附子一兩。爲末。每服一錢。臘茶湯調下。(簡要濟

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

業方）

㈡治赤白帶下。夏枯草花開時採。陰乾爲末。每服二錢。米飲下。食前服。（徐氏家傳方）

㈢治血崩不止。夏枯草爲末。每服方寸匕。米飲調下。（聖惠方）

㈣治產後血暈。心氣欲絕者。夏枯草搗絞汁。服一盞大妙。（徐氏家傳方）

㈤治撲傷金瘡。夏枯草口嚼爛。署上即愈。（衛生易簡方）

㈥治汗斑白點。夏枯草煎濃汁。日日洗之。（乾坤生意方）

㈦治瘰癧馬刀。不問已潰未潰。或日久成漏。用夏枯草六兩。水二鍾。煎七分。食遠溫服。虛甚者則煎汁熬膏。服并塗患處。兼以十全大補湯。加香附、貝母、遠志尤善。此物生血。乃治瘰癧之聖藥也。其草易得。其功甚多。（薛己外科經驗方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛胃弱而無鬱結者禁用。土瓜爲之使。

參攷資料 ㈠本草言夏枯草大治瘰癧。散結氣。有補養厥陰血脉之功。而不言及觀其退寒熱虛者可使。若實者以行散之藥佐之。外以芡葉灸亦漸取效。（朱震亨）㈡黎居士易簡方。夏枯草治目疼。用沙糖水浸一夜。用取其能解內熱。緩肝火。樓全善云。夏枯草治目珠疼至夜甚者神效。或用苦寒藥點之反甚者。亦神效。蓋目珠連目本屬厥陰之經。夜甚及點苦寒藥反甚者。夜與寒亦陰故也。夏枯草純陽之氣。補厥陰血脉。故治此如神。以陽治陰也。（李珍時）㈢生平澤冬至後生葉。似旋覆。三月四月開花。作穗紫白色。似丹參花。結子亦作穗。五月便枯。四月採之。（蘇恭）㈣原野間甚多。苗高一二尺許。其莖微方。葉對節生。似旋覆葉而長大。有細齒。背白多故莖端作穗。長一二寸。穗中開淡紫小花一穗有細子四粒。丹溪云無子。亦失察矣。嫩苗瀹過浸去苦味。油鹽拌之可食。（李時珍）㈤本經專治寒熱瘰癧。以辛能散結。苦能除熱。而瘰結癭氣散矣。胃輕身者。脚腫溼痺愈。而無重著之患也。（蘇石頑）㈥夏枯草本經以爲苦寒。而樓全善謂目珠疼痛。及點苦寒藥更甚者夜與寒皆陰也。此物冬至生。夏至枯。氣稟純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱鬱肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脉之功。殆能散而又能補者歟。（盧鵬飛）

【夏枯草露】

基本 本品係夏枯草蒸取之露。

主治 瘰癧風瘰。目痛羞明。

【夏草冬蟲】

即冬蟲夏草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『冬蟲夏草』條。

【夏菊】

即旋覆花之古籍別名。典見綱目。詳『旋覆花』條。

【夏臺】

基本 夏臺爲澤草類。可供藥用。

主治 濟絕氣。治百病。

參攷資料 ㈠夏臺與艾相類。祇供鍼灸家所用。不宜服食。（醫學大辭典）㈡艾名冰臺。此名夏臺。灸治百病。能回絕氣。治百病。濟絕氣。恐是一物重出也。（李時珍）

【夏橘】

即金橘之古籍別名。典見廣州志。詳『金橘』條。

【夏臺】

即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【奚毒】

即草烏頭之古籍別名。典見本經。詳『草烏頭』條。

【娑羅子】

即天師栗之古籍別名。典見綱目。詳『天師栗』條。

【宮粉】

㈠即白粉之古籍別名。典見綱目。詳『白粉』條。㈡即白粉之處方用名。詳『白粉』條。

【宮粉菜】

即山茱花之古籍別名。典見綱目。詳『山茱花』條。

【害母草】

即鬼白之古籍別名。典見圖經本草。詳『鬼白』條。

【宵燭】

即釜火之古籍別名。典見古今注。詳『釜火』條。

【家母藤】

即葛公藤之古籍別名。典見葛祖方。詳『葛公藤』條。

【家芥子】

即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【家苧】

即苧麻之古籍別名。典見綱目。詳『苧麻』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【家茵陳】卽茵陳蒿之古籍別名。典見和漢藥考詳『茵陳蒿』條。

【家菊】卽菊之古籍別名。典見本草拾遺詳『菊』條。

【家雁】卽鵝之古籍別名。典見綱目詳『鵝』條。

【家鄉肉】卽嘉香肉之別名。典見綱目拾遺詳『嘉香肉』條。

【家鳧】卽鴨之古籍別名。典見綱目詳『鴨』條。

【家蔆】卽菱之古籍別名。典見綱目詳『菱』條。

【家豬脂】卽豬脂之古籍別名。典見和漢藥考詳『豬脂』條。

【家貓】卽貓之古籍別名。典見綱目詳『貓』條。

【家孽】卽草豆蔻之古籍別名。典見和漢藥考詳『草豆蔻』條。

【家蘇子】卽紫蘇子之處方用名。詳『紫蘇子』條。

【射工】卽溪鬼蟲之古籍別名。典見本草拾遺詳『溪鬼蟲』條。

【射干】命名 本品莖梗疎長。正如射之長竿之形狀。故名。

古籍別名 烏扇。烏蒲。(本經) 烏翣。烏吹。紫蝴蝶。(俗名) 草薑。(別錄) 鳳翼。(拾遺) 鬼扇。仙人掌。紫金牛。(土宿) 野萱花。扁竹。(綱目) 黃遠。(吳普) 玉燕。夜干。爵干。爵乾。地扁竹。秋蝴蝶。扁筑。鬼前。(和漢藥考) 白花射干。(本草集註)



射干

外國名詞 Pardanthus sinensis.(拉丁)

基本 屬鳶尾科。爲射干之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。射干原產浙江。

形態 射干爲多年自生之草本。其花堪供賞玩。然實係毒草。莖高約二三尺。葉似菖蒲。宛如廣闊之劍。而葉端極尖銳。葉脈平行。各葉兩行密排。狀若展大之羽扇。夏月葉間忽抽一莖。更分數枝。頂端開六瓣大片之花。色帶黃紅。被有深紫色之斑點。實爲橢圓形之蒴果。後乃腹裂。而散出黑色之種子。根似良薑而瘠。其內色白。外則黃白。叢生鬚根。味辛。

種類 莖梗疎長。狀如射之長者。射干也。莖短葉側相比而如扇者。烏扇也。

採取 二三月或八九月間採根。去皮。日乾。

製法 雷敩曰。凡使射干。採根。先以米泔水浸一宿。漉出。然後以鹽竹葉煮之。從午至亥。日乾用。

性質 苦。平。有毒。

效能 瀉火。解毒。散血。消痰。用治咽喉腫痛及水腫吐酸藥。

主治 欬逆上氣。喉痺。咽痛不得消息。散結氣。腹中邪逆。食飲大熱。(本經) 療老血在心脾間。欬唾言語。氣臭。散胸中熱氣。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論射干曰。苦酒摩塗毒腫。【唐】甄權藥性本草論射干曰。治疰氣。消瘀血。通女人月閉。【宋】大明日華諸家本草論射干曰。消痰破癥結。胸膈滿。腹脹氣喘。痃癖。開胃下食。鎭肝明目。【宋】寇宗奭本草衍義論射干曰。治肺氣喉痺。爲佳。【金】張元素珍珠囊論射干曰。去胃中癰瘡。【元】朱震亨本草衍義補遺論射干曰。利積痰痼毒。消結核。【明】李時珍本草綱目論射干曰。降實火。利大腸。治癰毋。【明】繆希雍本草經疏論射干曰。射干辛而有毒。故本經謂其味苦平有毒。平亦辛也。別錄微溫。保昇微寒。二說一義。並無異云。潔古云。味苦入手少陽少陰厥陰。經苦能下洩。故善降。兼辛。故善散。故主欬逆上氣。喉痺。咽痛不得消息。散結氣。胸中邪逆。既降且散。益以微寒。故主食飲大熱。別錄又主老血在心脾間。欬唾言語。氣臭。散胸中熱氣。甄權主疰氣。消瘀血。主女人月閉。日華子主消痰。破癥結。胸膈滿。腹脹。氣喘。痃癖。寇宗奭喘。爲佳。潔古主胃中癰瘡。皆此意也。丹溪主行太陰厥陰之積痰。使結核自消。甚捷。又治足厥陰濕氣下流。因疲勞而發。便毒悉取其洩熱散結之力耳。故古方治喉痺咽痛。爲要藥。【清】黃宮繡本草求眞。論射干曰。射干形如烏羽。烏扇。又以烏羽烏扇爲名。辛苦微寒。書載瀉火解毒。散血消痰。然究毒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之所胎。血之所聚。痰之所積。又皆因火結聚而成。射干苦能降火。寒能勝熱。兼因味辛上散。俾火降熱除。而血與痰與毒。無不因之而平矣。是以喉痺咽痛結核。疝癥便癰癘毋等症。因於老血結於心脾。痰涎積於太陰厥陰者。無不可以調治。如金匱之治欬氣之用射干麻黃。治癘毋鱉甲煎丸用烏扇燒過。千金之治喉痺用烏骨膏。治便毒之用射干。同生薑煎。皆取性善主降。功多於上服則必瀉之意。若脾胃虛寒切忌。泔浸煮熟炒用。

近人學說 張山雷曰。本經謂不得消息。當作不得息。言其喘逆氣急。不得呼吸之常度也。古醫書言喘逆。不得息甚多。本草經此條作不得消息。義不可解。恐係衍文。雖舊本皆有消字。甚覺無謂。又曰射干苦降。而能開泄頑痰。瘀血散結。定逆。其功頗多。故別錄謂爲徵溫。石頑加以辛字。然熱痰寒飲。喘逆上氣。皆能治之。則皆以苦降爲主。固不必恃其爲溫。且射干之主治。雖似不一。實則降逆開痰。破結泄熱二語。足以概之。所以韓保昇謂之微寒。而瀕湖、景岳又徑以爲寒。究之下氣通滯。亦不係乎寒涼。本經苦平。最是至當不易。其所列之主治。則開泄定逆而已。至名醫別錄。則增益破瘀一層。其主咳唾言語。氣臭。亦肺胃蘊熱之病也。甄權稱其消瘀血。通婦女月閉。日華謂其消痰。破癥結痃癖。胸脇滿。腹脹。張潔古謂其去胃中癰瘡丹溪謂其利積痰疝毒。消結核。瀕湖稱其降實火。利大腸。治癘毋。陶弘景謂苦酒磨塗。可消腫毒。石頑謂散結降氣。爲咽喉痛要藥。能降相火。火息則血散腫消。而痰結自解。實而言之。開通泄降四字盡之矣。

配合應用 ㊀入鼈甲煎丸。治癘毋。

㊁治咽喉腫痛。用生射干、豬脂各四兩。合煎令焦。去滓。每噙棗許。即差。（袖珍方）

㊂治喉痺不通。用扁竹新根。擂汁嚥之。大腸動。即解。或酷研汁噙。逆上氣。皆能治之。則皆以苦降爲主。固不必恃其爲溫。且射干之主治。雖似不一。實則降逆開痰。破結泄熱二語。足以概之。所以韓保昇

方）

㊃治乳癰初腫。用扁竹根如僵蠶者。同萱草根爲末。鹽調敷之。神效。（永類鈐方）

㊄治喉痺有鳥翼膏。（孫眞人千金方）

㊅治咽喉腫痛。射干花根、山豆根、陰乾爲末。吹之。如神。（袖珍方）

㊆治傷寒咽閉腫痛。用生射干、豬脂各四兩。合煎令膏。去滓。每噙棗許。即瘥。（龐安常傷寒論方）

㊇治二便不通。諸藥不效。紫花扁竹根生水邊者佳。研汁一盞。服。即通。（普濟方）

㊈治水蠱腹大。動搖水聲。皮膚黑。用鬼扇根搗汁服一盃。即下。（肘後方）

㊉治陰疝腫刺。發時腫痛如刺。用生射干搗汁與服。取利。亦可丸服。（肘後方）

㊊治中射工毒生瘡者。烏翼、升麻各二兩。水三升。煎二升。溫服。以滓傳瘡上。（姚僧垣集驗方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡虛而無實火者禁用。

著名方劑 射干麻黃湯。治欬而上氣。喉中作水鷄聲。此湯主之。（金匱方）射干十三枚。一法三兩。麻黃、生薑各四兩。紫菀、款冬花各三兩。五味子半升。細辛三兩。半夏八枚。一法半升。大棗七枚。上九味。以水一斗二升。先煮麻黃兩沸。去上沫。納諸藥。煮取三升。分溫三服。

參攷資料 ㊀治便毒。此足厥陰濕氣因疲勞而發。取射干三寸。與生薑同煎。食前服。利三兩行。甚效。（朱震亨）㊁射干能降火。故古方治喉痺咽痛爲要藥。孫眞人千金方。治喉痺有鳥翼膏。張仲景金匱玉函方。治欬而上氣。喉中作水鷄聲。有射干麻黃湯。又治癘毋鼈甲煎丸。亦用烏扇燒過。皆取其降厥陰相火也。火降。則血散腫消。而痰結自解。癥瘕自除矣。（李時珍）㊂其葉叢生橫鋪一面。如烏翅及扇之狀。故有烏扇、烏翼、鳳翼、鬼扇、仙人掌諸名。俗呼扁竹。謂其葉扁生而根如竹也。根葉又如蠻薑。故曰草薑。（李時珍）㊃射干、鳶尾二物相似。人多不分。射干即人間所種爲花草名鳳翼者。葉如鳥翅。秋

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

生紅花赤點。鳶尾亦人間所種。苗低下於射干。狀如鳶尾。夏生紫碧花者是也。（陳藏器）㊂射干根潤形似高良薑。大小赤黃色。淡硬五六七八月採。（大明）㊃今在處有之。人家種之。春生苗。高一二尺。葉大。類蠻薑而狹長。橫張。疎如翅羽狀。故名烏翼。葉中抽莖。似薑草莖而強硬。六月開花。黃紅色。瓣上有細文。秋結實作房。中子黑色。一說射干多生山崖之間。其莖雖細小。亦類木。故荀子云。西方有木。名曰射干。莖長四寸。生於高山之上是也。（蘇頌）㊄射干。即今扁竹也。今人所種多是紫花者。呼爲紫蝴蝶。其花三四月開。六出。大如萱花。結房大如拇指。顏似泡桐子。一房四隔。一隔十餘子。子大如胡椒。而色紫。極硬。咬之不破。七月始枯。陶弘景謂射干鳶尾是一種。蘇恭、陳藏器謂紫碧花者是鳶尾。紅花者是射干。韓保昇謂黃花者是射干。蘇頌謂花紅黃者是射干。白花者亦其類。朱震亨謂紫花者是射干。紅花者非各執一說。何以憑依。謹按張揖廣雅云。鳶尾。射干也。易通卦驗云。冬至射干生。土宿眞君本草云。射干即扁竹。葉扁生如側手掌形。莖亦如之。青綠色。一種紫花。一種黃花。一種碧花。多生江南湖廣川澥平陸間。八月取汁。煮雄黃伏雌黃。制丹砂。能拒火。據此則鳶尾射干。本是一類。但花色不同。正如牡丹芍藥與菊花之類。其色各異。皆是同屬也。大抵入藥功不相遠。（李時珍）㊅射干之名有三。佛經射干貂鼠。此是惡獸。似青黃狗。食人能緣木。阮公云。射干臨層城者。是樹。殊有高大者。本草射干是草。即今人所種者也。（陳藏器）

【射父香】即麝香之古籍別名。見爾雅。詳『麝香』條。

【射罔】

性質 苦。有大毒。

主治 尸疰癥堅。及頭中風痒。

歷代記述 【唐】陳藏器 本草拾遺論射罔曰。癢痒根結核。瘕癰毒腫。及蛇咬。先取塗肉四畔。漸漸近瘡。習逐病至骨瘡有熱膿及黃水塗之。若無膿水有生血。及新傷破。即不可塗。立殺人。

參攷資料 ㊀人中射罔毒。以甘草、藍汁、小豆葉、浮萍、冷水、薺苨皆可。一味絞之。（大明）㊁草烏頭、射罔乃至毒之藥。非若川烏頭、附子人所栽種。加以釀制。殺其毒性之比。自非風癉急疾。不可輕投。甄權藥性論言。共益陽事。治男子腎氣衰弱者。未可遽然也。此類止能搜風勝溼。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒而已。豈有川烏頭、附子補右腎命門之功哉。吾蘄郝知府自貢知醫。因病風癱。服草烏頭、木鼈子藥過多。甫入腹而麻痺。遂至不救。可不愼乎。權曰。烏喙形如烏嘴。其氣鋒銳。宜其通經絡。利關節。尋蹊達徑。而直抵病所。煎爲射罔。能殺禽獸。非氣之鋒銳捷利。能如是乎。楊清叟曰。凡風寒溼痺。骨內冷痛。及損傷入骨。年久發痛。或一切陰疽腫毒。並宜草烏頭。南星等。少少加肉桂爲末。畫汁熱酒調塗。未破者能內消。久潰者能去黑爛。二藥性味辛烈。能破惡塊。逐寒熱。遇冷即消。遇熱即潰。（李時珍）

【射罔】即草烏頭煎汁之別名。見本草拾遺。詳『草烏頭』條。

【射香】即麝香。詳『麝香』條。

【射香榮】即前胡之古籍別名。見和漢藥考。詳『前胡』條。

【射影】即溪鬼蟲之古籍別名。見陸璣詩疏。詳『溪鬼蟲』條。

【射粉】即輕粉之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『輕粉』條。

【峯子油】即豚脫脂之古籍別名。典見綱目。詳『豚脫脂』條。

【峯眞王】即白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【師系】

古籍別名 臣堯。巨骨。

基本 師系爲雜草類之一種。可供藥用。

產地 生平澤中。

採取 八月採。

性質 甘。無毒。

主治 癰腫惡瘡。煮洗之。

【師姑草】即王瓜之古籍別名。典見土宿本草。詳『王瓜』條。

【席草】即燈心草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『燈心草』條。

【徐李】

本草綱目

產地 生山之陰。

形態 徐李爲雜木類之一種。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

樹如李而小。其實青色。無核。乃無核李也。其實可供藥用。

採取 實熟時採之。

主治 益氣。輕身延年。

【徐長卿】 **命名** 徐長卿者。人名也。彼常以此藥治邪病。遂以名之。

古籍別名 鬼督郵。(本經)石下徐長卿。(別錄)別仙蘗。(圖經)鈴柴胡。(日本)

外國名詞 Pyenostelma chinensis, Bge.(拉丁)スズサイユ(日本)

基本 係蘿藦科徐長卿屬之根。

產地 在山谷川澤溼地。

形態 徐長卿爲山草類之自生林野草本。莖高二三尺。細而剛。葉對生。作線狀披針形。無鋸齒。夏月自梢端及葉腋抽枝。開花。花形甚小。淡黃綠色。副冠爲五鱗片所成。著於雄蕊之上。蒴之各室有一花粉塊下垂。花後結子。其根橫生如細辛。微粗。色黃而有腥氣。可供藥用。

採取 三四月間採之。

製法 雷敩曰。凡採得粗杵。拌少蜜令遍。以磁器盛。蒸三伏時。日乾用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 鬼物百精蠱毒。瘧疾邪惡氣。溫瘧。久服强悍輕身。(本經)益氣延年。又曰。石下長卿。主鬼疰精物邪惡氣。殺百精蠱毒。老魅注。易亡走啼哭悲傷恍惚。(別錄)

參攷資料 ㊀抱朴子言上古辟瘟疫有徐長卿散良效。今人不知用此。(李時珍)㊁鬼督郵之名甚多。今俗用徐長卿者。其根正如細辛。小短扁扁爾。氣亦相似。今狗脊散用鬼督郵者。取其强悍宜腰腳。故知是徐長卿。而非鬼箭赤箭也。(陶弘景)㊂徐長卿生泰山山谷及隴西三月採。又曰。石下長卿。生隴西山谷池澤。亦三月採。(別錄)㊃所在川澤多有之。葉似柳。兩葉相當。有光澤。根如細辛。微粗長。黃色而有臊氣。今俗以代鬼督郵非也。(蘇恭)㊄生下溼川澤之間。苗似小桑。兩葉相對。三月苗青。七八月着子。似蘿藦子而小。九月苗黃。十月凋。八月採根。日乾。(韓保昇)㊅鬼督郵及已之亂杜衡。其功不同。苗亦不同也。徐長卿之亂鬼督郵。其苗不同。其功同也。杜衡之亂細辛。則根苗功用皆彷彿。乃彌近而大亂也。不可不審。(李時珍)

【徐黃】 **產地** 生水澤中。

形態 徐黃爲芳草類之一種。莖大葉細。香如薰。本莖可供藥用。

性質 辛。平。無毒。

主治 心腹積癥。治惡瘡。

【徑松】 即羅漢松之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『羅漢松』條。

【息王藤】 **產地** 生山谷間。

形態 息王藤爲蔓草類之一種。四時常青。凌冬不凋。可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 產後腹痛。惡露不盡。濃煮汁服。

【拳參】 **外國名詞** Tbiaqma Bistortae (拉丁)

基本 屬蓼科。爲金線蓼類之地下莖。

產地 凡山野陰溼之地。恒多生焉。



拳參

形態 拳參爲多年生草本。莖高二尺。葉作廣披針形。下部之葉。概有長柄。夏月梢上開小花。六瓣。色淡紅或白。簇生爲穗狀花序。葉與莖之連者。堪作食品。其地下莖。卽謂之拳參。色黑褐。長七分至二寸。肥大而扁平。粗如小指。下面梢稍凸隆。副根如髯鬚。或留瘢痕。上面凹陷。有溝一條。隨葉痕而生橫溝。一端彎曲。狀如海蝦。味有收斂性。

採取 五月採之。

成分 含有一種鞣酸。餘則澱粉等質也。

效能 專作收斂藥。

主治 爲末。淋漓腫氣。

國外學說 日本學說謂拳參者。生於中國。日本之高山。爲肥大之地下莖也。其形狀如海蝦。成分爲單寧酸。澱粉等。有收斂之效。但

13／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

內服不可不注意。又爲含漱藥。能固齒於矢筒見陪苦口中諸病用之有驗於慢性痔疾。黏液漏洩。及其他慢性咽喉炎及帶下等之局所用之。然現今能用者甚稀。又荷蘭藥鏡曰拳參多採於山野間。藥肆呼爲金線重繕。但陳久者不堪入藥。根之性質功效。與篤爾緜望拉同。爲最有效之收斂藥。凡諸管纖維因虛弱而弛緩之病。如久瀉失血稀液脫泄各症。俱治之。尿道滑液膜剝脫而小便淋痛。及經久無毒之淋病。白帶下亦治之。患間歇熱腐敗熱。以此藥加對症之劑。夙稱奇效。散劑用一錢至三錢。或加煎劑。或加苦味之越幾斯劑。製爲丸藥。或徑用越幾斯劑。均各從其便。煎劑取根一兩。水煎取用。以此根外敷。善治咽喉潰瘍。作含漱藥。功效卓著。

用量 七分至二錢。

參考資料 生淄州田野。葉如羊蹄。根似海鍛。黑色。土人五月採之。(蘇頌)

【拳參】卽紫參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫參』條。

【拳黃雞子】**古籍別名** 水蘿蔔(綱目拾遺)

基本 拳黃雞子爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 霍亂吐瀉並癘疾嘔碎水飲下。

【振靈香】卽返魂香之古籍別名。典見海藥本草。詳『返魂香』條。

【挾火】卽螢火之古籍別名。典見吳普本草。詳『螢火』條。

【挾劍豆】卽刀豆之古籍別名。典見綱目。詳『刀豆』條。

【致神】卽桑螵蛸之古籍別名。典見別錄。詳『桑螵蛸』條。

【旁巨芋】卽芋子之古籍別名。典見綱目。詳『芋子』條。

【旁其】卽烏桑之古籍別名。典見本草拾遺。詳『烏桑』條。

【旁通】卽刺蒺藜之古籍別名。典見本經。詳『刺蒺藜』條。

【旂那】卽番瀉葉之原名。詳『番瀉葉』條。

【旂楹】卽檀香之古籍別名。典見綱目。詳『檀香』條。

【旂檀娜】卽檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『檀香』條。

【晉鑿】卽明鑿之別名。詳『明鑿』條。

【晏青】卽斑蝥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『斑蝥』條。

【書梁】卽蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【枸核】**基本** 枸爲雜木類之一種。其核可供藥用。

採取 五月採之。

性質 苦。

主治 療水。身面癰腫。

【栗】**命名** 栗字說文作橡。從肉音條。象其花實下垂之狀。故名。

處方用名 栗實。栗子。

古籍別名 篤迦(梵書)。板栗。錐栗。茅栗。山栗。莘栗。柟栗。櫪栗。石栗(綱目)。芧栗(莊子)。

外國名稱 Castanea vulgaris. I am var.japonica, DC.(拉丁)

基本 係殼斗科栗屬。爲栗之果實。

產地 各省之山野間咸有出。

形態 栗爲落葉喬木。高四五丈。大者七八丈。葉作披針形。有鋸齒。五生。與櫟之葉相酷似。夏日開花。花小。單性。雌花與雄花同株。雄花作長穗狀。花序。雌花常三花集生。包以總苞。果實爲堅果。有二三枚。在囊之殼斗內。其殼斗全面帶刺。成熟後。則殼裂。出果實。其狀大小因種類而不一。



栗

種類 栗之最大者爲板栗。栗之中心扁子者爲櫟栗。栗之稍尖者爲山栗。山栗之圓而末尖者爲錐栗。栗之圓小如棣子者爲莘栗。栗之小如指頂者爲茅栗。卽柟栗、櫪栗。栗之出於薪州山中者。一年方熟。圓如彈而皮厚。味如胡桃。爲石栗。

採取 八九月採之。風乾用。

用法 風乾者味甘。可生嚼。或煮熟供食。或生杵煅研和藥。

性質 鹹。溫。無毒。

效能 補腎氣。厚腸胃。用作滋

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

養劑。

主治　益氣。厚腸胃。補胃氣。令人耐飢。

歷代記述弦證　【唐】孫思邈千金翼論栗子曰。生食治腰腳不遂。【唐】蘇恭新修本草論栗子曰。療筋骨斷碎腫痛瘀血生嚼塗之有效。【清】黃宮繡本草求眞論栗子曰。栗腎之巢也。味鹹性溫。體重而實。故能入腎補氣。凡人胃氣虧損。而見腰胸軟弱。並胃氣不充。而見腸鳴泄瀉。服此治無不效。然須風乾。連液吞咽爲佳。作粉爲食。勝於萎癟。若使栗不風乾。或生水氣未除。食則助溼發氣生蟲。蒸炙熟食。則壅氣滯脇。而於風水之人尤忌。小兒多食。令齒不生。【清】王士雄隨息居飲食譜論栗子曰。栗甘平。補腎益氣。厚腸止瀉。耐飢。最利腰脚。解羊肉毒。辟穀濟荒。生熟皆佳。點肴竝嬾。未時嚼之。作桂花香。老者風乾則甜而嬾。同橄欖食。風味尤美。以錢塘產者良。凡食均須細嚼。連液吞嚥。則有益。若頓食至飽。反壅氣傷脾。其外感未去。痞滿積癖痢瘧產後小兒病人不飢便祕者竝忌之。以生極難化。熟最滯氣也。【清】黃元御玉楸藥解論栗子曰。栗子鹹甘入脾。補中助氣。充虛益餒。培土實脾。諸物莫逮。但多食則氣滯難消。少嗽則氣達易觸耳。生食治腰腿不遂。生嚼塗筋骨碎斷。又消腫痛。行瘀血。破痃癖。去惡刺。出箭頭。止鼻衄。斂濕利風。乾者佳。

配合應用　㊀治小兒疳瘡。用生嚼栗子傅之。亦治蠏刺入肉。（外臺祕要方）㊁治馬汗入肉成瘡者。方同上。（勝金方）㊂治馬咬成瘡。獨顆栗子燒研傅之。亦治熊虎爪傷。（醫說方）㊃治小兒口瘡。大栗煻熟。日日與食之。甚效。（普濟方）㊄治衄血不止。宣州大栗七枚。刺破。連皮燒存性。出火毒。入麝香少許。研勻。每服二錢。溫水下。（聖濟總錄方）㊅治金刃斧傷。用獨殼大栗研傅。或倉卒嚼傅亦可。（集簡方）

施用宜忌　凡脾虛消化不足。及澀熱困中者禁用。

參攷資料　㊀相傳有人患腰脚弱。往栗樹下食數升。便能起行。此是補腎之義。然應生嗽若服餌則宜蒸曝之。（陶弘景）㊁栗於五果屬水。水潦之年。則栗不熟。類相應也。有人內寒。暴洩如注。令食煨栗二三十枚。頓愈。腎主大便。栗能通腎。於此可驗。經驗方治腎虛腰脚無力。以袋盛生栗懸乾。每旦喫十餘顆。次喫猪腎粥助之。久必強健。蓋風乾之栗。勝於日曝。而火煨油炒。勝於煮蒸。仍須細嚼。連液吞嚥。則有益。若頓食至飽。反致傷脾矣。按蘇子由詩云。老去自添腰脚病。山翁服栗舊傳方。客來爲說晨興晚。三咽徐收白玉漿。此得食栗之訣也。王禎農書云。史記載秦飢。應侯請發五苑藏栗。則本草栗厚腸胃。補腎氣。令人耐飢之說。殆非虛語矣。（李時珍）㊂臭栗雖大味短。不如北栗。凡栗日中曝乾食。即下氣補益。不爾猶有木氣。不補益也。火煨去汗。亦經水氣。生食則發氣。煮蒸炒熟食。則壅氣。凡患風水人。不宜食。味鹹生水也。（孟詵）㊃小兒不可多食。生則難化。熟則滯氣。腸食生蟲。往往致病。（寇宗奭）㊄今會稽諸暨栗。形大皮厚不美。剡及始豐栗皮薄而甜。乃佳。（陶弘景）㊅栗處處有之。而兗州宣州者最勝。木高二三丈。葉極類櫸。四月開花。青黃色。長條似胡桃花。實有房。蠹大者若拳。中子三四小者若桃李。中子惟一二。將熟則罅坼子出。栗類亦多。按陸璣詩疏云。栗五方皆有之。周秦吳揚特饒。惟濮陽及范陽栗甜美。味長他方者不及也。倭韓國諸島上。栗大如雞子。味短不美。桂陽有幸栗。叢生實大。如杏仁。皮子形色與栗無異。但較小耳。又有奧栗。皆與栗同。子圓而細。惟江湖有之。或云卽莘也。莘音榛。詩云。樹之榛栗是矣。（蘇頌）㊆板栗。雞栗。二樹皆大。茅栗似板栗而細如彘子。其樹雖小。葉亦不殊。但春生夏花。秋實冬枯。爲異耳。（蘇恭）㊇湖北一種旋栗。頂圓。末尖。卽榛栗。象榛子形也。栗欲乾收。莫如曝之。欲生收。莫如澗沙藏之。至夏初。尙如新也。（寇宗奭）㊈栗但可種成。不可移栽。按事類合璧云。栗木高二三丈。苞生多刺。如蝟

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

毛。每枝不下四五個。苞有青黃赤三色。中子或單或雙或三或四。其殼生黃熟紫。殼內有膜裹仁。九月霜降乃熟。其苞自裂而子墜者。乃可久藏。苞未裂者易腐也。其花作條。大如筋頭。長四五寸。可以點燈。（李時珍）

【栗子】即栗之處方用名。詳『栗』條。

【栗子粥】**命名**　本品係用栗和米所煮成之粥。故名。

主治　補腎氣。益腰脚。

【栗毛毬】**命名**　本品即栗實外面之刺包。形圓如毬。故名。

主治　煮汁洗火丹毒腫。

【栗列】即列當之古籍別名。典見和漢藥考。詳『列當』條。

【栗果】即橡櫟之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橡櫟』條。

【栗花】**主治**　瘰癧。

【栗莢】**基本**　本品即栗實內之薄皮也。

性質　甘。澁。平。無毒。

主治　搗散和蜜塗面。令光。去皺紋。

【栗殼】**基本**　本品即栗實外面之黑殼。

性質　甘。澁。平。無毒。

反胃消渴。煮汁服。

記述攷證　【宋】大明諸家本草論栗殼曰。煮汁飲。止瀉血。【清】趙學敏本草綱目拾遺論栗殼曰。解人參煎湯服之。解參之力。勝於萊菔。

【栗楔】**基本**　本品即栗實一毬三顆中之扁者。

主治　筋骨風痛。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論栗楔曰。活血充效。今衡山合活血丹用之。【宋】大明諸家本草論栗楔曰。每日生食七枚。破痃癖。又生嚼醫惡刺出。箭頭傅瘰癧腫毒痛。

【栗當】即列當之古籍別名。典見開寶本草。詳『列當』條。

【栗鼠】即貂鼠之古籍別名。典見爾雅。詳『貂鼠』條。

【栗實】即栗之處方用名。詳『栗』條。

【栗樹皮】**主治**　煮汁洗沙蟲溪毒。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論栗樹皮曰。治丹毒五色無常。剝皮有刺者。煎水洗之。【宋】蘇頌圖經本草論栗樹皮曰。療瘡毒。

【栗樹根】**主治**　療偏腎氣。酒煎服之。

【栘楊】即扶栘之古籍別名。典見古今注。詳『扶栘』條。

【梧子松】即海松子之一叢三葉者之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳『海松子』條。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論栗楔曰。活血充效。今衡山合活血丹用之。【宋】大明諸家本草論栗楔曰。每日生食七枚。破痃癖。又生嚼醫惡刺出。箭頭傅瘰癧腫毒痛。

【梧樓】即瓜蔞。詳『瓜蔞仁』條。

【栟拱】即枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【栟棋】即枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【栩】即櫟實子之古籍別名。典見綱目。詳『櫟實子』條。

【栭栗】即栗之古籍別名。典見綱目。詳『栗』條。

【楠李仁】即郁李仁之古籍別名。典見山海經。詳『郁李仁』條。

【梅檀草】即鬼針草之日本名。詳『鬼針草』條。

【桲栗】即栗之古籍別名。典見綱目。詳『栗』條。

【核桃】即胡桃之古籍別名。典見綱目。詳『胡桃』條。

【核桃肉】即胡桃之處方用名。詳『胡桃』條。

【根子】即筋子之古籍別名。典見本草拾遺。詳『筋子』條。

【根韭】即黃瑞之古籍別名。典見吳普本草。詳『黃瑞』條。

【格注草】**產地**　生山澤中。

形態　格注草爲毒草類之一種。葉似藪。根如紫草根。一株有二十許根苗。可供藥用。

採取　二月八月採根。五月六月採苗。日乾用。

性質　辛。苦。溫。有大毒。

主治　蠱疰諸毒疼痛。

【栽秧薦子】即覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳『覆盆子』條。

【桀步】即蟹之古籍別名。典見綱目。詳『蟹』條。

【桂】即肉桂之原名。詳『肉桂』條。

【桂丁】**形態**　桂丁即肉桂之子實。狀如吳萸。莫可供

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藥用。

主治　辟寒邪。止心痛。胃痛。研細酒下。

【桂心】卽肉桂之處方用名。詳『肉桂』條。

【桂耳】**命名**　本品係多年老桂樹上蒸出之蕈。色紅。狀如木耳。故名。

主治　一切血症。

【桂府滑石】卽滑石產於山東蓬萊縣境之桂府村者。與見綱目。詳『滑石』條。

【桂林滑石】卽滑石產於廣西舊桂林府境者。與見綱目。詳『滑石』條。

【桂枝】**處方用名**　川桂枝。盤桂枝。蜜炙桂枝。

古籍別名　牡桂枝(本經)

外國名詞　Cortex Cinnamomi(拉丁)

基本　桂枝屬於樟科之桂。其新幹及枝之外皮。剝下陰乾。卽桂枝也。

產地　陳仁山藥物生產辨云。桂枝產廣東肇慶六屬。羅定等處。酒綸出者爲最。幼世界產額。以我國之廣西。西川。及東印度安南諸地爲最夥。

形態　桂爲常綠喬木。自生於中國之南部及交趾。其他熱帶地方。則栽植之。樹幹高大。作灰色。外皮多而易聾裂。所謂桂皮是也。其皮香味甚烈。嫩枝作受壓狀。具有四稜。其莖柄與花穗之分枝。色均灰白。或帶黃。覆以軟毛。葉如皮革。作長卵圓形。有尖端。多係互生。至枝端則對生。長八仙米十至八仙米。廣二仙米至六仙米。葉皆有柄。長八密米。生有脈紋三條。面色綠有光澤。其網絡俱凹陷。背帶褐綠色。有極短之軟毛。香氣亦甚。花穗直立如軸。其末端之華穗。約有花三朵。花苞頗小。僅四密米。色帶黃白。覆以絹毛。其底部形如圓板。爲卵圓形之片。雄蕊附著於花苞之喉口。其數不定。多作三四螺旋線。在內者爲有生殖性之粉囊。粉囊分四房。疊積爲兩層。其生殖性雄蕊具有柄。梗或坐立。雌蕊較細。柱頭亦如圓板。果實在截片底部之邊緣。有彎裂六條。實爲漿果。被以薄皮。照最近考驗所得。謂桂枝外面現紅褐色之薄皮。闊五分許。質堅。作螺旋形。或兩邊向內卷縮。甚至卷轉如管。表面稍粗。有白色縱紋。皆隱隱隆起。裏面現褐色。亦不平滑。破折之處。幾盡平坦。不作纖維狀。味芳香。異常辛味。峻烈。桂皮乃剝取桂樹莖幹之皮。晒乾而成。厚自一密米至三密米。外面灰褐色或褐色。以顯微鏡檢視其橫斷面。則見其柔軟組織多含澱粉粒。其內面之石核細胞環層。在中斷。外伴纖維束。而石核細胞之膜壁。其厚薄又每個不同。大都在內者厚。在外者薄。再觀皮部。則處處有厚膜纖維。此纖維長皆〇・七密米。粗〇・〇一五・至〇・〇三密米。並見有油細胞及黏液細胞。體線概爲二細胞列。含有澱粉粒及細微之蓚酸鹽結晶。皆爲細長菱形。

種植　此樹不種苗。乃植其小樹。移種山腹。先灌糞水。後再堆肥。約經五六年。發育最爲旺盛。十年後始可採取其皮。

採取　每年於二月八月時間。提取其根。浸於水中。纔東洗淨其泥。檮木作槌。擊樹幹。令可剝取外皮。以鑲刀切尺許長。凡剝取桂皮一片。卽以竹片張於內面。攤麗廣上。置日中晒二三日。俟乾。則成暗褐單卷之根皮。長廣不等。梢枝則先去葉。亦斷爲尺許。剝取外皮。卽桂枝也。

製法　或以蜜炙。或以清炙。及白芍拌用。

性質　甘。微溫。無毒。

成分　中含揮發桂油(桂皮油)一・〇至一・五%。餘則爲樹脂。護謨。黏液質。糖質。單寧酸等。桂皮油(Oleum Cinnamomi.)有桂皮固有之芳香。質澄明而稍濃稠。色帶黃或黃褐。性善揮發。起酸性之反應。比重一・〇四至一・〇七。味如燒灼。酒精。伊打。哥喱仿。姆冰醋酸等能溶解之。其中含有桂亞爾台希度($C_6H_5=CH=CH=COH$)。台爾品($C_{10}H_{14}$)。及桂皮酸等。

效能　發汗解肌。溫經通絡。用爲治衝逆之要藥。

作用　桂枝之醫治作用。以桂枝有發汗解熱及止汗作用。鎮靜

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鎮痙鎮痛作用。亢奮强心强壯作用。祛痰作用。健胃驅風作用。疏通瘀血通經催產及下胎盤死胎之作用。利尿作用。矯味矯臭作用。則桂枝之主要成分。因含有桂枝油及揮發油。故藥物學所載揮發油之醫治作用。可謂卽桂枝之醫治作用也。

主治 上氣欬逆。結氣喉痺。吐吸。利關節。補中益氣。久服通神。輕身不老。（本經）心痛。脇痛。脇風。溫筋通脈。止煩出汗。（別錄）

張仲景之發明 桂枝一味。經張仲景之實驗。認爲主治衝逆。旁治奔豚頭痛。發熱惡風。汗出身痛等症。茲考徵如下。㈠桂枝加桂湯證曰。氣自少腹上衝心。（以上一方。桂枝五兩）㈡桂枝甘草湯證曰。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按。㈢桂枝甘草附子湯證。（此方於桂枝甘草湯而加附子。桂枝甘草湯條。有上衝證。然此湯亦當有上衝證。）㈣苓桂甘棗湯證曰。欲作奔豚。㈤苓桂五味甘草湯證曰。氣從少腹下衝胸咽。桂枝附子湯證。桂枝附子湯用桂枝多於桂枝加附子湯。而無上衝證。蓋闕文也。桂枝加附子湯條。猶有桂枝之證。況於此湯。而可無桂枝之證乎。（以上五方。桂枝皆四兩）㈥桂枝湯證曰。上衝。又曰。頭痛發熱。汗出惡風。㈦苓桂朮甘湯證曰。氣上衝胸。（以上二方。桂枝皆三兩）歷觀此諸方。桂枝主治衝逆也明矣。頭痛發熱之輩。其所旁治也。仲景之治疾。用桂枝者。居十之七八。今不枚舉焉。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論桂枝曰。去冷風疼痛。【金】張元素珍珠囊論桂枝曰。去傷風頭痛。開腠理。解表發汗。去皮膚風溼。【元】李東垣用藥法象論桂枝曰。橫行手臂。以其爲枝也。氣薄則發洩。故桂枝上行而解表。氣厚則發熱。故肉桂下行而補腎也。【清】楊時泰本草述鉤元論桂枝曰。桂枝性輕揚。能行上焦頭目。通手臂肢節。調營血和肌表。除傷風頭痛。肢節痛風。去皮膚風溼。散下焦蓄血。直行爲奔豚之先導。（奔豚爲腎氣。腎氣出膀胱。）橫行爲手臂之引經。世醫不悟桂枝實表之義。幾以此味爲能補衞而密腠理。若然。何以不用參芪耶。夫四時之風。因於四時之氣。冬月寒風。衞爲所併。不能爲營氣之固。而與之和。故汗出。惟桂枝辛甘。能散肌表寒風。又通血脈。故合於芍藥。由衞之固以達營。使共相和。而肌解汗止。又能去下焦蓄血。上焦蓄血多因熱氣上逆。血不循經。所致。非若下焦蓄血。則是寒氣冰凝。血不流行而蓄也。故散以桂枝辛熱之氣。仲景桃仁承氣湯中用之。【清】鄭澍本經疏證論桂枝曰。（上略）蓋其用之之道有六。曰和營。曰通陽。曰利水。曰下氣。曰行瘀。曰補中。其功之最大。施之最廣。無如桂枝湯。則和營其首功也。夫風傷於外。壅遏衞氣。衞中之陽與奔逆相逐。不得不就近曳營氣爲助。是以營氣弱。衞氣强。當此之時。又安能不調和營氣。使散陽氣之鬱遏。逐邪氣之相併耶。【清】黃宮繡本草求眞論桂枝曰。桂枝保肉桂枝梢。其體輕。其味辛。其色赤。有升無降。故能入肺而利氣。入膀胱化氣而利水。且能橫行於臂。調和營衞。治痛風脇風。止煩出汗。驅風散邪。爲解肌第一要藥。故書皆言無汗能發。有汗能收。然其汗之能發。止是因其衞實營虛。陰被陽湊。故用桂枝以調其營。營調則衞氣自和。而風邪莫容。遂自汗而解。非若麻黃能開腠理以發其汗也。其汗之能收止。因衞受風傷。不能內護於營。營氣虛弱。津液不固。故春汗發熱而惡風。其用桂枝湯爲治。取其內有芍藥。入營以斂陰。外有桂枝。入衞以【原】卻。則汗自克見。止非云桂枝能閉其汗孔。昧者不察。謂桂枝發汗止汗。是何意哉。徒以順口虛喝。其失遠矣。【清】葉天士本草經解論桂枝曰。桂氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味辛無毒。得地西方潤澤之金味。入手太陰肺經。氣味俱升。陽也。肺爲金臟。形寒飲冷則傷肺。肺傷則氣不下降。而病上氣欬逆矣。桂性溫。溫肺。肺溫則氣下降。而欬逆止矣。結氣喉痺吐吸者。痺者。開也。氣結於喉。閉而不通。但吐而不能吸也。桂辛溫。散結行氣。則結者散。而閉者通。不吐而能吸也。辛則能潤。溫則筋脈和而關

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

節利矣。中者。脾也。辛溫則暢達肝氣。而脾經受益。所以補中益氣者。肺主氣。肺溫則真氣流通而受益也。久服通神輕身不老者。久服則辛溫助陽。陽氣常伸而靈明。陽盛而身輕不老也。【清】張隱菴本草崇原論桂枝曰。桂木凌冬不凋。氣味辛溫。其色紫赤。水中所生之木火也。肺腎不交。則爲上氣欬逆之證。桂啓水之生陽。上交於肺。則上氣平而欬逆除矣。結氣喉痺者。三焦之氣不行於肌腠。則結氣而爲喉痺。桂稟少陽之木氣。通利三焦。則結氣通而喉痺可治矣。吐吸者。吸不歸根。卽吐出也。桂能引下氣與上氣相接。則吸入之氣。直至丹田而後出。故治吐吸也。關節者。兩肘兩腋兩髀兩膕皆機關之室。周身三百六十五節。皆神氣之周行。桂助君火之氣。使心主之神。而出入於機關。游行於骨節。故利關節也。補中益氣者。補中焦氣而益上下之氣也。久服則陽氣盛而光明。故通神明。三焦通會元眞於肌腠。故輕身不老。【清】陳修園本草經讀論桂枝曰。桂。牡桂也。牡陽也。卽今之桂枝、桂皮也。菌根也。菌桂。卽今之肉桂厚桂也。然生發之機。在枝幹。故仲景方中所用俱是桂枝。卽牡桂也。時醫以桂枝發表。禁不敢用。而所用肉桂。又必刻意求備。皆是爲施治不愈。卸罪巧法。

國外學說 依日本藥局方。爲芳香性健胃藥。又爲調味調香料。於慢性下痢。急性腸加答兒之末期。子宮弛緩。輕度之出血。（作用於子宮筋之力。比麥角遠弱。）可爲散劑。一日數回用〇・三至一・五。或以五・〇至一五・〇爲浸劑。一日中分服之。又集成藥物學曰。桂枝爲產於中國南部及安南樟科之樹皮。其主要成分爲桂皮油。旁含鞣酸、樹脂、橡膠等。桂枝之作用。在其揮發油與鞣酸。能亢進胃液及唾液之分泌。而奮起消化器。桂枝用於健胃驅風及子宮出血間。用爲催產藥。桂枝屬於芳香性神經藥。芳香性神經藥之通性。屬於本類者。爲因含有揮發油。而有效之植物及動物之一部分。與含有揮發油及其他香氣性不明物質。一二之動物性產物。本類之藥物。隨藥效的分類法。多屬於亢奮藥及回蘇性腦藥。往往亦依其用量之差異。而有鎭痙之效。

近人學說 ㊀曹炳章曰。傷寒金匱用桂枝。考其用意。皆屬發散肝脾而行營血。通達經絡而開皮毛。至於調經開閉。疏木止痛。通關逐痺。活絡舒筋。尤有專功。長沙藥解云。大抵雜症百出。非緣肺胃之逆。則因肝脾之陷。桂枝既宜於逆。又宜於陷。左之右之。無不宜之。凡潤肝養血之藥。一得桂枝。化陰滯而爲陽。和非羣藥所能及。惟溼熱宜辛涼。則此物應忌耳。曹拙巢曰。寒溼凝沍於肌肉。陽氣不達於外。仲師因立桂枝湯方。以扶脾陽而達營分之鬱。蓋孫絡滿佈。脾寒鬱於肌。孫絡爲之不通。非得陽氣以通之。營分中餘液。必不能蒸化而成汗。桂枝之開發脾陽。其本能也。但失此不治。溼邪內竄關節。則病歷節。或竄入孫絡而爲痛。按之不知其處。俗名寒溼流筋。其鬱塞牽涉肝臟。二證皆宜桂枝。然猶爲間接之治。若夫寒溼太甚。肝臟疎達之氣。爲溼邪所鬱。則爲腹中急痛。黃坤載以爲溼盛肝鬱。太陽篇云。陽脈濇。陰脈弦。（右爲陽。左爲陰。）法當腹中急痛。先予小建中湯。不差。予小柴胡湯。金匱婦人雜病。婦人腹中痛。小建中湯主之。蓋婦人無外事。深閨伏處。動多肝鬱之證。仲師以小建中湯爲主方。卽可證桂枝之能達肝鬱也。章次公曰。自有清中葉。蘇派學說盛行以後。桂枝之價值。遂無人能解。病屬外感。既不敢用之。解肌。病屬內傷。更不敢用之。以補中。不免有藥材之嘆。予遇有麻黃湯證。懼病者疑麻黃之猛悍。輒以荊防代麻黃。而以桂枝佐之。亦效。蓋桂枝本質。原無汗之能力。以其辛香氣散。故可助發汗藥之作汗。蘇派醫生。所以不敢用桂枝。其理由之可得而言者。不外『南方無眞傷寒』仲景之麻桂。僅可施於北方人。非江南體質柔弱者所能勝。故若輩一遇熱病。無論傷寒溫病。一例以大豆卷、葱翹、桑、菊應付之。於此而欲中醫之不式微。難言之矣。近世藥工剖切桂枝。必先以水浸三五日。是桂枝芳香之性。已受損失。自後世有

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

血家不宜桂枝之說。內傷病乃視桂枝如蛇蠍。其實桂枝辛溫。能使血液流行。亢進。不宜於血症之屬實熱者固也。至若虛勞羸弱。法當宗之。而蘇派醫生之較高明者。知桂枝治寒飲。然量僅二三分。寧不可笑。㊁張山雷曰。桂枝輕用三五分至七八分。重用一錢至錢半。若營血素虛而衛陽亦微。外有溫寒。則用一二分與白芍合炒。其舌滑無苔者。且必桂芍同炒而揀去桂枝弗用。僅取其氣。不食其味。此雖臭下近時新法。而不可謂其無深意者也。桂枝即肉桂之枝。柔嫩細條。芬芳馥郁。輕揚升散。味辛氣溫。祛營衛之風寒。主太陽中風而頭痛。（此中風爲風寒新感之病。實即今之所謂傷風。凡漢唐以上通稱中風。內經以及千金、外臺皆然。與金元以後之所謂中風大異。）立中州之陽氣。療脾胃虛鬆而腹疼。枝幹橫行。故宜通經絡。上達肩臂。溫辛勝水。則抑降腎氣。下定奔豚。開腎家之痺。若是陽微溲短。斯爲通溺良材。維在燥咳氣升。妄用即教血溢。抑或陰虧液耗。誤投必致病加。其效在皮。而仲景書反去其皮。可悟傳抄之謬。無皮爲木。而晚近來或用其木。毋乃嗜好之偏。

配合應用　㊀治風寒束表。用麻黃、柴胡、荊芥、防風、生姜、葱白。㊁治骨節疼痛。用桑枝、附子、牛膝、威靈仙、茯苓、防己。㊂治上氣咳逆。用芥子、厚朴、杏仁、半夏。

用量　幾分至二三錢。

施用宜忌　性能動血。陰虛火盛者忌之。忌生葱與火。

著名方劑　㊀桂枝湯。治上衝頭痛。發熱。汗出惡風者。桂枝、芍藥、大棗、生姜各七分。半甘草五分。上五味。以水一盞四分。煎取六分。古方藥品考桂枝湯條云。風邪受於表。必以先發表爲順。故用桂枝以發散表邪。芍藥以順血固肌。生姜以開痰達藥力。大棗以溫保胃氣。甘草以調和諸藥。㊁桂枝加桂湯。治本方證而上衝劇者。本方加桂五分。煎法同前。㊂桂枝加芍藥湯。治本方證。而腹滿時痛者。桂枝、芍藥、大棗、生姜各六分。甘草二分。上五味。以水一盞四分。煎取三分。去滓。再煎。溫服一盞。㊃桂枝加大黃湯。治本方證。而大便不通者。本方加大黃三分。煎法同前。㊄桂枝去芍藥湯。治本方證。不拘攣者。桂枝、大棗各九分。甘草六分。生姜四分。半生姜六分。上上六味。以水一盞六分。煎取六分。㊅桂枝加厚朴杏仁湯。治本方證。而胸滿微喘者。桂枝、芍藥、大棗、生姜各六分。甘草、厚朴、杏仁各四分。上七味。以水一盞四分煎取六分。㊆桂枝加附子湯。治本方證。而惡寒或支節微痛者。桂枝、芍藥、大棗、生姜各七分。半甘草三分。附子三分。半。煎法同前。㊇桂枝龍骨牡蠣湯。治桂枝湯證。而胸腹有動者。桂枝、芍藥、生姜、大棗、龍骨、牡蠣各六分。甘草四分。煎法同前。㊈桂枝加芍藥生姜人參湯。治桂枝湯證。而心下痞鞕。或拘攣。及嘔者。桂枝、大棗、人參各六分。生姜、芍藥各八分。甘草四分。上六味。以水二盞四分。煎取六分。㊉桂枝二麻一湯。治桂枝湯證多。麻黃湯少者。桂枝八分。芍藥、大棗、生姜各六分。半甘草五分。半。杏仁三分。半。上七味。以水一盞半。煎取六分。㊊桂枝二越婢一湯。治桂枝湯證多。越婢湯證少者。桂枝、芍藥、甘草、麻黃各四分。半。大棗、石羔各六分。生姜七分。煎法同前。㊋桂枝麻黃各半湯。治桂枝湯、麻黃湯二方證相半者。桂枝五分。芍藥、生姜、甘草、麻黃、大棗各三分。杏仁三分。上七味。以水一盞六分。煎取六分。

參弦資料　㊀桂、甘辛大熱。素問云。辛甘發散爲陽。故漢張仲景桂枝湯。治傷寒表虛。皆須此藥。正合辛甘發散之意。本草三種之桂。不用牡桂、菌桂者。此二種性止於溫。不可以治風寒之病也。然本經止言桂。仲景又言桂枝者。取枝上皮也。（寇宗奭）㊁桂能止煩出汗。而張仲景治傷寒有當發汗。凡數處皆用桂枝湯。又云無汗不得服桂枝。汗家不得重發汗。若用桂枝。是重發其汗。汗多者。用桂枝甘草湯。此又用桂枝閉汗也。一藥二用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

與本草之義相通否乎。曰本草言桂辛甘大熱。能宣導百藥。通血脈。止煩出汗。是調其血而汗自出也。仲景云太陽中風陰弱者汗自出。衛實營虛。故發熱汗出。又云太陽病發熱汗出者。此爲營弱衛強。陰虛陽必湊之。故皆用桂枝發其汗。此乃調其營氣。則衛氣自和。風邪無所容。遂自汗而解。非桂枝能開腠理。發出其汗也。汗多用桂枝者。以之調和營衛。則邪從汗出而汗自止。非桂枝能閉汗孔也。昧者不知出汗閉汗之意。過傷寒無汗者亦用桂枝。誤之甚矣。桂枝湯下發汗字。當認作出字。汗自然發出。非若麻黃能開腠理發出其汗也。其治虛汗。亦當逆察其意可也。（王好古）㈢桂枝本爲解肌。若太陽中風。腠理緻密。營衛邪實。津液禁固。其脈浮緊。發熱汗不出者。不可與此。必也皮膚疎泄。自汗。脈浮緩。風邪干於衛氣者。乃可投之。發散以辛甘爲主。桂枝辛熱。故以爲君。而以芍藥爲臣。甘草爲佐。者。風淫所勝。平以辛。苦以甘緩之。以酸收之也。以棗棗爲使者。辛甘能發散。而又用其行脾胃之津液。而和營衛。不專於發散也。故麻黃湯不用棗棗專於發汗。不待行其津液也。（成無己）㈣麻黃遍徹皮毛。故專於發汗。而寒邪散。肺主皮毛。辛走肺也。桂枝透達營衛。故能解肌。而風邪去。脾主營。肺主衛。甘走脾。辛走肺也。肉桂下行導火之原。此東垣所謂腎苦燥。急食辛以潤之。開腠理。致津液。通其氣者也。（李時珍）㈤有人患赤眼腫痛。脾虛不能飲食。肝脈盛。脾脈弱。用涼藥治肝。則脾愈虛。用暖藥治脾。則肝愈盛。但於溫平藥中。倍加肉桂。殺肝而益脾。故一治兩得之。傳云。木得桂而枯。是也。此皆與別錄桂利肝肺氣。牡桂治脇痛脇風之義相符。人所不知者。今爲拈出。又桂性辛散。能通子宮而破血。故別錄言其墮胎。廣安時乃云炒過則不損胎也。（醫餘錄）㈥桂枝亦惟有汗者宜之。若傷寒無汗。則當以發汗爲主。而不獨調其營衛矣。故曰無汗不得服桂枝。有汗不得服麻黃也。傷寒例云。桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。陰盛則亡。（汪訒庵）㈦桂枝辛甘而溫。氣薄升浮。入太陰肺太陽膀胱經。溫經通脈。發汗解肌。治傷風頭痛。傷寒自汗。調和營衛。使邪從汗出。亦治手足痛。風脇風。桂枝偏陽陰虛之人一切血證。不可誤投。（吳儀洛）

【桂芝】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【桂花】卽木犀花。詳『木犀花』條。

【桂花露】卽木犀花露。詳『木犀花露』條。

【桂根皮】基本　本品卽桂樹根上之皮。

採取　取陳年之入土最深者爲用。

主治　貼牙痛。能斷根。

【桂荏】卽紫蘇之古籍別名。典見爾雅。詳『紫蘇』條。

【桂棗】卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【桂圓】卽龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【桂圓肉】卽龍眼之處方用名。詳『龍眼』條。

【桂蠹糞】主治　漱嚥。

默骨哽。煎醋

【桂蠹蟲】形態　桂蠹蟲爲化生蟲類之一種。卽蠹蟲之生於桂樹者。大如指。色紫而香。蜜漬之可爲珍味。可供藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　去冷氣。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論桂蠹蟲曰。除寒痰。辟飲冷痛。

【桃】命名　本品早花易植而子繁。故字從木兆。十億爲兆。言其數多也。故名。又木兆諧聲曰桃。

種類　以其種類而名者。有緋桃。緋桃。蘇州桃。千葉桃。西王母桃。碧桃。美人桃。人面桃。二色桃。日月桃。鴛鴦桃。瑞仙桃。壽星桃。巨核桃。十月桃。油桃。李桃。（綱目）以其實之色而名者。有紅桃。綉桃。白桃。烏桃。金桃。銀桃。腳脂桃。（綱目）以其實之形而名者。有綿桃。御桃。方桃。匾桃。偏核桃。（綱目）以其時而名者。有五月早桃。十月冬桃。秋桃。霜桃。（綱目）小而多毛者名毛桃。榹桃。冬桃一名毒桃。又名仙人桃。亦名鼠嚙桃。番名波淡樹。（綱目）經

21／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬不落者名桃枭桃奴（綱目）汁液流出名桃膠（綱目）

外國名詞　Prunus Persica. S. et Z. var. vulgaris Maxim.（拉丁）モモ（日本）

基本　係薔薇科櫻桃屬。爲桃之果實。其仁。毛。梟花。葉。膠。枝。及樹根皮。詳見各條。

產地　山野平原。處處有出。

形態　桃爲果類之落葉喬木。高丈餘。葉披針形。長橢圓。有鋸齒。互生。春月與李同時開花。花有紅、紫、白等色。在單瓣者花冠自五瓣合成。重瓣者種亦多。實爲核果。外面生毛。夏月成熟。亦有熟於秋冬者。熟則蒂帶紅色。結實五年後。宜以刀劃其樹皮。出其脂液。則可垂久。其實俗謂桃子。可供食與藥用。



桃

性質　辛。酸。甘。熱。微毒。

主治　作脯食。益顏色。

歷代記述弦證　【唐】孫思邈千金翼論桃實曰。肺之果。肺病宜食之。

參攷資料　㈠桃子多食。令人有熱。（綱目）㈡黃帝書云。食桃飽入水浴。令人成淋。及寒熱病。（孫思邈）㈢生桃多食。令人膨脹。及生癰癤。有損無益。五果列桃爲下。以此。（李時珍）㈣桃與鼈同食。患心痛。服朮人忌食之。（吳瑞）

【桃仁】

處方用名　桃仁。泥。桃核仁。單桃仁。

古籍別名　脫核仁。脫核嬰兒。（和漢藥考）

外國名詞　Fructus Persicæ（拉丁）

基本　屬薔薇科。爲桃之核仁。

產地　陳仁山藥物生產辨云。桃仁各省均有出產。以湖南常德府。湖北襄樊。老河口。山東河南產者爲良。六七月出新。

形態　桃爲各地所栽植之落葉樹。高達丈餘。葉互生。作披針形。邊緣有細鋸齒。花先葉而開。普通爲淡紅色五瓣花。時或開白、緋、紫等色。有單瓣重瓣之別。果實爲肉果。作彈丸形。肉多汁。柔軟。呈赤色或橙色。核殼有許多短線溝。中有仁。仁爲白色扁平尖卵圓形。被有褐衣。且有縱皺。

採取　七月採實。取仁。陰乾。

製法　雷敩曰。凡使桃仁。須去皮。用白朮。烏豆二味。同於坩鍋中煮二伏時。漉出。劈開。心黃如金色。乃用。李時珍曰。桃仁行血。宜連皮尖生用。潤燥活血。宜湯浸去皮尖炒黃用。麥麩同炒。或燒存性。各隨本方。雙仁者有毒。不可食。

性質　苦。甘。平。無毒。

效能　破血行瘀。潤燥。通便。用治咳嗽。血病。風痛。

主治　瘀血血閉。癥瘕。邪氣。殺小蟲。（本經）止欬逆上氣。消心下堅硬。除卒暴擊血。通月水。止心腹痛。（別錄）

張仲景之發明　桃仁一味。經張仲景之實驗。認爲主治瘀血。少腹滿痛。故衆治腸癰及婦人經水不利。茲考徵如下。㈠桃仁承氣湯證曰。少腹急結。㈡大黃牡丹皮湯證曰。少腹腫痞。㈢薏苡湯證不具。上三方。桃仁各五十枚。㈣下瘀血湯證曰。產婦腹痛。又曰。經水不利。（上一方。桃仁三十枚。）㈤大黃䗪蟲丸證曰。腹滿。（上一方。桃仁一升。）㈥抵當丸證曰。少腹滿。（上一方。桃仁二十五枚。）㈦抵當湯證曰。少腹當鞕滿。又曰。婦人經水不利。（上二方。桃仁二十枚。）㈧桂枝茯苓丸證不具。（上一方。桃仁諸藥等方。）據此諸方。則桃仁主治瘀血。急結。少腹滿痛明矣。凡毒結於少腹。則小便不利。或如淋。其如此者後必有膿。自下。或瀉血者。或婦人經水不利者。是又臍下久瘀血之所致也。

歷代記述弦證　【唐】孟詵食療本草論桃仁曰。殺三蟲。又每夜嚼一枚。和蜜塗手面良。【金】張元素珍珠囊論桃仁曰。治血結血祕血燥。通潤大便。破蓄血。【明】李時珍本草綱目論桃仁曰。主血滯風痺。骨蒸。肝癉寒熱。鬼疰疼痛。產後血病。【清】賈九如辨藥指南論桃仁曰。桃仁味苦。能瀉血熱。體潤能滋腸燥。若連皮研碎。多用。霧其赤色。以走肝經。主破蓄血。逐月水。及遍身疼痛。四肢木痺。左半身不遂。左足痛甚者。以其舒經活血行血

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有去瘀生新之功。若去皮搗爛少用。取其純白。以入大腸。治血枯便閉。血燥便難。以其濡潤涼血和血。有開結通滯之力。

配合應用 ㈠治產後瘀血結塊作痛。并治壯盛婦人經閉不通。用桃仁、當歸、芍藥、澤蘭、延胡索、蘇木、五靈脂、紅花、牛膝、生地黃、益母草。

㈡治大腸血燥。便結不通。用桃仁、當歸、麻仁、地黃、麥門冬、芍藥、黃芩、肉蓯蓉、甘草。

㈢治上部內瘡。瘀血作痛。用桃仁、番降香、川通草、山查、穿山甲、乳香、沒藥、紅花、續斷、當歸。

㈣延年去風。令人光潤。用桃仁五合。去皮。用糠米飯漿同研。絞汁。令盡。溫溫洗面。極妙。（千金方）

㈤治偏風不遂及癬疾。用桃仁二千七百枚。去皮尖。雙仁。以好酒一斗三升。浸二十一日。取出晒乾。杵細作丸。如梧子大。每服二十丸。以原酒吞之。（外臺祕要方）

㈥治風勞毒腫攣痛。或牽引小腹及腰痛。桃仁一升。去皮尖。熬令黑烟出。熟研如脂膏。以酒三升。攪和服。煖臥取汗。不過三度瘥。（食醫心鏡方）

㈦治癰疾寒熱。桃仁一百枚。去皮尖。乳碎內研成膏。不得犯生水。入黃丹三錢。丸梧子大。每服三丸。當發日面北溫酒吞下。（唐愼微本草方）

㈧治骨蒸作熱。桃仁一百二十枚。留尖去皮及雙仁。杵爲丸。平旦井花水頻服之。令盡量飲酒至醉。仍須任意喫水。隔日一劑。百日不得食肉。（外臺祕要方）

㈨治上氣欬嗽。胸滿氣喘。桃仁三兩。去皮尖。以水一大升。研汁。和糠米二合。煮粥食。（食醫心鏡方）

㈩治卒得欬嗽。桃仁三升。去皮。杵。着器中。密封。蒸熟。日乾。絹袋盛。浸二斗酒中。七日可飲。日飲四五合。

(一一)治尸注鬼注。乃五尸之一。又挾鬼邪爲祟。其病變動有三十六種。至九十九種。大略使人寒熱淋瀝。沉沉默默。不知所苦。而無處不惡。累年積月。以至於死。死後復傳旁人。急以桃仁五十枚。研泥水煮。取四升。服之。取吐吐不盡。三四日再吐。（肘後方）

(一二)治傅尸鬼氣。咳嗽痎癖注氣。血氣不通。日漸消瘦。桃仁一兩。去皮尖。杵碎。水一升半。煮汁入米作粥。空心食之。

(一三)治鬼注心痛。桃仁一合。爛研。煎湯服之。（急救方）

(一四)治卒然心痛。桃仁七枚。去皮尖。研爛。水一合。服之。（肘後方）

(一五)治人好驚癖。桃仁。熬去皮尖。三七枚。以小便服之。（千金方）

(一六)治下部蟲蝕。病人齒無色。舌上白。喜睡。憒憒不知痛痒處。或下痢。乃下部生蟲食肛也。桃仁十五枚。苦酒二升。鹽一合。煮六合。服之。（肘後方）

(一七)治崩中漏下不止者。桃核燒存性。研細。酒服方寸匕。日三。（千金方）

(一八)治產後百病。千金桃仁煎。治婦人產後百病諸氣。取桃仁一千二百枚。去皮尖。雙仁。熬搗極細。以清酒一斗半。研如麥粥。納小瓶中。痴封。入湯中煮一伏時。每服一匙。溫酒和服。日再。（圖經方）

(一九)治產後身熱如火。皮如粟粒者。桃仁研泥。同臘豬脂傅之。日日易之。（千金方）

(二〇)治產後血閉。桃仁二十枚。去皮尖。鷰一塊。水煎服之良。（唐瑤經驗方）

(二一)治產後陰腫。桃仁燒研傅之。

(二二)治婦人陰瘡。桃仁杵爛。綿裹塞之。（肘後方）

(二三)治男子陰腫作痒。用桃仁炒香爲末。酒服方寸匕。日二。仍搗傅之。亦治小兒卵癕。（外臺祕要方）

(二四)治小兒爛瘡初起。腫漿似火瘡。桃仁研爛傅之。（子母祕錄方）

(二五)治小兒聤耳。桃仁炒研。綿裹。日日塞之。（千金方）

(二六)治風蟲牙痛。鍼刺桃仁。燈上燒烟出。吹滅。安痛齒上。咬之。不過五六次愈。（衞生家寶方）

(二七)治唇乾裂痛。桃仁搗和豬脂傅。（海上方）

(二八)治大便不快。裹急後重。用桃仁三兩。去皮。臭柒黃二兩。食鹽一兩。同炒熟。去鹽柒。每嚼桃仁五七粒。（聖濟總錄方）

(二九)治急勞咳嗽煩熱。桃仁三兩。去皮尖。豬肝一枚。薑子小便五升。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

同煮乾。於木臼內擣爛。入蒸餅和丸。梧子大。每溫水下三十丸。（聖惠方）

㊂治冷勞減食。漸至黑瘦。用桃仁五百顆。吳茱萸三兩。同入鐵鍋中。微火炒一炊久。將桃仁去皮。微黃色。即漸加火。待微烟出。即乘熱收入新瓶內。厚紙封住。勿令洩氣。每日空心取桃仁二十粒去皮嚼之。以溫酒下。至重者服五百粒愈。（聖惠方）

㊃預辟瘴癘。用桃仁一斤。吳茱萸、青鹽各四兩。同炒熟。以新瓶密封。一七取出。揀去茱鹽。將桃仁去皮尖。每嚼一二十枚。山居尤宜之。（全居士選奇方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無瘀滯者禁用。

著名方劑　桃核承氣湯。治傷寒太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外不解者。尚未可攻。宜先與桂枝湯解外。外解已。但小腹急結。此主之。（傷寒方）桃仁五十枚（去皮尖）桂枝二兩（去皮）大黃四兩。芒硝、甘草（炙）各二兩。上五味。以水七升。煮取二升半。去滓。納芒硝。更上火微沸。下火。先令溫服五合。日三服。當微利。

參攷資料　㊀桃仁苦重於甘。氣薄味厚。手足厥陰經血分藥也。苦以泄滯血。甘以生新血。故破凝血者用之。其功有四。治熱入血室一也。泄腹中滯血二也。除皮膚血熱燥痒三也。行皮膚凝滯之血四也。（李杲）㊁肝者血之源。血聚則肝氣燥。肝苦急。急食甘以緩之。桃仁之甘以緩肝散血。故張仲景抵當湯用之。以治傷寒八九日內有蓄血發熱如狂。小腹滿痛。小便自利者。又有當汗失汗。熱毒深入。吐血及血結胸煩躁讝語者。亦以此湯主之。與虻蟲、水蛭、大黃同用。（成無己）㊂血滯所宜者。桃仁、紅花、丹皮、蘇木、血竭之屬是也。第紅花、蘇木、血竭色紅。丹皮色紫。唯桃仁屬血而色乃白。固的知其爲肺果之頗曰。桃爲肺果。精專在仁。故司肺氣。爲營血之帥。凡血之不行不濡。即氣之不決不運。氣如橐籥。血如波瀾。故也。所說可謂中肯。所以紅花、丹皮、蘇木、血竭。本赤紫色。而入血分。各有所入。唯桃仁本白色。而能和血。故上中下無不行也。又曰。桃爲肺果。而却能奏功於血。猶杏爲心果。而能奏功於氣者也。其物理之妙有如此。（劉潛江）㊃桃仁性善破血。凡血結、血祕、血燥、瘀血、留血、蓄血、血痛、血痿等證。用之立通。第散而不收。瀉而無補。過用之。及用之不得其當。能使血下不止。損傷眞陰。爲害非細。故凡經閉不通。由於血枯。而不由於瘀滯。產後腹痛。由於血虛。而不由於留血結塊。大便不通。由於津液不足。而不由於血燥。門結。法並忌之。（繆希雍）

【桃仁泥】　即桃仁之處方用名。詳『桃仁』條。

【桃心】　即桃之嫩葉之別名。典見綱目。詳『桃葉』條。

【桃毛】　**基本**　本品即刮取桃實上之細毛也。

性質　辛平無毒。

主治　破血閉。下血瘕。寒熱積聚。無子。帶下諸疾。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論桃毛曰。能治惡鬼邪氣。【宋】大明諸家本草論桃毛曰。療崩中。破癥氣。

【桃奴】　即桃梟之古籍別名。典見別錄。詳『桃梟』條。

【桃皮酒】　**製法**　用桃皮煎汁。同秫米和麴釀酒飲。

主治　水腫。利小便。

【桃竹筍】　**古籍別名**　黃筍。

性質　苦。有小毒。

主治　六畜瘡中生蛆。搗碎納之。蛆盡出。

參攷資料　㊀南人謂之黃筍。灰汁煮之。可食。不爾蛾人喉。其竹叢生。醜類非一。（陳藏器）㊁桃枝竹出川廣中。皮滑而黃。犀紋瘦骨。四寸有節。可以爲席。（李時珍）

【桃竹筍殼】　**主治**　楊梅瘡。煅灰酒服。

【桃朮】　即桃橛之古籍別名。典見綱目。詳『桃橛』條。

【桃枝及樹根皮】　**製法**　李時珍曰。樹皮、根皮皆可用。根皮尤良。並取東行者。刮去粗皮。取白皮入藥。

性質　苦。平無毒。

主治　除邪鬼中惡。腹痛。去胃

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中熱。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論桃枝及樹根皮曰。治疰忤。心腹痛。解蠱毒。辟疫癘。療黃疸。身目如金。殺諸瘡蟲。

【桃花】　主治　詳見白桃花條。

【桃花石】　命名　本品卽赤石脂之不黏舌。堅如石而有花點者。故名。

性質　甘。溫。無毒。

主治　大腸中冷。膿血痢。久服令人肥悅能食。

參攷資料　桃花石卽赤石脂。非別一物。故其氣味功用皆同。昔張仲景治痢。用赤石脂名桃花湯。和濟局方治冷痢有桃花丸。皆卽此物耳。（李時珍）

【桃花吐鐵】　卽吐鐵之古籍別名。典見會稽志。詳『吐鐵』條。

【桃花鹽】　命名　桃花鹽產澤旺。每春深紅如桃花。至夏色漸淡。秋冬白。入春仍紅。故名。

性質　味鹹。

主治　胃痛人以鹽熨之。立止。

【桃金孃】　古籍別名　金絲桃。（花鏡）

產地　出粵省瀼生野間。

形態　桃金孃爲常綠灌木之一種。葉橢圓質厚。對生。夏月葉腋抽細梗。開花色淡紅。似梅而末微尖。似桃而色倍中莖純紫。中綴黃鬚。露出花外。狀似金絲。八九月實熟。青紺若牛乳狀。其實可供藥用。其花詳見該條。

性質　甘。寒。無毒。

主治　養血明目。

【桃金孃花】　主治　行血。

【桃柳藤】　卽何首烏之古籍別名。典見諸家本草『何首烏』條。

【桃核仁】　卽桃仁之處方用名。詳『桃仁』條。

【桃寄生】　命名　本品爲桃樹上之寄生。故名。

性質　苦。辛。無毒。

主治　小兒中蟲毒。腹內堅痛。面目青黃。淋露骨立。取二兩爲末。如茶點服。日四五服。

【桃梟】　命名　本品係經冬不落之桃實。懸乾。如梟首殘木之狀。故名。

古籍別名　桃奴。桃景。梟景。（別錄）神桃。鬼臼。鬱臼。（綱目）

採取　正月採之。以中實者良。

製法　雷敎曰。鬼臼。鬱臼。十一月採得。以酒拌蒸之。從巳至未。焙乾。以銅刀切。焙取肉用。

性質　苦。微溫。有小毒。

主治　殺百鬼精物。（本經）殺精魅五毒不祥。療中惡腹痛。（別錄）

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論桃梟曰。治肺氣腰痛。破血。療心痛。酒磨煖服之。【明】汪穎食物本草論桃梟曰。主吐血。諸藥不效。燒存性研末。米湯調服有驗。【明】李時珍本草綱目論桃梟曰。治小兒盧汗。婦人姙娠下血。破伏梁。結氣。止邪癰。燒烟熏痔瘡。黑油調傅小兒頭上肥瘡。軟癤。

【桃景】　卽桃梟之古籍別名。典見別錄。詳『桃梟』條。

【桃絲竹】　產地　出兩廣交趾等處。

形態　桃絲竹爲苞木類竹屬之一種。本大如斗。而色黑。葉色亦黑。形類棕竹。有大小之別。可爲筆筒。酒注。茶甌。及刀劍握等用。其莖可供藥用。筍殼詳見各該條。

採取　於竹莖上刮取之。先刮去其外之青皮。再刮取其內層之二黃用。

主治　降痰火。煎服。功勝淡竹。解蛇咬及天蛇毒。諸瘡發背。痘疔。爲末傅之。或作餅貼之。血崩。炒末水服。

【桃絲竹蝨】　基本　本品爲桃絲竹上所生之竹蝨也。

主治　瘧疔瘡有效。

【桃葉】　古籍別名　嫩葉名桃心。（綱目）

採取　以嫩者入藥尤勝。

性質　苦。平。無毒。

主治　除尸蟲。出瘡中小蟲。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論桃葉曰。治惡氣。小兒寒熱。客忤。【明】李時珍本草綱目論桃葉曰。療傷寒時氣。風痺。無汗。治頭風。通大小便。止霍亂腹痛。

參攷資料　㊀桃葉蒸汗法。張文仲備急方。治天行病。有支太醫

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

桃葉湯熏法。用水三石煮桃葉。取七斗。安牀簀下。厚被蓋臥牀上。乘熱熏之。少時當雨汗。汗過去湯。速粉之。并灸大推穴則愈。又陳藏且小品方有阮河南桃葉熏法云。連發汗汗不出者死。可熏之。如中風法。燒地令熱。去火。以少水洒之。布乾桃葉於上。厚二三寸。安席葉上臥之。溫覆得大汗。被中傅粉極燥便瘥也。凡桓葉麥麩。鹽沙。皆可如此法用。張苗言曾有人疲極汗出。臥簟受冷。但苦寒倦四日。凡人發汗。汗不出用此法而瘥也。（蘇頌）

㊁按許叔微本事方云。傷寒病。醫者須顧表裏。循次第。范雲爲梁武帝屬官。得時疫。熱疾。召徐文伯診之。是時武帝有九錫之命。期在旦夕。雲恐不預。求速愈。文伯曰。此甚易效。恐二年後不坐起爾。雲曰。朝聞道。夕死可矣。況二年乎。文伯乃以火煅地。布桃栢葉於上。令雲臥之。少頃汗出。粉之。翌日遂愈。後二年。雲果卒。取汗先期。尚能促壽。況不願表裏時日。便欲速愈者乎。夫桃葉發汗。妙法也。猶有此戒。可不愼歟。（李時珍）

【桃膠】 採取 於桃茂盛時。以刀割樹皮。久則有膠溢出。採收之。

製法 採得以桑灰湯浸過。曝乾用。

性質 苦。平。無毒。

主治 鍊服保中不飢。忍風寒。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草圖經。論桃膠曰。下石淋。破血。治中惡疰忤。【唐】孟詵食療本草。論桃膠曰。主惡鬼邪氣。【明】李時珍本草綱目。論桃膠曰。和血益氣。治下痢止痛。

參攷資料 ㊀本草言桃膠鍊服。保中不飢。按仙方服膠法。取膠二十斤。絹袋盛。於樸木灰汁一石中。煮三五沸。取掛高處。候乾再煮。如此三度。曝乾。研篩。蜜和丸梧子大。每空腹酒服二十丸。久服身輕不老。（蘇頌）㊁按抱朴子云。桃膠以桑灰汁漬過。服之。除百病。數月斷穀。久則睛有夜光。如月。又列仙傳云。高丘公服桃膠得仙。古方以桃膠爲仙藥。而後人不復用之。豈其功亦未必如是之殊耶。（李時珍）

【桃楔】 古籍別名 桃杙。（綱目）

基本 本品卽俗創桃木釘於地上。以鎭家宅者。

採取 以經三年者入藥良。

主治 卒心腹痛。鬼疰。破血。辟邪惡氣。腹滿。煮汁服之。與桃符同功。

【桃蟲】 卽巧婦鳥之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「巧婦鳥」條。

【桃蠹蟲】 命名 本品爲蠹蟲之生於桃樹上者。故名。

性質 辛。溫。無毒。

主治 殺鬼邪惡不祥。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論桃蠹蟲曰。食之肥人。悅顏色。

【桃蠹蟲糞】 主治 辟瘟疫。爲末水飲。

【桃椰子】 命名 本品木似椰而光利。故名。

古籍別名 姑椰木子。（臨海異物志）鵝木子。（伽藍記）董樸子。（楊愼卮言）鐵木子。（綱目）砂糖椰子。（日本）

外國名詞 Arenga saccharifera. Labill.（拉丁）ツグロツグ（日本）

基本 係棵櫚科。爲桃椰之子實。

產地 生嶺南熱帶諸地。

形態 桃椰爲喬木類之常綠木本。大者四五圍。高五六丈。葉作羽狀複葉。自許多小葉成。小葉細而長。葉下有鬚。如粗馬尾。可以織巾。花小單性。雌花與雄花同株。爲肉穗花序。其汁液可製砂糖。結實如青珠。幹內有粉。赤黃色。可作餅餌。名桃椰鵝。其子可供藥用。



桃椰子

性質 苦。平。無毒。

主治 破宿血。

【桃椰麵】 命名 本品乃桃椰幹皮中之白粉。形似鵝粉。故名。

性質 甘。平。無毒。

主治 作餅炙食。脾美。令人不

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

饑。補益虛羸。損乏。腰脚無力。久服輕身辟穀。

【桐】　古籍別名　白桐。椅桐。岡桐。榮桐。紫花桐（綱目）

外國名詞　Paulownia tomentosa H.Bn.（拉丁）キリ（日本）

基本　係玄參科桐屬。爲桐之木材。其木、皮、葉、花詳見各該條。

産地　山谷原野均有。

形態　桐爲喬木類之落葉木本。高三丈。葉大對生。春夏間開花於枝梢。排列爲圓錐花序。花冠呈紫色或白色。作脣形。萼五裂。實爲兩房之蒴果。長寸餘。熟則兩裂。散出無數小扁種子。隨風飄揚。其木可供藥用。



桐

主治　腫從脚起。削片煮汁漬之。并飲少許。

【桐木皮】　主治　五痔。殺三蟲。（本經）療奔豚氣病。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論桐木皮曰。五淋。沐髮去頭風。生髮滋潤。【明】李時珍本草綱目論桐木皮曰。治惡瘡小兒丹毒。煎汁塗之。

【桐油傘紙】　基本　本品卽雨傘上之桐油紙。

主治　蛀幹陰瘡。燒灰出火毒一夜。傅之。便結痂。

【桐花】　主治　傅豬瘡。飼豬肥大三倍。

【桐蛀】　基本　桐油樹中之蠹蟲也。

主治　惡腫毒。（取七根焙末。沖酒服）

【桐麻】　卽苘麻之日本名。詳『苘麻』條。

【桐葉】　性質　苦。寒。無毒。

主治　惡蝕瘡陰瘡。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論桐葉曰。消腫毒。生髮。

【桑上寄生】　卽㊀桑寄生之古籍別名。典見本經。詳『桑寄生』條。㊁卽桑耳之古籍別名。典見綱目。詳『桑耳』條。

【桑仁】　卽桑椹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑椹』條。

【桑牛】　卽緣桑蠹之古籍別名。典見綱目。詳『緣桑蠹』條。

【桑生】　卽桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【桑白皮】　原名　桑根白皮。

命名　本品係採剝桑嫩根之白色內皮。故名。

處方用名　生桑皮。炙桑皮。

古籍別名　伏蛇皮。馬額皮。（吳淑事類賦）奠食蠶。延年卷雪。（和漢藥考）

基本　屬桑科。爲鷄桑之嫩根白皮。

産地　凡養蠶區域恒有生焉。陳仁山藥物生産辨云。桑白皮以産廣東南海、西樵、三水、橫江爲好。味以東沙島爲好。肉粉口。清遠次之。其餘東莞等處亦有。

形態　桑之嫩根。外色青黃。內色白。皮內又有黏汁。色亦潔白。



桑白皮

採取　桑根採無時。但須採十年以上者之嫩根。剝取其內之白皮。焙乾。

製法　雷敎曰。凡使桑白皮。採十年以上向東畔嫩根。銅刀刮去青黃薄皮一重。取裏白皮。切焙乾用。其皮中涎勿去之。藥力俱在上也。忌鐵及鉛。有同糯炒者。

性質　甘。寒。無毒。

效能　瀉肺。行水。用爲水腫之利尿藥。又爲喘咳之祛痰藥。

主治　傷中五勞六極。羸瘦。崩中。絕脈。補虛益氣。（本經）去肺中水氣。唾血。熱渴。水腫。腹滿。臚脹。利水道。去寸白。可以縫金瘡。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論桑白皮曰。治肺氣喘滿。虛勞客熱。頭痛。內補不足。【唐】孟詵食療本草論桑白皮曰。煮汁飲。利五臟。入散用。下一切風氣水氣。【宋】大明諸家本草論桑白皮曰。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

調中下氣。消痰止渴。開胃下食。殺腹臟蟲。止霍亂吐瀉。研汁治小兒天弔、驚癇客忤。及傅鵝口瘡大驗。【明】李時珍本草綱目論桑白皮曰。瀉肺利大小腸。降氣散血。【明】繆希雍本草經疏論桑白皮曰。桑根白皮味甘氣寒而無毒。東垣海藏俱云兼辛。甘以固元氣而補不足。辛以瀉肺邪之有餘。故能止嗽也。凡肺中有水氣及肺火有餘者宜之。傷中者。中氣傷也。五勞者。五臟勞傷也。六極者。六腑之中氣極也。羸瘦者。肌肉脫也。崩中者。血脫也。脈絕者。氣血兩虛之至。故脈不來也。之數者。皆由陰不足則陽有餘。陽有餘則火盛而內熱。火與元氣不兩立。火能消物。造化自然也。惟甘也可以補元氣。惟寒也可以除內熱。熱除矣。元氣生矣。則上來諸證自瘳。故本經終之以補虛益氣。爲別錄去肺中水氣者。即十劑中云燥可去溼。桑白皮之屬是已。吐血熱渴者。熱傷肺。火炎迫血妄行。溢出上竅。而兼熱作渴也。其主水腫腹滿臟脹者。即利水道。除溼補虛之功也。溼熱盛則寸白生。消除溼熱。則蟲自不能留也。繼金瘡者。甘寒補益。宜於傷損也。【明】李士材本草圖解論桑白皮曰。桑根白皮甘辛。瀉肺氣而痰水喘嗽皆除。古稱補氣者。非若參耆之正補。乃瀉邪所以補正也。愚者信爲補劑。而肺虛者亦用之。大失桑皮之面目矣。刮去皮。蜜水炒。【清】黃宮繡本草求眞論桑白皮曰。桑白皮辛甘性寒。善入肺中氣分。瀉火利水。除痰泄氣。絲氣與水與痰。止屬病標。其氣逆不利。與水飲膠結。未有不因火結而成。久而不治。則瘀結便祕。喘嗽胸滿。唾血口渴。水腫臟脹。靡不色色而見。桑白皮辛甘而寒。能於肺中治火利水。俾火去而水自消。水去而火即滅。而氣因爾而治。至書有云。能補元氣之不足。不過云其氣得自安。若以甘寒之味。可以補氣。則當置甘溫於何地乎。況本草十劑篇云。燥可去溼。桑白皮赤小豆之屬是也。故溼則爲重。宜燥劑以除之。但此性寒而裂。雖有甘味。不能以制。故古人有戒勿多用之條。及肺虛火衰水犯。風寒作嗽者。爲切忌。爲線可繼金瘡。刮去皮取白。或恐瀉氣。蜜炙用。

配合應用 ㊀治嗽之要藥。桑白皮、天麥二冬、款冬花、百部、薄荷、甘草、沙參、貝母、枇杷葉、五味子。㊁治水腫之神劑。桑白皮、芍藥、薏苡仁、木瓜、茯苓、橘皮、赤小豆。㊂治欬嗽吐血甚者。殷鮮桑根白皮一斤。米泔浸三宿。刮去黃皮。剉細。入糯米四兩。焙乾爲末。每服一錢。米飲下。(經驗方)

㊃治消渴原多。用入地三尺桑根。剉取白皮炙黃黑。剉。以水煮濃汁。隨意飲之。亦可入少米。勿用鹽。(肘後方)

㊄治產後下血。炙桑白皮。煮水飲之。(肘後方)

㊅治血露不絕。鍥截桑根取屑五指撮。以淳酒服之。日三服。(肘後方)

㊆治墜馬拗損。桑根白皮五斤。爲末一升。煎膏傅之。便止。已後亦無宿血。終不發動。(經驗方)

㊇治金刃瘡傷。新桑白皮燒灰。和馬糞塗瘡上數易之。亦可煮汁服之。(廣利方)

㊈治雜物眯眼。新桑根皮洗淨。趙爛。入眼撥之自出。(聖惠方)

㊉治髮鬢墮落。桑白皮剉三升。以水淹浸。煮五六沸。去滓。頻頻洗沐。自不落也。(聖惠方)

㊊治髮槁不澤。桑根白皮、柏葉各一斤。煎汁沐之。潤。(聖惠方)

㊋治小兒重舌。桑根白皮煮汁塗乳上。飲之。(子母祕錄方)

㊌治小兒流涎脾熱也。胸膈有痰。新桑根白皮。搗自然汁塗之。甚效。乾者煎水。(聖惠方)

㊍治小兒天弔。驚癇客忤。家桑東行根。取研汁服。(聖惠方)

㊎治小兒火丹。桑根白皮煮汁浴之。或爲末。羊脊和塗之。(千金方)

㊏治石癰堅硬。不作膿者。蜀桑白皮。陰乾爲末。烊膠和酒調傅。以軟爲度。(千金方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡肺虛無火及寒嗽者禁用。忌鐵鍋。纖斷桂心、麻子爲之使。

著名方劑 瀉白散。治肺熱咳嗽。(錢氏方)桑皮(炒)地骨皮各

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一兩甘草五錢。上爲末。每服一二錢。入糯米百粒水煎。

參攷資料　㈠桑白皮長於利小水。乃實則瀉其子也。故肺中有水氣及肺火有餘者宜之。十劑云。燥可去濕。桑白皮赤小豆之屬是矣。宋醫錢乙治肺氣熱甚。欬嗽而後喘。面腫身熱。瀉白散用桑白皮炒一兩。地骨皮焙一兩。甘草炒半兩。每服一二錢。入糯米百粒。水煎食後溫服。桑白皮地骨皮皆能瀉火。從小便而去。甘草瀉火而緩中。糯米清肺而養血。此乃瀉肺諸方之準繩也。元醫羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣。瀉邪所以補正也。若肺虛而小便利者。不宜用之。（李時珍）㈡桑根白皮作線縫金瘡腸出。更以熱雞血塗之。唐安金藏剖腹用此法而愈。（蘇頌）㈢古本草言桑根見地上者名馬額。有毒殺人。旁行出土者名伏蛇。亦有毒而治心痛。故吳淑事類賦云。伏蛇痛馬額殺人。（李時珍）。

【桑皮】卽桑根白皮之簡稱。

【桑皮中白汁】　**主治**　小兒口瘡。白漫拭淨。塗之便愈。又塗金刃所傷。燥痛。須臾血止。仍以白皮裹之。甚良。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論桑皮中白汁曰。塗蛇、蜈蚣、蜘蛛傷有效。取枝燒灑。治大風瘡疥。生眉髮。

【桑耳】　**命名**　本品係生於桑上之菌耳。故名。

古籍別名　桑檽（唐本草）桑蛾（宋本草）桑黃桑臣（藥性）桑雞（桑上寄生。綱目）

外國名詞　Hirneola polytricha, Fr. Schroet（拉丁）キクラゲ（日本）

基本　係眞正擔子菌類。爲桑樹上寄生之菌耳。

產地　多生在栽桑區域。

形態　詳見木耳條。

性質　甘平有毒。

主治　黑者主女人漏下赤白汁。血病癥瘕積聚。陰痛。陰陽寒熱無子。（本經）療月水不調。其黃熟陳白者。止久洩。益氣不飢。其金色者。治癖飲積聚。腹痛金瘡。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論桑耳曰。治女子崩中帶下月閉血凝。產後血凝。男子痃癖。【唐】孟詵食療本草論桑耳曰。利五臟。宣腸胃氣。排毒氣。壓丹石人發熱。和葱豉作羹食。【宋】大明諸家本草論桑耳曰。止血衄。腸風瀉血。婦人心腹痛。

【桑臣】　卽桑耳之古籍別名。典見藥性。詳『桑耳』條。

【桑枝】　**處方用名**　嫩桑枝。桑柔枝。

外國名詞　Morus alba L.（拉丁）クハ（日本）

基本　係桑科桑屬之嫩枝。

形態　桑枝長者七八尺。短者三四尺。有粗有細。枝莖色青褐。略有彎形。稍端細。下端粗。皮內有白色黏汁。葉柄生於枝之左右側面。差錯而生。冬月葉落之後。其枝間有葉柄蒂痕。蒂痕之下有新葉苗芽。

採取　春夏採之。

製法　蘇頌曰。凡使桑枝。近效方。一法用花桑枝寸剉炒香。瓦器煮。減一半。再入銀器重湯熬。減一半。或入少蜜亦可。

性質　苦平無毒。

效能　祛風。溼。利關節。專作風痺藥。

主治　偏體風痒。乾燥。水氣脚氣。風氣。四肢拘攣。上氣眼暈。肺氣欬嗽。消食利小便。久服輕身聰明耳目。令人光澤。療口乾及癰疽後渴。用嫩條細切一升。熬香煎飲。亦無禁忌。久服終身不患偏風。

配合應用　㈠治服食變白。久服通血氣。利五臟。雞桑嫩枝。陰乾爲末。蜜和作丸。每日酒服六十丸。（聖惠方）

㈡治水氣脚氣。桑條二兩。炒香。以水一升。煎二合。每日空心服之。無忌。（聖濟總錄方）

㈢治風熱臂痛。桑枝一小升。切炒。水三升。煎二升。一日服盡。許叔微云。常病臂痛。諸藥不效。服此數劑。自愈。觀本草切用及圖經言其不冷不熱。可以常服。抱朴子言一切仙藥。不得桑枝煎不服。（本事方）

㈣解中蠱毒。令人腹內堅痛。面黃青色。淋露骨立。病變不常。桑木心剉一斛。着釜中。以水淹三斗。煮取二斗。澄清。微火煎得五升。空心

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

服五合。則吐蟲毒出也。（肘後方）

㊃治刺傷手足犯露水腫痛多殺人。以桑枝三條。燒火炮熱。斷之。以頭熨瘡上。令熱。冷卽易之。盡二條。則瘡自爛。仍取韭白或薤白傅上。愈。以帛裹之。有腫更作。（千金方）

㊄治業白癜風。桑枝十斤。金毋草三斤。水五斗。漫煮至五斗。去滓。再煎成膏。每臥時。溫酒調服半合。以愈爲度。（聖惠方）

用量 錢半至三錢。

參攷資料 煎藥用桑者。取其能利關節。除風寒濕痺諸痛也。觀靈樞經治寒痺內熱。用桂酒法。以桑炭炙布巾熨痺處。治口僻用馬脊法。以桑鈎鈎其口及坐桑灰上。皆取此意也。又癰疽發背不起發。或瘀肉不腐潰。及陰瘡瘰癧流注。臁瘡頑瘡惡瘡。久不愈者。用桑木炙法。未潰則拔毒止痛。已潰則補接陽氣。亦取桑通關節。去風寒火性。暢達鬱毒之意。其法以乾桑木劈成細片。熱作小把。然火吹息。炙患處。每吹炙片時。以瘀肉腐動爲度。內服補托藥。誠良方也。又按趙宧養疴漫筆云。越州一學錄。少年苦嗽。百藥不效。或令用南向桑條一束。每條寸折。納鍋中。以水五盞。煎至一盞。盛瓦器中。渴卽飲之。服一月而愈。此亦桑枝變煎法耳。（李時珍）

【桑油】 **基本** 本品卽桑木之油。

採取 取鮮桑木槌碎。裝入瓶內。用一瓶蓋口。倒埋土中。糠火煨之。油自滴下。貯磁瓶用。

主治 小兒身面爛瘡。輕粉。雄黃各五錢。猪膽一個。滑石一兩。硫黃五錢。穿山甲十五片。炙。鳳凰退燒存性五錢。爲末。用桑油猪膽汁調絹包擦之。

【桑花】 **命名** 本品乃桑樹上之苔蘚。狀如桑椹之花。故名。

古籍別名 桑蘚。桑錢。（綱目）

性質 苦。溫。無毒。

主治 健脾。滿腸。止鼻洪。吐血。腸風。崩中。帶下。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論桑花曰。治熱欬。

【桑柔枝】 卽桑枝之處方用名。詳『桑枝』條。

【桑柴火】 **命名** 本品係用桑木所燃之火。故名。

主治 癰疽發背不起。瘀肉不腐。及陰瘡瘰癧流注。臁瘡頑瘡。燃火吹滅。日炙二次。未潰拔毒止痛。已潰補接陽氣。去腐生肌。凡一切補藥諸膏。宜此火煎之。但不可點艾傷肌。

參攷資料 ㊀火以暢達。拔引鬱毒。此從治之法也。（朱丹溪）㊁桑木能利關節。養津液。得火則拔引毒氣。而祛逐風寒。所以能去腐生新。抱朴子云。一切仙藥。不得桑煎不服。桑乃箕星之精。能助藥力。除風寒痺諸痛。久服。終身不患風疾。故也。藏器曰。桑柴火炙蛇則足見。（李時珍）

【桑柴灰】 **性質** 辛。寒。有小毒。

主治 燕淋。取汁爲煎。與冬灰等分。同滅痣。蝕黑子。蝕惡肉。煮小豆食。大下水腫。傅金瘡止血。生肌。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論桑柴灰曰。桑霜治噎食。積塊。

【桑根白皮】 卽桑白皮之原名。詳『桑白皮』條。

【桑根蛇】 卽黃頷蛇之古籍別名。典見綱目。詳『黃頷蛇』條。

【桑脂】 卽桑葉滋之原名。詳『桑葉滋』條。

【桑寄生】 **命名** 本品寓他木而生。如鳥立於上。稱曰寄生。以寓生桑上者入藥。故名。蔦木俗呼爲寄生草。東方朔傳云。在樹爲寄生。在地爲之蜜藪。

古籍別名 桑上寄生。寄屑。寓木。宛童（本經）。蔦。寄童。窠屑。窠童。桑生。桑絡。混沌。螟蛉。桑上羊兒藤。（和漢藥考）

基本 屬寄生科。爲桑上寄生木之枝葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。桑寄生。國內無論何省。有桑樹者則有出。俗人多以廣東花地爲正。實不盡然。凡往花地摘寄生。一到該園。必多方逢迎。又每元必有若干回頭俾臨時必着人往採雜寄生回園。預備插雜。採得數十斤。卽出頭門之廳。開茶烟點心。休息談話。此時園內之伴卽倣插雜工夫。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

真假混亂。如初一摘去寄生一百斤。初二則採取雜寄生百餘斤回園。安插回摘去寄生之頭處。用牛屎禾稈經之。加之尿水足淋。不十天其葉色暢茂。到十五日後。又從而摘之。有何好處。究不如廣西融縣之大桑樹。數十年生長滿地皆是。寄生之寄於樹者。亦滿目皆是。供多求少。左宜右有。價廉味高。隨卽在梧州開略片蒸一息。其葉仍青。晒乾用之。與花地之寄生。有天淵之別。凡研究藥品者。必須親臨境地。方實而有據也。

形態 桑寄生生於桑樹枝間。根在枝節之內。高二三尺。其葉圓而微尖。質厚而柔面青而光澤。背淡紫而有茸。自生枝葉四月開白花。五月結實。實赤大如小豆。九月熟。汁黏稠者良。生桑樹者佳。

種類 大者曰篤葉。葉如石榴葉。小者曰女蘿。葉如麻黃葉。

採取 每年三月間。連桑枝採其莖葉陰乾。九月間。採其子實晒乾。

製法 雷敩曰。採得用銅刀和根枝莖葉細剉。陰乾用。勿見火。

性質 苦。平。無毒。

效能 驅風濕。健筋骨。益營血安胎元。專用爲婦人藥。

主治 腰痛。小兒背强。癰腫。充肌膚。堅髮齒。長鬚眉。安胎去女子崩中。內傷不足。產後餘疾。下乳汁。主金瘡去痺。

歷代記述效證 【唐】甄權藥性本草論桑寄生曰。主懷妊漏血不止。令胎牢固。【宋】大明日華諸家本草論桑寄生曰。助筋骨。益血脈。【明】繆希雍本草經疏論桑寄生曰。桑寄生感桑之精氣而生。其味苦甘。其氣平和。不寒不熱。固應無毒。詳其主治。一本於桑。抽其精英。故功用比桑尤勝。腰痛及小兒背强。皆血不足之候。癰腫多由於營氣熱。肌膚不充。由於血虛。齒者骨之餘也。髮者血之餘也。益血則髮華。腎氣足則齒堅而鬚眉長。血盛則胎自安。女子崩中及內傷不足。皆血虛內熱之故。產後餘疾。皆由血分。乳汁大下。亦由血虛。金瘡則全傷於血。上來種種疾病。莫不悉由血虛有熱所發。此藥性能益血。故竝主之也。兼能祛濕。故亦療痺。【清】閻立陞本草選旨論桑寄生曰。桑寄生味苦平。無毒。感桑氣之精以生。故其功用一本於桑。而比桑尤勝。本經主腰痛。小兒背强。皆血不足之候。又主癰腫。充肌膚者。腫疽多由於營氣之熱。肌膚不充。由於血之虛也。齒者骨之餘。髮者血之餘。腎氣足則鬚髮長。血盛則胎自安。女子崩中及內傷不足。皆血虛內熱之故。產後餘疾。皆由於血分。乳汁不下。亦由於血虛。金瘡則金傷於血。故成種種疾病。莫不悉由血虛有熱所致。此藥性能益血。故並主之也。就能祛濕。故亦主風濕痺。就古人於風濕作痛之症。每用獨活寄生湯。百發百中。今人服之。杳無奏功。詎非藥不得其眞。故耳。況川獨活。市人多以土當歸僞充。兩性俱燥。用之則耗衝敗營。無益有損。寧不爭劇耶。惟葵山吳氏。謂獨活原本羌活一種。以節密輕虛者爲羌。節疎重實者爲獨。川續斷與桑寄生。氣味略異。主治願同。不得寄生。卽加續斷。別立其名曰羌活續斷湯。使醫者不泥於專名。病家勿誤於假藥。仁恩溥濟。何其遽哉。【清】黃宮繡本草求眞論桑寄生曰。桑寄生感桑精氣而生。味苦而甘。性平而和。不寒不熱。號爲補腎補血要藥。緣腎主骨。髮主血。苦入腎。腎得補則筋骨有力。不致痿痺。而不酸痛矣。甘補血。血得補則髮受其灌隆。而不枯脫落矣。故凡內而腰痛。筋骨痿疾。胎墮。外而金瘡。肌膚風濕。何一不藉此以爲主治乎。第出桑樹生者眞。和莖葉細剉。陰乾。忌火服。則其效如神。若雜樹所出。性氣不同。恐反有害。【清】黃元御玉楸藥解論桑寄生曰。桑寄生。通達經絡。驅逐濕痺。治腰痛。背强。筋攣。骨弱。血崩。乳閉。胎動。腹痛。痢疾。金瘡。癰疽。堅髮齒。長眉鬚。【清】張隱菴本草崇原論桑寄生曰。寄生感桑氣而寄生枝節間。生長無時。不假土力。奪天地造化之神功。故能資養血脈於空虛之地。而取效倍於他藥也。主治腰痛者。腰乃腎之外俟。男子以藏精。女子以繫胞。寄生得桑精之氣。虛繫而生。故治腰痛。小兒腎形未足。似無腰痛之證。應有背强癰腫之疾。寄生治腰痛。則小兒背强癰

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膿之能治之充肌膚精氣外達也。堅髮齒精氣內足也。精氣外達而充肌膚則髮眉亦長。精氣內足而堅髮齒則胎亦安蓋肌膚者皮肉之餘。齒者骨之餘。髮與鬚眉者血之餘。胎者身之餘。以餘氣寄生之物。而治餘氣之病。同類相感如此。

【清】徐洄溪本草經百種錄論桑寄生曰。寄生乃桑之精氣所結。後生小樹於枝間。有子之象。爲故能安胎。其性與桑相近。故能驅風養血。其生不著土。資天氣而不資地氣。故能滋養血脈於空虛之地。而取效更神也。

國外學說 和漢藥考曰。屬於槲寄生科之宿木。一曰寄生。故寄生槲樹或他種樹木之植物。謂之槲寄生。暖地不飼蠶之老桑樹。其枝間寄生一種宿木。自桑樹之皮部抽莖而出。宛似插枝於他木者然。其枯死之枝葉俱現黃色。因採之以入藥。又大和本草曰。檄桑樹無寄生。而養蠶之地。老桑亦少。故眞者難得。惟日本隱岐及肥前五島有之。俗以爲中風要藥。頗貴重。又和漢三才圖會曰。他樹寄桑木而生。曰桑寄生。又本草序例桑耳。名桑寄生。是一名而二物矣。非一物而二名也。又手板發蒙曰。諸木皆有寄生。入藥須用桑上寄生。他木寄生者有毒。桑上寄生。作黃色。隱州產爲上。不飼蠶之暖地。桑無採斫之苦。故茂盛而寄生多。其寄生他木者黃色。非天然。乃僞染也。不可不辨。

配合應用 ㊀治血虛。手臂骨節疼痛。桑寄生、枸杞子、地黃、胡麻、川續斷、何首烏、當歸、牛膝。

㊁療一切風濕痺用桑寄生入獨活寄生湯。

㊂療胎動腹痛。桑寄生一兩五錢。阿膠炒五錢。艾葉五錢。水一盞半。煎一盞。去滓溫服。或去艾葉。以其熱也。（聖惠方）

㊃治腸氣生。桑寄生搗汁一盞。服之。（集簡方）

㊄治毒痢膿血。六脈微小。並無寒熱。宜以桑寄生二兩。防風、大芎二錢半。炙甘草三錢。爲末。每服二錢。水一盞。煎八分。和滓服。（楊子建護命方）

㊅治下血後虛。下血止後。但覺丹田元氣虛乏。腰膝沉重。少力。桑寄生爲末。每服一錢。非時白湯點服。（楊子建護命方）

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡非桑上者禁用。忌火。並忌鐵器。

著名方劑 獨活寄生湯。治風寒濕痺。偏枯腳氣。（千金方）獨活三兩。桑寄生、秦艽、細辛、歸身、生地、白芍、川芎、桂心、茯苓、杜仲、牛膝、人參、甘草各等分。爲粗末。每服四錢。煎服。一方有防風。

參攷資料 ㊀桑寄生新脩書云。今處處有之。從宮南北。實處處難得。豈歲歲窠斫摘踐之苦而不能生邪。抑方宜不同也。若以爲鳥食物子落枝節間。感氣而生。則麥當生麥。穀當生穀。不當但生此一物也。又有於柔滑細枝上生者。如何得子落枝節間。由是言之。自是感造化之氣。別是一物。古人當日。惟取桑上者。實假其桑耳。又云。今醫家鮮用此極誤矣。今醫家非不用也。第以難得眞桑上者。嘗得眞桑寄生。下嚥必驗如神。（寇宗奭）

㊁寄生松上、楊上、楓上。皆有形類一般。但根津所因處爲異。則各隨其樹名之。生樹枝間。根在枝節之內。葉圓青赤。厚澤帶折。旁自生枝節。冬夏生。四月花白。五月實赤。大如小豆。處處皆有。以出彭城者爲勝。俗呼爲續斷用之。而本經續斷別在上品。主療不同。市人混雜無識者。（陶弘景）㊂此多生楓槲柳水楊等樹上。葉無陰陽。如細柳葉而厚。腥莖粗短。子黃色。大如小棗。惟虢州有桑上者。子汁甚黏。核大似小豆。九月始熟。黃色。陶言五月實赤。大如小豆。蓋未見也。江南人相承用。其莖爲續斷。殊不相關。（蘇恭）㊃諸樹多有寄生。莖葉並相似。云是鳥食一物子。糞落樹上。感氣而生。葉如橘而厚軟。莖如槐而肥。腥處處雖有。須桑上者佳。然非自採。卽難以別。可斷莖視之。色深黃者爲驗。又圖經云。葉似龍膽而厚闊。莖短似雞脚。作樹形。三月四月花黃白色。六月七月結子黃綠色。如小豆。以汁稠黏者良也。（韓保昇）㊄寄生高者二三尺。其葉圓而微尖。厚而柔。面青而光澤。背淡紫而有茸。人言川蜀桑多時

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有生者。他處鮮得。須自采或連桑采者。乃可用。世俗多以雜樹上者充之。氣性不同。恐反有害也。按鄭樵通志云。寄生有兩種。一種大者。葉如石榴葉。一種小者。葉如麻黃葉。其子皆相似。大者曰蔦。小者曰女蘿。今觀蜀本韓氏所說。亦是兩種。與鄭說同。（李時珍）

【桑寄生實】性質　甘。平。無毒。

主治　明目。輕身。通神。

【桑寄生實】古籍別名　草王。（別錄）

產地　多生園中。

形態　桑莖實爲雜草類之一種。方莖。大葉如荏。可供藥用。

採取　十月採之。

性質　酸。溫。無毒。

主治　婦人孕餘病。益氣輕身。

【桑絡】即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【桑黃】即桑耳之古籍別名。典見藥性。詳『桑耳』條。

【桑椹】處方用名　黑桑椹。

古籍別名　葚。人精。桑仁。桑實。文武實。（和漢藥考）

外國名詞　Mori Succus（拉丁）

基本　屬於桑科。爲山桑所結之子實。

產地　㊀陳仁山藥物生產辨云。本品以中國地產者佳。尤以廣東、南海、順德、更好。㊁桑椹原產波斯國。今我國養蠶各地。皆有之。

形態　桑椹初結色青黃。成熟色紫黑。形橢圓。表面凸凹不平。內含圓形小仁。種子懸其內。胚曲鉤。汁頗多。

種類　椹有烏白二種。而烏者良。

採取　每年四月間成熟時。採之日乾。

製法　寇宗奭曰。凡使桑椹。摘微研。以布濾汁。石器熬成稀膏。量多少入蜜。熬稠。貯藝器中。仙方日乾爲末。蜜和爲丸。酒服亦良。李時珍曰。桑椹酒能理百種風熱。其法用椹汁三斗。重湯煮至一斗半。入白蜜二合。酥油一兩。生薑一合。煮令得所。瓶收。

用法　與他藥水煎。或剉末糊丸。其鮮者。搗汁用。

性質　甘。寒。無毒。

成分　桑椹味初酸。繼轉甜。中含機酸、糖分、黏液質、鹽類、色素等。

效能　補腎明目。養血祛風。用作強壯藥。又治習慣性便祕。

作用　在胃中能補胃液之缺乏。以助消化之不足。入腸能激腸之黏膜。使腸之分泌增多。并能稍促腸之蠕動。

主治　利五臟。關節痛。血氣。久服不飢。安魂鎮神。令人聰明。變白不老。多收暴乾爲末。蜜丸日服。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論桑椹曰。單食止消渴。

【明】李時珍本草綱目論桑椹曰。搗汁飲。解中酒毒。釀酒服。利水氣。消腫。【明】繆希雍本草經疏論桑椹曰。桑椹者。桑之精華所結也。其味甘。其氣寒。其色初丹後紫。味厚於氣。合而論之。甘寒益血而除熱。其爲涼血補血益陰之藥無疑矣。消渴由於內熱。津液不足。生津故止渴。五臟皆屬陰。益陰故利五臟。陰不足則關節之血氣不通。血生津滿。陰氣長盛。則不飢而血氣自通矣。熱退陰生。則肝心無火。故魂安而神自清寧。神清則聰明內發。陰復則變白不老。甘寒除熱。故解中酒毒。性寒而下行利水。故利水氣而消腫。此皆自然之道也。【清】黃宮繡本草求眞論桑椹曰。桑椹甘涼色黑。治能除熱。養陰止渴。烏鬚黑髮。【清】黃元御玉楸藥解論桑椹曰。桑椹滋木利水。清風潤燥。治消渴。癰淋。瘧疫。殆。烏鬚黑髮。【清】王士雄隨息居飲食譜論桑椹曰。桑椹甘平。滋肝腎。充血液。止消渴。利關節。解酒毒。祛風濕。聰耳明目。安魂鎮魄。可生啖。（宜微鹽拌食）。可飲汁。或熬以成膏。或爆乾爲末。設逢歉歲。可充糧食。久久服之。鬚髮不白。以小滿前熟透色黑而味純甘者良。熟桑椹以布濾取汁。瓷器熬成膏收之。每日白湯或醇酒調服一匙。老年服之。長精神。健步履。息虛風。靖虛火。兼治水腫脹滿。瘰癧結核。

國外學說　英美學說謂桑椹汁俗名桑仁汁。用桑椹扭出之。中國西國均有之。樹高約二丈至三丈。不等。從太古以來。無人不知有此樹。其原產地在波斯國等處。漸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

移植於歐羅巴之南。今英國則各處種植此樹。桑椹熟時。其汁含水質甚多。

配合應用 ㊀四時月令云。四月宜飲桑椹酒。能理百種風熱。其法用桑椹汁三斗。重湯煮至一斗半。入白蜜二合。酥油一兩。生薑汁一合。煮令得所。瓶收。每服一合。和酒飲之。亦可以汁熬燒酒藏之。經年味愈佳。

㊁治瘰癧結核。文武膏用文武實。即桑椹子二斗。黑熟者。以布取汁。銀石器熬成膏。每白湯調服一匙。日三服。（保命集方）

㊂治水腫脹滿。水不下則滿溢。水下則虛竭。還脹十無一活。宜用桑椹酒治之。桑心皮切。以水二斗。煮汁一斗。入桑椹再煮取五升。以糯飯五升。釀酒飲。（普濟方）

㊃治諸骨鯁咽。紅椹子細嚼。先嚥汁。後嚥滓。新水送下。乾者亦可。（聖惠方）

㊄治小兒赤禿。桑椹取汁類服。（千金方）

㊅治小兒白禿。黑椹入器中曝三七日。化爲水。洗之三七日。神效。（聖惠方）

㊆拔白變黑。黑椹一斤。蝌蚪一斤。瓶盛封閉。懸屋東頭一百日。盡化爲黑泥。以染白髮如漆。（本草拾遺方）

㊇髮白不生。黑熟桑椹。水浸日曬。搽塗。令黑而復生也。（千金方）

㊈治陰證腹痛。桑椹絹包。風乾。過伏天爲末。每服三錢。熱酒下取汗。（集簡方）

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡大便溏瀉。腎虛無熱者禁用。

參攷資料 ㊀本經言桑甚詳。然獨遺烏椹。桑之精英。盡在於此。採摘微研。以布濾汁。石器熬成稀膏。量多少入蜜熬凋。貯瓷器中。每抄一二錢。飲後夜臥。以沸湯點服。治服金石發熱。口渴生精神。及小腸熱。其性微涼。故也。仙方曰。乾爲末。蜜和爲丸。酒服亦良。（寇宗奭）

【桑椹酒】

製法 用桑椹搗汁。煎過同麴米釀酒飲。

主治 補五臟。明目。治水腫。

【桑葉】

處方用名 冬桑葉。霜桑葉。桑葉。桑葉。枯桑葉。

基本 屬桑科。爲山桑之葉。

產地 ㊀陳仁山藥物生產辨云。桑葉產廣東以南海。順德爲最。㊁凡江浙養蠶區域。恒多生焉。

形態 桑葉爲廣卵圓形。末端尖銳。底部作心臟形。近絲有鋸齒。有時分三裂五裂。葉面作淺綠色。

種類 葉無岐者。俗稱家桑。爲上品。葉有岐者。俗稱野桑。爲下品。

採取 九十月間採摘晒乾。其經霜後枝上賸留者尤佳。

製法 蘇頌曰。凡使桑葉。以四月桑茂盛時採葉。又十月霜後三分二分已落時。一分在者。名神仙葉。即採取與前葉同陰乾用。

性質 苦。甘。寒。有小毒。

效能 祛風。清熱。涼血。明目。爲疏表解熱藥用於傷風感冒。及白喉等症。又能輕微刺激肺黏膜。及喉頭黏膜。使分泌增加。爲祛痰鎮咳藥。

主治 除寒熱出汗。（本經）汁解蜈蚣毒。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論桑葉曰。煎濃汁服。能除脚氣水腫。利大小腸。【唐】孟詵食療本草論桑葉曰。炙熱煎飲。代茶止渴。【唐】陳藏器本草拾遺論桑葉曰。研汁治金瘡。及小兒吻瘡。煎汁服。止霍亂腹痛吐下。亦可以乾葉煮之。雞桑葉煮汁熬膏服。去老風及宿血。【宋】大明諸家本草論桑葉曰。煎飲。利五臟。通關節。下氣。嫩葉煎酒服。治一切風。蒸熱搨腎風痛出汗。并撲損瘀血。挼爛塗蛇蟲傷。【明】李時珍本草綱目論桑葉曰。治勞熱咳嗽。明目長髮。【清】黃宮繡本草求眞論桑葉曰。清肺瀉胃。涼血燥澀。去風明目。

近人學說 張山雷曰。以老而經霜者爲佳。欲其氣之全。力之厚也。故入藥用冬桑葉。亦曰霜桑葉。古稱桑爲箕星之精。箕主風而通於肝。故以桑葉爲平肝之藥。頤謂此葉清芬。而經秋入冬。得嚴霜之令。故能泄降肝膽之鬱熱。非但木之折其剛暴之性。蓋桑樹確是肝家要藥。故桑枝宣通肝絡。疏利脇肋搘撐。桑椹入血補營。滋養肝腎陰液。而其葉脈絡最多。清疏明朗。則宣通肺絡。而疏達皮毛。清燥泄熱。皆以性情爲主治也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

配合應用　㊀治青盲洗法。昔武勝軍宋仲孚患此已二十年。用此法二年。目明如故。新研青桑葉焙乾。逐月按日就地上燒存性。每以一合。於瓷器內煎減二分。傾出澄清。溫熱洗目至百度。常試有驗。（普濟方）㊁治風眼下淚。膿月不落。桑葉煎湯。日日溫洗。或入芒硝。（集簡方）㊂治赤眼澀痛。桑葉爲末。紙卷燒煙。熏鼻取效。海上方也。（普濟方）㊃治頭髮不長。桑葉、麻葉煮汁水沐之。七次。可長數尺。（千金方）㊄治吐血不止。晚桑葉焙研。涼茶服三錢。只一服止。後用補肝肺藥。（聖濟總錄方）㊅治小兒渴疾。桑葉不拘多少。逐片染生蜜。綿繫帶上。綳陰乾。細切。煎汁日飲代茶。（勝人方）㊆治霍亂轉筋入腹。須用桑葉一握。煎飲一二服立定。（聖惠方）㊇治大腸脫肛。黃皮桑樹葉三升。水煎過。用帶溫卷納之。（仁齋直指方）㊈治肺毒風瘡。狀如大風。絳雲散。用好桑葉洗淨。蒸熟。一宿日乾爲末。水調二錢。七服。（經驗方）㊉治癰口不斂。經霜黃桑葉爲末傳之。（直指方）㊊治穿掌腫毒。新桑葉研爛。會之即愈。（通玄方）㊋治湯火傷瘡。經霜桑葉燒存性爲末。油和傳之。三日愈。（醫學正傳方）㊌治手足麻木。不知痛痒。霜降後桑葉煎湯類洗。（急救方）

用量　錢半至三錢。

著名方劑　桑菊飲。治太陰風溫。但咳。身不甚熱。微渴者。此方主之。（溫病條辨方）桑葉二錢半。菊花一錢。杏仁一錢。連翹一錢半。薄荷八分。苦梗二錢。甘草八分。蘆根二錢。右以水二杯。煮取一杯。日二服。

參攷資料　㊀桑葉擣末丸散任服。或煎水代茶飲之。又霜後葉煮湯淋漉手足。去風瘁殊勝。又微炙和桑衣煎服。治痢及金瘡諸損傷止血。（陶弘景）㊁經霜桑葉研末。米飲服。止盜汗。（朱震亨）㊂桑有數種。有白桑、葉大如掌而厚。雞桑、葉花而薄。子桑、先椹而後葉。山桑、葉尖而長。以子種者。不若壓條而分者。桑生黃衣。謂之金桑。其木必將槁矣。種樹書云。桑以構接則桑大。桑根下埋龜甲。則茂盛不蛀。（李時珍）

【桑葉滋】　**原名**　桑脂。

基本　本品即新鮮桑葉筋中之白汁。

性質　苦。微寒。無毒。

主治　天絲入目點之。乳癰、癰瘡及蜈蚣咬傷。

配合應用　㊀治乳癰。用桑葉不拘頭二葉。摘去半段。取後半段。脂三分。黃柏八錢。水煎。乾止用三分。飯鍋蒸一次。夜露一宿。塗患處。雖爛見骨者。亦能收口平復。（集驗方）㊁治小石癰。採二霣桑葉。滴下滋水。點上愈。小石癰。令人呼爲紮馬疔。（錢峻經驗單方）㊂消癭瘤。用蝌蚪一錢。蛇脫、泥球包煅爲末。三分。鬼饅頭滋乾一錢。桑滋乾一錢。乳香、沒藥各三分。麝香一分。共爲細末。飯和搗爲錠。臨用時。再取鬼饅頭滋化開。以雞翎搽患處。過宿即消。（秋泉祕方）

【桑葉露】　**主治**　目疾紅筋。去風清熱。

【桑蛾】　即桑耳之古籍別名。典見宋本草。詳「桑耳」條。

【桑實】　即桑椹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑椹」條。

【桑椹柮】　**基本**　本品即多年老桑數被翦伐嫩枝。其枝頭長成如拳狀者。

主治　腸症燒紅存性。爲末酒服。

【桑鳽】　**古籍別名**　竊脂。（爾雅）青雀（郭璞）蠟嘴雀。（綱目）

外國名詞　Eophona (Coccothraustes) personata (拉丁)

基本　係脊椎動物鳥類鳴禽類雀科之桑鳽。

產地　山林間。

形態　桑鳽爲林禽類之一種。大如鴿鴿。其嘴圓錐形而粗短。色黃。嘴根青黑。頭頂眼尖。眼緣及尾皆黑色。有鋼光。腹背皆灰色。略帶褐翼紫黑。有白條紋。脚淡黃色。性

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

喜食果實穀類。爲農家之害鳥。其肉可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 肌肉虛羸。益皮膚。

【桑錢】 卽桑花之古籍。別名典見綱目。詳『桑花』條。

【桑螵蛸】 **命名** 本品輕飄如綿。而須採桑樹上者。故名。

古籍別名 蟷螂窠。刀螂窠。致神。(綱目)拒斧窠不過。(爾雅)蝕肬。蜱蛸。螳螂。(別錄)螵蛸蟲尿窩。(本草綱目)野狐鼻涕。(和漢藥考)冒夷。(揚雄方言)

基本 係屬昆蟲類中爲直翅類螳螂之卵。秋日築窠桑樹上。經日堅凝而成螵蛸。

產地 陳仁山藥物生產辨云。以廣東各屬產者爲最。尤以新安東莞爲上。廣西八屬等亦有出。次之。又有產江蘇鎭江府者。又次之。均九月新。

形態 桑螵蛸爲形如舊紙之塊。性極輕。長寸許。色黑褐或黃褐。破之則類似海螵蛸。各房中俱藏卵子。(本草徵要曰。一生出九十九。)

種類 螳螂卵子。蓬樹便產。惟以桑樹上者。是得桑皮之津氣良。

採取 每年於二三月間。連桑枝採收之。

製法 別錄曰。凡使桑螵蛸。卽桑枝上螳螂子也。採來蒸過火炙用。不爾令人洩。雷敎曰。凡使勿用雜樹上生者。名螵螂。須覓桑樹東畔枝上。採得去核子。用沸漿水浸淘七次。鍋中熬乾。用別修治無效也。韓保昇曰。採得以熱漿水浸一伏時焙乾。於柳木灰中炮黃用。

性質 鹹。甘。平。無毒。

效能 固腎益精氣。補虛治遺溺。用以治陰痿。遺精及夜尿病。

主治 傷中。疝瘕。陰痿。益精生子。女子血閉。腰痛。通五淋。利小便。小道。(本經)療男子虛損。五臟氣微。夢寐失精。遺溺。久服益氣養神。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論桑螵蛸曰。炮熟空心食之。止小便利。男子身衰精自出及虛而小便利者。加而用之。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論桑螵蛸曰。古方漏精。及風藥中多用之。【宋】寇宗奭本草衍義論桑螵蛸曰。男女虛損。腎衰陰痿。夢中失精。遺溺。白濁。疝瘕。不可閑也。【明】李時珍本草綱目論桑螵蛸曰。桑螵蛸肝腎命門藥也。古方盛用之。【明】經希雍本草經疏論桑螵蛸曰。桑螵蛸。桑樹上螳蜋子也。本經味鹹氣平。別錄甘無毒。氣薄味厚。陰也。入足少陰太陽經。人以腎爲根本。男子腎經虛損。則五臟氣微。或陰痿。夢寐。失精。遺溺。鹹味屬水。內合於腎。腎得之而陰氣生長。故能愈諸疾。及益精生子也。腎與膀胱爲表裏。腎得所養。則膀胱自固。氣化則能出。故利水道。通五淋也。女子屬陰。肝腎用事。疝瘕血閉。腰痛。皆二經爲病。鹹能益陰入血。軟堅。是以主之。甘能補中。故主傷中。益氣。腎足則水自上升。克與心交。故能養神也。【淸】黃宮繡本草求眞論桑螵蛸曰。桑螵蛸卽桑枝上螳螂子也。一生九十九子。用一枚便傷百命。勿輕用之。味鹹寒甘。氣平無毒。入足少陰腎。足太陽膀胱。蓋人以腎爲根。本男子腎經虛損。則五臟氣微。或陰痿。夢寐。失精。遺溺。螵蛸味屬水。內合於腎。腎得之而陰氣生長。故能愈諸疾。及益精生子。腎與膀胱爲表裏。腎得所養。則膀胱自固。氣化則能出。故利水道通五淋也。女子屬陰。肝腎用事。疝瘕血閉。腰痛。皆二經爲病。鹹能入血軟堅。是以主之。甘能補中。故主傷中。益氣。腎足。則水自上升。克與心交。故能養神也。又言利便。義由是矣。產桑樹者佳。

配合應用 (一)治虛勞盜汗。遺精白濁。桑螵蛸炙白龍骨等分。爲細末。每服二錢。空心鹽湯下。(外臺祕要方)

(二)治婦人遺尿。桑螵蛸酒炒爲末。白湯服二錢。兼治胎前產後遺尿不禁。(千金翼方)

(三)治小便不通。桑螵蛸炙黃。三十枚。黃芩二兩。水煎分二服。(聖惠方)

(四)治婦人胞轉。小便不通。用桑螵蛸炙爲末。飮服方寸匕。日用二。(產書方)

(五)治咽喉腫塞。桑上螳螂窠一兩。燒灰。馬屁勃半兩。研勻。蜜丸。梧

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子大煎犀角湯每服三五丸。（總病論方）

㈥治咽喉骨鯁。桑螵蛸醋煎呷之。（經驗良方）

㈦治底耳疼痛。桑螵蛸一箇燒存性。麝香一字研末。每用半字。摻入神效。有膿先拭淨。（經驗方）

㈧治小兒軟癍。桑螵蛸燒存性。研末油調傅之。（危氏方）

用量　一錢至三錢。

施用宜忌　凡火盛者宜少用。

長旋覆花戴椎。

著名方劑　桑螵蛸散。治小便頻數。遺精白濁。心神恍惚。健忘等症。（盛宗奭方）桑螵蛸（燕過略炒）遠志石菖蒲人參茯神當歸龍骨（另研）龜甲（炙黃）甘草各一兩。右共研末。臨睡時。以人參湯調下二錢。

【桑橋】　即桑耳之古籍別名。典見唐本草。詳『桑耳』條。

【桑蟲】　即桑蠹蟲之簡稱。

【桑雞】　即桑耳之古籍別名。典見綱目。詳『桑耳』條。

【桑蘇】　即桑花之古籍別名。典見綱目。詳『桑花』條。

【桑瘼】　命名　本品生於老桑樹上之瘿塊。狀如瘤形。故名。

採取　用刀斫下。陰乾用。

主治　療胃痛。去風痺諸溼。浸酒用。

【桑蠹糞】　主治　腸風下血。婦人崩中。產痢。小兒驚風。胎癬。咽喉骨鯁。

【桑蠹蟲】　命名　本品爲蠹蟲之生於桑樹者。故名。

古籍別名　桑蝎（綱目）

形態　桑蠹蟲爲化生蟲類之一種。乳白色。無脚。有黃褐色短毛。被覆全體。背有顆粒狀突起之物。能支其體。以覆行。蝕桑能入蛛中。致桑枯死。其蟲可供藥用。

性質　甘溫。無毒。

主治　心暴痛。金瘡肉生不足。

歷代記述攷證　【唐】韓保昇曰。本草論桑蠹蟲曰。治眼疾。【唐】陳藏器本草拾遺論桑蠹蟲曰。去風。補不足。治小兒乳癜。【宋】日華諸家本草論桑蠹蟲曰。胸下堅滿。障翳瘀腫。治風瘧。【明】李時珍本草綱目論桑蠹蟲曰。小兒驚風。口瘡。風疳。婦人崩中。漏下赤白。墮胎下血。產後下痢。

【桓】　即無患子之古籍別名。典見本草拾遺。詳『無患子』條。

【桑】　即櫟之別名。典見植物學大辭典。詳『櫟』條。

【桑栗】　即栗之叢生者。實大如杏仁。詳『栗』條。

【桔皮】　即橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【桔枸子】　即枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【桔梗】　命名　本品根莖結實而梗直。故名。

處方用名　苦桔梗。白桔梗。蜜炙桔梗。玉桔梗。

古籍別名　薺苨（本經）白藥。梗草（別錄）利如。符婁。虛菇。房圖。方圖（吳氏本草）苦梗（綱目）木便。苦蔓。吉祥杵。都乙。羅叱。道乙。阿叱（和漢藥考）

學名　Platycodon grandiflorum A. D. C.

基本　屬桔梗科爲 Campanulaceae 植物 Platycodon grandiflorum之根。



桔梗（二）



桔梗（一）

形態　桔梗爲多年生草本。自生於山野向陽之地。春日生苗莖高二三尺。大者可四五尺。葉爲長卵圓形或披針形。邊緣有細鋸齒。多互生。夏秋之交。莖端開花。色或白或青紫。花冠五裂如鐘。花後結倒卵圓形之蒴果。根類沙參而扁。曲外現黃褐色。直下肥厚。

產地　陳仁山藥物生產辨云。桔梗產安徽滁州府。廣西各屬亦有出。產每年春秋兩次收成。

種類　味苦而根中有心者曰桔梗。即苦桔梗。味甜而根中無心者曰薺苨。即甜桔梗。

採取　春採嫩苗。可以羹食。二月八月間採根。曝乾。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

製法 雷敩曰。凡使桔梗。須去頭上尖硬。細剉用。生百合搗碎。水浸一伏時。火熬令乾。李時珍曰。今但刮去浮皮。米泔水浸一夜。切片微炒用。

性質 辛。微溫。有小毒。

效能 宣肺氣。散風寒。能載藥上行。用爲祛痰鎮咳藥。治於感冒痰咳喘息。肺結核。肋膜炎等症。

主治 胸脇痛如刀刺。腹滿腸鳴。幽幽驚恐悸氣。(本經)利五臟腸胃。補血氣。除寒熱。風痺。中消穀。療喉咽痛。下蟲毒。(別錄)

張仲景之發明 桔梗一味。經張仲景之實驗。謹爲主治濁唾腥膿也。旁治咽喉痛。茲考徵如下。㊀排膿湯證闕。㊁桔梗白散證曰。出濁唾腥臭。久久吐膿。㊂桔梗湯證曰。出濁唾腥臭。久久吐膿。㊃排膿散證闕。以上四方。其用桔梗者。或三兩。或一兩。或三分。或二分。上四方者。皆仲景之方也。而排膿湯。以桔梗爲君藥也。不載其證。今乃歷觀其用桔梗諸方。或肺癰。或濁唾腥臭。或吐膿也。而以桔梗爲君藥者。名爲排膿。則其排膿也明矣。排膿湯之證雖闕。而桔梗湯觀之。則其主治明矣。桔梗湯證曰。出濁唾腥臭。久久吐膿。仲景曰。咽痛者。可與甘草湯。不差者。與桔梗湯。也是乃甘草者。緩其毒之急迫也。而濁唾吐膿。非甘草之所主。故其不差者。乃加桔梗也。由是觀之。膿痛急迫。則桔梗湯。濁唾吐膿多。則排膿湯。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論桔梗曰。主治下痢。破血積。氣。消聚痰。涎。去肺熱。氣促。嗽逆。除腹中冷痛。主中惡及小兒驚癎。【宋】大明諸家本草論桔梗曰。下一切氣。止霍亂轉筋。心腹脹痛。補五勞養氣。除邪辟溫。破癥瘕。肺癰。養血排膿。補內漏。及喉痺。【金】張元素珍珠囊論桔梗曰。利竅。除肺部風。熱。清利頭目。咽嗌。胸膈滯氣及痛。除鼻塞。【元】李東垣用藥法象論桔梗曰。治寒嘔。【明】李時珍本草綱目論桔梗曰。主口舌生瘡。赤目腫痛。【明】繆希雍本草經疏論桔梗曰。桔梗本經味辛氣微溫。別錄加苦。云有小毒。神農醫和岐伯雷公咸曰無毒。而復加甘。觀其所主諸病。應是辛苦甘平。微溫無毒。傷寒邪結胸脇。則痛如刀刺。邪在中焦。則腹滿及腸鳴幽幽。辛散升發。苦洩甘和。則邪解而氣和。諸證自退矣。其主驚恐悸氣者。心脾氣血不足。則現此證。諸補心藥中。藉其升上之力。以爲舟楫勝載之用。此佐使之職也。別錄利五臟腸胃。補血氣者。蓋指邪解則臟腑腸胃自和。和則血氣自生也。除寒熱風痺。溫中。療喉咽痛。下蟲毒者。皆散邪解毒。通利之功也。消穀者。以其升載陽氣。使居中焦而不下陷。則脾中陽氣長浮。而穀食自消矣。甄權用以治下痢。及去肺熱氣促者。升散熱邪之故也。日華子用以除邪辟瘟。肺癰。排膿。潔古用以利竅。除肺部風熱。清利頭目。咽嗌。胸膈滯氣及痛。除鼻塞者。入肺開發和解之功也。【明】李士材本草圖解論桔梗曰。桔梗苦辛。氣輕味平。入肺經。載引諸藥入至高之分。爲舟楫之劑。肺金稱職。則清肅下行。故能利膈下氣。散痞滿。治胸脇痛。破血結。消痰涎。理喘咳。療肺癰。排膿血。清上焦熱。凡頭目咽喉口鼻諸症。一切主之。按桔梗之用。惟其上入於肺。肺爲主氣之臟。故能使諸氣下降。世俗泥爲上升之劑。不能下行。失其用矣。凡用桔梗。去蘆及浮皮及尖。以百合搗爛。同浸一日。剉碎微焙。【清】黃宮繡本草求眞。論桔梗曰。桔梗辛苦而平。按書而載能引諸藥上行。又載能以下氣。其義何居。蓋緣人之臟腑胸膈。本貴通利。一有寒邪阻塞。則氣血不通。其在於肺。則或爲不利。而見痰壅。氣促。鼻塞。其在陽明。則或風熱相搏。而見齒痛。其在少陰。則因寒薇火鬱。而見目赤。喉痺。咽痛。久而火鬱於肺。則見口瘡。肺癰。乾咳。火鬱上焦。則見胸膈刺痛。肺火移鬱大腸。則見下痢。腹痛。腹滿。腹鳴。總皆寒入於肺。閉其竅道。則清不得上行。濁因不得下降。耳。桔梗味苦。氣平。質浮。色白。係開提肺氣之聖藥。可爲諸藥舟楫。載之上浮。能引苦泄峻下之劑。至於至高之分。成功。俾清氣既得上升。則濁氣自克下降。降氣之說。理根於是。是以好古加味甘桔。無不因症加藥。如失音則加訶子。聲不出加牛夏。上

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

氣加陳皮。涎嗽加知母貝母。咳加五味。酒毒加葛根。少氣加人參。嘔加半夏生姜。吐膿血加紫菀。肺痿加阿膠。胸膈不快加枳殼。痞滿加枳實。目赤加梔子大黃。面腫加茯苓。膚痛加黃耆。瘡疽加荊防。疫癘加牛蒡大黃。不得眠加梔子。總不離乎桔梗。以爲開提。奈世僅知此屬上升。而不知其下行。其失遠矣。但痘疹下部不起。勿用以其性升之故。久嗽不宜用。以其通陽泄氣之故。陰虛不宜用。以其拔火上乘之故。其蘆能吐膈上風熱痰實。生研末。水調服。探吐去浮皮。泔浸微炒用。【清】鄒澍本經疏證論桔梗曰。海藏東垣丹溪皆謂桔梗入腎。豈不以仲景治少陰咳痛耶。殊不知桔梗主咳痛。仍是治肺非治腎也。夫足少陰直者。從腎上貫肝膈。入肺中。循喉嚨。挾舌本。支者。從肺注心中。腎家邪熱。循經而上。肺不任受。遂相爭競。二三日邪熱未盛。故可以甘草瀉火而愈。若不愈。是肺竅不利。氣不宣洩也。以桔梗開之。肺竅既通。氣遂宣洩。熱自透達矣。雖然。此舉其暫者言耳。曰咳而胸滿振寒。脈數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。非氣停卽飲停。飲停卽熱生。氣血爲之潰腐耶。亦主以桔梗湯。而注其效曰。再服則吐膿血。豈非火清則熱行。氣宣則腐去也。由此而推。謂腎家之熱爲肺所阻者。其一端也。肺家有熱。氣不宣洩。何獨不能阻腎之氣。使熱復生於下哉。又曰。亦主血瘀。血瘀之脈。寸口關上微。尺中小緊。是病亦關於腎。蓋血瘀由於氣瘀。氣開則血開。上竅通。下竅自通也。通嶁四逆湯。咽痛者。去芍藥。加桔梗。利止嶁不出者。去桔梗。加人參芍藥。開陰結。止腹痛下利。桔梗開陽結。亦止腹痛下利。可知戴陽之候。有結於陽。有結於陰。桔梗芍藥之用。隱然相對待矣。利止必腹痛先已。腹痛已。則結已開。無所事芍藥。并無所事桔梗。況結既開。正嶁其虛。又烏可復用開洩人參之補。肺桔梗之開。肺又隱然相對待矣。於此知桔梗之苦先於辛。苦藉於辛。苦者以開提腸胃蓄積。辛者使從肺泄爲出路。諸家謂爲升提。謂爲舟楫。似矣。其實又有故焉。如此者。寒實結胸無熱證者。治以白散。散中用桔梗爲疏通氣分之主。夫開導胸中之氣。仲景於大承氣湯、小承氣湯、梔子厚朴湯。莫不用枳朴。此偏不用何哉。蓋病有上下。治有操縱。結在上者。宿痰停飲也。故凡結胸無論熱實寒實。寧用甘遂、芫花、巴豆。不用枳朴。如大陷胸湯丸。白散是也。結在中下。始熱與實洩。氣隨熱化。則於蕩滌邪穢中。疏利其與邪爲伍之氣。大小承氣等湯是也。況桔梗之用。使氣上越而不使氣下洩。今病在至高。固宜操上而縱下。不使中下無過之地。橫被侵凌。故曰病在膈上必吐。在膈下必利也。熱邪與停飲結。治以瓜蒂而佐之者。反用半夏黃連。寒邪與停飲結。治以巴豆而佐之者。反用桔梗。具毋於寒因熱用。熱因寒用之中。反佐以取之。可謂精義入神以致用者矣。排膿散卽枳實芍藥。論加桔梗。雞子黃也。排膿湯卽桔梗湯加薑棗也。排膿何必取桔梗。薑皮毛者肺之合。桔梗入肺。暢達皮毛。膿自當以出皮毛爲順也。散之所至者深。湯之所至者淺。枳實芍藥散。本治產後瘀血腹痛。加桔梗、雞子黃爲排膿。是知所排者。結於陰分血分之膿。桔梗湯本治肺癰吐膿。喉痛加薑棗爲排膿湯。是知所排者。陽分氣分之膿矣。二方除桔梗外。無一味同。皆以排膿名可見。排膿者必以桔梗而隨病之淺深以定佐使。是桔梗者。排膿之君藥也。

國外學說 日本學說謂桔梗者可用爲強壯劑。漢醫則配列於祛痰劑。用量二・〇至六・〇。又本草綱目啓蒙曰。桔梗自生於山中向陽之地。形似沙參。無毛。帶白色。斷之則有白汁。莖圓高三五尺。葉幡圓有細鋸齒。皆互生。或二三葉相對。六月以後。莖端開花。茂盛者。雖葉間亦開。尋常多單瓣青紫色。亦有作雙層千瓣。圓扁等形。與深藍黃白相間諸色者。雙層者有紫二重桔梗、白二重桔梗、二重仙臺桔梗、牡丹桔梗等。千瓣者。亦有紫白二種。扁者名擂鼓桔梗。有深藍淡藍二種。千瓣形扁。莖亦帶扁。黃色者名淺黃桔梗。間色者有白花紫點桔梗、仙臺桔梗、南京桔梗。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更有單瓣不作筒狀者。名紋桔梗。此數種皆藝花家所重者。入藥以常品爲良。市中所販。根潔白者。是曬乾也。藥舖稱三原桔梗。其根細長。末尤細。末不細者。稱竹原桔梗。氣味更薄。不堪用。味苦爲桔梗之本性。故有苦梗、苦桔梗之名。又古方藥品考曰。桔梗有數種。形似沙參。屈曲不直。皮褐肉白。有滋味者爲上品。潔白者與根粗色白者俱不堪用。採根浸水。候腐爛而後曬乾。則氣味消失。亦不能入藥。別有名花壇者。是花園中老根。尤粗劣。勿用。又大和本草曰。山野多有之。春日宿根出新芽。秋開碧花。或放白花。其花瓣有多至八層者。殊美觀。入藥以碧花之根。冬日及正二月採者爲良。小根性薄。大者合用。此草以雞糞壅之。則肥茂。實生長極速。二年卽開花。根亦大。花堪賞玩。叢生者花愈多。莖不高。又用藥須知曰。日本產桔梗。可用。其花有單瓣、重瓣。色有紫白之別。其根亦有細大之分。入藥以小者爲貴。藥舖稱楊枝手是也。一種名羅桔梗。日醫嘗遠志用。非是。又物類品隲曰。桔梗。日本所在多有。花作紺碧色。或白花、紫花。或二色相雜。花瓣亦有單瓣、重瓣之異。近世製藥者多於六月土用中採掘其根。浸河水數日。待外皮爛。然後洗淨曬乾。色純白。然氣味薄。甚宜八九月掘取。又日用藥品考曰。日本藥舖所售。俱本國產。如三原桔梗、竹原桔梗、白桔梗。皆夏月浸於流水。曬乾收用者也。惟氣味俱薄。其他尙有呼爲生乾及楊枝手者。皺根亦通用。又手板發蒙曰。日本方書。稱桔梗爲佛吉草。出金剛山者。曰金桔梗。出奧州者。曰相馬桔梗。別一種曰生乾桔梗。桔梗與遠志根有相同之效。中含有沙波寧藥劑師清水如水氏嘗將其提出之物質研究之。定名曰普剌企靈。

辨僞 ㊀鄭肯巖曰。苦桔梗之根。結實而梗直。故有是名。非木上之梗也。近道處處有之。其根外白中黃。有心。味苦而辛。本經主治胸脇痛如刀刺。腹滿腸鳴。幽幽驚恐悸。氣。其一種無心味甜者。薺苨也。一名杏葉沙參。又名甜桔梗。性味功用。與桔梗大不相同。近今藥肆因苦桔梗價賤。多以甜梗僞充。又有一種水口梗。性味更劣。服之安能見功耶。㊁曹炳章曰。按桔梗出安慶古城山。色白有蘆。內起菊花心。味甜帶苦者佳。寧國府涇縣出者。形味略同。亦佳。其他如鎭江、全椒、滁州、白陽山、常州、宜興、天長、定遠、樟渚、各縣皆出。色黃白。味甜。均不道地。此藥乃開提肺氣。爲手太陰要藥。須擇色白性糯飽綻。味苦而有心者用之。若味甜者。卽薺苨也。效用不同。不可混用耳。

近人學說 ㊀袁溯範曰。桔梗一名苦梗。爲屬桔梗科(Campanulaceae)植物 Platycodon grandiflorum之根。中醫以爲祛痰鎭靜等之要藥。用於呼吸器病及神經系病。或以之代人參用之。以爲能補五勞養氣之強壯藥。故自神農本經已收之於藥品中矣。㊁張山雷曰。桔梗功用。諸家所述。皆溫通宣泄。無論上焦下焦結滯之病。一例通治。獨潔古謂其爲諸藥之舟楫。載以上行。至胸中最高之分。諸藥中有此一物。則不能下沈云云。繆仲醇和之。謂其性陽而上升。凡病氣逆上升者弗用。及下焦藥中弗入此味。張景岳之本草上。又大暢其旨。謂專用降劑。此物不宜同用。頤按此說不知易老從何處悟入。本經別錄皆無此意。殆誤認仲景于金甘桔湯方。或治咽痛喉痺。或治肺癰喘咳。皆主上焦之病。而云然。然試觀本草經主腹滿腸鳴。別錄下蠱毒。豈無下行之用。張隱庵辨之。謂桔梗氣分之藥。上中下皆可治。斥潔古爲杜撰。然潔古景岳之說。今尙盛行於時。遂令通達三焦。宣陽行氣之功。不復信用於世。易老誤人。正是不淺。丹溪之言曰。乾咳嗽乃痰火之邪。鬱在肺中。苦桔梗以開提之。頤按桔梗辛宜以治火鬱。未能熨貼。但輕用之。以溫爲嚮導。尙無大弊。石頑謂痘疹下部不能起發。大忌桔梗。陰虛久嗽。不宜用。皆以其疏泄陽氣也。仲景甘桔湯。本治少陰咽痛。而後人乃以此方統治一切風熱實火咽痛。多未見其效者。則抹却少陰一層之過也。且自易老獨創桔梗上升之議。仲醇景岳石頑諸子。靡然宗之。而猶認定其爲咽痛

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

專藥。就使桔梗果屬升提。則凡風熱實火諸喉咽病。正是火勢壅上之候。更與辛升。寧不抱薪救火。而益張其燄。奈何庸俗之流。猶昧然盲從。而執定甘桔爲咽痛之普通藥劑耶。

配合應用　㊀治胸滿不痛。桔梗、枳殼等分。水二鍾。煎至一鍾。溫服。（南陽活人書方）

㊁治傷寒腹脹陰陽不和也。桔梗半夏湯主之。桔梗半夏陳皮各三錢。薑五片。水二鍾。煎一鍾。溫服。（南陽活人書方）

㊂治痰嗽喘急。桔梗一兩半。爲末。用童子小便半升。煎四合。去滓。溫服。（簡要濟衆方）

㊃治肺癰咳嗽。胸滿振寒。脈數咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿。如糜米粥者。桔梗湯主之。桔梗一兩。甘草二兩。水三升。煮一升。分溫再服。及朝暮吐膿血則癒。（金匱方）

㊄治喉痺毒氣。桔梗二兩。水三升。煎一升。頓服。（千金方）

㊅治齒齦腫痛。桔梗、藶茨仁等分爲末。服。（永類鈐方）

㊆治骨槽風痛。牙根腫痛。桔梗爲末。棗瓤和丸。皁子大。綿裹咬之。仍以荊芥湯漱之。（經驗方）

㊇治牙疳臭爛。桔梗、茴香等分。燒研傅之。（衛生易簡方）

㊈治肝風眼黑。目睛痛。肝風盛也。桔梗丸主之。桔梗一升。黑牽牛頭末三兩。爲末。蜜丸。梧子大。每服四十丸。溫水下。日二服。（保命集方）

㊉治鼻出衄血。桔梗爲末。水服方寸匕。日四服。一加生犀角屑。亦治吐血下血。（普濟方）

㊊治打擊瘀血在腸內。久不消。時發動者。桔梗爲末。米飲下一刀圭。（肘後方）

㊋治中蠱下血如雞肝。晝夜出血石餘。四臟皆損。惟心未毀。或鼻破將死者。苦桔梗爲末。以酒服方寸匕。日三服。不能下藥。以物均口灌之。心中當煩。須臾自定。七日止。當食豬肝肺以補之。神良。一方加犀角等分。（古今錄驗方）

㊌治妊娠中惡。心腹水痛。桔梗一兩。劍水一鍾。生薑三片。煎六分。溫服。（聖惠方）

㊍治小兒客忤。死不能言。桔梗燒研三錢。米湯服之。仍吞麝香豆許。（張文仲備急方）

用量　八分至一錢。

施用宜忌　凡陰虛火逆。及無風寒痺肺者禁用。長白芨、龍膽草。忌猪肉、節皮爲之使。

著名方劑　㊀桔梗白散。治咳而胸滿振寒。脈數咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿。如米粥者。爲肺癰。（外臺方）桔梗、貝母各三分。巴豆一分。去皮熬令如脂。上三味爲散。强人飲服半錢。羸者減之。病在上膈者。吐膿血。膈下者瀉出。若下多不止。飲冷水一杯則定。

㊁桔梗湯。治少陰咽痛。先與甘草湯。不差。與桔梗湯。（傷寒方）桔梗一兩。甘草二兩。右二味。水二升。煮減半。去滓。溫服。日二服。

參攷資料　㊀朱肱活人書。治胸中痞滿不痛。用桔梗、枳殼。取其通肺利膈。下氣也。張仲景傷寒論治寒實結胸。用桔梗、貝母、巴豆。取其溫中消穀。破積也。又治肺癰唾膿。用桔梗、甘草。取其苦辛清肺。甘溫瀉火。又能排膿血。補內漏也。其治少陰證二三日咽痛。亦用桔梗、甘草。取其苦辛散寒。甘平除熱。合而用之。能調寒熱也。後人易名甘桔湯。通治咽喉口舌諸病。宋仁宗加荊芥、防風。連翹。遂名如聖湯。極言其驗也。（李時珍）㊁乾咳嗽乃痰火之邪鬱在肺中。宜苦梗以開之。痢疾腹痛。乃肺金之氣鬱在大腸。亦宜苦梗開之。後用痢藥。此藥能開提氣血。故氣藥中宜用之。（朱震亨）㊂此草之根結實而梗直。故名梗。普本草一名利如。一名符扈。一名房圖。方書並無是蓋亦度詞爾。桔梗、薺苨乃一類。有甜苦二種。故本經桔梗一名薺苨。而今俗呼薺苨爲甜桔梗也。至別錄始出薺苨條。分爲二物。然其性味功用皆不同。當以別錄爲是。（李時珍）㊃今在處有之。根如指大。黃白色。春生苗。莖高尺餘。葉似杏葉而長。橢四葉相對而生。嫩時亦可羹食。夏開小花。紫碧色。頗似牽牛花。秋後結子。八月採根。其根有心。若無心者爲薺苨。關中所出桔梗。根黃皮似蜀葵根。莖細青色。葉小青色。似菊葉也。（蘇頌）㊄凡使勿

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用木梗。眞似桔梗。只是咬之腥澀不堪。凡用桔梗。須去頭上尖硬二三分已來。并兩畔附枝子槐砧上細剉用生百合搗膏。緩火熬令乾用。每桔梗四兩。用百合二兩五錢。（雷敎）

【桔梗蘆頭】 主治 吐上膈風熱痰實。生研末。白湯調服一錢。探吐。

【柏油】 卽烏柏子油之原名。詳『烏桕子油』條。

【殷孽】 命名 本品生於石上。隱然如木之孽也。故名。

古籍別名 鼇石（綱目）

基本 殷孽爲石類之一種。乃鐘乳之根。附石而生。可供藥用。

產地 出山谷中。

性質 辛。溫。無毒。

主治 爛傷瘀血。洩痢。寒熱。風癢。瘕瘕結氣。脚冷疼痹。（本經）熏筋骨痹。并痔瘻及下乳汁。（別錄）

施用宜忌 惡防已。畏朮。

【氣包魚】 卽河豚之古籍別名。典見綱目。詳『河豚』條。

【氣砂】 ㊀卽礵砂之古籍別名。典見圖經本草。詳『礵砂』條。㊁卽鑛砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『靈砂』條。

【氣酒】 卽燒酒之古籍別名。典見綱目。詳『燒酒』條。

【氣殺鄧草】 卽玉淨瓶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉淨瓶』條。

【氣結】 產地 出交趾、眞臘、占城、瓊海等處。

主治 噎膈。

參攷資料 此乃伽倆香樹中空腹內所結。藉伽倆芬烈之氣。得日月雨露之精華。凝結而成。故名氣結。形亦同香塊。而酥潤黑膩。不甚堅大。約伽倆得其質。此得其魂。亦如天生黃出湯泉。爲硫氣熏結而成者。然顏難得。世不見多者也。（單斗南）

【氣盤蟲】 卽行夜之古籍別名。典見本草集註。詳『行夜』條。

【氣攀】 卽行夜之古籍別名。典見綱目。詳『行夜』條。

【泰和老雞肉】 命名 本品爲雞之出於江西泰和、吉水諸縣。家家畜之。近則五六年。遠則一二十年者。故名。

性質 甘。辛。熱。無毒。

主治 內托小兒痘瘡。

參攷資料 泰和老雞。俗傳能發痘瘡。待痘瘡發時。以五味煑爛。與兒食。甚則加胡椒及桂附之屬。此亦陳文中治痘用木香異攻散之意。取其能助澄熱發膿也。風土有宜不宜。不可以爲法。（李時珍）

【浙朮】 卽白朮之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『白朮』條。

【浙貝母】 命名 本品爲產於浙江者。功用別於川貝。故名。

處方用名 象貝母。

產地 浙江省皆有出。其中尤以寧波象山出者爲最佳。

形態 皮糙獨顆。無瓣。頂圓心斜。

性質 苦。寒。無毒。

主治 化痰止嗽。開宣肺氣。

配合應用 本經逢原云。貝母浙產者。治疝瘕。喉痺。乳癰。金瘡。風痙。一切癰瘍。同苦參。當歸。治妊娠小便難。同青黛。治人面惡瘡。同連翹。治項上結核。皆取其開鬱散結。化痰解毒之功也。

參攷資料 ㊀寧波象山所出貝母。亦分兩瓣。味苦而不甜。其頂平而不尖。不能如川貝之象荷花蕊也。土人於象貝中揀出一二。與川貝形似者。以水浸去苦味。曬乾。充川貝賣。但川貝與象貝。性各不同。象貝苦寒。解毒利痰。開宣肺氣。凡肺家挾風火有痰者宜此。川貝味甘而補肺矣。不若用象貝治風火痰嗽爲佳。若虛寒咳嗽。以川貝爲宜。（葉閒齋）㊁象貝味大苦。性寒。陰也。降也。乃手太陰少陽。足陽明厥陰之藥。大治肺癰。肺瘍。咳喘。吐血。衄血。最降痰氣。善調鬱結。止疼痛。消脹滿。清肝火。明耳目。除時氣煩熱。黃疸。淋閉。便血。溺血。解熱毒。殺諸蟲。及療喉痺。瘰癧。乳癰。發背一切癰瘍毒。瀉熱惡瘡。痔漏。金瘡出血。火瘡疼痛。爲末可敷。煎湯可服。性味俱厚。較之川貝母清降之功。不啻數倍。反爲頭。又解上焦肺胃之火。

【浙茗】 卽茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【浙烏頭】 古籍別名 僧鞋菊。（綱目拾遺）鶏哥菊（俗名）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產地 出於浙江錢塘筧橋。

主治 取根浸酒服。追風活血。爲風痰要藥。

【浙茯苓】即茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【浙驢皮膠】

命名 本品係浙人所造之黑驢皮膠。故名。

製法 其造法一如造阿膠式。但用杭屬臨平鎭。寶莊渡地方之泉水。煎熬而成。赤黑色帶綠。頂有猪鬃紋。與東阿所造無二。入藥亦頗有效。

主治 內傷腰痛。强力伸筋。添精固腎。並補血潤燥。功同阿膠。

參攷資料 阿膠眞者難得。有浙膠則較勝於用雜膠也。寶莊在臨平湖西岸。有寶莊泉。土人名爲大力水。云食之多力。向聞虎跑泉水。注大缸中。平口投錢於中。能吞一百六十青錢。而水不溢。他水至八十已浸漫於外矣。而寶莊水。能吞二百青錢不溢。其力更勝可知。以此水作膠。自可敵伏流之濟水。蓋其含有特殊之礦質。故功亞阿膠。（綱目拾遺）

【涎草】即天門冬之古籍別名。典見綱目。詳『天門冬』條。

【浮小麥】

處方用名 浮麥。

古籍別名 麩麥。（和漢藥考）

基本 係小麥水淘浮起者。

產地 凡產麥區域。恒有之。

形態 浮麥之形色與小麥同。惟浮麥中虛體輕。故能浮水也。

採取 夏四五月間。採取曬乾。

製法 淘淨焙用。

性質 甘鹹寒。無毒。

效能 滋斂止汗。用作解除虛熱藥。

主治 益氣除熱。止自汗盜汗。骨蒸虛熱。婦人勞熱。

配合應用 治虛汗盜汗。用浮小麥。文武火炒爲末。每服二錢。半煮熟。切片米飲下。日三服。或煎湯代茶飲。一方以猪嘴唇燻食亦良。（衛生寶鑑方）

參攷資料 蓋浮麥無肉也。凡人身體疼痛及瘡癤腫爛沾濕。或小兒暑月出痘瘡潰爛。不能著席睡臥者。並用夾褲盛麩縫合。藉臥。性涼而韌。誠妙法也。

【浮石】即浮海石之原名。詳『浮海石』條。

【浮貝】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【浮根蔑】即菱之古籍別名。典見綱目。詳『菱』條。

【浮海石】

原名 浮石。

命名 本品體輕而多氣孔。入水則浮海中。故名。

古籍別名 水花（拾遺）羊肚石。海南石。玉脂芝。（和漢藥考）

外國名稱 Bimsstein（拉丁）

基本 火山噴出之花崗岩。消失中存之珪酸鐵等可熔性物質。而但遺石灰質及雲母質之物。其在海濱者。更爲海水溶解。失其成分。而似海綿。且被波濤磨擊。微呈圓形。入藥以得海濱者爲良。

產地 陳仁山藥物生產辨云。海石產廣東新安、平海、水東等處。

形態 浮海石爲疎鬆極輕之塊。色有多種。或白。或灰白。或帶黃。或青黑。有類似琥璃或絹絲之光澤。質雖堅而甚脆。有無數大小之氣孔。破碎面作貝殼狀。硬度概爲四・五。比重二・一至二・五。投水中。則上浮而不沈。以其多氣孔故也。因是又有輕石之名。

製法 洗淨煆過水飛用。

性質 鹹平。無毒。

成分 出於火山者。與海岸所產者。成分雖略有不同。大都含有珪酸、礬土、石灰、苦土、養化鐵、養化鋁、鉀、鈉等。

效能 消老痰結核。清肺金降火。用治諸淋及咳痰藥。

主治 煮汁飲。止渴治淋。殺野獸毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論浮海石曰。止咳。【宋】寇宗奭本草衍義論海石曰。去目翳。【元】朱丹溪本草衍義補遺論海石曰。清金降火。消積塊。化老痰。【明】李時珍本草綱目論海石曰。消瘤癭。結核疝氣。下氣。消瘡腫。【明】李士材本草圖解論海石曰。海浮石乃水沫結成。色白體輕。肺之象也。氣味鹹寒。潤下之用也。故入肺除痰嗽而韌堅。上源既清。故又治諸淋咳逆。由於虛氣上沖者。勿用。痰飲由於脾腎元虛者忌之。【清】黃宮繡本草求眞論浮海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石曰。海石即書所云浮石者是也。其石係水沫結成。浮於水上。故以浮名。色白體輕。味鹹氣寒。蓋既有升上之能。復有達下之力。其曰能治上焦痰熱。目翳瘡癰者。以其氣浮上達之謂也。能治諸淋積塊癭瘤者。以其鹹潤軟堅之意也。至於實則宜投。虛則忌服者。以其忌有越劑之氣也。味鹹者良。煅過水飛用。

配合應用 ㈠治咳嗽不止。浮石末。湯服。或蜜丸服。(肘後方)

㈡治消渴引飲。浮石、鮑上青黛等分。麝香少許。爲末。溫湯服一錢。又方。用白浮石、蛤粉、蟬殼等分。爲末。鯽魚膽汁七個調服三錢。神效。(本事方)

㈢治血淋砂淋。小便滿痛。用黃爛浮石爲末。每服二錢。生甘草煎湯調服。(直指方)

㈣治石淋破血。浮石滿一手爲末。以水三升。酢一升。和煮二升。澄清。每服一升。(傳信適用方)

㈤治小腸疝氣。睾縮囊腫者。直指方用浮石爲末。每服二錢。木通、赤茯苓、麥門冬煎湯調下。又用海石、香附等分爲末。每服二錢。薑汁調下。(丹溪方)

㈥治頭核腦痺。頭枕後生痰核。正者爲腦側者爲痺。用輕虛白浮石燒存性爲末。入輕粉少許。麻油調掃塗。勿用手按。即潰。或加焙乾黃牛糞尤好。亦治頭瘰。(直指方)

㈦治底耳有膿。海浮石一兩。沒藥一錢。麝香一字。爲末。綿淨吹之。(普濟方)

㈧治疳瘡不愈。海浮石燒紅。醋淬數次。二兩。金銀花一兩。爲末。每服二錢。牛水煎服。病在上食後。在下食前。一年者半年愈。(儒門事親方)

㈨治疔瘡發背。白浮石半兩。沒藥二錢半。爲末。醋糊丸。梧子大。每服六七丸。臨臥冷酒下。亦治諸般惡瘡。(普濟方)

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡氣血兩虛。及痰飲寒嗽者禁用。

參攷資料 ㈠遠行無水。止渴。和苦栝樓爲丸。每日服三十丸。永無渴也。(陳藏器)㈡浮石乃江海間細沙水沫凝聚日久而結成者。狀如水沫及鐘乳石。有細孔如蜂窠。白色。體虛而輕。今皮作家用磨皮垢。甚妙。海中者味鹹。入藥更良。(李時珍)㈢燒泥爲瓦。燔木爲炭。水沫爲浮石。此皆去其柔脆。變爲堅剛也。汝州記云。海中有浮石。轉虛。如以磨脚。麥水飲之。止渴。即此也。(拖朴子)

【浮蚍】即酒醭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『酒醭』條。

【浮麥】即浮小麥之處方用名。詳『浮小麥』條。

【浮留】即蒟醬之古籍別名。典見食療本草。詳『蒟醬』條。

【浮留藤】即蒟醬之古籍別名。詳『蒟醬』條。

【浮萍】 原名 水萍。

命名 本品與蘋藻之類不同。蓋無根以入水底土中。而輕浮水面。隨風蕩漾。故名。

處方用名 浮萍草。紫背浮萍。

古籍別名 荇。水花。水衣。水蘇。水白。蛙食。魚食。池星。鴨搔。浮藻。搔水。

藏 九子萍水中萍子草。(和漢藥考)

基本 屬浮萍科植物。爲水中之浮萍。

產地 多在池澤溝渠深水間。

形態 浮萍爲一年生草。三葉相集。浮於水面。葉爲扁平之倒卵圓形。大二三分。有光澤。面綠色。背紫紅色。葉下多鬚根。夏開淡綠色小花。此草浮遊不定。隨風所至。吸取溶解水中之養分。故生長旺盛。

種類 ㈠大者曰藻。中者曰荇。小者曰萍。㈡蘋荇葉大。雖生水而有根。直入水底土中。與小者浮萍。迥然不同。㈢浮萍有背面皆綠者。有面青背紫赤若血者。入藥以紫背爲良。古今要覽稿第四百六十五卷浮萍條云。本草綱目菩菜集解。庚辛玉册云。鳧葵花爲菩菜。白花爲白蘋。即水鏡草之一。水鏡草。菩之別名也。詩召南。于以采蘋。古之所謂蘋。今之大萍也。俗呼水靨泡子。亦曰蘭山。此萍八月抽莖開花。早者五月即開。七月結實。色綠。



浮萍

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小於蓮子。五六月間開花者。在莖之一寸四五分處。三瓣白色。能結實。其開花遲者。則開於莖下之一寸許。色綠。不結實。入藥用此種。水萍有青萍品字藻。槐葉蘋。滿江紅種種。青萍及品字藻俱屬浮萍科植物。槐葉蘋及滿江紅俱屬槐葉蘋科植物。凡止水中。處處皆有之。青萍葉長。兩面皆綠。品字藻三葉相附。色較淡。槐葉蘋肥如山椒。生四五葉。色深。綠根細長一二寸。色黃褐。性柔。輭以其葉形如槐葉故名。滿江紅葉簇生。色紅紫。經冬不凋。別有一種紫背浮萍。俗呼爲家鴨之餌。生於三月。故禮月令云。春季萍始生。此草入冬。經霜即枯沈於水底。明年三月又復上浮。生葉繁茂。葉面色綠。葉背色紫。有細根。入藥用。

採取 六七月間。採之曝乾。

製法 李時珍曰。紫背浮萍七月採之。揀淨。以竹篩攤曬。下置水一盆。映之。卽易乾也。

性質 辛。寒。無毒。

效能 發汗。利溲。用作解熱及利尿藥。

主治 暴熱身癢。下水氣。勝酒。長鬚髮。止消渴。久服輕身。（本經）

下氣。以沐浴生毛髮。（別錄）

歷代記述 弘體【唐】陳藏器本草拾遺論浮萍曰。搗汁服。主水腫。利小便。爲末。酒服方寸匕。治人中毒。爲膏傅面。黯【宋】大明諸家本草論浮萍曰。治熱毒風熱。熱狂。煩悶毒。湯火傷。風瘡。【明】李時珍本草綱目論浮萍曰。主風。澀麻痺。脚氣。打撲傷損。目赤翳膜。口舌生瘡。吐血衄血。癜風丹毒。【明】繆希雍本草經疏論浮萍曰。水萍專得水氣之清陰。故味辛氣寒。別錄兼酸無毒。蓋其體輕浮。其性清燥。能祛澀熱之藥也。熱氣鬱於皮膚則作癢。味辛而氣清寒。故能散皮膚之澀熱也。寒能除熱。燥能除濕。故下水氣。酒性澀熱而萍之質不沈於水。其氣味辛寒。輕清而散。故能勝酒。血熱則鬚髮焦枯而易墮。涼血則營氣清而鬚髮自長矣。別錄主消渴者。以澀熱之邪去。則津液自生。而渴自止也。其曰下氣。以沐浴生毛髮者。亦以寒能除熱。涼血之驗也。熱邪不干。營氣清旺。則能獲輕身矣。【清】黃宮繡本草求眞論浮萍曰。浮萍浮於水上。體輕氣浮。辛寒。古人謂其發汗勝於麻黃。下水捷於通草。一語括盡浮萍治功。故凡風濕內淫。癱瘓不舉。在外而見肌膚搖癢。一身暴熱。在內而見水腫不消。小便不利。用此疎肌通竅。俾風從外散。濕從下出。而癱與瘓。其悉除矣。至本經載長鬚髮者。以毛竅利而血脈榮也。止消渴者。以經氣和而津液復也。勝酒者。以陽明通達而能去酒毒也。總皆因其體浮。故能散風。因其氣寒。故能勝熱。因其產於水上。故能以水利水耳。用浮萍其背紫色。爲末蜜丸彈子大。空心酒服。然必大實大熱。方可用此。若表虛自汗者。其切禁焉。機酒辟蚊亦佳。但氣虛切勿近此。【清】黃元御玉楸藥解論浮萍曰。浮萍辛涼發表。治瘟疫斑疹。療肌肉麻痺。中風喎斜。癱瘓。醫癰疽熱腫。隱疹瘙癢。楊梅粉刺。汗斑皆驅。利小便。閉癃。消肌膚腫脹。止吐衄。長鬚髮。

近人學說 張山雷曰。浮萍味辛氣寒。而輕浮最甚。故上宣肺氣。外達皮毛。發汗泄熱。下通水道。皆其天然之情性作用。本經別錄大明諸家主治。無不在此範圍之內。然而色綠而背色紅紫。則又不僅專入氣分。而亦必兼清血熱。故聖濟以治吐血不止。聖惠方又治鼻衄。瀕湖以治目赤口瘡。既善清火。而又導熱下行。其效良捷。近人止以爲發汗之藥。而不知清熱正其專長。殊覺未盡其用。且其質最輕。氣味皆薄。雖曰發汗。性非溫熱。必無過汗之慮。而俗子畏之。多不敢用。則綱目所引去風丹一方。有鐵鍋頭上也出汗一句之故。張石頑因之。亦謂去風丹治大風癩風等皆驗。且有發汗勝於麻黃之句。蓋皆未嘗於物理上體驗之耳。壽頤按瀕湖所引去風丹一詩。不知何本。據其所稱。東京石碑。梵書大篆。人不能曉。眞人林某逐字辨譯云云。頤謂既梵字。斷無逐字譯之。卽成七言詩句之理。且大篆之與梵字。風馬牛不相及。何以梵字而有大篆之名。其爲妄人僞造。不攻自破。據其所治有左癱右瘓。三十六種風等說。淺俗已極。明是無知方

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

士。嚮壁虛構。且更有胎孕有傷。服過百粒。卽爲全人云云。不成文理。可鄙孰甚。李氏不知抉擇。貪多務得。取盈篇幅。徒亂人意。殊可哂矣。

配合應用 ㈠治夾竊傷寒。紫背浮萍一錢。犀角屑半錢。鈎藤鈎三七個。爲末。每服半錢。蜜水調下。連進三服。出汗爲度。（聖濟總錄方）

㈡治消渴飲水。日至一石者。浮萍搗汁服之。又方。用乾浮萍栝樓根等分。爲末。人乳汁和丸。梧子大。空腹飲服二十丸。三年者數日愈。（千金方）

㈢治小便不利。膀胱水氣流滯。浮萍日乾爲末。飲服方寸匕。日二服。（千金方）

㈣治水氣洪腫。小便不利。浮萍日乾爲末。每服方寸匕。白湯下。日二服。（聖惠方）

㈤治霍亂心煩。用蘆根灰一兩。半水萍焙。人參枇杷葉灰各一兩。每服五錢。入薤白四寸。酒煎溫服。（聖惠方）

㈥治吐血不止。紫背浮萍焙半兩。黃芪灰二錢半。爲末。每服一錢。棗蜜水調下。（聖濟總錄方）

㈦治鼻衄不止。用浮萍末吹之。（聖惠方）

㈧治中水毒病。手足指冷至膝肘卽是。以浮萍日乾爲末。飲服方寸匕良。（姚僧坦集驗方）

㈨治大腸脫肛。水聖散。用紫浮萍爲末。乾點之。（危氏得效方）

㈩治身上虛瘡。用浮萍末一錢。以黃芩一錢。同四物湯煎湯調下。（丹溪纂要方）

⑪治風熱癮疹。浮萍蒸過。焙乾。牛蒡子酒煮曬乾。炒各一兩。爲末。每薄荷湯服一二錢。日二次。（古今錄驗方）

⑫治風熱丹毒。浮萍搗汁塗塗之。（子母祕錄方）

⑬治汗斑癜風。端午日收紫背浮萍。曬乾。以四兩煎水浴。并以萍擦之。或入漢防己二錢亦可。（袖珍方）

⑭治少年面皰。浮萍日揆禽之。并飲汁少許。（外臺祕要方）又用紫背萍四兩。防己一兩。煎濃汁洗之。仍以萍於斑黯上熱擦。日三五次。物雖微末。其功甚大。不可小看。（普濟方）

⑮治粉萍面黑。溝渠小萍爲末。日傅之。（聖惠方）

⑯治大風瘋疾。浮萍草。三月採。陶三五次。窖三五日。焙爲末。不得見日。每服三錢。食前溫酒下。又方。七月七日。取紫背浮萍。日乾爲末。半升。入好消風散五兩。每服五錢。水煎熱飲。仍以煎湯洗浴之。（十便良方）

⑰治癍瘡入目。浮萍陰乾爲末。以生羊子肝半個。同水半盞。煮熟。搗爛絞汁。調末服。甚者不過一服。已傷者十服見效。（危氏得效方）

⑱治穿肉攀睛。青萍少許。研爛。入片腦少許。貼眼上效。（危氏得效方）

⑲治毒腫初起。水中萍子草。搗傅之。（肘後方）

⑳治發背初起。腫脹赤熱。浮萍搗和雞子清貼之。（聖惠方）

㉑治楊梅瘡癬。水萍煎汁。浸洗半日。數日一作。（集簡方）

㉒治燒煙去蚊。五月取浮萍陰乾用之。（孫眞人方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非實熱實邪者禁用。

參攷資料 ㈠浮萍發汗。勝於麻黃。（朱震亨）㈡俗醫用治時行熱病。亦堪發汗。甚有功。方用浮萍一兩四月十五日採之。麻黃去根節。桂心附子炮製去臍皮各半兩。四物搗細篩。每服一錢。以水一中盞。生薑半分。煎至六分。和滓熱服。汗出乃瘥。又治惡疾瘡瘡遍身者。濃煮沐浴半日。多效。此方甚奇古也。（蘇頌）㈢浮萍其性輕浮。入肺經。達皮膚。所以能發揚邪汗也。世傳宋時東京開河。掘得石碑。梵書大篆一詩。無能曉者。眞人林靈素。逐字辨譯。乃是治中風方。名去風丹也。詩云。天生靈草無根幹。不在山間不在岸。始因飛絮逐東風。汎梗青青飄水面。神仙一味去沈痾。採時須在七月半。選甚癰風與大風。些小微風都不算。豆淋酒化服三丸。鐵鍱頭上也出汗。其法以紫色浮萍曬乾爲細末。煉蜜和丸。彈子大。每服一粒。以豆淋酒化下。治左癱右瘓。三十六種風。偏正頭風。口眼喎斜。大風癩風。一切無名風。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

及脚氣。并打撲傷折。及胎孕有傷。服過百粒。卽爲全人。此方後人易名紫萍一粒丹。（李時珍）㊀本草所用水萍。乃小浮萍。非大藾也。陶蘇俱以大藾註之。誤矣。萍之與藾音雖相近。字却不同。形亦迥別。浮萍處處池澤。止水中甚多。季春始生。或云楊花所化。一葉經宿卽生數葉。葉下有微鬚。卽其根也。一種背面皆綠者。一種面青背紫赤若血者。謂之紫萍。入藥爲良。七月採之。淮南萬畢術云。老血化爲紫萍。恐自有此種。不盡然也。小雅呦呦鹿鳴。食野之芩者。乃蒿屬。陸佃指爲萍。誤矣。（李時珍）

【浮萍草】卽浮萍之處方用名。詳『浮萍』條。

【浮藻】卽浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【浮爛羅勒】產地 生康國。

形態 浮爛羅勒爲喬木類之一種。其皮似厚朴。可供藥用。

性質 酸。平。無毒。

主治 一切風氣。開胃。補心。除冷痺。調臟腑。

【浴香】㊀卽檀香之古籍別名。典見綱目。詳『檀香』條。㊁卽乳香之古籍別名。典見綱目。詳『乳香』條。

【海人草】卽鷓鴣菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鷓鴣菜』條。

【海山仙人】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【海仁草】卽鷓鴣菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鷓鴣菜』條。

【海巴子】卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【海月】命名 本品蛤類也。形似牛月。故名。

古籍別名 玉珧。明瓦。江珧。馬頰。馬甲。（綱目）

外國名稱 Placenta placenta Linn. Window Shell（拉丁）マドガヒ（日本）

基本 係軟體動物瓣鰓類無管類單柱類海月科。爲海月之殼。其肉詳見該條。

產地 生閩粵海濱間。

形態 海月爲介類之一種。其殼圓形而扁。色澤似雲母而質透明。鉸合部在右殼有二齒。與左殼之二溝相對。脚無足絲。棲於海濱砂土。腹中有小蟹。飢則蟹出覓食。飽則海月亦飽。以火近之。蟹出而海月斃。其殼透明。可供遮窗與藥用。

性質 甘。辛。平。無毒。

主治 消渴下氣。調中利五臟。止小便。消腹中宿物。令人易飢。能食。生蘆醬同食之。

【海月肉】性質 甘。辛。平。無毒。

主治 瀉濕熱。療鶴膝風。煎湯洗之。

【海牛】命名 本品有角如牛。故名。

產地 出東海中。

形態 海牛爲介類海螺之一種。頭有硬角。尖銳有紋。身蒼色。有龜背紋。腹部黃白色。有筋頂花點。魚尾可供藥用。

性質 鹹。溫。無毒。

主治 益腎。固精。興陽。

【海石榴】卽石榴高一二尺。卽結實者之別名。詳『石榴』條。

【海米】卽蓧草之古籍別名。典見方孝孺集。詳『蓧草』條。

【海羊】卽蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【海男子】卽海參之大而有刺者。詳『海參』條。

【海芋】命名 故名。本品模形似芋。

古籍別名 羞天草（玉册）觀音蓮。天荷。隔河仙。（綱目）

外國名稱 Alocasia Macrorhiza, Schott.（拉丁）アンシウイモ（日本）

基本 係天南星科海芋屬。爲海芋之根。

產地 生山野間。

形態 海芋爲毒草類之野生草本。春月生苗。高四五尺。葉似芋葉而有幹。夏秋間抽莖。開花如一瓣蓮花。碧色。花中有蕊。長作穗狀。其根可供藥用。

性質 辛。有大毒。

主治 癌瘰毒腫。風癩。伏砒砂。

【海松】卽海松子。詳『海松子』條。

【海松子】命名 本品乃海松樹之子實。故名。

產地 松子仁。海松實。

古籍別名 孔雀松。（綱目）一葉五葉者名五鬣松。新羅松子。（綱目）朝鮮松。（日本）栝子松。

47／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（西陽雜俎）松實。（俗名）

外國名詞 Pinus Koraien-sis, D. et Z.（拉丁）テウセンマツ テウセンゴエウ（日本）

基本 係松杉科松屬。爲海松之子仁。

產地 寒地恒有出。醫學大辭典曰。產關東及直隸等處。

形態 海松子爲夷果類之喬木。高至數丈。有三樹脂道。葉作長針形。往往五葉相叢生花單性。雌花與雄花同株。果實甚大。爲毬果。呈長卵形。長約六七寸。各鱗片間有二子。長五分許。有脂氣。甚香美。大如巴豆。上有三稜。一端略尖。



海松子

採取 七八月間採之。過時即散落難收也。

製法 採得剝去殼。取仁用。水煎。或搗研和藥。

性質 甘小溫。無毒。

效能 通虛祕。治風痺。用作潤燥鎮咳藥。又爲祛風頑痺藥。

主治 逐風痺寒氣。虛羸少氣。補不足。潤皮膚。肥五臟。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論海松子曰。主諸風。溫腸胃。久服輕身延年不老。【宋】開寶重定新本草論海松子曰。骨節風。頭眩。去死肌。變白。散水氣。潤五臟不饑。【宋】寇宗奭本草衍義論海松子曰。同柏子仁治虛祕。【明】李時珍本草綱目論海松子曰。潤肺治燥結咳嗽。【明】繆希雍本草經疏論海松子曰。海松子氣味香美甘溫。甘溫助陽氣而通經。則骨節中風水氣及因風頭眩死肌自除矣。氣溫屬陽。味甘補血。血氣充足。則五臟自潤。髮白不飢。所由來矣。仙方服食。多餌此物。故能延年輕身不老也。【清】王士雄隨息居飲食譜論海松子曰。海松子甘平潤燥。補氣充飢。養液息風。耐飢溫胃。通腸辟濁。下氣香身。最益老人。果中仙品。宜肴宜餡。服食所珍。

配合應用 ㊀服松子法。七月取松實。去木皮。擣如膏。收之。每服雞子大。酒調下。日三服。百日身輕。三百日行五百里。絕穀。久服神仙。渴即飲水亦可。以練過松脂同服之。（聖惠方）

㊁治肺燥咳嗽。蘇遊鳳髓湯。用松子仁一兩。胡桃仁二兩。研膏。和熟蜜半兩收之。每服二錢。食後沸湯點服。（外臺祕要方）

㊂治小兒寒咳。或作瘖喘。用松子仁五個。百部炒。麻黃各三分。杏仁四十個。去皮尖。以少水略煮三五沸。化白砂糖丸芡子大。每食後含化十丸。大妙。（錢乙小兒方）

㊃治大便虛祕。松子仁、柏子仁、麻子仁等分。研泥。溶白蠟和丸。梧子大。每服五十丸。黃芪湯下。（危氏方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡胃薄便溏及有溼滯痰飲者禁用。

參攷資料 ㊀服食家用松子。皆海松子。曰中國松子。肌細力薄。只可入藥耳。按列僊傳云。偓佺好食松實。體毛數寸。走及奔馬。又犢子少在黑山。食松子茯苓。壽數百歲。又赤松子好食松實。天門冬、石脂。鹵落更生。髮落更出。莫知所終。皆指此松子也。（李時珍）㊁新羅松子甘美大溫。去皮食之甚香。與雲南松子不同。雲南松子似巴豆。其味不及。與東古國偏桃仁相似。多食發熱毒。（李珣）㊂按醫說云。食胡羊肉。不可食松子。而物類相感志云。凡雜色羊肉。入松子則無毒。其說不同何哉。（李時珍）㊃海松子出遼東及雲南。其樹與中國松樹同。惟五葉一叢者。毬內結子大如巴豆。而有三稜。一頭尖爾。久收亦油。中國松子。大如柏子。亦可入藥。不堪果食。按段成式酉陽雜俎云。予種五鬣松二株。根大如碗。結實與新羅南詔者無別。其三鬣者。俗呼孔雀松。亦有七鬣者。或云三鍼者爲栝子。松五鍼者爲松子松。（李時珍）

【海松根】卽長松根之古籍別名。典見植物名彙。詳「長松根」條。

【海松實】卽海松子之處方用名。詳「海松子」條。

【海狗油】卽腽肭油之原名。詳「腽肭油」條。

【海狗腎】卽腽肭臍之處方用名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【海金砂】命名　本品實細色黃故名。謂之海者。神異之也。俗名竹園荽者。象葉形也。

古籍別名　竹園荽（俗名）

外國名稱　Lygodium japonicum, Sw.（拉丁）

基本　屬海金砂科。爲其葉背之胞子。

產地　陳仁山藥物生產辨云。海金砂以湖南、四川等所產爲上。乃升金砂所結之粉。體輕色紅棕者爲佳。廣東英德清遠亦有之。又有名土金砂。乃燈心花仁出產番禺大石。



海金砂

形態　海金砂爲多年生羊齒類。春日從宿根生苗。及長則成蔓莖。質硬而有光澤。纏繞他物。長達數尺。葉爲分裂之複葉。柄頭小葉類葱葉。背之邊緣。皆鑲作卷狀。中並列子囊。一端稍作帽狀。胞子爲可動性輕粉末。呈黃褐色。遙火則燃燒如石松子。秋季取柄葉於紙上曬乾。則子囊落集其上。謂之海金砂。供藥用。

採取　秋七月間採葉收之。

性質　甘。寒。無毒。

效能　滲濕熱。通五淋。用作鎮靜及利水藥。

主治　通利小腸。得梔子、馬牙消、蓬沙。療傷寒熱狂。或丸或散。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目。論海金砂曰。治濕熱腫滿。小便熱淋。膏淋。血淋。石淋。莖痛。解熱毒。【明】繆希雍本草經疏。論海金砂曰。海金砂味甘淡。氣寒。性無毒。甘寒淡滲之藥。故主通利小腸。得牙硝、梔子。皆鹹寒苦寒之極。又得蓬砂之辛。所以能治傷寒熱狂。大熱當利小便。此釜底抽薪之義也。淡能利竅。故治熱淋血淋。膏淋等病。乃手太陽小腸經之藥也。【清】黃宮繡本草求眞。論海金砂曰。海金砂味甘而淡。氣寒。無毒。爲主通利小腸血分要藥。凡小腸熱閉而見五淋疼痛不止者。服之使熱盡從小便而出。且於傷寒熱閉。而見腹滿狂燥。則當於此加梔子、朴硝、蓬砂投治。俾熱亦從小便而出。此釜底抽薪之一義也。但腎臟眞陽不足。切忌淘淨取浮者曬乾。撚之不沾指者。眞忌火。

配合應用　㈠治熱淋急痛。海金砂草陰乾爲末。煎生甘草湯。調服二錢。此陳總領方也。一加滑石。（夷堅志方）

㈡治小便不通。臍下滿悶。海金砂一兩。臘雨茶半兩。搗碎。每服三錢。生薑、甘草煎湯下。日二服。亦可末服。（圖經本草方）

㈢治膏淋如油。海金砂、滑石各一兩。甘草梢二錢半爲末。每服二錢。麥門冬煎湯服。日二次。（仁存方）

㈣治血淋痛澀。但利水道。則清濁自分。海金砂末。新汲水或沙糖水服一錢。（普濟方）

㈤治脾澼腫滿。腹脹如鼓。喘不得臥。海金砂散。用海金砂三錢。白朮四兩。甘草半兩。黑牽牛頭末一兩半爲末。每服一錢。煎倒流水調下。得利爲妙。（東垣蘭室祕藏方）

㈥治瘡瘡變黑歸腎。用竹園荽草煎酒傅其身。卽發起。（直指方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡虛而無濕熱者禁用。忌火。

參攷資料　㈠出黔中郡。湖南亦有生。作小株。高一二尺。七月收其全科。於日中曝之。小乾。以紙襯承。以杖擊之。有細砂落紙上。且曝且擊。以盡爲度。（劉禹錫）㈡江、浙、湖、湘、川、陝皆有之。生山林下。莖細如線。引於竹木上。高尺許。其葉細如園荽葉而甚薄。背面皆青。上多皺文。皺處有砂子。狀如蒲黃粉。黃赤色。不開花。細根堅強。其砂及草。皆可入藥。方士採其草。取汁煮砂熬汞。（李時珍）㈢海金砂生於葉上。小腸膀胱血分藥也。熱伏二經血分者宜之。故小便熱淋莖痛爲要藥。（張石頑）㈣海金砂子結葉間。如膽附肝之象。三焦與膽通。惟膽中相火結。三焦之水乃結。此葉以結解結。（唐容川）㈤海金砂草上結砂。亦所含之精英也。氣輕上浮。宜入心肺。砂體下墜。則入二腸。甘淡則能滲濕去熱。色黃赤則入

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

血分。故主治五淋莖痛澀腫。下熱除則上熱亦息。（汪雙池）

【海南石】卽浮海石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮海石』條。

【海南檳】卽檳榔之處方用名。詳『檳榔』條。

【海砂】卽食鹽之古籍別名。典見綱目。詳『食鹽』條。

【海紅】古籍別名　海棠梨。（綱目）

產地　出海外。

形態　海紅爲山果類之一種。卽海棠梨之果實。如木瓜而小。二月開紅花。八月實熟。採得可供藥用。

性質　酸。甘。平。無毒。

主治　止洩痢。

【海紅豆】命名　本品大如紅豆。故名。

產地　生南海諸地。

形態　海紅豆爲喬木類之一種。樹高二三丈。葉似梨葉而圓。春開白花。花後枝間結莢。其子略扁。累累如綴珠。皮紅肉白。可供藥用。

性質　微寒。有小毒。

主治　人黑皮黯點花瓣。頭面遊風。宜入面藥及澡頭。

【海紅柑】卽柑之樹小實大。皮厚色紅者。典見綱目。詳『柑』條。

【海胡桃】卽甘劍子之古籍別名。典見綱目。詳『甘劍子』條。

【海苔】卽乾苔之古籍別名。典見綱目。詳『乾苔』條。

【海若白事小吏】卽烏鰂骨之古籍別名。典見圖經本草。詳『烏鰂骨』條。

【海孫】卽王孫之齊地別名。詳『王孫』條。

【海扇】卽車渠之古籍別名。典見綱目。詳『車渠』條。

【海根】形態　海根爲澀草類之一種。多生山谷中。莖色赤。葉似馬蓼。其根形似菱藕。可供藥用。

性質　苦。小溫。無毒。

主治　霍亂中惡。心腹痛。鬼氣疰忤。飛尸。喉痺。蠱毒。癰疽惡腫。赤白遊瘴。蛇咬大毒。酒及水磨服并傅之。

【海桐皮】命名　本品樹似桐而皮黃白有刺。故名。

古籍別名　刺桐皮（綱目）木棉樹皮。（藥物生產辨）

基本　屬海桐花科。爲海桐之木皮。海桐爲落葉喬木。高數尺。木幹皆有刺。葉圓大。稍似梧桐。甚繁密。春暮色深紅。花附幹生。側數如掌形。若金鳳。其子實似楓。

產地　陳仁山藥物生產辨云。海桐皮產廣東博羅。各省亦有出。

形態　似梓白皮而堅韌。

製法　與他藥水煎。或酒浸服。或剉末和作丸散。

性質　苦。平。無毒。

效能　祛風澀。利經絡。治頑痺。療脚氣。用治風澀痺痛藥。

主治　霍亂中惡。赤白久痢。除疳蝕疥癬。牙齒蟲痛。並煮服及含之。水浸洗目。除膚赤。

歷代記述弦證　【唐】李珣海藥本草論海桐皮曰。主治腰脚不遂。血脈頑痺。腿膝疼痛。赤白瀉痢。【明】李時珍本草綱目論海桐皮曰。去風殺蟲。煎湯洗赤目。【淸】黃宮繡本草求眞論海桐皮曰。海桐皮辛苦而溫。能入肝經血分。祛風除濕。及行經絡。以達病所。是以腰膝脚痛能療。赤白瀉痢能止。蟲牙風痛。煎湯漱之能愈。疳蝕疥瘡。磨汁塗之能消。目赤膚翳。浸水洗之能退。一皆風祛濕散之力用者。須審病自外至則可。若風自內成。未可妄用。須隨症酌治可耳。

近人學說　張山雷曰。海桐皮唐人李珣海藥本草。謂此木生南海山谷中。似桐而皮黃白色有刺。故名海桐。亦名刺桐。蘇頌謂生南海及雷州近海諸郡。皮堅韌。可作繩索。入水不爛。壽頤按物實如此。其力在皮。故入藥能外治皮膚之病。祛風逐濕而亦宣通絡脈。可療頑痺腿膝疼痛。蘇頌引劉禹錫傳信方。以此藥合牛膝芎藭。羌活地骨皮。五茄皮甘草。薏苡。生地。浸酒服。治腰膝痛不可忍。有驗。洵又謂治赤白痢。蓋味苦氣涼。能導濕熱積滯。以下行也。大明以爲性溫者非是。

配合應用　㊀同眞川槿皮、輕粉、蛇牀子、山大黃爲末。傅癬瘡。㊁治風癬有蟲。海桐皮、蛇牀子等分爲末。以臘豬脂調搽之。（艾元英如宜方）㊂治風蟲牙痛。海桐皮煎水漱

50／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之。（聖惠方）

㊃治中惡霍亂。海桐皮煮汁服之。（聖濟總錄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無風寒濕邪者禁用。

著名方劑　㊀海桐皮散。治手足拘攣（證治準繩方）海桐皮、當歸（湯洗焙乾）牡丹皮、熟地、牛膝（酒浸焙）各一兩。山茱萸、補骨脂各五錢。上藥研爲細末。每服一錢。清水八分。加葱白二寸。煎至五分。去滓。食前溫服。㊁海桐皮湯。治跌打損傷（金鑑方）海桐皮、鐵線透骨草、乳香、沒藥各二錢。當歸、錢半（酒洗）川椒三錢。川芎、紅花各一錢。威靈仙、白芷、甘草、防風各八分。右爲細末。裝白布袋內。紮口。煎湯熏洗患處。

參攷資料　㊀古方多用浸酒。治風腫。南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方云。頃年予在姑孰。得腰膝痛不可忍。醫以腎臟風毒攻刺。諸藥莫療。因覽劉禹錫傳信方。備有此驗。修治一劑。便減五分。其方用海桐皮二兩。牛膝、芎藭、羌活、地骨皮、五加皮各一兩。甘草半錢。薏苡仁二兩。生地黃十兩。並淨洗焙乾。剉。以綿包袋。入無灰酒二斗浸之。冬二七。夏一七。空心飲一盞。每日早午晚吞三次。長令醺醺。此方不得添減。禁毒食。（蘇頌）㊁海桐皮能行筋絡。達病所。又入血分。及去風殺蟲。（李時珍）㊂海桐生南海及雷州。近海州郡亦有之。葉大如手。作三花。尖皮若梓白皮而堅韌。可作繩。入水不爛。不拘時月採之。又云。嶺南有刺桐。葉如梧桐。其花附幹而生。側敷如掌形。若金鳳。枝幹有刺。花色深紅。江南有赬桐。紅花無實。（蘇頌）㊃海桐皮有巨刺。如龜甲之刺。或云即刺桐皮也。按楚含南方草木狀云。九眞有刺桐。布葉繁密。三月開花。赤色照映。三五方週。則三五復發。陳藏器謂云。刺桐生山谷中。文理細緊而性喜折裂。體有巨刺。如欖樹。其實如楓。類桐身青。葉圓大而長。高三四尺。便有花。成朵而繁。紅色如火。爲夏秋榮觀。（李時珍）



海桐花

【海珠】卽紅海粉之別名。詳『紅海粉』條。

【海珠蕙】卽龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【海珠薑】卽龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【海粉】卽紅海粉之別名。詳『紅海粉』條。

【海粉半夏麴】原名　海粉麴

命名　本品爲半夏麴之一種。係和海粉製成者故名。

製法　用半夏爲末。入海粉、雄黃二分之一。和熟蜜。草盒七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取　以陳久者良。

主治　療積痰沉痾。

【海粉麴】卽海粉半夏麴之原名。詳『海粉半夏麴』條。

【海荏】卽水蘇之古籍別名。典見唐天寶單方圖。詳『水蘇』條。

【海蚌殼】卽石決明之古籍別名。典見和藥考。詳『石決明』條。

【海馬】命名　本品乃魚鰕類也。狀如馬。形故名。

古籍別名　水馬（綱目）

產地　生南海中。

形態　海馬爲介類硬骨魚之一種。雄者色黃。雌者色青。長一二寸至三四寸。側面視之。頭略似馬。體或褐色。或作銀白色。有喙下垂。全體有硬皮。成環節狀。腹部稍粗。尾細長。可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　婦人難產。帶之於身。甚驗。臨時燒末。飲服。并手握之。卽易產。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論海馬曰。主產難及血氣痛。【明】李時珍本草綱目論海馬曰。暖水臟。壯陽道。消瘕塊。治疔瘡腫毒。

參攷資料　海馬雌雄成對。其性溫暖。頗有交感之義。故難產及陽虛房中方術多用之。如蛤蚧、鄧君子之功也。鍛亦壯陽。性應同之。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【海參】命名 本品滋補之力不弱人參故名。

古籍別名 海鼠沙噀。（動物學大辭典）有刺者名刺參無刺者名光參大而有刺者名海男子。（綱目拾遺）

外國名稱 Stichopus japonicus Selenka（拉丁）（Sea-slug）（英）ナマコ或イリコ（日本）

基本 係棘皮動物海參類有足類海參科之海參。

產地 生海灣中及外海礁岩間。

形態 海參爲魚屬之一種。形圓長。體柔軟。呈蠕蟲狀。皮層黏滑。內有小骨片。一端有口。一端有肛門。口緣列有觸角二十個。背面具大圓錐狀之突起。腹面有管狀之水管。足三列。水管足有吸盤。能伸縮自如。爲運動器。口內有石灰管。下接於腸。腸迂曲初向後又折於前。復向於後。終達肛門。當腸將達肛門處之稍偏前面。旁有一種分歧。如樹枝之管。乃是水肺。爲呼吸器。體色青黃褐或赤。背腹異彩。腹面有三條縱帶紋。背面有二條長約一尺。日則潛伏。夜則以水管足及體內之筋肉扭動而匐行。觸手表面分泌一種黏液。時時卷曲。可以鉤取食物。產海灣泥底者色多青黑而質軟。產外海岩礁者色多黃褐而質硬。捕得晒乾。可供食品與藥用。

性質 甘。鹹。溫。無毒。

主治 補腎經。益精髓。消痰涎。攝小便。壯陽道。殺瘡蟲。降火滋腎。通腸潤燥。除勞怯諸症。

配合應用 ㈠治虛火燥結。同木耳切爛。入豬大腸煮食之。㈡治休息痢。每日煮湯服之。㈢治一切潰瘍生蛆。焙末傳之。

參考資料 臨安儒醫盛天然云。曾往青山里視一婦人病。眼鼻口耳髮根出血。下部亦然。其人已昏不知人。詢其夫得症之由。數日前受驚而起。時天酷暑大旱。又中燥烈之氣。致血溢奔騰。上下散出。即不救矣。諸醫皆斂手無策。盛有叔曾於都中得一方。專治此症。幸尙記憶。遂急喚人取山泉一桶。燒酒一勫。挾婦起坐。裸其小腿。先以燒酒淋之。俾酒從踝下即滴入水桶內。淋訖。然後將腿置水中。一飯頃。其上下血即止。婦亦甦。面色如粉。急叫人覓壯年乳婦。以乳哺之。再用海參半觔。切片。焙爲末。每次調服三錢。日三服。蓋海參能生百脈之血。若失血過多。必須以此補之。其生血之功。捷於歸芎也。（趙學敏）

【海帶】命名 本品產海石間。柔韌而長。如帶。故名。

古籍別名 綱昆布。盆布。（日本）

外國名稱 Laminaria（拉丁）ホフメボンメ（日本）

基本 係褐色藻類昆布屬之海帶。

產地 生海中水土間。

形態 海帶爲水草類之一種。如海藻而粗。其葉體短小而扁平。厥形如帶。長自一尺至三尺。幅廣近尺。可供藥用。

性質 鹹。寒。無毒。

主治 催生。治婦人病。及療風下水。

歷代記述考證 【明】李時珍本草綱目論海帶曰。治水病。癭瘤。功同海藻。

參考資料 海帶可以束物。醫家用以下水。勝於海藻、昆布。（掌禹錫）

【海梧】命名 本品形似梧桐。故名。

產地 出安南及熱帶諸地。

形態 海梧爲喬木類之一種。樹如桐而色白。結實肥大如小栗。而有三角。甘肥同松子。可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 利大小腸。益智慧。開心胸。明耳目。療怔忡健忘。夜多惡夢。空心日食十數枚。月餘自愈。疝氣囊大如斗。燒灰服之。

【海梧子】產地 生安南及熱帶諸地。

形態 海梧爲喬木類之一種。樹似梧桐。色白。葉似青桐。結實肥大。如小栗而有三稜。味甘可食。同於松子。其子可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 明耳目。益智慧。開心胸。利大小腸。治怔忡。健忘。疝氣。囊大如斗。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【海犀皮】功用　活血。治風。

【海犀膏】卽黃明膠之古籍別名。典見綱目。詳『黃明膠』條。

【海豚魚】命名　本品因其形似豚。故名。

外國名稱　Delphinus longirostris Gray 或 Prodelphinus longirostris(拉丁)(Dolphin)(英)

古籍別名　海豕生江中者名江豚。(拾遺)江豬。水豬。(異物志)鰿魚。饒魚。鰐鮪。(綱目)

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類游水類齒鯨類海豚科。

產地　生江海中。

形態　海豚魚爲無鱗魚類鯨屬之一種。體長八九尺。如紡錘狀。口吻尖。爲嘴狀。上下顎皆有錐形之齒。各五十六枚。齒頭尖銳。耳小。善聽。鼻孔有鱗狀膜。背面及體旁皆黑藍色。腹白有兩乳。背有高約七八寸之脊鰭。向後風前肢變爲狹尖之鰭。無後肢。尾平擴。亦呈鰭狀。牛月形。其膏脂最多。可燃燈。骨硬肉肥。可供藥用。



海豚魚

性質　鹹。腥。無毒。

主治　飛尸。蠱毒。瘴癘。作脯食之。

【海豚魚肪】主治　靡噩瘡。疥癬。痔瘻。犬馬瘡疥。殺蟲。

【海蛇】卽蛇婆之別名。詳『蛇婆』條。

【海肥】卽貝子之古籍別名。典見綱目。詳『貝子』條。

【海鹿】卽鷦鷯菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鷦鷯菜』條。

【海湯草】卽海藻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『海藻』條。

【海棗】卽無漏子之古籍別名。典見草木狀。詳『無漏子』條。

【海棠梨】卽海紅之古籍別名。典見綱目。詳『海紅』條。

【海椒】卽蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕃椒』條。

【海菜】卽海藻之古籍別名。典見綱目。詳『海藻』條。

【海蛤】基本　本品乃海中諸蛤爛殼之總稱也。

形態　海蛤爲介類之一種。類甚多。大者如棋子。小者如油麻粒。其殼經海水磨礪或漂至海邊。多集於沙土中。其色不一。或黃或白。或赤。採得研末。可供藥用。

採取　四五月間淘沙取之。

製法　雷斅曰。凡使海蛤。勿用游波蟲骨。眞相似。只是面上無光。誤餌之。令人狂走欲投水。如鬼祟。惟醋解之。立愈。其海蛤用漿水煮一伏時。每一兩入地骨皮。桐葉各二兩。同煮一伏時。東流水淘三次。搗粉用。韓保昇曰。取得以半天河煮五十刻。以栴杷汁拌勻。入盞竹筒內。蒸一伏時。搗用。

性質　苦。鹹。平。無毒。

主治　欬逆上氣。喘息煩滿。胸痛寒熱。(本經)療陰痿。(別錄)

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論海蛤曰。主治十二水滿。急痛。利膀胱大小腸。【唐】甄權藥性本草論海蛤曰。治水氣浮腫。下小便。治噦逆上氣。項下瘤癭。【唐】蕭炳四聲本草論海蛤曰。止消渴。潤五臟。治服丹石人有瘡。【宋】日華諸家本草論海蛤曰。療嘔逆。胸脇脹急。腰痛。五痔。婦人崩中。帶下。【明】李時珍本草綱目論海蛤曰。清熱利濕。化痰飲。消積聚。除血痢。婦人血結胸。傷寒反汗。搐搦。中風癱瘓。

【海蛤粉】卽蛤粉之處方用名。詳『蛤粉』條。

【海蛇】古籍別名　水母。樗蒲魚。(拾遺)石鏡。(綱目)

海蜇。(俗名)

外國名詞　Phopilemaesoulenta(拉丁)ビセンクラゲ(日本)

基本　係腔腸動物。海蛇科魚類。爲海蛇之肉。其皮詳見該條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態　海蛇爲無鱗魚類之一種。種類甚多。大者徑尺餘。普通者上面高凸。狀如張繖。平滑而軟。色淡藍皮薄。下面有六腕。延長如柄。色淡紅。腕上觸手叢生。觸手之間有無數細口。內通胃腔。繖之邊緣有耳目。常浮水面。捕蝦附之。其肉可供藥用。

製法　採得浸以石灰、礬水。去其血汁。其色遂白。其最厚者。謂之蛇頭。其味更勝。生熟皆可食。茄柴灰和鹽水醃之尤良。

性質　鹹溫。無毒。

主治　婦人勞損。積血帶下。小兒風疾。丹毒。湯火傷。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論海蛇曰。療河魚之疾。

【海蛇皮】命名　本品卽海蛇之外白皮。故名。

性質　鹹。濇。溫。無毒。

主治　祛風。消痰行積。治頭風痞塊。瘰癧無名腫毒。

【海雲】卽海藏之日本名。詳『海藏』條。

【海槐】卽無漏子之木名。典見綱目。詳『無漏子』條。

【海椒子】古籍別名　千年棗。（綱目）鳳尾蕉子。無漏子。無漏果。棗實。（綱目拾遺）

形態　海槐爲喬木類之一種。高三四丈。圍五六尺。春月開花。狀如蕉花。有兩腳。漸漸開罅。中有十餘房。子長二寸。黃白色。形類楝子。有核。新秋實熟。色黑。味甘如飴。可供食與藥用。

製法　用刀剝去青皮。石灰湯淪之。入冷熟蜜浸換四次。則澀味去。瓶封。久藏不壞。

性質　甘溫。無毒。

主治　消食寬中。除痰止嗽。益氣潤顏。久食令人肥美。

【海狹】卽人參之古籍別名。典見廣雅。詳『人參』條。

【海藍】卽海蛇之訛名。詳『海蛇』條。

【海蜞】卽淡菜之古籍別名。典見綱目。詳『淡菜』條。

【海凰】卽海參之別名。詳『海參』條。

【海凰藤】卽蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕃椒』條。

【海漆】卽倒捻子之古籍別名。詳『倒捻子』條。

【海瘋藤】卽蕃椒之古籍別名。典見花鏡。詳『蕃椒』條。

【海精水】卽水英之古籍別名。典見綱目。詳『水英』條。

【海蕎】卽山道年可之別名。詳『山道年可』條。

【海蓊子】卽鳳仙子之古籍別名。典見救荒本草。詳『鳳仙子』條。

【海豨】卽海豚魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳『海豚魚』條。

【海狸】卽狸之古籍別名。典見廣雅。詳『貓狸』條。

【海鳳絲】古籍別名　草蓮。

產地　生廣信。



海鳳絲

形態　叢生橫根。綠莖細如小竹。初生葉如青蒿。漸長細如茴香葉。可供藥用。

主治　頭風。利大小便。

【海髮】卽海藻之古籍別名。典見本草集註。詳『海藻』條。

【海榴茶】卽山茶花之古籍別名。典見綱目。詳『山茶花』條。

【海燕】外國名詞　Patiria 或 Asterina（拉丁）イトマキヒトデ（日本）

基本　係棘皮動物海盤車類之海燕。

產地　出海中礁岩間。

形態　海燕爲介類之一種。五腕甚短。體爲五角形。略似燕。色藍。有赭色斑點。口在體之下面。口緣分裂作深溝。直沿各腕之中央。達於其端。溝中有管足二列。以司運動。可供藥用。

性質　鹹溫。無毒。

主治　陰雨發損痛。麥汁服。取汗卽解。亦入滋陽藥。

【海螄】

性質　鹹寒。

主治　瘰癧結核。能降鬱氣。

參攷資料　㊀海螄。杭俗立夏以爲應時之味。以花椒酒之。麻油拌食。從新云。比螺螄身細而長。殼有旋紋六七屈。頭上有鬣。春初蜓起。叮海崖石壁。海人設網於下。一掠而取。治以鹽酒椒桂。按海螄有

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大如指長一二寸許者名釘頭螺。溫台沿海諸郡多有之海蝤螺生海塗中立夏後有人見其羣變爲虹今人所稱豆娘是也或云此螺能跳丈許蓋遷其處此物又能食蚶明州奉化多蚶田皆取苗於海塗種之久則自大時田者不時耨視恐有海蝤苗蓋蚶不長他物惟長海蝤蚶田中一有此物蚶無遺種皆被其吮食盡玉環出者大如指名釘頭螺（杭州府志）㈡辟蛆雲客傳方立夏日食海蝤後以殼七枚勿令人見撒廁中或馬桶內暑日不生蛆蟲頗靈驗（趙恕軒）

【海龍】命名 本品乃海馬之大者其形似龍故名。

產地 出閩粵南海中。

形態 海龍爲魚類海馬屬之一種首尾如龍而無牙爪長四五寸至尺餘身長而尾直不捲體如玉色雌者黃雄者青可供藥用。

主治 益房箔催生尤有捷效。握之即產功倍海馬。

參攷資料 ㈠海馬之屬有三。小者長不及寸名海蛆不入藥中等者長一二寸名海馬尾盤旋作圈形扁如馬其性溫味甘煖水臟壯陽道消痰塊治疔腫產難血氣痛海龍乃海馬中絕大者長四五寸至尺許不等皆長身而尾直不作圈入藥功力尤倍雖同一類形狀微有不同此物廣州南海亦有之體方周身如玉色起竹節紋密密相比光瑩耀目誠佳品也（百草鏡）㈡介語蝦姑一名海馬其扁如蜈蚣者燒服主夜遺（綱目拾遺）

【海龜】即蠵龜之別名詳『蠵龜』條。

【海蠃蛸】即烏賊骨之原名詳『烏賊骨』條。

【海螺】古籍別名 流螺（圖經）假猱螺小者名釘頭螺（綱目）原名 海贏。

產地 生海濱間。

形態 海螺爲介類螺蚌屬之一種種類甚多硬殼有旋線身可宛轉伏藏其大者殼可爲酒巵及吹器內面光潔美麗亦可以鑲嵌漆器肉可供食與藥用。

性質 甘冷無毒。

主治 目痛累年或三四十年生贏取汁洗之或入黃連末在內取汁點之。

歷代記述弦證 【唐】孫思邈千金翼論海螺肉曰合菜煮食治心痛。

【海螺髒】古籍別名 甲香。（交州記）

製法 雷敩曰凡使用生茅香皂魚同煮半日石搗篩用之經驗方曰凡使用黃泥同水煮一日。溫水浴過再以米泔或灰汁煮一日再浴過以蜜酒煮一日浴過煿乾用蘇頌曰傳信方藏其法云每甲香一斤以泔斗半微火煮一伏時換泔再煮凡二換漉出衆手刮去香上涎物以白米三合水一斗微火煮乾又以蜜三合水一斗煮三伏時乃以炭火燒地令熱酒酒令潤鋪香於上以新瓦蓋上一伏時待冷硬石臼木杵搗爛入沉香末三兩麝一分和搗卽成以瓶貯之埋過經久方燒凡燒此香須用大火爐多着熱灰剛炭猛燒令盡去之爐勞着火煖水卽香不散此法出於劉兗奉禮也宗奭曰甲香善能管香烟與沉檀龍麝香用之尤佳。

性質 鹹平無毒。

主治 心腹滿痛氣急止痢下淋。

歷代記述弦證 【唐】李珣海藥本草論海螺髒曰和氣清神主腸風痔瘻【唐】陳藏器本草拾遺論海螺髒曰瘻瘡疥癬頭瘡嚩瘡甲疽蛇蠍蜂螫。

【海鰿白皮】卽白皮子之俗名詳『白皮子』條。

【海膽石】卽血竭之古籍別名。見和漢藥考詳『血竭』條。

【海藤】卽藤黃樹之古籍別名。見郭義恭廣志詳『藤黃』條。

【海藥子】古籍別名 連木（本經）

產地 生山谷間。

形態 海藥爲蔓草類之一種。其子實似黃藥子苦藥子可供藥用。

製法 凡使去皮取仁研細用。

性質 辛溫無毒。

主治 邪氣諸痺疼痠續絕傷補骨髓（本經）破血止痢消腫除

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蟲。莊。解蛇毒。(別錄)

【海鏡】古籍別名 鏡魚。瓊蚶。(郭璞賦)膏薬盤。鼈鏡。(綱目)

外國名稱 Amusium japonicus Gmel.(拉丁)ツキヒガヒ(日本)

基本 屬軟體動物瓣鰓類無管類單柱類海扇科海鏡之肉

產地 福建、港、粵諸海濱均有產之。

形態 海鏡形似海月。而殼形略圓。右殼平。左殼稍膨凸起。近殼頂之耳狀突起小。而前後同形。殼外面無隆線。但有細微之放射線。左殼面色褐或淡紅。有多數之細紫輪紋。右殼色白或青白。殼長約四寸。土人多磨礪其右殼。使之透明。嵌之於天窗或窗櫺。亦可作明瓦。取其肉可供食與藥用。

性質 鹹。寒。無毒。

效能 利尿。祛溼。消積。療風。下氣。和中。

主治 消渴。祛腹中宿積。令人易饑。

參攷資料 產於南海。兩片相合成形。殼圓如鏡。光瑩放射如雲母。內有肉形如蚌。胎腹有寄生蟲。大如豆狀。如蟹饑則出食。入則飽矣。(李時珍)

【海藻】命名 藻乃水草之有文者。潔淨如浴澡。故謂之曰藻。本品係生海中者。名之曰海藻。海藻者。海中所產藻類之總稱也。但藥則用馬尾藻。

處方用名 淡海藻。馬尾藻。

古籍別名 蕰。海羅。(爾雅)藫。(別錄)蒔首。(本經)神馬草。海湯草。(和漢藥考)海菜。(綱目)海髮。(本草集註)

基本 屬褐色海藻門之馬尾藻 Sargassum Enerve, C. Ag.

產地 陳仁山藥物生產辨云。海藻產廣東新安。平海。汕尾等。鹹水海處。十二月出新。至五月止。

形態 海藻類中之馬尾藻。係生於各地沿海暗礁之藻類。長自三四尺至五六尺。莖細而分歧互生。狹長葉。葉腋有大一分餘之黑色球圓形氣胞。壓之則破裂有聲。日本之筑前地方。呼此爲捉虱子。其藥莖生鮮時。呈黑色。入溫湯則變綠。

採取 十二月至來年五月止。爲採取時期。

製法 雷敩曰。凡使須用生烏豆、井葉背天葵三件。同煮伏時。日乾用。李時珍曰。近人但洗淨鹹味。焙乾用。

性質 苦。鹹。寒。無毒。

效能 瀉熱。散結。化痰。涎。消癭。用作軟堅藥。又爲利尿藥。

主治 癭瘤結氣。散頸下硬核痛。癰腫。瘰癧堅氣。腹中上下雷鳴。下十二水腫。(本經)療皮間積聚。暴瘕。瘤氣結熱。利小便。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論海藻曰。辟百邪鬼魅。治氣急。心下滿疝氣下墜疼痛。卵腫。去腹中幽幽作聲。【唐】李珣海藥本草論海藻曰。治奔豚氣。腳氣。水氣。浮痛。宿食不消。五膈痰塊。【明】繆希雍本草經疏論海藻曰。海藻味苦。鹹寒。而無毒。氣味俱厚。苦能洩結。寒能除血熱。鹹能軟堅潤下。故本經主癭瘤氣。頸下核。破散結氣。癰腫。瘰癧。堅氣。及腹中上下鳴。下十二水腫。療皮間積聚。暴瘕。瘤氣。結熱。利小便。潔古專消癭瘤。馬刀。瘰癧。諸瘡堅而不潰者。經云。鹹能軟堅。營氣不從。外爲浮腫。隨各引經治之。腫無不消。反甘草一云有小毒。【清】黃宮繡本草求眞。論海藻曰。海藻書載性反甘草。能治項頸一切瘰癧。瘰疬。及痰飲。腳氣。水腫等症。其故奚似。蓋緣苦能洩結。寒能除熱。鹹能軟堅。海藻氣味俱備。與甘草本屬不合。凡其水因熱成。而致隧道閉塞。小便不通。硬結不解者。用此堅軟結泄邪退。熱解。使熱盡從小便而出。而病自無不愈也。至有病非實結。最不宜用。非獨海藻爲然。卽凡海中諸藥。無不如是。海帶有似海藻而粗。柔韌而長。主治無異。昆布亦同海藻。海帶俱性帶滑且雄。凡癭堅如石者。非此不除。且其下氣最速。久服多令人瘦。至云海島人常食。以其水土不同。故耳。皆反甘草。略洗去鹽水用。

近人學說 張山雷曰。海藻生長海中。鹹苦而寒。故能軟堅散結。癭瘤結核。皆肝膽火炎。灼痰凝絡所致。寒能清熱。固其專長。而陰寒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

凝聚之結核。非其治矣。癰腫瘰癧。多由血熱淤滯而生。腹鳴水腫更多溼熱停頓之候。凡此諸症之屬於陽實有餘者。固可治之。而正氣不及。清陽不運諸症。不可概施。別錄特提結熱二字。最當注意。非謂陽虛血瘀之瘕癖癰腫。及寒水泛溢等病。皆可以此統同論治也。十二水腫。蓋以十二經而言。諸經積水。固皆有溼熱不利之一候。此類寒滑泄水之藥。固可用之。又曰甄權謂治心下滿。疝氣下墜疼痛。卵腫。李珣海藥本草。以治奔豚氣。腳氣。水氣。浮腫。皆當以熱藥有餘一面而言。正與腎水泛濫之奔豚及寒水凌心寒疝結痛諸症。兩得其反。此皆讀古人書者。不可不辨之門徑。非謂凡此諸病。不問虛實寒熱。皆以此物一例通用也。

配合應用 ㈠海藻酒治癭氣。用海藻一斤。絹袋盛之。以清酒二升浸之。春夏二日。秋冬三日。每服兩合。日三。酒盡再作。其滓曝乾爲末。每服方寸匕。日三服。不過兩劑即瘥。(范汪方)

㈡治癭氣初起。海藻一兩。黃連二兩爲末。時時酤嚥。先斷一切厚味。(丹溪方)

㈢治項下瘰癧如梅李狀。宜連服前方海藻酒消之。(肘後方)

㈣蛇盤瘰癧頸項交接者。海藻菜以蔴麪炒過。白殭蠶炒等分爲末。以白梅泡湯和丸。梧子大。每服六十丸。米飲下。必泄出毒氣。(危氏得效方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒而有溼滯者禁用。反甘草。

參攷資料 ㈠海藻起男子陰消。男子癆疾。宜常食之。南方人多食。北方人效之。倍生諸疾。更不宜矣。(孟詵)㈡東垣李氏治瘰癧馬刀。散腫潰堅。湯海藻甘草兩用之。蓋以堅積之病。非平和之藥所能取捷。必令反奪以成其功也。(李時珍)㈢此有二種。馬尾藻生淺水中。如短馬尾。細黑色。用之當浸去鹹味。大葉藻生深海中。新羅國葉如水藻而大。海人以繩繫腰沒水取之。五月以後有大魚傷人。不可取也。爾雅云。綸似綸。組似組。東海有之。正爲二藻也。(陳藏器)㈣

此卽水藻生於海中者。今登萊諸州有之。陶隱居引爾雅綸組註昆布。謂昆布似組。青苔葉菜似綸。而陳藏器以綸組爲二藻。陶說似近之。(蘇頌)

【海藻酒】製法 用海藻一斤。洗淨。浸酒飲。

主治 癭瘤結氣。

【海蘇】卽連錢草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連錢草』條。

【海蘊】命名 縕亂絲也。本品葉似之故名。

古籍別名 海雲(日本)

外國名詞 Mosoglota dectpions, Sur.(拉丁)モジク(日本)

基本 係海藻科。爲海藻類之海蘊。

産地 出淺水岩石上。寄生於馬尾藻類之藻。

形態 海蘊爲水草類之隱花植物。枝多細長而柔滑。葉細如絲。色蒼黏滑。浮於水面。長數尺可生食。與藥用。

性質 鹹。寒。無毒。

主治 癭瘤結氣在喉間。下水。

歷代記載匯輯 【宋】蘇頌 嘉祐圖經本草。論海蘊曰。主水癭。

【海鰡】卽鯖魚產於海中者之別名。詳『泥鰍』條。

【海鯀】命名 本品爲鰕之產於海中者故名。

古籍別名 紅鰕(綱目拾遺)鱃(爾雅)

形態 海鰕爲魚類鰕屬之一種。長可二尺餘。皮殼嫩紅。礫鬚鉞鼻。背有斷節。尾有硬鱗。前足有鉗。多足善躍。其肉作鮓。可供食與藥用。

性質 甘。平。有小毒。

主治 飛尸。蛇蟲口中甘蠶齲齒。頭瘡。去疥癬。風瘙身痒。治山蚊子入人肉。和食療發則愈。

參攷資料 海鰕同猪肉食。令人多唾。(李時珍)

【海贏】卽海螺之原名。詳『海螺』條。

【海鷄魚】命名 本品形象海鷄故名。

古籍別名 邵陽魚。少陽魚。荷魚。鮸魚。鯔魚。蕃隄魚。石蠣(綱目)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

基本 係脊椎動物魚類板鰓類橫口類魚類之海鷂魚。

產地 常棲於海底沙土中。

形態 海鷂魚爲無鱗類魚族之一種。體形扁平。大者圍七八尺。狀如盤及荷葉。頭部之下面有口鼻及五對之鰓孔。頭部之上面有兩眼及噴水孔。此孔可認爲鰓孔所變化者。口有小齒。胸鰭甚擴張。故外貌似胸部甚覺扁大。多呈斜方形。或圓扇形。尾部狹小。背面具銳棘。腹鰭小。無臀鰭。尾鰭亦小。僅有上葉。無下葉。全體無鱗而骨軟。游泳甚拙。鰲人甚喜其肉可供藥用。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 男子白濁。腎淋。玉莖瀝痛。

參攷資料 (一)海鷂魚肉。氣味有小毒。(李時珍)(二)海鷂魚肉不益人。(陶弘景)

【海鷂魚尾】 **性質** 有毒。

主治 齒痛。

【海鷂魚齒】 **性質** 無毒。

主治 瘧瘧燒黑研末。酒服二錢七。


【海鰻鱺】 **命名** 本品出海中。形類鰻鱺而大。故名。

古籍別名 慈鰻鱺。狗魚。(日華)

外國名詞 Muraenosox cinereus. (拉丁) Forsk (英) ハモ(日本)

基本 係脊椎動物魚類喉鰾類海鰻鱺科。

產地 生海中岩礁裂隙間。



海鰻鱺

形態 海鰻鱺爲無鱗魚類之一種。體圓長。至尾端漸側扁。形似鰻鱺。皮面無鱗。口大具銳齒。上顎微爲鉤狀。下顎不突出。脊鰭始於鰓孔之上。臀鰭始於體之中段。連續於尾。背色淡灰黑稍帶紫。腹面暗白。微帶青。脊臀鰭色黑。有闊緣。邊本體長三尺餘。大者六尺許。棲於海潮流緩慢處。晝伏夜出覓食。其肉可供藥用。

性質 甘。平。有毒。

主治 療皮膚惡瘡。疥癬。疳瘡。痔瘻。

參攷資料 海鰻鱺功似鰻鱺。緩而不補。(李時珍)

【海蘿】 卽海藻之古籍別名。典見爾雅詳『海藻』條。

產地 生南海山石間。

形態 海蘿爲蠶之一種。其狀似蠶。大如拇指。其沙甚白。如玉粉狀。可供藥用。

性質 鹹。大溫。無毒。

主治 虛勞冷氣。諸風不遂。久服補虛羸。令人光澤。輕身延年不老。

參攷資料 海蘿沙難得眞者。彼人以水搗葛粉石灰。以梳齒印成僞充之。縱服無益。反能損人。宜愼之。(李時珍)

【海鹽】 卽鹽之以海水製成者。詳『食鹽』條。

【浸藍水】 **基本** 係取藍草浸漬之水。

製法 取藍草厚鋪木板上。漬之以水。使起酵發熱。待至乾燥上下攪和。再漬水發酵。如是多次。至酵全息。則成暗青黑色。

性質 辛。苦。寒。無毒。

效能 除熱。解毒。殺蟲。消積。

主治 治誤吞水蛭成積。腹痛黃瘦。

參攷資料 昔有人因醉飲田中水。誤吞水蛭。胸腹脹痛。面黃。以此水飲之。大瀉數行。頓愈。

【消石】 **命名** 本品力能消化諸石。故名。

古籍別名 芒消。(別錄)苦消。(甄權)焰硝。(土宿)火消。(綱目)地霜。(蜀本)生消。(唐本)硝石。鹽石化金石。河東野。北帝玄珠。(和漢藥考)

外國名詞 Salpetrae. Salnitri. (拉丁) Niter. (英) Salpeter (德)

基本 爲硝礦之一種。

產地 在山谷川澤及諸國地。

形態 消石爲六稜之泠柱狀結晶無色。或白色。味微辛苦。冷而有刺戟性。置空氣中不變化。水善

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

溶解。投入火中。則爆鳴。立即燃燒而發鮮明之焰。

製法　大明曰。眞消石柳枝湯煎三周時。如湯少卽加熱者。伏火卽止。霹靂曰。凡治消石。先研如粉。用雞腸菜、柏子仁、共二十五箇。和作一處。丸如小帝珠子。以瓷瓶子於五斤火中煅赤。投消石四兩於瓶內。連投藥丸入瓶。自然伏火也。抱樸子曰。能消柔五金。化七十二石。爲水制之。須用地蓮子、猪牙皂角、苦參、南星、巴豆、漢防己、晚蠶砂。李時珍曰。硝化。投甘草入內。卽伏火。

性質　苦。寒。無毒。

成分　化學上謂之硝酸加溜謨。KNO_3

效能　破堅積。消瘕癥。療霍亂。通五淋。用作清涼利尿藥。又治水腫石淋。

作用　在胃中能激動胃腺。使分泌增加。入至腸又能刺激腸黏膜。使腸之分泌亦增多。催促大糞之排出。由腸壁而吸入血中。能增血液中之鹼性。遲緩悸進之心臟。以減退原有之體溫。由血中游離而至腎臟。能將腎臟充血。使全身之過量水分。迅速迫向腎臟排出。若服量過多。則易釀成腸胃炎。

主治　五臟積熱。胃脹便閉。滌去蓄結飲食。推陳致新。除邪氣。煉之如膏。久服輕身（本經）。療五臟十二經脈中百二十疾。暴傷寒。腹中大熱。止煩滿消渴。利小便及瘡蝕瘡。天地至神之物。能化七十二種石（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論消石曰。破積散堅。治腹脹。破血下瘀。瀉得根出。【宋】大明諸家本草論消石曰。含嚥。治喉閉。【明】李時珍本草綱目論消石曰。治伏暑傷冷。霍亂吐利。五腫淋疾。女勞黑疸。心腸疼痛。赤眼。頭痛。牙痛。

國外學說　日本學說謂依日本藥局方云。爲消炎藥。於肺炎肋膜炎。心內外腹炎。急性關節炎用之。爲利尿藥。於諸般之水腫。與實芰答利斯配用。一日三回。自〇、三至一、五。爲水散服之。腸胃炎及衰弱者宜禁忌。又和漢藥考曰。消石熱帶地方。因含窒素有機物之腐敗。窒素爲空氣中之酸素所酸化。變爲硝酸。更與地中之亞兒加里化合而生鹽。取而精製之。遂成消石。日本舊法。採取地板下經過數年之土類。以水溶化。候土實類沈降器底。汲取其上面澄清者。蒸發而使結晶。又從而精製之。

配合應用　㊀頭痛欲死。消石末吹鼻內卽愈。（炮炙論）

㊁治諸心腹痛。絡消雄黃各一錢。研細末。每點少許入眥內。名火龍丹。亦治膜腹諸痛。（集玄方）

㊂治赤眼腫痛。消石末。臥時以鋼筋點黍米大入目眥。至旦以鹽水洗去之。（聖惠方）

㊃治眼目障翳。男女內外障翳。或三五箇月不見效者。一點復明。好絡消一兩。銅器鎔化。入飛過黃丹二分。片腦二分。銅匙急炒。入罐內收之。每點少許。其效如神。（張三伴仙方）

㊄治風熱喉痺。及纏喉風病。玉鈐匙。用絡消一兩半。白殭蠶一錢。硼砂半兩。腦子一字。研細末。吹之。（三因方）

㊅治重舌鵝口。竹瀝同絡消點之。（普濟方）

㊆治伏暑瀉痢。及腸風下血。或酒毒下血。一服見效。遠年者不過三服。消石、舶上硫黃各一兩。白礬滑石半兩。飛鷄四兩爲末。滴水丸。梧子大。每新汲水下三五十丸。名甘露丸。（普濟方）

㊇治五種淋疾。勞淋、血淋、熱淋、氣淋、石淋及小便不通。至甚者。透脊散。用消石一兩。不夾泥土。雪白者。生研爲末。每服二錢。各依湯使。勞淋勞倦虛損。小便不出。小腹急痛。葵子末煎湯下。通後便須服補虛丸。散。小便不出。時下血疼痛滿急。熱淋小便熱赤色。臍下急痛。並用冷水調下。氣淋小腹急滿。尿後常有餘瀝。木通煎湯下。石淋窒肉痛。尿不能出。內引小腹膨脹急痛。尿下砂石。令人悶絕。將藥末先入銚內。隔紙炒至紙焦爲度。再研用溫水調下。小便不通。小麥湯下。卒患諸淋。只以冷水下。並空心調藥。使消如水。服之。（沈存中靈苑方）

㊈治服石發瘡疼不可忍。用紙圈圈之。中心塡消石令滿。以匙抄水淋之。覺不熱痛卽止。（兵部手

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

集方）

㊄治發背初起。惡寒膏膏。或已生瘡腫隱疹。消石三兩。暖水一升。泡化。青布摺三重。溫塌赤處。熱即換。頻易取痊。（外臺秘要方）

㊅治女勞黑疸。仲景曰。黃家日晡發熱及惡寒。此爲女勞得之。膀胱急。少腹滿。身盡黃。額上黑。尺下熱。因作黑疸。腹脹如水。大便黑時溏。非水也。腹滿者難治。消石、礬石燒等分爲末。以大麥粥汁和服方寸匕。日三。病隨大小便去。小便黃。大便黑。是其候也。（金匱方）

㊆治手足不遂。大風及丹石熱風。不遂。用消石一兩。生烏麻油二斤。置鐺中。以土塹蓋口。紙泥固濟。火煎。初時氣腥。熟則氣香。更以生麻油二升。合煎得所。收不津器中。服時。坐室中。重作小紙屋。然火於內。服一大合。發汗。力壯者日二服。三七日。頭面疱瘡皆滅也。然必以火爲使。（波羅門僧方）

用量　五分至三錢。

施用宜忌　凡無實邪者禁用。惡苦參、苦菜、畏女菀、杏仁、竹葉。火爲之使。

參攷資料　㊀朴消屬水。味鹹而氣寒。其性下走。不能上升。故惟蕩滌腸胃積滯。折治三焦邪火。消石屬火。味辛帶苦。微鹹而氣大溫。其性上升。故能破積散堅。治諸熱病。升散三焦火鬱。調和臟腑虛寒。與硫黃同用則配類二氣均調。陰陽有升降水火之功。治冷熱緩急之病。厥制礞石。則除積滯痰飲。蓋硫黃之性。燥而利。其性下行。消石之性。暖而散。其性上行。礞石之性。寒而下。消石之性。暖而上。一升一降。一陰一陽。此制方之妙也。今兵家造烽火銃機等物。用消石者。直入雲漢。其性升可知矣。雷公炮炙論序云。腦痛欲死。鼻投消末。是亦取其上升辛散。乃從治之義。本經言其寒。別錄言其大寒。正與龍腦性寒之誤相似。凡辛苦物。未有大寒者。況此物得火則焰生。與樟腦火酒之性同。安有性寒大寒之理哉。史記倉公傳云。菑川王美人懷子不乳。來召淳于意。意往飲以黃牙藥一撮。以酒飲之。旋乳。意復診其脈。躁。躁者有餘病。即飲以消石一劑。出血豆比五六枚而安。此去血結之驗也。（李時珍）㊁消石療病。與朴消相似。仙經用此消化諸石。今無眞識此者。或云與朴消同。山所以朴消一名消石朴也。又云一名芒消。今芒消乃是煉朴消作之。並未覈研其驗。有人得一種物色。與朴消大同小異。腦腦如握鹽雪。以火燒之。紫青烟起。云是眞消石也。今宕昌以北諸山有鹹土處皆有之。（陶弘景）㊂神農本草無芒消。只有消石一名芒消。名醫別錄乃出芒消。療與消石同。疑即消石也。舊出寧州。黃白粒大。味極辛苦。今醫家多用煑煉作色者。全白粒細而味不甚烈。皇甫士安言無朴消。可用消石。消石生山之陰。鹽之膽也。取石脾與消石。以水煑之。一斛得三斗。正白如雪。以水投中即消。故名消石。其味苦無毒。主消渴熱中。止煩滿。三月采於赤山。朴消者。亦生山之陰。有鹽鹹苦之水。則朴消生於其陽。其味苦無毒。其色黃白。主療熱腹中飽脹。養胃消穀。去邪氣。亦得水而消。其療與消石小異。按如此說。是取芒消合煑。更成爲眞消石。以朴消作芒消者。用燈湯淋汁煑之。着木盆中經宿。即成矣。今益州人復鍊礬石作消石。絕柔白而味猶是礬爾。又曰。朴消今出益州北部汶山郡。四川疊陵二縣界。生山厓上。色多青白。亦雜黑斑。土人擇取白軟者。以當消石用之。當燒令汁沸。出狀如礬石也。（陶弘景）㊃朴消有縗理縗理二種。用之無別。其白軟者朴消苗也。虛軟少力。鍊爲消石。所得不多。以當消石。功力大劣也。又曰。消石即是芒消。朴消一名消石朴。今煉粗惡朴消。取汁煎作芒消。即是消石別錄復出芒消誤矣。晉宋占方多用消石。少用芒消。近代諸醫。但用芒消。勘言消石。理既明白。不合重出。（蘇頌）㊄舊說朴消芒消消石三物同種。初采得苗。以水淋汁煎成者爲朴消。一名消石朴。又煉朴消或地霜而成。堅白如石者爲消石。一名芒消。又取朴消淋汁煉煎結成有細芒者爲芒消。雖一體異名。而修煉之法既殊。則主治之功亦別。然本經所載。疑是二種。今醫方所用。亦不能究。但以未煉成塊。微青色者爲朴消。煉成盆中有

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

芒者。爲芒消。亦謂之盆消。芒消之底澄凝者爲消石。朴消力緊芒消次之。消石更緩。未知孰是。蘇恭言晉宋古方多用消石。少用芒消。按、張仲景傷寒論承氣陷胸。皆用芒消。葛洪肘後方傷寒時氣亦多用芒消。惟治食鱠不化云。無朴消用芒消代之。是晉宋以前通用朴消芒消矣。胡洽方十棗湯用芒消。大五飲丸用消石。並云無消石用芒消。是梁隋間通用芒消消石矣。以此言之。朴消消石爲精。芒消爲粗。故陶氏引皇甫士安之言爲證。是消石當時已難得其眞。故方書通以相代矣。又古方金石淺法。用朴消、滑石、芒消、馬牙消四種相參。次第下之。方出唐世。不知當時如何分別也。又南方醫人著消說云。本草有朴消、消石、芒消、而無馬牙消。諸家所注三種。竟無斷決。或言芒消、消石是一物。不合重出。或言煎鍊朴消。經宿。盆中有細芒爲芒消。或言馬牙消自是一物。今諸消之體各異。理亦易明。而惑乃如此。朴消味苦而微鹹。出蜀郡者。瑩白如冰。雪內地者小黑。皆蘇脆易碎。風吹之則結霜。泯泯如粉。熬之烊沸。亦可鎔鑄以水。合甘草猪膽煮至減半。投大盆中。又下凝水石屑同煎一宿。則凝結如白英者芒消也。掃地霜煎鍊而成。試竹上如解鹽而味辛苦。燒之成焰都盡者消石也。能消金石。又性畏火而能制諸石使拒火。亦天地之神物也。牙消卽是芒消也。又有生消不因煮鍊而成。亦出蜀道。類朴消而小堅也。其論雖辨。然與古人所說殊別。亦未可全信也。（蘇頌）㊀諸消自晉唐以來。諸家皆執名而猜。都無定見。惟馬志開寶本草。以消石爲地霜煉成。而芒消、馬牙消、是朴消煉出者。一言足破諸家之惑矣。諸家蓋因消石一名芒消。朴消一名消石。朴之名相混。遂致費辨不決。而不知消有水火二種。形質雖同。性氣迥別也。惟神農本經朴消、消石二條爲正。其別錄芒消、嘉祐馬牙消。開寶生消。俱係多出。今並歸併之。神農所列朴消。卽水消也。有二種。煎鍊結出細芒者爲芒消。結出馬牙者。亦名牙消。又名生消。其凝底成塊者。通爲消石。其氣味皆辛苦而大溫。二消皆有芒消、牙消之稱。故古方有相代之說。自唐宋以下所用芒消、牙消。皆是水消也。南醫所辨雖明。而以凝水石猪膽煎成者爲芒消。則誤矣。今通正其誤。其石脾一名消石者。乃造成假消也。（李時珍）

【消石朴】卽朴消之古籍別名。典見別錄。詳『朴消』條。

【涎衣草】卽地膚子之古籍別名。典見唐本草。詳『地膚子』條。

【烈節】

產地 生林箐中。

形態 烈節爲蔓草類之一種。春生苗莖。葉似于公藤而纖微。無花實。其莖可供藥用。

採取 九月採之。曝乾用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 肢節風冷。筋脈急痛。作湯浴之。

參攷資料 楊倓家藏經驗方。有烈節酒。治歷節風痛。用烈節、松節、牛膝、熟地黃、當歸各一兩。爲粗末。絹袋盛之。以無灰酒二百盞。浸三日。每服一盞。入生酒一盞。溫服。（李時珍）

【烈樸】卽厚樸之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『厚樸』條。

【烏丁】卽孩兒茶之古籍別名。典見綱目。詳『孩兒茶』條。

【烏丁泥】卽烏爹泥之別名。詳『孩兒茶』條。

【烏女】㊀卽玉竹之古籍別名。典見吳普本草。詳『玉竹』條。㊁卽蓑衣之別名。詳『玉竹』條。

【烏山椒】卽食茱萸之原名。詳『食茱萸』條。

【烏元參】卽玄參之處方用名。詳『玄參』條。

【烏文木】卽烏木之古籍別名。典見綱目。詳『烏木』條。

【烏木】

古籍別名 烏楠木。烏文木。（綱目）

外國名詞 Diospyros Peregrina, Gurke.（拉丁）

基本 係柿樹科柿樹屬。爲烏木之木材。

產地 出東印度及馬來半島。與熱帶諸地。

61／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



烏木

形態　烏木爲喬木類之常綠木本。高二丈餘。葉長橢圓形。平滑互生。花單性合瓣。花冠淡黃色。雌雄同株。果實毬形。赤黃色。其木材黑色。體重堅實。入水則沉。老者色純黑。可製器具。與供藥用。

性質　甘。鹹。平。無毒。

主治　解毒。又主霍亂吐利。取屑研末。溫酒服。

【烏牛子】　卽經霜絲瓜子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『絲瓜』條。

【烏古瓦】　卽古瓦之原名。詳『古瓦』條。

【烏玉玦】　卽墨之古籍別名。典見綱目。詳『墨』條。

【烏尖】　卽鹽筍乾之古籍別名。典見目綱拾遺。詳『鹽筍乾』條。

【烏羊婆婀】　卽沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『沙參』條。

【烏白木】　卽烏桕木。詳『烏桕木』條。

【烏吹】　卽射干之古籍別名。典見別錄。詳『射干』條。

【烏芋】　卽荸薺之原名。詳『荸薺』條。

【烏豆】　卽黑大豆之處方用名。詳『黑大豆』條。

【烏貝】　卽蚌之別名。詳『蚌』條。

【烏足】　卽車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『車前草』條。

【烏柿】　**命名**　本品卽柿用火薰乾而色黑者。故名。

性質　甘。溫。無毒。

主治　殺蟲。金瘡火瘡。生肉止痛。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論烏柿曰。治狗齧瘡。斷下痢。【唐】陳藏器本草拾遺論烏柿曰。服藥口苦及嘔逆者。食少許卽止。

【烏花蛇】　卽烏梢蛇之別名。詳『烏梢蛇』條。

【烏金】　㊀卽墨之古籍別名。典見綱目。詳『墨』條。㊁卽鐵之古籍別名。典見綱目。詳『鐵』條。

【烏金石】　卽石炭之古籍別名。典見綱目。詳『石炭』條。

【烏金紙】　**產地**　出浙江杭縣。

主治　療下疳。

參攷資料　烏金紙之製法。先造烏金水刷紙。候黑如漆。再熏過。以鎚石砑光。性最堅韌。不中書畫。用以包裹珍寶及藥物作襯紙。則瀉氣不入。凡打金箔。則以此紙包金片。揮巨斧捶之。金成箔而紙不損。其紙價頗昂。蓋惟浙人善造也。（醫學大辭典）

【烏金磚】　**基本**　本品爲年久窯窖中之瓦磚也。

主治　小兒痘不貫漿。虛弱無力者大效。

【烏桕】　卽柿之古籍別名。典見綱目。詳『柿』條。

【烏韭】　**古籍別名**　石髮。石苔。（唐本草）石衣（日華）石花。石馬騮。鬼麵（綱目）

基本　係羊齒門羊齒類水龍骨科骨碎補屬。爲烏韭之莖根。

產地　生山陰石間。

形態　烏韭爲苔類瓦松屬之一種。常綠草本。根莖堅硬。橫臥地下。自此生葉。葉柄堅硬而滑澤。呈圓柱形。葉身稍帶革質。長於葉柄。全體爲橢圓形披針形。裂片細略呈四回羽狀。莖長四五寸。茸茸青翠。可供藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　皮膚往來寒熱。利小腸膀胱氣（本經）療黃疸。金瘡內塞。補中益氣（別錄）

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論烏韭曰。燒灰沐頭。長髮令黑。

配合宜忌　蚯蚓爲之使。

【烏韭】　㊀卽麥門冬之異名。典見綱目。詳『麥門冬』條。㊁卽陸鱉之古籍別名。典見綱目。詳『陸鱉』條。

【烏食草】　卽七葉黃荊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『七葉黃荊』條。

【烏扇】　卽射干之古籍別名。典見本經。詳『射干』條。

【烏柏子油】　**原名**　柏油。

基本　本品乃榨烏桕子實所得之脂肪油。

性質　甘。涼。無毒。

主治　塗頭變白爲黑。服一合。令人下利。去陰下水氣。炒子作湯亦可。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論柏油曰塗一切腫毒瘡疥。

【烏柏木】命名　本品子實烏喜食之又木老則根下黑爛成臼故名。

處方用名　烏柏根皮。

古籍別名　鴉臼（綱目）鴉舅。（和漢藥考）

外國名詞　Sapium Sebiferum Roxb.（拉丁）

基本　屬大戟科。藥用烏臼之根皮。

產地　凡南方平澤間恒多生焉。



烏臼木

形態　烏臼爲喓地所產之落葉喬木。高一丈至三丈餘。葉互生作廣卵圓形。前端尖。夏月於梢上生花穗。綴黃色單性小花。秋末結實三四寸。黑褐色扁圓形之實。表面被有白粉。中藏三子。如豆大。皮部含有多量脂肪。採其根皮供藥用。

製法　大明曰。慢火炙乾黃乃用。

性質　苦。微溫。有毒。

效能　瀉熱毒。消水腫。用作利水藥。

主治　暴水癥結積聚。

歷代記述攷證　【宋】大明曰華諸家本草論烏桕根白皮曰。療頭風。通大小便。【元】朱丹溪本草衍義補遺論烏桕根白皮曰。解蛇毒。【明】繆希雍本草經疏論烏桕根白皮曰。烏桕木根皮味苦氣微溫。日華子言涼。然詳其用。應是辛苦溫之藥。而其性則有毒也。與巴豆、牽牛大略相似。入手足陽明經。其主暴水癥結積聚者。皆二經爲病。苦能泄。辛能散。溫能通行腸胃。則諸證無不除矣。

配合應用　㈠治小便不通。烏桕根皮煎湯飲之。（肘後方）

㈡治大便不通。烏桕木根方長一寸。劈碎。水煎半盞服之。立通。不用多喫。其功神聖。兼能取水。（斗門方）

㈢治二便關格二三日則殺人。烏桕東南根白皮。乾爲末。熱水服二錢。先以芒硝二兩煎湯服。吐甚效。（肘後方）

㈣治水氣虛腫。小便澀。烏桕皮、檳榔、木通一兩爲末。每服二錢。米飲下。（聖惠方）

㈤治腳氣澀瘡。極痒有蟲。烏桕根爲末。傅之。少時有涎出良。（摘玄方）

㈥治尸注中惡。心腹刺痛。沈默錯亂。用烏桕根皮煎濃汁一合。調硃砂末一錢服之。肘後方無硃砂。（永類鈐方）

㈦治喑疰昏狂。瘡頭凸紅。桕樹根經行路者。取二尺許。去皮搗爛。井華水調一盞服。待瀉過。以三角銀杏仁浸油搗敷患處。（聖濟總錄方）

㈧治嬰兒胎瘡滿頭。用水邊烏桕樹根。晒研。入雄黃末少許。生油調搽。（經驗良方）

㈨治鼠莽砒毒。烏桕根半兩。擂水服之。（普方大成）

㈩治鑾胸痰喘。桕樹皮去粗搗汁。和飛麪作餅烙熟。早晨與兒喫三四箇。待吐下鹽涎乃住。如不行。熱茶催之。（摘玄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。

參攷資料　㈠烏桕根性沉而降。利水通腸。功勝大戟。一野人病腫滿氣壯。令掘此根。搗爛。水煎服一盆。連行數行而病平。氣虛人不可用之。此方出太平聖惠方。言其功神聖。但不可多服爾。誠然。（李時珍）㈡烏桕葉。如小杏葉。但微薄而綠色差淡。子八九月熟。初青後黑。分爲三瓣。取子出油然燈及染髮。（寇宗奭）㈢烏臼。烏喜食其子。因以名之。陸龜蒙詩云。行歌每依鴉舅影。挑頰時見鼠姑心是矣。鼠姑牡丹也。或云其木老則根下黑爛成臼。故得此名。鄭樵通志言烏臼卽拒柳者非也。（李時珍）㈣生山南平澤。樹高數仞。葉似梨杏。五月開細花。黃白色。子黑。（蘇頌）㈤南方平澤甚多。今江西人種植。採子蒸煮。取脂澆燭貨之。子上皮脂膠於仁也。（李時珍）㈥水腫多屬脾虛。不能制水。以致水氣泛濫。

63／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

法當補脾實土爲急。此藥必不可輕用。如果元氣壯實者。亦須暫施一二劑。病已卽去之。(繆希雍)

【烏柏根皮】卽烏桕木之處方用名。詳『烏桕木』條。

【烏柏葉】**主治**　食牛馬六畜肉。生疔腫欲死者。搗汁頓服。得大利。去毒卽愈。未利再服。冬用根。

【烏爹泥】卽孩兒茶之原名。詳『孩兒茶』條。

【烏草】卽鼠尾草之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鼠尾草』條。

【烏骨雞】**命名**　本品乃鷄類之骨色烏者。故名。

處方用名　烏鷄肉。

基本　屬鷄鷄類。爲舌黑或骨烏之鷄。

形態　與鷄條同。惟其骨或羽毛之色爲烏黑耳。

製法　孟詵曰。凡使烏鷄。治新產婦。須用烏鷄一隻。治淨。和五味末炒香。投二升酒中。封一宿取飲。令人肥白。又和烏油麻二升。熬香入酒中。極效。

性質　甘。平。無毒。

效能　補虛羸。治勞損。用作滋養强壯藥。

主治　補虛勞羸弱。治消渴中惡。鬼擊。心腹痛。益產婦。治女人崩中帶下。一切虛損諸病。大人小兒下痢禁口。並煑食飲汁。亦可搗和丸藥。

歷代記述攷證　【明】繆希雍本草經疏論烏骨鷄曰。烏骨鷄性屬陰。能走肝腎血分。補血益陰。則虛勞羸弱可除。陰回熱去。則津液自生。渴自止矣。陰平陽祕。表裏固密。邪惡之氣不得入。心腹和而痛自止。鬼亦不能犯矣。益陰則衝任帶三脈俱旺。故能除崩中帶下一切虛損諸疾也。古方烏骨鷄丸。治婦人百病者。以其有補虛益陰入血分之功。

配合應用　㈠治赤白帶下。白果、蓮肉、江米各五錢。胡椒一錢。爲末。烏骨鷄一隻。如常治淨。裝末入腹。煑熟。空心食之。

㈡治遺精白濁下元虛憊者。用前方食之良。

㈢治脾虛滑泄。烏骨母雞一隻。治淨。用豆蔻一兩。草果二枚。燒存性。摻入雞腹內。紮定。煑熟。空心食之。

施用宜忌　凡非虛羸而有實邪者禁用。

參攷資料　雞屬木而骨反烏者。異變坎也。受水水之精氣。故肝腎血分之病宜用之。男用雌。女用雄。婦人方科有烏雞丸。治婦人百病。煑雞至爛。和藥或并骨衆用之。鬼擊卒死。用其血塗心下亦效。(李時珍)

【烏鬼】卽鸕鷀之古籍別名。典見杜甫詩。詳『鸕鷀』條。

【烏巢子】卽鼠李子之古籍別名。典見圖經本草。詳『鼠李子』條。

【烏梅】**命名**　本品係以未熟之梅實。剝去核。入籠於薰火煤煙中薰乾者。色變烏黑。故名。

處方用名　烏梅。烏梅肉。

古籍別名　梅實(本經)。薰梅(綱目)。巢煙九助(和漢藥考)。

基本　屬薔薇科梅樹未熟之實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。烏梅各省均有出。

採取　三四月間採其半黃者。以煙薰乾。

製法　陶弘景曰。凡使烏梅。須去核微炒之。李時珍曰。造法取青梅籃盛。於突上薰黑。若以稻灰淋汁潤溼薰過。則肥澤不蠹。

性質　酸。溫。平。濇。無毒。

效能　斂肺。濇腸。殺蟲。柔肝。有健胃固腸之效。用於下痢。又有發汗解熱之效。用於感冒。

主治　下氣。除熱煩滿。安心止肢體痛。偏枯不仁。死肌。去青黑痣。蝕惡肉。(本經)去痺利筋脈。止下痢好唾口乾。(別錄)

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論烏梅曰。水漬汁飲。治傷寒煩熱。【唐】陳藏器本草拾遺論烏梅曰。止渴調中。去痰。治瘧痺。止吐逆霍亂。除冷熱痢。【宋】大明諸家本草論烏梅曰。治虛勞骨蒸。消酒毒。令人得睡。和建茶乾薑爲丸服。止休息痢大驗。【明】李時珍本草綱目論烏梅曰。斂肺澀腸。止久嗽瀉痢。反胃噎膈。蚘厥吐利。消腫通痰。殺蟲解魚毒。馬汗毒。疏黃毒。【明】繆希雍本草經疏論

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

烏梅曰。梅實。即今之烏梅也。其味最酸。經曰。熱傷氣。邪客於胸中。則氣上逆而煩滿。心爲之不安。烏梅味酸。能斂浮熱。能吸氣歸元。故主下氣。除熱煩滿及安心也。下痢者。大腸虛脫也。好唾口乾者。虛火上炎。津液不足也。酸能斂虛火。化津液。固腸脫。所以主之也。其主肢體痛。偏枯不仁者。蓋因溼氣浸於經絡。則筋脈弛縱。或疼痛不仁。肝主筋。酸入肝而養筋。肝得所養。則骨正筋柔。機關通利而前證除矣。其主去死肌。青黑痣惡肉者。白梅之功也。白梅味鹹。鹹能軟堅。故也。又能消痰醒睡。止霍亂。解酒毒。弘景云。生梅。烏梅。白梅。功用大約相似。第烏梅較良。資用更多。【清】黃宮繡本草求眞論。烏梅曰。烏梅酸濇而溫。似有類於木瓜。但此入肺則收。入腸則濇。入筋與骨則軟。入蟲則伏。入於死肌惡肉惡痣則除剌。入肉中則拔。故於久瀉久痢。氣逆煩滿。反胃骨蒸。無不因其收濇之性。而使下脫上逆。皆治。且於癰毒可敷。中風牙關緊閉可開。蛇蟲上攻眩仆可治。口渴可止。寧不爲酸濇收斂之一驗乎。不似木瓜功專疏泄。脾胃筋骨溼熱。收斂脾肺耗散之元。而於他症則不及也。但肝喜散惡收。久服酸味。亦伐生氣。且於諸症初起切忌。【清】王士雄隨息居飲食譜論。烏梅曰。梅性酸溫。生時宜鹽。鹽食溫膽生津。孕婦多嗜之。以小滿前肥胭不帶苦者佳。食梅齒讒。嚼胡桃肉解之。多食損齒。生痰助熱。凡痰嗽。疳膨。痞積。脹滿。外感未清。女子天癸未行。及婦女汎期前後。產後瘀痘後。並忌之。青者鹽醃曝乾爲白梅。亦可蜜漬。糖收法。製以充方物。半黃者烟熏爲烏梅。入藥及染色用之。極熟者榨汁。曬收爲梅醬。古人用以調饌。故書曰若作和羹。爾惟鹽梅也。

辨僞　一鄭肖巖曰。造烏梅法。係取青梅籃盛於竈突上熏黑。若以稻灰淋汁調溼蒸過。則肥澤不蠹。近有以小李僞造充售。則無益而有害矣。二曹炳章曰。按烏梅杭州出者。肉厚核小。色黑。性潮潤者佳。紹興楓橋出者。性燥核大。肉薄。色黑微黃者。略次。別處亦出。總要肉厚色黑。性糯爲佳。

配合應用　一治渴消煩悶。烏梅肉二兩。微炒爲末。每服二錢。水二盞。煎一盞。去滓。入豉二百粒。煎至半盞。溫服。（簡要濟衆方）

二治泄痢口渴。烏梅煎湯。日飲代茶。（扶壽精方）

三治產後痢渴。烏梅肉二十箇。麥門冬十二分。每以一升。煮七合。細呷之。（必效方）

四治赤痢腹痛。烏梅肉炒。黃連各四兩。爲末。煉蜜丸。梧子大。每米飲服二十丸。日三服。（聖惠方）

五治便痢膿血。烏梅一兩。去核。燒過爲末。每服二錢。米飲下立止。（聖濟總錄方）

六治久痢不止。腸垢已出。用烏梅肉二十個。水一盞。煎六分。食前分二服。（肘後方）又用烏梅肉、白梅肉各七箇。搗爛。入乳香末少許。杵丸。梧桐子大。每服二三十丸。茶湯下。日三。（袖珍方）

七治大便下血及酒痢久痢不止。用烏梅三兩。燒存性爲末。醋煮米糊和丸。梧子大。每空心米飲服二十丸。日三。（濟生方）

八治小便尿血。烏梅燒存性。研末。醋糊丸。梧子大。每服四十丸。酒下。

九治血崩不止。烏梅肉七枚。燒存性。研末。米飲服之。日三。

十治大便不通。氣奔欲死者。烏梅十顆。湯浸去核。丸粟大。納入下部。少時卽通。（食療本草方）

十一治霍亂吐利。鹽梅煎湯。細細飲之。（如宜方）

十二治蛇蟲上行。出於口鼻。烏梅煎湯類飲。幷含之。卽安。（食鑑本草方）

十三治水氣滿急。烏梅、大棗各三枚。水四升。煮二升。納蜜和勻。含嚥之。（聖濟總錄方）

十四治梅核腫氣。取半青半黃梅子。每個用鹽一兩。淹一日夜。曬乾。又浸又曬。至水盡乃止。用青錢三個。夾二梅。麻線縛定。通裝磁礶內。封埋地下。百日取出。每用一枚含之。嚥汁入喉。卽消。收一年者治一人。二年者治二人。其妙絕倫。（龔氏經驗方）

十五治心腹脹痛。短氣欲絕者。烏梅二七枚。水五升。煮一沸。納大錢二七枚。煮二升半。頓服之。（肘後

65／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

方）

㈥治勞瘧劣弱。烏梅十四枚。豆豉二合。桃柳枝各一虎口。甘草三寸。生薑一塊。以童子小便二升。煎一半。溫服即止。（圖經本草方）

㈦治久欬不已。烏梅肉微炒。罌粟殼去筋膜。蜜炒等分爲末。每服二錢。睡時蜜湯調下。

㈧治痰厥頭痛如破者。烏梅肉三十個。鹽三撮。酒三升。煮一升。頓服。取吐卽愈。（肘後方）

㈨治傷寒頭痛肚熱。胸中煩痛。四五日不解。烏梅十四枚。鹽五合。水一升。煎半升。溫服取吐。吐後避風良。（梅師方）

㈩治折傷金瘡。乾梅燒存性傅之。一宿瘥。（千金方）

⑪治馬汗入瘡作痛。用烏梅連核搗爛。以頭醋和敷。仍先刺瘡出去紫血。乃傅之。繫定。（經驗方）

⑫治猘犬傷毒。烏梅末酒服二錢。（千金方）

⑬治指頭腫毒痛甚者。烏梅肉。和魚鮓擣封之。妙。（李樓奇方）

⑭治傷寒噩瘡。生下部者。烏梅肉三兩。炒爲末。煉蜜丸。梧子大。以石榴根皮煎湯。食前下二三十丸。（聖惠方）

⑮治小兒頭瘡。烏梅燒末生油調塗。（聖濟總錄）

⑯治硫黃毒發。令人背膊疼悶。目暗漠漠。烏梅肉焙一兩。沙糖半兩。漿水一大盞。煎七分。呷之。（聖濟總錄方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡病當發散者禁用。又忌豬肉。

著名方劑　烏梅丸。治病者靜而時煩。因臟寒。蛔上入其膈。爲蚘厥。當吐蚘。並治久痢。（仲景方）烏梅三百個。黃連一斤。黃栢六兩。乾薑十兩。附子六枚。（炮）蜀椒四兩。（熬去汗）桂枝六兩。細辛六兩。人參六兩。當歸四兩。右十味。異搗篩。合治之。以苦酒漬烏梅一宿。蒸之五升米下。飯熟搗成泥。和藥令相得。納臼中。與蜜二千下。如梧子大。先食飲服十丸。日三服。稍加至二十丸。禁生冷滑物臭食。

參攷資料　㈠烏梅、白梅所主諸病。皆取其酸收之義。惟張仲景治蚘厥烏梅丸及蟲鬬方中用者。取蟲得酸卽止之義。稍有不同耳。醫說載曾魯公痢血百餘日。國醫不能療。陳應之用鹽水梅肉一枚。研爛。合臘茶入醋服之。一啜而安。大丞粟莊肅公亦痢血。應之用烏梅、胡黃連、蘆下土等分爲末。茶調服亦效。蓋血得酸卽斂。得寒則止。得苦則濇。故也。其蝕惡瘡瘜肉。雖是酸收。却有物理之妙。說出本經。其法載於劉涓子鬼遺方。用烏梅肉燒存性。研傅惡肉上。一夜立盡。聖惠用烏梅和蜜作餅貼者。其力緩。按楊起簡便方云。起臂生一疽。膿潰百日方愈。中有惡肉。突起如蠶豆大。月餘不消。醫治不效。因閱本草得此方試之。一日夜。去其大半。再上一日而平。（李時珍）㈡烏梅收酸益津。開胃。治休息痢。能斂肺濟腸。血痢不止。以烏梅燒灰存性。米湯服之。漸止。中風僵仆。牙關緊閉者。取烏梅擦牙。齦卽開。按烏梅之酸。固有酸收酸軟之兩義也。（張石頑）㈢梅古文作枏。枏字在木上之形。梅乃杏類。故反杏爲枏。書家訛爲甘木。後作梅。從每。諧聲也。或云梅者媒也。媒合衆味。故書云。若作和羹。爾惟鹽梅。而梅字亦從某也。陸佃埤雅言。梅入北方變爲杏。郭璞註爾雅以栘爲梅。皆誤矣。栘卽栘木。荊人呼爲梅。見陸璣草木疏。（李時珍）㈣多食損齒傷筋。蝕脾胃。令人發腸上痰熱。服黃精人忌食之。食梅齒齲者。嚼胡桃肉解之。物類相感志云。梅子同韶粉食。則不酸。不軟牙。（大明）

【烏梅肉】卽烏梅之處方用名。詳『烏梅』條。

【烏梅乾】卽烏梅之處方用名。詳『烏梅』條。

【烏梢蛇】原名　烏蛇。古籍別名　劍脊烏梢蛇。黑花蛇。（綱目）黑風蛇。烏花蛇。（和漢藥考）

基本　屬爬蟲類蛇類。爲烏蛇之肉。

產地　陳仁山藥物生產辨云。烏蛇產江蘇鎭江府。十月新。

形態　烏蛇棲息各地山野間。全體漆黑色。腹部灰黑色。頭圓尾尖。背有三稜。眼有赤光。雖枯死。眼不陷。如活者。其重一兩以下者爲上。粗大而重者爲下。以其藥力減

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。

種類　有劍脊而細尾者爲烏梢蛇。無劍脊而粗尾者爲風梢蛇。

採取　夏秋間恒於蘆梦上捕得之。

製法　雷敩曰。凡使去頭及皮鱗。剉斷。苦酒浸一宿。漉出。柳木炭火炙乾。或以酥炙。於屋下巳地上掘坑埋一夜。再炙乾。或以酒浸炙乾用。

用法　水煎服。或酒浸飲。或焙剉爲末。和作丸散。

性質　甘。平。無毒。

主治　祛風燥濕。治癩瘡瘡。諸風頑痺。皮膚不仁。風瘧癮疹疥癬。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論烏梢蛇曰。熱毒風。皮肌生癩。眉髭脫落。癜疥等瘡。【明】李時珍本草綱目論烏梢蛇曰。功與白花蛇同。而性善無毒。色黑如漆。尾細。【清】楊時泰本草述鉤元論烏梢蛇曰。烏梢蛇與白花蛇。味皆甘。皆入血。而白花蛇獨兼有鹹。則入血而祛風者。烏梢似難與白花同。故本草所列主治。有輕重之別也。

配合應用　㈠治例。治大風。用烏蛇三條。蒸熟取肉。焙研末。蒸餅丸。米粒大。以喂烏雞。待盡。殺雞烹熟。取肉焙研末。酒服一錢。或蒸餅丸服。不過三五雞。卽愈。又用大烏蛇一條。打死盛之。待爛。以水二碗浸七日。去皮骨。入糙米一升。浸一日。晒乾。用白雞一隻。餓一日。以米飼之。待毛羽脫去。殺雞煮熟食。以酒下之。吃盡。以熱湯一盆浸洗大半日。其病自愈。（祕韞方）

㈡治紫白癜風。烏蛇肉酒炙六兩。枳殼麩炒。牛膝。天麻各二兩。熟地黃四兩。白蒺藜炒。五加皮。防風。桂心各二兩。剉片。以絹袋盛於無灰酒二斗中浸之。密封七日。每溫服一小盞。忌雞鵝魚肉發物。（聖惠方）

㈢治面瘡黯皰。烏蛇肉二兩。燒灰。臘猪脂調傅。（聖惠方）

㈣治嬰兒撮口不能乳者。烏梢蛇酒浸。去皮骨。炙半兩。麝香一分。爲末。每用半分。荊芥煎湯調灌之。（聖惠方）

㈤治破傷中風。項强身直。定命散主之。用白花蛇、烏蛇並取向後二寸。酒洗。潤取肉。蜈蚣一條全者。炙。右各爲末。每服三錢。溫酒調服。（普濟方）

用量　錢半至二錢。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。

參攷資料　㈠商州有人患大風。家人惡之。山中爲起茅屋。有烏蛇墮酒罌中。病人不知。飲酒漸瘥。罌底見有蛇骨。始知其由。（朝野僉載）㈡烏蛇。生商洛山。背有三稜。色黑如漆。性善不噬物。江東有黑梢蛇。能經物至死。亦此類也。（馬志）㈢蘄州黃州山中有之。乾寧記云。此蛇不食生命。亦不害人。亦生蘆叢中。吸南風及其花氣。最難採捕。多於蘆枝上得之。其身烏而光。頭圓尾尖。眼有赤光。至枯死眼不陷。如活者。稱之重七錢至一兩者爲上。十兩至一鎰者爲中。粗大者力猶減也。作僞者用他蛇熏黑。亦能亂眞。但眼不光耳。（蘇頌）㈣烏蛇脊高。世稱劍脊烏梢。尾細長。能穿小銅錢一百文者佳。有身長丈餘者。其性最風癘。蛇類中惟此入藥最多。（寇宗奭）

【烏梢蛇皮】　主治　風毒氣。眼生瞖。唇緊唇瘡。燒灰。酥和傅之。（李時珍）

【烏梢蛇卵】　主治　大風癩疾。

參攷資料　聖濟總錄。治癩風。用烏蛇卵和諸藥爲丸服。云與蛇肉用功。（李時珍）

【烏梢蛇膏】　主治　耳聾。繞裹豆許塞之。神效。

【烏梢蛇膽】　主治　大風癘疾。木舌腫塞。

【烏犀】　卽皂莢之古籍別名。典見綱目。詳『皂莢』條。

【烏犀角】　卽犀角之處方用名。詳『犀角』條。

【烏蛇草】　卽七葉黃荊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『七葉黃荊』條。

【烏魚】　㈠卽鱧魚之別名。詳『鱧魚』條。㈡卽烏鯽魚之簡稱。詳『烏鯽骨』條。

【烏魚蛋】　古籍別名　雄白魚。（藥性考）

基本　本品係烏鯽魚腹中之

67／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

卵。

產地　登萊。

性質　鹹。平無毒。

主治　開胃利水。

【烏麥】卽蕎麥之古籍別名。典見日用本草。詳『蕎麥』條。

【烏麻】卽菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菟絲子』條。

【烏喙】古籍別名　原名　草烏喙。

（綱目）

性質　辛。微溫。有大毒。

主治　風溼丈夫腎溼陰寒痺寒熱歷節。拘引腰痛。不能行步。癰腫膿結。又墮胎。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論草烏喙曰。男子腎氣衰弱。陰汗。瘰癧歲月不消。【明】李時珍本草綱目論草烏喙曰。主大風頑痺。

【烏棗】卽大棗黑者之處方用名。詳『大棗』條。

【烏桿】卽桿柿之古籍別名。典見開寶本草。詳『桿柿』條。

【烏殺硬蟲】卽蜣螂之別名。詳『蜣螂』條。

【烏絨樹皮】卽合歡皮之別名。詳『合歡皮』條。

【烏絲子】卽鼠李子之別名。詳『鼠李子』條。

【烏桑】卽桑之古籍別名。典見吳普本草。詳『桑』條。

【烏雄雞肉】基本　係脊椎動物鳥類鷄雞類雄科。

性質　甘。微溫。無毒。

主治　補中止痛。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論烏雄雞曰。止肚痛。心腹惡氣。除風溼痲痺。諸虛羸。安胎。治折傷井癰疽。生搗塗竹木刺入肉。

參攷資料　按李廷飛云。黃雞宜老人。烏雞宜產婦。暖血。馬雄卿云。妊婦宜食牡雞肉。取陽精之全於天。產者此亦胎教宜見虎豹之意耳。又唐崔行功纂要云。婦人產死。多是富貴家擾攘。致婦驚悸氣氛。故耳。惟宜屏除一切人。令其獨產。更燖煲牡雞取汁。作粳米粥與食。自然無恙。乃和氣之效也。蓋牡雞汁性滑而濡。不食其肉。恐難消也。今俗產家。每產後卽食雞啖卵。氣壯者。幸而無恙。氣弱者。因而成疾。皆由不解此意也。（李時珍）

【烏園】卽鴝尾之古籍別名。典見本經。詳『鴝尾』條。

【烏滑石】卽滑石色烏似墨。上有青白膩文者之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『滑石』條。

【烏葉】卽南天燭之別名。詳『南天燭』條。

【烏賊甲】卽烏鰂骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏鰂骨』條。

【烏賊骨】卽烏賊魚骨之簡稱。詳『烏鰂骨』條。

【烏飯】卽青精乾石飯之古籍別名。典見綱目。詳『青精乾石飯』條。

【烏飯草】卽南天燭之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『南天燭』條。

【烏梗子】卽鼠李子之古籍別名。典見綱目。詳『鼠李子』條。

【烏爾格納】卽山穀之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『山穀』條。

【烏鍥】卽射干之古籍別名。典見別錄。詳『射干』條。

【烏蒜】卽石蒜之古籍別名。典見救荒本草。詳『石蒜』條。

【烏蒲】卽射干之古籍別名。典見本經。詳『射干』條。

【烏銀】製法　烏銀。用硫黃熏銀則色黑。成烏銀。養生家製爲器。盛醴飲之。

主治　長年。辟惡。

配合應用　治翻胃如神。用紋銀錢二分。硫黃一勻。將硫黃分作一百二十包。取大傾銀罐一個。將銀放入罐內。炭火上煅。將硫黃逐包投入罐內。黃盡爲度。取銀爲末。初次服三分。二次服二分。三次服一分。再加丁香。茴香。麝香。沉香各三分。麝香一分。分爲三服。每服用銀粉二分。水一鍾。煎棗至半鍾。將銀粉空心送下。作三日服完。卽愈。

【烏鳶】卽鴝尾之古籍別名。典見別錄。詳『鴝尾』條。

【烏樟】　原名　釣樟。

命名　本品根似烏藥氣香。故名。

古籍別名　杶章。（本草集註）

枕。豫。（綱目）

基本　屬樟科。爲烏樟之根皮。

產地　凡山谷間恒多產。爲和

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

漢藥考曰。產暖地山中。日本之四國、安房、伊豆等處。亦頗產此。

形態　烏樟爲落葉灌木。幹高自七八尺至一丈。葉爲長橢圓形或披針形。前端尖。三五葉簇生。初夏於生新葉之前。枝梢先開黃色小花。作繖狀。實黑色。圓形大二三分。藥用其根皮。



烏樟

採取　八九月間。採根皮日乾。

用法　水煎或磨服。或剉末外傅。

性質　辛。溫。無毒。

成分　根皮成分未詳。木部、葉實、皮部俱含有揮發油。採收之名爲烏樟油或釣樟油。

效能　傅金瘡。療疥癬。用作止血藥。

歷代記述攷證　【唐】蕭炳四聲本草論烏樟曰。磨汁服。治蠱亂。【宋】大明日華諸家本草論烏樟曰。治奔豚脚氣。水腫。煎湯服。亦可浴瘡瘕。疥癩。風瘙。併研末傅之。

參攷資料　㊀樟有大小二種。紫淡二色。此卽樟之小者。按鄭樵通志云。釣樟亦樟之類。卽爾雅所謂豫無疵是也。又相如賦云。楩柟豫章。顏師古注云。豫卽枕木。章卽樟木。二木生至七年。乃可分別。觀此。則豫卽別錄所謂釣樟者也。根似烏藥香。故又名烏樟。（李時珍）㊁生柳州山谷。樹高丈餘。葉似楠葉而尖長。背有赤毛。若枇杷葉上毛。八月九月採根皮日乾。（蘇恭）

【烏樟莖葉】　**主治**　置門上。辟天行時氣。

【烏楠木】　卽烏木之古籍別名。典見綱目。詳『烏木』條。

【烏薇】　卽薇。老而殼硬者。詳『薇』條。

【烏膠】　卽阿膠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『阿膠』條。

【烏麥】　㊀卽參果根之古籍別名。典見別錄。詳『參果根』條。㊁卽黍蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黍蘆』條。

【烏鴉】　**古籍別名**　鴉烏。（爾雅）老鴉。鷽。鴉鵐。楚烏。（綱目）大嘴烏。（禽經）

外國名詞　Corvus macrorhynchus Bp（拉丁）Oriental raven,（英）Crow Krähe（德）

基本　係脊椎動物烏類鳴禽類烏鴉科。

產地　出山林間。浙東尤多。

形態　烏鴉爲林禽類之一種。其嘴强直。色黑而大。嘴根具剛毛。被覆鼻孔。體之上面黑色。翼之基部暗色。有綠光。喉部之羽呈披針形。其翼大。有十手。蹠脚較細。色黑。四趾踏地。前三後一。趾端有鈎爪。體長一尺八寸。翼長一尺四寸。嘴長六七分。食穀類。喜晨鳴。其肉可供藥用。

性質　酸。澀。平。無毒。

主治　瘦病咳嗽。骨蒸勞疾。膿月以瓦瓶泥固燒存性。爲末。每服飲一錢。又治小兒癇疾及鬼魅。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論烏鴉肉曰。治暗風癇疾及五勞七傷。吐血咳嗽。殺蟲。

參攷資料　㊀烏鴉肉澀。臭不可食。止可治病。（孟詵）㊁烏鴉肉及卵食之。令人昏忘。其毛亦然。蓋未必昏。爲其臭耳。（陳藏器）㊂烏鴉今人多用治急風。而本經不著。宜於臘月捕取。翅羽嘴足全者。泥固。煆過入藥。治諸風。烏犀丸中用之。見和劑局方。（蘇頌）㊃聖濟總錄。治破傷中風。牙關緊急。四肢强直。有金烏散。煆過入藥。品多不錄。（李時珍）

【烏鴉心】　**主治**　卒然咳嗽。炙熟食之。

【烏鴉目】　**主治**　吞之令人見諸魅。或研汁注目中。夜能見鬼。

【烏鴉翅羽】　**主治**　從高墜下。瘀血搶心。面青。氣短者。取右翅七枚。燒研酒服。當吐血便愈。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論烏鴉翅羽曰。治針刺入肉。以三五枚炙焦。研末。酯調。傅之數次。卽出。甚效。又治小兒痘瘡不出復入。

【烏鴉頭】　**主治**　土蜂瘡。燒灰傅之。

【烏鴉膽】　**主治**　點風眼。紅爛。餘與慈烏膽汁同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【烏頗骨】卽虎骨之古籍別名。典見肘後方。詳『虎骨』條。

【烏賴樹皮】卽合歡皮之古籍別名。典見綱目。詳『合歡皮』條。

【烏頭】㊀卽川烏之原名。詳『川烏』條。㊁卽附子正根也。詳『附子根』條。

【烏頭尖】卽川烏尖之處方用名。詳『川烏』條。

【烏頭附子尖】

性質　辛。溫。有毒。

主治　爲末茶服半錢。吐風痰癲癎。

歷代記述攷證　【淸】黃宮繡本草求眞。論烏附尖曰。烏附尖能吐風痰。以治癲癎。取其直達病所也。

配合應用　㊀治風厥癲癎。凡中風、痰厥、癲癎、驚風、痰涎上壅、牙關緊急、上視、搐搦、並宜碧霞丹主之。烏頭尖、附子尖、蠍梢各七十個。石綠研九度。飛過十兩爲末。麵糊丸。芡子大。每用一丸。薄荷汁半盞化下。更服溫酒半合。須臾吐出痰涎爲妙。小兒驚癎。加白殭蠶等分。（和劑局方）

㊁治脾風撮口。生川烏尖三個。全足蜈蚣半條。酒浸炙。麝香少許。爲末。以少許吹鼻得嚏。乃以薄荷湯灌一字。（永類鈐方）

㊂治木舌腫脹。川烏尖、巴豆研細。醋調塗刷。（集簡方）

㊃治牙痛難忍。附子尖、天雄尖、全蠍各七個。生研爲末。點之。（永類鈐方）

㊄治奔豚疝氣作痛。或陰囊腫痛。去鈴丸。用生川烏尖七個。巴豆七枚。去皮油。爲末。糕糊丸。梧子大。朱砂、麝香爲衣。每服二丸。空心冷酒或冷鹽湯下。三兩日一服。不可多。（澹寮方）

㊅治割甲成瘡。連年不愈。川烏頭尖、黃蘗等分。爲末。洗淨貼之。以愈爲度。（古今錄驗方）

㊆治老幼口瘡。烏頭尖一個。天南星一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。卽愈。

參攷資料　㊀烏附用尖。亦取其銳氣直達病所爾。無他義也。保幼大全云。小兒慢脾驚風。四肢厥逆。用附子尖一個。硫黃棗大一個。蠍梢七個爲末。薑汁麵糊丸。黃米大。每服十丸。米飲下。亦治久瀉痼羸。凡用烏附。不可執爲性熱。審其手足冷者。輕則用湯。甚則用丸。重者用膏。候手足暖。陽氣回。卽爲佳也。按此方乃和劑局方碧霞丹變法也。非眞慢脾風不可輒用。是故初虞世有金虎碧霞之戒。（李時珍）㊁常山吐瘧疾。積飲在於心下。瓜蒂吐熱痰在膈。木鱉子引吐熱毒從痰外出。萊菔子吐氣痰在膈。參蘆吐虛痰。烏附尖、藜蘆吐風痰。（黃宮繡）㊂朱丹溪治白雲屢用瓜蒂、梔子、苦參、藜蘆等劑。吐之不透。後用附子尖和糞水與之。始得大吐膠痰數碗。（汪昂）

【烏龍】卽狗之俗名。詳『狗』條。

【烏龍革】卽七葉黃荊之別名。詳『七葉黃荊』條。

【烏龍鬚】形態　烏龍鬚爲雜草類之一種。掛生於烏桕樹上。細長如燈芯草狀而下垂。採得曬藏可供藥用。

主治　一切血症。癰腫。勞瘵。痼疾。

【烏擇】卽虎骨之古籍別名。典見漢書。詳『虎骨』條。

【烏氈】

命名　本品皆以畜毛織成。其黑乃本色。故名。

主治　火燒生瘡。令不着水風。止血。除賊風。燒灰酒服。治產後血下不止。久臥吸人脂血。損顏色。上氣。

參攷資料　氈屬甚多。出西北方。皆畜毛所作。其白或黑者。本色也。其青、烏、黃、赤者。染色也。其氈、毯、褐、罽、氍、毹等稱者。因物命名也。大抵入藥不甚相遠。（李時珍）

【烏蟲泥】卽孩兒茶之古籍別名。典見綱目。詳『孩兒茶』條。

【烏蠔】卽蠔蛇之黑色者。典見綱目拾遺。詳『蠔蛇』條。

【烏雞】卽烏骨雞之簡稱。詳『烏骨雞』條。

【烏雞肉】卽烏骨雞之處方用名。詳『烏骨雞』條。

【烏鯉魚】卽鯉魚之別名。詳『鯉魚』條。

【烏藤菜】卽劉寄奴草之古籍別名。典見綱目。詳『劉寄奴草』條。

【烏藥】

處方用名　台烏藥。天台藥。

古籍別名　旁其（綱目拾遺）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鷓鴣（綱目）矮樟房花臺麻稔樟。矮脚樟比目沈香（和漢藥考）

外國名調　Lindera Strychnifolia, Vill.（拉丁）（Daphidium Strychnifolium, S. et Z.）（英）

基本　屬樟科之天台烏藥及屬防己科之衢州烏藥之根。

產地　凡嶺南諸州及吳楚山谷中恒多產焉。九以天台者佳。

形態　烏藥爲常綠灌木。高八九尺。葉厚作圓形或橢圓形。前端尖。邊緣無鋸齒。縱有三條脈絡。春月於枝梢葉腋開淡黃綠色之小花。其根外部紫褐色。內部黃白色。根葉均有一種香氣。

種類　㊀嶺南者。黑褐色而堅硬。㊁天台者。其色白而虛輭。形如天冬。兩端尖。中肥大。成連珠狀。旁有鬚根。粗三四分。長四五寸許。以新者爲良品。㊂衢州者。形如木根。不作連珠狀。實爲下品。

採取　八月間採根。根如車轂紋。形如連珠者用。

製法　根採旁附狀如鐲珠連者。直根不堪用。去皮心。略炒或生磨用。

性質　辛。溫。無毒。

效能　溫中順氣。用治中風中氣霍亂藥。

主治　中惡心腹痛。蠱毒。痓忤鬼氣。宿食不消。天行疫瘴。膀胱腎間冷氣。攻衝背膂。婦人血氣。小兒腹中諸蟲。

歷代記述攷證　【宋】大明曰　華諸家本草論烏藥曰。除一切冷。霍亂反胃。吐食瀉痢。癰瘡疥癩。幷解冷熱。其功不可悉載。貓犬百病。竝可磨服。【元】王好古湯液本草論烏藥曰。理元氣。【明】李時珍本草綱目論烏藥曰。中氣脚氣疝氣。頭痛腫脹喘急。止小便頻數。及白濁。【明】繆希雍本草經疏論烏藥曰。烏藥味辛氣溫。無毒。然嘗其味。亦帶微苦。氣亦微香。足陽明少陰經。其主中惡心腹痛痓忤鬼氣。天行疫瘴者。皆足陽明受病。陽明開竅於口鼻。凡邪惡忤鬼。與夫疫瘴之氣。侵人。悉從口鼻而入。此藥辛溫煖胃。辟惡散邪。故能主諸證也。胃煖則宿食自消。辛散則蠱毒亦解。又腎與膀胱爲表裏。虛則寒客之而冷氣攻衝背膂。辛溫能散寒邪。其性又善下走。則冷氣攻衝自止也。性溫走泄。故復能散婦人血凝氣滯。微苦而辛。故又能療小兒腹中諸蟲也。【清】黃宮繡本草求眞論烏藥曰。烏藥辛溫香竄。書載上入脾肺。下通腎經。如中風中氣。膀胱冷結。小便頻數。反胃吐食。泄瀉霍亂。女人血氣凝滯。小兒蚘蛔。外而瘡癬疥癩。幷凡一切病之屬於氣逆。而見胸腹不快者。皆宜用此。功與木香香附同爲一類。但木香苦溫。入脾爽滯。宜於食積。則宜香附辛苦入肝膽二經。開鬱散結。每於鬱鬱則妙。此則逆邪橫胸。無處不達。故用以爲胸腹逆邪要藥耳。氣行則風自散。若氣虛內熱。而見胸膈不快者。非其所宜。根有車轂紋。形而連珠者良。酒浸一宿或煨研用。

配合應用　㊀同沉香、木香、白豆蔻、香附、檳皮、檳榔。治婦人氣實暴氣壅腹。

㊁治一切氣痛。不拘男女。冷氣血氣。肥氣息賁氣。伏梁氣。奔豚氣。搶心切痛。冷汗喘息。欲絕。天台烏藥小者。酒浸一夜。炒。茴香炒。青橘皮去白炒。良薑炒。等分爲末。溫酒童便調下。（衛生家寶方）

㊂治男婦諸病。香烏散。用香附、烏藥等分爲末。每服二錢。飲食不進。薑棗湯下。瘧疾。乾薑白鹽湯下。腹中有蟲。檳榔湯下。頭風。盧朧。茶湯下。婦人冷氣。米飲下。產後血攻心。脾痛。童便下。婦人血海痛。男子疝痛。茴香湯下。（乾坤祕韞方）

㊃治小腸疝氣。烏藥一兩。升麻八錢。水二鍾。煎一鍾。露一宿。空心熱服。（孫天仁集效方）

㊄治腳氣壅痛。鄉村無藥。初發時。卽取土烏藥。不犯鐵器。布揩去上粗瓦刮屑。好酒浸一宿。次早空心溫服。滓泄卽愈。入麝少許尤佳。

痛入腹者。以烏藥同雞子。瓦罐中水煮一日。去雞子。切片飜食。以湯送下甚效。（永類鈐方）

㊅治血痢瀉血。烏藥燒存性。研。陳米飯丸。梧子大。每米飲下三十丸。（普濟方）

㊆治小兒慢驚昏沈。或搐。烏藥磨水灌之。（濟急方）

㊇治氣厥頭痛。不拘多少。及產

71／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

後頭痛。天台烏藥、川芎、鶉等分爲末。每服二錢。臘茶清調下。產後鐵鉼燒紅。淬酒調下。(濟生方)

㈧治咽喉閉痛。生烏藥郁矮樟根。以醯醋二盞。煎一盞。先噙後嚥。吐出痰涎爲愈。(經驗方)

㈨治孕中有癮。洪州烏藥。輭白香辣者五錢。水一盞。牛皮膠一片。同煎至七分。溫服。(婦人良方)

㈩治心腹氣痛。烏藥水磨濃汁一盞。入橘皮一片。蘇葉一錢。煎服。(集簡方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡氣虛而有內熱者禁用。

著名方劑 ㈠烏沉湯。治一切氣。一切冷。補五臟。調中壯陽。暖腰膝。去邪氣。冷風麻痺。膀胱腎間冷氣。攻衝背膂。俛仰不利。風水毒腫。吐瀉轉筋。癥癖刺痛。中惡。心腹痛。鬼氣疰忤。天行瘴疫。婦人血氣痛。(局方)天台烏藥百兩。沉香五十兩。人參三兩。甘草四兩。右共研末。每服半錢。盞鹽湯空心服。或水煎溫服。㈡縮泉丸。治脬氣不足。小便頻數。(丹溪方)烏藥、益智仁各等分。右共研末。酒煮山藥糊丸。㈢四磨飲。治七情傷感。上氣喘急。胸膈不快。妨悶不食。(濟生方)人參、烏藥、檳榔、沉香。右四味。各濃磨水。取七分。煎三五沸。空心溫服。

參攷資料 ㈠烏藥性和來氣少。走泄多。但不甚剛猛。同沈香同磨。作湯點服。治胸腹冷氣甚穩當。(寇宗奭)㈡烏以色名。其葉狀似鰿魦魚。故俗呼爲鰿魦樹。拾遺作旁。其方音訛也。南人亦呼爲矮樟。其氣似樟也。(李時珍)㈢烏藥生嶺南邕州、容州及江南。樹生似茶。高丈餘。一葉三椏。葉青陰白。根狀似山芍藥及烏樟根。色黑褐。作車轂紋。橫生。八月採根。根直者不用。(陳藏器)㈣今台州、雷州、衡州皆有之。以天台者爲勝。木似茶櫃。高五七尺。葉微圓而尖。面青背白。有紋。四五月開細花。黃白色。六月結實。根有極大者。又似釣樟根。然根有二種。嶺南者黑褐色而堅硬。天台者白而虛輭。並以八月採根。如車轂紋形。如連珠者佳。或云天台者香白可愛。而不及海南者力大。(蘇頌)㈤吳楚山中極多。人以爲薪。根、葉皆有香氣。但根不甚大。繞如芍藥爾。嫩者肉白。老者肉褐色。其子如冬青子。生青熟紫。核殼極薄。其仁亦香而苦。(李時珍)

【烏藥子】 **主治** 陰毒傷寒。腹痛欲死。取一合炒起黑烟。投水中。煎三五沸。服一大盞。汗出陽回即瘥。

【烏藥茶】 **產地** 出東莞。

製法 以芝麻、薑油、雜茶爲汁煎之。

主治 去風溼。破食積。

【烏藥嫩葉】 **主治** 炙碾。煎飲代茗。補中益氣。止小便滑數。

參攷資料 烏藥下通少陰腎經。上理脾胃元氣。故丹溪朱氏開陰丸藥中。往往加烏藥葉也。(李時珍)

【烏蘸子】 卽覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳「覆盆子」條。

【烏鯽骨】 **原名** 海螵蛸。

命名 本品形象螵蛸。故名。

處方用名 烏賊骨。

古籍別名 墨魚骨(綱目)綿魚骨。(日華)海若白事小吏。(國經)白龍柔骨。烏賊甲。墨烏骨。烏魚。(和漢藥考)

基本 屬頭足科二鰓類。爲輭體動物烏賊之背骨。

產地 陳仁山藥物生產辨云。海螵蛸以廣東北海、平海、汕尾、水東等處產者爲大隻。日本山東亦有出。

形態 烏賊體作囊狀。呈灰色。下部叢集八短脚。另有一對頗長之鬚狀觸脚。各脚具有吸盤四列。體囊側緣有扁平擴展作鰭狀者。口生於體與脚之間。眼生於口上。體肉白色。囊中貯有墨汁。遙敵卽吐而自晦。其蹤跡本品爲雪白色長橢圓形之骨質。表面作革質狀。一面稍凹。一面隆凸。由石灰鹽類之結晶針組成。質脆。易遙酸類卽溶解。遺留膜狀物質。



烏鰂

種類 烏賊種類頗多。日本產者有眞烏賊 Sepia irermis Ha-

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

sset,刺烏賊 Sepia a uleta.槍烏賊 Loligo vulgaris, Lam.花枝Spiotenth lessoniana, Fer. et Orb.耳烏賊 Sopiola japonica Fer. et bOr.鱆烏賊Ommastrephes pacificus, Appel. 六種採取骨質供藥用者。爲眞烏賊及刺烏賊二種。其他質柔薄不適藥用。

製法 陶弘景曰。凡使烏鰂骨。須炙黃用。雷敎曰。勿用沙魚骨。其形眞似。但以上文順者是假。以血滴作水浸。并煮一伏時漉出。搥一坑燒紅。入魚骨在內。經宿取出入藥。其效加倍也。

性質 鹹溫無毒。

成分 由燐酸鈣、炭酸鈣、膠質等而成。

效能 通血脈。祛寒溼。溫經。止帶。用作止血藥及爲女子血枯經閉藥。或配合眼藥及用作牙粉原料。又治肺結核。咯血痔出血。創傷。其作用與石決明同。惟凝固血液之能較石決明爲強。

主治 女子赤白漏下。經汁血閉。陰蝕腫痛。寒熱瘕瘕。無子。(本經)驚風入腹。腹痛環臍。丈夫陰中腫痛。令人有子。又止瘡多膿汁不燥。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺。論海螵蛸曰。炙研飲服。治婦人血瘕。大人小兒下痢。殺小蟲。【唐】孟詵食療本草。論海螵蛸曰。治眼中熱淚及一切浮翳。研末和蜜點之。久服益精。【宋】大明日華諸家本草。論海螵蛸曰。療血崩殺蟲。【明】李時珍本草綱目。論海螵蛸曰。主女子血枯病。傷肝唾血下血。治癰疽瘡。研末傅小兒疳瘡瘡臭爛。丈夫陰瘡。湯火傷跌傷。出血。燒存性。酒服。治婦人小戶嫁痛。同雞子黃塗小兒重舌鵝口。同蒲黃末傅舌腫血出如泉。同桃花末吹鼻治衄血。同銀硃吹鼻治喉痺。同白礬末吹鼻治蠱毒疼痛。同麝香吹耳治腫耳有膿及耳聾。【明】繆希雍本草經疏。論海螵蛸曰。烏賊魚骨味鹹。氣微溫。無毒。入足厥陰少陰經。厥陰爲藏血之臟。女人以血爲主。虛則漏下赤白。或經汁血閉。寒熱瘕瘕。少陰爲藏精之臟。主陰曲之地。虛而有溼。則陰蝕腫痛。虛而寒客之。則陰中寒腫。男子腎虛。則精竭無子。女子肝傷。則血枯無孕。鹹溫入肝腎。通血脈而祛寒溼。則諸證除。精血足。令人有子也。其主驚氣入腹。腹痛環臍者。蓋肝屬木主驚。驚入肝膽。則營氣不和。故腹痛環臍也。入肝膽。舒營氣。故亦主之。溫能燥溼。故又主瘡多膿汁也。按素問云。有病胸脇支滿者。妨於食。病至則先聞腥臊臭出清液。先唾血。四肢清。目眩。時時前後血痛。名曰血枯。得之年少時有所大脫血。或醉入房中。氣竭肝傷。故月事衰少不來。治之以四烏鰂骨一藘茹爲末。丸以雀卵大如小豆。每服五丸。飲以鮑魚汁。所以利腸中及傷肝也。觀此則其入厥陰血分。爲女人崩漏下血之要藥。可知矣。【清】葉天士本草經解。論海螵蛸曰。烏賊魚骨。氣微溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味鹹無毒。入足少陰腎經。氣味頗多於倒陽也。女子以血爲主。肝爲藏血之臟。肝血不藏。則赤白漏下。其主之者。氣溫以達之也。肝藏血。血枯。則血閉。其主之者。味鹹以通之。腎爲藏精之臟。主陰戶隱曲之地。肝爲厥陰。其經絡陰器。其筋結陰器。二經溼濁下注。則陰蝕腫痛。其主之者。氣溫可以燥溼。味鹹可不消腫也。寒熱瘕瘕者。瘕瘕而發寒熱也。烏賊骨鹹可軟堅。溫可散寒熱也。男子腎虛。則精竭無子。女子肝傷。則血枯無子。鹹溫入肝腎通血益精。令人有子也。【清】黃元御玉楸藥解。論海螵蛸曰。烏鰂魚骨善能斂新血而破瘀血。素問治女子血枯。先唾血。四肢青。目眩之前便血。以烏鰂魚骨。茜茹爲末。丸以雀卵。血枯必由夫血脫。血脫之原。緣瘀滯不流。經脈莫容。烏賊骨行瘀固脫。兼擅其長。故能著奇功。其諸治效。止吐衄崩帶。靡腎障瘕瘕。療跌打湯火。淚眼雀目。重舌鵝口。喉痺耳聾。縮瘾消腫。拔疔敗毒。斂瘡燥膿。化癜止痛。收陰澀溼。療除小便血淋。【清】楊時泰本草述鈎元。論海螵蛸曰。烏賊骨既治女子赤白漏下。經汁及血崩唾血下血矣。而又主血閉月事衰少不來。瘕瘕無子。何以一物之用。能通能止。迥殊哉。夫經閉有有餘不足二證。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有餘者多爲氣與寒與積所逆證發於暫或痛或實通劑乃可用之不足者衝任內竭其證無形其來也漸不可用通劑烏賊所主者乃肝傷血閉不足之病也即崩漏亦有有餘不足之分其爲熱所乘致傷衝任者是謂有餘可治以黃連解毒湯其肝腎受傷而衝任之氣不能約制經血者是謂不足治以烏賊骨末醋湯調下是也然則用烏賊骨或通或止總爲益肝腎之陰氣而已血隨氣而行亦因氣而固方書概言中氣而不言肝腎之氣雖補益中氣亦可以治肝腎第由肝腎之虛以傷中氣者不本病因而投之可乎且陰氣陽氣之治有殊此味稟陰氣之專以化血而血黑故肝腎之陰氣有損者投之適宜不漫同他味之能益陰也女子赤白帶下方書多主澀熱東垣云此任脈之病尺脈濡弱而滑沉微無力爲白帶爲血虛或濇數而實爲赤帶爲熱然則烏賊所主者任脈病非中宮澀熱下溜之病也其味鹹宜歸水臟血爲水所化一切主治總由益腎之陰氣并使肝之藏血者能司其運化出納之職而已豈獨爲女子要藥乎凡屬血病上而鼻舌下而前後血皆能療之即不屬血病上而目瞤耳鞕下而溺失精遺痔患亦能療之

配合應用　㊀治赤白目翳傷寒熱毒攻眼生赤白翳用烏鰂魚骨一兩去皮爲末入龍腦少許點日三又治諸目翳用烏鰂骨、五靈脂等分爲細末熟猪肝切片蘸食日二（聖惠方）

㊁治赤翳攀睛照水丹治眼翳。惟厚者尤效及赤翳攀睛貫瞳人用海螵蛸一錢辰砂半錢乳細水飛澄取以黃蠟少許化和成劑收之臨臥時火上旋丸黍米大揉入背中睡至天明溫水洗下未退更用一次即效（海上方）

㊂治雀目夜眼烏賊骨半斤爲末化黃蠟三兩和捏作錢大餅子每服一餅以猪肝二兩竹刀批開摻藥扎定米泔水半碗煮熟食之以汁送下（楊氏家藏方）

㊃治血風赤眼女人多之用烏賊魚骨二錢銅綠一錢爲末每用一錢熱湯泡洗（楊氏家藏方）

㊄治疳眼流淚烏賊魚骨、牡蠣等分爲末糊丸皁子大每用一丸同猪肝一具米泔煮食（經驗方）

㊅治底耳出膿海螵蛸半錢麝香一字爲末以綿杖縷淨吹入耳中（澹寮方）

㊆治鼻瘡疳蝕烏賊魚骨白及各一錢輕粉二字爲末搽之（錢乙小兒方）

㊇治小兒臍瘡出血及膿海螵蛸、臙脂爲末油調搽之（聖惠方）

㊈治頭上生瘡海螵蛸白膠香各二錢輕粉五分爲末先以油潤淨乃搽末二三次即愈（衛生易簡方）

㊉治癜瘡白駁先以布拭赤用烏賊骨磨三年醋塗之（外臺祕要方）

㊊治疔瘡惡腫先刺出血以海螵蛸末摻之其疔即出（普濟方）

㊋治蠍螫痛楚烏賊骨一錢白礬二分爲末嚙鼻在左壁者嚙左鼻在右壁者嚙右鼻（衛生寶鑑方）

㊌治炎瘡不瘥烏賊骨白礬等分爲末日日塗之（千金方）

㊍治小兒痰齁多年海螵蛸末米飲服一錢（葉氏摘玄方）

㊎治小便血淋海螵蛸末一錢生地黃汁調服又方海螵蛸生地黃赤茯苓等分爲末每服一錢柏葉車前湯下（經驗方）

㊏治大腸下血不問大人小兒臟毒腸風及內痔下血日久多食易飢先用海螵蛸炙黃去皮研末每服一錢木賊湯下三日後服猪臟黃連丸（直指方）

㊐治卒然吐血烏賊骨末米飲服二錢（聖惠方）

㊑治骨鯁在喉烏賊魚骨、陳橘紅焙等分爲末寒食麵和餳丸茨子大每用一丸含化嚥汁（聖濟總錄方）

㊒治舌腫出血如泉用烏賊骨、蒲黃各等分炒爲細末每用塗之（簡便單方）

㊓治跌破出血烏賊魚骨末傅之（直指方）

㊔治陰瘡溼痒烏賊骨、蒲黃撲之（醫宗三法方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛多熱者禁

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用。惡白茂、白斂附子。

參攷資料 ㈠海螵蛸亦治牛馬障翳。(蘇恭) ㈡海螵蛸投於井水。蟲皆死。(陳藏器) ㈢烏賊骨久服絕嗣無子。(張鼎) ㈣按本經云主癥瘕無子。別錄云令人有子。孟詵亦云久服益精而張鼎此說。獨相背戾。必誤矣。若云血病無多食鹹。烏鰂亦主血閉。故有此說。然經閉有有餘不足二證。有餘者血滯不足者肝傷。烏鰂所主者肝傷血閉不足之病。正與素問相合。豈有令人絕嗣之理。當以本經別錄爲正。恐人承誤。故辨正之。(李時珍) ㈤陶隱居言。此是鵜鳥所化。今其口腹具存。猶頗相似。腹中有墨可用。故名烏鰂。能吸波噀墨。令水溷黑自衛。以防人害。又南越志云。其性嗜烏。每自浮水上。飛鳥見之以爲死而啄之。乃卷取入水而食之。因名烏賊。言爲烏之賊害也。(蘇頌) ㈥案羅願爾雅翼云。九月寒烏入水化爲此魚。有文墨可爲法則。故名烏鰂。鰂者則也。骨名螵蛸。象形也。(李時珍) ㈦魚有兩鬚。遇風波卽以鬚下矴或黏石如纜。故名纜魚。(大明) ㈧近海州郡皆有之。形若革囊。口在腹下。八足聚生於口旁。其背上只有一骨。厚三四分。狀如小舟。形輕虛而白。又有兩鬚如帶。甚長。腹中血及膽正如墨。可以書字。但逾年則迹滅。惟存空紙耳。世言烏賊斂墨而知禮。故俗謂是海蒼白事小吏也。(蘇頌) ㈨烏鰂無鱗有鬚。黑皮白肉。大者如蒲扇。爛熟。以薑醋食之。脆美。背骨名海螵蛸。形似樗蒲子而長。兩頭尖。色白脆。如通草。重重有紋。以指甲可刮爲末。入亦鏤之爲細節。又相感志云。烏鰂過小滿而形小也。(李時珍)

【烏鰂魚肉】 性質 酸。平。無毒。

主治 益氣强志。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論烏鰂肉曰。益人。通月經。

參攷資料 烏鰂肉味珍美。動風氣。(吳瑞)

【烏鰂魚血】 主治 耳聾。

【烏鰂魚腹中卵】 性質 鹹。無毒。

主治 開胃。利水。

【烏鰂腸中墨】 主治 血刺心痛。醋磨服之。炒研。醋調服亦可。

【烏爛死蠶】 基本 本品爲蠶在簇上爛死而黑臭者。

主治 蝕瘡有根者。及外野雞病。並傅之。白死者主白遊瘤。赤死者主赤遊瘤。

【烏蘞莓】 命名 本品五葉如白蘞。故名。

古籍別名 五葉莓。龍草。(陶弘景) 拔龍葛。(爾雅)赤葛。五爪龍。(綱目)赤瀉藤。(綱目)五葉蔦。五瀉藤。(和漢藥考)五葉屯。(綱目)五龍草。(綱目)

外國名詞 Cissus Japonica, Willd. (拉丁)

基本 屬葡萄科爲烏蘞莓之根。

產地 多在山野川谷及平澤園籬間。

形態 烏蘞莓爲山野自生之多年生蔓草。其莖每節有卷鬚。纏繞他種草木。輒妨礙其生長。故日本呼爲『蘞枯』。葉互生。爲五個掌狀複葉。夏月於枝梢開黃綠色四瓣小花。作聚繖花序排列。後結圓實。略與南天燭實同大。初綠色。成熟則變黑色。根爲黃白色。長一二尺。其粗如指。搗之有汁。



烏蘞莓

採取 四五月採之。

用法 根搗汁外塗或內飲。葉揉熟外貼之。

性質 酸。苦。寒。無毒。

效能 清熱毒。消癰腫。用治癰瘍藥。凡癰癤瘡腫。蟲咬。搗根傅之。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論烏蘞莓曰。風毒熱腫。游丹。攝傅并飲汁。【明】李時珍本草綱目論烏蘞莓曰。涼血解毒。利小便。根搗酒服。消癥瘕神效。

配合應用 ㈠治小便尿血。五葉藤。陰乾爲末。每服二錢。白湯下。(衛生易簡方) ㈡治喉痺腫痛。五爪龍草、車前

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

草、馬蘭菊。各一握搗汁。徐嚥。祖傳方也。（醫藥正傳方）

㈢治項下熱腫俗名蝦蟆瘟。五葉藤搗傅之。（丹溪纂要方）

㈣治一切腫毒。發背乳癰。便毒憑瘡初起者。並用五葉藤或根一握。生薑一塊。搗爛入好酒一盞。絞汁熱服。取汗。以渣傅之。即散。一用大蒜代薑亦可。（壽域神方）

㈤治跌撲損傷。五爪龍搗汁。和童尿熱酒服之。取汗。（簡便方）

參攷資料 ㈠五葉如白蔹。故曰烏蔹。俗名五爪龍。江東呼龍尾。亦曰虎葛。曰龍曰葛。並取莖形赤澁與赤葛及拔音相近。（李時珍）㈡莖端五葉。開花青白色。所在有之。夏採苗用。（韓保昇）㈢墻壍間甚多。其藤柔而有稜。一枝一葉。凡五葉葉長而光。有疎齒。面青背淡。七八月結苞成簇。青白色。花大如粟黃色。四出。結實大如龍葵子。生青熟紫。內有細子。其根白色。大者如指。長一二尺。搗之多涎滑傳滋。醫學集成謂即紫葛。楊起簡便方謂即老鴉眼睛草。斗門方謂即何首烏。並誤矣。（李時珍）

【烏蔹莓】性質功用與根同。詳『烏蔹莓』條。

【烏鰡】即鱧魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱧魚』條。

【烏欖】命名 本品即橄欖之烏色者。故名。

產地 廣東番禺諸地。

形態 烏欖爲橄欖屬之一種。樹高端直而多。獨幹至頂。乃布枝柯。有雌有雄。結子如棗大。長寸許。光澤無稜角。其瓣先生者向下。後生者向上。八九月成熟。皮青黑。肉白有文。層叠如海螵蛸狀。其仁肥大。與實俱可供藥用。

採取 以長竿擊之。或刻其幹。束納以紅鹽。則其幹東之子遂落。刻其幹之西或南北亦然。

性質 甘。濟。溫。無毒。

主治 補血。

參攷資料 橄欖即今常食之青果。欖仁可治吻燥者。亦指青果核中仁而言。非指烏欖仁也。橄欖有青烏二種。閩人以白者名青果。粵中止名白欖。不曰青果也。白欖利徹。人少種焉。烏欖下番禺諸鄉皆種之。種至二年。其秧長八九尺。必扦之乃結實。扦至三年。而子小收。十年而大收矣。烏欖子以溫水泡軟。俟紫脂浮起溢出。乃可食。水冷則生膠。熱則肌膚反實。總二欖論之。白欖雄而烏欖雌。白屬陽而烏屬陰。陽故色白而行氣。陰故色紅而補血。惟烏者陰。故有仁可食。白者陽。故仁小而不成。此其別也。（趙學敏）

【烏欖子仁】性質 甘。淡。無毒。

主治 潤肺下氣。補血。殺諸魚毒。

【烏鬱】即葵籽之古籍別名。典見本草拾遺。詳『葵籽』條。

【烘柿】基本 本品非謂火烘。自然紅熟如烘成。澀味盡去而甘如甜者。

性質 甘。澀。寒。無毒。

主治 通耳鼻氣。治腸胃不足。解酒毒。醒胃間熱。止口乾。

歷代記述及證 【唐】孟詵食療本草論烘柿曰。續經脈氣。

參攷資料 ㈠飲酒食紅柿。令人易醉。或心痛欲死。別錄言解酒毒。失之矣。（李時珍）㈡生柿性冷。鹿心柿尤不可食。令人腹痛。（陶弘景）㈢凡柿皆涼。不至大寒。食之引痰。爲其味甘也。日乾者食多動風。凡柿同蟹食。令人腹痛作瀉。二物俱寒也。（寇宗奭）㈣按王璆百一選方云。一人食蟹多食紅柿。至夜太吐。繼之以血。昏不省人。一道者云。惟木香可解。爲磨汁灌之。即漸甦醒而愈也。（李時珍）

【烘柿】即柿之古籍別名。典見綱目。詳『柿』條。

【烙鐵草】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【烟油】基本 係烟具中所積滯之流質也。

古籍別名 五行丹（綱目）

性質 辛。微毒。

主治 毒蛇咬。蜈蚣咬。

參攷資料 ㈠烟油入目。如小兒及好吃烟者誤犯之。若將別種湯洗。愈洗愈疼。必至瞎而後已。須用亂頭髮或騌纏緩緩揉之。即愈。（同壽錄）㈡烟油乃五行之氣相合而生。近日外丹家用以點藥金。又可金金色。術士隱其名。呼爲太

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

極膏。又曰氣泥。曰五行丹。別以燃燈代油。則一切毒蟲皆不近入水。蛟龍亦長之。入藥舊竹桿劈取者良。凡梅條藤條紫檀烏木老鶴草及純銅純銀桿中油。皆不及竹中者性良。惟象牙桿中烟油。可殺蟲毒。圖有極巧木烟桿。其中油可毒魚。至烟膏亦各隨所食烟實爲高下。烟肆所市烟。俱以烟葉噴油打成塊。用鐵鑯披竹絲舊之。此爲純葉。不雜爲上品。更有打塊時。夾素葉葉雜以蠟紅鑯成絲。再加薑黃末以和其色者。其氣燥烈損人。烟膏亦淡而薄。不及上品力厚也。海鹽朱進士醒菴云。烟油解蛇毒。初不甚信。後見里人獲一赤練蛇。長八九尺。粗如臂。口吐毒烟。一人近之。蛇噓以氣。即腹裂死。一人戲以舊竹烟桿去頭嘴。以竹絲通出油。刺入蛇口。蛇嚙之。即瞑目閉口身捲縮。俄復伸長。如是數次。直如繩而斃。始知其解毒殺蟲之功。信不虛謬。諸城劉仲旭少府云。西北口外出一種毒蟲。名曰蜢蝶。狀如中土蜚蠊。人出遇之。即觸人面。不論何處。被其觸者。亦不甚痛。頃覺眼眶四圍出細蛆。攢食睛膏。痛不可忍。彼土人治法。惟取烟桿四五枝。折取烟油。塗目內。痛忍片時。其蛆皆死。然後再用溫水洗去烟油。即愈。（陳毅齋）

【烟花】即烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烟草』條。

【烟珠】即梁上塵之古籍別名。典見綱目。詳『梁上塵』條。

【烟草】古籍別名　萇。菸草。烟花。長命草。淡肉菜。延命草。相思草。貧報草。南蠻草。返魂草。（和漢藥考）淡芭菰。（植物學大辭典）

外國名詞　Nicotiana tabacum, L.（拉丁）タバコ（日本）

基本　係茄科烟草屬。爲煙草之葉。

產地　原產地在南美及西印度諸島。今則各國有之。我國向產於福建。現今種者尤夥。

形態　烟草爲毒草類一年生草本。種類甚多。栽者另闢煙圃種之。莖圓。高五六尺。葉爲闊大之橢圓形。末端帶尖。皆互生。葉柄短。若以葉面抱其莖者。故作水涙式。長尺許。面黃綠。背較淡。乾則變赭褐色。具有麻醉性。味苦。葉與莖俱有微細之茸毛。毛頭有黏液腺。花開於秋初。時則花梗抽出。放淡紅紫色之花。長寸許。爲五裂漏斗狀之合瓣花。排列作短穗狀。果實爲蒴果。形圓如球。又似卵。中藏無數淡褐色之細小種子。



烟草

性質　辛。溫。微毒。

成分　主要成分。一爲植物鹽基。名尼古丁 Nicotin.（煙草中尼古丁之含量。視產地、種類、種植法等而有多少之別。有祇含百分之二者。有多至百分之九者。此尼古丁係千八百二十八年德國攝爾托及伊衣滿兩人最先發見）一爲煙草精。名尼可却丁 Nicotianin.（又名煙草腦）其灰分中則含有加里石灰、酸、化里胃謨等。

主治　宣陽氣。行經絡。祛山嵐瘴氣。寒溼陰邪。辟穢殺蟲。

歷代記述攷證　【清】黃宮繡本草求眞論烟草曰。下咽。即能醉人。且或醉倒而復甦。其性力之猛。殆非他物所能比類者矣。景岳云。吸其味。則辛而鮮甘。審其氣。則溫而且熱。凡書所述烟草。皆言在表。則能散陰助陽。如山嵐惡毒瘴溼而致羣理閉密。筋骨痺痛。服此可以見效。在裏則能開胃和中。凡因風寒食滯而致霍亂嘔吐。宿食難消。膨脹鬱結。下陷後墜。服此亦克有功。且其氣一入人口。不比常度。頃刻而周一身。令人通體俱快。醒能使人醉。醉能使人醒。饑能使人飽。飽能使人饑。以之代酒代茗。終身不厭。卒不能以妨人。其故何耶。蓋緣烟性猛。人不能勝。故下咽即醉。醉因氣耗。理固然也。然烟氣易散。而人氣隨服陽性留中。旋亦生氣。雖散仍補。此惟陰滯者用之如神。若陽盛氣越。多燥多火。及氣虛氣短多汗者。皆不宜用。閱產者最佳。

配合應用　㊀治風寒溼氣。骨節疼痛。瘰癧不仁。鶴膝風。歷節風。及偏頭風。漏肩風。有見現膏用鮮

77／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

煙葉搗汁。浸松香。曬乾入藥。亦取其氣味以透利筋絡也。（葉天士種福堂方）㊀治毒蛇咬傷。先避風。擠出惡血。用生煙葉或乾葉搗研傅之。或煙膏煙灰皆可。（慈航活人書方）㊁辟臭蟲。煙葉鋪牀代褥。或燒熏之盡絕。

參攷資料　烟葉生者有毒。食之卽中毒。難治。其莖更烈。凡溪塘中大魚難捕。用烟莖剉末。同青胡桃皮。搗爛。置水中。大魚輒如醉浮水面。小魚皆死。雖鼈鼉鼈蝦鱟蟹蚌蛤之屬。無一活者。其毒之烈如此。但造烟吸之。則味淡迥不如葉之味厚耳。（綱目拾遺）

【烟桿】　基本　本品爲吸旱烟毛竹。男子用者良。

主治　婦人血崩。

參攷資料　㊀新昌張姓。茹竹烟管四十餘年。色如漆而光可鑑。珍同拱璧。雖戚好不輕假也。母病無藥餌。資貲二繒。典主子患損病。諸藥罔效。或謂非多年竹烟管不可治。遂取張物截之數寸。煎湯服之。愈後酬張以巨萬金。（秋燈叢話）㊁烟桿雖受烟火熏漬之氣。然非藉人氣津液漸漬之。必不酥透。其桿經男子食者。光澤可鑑。一經婦人口。便色黯不鮮明。且多直裂紋。又最忌糞。凡多年好桿。持以上廁。能令光澤若漆桿便裂。開走油。不堪用。物性之相忌如此。（陳毅齋）㊂殺蟲毒。傳屍瘵。塗惡瘡。舉取中心油。透而酥者。攙如糊。塗瘡卽痂。或攤油紙上。貼治蟲牙。（陳毅齋）㊃毒蛇咬傷。先取婦人膏油頭繩。紮住腫處。勿令腫上。再取耳垢封之。止痛。隨用多年油黑竹烟筒桿。紫色者亦可。毛竹最佳。一段約長三寸。咀嚼嚥汁。渣淡吐去。并取桿中之油。搽患處。烟桿味辣。服之反甜。蛇毒亦隨解。痛止自愈。試效多人。凡蛇咬有蛇齒留肉內者。烟油塗之卽出。（百草鏡）㊄凡血崩諸藥不效者。用多年舊烟桿紫色油透者佳。截一寸燒灰。黃酒調服。下喉卽止。屢試屢效。（劉怡軒）

【烟筒頭中煤】　主治　蜈蚣咬傷。取烟筒頭內硬煤擦之。立時止痛。

【烟葉】　主治　風寒濕熱。骨節疼痛。痿痺不仁。鶴膝風。歷節風。偏頭風。漏肩風。毒蛇咬傷。辟臭蟲。兼治腦漏。

參攷資料　於葉半觔。曬乾。研極細末。調花露四兩。曬乾用。玫瑰餅再研吹入。吃。蘭花烟成腦漏者。以白鴿脊骨燒烟燻之。數日愈。蘭花乃江西貢人帶來一種蘭子。卽澤蘭子也。氣香烈。取其子研。拌入烟名曰蘭花烟。人食之作蘭花香。然其氣竄上。往往入頂傷腦。易成腦漏。（楊春涯驗方）

【烟膠】　命名　本品係熏消牛皮竈及燒瓦窰所結之黑土。由烟煤結如膠狀。故名。

主治　顛癇白禿。疥瘡風癬。瘡痛流水。取牛皮竈岸爲末。麻油調塗。或和輕粉少許。

【烟藥】　基本　烟葉爲石類之一種。可供藥用。

性質　辛。溫。有毒。

主治　瘭癤痔瘻。瘡根惡腫。

【煜鐵石】　卽慈石之古籍別名。典見本草衍義。詳「慈石」條。

【特生礬石】　命名　本品所謂特生者。以不附着於他石而生。故名。

古籍別名　蒼礬石。蒼石。（別錄）鳳毒。梁州礬石。（綱目）

製法　徐之才曰。火煉之良。

性質　甘。溫。有毒。

主治　明目利耳。腹內絕寒。破堅積及風癉。殺百蟲惡獸。蒼石主寒熱。下氣瘡蝕。殺禽獸。

配合宜忌　長水。

參攷資料　㊀別錄云。礬石久服。令人筋攣。特生礬石。久服能延年。丹書亦云。礬石化爲水。能伏水銀。煉入長生藥。此皆方士謬說也。與服砒石永長生之義同。（李時珍）㊁礬石有數種。白礬石。蒼礬石。紫礬石。紅皮礬石。桃花礬石。金星礬石。銀星礬石。特生礬石。俱是一物。但以形色立名。其性皆熱。毒並可毒鼠。制汞。惟蒼白二色入藥用。諸礬生於山則草木不生。霜雪不積。生於水則水不冰凍。或有溫泉。其氣之溫可知已。庚辛玉冊云。礬陽石也。生山谷水中。瀝出似礬。有文理橫截在其中。爲佳。伏火制

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

砂汞。其狀頗與方解石相似。但投水不沈者爲眞。其出金穴中者名握雪礜石(李時珍)

【特迦香】(綱目拾遺) 古籍別名 鷹嘴香。

主治 辟邪去瘧。安魂魄。定驚悸。

參攷資料 出弱水西。形如雀卵。色頗淡白。焚之辟邪去穢。鬼魅避之。博物志載。漢武帝焚西使香。宮中病者盡起。徐審得鷹嘴香焚之。一家獨不疫疾。卽此類歟。(五雜俎)

【狻猊】卽獅之古籍別名。典見綱目詳『獅』條。

【狼】 古籍別名 毛狗。(綱目)

牡者名獾。子名獑。(爾雅)

外國名稱 Canis lupur L.(拉丁)(Wolf)(英)オーカミ或オホカミ(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類裂脚類犬科。

形態 狼爲獸類犬屬之一種。形酷似犬。性猛惡。常食哺乳類鳥類動物。眼裂斜。有凶光。鼻長。口裂深。耳殼小而尖。頸上生剛毛。呈粗頸之觀。體瘦。背略傾斜。肩高。蹯四肢長。能涉水。毛剛硬。肩、頸、臀、各部爲尤長。體黃或褐灰。口吻黑。頰及眼之上部淡黃或灰褐。上脣與上頷白色。前肢之腕部有黑色條紋。尾下垂。常蓬鬆。全體常發一種惡臭。長約五六尺。高約三尺。性凶惡。食生物其肉可供藥用。

性質 鹹。熱。無毒。

主治 補益五臟。厚腸胃。堅骨髓。腹有冷積者宜食之。

【狼子】卽狼牙之古籍別名。典見別錄。詳『狼牙』條。

【狼牙】 命名 本品根黑如獸之齒牙。故名。

產地用名 狼牙根。

古籍別名 牙子(本經)狼齒。狼子(別錄)犬牙。抱牙(吳普)支蘭(李當之)源草(日本)

外國名稱 Potentilla Crypttotaeniae, Maxim.(拉丁)ミツモトサウ ミナモトサウ ラウゲ ラフゲ(日本)

基本 係薔薇科委陵菜屬。藥用狼牙之根與莖葉。

產地 多在山野川谷間。

形態 狼牙爲毒草類之野生草本。莖頗長。質硬而直立。上部之葉。每葉皆有三小葉。花黃色。花序由數花而成。有專檬之苞。雌蕊多數。各雌蕊含一胚珠。花後結乾果。色黑。

性質 苦。寒。有毒。

主治 邪氣熱氣。疥瘙。惡瘡。瘡痔。去白蟲。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論狼牙曰。治浮風瘙痒。煎汁洗惡瘡。【宋】大明諸家本草論狼牙曰。殺腹臟一切蟲。止赤白痢。煎服。【清】黃元御長沙藥解論狼牙曰。狼牙味苦性寒。入足厥陰肝經。清肝之鬱熱。療女子之陰瘡。金匱狼牙湯(狼牙三兩。水四升。煮半升。以綿纏筋如繭。浸湯瀝陰日四)。治婦人少陰脈滑而數。陰中生瘡。蝕爛者。尺中候腎。尺脈滑數。是木鬱於水而生下熱。法當陰裏生瘡。溫熱蒸腐。故剝蝕而壞爛。狼牙清鬱熱而達肝。止蝕爛而消痛癢也。【清】張隱菴本草崇原論狼牙曰。狼性靈智。此草根如獸之牙。齒而專以狼名者。疑取其上下靈通之義。寒水之氣上行。則能散在表之邪氣。熱氣以及皮膚之疥瘙惡瘡。苦寒之氣下洩。則能除在下之瘡痔。以及在內之白蟲。金匱要略曰。少陰脈滑而數者。陰中卽生瘡。陰中蝕瘡爛者。狼牙湯洗之。此草氣味苦寒。稟性純陰。故能治少陽之火熱瘡爛也。

配合宜忌 惡地榆、棗。肌。蕪荑爲之使。

參攷資料 ㈠狼牙生淮南川谷及冤句。八月採根。暴乾。中澤腐爛生衣者殺人。(別錄)㈡葉青根黃赤。六七月華。八月實黑。正月八月採根。(吳普)㈢所在有之。苗似蛇莓而厚大。深綠色。根黑若獸之牙。三月八月採根。日乾。(韓保昇)㈣范子計然云。出建康及三輔。色白者善。(李時珍)

【狼牙根】卽狼牙之處方用名。詳『狼牙』條。

【狼牙莖及葉】 主治 金瘡出血。婦人陰蝕。小兒陰瘡。

【狼皮】 主治 暖人。辟邪惡氣。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【狼尾】主治 葉馬胸前脾邪氣令馬不驚。

【狼尾草】命名 本品穗狀似狼尾故名。

古籍別名 稂(詩)莠(爾雅)狼茅(孟子)宿田(詩疏)翁守田。

產地 生原野田澤及道旁間。

形態 狼尾草爲穀類之多年生草本。其莖直立而堅。有小刺毛。葉綱長而尖。有並行脈。秋日莖頂生黑褐色長刺毛。出穗五六寸。作圓柱形。如粟花紫色。列爲穗狀花序。密生長芒。其米可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 作飯食之令人不饑。

【狼把草】原名 耶耶草。

命名 閩人呼爺爲耶。龍。狼把當作耶龍乃通。故本品卽是耶耶草。

古籍別名 附草。虱草。田五加木。(和漢藥考)

外國名稱 Bidens tripartite L.(拉丁)

基本 屬菊科狼把草之葉莖。

產地 凡山野道旁川澤水濱。及田畦間皆有生焉。



狼把草

形態 狼把草爲一年生草。春季抽莖。高達二尺餘。其葉或裂爲三。或裂爲五。作卵圓披針形。邊緣有粗鋸齒。每節對生。惟梢上之葉則爲作披針形之單葉。夏季於枝梢開黃色筒狀花。冠頭狀花。總苞外另有多數有柄之小葉。秋季結刺栗毬狀實。成熟立卽脫落。附他物以達遠方。故日本俗呼此爲附草。虱草。

採取 夏月三伏中。刈取陰乾。

性質 苦。平。無毒。

成分 據東京衞生試驗所高橋增次郎氏之分析。言狼把草中含有樹脂。(稍多量)揮發油。(極少量)蠟。(稍多量)鞣酸。(多量)加鐵液則呈綠色。苦味質。(極少量)黏液質。(多量)無機鹽類。(多量硝石及綠化鉀)據氏言。未見有可治肺病之物質云。

效能 療血痢。治癬癢。用作健胃利尿藥。

主治 黑人髮。令人不老。又云耶耶草。主赤白久痢。小兒大腹痞滿。丹毒寒熱。取根莖煮汁服。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論狼把草曰。狼把草。主丈夫血痢。不療婦人。根治積年疳痢。取草二斤。搗絞取汁一小升。納白麵半雞子許。和勻。空腹頓服。極重者不過三服。或收苗陰乾搗末。蜜水半碗。服一方寸匕。【明】李時珍本草綱目論狼把草曰。可染鬚髮。治積年癬。天陰卽痒。搔出黃水者。擣末摻之。

國外學說 日本農學士原田東一郎氏著『藥用草木栽培法』之狼把草條下。載有類似草之識別法。摘錄於左。以供參考。(一)眞正狼把草。多生於濕地。能受陽光之處。類似草則生於堤岸竹園等乾燥之地。(二)眞者粗大。節與節間互相接近。類似草則纖細。節與節間相距頗長。(三)眞者枯時卽變黑褐色。類似草則變黃褐色。(四)眞者葉對生。類似草之葉。則非對生。(五)眞有花被。枯後仍貼附花萼。從不脫落。類似草則未有花被貼附花萼者。上野藥學士。更分析狼把草。據云其水製越幾斯。如仍溶化於水時。見有物質析出。聚集檢之。知該析出物。係由可溶於酒精之樹脂狀物及可溶於熱湯之無機鹽類。(硝石及綠化鉀)而成。其樹脂狀物質。根據試藥之反應。假定屬於糖原質。或苦味質。又和漢藥考曰。係民間藥。謂治肺病有特效云。(一說此草雖無治肺功效。但煎湯飲之。能使胃強健。治咳利尿)醫學博士中西氏著有『狼把草藥談』一文。醫學博士遠山氏著有『迷信狼把草』一文。俱論該藥對於肺病並無何等功效云。

用量 煎成菜狀。日服三合至五合。或錢半至三錢。

參攷資料 (一)方士言耶把草卽鳳尾草。功用亦近之。但無的據。(李時珍)(二)狼把草生山道旁。與穗秋子並可染皂。又曰。耶耶草生山澤間。高三四尺。葉作雁齒如鬼針苗。鬼針卽鬼釵也。其葉有極如釵脚狀。(陳藏器)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【狼杷草】卽狼把草之訛。見『狼把草』條。

【狼毒】命名　本品毒性猛烈如狼。故觀其名則知其毒矣。

古籍別名　狼青草（崇原）續毒（和漢藥考）

基本　爲狼毒草之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。狼毒卽尖尾木芋頭也。各屬皆有。三月新。

形態　狼毒葉似商陸及大黃。莖葉上有毛。四月開花。八月結實。其根皮黃肉白。以實重者良。輕者力劣。

採取　二月八月採根陰乾。

製法　凡使以陳久者良。宜醋炒入藥用。

用法　恒以剉末和作丸散。

性質　辛平有毒。

效能　止九種心痛。殺一切蟲。痛。用作鎮痛藥。又爲殺蟲藥。

主治　咳逆上氣。破積聚飲食。寒熱水氣。惡瘡瘕疽。蝕鬼精蠱毒。殺飛鳥走獸（本經）除胸下積僻（別錄）

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論狼毒曰。治痰飲癥瘕。亦殺鼠。【明】李士材本草圖解論狼毒曰。狼毒辛平有大毒。陳而沉水者良。主咳逆。治蟲疽瘰癧結痰。癰心痛。【清】張隱菴本草崇原論狼毒曰。狼青草有大毒。稟火氣也。氣味辛平。莖葉有毛。入水則沈。稟金氣也。稟金氣故主治肺病之咳逆上氣。金能攻利。故破積聚。破積聚則飲食壅滯。而爲寒爲熱之病。亦可治矣。水氣水寒之氣也。水氣而濡。則有惡瘡瘕疽蝕。并鬼精蠱毒之病。狼毒稟火氣而溫臟寒。故皆治之。又言其毒能殺飛鳥走獸。草以狼名。殆以此故。

國外學說　本草類編曰。狼毒。二月八月採根陰乾。四月開花。八月結實。本草綱目啓蒙曰。昔時有自漢傳來者。形如商陸。皮黃白色。有橫紋甚密如眞。正羌活。多抗瘤。肉白色。地錦抄曰。狼毒春自宿根生。葉多毛。花黃色。開於八九月。日俗呼「栗橘」。

配合應用　㈠治腹中冷痛。水穀陰積。心下停痰。兩脇痞滿。按之鳴轉。逆害飲食。用狼毒三兩。附子一兩。旋覆花三兩。搗末。蜜丸。梧子大。每服三丸。食前白湯下。日三服。亦治兩脇氣痛（肘後方）

㈡治陰疰欲死。丸縮入腹。急痛欲死。狼毒四兩。防風二兩。附子三兩。燒。以蜜丸。梧子大。每服三丸。日夜三度。白湯下（肘後方）

㈢治一切蟲病。川狼毒杵末。每服一錢。用鵝一皂子大。沙糖少許。以水化開。臥時空腹服之。次早卽下蟲也。（集效方）

㈣治乾溼蟲疥。狼毒不拘多少。搗爛。以猪油馬油。調搽患處。方睡勿以被蒙頭。恐藥氣傷面。此維揚潘氏所傳方（簡氏經驗方）。

㈤治積年疥癩。狼毒一兩。一半生研。一半研炒。輕粉三合。水銀三錢。以菜末少許。於瓦器內。以津液擦化爲末。同以清油浸藥。高一寸。三日待藥沉油清。過夜不見燈火。臘油塗瘡上。以口鼻於藥杯上吸氣以取效（永類鈐方）

㈥治積年乾癬生痂。搔之黃水出。每逢陰雨卽痒。用狼毒末塗之（聖惠方）

㈦治惡疾風瘡。狼毒、秦艽等分。爲末。每服方寸匕。溫酒下日二服。或一服（千金方）

㈧治心腹連痛作脹。用狼毒二兩。附子半兩。搗篩。蜜丸。梧子大。一日服一丸。二日二丸。三日三丸止。又從一丸起。至三丸止。以瘥爲度（肘後方）

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。惡麥句薑。長占斯。蜜陀僧。大豆爲之使。

著名方劑　九痛丸。治九痛。（一蟲二蛀三風四悸五食六飲七冷八熱九氣）又治連年積冷流注。心胸及落馬墮車。瘀血中惡等證。（局方）狼毒、（炙香）吳茱萸、（湯泡）巴豆、（去心取霜）乾薑、（炮）人參各一兩。附子（去皮）三兩。右各爲末。煉蜜丸。梧子大。每空腹溫酒下一丸。

參攷資料　㈠狼毒合野葛。納耳中。治聾。（抱朴子）㈡狼毒生秦亭山谷及奉高。二月八月採根。陰乾。陳而沉水者良。（別錄）㈢秦亭在隴西。奉高是大山下縣。陶云沉。

81／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者是狼毒。浮者是防葵。此不足爲信。假使防葵秋冬採者堅實。得水皆沉。狼毒春夏採者輕虛。得水皆浮。且二物全別。不可比類。此與麻黃、橘皮、半夏、枳實、吳茱萸、黃爲六陳也。（馬志）㊁根似玄參。惟虛浮者爲劣也。（韓保昇）㊂狼毒出秦晉地。今人往往以草薗荵爲之。誤矣。（李時珍）

【狼青草】卽狼毒之古籍別名。見本草崇原。詳『狼毒』條。

【狼屎】主治 療癰燒灰。油調封之。又治骨疽不下。燒灰水服之。

【狼茅】卽狼尾草之古籍別名。見爾雅。詳『狼尾草』條。

【狼屎中骨】主治 小兒夜啼。燒灰水服二黍米大。卽定。又能斷酒。

【狼脂膏】採取 於臘月煉淨收之。

主治 補中益氣。潤燥澤皺。塗諸惡瘡。

歷代記述致證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論狼脂膏曰。入風氣膏中。能去積久風痺。調酒服。散逆結之氣。

參考資料 小切狼臗膏。與稻米爲飴。調以狼胸臆中膏。和米作粥。糜也。古人多食狼肉。以膏煎和飲食。故內則食狼去腸。周禮獸人冬獻狼。取其膏粢也。諸方亦時用狼之髓、牙、皮、糞而本草並不著其功用。祇有陳藏器逃狼筋疑似一說。可謂缺矣。今通據飲膳正要諸書補之云。（李時珍）

【狼喉蠶】主治 噎病日乾爲末。每以半錢入飯內食之妙。

【狼跋子】原名 黃環子。

命名 跋乃狼足。其葉似之。故名。

性質 苦。寒。無毒。

主治 惡瘡蝎疥。殺蟲魚。

歷代記述致證 【南北朝】陶弘景本草集註論狼跋子曰。苦酒磨塗瘡疥效。

【狼嗉下皮】主治 搓作條勒頭。能去風止痛。

【狼鴦】卽莨菪子之古籍別名。見和漢藥考。詳『莨菪子』條。

【狼齒】卽狼牙之古籍別名。見別錄。詳『狼牙』條。

【珠子仁】卽薏仁之古籍別名。見和漢藥考。詳『薏仁』條。

【珠子草】卽七葉黃荊之古籍別名。見綱目拾遺。詳『七葉黃荊』條。

【珠友】卽瑞香之古籍別名。見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【珠參】原名 珠兒參。

命名 本品卽人參之產於閩地。形扁而圓。大如珠狀。故名。

產地 出閩中及雲南蒼姚安府境。

採取 以閩產大而明透者佳。

製法 須去皮。水泡過用。因苦劣之味。皆在皮耳。

性質 苦。微甘。寒。無毒。

主治 補肺降火。下氣止牙痛。

參考資料 ㊀珠兒參味厚體重。肺熱者宜之。臟寒者服之。卽作腹痛。鬱火服之。火不能透發。反生寒熱。其功與西洋參相同。非眞能補也。珠兒參功能托裏。外症堪用。血症可代三七。（綱目拾遺）㊁按珠參本非參類。前未聞有。此近年始行。然南中用之。絕少。或云來自粵西。是三七子。又云草根大約以參名。其性必補。醫每患其苦寒。友人朱秋亭客山左。聞貨珠參者有。製法。服之可代遼參。每五錢。索價五十金。秋亭罄千金市其方。祕不輕授。予懇其弟退谷。始得其術。因錄之以濟貧。珠參切片。每五錢。以附子三分。研末拌勻。將雞蛋一個。去黃。白每殼納參片五錢。封口。用雞哺待小雞出時取出。將筆畫一圈於蛋上作記。如此七次。共成七圈。其藥卽成矣。每遇垂危大症。并產孱無力吃參者。煎服五錢。力勝人參。并能起死回生。較臘狐心功力尤捷。不得少服。約人以五錢爲率。每次須多做數兩。救人。（綱目拾遺）㊂又接濟陰保元湯載在醫鈐。此方理脾化邪。生氣引氣。生血。爲調經聖藥。滇珠參三錢。以米仁四錢。拌水蒸透。咀片。再入薑加米仁汁蒸晒乾。用饅生地一兩。砂仁、酒薑、三味拌蒸。九曬收。再以瓦焙爲炭。當歸四錢。白芍三錢。酒炒川芎二錢。去淨油。米泔水浸洗。收

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乾。再入酒浸。丹參四錢酒洗透。芜蔚子四錢酒蒸透。香附三錢。以薑、土醋、鹽童便甘草水、乳汁。逐次製過。用雲白朮五錢陳土炒。女貞子三錢。以白芥車前水浸乾用。如氣血熱加丹皮生地。氣血寒加肉桂數分。不眞確之寒熱而先後至者。照本方如經閉無分婦女。本方加牛膝。（綱目拾遺）

【珠兒參】卽珠參之處方用名。詳『珠參』條。

【珠粉】卽眞珠之處方用名。詳『眞珠』條。

【珠實】卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【珠樹】卽靑琅玕之古籍別名。典見山海經。詳『靑琅玕』條。

【珠蟹】卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【珠蘭】古籍別名 雞爪蘭花。珍珠蘭。魚子蘭（綱目拾遺）芝蘭。

形態 珠蘭爲蘭之一種。枝葉似茉莉花。發長條細蔴。與建蘭同。其香亦相似。而濃郁過之。其根可供藥用。

主治 磨傅癰瘍。

參攷資料 珠蘭性毒。止可取其香氣。故不入藥。張篁壬云。中條山有老道士。敎人治狐魅。有一女子爲雄狐所崇。敎以用珠蘭根搗爛。置牀頭。俟狐來交時。塗其莖物上。狐大嚼。竄去。次日野外得一死狐。道士云。此根狐肉沾之卽死。性能毒狐。尤捷效也。（綱目拾遺）

【珠鼈】產地 出海中。

形態 珠鼈爲介類鼈屬之一種。其狀如肺。有四目六足。皆有珠。蓋蚌珠在腹。而鼈珠在足。故以名之。可供藥用。

性質 甘。酸。無毒。

主治 食之辟疫癘。

【班珠藤】產地 生山谷中。

形態 班珠藤爲蔓草類之一種。凌冬不凋。其子如珠而有斑。可供藥用。

採取 冬月採之。

性質 甘。溫。無毒。

主治 祛風活血。羸瘦婦人諸疾。

【珙】卽珂之古籍別名。典見綱目。詳『珂』條。

【病草】卽艾葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『艾葉』條。

【皋比】卽虎皮之古籍別名。典見莊子。詳『虎皮』條。

【皋蘆】古籍別名 瓜蘆。（陶弘景）苦荼。過羅。物羅。（綱目拾遺）唐茶。苦茶。（日本）

外國名詞 Thea Dinensis, L. var. macrophyl la, Sieb.（拉丁） タウチヤ ニガチヤ キッカフチヤ（日本）

基本 係山茶科山茶屬。

產地 生山野間。

形態 皋蘆爲味果類茶之一種。乃常落灌木。全體與茶樹相似。惟莖較粗。葉亦肥大而厚。長三四寸。秋末葉腋生花。比茶花亦稍大。白色。其嫩葉不宜煎飲。可充紅茶之料。老葉可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 煮飲。止渴明目。除煩。令人不睡。消痰利水。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論皋蘆葉曰。通小腸治淋。止頭痛煩熱。【明】李時珍本草綱目論皋蘆葉曰。喰嚥清上膈利咽喉。

施用宜忌 凡胃寒脾冷者禁用。

【益母草】原名 茺蔚。

命名 本品莖葉與子實皆茺盛密蔚。故名。

古籍別名 益明。火枚。（本經）蓧菜（陳藏器）貞蔚（別錄）蠲蓬（爾雅）牛藪（爾雅注）野天麻（會編）鼈臭草。貞擔（唐殷產寶方）苦低草（圖經）夏枯草。（外臺祕要）猪麻。土貫汗（綱目）黃大札。小胡麻。千層塔。天芝麻。反魂丹。臭鼈草。透骨草。鼈臭苗。目比也叱。（和漢藥考）

外國名詞 Leonurus isbiricus, L.（拉丁）

基本 屬脣形科。爲益母草之莖葉。

產地 凡海濱及田野間恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。益母草產廣東各屬。以肇慶來者多。

形態 益母草乃雜草也。多生原野間。春日抽莖。入夏莖高三四尺。莖作方形。有縱溝。每節對生有長柄之葉。葉作深裂。三各片更有

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

深缺刻。似鳥頭葉。其莖頂之葉。則似艾葉。裏面色綠。夏中。葉間輪生淡紫色之小穗形花。一花常結四子。是名茺蔚子。亦入藥用。

種類　㊀益母之白花者。入氣分。卽藏器所謂蓧蒿爾雅所謂蓷也。㊁益母之紅花者。入血分。卽爾雅所謂藒也。

採取　五月採刈葉莖。九月採收子實。

製法　凡使益母膏。須三月採取。連根葉莖花洗擇令淨。於箔上攤曝水乾。以竹刀切長五寸。勿用鐵刀。置於大鍋中。以水浸過二三寸。煎煮候草爛。水減三之二。漉去草。取汁約五六斗。入盆中澄半日。以綿漉去濁滓。以清汁入釜中。慢火煎取一斗。如稀錫狀。磁瓶封收。

性質　辛。微苦。寒。無毒。

效能　祛瘀生新。活血調經。用作通經藥。

主治　癰癬。可作浴湯。

歷代記述　【唐】蘇恭新修本草論益母草曰。擣汁服。主浮腫下水。消惡毒。丁腫。乳癰。丹遊等毒。併傅之。又服汁。主子死腹中及產後血腹悶。滴汁入耳中。主聤耳。擣傅蛇虺毒。【唐】陳藏器本草拾遺論益母草曰。入面藥。令人光澤。治粉刺。【明】李時珍本草綱目論益母草曰。活血破血。調經解毒。治胎漏產難。胎衣不下。血暈血風痛。崩中漏下。尿血瀉血。痢疳痔疾。打撲內損瘀血。大便小便不通。【清】黃宮繡本草求眞論益母草曰。益母草一名茺蔚。辛。微苦。寒。功能入胞心胞絡。消水行血。去瘀生新。調經解毒。爲胎前胎後要劑。是以無胎而見血淋。血閉血崩帶血下痛。既胎而見胎漏。臨產而見難產。已產而見血暈。疔癰乳腫等症。服此皆能去瘀生新。蓋味辛則於風可散。血可活。味苦則於瘀可消。結可除。加以氣寒。則於熱可療。並可臨症酌施。則於母自有益耳。外此番沙腹痛。嘔之用。此濃煎恣飲。亦取能散惡血。然氣味辛散。瞳子散大者。其切忌之。益母子。主治略同。但行中有補。非若益母草。徒以消水行血爲事也。小暑端午及或六月六日採取良。忌鐵子。微炒妙。【清】賈九如辨藥指南論益母草曰。益母草味苦略辛。入肝清熱。疏散。專治胎前產後諸症。故名益母。凡胎前氣易滯。故惡阻而胎不安。產後血易凝。故血暈而腹痛。以此活血行氣。而不推蕩。使血氣流通。以除凝滯。大有益於陰分。故云有補陰之功。此非濡潤之物。體本枝葉。僅可通散。不可滋補。惟用之疏滯氣。卽所以養眞氣。用之行瘀血。卽所以生新血耳。

國外學說　荷蘭藥鏡云。益母草。又名茺蔚。有稀釋鑽透鎮痙強壯之效。於子宮諸病。心腹痛。心下牽腹。心悸。或黏液壅滯。妨凝胃之消化運動。致發擊急痛者。或肢節牽引拘攣者。以此作泡劑服飲。俱有效。洵良藥也。

配合應用　㊀濟陰返魂丹。此方乃吉安文江高師禹備禮求於名醫所得者。其效神妙。活人甚多。能治婦人胎前產後諸疾危證。用野天麻。又名益母。又名火秧。又名貢擡。卽茺蔚子也。葉似艾葉。莖類火麻。方梗四面。四五六月節節開花。紅紫色。如蓼花。南北隨處皆有。白花者不是。於端午小暑或六月六日。花正開時。連根收採。陰乾。用葉及花子。用忌鐵器。以石器碾爲細末。煉蜜丸如彈子。隨證嚼服。用湯使其根。燒存性爲末。酒服。功與黑神散不相上下。其藥不限丸數。病愈爲度。或丸如梧子大。每服五七十丸。又可搗汁。澄淨熬膏服之。胎前臍腹痛。或作墜者。米飲下。胎前產後。臍腹刺痛。胎動不安。下血不止。當歸湯下。產後以童子小便化下一丸。能安魂定魄。血氣自然調順。諸病不生。又能破血痛。養脈息。調經絡。並溫酒下。胎衣不下及橫生不順。死胎不下。經日腹滿。心悶心痛。並用炒鹽湯下。產後血暈。眼黑。血熱。口渴煩悶。如見鬼神。狂言不省人事。以童子小便和酒化下。產後結成血塊。臍腹奔痛。時發寒熱。有冷汗。或面垢顏赤。五心煩熱。並用童子小便酒下。或薄荷自然汁下。產後惡露不盡。結滯刺痛。上衝心胸滿悶。童子小便酒下。產後瀉血水。以漉湯下。產後痢疾。米湯下。產後血崩漏下。糯米湯下。產後赤白帶下。煎膠艾湯下。月水不調。溫酒下。產後中風。牙關緊急。牛

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

身不遂。失音不語。童便酒下。產後氣喘。咳嗽。胸膈不利。惡心。吐酸水。面目浮腫。兩脇疼痛。舉動失力。溫酒下。產後月內咳嗽。自汗發熱。久則變爲骨蒸。童便酒下。產後鼻衄舌黑口乾。童便酒下。產後兩太陽穴痛。呵欠。心忪。氣短。羸瘦。不思飲食。血風身熱。手足頑麻。百節疼痛。並米飲化下。產後大小便不通。煩燥口苦者。薄荷湯下。婦人久無子息。用溫酒下。（普濟產寶方）

㈡治婦人難產。益母草搗汁七大合。煎減半。頓服立止。無新以乾者一大握。水七合煎服。（章宙獨行方）

㈢治胎死腹中。益母草搗熟。以暖水少許。和絞取汁。頓服之。（章宙獨行方）

㈣治產後血暈。心氣欲絕。益母草研汁。服一盞。絕妙。（子母祕錄方）

㈤治產後血閉不下者。益母草汁一小盞。入酒一合溫服。（聖惠方）

㈥治帶下赤白。益母草花開時採擣爲末。每服二錢。食前溫湯下。（集驗方）

㈦治小便尿血。益母草擣汁服一升。立瘥。此蘇澄方也。（外臺祕要方）

㈧治赤白雜痢困重者。益母草日乾。陳鹽梅燒存性。等分爲末。每服三錢。白痢乾薑湯下。赤痢甘草湯下。名二靈散。（衞生家寶良方）

㈨治小兒疳痢垂死者。益母草嫩葉。同米煮粥食之。取足以瘥爲度。甚佳。取汁飲亦可也。（廣利神效方）

㈩治痔疾下血。益母草葉擣汁飲之。（食醫心鏡方）

⑪治一切癰瘡。婦人如乳。乳癰。小兒頭瘡。及浸淫黃爛熱瘡。疥疽陰蝕。並用天麻草切五升。以水一斗半。煮一半。分數次洗之。以殺痒。（千金方）

⑫治急慢疔瘡。用益母草擣封之。仍絞五合服。卽消。（聖惠方）又用益母草四月連花採之。燒存性。先以小尖刀十字劃開疔根。令血出。次逃根開破。捻出血拭乾。以稻草心蘸藥。撚入瘡口。令到底良久。當有紫血出。捻令血淨。再撚藥入。見紅血乃止。一日夜撚藥三五度。重者二日根爛出。輕者一日出。有瘡根脹起。卽是根出。以針挑之。出後仍傅藥生肌。易愈。忌風寒房室酒肉一切毒物。（醫方大成方）

⑬治癰毒已破。益母草擣傅甚妙。（斗門方）

⑭治勒乳成癰。益母爲末。水調塗乳上。一宿自瘥。生擣亦得。（聖惠方）

⑮治喉閉腫痛。益母草擣爛。新汲水一盞。絞濃汁。頓飲。隨吐愈。冬月用根。（衞生易簡方）

⑯治聤耳出汁。羌蔚莖葉汁滴之。（聖惠方）

⑰治粉刺黑斑。閨閣事宜云。五月五日收帶根天麻。紫花者。曬乾。燒灰。以商陸根擣自然汁。加酸醋和搜。灰作餅。炭火煅過。收之半年方用。入面藥甚能潤肌。又蘇頌曰。唐天后鍊益母草澤面法。五月五日。採根苗具者。勿着火。曝乾。搗羅。以麵水和成團。如雞子大。再曝乾。仍作一爐。四旁開竅。上下置火。安藥中央。大火一炊久。卽去大火。留小火養之。勿令火絕。經一伏時出之。瓷器中研治。篩。再研。三日收用。如澡豆法。日用二方。每十兩加滑石一兩。胭脂一錢。

㈡治馬咬成瘡。苦低草切細。和醋炒鹽之。（孫眞人方）

㈢新生小兒。益母草五兩。煎水浴之。不生瘡疥。（簡要濟衆方）

㈣五月五日。採紫花益母草。擣汁。分貯瓷器內。各少許。曬乾。別取和蜂蜜封固。加人參、琥珀、乳香、沒藥、血竭、沉香、丹砂、五靈脂。催生及胞衣不下神效。兼產後血暈。瘀血薄心。惡露不行。腹痛。少腹兒枕痛。調經。治血閉經阻。經行作痛。

㈤單用和童便服。能下死胎。及治熱入血室。發熱。煩燥。類傷寒。

㈥君四物湯。杜仲、阿膠、眞川續斷。爲丸。安胎止痛。

㈦得生地黃、白芍藥、麥門冬、枇杷葉、靑蒿子、五味子、阿膠。治血熱經行先期。及胎漏下血。

㈧同生甘菊、蒼耳草、金銀花、紫花地丁。各一握。貝母、鼠黏子、白芷、殭蠶。白及。白斂。生甘草、連翹、生地黃各三錢。熬夏枯草汁。和藥同煎。濃頓飲之。消一切疔腫。發背及無

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名腫瘇。

㊀益母膏。治產婦諸疾。及折傷內損有瘀血。每天陰則痛。神方也。三月採益母草一名貞擔。一名夏枯草。連根葉莖花洗。擇令淨。於箔上攤曝水乾。竹刀切長五寸。勿用鐵刀。置於大鍋中。以水浸過二三寸。煎煮。候草爛。水減三之二。濾去草。取汁。約五六斗入盆中。澄半日。以綿濾去濁滓。以清汁入釜中。慢火煎取一斗。如稀餳狀。盛封收。每取梨大。暖酒和服。日再服。或和羹粥亦可。如遠行。卽更煉之。可丸收之。服至七日。則疼漸平復也。產婦惡露不盡。及血暈。一二服。瘥。其藥無忌。又能治風益心力。

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡血虛無瘀者禁用。忌鐵。

參攷資料　㊀益母草之根莖花葉實。並皆入藥。可同用。若治手足厥陰血分風熱。明目益精。調婦人經脈。則單用莧蘞子爲良。若治腫毒瘡瘍。消水行血。婦人胎產諸病。則宜並用爲良。蓋其根莖花葉尊於行。而其子則行中有補。故也。（李時珍）㊁莧蘞之功。宜於婦人及明目益精。故有益母之稱。其莖方類麻。故謂之野天麻。俗呼爲猪麻。猪喜食之也。夏至後卽枯。故亦有夏枯之名。近效方謂之土貫汗。林億云。貫汗出西番。乃熱血合諸藥煎成。治金瘡折傷。益母亦可作煎治折傷。故名爲土貫汗也。（李時珍）㊂爾雅萑雚注云。今莧蘞也。又名益母。劉歆云。雚臭穢也。臭穢卽莧蘞也。陸璣云。雚益母也。故曾子見之。嘗爲之感思云。（掌禹錫）㊃莧蘞初春生時。亦可浸洗。淘去苦水。煮作菜食。凌冬不凋悴也。（寇宗奭）㊄莧蘞近水澄處甚繁。春初生苗。如嫩蒿。入夏長三四尺。莖方如黃麻莖。其葉如艾葉而背青。一梗三葉。葉有尖歧。寸許一節。節生穗。叢簇抱莖。四五月間。穗內開小花。紅紫色。亦有微白色。每蓼內有細子四粒。粒大如同蒿子。有三稜。褐色。藥肆往往以作巨勝子貨之。其草生時有臭氣。夏至後卽枯。其根白色。蘇頌圖經謂其葉似荏。其子黑色似雞冠子。九月採實。寇宗奭衍義謂其凌寒不凋者。皆誤傳也。此草有白花紫花二種。然莖葉子穗皆一樣也。但白者能入氣分。紅者能入血分。別而用之可也。按閩閤事宜云。白花者爲益母。紫花者爲野天麻。返魂丹註云。紫花者爲益母。白花者不是。陳藏器本草云。莧蘞生田野間。人呼爲臭麻。天麻生平澤。似馬鞭草。節節生紫花。花中有子。如青葙子。孫思邈千金方云。天麻草莖如火麻。冬生苗。夏着赤花。如鼠尾花。此皆似以莧蘞天麻爲二物。蓋不知其是一物二種。凡物花皆有赤白。如牡丹芍藥。菊花之類是矣。又按郭璞爾雅注云。雚音推。卽莧蘞。又名益母。葉似荏。白華生節間。又云。蘠音推。方莖藥長而銳。有穗。穗間有花。縹色。可以爲飲。江東呼爲牛蘠。據此則是雚蘠名本相同。但以花色分別之。其爲一物無疑矣。宋人重修本草。以天麻草誤註天麻。尤爲謬矣。陳藏器本草又有蘞菜云。生江南陰地。似益母。方莖對節。白花。主產後血病。此卽莧蘞之白花者。故其功主血病亦相同。（李時珍）

【益母草子】　原名　莧蘞子。

基本　屬唇形科。爲莧蘞之子實。

採取　九月間採收子實。曬乾。

製法　李時珍曰。凡使益母草丸用子。微炒香。亦或蒸熟。烈日曝燥。舂簸去殼。取仁用。

性質　辛。甘。微溫。無毒。

效能　活血調經。逐風明目。用作通經收斂藥。

主治　明目益精。除水氣。久服輕身。（本經）療血逆。大熱頭痛心煩。（別錄）

歷代記述攷證　【宋】大明曰。華諸家本草論莧蘞子曰。治產後血脹。【元】吳瑞日用本草論莧蘞子曰。舂仁生食。補中益氣。通血脈。填精髓。止渴潤肺。【明】李時珍本草綱目論莧蘞子曰。治風解熱。順氣活血。養肝益心。安魂。調女人經脈。崩中帶下。產後胎前諸疾。久服令人有子。【明】繆希雍本草經疏論莧蘞子曰。莧蘞子味辛甘微溫。微寒無毒。入手足厥陰經。爲婦人胎產調經之要藥。此藥補而能行。辛散而兼潤者也。目者肝之竅也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

益肝行血。故明目益精。其氣純陽。辛走而不守。故除水氣。肝臟有火則血逆。肝涼則降而順矣。大熱頭痛心煩。皆血虛而熱之候也。清肝散熱和血。則頭疼心煩俱解。【清】葉天士本草經解論莞蔚子曰。莞蔚子氣微溫。稟天初春之木氣。入足厥陰肝經。味辛甘無毒。得地金土之味。入手太陰肺經。足太陰脾經。氣味俱升陽也。肝爲藏血之臟。脾爲統血之臟。辛甘益血。目得血則能視。所以明目。脾者陰氣之原也。肺者津液之原也。甘辛能潤。所以益精。脾者爲胃行津液者也。肺者相傳之官。通調水道者也。辛甘益脾肺。則津液行而中道通。所以除水氣。久服益肝脾肺。肺主周身之氣。脾主周身之血。肝爲生生之臟。以生氣血。氣血生生長旺。自然身輕矣。【清】陳修園本草經讀論莞蔚子曰。本經莞蔚子主治。無一字言及婦人經產之病。其云微溫者。得春木之氣也。味辛者。得秋金之味也。木有制則其性和。性和則有輕身之效。經所謂風能生物。是也。其云明目者。以肝開竅於目也。其云益精者。以精生於飲食之菁華。先散於肝而後藏之於腎也。葉主癮疹痒者。以洗浴能去肌表之風也。凡產後微微發熱。是外感微風。此物甚爲對症。若重症則不足恃。況症重藥輕。病將日深。終至敗壞而莫挽。今人奉爲女科崇藥。貽誤滋多。且其獨具之長反掩矣。

近人學說　張山雷曰。莞蔚古人止用其子。本經之明目益精。則溫和養血而又洩重直達下焦。故爲補益腎陰之用。除水氣者。辛溫下降。故能通絡而逐水。其莖可浴瘡痒。則活血疏風之功也。別錄加以微寒。則亦溫亦寒。大是不妥。豈當時以治熱證。因而羼入此說。療血逆者。溫和行血。又子能重墜下降。故能平逆。惟主大熱頭痛心煩。則與溫養之性不符。存而不論可也。又曰。莞蔚古用其子。今用莖葉。氣烈味濃。功專活血行血。今三吳之俗。以爲產後唯一之要藥。無人不服。又主經行不利。腹痛瘕脹。皆有捷驗。其稟溫和之性。亦可概見。而又治癰腫瘡瘍。內飲其汁。外敷其滓。則頗似涼血解毒。不知生搗取汁。其性已與煎服微有不同。而辛溫之氣。宣通血絡。自然散毒消腫。其子其莖。皆具溫通之性。但子則沈重下降。守而不走。故能補腎益精。明目。莖葉則扶疏旁達。走而不守。故能活血流氣。通調經絡。凡草木之枝葉花實。性質各有不同。皆即此義。若白花紅花之異。則一類二種。形式臭味。皆無二致。其用亦同。或謂紅者主血分。白者主氣分。則皮相之見也。

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡非血滯血熱及瞳神散大者禁用。忌鐵。

【益母草苗】　原名　蟹棗。

性質　辛平無毒。

主治　破血。產後腹痛。煮汁服。

參攷資料　㊀蟹棗生江南陰地。似益母。方莖對節。白花。（陳藏器）㊁此即益母之白花者。乃爾雅所謂蘿是也。其紫花者。爾雅所謂蘩是也。蘿蘩皆同一音。乃一物二種。故此條亦主血病。與益母功同。郭璞獨指白花者爲益母。皆殷地方言。不必泥也。（李時珍）

【益志】　即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【益志子】　即益智仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益智仁』條。

【益決草】　產地　生山陰間。

形態　益決草爲雜草類之一種。根如細辛。可供藥用。

性質　辛。溫無毒。

主治　咳久肺傷。

【益明】　㊀即益母草之古籍別名。典見本經。詳『益母草』條。㊁即地膚子之古籍別名。典見藥性。詳『地膚子』條。

【益智】　即龍眼之古籍別名。典見別錄。詳『龍眼』條。

【益智仁】　命名　脾主智。此味能益脾胃。故名。

古籍別名　英華庫。益志子。（和漢藥考）

基本　爲屬於薑荷科之植物。其子實即名益智。

產地　㊀陳藏器云。凡嶌嶺國及交趾。今嶺南州郡及馬剌拔爾地方。恒多產焉。㊁陳仁山藥物生可食。故謂之菜寇宗奭言莞蔚苗可煮食。正合此也。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產辨云。產瓊崖十三屬。以陵水爲上等。五六月新。

形態　益智葉似冀荷。長丈餘。其根上有小枝。高八九寸。莖如竹筍。二月花連著實。五六月熟。其子如筆頭。而頭尖長七八分。但今益智子。形如棗核。而其皮及仁。皆似草豆蔻也。但係覆果。大於縮砂。形長圓。色暗黑。頂端有小嘴。其下則有果梗。中藏細小種子。色紅褐。作多角形。氣芳香。略似沒藥。

採取　每年六七月間採實陰乾。

製法　米氏集驗方曰。凡使益智仁。去殼用鹽水炒。

性質　辛。溫。無毒。

成分　含有比重〇一九二至〇一九四之右旋性發揮油。自百分之三至百分之五。脂肪油百分之一。澱粉百分之三。

效能　煖腎縮小便。溫脾止洩瀉。用作健胃消化藥。又用以治遺精、小便餘瀝、及夜中尿多諸症藥。

主治　遺精虛漏。小便餘瀝。益氣安神。補不足。利三焦。調諸氣。夜多小便者。取二十四枚。碎。入鹽同煎服。有奇驗。

歷代記述攷證　【元】王好古湯液本草論益智曰。益脾胃。理元氣。補腎虛滑瀝。【元】李東垣用藥法象論益智曰。客寒犯胃。和中益氣。及人多唾。【明】李時珍本草綱目論益智曰。冷氣腹痛。及心氣不足。夢洩赤濁。熱傷心系。吐血血崩諸證。【明】繆希雍本草經疏論益智曰。益智子。仁味辛。其氣溫。其性無毒。入足太陰足少陰經。惟辛故所以散結。惟溫故所以通行。其氣芳香。故主入脾。其稟火土與金。故燥而收斂。以其斂攝。故治遺精虛漏。及小便餘瀝。此皆腎氣不固之證也。腎主納氣。虛則不能納矣。又主五液。涎乃脾之所統。脾腎氣虛。二臟失職。是腎不能納。脾不能攝。故主氣逆上浮。涎穢泛濫而上溢也。斂攝脾腎之氣。則逆氣歸元。涎穢下行。宜東垣用以治客寒犯胃。和中益氣。及人多唾。王好古謂益智本脾家藥。主君相二火。故用以益脾胃。理元氣。補腎虛滑瀝。劉河間又謂益智辛熱。能開發鬱結。使氣宣通。皆以其香可入脾開鬱。辛能散結。復能潤下。於開通結滯之中。復有收斂之義故也。【清】黃宮繡本草求眞。論益智曰。益智氣味辛熱。功尚燥脾溫胃。及斂脾腎氣逆。藏納歸源。故又號爲補心補命之劑。是以胃冷而見涎唾。則用此以收斂。脾虛而見不食。則用此溫理。腎氣不溫。而見小便不縮。則用此鹽炒。與烏藥等分爲末。酒煮山藥粉爲丸。鹽湯下。名縮泉丸以投。與夫心腎不足。而見夢遺崩帶。則用此以爲祕精固氣。若因熱成氣虛。而見崩濁夢遺等症者。則非所宜。此雖類於縮砂蜜。同爲溫胃。但縮砂蜜多有快滯之功。此則止有逐冷之力。不可不分別而審用耳。出嶺南。形如棗核者。【清】閻立陞本草選。旨論益智曰。益智味辛。微澀無毒。入手足太陰經。治心腎脾肺和中。煖胃之藥也。故凡嘔吐自利。飲食少進。脾胃受寒之故也。遺精虛漏。淋帶赤白。胃氣虛冷之故也。三焦衰弱。涕唾稠黏。肺氣淹滯之故也。惟用益智之辛溫。開發以宣暢而通理焉。使寒者溫之。虛者補之。滯者泄之。滯者和之。則君相之火以調。脾肺之氣以健。是四經之藥也。然好古有言。益智本脾藥。在集香丸則入肺。在四君子湯則入脾。在風髓膏則入腎。三經互用。有子母相關之義。當於補中兼用之故。今人於進食劑中。用補心腎氣藥用。又方治應多小便者。取三十四枝。碎入鹽同煮服。有奇驗。其必有道矣。亦勿多服。

國外學說　日本學說謂益智漢醫用爲健胃消化藥。益智有一種芳香。是由揮發油而來者。此油在種子中。其成分含有一種「ステアロプテン」在藥局方上僅供製劑之用。如於複方丁幾類中。爲芳香性附加物而已。（又扶氏藥物學）Cardamomum. 從前譯作益智。其入藥之仁。名曰 Fructus cardamomum, Matson. 又名馬剌拔爾加他摩斯。此物產於馬剌拔爾之海岸。約在二千五百至五千尺高處。錫蘭亦有之。果實爲三稜長圓形。呈淡褐色。長一二仙米。徑一仙米許。具有雜亂之稜線與皺襞。蘚殼中包藏種子。約二十粒。香味特異。酷似樟腦。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

含有比重〇・九二至〇・九四之右旋性揮發油自三%至五%。脂肪油一%澱粉三%。三四兩次改正之日本藥局方內特收入此藥定名爲小豆蔻 Fructus Cardamomi (Ectteria cardamomum, White et Maron.) 大抵係採收稔熟之蒴果而乾燥之。顆粒作淡黃色長一二仙米。粗約一仙米有鈍稜三條。且有縱脈。頂端有小嘴。內分三房。各房俱藏縱列之種子約七粒。種子色褐。呈不整齊之有角性。且帶皺紋而覆以無色菲薄之衣。種子在囊殼中時。含有極芳香之分泌物。至果殼則無甚氣味。又和漢藥考曰。益智原名 Cardamomum。爲香味藥。多產於東印度地方。種類頗夥。益智縮砂草果等皆屬之。初版日本藥局方中收入縮砂 Fructus Cardamomi。嘗記其基本植物名與其形狀。至第三四版。特更名爲小豆蔻。亦記其基本形狀等。故此 Cardamomum 之譯名。與其基本植物。當定名時。煞費苦心也。又有譯作小益智、白豆蔻、草果等名者。

近人學說 張山雷曰。益智始見於藏器本草拾遺。謂之辛溫不言其澁。但諸家所述主治。無一非溫澁功用。藏器謂主遺精虛漏。小便餘瀝。夜多小便者。以二十四枚碎之。入鹽同煎服。有奇效。東垣謂治客寒犯胃。和中益氣。及人多唾。（石頑謂胃虛多唾。蓋胃氣虛寒。而厭泉不攝。涎唾自流。此藥溫胃而澁。最有捷效。）海藏謂益脾胃。理元氣。補腎虛滑瀝。皆溫補脾腎。而尤以固澁爲主。瀕湖謂其大辛。行陽退陰。三焦命門氣弱者宜之。（此氣弱以元陽之氣而言。）李氏集驗方縮泉丸（益智子鹽炒烏藥等分。酒煮山藥粉爲丸）治脬氣不足。小便頻數。及老年陽虛遺瀝皆效。楊仁齋直指方云。心者脾之母。進食不止於和脾。火能生土。當使心藥入脾胃藥中。庶幾相得。古人進食藥中。多用益智。土中益火也。頃案此爲脾陽虛餒。而不思食者立法。脾土喜溫而惡寒。喜燥而惡溼。寒溼困之。則健運力乏。而不思納穀。且食亦無味。此惟溫煦以助陽和。而斡旋大氣。則能進食。益智醒脾。益胃。固亦與砂仁豆蔻等。一以貫之。仁齋說到益火生土上去。附會心經之藥。尚是舍近求遠。故意深言之。亦殊不必。瀕湖又謂治心氣不足。夢洩赤濁。則以腎陽無權。滑泄不禁者立論。故可用此溫澁一法。然遺濁之虛寒症絕少。石頑謂因於熱者。色黃乾結。不可誤用。極是。瀕湖又謂治熱傷心系。吐血血崩諸證。則既是熱傷。而反用此大辛大熱之藥。何其背謬一至於此。要知洪氏夷堅志所載。吐血不止。驚顫狂躁一條。用益智等藥而愈者。本是小說家言。何可徵信。按之病理。寧不矛盾。而乃採入綱目。且因之而創爲專治熱傷之吐血。亦可謂好奇太過矣。

配合應用 ㈠佐人參、茯苓、半夏、橘皮、車前子。則攝涎磩立效。㈡同藿香、蘇子、橘皮、枇杷葉、木瓜。止逆氣上痙。㈢同五味子、山萸肉、炒鹽、人參。治小便頻數淋瀝。㈣同人參、乾薑、橘皮、藿香。治因寒犯胃。作嘔吐。㈤小便頻數。脬氣不足也。雷州益智子。鹽炒。去鹽。天台烏藥等分。爲末。酒煮山藥粉糊爲丸。如梧子大。每服七十丸。空心鹽湯下。（名縮泉丸。朱氏集效方）㈥心虛尿滑。及赤白二濁。益智子仁、白茯苓、白朮等分。爲末。每服三錢。白湯調下。㈦白濁腹滿。不拘男婦。用益智仁。鹽水浸炒。厚朴薑汁炒。等分。薑三片。棗一枚。水煎服。（永類鈐方）㈧小便赤濁。益智仁、茯神各二兩。遠志、甘草水煮各半斤。爲末。酒糊丸。梧子大。空心薑湯下五十丸。㈨腹脹忽瀉。日夜不止。諸藥不效。此氣脫也。用益智子仁二兩。濃煎飲之立愈。（危氏得效方）㈩婦人崩中。益智子炒磩細。米飲入鹽服一錢。（產寶方）(一)香口脾臭。益智子仁一兩。甘草二錢。磩粉延之。（經驗良方）(二)漏胎下血。益智仁半兩。縮砂仁一兩。爲末。每服三錢。空心白湯下。日二服。（胡氏濟陰方）

用量 一錢至三錢。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

施用宜忌 益智芳香。性本溫熱。證屬燥熱。病人有火者。皆當忌之。故凡嘔吐由於熱而不因於寒者。氣逆由於怒而不由於虛者。小便餘瀝。由於水涸精虧者。內熱而不由於腎氣者。虛寒泄瀉。由於濕火暴注而不由於氣虛腸滑者。並禁用。

參攷資料 ㊀按洪邁夷堅志云。秀川進士陸迎。忽得吐血不止。氣厥驚顫。狂躁直視。至深夜。欲投戶而出。如是兩夕。徧用方藥弗瘳。夜夢觀音授一方。命但服一料。永除病根。夢覺記之。如方治藥。其病果愈。其方用益智子仁一兩。生硃砂二錢。青橘皮五錢。麝香一錢。碾爲細末。每服一錢。空心燈芯湯下。(李時珍)㊁脾主智。此物能益脾胃。故也。與龍眼名皆智義同。按蘇軾記云。海南產益智。花實皆長穗而分爲三節。觀其上中下節。以候早中晚禾之豐凶。大豐則皆實。大凶皆不實。罕有三節並熟者。其爲藥只治水而無益於智。其得此名。豈以其知歲耶。此亦一說也。終近穿鑿。(李時珍)㊂顧微廣州記云。其葉似夔荷。長丈餘。其根上有小枝。高八九寸。無華萼。莖如竹箭。子從心出。一枝有十子。叢生。大如小棗。其中核黑而皮白。核小者佳。含之攝涎穢。或四破去核。取外皮蜜煲爲粽食。味辛。晉盧循遺劉裕益智粽是此也。(陳藏器)㊃益智子似連翹子頭。未開者苗葉花根與豆蔻無別。惟子小爾。(蘇恭)㊄按蜀舍南方草木狀云。益智二月花。連着實。五六月熟。其子如筆頭而兩頭尖。長七八分。雜五味中。飲酒芬芳。亦可鹽曝及作粽食。觀此則顧微言其無華者誤矣。今之益智子。形如棗核。而皮及仁皆似草豆蔻云。(李時珍)

【益孀草】產地 出浙江永嘉縣。

形態 益孀草爲芳香草類之一種。葉如澤蘭。莖赤。高二三尺。可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 五痔脫肛。止血。炙香浸酒服。

【盍旦】 卽寒號蟲之古籍別名。典見綱目。詳『五靈脂』條。

【盍合子】 卽預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『預知子』條。

【眞川柏】 卽黃柏之處方用名。詳『黃柏』條。

【眞川連】 卽黃連之處方用名。詳『黃連』條。

【眞水仙】 卽水仙之古籍別名。典見蠹齋芳譜。詳『水仙』條。

【眞朱】 卽硃砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硃砂』條。

【眞芋】 卽芋子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『芋子』條。

【眞京膽】 卽天南星之處方用名。詳『天南星』條。

【眞阿膠】 卽阿膠之處方用名。詳『阿膠』條。

【眞青黛】 卽青黛之處方用名。詳『青黛』條。

【眞珍珠】 卽眞珠之處方用名。詳『眞珠』條。

【眞風斗】 卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【眞桑瓜】 卽甜瓜之日本名。詳『甜瓜』條。

【眞海決】 卽石決明之處方用名。詳『石決明』條。

【眞珠】 處方用名 眞珠。珠粉。湖壖珠。壖珠粉。壖珠。奎璧珠。細壖珠。中壖珠。珍珠母。

古籍別名 珍珠。(開寶)蚌珠。(南方志)蠙珠。(禹貢)走珠。明月珠。神胎。蜃尼。滑珠。鮫珠。蚌胎。鼈珠。蠣珠。西洋珠。北海珠。南海珠。李藏珠。走盤珠。南蕃珠。惡思佛。(和漢藥考)馬價珠。(格古論)

外國名詞 Magaritae. (拉丁) Pearl. (英) Peridohne. (德)

基本 係貝類之甕。內面生一種病之分泌物。就中以雙殼類中屬於異柱類之眞珠介所產最爲著名。

產地 陳仁山藥物生產辨云。珍珠產區衆廣。原日以廣東廉州、合浦產者正地道。奈近日少出。俱以南洋蘇祿爲上等。印度更多出。架喇吉打、嗢咪兩埠爲聚處。由此運來。和漢藥考曰。眞珠產於印度、巴西、墨西哥、阿剌伯、澳洲、日本各處之海灣中。國亦有之。

形態 眞珠介一名珠母。以其

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

殼之外面。黏附於深二丈至六丈之海中岩礁上而產生。介殼似帆立貝。大自三寸至六七寸。形扁平。上緣直。如切下。緣作半圓形。外現茶褐色。或帶紫色。如牡蠣殼。邊緣極薄。內面有眞珠狀光澤。殊美麗。其肉可食。此貝雖有足而不能匍匐。故殼外叢生無數似絲之毛。以是牢附岩石。其毛長一二寸至六七寸。色黑綠。有光澤。老介中偶產有極貴重之眞珠。尙有雙殼類中屬於同柱類之蚌。則潛生於潮沼池澤等淡水之底。介殼稍呈橢圓形。長二寸至四寸。廣三寸至七寸許。外黑似漆。內面有眞珠狀光澤。中產眞珠。土人浮小舟。以趕網搖取之。檢視其殼內有無眞珠。其肉可充肥料。眞珠介及蚌貝等物。當在水中生存之時。偶有微細之生物或砂粒等竄入殼中。外套膜受其刺戟。殊覺不適。遂分泌眞珠質。(與殼內有光輝之物質相同。)被覆而保護己體。因此眞珠者。實一種病之物質也。試檢查眞珠。其中心必皆存有砂粒。砂粒之外。則係無數之薄層疊積而成。卽知非虛妄矣。現今東西各國。盛行飼養珠母之法。於其外套膜間。投入砂粒。放養數年。自然產生眞珠。遂採收而貨賣之。蚌貝所產之眞珠。較珠母略大。然用眞珠養成術者。其光澤不及珠母之珠。惟介殼類之種族、原因、位置、種種不同。故產生之眞珠。其形狀大小、色澤亦異。形狀有球圓、長圓之別。最小如芥子。最大若大豆。色澤有白、藍、黃、黑、褐諸種。質堅。微透映。有如銀之光澤。放美麗之光。重量自一毫至三分餘。要之不論大小。概以正圓形者爲上品。光澤以產於海水者爲佳。淡水產次之。

採取　五月至九月間採之。

製法　李珣曰。凡使珍珠。須要新完未經鑽綴者。研如粉。方堪服食。不細則傷人臟腑。雷敩曰。凡用以新者絹袋盛之。置牡蠣四兩於平底鑊中。以物四向支穩。然後著珠於上。乃下地榆五花皮五方草各剉四兩。籠住。以漿水不住火煮三日三夜。取出。用甘草湯淘淨。於臼中搗細。重篩。更研二萬下。方可服食。愼微曰。抱朴子云。眞珠徑寸以上。服食令人長生。以酪醬漬之。皆化如水銀。以浮石、蜂巢、蛇黃等物合之。可引長三四尺。爲丸服之。李時珍曰。凡入藥不用首飾及見尸氣者。以人乳浸三日。煮過。如上搗研。一法。以絹袋盛。入豆腐腹中。煮一炷香。云不傷珠也。

用法　恒以剉末和作丸散。

性質　鹹。甘。寒。無毒。

成分　眞珠主要之成分。爲炭酸鈣 $CaCO_3$。東京化學會誌會載有眞珠之成分。錄之如左。眞珠如不碎之爲粉。醋酸便不溶解。其成分爲炭酸鈣九一・七二。動物質植物質五・九四。水二・二三。與存在全母貝殼中之量不同。

效能　瀉熱。滋陽。安神。定驚。膾瞖。明目。或專作眼科藥。又作解熱解毒藥。

主治　鎭心點目。去膚瞖障翳。塗面令人潤澤。好顏色。塗手足去皮膚逆皵。綿裹塞耳主聾。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論眞珠曰。磨瞖除瘀。【唐】李珣海藥本草論眞珠曰。除面黯。止洩。合知母療煩熱消渴。合左經根治小兒瘈瘲入眼。【宋】寇宗奭本草衍義論眞珠曰。除小兒驚熱。【明】李時珍本草綱目論眞珠曰。安魂魄。止遺精。白濁。解痘疔毒。主難產。下死胎。胞衣。【明】繆希雍本草經疏論眞珠曰。珠藏於澤則川自媚。況塗面寧不令人潤澤好顏色乎。凡小兒驚熱風癎爲必須之藥。【淸】黃宮繡本草求眞論眞珠曰。珍珠。卽蚌所生之珠也。珠稟太陰精氣而成。故中秋無月。則蚌卽無珠也。此藥偽楚瞻辨論最詳。謂其功用多入陰經。其色光明。其體堅硬。大小無定。要以新完未經鑽綴者爲尙。味甘微鹹。氣寒無毒。入手少陰心經。足厥陰肝經。蓋心虛有熱。則神氣浮遊。肝虛有熱。則目生翳障。除二經之熱。故能鎭心明目也。主驚本屬腎虛有熱。甘寒所以主之。逆厥者。尿脹也。胸腹氣逆脹滿。以及手足皮膚皆腫也。經曰。諸溼腫滿。皆屬脾土。諸滿脹大。皆屬於熱。此脾虛有熱。兼有積滯所致。珍珠味甘。既能益脾。寒能除熱。體堅。復能磨積消滯。故亦主之。至於疔毒癰腫。長肉生肌。尤臻奇

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

效。但體最堅硬。研如飛麵。方堪服食。否則傷人臟腑。外摻肌肉作疼。蚌蛤無陰陽牝牡。須雀化成。故珠喘一於陰精也。

國外學說 日本和漢藥考曰。眞珠藥用者少。裝飾者爲多。其新光正圓且巨大者。世人莫不珍之。若小而不整。或暗且帶色。則價值大有等差。必裝飾不適用者。方肯入藥。如大村眞珠、伊勢眞珠、志摩眞珠、尾張眞珠、水戶眞珠、蛤仔眞珠、石決明眞珠等。皆供藥料者也。又眞珠自來多僞造品。因除藥用外。且作裝飾品。故奇貨可居也。如法、意等國。俱以玻璃、蠟、魚眼等。仿造其原形。外以淡水產之魚鱗。研成粉末。塗之。製作之巧。誠足驚人。驟視之。竟與眞珠無別也。又以眞珠製成細末。（眞珠質堅。欲研粉末。必先加熱。然熱之過度。仍難成粉末。故相傳搗碎研粉。俞爲穩妥之舊法也。）有種種之法。將眞珠入土器。加大豆四五粒。土器加蓋。爐上熱之。至大豆膨脹爲度。將珠取出。或入米泔水蓋煮至微鳴取出。搗碎。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。珍珠僞名藥珠。每用上海假珠。或廣東料珠僞充。若研爲粉。更難辨識。古方外症多用。湯藥罕用。近人湯劑喜用蘇珞珠。又豈料爲假珠所欺誰乎。用者愼之。㊁曹炳章曰。按范成大蟲魚志云。珍珠出合浦海中有珠池。蜑戶投水採蚌取之。相傳海底有處所如城郭。大蚌居其中。有怪物守之。不可近。蚌之細碎墓延於外者。始得而採之。嶺表錄異云。珠池在廉州邊海中。有洲島。島上有大池。謂之珠池。每年刺史親監珠戶入池採珠。以充貢賦。皆採老蚌取而剖珠。池在海上。其底與海通。其水乃淡。深不可測也。土人採小蚌肉作脯食。亦往往得細珠如粟。（即今之廉珠也）乃知珠池之蚌。隨其大小。悉胎中皆有珠矣。而今之取珠蚌者。云得之海邊。不得於池中也。其北海珠蚌種類小。土人取其肉。或有得珠者。色黃白不甚光瑩。（或即今之粟珠也）蚌中又有一種江瑤者。腹亦有珠。皆不及南海者奇。而且多。寇宗奭曰。河北塘濼中亦有珠。圓及寸者。色多微紅。珠母與廉州者亦不相類。但清水急流處。其色光白。濁水及不流處。其色暗也。熊太古冀越集云。禹貢言淮夷蠙珠。後世乃出嶺南。今南珠色紅。西洋珠色白。北海珠色微青。各隨方色也。予嘗見蜑人入海取得珠子。樹數株。狀如柳枝。蚌生於樹。不可上下。樹生於石。蜑人鑿石得樹以求蚌。甚可異也。南越志云。珠有九品。以五分至一寸八九分者爲大品。有光彩。一邊似鍍金者名璫珠。次則走珠、滑珠等品也。格古論云。南番珠色白圓耀者爲上。廣西者次之。北海珠（即藥珠）色微青者爲上。粉白油黃者下也。西番馬價珠爲上。色青如翠。其老色夾石粉青油烟者下也。凡蚌聞雷則癡瘦。其孕珠如懷孕。故謂之珠胎。中秋無月。則蚌無胎。左思賦云。蚌蛤珠胎。與月盈虧是矣。陸佃云。蚌蛤無陰陽牝牡。須雀蛤化成。故能生珠。專一於陰精也。龍珠在領。蛇珠在口。魚珠在眼。鮫珠在皮。鼈珠在足。蛛珠在腹。皆不及蚌珠也。據近時市上所通用。最上者爲濂珠。即廉州合浦縣珠池所產。粒細如粟。如粟色白光滑有寶光。其次曰粟珠。種類甚多。即北海所產。色白黃有神光者亦佳。惟色黑質鬆者爲最次。不入藥用。

配合應用 ㊀治小兒驚癇風熱。大人失志癲狂。用眞珠粉、丹砂、牛黃、犀角、天竺黃、茯神、遠志、鈎藤鈎、琥珀、金箔。

㊁治目生腎障。眞珠、爐甘石、龍腦香、白硼砂、空青、人爪、點目。

㊂治廣瘡結毒。及陰蝕瘡。眞珠粉、鍾乳石、象牙末、牛黃、冰片、白礬、輕粉、紅鉛、天靈蓋、蛀竹屑、樺皮灰、沒藥、明礬。

㊃治口瘡。珠粉、人中白、黃檗、青黛、硼砂、和冰片少許。治下瘡。加入雞內金膩粉。

㊄安魂定魄。眞珠末豆大一粒。蜜一蜆殼和服。日三。於小兒尤宜。（肘後方）

㊅治卒忤不言。眞珠末。用雞冠血和丸。小豆大。以三四粒納口中。（肘後方）

㊆治灰塵迷目。用大珠拭之則明也。（格古論方）

㊇治婦人難產。眞珠末一兩。酒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

服立出。(千金方)

(九)治胞衣不下。眞珠一兩。研末。苦酒服。(千金方)

(十)治子死腹中。眞珠末二兩。酒服立出。(外臺祕要方)

(十一)治瘢痘不發。珠子七枚爲末。新汲水調服。(儒門事親方)

(十二)治肝虛目暗。茫茫不見。眞珠末一兩。白蜜二合。鯉魚膽二枚。和合銅器煎至一半。新綿濾過。瓶盛。頻點取瘥。亦治青盲不見。(聖惠方)

(十三)治小兒中風。手足拘急。眞珠末水飛一兩。石燕末一錢。每服一錢。水七分。煎四分。溫服。日三。(聖惠方)

(十四)治目生翳膜。眞珠一兩。地榆二兩。水二大盌。煮乾。取眞珠以醋浸五日。熱水淘去醋氣。研細末用。每點少許。以愈爲度。

用量 五釐至一分。

施用宜忌 凡無實火鬱熱者禁用。

參攷資料 (一)河北漳澤中亦有圓及寸者。色多微紅。珠母與廉州者不相類。但清水急流處其色光白。濁水及不流處其色灰暗也。(寇宗奭)(二)按廉州志云。合浦縣海中有梅青墾三池。蜑人每以長繩繫腰。攜籃入水。拾蚌入籃。即振繩令舟人急取之。若有一線之血浮水。則葬魚腹矣。又熊太古冀越集云。禹貢言淮夷蠙珠。後世乃出嶺南。今南珠色紅。西洋珠色白。北海珠色微青。各隨方色也。予嘗見蜑人入海。取得珠子。樹數攜。其樹狀如柳枝。蚌生於樹。不可上下。樹生於石。蜑人鑿石得樹。以求蚌。甚可異也。(李時珍)

【眞珠】卽硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『硃砂』條。

【眞珠母】卽蚌殼之處方用名。詳『蚌殼』條。

【眞珠花】卽蒴藋之別名。詳『蒴藋』條。

【眞珠草】古籍別名 陰陽草。

假油柑(綱目拾遺)

產地 生野道旁及牆垣間。

形態 眞珠草爲澀草類之一種。葉似桃而狹小。晝開夜閉。葉背生小珠如鳳仙子。蘂黃直。綴經霜輒紅。高三四寸。可供藥用。

主治 小兒百病。及諸疳瘦弱。眼欲盲。皆效。爲末。白湯下。或蒸煮魚肉食。

【眞珠菜】**性質** 甘。潤。無毒。

主治 利水。通淋結。消腹脹。下氣。癃閉。

參攷資料 六安有眞珠菜如眞珠。又盒部方物略記。眞珠菜戎瀘等州有之。生水中石上。翠纓纖莖。首貫珠。蜀人以蜜煑食之。或以醯煮。可致千里不壞。又黃山志。眞珠菜藤本。莖生暮春。發芽。每芽端綴一二蘆。圓白如珠。葉翠綠如茶。連蘆瞎之。香甘鮮滑。他蔬讓其美。(趙恕軒)

【眞珠黃】卽石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【眞菊】卽茶菊之古籍別名。典見蓼芳譜。詳『茶菊』條。

【眞荣】卽雲薑子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雲薑子』條。

【眞寧豆】**命名** 本品卽豆之產於甘肅省舊慶陽府眞寧地方者。故名。

性質 甘。平。無毒。

主治 解諸藥毒。

【眞檀】卽檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『檀香』條。

【眞蟲草】日本名蓼麻爲眞蟲草。詳『蓼麻』條。

【眞薰香】卽薰香之處方用名。詳『薰香』條。

【皴皯】卽拔葜之古籍別名。典見綱目。詳『拔葜』條。

【砭石】卽羊肝石之原名。詳『羊肝石』條。

【砧凰】卽螺蛤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『螺蛤』條。

【砭石】**命名** 本品石鋒。古以代針刺病之石。故名。

古籍別名 鍼石(綱目)

主治 刺百病癰腫。

參攷資料 按東山經。云高氏之山。鳧麗之山。皆多鐵石。郭璞注云。可爲砭鍼也。素問異法方。且論云。東方之域。魚鹽之地。海濱傍水。其病爲癘瘍。其治宜砭石。故砭石亦從東方來。王冰注云。砭石如玉。可以爲鍼。蓋古者以石爲鍼。李世以鍼代石。今人又以瓷鍼刺病。亦砭之遺意也。但砭石無識者。豈卽石弩之屬爲之與。(李時珍)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【硇砂石】卽井泉石之別名。詳『井泉石』條。

【破布】產地 出廣東高要、陽江、陽春、思平諸地。

基本 破布爲雜木類之一種。其葉狀如掌而色綠。可供藥用。

主治 解夢香毒。能醒迷。

參攷資料 嶺南險地。舟人多以胡蔓草合香焚之。人卽迷悶。名爲夢香。以此煎服。立解。故有身無破布葉。莫上夢香船之曲。（綱目拾遺）

【破地錐】卽菜菔之古籍別名。見王禎農書。詳『菜菔』條。

【破門】卽大黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大黃』條。

【破故芷】卽補骨脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『補骨脂』條。

【破故紙】卽補骨脂之處方用名。詳『補骨脂』條。

【破軍殺】卽大戟之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大戟』條。

【破胸槌】卽枳實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳實』條。

【破雪】卽萯荢子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萯荢子』條。

【破菅草】卽雀麥之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雀麥』條。

【破銅錢】卽蘋之古籍別名。典見綱目。詳『蘋』條。

【破關草】卽雀麥之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雀麥』條。

【破關符】卽蓬莪朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬莪朮』條。

【祕惡】古籍別名 杜蓬（別錄）

基本 祕惡爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 酸。無毒。

主治 肝經邪氣。

【祝鳩】卽斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳『斑鳩』條。

【神丹】基本 神丹爲石類之一種。可供藥用。

性質 辛。溫。有小毒。

主治 百病寒熱。

【神木】卽茯神木之簡稱。詳『茯神木』條。

【神水】㊀卽口津之古籍別名。典見綱目。詳『口津』條。㊁卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。㊂卽五月五日剖取新竹中之水。其功用詳『竹精』條。

【神火】製法 取神火法。用劈砂一斤。帶水研細。以淺水沖之。面上有浮起細沫一層。用荊川紙拖水面。其沫卽黏著紙上。將紙曬乾。掃下。卽神火也。其砂澄清去水再研。再沖。見有浮起之沫。依前法拖曬。如此六七次。直至無浮沫方止。每砂一斤。約可取神火八九。用烏金紙包收貯。

效能 拔毒收口。

主治 凡癰疽毒瘡。難收口者。以神火少許。鷄翎掃攝。掃藥上貼。毒水易乾。瘡口易斂。爲外科聖藥。

【神仙對坐草】古籍別名 蜈蚣草 地蜈蚣（綱目拾遺）

產地 生山野陰濕諸地。及道旁多有之。

形態 神仙對坐草爲濕草類之一種。莖幹蔓生。兩葉相對。色青。形圓似佛耳草。夏開小黃花。每節間着二朶。清明時發苗。高尺許。亦似鷄腸草狀。對節而生。可供藥用。

採取 二三月間採之。陰乾用。

主治 黃疸初起。脫力虛黃。白火丹。反胃噎膈。水腫臌脹。陰症傷寒。及一切疝氣。

【神末砂】卽硃砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『硃砂』條。

【神守】卽鼈甲之古籍別名。典見古今注。詳『鼈甲』條。

【神朴】卽厚樸之處方用名。詳『厚樸』條。

【神芝】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【神屋】卽龜版之古籍別名。典見本經。詳『龜版』條。

【神砂】㊀卽靈砂之古籍別名。典見本草求眞。詳『靈砂』條。㊁卽礪砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礪砂』條。㊂卽硃砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硃砂』條。

【神胎】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【神座砂】卽硃砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『硃砂』條。

【神桃】卽桃梟之古籍別名。詳『桃梟』條。

【神草】㊀卽人參之古籍別名。典見別錄。詳『人參』條。㊁卽天廚之古籍別名。典見吳普本草。詳『天

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

廠』條。

【神馬草】卽海藻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『海藻』條。

【神符白雪】卽鉛霜之古籍別名。典見綱目。詳『鉛霜』條。

【神符樹】卽夜蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『夜蘭』條。

【神黃豆】產地　出雲南西南境地及四川。

形態　神黃豆莢如桃角。形似細竹筒。長可三四寸。搖之有聲。中如竹節。片片相疊。剖之狀如棋子而色白。內有豆粒。色黃光亮。較蠶豆略大。似五倍子。中有線紋。堅實而扁。其出四川者。莢如連翹而略短。內有豆粒。作微紅色。俱可供藥用。

主治　稀痘。解毒。

配合應用　㊀凡痘自胸以上。有痘可無慮。（張璞種痘新書方）

㊁神黃豆用筒瓦火焙去其黑殼。碾末。白水下之。可永除小兒痘毒。服法。以每月初二日。十六日爲期。半歲每服半粒。一歲每服一粒。一歲半每服一粒半。遞至三歲。服三粒。則終身不出矣。或曰按二十四氣服之。以二十四粒爲度。或云水畢閉日服之。（綱目拾遺方）

㊂痘將發未發時。用神黃豆連殼焙炒燥。用豆研細。水服。（珍異藥品方）

㊃痘將出時。用神黃豆。按一歲一粒。剝去外殼并內皮。將瓦焙熱。一半留生。一半芫荽湯調服。毒重者稀。毒輕者更稀。十餘歲者亦不過七粒。倘未曾出痘者。亦如法以水調服之。竟不出痘。宜三月三。五月五。七月七。九月九等日。（寶笈方）

【神貍香】卽靈貓香之古籍別名。典見離騷註。詳『靈貓香』條。

【神箭】卽衝矛之古籍別名。典見廣雅。詳『衝矛』條。

【神膠】卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【神燈火】主治　一切腫毒。癰疽發背。能解毒活血。消腫散瘀。

參攷資料　外科有神燈照法。用硃砂、雄黃俱研。水飛。血竭、沒藥。簪烘去汗各二錢。麝香四分。爲極細末。每用三分。以紅棉紙緊捲撚條。約長七寸。麻油潤透。以火撚著。須令患者坐無風處。將藥條離瘡半寸。自外至內。週圍徐徐照入。火頭向上。藥氣乃入。毒卽隨火解散。自不內侵臟腑。不可太過。恐傷好肉。其瘡微微覺熱。心神卽爽。每日只熏一次。初用三條。每日加一條。加至四五條。勢卽漸減。然後每日減去一條。直熏至紅腫消盡爲度。熏後用後藥。豨薟草新鮮採得者。搗爛。入陳年小粉等分。和起。再加白鹽研細少許。打成稠糊。敷半寸厚。留頭。必須敷過瘡掌三分。方能箍定毒根。瘡口之上。用大蒽葉滾水泡熱。扯開貼之。或青蓋亦可。避風爲妙。自能拔出膿毒。如無鮮草。以如意黃金散代之。集要云。神燈照法。勿用太早。如瘡四五日間。形未成。毒未聚。驟用之。毒必內鬱。反難外出。須用在八九日後。瘡勢已定。毒氣已聚。未成膿腐之時。用此照之。未成者自消。已成者自高。不起發者卽發。不腐潰者卽潰。若毒已潰膿已泄者。不宜用。每日以猪蹄湯淋洗。或蔥頭煎湯洗亦佳。忌發物。（趙恕軒）

【神錦花】卽翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『翠羽草』條。

【神輿草】卽槐牛兒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『槐牛兒』條。

【神麴】命名　昔人用麴多以供藥用。力更勝之。蓋取諸神聚會之日造之。故得神名。

處方用名　六神糘。范志糘。建神糘。神糘。六糘。採芸神糘。焦六糘。炒神糘。

古籍別名　陳麴。（俗名）麥曲。六丁麴。（和漢藥考）

基本　神麴係用白麵和藥汁。如造醬黃法而製成者。

產地　陳仁山藥物生產辨云。神糘原產福建。名曰建麴。但字號名目太多。眞僞難辨。以左字採芸居麴爲通行。其次范志麴。其餘滿

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

地壳麴。但正貨俱無香味。充貨切開必香。凡用此味。菁在消滯解表。究竟用六神麴較穩當也。六神麴方青蒿葉蒼耳子北杏正小荳生皁辣蓼各等分。春爛用粗麥麵埋餅。卽完全六神麴也。

製法 李時珍曰五月五日。或六月六日。或三伏日。用白麵百斤。青蒿自然汁赤小豆末杏仁泥各三升。蒼耳自然汁野蓼自然汁各三升。以配白虎青龍朱雀玄武勾陳螣蛇六神。用汁和麵豆杏仁作餅。麻葉或楮葉包簪。如造醬黃法。待生黃衣曬收之。臨用炒令香入藥。

性質 甘。辛。無毒。

效能 行氣。消食。治瀉痢。化痰涎。用爲消化藥。

主治 化水穀。宿食。癥結。積滯。健脾暖胃。

歷代記述攷證 【金】張元素珍珠囊論神麴曰。養胃氣。治赤白痢。【明】李時珍本草綱目論神麴曰。消食下氣。除痰逆。霍亂。泄痢。腹滿諸疾。其功與麴同。內挫腰痛者。煅過淬酒溫服有效。婦人產後欲回乳者。炒研酒服二錢。日二卽止。甚驗。【清】黃宮繡本草求眞論神麴曰。神麴辛甘氣溫。其物本於白麵杏仁赤小豆青蒿蒼耳紅蓼六味。作餅蒸鬱而成。其性六味爲一。故能散氣調中。溫胃化痰。逐水消滯。小兒補脾。輕平等藥。醫多用此以爲調治。蓋取辛不甚散。甘不甚壅。溫不見燥也。然必合以補脾等藥。並施則佳。若孕婦無積及脾陰不足。胃火旺者。並勿用耳。義與麥芽同也。【清】陳修園本草經讀論神麴曰。凡麴蘗皆主化穀食積。服此便消。或鼻中如聞酒香。藥性所生。主治亦不外此。癥結積聚者。水穀之積久而成也。健脾暖胃者。化水穀之效也。除化水穀之外。並無他長。人人以之常服。且云祛百病。怪甚。考造麴之法。六月六日是六神聚會之日。用白麵百斤。青蒿茶葉野蓼各自然汁三升。杏仁研泥。赤小豆爲末各三升。通化作餅。麻葉或楮葉包簪。如造醬黃法。待生黃衣曬收之。陳久者良。藥用六種。故名六神麴。今人除去六字。只名神麴。任意加至數十味。無非尅破之藥。大傷元氣。且有百草神麴。害人更甚。近日通行福建神麴。其方於六神本方中。去赤小豆。惡其易蛀。加五苓散。平胃散料。及麥芽。穀芽。使君子。檳子。大黃。黃芩。大腹皮。砂仁。白蔻。丁香。木香。藿香。香附。良薑。芍藥。防風。秦艽。羌活。獨活。川芎。蘇葉。荊芥。防己。澤瀉。茯苓。萊菔子。茂仁。木通。茶葉。乾薑。乾葛。枳椇。查肉。檳榔。青皮。木瓜。薄荷。蟬退。桃仁。紅花。三稜。莪朮。鬱金。菖蒲。柴胡。菊花等爲末。製爲方塊。以草窖發黃衣。曬乾。此方雜亂無序。誤人匪淺。且以藥末合五穀窖造發黃而爲麴。只取其速於釀化。除消導之外。並無他長。何以統治百病。且表散之品。因窖發而失其辛香之氣。攻堅之品。以窖發而失其雄入之權。補養之藥。氣味中和。以窖發而變爲臭腐穢濁之物。傷脾妨胃。更不待言。明者自知。如感冒病。宜審經以發散。若服神麴。則裹氣以攻伐。而虛表邪隨虛而入裏矣。傷食新病。宜助胃以尅化。傷食頗久。宜承氣以攻下。若服神麴。則釀成甜酸穢腐之味。滯於中焦。漫無出路。則爲噁心腹痛矣。吐瀉是陰陽不交。泄瀉是水穀不分。赤白痢是濕熱下注。噎膈是貫門乾槁。翻胃是命門火衰。痰餘是水氣泛溢。與神麴更無干涉。若誤服之。輕則致重。重則致死。可不愼哉。

配合應用 (一)神麴開胃健脾。消食止泄。同山查。麥蘗。穀蘗。縮砂。陳皮。草果。藿香。白朮。乾葛。蓮肉等用效。

(二)療痞滿暑泄。麴朮丸。用神麴炒。蒼朮泔製。炒等分爲末。糊丸梧子大。每米飲下五十丸。(百一選方)

(三)健胃思食。治脾胃俱虛。不能消化水穀。胸膈痞悶。腹脇膨脹。連年累月。食減嗜臥。口無味。神麴六兩。麥蘗炒三兩。乾薑泡四兩。烏梅肉焙四兩。爲末。蜜丸梧子大。每米飲下五十丸。日三服。(和劑局方)

(四)食積心痛。陳神麴一塊。燒紅。淬酒二大碗服之。(摘玄方)

(五)胃虛不尅。神麴半斤。麥芽五升。杏仁一升。各炒爲末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼化一丸。(普濟方)

(六)治暴泄不止。神麴炒二兩。茶

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黃湯泡炒半兩爲末。醋糊丸梧子大。每服五十丸。米飲下。（百一選方）

㊄治產後暈絕。神麴炒爲末。水服方寸匕。（千金方）

用量 二錢至四錢。

施用宜忌 凡中虛無積胎元不足者禁用。

參攷資料 ㊀按倪維德啓微集云。神麴治目病。生用能發其生氣。熟用能斂其暴氣也。竇思齋民要術雖有造神麴古法。繁瑣不便。近時造法更簡易也。（李時珍）㊁金匱葶藶丸用神麴治虛勞百病。以其調中而消滯也。（黃元御）㊂六神者。白虎。（白麵）青龍。（青蒿）朱雀。（赤小豆）玄武。（杏仁）勾陳。（蒼耳）騰蛇。（野蔞）各配六神也。此藥陳者爲良。故一名陳麴。（和漢藥考）

【神麴酒】 製法 用神麴燒赤。淬酒飲。

主治 閃肭腰痛。

【神窩石】 卽石硫黃之古籍別名。典見本草集註。詳『石硫黃』條。

【神醫】 卽白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【秘】 卽黍之一稃二米者。典見爾雅。詳『黍』條。

【秦爪】 卽秦艽之古籍別名。典見四聲本草。詳『秦艽』條。

【秦王試劍草】 卽鹿蹄草之古籍別名。典見綱目。詳『鹿蹄草』條。

【秦仇】 卽秦艽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『秦艽』條。

【秦札】 卽秦艽之古籍別名。典見別錄。詳『秦艽』條。

【秦皮】 **命名** 一作梣。其木小而岑高。故名。或云本出秦地。藥用其皮。遂名之秦皮。

古籍別名 梣皮。梣木皮。石檀皮。（別錄）樊槐皮。（陶弘景）盆桂皮。（日華）苦樹皮。（蘇恭）苦櫃皮。（綱目）梣槐皮。白梣木皮。若裏木皮。細辛木皮。（和漢藥考）

外國名詞 Fraxinus Bungeana, DC. var. pubinervis, Wg.（拉丁）

基本 屬木犀科爲秦樹之皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。秦皮產奉天省。十月新。

形態 秦皮爲山野自生之落葉喬木。多產於寒地。幹高二三丈。周圍可三尺。葉爲奇數羽狀複葉。小葉形長橢圓或長卵圓。皆對生。末端尖銳。三四月間。枝梢簇生淡紫色小花。有四萼片而無花冠。果實爲扁平之翅果。樹皮平滑。色青綠。以水浸之。立變碧青。此液多用以洗患眼。煎樹熬皮可製成一種越幾斯。謂之木膠。入藥用。此樹皮所生之白蠟。用以塗物。殊滑澤。



秦皮

採取 二月八月採之。採剝其皮。陰乾用。尤以去骨取皮。濱水水色碧青者佳。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 瀉熱明目。澁腸止痢。用作眼藥。又爲瀉痢藥。

主治 風寒溼痺。洗洗寒氣。除熱。目中青翳白膜。（本經）療男子少精。婦人帶下。小兒癇身熱。可作洗目湯。久服皮膚光澤肥大有子。（別錄）

歷代記述致畧 【唐】甄權 藥性本草論秦皮曰。明目去目中久熱。兩目赤腫疼痛。風淚不止。作湯浴小兒身熱。煎水澄清。洗赤目極效。【唐】陳藏器本草拾遺論秦皮曰。同葉麥湯洗蛇咬。并研末傅之。【元】王好古湯液本草論秦皮曰。主熱痢下重。下焦虛。【清】黃宮繡本草求眞論秦皮曰。秦皮味苦。氣寒色青。性澁。功專入肝以除熱。入腎以澁氣。是以因風而見溼痺驚癎目障之症者。則當用此苦燥苦降之味以除。因脫而見崩帶腸癖下痢之症者。則當用此取澁寒氣以固。如仲景白頭翁之用秦皮苦澁之類。老子云。天道貴澁。惟澁故補。服此不惟泄瀉止。脫而且益腎有子矣。至治赤眼腫痛。則合黃連等分類點。並秦皮一味煎湯以洗。甚效。但此氣寒傷胃。總不宜於胃虛少食之人耳。出西上。皮有白點。濱水碧色。書紙不脫者眞。

國外學說 日本和漢三才圖會曰。秦皮。其木大抵似檀。枝幹皆青綠色。葉細如匙頭。虛大而不光。無花實。皮有白點而不粗錯。取皮

97／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

漬水。便成碧色。書紙看之。皆青色者眞也。根似槐。根又古方藥品考曰。秦木高一二丈。幹枝皆綠白色。春出葉。一條五六葉排生。夏月枝梢開花。後結實。薄似松子而長大。日本產秦皮有二種。其皮不厚。白綠色。裏面褐色。浸水即變碧色。此爲眞品。今藥舖賣者可用。出丹州、若州等處。又有小葉者。高四五尺。枝葉相似。但瘦小。以其皮浸水。即變淡綠色。味略同。下品也。出城州天臺山。又大和本草曰。葉似椿葉。又似槐葉而小。亦似薔薇葉。以皮與葉浸水。立成綠汁。此汁善治紅眼腫。花多作紫色。如女郎花。樹幹性直。堪作鑞刀之柄。樹皮現紫黑色。又物類品騰曰。所在多有。大葉者形似臭茉莉。小葉者叢生。此藥用治眼病。其效最顯。取其浸汁入墨。色尤光潤。加入畫色中更妙。又荷蘭藥錄載秦皮之效如左。樹之裏皮色白。乾則帶黃色。味苦。收濇。能發汗。利小便。治瘡有特效。爲煎劑或散劑服之。木實性收濇。爲末敷之。可愈創止血。或謂煎劑能治黴毒。一說。此樹滲出之汁。治蝮蛇咬傷。取效如神。堪爲解毒藥。故以之內服。其葉則貼傷部。綠枝瓦上焙之。折斷處自有津液滴出。凡患傷冷毒之耳聾。以此津液滴入耳中。立愈。子實能利小便。治水腫。每晨以子半錢。和葡萄酒一盞飲服。即利小便。以治水腫黃疸。累驗。

配合應用 ㊀治赤眼生翳。秦皮一兩。水一升半。煮取七合。澄清。日日溫洗。一方加滑石。黃連等分。（外臺祕要方）

㊁治眼暴腫痛。秦皮、黃連各一兩。苦竹葉半升。水二升半。煮取八合。食後溫服。此乃謝道人方也。（外臺祕要方）

㊂治赤眼睛瘡。秦皮一兩。清水一升。白盤中浸。春夏一食頃以上。看碧色出。即以筋頭纏綿仰臥點。令滿眼。微痛勿畏。良久瀝取熱汁。日點十度以上。不過兩日即瘥也。（外臺祕要方）

㊃治眼弦挑鍼。乃肝脾積熱。刳秦皮。夾沙糖水煎調大黃末一錢。微利佳。（直指方）

㊄治血痢連年。秦皮、鼠尾草、薔薇根等分。以水煎取汁。銅器重釜煎成丸。如梧子大。每服五六丸。日二服。稍增以知爲度。亦可煎飲。（千金方）

㊅治天蛇毒瘡。似癩非癩。天蛇乃旱暘花蜘蛛也。人被其螫爲露水所濡。乃成此疾。以秦皮煮汁一斗。飲之即瘥。（寇宗奭方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡脾胃虛寒及無實熱者禁用。惡苦瓠、防葵、吳茱萸。忌火。大戟爲之使。

參攷資料 ㊀痢則下焦虛。故張仲景白頭翁湯以黃蘗、黃連、秦皮同用。皆苦以堅之也。秦皮浸水青藍色。與紫草同用。治目病以增光彩。尤佳。（王好古）㊁榉皮色青氣寒味苦性濇。乃是厥陰肝少陽膽經藥也。故治目病驚癇。取其平木也。治下痢崩帶。取其收濇也。又能治男子少精益精。有子。皆取其濇而補也。故老子云。天道貴濇。此藥乃服食及驚癇崩痢所宜。而人止知其治目一節。幾於廢棄。良爲可惋。淮南子云。榉皮色青治目之要藥也。又萬畢術云。榉皮止水。謂其能收淚也。高誘解作致水。言能使水沸者。謬也。（李時珍）㊂樹葉似檀。故名石檀。俗因味苦。呼爲苦樹。（蘇恭）㊃秦皮生廬江川谷及冤句水邊。二月八月採皮。陰乾。（別錄）㊄俗云是樊槐皮。而水濇以和墨書。色不脫。微青。（陶弘景）㊅此樹似檀葉細皮。有白點而不粗錯。取皮漬水。便碧色。書紙看之。皆青色者是眞。（蘇恭）㊆今陝西川郡及河陽亦有之。其木大。都似檀枝。幹皆青綠色。葉如匙頭。虛大而不光。並無花實。根似槐。根俗呼爲白榉木。（蘇頌）

【秦尖】卽刺蒺藜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『刺蒺藜』條。

【秦艽】

原名 秦糺。

命名 本品出秦中。而根作羅紋交糾者佳。故名。

處方用名 左秦艽。西秦艽。紋秦艽。

古籍別名 秦爪（四聲本草）秦糺。秦糾（別錄）秦膠（俗名）秦仇。網草。產家大器。（和漢藥考）

外國名詞 Zanthoxylum Piperitum DC.（拉丁）

學名 Insiacia gendarus.

98／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

基本 屬爵牀科。爲秦艽之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。秦艽以陝西省漢中府產者爲正地道名曰西秦艽。其次雲南產者多。四川者少。總其名稱曰川秦艽。氣味不及西艽之佳也。

形態 秦艽莖高五六寸。葉婆娑。莖梗俱青色。如高苣葉。六月中開紫色花。似葛花。花後遂結子。其根色黃。而互相交糾。長一尺左右。粗細不等。

採取 二月八月間。採根曝乾。

製法 雷敩曰。凡使秦艽。須於脚文處。認取左文列爲秦。治疾右文列爲艽。即發脚氣。凡用秦。以布拭去黃白毛。乃用黃元湯浸一宿。日乾用。李時珍曰。秦艽但以左文者爲良。分秦與艽爲二。則謬矣。

性質 苦平無毒。

效能 散風濕。治痺痛。用作風痺藥。

主治 寒熱邪氣。寒溼風痺。肢節痛。下水。利小便。(本經)療風無問久新。通身攣急。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論秦艽曰。牛乳點服。利大小便。療酒黃黃疸。解酒毒。去頭風。【宋】大明諸家本草論秦艽曰。傳尸骨蒸。治疳及時氣。【金】張元素珍珠囊論秦艽曰。除陽明風溼。及手足不遂。口噤牙痛。口瘡。腸風瀉血。養血榮筋。【元】王好古湯液本草論秦艽曰。泄熱益膽氣。【明】李時珍本草綱目論秦艽曰。治胃熱。虛勞發熱。【明】繆希雍本草經疏論秦艽曰。秦艽味苦平。別錄兼辛。微溫而無毒。潔古氣微溫味苦辛。亦可云微寒。苦能洩。辛能散。微溫能通利。故主寒熱邪氣。寒溼風痺。肢節痛。下水。利小便。性能祛風除溼。故別錄療風。無問久新。及通身攣急。能燥溼。散熱結。故日華子治骨蒸及疳熱。甄權治酒疸。解酒毒。元素除陽明風溼。及手足不遂。腸風瀉血。養血榮筋。好古泄熱。益膽氣。成以其除溼。散結。清腸胃之功也。【清】黃宮繡本草求眞論秦艽曰。秦艽苦多於辛。性平微溫。凡人感冒風寒與溼。則身體酸痛。肢節煩疼。拘攣不遂。如風勝則爲行痺。寒勝則爲痛痺。溼勝則爲着痺。在於骨則體重。痺在於脈則血濇。痺在於筋則拘攣。痺在於肉則不仁。痺在於皮則膚寒。至於手足酸疼。寒熱俱有。則爲陽明之溼潮溼。骨蒸。則爲陽明之熱。推而疸黃便澁。腸風瀉血。口噤牙痛。亦何莫不由陽明溼熱與風所成。用此苦多於辛。以燥溼邪。辛兼以苦。以除肝膽風熱。實爲驅風除溼之劑。然久痛虛羸。血氣失養。下體虛寒。痠疼枯瘦。小便利者。咸非所宜。形作羅紋相交。長大黃白。左紋者良。右紋勿用。

國外學說 日本和漢藥考曰。此藥純係中國產。其基本植物未詳。產於中國之河北。河南諸省。一說。因產於陝西。故名秦艽。一說屬於醫牀科。未得其證。不敢臆斷。日本向以屬毛茛科之牛扁充之。截然不同也。本草綱目啓蒙曰。中國產根肥大。色黃白。左右分岐。又有上爲分枝而末端仍合爲一者。根中空。外如網。因之如羅紋相交。享保年間。國人自高麗攜其秧來。始有此種。頃已漸多。葉似毛茛葉而無毛。一根叢生。方莖直立。葉互生。開淡黃花。形似烏頭花而小。根黃色。此草多產於城州之北山及信州。花亦有作淡紫色或黃白色者。種樹家稱爲伶人草。其根極似中國來之乾根。色黑褐。去皮則內中空。虛羅紋相交。味苦。同時又有中國來者。偶有葉雜入。則見其葉似蓑荷葉。非毛茛葉之形。據此則葛麗之種。殆又非秦艽矣。

辨僞 (一)鄭肖巖曰。假艽出秦中。今涇州鄜州岐州河陝諸郡皆有。其根土黃色。作羅紋交糾。左右旋轉。李時珍云。以左紋者良。今市肆僞品。即邊秦有毛。其枝尚小。匪特左右紋難辨。不知何物混充。又安能療病乎。(二)曹炳章曰。按秦艽。陝西寧夏府出者。色黃肥大。麤少左旋者。佳。山西五臺山亦出。皮色略黑。肉黃白色。亦佳。以上皆名西秦艽。湖北產者。條細質鬆。毛屑較多。名漢秦艽。爲次。

近人學說 (一)袁淑範曰。秦艽味苦辛。而氣平。性溫無毒。主治寒熱邪氣。寒溼風痺。肢節痛。下水。利小便。本草證類亦曰療風不問新久。皆效。藥性論亦云。秦艽利大小

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

便。差五種黃病。蕭炳曰療酒黃黃疸大效。廣利方曰。秦艽療黃心煩熱口乾。皮肉皆黃有極效。此外如孫眞人治黃疸亦用秦艽。以此等例觀之。秦艽似有鎭痛利水作用也。其主要成分供簡單的化學方法檢驗時。似爲一種配糖體也。㈡張山雷曰。秦艽之艽。本從草下牛。取糾結之意。玉篇本作芁。孫氏間經堂所刻本草經從之。今作艽。或作芃者。皆芁之變體。非從草下九及几也。其根入土甚深。互相糾結。故以爲名。而能通行經絡。流利骨節。名義功用。皆從此出。其氣味則本經謂之苦平。而別錄加以辛及微溫。以其主治風寒溫痺。必有溫通性質也。然其味本苦。其功用亦治風熱。而能通利二便。已非溫藥。本色後人且以治胃熱黃疸煩渴等症。其非溫性。更是彰明較著。考本經別錄主治。功在舒筋通絡。流利骨節。惟治痺痛攣結之證。蓋與防風羌獨同類之品。甄權之治頭風。卽祛風也。惟又稱其利大小便。亦與本經下水利小便之旨相合。蓋秦艽之根。曲折通達。既能外行於關節。亦能內達於下焦。故宜通諸府。引導濕熱。直走二陰而出。昔人每謂秦艽爲風家潤藥。其意指此。因之而并及腸風下血。張石頑且謂其治法。皆以濕熱有餘。宜泄積滯言之。非統治諸虛不攝之下血。帶下也。又就其導濕去熱而引伸之。則治胃熱泄內熱。而黃疸酒毒。牙痛口瘡。溫疫熱毒。及婦人懷胎蘊熱。小兒疳熱煩渴等症。皆胃家濕熱。而秦艽又能通治之矣。約而言之。外通經隧。內導二便。是其眞宰。而通絡之功。又在理溫之上。要之皆是從濕阻熱結一面着想。而氣虛血弱之症。皆非其治。仍與防風羌獨等味。異曲同工耳。又曰秦艽之根。以互相糾結爲名。故陶弘景謂相交而長大者佳。無謂左右也。乃劉宋時之雷斅妄爲區別。竟謂左文爲秦。右文爲艽。鄙陋可笑。其謬已極。秦是地名。艽是物理。而可分以爲二。不通孰甚。而後人能爲應聲之蟲。皆以左者爲佳。不知草之根莖。隨便互結。左右何關性質。亦猶藤本莖生。未聞左旋右旋。顯分區別也。考雷斅所著之炮炙論。詞多可鄙。本無足取。因其書竟稱爲雷公炮炙論而無識者流。甚至誤認爲黃帝時之雷公。謬加推崇。轉相援引。因而滔訛襲謬。附和同聲。卒莫知其究竟。此亦談醫之一則笑話矣。秦艽治熱。本因其能通利二便。遂以胃家濕熱諸症。一概歸其主治。然皆治實熱非虛熱也。自日華本草。插入主傳尸骨蒸一語。而俗醫又以爲勞瘵發熱之聖藥。於是血虛身熱。率以秦艽柴胡。錯綜相同。自謂已握治勞之祕鑰。不知苦能傷胃。寒能傷脾。寧不輕者致重。重者致死。而病者醫者。皆不覺悟。則日華殆其作俑者乎。李東壁謂黃疸煩渴之用秦艽。取其去陽明之溫熱也。陽明有濕。則身體痠疼而煩熱。陽明有熱。則日晡朝熱而骨蒸。其說甚是清澈。蓋其能治潮熱骨蒸。亦皆胃有實熱之證。而謬者遂以移之於虛熱。其相去不太遠耶。若小兒疳熱亦惟實證爲宜。挾虛者審之。石頑亦謂肢體疼痛。或浮腫。挾有客邪者。用以祛風利濕。方爲合劑。若久痛虛羸。血氣不能營養而痛。及下體虛寒。痠疼枯瘦。而小便清利者。咸非所宜。

配合應用　㈠治酒疸。秦艽、乾葛、茵陳、五味子、黃連、扁豆、木通、苜蓿。

㈡治下部濕熱作疼。或生瘡瘡。秦艽、苡仁、木瓜、五加皮、黃柏、蒼朮、牛膝。

㈢治五種黃疸。崔元亮海上方云。凡黃有數種。傷酒發黃。誤食鼠糞。亦作黃。因勞發黃。多痰涕。目有赤脈。益憔悴。或面赤惡心者是也。用秦艽一大兩。剉作兩帖。每帖用酒半升。浸絞取汁。空腹服。或利便止。就中飲酒人易治。屢用生力。又治黃病。內外皆黃。小便赤。心煩口乾者。以秦艽三兩。牛乳一大升。煮取七合。分溫再服。此方出於許仁則又孫眞人方加芒硝六錢。（眞元廣利方）

㈣治暴瀉引飲。秦艽二兩。甘草炙半兩。每服三錢。水煎服。（聖惠方）

㈤治傷寒煩渴。心神燥熱。用秦艽一兩。牛乳一大盞。煎六分。分作二服。亦治小兒骨蒸。（聖惠方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈥治小便艱難。或轉胞腹滿悶。不急療殺人。用秦艽一兩。水一盞。煎六分。分作二服。又方加冬葵子等分爲末。酒服一匕。（聖惠方）

㈦治胎動不安。秦艽、甘草炙、鹿角膠炒各半兩爲末。每服三錢。水一大盞。糯米五十粒。煎服。又方。秦艽、阿膠炒、艾葉等分。如上煎服。（聖惠方）

㈧治發背初起。疑似者。便以秦艽、牛乳煎服。得快利三五行。卽愈。（海上方）

㈨治瘡口不合。一切皆治。秦艽爲末。糝之。（直指方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡便滑溲數及無風濕者禁用。畏牛乳。喜蒲爲之使。

著名方劑 ㈠秦艽鼈甲散。治骨蒸潮熱。肌肉消瘦。唇紅頰赤。氣粗。四肢倦。夜有盜汗。咳嗽。（羅謙甫方）柴胡、鼈甲（去裙醋炙）、選九肋者）地骨皮各一兩。秦艽、當歸、知母各五錢。右六味。爲粗末。每服五錢。水一盞。青蒿五葉。烏梅一個。煎至七分。去滓。溫服。空心。臨臥各一服。㈡秦艽扶羸湯。治膽肺二經虛熱。及肺癆。骨蒸已成。或寒或熱。聲嗄不出。體虛自汗。四肢怠惰。（直指方）柴胡二錢。人參、鼈甲（醋炙）、秦艽、當歸、紫菀、半夏各一錢。地骨皮錢半。甘草五分。右水二盞。薑三片。烏梅、大棗各一枚。煎七分。食後服。如熱甚者加青蒿。汗多者加黃芪。去半夏。生薑二味。

參攷資料 ㈠秦艽手足陽明經藥也。兼入肝膽。故手足不遂。黃疸煩渴之病。須之取其去陽明之濕熱也。陽明有濕。則身體酸疼煩熱。有熱則日晡潮熱。骨蒸。所以聖惠方治急勞煩熱。身體酸疼。用秦艽、柴胡一兩。甘草五錢爲末。每服三錢。白湯調下。治小兒骨蒸潮熱。減食瘦弱。用秦艽、炙甘草各一兩。每用一二錢。水煎服之。錢乙加薄荷葉五錢。（李時珍）㈡今河陝州郡多有之。其根土黃色。而相交糾。長一尺以來。粗細不等。枝幹高五六寸。葉婆娑連莖梗俱青色。如萵苣葉。六月中開花紫色。似葛花。當月結子。每於春秋採根陰乾。（蘇頌）㈢今庸師喜用秦艽。且不辨左紋右紋。凡遇痛症。動輒用之。失其旨矣。（張石頑）

【秦糾】卽秦艽之原名。詳『秦艽』條。

【秦糾】卽秦艽之古籍別名。典見別錄。詳『秦艽』條。

【秦荻藜】古籍別名 藜茹荻。（山海經）

產地 生於低濕諸地。

形態 秦荻藜爲菜類之一種。狀如荻。莖葉可供菜茹。與藜用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 心腹冷脹。下氣消食。和醬醋食之。

歷代配述攷證 【唐】孟詵食療本草論秦荻藜曰。破氣甚良。又末之。和酒服。療心痛悒悒。塞滿氣。

參攷資料 秦荻藜加入生菜中。最香美。（孟詵）

【秦荻藜子】主治 腫毒。搗末和醋塗。

【秦椒】㈠卽蕃椒之古籍別名。典見龍柏秦性考。詳『蕃椒』條。㈡卽花椒之原名。詳『花椒』條。

【秦葱】卽萊菔之古籍別名。典見圖經本草。詳『萊菔』條。

【秦當歸】卽當歸之處方用名。詳『當歸』條。

【秦膠】卽秦艽之俗名。詳『秦艽』條。

【秦燕毛】命名 本品爲燕之由古秦地南來者故名。

主治 解諸藥毒。取二七枚。燒灰水服。

【秦龜甲】卽山龜甲之原名。詳『山龜』條。

【秦歸】頭圓尾多色紫。氣香肥潤者。卽馬尾歸之古籍別名。典見綱目。詳『當歸』條。

【秧雞】古籍別名 水雞。

外國名詞 Rallus aquaticus indicus. Blyth（拉丁）（Water rail 或 Eastern water-rail 或 Indian water-rail）（英）

基本 係脊椎動物鳥類涉禽類秧雞科。

產地 出田澤沼池水畔間。

形態 秧雞爲原禽類之一種。其狀似雞。嘴比頭長。略彎曲。嘴根赤而尖。淡黑。背面概作煤褐色。具白斑。混交赤褐。中殆黑。翼亦黑。頰

101／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黑褐。眼之上部亘頰部灰赤色。有淡黑之橫斑。尾短色黑。脚帶赤褐色。趾無蹼。體長四寸餘。翼長三寸半。尾長一寸八分。能游泳。善步行。不能高飛。夏至後夜鳴達旦。秋後即止。其肉可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 蟻瘻。

【秫】

命名 秫字篆文。象其禾體柔弱之形。故名。

古籍別名 粢。糯。秫。糯粟。（唐本草）黃糯黃米。（綱目）

外國名詞 Panicum italicum L. Var. glutinosa.（拉丁）モチアハ（日本）

基本 係禾本科稷屬。爲秫之米。其根詳見『秫根』條。

形態 秫米爲稷粟類之一種。乃粱米粟米之有黏性者。有赤、白、黃三色。皆可釀酒熬糖。及作餈糕食。與供藥用。

性質 甘。微寒。無毒。

主治 寒熱。利大腸。療漆瘡。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論秫米曰。治筋骨攣急。殺瘡疥毒熱。生搗和雞子白。傅毒腫良。【宋】日華諸家本草論秫米曰。主犬咬凍瘡。嘴傅之。【明】李時珍本草綱目論秫米曰。治肺癰及腸盛陰虛。夜不得眠。及食鵝鴨成瘕。妊娠下黃汁。

參攷資料 ㈠秫米性平。不可常食。擁五臟氣。動風。悶人。（孟詵）㈡秫米味酸。性熱。黏滯。易成黃積病。小兒不宜多食。（李時珍）㈢秫米作酒熬糖。肥膩易消。方藥不正用。惟嚼以塗漆瘡及釀諸藥。（陶弘景）㈣秫者。肺之穀也。肺病宜食之。故能去寒熱。利大腸。大腸者。肺之合。而肺病多作皮寒熱也。千金治肺癰方用之。取此義也。靈樞經。岐伯治陽盛陰虛。夜不得瞑。半夏湯中用之。取其益陰氣而利大腸也。大腸利。則腸不盛矣。方見半夏條。又吳苑云。宋元嘉中。有人食鴨成癥。醫以秫米研粉。調水服之。須臾煩躁。吐出一鴨。雛而痊也。千金方。治食鴨肉成病。胸滿面赤。不能食。以秫米泔一盞飲之。（李時珍）

【秫米粥】

性質 甘。溫。無毒。

主治 益氣。治脾胃虛寒。洩痢。吐逆。小兒瘡瘡白色。

【秫根】

主治 煮湯洗。祛風。

【秬】㈠即稷米之黑者。典見綱目。詳『稷米』條。㈡即黍之色黑者。典見爾雅。詳『黍』條。

【笋】即竹筍之俗名。詳『竹筍』條。

【粉口兒茶】即孩兒茶之別名。詳『孩兒茶』條。

【粉丹皮】即牡丹皮之處方用名。詳『牡丹皮』條。

【粉甘草】即甘草之處方用名。詳『甘草』條。

【粉沙參】

原名 土人參。

命名 本品各地皆產。藥葉一似人參。故名。出江浙者。俗名粉沙參。

古籍別名 竹節人參。土參。節人參。佛掌參。竹鞭人參。（和漢藥考）

外國名詞 Panax Repona.（拉丁）

基本 屬五加科爲土參之根。

產地 趙學敏本草綱目拾遺曰。土人參。各地皆產。尤於錢塘西湖南山尤多。

形態 土人參爲多年生草生於深山陰地。莖葉俱酷似人參。莖高二尺餘。葉爲掌狀複葉。由五小葉而成。類七葉樹葉。夏月於梢頭簇生。細小五瓣白花。作繖形花序排列。實小如豆。初綠。熟紅。頂端有黑色。輪根初爲球根。次變直根。後復橫行爲竹節狀。橫生。根如小指大。呈餡黃色。有多數鬚根。本根味苦。鬚根則甘。

種類 ㈠粉沙參即土人參之出於江浙者。㈡紅黨參即土人參之去皮淨煮極熟。陰乾而成者。㈢小人參即土人參之產於日本薩摩者。㈣鬚人參即土人參之產於日本信濃下野日光者。

採取 夏秋之交。採根日乾。

製法 趙學敏曰。凡使須蒸之極透。則寒去而氣香味淡。

性質 甘。微寒。無毒。

成分 日本藥學士井上圓治氏嘗研究竹節人參之成分。由化學試驗之結果。發見一種糖原質。又由動物試驗。確定其所含成分應屬『沙波寧』Saponin. 沙波寧爲祛痰藥主要成分。故氏謂中

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

醫用竹節人參作祛痰藥。並非偶然云。

效能 肅肺。下氣。治咳嗽。平喘逆。爲人參之代用品。亦爲强壯藥。此外有健胃解熱祛痰之效。

醫治 慢性消化不良症。習慣性便祕。

作用 助胃醱分泌之不足。刺激胃之蠕動。使消化功能增大。至腸始吸收至血中。使心臟動力增加。

主治 氣香味淡。性善下降。能伸肺經治節。使清肅下行。補氣生津。治咳嗽喘逆。痰湧火升。久瘧淋瀝。難產。經閉。瀉痢由於肺熱者。反胃噎膈由於燥澀者。凡有升無降之症。每見奇效。以其根一直下行入土最深故也。

配合應用 ㊀治白帶初起。土人參切片三兩。用陳紹酒。飯上蒸熟。分作三服。服完卽愈。（百草鏡方）

㊁補陰虛及楊梅結毒。對配茯苓熬膏。酒煎服。（王安採藥方）

用量 一錢至三錢。

施用宜忌 凡脾虛下陷滑精夢遺者禁用。孕婦亦忌。以其下行而滑竅也。

參考資料 土參於春二三月。發苗如蒿艾而葉細小。本長二三寸。作石綠色。映日有光。土人恒於夏月採根入藥。（綱目拾遺）

【粉兒茶】卽粉口兒茶之簡稱。

【粉草】卽甘草之處方用名。詳『甘草』條。

【粉萆薢】卽萆薢之處方用名。詳『萆薢』條。

【粉葛根】卽葛根之處方用名。詳『葛根』條。

【粉團花】古籍別名 大者名玉粉團。小者名洋粉團。（綱目拾遺）

形態 粉團爲落葉灌木類之一種。葉略成圓形。有鋸齒。多皺紋。生細毛。夏初開白花。千瓣成簇。望之如粉團。大者初青後白。小者青色。轉白。白後轉紅藍色。雄雌花叢集成球。直徑可達二寸許。其花可供藥用。

性質 寒。無毒。

主治 水煎洗腎囊風。同水龍骨、雷公藤。燒蒸除臭蟲。

【粉團花根】主治 喉爛。醋磨。翎毛調持。涎出卽愈。

【粉節草】卽蕭蔷之古籍別名。典見綱目。詳『蕭蔷』條。

【粉藿苓】卽藿苓之處方用名。詳『藿苓』條。

【粉錫】卽白粉之古籍別名。典見本經。詳『白粉』條。

【粉霜】命名 本品由水銀復轉升鍊而成。質輕如粉。色白如霜。故又命之曰水銀霜。

古籍別名 水銀霜。白雪。白鑞砂。（綱目）白霜砂。（新中藥）

外國名詞 Corrosive Sublimate.（拉丁）

基本 係汞化物之一種。

形態 粉霜爲白色半結晶性之塊粒或粉末。潔白而有光澤。

製法 李時珍曰。升鍊法。用眞汞粉一兩。入瓦罐內。令勻。以燈盞仰蓋罐口。鹽泥塗縫。先以小炭火鋪罐底。四圍以水溼紙不住手在燈盞內攙。勿令間斷。逐漸加火。至罐頸住火。冷定取出。卽成霜如白蠶。按外臺祕要載古方崔氏造水銀霜法。云用水銀十兩。石硫黃十兩。各以一鐺熬之。良久。銀熱黃消。急傾入一鐺。少緩。卽不相入。仍急攪之。良久。硫成灰。銀不見。乃下伏龍肝末十兩。鹽末一兩。攪之。別以鹽末鋪鐺底。一分入藥在上。又以鹽末蓋面。一分以瓦盆覆之。鹽土和泥塗縫。炭入煆一伏時。先文後武。開盆刷下。凡一轉後。分舊土爲四分。以一分和霜入鹽末二兩。如前法飛之訖。又以土一分鹽末二兩和飛。如前。凡四轉上盡。更用新土。如此七轉。乃成霜用之。此法後人罕知。故附於此云。

用法 恒以和作丸散用。

性質 辛。溫。無毒。

效能 殺痰消積。或用作驅蠲藥。

主治 下痰涎。消積滯。利水。與輕粉同功。

作用 有直接殺滅黴菌之能。性甚强烈。可刺激患部之黏膜。使分泌驟增。若用時過久。反致局部結痂而腐蝕。

配合應用 ㊀治小兒急驚。搐搦涎盛。粉霜二釐。白牽牛炒。輕粉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

各一錢爲末。每服一字。薄荷湯下。吐涎爲效。（全嬰方）

㈡治小兒躁渴。粉霜一字。小兒半錢。蓮花湯調下。冬月則用蓮肉。（保幼大全方）

㈢治風熱驚狂。神白丹。治傷寒積熱。及風生驚搐。或如狂病。諸藥不效。粉霜一兩。以白麵六錢和作餅子。炙熱同研。輕粉半兩。鉛白霜二錢半。爲末。滴水丸。梧子大。每服十丸至十五丸。米飲下。（宣明方）

㈣治瘢疹生瞖。粉霜八分。硃砂一錢。爲末。水調少許。傾入耳內。（飛鴻集方）

㈤治腋下胡臭。粉霜、水銀等分。以面脂和塗之。（聖濟總錄）

㈥治楊梅惡瘡。粉霜一味。搽之。（集簡方）

用量　五分至一錢。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。長蕎麥稈灰、硫黃。

參攷資料　㈠以汞粉轉升成霜。故曰粉霜。抱朴子云。白雪。粉霜也。以海鹵爲匱蓋。以土鼎勿洩精華。七日乃成。要足陽氣。勿爲陰侵。惟臺藕地丁河車。可以煉之點化在仙爲玄霜。在人爲精原。在丹爲木精。在造化爲白雪。在天爲甘露。（李時珍）㈡粉霜輕粉。亦能潔淨腑。去膀胱中垢膩。既毒而損齒。宜少用之。（張元素）

【紋秦艽】　卽秦艽之處方用名。詳『秦艽』條。

【紋銀】　卽銀箔之處方用名。詳『銀箔』條。

【納鼈】　**古籍別名**　鮸才。（圖經）

形態　納鼈爲介類之一種。卽鼈之無裙而頭足不縮者。其甲可供藥用。

性質　有小毒。

主治　傳尸勞。及女子經閉。

參攷資料　納鼈肉有毒。食之令人昏塞。以黃耆羌藍煎湯服之。立解。（蘇頌）

【純青蒿】　卽青蒿之處方用名。詳『青蒿』條。

【純鉤鈎】　卽鉤藤之處方用名。詳『鉤藤』條。

【純陽草】　卽金剛篡之古籍別名。典見丹房本草。詳『金剛篡』條。

【紗羊】　卽蜻蜓之古籍別名。典見綱目。詳『蜻蜓』條。

【紗帽翅】　**形態**　紗帽翅爲雜草類之一種。一莖間數十花。色黃。其葉可供藥用。

主治　癬疾。

【紙母】　卽知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『知母』條。

【素火腿】　卽處笋片之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『處笋片』條。

【素心蘭】　卽建蘭之別名。詳『建蘭』條。

【素芝】　卽白芝之古籍別名。典見綱目。詳『白芝』條。

【素索】　卽蘋果色白者之古籍別名。典見綱目。詳『蘋果』條。

【素馨花】　產地　以廣東南番爲最多。



素馨花

主治　解心氣鬱痛。下痢腹痛。

古籍別名　馬耳。（別錄）

基本　索干爲雜草類之一種。可供藥用。

性質　苦。無毒。

主治　易耳。

【索鬘香】　卽丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『丁香』條。

【缺盆子】　卽覆盆子之古籍別名。典見爾雅。詳『覆盆子』條。

【缺盆草】　卽尊之古籍別名。典見綱目。詳『尊』條。

【羔羊肉】　卽幼羊之肉。其功用詳『羊肉』條。

【殺羊肉】　卽羊肉之處方用名。詳『羊肉』條。

【殺羊齒】　卽百里奚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『百里奚草』條。

【殺肉】　卽羊肉之古籍別名。典見綱目。詳『羊肉』條。

【耆婆草】　卽曼陀羅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『曼陀羅』條。

【耕香】　**形態**　耕香爲茅草類之一種。乃排草香之一類。其莖生細葉。可供藥用。

產地　出熱帶諸地。

性質　辛。溫。無毒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　調中。辟惡去臭。

【胭脂】卽臙脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『臙脂』條。

【耿子】卽草烏頭之古籍別名。典見吳普本草。詳『草烏頭』條。

【能消】卽威靈仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳『威靈仙』條。

【能消草】卽玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玄參』條。

【能鼈】古籍別名　三足鼈。（綱目）

產地　出吳興陽羨縣山池中。

形態　能鼈爲介類鼈屬之一種。形似鼈而生三足。其肉可供藥用。

性質　大寒。有毒。

主治　折傷主痛。化血。生搗塗之。道家辟諸厭穢。死氣。或畫像止之。

參攷資料　㊀能鼈食之殺人。（蘇頌）㊁按姚福庚巳編云。太倉民家得三足鼈。命婦烹食。舉入臥少頃。形化爲血水。止存髮耳。隣人疑其婦謀害。訟之官。時知縣黃廷宣。鞫問不決。乃別取三足鼈。令婦如前烹治。取死囚食之。入獄亦化如前人。遂辨其獄。竊謂能鼈之有毒。不應如此。然理外之事。亦未可以臆斷也。而山海經云。從水多三足鼈。食之無蠱。近亦有人誤食而無恙者。何哉。蓋有毒害人。亦未必至於骨肉頓化也。（李時珍）

【脂麻】卽胡麻之古籍別名。典見本草衍義。詳『胡麻』條。

【胭蛇】命名　本品體能胞斷。故名。

產地　出雲南、貴州、及邕管山野間。

形態　胞蛇爲鱗類蛇屬之一種。長尺餘。圓如錢。嘴尖尾禿。背黑腹白。暗鱗點點。常伏莽草間。見人輒躍起數尺。跌爲十二段。人去復合爲一。兩端俱生頭。其色如白金。甚光亮。誤拾之。往往觸毒卽斃。其肉可供藥用。

採取　置竹筒於其側。候其入筒中。急持之。方得完全。稍緩則碎斷。或倘其斷時。鉗取之。須各置異處。以免仍續成蛇。待風乾入煎用。

性質　有毒。

主治　熬膏搽箍癧疽。及療風瘋。

參攷資料　胭蛇治惡疽。腰以上用首。腰以下用尾。又治大麻風及痢疾。（綱目拾遺）

【胭蛇骨】主治　醋磨圍腫毒。

【臭牡丹】形態　葉形與臭梧桐相同。但薄而糙。氣亦臭。五月開花成朶。一蒂百花。色粉紅。

主治　洗痔瘡。治疔瘡。耳、臭牡丹各一大握。搗爛。新汲水調服。瀉下黑水。卽愈。一切癰疽。臭牡丹枝葉。搗爛。罨之立消。

【臭牡丹葉】功用詳『臭牡丹』條。

【臭芙蓉】卽臭梧桐之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『臭梧桐』條。

【臭花娘草】卽天名精草之別名。詳『天名精』條。

【臭屎茉莉頭】產地　南海大瀝。

採取　二三月。

主治　理脚氣。

【臭柚】卽柚之古籍別名。典見綱目。詳『柚』條。

【臭草】產地　出西域諸地。

形態　臭草爲雜草類之一種。高尺許。開小黃花。結子成實。裂分四房。每房有子數粒。春秋二仲。皆可布種。或於春月折枝插之亦能活。不畏霜雪。又不喜肥。須澆以清水則茂。若以手撏之則臭氣拂拂。亦非穢汚腐臭之氣可比。其葉與花蕊可供藥用。

主治　泄瀉及小便不通。解蛇蠍蜈蚣諸毒。生食或煮食。鼻衄。搗葉塞之。危急重病昏暈。醋烹搓塞鼻孔。耳痛。搗汁置石榴皮內。煅過灌之。目痛。置清水內。露二三夜。點之。功用與香草等。

參攷資料　臭草植樹下。能殺樹上蟲。植圃中。能辟蛇蠍蜈蚣等。諸毒。並治蟲蟲。以清油煎臭草葉。搗爛敷臍上。勝食使君子遠矣。目力過勞。以臭草葉自然汁。加蜂蜜一滴。井略加小茴香自然汁。調和點眼。久則光明。楊梅瘡。以自然汁略加好酒。井清水粉同煎。治之。婦人心氣痛。病由於子宮上沖。用臭草葉嗅之。以愈爲度。大廣實上士。曾用此方。嘆其靈驗。小兒大便腸出。以好酒煮臭草葉。搗爛。用布作膏貼之。（綱目拾遺）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【臭草】卽雲實之古籍別名。典見圖經本草。詳『雲實』條。

【臭梧桐】古籍別名　秋葉。（採藥書）後庭花（學圃餘疏）臭芙蓉八角梧桐。（綱目拾遺）

產地　羣芳譜云。臭梧桐生南海及雷州。近澧之州郡亦有之。

形態　羣芳譜云。臭梧桐葉大如手。作三花尖長。青不彫。皮若梓白而堅韌。可作繩。水入不爛。花細白如丁香而臭。味不甚美。遠觀可也。人家園內多植之。皮堪入藥。採取無時。敏按。臭梧桐有家野之別。家生者成樹而高大。野生者木小不成樹。不過三四尺。花色粉紅。赤無大紅。純白者二種。俱可入藥。功用亦相近。綱目拾遺云。臭梧桐生人家牆砌下甚多。一名芙蓉根。葉深綠色。大暑後開花。紅而淡。似芙蓉。外苞內蕊。花白五出。瓣尖蒂紅。霜降後苞紅中有實。作紫翠色。百草鏡云。一名臭芙蓉。其葉圓尖。不甚大。搓之氣臭。葉上有紅筋。夏開花。外有紅苞成簇。色白五瓣。結實青圓如豆。十一月熟。藍色花葉皮、俱入藥。

主治　寬筋活血。化痞消癥。

配合應用　㈠治獨脚楊梅瘡。洗鵝掌風。一切瘡疥。煎湯洗汗斑。溼火腿腫。久不愈者。同蔥鬚子浸酒服。并能治一切風溼止痔腫。煎酒服。貼臁瘡。搗爛作餅。加桐油貼。神效。

㈡治半支風。取葉連根。掛於風頭廊下。吹乾。將葉燒灰入瓶內。每早服三錢。酒吞。（百草鏡方）又用臭梧桐葉。并梗。曬燥。磨末。共二斤。用白蜜一斤爲丸。早滾水下。晚酒下。每服三錢。驗過神效。（邱虎臣驗方）

㈢治半邊頭痛。用川椒五錢。臭梧桐葉二兩。先將桐葉炒黃。次入椒再炒。以火酒灑在鍋內。拌和取起。捲在綢內。紮在痛處。吃熱酒一碗。取被蓋頭而睡。出汗卽愈。

㈣治一切內外痔。用臭梧桐葉七片。瓦松七枝。皮硝三錢。煎湯熏洗。神效。（急救方）

㈤治風氣頭風。集聽。凡頭風用臭梧桐花。陰乾。燒灰存性。爲末。每服二錢。臨臥酒下。三服無不愈。

㈥止痢。用隔年臭梧桐花。煎湯服卽愈。（必效方）

㈦消癰腫疽。臭梧桐葉百片。煎湯服三四次。（救生苦海方）

㈧治內外一切乳毒。用臭梧桐。春夏取頭。三個。秋冬取根。搗爛。絞汁。對陳酒熱。服取汗爲度。神效。（經驗廣集方）

㈨治拄心疝。臭梧桐葉。每歲用一片。共歲若干。葉若干。清水洗葉。用無灰白酒煎服。（華玉先試效方）

㈩豨桐丸。此丸治男婦感受風溼。或嗜飲冒風。內溼外邪。傳於四肢。脈絡壅塞不舒。以致兩足軟痠疼痛。不能步履。或兩手牽絆。不能仰舉。凡辛勞之人。常患此症。狀似風癱。服此丸立能全愈。用地梧桐。俗謂臭梧桐。不論花、葉、梗、子。曬乾。切碎爲末。一斤。豨薟草炒。磨末八兩。二味和勻。蜜丸如桐子大。早晚以白滾湯送下四錢。忌食猪肝、羊血、番茄等物。或單用臭梧桐二兩。煎湯飲。以酒過之。連服十劑。其痛卽瘥。或煎湯洗手足亦可。（濟世養生集方）

參攷資料　周廷園云。臭梧桐。一年三月十月兩次作花。若葉無紅筋。搓之不臭者。疏。臭梧桐者。臭地野生。花色淡。無植之者。淮揚間成大樹。花微紅者。縉紳家植之中庭。或云後庭花也。獨閩中此花鮮紅。異常。名百日紅。花作長鬚。亦與吳地不同。園林中植之。灼灼出矮牆上。至生深澗中。與清泉白石相映。永嘉人謂之丁香花。

【臭葡萄】卽臭藤之古籍別名。見汪氏藥錄。詳『臭藤』條。

【臭萵】卽黃花萵之古籍別名。典見綱目。詳『黃花萵』條。

【臭樗皮】卽椿樗白皮之處方用名。詳『椿樗白皮』條。

【臭橘】卽枸橘之古籍別名。典見綱目。詳『枸橘』條。

【臭橙】卽柚之古籍別名。典見食性本草。詳『柚』條。

【臭燕薁】卽燕薁之處方用名。詳『燕薁』條。

【臭蟲】卽壁蝨之古籍別名。典見綱目。詳『壁蝨』條。

【臭藤】古籍別名　卻藤。（綱目拾遺）臭葡萄。（汪

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

氏藥錄）卻節。（李氏草祕）

形態 臭藤爲蔓草類藤屬之一種。二月發苗。蔓生地上。葉對生。而氣臭。六七月開花粉紅色。結子似鼠李而氣亦臭。其根細小。二三年者大如菜菔。可供藥用。

主治 腿脚諸風。寒溼痛拘攣。煎洗。腸癰。跌打損傷。流注風火。瘰癧痔毒。散鬱氣。理疝疾。合紫蘇煎湯洗。

【臭蘇】㊀卽薺苨之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『薺苨』條。㊁卽薺苨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薺苨』條。

【臭鬱草】卽益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益母草』條。

【般若湯】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【舩矶魚】卽杜父魚之古籍別名。典見綱目。詳『杜父魚』條。

【舩虹】**產地** 生川蜀諸地。

形態 舩虹爲雜草類之一種。其色黃。可供藥用。

採取 立秋採之。

性質 酸。無毒。

主治 下氣止煩渴。可作浴湯藥。

【茖葱】**古籍別名** 山葱。生沙地者名沙葱。生水澤者名水葱。（綱目）

外國名詞 Allium victorialis L.（拉丁）ギヤウジヤニンニク ヤマル センジヤウニンニク（日本）

基本 係百合科葱屬。爲茖葱之葉莖。

產地 山野平原。處處有之。

形態 茖葱爲葱類野生之一種。開白花。結子如小葱頭。莖葉可供藥用。

性質 辛。微溫。無毒。

主治 除瘴氣惡毒。久食强志。益臍氣。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭 新修本草論茖葱曰。主諸惡戲。狐尿刺毒。山溪中沙蟲。射工等毒。麥汁浸。或搗傅大效。

【茖葱】卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【茖葱子】**性質** 辛。微溫。無毒。

主治 洩精。

【茗】卽茶葉之原名。詳『茶葉』條。

【茗荷】卽蘘荷之日本名。詳『蘘荷』條。

【荔支】卽荔枝。詳『荔枝』條。

【荔支紅】卽山牛膝之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『山牛膝』條。

【荔奴】卽龍眼之古籍別名。典見新修圖經本草。詳『龍眼』條。

【荔枝】**原名** 離枝。

命名 本品結實時。枝弱而帶牢不可摘。須以刀斧劚取其枝。劚與劦同。故名。

處方用名 荔枝肉。

古籍別名 丹荔（綱目）。肉。大荔。山芝。天芝。火芝。丹芝。赤芝。金芝。火實。茵芝。桂芝。紫芝。紫囊。神芝。雷芝。離芝。甘液。側生。朱柿。紅鸞。細枝。櫻枝。瓊珠。綠皮。垣衣。福果。絳殼。荔錦。十八娘。五德子。天垢子。玉晴子。甘露水。燕胎子。賴蛇珠。海山仙人飣坐眞人。蜂衣仙子。鏤玉天漿。（和漢藥考）

外國名詞 Nephelium Litchi Camb.（拉丁）

基本 屬無患樹科荔枝之實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。荔枝核產廣東。以番禺、增城、東莞爲多。出新安、惠州、汕尾亦有。

形態 荔枝爲高一丈五尺餘之常綠樹。葉爲羽狀複葉。顏爲滑澤。花似橘花。呈青白色。花後結實。色爲茶褐。形近球圓狀。酷似龍眼。外被有鱗形皺襞之殼皮。破之。內部空虛。正中有核。稍附果肉。氣味俱類龍眼。



荔枝

採取 五六月間成熟時採之。

用法 生食或煮服。或生搗或煅用。

性質 甘。平。無毒。

效能 養血止煩渴。消腫發痘瘡。用治瘰癧瘡贅及疔瘡惡腫藥。

主治 止渴。益人顏色。

歷代記述攷證 【唐】李珣 海藥本草論荔枝曰。食之止煩渴。頭重。心燥。背膊勞悶。【唐】孟詵 食療本草論荔枝曰。通神。益智。健氣。【明】李時珍 本草綱目論荔枝曰。治瘰癧瘡贅。赤腫疔腫。發小兒痘瘡。【明】繆希雍 本草經疏論荔枝

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

曰。荔枝子。南方果也。本經雖云平。而其氣實溫也。鮮時味極甘美。多津液。故能止渴。甘溫益血。助榮氣。故能益人顏色也。多食令人發熱。或衄血齒痛者。以其生於炎方。熟於夏月。故性善助火發熱耳。【清】黃宮繡本草求眞論荔枝曰。荔枝味甘而酸。氣溫故能入脾助氣。入肝益血養營。然於血虛火衰則宜。若使病非虛弱。及素火盛服之。反致助火發熱。而有衄血齒痛之病矣。瘡瘡不起。用殼煎湯以服。蓋取殼性溫補內托之意。然要皆屬性燥。用當酌症所宜。非若龍眼性主溫和。而資益甚多也。出建寧者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論荔枝曰。荔枝甘溫而香。通神益智。壞精充液。辟臭止疼。滋心營養肝血。果中美品。鮮者尤佳。以核小肉厚而純甜者勝。多食發熱。動血損齒。凡上焦有火者忌之。食之而醉者。卽以其殼煎湯或蜜湯解之。

配合應用　㊀治瘡瘡不發。荔枝肉浸酒飲。幷食之。忌生冷。（聞人規瘡疹論方）

㊁治疔瘡惡腫。用荔枝五箇。或三箇。不用雙數。以狗糞中米。淘淨爲末。與糯米粥同研成膏。攤紙上貼之。留一孔出毒氣。（普濟方）用荔枝肉白梅各三箇。擣作餅子。貼於瘡上。根卽出也。（濟生祕覽方）

㊂治風牙疼痛。荔枝連殼燒存性。研末。擦牙卽止。乃治諸藥不效仙方也。（普濟方）用大荔枝一箇。別開壞。鹽滿殼。煨研。擦之卽愈。（孫氏集效方）

㊃呃逆不止。荔枝七箇。連皮核。燒存性爲末。白湯調下立止。（楊拱醫方摘要）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛火旺者禁用。

參攷資料　㊀荔枝屬陽主散。無形質之滯氣。故瘤贅赤腫者用之。苟不明此。雖用之無應。（朱震亨）㊁多食不傷人。如少過度。飲蜜漿一盃便解也。（蘇頌）㊂荔枝氣味純陽。其性畏熱。鮮者食多卽齦腫口痛。或衄血。此病齒露及火病人尤忌之。開寶本草言其性平。蘇氏謂多食無傷。皆謬說也。按物類相感志云。食荔枝多則醉。以殼浸水飲之卽解。此卽食物不消。還以本物消之之意。（李時珍）㊃司馬相如上林賦作離支。按白居易云。若離本枝。一日色變。三日味變。則離支之名。又或取此義也。（李時珍）㊄荔枝生嶺南及巴中。今閩之泉福漳州興化軍蜀之嘉蜀逾涪州及二廣州郡皆有之。其品以閩中爲第一。蜀州次之。嶺南爲下。其本高二三丈。自徑尺至於合抱。類桂木冬青之屬。綠葉蓬蓬然。四時榮茂不彫。其木性至堅。勁土人取其根作阮咸槽。及彈碁局。其花青白狀。若冠之蕤綬。其子喜雙實。狀如初生松毬。殼有皺紋。如羅初青。漸紅。肉色淡白。如肪玉。味甘而多汁。夏至將中。則子爲然俱赤。乃可食也。大樹下子至百斛。五六月盛熟時。彼方皆燕會其下。以賞之。極量取啖。雖多亦不傷人。少過則飲蜜漿便解。荔枝始傳於漢世。初惟出嶺南。後出蜀中。故左思蜀都賦云。旁挺龍目。側生荔枝。唐白居易圖序論之詳矣。今閩中四郡所出特奇。蔡襄譜其種類至三十餘品。肌肉甚厚。甘香瑩白。非廣蜀之土也。福唐歲貢白曝荔枝。蜜煎荔枝。肉俱爲上方珍果。白曝須嘉實乃堪。其市貨者多用雜色荔枝入鹽梅。曝成。皮色深紅。味亦少酸。殊失本眞。經曝則可經歲。商販流布。遍及華夏。味猶不歇。百果之盛。皆不及此。又有焦核荔枝。核如雞舌。香味更甜美。或云是木生背陽。結實不完。就者。又有綠色蠟色。皆其品之奇者。本上亦自難得。其蜀嶺荔枝。初生小酢。肉薄核大。不堪白曝。花及根亦入藥。（蘇頌）㊅顧微廣州記云。荔枝冬夏常青。其實大如雞卵。殼朱肉白。核黃黑色。似牛熟蓮子。精者核如雞舌。香甘美多汁。極益人也。（陳藏器）㊆荔枝炎方之果。性最畏寒。易種而根浮。其木甚耐久。有經數百年猶結實者。其實生時肉白。乾時肉紅。日曬火烘。鹵浸蜜煎。皆可致遠。成朶嚥乾者。謂之荔錦。按白居易荔枝圖序云。荔枝生巴峽間。樹形團團。如帷蓋。葉如冬青。花如橘而春榮。實如丹而夏熟。朶如蒲桃。核如枇杷。殼如紅繒。膜如紫綃。瓤肉瀫白如冰雪。漿液甘酸如醴酪。大略如彼。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其實過之。若離本枝。一日而色變。二日而香變。三日而味變。四五日外。色香味盡去矣。又蔡襄荔枝譜云。廣蜀所出。早熟而肉薄。味甘酸。不及閩中下等者。閩中惟四都有之。福州最多。興化最奇。泉漳次之。福州延亘原野。一家甚至萬株。興化上品。大徑寸餘。香氣清遠。色紫殼薄。瓤厚膜紅。核如丁香母。剝之如水精。食之如絳雪。荔枝以甘爲味。雖百千樹。莫有同者。過甘與淡。皆失於中。若夫厚皮尖斜。肌理黃色。附核而赤。食之有渣。食已而澀。雖無酢味。亦自下等矣。最忌麝香。觸之花實盡落也。又洪邁夷堅志云。莆田荔枝名品。皆出天成。雖以其核種之。亦失本體。形狀百出。不可以理求也。沈括筆談謂焦核荔子。乃土人去其大根燔焦種成者。大不然也。(李時珍)

荔枝果品 中今未見用。惟崔元亮方中收之。果實中爲上品。多食亦令人發虛熱。此物喜雙實。尤可愛。宋朝有蔡君謨荔枝譜。其說甚詳。唐杜牧詩云。一騎紅塵妃子笑。無人知是荔枝來。此是川蜀荔枝。亦可生置之長安也。(寇宗奭)

⑨所謂止渴者。亦陽虛而不能化陰。則津液不生。故能止之。猶止泄渴。以白朮健胃生津也。若陽盛而渴者用之。則爲倒施矣。(劉潛江)

【荔枝肉】 卽荔枝之處方用名。詳『荔枝』條。

【荔枝花及皮根】 **主治** 喉痺腫痛。用水煮汁。細細含嚥之。

【荔枝核】 **基本** 屬無患科。爲荔枝之核。

形態 荔枝之核。橢圓而紫褐色。味甘。

性質 甘。溫。濇。無毒。

效能 散寒溼結氣。消疝瘕腫痛。專作疝痛藥。

主治 心痛。小腸氣痛。以一枚煨存性。研末。新酒調服。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目。荔枝核曰。治癩疝氣痛。婦人血氣刺痛。【明】繆希雍本草經疏。論荔枝核曰。核味甘溫。主心痛。小腸氣痛。癩疝。婦人血氣刺痛。以一枚。煨存性。研末。酒調服。蓋其氣溫而通行。入肝腎。散滯氣。辟寒邪。所以能療如上諸證也。【清】黃宮繡本草求眞。論荔枝核曰。荔枝核味甘氣溫。專入肝腎。散滯辟寒。雙核形似睾丸。尤治癩疝卵腫。以其形類相似。有感而通之義也。

配合應用 (一)治脾痛不止。荔枝核煅爲末。醋服二錢。數服卽愈。(衛生易簡方)

(二)治婦人血氣刺痛。用荔枝核。燒存性半兩。香附子炒一兩。爲末。每服二錢。鹽湯米飲任下。名蠲痛散。(婦人良方)

(三)治疝氣癩腫。荔枝核。炒黑色。大茴香炒等分。爲末。每服一錢。溫酒下。(孫氏方)玉環來笑丹。用荔枝核四十九箇。陳皮連白九錢。硫黃四錢。爲末。鹽水打麵糊丸。綠豆大。遇痛時。空心酒服九丸。良久再服。不過三服。其效如神。亦治諸氣痛。(普效方)

(四)治陰腎腫痛。荔枝核燒研酒服二錢。

(五)治腎腫如斗。荔枝核、青橘皮、茴香等分。各炒研。酒服二錢。日三用。量 錢半至三錢。

參攷資料 荔枝核入厥陰。行散滯氣。其實雙結而核肖睾丸。故其治癩疝卵腫有效。類象形之義。(李時珍)

【荔枝草】 **古籍別名** 鏃皮蔥。雪裏青(綱目拾遺)過冬青。天名精(經驗廣集)鳳眼草。鞭師草。隔冬青(草藥方)

形態 荔枝草爲雜草類之一種。冬盡發苗。經霜不枯。三月抽莖。高近尺許。開花細紫成穗。五月遂枯。莖方中空。葉尖長面有麻點。邊有鋸齒。葉色深青。映日有光。背淡白色。有絲筋紋綻露。葉面麻點凹凸分明。皆獨瓣一叢。數十葉可供藥用。

性質 涼。無毒。

主治 涼血消癰腫。楊梅瘡。痔瘡。煎療咽喉十八症。

配合應用 (一)治急驚。荔枝草汁半鎰。水飛過砂砂半分。和勻服之立愈。

(二)治小兒疳積。荔枝草汁入茶盃內。用不見水雞一隻。將銀針鑽數孔。浸在汁內。汁浮於肝。放飯鍋上蒸熟。食之卽愈。(集驗方)

(三)治喉痛或生乳蛾。用荔枝草

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

搗爛。加米醋絹包裹縛筋頭上。點入喉中。數次愈。(救生苦海方)

㊃治雙單蛾。雪裏青一握。搗汁半茶鍾。滾水冲服。有痰吐出。如無痰。將雞毛探吐。若口乾。以鹽湯醋湯止渴。切忌青菜菜油。(集效方)

㊄治痔瘡。雪裏青汁。炒桃米爲末。柿餅搗丸如桐子大。每服三錢。雪裏青煎湯下。(活人書方)

㊅治白濁。雪裏青草。生白酒煎服。

㊆治無名腫毒。雪裏青一握。鮮者佳。加金剪刀同搗爛。入酒糟半鍾。共搗數。不必留頭。輕者自散。重者雖出膿。無效。(葉天士效方)

㊇治鼠瘡。用過冬青。即荔枝草。又名天名精。五六枚。同鯽魚入鍋煮熟。去草及魚。汁飲之。(經驗廣集方)

鳳眼草。即荔枝草。土人稱爲賴師草。醫家名隔冬青。涼血止崩漏。散一切癰毒最效。(汪連仕草藥方)

【荔枝殼】主治　婦人血崩。燒研存性。空心酒服。小兒痘出無漿。煎湯飲。

參攷資料　荔枝殼功能理血。

透發分標。凡疹瘡難透。及痘出模糊。非此不能解表成漿。

【荔珠奴】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【荔草】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【荔蓼】即馬蘭子之古籍別名。典見別錄。詳『馬蘭子』條。

【荔錦】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【茛】㊀即草烏頭苗之古籍別名。典見本草拾遺。詳『草烏頭』條。㊁即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【茛根炭】即茜草根焙炒成者。詳『茜草根』條。

【茜草】即茜草根之原名。詳『茜根草』條。

【茜草根】命名　茜者。西也。本品東方有而少。不如西方多。藥用其根。故名。

處方用名　茜根炭。

古籍別名　蒨茅蒐。茹蘆。地血。

塔草。四岳近陽草。四天王草。四補草。鳳車草。(土宿)過山龍。(補遺)牛蔓。(綱目)地紅。地蘇。血藤。茹藤。過山紅。(和漢藥考)嘉草。西天王草。(土宿眞君本草)

外國名稱　Radix Rubiae. (拉丁)

基本　屬茜草科。爲茜草之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。茜草根產河南禹州。山西等處。秋季新。



茜草根

形態　茜草爲多年生蔓草。或自生。或種植。春日自宿根抽莖。莖方中空。有刺。刺皆向下。葉形卵圓。或如心臟而長。邊緣有細刺。皆輪生。入秋。梢頭節間。俱簇生穗狀之花。大分許。色白四瓣。果實形如球。色黑。類山椒子。其根形如圓柱。大若稻稈。或如羽莖。多帶殘莖。幹根有多數之節。外面色紅黃或紅褐。久置空氣中。則色變深。味稍甘後乃變收斂性之苦味。有一種臭氣。嚐之則唾津染紅。

採取　二月三月間採之。尤須掘取經過數年肥大之根爲佳。

製法　雷敦曰。凡使茜草。須用銅刀於槐砧上剉。日乾。勿犯鉛鐵氣。勿用赤柳草根。眞相似。只是味酸濇。誤服令人患內障眼。遠服甘草水止之。即毒氣散。

性質　苦寒無毒。

成分　茜根之主成分爲阿里乍林(Alizarin $C_{14}H_8O_4$)與勃兒富林(Purpurin $C_{14}H_8O_5H_2O$)阿里乍林與葡萄糖抱合之糖原質。謂之魯培利台栗克酸(Ruberytheric acid, $C_{32}H_{30}O_{14}$)因受發酵作用而生阿里乍林。

效能　吐衄下血。祛瘀生新。用爲通經藥。又作利尿藥用。於心臟病及爲發汗藥用於風邪。

主治　寒溼風痺。黃疸補中。(本經)止血內崩下血。膀胱不足。墜跌蟲毒。久服益精氣。輕身可以染絳。又茜根主痺及熱中傷跌折。(別錄)

歷代記述攷證　【唐】甄權藥

(別錄)染緋草。(蜀本)血見愁。鐵

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性本草論茜草根曰。治六極傷。心肺吐血。溺血。【宋】大明諸家本草論茜草根曰。止鼻洪。尿血。產後血暈。月經不止。帶下。撲損瘀血。泄精。痔瘻。瘡癰。排膿。酒煎服。【明】李時珍本草綱目論茜草根曰。通經脈。治骨節風痛。活血行血。【明】繆希雍本草經疏論茜草根曰。茜根味苦寒。甄權云。甘。潔古微酸。鹹。無毒。蓋盡之矣。行血涼血之要藥。非苦不足以洩熱。非甘不足以和血。非鹹不足以入血輭堅。非溫少陽之氣。不足以通行故主痺及疸。疸有五。此其爲治。蓋指蓄血發黃而不專於濕熱者也。痺者血病行血輭堅。則痺自愈。甘能益血而補中。病去血和。補中可知矣。苦寒能下洩熱。熱氣故止內崩。及下血除熱。故益膀胱。瘕跌。則血瘀。血行則瘕跌自安。涼無病之血。行已傷之血。故治蠱毒。藥性論味甘。主六極傷心肺吐血。溺血。日華子味酸。止鼻洪。帶下。產後血暈。乳結。月經不止。腸風痔瘻。排膿。治瘡癰。泄精。尿血。撲損瘀血。皆取其涼血行血。苦寒泄熱之功耳。【清】黃宮繡本草求眞論茜草根曰。茜草味酸。鹹。寒。色赤。功用略有似於紫草。但紫草則止入肝涼血。使血自爲通活。此則能入肝與心胞。使血必爲走泄也。故凡經閉。風痺。黃疸。因於瘀血內阻者。服之。固能使瘀下行。如值吐崩尿血。因於血滯而見艱澁不快者。服之。更能逐瘀血止。總皆除瘀去血之品。與紫草血熱則涼之意。貌同而實異。不可混也。但血虛發熱者忌用。根可染絳。忌鐵。【清】陳修園本草經讀論茜草根曰。氣味苦寒者。得少陰之氣化也。風寒溼三氣合而爲痺。而此能入手足少陰。俾上下交通。則中土自和。斯有補中之效矣。中土和。則溼熱之氣自化。而黃疸自愈矣。又素問以蘆菰二兩。烏鯽骨四兩。丸以雀卵。飲以鮑魚汁。治氣竭肝傷。脫血枯經閉。丈夫陰痿。精傷。名曰四烏鯽骨一蘆菰丸。蘆菰即茜草也。亦取其入少陰以生血。補中宮以統血。汁可染絳。以血而能行血。無後人以此三味。入烏骨白絲毛雞腹內。以陳酒童便煮爛。烘乾爲丸。以百勞水下五七十丸。治婦人倒經。血溢於上。男子咳嗽吐血。左手關脈弦。背上畏寒。有瘀血者。【清】楊時泰本草述鈎元論茜草根曰。茜根味甘而微酸。鹹。色赤。氣溫。專於行血活血。本經治寒溼風痺。固以其溫而行之矣。乃亦以治黃疸者。蓋血挾熱則毒內瘀而發黃。以寒涼行之。不若以溫從治之。此義可通於血證。凡滯血發熱者。其脈濇。外證必兼嗽水。及嘔惡痰涎。或兩脚厥冷。或小腹結急。或唾血。或鼻衄。心煩燥渴。皆其明驗。又熱毒瘀血。在小便爲淋痛。在大便爲腸風。繹此則茜根之療唾血衄血及尿血溺血。非從治而導瘀之故歟。夫血以寒泣。亦以熱瘀。熱能使陰不守。致血狂越而四溢。亦能瘀之使不循經而四溢。然則療血證者。可不知行之活之而徒守降火一法乎。甄氏又言治六極傷心肺吐血溺血。夫六極皆虛勞證。何以茜根亦治之。觀金匱以大黃䗪蟲丸主乾血。則知茜根之治六極所傷而爲吐血溺血者矣。夫血蓄於內。瘀則易治。乾則難治。茜根非能治乾血也。特有內傷者。卽能瘀血。不獨吐衄者有之。且如女子血證。豈惟閉者爲瘀。卽月經不止。或亦調養失節。內傷元氣。致血壅隧道。不能歸經而錯出。是皆得以茜根行之者。不可不知也。

【國外學說】和漢藥考曰。西洋茜草。亦多年生草本。從前南歐及東歐。栽種甚多。莖高一二尺。葉爲廣披鍼形。邊緣有細刺。六葉輪生。花開於梢頭。與葉昧爲黃綠色之小花。攢簇如穗。果實爲漿果。然甚小。荷蘭藥鏡曰。茜草以根入藥。又爲紅色染料。性溫。昧帶苦。有收澁、解凝、利尿之效。故能淨刷肝、脾、腎及子宮。而用於脾病、黃疸、水腫諸種腫病。爲一種疏解開達之良藥。治肝脾壅塞諸症。以茜根水煎。或爲泡劑服之。極驗。跌打損傷及內部創傷。用之則散瘀血。止疼痛。俱有速效。水煎或葡萄酒、麥酒浸服。或燒酒浸。製爲丁幾劑用。一說。服此根後。則小便及婦人之乳汁。俱變紅色。終則骨亦變紅。以此用於諸骨病。有奇效。（或云久服此藥。則諸骨變輭。故於骨病有害）然

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有人用於小兒佝僂病。試服此根四年。終奏殊效。誠經驗之良方也。

方用茜根二錢。乾橙皮一分六釐。茴香搗碎二分半。右剉細。同入磁罐。以水六磅。煎至二磅。冷定。取上清收貯玻璃瓶中。作一日之服量。名茜根煎。凡小兒諸骨。柔輭痿弱。雞於舉動。或諸骨已彎屈者。祇須無他惡症。服此決能恢復。但此煎劑中宜酌加蜂蜜。令其適口。即乳母亦可服之。若別有大便祕結。或下利腹脹之患者。則各加對症之藥。此劑苟非連服數月。必不見效。

茜根於經閉爲最有效之藥。而且性最平穩。不如他種通經藥有攻擊驅泄之害。

近人學說 張山雷曰。茜根性寒。所主多血熱。失血之症。古今說解。都無異義。而本經主治。獨以寒溼二字爲冠。最爲不倫。雖各本無不盡同。然病情藥性。大相矛盾。此必古人傳寫之訛。不可望文生義。曲爲附和。風痺指血瘀血熱痺者。不行而言。茜草寒涼。又色赤入血。而能通瘀活絡。是以主之古人論痺。本有熱痺一候。此必不可與上文寒溼。連屬讀之。而謬謂可治寒痺溼痺也。黃疸本屬熱症。此則并能清熱逐瘀。繆仲醇謂指蓄血發黃。而不專於溼熱。其說甚是。補中以清熱言。熱淫於裏。則中氣傷。惟去其熱。清其血。則中得其補。經文最簡。皆當觀其會通。並非泛泛言之。別錄止血。以血熱湧泄言之。一以清血中之熱。一以通壅積之瘀。斯血循古道而不橫逆。崩中亦以龍雷太亢之時而言。如其所失太多。陽氣已竭。即非所宜。痿跌必有血瘀。瘀則蘊而生熱。故宜清熱行瘀。蠱毒皆南方熱淫之毒。清血熱者必能解毒。陳藏器謂冀荷與茜主蠱爲最。惟膀胱不足一證。殊屬費解。姑且存而不論。以俟知者。又曰。瀕湖謂茜根赤色而氣溫。味微酸而帶鹹。色赤入營。氣溫行滯。味酸入肝而鹹走血。專於行血活血。俗方治女子經水不通。以一兩煎酒服之甚效。

配合應用 ㊀治吐血衄血。諸血熱妄行。溢出上竅。茜草、地黃、麥門冬、當歸、阿膠、茅根、童便。

㊁治腸風下血。茜草、牛膝、地黃、黃耆、地榆、芍藥、荊芥穗。

㊂佐地榆治檳瘡魚口有神。

㊃同鹿蟲乳香沒藥桂心牛膝、地黃主跌。

㊄治吐血不定。茜根一兩。搗末。每服二錢。水煎冷服。亦可水和二錢服。(周應簡要濟衆方)

㊅治吐血躁渴及解毒。用茜根、雄黑豆去皮甘草炙等分爲末。井水糊丸。彈子大。每服溫水化一丸。(聖濟總錄方)

㊆治鼻血不止。茜根、艾葉各一兩。烏梅肉二錢半。爲末。煉蜜丸。梧子大。每烏梅湯下五十丸。(本事方)

㊇治五旬行經。婦人五十後。經水不止者。作敗血論。用茜根一名過山蟲一兩。阿膠、側柏葉炙黃芩各五錢。生地黃一兩。小兒胎髮一枚。燒灰。分作六帖。每帖水一盞半。煎七分。入髮灰服之。(經驗方)

㊈治心痺心煩內熱。茜根煮汁服。(傷寒類要方)

㊉解中蠱毒。吐下血如豬肝。茜草根、蘘荷葉各三分。水四升。煮二升。服卽愈。(陳延之小品方)

㊊黑髭鬚。茜草一斤。生地黃三斤。取汁。以水五大盆。煎茜絞汁。撏滓再煎三度。以汁同地黃汁微火煎如膏。以瓶盛之。每日空心溫酒服半匙。一月髭鬚如漆也。忌蘿蔔五辛。(聖濟總錄方)

㊋治蠼蛄漏瘡。茜根燒灰。千年石灰等分爲末。油調傅之。(儒門事親方)

㊌治脫肛不收。茜根、石榴皮各一握。酒一盞。煎七分。溫服。(聖惠方)

㊍預解瘡疹。時行瘡疹。正發。服此則可無患。茜根煎汁。入少酒飲之。(奇效良方)

用量 錢半至二錢。

配合宜忌 畏鼠姑汁。忌鐵、鉛。制雄黃。

參攷資料 ㊀茜草主蠱毒。煮汁服。周禮庶民掌除蠱毒。以嘉草攻之。嘉草者。蘘荷與茜也。主蠱爲最。(陳藏器)㊁俗人治痛風用草藥。取速效。如石絲爲君。過山龍等佐之。皆熱性而燥。不能食陰。却能燥溼。病之淺者。溼痰得燥而開。瘀血得熱而行。故亦暫效。若病深而

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

血少者。則愈拔愈虛。而病愈深矣。（朱震亨）㈢茜根赤色。而氣溫味酸而帶鹹。色赤入營。氣溫行滯。味酸入肝而鹹走血。手足厥陰血分之藥也。專於行血活血。俗方治女子經水不通。以一兩煎酒服之。一日卽通。甚效。名醫別錄言其久服益精氣。輕身。華子言其泄精。殊不相合。恐未可憑。（李時珍）㈣按陸佃云。許氏說文言蒐乃人血所化。則草鬼爲蒐。以此也。陶隱居本草言東方有而少。不如西方多。則西草爲茜。又以此也。陸璣云。齊人謂之茜。徐人謂之牛蔓。又草之盛者爲蒨。牽引爲茹蘆。覆爲藬。則蒨茹藬之名。又取此義也。人血所化之說。恐亦俗傳耳。土宿眞君本草云。四補草。其根茜草也。一名西天王草。一名四岳近陽草。一名鐵塔草。鳳車兒草。（李時珍）㈤茜根生喬山山谷。二月三月採根。曝乾。又曰。苗根生山陰谷中。蔓延草木上。莖有刺。實如椒。（別錄）㈥染緋草。葉似紫葉。頭尖下闊。莖葉俱濶。四五葉對生。節間蔓延草木上。根紫赤色。所在皆有。八月採。（韓保昇）㈦今圃人亦作畦種蒔。故史記云。千畝卮茜。其人與千戶侯等。言其利厚也。（蘇頌）㈧茜草十二月生苗。蔓延數尺。方莖中空。有筋。外有細刺。數寸一節。每節五葉。葉如烏藥葉而糙澀。面青背綠。七八月開花結實。如小椒大。中有細子。（李時珍）

【茜草莖】性實功用。詳『茜草根』條。

【茜草塵】卽茜草。詳『茜草根』條。

【荊甄】卽天名精之古籍別名。典見爾雅。詳『天名精』條。

【荸麻仁】卽大麻仁之古籍別名。典見本經。詳『大麻仁』條。

【荳子】卽覆盆子之古籍別名。典見爾雅。詳『覆盆子』條。

【茨】卽刺蒺藜之古籍別名。典見爾雅。詳『刺蒺藜』條。

【茨梧桐】卽鳥不宿之別名。詳『鳥不宿』條。

【茨菇】卽慈菇。詳『慈菇』條。

【茨菰】卽慈菇。詳『慈菇』條。

【茨蒒】卽知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『知母』條。

【莽白】原名 菰。

命名 本名根交結而色白。故名。

古籍別名 茭草。（說文）蔣草。（綱目）芽名菰筍。（綱目）茭筍。（日用）菰菜。（圖經）其苗有莖梗者。名菰蔣草。（綱目拾遺）

外國名詞 Zizania aquatica, L.（拉丁）マコモ（日本）

基本 係禾本科菰屬。爲菰之筍。其葉根米均詳見各條。

產地 生江湖池澤中。

形態 菰爲水草類之多年生草本。高五六尺。春月生新芽。如筍狀。卽菰筍。亦卽俗名茭白。生熟可啖。爲蔬類植物之一種。其葉細長而尖。有平行脈。夏秋之間。梢上開花。花單性。列爲圓錐花序。結實如米。可煮粥飯。其筍可供食與藥用。



茭白

性質 甘。冷。滑。無毒。

主治 利五臟。邪氣。酒皰面赤。白癩。瘧瘕。目赤。熱毒。風氣。卒心痛。可鹽醋煮食之。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺。論菰筍曰。去煩熱。止渴。除目黃。利大小便。止熱痢。雜鯽魚爲羹食。開胃口。解酒毒。壓丹石毒發。

參攷資料 ㈠菰筍寒滑。不可多食。（孟詵）㈡菰之種類。皆極冷。不可過食。甚不益人。惟服金石人相宜耳。（蘇頌）

【茭米】原名 菰米。

命名 本品乃茭草之子實。故名。

古籍別名 彫蓬。（爾雅）彫蔬。彫胡米。安胡。（綱目）

形態 茭米爲六穀之一種。色白而滑膩。作飯香脆。可供藥用。

採取 霜後採之。

性質 甘。冷。無毒。

主治 止渴。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論茭米曰。解煩熱。調腸胃。

【莽白根】古籍別名 菰根。菰蔣。（綱目）

113／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　甘。大寒。無毒。

主治　腸胃痼熱。消渴。止小便利。搗汁飲之。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論莢白根曰。燒灰和雞子白。塗火燒瘡。

參攷資料　莢白根亦如蘆根。冷利更甚（蘇頌）

【莢耙】　原名　菰手。

命名　本品爲菰菜三年者。中心生白薹如藕狀。似兒臂。故有菰手之稱。卽俗謂之莢耙也。

古籍別名　菰首（蜀本草）烏蠻（拾遺）蓮蕸（綱目）

性質　甘。冷。滑。無毒。

主治　心胸中浮熱。風氣。滋菌。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論莢耙。麥食止渴。及小兒水痢。

參攷資料　莢耙性滑。發冷氣。令人下焦寒。傷陽道。禁蜜食。發痼疾。服巴豆人不可食（孟詵）

【莢草】　卽莢白之古籍別名。典見訊文。詳『莢白』條。

【莢蚤】　卽壁蟲。詳『壁蟲』條。

【莢筍】　卽莢白之古籍別名。典見

日用本草。詳『莢白』條。

【莢蟲】　卽壁蟲。詳『壁蟲』條。

【莢雞】　卽鳧鷖之古籍別名。典見綱目。詳『鳧』條。

【莢兎】　卽伏兎。詳『茯苓』條。

【茯苓】

命名　本品乃松之神靈。伏結而成。故名。俗作茯苓。乃傳寫之訛耳。

原名　伏靈。

處方用名　白茯苓。白雲苓。白苓。浙茯苓。白苓塊。浙苓。雲茯苓。苓乳糕。雲苓。白苓糕。雲苓塊。白糕。製茯苓。

古籍別名　伏兎。（本經）松腹。不死薬。（記事珠）更生雪腹。金翁。兎絲。形絲不死麵。萬岑精。絳晨伏胎。（和漢藥考）

外國名詞　Pachyma Cocos.（拉丁）Lycoperdon.（英）

基本　係生於截斷松樹根部下之一種茸類菌蠹物。

產地　陳仁山藥物生產辨云。茯苓以雲南產者爲雲苓。最正地道。質結不能刨片。產安徽者名安苓。選起最好者爲排苓。又名天生苓。其次大塊苓。中塊苓。小塊苓之分。刨片者俱用安徽苓。原梢來者名平片。餘碎作切片。原個到廣東刨片名齊厚片。頂厚片。上厚片。中厚片。頂卷。齊頂卷。上卷。中卷。上散片。白茯邊之分。赤茯單產日本。以橫濱爲最。神戶次之。

形態　茯苓爲大小不同之塊。大如兒頭。表皮極厚。擁腫如疣。乾則現黑褐色。而生細皺。內部爲肉質。粒狀。色白或淡紅。白者質堅實。名白茯苓。上品也。淡紅者質輕虛。名赤茯苓。品下矣。

採取　採收茯苓。自七月下旬。至來年三月止。山民用茯苓突。刺入截斷松樹近旁之土中。以探索茯苓。若覺有如芋塊之物。或出茯苓突嗅之。覺帶有茯苓之臭氣者。依之發掘。每得茯苓。百不失一。茯苓突者。乃比鐵火箸稍粗之鐵棒也。一端裝柄。作丁字式。茯苓掘出之後。先浸水中一宿。以小刀削去外皮。切成小片。陰乾。約六七日。包裹收貯。

製法　雷敩曰。凡使茯苓。用皮去。心搗細。於水盆中攪濁。浮者濾去之。此是茯苓赤筋。若難服餌。令

人瞳子並黑睛點小。兼目盲。陶弘景曰。作丸散者。先煮一二沸。乃切曝乾用。後人有用乳蒸者。

性質　甘。平。無毒。

成分　未經細加試驗。但其主要成分。則爲匹克聖。

效能　益心脾。行水濕。用爲利水藥。以治水腫與淋病。又爲强壯藥。用於衰弱者。

作用　與胃極無變化。由腸壁吸入血中。能增高血壓。使腎臟之分泌機能亢進。

主治　胸脇逆氣。憂恚驚邪恐悸。心下結痛。寒熱煩滿。欬逆口焦舌乾。利小便。久服安魂養神。不饑延年（本經）止消渴。好睡。大腹淋漓。臍中痰水。水腫淋結。開胸脇。調臟氣。伐腎邪。長陰益氣。力保神氣。

（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論茯苓曰。開胃止嘔逆。善安心神。主肺癆痰壅。心腹脹滿。小兒驚癎。及女人熱淋。【宋】大明日華諸家本草論茯苓曰。補五勞七傷。開心益志。止健忘。煖腰膝。安胎。【金】張元素珍珠囊論茯苓曰。止

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

渴。利小便。除溼益燥。和中益氣。利腰臍間血。【元】李東垣用藥法象論茯苓曰。逐水燥脾。生津導氣。平火止泄。除虛熱。開腠理。【元】王好古湯液本草論茯苓曰。瀉膀胱。益脾胃。治腎積奔豚。【明】繆希雍本草經疏論茯苓曰。茯苓生於古松之下。味甘平。性則無毒。入手足少陰手太陽足太陰陽明經。胸脇逆氣。邪在手少陰也。憂恚驚邪。皆心氣不足也。恐悸者。腎志不足也。心下結痛。寒熱煩滿。欬逆口燋舌乾。亦手少陰受邪也。甘能補中。淡而利竅。補中則心脾實。利竅則邪熱解。心脾實則憂恚驚邪自止。邪熱解則心下結痛。寒熱煩滿。欬逆口燋舌乾。自除。中焦受溼。熱則口爽。渴。溼在脾。脾氣不行。則好睡大腹者。脾土虛不能利水。故腹脹大也。淋瀝者。脾受溼邪。則水道不利也。腫中痰水水腫。皆緣脾虛所致。中焦者。脾土之所治也。中焦不治。故見欬痰利水實脾。則其證自退。安開胸膈。調臟氣。伐腎邪者。何莫非利水除溼。解熱散結之功也。長陰益氣。力保神守。中久服安魂養神。不饑延年者。補心脾。伐腎邪。除溼利竅之極功也。白者入氣分。赤者入血分。補心益脾。白優於赤。通利小腸。專除溼熱。赤亦勝白。【清】黃宮繡本草求眞。論茯苓色白入肺。味甘入脾。味淡滲溼。故書皆載上滲脾肺之溼。下伐肝腎之邪。其氣先升後降。凡人病因水溼而見氣逆煩滿。心下結痛。嘔逆囉吐。口苦舌乾。水腫淋結。憂恚驚恐。及小便或澀或多者。服此皆能有效。故入四君。則佐參朮以滲脾家之溼。入六味。則使澤瀉以行腎邪之餘。最爲利水除溼要藥。書曰。健脾即水去。而脾自健之謂也。又曰。定魄即水去。而魄自安之意也。且水既去。則小便自開。安有癃閉之慮乎。水去則內溼已消。安有小便多見之謂乎。故水去則胸膈自寬。而結痛煩滿不作。水去則津液自生。而口苦舌乾悉去。惟水衰精滑。小便不禁。非由水溼致者切忌。恐其走表洩氣。故耳。苓有赤白之分。赤入小腸。白入膀胱。白微有補。赤則止瀉溼熱。一氣一血。自不容混。如此至皮專治水腫膚腹。以皮行皮之義。以大塊堅白者良。【清】賈九如辨藥指南論茯苓曰。茯苓苓字世俗訛傳。史記及仙經。皆名茯靈。假松之眞液而生。受松之靈氣而結。裹坤陰最厚。味獨甘淡。甘則能補。淡則能滲。甘淡屬土。用補脾陰。土旺生金。兼益肺氣。主治脾胃不和。泄瀉腹脹。胸脇逆氣。憂思煩滿。胎氣少安。魂魄驚跳。腸間痰氣。蓋甘補則脾臟受益。中氣既和。則津液自生。口焦舌乾。煩渴亦解。又治下部溼熱。淋瀝水腫。便澀黃赤。腰膊不利。停蓄邪水。蓋淡滲則膀胱得養。腎氣既旺。則腰膊同血自利。津道流行。益肺於上。源脾於中。部。令脾肺之氣。從上順下。通調水道。以輸膀胱。故小便多而能止。澁而能利。惟瘡瘡起脹時禁用。恐滲泄不能貫衆。其赤茯苓。淡赤微黃。但不堪入肺。若助脾行痰。與白者功同。因松種不一。故分赤白。原無白補赤瀉之分。

辨僞　㊀鄭肖岩曰。茯苓當取整個切片。照之微有筋膜者。眞切之其片自捲。以結白爲上。近來有一種鱉片。多以米粉和苓末假造混充。閱又有以米粉包裹松根造成整個者。亦宜細辨。㊁曹炳章曰。按寇宗奭曰。茯苓生於多年大松之根。乃松之精氣盛而抑鬱發泄於外。結爲茯苓。故不抱根。離其本體。有零之義也。精氣不盛。止能附結本根。既不離本。故曰伏神。淮南子云。千年之松。下有茯苓。上有菟絲。寇宗奭曰。上有菟絲之說。甚爲可信。李時珍曰。下有茯苓。上有靈氣。如絲之狀。土人亦時見之。非菟絲也。典術云。松脂入地千年爲茯苓。望松樹赤者。下有茯苓。此皆言天然野生之茯苓。其生長在十年或數百年不等。得松之精氣足。其皮黑綱。其肉堅緻。結白不論何地產。皆爲佳品。惟雲南產。天然生者爲多。亦皮薄起綱紋。肉帶玉色。體糯實重爲最佳。惜乎出產不多。其他產處安六安於潛者。種者爲多。其法用本地天產鮮茯苓。搗碎如泥。種於肥土山業茂松根上。先將松根傍離根二尺餘。掘去泥土。至見松根。將茯苓層層每株約一兩。以竹管裹附松之支根上。閱半年施肥料一次。至三年起掘。則成二三

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

斤重量之茯苓。然其生結不在原種根上。隨氣息止而結苓。往往有種於西枚根而結苓在東枚根間有種而不結者。且松根下結苓而葉必萎黃或發紅色。此卽松之精氣。收聚凝結爲苓也。故土人望而卽知其謂有苓。種苓外皮鬆浮而厚。內肉鬆而不堅結。色白無神。卽種苓也。爲次。凡茯苓有筋者去之。雷斅云。茯苓有赤筋者。誤服令人目中有星。多服致目盲。服茯苓者注意之。

配合應用 ㊀白茯苓。得煉蜜。胡麻仁餌之。可以辟穀。延年不饑。

㊁入五苓散。利水。除溼。暑氣勝則去桂。

㊂得人參、白朮、橘皮、山藥、穭豆、芍藥、甘草。爲補脾胃之上藥。

㊃得二朮、澤瀉、車前、白芍藥、橘皮、木瓜、豬苓。爲消水腫之要劑。

㊄入六味地黃丸。能伐腎邪。

㊅入補心丹。則補心安魂養神。

㊆治血虛心汗。別處無汗。獨心孔有汗。思慮多則汗亦多。宜養心血。以芡湯調茯苓末服一錢。（證治要訣方）

㊇治心虛夢洩。或白濁。白茯苓末二錢。米湯調下。日二服。東坡方也。（直指方）

㊈治妊娠水腫。小便不利。惡寒。赤茯苓去皮。葵子各半兩。爲末。每服二錢。新汲水下。（禹諦師方）

㊉治卒然耳聾。黃蠟不拘多少。和茯苓末細嚼。茶湯下。（普濟方）

㊊治血餘怪證。十指節斷壞。惟有筋連。無節肉蟲出。如燈心長數寸。遍身綠毛卷。名曰血餘。以茯苓、胡黃連煎湯飲之愈。（夏子益奇疾方）

㊋治水腫尿澀。茯苓皮、椒目等分。煎湯日飲。取效。（普濟方）

㊌治胸脇氣逆脹滿。茯苓一兩。人參半兩。每服三錢。水煎服。日三。（聖濟總錄方）

㊍治小便頻多。白茯苓去皮。乾山藥去皮。以白礬水淪過。焙等分。爲末。每米飲服二錢。（儒門事親方）

㊎治下虛消渴。土盛下虛。心火炎爍。腎水枯涸。不能交濟而成渴證。白茯苓一斤。黃連一斤。爲末。熬天花粉作糊丸。梧桐子大。每溫湯下五十丸。（德生堂經驗方）

㊏治下部諸疾。龍液膏。堅實白茯苓去皮焙研。取清溪流水。浸去筋膜。復焙。入瓷罐內。以好蜜和勻。入銅釜內。重湯煮柴灰煮一日。取出收之。每空心白湯下二三匙。解煩鬱躁渴。一切下部疾皆可除。（積善堂方）

㊐治飧泄滑痢不止。白茯苓一兩。木香煨半兩。爲末。紫蘇木瓜湯下二錢。卽止。（百一選方）

㊑治面黑雀斑。白茯苓末。蜜和。夜夜傅之。二七日愈。（姚僧垣集驗方）

㊒治猪雞骨哽。五月五日。取楮子曬乾。白茯苓等分。爲末。每服二錢。乳香湯下。一方不用楮子。以所哽骨煎湯下。（經驗良方）

㊓治漏痔神方。赤白茯苓。去皮。浸藥各二兩。破故紙四兩。石臼搗成一塊。春秋酒浸三日。夏二日。冬五日。取出。木籠蒸熟。曬乾爲末。酒糊丸。梧桐子大。每酒服二十丸。漸加至五十丸。（革炳集驗方）

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡陰虛而無溼熱者禁用。惡白斂。畏牡蠣、地榆、雄黃、秦艽、鼈甲。忌米醋。及酸物。馬鬩爲之使。得甘草、防風、芍藥、紫石英、麥門冬、共療五臟。

著名方劑 ㊀朱雀丸。治心神不定。恍惚健忘。心火不降。腎水不升。時復振跳等症。（百一選方）茯神二兩。（去皮）沉香半兩。上共研末。煉蜜丸。小豆大。每服三十丸。食後人參湯下。㊁威喜丸。治丈夫元陽虛憊。精氣不固。小便下濁。淋瀝常漏。夢寐多驚。頻頻遺泄。婦女白淫白帶。並主之。（局方）白茯苓四兩。（去皮作匾）豬苓四錢半。（入內煮二十餘沸。取出日乾。去豬苓爲末）上藥以黃蠟搜和丸彈子大。每嚼一丸。空心津下。以小便清爲度。忌米醋。㊂茯苓丸。治心腎俱虛。神志不守。小便淋瀝。或夢遺白濁。（三因方）白茯苓、赤茯苓各等分。上藥爲末。新汲水飛去沫。控乾。以地黃汁同搗。酒煮作膏。和丸。彈子大。空心鹽湯嚼下一丸。㊃茯菟丸。治夢遺滑精。赤白便濁。以及強中消渴。（局方）茯苓、石蓮子各三兩。菟絲子十兩。（酒浸）五味子八

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

兩上共研末。以山藥六兩。酒煮糊丸。痛精鹽湯下。赤濁燈心湯下。白濁茯苓湯下。消渴米飲下。

參攷資料 ㈠茯苓白色者補。赤色者利。俗用甚多。仙方服食亦爲至要。云其通神而致靈。和魂而鍊魄。利竅而益肌。厚腸而開心。調營而理衛。上品仙藥也。善能斷穀不飢。（陶弘景）㈡茯苓赤瀉白補。上古無此說。氣味俱薄。性浮而升。其用有五。利小便也。開腠理也。生津液也。除虛熱也。止瀉也。如小便利或數者。多服則損人目汗多人服之亦損元氣。天人爲其淡而滲也。（張元素）㈢小便多能止之。小便濇能利之。與車前子相似。雖利小便而不走氣。酒浸與光明朱砂同用。能秘童元。味甘而平。如何是利小便耶。（王好古）㈣茯苓茯神生大山山谷大松下。二月八月採陰乾。（別錄）㈤今出鬱州。大者如三四升器。外皮黑而細皺。內堅白。形如鳥獸龜鱉者良。虛赤者不佳。性無朽蛀。埋地中三十年。猶色理無異也。（陶弘景）㈥今泰山亦有。茯苓實而理小不復採用。第一出華山。形極粗大。雍州南山亦有。不如華山。（蘇恭）㈦所在大松處皆有。惟華山最多。生枯松樹下。形塊無定。以似龜鳥形者爲佳。（韓保昇）㈧范子計然云。茯苓出蒿山及三輔。淮南子言千年之松。下有茯苓。上有菟絲。與術言松脂入地千歲爲茯苓。望松樹赤者有之。廣志言茯神乃松汁所作。勝於茯苓者。云卽茯苓實着松根者生朱提濮陽縣。（掌禹錫）㈨今大華嵩山皆有之。出大松下。附根而生。無苗葉花實。作塊如拳。在土底。大者至數斤。有赤白二種。或云松脂變成。或云假松氣而生。今東人見山中古松。久爲人斬伐。其枯折槎枒枝葉不復上生。者謂之茯苓。掇。卽於四面丈餘地內。以鐵頭錐刺地。如有茯苓。則錐固不可拔。乃掘取之。其掇大者。茯苓亦大。皆自作塊。不附着根。其包根面輕虛者爲茯神。則假氣生者。其說勝矣。龜策傳云。茯苓在菟絲之下。狀如飛鳥之形。新雨已霽。天晴無風。以火夜燒菟絲去之。卽篝燭此地。覆之。火滅。卽記其處。明乃掘取。入地四尺或七尺得矣。此類今不聞有之。（蘇頌）㈩下有茯苓。則上有靈氣。如絲之狀。山人亦時見之。非菟絲子之菟絲也。注淮南子者。以菟絲子及女蘿爲說誤矣。茯苓有大如斗者。有堅如石者。絕勝其輕虛者不佳。蓋年淺未堅故爾。劉宋王微茯苓贊云。皓苓下居。形絲上蒼。中狀雞鳧。其容龜蔡。神侔少司。保延幼艾。終志不移。柔紅可佩。觀此形絲。卽菟絲之證矣。寇氏未解此義。（李時珍）⑪茯苓乃松之精汁。流注於根而生。是則天之陽。以下返其宅者也。下有茯苓。其松巔上有茯苓苗。名威喜芝。茯苓在土中。氣自能上應於苗。得松之精。則有水性。能疏土也。凝土之質。味淡色白。功主滲利。能行水也。其氣不相連接。自上應於苗。故能化氣上行而益氣。（唐容川）⑫有謂茯苓善滲。凡下元不足者忌之。非也。夫茯苓爲古松精華。蘊結而成。入地最久。得氣最厚。其質重。其氣清。其味淡。重能培土。清能益金。淡能利水。惟其得土氣之厚。故能調三部之虛。盧熱虛火。脾虛痰溼。凡涉虛者皆宜之。以其中和粹美。非他迅利剋伐者比也。又能爲諸陰藥之佐。而去其滯。爲諸陽藥之使。而宣其道。補不滯。滲泄不峻。利精純之品。無以過之。乃治虛勞者。久已與澤瀉同棄。殊爲良藥惜矣。（理虛元鑑）⑬茯苓一味。爲治痰主藥。痰之本水也。茯苓可以行水。痰之動溼也。茯苓又可行溼。（世補齋）⑭松之餘氣。爲茯苓。楓之餘氣。爲猪苓。竹之餘氣。爲雷丸。亦名竹苓。猪苓在本經爲中品。雷丸在下品。茯苓在上品。方藥用之獨多。以其得松之精英。久服可以安魂養神。不飢延年也。又有一種楠苓。生於楠樹。其形如覃。可治乳癰。見趙恕本草綱目拾遺。（冷廬醫話）

【茯苓皮】外國名詞 Smilax sinensis （拉丁）（Cortex）（英）

主治 水腫膚脹。利水道。開腠理。

參攷資料 茯苓皮行水而不耗氣。功勝大腹皮。其用法。去心搗末。濾過用。猪溺者爲赤筋。能傷目。（醫學辭典）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【茯苓粉粥】基本 本品以茯苓粉和米煮成之粥。

主治 清上實下。

【茯苓酒】製法 用茯苓粉和麴米釀酒飲。

主治 頭風虛眩。暖腰膝。療五勞七傷。

【茯神】命名 本品由松根之津氣不盛。止能附結本根。不能發泄於外。結爲茯苓。既不離本。遂抱根而生者。故曰茯神。

處方用名 辰茯神。抱木茯神。碎茯神。雲茯神。茯神塊。茯神糕。

基本 屬芝楠科。爲松根地下所結之菌塊。

形態 茯神爲寓木類菌類之一種。與茯苓同生於松根。但茯苓泄結於根外。而茯神則抱根而生。無苗葉蓫花。形大如拳。肉白質鬆。

採取 二月八月採之陰乾。

製法 凡使去木。先以茯神去皮。剉細。入雞篩內。置水盆中。蕩篩去筋膜。澄清。取水底細末。曬乾。復以人乳拌蒸三四次或五六次。更佳。每一兩蒸作二兩。

性質 甘。平。無毒。

效能 安神。魄。養精。治驚悸失眠。用作鎮靜藥。

主治 辟不祥。療風眩。風虛五勞口乾。止驚悸。多恚怒。善忘。開心益智。安魂魄。養精神。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論茯神曰。補虛之主。心下急痛堅滿。人虛而小腸不利者。加而用之。【明】繆希雍本草經疏論茯神曰。茯神抱木心而生。以此別於茯苓。別錄謂茯神平。總之其氣味與性應是茯苓一體。茯苓入脾腎之用多。茯神入心之用多。故主辟不祥。療風眩。風虛五勞口乾。止驚悸。多恚怒。善忘。開心益智。安魂魄。養精神。藥性論又云。茯神君味甘無毒。主驚癎。安神定志。補勞乏。主心下急痛堅滿。人虛而小腸不利。加而用之。其心名黃松節。治偏風。口面喎斜。毒風筋攣不語。心神驚掣。虛而健忘。其所主與茯苓大同小異耳。【清】黃宮繡本草求眞論茯神曰。茯神功與茯苓無異。但神抱心以生。苓則不從心抱故。苓則能入脾與腎。而神則多入心耳。書曰。服此開心益智。安魂定魄。無非入心導其痰濕。故能使心與腎交通之謂耳。心木書名黃松節。味苦性溫。能治諸筋攣縮。偏風喎斜。心制健忘。是入血滲濕之意。取苓有心者是。去皮及中木用。【清】張隱菴本草崇原論茯神曰。離松根而生者爲茯苓。抱松根而生者爲茯神。總以茯苓爲勝。茯苓皮。茯神木。後人收用。各有主治。然皆糟粕之棄。並無精華之氣。不足爲重也。【清】賈九如辨藥指南論茯神曰。茯神生於枯松根下。因無枝葉上升津氣向下。抱根附結。得松之神氣而成。不離於本。有伏守之義。故名茯神。特取此鎮伏心神。能中守而不移。以其體沉重。重可去怯。其性溫。補可去弱。戴人曰。心本熱。虛則寒。如心氣虛怯。神不守舍。驚悸怔忡。魂魄恍惚。勞怯健忘。俱宜溫養心神。非此不能也。

辨僞 ㊀鄭肖岩曰。茯神眞者木心或在旁。或在中。亦不止一心。切開有筋膜者是也。假者木心在中。且止一心。而無筋膜。㊁曹炳章曰。按茯神卽茯苓之抱木中心者。茯苓乃得松之氣。自作塊而大。不附着根。其包根而青虛者。茯神也。其餘鑑別法。詳前茯苓條下。

配合應用 養心安神。朱雀丸。治心神不定。恍惚健忘。不樂。火不下降。水不上升。時復振跳。常服消陰養火。全心氣。用茯神二兩。去皮。沉香半兩。爲末。煉蜜丸。小豆大。每服三十丸。食後人參湯下。（百一選方）

用量 三錢至四錢。

著名方劑 茯神丸。治心臟風虛。驚悸心忪。健忘等症。（準繩方）茯神（去木）人參（去蘆）麥冬（去心）熟地。黃芪。茯仁。栢子仁。犀角屑各一兩。龍齒。雲母粉各兩半。防風（去蘆）。黃耆各七錢半。上藥共研細末。令勻。煉蜜和丸。梧子大。每服二十丸。不拘時。溫粥飲送下。

參攷資料 ㊀仙方止云茯苓而無茯神。治療既同。用應無嫌。（陶弘景）㊁神農本草止言茯苓。名醫別錄始添茯神。而主治皆同。後人治心病。必用茯神。故潔古張氏於風眩心虛。非茯神不能除。然茯苓未嘗不治心病也。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

●肝風內煽。發厥。不省人事者。余每重用茯神木治之。無不神效。蓋此症雖屬肝而內煽則必上薄於心。心君爲之不寧。故致發厥。茯神本治心。而中抱之木又屬肝。以木制木。木平則風定。風定則心寧。而厥自止也。(沈金鰲)

【茯神木】命名 本品卽茯神心內木。故名。

原名 黃松節。

主治 偏風口面喎斜。毒風筋攣不語。心神驚擊。虛而健忘。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論茯神木曰。治脚氣痺痛。諸筋牽縮。

【茯神塊】卽茯神切成塊之處方用名。詳『茯神』條。

【茯神糕】卽茯神製成之糕。詳『茯神』條。

【茯蘆】卽茯苓之本名。詳『茯苓』條。

【茶苓】卽礬苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礬苓』條。

【茶莧粥】基本 本品卽以茶莧和米煮成之粥。

主治 治心腹疼痛。

【茫芒】原名 茫芒決明。

外國名稱 Lathyrus Davidii Hce.(拉丁)イタチササゲ エンドウサウ(日本)

基本 係豆科山黧豆屬。爲茫芒之子實。

產地 山野道旁間。

形態 茫芒爲蔓草類之蔓生草本。由卷鬚而上昇。葉爲羽狀複葉。小葉卵形。其數在二對以上。有托葉。莖類著。蝶形花冠。呈黃色。果實細長。與豌豆之莢相似。其子扁而色褐。可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 調中除痰。止渴。令人不睡。

參攷資料 茫芒莖葉味甘而滑。可作酒麴。嫩時採以爲蔬及點菜食。均甚香美(醫學辭典)

【茫芒決明】卽茫芒之原名。詳『茫芒』條。

【茴芸】【茴香】卽防風之古籍別名。典見吳普本草。詳『防風』條。

【茴香】卽大茴香。其子實莖葉。詳『大茴香』條。

【茴香八角珠】卽葬草之別名。詳『葬草』條。

【茴香酒】製法 用茴香浸酒飲。舶茴尤妙。

主治 卒然腎氣痛。睾丸偏墜。牽連心腹痛。

【茴香粥】基本 和米煮成之粥。

主治 和胃。治疝。

【茴香蟲】命名 本品係生於茴香枝葉中之蟲。故名。

形態 茴香蟲爲卵生蟲類之一種。狀如尺蠖。青色。可供藥用。

主治 小腸疝氣。

【茴草】卽防風之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防風』條。

【茵芋】古籍別名 莞草。卑共。(別錄)茵蕳。衞與。阜山竹。(和漢藥考)

基本 屬繖形科茵芋之葉莖。

產地 凡深山幽谷之陰地間恒有生焉。

形態 茵芋爲多年自生草本。莖高一二尺或三四尺。春生苗葉。葉酷似櫧葉。夏月開圓錐花。呈綠白色。秋季結紅色肉果。味辛苦。有芳香。

採取 三四月間採莖葉用。

製法 凡使莖葉陰乾疾用。

性質 苦。溫。有毒。

成分 含有茵芋精 Miyamaphilitmin $C_{26}H_{43}NO_9$。毒質。

效能 祛風。澄。療痺痛。用作治風藥。又治振顫。麻痺痛風。

作用 入胃後。略能激刺胃液。神經。使胃分泌增多。出幽門而至十二指腸及小腸內。次第被吸收而入血。由末梢神經被刺激而傳達於大腦。大腦亦被激而麻醉。同時血液之循環。與細胞之新陳代謝。亦遲滯而緩慢。

主治 五臟邪氣。心腹寒熱。羸瘦如癆狀。發作有時。諸關節風溼痺痛。(本經)療久風溼。走四肢脚弱。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論茵芋曰。治男子女人轉脚。毒風拘急。攣痛。【宋】大明諸家本草論茵芋曰。一切冷風。筋骨怯弱。羸瘦。顛入藥炙用。【清】黃宮繡本草求眞論茵芋曰。茵芋本屬毒物。味辛而苦。氣溫有毒。據書所述治

119／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

症。多是風溼爲用。如治風癇。則有茵芋丸。治風痺。則有茵芋酒。治產後風。則有茵芋膏。凡風溼痺症。多用茵芋。與石南葬草。同爲一類。若云能療虛贏寒熱。恐莫及耳。出彭城海鹽。莖赤。葉如石榴而短厚者佳。取根葉陰乾炙用。

國外學說 本草綱目啓蒙曰。茵芋係生於深山幽陰處之山木。高一二尺。更高者其本皆倒揚。祇末直立。今種樹家多栽之。高四五寸者。亦能開花結實。葉兩對形似Moten Kohu（日名）葉厚而帶赤。經冬不凋。正二月枝頭簇花。成穗二寸許。花大三分。五瓣。白色。蕚稍帶褐色。後結圓實。熟作赤色。大如南天燭子。有一種綠蕚者。帶亦綠色。又大和本草曰。茵芋有毒。煎注菜蔬殺蟲。又本田重次郎氏從茵芋葉及各部分。發見一種植物鹽基。名茵芋精。加以化學的及藥物學的研究。知本品爲極微弱鹽基。雖能與磺酸共結結晶性鹽。但一加水。則仍返爲分離鹽基。其化學的集成爲 $C_{22}H_{23}NO_9$。對於筋之作用。甚爲顯著。蛙筋接觸其毒。即陷於强直狀態。盡失運動能力。即在1:4000之稀薄液。此作用仍顯明現出。若比較筋對於本品之感受性。則赤蛙筋較金線蛙筋爲易。本品又能使反射興奮性亢進。惟此現象。在赤蛙不可得見。此外本品對於心臟之作用。亦頗顯著。試之於蛙。其心臟即漸次衰弱。終至筋呈麻痺狀而靜止。於其他動物行大量靜脈內注射。輒發痙攣而斃。此時之直接死因。亦爲心臟麻痺。若僅用中等量。則對於心臟之作用小而且暫。祇使血壓沉降而已。今就其微弱鹽基對於筋之作用。亢進反射與奮性作用等以觀。則本品似甚類咖啡精。惟咖啡精之特殊作用。影響筋之動作。及尿之分泌作用。在本品則無。故終不能歸入咖啡精類也。

配合應用 ㊀茵芋酒。治賊風手足枯痺拘攣。用茵芋、附子、天雄、烏頭、秦艽、女萎、防風、防巳、石南葉、蹢躅花、細辛、桂心各一兩。十二味切。以絹袋盛。清酒一斗漬之。冬七夏三。春秋五日。藥成。每服一合。日二服。以微痺爲度。方出胡治居士百病方（圖經方）

㊁茵芋丸。治風氣積滯成脚氣。發則痛者。茵芋葉炒。薏苡仁各半兩。郁李仁一兩。牽牛子三兩。生研末。半兩。上爲末。煉蜜丸如梧子大。每服二十丸。五更薑棗湯下。取利。未利再服。取快。（本事方）

㊂治產後中風。茵芋五兩。木防巳半斤。苦酒九升。漬一宿。豬脂四斤。煎三上三下。膏成。每服熱摩千遍。（千金方）

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡陰虛而無風溼寒邪者禁用。

參攷資料 ㊀千金外臺諸古方。治風癇有茵芋丸。治風痺有茵芋酒。治婦人產後中風有茵芋膏。風溼諸方多用之。茵芋、石南、葬草。皆古人治風妙品。而近世罕知。亦醫家疎缺也。（李時珍）㊁茵芋生太山川谷。三月三日採葉陰乾。（別錄）㊂好者出彭城。今近道亦有。葉狀似葬草而細韌。連細莖採之。方用甚稀。惟合療風酒。（陶弘景）㊃今雍州、絳州、華州、杭州亦有之。春生苗。高三四尺。莖赤。葉似石榴而短厚。又似石南葉。四月開細白花。五月結實。三月四月七月採莖葉日乾。（蘇頌）

【茵草】卽葬草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『葬草』條。

【茵陳】卽茵陳蒿之簡稱。詳『茵陳蒿』條。

【茵陳草】卽茵陳蒿之處方用名。詳『茵陳蒿』條。

【茵陳酒】**基本** 本品係以茵陳釀成之酒。

製法 用茵陳蒿一斤。秫米一石。麴三斤。如常釀之。

主治 風痰筋骨攣急。

【茵陳蒿】**原名** 山茵陳。

命名 本品雖屬蒿類。經冬不死。至春因舊苗枯。則由陳莖而再生。故名因陳。形似蓬蒿。後加蒿字耳。

處方用名 綿茵陳。茵陳草。

古籍別名 因塵（張揖廣雅）白蒿（圖經本草）薯蒿。家茵陳。（大明本草）石茵陳。（和漢藥考）

外國名詞 Herba Artemisiae Copillaris Herb. Artem. Cap.（拉丁）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

基本 屬菊科茵陳蒿之葉莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。茵陳蒿產江西吉安府爲最名曰土茵陳。產廣西柳州者氣味亦同。有一種名綿茵陳。以產湖北省黃州府、漢陽府兩屬毗連數縣所產爲佳。安徽亦有出。形狀披散。名爲鷄絲。不悅俗眼。春季出新。

形態 茵陳蒿爲生於山野或河岸沙礫之多年生草。春季叢生。莖密生白毛。葉類似胡蘿蔔葉。繼抽莖二三尺。互生。銀鼠色。細葉愈上而愈細。作絲狀。夏秋之間。於梢葉間點綴白色穗狀小花。結實如芥子。色褐黃。

種類 ㈠山生者曰山茵陳。㈡野生者曰野茵陳。㈢採集其細莖葉者曰綿茵陳。

採取 每年五月間及立秋節。採其莖葉陰乾。

製法 雷敦曰。凡使須用葉有八角者。陰乾。去根。細剉。勿令犯火。

性質 苦。平。微寒。無毒。

效能 清溼熱。治黃疸。有解熱發汗。淨血三作用。爲黃疸之特效藥。

主治 風溼寒熱。邪氣熱結。黃疸。久服輕身益氣。耐老。面白悅長年。白兎食之仙。(本經)治通身發黃。小便不利。除頭熱。去伏瘕。(別錄)

張仲景之證明 茵陳一味。經張仲景之實驗。認爲主治溼熱發黃也。茲考徵如下。㈠茵陳五苓散證曰。黃疸。㈡茵陳蒿湯證曰。心胸不安。久久發黃。以上二方。茵陳蒿一方六兩。一方十分。觀此二方。茵陳蒿治發黃也明矣。或問曰。發黃之證。治之之方。其不用茵陳蒿者。間亦有之。如何。答曰。發黃小便不利。或渴。無餘證者。茵陳五苓散主之。發黃大便不通者。茵陳蒿湯主之。若乃一身盡黃。腹脹。小便必黑。時溏者。消鞕散主之。發黃。心中懊憹。梔子大黃豉湯。發黃。腹滿。小便不利。大黃消石湯。發黃。頭痛惡風。自汗出。桂枝加黃耆湯。發黃。嘔逆。小半夏湯主之。發黃。胸脇苦滿。小柴胡湯主之。發黃。腹中拘急。小建中湯主之。此皆隨證而異方也。仲景氏之於茵陳蒿。特用之於發黃。無他病者而已。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺。論茵陳曰。通關節。去滯熱。傷寒用之。【宋】大明日華諸家本草。論茵陳曰。石茵陳。治天行時疾。熱狂。頭痛。頭旋。風眼疼。瘴癘。女人癥瘕。并閃損乏絕。【明】繆希雍本草經疏。論茵陳曰。茵陳蒿。味苦平。微寒。無毒。故主風溼寒熱。邪氣熱結。黃疸。通身發黃。小便不利。及頭熱。皆溼熱在陽明太陰所生病也。苦寒能燥溼除熱。溼熱去。則諸證自退矣。去伏瘕。及久服輕身益氣。耐老。面白悅長。年未有修事者。日華子云。石茵陳。味苦涼。無毒。卽山茵陳也。入足陽明太陰足太陽三經。除溼散熱結之要藥也。【明】李士材本草圖解。論茵陳曰。茵陳蒿。足太陽藥也。治發黃。驅溼熱。利小便。通關節。按發黃有陰陽二種。茵陳同梔子黃檗。以治陽黃。同附子乾薑。以治陰黃。總之茵陳爲君。隨佐使之寒熱。而理黃症之陰陽也。古法。以茵陳同生薑搗爛。於胸前四肢。日日擦之。【清】黃宮繡本草求眞。論茵陳曰。茵陳味苦微寒。諸書皆言溼熱伏於陽明。用此以入太陽膀胱。發汗利水。俾太陽陽明溼熱之邪。盡得於藥而解矣。且治傷寒時疾。狂熱瘴癘。頭痛頭旋。女人疝瘕。亦是溼熱爲病。但黃原有陰陽寒熱之分。陽黃者。由熱蘊於脾土。如苗值於大旱。則苗必燥而黃。是苗因燥而黃者也。太湧則苗必溼而黃。是苗因溼而黃者也。熱爲陽。寒爲陰。故黃亦以陰陽分之。是以仲景立有茵陳蒿湯。梔子蘗皮湯。麻黃連翹赤小豆湯。以治陽黃之症。又立茵陳附子湯。以治陰黃之症。茵陳治黃通劑。在人審其所因而酌治耳。若蓄血發黃。則治不在茵陳之列。以茵陳本屬氣分藥也。於血則不能治矣。茵陳本有二種。葉細而青蒿者可用。若生子如鈴。則爲山茵陳矣。當於殺蟲及治口瘡。【清】鄒澍本經疏證。論茵陳曰。風溼寒熱邪氣。新感者也。熱素有者也。新感之邪爲素有之熱結成黃疸。此證已所謂茵陳矣。故傷寒金匱二書。幾若無疸不茵陳者。然梔子檗皮湯證。有外熱而無裏熱。麻黃連翹赤小豆湯證。有裏熱而無外熱。小建中湯證。小便

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

自利。小柴胡湯證。腹痛而嘔。小半夏湯證。小便色不變而嘔。桂枝加黃芪湯證。脈浮。梔子大黃湯證。心中懊憹。消石礬石散證。額上黑。日哺發熱。則內外有熱。但頭汗出。齊頸而還。腹滿。小便不利。口渴。爲茵陳蒿湯證矣。第腹滿之治在大黃。內熱之治在梔子。惟外復有熱。但頭汗出。小便不利。始爲茵陳的治。其所以能治此者。豈不爲新葉茵陳幹而生清芬。可以解鬱熱苦寒可以洩停溼邪。蓋陳幹本能降熱利水。復加以葉之如絲如縷。挺然於暑溼蒸逼之時。先草木而生。後草木而彫。不必能發散而清芳揚溢。氣暢不歛。則新感者遂不得不解。目是汗出不止於頭矣。故曰發熱汗出。此爲熱越。不能發黃也。

國外學說 日本學說謂茵陳蒿者。自生於山野。宿根之草也。收花供藥用。又茵陳蒿者。古來皆用以療黃疸有效。而著名者。猪子博士嘗論其效驗云。茶症爲加答兒性黃疸。又療水腫有效。然果較他利尿劑優勝與否。不能無疑。氏又於化學分析上。得一種苦味素。然不能斷爲本藥之有效成分。又療黃疸有效之說。村井純之助云。殆因有物質。如洋藥亞爾鮮中所含苦味質之「アブシンチン」之故歟。茵陳蒿之用量。一日五・〇至一〇・〇。爲煎劑與之。

近人學說 ㈠黎伯概曰。昔李時珍作本草綱目。於茵陳蒿謂有石茵陳。山茵陳。家茵陳。三種。豈知今日已無此等名目。別有所謂綠茵陳。綿茵陳二種。查綠茵陳之所以名爲綠。不知何所取義。其來由爲何。然其物莖梗葉俱有。莖爲方莖。似是蒿類。然殊不見其綠。若綿茵陳一種。純是細小花瓣。其所謂綿。當是指其柔輭嘎之別有一種香氣。其性輕浮。實爲走表之物。至爲何種之花。不得而知。惟與綠茵陳形色性味。劃然各別。查茵陳蒿本治黃疸。即西醫所謂膽汁溢出之病。實以綠茵陳爲合。今醫士處方但書茵陳。據藥店人云。率以綠茵陳與之。然余曾實驗過。亦有與以綿茵陳者。殊不一定。余意須以綠茵陳爲正。但僅書茵陳。不能必藥店之定給以何種。是則處方時須特別註明也。㈡張山雷曰。茵陳味淡利水。乃治脾胃二家溼熱之專藥。溼疸酒疸。身黃瘦赤。如醬。皆胃土蘊溼積熱之證。古今皆以此物爲主。其效甚速。湯滌腸胃。外達皮毛。非此不可。蓋行水最捷。故凡下焦溼熱痒瘙。及足脛跗腫。溼瘡流水。並皆治之。其陰黃一證。雖曰虛寒。然亦內有蘊熱。故能發見黃色。則以入於溫經隊中而掃蕩之。卽仲景茵陳附子之法。惟女勞疸一症。則瘀滯痺着。非僅通利所可奏功。故必以硝石礬石之峻利者。爲刮垢磨光之治。而無取於茵陳也。

配合應用 ㈠茵陳性苦寒。能除一切溼熱。五疸雖各有其因。然同爲溼熱所成。故得黃連、乾葛、黃蘗、苜蓿五味子、治酒疸如神。㈡治穀疸。茵陳、二朮、茯苓、澤瀉、車前子、木通、橘皮、神麴、紅麴、麥門冬。㈢治疸因酒色而得。病名女勞疸。茵陳、生地黃、仙人對坐草、石斛、木瓜、牛膝、黃蘗。㈣治穀疸寒熱不食。食卽頭眩。心胸不安。茵陳六兩。梔子十四枚。大黃二兩。以水一斗。先煮茵陳。減六升。內二味。煮取三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便而去也。（仲景茵陳湯）㈤又茵陳五苓散。總治諸疸。㈥茵陳蒿除大熱。寒疸。傷寒頭痛。風熱。瘧瘧。利小便。以茵陳細切。麥蒸食之。生食亦宜。（食醫心鏡方）㈦治遍身風痒。生瘡疥。用茵陳煮濃汁。洗之立瘥。（千金方）㈧治霍亂風病。茵陳蒿兩握。水一斗五升。煮取七升。先以皂莢湯洗。次以此湯洗之。冷更作。隔日一洗。不然。恐痛也。（崔行功纂要方）㈨治風疾擧急。茵陳蒿一升。秫米一石。麴三斤。和匀。如常法釀酒服之。（聖濟總錄方）㈩治癉黃如金。好眠吐涎。茵陳蒿、白鮮皮等分。水二鍾。煎服。日服二。（三十六黃方）⑪治遍身黃疸。茵陳蒿一把。同生薑一塊。搗爛。於胸前四肢。日日擦之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈢治男子酒疸。用茵陳蒿四根。梔子七箇。大田螺一箇。連殼擂爛。以百沸白酒一大盞。冲汁飲之。祕方也。

㈣治眼熱赤腫。山茵陳、車前子、等分。煎湯。細茶調散服數服。（直指方）

用量　二錢至四錢。

施用宜忌　凡無溼熱而發黃由於蓄血者禁用。忌火。

著名方劑　黃疸方。治身目皆黃。皮肉麴塵出。（千金翼方）茵陳一把。梔子二十四枚。石膏一斤。上以水五升。煮二升。取二升半。去滓。以猛火燒石膏令赤。投湯中。沸定。服一升。覆取汗。周身以粉粉之。不汗更服。

參攷資料　㈠張仲景治傷寒熱甚發黃。身面悉黃者。用之極效。一僧因傷寒後發汗不澈。有留熱。一面身皆黃。多熱。期年不愈。醫作食治。不對而食不減。予與此藥服五日病減三分之一。十日減三分之二。二十日病悉去。方用山茵陳山梔子各三分。秦艽、升麻各四錢。爲散。每用三錢。水四合。煎二合。去滓。食後溫服。以知爲度。此藥以山茵陳爲本。故書之。（寇宗奭）㈡張仲景曰。茵陳梔子大黃湯治溼熱也。梔子蘗皮湯。治燥熱也。如苗澇則溼黃。苗旱則燥黃。溼則瀉之。燥則潤之可也。此二藥治陽黃也。韓祗和李思訓治陰黃用茵陳附子湯。大抵以茵陳爲君。主而佐之以附子大黃。各隨其寒熱也。（王好古）㈢近道皆有之。不及太山者佳。春初生苗。高三五寸。似蓬蒿而葉緊細。無花實。五月七月採莖葉陰乾。今謂之山茵陳。江寧府一種茵陳。葉大根粗。黃白色。至夏有花實。階州一種白蒿。一似青蒿而背白。本土皆以爲茵陳。入藥今南方醫人用山茵陳乃有數種。或著其說云。山茵陳汴京及北地用者。如艾蒿。葉細面背白。其氣亦如艾。味苦。乾則色黑。江南所用者。莖葉都似家茵陳而大。高三四尺。氣極芳香。味甘辛。俗又名龍腦薄荷。吳中所用。乃石香柔也。莖葉細。色黃。味辛甚香烈。性溫。若誤作解脾藥服。大令人煩。以本草論之。但有茵陳蒿。無山茵陳。注云。似蓬蒿而緊細。今汴京北地所用山茵陳是也。大體世方用山茵陳。療體痛。解寒發汗。行肢節滯氣。化痰利膈。治勞倦最要。詳本草正經。惟療黃疸利小便。與世方都不應。今試取汴京所用山茵陳爲解肌發汗藥。灼然少效。江南山茵陳療傷寒腦痛絕勝。比見諸醫議論。謂家茵陳亦能解肌下膈。去胸中煩。方家少用。但可研作飲服之。本草所無自出。俗方茵陳蒿。當別是一物。主療自異。不得爲山茵陳也。此說亦可據。但以功較之。則江南者爲勝。以經言之。則非本草所出。醫方所論。更當考論爾。（蘇頌）㈣茵陳普人多莳爲蔬。故入藥用山茵陳。所以別家茵陳也。洪舜俞老圃賦云。醋糟紫蓼之掌。沭醯青陳之絲是也。今淮揚人二月二日猶採野茵陳苗。和粉麵作茵陳餅食之。後人各據方土所傳。遂致淆亂。今山茵陳二月生苗。其莖如艾。其葉如淡色青蒿而背白。葉岐緊細而扁。九月開細花。黃色。結實大如芝子。花實並與菴蕳花實相似。亦有無花實者。（李時珍）㈤茵陳有二種。一種葉細如青蒿者。名綿茵陳。專於利水。爲溼熱黃疸要藥。一種生子如鈴者。名山茵陳。又名角蒿。其味苦辛小毒。專於殺蟲。治口齒瘡絕勝。本經主風溼寒熱。熱結黃疸。溼伏陽明所生之病。皆指綿茵陳而言。茵陳專走氣分。而利溼熱。若畜血發黃。非此能治也。（張石頑）

【茵蔯】　卽茵芋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茵芋』條。

【茶子】　主治　喘急咳嗽。去痰垢。搗仁洗衣除油膩。

【茶芎】　卽土當歸之古籍別名。典見進賢。詳『土當歸』條。

【茶果】　卽紫金牛之古籍別名。典見植物名彙。詳『紫金牛』條。

【茶油】　原名　棕油。

外國名稱　Oleum Camelliae.（拉丁）（Tea Oil）（英）

基本　本品乃棕樹子實榨取之油。俗呼爲茶油。

性質　甘涼無毒。

主治　潤腸清胃。殺蟲解毒。燃燈益目。抹髮解脘。

123／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料　茶油不宜生食及煎熬不熟食之令人作瀉。（趙學敏）

【茶肭】　**產地**　出遼東塞外諸地。

形態　茶肭爲山果類之一種。高三尺許。葉如楝樹。背有黃白點。開花碧色。有四出。有八出。形似手結子大如拳。味甘如飴。樹皮浸水可取油以燃燈。其子實可供食與藥用。

性質　甘。無毒。

參攷資料　遼塞無棗。士人有病者。恒取啖之。卽愈。（趙學敏）

【茶根】　卽茶樹根之簡稱。

【茶矩摩】　卽鬱金香之古籍別名。典見佛書。詳『鬱金香』條。

【茶婆蟲】　卽蚩蠓之古籍別名。典見綱目。詳『蚩蠓』條。

【茶蚍蟲】　**基本**　茶蚍蟲爲化生蟲類之一種。卽蠹蟲之生於茶葉籠中者。其蚍屑可供藥用。

主治　聤耳出汁。研末絞淨摻。

【茶蚍蟲蚍屑】　**功用**　治聤耳出汁。（研末摻之）

【茶蚍蟲糞】　卽茶蚍蟲蚍屑。

【茶菊】　**古籍別名**　黃色者名高脚黃紫色者名紫蕊盤桓白色千葉者名玉玲瓏。（綱目拾遺）眞菊。家菊。（羣芳譜）

產地　出浙江杭州之覓橋及紹興之新昌。與安徽、江西皆有之。

形態　茶菊爲溼草類菊屬之一種。其莖柔軟。嫩青老紫。葉色淡綠。似小金鈴而尖。氣似薄荷。花色有黃有白。小如指頭。實如芎藭而細。種之亦生。其花可供藥用。

採取　以浙江、江西者佳。入藥陰乾去蒂用。

性質　苦。微甘。平。無毒。

主治　諸風頭目眩暈。平咳逆。解肌熱。清鬱火。益肺腎。

配合宜忌　反河鈍。無鱗魚。白朮、杞子、地骨皮爲使。

【茶菊枝葉】　**主治**　紅絲疔瘡和雄黃、蜈蚣共搗爛。傅至絲盡處。跌打損傷和童便無灰酒煎服。

【茶菊花露】　**基本**　本品卽以茶菊蒸取之露。

性質　苦。微甘。平。無毒。

主治　清心明目。除熱祛風。

【茶菊根】　**採取**　以白花者良。

主治　疔腫。紅絲疔。喉疔。喉癬。

【茶葉】　**原名**　茗。

古籍別名　苦搽。（唐本草）檟。（爾雅）蔎。荈。（綱目）茆。苦荼。碧澗。雲霧。（郭璞註爾雅）

外國名稱　Thea（拉丁）Tea（英）Thee（德）

基本　屬山茶科茶樹之葉。

產地　陳仁山藥物生產辨云。茶各屬有出。三四月新。普洱茶產雲南。由蒙自配車經河口魯街出河內。轉海防。付船來港。近日以同慶印同興印爲最好。原以姑娘茶爲最好。惜乎甚少。



茶葉

形態　茶爲常綠小灌木。高達五六尺。葉作長橢圓形。長一寸許。呈深綠色。有光澤。邊緣有細鋸齒。初夏生新葉。至秋季。開類似椿花之白色單瓣花。果實作褐色扁圓形。熟則有三子裂出。

種類　㈠綠茶。係揑得焙去苦水。便可泡飲者。㈡紅茶。係蒸焙酸酵而製成者。㈢紅綠兩種乃普通常用之飲料。其餘因產地。製法。培植。採取而異其名稱者頗多。

種植　茶有野生種。生種者用子。二月下種。一次須數百顆。乃生一株。蓋其空殼者多之故耳。

採取　每年於立春後八十八日前後採之。置蒸籠中蒸熟後。卽攤蔴上冷之。次乃以焙爐上揉搓。使充分乾燥。

製法　凡入藥用須以臘茶。研治作餅。日乾用。尤以陳細者良。

用法　沸水冲。或水煎或劑末用。

性質　苦。甘。微寒。無毒。

成分　茶葉中含有咖啡鹼、○・二至三・四%揮發油、單寧等。咖啡鹼 Caffeinum $C_8H_{10}N_4O_2$ + H_2O 爲柔韌白色針狀結晶。有絹絲狀光澤。味微苦。溶於八十分

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之水。無色溶化。呈中性反應。溶於二分之沸湯。冷後凝結。成爲結晶性糜粥。又可溶於哥羅仿姆(Chloroform)及約五十分之酒精。惟於伊打。則不甚溶解。置空氣中則風化。將本品徐徐燒熱。約在百度時。僅一部分揮散。至一百八十度。則完全昇華。又將本品〇・一瓦。溶化於綠氣水十立方仙米內。於重湯煎上蒸發。所得殘留物。作黃赤色。和以安母尼亞水少許。則呈紫紅色。

效能　清熱。降火。消食。醒睡。用作興奮神經藥。又爲利尿藥。又治疲勞性精神衰弱症。

作用　入胃後。除所含之一部分單寧制止消化酵素之作用及凝固已消化之蛋白外。餘皆不起何等變化。惟精油(香精)有稍能激胃分泌增多之功。由幽門而達十二脂腸。小腸等處。始次第將茶精吸入血中。由微血管而傳達中樞神經。使血液循環加速。腦部血量增多。精神遂被激而興奮。惟效力微甚。而時間亦短促。

主治　癆瘡。利小便。去痰熱。止渴。令人少睡。有力悅志。

歷代記述弦證　【唐】蘇恭新修本草論茶葉曰。下氣消食。作飲加茱萸葱薑良。【唐】陳藏器本草拾遺論茶葉曰。破熱氣。除瘴氣。利大小腸。【宋】陳承本草別說論茶葉曰。治傷寒。合醋服治泄痢甚效。【元】王好古湯液本草論茶葉曰。清頭目。兼治中風昏憒。多睡不醒。【明】吳瑞日用本草論茶葉曰。炒煎飲。治熱毒赤白痢。同芎藭葱白煎飲。止頭痛。【明】李時珍本草綱目論茶葉曰。濃煎飲。吐風熱痰涎。【明】繆希雍本草經疏論茶葉曰。若本經昧甘氣微寒無毒。藏器言苦。然亦有不苦者。氣薄昧厚。入手太陰少陰經。太陰爲清肅之臟。喜涼而惡熱。熱則生痰而津液竭。故作渴也。瘡瘡者。大腸積熱也。小便不利者。小腸熱結也。甘寒入心肺而除熱。則津液生。痰熱解。臟氣既清。腑病不求其止而止矣。令人少睡者。蓋心臟神。神昏則多睡。清心經之熱。則神常自惺。寂故不寐也。下氣消食者。苦能下泄。故氣下火降。而兼滌除腸胃。則食自消化矣。【明】李士材本草圖解論茶葉曰。若苦甘微寒。下氣消食。清頭目。醒睡眠。解炙煿毒。酒毒。消暑同薑治痢。按若得天地清陽之氣。故善理頭風。肅清上膈。使中氣寬舒。神情爽快。此惟洞山上品。方獲斯效。至如俗用雜茶。性味不佳。久啜墓雅。必使中土蒙寒。元精暗耗。輕則黃瘦減食。甚則嘔泄痞腫。無病不集。害可勝數哉。茶序云。消停釋滯。一日之利。暫佳。脩氣侵精。終身之累。斯大東坡云。除煩去膩。不可無茶。然空心飲茶。直入腎經。且寒脾胃。乃引賊入室也。【清】黃宮繡本草求眞。論茶葉曰。茶茗大者爲茗。小者爲茶。茶稟天地至清之氣。得春露以培生。意克足纖芥滓穢不受。味甘氣寒。故能入肺清痰利水。入心清熱解毒。是以垢膩能滌。炎煿能解。凡一切食積不化。頭目不清。痰涎不消。二便不利。消渴不止。及一切吐血便血。衄血血痢。火傷目疾等症。服之皆能有效。但熱服則宜冷服。聚痰。多服少睡。久服瘦人。至於空心飲茶。既使入腎削火。復於脾胃生寒。萬不宜服。茶之產處甚多。有以陽羨名者。謂之眞陽茶。治能降火。以清頭目。有以臘茶名者。以其經冬過臘。佐劉寄奴治便血最效。有以松蘿名者。是生於徽。嵩於化食。有以日鑄名者。生於浙紹。嵩於清火。有以建茶名者。生於閩地。嵩於辟瘴。有以苦丁名者。產於六合。嵩於止痢。有以普洱名者。生於滇南。嵩於消食辟瘴止痢。至於蒙山。世所罕有。且有許多僞充。眞僞莫辨。然大要總屬導痰宣滯之品。雖一日之利暫快。而終身之累斯大。損多益少。服宜愼矣。【清】王士雄隨息居飲食譜論茶葉曰。茶微苦微甘而涼。清心神。醒睡除煩。涼肝膽。滌熱消痰。肅肺胃。明目解渴。不渴者勿飲。以春採色青。炒焙得法。收藏不泄氣者良。色紅者已經蒸窖。失其清滌之性。不能解渴。易成停飲也。普洱產者味重力峻。善吐風痰。消肉食。凡暑穢痧氣。腹痛乾霍亂。痢疾等證初起。飲之輒愈。

國外學說　英美學說謂茶葉產中國。日本。英國。印度等處。內含一精。曰提年。糶茶共分爲二大類。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其第一類謂之綠茶。綠茶能分數種。內有五種。如官茶。圓珠。熙春。雨前。屯溪等。此類茶樹均耐冷。故英國多種植此樹。能經冬不枯。中國有數種綠茶。其色係將靛類之物所染。曾有西人查考常出售之綠茶。有加色料與不加色料之別。其第二類謂之武夷茶。西國以爲此樹出各種黑茶。即爲毫臘生小種。工夫。武夷等。第黑茶與綠茶。俱爲綠茶樹之葉。在中國之南方北方等處。惟黑茶則大半在中國之南。如廣東省等處。而黑茶與綠茶之分別。因黑茶必先置籮天若干時。待其少發酵而後加熱烘之。則能變爲黑色。印度人種中國之茶子。以其所得茶樹之葉。依中國法烘之。而與中國安徽省之上等烏龍茶相比較。初無上下之分。考茶之功用。能收斂而稍行血氣。大半感動腦筋。令人覺爽適。如辛勞力乏時飲之。能補精神。飲濃茶則能感動腦筋。如飲更淡之茶。則能平火安心。其功用又能發汗。解瘟片毒。免其困迷。日本和漢藥考曰。種茶及製茶之起始。散見諸書。今將「日本事物起原」所載者。錄之如左。種茶及製茶之起始。無從確知。惟徽之史乘。有聖武天皇太平年間。召百僧於禁庭賜茶云云。又嵯峨天皇弘仁年間。始立賞茶式云云。足見日本飲茶。年代頗遠。至後鳥羽院文治年間。有建仁寺開基千光國師榮西。留學宋國。於臺久年間歸日。由江南浮梁。攜回茶之種子。種於筑前國脊振山。其所製茶謂之岩上茶。並著有喫茶養生錄一書。榮西實爲日本種茶及製茶之始祖也。

近人學說 愈霞曰。茶葉爲我國特產。且爲一般人所嗜之飲料。最近據大阪市立衛生試驗所山口博士研究所得。茶內實含有偉大的殺菌力。以之治却潑司虎列拉。赤痢諸症。甚見功效。博士曾以却潑司之細菌置於濃冷之茶汁中。發見此種細菌。在紅茶中二十分鐘。在綠茶中三十分鐘。全告死亡。若於咖啡中。則不見效。因茶中含有多量的單寧酸。單咖啡則無。細菌中之蛋白質。遇茶中之單寧酸。即被吸收結合而停止其生活。此與石炭酸而做成普通消毒劑。完全不同。而自成爲一種獨特新異的殺菌法。至於紅茶中所含之單寧酸。較綠茶中所含者約多二倍。故紅茶之功效較偉。又虎列拉與赤痢之細菌。比却潑司之細菌尤弱。博士以此種細菌置於顯微鏡下。以茶汁一滴注之。不到七分鐘。即失其活動。博士並言印人昔以茶治傷風。却潑司諸病。云甚靈效。今由實驗所得。可信其言不誣。故普通以茶作飲品。不但可以預防傳染。即以治療上述諸病。亦必應驗異常也。

配合應用 ㈠治氣虛頭痛。用上春茶末。調成膏。置瓦盞內覆轉。以巴豆四十粒。作二次燒烟熏之。曬乾。乳細。每服一字。別入好茶末。食後煎服。立效。(譬方大成方)

㈡治熱毒下痢。以好茶一斤。炙搗末。濃煎二二盞服。久患痢者。亦宜服之。又用膩茶。赤痢以蜜水煎服。白痢以連皮自然薑汁。同水煎服。二三服即愈。(孟詵方)又用蠟茶二錢。湯點七分。入麻油一蜆殼和服。須臾腹痛大下。即止。一少年用之有效。(直指方)一方蠟茶末。以白梅肉和丸。赤痢甘草湯下。白痢烏梅湯下。各百丸。一方塗茶合醋煎熱服即止。(經驗方)

㈢治大便下血。榮衛氣虛。或受風邪。或食生冷。或暖炙煿。或飲食過度。積熱腸間。使脾胃受傷。糟粕不聚。大便下利清血。臍腹作痛。裏急後重。及酒毒一切下血。並皆治之。用細茶半斤。碾末。川百藥煎五箇。燒存性。每服二錢。米飲下。日二服。(普濟方)

㈣治產後祕塞。以葱涎調蠟茶末丸百丸。茶服自通。不可用大黃利藥。利者百無一生。(郭稽中婦人方)

㈤治久年心痛。十年五年者。煎溯茶。以頭醋和勻服之良。(兵部手集方)

㈥治腰痛難轉。煎茶五合。投醋二合。頓服。(孟詵方)

㈦治嗜茶成癖。一人病此。一方士令以新鞋盛茶令滿。任意飲盡。再盛一鞋飲。如此二度。自不嗜也。男用女鞋。女用男鞋。用之果愈也。(集簡方)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀解諸中毒。芽茶白礬等分碾末。冷水調下。（簡便方）

㊁治痘瘡作痒。房中宜燒茶烟恒熏之。

㊂治陰囊生瘡。用蠟面茶爲末。先以甘草湯洗後貼之妙。（經驗方）

㊃治脚極濕爛。茶葉嚼爛傅之有效。（攝生方）

㊄治蠼螋尿瘡。初如豌粟。漸大如豆。更大如火烙漿泡。疼痛至甚者。速以草條并蠟茶俱可以生油調傅。葉至痛乃止。（勝金方）

㊅治風痰顚疾。茶芽、梔子各一兩。煎濃汁一碗。服良久探吐。（摘玄方）

㊆治霍亂煩悶。茶末一錢。煎水調乾薑末一錢。服之卽安。（聖濟總錄方）

㊇治月水不通。茶清一瓶。入沙餹少許。露一夜。服。雖三箇月胎亦通。不可輕視。（鮑氏方）

㊈治痰喘咳嗽。不能睡臥。好茶茶一兩。白礬灰一兩爲末。放盞內盡定。傾沸湯一小盞。臨臥再添湯點服。（瑞竹堂方）

用量　錢半至二錢。

施用宜忌　凡脾虛胃寒及酒後與水腫痕疝者禁用。

參攷資料　㊀一人好燒鵝炙煠。日常不缺。人咸防其生癰疽。後卒不病。訪知其人每夜必啜涼茶一碗。乃知茶能解炙煠之毒也。（汪穎）㊁薑茶治痢。薑助陽。茶助陰。並能消暑解酒食毒。且一寒一熱。調平陰陽。不問赤白冷熱。用之皆良。生薑細切。與眞茶等分。新水濃煎服之。蘇東坡以此治文潞公有效。（楊士瀛）㊂茶苦而寒。最能降火。火爲百病。火降則上清矣。然火有五火。有虛實。若少壯胃健之人。心肺脾胃之火多盛。故與茶相宜。溫飲則火因寒氣而下降。熱飲則茶借火氣而升散。又兼解酒食之毒。使人神思閒爽。不昏不睡。此茶之功也。若虛寒及血弱之人。飲之既久。則脾胃惡寒。元氣暗損。土不制水。精血潛虛。成痰飲。成痞膜。成痿痺。成黃瘦。成嘔逆。成洞瀉。成腹痛。成疝瘕。種種內傷。此茶之害也。（李時珍）㊃與槪同食。令人身重。（胡洽）㊄大渴及酒後飲茶水。入腎經。令人腰脚膀胱冷痛。兼患水腫。痺痛諸疾。大抵飲茶宜熱宜少。不飲尤佳。空腹最忌之。（李廷飛）㊅凡服威靈仙土茯苓者。忌飲茶。（李時珍）㊆郭璞云。早採爲茶。晚採爲荈。一名茶。蜀人謂之苦荼。陸羽云。其名有五。一茶、二檟、三蔎、四荈、五茗。（蘇頌）㊇今閩浙、蜀、江、湖、淮南山中皆有之。通謂之茶。春中始生嫩葉。蒸焙去苦水末之。乃可飲。與古所食。殊不同也。陸羽茶經云。茶者南方嘉木。自一尺二尺至數十尺。其巴川峽山有兩人合抱者。伐而掇之。木如瓜廬。葉如梔子。花如白薔薇。實如栟櫚。苹如丁香。根如胡桃。其上者生烂石。中者生礫壤。下者生黃土。藝法如種瓜。三歲可採。陽岸陰林。紫者上。綠者次。筍者上。芽者次。葉卷者上。舒者次。筍者生於二月三月四月之間。茶之筍者生於烂石之間。長四五寸。若蕨之始抽。俊露採之。茶之芽者。發於叢薄之上。有三枝四枝五枝。於枝顚採之。採得蒸焙封乾。有千類萬狀也。略而言之。如胡人靴者。蹙縮然如犂牛臆者。廉沾然出山者。輪囷然。拂水者。涵澹然。皆茶之精好者也。如竹籜。如霜荷。皆茶之髒老者也。其別者有名南芽。枸杞芽。枇杷葉。皆治風疾。又有鬼目芽。桃芽。柳芽。乃上春摘其芽。和茶作之。故今南人輸貨茶。往往雜以衆葉。惟芽蘆竹筍之類。不可入。自餘山中草木芽葉。皆可合和。椿梓尤奇。眞茶性冷。惟雅州蒙山出者溫而主疾。毛文錫茶譜云。蒙山有五頂。上有茶園。其中頂曰上淸峯。有僧人病冷且久。遇一老父謂曰。蒙之中頂茶。當以春分之先後。多聚人力。俟雷發聲。併手採擇。三日而止。若獲一兩。以本處水煎服。卽能祛宿疾。二兩當眼前無疾。三兩能固肌骨。四兩卽爲地仙矣。其僧如說。獲一兩餘。服之未盡而疾癒。其四頂茶園。採摘不廢。惟中峯草木繁密。雲霧蒙蔽。鷲獸時出。故人跡不到矣。近歲稍貴此品。製作亦精於他處。（蘇頌）㊈茶有野生種生。種者用子。其子大如指頂。正圓黑色。其仁入口。初甘後苦。最戟人喉。而閩人以榨油食用。二月下種。一次須百顆。乃生一株。蓋空殼者多

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

故也。長水與日最宜坡地窪處。清明前採者上。穀雨前者次之。此後皆老茗爾。採蒸揉焙。修造皆有法。詳見茶譜。昔賢所稱。大約謂唐人尚茶。茶品益衆。有雅州之蒙頂。石花。露芽。穀芽。爲第一。建寧之北苑。龍鳳團爲上供。蜀之茶則有廣川之神泉。獸目。峽州之碧澗。明月。夔州之眞香。邛州之火井。思安。黔陽之都濡。嘉定之峨眉。瀘州之納溪。玉壘之沙坪。楚之茶則有荊州之仙人掌。湖南之白露。長沙之鐵色。蘄州蘄門之團面。壽州霍山之黃芽。廬州之六安英山。武昌之樊山。岳州之巴陵。辰州之溆浦。湖南之寶慶。茶陵。吳越之茶。則有湖州顧渚之紫筍。福州方山之生芽。洪州之白露。雙井之白毛。廬山之雲霧。常州之陽羨。池州之九華。丁山之陽坡。袁州之界橋。睦州之鳩坑。宣州之陽坑。金華之舉岩。會稽之日鑄。皆產茶有名者。其他猶多。而猥雜更甚。按陶隱居註苦茶云。西陽、武昌、廬江、晉陵。皆有好者。飲之宜人。凡所飲物。有茗及木葉。天門冬苗。菽藝。藥皆益人。餘物並冷利。又巴東縣有眞茶。火焙作卷結。爲飲亦令人不服。俗中多煮檀葉及大皂李葉作茶飲。並冷利。南方有瓜蘆木。亦似茗。也。今人採櫧櫟。山礬。南燭。烏藥諸葉。皆可爲飲。以亂眞茶云。(李時珍)㊀徽之松蘿茶化食六合之苦丁茶止痢。滇南之普洱茶消食辟瘴。(盧明飛)㊁產中國。日本。印度。日本除北海道外。各地皆產之。其中有名者。如山城之宇治。駿河之安倍。廬久保。近江之信樂。武藏之狹山等。(和漢藥考)㊂貯茶用磁製或錫製壺最佳。陶製及玻璃器不能將茶保存長久。(和漢藥考)㊃蠶豆葉。枸杞葉。柳葉等。農家往往用以代茶。奸商則往往以之混入茶葉。使增加重量。(和漢藥考)

【茶腿】卽火腿之別名。見『火腿』條。

【茶樹根】性質　味苦。平。無毒。

主治　口爛。煎湯代茶飲之。立效。

【茸母】卽鼠麴草之古籍別名。典見『鼠麴草』條。

【茹花枝】卽合歡皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『合歡皮』條。

【茹根】卽白茅根之古籍別名。典見本經。詳『白茅根』條。

【茹草】卽柴胡之古籍別名。典見吳普本草。詳『柴胡』條。

【茹蘆】卽茜草根之古籍別名。典見別錄。詳『茜草根』條。

【茹藤】卽茜草根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茜草根』條。

【茭蔚】卽益母草之原名。詳『益母草』條。

【茭蔚子】卽益母草子之原名。詳『益母草子』條。

【茼蒿】(綱目)

外國名詞　Chrysanthemum Coronarium, L.(拉丁)　シュンギク　キクナ　ムジンサウ(日本)

基本之莖葉。

產地　生原野間。

形態　茼蒿爲菜類之一年生或越年生草本。高二三尺。葉二回羽狀深裂。互生。花黃色。或白色。頭狀花序。其花外圍之花。作舌狀花冠。中部之花。作筒狀花冠。每一花結子近百。成毬如地菘。及苦實子。其莖葉可供食與藥用。



茼蒿

性質　甘。辛。平。無毒。

主治　安心氣。養脾胃。消痰飲。利腸胃。

參攷資料　茼蒿多食動風。氣薰人心。令人氣滿。(掌禹錫)

【荃】卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【荅】卽赤小豆之古籍別名。典見廣雅。詳『赤小豆』條。

【荊】卽雞之古籍別名。典見綱目。詳『雞』條。

【荊三稜】卽三稜之處方用名。詳『三稜』條。

【荊芥】原名　假蘇。

命名　本品莖葉辛香似蘇。故名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

處方用名 荊芥穗。荊芥炭。炒荊芥。黑荊芥。

古籍別名 鼠蓂（本經）薑芥。（別錄）京芥。鄭芥。一捻金。再生丹。如聖散。獨行散。舉卿古拜散。（和漢藥考）胡荊芥。石荊芥。新羅荊。（綱目）

外國名詞 Salvia Plebeia. R. Br.（拉丁）（Sage.）（英）

基本 屬唇形科。爲荊芥之花穗。與莖葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。荊芥產江西。紅梗者爲佳。其次浙江杭州府。再次湖北。廣城。廣東產者名土荊芥。全無辛香。不適用。夏季出新。

形態 荊芥（此與土荊芥異。）爲一年生草本。莖直立。高一二尺。葉作長披鍼形。其端尖銳。別有五小葉。成爲鬣狀。葉腋歧生分枝。梢端開淡紅色之唇形花。與紫蘇花相似。綴成長穗。氣芳香。味如樟腦。

採取 五六月間。並花實成穗者。採之曝乾。

製法 凡使以陳者良。去梗取穗。有微炒用以殺辛香者。若用以止血。須炒黑。

性質 辛。溫。無毒。與黃芩同而較弱。

成分 含有揮發油與樹脂。

效能 輕宣發表。祛風理血。爲鎮痛鎮痙藥。用於冒寒性痙攣及痛風發作。產後亦多用之。若用大量則有疏表發汗之用。施於感冒及天疱瘡疹。功效甚著。又治流行性感冒。

主治 寒熱。風瘙癮瘧。生瘡。破結聚。氣下瘀血。除溼痘。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論荊芥曰。去邪除勞渴。冷風出汗。煮汁服之。搗爛醋和傅丁腫腫毒。【唐】甄權藥性本草論荊芥曰。單用治惡風眩風。口面喎斜。遍身瘡瘤。心虛忘事。益力添精。辟邪毒。氣通利血脈。【唐】陳士良食性本草論荊芥曰。主血勞風氣。壅滿背脊疼痛。虛汗理丈夫脚氣。筋骨煩疼。及陰陽毒。傷寒頭痛頭旋目眩。手足筋急。【唐】孟詵食療本草論荊芥曰。產後中風。身強直。研末酒服。【宋】日華諸家本草論荊芥曰。利五臟。消食下氣。醒酒作菜生熟皆可食。幷煎茶飲之。以豉汁煎服。治暴傷寒。能發汗。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論荊芥曰。治婦人血風及瘡疥爲要藥。【明】李時珍本草綱目論荊芥曰。散風熱。清頭目。利咽喉。消瘡腫。治項強。目中黑花。及生瘡陰癢。吐血衄血。下血。血痢崩中。痔漏。【明】繆希雍本草經疏論荊芥曰。假蘇。荊芥也。其氣溫。其味辛。其性無毒。入血分之風藥也。故能發汗。其主寒熱者。寒熱必由邪盛而作。散邪解肌出汗。則寒熱自愈。風瘧由熱結於足少陽陽明二經。火熱鬱結而成瘧癘爲病。亦屬二經。故也。生瘡者。熱血有溼也。涼血燥溼。瘡自脫矣。破結聚氣者。辛溫解散之力也。下瘀血。入血分。辛以散之。溫以行之。之功用也。痺者。風寒溼三邪之所致也。祛風燥溼。散寒。則溼痺除矣。【清】黃宮繡本草求眞論荊芥曰。荊芥辛苦而溫。芳香而散。氣味輕揚。故能入肝經。氣分。驅散風邪。凡風在於皮裏膜外。而見肌膚灼熱。頭目昏眩。咽喉不利。身背疼痛者。用此治無不效。不似防風氣不輕揚。驅風之必入人骨肉也。是以宣散風邪。用以防風之必兼用荊芥者。以其能入肌膚宣散故耳。且既入肝經。風木之臟。則肝卽屬於藏血之地。故又能以通利血脈。伸吐衄腸風。崩痢。產後血暈。瘡毒。癰腫。血熱等症。靡不藉其輕揚。以爲宣滯之具。寧於風木之臟。既於其氣而理者。復不於血而治乎。玩古方產後血暈風起。有用荊芥爲末。同酒。及或童便。調治。崩中不止。有用炒黑荊芥以治。於此可見其概矣。連穗用。治血須炒黑。

國外學說 日本藥學士村山義溫嘗試驗中國產荊芥中之揮發油。據稱揮發油中。含有薄荷精。與日本產薄荷油中所含者相似。惟用光學試驗。則見平面相同。立體則異。蓋含於荊芥油中者爲右旋性。含於薄荷油中者。乃左旋性也。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。荊芥本經名假蘇。味辛性溫。臭香。處處有之。本係野生。今多栽種。近有一種僞品。並無香味。又安能治寒熱。破結聚。下瘀血而除溼痘乎。㊁曹炳章

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

曰。按荊芥三月出新。江南孟阿陵宛產者。莖細短。穗多色綠爲最佳。太倉出者。穗多氣香亦佳。蕭山鑫山出者。梗粗葉綠。穗少氣香。略次。江西山東產者。梗粗穗紅不香。南京出性硬。皆極次。其他各處皆出。總要梗紅穗多葉綠氣香者爲道地。

近人學說　張山雷曰。荊芥味微辛而帶芳香。其氣甚清。質又輕揚。故治風熱在表在上諸症。能泄肺熱而達皮毛。風熱咳嗽宜之。風熱外感頭痛寒熱。亦是主藥。又入血分。清血熱。能治咽喉口舌發頤大頭諸症。亦治瘡瘍風疥瘰癧。吐蚵下血崩漏。能澈上澈下。散結導瘀。厥功甚多。而亦甚捷。誠風熱血熱之一大法王。不可以其微賤易得而忽視之。然古法每謂產後中風。口噤發痙。角弓反張。血暈不醒。有豆淋酒法。以防風、羌活、荊芥等藥。炒研爲末。另以黑大豆炒熱。酒淋乘熱調藥沖服。意謂此是產後猝受外風。故宜風藥酒服。溫升疏散之法。無論何書。往往稱爲大效。甚且託名於華元化。稱之爲華陀愈風散。不知產後噤厥。角弓反張。純是陰脫於下。陽浮於上。雖曰中風。明是內動之風。上升沖腦。以致知覺運動。頓失其常。鎮而降之。猶恐不濟。妄投風藥。加以熱酒。是爲教森升木。火上添油。殺之速。安有得效之理。此皆古人誤認內風作外風之治法。一盲傳盲。千篇一律。最是黑暗地獄。惟荊芥炒黑。則輕揚疏散之性已失。而黑能入血。可以止血之妄行。若產後去血過多。陰不涵陽。羣厥昏瞶者。用童便調灌。則又能立定其氣血沖腦之變。是爲一舉兩得。卻是佳方。此不可與豆淋酒之法作一例觀也。

配合應用　㊀治頭項風強。八月後。取荊芥穗作枕。及鋪牀下。立春日去之。（千金方）

㊁治風熱頭痛。荊芥穗、石膏等分爲末。每服二錢。茶調下。（永類鈐方）

㊂治風熱牙痛。荊芥根、烏桕根、葱根、等分。煎湯。頻含漱之。

㊃治小兒鵝癇。一百二十種。用荊芥穗二兩。白礬半生半枯一兩。爲末。糊丸。黍米大。硃砂爲衣。每臺湯下二十丸。日二服。（醫學集成方）

㊄治一切偏風。口眼喎斜。用青荊芥一斤。青薄荷一斤。同入砂盆內研爛。生絹絞汁。於甕器中煎成膏。濾去滓三分之一。將二分日乾爲末。以膏和丸。梧子大。每服三十丸。白湯下。早暮各一服。忌動風物。（經驗方）

㊅治中風口噤。荊芥穗爲末。酒服二錢。立愈。名荊芥散。實似道云。此方出會公談錄。前後用之甚驗。其子名順者。病此已革。服之立定。眞再生丹也。

㊆華佗愈風散。治婦人產後中風。口噤。手足瘛瘲如角弓。或產後血暈。不省人事。四肢強直。或心眼倒築。吐瀉欲死。用荊芥穗子。微焙爲末。每服三錢。豆淋酒調。或童子小便服之。口噤則挑齒灌之。斷噤則灌入鼻中。其效如神。大抵產後太眩。則汗出而腠理疎。則易於中風也。時珍曰。此方諸書盛稱其妙。（姚僧垣集驗方）以酒服名如聖散。云藥下可立待應效。（陳氏方）名舉卿古拜散。（簡存敬方）用古考錢煎湯服。名一捻金。（王貺指迷方）加當歸等分。水煎服。許叔微本事方云。此藥委有奇效神聖之功。一婦人產後睡久。及醒則昏昏如醉。不省人事。醫用此藥及灸加數。云服後當睡。必以左手摩頭。用之果然。嘗覩產實方云。此病多因怒氣傷肝。或憂氣內鬱。或坐草受風而成。急宜服此藥也。戴原禮證治要訣名獨行散。實似道悅生隨抄。呼爲再生丹。

㊇治產後迷悶。因怒氣發熱迷悶者。獨行散。用荊芥穗。以新瓦半炒半生。爲末。童子小便服一二錢。若角弓反張。以豆淋酒下。或剉散。童尿煎服。極妙。蓋荊芥乃產後要藥。而角弓反張。乃婦人急候。得此證者。十存二三而已。（戴原禮要訣方）

㊈治產後血暈築心。眼倒風縮。欲死者。取乾荊芥穗。擣篩爲末。每用二錢七。童子小便一酒盞。調勻熱服。立效。口噤者。挑齒口閉者。灌鼻中。皆效。近世名醫用之。無不如神也。（圖經本草方）

㊉治產後血眩風虛。精神昏冒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

荊芥穗一兩三錢。桃仁五錢。去皮尖。炒爲末。水服三錢。若喘加杏仁。去皮尖。炒甘草炒各三錢。（保命集方）

㈣治產後下痢。大荊芥四五穗。於盞內燒存性。不得犯油火入麝香少許。以沸湯些須調下。此藥雖微。能愈大病。不可忽之。（梁師方）

㈤治產後鼻衄。荊芥焙研末。童子小便服二錢。海上方也。（婦人良方）

㈥治九竅出血。荊芥煎酒通口服之。（直指方）

㈦治口鼻出血如涌泉。因酒色太過者。荊芥燒研。陳皮湯服二錢。不過二服也。

㈧治吐血不止。用荊芥連根洗。搗汁半盞服。乾穗爲末亦可。（聖惠方）又用荊芥穗爲末。生地黃汁調服二錢。（經驗方）

㈨治小便尿血。荊芥碾砂等分爲末。糯米飲下三錢。日三服。（集簡方）

㈩治崩中不止。荊芥穗於麻油燈上燒焦爲末。每服二錢。童子小便服。此夏太君娘娘方也。（婦人良方）

(11)治痔漏腫痛。荊芥煮湯。日日洗之。（簡便方）

(12)治大便下血。用荊芥炒爲末。每米飲服二錢。婦人用酒下亦可。拌麵作餛飩食之。（經驗方）又用荊芥二兩。槐花一兩。用炒紫爲末。每服三錢。清茶送下。（簡便方）

(13)治小兒脫肛。荊芥皂角等分。煎湯洗之。以鐵漿塗上。亦治子宮脫出。（經驗方）

(14)治陰癰腫痛。荊芥穗瓦焙爲散。酒服二錢即消。

(15)治小兒臍腫。荊芥穗煎湯洗淨。以熯葱刮薄。出火毒。貼之即消。（海上方）

(16)治瘰癧潰爛。癧瘡牽至胸前兩腋塊如茄子大。或牽至兩肩上。四五年不能療者。皆治之。其效如神。武進縣朱守仁傳云。其項不能回頭。用此數日減。如瘡爛破者。用荊芥根下一段。剪碎。煎沸湯。溫洗良久。看爛破處紫黑。以鍼一刺去血。再洗三四次。用樟腦、雄黃等分爲末。麻油調搽上。出水。次日再洗再搽。以愈爲度。（活法機要方）

(17)治疔腫諸毒。荊芥一握。切。以水五升。煮取一升。分二服。俟冷飲。（藥性論方）

(18)治一切瘡疥。荊芥末。以地黃自然汁熬膏和丸。梧子大。每服三十五丸。茶酒任下。（普濟方）

(19)治脚極溼爛。荊芥葉搗傅之。（簡便方）

(20)治纏脚生瘡。荊芥燒灰。葱汁調傅。先以甘草湯洗之。（摘玄方）

(21)治小兒風寒。煩熱有痰。不省人事。荊芥穗半兩。焙。麝香片腦各一字。爲末。每茶服半錢。大人亦治。（普濟方）

(22)治頭目諸疾。一切眼疾血勞。風氣頭痛。頭旋目眩。荊芥穗爲末。每酒服三錢。（龍樹論方）

(23)治癃閉不通。小腹急痛。無問久新。荊芥、大黃爲末等分。每溫水服三錢。小便不通。大黃減半。大便不通。荊芥減半。名倒換散。（普濟方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無外感風寒溼邪者禁用。忌火。反魚蟹河豚臟肉。

參攷資料　㈠荊芥反魚蟹河豚之說。本草醫方並未言及。而稗官小說往往載之。按李廷飛延壽書云。凡食一切無鱗魚。忌荊芥。食黃鱔魚後食之。令人吐血。惟地漿可解。與蟹同食動風。又蔡絛鐵山叢話云。予居嶺嶠。見食黃顙魚。犯薑芥者立死。甚於鈎吻。洪邁夷堅志云。吳人魏幾道。啖黃顙魚羹。後採荊芥和茶飲。少頃足痒上澈心肺。狂走。足皮欲裂。急服藥兩日乃解。陶九成輟耕錄云。凡食河豚。不可服荊芥。藥大相反。予在江陰。見一儒者。因此喪命。章航細談云。凡服荊芥風藥。忌食魚。楊誠齋嘗見一人立致於死也。時珍按荊芥乃日用之藥。其相反如此。故詳錄之。以爲警戒。又按物類相感志言。河豚用荊芥同煮三五次。換水則無毒。其說與諸書不同。何哉。大抵養生者能守前說爲戒可也。（李時珍）㈡按吳普本草云。假蘇一名荊芥。葉落麤而細。蜀中生野之。普乃東漢末人。去別錄時未遠。其言當不謬。故唐人蘇恭祖其說而陳士良蘇頌復啓爲兩物之疑。亦臆說爾。曰蘇曰薑曰芥皆因氣味辛

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

香如蘇而氣如芥也。(李時珍)㈢今處處有之。葉似落藜而細。初生香辛。可啜。人取作生菜。古方稀用。近世醫家爲要藥。並取花實成穗者。曝乾入藥。又有胡荊芥。俗呼新羅荊芥。又有石荊芥。生山石間。體性相近。入藥亦同。(蘇頌)㈣荊芥原是野生。今爲世用。遂多栽蒔。二月布子生苗。炒食辛香。方莖細葉。似獨帚葉而狹小。淡黃綠色。八月開小花。作穗成房。房如紫蘇。房內有細子。如荸薺子。狀黃赤色。連穗收採用之。(李時珍)㈤今人但過風證。概用荊防。不知唯風在皮裏膜外者宜之。若風入骨肉者。須防風不得混用。(吳遵程)

【荊芥炭】卽荊芥之處方用名。詳『荊芥』條。

【荊芥穗】卽荊芥之處方用名。詳『荊芥』條。

【荊桃】卽櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳『櫻桃』條。

【荊崗沙】卽菝葜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菝葜』條。

【荊鳩】卽斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳『斑鳩』條。

【荊瀝】

命名 本品係用牡荊根莖炙取之汁。如竹瀝然。故名。

基本 屬馬鞭草科。爲牡荊之根汁。

形態 牡荊爲落葉灌木。每植庭園中。以供玩賞。高四五尺。大達丈餘。新枝色綠。其形方。有茸毛。舊枝色褐。其形圓。葉爲掌狀複葉。三小葉附之。其在梢頭者。則有五小葉俱有長柄。小葉爲橢圓狀。或爲長披鍼形。葉尖有鋸齒。與茸毛花朶小。色青紫。夏日開於枝葉之間。爲圓錐花序。其瀝則清冽如水。與竹瀝相彷彿。

製法 時珍曰。取法。用新採根莖。截尺五長。架於兩磚上。中間燒火炙之。兩頭以器承取用。又法。截三四寸長。束入瓶中。仍以一瓶合住。固外。以糠火煨燒。其汁瀝入下瓶中。亦妙。

用法 乘熱時飲服。或和入湯藥中。

性質 甘。平。無毒。

效能 通經絡。瀉痰涎。用爲祛痰藥。

主治 飲之去心閙煩熱。頭風。旋暈目眩。心頭澮澮欲吐。卒失音。小兒心熱驚癎。止消渴。除痰吐。令人不睡。

歷代記述及證 【明】李時珍本草綱目論荊瀝曰。除風熱。開經絡。導痰涎。行血氣。解熱利。【清】汪訒庵本草備要論荊瀝曰。荊瀝甘平。除風熱。化痰涎。開經絡。行血氣。治中風失音。驚癎痰迷。眩暈煩悶。消渴熱痢。爲去風化痰妙藥。氣虛食少者忌之。

配合應用 ㈠治中風口噤。荊瀝每服一升。(范汪方)

㈡治頭風頭痛。荊瀝日日服之。(集驗方)

㈢治喉痺痰腫。荊瀝細細咽之。或以荊一握。水煎服之。(千金方)

㈣治目中卒痛。燒荊木黃汁點之。(肘後方)

㈤治心虛驚悸瘦羸者。荊瀝一升。火煎至一分。作四服。日三夜一。(小品方)

㈥赤白下痢。五六年者。荊瀝每日服五合。(外臺祕要方)

㈦澼癖瘡癬。荊木燒取汁。日塗之。(梅師方)

用量 八分至錢半。

參攷資料 ㈠荊瀝氣平味甘。化痰去風爲妙藥。故孫思邈千金翼云。凡患風人多熱。常宜於竹瀝、荊瀝。姜汁合五合和勻。熱服。以瘥爲度。陶弘景亦云。牡荊汁治心風爲第一。延年祕錄云。熱多用竹瀝。寒多用荊瀝。(李時珍)㈡二汁同功。並以姜汁助送。則不凝滯。但氣虛不能食者。用竹瀝。氣實能食者。用荊瀝。(朱震亨)㈢牡荊本東印度所產。享保年間。始有人取漢種。栽種江戶藥園。說見小野蘭山翁著本草紀聞。(和漢藥考)

【荎草】

基本 荎草爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 辛。無毒。

主治 療金瘡。

【荇】㈠卽莕菜之古籍別名。典見詩經。詳『莕菜』條。㈡卽浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【荇絲菜】卽莕菜之俗名。詳『莕菜』條。

【莽】卽茶葉之古籍別名。典見綱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

目。詳『茶葉』條。

【草八角】古籍別名　紅孩兒。孩兒撐傘。（綱目拾遺）

產地　出浙江於潛昌化之山野間。

形態　草八角爲木八角之一種。高尺許。葉角上仰。色黃。獨莖一葉。夏秋間開花。兩朵相對。粉紅色。下垂。結子紅色。亦成對。其根圓而不長。可供藥用。

性質　溫。無毒。

主治　祛骨內風。療癰腫諸毒。

參攷資料　八角金盤。有草木二種。木本者其葉尖角仰起如盤之狀。葉背色黃。故曰金盤。草本者。葉尖角不仰。葉背不黃。微有分別。此藥性熱力猛。有毒。咀之味麻。雖壯實人亦宜少用。服藥後忌魚腥。猪、羊、牛、馬等肉。犯之令人癲狂。惟白菜腹可解。入藥用近根皮。酒煎服。取汗即愈。力弱者發咳作吐。病亦愈。（趙學敏）

【草三稜】即三稜之古籍別名。典見開寶本草。詳『三稜』條。

【草木之王】即南天燭之古籍別名。典見登眞隱訣。詳『南天燭』條。

【草牛黃】即萇菁子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萇菁子』條。

【草王】即桑莖實之古籍別名。典見別錄。詳『桑莖實』條。

【草古】即甘草之古籍通用簡名。詳『甘草』條。

【草甘遂】即蚤休之古籍別名。典見唐本草。詳『蚤休』條。

【草石蠶】命名　本品根似石蠶。故名。

古籍別名　地蠶（日用）土蛹（餘冬錄）甘露子（食物）滴露。地瓜兒（綱目）

外國名詞　Stachys Sieboldi Miq.（拉丁）チョロギチョウロギ（日本）

基本　係脣形科水蘇屬。爲草石蠶之根。

產地　出山野間。

形態　草石蠶爲山草類之多年生草本。方莖。高二尺餘。葉與莖皆密生毛茸。葉對生。有鋸齒。下部之葉長心臟形。上部之葉長卵形。秋日花生於上部之葉腋。連綴如穗狀。脣形花冠呈淡紅紫色。其生於地下根莖尖端肥大。肉質呈連球狀。白色。大如指。形如蠶。可爲食味如馬鈴薯。亦供藥用。



草石蠶

採取　冬月採之。

性質　甘平無毒。

主治　浸酒除風破血。煮食治溪毒。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論草石蠶曰。焙乾主走注風。散血止痛。其節亦可擣末。酒服。

【清】趙學敏本草綱目拾遺論草石蠶曰。治風痺。羊毛痧。虎咬成瘡口不飲。爲末摻之。解硫黃毒。蛇毒。治發背癰疽。結核等症。竹、木、魚刺、黃疸、熱淋、洗眼疾。及陰溼瘡。

參攷資料　㈠草石蠶和五臟。下氣清神。（飲膳正要）㈡草石蠶不宜生食及多食生寸白蟲。與諸魚同食。令人吐。（李時珍）

【草血竭】即地錦草之古籍別名。典見綱目。詳『地錦草』條。

【草兵】即巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴豆』條。

【草決明】即青葙子之原名。詳『青葙子』條。

【草豆仁】即草豆蔻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『草豆蔻』條。

【草豆蔻】原名　豆蔻。

命名　草豆蔻是對肉豆蔻而名也。

處方用名　煨草果草果仁。

古籍別名　漏蔻（草物志）草果（鄭樵通志）豆叩。豆株。家孽。寶蔻。草豆仁（和漢藥考）蘇迄米羅細（金光明經）

外國名詞　Cardamomum（拉丁）（Cardamoms.）（英）

基本　屬於薑荷科。爲草豆蔻之子實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。草果產雲南百色。廣西龍州等處。有運東京海防而來。有運南寧而來。十一月新。

形態　草豆蔻苗似蘆。其葉似山薑。杜若輩。根似高良薑。二月開花作穗。房生莖下。嫩葉卷之。初如芙蓉花。微紅。穗頭深色。其葉漸廣。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

花漸出。色漸淡。亦有黃白色者。結實若龍眼。皮無鱗甲。皮中子如石榴瓣。夏月熟時採之。曝乾。根苗微作樟木香。根莖子俱辛香也。

種類　㊀建寧所產者名草豆蔻。大如龍眼而形微長。其皮黃白薄而稜峭。其仁大如縮砂仁。而辛香氣和。㊁滇廣所產者名草果。長大如訶子。其皮色黑。厚而稜密。其子粗而辛臭。正如斑蝥之氣。

採取　夏月採實曝乾。

製法　雷敩曰。凡使草豆蔻。須用蒂取向裏子及皮。用茶黃同於鐵上緩炒。待茶黃微黃黑。卽去茶黃。取草豆蔻皮及子杵用之。李時珍曰。今人惟以麵裹煨火煨熟去皮用之。

性質　辛。溫。濇。無毒。

效能　燥溼。祛寒。除痰。截瘧。用爲健胃。解毒藥。

主治　溫中。心腹痛。嘔吐。去口臭氣。

歷代記述攷證　【宋】開寶重定新本草論草蔻曰。下氣止霍亂。一切冷氣。消酒毒。【元】李東垣用藥法象論草蔻曰。調中補胃。健脾消食。去客寒。心與胃痛。【明】李時珍本草綱目論草豆蔻曰。治瘴癘寒瘧。傷暑吐下。洩痢噦膈。反胃痞滿。吐酸。痰飲積聚。婦人惡阻帶下。除寒燥溼。開鬱破氣。殺魚肉毒。制丹砂。【明】繆希雍本草經疏論草豆蔻曰。味辛氣溫。而性無毒。海藏又云大辛熱。入足太陰陽明經。蓋辛能破滯。香能入脾。溫熱能祛寒燥溼。故主溫中。及寒客中焦。心腹痛中寒嘔吐也。脾開竅於口。脾家有積滯。則瘀而爲熱。故發口臭。醒脾導滯。則口氣不臭矣。辛散溫行。故下氣。寒客中焦。飲食不消。氣因閉滯。則霍亂。又散一切冷氣。消酒毒者。亦燥溼破滯。行氣健脾開胃之功也。產閩之建寧者。氣芳烈。類白豆蔻。善散冷氣。療胃脘痛。理中焦。產滇貴南粵者。氣猛而濁。俗呼草果者是也。善破瘴癘。消穀食及一切宿食停滯。作脹悶及痛。【清】黃宮繡本草求眞論草蔻曰。草豆蔻辛熱香散。功與肉蔻相似。但此辛熱燥溼除寒。性兼有澁。不似豆蔻澁性居多。能止大腸滑脫不休也。又功與草果相同。但此止逐風寒客在胃口之上。症見當心疼痛。不似草菓辛熱浮散。嘉治瘴癘寒瘧也。故凡溼鬱成病。而見胃脘作疼。服之最爲有效。若使鬱熱內成。及陰虛血燥者。服之爲大忌耳。閩產名草蔻。如龍眼而微長。皮黃白薄而稜峭。仁如砂仁。而辛香氣和。滇廣所產名草菓。如訶子。皮黑厚而稜密。子粗而辛臭。雖是一物。微有不同。麵裹煨熟取仁。忌用鐵器。【清】閻立堃本草選旨論草蔻曰。草菓。味大辛熱。氣溫而猛。升也陽也。無毒。與草豆蔻並入足太陰陽明經。辛能去滯。香能入脾。溫熱能祛寒燥溼。故主治消食除瘴。祛寒破滯。但氣比草菓猛而且濁。功力迅速。故凡胸腹痞滿。宿食不消。或感寒中寒。腹痛吐利。或生冷積聚。痰涎鬱結。或寒邪客胃。當心作疼。或感山嵐瘴氣。或病霍亂惡心。若審知其爲寒溼所致。而不爲暑熱所傷者。用之如鼓應桴。而且同縮砂能溫中焦。故寒中者用之。同常山能截瘧。故時瘧者用之。皆取其氣之猛烈。功之大而效之速也。然其氣溫。積溫成熱。過多能助脾熱。傷肺損目。至於老衰虛羸。元氣不足者。則全戒焉。以其氣專消導也。

國外學說　英美學說謂草豆蔻產印度、暹羅等國。其果可入藥。能溫補。開胃祛風。佐瀉劑同服。能免肚疼。每服一分至三分半。

配合應用　㊀入人參養胃湯。能消一切宿食。開拓中焦滯氣。㊁藥性論云。草豆蔻單用。能主一切冷氣。㊂治心腹膜滿短氣。用草豆蔻一兩。去皮爲末。以木瓜生薑湯調服半錢。（千金方）㊃治霍亂煩渴。草豆蔻、黃連各一錢半。烏豆五十粒。生薑三片。水煎服。（聖濟總錄方）㊄治脾腎不足。虛寒泄瀉。草果仁一兩。以舶上茴香一兩。炒香。去茴不用。吳茱萸一兩。湯泡七次。同破故紙一兩。炒香。去故紙不用。胡盧巴一兩。同山茱萸一兩。炒香。去茱萸不用。三味爲末。酒糊丸。每六七十丸。鹽湯下。（百一選方）㊅香口辟臭。草豆蔻細辛爲末含之。（直指方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊐治脾痛脹滿。草果仁二箇。酒煎服之。(肘後方)

㊑治胃弱嘔逆不食。用草豆蔻仁二枚。高良薑半兩。水一盞。煮取汁。入生薑汁半合。和白麵作撥刀。以羊肉臛汁煮熟。空心食之。(普濟方)

㊒治虛痛自汗不止。用草果一枚。麵裹煨熟。連麵研入平胃散二錢。水煎服。(經效濟世方)

㊓治赤白帶下。連皮草果一枚。乳香一小塊。麵裹煨焦黃。同麵研細。每米飲服二錢。日二服。(衛生易簡方)

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡陰血不足而無寒溼實邪者禁用。

著名方劑　果附湯。治氣虛脾寒。瘧疾少寒多。或熱多寒少。或單寒不熱。或大便泄而小便多。不能食。(濟生方)草果仁、熟附子各二錢半。生薑七片。棗肉二枚。上以水三盞煎取一盞。溫服。

參攷資料　㊀草豆蔻氣味極辛。微香性溫。而調散冷氣甚速。虛弱不能飲食者。宜此與木瓜、烏梅、縮砂、益智仁、麴蘗、甘草、生薑同用。(寇宗奭)㊁風寒客邪在胃之上。當心作疼者。煨熟用之。(李杲)㊂草豆蔻性溫。能散滯氣。消膈上痰。若明知身受寒邪。口食寒物。胃脘作疼。方可溫散用之。如鼓應桴。或溼痰鬱結成病者。亦效。若熱鬱者不可用。恐積溫成熱也。必用扈子之劑。(朱震亨)㊃豆蔻治病。取其辛熱浮散。能入太陰陽明。除寒燥溼。開鬱化食之力而已。南地卑下。山嵐烟瘴。飲啖酸鹹。脾胃常多寒溼鬱滯之病。故食料必用與之相宜。然過多亦能助脾熱。傷肺損目。或云與知母同用。治瘧癉寒熱。取其一陰一陽。無偏勝之害。蓋草果治太陰獨勝之寒。知母治陽明獨勝之火也。(李時珍)㊄按楊雄方言云。凡物盛多白蔻之名。或取此義。豆象形也。南方異物志作漏蔻。蓋南人字無正音也。今雖不專爲果。猶入茶食料用。尙有草果之稱焉。金光明經三十二品香藥。謂之蘇乞迷羅細。(李時珍)㊅草豆蔻今嶺南皆有之。苗似蘆。其葉似山薑。杜若。根似高良薑。二月開花作穗。房生於莖下。嫩葉卷之而生。初如芙蓉花。微紅。穗頭深色。其葉漸廣。花漸出而色漸淡。亦有黃白色者。南人多採花以當果。尤貴其嫩者。幷穗入鹽同淹。治壘壘作痰不散。又以木槿花同浸。欲其色紅。爾其結實若龍眼子而銳。皮無鱗甲。皮中子如石榴瓣。夏月熟時採之。曝乾。根苗微作樟木香根。莖子並辛香。(蘇頌)㊆豆蔻生交趾。其根似益智。皮殼小厚。核如石榴而辛香。葉如芜蘭而小。三月採。其葉細破陰乾用。味近苦而有甘。(李珣)㊇草豆蔻草果雖是一物。然微有不同。今建寧所產豆蔻大如龍眼而形微長。其皮黃白薄而稜峭。其仁大如縮砂仁而辛香氣和。滇廣所產草果長大如訶子。其皮黑厚而稜密。其子粗而辛臭。正如痤蝨之氣。彼人皆用毛茶及作食料恒用之。物廣人取生草蔻入梅汁鹽漬令紅。曝乾薦酒。名紅鹽草果。其初結小者名鷄哥舌。元朝飲膳皆以草果爲上供。南人復用一種火楊梅。僞充草豆蔻。其形圓而粗。氣味辛猛而不和。人亦多用之。或云卽山薑實也。不可不辨。(李時珍)

【草東床】卽大腹皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大腹皮』條。

【草果】卽草豆蔻之古籍別名。典見鄭樵通志。詳『草豆蔻』條。

【草果仁】卽草豆蔻之處方用名。詳『草豆蔻』條。

【草河車】卽草紫河車之簡稱。詳『蚤休』條。

【草金丹】卽杏仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杏仁』條。

【草金鈴】卽牽牛子之古籍別名。典見炮炙論。詳『牽牛子』條。

【草附子】卽香附子之古籍別名。典見圖經本草。詳『香附子』條。

【草禹餘粮】卽土茯苓之古籍別名。典見本草拾遺。詳『土茯苓』條。

【草蒔】卽蓬蒿之日本名。詳『蓬蒿』條。

【草烏】卽草烏頭之簡稱。詳『草烏頭』條。

【草烏喙】㊀卽烏喙之原名。詳『烏喙』條。㊁卽草烏頭兩歧相合者之別名。詳『草烏頭』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【草烏頭】原名　烏喙。土附子。

命名　本品形如川烏而又爲野生者故名。

古籍別名　兩頭尖。奚毒。（本經）耿子毒。公帝秋。（吳普本草）金鴉。鶯粟菊。（綱目）苗名莨菪。獨白草。（綱目拾遺）汁煎名射罔。（綱目拾遺）僧鞋菊。（吳俗名）雙蘭菊。（日名）

外國名詞　Aconitum（拉丁）

基本　屬毛茛科。爲烏頭之球根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。烏頭產四川龍安府。陝西漢中兩處。近日所用川烏草烏。長身細個者。俱由日本運來。萬國藥方卷三四十七篇論產於歐洲印度大譯。

形態　烏頭爲山野自生之宿根。莖高二三尺。葉有光澤。作掌狀分裂。十月間於梢上開青紫色或白色花。有兜狀不整齊萼。形如伶人之烏冠。故日本呼此爲烏兜。此草由產地而異其花形。葉莖亦有硬轢之別。其球根卽烏頭。作蘿蔔狀。下部漸漸細小。末端或尖或鈍。上部壓平。往往彎曲。頗多縱橫皺裂。色帶褐黃。

採取　春二月間採根。陰乾。

製法　李時珍曰。凡使烏頭。或生用。或炮用。或以烏大豆同煎熟。去其毒用。

用法　恒用焙剉爲末。和作外治藥。間有和作丸散用。

性質　辛。溫。有大毒。

成分　主成分爲耶普阿哥尼丁 Japaconitine $C_{36}H_{49}NO_{12}$

效能　祛風。澄開頑痰。用作麻醉與鎮痙藥。施於腹痛、胸痛、頭痛、足痛、關節痛、及諸風痛。瘰癧癌腫。黑內障眼等症。又治疝痛。偏癱。腦性痙攣性小兒痲痺。

作用　自腸壁吸入血中。卽能大減血液循環之速率。使血壓降低。由末梢神經傳達入腦。腦神經被激而痲痺。視覺聽覺亦均減其敏銳。心臟之跳動先速而後緩。同時全身肌肉弛緩。思想紊亂。汗出尿增。若服過量。竟可由失覺而死。

主治　中風惡風。洗洗出汗。除寒澀痺。咳逆上氣。破積聚寒熱。其汁煎之。名射罔。殺禽獸。（本經）消胸上痰冷。食不下。心腹冷痰。臍間痛。不可俛仰。目中痛不可久視。又墮胎。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論草烏曰。主惡風。憎寒。冷痰包心。腸腹疼痛。痿癖氣塊。腫痛。益陽事。强志。【明】李時珍本草綱目論草烏曰。治頭風喉痺。癰腫疔毒。【清】黃宮繡本草求眞論草烏曰。草烏頭辛苦大熱。按書論此。惟長洲張璐辨之明晰。言此與射罔乃至毒之物。非若川烏頭附子之比。自非風頑急疾。不可輕投此藥。止能搜風勝濕。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒而已。本經治惡風。洗汗出。但能去惡風。而不能回陽散寒。可知昔人病風癱服草烏頭木鱉子藥過多。甫入腹。遂痲痺不救。烏附五種。主治攸分。附子大壯元陽。雖偏下焦。而周身內外。無所不至。天雄峻溫。不減於附。而無頃刻回陽之功。川烏專搜風濕痛痺。却少溫經之力。側子善行四支。不入臟腑。草烏悍烈。僅堪外治。此烏附之同類異性者。至於烏喙稟氣不純。服食遠之可也。【清】張隱菴本草崇原論草烏曰。烏喙雖亦名烏頭。實乃土附子也。性劣有毒。但能搜風勝濕。開頑痰。破堅積。治頑瘡。以毒攻毒。不能如附子益太陽之標陽。助少陽之火熱。而使神機之環轉。用者辨之。【清】楊時泰本草述鈎元論草烏曰。草烏頭爲至毒之藥。如用以去病。必須沉寒痼冷。足以相當。或寒濕合并。結聚癖塊。頑痰死血。阻塞眞陽。非是不可以開道路。令流氣破積之藥。得以奏功。蓋因於風虛。則病濕。濕聚而不化。則病於風毒。謂之頑風。是其所治者濕風也。故明其爲風虛。則知用此以透陽之鬱。覺得概謂治風而投之風淫。以取敗哉。【清】鄒澍本經疏證論草烏曰。烏頭之用。大率亦與附子略同。其有異者。亦無不可條疏而件比之也。夫附子曰主風寒咳逆邪氣。烏頭曰中風惡風。洗洗出汗。咳逆邪氣。明明一偏於寒。一偏於風。一則沉著而回浮越之陽。一則輕疏而散已潰之陽。於此見附子沉。烏頭浮矣。附子曰除寒濕踡躄拘攣。膝痛不能行步。烏頭曰除寒濕痺。一主治踡。一主治痺。踡躄拘攣。是筋因寒而收引陽氣

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

柔則能養筋。又何患其不伸。寒溼痺是氣因邪而阻閉。陽氣强則能逐邪。又何患其不開。於此見附子柔烏頭剛矣。夫惟其沉方能柔。惟其散則爲剛。沉而柔者無處不可到。無間不可入。散而剛者無祕不可開。無結不可解。故附子曰破癥堅積聚血瘕。烏頭曰破積聚寒熱。於此可見共一衆入血。一則止及氣分矣。大烏頭煎治寒疝。只用烏頭一味。篇中論蜮甚詳。尤在涇釋之尤妙。曰弦緊蜮皆陰也。而弦之陰從內生。緊之陰從外得。弦則衞氣不行。惡寒者陰出而痺其外之陽也。緊則不欲食者陰入而痺其胃之陽也。衞陽與胃陽並衰。外寒與內寒交盛。由是陰反無畏而上衝。陽反不治而下伏。所謂邪正相搏。卽爲寒疝。此用烏頭之蜮也。曰寒疝繞臍痛。自汗出手足厥冷。曰拘急不得轉側。發作有時。陰縮。此用烏頭之證也。此外用烏頭之法。猶有二證。一則曰病歷節不可屈伸疼痛者。烏頭湯。一則曰寒疝腹中痛逆冷手足不仁。若身疼痛。灸刺諸藥不治者。抵當烏頭桂枝湯。烏頭湯比於麻黃。抵當烏頭桂枝湯比於桂枝。可知烏頭爲治陽痺陰逆之要劑矣。

國外學說　日本學說謂據猪子氏之實驗云。烏頭究非如漢醫所稱道之貴重藥品。若於病床用之。則從來所謂適宜之症。宜有制限者。不過用於神經痛（內服或外用）而已。就二三藥物書。擧其醫治效用。大略（一）爲鎭痛藥。於饗麻賀斯神經痛。痛風等症用之。（二）以鎭靜心動之亢進爲目的。於脚氣用之。但因熱發而亢進者。反以不用爲良。（三）爲利尿藥。於諸般之水腫用之。至其用量根內用一回〇・〇三（七毫八絲）一日〇・三（七釐八毫）極量一回〇・一（二釐六毫）一日〇・五（二分三釐）又藥用烏頭品種甚多。藥學博士下山順一郎氏大別之爲草烏頭、白川附子、勝山附子（以上三種爲日本產）川烏頭、大附子（以上二種華產）五種。註明草烏頭爲烏頭稚根。白川附子爲其老根。而川烏頭及大附子。則未有註釋。又據有毒草木圖說曰。烏頭有大毒。有二種。山中自生者。曰草烏頭。毒性甚烈。春從宿根生苗。高三四尺。莖弱不能直立。葉分歧而互生。至秋。每葉間開花。作深碧色。大抵二三朶相綴。狀似伶人鳥冠。又有濃紫色與白色者。後者日本呼爲 Hanazuma. 人家園圃所栽者。曰川烏頭。毒性較草烏頭稍遜。莖强而直立。葉厚。有深綠色光澤。花濃紫色。狀與草烏頭之花無異。凡烏頭卽爲其母。附子卽爲其子。側子生於附子之側。栽附子不生子而長大者。則謂之天雄。此皆根之名。本草綱目烏頭釋名曰。李時珍曰。『草烏頭取汁和酒爲毒藥。射禽獸。』蝦夷地方取附子加蜘蛛蕃椒同搗。將煎凝之毒汁。塗於竹箭。以射禽獸。謂之 Bugu 或 Hotokinoya. 足知其毒之深。綱目謂之射罔。卽此。英美學說謂草烏頭產中國。歐羅巴。印度等處。高約一尺六寸至五尺。根則頭大而末削。及多橫蔓。長約三四寸。其根與葉均可爲藥品。內含一精。卽厄哥匿顛精（亞格尼賀涅）野生者。較家烏頭尤毒。本草綱目謂其爲至毒之藥。況西土較中國高亢。所產者其力自較中國愈大。用鮮葉可配青汁等用。乾根可配酒及搽酒等。第根之功力比葉尤峻。故凡釀作藥酒者。或用根或用葉亦須聲明。西國常用之草烏頭。在歐羅巴數處山上養六畜之處或冷處得之。如英國內地。間亦有之。西國古時原入毒品。人所鮮服。其用以作服劑。僅百有餘年耳。至其醫治作用爲止痛寧睡藥。平腦藥。平脈藥。又爲解熱藥。解炎藥。第有最烈之毒。能徑平知覺腦筋。如欲用減熱氣之藥。則此藥有大用。如以根少許入口嚼之。則發口津必多。口中覺熱而癢。唇舌間覺有針刺。服後則能平腦。令運體腦筋麻木不寧。四肢如觸鍼。肉筋亦隨減力。若服稍多。則必眼簾收縮。又令人昏蒙癱瘓。因擧絕而死。如或服至殺人之分。兩則覺喉刺熱壯疼。作渴。作吐作瀉。遍體麻木而愈形軟弱。惟不至昏蒙抽搐。又如腦氣筋疼。風溼及心病。用此藥均有益。凡腦氣筋疼。或服飲劑。或以搽酒類搽甚驗。又如牙部腦筋作疼。宜

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

先用搽酒搽腮頰。俟數日不愈。方可內服。又如牙痛以綿花蘸搽酒塞入牙穴。其痛卽止。又如初患風溼。每日宜服此藥三四次。連服數日可愈。若舊症骨衣生厚。亦宜每日服飲劑三四次。兼以搽酒搽之。又如跌打損傷。以搽酒搽之。有奇效。又如胃不消化。及舌有白苔。宜與發汗藥或瀉藥同服。此藥以火酒浸之。能提出功力。尋常用者。則以所浸之酒入藥。其功用又能治痛風。胃氣疼。毒瀉。心體變大。梅核生炎。牙關緊閉。瘰癧。第藥性酷烈。用宜愼。至解藥之解此毒。須先用吐劑。後用內外行氣劑。

近人學說 ㊀張山雷曰。本經亦有烏頭之名。李氏綱目謂此非川產之烏頭。而野生於他處者。故以草烏頭別之。蕭頤按本經烏頭。但云生山谷。初無川產非川產之明文。但今之草烏。既非川產。則藥性當自有別。蓋川中烏附。擴宋人楊天惠附子說。謂產於棉州之彰明縣。熟耕作壘。冬月播種。春月生苗云云。可知川產皆爲人力所培植。而他處所產。既是野生。則毒烈自當更甚。其汁煎之。名曰射罔。能殺野獸。其毒可知。國語謂驪姬置堇於閟。韋昭注堇烏頭也。左傳載驪姬置毒事。謂公祭之地。餽與犬。犬斃。與小臣。小臣亦斃。烏頭大毒。乃至於此。誠非附子之可以同日語也。本經謂主中風惡風洗洗。蓋仍以外感寒風而言。洗洗讀作灑灑。仍是灑淅惡風之候。而後世乃謂可治惡風。以惡字作如字讀。豈古人之眞旨。要知毒風厲風等症。皆是血熱成毒。似此大熱大毒之物。胡可妄投。此蓋誤讀古書之謬。凝人說夢。妄不可聽。惟果是寒溼寒痰。涸陰沍寒。堅凝結聚之症。始可用爲佐使。引到病所。以開堅積耳。此藥雖經甘草湯浸。姜汁製透。然入口嘗之。喉舌卽刺痛異常。少頃且麻木熱腫。猛烈莫與等倫。欲入煎劑。不過一二分而止。瀕湖謂吾蘄郡知府自貢知醫。因爲風痺。服草烏頭木鱉子。藥入腹麻痺。遂至不救。後人亦當知所戒矣。㊁楊華亭曰。本草經烏頭、附子、天雄、雖分三名。而主治略同。惟烏頭條下有可爲射罔殺禽獸等語。別錄云『烏頭生耶陵』（屬河南確山縣）李時珍以川產者爲烏頭。他處爲草烏頭。實大誤。近世烏頭、附子、天雄、側子。皆用四川人工產者。其形態與天產稍異。其根粗圓而短。其鮮貨大者兩餘。乾者約七八錢。若天產鮮貨至大不過四錢。小者一二錢。乾貨大者約一二錢。小者數分。西國入藥統名烏頭。非西國烏頭不生附子。亦非棄去附子。蓋烏頭、附子、天雄、側子、漏籃子。其性味皆同。實不能强爲分別。獨恨雷敩云『喙、附烏雄、側中毗者服之令人喪目』。自欺欺世。誠醫藥界之罪人也。予嘗以天生之烏頭附子等爲末。試服二哩至一小時。覺腦中如開電機。顫動迅速而動力輕浮。微茫如分劑再加。卽至眩暈。因知此藥先至腦部。故漢雹顯使醫淳于衍以烏頭毒皇后。后曰。我頭岑岑也。或謂中西烏頭附子等不類。但予嘗嘗驗其功能。實係相同。其不同者。中西用法有異耳。中醫多用原貨配藥煎服。西醫多用烏頭酒單服。而配劑較少。故其取較與主治常覺不類。非藥之本實有懸殊也。別錄於烏頭等之修治云『採根陰乾』。至雷敩與陶弘景云『熱灰炮製』。由是炮製之法。日益加多。至宋乃有釀造之治。明李中梓以薑汁鹽水煮之。今四川人工產者。均以鹽水煮熟。色褐黑而光。形如煮熟甘藷。因此藥內含澱粉。如被煮熟。則體質已變而黏。（藥市以此爲生附子。生烏頭實誤）及至藥房復用水浸。必達至咀嚼無味。切成薄片。美其名曰淡附片。俗醫往往用至兩許。皆此造作物也。陳修園云『按製藥始於雷公炮製荒謬。難以悉舉。要知此人名歟。宋時人非黃帝時之雷公也。』日人和田啓十郎云『後世修治之法甚煩。去酷烈之本味。棄偏性之毒氣。使鈍弱無能之物。而欲以除毒治病。是猶緣木求魚也。蓋藥之本性在毒。無毒則不成藥。豈能專司修治以滅藥之毒耶。』夫藥之大毒小毒。以病當之。以分劑計之。何毒之有。本草徑凡例云『若用毒藥療病。先起如黍粟。病去卽止。不去倍之。不去十之。取去爲度。』西醫用藥。多提取元素去

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其糟粕。如烏頭素以極淡之溶液。（如千分含一）嘗之能令唇舌麻痺。今我中醫用藥。乃去其元素。取其糟粕。反謂之去毒精製。誠大惑莫解也。蓋烏頭附子等雖極毒。而入藥主治之功能。則爲諸藥所莫及。然單服者甚少。宜與他藥並用爲妙。明其病理與分劑。卽勿須畏其毒。惟能用毒藥。方爲良醫。夫兵者凶器也。而仁人用之。可以救民。用藥適乎用兵也。故內經多稱毒藥。淮南子云。『天下之物。莫凶於奚毒。然而良醫橐而藏之。有用也。』李時珍云。『吾聞郝知府自負知醫。因病癬。服草烏頭。木鱉子。藥過多。甫入腹而麻痺。遂至不救。可不愼乎。』予謂郝氏之死。非死於毒。乃死於不善用毒耳。李氏又云。『李東垣治馮翰林姪陰盛格陽傷寒。面赤煩渴。引飲。脈來七八至。按之則散。用薑附湯加人參投半斤服之。得汗而愈。此則神聖之妙也。』按以上所云。陰盛格陽。其脈七八至。面目赤而煩渴者。無一非烏頭之正治。用之而效。固其宜也。又何神奇之有。李氏不知。乃以不奇爲奇。非所謂皆非勝是者歟。惟云共投半斤。則幸爲製造無力之物。如同啜粥嗽飯。否則立時致命矣。金匱用烏頭約五方。用天雄一方。用附子約十八方。傷寒論用附子約十九方。古用皆天產也。烏頭、附子、天雄、側子、俱用原質。此藥喜生深山向陰之地。採根於春日及花後莖枯之時。洗去泥土及根鬚。輕刮去外皮。陰乾收藏。勿洩氣。用時搗碎。採子於成熟之後。採葉於夏日陰乾。用之入藥用根與子。其莖葉亦可。惟力較遜。有大毒。微臭。鮮嘗。嘗之味先甜微苦。後則辛熱麻剌。（嘗時須謹愼）烏頭、附子、天雄、側子、性味俱同。行於皮膚則生汗。若與桂枝並用。亦能止汗。傷寒論桂枝加附子湯用之。能令血管舒縮中樞微阻。故能止其漏汗。若走於神經系統。能平腦止痛。醫風寒溼脾。頭痛目痛。不能久視。項强關節炎。肩臂痛。膜痛。四肢拘攣。寒氣腹痛。經痛。子宮寒。白帶等症。均有效。行於血循環。能令血壓減少。因祕走神經中樞被激。心臟受阻。則血管舒短。中樞亦受阻。是以血壓爲緩。故於脈波洪數。因血旺鼻衄心跳等症。佐生地三七等藥服之。能令脈數爲緩。但至脈沉微欲絕時。如四肢厥逆。霍亂吐瀉等症。與乾薑等藥相配。又能加增血壓。有回陽通絡溫經之功。故仲師四逆湯通脈四逆湯用之。再走於腎經。能激刺小便。加多。故桂枝加附子湯內用之。主小便難。癆學云。『此藥乃醫家爲重要之劑。其效尤爲他藥不能及。』但此藥功效雖多。其毒性亦烈。只醫士臨症變化。惟於虛弱症愼用。若於局部神經系痛。以烏頭素擦脊擦之有效。惟於近目口處不可用。再此藥能悉胃。足分劑多服令人眩暈嘔吐。金匱烏頭桂枝湯云。『加至五合。其知者如醉狀。得吐者爲中病。』此係烏頭入腦悉胃之力。毒分劑則致呼吸中樞被癱。脈波弛緩。以至心舒停止而死。

配合應用 ㈠治陰毒傷寒。生草烏頭爲末。以葱頭薤藥納穀道中。名提盆散。亦治二便不通。（王海藏陰症略例方）

㈡治中風癱瘓。手足顫掉。言語蹇澁。左經丸。用草烏頭炮去皮四兩。川烏頭炮去皮二兩。乳香、沒藥各一兩。爲末。生烏豆一升。以班蝥三七箇。去頭翅。同煮豆熟。去蝥取豆。焙乾爲末。和勻。以醋麵糊丸。梧子大。每服三十丸。溫酒下。（簡易方）

㈢治癱瘓頑風。骨節疼痛。下元虛冷。諸風痔漏。下血一切風瘡。草烏頭、川烏頭兩頭尖各三錢。硫黃、麝香、丁香各一錢。木鱉子五箇爲末。以熟蕷艾揉糰。合成一處。用草紙包裹。燒熏病處。名雷丸。（孫天仁集效方）

㈣治諸風不遂。用生草烏頭。晚蠶沙等分爲末。取生地龍搗和。入少醋糊丸。梧子大。每服四五丸。白湯下甚妙。勿多服。恐麻人。名鄭清小金丹。（宋氏集驗方）又用草烏頭四兩。去皮。大豆半升。鹽一兩。同以沙瓶煮三伏時。去豆。將烏頭入木臼搗三百杵。作餅。焙乾爲末。酒糊丸。梧子大。每空心鹽湯下十丸。名至寶丹。（經驗濟世方）

㈤治一切風證。不問頭風痛風。黃瘟弔脚風痺。生淮烏頭一斤。生

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

川烏頭一枚。生附子一枚。並爲末。葱一斤。薑一斤。搗如泥。和作餅子。以草鋪盤內。加楮葉於上。安餅於葉上。又鋪草葉蓋之。待出汗。只一日夜。乃囓之。碎爲末。以生薑取汁。煮麵糊和丸。梧子大。初服三十丸。日二服。服後身痺。汗出卽愈。惟須避風。（乾坤祕韞方）

㊈治破傷風病用草烏頭爲末。每以一二分。溫酒服之。出汗。（壽域方）又用草烏尖、白芷、井生研末。每服半錢。冷酒一盞。入葱白一根。同煎服。少頃。以葱白熱粥投之。汗出卽愈。（儒門事親方）

㊉治年久麻痺。或歷節走氣。疼痛不仁。不拘男女。神授散。用草烏頭半斤。去皮爲末。以袋一箇。盛豆腐半袋。入烏頭末在內。再將豆腐壓滿。壓乾。入鍋中煮一夜。其藥卽堅如石。取出。曬乾爲末。每服五分。冷風溼氣。以生薑湯下。麻木不仁。以葱白湯下之。（活人心統方）

㊀治風溼痺木。黑神丸。草烏頭連皮生研。五靈脂等分爲末。六月六日。滴水丸彈子大。四十歲以下分六服。病甚一丸作二丸。薄荷湯化下。（衛濱麻爲度。（本事方）

㊁治風溼走痛。黑聲煎丸。用兩頭尖。五靈脂各一兩。乳香、沒藥、當歸三錢爲末。醋糊丸梧子大。每服十丸至三十丸。臨臥溫酒下。忌油膩溼麵。孕婦勿服。（瑞竹堂方）

㊂治腰脚冷痛。烏頭三箇。去皮臍。研末。醋調貼。須臾痛止。（十便良方）

㊃治膝風作痛。草烏、細辛、防風等分爲末。摻靴襪中。及安護膝內。能除風溼。健步。（扶壽方）

㊄治遠行脚腫。草烏、細辛、防風等分爲末。摻鞋底內。如草鞋則以水微溼摻之。用之可行千里。甚妙。（經驗方）

㊅治脚氣舉痛。或胯間有核。生草烏頭、大黃、木鼈子。作末。薑汁煎茶調貼之。又法。草烏一味爲末。以薑汁或酒糟同搗貼之。（永類鈐方）

㊆治溼滯足腫。早輕晚重。用草烏頭一兩。以生薑一兩同研。交感一宿。蒼朮一兩。以葱白一兩同研。交感一宿。各焙乾爲末。酒糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。

㊇除風去溼。治脾胃虛弱。久積冷氣。飲食減少。用草烏頭一斤。蒼朮二斤。以去白陳皮半斤。生甘草四兩。黑豆三升。水一石。同煮乾。只揀烏木。曬焙爲末。酒糊丸。梧子大。焙乾收之。每空心溫酒下二三十丸。麻卽漸減之名烏朮丸。（集簡方）

㊈治偏正頭痛。草烏頭四兩。川芎藭四兩。蒼朮半斤。生薑四兩。連鬚生葱一把。搗爛。同入瓷瓶。封固。埋土中。春五夏三。秋五冬七日。取出曬乾。揀去葱薑爲末。醋麵糊和丸。梧子大。每服九丸。臨臥溫酒下。立效。（戴古渝經驗方）

㊉治久患頭風。草烏頭尖。生用一分。赤小豆三十五粒。麝香一字。爲末。每服半錢。薄荷湯冷服。更隨左右瘡鼻。（指南方）

㊀治風痰頭痛。體虛傷風。停聚痰飲。上厥頭痛。或偏或正。草烏頭炮去皮尖。半兩。川烏頭生去皮尖一兩。麝香、乳香三皂子大。爲末。每服二錢。薄荷薑湯下。食後服。（陳言三因湯方）

㊁治女人頭痛。血風證。草烏頭、梔子等分爲末。自然葱汁。隨左右調塗太陽及額上。勿過眼。須避風。（濟生方）

㊂治腦洩臭穢。草烏去皮半兩。蒼朮二兩。川芎二兩。並生研末。麵糊丸。絲豆大。每服十丸。茶下。忌一切熱物。（聖濟總錄方）

㊃治耳鳴耳聾。如流水及風聲。不治成壅。用生烏頭。掘得乘溼削如棗核大。塞之。日易二次。不三日愈。（千金方）

㊄治喉痺口噤。不開欲死。草烏頭、皂莢等分爲末。入麝香少許。擦牙。井嗑鼻內。牙關自開也。用草烏尖、石膽等分爲末。每用一錢。醋煮皂莢汁調稀。掃入腫上。流涎數次。其毒卽破也。（濟生方）

㊅治虛腫口瘡。滿口連舌者。草烏一箇。南星一箇。生薑一大塊。爲末。睡時以醋調塗手心足心。或以草烏頭、吳茱萸等分爲末。蜜調塗足心。（本事方）

㊆治疳蝕口鼻。穿透者。草烏頭燒灰。入麝香等分爲末。貼之。

㊇治風蟲牙痛。草烏炒黑一兩。細辛一錢。爲末。揩之。吐出涎。一方

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

草烏食鹽同炒。黑摻之。(海上方)

㊀治寒氣心疝三十年者。射罔、食茱萸等分爲末。蜜丸梧子大。每酒下二丸。日三服。劉國英所祕之方。(范汪東陽方)

㊁治寒瘧積瘧。巴豆一枚去心皮。射罔去皮。如巴豆大。大棗去皮一枚。搗成丸。梧子大。清旦先發時每服一丸。白湯下。(肘後方)

㊂治脾寒厥瘧。先寒後熱。名寒瘧。但寒不熱而色黑者。名厥瘧。寒多熱少。面黃腹痛。名脾瘧。三者並宜服此。賈耘老用之二十年。累試有效。不蛀草烏頭。削去皮。沸湯泡二七度。以盞蓋良久。切焙。研稀糊丸。梧子大。每服三十丸。棗十片。棗三枚。葱三根。煎湯清早服。以棗壓之。如人行十里許。再一服。絕勿飲湯。便不發也。(東坡良方)

㊃治腹中癥結。害妨飲食。羸瘦。射罔二兩。椒三百粒。搗末。雞子白和丸。麻子大。每服一丸。漸至三丸。以愈爲度。(肘後方)

㊄治水泄寒痢。大草烏一兩。以一半生研。一半燒灰。醋糊和丸。綠豆大。每服七丸。井華水下。忌生冷魚肉。(十便良方)

㊅治泄痢注下。三神丸。治清濁不分。泄瀉注下。或赤或白。腹臍刺痛。裏急後重。用草烏頭三箇。去皮尖。以一箇火炮。一箇醋煮。一箇燒灰爲末。醋糊丸。綠豆大。每服二十丸。水瀉流水下。赤痢甘草湯下。白痢薑湯下。忌魚腥生冷。(和劑局方)

㊆治結陰下血腹痛。草烏頭。蛤粉炒。去皮臍。切。一兩。茴香炒三兩。每用三錢。水一盞。入鹽少許。煎八分。去滓。露一夜。五更冷服。(聖濟總錄方)

㊇治老人遺尿。不知出者。草烏頭一兩。童便浸七日。去皮。同鹽炒爲末。酒糊丸。綠豆大。每服二十丸。鹽湯下。(普濟方)

㊈治內痔不出。草烏爲末。津調點肛門內。痔卽反出。乃用枯痔藥點之。(外科集驗方)

㊉治疔毒初起。草烏頭七箇。川烏頭三箇。杏仁九箇。飛羅麵一兩。爲末。無根水調搽留口。以紙蓋之。乾則以水潤之。(唐瑤經驗方)

㊊治疔毒惡腫。生烏頭切片。醋熬成膏。攤貼。次日根出。又方兩頭尖一兩。巴豆四箇。搗貼。疔自拔出。(普濟方)

㊋治疔瘡發背。草烏頭去皮爲末。用葱白連鬚和搗。丸豌豆大。以雄黃爲衣。每服一丸。先將葱一根細嚼。以熱酒送下。或有惡心嘔三四口。用冷水一口止之。卽臥。以被厚蓋。汗出爲度。亦治頭風。(乾坤祕韞方)

㊌治惡毒諸瘡。及發背疔瘡便毒等證。二烏膏。用草烏頭。川烏頭。於瓦上以井華水磨汁塗之。如有口。卽塗四邊。乾再上。亦可單用草烏磨醋塗之。(永類鈐方)

㊍治大風癩瘡。遍身黑色。肌體麻木。痺痛不常。草烏頭一斤。刮洗去皮。極淨。攤乾。以清油四兩。鹽四兩。同入銚內炒令深黃色。傾出剩油。只留鹽并藥。再炒令黑煙出爲度。取一枝擘破。心內如米一點白者。始好。白多再炒。乘熱杵羅爲末。醋麵糊丸。梧子大。每服三十丸。空心溫酒下。草烏性毒難制。五七日間。以黑豆煮粥食。解其毒。(澹寮方)

㊎治遍身生瘡。陰囊兩脚尤甚者。草烏一兩。鹽一兩。化水。浸一夜。炒赤爲末。猪腰子一具。去膜煨熟。竹刀切。搗。醋糊丸。綠豆大。每服三十丸。空心鹽湯下。(澹寮方)

㊏治一切諸瘡未破者。草烏頭爲末。入輕粉少許。臘猪油調和。搽。(普濟方)

㊐治瘰癧初作未破。作寒熱。草烏頭半兩。木鱉子二箇。以米醋磨細。入搗爛葱頭。蚯蚓糞少許。調勻。傅上。以紙條貼令通氣孔妙。(醫林正宗方)

㊑治馬汗入瘡腫痛急療之。遲則毒深。以生烏頭末傅瘡口良久。有黃水出卽愈。(靈苑方)

㊒治蛇蚘螯人。射罔傅之。頻易。血出愈。(梅師方)

㊓治中沙虱毒。用射罔傅之佳。(千金方)

用量 八分至一錢。

施用宜忌 凡陰虛陽盛。及非眞中寒者禁用。反半夏、栝蔞、貝母、白斂、白蘞、惡黎蘆。

著名方劑 ㊀烏頭湯。治歷節疼痛。不可屈伸。(金匱方)麻黃、芍

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

棗、黃耆、甘草(炙)各三兩。烏頭三枚。(咬咀)以蜜二升煮取一升。卽出烏頭。上五味。咬咀四味。以水三升。煮取一升。去滓。納蜜煎中。更煎之。服七合。不知。更服之。㈡大烏頭煎。腹滿脈弦而緊。弦則衞氣不行。卽惡寒。緊則不欲食。邪正相搏。卽爲寒疝。逐臍痛。若發則白津出手足厥冷。其脈沉緊者。此主之。(金匱方)烏頭。(大者五枚。熬去皮不必咀)水二升。煮取一升。去滓。納蜜二升。煎令水氣盡。又一煎法取二升。強人服七合。弱人服五合。不知。明日更服。不可一日再服。㈢烏頭赤石脂丸。心痛澈背。背痛澈心。此主之。(金匱方)蜀椒一兩。烏頭一兩。(炮)附子半兩。乾姜一兩。赤脂一兩。上五味。末之。蜜丸。如梧子大。先食服一丸。日三服。不知。再加。㈣烏頭桂枝湯。治寒疝。腹中痛。逆冷。手足不仁。若身疼痛。疥刺諸藥不能治者。(金匱方)烏頭大者五枚。(熬去皮不必咀)以水二升。煎減半。去滓。以桂枝湯五合解之。又一煎。法令將一升後。初服二合。不知。卽服三合。又不知。深加至五合。其知者。如醉狀。得吐者。爲中病。

參攷資料 ㈠草烏頭。今杭人多植於庭院。九月開花。淡紫斕豔。與菊同時。謂之鸚嘴菊。又謂雙鴛菊。鴛鴦菊。僧鞋菊。皆以花之形狀名之。根有大毒。與川中所出之烏頭迥別。古時烏頭烏喙。隨時所稱。非有異也。後人以形正者有似烏。烏之頭。其兩歧相合而生者有似烏烏之喙。以此別之。然形狀雖殊。主治則一。(王琢崖)㈡草烏之毒。甚於川烏。蓋川烏由人力種蒔。當時則採。草烏乃野生地上。多歷歲月。故其氣力尤爲勇悍。猶之乎子人植者無毒。可啖。野生者有毒。不可啖。其理一也。又川烏先經鹽淹。殺其烈性。寄至遠方。爲日稍久。故其毒少減。草烏未經淹製。或係現取。其毒較甚。(王琢崖)㈢今人製造酒藥。凡川烏草烏暨各種毒品。亦皆在內。名曰紹興酒藥。釀酒易熟。且多氣味香烈。杭俗甚行。而受其害者比比也。(仲氏)㈣凡風寒濕痺。骨內冷痛。及損傷入骨。年久發痛。或陰疽腫毒。並宜草烏頭。南星等分。少加肉桂爲末。薑汁熟酒調塗。未破者能內消。久潰者能去黑爛。二藥性味辛烈。能破惡塊。逐寒熱。遇冷卽消。遇熱卽潰。(楊清叟)

【草珠兒】卽苡仁之古籍別名。典見救荒本草。詳『苡仁』條。

【草紙】**基本** 本品係用稻草所製成之紙。用以包物者。

性質 甘。平。無毒。

主治 腸風下血。癰腫惡瘡。小兒臍瘡。燒灰用。餘與楮紙同。

【草荔】卽木蓮之古籍別名。典見山海經。詳『木蓮蕊』條。

【草梢】卽甘草梢之處方簡名。詳『甘草』條。

【草犀】**命名** 本品解毒之功如犀角。故名。

處方用名 草犀根。

產地 在山野間。

形態 莖高二三尺。獨莖。根如細辛。

性質 辛。平。無毒。

主治 解一切毒氣。虎狼蟲虺所傷。溪毒。野蠱惡刺等毒。並宜燒服之。臨死者亦得活。

【唐】陳藏器 本草拾遺。論草犀根曰。天行瘴瘴。寒熱咳嗽。痰壅。飛尸。喉痺。瘡腫。小兒寒熱丹毒。中惡。注忤。利血等病。煮汁服之。嶺南及睦婺間。中毒者。以此及千金藤並解之。

參攷資料 ㈠草犀生衡婺洪饒間。苗高二三尺。獨生。根如細辛。生水中者名水犀。(陳藏器)㈡廣州記云。生嶺南及海中。獨莖對葉而生。如燈臺。根若細辛。(李珣)

【草犀根】卽草犀之處方用名。詳『草犀』條。

【草紫河車】卽蚤休之別名。詳『蚤休』條。

【草豉】**形態** 草豉爲葉類之一種。草狀如韭。其豉出花中。可供食與藥用。

性質 辛。平。無毒。

主治 辟惡氣。調中。益五臟。開胃。令人能食。

【草雀】卽鵓雀之別名。詳『鵓雀』條。

【草魚】卽鱞魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱞魚』條。

【草魚目】卽苡仁之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見和漢藥考。詳『苡仁』條。

【草麻繩索】　命名　小曰索。大曰繩。本品係用草或麻所製成之繩索。故名。

主治　大腹水病。取三十枚去皮。研。水三合。旦服。日中當吐下水汁結囊。若不盡。三日後再作。未盡更作。瘥後禁水飲鹹物。

【草雲母】　即雲實之苗。見唐本草。詳『雲實』條。

【草當歸】　即當歸色白而味薄者之古籍別名。典見本草集註。詳『當歸』條。

【草蝓】　即水蛭之古籍別名。典見綱目。詳『水蛭』條。

【草蜂窠】　即露蜂房之古籍別名。典見綱目。詳『露蜂房』條。

【草裏金釵】　即玉釵草開黃花者之別名。詳『玉釵草』條。

【草棉】　外國名稱　Gossypium herbaceum L.

產地　東印度及亞剌比亞原產。我國各地亦有栽培。

基本　錦葵科草棉屬。

形態　草棉爲一年生草本。高至二三尺。葉掌狀分裂。有長葉柄。互生。托葉二片。形狹而尖。秋月葉腋開花。花大有苞。基部連合。上部分裂。萼杯狀。花冠五瓣。黃色單體雄蕊包圍於雌蕊之外。雌蕊一枚。子房上位。果實爲蒴果。熟則開裂。其種子被以長毛白色。俗名棉花。可爲絮及藥用。



草棉

性質　甘。溫。

主治　禦寒却冷。燒灰止血。敷凍瘡。

【草裏銀釵】　即玉釵草開白花者。見『玉釵草』條。

【草蒿】　❶即青蒿之古籍別名。典見本經。詳『青蒿』條。❷即黃花蒿之古籍別名。典見綱目。詳『黃花蒿』條。

【草蒿子】　即青蒿子之古籍別名。典見本經。詳『青蒿子』條。

【草蜘蛛】　原名　蛛蠨。

產地　生原野草木稠密諸處。

形態　草蜘蛛爲蜘蛛類之一種。其腹長。恒於草木枝莖間張平網如棚。作穴於一隅。匿伏其身。以待蟲至網而捕食。此物可供藥用。

主治　出疔腫根。搗膏塗之。

【草蜘蛛絲】　主治　去瘤贅疣子。除癌疾。

【草蜜】　即羊刺蜜之古籍別名。典見本草拾遺。詳『刺蜜』條。

【草節】　即甘草之處方用名。詳『甘草』條。

【草節鉛】　即鉛之產於四川犍爲縣者。見『鉛』條。

【草蓮】　即海鳳絲之別名。見『海鳳絲』條。

【草蒞蓉】　即列當之處方用名。詳『列當』條。

【草藨】　即鹿豆之古籍別名。典見爾雅。詳『鹿藨』條。

【草鞋】　古籍別名　草歷。腳不借。千里馬。(綱目)

採取　以破舊者入藥用。

主治　和人髮燒灰。醋調。傅小兒熱毒遊腫。

歷代記述弦譯　【明】李時珍本草綱目論草鞋曰。催生治霍亂。

【草鞋底】　即蓁笋之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蓁笋』條。

【草鞋鼻】　功用與草鞋同。詳該條。

【草頭】　首帶之別名。見『首帶』條。

【草鴟頭】　即貫衆之古籍別名。典見別錄。詳『貫衆』條。

【草龍珠】　即葡萄之古籍別名。典見綱目。詳『葡萄』條。

【草龍芻】　即龍鬚草之古籍別名。典見逸異記。詳『龍鬚草』條。

【草龍膽】　即龍膽之俗名。詳『龍膽』條。

【草歷】　即草鞋之古籍別名。典見綱目。詳『草鞋』條。

【草薑】　即射干之古籍別名。典見別錄。詳『射干』條。

【草螺子】　即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【草鏝乳】　即韭之古籍別名。典見本草拾遺。詳『韭』條。

【草蘭茹】　即通用蘭茹。取其漆頭赤皮者。本品乃白蘭茹之別名。典見綱目功用與蘭茹同。詳『蘭茹』條。

【草麒麟】　即無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

條。

【草續斷】卽石龍芻之古籍別名。典見本經詳「石龍芻」條。

【草蘭】 原名 蘭草。

命名 本品葉似馬蘭。故名。

處方用名 省頭草。

古籍別名 蕑水香。(本經)香水蘭燕尾香。(開寶)煎澤草。(唐本)蘭澤草。(弘景)大澤蘭。(炮炙)都梁香。(李氏藥錄)女蘭。孤兒菊。(綱目)孩兒菊。千金草。九節蘭。(綱目拾遺)

基本 屬蘭科。爲草蘭之葉。



草蘭 (一)

形態 草蘭爲芳草類之多年常綠草本。山野及池澤恒有自生。高二三尺。有地下莖。葉細長而尖。或短而狹。小實平滑有光澤。邊緣有鋸齒甚細。長尺許。有平行脈。由根叢生。下部之葉三裂。上部尖長。花色淡紫。或淡黃綠色。瓣上有細紫點。花冠爲管狀。列爲頭狀花序。一莖一花。幽香清遠。古人恒摘而佩之。故謂之都梁香。其花子根葉可供藥用。



草蘭 (二)

採取 四五月間採之。

性質 辛。平。無毒。

效能 辟惡。調氣。用作芳香健胃藥。

主治 利水道。殺蟲毒。辟不祥。久服益氣。輕身不老。通神明。(本經)除胸中痰癖。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】雷敎雷公炮炙論蘭草曰。生血。調氣養營。【唐】陳藏器本草拾遺論蘭草曰。主惡氣香澤。并可作膏塗髮。【宋】馬志開寶新詳定本草論蘭草曰。麥水浴風病。【元】李東垣用藥法象論蘭草曰。其氣清香生津。止渴。潤肌肉。治消渴膨脹。【明】李時珍本草綱目論蘭草曰。消癰腫。調月經。煎水解中牛馬毒。【明】繆希雍本草經疏論蘭草曰。蘭草稟天地清芬之氣。以生。故其味辛。氣平無毒。入手太陰足陽明經。肺主氣。肺氣鬱結。則上竅閉而下竅不通。胃主納水穀。胃氣鬱滯。則水穀不以時化而爲痰癖。蟲毒不祥之氣。亦胃中受病。辛平能散結滯。芬芳能除穢惡。則上來諸證自瘳。大都開胃除惡。清肺消痰。散鬱結之聖藥也。久服等語。亦言其效之極功耳。

近人學說 張山雷曰。蘭草芳香。故能解毒辟穢。而生於水中。則能利水。功用亦與澤蘭無甚大別。東垣謂其氣清香。生津止渴。治消渴脾癉。蓋消渴脾癉。皆脾胃熱蒸。氣愈鬱則熱愈熾。清芳可以導濁。則熱氣疏通。內經謂肥美所甕。令人口甘。治之以蘭。除陳氣也。石頑逢原。亦謂嘔噦脾癉。口中時時溢出甜水者。非此不除。芳香辛溫。調肝和脾。功倍薷香。善散積久陳鬱之氣。

配合應用 (一)同薷香、枇杷葉、石斛、竹茹、橘紅、開胃氣之神品。(二)治嘔膈之將成者。加入沈水香、鬱金、白豆蔻、眞蘇子、蘆根汁。下氣開鬱。(三)治消渴。同梧樓根、麥冬、黃連、竹葉、蘆根汁。(四)食牛馬毒殺人者。省頭草連根葉煎水服卽消。(唐瑤經驗方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 (一)蘭草浸油塗髮。去風垢。令香潤。史記所謂羅襦襟解。微聞香澤者是也。崔寔四時月令。作香澤法。用清油浸蘭香、薷香、雞舌香、甘松香四種。以新綿裹浸。胡麻油和豬脂納銅鐺中沸定。下少許青蒿。以綿幕瓶鐺嘴瀉出瓶收用之。(李時珍)(二)香蘭乃香草。能辟不祥。陸璣詩疏。言鄭俗三月男女秉蕑於水際。以自祓除。蓋蘭以蘭之。蕑以閑之。其義一也。淮南子云。男子種蘭美而不芳。則蘭須女子種之。女蘭之名。或因乎此。其葉似菊。女子小兒喜佩之。則女蘭孩菊之名。又或以此也。唐瑤經驗方言。江南人家種之。夏月採置髮中。令頭不臚。故名省頭草。其說正合。煎澤之義。古人蘭蕙皆稱香草。如零陵香草。都梁香草。後人省之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

通呼爲香草爾。近世但知蘭花。不知蘭草。惟虛谷方回考訂言古之蘭草。卽今之千金草。俗名孩兒菊者。其說可據。（李時珍）㈢蘭草澤蘭。一類二種也。俱生水旁下濕處。二月宿根生苗成叢。紫莖素枝。赤節綠葉。葉對節生。有細齒。但以莖圓節長而葉光有歧者爲蘭草。莖微方節短而葉有毛者爲澤蘭。嫩時並可挼而佩之。八九月後漸老。高者三四尺。開花成穗。如鷄蘇花。紅白色。中有細子。雷敎炮炙論所謂一幹一花爲蘭。一幹數花爲薰者。蓋因不識蘭草。薰草。遂以蘭花强生分別也。蘭草與澤蘭同類。故陸璣言蘭似澤蘭。但廣而長節。離騷言其綠莖紫莖素枝。可紉可佩。可藉可膏可浴。鄭詩言士女秉蘭。應邵風俗通言尙書奏事。懷香握蘭。禮記言諸侯贊薰。大夫贊蘭。漢書言蘭以香自燒也。若夫蘭花有葉無枝。可玩而不可紉佩藉浴。秉程膏熒。故朱子離騷辨證言古之香草。必花葉俱香。而燥溼不變。故可刈佩。今之蘭薰。但花香而葉乃無氣。質弱易萎。不可刈佩。必非古人所指甚明。古之蘭似澤蘭而薰。卽今之零陵香。今之似茅而花有二種者。不知何時誤也。陳大古冀越集言世俗之蘭。生於深山窮谷。決非古時水澤之蘭也。陳遯齋閑覽言楚騷之蘭。或以爲都梁香。或以爲澤蘭。或以爲猗蘭。當以澤蘭爲正。今人所種如麥門冬者。名幽蘭。非眞蘭也。故陳止齋著蘭盜說以譏之。方虛谷訂蘭說。言古之蘭草。卽金之千金草。俗名孩兒菊者。今之所謂蘭。其葉如茅而嫩。江賦襯以蘭紅。注亦以爲澤蘭。蓋所謂一幹一花爲蘭。一幹數花爲薰者。蓋因不識蘭草。薰草。遂以蘭花强生分別也。蘭草與澤蘭同類。故陸璣言蘭似澤蘭。但廣而長節。離騷言其綠莖紫莖素枝。可紉可佩。可藉可膏可浴。鄭詩言士女秉蘭。應邵風俗通言尙書奏事。懷香握蘭。禮記言諸侯贊薰。大夫贊蘭。漢書言蘭以香自燒也。若夫蘭花有葉無枝。可玩而不可紉佩藉浴。秉程膏熒。故朱子離騷辨證言古之香草。必花葉俱香。而燥溼不變。故可刈佩。今之蘭薰。但花香而葉乃無氣。質弱易萎。不可刈佩。必非古人所指甚明。古之蘭似澤蘭而薰。卽今之零陵香。今之似茅而花有二種者。不知何時誤也。陳大古冀越集言世俗之蘭。生於深山窮谷。決非古時水澤之蘭也。陳遯齋閑覽言楚騷之蘭。或以爲都梁香。或以爲澤蘭。或以爲猗蘭。當以澤蘭爲正。今人所種如麥門冬者。名幽蘭。非眞蘭也。故陳止齋著蘭盜說以譏之。方虛谷訂蘭說。言古之蘭草。卽金之千金草。俗名孩兒菊者。今之所謂蘭。其葉如茅而嫩。根名土續斷。因花馥郁。故得蘭名也。楊升菴云。世以如蒲萱者爲蘭。九畹之受誣久矣。又吳草廬有蘭甚詳云。蘭爲醫經上品之藥。有枝有莖。草之植者也。今所謂蘭無枝無莖。因黃山谷稱之。世遂謬指爲蘭。騷之蘭。寇氏本草亦溯於俗。反疑舊說爲非。夫醫經爲實用。豈可誤哉。今之蘭。果可利水殺蟲而除痰癖乎。其種盛於閩。朱子乃閩人。豈不識其土產。而反辨析如此。世俗至今。猶以非蘭爲蘭。何其惑之難解也。（李時珍）㈣此非今蘭薰建蘭之蘭。湖綱目辨之極詳。說文謂之香草。陸璣草木疏謂蘭爲王者之香。其莖葉皆似澤蘭。廣而長節。節中赤。高四五尺。藏之書中。辟蠹。據此則蘭草澤蘭。相似而非一物。故本經上品既有蘭草。而中品又有澤蘭。然別錄謂蘭草生太吳池澤。本經亦曰一名水香。水香零陵郡都梁縣西小山上有淨水。其中悉生蘭草。則本是水產。實與澤蘭大同小異。故漢書司馬相如傳。衡蘭芷若。顏注謂卽今之澤蘭。

二物之相混久矣。瀕湖亦謂一物二種。張山雷㈤草蘭子治目腎赤眼生膜。納眥內少頃。膜卽出。塵物入目。納三四枚於目中。子卽澀脹。與塵俱出。（醫學辭典）㈥草蘭花性質。苦無毒。功用宣氣利水道。治滯下痢疾。煮酒服。辟不祥。按此物氣類木香。苦甚黃連。善能宣氣四達。故治痢疾功效甚捷。（醫學辭典）

【草麝香】卽鬱金香之古籍別名。典見佛書。詳『鬱金香』條。

【草龍甲】卽茄子之古籍別名。典見養生主論。詳『茄子』條。

【莜】㈠卽冬葵子之古籍別名。典見爾雅。詳『冬葵子』條。㈡卽蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜀葵』條。

【莜麥】卽蕎麥之古籍別名。典見日用本草。詳『蕎麥』條。

【蓳蒿】卽五味子之古籍別名。典見爾雅。詳『五味子』條。

【荏桐】卽梧子桐之古籍別名。典見本草衍義。詳『梧子桐』條。

【荒夫草】卽無風獨搖草之古籍別名。典見郭璞賦。詳『無風獨搖

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

草』條。

【兩草】卽莽草之原名。詳『莽草』條。

【莱】卽藜之古籍別名。典見綱目。詳『藜』條。

【虵】卽獅之古籍別名。典見綱目。詳『獅』條。

【虵烏蠋】卽枸杞蟲之古籍別名。典見爾雅。詳『枸杞蟲』條。

【蚊窩樹】卽夜蘭之古籍別名。典見嶺南雜記。詳『夜蘭』條。


【蚌】古籍別名　烏貝。（動物學大辭典）

外國名詞　Anodonta chinensis（拉丁）Swan mussel（英）Flussmuschel（德）カラヌガヒ或ドブガヒ或タンガヒ（日本）

基本　係軟體動物瓣鰓類無管類同柱類蚌科。

産地　生江湖淡水中。

形態　蚌爲介類之一種。與蛤同類而異形。其殼長橢圓形而薄。殼內眞珠色帶微紅。老者殼頂之表皮剝脫。常露出眞珠層。鉸合部無齒。唯後方有一側齒。又有內外



蚌

甌。廣而突出。肉色黃白。肉柱有二。脚大殼長約達尺許。其肉可供食與藥用。

性質　甘。鹹。冷。無毒。

主治　止渴。除熱。解酒毒。去眼赤。

歷代記述弦證　【唐】陳藏器本草拾遺論蚌肉曰。明目除濕。主婦人勞損下血。【宋】日華諸家本草論蚌肉曰。除煩。解熱毒。血崩帶下。痔瘻。壓丹石藥毒。以黃連末納入。取汁點赤眼眼暗。

參弦資料　㊀蚌肉性微冷。多食發風。動冷氣。（寇宗奭）㊁馬刀。蚌。蛤。蜊。大同小異。寇氏止言冷而不言濕。濕生熱。熱久則氣上升而生痰生風。何冷之有。（朱震亨）

【蚌水】命名　本品係蚌殼中所含之水。故名。

性質　涼。無毒。

主治　清熱。消痰。除濕。治雀目夜盲。婦人胎動。小兒啞驚。塗湯火傷。解酒積丹石藥毒。

【蚌胎】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【蚌珠】卽眞珠之古籍別名。典見南方志。詳『眞珠』條。

【蚌粉】卽蚌殼粉之原名。詳『蚌殼粉』條。

【蚌淚】基本　卽蚌中水也。

性質　鹹。寒。

主治　清熱安胎。消痰除濕。解酒積丹石藥毒。初生小兒啞驚。逢原云。用活蚌水磨墨。滴入口中。少頃。下黑糞而愈。湯火傷用生蚌炙水塗之。

參弦資料　蚌生淡水中。色蒼入肝。故有清熱行濕。治雀目夜盲之力。綱目載蚌肉及蚌粉。功用獨遺其殼內所含之水。不知此水乃眞陰天一之精。又藥最廣。特爲補其缺。（趙恕軒）

【蚌殼】處方用名　眞珠母。

製法　凡使蚌殼。去淨外層黑殼。擇其內層光潔如眞珠

色者用。故俗有眞珠母之稱。以眞珠生於蚌殼中故也。

性質　甘。鹹。冷。無毒。

主治　滋肝陰。清肝火。治顚狂驚癎。眩暈。耳鳴心跳。血熱崩中。吐衄。

參弦資料　蚌殼入心肝二經。與石決明僅入肝經者不同。故涉神志病者。非此不可。（醫學辭典）

【蚌殼灰】卽蚌殼粉之處方用名。詳『蚌殼粉』條。

【蚌殼粉】原名　蚌粉。

命名　本品係蚌殼製成之粉。故名。

處方用名　蚌殼灰。

性質　鹹。寒。無毒。

主治　爛殼粉治反胃。心胸痰飲。用米飲服。

歷代記述弦證　【宋】日華諸家本草論蚌殼粉曰。諸瘧止痢。并嘔逆。醋調塗癰腫。【明】李時珍本草綱目論蚌殼粉曰。解熱燥濕。化痰消積。止白濁。帶下痢疾。除澤腫水噦。明目。擦陰瘡。瀉瘡瘍。

參弦資料　蚌粉與海蛤粉同功。皆水產也。治病之要。只在清熱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

行澀而已。日華言其治疳。近有一兒病疳。專食此粉。不復他食。亦一異也。（李時珍）

【蚍蜉酒草】卽鼠麴草之古籍別名。典見『四陽雜俎』。詳『鼠麴草』條。

【蛾】卽水蛭之古籍別名。典見別錄。詳『水蛭』條。

【蚓螬】㊀卽蚯蚓泥之古籍別名。典見綱目。詳『蚯蚓泥』條。㊁卽蚯蚓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蚯蚓』條。

【蚯母】卽知母。見『知母』條。

【蚖】古籍別名　虺（綱目）　狗蠪（俗名）

基本　係脊椎動物爬蟲類蛇類管牙類蝰科響管蛇亞科。爲蝮蛇屬之蚖蛇。

形態　蚖爲蝮蛇類之一種。全體比蝮爲小。土色無文。蟠時不圓。風如狗。糞亦有劇毒。其肉可供藥用。

製法　凡使去頭、尾、腸、皮、骨、醋炙研末用。

主治　療痺內漏。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論蚖曰。治破傷中風大風惡瘡疾。

【蚖青】卽地膽之古籍別名。典見本經。詳『地膽』條。

【蚊】卽蚊蟲之簡稱。詳該條。

【蚊蟲】古籍別名　蚉。蜹。人龍。

（綱目）

形態　蚊爲九蟲之一種。乃蠕形動物。狀如蚯蚓而無環節。色白。兩端甚尖。寄生於人腹小腸間。雌者長至尺餘。雄者亦長七八寸。可供藥用。

性質　大寒。

主治　目中膚赤熱痛。取大者洗淨。斷之。令汁滴目中。三十年膚赤亦瘥。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論蚊蟲曰。治一切眼疾。及生膚翳。赤白膜。小兒胎赤風赤眼。燒末傅之。或以小兒吐出者。陰乾爲末。入汞粉少許。唾津調塗之。又治一切冷瘧。

參攷資料　蚊入腹中。長蟲也。按巢元方病源云。人腹有九蟲。伏蟲長四分。羣蟲之主也。蚊蟲長五六寸至一尺。發則心腹作痛。上下口喜吐涎及清水。貫上心則死。白蟲長一寸。色白頭小。生育轉多。令人精氣損弱。腰脚疼。長一尺。亦能殺人。肉蟲狀如爛杏。令人煩悶。肺蟲狀如蠶。令人咳嗽成勞。殺人。胃蟲狀如蝦蟆。令人嘔逆喜噦。弱蟲又名蒂蟲。狀如瓜瓣。令人多唾。赤蟲狀如生肉。動作腹鳴。蝕蟲至微。形如菜蟲。居胴腸中。令人生癰疽。疥癬瘡瘍。疳蝕。齲齒諸病。諸蟲皆依腸胃之間。若入臟腑。氣實則不爲害。虛則浸蝕變生諸病也。又有尸蟲與人俱生。爲人大害。其狀如犬馬尾。或如薄筋。依脾而居。三寸許。有頭尾。凡服補藥。必須先去此蟲。否則不得藥力。凡一切癥瘕。久皆成蟲。紫庭眞人云。九蟲之中。六蟲傳變爲勞瘵。而蛔、蚘寸白。三蟲不傳。其蟲傳變。或如嬰兒。如鬼形。如蝦蟆。如守宮。如蜈蚣。如蠐螬。如蛇。如鼈。如蟬。如蝦。如猪肝。如血汁。如亂髮。亂絲等狀。凡蟲在腹上旬頭向上。中旬向中。下旬向下。服藥須於月初四五日五更時。則易效也。張子和云。巢氏之衍九蟲詳矣。然蟲之變不可勝窮。要之皆以溼熱爲生蟲。得木氣乃生。得雨氣乃化。豈非風木主熱。雨澤主溼耶。故五行之中。皆有蟲。諸木有蟬。諸果有蠹。諸穀有螟、螣、螢、蟘、麥朽蛾飛。粟破蟲出。草腐螢化。皆木之蟲也。烈火有鼠。爛灰生蠅。皆火之蟲也。穴蟻。牆蠭。田螻。石蜴。皆土之蟲也。蝌蚪。馬蛭。魚鼈。蛟龍。皆水之蟲也。昔有冶工破一釜。見其斷處臼中有一蟲。如米蟲。色正赤。此則金中亦有蟲也。（李時珍）

【蚖蟲窠】卽雀甕之古籍別名。典見本經。詳『雀甕』條。

【蚤休】命名　本品能療蟲蛇之毒。得此治之。卽能早休。故名。

處方用名　蚤休根。

古籍別名　蚩休（別錄）重臺。重樓金線草甘遂（唐本草）螫休。（日華）紫河車（圖經）七葉一枝花（蒙筌）三層草白甘遂（綱目）草紫河車（圖經）

基本　屬毒草類。爲蚤休之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。蚤休以廣西南寧屬多出。

形態　蚤休爲野生深山之多

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

草生草本。一莖獨上。高尺餘。莖當葉心。葉爲長卵形。成層輪生。凡二三層。或五七層。每一層有七葉。色綠。似芍藥。夏月莖端開赤黃色花。一花七瓣。有金絲蕊。下垂長三四寸。秋結紅子。根大如鬼臼。或如蒼朮狀。又似凡亩峨蛤。肥紫蒼蒲。外紫中白。

採取　五月採之。

製法　採根。洗淨。切片。日乾用。

用法　與他藥水煎。或刺末服。或磨汁外塗。

性質　苦。微寒。有毒。

效能　殺三蟲。治癰瘡。專作解毒藥。

主治　寫瘤搖頭弄舌。熱氣在腹中（本經）癲疾癰瘡。除蝕下三蟲。去蛇毒。（別錄）

歷代記述及證　【唐】蘇恭新修本草論蚤休曰。生食一升。利水。【宋】大明諸家本草論蚤休曰。治胎風手足搐。能吐泄瘰癧。【明】李時珍本草綱目論蚤休曰。去瘧疾寒熱。

近人學說　㈠張山雷曰。蚤休乃苦泄解毒之品。瀕湖謂足厥陰經之藥。蓋清解肝膽之鬱熱。息風降氣。亦能退腫消痰。利水去溼。本經治寫瘤搖頭弄舌。皆肝陽肆虐。木火生風之症。又謂之癲疾者。癲卽巔頂之巔字。亦作顛。謂是肝風上凌。直上頂巔之病。今西學家所謂血沖腸經者。頗似吾國舊學向所未聞。然氣上不下。頭痛巔疾。見於素問五常政大論。字皆作巔。豈非明言其病在巔頂。聲類謂嵐爲風病。豈非風動上凌。直犯巔頂。則其病在腦。亦可於言外得之。可證此種肝風猙動之變。吾國舊籍。早已明知其爲氣血上沖。正不待西學家自矜創獲。蚤休能治此症。正以苦寒泄降。能息風陽而清氣火。則氣血不沖。腦經不擾。而癲疾寫瘤搖頭弄舌。諸病可已。本經之旨。直與龍素諸條。息息相通。以皆古醫經之無上精義。惜乎漢魏六朝以降。誤以巔頂之巔。認作顛狂之顛。而寫瘤昏仆等症之眞旨遂晦。是病乃不復可治。此是後世醫學之陋。固不可與素問本草經同日而語。然卽此可知本經素問。論病探源。竟有非漢魏以下醫家所能悟到者。則信乎古書之眞非易讀矣。若其專治癰腫。則苦寒清熱。亦能解毒。治陰蝕下三蟲。亦苦寒勝溼。自能殺蟲。其用淺顯易知。不煩多贅。瀕湖引諺語。有七葉一枝花。深山是我家。癰疽如遇着。一似手拈拿云云。知此草專治癰腸。古今無不推重。然此類寒涼諸品。惟陽發紅腫大痛者爲宜。而堅塊頑木之陰症大忌。非謂凡是外科。無不統治也。

配合應用　㈠治小兒胎風手足搐搦。用蚤休卽紫河車爲末。每服半錢。冷水下。（衛生易簡方）

㈡治慢驚發搐。帶有陽證者。白甘遂末。卽蚤休一錢。栝樓根末二錢。同於慢火上炒焦黃。研勻。每服一字。煎薑香薄荷湯調下。（錢乙小兒方）

㈢治中鼠莽毒。金線重樓根。磨水服卽愈。（集簡方）

㈣治咽喉齧腫痛用重臺。赤色者。川大黃炒。木鱉子仁。馬牙消半兩。半夏泡一分。爲末。蜜丸芡子大。含之。（聖惠方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無實火熱毒者禁用。

參考資料　㈠冷。無毒。伏雄黃丹砂。蓬砂及鹽。（大明）㈡蟲蛇之毒。得此治之。卽休。故有蚤休整休諸名。重臺三層。因其葉狀也。金線重樓。因其花狀也。甘遂。因其根狀也。紫河車。因其功用也。（李時珍）㈢今謂重樓金線者是也。一名重臺。南人名爲甘遂。一莖六七葉。似王孫、鬼臼、萬麻輩。葉有二三層。根如肥大菖蒲。細肌脆白。（蘇恭）㈣蚤休無旁枝。止一莖挺生。高尺餘。頂有四五葉。葉有岐。似苦梜。中心又起莖。亦如是。生葉惟根入藥用。（寇宗奭）㈤重樓金線。處處有之。生於深山陰溼之地。一莖獨上。莖當葉心。葉綠色。似芍藥。凡二三層。每一層七葉。莖頭夏月開花。一花七瓣。有金絲蕊。長三四寸。王屋山產者至五七層。根如鬼臼。蒼朮狀。外紫中白。有黏黐二種。外丹家採制三黃砂汞。入藥洗切焙用。（李時珍）㈥蚤休入足厥陰經。爲散結導熱之品。以治外證。殊有功效。但其性苦寒。不宜多服。元氣虛者。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

忌之。（醫學大辭典）

【蚤休根】卽蚤休之處方用名。詳『蚤休』條。

【蚺蛇】

命名 本品身大。而行更紓徐。冉冉然也。故名。

處方用名 蚺蛇膽。

古籍別名 南蛇。埋頭蛇。（綱目）巴蛇。（綱目）

外國名詞 Python molurus L.（拉丁）（Indian python 或 Black-tailed python）（英）

基本 係爬蟲類蛇屬。棲用蚺蛇之膽。

產地 在嶺南諸地之山野間。



蚺蛇

形態 蚺蛇大者五六丈。圍四五尺。小者不下三四丈。身有斑紋如錦。形如鱣頭似鼉。尾圓。無鱗。其首不舉。故有埋頭蛇之稱。其膽狹長。通黑。皮膜極薄。舐之甜苦。刮末着水中。浮游盤旋行走者。眞。其僞者旋行但遲耳。

製法 採得曝乾用。

用法 恒以外傅。剉末和藥。

性質 甘苦寒。有小毒。

效能 瀉熱。明目。治疳。用作殺蟲。蠹瘡藥。又爲去翳明目藥。及傷科要藥。

主治 目腫痛。心腹蠹痛。下部蠹瘡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論。蚺蛇膽曰。治小兒八癎。【唐】孟詵食療本草論。蚺蛇膽曰。疳。水化灌鼻中。除小兒腦熱。疳瘡。蠹瘡。灌下部。治小兒疳痢。同麝香。傅齒疳宣露。【唐】陳藏器本草拾遺論。蚺蛇膽曰。破血止血痢。蟲蟲下血。【明】李時珍本草綱目論。蚺蛇膽曰。明目去瞤膜。療大風。【明】繆希雍本草經疏論。蚺蛇膽曰。蚺蛇膽味苦。中有甘氣。寒。有小毒。入手少陰。足厥陰陽明經。心腹蠹痛者。蟲在內攻嚙也。下部蠹瘡者。蟲在外侵蝕也。溼熱則生蟲。苦寒能燥溼殺蟲。故內外施之皆得也。肝開竅於目。肝熱則目腫痛。入肝泄熱。則腫痛除矣。今人受杖時用此噙化。可得不死。其功能護心止痛。使止血不上薄心。有神力也。

配合應用 ㈠治小兒急疳瘡。水調蚺蛇膽傅之。（聖惠方）㈡治小兒疳痢。羸瘦多睡。坐則閉目。食不下。用蚺蛇膽豆許二枚。煮通草汁研化。隨意飲之。并塗五心下部。（楊氏產乳方）㈢治齒蠹宣露出膿血。用蚺蛇膽三錢。枯白礬一錢。杏仁四十九枚。研勻。以布揩齦嗽令血盡。日三揩之。愈乃止。（聖惠方）㈣治疳瘡腫痛。蚺蛇膽研。香油調塗立效。（醫方摘要方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡無風熱實火者禁用。

參攷資料 ㈠嶺表錄云。雷州有養蛇戶。每歲五月五日。卽舁蛇入官取膽。曝乾。以充土貢。每蛇以軟草藉於籃中。盤屈之。將取則出於地上。用杈枴十數。翻轉蛇腹。按定約分寸。於腹間剖出肝膽。膽狀如鴨子大。取乾內肝於膽。以線縫合。舁歸放之。或言蛇被取膽者。他日捕之。則遠遠露腹瘡。以明無膽。又言取後尙能活三年。未知的否。（蘇頌）㈡眞膽狹長。通黑。皮膜極薄。舐之甜苦。廩以注水。卽沉而不散。（陶弘景）㈢試法。剔取粟許。着淨水中。浮游水一回。旋行走者爲眞。其徑沉者。諸膽血也。勿多着。亦沉散也。陶未得法耳。（蘇恭）㈣人多以猪膽虎膽僞之。雖水中走。但遲耳。（孟詵）㈤其膽着醋能卷人筋。終不可脫。惟以芒草作筋乃可。段成式酉陽雜俎云。蚺蛇長十丈。嘗吞鹿。鹿消盡。乃遶樹。則腹中之骨。穿鱗而出。養瘡時。肪腴甚美。或以婦人衣投之。則蟠而不起。（陳藏器）㈥按劉珣錄異記云。蚺蛇大者五六丈。圍四五尺。小者不下三四丈。身有斑紋。如故錦繡。秋夏於山林中同鹿吞之。蛇遂羸瘦。待鹿消乃肥壯也。或言一年食一鹿也。又顧玠海槎錄云。蚺蛇吞鹿及山馬。從後脚入。毒氣呵及。自解脫。其膽以小者爲佳。王濟手記云。橫州山中多蚺蛇。大者十餘丈。食麋鹿。骨角隨腐。土人採葛藤塞入穴中。蛇嗅之卽躍。乃發穴取之。肉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

極腴美。皮可冒皷及飾刀劍樂器。范成大虞衡記云。寨兵捕蚺蛇。滿頸插花。蛇即注視不動。乃逼而斷其首。待其騰擲力竭。乃斃。舁歸食之。又按山海經云。巴蛇食象。三年而出其骨。君子服之。無心腹之疾。郭璞注云。今蚺蛇即其類也。南裔志。蚺蛇贊曰。蚺惟洪且長。採色駁映。其文錦章。食灰吞鹿。腴成養瘡。賓饗嘉食。是豆是觴。（李時珍）

【蚺蛇牙】採取　以長六七寸者用。

主治　佩之辟不祥。利遠行。

【蚺蛇肉】性質　甘。溫。有小毒。

主治　飛尸游蠱。喉中小物。吞吐不出。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論蚺蛇肉曰。除疳瘡。辟瘟疫。瘴氣。【明】李時珍本草綱目論蚺蛇肉曰。除手足風痛。殺三蟲。去死肌。皮膚風毒。癩風。疥癬。惡瘡。

參攷資料　㈠蚺蛇肉。四月勿食之。（綱目）㈡度嶺南食蚺蛇瘴毒不侵。（甄權）㈢按柳子厚捕蛇說云。永州之野產異蛇。黑質白章。觸草木盡死。無禦之者。然得而腊之以爲餌。可已大風攣踠瘰癧。去死肌。殺三蟲。又張鷟朝野僉載云。泉州盧元欽。患癩風。惟鼻未倒。五月五日。取蚺蛇進貢。或言肉可治風。遂取食之。三五日頓可。百日平復。（李時珍）

【蚺蛇酒】製法　用蚺蛇肉一斤。羌活一兩。袋盛。同麴置缸底。糯米飯蓋之。釀酒。待熟取酒。以蛇肉焙乾。研末和藥。或袋盛浸酒亦可。

主治　諸風痛痺。殺蟲辟瘴。治癩風。疥癬。惡瘡。

【蚺蛇膏】性質　甘。平。有小毒。

主治　耳聾及皮膚風毒。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論蚺蛇膏曰。治癩疾。【明】李時珍本草綱目論蚺蛇膏曰。綿裹塞耳。聾。

辨僞　眞膏藥黑如梨豆子相着。他蛇膏皆大如梅李子也。（陶弘景）

【蚱蝶】卽蝴蝶之俗名。詳『蝴蝶』條。

【蚱蟬】卽青蚱之古籍別名。典見綱目。詳『青蚱』條。

【蚩休】卽蚩休之古籍別名。典見別錄。詳『蚩休』條。

【訓狐】卽鵂之古籍別名。典見拾遺。詳『鵂』條。

【豇豆】命名　故名。

古籍別名　豉豎。（綱目）大角豆。（日本）長豆。（俗名）

外國名稱　Vigna sinensis, hassk.（拉丁）ササゲ（日本）

基本　係豆科豇豆屬。爲豇豆之子實。

形態　豇豆爲穀類之一年蔓生草本。莖有蔓性。能纏繞於他物上。葉爲羽狀複葉。自三小葉成。夏日開花。作蝶形花冠。色淡青帶紫。果實爲長莢。莢內有種子數粒。既可供食。亦可充藥用。



豇豆

採取　秋月採之。

性質　甘。鹹。平。無毒。

主治　理中益氣。補腎健胃。和五臟。調營衞。生精髓。止消渴。吐逆。泄痢。小便數。解鼠莽毒。

歷代記述攷證　【清】黃宮繡本草求眞論豇豆曰。豇豆味甘而鹹。性平無毒。考之時珍云。豇豆可菜可穀。備用最多。乃豆中之上品。又曰豇豆開花結莢。必兩兩並垂。有習坎之義。豆象微曲。有似人腎。所謂豆爲腎穀者。宜此當之。是以腎氣虛損。必賴此爲主治。且此味甘而平。入腎而更入胃。故凡胃津不生。胃渴不止。吐逆泄痢。小便頻數。草莽毒中。皆得甘以調劑。而使諸症悉平也。書載諸疾。無腫惟水腫忌補腎氣。不宜多食耳。【清】王士雄隨息居飲食譜論豇豆曰。豇豆甘平。輭時採莢爲蔬。可蓄可素。老則收子充食。宜餡宜饘。頗肖腎形。或有微補。

參攷資料　㈠豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。不

150／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

宜多食耳。又袖珍方云。中鼠莽毒者。以豇豆煮汁飲。卽解。欲試者。先刈鼠莽苗。以汁潑之。便根爛不生。此則物理然也。（李時珍）㊁此豆紅色居多。莢必雙生。故有豇豎豐之名。廣雅指爲胡豆。誤矣。（李時珍）㊂豇豆。處處三四月種之。一種蔓長丈餘。一種蔓短。其葉俱本大而尖。嫩時可茹。其花有紅白二色。莢有白紅紫赤斑駁數色。長者至二尺。嫩時充菜。老則收子。此豆可菜可果可穀。備用最多。乃豆中之上品。而本草失收何哉。（李時珍）

【豹】 古籍別名 程（列子）失剌孫（綱目）

外國名詞 Felis leopardus L.（拉丁）（Leopard或Panther（英）ヒョー或ヘウ（日本））

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類裂腳類貓科。

產地 出西南亞洲及非洲諸地。

形態 豹爲獸類之一種動物。其形似虎。面圓耳短。比虎耳尖。瞳孔能隨光而收放。齒具門犬曰三種。毛短密生。色蒼褐。至赤褐有光輝。具暗褐色或黑色之斑點。在背與體旁之斑點。如薔薇花形或環形。大且明。在肢者則減少且稍黑。腹部白色。身長四尺許。四肢大。尾長。能攀樹木。性殘忍。捕食動物。其肉可供藥用。



豹

性質 酸平。無毒。

主治 安五臟。補絕傷。輕身益氣。冬食利人。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論豹肉曰。辟鬼魅神邪。宜腎。【宋】日華諸家本草論豹肉曰。壯筋骨。強志氣。耐寒暑。令人猛健。

參攷資料 ㊀豹肉氣味溫。微毒。正月勿食。傷神損壽。（千金）㊁豹肉令人志性粗豪。食之便覺少頃消化。乃定。久食亦然。（孟詵）㊂此獸猛捷。過虎。故能安五臟。補絕傷。輕身壯筋骨也。（寇宗奭）

【豹皮】 參攷資料 ㊀豹皮。不可藉睡。令人神驚。其毛入人瘡中有毒。（陳藏器）㊁廣西南界有唉獵蟲。食死人尸。不可驅逐。惟以豹皮覆之。則長慴而不來。（李時珍）

【豹足】 卽卷柏之古籍別名。典見吳普本草。詳『卷柏』條。

【豹脂】 基本 本品係用豹肉所熬成之脂膏。

主治 生髮。亦入面脂。

【豹鼻】 主治 鬼交狐魅。同狐鼻水煎服。

【豹頭骨】 主治 燒灰淋汁。去頭風白屑。（孟詵）

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論豹頭骨曰。作枕辟邪。

【豺】 古籍別名 豺狗（綱目）

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類裂腳類犬科。

形態 豺爲獸類之一種。形瘦如犬。略似狼。口吻狹長。口裂深。幾至耳下。腦與鼻根處不凹。耳殼直立。眼銳有光。牙銳利。軀幹長。四肢前長後短。各肢具鉤爪。有小蹼便游水。尾垂後方。稍蓬鬆。毛色茶褐帶微紅。或灰黃而帶薄黑色。頰有小白點。全體長四尺餘。有臊臭氣。鳴聲如犬吠。性凶暴。喜食羊。其皮可供藥用。

性質 熱。

主治 冷痺。軟脚氣。熱之以纏衰病上。卽瘥。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論豺皮曰。療諸瘧痢。腹中諸瘡。炙汁飲。或燒灰酒服之亦可。傅靈齒瘡。【明】李時珍本草綱目論豺皮曰。治小兒夜啼百法不效。同狼屎中骨。燒灰等分。水服少許。卽定。

參攷資料 ㊀豺皮燒灰。和酒灌解槽牛馬。便馴良。㊁豺肉酸熱有毒。食之損人精神。消人脂肉。令人瘦。（孟詵）

【豺漆】 卽豺節。

【豺節】 卽五加皮之別名。見『五加皮』條。

【貢尖】 六安茶之最佳者。功用見『六安茶』條。

【貢沉香】 卽沉香之處方用名。詳『沉香』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【貫桂】卽肉桂之處方用名。詳『肉桂』條。

【迷迭香】外國名詞 Rosmarinus officinalis, L.（拉丁）マンロネ　ンウマンルサウ(日本)

基本　係脣形科迷迭香屬。葉用迷迭香之子實。


迷迭香

產地　原產南部歐羅巴。

形態　迷迭香爲芳草類之常綠小灌木。葉作線形。革質。花淡黃色。生於莖上部之葉腋。結實。嚴霜不凋。芳香甚烈。枝弱。根繁。花結實。嚴霜弗凋。收採幽殺。摘去枝葉。入袋佩之。芳香甚烈。與今之排香同氣。（李時珍）㊁迷迭香用爲通經藥。又將其枝葉蒸溜之。採取迷迭油。以之供外用。亦間有內用者。此油有毒。故用時若其量過多。足以致死。（植物學大辭典）

性質　辛。溫。無毒。

主治　惡氣。令人衣香。燒之去鬼。合芫活爲丸燒之。可以辟除蚊蚋。

參攷資料　㊀廣志云。出西海。魏略云。出大秦國。（陳藏器）㊁魏文帝時。自西域移植庭中。同曹植等各有賦。大意其草修幹柔莖。細枝繁花。結實。嚴霜弗凋。收採幽殺。摘去枝葉。入袋佩之。芳香甚烈。與今之排香同氣。（李時珍）㊂迷迭香用爲通經藥。又將其枝葉蒸溜之。採取迷迭油。以之供外用。亦間有內用者。此油有毒。故用時若其量過多。足以致死。（植物學大辭典）

【起蛟水】主治　壯筋骨。健腰膝。已虛勞。除驚悸。殺蟲蠱。已疰鬼疰。遁尸邪氣。浴瘡疥。虛弱者。以代水煎。滋補藥良。性升。能直透巔頂。

參攷資料　㊀撥州多山。每春夏之交。久雨有起蛟之患。村人習見勿異也。蛟初起一二日間。地中先有聲。隱隱如雷鳴。或如牛吼。至期。土中颯陷出一小穴。如豆大。水從穴出。直上一二尺。如箭。已而漸升漸長。至簷隙。與溜合。則水勢乃大。下穴亦漸大如碗。孔蛟如鰍鱔形。從穴出。乘水而上。過簷。則形變大。乃飛越奔騰而去。屋宇亦無害。惟相隔一二里許。田禾間有傷損者。爲山水沖刷而然。此水初起一二尺時。山人以瓶盆之屬接取。食之力大無窮。蓋出蛟口中。含吮精力。貫注直逼而上。其全身之力蓋在此水。故人亦不能多食。壯健者三盞。卽腹脹不能再飲。土人以釀酒。更壯精力。可已虛勞。（張宇南）㊁蛟初起時。水如箭。清如泉。脈漸湧而高。必合天雨水。則勢大而能飛騰。蛟出穴口。始泛出水。名曰發洪。若初起時。用河水一杓。灌入其穴。則蛟水自回。便不能出穴。或取婦人月經穢布塞之。亦止。若人服蛟水作脹。用千里長流河水煎服之。亦可解也。（單杜可）

【起目】卽茨仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨仁』條。

【起貧草】卽紫菫之古籍別名。典見寶藏論。詳『紫菫』條。

【起陽草】卽韭之古籍別名。典見侯氏藥譜。詳『韭』條。

【軒于】卽鶯草之古籍別名。典見綱目。詳『鶯草』條。

【追風使】卽五加皮之古籍別名。典見圖經本草。詳『五加皮』條。

【追魂使者】卽鉛之古籍別名。典見土宿眞言本草。詳『鉛』條。

【逆石】卽石牀之古籍別名。典見綱目。詳『石牀』條。

【逆流水】命名　本品卽倒流之水。故名。

性質　甘。平。無毒。

主治　中風卒厥。頭風。癎疾。咽喉諸病。其性逆而倒上。故宜吐痰飲之藥。宜用之。

【郎君子】產地　生海中。

形態　郎君子爲介類之一種。狀如螺。中實如石。大如豆。藏箱篋中。積年不壞。若置醋中。卽盤旋不已。可供藥用。

主治　婦人難產。手握之便生。極驗。

【郎耶草】卽狼把草之原名。詳『狼把草』條。

【郎皋】卽斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳『斑鳩』條。

【郎城薺】卽菱之古籍別名。典見綱目。詳『菱』條。

【酒母】卽小麥麴之古籍別名。典見綱目。詳『小麥麴』條。

【酒杯藤】產地　出自西域諸地。

形態　酒杯藤爲果類之一種。藤大如臂。葉堅硬。結實大如指。味

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

似豆蔻。其子可供藥用。

性質　甘。辛。平。無毒。

主治　消食下氣。消酒止渴。辟邪癘。消癰腫。殺蚘蟲。治尸蛀勞瘵。蟲蟻瘡瘕瘤。結核癰疽。潰爛食果成積。用酒杯藤子燒灰。糖拌服。下五七錢自效。飲酒過量成病用酒杯藤子煎服極驗。

【酒泥草】　**命名**　本品係酒罈頭泥中之草故名。

主治　翦刀風。

【酒炒】　即米酒之處方用名。詳『米酒』條。

【酒芩】　即黃芩用酒製成者之處方用名。詳『黃芩』條。

【酒浸】　即米酒之處方用名。詳『米酒』條。

【酒窩】　即酒釀之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『酒釀』條。

【酒製軍】　即大黃以酒製成者之處方用名。詳『大黃』條。

【酒蕈】　**命名**　本品爲年久酒罈中所生之蕈。故名。

主治　一切酒傷。酒勞。酒疸。因酒成病諸症。服之立效。

參攷資料　酒蕈生酒罈中。不恒有。凡藏酒之家。千百罈酒間。有一罈。啓之中空無酒。下有蕈結於中。其蕈初結之時。酒上薄凝如衣膜。久則漸厚一二寸。便能滲酒。將酒中精華醇釅之氣。盡攝於膜內。膜乃漸厚。酒亦漸少。久久則酒乾。所存十不餘一。其膜如鮮海蜇。濡潤而軟。嗅之作酒香。微帶微蒸氣。識者取之焙乾。乾者如瓜皮。面青黑。背作肉紅色。溼軟如棉。可入藥。蓋酒能生蕈。必罈係新出窰。未脫火氣。而置酒之地。又爲溼熱所蒸。致中變而成此。故造釀家用罈。貴舊而不貴新也。（趙學敏）

【酒糟】　**原名**　糟。

古籍別名　粕。

基本　本品爲糯粳黍麥之屬。蒸釀酒後所餘之糟粕。

採取　以臘月清明重陽。造酒者良。

製法　漉乾。入鹽少許收藏。若糟乾者則無味不適用。

性質　甘。辛。無毒。

主治　溫中消食。除冷氣。殺腥。去草菜毒。潤皮膚。調臟腑。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論酒糟曰。撲損瘀血。浸水洗凍瘡。搗傅蛇咬蜂叮毒。

參攷資料　酒糟有麴藥之性。能活血行經。止痛。故治傷損有功。按許叔微本事方云。治跌折傷筋骨。痛不可忍者。用生地黃一斤。藏瓜薑糟一斤。生薑四兩。都炒熱。布裹。卷傷處。冷卽易之。又類編所載。只用藏瓜薑糟一物。入赤小豆末和勻。卷於斷傷處。以杉片或白桐片夾之。云不過三日卽痊也。（李時珍）

【酒罈上紙】　**基本**　本品卽封蓋酒罈口上之紙。

採取　陳久者良。

主治　療皮膚間忽然血出。撕破貼之。

【酒藥】　卽小麥麴之俗名。詳『小麥麴』條。

【酒釀】　**基本**　本品乃未榨出酒之米醪。

古籍別名　酒窩。浮蚳。（綱目拾遺）

性質　甘。辛。溫。無毒。

主治　行血氣。發痘漿。益髓腦。生津液。

配合應用　㈠治赤眼淹纏。杜仲。厚朴。桑白皮。檳榔各一錢。取雄雞肝一個。忌見水。去紅筋。入白酒釀六兩。隔湯蒸熟。去渣。以湯肝食下。隔二日再服一次。全愈。（祕氏效方）

㈡治小兒鼻風。吹乳腫痛。用酒釀。和菊花葉敷上立愈。無葉用根。甘菊葉尤佳。搗汁沖和服更效。（劉起堂經驗方）

㈢治吹乳方。用苧蔴根嫩者炒。和白酒釀少許。共搗爛敷患處。一日夜卽消。忌食發物。（周氏家寶方）

㈣治頭風。用蒼耳子。白芷。穀精草各五錢。川芎三錢。甜酒釀四兩。老酒二碗。煎一碗服。（妙淨方）

㈤治夢遺白濁。酸棗草二錢。孩兒菊二錢。搗取汁。加不見水酒釀。空心量服。（救世青囊方）

㈥治難產。用酒釀。麻油。蜂蜜。童便。雞子白各半盞。煎溫服。卽下。

㈦治痘出不起。用狗蠅七枚。冬日取蠅。在狗耳內搗爛。和酒釀服。卽日發起。紅潤可觀。（不藥良方）

153／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治瘡瘡不起。荸薺搗汁。和白酒釀頓溫服之。但不可頓大熱大熱則反不妙。愼之。（良方集要）

㊁保元丹。黃精一觔。甘枸杞四兩。酒釀五觔。好黃酒五觔。入礞煮一炷香。每食一茶杯。藥渣搗爲丸。加胡桃肉八兩。大黑棗八兩。青州柿餅一觔。（千金不易方）

參攷資料　酒釀味醞厚。多飲腹漲。而性善升透。凡火上行者忌之。（趙學敏）

【釘頭赭石】卽代赭石之處方用名。詳『代赭石』條。

【釘頭螺】卽海螺小者之別名。見綱目。詳『海螺』條。

【釜月下土】卽伏龍肝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『伏龍肝』條。

【釜月中墨】卽釜臍墨之古籍別名。典見四聲本草。詳『釜臍墨』條。

【釜炭】卽釜臍墨之古籍別名。見綱目。詳『釜臍墨』條。

【釜煤】卽釜臍墨之古籍別名。見綱目。詳『釜臍墨』條。

【釜臍墨】命名　本品卽釜臍下之黑灰。故名。

古籍別名　釜月中墨（四聲）鐺墨（開寶）釜煤。釜炭。鍋底墨。（綱目）

性質　辛。溫。無毒。

主治　中惡蠱毒。吐血。血暈。以酒或水溫服二錢。亦塗金瘡止血生肌。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論釜臍墨曰。消食積舌腫。喉痺。口瘡。陽毒發狂。

參攷資料　古方治傷寒。黑奴丸用釜底墨。竈突墨。梁上塵。三物同合諸藥。爲其功用相近耳。（李時珍）

【針辰砂】卽靈砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『靈砂』條。

【針砂】卽硃砂之古籍別名。典和漢藥考。詳『硃砂』條。

【針魚】卽鱵魚之俗名。詳『鱵魚』條。

【陝州豉汁】命名　本品乃用陝州大豆和鹽、椒、生姜所製之豆豉汁。故名。

主治　除煩熱。

【陟釐】古籍別名　側梨。（蘇恭）水苔。石髮。（開寶）

石衣（廣雅）水衣（說文）水綿。潭。

【除】外國名詞　Equus caballus Linn.（拉丁）（Horse 或 Mare 或 Stallion）（英）

烏韭。（綱目）

產地　生淡水中及水石間。

形態　陟釐爲苔類之一種。其形有多數之細胞。成爲一列綠色。或蠶茸如髮。或纏繞如絲。以顯微鏡視之。葉體成螺旋形。構造甚精。可爲肥料。并可供藥用。

性質　甘。大溫。無毒。

主治　心腹大寒。溫中消穀。強胃氣。止洩痢。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論陟釐曰。濃汁服。治天行病心悶。【宋】寇宗奭本草衍義論陟釐曰。作脯食。能止渴疾。禁食鹽。【明】李時珍本草綱目論陟釐曰。擣塗丹毒赤遊。

【除辛】卽鉤吻之古籍別名。典見吳普本草。見『鉤吻』條。

【隻剌】卽蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼耳子』條。

【隼】卽鴟之古籍別名。典見綱目。詳『鴟』條。

【馬】外國名詞　Equus caballus Linn.（拉丁）（Horse 或 Mare 或 Stallion）（英）

基本　係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。有蹄類。奇蹄類。馬科。

產地　出新疆。蒙古。青海。川邊一帶。

形態　馬爲獸類家畜類之一種。卽野馬之變種也。面部長。耳微直立。能動。頸背有鬣。上下顎各有門牙三對。犬牙一對。牝者無之。臼牙六對。四肢強健。肢各一趾。着地趾有蹄。尾具長毛。體毛或褐或白或黃不一。體長五六尺至七八尺。性溫順。堪力役。其肉可供藥用。

採取　以純白牡者良。

性質　辛。苦。冷。有毒。

主治　傷中。除熱下氣。長筋骨。強腰脊。壯健強志。輕身不飢。作脯。治寒熱痿痺。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論馬肉曰。煮汁洗頭瘡白禿。

參攷資料　㊀馬肉只堪煮食。餘食難消。瀆以清水。搦洗血盡。乃煮。不然。則毒不出。患疔腫。或曰以冷水煮之。不可蓋釜。（日華）㊁馬生角。馬無夜眼。白馬青蹄。白馬黑顖者。並不可食。食令人癲。馬鞍下

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

肉色黑。及馬自死者。並不可食。殺人。馬黑脊而斑臀者。不可食。（張鼎）㊁患痢生疥人。勿食。食必加劇。妊婦食之。令子過月。乳母食之。令子疳瘡（蕭炳）㊂同倉米。舊耳食。必得惡病。十有九死。同薑食。生氣噦。同豬肉食。成霍亂。食馬肉毒發心悶者。飲清酒則解。飲濁酒則加。（孟詵）㊃食馬中毒者。飲薰腹汁。食杏仁可解。（李時珍）

【馬刀】　命名　俗稱大爲馬。本品大而形如刀。故名。

古籍別名　馬蛤（別錄）齊蛤（吳普）蜬（爾雅）蜃（周禮）蝑蠣（單母爐岸（綱目）

產地　生江湖池澤及海中。

製法　凡使馬刀。殼煉粉用。

形態　馬刀爲介類動物之一種。棲水泥中。其形似蚌而小。形狹而長。其類甚多。又與蠔相類。殼成長方形。大者長三四寸。外色蒼黃。內色淡黃。其肉可供食。殼可供藥用。

性質　辛。微寒。有毒。

主治　婦人漏下赤白。寒熱。破石淋。殺食獸賊鼠。（本經）能除五臟間熱。肌中鼠鼷。止煩滿。神中氣。去厥痺。利機關。（別錄）

歷代配述攷證　【明】李時珍本草綱目論馬刀殼曰。消水癭。氣癭。痰飲。

參攷資料　㊀馬刀殼得水火良。（蘇恭）㊁馬刀殼得水爛人腸。（綱目）

【馬口鐵】　古籍別名　馬勒口鐵。

基本　本品爲馬口中所含之鐵嚼環也。

性質　辛。

主治　小兒驚風。

【馬子齲】　卽人中黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人中黃』條。

【馬天乙茸】　卽馬勃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬勃』條。

【馬心】　主治　健忘。

參攷資料　㊀馬心患痢人食之。則痞悶加甚。（孟詵）㊁以白馬者良。

【馬牙半支】　命名　本品卽虎牙半支之葉扁大者。故名。

古籍別名　瞥蹄半支。鐵梗半支。山半支。（綱目拾遺）旱半支。（百草鏡）瞥蹄豆草。（家寶方）瞥蹄草。

產地　生石壁間。及燥土平溼諸處。

形態　馬牙半支爲半支類之一種。引蔓而生。二月發苗。其莖微方。作水紅色。有細紅點子。經霜不凋。四月開黃花。如瓦松。葉大叢生。圓如瞥中豆瓣。莖葉可供藥用。

性質　寒。無毒。

主治　利水化溼熱。和血消癰腫。療腸癰痔漏。並蛇咬。疔疽。便毒。風痺。跌撲。黃疸。擦汗斑。尤妙。搗汁。陳酒和服。

配合應用　㊀絕癮。瞥板豆草。六月六日。雞鳴時。採略洗。蒸熟。一日曬乾。不乾焙之。每一勿。配老薑一勿。磨細收貯。一日者一錢。二日者二錢。三日者三錢。酒調服。服後。飲酒至醉爲妙。合時忌雞犬婦人見之。神效。（家寶方）

㊁治狗咬。以酒洗淨瘡口血。搗瞥板半支。罨上。一二日。卽痂而愈。

㊂治瘰癧。馬牙半支。作菜常服。多年瘰癧皆消。屢試屢驗。

㊃治急疥。用瞥蹄草陰乾。每服三錢。水煎服。

㊄治淋疾。芝麻一把。核桃一個。石上馬牙半支。共搗。滾生酒沖服。（奇方類編）

㊅治水臌。取瞥蹄草。搗合麝香。貼臍眼。如人行五里。其水卽下。

參攷資料　馬牙半支有二種。有紅梗青梗之別。治婦人赤白帶第一妙藥。赤帶用赤梗者。白帶用白梗者。採得。搗汁半酒盞。酸迷迷。草亦有赤白二種。赤帶用赤者。白帶用白者。搗汁半酒盞和勻。加紹酒半盞。煖熱一服。卽止。永不再發。（綱目拾遺）

【馬牙砂】　卽硇砂之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『硇砂』條。

【馬牙消】　古籍別名　牙消。

（綱目）英消。（綱目）

產地　陳仁山藥物生產辨云。牙消。各國各省均有出。乃用舊坭頃而得之。近日由外洋來者多屬田料用之。

製法　用芒硝再煎。化澄去脚。入蘿蔔數枚。同煮熟。傾盆中。經宿。結於上面。生牙如圭角。作六稜縱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

櫺玲瓏。洞澈可愛者。卽馬牙消也。

性質 甘。大寒。無毒。

主治 除五臟積熱伏氣。末簡點眼。赤去赤腫障膚。濃淚痛。亦入點眼藥中用。功同芒硝。

【馬牙硝】㊀卽朴硝之處方用名。詳『朴硝』條。㊁卽馬牙消。

【馬牙齒】**性質** 甘。平。有小毒。

主治 小兒馬癇。水磨服。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論馬齒曰。燒灰唾和塗癰疽丁腫。出根效。

【馬包】卽馬勃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬勃』條。

【馬叱同仇大乃】卽蛺蜨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛺蜨』條。

【馬尼菌】卽馬勃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬勃』條。

【馬甲】卽海月之古籍別名。典見綱目。詳『海月』條。

【馬甲子】**產地** 江西處處有之。

形態 如葵葉。赭莖。大葉如柿。葉亦硬。面綠。背淡有赭紋。開小白花。如瑞花。結實形似鰒魚。圓小如錢。生青熟赭。有扁核。青時味如瑞而淡。其根可供藥用。



馬甲子

【馬皮】**主治** 喉痛。

主治 婦人臨產。赤馬皮催生良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬皮曰。治小兒赤禿。以赤馬皮。白馬蹄燒灰。和臘豬脂傅之良。

【馬目毒公】卽鬼臼之古籍別名。典見本經。詳『鬼臼』條。

【馬目奪公】卽八角連之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『八角連』條。

【馬矢蒿】卽馬先蒿之古籍別名。典見本經。詳『馬先蒿』條。

【馬先蒿】**命名** 本品氣如馬矢。先爲矢字之誤。故名。

古籍別名 馬矢蒿。(本經)練石草。爛石草。(別錄)馬新蒿。(唐本草)虎麻。(綱目)蠻鼻菊。蠻鼻草。(日本)

外國名詞 Pedicularis resupinata, L.(拉丁) シホガマギク シホガマサウ(日本)

基本 係玄參科馬先蒿屬。葉用馬先之莖葉。

形態 馬先蒿爲澀草類蒿屬之一種。多年生草本。高二三尺。葉長。卵形。互生或對生。秋月開花。作穗形。花冠紅紫色。生於莖之上部。或有帶黃白色者。八月結角。似小豆。銳而長。其莖葉可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 寒熱鬼疰。中風澀痺。女子帶下病無子。(本經)練石草治五癰。破石淋。膀胱中結氣。利水便小便。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論馬先蒿曰。治惡瘡。

參攷資料 葉大如荏。蔚。花紅白色。三月八月採莖葉陰乾用。八月九月實熟。俗謂之虎麻是也。一名馬新蒿。所在有之。莖蔚苗短小。其子夏中熟。二物初生極相似也。(蘇恭)

【馬耳】卽索干之古籍別名。典見別錄。詳『索干』條。

【馬行】卽紫參之古籍別名。典見別錄。詳『紫參』條。

【馬尾】**主治** 女人崩中。小見客忤。

參攷資料 馬尾。濟生方治崩中。十灰丸中用之。又延壽書云。刷牙用馬尾。令齒疎損。近人多用燒灰揩拭。最虧齒齶。不可不知。(李時珍)

【馬尾】卽商陸之古籍別名。典見廣雅。詳『商陸』條。

【馬尾香】卽乳香之古籍別名。典見海藥。詳『乳香』條。

【馬尾連】**產地** 出雲南省。

形態 乾者形如絲。上有小根頭。土人盤曲之以市。

性質 性寒。味苦。

效能 能去皮裏膜外及筋絡之邪熱。

主治 小兒傷風及痘疹難透。

【馬尾絲】**命名** 本品形如馬尾。故名。

產地 出臺灣海島間。

形態 馬尾絲爲雜草類之一

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

種。葉細而長。花紅而小。根似荔子核。色黃且多細絲如髮。不拘鮮乾俱可供藥用。

主治 蛇蜂諸毒。

【馬尾歸】卽當歸之產於陝西頭圓多尾色紫氣香而肥者。詳『當歸』條。

【馬尾藻】卽海藻之處方用名。詳『海藻』條。

【馬屁勃】卽馬勃之處方用名。詳『馬勃』條。

【馬折】卽馬鞭草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬鞭草』條。

【馬兆】卽馬勃之古籍別名。典見綱目。詳『馬勃』條。

【馬肝】古籍別名 懸癬。

性質 有大毒。

主治 經水不通。

參攷資料 ㊀馬肝及鞍下肉。殺人(陶弘景)㊁按漢武帝云。食肉毋食馬肝。又云。文成食馬肝而死。章莊云。食馬留肝。則其毒可知矣。方家以豉汁、鼠矢解之。(李時珍)

【馬肝石】外國名詞 Polygonum multiflorum Thunb.(拉丁)

命名 本品爲石之青黑如馬肝者。故名。

製法 須盛以金函。養以水銀。

主治 烏髮拭之止饑。和九轉丹服。

【馬肝石】卽何首烏之古籍別名。典見綱目。詳『何首烏』條。

【馬豆】卽雲實之古籍別名。典見圖經本草。詳『雲實』條。

【馬辛】卽蒔蘿之古籍別名。典見綱目。詳『蒔蘿』條。

【馬乳】性質 甘。冷。無毒。

主治 止渴。治熱。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論馬乳曰。作酪性溫。飲之消肉。

參攷資料 馬乳性冷利。同魚膾食作瘕。(孫思邈)

【馬乳葡萄】卽葡萄之古籍別名。典見綱目。詳『葡萄』條。

【馬夜眼】古籍別名 附蟬尸。

基本 本品在馬膝上。有此目。能夜行。

主治 卒死尸厥。齲齒痛。

【馬帶子】卽馬薤子之古籍別名。典見爾雅。詳『馬薤子』條。

【馬明退】卽靈蛻之古籍別名。典見補註本草。詳『靈蛻』條。

【馬牀】卽蛇牀子之古籍別名。典見廣雅。詳『蛇牀子』條。

【馬肺】主治 寒熱陰瘡。

【馬金南】卽馬檳榔之古籍別名。典見記事珠。詳『馬檳榔』條。

【馬金囊】卽馬檳榔之古籍別名。典見雲志。詳『馬檳榔』條。

【馬前子】卽車前子之別名。詳『車前子』條。

【馬勃】處方用名 輕馬勃。馬屁勃。

古籍別名 馬兆。馬繡。灰藋。牛屎菰(綱目)灰包。馬包。馬胞。馬尼菌。馬天乙茸(和漢藥考)狗頭灰。(俗名)

外國名詞 Lycoperdon bovisto, L.(拉丁) Puffball(英)

基本 係夏季生於山林陰地之馬勃爲菌類之一種。

產地 陳仁山藥物生產辨云。馬勃以廣東南順之桑基產者爲佳。質鬆浮。其次廣西產者再次則產於河南者開封府。質結而重。均十月新。

形態 初生作白色球狀。如馬糞。及長大。外面作暗褐色。質輕如綿。中含無數胞子。其熟者。觸之發塵煙。

採取 夏秋間採曝乾。

製法 李時珍曰。凡用以生布張開。將馬勃於上摩擦。下以盤承取末用。

性質 辛。平。無毒。

效能 清肺火。療喉痛。開音。止血。

主治 噩瘡馬疥。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論馬勃曰。傳諸瘡疥甚良。【宋】寇宗奭本草衍義論馬勃曰。去膜。以蜜拌炒。少以水調呷。治喉痺痛。則辛散之功也。【清】汪訒庵本草備要論馬勃曰。馬勃辛平輕虛。清

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

肺解熱。散血止嗽。治喉痺咽痛。鼻衄失音。外用敷諸瘡良。生澁地朽木上。狀如肺肝。紫色虛輭。彈之粉出。取粉用。

近人學說 張山雷曰。馬勃生於陰濕之處。色紫成團。輕鬆多粉。乾而撲之。粉輕四散。有如烟霧。雖非菌類。而稟陰濕之氣以生。蓋亦與苔相似。故李氏綱目附於苔類之末。唯輕虛能散。與苔類之專於滑降者不同。其氣味則名醫別錄以爲辛平。其主治則別錄雖止治惡瘡馬疥。蓋既能散毒。又能燥濕。以療濕瘡。固得其宜。故弘景亦謂傅諸瘡甚良。今人用以爲金瘡止血。亦效。寇宗奭謂以蜜拌揉。以水調呷。治喉痺咽疼。蓋既散鬱熱。亦清肺胃。確是喉症良藥。東垣普濟消毒飲用之。亦是此意。瀕湖謂清肺散血熱。解毒。內服外敷。均有捷驗。誠不可以微賤之品而忽之。

配合應用 ㊀治咽喉腫痛。嚥物不得。馬勃一分。蛇退一條。燒末。綿裹一錢。含嚥立瘥。（聖惠方）㊁治走馬喉痺。馬屁勃。卽灰孤。焰消一兩。爲末。每吹一字。吐涎血卽愈。（經驗良方）㊂治聲失不出。馬猶勃、馬牙消等分。研末。沙糖和丸。茨子大。噙之。（摘玄方）㊃治久嗽不止。馬勃爲末。蜜丸。梧子大。每服二十丸。白湯下卽愈。（普濟方）㊄治魚骨哽咽。馬勃末。蜜丸彈子大。噙嚥。（聖濟總錄方）㊅治積熱吐血。馬屁勃爲末。沙糖丸如彈子大。每服半丸。冷水化下。（袖珍方）㊆治妊娠吐衄不止。馬勃末。濃米飲服半錢。（聖惠方）㊇治斑瘡入眼。馬屁勃、蛇皮各五錢。皂角子十四箇爲末。入罐內。鹽泥固濟。燒存性。研。每溫酒服一錢。（閻孝忠集驗方）㊈治臁瘡不斂。葱鹽湯洗淨拭乾。以馬屁勃末傅之。卽愈。（仇遠稗史方）

用量 八分至錢半。

參攷資料 ㊀馬勃卽唐韓退之所謂牛溲馬勃。俱收並蓄者也。有大如斗者。小亦如升杓。去膜。以蜜採拌。少以水調呷。治喉閉咽痛。生澁地及腐木上。夏秋採之。（寇宗奭）㊁每見用寒涼藥敷瘡者。雖愈而熱毒內攻。變生他病爲害不小。惟馬勃辛平而散。甚爲穩妥。（吳遵程）

【馬屎】卽馬通之俗名。詳『馬通』條。

【馬屎中粟】

主治 金創。小兒痙熱咨忤。不能食。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬屎中粟曰。治小兒臍痛。

【馬思哥油】卽酥之古籍別名。典見綱目。詳『酥』條。

【馬思答吉】

產地 出西域諸地。

形態 馬思答吉爲菜類植物之一種。形如椒而香氣酷烈。可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 去邪。順氣。溫中。利膈。止痛。生津。解渴。令人口香。

【馬珂螺】卽珂之古籍別名。典見綱目。詳『珂』條。

【馬胸】卽白棘之古籍別名。典見綱目。詳『白棘』條。

【馬胞】卽馬勃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬勃』條。

【馬胞衣】

主治 婦人天癸不通。煅存性。爲末。每服三錢。入麝香少許。空腹漸汲水下。不過三服良。

【馬革】卽黍之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳『黍』條。

【馬韭】卽麥門冬之莖名。典見綱目。詳『麥門冬』條。

【馬唐】卽鼈草之古籍別名。典見別錄。詳『鼈草』條。

【馬瓟瓜】卽王瓜之古籍別名。典見本草衍義。詳『王瓜』條。

【馬料豆】卽穭豆之俗名。詳『穭豆』條。

【馬草】卽敗醬之古籍別名。典見別錄。詳『敗醬』條。

【馬骨】

性質 有毒。

主治 燒灰和醋。傅小兒頭瘡及身上瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬骨曰。止邪癘。燒灰和油。傅小兒耳瘡。頭瘡。陰瘡。瘰疬有漿。如火灼。敷乳頭。飲兒止夜啼。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【馬兜鈴】命名 本品蔓附木上。秋間葉落。其實懸垂。狀如馬項之鈴。故名。

處方用名 杜兜鈴。蜜炙兜鈴。

古籍別名 王黃瓜。王宝瓜。玉寶瓜。兜鈴苗。兩金藤。(和漢藥考)雲南根。(綱目)都淋藤。(肘後方)

外國名稱 Aristolochia debilis, S. et Z. (拉丁)

基本 屬馬兜鈴科。藥用馬兜鈴之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。馬兜鈴產安徽亳州。河南。山東。直隸。山西平古縣等。



馬兜鈴

形態 馬兜鈴爲生於原野路旁之多年生蔓草。春季自宿根生苗。纏絡樹木而上。葉似鼕蕷葉而厚。背呈白色。有毛茸。葉莖俱有一種惡臭。夏季於葉腋開黃紫色不整筒狀花。後結實。卽名馬兜鈴。根名青木香。此草至秋季而枯死。實爲褐色卵圓形。長一寸。圍六七分。被有薄皮。中有多數白色扁平種子。類似檳實。

採取 七八月採實陰乾。

製法 雷敦曰。凡用馬兜鈴。採得實。去葉及蔓。以生絹袋盛於東屋角畔。待乾劈開。去革膜。取淨子焙用。

性質 苦。寒。無毒。

效能 開肺下氣。消熱。化痰。治肺熱喘咳症。

主治 痰結喘促。血痔瘻瘡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論馬兜鈴曰。肺氣上急。坐息不得。咳逆連連不止。潔古用以清肺氣。補肺。去肺中澁熱者。皆除熱降氣。散結之力也。【清】黃宮繡本草求眞論馬兜鈴曰。馬兜鈴辛苦寒。體輕而虛。熟則四開象肺。因苦則能入肺降氣。因寒則能瀉熱除痰。因辛則於寒中帶散。故肺熱痰喘。聲音不清者。服此最宜。且其體輕則性上涌。故篤要治蛇蟲毒。一味濃煎服之。探吐。其毒卽解。至有云服馬兜鈴能補肺陰者。取其熱清氣降。而肺自安之意。錢氏用此。同阿膠。糯米補肺。其功原在糯米阿膠耳。豈馬兜鈴之謂哉。又云可治腸風痔瘻。以肺與大腸爲表裏。腸胃之熱。本於肺臟所移。肺清而腸之熱與之俱清耳。若肺寒喘嗽失音者。切忌去筋膜。取子用。【清】汪訒庵本草備要論馬兜鈴曰。馬兜鈴體輕而虛。熟則四開象肺。故入肺。寒能清肺熱。苦辛能降肺氣。治痰嗽喘促。血痔瘻瘡。大腸經熱。亦可吐蟲。蔓生實如鈴。去筋膜。取子用。【清】黃元御玉楸藥解論馬兜鈴曰。馬兜鈴味苦氣寒。入手太陰肺經。清肺降逆。定喘止嗽。治痔瘻腫病。能解蛇蟲之毒。多用則吐。【清】楊時泰本草述鉤元論馬兜鈴曰。馬兜鈴所治。專主咳嗽之因於肺熱。而痰結喘促者。第肺熱痰結。須分虛實。經曰。太陽獨至。厥喘虛氣逆。是陰不足。陽有餘也。又有虛勞少血。津液內耗。心火自焚。使燥熱乘肺。咯喘膿血。上氣涎潮。其嗽連續而不已者。用兜鈴於補瀉中。得不從所主劑以爲別乎。且就痰結而論。亦不能以熱盡之。有咳因寒澀。久而痰滯。氣道壅塞。亦竟喘促不得臥。是乾薑理中之治也。較病於肺熱爲陽之有餘者。霄壤懸殊。而患證相類。就是推之。則六淫所感。寒熱而外。更如風暑燥濕。有乘於各氣之偏。累及陰陽合和之宗氣。遂極於主氣肺臟以爲咳喘氣逆者。更舉七情受病。有因各臟之厥氣。以累及宗氣而極於主氣者種種。可止就肺熱而責之歟。況六淫七情。每每因鬱化火。治火之法。必先治鬱。而火乃散。又不謂清肺熱。下逆氣。便可一了百當也。知此則可以善用兜鈴矣。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

近人學說 ㈠買九如曰。馬兜鈴體實輕。氣味俱清。凡輕清者上浮。單入肺部。主治肺熱久嗽。痰結喘促。肺氣上急。坐臥不安。蓋嗽久則肺虛。肺虛則氣熱。氣逆則喘促上急。以此苦味者涼之降之。使肺熱去而嗽自止也。盛後湖云。肺熱久嗽。喘促連聲不絕者。非此不能除。因其體輕升上。直入腦竅。主治腦漏。㈡張山雷曰。馬兜鈴。開竇本草稱其苦寒。甄權則謂之平。瀕湖則曰微苦辛。蕭頤按味固稍苦。而氣甚清。雖能清熱。卻非大苦大寒之品。東垣謂味厚氣薄。陰中微陽。瀕湖加一辛字。蓋亦以其輕而能散。固亦隱隱有辛開之作用者也。開竇謂主肺熱咳嗽。痰結喘促。正以形質空虛。中雖有實。而亦片片如紙。宛若木蝴蝶之臨風飛揚。故同爲宣通肺氣。化痰開閉之藥。其能治喘促者。以肺有痰濁鬱結。則呼吸不暢。而喘促隨之。此能通其結塞。斯氣道利而喘促自寧。此與虛喘。家濁陰上逆。宜於攝納鎮墜之治者。一輕一重。用藥相反而同爲定喘之兩大法門。甄權謂主肺氣上急。咳逆連連。潔古謂去肺中濕熱。固皆肺實氣壅之正治也。開竇又謂治血痔瘻瘡。則清利宣通。固爲瘡家血熱壅結之良劑。且血痔腸漏。皆屬大腸燥金濕熱之壑。滯此能清金開泄。是以主之。若潔古以爲清肺。而又以爲補肺。則殆誤解錢仲陽補肺阿膠散之眞旨。要之仲陽意中。祇爲肺受燥火之陵。熱壅不宣。故用牛蒡杏仁兜鈴。皆屬開宣清熱主治。特以熱傷肺陰。乃主阿膠。非諸藥皆是補肺正將。瀕湖已謂錢氏此方。非以兜鈴補肺。乃取其清熱降氣。使邪去而肺安。蕭頤案宣肺之藥。紫苑微溫。兜鈴微清。皆能疏通壅滯。止嗽化痰。似此二者。有一溫一清之分。宜辨寒嗽熱嗽。寒喘熱喘主治。究竟紫苑本非大溫。兜鈴亦非大寒。而能抉壅疎通。皆有捷效。洵乎同爲肺金窒塞之良藥矣。

辨僞 張山雷曰。近今市肆中。別有所謂洋兜鈴者。止有片片之兜鈴實。而無其外囊。形狀稍巨。作淡褐色。謂同類異種。似屬可信。用者取其色澤鮮明。頗行於世。然氣味更清。力量更薄。究其功用。不如杜兜鈴爲佳。而價值則較貴。尙不知究是何物。如謂果卽兜鈴之別種。則其外囊又何以棄而不用。且此藥之所以開肺者。性情專在於殼。瀕湖所謂體輕而虛。熟則懸而四開。有肺之象者是也。今乃偏去其外殼。則未免有買櫝還珠之憾矣。

配合應用 ㈠治水腫腹大。喘急。馬兜鈴煎湯日服之。(千金方)㈡治肺氣喘急。馬兜鈴二兩。去殼。及膜。酥炙兩入盌內。拌勻。慢火炒乾。甘草炙一兩爲末。每服一錢。水一盞。煎六分。溫呷或嚥之。(簡要濟衆方)㈢治一切心痛。不拘大小男女。大馬兜鈴一個。燈上燒存性爲末。溫酒服立效。(摘玄方)㈣解蛇蟲毒。飲食中得之。咽中如有物。嚥不下。吐不出。心下熱悶。兜鈴一兩。煎水服。卽吐出。(崔行功纂要方)㈤治痔瘻腫痛。以馬兜鈴於瓶中燒烟熏病處良。(日華本草方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡屬寒嗽及脾弱便泄者禁用。

參攷資料 ㈠馬兜鈴體輕而虛。熟則懸而四開。有肺之象。故能入肺。氣寒味苦。微辛寒。能清熱苦辛。能降肺氣。錢乙補肺阿膠散用之。非取其補肺。乃取其清熱降氣。邪去則肺安矣。其中所用阿膠糯米。則正補肺之藥也。湯劑中用多。亦作吐。故崔氏方用以吐蟲。其不能補肺又可推矣。(李時珍)㈡其根吐利人。微有香氣。故有獨行木香之名。嶺南人用治蟲。隱其名爲三百兩銀藥。肘後方作都淋蓋誤傳也。(李時珍)㈢獨行根。生古堤城旁。所在平澤叢林中皆有之。山南名爲土青木香。一名兜鈴。根莖生葉似蘿摩而圓且澀。花青白色。其子大如桃李而長。十月以後枯。則頭開四系。若蠟。其中實薄扁似榆莢。其根扁而長尺許。作葛根氣。亦似漢防己。二月八月採根。(馬志)㈣馬兜鈴今關中河東河北淮襄浙州郡皆有之。春生苗作蔓。繞樹而生。葉如山藥葉而厚大。背白。六月開黃紫花。頗類枸杞花。七

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

月結實如大棗。狀似鈴。作四五瓣。其根名雲南根。微似木香。大如小指。赤黃色。七八月採實曝乾。（蘇頌）㊀肺熱咳嗽。爲絕少之症。今人惑於錢乙補肺阿膠一方。取以治虛嗽。百服百死。按單以馬兜鈴治虛嗽。固不可。若配以阿膠糯米。有何不可。此則一偏之言也。（陳修園）

【馬兜鈴根】卽青木香之原名。詳『青木香』條。

【馬勒口鐵】卽馬口鐵之別名。見『馬口鐵』條。

【馬眼】採取　以白馬生殺者。取之良。

性質　平。無毒。

主治　驚癇。腹滿。癰疾。

歷代記述攷證【唐】蘇恭新修本草論馬眼曰。小兒慰病。與母帶之。

【馬絆繩】命名　本品乃繫馬之繩。故名。

主治　煎水洗小兒瘡疾。

歷代記述攷證【明】李時珍本草綱目論馬絆繩曰。燒灰摻鼻瘡。

【馬脛骨】性質　甘。寒。無毒。

主治　煆存性。降陰火。中氣不足者用之。可代黃芩。黃連。

【馬莧】卽馬齒莧之古籍別名。典見別錄。詳『馬齒莧』條。

【馬蚿】卽馬陸大者之別名。詳『馬陸』條。

【馬蛟】卽馬陸之古籍別名。典見郭璞賦。詳『馬陸』條。

【馬通】命名　本品卽馬之糞。凡糞必達洞腸而出。故名。

處方用名　白馬通。白馬屎。

古籍別名　馬屎。馬糞（俗名）

製法　新瓦上焙乾用。

性質　微溫。無毒。

效能　清血熱。止吐衄。用作解熱止血藥。

主治　止渴。止吐血。下血。鼻衄。金瘡出血。婦人崩中。

歷代記述攷證【南北朝】徐之才雷公藥對論馬通曰。敗頂止衄。【唐】陳藏器本草拾遺論馬通曰。絞汁服。治產後諸血氣。傷寒時疾。當吐下者。【唐】孟詵食療本草論馬通曰。治時行病起。合陰陽垂死者。絞汁三合。日夜各二服。又治杖瘡。打損傷瘡。中風作痛者。炒熱包熨五十遍。極效。【明】李時珍本草綱目論馬通曰。絞汁灌之。治卒中惡。死酒服。治產後寒熱悶脹。燒灰水服。治久痢赤白。和豬脂治馬咬人瘡。及馬汗入瘡。剝死馬骨刺傷人。毒攻欲死者。【明】繆希雍本草經疏論馬通曰。白馬通本經雖云微溫。然必是苦而涼者也。惟其苦涼。所以能療諸血熱證。止渴。及孟詵主陰陽易垂死者。絞汁服也。【明】李士材本草圖解論馬通曰。白馬通卽馬屎。微溫。主婦人崩中止渴。及吐血下血鼻衄。金瘡止血。治陰陽易垂死者。絞汁服。白馬溺味辛微寒。主消渴。破癥堅積。聚男子伏梁。積痂。婦人癥疾。銅器盛飲之。【清】鄒澍本經疏證論馬通曰。史記大宛多善馬。馬汗血其先天馬子也。是知馬之氣最盛者。能使血隨汗出。卽劣亦能不使血停於中。散之以行脈絡矣。然獨用其通何也。蓋馬通之治。治血之因寒而停。遇隙以溢者。何以知之。則以劉錄謂其微溫。仲景用於柏葉湯知之。夫血緣火迫而溢。必不用性溫者爲治。且不使與乾薑艾葉爲伍矣。馬一身之物。非性寒卽有毒。均非能鑪生氣於人身者。惟通則性溫。而爲養馬一身之餘。縱使一切性寒有毒之骨肉臟腑。皆賴此以生長。則人之身其因寒因傷而血停。因血停而吐衄崩漏者。均能行以散之。不容其再停矣。然謂其止渴何也。夫惟止渴一語。獨隸於婦人崩中之下。亦可知其崩中則一身津液隨血而流。遂不足以滋。固無與於吐衄金創小小下血者矣。

配合應用　㊀治吐血不止。燒白馬通。以水研絞汁一升服。（梅師方）

㊁治衄血不止。用綿裹白馬屎塞之。（錄驗方）又用赤馬糞絞汁。飲一二升。並滴鼻內。乾者浸水亦可。（千金方）

㊂治口鼻出血。用赤馬糞燒灰。溫酒服一錢。（永類鈐方）

㊃治久痢赤白。馬糞一丸。燒灰水服。（肘後方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊄治卒中惡死。吐利不止。不知是何病。不拘大人小兒。馬糞丸絞汁灌之。乾者水煮汁亦可。此扁鵲法也。（肘後方）

㊅治攪腸痧痛欲死者。用馬糞研汁飲之立愈。（經驗方）

㊆治小兒卒忤。馬屎三升燒末。以酒三斗煮二沸。取汁浴兒。避風。（千金方）

㊇治小兒驅。啼面青腹強。是忤客氣。新馬糞一團。絞汁灌之。（聖濟總錄方）

㊈治傷寒勞復。馬屎燒末。冷酒服方寸匕便愈。（聖惠方）

㊉治熱毒攻肢。手足腫痛欲脫。以水煮馬屎汁漬之。（外臺祕要方）

㊀治風蟲牙痛。白馬屎汁。隨左右含之。不過三口愈。（聖惠方）

㊁治鼻齆不聞。新馬屎汁含滿口。灌入即通。（聖惠方）

㊂治筋骨傷破。以熱白馬屎傅之無瘢。（千金方）

㊃治疔腫傷風作腫。以馬屎炒熨瘡上五十遍極效。（聖惠方）

㊄治多年惡瘡。或痛痒生蟲。用馬糞并鹽。同研爛。傅上不過數次。武承相在蜀時。脛有瘡痒不可忍。用此而瘥。（兵部手集方）

㊅治諸瘡傷水。或傷風寒痛劇。用馬屎燒烟熏令汗出愈。（千金方）

㊆治凍指欲墮。馬糞煮水漬半日即愈。（千金方）

㊇治積聚脹滿。白馬糞同蒜搗膏。傅患處效。（活人心鏡方）

㊈治一切漏疾。白馬通汁。每服一升良。（千金方）

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡無實熱者禁用。

參攷資料 ㊀馬屎曰通牛屎曰洞。豬屎曰零。諱其名也。凡屎必達胴腸乃出。故曰通曰洞。胴。廣腸也。（李時珍）㊁別錄以雲中馬爲良。雲中今大同府也。大抵馬以西北方者爲勝。東南者劣弱不及。馬應月。故十二月而生。其年以齒別之。在畜屬火。在辰屬午。或云在卦屬乾。屬金。馬之眼光照人。全身者其齒最少。光愈近齒愈大。馬食杜衡善走。食稻則足重。食鼠屎則腹脹。食鷄糞則生骨眼。以僵蠶爲梅拭牙則不食。得桑葉乃解。掛鼠狼皮於槽。亦不食。過海馬骨則不行。以豬槽飼馬。石灰泥馬槽。馬汗着門。並令馬落駒。繫獼猴於廐。辟馬病。皆物理當然耳。（李時珍）

【馬逢】 **基本** 馬逢爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 辛。無毒。

主治 殺癬蟲。

【馬陰莖】 **製法** ㊀陳藏器曰。凡收當取銀色無病白馬。春月游牝時。力勢正强者。生取陰乾百日用。㊁雷敩曰。用時以銅刀破作七片。將生羊血拌蒸半日。曬乾。以粗布去皮及乾血。挫碎用。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 傷中絕脈。陰不起。强志益氣。長肌肉。肥健生子。（本經）小兒驚癎。（別錄）

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬陰莖曰。益丈夫陰氣。

參攷資料 ㊀陰乾。同肉蓯蓉等分爲末。蜜丸。梧子大。每空心酒下四十丸。日再。百日見效。（孟詵）

㊁主男子陰痿。故房中術偏用之。（甄權）

【馬陸】 **古籍別名** 百足。（本經）馬軸。（別錄）飛蚿蟲。（李氏藥錄）刀環蟲。（蘇恭）百節。（衍義）千足。（炮炙論）馬蚿。馬蠅。馬蟥。（郭璞）馬蛾。（爾雅）蚿。（綱目）馬蚰。

外國名稱 Julus Iulus Thousandlegs（拉丁）ヤスデ（日本）

基本 係節肢動物多足類馬陸類馬陸科。

產地 陰溼諸地。處處有之。

形態 馬陸爲溼生蟲類之一種。其體圓長。約三十節同形之環節合成。每環節具脚二對。頭部扁平。有短觸鬚一對。及單眼數個。口有上下顎各一對。無毒鉤。背面有黃黑相間之環紋。晝伏夜出。食草根及腐敗物。常有一種惡臭。觸之則踡曲如螺狀。而不動。其在山而大者。謂山蚿蟲。採得可供藥用。

製法 雷敩曰。凡收得馬陸。以糠頭炒至糠焦黑。取出去糠。竹刀刮去頭足。研末用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　辛溫有毒。

主治　腹中大堅癥。破積聚息肉。惡瘡白禿（本經）療寒熱瘕結脇下滿（別錄）

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論馬陸曰。辟邪癘。

參攷資料　馬陸係神農藥。雷氏備載炮炙之法。而古方鮮見用者。惟聖惠逐邪丸用之。其方治久瘧發歇無時。用百節蟲四十九枚。溼生蟲四十九枚。砒霜三錢。棕子角七枚。五月五日未出時。於東南上尋取兩般蟲至午時向南研勻。丸小豆大。每發日早。男左女右。手把一丸嗅之七遍。立效。修時忌孝子。婦人師尼。雞犬見之。亦合別錄療寒熱之說。大抵毒物止可外用。不敢輕入丸散中。（李時珍）

【馬留】　卽獼猴之古籍別名。典見倦遊錄。詳『獼猴』條。

【馬鳧】　卽車前草之古籍別名。典見別錄。詳『車前草』條。

【馬蛤】　卽馬刀之古籍別名。典見別錄。詳『馬刀』條。

【馬蛭】　卽水蛭之古籍別名。典見唐本草。詳『水蛭』條。

【馬軸】　卽馬陸之古籍別名。典見別錄。詳『馬陸』條。

【馬軻螺】　卽珂之古籍別名。典見綱目。詳『珂』條。

【馬新薑】　卽馬先蒿之古籍別名。典見唐本草。詳『馬先蒿』條。

【馬棟子】　卽馬藭子之處方用名。詳『馬藭子』條。

【馬溺】　採取　以白馬者良。

性質　辛微寒有毒。

主治　消渴。破癥堅積聚。男子伏梁積痂。婦人瘕積。銅器承飲之。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論馬溺曰。洗頭瘡白禿。瘡惡刺瘡。日十次。愈乃止。【明】李時珍本草綱目論馬溺曰。熱飲治反胃殺蟲。

參攷資料　馬尿治癥瘕有驗。按祖台之志怪云。昔有人與其奴皆患心腹痛病。奴死剖之。得一白鼈。赤眼。仍活。以諸藥納口中。終不死。有人乘白馬觀之。馬尿墮鼈而鼈縮。遂以灌之。卽化成水。其人乃服白馬尿而疾愈。此其徵效也。反胃亦有蟲積者。故亦能治之。（李時珍）

【馬腦】　性質　有毒。

主治　斷酒。臘月者溫酒服。

參攷資料　馬腦食之令人癲。（孟詵）

【馬腸】　產地　生泰州。

形態　馬腸爲雜木類之一種。其葉似桑。其根葉可供藥用。

採取　三月採葉。六月採根。

性質　苦辛寒有毒。

主治　根療蠱除風。其葉療瘡疥。

【馬蕤】　卽鬱金之原名。詳『鬱金』條。

【馬蜂】　卽土蜂之古籍別名。典見綱目。詳『土蜂』條。

【馬蛾】　卽蟬草之古籍別名。典見別錄。詳『蟬草』條。

【馬瘍木】　產地　生山谷間。

形態　爲雜木類之一種。樹形似櫪。其根皮可供藥用。

性質　有小毒。

主治　惡瘡疥癬。生蟲作痒。爲末和油塗之。

【馬精香】　卽返魂香之古籍別名。典見海藥本草。詳『返魂香』條。

【馬蛻】　卽水蛭之古籍別名。典見唐本草。詳『水蛭』條。

【馬蜩】　卽蟬之古籍別名。典見爾雅。詳『蟬』條。

【馬蛾】　卽馬陸之古籍別名。典見爾雅。詳『馬陸』條。

【馬銜芎藭】　卽芎藭節大莖細。狀如馬銜者之古籍別名。典見綱目。詳『川芎』條。

【馬鳴退】　卽蟬蛻之別名。見『蟬蛻』條。

【馬靴草】　卽馬鞭草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬鞭草』條。

【馬價珠】　卽眞珠產於西番者之古籍別名。典見格古論。詳『眞珠』條。

【馬寮】　卽馬勃之古籍別名。典見綱目。詳『馬勃』條。

【馬簹】　卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳『黃精』條。

【馬蓼】　古籍別名　大蓼。蔄蕺。

水紅花。墨記草（綱目）

外國名稱　Polygonum Posumbu, Hain. Var. Blumei, Matsum.（拉丁）イヌタデ（日

163／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本）

基本 係麥科麥屬。爲馬麥之莖葉。

產地 原野濕地均有出。

形態 馬麥爲濕類之野生雜草本。莖高一二尺。葉長橢圓形而尖。互生。其鞘狀托葉之邊緣有細長之剛毛。甚多。初夏開花。花淡紅色。密生於花軸之上部。穗狀花序。其莖葉可供藥用。



馬麥

性質 辛。溫。無毒。

主治 去腸中蛭蟲。輕身。

參攷資料 ㊀馬麥伏丹砂、雌黃。（李時珍）㊁凡物大者。皆以馬名之。俗呼大麥是也。高四五尺。有大小二種。但每葉中間有黑跡如墨點記。故方士呼爲墨記草。（李時珍）㊂馬麥生濕地。莖斑葉大。有黑點。亦有兩三種。其最大者。名曹薁。即水莊花也。（陶弘景）

【馬醉木】**命名** 本品牛馬食其葉即有醉狀。故名馬醉木。

古籍別名 梫木。（拾遺）

基本 屬石南科馬醉木之葉。

產地 凡山野川谷間皆有之。

形態 馬醉木爲山野自生之常綠樹。庭園亦栽植之。以供玩賞。高五六尺。但生於深山者。有時高至二丈。葉互生。爲革質。作長卵圓形而稍尖。邊緣有細鋸齒。春季於枝梢垂穗三寸許。簇生白色壺狀小花。花後結小實。



馬醉木

用法 水煎薰洗。或焙劑外摻。

性質 苦。平。有毒。

效能 殺蟲蝨。洗瘡癬。用作殺蟲藥。

主治 破產後血。煮汁服之。其葉煎汁洗瘡癬。搗碎封蛇傷。

用量 八分至一錢。

國外學說 本草綱目啓蒙曰。梫木生山中者。多係五六尺小木。年久者始至丈餘。葉互生。形細長。有鋸齒。似羚葉而薄。經冬不凋。春日枝梢開花。呈白色。如新木花。穗長三寸許。叢集下垂。後結小子。亦如綠木子。牛馬若食此葉。即作醉狀。故名馬醉木。鹿食之則不時角解。菜圃生小長黑蟲時。用此葉煎湯。放冷灌之。可殺蟲。又和漢藥考曰。將葉之生汁點舌上。舌立麻痺。若誤咽下。時致喪命云。

用量 八分至一錢。

施用宜忌 凡內服藥中禁用。

參攷資料 ㊀梫木生江東林箐間。樹如石榴。葉細高丈餘。四月開花。白如雪。（陳藏器）㊁此木今無識者。其狀頗近山礬。恐古今稱謂不同耳。（李時珍）

【馬駒】即薪蓁之古籍別名。典見吳普本草。詳『薪蓁』條。

【馬齒砂】即硃砂之古籍別名。典見本草集註。詳『硃砂』條。

【馬齒莧】**命名** 本品葉序比竝如馬齒而性滑利似莧。故名。

古籍別名 馬莧。（別錄）五行草。（圖經）五方草。長命菜。馬齒龍芽草。九頭獅子草。狒耳草。（綱目）五色莧。鳳齒莧。（和漢藥考）

外國名稱 Portulaca oleracea L.（拉丁）

基本 屬馬齒莧科。馬齒莧之葉莖。

產地 凡原野間恒多生焉。

形態 馬齒莧爲一年之自生草本。春季生苗。平臥地上。分歧成長莖。圓帶微赤色。葉厚而對生。作長橢圓形。葉莖俱係多汁肉質。表面滑澤。夏季於葉腋開大二分許之黃色五瓣花。後結實。實橫裂。中藏小黑色粒子。



馬齒莧

採取 六七月間採之。

製法 雷敩曰。凡使勿用大葉者。韓保昇曰。葉小者至難燥。當以桃木槌碎。向日東作架曬之。三兩日即乾。如隔年矣。入藥須去莖。用其莖無效。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質 酸。寒。無毒。

效能 瀉熱治惡瘡。解毒散血癖用治毒蟲及毒蛇刺傷藥。

主治 諸腫瘭疣目擣搭之。破癬止消渴。

歷代記述攷證 【唐】韓保昇蜀本草論馬齒莧曰。治白尸脚。陰腫。【唐】蘇恭新修本草論馬齒莧曰飲汁。治反胃諸淋。金瘡流血。破血癖癥瘕。小兒尤良。用汁治緊唇面皰。解馬汁射工毒。塗之瘥。【唐】孟詵食療本草論馬齒莧曰。作膏塗瘡瘤。白禿杖瘡。又主三十六種風。麥粥止痢及痔瘌。治腸痛。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論馬齒莧曰。能肥腸。令人不思食。治女人赤白帶下。【宋】開寶重定新本草論馬齒莧曰。服之長年不白。治癰瘡殺諸蟲。生擣汁服。當利下惡物去白蟲。和梳垢封丁腫。又燒灰和陳醋滓。先灸後封之。即根出。【明】李時珍本草綱目論馬齒莧曰。散血消腫。利腸滑胎。解毒通淋。治產後虛汗。【明】繆希雍本草經疏論馬齒莧曰。馬齒莧味辛苦。氣寒無毒。經云。營氣不從。逆於肉裏。乃生癰腫。原病式云。諸痛痒瘡瘍。皆屬心火。辛寒能涼血散熱。故主癥結癰瘡疔腫。白禿。及三十六種風結瘡。搗敷則腫散。疔根拔。絞汁服則惡物當下。內外施之。皆得也。辛寒通利。故寒熱去。大小便利也。苦能殺蟲。寒能除熱。故主殺諸蟲。去寸白。止渴。辛寒能散肺家之熱。故主目盲白翳也。長年不白。總言其涼血益血。病去身輕之功耳。方士多採取用。以其亦有代砂結汞之能也。

近人學說 張山雷曰。此草葉似苜蓿而肥厚。如錢。其莖亦最肥碩。曬於烈日之中。不易乾燥。其稟性陰寒。已可概見。故最善解癰腫熱者。亦可作敷藥。蜀本草稱其酸寒。寇宗奭謂其寒滑。陳藏器謂治諸腫。破瘕。癬止消渴。皆寒涼解熱之正治。蘇恭亦謂飲汁。治反胃金瘡流血。諸淋。破血癖癥瘕。則不獨治癰腫。兼能消痞。蓋此草之葉面青而背紫。莖亦作紫色。故入血分。而破血滯。諸症。頗謂治女人赤白帶下。則此症多由溼熱凝滯。寒滑以利導之。而溼熱可泄。又兼能入血破瘕。故亦治赤帶。瀕湖謂散血消腫。利腸滑胎。解毒通淋。又無一非寒滑二字之成績也。

配合應用 ㈠治三十六風結瘡。馬齒莧一碩。水一碩。煮取汁入蜜蠟三兩。重煎成膏。塗之。（食療本草方）

㈡治諸氣不調。馬齒莧煮粥食之。（食醫心鏡方）

㈢治癰解疫氣。六月六日。採馬齒莧曬乾。元旦煮熟。同鹽醋食之。可解疫癘氣。（唐寶經驗方）

㈣治筋骨疼痛。不拘風溼氣。楊梅瘡。及女人月經病。先用此藥止疼。然後調理。乾馬齒莧一斤。溼馬齒莧二斤。五加皮半斤。蒼朮四兩。舂碎。以水煎湯洗澡。急用葱薑擂爛。沖熱湯三碗服之。暖處取汗。立時痛止。（海上名方）

㈤治脚氣浮腫。心腹脹滿。小便澀少。馬齒莧和少糜米醬汁煮食之。（食醫心鏡方）

㈥治男女癆疾。馬齒莧擣扎手寸口。男左女右。

㈦治產後虛汗。馬齒莧研汁三合服。如無以乾者煮汁。（婦人良方）

㈧治產後血痢。小便不通。臍腹痛。生馬齒莧菜杵汁三合。煎沸。入蜜一合和服。亦治小兒血痢。（產寶方）

㈨治肛門腫痛。馬齒莧葉三葉。酸棗等分。煎湯熏洗。一日二次。有效。（瀕湖方）

㈩治痔瘡初起。馬齒莧不拘鮮乾。煮熟。急食之。以湯熏洗。一月內外其孔閉。卽愈矣。（楊氏經驗方）

⑪治赤白帶下。不問老稚孕婦。悉可服。取馬齒莧擣絞汁三大合。和雞子白二枚。先溫令熱。乃下莧汁。微溫。頓飲之。不過再作卽愈。（崔元亮海上方）

⑫治小便熱淋。馬齒莧汁服之。（聖惠方）

⑬治陰腫痛極。馬齒莧擣傅之良。（永類鈐方）

⑭治中蠱欲死。馬齒莧擣汁一升。飲。并傅之。日四五次。（壽域方）

⑮治腹中白蟲。馬齒莧水煮一碗。和鹽醋空腹食之。少頃。白蟲盡出。（孟詵方）

⑯治緊唇面皰。馬齒莧煎湯日洗之。（聖惠方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治目中息肉淫膚赤白膜。馬齒莧一大握洗淨。和芒硝末少許。綿裹安上。頻易之。（龍本論方）

㊁治風齒腫痛。馬齒莧一把。嚼汁漬之。卽目腫消。（本事方）

㊂治漏耳諸瘡。治耳內外惡瘡。及頭瘡、肥瘡、癜瘡。黃馬散、黃蘗半兩。乾馬齒莧一兩。爲末。傅之。（聖惠方）

㊃治項上癰瘡。用馬齒莧陰乾。燒研。臘猪脂和。以暖泔洗拭。傅之。（外臺祕要方）又治瘰癧未破。馬齒莧同靛花搗。摻。日三次。（簡便方）

㊄治腋下胡臭。馬齒莧杵。以蜜和作團。紙裹。泥固。半寸厚。日乾。燒過。研末。每以少許和蜜作餅。先以生布揩之。以藥夾脇下。令極痛。久忍。然後以手巾勒兩臂。日用一次。以瘥爲度。（千金方）

㊅治小兒丹熱如火。遶臍卽損人。馬齒莧搗塗。（廣利方）

㊆治小兒臍瘡久不瘥者。馬齒莧燒研。傅之。（千金方）

㊇治跳豆瘢瘡。馬齒莧燒研。傅之。須臾根逐藥出。不出則更傅之。（肘後方）

㊈治疔瘡腫毒。馬齒莧二分。石灰三分。爲末。雞子白和傅之。

㊉治反花惡瘡。馬齒莧一斤。燒研。豬脂和傅。

㊊治蛀脚臁瘡。用乾馬齒莧研末。蜜調傅上。一宿其蟲自出。神效。（海上方）

㊋治足趾甲疽腫爛者。屋上馬齒莧。鳥嘴青木香、印城鹽等分。和勻。燒存性。入光明硃砂少許。傅之。（外臺祕要方）

㊌治瘡久不瘥。積年者。馬齒莧搗爛。封之。取汁煎稠。傅亦可。（千金方）

㊍治馬咬人瘡入心者。馬齒莧煮食之。（聖惠方）

㊎治射工溪毒。馬齒莧擣汁一升。服。以滓傅之。日四五次良。（海上方）

㊏治毛蟲螫人。赤痛不止。馬齒莧搗熟。封之妙。（靈苑方）亦治蜂蠆螫人。（張文仲方）

㊐治蜈蚣咬傷。馬齒莧汁塗之。

㊑治小兒白禿。馬齒莧煎膏塗之或燒灰。猪脂和塗。（聖惠方）

㊒治身面瘢痕。馬齒莧湯日洗二次。（聖惠方）

㊓治雜物眯目不出。用東牆上馬齒莧燒灰。研細。點少許於眥頭。卽出也。（聖惠方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾虛便泄及孕婦禁用。忌煞甲。

參攷資料 ㈠馬齒莧所主諸病。皆只取其散血消腫之功也。（李時珍）㈡多年惡瘡百方不瘥。或痛煞不已者。竝擣爛馬齒莧傅上。不過三兩遍。此方出於武元衡相國。武在西川。自苦脚瘡。潰痒不堪。百醫無效。及到京。有廳吏上此方。用之便瘥也。李絳記其事於兵部手集。（蘇頌）㈢馬齒莧雖名莧類。而苗葉與莧都不相似。一名五行草。以其葉青梗赤花黃根白子黑也。（蘇頌）㈣馬齒莧處處園野生。之柔莖布地。細細對生。六七月開細花。結小尖實。實中細子如葶藶子狀。人多採苗煮曬爲蔬。方士採取伏砒結汞。煮丹砂。伏硫黃。死雄制雌。別有法度。一種水馬齒生水中。形狀相類。亦可拘食。見王西樓菜譜（李時珍）

【馬齒莧子】 主治 歷代記載攷證

【唐】孟詵食療本草論馬齒莧子曰。延年益壽。【明】常效先食。醫心鏡論馬齒莧子曰。青盲白翳。除邪氣。利大小腸。去寒熱。以一升擣末。每以一匙。用薤豉煮粥食。或著米糝五味作羹食之。

【馬齒莧粥】 基本 本品係以馬齒莧和米煮成之粥。

主治 治痺。消腫。

【馬齒龍芽草】卽馬齒莧之古籍別名。典見綱目。詳『馬齒莧』條。

【馬齒蘩】卽地錦草之古籍別名。典見本草集註。詳『明蘩』條。

【馬蹟】卽水蛭之古籍別名。典見本草衍義。詳『水蛭』條。

【馬瘭子】卽覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳『覆盆子』條。

【馬鱉草】卽地錦草之古籍別名。典見綱目。詳『地錦草』條。

【馬蹄】卽馬懸蹄之簡稱。詳『馬

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

懸蹄』條。

【馬蹄決明】卽決明子之古籍別名。典見本草集註。詳『決明子』條。

【馬蹄香】㊀卽杜若之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『杜若』條。㊁卽杜衡之處方用名。詳『杜衡』條。

【馬蹄草】㊀卽蓴之古籍別名。典見綱目。詳『蓴』條。㊁卽決明子之古籍別名。典見本草集註。詳『決明子』條。

【馬蹄莘】卽杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜衡』條。

【馬錢子】卽番木鼈之古籍別名。典見綱目。詳『番木鼈』條。

【馬頭骨】性質　甘微寒。有小毒。

主治　喜眠。令人不睡。燒灰水服方寸匕。日三夜一。作枕亦良。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草。論馬頭骨曰。治齒痛。燒灰傅頭耳瘡。【明】李時珍本草綱目論馬頭骨曰。療馬汗氣入瘡痛腫。燒灰傅之。白汗出良。

【馬頰】卽海月之古籍別名。典見綱目。詳『海月』條。

【馬糞】卽馬通之俗名。詳『馬通』條。

【馬糞石】卽鮓荅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鮓荅』條。

【馬薊】㊀卽白朮之古籍別名。典見綱目。詳『白朮』條。㊁卽大薊之古籍別名。典見范汪。詳『大薊』條。㊂卽蒼朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼朮』條。

【馬薊根】卽續斷之古籍別名。典見初虞氏古今錄驗方。詳『續斷』條。

【馬薤子】卽馬脰子之古籍別名。典見禮記注。詳『馬脰子』條。

【馬檳榔】古籍別名　馬金囊。（雲志）馬金南。（記事珠）紫板檳（綱目）

形態　馬檳榔爲檳榔之一種。其莖莖生。結實大如葡萄。紫色。核顏大。似大楓子。而殼稍薄。圓長斜扁。其中仁。可供藥用。

性質　苦。甘。寒。無毒。

主治　產難。臨時細嚼數枚。井華水送下。須臾立產。再以五枚去殼。兩手各握二枚。惡水自下也。欲斷產者。常嚼二枚。水下久則子宮冷。自不孕矣。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論馬檳榔仁曰。傷寒熱病。食數枚。冷水下。又治惡瘡腫毒。內食一枚。冷水下。外嚼塗之。卽無所傷。

參攷資料　馬檳榔仁。凡嚼之者。以冷水一口送下。其甜如蜜。亦不傷人也。（汪機）

【馬蓼】卽玉竹之古籍別名。典見別錄。詳『玉竹』條。

【馬藍】命名　本品爲藍之一種。其葉如苦實者。故名。

古籍別名　板藍（俗名）大葉冬藍（山海經）琉球藍（和漢藥考）

外國名詞　Strobilanthes flaccidifolius, Nees.（拉丁）

主治　婦人敗血。連根焙搗下節酒服一錢匕。

【馬蠔】卽水蛭之古籍別名。典見本草衍義。詳『水蛭』條。

【馬鞭草】命名　本品節生紫花。如馬鞭之節而穗類鞭。故名。

古籍別名　龍牙草。（圖經）鳳頭草（綱目）馬折。馬鞚草。杜牛夕。鐵掃帚。鐵莞草。（和漢藥考）鐵箒。

外國名詞　Verbena officinalis, L.（拉丁）Vervain.（英）

基本　屬馬鞭草科。馬鞭草之葉莖。

產地　陳仁山藥物生產辨云。馬鞭草有兩種。產廣西、南寧百色。安南東京等處。單枝形如馬鞭。又名黃草。洗淨。僞充金銀斛用。廣東生草藥店所沽者。其形若傘。開花結子時有。節。經過草邊。穗脚每多被節所剌。以此種爲正。

形態　馬鞭草爲原野自生之多年生草。亦有栽植以供玩賞者。春季自宿根生苗。莖作方形。高二三尺。葉對生。初似菊葉。後作三尖。更分裂爲羽狀。邊緣有細鋸齒。夏日梢上開穗狀小花。作淡紫色。花冠作唇形。根白色。類貝母。



馬鞭草

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

採取 七八月間採之。

製法 採得莖葉曬乾用。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 破血通經。殺蟲消脹。用作清血藥。

主治 下部鬱瘡。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論馬鞭草曰。癥瘕血瘕。久瘧。破血殺蟲。搗爛煎取汁。熬如飴。每空心酒服一匕。【宋】大明諸家本草論馬鞭草曰。治婦人血氣。肚脹。月候不勻。通月經。【元】朱丹溪本草衍義補遺論馬鞭草曰。治金瘡行血活血。【明】李時珍本草綱目論馬鞭草曰。搗塗癰腫及蠼螋尿瘡。男子陰腫。【明】繆希雍本草經疏論馬鞭草曰。馬鞭草。圖經謂之龍牙。別錄味苦。氣寒。無毒。保昇曰。華子咸。謂辛涼。本是涼血破血之藥。下部鬱瘡者。血熱之極。兼之澀熱。故血汚濁而成瘡。且有蟲也。血涼熱解。汚濁者破而行之。膿不瘥矣。陳藏器謂其破血殺蟲。亦此意耳。

配合應用 ㊀治癰疽寒熱。用馬鞭草搗汁五合。酒二合。分二服。（千金方）

㊁治鼓脹煩渴。身乾黑瘦。馬鞭草細剉。曝乾。勿見火。以酒或水同煮。至味出。去滓。溫服。以六月中旬雷鳴時採者。有效。（衛生易簡方）

㊂治大腹水腫。馬鞭草、鼠尾草各十斤。水一石。煮取五斗。去滓再煎。令稠。以粉和丸。大豆大。每服二三丸。加至四五丸。神效。（肘後方）

㊃治男子陰腫大如升。核痛。人所不能治者。馬鞭草搗塗之。（集驗方）

㊄治婦人痂痛。名小腸氣。馬鞭草一兩。酒煎漬服。以湯浴身。取汗甚妙。（纂要奇方）

㊅治婦人經閉。結成瘕塊。胁脹大欲死者。馬鞭草根苗五斤。剉細。水五斗。煎至一斗。去滓。熬成膏。每服半匙。熱酒化下。日三服。（聖惠方）

㊆治酒積下血。馬鞭草灰四錢。白芷灰一錢。蒸餅丸梧子大。每米飲下五十丸。（摘玄方）

㊇治魚肉癥瘕。凡食魚鱠及生肉在胸脇不化。成癥瘕。馬鞭草搗汁飲一升。卽消。（千金方）

㊈治乳癰腫痛。馬鞭草一握。酒一碗。生薑一塊。擂汁服。渣敷患處。（衛生易簡方）

㊉治白癜風瘡。馬鞭草爲末。每服一錢。食前荊芥、薄荷湯下。日三服。忌鐵器。（聖惠方）

㊊治人疥馬疥。馬鞭草不犯鐵器。搗自然汁半盞。飲盡。十日內愈。神效。

㊋治赤白下痢。龍牙草五錢。陳茶一撮。用水煎服。神效。（醫方摘要方）

㊌治發背癰毒。痛不可忍。龍牙草搗汁飲之。以滓敷患處。（集簡方）

㊍治楊梅惡瘡。馬鞭草煎湯。先熏後洗。氣到便爽。痛腫隨減。（本草蒙筌方）

㊎治馬喉痺。風。腫頰吐血。馬鞭草一握。避風。去兩頭。搗汁飲之良。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯。及元虛而無溼熱瘡毒者。禁用。忌火。

參攷資料 ㊀葉似狼牙及苎蔚。抽三四穗。紫花。似車前穗類鞭鞘。都不似蓬蒿也。（蘇恭）㊁今衡山廬山江淮州郡。皆有之。苗類益母而莖圓。高二三尺。又曰龍牙草。生施州高二尺以來。春夏有苗。葉至秋冬而枯。採根洗淨用。（蘇頌）㊂馬鞭下地甚多。春月生苗。方莖葉似益母。對生。夏秋開細紫花。作穗。如車前穗。其子如蓬蒿子而細。根白而小。（李時珍）㊃馬鞭氣味苦有毒。伏丹砂硫磺。（甄權）

【馬鞭草根】

性質 辛。溫。無毒。

主治 赤白下痢初起。焙搗羅末。每米飲服一錢匕。無所忌。

【馬額皮】卽生於土上之桑根之皮。與桑白皮性味完全不同。不可採用。有毒。食之殺人。

【馬蟻草】卽地錦之別名。詳『地錦』條。

【馬顛】

基本 馬顚爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 甘。有毒。

主治 療浮腫。不可多食。

【馬騣】卽馬騣毛之簡稱。詳『馬騣毛』條。

【馬騣毛】

原名 鬃毛。

古籍別名 鬣（綱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

目）

性質 有毒。

主治 小兒驚癇。女子崩中。赤白帶。赤用赤馬。白用白馬。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論馬毳毛曰。燒灰服止血。塗惡瘡。

【馬寶】卽鮓苔之生於馬腹中者。用治癲癇。其性味詳『鮓苔』條。

【馬懸蹄】採取 以赤白馬者良。

性質 甘平無毒。

主治 驚邪惡癘。乳難。辟惡氣。鬼毒。蠱疰不祥。（本經）止衄。內漏。齲齒。赤馬者。治婦人崩。白馬者。治白帶。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】韓保昇曰。本草論馬懸蹄曰。主癲癎齒痛。【唐】孟詵食療本草論馬懸蹄曰。赤馬者辟溫瘧。【明】李時珍本草綱目論馬懸蹄曰。療腸癰。下瘀血。帶下。殺蟲。又燒灰入鹽少許。摻走馬疳蝕甚良。

【馬蘭子】原名 蠡實。

處方用名 馬棟子。

古籍別名 劇草子。豕首子。

（本經）荔實。（別錄）馬薤子。（禮記注）馬帶子。（爾雅。纖掃帶子。（救荒本草）旱蒲子。（禮記）三堅子。（綱目）芋子。（爾雅）

外國名詞 Iris ensata, Thunb var. chinensis, Maxim.

基本 屬鳶尾科。馬蘭之種子。

形態 馬蘭爲自生之宿根草。春末自宿根叢生數十葉。高二三尺。葉細厚旋捲。類溪蓀葉。故有捲溪蓀之名。四五月間抽莖梢上開紫碧色。類似溪蓀之六瓣花。後結蒴實。中有帶赤色小扁子。謂之馬蘭子。供藥用。



馬蘭子

採取 五月間採實。陰乾。

製法 時珍曰。凡入藥炒過用。治疝則以醋拌炒之。

性質 甘平無毒。

效能 瀉溼熱。解諸毒。用治小腹疝痛藥。

主治 皮膚寒熱。胃中熱氣。風寒溼痺。堅筋骨。令人嗜食。久服輕身。（本經）止心煩滿。利大小便。長肌膚肥大。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論馬蘭子曰。療金瘡血內流。癰腫有效。【宋】大明日華諸家本草論馬蘭子曰。婦人血氣煩悶。產後血暈。幷經脈不止。崩中帶下。消一切瘡癤。止鼻衄。吐血。通小腸。消酒毒。治黃病。殺蠱毒。傅蛇蟲咬。【明】李時珍本草綱目論馬蘭子曰。治小腹疝痛。腹內冷積。水痢諸病。

配合應用 ㈠治諸冷極病。醫所不治者。馬蘭子九升。洗淨。空腹服一合。酒下。日三服。（千金方）

㈡治寒疝諸疾。寒疝不能食及腹內一切諸疾。消食肥肌。馬蘭子一升。每日取一把。以麵拌炙吞之。服盡愈。（姚僧垣集驗方）

㈢治喉痺腫痛。用蠡實一合。升麻五分。水一升。煎三合。入少蜜攪勻。細呷大驗。（聖惠方）用馬蘭子二升。升麻一兩。蜜丸。水服一錢。又方。馬蘭子八錢。牛蒡子六錢。研爲細末。空心用溫酒服方寸匕。（衛生易簡方）

㈣治水痢百病。用馬蘭子。以六月六日麵熬各等分爲末。空心米飲服六寸匕。如無六月六日麵。常麵亦可。或牛骨灰亦可。又方。馬蘭子。乾薑。黃連各等分爲散。熱湯服二方寸匕。入腹卽斷也。冷熱皆治。常用神效。不得輕之。忌豬肉冷水。（張文仲備急方）

㈤治腸風下血。有痔瘡瘡破者不治。馬蘭子一斤。研。破酒浸。夏三冬七日。曝乾。何首烏半斤。雄黃雌黃各四兩。爲末。以浸藥酒打糊丸。梧子大。每服三十丸。溫酒下。日三服見效。（普濟方）

用量 錢半至三錢。

參攷資料 ㈠月令。仲冬。荔挺出。鄭玄注云。荔馬薤也。通俗文云。一名馬蘭。本草謂之荔實。（蘇恭）

㈡馬蘭子北人訛爲馬棟子。廣雅云。馬薤。荔也。高誘云。荔挺出。荔草挺出也。講禮者不識。呼爲荔挺。又作馬莧。並誤矣。馬莧亦名豚耳。卽馬齒也。（蘇頌）㈢爾雅云。芣音瓶。馬帶也。此卽荔草。謂其可爲馬刷。故名。今河南北人呼爲鐵掃帚是

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

矣。（李時珍）㊃今陝西諸郡及鼎澧州亦有之。近汴尤多。葉似薤而長厚。三月開紫碧花。五月結實。作角子如麻。大而赤色。有稜。根細長。通黃色。人取以爲刷。三月開花。五月採實。並陰乾用。許愼說文云。荔似蒲而小。根可爲刷。高誘云。河北平澤牽生之。江東頗多種於階庭。呼爲旱蒲。不知卽馬薤也。（蘇頌）㊄蠡草生荒野中。就地叢生一本二三十莖。苗高三四尺。葉中抽莖開花。又能結實也。（李時珍）

【馬蘭花及根葉】主治 去白蟲。（本經）療喉痺。多服令人瀉洩。（別錄）

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬蘭花及根葉曰。主癰疽惡瘡。

配合應用 ㊀治睡死不寤。蠡實根一握。搗爛。以水絞汁。稍稍灌之。（外臺祕要方）

㊁喉痺口噤。馬蘭花一兩。莧莉子一兩。爲末。溫水服一錢。

㊂喉痺腫痛。喘息欲死者。外臺祕要用馬蘭根葉二兩。水一升半。煮一盞。細飲之。立瘥。用根搗汁三合。蜜一合。慢火熬成。徐徐點之。日五七度。（聖惠方）

㊃治沙石熱淋。馬蘭花七枚。燒故箏頭二七枚。燒粟米一合。炒爲末。每服二錢。酒下。日二服。名通神散。

㊄治小便不通。馬蘭花炒。茴香炒。葶藶炒。爲末。每酒服二錢。（十便良方）

㊅治一切癰疽。發背惡瘡。用鐵掃帚同松毛。牛膝以水煎服。（乾坤生意方）

㊆治面上瘢黯。取鐵掃帚地上自落葉井子。煎湯頻洗。數次自消。（壽域神方）

㊇治面皰鼻齄。馬蘭子花杵。傅之佳。（肘後方）

參攷資料 ㊀蠡草花實皆入藥。列仙傳云。寇先生宋人。好種荔食其葩實。是矣。（蘇頌）㊁按葉水東日記云。北方田野人患胸腹飽脹者。取馬蘭花搗。涼水服。卽泄數行而愈。按此則多服令人泄之說。有驗。而蠡實謂之馬蘭。更無可以疑矣。（李時珍）

【馬藻】卽水藻之古籍別名。典見綱目詳「水藻」條。

【馬靳】命名 凡物大者。多以馬名。本品似芹而大。故名。

古籍別名 牛蘄。（爾雅）胡芹。（通志）野茴香。（綱目）

產地 生水澤間及卑溼諸地。

形態 馬蘄爲菜類之一種。與芹同類。三四月生苗。一本叢生。如蒿。白毛蒙茸。似水芹而微小。似芎藭葉而色深。五六月開碎花。攢簇如蛇牀及蓍蘿花。青白花。結實亦如蓍蘿。而色黑且重。根白色。長尺許。氣亦香。硬堅。不堪食。莖苗可供食與藥用。

性質 甘。辛。溫。無毒。

主治 益脾胃。利胸膈。去冷氣。

作菜茹食。

【馬靳子】性質 甘。辛。溫。無毒。

主治 心腹脹滿。開胃。下氣。消食。調味用之。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論馬蘄子曰。炒研醋服。治卒心痛。令人得睡。【明】李時珍本草綱目論馬蘄子曰。溫中。暖脾。治反胃。

【馬髻膏】命名 髻。項上也。卽馬項上之脂膏。故名。

性質 甘。平。有小毒。

主治 生髮。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬髻膏曰。治面黯。手足皴粗。入脂澤用。療偏風口喎僻。

參攷資料 ㊀馬髻脂膏柔五金。（鑑源）㊁按靈樞經云。卒口僻急者。頰筋有寒。則急引頰移。頰筋骨熱。則縱緩不收。以桑鉤鉤之。以生桑灰置坎中坐之。以馬膏熨其急頰。以白酒和桂末。塗其緩頰。且飲美酒。噉炙肉。爲之三拊而已。靈樞無註本。世多不知此方之妙。竊謂口頰喎僻。乃風中血脈也。手足陽明之筋絡於口。會太陽之筋絡於目。寒則筋急而僻。熱則筋緩而縱。故左中寒。則逼熱於右。右中寒。則逼熱於左。寒者急而熱者緩也。急者皮膚頑痺。營衞凝滯。治法。急者緩之。緩者急之。故用馬膏之甘平柔緩以靡其急。以潤其痺。以通其血脈。用桂酒之辛熱急束以鍼其緩。以和其營衞。以通其經絡。桑

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

能治風痺。通節疼也。病在上者。酒以行之。甘以助之。故飲美酒。瘧疾肉云。(李時珍)

【馬蘭】 命名 本品葉形似蘭且大。而俗稱物之大者爲馬。故名。

處方用名 馬蘭根。馬蘭葉。

古籍別名 紫菊(綱目)紺菊(日本)嫩尖名馬蘭頭(俗名)

外國名詞 Aster trinervus, Roxt. var. adustus Maxim. (拉丁)コンギク(日本)

基本 係菊科紫菀屬爲馬蘭之根莖。

產地 多生於山野田澤間。



馬蘭

形態 馬蘭爲芳草類之多年生草本。高二三尺。葉長作卵形而尖。粗糙有三大脈。其鋸齒甚深。互生。秋月莖頭枝梢開花。花深紫色。與雞兒腸相類。惟有許多冠毛。故相差異。其嫩苗可作蔬茹。而根葉等均可供藥用。

性質 辛。平。無毒。

主治 破宿血。養新血。止鼻衄吐血。合金瘡。斷血痢。解酒疸。及諸菌毒。蟲毒。生擣塗蛇咬。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬蘭曰。主諸癰及腹中急痛痔瘡。

近人學說 祝天一曰。吳地町畦有草。葉似澤蘭。青而滋。花似野菊。瓣紫蕊黃。莖圓而赤。嫩時野人摘而充饌。味頗美。因值錢。亦不甚惜。鄉人名之曰馬藍。言此草係藍屬。繁植而賤。可供馬食。故稱爲根名爲馬藍根。亦賤名也。味辛涼。能解毒。東垣普濟解毒飲用治時行大頭有奇效。搗汁敷暴毒。滴喉痺。應響甚疾。誠良藥也。綱目有馬蘭。釋名紫菊。註云葉似澤蘭。花似菊。抑即馬藍歟。蘭與藍音同。故出此。綱目藍條中。另有馬藍。蓋指葸藍而言也。或曰蘭與藍既音同。不妨名之爲蘭。何必名之爲藍。余曰蘭芳草也。此草不香。不可稱蘭。蘭貴名也。此草託身田坂。安可自稱尊而僭亂其名乎。

參攷資料 (一)馬蘭辛平。能入陽明血分。故治血與澤蘭同功。近人用治痔漏云有效。春夏取生。秋冬取乾者。不用鹽醋。白水煮食。幷飲其汁。或以酒煮焙研糊丸。米飲日日服之。仍用煎水入鹽少許。日日熏洗之。醫學集成云。治痔用馬蘭根擣傳片時。看肉平卽去之。稍遲恐肉反出也。(李時珍)(二)馬蘭生澤旁。如澤蘭而氣臭。楚辭以惡草噉惡人。北人見其花呼爲紫菊。以其似單瓣菊花而紫也。又有山蘭。生山側。似劉寄奴葉。無極不對生。花心微黃赤。亦大破血。皆可用。(陳藏器)(三)馬蘭湖澤卑溼處甚多。二月生苗。赤莖白根。長葉有刻齒。狀似澤蘭。但不香爾。南人多採汵曝乾爲蔬及饘餡。入夏高二三尺。開紫花。花罷有細子。楚辭無馬蘭之名。陳氏指爲惡草何據。(李時珍)(四)馬蘭根露。係馬蘭根蒸取之露也。性質辛涼無毒。功用散結清熱。破宿血。治痔瘡。以此物辛涼。爲散結清熱之良品。入陽明血分。有和營清化之功效。(醫學大辭典)(五)馬蘭膏。功用治小兒紅赤遊風丹毒。並治大人丹毒。或潛熱伏於經絡。腿面不紅不腫。疼痛異常。病者祇覺熱。他人按之極冷者。方用馬蘭不拘多少。無葉取根。清水洗去泥。搗絞取汁。以雞毛蘸汁搽之。乾則再換。或調飛浮六一散搽之亦可。(醫學大辭典)

【馬蘭根】 卽馬蘭之處方用名。詳『馬蘭』條。

【馬蘭葉】 卽馬蘭之處方用名。詳『馬蘭』條。

【馬蘭頭】 卽馬蘭嫩尖之俗名。詳『馬蘭』條。

【馬縴樹皮】 卽合歡皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『合歡皮』條。

【馬鬱】 卽馬陸之古籍別名。典見郭璞賦。詳『馬陸』條。

【馬蠔】 卽馬陸之古籍別名。典見郭璞賦。詳『馬陸』條。

【馬鼈】 卽水蛭之古籍別名。典見本草衍義。詳『水蛭』條。

【骨片】 卽鹿茸之花名。詳『鹿茸』條。

【骨皮露】 基本 本品爲地骨皮所蒸之露。

主治 解肌熱。骨蒸。一切虛火。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【骨托禽】卽鸕鳥之古籍別名。見綱目詳『鸕鳥』條。

【骨咄犀】卽蛇角之古籍別名。見綱目詳『蛇角』條。

【骨美】卽白薇之古籍別名。見綱目詳『白薇』條。

【骨訥】卽臘肭臍之古籍別名。見和漢藥考詳『臘肭臍』條。

【骨豽】卽臘肭臍之古籍別名。見綱目詳『臘肭臍』條。

【骨脾草】卽辟瘟草之俗名。詳『辟瘟草』條。

【骨狵】卽臘肭臍之古籍別名。見和漢藥考詳『臘肭臍』條。

【骨碎補】原名 猴薑

命名 本品能治折傷而補骨碎故名。根如猴形。狀似薑塊。遂有猴薑之稱。

處方用名 鮮毛薑。申薑。

古籍別名 胡孫薑(拾遺)石毛薑(日華)石蓮蘭(綱目)毛薑(俗名)

基本 隰花植物。石草類。爲骨碎補之根。

產地 多在山野川谷石樹間。

陳仁山藥物生產辨云骨碎補產廣東北江、清遠、三坑等處。

形態 骨碎補爲石草類多年自生之隰花植物。莖細長。延繞於巖石或樹木上。其枝幹密生。春生葉。爲三出羽狀複葉。葉面青綠。背面色白。夏月生多數子囊羣。有包如穀斗。其根扁長似薑。入藥用。



骨碎補

採取 春秋季採之。

製法 敎曰。凡採得用銅刀刮去黃赤毛。細切。蜜拌潤。甑蒸一日。曬乾用。急用只焙乾不蒸。亦得也。

性質 溫無毒。

效能 補腎治骨傷。破血療風痛。用作緩和滋養藥。又爲殺蟲鎭痛藥。

主治 破血止血。補傷折。

歷代記述弦證 【唐】甄權藥性本草論骨碎補曰。主骨中毒氣。風血疼痛。五勞六極。足手不收。上熱下冷。【宋】大明諸家本草論骨碎補曰。惡疾蝕爛肉。殺蟲。【明】李時珍本草綱目論骨碎補曰。研末。猪腎夾煨。空心食。治耳鳴及腎虛久泄。牙疼。【淸】黃宮繡本草求眞論骨碎補曰。骨碎補味苦而溫。功專入腎補骨。且能入心破血。是以腎虛耳鳴。久瀉。跌仆損傷。骨痛牙痛。血出。無不用此調治。俾其腎補骨堅。破瘀生新。而病卽除。至論其名曰骨碎補。以其骨碎能補骨故耳。雖與補骨脂相似。然總不如補骨脂性尚固腎通心。而無逐瘀破血之治也。去毛。蜜拌蒸用。【淸】鄒澍本經疏證論骨碎補曰。折之不死。插之輒生。剪枝移纘。剔根重栽。皆草木恒性。詎足爲異。未可以療傷折也。然則倒插亦生。橫埋亦生。雖切之成塊。暴之至枯。摘其一葉。分其一瓣。無不可生者。遂可以療傷折乎。此不過水與土正相媾。草木偶得之。遂乘此生發耳。又烏足以療傷折。且傷之爲傷。豈無差別。在皮肉曰傷。破。在筋衄曰傷。斷。惟在骨乃曰傷折。傷旣在骨。而遠望水土之滋。凝草木之聯屬。其傷處敗壞久矣。惟骨碎補者。寸寸折之。寸寸皆生。處處折之。處處有汁。無藉根株之係。不致血液之漏。故曰主破血止血。補傷折。言能不使瘀結者留滯。不使流動者妄行。而補其傷折。如未嘗傷折也。所以然者。苦本堅實而內含水。自應腎之體。溫本生發而能運水。自應腎之用。此後人所以察其幾微。而謂爲補腎以除耳鳴齒痛。皆可以是義推之矣。

近人學說 張山雷曰。骨碎補寄生石樹之間。有根有葉。黏着不落。亦猶桑上寄生之屬。性溫而通。故入血和血。通調脈絡。開竅本草謂氣味苦溫。主破血止血。補傷折。又入藥用根。溫而達下。則入肝腎。故甄權謂主骨中毒氣。風血疼痛。上熱下冷。蓋溫養下元。能引升浮之熱。藏於下焦窟宅。是以可治上熱下冷。李瀕湖謂研末同猪腎煨食。可治耳鳴及腎虛久泄牙痛。皆是此意。非可通治胃家實火之齒痛。壽頤先業師閻仙朱先生嘗用以治寒痰凝滯。牙齦不利。頰車隱痛之骨槽症。甚有捷驗。又凡陰虛於下。而肝膽浮陽。挾痰上凝之齒痛。牙槽不利。及陰寒逼陽上浮之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

喉痛喉癬諸症。用此亦頗有效。皆即瀕湖用治牙痛之意而陽邪實盛者類皆不可妄試。昔人每謂此藥入腎。治骨傷碎。因得此名者。皆當識得此意。非陰虛有熱之骨痛骨痿果可以一概主治也。戴元禮症治要訣。謂痢後下虛不善調養。或遠行。或房勞致兩足痿輭。或痛或痺。遂成痢風。宜用獨活寄生湯加虎骨四斤丸。仍以骨碎補三分之一同研酒服。則以腎之虛寒而言。此藥溫腎。能起骨痿宜矣。惟痢後風之脚輭膝腫。亦有陰虛生內熱者。則宜魏玉璜之一貫煎。戴氏此法。非可概投。所謂萬痛有正面皆有反面。審症論治。最當明辨。設或囫圇吞棗。希圖弋獲。未有不敗者矣。此藥之根。有似於薑。且生茸茸之毛。故又有毛薑之名。一名猴薑。或謂即以有毛其形似猴得名。蕃頤則謂寄生木石之上。等於猱之升木。字之以猴。其義易知。非象形也。又名申薑。則以申年之即猴兒年耳。

配合應用 ㊀治虛氣攻牙。齒痛血出。或痒痛。骨碎補二兩。銅刀細剉。瓦鍋慢火炒黑爲末。如常揩齒。良久吐之。嚥下亦可。劉松石云。此法出鬱苑方。不獨治牙痛。極能堅骨固牙。益精髓。去骨中毒氣疼痛。牙動將落者。數擦立住。再不復動。經用有神。㊁治風蟲牙痛。用骨碎補、乳香等分爲末。糊丸。塞孔中。名金針丸。（聖濟總錄方）㊂治耳鳴耳閉。骨碎補削作細條。火炮乘熱塞之。（圖經）㊃治病後髮落。胡孫薑、野薔薇嫩枝。煎汁刷之。㊄治腸風失血。胡孫薑燒存性五錢。酒或米飲服。（仁存方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡痿厥血虛及無瘀滯者禁用。

參攷資料 ㊀骨碎補入婦人血氣藥。蜀人治閃折筋骨傷損。取根搗篩。煮黃米粥和裹傷處有效。（蘇頌）㊁骨碎補足少陰藥也。故能入骨治牙。及久泄痢。昔有魏刺史子久泄。諸醫不效。垂殆。予用此藥末入豬腎中煨熟與食。頓住。蓋腎主大小便。久泄屬腎虛。不可專從脾胃也。雷公炮炙論。用此方治耳鳴。耳亦腎之竅也。按戴原禮症治要訣云。痢後下虛。不善調養。或遠行。或房勞。或外感。致兩足痿輭。或痛或痺。遂成痢風。宜用獨活寄生湯。吞虎骨四斤丸。仍以骨碎補三分之一同研。取汁酒解服之。外用杜牛膝、杉木節、草薢、白芷、南星煎湯。頻頻熏洗。此亦從腎虛骨痿而治也。（李時珍）㊂骨碎補本名猴薑。開元皇帝以其主傷折補骨碎。故命此名。或作骨碎布訛矣。江西人呼爲胡孫薑。象形也。（陳藏器）㊃菴蕳主折傷破血。此物功同。故有菴蕳之名。（李時珍）㊄今淮浙陝西夔路州郡皆有之。生木或石上。多在背陰處。引根成條。上有黃赤毛及短葉附之。又抽大葉成枝。葉面青綠色。有青黃點。背青白色。有赤紫點。春生葉。至冬乾黃無花實。採根入藥。（蘇頌）

【骨路支】

古籍別名 飛藤。（綱目拾遺）

產地 生山野間。

形態 骨路支爲蔓草類藤屬之一種。莖葉似淩霄藤。根如青木香。可供藥用。

性質 辛平。無毒。

主治 上氣浮腫。水氣嘔逆。婦人崩中。餘血瘕痕。殺三蟲。

【骨蓬】 即萍蓬草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萍蓬草』條。

【骨篤】 即蛇角之古籍別名。典見綱目。詳『蛇角』條。

【骨篤犀】 即骨咄犀。詳『蛇角』條。

【高山源黑魚】 即鯇魚之別名。典見和漢藥考。詳『鯇魚』條。

【高良薑】

命名 本品始出高良郡。即今高州。故名。其山高而稍涼。則名當作高涼也。

產方用名 高良薑。

古籍別名 蠻薑。（綱目）埋光。烏藥。比目連理花。（和漢藥考）

外國名詞 Galanga.（拉丁）Galangal.（英）Galgant（德）

基本 係屬薑荷科良薑之地下莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。良薑產廣東瀼州各屬爲多。

形態 良薑爲多年生草。莖圓而直立。高六七尺。葉作披針形。有短柄。稍似肉質。花呈綠白色。不整

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



高良薑

實作濃橙色卵圓形。其表皮顏多。長約二寸。粗約四五分。外部時或生有許多節環。並被有細皺紋之薄皮。呈赤褐色。惟內部則爲白色。充實而呈纖維狀。實輕而作木質狀。氣味芳香。味如胡椒。

種類 良薑出嶺南者。形大虛鞭。生江左者。細緊。亦不甚辛。其實一也。今人呼細者爲杜若。大者爲良薑者。亦非也。

採取 二三月間根採。

製法 李時珍曰。凡使良薑紅豆蔻。并宜炒過入藥。亦有以薑同吳茱萸東壁土炒過入藥者。朱氏集驗方。脾虛寒瘧。高良薑麻油炒。永類鈐方。治婦人妊娠瘧疾。猪膽汁浸一宿。東壁土炒。

性質 辛大溫。無毒。

成分 爲揮發油。辛味性樹脂。越幾斯。澱粉。膠質等。凡高良薑中含有三種結晶體。卽「幹普賈里篤」Kaempferid。「格蘭仁」Galangin。「阿魯卑寧」Alpinin。是也。甲爲黃色扁平結晶體。($C_{15}H_{12}O_5.H_2O$)不溶於水。熱之則於二百二十一度至二百二十二度熔化。乙爲淡黃色稜柱狀結晶體。丙爲粒狀結晶體。

效能 煖胃散寒。止痛消食。用作芳香性健胃藥。能治初期虎列拉。橫隔膜痙攣。急性腸加答兒。

作用 能刺激胃壁神經。使消化機能亢進。亦能刺激腸壁血管。使之收縮。傷寒霍亂等菌過之。卽感强烈之刺激而死。

主治 暴冷胃中冷逆。霍亂腹痛。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論良薑曰。治風破氣。腹內久冷氣痛。去風冷痺弱。【唐】陳藏器本草拾遺論良薑曰。下氣益聲。好顏色。煮飯服之。止痢。【宋】大明曰。華諸家本草論良薑曰。轉筋瀉痢。反胃解酒毒。消宿食。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論良薑曰。含塊癰津。治忽然惡心嘔清水。逶巡而痗。若口臭者。同草豆蔻爲末。水煎飲。【明】李時珍本草綱目論良薑曰。健脾胃。寬噯膈。破冷癖。除瘴癘效。【明】繆希雍本草經疏論良薑曰。高良薑本經大溫。藏器辛溫。元素辛熱。純陽浮也。入足陽明太陰經。二經爲客寒所犯。則逆冷。霍亂腹痛。諸病生焉。辛溫煖脾胃而逐寒邪。則胃中冷逆自除。霍亂腹痛自愈矣。甄權治腹內久冷氣痛。去風冷痺弱。大明主轉筋瀉痢。反胃解酒毒。消宿食。蘇頌治惡心嘔清水。皆取其煖胃溫中。散寒祛冷之功也。【清】黃宮繡本草求眞論良薑曰。良薑氣味辛熱。治無他屬。凡因客寒積於胃脘。而見食積不消。絞痛殆甚。暨霍亂瀉痢。吐惡噯膈。痺癌冷癖。皆能溫胃却病。故同薑附則能入胃散寒。同香附則能除寒祛鬱。若傷暑泄瀉。實熱腹痛切忌。此雖與乾薑性同。但薑乾經炮經制。則能以去內寒。此則辛散之極。故能以辟外寒之氣也。

辨僞 ㈠鄭肯巖曰。陶隱居言高良薑始出高良郡。故得此名。別錄云氣味辛大溫無毒。主治暴冷胃中冷逆。霍亂腹痛。近有僞品色黑而暗不黃。根瘦無味。非高良所產。不可用。用之反有害矣。㈡曹炳章曰。高良薑廣東海南出者。皮紅有橫節紋。肉紅黃色。味辛辣。爲道地出貨。多用途少。僞者鮮見。南越筆記云。高良薑出於高涼。故名。根爲高良薑。子卽紅豆蔻。子未坼含胎衣。醃經冬。味辛香入饌。又云。凡物盛多謂之寇。是子如紅豆而叢生。故名紅豆蔻。今驗此花深紅如灼。與圖經花紅紫色相閒合。花罷結實。大如白果。有稜。嫩時色紅綠。如細如橘瓤。所謂含胎也。老則色紅。卽草木狀之生薑蔻辭之杜若也。

近人學說 良薑大辛大溫。潔古謂辛熱純陽。故專主中宮眞寒重症。別錄獨以治胃冷氣逆。霍亂腹痛者。正以霍亂皆中宮大寒。忽然暴仆。俄頃之間。胸腹絞痛。上吐下瀉。卽四肢冰冷。面唇舌色淡白如紙。脈伏不見。冷汗如油。大肉陡削。良由盛暑之時。乘涼飲冷。汨沒眞陽。致中氣暴絕。見症如是之劇。甚者一二時卽已告斃。此非大劑溫燥。萬不能挽回垂絕之元陽。三

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十年來。時疫類行。無年不有。所見無不如是。薑附吳萸。良薑藁茇之屬。均爲此症必須要藥。惟近賢王孟英陸九芝兩家。所論霍亂。皆主溼熱而言。且謂肢冷脈伏。卽是熱深厥深之候。萬萬不可誤用四逆法者。此則當時見症之不同。蓋亦天時人事之變遷。固自有不可一概論者。此當以舌苔之皖白與黃膩辨之。而所瀉所吐之物。一則清澈如水。一則穢氣惡濁。亦必確乎有憑。固不患臨症時之無所適從也。又曰。藏器謂止痢者。當以虛寒滑利言之。必非溼熱積滯之腸辟可知。甄權謂治腹內久冷氣痛大明治反胃。則胃中無火。食入反出之朝食暮吐。完穀清澈者也。蘇頌謂舍塊噦津。治忽然惡心嘔清水。亦胃寒之症。瀕湖謂健脾胃。寬噎膈。破冷痺。除瘴癘。皆以陰霾塡塞者言。而胃燥津枯之噎膈。溼熱穢濁之瘴癘。非可一概論矣。石頑謂脾胃爲客寒所犯。則逆冷霍亂。辛溫暖脾胃而逐寒邪。故能治之。甄權大明之主治。皆暖胃溫中散寒之功。如寒疝小腹痛。須同茴香治之。產後下焦虛寒。瘀血不行。小腹結痛者。亦用之。若胃火作嘔。傷暑霍亂禁用。

配合應用 ㊀治霍亂吐利。高良薑、炙令香。每用五兩。以酒一升。煮三四沸。頓服。亦治腹痛中惡。（外臺祕要方）

㊁治霍亂嘔甚不止。用高良薑生剉二錢。大棗一枚。水煎冷服立定。名冰壺湯。（普濟方）

㊂治心脾冷痛。用高良薑三錢。五靈脂六錢爲末。每服三錢。醋湯調下。（永類鈐方）

㊃治霍亂腹痛。高良薑一兩。剉。以水三大盞。煎二盞半。去滓。入粳米一合。煮粥食之。便止。（聖惠方）

㊄養脾溫胃。去冷消痰。寬胸下氣。大治心脾痛。及一切物傷。用高良薑乾薑等分。泡。研末。麵糊丸梧子大。每食後橘皮湯下十五丸。妊娠勿服。（和劑局方）

㊅治脾虛寒。瘧寒多熱。少飲食不思。用高良薑麻油炒乾。薑炮各一兩爲末。每服五錢。用豬膽汁調成膏。子臨發時。熱酒調服。或以膽汁和丸。每服四十丸。酒下亦佳。此丸屢施皆效。救人以百計。大抵寒發於膽。用豬膽引二薑入膽去寒而燥脾胃。一寒一熱。陰陽相制。所以作效也。一方只用二薑。半生半炮。各半兩。穿山甲炮三錢爲末。每服二錢。豬腎煮酒下。（朱氏集驗方）

㊆治妊婦腫疾。先因傷寒變成者。用高良薑三錢。剉。以豬膽汁浸一夜。東壁土炒黑。去土。以肥棗肉十五枚。同焙爲末。每用三錢。水一盞。煎熱。將發時服。神妙。（永類鈐方）

㊇治暴赤眼痛。以管吹良薑末。入鼻取嚏。或彈出鼻血。卽散。（試驗方）

㊈治風牙腫痛。良薑二寸。全蠍焙一錢爲末。摻之吐涎。以鹽湯嗽口。此乃樂清丐者所傳。（百一選方）

㊉治頭痛。用良薑生研。類嚏鼻。（普濟方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡胃火作嘔。傷暑霍亂。火熱注瀉。心虛作痛等症。禁用。

著名方劑 ㊀良附丸。治胃脘寒痛。屢發屢止。（心口痛方）高良薑（酒洗）七次。二錢。香附（醋洗）七次。一錢。右二味。剉爲末。加薑汁一匙。鹽少許。爲丸。每服一錢。米飲下。㊁高良薑丸。治心脾冷痛。（永類鈐方）高良薑（切片）四兩分作四份。一兩用陳廩米半合。炒黃去米。一兩用陳壁土炒黃去土。一兩用巴豆三十四粒。炒黃去豆。一兩用斑蝥炒黃去蝥。更以吳茱萸一兩。酒浸一夜。同良薑再炒爲末。以浸吳萸之酒。打糊爲丸。梧子大。每服五十丸。空心薑湯下。

參攷資料 ㊀噫逆胃寒者。高良薑爲要藥。人參茯苓佐之。爲其溫胃解散胃中風邪也。（楊士瀛）㊁孫思邈千金方言。心脾冷痛用高良薑細剉。微炒爲末。米飲服一錢立止。（李時珍）㊂凡男女心口一點痛者。乃胃脘有滯。或有蟲也。多因怒及受寒而起。遂致終身俗言心氣痛者。非也。用高良薑以酒洗七次。焙研。香附子以醋洗七次。焙研。各記收之。病因寒得用薑末二錢。附末一錢。因怒得用附末二

175／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

錢。薑末一錢。寒怒衆有各一錢半。以米飲加入生薑汁一匙。鹽一捻。服之立止。韓飛霞醫通書亦稱其功云。(心口痛方)㈣良薑形氣與杜若相似。而葉如山薑(李時珍)㈤良薑內郡雖有。而不堪入藥。春生莖葉如薑苗而大。高一二尺許。花紅紫色。如山薑花(蘇頌)㈥良薑不可單用多用。恐犯冲和之氣。虛人須與參朮同行(吳儀洛)㈦凡患脚氣人。每旦飽食午後少食。晚則不食。若飢可食豉粥。若不消而欲致霍亂者。卽以高良薑一兩。水三升。煮一升。頓服盡。卽消。若倉卒無者。以毋薑一兩代之。清酒煎服。雖不及高良薑。亦甚效也。(蘇恭)

【高良薑子】 原名 紅豆蔻。

產地 生南海諸山谷中。

形態 紅豆蔻花叢生。葉瘦如碧蘆。春末始發。初開花。抽一莖。有大鐸包之。鐸坼花見。一穗數十蕾。淡紅鮮妍。如桃杏花色。蕊重則下垂。如羅蔔叉如火齊瓔珞。及剪彩鸞枝之狀。每蕊有心兩瓣。人比之連理也。子似豆蔻。故名紅豆蔻。

性質 辛溫無毒。

主治 腸虛水瀉。心腹絞痛。霍亂嘔吐酸水。解酒毒。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論紅豆蔻曰。冷氣腹痛。消瘴雜毒氣。去宿食。溫腹腸。吐瀉痢疾。【明】李時珍本草綱目論紅豆蔻曰。治噫膈反胃。虛癆寒脹。燥溼散寒。【清】黃宮繡本草求眞論紅豆蔻曰。氣味辛甘而溫。炒過入藥。亦是散寒燥溼。補火醒脾之味。且善解酒。并治風寒牙痛。

配合應用 治風寒牙痛。用紅豆蔻爲末。擦左右以少許。搐鼻中。并搽牙取涎。或加麝香。(衛生家寶方)

參攷資料 ㈠紅豆蔻苦辛。多食令人舌粗。不思飲食。(甄權)㈡紅豆蔻最能動火。傷目致蚘。食料不宜用之。(生生編)㈢紅豆蔻李東垣脾胃藥中常用之。亦取其辛熱芳香。能醒脾溫肺。散寒燥溼。消食之功爾。若脾肺素有伏火者。切不宜用。(李時珍)㈣紅豆蔻之禁忌炮製。一如良薑。(吳儀洛)㈤紅豆蔻苗如蘆。葉如薑。花作穗。嫩葉卷之而生。微帶紅色。嫩者入鹽。累累作朵。不散落。須以朱槿花染令色深。善醒醉。解酒毒。無他要使也。(李珣)

【高柴子】 卽胡荽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡荽』條。

【高飛】 ㈠卽白楊之古籍別名。典見綱目。詳『白楊』條。㈡卽柊栘之古籍別名。典見崔豹。詳『柊栘』條。

【高魚】 卽石斑魚之古籍別名。典見綱目。詳『石斑魚』條。

【高粱】 卽稷米之俗名。詳『稷米』條。

【高脚黃】 卽茶菊之黃色者。典見綱目拾遺。詳『茶菊』條。

【高麗胡椒】 卽蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕃椒』條。

【高麗參】 命名 本品爲人參產於朝鮮者。卽古之百濟、新羅諸地故名。

古籍別名 白條參(別錄)朝鮮參。韓國參。百濟參。新羅參。紅參。白參。別直參(綱目)

外國名詞 Corea-Ginseng.(拉丁)

產地 朝鮮江原道之太白山、小白山。爲古來有名產地。其次咸鏡道之麒麟山。白雲山。狼林山。白頭山等。爲八道中有名產地。其中除小白山外。以狼林山所產爲最粗性實亦佳。

種植 高麗常於園圃培植人參。自蒔後須閱七年。方可採取。

採取 產生於山野者。恒集山中搜採採取之法。由時而異。其最簡者。於積雪未消盡時入山。有參之處。其地較暖。則雪先融消約二尺大四方地者。卽知有參而採之。

性質 甘。微溫。無毒。

主治 腸胃中冷。心腹鼓痛。胸脇逆滿。霍亂吐逆。調中止消渴。通血脈。破堅積。令人不忘。

近人學說 張山雷曰。朝鮮地當東海之濱。稟東方發生之氣。故其氣味濃厚。色亦重濁。具有溫養生發之性。今用之於脾腎虛寒。眞陽衰弱。及中氣不振。陰寒用事諸證。功效甚捷。較之遼參偏於養陰。含有清涼氣味者。性質迥異。蓋遼參稟性醇正。絕無剛烈氣象。是以滋養陰津。尤其獨步。而高麗參則

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

已有剛健姿態。溫升之性。時時流露。所以兼能振作陽氣。戰勝陰靈。二者所主之病雖同。陰枯血耗之候。惟陰虛之體。相火易升。則宜於遂參而不宜於高麗參。若陰液既耗。而眞陽亦衰。則宜用高麗參而不宜用遂參。一則養陰而兼理虛熱。一則補陰而卽以扶陽。各有專主。不容或紊。若治虛熱而誤用高麗參。無異抱薪救火。則欲蘇涸轍之鮒。而灼其垂涸之脂膏。若治虛寒而誤投遂參。幾於落阱下石。則欲回黍谷之春。而適以陽絕於冰窖。同是虛也。同是參也。在當用之時。而一字之爭。已如水火冰炭之各異。彼夫風寒濕邪。痰飮食積。氣血鬱結之不得妄投。是味者。更無庸言矣。

辨僞 ㊀鄭肯巖曰。別直參。卽高麗參。以野山所產爲上品。近日價值甚昂。有以副野僞充者。卽新山所產也。色白味淡。紋稀虛寒之體。服之作瀉。且煎熬之後。參片糜爛。不比眞者參片完固。以此辨之。便知眞僞。聞又有抄參糖參二種。以之混充。則殊礙衛生。㊁曹炳章曰。抄參糖參二種。乃人參之種參。前人參條下已辨明。與別直不同。別直產韓國。卽古之高麗。其產參之地。如京畿道之松都龍仁。平安道之江界。全羅道之錦山。忠淸道之忠州。其間以松都產者爲最勝。紅參製造官廠在焉。其地在韓京之北二十餘里。四面皆山。居北緯三十八度。寒暑之差殊甚。如松都產者。以金剛山出者曰金剛參。爲最上品。卽今正官別直也。而參頭參次之。且有官私之別。紅白之分。官參松都所產。由義州出關。加以重稅。私參別處所出。多偸漏出口。故曰私也。廣報云。白參雖不行於內地。而實則紅參鮮時亦是白參製成。不過加附子水以釅其色。價且較白參爲昂。及考其性。紅參又遠不逮白參之和平。故土人無食紅參者。蓋別直雖爲種品。如歷年餘久。質味愈良。古時每栽七年而採。後則五年而採。近世韓國割讓日本。日人多精農學。敎以人工栽培速成之法。三年卽能採買。故其受氣遜年薄弱。而性味效能亦年不如年也。凡辨眞僞。若眞正官別。體態圓方形而直。蘆頭大。與身混直而上。皮面近蘆有細橫皺紋中。身細直紋。枝鬚則無紋。味若兼微甘。鮮潔而有淸香氣。煎淘多次。汁淸而參仍不腐爛。此爲最上之品。近時射利之徒。多以廠參僞充。卽俗所爲扁剛石渠子。是也。考廠參中身大。蘆頭小。頸細。枝下亦粗圓而大。皮紋直而粗。味苦而兼濇。煎淘汁混。參亦腐化。以此可辨爲僞品。若廠參以鑛灰同貯藏年餘。參性受灰炕燥過度。形質因此堅緻。煎之亦汁淸不烊。其味仍苦兼濇。總不若眞別直質味之淸香鮮潔也。

參弦資料 ㊀韓國人參之起原。去今數百年前。一韓人於巨濟（釜山與馬山浦之間）之幽谷。發見一奇草。採掘之。攜至釜山。以示中國商人。詢其名。不能答。卽出高價購之。且頻促再往探索採取。此事喧傳遐邇。人爭趨之。深山幽谷。一時採掘殆盡。該韓人乃試行栽植。終不能如天然產。其後思得一法。將栽植者蒸熟曬乾。再示之中國商賈。云此亦可。韓國之人參殆卽起原於此。蓋始識之者爲華人。而今則成爲韓國國產之一云。㊁韓國之輸出人參於中國。以宣德年間廢除歲幣金銀。改齎紅參爲其濫觴。自是高麗人參之名。見稱於中國。歷年貢使赴北京時。許隨員各帶紅參八十斤。准其出售。謂之包定。數明亡淸興。運帶紅參。其數大增。貢使隨員書狀官以下三十五六名人員。共得攜帶至一萬二百斤。此外義州商賈之隨該員。密運者。年達一二萬斤云。隨員攜帶紅參。應繳先在松都購得定數。每斤納錢文二十五兩（二貫五百文）之稅於松都留守處。取得類似今之印花者。貼箱上。准許攜帶及一行渡鴨綠江時。義州府使再加查驗。復納每斤二兩（一云銀四兩半）渡江稅。始准通行云。

【高麗牽牛花】卽曼陀羅花之古籍別名。典見和漢藥考詳『曼陀羅』條。

【鬲子】卽附子之模左右附而偶生者之古籍別名。典見綱目詳『附子』條。

【鬼丹】卽蘆菪之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

和漢藥考。詳『蘆薈』條。

【鬼仙木】卽杜仲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜仲』條。

【鬼仙橘】卽山馬蘭之古籍別名。典見百草鏡。詳『山馬蘭』條。

【鬼目】㊀卽羊蹄之古籍別名。典見本經。詳『羊蹄』條。㊁卽鹿目之古籍別名。典見綱目。詳『鹿目』條。㊂卽白英子之古籍別名。典見綱目。詳『白英』條。

【鬼目花】卽淩霄花之古籍別名。典見吳普本草。詳『淩霄花』條。

【鬼老子】卽蛇牀子之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『蛇牀子』條。

【鬼臼】

命名 本品根形似臼。故名。

產地 多生山野川谷間。

形態 鬼臼爲毒草類之多年生山草本。年生一莖。既枯則生一臼。葉六出。或五出。形如雁掌。莖端一葉。如繖。隨日傾向。且東夕西花。紅紫色。如荔枝。爲葉所蔽。不常外現。其根成臼形。而似天南星。採得可供藥用。



鬼臼

基本 係小蘗科。鬼臼屬。爲鬼臼之根。

處方用名 鬼臼根。

古籍別名 九臼。爵犀。馬目毒公。(本經)天臼。九老。(本草崇原)

解毒(別錄)害母草。瑤田草。(圖經)獨脚蓮。獨荷草。(土宿)鬼藥。羞天子。羞天花。兀律草。山荷葉。旱荷葉。羞寒花。旱荷八角盤。八角鏡。唐婆鏡。(綱目)

外國名詞 Podophyllum versipello, Hoe. (拉丁)

採取 二月八月採之。

製法 採得根焙乾或陰乾用。

性質 辛溫有毒。

效能 殺蟲辟惡。專作解毒藥。

主治 殺蟲毒。鬼疰精物。辟惡氣不祥。逐邪解百毒。(本經)殺大毒。療咳嗽喉結。風邪煩惑。失魂妄見。去目中膚翳。不入湯。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論。鬼臼曰。主尸疰殭瘃勞疾。傳尸瘵疾。【明】李時珍本草綱目論。鬼臼曰。下死胎。治邪癌癰疽。蛇毒。射工毒。【明】繆希雍本草經疏論。鬼臼曰。鬼臼辛溫有毒。乃陰草中之散結辟邪者也。故能入陰分。以辟不祥。及諸蟲毒。鬼疰精物。尸疰傳尸煩惑。失魂妄見。然此諸病。何莫非陰邪。尸鬼之所爲。凡物以類相從。故惟陰草之異品。乃能治乎陰鬼之賊害也。其去目中膚翳及咳嗽喉結。風邪則辛散之功耳。其藥有二種。味甘者勝。苦者稍劣。

配合應用 ㊀治子死腹中。胞破不生。此方累效救人。蟲萬數也。鬼臼不拘多少。黃色者。去毛爲細末。不用篩羅。只撚之如粉爲度。每服一錢。無灰酒一盞。同煎八分。通口服。立生如神。名一字神散。(婦人良方)

㊁治射工中人。寒熱發瘡。鬼臼葉一把。苦酒漬。搗取汁。服一升。日二次。(千金方)

㊂治黑黃急病。面黑黃。身如土色。不妨食。脈沉。若青脈入口者死。宜烙口中黑脈。耳會。玉泉。章門。心俞。用生鬼臼搗汁一小盞服。乾者爲末。水服。(三十六黃方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用。畏垣衣。

參攷資料 ㊀古方治五尸鬼疰百毒惡氣多用之。又曰。今福州人三月採瑤田草根葉。焙乾搗末。蜜丸服。治風疾。(蘇頌)㊁鬼臼根如射干。白而味甘。九臼相連。有毛者良。故名。(陶弘景)㊂此物有毒而臼如馬眼。故名馬目毒公。殺蟲解毒。故有犀名。其葉如鏡如盤如荷。而新苗生則舊苗死。故有鏡、盤、荷、蓮、害母諸名。蘇東坡詩集云。瑤田草。俗號唐婆鏡。卽本草鬼臼也。歲生一臼。如黃精根而堅瘦。可以辟穀。宋祁劍南方物贊云。羞天花。蜀地處處有之。依莖綴花。蕨葉自隱。俗名羞天子。改爲羞寒花。卽本草鬼臼也。贊云。胃寒而茂。莖修葉廣。附莖作花。葉蕨其上。以其自蕨。若有羞狀。別有羞天草。與此不同。卽海芋也。(李時珍)㊃鬼臼生深山巖石之陰。葉如蒴麻。重樓。羣生一莖。莖端一葉。亦有兩歧者。年長

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一莖莖枯則爲一白。假令生來二十年。則有二十白。豈惟九白耶。根肉皮鬚。並似射干。今俗用多是射干。而江南別送一物。非眞者。今荊州當陽縣。陝州遠安縣。襄州荊山縣山中並貢之。亦極難得。（蘇恭）

㊀鬼臼根。如天南星相疊之狀。故市人道謂小者爲南星。大者爲鬼臼。殊爲謬誤。按黃山谷集云。唐婆鏡葉底開花。俗名羞天花。卽鬼臼也。歲生一臼。滿十二歲。則可爲藥。今方家乃以鬼燈檠爲鬼臼。誤矣。又鄭樵通志云。鬼臼葉如小荷形。如鳥掌。年長一莖。莖枯則根爲一臼。亦名八角盤。以其葉似之也。據此二說。則似是今人所謂獨脚蓮者也。又名山荷葉。獨荷草。旱荷葉。八角鏡。南方處處深山陰密處有之。北方惟龍門山。玉屋山有之。一莖獨上。莖生葉心而中空。一莖七葉。圓如初生小荷葉。面青背紫。揉其葉作瓜李香。開花在葉下。亦有無花者。其根全似蒼朮。紫河車。丹爐家採根制三黃砂汞。或云其葉八角者更靈。或云其根與紫河車一樣。但以白色者爲河車。赤色者爲鬼臼。恐亦不然。而庚辛玉册謂蚤休陽草。旱荷陰草。亦有分別。陶弘景以馬目毒公與鬼臼爲二物。殊不知正是一物。而有二種也。又唐獨孤滔丹房鏡源云。朮律草有二種。根皆似南星。赤莖直上。莖端生葉。一種葉凡七瓣。一種葉作數層。葉似蔥麻。面青背紫。而有細毛。葉下附莖。開一花。狀如鈴鐸。倒垂。青白色。黃蕊中空。結黃子。風吹不動。無風自搖。可制砂汞。按此卽鬼臼之二種也。其說形狀甚明。（李時珍）㊁鬼臼性最猛悍。故能以毒攻毒。顧名思義。故能殺鬼辟邪。（醫學大辭典）

【鬼臼根】卽鬼臼之處方用名。詳『鬼臼』條。

【鬼皂莢】**產地** 生江南澤畔。

形態 鬼皂莢爲雜草類之一種。狀如皂莢。高一二尺。其葉可供藥用。

主治 作湯浴。去風瘡疥癬。採葉去衣垢。沐髮令長。

【鬼芋】**古籍別名** 蒟蒻。（圖經本草）

形態 鬼芋爲芋之一種。狀如蓴菜。可供藥用。

製法 採得剖作四片。入砂盆磨作膠漿。鍋煑成膏。待冷則凝結如餅塊。一復剖爲四片。添水再煑成膏。膏成照前三煑四煑。乃可食。

主治 療饑。

【鬼見愁】卽無患子之古籍別名。典見綱目。詳『無患子』條。

【鬼油麻】卽漏盧之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『漏盧』條。

【鬼芭】卽師系之古籍別名。典見別錄。詳『師系』條。

【鬼前】卽射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳『射干』條。

【鬼屋】卽鬼蓋之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鬼蓋』條。

【鬼柳】卽櫸之古籍別名。典見綱目。詳『櫸』條。

【鬼香油】**命名** 本品搗汁。其味如香油。故名。

基本 鬼香油爲蔓草類之一種。苗葉如香需。可供藥用。

主治 諸瘡腫毒。敗瘡毒。潤肌膚。滋顏色。

配合應用 冬瓜癬。附骨疽。用鬼香油加甘草一錢。入醬板鹽花。搗罨有效。（草藥方）

【鬼香油根】功用與葉同。詳『鬼香油』條。

【鬼扇】卽射干之古籍別名。典見土宿本草。詳『射干』條。

【鬼扇草】**產地** 生石壁間。

形態 鬼扇草爲石草類之一種。葉面青。有直紋。如白葉狀。枝枝生如扇骨形。可供藥用。

主治 打傷昏死。搗汁灌入卽醒。

【鬼桃】卽羊桃之古籍別名。典見本經。詳『羊桃』條。

【鬼神】卽藁本之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藁本』條。

【鬼針草】**古籍別名** 鬼鍼。鬼釵。（綱目）栜檀草。（日本）

外國名詞 Biaens bipinata, L.（拉丁）センダングサ キツネバソ（日本）

基本 係菊科鬼針草屬。藥用鬼針之根苗。

產地 原野池畔均有出。

形態 鬼針草爲溼草類之野

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

生草本。莖高二三尺。葉爲三出之二回羽狀複葉。對生。秋末各枝梢着頭狀花。黃色。花後結實。長五六分。頂上有刺毛四五本。能藉是附着人物。散布他處。

性質　苦。平。無毒。

主治　蜘蛛蛇咬。杵汁服。併敷。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鬼針草曰。塗蠍蠆傷。

參攷資料　㈠生池畔。方莖葉有極子作叙脚。著人衣如針。北人謂之鬼針。南人謂之鬼叙。（陳藏器）㈡割甲傷肉不愈。鬼針草苗。搗黏子根搗汁和臘猪脂塗。（千金）

【鬼卿】　卽藁本之古籍別名。典見本經。詳『藁本』條。

【鬼眼】　卽龍眼最小者之別名。詳『龍眼』條。

【鬼眼睛】　卽螺螄殼之古籍別名。典見綱目。詳『螺螄殼』條。

【鬼叙】　卽鬼針草之古籍別名。典見綱目。詳『鬼針草』條。

【鬼畫符】　卽夜蘭葉上之白篆文者之古籍別名。典見嶺南雜記。詳『夜蘭』條。

【鬼都郵】　卽鬼督郵之古籍別名。典見唐本草。詳『鬼督郵』條。

【鬼新】　卽藁本之古籍別名。典見本經。詳『藁本』條。

【鬼督郵】　**命名**　本品專治鬼祟邪病。猶司鬼之督郵。故名。

古籍別名　鬼都郵。鬼獨搖草。（唐本草）

學名　Macroclinidium rigidium, Mark.（植名後編植辭 B. E. R.）Pertya sigdula, Makino,（圖鑑）Pertya Macroclinidium, Mak.（圖鑑）M. robustum, Max.（植物名彙）

基本　係菊科。爲鬼督郵之根。

產地　在山野間。

形態　鬼督郵爲山草類之野生草本。叢生而苗惟一莖。莖端生葉。若繖狀花。生於葉心。黃白色。其根橫生而細黑無鬚。可供藥用。



鬼督郵

採取　二月八月間採之。

製法　雷敩曰。凡採得細剉。用生甘草水煮一伏時。日乾用。

性質　辛。苦。平。無毒。

主治　鬼疰。卒忤中惡。心腹邪氣。百精毒。溫瘧疫疾。强腰脚。益脊力。

參攷資料　㈠按東晉深師方。治上氣咳嗽邪嗽。鰓嗽。冷嗽。四滿丸。用鬼督郵同蜈蚣。芫花。躑躅諸毒藥爲丸。則其有毒可知矣。非毒藥不能治鬼疰邪惡之病。唐本云無毒。蓋不然。（李時珍）㈡此草獨莖而葉攢其端。無風自動。故曰鬼獨搖草。後人誤爲鬼督郵。爾因其專主鬼病。猶司鬼之督郵也。古者傳舍有督郵之官。主之。徐長卿、赤箭、皆治鬼病。故並有鬼督郵之名。名同而物異。（李時珍）㈢莖似細箭。攀高二尺以下。葉生莖端。狀如傘花。生葉心。黃白色。根橫生而無鬚。二月八月採根。徐長卿。赤箭。並有鬼督郵之名。而主治不同。宜審用之。（韓保昇）㈣鬼督郵與及已同類。根苗皆相似。但以根如細辛而色黑者爲及已。根如細辛而色黃白者爲鬼督郵。（李時珍）

【鬼督郵】　㈠卽天麻之古籍別名。典見本經。詳『天麻』條。㈡卽徐長卿之古籍別名。典見本經。詳『徐長卿』條。

【鬼膊藤】　**產地**　生林野澗邊。

形態　鬼膊藤爲蔓草類之一種。葉如梨葉子如槵子。其藤葉可供藥用。

性質　苦。溫。無毒。

主治　浸酒服。祛風氣。

【鬼膊藤葉】　**性質**　苦。溫。無毒。

主治　搗傅癰腫。

【鬼蒜】　卽百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳『百合』條。

【鬼蒟蒻】　卽天南星之古籍別名。典見諸家本草。詳『天南星』條。

【鬼蓋】　**古籍別名**　朝生。鬼繖。（弘景）鬼屋。（藏器）

產地　生陰濕諸地及墻垣之下。

形態　鬼蓋爲土菌之一種。朝生夕死。狀如菌而莖赤。可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　和醋傅腫毒惡瘡。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鬼蓋】卽人參之古籍別名。典見本經。詳『人參』條。

【鬼箸】卽箸葉之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『箸葉』條。

【鬼箭】卽衛矛之古籍別名。典見別錄。詳『衛矛』條。

【鬼箭羽】卽衛矛之處方用名。詳『衛矛』條。

【鬼骷髏】基本 本品乃殘老之向日葵。其子可供藥用。

主治 通氣透膜。合麝香、急性子搗爛爲膏。貼臍能落胎。

參考資料 冬日桃園中。有樹上乾枯殘桃。亦名鬼骷髏。與此名同物異。

【鬼齒】基本 本品爲腐敗竹根之先入地者。

古籍別名 鬼鍼(綱目)

性質 苦。平。無毒。

主治 中惡注忤。心腹痛。煮汁服之。

歷代記述 【明】李時珍 本草綱目論鬼齒曰。煮汁服下骨硬。燒存性。入輕粉少許。油調塗小兒頭瘡。

【鬼燈檠】卽山慈姑之古籍別名。典見綱目。詳『山慈姑』條。

【鬼獨搖草】卽鬼督郵之古籍別名。典見唐本草。詳『鬼督郵』條。

【鬼頭】卽蒟蒻之古籍別名。典見綱目。詳『蒟蒻』條。

【鬼螺蛳】卽石上螺螄之俗名。詳『石上螺螄』條。

【鬼醜】卽甘遂之古籍別名。典見吳普本草。詳『甘遂』條。

【鬼鍼】㊀卽鬼針草之古籍別名。典見綱目。詳『鬼針草』條。㊁卽鬼齒之古籍別名。典見綱目。詳『鬼齒』條。

【鬼蠟燭】卽蒲包草實之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蒲包草』條。

【鬼臼臛】卽桃梟之古籍別名。典見綱目。詳『桃梟』條。

【鬼鱖】卽鱖魚之小者。典見綱目。詳『鱖魚』條。

十一畫

【乾冬菜】命名 本品卽冬菜之曝乾者。故名。

古籍別名 徽乾菜(綱目拾遺)

性質 甘。平。無毒。

主治 利腸下氣。開胃益血。生津液。補虛勞。並療久年痰嗽。聲音不出。泡湯飲。湯火傷。和酒搗傅。白火丹煎服及洗浴之。

參考資料 冬菜乃白菜。杭俗小雪前後。居人率市白菜以鹽醃之。作蘆藏爲禦冬及春時所食。名曰冬菜。其滷汁煑豆及豆腐食。能清火益肺。誠食中佳品。至春分後。天漸暖。菜亦漸變黑色。味苦不堪食。以之曬作乾。飯鍋上蒸熏。再曬再蒸。如此數次。乃曬之極乾。貯缸罌中。可久藏不壞。名曰徽乾菜。卽乾冬菜也。年久者出之。香氣頗烈。功能開胃。噤口痢及產孿以之下粥。大有補益。蓋白菜本能和中下氣。利三焦。通二便。含土德之精。有生金之用。乾之則苦返其初。而從毋化也。久蒸久曬。則味反甘。全其德。故有中和之運功。與參耆等。惜乎世多忽而不知。余故特爲表之。瀕湖綱目蔈下無乾菜之用。殊爲缺略。近日覓橘人所市者。乃蘿蔔英所乾。與芥菜乾蒸曬成者。皆不入藥。須入家冬白菜醃作蒸曬。年久者爲佳。暈芳譜有造黑醃蘆法。用白菜如法醃透。取出掛於桁上。曬極乾。上甑蒸熟。再曬乾收之。極耐久藏。夏月以此蘆和肉炒。可以久留不臭。卽今乾冬菜也。(趙學敏)

【乾地黃】卽大生地之原名。詳『大生地』條。

【乾地龍】卽蚯蚓之處方用名。詳『蚯蚓』條。

【乾陀木皮】命名 本品褐色。可染僧褐。故名。

產地 生西域諸地。安南亦有

181／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

出。

形態 乾陀木爲雜木類之一種。樹大皮厚。葉似櫻桃葉。其木皮可供藥用。

性質 溫。平。無毒。

主治 癥瘕氣塊。溫腹煖胃。止嘔逆。破宿血。婦人經閉。腹內血塊。酒煎服之。

【乾柿】卽柿餅之別名。性質功能。詳『柿餅』條。

【乾苔】基本 本品爲海苔之乾燥者。

古籍別名 苔菜(本草彙言)

海苔(綱目)青苔(日本)紅麗(本草綱目)

外國名詞 Enteromorpha Linza, J. G. Ag.(拉丁)アラノソ(日本)

基本 係眞正綠藻類絲藻族石蓴科乾苔屬之乾苔。

產地 出淺海中。

形態 乾苔爲苔類之一種。卽苔之產海中者。葉爲細長之管狀體。似絲綿。又似韭。可供食與藥用。

採取 冬春間採長數寸者。日乾用。

性質 鹹。寒。無毒。

主治 癥瘤結氣。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論乾苔曰。治痎殺蟲及霍亂嘔吐不止。煑汁服。【唐】陳藏器本草拾遺論乾苔曰。心腹煩悶者。冷水研如泥。飲之卽止。【宋】日華諸家本草論乾苔曰。下一切丹石諸藥毒。納木孔中。殺蠹。【明】吳瑞日用本草論乾苔曰。消茶積。【明】李時珍本草綱目論乾苔曰。燒末吹鼻止衄。血湯浸擣傅手背腫痛。

參攷資料 ㊀洪氏夷堅志云。河南一寺僧。盡患癭疾。有洛陽僧共寮。每食取苔脯同餐。經數月。僧項贅皆消。乃知海物皆能除是疾也。(李時珍) ㊁柔苔寒。乾苔熱。(陶弘景) ㊂苔脯食多發瘡疥。令人瘙黃。少血色。(孟詵) ㊃有咳嗽人。不可食之。(吳瑞)

【乾苧叢】卽獨脚一枝蓮之古籍別名。典見百草鏡。詳『獨脚一枝蓮』條。

【乾皋】卽鷄冠之古籍別名。典見綱目。詳『鷄冠』條。

【乾魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮑魚』條。

【乾棗】卽大棗曝乾者之古籍別名。典見別錄。詳『大棗』條。

【乾葛】卽葛根之處方用名。詳『葛根』條。

【乾萊菔】卽地骷髏之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『地骷髏』條。

【乾菖蒲】卽菖蒲之處方用名。詳『菖蒲』條。

【乾漆】命名 漆本作黍。水汁可以髹物。其字象水滴而下之形也。故名。藥用其乾涸者。遂命之曰乾漆。

古籍別名 續命筒。(和漢藥考)黑漆(俗名)

基本 乾漆爲漆樹之液汁。貯置器內。漸次乾涸。凝成堅固之塊粒。

產地 陳仁山藥物生產辨云。乾漆乃油漆店之漆盆底。乾而不能再用之漆。取出沽之。

形態 漆樹科之漆樹(Rhus Vernicifera, D. C.)其樹幹鋸下後。鋸痕有液汁流出。卽爲漆液。其散去水氣。成爲暗褐色濃稠液者。謂之黑目漆。其乾涸成爲黑色蜂窩狀輕塊。謂之籠目乾漆。可供藥用。

製法 大明曰。凡使乾漆入藥。須搗碎炒熟。不爾損人腸胃。若是溼漆煎乾更好。亦有燒存性。

用法 恒以剉末和作丸散用。

性質 辛。溫。無毒。

成分 生漆之成分爲水、漆酸($C_{42}H_{38}O_2$)膠質、蛋白質等。漆液在空氣中之硬化。係由其主成分養化所致。但須有溼氣存在。方能硬化。

效能 破血、消積、燥溼、殺蟲。用作通經藥。又有燒烟吸之。用治勞瘵喉痺等。

主治 絕傷。補中。續筋骨。壞髓腦。安五臟。五緩六急。風寒溼痺。生漆去長蟲。久服輕身耐老。(本經)乾漆療咳嗽。消瘀血痞結。腰痛。女子疝瘕。利小腸。去蚘蟲。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論乾漆曰。殺三蟲。主女人經脈不通。【宋】大明諸家本草論乾漆曰。治傳尸勞。除風。【金】張元素珍珠囊論乾漆曰。削年深堅結之積滯。破日久凝結之瘀血。【明】

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

繆希雍本草經疏論乾漆曰。乾漆味辛氣溫。甄權加鹹。宗奭加苦。氣味俱厚。通行腸胃。入肝行血之藥也。凡風寒溼邪之中人。留而不去。則腸胃鬱而生蟲。久則五臟六腑皆受病。或爲癰瘍。或爲拘攣。所自來矣。此藥能殺蟲消散。逐腸胃一切有形之積滯。腸胃既清。則五臟自安。瘵緩痺結自調矣。又損傷一證。專從血論。蓋血者有形者也。形質受病。惟辛溫散結而兼鹹味者。可入血分而消之。瘀血消則絕傷自和。筋骨自續。而髓腦自足矣。其主痞結腰痛。女子痂癥者。亦指下焦血分受寒血凝所致。利小腸者。取其通行經脈之功耳。至於瘵咳嗽雖非正治。然亦有瘀血停積。發爲骨蒸勞瘵。以致咳嗽者。得其消散瘀血之力。則骨蒸退而咳嗽亦除也。誤中漆毒者。多食蟹及甘豆湯解之。【明】李士材本草圖解論乾漆曰。乾漆辛溫降而行血。毒而殺蟲。二者已罄其功。能若祛風止痛。除嗽理傳尸。正行血殺蟲之效也。性急多毒。弗得過用。凡畏漆者。嚼椒塗口鼻。免生漆瘡。如杉木如紫蘇。如蟹。患漆瘡者。皆可煎湯浴之。煎乾。炒令烟盡。存性。【清】黃宮繡本草求眞。論乾漆曰。乾漆味辛氣溫。有毒。有降無升。專破日久凝結之血。及削年深堅結之積。緣人感受風寒暑溼。鬱而爲病。則中外不舒。胃中有物留滯不消。久而生蟲。血積不化。結而爲瘀。由是陽氣竭澤。津液枯槁。癱瘓風痺。因之不免。用此辛溫毒烈之性。蠲除瘀積。中氣得復。絕陽皆續。而緩急和矣。

拔血見漆花水。故能化蟲破血。千金三蟲方。皆賴以之爲君。本經言能輕身者。以其蟲去而身自輕之謂也。所謂中氣可復。絕陽可續者。亦因瘀去而中自復。與陽自續之謂也。但無積血者切忌。以其傷營血。損胃氣耳。炒令烟盡爲度。

配合應用　㊀治腹中瘀血作痛。乾漆、鱉蟲、桃仁、當歸、紅花、蘇木、牡丹皮、五靈脂、延胡索、牛膝或產後感寒惡露未盡。結成痞塊作痛者。加入乾薑、澤蘭。

㊁殺腸胃一切諸蟲。乾漆、楝根、鵝蟲、檳榔、錫灰、慈菇根、烏梅、龍膽草。

㊂治女子月閉。乾漆、牛膝、牡丹皮、續斷、赤芍藥、桃仁、乳香、沒藥、紅花、延胡索、鼈甲。若瘀血腫腹作痛。畏寒及不發熱。不口渴者。可加桂。

㊃治紫雲風。乾漆、豨薟葉、生地黃、牛枝蓮、胡麻、荊芥、何首烏、天門冬、苦參。

㊄治小兒蟲病。胃寒危惡證。與癇相似者。用乾漆搗燒烟盡。白蕪荑等分爲末。米飲服一字至一錢。（杜仁方）

㊅治九種心痛。及腹脇積聚滯氣。筒內乾漆一兩。搗炒烟盡。研末。醋煮麵糊丸。梧子大。每服五丸至九丸。熱酒下。（簡要濟衆方）

㊆治婦人不曾生長。血氣疼痛不可忍。及治丈夫疝氣。小腸氣撮痛者。並宜服二聖丸。溼漆一兩。熬一食頃。入乾漆末一兩。和丸梧子大。每服三四丸。溫酒下。怕漆人不可服。（經驗方）

㊇治產後青腫疼痛。及血氣水疾。乾漆、大麥芽等分爲末。新瓦罐相間鋪滿。鹽泥固濟。煅赤。放冷。研散。每服一二錢。熱酒下。但是產後諸病。皆可服。（婦人良方）

㊈治五勞七傷。補益方。用乾漆、柏子仁、山茱萸、酸棗仁各等分爲末。蜜丸梧子大。每服二七丸。溫酒下。日二服。（千金方）

㊉治喉痺欲絕。不可針藥者。乾漆燒烟。以筒吸之。（聖濟總錄方）

㊀解中蟲毒。平胃散末。以生漆和丸梧子大。每空心溫酒下七十丸至百丸。（直指方）

㊁下部生瘡。生漆塗之良。（肘後方）

用量　八分至一錢半。

施用宜忌　凡無瘀滯者禁用。畏雞子、忌油脂、惡川椒、紫蘇及蟹。半夏爲之使。

參攷資料　㊀仙方用蟹消漆爲水。練服長生。抱朴子云。淳漆不黏者。服之通神長生。或以大蟹投其中。或以雲母水。或以玉水合之。服九蟲悉下。蟲血從鼻出。服至一年。六甲行廚至也。（陶弘景）㊁漆性毒而殺蟲。降而行血。所主諸證雖繁。其功只在二者而已。（李時珍）㊂今人貨漆多雜桐油。故多毒。淮南子云。蟹見漆而不乾。相感恚云。漆得蟹而成水。蓋物性相制

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。凡人畏漆者。嚼蜀椒塗口鼻則可免。生漆瘡者。杉木湯、紫蘇湯、漆姑草湯、蟹湯浴之皆良。(李時珍)

㊱梁州漆最苦。益州亦有。廣州漆性急易燥。其諸處漆桶中自然乾者。狀如蜂房。孔孔隔者爲佳。(陶弘景)㊲漆樹高二三丈餘。皮白葉似椿。花似槐。其子似牛李子。木心黃。六月七月刻取滋汁。金州者最善。漆性並急。凡取時須荏油解破。故淳者難得。可重重別制拭之。上等清漆色黑如墨。若鐵石者好。黃熾若蜂窩者不佳。(韓保昇)㊳

澀漆藥中未見用者。皆乾漆爾。其澀者在燥熱及未冷時則難乾。得陰濕雖寒月亦易乾。亦物之性也。若霜潰人。以油洽之。凡驗漆惟稀者以物攝起。細而不斷。斷而急收。更有塗於乾竹上。蔭之速乾者並佳。(范宗奭)㊴

漆樹人多種之。春分前移栽。易成有利。其身如柿。其葉如椿。以金州者爲佳。故世稱金漆。人多以物亂之。試訣有云。微扇光如鑑。黑絲急似鉤。擾成琥珀色。打着有浮漚。今廣浙中出一種漆樹。似小榎而大。六月取汁漆物。黃澤如金。卽唐書所謂黃漆者也。入藥仍當用黑漆。廣南漆作飴糖氣。沾沾無力。(李時珍)

【乾餅藥】卽石鹼之古籍別名。典見癘科書。詳『石鹼』條。

【乾蝦】命名 蝦之曬乾者也。

主治 能解蟲毒。幷治水土不服。

參攷資料 蝦生淡水者色青。生鹹水者色白。溪澗中出者。殼厚氣腥。以其得土氣薄也。湖澤池沼中者。殼薄肉滿。氣不腥。味佳。海中者色白肉粗。味殊劣。(趙恕軒)

【乾醋】卽醋之古籍別名。典見新本草詳『醋』條。

【乾葚蓉】卽肉蓯蓉之處方用名。詳『肉蓯蓉』條。

【乾餳糟】命名 本品係製造餳飴所餘之糟粕。故名。

性質 甘。溫。無毒。

主治 反胃吐食。暖脾胃。化飲食。益氣緩中。

參攷資料 餳以熟成。暖而消導。故其糟能化滯緩中。養脾止吐也。按繼洪濟寮方云。甘露湯治反胃嘔吐不止。服此利胸膈。養脾胃。進飲食。用乾餳糟六兩。生薑四兩。二味同搗作餅。或焙或晒。入炙甘草末二兩。鹽少許。點湯服之。常熟一富人。病反胃。往京口甘露寺。設水陸。泊舟岸下。夢一僧持湯一杯與之。飲罷便覺胸快。次早入寺。供湯者。乃夢中所見僧。常以此湯待賓。故易名曰甘露湯。予在臨汀。療小吏旋愈。切勿忽之。(李時珍)

【乾糗糧】卽麨米之古籍別名。典見綱目。詳『麨米』條。

【乾薑】處方用名 淡乾薑。川乾薑。

古籍別名 白薑。均薑。(李時珍)

外國名稱 Zingiber. (Ginger.)

基本 屬薑荷科。爲 Zingiber officinale 之根。

薑、均薑之名。外面黃褐色。有皺紋。

製法 陶弘景曰。凡作乾薑。水淹三日。去皮。置流水中六日。更刮去皮。然後晒乾。置磁缸中釀三日乃成。蘇頌曰。造法採根於長流水中洗過。日晒爲乾薑。以漢溫池州者爲良。陶說乃漢州乾薑也。李時珍曰。乾薑以毋薑造之。今江西襄均皆造。以白淨結實者爲良。故今人呼爲白薑。又曰均薑。凡入藥並宜炮用。

性質 辛。溫。無毒。

成分 含有揮發油及纖維等。

效能 溫中祛寒。燥濕消痰。用作驅風消化藥。

主治 胸滿咳逆上氣。溫中止血。出汗。逐風溼痺。腸澼下痢。生者尤良。(本經)寒冷腹痛。中惡霍亂。腹滿。風邪諸毒。皮膚間結氣。止唾血。(別錄)

張仲景之善用 乾薑一味。經張仲景之實驗。認爲『主治結滯水毒也。旁治嘔吐咳。下利厥冷。煩躁。腹痛。胸痛。腰痛』。茲考徵如下。㊀大建中湯證曰。心胸中大寒痛。嘔不能飲食。㊁茯苓甘薑湯證曰。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

身體重。腰中冷。又云。腰以下冷痛。㊂半夏乾薑散證曰。乾嘔吐逆。吐涎沫。（以上三方。乾薑或四兩。或諸藥等分。）㊃人參湯證曰。喜唾。又曰。心中痞。㊄通脈四逆湯證曰。下利清穀。又曰手足厥逆。又云乾嘔。㊅小青龍湯證曰。心下有水氣。乾嘔。又云咳。㊆半夏瀉心湯證曰。嘔而腸鳴。㊇柴胡姜桂湯證曰。胸脇滿。又云。心煩。㊈黃連湯證曰。腹中痛。欲嘔吐。㊉茱甘五味姜辛湯證曰。咳胸滿。㊊乾薑黃連黃芩人參湯證曰。吐下。㊋六物黃芩湯證曰。乾嘔下利。（以上九方。乾薑皆三兩。）㊌梔子乾薑湯證曰。微煩。㊍甘草乾薑湯證曰。厥。咽中乾。煩躁吐逆。㊎乾薑附子湯證曰。煩躁不得眠。（以上三方。乾薑二兩一兩而四兩之例。）㊏四逆湯證曰。下利清穀。又曰手足厥冷。（以上一方。乾薑一兩半而三兩之例。）㊐桃花湯證曰。下利。㊑乾薑人參半夏丸證曰。嘔吐不止。（以上二方。乾薑一兩而三兩之例。）歷觀此諸方。其嘔吐者。咳者。痛者。下利者之等。壹是皆水毒之結滯者也。

歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論乾薑曰。治腰腎間疼冷。冷氣。破血去風。通四肢關節。開五臟六腑。宣諸絡脈。去風毒冷痺。夜多小便。【宋】大明日華諸家本草論乾薑曰。消痰下氣。治轉筋吐瀉。腹臟反胃乾嘔。瘀血撲損。止鼻衄。解冷熱毒。開胃消宿食。【元】王好古湯液本草論乾薑曰。主心下寒痞。目睛久赤。【明】李時珍本草綱目論乾薑曰。乾薑能引血藥入血分。氣藥入氣分。又能去惡養新。有陽生陰長之意。故血虛者用之。凡人吐血衄血下血有陰無陽者。亦宜用之。乃熱因熱用。從治之法也。【明】繆希雍本草經疏論乾薑曰。乾薑稟天地之陽氣。故味辛而氣溫。雖熱而無毒。辛可散邪。理結溫可除寒。通氣。故主胸滿咳逆上氣。溫中出汗。逐風溼痺。下痢因於寒冷。止腹痛。其言止血者。蓋血虛則發熱。熱則血妄行。乾薑炒黑。能引諸補血藥入陰分。血得補。則陰生而熱退。血不妄行矣。治腸癖亦其義也。生薑能通神明。辟惡氣。故主中惡霍亂。脹滿。風邪諸毒。皮膚間結氣。惟唾血。定非寒證。則錄載之誤矣。【清】陳修園本草經讀論乾薑曰。乾薑氣溫。稟厥陰風木之氣。若溫而不烈。則得沖和之氣而屬土也。味辛得陽明燥金之味。苦辛而不偏。則金能生水而轉潤矣。故乾薑爲臟寒之要藥也。胸中者。肺之分也。肺寒則金失下降之性。氣壅於胸中而滿也。滿則氣上。所以咳逆上氣之症生焉。其主之者。辛散溫行也。中者土也。土虛則寒。而此能溫之。止血者。以陽虛陰必走。得煖則血自歸經也。出汗者。辛溫能發散也。逐風溼痺者。治寒邪之留於筋骨也。治腸癖下痢者。除寒邪之陷於腸胃也。以上諸治。皆取其雄烈之用。如孟子所謂剛大浩然之氣。塞乎天地之間也。生則辛昧渾全。故又申言曰。生者尤良。即金匱治肺癰。用甘草乾薑湯。自註炮用。以肺虛不能驟受過辛之味。炮之使辛味稍減。亦一時之權宜。非若後世炮黑炮灰。全失薑之本性也。葉天士亦謂炮黑入腎。何其陋歟。【清】黃元御長沙藥解論乾薑曰。乾薑燥溼溫中。行鬱降濁。補益火土。消納飲食。暖脾胃而溫手足。調陰陽而定嘔吐。下衝逆而平咳嗽。提脫陷而止滑泄。【清】黃宮繡本草求真論乾薑曰。乾薑其味本辛。炮制則苦。大熱無毒。守而不走。凡胃中虛冷。元陽欲絕。合以附子同投。則能回陽立效。故書則有附子無薑不熱之句。與仲景四逆白通姜附湯皆用之。且同五味。則能通肺氣而治寒嗽。同白朮。則能燥溼而補脾。同歸芍。則能入氣而生血。故凡因寒內入。而見臟腑痼蔽。關節不通。經絡阻塞。冷痺寒痛。反胃隔絕者。無不藉此以爲拯救。除寒炒黑。其性更純。味變苦鹹。力主下走。黑又止血。辛熱之性雖無。而辛涼之性尚在。故能去血中之鬱。熱而不寒。止吐血之妄行而不滯。較之別藥。徒以黑能止血爲事者。功勝十倍矣。血寒者可多用。血熱者不過三四分。爲鄉導而已。白淨結實者良。毋喜嗤乾者爲乾薑。【清】賈九如辨藥指南論乾薑曰。乾薑乾久。體質收束。氣則走泄。味則含蓄。比生薑辛熱過之。所以止而不行。專散裏寒。如腹痛身涼作

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瀉。完穀不化。配以甘草。取辛甘合化爲陽之義。入五積散。助散標寒。治小腹冷痛。入理中湯。定寒霍亂。止大便溏瀉。助附子以通經。寒大有回陽之力。君參朮以溫中氣。更有反本之功。生薑主散。乾薑主守。一物大相逕庭。孕婦勿用。

國外學說 英美學說謂乾薑產中國、印度及西印度羣島等地。根可入藥。第須刮去外皮令乾。如不刮去外皮。則謂之黑薑。刮去外皮。則謂之白薑。古時羅馬人疑薑爲胡椒之根。因其味與胡椒略同。西國常出售之黑薑。係從東印度運來。此薑多種植於印度平原與山上各處。白薑則從西印度運來。白薑黑薑俱有香辛之味。如以水或濃酒浸之。則其藥性之實自能消化而出。其醫治作用。爲安胃暖性之香藥。能爲引炎取嚏。生津藥。又能爲行氣補胃藥。祛風藥。如傷食胃中發氣或胃難消化。宜服之。兼能療治血滯身冷等症。入鼻則能作嚏。入口則能令喉熱生津液。入胃則能令內皮發暖。行血第此藥除肚疼氣脹外。獨用之處甚少。大抵多借別藥而作補劑。與瀉劑同服。能止瀉藥之烈。而瀉時之肚疼可免。外用能作漱水。治喉鬆處方。乾薑四錢。搗爛。沸水十二兩四錢四分。浸半點鐘。濾淨。宜乘熱服。治肚疼氣脹。或輕痢症。服此亦效。每服一兩至二兩。(乾薑泡水方。)

辨僞 (一)鄭肖巖曰。土北薑溫州所產。質鬆不結。味淡不辛。又有一種洋北薑。氣味尤劣。更不可用。按北乾薑氣味辛溫。其色黃白兼見。乃手足太陰之溫藥也。凡製乾薑炮薑。當以三衢開化產者爲佳。用母薑水浸晒乾。以肉厚而白淨。結實明亮。如天麻者良。故又名白薑。近今藥肆。且有以傷水變味之生薑。晒乾炮用。未免有名無實。談人匪淺。(二)曹炳章曰。按乾薑湖南均州出小雙頭內白色。爲均薑最佳。浙江台州出者。爲台薑。個小肉黃黑色者次。其他江南、江西、寧國、四川皆出。總要個大堅實。內肉色白爲佳。

配合應用 (一)治血脫色白面天不澤。脈濡者。此大寒也。宜乾薑之辛溫以益血。大熱以溫經。須炒黑用。(二)治脾胃虛弱。飲食減少。易傷難化。無力肌瘦。用乾薑類研四兩。以白鑞切塊。水浴過。入鐵銚溶化。和丸梧子大。每空心米飲下三十丸。(三)治頭章吐逆。胃冷生痰。用炮薑二錢。半炙草一錢二分。水一鍾半。煎減半服。(四)治中寒水瀉。炮薑研末。粥飲服二錢。(五)治寒痢青色。乾薑切如豆大。每米飲服六七枚。日三夜一。累用得效。(六)治血痢不止。乾薑燒黑存性。放冷爲末。每服一錢。米飲下。神效。(七)治脾寒瘧疾。乾薑炒黑爲末。臨發時。以溫酒服三錢匕。(八)治胸滿咳逆上氣。乾薑生用同橘皮、烏藥、白豆蔻。(九)乾薑、紫蘇、桂枝。能溫中出汗。加朮則能逐風溼痺。(十)治下利。寒冷腹痛。用乾薑、朮、茯苓、人參、甘草。(十一)治產後惡露不盡。血虛發熱。用乾薑炒黑。同生地黃、白芍藥。當歸、牛膝。(十二)治腸澼下血。用乾薑、生地黃、白芍藥、麥門冬、人參、黃耆、甘草、升麻。(十三)治中惡。用乾薑、麝香、縮砂、橘皮、紫蘇、木香。去木香加木瓜。則治霍亂腹滿。加桂枝。幷治風邪諸毒。皮膚間結氣。(十四)治胃虛嘔逆。乾薑、橘皮、人參。(十五)治痰癖久不愈。用乾薑、橘皮、朮、貝母、茯苓。(十六)治寒瘧。用乾薑、人參、朮、桂枝、橘皮。(十七)治虛寒泄瀉。中寒作泄。用乾薑、人參、朮、甘草。

用量 三分至一錢。

施用宜忌 乾薑大辛。能散氣走血。久服損陰傷目。陰虛內熱。陰虛咳嗽。吐血衄血。虛有熱汗出。自汗盜汗。臟毒下血。因熱嘔惡。火熱腹痛等症。禁用。惡黃芩、黃連。夜明砂、秦椒爲之使。

著名方劑 (一)大順散。治胃暑伏熱。引飲過多。脾胃受濕。水穀不分。霍亂吐瀉。臟腑不調。(局方)乾薑四斤。甘草三十斤。(剉寸長)杏

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

仁（去皮尖）肉桂（去粗皮）各四斤。先將甘草用白砂糖炒及八分黃熟。次入乾薑同炒。令薑裂。次入杏仁又同炒。候不作聲。爲度。篩淨。後入肉桂一處搗爲散。每服二錢。水煎溫服。如煩燥。井花水調下。不拘時。沸湯調亦得。㊁乾薑人參半夏湯。治妊娠嘔吐不止。（金匱方）乾薑、人參各一兩。半夏二兩。上三味。末之。生薑汁和丸。梧子大。每服十丸。

參攷資料 ㊀乾薑。大辛大熱。陽中之陽。其用有四。通心助陽一也。去臟腑沉寒痼冷二也。發諸經之寒氣三也。治感寒腹痛四也。腎中無陽。脉氣欲絕。黑附子爲引。水煎服之。名薑附湯。亦治中焦寒邪。寒淫所勝。以辛散之也。又能補下焦。故四逆湯用之。乾薑本辛。炮之稍苦。故止而不移。所以能治裏寒。非若附子行而不止也。理中湯用之者。以其回陽也。（張元素）㊁乾薑。生辛。炮苦。陽也。生則逐寒邪而發表。炮則除胃冷而守中。多用則耗散元氣。辛以散之。是壯火食氣故也。須以生甘草緩之。辛熱以散裏寒。同五味子用。以溫肺。同人參用。以溫胃也。（李杲）㊂乾薑心脾二經氣分藥也。故補心氣不足。或言乾薑辛熱而言補脾。今理中湯用之。言泄不言補。何也。蓋辛熱燥溼。泄脾中寒溼。邪氣。非泄正氣也。又云服乾薑以治中者。必僭上。不可不知。（王好古）㊃乾薑入肺中。利肺氣。入腎中。燥下溼。入肝經。引血藥生血。同補陰藥。亦能引血藥入氣分。生血。故血虛發熱。產後大熱者。用之。止唾血。痢血須炒黑。用之有血脫色白而天不澤脉懦者。此大寒也。宜乾薑之辛溫以益血大熱。以溫經。（朱震亨）㊄乾薑孕婦不可食。令胎內消。蓋其性熱而辛散故也。（李時珍）㊅乾薑如懼性散。炒黃用。或炒微焦。市醫將其泡淡用之。殊屬可笑。（吳瀏程）㊆薑留皮則冷。去皮則熱。非皮性本冷也。蓋留皮則行表而熱去。去皮則守中而熱存耳。（朱丹溪）㊇造乾薑法。選取母薑無筋者。水漚三日。用竹刷去皮。洗淨。風日透乾。以堅爲度。除夕製此最良。惟天陰雨雪。難免凍壞耳。他時製者力邇。用時水洗剉細。藥舖製法。與此不同。不分母薑子薑。投滾水中。煮片刻。卽取出。晒乾。石灰粉之。收貯販賣。以此要利。愼勿用之。又有寒製乾生薑。亦不分其母子。但切作錢片。晒乾收藏。於小寒大寒三十日中製之。故云此種質軟輕虛。氣味俱減。然勝於湯灰乾薑遠矣。缺時可倍用之。本草綱目引張元素語曰。乾薑本辛。炮之稍苦。故止而不移。李杲曰。乾薑生辛炮苦。朱震亨曰。止唾血痢血。須炒黑用之。三說皆非。蓋乾薑之味本辛。何來苦味。所以苦者。卽炮炒焦黑之變。非本味也。物經焦黑。無不變苦。豈獨乾薑哉。故用炒焦乾薑者。與不用同。（和漢藥考）㊈整塊晒乾者。日本藥舖呼爲麻留乾薑。切片晒乾者。呼爲乾生薑。俱佳。色白。味甚辛上品也。又三河乾薑。形瘦小。外白肉赤。如餳。辛味較薄。不及前二種。製法。秋冬之交。取老薑肥大者。水浸洗過。候天晴。刮去皮。或切片。晒乾。若一時難乾。入磁器。烘之亦可。或云。乘中製者。不堪用。以其極不易乾。兼易凍壞。其氣味俱損故也。（古方藥品考）㊉乾薑以白淨結實者爲佳。來自外國者。無此貨。日本參州遠州出者。名三河乾薑。其色白。以石灰收貯故也。用時宜洗去石灰。黑薑一名炮薑。乾生薑藥舖亦多。或誤作乾薑用之。非生薑。方書以嫩根爲子薑。或稱紫薑。其老根爲母薑。（日用藥品考）㊋養老新書曰。老人和脾胃。氣進飲食。止痰逆。療腹痛。調中氣。莫如用木香人參散。方用木香半兩。人參去蘆頭半兩。甘草半兩。炒。乾薑半兩。炒。陳皮半兩。去穰。茯苓去黑皮一分。白朮半兩。微炒。枇杷葉去毛一分。厚朴去粗皮。用生薑汁製丁香半兩。凡十二味。秤準分兩。搗羅爲末。每服二錢。水一盞。入生薑一片。棗二枚。同煎至六分。去滓。溫服。此男子婦女通用之方也。方中厚朴無分量。大約與丁香相等耳。（錄續見陽漫錄）

【乾歸】卽當歸之古籍別名。典見本經。詳『當歸』條。

【乾雞筋】卽淫羊藿之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『淫羊藿』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【乾藕節】卽藕節陰乾者之別名。詳『藕節』條。

【乾蟾】卽蟾蜍晒乾者之別名。詳『蟾蜍』條。

【乾蟾腹】卽蟾蜍之處方用名。詳『蟾蜍』條。

【乾鵲】卽鵲之新語名。詳『鵲』條。

【乾蠍】卽全蠍晒乾者之別名。詳『全蠍』條。

【偃鼠】卽隱鼠之古籍別名。典見綱目。詳『隱鼠』條。

【假君子】卽牽牛子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牽牛子』條。

【假油柑】卽眞珠草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『眞珠草』條。

【假建】卽煙草之葉絲非福建產者。性質功能。詳『煙草』條。

【假素馨】**原名**　青藤仔。

產地　出粵中。

形態　假素馨爲藤屬之一種。葉長三四寸。多芒刺。莖大如指。而堅勁似柳條。其花可供藥用。

主治　煎湯洗疥癬。

【假蘇】卽荊芥之原名。詳『荊芥』條。

【假豬蝶】卽海螺之古籍別名。典見綱目。詳『海螺』條。

【偏桃核】卽桃實之肉薄而尖頭偏。狀如月牙形。仁似新羅桃實者。性質功能。與尋常桃實同。詳『桃』條。

【偏精】卽黃精葉偏生不對節者之別名。性質功能。詳『黃精』條。

【做打麻】卽番打馬之別名。性質功能。詳『番打馬』條。

【側子】**命名**　本品生於附子之側。故名。

處方用名　製側子。

古籍別名　荊子（許慎）

基本　屬毛茛科。爲附子根旁之塊根。

採取　八月間須在附子邊側間削取之。

用法　水煮蒸洗。或剉末用。

性質　辛。大熱。有毒。

效能　療脚氣。治頑痺。用作麻醉性之麤風燥溼藥。

主治　癰腫風痺。歷節。腰脚疼冷。寒熱。風瘧。及墮胎。

歷代記述攷證　【南北朝】雷敎雷公藥對論側子曰。冷酒調服。治遍身風癩神妙。【唐】甄權藥性本草論側子曰。療脚氣。冷風溼痺。大風筋骨攣急。【淸】黃宮繡本草求眞論側子曰。側子速生附側。宜於發散四肢。故治手足風溼諸痺。其功皆與附子補散差殊。【淸】汪訒庵本草備要論側子曰。側子散側旁生。宜於發散四肢。充達皮毛。治手足風溼諸痺。

用量　五分至八分。

施用宜忌　凡無風寒溼邪者禁用。

參攷資料　㊀唐元希聲侍郎治癱瘓風有側子湯。見外臺祕要。（李時珍）㊁此附子邊角之大者。削取之。昔時不用。比來醫家以療腳氣多驗。（陶弘景）㊂側子附子。皆是烏頭下旁出者。以小者爲側子。大者爲附子。今以附子角爲側子。理必不然。若當陽以下江左山南嵩高齊魯間。附子時復有角。如大豆許。襄州以上劍南所出者。附子之角。但如黍粟。豈可充用。比來都下皆用細附子。有效。未嘗取角也。（蘇恭）

【側生】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【側金盞花】卽黃蜀葵之古籍別名。典見綱目。詳『黃蜀葵』條。

【側柏子仁】**原名**　柏實。

命名　葉扁而側生。故曰側柏。

古籍別名　栝仁。柏子仁。（和漢藥考）

基本　係屬松杉科側柏之核仁。

產地　陳仁山藥物生產辨云。產山東兗州府。九月新。

形態　本品作倒卵圓形。大四五分許。內有黃白之仁。如麥粒大。



側柏子仁

採取　每年九月採。晒乾。

製法　雷敎曰。凡使先以酒浸一宿至明。漉出。晒乾。用黃精自然汁。於日中煎之。緩火煮成膏爲度。每煎柏子仁三兩。用酒五兩浸。李時珍曰。此法是服食家者用。尋常用只蒸熟。曝裂。日舂簸取仁。炒研入藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　甘。平。無毒。

效能　補心脾。潤血脉。用作滋養强壯藥。

主治　療恍惚。虛損吸吸。歷節腰中重痛。益血止汗。驚悸。益氣。除風溼。安五臟。久服令人潤澤。美色。耳目聰明。不飢不老。輕身延年。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論柏實曰。治頭風腰腎中冷。膀胱冷。濃宿水。與陽道益壽。去百邪鬼魅。小兒驚癎。【元】王好古湯液本草論柏實曰。潤肝。【明】李時珍本草綱目論柏實曰。養心氣。潤腎燥。安魂定魄。益智寧神。燒灑澤頭髮。治疥癬。【明】繆希雍本草經疏論柏實曰。柏感秋令。得金氣。其實堅而氣極芬芳。故其實味甘平無毒。甄權加辛亦應有之。其主驚悸者。心藏神。腎藏精與志。心腎兩虛。則病驚悸。入心故養神。入腎故定志。神志得所養而寧定。則其證自除矣。芬芳則脾胃所喜。潤澤則肝腎所宜。故能安五臟。皆安。則氣自益矣。心主五色。耳爲腎竅。目爲肝竅。如以久服氣專。其力倍。豈不令人潤澤美色。耳目聰明。不飢不老。輕身延年哉。惟除風溼痺之功。非潤藥所能當。是藥之能事耳。別錄療恍惚。即驚悸之漸也。虛損吸吸。精氣微也。歷節腰中重痛。肝腎不足也。汗乃心液。心主血。益陰血。則諸證悉瘥矣。【清】黃宮繡本草求眞。論柏實曰。柏子仁辛甘平潤。考書俱言四臟皆補。究之止屬心藥耳。蓋香雖能補脾。而實可以通竅而入心。潤雖可以補肝。而益腎。而實可以寧神而定志。甘雖足以和胃而固中。而實足以益血而神守。是以風溼可除。驚癎可療。邪魅可辟。皮膚可澤。惟見神悟氣通。耳聰目明。而無枯槁燥塞之患矣。然性多潤滑。陰寒泄瀉者切忌。氣多香洩。體虛火盛者亦忌。若云不飢不老。延年輕身。雖出經典。仍當活視。毋爲書執。蒸熟暴乾。自裂入藥。炒。【清】黃元御玉楸藥解。論柏實曰。柏子仁辛香甘濡。乘燥金斂肅之氣。而體實。則極滋潤。能收攝神魂。寧安驚悸。滑腸開祕。棄肝起瘾。明目聰耳。健膝强腰。澤潤。舒筋斂血。止汗燥。可泄瀉。亦清風至善之品。蒸曬舂簁。取仁。炒研。燒灑取油。光澤鬚髮。塗抹癬疥。搽黃水瘡。溼最效。

配合應用　㊀服柏實法。九月連房取實。暴收去殼。研爲細末。每服二錢。溫酒下。一日三服。渴卽飲水。令人悅澤。一方加松子仁等分。以松脂和丸。一方加菊花等分。蜜丸服。

㊁治老人虛閉。柏子仁、松子仁、大麻仁等分同研。鎔蜜蠟丸梧子大。以少黃丹湯食前服二三十丸。日二服。(寇宗奭方)

㊂治小兒驚啼驚癎。腹滿。大便青苔色。用柏子仁末。溫水調服一錢。(聖惠方)

㊃陸氏積德堂方。治黃水溼瘡。眞柏油二兩。熬稠。搽之如神。(聖惠方)

㊄治腸風下血。柏子仁十四粒。搥碎。甕貯。浸好酒三盞。煎八分服。立止。(普濟方)

用量　一錢至三錢。

施用宜忌　凡便瀉多痰者禁用。畏菊花、羊蹄草。

著名方劑　柏子仁丸。治經行復止。血少神衰。用柏子仁(去油)牛膝(酒浸)各五錢。澤蘭、續斷各二兩。熟地黃一兩。蜜丸。米飲下。

參攷資料　㊀柏取濫以療馬癘疥。今未見用。松濫者。老人虛祕。柏子仁、大麻子仁、松子仁等分同研。溶白蠟丸。桐子大。以少黃丹湯服二三十丸。食前。嘗官陝西。每登高望之。雖千萬株。皆一一西指。蓋此木爲至堅之木。不畏霜雪。得木之正氣。他木不逮也。所以受金之正氣所制。故一一向之。(寇宗奭)㊁柏子仁性平。而不寒不燥。味甘而補。辛而能潤。其氣清香。能透心腎。益脾胃。蓋仙家上品藥也。宜乎滋養之劑用之。列仙傳云。赤松子食柏實。齒落更生。行及奔馬。諒非虛語也。(李時珍)㊂金匱竹皮大丸。治乳婦中虛煩亂。嘔逆煩喘者。加柏實一分。以其清金降逆而止煩嘔也。徐忠可云。神哉喘加柏實。柏每西向。得西方之氣最清。故能益金。潤肝木而養心。則肺不受燥。喘自平也。按酸棗仁。本經主治心腹寒熱。邪結氣聚。四肢痠痛。溼痺。而柏子仁。則主除風溼痺。安五臟。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

均是仁也。而所治大略相同如此。方書安心之藥。每用棗仁。補心之丹。不遺柏仁一方之中。往往連類而及。想有同等功效之故歟。（黃元御）

【側柏子殼】 主治 解砒霜如神。用三錢炒紅。土三錢同研爲末。用雞子清調服。服後作一寒顫。卽愈。重者不過兩服。

【側柏油】 基本 係屬松杉科之側柏爲該樹所榨取之油脂。

產地 側柏油各省境內均有產。惟產於山西者最佳。

形態 本品受熱極易成溶液。冷則成結晶狀之塊。粒並耀烏黑色之瑩光。氣若松香。取之可供塗敷。與藥用。

主治 諸癬。癰毒。赤遊丹。禿瘡。頭面耳部黃水瘡。

參考資料 ㊀身面疣目。同松脂研勻塗之。數夕自失。（聖惠）㊁本品殺蟲力最強。如壁蟲匿藏板壁之空隙處。祇須滴少許於板壁縫內。蟲卽盡死。㊂此物以竹簽挑之。懸絲不斷者爲眞。

【側柏炭】 卽側柏葉焙炒成炭者之處方用名。詳『側柏葉』條。

【側柏枝節】 主治 煮汁釀酒。去風痺歷節風。燒取豬油。療瘡疥及蟲癩良。

配合應用 ㊀治霍亂轉筋。以煖物裹脚。後以柏木片煮湯淋之。（經驗方）

㊁治齒齲腫痛。取柏枝燒熱。拄孔中。須臾蟲緣枝出。（聖惠方）

㊂治惡瘡有蟲。久不愈者。以柏枝節燒瀝取油。敷之。三五次無不愈。亦治牛馬疥。（陳永本草方）

【側柏根白皮】 性質 苦。平。無毒。

效能 涼血液。生毛髮。

主治 火灼爛瘡。

配合應用 熱油灼傷。柏白皮以臘豬脂煎油。塗敷瘡上。（肘後方）

【側柏葉】 原名 扁柏葉。

命名 柏有多種。入藥宜用葉扁而側生者。故名。

處方用名 側柏炭。扁柏葉。柏葉汁。

古籍別名 㯳葉（綱目）。㯳柏葉（和漢藥考）

外國名詞 Leaf of Arbor-vitae.（英）

基本 爲松杉科側柏樹之葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。扁柏中國各省有出。廣東各屬均有。但以清遠爲多。功用行氣祛風利小便。行瘀血。

形態 側柏爲山野之常綠樹。本品作小鱗狀。酷類檜葉。

製法 雷敩曰。凡用採去兩畔并心枝子。用糯泔浸七日。以酒拌蒸一伏時。每一斤用黃精自然汁十二兩。浸焙。又浸又焙。待汁乾用之。李時珍曰。此服食治法也。常用或生或炒。各從本方。

性質 苦。微溫。無毒。

成分 主要素爲 pinipicrin, thujin, 餘爲揮發油。樹脂。單寧酸。

效能 涼血止血。去風。理濕。用作婦人崩漏及吐衄之止血藥。亦爲淋疾之利尿藥。

作用 入胃後。略能促進胃分泌。同時又能防止其過量之醱酵入腸。能增加腸之斂性。至血中稍有收縮血管凝固血球之功。

主治 吐血。衄血。崩血。崩中赤白。輕身益氣。令人耐寒暑。去濕痺生肌。

歷代記述攷證 【唐】甄權：柏葉性本草論側柏葉曰。治冷風。歷節疼痛。止尿血。【宋】大明：日華諸家本草論側柏葉曰。炙暑凍瘡。燒取汁塗頭。黑潤髮。【宋】蘇頌：嘉祐圖經本草論側柏葉曰。傳：湯火傷止痛滅瘢。服之療蠱痢。作湯常服。殺五臟蟲。益人。【明】：繆希雍：本草經疏論側柏葉曰。側柏葉味苦而微溫。義應竝於微寒。故得主諸血崩中赤白。若夫輕身益氣。令人耐寒暑。則略同於柏實之性矣。惟生肌去濕痺。乃其獨擅之長也。【清】：黃宮繡：本草求眞論側柏葉曰。側柏葉苦澁微寒。書言養陰滋肺燥土。然稟受西金。堅勁不凋。服此大能伐胃。雖有止血涼血之功。而氣味與血分無涉。不過伏金氣以制木。借炒黑以止血耳。別錄稱爲補益。似屬未是。但塗湯火傷損。生肌殺蟲。炙暑凍瘡。汁染鬚髮最佳。酒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

浸或炒或生用。

國外學說　英美學說謂側柏產中國西國等處。取該樹之葉與子。可爲藥品。然惟葉扁而側生者。始可入藥用。其子之功用。能利小便。行氣。祛風。主治白淋。臌症。作泡水或服油酒等。處方以側柏子一兩。或用葉亦可。水十六兩。泡一刻鐘。濾渣爲度。分三次服。能利小便。治老人小便閉甚效。（側柏泡水方）又側柏子四錢。麥糵八兩。甘菊二錢。煮糊乘熱敷之。凡毒瘡初腫未潰者。以側柏子搗爛。和別藥塗之最良。（側柏子糊方）

配合應用　㊀服松柏法。孫眞人枕中記云。嘗以三月四月採新生松葉。長三四寸許。幷花蘆陰乾。又於深山巖谷中。採當年新生柏葉。長二三寸者。陰乾爲末。白蜜丸如小豆大。常以日未出時。手持八十一丸。以酒下。服一年。延十年命。服二年。延二十年命。欲得長肌肉。加大麻巨勝。欲心力壯健者。加茯苓。人參。此藥除百病。益元氣。滋五臟。六腑。清明耳目。强壯不衰。老延年益壽。神驗。用七月七日露水丸之更佳。

㊁神仙服餌。五月五日。採五方側柏葉三斤。遠志去心二斤。白茯苓去皮一斤。爲末。煉蜜和丸。梧子大。每以仙靈脾酒下三十丸。日再服。並無所忌。勿示非人。

㊂治中風不省。涎潮口禁。語言不出。手足躁曳。得病之日。便進此藥。可使風退氣和。不成廢人。用柏葉一握。去枝。葱白一握。連根研如泥。無灰酒一升。煎一二十沸。溫服。如不飲酒。分作四五服。方進他藥。（楊氏家藏方）

㊃治時氣瘴疫。社中西南柏樹東南枝。取葉乾研末。每服一錢。新水調下。日三四服。（聖惠方）

㊄治霍亂轉筋。柏葉搗爛。裹脚及煎汁淋之。（聖惠方）

㊅治吐血不止。用柏葉米飲。服二錢。或蜜丸。或水煎服並良。（聖惠方）

㊆治衄血嘔血。煩滿少氣。胃中疼痛。柏葉爲散。米飲調服二方寸匕。（聖惠方）

㊇治衄血不止。柏葉、榴花研末吹之。（普濟方）

㊈治小便尿血。柏葉、黃連焙研。酒服三錢。（濟急方）

㊉治大腸下血。隨四時方向採側柏葉燒研。每米飲服二錢。王渙之舒州病此。陳宜父大夫傳方。二服愈。（百一選方）

㊀治酒毒下血或下痢。嫩柏葉九蒸九晒。二兩。陳槐花炒焦。一兩。爲末。蜜丸。梧子大。每空心溫酒下四十丸。（普濟方）

㊁治蠱痢下血。男子婦人。小兒大腹下黑血。茶脚色。或膿血如淀色。柏葉焙乾爲末。與黃連同煎爲汁服之。（圖經方）

㊂治小兒泄痢。柏葉麥汁。代茶飲之。（經驗方）

㊃治月水不斷。側柏葉炙、芍藥等分。每用三錢。水酒各半煎服。室女用側柏葉、木賊炒微焦。等分爲末。每服二錢。米飲下。（聖濟方）

㊄治湯火燒灼。柏葉生擣塗之。立定。二三日止痛滅癒。（圖經方）

㊅治風瘡核痛。未成膿。以柏葉擣塗。煞鹽熨之。氣下卽消。（姚僧坦集驗方）

㊆治大風癩疾。眉髮不生。側柏葉九蒸九晒爲末。煉蜜丸。梧子大。每服五丸至十丸。日三夜一。服百日卽生。（聖惠方）

㊇治頭髮不生。側柏葉陰乾作末。和麻油塗之。（梅師方）

㊈治頭髮黃赤。生柏葉末一升。猪膏一斤。和丸彈子大。每以布裹一丸。納泔汁中。化開沐之。一月色黑而潤矣。（聖惠方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無溼熱者禁用。畏菊花、羊蹄、礬石及麵麴、瓜子、牡蠣、桂爲之使。

著名方劑　柏葉湯。治吐血不止。（金匱方）柏葉乾薑各三兩。艾三把。上三味。以水五升。取馬通汁一升。合煮。取一升。分溫再服。

參攷資料　㊀柏性後凋而耐久。稟堅凝之質。乃多壽之木。所以可入服食。道家以之點湯常飲。元旦以之浸酒。辟邪。皆有取於此。蘇食之而體香。毛女食之而體輕。亦其證驗矣。毛女者。秦王宮人。關東賊至。驚走入山。飢無所食。有一老公。教喫松柏葉。初時苦澀。久乃相宜。遂不復飢。冬不寒。夏不熱。至漢

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成帝時。獵者於終南山見一人。無衣服。身生黑毛。跳坑越澗如飛。乃密圍獲之。去秦時二百餘載矣。事出葛洪抱朴子書中。（李時珍）㊁史記言松柏爲百木之長。其樹聳直。其皮薄。其肌膩。其花細瑣。其實成球狀。如小鈴。霜後四裂。中有數子。大如麥粒。芬香可愛。柏葉松身者檜也。其葉尖硬。亦謂之梔。今人名圓柏。以別側柏。松葉柏身者縱也。松檜相半者檜柏也。峨嵋山中一種竹葉柏身者。謂之竹柏。（李時珍）

【側柏癮】卽柏癮之別名。詳『柏癮』條。

【側梨】卽陟釐之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『陟釐』條。

【兜木香】卽返魂香之別名。性質功能詳『返魂香』條。

【兜納香】性質　辛。平。無毒。

主治　溫中。除暴冷。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論兜納香曰。惡瘡腫瘍止痛。生肌。並入膏用。燒之辟遠近惡氣。帶之夜行。壯膽安神。與茅香柳枝煎湯浴小兒。易長。

【兜娑婆香】㊀卽檀香之古籍別名。典見綱目。詳『苘香』條。㊁卽薰香之古籍別名。典見楞嚴經。詳『薰香』條。

【兜鈴苗】卽馬兜鈴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬兜鈴』條。

【剪刀草】產地　生建昌。

形態　獨莖高尺許。對葉尖長。微似鳳仙花葉而無齒。面綠背青白。梢端抽長條。結黃實。如薏仁而小。層緻如穗而疏。可供藥用。



剪刀草

泰弦資料　兜納香氣味甘溫。（陳藏器）

【兜婆香】㊀卽檀香之古籍別名。典見綱目。詳『苘香』條。㊁卽薰香之古籍別名。典見楞嚴經。詳『薰香』條。

【剪紅羅】卽蔊春羅之古籍別名。典見綱目。詳『蔊春羅』條。

【剪草】產地　生山澤間。

形態　剪草爲莧草類之一種。其葉似茗而細。狀如茜草。又如細辛。或謂卽茜草。其根可供藥用。

採取　二月三月。採根曝乾用。

性質　苦。涼。無毒。

主治　諸惡瘡疥癬。風瘙瘙蝕有蟲。浸酒服。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論剪草曰。主一切失血。

泰弦資料　㊀上部血。須用剪草、牡丹皮天門冬、麥門冬。（張元素）㊁許學士本事方云。剪草治勞瘵。吐血損肺。及血妄行。名曰神傳膏。其法每用一斤。淨洗晒爲末。入生蜜二斤。和爲膏。以器盛之。不得犯鐵器。一日一熬。九熬九曝。乃止。病人五更起。面東坐。不得語言。以匙抄藥四匙。食之。良久。以稀粟米飲壓之。藥只冷服。米飲亦勿太熱。或吐或否。不妨。如久病肺損咯血。只一服愈。尋常嗽血妄行。每服一匙可也。有一貴婦病瘵。得此方九日藥成。前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥。次日將服藥。置土墜器中。不可用。再合成。將服爲籍覆器。又不得食。再合未就而夫人卒矣。此藥之異有如此。若小小血妄行。只一啜而愈也。此藥絕妙若此。而世失傳。惜哉。（李時珍）

【剪金子】卽王不留行之古籍別名。典見諸家本草。詳『王不留行』條。

【剪金花】卽王不留行之古籍別名。典見諸家本草。詳『王不留行』條。

【剪刀草】卽玉如意之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉如意』條。

【剪金子】卽王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王不留行』條。

【勒佉】卽紫鑌之古籍別名。典見綱目。詳『紫鑌』條。

【勒母】卽貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝母』條。

【勒草】卽葎草之古籍別名。典見別錄。詳『葎草』條。

【勒馬宣】卽大戟之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大戟』條。

【勒魚】命名　本品魚腹有硬刺。勒人。故名。

古籍別名　鰳（動物辭典）乾者名勒魚（綱目）

基本　係脊椎動物魚類喉齶類鯣科。爲勒魚之肉。

產地　出東南海中。

形態　勒魚爲鱗類之一種。其形似鯽。亦似鯊。鱗呈櫛狀。眼大下

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

顎比上顎長。口略向上。殆無齒脊。鰭小。胸臀鰭亦小。尾分叉。肉可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 開胃暖中。作煮尤良。

【勒魚鰓及脊骨】主治 癌疾。以一寸入七竅。飲酒水各半煎。露一夜服。

【勒魚】 卽勒魚之乾者。與見綱目詳『勒魚』條。

【瓠瓜】 卽壺蘆實之無柄而圓大形扁者。性質功能。詳『壺蘆』條。

【區余】基本 區余爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 辛。無毒。

主治 心腹熱癰。

【參三七】 卽三七之處方用名。詳『三七』條。

【參貝陳皮】 卽橘皮用參貝製成者。詳『橘皮』條。

【參果根】古籍別名 蓼。鼠蓼。鹿蒲。(別錄)

形態 參果爲雜草類之一種。根生百餘。根根有衣裹莖。可供藥用。

採取 三月三日採根。

性質 苦。有毒。

主治 鼠瘻。

【參軍肉】 卽豬肉之古籍別名。與見崔豹古今注。詳『豬肉』條。

【唵叭香】 卽藏香之別名。性質功能。詳『藏香』條。

【啄木鳥】命名 本品斲裂樹木取其蠹食。故名。

古籍別名 斲木鳥。(爾雅)鴷。(綱目)青鴷。(動物辭典)赤色者名山啄木鳥。(圖經本草)

外國名稱 Pious sp.(拉丁) Wood-pecker(英) Specht(德) キツツキ或アヲゲラ(日本)

基本 屬脊椎動物鳥類攀禽類啄木鳥科。

產地 出山林間。及原野之樹洞中。

形態 啄木鳥爲林禽類之一種。其嘴尖直而堅。嘴根有剛毛。接於額而開鼻孔。舌細長。尖端具逆鉤。伸縮自如。體之上面概青色。雄之頭部紅色。雌者灰色。眼下有紅斑。翼羽稍帶黃。手翼暗褐。而外翈有多數白斑。腰部有鮮黃斑。體下淡綠。有暗色橫斑。尾羽軸剛直。上嘴綠。下灰色。脚短。二趾前。二趾後。皆具尖銳之鉤爪。便於攀木。常叩樹幹。覓蠹食之。其肉可供食與藥用。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 痔瘻及牙齒疳蟲。蟲牙。燒存性。研末。納孔子中。不過三次。

歷代記述 【明】李時珍本草綱目論啄木鳥肉曰。追勞蟲。治風癇。

參攷資料 ㊀淮南子云。啄木愈齲。以類相攝也。荊楚歲時記云。野人以五月五日取啄木主齒痛。(劉禹錫)㊁追勞治癇。皆取制蟲義也。(李時珍)

【啄木鳥舌】主治 齲齒作痛。以綿裹尖。咬之。

【啄木鳥血】主治 庚日向西熱飲。令人面色如朱。光彩射人。

【商陸】原名 蓫。募。

命名 本品能逐蕩水氣。故曰蓫募。訛爲商陸。又訛爲當陸。北音訛爲章柳。或云枝枝相值。葉葉相當。故曰當陸。或云多當陸路而生也。

處方用名 商陸根。

古籍別名 夜呼。(本經)當陸。白昌。(開寶)章柳根。(圖經)馬尾。(廣雅)莧陸。(易經)昌陸。章陸。鹿神。文章柳。牛舌根。杜大黃。樟柳根。(和漢考藥)

外國名稱 Radix Phytolaccae. (拉丁)

基本 屬商陸科。爲山牛蒡之根。

產地 凡山野川谷間之陰地恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。商陸產廣東清遠。

形態 商陸爲多年宿根草。莖高三四尺。葉互生。爲長卵圓或長橢圓形。似菘葉而小。且有光澤。夏日莖梢葉腋間。開有梗無萼之小白花。作總狀花序排列。果實爲漿果。色紫黑。其根形似蘿蔔根。外面淡褐色。內部灰白色。出售者多截作三寸許。再切成片。日本藥局方載入商陸。略謂商陸係採其根莖。乾而用之。根頗彎曲。縱載面有汚白色之條紋。紋皆隆起。似行行排列。其左右兩面。被以似紅似白之

193／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

外皮。橫切片有屈曲凹凸之輪層。性柔韌。不易破折。內色白。帶粉性。無甚臭味云。但第四版改正。已刪去。（和漢藥考）



商陸

採取 二月八月採根日乾。

製法 雷敩曰。取花白者根。銅刀刮去皮。薄切。以東流水浸兩宿。漉出。絞乾。蒸以黑豆葉一重。商陸一重。如此蒸之。從午至亥取出去豆葉。曝乾。剉用。無豆葉。以豆代之。

性質 辛平有毒。

成分 商陸根中有毒成分。名曰費脫拉克託克辛（Phytolacctoxin. $C_{21}H_{30}O_8$）。爲無結晶之華爾斯。水不能溶解。遇酒精即全溶解。然加水冲淡。則再起沈澱。此有毒成分。在商陸根中。約含有四%至五%。析出之後。以水製成越幾斯。行生理之試驗。毫無效果。復試以酒製越幾斯。則功效顯著。

效能 大瀉臟腑水飲。專作利尿藥。

主治 水腫疝瘕痺熨。除癰腫。殺鬼精物。（本經）療胸中邪氣。水腫瘕痺腹滿。洪直疏五臟。散水氣。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論商陸曰。瀉十種水病。喉痺不通。薄切醋炒。塗喉外良。【宋】大明日華諸家本草論商陸曰。通大小腸。瀉蠱毒。墮胎煬腫毒。傳惡瘡。【明】李士材本草圖解論商陸曰。商陸酸辛有毒。通大小腸。疎泄水腫。攻消痃癖。搗爛傅腫毒喉痺。小兒瘡毒。同葱白塡臍。白者可入湯散。赤者但堪外貼。古贊云。其味酸辛。其形類人。其用療水。其效如神。與大戟甘遂。異性同功。虛者不可用。止用貼臍。小便利。卽腫消也。腫脹因脾虛者多。若誤用之。一時雖效。未幾再作。決不能救。【清】黃宮繡本草求眞論商陸曰。商陸辛酸苦寒。有毒。功專入脾行水。其性下行最峻。有排山倒海之勢。功與大戟、芫花、甘遂相同。故凡水腫水脹。痞癖癥腫。喉痺不通。溼熱蠱毒惡瘡等症。服此卽能見效。如仲景牡蠣澤瀉散之用商陸。以治大病後腰以下腫。用此急迫以散之也。若脾虛水腫。因服輕劑未愈。遂用苦劣有毒純陰之藥。迅迫效雖稍見。未幾卽斃。決不可救。取花白者良。赤者只堪貼臍。黑豆湯浸蒸用。得蒜良。【清】黃元御長沙藥解論商陸曰。商陸根酸苦湧泄。專於利水。功力迅急。與芫遂大戟相同。得水更烈。善治水氣腫脹之病。神效非常。兼療癥腫痞癖諸證。赤者大毒。用白者鮮根搗汁。服後勿飲水。【清】鄒澍本經疏證論商陸曰。異哉。李瀕湖謂商陸沈降而陰。其性下行。專於治水。與大戟甘遂異性同功也。夫所貴於治本經者。爲能審名辨物。知其各有所宜耳。若商陸之功。不過與大戟甘遂埒。則用大戟甘遂已耳。又何取於商陸哉。夫大戟甘遂。味苦。商陸味辛。苦者取其降。辛者取其通。降者能行逆折橫流之水。通者能行壅淤停蓄之水。取義既殊。功用遂別。豈得以此況彼也。仲景書中十棗湯用大戟甘遂。大陷胸湯。甘遂半夏湯。大黃甘遂湯。均用甘遂。不用大戟。則甘遂之與大戟。固自有異矣。獨於大病差後。腰已下有水氣者。牡蠣澤瀉散中。偏取商陸。謂非商陸有異於大戟甘遂乎。商陸不用赤花赤根。獨有取於白花白根者。蓋以其色之白。恰配其味之辛。以爲攻堅破積之用。下病者上取。上病者下取。牡蠣澤瀉散。治腰以下水氣不行。必先使商陸導歷從肺及腎。開其來源之壅。而後牡蠣海藻之軟堅。蜀漆澤瀉之開洩。方能得力。用栝樓根者。恐行水之氣過驟。有傷上焦之陰。仍使之從脾吸陰。還歸於上。與常山之蛇擊其首則尾應。擊其尾則首應者不殊也。是故商陸之功。在決壅導塞。不在行水疏利。明乎此。則不與他行水之物同稱混指矣。

國外學說 日本學說謂商陸者。自昔爲有名之利尿劑。本草綱目云。療水。其效如神。樫村清德氏確定其酒精溲幾斯。於諸般水腫有顯效。又長井氏摘出一種華爾斯樣之化合物。命名曰『フ井トラッコトキシン』。然依動物試驗之結果。卽以之爲商陸之利尿

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成分似太輕率。其利尿之理由。今尚不明。日本和漢藥考曰。世俗每以山牛蒡爲商陸。實則同名而異物也。山牛蒡爲屬於菊科之宿根草。根似牛蒡。故名山牛蒡。莖高二三尺。上葉葉柄短。葉形卵圓或橢圓。邊緣有鋸齒。下葉葉柄長。似牛蒡之葉。莖與葉俱有灰白色之茸毛。至秋生蕾。形圓如球而有刺。旋開深紫色之喇叭花。作頭狀花序排列。其嫩葉如商陸。可供食用。老葉用以引火。山牛蒡之嫩葉。浸以豉汁。可供食用。其乾根煎服。不見有害。生根之絞汁則毒性猛烈。服之往往致死。島根土人。秋分掘山野自生之山牛蒡根。以小刀剝去外皮。浸豉汁或作醬餚食之。以治風毒、水腫、脚氣、諸症。頗有效。牛蒡根爲菊科植物之宿根草。歐洲各國多產之。莖與花俱似牛蒡。入藥以野生者爲佳。故有山牛蒡根之名。近人譯作商陸。其實與眞正之商陸相混。此根外作灰褐或灰白色。有皺襞。形如紡錘。內部類白色。橫斷面爲放線狀。味甘。性微黏。其生根有一種烈臭。爲發汗利尿藥。以治慢性皮膚病、黴毒、痛風等症。用此藥一〇・〇至二〇・〇。製成煎劑服之。成分爲伊努寧（Inulin）、糖質、蘋酸等。山牛蒡根爲商陸科植物之宿根草。產於北美及非洲之北部。與歐洲之南部。爲商陸之一種。此可充眞正之商陸。服〇・〇六至〇・三已有利尿、變質之效。若服至〇・五或二・〇。必起吐瀉。商陸之基本植物。同名異種者頗多。一說中國產之商陸。與日本產爲異種云。

辨僞 ㈠鄭肯巖曰。爲名次商陸。卽俗所稱豬卜者。其性無從稽考。萬不可服。按商陸氣味辛平有毒。主治水腫癰腫。殺鬼精物。近道所在有之。春生苗高二三尺。莖青赤。極柔脆。葉如牛舌而長。夏秋開花作朵。根如蘿蔔。似人形者有神。有赤白二種。白根者花白。赤根者花赤。白者入藥。赤者毒更甚。俗名章柳。不可服。服之見鬼神。嗟嗟同是一種。根色赤者。尙不可用。豬卜卜之異種乎。㈡曹炳章曰。按商陸八九月出新。各處皆出。吾江浙市上通用白商陸。赤者不入藥。服之有消爍筋腎之毒。故勿餌。鄭君所云豬卜卜。不知其形狀若何。因未嘗見過。不敢妄評。

配合應用 ㈠治遲氣脚軟。章柳根切小豆大。煮熟。更以綠豆同煮爲飯。每日食之。以瘥爲度。甚效。（斗門方）

㈡治水腫氣滿。用白商陸根去皮。切如豆大。一大盞。以水二升。煮一升。更以粒米一大盞。同煮成粥。每日空心服之。取微利。不得雜食。（外臺祕要方）用白商陸六兩。取汁半合。和酒半升。看人與服。當利下水取效。（千金翼方）用白商陸一升。羊肉六兩。水一斗。煮取六升。去滓。和葱豉作臛食之。有效。（梅師方）

㈢治腹中暴癥。有物如石。痛刺啼呼。不治。百日死。多取商陸根。搗汁或蒸之。以布藉腹上。安藥勿覆。冷卽易。晝夜勿息。（千金方）

㈣治痃癖如石。在脇下堅硬。生商陸根汁一升。杏仁一兩。浸去皮。搗如泥。以商陸汁絞杏泥。火煎如餳。每服棗許。空腹熱酒服。以利下惡物爲度。（聖惠方）

㈤治產後腹大。堅滿喘不能臥。白聖散用章柳根三兩。大戟一兩半。甘遂炒一兩。爲末。每服二三錢。熱湯調下。大便宣利爲度。此乃去水聖藥也。（潔古保命集方）

㈥治五尸注痛。腹痛脹急。不得喘息。上攻心胸。旁攻兩脇痛。或磔塊涌起。用商陸根蒸。以囊盛。更互熨之。取效。（肘後方）

㈦治小兒痘毒。小兒將痘發熱。失表。忽作腹痛及膨脹。奪氣。乾霍亂。由毒氣與胃氣相搏。欲出不得出也。以商陸根和葱白搗傅臍上。斑止痘出。方免無虞。（摘玄方）

㈧治耳卒熱腫。以生商陸削尖納入。日再易。（聖濟方）

㈨治喉卒攻痛。商陸切根炙熱。隔布熨之。冷卽易。立愈。（圖經本草方）

㈩治癰癤喉痺攻痛。生商陸根搗作餅。置癤上。以艾炷於上灸三四壯良。（外臺祕要方）

⑪治一切腫毒。商陸根和鹽少許搗傅。日再易之。（千金方）

⑫治石癰如石。堅硬不作膿者。生章陸根搗擦之。燥卽易。取軟爲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

虎。亦治瀉漏諸瘡。（張文仲備急方）㊂治療傷水毒。商陸根搗炙。布裹熨之。冷卽易之。（千金方）

用量 五分至一錢。

施用宜忌 凡脾虛而非邪實者禁用。

參攷資料 ㊀方家不甚用。惟療水腫切生根。雜鯉魚煮作湯服。道家乃散用之。及煎釀服。皆能去尸蟲。見鬼神。其實子亦入神藥。花名蔈花。尤良。（陶弘景）㊁商陸苦寒。其性下行。專於行水。方家治腫滿。小便不利者。以赤根搗爛。入麝香三分。貼於臍心。以帛束之。得小便利。卽腫消。又治溼水。以指畫肉上隨散。不成文者。用白商陸。香附子炒乾。出火毒。以酒浸一夜。日乾爲末。每服三錢。米飲下。或以大蒜同商陸煮汁服。亦可其莖葉作蔬食。亦可治腫疾。（李時珍）㊂赤者但可貼腫。服之傷人。痢血不止。殺人。令人見鬼神。（蘇頌）㊃俗名章柳根。多生於人家園圃中。春生苗。高三四尺。青葉如牛舌而長。莖青赤。至柔脆。夏秋開紅紫花。作朵根如蘿蔔而長。八九月採之。爾雅謂之蔥蔣。廣雅謂之馬尾。易經謂之莧陸。雷敩曰。一種赤莖。苗葉絕相類。不可服之。有傷筋骨。消腎之毒。惟花白年多者。仙人採之作脯。可下酒也。（蘇頌）㊄商陸昔人亦種之爲蔬。取白根及紫色者。擘破作畦栽之。亦可種子。根苗莖並可洗蒸食。或用灰汁煮過亦良。服丹砂乳石食之尤利。其赤與黃色者有毒。不可食。按周憲王救荒本草云。章柳幹粗似雞冠花幹。微有線楞。色微紫赤。極易生植。（李時珍）

【商陸花】**原名** 蔈花。

主治 人心昏塞。多忘。喜臥。取花陰乾。百日搗末。日暮水服方寸匕。乃臥。思念所欲事。卽於眠中醒悟也。

【商陸根】卽商陸之處方用名。詳『商陸』條。

【商陸葉】**性質** 辛。平。有毒。

效能 行水利便。通腸消腫。

主治 腫瘕。

【商庚】卽鶯之古籍別名。典見爾雅。詳『鶯』條。

【商草】卽貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝母』條。

【商棘】卽天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天門冬』條。

【商殼】卽枳殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳殼』條。

【問荊】卽接續草之別名。性質功能。詳『接續草』條。

【國大李仁】卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『郁李仁』條。

【國木皮】卽土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土骨皮』條。

【國丹】卽黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃丹』條。

【國老】卽甘草之古籍別名。典見別錄。詳『甘草』條。

【國豆】卽蔨豆之古籍別名。典見綱目。詳『蔨豆』條。

【執火】卽蠶之古籍別名。典見綱目。詳『蠶』條。

【堊石】卽石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石灰』條。

【堊灰】卽石灰之古籍別名。典見本經。詳『石灰』條。

【堅蠶】卽蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳『蚯蚓』條。

【堇】㊀卽旱芹菜之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『旱芹菜』條。㊁卽草烏頭苗之古籍別名。典見本草拾遺。詳『草烏頭』條。

【堇草】卽葫蘆之古籍別名。典見別錄。詳『葫蘆』條。

【堇堇菜】卽紫花地丁之古籍別名。典見植物圖考。詳『紫花地丁』條。

【堇葵】㊀卽石龍芮之古籍別名。典見山海經。詳『石龍芮』條。㊁卽旱芹菜之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『旱芹菜』條。

【堇茶】卽香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香薷』條。

【婆子】卽水黽之別名。詳『水黽』條。

【婆木香】卽煎香之別名。詳『煎香』條。

【婆那娑】卽波羅蜜之古籍別名。典見綱目。詳『波羅蜜』條。

【婆固脂】卽補骨脂之原名。詳『補骨脂』條。

【婆固紙】卽補骨脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『補骨脂』條。

【婆律香】㊀卽冰片之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見新修本草圖經。詳『冰片』條。㊁卽百部之古籍別名。典見和漢藥考。詳『百部』條。

【婆律香膏】原名　龍腦香膏。

命名　本品卽冰片製成之膏。故名。

主治　耳聾。摩一切風。

【婆娑石】（綱目）古籍別名　摩娑石。

產地　生南海。

形態　婆娑石爲石類之一種。其色綠。無斑點。或謂海南有山。五色聳峙。其下水流如箭。舟過其下。人以刀斧擊取。其石有光焰。燒之作硫黃氣。可供藥用。

採取　以有金星而能磨成乳汁者佳。以手磨點鷄冠血。當化爲水者眞。

性質　甘。淡。寒。無毒。

主治　解一切藥毒。瘴疫。熱悶頭痛。

參攷資料　婆娑石。能置五金。伏三黃。制鉛汞。（李時珍）

【婆婆奶】卽大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大生地』條。

【婆婆酸】卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【婆婆鍼線包】卽羅摩之俗名。詳『羅摩』條。

【婆塔】卽百部之古籍別名。典見和漢藥考。詳『百部』條。

【婆婦草】卽百部之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『百部』條。

【婆羅得】（綱目）古籍別名　婆羅勒。

產地　生於波斯。

形態　婆羅得爲喬木類之一種。樹似柳。實如蕓麻子。以指甲抓之。卽有汁出。其子可供藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　冷氣塊。溫中補腰腎。破痃癖。可染髭髮令黑。

【婆羅門皂莢】卽阿勃勒之古籍別名。典見本草拾遺。詳『阿勃勒』條。

【婆羅門參】卽仙茅之古籍別名。典見圖經本草。詳『仙茅』條。

【婆羅勒】卽婆羅得之古籍別名。典見綱目。詳『婆羅得』條。

【婆羅樹】卽天門冬之古籍別名。典見綱目。詳『天門冬』條。

【婢屩魚】卽比目魚之別名。典見臨海志。詳『比目魚』條。

【婢寵魚】卽比目魚之古籍別名。典見綱目。詳『比目魚』條。

【婪尾春】卽白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芍』條。

【宿田翁】卽狼尾草之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『狼尾草』條。

【宿苓】卽黃芩之古籍別名。典見本草集註。詳『黃芩』條。

【寄生】卽鐵指甲之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鐵指甲』條。

【寄生草】卽桑上寄生之別名。性質功能。詳『桑寄生』條。

【寄生蟲】卽寄居蟲之古籍別名。典見綱目。詳『寄居蟲』條。

【寄居】卽蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【寄居蟲】基本　本品爲蟲之寄居於螺殼中者。


古籍別名　寄生蟲（綱目）巢螺。蝸蟬（動物辭典）

外國名詞　Pagurus 或 Eupagurus Hermit Crab Einsiedlerkreba（拉丁）ヤトカリ（日本）

基本　係節肢動物甲殼類胸甲類十腳類長尾類寄居蟲科之寄居蟲。

產地　生海涯及湖澤間。

形態　寄居蟲爲蟲類之一種。其頭胸部堅硬。被剛毛。有肢腹部。柔軟。觸角稍長。第一對腳形大爲鉗狀。全體赤色或蒼黑。大者長四寸。恒寄居螺類之遺殼。可供藥用。



寄居蟲

主治　益顏色。美心志。

參攷資料　㊀海南一種似蜘蛛。入螺殼中。負殼而走。觸之卽縮如螺。火炙乃出。一名蟦。無別功用。（陳藏器）㊁案孫愐云。寄居在龜殼中者名曰蝠。則寄居亦非一種也。（李時珍）

【寄屑】卽桑寄生之古籍別名。典見本經。詳『桑寄生』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【寄童】卽桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【密陀僧】命名　密陀沒多皆梵語也。

古籍別名　沒多僧。(唐本)爐底。(綱目)灰坯。陀僧理文石。甜陀淳子。甜面淳子。(和漢藥考)丹錠。(西藥名)銀池。淡銀。(藥物生產辨)

外國名稱　Litharyrum. (拉丁) Litharge. (英) Bihigliotte. (德)

產地　陳仁山藥物生產辨云。密陀僧各屬有出。此乃傾銀爐之爐底也。又名銀池。又名淡銀。西藥名丹錠。

形態　密陀僧爲粉末或鱗片狀之塊。色黃或紅黃。無臭無味。水不能溶解。稀硝酸能溶解之。又浸於稀硝酸中。則夾雜其間之銅鐵。均可除去。

種類　㊀帶灰色者謂之銀密陀僧。㊁現黃色者謂之金密陀僧。品質相同。惟因色彩而區別耳。

製法　雷敦曰。凡使搗細。安瓷鍋中。重紙袋盛。柳蛀末煿之。次下東流水。浸滿。火煮一伏時。去柳末。紙袋取用。又精鍊銀鑛之際。熱鑛石末。加入鐵屑。除去硫黃。加鉛熔合。再使鉛酸化。令吸收於木灰中。依精鍊之灰吹法。而造出副產物。是爲密陀僧。或祇將鉛鎔化。使觸空氣酸化而製之。

性質　鹹。辛。平。有小毒。

成分　在化學上謂之酸化鉛(PbO)

效能　刦痰。鎮驚。配合膏藥。用爲治瘡藥。澀瘡水疱疹。

作用　能收縮黏膜及潰瘍處之血管。使分泌減少。同時又與白血球化合。而成蛋白化鉛。令患處與空氣隔膜。故可免除腐爛。

主治　久痢。五痔。金瘡。面上瘢黯。面膏藥用之。

歷代記述攷證　【宋】大明曰。華諸家本草論密陀僧曰。鎮心。補五臟。治驚癎。咳嗽嘔逆。吐痰。【明】李時珍本草綱目論密陀僧曰。療反胃。消渴。癰疾。下痢。止血殺蟲。消積。治諸瘡。消腫毒。除胡臭。染髭髮。【明】繆希雍本草經疏論密陀僧曰。密陀僧。慘銀銅之氣而結。故其味鹹辛氣平。有小毒。久痢五痔。大腸澼熱積滯也。辛主散結滯。鹹主潤下。除熱。大腸清寧。則久痢五痔自瘳矣。體重能消磨堅積。味鹹能入血涼血。故又主金瘡。及滅面上瘢黯也。【清】黃宮繡本草求眞論密陀僧曰。密陀僧係出銀坑之中。眞者難得。今用多屬傾銀爐底。味辛而鹹。氣平小毒。大率多屬祛澀除熱。消積滌痰。鎮墜之品。故書載能絕癰除痢。安驚定魄。止血散腫。消積殺蟲。及療腫毒。敷凍瘡。解狐臭。染鬚髮。非其痰祛熱清。澀除重鎮。輕墜。則病易克去乎。但此出於銷銀爐裏。則有銅氣雜入。不堪入藥。且只可以外敷。不可以作服餌也。若入藥須煮一伏時。

國外學說　日本和漢三才圖會曰。灰吹之滓也。有金密陀僧。銀密陀僧二種。以黃白色別之。用煎湯藥者少。膏藥或桐油漆中始用之。英美學說謂密陀僧化名鉛養。係從鉛礦製出。其結冰如鱗片。在古人早已知有此質。爲提金提銀工內所常用。至鉛中分銀之工內。亦用之。尋常出售之密陀僧。常含鐵少許。又含銅鉛養。炭養(二)玻養(三)。與土質等。其毒質。與鉛之別質相同。匠之以鉛爲業者。每易受其害。如與流質油相和。成密陀僧膏藥。可爲數種膏藥內之要質。不可內服。外用能作貼膏類。至解藥之解此毒者。須先服土朴硝或洋朴硝。後服吐劑瀉劑。解毒之後。服鴉片止痛。又服牛奶與雞蛋清等。用密陀僧貼膏四分。黃蠟一分。杏仁油三分。或香油亦可。共化勻。攤布條上。以裹患處。治溼癬甚效。(密陀僧油膏方)又密陀僧膏二十四兩。松香三兩二錢。洋肥皂一兩六錢。先將密陀僧膏煠熱。另以一鐺。將松香洋肥皂煮熔。然後加入密陀僧膏和勻。此膏宜以布開調。凡割症用以合口甚妙。(密陀僧合口膏方)又密陀僧膏二十七兩。洋肥皂四兩八錢。松香八錢。照合口膏方製之。製成後。用布開紙開調均可。凡瘡科及皮膚等症不能收口者。以此膏貼之。(密陀僧收口膏方)

配合應用　㊀治痰結胸中不散。密陀僧一兩。醋水各一盞。煎乾

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲末。每服二錢。以酒水各一小盞。煎一盞。溫服。少頃當吐出痰涎爲妙。（聖惠方）

㈡治消渴飲水。神效方用密陀僧二兩研末。湯浸蒸餅丸。梧子大。濃煎鹽湯或茄根湯或酒下一日五丸。日增五丸。至三十丸止。不可多服。五六服後。以見水惡心爲度。惡心時。以乾物壓之。日後自定。甚奇。（選奇方）

㈢治赤白下痢。密陀僧三兩。燒黃色。研粉。每服一錢。醋茶下。日三服。（聖惠方）

㈣治腸風痔瘻。用銅青、密陀僧各一錢。麝香少許。爲末。津和塗之。（濟急方）

㈤治小兒初生。遍身如魚鱗。又如水晶。破則成水流滲。又生者。用密陀僧生研。搽之。仍服蘇合香丸。（救急方）

㈥治腋下胡臭。漿水洗淨。油調密陀僧塗之。以一錢用熱蒸餅一箇切開摻末夾之。（集簡方）

㈦治口臭。密陀僧一錢。醋調漱口。（普濟方）

㈧治大人口瘡。密陀僧鍛研摻之。（聖濟方）

㈨治小兒口瘡。不能吮乳。密陀僧末。醋調塗足心。瘡愈洗去。（蔡醫博方也。（黎居士簡易方）

㈩治鼻內生瘡。密陀僧、香白芷等分爲末。蠟燭油調搽之。（簡便方）

(十一)治鼻齇赤皰。密陀僧二兩。細研。入乳調夜塗。旦洗。譚氏亦治瘡癤。又外臺治黯黶斑點。（聖惠方）

(十二)治夏月汗斑如疹。用密陀僧八錢。雄黃四錢。先以畫片擦熱。仍以畫片蘸末擦之。次日卽焦。（活人心統方）

(十三)治骨疽出骨。一名多骨瘡。不時出細骨。乃母受胎未及一月。與六親骨肉交合。感其精氣。故有多骨之名。以密陀僧末。桐油調勻。攤貼之。卽愈。（壽域方）

(十四)治血風臁瘡。密陀僧香油入粗盆內。磨化。油紙攤膏。反覆貼之。（孫氏集效方）

(十五)陰汗濕痒。密陀僧末傅之。戴氏加蛇牀子末。

施用宜忌　凡中寒無實邪者禁用。

參攷資料　㈠密陀僧感鉛銀之氣。其性重墜下沈。直走下焦。故能墜痰止吐。消積定驚。痫。治癎痢。止消渴。療瘡腫。洪邁夷堅志云。驚氣入心絡。痛不能言語者。用密陀僧末一匕。茶調服。卽愈。昔有人伐薪。爲猩所逐。而得是疾。或授此方而愈。又一軍校採藤。逢惡蛇。病此。亦用之而愈。此乃驚則氣亂。密陀僧之重以去怯。而平肝也。其功力與鉛丹同。故膏藥中用代鉛丹云。（李時珍）㈡密陀僧堅重椎破如金色者佳。（寇宗奭）㈢今嶺南閩中銀銅冶處亦有之。是銀鉛腳。其初採破時。銀銅相雜。先以鉛同煎鍊。銀隨鉛出。又採山木葉燒灰。開地作爐。填灰其中。謂之灰池。置銀鉛於灰上。更加火煅。鉛滲灰下。銀住灰上。罷火候冷。出銀。其灰池感金銀氣。積久成此物。（蘇頌）㈣密陀僧。原取銀冶者。今旣難得。乃取煎銷銀鋪爐底用之。造黃丹者。以腳滓鍊成。密陀僧。其似瓶形者似也。（李時珍）㈤密陀僧惟治黯黶傳面外。今人無復用以服食者。大都可外敷。不可內服。此藥難得眞者。銷銀爐底。乃硝銅之氣所結。能爛一切物。故益不宜輕用。（繆希雍）㈥密陀僧製法。先以鉛入鍋煮鎔。用鏟再煽。令與天空養氣相合。變作黃粉。卽黃丹。隨將該粉撥出。復用烈火煮透。俟冷凝結。卽成。爲密陀僧。不入服劑。製膏或和入別藥作收口膏。凡瘡科皮膚等症。不能收口者。以此膏貼之。（西藥略釋）

【密香】卽沈香之古籍別名。典見綱目。詳『沈香』條。

【密蒙花】命名　本品花序繁密。蒙茸如錦簇。故名。

古籍別名　水錦花（炮炙論）

寒不凋（和漢藥考）

外國名詞　Buddleia officinalis（拉丁）

基本　屬馬錢科。爲密蒙之花。

產地　陳仁山藥物生產辨云。密蒙花產陝西。與安府、漢中府、湖北宜昌府均有出。又有一種俗稱明花珠。實磨盆草仁。產湖南湖北兩省。

形態　密蒙花樹高丈餘。葉經

199／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬不凋。似冬青葉而厚。背白有細毛。又云不倡冬青柔而不实。色深綠。其花細碎。數十房成一朵。冬生春開。微紫色。

採取　二三月間採花曝乾。

製法　雷敦曰。凡使揀淨。酒浸一宿。漉出候乾。拌蜜令潤。蒸之。從卯至酉。日乾。再拌蒸。如此三度。日乾用。每一兩用酒八兩。蜜半兩。

性質　甘。平。微寒。無毒。

效能　祛瞤障。明眼目。專作眼科藥。

主治　青盲膚翳。赤腫多眵淚。消目中赤脉。小兒麩豆及疳氣攻眼。

歷代記述攷證　【元】王好古湯液本草論密蒙花曰。入肝經氣血。分潤肝燥。【明】繆希雍本草經疏論密蒙花曰。密蒙花其蕾茁於冬而開於春。氣平微寒。味甘而無毒。爲厥陰肝家正藥。觀本經所主。無非肝虛有熱所致。蓋肝開竅於目。目得血而能視。肝血虛則爲青盲膚翳。肝熱甚則爲赤脘眵淚。赤脈。及小兒豆瘡餘毒。疳氣攻眼。此藥甘以補血。寒以除熱。肝血足而諸證無不愈矣。好古謂其潤肝燥。守眞以之治畏日羞明。誠謂此也。形與羌花相似。但羌花狹小而密。蒙花差大爲異。用者宜詳辨之。

辨僞　㊀鄭肖巖曰。蒙花一名蒙山茶。一名雲芝茶。性寒。能清肺胃之熱。故參病用之尤宜。近今多以近道礦花僞充。則性味懸殊矣。㊁曹炳章曰。按蒙花三月出新湖北當歸山出者。其花白綠色。白茸毛。淨而無梗者佳。各處出花碎小。色白黃梗多者次。

配合應用　㊀治青盲翳障。密蒙花、空青、木賊、生地黃、蟬蛻、白蒺藜、穀精草、決明子、羚羊角。㊁治肝腎虛目不能遠視。密蒙花、甘菊花、枸杞子、生地黃、白蒺藜、穀精草。㊂治風熱湿熱眼赤痛。密蒙花、黃連、赤芍藥、防風、荊芥穗、黃檗、甘菊花、甘草、龍膽草。㊃治小兒疳積。眼目不明。密蒙花、胡黃連、白蕪荑、使君子、蟬蛻、木賊、薏苡。㊄治目中障翳。密蒙花、黃蘗根各一兩爲末。水丸梧子大。每服時湯服十丸至十五丸。（聖濟總錄方）

用量　八分至錢半。

參攷資料　㊀密蒙花蜀中州郡皆有之。樹高丈餘。葉似冬青葉而厚。背白有細毛。又似橘葉。花微紫色。二月三月採花曝乾用。（蘇頌）㊁利州甚多。其葉冬不凋。亦不似冬青。柔而不光潔。不深綠。其花細碎。數十房成一朵。冬生春開。（寇宗奭）

【寇脫】即通草之古籍別名。典見山海經。詳『通草』條。

【將軍】㊀即大黃之古籍別名。典見李氏藥錄。詳『大黃』條。㊁即石硫黃之古籍別名。典見綱目。詳『石硫黃』條。

【將軍乾】即蟋蟀之處方用名。詳『蟋蟀』條。

【將離】即白芍之古籍別名。典見綱目。詳『白芍』條。

【尉佗生】即肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉桂』條。

【尉佗桂】即肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉桂』條。

【尉魚】即鱒魚之古籍別名。典見毛詩疏義。詳『鱒魚』條。

【屏風】㊀即防風之古籍別名。典見別錄。詳『防風』條。㊁即蓼菜之古籍別名。典見楚詞。詳『蓼菜』條。

【崑崙】即白斂之古籍別名。典見別錄。詳『白斂』條。

【崑崙瓜】即茄子之古籍別名。典見御覽。詳『茄子』條。

【崑崙桃】即冬桃之古籍別名。典見綱目。詳『冬桃』條。

【崑崙草】即青葙子之古籍別名。典見唐本草。詳『青葙子』條。

【崑崙紫瓜】即茄子之古籍別名。典見杜寶拾遺錄。詳『茄子』條。

【崑崙黃】㊀即雌黃之古籍別名。典見綱目。詳『雌黃』條。㊁即石硫黃之古籍別名。典見本草集註。詳『石硫黃』條。

【崑崙蔗】即甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳『甘蔗』條。

【崖香】即海南沈香之產於崖州者。性質功能與尋常之沈香同。詳『沈香』條。

【崖椒】古籍別名　野椒。（綱目）

200／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Schinnitolium, S. et Z.（拉丁）

基本 屬芸香科山椒類。爲野椒之果實。椒紅。

產地 多野生於山崖間。

形態 崖椒爲蜀椒之一種。藥大於蜀椒。其子灰色。不黑無光。亦不甚香。其紅可供藥用。



崖椒

性質 甘。辛。溫。無毒。

主治 婦人血氣。并五勞七傷。以根同牛天回雞翁藤。野蘭根。四味洗焙爲末。每服二錢。溫酒下。丈夫無所忌。婦人忌雞魚濕麵。

【崖蜜】㊀卽櫻桃之實。最大而甘者之古籍別名。典見孫炎註解。詳『櫻桃』條。㊁卽石蜜之古籍別名。典見綱目。詳『石蜜』條。

【崖鹽】卽光明鹽之古籍別名。典見綱目。詳『光明鹽』條。

【巢鉤子】卽鉤栗之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鉤栗』條。

【巢煙九助】卽烏梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏梅』條。

【巢螺】卽寄居蟲之古籍別名。典見動物辭典。詳『寄居蟲』條。

【帶心連翹】卽連翹之處方用名。詳『連翹』條。


【帶柳】卽帶魚之小者。典見綱目拾遺。詳『帶魚』條。

【帶魚】外國名詞 Trichiurus chinensis（拉丁） Hair-tail（英）

古籍別名 裙帶魚。小者名帶柳。（綱目拾遺）

產地 出海中。

形態 帶魚爲無鱗類。魚屬之一種。頭尖尾細。身扁眼大。口有强齒。脊鰭連續甚長者。至五六尺大小不等。體有滑涎。背淡青。腹白色。乾者作銀光色。周身無細骨。止中有一脊骨。狀如邊箕。兩面皆肉。肉細而肥。棲洋海中。來則千百成羣。喜尾而行。不受網羅。惟以鈎釣。斯可得其一。而連續不絕。出以八月。盛於十月。而務重則多。務少亦少。捕得可供食與藥用。



帶魚

性質 甘。平。無毒。

主治 和中開胃。去風殺蟲。

參弦資料 帶魚膾醃風乾久藏不敗。煎烹味美。多食發疥。（綱目拾遺）

【帶鳥】卽練鵲之古籍別名。典見食經。詳『練鵲』條。

【帶殺莖】卽白豆蔻之處方用名。詳『白豆蔻』條。

【帶葉蘇梗】卽紫蘇之處方用名。詳『紫蘇』條。

【常山】 **原名** 蜀漆。

命名 本名苗名蜀漆。根名常山。

處方用名 炒常山。製蜀漆。

古籍別名 互草（本經）恒山。（吳普）雞尿草。鴨尿草（日華）亘草。翻胃木（和漢藥考）

外國名詞 Orixa Japonica, Thunb.（拉丁）

基本 屬芸香科。爲常山之根與葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。常山。產四川萬縣。重慶及湖南爲正。又有土常山。產廣東清遠。其功雖亦能吐。惟不及四川、湖南之佳。常山葉產四川、湖南、湖北、江西各省。廣東產自清遠。



常山（一）

201／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態 常山爲落葉小灌木。莖高五六尺。長者可丈許。葉爲廣橢圓或倒卵圓形。有短柄。面有光澤。彼此互生。葉面且有透明之小點。臭氣甚烈。四五月間。開淡黃色四瓣小花。雌雄異株而生。雌花有短梗。攢簇葉腋而生。雄花有長梗。排列爲總狀。果實爲蒴果。熟則綻裂。種子飛散。遠處根細長。屈曲色黃。內部充實。有苦味。最細者稱雞骨常山。本草以常山入毒草類。農家以之煎汁。爲牛馬之殺虱藥。又有海州常山。爲屬於馬鞭草科臭桐之根。藥舖往往以之染黃。僞充常山。土常山爲屬於虎耳草科之甘茶。亦落葉灌木。四月八日佛會用之。



常山（二）

採取 五月採葉。（即採蜀漆）八月採根。（即採常山）

製法 雷敩曰。凡使常山。採時連根苗收。如用莖葉。臨時去根。以甘草細剉。同水拌溼蒸之。臨時去甘草。取蜀漆細剉。又拌甘草水勻再蒸。日乾用。其常山。凡用以酒浸一宿。漉出日乾。然搗用。李時珍曰。近時有酒洗蒸熟。或瓦炒熟者。亦不甚吐人。又有醋制者吐人。

性質 苦寒有毒。

成分 常山之成分。亦爲祕魯培林與黃連同。

效能 行水。吐痰。除寒熱。用爲截瘧之要藥。

作用 在胃中微有激胃神經。使胃黏膜之分泌增加。至腸中略能激腸之蠕動。使積黨緩緩排出入血中。卽刺激中樞神經。使體溫下降。又能減少窒素之排泄。以阻止體溫之高升。且可使固有溫度次第消失之。

主治 傷寒寒熱。發溫瘧鬼毒。胸中痰結。吐逆。（本經）療鬼蠱往來水脹。洒洒惡寒。鳥瘧。（別錄）

歷代記述及證 【唐】甄權。藥性本草論。常山曰。治諸瘧。吐痰涎。治項下癭癧。【明】繆希雍本草經疏論。常山曰。常山味苦寒。別錄桐君益之以辛。宜其有毒也。苦泄辛散。故善逐飲。陰寒祛熱。故善破瘴癘。入口卽吐。其性暴悍。又可知已。本經主傷寒寒熱。宜作主山嵐瘴氣寒熱。發爲溫瘧鬼毒。胸中痰結。古方治瘧多用。蓋以嶺南西粵鬼方。咸多山嵐瘴癘之氣。所感邪氣。充於榮衞皮膚之間。欲去皮膚毛孔中瘴氣。根本非常山不可。以其性能祛逐老痰積飲。善散山嵐瘴癘之邪故也。【明】李士材本草圖解論。常山曰。常山苦寒有小毒。消痰至捷。截瘧如神。常山却痰療瘧。無他藥可比。須在發散表邪之後。用之得宜。立建神功。世俗聞雷敩有老人久病之戒。遂視常山爲峻劑。殊不知常山發吐。惟生用與多用爲然。與甘草同行。則亦必吐。若酒浸炒透。但用錢許。余每用必見奇功。未有見其或吐者也。不一表明。將使良藥見疑。沉痾難起。抑何其愚耶。酒浸一宿。切薄片。慢火久炒。形如雞骨者良。性猛烈。施之鴆食者多效。若肉食之人。稍稍挾虛。不可輕入。【清】黃宮繡本草求眞。論常山曰。常山辛苦而寒有毒。功專引吐行水。爲除瘧疾老痰積飲要藥。蓋瘧無不挾痰挾熱而成。然亦有風痰寒熱食氣之分。治須分其陰陽虛實表裏。以定如瘧果因傷寒寒熱。及時氣溫疫。而致黃涎聚於胸中。心下牢固不解。則當用此引吐。然亦須在發散表邪。及提出陽分之後而用之。其用又當審其所見部位。又藥佐使以治。如常山得甘草則吐。水在上焦者宜之。得烏梅山甲則入肝。水在脇下者宜之。得大黃則利水。邪熱交結而成內實者宜之。得小麥竹葉則入心。得秫米麻黃則入肺。得龍骨附子則入腎。得草果檳榔則入脾。然此陰毒之草。其性悍暴。雖有破瘴逐飲之能。而亦終損眞氣。所以仲景治瘧方中。從無及此。而夏傷於暑。秋必瘧瘧。及瘧在三陰元氣寒入則常山等藥皆爲戈戟。或問吐藥甚多。何以瘧疾必用常山蜀漆。蓋以常山性兼逐痰。瘧疾本於溼痰。故於常山蜀漆則宜。猶之瓜蒂、烏附尖、萊菔子、藜蘆皆爲吐劑。而瓜蒂則止宜於熱痰。烏附尖則止宜於溼痰。萊菔子則止宜於氣痰。藜蘆則止宜於風痰也。酒浸炒用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

根卽蜀漆。功用略同。但苗性輕揚。其於上焦邪結。治之更宜。

國外學說 日本學說謂常山者。用於間歇熱。（卽瘧病）其成分如黃連。內有「ベルベリン」古方藥品考曰。蜀漆（卽茗葉常山苗）木高五六尺。葉似茗葉而闊大光滑。觸之臭氣染手。春發細黃花。根屈曲。色淡黃（卽常山）

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。常山假者色極淡。眞者色帶黃。按常山又名恒山。產益州及漢中。今汴西淮浙湖南諸州郡皆有。生山谷間。常山者。根之名也。狀似荊根。細實而黃者。謂之雞骨常山。用之最勝。今市肆所賣。假常山不知何物僞充。良可慨已。㊁曹炳章曰。按常山十月出新。湖南常陽山出者。色黃無蘆。形如雞骨者良。俗稱雞骨常山爲最佳。如外黃內白粗大者。皆僞。是別種樹根僞充。不可不辨也。㊂許小士曰。常山之治瘧發明。可謂古古本經別錄甄權不云乎。考之歷代之治瘧藥物。非參用本品不爲功。此則一勘古書之治案。卽可得也。蓋以瘧有日日瘧、間日瘧、三日瘧之分。其病原係由痲拉利亞原蟲侵入人體血液中之赤血球。其傳染之媒介爲蚊。蚊名曰安俄斐雷斯（Anopheles）此痲拉利亞原蟲之侵入赤血球後也。乃在此赤血球內營其增殖繁族之作用。及至成爲多數之幼蟲。赤血球卽爲其所破壞。當此之時。此種痲拉利亞原蟲。乃遊走血液中。而產生一種毒素。人體因其毒素之刺激。遂發寒熱。故名爲瘧。脾爲無管腺之一。今汴西淮浙湖南諸州郡皆有。生山谷間。常山者根之名也。狀似荊根。細實而黃者。謂之雞骨常山。用之最勝。今市肆所賣。假常山不知何物僞充。良可慨已。㊁曹炳章曰。按常山十月出新。湖南常陽山出者。色黃無蘆。形如雞骨者良。俗稱雞骨常山爲最佳。如外黃內白粗大者。皆僞。是別種樹根僞充。不可不辨也。㊂許小士曰。常山之治瘧發明。可謂古古本經別錄甄權不云乎。考之歷代之治瘧藥物。非參用本品不爲功。此則一勘古書之治案。卽可得也。蓋以瘧有日日瘧、間日瘧、三日瘧之分。其病原係由痲拉利亞原蟲侵入人體血液中之赤血球。其傳染之媒介爲蚊。蚊名曰安俄斐雷斯（Anopheles）此痲拉利亞原蟲之侵入赤血球後也。乃在此赤血球內營其增殖繁族之作用。及至成爲多數之幼蟲。赤血球卽爲其所破壞。當此之時。此種痲拉利亞原蟲。乃遊走血液中。而產生一種毒素。人體因其毒素之刺激。遂發寒熱。故名爲瘧。脾爲無管腺之一。其實蓋一較大之淋巴腺耳。有製造白血球及淋巴球之功能。據一般醫學家之研究。凡人體感傳染病時。而脾臟常腫大。所以然者。因脾細胞有吞噬細菌之作用。淋巴腺則在人體中。有吸收水分及雜質之特能。其次。凡有害於身體之細菌。亦多爲淋巴球所困。使不致有蔓延作祟之虞。綜上所述。之生理病理及證之余個人臨牀之經驗。確知常山之有治瘧效能者。第一。卽能中和痲拉利亞原蟲在血液中分泌之毒素。并有撲殺瘧原蟲之可能性。第二。當有刺激淋巴蠶最吸收毒素及排除毒素等抗毒作用。故凡患者。服用常山後。血液中之痲拉利亞毒素。被其中和。精神不受刺激。其寒熱當不發。故瘧愈。瘧愈則淋巴已無毒素之遺留。故脾腫亦消。其有患久瘧之緩性脾腫者。則常山服之無效。因此時脾臟內之血管。以發生栓塞。故必須用去瘀藥攻之。常山無蕩滌瘀血之功能。故服之不效也。晚近治瘧之藥物。莫不知有規寧（金雞納霜）其藥者。然瘧症服規寧後。往往有復發之記錄。服本品則否。故余謂本品有撲殺瘧原蟲者。蓋亦絕對可信者也。據植物辭典謂本品之汁液。外用可殺牛馬之蝨。可知內服當亦有殺病原蟲之作用。以此而證明本品治瘧之特效。愈覺先民之發明藥理。眞確可靠。予我人研究之興趣。此其功德。至可欽佩者也。雖然。本品不僅治瘧而已。別錄之治鼠瘻。甄權之治項下瘤癭。鼠瘻瘤癭之病狀部位。非項下之淋巴腺腫脹乎。所以然之謂。因淋巴有吸收毒素之抗毒作用。今淋巴因吸收某種毒素太多。膿之閒隙。被其梗阻。以致淋巴液不能流通。故其處腫大或發炎也。故我爲常山有刺激淋巴吸收羅梅及排除梅毒等抗毒作用者。若用以治此淋巴腺之腫脹。而促進其循環。其奏效亦何疑焉。至謂其治胸中痰涎及方書之所謂無痰不成瘧者。我人若深明淋巴之生理。及此所謂無痰不成瘧之語意。則此所謂無痰不成瘧之痰字。乃爲瘧時之一種經胃間之滲出物之證狀。所以然者。因淋巴原爲吸收人體中之水分及雜質之機能。今因本身吸收毒素太多之故。而瘧原蟲之分泌毒素。復源源而來。如是因循。則其原有之抗毒作用。以慾不平衡。遂致肺胃間之雜質水分。難以盡量吸收。故潴留而爲痰。爲涎矣。故瘧愈。則淋巴之機能以恢復原狀。而營其原有之生理工作。於是之所謂痰涎之來源。遂可不治而愈。俗醫不知此理。因治瘧時。見其多痰多涎。卽疑瘧爲痰涎所作。彼又安知此所謂痰涎云者。蓋卽淋巴失其功用乎。

配合應用 ㊀截瘧諸湯用常山三兩。漿水三升。浸一宿。煎取一

203／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丹。欲發前服取吐。(外臺祕要方)
用常山一兩。秫米一百粒。水六升。煮三升。分三服。先夜未發臨發時服盡。(肘後方)予用此四十年。奇效。不能盡述。切勿加減。萬一無吐者。常山酒煮曬乾。知母貝母。葛果各一錢半。水一鍾半。煎半熟。五更熱服。滓以酒浸。發前服。(養生主論王隱者驅瘧湯方)

㊂截瘧諸酒用常山一兩。酒一升。漬二三日。分作三服。平旦一服。少頃再服。臨發又服。或加甘草煮服之。(肘後方)醇醪湯治間日瘧。支太醫云。乃桂廣州方也。甚驗。恒山一錢二分。大黃二錢半。炙甘草一錢二分。水一盞半。煎減半。醇發日五更溫服。再以水一盞煎減半。日醞未發時溫服。(宋侯經心錄方)治久瘧不止。常山一錢半。檳榔一錢。丁香五分。烏梅一個。酒一盞。浸一宿。五更飲之。一服便止。永不再發。如神。(虞搏醫學正傳方)

㊃截瘧譜丸恒山丸。治數年不瘥者。兩劑瘥。一月以來者。一劑瘥。恒山三兩。研末。雞子白和丸。梧子大。瓦器煮殺蟲氣。則取曬乾收之。每服二十丸。竹葉湯下。五更一服。天明一服。發前一服。或吐或否。卽止。(千金方)恒山搗末三兩。眞丹一兩。研白蜜和杵百下。丸梧子大。先發時三丸。少頃再服三丸。臨時服三丸。酒下。無不斷者。(肘後丹炒丸方)黃丹丸。治大小久瘧。恒山二兩。黃丹半兩。烏梅連核瓦焙一兩。爲末。糯米粉糊丸。梧子大。每服三五十丸。涼酒下。隔一夜一服。平旦一服。午後方食。(活幼心書方)用恒山三兩。知母一兩。甘草半兩。搗末。蜜丸。梧子大。先發時服十丸。次服七丸。後服五六丸。以瘥爲度。(葛洪肘後方)瞻仰丸。治一切瘧。常山四兩。炒存性。草果二兩。炒存性。爲末。薄糊丸。梧子大。每臥時冷酒服五十丸。五更再服。忌鵝羊熱物。(和劑局方)又勝金丸。治一切瘧。胸膈停痰。發不愈者。常山八兩。酒浸。蒸焙。檳榔二兩。生研末。糊丸。梧子大。如上法服。(和劑局方)二聖丸。治諸瘧不拘遠近大小。用雞骨恒山、雄心檳榔各一兩。生研。鱉鯉甲煨焦一兩半。爲末。糯粉糊丸。菉豆大。黃丹爲衣。每服三五十丸。如上法服。(集簡方)

㊄治厥陰肝瘧。寒多熱少。喘息如死狀。或小腹滿。小便如膿。不聞久近。不吐不泄。如神。恒山一兩。醋浸一夜。瓦器煮乾。每用二錢。水一盞。煎半盞。五更冷服之。(趙眞人濟急方)

㊅治太陰肺瘧。痰聚胸中。病至令人心寒。寒甚乃熱。熱間善驚。如有所見。恒山三錢。甘草半錢。秫米三十五粒。水二鍾。煎一鍾。發日早分三次服。(千金方)

㊆治少陰腎瘧。淒淒然寒。手足寒。腰脊痛。大便難。目眴眴然。恒山二錢半。豉半兩。烏梅一錢。竹葉一錢半。葱白三根。水一升半。煎一升。發前分三服。(千金方)

㊇治牡瘧獨熱不冷者。蜀漆一錢半。甘草一錢。麻黃二錢。牡蠣粉二錢。水二鍾。先煎麻黃蜀漆去沫。入藥再煎至一鍾。未發前溫服。得吐則止。(外臺祕要方)

㊈治溫瘧熱多。恒山一錢。小麥三錢。淡竹葉二錢。水煎五更服。甚良。(集性論方)

㊉治三十年老瘧。及積年久瘧。常山、黃連各一兩。漬三升。漬一宿。以瓦釜煮取一升半。發日早服五合。臨時再服。熱當吐。冷當利。無不瘥者。(肘後方)用恒山一兩半。龍骨五錢。附子炮二錢半。大黃一兩。爲末。雞子黃和丸。梧子大。未發時五丸。將發時五丸。白湯下。支太醫云。此方神驗。無不斷者。(張文仲備急方)

㊋治瘧瘧寒熱。常山一寸。草果一枚。熱酒一碗。浸一夜。五更望東服之。蓋臥。酒醒卽愈。(劉長春經驗方)用常山、檳榔、甘草各二錢。黑豆一百粒。水煎服之。乃彭司寇所傳。(談埜翁試驗方)用常山、黃連、香豉各一兩。附子炮七錢。搗末。蜜丸。梧子大。空腹飲服四丸。欲發時三丸。至午後乃食。(葛稚川肘後方)

㊌治妊娠瘧疾。酒蒸常山、石膏煅各一錢。烏梅炒五分。甘草四分。水一盞。酒一盞。浸一夜。平旦溫服。(姚僧坦經驗方)

㊍治小兒驚忤。暴驚卒死中惡。用蜀漆炒二錢。左顧牡蠣一錢二分。漿水煎服。當吐痰而愈。名千金

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

湯（阮氏方）㊀治胸中痰飲。恒山、甘草各一兩。水五升。煮取一升。去滓。入蜜二合。溫服七合。取吐。不吐更服。（千金方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。畏玉札。忌葱菜及蔊菜伏兎石。得甘草吐癊痰。

著名方劑　㊀常山飲。治痰癊。（局方）常山（火酒炒）知母、貝母、草果、栝樓各一錢。烏梅三枚。加姜棗煎。癊未發時面東溫服。㊁蜀漆散。癊多寒者。名曰牝癊。此湯主之。（金匱方）蜀漆（洗去腥）雲母（燒二日夜）龍骨各等分。杵爲散。未發時。以漿水服半錢匕。溫癊加蜀漆半分。臨發時服一錢匕。

參攷資料　㊀蜀漆春夏用莖葉。秋冬用根。老人久病切忌服之。（雷敩）㊁常山蜀漆有卻痰截癊之功。須在發散去邪及提出陽分之後用之。得宜。神效立見。用失其法。眞氣必傷。夫癊有六經五臟癊。痰溼食積瘴疫鬼邪諸癊。須分陰陽虛實。不可一概論也。常山蜀漆。生用則上行必吐。酒蒸炒熟用則氣稍緩。少用亦不致吐也。得甘草則吐。得大黃則利。得烏梅鼈甲則入肝。得小麥竹葉則入心。得秫米麻黃則入肺。得龍骨附子則入腎。得草果栝樓則入脾。蓋無痰不作癊。二物之功。亦在驅逐痰水而已。楊士瀛直指方云。常山治癊人皆薄之。癊家多蓄痰涎黃水。或停滯心下。或結瀝胸間。乃生寒熱。法當吐痰逐水。常山豈容不用。水在上焦則常山能吐之。水在脇下則常山能破其癖而下其水。須行血藥品佐助之。必收十全之功。其有純陽發癊。或蘊熱內實之證。投以常山。大便點滴而下。似泄不泄者。復用北大黃爲佐。泄利數行。然後獲愈也。又待制李濂云。嶺南瘴氣。寒熱所感。邪氣多在營衛肉皮之間。欲去皮膚毛孔中瘴根。本非常山不可。但性吐人。惟以七寶散冷服之。卽不吐。且驗也。（李時珍）㊂恒亦常也。恒山乃北岳名。在今定州。常山乃郡名。亦今眞定。豈此藥始產於此。得名歟。蜀漆乃常山苗。功用相同。今併爲一。（李時珍）㊃

常山生山谷間。莖圓有節。高者不過三四尺。葉似茗而狹長。兩兩相當。二月生白花。青萼。五月結實。青圓三子爲房。其葉暴燥色青白堪用。若陰乾。便黑爛變壞矣。（蘇恭）㊄今汴西淮浙湖南州郡亦有之。海州出者。葉似楸葉。八月中有花。紅白色。子碧色。似山楝子而小。今天台山出一種。草名土常山。苗葉極甘。人用爲飲。甘味如蜜。又名蜜香草。性涼。益人。非此常山。（蘇頌）㊅癊疾必有黃涎聚于胸中。故曰無痰不成癊。弦脈主痰飲。故曰癊脈自弦。常山去老痰積食。故爲諸癊要藥。又曰。常山吐癊痰。瓜蒂吐熱痰。烏附尖吐溼痰。萊菔子吐氣痰。藜蘆吐風痰。（吳遵程）

【常山苗】卽蜀漆之別名。典見綱目詳『常山』條。

【常吏之生】　古籍別名　常吏之生（蜀本草）

形態　常吏之生爲雜草類之一種。結實有刺。大如稻粟。可供藥用。

性質　苦。平。無毒。

主治　明目。

【常吏之生】卽常吏之生之譌寫者。典見蜀本草。詳『常吏之生』條。

【常思子】卽蒼耳子之古籍別名。典見本草集註。詳『蒼耳子』條。

【常春藤】　命名　本品小皃取有土鼓之名。後改爲常春藤。

古籍別名　土鼓藤（拾遺）龍鱗荔（日華）木蔦（日本）

外國名詞　Hedera Helix, L. var. colchica, C. koch.（拉丁）キヅタフユヅタ（日本）

基本　係五加科常春藤屬。爲常春藤之莖葉。其子實詳見該條。

產地　生山野間。



常春藤

形態　常春藤爲蔓草類藤屬之常綠灌木。本莖蔓生。常以氣根攀緣於他木。其大者幹徑約二三寸。葉卵形。全邊或掌狀分裂。冬開小花。黃綠色。花瓣五。爲繖形花序。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

結實形圓色黑。莖與葉俱供藥用。

性質 苦。無毒。

主治 凡一切癰疽。腫毒初起。取莖葉一握。研汁和酒溫服。利下惡物。去其根本。

【常春藤實】 **性質** 甘。溫。無毒。

主治 風血。贏老。腹內諸冷。血閉。強腰脚。變白。煮服浸酒皆宜。

【常蒐子】 卽蒼耳子之古籍別名。典見廣雅。詳『蒼耳子』條。

【康于石】 卽松化石產於康于河者之別名。典見唐書。詳『松化石』條。

【康伯豉】 卽蒲州豉之別名。性質功能。詳『豆豉』條。

【張天剛】 **產地** 生南安。

形態 叢生硬莖有節。紅黃色。葉似水蘇葉。實如小嬰。褐色。莖葉實俱有小刺如毛。根淡紅色。有鬚。可供藥用。



張天剛

性質 甘。溫。

效能 補陰分不足。

主治 下部虛軟。

【強仇】 卽百合之古籍別名。典見本草圖註。詳『百合』條。

【強瞿】 卽百合之古籍別名。典見別錄。詳『百合』條。

【強脊】 卽狗脊之古籍別名。典見別錄。詳『狗脊』條。

【彫胡米】 卽茭米之古籍別名。典見綱目。詳『茭米』條。

【彫菰】 卽茭米之古籍別名。典見綱目。詳『茭米』條。

【彫蓬】 卽茭米之古籍別名。典見爾雅。詳『茭米』條。

【彫瓊】 卽茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茉莉花』條。

【御戈】 卽鬼桃之古籍別名。典見綱目。詳『羊桃』條。

【御米】 卽罌粟子之處方用名。詳『罌粟子』條。

【御米粥】 **基本** 本品卽以御米麥成之粥。

主治 反胃。利大腸。

【御米殼】 卽罌粟殼之處方用名。詳『罌粟殼』條。

【御李子】 卽李子之古籍別名。典見綱目。詳『李子』條。

【御風草】 卽天麻之古籍別名。典見藥性。詳『天麻』條。

【御柳】 卽檉柳之日本名。詳『檉柳』條。

【御麥】 卽玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳『玉蜀黍』條。

【御栗】 卽落葵之古籍別名。典見綱目。詳『落葵』條。

【御黃李子】 卽李子之北方產者。典見綱目。詳『李子』條。

【御溝金水】 **性質** 性平。味微鹹。帶甘。

主治 男婦骨蒸。乾血勞。童子勞。晝夜發熱。至緊不肯服藥。此水不比尋常。大有功效。

參攷資料 製御溝金水法。用簍雞八隻。高二尺。取山上淨土。裝入雞內。用磁鉢八個盛之。取童便八桶。傾入七雞土內淋下。上以井花水推之。共傾入一雞土內。如淋少。再用清水推前七雞淋下。又加上一雞內。待他一夜淨。淋下水三五碗。以磁罐收貯。外用井水養之。但遇此症。待口中要茶吃。將此水半杯。溫服卽安。至重不過三七次立愈。(集驗方)

【御藥園木香】 卽土木香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土木香』條。

【惟那木】 卽南天燭之古籍別名。典見登眞隱訣。詳『南天燭』條。

【戚施】 卽蟾蜍之古籍別名。典見韓詩註。詳『蟾蜍』條。

【悉蘭脂】 卽錫慄脂之古籍別名。典見綱目。詳『錫慄脂』條。

【渙華】 **基本** 渙華爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 上氣解煩。堅筋骨。

【扈子】 卽鹿茸之花名。詳『鹿茸』條。

【捨子花】 卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【捻頭】 卽爽具之古籍別名。典見錢乙。詳『爽具』條。

【掃帶】 卽地膚子之古籍別名。典見本草集註。詳『地膚子』條。

【掃帚菜】 卽地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地膚子』條。

【排風】 卽白英之古籍別名。典見

206／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本草拾遺。詳『白英』條。

【排風藤】卽葫蘆之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『葫蘆』條。

【排草香】命名　本品根莖芬芳。亦可供合諸香。故名。

處方用名　排草根。排草香根。

外國名詞　Lysimachia sikokiana, Miq.（拉丁）モロユシサウ（日本）

基本　係櫻草科珍珠菜屬。爲排草之香根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。排草產廣東番禺石排。

形態　排草爲芳草類之多年生草本。獨莖。長葉長根。其葉參差而生。色淡綠。與莖同。偏反下垂。微似鳳仙花葉。而光澤無鋸齒。夏間開細柄黃花。五瓣尖長。有淡黃蕊。一簇。花罷結細角。長二寸許。枯時可以浸油刷髮。其根狀如白茅。亦如細柳根。色白而氣甚香。如麝香。爲熱帶諸香所不及。

採取　秋間採之。

製法　採得根。陰乾用。

用法　恒以外用。水煎薰洗。或燒煙薰之。

效能　辟穢濁。驅時氣。用作祛惡辟臭藥。

主治　辟臭。去邪惡氣。

歷代記述攷證　【清】黃宮繡本草求眞。論排草香曰。排草氣味芳香。據書載能祛惡辟臭。除魅與天時行。並宜燒之。水腫浮氣。風癩。可用生薑芥子煎湯浴洗。玩此氣味芳香。僅可以辟邪魅鬼惡。使之氣不克勝。至於水腫浮氣。亦須香以通達。使之氣伸浮散。故止可入外用。若使作湯以服。則經絡遍布。雖曰祛邪扶正。而正氣或虛。則又因香而鬱敗矣。故古人制方。有宜於外者。則卽以外爲主。而內不投。有宜於內者。則卽以內爲要。而外不行。卽云諸香有類於斯。內亦見用。然此補少泄多。古人獨於此昧。別爲外治。而不內入。未必不有意義於其中也。

參攷資料　㊀排草香出交趾。今嶺南亦或蒔之。草根也。白色。狀如細柳根。人多僞雜之。案范成大桂海志云。排草香狀如白茅香。芬烈如麝香。人亦用以合香。諸香無及之者。又有麝香木。出占城。乃老朽樹心節。氣頗類麝。（李時珍）㊁排草根芳香之氣。皆可辟臭去邪惡氣。天行時氣。並宜燒之。水煮洗水腫浮氣。與生薑芥子煎湯浴風癩。效。（張石頑）㊂此味亦止可入外用。若使作湯以服。則經絡遍布。雖曰祛邪扶正。而正氣或虛。則又因香而鬱敗矣。（盧飛鵬）

【排草香根】卽排草香之處方用名。詳『排草香』條。

【排草根】卽排草香之處方用名。詳『排草香』條。

【掘揸】卽茼茹之古籍別名。典見綱目。詳『茼茹』條。

【掛金燈】卽旋花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋花』條。

【掛金藤】卽金綫釣蝦蟆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金綫釣蝦蟆』條。

【掛綠】卽荔枝實之最佳者。產廣東增城縣。性質功能。參詳『荔枝』條。

【採芸神麴】卽神麴之處方用名。詳『神麴』條。

【接余】卽香菜之古籍別名。典見爾雅。詳『苦菜』條。

【接骨】㊀卽續斷之古籍別名。典見別錄。詳『續斷』條。㊁卽攀倒甑之古籍別名。典見綱目。詳『攀倒甑』條。

【接骨木】命名　本品功能接骨。故名。

古籍別名　續骨木。木蒴藋。（綱目）木英。扦扦活。野黃楊。草漆木。（和漢藥考）

外國名詞　Sambucus racemosa, L.（拉丁）

基本　屬忍冬科。爲接骨木之枝葉。

形態　接骨木爲落葉灌木。或自生山野。或種於人家之牆角。樹幹拗捩。然枝條繁茂。高可丈餘。早春卽發芽。葉爲奇數羽狀複葉。皆對生。小葉爲長卵圓形。邊緣有鋸齒。葉面平滑。夏日。梢頭開五瓣之花。色白而帶綠黃。相簇而爲圓錐形花序。果實爲小核果。至秋成熟。現紫黑色。

性質　甘。苦。平。無毒。

效能　除用爲發汗藥外。打傷。挫傷等。並可服用。又用爲愚部之

207／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

番法料。

主治　折傷。續筋骨。除風痺齲齒。可作浴湯。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論接骨木曰。根皮主痰飲。下水腫及痰癧。煮汁服之。當痢下及吐出不可多服。葉主痰癧大人七葉。小兒三葉。生搗汁服。取吐。【明】李時珍本草綱目論接骨木曰。千金方。打傷瘀血及產婦惡血一切血不行。或不止。並煮汁服。

國外學說　日本和漢藥考曰。西洋產接骨木。其花可作緩和之興奮劑及發汗藥。又爲蒸湯劑及數藥用於風溼痛及潰瘍疼痛等症。花瓣乾則變黃。日本產之花。乾則作黃褐色。且香氣不佳。故不入藥用。又西洋產者。不惟花可入藥用。即其果實、葉、嫩芽、皮等。均可作瀉藥並利尿藥也。

配合應用　㈠治折傷筋骨。接骨木中兩乳香中錢。芍藥、當歸、骨碎補各一兩。爲末。化黃蠟四兩。投藥攪勻。衆手丸如梧子大。若止傷損。酒化一丸。若碎折筋骨。先用此敷貼。乃服。（衛生易簡方）

㈡治產後血暈。五心煩熱。氣力欲絕。及寒熱不禁。以接骨木破如算子一握。用水一升。煎取半升。分服。或小便頻數。惡血不止。服之即瘥。此木燒之三次。其力一般。乃起死妙方。（產書方）

用量　錢半至三錢。

參攷資料　㈠接骨以功而名。花葉都類蒴藋、陸英。水芹輩。故一名木蒴藿（蘇頌）㈡所在皆有之。葉如陸英。花亦相似。但作樹高一二丈許。木體輕虛無心。（蘇恭）

【接骨仙桃】

古籍別名　八卦仙桃（集驗）奪命丹。活血丹。（本草拾遺）蟠桃草（綱目拾遺）

產地　田野近水處之田塍。多有產生。

形態　接骨仙桃。係桃類之一種。形似蟯腸。穀雨後生苗。葉光如石榴葉。形長類旱蓮。高可尺許。莖空。摘斷不黑。亦不香。立夏後開細白花而成穗。結實如豆。形似桃子。絕小。中空內有小蟲者。眞入藥。實連蟲用。

採取　芒種前後。須俟實紅而採。以空內小蟲未生翅翼。不能穿穴而出時收用。則藥力方全。豈此藥之用。全在乎蟲。若過夏至去採。則蟲穴孔而出。化爲小蚊。苞空無用矣。

製法　採後即須曬焙。令內蟲死。若懸挂風乾。恐內蟲生翅越出。則藥亦無用矣。

性質　甘。淡。溫。無毒。

主治　消癰腫。

配合應用　㈠專治肝氣、胃氣、小腸疝症。用仙桃草有蟲者。金橘核、福橘核、薑。澀茄各等分。爲末。砂糖調丸。蓂豆大。每晚服一錢。許至重者二服斷根。（和肝胃氣方）

㈡百草鏡云。取有蟲仙桃草用童便製透。入補藥用。（勞損虛怯方）

㈢百草鏡云。用新鮮接骨仙桃草。搗汁。加入乳和服。按吐血諸方。皆用涼血之劑。惟此藥性熱。加入乳能引血歸經。故妙。（治吐血方）

㈣專治跌撲損傷用蘇木五錢。八角金盤根一錢。接骨仙桃草五錢。臭梧桐花三錢。煎服。（救生苦海方）

【接骨草】

古籍別名　四季花。（蘷芳譜）

外國名調　Dioliptera japonica, Makino.（拉丁）

產地　出廣西園林中多有之。

形態　接骨草爲溼草類之一種。高二三尺。而叢生。葉大如柳而厚。莖有節。綠色而圓。三月開花。白色。至九月不絕。其枝葉可供藥用。



接骨草

性質　平。

主治　跌折傷。續斷骨。搗罨之。

【接骨草】即蒴藋之古籍別名。典見綱目。詳「蒴藋」條。

【接續草】

形態　接續草爲溼草類之一種。莖如木



接續草

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

賊。每寸許結節。節節相接。採之可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 治上氣。氣急結氣。瘤痛。

【推丸】卽蜣螂之古籍別名。典見本草集註詳『蜣螂』條。

【推石】卽綠膚青之古籍別名。典見別錄。詳『綠膚青』條。

【推車客】卽蜣螂之古籍別名。典見綱目。詳『蜣螂』條。

【推車蟲】卽推車客之古籍別名。典見綱目。詳『蜣螂』條。

【推青】卽綠膚青之古籍別名。典見別錄。詳『綠膚青』條。

【推屎蟲】卽蜣螂之古籍別名。典見孫氏集效方。詳『蜣螂』條。

【推蠭】卽千歲蠭之古籍別名。典見陸璣草木疏。詳『千歲蠭』條。

【掬天皮】卽地衣草之古籍別名。典見綱目。詳『地衣草』條。

【救火】㊀卽景天之古籍別名。典見別錄。詳『景天』條。㊁卽螢火之古籍別名。典見吳普本草。詳『螢火』條。

【救命王】古籍別名　死裏逃生(綱目拾遺)　基本　救命王爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 小兒感冒風寒咳嗽。大人傷力。損傷。吐血。及諸風疼痛。無名腫毒。

【救命王】卽金不換之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金不換』條。

【救赦人者】基本　救赦人者爲雜草類之一種。可供藥用。

產地 生庭院中。

採取 五月十月採。曝乾用。

性質 甘有毒。

主治 通氣疝痺。諸不足。

【救荒草】卽黃精之古籍別名。典見本草拾遺。詳『黃精』條。

【救窮草】卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳『黃精』條。

【敗石】基本　敗石爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 苦。無毒。

主治 療渴痺。

【敗芒箔】**命名** 本品係芒蓆製成之箔。而日久敗壞者。故名。

主治 產後血滿。腹脹。血渴。惡露不盡。月閉止。好血。下惡血。去鬼氣。疰痛。癥結。酒煮服之。亦燒末酒下。瘧久着煙者佳。

【敗席草】基本　本品乃石龍芻之莖所織成。入藥須用其破舊者。

主治 淋病。及小便不通。煮汁服。

【敗席草】卽石龍芻之處方用名。詳『石龍芻』條。

【敗毒菜】卽羊蹄之古籍別名。典見綱目。詳『羊蹄』條。

【敗荷葉】卽荷葉之處方用名。詳『荷葉』條。

【敗將】卽龜版之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『龜版』條。

【敗舡茹】**命名** 本品卽大膓。刮竹茹以補漏者。故名。

主治 平療婦人崩中。吐血。痢血不止。

歷代記述攷證 【唐】蘇頌圖經本草論敗舡茹曰。治金瘡刮敗舡茹灰傅之。功同牛膽石灰。

參攷資料 敗舡茹。古人以舡茹。今人只以麻筋和油石灰爲之矣。(李時珍)

【敗蓽】卽莞花之古籍別名。典見吳普本草。詳『莞花』條。

【敗筆頭灰】基本　本品係破舊之筆毛燒灰以供藥用。

採取 兎毫者爲最佳。

性質 微寒。無毒。

主治 水服。治小便不通。小便數難。淋瀝。陰腫。脫肛。中惡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論敗筆頭灰曰。酒服二錢。治男子交婚之夕。莖萎。【明】李時珍本草綱目論敗筆頭灰曰。酒服二錢。治難產。漿飲服二錢。治咽喉痛。不下飲食。

【敗鼓皮】**命名** 本品係舊鼓上兩面之破皮。故名。

採取 以黃牛皮者良。

性質 平。無毒。

主治 中蠱毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論敗鼓皮曰。治小便淋瀝。塗月蝕耳瘡。並燒灰用。

【敗龜版】卽龜版之處方用名。詳『龜版』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【敗瓢】命名 本品乃匏蚕破開爲之者故名。

採取 以苦匏者佳。年久者尤良。

性質 苦。平。無毒。

主治 消脹。殺蟲。治痔漏下血。崩中帶下赤白。

【敗醬】命名 本品根作醬氣。味故名。

古籍別名 鹿腸（本經）澤敗。鹿首。馬草（別錄）苦菜。苦蠪（綱目）

外國名稱 Patrinia scabiosaefolia, Link.（拉丁）

基本 屬敗醬科爲 Patrinia Scabiosaefolia, Link. 之根。



敗醬（一）

形態 敗醬爲多年自生之宿根草本。莖高三四尺。葉對生。下部者爲類菊葉之羽狀複葉。或羽狀裂葉。上部者爲細長單葉。或三裂。秋季於梢上簇生黃色小花。狀如薰蒿。根作紫白色。狀類柴胡。

採取 八月採根曝乾。

製法 雷敩曰。凡收得。便粗杵。入甘草葉相拌。對蒸。從巳至未。去甘草葉。焙乾用。



敗醬（二）

性質 苦。平。無毒。

效能 破瘀滯。活血。消癰腫排膿。磨障膜。消腎肉。用作瘡瘍藥。又爲目疾藥。

主治 暴熱。火瘡。赤氣。疥瘙。疽痔。馬鞍熱氣。（本經）除癰腫浮腫結熱。風痺不足。產後痛。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權：藥性本草論敗醬曰。治毒風瘡痺。破多年凝血。能化膿爲水。產後諸病。止腹痛。餘疹煩渴。【宋】大明：諸家本草論敗醬曰。治血氣。心腹痛。破癥結。催生落胞。血運。鼻衄。吐血。赤白帶下。赤眼障膜。腎肉聤耳。瘡癬。癰疥。癬丹毒。無一非實熱瘀滯之症。惟產後諸痛。當以瘀露作痛者爲宜。而澠湖所引別錄。竟作產後疾痛。大明本草又以產後諸病渾言之。則流弊良多。不可不知所辨別者也。

配合應用 ㊀治腹癰有膿。薏苡仁附子敗醬湯。用薏苡仁十分。附子二分。敗醬五分。搗爲末。每以方寸匕。水二升。煎一升。頓服。小便當下。卽愈。（金匱方）

㊁治產後惡露七八日不止。敗醬、當歸各六分。續斷、芍藥各八分。芎藭、竹茹各四分。生地黃炒十二分。水二升。煮取八合。空心服。（外臺祕要方）

㊂治產後腰痛。乃血氣流水。腰腿痛不可轉者。敗醬、當歸各八分。芎藭、芍藥、桂心各六分。水二升。煮八合。分二服。忌葱。（廣濟方）

㊃治產後腹痛如錐刺者。敗醬草五兩。水四升。煮二升。每服二合。日三服良。（衛生易簡方）

㊄治蠱。蛊尿瘡遶腰者。敗醬煎汁塗之良。（楊氏產乳方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯實熱者禁用。

參攷資料 ㊀敗醬乃手足陽明厥陰藥也。善排膿破血。故仲景治癰。及古方婦人科皆用之。易得之物。而後人不知用。蓋未遇識者耳。（李時珍）㊁南人採嫩者暴蒸作菜食。味微苦。而有陳醬氣。故又名苦菜。與苦蕒甜葵同名。亦名苦蘵。與酸醬同名。苗形則不同也。（李時珍）㊂處處原野有之。俗名苦菜。野人食之。江東人每採收鬻

近人學說 張山雷曰。敗醬有陳腐氣。故以敗醬得名。能清熱泄結。利水消腫。破瘀排膿。惟宜於實熱之體。本經稱其味苦平。主暴熱火創。赤氣。疥搔。疽痔。馬鞍熱氣等。（創今作瘡。搔今作瘙。馬鞍熱氣四字。頗不經見。蓋陰胯間熱氣蒸騰。亦陰分之溼熱也。）別錄稱其味鹹。微寒。除癰腫浮腫。結熱風痺。產後痛。甄權稱其辛苦微寒。治毒風。瘡痺。破凝血。能化膿爲水。止煩渴。療腹痛。產後諸病。日華治血氣心腹痛。破癥結。催生落胞。定血運。吐血衄血。赤白帶下。赤眼障膜。醬肉聤耳。瘡癬疥癬。丹毒。無一非實熱瘀滯之症。惟產後諸痛。當以瘀露作痛者爲宜。而澠湖所引別錄。竟作產後疾痛。大明本草又以產後諸病渾言之。則流弊良多。不可不知所辨別者也。

210／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲。春初生苗。深冬始凋。初時葉布地生。似松菜葉而狹長。有鋸齒綠色。面深背淺。夏秋莖高二三尺。而柔弱。數寸一節。節間生葉。四散如纖。顚頂開白花成簇。如芹花蛇狀子花狀。結小實成簇。其根白紫。顚似柴胡。(李時珍)

【敍肺候】卽款冬花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『款冬花』條。

【旋栗】卽橉栗之別名。性質功能。參詳『橉栗』條。

【旋復花】卽旋覆花之處方用名。詳『旋覆花』條。

【旋菖】卽旋花之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『旋花』條。

【旋花】古籍別名 筋根(本經)美草(別錄)旋菖(蘇恭)續筋根。鼓子花。纯腸草。(圖經)天劍草。纏枝牡丹。(綱目)打碗花。狗兒蔓。纯腸草。掛金燈。牽枝牡丹。(和漢藥考)

外國名稱 Calystegia sepium, R. Br. var. japonica, (拉丁)

基本 屬旋花科。爲旋花之莖葉花根。

產地 凡川澤田野間恒多生爲。

形態 旋花爲多年生蔓性草本。多自生於原野道旁。莖細長。左旋纏繞他物而成長。葉爲箭狀。又似戟。長二三寸。中片特長。末端稍凸而尖。其側片則極短。具長葉柄。皆互生。盛夏葉腋開合瓣花。色淡紅。狀似喇叭。類牽牛花而小。朝開暮謝。果實爲扁平之蒴果。內分三室。室藏種子數粒。根色白。細如筋。雖寸寸切斷。仍能生長爲一體。其繁殖力頗强也。



旋花

採取 五月採花陰乾。二月八月採根日乾。

性質 花甘。根辛。溫。無毒。

效能 補陰。續筋。用爲利尿藥。

主治 面皯黑色。媚好益氣。根主腹中寒熱邪氣。(本經)利小便。久服不飢。輕身。續筋骨。合金瘡。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺。論旋花曰。搗汁服。主丹毒。熱。【明】李時珍本草綱目。論旋花曰。補勞損。益精氣。

配合應用 (一)治被斫斷筋。旋菖根搗汁。灑瘡中。仍以滓傅之。日三易。半月卽斷。筋處便續。(外臺秘要方)

(二)太乙金鎖丹。祕精益髓。用五色龍骨五兩。覆盆子五兩。蓮花鬚四兩。未開者陰乾。鼓子花三兩。五月五日採之。雞頭子仁一百顆。並爲末。以金櫻子二百枚去毛。木臼搗爛。水七升。煎濃汁一升。去滓。和藥杵二千下。丸梧子大。每空心溫鹽湯下三十丸。服之至百日。永不泄。如要泄。以冷水調車前末半合服之。忌葵菜。(瑞竹堂方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 (一)凡藤蔓之屬。象人之筋。所以多治筋病。旋花根細如筋。可喫。故別錄言其久服不飢。時珍自京師還。見北上車夫每載之云。暮歸煎湯飲。可補損傷。則益氣續筋之說。尤可徵矣。(李時珍)(二)旋花蔓生。今之河北京西關陝田野中甚多。最難鋤芟。治之又生。世又謂之鼓子花。言其形肖也。四五月開花。亦有多葉者。其根寸截置之土下。頻灌漑。方涉旬。苗已生。(蘇恭)(三)旋花卽平澤旋菖也。其根似筋。故一名筋根。(蘇恭)(四)其花不作瓣狀。如軍中所吹鼓子。故有旋花鼓子之名。一種千葉者。色似粉紅牡丹。俗呼爲纏枝牡丹。(李時珍)(五)旋花田野塍壅皆生。逐節蔓延。葉如波棱葉而小。至秋開花。如白牽牛之花。粉紅色。亦有千葉者。其根白色。大如筋。不結子。(李時珍)

【旋龜】形態 旋龜爲介類龜屬之一種。鳥首鳧尾。聲如破木。可供藥用。

主治 耳聾佩之。

【旋覆花】命名 本品花綠繁茂。圍而覆下。故名。

處方用名 旋復花。金佛花。全福花。金佛草。全福梗。

古籍別名 金沸草。(本經)戴椹。(別錄)金錢花。滴滴金。夏菊。(綱目)盜庚。(爾雅)癸菊。滴淚。盛椹。六月菊。野金錢。野油菊。(總徵

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

論）飛天蠶。疊羅黃。（和漢藥考）

毗尸沙（西陽雜俎）

基本 屬菊科。爲旋覆之花蕾。

產地 凡川谷平澤間恒多生。焉。陳仁山藥物生產辨云旋覆花產廣西賀縣鐵山、八步。廣東下四府惠州、陽江等處均有出。

形態 旋覆花爲多年生草本。多自生於原野之濕地。春日生苗。莖長一二尺。多一株一莖。有時出二莖。葉無柄。形若披針。邊緣有粗鋸齒。微有毛。皆互生。至夏梢端開黃花。大如錢。其形若菊。排列爲頭狀花序。其周圍之花爲舌狀花冠。中心之花爲筒狀花冠。有單瓣、雙瓣二種。根作白色。鬚蔓延。殊茂盛。



旋覆花

採取 七八月間採花日乾。

製法 雷敦曰。採得花去蓋并殼皮及蒂子。蒸之。從巳至午。曬乾用。

用法 恒入煎劑。須用綿包。或以絹袋盛。褒。蓋有細毛。恐射入肺令人咳逆。間有焙剉爲末。和作丸散。

性質 鹹。溫。有小毒。

效能 下氣。消痰。除噫。噯。軟堅結。用作健胃祛痰藥。

主治 結氣。脇下滿。驚悸。除水去五臟間寒熱。補中下氣。（本經）消胸上痰結。唾如膠漆。心胸痰水。膀胱留飲。風氣溼痺。皮間死肉。目中眵曚。利大腸。通血脈及益色澤。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權：藥性本草論旋覆花曰。主水腫。逐大腹。開胃止嘔。逆不下食。【宋】寇宗奭本草衍義論旋覆花曰。行痰水。去頭目風。【元】王好古湯液本草論旋覆花曰。消堅軟痞。治噫氣。【明】繆希雍本草經疏論旋覆花曰。旋覆花別錄甄權、日華子、寇宗奭皆無毒。宗奭又加苦辛而曰冷利。其稟冬之氣而生者乎。故其味首係之以鹹。潤下作鹹。鹹能軟堅。別錄加甘。甘能緩中。微溫。能通行。故主結氣。脇下滿。心脾伏飲。則病驚悸。飲消則復常矣。除水去五臟間寒熱。及消胸上痰結。唾如膠漆。心脇痰水。膀胱留飲。風氣溼痺。皮間死肌。目中眵曚。利大腸者。皆軟堅冷利。潤下。消痰飲。除水之功也。其曰補中下氣者。以甘能緩中。鹹能潤下故也。通血脈。益色澤者。蓋指飲消則脾健。健則能運行。脾裹血叉統血故也。【清】黃宮繡本草求眞：論旋覆花曰。旋覆花卽本經所名金沸草者是也。其性雖兼辛溫。凡陰虛勞嗽。風熱燥嗽。不可誤用。用之其嗽必甚。究之味苦而鹹。性主下降。凡心脾伏飲。脇下脹滿。胸上痰結。唾如膠漆。風氣溼痺。皮間死肉。服之卽能有效。更能續筋敷傷。是以仲景之治傷寒汗下後。心下痞堅。噫氣不除。有旋覆代赭石湯。並金匱中產漏下。有旋覆花湯。胡治治痰飲在兩脇脹滿。有旋覆花湯。皆取苦能下氣故耳。惟其性專主下。故書皆載病衰弱。大腸虛寒。暑切忌。以其不禁再下故也。五月五日採花曬乾。去皮蒂。蒸殼用。【清】葉天士本草經解論旋覆花曰。旋覆氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味鹹有小毒。得地北方陰慘之水味。入足少陰腎經。氣味降多於升陰也。溫能散結。鹹能軟堅。故主結氣脇下滿也。水氣乘心則驚悸。鹹溫下水。所以幷主驚悸也。去五臟間寒熱者。五臟藏陰臟也。痰蓄五臟。則臟陰不藏。而寒熱矣。鹹溫可以祛痰。所以去寒熱也。補中者。中爲脾胃。水行痰消。則中宮脾胃受補也。下氣者。鹹性潤下也。因有小毒。所以服之必煩也。【清】陳修園本草經讀論旋覆花曰。旋覆花氣溫。稟風氣而主散。味鹹。得水味潤下而軟堅。味勝於氣。故以味爲主。唯其軟堅。故結氣脇下滿等證。皆能已之。唯其潤下。故停水驚悸及五臟鬱滯而生寒熱等證。皆能已之。藉鹹降之力。上者下之。水氣行。痰氣消。而中氣自然受補矣。

近人學說 ㊀張山雷曰。旋覆花體質甚輕。飛揚疏散。其主治。當以泄散風寒。疏通脈絡爲專主。別錄治風氣溼痺。皮間死肉。通血脈。宗奭去頭目風。皆其輕疏泄散之功也。以治風寒喘嗽。寒飲滾肺。最是正法。或謂旋覆降氣。寒邪在肺

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者不宜早用則止知疏泄之力足以下降而不知其飛揚之性本能上升且本經明謂其溫寇宗奭又以爲辛則疏散寒邪正其專職若其開結泄水下氣降逆等治則類皆沈重下達之義頗嫌其與輕揚之本性不甚符合按本經旋覆花一名金沸草局方有金沸草散一方疑古人本有用其莖葉而未必皆用其花者考草木花葉之功用不同者甚多或升或降各有取義亦其稟職使然不容混合且莖則質重花則質輕亦物理自然之性況旋覆花之尤爲輕而上揚者乎乃今人恒用其花而並不用莖葉竟以重墜之功責之輕揚之質恐亦非古人辨別物性之眞旨也且其花專主溫散疏泄之力亦猛宜於寒飲而不宜於熱痰石頑曰謂陰虛勞嗽風熱燥咳誤用之嗽必愈甚是亦以其輕揚升泄太過正與降氣之理相反惟其輕飄之性流動不滯自能流通氣化而宣壅塞固非專以升散見長若但以逐水導濕爲治似不如兼用其莖葉較爲近理別錄稱其根專主風溼其意可曉然也㊁黎伯概曰今日之旋覆花大概有二種一稱廣旋覆一稱漳旋覆當爲廣漳二州所出不然不冠以廣漳二字然二種性質不同廣旋覆花堅小而色深黃花瓣並不開展所謂旋覆實言其象與本草綱目所云形似菊又稱金錢花狀況不殊惟漳旋覆不然花瓣輕飄色白與本草所說大相徑庭此味本治胸結痰飲降氣下行本草稱其氣味鹹溫張仲景旋覆代赭石湯治水飲噫氣輭嘔實相吻合此惟廣旋覆合用若漳旋覆氣味未必鹹溫色白質輕性揚與病理實不相投此種花究竟不知何花而亦被以旋覆之名可謂名不副實核其形態絕不相類處方者若率書旋覆花則爲廣爲漳任由藥店支配而醫士未必盡知是則此物亦須特別註明方可也

配合應用 ㊀治中風壅滯用旋覆花洗淨焙研煉蜜丸梧子大夜臥以茶湯下五丸至七丸十丸（經驗方）㊁治半產漏下虛寒相搏其脈弦乳旋覆花湯用旋覆花三兩葱十四莖新絳少許水三升煮一升頓服（金匱方）㊂治月蝕耳瘡旋覆花燒研羊腦和塗之（集簡方）㊃治小兒眉癬小兒眉毛眼瞤因癬退不生用野油化卽旋覆花赤箭卽天麻苗防風等分爲末洗淨以油調塗之（總微論方）㊄胡治治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花丸。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡眞元虛衰而無實邪者禁用。

著名方劑 七物旋覆代赭湯治傷寒汗吐下後心下痞硬噫氣不除此主之（仲景方）旋覆花三兩人參二兩生姜五兩（切）半夏半升（洗）赭石一兩大棗十二枚炙甘草三兩上七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服。

參攷資料 ㊀寇宗奭言其行痰水去頭目風亦走散之藥病人涕唾盛者不宜多服冷利大腸宜戒也（朱震亨）㊁諸名皆以花狀命也爾雅云覆盆庚也庚者金也謂其夏開黃花盆藏金氣也西陽雜俎云金錢花一名吡尸沙自梁武帝時進入中國（李時珍）㊂今所在皆有二月以後生苗多近水旁大似紅藍而無刺長一二尺以來葉似柳莖細六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼爲金錢花七八月採花今近道人家園圃所蒔金錢花花葉並同極易繁盛恐卽旋覆也（蘇頌）㊃旋覆葉如大菊又如艾高秋開花如梧桐子花淡黃色其香過於菊別有旋花乃鼓子花非此花也（寇宗奭）㊄花狀如金錢菊水澤邊生者花小瓣單人家栽者花大蕊簇蓋襄療使然其根細白俗傳露水滴下卽生故易繁亦不然（李時珍）

【旋覆根】㊀治 療風濕緩筋斷搗傅之。

【旋覆葉】㊀治 傅金瘡止血。

【歷代記述弦醫】【明】李時珍本草綱目論旋覆葉曰治疔瘡腫。

【斜枝大士】卽龍膽之古籍別名。

213／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見和漢藥考。詳『龍膽』條。

【斜枝大夫】卽龍膽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍膽』條。

【既濟公】卽升麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『升麻』條。

【晚李子】卽李子之遲熟者。詳『李子』條。

【晚娘棒】卽鳥不宿之古籍別名。典見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】卽粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚蠶矢】卽原蠶沙之古籍別名。典見方書。詳『原蠶沙』條。

【晚蠶沙】卽原蠶沙之處方用名。詳『原蠶沙』條。

【晚蠶蛾】卽原蠶蛾之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『原蠶蛾』條。

【曹公爪】卽枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【曹末砂】卽硇砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『硇砂』條。

【曼陀羅】

命名 道家北斗有陀羅星使者手執此花。故後人因以名之。

處方用名 曼陀羅花。曼陀羅子。曼陀羅葉。

古籍別名 風茄兒。山茄子。(綱目)惡客。(姚伯聲花品)佛花。雜色癲茄。(善樂草醉仙桃。閻陀羅華。天茄。胡陀花。高麗牽牛花。(和漢藥考)佛茄兒。東蔓麻子。(新本草)

外國名稱 Stramonium (Datura Alba.) (Thornapple Jamestown Weed.)

基本 屬茄科。藥用曼陀羅之花子與葉。

產地 凡山野路旁間。恒多生焉。

形態 曼陀羅爲一年生草本。自生於山野路旁。或種植園圃。春日抽莖。至夏可高三四尺。分枝稀疎。葉爲巨大之卵圓形。彼此互生。似茄子葉。有不整之尖。晚夏開放白花。狀如喇叭。花冠頗長。有突起五朝。開夕萎。實爲裂果。大可寸許。其形橢圓。外生多刺。中藏種子無數。扁平色黑。此爲毒草。故花、葉、莖、實皆毒。子毒尤甚。人誤食之。立卽狂亂。洋產曼陀羅(Datura Tatula, L.)莖高一尺至五尺。紫色。葉形卵圓。有不整之缺裂。其柄頗長。彼此互生。夏日葉腋開紫花。作喇叭狀。又似漏斗。但不全開耳。花冠之邊緣。俱作五裂。果實爲蒴果。外生頼剌。中藏無數扁平之黑色種子。其葉爲尖卵圓形。其邊緣有三五不整之尖。葉柄頗長。面深綠。背淡綠。有一種不快之麻醉性臭。乾則無之。味苦辛。種子色褐黑。有光澤。扁平。形如雞心。有小窩點。中藏多白汁之胚乳。與鉤狀之子葉相同。



曼陀羅

效能 爲麻醉藥。用於喘息及痙攣性咳嗽。他如神經痛。梅毒。癌腫。痛風等症。俱可治之。尤能治老年哮喘。

主治 諸風及寒濕腳氣。煎湯洗之。又主竊痔及脫肛。幷入麻藥。

作用 入胃後。略能激胃壁神經。梢。使麻醉之。至腸被吸收而至血中。與血液極不起變化。其功效最著者。卽由末梢神經受激而傳達腦神經。使腦部受激而將全身血管收縮。心跳增速。全身分泌減少。瞳孔亦隨而縮小。同時腸蠕動亦被激而增加。若服大量。則心跳弛緩。血壓減低而死。

採取 八月採花及葉。九月採實。

用法 劑末和入麻藥中。

性質 辛。溫。有毒。

成分 曼陀羅華之有效成分。據下山藥學博士所實驗。知其爲菲沃斯卻明(Hyoscyamin $C_{17}H_{23}NO_3$)又藥學士兒島高里。依下山博士之指導。將日本產曼陀羅華子行化學檢查。結果與洋種

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

包藏於結晶質。味微苦而鹹。此藥須特別貯藏。一次極量〇・二(〇.8g)。一日極量〇・六(〇.8g)。和漢藥考曰。前人行外科手術時。每以曼陀羅華配和爲麻醉藥。從前外科大家華岡清洲。祕製麻藥方劑。曾配合曼陀羅華。醫事啓源載之。茲摘錄如下。曼陀羅花八分(陳舊者佳。新者發嘔)。草烏頭二分。白芷二分。當歸二分。川芎二分。上五味爲粗末。一劑。空心服之。須臾心氣昏暈。手足麻痺。或洗眠不覺。或鬧亂發狂。乘時治之。既而飲以濃茶。又與黃連解毒加石膏湯。二三時乃醒。如目眩、咽乾、神氣不復者。用黑豆湯卽解。倘其不醉者。更飲溫酒或乘興動搖。必醉。其醉有遲速者。由天資有躁靜爾。英美學說謂此藥產中國、印度、歐羅巴及北亞美利加等。處處有之。葉與花及子均可入藥。內含一精。卽打都仁精。如用其子。須用其成熟者。如用其葉。則新乾均可。如用其花。則用其新乾者。功力勝於其葉而遜於其子。此藥在印度古時卽用爲藥品。而阿剌伯人則從印度得之。此草全體有大臭。能從遠處分辨之。其全體均有藥性。其作用爲止痛藥。又爲治轉筋藥。又因其能止痛。則能助睡。如臟筋疼或風溼。無論作內外科之用。均能減痛。又如發狂之人服之。亦能平心。然用藥而服至三四釐。則必脈略數。頭略昏。遍體發熳。而面與手亦旋發汗。倘服藥而至八九釐。則能令人醉。身略發熱。語多含糊。甚至瞳人散大。作渴作悶。小便發多。大便亦不禁。若服過多。則語言顛倒。恍如沉醉。有患氣喘類病者。將其葉作煙葉燃吸。以一分至半錢爲一次。能頃刻見效。然作煙吸時。亦不可過多。其功用能治咳嗽。胃氣疼。若外用能止痛。可作貼膏油膏用。至解藥之解此毒。與顚茄同。

配合應用 ㈠治面上生瘡。曼陀羅花晒乾研末。少許貼之。(衛生易簡方)

㈡治小兒慢驚。曼陀羅花七朶。重一字。天麻二錢半。全蝎炒十枚。天南星炮。丹砂乳香各二錢半。爲末。每服半錢。薄荷湯調下。(御藥院方)

㈢治大腸脫肛。曼陀羅子連殼一對。樣斗十六箇同剉。水煎三五沸。入朴硝少許洗之。(儒門事親方)

參攷資料 ㈠相傳此花笑采釀酒飲。令人笑。舞采釀酒飲。令人舞。予嘗試之。飲須半酣。更令一人或笑或舞。引之乃驗也。八月採此花七月採火麻子花。陰乾。等分爲末。熱酒調服三錢。少頃昏昏如醉。割瘡炙火。宜先服此。則不覺其苦也。(李時珍)㈡法華經言。佛說法時。天雨曼陀羅花。又道家北斗有陀羅星使者。手執此花。故後人因以名花。曼陀羅。梵言雜色也。茄乃因葉形爾。姚伯聲花品呼爲惡客。(李時珍)㈢曼陀羅生北土。人家亦栽之。春生夏長。獨莖直上。高四五尺。生不旁引。綠莖碧葉。葉如茄葉。八月開白花。凡六瓣。狀如牽牛花而大。攢花中折。酥葉外包。而朝開夜合。結實圓而有丁拐。中有小子。八月採花。九月採實。(李時珍)㈣日本近代世事談云。朝鮮牽牛花來自貞享年中。八月開白花。顏似朝顏。一名曼陀羅花。乃蔓草也。

(和漢藥考)

【曼陀羅花】卽曼陀羅之處方用名。詳『曼陀羅』條。

【曼陀羅葉】卽曼陀羅之處方用名。詳『曼陀羅』條。

【曼陀羅樹】卽山茶花之古籍別名。典見綱目。詳『山茶花』條。

【曼珠沙華】卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【曼遊藤】 古籍別名 沉醜藤(綱目)

產地 生山谷中。

形態 曼遊藤爲蔓草類之一種。莖纏木上。狀如寄生。葉似柳。春月開紫色花。可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 久嗽。癬疾。久服長生延年。

【望日砂】卽兎屎之古籍別名。典見綱目。詳『兎屎』條。

【望月砂】卽兎屎之處方用名。詳『兎屎』條。

【望江青】 古籍別名 還精草。玉星草。銀腳驚鷺。血見愁。天芝麻(綱目拾遺)。九節金獅草(秋泉家祕)

215／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

處地　多生澤旁湖岸間。

形態　望江青爲澤草類之一種。穀雨後始發苗。莖方中空。葉狹長而尖。有鋸齒。對節生。小滿後抽莖開花成穗。細紫層層直上。寒露時則枯。根多鬚。節間方而色白。極長中亦空明。絕類水芹。可供菜用。

性質　苦。微寒。無毒。

主治　止吐血。生精力。除濕熱。去星障。療肺癰。勞傷脫力及小兒驚風。同金器煎服。

配合應用　㈠治打傷撲傷。最活血。搗汁。沖酒服。渣罨傷處。同牛膝、芍藥、當歸、獨活、玉叉草、活血丹、七葉草、五爪龍、放棒行、金雀腦、覆絲藤、瓜瓣草等。和勻搗汁。加酒服之。損傷垂死。但得入咽可生。並治諸爛痛瘡癬吐血亦效。

㈡去目中星翳障。望江青一兩。羊肝一具。同豆腐煮食。（百草鏡方）

㈢治吐血。白蜜二兩。隔湯頓熟。望江青一兩。煎汁。沖蜜服。不論遠年新起一切血症。二服除根。但服此藥後。每服須吃桂圓五觔。二服吃十觔。方無後患。此藥服後。人如醉。惺惺然欲睡。一週時自愈。再得燕窩粥培元更妙。

㈣治乳癰乳核。秋泉家祕祖傳天下第一奇方。治乳癰乳核。腫硬大者服之。卽內消。用九龍川。卽龍見怕一兩。細葉冬青。卽山黃楊五錢。龍爪棠金鞭。卽馬鞭草。又名龍爪草一兩。金剪刀三錢。九節金絲草。卽望江青五錢。遍地金龍草。卽地五爪三錢。用無灰酒二碗。加香糕葉。或橘葉十餘片。煎鐘半。饑時隨量二三次服之。渣再煎服。

㈤絕癮。望江青乾者五錢。煎酒服。

【望江南】　古籍別名　飯匙倩　草。蛇滅門草。（和漢藥考）　大吳風草。（植物辭典）

基本　係屬豆科。望江南 Cassia Occidentalis. L. 之子實。

產地　生山野陰地。

形態　望江南爲草本。高二三尺。葉概爲五對。裏葉各小葉作卵圓或長橢圓形。前端尖。於莖之上部葉腋抽莖。開黃花。莖之下部葉腋亦著花。花後結長三寸許之莢果。中有作嘴狀之多數扁卵圓形種子。

成分　望江南所含之成分。大約與大黃及「弗蘭格拉」皮中所含「愛莫琴」$C_{14}H_4CH_3(OH)_3$相同。

採取　十月間採實去莢用。

主治　腹痛。下痢食傷。白湯下十二三粒。

【望江南葉】　主治　蛇蟲咬傷。採葉貼之。

【望見消】　卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【望春】　卽辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛夷』條。

【望果】　卽蜜望子之古籍別名。見綱目拾遺。詳『蜜望』條。

【望魚】　卽鱭魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱭魚』條。

【梁上塵】　古籍別名　倒掛塵。　烏龍尾。烟珠。（綱目）

基本　本品卽屋上倒挂之塵。

製法　雷敩曰。凡梁上塵。須去烟火。大遠高堂殿上者。拂下篩淨。末用。李時珍曰。凡用倒掛塵。燒令烟盡。篩取末入藥。雷氏所說。似是梁上灰塵。令人不見用。

性質　辛。苦。微寒。無毒。

主治　腹痛。噤脣。中惡。鼻衄。小兒轉癇。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論梁上塵曰。食積止金瘡血出。斷出血。

【梁州礬石】　卽特生礬石之古籍別名。典見綱目。詳『特生礬石』條。

【梅子水】　性質　酸鹹。無毒。　主治　諸毒惡瘡。

參攷資料　造梅子水法。用大梅子三五十個。搗碎。入有嘴瓶內。加鹽三兩。入河水浸過二指。日取蜈蚣投入。多多益善。經年更佳。凡毒將水擦之卽消。（秋泉祕錄）

【梅仁】　卽梅核仁之簡稱。詳『梅核仁』條。

【梅片】　卽冰片之處方用名。詳『冰片』條。

【梅冰】　卽冰片之別名。詳『冰片』條。

【梅杏】　卽杏之實黃而味酸者。性質功能。與尋常杏同。參詳『杏』條。

【梅花】　處方用名　綠蕚梅。紅梅花。綠梅花。

古籍別名　杲（綱目）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

基本　屬薔薇科爲梅樹(Prunus Mume, S. et Z.)之花蕾。

形態　梅爲落葉喬木之一種。樹幹高達二三丈。葉互生作長卵圓形。邊緣有鋸齒。在早春未長葉前先衆樹而開單瓣或重瓣之圓形花。有香氣。色有紅白淡紅等。初開時。微帶皺綠色。凡花蕾實仁實水葉梗根均能療病。另詳各該條。

種類　梅之種類頗多。其主要者有鶏項梅、重葉梅、野梅、鴛鴦梅、早梅、綠萼梅、六瓣梅、水梅、紅梅等。

採取　以單葉綠萼者入藥良。含苞者力較勝。採取時不犯人手者更佳。

性質　微酸。濇。無毒。

效能　開胃散鬱。生津止渴。解暑除煩。安神定魄。滌痰熱。清頭目。利氣平肝。

主治　痰熱壅滯。唇瘡。瘰癧。瘤結核。先天胎毒。痘毒。一切中毒。

配合應用　㈠治療癧方。以雞蛋開一孔。入綠萼梅花將開者七朶。封口飯上蒸熟。去梅花食蛋。每日一枚。七日全愈。

㈡治唇上生瘡。白梅瓣貼之神效。如開裂出血者即止。（赤水玄珠方）

㈢宜端午日製合。飛硃砂紅芽大戟、處州山茨菇、千金霜、川文蛤、淨粉草、河車。以上六味各二兩。珍珠、琥珀、明雄黃、冰片、陳金墨各五錢。梅花蘆、西牛黃各一兩。川麝香四錢。上各藥爲末。乳飾極細。以糯米粉糊杵爲丸。研用。（紫金錠方）

㈣白梅花蘆三錢。採飽綻者。須預備曬乾。生地黃三錢。當歸三錢。生甘草一錢。臍帶小兒自己落下時去灰。或用纏新瓦炙存性。研極細末。同煎濃汁。滷清熬膏。作一日吃完。可使小兒永不出痘。萬病回春。（稀痘神方）

㈤九仙奪命丹。集驗云。又名十聖丹。治七十二般無名腫毒惡瘡流注、火痺等症。硃砂三錢。雄黃乳香、沒藥、冰片、血竭各二錢。石膽、礬、銅青、麝香枯礬、熊膽、飛過黃丹各一錢五分。蜈蚣、蚯蚓、殭蠶各二條。微炒黃色去嘴。梅花一升。寒水石、牛黃、蟾酥、白宮粉、硼砂各一錢。全蝎九個。蜗牛七條。以上廿三味爲末。研極細。以硃砂一錢五分爲衣。其修合之法。先將蟾酥用乳汁化開。共爲丸。如丸不起。略加麵糊。如桐子大。每服一丸。令病人口嚼生葱一根。咽下。又嚼一根極爛。吐在手心上。裹藥用滾熱老酒吞下。量冷暖時候。蓋被出汗。如病人不能嚼。人代嚼之亦可。如無汗。再服一丸。自愈。凡諸毒證。週毒走攻心。必不可救。若汗來。週以熱酒催之。不可以手摸。摩患處。如癢以舊木梳梳之自止。（九仙奪命丹方）

㈥用綠萼梅花七朶。須預養於花瓶內。春分日摘花半開者。只用淨瓣搗爛。白糖三匙。滾水服之。毒即全消。免出痘矣。小兒滿月後即可服。（稀痘方）

㈦新安汪偉公先生。傳其家親友。凡小兒服此丸。永不出痘。其方即前稀痘神方。臍帶曰坎氣。梅花先天之氣。故名二氣丸。（二氣丸方）

㈧梅花點舌丹。治一切疔毒及惡瘡初起。天行瘟毒。咽喉腫痛等症。輕者二粒。重者四粒。先用無根水送下。次取一粒。噙於舌下化之。乳香去油二兩。珍珠豆腐煮過。麝香水飛。熊膽各六分。沒藥去油。京牛黃、苦淨蘆、硃砂、硼砂、蟾酥、人乳泡血竭、雄黃水飛各二錢。片腦一錢。另研沈香一錢。白梅花陰乾一錢二分。共爲細末。用人乳汁化蟾酥丸。黍米大。金箔爲衣。（集驗方）

㈨三花丹。將出痘之時。用此能稀痘。梅花、桃花、梨花。取已開未開者。陰乾爲末等分。蒐腦爲丸。雄黃爲衣。用赤小豆蒸豆、黑大豆湯送下。（赤水玄珠方）

㈩預稀痘疹。每年臘月清晨摘帶露綠萼梅蘆一百朶。加上白糖搗成小餅。令食之。（不藥良方）

(一)張璞種痘新書。治痘氣血兩虛。灰白水泡。瘡場等症。黃芪二兩。人參一兩。甘草五錢。紫河車一兩。梅花一兩五錢。鹿茸一兩。共爲末。每服八九分。用內托散煎湯下。氣實者。加山查、陳皮各五錢。（七仙丹方）

(二)用生青果核七個。碎去仁。曬乾。研極細末。不宜火焙。又不宜沾生水。再用玉蝶梅花二十一朶去蒂。共白蜜兩茶匙。搗濃。恰交春分時。與小兒服。可永不出痘。即出亦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不過數粒。此方傳自江寧王培德家。已九世無痘爲之見眞異方也。（青梅散方）

㊀梅桃丹。治痘已出未出。不起不發。隱在皮膚。並治麻症斑症。用梅花一兩。桃仁。炭。砂。甘草各二錢。絲瓜五錢爲末。每服五分。參蘇湯下。痘不問前後。凡黑陷咬牙寒戰。用梅花六錢。穿山甲一兩。仙靈脾五分。麝香一錢爲末。每服三五分。咬牙戰。加人牙二三釐。內托散送下。（赤水玄珠方）

㊁種痘新書云。能起五陷。黃蠟梅花。棄心者尤良。陰乾不拘多少。去毛殼。罐盛。蠟用桃花陰乾。山查去核。炒爲末。小絲瓜陰乾爲末。陳皮去白。人參。黃芪。炙甘草。炙硃砂。紫河車。酒洗去筋。燕焙乾。鹿茸酒酥炙。穿山甲。取首尾四足者。炒。仙靈脾去四弦。刺酒焙。人牙火煅。韭汁炸七次。各爲末。用按綱目梅花條下。並無主治。而於臘梅花下亦僅言解暑生津而已。不知臘梅亦並非梅種。其主治亦廣。不僅治痘也。（二花散方）

㊂絕痘。用南方綠萼梅蕊。未放採。藏。風乾。逢四時八節。節前一日。用雞蛋一個。打孔入蕊。紙糊好。飯上蒸熟。吃數次。永不出痘。即出亦不過數粒。（楊春涯驗方）

㊃解痘毒。立春前後三日。採紅梅蕊。半含半開者。一鐺去蒂。仍安鐺內。磁碟蓋住。一週時足。氣汁升上。用新搥盆。未經五辛者。擂研如泥。撽成餅。樣加明硃砂水飛一錢。勻。摻於上。緩緩研勻。再加白蜜少許。丸如彈子。曬半乾。金箔爲衣。每服一丸。甘草湯下。忌鐵器。葷腥。服過一丸後。當日晚間。微微發熱。次日遍身發出細瘡。是其驗也。朱再功仙傳稀痘方。赤豆。黑豆。蕎豆各一兩。研末入新竹筒中。削皮留節。鑿孔入藥。杉木塞緊。用蠟封固。臘月浸廁中。一月取出。風乾。每藥配梅花片三錢。每服一錢。以經霜絲瓜藤筋煎湯下。神效。（劉氏得效方）

㊄龍腦骨。治痘出未透。心狂見鬼。陷伏等症。用梅花不拘多少。曬乾爲末。加冰片少許。共研爲末。以猪心血和勻爲丸。狂譫者。燈心湯引。紫陷者。以紫草煎湯調之。加酒數茶點化下。（種痘新書方）

㊅千里梅花丸。途中備用。用枇杷葉。乾葛。末。百藥煎。烏梅肉。臘梅花。甘草各等分爲末。用蠟化開。投蜜。每蠟一兩。加白蜜二錢。和藥末。搗二三百下。丸如雞豆實大。夏月長途。含化一丸。津液頓生。寒香滿腹。妙不可言。（醫學指南方）

參攷資料　㊀白梅花。古方未見用者。近時有梅花湯。用半開花溶蠟封花口。投蜜罐中。過時以一兩。柔同蜜一匙。點沸湯服。又有蜜漬梅花法。用白梅肉少許。浸雪水潤花露一宿。蜜浸薰酒。又梅花粥法。用落英入熟米粥。再煮食之。故楊誠齋有蜜點梅花帶露餐及脫蕊收將熬粥喫之句。皆取其助雅。致清神思而已。（李時珍）㊁梅花冬蕊春開。其花不畏霜雪。花後發葉。得先天氣最足。故能解先天胎毒。（百草鏡）

【梅花冰片】即冰片之處方用名。詳『冰片』條。

【梅花鹿】即鹿之毛褐色而有白星斑點者。以之入藥最良。性質功能。參詳『鹿』條。

【梅花腦】即龍腦香之狀如梅花者。爲最上品。性質功能。參詳『冰片』條。

【梅柏砂】即硃砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『硃砂』條。

【梅桃】即山梨。桃之古籍別名。典見綱目。詳『山梨桃』條。

【梅核仁】基本　本品即梅實中之核仁。

性質　酸。平。無毒。

主治　明目。益氣。不饑。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草。論梅核仁曰。除煩熱。【明】李時珍本草綱目。論梅核仁曰。治代指。忽然腫痛。搗爛和醋浸之。

【梅梗】採取　以綠萼者入藥良。並宜帶葉成枝者用。

主治　通上下膈氣。並治婦人小產。

參攷資料　㊀凡梅有氣條。青翠色。此條無葉止光梗出枝鱗薛徵君生白曾言。用以通上下膈氣有效。此氣條而非梗也。（趙學敏）㊁保產神效方。凡婦人妊娠三月。久慣小產。百藥不效者。以梅梗三五條。煎濃湯飲之。復飲龍眼湯。無

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有不保者。(道聽集)

【梅葉】 性質 酸。平。無毒。

主治 休息痢及霍亂。煩燥。濃汁飲。

參攷資料 ㊀嵩陽子言。清水採梅葉。洗蕉葛衣。經夏不脆有驗。(陳藏器)㊁夏衣生黴點。梅葉煎湯洗之。即去甚妙。(李時珍)

【梅精】 即冰片之別名。詳『冰片』條。

【梅實】 古籍別名 生青梅。黃熟梅。

產地 河南、湖北、川蜀、江、浙諸省境內均有產之。

基本 屬薔薇科。爲梅樹之果實。

形態 梅實作球圓形。小如彈丸。大如杏實。表皮作絨毛樣之光芒。於夏日梅雨時節結實。在未熟期內。色爲翠綠。成熟後色呈杏黃。稍間紅色。內質鬆脆。多液無滓。含之香口。嚼之頗酸。取之可供食與藥用。

製法 採用半青半黃之梅實。每箇用鹽一兩。(鹽少不效)淹浸一日一夜。取出晒乾。又淹又晒。漬至鹽水盡爲度。每用青銅錢三枚。夾鹽梅兩箇。麻線紮住。裝貯瓷罐內。封固埋藏地中。約經百日許。取出可用。埋藏一年者佳。以愈陳愈良。又有用糖漬鹽浸者。爲白梅。薰黑者。名烏梅。各有效能。另詳各該條。

性質 酸。平。無毒。

主治 痰涎壅塞。喉如有物。膈間作痛。吐之不出。嚥之不下。梅核膈氣。用此含口。嚥汁入喉。即消。

參攷資料 ㊀梅花開於冬而實熟於夏。得春之全氣。味最酸。性能收斂。食之生津。糖藏可充果餌。榨汁可以製梅醬。(李時珍)㊁梅實多食。損齒傷筋。蝕脾胃。令人發膈上痰熱。齒齲者。嚼胡桃肉即解。曾服黃精者。忌食。(大明)㊂梅實如同蒜粉拌食。則不酸。且無齲牙之患。(物類相感志)

【梅實仁】 即梅核仁之別名。詳『梅核仁』條。

【梅實水】 即梅子水之別名。詳『梅子水』條。

【梅樹根】 採取 以不出土者用。主治 風痺。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論梅樹根曰。煎湯飲。治霍亂。止休息痢。

參攷資料 ㊀梅樹根。出土者。不可用。用之殺人。(綱目)㊁初生小兒。取梅樹根。同桃李根。煮湯浴之。無瘡熱之患。(崔氏纂要)

【梅螺】 即吐鐵之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『吐鐵』條。

【梅露】 性質 酸。斂。

主治 生津解渴。

參攷資料 ㊀鮮綠萼初放花。採取蒸露。能解先天胎毒。六月未出痘小兒。和金銀露食之極佳。㊁閩小記海澄人。蒸梅及薔薇露。取如燒酒法。酒一壺。滴少許。便芳香。(周櫟園)

【梅邊】 即鞭筍之感梅雨濕氣而早生者。味淡肉硬。不及秋生者佳。性質功能。參詳『鞭筍』條。

【梓】 古籍別名 木王。(綱目)

外國名稱 Catalpa Kaempferi, S. et Z. (拉丁)キササゲ アヅサ カヒラヒサギ カミナリササゲ ハブテヲ(日本)

基本 係紫葳科梓屬之梓。

產地 生山野間。

形態 梓爲喬木類之落葉木本。高二丈餘。葉略呈卵形。掌狀淺裂。與桐葉相類。惟較小。葉柄長。夏日開花。唇形。花冠淡黃色。帶有紫色之斑紋。蒴亦唇形。有二深裂。結實細長。略似豇豆之莢。其根白皮可供藥用。



梓

種類 ㊀木理白者。爲梓。梓之有美文者。爲椅。㊁木理赤者。爲楸。梓之小者。爲榎。

採取 以堅實不腐者良。

製法 凡使去外層黑皮。取裏白入藥用。

性質 苦。寒。無毒。

主治 熱毒去三蟲。(本經)療目中疾。主吐逆。胃反。及小兒熱瘡。身頭熱煩。蝕瘡。煎湯浴之。并搗傅。

219／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（別錄）

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論梓根白皮曰。煎湯洗小兒壯熱。一切瘡疥。皮膚瘙癢。【明】李時珍本草綱目論梓根白皮曰。治溫病復感寒邪。變爲胃吻。煮汁飲之。

【梓葉】　主治　搗傅磕瘡。飼磕肥大三倍。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論梓葉曰。療手足火爛瘡。

【梓藻】　卽父陛根之古籍別名。典見別錄。詳『父陛根』條。

【梔子】　卽山梔子之原名。詳『山梔子』條。

【梔子仁】　卽山梔子仁之別名。詳『山梔子仁』條。

【梔子皮】　卽山梔子皮之別名。詳『山梔子皮』條。

【梔花】　卽山梔子花之別名。詳『山梔子花』條。

【梗草】　卽桔梗之古籍別名。典見別錄。詳『桔梗』條。

【梗通草】　卽通草之處方用名。詳『通草』條。

【梗雞】　基本　梗雞爲溼生蟲類之一種。可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　痺症。

【條】　卽柚之古籍別名。典見爾雅。詳『柚』條。

【條苓】　卽黃芩之處方用名。詳『黃芩』條。

【梟】　卽鴞之古籍別名。典見本草綱目。詳『鴞』條。

【梟羊】　卽狒狒之古籍別名。典見山海經。詳『狒狒』條。

【梟景】　卽桃梟之古籍別名。典見別錄。詳『桃梟』條。

【梟鴞】　卽鴞之古籍別名。典見爾雅。詳『鴞』條。

【梫皮】　卽秦皮之古籍別名。典見別錄。詳『秦皮』條。

【梫油】　卽茶油之原名。詳『茶油』條。

【梫槐皮】　卽秦皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『秦皮』條。

【梧桐】　古籍別名　櫬（綱目）

外國名詞　Sterculia platanifolia, L.（拉丁）アラギリ（日本）



梧桐

基本　係梧桐科梧桐屬。爲梧桐之木皮。其花子葉詳見各該條。

產地　原野間處處有之。

形態　梧桐爲落葉喬木類。桐之一種。有綠色之枝幹。葉大分裂。爲掌狀。基腳呈心臟形。葉之裏面有毛。葉脈之分歧點。有褐色之斑紋。是謂蜜腺。葉柄長。互生。夏開小花。圓錐形花序。帶黃色。雌雄同株。結實爲蓇葖。熟則裂如葉狀。種子附於其緣邊。大如胡椒。味如菱茨。其木白皮纖維有黏汁。可供藥用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　燒研和乳汁塗。烏鬚髮。祛黃赤。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論梧桐木白皮曰。治腸痔。

【梧桐子】　性質　甘。平。無毒。

主治　搗汁塗。拔去白髮根。下必生黑者。又治小兒口瘡。和雞子燒存性研摻。

【梧桐花】　主治　癩頭。杖丹。湯火傷。

【梧桐葉】　性質　苦。寒。無毒。

主治　發背疔瘡。焦研末。蜜調傅乾卽易。

【梧鼠】　卽蠷蛄之古籍別名。典見荀子。詳『蠷蛄』條。

【梧實】　卽飛松子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『飛松子』條。

【梫】　卽肉桂之古籍別名。典見爾雅。詳『肉桂』條。

【梫木】　卽馬醉木之古籍別名。典見本草遺拾。詳『馬醉木』條。

【梼棗】　卽君遷子之古籍別名。典見廣志。詳『君遷子』條。

【梭子香】　卽沉香之形似梭子者。詳『沉香』條。

【梳篦】　命名　梳者。其齒疏通也。篦者。其齒細密相比也。櫛者。其齒連節也。乃用以梳髮之具。故名。

古籍別名　櫛（綱目）

採取　以黃楊木及石楠木所製者良。

主治　風病煮汁服之。及洒風

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

入腹爲病。成癥瘕者。

歷代記述 攷證 【明】李時珍

本草綱目論梳篦曰。主小便淋瀝。乳汁不通。蜜亂轉筋。噎塞。

【視砂】卽石鹼之古籍別名。典見癮科書。詳『石鹼』條。

【款冬藥】卽款冬花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『款冬花』條。

【款凍】卽款冬花之古籍別名。典見郭璞賦。詳『款冬花』條。

【殼菜】卽淡菜之古籍別名。典見綱目。詳『淡菜』條。

【液石】卽滑石之古籍別名。典見別錄。詳『滑石』條。

【涼水】卽松楊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『松楊』條。

【涼粉草】卽仙人凍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『仙人凍』條。

【涼繖遮金珠】卽紫金牛之西俗名。詳『紫金牛』條。

【浙二泔】卽粳米泔水之原名。詳『粳米泔水』條。

【淘河】卽鵜鴣之別名。典見動物學大辭典。詳『鵜鴣』條。

【淘鵜】卽鵜鴣之古籍別名。典見綱目。詳『鵜鴣』條。

【淡子芩】卽黃芩之處方用名。詳『黃芩』條。

【淡天冬】卽天門冬之處方用名。詳『天門冬』條。

【淡竹花】卽小青草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『小青草』條。

【淡竹茹】卽竹茹之原名。詳『竹茹』條。

【淡竹殼】 原名 淡竹鞭。

命名 本品卽淡竹撇時所苞之鞭殼。故名。

主治 去目翳。功同熊膽。拭淨毛。燒存性。同麝香。搐細點之。

【淡竹葉】 原名 鴨跖草。

命名 本品莖葉似竹。故名。

古籍別名 鴨跖草。(嘉祐)根名碎骨子。水竹。(時珍)

外國名詞 Lophatherum gracile, Brongn. var. elatum, Hack.

基本 屬禾本科淡竹(Lophatherum elatum, zoll)之葉。

產地 凡山野道旁。以及卑濕處。恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。淡竹葉廣東各屬均有產。以花縣從化下四府爲多出。

形態 淡竹爲生於山野路旁之草本植物。春月從宿根生苗。初時類竹。莖高達二三尺。葉互生。似竹葉。作廣披針形。前端尖。闊一寸許。長六七寸。花爲粗大穗狀花。開於梢上。根爲纖維狀。附生如麥門冬之堅球根。



淡竹葉

性質 甘。寒。無毒。

效能 滲濕清熱。專作利尿藥。

主治 葉去煩熱。利小便。清心。

根能墮胎催生。

近人學說 張山雷曰。此非竹類也。生下濕地。細莖綠葉。有似於竹。故有此名。四五月間。開花如蛾。兩瓣舒展。作翅翎欲飛。深碧可玩。古書謂之鴨跖草。陳藏器謂味苦大寒。治寒熱痺癎痰飲丁腫。小兒丹毒。狂熱狂痫。大腹痞滿。身面氣腫。熱痢。蛇犬咬。癰腫等毒。日華謂治溼痺。利小便。瀕湖以消喉痺。亦清熱解暑。泄火利水之良品也。

用量 三錢。

施用宜忌 凡無濕熱及孕婦禁用。

參攷資料 ㊀古方書所載之淡竹葉。係 Wanghee 之葉。(和漢藥考) ㊁竹葉象形。碎骨言其下胎也。(李時珍) ㊂淡竹葉處處原野有之。春生苗。高數寸。細莖綠葉。儼如竹米落地所生。細竹之莖葉。其根一窠數十鬚。鬚上結子。與麥門冬一樣。但堅硬。爾隨時採之。八九月抽莖。結小長穗。俚人採其根苗。搗汁和米。用作酒麴。甚芳烈。(李時珍)

【淡竹葉】卽鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳『鴨跖草』條。

【淡竹瀝】卽竹瀝之處方用名。詳『竹瀝』條。

【淡竹鞭】卽淡竹殼之原名。詳『淡竹殼』條。

【淡肉果】卽烟草之別名。詳『烟草』條。

【淡伯】卽厚樸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『厚樸』條。

【淡附子】卽附子之處方用名。詳

221／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

『附子』條。

【淡豆豉】命名　豉者。嗜也。功能調和五味。可甘嗜也。故名。

處方用名　製豆豉。炒香豉。香豆豉。

古籍別名　大豆豉。（別錄）

基本　係黑大豆製成之淡味豆豉。

產地　陶弘景曰。豉出襄陽錢唐者香美而濃。入藥取中心者佳。

形態　豉色褐而灰。質柔韌而潤。其味淡。顆粒則較生豆爲小而扁也。

製法　㈠造淡豉法。用黑大豆二三斗。六月內淘淨。水浸一宿。瀝乾。蒸熟。取出攤席上。候微溫。蔴覆。每三日一看。候黃衣上遍。不可太過。取曬。簸淨。以水拌。乾溼得所。以汁出指間爲準。安甕中。築實。桑葉蓋厚三寸。密封泥。於日中曬七日。取出曝一時。又以水拌入甕。如此七次。再蒸過。攤去火。安甕收藥封。卽成矣。㈡造鹹豉法。用大豆一斗。水浸三日。淘蒸攤暑。候上黃。取出簸淨。水淘漉乾。每四斤入鹽一斤。薑絲半斤。椒、橘蘇、茴香仁拌勻入甕。上面水浸過一寸。以箬蓋封口。曬一月。乃成也。㈢造豉汁法。十月至正月用好豉三斗。清麻油熬令烟斷。以一升拌豉蒸過。攤冷。曬乾。拌再蒸。凡三遍。以白鹽一斗。搗和。以湯淋汁三四斗。入淨釜。下椒薑葱橘絲同煎。三分減一。貯於不津器中。香美絕勝。也有麪豉。瓜豉。醬豉諸品。皆可爲之。但充食品。不入藥用也。

性質　苦。寒。無毒。

效能　解肌表。除煩熱。有發汗作用。用於感冒及急性傳染病。斑疹未透而惡寒者。又本品能刺激胃之知覺神經。間接反射於延髓之嘔吐中樞。而引起嘔吐。爲催吐藥。須用大量。凡胃不消化。異物積滯。食道內。或病後胃之機能薄弱。以致積滯而引起苦悶欲吐者。均宜之。並能吐去痰涎及黏液。故兼有祛痰作用。

主治　傷寒頭痛。寒熱。瘴氣。惡毒。煩躁滿悶。虛勞喘吸。兩腳疼冷。殺六畜胎子諸毒。

張仲景之實驗。認爲『主治心中懊憹也。旁治心中結痛。及心中滿而煩也。』茲考徵如下。㈠枳實梔子豉湯證不具也。（枳實梔子豉湯條。無心中懊憹證。爲則按梔子大黃豉湯。此枳實梔子豉湯而加大黃者。而其條有心中懊憹之證。心中懊憹。固非大黃所主治也。然則枳實梔子豉湯條。其脫心中懊憹之證也明矣。）㈡梔子大黃豉湯證曰。心中懊憹。（以上二方。香豉皆一升。）㈢梔子豉湯證曰。心中懊憹。又曰胸中窒。又曰心中結痛。㈣梔子甘草豉湯證不具也。㈤梔子生姜豉湯證不具也。（梔子甘草豉湯。梔子生姜豉湯。是梔子豉湯加味之方也。故每章之首。冠以若字焉。心中懊憹而少氣者。梔子甘草豉湯。心中懊憹而嘔者。梔子生姜豉湯。斯可以知已。）以上三方。香豉皆四合。㈥瓜蒂散證曰。心中滿而煩。（以上一方。香豉一合。）展觀此諸方。其主治心中懊憹也明矣。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論香豉曰。治時疾熱病發汗。熱來能止盜汗。除煩。生搗爲丸服。治寒熱風。胸中生瘡。煮服治血痢腹痛。研塗陰蝕生瘡。【宋】大明諸家本草論香豉曰。治瘡疾骨蒸中毒。藥蟲氣犬咬。【明】李時珍本草綱目論香豉曰。下氣調中。治傷寒溫毒發痙。嘔逆。【明】繆希雍本草經疏論香豉曰。豉諸豆皆可爲之。惟黑豆者入藥。有鹹淡二種。惟江右淡者治病經云。味苦。無毒。然詳其用。氣應微溫。蓋黑豆性本寒。得蒸曬之氣。必溫。非苦溫則不能發汗。開腠理。治傷寒頭痛寒熱。及瘴氣惡毒也。苦以湧吐。故能治煩躁滿悶。以熱鬱胸中。非宣劑無以除之。如傷寒短氣煩躁。胸中懊憹。飢不欲食。虛煩不得眠者。用梔子豉湯吐之是也。又能下氣調中。辟寒。故主虛勞喘吸。及兩腳疼冷。【清】黃宮繡本草求眞論香豉曰。淡豆豉本於黑豆蒸曬而成。按其味苦氣寒。似屬苦降下行之味。而無升引上行之力也。然經火蒸曬。味雖苦而氣則馨。氣雖寒而質則浮。能升能散。故得葱則發汗。得鹽則引吐。得酒則治風。得韭則治痢。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

得蒜則止血。炒熟又能止汗。是以邪在上而見煩躁。頭痛滿悶。懊憹不眠。發瘡嘔逆者。合於梔子。則能引邪上吐。使不致陷入而成內結之症也。然必江有製者方堪入藥。【清】鄒澍本經疏證論香豉曰。張隱庵謂豆爲腎穀。色黑性沈。宜熟而成。輕浮主啓陰竅之精上貢。故其治煩躁滿悶也。非特由於傷寒頭痛寒熱者可用。即由於瘴氣惡毒者亦可用也。蓋煩者陽盛。躁者陰逆。陽盛而不得下交。陰逆而不能上濟。是以神不安於內。形不安於外。最是仲景形容之妙。曰反覆顛倒。心中懊憹。惟其反覆顛倒。心中懊憹。正可以見上以熱盛不受陰之滋下。因陰逆不受陽之降。治之不以他藥。止以豆豉梔子成湯。以梔子能泄熱下行。即可知豆豉能散陰上逆矣。曰仲景用豆豉多於汗吐下後何也。曰豆豉之功在除煩躁滿悶。煩躁滿悶。非汗吐下後不多見也。雖然汗吐下後兼煩躁兼滿悶者不少矣。於何定其爲梔豉湯證。夫汗後有亡陽證。則煩躁而不滿悶。有內熱證。有內實證。則煩而不躁。下後有結胸證。有痞證。則滿悶而不煩躁。吐後有煩滿而無躁。蓋煩躁則非實。滿悶則非虛。惟其虛實之間。斯爲發越浼降所宜用。於此猶不可定豆豉爲開發上焦鬱抑。宣導陰濁。逗遛耶。然則葛稚川取葱豉湯治傷寒初起非歟。夫稚川固言之矣。曰凡初覺頭痛身熱。脈洪一二日便以葱豉湯治之。則其爲熱邪非寒邪。在陽明不在太陽明甚。何則。寒邪應惡風惡寒。此但言身熱。寒邪當脈數脈緊。此則言脈洪。證之以仲景所謂傷寒三日陽明脈大者。詎非若合符節。且梔子與葱白。一係洩熱。一係通陽洩熱者。縱通陽者衡。縱則能通上下之道。此所以宜於汗吐下後。表邪已滅之時。衡則能達外內之情。此所以宜於病初起卒雞辨識之際。是在先在後。關梔子葱白。不關豆豉。又可明矣。曰梔子煎湯證。亦未見必有滿悶也。此則論中所載多矣。曰胸中窒。曰心中結痛。非滿悶之謂耶。特按之心下濡句。切宜著眼。究恐煩滿爲實熱證也。若論煩躁則在陰者多。在陽者少。如少陰有吐利躁煩四逆者。有自利躁煩不得臥者。有吐利手足逆冷煩躁欲死者。厥陰有熱少厥。微指頭寒。默默不欲食煩躁者。有脈微。手足厥冷煩躁者。皆以有脈微四逆而無滿悶。知其非陽經證。不得治以豆豉矣。然陽經之煩躁。陰經之煩躁。其因究有別也。應如何而審之。夫煩未有非陽盛者。躁無有非陰逆者。特陽經之煩躁。是陰陽相搏。陰經之煩躁。是陰陽相逐。相搏者其力足相敵。而兩不相下。相逐則陽既敗北。陰復追之也。是故陽經之煩躁。雖輕揚之豆豉散其陰逆有餘。陰經之煩躁。即沉重之薑附輔其陽弱不足也。雖然。豆豉味苦氣寒。本屬陰。以之治陰逆。則寒因熱用。熱因寒用非歟。夫氣寒氣涼。治以寒涼。行水漬之。此五常政大論文也。注家謂熱湯浸漬。則寒涼之物。能治寒涼。試檢傷寒論諸用豆豉湯。皆不以生水煮甚者。枳實梔子豉湯。先空煮清漿水。更入枳實梔子。再下豉。僅須五六沸。即已成湯。如金匱要略梔子大黃湯。以治陽而非治陰。遂入藥不分先後。是其乘經訓。何如嚴耶。又如瓜蒂散證。在太陽曰胸有寒。在少陰曰手足寒。脈弦遲。在厥陰曰手足厥冷。脈緊更明明爲寒。非如諸梔子豉湯證之並未言寒也。而瓜蒂苦寒。豆豉又苦寒。亦以熱湯下豉煮汁。和瓜蒂赤小豆末服。正與以寒治寒之旨相符。其證爲邪與痰飲。因陰陽相搏。而結於胸中。斷可識矣。於此見陰翳之所在。即陽氣之所阻。驅散其陰翳。陽氣自伸。此豆豉之功。陽氣既伸。其實者隨即引而越之。使不經無病之所。虛者隨即抑而下之。使不傷未敗之氣。此瓜蒂與梔子之力夫。故曰胸中實。曰虛煩。而用豆豉可並行不背也。說者謂仲景之六經。是區分地面所該者廣。雖以脈爲經紀。凡風寒溼熱。內傷外感。自表及裏。寒熱虛實。無乎不包。素問皮部論曰。皮有分部。脈有經紀。其生病各異。別其部分。左右上下。陰陽所在。諸經始終。此其立說之源也。即惡寒壯熱。顏色微赤。不能下食。日漸羸瘦。方用豆豉、葱白、生地黃、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

甘草、童子小便。張文仲療虛損慘頓不食。四體勞強。時翕翕熱。無氣力。作骨蒸。方用豆豉、梔子、杏仁、童子小便。服後四體盒熱。卽服豆豉、葱白、生薑、生地黃、童子小便。仍不離陽明葱豉法。刪繁療膽腑實熱。精神不守。瀉熱梔子煎方用豆豉、梔子、甘竹茹、大青、橘皮、赤蜜。千金療心實熱。或欲吐不出。悶喘急。頭痛、瀉心湯方用豆豉、梔子、小麥、石膏、地骨皮、茯苓、淡竹葉。仍不離太陽陽明梔豉法信然。以是類推。則刪繁之以理中茯苓湯治脈實熱極。血氣傷心。使心好生赫怒。口爲變赤。言語不快。消熱止血氣。調脈。以鼈甲湯治勞熱。四肢腫。急少腹滿痛。顏色黑黃。關格不通者。並用豆豉甚者。千金以豆豉地黃二味。搗散酒服。治虛勞冷。骨節痛。無力。崔氏枸杞酒。取豆豉以枸杞湯淋。秋麻子粉黃汁。取半浸麴。取半浸米。和地黃蒸飯。釀成酒。治五內邪氣。消渴。風溼。下胸脇間氣。頭痛。堅筋骨。強陰。利大小腸。填骨髓。長肌肉。破除結氣。五勞七傷。去胃中宿食。利耳目。鼻衄吐血。內溼風痓。補中逐水。破積瘀。膿惡血。石淋。長髮。

傷寒瘴氣。煩躁滿悶。虛勞喘吸。逐熱破血。及腳氣腫痹。亦悟別錄虛勞喘吸兩腳疼冷之旨矣。【清】閻立陞本草遵旨論香豉曰。淡豆豉味苦。氣寒。陰中之陰。無毒。原夫黑豆性平。作豉則溫。既經蒸曝。又能升能降。本草主治傷風頭痛。寒熱。瘴氣。惡毒。煩躁。滿悶。虛勞呼吸。兩腳疼冷。殺六畜胎子。諸毒。故時珍以之下氣調中。治傷寒溫毒發斑癍之症。今人佐以葱白。散寒熱頭痛。助以梔子。除虛煩懊憹。醇酒浸嘗。治足冷痛。甚薤白煮服。止血痢多疼。而且佐鹽使之能吐。佐蒜使之止血。炒熟使之止汗。江南人凡得時氣。既先用葱豆湯取汗。往往便差。皆竊取於李氏之意而推廣之也。若其未經造豉。則又有異焉。夫豆有五色。各治五臟。惟黑豆屬水性。寒。爲腎之穀。入腎居多。且走血分。而壯氣充元。與青白豆動氣之物不同。故以逐水脹。消癰腫。除風熱。下結氣。散瘀血。所謂同氣相求。昔陶華嘗以黑豆入鹽煮食。云能補腎。蓋豆乃腎之穀。其形類腎。黑色通腎。又引之以鹽。所以妙也。若其生用。生毒之人。食生豈而不噦。服毒之人。食豆豈而自吐。此爲解毒之物。又曰豆腐可以發毒。何也。蓋生毒之人。以實脾爲要。豆腐凡瀉肝之物。恐脾虛有傷元氣。而瘡毒難收。故爾云然。豆腐乾之實脾而健胃。因其豆之熟也。豆腐漿之止嗽而治噦。因其豆之液也。豆腐皮之實脾。虛豆腐焦之開胃氣。因解表故而又熟則補也。又曰炒食則熱。煮食則寒。牛食之溫。馬食之涼。一體之中。功效各殊。

近人學說　張山雷曰。大豆本是堅實補腎之品。惟用以製豉則罨而發酵。變堅實而爲空鬆。當其罨時。外必生霉。豆中實液。確已外散。故有表散外邪之性情。葛洪肘後方葱豉湯。謂傷寒有數種。（此所謂傷寒有數種。蓋卽難經所謂傷寒有五之例。凡春溫夏熱。溼溫冬溫等候。古人俱以傷寒二字總稱之。）庸人卒不能分別者。今取一藥兼療之。（此所謂一藥言一方也。卽葱豉湯。藥止葱白豆豉二物。）洵不誣也。但古之豆豉當汗解肌。散膚表之熱。止取其蒸罨貿鬆。輕而能散。而今之江浙市肆中。又以麻黃湯浸過。則發汗之力。乃陡加倍蓰。譬頤在壬寅秋仲。偶感新涼。微寒發熱。病本不重。惟時雖已習醫。不敢自信。乃延同邑之世醫某君定方。用淡豆豉三錢。初服一二劑。無甚變動。迨服至三劑。則烘熱蒸蒸。汗出如浴。歷三日後。不論寤寐。淋漓不息。幾致神志迷惑。如在霧中。初時舌有白膩之苔。而大汗之後。頓至光紅如鏡。卽卽繼以大劑清養益津。而一臥三月。久不恢復。當時亦歸咎於醫之冒昧。謂陰液素薄之體。不當連用發散之藥。實則此藥中雖有麻黃。分量甚少。何致遽有此變。此必市肆中之製法不善。誤用過量之麻黃所致。然亦可知今之豆豉。已非古書中之豆豉所可等量齊觀者已。古法仲景梔子豉湯。治吐下後心中懊憹。及大下後身熱不去。心中痛。皆取其質之輕鬆。能宣通胸中鬱窒之義。今則藥質已異。性情不侔。恐亦無此效用。又古以治血痢刺痛。赤白後重。亦皆以宣通結塞爲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

功。今既製入麻黃。則必有不可同年而語者。

配合應用　㈠治傷寒發汗。云傷寒有數種。庸人卒不能分別者。今取一藥兼療之。凡初覺頭痛身熱。脈洪。二日便以葱豉湯治之。用葱白一虎口。豉一升。綿裹。水三升。煮一升。頓服取汗。更作加葛根三兩再不汗。加麻黃三兩。又法用葱湯煮米粥。入鹽豉食之。取汗。又法用豉一升。小男溺三升。煎一升。分服取汗。(肘後方)

㈡治傷寒不解。已三四日。胸中鬧惡者。用豉一升。鹽一合。水四升。煮取一升半。分服取吐。此祕方也。(梅師方)

㈢辟除溫疫。豉和白朮。浸酒常服之。(梅師方)

㈣治傷寒懊憹。吐下後。心中懊憹。大下後。身熱不去。心中痛者。並用梔子豉湯吐之。肥梔子十四枚。水二盞。煮一盞。入豉半兩。同煮至七分。去滓。服。得吐止後服。(傷寒論方)

㈤治傷寒餘毒。傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫。用豉五合。微炒。以酒一升半。同煎五七沸。任性飲之。(簡要濟衆方)

㈥治傷寒目翳。燒豉二七枚。研末吹之。(肘後方)

㈦治傷寒暴痢。以豉一升。薤白一握。水三升。煮薤熟。納豉更煮。色黑去豉。分爲二服。(藥性方)

㈧治血痢不止。用豉、大蒜等分。杵丸。梧子大。每服三十丸。鹽湯下。(王氏博濟方)

㈨治血痢如刺。以豉一升。水瀆相淹。煎兩沸。絞汁頓服。不瘥再作。(藥性方)

㈩治赤白重下。葛氏用豆豉熬小焦。搗服一合。日三。或炒焦以水浸汁服亦驗。外臺用豉心炒爲末。一升。分四服。酒下。入口即斷也。

(一)治臟毒下血。烏犀散。用淡豉十文。大蒜二枚。煨同擣丸。梧子大。煎香菜湯服二十丸。日二服。安乃止。永絕根本。無所忌。(究原方)

(二)治小便血條。淡豆豉一撮。煎湯。空腹飲。或入酒服。(危氏得效方)

(三)治癰疾寒熱。麥豉湯飲數升。得大吐即愈。(肘後方)

(四)治小兒寒熱。惡氣中人。以溼豉研丸。鷄子大。以摩腦上及手足心六七遍。又摩心臍上。旋旋呪之。上破豉丸。看有細毛。棄道中。即便癒也。(食醫心鏡方)

(五)治盜汗不止。以豉一升。微炒香。清酒三升。漬三日。取汁。冷暖任服。不瘥。更作三兩劑。即止。(孟詵方)

(六)治鬱噦痰積。凡天雨便發。坐臥不得。飲食不進。乃肺竅久積冷痰。遇陰氣觸動則發也。用此一服即愈。服至七八次。即出惡痰數升。藥性亦隨而出。即斷根矣。用江西淡豆豉一兩。蒸搗如泥。入砒霜末一錢。枯白礬三錢。丸綠豆大。每用冷茶冷水送下七丸。甚者九丸。小兒五丸。即高枕仰臥。忌食熱物等皆效。

(七)治風毒膝攣。骨節痛。用豉三五升。九蒸九暴。以酒一斗。浸經宿。空心隨性溫飲。(食醫心鏡方)

(八)治手足不隨。豉三升。水九升。煮三升。分三服。又法。豉一升。微熬。囊貯。漬三升酒中。三宿。溫服。常令微醉爲佳。(肘後方)

(九)治頭風疼痛。豉湯洗頭。避風取瘥。(孫眞人方)

(十)治卒不得語。麥豉汁加入美酒服之。(肘後方)

(十一)治喉痺不語。麥豉汁一升。服。覆令取汗。仍着桂末於舌下嚥之。(千金方)

(十二)治咽生瘜肉。鹽豉和搗塗之。先刺破出血。乃用。神效。(聖濟總錄方)

(十三)治口舌生瘡。胸膈疼痛者。用焦豉末含一宿。即瘥。(聖惠方)

(十四)治舌上出如針孔者。用豉三升。水三升。煮沸。服一升。日三服。(葛氏方)

(十五)治墮胎血下煩滿。用豉一升。水三升。煮三沸。調鹿角末方寸匕。(子母祕錄方)

(十六)治妊娠動胎。豉汁服。(子母祕錄方)

(十七)治婦人難產。乃兒枕破。與敗血裹其子也。以勝金散逐其敗血。即順矣。用鹽豉一兩。以舊青布裹了。燒赤。乳細。入麝香一錢爲末。取秤錘燒紅。淬酒調服一大盞。(郭稽中方)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈥治小兒胎毒。淡豉煎濃汁與三五口其毒自下又能助脾氣消乳食。（聖惠方）

㈦治小兒嗅乳。用鹹豉七箇去皮。臘粉一錢。同研丸黍米大。每服三五丸。鬱香湯下。（全幼心鑑方）

㈧治小兒丹毒。作瘡出水。豉炒烟盡。爲末。油調傅之。（姚和衆方）

㈨治小兒頭瘡。以黃泥裹煨熟取研。以蕘菜油調傅之。（勝金方）

㈩治發背癰腫已潰未潰。用香豉三升。入少水。搗成泥。熬腫處大小作餅。厚三分。瘡有孔。勿覆孔上。鋪豉餅以艾列於上。灸之。但使溫溫。勿令破肉。如熱痛。卽急易之。患當滅。快一日二次灸之。如先有孔。以汁出爲妙。（千金方）

(11)治一切惡瘡。熬豉爲末。傅之。不過三四次。（產乳方）

(12)治陰莖生瘡痛爛者。以豉一分。蚯蚓溼泥二分。水研和塗上。乾卽易之。禁熱食酒蒜芥菜。（藥性論方）

(13)治癰瘻。尿瘡。杵豉傅之甚良。（千金方）

(14)治一切蟲刺螫人。豉心嚼敷。少頃見豉中有毛卽瘥。若不見。再傅。晝夜勿絕。見毛爲度。（外臺祕要方）

(15)治蹉跌破傷筋骨。用豉三升。水三升。漬濃汁飲之。止心悶。（千金方）

(16)治毆傷瘀聚。腹中悶滿。豉一升。水三升。煮三沸。分服。不瘥再作。（千金方）

(17)解蜀椒毒。豉汁飲之。（千金方）

(18)治中牛馬毒。豉汁和人乳頓服之效。（衞生易簡方）

(19)小蝦蟆有毒。食之令人小便祕澀。臍下悶痛。有至死者。以生豉一合。投新汲水半碗。浸濃汁。頓飲之。卽愈。（莆亭客語方）

(20)治中酒成病。豉煮白各半升。水二升。煎一升。頓服。（千金方）

(21)治服藥過劑悶亂者。豉汁飲之。（千金方）

(22)治雜物眯目不出。用豉三七枚。浸水洗目。視之卽出。（聖濟總錄方）

(23)治刺在肉中。嚼豉塗之。（千金方）

(24)治腫從腳起。豉汁飲之。以滓傅之。（肘後方）

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 無外感風寒者禁用。

參攷資料 (一)古今方書用豉治病最多。江南人善作豉。凡得時氣。卽先用葱豉湯服之。取汗。往往便瘥也。（蘇頌）(二)蒲州豉味鹹。作法與諸豉不同。其味烈。陝州有豉汁。經十年不敗。入藥並不如今之豉心。爲其無鹽故也。（陳藏器）(三)陝府豉汁甚勝常豉。其法以大豆爲黃。蒸每一斗。加鹽四升。椒四兩。春三日。夏二日卽成。半熟加生薑五兩。既潔淨且精也。（孟詵）(四)豉諸大豆皆可爲之。以黑豆者入藥。有淡豉鹹豉。治病多用淡豉。汁及鹹者當隨方法。其豉心乃合豉時取其中心者。非剝皮取心也。此說見外臺祕要。（李時珍）

【淡芭蕉】卽烟草之別名。典見植物學大辭典。詳『烟草』條。

【淡吳萸】卽吳茱萸之處方用名。詳『吳茱萸』條。

【淡昆布】卽昆布之處方用名。詳『昆布』條。

【淡秋石】卽秋石之處方用名。詳『秋石』條。

【淡秋冰】卽秋石之處方用名。詳『秋石』條。

【淡海藻】卽海藻之處方用名。詳『海藻』條。

【淡乾薑】卽乾薑之處方用名。詳『乾薑』條。

【淡菜】**命名** 本品曬乾時。不加鹽卽可食。故名。

古籍別名 殼菜（本草綱目）海蛾（東海夫人綱目）貽貝（動物學大辭典）

外國名稱 Mytilus Ciassitesta Lischke Mussel Miesmuschel（拉丁）イガヒ或イノカヒ或シウリ或セトガヒ（日本）

基本 係軟體動物瓣鰓類無管類異柱類殼菜科。爲殼菜之肉。

產地 生海水中。

形態 淡菜爲介類之一種。其殼呈三角形。稍膨大。表皮厚。有輪層。殼頂之鉸合部。外面有靱帶。自殼頂延及後方。內面有齒。左殼有主齒一。右殼有主齒二。側齒頗小。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

殼外黑色。背面有白褐色斑紋。殼內眞珠色。肉體有前肉柱小。後肉柱大。腳長有溝。多具筋肉。腳之根部。有分泌黏液之腺。黏液由腳溝流下。凝爲絲狀物。卽爲足絲。爲固着於外物之用。殼長二寸。高四寸。其肉紅紫色。味佳。可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 虛勞傷憊。精血衰少。及吐血久痢。腸鳴腰痛。疝瘕。婦人帶下。產後瘕瘀。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論淡菜曰。產後血結。腹內冷痛。治癥瘕。潤毛髮。治崩中帶下。燒食一頓。令飽。【宋】日華諸家本草論淡菜曰。煮熟食之。能補五臟。益陽事。理腰腳氣。能消宿食。除腹中冷氣。疫癘。亦可燒汁沸出食之。【明】李時珍本草綱目論淡菜曰。消癭瘿氣。

參攷資料 ㊀淡菜常時燒食。卽苦不宜人。與少米先煮熟後。除去毛。再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜同煮。卽更妙。(孟詵)㊁淡菜生海藻上。故治癭與海藻同功。(李時珍)㊂淡菜不宜多食。多食令人頭目鬧。鬧得微利。卽止。(日華)㊃淡菜多食發丹石。令人腸結。久食脫人髮。(陳藏器)

【淡黃芩】卽黃芩之處方用名。詳『黃芩』條。

【淡銀】卽蜜陀僧之古籍別名。典見藥物生產辨。詳『蜜陀僧』條。

【淡蔥蓉】卽肉蓯蓉之處方用名。詳『肉蓯蓉』條。

【淡鼈甲】卽鼈甲之處方用名。詳『鼈甲』條。

【淨毛燕】卽燕窩之處方用名。詳『燕窩』條。

【淨牛膽汁】卽牛膽之處方用名。詳『牛膽』條。

【淨皮硝】卽朴硝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『朴硝』條。

【淨粉】卽番薯粉之依法製成者。詳『甘藷』條。

【淨柴胡】卽柴胡之處方用名。詳『柴胡』條。

【淨骨皮】卽地骨皮之處方用名。詳『地骨皮』條。

【淨連翹】卽連翹之處方用名。詳『連翹』條。

【淨黃連】卽黃連之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃連』條。

【淨銀花】卽金銀花之處方用名。詳『金銀花』條。

【淨蓮鬚】卽蓮鬚之處方用名。詳『蓮鬚』條。

【淨雙鉤】卽鉤藤之處方用名。詳『鉤藤』條。

【淫羊藿】

命名 西川北部有淫羊。一日百遍合。蓋食此藿所致。故名。

古籍別名 剛前(本經)仙靈脾(唐本)三枝九葉草(圖經)放杖草。棄杖草。千兩金。乾鷄筋。黃連祖(日華)仙靈毗(柳子厚文)棄杖草。黃德祖。棄仗尊師。碇草(和漢藥考)

外國名稱 Barrenwort. (英)

基本 係小蘗科碇草(Epimedium macranthum, Morr. et Decne)之葉。

產地 蘇頌圖經本草云。淫羊藿江東、陝西、泰山、漢中、湖湘間皆有之。陳仁山藥物生產辨云。產廣東北江連州屬。

形態 淫羊藿一名碇草。爲宿根草。自舊根叢生。數細莖。春日生葉及穗。高一二尺。一柄有三枝九葉。葉爲卵圓形。大二三寸。類杏葉。邊緣有細鋸齒。夏月。莖上開或白或黃白。或淡紅。或淡紫色之四瓣花。倒垂。其狀如碇。故名碇草。



淫羊藿

採取 每年五月間採根葉陰乾。

製法 雷敩曰。凡使用淫羊藿。(時呼爲仙脾)。以夾刀夾去葉四畔花枝。每一觔用羊脂四兩拌炒。待脂盡爲度。

性質 辛。寒。無毒。

效能 補命門。興陽事。治陰痿。強腰膝。專作強壯藥。

主治 陰痿絕傷。莖中痛。利小便。益氣力。強志(本經)。堅筋骨。消瘰癧。赤癰。下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服。令人有子(別錄)。

歷代記述攷證 【宋】大明曰。華諸家本草論淫羊藿曰。丈夫絕

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

陽無子。女人絕陰無子。老人昏老。中年健忘。一切冷風勞氣筋骨攣急。四肢不仁。補腰膝。强心力。【明】李時珍本草綱目論淫羊藿曰。淫羊藿味甘氣香。性溫不寒。能益精氣。乃手足陽明三焦命門藥也。眞陽不足者宜之。【明】繆希雍本草經疏論淫羊藿曰。淫羊藿味辛甘其氣溫而無毒。本經言寒者誤也。入手厥陰。爲補命門之要藥。亦入足少陰厥陰。可升可降。陽也。辛以潤腎。甘溫益陽氣。故主陰痿絕陽。益氣力。强志。堅中痛者。肝腎虛也。補益二經。痛自止矣。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。辛以潤其燥。甘溫益陽氣以助其化。故利小便也。肝主筋。腎主骨。益腎肝則筋骨自堅矣。辛能散結。甘能緩中。溫能通氣。行血。故主瘰癧赤癜。及下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服令人無子者。因陽旺則陽道數舉。婦人女而精耗散。故無子也。一名仙靈脾。柳文作毗。毗者人脾也。脾爲命蒂。故主入命門。修事如雷公法。【明】李士材本草圖解論淫羊藿曰。淫羊藿辛溫無毒。主陰痿絕陽。堅中痛。利小便。益氣力。强志堅筋骨。消瘰癧赤癜。下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服無子。恐陽旺多慾。精氣耗散。無他故也。去枝。羊脂拌炒。

近人學說　張山雷曰。淫羊藿稟性辛溫。專壯腎陽。故主陰痿。曰絕傷者。卽陽事之絕傷也。堅中痛。亦腎臟之虛寒。利小便者。指老人及虛寒人之陽事不振。小便滴瀝者言之。得其補助腎陽而小便自利。非瀉熱蘊結。水道赤澁者可比。讀書愼弗誤會。益氣力。强志。堅筋骨。皆元陽振作之功。然虛寒者固其所宜。而陰精不充。眞陽不固者。萬不可爲揠苗之助長者也。消瘰癧赤癜。蓋亦因其溫通氣血。故能消化凝結。然瘰癧之病。由於陰血不充。肝陽燔灼。而煎熬津液。凝結痰濁者爲多。幸勿誤讀古書。反以助其烈燄。陷人於炮烙之酷刑。洗下部之瘡。則辛燥能除濕熱。亦猶蛇牀子之洗瘡殺蟲耳。又曰。日華主丈夫絕陽。女子絕陰。一切冷風勞氣。筋骨攣結。四肢不仁。補腰膝。則辛溫之品。固不獨益腎壯陽。并能通行經絡。祛除風寒濕痺。但日華又謂治老人昏耄。中年健忘。則未免譽之太過。而景岳且謂男子陽衰。女子陰衰之難於子嗣者。皆宜服之。則偏信溫補。其弊滋多。更非中正之道矣。石頑謂一味仙靈脾酒。爲偏風不遂要藥。頗按不遂之病有二因。一爲氣血俱虛。不能榮養經絡。或風寒濕邪痺着之病。古之所謂痺症是也。其來也緩。一爲氣血上沖。擾亂腦神經而忽失其運動之病。今之所謂中風。西醫之所謂腦經病是也。其病也暴。仙靈脾酒止可以治風寒濕痺之不遂。并不能治氣血兩虛之不遂而血沖腦經之不遂。更萬萬不可誤用。

配合應用　㊀淫羊藿。陽起石。甘溫益陽。氣辛則走而能補。宜與白蒺藜、甘枸杞、肉蓯蓉、五味子、牛膝、山萸肉同用。爲補陽之妙劑。

㊁潰醇酒飲。益丈夫興陽道。理腰膝冷。亦治偏風不遂。大約每藿一斤。潰酒十斤。如常法。勿令過醉。修事時忌雞犬婦人見。

㊂治三焦欬嗽。腹滿不飲食。氣不順。淫羊藿、五味子等分爲末。煉蜜丸。如梧子大。每三十丸。熏茶湯下。

㊃治目昏生翳。用仙靈脾、生王瓜。卽小栝樓紅色者。等分爲末。每服一錢。茶下。日三服。（聖濟總錄方）

㊄治病後青盲目。日近者可治。仙靈脾一兩。淡豆豉一百粒。水一碗半。煎一碗。頓服。卽愈。（百一選方）

㊅治小兒雀盲。仙靈脾、晚蠶蛾各半兩。炙甘草。射干各二錢半。爲末。羊肝一枚。切開。摻藥末二錢。紮定。以黑豆一合。米泔一盞。同煮熟。分二次食。以汁送之。（普濟方）

㊆治瘄疹入目。用仙靈脾、蕨蠶仙等分。爲末。每服五分。米湯下。

用量　一錢至三錢。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

施用宜忌　相火易動、陽强易舉、夢遺便赤、口乾等症、禁用。壯、弱、萎之使得酒良。

參攷資料　㊀淫羊藿後人因別錄羊食而淫之說、遂改爲性熱助陽、誤矣。夫羊性喜淫、乃其天賦、不必食此藿也。即謂食之益淫、故以命名、然人非羊也、食之何必淫。蓋體臟既殊、不能以一例論也。余謂羊爲火畜、藿稟水氣、羊果食藿而益淫、亦內經陰平陽祕之旨耳。（王秉衡）㊁豆葉曰藿、此葉似之、故亦名藿。仙靈脾、千兩金、放杖草、剛前、皆言其功用也。鷄筋黃連祖、皆因其根形也。柳子厚文作仙靈毗、入脾曰毗、此物補下於理尤通。（李時珍）㊂淫羊藿江東陝西泰山、漢中、湖湘間皆有之。莖如粟稈、葉青如杏葉、上有刺、根紫色有鬚。四月開白花、亦有紫花者、碎小獨頭。五月採葉曬乾、湖湘出者、葉如小豆枝、莖緊細、經冬不凋、根如黃連。關中呼爲三枝九葉草、苗高一二尺許。根葉俱堪用、蜀本草言生蜀不聞水聲者良。（蘇頌）㊃淫羊藿生大山中、一根數莖、莖粗如線。高一二尺、一莖三極、一極三葉葉長二三寸、如杏葉及豆藿、面光背淡、莖薄而細、齒有微刺。（李時珍）

【淫羊藿】即天門冬之古籍別名。典見嘉祐本草。詳『天門冬』條。

【淮小麥】即小麥之處方用名。詳『小麥』條。

【淮山】即山藥之處方用名。詳『山藥』條。

【淮山藥】即山藥之處方用名。詳『山藥』條。

【淮牛膝】即牛膝之處方用名。詳『牛膝』條。

【淮木】古籍別名　百歲城中木（本經）城裏赤柱（綱目）

基本　淮木爲雜木類之一種。可供藥用。

產地　出山西平陽及河東諸地。或謂即古城中之木材。

性質　苦、平、無毒。

主治　主久欬上氣、傷中虛羸。（本經）女子陰蝕漏下赤白沃。城裏赤柱療婦人漏血白沃陰蝕。溼痺邪氣補中益氣。（別錄）

參攷資料　淮木煮湯服主難產。（杜正倫）

【淮豆】即豌豆之古籍別名。典見綱目。詳『豌豆』條。

【淮東子】古籍別名　跳蝦蟲。跳蟲（綱目拾遺）

產地　多生水旁溼土中。

形態　淮東子爲溼生蟲類彈尾類昆蟲之一種。形如跳蚤而大、逾倍。色如蝦灰黑色、有灰色斑紋。身有細毛。觸角粗短、分四節。頭側各有單眼八。腹部多足、如蝦。尾部有附屬物、如劍狀。善跳躍、可供藥用。

採取　以器置水中、候其跳入、則不能出、而取之。

主治　療風痺、去溼腫。

參攷資料　淮東子秋時闘蟋蟀家多畜之。凡蚤遇鬬傷及虛羸、必每日以此飼之云。能益蚤力也。其性最黠捷、能達透經絡、皮裏膜外、無不行到。（趙學敏）

【淮烏頭】即草烏頭之生於淮域者。詳『草烏頭』條。

【淮鹽】即戎鹽之古籍別名。典見藥物生產辨。詳『戎鹽』條。

【深深妙】即大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大生地』條。

【深黃】即鬱金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鬱金』條。

【混元母】即人胞之古籍別名。典見本草綱目。詳『人胞』條。

【混沌】即雞卵殼之名。詳『雞卵』條。

【混沌衣】即人胞之古籍別名。典見綱目。詳『人胞』條。

【混沌池】即雞抱出卵殼之別名。典見綱目拾遺。詳『雞抱出卵殼』條。

【混沌螟蛉】即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【清水豆卷】即大豆卷之處方用名。詳『大豆卷』條。

【清阿膠】即阿膠之處方用名。詳『阿膠』條。

【清炎草】即甘草之處方用名。詳『甘草』條。

【清炎者】即黃耆清炎者之處方用名。詳『黃耆』條。

【清風藤】古籍別名　青藤。尋風藤（綱目）

外國名稱　Sabia japonica, Maxim.（拉丁）アラカヅラ

229／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（日本）

基本 係清風藤科清風藤屬。爲清風藤之莖。

產地 生山野間。浙江天台山有出。

形態 清風藤爲蔓草類之纏繞灌木本。嫩莖綠色。葉卵形。尖端革質。滑澤深綠色。秋季脫落。葉柄仍留。爲針狀。三月間花生葉腋。花五瓣。黃色。結實球形。熟則呈深碧色。其莖可供藥用。



清風藤

主治 風痰。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論清風藤曰。治風濕流注。歷節鶴膝。痲痺瘙痒。損傷瘡腫。入酒藥中用。

【清涼種】卽香薷之古籍別名。見和漢藥考。詳『香薷』條。

【清油】卽胡麻油之古籍別名。見和漢藥考。詳『胡麻油』條。

【淺瓜】卽越瓜之日本名。詳『越瓜』條。

【牽】卽牛之牝者。見『牛』條。

【牽牛酥】基本 係取脊椎動物反芻類牽牛之乳汁。製煉爲酥。

性質 甘。微寒。無毒。

效能 和氣活血。通腸利水。潤肌膚。澤毛髮。

主治 心熱肺痿。胸中客熱。渴漱。吐血。虛勞。急痛。療口瘡。及諸瘡毒。

【牽牛子】命名 本品始出田野人牽牛謝藥。故以名之。後人隱其爲黑丑白丑者。蓋丑屬牛也。

處方用名 丑牛。黑丑。白丑。白牽牛。

古籍別名 盆甑草。天茄。（綱目）狗耳草。（救荒）草金鈴。（炮炙）假君子。三白草。（和漢藥考）

外國名詞 Pharbitis hederacea L.（拉丁）

基本 屬旋花科喇叭花牽牛之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。牽牛子產陝西漢中府。安徽亳州縣。

形態 喇叭花爲一年生之纏繞草本。葉皆互生。每葉片各有三裂。葉面微生細毛。夏日葉腋開合瓣花。形如喇叭。頗大。朝開夕萎。故又名朝顏花。果爲蒴果。形圓如球。中分三室。室藏種子兩粒。此花有紅、白、紫、藍、雜色等。而花與葉之形狀亦殊。多變化。種子作三角形。外面色黑褐。內面色白。



牽牛子

種類 ㊀凡開青藍色之花。則子黑。名黑丑。力速。㊁凡開白色之花。則子白。名白丑。力遲。

採取 八月與九月間采實晒乾。

製法 雷敎曰。凡採得子晒乾。水淘去浮者。再晒。拌酒蒸。從巳至未。晒乾收之。臨用舂去黑皮。李時珍曰。今多只磑取頭末。去皮麩不用。亦有半生半熟用者。

性質 苦。寒。有毒。

成分 含有主要之昆蘭胡林（Convolvulin $C_{31}H_{50}O_{16}$）與藥刺巴根相同。

效能 瀉溼熱。利二便。用作和緩下劑。爲便祕與腳氣藥。

主治 下氣。療腳滿水腫。除風毒。利小便。

歷代記述攷證 【唐】甄權云。性本草論牽牛子曰。治痃癖氣塊。利大小便。除虛腫。落胎。【唐】孟詵食療本草論牽牛子曰。和山茱萸服。去水病。【宋】大明日華諸家本草論牽牛子曰。取腰痛。下冷膿。瀉蠱毒藥。并一切氣壅滯。【元】李東垣用藥法象論牽牛子曰。除氣分濕熱。三焦壅結。【明】李時珍本草綱目論牽牛子曰。逐痰消飲。通大腸氣祕。風祕。殺蟲。達命門。【明】繆希雍本草經疏論牽牛子曰。牽牛子本經不載。乃名醫續註本草謂爲苦寒有毒。其主下氣者。乃損削眞氣之謂也。療腳滿水腫。除風毒。利小便。皆相似語。況前病多屬脾胃氣虛。此是瀉藥。今反用之。爲害滋大。【明】李士材本草圖解論牽牛子曰。牽牛子辛溫入肺及大小

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

腸。利小便。通大腹。消水腫。逐痰飲。除氣分濕熱。疏三焦壅結。牽牛主脾家水氣。喘滿腫脹。下焦鬱遏。腰背脹重。及大腸風祕氣祕。卓有殊功。但病在血分及脾虛痞滿者。不可服也。磑取頭末。去皮麩用。亦有半生半熟用者。皮能滑氣。勿得誤用。【清】黃宮繡本草求眞論牽牛子曰。牽牛有白有黑。白者其性入肺。黑於上焦氣分。除其濕熱。故氣逆壅滯。及大腸風祕者。得此以治。黑者其性兼入右腎。能於下焦通其遏鬱。故腫滿腳氣。及大小便祕。俱得以治。但下焦血分濕熱。濕自下受。宜用苦寒以折牽牛氣味辛辣。久嚼雄烈服之。最能泄肺。若以下焦血病而於氣分有損之藥以爲投治。是以血病瀉氣。不使氣血俱損乎。惟是水氣在肺。喘滿腫脹等症。暫用以爲開泄。俾氣自上達下。而使二便頓開。以快一時。若果下焦虛腫。還當佐以沉香補骨脂等味。以爲調補。俾補瀉兼施。而無偏陂損泄之害矣。取子炒去浮者。舂去皮。得木香乾薑良。【清】陳修園本草經讀論牽牛子曰。牽牛子大毒大破之藥。不堪以療內疾。惟楊梅瘡或毒發周身。或結於一處。甚則陰氣剝。鼻柱壞。顙潰不合。其病多從陰氣而入。亦必使之從陰器而出也。法用牽牛研取頭末。以土茯苓自然汁泛丸。又以燒穢散爲衣。每服一錢。生桃蘆四錢。以土茯苓湯送下。一日三服。服半月效。【清】楊時泰本草述鈎元論牽牛子曰。牽牛子感熱火之化所生。稟性雄烈。色黑者。先甘後苦。甘少苦多。其力速。色白者。先甘後辛。甘少辛多。其效遲。二者均瀉氣分之濕。故下水積類用之。夫濕屬血病。又有所謂氣分之濕者。此卽血中之氣也。人身元氣。不能化濕。積久而蘊隆之氣。滯着填壅。以致喘滿腫脹。或鬱遏下焦。二便不得施化。斯時將從血治乎。將必於血中之氣而責之。用此爲斬關奪門之將。乃有入處而猥以其泄元氣。遂束手待斃。可乎。如邪不至於蘊隆。患不極於壅壅。則正氣未併於濕邪。但處其弱而已。弱而施投之。能復有存者寡矣。故臨證投劑。惟審濕邪之盛否。以爲用舍耳。凡人三焦氣壅。有升無降。津液皆化爲痰飲。不能下滋腸腑。而病腸結。服硝黃徒入血分。必若閉閘。更有必用大黃之證。無牽牛則竟不能入胃口以下者。可知此味爲血中開導之先驅。卽漫然謂其泄氣不可也。大抵牽牛屬陽中之陰。稟性辛烈。故多旋陰濕之氣以爲開。非治熱也。不論寒濕。濕熱。但其壅結處。卽其奏功處。若寒濕濕熱之痰上壅下祕。尤其的對。如下焦病於氣壅而實。以致脹痛者。用此能達命門。走精隧。以此病亦本於濕所化也。惟水氣爲患。正當益脾健運。以資氣化焉。用此不能化氣。而徒泄氣之味。以致氣化愈窮哉。

【日本外學說】日本學說謂牽牛子者。「アサガホ」之種子。自昔知有下泄之效。故極著名。其用量爲一、二至四、〇。平野一貫氏分析檢得「コンウォルヴリン」。猪子氏亦得此成績。故牽牛子之有效分。不外「コンウォルヴリン」。然近時猪子氏。供治療用之製劑。非此「コンウォルヴリン」而爲氏所謂牽牛子華爾斯。以其製法甚簡易。而效用頗確實故也。猪子氏於數多患便祕者。投與此劑。頗得良效。用法大約以〇、五至〇、七爲丸。一回內服之。服後經數時。發下痢。其際雖有腹痛。然通常不劇。牽牛子華爾斯之製法。以牽牛子加亞爾個保爾。蒸餾或蒸散後。於殘渣內加溫蒸餾水。頻頻洗滌。至水無色爲度。終以全量。於水浴上屢次攪拌之。使乾燥爲度。英美學說謂牽牛子又名二丑。產中國各處。有黑白二種。黑者於野處滋生。尤爲繁多。至白者則多有人種植之。然此草雖分黑白二種。如用爲藥品。其功力無稍異。

【近人學說】張山雷曰。牽牛善泄濕熱。通利水道。亦走大便。故別錄謂其苦寒。至李氏東垣。以其兼有辛葱氣味。遂謂是李熱雄烈。壽頤按此物甚滑。通泄是其專長。試細嚼之。惟其皮稍有辛味。古今主治。皆用之於濕熱氣滯。實腫脹滿。二便不通。則東垣以爲辛熱。張石頑和之。亦謂辛溫。皆屬不確。當以別錄之苦寒爲正。又葱氣戟人喉舌。細味之亦在皮中。所謂有毒蓋

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

卽在此。古方中凡用末子。均稱止用頭末。正以其皮黏韌不易細碎。祇用頭末。則棄其皮而可無辛葱之毒。頗有意味可思。觀別錄主治專破氣分之壅滯。泄水濕之腫滿。除風利便。固皆以實病言之。此藥功用固已包舉無遺。甄權申之。則曰治痃癖氣塊。利大小便。東垣謂除氣分濕熱。三焦壅結。瀕湖謂逐痰飲。通大腸氣祕。風祕殺蟲。亦皆主結滯壅塞各論。而甄權乃又謂除虛腫。則謏矣。日華本草謂治腰痛。蓋亦指濕熱阻塞。腰脊不利之症。惟言之殊不分明。究屬非是。

配合應用 ㈠黑牽牛得白木香、檳榔、使君子。能追蟲取積。

㈡牛郎丸。治氣築奔衝不可忍。用黑牽牛半兩。檳榔二錢半。爲末。每服一錢。紫蘇湯下。追蟲取積亦可用。（普濟方）

㈢治面上風刺。黑牽牛酒浸三宿。爲末。先以薑汁擦面。後用藥塗之。（摘玄方）

㈣治面上粉刺。瘟子如米粉。黑牽牛末。對入面粉藥中。日日洗之。（聖惠方）

㈤搜風通滯。風氣所攻。臟腑積滯。用牽牛子以童尿浸一宿。長流水上洗半日。生絹袋盛。掛風處令乾。每日鹽湯下三十粒。極能搜風。亦消虛腫。久服令人體清瘦。（斗門方）

㈥利膈丸。治三焦壅塞。胸膈不快。頭昏目眩。涕唾痰涎。精神不爽。用牽牛子四兩。半生半炒。不炷皂莢。酥炙二兩爲末。生薑自然汁煮糊丸。梧子大。每服二十丸。荊芥湯下。（王衮博濟方）

㈦治一切積氣。宿食不消。黑牽牛頭四兩爲末。用蘿蔔剜空。安末蓋定。紙封蒸熟。取出入白荳蔻末一錢。搗丸。梧子大。每服一二十丸。白湯下。名順氣丸。（普濟方）

㈧治男婦五積五般積氣成聚。用黑牽牛一斤。生搗末八兩。餘滓以新瓦炒香。再搗。取四兩。煉蜜丸。梧子大。至重者三十五丸。陳橘皮、生薑煎湯。臥時服。半夜未動。再服三十丸。當下積聚之物。尋常行氣。每服十丸甚妙。（博濟方）

㈨治胸膈食積。牽牛末一兩。巴豆霜三個。研末。水丸。梧子大。每服二三十丸。食後隨所傷湯下。（儒門事親方）

㈩治腎氣作痛。黑白牽牛等分。炒爲末。每服三錢。用猪腰子切縫。入茴香百粒。川椒五十粒。摻牽牛末入內。扎定。紙包。煨熟。空心食之。酒下。取出惡物效。（直指方）

⑪治傷寒結胸。心腹硬痛。用牽牛頭末一錢。白糖化湯調下。（鄭氏家藏方）

⑫治大便不通。用牽牛子半生半熟爲末。每服二錢。薑湯下。未通再以茶服。一方加大黃等分。一方加生檳榔等分。（簡要方）

⑬治大腸風祕結濇。牽牛子微炒。搗頭末一兩。桃仁去皮尖。麩炒半兩。爲末。熟蜜丸。梧子大。每湯服三十丸。（衛義方）

⑭治水蠱腹滿。白牽牛、黑牽牛各取頭末二錢。大麵麥四兩。和作燒餅。臥時烙熟食之。以茶下。降氣爲驗。（宣明方）

⑮治諸水飲病。强子和云。病水之人。如長川泛溢。非盃杓可取。必以神禹決水之法治之。故名禹功散。用黑牽牛頭末四兩。茴香一兩。炒爲末。每服一二錢。以生薑自然汁調下。當轉下氣也。（儒門事親方）

⑯治陰水陽水。黑牽牛頭末三兩。大黃末三兩。陳米飯鍋糕一兩。爲末。糊丸。梧子大。每服五十丸。薑湯下。欲利服百丸。（醫方捷徑方）

⑰治水腫尿濇。牽牛末。每服方寸匕。以小便利爲度。（千金方）

⑱治瀉氣中滿。足脛微腫。小便不利。氣急欬嗽。用黑牽牛末一兩。厚朴製半兩。爲末。每服二錢。薑湯下。或臨時水丸。每棗湯下三十丸。（普濟方）

⑲治水氣浮腫。氣促。坐臥不得。用牽牛子二兩。微炒。搗末。以烏牛尿浸一宿。平旦入葱白一握。煎十餘沸。空心分二服。水從小便中出。（聖惠方）

⑳治風毒腳氣。捻之沒指者。牽牛子。搗末。蜜丸。小豆大。每服七丸。生薑湯下。取小便利乃止。亦可吞之。其子黑色。正如棘小核。（肘後方）

㉑治小兒腫病。大小便不利。黑牽牛、白牽牛各二兩。炒取頭末。井

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

華水和丸。綠豆大。每服十二丸。蘿蔔子煎湯下。（聖濟總錄方）

㊀治小兒腹脹。水氣流腫。膀胱實熱。小便赤澁。牽牛生研一錢。青皮湯空心下。一加木香。減牛丸服。（鄭氏小兒方）

㊁治疳氣浮腫。常服自消。黑牽牛、白牽牛各半生半炒。取末。陳皮、青皮等分爲末。糊丸。綠豆大。每服三歲兒服二十丸。米湯下。（鄭氏小兒方）

㊂治疳氣耳聾。疳氣攻腎。耳聾陰腫。牽牛末一錢。豬腰子半個。去膜。薄切。摻入內。加少鹽。濕紙包煨。空心食。（鄭氏小兒方）

㊃治小兒雀目。牽牛子末。每以一錢。用羊肝一片。同麵作角子二個。炙熟。食米飲下。（普濟方）

㊄治風熱赤眼。白牽牛末。以葱白煮研丸。綠豆大。每服五丸。葱湯下。服訖。睡半時。（衛生家寶方）。

㊅治馬脾風。小兒急驚。肺脹喘滿。胸高氣急。脇縮鼻張。悶亂欬嗽。煩渴痰潮。聲嘎。俗名馬脾風。不急治。死在旦夕。用白牽牛半生半炒。黑牽牛半生半炒。大黃煨。檳榔各取末一錢。每用五分。蜜湯調下。痰盛加輕粉一錢。名牛黃奪命散。（全幼心鑑方）

㊆治小兒夜啼。黑牽牛末一錢。水調傅臍上。卽止。（生生編方）

㊇治臨月滑胎。牽牛子一兩。赤土少許。研末。覺胎轉痛時。白榆皮煎湯下一錢。（王袞博濟方）

㊈治小便血淋。牽牛子二兩。半生半炒。爲末。每服二錢。薑湯下。良久。熱茶服之。（經驗方）

㊉治腸風瀉血。牽牛五兩。牙皂三兩。水浸三日。去皂。以酒一升。煮乾。焙研末。蜜丸。梧子大。每服七丸。空心酒下。日三服。下出黃物。不妨病。減後。日服五丸。米飲下。（本事方）

㊊治痔漏有蟲。黑白牽牛各一兩。炒爲末。以猪肉四兩。切碎。炒熟。羅末。食盡。以白米飯三匙。壓之。取下白蟲爲效。又方。白牽牛頭末四兩。沒藥一錢。爲細末。欲服藥時。先日勿夜飯。次早空心。將猪肉四兩。炙切片。羅末。細細嚼食。取下膿血爲效。量人加減用。忌酒色油膩三日。（儒門事親方）

㊋治漏瘡水溢。乃腎虛也。牽牛末二錢半。入切開猪腎中。竹葉包定。煨熟。空心食。溫酒送下。借腎入腎。一經一橫。兩得其便。惡水旣泄。不復淋瀝。（直指方）

㊌治一切癰疽發背。無名腫毒。年少氣壯者。用黑白牽牛各一合。布包搥碎。以好醋一盆。煮至八分。露一夜。次日五更溫服。以大便出膿血爲妙。名濟世散。（張三丰仙方）

㊍治澁熱頭痛。黑牽牛七粒。砂仁一粒。研末。井華水調汁。仰灌鼻中。待涎出卽愈。（聖濟總錄方）

㊎治氣滯腰痛。牽牛不拘多少。以新瓦燒赤。安於上。自然一半生一半熟。不得撥動。取末一兩。入硫黃末二錢半。同研勻。分作三分。每分用白麵三匙。水和捍開。切作碁子。五更初。以水一盞。煮熟。連湯溫下。痛卽已。未住。隔日再作。予嘗有此疾。每發。一服痛卽止。（本事方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡氣虛及溼熱在血分者禁用。

著名方劑　舟車神佑丸。治水腫水脹形氣俱實者。（河間方）黑牽牛四兩。大黃二兩。（酒浸）甘遂一兩。（麵裹煨）楠紅大戟。（麵裹煨）芫花。（醋炒）青皮。（炒）各一兩。木香五錢。檳榔五錢。輕粉一錢。上爲末。水丸。每服五分。五更溼水下。大便利三次爲度。量虛實用之。並忌鹽醬百日。

參攷資料　㊀牽牛以氣藥引則入氣。以大黃引則入血。利大腸。下水穢。色白者瀉氣分溼熱。上攻喘滿。破血中之氣。（王好古）㊁牽牛治水氣在脾。喘滿腫脹。下焦鬱遏。腰背脹重。及大腸風祕氣祕。卓有殊功。但病在血分及胃脾虛弱而痞滿者。則不可取快一時及常服。暗傷元氣也。一宗室大人。年幾六十。平生苦腸結病。旬日一行。蓋於生產服養血潤燥藥。則泥膈不快。服消黃通利藥。則若罔知。如此三十餘年矣。時珍診其人體肥膏粱。而多憂鬱。日吐酸痰。疏許乃寬。又多火病。此乃三焦之氣壅滯。有升無降。津液皆化爲痰飲。不能下滋腸腑。非血燥也。潤劑留滯。消黃徒入血分。不能通氣。俱爲痰阻。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

故無效也。乃用犀牛末。皂莢膏丸與服。即便通利。自是但覺腸結。一服就順。亦不妨食。且復精爽。蓋犀牛能走氣分。通三焦。氣順則痰逐飲消。上下通快矣。外甥柳喬棗多酒色。病下極腹痛。二便不通。不能坐臥。立哭呻吟者七晝夜。醫用通利藥不效。遣人叩予。予思此乃澀熱之邪在精道。壅腹隧路。病在二陰之間。故前阻小便。後阻大便。病不在大腸膀胱也。乃用楝實、茴香、穿山甲諸藥入犀牛加倍。水煎服。一服而減。三服而平。犀牛能達右腎命門。走精隧。人所不知。惟東垣李明之知之。故明之治下焦陽虛天真丹用犀牛以鹽水炒黑。入佐沈香、杜仲、破故紙、官桂諸藥。深得補瀉兼施之妙。方見醫學發明。又東垣治脾澀太過。通身浮腫喘不得臥。腹如鼓。海金沙散。亦以犀牛爲君。（李時珍）

【犀枝牡丹】即旋花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋花』條。

【犀牛皮】基本　此是海犀。其皮可供藥用。

主治　治風活血最效。

效能　祛風澀。解熱毒。

參攷資料　犀皮多刨入藥。一斤兌二元餘。爲祛溫解毒之要劑。正剛皮。一斤值洋廿元。余在生藥行時。殊罕見貨眞。特向巴貨商詢問。始知本品爲服食上品。如燕窩魚翅然。不常入煎藥也。（程登瀛）

【犀角】命名　犀字篆文象形。本品即犀牛之角。

處方用名　犀角尖。犀角片。烏犀角。黑犀角。靡犀尖。

古籍別名　兕角。（綱目）低密。（番名）奴角。兕角。吡沙拏。（和漢藥考）竭伽角。（番書）斑角。（唐本草）

外國名詞　Rhinoceros horn.（英）

基本　屬哺乳動物中之奇蹄類。爲犀之鼻角。

產地　陳仁山藥物生產辨云。犀角產安南金邊龍賴爲最好。近日少出。以暹羅爲上。但其庄頭略劣。反以石叻內埠嶼內埠山打根等處莊頭略好。人多悅之。仰光亦有出次之。和漢藥考曰。產於中國、暹羅、安南、蘇門答臘及非洲等處。

形態　犀爲牛類。巨獸也。好棲息於池沼湖澤等陰濕之地。其出也。必數頭爲一羣。體亞於象。肥大而稍黑。皮膚幾於無毛。若裸體然。皮厚而堅。頸肩腰部諸具極深之皺襞。俾體之運動可以自如。其足三趾。末端有蹄。頭稍帶三角形。上脣突出下脣之外。無大齒。鼻上之皮膚變而爲尖銳上挺之物。或一或二。謂之犀角。然不如他獸之用以格鬬。僅恃以傷樹木掘泥土。與投石而已。性愚鈍。然野而難馴。見人即奔竄。若追之過急。則亦反身抗拒。勢不可當。其聽覺嗅覺均極銳敏。惟目力多弱。常以木葉爲食。餌從前歐洲寒地犀之孳生殊繁。今則已絕其種。僅亞非兩洲之熱帶地方。猶見有棲息者。在亞洲者爲印度犀。體長一丈二尺。高六七尺。鼻上有尖物一。故名一角犀。皮多皺襞。全身有粟瘤。具粟眼。因此所得犀角。又有粟紋角、粟眼角等別名。在非洲者。體長丈餘。高五尺許。鼻上之尖物有二。一前一後。但較短。故名二角犀。皮膚之皺襞似甲。其性兇暴。甚於印度犀。其角爲角質狀之一種尖物。微彎曲。有剛毛。大抵牡者爲短。牝者爲長。最長者可二三尺。尋常多七八寸或尺許。底部闊五六寸。其色不一。或外面淡褐綠色。內作黃色。中央黑色。或爲黑白二種。或黑色相和。角尖爲膀入藥以用黑色者爲佳品。故烏犀角之名最著。試以鋸縱解之。見爲粗糙之纖維狀。然稍滑澤。其性質與毛爪相同。

製法　蘇頌曰。凡使犀角。捕得殺死。爲上。蛇角者次之。寇宗奭曰。鹿取茸。犀取尖。其精銳之力。盡在是也。以西番生犀磨服爲佳。入湯散屑之。雷敩曰。凡使物用奴犀。病水犀。孿子犀。無潤犀。惟取烏黑肌皺折裂光潤者。鎪屑入臼杵細。萬匝乃用。李珣曰。凡犀角鋸成。當以薄紙裹於懷中蒸燥。乘熱搗之。應手如粉。故歸田錄云。翡翠屑金。人氣粉犀。

用法　古法多剉末或作片用。近則多磨服。

性質　苦。酸。鹹。寒。無毒。

成分　含炭酸石灰、燐酸石灰、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膠實等。其有效成分爲硫化乳酸。

效能　清心胃營熱。療傷寒時疫。解溫毒。止吐衄。用作强壯解熱解毒諸藥。

作用　在胃不起作用。至腸略有激腸蠕動之效。入血中能使中樞神經興奮。心跳强盛。血壓增高。同時又能減少白血球使體溫下降。

主治　百毒鬼疰。邪鬼瘴氣。殺鉤吻鴆羽蛇毒。除邪不迷惑魘寤。久服輕身。（本經）又治傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣。令人駿健。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論犀角曰。辟中惡毒氣。鎮心神。解大熱。散風毒。治發背癰疽。瘡腫化膿。作水療時疾熱如火。煩毒入心。狂言妄語。【唐】李珣海藥本草論犀角曰。主風毒攻心。氐氐熱悶。赤痢小兒豌豆及風熱驚癇。【唐】孟詵食療本草論犀角曰。燒灰水服。治卒中惡。心痛。飲食中毒。藥毒。熱毒。筋骨中風。心風煩悶。中風失音皆瘥。以水磨服。治小兒驚熱。山犀水犀。功用相同。【宋】日華諸家本草論犀角曰。治心煩。止驚癲。肝明目。安五臟。補虛勞。退熱消痰。解山瘴溪毒。【明】李時珍本草綱目論犀角曰。磨汁治吐血衄血下血。及傷寒蓄血。發狂譫語。發黃發斑。痘瘡稠密。內熱黑陷。或不結痂。瀉肝涼心。清胃解毒。【清】黃宮繡本草求眞。論犀角曰。犀角苦鹹大寒。功出入胃清熱。及入心涼血。蓋胃爲水穀之海。無物不受。口鼻爲陽明之竅。凡毒邪必先由於口鼻而入。以至及於陽明胃腑。犀角爲神靈之獸。食百草之毒。及衆木之棘。角尖精力盡聚。用此苦寒之性。使之出入陽明。以清諸熱百毒也。熱邪既去。心經自明。所以狂言妄語。熱毒癰腫。驚煩目赤。吐血衄血蓄血時疫斑黃。疽瘡黑陷等症。無不由於入胃入心。散邪清熱。涼血解毒之功也。然瘡瘡心火。初用不無冰伏之慮。後用不無引毒入心之患。故必愼用。始無礙耳。至於蠱毒之鄉。遇有飲食。以犀筯攪之。有毒則生白沫。無毒則無。若云可以發表取汗。則必毒熱閉表。合以升發等味同投。則見魂汗淋漓。若微毒單用則不及矣。銼成以熱掌摸之香者眞。不香者假。成器多破蒸煮無力。入湯劑磨汁八九劑。剉細納懷中。待熱搗之立碎。【清】楊時泰本草述鈎元論犀角曰。犀茹百毒。食衆棘。凡毒入此獸之胃而悉化。其角屬陽性走散。潔古謂爲陽中之陰。大抵入胃而效心之用者。心爲火主。風逐火焰。火散而風自平。且肝脾之系。俱連繫於心。是以風毒風熱。驚癇斑黃。遇之而悉瘳。至於瘡腫化膿。特療血分熱毒之餘事耳。【清】貫九如辨藥指南論犀角曰。犀角氣香屬陽。主走散。性涼屬陰。主瀉泄。妙在陰陽並用。善清虛火上炎。致吐衄妄行。肺胃中蓄血凝滯。又取其味苦酸鹹。恰合心神之性。蓋心惡熱。以苦涼之。心苦緩。以酸收之。心欲軟。以鹹軟之。且清香透心。以此益心神。卽能鎮肝氣。一切心經肝膽之熱。必不可缺。若小兒驚癇疳熱。痘瘡血熱。尤爲聖藥。

國外學說　日本古方藥品考曰。來自外國之犀角有數種。其角彎曲。黑色有光澤。長七八寸至尺許。根部扁闊。徑五六寸。皮極粗糙。色灰白。中心作深黑色者。名爲犀角。爲上品。其白色者爲下品。凡劈之縱理。撫之滑澤者眞。其高二三寸。色黑。形如盆山者。呼倍多利。亦堪用。其形似牛角。長一尺六七寸。根粗三四寸。不扁闊。劈之縱理密者。爲水犀。不眞。又和漢藥考曰。中國人以犀角製爲酒杯花瓶等。視爲珍品。酒杯曰兕觥。酒中如有鴆毒。一入此杯。立卽沸騰泛溢。人知此酒有毒。得免於害。試之百不爽一。又犀皮異常堅厚。卽鋼刃亦難剌割。銃丸亦不易貫徹。故印度及非洲土人。均以其革製鎧楯。頗重視之。其肉味極美。印度人嗜食之。

辨僞　㈠犀角用黑兕角及水牛角。雖琢形似。假造混售。鑑便之粉。或鋸便之屑。更難辨別。按李時珍云。犀出西番南番、滇南、交趾等處。有山犀水犀二種。水犀出入水中。尤難得。陶宏景云。入藥惟取雄犀。生者爲佳。若犀片及見成器物。已被蒸煮。不堪用。寇宗奭云。鹿取茸。犀取尖。其精銳之力。盡在是也。用者當選角質烏黑。肌皺折裂光

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

潤者。錯屑入臼。杵細研末。或當面鏃粉。或取頂尖磨水取汁尤佳。再李珣有云。凡犀角鋸成。當以薄紙裹於懷中。蒸燥乘熱擣之。應手如粉。此法今人鮮知。故罕用耳。㊀曹炳章曰。按嶺表錄異云。犀牛似牛形而豬頭。腳似象。蹄有三甲。首有兩角。一在額上爲兜犀。一在鼻上。較小爲胡帽犀。鼻上者皆簇束而花點小。多有奇紋。牯犀亦有兩角。皆謂毛犀。俱有粟紋。堪爲腰帶。千里犀中或有通者。花點大小奇異。固無常定。有編花路通。有頂花大而根花小者。謂之倒插通。此二種亦五色無常矣。若通處白黑分明。花點差池。計價巨萬。希世之寶也。海島逸志云。犀牛大過於牛。皮如荔殼。而紋大如錢。背皮如馬鞍以覆其項。頭似鼠。嘴似龜。足雕腫如象。好行荊棘中。喜食藤刺。頭一角在鼻梁。世所繪其角在額者非也。此余所目覩。其行林中。觸樹多折。此頭一角。或即犀屬也。沈萍如云。犀角本草載出西番。番滇南交廣諸處。有山水兕三種。山犀易得。水犀難見。並有兩角。鼻角長而額角短。水犀皮有珠甲。山犀則無。兕即犀。止一角在頂。紋理細膩。斑白分明。不可合藥。蓋牯角紋大而犀角紋細也。其紋如魚子形。謂之粟紋。紋中有眼。謂之粟眼。黑中有黃花者爲正透。黃中有黑花者爲倒透。花中復有花者名重透。並名通犀。乃上品也。花如椒豆斑者次之。烏犀純黑無花者爲下品。其通天夜視有光者。名夜光犀。能通神。又有角上有紋直上至端。夜露不濡者。名通天犀。莞海雜誌云。犀角皮厚而無毛。鼻上生前後兩角。後之所產祇有一角。爲解熱之特效藥。且亦自能解角。角藏於巖穴中。獵人以如其形木角易之。則次年解角仍藏原處。否則更易他處。不復再見矣。今就市上所通行者。惟暹邏角爲最佳品。其外有禮根盤內有蜂窠形。中凸出如墩。兩畔陷紋粗。刨片白多黑少。爲上品。交趾產者。外無禮。內無墩。紋較細者次之。又有一種天麻角。性硬。更次。雲南產者。角尖長。其氣臭。最次。凡犀角爲熱症中之退熱特效藥。關係人命生死。非尋常藥可比。必須採辦的眞暹羅角爲要。須看色黑。劈開處直紋粗絲者爲妙。尖上頭圓更佳。試法以眞犀角置爲酒器。則清香爲異耳。沈萍如云。犀角以有花紋而粗者爲貴。今市人多以雲貴山中野牛野羊角僞之。其角黑而無花紋。且氣羶耳。此等僞角。害人生命。不可不愼。

近人學說 ㊁程登瀛曰。犀兕之暹產者。其形狀愚曾爲文在助坡醫藥月刊發表。並預備拍攝犀照。以證歷來角生鼻端說之訛誤。惟此項照片不易得。查辭典所收圖說。皆係角生鼻端。即洋人所畫之獵獸圖。亦係一角生於鼻尖。以是疑是各地產物變形。蓋暹地出產頗多。獵人每割頭角出市場。犀之形狀。固人人知曉也。茲特將暹產特徵及近日市價。摘錄如下。犀之形態似水牛。而體較長大。頭尖眼細。頸肥短。不善轉側。腳成筒狀。三個蹄趾甚擴展。辨其皮角。分正副二種。價值相差甚鉅。犀一角生頭額中。兕二角。縱列。長角在頭額中。照角在鼻端。形如枳殼。重兩許。高不過一寸。亦稱角餅。蓋扁薄如餅餌故也。犀角成斜圓錐體。角頭徑達四寸。重至二磅者。長僅六七寸。平常多隆凸如山峯。兕角長至尺許。微彎斜。又犀角表面灰黑而角質白。角盤部顆突粗糙。盤緣週圍有凹痕。稍腰底部有均勻小溝紋。自角壁外逼入內壁。成凸凹紋。世稱千支紋兕角。灰黑色。角盤部逐漸擴大成平坡狀。無凹溝。表面粗製如松皮狀。（與正犀之數十條角絡成組顆突者不同）犀角端鈍圓。角空淺。兕角端微尖。角空較深。角空底皆有蜂窩孔。犀皮皺襞成不規則圓形。大半呈六角形。大如細錢。俗稱鳳梨皮。（即婆羅蜜皮樣）兕皮皺襞多直紋。亦有交錯成小井字形部位。犀毛生皺襞中。粗硬而疏。短。尾短無拂毛。兕尾似牛尾。毛細密。犀腳趾甚擴展。蹄甲面圓滿。兕趾不甚擴展。蹄甲面稍腰。據近日兌價。犀角一斤莊。每斤値七百餘錢。兕角値六百錢。十二兩以上。作斤莊計算。小角較廉。在往時兕角常比犀便宜一半。嘗發見以小兕角刻造混充正犀之糾紛。犀皮每擔値二千錢。兕皮

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

約一百五十鍊而已。此種皮角。概由香港轉運至上海。犀之種類名稱不一。今分析之。犀較小於象。角生鼻端。其皮鞣鍊極堅厚。印度犀一角。非洲犀二角。縱列。一前一後。角質堅緻。可以製器。可以入藥。見辭源。犀（本經中品）奇蹄動物。體較河馬爲重。四肢短。有三蹄。頭上有一角或二角者。前角在鼻骨處。後角在頭骨。一角者只有前角。產亞非兩大洲。水陸均有之。見中國醫學大辭典。按辭源醫典所附犀圖相同。均係一角。位於鼻尖端與耳對立。成三角柱形。卽一角者只有前角是也。大概兩辭書係取材歐美動物學書。不知該圖採自何地。其兩耳長而聳豎。角基細長與耳埒。殊不類暹產的活犀。辭源復謂印度犀一角。其圖殆爲印度產歟。暹與印度接壤。所產亦只有一角。（照角不算）其角却生頭額正中。此距離幾百里產物之異形歟。抑辭書之訛譌耶。犀爲食草反芻獸。高如大水牛。體較長大。尾短無拂毛。頸肥大。自肩至頭尖突如棱。全頸短硬。不善轉側。耳向兩旁斜翹。頭尖眼細。角位於耳目之中央。照角生鼻骨端。爲硬革包軟骨質的隆凸形。老兒牯高寸許如女乳挙。雌者較低平。正火犀則消滅無形。肢肥短成圓筒狀。蹄擴展。辨其皮角分正副二種。價值相差甚鉅。正金鋼犀。眼睛黃赤如瑪瑙色。俗稱火犀。皮突起顱疣狀。毛極疎小。生裂痕。中其皺襞成不規則之圓形紋。曰鳳梨皮。（卽婆羅蜜樣）厚五六分。以至七八分。以年齡之老幼爲差別。其胎孕十二個月。壽命較長於象。前年每擔皮值千元。現市價報千五六。最近有售得二千餘元者。兒犀（商人簡作庶。名其皮角爲副莊）尾毛似牛。皮略有粗橫紋。或橫直交錯。粗裂如象皮。厚四五分。一擔值百五六元。正鋼角大十三四兩者。長僅五六寸。由角纖維組織而成。附著於頭皮。無角盌基部甚擴大。如竹筍形。層層粗糙。或顆粒如珠釘。蒂角尖椎鈍。微呈彎斜。向前或向後無定。小角僅隆凸三四寸。如山峯。角基絲壁有柚皮狀的細毛管粒。角空甚淺。反倒頭視之。恰成小醬碟樣的窩凹。底部呈海棉狀鬆疏的枯骨。孔固著於頭額特形凸突之硬筋膜。爲血管神經所出入。兒副莊角較細長。外表平端尖細。略彎曲。角盤無甚擴展。角空成半球圓。干支紋毛管粒。比較皆糊塗不能如正莊之顯著。刻下市價較前年漲三分之一。一觔莊。正角售九百元。副五六百元。十二兩以上作觔莊計算。小者較廉。舊說謂牝犀曰兒。無角。但究實牝牡皆有角。牝角恒較小耳。上述兩種皆有其雌雄。據獵人言。僉謂犀之生殖力甚衰弱。自和中國交通以來。視爲山林間之活寶。百計謀殺之。故現時森林中之剛犀頗稀少。而山牛却很多。剛犀起蟄尋不遇雄性交媾時。卽與山牛交而生變種的兒。雌兒與犀交生犀。與牛交生牛。雄者交犀交牛皆生兒。變種從雄性化也。此說雖未有憑證。可以證實。我們也無比較眞確的證據。可以駁他。只能說犀兒是同類異種。但觀察家作旁證。驢馬與鷄鴨能變種。人類亦能變種。犀之形態似牛。通稱爲犀牛。特頭尾皮毛蹄角與牛異。兒之皮尾毛類牛。短椎角變爲較細長。而有彎曲。假定爲犀與牛交之變種。其推測却有相當之理由可信。（按商場別稱爲庶。副兒字是我僭加的。此種副莊犀。是否古人稱虎兒之兒。余不敢斷定。）獵人三五成組。帶米與火種入深山。隨地砍竹爲炊器。以藤鹽葉實爲加味。獵取禽獸佐餐。常生活於森林中。犀喜居山坡。抓土瘡積水爲住所。常以泥漿塗其身。發見足跡。則隱伏其常行路旁。截橫身射擊之。中彈則一直前走。因其習性罕回頭傷人。可從尾後追趕無危險。垂死時卽出尿。獵人備竹筒承之。並割取其珍貴部分。倘淺山距市場較近。及正剛犀則盡取其皮肉尖噴。弄宣兩府。常年獲二三十頭。全西勢當有百幾十頭。其皮角概運銷我國及日本。犀食草蔬。肉卻細膩如雞。經過三日尚未腐敗可食。味亦甘美適口。除骨肉外。各部分大多收入藥。於治療上有特效者。如角。皮。齒。蹄甲。勢。屎。血等。犀藥性

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

清潔。喝必掃流水。先以右前足攪之。使沉澱之樹葉雜草。隨水流淨。至澄清見沙石才飲。故右前蹄較光赤爲最佳。一腳三個甲。中甲兜肚狀。外甲略成三角形。甲空之裂痕。蜂窠孔。略如角空一樣。故眞蹄角是無物可以混充的。其清熱解毒。治失血發癍諸症。功用與角同。雖效力稍遜。但重用之。仍較廉宜。故能暢銷於本地各市肆。勢爲剛犀之生殖器。短大似驢。副細長如牛。末端分叉。每具值百末。味鹹微甘。溫熱。善發汗。取三錢和生姜煎服。治傷寒。感冒初起。惡寒症有特效。惜常人無病理常識。遇伏暑溫熱亦作服。服必淋汗。因之灼燥津液。增加溫熱。病至不起者甚多。尿青綠色。味極臭惡。治黃腫下消。小便渾濁症。頗有效。純犀者難得。多是獵人割時注尿洗滌其尿胞而已。屎（肚草）有毒。能殺蟲。燃燒薰疥癬疾。煨研搽腫瘍。無名腫毒。其消腫解毒之功甚偉。血療跌打傷。沖溫酒服。其破瘀行血之效。勝山羊血。殺時收血入竹筒內。以草管貫其中。架炭火上隨炙隨吹乾結後劈竹成片。故有發酵樣的葱孔。齒與蹄甲。磨水服。清涼。修治成膏。或以醋磨濃。搽熱毒瘡癤腫瘍疼痛最有效。兕皮多刨入藥。一斤兕二元餘。爲祛溼解毒之要劑。正剛皮一斤值二十元。余在生藥行時。殊罕見貨。買特向巴貨商詢問。始知本品爲服食上品。如燕窩魚翅。不常入煎劑也。舊以嶺表錄異所載。犀之種類最多。但沈萍如、劉恂辨釋種類。都有五通五色花樣。在今日但覺光怪陸離。無從核對。惟通天犀一名。邏地亦有傳說。謂某地有火犀一頭。夜行森林中。火光照耀如電。靈異通神。獵人伺捕皆不能銃中云。李時珍云。犀出西南番、滇南、交廣諸地。有山水兕三種。避水犀尤難得。地方繁盛。大野獸逐漸滅種。今世殆無避水犀。則上述兩種。在邏地亦已年見減少矣。抱朴子云。犀食百草之毒。故能解百毒。凡蟲毒之鄉。於飲食時。以角攪之。有毒則生白沫。無毒則否。以之熏毒藥。則無復毒熱。充海雜誌載皮厚無毛。鼻上生前後兩角。爲退熱解毒之特效藥。自能解角脫角藏於巖穴中。獵人以如其形之木角易之。則次年解角仍存原處。否則更易他處。不復再見矣。陶宏景云。入藥惟取雄犀生者爲良。自脫者次之。苦角片及見成器物。已被蒸煮不堪用。李珣有云。當以薄紙裹於懷中蒸燥。乘熱搗之。應手如粉云。此皆理想之言。一一試之。並未盡然。據獵人說。不曾捕獲無角或新生小角者。從可推知其角之牢固。沒有解換。縱有自脫之死角。亦非偶然所能拾得。故知市肆必無自脫之角。亦無已被煮之現成器。陶氏之言。無須顧慮。只要提防假角耳。在邏地一角值百元至千元。以此爲貨當交易。亦常發生假角騙案。但正角有直破痕者。最無價值。或竟無人承買。不知何故。俗稱破裂角是死邏。裹兆。殆因實無錢。故爲是言耳。㈡袁淑範曰。今將依化學的試驗所得之成績。簡略陳之。則如左。一、犀角五瓦之熱湯浸出液中。含有〇、〇二二五瓦之乾燥物質。二、犀角一瓦中含有〇・〇〇三瓦之灰分。三、犀角一瓦中有〇・〇五瓦。卽含有五

%之硫黃。四、犀角浸出液不呈任何 Alkaloid 反應。五、犀角之加水分解產物中。得證明約有二%之奇羅進（Tyrosin）及若干之硫化乳酸（Thiomilchsäure）奇士秦（Zystin）等。六、犀角之水蒸汽蒸餾液中。含有與水性浸出液呈同樣硫黃臭之揮發成分。由是知犀角之有效成分。吾人不得不先注目於 Zystin 及 Thiomilchsäure。前者據濮氏（Buchtala）之法。以人類之頭髮用化學的方法處置之。而得 Zystin 之結晶。後者又依雷鳴氏（Levin）之法。從製 Brenzcatechinschwefelsäure 着手。用人工的集成法。可得 Thiomilchsäure 之純品。然後再以之與犀角浸出液行比較的動物實驗。其結果可證明 Thiomilchsäure 稀薄溶液之作用。完全與犀角浸出液之作用相同。Thiomilchsäure 存在於角質之加水分解產物中。早經史氏（Suter）證明確定之事實。今又將犀角水蒸汽蒸餾液用依的兒（Aether）振盪之。再試驗其依的兒殘渣時。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Thiomilchsäure之反應。確爲陽性。依此犀角之一種有效成分爲硫化乳酸 Thiomilchsaure。於此益可知矣。概括以上實驗之成績而得結論如左。(一)犀角對於由溫剌或由副腎素腦內注射所發之熱。不呈解熱作用。(二)犀角於正常之心臟不呈作用。然對於能力減弱之心臟。有使心動强盛之效。(三)犀角對於或種毒物。有解毒作用。(四)犀角浸出液靜脈內注射。能使白血球減少。(五)犀角之加水分解產物中。證明有 Tyrosin, Zystinund Thiomilchsäure等。(六)犀角之浸出之水蒸汽蒸餾液生理的作用。與硫化乳酸 (Thiomilchsäure) 之作用完全相同。依以上諸種實驗之成績。使吾人得知犀角之一有效成分。確爲硫化乳酸無疑。

配合應用 ㊀犀角鬼臼麝香、龍齒茯神蘇合香沉水香天靈蓋、丹砂雄黃能辟鬼疰邪氣。

㊁治大人小兒風熱驚癎。用犀角、丹砂琥珀金箔天竺黃牛黃鈎藤鈎羚羊角眞珠麝香。

㊂治瘡瘡血熱。初見點。紅豔。壯熱口渴煩燥狂語。犀角磨汁同生地黃紅花子麥門冬紫草白芍藥、鼠黏子。多服可保無虞。

㊃治吐血衄血。犀角磨汁同鬱金童便生地黃麥門冬炙甘草白芍藥紫蘇子。剪草丹參白薬子。

㊄犀角地黃湯。治傷寒蓄血發黃。或熱盛吐血。

㊅入紫雪丸。治大人小兒顚狂。溫疫鬼毒邪魅。一切煩熱爲病。

㊆入抱龍丸。治小兒恍惚驚悸。痰涎壅塞。

㊇入至寶丹。治中風不語。中惡氣絕。一切神魂恍惚。癲狂擾亂等證。

㊈治中忤中惡鬼氣。其證或暮夜登廁。或出郊外。驀然倒地。厥冷握拳。口鼻出清血。須臾不救。似乎尸厥。但腹不鳴。心腹暖耳。勿移動。令人圍繞燒火打鼓。或燒蘇合香安息香麝香之類。候醒。乃移動。用犀角五錢。麝香、硃砂各二錢五分爲末。每水調二錢服。卽效。(華陀方)

㊉治臥忽不寤。若以火照之則殺人。但唾其面。痛嚼其踵及大趾甲際。卽活。以犀角爲枕。卽令不魘。

㊊治瘡瘡稠密。不拘大人小兒。生犀於瀝器中。新汲水磨濃汁冷飲服之。(錢氏小兒方)

㊋治消毒解熱。生犀角尖磨濃汁頻飲之。(錢氏小兒方)

㊌治蠱毒尿瘡。狀如菜萸。中央白膿。惡寒壯熱。可磨犀角汁塗之。(千金方)

㊍治癰疽毒瘡。喜着十指。狀如代指。根深至肌。能壞筋骨。毒氣入臟。殺人。宜燒鐵烙之。或灸百壯。日飲犀角汁取瘥。(千金方)

㊎治山嵐瘴氣。犀角磨水服之良。(集簡方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非大熱及無溫毒者。與孕婦禁用。惡雷丸烏頭烏喙蕳茵忌鹽松脂升麻爲之使。

著名方劑 犀角地黃湯。治傷寒及溫病應發汗而不汗。內蓄血者。及鼻血吐血不盡。內餘瘀血大便黑。面黃。消瘀血。(千金方)犀角一兩。生地黃八兩。芍藥三兩。丹皮二兩。上四味。㕮咀。以水九升。煮取三升。分三服。

參玆資料 ㊀犀角犀之精靈所聚。足陽明藥也。胃爲水穀之海。飲食藥物。必先受之。故犀角能解一切諸毒。五臟六腑皆稟氣於胃。風邪熱毒。必先干之。故犀角能療諸血及驚狂斑痘之證。抱朴子云。犀食百草之毒。及衆木之棘。所以能解毒。凡蟲毒之鄉。有飲食以此角攪之。有毒則生白沫。無毒則否。以之煮毒藥。則無復毒熱也。北戶錄云。凡中毒箭。以犀角刺瘡中立愈。由犀食百毒棘刺也。昔溫嶠過武昌牛渚磯下。多怪物。嶠然犀角照之。而水族見形。淮南子云。犀角置穴。狐不敢歸。則犀之精靈辟邪不惑。於此益可見矣。(李時珍)㊁犀角妊婦勿服。能消胎氣。(雷敎)㊂犀字篆文象形。其牸名兕。亦曰沙犀。爾雅翼云。兕與牸字音相近。猶殺之爲牯也。大抵犀兕是一物。古人多言兕。今人多言犀。北音多言兕。南音多言犀。爲不同耳。梵書謂犀曰墝伽。(李時珍)㊃犀出永昌山谷。及益州。永昌卽今滇南也。(別錄)㊄今出武陵交州寧州諸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

遠山。犀有二角。以額上者爲勝。又有通天犀。角上有一白縷。直上至端。夜露不濡。入藥至神驗。或云此是水犀角。出水中。漢書所謂駭雞犀者。置米飼雞。皆驚駭不敢啄。置屋上。鳥雀不敢集。又有牸犀角。甚長。文理似犀。不堪入藥。（陶弘景）㊀牸是雌犀。文理細膩。斑白分明。俗謂斑犀。服用爲上。入藥不如雄犀。（蘇頌）㊁犀出西番、南番、滇南、交州諸處。有山犀、水犀、兕犀三種。又有毛犀似之。山犀諸山林人多得之。水犀出入水中。最爲難得。並有二角。鼻角長而額角短。水犀皮有珠甲。而山犀無之。兕犀即犀之牸者。亦曰沙犀。止有一角在頂。文理細膩。斑白分明。不可入藥。蓋牯角文大而牸角文細也。洪武初。九眞曾貢之。謂之獨角犀是矣。陳藏器謂犀無水陸。郭璞謂犀有三角。蘇頌謂毛犀爲牯犀。皆其訛傳。毛犀即旄牛也。犀角紋如魚子形。謂之粟紋。紋中有眼。謂之粟眼。黑中有黃花者爲正。透黃中有黑花者爲倒透。花中復有花者爲重透。並名通犀。乃上品也。花如椒豆斑者次之。烏犀純黑無花者爲下品。其通天夜視有光者。名夜明犀。故能通神開水。飛禽走獸見之皆驚。又山海經有白犀白色。開元遺事有辟寒犀。其色如金。交趾所貢。冬月暖氣襲人。白孔六帖有辟暑犀。唐文宗得之。夏月能清暑氣。續表錄異有辟塵犀。爲簪梳帶胯。塵不近身。杜陽編有鐲忿犀。云爲帶令人鐲去忿怒。此皆希世之珍。故附見之。（李時珍）

【犀角片】卽犀角之處方用名。詳『犀角』條。

【犀角尖】卽犀角之處方用名。詳『犀角』條。

【犀洛】古籍別名　星洛。泥洛。（別錄）

基本　犀洛爲雜草類之一種。可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　癰疾。

【犁鶂】卽鵜鶘之原名。詳『鵜鶘』條。

【猛火油】卽石腦油之古籍別名。典見康譽之昨夢錄。詳『石腦油』條。

【猪心花】卽辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛夷』條。

【猪牙草】卽蒴蓄之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒴蓄』條。

【猪耳朶】卽羊蹄之古籍別名。典見和漢藥考。詳『羊蹄』條。

【猪屎草】卽夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夏枯草』條。

【猓然】卽果然之古籍別名。典見綱目。詳『果然』條。

【理石】命名　本品卽石膏之順理而微硬有肌者。故名。

古籍別名　立制石。（本經）肌石。（別錄）精理黃石。

外國名詞　Marmor

形態　理石爲石類之一種。卽石灰岩之變性。有白色雜色兩種。白者爲火成石灰岩。由粒狀之結晶質集合而成。可供造像碑坊。其雜色者。爲水成石岩。質極緻密。含鐵及黏土等不純物。有黑、黃、青諸彩色。具山川雲物之形狀。可供屏風及嵌桌椅窗壁。但有由人工造成者。其狀頗似其天然生成者。可供藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　身熱。利胃。解煩。益精明目。破積聚。去三蟲。（本經）除營衛中去來大熱。結熱。解煩毒。止消渴。及中風痿痺。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論理石曰。漬酒服。療癖。令人肥悅。

配合宜忌　惡麻黃。滑石爲之使。

【理文石】卽蜜陀僧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜜陀僧』條。

【琉球蘐】卽番蘐之日本名。詳『番蘐』條。

【琉球藍】卽馬藍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬藍』條。

【琉璃】卽琉璃石之原名。詳『琉璃石』條。

【琉璃石】原名　琉璃。

命名　本品漢書作流離。蓋謂其流光陸離也。故名。

古籍別名　火齊。（綱目）

產地　出高麗諸地。

形態　琉璃石爲石類之一種。色白而堅。厚半寸許。可製爲燈罩。映光較明。採得可供藥用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　身熱目赤。以水浸冷服之。

【琉璃草】產地　出廣東始興縣玲瓏岩。

形態　琉璃草爲雜草類之一種。莖如芹梗。可供藥用。

主治　風疾。功類風藥。

【瓠瓜】卽壺蘆之實首尾如一者。詳『壺蘆』條。

【瓠壺】卽壺蘆之別名。詳『胡蘆』條。

【甜勾根】卽覆盆根之古籍別名。詳『覆盆根』條。

【甜瓜】命名　本品味甜於諸瓜。故名。

古籍別名　甘瓜（唐本）果瓜（綱目）眞桑瓜（日本）

外國名詞　Cucumis Melo, L.（拉丁）マクハウリ（日本）

基本　係葫蘆科胡瓜屬。爲甜瓜之瓜瓤。

產地　原產亞細亞及亞非利加之熱帶地方。現我國各省均有出。

形態　甜瓜爲果類之一種蔓生本草莖細長。有卷鬚。纏繞他物之上。葉圓作心臟形。掌狀分裂。夏日開花。花單性。雌花與雄花同株。合瓣花冠色黃。結實爲瓠果。至盛夏成熟。概呈橢圓形。長四寸許。色亦黃。有縱條紋而無刺。味甘甜。



甜瓜

性質　甘。寒。滑。有小毒。

主治　止渴。除煩熱。利小便。通三焦。開壅塞氣。治口鼻瘡。

歷代記述攷證　【宋】寇宗奭本草衍義論甜瓜曰。暑月食之。永不中暑。【清】黃宮繡本草求眞論甜瓜曰。甜瓜暑月解止渴之品也。味甘性寒有毒。凡人因於暑月內伏。症見膿血惡痢。痛不可忍。須以水浸甜瓜數枚食之。卽愈。若瓜經日曝。其寒尤甚。故書有言瓜寒於曝。油冷於煎。卽是此意。但此陽氣素盛。亦宜少食。若使脾胃素冷。服之則有瘧痢痘黃。動氣反胃。陰下生瘡。生瘡發熱。作脹之變。須用鹽花少許。麝香與酒則解。脚氣癥癖食之患。永不除。瓜蔕當主涌吐。但有兩鼻兩蔕者。殺人。皮可取收作羹。或蜜收晒爲菓。【清】王士雄隨息居飲食譜論甜瓜曰。甜瓜甘寒滌熱。利便除煩。解渴療飢。亦治暑痢。種類匪一。以清香甘脆者勝。多食每患瘧痢。凡虛寒多溼便滑腹脹。脚氣及產後病後皆忌之。其子亦可食。

參攷資料　㈠瓜性最寒。曝而食之尤冷。故稽聖賡云。瓜寒於曝。油冷於煎。此物性之異也。王冀洛都賦云。瓜則消暑蕩悁。解渴療飢。又奇效良方云。昔有男子病膿血惡痢。痛不可忍。以水浸甜瓜食數枚。卽愈。此亦消暑之驗也。（李時珍）㈡多食發黃疸。令人虛羸多忘。解藥力。病後食多。或反胃。脚氣人食之。患永不除也。（孫思邈）㈢多食令人陰下溼痒生瘡。動宿癥癖。病破腹。發虛熱。令人慢慢氣弱。脚手無力。少食則可。龍魚河圖云。凡瓜有兩鼻兩蔕者。殺人。五月瓜沉水者。食之得冷病。終身不瘥。九月被霜者。食之冬病寒熱。與油餅同食。發病。多食瓜作脹者。食鹽花卽化。（孟詵）㈣張華博物志。言人以冷水澆至膝。可頓啖瓜至數十枚。澆至項。其啖轉多。水皆作瓜氣也。則水浸消瓜。亦物性也。瓜最忌麝香與酒。凡食瓜過多。但飲酒及水。服麝香丸。勝於食鹽澆水也。（李時珍）㈤瓜字篆文。象瓜在鬚蔓間之形。甜瓜之味。甜於諸瓜。故獨得甘甜之稱。舊列菜部。誤矣。按王禎云。瓜類不同。其用有二。供果者爲果瓜。甜瓜、西瓜是也。供菜者爲菜瓜。胡瓜、越瓜是也。在木曰果。在地曰蓏。大曰瓜。小曰瓞。其肉曰瓤。其堆曰瓞。謂脫花處也。其蔕曰蔕。謂繫蔓處也。禮記爲天子削瓜及瓜祭。皆指果瓜也。本草瓜蔕亦此瓜之蔕也。（李時珍）㈥甜瓜北土中州種時甚多。二三月種下。延蔓而生。葉大數寸。五六月花開黃色。六七月瓜熟。其類最繁。有圓有長。有尖有扁。大或徑尺。小或一捻。其稜或有或無。其色或青或綠。或黃斑糝斑。或白路黃路。其瓤或白或紅。其子或黃或赤。或白或黑。按王禎農書云。瓜品甚多。不可枚舉。以狀得名。則有龍肝虎掌兔頭

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

狸首羊髓蜜筒之稱。以色得名。則有烏瓜白圓黃瓤白瓤小青大斑之別。然其味不出乎甘香而已。廣志惟以遂東、燉煌、廬江之瓜爲勝。然瓜州之大瓜陽城之御瓜西蜀之溫瓜。永嘉之寒瓜。未可以優劣論也。甘肅甜瓜皮瓤皆甘。勝糖蜜。其皮最甘猶美。斲中一種陰瓜。種於陰處。熟則色黃如金。膚皮稍厚。藏之至春。食之如新。此皆種藝之功。不必均以土地也。甜瓜子曝裂取仁。可充果食。北瓜最長。廚氣觸之。甚至一蒂不收也。（李時珍）

【甜瓜子仁】　製法　雷敩曰。凡收得曝乾杵細。馬尾篩篩過成粉。以紙三重裹。壓去油用。不去油。其力短也。西瓜子仁同。

性質　甘。寒。無毒。

主治　腹內納聚。破潰膿血。最爲腸胃脾內壅要藥。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺。論甜瓜子仁曰。止月經太過。研末。去油水調服。【唐】孟詵食療本草。論甜瓜子仁曰。炒食補中宜人。【明】李時珍本草綱目論甜瓜子仁曰。清肺潤腸。和中止渴。

【甜瓜花】　主治　心痛欬逆。

【甜瓜蒂】　㊀卽瓜蒂之處方用名。詳『瓜蒂』條。㊁卽瓜蒂之原名。詳『瓜蒂』條。

【甜瓜蔕】　原名　瓜蔕。

命名　本品係甜瓜之蒂。故名。

古籍別名　瓜丁（千金）苦丁香（象形）瓜鼻（和漢藥考）

基本　屬葫蘆科甜瓜未熟之蒂。

產地　陳仁山藥物生產辨云。甜瓜蒂產山東登州府蓬萊縣。八月新。

形態　甜瓜爲栽植園圃之一年生蔓草。莖有長粗毛。以卷鬚纏繞他物而成長。葉作心臟圓形。有淺掌狀分裂。葉柄頗長。花爲單性。爲黃色合瓣花冠。深作五裂。雌花及雄花生於同株。果實爲漿果。有甘味。形狀不一。但多數爲橢圓形。長四五寸。徑二寸餘。成熟則呈有光澤黃色。有綠色縱線。其蒂之熟者苦味少而效力薄。故入藥宜以未熟瓜之蒂。

採取　六七月間採其青瓜蒂。陰乾用。

製法　雷敩曰。凡使勿用白瓜蒂。要取青綠色瓜氣足時。其蒂自然落在蔓上。採得繫屋東有風處。吹乾用。寇宗奭曰。此甜瓜蒂也。去瓜皮用蒂約半寸許。曝極乾。臨時研用。李時珍曰。按唐瑤云。甜瓜蒂以圓而短瓜圓瓜者良。若香甜瓜及長如瓠子者。皆供菜之瓜。其蒂不可用也。

性質　苦。寒。無毒。

成分　日本醫學博士猪子吉人氏。對於其有效成分。名之爲甜瓜毒素（Melotoxin）。其後醫學博士高橋順太郎氏繼續研究。證明所謂甜瓜毒素者。實與瑪瑪琪加（Momordica）果實中所含愛拉鐵林（Elaterin $C_{20}H_{28}O_5$）爲同一物云。（見東京醫事新誌第八百五十七號）

效能　吐熱痰。治風癇。用作催吐藥。

主治　大水身面四肢浮腫。下水殺蟲毒。欬逆上氣。及食諸果病在胸腹中。皆吐下之。（本經）去鼻中瘜肉。療黃疸。（別錄）

張仲景之證明　瓜蒂一味。經張仲景之實驗。認爲主治胸中有毒。欲吐而不吐。茲考徵如下。瓜蒂散證曰。胸中痞鞕。氣上冲咽喉。不得息者。又曰。必中滿而煩。饑而不能食者。病在胸中。上方用瓜蒂一分。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論瓜蒂曰。治臍寒熱鼈。眼昏吐痰。【元】王好古湯液本草論瓜蒂曰。得麝香細辛。治鼻不聞香臭。【明】李時珍本草綱目論瓜蒂曰。吐風熱痰涎。治風眩、頭痛、癲癇、喉痺、頭目有溼氣。【明】繆希雍本草經疏論瓜蒂曰。瓜蒂感時令之火熱。稟地中之伏陰。故其味苦氣寒。有小毒。入手太陰足陽明足太陰經。其主大水身面四肢浮腫黃疸者。皆脾胃虛。水氣溼熱。乘虛而客之也。苦以湧泄。使水溼之氣外散。故能主之。經曰。在高者。因而越之。病在胸中。則氣不得歸元而爲欬逆上氣。吐出胸中之邪。則氣自順。欬逆止矣。殺蟲毒者。亦取吐出

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之義。去鼻中瘜肉者。以其苦寒能除肺家之熱也。日華子治膈塞熱鬱。眼脅吐痰。好古得麝香細辛治鼻不聞香臭。及吐風熱痰涎。風眩頭痛。癲癇喉痺。頭面有瀆氣傷寒客水胸中。傷食脹滿。下部無脈等證。皆借其宣發湧泄引涎追淚之功耳。【清】黃宮繡本草求眞論瓜蒂曰。甜瓜蒂卽俗名苦丁香是也。味苦氣寒有毒。蓋此氣味純陰。功當涌泄。凡因熱痰聚膈而見面目浮腫。欵逆上氣。皮膚水氣。黃疸瀉熱諸症。則當用此調治。或兼他藥同入涌吐。如仲景合赤小豆之酸甘以吐胸中寒邪。金匱瓜蒂湯以治中暍無汗之類。若不因其高而越。則爲喘爲嗽。勢所必至。但非實熱實症。不可輕用。

國外學說 日本學說謂昔時用爲催吐藥。然自吐酒石吐根等輸入後。已相形見絀矣。藥用者。當甜瓜未熟之時。採其蒂。乾燥之。有催吐之效。尤以新而味苦辛者爲良。經年而失氣味者爲劣。依猪子氏之實驗云。本品之有效成分爲雖溶於水而易溶於亞爾個保爾及依的兒之物質。而非糖原質。或亞爾加魯乙度之類。其作用也。或直達。或間接。刺戟嘔吐中樞。以誘起嘔吐。本藥以日本越前產者。尤有峻劇之性。故病牀上甚宜注意。因曾舉動物試驗之成績而詳論之。(和漢藥論)漢醫吐劑之用量。凡〇・四又和漢藥考曰。蒂之熟者少苦。味效力薄。日藥舖所售者。爲越前福井所產最佳。(爲甜瓜之一種)之蒂。呼越前瓜蒂。爲良品。擯猪子博士言。瓜蒂注意服之。則祇刺戟胃腸而已。并不起吸收作用。(卽起呼吸障礙等)故毫無危險。惟服大量則發急性胃腸炎。故須審愼云。

配合應用 ㈠治太陽中暍。身熱頭痛而脈微弱。此夏月傷冷水。水行皮中所致。瓜蒂二七箇。水一升。煮五合。頓服取吐。(金匱方)

㈡治風涎暴作。氣塞倒仆。用瓜蒂爲末。每用一二錢。賦粉一錢匕。以水半合調灌。良久涎自出。不出含沙饋一塊。下咽卽涎出也。(衍義方)

㈢治諸風諸癎。諸風腦痰。諸癎涎涌。用瓜蒂炒黃爲末。量人以酸蠶水一盞調下。取吐。風癎加蠍梢半錢。溼氣腫滿加赤小豆末一錢。有蟲加狗油五七點。雄黃一錢。甚則加芫花半錢。立吐蟲出。(活法機要方)

㈣治風癎喉風。欵嗽及遍身風癢。急中涎潮等證。不拘大人小兒。此藥不大吐逆。只出涎水。瓜蒂爲末。壯年服一字。老少半字。早晨井華水下。一食須含沙饋一塊。良久涎如水出。年深者出墨涎。有塊布水上也。涎盡食粥一兩日。如吐多。人困甚。急以麝香泡湯一盞。飲之卽止。(經驗後方)

㈤治急黃喘息。心上堅硬。欲得水喫者。瓜蒂二小合。赤小豆一合。研末。暖漿水五合。服方寸匕。一炊久當吐。不吐再服。吹鼻取水亦可。(傷寒類要方)

㈥治遍身如金。瓜蒂四十九枚。丁香四十九枚。甘鍋內燒存性爲末。每用一字吹鼻。取出黃水。亦可揩牙追涎。(經驗方)

㈦治熱病發黃。瓜蒂爲末。以大豆許吹鼻中。輕則半日。重則一日。流取黃水乃愈。(千金方)

㈧治黃疸癮黃。並取瓜蒂、丁香、赤小豆各七枚爲末。吹豆許入鼻。少時黃水流出。隔日一用。瘥乃止。亦治身面浮腫。(孟詵方)

㈨治十種蠱氣。苦丁香爲末。棗肉和丸梧子大。每服十三丸。棗湯下。甚效。(瑞竹堂方)

㈩治溼家頭痛。用瓜蒂末一字。噹入鼻中。口含冷水。取出黃水愈。(活人書方)

(一)治瘧疾寒熱。瓜蒂二枚。水半盞。浸一宿頃。服取吐愈。(千金方)

(二)治發狂欲走。瓜蒂末井水服一錢。取吐卽愈。(聖惠方)

(三)治大便不通。瓜蒂七枚。研末。綿裹塞入下部卽通。(必效方)

(四)治鼻中瘜肉。陳瓜蒂末吹之。日三次。瘥乃已。又方。瓜蒂末。白礬末各半錢。綿裹塞之。或以猪脂和蒂子塞之。日一換。又方。青甜瓜蒂二枚。雄黃、麝香半分。爲末。先抓破後貼之。日三次。(聖惠方)又用瓜蒂十四枚。丁香一枚。黍米四十九粒。研末。口中含水。噹鼻取下乃止。(湯液方)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈤治風熱牙痛。用瓜蒂七枚。炒研。麝香少許和之。綿裹。咬定流涎。（聖濟總錄方）

㈥治雞尿白禿。甜瓜蔓連蒂。不拘多少。以水浸一夜。砂鍋熬取苦汁。去性再熬如膠。盛收每剃去痂。洗淨。以膏一盞。加半夏末二錢。薑汁一匙。狗膽汁一枚。和勻塗之。不過三上。忌食動風之物。（儒門事親方）

㈦治胸喘痰氣。苦丁香三箇爲末。水調服。吐痰即止。（朱氏經驗方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。

著名方劑　瓜蒂散。治太陽痛胸中痞鞕。氣上冲胸。不得息。此胸中有寒也。或手足厥冷。脈乍緊。心中煩滿不能食。病在胸中。並當吐之。瓜蒂（熬）赤小豆各一分。上二味。各別搗篩爲散。已合治之。取一錢匕。以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀糜。去滓取汁。和散溫頓服之。不吐者少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家不可與之。

參攷資料　㈠瓜蒂乃陽明經除濕熱之藥。故能引去胸脘痰涎。頭目濕氣。皮膚水氣。黃疸濕熱諸證。凡胃弱人及病後產後用吐藥皆宜加愼。何獨瓜蒂爲然。（李時珍）㈡瓜象實在鬚蔓間也。蒂瓜之綴蔓處也。性屬蔓延。末繫於本。故少延瓤腐。爾雅曰。其紹瓞疏云。繼本曰紹。形小曰瓞。故近本之瓜常小。近末之瓜轉大也。凡實之吮抽津液。惟瓜稍最。而吮抽津液之樞。惟蒂是以瓜蒂具徹下炎上之用。乃蒂味苦而瓜本甘。以見中樞之所以別於上下內外。誠湧泄之宜劑通劑也。（盧子由）

【甜瓜葉】　**主治**　搗汁塗頭生髮。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論甜瓜葉曰。補中。治小兒疳及打傷損折。爲末酒服。去瘀血。

【甜瓜蔓藤】　**製法**　採得陰乾用。

主治　女人月經斷絕。同使君子各半兩。甘草六錢。爲末。每酒服二錢。

【甜瓜瓤】　卽甜瓜之別名。詳『甜瓜』條。

【甜貝母】　卽川貝母之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『川貝母』條。

【甜杏仁】　**原名**　巴旦杏。

命名　本品卽杏仁之甜味者。故名。

處方用名　京杏仁。

古籍別名　八擔杏。忽鹿麻。（綱目）把慌杏。

外國名稱　Prunus Amygdalus, Stokes.

產地　出回回舊地。今關西諸處亦有之。

形態　甜杏爲果類之一種。樹如杏而葉差小。實亦尖小而肉薄。核如梅核。殼薄而仁較杏爲大。其味甘美。如橡子。可供茶點與藥用。



甜杏仁

性質　甘。平。溫。無毒。

主治　止咳下氣。消心腹逆悶。

【甜陀淳子】　卽蜜陀僧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜜陀僧』條。

【甜柑】　卽柑實之先霜而黃。每顆八瓣者。性質功能。詳『柑』條。

【甜桔梗】　㈠卽桔梗之甜者別名。典見綱目。詳『桔梗』條。㈡卽薺苨之處方用名。典見綱目。詳『薺苨』條。

【甜消】　㈠卽芒硝之用蘿蔔同煮。煉去鹹味者。性質功能。參詳『芒硝』條。㈡卽英消製煉之別名。詳『英消』條。

【甜梅】　卽杏仁之古籍別名。典見綱目。詳『杏仁』條。

【甜菜子】　卽枸杞子之古籍別名。典見圖經本草。詳『枸杞子』條。

【甜菊花】　卽菊花之處方用名。詳『菊花』條。

【甜葡萄酒】　**主治**　令病人精神速復。

【甜橘紅】　卽橘紅用糖汁製煉者之別名。詳『橘紅』條。

【甜葶藶】　卽葶藶之處方用名。詳『葶藶』條。

【甜廣皮】　卽橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【甜蕎】　卽蕎麥之古籍別名。典見綱目。詳『蕎麥』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【甜蕎麥】卽蕎麥之處方用名。詳『蕎麥』條。

【甜藤】 產地 生山野林下。

形態 甜藤爲蔓草類之一種。莖如葛。葉尖長。氣辛臭。莖可供藥用。其葉詳見該條。

性質 甘。寒。無毒。

主治 熱煩解毒。調中氣。令人肥健。止洩。又治刺馬血毒入肉。及狂犬牛馬黃病。蛇咬傷。

【甜藤】㊀卽甘藤之古籍別名。典見補註本草。詳『甘藤』條。㊁卽忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『忍冬藤』條。

【甜藤葉】 性質 辛。臭。

主治 搗傅小兒腹中閃癖痞滿。

【甜櫧】卽櫧之木紋細白而實小者。性質功能。詳『櫧』條。

【甜櫧子】卽鉤栗之古籍別名。典見吳瑞本草。詳『鉤栗』條。

【產家大器】卽秦艽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『秦艽』條。

【畢石】卽膽礬之古籍別名。典見本經。詳『膽礬』條。

【畢豆】卽豌豆之古籍別名。典見廣史。詳『豌豆』條。

【畢勃】卽蓽茇之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蓽茇』條。

【畢茄煙】卽煙草之一種。性質功能。與煙草同。詳『煙草』條。

【畢楞伽子】卽覆盆子之古籍別名。典見圖經本草。詳『覆盆子』條。

【畢澄茄】 古籍別名 吡陵茄子。蓽澄茄(綱目)

外國名詞 Piper cubeba, L.E(拉丁)ヒッチョウカ(日本)

基本 係胡椒科胡椒屬爲畢澄茄之果實。

產地 出東印度及爪哇等處。

形態 畢澄茄爲喬木類之蔓生植物。葉長卵形。而尖。開白花。穗狀花序。至夏結實。爲漿果。如豌豆大。呈黑褐色。與胡椒一類二種。其實可供藥用。

採取 八月九月採之。

性質 辛。溫。無毒。

製法 雷敎曰。凡採得。去柄及皺皮。用酒浸蒸之。從巳至酉。杵細。晒乾。入藥用。

主治 下氣消食。去皮膚風。心腹間氣脹。令人能食。療鬼氣。能染髮。及香身。

歷代記述弦證 【宋】大明諸家本草論畢澄茄曰。治一切冷氣痰癖。并霍亂吐瀉。肚腹痛。腎氣膀胱冷。【明】李時珍本草綱目論畢澄茄曰。暖脾胃。止嘔吐。噦逆。

【畢撥】卽蓽茇之古籍別名。典見大明會典。詳『蓽茇』條。

【異翅】卽連翹之古籍別名。典見爾雅。詳『連翹』條。

【略石】卽絡石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『絡石』條。

【略苯草子】卽地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地膚子』條。

【盜庚】卽旋覆花之古籍別名。典見爾雅。詳『旋覆花』條。

【盒子草】卽天毬草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『天毬草』條。

【盒兒藤】卽天毬草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『天毬草』條。

【衆】卽秫之古籍別名。典見唐本草。詳『秫』條。

【衆口芝】卽蜂蜜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜂蜜』條。

【衆茂】卽紫參之古籍別名。典見別錄。詳『紫參』條。

【晒子】卽蝌蚪之古籍別名。典見綱目。詳『蝌蚪』條。

【硃砂】 原名 丹砂。

命名 丹乃石名。其字從井中一點。象丹在井中之形義。後人以丹爲朱色。遂呼爲朱砂。其出辰州者爲上。故有辰砂之稱也。

處方用名 辰砂。飛辰砂。塊辰砂。洋尖砂。劈砂。豆砂。鏡面砂。

古籍別名 朱砂。肺砂。土坑砂。新坑砂。舊坑砂。(綱目)梅柏砂。金星砂。神末砂。平面砂。箭鏃砂。白庭砂。神座砂。妙硫砂。金座砂。玉座砂。白金砂。澄水砂。陰成砂。辰錦砂。芙蓉砂。曹末砂。(雷公炮炙論)巴砂。越砂。雲母砂。馬齒砂。豆砂。末砂。(本草集註)光明砂。馬牙砂。無重砂。(新修本草圖經)日精。眞珠。仙硃。汞砂。赤帝太陽朱鳥。絳陵朱兒。絳宮朱兒。赤帝精。赤帝髓。朱雀。(石藥爾雅)塊砂。階砂。針砂。神砂。溪砂。宣砂。眞朱。半面砂。(和漢藥考)顆塊。鹿簇。(圖經本草)

外國名詞 Hydrargyri Sulphidum Rubrum(拉丁)Cinnabarite.(英)Zinnober.(德)

245／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

基本　係金岩屬。爲汞礦類之丹砂。

產地　陳仁山藥物生產辨云。硃砂產貴州省。以漢口爲上。銅仁次之。大豆砂。鏡砂。均由此舶出。大粒者呼名鏡砂。爲好。豆砂次之。和漢藥考曰。產於西班牙。奧大利亞。匈牙利。意大利。祕魯。墨西哥諸國。中國以產於宣州。辰州者爲上。錦州次之。日本則產於阿波。大和。伊勢。肥後。陸前等地。

形態　辰砂之形狀。如板。如絲。如粒。如塊。色紅。或褐紅。或褐黑。有金剛光澤。條痕作緋紅色。硬度二・〇至三・五。比重八・〇至八・二。熱則發生亞硫酸瓦斯而蒸升水銀。諸酸類不溶解。惟濃硝酸能溶解之。

種類　丹砂品類頗多。以辰州。錦州出者爲良。如馬牙光明者爲上品。白光如雲母者爲中品。石片稜角生青光者爲下品。其最佳者名箭簇砂。結而不實者名肺砂。細者名末砂。色紫不染紙者名舊坑砂。色鮮染紙者名新坑砂。

採取　採無時。土人採之。穴地數十丈。始見其苗。乃白石也。謂之朱砂牀。砂生於石上。其大塊者如雞子。小者如石榴子。十二枚爲一座。其色如未開蓮花。光明耀目。亦有九枚爲一座者。及有七枚五枚者次之。每座中大者爲主。四圍小者爲臣。朝護四面。雜砂一二斗抱之。中有芙蓉頭成顆者。乃入上品之丹砂也。

製法　雷敩曰。凡修事朱砂。靜室焚香齋沐。後取砂以香水浴過。拭乾。碎搗之。鉢中更研三伏時。取一瓷鍋子。每朱砂一兩。同甘草二兩。紫背天葵一錢。五方草一錢。着砂上。以東流水煮三伏時。勿令水闕。去藥。以東流水淘淨。乾。熬。又研如粉。用小瓷瓶入青芝草山鬚草半兩。蓋之。下十斤火煅。從巳至午。方歇候冷取出。細研用。如要服。則以熬蜜丸。細麻子大。空腹服一丸。李時珍曰。今法惟取好砂研末。以流水飛三次。用其末砂多雜石末鐵屑不堪入藥。又法以絹袋盛砂。用蕎麥灰淋汁。煮三伏時。取出。流水浸洗過。研粉飛晒用。又丹砂以石膽。消石和埋土中。可化爲水。

性質　甘。微寒。無毒。

成分　百分中含水銀八十六。硫黃十四。化學上謂之硫化水銀 HgS。天產品質中。多夾有土質。

效能　安魂魄。定驚癎。明目。解毒。用作鎮痙藥。又治初期梅毒。

作用　有直接殺滅黴菌之能。惟功效遠不及水銀。

主治　身體五臟百病。養精神。安魂魄。益氣明目。殺精魅邪惡鬼。久服通神明不老。能化爲汞。（本經）通血脈。止煩滿消渴。益精神。悅澤人面。除中惡腹痛。毒氣疥瘡諸瘡。輕身神仙。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論硃砂曰。鎮心。主尸疰。抽風。【宋】大明諸家本草論硃砂曰。潤心肺。治瘡痂息肉。并塗之。【明】李時珍本草綱目論硃砂曰。治驚癎。解胎毒。痘毒。驅邪瘡。發汗。【明】繆希雍本草經疏論硃砂曰。丹砂味甘微寒。而無毒。蓋指生砂而言也。藥性論云。丹砂君。爲清鎮少陰君火之上藥。辟除鬼魅百邪之神物。安定神明。則精氣自固。火不妄炎。則金木得平。而魂魄自定。氣力自倍。五臟皆安。則精華上發。故明目。心主血脈。心火寧謐。則陰分無熱。而血脈自通。煩滿自止。消渴自除矣。殺精魅邪惡鬼。除中惡腹痛者。陽明神物。故應辟除不祥。消散陰惡殺厲之氣也。久服通神明不老者。古之眞人。飛丹煉石。引納清和。配以金鉛。按之法象。自能合丹道而成變化也。【清】黃宮繡本草求眞論硃砂曰。辰砂即書所云丹砂。朱砂者是也。因砂出於辰州。故以辰名。體陽性陰。外顯丹色。內含眞汞。不熱而寒。離中有坎。也不苦而甘。火中有土也。嬰兒姹女。交會於中。故能入心解熱。而神安魄定。是以同滑石甘草則清暑。同遠志龍骨則養心氣。同丹參則養心血。同地黃枸杞則養腎。同厚朴川椒則養脾。同南星川烏之類則祛風。且以人參茯神濃煎。調入丹則治離魂病。以丹砂末一錢。和生雞子黃三枚。攪勻頓服。則妊娠胎動即安。胎死即出。愼勿經火。及一切烹鍊。則毒等於砒礵。況此純陰重滯。即未烹鍊。久服猶閼以其虛靈之氣。被其鎮墜也。辰砂如明篩簇者

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

良。

國外學說　英美學說謂硃砂產中國之廣東、貴州、四川、湖南等處。係自然生成。其配成者。係從汞與硫磺粉製煉。硃砂爲希臘國人所知之藥。在古時埃及國人用之爲顏料。中國與印度國。自古以來。即用爲藥品。而中國所產之硃砂。在西國久已著名。又日本古方藥品考曰。朱眞。即今辰砂也。以出辰州者爲勝。故名。從前運至日本之辰砂。有馬牙砂、箭鏃砂、雲母砂、米粒砂數種。現今運來者皆如豆粒大。體重。朱色鮮豔。此爲上品。亦有細砂作黃赤色者。須水飛去黃。取丹砂用。日本產不入藥舖。方書中單稱朱。或單稱丹者。皆指辰砂言。日本呼作丹者。即鉛丹。呼作朱者。即銀朱。以水銀製之。故有毒。與朱砂不同。辰砂生用無毒。若煅煉過。則生水銀。有毒。故忌火。

辨僞　㊀鄭肯巖曰。丹砂始出涪州山谷。今辰州、錦州及雲南波斯蠻獠洞中。石穴內皆有。而以辰州爲勝。故又名辰砂。大者如芙蓉花。小者如箭鏃。研之明淨鮮紅。斯爲上品。近今市肆有以鉛丹攙入硃砂。又用代赭攙入辰砂。貽害多矣。㊁曹炳章曰。按硃砂體質極重。鮮紅硃紅色至褐紅色之粒塊。亦有成細小透明之斜方之結晶體者。或爲紅色粉末。有時含爲機物。則顏色殆黑。不明亮。俗爲陰沙。實內含有鉚質或鐵質。銅及各種硫化物礦相伴。不堪入藥。周去非云。據本草金石部。以湖南辰州所產爲佳。雖今世亦貴之。今辰砂乃出沅州。其色與廣西宜州所產相類。色鮮紅微紫。與邕州砂之深紫微黑者大異。功效亦相懸絕。蓋宜山即辰山之陽。故也。雖然。宜辰硃砂雖良。要非仙藥。嘗聞邕州石江溪峒歸德州大秀墟。有金纏砂。大如箭鏃。而上有金絲縷文。乃眞仙藥。得其道者。可用以變化形質。試取以煉水銀。乃見其異。乃邕州燒水銀。當硃砂十二三斤。可燒成十斤。其良者十斤。眞得十斤。惟金纏砂八斤可得十斤。不知此砂一經火力。形質乃重。何也。是砂也。取毫末而嚼之。色如鮮血。誠非辰宜可及。惜乎出產不豐。不能分銷全國耳。今所通行者。皆湖南辰州及雲南貴州出者。荷能片大而薄。如鏡面光亮。色紫紅鮮豔明透者。爲鏡面砂。亦佳。如整粒者爲豆砂。能起鏡面光豔。亦佳。細如粉屑者爲米砂。略次。如呆色紫暗不明亮者。即陰砂。內含鉚質或鐵質。爲更次。不宜入藥用。

配合應用　㊀服食丹砂。三皇眞人鍊丹方。丹砂一斤。研末。童緌以醇酒沃之。如泥狀。盛以銅盤。置高閣上。燥則復以酒沃。令如泥。陰雨疾風。則藏之。盡酒三斗。乃暴之。三百日。當紫色。靜室飯丸。麻子大。常以平旦向日吞三丸。一月三蟲出。半年諸病癒。一年鬚髮黑。三年神人至。（太上玄變經方）

㊁小神丹方。眞丹末三斤。白蜜六斤。攪合日曝。至可丸。丸麻子大。每旦服十丸。一年白髮反黑。齒落更生。身體潤澤。老翁成少。（抱朴子內編方）

㊂明目輕身。去三尸。除瘡癩。美酒五升。浸朱砂五兩。五宿日乾。研末。蜜丸小豆大。每服二十丸。白湯下。久服見效。（衞生易簡方）

㊃神注丹方。白茯苓四兩。糯米酒煮。軟。竹刀切片。陰乾。爲末。入朱砂末二錢。以乳香水打糊丸。梧子大。朱砂末二錢爲衣。陽日二丸。陰日一丸。要祕精新汲水下。要逆氣過精。溫酒下。並空心。（醫壘元戎方）

㊄烏髭變白。小雌雞二隻。只與烏油麻一件。同水餉之。放卵時收取。先放者打窠。以朱砂末填入糊定。同粟卵抱出。雞取出其藥。自然結實。研粉。蒸餅和丸。如綠豆大。每酒下五七丸。不惟變白。亦且愈疾。（張潞方）

㊅小兒初生六日。解胎毒。溫腸胃。壯氣血。朱砂豆大。細研。蜜丸一粟大。調與吮之。一日令盡。（姚和衆至寶方）

㊆預解痘毒。初發時或未出時。以朱砂末半錢。蜜水調服。多者可少。少者可無。重者可輕也。（丹溪方）

㊇治初生兒驚。月內驚風欲死。朱砂磨新汲水。塗五心最驗。（斗門方）

㊈治小兒寫熱。夜臥彡啼。朱砂

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

牛兩。牛黃一分爲末。每服一字。犀角磨水調下。（普濟方）

㊀治急驚搐搦。用丹砂半兩。天南星一個一兩。重者炮裂。酒浸。大蠍三個爲末。每服一字。薄荷湯下。（聖濟總錄方）

㊁治驚忤不語。打撲驚忤。血入心竅。不能言語。朱砂爲末。以雄豬心血和丸。麻子大。每服湯下七丸。（直指方）

㊂治客忤卒死。眞丹方寸匕。蜜三合和灌之。（肘後方）

㊃治癲癎狂亂。歸神丹。治一切驚憂。思慮多忘。及一切心氣不足。癲癎狂亂。嬭豬心二個。切入大朱砂二兩。燈心三兩在內。麻扎。石器煮一伏時。取砂爲末。以伏神末二兩。酒打薄糊丸。梧子大。每服九丸。至十五丸。至二十五丸。麥門冬湯下。甚者乳香人參湯下。（百一選方）

㊄治產後癲狂。敗血及邪氣入心。如見崇物顚狂。用汁三四茶匙。調澄。以紫項地龍一條。入藥滾三滾。刮淨。大辰砂一二錢。研細飛過。用飲兒乳去地龍不用。入無灰酒一盞。分作三四次服。（何氏方）

㊅治心虛遺精。豬心一個。批片相連。以飛過朱砂末摻入。線縛。白水煮熟食之。（唐瑤經驗方）

㊆治男婦心痛。朱砂、明礬枯等分爲末。沸湯調服。（摘玄方）

㊇治心腹宿癥。及卒得癥。用朱砂研細。搜飯。以雄雞一隻。餓二日。以飯飼之。收糞曝燥爲末。溫酒服方寸匕。日三服。服盡更作。愈乃止。（外臺祕要方）

㊈治霍亂轉筋。身冷心下微溫者。朱砂研二兩。蠟三兩和丸。著火籠中熏之。周圍厚覆。勿令烟洩。兼牀下著火。令腹微煖。良久當汗出而甦。（外臺祕要方）

㊉辟瘴正陽丹。砂三兩。水飛。每服半錢。溫蜜湯下。（普濟方）

㊊治傷寒發汗。傷寒時氣溫疫。頭痛。壯熱脈盛。始得一二日者。取眞丹一兩。水一斗。煮一升。頓服。覆被取汗。忌生血物。（外臺祕要方）用眞丹末。酒調。遍身塗之。向火坐得汗愈。（肘後方）

㊋辟穢溫疫。上品朱砂一兩。細研。蜜和丸。麻子大。常以太歲日平旦。一家大小勿食諸物。向東各吞三七丸。勿令近齒。永無溫疫。（外臺祕要方）

㊌治諸般吐血。朱砂、蛤粉等分爲末。酒服二錢。又方。丹砂半兩。金箔四片。蚯蚓三條。同研丸。小豆大。每冷酒下二丸。（聖濟總錄方）

㊍治妊婦胎動。朱砂末一錢。和雞子白三枚。攪勻。頓服。胎死即出。未死即安。（普濟方）

㊎治子死腹中不出。朱砂一兩。水煮數沸。爲末。酒服立出。（十全博救方）

㊏治目生障翳。生辰砂一塊。日日擦之。自退。王居雲病此。用之如故。（普濟方）

㊐治目膜息肉。丹砂一兩。五月五日研勻。銅器中以水漿一盞。膩水一盞。浸七日。暴乾。銅刀刮下。再研。瓶收。每點少許。皆上。（聖濟總錄方）

㊑治目生瞖肉及珠。管眞丹。貝母等分爲末。點注。日三四度。（肘後方）

㊒治面上皯黯。雞子一枚。去黃。朱砂末一兩。入雞子內封固。入白。伏雌下抱。至雛出。取塗面即去。不過五度。面白如玉。此乃陳朝張貴妃常用。方出西王母枕中方。（外臺祕要方）

㊓治沙蜂叮螫。朱砂末水塗之。（摘玄方）

㊔治木蛭瘡毒。南方多雨。有物曰木蛭。大類鼻涕。生於古木之上。聞人氣則閃而動。人過其下。墮人體間。卽立成瘡。久則遍體。惟以朱砂、麝香塗之卽愈。（張杲醫說方）

㊕治產後舌出不收。丹砂傅之。暗擲盆盎作墮地聲驚之。卽自收。（集簡方）

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡無實熱者禁用。

惡慫石　長鹹水。忌一切血。

參攷資料　㊀同遠志龍骨之類。則養心氣。同當歸丹參之類。則養心血。同枸杞地黃之類。則養腎。同厚朴川椒之類。則養脾。同南星川烏之類。則祛風。可以明目。可以安胎。可以解毒。可以發汗。隨佐使而見功。無所往而不可。夏子益奇疾方云。凡人自覺本形作兩人並

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

行並臥。不辨眞假者。離魂病也。用辰砂人參茯苓濃煎日飲。眞者氣爽。假者化也。類編云。錢丞少卿夜多惡夢。通宵不寐。自慮非吉。遇鄧州推官胡用之曰。昔常如此。有道士教戴辰砂如箭鏃者。涉旬卽驗。四五年不復有夢。因解囊中一絳囊遺之。卽夕無夢。神魂安靜。道書謂丹砂辟惡安魂。觀此二事可徵矣。（李時珍）㊁臨沅縣廖氏家。世世壽考。後徙去。子孫多夭折。他人居其故宅。多壽考。疑其井水赤。乃撈之。得古人埋丹砂數十斛也。飲此水而得壽。況練服者乎。（抱朴子）㊂鄭康成註周禮以丹砂、石膽、雄黃、礬石、慈石爲五毒。古人惟以攻瘡瘍而本經以丹砂爲無毒。故多練治服食。鮮有不爲藥患者。豈五毒之說勝乎。宜當以爲戒。（蘇頌）㊃朱砂鎭養心神。但宜生使。若練服少有不作疾者。一醫疾服伏火者數粒。一旦大熱。數夕而斃。沈存中云。表兄李勝練朱砂爲丹。歲餘沐浴。再入鼎。誤遺一塊。其徒丸服之。遂發懵冒。一夕而斃。夫生砂初生小兒便可服。因火力所變。遂能殺人。不可不謹。（寇宗奭）㊄葉石林避暑錄載林彥振謝任伯皆服伏火丹砂。俱病腦疽死。張杲醫說載張懋服食丹砂。病中消數年。發鬚疽而死。皆可爲服丹之戒。而周密野語載臨川周推官平生孱弱多服丹砂、烏附藥。晚年發背疽。醫悉歸罪丹石。服解毒藥不效。竇醫老祝診脈曰。此乃極陰證。正當多服伏火丹砂及三建湯。乃用小劑試之。復作大劑。三日後用膏數貼。半月而瘡平。凡服三建湯一百五十服。此又與前諸說異。蓋人之臟腑稟受萬殊。在智者辨其陰陽脈證。不以先入爲主。非妙入精微者不能企此。（李時珍）㊅丹砂卽今朱砂。俗醫別取武都仇池雄黃夾雌黃者名爲丹砂。用之謬矣。符陵是洽州接巴郡南。今無復采者。乃出武陵西川諸蠻夷中。皆通屬巴地。故謂之巴砂。仙經亦用越砂。卽出廣州臨漳者。此二處並好。惟須光明瑩徹爲佳。如雲母片者謂之雲母砂。如樗砂子紫石英形者謂之馬齒砂。亦好。如大小豆及大塊圓滑者謂之豆砂。細末碎者謂之末砂。此二種粗不入藥用。但可盡用爾。朱砂皆鑿坎入數丈許。雖同出一郡縣。亦有好惡。地有水井。勝火井也。仙方煉餌。最爲長生之寶。（陶弘景）㊆丹砂大略二種。有土砂石砂。其土砂復有塊砂末砂。體並重而色黃黑。不任畫用。療瘡疥亦好。但不入心腹之藥。然可燒之出水銀。乃多也。其石砂有十數品。最上者爲光明砂云。一顆別生一石龕內。大者如雞卵。小者如棗栗。形似芙蓉。破之如雲母。光明照徹。在龕中石鑒上生。得此者帶之辟惡爲上。其次或出石中。或出水內。形塊大者如拇指。小者如杏仁。光明無雜名馬牙砂。一名無重砂。入藥及畫俱善。俗間亦少有之。其膾鏊新井別井沈井火井芙蓉石末石堆豆末等砂形。類頗相似。入藥及畫。當擇去其雜土石。便可用矣。別有越砂。大者如拳。小者如雞鴨卵。形雖大。其雜土石不如細而明淨者。經言末之名眞朱者謬矣。豈有一物以全末殊名乎。（蘇恭）㊇砂凡百等。不可一一論。有妙硫砂。如拳許大。或重一鎰。有十四面。面如鏡。若遇陰沉天雨。卽鏡面上有紅漿汁出。有梅柏砂。如梅子許大。夜有光生。照見一室。有白庭砂。如帝珠子許大。面上有小星。現有神座砂、金座砂、玉座砂。不經丹竈服之。而自延壽命。次有白金砂、澄水砂、陰成砂、辰錦砂、芙蓉砂、鏡面砂、箭鏃砂、曹末砂、土砂、金星砂、平面砂、神末砂等。不可一一細述也。（雷敎）㊈今出辰州、宜州、階州。而辰砂爲最。生深山石崖間。土人采之。穴地數十丈。始見其苗。乃白石謂之朱砂脉。砂生石上。其大塊者如雞子。小者如石榴子。狀若芙蓉頭。箭鏃。連脉者紫黯若鐵色。而光明瑩徹。碎之嶄岩作牆壁。又似雲母片。可折者眞辰砂也。無石者彌佳。過此皆淘土石中得之。非生於石脉者。宜砂絕有大塊者。碎之亦作牆壁。但罕有類物狀。而色亦深赤。爲用不及辰砂。蓋出土石間。非白石脉所生也。然近宜州隣地。春州、融州皆有砂。故其水盡赤。每烟霧蒸蒸之氣亦赤黃色。土人謂之朱砂氣。尤能作瘴癘爲人患也。階砂又次之。不堪入藥。惟

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

可畫色褙。凡砂之經好者。爲光明砂。其次謂之顆塊。其次謂之鹿鬃。其下謂之末砂。惟光明砂入藥。餘並不用。（蘇頌）㊀丹砂以辰錦者爲最。麻陽即古錦州地。佳者爲箭鏃砂。結不實者爲脚砂。細者爲末砂。色紫不染紙者爲舊坑砂。爲上品。色鮮染紙者爲新坑砂。次之。蘇頌承所謂階州金商州砂者。乃陶弘景所謂武都雄黃。非丹砂也。范成大桂海志云。本草以辰砂爲上。宜砂次之。然宜州出砂處。與湖北大乖山相連。北爲辰砂。南爲宜砂。地脈不殊。無甚分別。老者亦出白石牀上。蘇頌乃云宜砂出土石間。非石牀所生。是未識此也。別有一種色紅質嫩者。名土坑砂。乃土石間者。不甚耐火。邕州亦有砂。大者數十百兩作塊。黑暗少牆壁。不堪入藥。惟以燒取水銀。蘇頌云。融州亦有。今融州無砂。乃邕州之訛也。臞仙庚辛玉册云。丹砂石以五溪山峒中產者。得正南之氣爲上。麻陽諸山與五溪相接者次之。雲南波斯西胡砂並光潔可用。柳州一種砂。全似辰砂。惟塊圓如皂角子。不入藥用。商州黔州土丹砂。宣州砂。皆內含毒氣。及金銀銅鉛氣。不可服。張杲丹砂要訣云。丹砂者。萬靈之主。居之南方。或赤龍以建號。或朱鳥以爲名。上品生於辰錦二州石穴中。品生於交桂。下品生於衡邵。名有數種。清濁體異。眞僞不同。辰錦上品砂。生白石牀之上。十二枚爲一座。色如未開蓮花。光明耀日。亦有九枚爲一座。七枚五枚者次之。每座中有大者爲主。四圍小者爲臣。朝護四面。雜砂一二斗抱之。中有芙蓉頭成顆者。亦入上品。又有如馬牙。光明者爲上品。白光若雲母爲中品。又有紫靈砂。圓長似筍而紅紫爲上品。石片稜角生青光爲下品。交桂所出。但是座上及打石得。形似芙蓉頭面光明者。亦入上品。顆粒而通明者爲中品。片段不明徹者爲下品。衡郡所出。雖是紫砂。得之砂石中者。亦下品也。有溪砂。生溪州砂石之中。土砂生土穴之中。土石相雜。故不入上品。不可服餌。唐李德裕黃治論云。光明砂者。天地自然之寶。在石室之間。生雪牀之上。如初生芙蓉。紅芭未坼。細者環拱。大者處中。有辰居之象。有君臣之位。光明外徹。采之者尋石脈而求。此造化之所鑄也。

【硃砂根】古籍別名　平地木。火龍珠。水龍珠。山豆根。（植物名彙）萬兩（日本）

外國名詞　Ardisia Cronata, Sins.（A. Crespe, A. De.）（拉丁）マンリヤウ（日本）

基本　係紫金牛科紫金牛屬。爲硃砂（Myrsineaceae）之根。

產地　凡山野陰地恒多有出。



硃砂根（一）

形態　硃砂根爲山草類之常綠亞灌木。莖高二三尺。在暖地則至七八尺。葉互生。長橢圓形。有尖端。革質厚而光澤。緣邊有鈍鋸齒。夏月莖梢抽出花梗。花小作繖形花序。花冠帶白色。有暗色之小點。五裂。雄蕊與花冠之裂片對生。果實色赤如球形。大如豌豆。經久不落。果色有白有黃。其根色赤。大如筯。可供藥用。



硃砂根（二）

性質　苦。涼。無毒。

主治　咽喉腫痺。磨水或醋噙之。甚良。

參攷資料　硃砂根生深山中。今惟太和山人采之。苗高尺許。葉似冬青葉。背甚赤。夏月長茂。根大如筯。赤色。此與百兩金彷彿。（李時珍）

【硃砂魚】即金魚之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金魚』條。

【硃砂銀】基本　本品乃方士用諸藥合硃砂鍊製而成者。

性質　冷。無毒。

主治　延年益色。鎭心安神。止驚悸辟邪。治中惡蠱毒。心熱煩煩。憂忘虛劣。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

配合宜忌　畏石亭脂、慈石、鐵。忌一切血。

【硃茯神】卽茯神用硃砂拌成者之處方用名。詳『茯神』條。

【硃連翹】卽連翹之處方用名。詳『連翹』條。

【硇砂】卽硇砂之原名。詳『硇砂』條。

【硇砂霜】卽硇砂之處方用名。詳『硇砂』條。

【研星草】卽小將軍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『小將軍』條。

【研茶】

製法　東莞人以芝麻、薔油、雜菜葉、煲煎而成。

主治　去風、消解除食積、療飢。

【研藥】

古籍別名　研藥根。

基本　屬樟科烏藥類之研藥根。

產地　粵南諸州及浙之台州均有產之。

形態　研藥爲常綠灌木、樹較烏藥稍小、葉形如椒、根則全類烏藥而圓細、取之可供藥用。

性質　苦溫、無毒。

主治　霍亂中惡、蠱毒、腹內不調、痢下赤白。

【移角】卽車整角不正者之古籍別名。典見臨海水土記。詳『車整』條。

【移柳】卽水楊之古籍別名。典見古今注。詳『水楊』條。

【章】㊀卽烏樟之古籍別名。典見綱目。詳『烏樟』條。㊁卽胡椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡椒』條。

【章柳根】卽商陸之古籍別名。典見圖經本草。詳『商陸』條。

【章魚】古籍別名　章舉。（韓文）倍烏魚。（臨海志）

外國名詞　Octopus octopodia L.（拉丁）Poulpe 或 Devil-fish（英）タユ或マタユ（日本）

基本　係軟體動物頭足類二鰓類章魚科、爲章魚之肉。

產地　生海中。

形態　章魚爲鱗類之一種。其體分頭及幹軀兩部、全係筋肉而無骨骼、皮膚粗滑、皮內有含色之小胞、故能時時變換體色、頭部兩旁有眼、口旁有觸脚八條、比烏鰂少二條、體長逾腹數倍、頗强壯、大者能攝羊豕入水、因脚端各有吸盤二行、及唇狀之膜、互相連續、腹短小而圓、無內殼、捕魚介爲食、其肉可供食與藥用。

性質　甘、鹹、寒、無毒。

主治　養血益氣。

【章陸】卽商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『商陸』條。

【章漆木】卽接骨木之古籍別名。典見和漢藥考。詳『接骨木』條。

【章魚】卽章魚之古籍別名。典見韓文。詳『章魚』條。

【笛師】卽竹蜂之古籍別名。典見山海經。詳『竹蜂』條。

【符蹇】卽桔梗之古籍別名。典見吳普本草。詳『桔梗』條。

【笹龍膽】卽龍膽之日本名。詳『龍膽』條。

【粕】卽酒糟之古籍別名。典見綱目。詳『酒糟』條。

【粒紅花】卽紅花之處方用名。詳『紅花』條。

【粘刺】㊀卽雲實之古籍別名。典見綱目。詳『雲實』條。㊁卽枳實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳實』條。

【粘糊菜】卽豨薟草之古籍別名。典見救荒本草。詳『豨薟草』條。

【粗草紙】產地　出於富陽、桐廬兩縣。

基本　爲稻草與石灰質所澱而成。

性質　淡、溫、平。

主治　發散、燥濕。

配合應用　㊀發疹瘡、折角草紙半張、南貨店包物厚者是也、煎服較檀柳尤透發。（百草鏡方）㊁治小兒臍瘡、急用大草紙燒灰、敷之、則不致變瘋癇、或加枯礬、或再加龍骨燒灰等分、入麝香少許、撒之。（不藥良方）㊂治腸風下血、粗草紙燒灰、砂糖拌勻、開水服。（不藥良方）㊃貝母圓、經驗廣集、治羊兒瘋。百發百中、用川貝母去心一兩、研粉、用羅篩過、鋪大草紙一百張、一層草紙篩一下、一百張草紙篩一百下、然後用線縫之、入四碗水煮乾、每清早取一張紙、成圓煨過、滾湯泡汁飲之、服盡全愈、神妙無比。（趙恕軒）

【紫丁香】卽瑞香之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【紫丹】卽紫草之古籍別名。典見別錄。詳『紫草』條。

【紫丹參】卽丹參之處方用名。詳『丹參』條。

【紫玉環】基本 本品卽荔枝之產四川瀘縣者。

產地 產於四川瀘縣。

主治 除瘴辟瘴。

參攷資料 紫玉環晒乾。啖一枚。早行大霧中。則嵐風不致侵受。(趙學敏)

【紫玉簪】卽玉簪花之開紫色花者。詳『玉簪花』條

【紫石英】命名 英。亦作瑛。玉光也。五種石英。皆似玉之有光瑩。故名。

外國名詞 Amthyst. (英)(德)

基本 屬巖石。爲石英類之一種。

產地 別錄『紫石英生太山山谷。李時珍曰。自大峴至太山皆有之。烏程縣北顧山。亦有出。東莞縣。燥山。又有出。

形態 紫石英屬於六角系稜柱狀結晶之鑛石。色紫。或青紫。或略帶灰色。惟色之深淺。頗不一定。質透明。有玻璃光澤。硬度七。比重二・五至二・八。諸酸類俱不能溶解之。

製法 李時珍曰。凡入丸散。用火煆。醋淬七次。碾末水飛過。晒乾入藥。

性質 甘。溫。無毒。

效能 溫營鎭心。補肝。又可用爲妊娠藥。

主治 心腹咳逆邪氣。補不足。女子風寒在子宮。絕孕十年無子。療上氣心腹痛。寒熱邪氣。結氣。補心氣不足。定驚悸。安魂魄。填下膽。止消渴。除胃中久寒。散癰腫。令人悅澤。久服溫中。輕身延年。

歷代記述攷證 【唐】甄權 紫性本草論紫石英曰。養肺氣。治驚癎。蝕膿。【明】繆希雍 本草經疏論紫石英曰。紫石英。本經味甘。氣溫無毒。別錄加辛。雷公言大溫。獨李當之言大寒者。是昧其性矣。味厚於氣。入手少陰。手厥陰。足厥陰經。少陰主心。屬陽。而本熱。虛則陽氣衰。而寒邪得以乘之。或爲上氣咳逆。或爲氣結寒熱。心腹痛。此藥溫能散風寒邪氣。故爲女子煖子宮之要藥。補中氣。益心肝。通血脈。鎭墜。虛火使之歸元。故又能止消渴。散癰腫。令人悅澤。及久服輕身延年也。凡入丸散。用火煆醋淬七次。碾末水飛過。曬乾入藥。【清】黃宮繡 本草求眞論紫石英曰。紫石英。卽係石英之紫色者。故爾別其名曰紫。性味俱同。而紫卽能直入血分。不似白石英因其色白。功尚潤肺。止就肺部之病而言之也。紫能入血治療。凡婦人子戶。因於風寒。內乘。絕孕。男子寒熱咳嗽。驚悸夢魂不安。服此則能鎭魄安神。爲心肝經溫血要藥。除寒。甘能補中。中氣足。心得補。諸證無不瘳矣。驚悸。屬心虛。魂魄不安。亦由心君怯弱。無以鎭壓諸經。茲得鎭墜之力。而心君有以鎭攝。卽重以去怯之義也。其主女子風寒在子宮。絕孕。無子者。蓋女子繫胎於腎。及心胞絡。皆陰臟也。虛則風寒乘之而不孕。非得溫煖之氣。則無以祛風寒。而資化育之妙。此藥填下焦。走腎及心包絡。辛溫

配合應用 (一)治女人子宮虛寒。絕孕。無子。用紫石英、白薇、艾葉、白膠、當歸、山茱萸、川芎、香附。(二)治虛勞驚悸。補虛止驚。令人能食。紫石英五兩。打如豆大。水洵一遍。以水一斗。煮取三升。細細服。(張文仲備急方)(三)療心中結氣。用紫石英、茯苓、人參。(四)療霍亂。用紫石英、天雄、菖蒲。(五)治癰腫毒氣。紫石英火燒。醋淬爲末。生韭米醋煎數之。膾亦得。(日華本草方)

用量 一錢至四錢。

施用宜忌 止可暫用。不宜久服。及婦人絕孕。凡由於陰虛火旺。不能攝受精氣者。禁用。畏附子、扁青、惡鮑甲、黃連、麥句薑、長石爲之使。

書名方劑 風引湯。治風熱瘛瘲及驚癎。巢氏云。脚氣宜用此湯。(金匱方)紫白石英、寒水石、石膏、乾薑、大黃、龍齒、牡蠣、甘草、滑石各等分。咬咀。水一升。煎去三分。食後溫呷。無不效者。一方有桂枝、赤石脂。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊂紫石英明澈如水精。但其色紫而不勻。（慈宗奭）㊁紫石英凡虛而鬱悶不安者。宜加用之。婦人服之有子。（甄權）㊂乳石論無單服紫石英者。惟五石散中用之。張文仲備急方有鎮心單服紫石煮水法。胡演及千金方則多雜諸藥同用。今方治婦人及心病時有使者。（蘇頌）㊃紫石英手少陰足厥陰血分藥也。上能鎮心。重以去怯也。下能益肝澀以去枯也。心主血。肝藏血。其性煖而補。故心神不安。肝血不足。及女子血海虛寒不孕者宜之。別錄言其補心氣。甄權言其養肺者。殊昧氣陽血陰營衞之別。惟本經所言諸症。甚得此理。（李時珍）㊄紫石英今第一用太山石色重澈。下有根。次出雷零山。亦好。又有南成石無根。又有青綿石色亦重。黑明徹。又有林邑石。腹裏必有一物如眼。吳興石四面纔有紫色。無光澤。會稽諸暨石形色如石榴子。先時並雜用。今惟采太山最勝。仙經不正用。而俗方重之。（陶弘景）㊅紫石英按嶺表錄云。瀧州山中多紫石英。其色淡紫。其質瑩澈。隨其大小。皆有五稜。兩頭如箭鏃。煮水飲之。暖而無毒。比之北中白石英。其力倍矣。（劉禹錫）㊆按太平御覽云。自大覩至太山。皆有紫石英。太山所出甚瓌瑋。平氏陽山縣所出。色深特好。烏程縣北壟山所出。甚光明。但小黑東莞縣爆山所出。舊以貢獻。江夏攀山亦有出。永嘉固陶村小山所出。芒角甚好。但小薄爾。（李時珍）

【紫石華】古籍別名　琵石華。（別錄）

基本　紫石華爲石類之一種。可供藥用。

產地　生河南山中。

採取　採無時。

性質　甘。平。無毒。

主治　止渴。去小腸熱。

【紫耳】卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【紫朱】卽代赭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『代赭石』條。

【紫地丁】卽紫花地丁之處方用名。詳『紫花地丁』條。

【紫草茸】卽紫草之處方用名。詳『紫草』條。

【紫衣】產地　石瓦間皆有之。

基本　紫衣爲苔類之一種。可供藥用。

性質　苦。無毒。

主治　黃疸暴熱。目黃下水。熱痢煮服。長髮。作灰淋汁沐之。并可染褐色。

【紫李】係李之一種。實甘美堪食。功能性質。與尋常李同。參見『李』條。惟核仁不入藥用。

【紫沙糖】卽赤沙糖之別名。功能性質。詳『赤沙糖』條。

【紫的】卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【紫芋】卽芋子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『芋子』條。

【紫貝】命名　本品大而質白。文紫無姿。自然不假外飾。而光彩煥爛。故名。

古籍別名　文貝。砑螺。紫貝齒。紫貝螺。（綱目）

產地　出東南海中。

形態　紫貝爲貝類之一種。形亦相似。而大二三寸。背上深紫有斑點。光潔可愛。大者至尺餘。殼質色白如玉。古人作貨幣。畫家以砑物。其殼可供藥用。

性質　鹹。平。無毒。

主治　明目去熱毒。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論紫貝曰。治小兒癲癇。目瞽。

【紫貝齒】卽紫貝之古籍別名。典見綱目。詳『紫貝』條。

【紫貝螺】卽紫貝之古籍別名。典見綱目。詳『紫貝』條。

【紫河車】㊀卽蚤休之古籍別名。典見圖經本草。詳『蚤休』條。㊁卽人胞之處方用名。詳『人胞』條。

【紫芙】卽紫草之古籍別名。典見廣雅。詳『紫草』條。

【紫芙】卽紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫草』條。

【紫芥子】卽芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【紫芝】命名　本品卽芝草之紫色者。故名。

古籍別名　木芝。（本經）菌枝。（和漢藥考）

性質　甘。溫。無毒。

主治　耳聾。利關節。保神。益精

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

氣。堅筋骨。好顏色。久服輕身。不老延年。



紫芝

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論紫芝曰。療虛勞治痔。

【紫花地丁】 處方用名 地丁草。紫地丁。

古籍別名 羊角子(祕韞)箭頭草。獨行虎。米布袋(綱目)堇堇菜(植物圖考)

外國名詞 Viola Patrinii, DC. var. chinensis, Ging (拉丁)スミレ スモトリバナ(日本)

藝本 係堇菜科紫花地丁屬。藥用其莖葉。

產地 凡山野原澤間。恒有生焉。陳仁山藥物生產辨云。地丁廣東各省有出。以北江爲多。廣西各屬亦有出。以南寧爲多。但上海來者。與廣東正天葵有八成相像。

形態 紫花地丁爲澀草類之多年生草本。生平地者。起莖。生溝壑者。起蔓。莖高三四寸。葉作長卵形。或長橢圓形。葉柄長而叢生。春夏間花莖自葉叢間抽出。端著一花。有五瓣。其瓣大小不齊。中有一瓣有長距。花白者。莖紫花紫者。莖白。夏日結角。其實爲蒴果。有銳頭。常裂開而散種子。其根如大枝人參。巨者如菜菔。色白可烹食。其變種之花有淡紫帶紅白雪白等色。莖葉可供藥用。



紫花地丁

採取 夏季採之。採得陰乾用。

性質 苦。辛。寒。無毒。

效能 瀉熱解毒。專作外科瘡瘍藥。

主治 一切癰疽發背。疔腫瘰癧。無名腫毒惡瘡。

歷代記述攷證 【明】李士材本草圖解。論紫地丁曰。紫花地丁。稟地之陰氣。入肝胃經。爲癰證散結泄熱解毒之要藥。癰疽已潰及陰證平塌忌之。【清】黃元御玉楸藥解論紫地丁曰。地丁味苦辛微寒。消毒腫。療瘡疥。行經泄火。散腫消毒。治癰疽瘰癧。疔毒惡瘡。敷食皆佳。紫花地丁更勝。

近人學說 張山雷曰。地丁專爲癰腫丁毒通用之藥。瀕湖綱目稱其苦辛寒。治一切癰疽發背疔腫瘰癧。無名腫毒惡瘡。然辛涼散腫。長於退熱。惟血熱壅滯。紅腫煩發之外瘍宜之。若謂通治陰疽發背寒凝之證。殊是不公。蓋腦疽發背。古人多作火毒治者。以六朝隋唐之世。人多好服金石燥烈之藥。故病源千金外臺。皆有金石丹毒發一門。古之腦疽發背。皆是丹藥熱毒。治宜寒涼。亦固其所。而自宋金以降。金丹一派。漸以銷沈。蓋亦久無丹石發之一症。而凡患有腦背之疽者。純是太陽經寒水爲病。雖外形亦有紅腫煩熱。頗似實火。然項背必拘急不仁。舌苔必白潤。垢膩。誤投涼劑。內陷隨之。卽平塌頑木。不可復救。此其病情與古時熱毒正相對峙。而外瘍諸書。猶沿用大寒大涼之法。皆是此症之戈戟。石頑已謂地丁性寒。不利陰症。漫腫無頭。不赤不高者。禁用。地丁之名。以花蔫一莖直上。有似於丁。故蒲公英亦有黃花地丁之稱。而此草又有紫花白花二種。向來用者。以紫花爲主。蓋取其色紫。能入血分。以療血熱。然花雖有二色。而花紫者莖白。花白者莖紫。則固皆入血分。亦無所用其區別。又有以治黃疸者。亦清熱利濕之功用也。

配合應用 ㊀治黃疸內熱。地丁末。酒服三錢。又稻芒黏咽不得出者。箭頭草嚼嚥下。又療癰疔瘡。發背諸腫。紫花地丁根。去粗皮。同白蔌黎爲末。油和塗神效。(乾坤祕韞方)

㊁治癰疽惡瘡。紫花地丁連根。同蒼耳葉等分。搗爛。酒一鐘。攪汁服。(楊誠經驗方)

㊂治癰疽發背。無名諸腫。貼之如神。紫花地丁草三伏時收。以白麪和成。鹽醋浸一夜。貼之。(孫天仁集效方)

㊃治一切惡瘡。紫花地丁根。日乾。以罐盛。燒煙對瘡熏之。出黃水。取盡愈。(衛生易簡方)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊁治丁瘡腫毒。用紫花地丁草搗汁服。雖極者亦效。（千金方）又用紫花地丁草、葱頭、生蜜共搗貼之。若瘡瘡加新黑牛屎。（楊氏方）㊂治喉痺腫痛。帶頭草葉入醬少許。研膏點入取吐。（普濟方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡屬虛寒者禁用。

參攷資料　處處有之。其葉似柳而微細。夏開紫花結角。平地生者起莖。溝壑邊生者起莖。普濟方云。鄉村雞落生者。夏秋開小白花。如鈴。見倒垂。葉微似木香花之葉。此與紫花者相戾。恐是別一種也。（李時珍）

【紫花地丁】㊀即列當之古籍別名。典見和漢藥考。詳『列當』條。㊁即肉蓯蓉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉蓯蓉』條。

【紫花菸】即萊菔之古籍別名。典見爾雅。詳『萊菔』條。

【紫花菸子】即萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊菔子』條。

【紫花桐】即紫桐之古籍別名。典見綱目。詳『桐』條。

【紫花梨】係梨之一種。性質功能。與尋常梨同。參見『梨』條。

【紫果】即紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫草』條。

【紫油朴】即厚樸有紫色油光者之處方用名。詳『厚樸』條。

【紫風柳】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【紫金牛】古籍別名　平地木。（圖經）石青子。（植物圖考）涼徹遮金珠。（西俚名）藪柑子。（日本）茶果。小青矮茶。金牛草。（植物名彙）

外國名詞　Ardisia japonica, Bl.（拉丁）ヤブカウジ　ヤマタチバナ　ヤブタチバナ　アカダマノキ（日本）

基本　係紫金牛科。爲紫金牛屬（Myrsiaceae）之根皮。

形態　紫金牛爲山草類之常綠小灌木。狀如多年草木。高四五寸或八九寸。葉互生。長卵形。有鋸齒。夏月莖梢間開花。花小有花梗。作合瓣花冠。帶青白色。着以赤色之小點。常二花聚集而生。其果實小如珠形。熟則呈紅色或白色。鮮美可愛。而經久不落。其根與皮可採供藥用。



紫金牛

性質　辛。平。無毒。

主治　時疾。腦氣去風痰。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論紫金牛曰。解毒。破血。

配合應用　紫金皮散。治打撲金瘡。傷處浮腫。方用紫金皮、南星、草烏、川烏、牛夏、川當歸、黃柏、杜當歸、川芎、烏藥、破故紙、白芷、劉寄奴、川牛膝、桑白皮各等分。研爲細末。生薑薄荷汁調敷。皮熱者加黃柏。生地各五錢。有瘡口者勿封。即於四邊敷之。（證治準繩方）

參攷資料　紫金牛生福州。葉如茶葉。上綠下紫。結實圓紅色。如丹朱。根微紫色。八月採根。去心暴乾。頗似巴戟。（蘇頌）

【紫金牛】即射干之古籍別名。典見土宿本草。詳『射干』條。

【紫金皮】㊀即野蘿蔔之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『野蘿蔔』條。㊁即紅木香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『紅木香』條。㊂即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【紫金沙】即露蜂房之古籍別名。典見綱目。詳『露蜂房』條。

【紫金藤】（綱目）古籍別名　山甘草。

產地　生山野間。

形態　紫金藤爲蔓草類藤屬之一種。春生苗葉。色青。至冬凋落。莖如枯條。藤皮可供藥用。

採取　採皮曬乾用。

主治　療丈夫腎氣。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論紫金藤皮曰。治損傷瘀血。搗傅惡瘡腫毒。

【紫佳石】古籍別名　赤英。石血。（別錄）紫賀石。（陶弘景）

產地　出直隸、部鄖縣諸地。

形態　紫佳石爲石類之一種。狀如爵疏。可供藥用。

採取　二月採之。

性質　酸。無毒。

主治　除痺。活氣血。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【紫柰】㊀卽柰之花青核紫實大如升。其汁如漆者。性質功能與尋常柰同。詳『柰』條。㊁卽菟奈之古籍別名。典見崘嵷神書。詳『菟奈』條。

【紫背仙橋】卽毛葉仙橋葉之有紫背者。詳『毛葉仙橋』條。

【紫背浮萍】卽萍萍之有紫背者。詳『萍萍』條。



紫背草

【紫背金盤】產地 生水石間。

形態 紫背金盤爲石草類之一種。莖高尺許。蔓如黃絲。搓之卽斷。葉背紫色。無花。其根可供藥用。

性質 辛。濇。熱。無毒。

主治 婦人血氣痛。洗焙研末酒服。

施用宜忌 能消胎氣。孕婦禁用。忌雞、魚、羊血、溼麪。

【紫背草】產地 南嶽山坡爲多。

形態 似蒲公英而紫莖。近根葉叉微稀。背俱紫。梢端秋深開紫花。似兗女頭花。不全放。老亦飛絮。其功用與蒲公英同。

【紫背稀奇】產地 多生陰山間。

形態 紫背稀奇爲蔓草類之一種。着地而生。苗葉有兩大兩小。葉面灰色。有直紋。背面微紫。若起心藤。長一二尺。葉尖對生。可供藥用。

主治 瘡毒。取鮮者酒煎服。已成速愈。未成立消。

【紫背龍牙】卽蛇含之古籍別名。典見圖經。詳『蛇含』條。

【紫背萱】係萱之一種。產於原野。北方多有植者。莖高尺餘。葉爲複葉。似豌豆而小。開紫花。莢宛轉彎曲。性質功能與萱同。參詳『萱』條。

【紫苧】卽苧麻之古籍別名。典見綱目。詳『苧麻』條。

【紫茄】卽茄子之古籍別名。典見圖經本草。詳『茄子』條。

【紫英】卽紫草之古籍別名。典見新本草。詳『紫草』條。

【紫茉莉】古籍別名 臙脂花。（草花譜）狀元紅。（花鏡）夜繁花。（綱目）

外國名稱 Mirabilis jalapa, L.（拉丁）オシロイバナ（日本）

基本 係紫茉莉科紫茉莉屬。爲紫茉莉之根。其子詳見該條。

產地 原產西印度。

形態 紫茉莉爲茉莉類之一種。多年生。或一年生草本。莖高二三尺。葉卵圓形。或心臟形而尖。葉柄長。對生。夏月每夕開花。一夜凋落。花有合瓣。蕚如漏斗狀。有白、紅、黃等色。亦有一本五色兼備者。甚美麗。有香氣。結實外有苞。形圓有皺紋。苞內青子成簇。大如豌豆。久乃黑子內白色。有粉狀之胚乳。可作化粧品。而花可浸酒。其根三年不取。大如牛蒡。味甘如山藥。去其外皮。鹽漬可佐饌食。與藥用。



紫茉莉

性質 微甘。無毒。

主治 婦人乳癰。男子淋濁。及去風活血。

配合宜忌 忌鐵。

參攷資料 紫茉莉根。性稟純陰。柔中帶剛。久食恐骨軟。故陽虛人尤宜忌之。（綱目拾遺）

【紫茉莉子】古籍別名 土山茶（綱目拾遺）

性質 寒。

主治 去面上痤痣。粉刺。取粉用。

【紫逃香】卽鬱金香之古籍別名。典見綱目。詳『鬱金香』條。

【紫桐】卽桐之花紫而葉上密生黏毛。實可煮皀者。性質功能與桐同。參見『桐』條。

【紫珠】卽紫荊之古籍別名。典見本草拾遺。詳『紫荊』條。

【紫荊】命名 本品木似黃荊而色紫。故名。

處方用名 紫荊木。紫荊皮。紫荊花。紫荊梗。

古籍別名 紫珠（陳藏器）皮名肉紅。內消。（綱目）滿條紅。（羣芳譜）花蘇芳。蘇芳花。（日本）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

外國名詞　Cercis chinensis, Bge.（拉丁）ハナズハウ　スハウバナ　ハナヅハウ　スワウバナ（日本）

基本　係豆科爲荊屬紫荊之木棵與花皮。

產地　凡山野林澤間均有出。

形態　紫荊爲落葉灌木高十尺有餘。枝節叢生春月先葉節節攢簇生花花爲蝶形花冠紅紫色。數朵一簇。細碎可愛。或生木身之上。或附根上枝下無花梗。花罷葉漸出。葉圓作心臟形而尖。有光澤而互生。其果實爲莢扁平長二寸餘。闊四五分。



紫荊

採取　春月採花。餘時採皮梗。其皮以色紫味苦如膽者佳。

性質　苦平無毒。

效能　解熱毒消癰腫。破癥活血。用作外科瘡傷要藥。

主治　破宿血下五淋。濃煮汁服。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論紫荊曰。解諸毒物。癰疽。喉痹。飛尸。蠱毒。蛇虺蟲獗狂犬毒。並煮汁服。亦可以之洗瘡。【宋】大明諸家本草論紫荊曰。通小腸。【明】李時珍本草綱目論紫荊曰。活血行氣。消腫解毒。治婦人血氣疼痛。經水凝滯。

配合應用　㊀治婦人血氣。紫荊皮爲末。醋糊丸。櫻桃大。每酒化服一丸。（熊氏補遺方）

㊁治鶴膝風攣。紫荊皮三錢。老酒煎服。日二次。（直指方）

㊂治傷眼青腫。紫荊皮小便浸七日。礪研。用生地黃汁。薑汁調傅。不腫用葱汁。（永類鈐方）

㊃治猘犬咬傷。紫荊皮末。沙糖調塗。留口退腫。口中嚼嚥杏仁去毒。（仙傳外科方）

㊄治鼻中疳瘡。紫荊花陰乾爲末。貼之。（衛生易簡方）

㊅治發背初生。一切癰疽皆治。單用紫荊皮爲末。酒調。徹住。自然攝小不開。內服柞木飲。此乃救貧良劑也。（仙傳外科方）

㊆治癰疽未成。用白芷、紫荊皮等分爲末。酒調服。外用紫荊皮末蠟、赤芍藥等分爲末。酒調作膏藥。（仙傳外科方）

㊇治痔瘡腫痛。紫荊皮五錢。新水食前煎服。（直指方）

㊈治產後諸淋。紫荊皮五錢。牛酒半水煎溫服。（熊氏補遺方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無癰毒及癥滯者禁用。

參攷資料　㊀楊清叟仙傳方。有忡和膏。以紫荊爲君。其方治一切癰疽。發背流注。諸腫毒。冷熱不明者。紫荊皮炒三兩。獨活去節炒三兩。赤芍藥炒二兩。生白芷一兩。木蠟炒一兩爲末。用葱湯調熱敷。血得熱則行。葱能散氣。瘡不甚熱者。酒調之。痛甚者。筋不伸者。加乳香。大抵癰疽流注。皆氣血凝滯所成。遇溫則散。遇涼則凝。此方溫平。紫荊皮破血消腫。獨活止風動血。引拔骨中毒。去痹濕氣。芍藥生血止痛。木蠟消腫散血。同獨活能破石腫堅硬。白芷去風生肌止痛。蓋血生則不死。血動則流通。肌生則不爛。痛止則不燻。風去則血自散。氣破則硬可消。毒自去。（李時珍）

㊁皮梗及花氣味功用並同。（大明）㊂其皮色紅而消腫。故瘍科呼爲肉紅。又曰內消。與何首烏同名。（李時珍）㊃紫荊處處有之。人多種於庭院間。木似黃荊。葉小無極。花深紫可愛。（蘇頌）㊄即田氏之荊也。至秋子熟。正紫。圓如小珠。名紫珠。江東林澤間尤多。（陳藏器）

【紫荊木】　即紫荊之處方用名。詳『紫荊』條。

【紫荊皮】　即紫荊之處方用名。詳『紫荊』條。

【紫荊花】　即紫荊之處方用名。詳『紫荊』條。

【紫荊桂】　係桂之一種。性質功能。與姚桂同。參見『肉桂』條。

【紫荊梗】　即紫荊之處方用名。詳『紫荊』條。

【紫草】　命名　本品花紫根紫。可以染紫。故名。其根頭有白毛如茸。又名紫草茸。

處方用名　紫草茸。紫草根。

古籍別名　紫丹（別錄）紫芙。

257／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茈草。(廣雅)茈草。貌。(爾雅)地血。鶡衙草。(吳普)紫果。紫芙。紫荊。瑤茅。(和漢藥考)紫英。芝草。(新本草)

學名 Lithospermum officinale, L. var. Erythrorgon, Clarke.

基本 屬紫草科。爲 Boraginaceae 之根。

產地 雲南、貴州、山東、陝西、廣西等省之山谷原野間。恒有生焉。



紫草

形態 紫草爲山野自生之宿根草。園圃亦栽種之。莖高一二尺。葉無柄。爲廣披針形或長卵圓形。皆互生。莖與葉面皆粗糙。至夏枝梢開如筒五裂之小白花。底部有似葉之物苞之。果實爲小堅果。形圓如球。質平滑。色淡褐。其根頗直生者作牛蒡臭氣。皮肉俱有酸味。乾則根屈曲。粗似小指。外作暗紫色。有皺紋。內面爲黃白色。質輕虛。浸以熱水。卽成紅色之液。

採取 三月間採根陰乾。

製法 雷敦曰。凡使每一斤。用蠟二兩。溶水拌蒸之。待水乾。取去頭并兩畔髭。細剉用。

性質 苦寒無毒。

成分 日本理學博士久原躬弦氏。曾從其中提煉出一種色素。曰紫草紅 (Lithospermroth) 證其化學式爲 $C_{30}H_{30}O_{15}$。其後理學士黑田氏。又從其中提煉出一種色素。曰紫根仁 (Shikonin) 證其化學式爲 $C_{16}H_{18}O_5$。並聲明謂其係一醋基化合物。生根有特殊之臭氣。皮肉皆具酸味。粗者小指外面呈暗紫色。有皺紋。裏面呈黃白色。質則疎鬆。用溫湯浸時。可得紅色之液。昔時在人工染料發明以前。曾用其爲紫色染料。綜觀各種書籍。似尠有瀉利作用也。

效能 發痘疹。塗瘡癤。用治惡瘡藥。

主治 心腹邪氣。五疳。補中益氣。利九竅。(本經)通水道。療腫脹滿痛。用以合膏。療小兒瘡及面齄。

(別錄)

歷代記述弦證 【唐】甄權藥性本草論紫草曰。治惡瘡癜癬等。【明】李時珍本草綱目論紫草曰。治斑疹。痘毒。活血涼血。及利大腸。【明】繆希雍本草經疏論紫草曰。紫草味苦氣寒而無毒。爲涼血之聖藥。故主心腹邪熱之氣。五疸者。瀉熱在脾胃所成。去瀉除熱利竅。其疸自愈。邪熱在內。能損中氣。邪熱散卽能補中益氣矣。苦寒性滑。故利九竅而通利水道也。腹腫脹滿痛者。瀉熱瘀滯於脾胃。則中焦受邪而爲是病。瀉熱解而從小便出。則前證自除也。合膏藥療小兒痘瘡及面齄。皆涼血之效也。【明】李士材本草圖解論紫草曰。紫草之用。當以涼血爲功。疹痘毒盛則血熱。血熱則乾枯而毒不得越。得紫草涼之。則血行而毒出。世俗未明此旨。誤認爲宣發之劑。非矣。其性涼潤。便閉者乃爲相宜。若大便利者。不敢多用。緻而紫色染手者佳。【清】黃宮繡本草求眞論紫草曰。紫草甘鹹氣寒。色紫質滑。當入厥陰血分。涼血。血涼則九竅通。二便利。故凡血熱毒閉。而見心腹急痛。水腫不消。五痛癜癬惡瘡。及痘瘡血熱毒盛。二便閉澁者。治當用此。俾血得寒而涼。得鹹而降。得滑而通。得紫而入。血涼毒清。而二便因以解矣。奈世謨以爲宣發之藥。不論毒閉與否。輒用。殊失用藥意義矣。瀉者忌服。茸得陽氣之早。用宜取茸爲正。酒洗用。

國外學說 和漢藥考曰。紫根之良否。關於產地之寒暖。以寒地產者爲良。又紫根有山根、里根之別。山根乃野生之種。推爲佳品。里根爲栽種品。採收之期。多於莖將枯時掘取。不用水洗。徑曬乾收藏。勿令受溼。別有藥用稱紫草茸者。乃其嫩苗之葉也。俟醫學得業士澤田玄弘氏。(東北醫學會報第二九號) 之實驗云。紫根者。紫草之根。古來爲膏藥。於皮膚病等外用之。華岡膏方便覽中。有紫雲膏者。其製法如左。紫根二兩。當歸二兩。萬貞鹿四錢。黃蠟八兩。胡麻油四合。上五味先煎香油。次煎當歸、萬貞鹿。後入紫根。見泡沫消時。去火。且煖時濾之。此膏藥。氏於火傷、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

凍傷、溫疹、水泡疹、及淺在性潰瘍、（下腿潰瘍等）試用之。曾收偉效。今概括氏之實驗如左。（一）紫膏（氏改稱）者。於火傷、凍傷、溫疹、表在性潰瘍及水泡疹等病的分泌過多之症。用之有卓效。（二）爲紫膏主劑之紫根中。殆含收斂性物質。即某種鞣酸。（三）該鞣酸爲色素。或爲別物。尙未明瞭。

近人學說 ㊀祝天一曰。草之初生曰茸。紫草茸者。言紫草初生茸亂之嫩苗也。今市上所謂之紫草茸。形如螳螂卵。色紫。斷之透明。燒之烊作黏液。可黏破損玻璃器。是膠質也。非紫草之嫩苗也明矣。然不知其爲何物也。遍搜本草。類似蟲部中之紫鑛。今人痘科方。多用紫草茸。藥肆即以此物與之。醫家藥家病家皆不知察。人云是。我亦云是。余惑之。故拈出與博雅者研幾之。㊁王治華曰。紫草之嫩苗。即紫草茸也。今市肆所售色紫。狀似鑛石。乃係一種細蟲。如蠶虱。緣於樹枝。聚其脂液而成。此物本名紫鑛。今人用以治痘瘡有活血起脹之功。無鹹寒作瀉之患。其功倍於紫草。故亦以紫草茸呼之。實非紫草同類也。紫草以產於廣西色深紫而脆者爲上。嫩苗尤良。出貴州色紫性韌者亦佳。山東出者次之。按紫草入肝經。兼入心包絡。爲涼血宣竅。泄熱解毒之品。日醫石原保秀用以涼血活血。利大小腸。故於痘疹欲出未出。血熱毒盛。大便閉澁者宜之。已出而紫黑便閉亦宜之。第已出而紅活。及白陷大便利者。是當愼用者耳。曾青溪謂紫草性寒。小兒脾氣實者猶可用。脾氣虛者反能作瀉。古方惟用茸。取其初得陽氣。以發痘疹。今人不達此理。一概用之。則誤矣。㊂張山雷曰。紫草氣味苦寒。而色紫入血。故清理血分之熱。古以治臟腑之熱結。後人則專治痘瘡。而兼療斑疹。皆涼血清熱之正旨。楊仁齋以治癮瘡之便閉。則凡外瘡家血分實熱者。皆可用之。且一切血熱妄行之實火病。及血痢血痔。瀝血淋血之氣壯邪實者。皆在應用之列。而今人僅以爲痘家專藥。治熱病者治外瘡者。皆不知有此疏矣。

配合應用 ㊀治痘瘡深紅色。或紫或黑陷。乾枯便閉。紫草、紅花子、生地黃、甘草、貝母、牡丹皮。濃煎。加生犀角汁。量兒大小。以四十九匙至半盞爲度。神效。若在一朝及二朝內。稍有元氣。雖危可生。痘疔痘毒咸治之。惟痘毒須加黃耆、金銀花、鼠黏子。痘瘡夾斑癍者。加硬石膏、麥冬、知母、竹葉。一二劑即去之。㊁消解痘毒。紫草一錢。陳皮五分。葱白三寸。新汲水煎服。（直指方）㊂治嬰童疹痘。三四日隱隱將出未出。色赤便閉者。紫草二兩。蚓以百沸湯一盞泡封。勿泄氣。待溫時。服半合。其瘡雖出亦輕。大便利者勿用。煎服亦可。（經驗良方）㊃治痘毒黑疔。紫草三錢。雄黃一錢爲末。以胭脂汁調銀簪挑破。點之極妙。（集簡方）㊄治癮疹便閉。紫草、栝樓實等分。新水煎服。（直指方）㊅治小兒白禿。紫草煎汁塗之。（聖惠方）㊆治小便卒淋。紫草一兩爲末。每食前用井華水服二錢。（千金方）亦治產後淋瀝。（產寶方）㊇治惡蟲咬人。紫草煎油塗之。（聖惠方）㊈治火黃身熱。午後卻涼。身有赤點或黑點者不可治。宜烙手足心、背心、百會下廉。內服紫草湯。紫草、吳藍一兩。木香、川黃連一兩。水煎服。（三十六黃方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡胃寒脾弱。大便滑泄者禁用。

參攷資料 ㊀紫草古方稀用。今醫家多用治傷寒時疾。發瘡疹不出者。以此作藥。使其發出。韋宙獨行方。治豌豆瘡。煮紫草湯飲。後人相承用之。其效尤速。（蘇頌）㊁紫草味甘鹹而氣寒。入心包絡及肝經。血分。其功長於涼血活血。利大小腸。故痘疹欲出未出。血熱毒盛。大便閉澁者宜用之。已出而紫黑便閉者亦可用。若已出而紅活及白陷大便利者。切宜忌之。故楊士瀛直指方云。紫草治痘。能導大便使發出。亦輕。得木香白朮佐之。尤爲有益。又曾世榮活幼新書云。紫草性寒。小兒脾氣實者猶可用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

脾氣虛者反能作瀉。古方惟用茸。取其初得陽氣。以類觸類。所以用發痘瘡。今人不達此理。一概用之非矣。(李時珍)㊁出襄陽。多從南陽新野來。彼人種之。即是今染紫者。方藥都不復用。博物志云。平氏陽山紫草。特好。魏國者染色殊黑。比年東山亦種之。色小淺於北者。(陶弘景)㊂所在皆有。人家或種之。苗似薤。香。莖赤節青。二月開花。紫白色。結實白色。秋月熟。(蘇恭)㊃種紫草。三月逐墐下子。九月子熟時。刈草。春社前後。採根陰乾。其根頭有白毛如茸。未花時採。則根色鮮明。花過時採。則根色黯惡。採時以石壓扁。曝乾。收時忌人溺及驢馬糞。并烟氣。皆令草黃色。(李時珍)

【紫草貝母】卽貝母之產於四川東境者。形較川貝稍大。而力稍遜。參見『貝母』條。

【紫草根】卽紫草之處方用名。詳『紫草』條。

【紫草茸】命名　本品形似紫草。而根柔茸。兼色紫。故名。

產地　康藏。西番。

形態　本品鮮時色淡紅而透明。如琥珀。陳久成塊。形如指形大。色呈深紫。質堅似木。卷形如桂皮。可供藥用。

性質　辛。涼。

效能　涼血解毒。散熱催生。

主治　痘疹諸腫。一切瘡毒。

參攷資料　㊀痘學眞傳云。紫草茸古本不見。近刻但在紫草項下註明。紫草茸染手者爲佳。竟不知別有一種。予幼時見世叔華泓卿家有紫草茸爲發痘神丹。乃其高祖學士鴻山公使外國帶歸者。予取而藏之。每遇血熱毒甚失血煩悶。頂陷不起。痘疔腫脹。於清解藥中。研加四五分。無不神效。惜乎方書不載。不敢擅增本草。近見神應心書。獨標紫草茸色滑紅出烏思藏。着大樹枝上。如白蠟。其價如千金。不特發痘如神。用酒調服一二錢。能治諸腫毒惡瘡。又云。順手擂一錢酒下。力能催生。此救水譚應夢。屢獲其效。併請正西番貢僧之語。至近時亦知茸非紫草之嫩苗。復譏認胭脂渣。卽是紫草茸。此說更謬。(葉大樺)㊁按紫草本草諸方皆用根。章宙獨行方治豌豆瘡不發。煮紫草湯飲。後人相承用之。則以之治痘。涼血解毒。自此始也。曾世榮活幼新書云。紫草性寒。小兒脾氣實者。猶可用。脾氣虛者。反能作瀉。古惟用茸。取其初得陽氣。以類觸類。所以用發痘瘡。則用茸亦見於此。而亦未聞有鳥思藏所出一種。據藥所云。又似紫卿。亦無的解。以其親試歷效。故存其說。以俟後之博訪。㊂痘科釋義云。痘科用紫草。古方惟用其茸。取氣輕味薄。而有清涼發散之功。凡下紫草。必用糯米五十粒。以制其冷性。庶不損胃氣。而致泄瀉。惟大熱便祕者。不必加。(醫良)

【紫苑】卽紫菀之處方用名。詳『紫菀』條。

【紫荊】卽紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫草』條。

【紫酒】命名　故名。本品以其色紫。

製法　用雞屎白炒焦。投酒中。待變紫色。卽去滓飲之。

主治　卒然中風。口偏不語。角弓反張。煩亂欲死。及臟腑不消。

【紫眞香】卽降眞香之處方用名。詳『降眞香』條。

【紫粉霜】卽銀朱之古籍別名。典見綱目。詳『銀朱』條。

【紫參】命名　本品根形似參。而色紫。故名。

外國名詞　Tzu-Shen

學名　Polygonum bistorta, Br.

基本　屬麥科。紫參屬。藥用紫參之根莖。

產地　凡山野巖谷及溪澗旁。恒有生焉。

形態　紫參爲多年生草本。自生於深山之陰地。葉形卵圓。大小不一。末端帶尖。生於地下莖之頭端。具長葉柄。葉皆簇生。莖高三四寸。葉叢間抽出穗狀有托葉之花莖。而於其頂端。春暮開帶紅白色之六瓣小花。連纏而爲穗狀。根爲形似地黃之地下莖。但稍長。延長約尺餘。根有節。每節約寸餘。卽有細條連續之作連珠狀。外面色黑褐。收藏多年者。長約尺許。被以褐色之粉衣。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

採取 三月採之。

製法 採得曬乾。或火炙。使色紫用。

性質 苦。寒。無毒。

效能 破血。消癰。治痢。或用作通經藥。

主治 心腹積聚。寒熱邪氣。通九竅。利大小便。（本經）療腸胃大熱。唾血嘔血。腸中聚血。癰腫諸瘡。止渴益精。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權：紫性本草論紫參曰。治心腹堅脹。散瘀血。治婦人血閉不通。【唐】蘇恭新修本草論紫參曰。牡蒙治金瘡。破血。生肌肉。止痛。赤白痢。補虛益氣。除脚腫。發陰陽。【元】王好古湯液本草論紫參曰。主狂癎。溫癎。鮫血汗出。治血痢。【明】繆希雍本草經疏論紫參曰。紫參味苦辛。氣寒而無毒。專入血分。爲除熱散結逐血之要藥。故主心腹積聚。寒熱邪氣。通九竅。利大小便。略同紫草也。苦以燥溼洩熱。辛以散結。寒以除邪氣。故療腸胃大熱。唾血嘔血。腸中聚血。亦主癰腫諸瘡者。營氣熱則留瘀而成癰腫。血涼而活則自散也。能散瘀血。故主婦人血閉不通。癥有血蓄則狂。陽明熱則鼽血。溼熱在腸胃。則血瘀滯而成血痢。除熱活血。故亦主金瘡。【清】黃宮繡本草求眞論紫參曰。紫參味苦而辛。氣寒無毒。功尚入肝。逐瘀破血。兼入胃腑膀胱。使血自爲通利。故凡寒熱血痢癰腫積塊。心腹積聚。因於血瘀阻滯而成者。無不可以調治。以其味苦則泄。味辛入肝。寒則勝熱。而使血從二便出矣。仲景治下痢腹痛。而用紫參湯以除。亦取散其積血之意。但世人罕識其眞。用以紫菀爲代。雖其寒熱不同。而其疎利則一。【清】張隱菴本草崇原論紫參曰。金匱澤漆湯方用紫參。本論云。咳而脉沉者。澤漆湯主之。綱目集解云。古方所用牡蒙。皆爲紫參。而陶氏又以玉孫爲牡蒙。今用亦希。因金匱方有紫參。故存於此。

近人學說 張山雷曰。紫參味苦性寒色紫。故清熱而入血分。主心腹積聚。寒熱邪氣者。蓋血熱而瘀結之積聚。與玄參之主腹中寒熱積聚同意。非能治氣滯寒凝之積聚也。別錄主腸中聚血。亦卽此意。通九竅利二便者。清熱涼血。則九竅自通。二便自利。別錄療腸胃大熱。吐血嘔血。癰腫諸瘡。皆苦寒能清血熱之功用。止渴者。熱清而渴自止。益精者。則因其清火而甚言之。邪熱旣去。而眞陰斯充。究竟陰寒之貧。非補益之品也。又曰。紫參苦寒。故專主血熱。而味又微辛。則能散瘀。故又能破逐血積。凡血中鬱熱而成瘀結。如痞塊癥瘕之屬。皆可治之。惟氣滯寒凝之瘀血。必非其治也。

配合應用 ㈠紫參湯治痢下。紫參半斤。水五升。煎二升。入甘草二兩。煎取半升。分三服。（金匱方）㈡治吐血不止。紫參、人參、阿膠炒等分。爲末。烏梅湯服一錢。一方去人參。加甘草。以糯米湯服。（聖惠方）㈢治面上酒刺。五參丸用紫參、丹參、人參、苦參、沙參各一兩爲末。胡桃仁杵和丸梧子大。每服三十丸。茶下。（普濟方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯及脾胃虛寒者禁用。畏辛夷。

參攷資料 ㈠紫參色紫黑。肝臟血分藥也。故治諸血病。及寒熱癥痕。癰腫積塊之屬。厥陰者。古方治婦人腸覃病。烏啄丸所用牡蒙。卽此物也。唐蘇恭註玉孫引陳延之小品方。牡蒙所主之證。正是紫參。若玉孫則止治風溼痺證。不治血病。（李時珍）㈡紫參、玉孫並有牡蒙之名。古方所用牡蒙。多是紫參也。按錢起詩集云。紫參幽芳也。五葩連萼。狀如飛禽羽舉。故俗名五鳥花。（李時珍）㈢紫參一名牡蒙。生河西或商山。圓聚生根。黃赤有文。皮黑中紫。五月花紫赤。實黑。大如豆。（吳普）㈣今河中晉解齊及淮蜀州郡皆有之。苗長一二尺。莖青而細。其葉青似槐葉。亦有似羊蹄者。五月開花白色。似葱花。亦有紅紫而似水萚者。根淡紫黑色。如地黃狀。肉紅白色。肉淺而皮深。三月採根火炙。紫色。又云。六月採。曬乾用。（蘇頌）㈤紫參根。乾紫黑色。肉帶紅白狀。如小紫草。范子計然云。紫參出三輔。有三色。以青赤色爲善。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【紫接骨】基本　本品即接骨草之紫色者。

古籍別名　金寶相。鐵皮蔥。金鉢盂。（綱目拾遺）

產地　多生山土間。

形態　紫接骨爲接骨草之一種。與衣接骨相似。而莖葉俱紫色。葉似蝴蝶花。根形如商陸。可供藥用。

主治　跌打勞損。瘀血。散風透膿。爲金瘡之聖藥。

【紫梗】即紫鑛之古籍別名。典見綱目。詳『紫鑛』條。

【紫莧】基本　屬莧科莧類之紫色植物。

性質　甘。無毒。

主治　治氣痢。殺蟲毒。療諸蛇螫傷。搗汁飲。並以渣敷傷處。

【紫蛙】即石蚵之古籍別名。典見綱目。詳『石蚵』條。

【紫頂龍芽】即龍芽草之開紫花者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『龍芽草』條。

【紫梢花】原名　弔精。

性質　甘。溫。無毒。

主治　益陽祕精。療眞元虛憊。陰痿遺精。餘瀝白濁如脂。小便不禁。囊下溼癢。女人陰寒冷帶。入丸散及煎湯用。

參攷資料　和劑玉霜丸注云。如無紫梢花。以木賊代之。（綱目）

【紫梢花】即弔膏之精。典見北夢瑣言。詳『弔膏』條參考資料二三兩項。

【紫檳榔】即馬檳榔之古籍別名。典見綱目。詳『馬檳榔』條。

【紫賀石】即紫佳石之古籍別名。典見本草集註。詳『紫佳石』條。

【紫筍】即茶之產於浙江吳興縣境者。性質功能。參見『茶』條。

【紫紿】古籍別名　野葵。（別錄）

產地　生高陵諸地。

形態　紫紿爲雜草類之一種。野生郊外。其根如烏頭。可供藥用。

採取　三月三日採之。

性質　鹹。

主治　毒風。洩注頭部。

【紫菀】命名　本品根色紫而柔宛。故名。

處方用名　紫菀。茜紫菀。

古籍別名　青菀。紫菀。（別錄）返魂草。（綱目）夜牽牛。（斗門方）菘菀。紫舊萬金茸。白羊鬚草。（和漢藥考）

外國名稱　Aster tataricus. L.（拉丁）

基本　屬菊科。爲紫菀之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。紫菀產安徽亳州。河南禹州。秋季出新。

形態　紫菀爲多年生草本。春苗芽。莖互生。直立不倚。高可六七尺。葉大而爲長橢圓形。有鋸齒。面粗糙。中秋。莖端及枝梢開花。排列爲頭狀花序。在其周圍之花。爲淡紫色之舌狀花冠。中央之花。爲黃色筒狀花冠。其色美麗。堪供玩賞。其根爲一株叢生細長之根。狀似細辛。外面色紅紫。質柔韌。折之不易斷。



紫菀

採取　二三月間採根。陰乾。

製法　雷敎曰。凡使紫菀。須去頭及土。用東流水洗淨。以蜜浸一宿。至明於火上焙乾。用一兩用蜜二分。

性質　苦。溫。無毒。

效能　溫肺下氣。化痰止嗽。用治咳逆藥。

主治　咳逆上氣。胸中寒熱結氣。去蠱毒。療驚安五臟。（本經）療咳唾膿血。止喘悸。五勞體虛。補不足。小兒驚癎。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論紫菀曰。治尸疰。補虛下氣。勞氣虛熱。百邪鬼魅。【宋】大明諸家本草論紫菀曰。調中消痰。止渴。潤肌膚。添骨髓。【元】王好古湯液本草論紫菀曰。益肺氣。主息賁。【明】繆希雍本草經疏論紫菀曰。紫菀味苦。溫。別錄衆辛無毒。苦以泄之。辛以散之。溫以行之。辛先入肺。肺主諸氣。故主咳逆上氣。胸中寒熱結氣。去蠱毒。亦辛之力也。痿壅者。陽明之澀熱。熏蒸於肺。則肺熱而津液不能下滴。傷其氣化。以困水之上源。故爲痿壅也。肺爲五臟之華蓋。而主諸氣。肺安則能朝百脈。散精布液於各臟。故云安五

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

臟也。療咳逆。吐膿血。止喘悸者。散肺家之邪也。能安五臟。故治五勞及體虛不足。小兒驚癇。亦虛而有熱故也。熱散則驚癇自止矣。得蜜蒸焙良。【明】李士材本草圖解論紫菀曰。紫菀辛甘微溫。肺家藥也。益肺調中。消痰定喘。止血療咳。解渴潤肌。補虛辟鬼。辛而不燥。潤而不寒。補而不滯。誠哉金玉君子然非獨用多用。不能速效也。小便及溺血者。服一兩立效。去鬚洗淨。微火焙之。【清】黃宮繡本草求眞論紫菀曰。紫菀辛苦而溫。色赤。雖入至高之臟。仍兼下降。故書載入肺金血分。能治虛勞咳嗽。驚悸吐衄諸血。又能通調水道。以治溺濇便血。用此上下皆宜。且此辛而不燥。潤而不滯。於肺實爲有益。然疎泄性多。培養力少。與桑白皮、杏仁同爲一類。但桑白皮、杏仁則瀉肺經氣分。此則專瀉血經氣分也。故肺虛乾咳禁用。紫色潤轉者良。其藥雖分上中與下。然下疎泄尤甚。蜜炒用。款冬爲使。白者爲女菀。入氣分。大泄肺氣。肘後方用此三分。鉛丹一分。並醍漿服一刀圭。日進三服。至二十一日。能令面黑轉白。過服不宜。去頭蘸蜜水炒用。【清】賈九如辨藥指南論紫菀曰。紫菀味甘而帶苦。性涼而體潤。恰合肺部血分。主治肺焦葉舉。久嗽痰中帶血。及肺痿痰喘。消渴。使肺竅有清涼潤澤之功。因其色紫類肝。用入肝經。凡勞熱不足。肝之表病也。蓄熱結氣。肝之裏病也。吐血衄血。肝之逆上也。便血溺血。肝之妄下也。無不奏效。因其體潤。善能滋腎。蓋腎主二便。以此潤大便燥結。利小便短赤。開發陰陽。宣通壅澁。大有神功。同生地、麥冬入心。寧神養血。同丹皮、赤芍入胃。清熱涼血。其桑皮色白。爲肺中氣藥。紫菀色紫。爲肺中血藥。宜分別用。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。僞名次紫菀。又名硬蘆紫菀。服之往往愈見咳逆氣結。其害無窮。按紫菀近道處處雖有出產。然色紫味苦。質極柔宛。若此種硬蘆。形質既殊。性味自劣。聞又有以車前及旋覆根。赤土染過混充者。更奚堪入藥乎。㊁曹炳章曰。按紫菀鳳陽府亳州龍王廟四鄉出者。鬚根粗轉糯。色紫紅。硬梗少者佳。河南淮慶府出。枝略細轉糯亦可用。湖北出者。性硬根細。泥屑重者次。爲者浙江尙少。因價賤。出貨亦多故耳。

近人學說 張山雷曰。紫菀柔潤有餘。雖曰苦辛而溫。非燥烈可比。專能開泄肺鬱。定咳降逆。宣通窒滯。其味微辛。則入氣分。其色殷紫。則入血分。故能兼疏肺家氣血。凡風寒外束。肺氣壅塞。咳嗆不爽。喘促哮吼。及氣火燔灼。鬱爲肺癰。咳吐膿血。痰臭腥穢。諸證。無不治之。而寒飲蟠踞。濁涎膠固。喉中如水雞聲者尤爲相宜。惟其溫而不熱。潤而不燥。所以寒熱皆宜。無所避忌。景岳謂水虧金燥。咳嗽失血者非其所宜。石頑謂陰虛肺熱乾咳者忌之。蓋恐開泄太過。重傷肺金。又恐辛溫之性。或至助火。要之虛勞作嗽。亦必有濁痰阻塞肺竅。故頻頻作咳。以求其通。不爲開之。咳亦不止。以此溫潤之品。泄化垢膩。順調氣機。而不傷於正。不偏於燥。又不犯寒涼遏抑。滋膩戀邪等弊。豈非正治。且柔潤之質。必不偏熱。較之二冬二母。名爲滋陰而羣陰膩滯。阻塞隧道者。相去猶遠。惟實火作咳。及肺癰成膿者。則紫菀雖能泄降。微嫌其近於辛溫。不可重任。然藉爲嚮導。以搗穴犁庭。亦無不可。總之肺金窒塞。無論爲寒爲火。皆有非此不開之勢。而俗子多不知之。但以從事於蘇子之辛溫。桑皮之抑降。此肺勞之人。所以項背相望。而不可救藥也。繆氏經疏反謂其辛散之功甚烈。且謂咳逆喘嗽。皆是陰虛肺熱之證。欲用紫菀須與二冬桑皮同用。則不獨沒煞肺寒喘嗽一層。且紫菀之功力。惟在開泄。乃以二冬膩之。且以桑皮之大寒苦降者遏抑之。是惟恐其肺家痰涎濁膩。或有透泄之路。而必欲閉之塞之。乃至於絕也。如此談證。直以殺人爲能事。然則今之治嗽。而只知有二冬桑皮者。皆繆仲醇作俑之孽矣。立言不愼。貽禍無窮。不可不辨。又凡小便不利之候。多有由於氣化不宣者。古人謂之氣癃。不調其氣。但與滲利。亦必不效。惟紫菀疏泄肺氣。則上竅開而下竅亦泄。石頑謂其通調小道。其用在是。非僅以其溫潤也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

配合應用 ㈠治肺傷咳嗽。紫菀五錢。水一盃。煎七分。溫服。日三次。（衞生易簡方）

㈡治久嗽不瘥。紫菀、款冬花各一兩。百部半兩。搗羅爲末。每服三錢。薑三片。烏梅一個。煎湯調下。日二甚佳。（圖經本草方）

㈢治小兒咳嗽聲不出者。紫菀末、杏仁等分。入蜜同研丸。茨子大。每服一丸。五味子湯化下。（全幼心鑑方）

㈣治吐血咳嗽。吐血後咳者。紫菀、五味炒爲末。蜜丸茨子大。每含化一丸。（指南方）

㈤治產後下血。紫菀末。水服五撮。（聖惠方）

㈥治纏喉風痺不通。欲死者。用返魂草根一莖。洗淨。納入喉中。待取惡涎出。卽瘥。神效。更以馬牙消津嚥之。卽絕根本。一名紫菀。南人呼爲夜牽牛。（斗門方）

㈦治婦人小便卒不得出者。紫菀爲末。井華水服三撮。卽通。小便血者。服五撮立止。（千金方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛肺燥及有實熱者禁用。惡天雄、礬麥、藜本、雷丸、遠志、長茵蔯、款冬爲之使。

著名方劑 紫菀湯治肺傷氣極。勞熱咳嗽。吐痰吐血。肺痿肺癰。（王海藏方）紫菀、知母、貝母、阿膠各二錢。人參、甘草、桔梗、茯苓各五分。五味子十二粒。上藥水煎服。日二服。一方加蓮肉。

參攷資料 ㈠形似重臺。根作節。紫色。潤韌者佳。（大明）㈡紫菀連根葉採之。醋浸。入少鹽收藏作菜。辛香。號名仙菜。鹽不宜多。多則腐也。（王顧）㈢按陳自明云。紫菀以牢山所出。根細辛者爲良。沂兗以東皆有之。今人多以車前旋覆根赤土染過僞之。紫菀肺病要藥。肺本自亡津液。又服走津液藥。爲害滋甚。不可不愼。（李時珍）㈣辛溫暫用之品。陰虛肺熱者不宜專用多用。須與二冬之桑皮共之。白者名女菀。入氣分。大泄肺氣。（顧松園）

【紫菀茸】 卽紫菀之根最柔韌者。典見綱目。詳『紫菀』條。

【紫菊】 卽馬蘭之古籍別名。典見綱目。詳『馬蘭』條。

【紫菜】

古籍別名 紫蕰。（綱目）甘海苔。（日本）

外國名稱 Porphyra tenera, Kjellm.（拉丁）アサクサノリ（日本）

基本 係紅藻類紫菜屬之紫菜。

產地 多出閩越諸地之海濱岩石間。

形態 紫菜爲水菜類藻屬之一種。全體扁平。呈廣披針形或橢圓形。稍稍分歧。有紅紫、綠紫、黑紫等色。長一二寸。濶五六分。採而乾之。可供食與藥用。



紫菜

採取 冬春間採之。

性質 甘。寒。無毒。

主治 熱氣煩塞。咽喉。麥汁飲之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論紫菜曰。病癭瘤脚氣者宜食之。

參攷資料 ㈠紫菜多食令人腹痛。發氣。吐白沫。飲熱醋少許卽消。（陳藏器）㈡凡癭結積塊之疾。宜常食紫菜。乃鹹能軟堅之義也。（朱丹溪）

【紫菫】

古籍別名 蜀芹。楚葵。苦菜。（圖經）赤芹。水葱菜。（綱目）起貧菜。（實藏論）

外國名稱 Corydalis incisa, Pers.（拉丁）ムラサキケマンヤブケマン（日本）

基本 係罌粟科紫菫屬。爲紫菫之苗葉。

產地 生山野間。



紫菫

形態 紫菫爲菜類之多年生雜草本。莖高一二尺。葉二三回分裂。缺刻銳。頭翦碎。稍似胡蘿蔔。又似水菫之葉。有長柄而互生。春夏間開花。總狀花序。花軸上之苞有缺刻。紫紅色。一瓣有距。雄蕊凡六。果實爲蒴。呈線狀。其苗葉可作蔬

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

食與藥用。

採取 三四月間採之。

性質 苦。澀。

參攷資料 取汁煮雌黃制汞。伏硃砂。擒三黃。(綱目)

【紫堇花】 古籍別名 水菊菜。

性質 酸。微溫。無毒。

主治 曝乾研末塗脫肛。

【紫棗】 卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【紫梢蛇】 卽弔精之原名。詳『弔精』條。

【紫萍】 卽浮萍之葉體較大。面青背紫。而多下垂之鬚根者之別名。詳『浮萍』條。

【紫雲英】 卽翹搖之別名。典見植物學大辭典。詳『翹搖』條。

【紫雲瑪瑙】 卽瑪瑙之產於安徽和縣者之別名。性質功能。與尋常瑪瑙同。詳『瑪瑙』條。

【紫葛】 外國名稱 Vitis Coignetiae, Pull. (拉丁) ヤマブドウ ガネブ (日本)

基本 係葡萄科葡萄屬。爲紫葛之根皮。

產地 生山中及田野間。

形態 紫葛爲藤類之草。生灌木。本葉大而圓。基脚作心臟形。掌狀分裂。裂痕淺。呈稜角狀。緣邊有不等之齒牙。上面平滑。下面密生褐色之毛。如綿狀。夏末莖梢著花。圓錐花序。基部有卷鬚。花冠五瓣。黃綠色。結實漿果。熟則紫黑色。味酸多甘少。可食。其根皮肉紫色。大者徑二三寸。可供藥用。

採取 三月八月間。採根皮曬乾用。

性質 甘。苦。寒。無毒。

主治 癰腫惡瘡。搗末醋和封之。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論紫葛根皮曰。主癰瘍。緩攣急。并熱痛風。通小腸。燒灰制消石。【明】李時珍本草綱目論紫葛根皮曰。生肌散血。

【紫葡萄】 卽葡萄之紫色者。功能最良。典見綱目。詳『葡萄』條。

【紫蕨】 卽凌霄花之原名。詳『凌霄花』條。

【紫蕨】 卽紫菜之古籍別名。典見綱目。詳『紫菜』條。

【紫葉】 詳『紫菜』條。

【紫蘇枝】 卽紫蘇之處方用名。詳『紫蘇』條。

【紫蒂盤桓】 卽菜菊之紫色者。典見綱目拾遺。詳『茶菊』條。

【紫鉚】 卽紫鑛之原名。詳『紫鑛』條。

【紫園參】 卽黨參之產於紫園山紫色稍扁者。性質功能。與尋常黨參無異。參詳『黨參』條。

【紫蒨】 卽紫菀之古籍別名。典見別錄。詳『紫菀』條。

【紫銅鉚】 產地 雲南。

主治 鎭心利肺。降氣墜痰。火煆末用。可續筋骨折傷。

參攷資料 金花鉚。錫鉚。主治相同。

【紫膠】 卽火漆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『火漆』條。

【紫蔗】 卽甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳『甘蔗』條。

【紫參】 卽參之紫色者。性質功能。詳『參』條。

【紫蝴蝶】 ㊀卽鳶尾之古籍別名。典見植物圖考。詳『鳶尾』條。㊁卽射干之俗名。詳『射干』條。

【紫薑】 卽香薑之作赭紫色者。爲薑中之下品。性質功能與尋常香薑無異。惟力較遜。參詳『香薑』條。

【紫葱根】 卽白芨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芨』條。

【紫鴛鴦】 卽鸂鶒之古籍別名。典見綱目。詳『鸂鶒』條。

【紫龍鬚】 卽龍鬚藤之紫色者。詳『龍鬚藤』條。

【紫蓀】 卽魚腥草之處方用名。詳『魚腥草』條。

【紫蘇】 卽紫菀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫菀』條。

【紫檀】 命名 檀。善木。故從亶。亶。善也。其色紫者。名紫檀。

處方用名 紫檀香。紫檀木。紫檀片。

古籍別名 赤檀。(綱目)

外國名稱 Pterocarpus santalinus, L.f. (拉丁) シタン (日本)

基本 係豆科紫檀屬之木質。

產地 東印度爲原產地。今廣東雲南諸省均有出。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



紫檀

形態　紫檀爲常綠木本。莖高五六丈。葉爲奇數羽狀複葉。有三小葉。花序總狀。專有毛。花冠蝶形。呈黃色。果實有翼。其木質新者色紅。舊者色紫。甚堅重。入水沉。既可用作器具及染料。又可充藥用。

製法　採得紙封收藏則不泄氣。削片或剉末或磨汁用。

性質　鹹。微寒。無毒。

效能　消腫。毒。辟惡氣。用作瘡毒藥。

主治　磨塗惡毒風毒。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論紫檀曰。刮末傳金瘡止血。止痛療淋【宋】大明諸家本草論紫檀曰。醋磨傅一切卒腫【明】繆希雍本草經疏論紫檀曰。紫眞檀味鹹。氣微寒。性應無毒。其主惡毒風毒者。凡毒必因熱而發。熱甚則生風。而營血受傷。毒乃生焉。此藥鹹能入血。寒能除熱。則善自消矣。弘景以之傅金瘡止血止痛者。亦取此意耳。宜與番降眞香同爲極細末。傅金瘡良【清】張石頑張氏醫通論紫檀曰。白檀辛溫。氣分藥也。故能理衞氣而調脾肺。利胸膈。紫檀鹹平。血分藥也。力能和營氣而消腫毒。治金瘡。

用量　五分至一錢。

施用宜忌　紫檀能動火耗氣。若癰腫潰後諸瘡多膿。及陰虛火亢者。均忌之。

【紫檀片】　卽紫檀之處方用名。詳『紫檀』條。

【紫檀木】　卽紫檀之處方用名。詳『紫檀』條。

【紫檀香】　卽紫檀之處方用名。詳『紫檀』條。

【紫薑】　卽生薑根之初生嫩芽。尖而微紫者。性質功能。與尋常薑同。詳『生薑』條。

【紫檳榔】　卽馬檳榔之別名。而馬檳榔。係大腹子之一種。詳『檳榔』條。

【紫藍】　**基本**　紫藍爲雜草類之一種。可供藥用。

性質　鹹。無毒。

主治　解諸肉毒。

【紫藏】　卽藏香之紫色者。性質功能。與藏香同。詳『藏香』條。

【紫礬石】　卽礬石紫色者之別名。詳『礬石』條。

【紫羅毯】　卽石將軍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『石將軍』條。

【紫羅蘭】　卽紫羅襴之別名。詳『紫羅襴』條。

【紫羅襴】　卽鳧尾之古籍別名。典見花鏡。詳『鳧尾』條。

【紫羅襴】　**產地**　生溪澗中或原野間。

形態　紫羅襴爲山草類之一種。葉如箭鏃。質厚。密生白色軟毛。高二三尺。下部形類灌木。春開紫紅花。其根可供藥用。

採取　以溪澗而白花者爲佳。

主治　臟腑腫滿。清利水道。其土產者。療跌打損傷。搗和酒服。

參攷資料　紫羅襴根。不可多服。令人吐瀉。傷胃氣（趙學敏）

【紫藤】　**古籍別名**　招豆藤（綱目拾遺）

外國名詞　Kraunhia floribunda, Taub.（拉丁）フヂムラサキフヂ（日本）



紫藤

基本　係豆科紫藤屬之紫藤。

產地　生山野間。

形態　紫藤爲蔓生落葉木本。莖卷絡於他物。葉互生。作奇數羽狀複葉。小葉長卵形。春末隨葉出花。軸下垂。開花蝶形。花冠紫色或白色。長總狀花序。結實爲長莢。有短毛。密生。其皮之纖維可供織物。嫩葉與種子可供食與藥用。

性質　甘。微溫。有小毒。

主治　作煎和糖服。下水。癰病。

參攷資料　藤皮着樹從心重重有皮。四月生紫花可愛。長安人亦種飾庭也。江東呼爲招豆藤。其子作角。角中仁熬香。着酒中。令酒不敗。敗酒中用之亦正（陳藏器）

【紫藤】　卽省藤之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『省藤』條。

【紫藤香】　卽降眞香之古籍別名。典見綱目。詳『降眞香』條。

266／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【紫蘇】　原名　蘇。

命名　蘇從穌。舒暢之謂。本品性能舒暢。功能行血和血。故名。但莖葉色紫者。遂名紫蘇也。

處方用名　蘇葉。蘇梗。帶葉蘇梗。

古籍別名　赤蘇。(肘後)桂荏。(爾雅)香蘇。(千金方)水蘇。山魚蘇。白魚蘇。水狀元。(和漢藥考)

外國名詞　Perilla nankinensis, Done. (拉丁)

基本　屬唇形科。爲紫蘇之葉。其子葉詳見各該條。

產地　凡山野平原間。恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。蘇葉產廣東。以連州、清遠爲多出。

形態　紫蘇爲一年生草本。多種於園圃。春下種子。莖高三尺許。其形方。分莖有稜。具外逆之稀毛。葉作卵圓或廣橢圓形。末端帶尖。長二寸內外。邊緣有鋸齒。多皺襞。葉有柄。皆對生。背面多紫紅色。通體發一種之芳香。八九月間。莖端葉腋。俱出三四寸長之穗。開或白或淡紫之唇形花。小花叢爲總狀花序。萼五裂。果實爲屬於閉果之瘦果。亦有芳香性。種子黃褐色。如芥子大。其葉可供藥用。



紫蘇

種類　㈠其葉面背皆紫色者。紫蘇也。㈡其葉面背皆白色者。白蘇也。㈢其葉色不紫而氣不香。似荏者。野蘇。卽荏也。㈣其葉細齒密紐。如翦成之狀。香色莖子一無稍異於紫蘇。惟其莖葉子實較爲俱細者。卽花紫蘇也。亦卽所稱回回蘇也。

種植　園圃間恒有栽植。有於二三月間下種者。有由宿子在地。屆春而自生者。茲述其栽培之要點於下。㈠氣候及土質。氣候以溫和者爲最佳。寒冷地方。於其生長有所不適。土地不論黏土、壤土、砂土、園土、及石灰土等。栽培之皆能生長。惟其品質上稍有差異。最適者爲砂土。栽培之可使生長完全而無缺也。次之則園土。栽培之則其品質略有不良。石灰土尙能生長。其品質已劣而不可比。至於黏土、壤土。栽培之能生長者甚少。雖有生長。品質亦劣。且其生產大減。故栽培者。往往有虧資之苦也。㈡產地及種類。產於南省者。如福建、廣東、廣西等是也。產於中省者。如四川、湖北、江西、浙江等是也。產於北省者。如山西、甘肅等是也。南省產出。品質雖爲最佳。其中亦有優劣之分。廣東之產出者。較福建、廣西產出者爲佳。是其證也。中省產出者。品質雖較南省爲劣。其中有時亦不無反較南省爲優者。如四川有時產出之品質。實優於廣西、福建產出之品質也。北省則不及也。故藥中所用者。皆廣東所產出之品質。而用北省者甚少。其種類亦有早中晚之別。中種最佳。早種次之。晚種不及。惟收量較多。是其長也。㈢治地。先擇適宜之砂土。砂土不得。則以園土代之。於冬季耕鬆土地。或於春季二三月間耕起之。(冬耕宜深。春耕宜淺)耕起之後。將耙打碎土塊。乃可作畦。畦闊約二尺五寸至三尺爲度。高約五六寸。栽中種者。其畦稍可狹小。約闊二尺至二尺五寸。高約三四寸已足。畦上土面。須耙平爲要。㈣時期。栽早種者。於二月下旬至三月上旬。可以栽種於已作畦上也。栽中種者。稍遲二十餘日。於三月中旬至四月上旬。亦可栽種於畦間也。栽晚種者。於四月中旬至四月下旬。卽當栽種。不可再遲也。㈤播種。治地旣完。時期又擇。於是可以從而播種也。播種分有二式。一點播。二條播。點播者。用器點穴於畦上。限定若干距離。不可有廣狹之差。而後將種子授入於畦上之穴間也。條播者。於畦上掘小溝。溝不可斜。當如直線。而後將種子排放其中也。條播與點播。其利益相差無幾。所差者點播之用種子較少於條播之種子也。㈥施肥。自播至刈。施二三次之稀薄人糞尿已足。第一次當於播種後施之。第二次宜在中耕後施之。第三次於除草後。當卽施與。或稍遲十餘日後施之。亦無不可。㈦中耕。播種後待二

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

月之久。卽行中耕一次。可毋庸多行也。㈧除草宜時時動除之爲要。不可怠忽。又不拘定時期。限定次數也。㈨收穫早種於七八月間。可以刈取。中種於八月下旬。亦可刈取。晚種刈取之期。則在九月中旬也。刈取之法。用銳鐮刈之。或者先用小耙掬鬆土地。而後手摘莖葉中帶根枝拔起之。拔起之後。曝日中二三日。始可乾燥無溼。而後再貯藏於高燥之地上可也。㈩計算。每畝收穫量。約可得七八百斤。而二三百斤者爲最劣。每畝播種之量。點播約需一升四合。條播約需二升六七合。若過少則不能數一畝之用。過多則徒耗其種子也。

採取　七月至九月間。採其莖葉日乾。

製法　凡使蘇葉。須用兩面俱紫者。去蛛網蟲子。切剉用。

性質　辛溫。無毒。

效能　發肌表。散風寒。用作下氣藥。又爲殺一切魚肉毒之要藥。

主治　下氣。除寒中。其子尤良。

歷代記述攷畫　【唐】甄權藥性本草論紫蘇曰。以葉生食作羹。殺一切魚肉毒。【唐】孟詵食療本草論紫蘇曰。除寒熱。治一切冷氣。【宋】日華諸家本草論紫蘇曰。補中益氣。治心腹脹滿。止霍亂轉筋。開胃下食。止脚氣。通大小腸。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論紫蘇曰。通心經。益脾胃。煑飲尤勝。與橘皮相宜。【明】李時珍本草綱目論紫蘇曰。解肌發表。散風寒。行氣寬中。消痰利肺。和血溫中。止痛定喘。安胎解魚蟹毒。治蛇犬傷。【明】李士材本草圖解論紫蘇曰。紫蘇辛溫。肺家藥也。葉可發散風寒。梗能行氣安胎。子可消痰定喘。解魚蟹毒。治蛇犬傷。按紫蘇以辛散爲功。久服泄人眞氣。世俗喜其芳香。愛其達氣。或爲小蔬。或作蜜餞。朝暮用之。甚無益也。古人謂芳草致豪貴之疾。蓋指此耳。【清】黃宮繡本草求眞論紫蘇曰。紫蘇背面俱紫。辛溫香竄。五月端午採用。凡風寒偶傷。氣閉不利。心膨氣脹。並暑溼泄瀉。熱閉血蚵崩淋。喉腥口臭。俱可用此調治。取其辛能入氣。紫能入血。香能透外。溫可暖中。使其一身舒暢。故命其名曰蘇。是以時珍謂其同橘皮砂仁。則能行氣安胎。同薤香、烏藥。則能快氣止痛。同麻黃、葛根。則能發汗解肌。同芎藭當歸。則能和營散血。同木瓜厚朴。則能散溼解暑。同桔梗枳殼。則能利膈寬中。同杏子、腹子。則能消痰定喘。要皆疎肺利氣之品。雖其氣味淺薄。難以奏效。但久服亦能泄人眞氣。虛寒泄瀉尤忌。卽安胎和胃寒中用之。不過取其辛香。暫調胃寒氣滯之症。豈可概用久用。以陷虛虛之禍耶。梗下氣稍緩。子降氣最速。【清】賈九如辨藥指南論紫蘇曰。蘇葉爲發生之物。辛溫能散。氣薄能通。味薄發泄。專解肌發表。療傷風傷寒。及瘡疾初起。外感霍亂。溼熱脚氣。凡屬表症。放邪氣出路之要藥也。丹溪治春分後溫熱病。頭痛身熱。脊強目痛。鼻乾口渴。每以此同葛根、白芷入六神通解散。助其威風。發汗解肌。其病如掃。取其辛香。以治抑鬱之氣。停滯胸膈。入心氣飲。開心胸鬱熱神妙。如寒滯腹痛。火滯痢疾。溼滯泄瀉。少佐二三分。從內略爲疏解。最爲妥當。參蘇飲治虛人感冒風寒。方中一補一散。古人良有深意。如不遵其義。減去人參。或服之不應。或邪氣未散。而正氣先虛。須知用藥得法。全在君臣佐使之間。此獨制魚蝦螃蟹之毒。如過傷其味者解之。

國外學說　古方藥品考曰。紫蘇面背皆紫。其氣芳香者可用。所謂花紫蘇是也。凡用葉者。須去蛛網蟲子。藥舖出售者甚粗劣。或香氣散失者。亦不可用。而青背紫者名片面紫蘇。面背俱不紫者名野蘇。此二種均不堪入藥。蘇子之功。專在芳香氣達。然今用其子而去殼。則淡薄而無香氣。故須連子殼用之。乃最有效。又大和本草曰。紫蘇須用紫色者。於近六月葉不乾時採之。最佳。時珍云。有一種花紫蘇。其葉細密細如剪成之狀。香色亦一般無二。人稱回回蘇。按此山野有之。形狀氣味與紫蘇不異。惟葉莖子俱細耳。若香氣則烈於尋常紫蘇。日本呼爲高麗紫蘇。生葉加入魚膾食之。去魚毒。有香氣。堪和以梅醬煑食。亦可。能開胃進食。

近人學說　張山雷曰。紫蘇芳

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

香氣烈。莖幹中空。故能徹上徹下。外開皮毛。泄肺氣而通腠理。上則通鼻塞。清頭目。爲風寒外感靈藥。中則開胸膈。醒脾胃。宣化痰飲。解鬱結而利氣滯。方言云。舒。蘇也。楚通語也。是蘇字有舒散之義。氣疎以達。蘇之得名以此。今人恒以莖葉子三者分主各症。蓋此物產地不同。形狀亦別。多葉者其莖亦細。而莖幹大者。則葉又少。故分析辨治尤爲精切。葉本輕揚。則風寒外感用之。疏散肺閉。宣通肌表。泄風化邪。最爲敏捷。莖則實堅。雖亦中空。而近根處偉大豐厚。巨者徑寸。則開泄裏氣用之。解結止痛。降逆定喘。開胃醒脾。固其開泄外感之旨不同。而子則滑利直下。降氣消痰。止嗽潤肺。又是別有意味。此今人選藥之密。已與宋金元明不同。不可謂非藥物學之進境者。惟其子多油。能泄眞氣。石頑謂氣虛久嗽。陰虛喘逆。脾虛滑泄者。皆不可用。

配合應用 ㊀治感寒上氣。蘇葉三兩。橘皮四兩。酒四升。煮一升半。分再服。（肘後方）

㊁治傷寒氣喘不止。用赤蘇一把。水三升。煮一升。稍稍飲之。（肘後方）

㊂治勞復食復欲死者。蘇葉煮汁二升。飲之。亦可入生薑、豆豉同煮。飲。（肘後方）

㊃治卒嘔不止。香蘇濃煮。頓服三升良。（千金方）

㊄治霍亂脹滿。未得吐下。生蘇搗汁飲之佳。乾蘇煮汁亦可。（肘後方）

㊅治諸失血病。紫蘇不限多少。入大碗內。水煎令乾。去滓。熬膏。以炒熟赤豆爲末。和丸。梧子大。每酒下三五十丸。常服之。（斗門方）

㊆治金瘡出血不止。以嫩紫蘇葉。疊葉同搗貼之。（永類鈐方）

㊇治顛撲傷損。紫蘇搗傅之。瘡口自合。（談埜翁試驗方）

㊈治傷損血出不止。以陳紫蘇葉。曬所出血。捻爛傅之。血不作膿。且愈後無瘢甚妙也。（永類鈐方）

㊉治風狗咬傷。紫蘇葉嚼傅之。（千金方）

㊊治蛇虺傷人。紫蘇葉搗飲之。（千金方）

㊋治食蟹中毒。紫蘇煮汁飲二升。（金匱方）

㊌治飛絲入目。令人舌上生泡。用紫蘇葉嚼爛。白湯嚥之。（危氏得效方）

㊍治乳癰腫痛。紫蘇煎湯頻服。并搗封之。（海上仙方）

㊎治咳逆短氣。紫蘇莖葉二錢。人參一錢。水一鍾。煎服。（普濟方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡氣弱表虛而無外感風寒者禁用。忌火。不可與鯉魚食之。生毒瘡。

著名方劑 紫蘇飲。治妊娠胎氣不和。懷胎近上。脹滿疼痛。謂之子懸。兼治臨產驚恐。氣結。連日不安。或二便不利。（嚴氏方）大腹皮、人參、川芎、橘皮、芍藥各五錢。紫蘇一兩。當歸三分。甘草一分。上生薑四片。葱白七寸。水煎服。一方無人參。有香附。名紫蘇和氣飲。

參攷資料 ㊀紫蘇近世要藥也。其味辛入氣分。其色紫入血分。故同橘皮、砂仁、則行氣安胎。同霍香、烏藥、則溫中止痛。同香附、麻黃、則發汗解肌。同芎藭、當歸、則和血散血。同木瓜、厚朴、則散濕解暑。治霍亂脚氣。同桔梗、枳殼、則利膈寬腸。同杏仁、萊菔子、則消痰定喘也。（李時珍）㊁紫蘇白蘇。皆以二三月下種。或宿子在地自生。其莖方。其葉圓而有尖。四圍有鉅齒。肥地者面背皆紫。瘠地者面青背紫。其面背皆白者。卽白蘇。乃荏也。紫蘇嫩時。採葉和蔬茹之。或鹽及梅鹵作菹。甚香。夏月作熟湯飲之。五六月連根採收。以火煨其根。陰乾。則經久葉不落。八月開細紫花。成穗作房。如荊芥穗。九月半枯時收子。子細如芥子而色黃赤。亦可取油。如荏油。務本新書云。凡地畔近道可種蘇。以遮六畜。收子打油。燃燈甚明。或熬之以油器物。丹房鏡源云。蘇子油能柔五金八石。沙州記云。乞弗虜之地。不種五穀。惟食蘇子。故王禎云。蘇有遮護之功。又有燈油之用。不可闕也。今有一種花紫蘇。其葉細窗密紐。如剪成之狀。香色莖子並無異者。人稱回回蘇云。（李時珍）㊂薄荷根莖。眞似紫蘇。但葉不同爾。薄荷莖燥紫蘇莖和入藥。須以刀刮去青薄皮。剉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之。(雷敩)㈣蘇色紫赤。枝莖空通。其氣朝出暮入。有如經脉之氣。晝行於陽。夜行於陰。是以蘇葉能發表。汗者血液之汗也。易思爾常用蘇莖通十二經之關竅。治咽膈飽悶。通大小便。止下利赤白。予亦常用治吐血下血。多奏奇功。夫茜草、芎歸之類。皆能引血歸經。然不若紫蘇晝出夜入之行速耳。(張隱菴)㈤長沙藥解。金匱半夏厚朴湯用蘇葉治婦人咽中如有炙臠。以其降濁而散滯也。(黃元御)

【紫蘇子】處方用名 炒蘇子。炙蘇子。家蘇子。杜蘇子。蘇子霜。

基本 屬脣形科。爲紫蘇之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蘇子各省均有出。廣東以番禺爲正。清遠大石等處亦多生焉。

形態 蘇子大似芥子。色黃褐。

採取 九月間。莖葉枯時收之。

製法 凡使蘇子。以自收者眞。市售者多僞。或焙炒或蜜炙用。

性質 辛溫無毒。

效能 開鬱下逆。氣消痰定喘咳。用作祛痰鎭咳藥。

主治 下氣除寒溫中。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蘇子曰。治上氣咳逆。冷氣。腰脚中澁氣。風結氣。研汁煑粥。長食令人肥白身香。【宋】日華諸家本草論蘇子曰。調中益五臟。止霍亂嘔吐反胃。補虛勞。肥健人。利大小便。破癥結。消五膈。消痰止嗽。潤心肺。【宋】寇宗奭本草衍義論蘇子曰。治肺氣喘急。【明】李時珍本草綱目論蘇子曰。治風順氣。利腸寬腸。解魚蟹毒。【清】汪訒庵本草備要論蘇子曰。蘇子與葉同功。潤心肺。尤能下氣定喘。止嗽消痰。利腸寬腸。溫中開胃。

配合應用 ㈠順氣利腸。紫蘇子、麻子仁等分。研爛。水濾取汁。同米煎粥食之。(濟生方)

㈡治風順氣。利腸寬中。用紫蘇子一升。微炒杵。以生絹袋盛於三斗清酒中。浸宿炒飲之。(聖惠方)

㈢治一切冷氣。紫蘇子、高良薑、橘皮等分。蜜丸梧子大。每服十丸。空心酒下。亦治風溼脚氣。(藥性論方)

㈣治風寒溼痺。四肢攣急。脚膓不可踐地。用紫蘇子二兩。杵碎。以水三升。研取汁。煑糠米二合。作粥和葱椒薑豉食之。(聖惠方)

㈤治消渴變水。服此令水從小便出。用紫蘇子炒三兩。蘿蔔子炒三兩。爲末。每服二錢。桑根白皮煎湯服。日二次。(聖濟方)

㈥治夢中失精。蘇子一升。熬杵。研末。酒服方寸匕。日再服。(外臺祕要方)

㈦治食蟹中毒。紫蘇子煑汁飲之。(金匱方)

㈧治上氣咳逆。紫蘇子入水研。濾汁。同糠米煑粥食。(簡便方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡腸滑氣虛者禁用。

著名方劑 蘇子降氣湯。治虛陽上攻。氣不升降。上盛下虛。痰涎壅盛。胸膈噎塞等症。(局方)蘇子、半夏各二錢。牛前胡、炙草、厚朴、陳皮各八分。當歸二錢。沉香七分。薑三片。上藥水煎。不拘時服。若虛冷人加肉桂五分。煑薯一錢。

參攷資料 ㈠蘇子下氣。與橘皮相宜。(陶弘景)㈡蘇子與葉同功。發散風氣宜用葉。清利上下則宜用子。(李時珍)㈢氣虛表虛者禁用葉。腸滑腎虛者禁用子。(李士材)㈣火升作嘔者不宜用蘇。惟可用子。(繆希雍)

【紫蘭】卽白芨之古籍別名。典見羣芳譜。詳『白芨』條。

【紫蘭根】卽白芨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芨』條。

【紫囊】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【紫櫻】卽櫻桃之實。紫色。皮裏有細黃點者。功能與尋常櫻桃同。參見『櫻桃』條。

【紫蠹】卽石蚓之俗名。典見綱目。詳『石蚓』條。

【紫蘸】卽石蚓之古籍別名。典見綱目。詳『石蚓』條。

【紫鑛】 **原名** 紫鉚。

命名 本品色赤。狀似鑛石。破開乃紅。故名。

古籍別名 赤膠(蘇恭)。紫梗。勒佉(綱目)。

產地 出南番諸地。

形態 紫鑛爲一種細蟲如蟻

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

虱。絲樹枝聚其脂液而成。其猶冬青樹上之小蟲。能造白蠟者。然明透如琥珀。可以染色與藥用。

性質 甘。鹹。平。有小毒。

主治 五臟邪氣。金瘡帶下。破積血。生肌止痛。與瞿麟竭大同小異。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論紫鑛曰。澀瘁瘡疥宜入脊用。益陽精。去陰滯氣。

參攷資料 紫鑛治痘瘡有活血起脹之功。無鹹寒作瀉之患。功用倍於紫草。（醫學大辭典）

【絲通草】卽通草之處方用名。詳『通草』條。

【細子】卽羊桃之古籍別名。典見綱目。詳『羊桃』條。

【細木通】卽木通之處方用名。詳『木通』條。

【細石】卽石膏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石膏』條。

【細辛】

命名 本品根細而味極辛。故名。

處方用名 北細辛。炙細辛。

古籍別名 小辛。少辛。（本經）



細辛

採取 二月八月採根。陰乾。

製法 雷敎曰。凡使細辛。切去頭子。以瓜水浸一宿。曝乾用。須揀去雙葉者。服之害人。

學名 Asarum Sieboldi, Miq.

基本 屬馬兜鈴科。爲細辛之鬚根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。細辛產自遼寧吉林兩省。五月新朝鮮亦有出。

形態 細辛爲多年生草本。生於山野陰地。春日自地下莖發生新葉。具長葉柄。葉爲心臟形。末端尖銳。底部凹陷。似杜衡而薄。無光澤。亦無紋理。花開於新葉之間。緊接地上。大纔三四分。三瓣。色紫黑。形似蜜。花朶極小。開則下垂。入秋則苗葉俱枯。其地下莖之副根。長三五寸。粗二三分。外淡褐色。內白色。氣味峻烈。辛者山椒。

性質 辛。溫。無毒。

效能 通竅搜風。散寒。行水。用作面部風痛藥。又爲頭痛咳嗽藥。

主治 咳逆上氣。頭痛腦動。百節拘攣。風溼痺痛。死肌。久服明目。利九竅。輕身長年。（本經）溫中下氣。破痰。利水道。開胸中滯結。除喉痺。齲齒。鼻不聞香臭。風癇癲疾。下乳結。汗不出。血不行。安五臟。益肝膽。通精氣。（別錄）

張仲景之發明 細辛一味。經張仲景之實驗。認爲主治宿飲停水。故治水氣在心下而咳滿。或上逆。或脇痛。茲考徵如下。小靑湯證曰。心下有水氣。乾嘔。發熱而咳。苓甘五味薑辛湯證曰。咳胸滿。（以上二方。細辛皆三兩）麻黃附子細辛湯證。（麻黃附子細辛湯條特云。少陰病。反發熱。而不舉餘證。爲則按六經也者。是後人之攙入。而非仲景之古也。所謂少陰病者。踡臥。小便清利也。踡臥者。惡寒甚也。惡寒者。水病也。仲景氏之治惡寒也。其用附子者居多。又其言曰。朮附並走皮中。逐水氣也。由是觀之。惡寒之爲水氣也明矣。其嗌而惡寒。有痰飲之變者。此方主之。）大黃附子湯證曰。脇下偏痛。桂薑草棗黃辛。附湯證曰。心下堅大如盤。邊如旋杯。（以上三方。細辛皆二兩）

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論細辛曰。含之去口臭。【唐】甄權藥性本草論細辛曰。添膽氣。治嗽。去皮風溼痺。風眼淚下。除齒痛。血閉。婦人血漏腰痛。【元】王好古湯液本草論細辛曰。潤肝燥。並治督脉爲病。脊强而厥。【明】李時珍本草綱目論細辛曰。治口舌生瘡。大便燥結。起目中倒睫。【明】繆希雍本草經疏論細辛曰。細辛味辛溫而無毒。入手少陰太陽經。風藥也。風性升。升則上行。辛則橫走。溫則發散。故主咳逆。頭痛腦動。百節拘攣。風溼痺痛。死肌。蓋痺及死肌。皆是感地之溼氣。或兼風寒所成。風能除溼。溫能散寒。辛能開竅。故療如上諸風寒溼疾也。別錄又謂溫中下氣。破痰開胸。除喉痺。齲鼻。下乳結。汗不出。血不行。益肝膽。通精氣。皆升發辛散。開

271／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

通諸竅之功也。其曰久服明目利九竅。輕身長年者。必無是理。蓋辛散升發之藥。豈可久服哉。【清】黃宮繡本草求眞。論細辛曰。細辛味辛而厚。氣溫而烈。爲足少陰腎溫經主藥。凡風寒邪入至陰。而見本經頭痛。腰脊俱强。口瘡喉痺。鼻淵齒齲。水停心下。口吐涎沫。耳聾鼻癰。倒睡便濇者。並宜用此調治。或用獨活爲使。俾在表之陽邪可表。而在裏之伏邪可除。故書載能通關利竅。破痰下乳。行血發汗。且走腎者。必兼肝與膽。膽虛癲及風眼淚下者。得此辛散宣通而令淚收。爲除至書所云。服能入腎潤燥。非是火盛水衰。陰被陽淘而成。實因陰盛陽衰。火屈於水而致也。遇此辛以除寒。溫以燥濕。則陰得解而不凝矣。豈剛燥不撓之謂也乎。世之論藥性者。每鮮如此體會。但知就燥論燥。而致固執不通。獨不思經有云腎苦燥。急食辛以潤之乎。然味厚性烈。所用止宜數分。過則氣塞命傾。若血虛頭痛者。尤宜戒焉。產華陰者眞。去雙葉者用之。【清】葉天士本草經解論細辛曰。細辛氣溫。稟天春升之木氣。入足厥陰肝經。味辛無毒。得地西方之金味。入手太陰肺經。氣味俱升陽也。肺屬金而主皮毛。形寒飲冷則傷肺。肺傷則氣不降。而咳逆上氣之症生矣。細辛入肺。溫能散寒。所以主之。風爲陽邪。而傷於上。風氣入腦。則頭痛腦動。風性動也。其主之者。風氣通肝。入肝辛散也。地之濕氣。感則害人皮肉筋骨。百節拘攣。濕傷筋骨也。風濕痺痛。濕傷肉也。死肌。濕傷皮也。細辛辛溫散濕活血。則皮肉筋骨之邪散而愈也。久服辛溫暢肝。肝開竅於目。五臟津液上奉。故目明。辛溫開發。故利九竅。肝木條暢。以生氣血。所以輕身長年也。【清】徐洄溪本草經百種錄論細辛曰。此以氣爲治也。凡藥香者。皆能疎叡風邪。細辛氣盛而味烈。其疎散之力更大。且風必挾寒以來。而又本熱而標寒。細辛性溫。又能驅逐寒氣。故其疎散上下之風邪。能無微不入。無處不到也。【清】黃元御長沙藥解論細辛曰。細辛味辛氣溫。入手太陰肺足少陰腎經。降衝逆而止咳。驅寒濕而蕩濁。最清氣道。兼通水源。【清】楊時泰本草述鉤元論細辛曰。細辛香味俱細。少陰本藥也。其辛熱能溫足少陰之寒。究溫寒之用。所以致於內外周身。而上行爲最者。非肝不能也。別錄所云益肝膽通精氣。最爲扼要。其在至陰之分。雖不倫於補腸諸味。却能就陰分而散寒邪。卽至陽之分。雖難比於行氣諸劑。却能就陽分而散陰結。陰中陽通。則能資營氣而使暢矣。陽中陰通。則能助風劑而使行矣。總以辛溫達腎肝之氣。而暢陽於下。導陰於上。紓腎陰而升肝陽。最爲有稗於人。而非益氣血之藥也。此味因潔古言諸風通用。而承襲者往往不察。所宜不知風從陽氣言之。有虛有實。如陽鬱於下而爲風。自以達陽爲主。若陽壅於上而爲風。卽宜以和陰爲主。反加辛溫升散。則陽愈壅而風愈甚矣。細辛治陽鬱之風。不治陽壅之風。投之若誤。爲害滋甚。有中氣虛而時患傷風。竟從補中氣而愈者。不可參此義。以用細辛乎哉。至其能治風溼痺痛。亦由陽虛化風。因之化溼者也。凡陽虛鬱風者多化溼。不可不知。【清】鄒澍本經疏證論細辛曰。細辛色紫。紫者赤黑相兼也。赤爲心色。黑爲腎色。心與腎皆屬少陰。兩少陰經皆短而直。細辛一枝直上。體細柔勁似之。少陰者。又皆水火相依。細辛體雖細。味極烈似之。故凡風氣寒氣。依於精血津液便溺涕唾。以爲患者。並能曳而出之。使相離而不相附。則精血津液。便溺涕唾。各復其常。風氣寒氣。自無所容。如本經所載。主治咳逆者。風寒依於胸中之飲。頭痛腦動者。風寒依於腦中之髓。百節拘攣者。風寒依於骨節屈伸洩澤之液。風溼痺痛死肌者。風寒依於肌肉中之津。推而廣之。隨地皆有津液。有津液處。風寒皆能依附焉。故在胸爲痰爲滯結。在喉爲痺。在乳爲結。在鼻爲齆。在心爲癲。在小腸爲水。在氣分爲汗。不出在血分爲血不行。此別錄之與本經一貫不異者也。然須審定風寒果否零亂細碎。倚著於津液者宜之。若風寒偏被一身。及與營衛相搏者。自有他味爲治。與細辛無預也。細辛能提出

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

依附津液之風寒。不能使津液復其常。且不能使津液中氣不隨提曳以出。故其治咳。每與五味子乾薑爲耦。如小青龍湯。眞武湯。厚樸麻黃湯是也。若射干麻黃湯。則不用乾薑用生薑。四逆散。小柴胡湯。則但用乾薑五味子。不用細辛。蓋水氣與風寒相搏。有飲有溼有水。隨人異亦隨證異。則兼嘔者有之。兼喘者有之。兼滿者有之。兼喘者有之。不可但因其咳。混同施治也。特風寒將化。則細辛不可用。小柴胡湯證半化半未化者且然。何況全化者耶。四逆散證雖以四逆係之。少陰然終外寒內熱。故其治咳。乾薑五味可用。細辛不可用矣。細辛惟治寒乃爲恰合。惡寒者。寒之方猖。口渴者。寒之已化。膈動者。寒與在上之陽戰。而陽欲貣。下有陳寒。則必噁寒可見矣。曰脇下偏痛發熱。其脈弦。此寒也。當以溫藥下之。宜大黃附子湯。曰寒氣厥逆。赤丸主之。二者一溫以附子。下以大黃。一溫以烏頭。利以茯苓。半夏。一使其從大便解。一使從小便解。皆以細辛聯絡其間。不然則溫自溫。下自下。利自利。終不能使寒氣徹底澄清耳。於金匱求大便通利者。有大黃附子湯。於傷寒論求利止者。有烏梅丸。可知細辛能已後陰諸疾矣。至千金治鼻塞耳聾齒痛諸方。用細辛者甚多。至口鼻目病。則幾乎無方不用。豈本經所謂明目利九竅者。誠不必別擇。盡可用之耶。然即此亦可窺其殿於去取之意矣。觀於目病由勞者息肉生者。有障翳者。有赤白膜膚者。生珠管者皆不用。眼暗者。淚出者。皆赤者多用之。則目病用細辛。有去取矣。鼻病生息肉者。齆血者皆不用。鼻塞者。鼻齆者多用之。則鼻病用細辛有去取矣。口病惟口臭齒痛多用之。耳病惟外治多用之。惟前陰病則絕無用者。曾謂九竅不利於細辛毫無別擇哉。素問曰。六經爲川。腸胃爲海。九竅爲水注之氣。細辛雖善治著水之寒。然著於小者能治之。著於川著於海。則非所長矣。前陰者汪洋大水之出路。故非細辛所能與也。【清】閻立陞本草選旨論細辛曰。細辛味大辛。氣溫。氣厚於味。陽也。升也。無毒。惡黃芪、獐毒、山茱萸。忌生菜、狸肉。畏滑石、硝石。反黎蘆。稟天地陽升之氣以生。入手少陰太陰經。風藥也。風性升。升則上行。辛則橫走。溫則發散。有開通諸竅之功。有除溫散寒之理。故本經主咳逆上氣。頭痛腦動。百節拘攣。風溫痺痛。死肌別主溫中下氣。破痰利水道。開胸中滯結。除喉痺塞鼻。不聞香臭。風癇癲疾。下乳結。汗不出。血不行。安五臟。益膽。通精氣。且甄權之除齒痛。血閉。弘景以之去口臭。而詳求厥志。其所以治諸風溼寒風頭痛。痰飲胃中滯氣。驚癇。取其辛溫能散也。其治口瘡口臭。喉痺。齒匱齒痛者。取其能散浮熱也。亦火鬱發之之義。其治風寒咳嗽上氣者。辛能泄肺也。其治膽氣不足。驚癇眼目諸疾者。辛能補肺也。其通少陰及耳竅。便濇者。辛能潤燥也。故嘗佐以獨活。治少陰頭痛。佐以骨青棗根。治諸溼痺。得歸芎、牡、本、芷、甘草。療婦人血閉。得決明、鯉魚膽、羊肝。止風淚目疼。得麻附煎湯。發寒邪自裏之表。每多得效耳。然其性辛燥發散。故凡病內熱火盛。及氣虛。血虛。陰虛等症。法並忌之。入風藥亦不可過五分。若過五分。直有氣塞而死之患。毋必有毒。特不識多寡耳。【清】賈九如辨藥指南論細辛曰。細辛味辛性溫。若寒邪入裏。而在陰經者。以此從內托出。佐九味羌活湯。發散寒邪快捷。因其氣味辛香。故能上升入萼。辛湯療目痛後羞明畏日。癮澁難開。合通竅湯。散肺氣而通鼻竅。佐清胃湯。祛胃熱而止牙疼。此熱藥入寒劑。蓋反以佐取之之義也。但少用助火。多用則氣閉不通。每劑止三四分耳。

國外學說　日本和漢三才圖會曰。細辛山谷間處處有之。皆不及華陰高麗者。葉似小葵柔莖。根細而直。色紫。味極辛。嚼之習習如椒。而更甚於椒。大搖能亂細辛者。甚多。皆當以根苗色味細辨之。杜衡。鬼督郵。徐長卿。白薇。白前。皆能僞細辛。按細辛中日俱用之。奧州津輕及江州之產良。阿波及豐前。小倉之產次之。其葉似小葵而青。有小白點。夏月開小紫花。朵短梗直。外黃內白。其氣略如椒。雖辛。不甚用。細辛藏人參。則人參不蛀云。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

又和語本草綱目曰。日本所謂細辛。類杜衡也。杜衡莖葉氣味俱似細辛。時珍曰。杜衡亂細辛。則根苗功用皆彷彿。不可不審。今家園多植之。謂可免雷霆之災。此細辛也。凡類似細辛者。本草多載。審用之可也。又大和本草曰。一說加茂葵爲細辛。其根甚辛。實乃杜衡也。又山野有一種。根味似細辛。俗卽謂之細辛。此白薇也。又物類品隲曰。種類頗多。中國產上品。葉圓而厚。日本產上品。葉稍長。南部、佐渡產大抵相似。伊豆之天城山產亦上品。讃岐之大川產葉薄。至冬卽枯。又用藥須知曰。細辛中日俱有之。形細味辛。習習如蜀椒者爲眞。日本產細辛。尙有優劣。加茂葵味薄。佐渡、秋田爲上。葉皆圓。色青。無白斑。視南部所產爲佳。關東及北地產。葉有香氣。又日用藥品考曰。細辛以中國產者爲眞。惟攙雜杜衡。宜選剔淨盡。日本產者。藥舖每呼爲眞細辛。其有呼土細辛、近江細辛、伊吹細辛、並杜衡也。杜衡較細辛根粗。辛味少。有臊氣。又藥學士朝比奈泰彥。嘗將杜衡及細辛之原植物。互相研究。記述其關係與區別。又析出杜衡之揮發油。並將油分蒸餾而析出揮發油之主成分。著有記事一篇。錄入明治四十年藥學雜誌第三百〇二號。題曰杜衡之研究及與細辛之關係。摘錄如下。細辛與杜衡。每易混淆。且杜衡之出產。視細辛爲多。故藥舖往往以杜衡代之。本草辨別之法。僅云細辛根細。味初不辛。須臾大辛烈。杜衡根粗。辛味少。有臊氣。頗屬簡陋。難臻完備。余按細辛之葉較薄。形似腎臟而銳尖。花筒內部有類似縱線之突起。杜衡葉厚如革。作卵狀心形。又似戟狀心形。多有白斑。花筒內部。有縱橫似網之突起。又細辛爲一年生。葉杜衡則爲常綠葉。依此區別。庶不致混亂矣。往年在東京藥舖。購得生細辛約三四十斤。皆杜衡也。可知吾國從前在盛行中藥時代。細辛與杜衡。常混用矣。此余所以利用此機。卽以研究杜衡。爲研究細辛之資也。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。僞名洋細辛。形雖似而無味。按細辛氣味辛溫。遼冀產者名北細辛。可以入藥。南方產者名杜衡。其莖稍粗。辛味稍減。一莖有五七葉。俗名馬蹄香。不堪入藥。北產者其莖極細。其味極辛。若此種粗而無味。先失命名之義。又奚有治病之功乎。㊁曹炳章曰。按細辛六月出新。關東出者爲北細辛。根莖細清白。氣辛。葉少梗多爲最佳。江南甯國、涇縣出亦佳。江甯句容、滁州、白陽山等處出皆次。亳州出者爲馬細辛。山東出爲東細辛。均次。不堪藥用。

配合應用 ㊀治陽明火熱上攻。以致齒痛。用細辛石膏。㊁通治婦人子宮冷不受孕。用細辛、當歸、芍藥、萼藭、牡丹、藁本、甘草、白薇。㊂療目痛。用細辛、鯉魚膽、青羊肝、甘菊花、決明子。㊃療傷寒少陰咽痛。用細辛、甘草。㊄治風頭痛。用細辛、藁本、芎藭、白芷、荊芥、防風。㊅解利傷風寒鼻塞。用細辛、紫蘇、防風、甘草、桔梗、杏仁、薄荷、桑白皮。㊆治暗風卒倒。不省人事。細辛末吹入鼻中。(危氏得效方)㊇治虛寒嘔噦。飲食不下。細辛去葉半兩。丁香二錢半爲末。每服一錢。柿蒂湯下。㊈治小兒客忤。口不能言。細辛、桂心末等分。以少許含口中。(外臺祕要方)㊉治小兒口瘡。細辛末醋調。貼臍上。(衛生家寶方)㊊治口舌生瘡。細辛、黃連等分爲末。摻之。漱涎甚效。名兼金散。一方用細辛、黃蘗。(三因方)㊋治口瘡舌齒齦腫痛。細辛煮濃汁。熱含冷吐。取瘥。(聖惠方)㊌治鼻中息肉。細辛末。時時吹之。(聖惠方)㊍治諸般耳聾。細辛末溶黃蠟丸。塞尿大。綿裹一丸塞之。一二次卽愈。須戒怒氣。名聰耳丸。(龔氏經驗方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡陰虛陽旺。及無風寒實邪者禁用。惡黃耆、狼毒、紫莧、忌生菜、狸肉、長消石、滑石、反藜蘆。脅背痛根爲之使。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料 ㈠治頭面風痛。不可缺此。(寇宗奭)㈡水停心下不行。則腎氣燥。宜以辛潤之。細辛之辛。以行水氣而潤燥。(成無己)㈢細辛非華陰者不得爲眞。若單用末。不可過一錢。多則氣閙塞不通者死。雖死無傷。近年開平獄中嘗治此。不可不記。非本有毒。但不識多寡耳。(陳承)㈣小辛少辛。皆細小之義也。按山海經云。浮戲之山多少辛。管子云。五沃之土。宜藥生少辛。是矣。(李時珍)

【細辛木皮】卽秦皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『秦皮』條。

【細亞錫飯】**產地** 生大庾嶺。

形態 硬莖。叢生。葉如柳葉。附莖攢結。長梗。小實。蟄紫下垂。可供藥用。



細亞錫飯

主治 洗瘡毒。

【細青皮】卽青皮之處方用名。詳『青皮』條。

【細昆布】卽海帶之日本名。詳『海帶』條。

【細草】卽遠志之古籍別名。典見本經。詳『遠志』條。

【細茶】卽雨前茶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雨前茶』條。

【細荔】卽龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【細理石】卽石膏之古籍別名。典見別錄。詳『石膏』條。

【細莧】卽野莧之古籍別名。典見別錄。詳『莧』條。

【細連枝】卽六安茶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『六安茶』條。

【細黑豆】卽穭豆之古籍別名。典見逢原。詳『穭豆』條。

【細腰蜂】卽蠭蜴之古籍別名。典見莊子。詳『蠭蜴』條。

【細葉冬青】卽冬青之葉細而木皮可製鞵者。詳『冬青』條。

【細葉菖蒲】卽石菖蒲葉較細者之別名。詳『石菖蒲』條。

【細瓔珠】卽眞珠之處方用名。詳『眞珠』條。

【細礜石】卽砥石之古籍別名。典見綱目。詳『砥石』條。

【紵麻】卽苧麻。以其皮可績紵。故名。性質功能。參見『苧麻』條。

【紺菊】卽馬蘭之日本名。詳『馬蘭』條。

【紺靑】卽虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『虎杖』條。

【紺殼】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【紺礬】卽蜻蛉之大而色玄紺者。性質功能。詳『蜻蜓』條。

【終石】**基本** 爲石類之一種。可供藥用。

性質 辛。無毒。

主治 療陰瘡痺。益精氣。小便難。

【袋角】卽鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿茸』條。

【羚羊片】卽羚羊角之處方用名。詳『羚羊角』條。

【羚羊肉】**性質** 甘。平。無毒。

主治 惡瘡。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草。論羚羊肉曰。和五味炒熟。投酒中。經宿飲之。治筋骨急强。中風。北人恒食。南人食之。免蛇蟲傷。

【羚羊角】**命名** 本品獨棲。驚角木上以遠害。可謂驚也。其字從鹿。從靈省文。故名麢。後人簡寫爲羚。藥用其角。遂名之曰羚羊角。

處方用名 鎊。羚羊。羚羊片。麢羚羊。

古籍別名 麢羊角。麢角。九尾羊角。(綱目)臟角。(山海經)懸角。羵羊角。(和漢藥考)

外國名稱 Nemorhaedus crispus Temm. (拉丁) Antelope-horn. (英) Hirschziegehorn (德)

基本 屬獸草類羚羊之角。

產地 陳仁山藥物生產辨云。羚羊產中俄交界各地。如西比利亞及安南等處。採辦者以張家口、牛莊爲聚處。

形態 羚羊體長四尺餘。高半之。類山羊。毛呈黃褐色。腹部則爲白色。日本所產倭羚羊。(麞鹿) A. Crispa. 亦爲羚羊之一種。其有名產地爲日本奧州南部地方。體高二尺餘。毛青灰色。其尖端呈黑褐色。其角爲細長角。長尺許。徑寸餘。

275／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

呈黃褐色。稍有光澤。末端稍彎曲。有螺旋狀關節。日本產者。帶黑色。長五寸餘。基部有橫皺。謂之倭羚羊角。羚羊產於中國西北者爲正地道。值昂而藥效甚著。產於暹緬、安南者爲南羚。其形態與北羚無異。棲息於多巖石之深山。烏白赤各色俱有。角之烏白隨其毛色爲轉移。有曲輪狀。亦有斜直者。此種南羚有效用與否。尙有待於證驗。唯其價值甚賤。而形質足以正地道者相混。則亟須辨別也。茲舉其相違特徵於下。㊀正羚。角基部橫剖面幾成正規圓。南羚。角空擴大。剖面呈橢圓形。㊁正羚。環節勁豎凸突。節目上球結成索結狀。南羚。節目坡斜。光滑。㊂正羚。角長一尺者。角尖常有三四寸。南羚。角尖約二寸左右。但有個共通點。凡角直者其尖長。曲輪角之角尖常較短。南羚亦有角基細圓者。唯產量不多。其環節亦坡斜。不能如正羚之凸突。故節目乃固定之特徵。可資鑑別者也。至角質白。尖端有血色跡。均與正羚相同。在出產地土人每對售二三元。某圓白雅者至市場值十餘元。嘗有人帶回國。竟以正角價售於市肆。其相似之形狀。概可想見矣。

製法　凡使不可單用。須要不折。元對繩縛。鐵錘錘細。重重密裹。避風。以旋旋取用。搗篩極細。更研萬匝入藥。免刮人腸。不用時密封貯存。臨用則麤末吞服。

用法　水磨服。又與他藥水煎。或刨末和作丸散。

性質　鹹。寒。無毒。

效能　平肝熄風。清熱。安神。用作鎮痙藥。又爲通經藥。

主治　明目益氣。起陰去惡血。注下。辟蠱毒惡鬼不祥。常不魘寐。（本經）除邪氣驚夢。狂越僻謬。療傷寒時氣寒熱。熱在肌膚。溼風注毒。伏在骨間。及食噎不通。久服强筋骨。起陰益氣。利丈夫。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論羚羊角曰。治驚悸煩悶。心胸惡氣。瘴癘惡瘡。溪毒。【唐】孟詵食療本草論羚羊角曰。治中風筋攣。附骨疼痛。作末蜜服。治卒熱悶及熱毒痢。血痂氣。磨水塗腫毒。【唐】甄權藥性本草論羚羊角曰。治一切熱毒風攻疰。中惡毒風卒死。昏亂不識人。散產後惡血衝心。煩悶。燒末酒服之。治小兒驚癎。治山瘴及噎塞。【元】朱丹溪本草衍義補遺論羚羊角曰。羚羊角味苦。鹹。性寒。無毒。入肝經。主傷寒熱在肌膚。溫風注伏在骨間。邪氣不祥。驚夢狂越。心神不寧。小兒卒熱驚搐。產後敗血沖心。清心解毒。明目益氣。燒灰又主食噎不通。其角多倒掛。痕深入者爲眞。羚羊屬木。宜入厥陰。木得其平。而風火諸症無能乘矣。【明】李時珍本草綱目論羚羊角曰。平肝舒筋。定風安魂。散血下氣。辟惡解毒。治子癎痙疾。【清】黃宮繡本草求眞論羚羊角曰。羚羊角苦鹹大寒。功當入肝瀉火。兼入心肺二經。考書所論主治多屬冗統。惟李時珍剖晰甚明。言羊火畜也。而羚羊則屬木。故其角入厥陰肝經甚捷。同氣相求也。肝主木。開竅於目。其發病也。目暗障翳。而羚羊角能平之。肝主風。在合爲筋。其發病也。小兒驚癎。婦人子癎。大人中氣搐搦。及筋脈攣急。歷節掣痛。而羚羊角能舒之。魂者肝之神也。發病則驚駭不寧。狂越僻謬。魘寐卒死。而羚羊角能安之。血者肝之臟也。發病則瘀滯下注。痂痛毒痢。瘡腫瘰癧。產後血氣。而羚羊角能散之。相火寄於肝膽。在氣爲怒。病則煩懣氣逆。噎塞不通。寒熱及傷寒伏熱。而羚羊角能降之。羚之性黠而筋骨之精在角。故又能辟惡而解諸毒。碎佛牙而燒煙。走蛇虺也。本經別錄甚著其功。而近俗罕能發揚。惜哉。時珍之論如此。但此雖能清肺及肝。若使過用久用。則更有伐生之氣。耳多兩角。一角者勝。剉研極細。或磨用。【清】張石頑張氏醫通論羚羊角曰。羚羊屬木。入足厥陰。伐肝最捷。目暗翳障。而羚羊角能平之。瘄痘正面稠密。不能起發。而羚羊能分之。小兒驚癎。婦人子癎。大人中風搐搦。及筋寒歷節痛。而羚羊能舒之。驚駭不寧。狂越魘寐。而羚羊能安之。惡鬼不祥。而羚羊能辟之。惡血注下。蠱毒疝腫。瘡腫瘰癧。產後血氣。而羚羊能散之。澄熱留滯。陽氣不振。陰翳衰憊。而羚羊角能起之。煩懣氣逆。噎塞不通。鬱爲寒熱。而羚

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

羊角能降之。詳本經所主。皆取散厥陰血結耳。愚按諸角。皆能入肝散血解毒。而犀角爲之首推。以其兼食百草之毒。彙走陽明。力能祛之外出也。故瘄癗之血熱毒盛者。爲之必需。若瘄癗之毒。并在氣分。而正面稠密。不能起發者。又須羚羊角。以分解其勢。使惡血流於他處。此非犀角之所能也。人但知羚羊角能消目翳。定驚癇。而散瘄癗惡血之功。人所共昧。羯羊角治青盲目暗。與羚羊角不殊。而辟除邪魅蠱毒。亦相彷彿。惜乎從未之聞。惟消乳癰。丹方用之。白羯羊角。亦能消乳癰。而方家每用琉璃角燈磁片。刮取薄屑。置胸中候施。杵細酒服方寸匙。屢效。當取宿腐之味。以消陳積之殆也。其鹿角刮屑。善消虛人乳腫。未潰即消。已潰即斂。即本經主漏下惡血之治。龍角。神魂不寧。功用與龍齒略同。千金方中有齒角并用者。牛角腮。當主閉血血崩。牛之一身。惟此無用。而本經特爲採錄。千金尤爲崩漏要藥。可見天地間無棄物也。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。羚羊僞者。用白兕角、及白牛蹄琢磨僞充。其現切之羚角絲。尤難辨識。按羚羊產梁州眞州各處。商洛諸巒山中。及秦隴西域皆有。角長尺餘。有節特起。環繞如人手指握痕。得二十四節者。尤有神力。今多用尖。取其精銳堅剛之力也。宜揀選地道頂尖。磨水取汁。用之尤靈。㊁曹炳章曰。羚羊有黑白二種。黑者清肾肝熱。白者清肺熱。熄風。近年以白者爲重。故市上僅有白羚羊。黑者多無覓。距知近年藥用漸繁。捕獵殆盡。因而價值日昂。且羚羊質性堅硬。刀切不入。我業習俗以形式相競。鎊片入藥。以求雅觀。查其鎊片之法。先將羚羊水浸七八日。再用滾水泡透。經此手續。化堅爲軟。則鎊之片張闊大。形式雖雅觀。然經水浸泡。汁液盡出。性味已失。反增腥臭惡氣。治病功能已大半消失。嘗考古人修治羚羊之法。先用鐵銼銼細。再搗篩極細。更研萬匝。入藥免刮黏胃腸。使原質不失。效力完固。法良意美。但一經研末。眞僞莫辨。難免以僞亂眞。則害人更甚。

配合應用 ㊀治驚邪魘寐及癲癎狂亂等疾。羚羊角、犀角、丹砂、牛黃、琥珀、天竺黃、金箔、茯神、遠志、鉤藤鉤、竹瀝。㊁治肝腎虛而有熱。以致目昏生翳。羚羊角、枸杞子、甘菊花、決明子、穀精草、生地黃、五味子、黃檗、蜜蒙花、木賊草、女貞實。㊂治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。(外臺祕要方)㊃治產後煩悶汗出不識人。羚羊角燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。(千金方)

用量 三分至一錢五分。

施用宜忌 凡非溫疫熱毒及肝經無熱者禁用。

著名方劑 ㊀紫雪丹。治煩熱發狂。(局方)犀角、羚羊、硃砂、朴硝、硝石、磁石、寒水石、滑石、石膏、丁香、沉香、木香、麝香、升麻、甘草。如法合成。每服三四分至一錢。冷開水調灌。㊁羚羊角散。治子癎。(本事方)用羚羊角屑一錢。杏仁、薏仁、防風、獨活、川芎、當歸、茯神、棗仁各五分。(炒)木香、甘草各二分半。加姜煎服。㊂羚羊角丸。治中風手顫。囈言語顛遯。(錢乙方)羚羊角(屑)一兩。犀角三錢。羌活、防風各一兩。薏苡仁(炒)、桑芫各一兩。上爲末。煉蜜丸。

參攷資料 ㊀在肝之病。必用羚羊角。亦猶入心之病之必用犀角也。(陸九芝)㊁羊火畜也。而羚羊則屬木。故其角入厥陰肝經。蓋捷同氣相求也。肝主木。開竅於目。其發病也。目暗障瞖。而羚羊角能平之。肝主風。在合爲筋。其發也。小兒瘈瘲。婦人子癎。大人中風搐搦。及經脈攣急。歷節製痛。而羚角能舒之。魂者肝之神也。發病則驚駭不寧。狂越僻謬。魘寐卒死。而羚羊能安之。血者肝之臟也。發病則瘀滯下注。痘痛毒痢。瘡腫瘰癧。產後血氣。而羚角能散之。相火寄於肝膽。在氣爲怒。病則煩懣氣逆。噎塞不通。寒熱及傷寒伏熱。而羚角能降之。羚之性靈。而筋骨之精在角。故又能辟邪惡而解諸毒。碎佛牙而燒烟走蛇虺也。本經別錄甚著其功。而近俗罕能發揚。惜哉。(李時珍)㊂羚羊出於西地。似羊而大。角有節。最堅勁。能碎金剛石與羱羝骨。夜宿防患。以角掛樹而棲。多

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

兩角。一角者勝。剉研極細。或磨用。（虛飛鵬）㊉按王安石字說云。鹿則比類而環角外向。以自防。麞則獨糜懸角木上。以遠害。可謂巧也。故字從鹿從麞省文。後人作羚。許愼說文云。麞山羊也。大面細角。山海經作獐。云狀如羊而馬尾。貫信星槎勝覽云。阿丹國羚羊自胸中至尾垂九塊。名九尾羊。（李時珍）㊄今出建平宣都諸蠻山中及西域。多兩角。一角者爲勝。角多節。節處圓繞。別有山羊。角極長。惟二邊有節。節亦疎大。不入藥用。乃爾雅云。羬羊者。羌夷以爲羚羊。能涉峻岅。（陶弘景）㊅羚羊。南山商洛間大有。今出梁州、眞州、洋州亦貫。其角細如人指。長四五寸而文。麤細。山羊或名野羊。大者如牛。角可爲鞍橋。又有山驢。大如鹿。皮可作靴。有兩角。大小如山羊角。俗人亦用之。陶氏所謂一邊有粗文者。是卽山羊也。（蘇頌）㊆今秦隴龍蜀金商州山中皆有。我人捕得來貨。其形似羊。青色而大。其角長一二尺。有節。如人手指握痕。又最堅勁。郭璞註爾雅云。麢似羊而大。其角細而圓銳。好在山崖間。羬似羖羊。其角大而墮。出西方。本草諸註各異。覈今所市者。與爾雅之羚羊。陶註之山羊。蘇註之山驢。大都相似。今人相承用之。以爲羬羊。細角長四五寸者。往往彎中有。磨角成痕處。詳諸說。此乃眞羬羊角。而世多不用。何也。又閩廣中山出一種野羊。彼人亦謂之羚羊也。㊇羚羊似羊而色青毛粗。兩角短小。羬羊似羖羊。兩角長大。山驢乃驢之身而羚羊之角。但稍大而節疎慢耳。陶氏言羚羊有一角。而陳氏非之。按寰宇志云。安南高石山出羚羊。一角極堅。能碎金剛石。則羚固有一角者矣。金剛石出西域。狀如紫石英。百鍊不消。物莫能擊。惟羚羊角扣之。則自然泮泮也。又鎮骨僞充佛牙。物亦不能破。用此角擊之。卽碎。皆相畏耳。羚羊皮西人以作座褥。（李時珍）㊈羚羊角以有掛痕者爲眞。今曆用之。角不見掛痕。已難確定其眞僞。若羚羊角片。則多以山羊角鎊成。且久煎無味。絕無效力。（孫鳳翔）㊉羚羊一物。惟溫疫邪毒可以解散。若傷寒表症而誤用之。則邪反陷矣。（仲氏）

【羚羊肺】**性**　甘。平。無毒。

主治　水腫。癰腫。脹小便不利。

參攷資料　羚羊肺。本草不收。千金翼載大醫山遵治章司業水腫。萬碧丸用之。蓋取其引藥入肺。以通小便之上源也。其方用羚羊肺一具。沸湯微燖。過。曝乾爲末。萬碧子一升。用三年。醋浸一伏時。蒸熟搗爛和丸。梧子大。每用四十丸。麥門冬湯食後服。候口中乾。妄語爲驗。數日小便大利卽瘥。無羚羊以青羊膽代之亦可。（李時珍）

【羚羊鼻】**主治**　炙研服。療五尸遁尸。邪氣。

【羚羊膽】**性**　苦。寒。無毒。

主治　面下皯黯。如雀卵色。以二升同煮三沸。塗四五次良。

【羝肉】卽羊肉之古籍別名。典見綱目。詳『羊肉』條。

【羞天子】卽鬼臼之古籍別名。見綱目。詳『鬼臼』條。

【羞天花】卽鬼臼之古籍別名。見綱目。詳『鬼臼』條。

【羞天草】卽海芋之古籍別名。典見庚辛玉册。詳『海芋』條。

【羞寒花】卽鬼臼之古籍別名。見綱目。詳『鬼臼』條。

【脫毛】卽白芋之古籍別名。典見別錄。詳『白芋』條。

【脫石】卽滑石之古籍別名。典見本草集註。詳『滑石』條。

【脫紅換棉】卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【脫核仁】卽桃仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桃仁』條。

【脫核嬰兒】卽桃仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桃仁』條。

【舂杵頭細糠】**採取**　以糝稻粟疏者良。

性　辛。甘。熱。

主治　卒噎。刮取舍之。亦可煎湯呷之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論舂杵頭細糠曰。燒研水服。令婦人易產。

參攷資料　舂杵頭細糠。治噎病。亦是舂搗義爾。（陶弘景）

【舂鉏】卽鷺鷥之古籍別名。典見綱目。詳『鷺鷥』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【舵菜】**命名**　本品係海舶舵上所生之菌菜。故名。

性質　鹹。甘。寒。無毒。

主治　癭瘤結氣痰飲。

【舶茴香】㈠即大茴香之處方用名。詳『大茴香』條。㈡即莽草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『莽草』條。

【船底苔】**基本**　本品爲苔之生於船底者。

性質　甘。冷。無毒。

主治　鼻洪。吐血。淋疾。同炙甘草。豉汁濃煎湯呷之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論船底苔曰。解天行熱病。伏熱頭目不清。神志昏塞。及諸大毒。以五兩和酥餅末一兩。半麵糊丸。梧子大。每溫酒下五十丸。

參攷資料　按方賢奇效方云。水之精氣。漬船板木中。累見風日。久則變爲青色。蓋因太陽晒之。中應陰陽之氣。故服之。能分陰陽。去邪熱。調臟腑。蓋物之氣味所宜也。（李時珍）

【荷包茄】即茄子之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『茄子』條。

【荷包牡丹】**形態**　荷包牡丹爲一年生草。庭院多栽植之。莖高二尺許。葉羽狀細裂。春月開紅花。成總狀下垂。取根可供藥用。

效能　搗汁和酒冲服。能令人沈醉不醒。

主治　專治金瘡止痛。

【荷包草】**命名**　本品葉大中缺。形如荷包。故名。

古籍別名　肉倪餓草。金鎖匙。（綱目拾遺）

產地　多生寺院牆砌石間。或亂石縫中。

形態　荷包草爲石草類之一種。形似地連錢。十月發苗。莖細葉似莢實。並有皺紋如腰包。延蔓布地。逐節生根。極易繁衍。至六七月間。上面生二子。青翠可愛。採得可供藥用。



荷包草

採取　須於四月十月採之。

性質　微寒。

主治　黃白火丹。去濕火。同神仙對坐草用。清五臟。點熱眼。止吐血。洗痔瘡。調婦人經期。

配合應用　㈠治水腫初起。活鯽魚大者一尾。用磁片割開。去鱗及腸。血以紙拭淨。勿見水。以荷包草填腹。令滿。甜白酒蒸熟。去草食魚。利濕熱。治黃白疸。臌脹。白濁。經閉。搗汁點熱眼。煎湯洗痔瘡腫痛。（百草鏡方）㈡治疝氣。用荷包草研爛汁。酒送服。此草形似荷包。上面有二子。初生時有葉無子。須至六七月方生。（周氏家寶方）㈢治黃疸。荷包草、螺螄三合。同搗汁澄清。煆熱服。（家寶方）㈣治眼中生疔。用肉倪餓草連根葉和酒漿板搗汁。飲二三次即愈。（酒漿板。即酒釀糟也。）（眼科要覽方）㈤治蛇咬。鵝項紅。即灰藋。肉倪餓。野甜菜。三味共搗敷之。（家寶方）

施用宜忌　忌鹽。

【荷花瓣】即蓮花之處方用名。詳『蓮花』條。

【荷魚】即海鷂魚之古籍別名。典見綱目。詳『海鷂魚』條。

【荷葉】**原名**　荷錢。

命名　藕生水中。其葉曰荷。蔽葉形象似錢。故名。

處方用名　青荷葉。鮮荷葉。敗荷葉。

古籍別名　藕荷葉。芰荷葉。（綱目）

外國名稱　Leaves of Lotus.（英）

基本　屬睡蓮科。爲蓮之葉。

產地　多生池沼中。

形態　蓮爲多年生草。春季從宿根生新葉。初小。謂之錢葉。（荷錢）稍大。浮水上。謂之水葉。地下莖肥大。有節。內有作縱行管狀之多數空隙。此即藕也。可供食用。葉初爲卷葉。後舒張。作圓形楯狀。高抽水上。表面滑澤。下面中央有葉柄。初夏開美麗白色或淡紅色大花。子實包藏於倒圓錐形之花托（蓮房）中。狀類椎實。

採取　六七月採。

製法　大明曰。荷葉荷鼻入藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

並多用。

用法 水煎或生搗或炙剉。

性質 苦。平。無毒。

效能 升清散瘀。消暑化熱。用爲止血及解毒藥。

主治 血脹腹痛產後。胎衣不下。酒煮服之。

歷代記述攷證 【宋】大明曰。華諸家本草論荷葉曰。止渴。落胞。破血。治產後口乾。心肺燥煩。【明】李時珍本草綱目論荷葉曰。生發元氣。裨助脾胃。澀精液。散瘀血。消水腫癰腫。發痘瘡。治吐血咯血。衄血。下血。溺血。血淋。崩中。產後惡血。損傷敗血。【明】李士材本草圖解論荷葉曰。主開胃消食。止血固精。【清】黃宮繡本草求眞論荷葉曰。荷葉其味雖苦。其氣雖平。然生水土之下。汚穢之中。挺然獨立。實有長養生發之氣。故昔人謂其色青主屬木。其形仰。主上行。其中空。主上發。其象震。主入膽。爲東方膽木必用之藥。故潔古枳朮丸方。用荷葉燒飯爲丸。取其以能升發脾胃之氣。東垣清震湯。用此以治頭面風痛等症。取其以爲升發風寒之具。開人規用此以治痘瘡風寒外襲。變黑倒靨。取其以爲溫肌散邪之具。證治要訣。用此一味。燒灰單服。以治湯水浮腫。取其溫以行水之意。至入脾胃。須用其帶。謂之荷鼻。取其味厚。獨勝他處。但服荷葉過多。令人瘦劣。非可常用。試觀丹士縮銀。用荷葉同煅。而銀質頓輕。於此可知其概矣。【清】王士雄隨息居飲食譜論荷葉曰。葉功用與房略同。其色青。其象震。故能升發膽中清氣。以達脾氣。凡脾虛氣陷而爲便瀉不運者。可佐入培中之劑。如荷米煎之類是也。古方荷葉燒飯。即是此義。蓋燒飯即煎飯。後人拘泥字面。不解方言。入火燒焦。全失清芬氣味矣。凡上焦邪盛。治宜清降者。切不可用。東垣清震湯之謬。章杏雲已力辨其非。試察其能治痘瘡倒陷。則章氏之言益信。痘疹論云。痘瘡倒陷。若由風寒外襲。竅閉血凝。漸變黑色。身痛肢厥者。溫肌散邪。則氣行而痘自起也。用霜後荷葉貼水紮背者炙乾。自直僵蠶炒去絲。等分爲末。每服五分。溫酒或蔴蝎湯調下。蓋荷葉能升發陽氣。散瘀血。留好血。僵蠶能解結滯之氣。故也。此藥平和易得。而活人甚多。勝於人牙龍腦多矣。名南金散。

配合應用 (一)治陽水浮腫。敗荷葉燒存性。研末。每服二錢。米飲調下。日三服。(證治要訣方)

(二)治腳膝浮腫。荷葉心。蠶本等分。煎湯淋洗之。(永類鈐方)

(三)治痘瘡倒靨。紫背荷葉散。又名南金散。治風寒外襲。倒靨勢危者。萬無一失。用霜後荷葉。貼水紮背者炙乾。白僵蠶直者炒去絲。等分爲末。每服半錢。用胡蒜湯或溫酒調下。(開人規痘疹論方)

(四)治諸般癰腫。拔毒止痛。用荷葉中心帶如錢者。不拘多少。煎湯淋洗。拭乾。以飛過寒水石。同臘豬脂塗之。又治癰腫。柞水飲方中用。(本事方)

(五)治打撲損傷。惡血攻心。悶亂疼痛者。以乾荷葉五斤。燒存性爲末。每服二錢。童子熱尿一盞。食前調下。日三服。利下惡物爲度。(聖惠方)

(六)治產後心痛。惡血不盡也。荷葉炒香爲末。每服方寸匕。沸湯或童子小便調下。或燒灰或煎汁皆可。亦治胎衣不下。(救急方)

(七)治傷寒產後。血暈欲死。用荷葉、紅花、童黃等分。炒研末。童子小便調服二錢。(龐安常傷寒論方)

(八)治孕婦傷寒。大熱煩渴。恐傷胎氣。用嫩卷荷葉。焙。半兩。蚌粉二錢半。爲末。每服三錢。新汲水入蜜調服。并塗腹上。名單胎散。(鄭氏方)

(九)治妊娠胎動。已見黃水者。乾荷蒂一枚。炙研爲末。糯米泔汁一鍾。調服即安。(唐氏經驗方)

(十)治吐血不止。嫩荷葉七箇。擂水服之。甚佳。又方。乾荷葉。生蒲黃等分。爲末。每服三錢。桑白皮煎湯調下。用經霜敗荷燒存性。研末。新水服二錢。(肘後方)

(十一)治吐血咯血。荷葉焙乾爲末。米湯調服二錢。一日二服。以止爲度。用敗荷葉。蒲黃各一兩。爲末。每服二錢。麥門冬湯下。(聖濟總錄方)

(十二)治吐血衄血。陽乘於陰。血熱妄行。宜服四生丸。陳日華曰。屢用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

得效。用生荷葉、生艾葉、生柏葉、生地黃等分。搗爛。丸雞子大。每服一丸。水三杯。煎一杯。去渣服。（濟生方）

㊂治崩中下血。荷葉燒研半兩。蒲黃、黃芩各一兩。爲末。每空心酒服三錢。

㊃治血痢不止。荷葉帶水煮汁服之。（活濟方）

㊄治下痢赤白。荷葉燒研。每服二錢。紅痢蜜白痢沙糖湯下。

㊅治脫肛不收。用貼水荷葉。焙研。酒服三錢。仍以荷葉盛末坐之。（經驗良方）

㊆治牙齒疼痛。青荷葉剪取錢。蒂七箇。以濃米醋一杯。煎半杯。去滓。熬成膏。時時抹之妙。（唐氏經驗方）

㊇治赤遊火丹。新生荷葉。搗爛。入鹽塗之。（摘玄方）

㊈治漆瘡作痒。乾荷葉煎湯洗之良。（集驗方）

㊉治偏身風癮。荷葉三十枚。石灰一斗。淋汁煮漬之。半日乃出。數日一作。甚良。（聖惠方）

㊊治偏頭風痛。升麻、蒼朮各一兩。荷葉一個。水二鍾。煎一鍾。食後溫服。或燒荷葉一個爲末。以煎汁調服。（簡便方）

㊋治刀斧傷瘡。荷葉燒研搽之。（集簡方）

㊌治陰腫痛痒。荷葉、浮萍、蛇牀等分。煎水日洗之。（醫壘元戎方）

用量　錢半至三錢。或用一角。

畜名方劑　清震湯治雷頭風。頭面痤瘡腫痛憎寒。拘急發熱狀如傷寒。（東垣方）升麻、蒼朮各四錢。荷葉（全者）一個。水煎食後服。

參攷資料　㊀按東垣試效方法。雷頭風證。頭面痤瘡腫痛。憎寒發熱。狀如傷寒。病在三陽。不可過用寒藥。重劑誅伐。無過一人病此。諸藥不效。余處清震湯治之而愈。用荷葉一個。升麻、蒼朮各五錢。水煎溫服。蓋震爲雷。而荷葉之形象震。其色又青。乃涉類象形之義也。又按聞人規痘疹八十一論云。痘瘡已出。復爲風寒外襲。則竅閉血凝。其點不長。或變黑色。此爲倒靨。必身痛四肢微厥。但溫肌散邪。則熱氣復行。而斑自出也。宜紫背荷葉散治之。蓋荷葉能升發陽氣。散瘀血。留好血。僵蠶能解結滯之氣也。此藥易得。而活人甚多。勝於人牙龍腦也。又戴原禮證治要訣云。荷葉服之。令人瘦劣。單服可以消陽水浮腫之氣。（李時珍）㊁荷葉伏白銀。伏硫黃。（李時珍）

【荷葉上露】

性質　甘。平。無毒。

主治　治一切虛損勞症。

參攷資料　夏日黎明。日將出時。將長杓坐碗於首。向荷池葉上傾瀉之。以伏露爲佳。秋露太寒。花上者性散。有小毒。勿用。（趙恕軒）

【荷葉燒飯】

基本　本品爲荷葉和粳米燒成之飯。

主治　厚脾胃。通三焦。資助生發之氣。

參攷資料　㊀易水張潔古枳朮丸。用荷葉裹燒飯爲丸。蓋荷之爲物。色青中空。爲生化萬物之根蒂。用此物以成其化。胃氣何由不上升乎。更以燒飯和藥。與白朮協力。滋養穀氣。今胃厚不致再傷。其利廣矣。大矣。（李杲）㊁東南人不識北方炊飯無甑。類乎爲燒如燒菜之意。遂訛以荷葉包飯。入灰火燒煨。雖丹溪亦未之辯。但以新荷葉煮湯。入粳米造飯。氣味亦全也。凡粳米造飯。用荷葉湯者寬中。芥葉湯者豁痰。紫蘇湯者行氣解肌。薄荷湯者去熱。淡竹葉湯者辟暑。皆可類推也。

【荷蒂】　卽荷鼻之別名。詳『荷鼻』條。

【荷蜂】　卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【荷鼻】

古籍別名　荷蒂。

基本　爲荷葉之蒂。

主治　安胎。去惡血。留好血。止血痢。殺菌毒。並煮水服。

用量　三枚至七枚。

【荷錢】　卽荷葉之原名。詳『荷葉』條。

【荷薙】　卽荷葉之別名。詳『荷葉』條。

【荸薺】

原名　烏芋。

命名　烏芋。其根如芋而色烏也。鳧喜食之。故爾雅名鳧茈。後遂訛爲鳧茨。又訛爲薊臍。蓋切韻鳧薊同一字母。音相近也。三棱地栗。皆形似也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名 鳧茈。鳧茨。葧臍。（衍義）黑三稜（博濟方）芍地栗。（鄭樵通志）

外國名稱 Heleocharis Plantaginea, R. Br.（拉丁）

基本 係莎草科植物葧臍之根。

產地 多生水田沃地間。

形態 荸薺爲多年生草本春季生葉形似燈心草而粗長三四尺實輭而內空夏時於莖頂生寸許類菅之穗黑色有白蘘根類似慈姑大六七分外部有紅有黑內部則皆白色。



荸薺

種植 恒以栽植於肥田中三月下種待霜後苗枯冬月掘取。

採取 冬春之間爲掘取時期。

製法 凡入藥有製成澱粉者法取荸薺自然汁曬乾成粉用。

用法 入藥恒用粉末或搗汁用間有整個加入煎劑。

性質 甘。微寒。滑。無毒。

效能 清熱明目化痰消積。用作消解藥。

主治 消渴。瘴熱。溫中。益氣。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論荸薺曰下丹石消風毒。除胸中實熱氣可作粉食明耳目消黃疸。【宋】日華諸家本草論荸薺曰開胃下食。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論荸薺曰作粉食厚人腸胃不飢又能解毒服金石人宜之。【明】汪機本草會編論荸薺曰療五種腸氣消宿食飯後宜食之。治誤吞銅物。【明】李時珍本草綱目論荸薺曰主血痢下血血崩辟蟲毒。【清】黃宮繡本草求眞論荸薺曰烏芋止一水菓何書皆言力能毀銅破積攻堅止血治痢住崩擦瘡解毒發痘清聲醒酒其效若是之多蓋以味甘性寒則於在胸實熱可除而諸實脹滿可消體黑則以力善下行而諸血痢血毒可祛是以冷氣勿食食則令人每患腳氣熱嗽勿用用則於人有集火氣之爲害耳。【清】王士雄隨息居飲食譜論荸薺曰甘平明目養胃和肝。治痢辟蟲。病人可食。

配合應用 (一)治腹滿脹大。烏芋去皮。填入雄猪肚內。線縫。砂器煮熟食之。勿入鹽。(二)善毀銅。銅器中煮之即爛。(三)誤吞銅物。以烏芋合胡桃食一二斤許。即消。(四)一味嚥乾爲末。服。能辟蟲毒。(五)大便下血。荸薺搗汁大半鍾。入酒少許。溫服。三日見效。（神祕方）(六)治下痢赤白。午日午時。取完好荸薺。洗淨拭乾。勿令損破。於瓶內入好燒酒浸之。黃泥密封收貯。遇有患者。取二枚細嚼。空心用原酒送下。（經驗方）(七)治婦人血崩。鳧茈一歲一個。燒存性。研末。酒服之。（李氏方）(八)治小兒口瘡。用荸薺燒存性。研末摻之。（簡便方）

用量 二枚至四枚。粉用五分至一錢。

施用宜忌 凡脾腎虛寒而無熱者禁用。

參攷資料 (一)按王氏博濟方。金鎖丸中用黑三稜。註云。即鳧茈乾者。則汪氏所謂消堅之說。蓋本於此。又薑炳集驗方云。地栗嚥乾爲末。白湯每服二錢。能辟蟲毒。傳聞下蟲之家。知有此物。便不敢下。此亦前人所未知者也。（李時珍）(二)鳧茈生淺水田中。其苗三四月出土。一莖直上。無枝葉。狀如龍鬚。肥田栽者。粗近葱蒲。高二三尺。其根白翦。秋後結顆。大如山查栗子。而臍有聚毛。累累下生入泥底。野生者黑而小。食之多滓。種出者紫而大。食之多毛。吳人以沃田種之。三月下種。霜後苗枯。冬月掘收爲果。生食煮食皆良。（李時珍）

【荸薺三七】即昭參之別名。詳『昭參』條。

【荸薺山漆】即昭參之別名。詳『昭參』條。

【荸薺粉】古籍別名 烏芋粉。黑三稜粉。（綱目拾遺）

製法 與藕粉同。

性質 甘。寒。無毒。

主治 毀銅銷堅。除腹中痞積。丹石蠱毒。清心去翳。除肺胃經邊

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱。過飲傷風失聲。疮毒乾漿。可以起發。

【荻皮】 **產地** 生江南諸地。

形態 荻皮爲雜木類之一種。形如松葉。有針刺。結實黃赤。其皮可供藥用。



荻皮

採取 十月採之。

性質 苦。

主治 止消渴。益氣。殺白蟲。

【荻梁】 卽蜀黍之古籍別名。典見廣雅。詳『蜀黍』條。

【荻葵】 卽蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜀葵』條。

【荻蔗】 卽甘蔗之節疎而細者之古籍別名。典見綱目。詳『甘蔗』條。

【荼】 卽苦菜之古籍別名。典見本經。詳『苦菜』條。

【荼苦荅】 卽白菊之別名。詳『白菊』條。

【茲夷】 卽燕夷之原名。詳『燕夷』條。

【蒂】 卽菟葵之古籍別名。典見外丹本草。詳『菟葵』條。

【蒂蔑】 卽豨薟之別名。詳『豨薟』條。

【蔑梁】 卽雞頭菜之古籍別名。典見綱目。詳『雞頭菜』條。

【莎木麵】 卽西國米之古籍別名。典見和漢藥考。詳『西國米』條。

【莎根酒】 卽香附根酒之原名。詳『香附根酒』條。

【莎草】 卽香附子之古籍別名。典見別錄。詳『香附子』條。

【莎草根】 卽香附子之原名。詳『香附子』條。

【莎婆子】 卽娑婆子之古籍別名。典見本草綱目。詳『娑婆子』條。

【莎結】 卽香附子之古籍別名。典見圖經本草。詳『香附子』條。

【莍藷】 卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【茼】 卽貝母之古籍別名。典見爾雅。詳『貝母』條。

【茼勒母】 卽貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝母』條。

【茼麻】 **處方用名** 茼麻實。

古籍別名 白麻。靑蘵。

茼麻（綱目）桐麻（日本）

外國名稱 Abutilon avicennae, Gaerth.（拉丁）イチビキリアサ（日本）

基本 係錦葵科茼麻屬之子實。

產地 原產於熱帶地方。凡原野間處處有出。

形態 茼麻爲灌草類之一年生草本。春日下種。生苗莖高五六尺。葉圓心臟形。葉柄長。夏月葉梢之葉腋開花。花小黃色。萼片五。花瓣五。雄蕊多而比花瓣短。雌蕊之柱頭二裂至五裂。果實至成熟後。則乾燥而裂開。現出有毛之種子。其莖皮可採纖維。色白光澤。供布典繩料。其實與根可供藥用。



茼麻

枚。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論茼麻曰。生眼翳瘀肉。起倒睫拳毛。

參攷資料 ㈠茼一作蕁。又作蘵。種必連項。故謂之蕁也。（李時珍）㈡茼卽蕁麻也。今人取皮作布及索者。實似大麻子。九月十月採陰乾。（蘇恭）㈢茼麻今之白麻也。多生卑濕處。人亦種之。葉大如桐葉。圓而有尖。六七月開黃花。結實如牛蘑形。有稜。嫩青。老黑。中子扁黑。狀如黃葵子。其莖輕虛潔白。北人取皮作麻。以莖瞧硫黃作煤燈。引火甚速也。其嫩子見小兒亦食之。（李時珍）

【茼麻根】 **主治** 止痢。古方用之。

【茼麻實】 卽茼麻之處方用名。詳『茼麻』條。

【蓄菜】 **命名** 本品葉顏似杏。故名。

古籍別名 堯葵。（唐本）水葵。（馬勃傳）水鏡草。（土宿）醫子菜。

283／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（野菜譜）荇（詩經）接余（爾雅）鑵金蓮子（訊文）荇絲菜　蒓公鬚（俗名）屏風（楚辭）

外國名稱 Limnanthemum nymphoides, Link. var. japonicum, miq.（拉丁）アサザ　ハナジュンサイ（日本）

基本　係龍膽科蒓菜屬爲蒓菜之莖葉。

產地　生池沼水澤間。

形態　蒓菜爲水草類之多年生草本。其葉爲圓心臟形。周緣稍呈波狀。表面綠色。裏面帶紫色。浮水面與慕相似。惟近葉柄處有缺刻爲異耳。夏日葉腋抽花梗出水面。花冠五裂。色深黃。亦有白者。緣邊有多數之突起。如毛狀。結實大如棗梨。中有細子。其莖葉可供藥用。

性質　甘。冷。無毒。

主治　消渴。去熱。利小便。

歷代記述攷證　【宋】開寶重定新本草論蒓菜曰。搗汁服。療寒熱。【明】李時珍本草綱目論蒓菜曰。搗傅諸腫毒。火丹遊腫。

【莖蒲】㊀卽白菖之古籍別名。典見別錄。詳『白菖』條。㊁卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【莘栗】卽栗之古籍別名。典見綱目。詳『栗』條。

【莘草】**產地**　生山澤間。

形態　莘草類爲雜草類之一種。形似蒲黃。葉如芥。可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　痺腫。跌撲損傷。

【蒼牛藻】卽聚藻之別名。性質功能。詳『聚藻』條。

【蓍蓬菜】卽蒼菜之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『蒼菜』條。

【莜子】卽薤之古籍別名。典見綱目。詳『薤』條。

【莞】卽白苹之古籍別名。典見綱目。詳『白苹』條。

【莞草】卽茵芋之古籍別名。典見別錄。詳『茵芋』條。

【莞蒻子】卽胡荽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡荽』條。

【莠】卽狗尾草之古籍別名。典見綱目。詳『狗尾草』條。

【莢蒾】卽漏盧之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『漏盧』條。

【莢榆】卽榆之古籍別名。典見綱目。詳『榆』條。

【莢蓾】**古籍別名**　繫迷。羿先。（詩疏）

外國名稱 Viburnum dilatatum, Thunb.（拉丁）ガマズミ　ソゾミ　ヨツヅミ　ヨツドソメ（日本）

基本　係忍冬科。莢蓾屬。爲莢蓾之枝葉。

產地　生山野間。

形態　莢蓾爲灌木類之落葉木本。莖高一二丈。葉廣橢圓形。或略似圓形。有短尖頭。緣邊有鋸齒。葉面甚粗糙。對生。初夏開花。聚繖花序。花小。白色。微帶褐。結實小。爲漿果。赤色。味甘可食。其枝葉可供藥用。



莢

性質　甘。苦。平。無毒。

主治　殺三蟲。下氣消穀。煮汁和米作粥。飼小兒甚美。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論莢蓾枝葉曰。作粥灌六畜。瘡中生蛆立出。

【莢蓾葉】卽莢蓾之枝葉。性質功能。參詳『莢蓾』條。

【莧菜】**命名**　本品莖葉高大而易見。故字從見而名曰莧。

古籍別名　莧實。莫實。（別錄）

外國名稱 Amaranthus mangostanus, L.（拉丁）ヒユ　マヒユ　ヒヤウナ（日本）

基本　係莧科。爲莧之莖葉。

產地　各地皆有出。

形態　莧爲菜類之二年生草本。高三四尺。葉互生。卵圓形。葉柄長。夏秋之際。花穗自莖梢抽出。花細小。呈黃綠色。苞與果實同長。或稍長於果實。春夏間採其嫩莖與葉。可供食與藥用。

性質　甘。冷。利。無毒。

主治　六莧并利大小腸。治初痢滑胎。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食

284／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

療本草論莧菜曰。白莧補氣。除熱。通九竅。【唐】蘇恭新修本草論莧菜曰。赤莧主赤痢射工沙虱。【唐】陳藏器本草拾遺論莧菜曰。紫莧殺蟲毒。治氣痢。【清】黃宮繡本草求眞論莧菜曰。莧菜味甘氣寒性滑。按據諸書。無不皆言其性冷利。能治熱結血痢。蟲毒之症。卽人服之者。亦無不謂其通腸利便。是亦菜中最利最滑之味也。且又戒其多食。則令人動氣煩悶。又曰不可與鱉同食。生鱉癥試取鱉肉切如豆大。以莧菜刺裹。置土坑內。用土掩蓋一宿。盡變成鱉。按此事卽未有。而其氣味之寒冷。與魚龜鱉同爲一類。故有如此箴規之詞矣。豈止尋常冷利之味哉。然果臟陽不陰。及於暑時挾有眞正熱候。亦又何忌。惟在食之者之能審其所用可耳。中治肝經風熱。上攻眼目赤痛。生翳遮障不明。青盲赤眼。並宜服之。爲末每服方寸匙。【清】王士雄隨息居飲食譜論莧菜曰。莧甘涼。補氣清熱。明目滑胎。利大小腸。種類不一。以肥而柔軟者良。矮脹滑瀉者忌之。尤忌與鼈同食。

參攷資料 ㈠人莧細莧幷冷利。赤莧療赤下而不堪食。方用莧菜甚稀。斷穀方中時用之。（陶弘景）㈡赤莧微寒。故主血痢。紫莧不寒。比諸莧無毒。故主氣痢。（蘇頌）㈢五月五日收莧菜和馬齒莧爲細末等分。與妊娠人常服。令易產也。（孟詵）㈣紅莧入血分。善走。故與馬莧同服。能下胎或煮食之。令人易產。（朱震亨）㈤莧凡六種。赤莧白莧。人莧紫莧。五色莧。馬莧也。惟人白二莧實。可入藥用。赤莧味辛。別有功用。（韓保昇）㈥莧並三月撒種。六月以後不堪食。老則抽莖如人長。開細花成穗。穗中細子扁而光黑。與青葙子雞冠子無別。九月收之。細莧卽野莧也。北人呼爲糖莧。柔莖細葉。生卽結子。味比家莧更勝。俗呼青葙苗爲雞冠莧。亦可食。（李時珍）

【莧菜根】主治 陰下冷痛。入腹則腫滿殺人。擣爛傅之。

【莧菜實】命名 本品乃莧菜結之子實。故名。

性質 甘。寒。無毒。

主治 青盲明目。除邪。利大小便。去寒熱。久服益氣力。不饑輕身。（本經）治白膿殺蚘蟲。（別錄）

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論莧菜實曰。益精氣。【明】李時珍本草綱目論莧菜實曰。治肝風客熱。腎目黑花。

參攷資料 莧實與青葙子同類異種。故其治目之功。亦彷彿也。（李時珍）

【莧實】 卽莧菜之古籍別名。典見別錄。詳『莧菜』條。

【莧陸】 卽商陸之古籍別名。典見易經。詳『商陸』條。

【莧】 卽烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烟草』條。

【莧碧】 卽莧碧子之古籍別名。典見本經。詳『莧碧子』條。

【莧岩子】命名 本品一作蔏。蔏其子服之。令人狂溷放宕。故名。

處方用名 天仙子。

古籍別名 橫唐子。（本經）行唐子。（綱目）行蘆子。虎茄。發狂草。狂奔蓼。猥蘆子。牙疼子。破雪草。牛黃。（和漢藥考）顚茄。（新本草）

外國名詞 Scopolia.（拉丁）（英）（德）

基本 屬茄科莧碧之葉、莖、根、種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。天仙子產自安南。西貢。石叻亦有出。但不如安南出者之佳。六七月新。



莧碧子

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

狂亂奔走。故或呼發狂草、狂奔薯。

採取　六月七月採于日乾。

製法　雷敩曰。凡使莨菪子十兩。以頭醋一鎰。煮乾爲度。却用黃牛乳汁浸一宿。至明日乳汁黑。即是眞者。曬乾搗篩用。

用法　恒剉末和入外施膏科藥中。間有和作內服丸散。

性質　苦寒無毒。

效能　薰蛀牙齒痛。療風癎癲狂。用作鎭痙鎭痛藥。治癲癎發狂及其他神經諸病。亦用於腺腫及瘰癧等。又治鴉片中毒。胃潰瘍。肺結核。盜汗。

作用　入胃後。因胃之作用。各質皆行分解。惟以莨菪精之量爲最大。故服後刻許。胃分泌神經被激而減少分泌。口鼻及鼻咽腔之分泌同減少。此品不特能制止胃液之分泌。又能制止脾液之分泌。至少亦能阻止其 secretinum 及他種藥物而來之脾液增多。但不能阻礙 Secretin 之作用。又能廢止膽囊及迷走神經管轄下之部份之分泌。至腸能令腸之蠕動弛緩。及制止腸之分泌。由腸壁入血中。卽促進血液之循環。使心跳之速率增加。迷走神經亦受激而麻痺。全身血管收縮。汗液及尿亦同時減少。如服過量。則脈搏速弱。瞳孔縮小而死。

主治　齒痛。出蟲。肉痺拘急。久服輕身。使人健行走及奔馬。並强志益力。通神見鬼。多食令人狂走。（本經）療癎狂風癎。顚倒拘攣。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論莨菪子曰。安心定志。聰明耳目。除邪逐風。變白。主痃癖。取子洗曬。隔日空腹水下一指撮。亦可小便浸。令泣盡。暴乾。如上服。勿令子破。破則令人發狂。【唐】甄權藥性本草論莨菪子曰。炒焦研末。能治下部脫肛。止冷痢。主蛀牙痛。咬之蟲出。【宋】大明諸家本草論莨菪子曰。燒熏蟲牙。及洗陰汗。【明】李士材本草圖解論莨菪子曰。莨菪子苦辛有毒。一名天仙子。主止搐攣風。甘草升麻。可解其毒。

國外學說　日本學說謂本品之效分。由理學博士長井長義氏及テシユミート氏檢明其中含有亞篤羅必涅及『ヒヨスチアミン』等。與歐洲所產之別剌敦那同其生理的作用。故可爲別剌敦那之代用品。咸供製造亞篤羅必涅及『ヒヨスチアミン』之用。又爲越幾斯。於鎭痙及鎭痛藥用之。我國之莨菪實爲貴重之藥品。現今日本藥局方亦收載之。其主要效能。爲鎭靜鎭痛藥。用於劇苦之咳嗽剌戟。（咯痰甚少而咳嗽頻發者）例如慢性喉頭及氣管枝加答兒。肺癆喘息。痙咳。胃痛。三叉神經痛。坐骨神經痛。及痙攣性狹窄。因肛門裂傷之筋收縮。子宮頸收縮。嘔吐。慢性便祕及癲癇。舞蹈病等。均有效。一日二三回。○・○三至○・二（自七毫八絲至五釐二毫）爲浸劑、散劑、或丸劑。外用則爲細粉。爲顫脊一回之極量○・二至○・六（五釐二毫至一分五釐六毫）但此爲莨菪草之量。其根及越幾斯。主治亦同。而根之量爲○・○一五至○・○七（三毫九絲至一釐八毫二絲）一日二三回。爲浸劑、散劑、丸劑。外用則爲粉末。爲輭劑。極量一回○・○七（一釐八毫三絲）一日極量○・三（七釐八毫）越幾斯一回之極量○・○五（一釐三毫）一日之極量○・二（五釐二毫）（日本藥局方）英美學說謂顚茄產中國。日本。歐羅巴及美國等處。與佛茄兒闊羊花同類。高約三尺。結實狀如李子。內有多核。此樹全身皆具功力。其花及子。可入藥。而藥品中多用其葉與根。內含一精卽ㄚ刀邊精。（亞篤魯必涅）其功力最峻烈。如用其葉。無論鮮乾。皆可配膏酒等。如用其根。則可配貼膏酒膏搽酒等。顚茄爲提神鎭睡藥。不宜過服。過服則喉渴目眩。頭昏。如沉醉而易傷命。然如蛤利類及斂劑。能敗此藥功力。不可同服。其功用又能止痛發表。解轉筋。利小便。補陽。主治風癎。腦氣筋疼。哮咳。嗽。癱風。瘧病類便祕。遺尿。陽痿。遺精。風溼。至解藥之解此毒。須先用膽礬一分七釐半。以水和服。待吐後。繼服鴉片膏。（第鴉片性毒。可按顚茄多少酌用。愼勿妄加）或服綠礬冰等。

配合應用　㊀治卒發顚狂。莨

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

碧三升爲末。以酒一升。漬數日。絞去滓。煎令可丸。如小豆三丸。日三服。當見面愈。頭中如有蟲行。額及手足有赤豆處。如此並是瘥候也。未知再服。取盡神良。（陳延之小品方）

㈡治風痺厥痛。天仙子三錢。炒大草烏頭、甘草半兩。五靈脂一兩。爲末。糊丸。梧子大。以螺青爲衣。每服十丸。男子菖蒲酒下。女子芫花湯下。（聖濟總錄方）

㈢治久嗽不止。有濃血。莨碧子五錢。淘去浮者。煮令芽出。炒研。眞酥一雞子。大棗七枚。同煎令酥盡。取棗日食三枚。又方。莨碧子三撮。吞之。日五六度。（孟詵方）

㈣治年久呷嗽至三十年者。莨碧子、木香、熏黃等分爲末。以羊脂塗青紙上。撒末於上。卷作筒。燒烟熏吸之。（崔行功纂要方）

㈤治積冷瘧癖。不思飲食。羸困者。莨碧子三分。水淘去浮者。大棗四十九個。水三升。煮乾。只取棗去皮核。每空心食一個。米飲下。覺熱卽止。（聖濟總錄方）

㈥治水瀉日久。青州乾棗十個。去核。入莨碧子塡滿。扎定。燒存性。每粟米飲服一錢。（聖惠方）

㈦治冷疳痢下。莨碧子爲末。臘猪脂和丸。綿裹納下部。可因痢出更納新者。不過三度瘥。（孟詵方）

㈧治赤白下痢。腹痛腸滑後重。大黃煨半兩。莨碧子炒黑一撮。爲末。每服一錢。米飲下。（普濟方）

㈨治久痢不止。變種種痢。兼脫肛。莨碧丸。用莨碧子一升。淘去浮者。煮令芽出。曬乾。炒黃黑色。青州棗一升。去皮核。醞醋二升。同煮。搗膏丸。梧子大。每服二十丸。食前米飲下。（聖惠方）

㈩治腸風下血。莨碧煎。用莨碧實一升。曝乾。搗篩。生薑半斤。取汁。銀鍋中更以無灰酒二升浸之。上火煎如稠。傷。卽旋投酒。度用酒可及五升。卽止。慢火煎令可丸。大如梧子。每日取酒通下三丸。增至五七丸止。若丸時黏手。則以菟絲粉襯隔之。火候忌緊。藥焦則失力也。初服微熱。勿怪。疾甚者服過三日。當下利。疾去利亦止。絕有效。（簡中方）

㈠治脫肛不收。莨碧子炒研。傅之。（聖惠方）

㈡治風牙蟲牙。用天仙子一撮。入小口瓶內。烟燒竹筒引烟入蟲孔內。熏之。卽死。永不再發。（瑞竹堂方）又用莨碧子入瓶內。以熱湯淋下。口含瓶口。令氣熏之。冷更作。盡三合乃止。有涎津可去。甚效。（普濟方）又用莨碧子數個。納孔中。以蠟封之。亦效。（備急方）

㈢治牙齒宣落。風痛。莨碧子末。綿裹咬之。有汁勿嚥。（必效方）

㈣治風毒咽腫。嚥水不下。及瘰癧咽腫。水服莨碧子末兩錢匕。神效。（外臺祕要方）

㈤治乳癰堅硬。新莨碧子半匙。清水一盞服之。不得嚼破。（外臺祕要方）

㈥治石癰堅硬。不作膿者。用莨碧子爲末。醋和傅瘡頭。根卽拔出。（千金方）

㈦治惡瘡似癩。十年不愈者。莨碧子燒研傅之。（千金方）

㈧治打撲折傷。羊脂調莨碧子末傅之。（千金方）

㈨治惡犬咬傷。莨碧子七枚吞之。日三服。（千金方）

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。

著名方劑　莨碧子散。治五癎。（外臺方）猪卵一具。陰乾一百日。莨碧子三斤。牛黃八分。鯉魚膽五分。桂心一兩。（研）上五味。以清酒一升。漬莨碧子。曝令乾。盡酒止。搗合下篩。酒服五分。日再服。不知稍增。

參攷資料　㈠以石灰清煮一伏時。掬出去芽。曝乾。以附子、乾薑、陳橘皮、桂心、厚朴爲丸。服去一切冷氣。積年氣痢。甚溫暖也。不可生服。傷人。（甄權）㈡莨碧之功。卻未見如上所說。而其毒則有甚焉。煮一二日而芽方生。其爲物可知矣。莨碧、雲實、防葵、赤商陸。皆能令人狂惑。見鬼者。昔人未有發其義者。蓋此類皆有毒。能使痰迷心竅。蔽其神明。以亂其視聽。故耳。唐安祿山誘契丹。飲以莨碧酒。醉而坑之。又嘉靖四十三年二月。有陝西游僧武如香。挾妖術。至昌黎縣民張柱家。見其妻美。設飯間。呼其全家

287／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

同坐。將紅散入飯內食之。少頃舉家昏迷。任其奸污。復將魘法。吹入柱耳中。柱發狂惑。見舉家皆是妖鬼。盡行殺死。凡一十六人。並無血迹。官司執柱囚之。十餘日。柱吐痰二碗許。問其故。乃知所殺者皆其父母兄嫂妻子姊姪也。柱與如香皆論死。世宗嘉皇帝命榜示天下。觀此妖藥。亦是莨菪之類耳。方其迷惑之時。視人皆鬼矣。解之之法。可不知乎。（李時珍）㈢莨菪性溫有毒。服之熱發。以綠豆汁、甘草、升麻、犀角並解之。（大明）㈣所在皆有之。葉似萩。藍莖。葉皆有細毛。花白色。子殼作罌粟狀。結實扁細。若粟米大。其色青黃。六月七月採子日乾。（韓保昇）㈤處處有之。苗莖高二三尺。葉似地黃。王不留行、紅藍等。而闊如三指。四月開花。紫色。莖莢有白毛。五月結實。有殼。作罌子狀。如小石榴房中子至細。青白色。如粟米粒。（蘇頌）㈥食莨菪中毒。其徵候初如醉酒。咽喉燥渴。終而瞳孔散大。不能見物。舌亦蹇澀。不能言語。精神狂亂。疾奔。（和漢藥考）

【莨菪根】**性質**　苦。辛。有毒。

主治　邪癌。疥癬。殺蟲。

配合應用　㈠治癌疾不止。莨菪根燒灰。水服一合。量人强弱用。（千金方）㈡治惡瘡有蟲。莨菪根搗爛。蜜和傅之。（千金方）㈢治趾間肉刺。莨菪根搗汁塗之。雷公炮炙論序云。脚生肉刺。視繫莨菪。謂繫於視帶上也。㈣治狂犬咬人。莨菪根和鹽搗傅之。日三上。（外臺祕要方）㈤治惡刺傷人。莨菪根水煮汁浸之。冷卽易。神方也。（千金方）㈥萬聖神應丹。治箭頭不出。端午前一日不語。尋見莨菪科根本枝葉花實全好者。道云。先生爾却在這裏道。罷用柴灰自東南起圍了。以木椑子撅取根下。周廻土次。日日未出時。依前不語。用鑼頭取出。洗淨。勿令雞犬婦人見。於淨室中。以石白搗如泥。丸彈子大。黃丹爲衣。以紙袋封懸高處陰乾。遇有箭頭不出者。先以象牙末貼瘡口。後用緋帛袋盛此藥。放臍中。綿兜肚繫了。當便出也。（儒門事親方）

【莪术】卽蓬莪朮之處方用名。詳『蓬莪朮』條。

【莪茂】卽蓬莪朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬莪朮』條。

【莪蒿】㈠卽蘼蕪之古籍別名。典見爾雅。詳『蘼蕪』條。㈡卽王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王不留行』條。

【莫耶婆伽】卽麝香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麝香』條。

【莫實】卽莧菜之古籍別名。典見別錄。詳『莧菜』條。

【莧】卽白莧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白莧』條。

【莧香】卽白莧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白莧』條。

【莘】卽芒之古籍別名。典見爾雅。詳『芒』條。

【莨菜】卽地榆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地榆』條。

【莽草】卽白棘之古籍別名。典見別錄。詳『白棘』條。

【莖砂】卽硇砂之處方用名。詳『硇砂』條。

【處石】㈠卽慈石之古籍別名。典見別錄。詳『慈石』條。㈡卽玄石之古籍別名。典見綱目。詳『玄石』條。

【處笋片】**基本**　本品係以茅竹筍片。微醃湯煮熏乾者。

古籍別名　素火腿。（綱目拾遺）

性質　甘。微鹹。平。無毒。

主治　利血消痰。

【處連】卽南連之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『南連』條。

【蚯蚓】**命名**　蚓之行也。引而後申。其壞如丘。故名。

處方用名　地龍。乾地龍。白頸蚯蚓。

古籍別名　土龍。別錄。地龍子。藥性。寒蠕。寒蚓。附蚓。（吳普）蠕蠕。朐螾。千人踏。（大明）日華諸家本草）堅。靈。蜜蠕。曲蟮。土蟮。歌女。（綱目）蚓蠕。蟮蟮。鳴砌。却行。寒欣。（和漢藥考）

外國名詞　Perichaeta sieboldii Horst 或 Lumbricus terrestris（拉丁）Earth-worm（英）

基本　屬環節蟲類之蚯蚓。

288／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產地　各處皆有之。

形態　蚯蚓爲棲息濕地之棲皮狀及圓筒狀蟲類。頭尖。無耳目鼻。有多數環節。腹面有細小短刺。以助前進而防後退。在地中時。肛門向地面食土。攝收滋養料。排泄細土於體外。



蚯　蚓

採取　二三月採之。曝乾。須取白頸。是其老者。或路上踏殺者。名千人踏。更良。

製法　陶弘景曰。凡使蚯蚓。若服乾。蚓。須熬作屑。擣曰。凡收來用。糯米泔浸一夜。漉出。以無灰酒浸一日。焙乾。切。每一兩。以蜀椒糯米各二錢半。同熬至米熟。揀出用。李時珍曰。入藥有爲末。或化水。或燒灰者。各隨方法。

用法　水煎。或生搗。或剉末和作丸散。

性質　鹹。寒。無毒。

效能　瀉熱行水。用作解熱及利尿藥。

主治　蛇癥。去三蟲。伏尸。鬼疰。蟲毒長蟲。（本經）化爲水。療傷寒伏熱狂謬。大腹黃疸。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論蚯蚓曰。溫病大熱狂言。飲汁皆瘥。炒作屑。去蚘蟲。去泥。鹽化爲水。主天行諸熱。小兒熱病癇癎。塗丹毒。傅漆瘡。【唐】蘇恭新修本草論蚯蚓曰。蔥化爲汁。療耳聾。【唐】韓保昇蜀本草論蚯蚓曰。解射罔毒。【唐】甄權藥性本草論蚯蚓曰。炒爲末。主蛇傷毒。【宋】日華諸家本草論蚯蚓曰。治中風癎疾。喉痺。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蚯蚓曰。治脚風。【明】李時珍本草綱目論蚯蚓曰。主傷寒瘟疾。大熱狂煩。及大人小兒小便不通。急慢驚風。歷節風痛。腎臟風注。頭風齒痛。風熱赤眼。木舌喉痺。鼻衄脣耳禿瘡瘰癧。卵腫脫肛。解蜘蛛毒。療蚰蜒入耳。【明】繆希雍本草經疏論蚯蚓曰。蚯蚓味鹹寒。無毒。大寒能祛熱邪。除大熱。故主伏鬼疰。及療傷寒伏熱狂謬。鹹主下走。利小便。故治大腹黃疸。諸蟲癥咸屬濕熱所成。得鹹寒之氣。則癥自消。蟲自去。而蟲毒之熱亦解矣。昔一道人治熱病發狂。用白頸蚯蚓十數條。同荊芥薷搗汁與飲之。得臭汗而解。其爲治傷寒伏熱狂謬之明驗也。【明】李士材本草圖解論蚯蚓曰。蚯蚓氣大寒。能除有餘邪熱。傷寒非陽明實熱狂躁者不宜用。溫病無壯熱。及脾胃素弱者不宜服。黃疸緣大勞腹脹。屬脾腎虛。尸疰因陰虛成勞。瘵者。咸不宜服。【清】黃宮繡本草求眞。論蚯蚓曰。蚯蚓最屬寒。味。觀書所載甚明。其言味寒無毒。性鹹。其論所治。則云能主伏屍鬼疰。傷寒伏熱。狂謬熱病發狂血熱。瘟瘡斑多紫黑癍癥。黃疸。損傷垂危。瘰癧潰爛。流串順風脚。氣備極毒熱形症。皆能調治。則其氣味之寒。不待言矣。究其所以致治。則因此物伏處窪處。鑽土飲泉。是其本性。故能除其鬼疰。解其伏熱。且咸鹹主下。處濕而以入濕爲功。故於濕熱之病。濕熱之物。遇之則化。停癥蓄水。觸着即消。而使盡從小便而出。蚯蚓本有鑽土之能。化血之力。而凡跌仆受傷。血瘀經絡。又安有任其停蓄而不爲之消化乎。但審認不確。妄爲投用。良非所宜。取老蚯蚓白頸者良。搗汁井水調下。入藥。或曬乾爲末。【清】張石頑張氏醫通論蚯蚓曰。蚯蚓體雖卑伏。性善穴。竄。專解濕熱。療黃疸。利小便。通經絡。故活絡丸以之爲君。溫病大熱狂妄。和人尿搗絞服之。熱毒從小便而出也。

國外學說　遠西名物考曰。蚯蚓油。用蚯蚓洗淨者半磅。阿利襪油三磅。入玻璃瓶中。置煖處淹二十一日。絞油貯之。又法。取蚯蚓若干。置磁器中三日。使吐淨泥土。用溫湯洗淨。布巾拭乾。置磁壺中。加阿利襪油至三指橫徑上。又加葡萄酒少許。固封。置煖處三日。乃置入磁鍋內。用文火煮去水氣。布巾包絞。再行濾過。靜置片時。去沉下之渣。入玻璃瓶封固貯之。用以外敷。能緩弛肢節拘強。神經擊急。療風痛。打撲傷。神經創。火傷。甚有效。

配合應用　㊀治傷寒熱結六七日。狂亂見鬼。欲走。以大蚯蚓半斤。去泥。用人溺煮汁飲。或生絞汁亦可。（肘後方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊁治陽毒結胸。按之極痛。或通而復結。喘促大躁狂亂。取生地龍四條。洗淨。研如泥。入生薑汁少許。蜜一匙。薄荷汁少許。新汲水調服。若熱熾者。加片腦少許。卽與揉心下片時。自然汗出而解。不效再服一次。神效。（傷寒蘊要方）

㊂治諸瘡煩熱大躁。用上方服之甚效。亦治瘴癘。（直指方）

㊃治小便不通。蚯蚓搗爛。浸水濾取濃汁半碗。服立通。（斗門方）

㊄治老人尿閉。白頸蚯蚓、茴香等分。杵汁飲之。卽愈。（朱氏集驗方）

㊅治小兒尿閉。乃熱結也。用大地龍數條。去泥。入蜜少許。研傅臍卵。仍燒靈蛻紙、朱砂、龍腦、麝香同研少許。以麥門冬、燈心煎湯調服。（全幼心鑑方）

㊆五福丸。治小兒急驚。用生蚯蚓一條。研爛。入五福化毒丹一丸。同研。以薄荷湯少許化下。

㊇乳香丸。治驚風悶亂。小兒慢驚風。心神悶亂煩懊。筋脉拘急。胃虛蟲動。反折啼叫。用乳香半錢。胡粉二錢。研勻。以白頸蚯蚓生挺去土。搗爛和丸。麻子大。每服七丸至十五丸。葱白煎湯下。（普濟方）

㊈治慢驚虛風。用平正附子。去皮臍。生研爲末。以白頸蚯蚓於末內滾之。候定。刮蚓上附末。丸黃米大。每服十丸。米飲下。（百一選方）

㊉治急慢驚風。五月五日。取蚯蚓竹刀截作兩段。急跳者作一處。慢跳者作一處。各研爛。入硃砂末和作丸。記明急驚用急跳者。慢驚用慢跳者。每服五七丸。薄荷湯下。（應驗方）

㊊治小兒卵腫。用地龍連土爲末。津調傅之。（錢氏方）

㊋治勞復卵種。或縮入腹中絞痛。身體重。頭不能舉。小腹急熱。拘急欲死。用蚯蚓二十四枚。水一斗。煮取三升。頓服取汗。或以蚯蚓數升。絞汁服之。並良。（肘後方）

㊌治手足腫痛欲斷。取蚓三升。以水五升。絞汁一升半。服之。（肘後方）

㊍治代指疼痛。用蚯蚓杵傅之。（聖惠方）

㊎治風熱頭痛。地龍炒研。薑汁、半夏餅、赤茯苓等分爲末。一字至半錢。生薑荊薷湯下。（普濟方）

㊏龍珠丸。治頭風疼痛。用五月五日。取蚯蚓。和腦麝杵丸。梧子大。每以一丸。納鼻中。隨左右先塗薑汁在鼻立愈。（聖濟總錄方）

㊐聖惠龍香散。治偏正頭痛不可忍者。用地龍去土焙、乳香等分。爲末。每以一字作紙撚。燈上燒烟。以鼻嗅之。（濟衆方）又方加入指甲等分云。（濟衆方）又一方每服一捻。香爐上慢火燒之。以紙筒引烟入鼻熏之。口噙冷水。有涎吐去。仍以好茶一盞點呷。卽愈。（徐分翁方）

㊑治風赤眼痛。地龍十條。炙爲末。茶服三錢。（聖惠方）

㊒治風蟲牙痛。鹽化地龍水。和麵納齒上。又以皂莢去皮。研末。塗上。蟲卽出。又同玄胡索、藁茇末塞耳。（普濟方）

㊓治牙齒齦腫。死曲蠖爲末。傅之。卽止。（千金方）

㊔治齒縫出血不止。用地龍末、枯礬各一錢。麝香少許。研勻擦之。（聖惠方）

㊕治牙齒動搖。及外物傷動欲落。謂藥不效者。乾地龍炒、五倍子炒等分。共爲末。先以生薑揩牙。後傅擦之。（御藥院方）

㊖治木舌腫滿。不治殺人。用蚯蚓一條。以鹽化水塗之。良久漸消。（聖惠方）

㊗治咽喉卒腫不下食。地龍十四條。搗塗喉外。又以一條着鹽化水。入蜜少許服之。（聖惠方）

㊘治喉痺塞口。用韭地紅小蚯蚓數條。醋搗取食之。卽吐出痰血二三碗。神效。（普濟方）又用地龍一條。研爛。以雞子白攪和。灌入卽通。（聖惠方）

㊙治鼻中瘜肉。地龍炒一分。牙皂一挺爲末。蜜調塗之。清水滴盡卽除。（聖惠方）

㊚治耳卒聾閉。蚯蚓入鹽。安葱內。化水點之。立效。（勝金方）

㊛治蹄耳出膿。生地龍、釜上蠶、生豬脂等分。研勻。葱汁和捻作挺子。綿裹塞之。或用地龍爲末吹之。（聖惠方）

㊜治耳中盯聹。乾結不出。用白蚯蚓入葱葉中。化爲水。滴耳令滿。不過數度。卽易挑出。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊂治蚰蜒入耳用地龍爲末。入葱內化水點入則蚰蜒亦化爲水。（聖惠方）

㊃治白禿頭瘡。乾地龍爲末。入輕粉麻油調搽。（普濟方）

㊄治瘰癧潰爛流串者。用荊芥根下段煎湯。溫洗良久。着瘡破紫黑處。以針刺去血。再洗三四次。用韭菜地上蚯蚓一把。五更時收取。炭火上燒紅爲末。每一匙入乳香、沒藥、輕粉各半錢。穿山甲九片炙爲末。油調傳之。如神。此武進朱守仁所傳有驗方。（保命集方）

㊅治龍纏瘡毒。水缸底蚯蚓一條。遶泥搗傳卽愈。

㊆治蛛蜘咬瘡。遍身皆有。以葱一枚去尖頭。將蚯蚓入葉中緊捏兩頭。勿令洩氣。頻搖動。卽化爲水。以點咬處。甚效。（譚氏小兒方）

㊇治陽證脫肛。以荊芥、生薑煎湯洗之。地龍蜷如錢樣者。去土一兩。朴硝二錢爲末。油調傳之。（全幼心鑑方）

㊈治中蟲下血如爛瓜者。以蚯蚓十四枚。苦酒三升。煮至蚓死。服水。已死者皆可活。（肘後方）

㊉治瘋風痛痒。白頭蚯蚓去土。以棗肉同搗丸。梧子大。每美酒下六十丸。忌薑蒜。（活人心統方）

㊊治對口毒瘡已潰出膿。取韭地蚯蚓。搗細。涼水調傅。日換三四次。（扶壽方）

㊋治耳聾氣閉。蚯蚓、川芎、蔥各兩半爲末。每服二錢。麥門冬湯下。服後低頭伏睡一夜一服。三夜立效。（聖濟總錄方）

㊌治口瘡糜瘡。地龍、吳茱萸研末。醋調。生麵和塗足心。立效。（摘玄方）

用量　一錢半至三錢。

施用宜忌　凡虛寒而無實熱者禁用。畏葱鹽。

參攷資料　㊀乾蚓煞作屑。去蚘蟲甚有效。（陶弘景）㊁腳風藥必須此藥爲使。然亦有毒。昔有人因腳病。藥中用此。果得奇效。病愈。服之不輟。至二十餘日。覺躁憒。但欲飲水不已。遂致委頓。大抵攻病用毒藥。中病卽當止也。（蘇頌）㊂蚯蚓爾雅謂之蠪蟺。巳人謂之朐腮。皆方音之轉也。盆蠪曲蠪。象其狀也。東方虬賦云。乍遥迤而蠪曲。或宛轉而蛇行。任性行止。聲物便曲是矣。術家言蚓可興雲。又知陰晴。故有土龍、地龍子之名。其鳴長吟。故曰歌女。（李時珍）㊃入藥用白頭。是其老者。取得去土。鹽之。日曝。須臾成水。道術多用其屎。呼爲蚓壤。亦曰六一泥。以其飲細泥。無沙石入合丹泥。釜用。（陶弘景）㊄今處處平濕膏壤地中有之。孟夏始出。仲冬蟄結。雨則先出。晴則夜鳴。或云結時能化爲百合也。與蠪釜同穴爲雌雄。故郭璞贊云。蚯蚓土精。無心之蟲。交不以分。睡於蠪釜是矣。今小兒陰腫。多以爲此物所吹。經驗方云。蚯蚓咬人。形如大風。眉鬚皆落。惟以石灰水浸之良。昔浙江將軍張韶病此。每夕蚯蚓鳴於體中。有僧教以鹽湯浸之數遍。遂差。（李時珍）

【蚯蚓泥】古籍別名　蚓壤。六一泥。（綱目）

性質　甘。酸。寒。無毒。

主治　赤白久熱痢。取一升炒煙盡。沃汁半升。濾淨飲之。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論蚯蚓泥曰。傳狂犬齧出犬毛。神效。【宋】日華諸家本草論蚯蚓泥曰。小兒陰囊忽虛熱腫痛。以生甘草汁入輕粉末調塗之。以鹽研傳瘡去熱毒及蛇犬傷。

【蚯蚓糞】卽蚯蚓泥之別名。詳『蚯蚓泥』條。

【蚱蟬】卽蟬之古籍別名。典見本經。詳『蟬』條。

【蚱蜢】卽蟲蟲之古籍別名。典見綱目。詳『蟲蟲』條。

【蚵蛄】卽蟾蜍之古籍別名。典見綱目。詳『蟾蜍』條。

【蚵蛄蟲】卽蠐螬之古籍別名。典見綱目。詳『蠐螬』條。

【蚵蛄草】卽天名精之古籍別名。典見綱目。詳『天名精』條。

【蚶】卽瓦楞子之古籍別名。典見劉珣嶺表錄。詳『瓦楞子』條。

【蚶子殼】卽瓦楞子之處方用名。詳『瓦楞子』條。

【蜊蝓】卽蛞蝓之古籍別名。典見別錄。詳『蛞蝓』條。

【蜊螺】卽蝸牛之古籍別名。典見爾雅。詳『蝸牛』條。

【蜊蠃】卽蝸牛之古籍別名。典見爾雅。詳『蝸牛』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【蚼螻】卽蟻之古籍別名。典見楊雄方言。詳『蟻』條。

【蚼蠐】卽蟾龜之古籍別名。典見綱目。詳『蟾龜』條。

【蜘蛛】㊀卽蜘蛛之古籍別名。典見綱目。詳『蟾蜍』條。㊁卽草蜘蛛之原名。詳『草蜘蛛』條。

【蚿】卽馬陸之古籍別名。典見莊子。詳『馬陸』條。

【蛀蟲】卽木蠹蟲之古籍別名。典見綱目。詳『木蠹蟲』條。

【蛄】卽金龜子之別名。詳『金龜子』條。

【蛸魚】卽衣魚之古籍別名。典見圖經本草。詳『衣魚』條。

【蛄蟖房】卽雀甕之古籍別名。典見蜀本草。詳『雀甕』條。

【蛆】卽五穀蟲之原名。詳『五穀蟲』條。

【蛆糠】卽馬陸之古籍別名。典見綱目。詳『馬陸』條。

【蛇口牛枝蓮】卽蛇草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蛇草』條。

【蛇皮】卽蛇蛻之古籍別名。典見藥性本草。詳『蛇蛻』條。

【蛇休草】卽川芎之古籍別名。典見和漢藥考。詳『川芎』條。

【蛇石】

基本　係毒蛇腦中所生之石。

產地　多在南粵桂西。以及南洋巽島。東印度等處。

形態　蛇石形類圓棋子。大如扁豆。有黑白二色。亦有以蛇肉和土舂成者。或謂卽大蛇之角。及蛇銜土之類。以置蛇頭上。蛇不敢走動者爲眞。取之可供藥用。

性質　有毒。

主治　治癰疽惡瘡。一切無名腫毒。及蜈蚣毒蟲等傷。

參攷資料　蛇石善於拔除各種毒氣。置患處。能緊黏不脫。毒盡則自落。惟用後必須以乳汁（人乳或牛羊乳均可）或溫水浸至乳汁略變綠色。或黃黑色。再以清水洗淨。抹乾收貯。否則石必粉裂。不堪再用。

【蛇舍】　**古籍別名**　蛇銜。（本經）紫背龍牙。（圖經）威蛇。（大明）小龍牙。（綱目）

外國名詞　Potentilla Kleiniana W. et A.（拉丁）ラ（ビイチゴ　オヘビイチゴ（日本）

基本　係薔薇科委陵菜屬。爲蛇舍之葉。

產地　山野原澤間。

形態　蛇舍爲澀草類之多年生草本。莖長而賁。輾。常伏臥於地上。葉爲掌狀複葉。呈淡綠色。葉柄長在莖之下部者有五小葉。上部者有三小葉。春夏間梢上分歧多數之花梗。著以黃色之小瓣花。雄蕊及雌蕊甚多。其根葉俱可供藥用。



蛇舍

性質　苦。微寒。無毒。

主治　鬻瘤。寒熱。邪氣。除熱。療金瘡。疽。鼠瘺。瘡。頭瘡。（本經）治心腹邪氣。腹痛。澼痺。養胎。利小兒。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權。藥性本草論。蛇舍曰。治小兒寒熱丹癜。【宋】大明諸家本草論。蛇舍曰。止血。協風毒。癰腫。赤眼。汁傳蛇虺蜂毒。【宋】蘇頌。嘉祐圖經本草論蛇舍曰。紫背龍牙。解一切蛇毒。治咽喉中痛。含嚥之。便效。

參攷資料　㊀蛇舍治蛇咬。今以草納蛇口中。縱傷人亦不能有毒也。種之亦令無蛇。（陳藏器）㊁按葛洪抱朴子云。蛇銜膏。連巳斷之指。今考葛洪肘後方。載蛇銜膏云。治癰腫瘀血。產後積血。耳目諸病。牛領馬鞭瘡。用蛇銜。大黃。附子。芍藥。大戟。細辛。獨活。黃芩。當歸。莽草。蜀椒各一兩。蓮白十四枚。上爲末。以苦酒淹一宿。以猪膏二斤。七星火上煎沸。成膏收之。每溫酒服一彈丸。日再服。病在外壁之傳之。在耳綿裹塞之。在目點之。若入龍銜藤一兩。則名龍銜膏也。所謂連斷指者。不知卽此膏否。（李時珍）㊂按劉敬叔異苑云。有田父見一蛇被傷。一蛇銜一草着瘡上。經日傷蛇乃去。田父因取草治蛇瘡皆驗。遂名曰蛇銜草也。其葉似龍牙而小。背紫色。故俗名小龍牙。又名紫背龍牙。（李時珍）㊃蛇銜處處有之。有兩種。並生石上。亦生黃土地。當用細葉有黃花者。（陶弘景）㊄出興州。今近處亦有。生土石上。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

或下溼地。蜀中人家亦種之。辟蛇一莖五葉或七葉。有兩種。八月採根陰乾。日華子云。莖葉俱用。五月採之。又曰。紫背龍牙生蜀中。春夏生葉。採無時。（蘇頌）㈥蛇銜。只用葉。曬乾。勿犯火。根莖不用。勿誤用。有鱗尖葉者。號竟命草。其味酸澀。誤服令人吐血不止。速服知時子解。（雷敩）㈦蛇舍根。治產後瀉痢。（綱目）

【蛇含石】卽蛇之於冬蟄時。口中所含之土。至春始吐出。其堅如石。故以爲名。其性實效能。與蛇黃略同。而力遜之。或誤以蛇含石爲蛇黃。不知蛇黃乃蛇膽中多年之結精。此不過蛇口中一季所含之土。故其精氣之厚薄。大有分別。不可同作一物也。

【蛇米】卽蛇牀子之古籍別名。典見本經。詳『蛇牀子』條。

【蛇衣】卽蛇蛻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛇蛻』條。

【蛇角】㈠基本　本品乃大蛇之角。

古籍別名　骨喘犀。骨篤碧犀。（綱目）

產地　出西域諸地。

形態　蛇角色淡如碧玉。稍有黃色。其文理如角。又似象牙。叩之聲清越。亦如玉磨刮。嗅之有香。燒之不臭。可供藥用。

性質　有毒。

主治　腫毒。解諸毒蟲毒。以毒攻毒也。

【蛇抱勒】產地　粵南大瀝等處多有產之。

性質　滴酸。

效能　除滋殺蟲。

主治　洗疥瘡。治瘰癧。及吐血牙痛。

【蛇牀子】㈠命名　蛇虺喜臥於下食其子。故有蛇牀、虺牀、蛇粟諸名。其葉似蘼蕪。故曰牆蘼。

古籍別名　蛇粟。蛇米。（本經）虺牀旺。（爾雅）馬牀。（廣雅）牆蘼。（別錄）老鬼子。（雷公炮炙論）雚毒。棗棘。思益。（本經）蛇常赤木草。赤目草。連陽八座。（和漢藥考）

㈡基本　邇來醫家多以屬緻形科濱芹之子實當之。藥舖所售者。別一種植物之子也。（和名鈔云。前人誤以爲屬眼子菜科之眼子菜而卽以其子充之。）

產地　陳仁山藥物生產辨云。蛇牀子廣東廣西各屬均有出。以江蘇鎮江爲多。各省所產味同。

形態　東三省所產之蛇牀子。高約四十至七十仙米。莖中空。有縱溝數條。並有稍稍膨出之關節。嫩莖之下部帶紫色。其近根處粗○・三至○・七仙米。間有至一仙米者。根與莖粗細略同。色白。長約六至十仙米。花爲繖形。作複繖形花序排列。有大花梗。大花梗上斜生無數之小花梗。向上放射。小花梗上之小葉有毛。繖形花長短略同。花極少。白色五瓣。各瓣爲倒卵圓形。末端尖銳。向內卷曲。其正中有凹溝。以顯微鏡檢之。卽見有繁密之斑點。雄蕊凡五。其粉囊如袋。雌蕊凡二。其尖端交互向外分裂。果二。附於簪柱。卽供藥用之蛇牀子也。各果長約三至三・五密米。外面黃褐色。帶茸毛。其新收採者。頂端尙附有雌蕊之餘基。又有廣皮膜狀（但非翅狀）之肋線五條。果殼現黑褐色。每殼皆有油腺。其兩分果之接合面。亦有兩油腺。六七月開花。秋間結實。花時點綴原野。甚美觀也。

種植　野生者多。間有生長於園圃者。

採取　五月採實。陰乾。

製法　雷敩曰。凡使須用濃藍汁。并百部草根自然汁同浸一伏時。漉出日乾。却用生地黃汁相拌蒸之。從巳至亥。取出日乾用。大明曰。凡服食。卽挼去皮殼。取仁微炒。殺毒。卽不辣也。作湯洗浴。則生用之。

用法　內服須炒研水煎。外治則生用湯洗。

性質　苦。平。無毒。

成分　蛇牀子揮發油中。有左旋性皮嫩、左旋性加諾芬、及異性纈草酸薄爾尼愛斯推兒。

效能　溫子臟。逐寒溼。療陰瘡腫癢。爲陰痿藥。及婦人陰腫藥。

主治　男子陰痿溼癢。婦人陰中腫痛。除痺氣。利關節。癲癇。惡瘡。久服輕身。好顏色。（本經）又能溫中下氣。令婦人子臟熱。男子陰強。久服令人有子。（別錄）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蛇牀子曰。治男子女人虛證痺風瘡痛去男子腰痛。浴男子陰去風冷大益陽事。【宋】大明日華諸家本草論蛇牀子曰。暖丈夫陽氣。女人陰氣。治腰胯酸疼。四肢頑痺。縮小便去陰汗。澀齒痛。赤白帶下。小兒驚癎。撲損瘀血。煎湯浴大風身瘡。【明】繆希雍本草經疏論蛇牀子曰。蛇牀子味苦平。別錄辛甘無毒。今詳其氣味。當必兼溫燥陽也。故主婦人陰中腫痛。男子陰瘡濕瘡。除痺氣利關節。惡瘡別錄溫中下氣。令婦人子臟熱。男子陰強。久服輕身。令人有子。蓋以苦能除濕。溫能散寒。辛能潤腎。甘能益脾。故能除婦人男子一切虛寒濕所生病。寒濕既除。則病去身輕。性能益陽。故能已疾。而又有補益也。【明】李時珍本草綱目論蛇牀子曰。蛇牀乃右腎命門少陽三焦氣分之藥。神農列之上品。不獨補助男子。而又有益婦人。世人捨此而求補藥於遠域。豈非賤目貴耳乎。【清】陳修園本草經讀論蛇牀子曰。蛇牀子氣味苦辛。其性溫熱。得少陰君火之氣。主治男子陰瘡濕瘙。婦人陰中腫痛。裏火氣而下濟其陰寒也。除痺氣。利關節。裏火氣而外通其經脈也。心氣虛而寒邪盛。則癲癎。心氣虛而熱邪盛。則生惡瘡。蛇牀味苦性溫。能助心氣。故治癲癎惡瘡。久服則火土相生。故輕身。心氣充盛。故好顏色。【清】徐洄溪本草經百種錄論蛇牀子曰。蛇牀生於陰濕卑下之地。而芬芳燥烈。不受陰濕之氣。故入於人身。亦能於下焦陰濕所歸之處。逐其邪而補其正也。【清】黃宮繡本草求真論蛇牀子曰。蛇牀子辛苦性溫。功能入腎補命。祛風燥濕。故凡命門火衰。而致風濕內淫。病見陰瘡濕瘙。及女子陰戶蟲蝕。子臟虛寒。產門不閉。暨腰酸體痺。帶下脫肛。與夫一切風濕瘡疥等症。服之則陽壅舉。關節利。腰背強。手足遂瘡疥搔。至於大瘋身癢難當。作湯洗浴。產後陰脫不收。用此絹袋熨收。【清】鄒澍本草疏證論蛇牀子曰。六氣惟濕最壅滯。惟風最迅疾。蛇牀子生陰濕地。而得芬芳燥烈之性味。是爲於濕中鍾風化。能於濕中行風化。則向所謂濕者。已隨風氣鼓盪。而化津化液矣。男子之陰瘡濕瘙。婦人之陰中腫痛。何能不已耶。至於肌肉中濕化。而痺氣除。骨骾中濕化。而關節利。膚腠中濕化。而惡瘡已。皆一以貫之。無事更求他義也。惟治癲癎一節。則似正病乎。風。而更助以風藥者。殊不知風因痰生。人因風病。若變因痰而生之風。如濕中所鍾風化。能鼓盪濕氣。化津化液。則此痰此風。早將變爲氤氳流行之生氣。尙何癲癎之足虞。以是知化病氣爲生氣。原非臆說也。【清】吳儀洛本草從新論蛇牀子曰。辛苦而溫。强陽補腎。散寒祛風。燥濕殺蟲。治陰瘡濕瘙。女子陰瘡陰癢。子臟虛寒。產門不閉。腎門之病。腰痠體痺。帶下脫肛。及頑癬惡瘡。風濕諸病。煎湯浴止風瘡。

近人學說 張山雷曰。蛇牀子溫燥剛烈之品。本經雖稱其苦辛。然主治婦人陰中腫痛。男子陰瘡濕瘙。則皆主寒濕言之。必也腎陽不振。寒水瀰漫。始可以爲內服之品。甄權已謂其有毒。瀕湖且謂蛇鳧喜臥其下。食其子。薆虛卑。濕汙下之地。本係濕熱之氣所鍾。其含毒質可知。觀雷敩製法。以濃藍汁同浸。再以生地黃汁拌蒸。無非監制其燥烈之性。其反能治濕熱病者。同氣相求。以從其類也。故近今醫籍。絕少用爲內服之藥。兎市肆中以爲賤品。皆不炮製而可妄用。以入煎劑乎。本經又謂除痺氣。利關節。癲癎。則燥烈之性。本能通行經絡。疏通關節。然非寒濕及未經法製者。愼弗輕投。本經又主惡瘡。則外治之藥也。別錄又謂辛甘能溫中下氣。令婦人子臟熱。男子陰强。令人有子。則其專溫腎陽。更屬彰明較著。甄權謂治虛寒濕痺毒風癱痛。起腰痛。去風冷。益陽事。日華謂治腰胯痠痛。四肢頑痺。縮小便。去陰汗濕。赤白帶下。景岳謂逐寒疝。起陽痿。主陽衰無子。皆是强陽主治。石頑謂辛香性溫。助男子壯火。腎火易動。陽强不固者弗服。甚是正論。李瀕湖竟泛泛然謂其補助男子。有益婦人。則以本經列於上品。而過於推崇。遂有左道旁門專於興陽而戕人生命者。皆

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

此類補陽助慾。不顧其本之說有以誤之。是不可以不愼也。惟治外瘍濕熱痛癢。浸淫諸瘡。可作湯洗。可爲末敷。收效甚捷。不得以賤品而忽之。

【配合應用】㊀治男子陰瘡濕癢。用蛇牀子、巴戟天、遠志、牛膝、何首烏、陽起石。㊁治婦人陰中腫痛。用蛇床子、巴戟天、牛膝、杜仲、續斷、地黃、黃檗、白膠。㊂治一切帶下。用蛇床子、黃檗、山萸肉、五味子、茯苓、車前子、香附、川續斷、補骨脂、赤者加白膠、阿膠。㊃治陽事不起。蛇牀子、五味子、菟絲子等分爲末。蜜丸梧子大。每服三十丸。溫酒下。日三服。（千金方）㊄治赤白帶下。月水不來。用蛇牀子、枯白礬等分爲末。醋麵糊丸。彈子大。胭脂爲衣。綿裹納入陰戶。如熱極再換。日一次。（儒門事親方）㊅蛇牀子散。治子宮寒冷。溫中坐藥。取蛇牀子仁爲末。入白粉少許。和勻。如棗大。綿裹納之。自然溫也。（金匱玉函方）㊆治婦人陰癢。蛇牀子一兩。白礬二錢。煎湯類洗。（集簡方）㊇治產後陰脫。絹盛蛇牀子。蒸熱熨之。又法。蛇牀子五兩。烏梅十四箇。煎水。日洗五六次。亦治婦人陰痛。（千金方）㊈治男子陰腫脹痛。蛇牀子末。雞子黃調傅之。（永類鈐方）㊉治大腸脫肛。蛇牀子、甘草各一兩爲末。每服一錢。白湯下。日三服。并以蛇牀末傅之。（經驗方）㊊治痔瘡腫痛不可忍。蛇牀子煎湯熏洗。（簡便方）㊋治小兒癬瘡。蛇牀子杵末。和豬脂塗之。（千金方）㊌治小兒甜瘡。頭面耳邊。連引流水。極癢。久久不愈者。用蛇牀子一兩。輕粉三錢。爲細末。油調搽之。（普濟方）㊍治耳內溼瘡。蛇牀子、黃連各一錢。輕粉一字。爲末。吹之。（金幼心鑑方）㊎治風蟲牙痛。蛇牀子、燭燼同研塗之。（千金方）又用蛇牀子煎湯。乘熱漱數次。立止。（集簡方）㊏治冬月喉痺。腫痛不可下藥者。蛇牀子燒煙於瓶中。口含瓶嘴。吸煙。其痰自出。（聖惠方）

【用量】一錢至三錢。

【施用宜忌】腎中有火。及下部有熱者禁用。惡牡丹、貝母、巴豆、伏硫黃。

【參攷資料】㊀蛇牀子。生於海濱。一根簇生數莖。莖初貼地。後漸昂起。高尺許。有線條。葉似鱔庶部。重複。至末則單。色淡綠。面滑澤。開重繖五瓣之小白花。尖向內卷。子室橢圓。有縱溝。頭有白色二柱雄蕊五。作淡紫色。大小繖俱有尖細之萼。果實略圓。縱脊大。無毛。長約分許。（增訂草木圖說）㊁葉似小葉芎藭。花白。子如黍粒。黃白花。生下濕地。所在皆有。以揚州囊州者爲良。（韓保昇）㊂三月生苗。高三二尺。葉青碎。作叢似薤。枝每枝上有花。頭百餘。結同一窠。似馬芹類。四五月乃開白色。又似繖狀。子黃褐色。如黍米。至輕虛。（蘇頌）㊃其花如碎米攢簇。其子兩片成合。似蓴蘿子而細。亦有細稜。凡花實似蛇牀者。嘗歸芎藭、水芹、藁本、胡蘿蔔是也。（李時珍）

【蛇莓】

【古籍別名】蛇蔴。地莓。（會編）蓩莓。（綱目）蛇殘莓。（日用）疔瘡藥。（南安）蛇蛋果。（淮南）地錦。（江漢）

【外國名稱】Duchesnea indica, Focke（拉丁）ヘビイチゴ（日本）

【基本】係薔薇科。爲蛇莓屬蛇莓之汁。蛇莓屬爲薔薇科之一屬。其特徵與雉子薖屬相類。似花有萼檞之苞。雌蕊甚多。子房內含一胚珠。果實爲閉果。而其差異如下。雉子薖屬。果實無肉質之花托。苞比萼小。而蛇莓屬則果實有肉質之花托。苞比萼大。

【產地】多在山野或陰暗卑濕地方。

【形態】蛇莓爲多年生草本。莖匍匐臥地。長二三尺。莖有微毛而不滑。葉以三小葉合成。而互生。有長柄。葉邊緣各生粗鋸齒。夏初於葉腋間各生一花。有長花梗。萼外有苞。花有五瓣。黃色。雄蕊約二十枚。雌蕊甚多。其果實細小。熟時花

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

托膨大。呈赤色。外形略與和蘭莓之果實相類。



蛇莓

採取　四五月採子及莖葉與根。

製法　採得陰乾或日乾。

用法　恒以生搗取汁。亦有水煎及剉末用。

性質　甘。酸。大寒。有毒。

效能　瀉熱解毒。

主治　胸腹大熱不止。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論蛇莓曰。治傷寒大熱及溪毒射工毒甚良。【唐】孟詵食療本草論蛇莓曰。主孩子口噤。以汁灌之。【宋】大明諸家本草論蛇莓曰。通月經。癰瘡腫。傅蛇傷。【明】李時珍本草綱目論蛇莓曰。傅湯火傷痛即止。

配合應用　㊀治口中生瘡。天行熱甚者。蛇莓自然汁半升。稍稍嚥之。（傷寒類要方）

㊁治傷寒下痢生瘡。以蛇莓汁服二合。日三服。仍水煮烏梅令濃入崖蜜飲之。（肘後方）

㊂治水中毒病。蛇莓根搗末服之。并導下部。亦可飲汁一二升。夏月欲入水。先以少末投中流。更無所畏。又辟射工。家中以器貯水浴身。亦宜投少許。（肘後方）

用量　三錢至五錢。

施用宜忌　凡無熱毒者禁用。

參攷資料　㊀蘷老時熟紅於地。其中空者爲蘷。莓中實極紅者爲蛇殘莓。人不啜之。恐有蛇殘也。（吳瑞）㊁所在有之。生下溼地。莖頭三葉。花黃子赤。似覆盆子。根似敗醬。四月五月採子。二月八月採根。（韓保昇）㊂蛇莓莖長不盈尺。莖端惟結實二顆。小而光潔。誤食腹人。非若覆盆苗長大而結實數顆。微有黑毛也。（汪機）㊃此物就地引細蔓。節節生根。每枝三葉。葉有齒刻。四五月開小黃花五出。結實鮮紅。狀似覆盆。而面與蒂則不同也。其根甚細。本草用汁。當是取其莖葉并根也。仇遠稗史訛作蛇蓼。草言有五葉七葉者。又言俗傳食之能殺人。亦不然。止發冷涎耳。（李時珍）

【蛇草】古籍別名　蛇口牛枝蓮。落得咬。（綱目拾遺）

產地　生陰溼譜地及古井間。與蘆叢水澤旁。

形態　蛇草爲雜草類之一種。形似淡竹葉。葉背有紅圈如蛇眼。可供藥用。

主治　一切蛇傷。疔腫痔瘡。連根搗罨。並煎泡酒服。

【蛇草】即蛇眼草之原名。詳『蛇眼草』條。

【蛇莓】即赤地利之古籍別名。見綱目拾遺。詳『赤地利』條。

【蛇退】即蛇蛻之處方用名。詳『蛇蛻』條。

【蛇退皮】即蛇蛻之古籍別名。見和漢藥考。詳『蛇蛻』條。

【蛇常】即蛇牀子之古籍別名。見和漢藥考。詳『蛇牀子』條。

【蛇婆】古籍別名　海蛇。（動物學大辭典）

外國名詞　Platurus (Hydrophis) fasciatus Diud 或 P. schisto hynchus Sea Snake（拉丁）カイジヤ或エラブウナギ或ウミヘビ（日本）

基本　係脊椎動物爬蟲類蛇類溝牙類蛇婆科。爲蛇婆蛇之肉。

產地　出南海及南洋諸島中。

形態　蛇婆爲蛇屬之一種。與魚類中之海蛇不同。其體長。下半部及尾皆側扁。左右擊水而游泳。頭及眼皆小。鼻孔在頭端。被一種膜瓣。口有毒牙。牙上有溝。鱗呈六角形相並列。背青綠。腹黃有白色與黑色環紋。肺甚大。足以減輕體重。以便浮游。長有三四尺。大者六七尺。其肉可供藥用。



蛇婆

性質　鹹。平。無毒。

主治　赤白毒痢。蟲毒下血。五野雞病。惡瘡疥。食或燒末。米飲服二錢。

【蛇眼草】原名　蛇草。

產地　生古井及年

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

久陰溼諸地。及蘆叢水澤旁。

形態　蛇草爲雜草類之一種。形如淡竹葉。背後皆是紅圈。如蛇眼狀。可供藥用。

主治　疔腫痔瘡及一切蛇咬傷。

【蛇符】卽蛇蛻之古籍別名。典見別錄。詳『蛇蛻』條。

【蛇脫】卽蛇蛻之處方用名。詳『蛇蛻』條。

【蛇脫皮】卽蛇蛻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛇蛻』條。

【蛇蛋果】卽蛇莓之古籍別名。典見淮南子。詳『蛇莓』條。

【蛇莆藤】**產地**　出福建舊福寧府境。

形態　蛇莆藤爲蔓草類藤屬之一種。莖細葉如猴耳。可供藥用。

主治　喉齒百病。

【蛇魚】卽鱴鱵之古籍別名。典見綱目。詳『鱴鱵』條。

【蛇魚草】**基本**　蛇魚草爲雜草類之一種。可供藥用。

主治　金瘡血出不止。搗傅之。

【蛇殼】卽蛇蛻之處方用名。詳『蛇蛻』條。

【蛇筋】卽蛇蛻之古籍別名。典見吳普本草。詳『蛇蛻』條。

【蛇粟】卽蛇牀子之古籍別名。典見本經。詳『蛇牀子』條。

【蛇殘莓】卽蛇莓之古籍別名。典見日用本草。詳『蛇莓』條。

【蛇黃】**命名**　本品生蛇腹中。正如牛黃之意。故名。

產地　出嶺南諸地之蛇腹中。

形態　蛇黃圓重如錫。有黃黑青雜色。或謂大者如鷄子。小者如彈丸。其色紫。可供藥用。

採取　九月間。掘土下七八尺。尋採之。

製法　大明曰。入藥燒赤。醋淬三四次。研末水飛用。

性質　冷。無毒。

主治　心痛疰忤。石淋。小兒驚癇。婦人產難。以水麥研服汁。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論蛇黃曰。鎭心。【明】李時珍本草綱目論蛇黃曰。磨汁塗腫毒。

【蛇蛻】**命名**　蛇字古文象其宛轉盤曲之形。蛻字音脫音退。有退脫之義。故名。

處方用名　蛇脫。蛇退。龍衣。蛇殼。

古籍別名　龍子衣。弓皮。（本經）龍子皮。蛇符。（別錄）蛇筋。（吳普）蛇皮。（甄權）龍退。（綱目）蛇退皮。局皮。蛇衣。石龍衣。蛇脫皮。（和漢藥考）

外國名詞　snake-slins.（英）

基本　屬爬蟲類之蛇族。爲其鱗上退脫之皮膜。

產地　陳仁山藥物生產辨云。龍衣各省均有出。但以江蘇省蘇州府最多。又云。南蛇皮產安南。南洋羣島。暹羅亦有出。但不如安南者佳。二三月出新。

形態　蛇蛻爲如管之皮膜。面有鱗形色銀灰。有光澤。首尾全長數尺。稍帶革質狀。其味鹹。入藥以不暴於雨露者爲良。

採取　五月五日或十五日取之良。尤以石上完全者佳。

製法　雷敎曰。凡使勿用青黃蒼色者。只用白色如銀者。先於地下摑坑。深一尺二寸。安蛻於中。一宿取出。醋浸炙乾用。李時珍曰。今人用蛇蛻。先以皂莢水洗淨。纏竹上。或酒或醋或蜜浸炙黃用。或燒存性。或鹽泥固煅。各隨方法而不同。

用法　恒以剉末和入丸散用。

性質　鹹。甘。平。無毒。

效能　驅風。解毒。辟惡。殺蟲。用作諸瘡解毒藥。

主治　小兒百二十種驚癎。蛇癎癲疾。瘓瘂。弄舌搖頭。寒熱。腸痔。蠱毒。（本經）大人五邪言語僻越。止噫。逆明目。燒之療諸惡瘡。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論蛇蛻曰。療喉痺百鬼魅。【唐】孟詵食療本草論蛇蛻曰。安胎。【唐】陳藏器本草拾遺論蛇蛻曰。止癘。【宋】日華諸家本草論蛇蛻曰。炙用辟惡。止小兒驚悸。客熱煎汁傅癮瘕。白癜風。催生。【明】李時珍本草綱目論蛇蛻曰。辟惡去風。殺蟲。燒末服。治婦人吹奶。大人喉風。退目翳。消木舌。傅小兒重舌重齶。唇緊解顫。面瘡月蝕。天泡瘡。大人疔腫漏瘡。腫毒。麥湯洗諸惡蟲傷。【明】繆希雍本草經疏論蛇

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蛻曰。蛇蛻。蛇之餘性猶存。不以氣味爲用者。故蛇之性上竄而主風。蛻之用入肝而辟惡。其性一也。小兒驚癇瘈瘲。癲疾寒熱。蛇癇弄舌搖頭。大人五邪言語僻越。皆肝經爲病。邪惡侵犯也。蛇蛻走竄。能引諸藥入肝散邪。故主如上等證。善能殺蟲。故主腸痔蟲毒惡瘡。去木平。故止嘔咳。明目。今人亦用以催生去翳膜者。取其善脫之義也。【洁】黃宮繡本草求眞論。蛇蛻曰。蛇退味甘而鹹。氣平無毒。凡治小兒驚癇風毒等症。無不用此爲主。蓋此具有四能。一則性善辟惡。而凡邪魅蟲毒者不敢近。以其飲風吸露。氣極清虛故也。二則性能驅風。而凡驚癇癲仆。偏正頭風。喉舌諸疾者皆能除。以其性極走竄。力能驅風故也。三則性能殺蟲。而凡惡瘡痔漏疥癬。無不用之即效。以其此屬毒物。以毒攻毒故也。四則能驅皮膚之疾。而凡眼目翳膜胎衣不下。得此即爲解脫。以其氣以類聚。即從其類以除也。

記合應用　㊀治小兒喉痺腫痛。蛇蛻燒末。以乳汁服一錢。（心鏡方）

㊁治纏喉風疾氣閉者。用蛇蛻炙、當歸等分爲末。溫酒一錢取吐。一方用蛇皮揉碎燒烟。竹筒吸入即破一方。蛇皮裹白梅一枚。噙嚥。（杜氏方）

㊂治大小口瘡。蛇蛻皮水浸轆。拭口內。一二遍即愈。仍以藥貼足心。（聖濟寶鑑方）

㊃治小兒木舌。蛇蛻皮燒灰。乳和服少許。亦治小兒重舌。（千金方）

㊄治小兒重齦。並用蛇蛻灰。醋調傅之。（聖惠方）

㊅治小兒口緊。不能開口。飲食不語即死。用蛇蛻燒灰。拭淨傅之。（千金方）

㊆治小兒解顱。蛇蛻熬末。以豬頰車髓和塗之。日三四易。（千金方）

㊇治小兒頭瘡。小兒面瘡。小兒月蝕。並用蛇蛻燒灰。臘豬脂和傅之。（肘後方）

㊈治小兒吐血。蛇蛻灰。乳汁調服半錢。（子母祕錄方）

㊉治痘後目翳。小兒痘後障翳。用蛇蛻一條。洗焙。天花粉五分爲末。以羊肝破開。夾藥縛定。米泔水煮食。子女及甥皆用此得效。眞奇方也。（周密齊東野語方）

㊊治卒生瞽朕。用蛇蛻皮一條。洗晒。細剪。以白麵和作餅。炙焦黑色爲末。食後溫水服一錢。日二次。（聖惠方）

㊋治小便不通。全蛇蛻一條。燒存性。研。溫酒服。

㊌治胎痛欲產。日月未足者。以全蛻一條。絹袋盛。逶腰繫之。（千金方）

㊍治橫生逆生。胞衣不下。蛇蛻炒焦爲末。向東酒服一刀圭。即順。（千金方）又用鹽泥固煅。研二錢。榆白湯服。（十全轉救方）治逆生。須臾不救。用蛇蛻一具。蟬蛻十四個。頭髮一握。並燒存性。分二服。酒下。仍以小針刺兒足心三七下。擦蠶少許。即生。（濟生祕覽）

㊎治婦人產難。蛇蛻泡水。浴產門自易。（寶鑑方）

㊏治婦人吹乳。蛇皮一尺七寸。燒末。溫酒一盞服。（產乳方）

㊐治腫毒無頭。蛇蛻灰。豬脂和塗。（肘後方）

㊑治石癰無膿。堅硬如石。用蛇蛻灰貼之。經宿便愈。（聖濟總錄方）

㊒治諸瘰有膿。蛇蛻灰。水和傅上。即蟲出。（千金方）

㊓治疔腫。魚腑。蛇蛻。雞子大。水四升。煮三四沸。服汁立蘇。（外臺祕要方）又治魚腑瘡出水。四畔浮漿。用蛇蛻燒存性。研。雞子清和傅。（直指方）

㊔治惡瘡似癩。十年不瘥者。全蛻一條。燒灰。豬脂和傅。仍燒一條溫酒服。（千金方）

㊕治癜風白駁。蛇皮灰。醋調塗。（聖惠方）又用蛻磨數百遍。令熱。棄草中。勿回顧。（外臺祕要方）

㊖治陷甲入肉痛苦。用蛇皮一具。燒灰。雄黃一彈丸。同研末。先以溫漿洗瘡。針破貼之。（初虞世方）

㊗治耳忽大痛。如有蟲在內奔走。或血水流出。或乾痛不可忍者。蛇蛻皮燒存性。研。鵝翎吹之立愈。經驗祕方也。（楊拱醫方摘要）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無風毒者及孕

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蝮蘇用。畏磁石及酒。

參攷資料　㊀蛇蛻從口退出。眼睛亦退。今眼藥及去翳膜用之。取此義也。(寇宗奭)㊁入藥有四義。一能辟惡。取其變化性靈也。故治邪僻鬼魅蟲癘諸疾。二能去風。取其屬巽性竄也。故治驚癇癰駭喉舌諸疾。三能殺蟲。故治惡瘡痔漏疥癬諸疾。用其毒也。四有蛻義。故治翳膜胎產皮膚諸疾。會意從類也。(李時珍)㊂蛇蛻止癘。正發日取塞兩耳。又以手持少許。幷服鹽醋汁令吐。(陳藏器)

【蛇滅門草】卽望江南之古籍別名。典見和漢藥考。詳『望江南』條。

【蛇銜】卽蛇含之古籍別名。典見本經。詳『蛇含』條。

【蛇菌】卽赤地利之古籍別名。典見本草拾遺。詳『赤地利』條。

【蛇頭抓草】卽蛇草之別名。詳『蛇草』條。

【蛇頭草根】卽天南星之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天南星』條。

【蛇遊草】卽川芎之古籍別名。典見和漢藥考。詳『川芎』條。

【蛇藍】卽曲節草之古籍別名。典見綱目。詳『曲節草』條。

【蛇藍】卽六月霜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『六月霜』條。

【蛇爾草】基本　屬澤草類。爲條。

主治　蛇虺毒蟲等螫。取根葉搗傅咬處。當下黃水。

參攷資料　㊀生平地。葉似苦枝而小。節赤。可高一二尺。種之辟蛇。又一種草。莖圓似芋。亦傅蛇毒。(陳藏器)㊁按百一方云。關東有草。狀如芋。莖方節赤。按傅蛇毒如摘却。然名蛇爾草。又有鼠爾草。卽後莽。(唐愼微)

【蛇蘇】卽蛇莓之古籍別名。典見本草會編。詳『蛇莓』條。

【蛱母】卽蠐螬之古籍別名。典見綱目。詳『蠐螬』條。

【蛱蜴】卽蠐螬之古籍別名。典見爾雅。詳『蠐螬』條。

【蛱蠐】卽蠐螬之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蠐螬』條。

【蛤蚧】卽蛤蟆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛤蟆』條。

【蛤蚓】卽蚯蚓之別名。詳『蚯蚓』條。

【蛤蜊】卽蛤蟆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛤蟆』條。

【蛜】卽壁蟲之別名。典見動物學大辭典。詳『壁蟲』條。

【蛣母】卽知母之原名。詳『知母』條。

【蛩蠐】卽蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳『蚯蚓』條。

【蛸蛇膽】卽蛸蛇之處方用名。詳『蛸蛇』條。

【蛋結】卽大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【蛋清】卽蛋白之別名。詳『雞子白』條。

【蛋精】卽雞子白之別名。典見新中藥。詳『雞子白』條。

【訥會】卽蘆薈之古籍別名。典見本草拾遺。詳『蘆薈』條。

【豉蟲】命名　本品形狀顏色。略似大豆。故名。

古籍別名　豉母蟲(綱目)

外國名詞　Cyrinus Curtus, Motsch.(拉丁)　ミヅスマシ(日本)

基本　係節肢動物昆蟲類鞘翅類豉蟲科之豉蟲。

產地　生水澤間。

形態　豉蟲爲翅生蟲類之一種。其體形楕圓。色黑或黃。有光澤。頭頂及前胸背皆光滑。上脣多直皺。複眼分離。計四枚。其中間出觸角。觸角短形。不正分九節。色黑褐。兩鬚及足。皆赤褐。翅鞘有刻點。所成之直列。尾端突出。翅端外前肢長。中後兩肢皆扁而短。附節有五。常集水中。善游泳。食小蟲。夜則飛於空中。捕得可供藥用。

性質　有毒。

主治　殺禽獸。蝕息肉。癰惡瘡。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論豉蟲曰。白楊裘含之。除射工毒。

【豉母蟲】卽豉蟲之古籍別名。典見綱目。詳『豉蟲』條。

【豚肉】卽豬肉之古籍別名。典見本經。詳『豬肉』條。

【豚脂】卽豬脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豬脂』條。

【豚榆係】卽地榆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地榆』條。

【豚顛】卽豬卵之古籍別名。典見本經。詳『豬卵』條。

【貧賴草】卽烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烟草』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【貨母】卽知母之古籍別名。典見本經。詳『知母』條。

【貫中】卽貫衆之古籍別名。典見吳普本草。詳『貫衆』條。

【貫仲】卽貫衆之處方用名。詳『貫衆』條。

【貫首】卽貫衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貫衆』條。

【貫筋】卽貫衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貫衆』條。

【貫衆】

原名 鳳尾草。

命名 本品塊莖如鳳尾。其根一本而衆枝貫之。故名。

處方用名 貫仲。貫衆根。管仲。

古籍別名 貫節。貫渠。百頭。虎卷。扁苻。(本經)泊萍。藻草。鳥頭。(別錄)黑狗脊。(綱目)鳳尾草。(圖經)貫中。(吳氏本草)牛高韭。(濕石頭。貫首。貫筋。(和漢藥考)

學名 Aspidium Falcatum. Br. Ch.

基本 屬水龍骨科貫衆之根。

產地 凡山野溪谷間之陰濕處。恒有生焉。陳仁山藥物生產辨云。貫衆產廣東各屬均有出。

形態 貫衆爲自生山中溪畔或深林陰處之羊齒類植物。葉叢生於一根。作羽狀。稍彎曲。長一二尺。小葉作楔狀。冬日不凋。根稍類烏頭。呈黑褐色。

採取 二月八月間採之。

製法 採得洗去土氣。陰乾用。

性質 苦。微寒。有毒。

效能 清濕熱。止崩帶。解毒。殺蟲。用作婦科藥。又作殺蟲藥。

作用 在胃中能激胃液之分泌。至腸中與絲蟲遇。卽驅殺而混入糞中排出。如服量過多或過久。則惹激中樞神經。而呈中毒現象。

主治 腹中邪熱氣。諸毒。殺三蟲。(本經)去寸白。破癥瘕。除頭風。止金瘡。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論貫衆曰。爲末水服一錢。止鼻血有效。【明】李時珍本草綱目論貫衆曰。治下血崩中帶下。產後血氣腹痛。斑疹毒。漆毒。骨哽。解諸病。【明】繆希雍本草經疏論貫衆曰。貫衆味苦而又微寒。止應云有小毒。以其苦寒。故主腹中邪熱氣諸毒。三蟲皆由濕熱所生。苦寒除濕熱。則三蟲自死矣。苦以洩之。亦衆有散之之義。故破癥瘕。苦寒能除風熱。故止頭風。金瘡出血後。必發熱。洩熱散結。則金瘡自止。【清】黃宮繡本草求眞論貫衆曰。貫衆卽俗稱爲管仲者是也。味苦微寒無毒。世遇天時行不正之氣。人多用此置之水缸。使人食之不染。且不獨力能解毒。凡遇崩中帶下。並癥瘕斑痘。蟲骨哽。皆可用之。蓋以苦能殺蟲。寒能散熱故也。昔王繇百一選方。言食鯉魚羹爲骨所哽。百藥不效。或令以貫衆煎濃汁。連進一咯而出。可見輭堅之功。其殆若是之神矣。形似狗脊而大。汁能制三黃。化五金。伏鐘乳。結沙制汞。解毒輭堅。

近人學說 張山雷曰。貫衆苦寒沈降之質。故主邪熱而能止血。并治血痢下血。甚有捷效。皆苦以燥濕。寒以泄熱之功也。然氣亦濃厚。故能解時邪熱結之毒。別錄除頭風。喜指風熱言之。凡大頭疫腫連耳目。用泄散而不遽應者。但加入貫衆一味。卽邪勢透泄。而熱解神清。不獨苦寒泄降。亦氣之足以散邪也。故時疫盛行。宜浸入水缸中。常飲則不傳染。而井中沉一枚。不犯百毒。則解毒之功。尤其獨著。不得以輕賤而忽之。

配合應用 ㈠治鼻衄不止。貫衆根末。水服一錢。(普濟方)

㈡治諸般下血。腸風。酒痢。血痔。鼠痔下血。黑狗脊黃者不用。須內肉赤色者。卽本草貫衆也。去皮毛。剉焙爲末。每服二錢。空心米飲下。或醋糊丸梧子大。每米飲下三四十丸。或燒存性。出火毒爲末。入麝香少許。米飲服二錢。(普濟方)

㈢治女人血崩。貫衆半兩。煎酒服之立止。(集簡方)

㈣治產後亡血過多。心腹徹痛者。用貫衆狀如刺蝟者一個。全用不剉。只採去毛及花萼。以好醋醃濕。慢火炙令香熟。候冷爲末。米飲空心每服三錢。甚效。(婦人良方)

㈤治赤白帶下。年深諸藥不能療者。用上方治之亦驗。名獨聖湯。(婦人良方)

㈥治年深欬嗽。出膿血。用貫衆、蘇方木等分。每服三錢。水一盞。生薑三片。煎服。日二服。又久欬漸成勞瘵。鳳尾草爲末。用魚鮓醃食之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（聖惠方）

㈣快斑散。治痘瘡不快。用貫衆、赤芍藥各一錢。升麻甘草各五分。入淡竹葉三片。水一盞半。煎七分。溫服。（王海藏方）

㈤治頭瘡白禿。貫衆、白芷爲末。油調塗之。又方貫衆燒末。油調塗。（聖惠方）

㈥治漆瘡作癢。油調貫衆末塗之。（千金方）

㈦治雞魚骨哽。貫衆、縮砂、甘草等分爲粗末。綿包少許。含之嚥汁。久則隨痰自出。（普濟方）

㈧解輕粉毒。齒縫出血腫。貫衆、黃連各半兩。煎水。入冰片少許。時時漱之。（陸氏積德堂方）

㈨治血痢不止。鳳尾草根。卽貫衆五錢。煎酒服。（集簡方）

㈩治便毒腫痛。貫衆酒服二錢良。（多能鄙事方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾虛胃寒而無實熱者禁用。蘑菌、赤小豆爲之使。

參攷資料　㈠貫衆大治婦人血氣。王海藏治夏月痘出不快。快斑散用之。云貫衆有毒而能解腹中邪熱之毒。病因內感而發之於外者多效。非古法之分經也。又黃山谷煮豆帖言荒年以黑豆一升。揀淨。入貫衆一斤。剉如骰子大。同以水煮。文火斟酌至豆熟。取出日乾。覆令展盡餘汁。簸去貫衆。每日空心嚥豆五七粒。能食百草木枝葉有毒。可飽。又王璆百一選方言滁州蔣教授。因食鯉魚玉蟬羹爲肋肉所哽。凡藥皆不效。或令以貫衆濃煎汁一盞。分三服。連進至夜。一咯而出。亦可爲末。水服一錢。觀此。可知其軟堅之功。不但治血瘡而已也。（李時珍）㈡苗似狗脊。狀如雉尾。根直多枝。皮黑肉赤。曲者名草鴟頭。所在山谷陰處均有之。（韓保昇）㈢今陝西河東州郡及荊襄間多有之。而少有花者。春生苗赤莖。葉大如蕨。莖幹三稜。葉綠色。似雞翎。又名鳳尾草。其根紫黑色。形如大瓜。下有一黑鬚毛。又似老鴟。郭璞注爾雅云。葉員銳。莖毛黑。布地冬不死。廣雅謂之貫節是矣。（蘇頌）㈣多生山陰近水處。數根叢生。一根數莖。莖大如筯。其莖兩兩對生。如狗脊之葉而無鋸齒。青黃色。面深背淺。其根曲屈而有尖嘴。黑鬚叢簇。亦似狗脊根而大。狀如伏鴟（李時珍）㈤貫衆有止血驅蟲解毒作用者明矣。古方解輕粉毒或汞毒性口腔炎時。多用貫衆、黃連各半兩。煎水。入冰片少許。時時漱之。謂有特效也。（袁淑範）

【貫衆花】主治　惡瘡。令人洩。

【貫衆根】卽貫衆之處方用名。詳『貫衆』條。

【貫節】卽貫衆之古籍別名。典見本經。詳『貫衆』條。

【貫渠】卽貫衆之古籍別名。典見本經。詳『貫衆』條。

【軟口湯】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【軟柴胡】卽柴胡之處方用名。詳『柴胡』條。

【軟棗】卽君遷子之古籍別名。典見千金食治。詳『君遷子』條。

【軟餹】卽飴餹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『飴餹』條。

【透石鳥】卽穿山甲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『穿山甲』條。

【透百合】卽山丹之日本名詞。詳『山丹』條。

【透血紅】卽山牛膝之古籍別名。典見綱目拾遺。性質功用。詳『山牛膝』條。

【透骨白】卽鳳仙花之古籍別名。典見綱目拾遺。性質功用。詳『鳳仙花』條。

【透骨消】產地　粵南大瀝諸地均有出之。

性質　酸。濇。香。平。

效能　散風除濕。

主治　專治骨痛。理跌打傷。

【透骨草】古籍別名　鐵線透骨草。（綱目拾遺）

形態　透骨草爲雜草類之一種。形如牛膝草及馬鞭草。可供藥用。

主治　瘰熱毒。軟堅。合金瘡。入骨補髓。兼治雞瘟。

配合應用　㈠治瘋氣疼痛。不拘遠年近日。透骨草二兩。穿山甲二兩。防風二兩。當歸三兩。白蒺藜四兩。白芍三兩。豨薟四兩。去莖用。葉九蒸九曬。海風藤二兩。生地四兩。廣皮一兩。甘草一兩。已上爲末。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用猪板油一斤。煉蜜爲丸。梧子大。早晚各五錢。酒下。腿疼難忍。（周氏家方寶）又核桃肉四個。酸棗炒七個。蜂蜜一個。纏透骨草三錢。水煎熱服。出汗愈。不問風濕皆效。（醫學指南方）

㊁治痞。透骨草一味。貼患處。一炷香或半炷香時。即揭去。皮上起泡即愈。（醫學指南方）

㊂洗癍瘡。秫方。蛤蚧一個。麻黃、川椒、透骨草、防風、大鹽各四兩。白花蛇二錢。艾一把。桃枝一條。川烏、草烏各二兩。紫花地丁一斤。用水二桶煎大缸半埋在地。入水。溫時坐上洗。再用水二桶煎渣。候冷時。再入熱水。或一日或一夜。臨出時。用水澆頂心數次。再用芥末稀貼患處。紙絹裹熱。坑上睡。汗出盡爲度。（醫學指南方）

參攷資料　透骨草大能軟堅。取汁浸龜板。能化爲水。專主煉膏丹。按鳳仙白花者亦名透骨白。追風散氣。紅花者名透骨紅。破血墮胎。亦有透骨之名。非一物也。

【透骨草】即益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益母草』條。

【透骨將軍】即礜砂之古籍別名。典見土宿本草。詳『礜砂』條。

【逐折】即厚樸子之原名。詳『厚樸子』條。

【逐馬】即玄參之古籍別名。典見藥性。詳『玄參』條。

【逐馬】即丹參之古籍別名。典見本草集註。詳『丹參』條。

【通石】即孔公孽之古籍別名。典見綱目。詳『孔公孽』條。

【通仙草】即石長生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石長生』條。

【通竹】即竹之空心直上而無節者。性質功能。與尋常竹同。參詳『竹』條。

【通血香】產地　出自西洋及陝西諸地。

形態　通血香爲芳草類之一種。色如乾薑。可供藥用。

主治　血症及肝經血氣諸症。入藥最良。

配合應用　㊀治臟腑。通血香一錢。取亞腰葫蘆一個。不去子膜。入香於內。再入酒煮。仍以所開之蓋合縫封固。以陳酒安鍋內。懸葫蘆於酒中。挨定。勿令傾倒。將鍋蓋煮三炷線香爲度。煮時其香透屋牆之外。煮完取出葫蘆內子膜并藥。烘乾爲末。每服一錢。空心時酒下。間五日再服一錢。服盡葫蘆內藥。服五六錢即愈。此方出廣筆記。云治脾虛有濕者。救生苦海方）

㊁治瘰癧內消方。紫背天葵一兩五錢。海藻、洋帶、昆布各一兩。海螵蛸五錢。貝母、桔梗各一兩。通血香三錢。右藥爲細末。酒糊爲丸。桐子大。每服七十丸。食後溫黃酒送下。（良朋彙集方）

㊂治痔漏通腸。胡連追毒方。專治痔漏。不拘遠年近日。有漏或通腸及污泥孔出者。先用此方。追盡膿血。後服黃連開管丸。取效最穩。用胡黃連八錢。切薑片汁拌炒。刺蝟皮一個。切片炒黃。爲末。通血香八分。須用眞者。研末。麝香二分。共和勻。糯飯爲丸。麻子大。每服一錢。食前酒下。服藥後膿水反多。乃藥之功。勿懼可也。（海藥祕錄方）

㊃黃連開管丸。胡黃連淨末八錢。甲片麻油內煠黃五錢。石決明煅過五錢。眞通血香六分。不可少。槐花五錢。共爲細末。蜜丸。麻子大。每服一錢。空心清米湯下。早晚二服。重者二十一日收功。此方不用針刀挂線之苦。誠起廢疾之良方也。如漏邊有硬肉突起者。加靈龜二十一個。炒末。和入此方。及遍身諸漏並治。屢試屢效。

㊄臟連丸。治痔漏。無論新久。但舉發便下血作痛。肛門墜重者。膿血不止。腫痛難坐者。並治。胡黃連淨末八兩。通血香錢半。用雄猪大腸盡頭一段。長一尺二寸。溫湯洗淨。將連末及通血香灌入腸內。兩頭以白絲線扎緊。煮酒二斤半。新砂鍋內。煮酒將乾爲度。取起腸藥。各搗如泥。倘藥爛。囉一時。復搗爲丸。桐子大。每服七十丸。空心溫酒送下。久服除根。又名白銀定子。治漏有孔者。只須半月見功神效。

㊅三品一條鞭。白礜淨末一兩。白礬淨末二兩。明雄黃二錢四分。通血香八分。乳香一錢二分。先將礜礬研極細末。鐵杓鎔成餅。入炭火煅煙淨。取出去火毒。爲末。和入雄黃、血香、乳香細末。作錠子。成條。插入漏內。直透裏痛處爲止。每日上三次。至七日爲止。半月瘡結而

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

愈。如痛未痊。用生肌散收口可也。生肌散。治諸痔瘡腫毒。收口神速。乳香、沒藥、海螵蛸、用三黃湯煮過、寒水石煅過、輕粉、龍骨煅赤、石膽煅、冰片各等分。共研細末。摻患處。外貼膏藥。

【通香木】 產地 出塞外及內蒙古諸地。

形態 通香木爲灌木類之一種。木長數尺。氣甚芬芳。可供藥用。

主治 焚之辟瘟疫、穢氣、邪祟。並治各種奇疾。

參攷資料 通香木以沸湯沃之。取其汁洗衣服。及灑一切花卉。灑屋宇壁。經年香氣不減。燒之香氣能達數百里。契丹珍之。（趙學敏）

【通泉草】 卽紅茂草之古籍別名。典見庚辛玉册。詳『紅茂草』條。

【通草】 原名 通脫木。

命名 本品功尚通利。故名。

產地 方通草。白通草。絲通草。梗通草。絳通草。花方通。紅通草。

古籍別名 活荛。離南。（爾雅）蔫脫。倚商。（山海經）

外國名詞 Aralia papyrifera Hook.（拉丁）ツウダツボク（日本）

基本 係五加科楤木屬。爲通脫木之木體。

產地 凡暖地山側。及原野間恒有生焉。陳仁山藥物生產辨云。通草產廣西南寧。百色。



通草（一）



通草（二）

形態 通脫木爲落葉灌木本。高丈餘。莖質不堅。含有白色之大體。體輕如紙。厚薄平勻。葉爲掌狀分裂。有長葉柄。集生於莖之上部。花與土當歸之花相似。其莖體切作薄片。可代紙用。及供製裝飾品之料。入藥用者。卽謂之通草。

採取 秋季採之。

製法 採得切片。日乾。用時有以辰砂拌赤。亦有紅花汁染赤者。

用法 恒以和入他藥。水煎服。

性質 淡。甘。平。無毒。

效能 利水道。清瀉熱。催生下乳。通利五淋。專作利尿藥。

主治 利痿。瘕。治五淋。除水腫。癃。瀉肺。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論通草曰。解諸毒蟲痛。【明】汪機本草會編論通草曰。明目退熱。下乳催生。【清】黃宮繡本草求眞論通草曰。通草氣味甘淡。體輕色白。有類燈心。功同入肺。引熱下降。及利小便。通淋治腫。然燈心質小。氣寒。則兼降心火。此則兼入胃。通氣上達。而下乳汁之爲異耳。況此體大氣輕。滲淡殆甚。能升能降。既可入肺而清熱。復能上行而通胃。東垣用此。以治五腫水腫。癃閉。非取氣寒能降。味淡能升之意乎。仲景用此。合當歸芍藥、桂枝、細辛、大棗、甘草。名爲當歸四逆湯。以治傷寒邪入厥陰。非取通草以通營衞之意乎。但孕婦勿服。

近人學說 張山雷曰。通脫木卽今之所謂白通草也。陳藏器本草云。通脫木生山側。葉似葛麻。其莖空心。中有瓤。輕白可愛。女工取以飾物。俗亦名通草。爾雅所謂離南。活脫也。（陳藏器唐開元時人。爲三原縣尉。著本草拾遺。活脫今爾雅作活莞。陸氏釋文。莞或作蔨。郭注。草生江南。高丈許。大葉。莖中有瓤。正白。爾雅又有倚商活脫。郭注卽離南也。陳氏本草引爾雅作離南活脫。蓋以莞字罕見。乃合爾雅前後兩條而并言之耳。山海經中山經。其草多寇脫。郭注。寇脫草生南方。高丈許。似荷。葉莖中有瓤。正白。零桂人植而日灌之。以爲樹。卽此。）壽頤案陳氏說。與郭景純合。則唐人所謂通脫木者。卽今之通草無疑。而確非本經之通草。陶注本經通草。繞樹藤生。而此則是草類。但高大似樹。惟瀕湖綱目亦列於蔓草類中。且釋之曰。蔓生山中。大者圍數寸。殊與郭氏陳氏所說不合。豈瀕湖曾見其確是蔓生乎。抑以其性情效力。有似木通而

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

連類及之。遂亦姑妄言之乎。茲姑依綱目並錄於木通之後。亦以其功用之相類耳。其氣味則李東垣用藥法象。謂甘淡寒無毒。壽頤案此甘字。非大甜之謂。實即淡字。如泉水食米皆謂味甘之例。此物無氣無味。以淡用事。故能通行經絡。清熱利水。性與木通相似。但無其苦。則泄降之力緩。而無峻厲之弊。雖能通利。不甚傷陰。澀熱之不甚者宜之。而壅遏閉結之症。必不能及。木通之捷效。東垣謂利陰竅。治五淋。除水腫。癰亦惟輕症乃能有功耳。又謂瀉肺利小便。與燈草同功。蓋皆色白而氣味清。所以亦能上行。泄肺之熱。閉宣其上竅。則下竅自利。說亦可取。乃又謂宜生用之。則輕清之藥。豈有炒用之笨伯耶。汪石山謂明目退熱。亦輕清上行之效。又謂下乳催生。則清淡者能滑利通竅耳。瀕湖謂色白氣寒。味淡體輕。氣寒降也。味淡升也。又曰。白梗通吾吳藥肆有之。不知是何草之梗。其大過於拇指。外皮微黑。中心純白。輕虛之甚。切薄片用之。其色澤顏與白通草相似。但不如白通草之柔韌。味淡氣清。功用與白通草等。而古今本草皆無此物。姑并錄之。以備藥籠所需。且近時白通草之價漸貴。而梗通尚廉。入藥功力。殊無軒輊。是可取也。

配合應用 ㊀治上部內傷。通草、香降香、紅麴、綠鯉甲、山查、沒藥。㊁洗頭風痛。新通草瓦上燒存性。研末二錢。熱酒下。牙關緊者。斡口灌之。（百一選方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡氣虛及孕婦並無澀熱者禁用。

參攷資料 ㊀通草瀉肺利小便。甘平以陰緩血也。與燈草同功。宜生用之。（李杲）㊁通脫木生山側。葉似蓖麻。其莖空心。中有白瓤。輕白可愛。女人取以飾物。俗名通草。（陳藏器）㊂郭璞言生江南。高丈許。大葉似荷而肥。莖中瓤正白。今園圃亦有種蒔者。或作蜜煎充果食之。甘美。（蘇頌）

【通草】卽木通之原名。典見本經。惟近世『木通』與『通草』係列爲二物。各見本條。

【通草子】卽木通實之別名。典見綱目。詳『木通』條。

【通草酒】**製法** 用通草子煎汁。同麴米釀酒飲。

主治 續五臟氣。通十二經脈。利三焦。

【通脫木】卽通草之原名。詳『通草』條。

【通脫木花上粉】**主治** 諸蟲瘧惡瘡。痔疾納之。

歷代記述致證 【宋】蘇頌圖經本草論通脫木花上粉曰。療瘧癮。及胸中伏氣。攻胃咽。

【通漆】卽節華之古籍別名。典見別錄。詳『節華』條。

【通靈草】卽忍冬藤之古籍別名。典見土宿本草。詳『忍冬藤』條。

【速香】卽伽倆香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『伽倆香』條。

【速腦】卽冰片之古籍別名。典見綱目。詳『冰片』條。

【逶迤酒】**製法** 桃花三兩三錢。五月五日收。馬蘭花五兩五錢。六月六日收。脂麻花六兩六錢。九月九日收。黃甘菊花九兩九錢。陰乾。十二月八日。取臘水三斗。待春分取桃仁四十九枚。好者去皮尖。白麵十斤。同前花和作麴。紙包四十九日。用時白水一瓶。麴一丸。麵一塊。封良久成矣。如淡再加一丸。

主治 補虛益氣。去一切風痺。澀氣。久服益壽。耐老好顏色。

【逢東根】卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【連】卽連翹之古籍別名。典見爾雅。詳『連翹』條。

【連及根】卽白茨之古籍別名。典見本經。詳『白茨』條。

【連母】卽知母之古籍別名。典見本經。詳『知母』條。

【連本】卽海藥子之古籍別名。典見本經。詳『海藥子』條。

【連皮檳】卽檳榔之處方用名。詳『檳榔』條。

【連蟲陸】卽羊蹄之古籍別名。典見本經。詳『羊蹄』條。

【連枝草】卽首蓿之古籍別名。典見郭璞賦。詳『首蓿』條。

【連桂】卽肉桂之古籍別名。典見和藥漢考。詳『肉桂』條。

【連珠】卽山丹之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

日華諸家本草。詳『山丹』條。

【連珠巴戟】卽巴戟天之處方用名。詳『巴戟天』條。

【連草】卽連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連異】卽連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連翹翹】卽連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連陽八座】卽蛇牀子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛇牀子』條。

【連喬】卽連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連軺】卽連翹之古籍別名。典見仲景全書。詳『連翹』條。

【連錢草】**原名** 穿牆草。蓋謂無論如何堅厚之牆。苟有閒隙。此草卽能穿過。故名。

命名 本品其葉如錢。相聯如連。故名連錢草。

古籍別名 積雪草。(本經)胡薄荷。(天寶)地錢草。(唐本草)海蘇。錢葛。新羅薄荷。(和漢藥考)

外國名詞 Hederae Terrestris.(拉丁)

基本 係屬脣形科連錢草之葉莖。



連錢草(一)

產地 中國南方。如荊、楚、江、淮、閩、浙等地多出之。

形態 連錢草爲原野自生之多年生草。莖方形。帶紫色。蔓延地上。花時直立。高五六寸。花後再偃臥地上。長及丈餘。葉作紫綠色。心臟形。或腎臟形。以長葉柄對生。邊緣有粗鋸齒。葉莖俱生粗毛。葉脫開淡紫色斑點之脣形花。此草氣香而味苦。



連錢草(二)

種類 蘇恭注薄荷云。有一種莖生。功用相似。圖經云。胡薄荷與薄荷相類。但味少甘。土人恒作茶飲。俗呼爲新羅薄荷。卽天寶方所用之連錢草也。據二說。則積雪草卽胡薄荷。乃薄荷之莖生者爾。

採取 每年八九月採取莖葉。

製法 曝乾。或陰乾。

用法 焙燥研末用。或生搗取汁用。

性質 苦。寒。無毒。

成分 連錢草含有揮發油及單寧等。

效能 搗敷瘡毒。消腫止痛。用作强壯藥。民間用治小兒癇。故一名疳切草。

主治 大熱惡瘡。癰疽。浸淫。瘭。皮膚赤。身熱。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論連錢草曰。單用治瘰癧。風漏。寒熱時節來往。【唐】陳藏器本草拾遺論連錢草曰。主暴熱小兒寒熱。腹內熱結。擣汁服之。【唐】蘇恭新修本草論連錢草曰。搗敷熱腫。丹毒。【宋】日華諸家本草論連錢草曰。以鹽挼貼腫毒。并風瘡疥癬。【明】李時珍本草綱目論連錢草曰。研汁點暴赤眼良。

著名方劑 九仙驅紅散。主治男女嘔吐諸血。及便血溺血。婦人崩漏。(董炳集驗方)積雪草五錢。當歸。(酒炒)黑山梔。蒲黃炭。黃連。黃芩。生地黃。槐花炭各一錢。上部加藕節一錢半。下部加地榆一錢半。水煎服。

用量 一錢至三錢。

施用宜忌 凡陰疽諸毒。以及脾弱便薄者。切勿搗服。忌麻子、蕎麥。

配合應用 (一)疏解內臟壅塞。祛肺腎等污液。(二)治冒寒欬嗽。痰欬淫喘等肺病。(三)用於勞欬之胸病。治欬嗽肺傷勞欬。有殊效。用於肺癆。能除敗液。愈創癆。加於和胸藥草或爲泡劑。或爲煎劑。或爲細末用之。或一味爲泡劑。和砂糖或白蜜。使甘美易服。(四)乾欬勞嗽。用此藥浸葡萄酒。長服有效。加黜失刺襄及洞庭藍尤佳。(五)熱病及勞瘵。血中有酷厲毒。侵刺肺部。欬嗽往蒋不止。或肺癆欬嗽呼吸不利等。用後方爲佳。此有同於香膏(Balsam)之功效。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

能愈創瘍。涼解內熱。祛除污液。且利大小便。奏殊效。

參攷資料 連錢草葉圖如錢。莉堃人謂之地錢草。徐儀樂草圖。名曰連錢草。

【連錢草】㈠即薄荷之古籍別名。典見天寶單方。詳『薄荷』條。㈡即積雪草之古籍別名。典見本經。詳『積雪草』條。

【連禪芋】即芋子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『芋子』條。

【連翹】**命名** 本品實似蓮房。翹出衆草。故名。

處方用名 淨連翹。碎連翹。連翹殼。連翹心。帶心連翹。圓圓連翹。

古籍別名 連異。翹(爾雅)。旱蓮子(藥性)。蘭華(吳普)。三廉。竹根(別錄)。根名連軺(傷寒論)。折根。黃苕。輒連。蒿。連異。大翹。連草。蕑華。卑蓮。度厄。錢。連異翹(和漢藥考)

外國名詞 Forsythia suspensa, Vahl.(拉丁)

基本 屬木犀科。爲連翹之實。

產地 陳仁山藥物生產辦云。連翹產河南恒慶府。湖北紫荊關。鄖陽府。山東、山西等處。均有出產。八月新。



連翹(一)

形態 連翹爲落葉灌木。枝條作蔓狀。葉爲卵圓形。複葉由三葉而成。邊緣有鋸齒。花爲鮮黃色。四裂合瓣花冠。春月先葉而開。六七月間結黃褐色實。本品爲表面暗褐色。短小之實。類玉榧實。有稍扰起之黃赤色斑點。其成熟者。裂爲二房。中含大如粟粒之種子。有香氣。



連翹(二)

種類 ㈠大翹生下溼地。葉狹長如水蘇。花黃。結子似榧實之未開者。作房翹出衆草也。㈡小翹生原岡上。花實皆如大翹。而細小色黑耳。

採取 八月採之。

製法 凡使宜以黑而閉口者良。去蒂根用。

性質 苦。平。無毒。

效能 散諸經客熱。治癰腫瘡毒。

主治 寒熱。風瘧瘭癰。癰腫惡瘡。瘰癧。結熱。蟲毒(本經)。去白蟲(別錄)。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論連翹曰。通利五淋。小便不通。除心家客熱。【宋】大明諸家本草論連翹曰。通小腸。排膿。治瘡癰止痛。通月經。【元】李東垣用藥法象論連翹曰。散諸經血結氣聚。消腫。【元】朱丹溪本草衍義補遺。論連翹曰。瀉心火。除脾胃濕熱。治中部血證。以爲使。【元】王好古湯液本草論連翹曰。治耳聾渾渾焞焞。【明】繆希雍本草經疏論連翹曰。連翹本經雖云味苦平無毒。平應作辛。乃爲得之。潔古謂其性涼味苦。氣味俱薄。入手足少陽手陽明經。亦入手少陰心經。其主寒熱鼠瘻瘰癧瘕結熱者。以上來諸證。皆從足少陽膽經氣鬱有熱而成。此藥正清膽經之熱。其輕揚芬芳之氣。又足以解足少陽之鬱氣。清其熱。散其鬱。癰不瘰矣。癰腫惡瘡。無非營氣壅遏。衛氣鬱滯而成。夫清涼以除瘀熱。芬芳輕揚以散鬱結。則營衛通和。而瘡腫消矣。蟲毒非熱非辛。則不成。熱解則蟲自消。濕熱盛則生蟲。清其熱而苦能洩。蟲得苦即伏。故去白蟲。甄權用以通利五淋。小便不通。除心家客熱。日華子用以通小腸。排膿。治瘡癰止痛。通月經。東垣用以散諸經血結氣聚。消腫。丹溪用以瀉心火。除脾胃濕熱。及治中部血證。以爲使。海藏用以治氣祕火炎之耳聾。一皆清熱散結下氣燥濕之功也。【明】李士材本草圖解論連翹曰。連翹苦寒入心。瀉心火。破血結。散氣聚。消腫毒。利小便。諸瘡痛癢。皆屬心火。連翹清心。遂爲瘡家要藥。治癰癰瘡瘍有神。然久服有寒中之患。【清】黃宮繡本草求眞論連翹曰。連翹味苦微寒。質輕而浮。書雖載瀉六經鬱火。然其輕清氣浮。實爲瀉心要劑。心爲火主。心清則諸臟與之皆清矣。然濕熱不除。病

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

症百出。是以癰毒五淋。寒熱鼠瘺。瘰癧惡瘡。熱結蟲毒等症。書載皆能以治。且經有言諸痛瘡瘍。皆屬心火。連翹實爲瘡家聖藥也。然多用胃虛食少。脾胃不足者愼之。況清而無補。癰疽潰後勿服。火熱由於虛者忌投。【清】鄒澍本經疏證論連翹曰。盧子繇曰。本經所列連翹主治。合陰陽內外而言。誠開闔之樞鍵也。故主熱結在中爲寒熱。鼠瘻瘰癧。其本在臟。其末在頸腋間也。若蠱毒則但沈於臟。瘭瘤癰腫則但浮於皾。咸屬寒熱爲病。因熱結爲形證者也。其功力與夏枯草相等。但夏枯草偏於從本。乘寒水化令。故上徹巔頂。下及趺踵。連翹偏於從末。乘容平氣味。故外彌膚腠。內徧五中。至解邪熱結於心理則一矣。連翹赤莖獨上。秋來結專莖端。花後分瓣作房。中含黑子。乾則振之。皆落而不著莖。其房剖之。卽解。片片相比。氣甚清馥。當夫溽暑之候。諸氣懈弛。血皾償涌。懈弛者多顚躓。償涌者易墮於僻仄徑折。最善顚躓之所也。故鼠瘻瘰癧。氣多於血之候。恒生於頸腋。平原曠蕩。尤善墮淤之地也。故癰腫惡瘡。血多於氣之候。恒生於背腹。及夫結爲癆。漫爲瘤。又何莫非氣遺炎鬱。而顚躓墮淤。迨至涼颸倏動。萬象清明。庶類遂剝落紛紜。頓然改舊。故草凋於土葉。辭於樹。水涸於瀆。與連翹之治寒熱鬱結。何以異哉。【清】賈九如辨藥指南論連翹曰。連翹氣味輕清。體浮性涼。浮可去實。涼可勝熱。總治三焦諸經之火。心肺居上。脾居中。州肝膽居下。一切血結氣聚。無不調達而通暢也。但連翹治血分功多。柴胡治氣分功多。同牛蒡子善療瘡瘍。解痘毒尤不可缺。

近人學說　張山雷曰。連翹味苦。苦能清熱。形圓而尖。中空有房。狀似心臟。故專清心家之熱。此物理自然之情性。非勉强附會之言也。又凡實輕而空鬆者。必有開泄宣通之作用。故亦能散結而泄化絡脈之熱。本經治瘭癰腫。瘡瘍瘍瘤。結熱蟲毒。固以諸痛痒瘡皆屬於熱。而疏通之實。非特清熱。亦以散其結滯也。又心與小腸爲表裏。故清心之品。皆通小腸。又能泄膀胱。利小水。導下焦之溼熱。甄權謂其通利五淋。小便不通。除心家客熱。日華謂其治瘡癰。排膿止痛。東垣謂其散諸經血結氣聚。消腫。丹溪謂其瀉心火。除脾胃溼熱。石頑謂其輕清而浮。主治諸瘡。爲結者散之之義。繆仲醇謂經主瘭癰瘍瘤。皆是少陽膽經氣鬱有熱。此藥輕揚清芳之氣。足以散其鬱而清其熱。海藏以主耳聾。亦氣火土壅之症也。又曰。近人有專用連翹心者。卽其房中之實也。細而實。輕。故性浮而專清上焦心肺之熱。較之其殼在外。亦能通行經絡。其用固自有別。然雖是心而亦不堅實者。是竟謂能清心家實火。亦殊未必。

配合應用　㈠連翹得貝母、白芷、甘草、金銀花、玄參、薄荷、夏枯草、白芨。能消瘰癧。加牡蠣、鼠粪、人爪、山豆根、蒲公英、消乳癰乳巖。㈡治瘰癧結核。連翹、脂麻等分爲末。時時食之。（簡便方）㈢治項邊馬刀屬少陽經。用連翹二斤。翟麥一斤。大黃三兩。甘草半兩。每用一兩。以水一盞半。煎七分。食後熱服。十餘日後。灸臨泣穴二七壯。六十日決效。（張潔古活法機要方）㈣治痔瘡腫痛。連翹煎湯熏洗。後以刀上飛過絲纏入麝香貼之。（集驗方）

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡陰虛內熱及癰毒已潰者禁用。

參攷資料　㈠連翹之用有三。瀉心經客熱一也。去上焦諸熱二也。爲瘡家聖藥三也。（張元素）㈡十二經瘡藥中不可無此。乃結者散之之義。（李杲）㈢手足少陽之藥。治瘡瘍瘤結核有神。與柴胡同功。但分氣血之異爾。與鼠黏子同用。治瘡瘍別有神功。（王好古）㈣按爾雅云。連異翹則是本名連。又名異翹。人因合稱爲連翹矣。連翹亦作連苕。卽本經下品翹根是也。唐蘇恭新修本草退入有名未用中。今并爲一旱蓮。乃小翹。人以爲鱉腸者。故同名。（李時珍）㈤今近汴京及河中、江寧、潤、淄、澤、兗、鼎、岳、利諸州。南康軍皆有之。有大小二種。大翹生下溼地或山岡上。青

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

葉狹長如榆葉水蘇攀。莖赤色。高三四尺。獨莖。梢間開花黃色。秋結實似蓮內作房瓣。根黃如薑根八月採房其小翹生岡原之上。花葉實皆似大翹而細。南方生者葉狹而小。莖短。纔高一二尺。花亦黃實房黃黑內含黑子如粟粒。亦名旱蓮。南人用花葉。今南方醫家說云。連翹有兩種。一種似椿實之未開者。殼小堅而外完。無跗蔕。剖之則中解。氣甚芳馥。其實纔乾。振之皆落。不着莖也。一種乃如菡萏。殼柔外有跗蔕抱之。而無解脈。亦無香氣。乾之雖久。着莖不脫。此甚相異。此種江南下澤間極多。如椿實者乃自蜀中來。入用勝似江南者。據本草則亦以蜀中爲勝。然未見其莖葉也。（蘇頌）㊀治膽熱。氣分用連翹。血分用柴胡。（劉潛江）

【連翹心】卽連翹中心之處方用名。詳『連翹』條。

【連翹根】性質　甘。寒。平。有小毒。

主治　下熱氣。益陰精。令人面悅。好明目。久服輕身耐老。（本經）以作蒸飲酒病人。（別錄）

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論連翹根曰。治傷寒瘀熱。欲發黃。

參攷資料　㊀翹根氣味。神農雷公甘有毒。李當之苦。（吳普）㊁翹根氣味苦寒。（王好古）㊂翹根生嵩高平澤。二月八月採。（本經）㊃方藥不用。人無識者。（陶弘景）㊄此卽連翹根也。能下熱氣。故張仲景治傷寒瘀熱在裏。麻黃連翹赤小豆湯用之。注云。卽連翹根也。（王好古）

【連翹莖根】主治　心肺積熱。

【連翹莖葉】主治　心肺積熱。

【連翹殼】卽連翹之處方用名。詳『連翹』條。

【途花】卽百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳『百合』條。

【郭公】卽鳩鳩之古籍別名。典見綱目。詳『鳩鳩』條。

【郭公刺】古籍別名　光骨刺。（綱目）

基本　郭公刺爲雜草之一種。其根可供藥用。葉詳見該條。

主治　哮喘。剉水煎服。卽止。

【郭公刺葉】主治　傅天泡瘡。搗細。油調搽之。

【郭索】卽蟹之古籍別名。典見揚雄方言。詳『蟹』條。

【都乙羅叱】卽桔梗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桔梗』條。

【都念子】卽倒捻子之古籍別名。典見綱目。詳『倒捻子』條。

【都草】卽百脈根之日本名。詳『百脈根』條。

【都梁香】卽草蘭之古籍別名。典見李氏藥錄。詳『草蘭』條。

【都淋藤】卽青木香之古籍別名。典見肘後方。詳『青木香』條。

【都羅木】卽天麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天麻』條。

【野人】卽狒狒之古籍別名。典見綱目。詳『狒狒』條。

【野丈人】形態　野丈人爲雜草類之一種。葉似芍藥。花似木槿。有白毛。長寸餘。披下如白頭翁。可供藥用。

主治　去腸垢。消積滯。

【野丈人】卽白頭翁之古籍別名。典見本經。詳『白頭翁』條。

【野三七】卽瓊州三七之別名。詳『山漆』條。

【野山漆】卽三七之別名。詳『山七』條。

【野山參】卽人參之處方用名。詳『人參』條。

【野山菊】產地　南嶺山中多有之。

形態　叢生花葉抱莖如苦蕒。而歧齒不尖。莖瘦無汁。梢端發枝。秋開花如寒菊。其根葉可供藥用。



野山菊

主治　搗敷瘡毒。

【野天冬】卽百部之處方用名。詳『百部』條。

【野天門冬】卽百部之古籍別名。典見綱目。詳『百部』條。

【野天麻】卽赤箭天麻之一種別名。詳『天麻』條。㊁卽益母草之古籍別名。典見本草會編。詳『益母草』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【野毛豆】古籍別名　勞豆。
產地　生田塍園圃間。
形態　野毛豆。爲菜類豆屬之一種。其莖葉與莢較家種者爲細小。引蔓而生。枝細弱。葉細尖。兩兩排枝對生。初生苗時。絕似金鳳花之葉狀。清明後開灰紫細花。結莢實如毛豆。又似角蒿。中有二子。圓小若菉豆。至小滿前後。則老黑枯落。採得可供藥用。
採取　立夏後採之。
性質　微寒。無毒。
主治　平肝火。能發汗。療目疾。小兒疳疾。黃白痘。及肝疳初起。取鮮者同雞肝煮食。解痘毒。煅存性。麻油調傅。

【野芥】即芥之野生而非由人工栽種者。入藥最良。參詳『白芥』條。

【野生薑】即黃精之古籍別名。見本草纂筌。詳『黃精』條。

【野羊】即山羊之古籍別名。見圖經本草。詳『山羊』條。

【野百合】即百合之處方用名。詳『百合』條。

【野老】即草蘇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『草蘇』條。

【野延胡】即一粒金丹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『一粒金丹』條。

【野赤豆】即赤小豆之處方用名。詳『赤小豆』條。

【野李】即李實之味苦者。性質功能。較尋常李爲遜。參詳『李實』條。

【野杉】即榧實之古籍別名。典見綱目。詳『榧實』條。

【野芝麻】即玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玄參』條。

【野芋】即芋子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『芋子』條。

【野芋艻】基本　本品即芋之野生者。或謂種芋三年不收。即成野芋。



野芋艻

性質　滑。有大毒。
主治　跌打損傷。痔漏。麻風。合麻藥用。消腫毒。止痛。療瘡癬。蛇傷搗傅。婦人乳癰。和香糟搗傅。

參攷資料　野芋性滑。下石毒。服食皆忌。祇可外用。中其毒者。令人戟喉音啞。煩悶垂死。以大豆漿糞汁解之。甚汁亦可。（趙學敏）

【野芋頭】形態　野芋頭爲野芋之一種。葉較小而略似茨菰。葉有尖端與草木形如鞋底者不同。亦可供藥用。
主治　諸物食積已成痞塊。麪爛和糯米粉煮粥淡食之。

【野芗草】基本　野芗草爲雜草類之一種。可供藥用。
主治　治痞滿用五斤。以一牛安烏盆內。置雞子十箇在草上。以草一牛蓋之。米醋浸二宿。雞子殼軟。乃取於飯上蒸熟。頓食之。塊漸消也。

【野豆】即野毛豆之簡稱。詳『野毛豆』條。

【野油花】即旋覆花之古籍別名。典見綱目。詳『旋覆花』條。

【野油菊】即旋覆花之古籍別名。典見總微論。詳『旋覆花』條。

【野芹子】即苦菜之日本名。詳『苦菜』條。

【野金錢】即旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋覆花』條。

【野於朮】即白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【野狐絲】即菟絲子之古籍別名。典見綱目。詳『菟絲子』條。

【野狐涕】即螳螂之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳『螳螂』條。

【野狐鼻涕】即桑螵蛸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑螵蛸』條。

【野紅花】即大薊之古籍別名。典見綱目。詳『大薊』條。

【野胡蘿蔔】係胡蘿蔔之一種。其莖葉花實。皆與胡蘿蔔同。惟根細小。味甘。生食蒸食皆宜。性質功能。與胡蘿蔔無異。參見『胡蘿蔔』條。

【野首蓿】即首蓿之野生者。詳『首蓿』條。

【野苗】即何首烏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『何首烏』條。

【野茄】即蒼耳子之古籍別名。典見綱目。詳『蒼耳子』條。

【野苧】即苧麻之古籍別名。典見綱目。詳『苧麻』條。

【野苧麻】古籍別名　天青地白草。川綿葱。銀苧天

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名精。（綱目拾遺）

產地　山麓溪澗河堰岸旁土隙間多有產之。

形態　野苧麻爲蕪類之一種。形狀頗似地蒸。立春後生苗長約尺許。葉圓而尖。如卵形。結子細碎。根肥白無筋。擣之有滑涎。可供藥用。

性質　甘。涼。無毒。

效能　發散風毒。活血。止血。消瘀。安胎。

主治　小兒丹毒。蟲脹崩淋。哮喘。白濁。疔瘡。發背。跌撲折傷。蟲螫蛇傷。

配合應用　㊀敎師白宇亮傳。大鯽魚一尾。獨核肥皂一個。胡椒七粒。黃梔子九個。老薑一片。蔥頭三個。野苧麻根一段。乾麵一撮。香糟一團。紹酒隨數用。同前藥合搗如泥。炒熱熨敷患處。外用布包紮緊。次日青出卽愈。（跌打閃挫方）

㊁徐若寧云。看咬傷處有竅是雄蛇。無竅是雌蛇。以針挑破傷處。成竅。然後取野苧麻嫩頭搗汁。和酒服三盞。絞剩渣敷傷口。能令毒從竅中出。立愈。將渣焚去。永不復發。（趙恕軒蛇虺咬傷方）

㊂治癰疽發背對口。一切無名腫毒。野苧麻搗汁用無灰酒沖下。渣敷患處。露頭蓋被出汗。卽出膿水。全愈。（一切腫毒方）

㊃日取野苧葉陰乾。囉燥搓熟。取白絨收藏。夏月遇有金刃傷者。敷之卽止血。且不作膿。（救生苦海方）

【野席草】　古籍別名　龍鬚草。（綱目拾遺）

產地　多生山澤水旁間。

形態　野席草爲澤草類之一種。較席草稍細而短。清明後生苗。小滿時開花細小。其根類似竹根而黑色。可供藥用。

主治　利溼熱。治癰淋精濁。崩中溼痺。鼻衄痔腫。明目疣痛。口咽諸毒火症。鶴膝風。齒牙疼痛欲脫者。煎飲之。

【野烏頭】　卽草烏頭野生者之別名。典見綱目。詳『草烏頭』條。

【野脂麻】　卽玄參之古籍別名。典見綱目。詳『玄參』條。

【野茴香】　卽馬蘄之古籍別名。典見綱目。詳『馬蘄』條。

【野馬】　**產地**　出甘肅及遼東山野中。

形態　野馬爲獸類野馬類之一種。其形似馬而小。皮可爲裘。肉可供藥用。其陰莖詳見該條。

性質　甘。平。無毒。

主治　人病馬癇。筋脈不能自收。周痺。肌肉不仁。用肉一斤。豉汁煮熟。入五味葱白。作醃臛及羹粥類食之。白煮亦可。

【野馬陰莖】　**性質**　酸。鹹。溫。無毒。

主治　男子陰痿縮少精。

【野馬蘭】　**命名**　本品功同馬蘭。因其野生故名。

形態　野馬蘭係蘭之一種。形似馬蘭。惟馬蘭氣味芳香。可佐蔬食。此蘭氣臭味劣。不堪供食。三月發苗。莖赤而粗。秋開白花。成簇細碎。莖葉俱入藥用。

採取　三四月採。陰乾。

性質　寒。涼。

效能　清血。

主治　溼熱蛇咬。小兒瘰癧。

【野甜瓜】　卽王瓜之古籍別名。典見綱目。詳『王瓜』條。

【野甜菜】　卽車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『車前草』條。

【野莙薘】　**產地**　生山野土中。

形態　野莙薘爲莙薘之一種。春日生苗。葉三出。似韭而細。葉上有光。根如豆大。年久則愈大。性喜燥。其生必在高原。若移植園圃。一經汙溼。根卽朽爛。而其生亦不易長。雖至百年。猶如錢大。其根可供藥用。

製法　採得磨粉。水中濾過。囉乾用。

主治　去目星。鼻肉面黯。斑痣。消瘀。

配合應用　㊀磨光散。點眼神藥。用野莙薘粉洗淨去皮。石臼搗爛。密絹絞汁。如做藕粉法。再用清井水飛。囉乾。盛甘石用。黃連、黃柏、黃芩、甘菊、薄荷。煎水煆。更用童便煆一次。將藥水飛。囉乾。珍珠入豆腐內煮過。研細水飛。每莙薘乾粉一兩。配製過甘石五錢。珠末三錢。各將磁瓶收貯。臨用漸漸配和。加冰片少許點之。（種福堂方）

㊁錦紋大黃一兩。北細辛四兩。將二味用上高泉水一百二十兩。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

將藥入砂鍋煎至二十兩。以細絹濾去渣。用大銀碗一個。盛藥碗下。以磚三塊。放定碗底下。將燈盞注麻油。用燈草七根。燃燈熏碗底內。煎藥成膏。滴水成珠。每膏一兩。用野荸薺粉五錢。多些亦不妨。冰片三分。和勻作錠。如多年厚瞖每兩加水飛過蟬退末五分。須要去頭足泥沙。水洗曬乾爲末。水飛三次用。（明目去瞖秘方）又方。野荸薺粉、猪胰各等分。搗和。用雞子殼半個。放藥在內。臨臥合印堂上。俟水流入目中。瞖隨淚出。二十日卽愈。并治田螺頭眼。

配合宜忌　忌鐵器。

參攷資料　野荸薺較產池澤者力尤峻利。故點眼去翳障如神。（趙學敏）

【野莧】係莧之野生者。柔莖細葉。生卽結子。作菜食。味比家莧更勝。性質功能。與莧菜同。參詳『莧』條。

【野麥】卽雀麥之古籍別名。典見綱目。詳『雀麥』條。

【野梨】㈠卽棠梨之古籍別名。典見綱目。詳『棠梨』條。㈡卽鹿梨之古籍別名。典見綱目。詳『鹿梨』條。

【野椒】卽崖椒之古籍別名。典見綱目。詳『崖椒』條。

【野菅】卽菅茅之別名。菅茅係白茅之一種。性質功能。參詳『白茅』條。

【野蔥】卽野菊花之處方用名。詳『野菊花』條。

【野菊花】

命名　本品自生於原野而形似菊。故名。

處方用名　野菊。野黃菊。黃菊花。

古籍別名　苦薏（綱目）油菊。（日本）

外國名詞　Chrysanthemum indicum, L.（拉丁）アブラキク（日本）

基本　係菊科菊屬。爲野菊之花。

產地　多在山野平原間。



野菊花（一）

形態　野菊爲濕草類之多年生草本。莖多分枝。高三四尺。葉與菊相似。但花較小。其葉有深缺刻及細鋸齒等。則與菊不同。晚秋枝梢開花。作頭狀花序。花黃色。外圍之花。作舌狀花冠。中部之花。作筒狀花冠。其舌狀花冠較花柱長數倍。果實無冠毛。其花葉莖根俱可供藥用。



野菊花（二）

性質　苦。辛。溫。有小毒。

主治　調中止洩。破血。婦人腹內宿血宜之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論野菊花曰。治癰腫疔毒。瘰癧眼瘡。【淸】黃宮繡本草求眞論野菊花曰。野菊花一名苦薏。爲外科癰腫藥也。其味辛而且苦。大能散火散氣。故凡癰毒疔腫瘰癧眼目熱痛。婦人瘀血等症。無不得此則治。以辛能散氣。苦能散火者是也。但胃氣虛弱。切勿妄投。

近人學說　祝天一曰。菊種衆多。種類顏色各殊。多瓣者供人玩賞。單瓣者俗名滿天星。雖列爲羣菊之點綴。人多賤之。又有九月間挺秀於籬落水涘之間。開黃花大如鵝眼者。名野菊。野者謂其生於原野。不受人工之栽培。而榮枯於自然也。古之菊本無家野。花都黃色。晉陶潛傷時世之不淑。棄官歸隱。見籬畔黃菊芳香孤立。不畏嚴霜。不伍衆草。慨然自比。爲之移植三徑。後人有慕逸士之風。爲蒔之於園圃。加之以剪移灌溉接植諸法。於是菊之變種百出。各呈其秀。以媚主人。菊性亦遷矣。維單瓣黃菊猶存其舊。故入藥取單瓣菊良。李時珍本草綱目。混苦薏爲野菊疎矣。苦薏生澤畔間。花葉莖一如商蒿。故鄉人呼爲野蓬蒿。四五月至八九月開黃花。形似單瓣菊。氣味辛香。採之作蒿氣。不若菊之沁芳。悅人也。味辛苦而澁。咀之令人作嘔。不若菊之辛芳快胃也。苦薏蒿屬也。非菊類也。前人誤指爲野菊。果非而時珍竟混其名者。更不當也。

參攷資料　㈠野菊花生於山野間者。味苦。莖青。服之大傷胃氣。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（朱震亨）㈢藶乃蓮子之心。此物味苦似之。故與之同名。（李時珍）㈣苦藶生於澤畔。莖如馬蘭花如菊。菊甘而藶苦。語曰。苦如藶是也。（陳藏器）㈤苦藶原野極多。與菊無異。但葉薄小而多尖。花小而蘆多如蜂窠狀。氣味苦辛慘烈。（李時珍）

【野菊根】㊀治　善利水。通癃閉。搗汁和酒服。療癰未破。搗爛酒煎服。自消自潰。

【野菊根葉】㊀治　癰腫疔毒。爲外科要藥。

㊁配合應用　㊀治療癰未破。用野菊花根煎酒熱服。以渣敷貼自消。（經驗方）

㊁治癰腫疔毒。用野菊花連根帶葉搗爛。煎酒熱服取汗。以渣敷貼。或用蒼耳同入。（採氏治毒方）

【野萊菔】即野蘿蔔之原名。詳『野蘿蔔』條。

【野雁】即鴇之別名。典見動物學大辭典。詳『鴇』條。

【野園荽】即石胡荽之古籍別名。典見綱目。詳『石胡荽』條。

【野黃菊】即野菊花之處方用名。詳『野菊花』條。

【野黃楊】即接骨木之古籍別名。典見和漢藥考。詳『接骨木』條。

【野萱花】即射干之古籍別名。典見綱目。詳『射干』條。

【野葛】即鉤吻之古籍別名。典見本經。詳『鉤吻』條。

【野葡萄】即蘡薁之俗名。詳『蘡薁』條。

【野葱】即沙葱之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『沙葱』條。

【野葵】即紫給之古籍別名。典見別錄。詳『紫給』條。

【野蔌蘇】即蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼耳子』條。

【野慈姑】即澤瀉之古籍別名。典見綱目。詳『澤瀉』條。

【野桃】即苦參之古籍別名。典見綱目。詳『苦參』條。

【野蒜】即山蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山蒜』條。

【野管根】即白茅根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白茅根』條。

【野綠豆】即鹿藿之古籍別名。典見綱目。詳『鹿藿』條。

【野蓼】即知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【野菱】即菱之古籍別名。典見別錄。詳『菱』條。

【野薤】即金鎖銀開之古籍別名。典見李氏草祕。詳『金鎖銀開』條。

【野豬】命名　本品即豬之野生者。故名。

外國名詞　Sus leucomystax Temm.（Wild boar）（拉丁）イノシシ或井ノシシ（日本）

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類不反芻偶蹄類野豬科。

產地　出山林中。原野亦有之。

形態　野猪爲獸類家畜猪之原種。其體肥大而强壯。前部尤健。頭部爲楔狀。頸部不顯。不能回顧。面部長而端有鼻孔。耳短小直立。能動。齒有門。犬臼三種。大牙甚發達。在上顎者向下鉤曲。在下顎者更長爲圓錐形。皆突出於外。全體被黑色粗毛。堅硬如針。四肢短。各有四趾。尾短小。生叢毛。體長四五尺。晝伏夜出。覓食其肉可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

㊀治　癲癇。補肌膚。益五臟。令人虛肥。不發風虛氣。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論野猪肉曰。炙食治腸風瀉血。不過十頓。

參攷資料　㊀野猪肉微動風。（寇宗奭）㊁野猪肉不發病。即減藥力。與家猪肉不同。但青蹄者不可食。微動風。（孟詵）㊂野豬處處深山中有之。惟關西者時或有黃。其形似豬而大牙出口外。如象牙。其肉有至二三百斤者。能與虎鬬。或云能掠松脂曳沙泥塗身以禦矢也。最害田稼。亦啖蛇虺。凡服巴豆藥者忌之。（李時珍）

【野豬皮】㊀治　燒灰塗鼠瘻惡瘡。

【野豬外腎】原名　野豬陰卵。

㊀治　連皮燒存性。研末飲服。治崩中帶下。及腸風瀉血血痢。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【野豬尾】**產地**　生山野間。**形態**　野豬尾爲蔓草類藤屬之一種。莖纏木上。四時不凋。有葉無花。莖根可供藥用。**性質**　苦。濇。涼。無毒。**主治**　心氣痛。解熱毒。同百藥頭等分。焙研爲末。每酒服二錢。

【野豬脂】**採取**　臘月採煉服之。**主治**　練淨。和酒日三服。令婦人多乳。十日後可供三四兒。素無乳者亦下。**歷代記述攷證**　【宋】日華諸家本草論野豬脂曰。悅色。除風腫毒。治疥癬。

【野豬陰卵】即野豬外腎之原名。詳『野豬外腎』條。

【野豬黃】**性質**　甘。平。無毒。**主治**　金瘡止血。生肉。療癲癇。水研如棗核許。服之。日二服效。**歷代記述攷證**　【唐】陳藏器本草拾遺論野豬黃曰。研水服。治血痢疰病。【宋】日華諸家本草論野豬黃曰。治惡毒風。小兒肝氣。客忤天明。

【野豬齒】**主治**　燒灰水服。治蛇咬毒。

【野豬頭骨】**主治**　邪癌。及積年下血。

【野豬膽】**主治**　惡熱毒氣。**歷代記述攷證**　【明】李時珍本草綱目論野豬膽曰。治鬼疰。癲癇。小兒諸疳。水研棗裹服。

【野靛青】**古籍別名**　鴨青。**形態**　如莧菜葉尖中心有青暈。**主治**　結熱黃疸。定瘡毒疼痛。生肌長肉。

【野貓】即貓貍之古籍別名。典見綱目。詳『貓貍』條。

【野鴞】即梟之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『梟』條。

【野樸】即厚樸之處方用名。詳『厚樸』條。

【野薔薇】**命名**　本品爲薔薇之野生者。故名。**古籍別名**　石珊瑚。**產地**　山野及籬落間有之。**形態**　野薔薇爲薔薇類之一種。其葉細而花小。莖本蔓生多刺。花有粉紅純白純紅等色。皆單瓣。氣香而甜。似玫瑰。其花可供藥用。根、枝、子、花露。詳見各該條。



野薔薇（一）



野薔薇（二）

主治　癆疾以白色含藏者拌茶煎服。又治婦人鬱結吐血。**參攷資料**　薔薇花香烈。大耗眞氣。虛人忌之。（綱目拾遺）

【野薔薇子】**主治**　產後轉癍。

【野薔薇枝】**主治**　婦人禿髮。以嫩枝同猴薑煎汁刷之。

【野薔薇花露】**基本**　本品即用野薔薇花蒸取之露。**主治**　散風熱。利溼濁。醒胃悅脾。療口瘡口糜。止消渴牙痛。並治腫毒瘡癬。

【野薔薇根】**主治**　肺癰吐膿痰。酒煎服。口瘡煎湯漱之。

【野螺螄】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【野鴿】**形態**　係鴿之原種。全體毛色。較尋常家鴿稍爲暗褐。惟背之中央爲灰白。頸及胸有紫綠色之光澤。棲於山野森林之中。出食田禾。爲農家之害鳥。**效能**　性質功能。較家鴿略遜。參詳『鴿』條。

【野雞斑】即杉材之古籍別名。典見綱目。詳『杉材』條。

【野雞】即雉之古籍別名。典見綱目。詳『雉』條。

【野雞冠子】即青葙子之古籍別名。典見綱目。詳『青葙子』條。

【野雞頭子】即青葙子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青葙子』條。

【野鶩】即梟之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『梟』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【野黨蔘】卽黨參之古籍別名。見黨參新研究詳『黨參』條。

【野蘭】卽漏盧之古籍別名。典見本經。詳『漏盧』條。

【野蘭根】形態 野蘭爲石草類之一種。高二尺有餘。四時有葉無花。其根可供藥用。

性質 微苦溫。無毒。

主治 功同崖棱根。

【野蘿蔔】原命 野萊菔。

古籍別名 紫金皮。巴壁虎。山蘿蔔（綱目拾遺）

形態 野蘿蔔爲萊菔之一種。苗葉根形與家種者無異。惟肉雖白。而皮則帶黃爲不同。其根可供藥用。



野蘿蔔

性質 寒。無毒。

主治 肺癰搗汁服。並療癰疽。澄傅亦可。

【野蹇豆】卽翹搖之古籍別名。典見綱目。詳『翹搖』條。

【釣樟】卽烏樟之原名。詳『烏樟』條。

【釣瓢】卽王瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王瓜』條。

【釣藤鉤】卽鉤藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鉤藤』條。

【釵子股】命名 石斛名金釵花。本品狀似之。故名。

古籍別名 金釵股棒蘭（海藥）三十根（綱目）

外國名詞 Luisia teres, Bl（拉丁）ボウラン マツラン（日本）

基本 係蘭科釵子股屬。爲 Orchideae 之根。

產地 凡熱帶地方川粵諸省之山野均有出。

形態 釵子股爲山草類之寄生老樹上。常綠草本。莖高至尺餘。葉形如箬。夏月葉腋開花。淡黃綠色。有暗紅色之斑點。其根每莖有三四十根。形如細辛。採得可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 解毒癰疽神驗。以水煎服。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論釵子股曰。解諸藥毒。煮汁服。亦生研。更烈。必大吐下。如無毒。亦吐。去熱痰。癉瘴。天行蠱毒。喉痺。

參攷資料 ㊀忠州、萬州者亦佳。草莖功力相似。綠嶺南多毒。家家貯之。（李珣）㊁按嶺表錄云。廣中多蠱毒。彼人以草藥金釵股治之。十救七八。其狀如石斛也。又忍冬藤解毒。亦號金釵股。與此同名云。（李時珍）

【陰土鹽】卽戎鹽之古籍別名。典見綱目。詳『戎鹽』條。

【陰地蕨】古籍別名 花蕨。（植物學大辭典）

外國名詞 Botrychium ternatum, Sw.（拉丁）ハナワラビ フユノハナワラビ フユワラビ ヒカゲワラビ トコワラビ（日本）

基本 係瓶爾小草科。爲陰地蕨屬之根苗。

產地 多產山野間。

形態 陰地蕨爲溼草類之多年宿根草本。高五六寸。葉數回羽狀分裂。呈黃綠色。每一葉則抽一穗。着生多數之子囊羣。根如細辛。苗與葉俱可供藥用。

性質 甘苦。微寒。無毒。

主治 腫毒風熱。

參攷資料 ㊀生鄧州順陽縣內鄉山谷。葉似青蒿。莖青紫色。花作小穗。微黃。根似細辛。七月採根用。（蘇頌）㊁江浙亦有之。外家採制丹砂硫黃。（李時珍）㊂男女吐血後。胸膈虛熱。陰地厥、紫荷車、貫衆、甘草各半兩。水煎服。每服三錢。（聖濟總錄方）

【陰成】卽菊花之古籍別名。典見別錄。詳『菊花』條。

【陰成砂】卽硇砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『硇砂』條。

【陰浴】卽雞涅之古籍別名。典見別錄。詳『雞涅』條。

【陰飛】卽姑獲鳥之古籍別名。典見玄中記。詳『姑獲鳥』條。

【陰陽水】卽生熟水之古籍別名。典見綱目。詳『生熟水』條。

【陰陽草】卽眞珠草之古籍別名。典見綱目遺拾。詳『眞珠草』條。

【陰精石】㊀卽玄精石之古籍別

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名。典見綱目。詳『玄精石』條。㈡即菩薩石之古籍別名。典見綱目。詳『菩薩石』條。

【陰諧】即雌鳩之別名。典見綱目。詳『鳩』條。

【陰龍膏】即豬脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豬脂』條。

【陰獸當門】即牛膽之古籍別名。典見和漢別考。詳『牛膽』條。

【陰藁】即蓬蒿之古籍別名。典見別錄。詳『蓬蒿』條。

【陳小麥】即小麥之處方用名。詳『小麥』條。

【陳火腿骨】性質　鹹。寒。

效能　祛熱。蕩積。

主治　諸痢。腸澼。霍亂。宿積。

配合應用　㈠治食積及痢。取本品煅黑研用。（百草鏡方）

㈡治諸痢。用陳火腿骨二根。炭火煅灰。篩過。加上白糖一兩。米湯飲。或滾水或酒調服。無不效。（救生苦海方）

㈢用赤白痢。用陳火腿骨灰、陳皮、炙草各一兩。爲末。蜜丸。如菉豆大。空心服一錢。白痢用薑赤痢用白湯送下。

㈣又用生火腿骨。焙燥研極細末。無灰酒送下。即止。（神錦方）

㈤用陳火腿骨煅灰六兩。飯鍋巴煅灰五兩。砂仁炒三兩。南山查炒五兩。共爲末。每服三錢。久痢人參湯下。紅痢紅糖湯下。白痢白糖湯下。糞痢炒焦白朮三錢。煎湯服。霍亂吐瀉。饞香湯下。（集祕方）

㈥治噤口痢。火腿骨煅一兩。蓮肉二兩。木香七錢。烏梅三錢。醋糊爲丸。桐子大。每服七丸。蜜蟾湯下。（筆珠萃方）

㈦陳年火腿骨。煅黑色。研末三錢。用火肉一斤。煮熟。去汁上肥油。取清湯一碗。又將此末送下。（不藥良方）

㈧治小兒臌。梨瘡。陳火腿骨燒灰。如瘡加攀少許。麻油調敷。不生髮。用老薑擦。（販翁醫要方）

【陳元參】即玄參之處方用名。詳『玄參』條。

【陳玄】即墨之古籍別名。典見綱目。詳『墨』條。

【陳皮】即橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。㈡即橙皮之古籍別名。典見新中藥。詳『橙皮』條。

【陳平珍果】即胡桃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡桃』條。

【陳米】即陳廩米之處方用名。詳『陳廩米』條。

【陳艾絨】即艾葉之處方用名。詳『艾葉』條。

【陳阿膠】即阿膠陳久者之處方用名。詳『阿膠』條。

【陳莞花】即莞花之處方用名。詳『莞花』條。

【陳知白】即何首烏之古籍別名。典見開寶本草。詳『何首烏』條。

【陳青黛】即青黛之處方用名。詳『青黛』條。

【陳思岌】古籍別名　石黃香。千金藤。（綱目拾遺）

產地　生嶺南山野間。

形態　陳思岌爲蔓草類之一種。莖蔓生。如小豆根及葉氣甚辛香。其根可供藥用。

性質　辛。平。無毒。

主治　解諸藥毒。熱毒。丹毒。癰腫瘡毒。壯熱喉痺。蟲毒。磨汁服。亦塗瘡腫。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草。論陳思岌曰。祛風。補益。輕身。酒浸服。

【陳家白藥】形態　陳家白藥爲蔓草類之一種。相傳謂蒼梧爲陳家所植。莖似土瓜。葉如錢。其根似防已。可供藥用。

採取　以緊小者良。

性質　苦。寒。無毒。

主治　解諸藥毒。水研服。必吐。未盡再服。並去心胸煩熱。天行瘟瘴。

參攷資料　㈠陳家白藥。典婆羅門白藥及赤藥。功用相似。（陳藏器）㈡陳家白藥。善解毒。爲諸藥所不及。（李時珍）

【陳香薷】即香薷之處方用名。詳『香薷』條。

【陳枳殼】即枳殼之處方用名。詳『枳殼』條。

【陳枳實】即枳實之處方用名。詳『枳實』條。

【陳倉米】即陳廩米之原名。詳『陳廩米』條。

【陳黃肉】即山茱萸之處方用名。詳『山茱萸』條。

315／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【陳棗核仁】　性質　焙之苦。平無毒。

主治　腹痛邪氣。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論陳棗核仁曰。惡氣卒痓忤。【明】李時珍本草綱目論陳棗核仁曰。核燒研。摻脛瘡良。

參攷資料　按劉根別傳云。道士陳玫如痴人。江夏袁仲陽敬事之。玫曰。今春當有疾。可服棗核中仁二十七枚。後果大病。服之而愈。又云。常服棗仁。百邪不復干也。仲陽服之有效。則棗果有治邪之說矣。又道書云。常含棗核治氣。令口行津液。嚥之。佳。謝承後漢書亦云。孟節能含棗核不食。可至十年也。此皆藉棗以生津。受氣而嚥之。又能達黃宮以交離坎之義耳。（李時珍）

【陳薇殼】　卽壺盧之處方用名。詳『壺盧』條。

【陳墨】　卽墨之處方用名。詳『墨』條。

【陳廣皮】　卽橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【陳橘皮】　卽橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【陳廩米】　原名　陳倉米。

命名　本品係糗米久入倉中而又陳赤者。故名。

處方用名　陳米。

古籍別名　老米。火米。紅粟。（綱目）

外國名詞　Old rice.（英）

基本　係貯藏倉中十年以上之糗米。

形態　陳倉米爲入倉之糗米。北人有用粟者。陳久則氣味變而色亦不潔澤。與新米大相懸殊。

製法　生研或微炒用。

性質　鹹。酸。溫。無毒。

效能　補腸胃。止洩痢。

主治　下氣。除煩渴。調胃止洩。

歷代記述攷證　【唐】陳士良食性本草論陳倉米曰。暖脾去熱氣。宜作湯食。【唐】孟詵食療本草論陳倉米曰。炊飯食。止痢。補中益氣。堅筋骨。通血脈。起陽道。以飯和酢搗封毒腫。惡瘡立瘥。北人以飯置甕中。水浸令酸食之。暖五臟六腑之氣。研米服。去卒心痛。【宋】大明日華諸家本草論陳倉米曰。補五臟。澀腸胃。【明】李時珍本草綱目論陳倉米曰。調腸胃。利小便。止渴除熱。【清】黃宮繡本草求眞論陳倉米曰。陳倉米卽米多年陳積於倉而未用者也。凡米存積未久。則性仍在未革。煮汁則膠黏不爽。食亦壅滯不消。至於熱病將愈。胃氣未復。猶忌食物。戀膩熱與食鬱而煩以生。必得沖淡甘平。以爲調劑。則胃乃通。陳米津液既枯。氣味亦變。服之正能養胃。除熱祛煩。是以古人載此。既有煮汁養胃之功。復有祛澀除煩之力。一切惡瘡百藥不效者。用此作飯成團。火煅存性。麻油腻粉調敷。可知沖淡和平。力雖稍遜。而功則大。未可忽也。若無病之時用此。日爲飽飯。則又未見其克合也。【清】鄭原食鑑本草論陳倉米曰。寬中消食。多食易饑。【清】楊時泰本草述鉤元論陳倉米曰。陳廩米氣味俱盡。還歸於淡。淡能滲濕。爲五味主。可以養胃氣。且化滯熱。又可以裕脾陰。方書主治瀉利居多。以下多則亡陰。而茲味不越於養脾胃之陰而已。如治吐利後大渴不止。固於脾胃之陰氣衆稗矣。至如倉廩湯主療痢下蠍口。此因胃氣虛而熱乘之。故用參苓。乃以羌獨柴胡升達其胃氣。幷散其毒氣。必入陳倉米以養脾陰。使不爲熱毒所幷也。又如滑瀉豆蔻飲。用陳米爲君。而肉蔻五味赤脂止牛之。又如脾胃氣弱。受寒注瀉。水穀不分。或冷熱不調。下利膿血。更如魚腦腸滑下數。腹痛脹滿。方用木香、肉蔻、粟殼、薑甘補脾胃止氣而固滑。卻必入陳米過倍。以大養陰氣。始能奏功。至於桃花湯治霍亂後。熱結下焦。下利膿血。既用赤脂烏梅。化血分之邪而收脫。仍以白朮炮薑。升廩正脾胃之氣。亦必佐以陳米。合於栀仁養脾胃之陰。而散其留熱。不令其下結也。合觀數證之用。豈得泛然止言其養胃哉。

國外學說　日本明治二十五年東京衞生試驗所。以村井純之助氏爲主任。試驗陳米。公表其成績。陳久之米。除香味色澤發生變化外。並稍減少脂肪。但其他成分。則與新米似無大差。陳米米質之變化。甚爲顯著。脂肪之減少亦甚。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

煮成之飯。少黏力。味淡白。易消化。恐非由糊精增加所致云。又和漢藥考曰。將寒製餅貯藏水中。（時時換水）謂之水餅。患痢疾時煮食之。有奇效云。又東京市淺草區須賀町之須賀神社。每年大祭。製有小團子。置竹筵。供神前。後分配於市民。夏日有吐瀉者。煮晒乾之。筵團子。食之則愈云。此等物之功效。或與陳廩米相同云。

配合應用　㈠治蜜倒大渴能殺人。以黃倉米三升。水一斗。煮汁澄清飲良。（永類鈐方）

㈡治反胃腸氣不下食者。大倉散。用倉米或白米。日西時以水微拌溼。自想日氣如在米中。次日晒乾。袋盛。掛風處。每以一撮。水煎和汁飲之。即時便下。又方。陳倉米炊飯焙研。每五兩入沉香末半兩和勻。每米飲服二三錢。（普濟方）

㈢治諸積聚。太倉丸。治脾胃饑飽。不時生病。及諸般積聚百物所傷。陳倉米四兩。以巴豆二十一粒。去皮同炒。至米香豆黑。勿令米焦。擇去豆不用。入去白橘皮四兩。爲末。糊丸。梧子大。每薑湯服五丸。日二服。（百一選方）

㈣治暑月吐瀉。陳倉米二升。麥芽四兩。黃連四兩。切。同蒸熟。焙研爲末。水丸。梧子大。每服百丸。白湯送下。

用量　三錢至五錢。

參攷資料　㈠貝原益軒翁有用新米變陳米法。法將糀米浸水一日取出。晒一日。如是七八次。則成陳米云。㈡陳倉米煮汁不渾。初時氣味俱盡。故冲淡可以養胃。古人多以煮汁煎藥。亦取其調腸胃利小便。去溼熱之功也。千金方治洞注下利。炒此米研末。飲服者。亦取此義。日華子謂其澀腸胃。寇氏謂其冷利。皆非中論。（李時珍）㈢有屋曰廩。無屋曰倉。皆官積也。方曰倉。圓曰囷。皆私積也。老亦陳也。火米有三。有火蒸治成者。有火燒治成者。又有舍田火米。與此不同。（李時珍）㈣陳廩米。即糗米。久入倉陳赤者。以廩軍人。故曰廩爾。方中多用之。人以作醋。勝於新糗米也。（陶弘景）㈤廩米北人多用粟。南人多用糗及秫。並水浸蒸晒爲之。亦有火燒過治成者。入倉陳久皆氣過色變。故古人謂之紅粟紅腐。陳相因也。（李時珍）㈥朱公米。南中紀聞。靖州南二十里飛山砦。相傳爲元末朱都督屯兵之所。糧礫時有米粒色微黑而不腐。云是朱公所遺兵糧。游客謁神祠取輒得之。至今尚存。療脾疾。（趙學敏）

【陳麴】　即神麴之俗名。詳『神麴』條。

【陳臕星】　即天南星之處方用名。詳『天南星』條。

【陵石】　**基本**　陵石爲石類之一種。可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　益氣耐寒。久服輕身長年。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論陵石曰。治汗後耳聾。取有竅如銀眼者。爲末冷水服。

【陵石】　即路石之古籍別名。典見別錄。詳『路石』條。

【陵苕花】　即凌霄花之古籍別名。典見本經。詳『凌霄花』條。

【陵郎】　即苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦參』條。

【陵時花】　即凌霄花之古籍別名。典見山海經。詳『凌霄花』條。

【陵馬】　即車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『車前草』條。

【陵鵌】　即赤舉之古籍別名。典見別錄。詳『赤舉』條。

【陵游】　即龍膽之古籍別名。典見本經。詳『龍膽』條。

【陵澤】　即甘遂之古籍別名。典見別錄。詳『甘遂』條。

【陵龜】　即攝龜之古籍別名。典見郭璞賦。詳『攝龜』條。

【陵藁】　即甘遂之古籍別名。典見吳普本草。詳『甘遂』條。

【陵鯉甲】　即穿山甲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『穿山甲』條。

【陵蠡】　即蛞蝓之古籍別名。典見本經。詳『蛞蝓』條。

【陵蘞】　㈠即蔓蘞之古籍別名。典見別錄。詳『蔓蘞』條。㈡即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【陸荊子】　即覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳『覆盆子』條。

【陸續丸】　即蔓荊子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蔓荊子』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【陸虎遺生】卽龍骨之古籍別名。典見和漢藥考詳『龍骨』條。

【陸英】**古籍別名**　華草。（別錄）榮（不榮而實者）英（爾雅）秀榮（榮而不實者）英（爾雅）

基本　係忽冬科接骨木屬爲陸英之根葉。

產地　熊耳川谷。及寃句諸田野間均有出之。

形態　陸英爲黐草類之一種。春生莖有節節間生枝。葉大似水芹。花形如蒴藋。園中植者。莖高大而色赤。立秋前後採其枝葉可供藥用。

性質　苦。寒。無毒。

效能　除煩解悶。降濁開鬱。利尿消腫。祛溼療風。

主治　骨間諸痺。四肢拘攣。膝寒酸痛。陰痿。脚腫。短氣不足。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論陸英曰。陸英能解風毒。及脚氣上衝。心煩悶絕。水氣虛腫。風瘡皮肌惡痒等症。煎湯入少酒浴之。妙。

參攷資料　㈠陸英卽蒴藋也。古方無蒴藋。惟言陸英。後人不識。溼出蒴藋條。此葉似芹。又似接骨花。三物亦同爲一類。故芹名水英。此名陸英。接骨名木英。此三英也。花葉並相似。（蘇恭）㈡蘇恭以陸英蒴藋爲一物。今詳陸英味苦寒無毒。蒴藋味酸溫有毒。旣此不同。難爲一種。蓋其類爾。（馬志）㈢蒴藋與陸英。性味及出產皆不同。治療又各有分別。自是二物。斷無可疑。（寇宗奭）

【雀】**命名**　雀字從小從隹。隹音錐。短尾也。蓋謂短尾小鳥。故名。

古籍別名　瓦雀。賓雀。老而有斑紋者名麻雀。小而黃口者名黃雀。嘉賓（綱目）

外國名稱　Passer montanus Linn（拉丁）Sparrow或Tree-sparrow（英）Sperling（德）

基本　係脊椎動物鳥類鳴禽類雀科。

產地　穴居樹洞。及屋簷瓦隙間。處處有之。

形態　雀爲原禽類鳥屬之一種。頭圓。尾短。嘴爲圓錐狀。色黑。頂及頸。都爲胡桃色。兼褐色。頭之兩旁。白色。中央有大黑斑。背面概褐色。多黑褐斑。下面除喉部黑色外。概灰色。翼菜綠有黑斑。每足四趾。前三後一。能跳行地上。體長二三寸。性狡猾。所產之卵有花斑。其肉可供藥用。



雀

性質　甘。溫。無毒。

主治　冬三月食之。起陽道。令人有子。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論雀肉曰。益精髓。縮五臟。氣不足宜常食之。不可停輟。【宋】日華諸家本草論雀肉曰。壯陽益氣。暖腰膝。縮小便。治血崩帶下。

參攷資料　㈠正月以前十月以後。宜食之。取其陰陽靜定。未泄也。故卵亦取第一番者。（寇宗奭）㈡今人取雀肉。和蛇牀子熬膏。和藥丸服。補下有效。謂之驛馬丸。此法起於唐世。云明皇常服之有驗。（蘇頌）㈢聖濟總錄治虛寒雀附丸。用肥雀肉三四十枚。同附子熬膏。丸藥。亦祖此意也。（李時珍）㈣雀肉不可合李食。及與諸肝食。妊婦食雀肉。飲酒。令子多淫。食雀肉豆醬。令子面黑。凡服白朮人忌之。（陶弘景）

【雀卵】**採取**　五月採之。

性質　酸。溫。無毒。

主治　下氣。男子陰痿不起。強之令熱。多精有子。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論雀卵曰。和天雄蒐絲子末爲丸。空心酒下五丸。治男子陰痿不起。女子帶下。便溺不利。除疝瘕。

參攷資料　㈠雀利陰陽。故卵亦然。術云。雀卵和天雄服之。令壓不衰。（陶弘景）㈡按素問云。胸脇支滿者。妨於食。病至則先聞膵臭。出清液。先唾血。四肢清。目眩時時前後血病。名血枯。得之年少時有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

故月事衰少不來。治之以烏鯽魚骨、薷茹二物。幷合之。丸以雀卵。大如小豆。以五丸爲後飯飲。飽魚汁。以利腸中。及傷肝也。飯後藥先爲後飯。本草三藥。並不治血枯。而經法用之。是攻其所生所起耳。（蘇頌）㊁今人知雀卵能益男子陽虛。不知能治女子血枯。蓋雀卵益精血耳。（李時珍）

【雀肝】　主治　腎虛陽弱。

【雀角花】　卽雀麥之古籍別名。典見綱目。詳『雀麥』條。

【雀見臥單】　卽地錦草之古籍別名。典見綱目。詳『地錦草』條。

【雀見酥】　卽胡頹子之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『胡頹子』條。

【雀見飯甕】　卽雀甕之古籍別名。典見蜀本草。詳『雀甕』條。

【雀見酸】　卽酢漿草之古籍別名。典見綱目。詳『酢漿草』條。

【雀林草】　卽酢漿草之古籍別名。典見綱目。詳『酢漿草』條。

【雀梅】　命名　本品實形如梅。故名。

古籍別名　千雀。（別錄）爵梅。

（綱目拾遺）

產地　生海中石間。

形態　雀梅爲雜草類之一種。葉似薔薇。實如梅而小。其有樹生者。枝不蔓曲。高大而不結。名山雀梅。其葉均可供藥用。

性質　酸。寒。有毒。

主治　蝕惡瘡。治癰腫。瀉熱解毒。療便毒。乳癰。

【雀梅子】　卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『郁李仁』條。

【雀梅仁】　卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『郁李仁』條。

【雀麥】　命名　本品乃野麥爲燕雀所食。故名。

古籍別名　燕麥（唐本草）。雚。杜姥草（外臺祕要）。牛星草。雀角花（綱目）

外國名詞　Bromus japonicus, Thunb.（拉丁）スズメノチヤヒキ（日本）

基本　係禾本科雀麥屬。爲雀麥之子實。其苗詳見該條。

產地　生原野間。

形態　雀麥爲穀類之一年生平滑草本。作小穗狀花序。往往自二三花成。有長芒。其葉細長而尖。有平行脈。葉柄作鞘狀。結實亦成穗。細長而疏。其子實可供藥用。



雀麥

性質　甘。平。無毒。

主治　充饑滑腸。

【雀麥】　古籍別名　破關草。破管草。（綱目拾遺）

形態　雀麥爲雜草類之一種。其花象雀脚。相傳謂花能令人鷇。愈。可供藥用。

性質　熱。有毒。

主治　點痔漏。

參攷資料　雀麥獵人採熬藥箭。故呼破關草。又能爛痔漏。又有破管之名。性熱氣烈。傷人肌膚立能潰腫。須以米醋炒用。並能腐腸之品。不入湯劑。惟外症用之。（綱目拾遺）

【雀喙及脚脛骨】　主治　小兒乳癖。每用一具。煮汁服。或燒灰米飲調服。

【雀麥苗】　性質　甘。平。無毒。

主治　難產胎死腹中。胞衣不下。煮汁飲之。

【雀粟】　卽九熟草之古籍別名。典見別錄。詳『九熟草』條。

【雀脾斛】　卽石斛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石斛』條。

【雀腦】　主治　綿裹塞耳。治聾。燒灰油塗凍瘡。

【雀腦香】　卽香附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香附子』條。

【雀鼠】　卽鼢鼠之古籍別名。典見埤雅。詳『鼢鼠』條。

【雀榎】　卽郁李仁之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『郁李仁』條。

【雀瓢】　㊀卽蘿藦實之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『蘿藦』條。㊁卽女青之古籍別名。典見本經。詳『女青』條。

【雀頭血】　主治　雀盲。以血點之。

【雀頭香】　卽香附子之古籍別名。典見唐本草。詳『香附子』條。

【雀甕】　命名　本品卽毛蟲所作之繭。形如甕。而雀喜

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

食其蟲中子故名。

古籍別名　蚘蟲窠。躁舍。（本經）蛄蟥房。雀兒飯甕。（蜀本草）天漿子。（圖經）棘剛子。（衍義）紅姑娘窠。（綱目）

產地　凡樹枝間處處有之。

形態　雀甕大如巴豆。形如桑蠶蛸上有蓋。

採取　八月採蒸之。尤宜採榴棘上者。內有蛹。正如蠶蛸之宜採桑上者用。

性質　甘。平。無毒。

主治　寒熱結氣。蠱毒鬼疰。小兒驚痛。

近人學說　尤學周曰。治熱壅肺閉。氣急目定。有驚風傾向者。用天漿殼及麻黃等品。師徒相傳。天漿殼旁必註一包字。而藥店所用天漿殼爲斫合子。俗名婆婆針線包。此物雖內如飛絮。煎時無包之必要。且此種平淡之品。有何功能。敢與麻黃同伍。其必爲本品之殼無異。醫不識藥。藥肆妄作主張。以羊易牛。而復以訛傳訛。不加更正。良足惋嘆。

參攷資料　㈠今醫家治小兒慢驚。用天漿子有蟲者。曰熏鼠、乾蛾、三物各三枚。徹炒搗末。煎麻黃湯調服一字。日三服。加減大有效也。（蘇頌）㈡雀甕打破。取汁。與小兒飲。令無疾。小兒病撮口者。漸漸口撮。不得飲乳。但先瀉口傍見血。以甕研汁塗之。或同鼠婦生搗塗之。（陳藏器）

【雀翹】　古籍別名　去母。更生。（別錄）

產地　生藍中。

形態　雀翹爲澤草類之一種。葉細黃莖赤有刺。四月結實。銳黃中黑。可供藥用。

採取　五月採。陰乾用。

性質　鹹。無毒。

主治　益氣明目。

【雀醫草】　古籍別名　白氣。（別錄）

形態　雀醫草爲雜草類之一種。春生莖葉。秋開白花。冬結黑實。可供藥用。

性質　苦。無毒。

主治　洗爛瘡。療風水。益氣。輕身。

【雀飯】　即甘露之古籍別名。典見杜鎬。詳『甘露』條。

【雀牌斛】　即石斛莖如雀牌。葉生莖端者。詳『石斛』條。

【雀蘇】　即白丁香之古籍別名。典見炮炙論。詳『白丁香』條。

【雀麥】　即雀甕之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雀甕』條。

【雀甕】　即鴟之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『鴟』條。

【牻牛兒】　古籍別名　門牛兒。風露草。神輿草。（和漢藥考）

外國名詞　Herba Geranii Herb. Geran.（拉丁）

基本　屬牻牛兒科。爲牻牛兒之莖葉。



牻牛兒

形態　牻牛兒莖生地上。莖帶茸毛。經冬不枯。初年莖細軟。至二年則粗硬。葉對生。大寸許。作掌狀。分裂。邊緣有鋸齒。葉面生有紫黑斑點。夏日於葉間開略似梅花之花。色有白紅及淡紅等。花後結蒴實。熟則縱裂爲五。散布種子。其狀如神輿之厭。故一名神輿草。

採取　七八月間採莖葉陰乾用。

成分　此草含有鞣質。

效能　爲民間藥。濃煎用治痢。休酸及普通資加垤質。

【雪朮】　即玉朮之別名。爲朮種之最上品。性質功能。較尋常之朮尤勝。參見『白朮』條。

【雪如來】　即白芨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芨』條。

【雪芝】

基本　本品芝之爲冰雪所結。歲久蒸積而成者。

產地　多生陰崖絕壁間。及衡岳諸地。

形態　雪芝爲芝類之一種。晶瑩如玉。懸挂峻坂。非攀蘿捫級不可擷取。取得可供藥用。

主治　療肺疾。降火清心。

【雪花】　即瑞香花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『瑞香花』條。

【雪花石羔】　即石膏之細粒相集

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色潔白如雪珠者。參見『石膏』條。

【雪花菜】卽豆腐渣之古籍別名。典見憨航活人書。詳『豆腐渣』條。

【雪客】㊀卽鸕鷀之古籍別名。典見綱目。詳『鸕鷀』條。㊁卽野薔薇之古籍別名。典見花鏡。詳『野薔薇』條。

【雪眉同氣】卽白扁豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白扁豆』條。

【雪茶】命名 以其產地臨近高山積雪之處。入夏不消。而形似茶。其色又白。故名。

古籍別名 白茶(大觀)白葉茶(東溪)

產地 出滇南麗江府屬山中雪地。

形態 色白。久則微黃。形似蓮心。

性質 甘。苦。溫。

主治 祛寒。治胃氣積痛。及痢疾。

參攷資料 ㊀此茶本非茶類。乃天生一種草芽。土人採得炒焙。㊁己亥臘。過餘杭。往訪劉艷清少府。啜雪茶。云帶自雲南。茶片皆作筒子。如蜜筒菊蕊瓣樣。詢所主治。因言此茶大能燥胃。凡嚴寒冰凍時。啜一盞。滿腹如火。若患瘧痢及失血過多之人。腹胃必寒。最忌食茶。惟此茶不忌。乃相與烹瀹食之。果入腹溫暖。味亦苦洌香美。較他茶更厚。㊂大觀茶論。白茶自爲一種。與常茶不同。其條敷闡。其葉蒨薄。崖林之間。偶然生出。非人力所可致。有者四五家。生者不過一二株。所造止於二三銙而已。芽葉不多。尤難焙。焙湯火一失。則已變而爲常品。須製造精微。運度得宜。則表裏昭澈。如玉之在璞。他無與論也。㊃東溪試茶錄。白葉茶於近歲園焙時有之。地不以山川遠近。發不以社之先芽。葉如紙。民間以爲茶瑞。(趙恕軒)

【雪荷】原名 雪蓮。

命名 本品生於雪中。形如蓮。故名。

產地 出伊犁西北。及金川大寒諸地。

形態 雪荷爲雜草類之一種。高可丈許。獨莖亭亭。葉如雞冠花。長尺許。雌雄並生。雌者花圓。雄者花尖。色深紅。瓣薄而狹長。可三四寸。狀類筆頭。其花可供藥用。

性質 大熱。無毒。

主治 除冷痰。助陽道。及小兒痘瘡不起。

參攷資料 雪荷花功同仙茅枸杞。據言其地有天山。冬夏雪。雪中有蓮。以產天山峯頂者爲第一。然不可得。山腰次之。其生也。有雌雄。土人採乾之。成對以市。性大熱。能補陰益陽。老人陽絕者。浸酒服。能令有子。灘陽銷夏錄。塞外有雪蓮。生崇山積雪中。狀如今之洋菊。名以蓮耳。其生必雙。雄者大。雌者小。然不並生。亦不同根。相去必一兩丈。見其一。再覓其一。無不得者。蓋如苁蓉茯苓。一氣所化。氣相屬也。(綱目拾遺)

【雪蛆】卽雪蠶之古籍別名。典見綱目。詳『雪蠶』條。

【雪裏青】古籍別名 土犀角。過冬青(綱目拾遺)

產地 生田塍間。

形態 雪裏青爲雜草類之一種。形如天名精。布地而生。無枝梗。葉有細白毛。四時不凋。雪天開小白花。亦有於三月間。起莖開白花成穗。如夏枯草。有毛者。其根可供藥用。葉詳見該條。

性質 苦。大寒。無毒。

主治 咽喉卒閉。搗汁灌之。咳血同豬肉蒸食。散風火。消腫毒。結滯肺痿。肺癰。齒痛。痔疾。搗汁服。

【雪裏青】卽荔枝草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『荔枝草』條。

【雪裏青葉】主治 單蛾雙蛾。同根及木蓮。蓬搗汁。米醋淡過。冲和含漱之。

【雪裏花】命名 本品性堅。與耐寒。均可勝梅。於隆冬冰雪之中。開花。故名。

產地 浙之鎮海。蘇之招寶山。龍潭旁瑣堵。均有出之。

形態 雪裏花係雜草類之一種。苗短小。狀如六月雪。高不過二寸。每於嚴寒冰雪之際。開白色鮮花。大如豆形。採得曝乾。可供藥用。

性質 辛。涼。無毒。

主治 痔疾。以本品爲末。溼者乾糝。乾者麻油調搽。一二度。痔卽消縮。

【雪裏開】命名 本品隆冬嚴寒。雪中開花。故名。

321／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產地　出深谷中。

形態　雪蕊開爲雜草類之一種。苗甚短小。如六月雪狀。高僅二寸許。每雪時開白花。如豆大。其花可供藥用。根詳見該條。

主治　痔瘡。爲末傅之。乾者麻油調搽。

【雪腴】　卽茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茯苓』條。

【雪蓮】　卽雪荷之原名。詳『雪荷』條。

【雪蓮花】　**產地**　本品生於溫帶之地。如雲南邊陲諸境。

效能　性極熱。浸酒爲補劑。多血熱妄行。或用合媚藥。其禍尤烈。

【雪蝦蟆】　**產地**　巴里坤之雪山中。

形態　雪蝦蟆爲溼生蟲類之一種。遍身有金線紋。其形絕似。可供藥用。

性質　大熱。微辛。

主治　補命門。益丹田。壯陽卻冷。除痿能興。

配合應用　內造伏虎丹。興陽種子。强腎助神。用眞川貝母四兩。須四製。第一次用大附子一個。童便一湯碗。燕乾切細。燒酒三湯碗。韭菜汁三湯碗。同入砂鍋。將貝母煑乾。去附子不用。第二次用雪蝦蟆一兩。無則以大蛤蚧一對代之。用石敲碎。亦用燒酒韭汁各三碗。同貝母煑乾。去蛤蚧不用。第三次。用吳茱萸一兩。亦用酒韭汁各三碗。同貝母煑乾。去茱萸不用。第四次用公丁香五錢。亦用酒韭汁各三碗。同貝母煑乾。去丁香不用。製完。其貝母爛如泥。置石臼中舂。再入眞阿芙蓉一錢。乳製蟾酥三錢。麝香五分。拌勻作條。焙乾收貯。用時唾津磨搽。

施用宜忌　凡火盛者。禁用。

參攷資料　雪蝦蟆能回巳絕之陽。功兼參附。故爲性命根源之藥。（趙學敏）

【雪鮹】　**命名**　本品屆冬而肥。故名。

產地　廣東諸地之池澤間多有之。

形態　雪鮹爲魚類之一種。形似鰱而稍短。性喜游泳波上。得湃流則跳躍尋丈。其味美。作膾尤佳。可供藥用。

主治　益氣力。健筋骨。活血行氣。逐水利溼。

參攷資料　雪鮹粵中池塘多畜之。以魚秧長成。與鯽性相反。鯽屬土。其性沈。常潛水中。鮹屬水。其性浮。常躍水上。鯽食之。可以實腸。鮹食之。可以行氣。鯽守而鮹行。性各不同如此。（趙學敏）

【雪壓珊瑚】　卽枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枸杞子』條。

【雪雞】　**產地**　出西陲諸地。

形態　雪雞爲原禽類雞屬之一種。千百成羣。棲止雪中。可供食與藥用。

採取　以雄者入藥良。

主治　暖丹田。壯元陽。除一切積冷陰寒。痼癖諸疾。較雪蓮尤效。

參攷資料　雪鷄肥美。可以爲食。惟性燥耳。（綱目拾遺）

【雪鱉蟲】　**命名**　本品生積雪中。而狀似鱉。故名。

古籍別名　雪蚓（綱目）

產地　出北方高山諸地。

形態　雪鱉爲卵生蟲類之一種。大如瓠。味極甘美。可供藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　解內熱渴疾。

參攷資料　王子年拾遺記云。員嶠之山有冰鱉。長六七寸。黑色有鱗角。以霜雪覆之。則作兩長一尺。抽五色絲。織爲文錦。入水不濡。投火不燋。堯時海人獻之。其質輕煖柔滑。按此亦雪鱉之類也。（李時珍）

【頂生地】　卽大生地之處方用名。詳『大生地』條。

【頂棗王】　卽枸杞子之處方用名。詳『枸杞子』條。

【釘坐眞人】　卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【魚丁】　卽魚魰之古籍別名。典見綱目。詳『魚魰』條。

【魚子】　**命名**　本品卽魚腹中之子。故名。

古籍別名　鮞。鱙。（綱目）

形態　凡魚皆於冬月孕子。至春末夏初。則於淵水草間生子。有牡魚隨之。洒白越數日則化生魚子。可供藥用。

採取　以青魚鯉鯽之屬者用。

主治　目中翳障。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【魚子蘭】卽珠蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『珠蘭』條。

【魚父】卽青鴗之古籍別名。典見綱目。詳『青鴗』條。

【魚生】卽魚鱠之古籍別名。典見綱目。詳『魚鱠』條。

【魚目青】卽白青之古籍別名。典見綱目。詳『白青』條。

【魚伯】卽青鴗之古籍別名。典見綱目。詳『青鴗』條。

【魚尾花】卽雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【魚尾草】卽醉魚草之古籍別名。典見綱目。詳『醉魚草』條。

【魚油】卽魚脂之古籍別名。典見綱目。詳『魚脂』條。

【魚狗】 **命名** 本品能在水面捕食小魚。如獵狗然。故名。

古籍別名 翡。天狗。水狗。（爾雅）魚虎。魚師。（禽經）翠碧鳥。（綱目）

外國名詞 Alcedo bengalensis Gm Kingfisher Eisvogel（拉丁）カワセミ或ショウビン或カハセビ（日本）

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類魚狗科。

產地 在水涯巖穴間。

形態 魚狗爲水禽類鳥族之一種。大如燕。形似杜鵑。嘴長而强直。有角稜。末端尖銳。體之下面。概青綠色。頭部濃橄欖色。有青綠色斑紋。眼下亦有一青綠紋。眼後具强光澤之橙褐色。頸及喉部黃白色。胸腹橙褐色。尾短足亦短小。色赤褐。常在水畔掘穴營巢而居。其肉可供藥用。

性質 鹹。平。無毒。

主治 魚哽及魚骨入肉不出。痛甚者。燒研飲服。或煮汁飲亦佳。

參攷資料 今人治魚骨哽。取得去腸。用陰陽瓦泥固煅存性。入藥用。蓋取其相制之意。（李時珍）

【魚狗舌】 **製法** 用魚狗舌。以桐油浸晒乾。再浸再晒。使硬如三稜鍼用。

主治 頭風。於頭上鍼之卽愈。

【魚食】卽浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【魚虎】 卽魚狗之古籍別名。典見禽經。詳『魚狗』條。

【魚津草】卽水英之古籍別名。典見綱目。詳『水英』條。

【魚師】卽魚狗之古籍別名。典見禽經。詳『魚狗』條。

【魚草】卽車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『車前草』條。

【魚脂】 **命名** 本品卽魚之脂肪。脂者旨也。其味甘旨。故名。

古籍別名 魚油。（綱目）

性質 甘。溫。有小毒。

主治 瘧疾。用和石灰泥船。魚脂腥臭者二斤。安銅器內。燃火炷令暖。隔紙熨瘧上。晝夜勿息火。又塗牛狗疥。立愈。

參攷資料 魚脂點燈治盲人目。

【魚腥草】 **命名** 本品莖葉紫赤。有魚腥臭氣。故名。

處方用名 蕺葉。魚腥草。紫蕺。

古籍別名 蕺。（別錄）菹菜。（蘇恭）蕺菜十藥。岑菜。蕺草。孟娘菜。筆管菜。龍鬚菜。（和漢藥考）

基本 屬三白草科。爲紫蕺之葉。典莖根。

產地 多在山谷原野之陰濕地方。

形態 蕺爲多年生草本。高自七八寸至尺餘。莖細長。色紅紫。葉爲心臟形。末端尖銳。似甘藷葉及蕎麥葉。葉與莖俱有一種不快之惡臭。初夏梢上歧生分枝。而於其頂端開淡黃色之小花。花皆裸出。無花被。連綴而爲穗狀花序。花序之下。具有類似花瓣之苞四瓣。色白。果實爲蒴果。小而作球圖形。藏三花柱。中藏多數種子。



魚腥草

採取 夏秋間採之。

製法 採得葉及莖根。陰乾用。

用法 水煎或生搗。

性質 辛。微溫。有小毒。

效能 瀉熱解毒。用作瘡瘍藥。

主治 蜈蚣尿瘡。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論魚腥草曰。淡竹筒內煨

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱。搗傅惡瘡白禿。【明】李時珍本草綱目論魚腥草曰。散熱毒癰腫。瘡痔脫肛。斷痂疾。解硇毒。【明】繆希雍本草經疏論魚腥草曰。載生於下濕之地。味辛氣溫。能治痰熱壅肺。發爲肺癰吐膿血之要藥。辛溫主散。故能治蠷螋溺瘡。肺主氣。辛溫能散氣。故多食令人氣喘。肺與大腸爲表裏。大腸濕熱盛。則爲痔瘡。得辛溫之氣。則大腸清寧。故又爲痔瘡必須之藥。

配合應用　㊀單用搗汁。入年久芥菜滷飲之。治肺癰有神。

㊁治背瘡熱腫。載菜搗汁塗之。留孔以洩熱毒。冷卽易之。（經驗方）

㊂治痔瘡腫痛。魚腥草一握。煎湯熏洗。仍以草挹痔卽愈。一方洗後以枯礬入片腦少許傅之。（救急方）

㊃治疔瘡作痛。魚腥草搗爛傅之。痛一二時。不可去草。痛後一二日卽愈。（陸氏積德堂方）

㊄治小兒脫肛。魚腥草擂如泥。先以朴硝水洗。遇用芭蕉葉托住。坐之自愈。（永類鈐方）

㊅治蟲牙作痛。魚腥草、花椒、菜子油等分。搗勻入泥少許。和作小丸。如豆大。隨牙左右塞耳內兩邊。輪換。不可一齊用。恐閉耳氣。塞一日夜。取看。有細蟲爲效。（簡便方）

㊆斷截瘧疾。紫載一握。搗爛。絹包。周身摩擦。得睡有汗卽愈。臨發前一時作之。（救急易方）

㊇治惡蛇蟲傷。魚腥草、皺面草、桃樹葉。草決明。一處杵爛傅之。甚效。（救急易方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無濕熱瘡毒者禁用。

參攷資料　㊀載字。段公路北戶錄作蕺。音戢。秦人謂之蕺子。蕺載音相近也。其葉腥氣故俗呼爲魚腥草。（李時珍）㊁載菜生濕地山谷陰處。亦能蔓生。葉似蕎麥而肥。莖紫赤色。山南江左人好生食之。關中謂之蕺菜。（蘇恭）㊂案趙叔文醫方云。魚腥草卽紫載。葉似荇。其狀三角。一邊紅。一邊青。可以養豬。又有五載。卽五毒草。花葉相似。但根似狗脊骨。（李時珍）㊃俗傳食載不利人脚。恐由閉氣故也。今小兒食之。便覺脚痛。（陶弘景）㊄小兒食之。三歲不行。久食發虛弱。損陽氣。消精髓。（孟詵）㊅載菜、又名十藥。氣甚臭。村民每取其根。飯上蒸熟食之。據云味甚甘。本草以此列入柔滑菜類。然實不可食。且有小毒。日俗馬醫用以飼馬。謂有十種藥之功。能故號稱十藥云。（大和本草）

【魚膏】卽鰾膠之古籍別名。典見綱目。詳『鰾膠』條。

【魚肭】命名　本品卽諸魚之腦骨。猶枕也。故名。

主治　能消毒。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論魚肭骨曰。解蠱毒。作器盛飲食。遇蠱輒裂破也。

【魚鮓】命名　鮓者醃也。諸魚皆可爲之。魚以鹽糝醃釀而成者。故名。

古籍別名　小者名鮨。（綱目）

性質　甘鹹。平。無毒。

主治　癬瘡和柳葉搗碎。炙熱傅之。取酸臭者。連糝和屋上塵。傅蟲瘡及馬病瘡。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論魚鱗曰。食魚中毒煩亂。或成瘕積。燒灰水服二錢。

參攷資料　魚鱗係魚身保護之具。爲透明之角質。由眞皮變化而成。排列如覆瓦狀。魚之產於淡水或海邊者。因易觸傷。故鱗片厚大。其產於遠洋者。則反是。其細微者。隱於皮中。視之如裸體。其全無

本草綱目論魚鮓曰。治瘡耳痔瘻。諸瘡有蟲。療白歿代指。病主下痢膿血。

參攷資料　㊀凡鮓皆發瘡疥。鮓內有髮害人。（陳藏器）㊁鮓不熱者。損人脾胃。反至疾也。（吳瑞）㊂諸鮓皆不可合生胡荽、爨菜豆、麥醬、蜂蜜而食。令人消渴。及蟹亂。凡諸無鱗魚鮓食之。尤不益人。（李時珍）

【魚鯉草】卽魚腥草之處方用名。詳『魚腥草』條。

【魚鯉】卽絲瓜之古籍別名。典見綱目。詳『絲瓜』條。

【魚鱗】命名　鱗者。粼也。魚產於水。其鱗似粼。故名。

主治　諸魚鱗燒灰。主魚骨鯁。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論魚鱗曰。食魚中毒煩亂。或成瘕積。燒灰水服二錢。

參攷資料　魚鱗係魚身保護之具。爲透明之角質。由眞皮變化而成。排列如覆瓦狀。魚之產於淡水或海邊者。因易觸傷。故鱗片厚大。其產於遠洋者。則反是。其細微者。隱於皮中。視之如裸體。其全無

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鱗者。則甚稀。今所謂無鱗魚者。實鱗之細微者居多爾（醫學辭典）

【魚鷹】 即鸕之古籍別名。典見禽經。詳『鸕』條。

【魚鱠】 命名 本品以魚創切成故名。凡諸魚之鮮活者。薄切洗淨血鮭。沃以蒜蘆薑醋五味食之。皆謂之鱠。

古籍別名 魚生（綱目）

性質 甘。溫。無毒。

主治 去冷氣。澄痺。除膀胱水。腹內伏梁。氣塊冷痰。結癖疝氣。喉中氣結。心下酸水。開胃口。利大小腸。補腰脚。起陽道。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論魚鱠曰。宜脚氣風氣人。治上氣喘咳。【唐】孟詵食療本草論魚鱠曰。鯽鱠。主久病腸癖痔疾。大人小兒丹毒風眩。

參攷資料 ㊀魚鱠辛辣。有却病之功。予在蒼梧。見一婦人。病吞酸。諸藥不效。偶食魚鱠。其疾遂愈。蓋此意也。（汪穎）㊁近夜勿食。不消成積。勿飲冷水。生蟲時行。病後食之。胃弱。勿同乳酪食。令人霍亂。不可同瓜食。（陳藏器）㊂按食治云。凡殺物命。既虧仁愛。且肉未停冷。動性猶存。旋烹不熟。食猶害人。況魚鱠肉生。損人尤甚。爲癥癥。爲痼疾。爲奇病。不可不知。昔有食魚生而生病者。用藥下出巳變蟲形。鱠縷尙存。有食鼈肉而成積者。用藥下出巳成動物而能行。皆可驗也。（李時珍）

【魚鼈金星】 命名 以其葉橢圓如魚鼈而葉面又起金點如星故名。

產地 浙江西子湖飛來峯之絕頂。以及其他背陰山石間。

形態 魚鼈金星爲植物雜草類之一種。立夏後發苗。根細如纖線。蔓延石上。葉不對節。一長一圓。長者爲魚。圓者爲鼈。葉經霜則老。背起金星。惟鼈葉無葉可供藥用。

性質 涼。

主治 治膨脹。癰蠶。火毒症。

【鳥不停】 即鳥不宿之古籍別名。典見汪連仕採藥書。詳『鳥不宿』條。

【鳥不宿】 命名 本品枝梗有刺。鳥不能棲宿故名。

古籍別名 晚娘棒（綱目）老虎草。骨樹。晚娘棒。鳥不踏。刺根白皮。石米刺（綱目拾遺）鳥不停。刺（汪連仕採藥書）茨梧桐。

產地 多生山塢間。

形態 鳥不宿爲灌木類之一種。枝赤色。長三四尺。皮色如桑。細者如大指。老者如甘蔗。葉如杏葉。開黃花成穗。其根白皮可供藥用。

性質 涇。

主治 透骨追風。行血定痛。療風毒流注。跌打損傷。催生下胎。雙單喉蛾。紫雲風。大麻風。筋骨疼痛。並治虛勞如神。

【鳥不宿根下蟲】 主治 風毒流注。神效。

【鳥不宿莖葉】 主治 雜產。同甘草和酒水煎服。

【鳥不踏】 即鳥不宿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鳥不宿』條。

【鳥木羊】 即狒狒之古籍別名。典見山海經。詳『狒狒』條。

【鳥栗】 即九熟草之古籍別名。典見別錄。詳『九熟草』條。

【鳥岡子】 即鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠李子』條。

【鳥奏】 即相鳥之古籍別名。典見綱目。詳『相鳥』條。

【鳥龍尾】 即梁上塵之古籍別名。典見綱目。詳『梁上塵』條。

【鹵水】 古籍別名 苦鹵（綱目拾遺）

性質 苦。鹹。無毒。

主治 治大熱消渴。去煩除邪。下蠱毒。柔肌膚。去澀熱。消痰癖。積塊。洗垢膩。多服損人。

參攷資料 有鹽膽水。乃巳燒成鹽。復澆下之。苦鹵一名鹵水。此乃取於鹵地。澆以燒鹽之用。與鹽膽水不同。（趙恕軒）

【鹵鹼】 原名 鹵鹹。

命名 本品乃土中所含一種質料。性滑而味鹹。可用以晾衣去垢者。就土性而曰鹵。取而用之。則曰鹼。故名。

古籍別名 鹵鹽。寒石（吳普）石鹹（補遺）鹵礜。凝結如石者名石鹼（綱目）

產地 出山西諸縣平野及太谷榆次等高亢地。

形態 鹵鹼爲鹵石類之一種。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

秋間皆生。鹵望之如水。近之如積雪。刮而熬之。遂成爲鹹。微有蒼黃者。卽鹵鹹也。爾雅所謂天生曰鹵人生曰鹹者是。可供藥用。

性質 苦寒無毒。

主治 大熱消渴狂煩除邪。及下蟲毒。柔肌膚（本經）去五臟腸胃留熱。結氣心下堅。食已嘔逆喘滿。明目目痛（別錄）

參攷資料 ㊀鹵鹹制四黃作鉼藥用。礪砂礬鐵。一時卽軟。（獨孤滔）㊁凡鹽未經滴去苦水。則不堪食。苦水卽鹵水也。鹵水之下澄鹽。凝結如石者。卽鹵鹼也。丹溪所謂石鹼者。乃灰鹼也。見土類。吳普本草。謂鹵鹹一名鹵鹽者。指鹵水之鹽。非鹵地之鹽也。不妨同名。（李時珍）

【鹵鹹】卽鹵鹼之古籍別名。典見綱目。詳『鹵鹼』條。

【鹵鹼】卽鹵鹼之原名。詳『鹵鹼』條。

【鹵鹽】卽鹵鹼之古籍別名。典見吳普本草。詳『鹵鹼』條。

【鹿皮】**主治** 一切漏瘡。燒灰。愈乃止。

【鹿白】卽苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦參』條。

【鹿列】卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【鹿竹】卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳『黃精』條。

【鹿肉】**性質** 甘。溫。無毒。

主治 補中益氣力。强五臟。生者療中風口僻。割片薄之。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草。論鹿肉曰。補虛瘦羸。調血脈。【明】李時珍本草綱目。論鹿肉曰。養血生容。治產後風虛邪僻。

參攷資料 ㊀九月後。正月前。可以食。他月不可食。發冷痛。白膿者。豹文者。並不可食。鹿肉脯炙之不動。及見水而動。或曝之不燥者。並能殺人。不可與雉肉、蒲白、鮸魚、蝦同食。發惡瘡。禮記云。食鹿去胃。（孟詵）㊁中風口偏者。以生肉同生椒搗貼。正卽除之。（華陀）㊂蜃居士言。鹿性多瞥烈。能別良草。止食葛花、葛葉。鹿藿、鹿藥、白蒿、水芹、甘草、薺苨、齊頭蒿、山蒼耳。他草不食。處必山岡。故產則歸下澤。饜神用其肉者。以其性烈清淨也。凡藥餌之人。久食鹿肉。藥必不得力。服爲其食解毒之草。制諸藥也。（孫思邈）

【鹿血】**主治** 陰痿。補虛。止腰痛。鼻衄。折傷。狂犬傷。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草。論鹿血曰。和酒服。治肺痿吐血。及崩中帶下。【明】汪穎食物本草。論鹿血曰。諸氣痛欲危者。飲之立愈。【明】李時珍本草綱目。論鹿血曰。大補虛損。益精血。解痘毒。藥毒。

參攷資料 ㊀近世有服鹿血酒者。云得於射生者。因採捕入山。失道數日。飢渴將委頓。惟獲一生鹿。刺血數升飲之。飢渴頓除。及歸。遂覺血氣充盛。過人。有效而服之者。刺鹿頭角間血。酒和飲之。更佳。（蘇頌）㊁近世韓飛霞補益方。有斑龍晏法。孫氏解痘毒。有陰陽二血丸。皆古所未知者。而沈存中又以刺血代茸爲非。亦一說也。（李時珍）

【鹿沙】卽沙魚之背有珠文。如鹿斑。長至八九尺者。性質功能。參詳『鮫』條。

【鹿良】**基本** 鹿良爲雜草類之一種。可供藥用。

採取 五月採之。

性質 鹹。臭。

主治 小兒驚癎。貫尿趣癌。大人癆病。

【鹿角】**命名** 本品乃鹿之頭角。

處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。

古籍別名 鎮山威。斑龍角。（和漢藥考）

外國名詞 Cornu Cervi（拉丁）Hartshorn（英）Hirschhorn（德）

基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。

產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山、關東、海參威、黑河、桂花城、西口、三姓等處。和漢藥考曰。非洲、海洋洲、均不產此。產於其他三大洲。

形態 鹿爲樓息山中性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

惟牡脊有白毛斑點。牝則雜有白毛。牝無角。牡有角。由年數而增加枝數。夏季觸樹水而脫落。此角謂之鹿角。供藥用。其角係作枝狀分歧之堅實角質。長有達三尺者。外面呈白色或淡褐色。處處疣起。下部斷面有無數鬆孔。是乃血脈穿過角質中之瘢痕。

種類　㊀鹿角有頭骨皮毛毗連者爲生角。㊁鹿角無頭骨皮毛毗連者爲解角。

採取　每年七月間採截其老角。須以鹿年久者佳。麦以爲膠。入藥更佳。尤要黃色緊重尖者之角。以此鹿食靈草。故異於衆鹿也。

製法　孟詵曰。凡用鹿角。槩角。並截段鋸屑。以蜜浸過。微火焙令小變色。曝乾。搗篩爲末。或燒飛爲丹。服之至妙。以角寸截泥裹於器中。大火燒一日。如玉粉也。李時珍曰。按崔行功要纂方。鹿角粉法。以鹿角寸截炭火燒過。搗末水和成團。以絹袋三五重盛之。再煨再和。如此五度。以牛乳和再燒過研用。

用法　與他藥水煎。或酒浸。或劑末和作丸劑。

性質　鹹。溫。無毒。

成分　爲燐酸鈣、炭酸鈣、膠質、軟骨等。

效能　散瘀活血。治瘡瘍腫毒。益氣補虛。治五勞七傷。用作溫補強壯藥。又治遺精。腎盂炎。

主治　惡瘡癰腫。逐邪惡氣。留血在陰中。除少腹血痛。腰脊痛。折傷惡血。益氣。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論鹿角曰。貓鬼中惡。心腹疼痛。【唐】孟詵食療本草論鹿角曰。蜜炙研末。酒服。輕身強骨。髓補陽道。絕傷。又治婦人夢與鬼交者。清酒服一撮。卽出鬼精。燒灰治婦人胞中餘血不盡。欲死。以酒服方寸匕。日三。甚妙。【宋】日華諸家本草論鹿角曰。水磨汁服。治脫精尿血。夜夢鬼交。醋磨汁塗瘡瘍癰腫。熱毒火炙熱熨小兒重舌鵝口瘡。【明】繆希雍本草經疏論鹿角曰。麋茸補陰。鹿茸補陽。角亦如之。凡角初生。軟嫩者爲茸。稟壯健之性。故能峻補腎家眞陽之氣。熬成白膠。則氣味甘緩。能通周身之血脈。生角則味鹹氣溫。惟散熱行血。消腫。辟惡氣而已。鹹能入血。軟堅。溫能通行散邪。故主惡瘡癰腫。逐邪惡氣。及留血在陰中。少腹血急痛。折傷惡血等證也。肝腎虛。則爲腰脊痛。鹹溫入腎。補肝。故主腰脊痛。氣屬陽。補陽故又能益氣也。【清】張隱菴本草崇原論鹿角曰。鹿角功力與茸角相等。而攻毒破洩。行瘀逐邪之功居多。較茸膠又稍銳焉。【清】徐洄溪本草經百種錄論鹿角曰。鹿之精氣全在於角。角本下連督脈。鹿之角於諸獸爲最大。則鹿之督脈最盛可知。故能補人身之督脈。督脈爲周身骨節之主。腎主骨。故又能補腎。角之中皆貫以血衝。爲血海。故能補衝脈。衝督盛而腎氣強。則諸效自臻矣。【清】閻立陛本草選旨論鹿角曰。鹿角有生用熟用兩法。生能散熱行血、消腫、辟邪。熟能益腎、補虛、強精、活血。故本草治惡瘡癰疽。逐邪惡氣。夜夢鬼交。留血在陰中。除少腹血痛。折傷惡血等症。服用水磨。塗用醋磨。所謂生用也。又強骨髓。補陽道。絕傷。脫精。尿血。腰脊痛。又婦人夢與鬼交。及婦人胞中餘血不盡。欲死。蜜炙酒服。或燒灰研服。所謂熟用也。

國外學說　英美學說謂鹿角係牡鹿之角。並其磅下之角。在古人常用之爲藥品。鹿角至春時則解。自第一年至第五年。逐年加大。過五年則漸減小。如將鹿角燒之。所成之灰。可以作炭養燐養(五)之用。所以鹿角之功用。如取鹿角磅下之花。合於水沸之。則成無色膠類質。有養身之性。可代魚肚等膠類形質。又有鹿角精與鹿角油。鹿角鹽。皆有祛痰、發汗、興奮之效。而鹿角膠則爲補藥。又日本和漢藥考曰。鹿畏人。惟日本大和國奈良及安藝國宮島之馴鹿。則爲人狎。生後一年之牡鹿無角。二年乃生角。但無枝。三年生一枝。四年生二枝。六年生四枝。六年以上。增加未有一定。昔時歐洲亦有以鹿角供藥用。並有鹿角所製之鹿角油(Oleum animal raspatum.)鹿角炭(Cornu cervi nigrum.)鹿角鹽(Sol. volatile cornu cervi)鹿角灰(Cornu cervi album.)等製劑。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

近人學說 曹炳章曰。鹿常棲於西北山林中。善別良草。常食菖葉、鹿葱、白蒿、水芹、甘草、蒼耳、薺苨、柏櫟、橡栗之芽蘖及樹皮果實等植物。夏期入深山。至冬出遊於山麓。性溫順。常驚駭善走。啼聲悲慘。喜羣居。分背而食。食則相呼。行則同旅。居則環角向外以防患。臥則口朝尾關以通督脈。常以一牡多牝而成羣。交尾期在秋季。一牡常交百數牝。謂之聚麀。至春初羸瘦。入夏得蒼蒲食之而肥。孕於仲秋。生於仲春。六月而生。每胎一子。初生鼻邊有缺者爲雄。雄者毛黃色。有白斑。有角。雌者無角。毛雜黃白色。無斑。鹿至六十歲必懷孕於角下有斑痕紫色。行則流涎。不復急走。故曰鹿戴玉而角斑。蠕範云。鹿千歲色蒼。一千五百歲色白。二千歲色元。隴蜀餘聞云。明正統十五年。洋縣橫溪獲一白鹿。項有銅牌。上有鐫刻皆漫滅。惟唐字可辨。其在千年以上者無疑。鹿之嗅覺甚敏銳。有上風有獵犬及人。能嗅得之。又能辨微聲。故不易獵獲。今之獵者每當秋季。吹鹿笛誘出而鎗殺之。鹿體癯弱。四肢細長。前二趾踏地有蹄。尾短。眼耳皆大。耳亮能轉動。牡者有枝形角一對。牝者無之。毛色至夏赤褐。有淡色白斑。是謂鹿斑。至冬概灰褐。體長四尺餘。角不空。由皮膚下層（卽眞皮）所變化而養達者。初爲瘤狀。呈紫褐色。蔽褐色密毛。是爲鹿茸。富有血管。拘之甚溫。迨鹿茸漸長。乃磨於樹幹。脫去皮毛。此時其營養盛。而血管破裂流血。乃見眞角。鹿角原實。與尋常各獸角不同。因牛羊等角有心。其原料與結成之阿勒約門實相類。鹿角至春日則脫。自第一年至第五年。逐年加大。過第五年則漸減少。當年初生者無角。頭上祇有兩凸處。至第二年則生出無枝之角。第三年則生叉形之角。第四年則生兩叉之角。第五年則生四叉之角。第六年則生五叉之角。第七年則生四叉之角。以後各年之形。無大變化。惟逐年減少。其原質與骨大同小異。鹿茸乃鹿解角後。新生含血之芽角。漸長則成毛角。再大則謂鹿角。故云宜如茄之小者。分歧貝大而不取。此舉茸生初久。形分大小而言。未可指爲鹿之大小解也。凡具氣者。幼則弱。老則衰。惟壯健者則强。是麋鹿之茸。皆當取於壯大之爲貴。乃今以小而毛黃爲鹿。大而毛青爲麋。致購茸之競爭小者。其惑甚矣。不知鹿之種類甚夥。古書誤解亦甚多。茲再詳細辨正之。鹿有同類異種。同種異形。其各種形態習性。分條辨列如下。（甲）鹿類異種當分爲二十二種。列舉於后。（一）羌鹿。體小而輕健。肩高約二尺。體重約三十斤。毛角赤黃褐色。頗美麗。角小而形簡。由前頭骨所生之長骨軸支之。角上有毛。牡者角長三寸至四寸餘。眼下有斜走之隆起二上顎之犬牙甚發達。爲防敵之用。叫聲如狐。性能怯弱。善馳。產於中國、日本、蘇門答臘、爪哇、菲律賓等處。（二）麞鹿。爲鹿類中之巨大者。長成之牡鹿高達五尺半以上。體重約千磅。角叉分十二至十四時達二十叉。長達五尺。多棲於美洲落磯山脈附近。能泳水。亦善馳。北美洲土人豢之。使曳撬或荷物。肉味頗美。（三）赤鹿。宴中記云。南山有赤鹿。足短。而身大如牛。肉千斤。毛皮冬夏異色。夏毛帶赤褐色。冬毛帶灰色。角如枝狀。長成者之角。長約三尺。有二十餘尖。有時達四十餘尖。當年之稚鹿無角。產子期在六月間。每產不過二子。稚鹿之背部及體旁有白斑。產於歐亞之北方。（四）麋鹿。體比赤鹿大。而强壯。相等。毛色煤褐。眼上具黃褐斑紋。角有三叉枝。株向前彎。而超過頭頂。尖端爲簡式之分。叉沿其曲線而直計之。長達四尺。（五）黇鹿。形似赤鹿而略小。成長之牡。肩高約三尺。體重約二百磅。毛色概黃褐。或帶赤褐。有明顯之白斑紋。又有多數白線紋。至冬季毛色增灰。至夏則常帶黑褐色。角之上部邊平。或爲掌狀無枝。略向前尾略長。性溫順。經三年而長成。可飼養之。爲園中玩賞品。亞歐兩洲皆產之。（六）麈鹿。體小形美。肩高二尺三寸許。體長三尺三寸許。角小。長約七寸至一寸七分。分三枝。全體色暗赤褐。毛粗。臀部近旁有白斑。無尾。眼之肉皆無凹窩。常獨居。產於歐洲之暖地及亞洲等各處。（七）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

臺鹿。體形似鹿有斑點。產於臺灣。(八)島鹿。形性似臺鹿。產馬來菲律賓。(九)馴鹿。產於亞歐美三洲之北極地。體軀之大小。隨產地而異。大概棲地愈北者則較大。頸短。頸下有長毛。四肢強健。第二第五趾。與第三第四趾踏地。蹄廣而分裂。踏雪而行。不致陷入。產於美洲者體最大。長大之牡。肩高達四尺許。重約四百磅。夏季毛色概暗褐。頸鼻腹及後肢皆白。至冬季毛換縮。色淡帶灰。牝牡皆有角。出胎數月間即生。牡角大。長達五尺許。角基圓長。角頂擴大生枝。枝端扁平如鍬。牝角較小。而分枝亦少。馴鹿原係野生。夏季出山林遊於山地。入秋再返舊地。其去森林爲避蚊蝱之刺螫故也。至冬日積雪滿地。善用其吻端角蹄。掘食雪下之地衣類。(十)長頸鹿。形略似鹿。頸甚長。故名。頭頂至趾高一丈八尺。爲動物中之最高者。頭小眼大。鼻孔能開閉。耳殼小。唇長而薄。上顎無門牙及犬齒。但上下顎之血齒强大。舌細長。具鉤曲之刀。牝牡皆有短角一對。牡者雖長不似鹿角之羊。交脫。角形如截木。外被皮膚。尖端簇生短毛。頸盛長。頸骨祇有七節。與他獸同。頸上具短鬣。胸部小。四肢長。前肢尤長。肩高九尺。尾細長。尖端有叢毛。全體毛色橙赤。散列暗黑色之圓斑。腹及肢下色較淡。體長丈六。乃至丈九。牝者較短。多產於非洲。性溫順。食草木之嫩芽。以四肢及頸俱長。亦適於食喬木之葉。步行甚速。(十一)馬鹿。稚寰云。晉楚有鹿似馬。當解角時。與馬無異。故名馬鹿。(十二)麚鹿。埤雅云。北狄有麚鹿。極大。而色蒼黃無斑。角大而有紋。堅瑩如玉。茸亦可用。(十三)天鹿。瑞應圖云。天鹿神獸也。狀如牛。身披五色而肉甲。方旭蠡蕞云。天鹿或作天祿。孟康西域傳注云。符拔一角爲天祿。兩角爲辟邪。伏似虎。正黃色。有髯而尾有茸毛。大如牛。蠕蝡云。天鹿野馬也。一角如茸。青色。其肉落地不沾泥沙。謂之鹿獸。(十四)靈鹿。粵述云。梧州火山。靈鹿三足。(十五)兩頭鹿。南中志云。兩頭鹿。產雲南。一身兩頭。食毒草。又名食毒鹿。張華博物志名茶首機。出永昌郡。是兩頭鹿名也。似鹿兩頭。其胎中屎。以四月取之。段成式酉陽雜俎云。雙頭鹿矢名耶希。夷人謂鹿爲耶。謂屎爲希。按唐韻屎字音矧。卽此義也。陳藏器以胎中屎敷惡瘡。乃蛇虺毒。范曄後漢書云。雲陽縣有神鹿兩頭。能食菲草。華陽國志云。此鹿出雲陽南郡熊舍山。荊州記云。式陵郡、雲陽山、點蒼山、產兩頭鹿。獸似鹿前後有頭。一頭食。一頭行。山人時或見之。(十六)黿。澤史紀餘云。黿鹿南海黿魚所化。其色較鹿稍赤。本草明辨云。外洋淡水處出黿鹿。乃黿魚所變。其角曰魚角。其色枯白。杈枝最多。不能取茸。(十七)飛孩獸。洞冥記。翕韓國獻飛孩獸。似鹿青色。帝以寒青之絲爲繩繫之。及死掛於苑門。皮毛皆朽。而骨猶毒人。知其靈異。更以他繩繫其足。明日往視。唯繫處存。餘皆飛去。(十八)把雜爾。坤輿外紀云。渤泥產把雜爾。狀似鹿。腹生一石。可療百病。國王甚重之。旭云。把雜爾八絃澤史作把雜蘭。出西南大海中。渤泥國。(十九)獵如。西山經云。皋塗山有獸曰獵如。狀如鹿而有四角。白尾。其前足如人手。而後足如馬蹄。(二十)夫諸。中山經云。敖岸山有獸曰夫諸。狀如白鹿而四角。(廿一)無損。騅雅云。豕頭而牙爲無損。訓寘云。南方有獸。似鹿而豕頭有牙。善依人。求五穀食之。名無損。(廿二)角端。廣輿紀云。角端產韃靼。角可爲弓。隴蜀餘聞云。角端產瓦屋山。能食虎豹。不傷人。談薈云。角端鹿形。馬尾。獨角生鼻上。日行萬八千里。能曉四夷之語。張尙瑗石里石識云。國朝崇德二年。蒙古貢齊希特。能解人語。蓋角端之屬。然則元時所見。或亦齊希達乎。元史元太祖至西印度見角端能言。(乙)麋類異種。當分爲四種。條舉列后。(一)麋。形體甚大。重一千四百磅。高約七尺。四肢較長。全體暗赤褐色。眼小耳闊。頸有短鬣。胸部及喉下密生長毛。向下垂。牡體生後九月而生角。逐年增枝。枝短而粗。角之全部成鍬形。從左右兩旁向內部彎曲。其中央略成凹形。角之大者。重達七百兩以上。每行深林中。必將其角向後橫臥。故能不與樹枝相抵觸。而

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

來去自如。此角極堅強。力能撲狼。頸極短。體又甚高。故不便俯首食地面雜草。常至叢林中。食樹皮樹葉及嫩芽等。性怯弱。喜孤立不成羣。馳走迅速。亦能游泳。夏日爲防蠅類刺螫。則浸入池中。僅露頭面。其蹄較大。故行軟泥地及雪上。無傾陷之患。牝者每次產二子。肉可食。產中國西北各山林中。及俄國、那威、瑞典及北美洲之北方。博物志云。麋生南方。恒千百爲羣。食澤草。其踐處成泥。名曰麋塗。種稻可收百倍。方旭云。狀與鹿無異。但目下有兩孔。能夜視。其毛帶青黑色。牡者亦有兩角。夏至解角。(二)麞。北山經云。倫山有獸曰麞。狀似麋而竄在尾上。與熊屬之羆不同者。(三)麏。胡東山經云。尸胡山有獸曰麏。胡狀如麋而魚目。鳴自呼。(四)麝。西域記云。麝似麋而大。前昂後低。毛多而長。爲裘甚暖。角扁而厚。爲筷甚良。(丙)鹿形異獸。當分爲四種。分列於后。(一)麈。係一種奇異之鹿。類頭似鹿。脚似牛。尾似驢。背似駱駝。從全體觀之。無一所似。故此人俗呼四不像。體大如小牛。毛淡褐。背稍濃。腹漸淡。角實堅。表面有凸凹。角基甚厚。從幹分二叉。一向後。一向外向後者。有並行之類。小彎直伸而出。向外者甚彎曲。末端復分歧。足頗大。蹄較小。體長(除尾)七尺三寸。肩出約四尺。性似鹿。食植物。常慢走。馳驅時比馬尤速。每年五月間產子。孕期八箇月。稚獸毛濃黃。兼褐色。有白色大斑。生後三箇月。斑即消失。牡者生後二年。角始分叉。角至冬至時則脫落。或謂此獸爲我國固有之動物也。地學雜誌云。額爾古納河右岸。鄂倫春所使者。彼名曰沃利恩。吾國名曰麈。俗名四不像。角有數歧。似鹿蹄分兩歧。似牛身長。色灰似驢。其頭則似鹿。非鹿。似牛非牛。寬額而長喙。毛甚豐。能負重百餘斤。鄂倫春俄人馴畜之。用時以木擊樹。或吹木器。聞聲即來。飼以苔。用畢則縱之去。即遊行山中。廣輿記云。麈產陝西終南山。六書故云。麈似鹿而大。長尾可爲拂塵。解角於長至節。名兔云。鹿之大者曰麈。羣鹿隨之。視其尾爲準。其尾能辟塵。拂甚則不蛀。置酉帛中。能歲久紅色不退云。(二)麈。正字通云。鹿狀似麈。但角不歧。毛不斑耳。爾雅謂牛尾一角誤。(三)麝。說文。麝。麈也。六書故云。麝之脂黃。亦謂黃羊。談薈云。麝無脂。埤雅云。麝性怯。飲水見影。即奔。本草綱目云。麝。秋冬居山。春夏居澤。其狀似鹿而小。無角。毛黃黑色。牡者口外有兩牙甚長。俗呼牙麝。白者曰銀麝。孟詵曰。麝肉八月至十一月可食。餘月動氣。(四)方輝格致鏡原云。弦超入泰山。見一物似麝而頭似婦人。髮髻簪珥悉具。歸告瓊智瓊智曰。此方輝也。五百年一見。見者必壽。後弦超果二百餘歲。綜觀以上鹿類二十二種。麞類四種。麈形異獸四種。計三十種。其間有同種異形者。有同形異種者。其角可入遂取茸者。不及六七種。錄之以備鑑別參考耳。

配合應用 ㊀服鹿角法。鹿角屑十兩。生附子三兩。去皮臍爲末。每服二錢。空心溫酒下。令人少睡。益氣力。通神明。(彭祖方)

㊁治腎消尿數。鹿角一具。炙搗篩。溫酒每服方寸匕。日二。(外臺秘要方)

㊂治骨虛勞極。面腫垢黑。骨痛不能久立。血氣衰憊。髮落齒枯。甚則喜唾。用尾角二兩。牛膝酒浸焙一兩半。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽酒下。(濟生方)

㊃治腎虛腰痛如錐刺。不能動搖。鹿角屑三兩。炒黃研末。空心溫酒服方寸匕。日三。(肘後方)

㊄治卒腰脊痛。不能轉側。鹿角五寸。燒赤。投二升酒中。浸一宿。飲。(梅師方)

㊅治婦人腰痛。鹿角屑。炒黃。研酒服方寸匕。日五六服。(楊氏產乳方)

㊆治妊娠腰痛。鹿角截五寸長。燒赤。投一升酒中。又燒又浸。如此數次。細研。空心酒服方寸匕。(產寶方)

㊇治產後腹痛。血不盡者。產後燒研。豉汁服方寸匕。日二。(子母祕錄方)

㊈治妊娠下血不止。鹿角屑。當歸各二兩。水三盞。煎減半。頓服。不過二服。(普濟方)

㊉治胎死腹中。鹿角屑三寸匕。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

煮漿菔湯和服。立出。(百一選方)

㈡治墮胎血瘀不下。狂悶寒熱。用鹿角屑一兩。爲末。菔湯服一錢。三日須臾血下。(聖惠方)

㈢治胞衣不下。鹿角屑三分爲末。童湯調下。(產乳方)

㈣治產後血暈。用鹿角一段。燒存性。出火毒爲末。酒調。灌下。卽醒。(楊倦醫方摘要方)

㈤治婦人白濁滑數。虛冷者。鹿角屑炒黃爲末。酒服二錢。(婦人良方)

㈥治筋骨疼痛。鹿角燒存性爲末。酒服一錢。日二。

㈦治食後喜嘔。鹿角燒末二兩。人參一兩爲末。童湯服方寸匕。日三。(肘後方)

㈧治小兒噦疾。鹿角粉、大豆末。等分相和。乳調塗乳上飲之。(古今錄驗方)

㈨治小兒瘧疾。鹿角生研爲末。先發時。以乳調一字服。(千金方)

㈩治小兒滯下赤白者。用鹿角灰、髮灰等分。水服三錢。日二。(千金方)

(一)治小兒重舌。鹿角末塗舌下。日三。(姚和衆方)

(二)治小兒流涎。脾熱也。鹿角屑末。米飲服一字。(普濟方)

(三)治面上皯皰。鹿角尖磨濃汁厚塗之。(神效方)

(四)治面上風瘡。鹿角尖磨酒塗之。(聖惠方)

(五)治咽喉骨鯁。鹿角爲末。含之。嚥津。(斗門方)

(六)治蹉跌損傷。血瘀骨痛。鹿角末酒服方寸匕。日三。(千金方)

(七)治竹木入肉不出者。鹿角燒末。水和塗上。立出。久者不過一夕。(千金方)

(八)治蠷螋尿瘡。鹿角燒末。苦酒調服。(外臺祕要方)

(九)治五色丹毒。鹿角燒末。豬脂和敷。(肘後方)

(十)治發背初起。鹿角燒灰。醋和塗之。日五六易。(千金方)

(一一)治乳發初起。不治殺人。鹿角磨濃汁塗之。井令人嗽去黃水。隨手卽散。(梅師方)

(一二)治吹奶掀痛。鹿角屑爲末。炒黃。酒服二錢。仍以梳梳之。(唐氏經驗方)

(一三)治下注脚瘡。鹿角燒存性。入輕粉同研。油調塗之。(集要方)

(一四)治癤腫毒。鹿角尖磨濃汁塗之甚妙。(瀕湖方)

(一五)治癜疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 杜仲爲之使。

著名方劑 斑龍丸。治虛損理百病。(青囊方)鹿角膠、鹿角霜、熟地黃、菟絲子、栝子仁等分。共研末。酒化膠和爲丸。

參玆資料 (一)鹿角生用則散熱行血。消腫辟邪。熟用則益腎補虛。强精活血。鍊霜熬膏。則專於滋補矣。(李時珍)(二)鹿角堅而棄角鬆。鹿角小而棄角大。鹿角單而棄角雙。小者曰鹿。大者曰麋。茸之大小。卽以此別。麋牡者有角而無齒。此指上齦齒也。若下齦齒則牝牡咸有。其無角有齒者。牝也。(楊時泰)

【鹿角片】卽鹿角之處方用名。詳『鹿角』條。

【鹿角菜】

命名 本品形似鹿角。故名。

古籍別名 土肉。石華。(郭璞海賦)龍鬚菜。(盛京志)猴葵。(綱目)麒麟菜。石花菜。細如牛毛者。名牛毛石花菜。(綱目拾遺)

外國名詞 Chondrus ocellatus Holmes (拉丁) ツノマタ (日本)

基本 係紅藻類杉海苔族鹿角菜屬之鹿角菜。

產地 生海濱沙石間。

形態 鹿角菜爲水菜類之一種。有紅白二色。紅者長四寸。分岐如叉。本細而末闊。末端純圓。作紫黃色。全形略似鹿角及珊瑚白者。根叢生。長約尺餘。狀如柳而色白。質皆酥脆。可供藥用。

性質 甘。大寒。滑。無毒。

主治 下熱風氣。療小兒骨蒸熱勞。服丹石人食之。能下石力。

歷代記述 【清】趙學敏本草綱目拾遺論鹿角菜曰。消痰如神。治一切痞積痔毒。

參玆資料 (一)鹿角菜微毒。丈夫不可久食。久食發痼疾。損腰腎。經絡。血氣。能令人脚冷痺。少顏色。(孟詵)(二)鹿角菜土人採曝。貨爲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

海錯。以水洗醋拌。則脹起。如新味極滑美。若久浸則化如膠狀。女人用以梳髮。黏而不亂。㊂石花菜生海中沙石間。高二三寸。狀如珊瑚。有紅白二種。洗去沙土。煮化凝成膏。糟醬俱佳。又有細如牛毛者。呼牛毛石花。味稍劣。郭璞海賦所謂土肉石華是也。（朱排山柑園小識）㊃龍鬚菜生於東南海邊石上。叢生。狀如柳根。長者至尺餘。白色。以醋浸食。亦佳蔬也。土人呼爲麒麟菜。出金州海邊。鹿角菜生東南海中。大如鐵線。分丫如鹿角。紫黃色。乾之爲海錯。水洗醋拌。則如新味。今金州海邊有之。據志則似一類二種也。（盛京志）㊄石花膏毛世洪養生集。治辛苦勞碌之人。或嗜酒多慾。忽生外痔。發作疼痛。步履難移。服此或大便瀉一遍。或不瀉。亦卽止痛。可以行走。再用搽洗等藥。自能斷根。用麒麟菜洗去灰一兩。用天泉水煮烊。和白糖五錢。食之。此方乃李治運泉司傳。靈隱寺僧。杭人。蕭成子患此症。僧往候。授以此方。服之隨愈。予記之。後治數人多效。

【鹿角膏】卽霍飯石膏之別名。係石膏之一種。功能較遜尋常石膏。參詳「石膏」條。

【鹿角膠】**命名**　本品係用鹿角熬成之膠。故名。

古籍別名　白膠。（本經）食膠。（和漢藥考）

外國名詞　Gelatina cornu cervi（拉丁）Gelatin of Harts-horn（英）Gelatin von Hirsch horn.（德）

基本　屬單蹄類爲牡鹿頭角所製成之膠。

形態　鹿角膠爲無色透明或半透明無氣味之薄片。劣品有腥臭。逢冷水則吸收而膨脹。入熱湯中易溶化。冷之則凝固。再熱之則融化。次分解發惡臭。

採取　七月間採截。

製法　蘇頌曰。凡使鹿角膠。七月採角。以鹿年久者。其角更好。煮以爲膠。入藥彌佳。別錄曰。白鹿生雲中。煮鹿角作之。陶弘景曰。今人少復煮作。惟合角弓用之。其法先以米漉汁漬七日令軟。煮煎如作阿膠法。耳又法。剉角令細。入乾牛皮一片。卽易消爛。不爾雖百年無一熟也。蘇恭曰。鹿角骥角。但煮濃汁重煎。卽爲膠矣。何必使爛。欲求爛亦不難。陶未見耳。孟詵曰。作膠法。須細破寸截。以河水浸七日令軟。方煮之。雷斅曰。採全角鋸開。並長三寸。以物盛於急水中浸一百日。取出。刀刮去黃皮。拭淨。以醪醋煮七日。旋旋添醋。勿令少歇。成時不用着火。只從子至戌一日足。角軟如粉。搗爛。每一兩入無灰酒一鎰。煮成膠。陰乾。研篩用。李時珍曰。今人呼煮爛成粉者爲鹿角霜。取粉熬成膠。或只以濃汁熬成膏者。爲鹿角膠。按胡璇衛生方云。以米泔浸鹿角七日。令軟入急流水中浸七日。去麤皮。以東流水桑柴火煮七日。旋旋添水。入醋少許。搗成霜用。其汁加無灰酒熬成膠用。又韓悉醫通云。用新角寸截。甕盛。於長流水中浸七日。以瓦缶入水。桑柴火煮。每一斤入黃醋半斤。以壺掩住。水少旋添。其角軟。以竹刀刮淨。搗爲霜用。孟詵曰。凡用鹿角棄角。並截段錯屑。以蜜浸過。微火焙令小變色。曝乾。搗篩爲末。或燒飛爲丹服之。至妙。以角寸截。泥裹於器中。大火燒一日。如玉粉也。李時珍曰。按崔行功要纂方。鹿角粉法。以鹿角寸截。炭火燒過。搗末。水和成團。以絹袋三五重盛之。再煅再和。如此五度。以牛乳和。再燒過研用。

用法　水化或酒化。或和他藥水煎。或溶化和作丸劑。

性質　甘。平。無毒。

成分　爲膠素（Glutin）、軟骨素（Chondrin）等。

效能　溫補肝腎。滋養精血。用作滋補神經衰弱之強壯藥。又治貧血咯血。

作用　入胃卽與胃酸化合而凝固。至腸復分解。而被腸壁吸入血中。頗有增加血液之凝固力。

主治　傷中勞絕。腰痛羸瘦。補中益氣。婦人血閉無子。止痛安胎。療吐血下血。崩中不止。四肢作痛。多汗淋露。折跌傷損。久服輕身延年。

歷代記述弦證　【唐】甄權藥性本草論鹿角膠曰。男子損臟氣。氣弱勞損。吐血。婦人服之。令有子。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

安胎去冷。治漏下赤白。【明】李時珍本草綱目論鹿角膠曰。炙搗酒服。補虛勞。長肌益髓。令人肥健悅顏色。又治勞嗽尿血瘡瘍腫毒。【明】繆希雍本草經疏論鹿角膠曰。白膠是煞鹿角而成。故其味甘氣平。別錄謂溫無毒。氣薄味厚。入足厥陰少陰手少陰厥陰經。經曰。勞則喘且汗出。內外皆越。中氣耗矣。故凡作勞之人。中氣傷絕。四肢作痛。多汗。或吐血下血。皆肝心受病。此藥味甘氣溫。入二經而能補益中氣。則絕傷和。四肢利。血自止。汗自斂也。折跌傷損。則血瘀而成病。甘溫入血通行。又兼補益。故折跌傷損自愈。婦人血閉無子。及崩中淋露。胎痛不安。腰痛羸瘦者。皆血虛肝腎不足之候。溫肝補腎益血。則諸證自退而胎自得所養也。血氣生。眞陽足。故久服能輕身延年耳。更治尿血溺精。瘡瘍腫毒。及漏下赤白。婦人久服能令有子。【清】黃宮繡本草求眞論鹿角膠曰。鹿膠由角煎熬。書載補陽益陰。強精活血。總不出通脈補命門之用。但其性力緩。味甘。不能如茸之力甚峻。蓋茸有通交陽維之功。膠有緣合衝脈之任。膠非藉桂同用。以通其陽。則不能除寒熱驚癇。膠非假龜膠同用。不能達任而治羸瘦腰痛。膠非假地黃當歸同投。不得引入衝脈。而治婦人血閉胎漏。至若膠治傷中絕勞。即茸所謂能主漏下惡下也。膠之能以補中益氣。即茸所謂能益氣強志也。膠之能以輕身延年。即茸所謂能以生齒不老也。然惟平臟服之得宜。若使純陰無陽。服此反能泥膈。先不免有腹脹飽滿之弊矣。生角味鹹氣溫。生能散熱行血。消腫辟惡。熟能益腎補虛。強精活血。角霜連汁煎乾。書載能治脾胃虛寒便泄。取其溫而不滯。若以煎過膠者代充。其膠既去。服之奚益。鹿胎鹿肉鹿筋。力能補陽。若麋胎麋筋麋肉。則反損陽而傷陰矣。不可不愼。鹿胎須以色淡形瘦者爲是。若色深形肥。則爲麋胎矣。若色皎白。其胎下唇不若鹿之長於上。則爲麋胎。其他獸胎總與鹿胎不侔。鹿筋亦須辨骨細者爲是。粗即是麋筋。不可妄用。【清】張隱菴本草崇原論鹿角膠曰。鹿茸形如萌芽。有初陽方生之意。鹿角形如劍戟。具陽剛堅銳之體。水煮成膠。故氣味甘平。不若鹿茸之甘溫也。主治傷中勞絕者。中氣因七情而傷。經脈因勞頓而絕。鹿膠甘平滋潤。故能治也。治腰痛羸瘦者。鹿運督脈。則腰痛可治矣。膠能益髓。則羸瘦可治矣。補中者補中焦。益氣者益腎氣也。治婦人血閉無子者。鹿性純陽。角具堅剛。膠質潤下。故能啓生陽。行瘀積。和經脈而孕子也。止痛安胎者。更和經脈而生子也。久服則益陰助陽。故輕身延年。【清】陳修園本草經讀論鹿角膠曰。白膠即鹿角煎熬成膠。何以本經白膠列爲上品。鹿茸列爲中品乎。蓋鹿茸溫補過峻。不如白膠之甘平足貴也。功用略同。不必再釋。其主婦人血閉止痛安胎者。皆補衝脈血海之功也。輕身延年者。精足血滿之效也。【清】賈九如辨藥指南論鹿角膠曰。鹿角膠性氣與味具厚濁。入腎肝兩經。鹿乃純陽之物。其頭常向尾。善通督脈。其精華在角。以此煎膠。氣味濃厚。精血有力。莫過於此。非尋常草類所比。故能補精氣。助火衰。興陽道。健腰膝。爲壯腎扶肝。捷勝之神物也。蓋阿膠補陰。鹿角膠補陽。功效各奏。

國外學說 日本和漢藥考曰。鹿角膠之製法。將鹿角屑入磁鍋。加清水燒熱。至角質柔軟。從火撤下。濾過。將其濾液。移於別器。用微火煎熬。至已成飴狀。乃放冷。待其凝固。切斷晒乾。又麤篤兒藥性曰。鹿角膠性易消化。有滋養功效。尤以患熱病者。胃腸感動敏疾。嘔吐、下痢、腹痛等。最有神效。爲暴瀉或失血太過。致精力虛損者之要藥。又醫方名物考曰。鹿角膠滋養潤補。易消化。治熱病類之胃腸感觸特甚。不勝飲食等症。或兼有嘔吐、下痢、腹痛等症。或失血過多所致之虛脫症。或加砂糖、梅漿汁、列印設酒等。使味美。

辨僞 ㊀僞藥條辨云。鹿角膠原名白膠。以鹿角寸截米泔浸七日。令軟。再入急流中浸七日。刮去粗皮。以東流水桑柴火煮七日。類類添水。取汁澄淨。加無灰酒熬成膏。冷則膠成矣。氣味甘平。主治傷

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中勞絕。腰痛羸瘦。補中益氣。婦人血閉無子。止痛安胎。市肆有以牛皮麦爲膠僞充。一層白色。俗名白頭。氣味羶臭黏濁。服之有害。㊁曹炳章曰。按鹿之種類有三。陸佃云。鹿之大者名曰麈。麈鹿以其尾爲趨向。其尾可作拂塵。今北人呼爲大尾鹿者是也。李濒湖以麋似鹿而色青黑。大如小牛。肉蹄。其目下有二竅。夜眼之說。證之似略有據。然未曾實指其角解於冬也。清高宗命南鹿角記言之詳矣。因二物俱解角於夏。乾隆丁亥長至。齋宿南郊。命侍臣詣南苑。聚木蘭之鹿。吉林之麋。大尾之麈。監視之。及五時而麈之角解。麋鹿皆不解。隨傳旨飲天監。改月令之麋角解爲麈角解。此經頒示天下。而人民所共知者也。是麈之尾與麋鹿殊。而角解於長至。地學雜誌云。麈俗稱爲四不像。蓋其形似鹿而牛身馬尾羊蹄。特其首類鹿耳。故得此名稱。清聖祖嘗在靈囿中。實驗此物。而改夏小正鹿角解之說。若麋與鹿。則李濒湖所言麋肉蹄四眼之說。亦猶牛黃之於水牛。形稍殊而其實一物也。且朱子之註孟子。亦曰麋鹿之大者。未嘗分爲二也。李時珍芝云。麋鹿俗名梅花鹿。尤有馬鹿之分。亦屬同類異種耳。新疆雜記云。麋鹿北疆概產之。每冬季多狩獵者。其角於小滿節後角根發癢。以頭相觸。角即脫落。堆於一處。獵者於深山中。有一獲數百對者。脫角後越五六日。新茸即生。此時最爲貴重。產於拜城之額什克巴什山。澳騰格里山。若焉耆之納剌達嶺。俗稱之曰鹿瀣。言其產鹿之多也。即品質言。尤以產於伊犁之果子溝者爲最佳。行銷於內地各藥行。大抵關東出者。其角外皮黃黑色。內白色。有神光。爲最佳。湖廣秭縣出亦佳。福建陝西出有雙角單角之分。雙角老者亦佳。單角爲次。海南丹山出者。無杈枝亦次。又外洋淡水中出魚角。又名沙角。爲鯊魚所變。其色枯白而大。杈枝甚多。爲最次。其他煎膠之法。用正鹿角鋸斷。每段約二寸零。通淨角內灰質。洗淨。煎七晝夜停火。取出骨渣。候冷濾淨。再熬至滴水成珠。取起入方錫盤中。候凝結成塊。取出以刀切塊。貯藏三年發售。名鹿角膠是也。

近人學說 徐兗仁曰。今之談軟骨病者。鮮不以維他命D爲治療之要素。且爲最新之聖劑。而孰知吾華夏天然之產物。其成效實有遠超於此者乎。即鹿角膠是。請假一事以徵之。余同鄉有許昶者。忽得腳軟不能行。乞余往診。余診其脈沉濡而細。周身肥白。飲食如常。惟下肢輭弱。跬步不能。毛竅豎起。冷汗時出。按之肌肉且失溫度。余斷爲腎陽虛衰。氣化失周。即唐韓昌黎所謂軟腳病也。爲疏金匱腎氣湯十劑。并囑續服鹿角膠。當自效。許依法施治月餘。果獲全痊。逾十七年春。而舊恙復發。兩足軟冷如故。憶余前次爲其治愈之方。雖已忘卻。尚記有鹿角膠一物。遂購服試之。詎服未一月。竟日臻痊愈。按鹿角膠鹹溫無毒。神農本經名白膠。李時珍謂其純陽。能通督脈。別錄主腰脊痛折傷。日華主腳膝無力。孟詵主强骨髓。益陽道。蓋腎主骨。骨爲幹。腎藏精。精生髓。以其有强壯腎命之功。故皆主之也。又嘗考其成分。內含燐質、石灰質、膠質、軟骨素等。夫燐質爲人身之要素。尤爲骨質中運用之靈魂。鹿角膠有增進燐質之功能。又能使石灰質之運化健全。故於軟骨症有特效也。且據近年西人之研究。謂軟骨症之發生。除食料偏乏維他命外。而悶居幽暗之處。亦爲一大原因。嘗實驗之於動物。如將該動物飼於暗處。雖食料如常。亦能使生輭骨之病。再次如用充足光綫施於動物之身。則雖常飼以完全不含維他命之食物。該動物亦不至生軟骨之病。其尤奇者。但須將飼養該動物之食料。暴於日光中。即該動物不受日光。亦不至發生軟骨病云云。由此言之。益信軟骨病爲陽虛之症。而日光非陽氣之精英乎。鹿角膠非補陽精之藥乎。

配合應用 ㊀治勞傷吐血。鹿角膠、牛膝、牡丹皮、麥門冬、地黃、眞蘇子、鬱金、白芍藥、當歸、童便、續斷。㊁治腎虛陽痿。精寒無子。鹿角膠、山茱萸、枸杞子、鹿茸、地黃、麥冬、杜仲、補骨脂、懷山藥、車前子、五味

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子、巴戟天、蓮鬚。加入當歸、紫石英、治婦人血閉子宮冷。服之受孕。㈢治虛勞尿精白膠二兩炙爲末。酒二升和溫服(外臺祕要方)㈣治虛損尿血白膠三兩炙。水二升。煮一升四合。分服。(外臺祕要方)㈤治湯火灼瘡白膠水煎令稠。待冷塗之(斗門方)

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛陽盛。及有實火者禁用。畏大黃。得火良。

著名方劑　斑龍二至百補丸。大補虛損。壯陽治痿(青囊方)鹿角膠、黃精、杞子、熟地、菟絲子、金櫻子、天冬、麥冬、牛膝、楮實子、龍眼肉、共熬成膏。加入煉蜜。調入後藥末。杵合爲丸。鹿角霜、人參、黃耆、茯苓、山藥、知母、熟地、萸肉、五味子。十味共研細末。和前膏爲丸。

【鹿角膠入粥】　**主治**　助元陽。治諸虛。

【鹿角藤】　**古籍別名**　白毛刺。不薪木(綱目拾遺)

形態　鹿角藤爲藤屬之一種。木本藤生。有長刺而氣臭。能傷人皮肉。腫痛不休。其根可供藥用。子葉詳見各該條。

性質　大熱。

主治　和香糟搗爛。罨風氣。消痞積。

【鹿角藤子】　**主治**　食之大能醉人。

【鹿角藤葉】　**主治**　燕酒服。鑽筋透骨。

【鹿豆】　㈠即鹿藿之古籍別名。典見郭璞賦。詳『鹿藿』條。㈡即葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『葛根』條。

【鹿豆忠】　即葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『葛根』條。

【鹿乳餅】　**基本**　本品係幼鹿腹中之乳餅。

形態　鹿乳餅爲母鹿飼子之乳汁。在幼鹿腹內結成餅塊。大如雲南棋子。色微黃。乾者老黃色。其氣甚腥。可供藥用。

採取　候鹿產子時。瓢於夜半伺其洞側。鹿乳子必五更乳畢出洞。至暮方歸。每日祇乳小鹿一次。食乳於腹結十二小餅。每一時即消一餅。土人候母鹿出洞。即將乳鹿抱歸剖腹取之。

主治　益命門。强陰氣。理怯弱虛損。發痘漿。治女子乾血勞。

【鹿胎】　**基本**　本品爲牝鹿之胎。

製法　入藥以眞者。酥炙黃用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　補養下元虛寒不足。

辨僞　張璐曰。胎中鹿其嘴、尾、蹄、趿、與生鹿無異者爲眞。其色淡形瘦者。爲鹿胎。若色深形肥者爲麋胎。愼勿誤用。能損眞陽。又獐胎。與鹿胎相類。但色皎白。且其下脣不若鹿之長於上脣也。其他雜獸之胎。與鹿胎總不相似也。

參攷資料　鹿性補陽益精。男子眞元不足者宜之。不特茸角莖胎入藥。而全鹿丸合大劑參耆歸附。大壯元陽。其胎純陽未散。宜爲補養天眞。滋益少火之良劑。然須參耆河車輩佐之。又爲得力。如平素虛寒下元不足者。入六味丸中。爲溫補精之要藥。而無桂附辛熱傷陰之患。但愼勿誤用麋胎。反傷天元陽氣也。(趙學敏)

【鹿胎】　即葱白之古籍別名。典見綱目。詳『葱白』條。

【鹿胎糞】　**主治**　解諸毒。

參攷資料　鹿食藥草。其胎中麋糞可療毒也。(時珍)

【鹿虻】　即虻蟲之古籍別名。典見綱目。詳『虻蟲』條。

【鹿神】　即商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『商陸』條。

【鹿英】　即英草花之古籍別名。典見別錄。詳『英草花』條。

【鹿韭皮】　即牡丹皮之古籍別名。典見本經。詳『牡丹皮』條。

【鹿首】　即敗鼈之古籍別名。典見別錄。詳『敗鼈』條。

【鹿脂】　**主治**　癰腫死肌。溫中。四肢不隨。頭風通腠理。不可近陰。

【鹿茸】　**命名**　本品即鹿角之初生者。含血未成骨時。如草之嫩芽。故名。

處方用名　鬬鹿茸。血蠟鹿茸。鬬茸。毛角。

古籍別名　斑龍。(綱目)鹿蟲。袋角。蘘角。茄子茸。九女眷。冲天室。鹹鹿茸。(和漢藥考)

北音及花名　血包。扈子。叉子。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（北音）蠟片。血片。風片。骨片。（花名）

外國名詞　Young harts-horn（英）

基本　爲單蹄類牡鹿於夏至脫去舊角初生之新角。

產地　陳仁山藥物生產辨云。鹿茸產中國邊境。以長白山爲最好。關東亦佳。俄屬海參威等處次之。六月見新。

形態　鹿茸爲蒙有毛皮之初生嫩角。柔輭作茄子狀。類蕈菌故名鹿茸。外面呈紫褐色有光澤。中有血管。其在春末解角生茸之際。初起如銀沓狀。漸成梨形及核桃形。北人名曰血包。此爲第一期。再則支生兩凸如茄子形。或如鞍子形。北人名曰扈子。至較子形。再養數日。急宜取用。此爲第二期。惟此指家畜者而言。如山野者則隨獲取茸。效力更偉。若逾此期。即爲叉子。或曰毛角。而爲第三期。血液枯燥。功力亦薄。

種類　㊀茸之頂尖最首屬。瑩白如蠟。油潤如脂者。名曰蠟片。㊁次屬白中兼黃。純係血液貫注其中者。名曰血片。㊂再次屬片有蜂窩色紫黑透孔者。名曰風片。㊃最次屬與骨吻連。同角相仿者。名曰骨片。

採取　每年於四五月間解角後。採截陰乾。

製法　雷敦曰。凡使鹿茸。用黃精自然汁浸兩日夜。漉出切焙搗用。免渴人也。又法。以鹿茸鋸作片。每五兩用羊脂三兩。拌天靈蓋末塗之。慢火炙。令內外黃脆。以鹿皮裹之。安室中一宿。則藥魂歸矣。乃慢火焙乾。搗末用。日華曰。只用酥炙炒研。寇宗奭曰。茸上毛。先以酥薄塗勻。於烈焰中灼之。候毛盡微炙。不如此。則火焰傷茸矣。李時珍曰。瀋寮濟生諸方。有用酥炙酒炙及酒蒸焙用者。當各隨本方。

用法　與他藥水煎或酒浸。或剉末和作丸劑。

性質　甘溫。無毒。

效能　補元陽。治虛勞。填精血。療瘡癰。用作滋補強壯藥。

主治　漏下惡血。寒熱驚癇。益氣強志。生齒不老。（本經）療虛勞。洒洒如瘧。羸瘦四支酸疼。腰脊痛。小便數利。洩精。溺血。破瘀血在腹。散石淋。癰腫。骨中熱疽瘡。安胎下氣。殺鬼精物。久服耐老。不可近丈夫陰令痿。（別錄）

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論鹿茸曰。補男子腰腎虛冷。脚膝無力。夜夢鬼交。精溢自出。女人崩中漏血。赤白帶下炙末。空心酒服方寸匕。壯筋骨。【明】李時珍本草綱目論鹿茸曰。生精補髓。養血益陽。強筋健骨。治一切虛損。耳聾目暗。眩暈虛痢。【明】繆希雍本草經疏論鹿茸曰。鹿茸稟純陽之質。含生發之氣。故其味甘氣溫。別錄言酸微溫。氣薄味厚。陰中之陽也。入手厥陰少陰。足少陰厥陰經。婦人衝任脈虛。則爲漏下惡血或瘀血在腹。或爲石淋。男子肝腎不足。則爲寒熱驚癇。或虛勞洒洒如瘧。或羸瘦。四肢酸疼。腰脊痛。或小便數利。洩精。溺血。此藥走命門心包絡。及腎肝之陰分。補下元眞陽。故能主如上諸證。及益氣強志。生齒不老也。癰腫疽瘍。皆營氣不從所致。甘溫能通血脈。和腠理。故亦主之。【明】李士材本草圖解論鹿茸曰。鹿茸鹹溫。腎經藥也。補火助陽。生精益髓。強筋健骨。暖腰壯膝。固精攝便。安胎殺鬼。鹿稟天地純陽之氣。氣化濃密。其角自生至堅。無兩月之久。大者至二十餘觔。凡物之生。無速於此。故能強陽補骨。非他藥可比也。長大爲角。與茸同功。力少遜耳。【清】黃宮繡本草求眞論鹿茸曰。鹿茸甘鹹氣溫。稟純陽之質。含發生之氣。號爲山獸。性淫而遊山。夏至得陰氣而角解。陰生陽退之象也。至於大於鹿者爲麋。麋是澤獸。居陰性淫而遊澤。冬至得陽氣而角解。陽生陰退之象也。陰陽相反如斯。故鹿氣味純陽。其茸故於右腎。補其精氣不足。大爲補精煖血之劑。是以書載能補髓養血。強筋健骨。凡腰腎虛冷。遺經崩帶等症。服皆有效。麋雖屬陰。而茸又屬陰中之陽。故能入於左腎。補其血液不足。且諸茸皆發督脈之背。督爲腎臟外垣。外垣既固。腎氣內充。命門相火不致妄動。血氣精津。得以凝聚。故鹿茸又云能補督脈之眞陽。麋茸能補督脈陰中之陽。不可不細爲明辨耳。但

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鹿茸與麋茸。世罕能辨。大抵其質粗壯。腦骨堅厚。毛色蒼駁而雜白毛者。則爲麋茸。形質差瘦。腦骨差薄。毛色黃澤而兼白毛者。則爲鹿茸。麋鹿雖分有二。然總不外填精補髓。堅强筋骨。長養氣血。而爲補肝滋腎之要藥也。鹿角初生。長二三寸。分歧如鹺。紅如瑪瑙。破之如朽木者良。酥塗微炙。用茸有小白蟲。視之不見。鼻覺恐蟲入鼻。【清】陳修園本草經讀論鹿茸曰。鹿爲仙獸。而多壽。其臥則口鼻對尾聞。以通督脈。督脈爲通身骨節之主。腎主骨。故又能補腎。腎得其補。則志强而齒固。以志藏於腎。齒爲骨餘也。督得其補。則大氣升舉。惡血不漏。以督脈爲陽氣之總督也。然角中皆血所貫。衝爲血海。其大補衝脈可知也。凡驚癇之病。皆挾衝脈而作。陰氣虛。不能寧謐於內。則附陽而上升。故上熱而下寒。陽氣虛。不能周衛於身。則隨陰而下陷。故下熱而上寒。鹿茸入衝脈而大補其血。所以能治寒熱驚癇也。至於長而爲角。別錄謂其主惡瘡逐惡氣。以一點胚血。發洩已盡。只有拓毒消散之功也。【清】徐洄溪本草經百種錄論鹿茸曰。鹿茸之中。惟一點胚血。不數日而卽成角。此血中有眞陽一點通督脈貫腎水。乃至靈至旺之物也。故入於人身。爲峻補陽血之要藥。又其物流動生發。故又能逐瘀通血也。鹿茸氣體全而未發洩。故補陽益血之功多。鹿角則透發已盡。故拓毒消散之功勝。先後遲速之間。功效輒異。非明乎造化之機者。不能測度也。【清】閻立陞本草選旨論鹿茸曰。鹿茸味甘鹹。又云苦辛。氣溫無毒。麻勃爲使。合鹿之精髓骨血而成。故能治精髓骨血之病。本草主漏下惡血洩精溺血。破瘀血在腹。散石淋癰腫。補男子腰腎虛冷。脚膝無力。夜夢鬼交。精溢自出。女人崩中漏血。赤白帶下。能健骨。能生齒。能益氣强志。及一切虛損耳聾目暗眩暈虛利。功用雖多。總不出此意耳。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。鹿茸頂尖帶血者。謂之血柿茸。價值甚昂。聞射利之徒。或用豬尾或用小腸。和以豬血。攙以雜藥。假造僞充。外形與眞無二。及煎熬之後。則糜爛臭穢。可驗而知之。若研末入丸藥。甚難辨識。按鹿茸氣味甘溫無毒。主治漏下惡血。寒熱驚癇。益氣强志。生齒不老。爲補骨血益精髓之要藥。麋茸尙不可用。又安用此假柿茸耶。若遇危險重症。服之則貽誤必多矣。㊁曹炳章曰。按茸者。如草芽初生之狀。麋鹿雌者無角。雄者之角。年解年生。乘其初生含血未成骨時。取以爲補精血藥。因其狀命名也。惟採茸之法。貴乎始生含血者。漸長則成角不適用。故云宜如茄之小者。分歧則大而不取。此舉茸生初久形分大小而言。非可指爲鹿之大小解也。凡其氣血者。幼則弱。老則衰。惟壯大者則强。是麋鹿之茸。正當取於壯大之麋鹿爲貴。當取其頭骨大。而茸豐肥。如馬鞍形。鞴形者爲最。至茄茸則太嫩而小。寇宗奭已論之矣。再論採取之法。羌海雜誌云。茸鹿一種。天下盛稱關東。其實製法。以西產爲良。品質亦不及西產之厚也。然西產製法。亦未嘗不佳。最上者亦曰旋茸。其法得一生鹿。閉於柵。聚圍之而呼噪。鹿性躁。驚距奮擲。足無停蹄。其體純陽。兩角更甚。約數小時。其熱度達於極點。有力者猝入。以利刃斷其首。長杆丈餘。上穿鐵環。綫八尺之鐵鏈。而以鹿角繫其端。極力搖而旋轉之。甲疲乙易。乙疲丙易。不知其數千萬轉。其精血靈活和勻。無孔不入。無竅不通。稍停則精血凝聚之處。易生微蟲。精血不到之處。元氣不足。非全材矣。此青海採製鹿茸之法也。此指家畜而言。如遇野山之鹿。卽隨時又獲取茸。功效尤偉。李春芝云。麋鹿俗呼梅鹿。尤有馬鹿之分。二鹿均能生茸。皆有蠟血片。大抵麋鹿解角後。其新茸芽生之際。初起如銀杏狀。漸成梨形及核桃形。名曰血包。此爲第一期。再則支生兩凸。如茄子形。或如鞍子形。名曰扈子。鞍子稍養數日。急宜取用。此爲第二期。倘逾此期。卽爲叉子。此爲第三期。卽毛角也。血液枯燥。功效已薄。上述麋鹿生茸。關於時際之遲早。以區別其形狀之良窳。再別其每架鹿茸切片時。復有蠟片、血片、風片、骨片之分。如茸之頂尖。最首層

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之白如蠟。油潤如脂。名之曰蠟片。次層白中兼黃。純係血液貫注其中。故名曰血片。再次層片有蜂窠。色紫黑透孔。名曰風片。俗云木通片。如木通之空通也。最次則與骨吡連同角相彷。名曰骨片。效力更薄矣。凡辨原架鹿茸之法。須顏色紫紅明潤有神。頂圓如饅頭式者佳。如色帶黃黑。頂上凹陷者次。東三省及青海新疆產均佳。浙江衢州金華出亦佳。僞者以鹿茸架用豬血麵粉做成。

近人學說 (一)丁福保曰。鹿茸爲峻補之藥。因其中有阿摩尼亞。峻補之功力。不在鹿茸。而在阿摩尼亞。阿摩尼亞得火則飛。故服鹿茸之法。應切片浸服。若不如此理。以火煎煮。阿摩尼亞得火飛去。則無功力。且鹿茸價甚昂貴。眞者難得。西國近年不用鹿茸。專用阿摩尼亞。以其功力同而價甚賤。平人不難常食。(二)曹炳章曰。鹿茸補精壇髓之功效雖甚偉。服食不善。往往發生吐血、衄血、尿血、目赤、頭暈、中風昏厥等症。考其原因。其人平時多陽旺液燥。貧血虧精。氣血乏運。若服食參茸能用份少。服日多。則助氣養血。有益無損。雖有餘熱。亦不爲害。若陽虛陰燥之人。再驟服大劑。以致有助燥爍陰之弊。蓋茸爲骨血之精。通督脈而上衝於腦。其上升之性。故如上述之病生焉。余每遇當用鹿茸之症。有一簣漸增至數分數錢。每獲妥效。此卽大虛緩補之義也。近有富室大老。日以煙霞爲友。更有嬌妻美妾爲樂。不知煙色消精爍髓。氣血亦隨之枯竭。陽越陰涸。百骸亦因而空虛。再妄服鹿茸。欲藉其補髓添精以助慾。不知茸爲腦之精華。專注於上。而週身敗血亦皆上迫於頭。以致頭痛昏暈諸症生焉。卽西醫所謂腦溢血。實卽內經所謂氣血併走於上。則爲大厥是也。總之煙色厥敗之身。精血枯竭之體。再妄啖鹿茸行血上竄之峻補。是無異抱薪救火。安有不戕生傷命者耶。鹿茸東三省皆產。要色紫紅明潤頂圓如饅頭形者佳。色帶黃黑。頂凹陷者略次。新疆雜記云。槀鹿北疆皆產之。其角於小滿後馬蘭花開時。角根發癢。以頭相觸。角卽脫落。堆於一處。獵者於深山中。有一獲數百對者。脫角後越五六日。新茸卽生。此時最爲貴重。產於拜城之額什克巴什山。漢膺格里山。若焉耆之納喇特嶺。俗稱之曰鹿圈。言其產鹿之多也。卽品質言。尤以產於伊犁之果子溝者爲最佳。行銷於內地各槀行。芜海雜誌云。鹿茸一種。天下盛稱關東。其實製法以北產爲良。品質實不及西產之厚也。其他如湖廣桂縣出亦略次。海南丹山出無杈枝亦次。外洋淡水處出一種沙鹿。乃鰲魚所變。其色枯白而大。杈枝多。不能取茸爲最次。他如福建、陝西、衢州皆出。皆能取茸。亦稱道地。日本產者曰洋茸。爲最次。不入藥用。鹿爲仙獸。其足甚捷。行走如飛。故獵者多苦之。每逐一鹿。須費數日之辛勞。備遇之則遣人四週堵擊。而以首領之人。迎頭猛擊。預伏數人於叢草中。以俟擊倒時。急持其角。否則鹿仆而茸角自毀矣。必須先取其茸。然後斃鹿。使鹿茸之血不散。蓋其力盡在血中也。故茸最難得不破。及不出血。以如槀茄者爲上。名茄子茸。太嫩則血氣未具。其實力少。太老則血液乾枯。亦力薄。惟長四五寸。形如分歧馬鞍茸端如瑪瑙紅玉。破之肌如朽木者最善。此關東野鹿。獵獲時取茸之法也。孟詵又云。鹿茸不可以鼻嗅之。其中有小白蟲。肉眼視之不見。入人鼻中。必爲蟲類。槀不及救也。據西醫化學試驗之結果。亦云內含微生菌實不宜於肉體。亦無若何功效云。按鹿茸補精壇髓。確有實據。其性質亦與西醫以肉補肉以血補血之功同。卽內經精不足者補之以味是也。大抵鹿茸之發生小白蟲微生菌者。率多洋茸及陳久次貨。其中含有多數雜質。不無微菌夾雜其內。間或有之。可指普通鹿茸皆如是也。沈存中筆談補云。今人以羣鹿茸作一種者誤矣。或刺羣鹿以代茸用。云茸亦血。更大誤矣。羣鹿利補陰。鹿茸利補陽。須以他藥佐之。則有功。凡含血氣之動物。肉差易長。筋次之。骨最難長。故人自胚胎至成人。至二十歲。骨髓方堅。惟麋鹿二角。自生至堅。無二月之久。大者至二十餘觔。一日夜須生

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

數兩。凡骨之生。無速於此。雖草木易生長。亦不及之。此骨之至强者。所以能補骨血。堅陽道。益精血也。頭者諸陽之會。上鍾於茸。角豈可與凡血爲比哉。李時珍曰。鹿之茸角補陽。右腎精氣不足者宜之。麋之茸角補陰。左腎血液不足者宜之。此乃千古之微祕。前人方法雖具。而義理未盡闡發。故論者紛紜。如楊氏家藏方治虛損有二至丸。兩角並用。其藥性過溫。止宜於陽虛寒濕。血瘀諸症。於左腎無與焉。孫思邈千金方。言麋角丸一百一十方。惟容成子羔所服者特出衆方之外。子羔服之羽化。今觀其方。比二至丸似可常服。㊁何心得曰。茸爲國藥。重要補品。習用已久。一至冬令。天序告藏。宜以服食補益精血。行銷頗廣。價值低昂。以種類異。本國產物。大抵以北地爲上。而山門亦多。非精於其業者。不能猝辨。有麋有鹿。性狀各別。麋鹿皆山獸。凡大山多有此物。滇蜀閩廣及國外之暹羅安南。南洋英荷各屬島俱有出產。顧不能與國產比。緯度四十以上。氣候嚴重。其茸壯而有力。南洋熱帶。多在緯線三五度之地。氣候宜發。其茸力薄。惟市上出售之茸。各產皆有。不可不辨。茲以素所考驗者。彙而記之。得其大略。服茸者若得吾說而參考之。亦不爲無益云爾。(一)北鹿茸。身圓毛黃。身分二叉。亦有三四叉者。每年夏至一陰生。則脫換一次。其叉之多者。因年而增。既老則止。盤以上至少二寸分叉。若僅寸外者。則非正北鹿。皮淡黃帶白。淡黑者亦有之。頂圓而豐滿。左右相朝對。盤上珠點分明。門角窄。頂骨薄。肉如蘆花色。功用則取紫潤圓短肥嫩者爲佳。否則鹿老而力遜。(二)北麋茸。身壯。毛帶紫黑色。身分三叉。一寸外便開叉。每年冬至一陽生。則脫換一次。年增一枝。其末分簇。則與鹿同。頂圓而豐滿。皮淺黑色。多茸毛。其肉色似桃花。其頂色則似柿葉。其色如朱。故北人名爲血柿茸。(三)關東之鹿茸。身比北鹿壯些。皮黃有光。毛白如蘆花。身有紋透頂。深而且現。少血頂。無脚珠。肉紫青色。通身至合頂處有小孔如木通狀。(四)三姓所產之茸。甚難分辨。似鹿非鹿。似麋非麋。身肥瘦皆同北鹿。皮紫黑色。毛薄黃色。肉白而淡青。少血頂。角門闊。頂骨厚。老嫩亦審其珠點之深淺。(五)關西之茸。身壯。皮紫黑帶黃。紋淺。毛粗而白。且皺。珠點凸起。多帶黑色。頭骨肥壯不長。附枝亞於正身之壯。頂尖有血。皮薄。而肉切開。其色則赤而帶黑。性鬆不黏。(六)家園茸。禿頂光。頭皮黑帶黃。珠盤極其分明。其紋淺而不現。少血頂。肉色淡如枯骨。性硬。毛茸中帶粗。身瘦不壯。(七)雲南所產之茸。身長瘦弱。皮黑紋深。皮面如漆之光。少毛。珠盤下方有粗毛。土黃色。味鹹。皮肉不相黏。肉鬆而不結。其色如老糠。食之無益。(八)閩地所產之茸。身如麋。乾。炊之輭如棉絮。皮色黑。肉多血色。切片有弦稜。方面不圓。如金狗脊之形。味香。食之亦稍有功力。利男子。少婦恐妨礙胎。老邁合宜。出在建寧台灣等處。所產不多。故此少見。(九)海南瓊州內山所產之茸。其身壯大。形體甚異。附枝多至四五枝。毛片細如棉。其形不潔。毛色紫黑。如艾絨帶黑。頂上豐滿。少血。皮黑。有些淡黃。其肉切開。色如死灰。性如烘火。味微鹹。食之有損無益。(十)安南所產之茸。嫩則身壯。骨硬。皮醬紅。間帶黑色。頂皺小。身材直而不曲。老則身瘦。皮轉黑色。性溫。味辛。肉色白。中有帶黑處。皮薄。珠盤高。甚少毛。有之亦盤面上些小而已。其色淡黃。其骨色如蜡玉。(十一)暹羅所產之茸。毛片皮肉。其色皆同安南之茸。惟安南之茸。身材老而且粗。暹產則身壯幼。其中亦有血頂者。切片之時。難分南北。其色皆紅。惟收貯三五日。其色即退如蜡。北茸之色不變。其中貴賤。即此便可見。(十二)仰光之茸。身瘦長。毛黃粗。皮烏黃色。頂少尖者。多結血頂。盤下大過盤面三分之一。肉色淡黃。皮薄。味微鹹。切開皮肉脫而不相連者亦有。(十三)西川所產之茸。毛幼而黃。身瘦。附枝甚長。頂角帶青。盤面即開叉。多連頂角。肉色同北麋。味淡。皮色微黃帶烏。(十五)坤甸之茸。皮黑而薄。毛烏黃而少。身直。肉色土白。味鹹。紋深且長。血者亦有。少而不多。實勝越山口洋、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

浮里洞等處所產。身皮毛色。皆不相上下。所差無幾。總之南洋各地所產之茸。身直無彎。皮色老而有光。紋深盤大。珠點凸起。身光少毛。身小短。重至斤者絕少。卽有亦老不堪用矣。（十五）高低、吧實、宋卡、大年、六坤、萬那老、蒲那老勿各埠。概深水地所產之茸。身長者尺五六。至二尺者亦百無二。皮色如鳥棗。毛鳥中帶些白黃。蓋皆連盤漸落。並無單取茸尾者。身材同坤甸等處所產相彷彿。認眞此道者。甚難分別。惟深水地之茸。味淡而氣香。因此多蛀。不能貯久。其血頂如邁茸。所有南洋之茸。血頂皆同。鹿茸之功。全在其血中之燐質硫質。故能補陽。以前製此藥。往往用火烘酥。或隔水蒸脆。而後爲末。不知此質一經見火。卽行飛散。功力已去八九。此皆不明化學之故。若以之鋸成寸段。而劈碎之。置於石灰缸中收燥。後生碾爲末。則原質全在。其功力必大不同。（但茸不得留過三年）惟此品以關東產者爲最。卽家畜者。價已不貲。若得野生者。更爲可寶。否則用川雲所產者。名曰蔴茸。照此製法。亦有功力。而價較廉也。

配合應用　㊀治腎虛腰痛。及陰痿不起。鹿茸、牛膝、杜仲、地黃、山萸肉、補骨脂、巴戟天、山藥、肉蓯蓉、菟絲子。

㊁斑龍丸。治諸虛。用鹿茸酥炙。或酒炙亦可。鹿角膠炒成珠。鹿角霜。陽起石煅紅。酒淬。肉蓯蓉酒浸。酸棗仁、柏子仁、黃芪、蜜炙各一兩。當歸、黑附子泡。地黃九蒸九焙各八錢。辰砂半錢。各爲末。酒糊丸。如梧子大。每空心溫酒下五十丸。（濟寮方）

㊂鹿茸酒。治陽事虛痿。小便頻數。面色無光。用嫩鹿茸一兩。去毛切片。山藥末一兩。絹袋裹。置酒罐中七日。開瓶。日飲三盞。將茸焙作丸服。（普濟方）

㊃治陰虛腰痛。不能反側。鹿茸炙。菟絲子各一兩。舶茴香半兩。爲末。以羊腎兩對。去酒麥爛。搗泥和丸。梧子大。陰乾。每服三十五丸。溫酒下。日三服。（本事方）

㊄治精血耗涸。耳聾口渴。腰痛白濁。上燥下寒。不受峻補者。鹿茸酒蒸。當歸浸酒各一兩。焙爲末。烏梅肉煮膏。搗丸。梧子大。每米飲服五十丸。（濟生方）

㊅治腰膝疼痛。傷敗者。鹿茸塗酥炙。紫爲末。每服酒服一錢。（續千金方）

㊆治小便頻數。用鹿茸一對。酥炙爲末。每服二錢。溫酒下。日三服。（鄭氏家傳方）

㊇治虛痢危困。因血氣衰弱者。鹿茸酥炙一兩爲末。入麝香五分。以燈心煮粟肉和丸。梧子大。每空心米飲下三五十丸。（濟生方）

㊈治飲酒成泄。骨立不能食。但飲酒卽泄。用嫩鹿茸酥炙。肉蓯蓉煨一兩。生麝香五分。爲末。陳白米飯丸。梧子大。每米飲下五十丸。名香茸丸。（普濟方）

㊉治室女白帶。因衝任虛寒者。鹿茸酒蒸焙二兩。金毛狗脊、白斂各一兩。爲末。用艾煮醋打糯米糊丸。梧子大。每溫酒下五十丸。日二。（濟生方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡非虛寒者禁用。

麻勃爲之使。

著名方劑　鹿茸丸。治腎臟眞陽久虛。下體痿弱疼痛。喘嗽水泛爲痰。（濟生方）鹿茸（酒炙）牛膝、（鹽酒炒）五味子各二兩。川楝肉（酒蒸）山藥、肉桂、杜仲、（鹽酒炒）澤瀉（鹽水炒）各一兩。沉香（研）五錢。上研末。酒和丸。梧子大。每服七十丸。清晨溫酒下。

參攷資料　㊀按濟寮方云。昔西蜀市中嘗有一道人貨斑龍丸。一名茸珠丹。每大醉高歌曰。尾閭不禁滄海竭。九轉靈丹都慢說。惟有斑龍頂上珠。能補玉堂關下穴。朝野遍傳之。其方蓋用鹿茸、鹿角膠、鹿角霜也。又載原禮證治要訣。治頭眩暈。甚則屋轉眼黑。或如物飛。或見一爲二。用茸珠丹甚效。或用鹿茸甚效。無灰酒三盞。煎一盞。入麝香少許。溫服亦效。云茸生於頭類之相從也。（李時珍）㊁鹿茸夏收之陰乾。百不收一。且易臭。惟破之火乾大好。（蘇恭）㊂南山多鹿。每一雄遊牝百數。至春羸瘦。入夏惟食菖蒲卽肥。當角解之時。其茸甚痛。獵人得之。以索繫住取茸。然後鑿鹿茸之血未散也。（抱朴

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子）㈣茸最難得不破及不出却血者。蓋其力盡在血中故也。此以如紫茄者爲上。名茄子茸。取其難得耳。然此大嫩。血氣未具。其實少力。堅者又大老。惟長四五寸。形如分歧馬鞍茸。端如瑪瑙紅玉。破之肌如朽木者最善。人亦將鬬角僞爲之。不可不察。（惡宗奭）㈤鹿字篆文象其頭角身足之形。爾雅云鹿牡曰麚。音加。牝曰麀。音攸。其子曰麛。音迷。絕有力曰麉。音堅。斑龍名出瀟湘。察方按乾寧記云。鹿與遊龍相戲。必生異角。則鹿得稱龍。或以此與。梵書謂之密利迦羅。（李時珍）㈥鹿處處山林中有之。馬身羊尾。頭側而長。脚高而行速。牡者有角。夏至則解。大如小馬。黃質白斑。俗稱馬鹿。牝者無角。小而無斑。毛雜黃白色。俗稱麀鹿。孕十月而生子。鹿性淫。一牡常交數牝。謂之聚麀。性喜食龜。能別良草。食則相呼。行則同旅。居則環角外向。以防害。臥則口朝尾閭。以通督脉。殷仲堪云。鹿以白色爲正。述異記云。鹿千歲爲蒼。又五百歲爲白。又五百歲爲玄。玄鹿骨亦黑。爲脯食之。可長生也。埤雅云。鹿乃仙獸。自能樂性。六十年必懷瑤於角下。斑痕紫色。行則有遞。不復急走。故曰鹿戴玉而角斑。魚懷珠而鱗紫。沈存中筆談云。北狄有駝鹿。極大而色蒼黃。無斑。角大而有文。堅瑩如玉。茸亦可用。名苑云。鹿之大者曰麈。麈鹿隨之。視其尾爲準。其尾能辟塵。拂甄則不蠹。置茜帛中。歲久紅色不黯也。（李時珍）

【鹿茸酒】製法　用鹿茸山藥。浸酒服。

主治　陽虛痿弱。小便頻數。勞損諸虛。

【鹿骨】性質　甘。微熱。無毒。

主治　安胎下氣。殺鬼精物。久服耐老。可酒浸服之。

歷代記述弦證　【唐】孫思邈千金翼論鹿骨曰。作酒主內虛續絕。傷補骨除風。【明】李時珍本草綱目論鹿骨曰。燒灰水服。治小兒洞痓下痢。

【鹿啣草】產地　九江建昌山中有之。

形態　綠葉紫背。鋪地而生。面有白棲。略似蕺葉而微長。根亦紫。可供藥用。

性質　溫。無毒。

效能　入肝腎二經。强筋健骨。補腰腎。生精液。

主治　浸酒治吐血。通經。

【鹿脛骨】製法　取脛骨。溼紙包裹。灰火煨之。以黃脆可研爲度。若焦黑者。爲過性勿用。

主治　生肌收口。爲末摻之。

【鹿御草】命名　本品鹿銜之則病癒。故名。

古籍別名　薇御草。麋御草。（本經）承脊草。（別錄）吳風草。（唐本）無心草。無顏草。承臍草。（吳普）

基本　爲鹿御草之莖葉。

產地　凡原野川澤均有出。

形態　鹿御草爲溼草類之野生草本。莖赤色。有風不偃。無風獨搖。葉大如芜蔚。叢生面綠背青。有毛。花黃色。花後結子。根如黃連。盤屈而生。赤黑色。其子與莖葉俱可供藥用。

性質　苦。平。無毒。

主治　風溼痺。歷節痛。鬻癇吐舌。悸氣喉風。鼠瘻癰腫。（本經）暴癥逐水。療瘧蹙。久服輕身明目。（別錄）

歷代記述弦證　【唐】陳藏器本草拾遺論鹿御草曰。婦人服之。絕產無子。【明】李時珍本草綱目論鹿御草曰。煎水洗瘡疽。甲疽。惡瘡。

參攷資料　㈠麋銜乃素問所用。治風病自汗棄而後世不知用之。誠缺略也。素問黃帝曰。有病身熱。懈惰汗出如浴。惡風少氣。此爲何病。岐伯曰。病名酒風。治之以澤瀉、兀各三五分。麋銜五分。合以三指撮。爲後飯。後飯者。先服藥也。（李時珍）㈡南人謂之吳風草。一名鹿銜草。言鹿有疾。銜此草即愈也。（蘇恭）㈢據蘇說則薇銜、麋銜、當作鹿銜也。鹿麋一類。按鄧道元水經注云。魏興錫山多生麋銜草。有風不偃。無風獨搖。則吳風亦當作無風乃通。（李時珍）㈣一名無心草。非草之無心者方藥少用。（陳藏器）㈤薇銜生漢中川澤及寇句邯鄲。七月採莖葉陰乾。（別錄）㈥此草叢生似芜蔚及白頭

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

翁。其葉有毛。赤莖。又有大小二種。楚人謂大者爲大吳風草。小者爲小吳風草（蘇頌）

【鹿麻】卽五母麻之古籍別名。典見別錄。詳『五母麻』條。

【鹿梨】古籍別名 鼠梨。（詩疏）山梨。（毛詩）陽檖。（爾雅）羅。樹梨。赤羅。野梨。（綱目）犬梨。（日本）

外國名詞 Pirus calleryana, Done（拉丁）イスナシ ヤマナシ（日本）

基本 係薔薇科梨屬。爲鹿梨之果實。其根皮詳見該條。

產地 生山野間。

形態 鹿梨爲果類之落葉喬木。乃梨之原種。高二三丈。木有紋如羅。赤者紋急。白者紋緩。枝有針。葉大橢圓形。或卵形。邊緣有微細鋸齒。葉柄及葉背密生輭毛。春日枝梢葉腋。攢簇白色之花。與梨花相似。結實呈球狀。如杏。其實可供藥用。

採取 八月採之。

性質 酸。濇。寒。無毒。

主治 煨食治痢。

【鹿梨根皮】性質 酸。濇。寒。無毒。

主治 療瘡疥。煎汁洗之。

【鹿陽生】卽玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玄參』條。

【鹿筋】主治 勞損續絕。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鹿筋曰。塵沙目眯者。嚼爛。接入目中。則黏出。

【鹿腎】性質 甘。平。無毒。

主治 補腎氣。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論鹿腎曰。補中。安五臟。壯陽氣。作酒及煮粥食之。

【鹿腎粥】主治 補腎虛諸疾。

【鹿腎膠】基本 係鹿腎所熬之膠。

性質 甘。平。無毒。

主治 婦人血淋。帶下。腰膝痠痛。不能受孕。與阿膠摶入服之。餘與鹿腎同。

【鹿跑草】㊀卽龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『龍鬚草』條。㊁卽鹿銜草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鹿銜草』條。

【鹿腦】主治 刺入肉。不出。傅之自出。並入面脂。令肌膚悅澤。

【鹿腸】㊀卽敗醬之古籍別名。典見本經。詳『敗醬』條。㊁卽玄參之古籍別名。典見吳普本草。詳『玄參』條。

【鹿葱】㊀卽萱草之古籍別名。典見嘉祐補註本草。詳『萱草』條。㊁卽黎蘆之古籍別名。典見綱目。詳『黎蘆』條。

【鹿精】古籍別名 鮫。（韓悉醫通）

主治 補虛羸勞損。

參攷資料 王師授予鹿鮫丸方云。鹿稟純陽而鮫者。天地初分之氣。牝牡相感之精也。醫書稱鹿茸角血髓。有大補益。而此鮫則入神矣。其法用初生牡鹿三五隻。苑圍馴養。每日以人參煎湯。同一切草藥。任其飲食。久之。以硫黃細末和入。從少至多。燥則漸減。周而復始。大約三年之內。一旦毛脫筋露。氣盛陽極。卸以牝鹿隔苑誘之。欲交不得。則精洩於外。或令其一交。卽設法取其精。瓦器收之。香黏如鐫。是爲鮫也。用和鹿角霜一味爲丸。空心鹽酒下。大起胎贏虛瘵危疾。凡服滋補丸藥。用此入煉蜜和劑。絕妙。（韓悉）

【鹿銜】卽薇銜之古籍別名。典見綱目。詳『薇銜』條。

【鹿蒲】卽參果根之古籍別名。典見別錄。詳『參果根』條。

【鹿劍】卽萱草之古籍別名。典見土宿本草。詳『萱草』條。

【鹿蝨】卽蝨產於鹿體者。性質功能。與牛蝨同。參見『牛蝨』條。

【鹿跑草】卽鹿蹄草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿蹄草』條。

【鹿齒】主治 鼠瘻留血。心腹痛。不可近丈夫陰。

【鹿蹄肉】主治 諸風。脚膝骨中疼痛。不能踐地。同豉汁五味煮食。

【鹿蹄草】命名 本品葉象鹿蹄。故名。能合金瘡。又名試劍草。

古籍別名 小秦王草。山慈姑。秦王試劍草。（綱目）鹿跑草。（和漢藥考）

外國名詞 Pirola ellipticoa,

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Nutt.

基本 屬鹿蹄草科。一藥草之葉莖。

產地 凡山野平原及寺院荒處恒多生焉。

形態 一藥草爲多年生常綠草。自生於山野。葉有長葉柄。自地上叢生。作深綠色之楕圓形。大四寸許。脈絡顯深。經冬不凋。夏月抽長七八寸之花莖。於上部開白色或紫色之六瓣總狀花多下向。



鹿蹄草

用法 搗塗或揉生葉外貼。

效能 用作止血收斂藥。

主治 金瘡出血。搗塗卽止。又塗一切蛇蟲犬咬毒。

國外學說 和漢藥考曰。其屬鹿蹄草科之冬青（Chimaphila umbellata, Nutt.）有譯作鹿蹄草者。但與一藥草實非同物。冬青英名爲 Winter green. 或 Pipsissewa 爲常綠草。葉作尖卵圓形。大二寸許。邊緣有鋸齒。表面作深綠色。裏面稍作青白色。揉碎新葉有一種臭氣。中含苦味越幾斯（Chinaphilin）單寧等。此物在歐美用作强壯收斂藥。治腺病、僂麻質斯等。由此葉採取之揮發油。謂之冬青油。無色或帶紅色。有芳香。味甘觸舌有溫感。比重爲一・一七至一・一八。沸點爲百度。專用於香料。

參攷資料 ㊀按軒轅述實藏論云。鹿蹄多生江廣平陸及寺院荒處。淮北絕少。川陝亦有。苗似堇菜而葉顏大。背紫色。春生紫花。結青實。如天茄子。可用制雌黃丹砂。（李時珍）㊁採生葉貼創口。可止血。或毒蟲螫傷。毒蛇咬傷痛甚者。貼之卽止痛。（和漢藥考）

【鹿頭肉】 **主治** 消渴夜夢鬼物。煎汁服。作膠飴善。

參攷資料 鹿頭可釀酒。須於作漿時稍益葱椒。（寇宗奭）

【鹿頭酒】 **製法** 用鹿頭燙爛。搗成泥。連汁和麴米釀酒飲。少入葱椒。

主治 虛勞不足。消渴夜夢鬼物。補益精氣。

【鹿糞】 **主治** 經日不產。乾溼各三錢。研末。薑湯服立效。

【鹿膽】 **性質** 苦。寒。無毒。

主治 消腫散毒。

【鹿蟲】 卽鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿茸』條。

【鹿藥】 **命名** 本品根莖。鹿好食之故名。

產地 出甘肅武陵縣。

形態 鹿藥爲山草類之一種。其苗與根皆似黃精。可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 療風血。去諸冷。益老起陽。酒浸服。

參攷資料 鹿食九種解毒之草。此其一也。（李時珍）

【鹿藿】 **命名** 豆葉爲藿。鹿喜食之故名。

古籍別名 草蘧（爾雅）鹿豆。（郭璞）營豆。野綠豆。（綱目）餓馬黃（俗名）痰切豆。金雀豆。狐豆。（日本）

外國名詞 Rhynchosia volubilis, Lour.（拉丁）クンキリマメ（日本）

基本 係豆科鹿藿屬。爲鹿藿之苗葉。

產地 生山野及田澤間。

形態 鹿藿爲菜類之多年生蔓草本。其莖細長。常卷絡於他物之上。葉有三小葉。葉柄甚長。夏月葉腋着以數花。短總狀花序。蝶形花冠。淡紫色。實爲莢果。長五六分。闊三分。常含二扁圓種子。色黑可磨粉蒸食。



鹿藿

採取 五月六月採苗。日乾用。

性質 苦。平。無毒。

主治 蠱毒。女子腰腹痛不樂。腸癰。瘕癖。癥氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鹿藿曰。止頭痛。

【鹿藿】 卽葛根之古籍別名。典見別錄。詳『葛根』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鹿簽】卽硃砂之古籍別名。典見圖經本草。詳『硃砂』條。

【鹿驢】卽木藜蘆之古籍別名。典見綱目。詳『木藜蘆』條。

【鹿髓】製法　煉淨入藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　丈夫女子傷中絕脈。筋急痛。咳逆。以酒和服之良。

歷代記述攷證　【明】日華諸家本草論鹿髓曰。同蜜煮服。壯陽道。令有子。同地黃汁煎膏服。填骨髓。壯筋骨。治嘔吐。【明】李時珍本草綱目論鹿髓曰。補陰強陽。生精益髓。潤燥澤肌。

參攷資料　㊀鹿髓可作酒。唐方多有其法。(蘇頌)㊁鹿髓近方稀用者。删繁方治肺虛毛悴。酥髓湯用之。御藥院方滋補藥用其脊髓。和酒煮膏丸藥。甚爲有理。白飛霞醫通云。取鹿腦及豬骨髓。煉成膏。每一兩。加煉蜜二兩。調勻盛器密收。用和滋補丸藥劑妙。凡腰痛屬腎虛寒者。以和古方蘑腰膏。薑汁化一粒。擦臂堂。則暖氣透入丹田。如火大補元陽。此法甚佳。人鮮知之。(李時珍)

【鹿醬】主治　氣瘕。以酒漬炙乾。再浸酒中。含嚥汁。味盡更易。十具乃愈。

【鹿驪根】卽漏盧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『漏盧』條。

【麥文】卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【麥冬】卽麥門冬之處方用名。詳『麥門冬』條。

【麥句薑】卽天名精之古籍別名。典見本經。詳『天名精』條。

【麥曲】卽神麴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『神麴』條。

【麥李子】卽李實之異。麥同熟。上有凹痕者。惟核仁性劣。不入藥用。功能參詳『李子』條。

【麥芽】原名　穬麥蘗。

命名　本品乃麥子製令萌出嫩芽。曬乾者。故名。

處方用名　生麥芽。炒麥芽。

古籍別名　麥蘗(和漢藥考)

麩麥芽(新本草)

外國名稱　Malt (英) Malz (德)

基本　係禾本科植物大麥之實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。麥芽各省均有出。

製法　麥芽用大麥浸水。至已柔輭。先去水。復乾其水氣。乃堆置五六日。則漸鬱蒸而生幼根及芽。此謂之麥蘗。曬乾。炒之。揉去其皮。以供藥用。

性質　鹹。溫。無毒。

效能　消食。下氣。溫中。除滿。爲助消化之滋養藥。

主治　消食和中。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論麥芽曰。破冷氣。去心腹脹滿。【宋】日華諸家本草論麥芽曰。溫中下氣。開胃止霍亂。除煩悶。消痰飲。破癥結。能催生落胎。【金】張元素珍珠囊論麥芽曰。補脾胃虛寬。腸下氣。腹鳴者用之。【明】李時珍本草綱目論麥芽曰。消化一切米麵諸果食積。【明】繆希雍本草經疏論麥芽曰。麥蘗以水漬大麥而成。其味鹹。氣溫無毒。功用與米蘗相同。而此消化之力更緊。鹹能軟堅。溫主通行。其發生之氣。又能助胃氣上升。行腸道而資健運。故主開胃補脾。消化水穀。及一切結積冷氣。脹滿。如上所言等證也。好古曰。麥芽神麴二藥。胃氣虛人宜服。【清】賈九如辨藥指南論麥芽曰。大麥爲五穀之長。甘溫入脾。以此發芽。取其體輕性銳。輕可去實。銳能消散。炒香開胃。以除煩悶。生用力猛。主消麥麵食積。癥瘕氣結。胸膈脹滿。鬱結痰涎。小兒傷乳。又能行上焦滯血。若女人氣血壯盛。或產後無見飲乳。乳房脹痛。丹溪用此二兩。炒香搗去皮爲末。分作四服。立消其性氣之銳。散血行氣。迅速如此。勿輕視之。凡痰火哮喘及孕婦。切不可用。

國外學說　英美學說謂大麥芽卽萌芽之大麥烤乾而成。其功用能作澱劑。養生。配麥芽膏用之。處方以大麥芽百分。粗末。水酌用。先用涼水一百分浸六點鐘。再用熱至八十六度之熱水四百分。漸加熱。不過一百三十一度。浸一點鐘。濾渣扭汁。入燙鍋復加熱。不過一百三十一度。散氣成膏。如蜜形爲度。每服一錢至四錢。

配合應用　㊀消食積。用麥藥同山查、紅麴、橘皮、草果、砂仁、厚朴、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蒼朮。

㈡快膈進食。麥芽四兩。神麴二兩。白朮、橘皮各一兩。爲末。蒸餅丸。梧子大。每人參湯下三五十丸。

㈢治產後腹脹不通。轉氣急。坐臥不安。以麥蘗一合爲末。和酒服。良久通轉。神驗。（李絳兵部手集方）

㈣治產後青腫。乃血水濆也。乾漆、大麥蘗等分爲末。新瓦中鋪漆。一層蘗一層。重重令滿。鹽泥固濟。煅赤研末。熱酒調服二錢。產後諸疾並宜。（婦人經驗方）

㈤治產後回乳。產婦無子食乳。乳不消。令人發熱惡寒。用大麥蘗二兩。炒爲末。每服五錢。白湯下甚良。（丹溪方）

㈥治穀勞嗜臥。飽食便臥。得穀勞病。令人四肢煩重。嘿嘿欲臥。食畢輒甚。用大麥蘗一升。椒一兩。並炒乾。薑三兩。擣末。每服方寸匕。白湯下日三。（肘後方）

㈦治腹中虛冷。食輒不消。羸瘦羽乏。因生百疾。大麥蘗五升。小麥麵半斤。豉五合。杏仁二升。皆熬黃。香搗篩。糊丸。彈子大。每服一丸。白湯下。（肘後方）

㈧治產後祕塞五七日不通。不宜妄服藥丸。宜用大麥芽。炒黃爲末。每服三錢。沸湯調下。與粥間服。（婦人良方）

㈨治妊娠欲去胎。麥蘗一升。蜜一升。服之。卽下。又小品用大麥芽一升。水三升。煮二升分三服。神效。（外臺祕要方）

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡脾胃虛而無積者禁用。

參攷資料　麥蘗、穀芽、粟蘗皆能消導米麵諸果食積。釀造餳者用之。可以類推矣。但有積者能消化。無積而久服。則消人元氣也。不可不知。若久服者。須同白朮諸藥兼用。則無害也矣。（李時珍）

【麥門】卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【麥芽橘餅】卽橘餅之出於閩中漳泉者。典見綱目拾遺。詳『橘餅』條。

【麥門冬】

原名　麥靈冬。

命名　麥蘗曰靈。本品根似麥而有鬚。葉如韭而凌冬不凋。故名。後人簡爲爲麥門冬。

處方用名　麥冬。寸麥冬。寬冬。大麥冬。辰麥冬。

古籍別名　靈冬。秦名烏韭。齊名愛韭。楚名馬韭。越名羊韭。禹餘糧（別錄）禹韭。忍冬。忍凌。隨脂。僊壘。不死草（吳普）麥文。麥門門冬。山菅。麥門東。雉骨。木階前草。（本草綱目）香墩草。不死葉。雉鳥老。草沙草。秀根。兒沙。里安神。隊枝。（和漢藥考）瓜黃。蘇冬。（俗名）

外國名詞　Ophiopogon Japonicus.

基本　屬百合科小葉麥門冬（沿階草）及大葉麥門冬之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。麥門冬產四川錦州者。俗名瓜黃。產浙江杭州者。名蘇冬。清明出新。兩相比較。以蘇冬味爲濃厚。

形態　小葉麥門冬爲山野自生之常綠草。人家階前亦多植之。故有沿階草之稱。形如小蘭。葉作細長形。長尺許。初夏於葉間抽出高四五寸之花軸。開淡紫色六片。穗狀花。果實作球形。呈鮮紫色。大葉麥門冬。生於陰溼之地。其形酷似前者。葉長一二尺。花軸至一尺以上。開淡紫色粗大穗狀花。果實作紫黑色。其根爲黃白色。有鬚根。作連珠形。中貯滋養質。柔潤而有橫皺紋。

種植　園圃田野恒有栽之。其法四月初採根。於黑壤肥沙地栽植。每年六月九月十一月中施用肥料一次。及灌溉之。或種其子亦可。但生成較爲遲慢耳。

採取　二月八月十月間。採根陰乾。

製法　陶弘景曰。凡使麥門冬。須用肥大者。湯澤抽去心。不爾令人煩。李時珍曰。凡入湯液。以溪水潤溼。少頃。抽去心。或以瓦焙軟。乘熱去心。若入丸散。須瓦焙熱。卽於風中吹冷。如此三四次。卽易燥。且不損藥力。或以湯浸搗膏和藥亦可。滋補藥以酒浸擂之。

性質　甘。平。無毒。

效能　補肺養胃。瀉火生津。用作祛痰藥。及爲和緩滋養藥。

主治　心腹結氣。傷中傷飽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。久服輕身不老不饑。（本經）療身重目黃。心下支

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

滿。虛勞客熱。口乾燥渴。止嘔吐。愈痿蹶。強陰益精。消穀調中。保神定肺。氣安五臟。令人肥健。美顏色。有子。（別錄）

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論麥冬曰。斷穀爲要藥。【唐】陳藏器本草拾遺論麥冬曰。去心熱。止煩熱寒熱。體勞下痰。飲久服輕身明目。和車前地黃丸服。去溼痺。變白夜視有光。【唐】甄權藥性本草論麥冬曰。治熱毒。大水面目肢節浮腫。下水。主泄精。【宋】大明諸家本草論麥冬曰。治五勞七傷。安魂定魄。止嗽定肺痿。吐膿。時疾熱狂。頭痛。【金】張元素珍珠囊論麥冬曰。治肺中伏火。補心氣不足。主血妄行。及經水枯。乳汁不下。【明】繆希雍本草經疏論麥冬曰。麥門冬本經甘平。平者。冲和而淡也。別錄微寒。入足陽明。兼入手少陰太陰。實陽明之正藥。主心腹結氣者。邪熱之氣結於心腹間也。以其清和微寒而平緩。故能散熱結而下逆氣也。傷飽。以致胃絡脈絕者。脾主肌肉。五臟之氣皆稟於胃。胃病則脾無所稟。故羸瘦而短氣也。身重目黃者。脾胃溼熱也。心下支滿者。脾虛而溼滯中焦也。虛勞客熱。口乾燥渴者。因虛勞而熱客中焦。故口乾而燥渴。陽明之熱上衝。則兼嘔吐也。痿蹶者。陽明溼熱病也。陽明溼熱盛。則上熏蒸於肺而爲痿蹶。治痿獨取陽明。治本之道也。陰精生於五味。五味先入脾胃。脾胃得所養。則能散精於各臟。而陰精充滿。故能強陰益精也。中焦者。脾胃之所治也。脾胃安。則中焦治。故能消穀而調中也。保神定肺氣。則兼潤乎心肺矣。胃氣盛。則五臟之氣皆有所稟而安。脾胃俱實。則能食而肥健。脾統血。心主血。五臟之英華。皆見於面。血充臟安。則華彩外發。而顏色美矣。脾胃強。則後天之元氣日盛。下氣則陽交於陰。交則虛勞愈而內熱不生。內熱去。則陰精日盛。故有子。斷穀固著於仙經。卻乃巳疾之良藥。故久服延年。輕身不老不飢也。【明】李士材本草圖解論麥冬曰。麥門冬甘而微寒。肺經藥也。清肺中伏火。定心臟驚煩。理瘀瘵骨蒸。止血熱妄行。理經枯乳閉。瘡肺痿吐膿。潤燥乾煩渴。主用殊多。要不越清肺之功。夏令溼熱人病困倦無力。身重氣短。孫眞人立生脈散。補天元眞氣。人參甘溫。瀉熱火而益元氣。麥冬甘寒。滋燥金而清水源。五味子之酸溫。瀉丙丁而補庚金。殊有妙用。然胃寒者不敢餌也。去心用。若入丸劑。湯潤搗膏。畏其寒者。酒浸搗。【清】黃宮繡本草求眞論麥冬曰。麥冬有類天冬。然麥冬甘味甚多。寒性差少。天冬所主在肺。而麥冬所主。則更在肺而在心。是以書載功能。消痰止嗽。解熱除煩。去痿除嘔。而又載同人參。則能復脈生津。非合心肺而皆治乎。蓋肺朝於百脈。脈屬心。心燥則肺失養。而脈絕。心清則氣即充。而脈復。麥冬氣稟清肅。能於心中除煩。譬如人當盛暑。則燔灼不寧。若值秋風一至。則炎熱頓解。而無燥鬱不堪之候矣。至於乳汁不開。用此則能通活。熱血妄行。用此則能即止。他如腸上之稠痰。得此則消。心下之支滿。得此則除。脾有積熱則化。胃有火嘔則止。色因血枯即潤。嗽久不止即愈。誠保肺之津液。清心之指南也。但氣寒而虛人禁用。肥大者良。去心用。入滋補藥酒浸。【清】楊時泰本草述鉤元論麥冬曰。虛勞以二冬爲治肺要藥。他如黃連清心。黃芩清肺。尤不得與麥冬之治虛勞等功。凡病惟上焦陽盛之熱。以芩連直折之而陰自復。若本至陰之虛。以致陽亢。而復投芩連。則不能和其陽之無依。而反絕其陰之化原。惟此味以清和之性。潤膩之質。回陰燥而透脈枯。使亢陽得以依於陰而不僭。乃爲中的也。雖然。溼潤者。第與燥氣對柔膩者。第與亢氣對。若有胃熱而兼溼滯。抑或陽氣居於卑弱。亦不可施。【清】賈九如辨藥指南論麥冬曰。麥冬色白體濡。主潤肺味甘性涼。主清肺。蓋肺苦氣上逆。潤之清之。肺氣得保。若咳嗽連聲。若客熱虛勞。若煩渴。若促痿。皆屬肺熱。無不悉愈。同生地。令心肺清則氣順。結氣自釋。治虛人元氣不運。胸腹虛氣痞滿。及女人經水枯。乳不下。皆宜用之。同黃芩扶金制木。治蠱脹浮腫。同山梔清金利水。治支滿黃瘖。又取其四時葉青。凌冬

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不凋。長生之物。同小荷錢。清養膽腑。以佐少陽生氣。入固本丸。以滋陰血。使心火下降。腎水上升。成坎離既濟。心腎相交之義。

國外學說 日本學說謂爲肺臟各病之解熱藥。和漢藥考曰。宇田川榛齋翁譯荷蘭藥鏡第十五卷沙列布條。載有麥門冬之性質效能。略似沙列布。可以代用云。英美學說謂麥門冬產中國之兩江等處。以其根似糯麥。故名麥門冬。其根可爲藥品。其功用能化痰止嗽。與天門冬同。

辨僞 ㊀鄭肯堂曰。僞名洋麥冬。色極白。味苦不甜。按麥冬古時野生。浚冬青翠。宛如麥粒。故名麥冬。今江浙多蒔植之。根色黃白。氣味甘平。質性滋潤。稟少陰冬水之精。上與陽明胃土相合。爲上品服食要藥。奚容僞物混充。而誤人不少乎。㊁曹炳章曰。按麥門冬。出杭州箕橋者。色白有神。體韌性糯。細長皮光潔。心細味甜。爲最佳。安徽寧國七寶浙江餘姚出者。名花園子。肥短體重。心粗色白帶黃。略次。近時市用。以此種最多。四川出者。色呆白短。實質重性梗。亦次。湖南衡州耒陽縣等處亦出。名採陽子。中勻形似川子。亦不道地。大者曰提青。中者曰青提。小者曰蘇大。曰紹大等名目。以枝頭分大小耳。

近人學說 張山雷曰。麥冬。產於西北土脈深厚之地。入土深遠。其味大甘。得坤土之正。而膏脂濃郁。故專補胃陰。滋津液。本是甘藥補益之上品。凡胃火偏盛。陰液漸枯。及熱病傷陰。病後虛羸。津液未復。或炎暑燥津。短氣倦怠。秋燥逼人。肺胃液耗等證。麥冬寒潤。補陰解渴。皆爲必用之藥。但稟西北嚴肅之氣。偏於陰寒。則惟熱熾液枯者最爲恰當。而脾胃虛寒。清陽不振者。亦非陰柔之品。所能助其發育生長。況復膏澤厚膩。荷脾運不旺。反以礙其轉輸。而有餘由澄阻痰凝。寒飲停滯者。固無論矣。本經別錄主治。多就養胃一層立論。必當識得此旨。方能洞達此中利弊。不然者。拘執傷飽支滿。身重目黃等說。一概亂投。自謂此亦古人精義所在。豈不益增其困。別錄又以麥冬主癉蹶者。正是內經治癉。獨取陽明之意。胃主肌肉。而陽明之經。又是足而上。陽明經熱。則經脈弛緩而不收。胃液乾枯。則絡脈失潤而不利。補胃之津。而養陽明之液。是爲治癉起廢之本。但亦有澀流關節。而足廢不用者。則宜先理其澀。又與滋潤一法。遙遙相對。不知辨別。其誤尤大。別錄又謂其定肺氣。而後人遂以麥冬爲補肺主藥。蓋以肺家有火。則滋胃之陰。以生肺金。亦是正法。參麥散一方。固爲養胃保肺。無上妙品。然肺爲貯痰之器。乾燥者少。澀濁者多。設使痰氣未清。而即投黏膩。其害已不可勝言。而麥冬又滋膩隊中之上將。或更以沙參玉竹二味等柔潤甘寒之物輔之。則盤踞不行。闢爲窟宅。而清肅之肺金。遂爲痰飲之淵藪矣。麥冬本爲補益胃津之專品。乃今人多以爲補肺之藥。雖曰補土生金。無甚悖謬。究之其所以專主者。固在胃而不在肺。寇宗奭謂治肺熱。亦就肺家有火者言之。柔潤滋液。以療肺熱葉焦。亦無不可。且華謂主肺癉。固亦以肺火熾盛者言之也。然又繼之曰吐膿。則係肺癰矣。究之肺癉肺癰。一虛一實。虛者乾癉實者痰火。麥冬潤而且膩。可以治火燥之癉。不可治痰塞之癰。景岳和之。遂以肺癰肺癉。併作一氣。則虛實之不分。豈非大謬。且肺癰爲痰濁與氣火交結。咯吐臭穢。或多膿血。宜清宜降。萬無投以滋膩之理。即使如法清理。火息痰清。咳吐大減。肺氣已呈虛弱之象。猶必以清潤爲治。誤與膩補。痰咳即盛。餘焰復張。又臨證以來之歷歷可據者。而肺癉爲肺熱葉焦之病者。但言理法。自必以補肺爲先務。然氣虛必咳。咳必迫火上升。而胃中水穀之液。即因而亦化爲痰濁。故肺雖癉矣。亦必痰咳頻仍。咯吐不已。惟所吐者。多涎沫而非穢濁之膿痰。是亦止宜清養肺氣。漸理其燥金之火。使但知爲虛而即與黏膩滋補。則虛者未必得其補益。而痰火即得所憑依。反致愈咳愈盛。必至碎金不鳴。而不復可救。此沙參玉竹、麥冬、知母等味。固不獨膿痰肺癰所大忌。即稀痰之肺癉。亦必有不可誤與者。皆俗醫之所不知者也。又麥冬本非治

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

咳嗽之藥。本經別錄。鑿鑿可據。自日華有止嗽一說。而景岳亦謂其治肺乾咳嗽。推其用意。亦謂乾咳無痰。則爲氣火利金。麥冬滋潤退熱。夫豈不可特咳嗽一證。雖有虛實寒熱之分。而挾痰挾濕者十恒八九。乾咳無痰者十不二三。卽使本是無痰。而誤投滋膩。則氣火交結。痰濁遂滋。適以助其黏膩。而邪無從泄。凡屬咳病。必肺氣鬱塞不能宣通。因而作聲。以求開泄。止宜順其機以導之。用輕揚疏達之品。如桑葉、蕎麥、麥冬、兜鈴、木蝴蝶之類。助其開展。則咳聲暢達。痰吐滑利。其勢卽解。誤與滋膩。則痰邪爲其閉塞。昔賢比之如油入麵。不可復出。最是確論。張石頑亦謂陰虛羸瘦。喘嗽上氣。失音失血。及風寒暴嗽。大非所宜。正是此旨。蓋痰濁得其滋壅。則無論爲風爲寒爲外來之邪。爲內蘊之熱。皆膠黏固結。牢不可破。永永閉錮於肺中。後雖欲開泄之而不可得。遂致釀成蟠結之根。時時震撼。試問肺葉嬌嫩。而能堪此日常之激動乎。勞瘵之由。强半在此。石頑又謂麻疹咳嗽。亦不可用此。因性寒助陰。適以固斂陽邪。不能發越。尤爲剴切。且咳病有服麥冬。必致音喑。是其陰寒斂邪入肺之明證。所以凡有咳證。麥冬等味。眞是鴆毒。徐靈胎嘗大聲疾呼。而人多不覺。近世名賢如葉天士、費伯雄。皆犯此禁。未始不誤於日華止嗽之一說。而陳藏器且以此物爲下痰飲。景岳亦更有消痰一說。則尤爲殺人之利刃。今之俗醫。又誤於葉氏指南。費氏醫醇等書。恒以襲造勞瘵爲事。所見治咳一方。匪此弊者。比比而是。甚矣。醫學之不昌。雖曰自昔已然。未免於今爲烈。曷禁感慨係之。日華又謂麥冬治五勞七傷。蓋亦本經主傷中之意。養胃滋陰。生津益血。夫孰非調和五臟之正治。然以爲服食之品。調養於未病之先則可。若曰勞傷已成。而以陰柔之藥治之。又非陽生陰長之旨。且勞損之病。雖曰內熱。然亦是陰虛而陽無所附。補脾之氣。助其健運。尚能擊其中堅。而首尾皆應。徒事滋潤養陰。則陰寒用事。而脾陽必敗。不食泄瀉等證。必不可操券以俟。越人所謂過中不治之病。又皆陰柔之藥。有以釀成之矣。

配合應用　㈠麥冬、人參、五味子。爲生脈散。能復脈通心。夏月暑傷氣。服之良。酒後飲之。解酒毒。肺熱者。去人參。加甘枸杞子作飲。治一切虛勞客熱。

㈡麥冬、五味子、枸杞、地黃、牛膝、鼈甲、醋棗仁、天冬。治五勞七傷。胃强者。可加當歸。火盛者。可入黃檗、砂仁、甘草三物。俱遞減。

㈢治陽明瘟大渴引飲。煩躁或嘔吐。麥門冬、石膏、知母、竹葉各數兩。病人虛者。加人參兩許。痰多者。加貝母、橘紅各兩許。

㈣藥性論云。麥門冬止煩渴。主大水。面目肢節浮腫。下水。治肺癰吐膿。宜同天門冬、薏苡仁、黃檗、芍藥、茯苓、石斛、桑根白皮、五味子、牛膝、煮飲。彌佳。止泄精。宜兼覆盆、蒺藜、黃檗、五味子。同茯苓、車前、黃連、石斛、藉苓、澤瀉。療心腹結氣。身重目黃。

㈤日華子治五勞七傷。安魂定魄。止渴肥人。時疾熱狂。頭痛止嗽。故同石膏、知母、竹葉、糯米、專療時氣頭痛。大渴煩躁及發狂。甚者須各數兩。濃煎頓飲。乃佳。虛羸人因作勞內傷而發者。可量加人參。名人參白虎湯。有肺熱者。勿入人參。

㈥麥冬黃連。治消渴。（崔元亮海上方）

㈦治心肺虛熱。虛勞客熱。入沙參、五味子。同青蒿、鼈甲、牛膝、地黃、芍藥、天門冬、枸杞子、五味子、胡黃連、山藥、茯苓、山茱萸、蜜丸。治骨蒸勞熱。（衛義方）

㈧治勞氣欲絕。用麥門冬一兩。甘草炙二兩。粳米半合。棗二枚。竹葉十五片。水二升。煎一升。分三服。（南陽活人方）

㈨治吐血衄血諸方不效者。麥門冬去心一斤。搗取自然汁。入蜜二合。分作二服。卽止。（活人心鏡方）

㈩治衄血不止。麥門冬去心。生地黃各五錢。水煎服立止。（保命集方）

⑪治齒縫出血。麥門冬煎湯漱之。（闕室寶鑑方）

⑫治咽喉生瘡。脾肺虛熱上攻也。麥門冬一兩。黃連半兩。爲末。煉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蜜丸。梧子大。每服二十丸。麥門冬湯下。(普濟方)

㊂治乳汁不下。麥門冬去心。焙爲末。每用三錢。酒磨犀角約一錢許。溫熱調下。不過二服便下。(熊氏補遺方)

㊃治下痢口渴。引飲無度。用麥門冬去心三兩。烏梅肉二十個。細剉。以水一升。煮取七合。細細呷之。(必效方)

㊄治金石藥發。用麥門冬六兩。人參四兩。甘草炙二兩。爲末。蜜丸。梧子大。每服五十丸。飲下。日再服。(本草圖經方)

㊅治男女血虛。麥門冬三斤。取汁。煮成膏。生地黃三斤。取汁。煮成膏。等分。一處濾過。入蜜四之一。再煮成瓶收。每日白湯點服。忌鐵器。(醫方摘要方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒而大便溏瀉者。禁用。惡歎冬、苦瓠、苦芙、苦參、青葙、木耳、伏石、鐘乳、地黃、車前爲之使。

著名方劑 麥門冬湯。治上焦傷風。開其腠理。上焦之氣。慓悍滑疾。遇開卽出。經氣失道。邪氣內著。故成漏氣之症。漏氣卽漏風。俗名蒸籠頭。(三因方)麥冬、生薑根、竹茹白朮各五兩。炙草、茯苓各二兩。人參、陳皮、葳蕤各三兩。上九味。每服四錢。棗五片。陳米一撮。煎熱服。

㊁麥冬湯。治火逆上氣。咽喉不利。止逆下氣。此湯主之。(金匱方)麥冬一升。半夏七升。人參、甘草各二兩。粳米三合。大棗十二枚。上六味。以水一斗二升。煮取六升。溫服一升。日三夜一服。

參攷資料 ㊀麥門冬治肺熱之功爲多。其味苦但專泄而不專收。寒多人禁服。治心肺虛熱及虛勞。與地黃、阿膠、麻仁同爲潤經益血。復脈通心之劑。與五味子、枸杞子同爲生脈之劑。(蹇宗奭)㊁六七月間溼熱方旺。人病骨乏無力。身重氣短。頭旋眼黑。甚則瘧瘧。故孫眞人以生脈散。補其天元眞炁。脈者人之元氣也。人參之甘寒。滌熱火而益元氣。麥門冬之苦寒。滋燥金而清水源。五味子之酸溫。斂丙火而補庚金。衆金五臟之氣也。(李杲)㊂按趙繼宗儒醫精要云。麥門冬以地黃爲使。服之令人頭不白。補髓通腎氣。定喘促。令人肌體滑澤。除身上一切惡氣不潔之疾。蓋有君而有使也。若有君無使。是獨行無功矣。此方惟火盛氣壯之人服之相宜。若氣弱胃寒者。必不可餌也。(李時珍)㊃麥門冬葉如韭。冬夏長生。生函谷川谷及隰坂肥土石間。久廢處。二月八月十月採根陰乾。(別錄)㊄出江寧者小澗出新安者大。白其苗大者如鹿葱。小者如韭葉。大小有三四種。功用相似。其子圓碧。(陳藏器)㊅所在有之。葉青似莎草。長及尺餘。四季不凋。根黃白色。有鬚在根如連珠形。四月開淡紅花。如紅蓼花。實碧而圓如珠。江南出者葉大。或云吳地者尤勝。(蘇頌)㊆潤肺除熱清心。爲心肺虛熱之神品。以甘先入脾胃。故又爲陽明之正藥。本經謂其主羸弱者。胃病則脾無所稟。而肌肉不生。別錄謂其療身腫目黃。心下支滿。能消穀調中者。蓋脾胃之熱去。則溼除而諸症愈。脾胃安而能食肥健矣。(顧松園)

【麥門東】卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【麥斛】㊀卽石斛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石斛』條。㊁卽白茅根之古籍別名。典見新中藥。詳『白茅根』條。

【麥黃】卽黃蒸麴之古籍別名。典見綱目。詳『黃蒸麴』條。

【麥裏藤】之。

形態 麥裏藤。爲蔓草類之一種。形似神仙對坐草。莖蔓麥上。葉對生而尖。微有毛。葉有大小兩種。以莖細節微紫而葉小者。可供藥用。

採取 四月採之。

主治 跌撲損傷。乾者酒煎服。

【麥飯石】

命名 本品狀如摻麥一團麥飯故名。

外國名詞 Maifanshih

產地 生溪中麻石間。

形態 麥飯石爲石類之一種。其形大小不等。或如拳。或如鵝卵。或如盞。或如餅。有粒點如豆如米。色黃白。採取可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 一切癰疽。發背。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料　大凡石類多主癰疽。世傳麥飯石膏。治發背癰甚效。乃中岳山人呂子華祕方。裴員外嚐之。以名第河南尹脅之以重刑。呂寧絕榮望。守死不傳其方。取此石碎如碁子。炭火燒赤。投米醋中浸之。如此十次。研末篩細。入乳鉢內。用數人更礪五七日。要細膩如麵。四兩鹿角一具。要生取連臍骨者。其自脫者不堪用。每二三寸截之。炭火燒令烟盡。即止。爲末。研細二兩。良斂生研末二兩。用三年米醋入銀石器內。煎令魚目沸。旋旋入藥在內。竹杖子不住攪熬。一二時久。稀稠得所。傾在盆內待冷。以紙蓋收。勿令塵入。用時以鵝翎拂膏於腫上。四圍赤處盡塗之。中留錢大洩氣。如未有膿即內消。已作頭即撮小。已潰即排膿。如湍水。若病久肌肉爛落。見出筋骨者。即塗細布上貼之。乾即易。逐日瘡口收斂。但中膈不穴者。即無不差。已潰者用時先以豬蹄湯洗去膿血。故帛揩乾。乃用藥。其瘡切忌手觸動嫩肉。仍不可以口氣吹風。及腋氣月經有孕人見之。合藥亦忌此等。初時一日一洗一換。十日後可二日一換。此藥要研極細方有效。若不細。塗之即極痛也。此方孫眞人千金月令已有之。但不及此詳悉耳。又北齊馬嗣明治楊邃彥背瘡。取粗黃石如鷄卵大者。猛火燒赤。納濃醋中。當有屑落。醋中再燒再淬。俟石至盡。取屑日乾。擣篩極細。末和醋塗之。立愈。劉禹錫傳信方謂之煉石法。用敷瘡腫。無不應驗。（蘇頌）

【麥麨】　原名　麨。

命名　本品係麥炒成者。故名。

古籍別名　糗。（綱目）

性質　甘。苦。微寒。無毒。

主治　和水服。解煩熱。止洩。實大腸。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論麥麨曰。治寒中除熱。湯消石氣。

【麥雞】　即鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳『鷓鴣』條。

【麥藍子】　即王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王不留行』條。

【麥櫻】　即山櫻桃之古籍別名。典見吳普本草。詳『山櫻桃』條。

【麥蘗】　即麥芽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥芽』條。

【麥蠶冬】　即麥門冬之原名。詳『麥門冬』條。

【麥糗】　即小麥麨之古籍別名。見綱目。詳『麥麨』條。

【麥蕈】　係香蕈之一種。多生溪邊沙壤中。味鮮美適口。形狀頗類磨菰。性質功能。亦與香蕈同。參見『香蕈』條。

【麥螺】　即吐鐵之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『吐鐵』條。

【麥顆】　即茶之最嫩者。性質功能。典與尋常茶同。參見『茶』條。

【麻】　即大麻之原名。詳『大麻仁』條。

【麻子仁】　即大麻仁之處方用名。詳『大麻仁』條。

【麻尼】　即眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【麻衣接骨】　**產地**　多生山背陰地及山麓山溪間。

形態　麻衣接骨爲接骨草類之一種。形似土牛膝。穀雨後發苗。葉似苧麻而背不白。對節生。節下則粗如鶴膝。作紫黯色。甚脆。折之從粗節處視之。紫透中心。可供藥用。

性質　溫。

主治　行血。跌打損傷。

參攷資料　接骨草數種。俱產深山濕隰旁。近地罕得。人家間有種之者。然麻衣接骨。每不易得。玉節骨性涼。味甘而稍能和中。調血生髓益津。其功不僅專治折損。麻衣接骨。性溫而行血。惟專治折損。故人多不傳其種。（趙學敏）

【麻伯】　**古籍別名**　君莒。衛道。自死。（別錄）

產地　出陝西諸地。

形態　麻伯爲芳草類之一種。狀如薤。其葉厚而黑。內白。莖實皆赤黑色。其根可供藥用。

採取　九月採之。

性質　酸。無毒。

主治　益氣止汗。

【麻沸湯】　即熱湯之古籍別名。典見仲景全書。詳『熱湯』條。

【麻油】　即胡麻子油之簡稱。詳『

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

胡麻子油』條。

【麻油半夏麴】原名　麻油麴。

基本　本品爲半夏麴之一種。係和胡麻子油製成者。

製法　用半夏入麻油。浸三五日。炒乾爲末。和麴草盒七日。待生黃衣。懸掛風乾入藥用。

採取　以陳久者良。

主治　虛咳內熱。勞嗽之痰。

【麻油麴】卽麻油半夏麴之原名。詳『麻油半夏麴』條。

【麻勃】卽大麻花之原名。詳『大麻花』條。

【麻枯餅】卽胡麻之古籍別名。典見綱目。詳『胡麻』條。

【麻枕】卽胡麻枯餅之古籍別名。典見綱目。詳『胡麻枯餅』條。

【麻紙】命名　本品係用麻製成之紙。故名。

主治　止諸血燒灰用。餘與楮紙同。

【麻茶澤】卽無食子之古籍別名。典見綱目。詳『無食子』條。

【麻黑】卽蕓豆之古籍別名。典見綱目。詳『蕓豆』條。

【麻雀】卽雀之老而斑者。典見綱目。詳『雀』條。

【麻黃】命名　本品味麻色黃。故名。

處方用名　炙麻黃。

古籍別名　龍沙（本經）卑相。卑鹽（別錄）赤根。狗骨。中央節土。中黃節土。（和漢藥考）豆補草。（日本）

外國名詞　Ephedra vulgaris, Rich. var. helvetica, H. et T.（拉丁）

基本　屬麻黃科。爲麻黃之莖。

產地　陳仁山藥物生產辨云。麻黃產北口八達嶺一帶。山上野生。三伏時採掘。和漢藥考曰。產中國、印度、西伯利亞、南非洲等處。



麻黃

形態　麻黃狀如木賊。莖高二三尺。莖間有節。有細小之鱗自枝分出。夏日莖梢開黃色之單性花。結實如百合。瓣似皂莢子。味甜。外皮紅。裏仁黑。其根作紫赤色。長者近尺。似木實。粗約如指。其莖似木賊而細。其色淡綠。內部空虛。亦有稍充實者。味有收斂性。令舌稍麻。

採取　立秋或三伏中採莖陰乾。令青。

製法　陶弘景曰。凡用麻黃。折去節根。水煮十餘沸。以竹片掠去上沫。令人煩。根節能止汗故也。

性質　苦。溫。無毒。

成分　藥理學博士長井長義曾見麻黃中含有一種植物鹽基。名之曰愛泛特林（Ephedorin. $C_{10}H_{15}NO$）。

效能　開腠理。發汗。利小便。行水。用爲止痢之收斂藥。近時用爲麻醉性之鎮咳祛痰藥。又治急性氣枝管炎。

作用　在胃腸中能收縮胃腸之血管。以阻止其蠕動。入血中能致血壓增高。心跳加速。內臟之血管均被激而收縮。惟以腎臟之血管收縮爲最甚。而外部皮下之微血管因强心增其鼓出之力。使血液自然轉運於外。故外部皮下之微血管反被激而放大。而汗腺之分泌遂此增多。氣枝管之抽搐亦被激而鬆弛。故能平喘治咳。

主治　中風傷寒頭痛。溫瘧。痰喘出汗。去邪熱。氣止咳逆。止氣除寒熱。破癥堅積聚（本經）五臟邪氣。緩急風。脇痛。字乳餘疾。止好睡。通腠理。解肌洩邪惡氣。消赤黑斑毒。不可多服。令人虛。（別錄）

張仲景之證明　麻黃一味經張仲景之實驗。認爲主治喘咳水氣也。旁治惡風惡寒無汗。身疼骨節痛。一身黃腫。茲考徵如下。㈠麻黃湯證曰。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘。㈡甘草麻黃湯證曰。裏水。㈢麻黃醇酒湯證曰。黃疸。（以上三方。麻黃四兩。或三兩而爲君藥。）㈣大青龍湯證曰。惡寒身疼痛。不汗出而煩躁。㈤越婢湯證曰。惡風。一身悉腫。㈥越婢加朮湯證曰。一身面目黃腫。㈦越婢加半夏湯證曰。其人喘。目如脫狀。（以上四方。麻黃皆六兩。）㈧麻黃杏仁甘草石膏湯證曰。汗出而喘。㈨牡蠣湯證。（牡蠣卽甘草麻黃湯。而加牡蠣。蜀漆方也。牡蠣治動氣。蜀漆主逐水。然則世所謂瘧疾動

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

無在上而喘者。此湯主之也。外臺祕要特云牡蠣而不舉其證。莊乎如舟行無津涯矣。（以上二方麻黃皆用一兩）㊀葛根湯證曰。無汗惡風。㊁小青龍湯證曰。心下有水氣。咳而微喘。㊂烏頭湯證曰。歷節疼痛。（以上三方麻黃皆三兩）㊃麻黃附子甘草湯證。㊄麻黃附子細辛湯證。（麻黃附子甘草湯。麻黃附子細辛湯二方。其條所謂少陰病者。惡寒甚也。而有無汗之證。故用麻黃也。）（上二方麻黃皆用二兩）歷觀此數方。麻黃主治喘咳水氣也明矣。故其證而惡風惡寒。無汗身疼。骨節痛。一身黃腫者。用麻黃皆治也。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論麻黃曰。治身上毒風瘭。痺。皮肉不仁。主壯熱溫疫。山嵐瘴氣。【宋】大明諸家本草論麻黃曰。通九竅。調血脈。開毛孔皮膚。【金】張元素珍珠囊論麻黃曰。去營中寒邪。洩衛中風熱。【明】李時珍本草綱目論麻黃曰。散赤目腫痛。水腫風腫。產後血澀。【明】繆希雍本草經疏論麻黃曰。麻黃療傷寒為解肌第一。專主中風傷寒頭痛溫瘧。發表出汗。去邪熱氣者。蓋以風寒溼之外邪。客於陽分皮毛之間。則腠理閉拒。榮衛氣血不能運行。故謂之實。此藥輕清成象。故能去其壅實。使邪從表散也。咳逆上氣者。風寒鬱於手太陰也。寒熱者。邪在表也。五臟邪氣緩急者。五緩六急也。風脇痛者。風邪客於脇下也。斯皆衛實之病也。衛中風寒之邪既散。則上來諸證自除矣。其曰消赤黑斑毒者。若在春夏非所宜也。破癥堅積聚。亦非發表所能潔古云。去營中寒邪。洩衛中風熱。乃確論也。多服令人虛。走散眞元之氣故也。【明】李士材本草圖解論麻黃曰。麻黃辛甘而溫。氣味俱薄。輕清上浮。入手太陰足太陽二經。去營中寒邪。泄衛中風熱。通利九竅。宣達皮毛。消瘀毒。破癥結。止咳逆。散腫脹。按麻黃輕可去實。為發表第一藥。惟當冬令在表眞有寒邪者。始為相宜。雖發熱惡寒。苟不頭疼身痛拘急。脈不浮緊者。不可用也。雖可汗之症。亦當察病之重輕。人之虛實。不得多服。蓋汗乃心之液。若不可汗而誤汗。雖可汗而過汗。則心血為之動搖。或亡陽。或血溢。而成壞症。可不愼歟。致謹哉。服麻黃而汗不止者。以水浸炙。仍用撲法。即止。凡服麻黃。須謹避風寒。不爾。復發雖療。去根節煮數沸。掠去上沫。沫令人煩。節根能止汗故也。【清】黃宮繡本草求眞論麻黃曰。麻黃辛溫微苦。中空而浮。入足太陽膀胱。兼入手太陰肺。仲景用此。以治寒入太陽無汗。其意甚深。蓋絲津液為汗。汗即血也。在營則為血。在衛則為汗。寒傷營。營血內澹。不能外通於衛。衛氣固密。津液不行。故無汗。發熱而惡寒。方用麻黃甘草同桂枝。引出營分之邪。達之肌表。佐以杏仁泄肺而利氣。是麻黃雖太陽發汗重劑。實散肺經火鬱之邪。其在十劑。有曰輕可去實。葛根麻黃之屬是也。但桂枝則解太陽風邪傷衛。葛根則解陽明肌熱口渴。柴胡則發少陽陽邪。寒熱往來。此則能發太陽陰邪傷營。不可不細辨也。發汗用莖去節。止汗須用莖節。並蛤粉粟米等分為末。袋盛撲之。【清】賈九如辨藥指南論麻黃曰。麻黃枝條繁細。細主性銳。形體中空。空通腠理。性味辛溫。辛能發散。溫可去寒。故發汗解表。莫過於此。屬足太陽膀胱經藥。治傷寒初起。皮毛腠理寒邪壅遏。營衛不得宣行。惡寒拘急。身熱燥盛。及頭腦巔頂。頸項肩中。腰背遍體。無不疼痛。開通腠理。為發表散邪之主藥。但元氣虛弱。及勞力感寒。或表虛者。斷不可用。倘誤用之。自汗不止。筋惕肉瞤。為亡陽症。難以救治。至若春分前後。玄府易開。如患足太陽經症。彼時寒變為溫病。皆為減用。入六神通解散。通解表裏之邪。則營衛和暢。若夏至前後。陽氣浮於外。膚腠開泄。人皆氣虛。如患足太陽經症。寒又變熱病。不可不太發汗。使眞氣先泄。故少用四五分。入雙解散。微解肌表。大清其裏。此二者。乃劉河間玄機之法。卓越千古。若四時暴感風寒。閉塞肺氣。為咳嗽聲啞。或鼻塞胸滿。或喘急痰多。用入三拗湯。以發散肺邪。奏功甚捷。若小兒疹子。當解散熱邪。以此同杏仁發表清肺。大有神效。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

國外學說　日本學說謂麻黃從來爲發汗劑。所常用之藥品也。明治十八年之頃。長井博士用析之發見一種類鹽基名曰「エレエドリン」化學的記號爲 $C_{10}H_{15}NO$ 以濃厚鹽酸處置之則分解而生「ベンゾールメチールケトン」及「メチールアマン」夫「エフエドリン」之主作用。在散大瞳孔。此爲高橋三浦兩氏所確定。緒子氏亦參預其實驗者也。其作用因刺戟瞳孔散大神經（頭部交感神經）之末端。或瞳孔開大筋。緒子氏與高橋氏共施行之於動物試驗云。投小量之「エフエドリン」則散大瞳孔之外。不見特殊之作用。然與大量則發全身之痙攣。此時血壓大高。但「エフエドリン」與「アトロピン」等相反。其毒性極少。故點眼之際。無中毒之虞。因「エフエドリン」而瞳孔散大。不能長久。故可以之檢查眼底。通常以二%至四%之鹽酸「エフエドリン」溶液爲點眼用。至「エフエドリン」與汗液分泌之關係。猪子氏嘗與高橋氏共施行試驗一二次。然未能詳悉。麻黃中。殆更有促發汗之成分歟。（和漢藥論）麻黃越幾斯者。中外醫事新報第三百五十二號有西尾重氏所記述。今摘記其要云。麻黃爲古方葛根湯中之主藥。其發汗之效。全歸麻黃。此世人所共知也。長井氏云。自麻黃中發見一種類鹽基。其成分爲「エフエドリン」（中略）故余嘗一思想。自麻黃製出麻黃越幾斯。以供藥用。即於麻黃二三〇・〇加水。凡三時許。用强火煮沸之。至其水量之半。而濾過之。又於其殘渣加水。煮沸而濾過之。混和此濾液於前液。在文火上使之蒸發至得適宜之調度而止。則可得有第二稠度之越幾斯。凡五〇・〇。此越幾斯。極富於黏稠性。其色爲黑褐色。味苦。有顯著之麻黃香味。其性爲弱酸性。服用時爲丸藥用之尤便。凡疾病要發汗者。如因感冒而發之急性鼻加答兒。急性咽喉加答兒。急性氣管支加答兒。痿麻質斯急性腎臟炎等。最宜用之。服用此藥之一定量。就褥。蓋被稍溫。則始覺全身溫暖。顏面及耳之邊緣。尤覺溫暖。次卽發汗。其發汗所需之時間。與服他種發汗劑時。無大差異。同時唾液之分泌。亦若稍過於平時。但不甚顯著。又尿之分泌。亦大增加。尿有麻黃臭。此尿至少至二十四時許。尙有特別之臭氣。又汗中亦有麻黃之臭氣。發汗之多少。關係於服用麻黃越幾斯之多少固已。然有極確實之結果者。服之覺全身溫暖。此時心臟之機能亢進。脈搏之數增加。至發汗旣終。則復如故。其副作用之可記者。如高橋三浦兩氏所研究。若稍侵害眼之調節作用。發汗後凡二十四時許。閱覽細字書猶覺眼之疲勞。殊甚然檢眼之瞳孔。不見特別散瞳。此外別無副作用。試執些少麻黃越幾斯。插入貓之眼結膜內。自眼瞼上按摸之。經過數十分時。則顯見瞳孔散大。此當爲麻黃越幾斯中之「エフエドリン」作用於瞳孔者。而麻黃越幾斯發汗之效。與別種發汗劑。如水楊酸曹達。「ピロカルピン」「ヤボランジ」葉互相比較。其發汗之多量。確與「ピロカルピン」及「ヤボランジ」葉相髣髴。然「ピロカルピン」及「ヤボランジ」葉之副作用。能令人嘔吐。及唾液之分泌過多。尿道痙攣等。致覺不快。又水楊酸曹達。其發汗不及「ピロカルピン」之確實。且發汗後致耳鳴。故對於副作用。以麻黃越幾斯爲佳。然其作用於心臟機能者。用大量。則比「ピロカルピン」危險之度爲幾何。非更研究與實驗。不易判明。用通常量。不致有他危險。而發汗之效甚確實。古方之用麻黃。已數千年。良有以也。故余勸人自麻黃製出麻黃越幾斯。而廣供藥用。並望日本藥局方中。後來宜將此藥加入之。余製出之麻黃越幾斯。通常量一回一・〇至二・〇。比麻黃原品爲與五・〇至一〇・〇相當。若與更大量。則發汗過多。非體格强壯偉大者。不可使用也。又和漢藥考曰。日本不產此物。皆自外國輸進。武藏國豐島郡之水邊沙地。產有一種類似麻黃之物。根似細筋。具有黑色紋理。莖似木賊。自來代麻黃用之。實則恐係

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鷹木賊科之節節菜（Equisetumalongatum, Willd.）也。又古方藥品考曰。麻黃來自外國者祇一種。其莖堅緻。色淡綠。氣味濇斂。咀之舌上覺麻痺者爲上品。又有和麻黃者。似麻黃而輕虛。味淡薄。非眞品也。松玄達云。麻黃日本亦有之。然功能不同。當價貴時。藥商每每劑和麻黃及燈心草。攙和雜賣。甚難辨認。

辨僞　㊀鄭肯堂曰。麻黃始出晉地。今滎陽、汴州、彭城諸處皆有之。氣味苦溫無毒。春生苗纖勁直。外黃內赤。中空有節。如竹形宛似毛孔。故爲發表出汗聖藥。市肆有以蔗草僞充。氣味既別。力量亦無。重症用之。不免貽誤。㊁曹炳章曰。按麻黃九十月出新山西大同府。代州邊城出者肥大。外青黃而內赤色爲道地。太原陵坦縣及五台山出者次之。陝西出者較細。四川滑州出者黃嫩。皆略次。山東河南出者亦次。惟關東出者細硬薰多不入藥。若蔗草僞充。更爲害人矣。

近人學說　㊀袁淑範曰。麻黃亦名龍沙。又名卑相。卑鹽、狗骨、赤根。產自歐洲、印度、及我國爲特多。野生於蒙古地方。屬麻黃科植物Ephedra Unlg Aris Rich. Rar. Helbetica Hook. et Thomps之莖。形甚細小。呈鱗狀。有收斂性之味。與一種麻醉性之香氣。麻黃古來在吾皇漢醫界爲用作發汗之要藥。張仲景治傷寒有麻黃湯。葛根湯及大小青龍湯皆用麻黃。治肺痿上氣有射干麻黃湯。厚朴麻黃湯皆重方也。麻黃湯。麻黃二錢。桂枝一錢三分。甘草六分。杏仁十個。葛根湯。葛根一錢半。桂皮、甘草、芍藥各七分半。麻黃一錢。小青龍湯。麻黃、芍藥、細辛、乾薑、甘草、桂皮各一錢半。五味子半夏各二錢。大青龍湯。麻黃五錢。桂皮、甘草、杏仁、石膏三錢。近年來在新醫界中。皆用含有麻黃之製劑爲鎭咳祛痰及喘息治療藥。其聲價愈增高。茲者余以關於麻黃從來之實驗藥物學的研究爲基礎。少述麻黃之醫治效用及其藥理。幸而爲臨床醫家用藥上之參考資料。抑或得爲關於麻黃治驗知識之交換。並吾國已得有數千年來之經驗而有大效之漢藥研究上有所裨益。則我國之古文明藉此可以發揚國粹因之而得保存。此著者之初望也。麻黃藥用之起源雖遠在四五千年前之神農本經。然其科學的研究。則爲近來之發見。即距今三十餘年前日本長井義博士先椙氏及史氏等。自麻黃中分離一種植物鹽基鹽命名爲Ephedrin此即今日所謂麻黃之有效成分也。其化學的性狀。亦依長井博士及泰西諸大家等研究證明矣。即其藥物學的作用亦由高橋三浦兩博士。廣瀨大津、久保田、杜氏等研究闡明無遺矣。（一）麻黃之有效成分。麻黃中約含有〇・三ー〇・五%之Ephedrin其製法。先將麻黃用鹽酸酸性水浸出之。後濃縮其浸出液。再加石灰使之乾燥成粉末。用酒精浸出時。Ephedrin即移行於此浸出液中矣。再依普通之植物鹽分離法處置之。其鹽基鹽現爲無水透映針狀之結晶形。依長谷博士之研究。謂Ephedrin之藥學的構造。類似副腎素（Adrenalin）

$C_6H_5-CH-CH_2$
$(OH)_2OHNH-CH_3$
Adrenalin

$C_6H_5-CH-CHOH_3$
$OHNa-CH_3$
Ephedrin

其藥物學的作用二者亦甚相似。據久保田、大津等之研究。謂其注Ephedrin於靜脈內時。因末梢血管之收縮。起血壓之上升。其作用雖不及Adrenalin之强。然富於持久性。又作用Ephedrin於氣管支筋、腸管等時。由交感神經末梢之刺戟及肌肉之痲痺起弛緩散大。又以此點眼時。刺戟眼交感神經。使瞳孔放大。此外對於骨格筋及心臟等。亦有相當之使用。而其對於金線蛙及家兎之致死量爲對體重一瓩〇・四〇・五瓦。（二）麻黃與發汗作用。麻黃古來即用作發汗之主藥。神農本經謂麻黃苦無毒。主治傷風傷寒頭痛溫瘧發表發汗去熱邪氣。止咳逆上氣煩寒熱。又大明謂麻黃通九竅。調血脈開毛孔皮膚。古方藥品考謂麻黃解寒逐濕除疼。雖

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

認有能排多量之水分於體外。然同書後段謂麻黃氣藥之驗達也。然前人單爲發汗之藥。余謹考之。非有發汗之能矣。張仲景曰。發汗後不可更行桂皮湯。汗出而喘無大熱者。麻黃甘石湯主之。可以徵也。不謂麻黃有發汗作用。麻黃古來吾漢方醫家常用做發汗劑。而近年日本西尾重研究麻黃醇之發汗作用。似有所得。今試介紹於下。在就寢前用麻黃之一定量。後將全身少溫覆之。則初覺全身溫暖。次則發汗所要之時間。與服其他之發汗劑無甚大差。其發汗量關係於麻黃醇服用量之多寡。然其發汗量多而且確實。等則髣髴於 Pilocarpin 及 Sabolandio 藥等。當服麻黃醇感全身溫暖之時。有心悸亢進脈搏增加等症候。至發汗終時則復舊態。其副作用似少有侵害眼之調節機能。此在發汗後二十四時間。覺閱細字書籍時。每覺多疲勞感。然此時不認有瞳孔散大作用。由此西尾氏常用麻黃醇於急性鼻炎。急性咽喉炎。急性氣管支炎。腹膜實斯。急性腎臟炎等。認有確實之發汗作用。藉此可證數千年來經驗古醫方之不謬矣。如上述多數之漢醫家雖認麻黃在臨牀上有發汗作用。然在近代之實驗藥物學上果有發汗作用與否。未開有一定之研究成績報告。最近早川氏曾在南滿醫學會雜誌第十一卷第七號上就麻黃及其有效成分 Ephedrin 與發汗作用之關係有所報告。同時多依歐哥民方氏將貓足部密閉於硝子筒內。流通乾燥空氣於此筒內。將皮膚放散之水分悉導之於鹽酸鈣內。再稱量之。與適用試驗液前之水分放散量比較測定之。而檢其成績時。注鹽酸 Ephedrin 〇・〇五以下於靜脈內時。全不起發汗作用。用〇・〇七瓦以上時。每回雖能證明發汗。然依詳細之實驗觀察時。此亦是大量之 Ephedrin 刺戟中樞神經之一徵候。麻黃或 Ephedrin 似無有令汗腺或汗腺神經使之起發汗作用。從來關於汗腺之分泌有種種之異說。蘭氏主張汗腺分泌神經只存於交感神經內。武藤氏諸依滿氏等則主張交感神經與副交感神經之二重分布說。然在實驗藥物學上。汗腺分泌神經對於毒藥之關係。全與一般交感神經之關係相異。對於副腎素（Adrenalin）不起何等之刺戟徵候。而對於副交感神經毒之 Pilocarpin atropin 等則起作用。在多數報告例中因 Adrenalin 之注射勿論動物或是人類皆有發汗之例。特別吾人感有興味的爲武藤氏之實驗。氏謂注射 Adrenalin 於羊馬等時。皆起甚劇烈之發汗。而 Ephedrin 之化學構造及藥物學上的作用均近似於 Adrenalin 故如早川氏之所說。謂麻黃與 Ephedrin 雖難認有特發性的發汗作用。然在一定之病的條件之下。特先將麻黃製爲浸劑或煎劑。與多量之液體一同服用時。始得認其發汗現象。亦非難想事也。如此以麻黃爲優秀發汗劑之諸醫家之貴重經驗與麻黃及 Ephedrin 雖認有特發的發汗作用。二者之孰是孰非。尙待今後之研究。

本草有麻黃根氣味甘平無害。止汗。夏月雜粉撲之。又曰。麻黃根節甘平。能止汗。效如影響。堇發汗氣。驗不能稽。物理之妙。不可測度如此。由是麻黃根應用於盜汗及虛汗等。其作用正與麻黃相反。麻黃自根而生。其作用相反。亦屬有興味之事也。關於麻黃根尙未有詳細之藥物學的研究報告。今試製麻黃根之浸液。注於動物血管內時。能使血壓下降。其作用正與麻黃相反。再依麻黃根浸所行之試驗成績判斷時。麻黃根除對於血壓之作用外。大多數皆與麻黃相等。無此根中含有之血壓下降物質比較的。依簡單之藥物的操作。卽可變爲血壓上升性質。故其有效成分。亦屬與 Ephedrin 相近似之 Alkaloid 歟。暫記於此。以待後之研究。（三）麻黃與利尿作用。麻黃於發汗作用之外。古書多記載其有利尿作用。服用時能增尿之排泄。有治水腫及浮腫之效。西尾氏言尿之分泌。依麻黃確實能增加。排泄有麻黃臭之尿。佐藤勤也博士報告。以麻黃之煎劑

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（一〇一一〇〇）用於慢性腎臟炎時有著明之利尿作用。麻黃有利尿作用否果著有利尿作用。是依如何之藥理而起至今日尚未有實驗的研究報告。按麻黃有血壓上升作用。在一定之時間內流通腎臟血管內之血液量亦當增加。故謂有利尿作用。非不可能之事也。然依大津及久保田氏之實驗。麻黃有效成分 Ephedrin 之血壓上升作用。由收縮末梢血管而起。然在犬之腎臟血管通流試驗時。Ephedrin 反收縮腎臟血管。果如上述。則其有利尿作用不得不勞求解說。麻黃中含有之 Ephedrin 及其他以外之物質。有能刺戟腎臟血管之作用歟。但以麻黃製成藥劑或其他之藥形服用時。多攝取液體能增各腺之分泌及利尿與其他一般藥劑相同。（四）麻黃之與瞳孔散大作用。麻黃之有效成分 Ephedrin 有散瞳作用。夙爲三浦博士所報告。據博士之研究。謂 Ephedrin 散瞳作用於短時間內即能消散。決不似 Atropin 劑點眼時綿長數日。且在此時決無侵犯眼調節筋之害。故用於眼底檢查時。定優於 Homoatropin 而其散瞳作用。又非動眼神經及瞳孔收縮之麻痺。專基於眼突感神經末梢之刺戟。長井博士在人工的合成 Ephedrin 之時。得一種比 Ephedrin 少一 Methyl 基之一新 Alkaloid 因命其硫酸鹽謂 Mydriatin

$$C_6H_5-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-\underset{\underset{NH-OH_3}{|}}{CH}-CH_3$$

Ephedrin

$$(C_6H_5-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-\underset{\underset{NH_2}{|}}{CH}-CH_3)_2\cdot H_2SO_4$$

Mydriatin

而此物據三浦博士之研究。謂比 Ephedrin 之瞳孔散大作用强大。今以其一〇%液點眼時二十分後起瞳孔散大作用。五十分其作用達至極點。至五時間則漸次恢復。二十－三十時間後則可完全復舊。如斯 Mydriatin 之散瞳作用。其恢復容易與 Hnmostropin 異。不起眼調節筋之麻痺作用。故在點眼後亦不起不快感及羞明等徵候。又水尾博士亦推奬 Mydriatin 爲卓越之瞳孔散大藥。然 Mydriatin 在現今眼科界中有不歡迎者何故。非其在臨牀上有劣於其他之散瞳藥者乎。（五）麻黃之鎭咳祛痰作用。麻黃主治肺氣怫鬱。咳嗽。痰喘。胸滿等。皆爲古醫聖所倡之學說也。古醫家多記麻黃湯。靑龍湯。麻黃甘石湯等。以麻黃做主藥之藥劑。皆有祛痰鎭咳之效。近年日本石野寬吉氏應用左記處方之麻黃劑於喘息症。常得佳良之結果。

處方。麻黃（一〇・〇）一〇〇・〇稀鹽酸五滴。單舍利別六・〇。

上一日量四回分服。然麻黃非有根治喘息之效。麻黃之主要成分 Ephedrin 與 Adrenalin 相同。對喘息恐係屬對症的作用。溯 Adrenalin 有治氣管支喘息之特效。初依卡氏及汲氏等之提倡。此後東西多數之學者。臨牀家多確認其作用雖屬一過性。然有著效。而關於藥理雖有多數之實驗。要之皆由 Adrenalin 作用於氣管枝筋使之弛緩。故其腔徑亦開大。在氣管支筋痙攣時。微量之 Adrenalin 亦容易奏效。此顯然之理也。又 Adrenalin 能對抗肺循環之鬱血。卽左心房內壓之增加。又氣管支黏膜中血管收縮等。亦屬不可爭之事實也。而麻黃中含有構造及作用。皆與 Adrenalin 相類似之 Ephedrin。故麻黃卽 Ephedrin。應如 Adrenalin 對於氣管支喘息有效力。此極顯著之理也。曩依大津及久保田氏之動物實驗。得有極富興味之成績。卽先將家兎用賓雷斯方法測定其呼吸量。再注如 Muskarin Pilocarpin Wutteepeton 等痙攣毒於家兎。使起氣管支痙攣。後再注麻黃之主成分 Ephedrin 於家兎時。雖在注射痙攣毒途中亦能除去痙攣。使呼吸漸次恢復。又將牛之氣管支筋摘出。養於 Ringer Sche loog 中。作用 Ephedrin 常見現弛緩作用。然在先用痙攣毒使之起痙攣。後再作用 Ephedrin 於該筋。其鎭痙作用愈顯著。又檢 Ephe-

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

drin對血行之作用雖不如Adrenalin之强烈然其血壓上昇作用富於持久性故其效力能少持久亦不難推想之理也喘息之原因雖有種種然不論其原因如何主症候終不外乎氣管支節之痙攣故能作用於其末梢使之弛緩之物質即使其作用屬一時的對治療上亦應有若干之效果喘息症如因肺循環鬱血氣管枝黏膜充血等之血行障礙時則不但使氣管支節弛緩即因其血壓作用亦能除去其血行障礙此是吾國數千年經驗之麻黃爲喘息症要藥之實驗的根據實驗藥物學上有興味之事實也㈢張澤霖曰考麻黃一物本草均謂主治傷寒喘咳等症功能發汗並未有利尿之說然則古人豈不知此而讓西人來發明哉蓋亦有意焉夫汗者液也小便亦液也麻黃能發汗其作用爲排泄液體於外使炭氣不致逗留體溫適其常度故我國醫以之爲肺病要藥實其利尿之作用亦如此也設若單純小便癃閉則麻黃非但不能治且可以增病何則小便不利其原因多端大都由於澀熱下注膀胱所致若不知而治以辛溫之麻黃其不僅事者幾希必也審詳其誘因參合其脈症知其小便不利確由汗孔閉塞肺之治節不行斯時與麻黃治之則效如桴鼓矣西人謂有刺戟腎臟血管之功用增加尿量之排泄實則知其然而不知所以然之說也㈢張山雷曰麻黃實輕而空疏氣味俱薄雖曰性溫然淡泊殊甚故輕浮上升專走氣分凡風寒溫熱之邪自外感而來初在氣分者無不治之雖古今皆以爲發表之藥仲景列之於太陽篇中然表即皮毛之部而皮毛即合於肺總之外來之邪皆自外入傷於皮毛則曰表病觸於口鼻則曰氣病而皮毛合於肺口鼻通於肺肺又專主氣之出納故外感之第一步皆氣分先受其病無論風寒溫熱之邪肺家首當其衝表病即氣病氣病即肺病寒邪則鼻塞身重凜寒發熱溫邪則鼻燥氣濁肌膚灼熱且必多兼咳嗽寒邪則咳聲不揚溫邪則咳痰不滑又皆感邪犯肺傷氣之明證是以治外感之病第一要着即在輕泄肺邪疏達氣分無不立解惟麻黃輕清上浮專疏肺鬱宣泄氣機是爲治感第一要藥雖曰解表實爲開肺雖曰散寒實爲泄邪風寒固得之而外散即溫熱亦無不賴之以宣通觀於本草經主中風傷寒去邪熱氣除寒熱之說及後人并治風熱斑疹熱痺不仁溫瘧風痙其旨可見而俗人猶以爲專主表寒之猛劑者誤矣且仲景麻黃湯之專主太陽病寒傷營者以麻黃與桂枝並行乃爲散寒之用若不與桂枝同行即不專主散寒發汗矣抑麻黃之泄肺亦不獨疏散外來之邪也苟爲肺氣鬱窒治節無權即當藉其輕揚以開痺着如仲景甘草麻黃湯之治寒水黃腫千金麻黃醇酒湯之表熱黃疸後人以麻黃治水腫氣喘小便不利諸法雖曰皆取解表然以開在內之閉塞塞非以逐在外之感邪也又凡寒邪鬱肺而鼻塞音啞熱邪窒肺而爲濁涕鼻淵水飲瀆肺而爲面浮喘促火氣灼肺而爲氣熱息粗以及燥火內燔新涼外束乾咳噎燥等證無不恃以爲疏達肺金保全清肅之要務較之杏貝苦降桑皮杷葉等之遏抑閉塞者功罪大是不俟而庸俗畏之幾如蛇蝎豈眞古今人之不相及耶蓋皆耳食之誤而未嘗體驗之耳李瀕湖本草綱目麻黃發明一條極言其爲肺金專藥申明仲景麻黃湯之功用本不專爲散寒發汗而設謂傷寒無汗之用麻黃湯雖治太陽實即治肺蓋汗爲津液所化汗即血也其在營則爲血在衞則爲汗寒邪傷營則營血內澁而氣不能外通於衞衞氣閉塞津液不行故無汗發熱而憎寒風邪傷衞則衞氣外泄而不能內護其營營氣虛耗津液不固故有汗發熱而惡風然風寒之邪皆由皮毛而入皮毛者肺之合也肺主衞氣包羅一身是其證雖屬太陽而肺實受其病其症必兼面赤怫鬱咳嗽有痰喘而胸滿非皆肺病之明驗乎蓋皮毛外閉而邪熱內攻則肺氣膹鬱故以麻黃甘草同桂枝引出營分之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而利其氣汗後無

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大熱而喘者。則加石膏。朱肱活人書有云。夏至後加以石膏知母。是皆泄肺火之藥。則麻黃湯雖曰太陽發汗重劑。而實爲發散肺金火鬱之藥。其說極是。於此可見麻黃湯之發汗。更重在桂枝。而麻黃之治。則其主在肺而不在表。尤彰彰明矣。又曰。麻黃性實。最輕氣味又淡。本草雖曰苦溫。亦因其功用而懸擬之。不過言其溫和升發之義耳。乃流俗畏之。幾以爲大溫大熱之藥。則李瀕湖綱目性熱一言誤之也。甚且謂其出產之地。冬不積雪。而繆氏經疏。更爲過甚之詞。竟有氣味大辛大熱之說。又謂自春深以至初秋。法所同禁。今試取麻黃而細嚼之。辛味何在。考古今各家本草。別錄謂微溫。則輕浮體質。必稟春升溫和之氣。最爲有據。惟張潔古稱其性溫味苦甘辛。然亦謂其氣味俱薄。不知繆氏何忽一變而爲大辛且加以大熱二字。似此危詞聳聽。最是駭人。實屬荒謬已極。而俗人聞聲却步。大率爲此謬說所累。不知麻黃發汗。必熱服溫覆。乃始得汗。不加溫覆。並不作汗。此則治驗以來。鑿鑿可據者。且亦惟寒邪在表。乃宜少少取汗。以解表邪之寒熱。若用以泄肺開喘。亦且無取乎得汗而奏效甚捷。何況輕揚之性。一過無餘。亦必不能大汗頻仍。留戀藥力。釀爲巨患。景岳已謂今人畏爲毒藥而不敢用。又有謂夏月不宜用麻黃者。皆可哂也。瀕湖又謂凡服麻黃藥。須避風一日。不則病恐復作。亦是臆說。不足徵也。

配合應用 ㊀治天行熱病。初起一二日者。麻黃一大兩。去節。以水四升。煮去沫。取二升。去滓。着米一升。及豉爲稀粥。先以湯浴後。乃食粥。厚覆取汗。卽愈。（必用方）

㊁治傷寒雪煎。麻黃十斤。（去節）杏仁四升。（去皮熬）大黃一斤十二兩。先以雪水五石四斗。煮麻黃於東向竈釜中。三沸後。納大黃攪勻。桑薪煮至二石。去滓。納杏仁。同煮至六七斗。絞去其滓。置銅器中。更以雪水三斗合煎。令得二斗四升。藥成丸如彈子大。有病者以沸白湯五合。研一丸服之。立汗出。不愈再服一丸。封藥勿令洩氣。（千金方）

㊂治傷寒黃疸表熱者。麻黃醇酒湯主之。麻黃一把。去節。綿裹。美酒五升。煮取半升。頓服。取小汗。春月用水煮。（千金方）

㊃治寒水黃腫。張仲景云。一身面目黃腫。其脈沉小便不利。甘草麻黃湯主之。麻黃四兩。水五斗。煮去沫。入甘草二兩。煮取三升。每服一升。重覆汗出。不汗再服。愼風寒。有患氣急。久不癒。變成水病。從腰以上腫者是。宜以此發汗。（千金方）

㊄治水腫脈沉。屬少陰。其脈浮者爲氣虛。脹者爲氣。非水者也。麻黃附子湯汗之。麻黃三兩。水七升。煮去沫。入甘草二兩。附子炮一枚。煮取二升半。每服八分。日三服。汗。（金匱方）

㊅治風痺冷痛。麻黃去根五兩。桂心二兩。爲末。酒二升。慢火煮如餳。每服一匙。熱酒調下。至汗出爲度。避風。（聖惠方）

㊆治小兒慢脾風。因吐泄後而成。麻黃長五寸十箇。去節。白朮指面大二塊。全蝎二箇。生薄荷葉包煨爲末。二歲以下一錢。三歲以上半錢。薄荷湯下。（聖惠方）

㊇治尸咽痛痺。語聲不出。麻黃以青布裹之。燒烟筒中熏之。（聖惠方）

㊈治產後腹痛。血下不盡。麻黃去節爲末。酒服方寸匕。一日二三服。血下盡卽止。（子母秘錄方）

㊉治心下悸病。半夏麻黃丸。用半夏、麻黃等分末之。煉蜜丸。小豆大。每飲服三丸。日三服。（金匱方）

㊊治瘡痛倒靨。寇宗奭曰。鄭州麻黃去節。半兩。以蜜一匙。同炒良久。以水半升。煎數沸。去沫再煎。去三分之一。去滓。乘熱服之。避風。其瘡復出也。一法用無灰酒煎其效更速。仙源縣掌工李用之子病疽瘡。風寒倒靨已困。用此一服。便出如神。

㊋治中風諸病。麻黃一秤。去根。以東流水三石三斗。以淨鐺盛五七斗。先煮五沸。掠去沫。逐漸添水盡。至三五斗。漉去麻黃。澄定。濾去滓。取清再熬。至一斗。再澄再濾。取汁再熬。至升半爲度。密封收之。一二年不妨。每服一二匙。熱湯化下。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

取汗。熬時要勤攪。勿令着底。恐焦。（宣明方）

用量　五分至錢半。

施用宜忌　凡氣虛自汗。肺熱喘嗽等症禁用。惡辛夷、石葦、忌鐵。厚朴、白薇爲之使。

著名方劑　麻黃湯。治太陽中寒。頭身俱痛。發熱無汗。惡風而喘。（傷寒論）麻黃三兩。（去節）桂枝二兩。（去皮）炙草一兩。杏仁七十個。（去皮尖）上四味。以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。納諸藥。煮取二升半。去滓。溫服。合覆取微汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息。

參攷資料　㈠張仲景治傷寒有麻黃湯。及葛根湯。大小青龍湯。皆用麻黃治肺瘧上氣。有射干麻黃。厚朴麻黃湯。皆大方也。（蘇頌）㈡麻黃乃肺經專藥。故治肺病多用之。張仲景治傷寒無汗用麻黃。有汗用桂枝。歷代明醫解釋。皆隨文傅會。未有究其精微者。時珍常釋愚之。似有一得。與昔人所解不同。云津液爲汗。汗卽血也。在營則爲血。在衞則爲汗。夫傷寒傷營。血內滯。不能外通於衞。衞氣閉固。津液不行。故無汗發熱而憎寒。風傷衞。衞氣外泄。不能內護於營。營氣虛弱。津液不固。故有汗發熱而惡風。然風寒之邪。皆由皮毛而入。皮毛者。肺之合也。肺主衞氣。包羅一身天象也。是證時雖屬乎太陽。而肺實受邪氣。其證兼面赤怫鬱。咳嗽有痰。喘而胸滿諸證者。非肺病乎。蓋皮毛外閉。則邪熱內攻而肺氣膹鬱。故用麻黃甘草同桂枝。引出營分之邪。達之肌表。佐以杏仁。泄肺而利氣。汗後無大熱而喘者。加以石膏。朱肱活人書。夏至後加石膏知母。皆是泄肺火之藥。是麻黃湯雖太陽發汗重劑。實爲發散肺經火鬱之藥也。腠理不密。則津液外泄。而肺氣自虛。虛則補其母。故用桂枝同甘草。外散風邪以救表。內伐肝木以防脾。佐以芍藥。泄水而固脾。泄東所以補西也。使以薑棗行脾之津液而和營衞也。下後微喘者。加厚朴杏仁。以利肺氣也。汗後脈沉遲者。加人參以益肺氣也。朱肱加黃芩爲陽旦湯。以瀉肺熱也。皆是脾肺之藥。是則桂枝雖太陽解肌輕劑。實爲理脾救肺之藥也。此千古未發之祕旨。愚因表而出之。又少陰病發熱脈沉。有麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯。少陰與太陽爲表裏。乃趙嗣其所謂熟附配麻黃。補中有發也。一錦衣夏月飲酒達旦。病水泄數日不止。水穀直出。服分利消導升提諸藥則反劇。時珍診之。脈浮而緩。大腸下脅。復發痔血。此因肉食生冷菜水過雜。抑遏陽氣在下。木盛土衰。秉間所謂久風成飧泄也。法當升之揚之。遂以小續命湯投之。一服而愈。昔仲景治傷寒六七日大下後。脈沉遲。手足厥逆。咽喉不利。唾膿血。泄利不止者。用麻黃湯平其肝肺。兼升發之。卽斯理也。如能神而明之。則此類是者也。（李時珍）㈢麻黃微苦而辛。性熱而輕。楊倓繼洪云。中牟有麻黃之地。冬不積雪。爲泄內陽也。故過用則洩眞氣。觀此則性熱可知矣。服麻黃自汗不止者。以冷水浸頭髮。仍用撲法。卽止。凡服麻黃藥。須避風一日。不爾病恐復作也。凡用須佐以黃芩。則無赤眼之患。（李時珍）㈣今青州、彭城、滎陽、中牟者爲勝。色青而多沫。蜀中亦有。不好。（陶弘景）㈤鄭州鹿臺及閿中沙苑河旁沙洲上最多。同州沙苑亦多。其青徐者。亦不復用。（蘇恭）㈥按段成式酉陽雜俎云。麻黃莖頭開花。花小而黃。蕤生子如覆盆子。可食。（掌禹錫）㈦今近汴京多有之。以滎陽中牟者爲勝。春生苗。至夏五月則長及一尺以來。梢上有黃花。結實如百合瓣而小。又似皂莢子。味甜。微有麻黃氣。外皮紅。裏仁子黑。根紫赤色。說有雌雄二種。雌者於三月四月之內開花。六月內結子。雄者無花。不結子。至立秋以後。收採莖陰乾。（蘇頌）㈧麻黃出鄭州者佳。剪去節中兩以蜜一匙。七同炒良久。以水半升。煎俟沸。去上沫。再煎去三分之一。不用滓。病瘡疱倒靨黑者。乘熱盡服之。避風。伺其瘡復出。一法用無灰酒煎。但小兒不能飲酒者。難服。然其效更速。以此知此藥入表也。（寇宗奭）㈨本經治中風。是主緩風癱瘓而言。云溫瘧傷寒。乃傳寫之誤。（張石頑）㈩今人多有畏之爲毒藥而不敢用。又有謂夏月不宜

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用麻黃者。皆不達可哂也。凡用散者。惟斯爲最。然柴胡、麻黃俱爲散邪要藥。但陽邪宜柴胡。陰邪宜麻黃。不可不察也。（張景岳）

【麻黃根】性質　甘。平。無毒。

主治　止汗。夏月雜粉撲之。

配合應用　㊀治盜汗陰汗。麻黃根、牡蠣粉爲末撲之。㊁治盜汗不止。麻黃根、椒目等分爲末。每末一錢。無灰酒下。外以麻黃根、故蒲扇爲末撲之。（奇效良方）㊂治小兒盜汗。麻黃根三分。故蒲扇灰一分爲末。以乳服三分。日服三。仍以乾薑三分。同爲末。三分撲之。（古今錄驗方）㊃治諸虛自汗。夜臥即甚。久則枯瘦黃黑。麻黃根各一兩。牡蠣米泔浸洗煅過爲散。每服五錢。水二盞。小麥百粒。煎服。（和濟局方）㊄治盧汗無度。麻黃根、黃芪等分爲末。飛麪糊作丸。梧子大。每用浮麥湯下百丸。以止爲度。（談埜翁試驗方）㊅治產後虛汗。黃芪、當歸各一兩。麻黃根二兩。每服一兩。煎湯下。㊆治陰囊溼瘡。腎有勞熱。麻黃根、石硫黃各一兩。再用米粉一合。爲末傅之。（千金方）㊇治內外障翳。麻黃根一兩。當歸身一錢。同炒黑色。入麝香少許。爲末。嗑鼻。頻用。此南京相國寺東黑孩兒方也。（普濟方）

參攷資料　㊀麻黃根節止汗。以故竹扇杵末同撲之。又牡蠣粉、粟粉、并麻黃根等分爲末。生絹袋盛貯。盜汗出。即撲手摩之。（甄權）㊁麻黃發汗之氣。缺不能禦。而根節止汗。效如影響。物理之妙。不可測度如此。自汗有風。溼。傷風。風溫。氣虛。血虛。脾虛。陰虛。胃熱。痰飲。中暑。亡陽。柔痙諸證。皆可隨證加而用之。當歸六黃湯加麻黃根。治盜汗尤捷。蓋其性能行周身肌表。故能引諸藥外至衞分。而固腠理也。本草但知撲之之法。而不知服餌之功尤良也。（李時珍）㊂麻黃發汗。而其根專於止汗。昔人每謂爲物理之奇異。不知麻黃輕揚。故走表而發汗。其根則深入土中。自不能同其升發之性。況苗則輕揚。根則重墜。一升一降。理有固然。然正惟其同是一本。則輕揚走表之性。猶存所以能徹表分而收其散越。斂其輕浮。以遂歸於裏。是固根荄收束之本性。則不特不能發汗。而并能使外發之汗。斂而不出。此則麻黃根所以有止汗之功力。投之瓢效者也。凡止汗如糯稻根、竈桃乾、小麥、粟仁之類。皆取其堅凝定靜之意。以收散失之氣。其旨皆同。夫豈麻黃與根同出一本。而其性顧乃背道相馳耶。防風發汗。其根止汗。亦是此義。（張山雷）

【麻黃香】係沈香之另一種者。性質功能。仍與沈香同。參詳『沈香』條。

【麻藥接骨】即紫接骨之古籍別名。典見綱目。詳『紫接骨』條。

【麻檳】即胡麻莖之原名。詳『胡麻莖』條。

【麻腐】即胡麻腐之古籍別名。典見綱目。詳『胡麻腐』條。

【麻腐豆粉】即胡麻子粉之古籍別名。典見綱目。詳『胡麻腐』條。

【麻韌香】即乳香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『乳香』條。

【麻黃】即大麻花之原名。綱目謂爲麻子者非也。詳『大麻花』條。

【麻藻萍】即蜈蚣萍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蜈蚣萍』條。

【麻蟲】㊀即黃麻梗蟲之古籍別名。典見綱目。詳『黃麻梗蟲』條。㊁即蒼耳蟲蟲之古籍別名。典見綱目。詳『蒼耳蟲蟲』條。

【麻藍】即大麻子之古籍別名。典見綱目。詳『大麻仁』條。

【麻羅】即百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳『百合』條。

【麻羅春】即百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳『百合』條。

【麻蘞】即胡麻莖之古籍別名。典見綱目。詳『胡麻莖』條。

十二畫

【傅延年】即菊花之古籍別名。典見別錄。詳『菊花』條。

【傅致膠】即阿膠之原名。詳『阿膠』條。

【傘子鹽】即井鹽之古籍別名。典見綱目。詳『食鹽』條。

【備身膏】即芫花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芫花』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【割田鳧】卽蓬藁之古籍別名。典見綱目。詳『蓬藁』條。

【割孤露澤】卽胡黃連之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡黃連』條。

【勝光子】卽雞脚草之子。典見綱目拾遺。詳『雞脚草』條。

【勝志】卽龍窩石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『龍窩石』條。

【勝春】卽月季花之古籍別名。典見綱目。詳『月季花』條。

【勝馬】卽車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『車前草』條。

【勝寫】卽車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『車前草』條。

【勞水】㊀卽流水之古籍別名。典見綱目。詳『流水』條。㊁卽甘澗水之古籍別名。典見綱目。詳『流水』條。

【勞豆】卽野毛豆之古籍別名。詳『野毛豆』條。

【勞鐵】**基本** 本品爲鋼鐵之一種。可供藥用。

主治 祛風邪。燒赤投酒中飲。

【博邪】卽屋遊之古籍別名。典見綱目。詳『屋遊』條。

【博帶】卽雌蟹之古籍別名。典見綱目。詳『蟹』條。

【博勞】卽伯勞之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『伯勞』條。

【博落迴】**古籍別名** 落迴勃勒回號筒草（拾遺）

外國名詞 Macleya cordata, Fr. Br.（拉丁）チャンパギク タケニグサ（日本）

基本 係罌粟科博落迴屬。

產地 生山谷原野間。

形態 博落迴爲毒草類之多年生草本。形如蓖麻。莖中空。吹之作聲。折斷莖中有毒汁。帶黃褐色。高五六尺。葉大而卵圓。基脚作心臟形。邊緣多缺刻。葉背有白粉。葉柄長。互生。秋月莖頭分枝。着花。圓錐花序。花小白色。萼二片。無花瓣。花後結小莢。採得可供藥用。



博落迴

性質 大毒。

主治 殺精魅。治溪毒。蠱毒。消癥瘕。瘀痰。瘧肉。療白癜風。及諸惡瘡。

參攷資料 博落迴祗可外用。不可內服。內服致人立死。故勿輕以入口。（綱目）

【厥櫬】卽蕣之古籍別名。典見爾雅。詳『蕣』條。

【善朮】卽獅子朮之古籍別名。典見清異錄。詳『於朮』條。

【喀提求】卽孩兒茶之西藥名。詳『孩兒茶』條。

【喜鵲】卽鵲之古籍別名。典見食療本草。詳『鵲』條。

【喝起草子】卽蒼耳子之古籍別名。典見綱目。詳『蒼耳子』條。

【單母】卽馬刀之古籍別名。典見綱目。詳『馬刀』條。

【單桃仁】卽桃仁之處方用名。詳『桃仁』條。

【堯韭】卽菖蒲之古籍別名。典見吳普本草。詳『菖蒲』條。

【報春花】卽辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛夷』條。

【報喜蘭】卽催生蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『催生蘭』條。

【壺柑】卽柚之古籍別名。典見唐本草。詳『柚』條。

【壺蜂】卽大黃蜂之古籍別名。典見綱目。詳『大黃蜂』條。

【壺蘆】**命名** 壺酒器也。盧飲器也。本品各象其形。又可爲酒飯之器。故名。

處方用名 陳蒲。瓟。葫蘆。瓟。

古籍別名 瓠瓜（說文）匏瓜。葫蘆。蒲蘆。（綱目）懸瓠（莊子）



壺蘆（一）



壺蘆（二）

形態 壺蘆爲菜類之一年蔓生草本。圓圃多植之。莖細長。以卷鬚絡於他物。葉圓心臟形。有軟毛。夏初開白花。夕開朝萎。至秋實熟。如大小二種。重疊狀。可供藥用。其蔓與花葉實中子。詳見各該條。

性質 甘。平。滑。無毒。

361／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　利水道。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論壺蘆曰消渴惡瘡鼻口中肉爛痛【唐】孟詵食療本草論壺蘆曰消熱服丹石人宜之【宋】大明諸家本草論壺蘆曰除煩治心熱利小腸潤心肺治石淋。

參攷資料　名醫錄云浙人食匏瓜多吐瀉謂之發暴蓋此物以暑月壅成故也惟與香藥同食則可免（李時珍）

【壺蘆子】主治　齒斷或腫或齲齒搖疼痛用八兩同牛膝四兩每服五錢煎水含漱日三四次。

【壺蘆葉】性質　甘平無毒。**主治**　耐飢作菜茹。

【壺蘆蔓鬚及花】主治　解毒。

【寒不凋】　即密蒙花之古籍別名。典見和漢藥考詳『密蒙花』條。

【寒水石】　即石膏之古籍別名見綱目詳『石膏』條。

【寒水石】原名　凝水石。**命名**　本品折片投水水能凝動故名寒水亦本其義也。**古籍別名**　白水石（本經）浚水石（別錄）鹽精石泥精鹽枕鹽根（綱目）白水石冷油石冷石（和漢藥考）

外國名詞　Calcareous Spar.

基本　層方解石或霰石類中之一種鑛石。

產地　凡鹵地積鹽之下恒有生焉。

形態　寒水石爲鹽之精液滲出土中年久結成清瑩有稜之石塊其狀爲白色或透明堅硬之固塊或爲粗糙細粒種類甚多。

製法　雷敩曰凡使須用生壹自然汁煮乾研粉用每十兩用生薑一錢。

性質　辛寒無毒。

成分　由結晶性炭酸鈣而成。

效能　瀉熱降火利水明目用作解熱配合眼藥又昔時亦用作牙粉原料。

主治　身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之久服不飢（本經）又除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止渴水腫小腹痺（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論寒水石曰壓丹石毒風解傷寒勞復【明】李時珍本草綱目論寒水石曰治小便白內障涼血降火止牙疼堅牙明目【明】繆希雍本草經疏論寒水石曰凝水石生於鹵地裏積陰之氣而成本經味辛氣寒別錄加甘大寒無毒經曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之又曰熱淫於內治以鹹寒大寒微燥之性故主身熱邪氣皮中如火燒煩滿及時氣熱盛五臟伏熱胃中熱也易飢作渴亦胃中伏火也甘寒除陽明之邪熱故能止渴不飢水腫者澀熱也小便多不利以致水氣上溢於腹而成腹痺辛鹹走散之性故能除熱利竅消腫也療腹中積聚者亦取其辛散鹹輭之功耳【清】黃宮繡本草求眞論寒水石曰寒水石又名凝水石又名白水石生於鹵地因鹽精滲入土中年久積聚清瑩有稜而成也味辛而鹹氣寒無毒書載能治時行大熱口渴水腫益以性稟純陰故也經曰熱淫於內治以鹹寒又曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以收之服此治熱利水適相宜耳然此止可暫治有餘之邪及敷湯火水傷若虛人熱浮其切忌焉。瑩白含之即化者眞否即是僞但眞者絕少。

配合應用　㈠治男女轉脬不得小便寒水石二兩滑石一兩葵子一合爲末水一斗麥五升時服一升即利（永類鈐方）

㈡治牙齦出血有竅寒水石粉三兩朱砂二錢甘草腦子一字爲末乾摻（普濟方）

㈢治湯火傷灼寒水石燒研傅之（衞生易簡方）

㈣治小兒丹毒皮膚熱赤寒水石半兩白土一分爲末米醋調塗之（經驗方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾胃虛寒及無實熱者禁用。

參攷資料　㈠凝水石稟積陰之氣而成其氣大寒其味辛鹹入腎走血除熱之功同於諸鹽古方所用寒水石是此石唐宋諸方寒水石是石膏近方寒水石則是長

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石方解石(李時珍)㊁凝水石色如雲母可折者鹽之精也生常山山谷中水縣及邯鄲(別錄)㊂常山卽恒山屬幷州中水屬河間郡鄚屬趙郡此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴硝此石末置水中夏月能爲冰者佳(陶弘景)㊃別錄言凝水鹽之精也陶氏亦云鹵地所生碎之似朴硝范子計然云出河東河東鹵地也獨孤滔丹房鑑源云鹽精出鹽池狀如水晶據此諸說則凝水卽鹽精石也一名泥精人謂之鹽枕今人謂之鹽根生於鹵地積鹽之下精液滲入土中年久至泉結而成石大塊有齒稜如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色者皆至暑月回潤入水浸久亦化蘇頌注玄精石謂解池有鹽精石味更鹹苦乃玄精之類又注食鹽謂鹽枕作精塊有孔竅若蜂窠可緘封爲禮贄者皆此物也唐宋諸醫不識此石而以石膏方解石爲注誤矣(李時珍)

【寒瓜】卽西瓜瓤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『西瓜瓤』條。

【寒石】卽鹵鹼之古籍別名。典見吳普本草。詳『鹵鹼』條。

【寒具】**命名** 本品冬春可留數月及供寒食禁烟之用。故名。

古籍別名 捻頭。(錢乙)環餅。(要術)饊。(綱目)

製法 用糯粉和麵。搓成細繩。盤曲如環形。入油煎之而成。可經久藏。

性質 甘。鹹。溫。無毒。

主治 利大小便。潤腸。溫中益氣。

【寒欣】卽蚯蚓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蚯蚓』條。

【寒花】卽露花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『露花』條。

【寒莓】卽蓬蘽之古籍別名。典見本草會編。詳『蓬蘽』條。

【寒食粥】**命名** 本品於寒食日用杏仁和諸花煮成之粥。故名。

主治 咳嗽。下血氣。調中。

【寒皋】卽鸛鶴之古籍別名。典見萬畢術。詳『鸛鶴』條。

【寒蚓】卽蚯蚓之古籍別名。典見吳普本草。詳『蚯蚓』條。

【寒菜】卽雲薹子之古籍別名。典見胡居士百病方。詳『雲薹子』條。

【寒號蟲】卽五靈脂之原名。詳『五靈脂』條。

【寒蒲草】卽玉蕈之古籍別名。典見綱目。詳『香蕈』條。

【寒鴟】卽慈烏之古籍別名。典見綱目。詳『慈烏』條。

【寒露粟】卽粟米之古籍別名。典見綱目。詳『粟米』條。

【寒蠏】卽蚓蚯之古籍別名。典見吳普本草。詳『蚯蚓』條。

【寓木】卽桑寄生之古籍別名。典見本經。詳『桑寄生』條。

【富水】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【尋風藤】卽清風藤之古籍別名。典見綱目。詳『清風藤』條。

【就蔦】卽黃環之古籍別名。典見唐本草。詳『黃環』條。

【屠蘇酒】**製法** 用赤木桂心七錢五分。防風一兩。菝葜五錢。蜀椒、桔梗、大黃五錢七分。烏頭二錢五分。赤小豆十四枚。以三角絳囊盛之。除夕夜懸井底。元旦取出置酒中。煎數沸。舉家東向。從少至長。次第飲之。藥滓還投井中。歲飲此水。一世無病。

主治 辟疫癘。一切不正之氣。

【帽子花】卽鴨跖草之日本別名。詳『鴨跖草』條。

【廋肉】卽豬肉之古籍別名。典見綱目。詳『豬肉』條。

【廋椒】卽蔓椒之古籍別名。典見別錄。詳『蔓椒』條。

【廋顛】卽天名精之古籍別名。典見別錄。詳『天名精』條。

【彭侯】**形態** 彭侯爲獸類之一種。狀如黑狗。無尾。可烹食。味如狗。其肉可供藥用。

性質 甘。酸。溫。無毒。

主治 辟邪氣。令志壯。

【彭根】卽石龍芮之古籍別名。典見吳普本草。詳『石龍芮』條。

【復累】卽魁蛤之古籍別名。典見綱目。詳『魁蛤』條。

【悶石】卽明礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『明礬』條。

【悶陀羅華】卽曼陀羅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『曼陀羅』條。

【惠貝】卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【惡士蔓勝】卽蒴醬苗之古籍別名。典見綱目。詳『蒴醬』條。

【惡客】卽曼陀羅之古籍別名。典見姚伯聲花品。詳『曼陀羅』條。

【惡思佛】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【惡疾】卽牛蒡子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛蒡子』條。

【惡草羅】卽蕺草之古籍別名。典見莊漫錄。詳『蕺草』條。

【惡實】卽牛蒡子之原名。詳『牛蒡子』條。

【惡實子】卽牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳『牛蒡子』條。

【提天冬】卽天門冬之處方用名。詳『天門冬』條。

【插田藨子】卽覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳『覆盆子』條。

【揚泛水】卽甘澜水之古籍別名。典見綱目。詳『流水』條。

【揚搖】產地　閩粵及熱帶諸地有之。

形態　揚搖爲夷果類之一種。其子生皮中長四五寸。有七脊。色黃無核。可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　通百脈。强筋骨。和中益氣。潤肌膚。好顏色。

【握雪礜石】基本　本品爲礬石之出於金穴者。

古籍別名　公石。（唐本草）化公石。（圖經本草）

性質　甘。溫。無毒。

主治　痴冷積聚。輕身延年。多食令人熱。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論握雪礜石曰。療大風瘡。

【揭拉婆】卽車渠之古籍別名。典見梵書。詳『車渠』條。

【揭羅闍】卽鵰之古籍別名。典見梵書。詳『鵰』條。

【散血丹】卽小將軍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『小將軍』條。

【散紅花】卽紅花之處方用名。詳『紅花』條。

【散鹽】卽末鹽之古籍別名。典見周禮。詳『食鹽』條。

【斑石】卽滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【斑尾】卽斑貓之古籍別名。典見綱目。詳『斑貓』條。

【斑希】卽玳瑁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玳瑁』條。

【斑杖】㊀卽虎杖之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『虎杖』條。㊁卽攀倒甑之古籍別名。典見綱目。詳『攀倒甑』條。

【斑枝花】卽木棉之古籍別名。典見綱目。詳『木棉』條。

【斑佳】卽斑鳩之古籍別名。典見范汪方。詳『斑鳩』條。

【斑蛭】卽斑貓之古籍別名。典見綱目。詳『斑貓』條。

【斑犀】卽兕犀之古籍別名。典見唐本草。詳『兕犀』條。

【斑蝥】卽斑貓之古籍別名。典見吳普本草。詳『斑貓』條。

【斑鳩】命名　鳩鵴也。言其聲。斑鰥也。言其色。故名。

古籍別名　鰥鳩。斑佳。（范汪方）鵴鳩。（左傳）祝鳩。鶖莉鳩。楚鳩。役鳩。糠鳩。鄖鳥。辟鳥。小而無斑者名佳。其子名鵴鳩。（綱目）

外國名詞　Turtur risorius L.（Indiandoue）（拉丁）シラコバト或ジュズカケバト（日本）

基本　係脊椎動物鳥類鳩鴿類鳩鴿科之斑鳩。

產地　在山林原野間。

形態　斑鳩爲原禽類鳩之一種。體比雉鳩略小。頭頸及下面概灰白色。稍帶赤色。脊背至尾色近灰褐。撥風羽黑褐。外側之尾羽根黑端白。頸部之背面有黑色之半環形輪。餘呈淡白色。其肉可供食與藥用。



斑鳩

性質　甘。平。無毒。

主治　明目多食。益氣助陰陽。

歷代記述攷證　【宋】寇宗奭本草衍義論斑鳩肉曰。久病虛損人食之補氣。【明】李時珍本草綱目論斑鳩肉曰。食之令人不噎。

參攷資料　范汪方治目有斑鳩丸。總錄治目有錦鳩丸。倪惟賢

364／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

氏謂斑鳩補腎。故能明目。藏謂鳩能益氣。則能明目矣。不獨補腎已爾。古者仲春羅氏獻鳩以養國老。仲秋授年老者以鳩杖。云鳩性不噎。食之且復助氣也。(李時珍)

【斑鳩血】主治　熱飲。及解蠱毒。

【斑鳩屎】主治　治耳出膿疼痛。及耳中生耵聹。同夜明沙末等分吹之。

【斑穀】即楮實子之古籍別名。典見唐本草。詳『楮實子』條。

【斑節相思】形態　斑節相思爲雜草類之一種。枝葉類似薄荷而大。其味如艾。可供藥用。

主治　解毒。

【斑蝥】即斑貓之原名。詳『斑貓』條。

【斑龍】即鹿茸之古籍別名。典見綱目。詳『鹿茸』條。

【斑龍角】即鹿角之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿角』條。

【斑貓】原命名　斑蝥。斑言其色。蝥言其毒。如矛刺故名。後俗訛爲斑貓也。

古籍別名　蟲蝥。(拾遺)龍蛇。斑尾。(綱目)斑蛰。晏青。赤頭。龍蛇。(和漢藥考)斑菌。(吳普)腫髮。豆斑貓。(新本草)

外國名詞　Cicindela chinensis, Deg.(拉丁)　Blister-fly.(英)

基本　斑貓爲屬甲翼類之昆蟲。

產地　陳仁山藥物生產辨云。斑貓各省均有出。廣東以清遠、石角、北江、惠州均有出。

形態　斑貓爲大豆葉上之甲蟲。長五六分。黃黑斑紋。烏腹尖喙。其體有一種臭氣。

採取　八九月間。就豆葉上捕取。陰乾。

製法　雷敩曰。凡斑蝥、芫青、亭長、地膽。修事並潰糯米小麻子相拌。炒至米黃黑色。取出去頭足兩翅。以血餘裹懸東牆角上。一夜用之則毒去也。大明曰。入藥須去翅足。糯米炒熟。不可生用。卽吐瀉人。李時珍曰。一法用麩炒過。醋煮用之也。

用法　慴以刲末。和入外傅藥。間有和作丸散。

性質　辛。寒。有毒。

成分　斑貓之主成分爲羯答利斯。此外含有芳香性揮發油及脂肪質。惟其含量由種類產地等而異。

效能　治疥癬。消瘰癧。用作發泡藥。及生毛藥。間有作爲利尿藥者。

主治　寒熱鬼疰。蠱毒。鼠瘻瘡疽。蝕死肌。破石癰。(本經)血積傷人肌。治疥癬墮胎。(別錄)

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論斑蝥曰。治瘰癧。通利水道。【宋】大明日華諸家本草論斑蝥曰。療淋疾。傷惡瘡瘻爛。【明】李時珍本草綱目論斑蝥曰。治疝瘕。解疔毒。蝎犬毒。沙蟲毒。蠱毒。輕粉毒。【明】繆希雍本草經疏論斑蝥曰。斑蝥味辛氣寒。扁鵲云。有大毒。近人肌肉則潰爛。毒可知矣。入手陽明手太陽經。性能傷肌肉。蝕死肌。故主鼠瘻疽瘡疥癬。辛寒能走散下泄。故主破石癰血積。及墮胎也。至於鬼疰蠱毒。必非極辛大毒之藥所能療。此本經之誤。甄權主瘰癧。通利水道。以其能追逐腸胃垢膩。復能破結走下竅也。【明】李士材本草圖解論斑蝥曰。斑蝥攻血積。利水道。治疝瘕。解疔毒。蝎犬毒。蠱毒。輕粉毒。治瘰癧墮胎。按斑蝥專主走下竅。直至精溺之處。蝕下敗物。但痛不可當。虛者大禁。炒醋煮。【清】黃宮繡本草求眞論斑蝥曰。斑蝥最屬惡物。聞人捕捉。卽於屁尾射出惡氣。令人臭不可聞。近人肌肉則潰入胎則墮。其毒概可知矣。其味辛。其氣寒。其性下走而不上。故書言外用。止可以蝕死肌。敷疥癬惡瘡。內治止可以破石淋。拔瘰癧疔腫。下大腸惡毒而已。取其以毒攻毒也。然惟實者可用。其拔瘰癧毒。則以斑蝥法製。使令毒根從便出。如粉片血塊爛肉之形。次以木通、滑石、燈心草輩導之。但下大毒之初。先於患人頭上拔去血髮二三莖。以斑蝥七枚去翅足。炙黃。用蟾蜍搗汁服之。瘡口於無風處。撅去血惡。小便洗淨。髮灸敷之。服後小便當有瘀泄。去三四日當有狗肉三四十枚爲盡。如

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

數少再服七枚若愈後忌聞鐘聲。復發則不可治矣去頭足糯米炒熟生用則吐瀉人亦有用米取氣不取質者

國外學說　日本學說謂日本之斑貓醫者亦夙知其有藥效謂能治蠱毒爛惡肉腐瘡毒利水道蓋含一種刺戟性之物質甚明甚其刺戟性物質爲何猶乎氏以爲卽係羯答利斯故我國之豆斑貓與泰西之芫菁有相同之效分製造舍羯答利斯劑及羯答利斯用之最爲適宜依丹波鈴木成島諸氏之實驗云羯答利斯之含量爲百分之三優勝於芫菁者幾至三倍（藥學雜誌第百三號）又謂羯答利斯酸鹽於治療上大得聲譽療喉頭結核尤稱有效其結節能褪色縮小壞瘍漸見治愈亦有全治愈者其用量以羯答利斯〇・一至〇・二瓦隔日注射之副作用中最當注意者爲刺戟腎臟卽患蛋白尿及腎炎是也故投藥時常宜檢查病者之尿斑貓之種類有如下述㈠豆斑貓（葛上亭長）日本各地產此上總地方尤多爲甲翼蟲（Epicanta gorhami, mars.）七八月間最多豈科植物及馬鈴薯葉等均受巨害人若觸葉立卽佯死墜地外觀類蚤長五分許作圓筒狀頭部作赤褐色心臟形觸角頗長甲翼作黑色其兩側中央有類黃色之線腹部作黑色有黃色輪四五條俱爲黃色毛所成有一種特異臭氣味如灼㈡青斑貓（芫菁）（Lytta vasicatoria Fab.）產歐洲南部尤以西班牙意大利法國南部等爲最多有西班牙蠅發泡蠅等別名食白楊接骨木槐木等葉而生長捕此之法可於早晨敷布樹下蒙面罩御手套用棒擊樹卽紛紛墮下集之置入薄醋中或用煮醋蒸氣燻殺之使充分乾燥其形態類豆斑貓而稍大長六七分全體有金綠色光澤具六脚有觸角頭部作心臟形呈赤色甲翼作四角形翅爲淡褐色氣味俱與豆斑貓同㈢日本斑貓（路敎）（Mylabris cichorii, Farbr.）棲息於日本各處沙地長七八分全身黑色有黃紅斑點頗爲美觀脚頗長晴天盛暑之日止於道旁路人行近則急起飛行數十步而復止其狀恰如敎人路徑故日本有路敎之稱其意猶言引路也㈣漢產斑貓（Mylabris cichorii, m. Pustulata m. rubipennis.）產中國山西山東湖南湖北安徽諸省全身黑色長寸許甲翅有黑褐色線一條至三條秋季捕集曬乾供藥用㈤土斑貓（地膽）（Meloe corvinus.）棲息於山野土石之間長寸許闊三四分全身碧黑色前翅短無後翅故祇能匍匐地上採集之亦供藥用㈥羯答利陳（Cantharidin $C_{10}H_{12}O_4$）爲光耀無色無氣味稜柱狀或葉狀之結體於二百十八度融解不溶於冷水及溫湯對於各種溶解劑則善能溶解有酸類之性與鹽基化合構成鹽類羯答利斯之製劑有酒軟膏硬膏油劑鈣劑等羯答利斯之一回服量爲〇・〇一至〇・〇五瓦英美學說謂斑蝥又名發泡斑蝥又名發泡甲蟲產中國西班牙法國俄羅斯等處係豆莢上飛蟲生暖處並日光多處爲最堅壯中國所產之斑蝥其形狀雖與西國有別而其功力則同內含一精卽甘道殿取以研末作藥殊多功效其作用爲特性毒藥又爲引炎惹皮膚藥又爲行氣藥利小便藥治久瘧病類久白濁便澀陽痿間能令生溺器具生炎如久挺流白帶白濁等症用之最有益但此藥之尋常用處爲弔炎令皮膚成泡約六點鐘至十二點鐘卽成然間能成溺淋務宜愼用又如起水泡能引病外出治肺膿生炎心胞絡生炎肺胞膜生炎照胸前部位搽之至解藥之解此毒須先服吐劑或用抽水節後服蔥麻油與鴉片其處方以斑蝥一分粗末淡酒八十分共入有蓋器內浸七天間時搖動濾澄用絞盤絞之過淋紙再加酒仍足八十分爲度治下痿小便淋瀝每服八釐七毫半至三分半（斑蝥酒方）又斑蝥一錢芥末四錢胡椒四錢樟腦四錢蒜頭一顆白醋四兩八錢火酒十兩零八分和勻同浸七天濾淨搽風濕症甚效（同上）又斑蝥一斤末黃蠟八兩松香八兩猪油八兩先將黃蠟松

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

香猪油煎焦。然後將斑蝥末加入。以攪至凝結爲度。此膏用布開調或用紙亦可。貼此膏約三四點鐘或五六點鐘。令其略起水泡。宜隨即撤去。再數以麥糠甘菊或數以爛飯。但貼此膏其症之輕重。亦須分辨。其在重症則刺破其水泡後。並須將其皮揭去而復貼以松香黃膏。令其膿盡發。庶易獲效。其在輕症則俟其起水泡後。隨即刺穿。另用白藥膏以潤之。至小貼此膏。須將白藥膏加入。令勿過烈。如臟腑發炎。須俟其稍退。貼此膏令引炎外出。又如頭腦積血伏熱等症。須先用藥以清其熱。次以此膏貼頸後及小腿裏。又如眼內久患熱症。以此膏貼太陽穴及貼頸後耳後等處。其翳膜自可免生。又如肺內熱症已退。仍覺痛而未愈。以此膏貼胸前。又如腦筋作疼。以此膏貼患處。若骨鯁發腫。以此膏貼數次。自能獲效。此膏有三妙用。其一能引炎外出。其二能令熱消散而免生翳膜。其三能行氣血。（斑蝥甲膏方）又斑蝥十二分極細末。黃蠟七分半。煉羊油七分半。洋松香三分。煉猪油六分。除斑蝥餘共入熬鍋鎔化。再加斑蝥調勻至涼爲度。能引症外出起水泡用。（臨時用樟腦細末撒膏面上。可免小便熱疼。外蒙亮紗一層。貼患處俟起水泡。即行揭去。）（斑蝥貼膏方）附錄。斑蝥生八日至九日即死。活時發一大臭。最爲可憎。捕取斑蝥之法。必在早起時。以布蓋護其手與面。後將其樹搖動。令斑蝥落下。或置醋內。或置篩內。令遇醋霧。則斑蝥已死。或在日光內曬之。或在暖房內晾乾。置瓶內。恐有他蟲蝕之。務宜密塞爲要。

近人學說　楊賢民曰。斑蝥一名斑貓。有作蟹蝥。身業綠色。兼金屬之光澤。因有斑文。（本草作有黃黑色斑文）故曰斑蝥。長約五六分以至寸許。多生在棗上。捕生蟲飲食料。很有功於農人。但性辛寒。有大毒。在醫業上本無足取。世人偏用之入藥。甚爲不解。茲將主治證候列下。以證明其不該入藥之原因。於下。斑蝥最重要之主治。（一）瘰癧。（二）瀏大傷。瘰癧各號末黃蠟七分半。煉羊油七分半。洋

不外痰溼風熱氣毒結聚而成。有急性慢性二種分別。急性者暴然而發。但容易潰破。所以治法不難。至於慢性瘰癧。來勢很緩。漸漸發作。結核腫痛。堅硬難消。經了一年半載。漸化膿潰爛。或竟變成危險證候。所以不容易治。瘰普通治法。不外消痰解鬱清毒行氣去結散核和血活絡。用藥如海藻丸、消核散、屑黃丸、控涎丹、消瘰化痰湯。內消瘰癧丸、紫霞膏。皆可隨證選用。原不必專倚賴斑蝥一物。自楊登甫創立瘰癧之毒。以斑蝥地膽爲主。製治如法。能使其從小便出。如粉片血塊爛肉。此其驗也。於是法製靈雞蛋。與楊氏家藏治瘰癧方。此等方藥。竟爲瘰癧證之主治。眞是萬分荒謬。須知瘰癧證之發生。雖有許多原因。但無非是身體血液中缺乏碘質。不能爲此。所以療治瘰癧方法。必須含有碘質者。方能奏效。自然界中含碘最富者。首推生存海中之動植物。（晉嵇康說頸處險而癭便是。離海太遠。缺乏碘質之故。）海藻海帶昆布。何以爲瘰癧之重要藥。即爲含有碘量之故。牡蠣何以有消堅軟核之功用。亦爲含碘甚富之故。試問斑蝥有甚關係。有甚能力。可以療治瘰癧。就使誤食蟲蟻氫殘陳水宿茶等。發生瘰癧。當然毒氣是聚在發生之部位。但斑蝥入腸便肆其攻竄之性。直達下部精溺之處。如須使之轉上行。以攻去病根。斷無此事。有人問患瘰癧者。一吃斑蝥以後。確能尿出如粉片血塊爛肉等物。豈非明驗。不知服斑蝥者。所以尿出之粉片血塊爛肉。完全由斑蝥造成。因其性質非常毒厲。將其汁染在肌肉上。可以使肌肉即時潰爛。可知服後所經過之地點。焉得不起潰爛作用。所以服斑蝥者。一定腹中便溺之處痛不可當。求生不能。求死不得。十分苦慘。豈非內臟破損之特徵耶。斑蝥第二項主治。是瀏犬傷。古人有言。國狗之噬。無不噬也。可見是甚厲害。但因無妥當之治法。至民國十一年。方有人提倡用仲景傷寒論中之抵當湯加減施治。（原方係用生川軍二錢。桃仁七粒。去皮尖。地鼈五七隻。炒去足。加白蜜三錢。酒一

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

杯煎。連渣服之。不拘帖數。至大小便不見惡物爲度。）幾經醫人試用。功效非常昭著。據發明者經過。係就被瘋犬嚙死之耕牛。剖腹察視。見腹中有斗大紫黑色血塊。擾之蠕蠕欲動。因悟出傷寒論中太陽病。其人發狂者。爲熱在下焦。蓄血之證。其人如狂者。血證諦也。下血乃愈。於是師着仲景之意。立此治法。眞是探本窮原。勝過古人萬倍。古人對於此證內容。皆不能十分明瞭。但從毒氣與平常犬畜之性質上着想。所以外治法用砂酒蜇吸毒。及追風如聖散。內治法用救生散、扶危散、木鼈、杏仁。此類藥物。皆非適當。救生扶危二散。皆以斑蝥爲主藥。雖能逐惡物。血塊由小便出。但內臟也難免並受損傷。腹中血塊。既然斗大。欲從很小之溺孔中盡逐去。病根決不可能。因爲斑蝥用量。雖極強壯之人。亦不能耐過三劑以上。而猘犬毒至少亦須十餘劑。方能見效。我恐如服斑蝥三四次。已早將小腸膜和泌尿管蝕化。豈尙有生命存留。所有受瘋犬傷者。與患瘵癘之人。甚不相宜。總之斑蝥除外治爲追蝕惡肉與生髮以外。決無一毫價值可言。

配合應用　㈠內消瘰癧。不拘大人小兒。用斑蝥一個。去翅足。以粟一升同炒。米焦去米不用。入薄荷四兩爲末。烏雞子清丸。如綠豆大。空心臘茶下三丸。加至五丸。却每日減一丸。減至一丸後。每日五丸。以消爲度。（經驗方）又瘰癧經久不痊。用斑蝥一枚。去翅足。微炙。以漿水一盞。空腹吞之。用蜜水亦可。重者不過七枚痊也。（廣利方）

㈡治瘧瘡有蟲。八月中多取斑蝥。以苦酒浸半日。曬乾。每用五個。銅器炒熟爲末。巴豆一粒。黃犬背上毛二七根。炒研。硃砂五分。同和苦酒頓服。其蟲當盡出也。

㈢治癰疽拔膿。癰疽不破。或破而腫硬無膿。斑蝥爲末。以蒜搗膏。和水一豆許貼之。少頃膿出。卽去藥。（直指方）

㈣治疔腫拔根。斑蝥一枚。捻破。以鍼劃瘡上。作米字形。標封之。卽出根也。（外臺祕要方）

㈤治血疝便毒。不拘已成未成。隨卽消散。斑蝥三個。去翅足。炒。滑石三錢同研。分作三服。空心白湯下。日一服。毒從小便出。如痛以車前木通澤瀉豬苓煎飲。名破毒散。甚效。（東垣方）

㈥治積年癬瘡。用斑蝥半兩。微炒爲末。蜜調傅之。（外臺祕要方）又用斑蝥七個。醋浸。露一夜。擦之。（永類鈐方）

㈦治面上瘡瘤大風。面上有紫瘡瘤未消。用乾斑蝥末。以生油調傅。約半日。瘡瘤腫起。以軟帛拭去藥。以棘鍼挑破。近下令水出乾。不得剝其瘡皮。及不可以藥近口眼。若是尖瘡瘤子。卽勿用此。別用膿繫末合藥以治之。（聖濟總錄方）

㈧治疣痣黑子。斑蝥三個。人言少許。以糯米五錢。炒黃去米。入蒜一個。搗爛點之。

㈨治瘋狗咬傷。此乃九死一生之病。急用斑蝥七枚。以糯米炒黃去米爲末。酒一盞。煎半盞。空心溫服。取下小肉狗三四十枚爲盡。如數少。數日再服。七次無狗形。永不再發也。累試累驗。（衞生易簡方）

又用大斑蝥三七枚。去頭翅足。用糯米一勺。略炒過。去斑蝥。別以七枚。如前炒。色變復去之。別以七枚。如前至青烟爲度。去蝥。只以米爲粉。用冷水入清油少許。空心調服。須臾再進一服。以小便利下毒物爲度。如不利。再進。利後肚疼。急用冷水調青靛服之。以解其毒。否則有傷。黃連水亦可解之。但不宜服一切熱物也。（醫方大成方）

㈩治中沙虱毒。斑蝥二枚。一枚末服。一枚燒至烟盡。研末。傅瘡中立瘥。（肘後方）

㈠治塞耳治聾。斑蝥炒二枚。生巴豆去皮心二枚。杵丸。棗核大。綿裹塞之。（聖惠方）

㈡治妊娠胎死。斑蝥一枚。燒研。水服卽下。（廣利方）

用量　三只至七只。

施用宜忌　凡非氣壯毒盛者禁用。畏巴豆、丹參、空青、惡膏、青甘草、豆花。

參攷資料　㈠斑蝥人獲得之。尾後惡氣射出。臭不可聞。故其入藥。亦專主走下竅。直至精溺之處。蝕下敗物。痛不可當。葛氏云。凡用斑蝥。取其利小便。引藥行氣。以毒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

攻毒是矣。楊登甫云。瘰癧之毒。莫不有根。大抵以斑蝥地膽爲主。制度如法。能使其根從小便中出。或如粉片。或如血塊。或如爛肉。皆其驗也。但毒之行。小便必澀痛不可當。以木通滑石燈心灌道之。又葛洪肘後方云。席辯剌史傳云。凡中蠱毒。用斑蝥蟲四枚。去翅足。炙熟。桃皮五月初五日採取。去黑皮。陰乾。大戟去骨。各爲末。如斑蝥一分。二味各用二分。合和棗核大。以米清服之。必吐出蠱。一服不瘥。十日更服。（李時珍）㊁斑貓、茺青、亭長、地膽之毒。醯汁、黃連、黑豆、葱、茶皆能解之。（李時珍）

【普陀茶】產地　定海之普陀山。

主治　血痢肺癰。

【普雨茶】卽普洱茶之古籍別名。典見物理小識。詳『普洱茶』條。

【普洱茶】（物理小識）

古籍別名　普雨茶。

產地　雲南普洱府。

性質　苦澀。

主治　逐痰下氣。刮腸通滯。

參攷資料　按普洱茶大者一團五觔。如人頭式。名人頭茶。每年入貢。民間不易得也。有僞作者。名川茶。乃川省與滇南交界處土人所造。其餅不堅。色亦黃。不如普洱清香獨絕也。普洱茶膏黑如漆。醒酒第一。綠色者更佳。消食化痰。清胃生津。功力尤大也。物理小識。普雨茶蒸之成團。西番市之。最能化物。與六安同。普洱茶膏。能治百病。如肚脹受寒。用薑湯發散出汗卽愈。口破喉腫。受熱疼痛。用五分噙口。過夜卽愈。受暑擦破皮血者。研敷之。

【普賢線】

古籍別名　仙人絛。

羅漢絛（綱目拾遺）

產地　出四川峨嵋山及湖南衡山。

形態　普賢線爲蔓草類之一種。種有二。其出峨眉山者。乃樹上苔鬚。蔓引而生。長達數尺。或謂在深谷中有尋丈。其出衡山者。生石上。與苔同種。色多鮮翠。長二三尺。叢垂若綢。無根蒂。狀如同心帶。三股色絛。俱可供藥用。

採取　以石生者入藥良。採取曬乾用。

主治　胃脘心氣疼痛。煎服之。

【景天】

古籍別名　愼火。戒火。（本經）救火。據火。火母。（別錄）護火。辟火。（綱目）瓦花。龍鱗草。辨慶草。（和漢藥考）

外國名詞　Sedum Purpureum, Link.（拉丁）

基本　屬景天科。爲景天之葉。

產地　多在山野川谷之石間。或有栽生於庭園中。亦有盆種於屋上者。謂能辟火之災云。



景天

形態　景天爲多年生草本。自生於高山之上。園圃種植者亦多。莖圓高一二尺。葉色白綠。作長卵圓或長橢圓形。略如匙頭。無柄。厚而帶肉質。且含漿液。邊緣有細鋸齒。彼此互生。夏秋岐生分枝。梢端開五瓣之花。色白而有紅暈。簇生如繖。間有開黃花或綠色花者。子黑。似粟粒。此草性極强健。試折取一莖。插置數日後。再插入地上。仍能發生細根。由漸成長。

採取　四月七月間。採葉陰乾。

用法　恒以和入外治藥劑。或煎水薰浴。或生搗塗敷。

性質　苦。平。無毒。

效能　解熱毒。治丹瘡。用治瘡腫解毒藥。

主治　太熱火瘡。身熱煩邪。惡氣。諸蟲毒。痂疕。寒熱。風痺。諸不足。

歷代記載攷證　【南北朝】陶弘景本草集註。景天曰。療金瘡止血。煎水浴小兒。去煩熱驚氣。【唐】甄權藥性本草論。景天曰。風瘧惡瘁。小兒丹毒及發熱。【宋】大明諸家本草論。景天曰。熱狂赤眼。頭痛寒熱。遊風。女人帶下。【明】繆希雍本草經疏論。景天曰。景天卽愼火草也。味苦平。別錄酸無毒。性能涼血解毒。故主大熱火瘡。身熱煩邪。惡氣。諸蟲毒。痂疕。寒熱。風痺。諸不足。熱解則毒散。血涼則陰生。故也。【清】吳儀洛本草從新。論景天曰。景天一名愼火草。瀉熱解毒。苦酸而寒。乃純陰之品。獨入離宮。專清熱毒。療諸種火丹一切遊風。搗傅蛇齕中寒者。服之有大

369／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

害。

配合應用 ㈠治驚風煩熱慎火草煎水浴之(普濟方) ㈡治小兒中風汗出中風一日頭項腰熱二日手足不屈用慎火草乾者半兩麻黃、丹參、白朮三錢半爲末每服半錢漿水調服三四歲服一錢(聖濟總錄方) ㈢治嬰孺風疹在皮膚不出及瘡毒取慎火苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞汁以熱手摩塗日再上之(圖經方) ㈣治熱毒丹瘡慎火草搗汁拭之日夜拭一二十徧一方苦酒搗泥塗之(千金方)治烟火丹毒從兩股兩脇起赤如火景天草眞珠末一兩搗如泥塗之乾則易(楊氏產乳方) ㈤治漆瘡作痒挼慎火草塗之。(外臺秘要方) ㈥治眼生花瞽瀝痛難開。景天搗汁日點三五次(聖惠方) ㈦治產後陰脫。慎火草一斤。陰乾酒五升煮汁一升分四服。(子母祕錄方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡病屬於虛寒者禁用。

參攷資料 ㈠景天氣味寒。有小毒。可煅研砂。(大明) ㈡今南北皆有之。人家種於中庭或盆置屋上。春生苗葉似馬齒莧而大。作層而上。莖極脆弱。夏中開紅紫碎花。秋後枯死。亦有宿根者。苗葉花並可用。(蘇頌) ㈢景天人多栽於石山上。二月生苗脆莖微帶赤黃色。高一二尺。折之有汁。葉淡綠色。光澤柔厚。狀似長匙頭。及胡豆葉而不尖。夏開小白花。結實如連翹而小。中有黑子如粟粒。其葉味微甘苦。煉熟水調可食。(李時珍) ㈣景天似佛甲草而大。折取之倒懸簷下。經日不凋。復栽於地。仍能生活。勝馬齒莧。(和漢藥考) ㈤日俗多以之治腫瘍。取新鮮葉火炙。剝去葉皮。貼數患處。膿自吸出。腫瘍遂愈。(和漢藥考)

【景天】卽蚤火之古籍別名。典見吳普本草。詳『蚤火』條。

【曾青】

命名 本品層層而生。其生從實至空。從空至實。故名。

產地 生銅礦中。

形態 曾青爲石類之一種。其色青。年久形如黃連相綴。或似蚯蚓屎。方稜式擊之如金聲者爲眞。以之塗鐵色赤如銅。可供藥用。

製法 雷敎曰。凡使勿用夾石及銅青。每一兩要紫背天葵、甘草、青芝草三件。乾澁各一錢。細剉。放瓷鍋內。安青於中。東流水二鎰。緩緩煮之。五晝夜勿令水火失時。取出。以東流水浴過。研乳如粉用。

性質 酸。小寒。無毒。

主治 目痛止淚出風痒。利關節。通九竅。破癥堅積聚。(本經)養肝膽。除寒熱。殺白蟲。療頭風腦中寒。止煩渴。補不足。盛陰氣。(別錄)

施用宜忌 長蒐絲子。

參攷資料 ㈠曾青住火成膏。可結汞。制丹砂。蓋含金氣所生也。須酒醋漬煮用。(獨孤滔) ㈡曾青治目義同空青。古方辟邪太乙神精丹用之。扁鵲治積聚留飲。有曾青丸。並見古今錄驗方。(李時珍)

【朝天一柱】

產地 生安南。

形態 肉根圓



對節生枝。長葉如柳。可供藥用。

效能 升氣。補虛。

主治 無名腫毒。蛇咬。

【朝天木蓮花】卽辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛夷』條。

【朝天蓼】卽辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛夷』條。

【朝生】卽鬼蓋之古籍別名。典見本草集註。詳『鬼蓋』條。

【朝開暮落花】卽木槿之古籍別名。典見綱目。詳『木槿』條。

【朝臌】卽樟腦之古籍別名。典見和漢藥考。詳『樟腦』條。

【朝鮮松】卽海松子之日本名。詳『海松子』條。

【朝鮮參】卽高麗參之別名。詳『高麗參』條。

【黎】

命名 本品性善下行而流利。故名。

處方用名 雅黎。黎汁。黎子皮。

古籍別名 快果。果宗。玉乳。蜜

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

父。梨兒梨。（綱目）綿梨。（綱目）乳梨。鵝梨。（嘉祐圖經本草）

外國名詞　Pirus sinensis, Lindl.（拉丁）ナシ　アリノミ（日本）

基本　係薔薇科梨屬。爲梨之果實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。產山東平原縣等處。醫學辭典曰。以產直隸之河間。山東之萊陽者爲佳。

形態　梨爲山果類之落葉喬木。高二三丈。惟爲採果之便。常彎屈其枝。或剪除之。變爲灌木形。葉作卵圓形。有尖端。邊緣生細微之鋸齒。如毛狀。葉柄長。互生。春月隨新葉而開花。花五瓣。白色。雄蕊甚多。葯黑褐色。雌蕊五。秋結果爲漿果。表皮有小斑點。中有子十餘粒。呈黑色。其花實葉等。俱可供藥用。



梨（一）



梨（二）

種植　山野園圃間有栽植者。以梨子十餘粒下種。惟一二子生梨。餘皆生杜。須以棠梨或桑樹接過。則結實早而佳。

採取　秋月成熟時採之。

製法　梨與蘿蔔相間收藏。或削梨蒂種於蘿蔔上藏之。皆可經年不爛不壞。

用法　恒以去皮生食。入藥連皮水煎。或搗汁和用。

性質　甘。微酸。寒。無毒。

效能　瀉熱養陰。用作清涼劑。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論梨曰。熱嗽。止渴。切片貼湯火傷。止痛不爛。【唐】孟詵食療本草論梨曰。卒暗風不語者。生搗汁頻服。胸中痞塞熱結者。宜多食之。【宋】開寶重定新本草論梨曰。治客熱中風不語。治傷寒熱發。解丹石熱氣。驚邪。利大小便。【宋】大明諸家本草論梨曰。除賊風。止心煩氣喘。熱狂。作漿吐風痰。【明】李時珍本草綱目論梨曰。潤肺涼心。消痰降火。解痘毒酒毒。【明】經希雍本草經疏論梨曰。梨味甘微酸。氣寒無毒。入手太陰。兼入足陽明經。別錄著梨。止言其害。不敘其功。陶隱居言梨不入藥。蓋古人論病多主於風寒外邪。以溫熱爲補藥多桂附。凡冷利之物。輟而不用也。不知時運迭降。稟受遍殊。今時之人。火病熱病痰病。往往皆是。梨能潤肺消痰。降火除熱。故蘇恭主熱嗽止渴。貼湯火傷。治客熱中風不語。傷寒寒熱。解丹石熱氣。驚邪。利大小便。大明主賊風心煩。氣喘熱狂。孟詵主胸中痞塞熱結等。誠不可闕者也。本經言多食令人寒中者。以其過於冷利也。乳婦金瘡不可食者。以血得寒則凝而成瘀。爲病也。凡人有痛處。脈數無力。或發渴。此癰疽將成之候。惟晝夜食梨。可轉重爲輕。膏粱之家。厚味釀酒。縱恣無節。必多痰火。卒中癱疽之病。數食梨。可變危爲安。功難盡述。【明】李士材本草圖解論梨曰。梨味甘寒。潤肺涼心。消痰降火。止嗽除渴。生者清六腑之熱。熟者滋五臟之陰。【清】黃宮繡本草求眞論梨曰。梨成於秋。花皆白。得西方金氣之最。味苦微酸。氣寒無毒。功專入肺與胃。凡胸中熱結。熱嗽。痰咳便祕。狂煩咽乾。喉痛中風。因瀝反胃不食。並湯火傷瘡。癰疽目障。丹石熱氣。一切屬於熱成者。惟食梨數枚。即能轉重爲輕。消弭於無事。然必元氣素實。大便素堅。方可與之。若使元氣虛弱。誤啖多致寒中。蓋梨是冷利之物。服之中益寒冷。金瘡乳婦。亦忌投服。恐血得寒益凝。豈可概謂能食而不審而別之乎。搗汁熬膏良。薑汁蜜製。清痰止嗽。用萊菔與梨相間收藏。則不爛。【清】黃元御玉楸藥解論梨曰。梨甘寒清利。涼心肺煩熱。滋臟腑燥。潤洗滌涎痰。疏通鬱塞。滋木清風。泄火敗毒。治風淫熱鬱。欲作癰瘍癰疽之病。陰土溼者忌之。泄胃滑腸。不可恣食。上熱者取汁溫服。點眼病赤腫弩肉。【清】王士雄隨息居飲食譜論梨曰。梨甘涼潤肺。清胃涼心。滌熱息風。化痰已嗽。養

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

陰濕燥。散結通腸。消癰疽。止煩渴。解丹石烟煤炙煿膏粱麴蘗諸毒。治中風不語。痰熱驚狂。溫暑等病。並絞汁服。名天生甘露飲。以皮薄心小肉細無渣。略無酸味者良。北產尤佳。切片貼湯火傷。止痛不爛。中虛寒禁。搗乳汁金瘡忌之。新產及病後須蒸熟食之。與蘆煎相間收藏。則不爛。可搗汁熬膏。亦可醬食。

配合應用　㈠治消渴飲水。用香水梨。或鵝梨。或江南雪梨。皆可取汁。以蜜湯熬成膏。用瓶收。以熱水或冷水調服。愈乃止。（普濟方）

㈡治卒得咳嗽。用好梨去核。搗汁一碗。入椒四十粒。煎一沸。去滓。納黑餳一大兩。消訖。細細含嚥。立定。（海上方）又用梨一顆。刺五十孔。每孔納椒一粒。麵裹。灰火煨熟。停冷。去椒食之。又方。去核。納酥蜜麵裹。燒熟。冷食之。又方。切片。酥煎食之。又方。搗汁一升。入酥蜜各一兩。地黃汁一升。煎成。含嚥。凡治嗽。須喘急定時。冷食之。若熱食反傷肺。令嗽更劇。不可救也。若反可作羊肉湯餅飽食之。即佳。（孟詵方）

㈢治痰喘氣急。梨剜空。納小黑豆令滿。留蓋合住。繫定。糠火煨熟。搗作餅。每日食之。至效。（摘玄方）

㈣治暗風失音。生梨搗汁一盞。飲之。日再服。（食療本草方）

㈤治小兒風熱。昏懵躁鬧。不能食。用消梨三枚。切破。以水二升。煮取汁一升。入糜米一合。煮粥食之。（聖惠方）

㈥治赤目。脅肉日夜痛者。取好梨一顆。搗絞汁。以絲裹黃連片一錢。浸汁。仰臥點之。（圖經方）

㈦治赤眼腫痛。鵝梨一枚。搗汁。黃連末半兩。膩粉一字。和勻。絲裹。浸梨汁中。日日點之。（聖惠方）

㈧治反胃轉食。藥物不下。用大雪梨一箇。以丁香十五粒。刺入梨內。溼紙包四五重。煨熟食之。（聖濟總錄方）

用量　錢半至四錢。

施用宜忌　凡胃寒便滑。及無熱邪者禁用。

參玆資料　㈠梨多食動脾。少則不及。病用梨者。當斟酌之。惟病酒煩渴人。食之甚佳。終不能卻疾。（寇宗奭）㈡孫光憲北夢瑣言云。有一朝士。見奉御梁新診之。曰。風疾已深。請速歸去。復見鄜州馬醫趙鄂診之。言與梁同。但語多喫消梨。咀齕不及。絞汁而飲。到家旬日。惟喫消梨。頓爽也。（唐慎微）㈢按類編云。一士人。狀若有疾。厭厭無聊。往楊吉老診之。楊曰。君熱證已極。氣血消鑠。此去三年。當以疽死。士人不樂而去。聞茅山有道士。醫術通神。而不欲自鳴。乃衣僕衣。詣山拜之。願執薪水之役。道士留置弟子中。久之。以實告道士。道士診之。笑曰。汝便下山。但日日喫好梨一顆。如生梨已盡。則取乾者。泡湯食。汁飲。疾自當平。士人如其戒。經一歲。復見吉老。見其顏貌腴澤。脈息和平。驚曰。君必遇異人。不然豈有疹理。士人備告吉老。吉老具衣冠。望茅山設拜。自告其學之未至。此與瑣言之說彷彿。觀夫二條。則梨之功。豈小補哉。然惟乳梨。鵝梨。消梨可食。餘梨則亦不能去病也。（李時珍）㈣梨處處皆有。而種類殊別。醫方相承用乳梨。鵝梨。乳梨出宣城。皮厚而肉實。其味極長。鵝梨河之南北州郡皆有之。皮薄而漿多。味差短。其香則過之。其餘水梨。消梨。紫糜梨。赤梨。青梨。茅梨。甘棠梨。棠兒梨之類甚多。俱不入藥也。一種桑梨。惟堪蜜煮食之。止口乾。生食不益人。冷中。又有紫花梨。療心熱。唐武宗有此疾。百藥不效。青城山邢道人。以此梨絞汁進之。帝疾遂愈。復求之。不可得。常山郡忽有一株。因緘封以進。帝多食之。解煩燥。殊效。歲久木枯。不復有種。今人不得而用之矣。（蘇頌）㈤梨樹高二三丈。尖葉光膩。有細齒。二月開白花如雪。六出。上已無風。則結實。必嘉。故古語云。上已有風梨有蠹。中秋無月蚌無胎。賈思勰言梨核每顆有十餘子種之。惟一二子生梨。餘皆生杜。此亦一異也。杜即棠梨也。梨品甚多。必須棠梨桑樹接過者。則結子早而佳。梨有青黃紅紫四色。乳梨即雪梨。鵝梨即錦梨。消梨即香水梨也。俱爲上品。可以治病。鵝兒梨即玉乳梨之訛。或云鵝兒一作語兒。地名也。在蘇州。嘉興縣見澳書注。其他青皮。早穀。半斤。沙糜諸梨。皆粗澀不堪。止可蒸煮及切烘爲脯爾。一種醋梨。易水煮熟。則甜美不損人也。昔

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

人言梨皆以常山、眞定、山陽、鉅野、梁國、睢陽、齊國、臨淄、鉅鹿、弘農、京兆、鄴都、洛陽爲稱。蓋好梨多產於北土。南方惟宣城者爲勝。故司馬遷史記云。淮北、棠南河濟之間。千株梨。其人與千戶侯等也。又魏文帝詔云。眞定御梨。大如拳。甘如蜜。脆如蔆。可以解煩釋悄。辛氏三秦記云。含消梨大如五升器。壓地則破。須以甕承取之。漢武帝常種於上苑。此又梨之奇品也。物類相感志言梨與蘿蔔相鬬。收藏或削梨帶種於蘿蔔上藏之。皆可經年不爛。今北人每於樹上包裹過冬。乃摘亦妙。（李時珍）㊀梨不論形色。總以心小肉細。嚼之無渣而味純甘者爲佳。凡丹石煙火。煤火酒毒。一切熱藥爲患者。咳之立解。溫熱虛病。及陰虛火熾。津液耗涸者。搗汁飲之。立效。此果中之甘露子。棄中之聖醍醐也。（王棄倚）㊁凡人有痛處。口渴脈數。此癰疽將成之候。惟晝夜食梨。可轉重爲輕。膏粱之家。厚味醇酒。縱慾無節。必多痰火。狩中癰疽之病。能常食梨可免。（顧松園）

【梨子皮】卽梨之處方用名。詳『梨』條。

【梨木皮】主治　解傷寒時氣。

【梨汁】卽梨之處方用名。詳『梨』條。

【梨尖草】卽牛蒡之別名。詳『牛蒡』條。

【梨花】主治　去面黑粉滓。

【梨花春】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【梨食】卽白芍之古籍別名。典見別錄。詳『白芍』條。

【梨棗樹】卽枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【梨葉】主治　霍亂吐利不止。

麥汁服。作煎治風。

【歷代記述攷證】【宋】蘇頌圖經本草論梨葉曰。治小兒寒疝。【明】吳瑞日用本草論梨葉曰。搗汁服。解中菌毒。

【梨蕊】卽芥之古籍別名。典見別錄。詳『芥』條。

【梨蓋】卽防葵之古籍別名。典見本經。詳『防葵』條。

【梨鬚】產地　出臺灣海島中。

形態　梨鬚爲雜草類之一種。其果實如肥皂。可供藥用。

主治　塵塗疔瘡。

【梨鶻鶘】卽鶻鶘之古籍別名。典見綱目。詳『鶻鶘』條。

【棄杖草】卽淫羊藿之古籍別名。典見諸家本草。詳『淫羊藿』條。

【棄枝草】卽淫羊藿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『淫羊藿』條。

【棆】卽鈎樟之古籍別名。典見本草集註。詳『烏樟』條。

【棆草】卽烏樟之古籍別名。典見綱目。詳『烏樟』條。

【棉子】基本　本品係草棉之子實。

性質　辛。熱。

主治　補虛煖腰。治損。油毒。昏目。瘙癬疥等。

配合應用　㊀治痰火後半身不遂。筋骨疼痛。核桃仁、棉花子仁、杜仲炒、巴戟、砂仁、骨碎補、枸杞子、續斷、牛膝各二兩。大蝦米四兩。菟絲餅四兩。用燒酒二十觔。煮服。如年高者。加附子、肉桂各一兩。酒服完。將渣曬乾爲細末。煉蜜爲丸。每服二錢。酒送下。

㊁長春丸。治腎虛精冷之症。魚鰾一觔。蛤粉炒成珠。極焦。棉花子取淨仁一觔。去油。淨。酒蒸。白蓮鬚八兩。金櫻子去仁毛淨。一觔。金釵石斛八兩。炒。蒺藜四兩。枸杞子四兩。五味子四兩。炒。鹿角五觔。鋸薄片。河水煮三晝夜。去角。取汁熬膏。和藥末爲丸。梧桐子大。每服三錢。（集驗良方）

㊂健步方。棉花子仁一觔。淨。肉用燒酒三觔炒乾。枸杞子四兩。酒浸。杜仲四兩。鹽酒煮炒。菟絲子四兩。酒炒。歸身二兩。破故紙四兩。酒洗炒。胡桃仁四兩。共爲末。煉蜜爲丸。桐子大。每服三錢。空心滾湯下。（凌雲集方）

㊃仙傳蠟桃丸。大有補益。治諸虛百損。棉花子取淨仁。乾。燒酒拌透。下用黃酒水平。對蒸一炷香。紅棗用黃酒煮熟。取淨肉各一觔。歸身、牛膝、枸杞。俱用酒浸。肉蓯蓉酒洗去泥甲。山萊萸酒潤去核。菟絲子酒蒸成餅。白魚膘。鰍炒成泡。白茯苓。人乳拌蒸。紙鹽水炒。熟地酒煮如餑。以上藥各四兩。淨巴戟酒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

洗去心五兩。共爲細末。煉蜜爲丸。三錢。早晚酒水任意送下。（臞雲山人傳方）

㈥種子方。棉子仁淨肉四兩。燒酒拌曬三次。熟地二兩。枸杞一兩。菟絲子。破故紙。茯苓。山藥。陳皮五味子。連翹。何首烏各一兩。蜜丸。鹽湯空心服四錢。（集驗方）

㈦治痔漏。管棉花子仁炒。急性子炒。草麻子仁炒。各等分爲末。每服三錢。空心好酒下。輕者半月。重者一月。嘗自退。（周氏家寶方）

㈧治出血不止。棉花子燒灰存性。爲末。敷之。（家寶方）

㈨治崩帶。陳蓮蓬燒灰存性五錢。棉花子肉燒灰存性三錢。共一服。無灰酒調下。（家寶方）

㈩治腸風下血。生柿子二個。竹刀切去蒂。核。以棉花子塞入柿內。仍蓋好。瓦上煅存性。研細末。米飲熱調服。重者三服全愈。（不藥良方）

⑪治穀道生瘡。俗呼偷糞老鼠。用棉花子炒去殼。壓粉。每早中晚三次。打糊服一碗。半月全愈。（不藥良方）

⑫治腎子大小偏墜。回生集。用棉子煮湯入甕。將腎囊坐入甕口。俟湯冷止。一二次。散其冷氣自愈。（不藥良方）

⑬治陽痿不起。棉花子水浸曬乾。燒酒拌炒去殼。用仁半觔。破故紙鹽水炒。韭菜子炒。各二兩。爲末。葱汁爲丸。梧子大。每服二錢。空心酒下。（祝氏效方）

⑭治痢疾。棉花子仁。新瓦炒去油。焦。研細。每服二錢。紅用燈心湯下。白用好陳酒下。（救生苦海方）

⑮治癰瘡。棉花瘡。用棉花子一斗。燒酒拌和。炒燥去灰。再拌再炒。以黑爲度。去殼再炒。搗爲末。用砂糖調和。每服三錢。服過一升許。（即愈。集驗方）

【棉花】㈠卽杜仲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜仲』條。㈡卽草棉花之俗名。詳『草棉』條。

【棉花葵】卽黃蜀葵之古籍別名。典見植物圖考。詳『黃蜀葵』條。

【棋子】卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【棵子】産地　生山野間。形態　棵爲果類之一種。三月開花。結實如梨。七八月成熟。色黃。味甘酢。而核甚堅。可供藥用。

性質　甘。澀。平。無毒。

主治　生食之止水痢。熟和蜜食之去嗽。

【棒槌草】卽龍鬚草之別名。詳『龍鬚草』條。

【棒雞草】卽龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『龍鬚草』條。

【棒蘭】卽釵子股之古籍別名。典見海藥。詳『釵子股』條。

【棕心草】卽龍常草之古籍別名。典見綱目。詳『龍常草』條。

【棕梠】卽機櫚之俗名。詳『機櫚』條。

【棕櫚】卽機櫚之俗名。詳『機櫚』條。

【棕櫚皮】卽機櫚之處方用名。詳『機櫚』條。

【棕櫚炭】卽機櫚炒黑者之處方用名。詳『機櫚』條。

【棕櫚草】卽藜蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藜蘆』條。

【棗】卽大棗之原名。詳『大棗』條。

【棗木心】性質　甘。濇。溫。有小毒。

主治　中蠱腹痛。面目青黃。淋露骨立。剉取一斛。水淹三寸。煮至二斗。澄清。煎五升。旦服五合。取吐卽愈。又煎紅水服之。能通經脈。

【棗杷】卽枸杞子之處方用名。詳『枸杞子』條。

【棗皃檳】卽檳榔之處方用名。詳『檳榔』條。

【棗油】卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【棗核仁】原名　陳棗核仁。

性質　煖之苦平。無毒。

主治　腹痛邪氣。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論棗核仁曰。惡氣。卒痓忤。【明】李時珍本草綱目論棗核仁曰。核燒研。摻壓瘡良。

參攷資料　按劉根別傳云。道士陳孜如癡人。江夏袁仲陽敬事之。孜曰。今春當有疾。可服棗核中仁二十七枚。後果大病。服之而愈。又云。常服棗仁。百邪不復干也。仲陽服之有效。則棗果有治邪之說。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

矣。又道書云。常含棗核。治氣令口行津液。嚥之佳。謝承後漢書亦云。孟節能含棗核不食。可至十年也。此皆藉棗以生津。受氣而嚥之。又能達黃宮以交離坎之義耳。（李時珍）

【棗脯】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【棗棘】即蛇牀子之古籍別名。典見本經。詳『蛇牀子』條。

【棗葉】性　甘。溫。微毒。

主治　覆麻黃能令出汗。（本經）和葛粉搗熱痲瘡良。（別錄）

歷代記述弦證　【宋】大明諸家本草論棗葉曰。治小兒壯熱。煎湯浴之。

參弦資料　棗葉作散服之。使人瘦。久則嘔吐。（別錄）

【棗實】即海棲子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『海棲子』條。

【棗青】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【棗樹皮】主治　同老桑樹皮。並取北向者。等分燒研。每用一合。井水煎澄取清。洗目一月三洗。昏者復明。忌葷酒房事。

【棗樹根】主治　小兒赤丹。從脚趺起。煎湯類浴之。

【棗貓】產地　生棗樹間。

形態　棗貓爲卵生蟲類之一種。即棗樹上之飛蟲。大如棗子。色青灰。有兩角。採得陰乾。可供藥用。

主治　小兒臍風。

參弦資料　按方廣云。小兒初生。以綿裹臍帶。離臍五六寸。扎定咬斷。以鵝翎筒送棗一二分。入臍大孔。輕輕揉散。以艾炷灸臍頭三壯。結住。勿打動。候其自落。永無臍風之患。萬不失一。臍硬者用之軟者無病。不必用也。其法用陰乾棗貓兒研末三箇。眞珠趙研四十九粒。炒黃丹五分。白枯礬、蛤粉、血竭各五分。研勻如上法用。臍有三孔。一大二小也。

【棗蠹屎】基本　本品即棗樹上之蠹蟲屎。

主治　聤耳出膿水。研末。同麝香少許吹之。

【棘竹】即竹之別名。詳『竹』條。

【棘刺】即白棘之古籍別名。典見別錄。詳『白棘』條。

【棘狗】即枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【棘枸子】即枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【棘剛子】即雀甕之古籍別名。典見本草衍義。詳『雀甕』條。

【棘菀】即遠志之古籍別名。典見本經。詳『遠志』條。

【棘實】即酸棗之小者。典見新修本草圖經。詳『酸棗』條。

【棘鍼】即白棘之古籍別名。典見別錄。詳『白棘』條。

【棟桂】即肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉桂』條。

【棠棣子】即山查之古籍別名。典見圖經本草。詳『山查』條。

【棠梨】古籍別名　野梨。（綱目）

基本　係薔薇科棠梨屬。爲棠梨之子實。其枝、葉、花詳見各該條。

產地　在山林間。

形態　棠梨爲梨之一種。落葉亞喬木。枝幹如梨。葉作卵形。有鋸齒。齒黯白色。春初開小白花。結實如小棟子。霜後可食。典供藥用。

性質　酸。甘。濇。寒。無毒。

主治　燒食止滑痢。

【棠梨枝葉】性質　酸。甘。濇。無毒。

主治　霍亂吐瀉不止。轉筋腹痛。取一握。同木瓜二兩。煎汁細呷之。

【棠梨花】主治　濟飢。燥食或曬乾磨粉食。

【棠棗】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【棠棣仁】即郁李仁之古籍別名。典見爾雅。詳『郁李仁』條。

【棧香】即伽倆香之別名。典見爾雅。詳『伽倆香』條。

【棲蘆李】即麥李之別名。典見郭璞註爾雅。詳『李子』條。

【棣仁】即郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『郁李仁』條。

【棫仁】即棪仁之古籍別名。典見爾雅。詳『棪仁』條。

【椅桐】即桐之古籍別名。典見本草集註。詳『桐』條。

【栟櫚】即櫚櫚之古籍別名。典見綱目。詳『櫚櫚』條。

【椰仁】即柏子仁之古籍別名。典

375／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見和漢藥考。詳『柏子仁』條。

【楒葉】卽柏葉之古籍別名。典見綱目。詳『柏葉』條。

【椋子木】卽松楊之古籍別名。典見綱目。詳『松楊』條。

【植豆】卽綠豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『綠豆』條。

【椎耳】卽香蕈之日本名。詳『香蕈』條。

【椎實螺】卽綠桑蠃之別名。典見動物學大辭典。詳『綠桑蠃』條。

【椐】卽靈壽木之古籍別名。典見綱目。詳『靈壽木』條。

【棹】卽鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠李子』條。

【棹柿】命名　棹乃柿之小而卑者。

古籍別名　漆柿。（日華）花棹。綠柿。（日用）青棹。（廣志）烏棹。（開寶）赤棠棹。（綱目）

基本　係柿樹科柿屬。爲棹柿之果實。

產地　產江淮以南。歙荊閩廣諸地。

形態　棹柿爲柿類之一種。卽漆柿。其汁謂之柿漆。可染諸物。他柿至熟黃赤。此則雖熟亦青黑色。可生啖。不可爲乾。可供藥用。

性質　甘。寒。溫。無毒。

主治　壓丹石藥發熱。利水解酒毒。去胃中熱。久食令人寒中。

歷代記述弦證　【宋】日華諸家本草論棹柿曰。止煩渴。潤心肺。除腹臟冷熱。

參攷資料　棹柿生啖性冷。服石家宜之。久食令人中寒。不可與蟹同食。（陶弘景）

【椒柏酒】製法　除夕日。用椒七枝。浸酒一瓶。元旦飲之。

主治　辟一切疫癘不正之氣。

【椒露】製法　用鮮椒蒸取。

主治　明目開胃。運食健脾。

【椗花】卽山欒之古籍別名。典見綱目。詳『山欒』條。

【棁】卽杉材之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『杉材』條。

【梢皮】卽土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土骨皮』條。

【梌祇】卽水仙之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳『水仙』條。

【款冬花】命名　款者至也。本品至冬而花。故名。

處方用名　蜜炙款冬。冬花。

古籍別名　橐吾。虎鬚（本經）氏冬。（別錄）款凍。（郭璞）顆凍。菟奚。（爾雅）鑽冬。（衍義）款花。冬花。藥款冬。藥。款肺侯。（和漢藥考）

外國名詞　Flores Farfarae

基本　屬菊科款冬之花蕾。

產地　陳仁山藥物生產辨云。款冬花產陝西靈台爲最。漢中亦可。山西次之。四川又次之。冬季出新。



款冬花（一）

形態　款冬爲山野自生之多年生草。春抽花莖。葉互生。初作長卵圓形。葉前端尖。花爲帶白色筒狀花冠。花其數頗多。作頭狀花序排列。花後葉莖發育。高達二尺餘。葉則作心臟圓形。而具長葉柄。根爲蔓延之地下莖。呈灰白色。質脆。易折。味苦。謂之款冬根。亦供藥用。其花爲帶青褐色。大如指頭之花蕾。作蠶荷筍狀。味苦。



款冬花（二）

採取　十一月十二月間。採花蕊陰乾。

製法　雷敎曰。凡採得。須去向裏裹花蕊殼。并向裏實。如栗零殼者。并枝棄。以甘草水浸一宿。却取款冬葉相并裹一夜。曬乾。去葉用。

性質　辛。溫。無毒。

效能　溫肺下氣。化痰止嗽。用作祛痰鎭咳藥。治痰咳喘息及妊婦之咳嗽。感冒亦有用者。

主治　咳逆上氣。善喘。喉痺。諸驚癇。寒熱邪氣。（本經）消渴。喘息呼吸。（別錄）

歷代記述弦證　【唐】甄權藥性本草論款冬花曰。療肺氣心促急。熱勞咳。連連不絕。涕唾稠黏。肺癰肺癰。咳吐膿血。【宋】大明諸家本草論款冬花曰。潤心肺。益五臟。除煩消痰。洗肝明目。及中風等疾。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【明】李士材本草圖解論款冬花曰。款冬花辛而微溫。肺經藥也。潤肺消痰。止咳定喘。清喉療理肺癰肺癤。古人治久款款冬花一兩蜂蜜拌潤。入茶壺中。以麵固其蓋。勿令漏氣。壺下着炭火。待烟從壺口出。口含吸嚥烟盡乃止。數日必效。按傅咸款冬花賦有云。冰凌盈谷。雪積破崖。顧見款冬。煒然華豔。則其純陽之性可知。雖具新溫。却不燥熱。故能輕揚。上達至高之府。贊相傳而奏功勳也。蜜水拌微火炒。【清】黃宮繡本草求眞論款冬花曰。款冬花按書既載辛溫純陽。又載瀉熱消痰。除煩定驚。明目潤咳逆上氣。喘渴暨喉痺。肺癰肺癤。咳吐膿血等症。其藥似屬兩歧。詎知所謂純陽者。因其氣味上達入陽而不入陰。且經當雪而秀。故謂其氣純陽。所謂能治咳逆者。因其咳因寒入。得此溫煖以爲疏滯。則寒自順而下矣。所謂能除熱痰而嗽者。亦是熱因寒入。痰因熱成。除寒而熱可清。除熱而寒自解。所謂能治肺癰肺癤。咳吐膿血者。亦是肺虛。得此以爲溫潤。故能服之即止。若使血因實致。則此斷屬難投。況此雖云純陽。於火更不克助。故辛溫之內。仍有和煖之意。是以書載可爲寒熱虛實通用。生河北關中者良。揀淨花。甘草水浸濕用。【清】鄒澍本經疏證論款冬曰。千金外臺。凡治咳逆久咳。竝用紫菀款冬者十方而九。然二物者一則開結。使中焦之陰化血一則吸陰下歸。先之功力略同。而其奏在千金外臺亦約略可見。蓋凡喘膿血失音者及風寒水氣盛者。多不甚用款冬。但用紫菀款冬則每同溫劑補劑用者爲多。是不可得其大旨哉。【清】賈九如辨藥指南論款冬花曰。冬花用蘆。蘆乃發生之品。舍蕾未放。生於冬而耐寒。得一陽初動之氣。開發生機。且喜其味苦主降。氣香主散。一物而兩用兼備。故用入肺部。順肺中之氣。又清肺中之血。專治咳逆上氣。煩熱喘促。痰涎稠黏。湧唾腥臭。爲諸證之要劑。如久嗽肺虛。尤不可缺。

辨僞　㊀鄭肖巖曰。款冬花爲治嗽要藥。十一二月開花如黃菊。雪積沙堅之時。款花偏豔。想見其純陽之品。故一名款凍。生河北關中。微見花未舒放者良。近今市肆多以枇杷花蘆僞充。雖無大害。然性不同則功自異耳。㊁曹炳章曰。按冬花九月出新。山西太原者色紫紅。無梗。爲手瓣冬花。最佳。有梗者曰上冬花。次之。梗多色黑紫者。曰中冬花。亦次。亳州出者更次。考冬花花瓣色紅紫光潔。枇杷花色黃紫有茸毛。形態不同。最易鑒別。

近人學說　張山雷曰。款冬嚴寒着花。其性微辛。是以性溫。而花本輕揚。故主肺病。能開泄鬱結。定逆止喘。專主咳嗽。性質功用。皆與紫菀絕似。所以本經主治。亦復多同。於寒束肺金之飲邪喘嗽最宜。然氣味雖溫。而生於水中。亦潤而不燥。則溫熱之邪。鬱於肺經而不得疏泄者。亦能治之。又如紫菀開肺。寒熱皆宜之例。特比之紫菀。究是辛溫一籌。則火邪鬱結。如肺癰成膿。痰紅臭穢之候。自當有所顧忌。甄權竟謂其主肺痿肺癰而景岳石頑從而和之。殊是未安。且石頑亦謂陰虛勞嗽忌之。以其性溫也。何獨於肺癰而不畏其溫。是知有二五而不知有一十矣。要之其功用大綱。多似紫菀。上文紫菀條中。論之已詳。茲亦不贅。試參考之。亦可觸類而旁通也。繆氏經疏。有一方用款冬花合貝母、桑根白皮、紫菀、枇杷葉、天花粉、百部、天冬、麥冬、杏仁。謂治喘逆咳嗽。則喘逆咳嗽四字之中。有寒有熱。有實有虛。證情病態。萬有不齊。豈有羅列幾味治肺之藥。而謂可以通治寒熱虛實之理。且所集諸藥。寒者溫者。開者斂者。疏通者閉塞者。渾籠於一爐之中。縱有幾味對證。亦已多所牽制。何由奏效。此類成方。貌視之頗似親切病情。無甚悖謬。實則龐雜已極。必無偶爾俾中之理。且開泄與遏抑並用。則紫菀款冬百部之最能疏化肺鬱者。已爲二冬之黏滯束縛不靈。況再加以桑皮苦寒抑降。閉而塞之。更是落阱下石之手段。惟恐其肺家鬱窄。稍得疏通。而必賦之塞之。以速其斃。製方之意。不知是何居心。又繆氏更有一方。以款冬、麻黃、杏仁、桑白皮、甘草。治風寒鬱實作喘。則寒邪外來。開肺宜也。但桑白皮遏抑肺氣。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

雖曰瀉肺而寒能抑塞。惟肺家燥烈爲宜。斷非外有寒邪者所可妄試。若去桑皮而易以紫菀則幾矣。

配合應用 ㊀款冬花。雖畏貝母。然得貝母、桑根白皮、紫菀、枇杷葉、栝樓根、百部、天麥門冬、杏仁。治喘逆及咳嗽反良。物有相制故也。如半夏畏生薑。得之則制其毒。而愈能奏效也。㊁款冬得麻黃、杏仁、桑根白皮、甘草。治風寒鬱實熱於上焦肺分作喘。其效甚速。㊂款冬一味燒烟吸之。治喘嗽。具如本草注中所載。㊃治痰嗽帶血。款冬花、百合蒸焙。等分爲末。蜜丸。龍眼大。每臥時嚼一丸。薄荷湯下。(濟生方)

㊄治口中疳瘡。款冬、黃連等分爲細末。用唾津調成餅子。先以蛇牀子煎湯漱口。乃以餅子傳之。少頃。確住。其瘡立消也。(楊誠經驗方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡火熱刑金。肺陰不足者。禁用。惡皂莢、消石、玄參、貝母、辛夷、麻黃、黃耆、黃芩、連翹、青葙。杏仁爲之使。得紫菀良。

參攷資料 ㊀本經主咳逆。古方用爲溫肺治嗽之最。崔知悌療久咳熏法。每旦取款冬花如雞子許。少蜜拌花使潤。納一升鐵鐺中。又用一瓦盆鑽一孔。孔內安一小筆管。以麵泥縫。勿令漏氣。鐺下着炭火。少時烟從筒出。以口含吸嚥之。如胸中少閣。須舉頭。即將指頭按住筒口。勿使漏至煙盡乃止。如是五日一爲之。得至六日。飽食羊肉饆飥一頓。永瘥矣。(蘇頌)㊁按述征記云。洛水至歲末凝厲時。款冬生於草水之中。則顆凍之名。以此而得。後人誤爲款冬。卽款凍爾。(李時珍)㊂百草中惟此不顧冰雪。最先春也。故世謂之鑽凍。雖在冰雪之下。至時亦生芽。春時人採以代蔬。入藥須微見花者良。如已芬芳。則都無氣力。今人多使如筋頭者。恐未有花也。(蔻宗奭)㊃第一出河北。其形如宿蓴未舒者佳。其腹裏有絲。次出高麗。百濟。其花乃似大菊花。次亦出蜀北部宕昌。而並不如。其冬月在冰下生。十二月正月旦取之。(陶弘景)㊄今出雍州南山溪水及華州山谷澗間。葉似葵而大。叢生。花出根下。(蘇恭)㊅今關中亦有之。根紫色。葉似蕈薤。十二月開花。黃青紫。蕚去土一二寸。初出如菊花。夢通直而肥實。無子。則陶氏所謂出高麗百濟者。近此類也。又有紅花者。葉如荷而斗直。大者容一升。小者容數合。俗呼爲蜂斗葉。又名水斗葉。則蘇氏所謂大如葵而叢生者是也。傅咸款冬賦序云。予曾逐禽登於北山。於時仲冬之月。冰凌盈谷。積雪被崖。顧見款冬煒然始敷華豔。是也。(蘇頌)

【款花】卽款冬花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『款冬花』條。

【殘竹草】卽扁蓄之古籍別名。典見藥物生產辨。詳『扁蓄』條。

【殺菜】卽淡菜之古籍別名。典見綱目。詳『淡菜』條。

【殺菽】卽白豆蔻之古籍別名。典見綱目。詳『白豆蔻』條。

【渠】卽蜉蝣之古籍別名。典見綱目。詳『蜣蜋』條。

【渡父魚】卽杜父魚之古籍別名。典見綱目。詳『杜父魚』條。

【渤海茄】卽茄子之古籍別名。典見綱目。詳『茄子』條。

【渴旦】卽寒號蟲之古籍別名。典見唐詩。詳『寒號蟲』條。

【渴砂】卽全蠍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『全蠍』條。

【渴棗】卽血竭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『血竭』條。

【游冬】卽苦菜之古籍別名。典見別錄。詳『苦菜』條。

【游冬蘇母】卽貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝母』條。

【游波】卽燕之古籍別名。典見炮炙論。詳『燕』條。

【游龍】卽紅草之古籍別名。典見詩經。詳『紅草』條。

【渼陂魚】**命名** 本品爲魚之產於陝西省鄠縣之渼陂地方。故名。

主治 痔疾。

【湔胡】卽前胡之原名。詳『前胡』條。

【湖丹皮】卽牡丹皮之處方用名。詳『牡丹皮』條。

【湖目】卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【湖廣朮】卽白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【湖瓔珠】卽眞珠之處方用名。詳『眞珠』條。

【湖雞腿】卽翻白草之古籍別名。典見綱目。詳『翻白草』條。

【湘潭茶】卽安代茶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『安代茶』條。

【湘蓮】卽蓮肉之處方用名。詳『蓮肉』條。

【湘蓮肉】卽蓮肉之處方用名。詳『蓮肉』條。

【湯主】卽山茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山茱萸』條。

【湯參】卽人參之古籍別名。典見綱目。詳『人參』條。

【溼石】卽溼石。參見『明礬』條。

【無不愈】卽天門冬之古籍別名。典見嘉祐本草。詳『天門冬』條。

【無心草】 **產地** 出河南諸地。

形態 無心草爲溼草類之一種。三月開花。五月結實。其根苗可供藥用。

採取 六七月間採之陰乾用。

性質 溫。無毒。

主治 化積血。逐氣塊。益筋節。補虛損。潤顏色。療癖洩腹痛。

參攷資料 鹿衡一名無心草。此草功用與之相近。其圖形亦相近。恐卽一物也。鼠耳草亦名無心。與此不同。(李時珍)

【無心草】㊀卽鼠麴草之古籍別名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。㊁卽鹿御草之古籍別名。典見吳普本草。詳『鹿御草』條。

【無名子】 **古籍別名** 阿月渾子。胡榛子。(拾遺)

產地 生山谷中。

形態 無名子爲果類之一種。結實狀如榛子。中有仁。可供藥用。其木皮詳見該條。

性質 辛。溫。濇。無毒。

主治 諸痢。去冷氣。令人肥健。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論無名子曰。治腰冷。陰腎虛瘀弱。房中術多用之。得木香山萊菔良。【清】趙學敏本草綱目拾遺論無名子曰。與榛子同類。性更溫良。能止痢。煖腎開胃。除腸積。得木香山萊菔良。能興陽。

【無名木皮】 **性質** 辛。大溫。無毒。

主治 陰腎衰弱。囊下溼癢。並蘸汁小浴。極妙。

【無名印】卽地楡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地楡』條。

【無名異】 **命名** 無名異。庾詞也。

古籍別名 黑石子。(俗名)土子。(和漢藥考)

外國名詞 Limonite。(拉丁)(英)

產地 陳仁山藥物生產辨云。無名異產廣西陝西兩省。此藥雜有鐵質。內含鐵養鹽養等。

形態 係附著石上有光澤黑褐色之球圓形塊。其大小不一。大者亦僅一分餘。小者如黍粟粒。磨成粉末。則作茶褐色。

採取 採無時。

用法 剉細。水飛。和作丸散。

性質 甘。平。無毒。

成分 含水養化鐵。

效能 末服治折傷。醋塗消癰腫。用作止血和血藥。

主治 金瘡折傷。內損止痛。生肌肉。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論無名異曰。消腫毒。佳癰疽。醋磨傅之。【明】李時珍本草綱目論無名異曰。收溼氣。【明】繆希雍本草經疏論無名異曰。無名異稟地中陰水之氣。以生本經味甘氣平無毒。蘇頌鹹寒。鹹能入血。甘能補血。寒能除熱。故主金瘡折傷內損。及止痛生肌肉也。蘇頌醋磨傅腫毒癰疽者。亦取其活血涼血之功耳。【明】李士材本草圖解論無名異曰。無名異甘平無毒。主金瘡折傷內損止痛。生肌肉。收溼氣。除折傷腫毒外。無他用。【清】黃宮繡本草求眞論無名異曰。無名異卽俗所名乾子者是也。味甘而鹹。微寒。無毒。諸書皆言能治癰腫。損傷接骨。金瘡合口。其義何居。以其鹹有入血之能。甘有補血之力。寒能勝熱之義者故耳。是以人於受杖時。每服三五錢。其於傷處不甚覺痛。用醋磨塗腫處。卽消。要皆外治之品。而非內服之味也。生川廣。小黑石子也。一包約數百枚。【清】黃元御玉楸藥解論無名異曰。無名異燥澀行瘀。消腫止痛。治金瘡打損。筋斷骨折。癰疽楊梅痔

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瘰癧瘡。腳氣臁瘡之類。此物善收濕氣。調漆煉油。其乾甚速。至燥之品。

配合應用　㊀治打傷腫痛。無名異爲末。酒服。起下四肢之末血皆散矣。（集驗方）

㊁治損傷接骨。無名異、甜瓜子各一兩。乳香、沒藥各一錢。爲末。每服五錢。熱酒調服。小兒三錢服畢。以黃米粥塗紙上攤左顧牡蠣末裹之。竹篦夾住。（多能鄙事方）

㊂治臨杖預報。無名異末。臨時溫服三五錢。則杖不甚痛。亦不甚傷。（談藪翁試效方）

㊃治赤癇丹毒。無名異末。葱汁調塗立消。（簡便方）

㊄治痔漏腫痛。無名異炭火煅紅。米醋淬七次。爲細末。以溫水洗瘡。綿裹筋頭。塡末入瘡口。數次愈。（簡便方）

㊅治天泡濕瘡。無名異末。井華水調服之。（普濟方）

㊆治臁瘡潰爛。無名異、虢丹細研。清油調搽。濕則乾搽之。（濟急方）

㊇治股陰瘼瘡。無名異二錢。麝香一字。研。酒半碗。午後空腹服。立效。（多能鄙事方）

㊈治拳毛倒睫。無名異末。紙卷作撚。點燈吹殺。熏之。睫自起。（保命集方）

㊉治消渴引飲。無名異一兩。黃連二兩。爲末。蒸餅丸。綠豆大。每服百丸。以茄根濃煎湯送下。（聖濟總錄方）

⑪治脚氣痛楚。無名異末。化牛皮膠調塗之。頻換。（衛生簡易方）

用量　八分至錢半。

參攷資料　㊀崔昉外丹本草云。無名異陽石也。昔人見山雞被網。損其足。脫去。卽一石。磨其損處。遂愈而去。乃取其石。理傷折大效。人因傳之。（李時珍）㊁無名異氣味鹹寒。伏硫黃。（蘇頌）㊂無名異出大食國。生於石上。狀如黑石灰。番人以油鍊如黐石。嚼之如餳也。（馬志）㊃今廣州山石中及宜州八星龍濱山中亦有之。黑褐色。大者如彈丸。小者如黑石子。採無時。（蘇頌）㊄生川廣深山中。而桂林極多。一包數百枚。小黑石子也。似蛇黃而色黑。近處山中亦時有之。用以煮蠻殺腥氣。煎煉桐油。收水氣。塗剪剪燈。則燈自斷也。（李時珍）㊅無名異產中國河南、陝西、廣東諸省。日本遠江、石見、隱岐、伊豆、土佐等處亦產之。（和漢藥考）

【無灰木】卽不灰木之古籍別名。典見綱目。詳『不灰木』條。

【無耳鬧雪】卽芭蕉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芭蕉』條。

【無姑仁】卽無漦之古籍別名。典見本經。詳『蘇漦』條。

【無花果】**命名**　和漢藥考云。本品一名一熟。蓋謂其果一月而成熟。苦時誤爲無花而結果。遂命之曰無花果。

古籍別名　映日果。（便民圖纂）優曇鉢。（廣州志）阿駔。（綱目）底珍。（酉陽雜俎）唐柿。蜜果。映日紅。王孫皮枝。仙桃青桃。（和漢藥考）

外國名稱　Ficus Carica, L.（拉丁）

基本　屬桑科無花果之實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。無花果各國均有出。廣東廣西各屬均有。土耳其產者均同一體。

形態　無花果種類甚多。爲人工栽植之喬木。高達丈餘。葉形大。爲單葉。有裂三至五。邊緣有鋸齒。有毛茸。質粗糙。切傷之有白汁流出。花生於花托。花托作囊狀。其上面生雄花。下面生雌花。花後花托漸次膨脹。變成倒卵圓形之果肉。氣候寒冷。則其表面被有白色粉霜。有特異氣味及良佳甘味。長約二寸。闊三寸許。作倒卵圓形之果實。外部生時作綠色。熟則變紫褐色或黃褐色。內部爲紫色或紅色。此果實在未熟時。滲出辛味乳液。及漸成熟。則漸減少。增加甘味。藥用採此乾燥之。



無花果

採取　六七月間實熟時採之。

用法　水煎或生搗用。

性質　甘平無毒。

成分　含有葡萄糖、膠質、脂肪。

效能　清熱潤腸。用作緩和滋養藥。又治痔疾及消化不良症。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

作用　入胃後。與胃液混和。協力助消化之不足。一部分至腸而被吸入血中。一部分仍向大便排出。入血後能促進血液之氧化。使細胞之新陳代謝增力。

主治　開胃止泄痢。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論無花果曰。治五痔。咽喉痛。【清】王士雄隨息居飲食譜論無花果曰。無花果甘寒清熱。療痔潤腸。上利咽喉。中寒者忌食。

國外學說　荷蘭藥鑑曰。乾實（蒸熟而曝乾者）含有甘味黏液。頗有緩和功效。故能解冒寒傷冷毒。酷厲液。凡咳嗽。聲嗄。咽喉刺痛。燃衝。肺燃衝。胸脇痛。或疝痛。淋疾燃痛等。一切適用緩和劑諸症。水煎用之。有殊效。咽喉口中燃痛等。加入漱劑。爲甘和止痛良藥。肺燃衝。胸脇痛諸症。乾咳。久嗽。勞咳等劇病。多服下方。有奇效。（一）潤解和胸飲。無花果。（剉）乾葡萄（剉）各二盎斯。甘草（剉）四錢。大麥煎（次出）二斤。蒸溜水一斤。上用文火煮至二斤。飲服。（二）大麥煎精大麥二盎斯。沸湯五斤。上先用冷水。細將大麥洗淨。加水半斤。煮一二沸。去其污色湯。取大麥。加沸湯五斤。煮減半。應用。（初煮一二沸。去污色湯。則無臭味。患者易服。）用此作燃衝熱等飲料。有止渴潤燥之效。或加橙汁少許。尤佳。將乾實置熱灰煨。貼腫瘍。善能化膿。貼痔痛。疼痛速消。用作罨布貼之。尤佳。潰爛貼之。有排膿之效。生實蔬澁。含有酷厲乳狀汁。故用以摩擦疣贅。魚目等。屢能消散。或用其汁和豚脂擦之。或用其樹葉摩擦之。亦皆有效。痔血閉止。用此樹葉。頻擦肛門。則潰破。瘀血通泄。英美學說。謂無花果。英俗名非格。各國皆產。其產土耳其者最爲上品。自古以來。卽用爲食物與藥品。此樹原產於亞細亞。後移植於歐羅巴各處。其樹身與枝。多含辛味。而如乳之汁。其未熟時。亦生此汁。比將熟時。則漸生膠質與糖質。此樹而如得合宜之水土與地氣。則所產之無花果。必多汁而輭。有最佳之味。須於將熟時。滴下乾之。今歐羅巴南遥所產甚多。而亞細亞各處所產亦復不少。有數處以無花果爲最大貿易之物。如阿富汗與波斯國之所產者。多運至印度國出售。而英國出售之無花果。則從土麥拿運來。可作食物之藥。未食慣者食之。有微利性。其功用能作潤劑。養生治便祕。藥品中用之。大半爲潤皮藥。將熟者加熱劈開。則能作輭布膏之用。治癬子疼。

用量　八分至錢半。

參攷資料　㊀無花果凡數種。此乃映日果也。卽廣中所謂優曇鉢。及波斯所謂阿駟也。（李時珍）㊁無花果出揚州及雲南。今吳楚閩越人家亦或折枝插成。枝柯如枇杷樹。三月發葉。如花樗葉。五月內不花而實。實出枝間。狀如木饅頭。其內虛輭。採以鹽漬。壓實令扁。日乾。充果食。熟則紫色輭爛。甘味如柿。而無核也。按方輿志云。廣西優曇鉢。不花而實。狀如枇杷。又段成式酉陽雜俎云。阿駟出波斯拂林。人呼爲底珍。樹長丈餘。枝葉繁茂。有子如蒐麻。無花而實。色赤類棹柿。一月而熟。味亦如柿。二書所說。皆卽此果也。又有文光果。天仙果。古度子。皆無花之果。（李時珍）

【無花果葉】

性質　甘。微辛。平。有小毒。

主治　五痔腫痛。煎湯輭熏洗之效。

【無重砂】

卽硃砂之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「硃砂」條。

【無風獨搖草】

命名　本品兩片開合。見人自動。故名。

古籍別名　荒夫草（郭璞）

産地　生山野間。

形態　無風獨搖草爲雜草類之一種。頭若彈子。尾若鳥尾。開花黃色。結實如菟絲子。可供藥用。

採取　五月五日採之。

性質　溫。平。無毒。

主治　頭骨遊風。遍體搖瘁。煮汁淋洗。

參攷資料　㊀羌活、天麻、鬼臼、蘼蕪、四者皆名無風獨搖草。而物異不同。（李時珍）㊁無風獨搖草。帶之令夫婦相愛。（陳藏器）

【無食子】

命名　本品波斯人無不食以代果。故名。

處方用名　沒食子。沒石子。

古籍別名　墨石子。（炮炙）麻

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茶澤。蒲盧子。（綱目）摩澤樹。拔屢子。（西陽雜俎）

基本　係喬木類。爲無食樹之子實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。產自印度波斯屬。來自嗢咪。

形態　無食樹高六七丈。葉似桃葉而長。間歲互生一根。春開白花。花心微紅。其子實圓如彈丸。生青熟黃。可供食。蟲蛀有孔者。並可充藥用。

採取　秋月採之。

製法　雷敩曰。凡使勿犯銅鐵。井被火驚。用顆小無枕米者妙。用漿水於砂盆中研令盡。焙乾再研。如烏犀色。入藥。

性質　苦。溫。無毒。

效能　濾精。斂腸。專作收攝藥。

主治　赤白痢。腸滑。生肌肉。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論無食子曰。腸虛冷痢。益血生精。和氣安神。烏髭髮。治陰毒瘡。燒灰用。【宋】馬志新詳定本草論無食子曰。溫中。治陰瘡。陰汗。小兒疳蟲。冷滑不禁。【清】黃宮繡本草求眞論無食子曰。沒石子味苦性溫。色黑。功當入腎固氣。凡夢遺精滑。陰痿。腎痛。腹冷泄瀉。瘡口不收。陰汗不止。一切虛火上浮。腎氣不固者。取其苦以堅腎。溫以煖胃。健脾。黑以入腎益氣。補精禪氣。接納丹田。不爲走泄。則諸病自能克愈矣。至書所云安神定魄。亦是神氣既收。不爲外浮之意。他如燒黑灰。煎湯。以治陰瘡。合他藥以染鬚髮。爲末。以擦牙齒。皆是賴其收斂之力。以爲保護。無他道也。但味苦性降。多用恐氣過下。不可不愼。出外番。顆小紋細者佳。炒研用。蟲蝕成孔者揀去。忌銅鐵。

配合應用　㊀治血痢不止。沒石子一兩爲末。飯丸小豆大。每食前米飲下五十丸。（普濟方）

㊁治小兒久痢。沒石子二箇。熬黃研末。作餛飩食之。（宮氣方）

㊂治產後下痢。沒石子一箇。燒存性。研末。酒服。熱卽用飲下。日二。（子母祕錄方）

㊃治牙齒疼痛。綿裹無食子末一錢。咬之。涎出吐去。（濟聖總錄方）

㊄治鼻面酒皶。用南方沒石子有孔者。水磨成膏。夜夜塗之。甚妙。（危氏得效方）

㊅治口鼻急疳。沒石子末。吹下部卽癒。（千金方）

㊆治大小口瘡。沒石子泡三分。甘草一分。研末摻之。月內小兒生者。少許置乳上吮之。入口卽啼。不過三次。（聖惠方）

㊇治足趾肉刺。無食子三枚。肥皂莢一挺。燒存性。爲末。醋和傅之。立效。（奇效方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡有實邪者禁用。

參攷資料　㊀沒石子合他藥染鬚。造墨家亦用之。（蕉宗奭）㊁波斯人每食以代果。故番胡呼爲沒石子。梵書無與沒同音。今人呼爲墨石。沒石轉傳訛矣。張仲景用治陰汗。燒灰。先以湯浴了。布裹灰撲之。甚良。（李珣）㊂無食子生西戎沙磧間。樹似櫟。劉禹錫曰。按段成式酉陽雜俎云。無食子生波斯國。呼爲摩澤樹。高六七丈。圍八九尺。葉似桃而長。三月開花白色。心微紅。子圓如彈丸。初青。熟乃黃白。蟲蝕成孔者。入藥用。其樹一年生無食子。一年生拔屢子。大如指。長三寸。上有殷中仁。如栗黃。亦可噉。（蘇恭）㊃按方輿志云。大食國有樹。一年生如栗子而長。名曰蒲盧子。可食。次年則生麻荼澤。卽沒石子也。間歲互生。一根異產如此。一統志云。沒石子出大食諸番。樹如樟。實如中國茅栗。（李時珍）㊄此樹中國印度俱有。用是果入藥。能收斂止血咳血。瀉血。大小腸血。痔瘡。白帶俱宜之。法用沒石子一兩。搗爛。水一斤半。煎至一斤。每服一兩。日服二三次。或研細作散。每服一分半至三分。日服二次。咳嗽弱者用沒石子水漱之。外用能止肛門痔瘡痛。法用沒石子一錢。研極細末。鴉片膏半錢。猪油八錢。攪和作膏。每用半錢。搽患處。腳瘡有血亦可用此油搽。（內科新說）

【無核李】卽徐李之古籍別名。典見綱目。詳『李』條。

【無根金絲草】卽無根草之古籍別名。典見百草鏡。詳『無根草』條。

【無根草】古籍別名　無根金絲草。火貉草。（百草鏡）豆馬黃。（李氏草祕）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態　無根草爲蔓草類藤屬之一種。莖細色赤。無根無葉。祇有青色細鱗。附於莖際。蔓延極長。繞於草木而生。有花有子。其苗可供藥用。子詳見該條。

採取　三月四月間採之。尤以色黃而細如線者爲眞。

性質　苦。微甘。寒。無毒。

主治　利水去溼。熱涼血。消癰疽。上吐衄。下血。解諸藥疽毒。及辟瘴癘。搗傳疔腫惡瘡。淋濁帶下。黃疸。並小便不通。狐臭。騷氣。和韭根煎湯洗。

【無根草子】　**主治**　活血。解痘毒。療難產。酒煎服。

【無根藤】　卽菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菟絲子』條。

【無骨苧麻】　**古籍別名**　玉接骨。血見愁。金不換。玉錢草。玉梗。草麒麟。玉連環。玉盤龍。玉梗半枝蓮。（綱目拾遺）

產地　多生陰溼諸地。

形態　無骨苧麻爲接骨草類之一種。立夏時發苗。蓬節則粗。高尺許。葉尖而長。形似苧麻而薄小。背不白。莖如筋。色明透。至九月間。莖白明如水晶。上有細紅點子。其花白色。結子青色。至十月草枯而子紅熟。每顆有一二百子。其根蔓延白色。多粗節。類竹根。中有黏液。種於鬆土。極易繁衍。其根可供藥用。

採取　九月採之。

性質　甘。涼。無毒。

主治　續筋骨。療折傷。理氣開胃。止吐衄。腸紅下血。

參攷資料　無骨苧麻能入肺經。血分。行肺經惡血。引良血歸經。大有功效。（綱目拾遺）

【無患子】　**古籍別名**　桓。（拾遺）木患子。肥珠子。油珠子。菩提子。鬼見愁。（綱目）

外國名詞　Sepindus Mukurosi Gaertn.（拉丁）ムクロジツフ（日本）

基本　係無患子科無患子屬。爲無患子之核外肉。

產地　生山野間。

形態　無患子爲落葉喬木類。高二丈餘。葉互生。作偶數羽狀複葉。小葉長卵形。夏月開小花。帶黃色。雄花八瓣。雄花子房三室。圓錐花序。結實略似球形。徑六七分。果深堅硬。熟時黃茶色。皺襞甚多。內含一種子。形圓色黑。質亦堅。可作念珠。其核外肉可供藥用。



無患子

採取　十月間採之。

性質　微苦。平。有小毒。

主治　滌垢去面黑。喉痺研納喉中立開。又主飛尸。

【無患子仁】　**性質**　辛。平。無毒。

主治　燒之辟邪惡氣。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論無患子仁曰。煨食辟惡去口臭。

【無情子】　卽礪砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礪砂』條。

【無殼月拔伊】　卽蛞蝓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛞蝓』條。

【無殼蝸蘆】　卽蛞蝓之古籍別名。典見爾雅。詳『蛞蝓』條。

【無義草】　卽山慈姑之古籍別名。典見綱目。詳『山慈姑』條。

【無腸公子】　卽蟹之古籍別名。典見抱朴子。詳『蟹』條。

【無實子】　卽鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠李子』條。

【無漏子】　**命名**　和漢藥考。一名蘇鐵。謂其將枯死時。打入鐵釘則復蘇。故名。無漏子殆係番音。

處方用名　千年棗。

古籍別名　波斯棗（拾遺）千年棗（開寶）萬歲棗（一統志）海棗（草木狀）番棗（嶺表錄異）金果（輟耕錄）木名海枧。鳳尾蕉。鳳尾松。蘇鐵。（綱目）火蕉。番蕉。鳳尾松。蘇鐵。（和漢藥考）窟莽樹（酉陽雜俎）

基本　屬蘇鐵科蘇鐵之子實。

產地　原產波斯國。彼人呼爲窟莽樹。和漢藥考曰。爲暖國植物。琉球薩摩日向等產此。台灣亦有產。

形態　蘇鐵爲自生之常綠樹。高達一丈餘。莖多直立。全面爲鱗片狀葉痕所掩。葉叢生於莖頂。爲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

長大之羽狀複葉。質硬而有光澤。其小葉作細長形。在暖地則開花。爲單性花。雄雄異株。雌花叢生。狀如火焰。全面有淡褐色長毛。雄花作松毬狀。子實至秋季成熟。其子實爲類桃實而稍扁平之子實。外面有赤色薄皮。皺而有光澤。內部有白色厚皮。內有白仁。

採取　七八月間採之。

用法　生食或煮汁。

性質　甘。溫。無毒。

效能　消痰止咳。用作通經收斂藥。

主治　補中益氣。除痰嗽。補虛損。好顏色。令人肥健。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論無漏子曰。消食止咳。治盧羸。悅人。久服無損。

配合應用　㊀蘇鐵澱粉。有治痢疾功效。又治嘔逆。（和漢藥考方）㊁治刀傷用蘇鐵燒焦豚脂煉合塗之。（和漢藥考方）

用量　一錢至三錢。

參攷資料　㊀無漏名義未詳。

千年萬歲言其樹性耐久也。曰海棗。曰波斯。曰番棗。言其種自外國來也。金果。貴之也。曰櫬。曰蕉。象其幹葉之形也。番人名其木曰窟莽。名其實曰苦魯麻棗。苦麻窟莽。皆番音相近也。（李時珍）㊁樹若栗木。其實若櫟子。有三角。（李珣）㊂按劉恂嶺表錄云。廣州有一種波斯棗木。無旁枝。直擎三四丈至巔。四向共生十餘枝。葉如櫻欄。彼土人呼爲海櫻木。三五年一着子。每朵約三二十顆。都類北方青棗。但小爾。舶商亦有攜本國者。至中國色類沙糖。皮肉輭爛。味極甘。似北地天蒸棗。而其核全別。兩頭不尖。雙卷而圓。如小塊紫礦。種之不生。蓋蒸熟者也。（蘇頌）㊃千年棗雖有棗名。別是一物。南番諸國皆有之。即杜甫所賦海櫻也。按段成式酉陽雜俎云。波斯棗生波斯國。彼人呼爲窟莽。樹長三四丈。圍五六尺。葉似土藤不凋。二月生花。狀如蕉花。有兩脚。漸漸開瓣。中有十餘房。子長二寸。黃白色。狀如楝子。有核六七月熟。則子黑。狀類乾棗。食之味甘如飴也。又陶九成輟耕錄云。四川成都有金果樹六株。相傳漢時物也。高五六十丈。圍三四尋。挺直如矢。木無枝柯。頂上有葉如櫬櫚。皮如龍鱗。葉如鳳尾。實如棗而大。每歲仲冬有司具祭收採。令醫工以刀剝去青皮。石灰湯瀹過。入冷熟蜜浸。換四次。瓶封進獻。不如此法。則生澀不可食。番人名爲苦魯麻棗。蓋鳳尾焦也。一名萬歲棗。泉州有萬年棗。即此物也。又晉含草木狀云。海棗大如杯碗。以比安期海上如瓜之棗。似未得其詳也。巴旦杏亦名忽鹿麻。另是一物也。（李時珍）

【無漏子】㊀即海櫻實之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『海櫻子』條。

【無漏果】即海櫻子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『海櫻子』條。

【無節竹】即通竹之古籍別名。典見綱目。詳『竹』條。

【無憂扇】即枇杷葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枇杷葉』條。

【無聲虎】即大黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大黃』條。

【無顧】即薇銜之古籍別名。典見吳普本草。詳『薇銜』條。

【無顚草】即鹿御草之古籍別名。典見吳普本草。詳『鹿御草』條。

【焦山查】即山查焙炒成者之處方用名。詳『山查』條。

【焦山梔】即山梔子焙炒成者之處方用名。詳『山梔子』條。

【焦六麴】即神麴焙成焦色者之處方用名。詳『神麴』條。

【焦朮】即白朮炒焦者之處方用名。詳『白朮』條。

【焦冬朮】即白朮炒焦者之處方用名。詳『白朮』條。

【焦白芍】即白芍炒焦者之處方用名。詳『白芍』條。

【焦石】即石炭之古籍別名。典見綱目。詳『石炭』條。

【焰曳】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【焰消】即消石之古籍別名。典見土宿本草。詳『消石』條。

【爲猴】即獼猴之古籍別名。典見說文。詳『獼猴』條。

【犂尖草】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【犂食】即芍藥之古籍別名。典見別錄。詳『芍藥』條。

【犂頭刺藤】即雷公藤之古籍別

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名。典見物理小識。詳『雷公藤』條。

【犁頭草】產地　在閩粵諸縣境內。

形態　本品爲雜草類之一種。

係一年生草本。形似犁頭。三四月出新。採之可供藥用。

效能　去腐生新。活血止痛。

主治　治火瘡惡毒。魚口便毒。

【猢猻頭】即鱷腸之古籍別名。典見本草必用。詳『鱷腸』條。

【猢猻頭草】即地錦草之古籍別名。典見綱目。詳『地錦草』條。

【猱】即水獺肝之古籍別名。典見綱目。詳『水獺肝』條。

【猩紅】即銀朱之古籍別名。典見綱目。詳『銀朱』條。

【猩猩】外國名詞　Simia satyrus 或 Pitheous satyrus（拉丁）(Orangoutang)（英）

基本　係脊椎動物哺乳類、有胎盤類、靈長類、猿類、狹鼻類、人猿科之猩猩。

產地　出蘇門答臘及婆羅洲諸地海岸沼澤之森林中。亦出非洲。有大猩猩、黑猩猩等種。



猩猩

形態　猩猩爲獸類之一種。面部裸出。呈鉛黑色。額略圓而高。眼大。口突出。脣薄。頤部之皮弛緩。忿怒或悅樂時。則生皺紋。無頰囊。門犬白三種。齒俱備。牡者頷下生長鬚。軀幹肥大。四肢較短。無尾。臀毛逆立。無臂扰。毛長色赤褐。前肢長。可達踝。拇指短。趾皆長。筋骨十二對。體長四尺餘。不善行立。其肉可供藥用。

性質　甘。鹹。溫。無毒。

主治　食之不昧不飢。令人善走。窮年無厭。可以辟穀。

參攷資料　逸書言猩猩肉食之。令人不昧。其猩猩可知矣。古人以爲珍味。故荀子言猩猩能言。笑二足無毛。而人廢其爽。食其肉。呂氏春秋云。肉之美者。猩猩之唇。獾獾之炙。是矣。（李時珍）

【猩皮】即刺蝟皮之古籍別名。典見本經。詳『刺蝟皮』條。

【猱】即狨之古籍別名。典見綱目。詳『狨』條。

【猴子棗】即猴棗之別名。典見藥物生產辨。詳『猴棗』條。

【猴丹】即猴棗之別名。詳『猴棗』條。

【猴佛】即辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛夷』條。

【猴梨】即山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【猴棗】古籍別名　猴子棗。羊腸棗（藥物生產辨）申棗。猴丹。（藥商隱名）

產地　多在南洋星加坡諸海島。及西藏印度等處。

形態　猴棗係屬鐵物質。爲石種類。形如鴿卵。大小不一。似石而鬆脆。擊之易碎。色黯黃而微白。其理層層褒疊而生。內有核仁。性極堅硬。印產者大如雞卵。色純青。藏產者。顆粒甚小。色青黑。光瑩耀目。類如寶石。質地尤爲堅實。效力差勝。

性質　微鹹兼苦。寒。平。無毒。

效能　平盧喘。鎮肝魂。定癎厥。止癮疾。開痰閉。清痰熱。

主治　爲癇。痰厥。癰疽。瘰癧。痰核。橫痃。

配合應用　㈠治痰熱壅塞。喘逆聲嘶。猴棗、竹瀝、遠志、天竺黃、菖蒲、貝母、膽星、半夏。㈡治癰疽痰核。猴棗醋磨塗。

用量　輕則一分。重則二三分。

參攷資料　㈠猴棗生於老猿猴之胃及肝膽間。緣猿猴常食各種山藥。積年累月。其精液所結成爲石者。形如棗。猶如牛之生黃。狗之生寶。馬之生墨。鹿之生玉。諸獸之生鮓答。此皆物之爲病。而人得之以爲寶。故功能有如此其捷。而治效亦相類也。㈡猴棗爲治熱痰最靈捷之聖藥。較之西黃八寶散。蠲諸祛熱痰藥。不啻功勝百倍。㈢猴棗以產於沙喇滑者爲正道地。坤甸產者。亦入上品。近日多出南洋羣島。由檳嶼石叻運來者多。該地土人。呼之爲羊腸棗。未必無因。好格物者。其細思之。（藥物生產辨）

【猴薁草】即南天燭之古籍別名。典見登眞隱訣。詳『南天燭』條。

【猴葵】即鹿角菜之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見綱目。詳『鹿角菜』條。

【猴蒜】卽毛茛之古籍別名。典見綱目。詳『毛茛』條。

【猴櫧】卽山查之古籍別名。典見危氏得效方。詳『山查』條。

【猴薑】卽骨碎補之原名。詳『骨碎補』條。

【猴藥】卽南天燭之古籍別名。典見登眞隱訣。詳『南天燭』條。

【猴闘子】古籍別名　仙茅果。（綱目拾遺）

產地　出臨海深山中。

形態　猴闘爲夷果類之一種。秋生冬實。大如指頭。其子可供藥用。

性質　苦。溫。無毒。

主治　暖丹田。益五臟。健脾。增氣力。

參攷資料　猴闘子樵人採食。并可磨粉。其性溫補。然城市亦無食之者。綱目有猴騷子。形典此別。又臨海出猴總子。一名土柿。每年九十月間生。形與紅柿同。皆非一物。（綱目拾遺）

【獾】卽水獺肝之古籍別名。典見綱目。詳『水獺肝』條。

【琥珀】

命名　地化爲石。本品形狀似之。故謂虎魄。俗文從玉。以其類玉也。

處方用名　血珀。毛珀。光珀。西血珀。紅琥珀。琥珀屑。西雲珀。

古籍別名　明珀。蠟珀。香珀。江珠。（綱目）阿澀摩揭婆（梵書）丹珀。南珀。紅珠。虎魄。大益珀。（和漢藥考）紅松脂。墜珀。花珀。水珀。石珀。物象珀。（炮炙論）

外國名詞　Succinum.（拉丁）Bernstem.（德）Succinite. Amber.（英）

基本　屬松柏科植物之樹脂。埋沒地中。歷久而化爲石。卽琥珀。

產地　和漢藥考曰。琥珀產於東洋之海岸各地。及俄、德、波蘭、瑞典、丹麥等國之沙中。或海水中。日本不產眞琥珀。僅陸前、陸中、能登、石狩等處。產類似之物。

形態　琥珀爲扁平或不正圓形之塊。色淡黃或淡白。質透明有類似松脂之光澤。但頗脆弱。破碎面作貝殼狀。有時含有無血蟲或水泡等物。比重一・〇至一・一八。硬度二・五。熱至二百十五度則變軟。熱至二百八十七度。則融解。遇酒精、伊打、松節油等。俱稍溶解。摩擦之則發生電氣。燃以火則膨脹而發白煙。氣芳香。乾餾之則可得琥珀油。

種類　㈠墜珀　卽衆珀之長者。㈡蠟珀　卽色黃而明瑩者。㈢香珀　卽有香氣者。㈣水珀　卽色淡黃無紅而多皺紋者。㈤石珀　卽重如石而色黃者。（不堪用）㈥花珀　卽文如新馬尾松中心文色紅黃相間者。㈦物象珀　卽中含有昆蟲等物者。㈧黃白者　曰明珀。㈨淡白者　曰金珀。又曰香珀。㈩日本奧州所產之薰陸者。乃木脂之別名。非琥珀也。(11)紅松脂者　似琥珀。但濁而且脆。其文橫爲別耳。

採取　採掘無時。

製法　雷敩曰。凡使琥珀。入藥用水調側柏子末。安磁鍋中。置琥珀於內。煮之。從巳至申。當有異光。搗粉飾用。今人有用乳製者。

用法　剉末和作丸散。或水煎或沖服。

性質　甘。平。無毒。

成分　爲樹脂、揮發油、琥珀酸、斯可企涅、及硫黃等。

效能　利水。散瘀。通淋。安神。用作利尿及通經藥。

主治　安五臟。定魂魄。殺精魅邪鬼。消瘀血。通五淋。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論琥珀曰。止血生肌。合金瘡。【宋】大明日華諸家本草論琥珀曰。壯心明目。磨翳。止心痛。顛邪。療魘毒。破結癥。治產後血枕痛。【金】張元素珍珠囊論琥珀曰。清肺利小腸。【清】黃宮繡本草求眞論琥珀曰。琥珀甘淡性平。按書雖曰脂入土而成寶。合以鐵墜等藥。則能安魂定魄。色赤能入心肝二經。血分。合以辛溫等藥。則能消瘀破癥。生肌合口。其味甘淡上行。合以滲利等藥。則能治淋通便。燥脾補土。且能明目退翳。逐鬼殺魅。謂是水去熱除安鎭之意。但此性屬消磨。則於眞氣無補。氣屬滲利。則於本源有耗。此惟水盛火衰者用之。得宜。若其火盛水涸。用之不能無慮。松脂入土年久結成。或楓脂結成。以摩熱拾芥者。眞琥珀仁

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

末。入瓦鍋同煮半日。搗末用。

國外學說　日本學說曰。琥珀者。漢醫用爲利尿通經藥。用量一・二至四・〇。琥珀之成分爲「スクシニーン」（或名爲琥珀燃土之黃色華爾斯。琥珀酸及少量之揮發油。據扶氏之藥物書云。琥珀者。專供熏烟之用。其熏烟之目的。在得爽快之氣。又於饐麻賀斯應用之。（此目的祇在導其蒸氣於患部。或以木棉裹和之。貼於患部）或如「コロフォニウム」用爲撒布末。然依和漢藥考。亦用爲通經及利尿藥。又和漢藥考曰。日本進口之琥珀。皆透明作深紅色。國人稱爲血透。亦名金珀。此爲上品。其色稍淡者名銀珀。次之淡黃色者名蠟珀。又次之。帶黑者爲下品。凡日本產皆重濁不透明。不堪入藥。又遠西醫方名物考曰。以琥珀末加香竄之蒸餾油。如迷迭香油。刺賢堊兒油等。入玻璃瓶中。時時搖盪之。則逐漸溶化。或以此末加松節油。或骨拜波拔爾撒謨一倍。入玻璃瓶中。密封。文火煮八日許。其末亦盡溶化而成紅色。於此依前法加杏仁油煮之。則變紫紅色。加橄欖油或胡桃油煮之。則變美麗之紅色。加罌粟子油煮之。則變紅黃色。加扁桃油或亞麻油煮之。則變黃色。又東京獸醫新報曰。琥珀油爲殺鼠藥。最有功效。其有效成分。卽在琥珀酸。法以琥珀酸與牛膽。并鼠喜食之蕎麥粉三者相和。製成丸子。鼠食之。立卽遍身毛戴。煩渴欲死。得水則飲。愈飲愈渴。漸漸動作遲鈍。自食後三時半至二十七時內。無不倒斃。平均十一時卽死。此雖係牛膽之苦味。酸刺戟其胃而然。而其主要之作用。實由於琥珀酸也。所用琥珀酸之量。每一丸含〇・一。用〇・三至〇・五。已足殺一鼠。又遠西醫方名物考曰。琥珀中所含之油氣鹽氣。能利小便。通經水。又患搐搦。痙攣。諸症。或昏睡眩暈。癎症。子宮病。脾病。用此俱有效。此因琥珀中所含竄透揮發之油鹽。有開達腦神經之效也。此外更能治下利。尿多。遺精。淋病。白帶下。吐血等症。蓋性能收斂耳。琥珀爲末。服其煎汁。或和雞子黃。或製爲丸。或作膏藥均可。服量。自一分至一錢。爲末。摻皮膚破裂及小瘡。和愈。其製法以乾餾琥珀而得之餾液。分爲二層。上層爲油。卽琥珀油也。下層爲水。中含琥珀酸。故可從此中製出琥珀酸。琥珀油爲褐色油狀之液體。臭味俱似拔爾撒謨。比重〇・九二至〇・九七。濃酒精能溶解之。遇碘則立卽爆發。成分爲一種炭化水素 $C_{10}H_8$。是名琥珀膩。入藥須用其精製者。謂之精製琥珀油。是爲無色或微黃之液體。有拔爾撒謨之臭氣。溶解於十分至十二分之酒精。此精製琥珀油。有衝動。鎭痙。發汗。利尿之效。每服五滴至十五滴。一日數次。或製爲丸劑、乳劑、酒精溶液等。皆可。用於風溼痛。癲癇。舞蹈病。百日咳。小兒痙攣諸症。又齒痛。風溼痛。痲痺等。多配合他種刺戟藥。以之外用。又袖珍藥說。述其性能曰。衝動。鎭痙。利尿。外用引赤。專治患歇斯的里。癲癇。月經不足者。均宜用之。外用。治局部痲痺。及慢性關節風溼痛。俱極著效。此外尙可治面部神經痛。法以琥珀油一分。阿片酒半分。搖和。時時塗擦痛處。卽愈。用法。內用。每服五滴至十五滴。和護謨漿用之。又袖珍藥說曰。製法以琥珀油一益斯。入玻璃器。取硝酸三益斯半。徐徐滴入。用玻璃棒攪拌。靜置三十六小時。分取上面之樹脂狀物。乃先洗以冷水。再洗以熱水。大約數次。至其水毫不帶酸味而止。主治性質極似麝香。可代用之。英美學說曰。琥珀係松香入地年久變成。內含數種松香類質。在古時希臘人。知以琥珀摩之。卽能吸輕體。殆因其生電氣之故。尋常所得之琥珀。則係海邊礫石內隨海水飄至岸邊者。至英國所用之琥珀。其大半得之於波羅的海邊。或印度海邊。地學家謂琥珀爲松樹類所產之松香。常有人在地內挖起變成石形之松木。又如木煤層內所遇見之琥珀。常見有微蟲或植物微迹。雜於其內。其常見者爲參差形脆塊。其色黃或黃紅。似松香。能透光。無臭亦無味。其功用能行氣。解轉筋。生津液。利小便。治經脈不調。羊癇風。牙關緊閉。嗽咳嗽。抽風。配酒油用之。今內服者少。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

辨僞　㊀鄭肖巖曰。琥珀出西番南番。及松樹楓木津液墜地。多年所化。色黃而明瑩者名蠟珀。色若松香。紅而且黃者名明珀。有香者名香珀。出高麗日本者色深紅。凡中有蜂蟻松枝。形色如生者尤好。當以手心摩熱。拾芥爲眞。氣味甘平無毒。能安五臟。定魂魄。消瘀血。通五淋。近有以松脂僞造混售。松脂氣味苦溫。性不同。則功自別。㊁曹炳章曰。按南蠻記云。寧州有折腰峯。岸崩則蜂出。土人燒治。以爲琥珀。常見琥珀中有物如蜂形。此說亦難憑信。列仙傳云。松柏脂入地千年成爲茯苓。茯苓化爲琥珀。今泰山出茯苓而無琥珀。益州永昌出琥珀而無茯苓。亦無實據。或言龍血入地爲琥珀。或言虎死時目光淪入地生琥珀。故又名虎魄。此屬無稽神話。更無價值可言。元中記言松脂入地爲琥珀。廣志云。哀牢縣生有琥珀。生地中。其土及旁不草。深者八九尺。大者如斛。削去外皮。中成琥珀。初如桃膠。凝結成也。滇志云。雲南麗江出者。其產地旁不生草木。深八九尺。大者如斗。削去外皮。中成琥珀。紅大明透者爲血珀。最佳。黃嫩者力薄爲金珀。次之。今蠻地莫對江猛拱地產此。夷民皆鑿山而得。與開礦無異。滇南雜誌云。琥珀產緬甸諸西夷地。以火珀及杏紅血珀爲上。金珀次之。蠟珀最下。供藥餌而已。又云。珀根有黑有白。有如雀腦。據諸家所說。是屬礦物質無疑。化學易知云。琥珀爲地內變化之松香。內含數種松香之質。史廷鷗說。琥珀云。琥珀爲松柏等脂液。埋置土內。日久遂成化石。雖云礦物。仍胚胎於植物者也。其成分純屬有機化合。平均百分中。含炭素七八・九四。水素一〇・五三。酸素一〇・五三。又往往有小蟲肢體混合其內。是必當時蟲類飛行。適觸流動狀之脂液中。陷入不復得脫。（南蠻記所說。或此類歟。）遂併而爲一焉。色黃而赤。又有呈褐色者。艷紅與黑。殆所罕見。則體爲不規則狀。多小顆。德國柏林博物館所藏。重量達十八磅。洵世界最大之產物也。性脆。爲半透明體。重量極低。與水相若。倘置於一零五一零九之海水中。則浮而不沉。硬度二乃至二五。較石膏猶過之。以銅片擦之。則易損傷。以布摩之。生強電氣。能引紙片毛髮等。但傳熱極鈍。加熱至攝氏百五十度而始柔軟。二百度至三百度而始溶解。若投於火。最易燃燒。放黃色煙與香氣。其殘餘之灰燼。適如海綿狀之炭物質。亦一奇觀也。其生產地。在北德之波羅的海濱。就中靡麥旦澤間。產額最多。其狀態可分爲二。其一屬第三紀之下部。漸新統。與褐炭層俱現。爲母床。其二遇海波之衝擊。及風雨冰雪之作用。離母床。雜海沙而漂積。其產於海濱者。稱海琥珀。質純而均。歷久不變色。比之山產。實遠過之。一千八百六十年頃。撒謨蘭島發見琥珀母床。後。其坑道近傍。常有天然露出者。與前紀之海濱產同。爲北德之特色。此係德國產之琥珀。科學之研究也。更據中國產之琥珀。以藥用者之鑑別。以深紅明透質鬆脆者爲血珀。最佳。廣西產者色紅明亮。爲西珀。亦佳。黃嫩者次之。金珀更次。廈門產者。色淡黃有松香氣。爲洋珀。更次。他如雲貴邊省人死以松香楓塡材底。伏土深久。松香由黃轉黑。土人名曰老材香。以充琥珀。年久古墓中往往發見之。然神色黑無神光。仍含松香氣。爲最次。不入藥用。欲辨眞僞。試將琥珀摩擦之。能發電氣。拾芥者眞。僞者不發電氣。放樟腦臭。置酒精中。最易浸入。以刀削之。不能粉末而爲小片。其硬度比天然產爲高。皆爲僞品。眞者刀刮鬆脆成粉。凡安心神。定魂魄。宜生用。與燈芯同研。去燈芯。眼科宜入豆腐內煮用。㊂柯等和曰。琥珀以產自雲貴者爲佳。其色紫紅明亮。名雲珀。陝西產者名西珀。以能吸芥者爲眞。所謂磁石引針。琥珀拾芥者也。敲光者名光珀。但充器皿。不入藥用。產於廈門及東洋者。皆不可用。作僞者。以松香煎煉而成。形色與眞者無異。然以火燒之。有松香氣不可用。

配合應用　㊀用琥珀、沒藥、乳香、延胡索、乾漆、鼈甲爲散。治產後血暈有神。佐以人參、益母草、澤蘭、生地、牛膝、當歸、蘇木作湯。送前藥。則治兒枕痛。惡露下不盡。腹痛少

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

腹痛。寒熱等證。極效。

㈡琥珀和大黃。鼈甲作散子。酒下方寸匕。下婦人腹內惡血。

㈢琥珀同鼈甲。京三稜各一兩。沒藥。延胡索各半兩。大黃六銖。煞搗爲散。空心酒服三錢。治婦人癥瘕氣塊。及產後血暈悶絕。兒枕痛。甚盧極者。減大黃。

㈣琥珀同丹砂。滑石。竹葉。麥冬。木通。治心家有熱。小腸受之。因之小水不利。立效。

㈤琥珀同人爪。珍珠。瑪瑙。珊瑚。除目翳赤障。

㈥琥珀得丹砂。犀角。羚羊角。天竺黃。遠志。茯神。鑌鐵。主諸癎。

㈦治小兒胎驚。琥珀。防風。各一錢。丹砂半錢。爲末。磉乳調一字。入口中最妙。(直指方)

㈧治小兒胎癎。琥珀。丹砂各少許。全蝎一枚。爲末。麥門冬湯調一字服。(直指方)

㈨治小兒轉胞。眞琥珀一兩。爲末。用水四升。葱白十莖。煮汁三升。入琥珀末二錢。溫服。砂石諸淋。三服皆效。(聖惠方)

㈩治小便淋瀝。琥珀爲末二錢。麝香少許。白湯服之。或萱草煎湯服。老人虛人。以人參湯下。亦可蜜丸。以赤茯苓湯下。(普濟方)

(十一)治從高墜下。有瘀血在內。刮琥珀屑。酒服方寸匕。或入蒲黃二三匙。日服四五次。(外臺祕要方)

(十二)治金瘡悶絕不識人。琥珀研粉。童子小便調一錢。三服瘥。(鬼遺方)

(十三)治小便尿血。琥珀爲末。每服二錢。燈芯湯下。(直指方)

(十四)治魚骨哽咽六七日不出。用塊琥珀珠一串。推入喉所。牽引之。卽出其骨。(外臺祕要方)

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡陰虛內熱。水腑火旺者禁用。

著名方劑　(十)琥珀散。止血生肌。鎭心明目。破癥瘕氣塊。產後血暈悶絕。兒枕痛。並主之。(海藥本草方)琥珀。鼈甲。京三稜各一兩。延胡索半兩。沒藥半兩。大黃六銖。共研末爲散。空心酒服三錢。七日再服。神驗。莫及產後減大黃。(十一)神效琥珀散。治石淋水道澁痛。鎭下沙石。(醫宗必讀方)琥珀。桂心(去皮)。滑石。(水飛)大黃。葵子。膩粉。木通。木香。磁石。(煅酒淬七次研)各等分。共研細末。每服二錢。燈芯煮白煎湯調服。

參攷資料　(一)古方用爲利小便以燥脾土有功。脾能運化。肺氣下降。故小便可通。若血少不利者。反致其燥急之苦。(朱震亨)(二)俗中多帶之辟惡。鄧削服瘵瘀血至驗。仙經無正用。(陶弘景)(三)和大黃鼈甲作散。酒下方寸匕。惡血婦人腹內血盡卽止。宋高祖時。寧州貢琥珀枕。碎以賜軍士。用傅金瘡。(陳藏器)(四)蜀說松脂淪入地千年所化。今燒之亦作松氣。亦有中有一蜂形色如生者。博物志乃云燒蜂巢所作。恐非實也。此或蜂爲松脂所沾。因墜地淪沒爾。亦有黃鱓雞子及青魚魰作者。並非眞。惟以手心摩熱。拾芥爲眞。今並從外國來。而出茯苓處並無不知出琥珀處復有茯苓否也。(陶弘景)(五)琥珀是海松木中津液。初若桃膠。後乃凝結。復有南珀。不及舶上來者。(李珣)(六)諸家所說茯苓琥珀。雖有小異。同皆云松脂所化。但茯苓、茯神乃大松擺折。或斫伐而根癥不朽。津液下流而結成。故治心腎通津液也。若琥珀乃是松樹枝節榮盛時。爲炎日所灼。流脂出樹身外。日漸厚大。因墜土中。津潤歲久。爲土所滲泄。而光瑩之體獨存。今可拾芥。尙有黏性。故其蟲蟻之類。乃木入土時所黏者。二物皆自松出。而所裹各異。茯苓生於陰而成於陽。琥珀生於陽而成於陰。故皆治驚安心。而利水也。(陳承)(七)凡用須分紅松脂。石珀。水珀。花珀。物象珀。蠶珀。琥珀。其紅松脂如琥珀只是濁大脆文。水珀多無紅色。如淺黃多皺文。石珀如石重色黃不堪用。花珀文如新馬尾松心文一路赤。一路黃。物象珀其內自有物命。入用神妙。蠶珀是象珀之長。琥珀如血色。以布拭熱。吸得芥子者眞也。(雷敎)(八)琥珀拾芥。乃草芥。卽禾草也。雷氏言拾芥子誤矣。唐書載西域康千河松木入水一二年。化爲石。正與松楓諸木潛入土化珀同一理也。今金齒麗江亦有之。其茯苓千年化琥珀之說。亦譌傳也。按實昭格古論云。琥珀

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

出西番南番。乃楓木津液多年所化。色黃而明瑩者名蠟珀。色若松香。紅而且黃者名明珀。有香者名香珀。出高麗倭國者色深紅。有蠅蟻松枝香尤好。（李時珍）

【琥珀孫】卽松脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『松脂』條。

【琥珀屑】卽琥珀之處方用名。詳『琥珀』條。

【琪珊香】卽伽倆香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『伽倆香』條。

【番木鼈】古籍別名　馬錢子。苦實把豆。火失刺把都。（綱目）



番木鼈

外國名詞　Semen Strychni

基本　屬馬錢科之常綠樹。爲番木鼈之種子。

產地　原產印度。今西藏亦有產焉。

形態　番木鼈形扁。圓者略曲。色灰黃。直徑二十耗。厚四耗。表面生毛茸。胚堅硬如角質。藏於七耗長之芽苞內。但核小於木鼈。而色白味苦。

採取　八九月採實取仁用。

用法　恒以搗剉。和作外治藥。

性質　苦。寒。無毒。

成分　主要素爲 Strychnine ($C_{21}H_{22}N_2O_2$) Brucine ($C_{23}H_{26}N_2O_4$) Igasurine Loganin.

作用　入胃時。無任何變化。至腸能刺激腸壁神經。使腸之蠕動增劇。而令大便祕結。一部分仍由大便排出。一部分由腸壁吸入而達血中。略能阻止血球氧化及排出二氧化炭之功。然最顯著之作用。卽由神經而達腦部。使腦神經特別興奮。且能延長數日之久。若服大量則腦神經反被麻醉。全身血液因氧分而停止流動。甚至呼吸弛緩。四肢痙攣而死。

主治　傷寒熱病。咽喉痺痛。消痞塊。並含之嚥汁。或磨水噙嚥。及治神經衰弱症。腦貧血。

配合應用　㊀治喉痺作痛。番木鼈。青木香。山豆根等分爲末。吹之。（楊琳醫方摘要方）

㊁治經喉風腫。番木鼈仁一個。木香三分。同磨水調。熊膽三分。麝五分。以雞毛掃患處取效。（唐瑤經驗方）

㊂治斑瘡入目。苦實把豆兒。卽馬錢子。半個。輕粉。水花銀。硃各五分。片腦。麝香。枯礬少許。爲末。左目吹右耳。右目吹左耳。日二次。（田日華飛鴻集方）

㊃治病欲去胎。苦實把豆兒研膏。納入牝戶三四寸。（集簡方）

參攷資料　㊀番木鼈狀似馬之連錢。故名馬錢。（李時珍）㊁番木鼈生回回國。今西土印州諸處皆有之。蔓生。夏開黃花。七八月結實。如梧樓。生青熟赤。亦如木鼈。其核小於木鼈而色白。彼人言治一百二十種病。每證各有湯引。或云以豆腐製過用之良。或云能毒狗至死。（李時珍）㊂番木鼈主治風癱。膀胱癱。膀胱口癱。或小便不利。或不能忍溺。自遺。均效。惟腦部有炎者。須去清方可服。以子作散。每服宜用三釐。每日三服。要之此藥高下不一。品質參差。故西醫多捨是而用士的年。卽番木鼈之精也。（西藥略釋）

【番石】卽滑石之古籍別名。典見別錄。詳『滑石』條。

【番豆】卽落花生之古籍別名。典見物理小識。詳『落花生』條。

【番南瓜】卽南瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『南瓜』條。

【番姜】卽蕃椒之古籍別名。典見范成台灣府志。詳『蕃椒』條。

【番紅花】命名　本品爲紅藍花之出於番地者。故名。

古籍別名　淹夫藍。撒法郎。（綱目）

外國名詞　Crocus Sativus, L.（拉丁）サフラン（日本）

基本　係鳶尾科番紅花屬。爲番紅花之花。

產地　生西番回回國諸地。

形態　番紅花爲蔓草類之多年生草本。高四五寸。地下莖與水仙之鱗莖相似。葉較水仙細長。亦叢生。有並行脈。夏秋間花自葉叢中出。花蓋六片。青綠色或白色。或淡紫色。有香氣。雄蕊三。雌蕊一。其花可供藥用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



番紅花

性質 甘。平。無毒。

主治 心憂鬱積氣鬲不散。活血。久服令人心喜。又治驚悸。

參攷資料 ㊀番紅花元時以入食饌用。(李時珍)㊁番紅花西醫視爲開胃行經之品。又可爲著色之用。(醫學大辭典)

【番苦荅】 卽番薏苡之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『番薏苡』條。

【番茄】 卽茄子之古籍別名。典見綱目。詳『茄子』條。

【番藷】 卽番薯之俗名。詳『番薯』條。

【番國米】 卽西國米之古籍別名。典見和漢藥考。詳『西國米』條。

【番荷】 卽薄荷之古籍別名。典見千金方。詳『薄荷』條。

【番麥】 卽玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳『玉蜀黍』條。

【番棗】 卽無漏子之古籍別名。典見嶺表異錄。詳『無漏子』條。

【番椒】 卽辣茄。參見『蕃椒』條。

【番蒜】 **產地** 出臺灣番地。

形態 番蒜爲蒜類之一種。其外形似木瓜。中形似柿。可供藥用。

主治 消鬱痕。解食毒水毒。

參攷資料 昔有浮山張氏宦於閩。一婢食鼈肉後。誤食莧。遂病面黃腹脹。硫破欲死者數矣。牛載後有儭番蒜者。婢偶食之。遂大瀉。有物如小鼈者數十。頃刻爽然。其疾若失。方知番蒜可治鼈莧毒也。(趙學敏)

【番蕉】 ㊀卽無漏子之樹名。典見和漢藥考。詳『無漏子』條。㊁卽鳳尾蕉之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鳳尾蕉』條。

【番薏苡】 **古籍別名** 番苦荅。心痛草。(綱目拾遺)

產地 種出荷蘭。

形態 番薏苡爲雜草類之一種。其葉秀嫩如雲板。噬乾則香。結子青紅色。可供藥用。

主治 一切心氣痛。

【番薯】 卽辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蕃椒』條。

【番瀉葉】 **原名** 旃那。

處方用名 洋瀉葉。瀉葉。

古籍別名 新拿。辛拏。辛那。辛拿。(藥物大成)

外國名詞 Cassia acutifolia Del.(拉丁)ヤンナ(日本)

基本 係豆科決明屬(Caesalpiniaceae)(亦作山扁豆屬)爲亞歷山旃那(Cassia acutifolia Delile)支內威黎旃那(Cassia anyustifolia Vahl)等樹葉之乾燥者。

產地 爲熱帶地方亞非利加之埃及。印度之替納勿里。暨中國南部。



番瀉葉

形態 旃那爲灌木狀之植物。樹幹高約二三尺。葉偶數羽狀複葉。葉小長卵形而銳尖。似小刀狀。葉體扁平而不反曲。實堅強而薄。帶黃綠色。葉柄甚短。邊緣平坦。全無毛茸。或惟於葉脈上少許有之。花書五瓣。稍不整齊。花色嫩黃。果實反莢形。狀扁平。厚而灰黯。密敷硬毛。採其葉用於下劑。最著效果。

性質 甘。苦。大寒。兼有惡臭。

成分 旃那葉之主要成分。爲加答爾精酸(Katharticsaure)。爲無晶形黑褐色之物質。此外另含有加答爾篤滿尼篤(Katharomannit 糖質)。佩利沙列精(Chrysoretein 黃色素)。旃那必佩林(Sennapikrin 苦味質)及植物鹽酸。加答爾精酸被吸收於血液中。後由諸分泌而排泄。故婦人內服本品後之乳汁。小兒飲之。亦能起同樣性之下利。而旃那中之黃色素。於十五分時已現於尿中。尿亦被染爲黃褐色。

效能 旃那葉之瀉下效力。頗爲確實。故於一時性之便祕服之。卽可以促進腸之排泄。如服小量(二分六釐)並可消化積食。增加食慾。如服適量(五分至一錢)功能緩下。欲其大瀉。則服二錢至三錢之浸劑。不問數小時。卽起效用而泄瀉也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

作用　旃那葉之作用。較諸大黃少强。內服小量（二分六釐至五分）約閒五六小時。則始呈其作用。起初放矢。以後不腹痛而起排泄。形似粥糜狀之轉便。內服大量（一錢至一錢三分）約閒三小時後。則發嘔氣嘔吐。雷鳴腹痛。利下溏薄。且損食氣。增加痔瘡及子宮之出血。甚之有致流產者。故於妊婦不宜服此。但能亢進大腸之蠕動。刺戟腸之管壁。較諸他種瀉下藥。則一時雖爲微弱。而於腸管有炎之症。則頗增劇。極易誘起腸黏膜發炎。故有此症時。最宜忌之。

主治　心腹脹滿。便祕積滯。并治膨脹水腫。屢試輒驗。多服令人肚疼反胃。宜佐香味藥同服。

辨僞　旃那葉銳尖形。質薄。黃綠色者。堪稱道地。如葉尖圓而厚。味獨苦而不甘者。則屬贋品。不入藥用。

用法　泡服或作散末服。或爲丸劑浸劑均可。

用量　小量二分半至五分。中量一錢至一錢半。大量二錢至三四錢。

參攷資料　服大量之旃那葉後。有慾起惡心嘔吐等症狀。此爲舍有樹脂樣之物質也。預以酒精浸製。除去其樹脂樣之物質。毫無逗留。使無揮發性之油脂存在。則仍不減瀉下之效。而可免惡心嘔吐之不快。（華實孚）

【番薯】原名　甘薯。

古籍別名　朱薯（綱目拾遺）紅薯。植物學大辭典）薩摩薯。琉球薯。唐薯（日本）山芋。番薯。番署。番茹（俗名）金第金薯。

外國名詞　Ipomaea batatas, Lam.（拉丁）

基本　係旋花科牽牛子屬甘薯類。

產地　產自南洋羣島。及暖地原野多有出。



番薯（一）

形態　甘薯爲菜類之多年生草本。莖細長。匍匐地上。葉卵形。或心臟形。有長葉柄互生。花作合瓣花冠。紫色。如漏斗狀。二三月及七八月間均可下種。大抵春種者塊根大。秋種者塊根小。其皮色有紫有白。有深淺紅。有濃淡黃。肉亦如之。要之紅皮者心黃而味甜。白皮者心白而味淡。其質理膩潤如脂。可供食與藥用。



番薯（二）

性質　甘。平。無毒。

主治　補虛乏。益氣力。健脾胃。强腎陰。功同薯蕷。

歷代記述攷證　【清】趙學敏本草綱目拾遺論番薯曰。補中和血。暖胃肥五臟。白皮白肉者。益肺氣。生津。中滿者不宜多食。能壅氣。煮時加生薑一片。調中與薑棗同功。紅花煮食。可理脾血。使不外洩也。

配合應用　㈠治痢疾下血。痢疾之起。多因脾胃先虛而後積滯成痢。其有脾氣虛甚。欲健中焦者。必宜甘溫之藥。其有命門不暖。欲實下焦者。必宜純熱之藥。至若濕熱所致。煩熱口燥。腹痛純紅。小水黃赤。以及下血者。用此薯蒸熟。以芍藥湯頻頻嚼服。或薯粉調冬蜜服亦愈。（傳習錄方）

㈡治酒積熱瀉。泄瀉之症不一。或水土相亂。併歸大腸而瀉。或土不制水。清濁不分而瀉。或小腸受傷。氣化無權而瀉。或真陰虧損。元陽枯涸而瀉者。此皆各從其類治之。若酒溼入脾。因而瘕泄者。用此薯煨熟食。（傳習錄方）

㈢治溼熱黃疸。黃疸之症有四。一曰陰黃。由氣血敗也。一曰表邪發黃。即傷寒症也。一曰膽黃。驚恐所致也。更有陽黃一症。或風溼外感。或酒食內傷。因溼成熱。因熱成黃者。用此薯煮食。其黃自退。

㈣治遺精淋濁。遺精與淋濁症不同。故治亦不同。然大要責在心脾腎。故凡遇此症。無論有夢無夢。有火無火。或氣淋。血淋。膏淋。勞淋。總宜調養心脾。每早晚用此粉調服。大有奇功。

㈤治血虛經亂。婦人血虛。或遇或早。經多不定。故陽虛補其陽。陰

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

虛補其陰。氣滯順其氣。其有不宜辛燥寒涼而宜於清和者。用此薯蕷煎熬頻服。調養其脾。使脾健生化。經期自定。

㊀治小兒疳疾。疳者乾也。在小兒爲五疳。在大人爲五勞。其病由於哺食乾燥之品。嗜啖肥厚之物。妄服峻利之藥。以致津液乾涸。延而成疳。此薯最能潤燥生津。安神養胃。使常服之。則舊積化而疳愈矣。

參攷資料

㊀按陳祈暘異物志云。甘藷出交廣南方民家。以二月種。十月收之。其根似芋。亦有巨魁。大者如鵝卵。小者如雞鴨卵。剝去紫皮。肌肉正白如肌。南人用當米穀。果實蒸炙。皆香美。初時甚甜。經久得風稍淡也。又按蔕含草木狀云。甘藷薯蕷之類。或云芋類也。根葉亦如芋根。大如拳。甌蒸煮食之。味同薯蕷。性不甚冷。珠厓之不業耕者。惟種此。蒸切曬收。以充糧糗。名曰糧。海中之人多壽。亦由不食五穀而食甘藷故也。（李時珍）

㊁甘薯即薯蕷之屬。見於陳祈暘異物志。蓋舍南方草木狀中土之有此物。其來舊矣。第不甚貴重。栽植者少。明季有閩人陳經綸復自呂宋移其種歸。巡撫金公學曾勸民樹藝。閩人德之。號爲金薯。然自是長樂謝肇淛、浙黃州李時珍、新城王象晉各有論述。皆不及經綸事。而其裔孫世元父子。復爲金薯傳習錄。盛侈其先世傳自呂宋之功。一似中國粟非所產者。此考證之疎也。夫以一物之微。足以備荒療疾。不費功力。其爲功於民食。實不淺尠。前任布政使李公渭。嘗舉以敎山東之民。其性又喜沙土高地。於山海之隔尤屬相宜。五雜俎百穀之外。有可以當穀者。芋也。薯蕷也。而閩中有薯蕷。似山藥而肥白過之。種沙地易生。而極蕃衍。饑饉之民。多賴全活。此物北方亦可種也。稽芳譜朱薯一名番薯。大者名玉枕薯。形圓而長。本末皆銳。皮紫肉白。質理膩潤。與芋及薯蕷自是各種。氣香生時。似桂花。熟者似薔薇露。撲地蔓生。一莖蔓延數十百莖。節節生根。一畝種數十石。勝種穀二十倍。閩廣人以當米穀。有謂性冷者。非二三月及七八月俱可種。但卵有大小耳。卵八九月始生。冬至乃止。生便可食。若未大者勿頓掘。令居土中。日漸大。到冬至須盡掘出。否則敗爛。金氏學曾曰。薯傳外番。因名番薯。形如玉瓜、藕臂。如拳如指。如卵如棗。大小不一。實同種別。皮有紫有白。有深淺紅。有濃淡黃。肉亦如之。蒸熟勻膩如脂。甘平益胃。性同薯蕷。海隅人以供饔飧。蔓延極遠。節節有根。入地即結。每畝可得數千斤。勝種五穀幾倍。徐氏元扈曰。昔人謂蔓菁有六利。而有七絕。予謂甘薯有十二勝。收入多。一也。白色味甘。諸土種中特爲夐絕。二也。益人與薯蕷同功。三也。徧地傳生。剪壅作種。今歲一壅。次年便可種數十畝。四也。枝葉附地。隨節生根。風雨不能侵損。五也。可當米。凶歲不能災。六也。可充糧實。七也。可釀酒。八也。乾久收藏。屑之旋作餅餌。勝用餳蜜。九也。生熟皆可食。十也。用地少易於灌溉。十一也。春夏下種。初冬收入。植葉極盛。草穢不容。但須壅培。不用鋤耘。不妨農。十二也。陸公薯錄有漸種藏製諸法。雖無關於藥病。而有濟於備荒。故併錄之。種薯宜高地沙地。起脊尺餘。種在脊上。遇旱可汲井澆灌。即遇潦年。若水退在七月中。氣候既不及藝五穀。即可剪藤種薯。至於蝗蝻爲害。草禾蕩盡。惟薯根在地。薰食不及。縱令壅葉皆盡。尚能發生。若蝗信到時。急令人發土徧壅。蝗去之後。滋生更易。是天災物害。皆不能爲之損。人家凡有隙地。但只數尺。仰見天日。便可種得石許。此救荒第一義也。歲前深耕。以大糞壅之。春分後下種。若地非沙土。先用柴灰或牛馬糞和土中。便土脈散緩。與沙土同可行根。重耕起要極深。將薯根每段截三四寸長。覆土深半寸許。每株相去縱七八尺。橫二三尺。俟蔓生既盛。苗長一丈。留二尺。作老根。餘剪三葉爲一段。插入土中。每栽苗相去一尺。大約二分入土。一分在外。即又生薯。隨長隨剪。隨種隨生。蔓延與原種者不異。凡栽薯須順栽。若倒栽則不生。節在土上則生枝。在土下則生卵。約各節生根。即從其連綴處斷之。令各成根苗。每節可得卵三五枚。凡藤蔓已遍地。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不能容者。卽爲游藤。宜剪去之。及掘根時。捲去藤蔓。俱可飼牛羊豕。或曬乾。冬月餵皆能令肥脂。二三月種者。每株用地方二步有半。而卵徧焉。每畝約用薯三十六株。四五月種者。地方二步而卵徧焉。每畝約六十株。六月種者。地方一步有半。而卵徧焉。約一百六株有奇。七月種者。地方三尺以內。得卵細小矣。畝約九百六十株。種種疎密。略以此準之。九月畦種生卵如箸如棗。擬作種。此松江法也。金氏曰。薯苗入地卽活。東西南北無地不宜。得沙土高地結尤多。天時旱澇俱能有秋。養苗地宜鬆。耕過須起町高四五寸。春分後取薯種科置町內。發土薄蓋。縱橫相去尺許。半月卽發芽。日漸蔓長一丈或五六尺。割七八寸爲一莖。勿割盡。留半寸許。當割處復發。生生不息。若養蔓作苗。須用稍長尺許。密密栽壅。如養葱蒜法。栽莖使牛耕町。寬二丈許。高五六寸。將莖斜插町心。約以七分在町內。三分在町外。町內者結實。町外者滋蔓。每莖相去一尺餘。十餘日町兩旁使牛耕開。令曬。又七八日。以糞壅之。仍使牛培上。每町可得薯三四觔。若雨多。須將蔓掇町上。毋令浮根匝地。然實結地內。蟲不能災。葉如食盡。亦能復發。早栽宜稀。晚栽宜密。三四月栽者實粗大。七八月栽者實細小。秋末實始加大。冬至前當掘盡。不掘盡亦不能大。熟時須先割蔓置町下。俟乾捲起。冬月剉餵牲畜。若北地早寒。則遲一個月栽。早一個月掘。宜遲宜早。亦看天氣冷暖耳。甘薯疏云。江南田汙下者不宜薯。若高仰之地。平時種藍種豆者。易以種薯。有數倍之穫。大江以北。土更高。地更廣。卽其利百倍不啻矣。倘慮天旱。則此種畝收十石數口之家。止種一畝。縱旱甚而汲井灌溉。一至成熟。終歲足食。又何不可取種之法。羣芳譜云。九月十月間掘薯卽近根先生者。勿令損傷。用輭草包裹。掛通風處陰乾。一法於八月中揀近根老藤。剪七八寸長。每七八根作一小束。耕地作畦。將藤束栽如栽韭法。過月餘。每條下生小卵如蒜頭狀。冬月畏寒。稍用草蓋覆。至來春分種。一法霜降前取近根卵稍堅實者。陰乾。以輭草作襯。另以輭草裹之。置無風和暖不近霜雪不受冰凍處。一法霜降前收取根藤。曬令乾。於竈下掘窖。約深一尺五六寸。先用稻糠三四寸。次置種其上。更加稻糠三四寸。以土蓋之。一法七八月取老藤種入木桶或磁瓦器中。至霜降前置草篤中。以稻糠襯置向陽近火處。至春分後。依前法種。金氏曰。存薯之法不一。在人變通。或存木斛草囤。磁甕竹籠中俱可。但性畏寒又畏熱。置避風和暖處。用草浮蓋俾通氣。若封固則發熱壞爛。敏前在東顯玉環。見其島民少穀食。多以茹爲糧。彼土有地產多種茹。土人云。其利十倍於穀。以茹糧多者爲富。其收茹之法。多曝乾切條。以竹席圍如囤。儲之久亦不蛀。用則以水煮代飯。云食之多力鮮病。蓋其味甘。能補脾土故也。金氏曰。薯初結卽可食。味淡多汁。及時則甜。煨食。煮食。燉食。蒸食。亦可生食。切片曝乾。磑作饃。粥。靡作粉。餌。漤水灼。可作丸。拌麵。可作酒。舂細水濾去渣。澄曬成粉。其葉可作蔬。范成臺。灣府志。長而色白者是舊種。圓而黃赤者出自文來。國金姓者攜回。故名金薯。諸羅縣志。他物下種。必用子用仁。或原物根芽。獨薯不然。取一條片片切之。只留皮一面種之。發根。（綱目拾遺）㊂甘鄧俗傳能發諸病。患痔漏者。愈後食之復發。以性能下行而滯氣故也。（趙學敏）

【番薑蔔子】卽胡盧巴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡盧巴』條。

【畫石】卽滑石之古籍別名。典見本草衍義。詳『滑石』條。

【畫眉石】卽黑石脂之古籍別名。典見綱目。詳『黑石脂』條。

【畫粉】卽白堊之古籍別名。典見綱目。詳『白堊』條。

【異草】產地　生籬木間。

形態　異草爲雜草類之一種。附木而生。葉如葵。莖旁有角。折斷有白汁。可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　痿痺。寒熱。去黑痣。

【異翹】卽連翹之古籍別名。典見爾雅。詳『連翹』條。

【酪公乳】卽鐘乳石之古籍別名。

394／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見別錄。詳『鐘乳石』條。

【留行子】卽王不留行之處方用名。詳『王不留行』條。

【留求子】卽使君子之古籍別名。典見綱目。詳『使君子』條。

【留軍待】產地　生山谷中。

形態　留軍待爲雜木類之一種。其葉似楠而細長。可供藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　肢節風痛。折傷瘀血。攣痛。

【留師】卽竹蜂之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『竹蜂』條。

【留師蜜】卽竹蜂蜜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『竹蜂』條。

【留黃】卽石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【疏趾】卽雉之古籍別名。典見綱目。詳『雉』條。

【痛痛草】卽蕺菜之日本別名。詳『蕺菜』條。

【登相子】卽東廧之古籍別名。典見保德州志。詳『東廧』條。

【登粟】卽登相子之別名。詳『東廧』條。

【登蔥子】卽萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊菔子』條。

【發狂草】卽莨菪子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『莨菪子』條。

【發里安】卽甘松之西名。詳『甘松』條。

【皴皮】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【盛椹】卽旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋覆花』條。

【盜庚】卽旋覆之古籍別名。典見爾雅。詳『旋覆花』條。

【短狐】卽溪鬼蟲之古籍別名。典見廣雅。詳『溪鬼蟲』條。

【短靑】卽羅漢松之短者。典見綱目拾遺。詳『羅漢松』條。



短脚三郎

【短脚三郎】產地　生南安。高五六寸。橫根絡色。叢發。赭莖。葉生梢頭。秋結圓實。下垂。生靑熟紅。與小靑相類。可供藥用。

性質　熱。

主治　跌打損傷。風痛。

【硝石】卽消石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『消石』條。

【硝石朴】卽朴硝之原名。詳『朴硝』條。

【硝黃半夏麴】原名　硝黃麴

採取　以陳久者良。

製法　用半夏入芒硝三分之一。煮透。與大黃膏和成。草盒七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

主治　中風卒厥。傷寒熱狂。由於痰濁者。

【硝黃麴】卽硝黃半夏麴之原名。詳『硝黃半夏麴』條。

【硝硼】卽硼砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硼砂』條。

【硾整】卽車整之別名。詳『車整』條。

【碑碟】卽車渠之別名。詳『車渠』條。

【硫黃】卽石硫黃之古籍別名。典見吳普本草。詳『石硫黃』條。

【硫黃油】卽石腦油之古籍別名。典見綱目。詳『石腦油』條。

【硫黃盆】卽石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【硫黃香】命名　本品形如硫黃而氣香。故名。

性質　辛。溫。無毒。

主治　去惡氣。殺蟲。

【硫黃香】卽石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【硫礦】卽石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【稂】卽狼尾草之古籍別名。典見爾雅。詳『狼尾草』條。

【程】卽豹之古籍別名。典見列子。詳『豹』條。

【稌】卽糯米之古籍別名。典見綱目。詳『糯米』條。

【稍瓜】卽越瓜之古籍別名。典見食物本草。詳『越瓜』條。

【硬石膏】卽長石之古籍別名。典見綱目。詳『長石』條。

【硬飯】卽土茯苓之古籍別名。典見綱目。詳『土茯苓』條。

【硬糍】卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【稬米】卽糯米之古籍別名。典見綱目。詳『糯米』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【童便】原名　人尿。

命名　本品係取十二歲以下之男童小便故名。

古籍別名　溲小便（素問）輪迴酒還元湯（綱目）還魂酒（和漢藥考）

基本　係取十二歲以下無病童男不茹葷辛者之小便。

形態　清澈如水者入藥用。

採取　取時去其頭尾以中間一段清澈者佳。

用法　取得乘熱飲。冬則隔湯燉溫服或和湯藥下。

性質　鹹寒無毒。

效能　滋陰降火用爲止血消瘀藥。

主治　寒熱頭痛。溫氣。童男者尤良。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論人尿曰主久嗽上氣。失聲及癥積滿腹。【唐】陳藏器本草拾遺論人尿曰明目益聲潤肌膚利大腸推陳致新。去咳嗽肺癆鬼氣痙病。停久者服之佳。恐冷則和熱湯服。【宋】大明日華諸家本草論人尿曰止勞渴潤心肺療血悶熱狂。撲損瘀血在內。暈絕。止吐血鼻衄。皮膚皺裂。難產。胎衣不下。蛇犬咬。【元】朱丹溪本草衍義補遺論人尿曰滋陰降火甚速。【明】李時珍本草綱目論人尿曰殺蟲解毒。療癌中喝。【明】繆希雍本草經疏論人尿曰人溺乃津液之濁者。滲入膀胱而出。其味鹹氣寒無毒。爲除勞熱骨蒸咳嗽吐血及婦人產後血暈悶絕之聖藥。晉褚澄勞極論云。降火甚速。降血甚神。飲溲溺百不一死。服涼藥百不一生。言其功力之優勝也。經云。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。故人服小便入胃。亦隨脾之氣上歸於肺。下通水道。而入膀胱。乃循其舊路也。故能治肺病。引火下行。凡人精氣。清者爲氣。濁者爲血。濁之清者爲津。液清之濁者爲小便。與血同類也。故其味鹹而走血。鹹寒能伏虛熱。使火不上炎。而血不妄溢。是以能療諸血證也。蘇恭主久嗽上氣失聲。及日華子止勞渴潤心肺。療血悶熱狂。撲損瘀血在內。暈絕。止吐血鼻衄。皮膚皺裂。難產。胞衣不下。諸證。悉由此故。本經主寒熱頭疼溫氣者。鹹寒能除邪熱故耳。法當熱飲。熱則於中尙有眞氣存在。其行自速。冷則惟存鹹味寒性矣。【明】李士材本草圖解論人尿曰小便鹹寒。滋陰降火。止血和經。去瘀養新。定嗽消痰。童便尤良。【清】黃宮繡本草求眞論人尿曰童便係孩童津液濁氣。滲入膀胱而出。味鹹氣寒無毒。爲除勞熱骨蒸。咳嗽吐血。婦人產後血衄暈悶絕之聖藥。褚澄遺書云。降火甚速。降血甚神。飲溲溺百不一死。非眞不死。甚言功力之優也。經云。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。故人服小便入胃。亦隨脾之氣上歸於肺。下通水道。而入膀胱。乃尋其舊路也。故能治肺病。引火下行。凡人精氣。清者爲氣。濁者爲血。濁之清者爲津。液清之濁者爲小便。與血同類也。故味鹹而走血。鹹寒能伏虛熱。使火不上炎。而血不妄溢。是以能療諸血證也。凡人久嗽失音。勞渴煩躁。吐衄。損傷皮膚皺裂。人咬火燒。絞腸痧痛。難產。胞衣不下。法當乘熱飲之。蓋熱則尙存眞氣。其行自速。冷則惟有鹹味寒性矣。若救陰却瘍。必以童便爲優。蓋取混元之氣。清純而不清雜耳。今人類用秋石。雖亦能入腎除熱。但經水澄火煉。眞元之氣。全失其功。不及童便多矣。況多服久服。則鹹能走血。令血凝氣滯。爲病。矧有陽氣。素虛。食少腸滑者。其可用之。爲治乎。取童子十歲以下。相火未動。不食葷腥酸鹹者佳。去頭尾。取中間一節。清澈如水者用。痰用薑汁。冬月用湯溫之。

近人學說　閻立陞曰。童便味鹹。氣寒。無毒。純陽之物也。爲降相火之要藥。消瘀血之神品。本草治勞渴。潤心肺。療陰虛火動。熱蒸如燎。久嗽失聲。及治虛中渴洗。暴發赤眼。潤口舌生瘡。是降火之用也。療血悶。熱狂撲損。瘀血在內。暈絕止吐血。鼻血。難產。胞衣不下。血凝頭痛。蛇犬咬。是散血之用也。故婦人臨產之時。血上搶心。惡心煩悶者。已產之後。去血過多。陰無所附者。產內血閉。惡露不行者。或呵欠頓悶。或嘔逆不止。或自汗多來。皆

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

陰虛之症。必以此至陽之物助之。使衝逆於上者。得鹹寒之味而順下。妄行於下者。亦得純陽之氣以相依。其在男子陰虛不足者。與之便以滋陰。陽虛不足者。與之便以壯陽。卽嘔吐咯衄之症。亦用便以止之。血虛勞熱之症。亦用便以和之。是皆卽降火散血之理。而神明其用者也。而究其能散之故。其何道以致此哉。夫飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。膀胱乃便之舊路也。故能治肺病。引火下行。此其病降火之道也。凡人精氣。淸者爲氣。濁者爲血。濁之淸者爲津液。淸之濁者爲小便。小便與血同類也。故其味鹹而走血。治諸血病。此其爲散血之道也。昔禇澄書論咳血症云。惟飲溲溺百不一死。若服寒涼百不一生。見道之言。眞百試而百驗者歟。人中白卽便之下凝乾久者。故降火消血之用。大略相同。本草以治傳屍勞熱。止肺癰。吐血。瀉肝火。三焦火。井膀胱火。從小便而出。其義亦不甚遠也。特其飮經火煅。則稍除寒氣。而乾久則效亦稍緩。故熱則用便。緩則用白。秋石卽便之依法以秋露斬其滓穢。經陰陽二煉而成者也。得日精火焰之氣。已變寒而爲溫。況其物本出心腎水火二臟而流於小腸。而又假天地之水火。凝而爲體。又名還元丹。能滋腎水。反本還元。養丹田。歸根復命。安五臟。潤三焦。消痰咳。退骨蒸。鞕堅塊。明目淸心。延年益壽。其法空心服。陽煉日午服。陰煉。久服去百病。强骨髓。補神血。開心益智。補煖下元。悅色進食。則臍下嘗如火暖。諸般冷疾。久年冷勞。虛憊者皆愈。所以人部中稱人乳汁、紫河車。併斯三者均爲接命之至寶。良不誣也。而瓊碎錄乃云秋石味鹹走血。使水不勝火。久服令人成渴疾者。必是淫慾之人。藉此放肆。甚或加以陽藥。助其邪火所主耳。若謂秋石本有此害。豈知秋石哉。

配合應用 ㊀治陰虛咳嗽聲啞。喉間血腥氣。用童便、枇杷葉、天門冬、麥門冬、蘇子、桑白皮、沙參五味子、生地黃、款冬花、百部。

㊁治內傷吐血。或瘀血停留作痛。用童便、蘇木、番降香、續斷、牛膝、牡丹皮、蒲黃。

㊂治產後血暈。童便、澤蘭、荊芥、白芷、續斷、延胡索、牛膝、蘇木、黑豆。虛者加人參。凡產後溫飮一盃。可免血暈。至三日後止之。

㊃治中喝昏倒。以熱小便灌之。卽活。

㊄治頭痛至極。童便二盞。豉心半合。同煎至五分。溫服。（聖濟總錄方）

㊅治熱病咽痛。童便三合。含之。卽止。（聖惠方）

㊆治骨蒸發熱。三歲童便五升。煎取一升。以蜜三匙和之。每服二碗半。日更服。此後常取自己小便服之。輕者二十日。重者五十日。瘥。二十日後。當有蟲如蚰蜒在身。常出十步內。聞病人小便臭者。瘥也。（孟詵必效方）

㊇治男婦怯證。男用童女便。女用童男便。斬頭去尾。日進二次。乾燒餅壓之。月餘全愈矣。（聖惠方）

㊈治久嗽涕唾。肺痿。時時寒熱。頰赤氣急。用童便去頭尾少許。五合。取大粉甘草一寸。四破浸之。露一夜。去甘草。平旦頓服。或入甘草末一錢同服亦可。一日一劑。童子忌食五辛熱物。（姚僧垣集驗方）

㊉治肺痿咳嗽。鬼氣疰病。停久臭溺。日日溫服之。（集驗方）

㊊治吐血鼻洪。人溺盞汁和勻服一升。（日華本草方）

㊋治齒縫衄血。童便溫熱。含之立止。（聖惠方）

㊌治消渴重者。衆人溺坑中水。取一盞服之。勿令病人知。三度瘥。（聖惠方）

㊍治癥積滿腹。諸藥不瘥者。人溺一服一升。下血片塊。二十日卽出也。（蘇恭本草方）

㊎治絞腸痧痛。童子小便。服之卽止。（聖惠方）

㊏治卒然腹痛。令人騎其腹。溺臍中。（肘後方）

㊐治下痢休息。杏仁去皮麵炒研。以猪肝一具。切片。水洗血淨。置淨鍋中。一重肝。一重杏仁鋪盡。以童便二升同煎。乾。放冷。任意食之。（聖惠方）

㊑治癮疹渴甚。童便和蜜煎沸頓服。（簡便方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治瘴癘諸瘧。無論新久。童便一升。入白蜜三匙。攪去白沫。頓服。取吐碧綠痰出爲妙。若不然。終不除也。（聖惠方）

㊁治中喝昏悶。夏月人在途中熱死。急移陰處。就掬道上熱土。擁臍上作窩。令人溺滿。暖氣透臍。即醒。乃服地漿蒜水等藥。（仲景方）

㊂治中惡不醒。令人尿其面上即甦。此扁鵲法也。（肘後方）

㊃治三十年癲。一切氣塊。宿冷惡病。苦參二斤。童子小便一斗二升。煎取六升。和糯米及麴。如常法作酒。服。但腹中諸疾。皆治。酒放二三年不壞。多作救人神效。（聖惠方）

㊄治金瘡中風。自己小便。日洗二三次。不妨入水。（聖惠方）

㊅治金瘡血出不止。飲人尿五升。（千金方）

㊆治打傷瘀血攻心者。人尿煎服一升。日一服。（蘇恭本草方）

㊇治折傷跌撲。童便入少酒飲之。推陳致新。其功甚大。薛已云。余在居庸。見覆車被傷七人。仆地呻吟。俱令灌此。皆得無事。凡一切傷損。不問壯弱。及有無瘀血。俱宜服此。若脇膜或作痛。或發熱煩躁口渴。惟服此一甌。勝似他藥。他藥雖效。恐無瘀血。反致誤人。童便不動臟腑。不傷氣血。萬無一失。軍中多用此。屢試有驗。（外科發揮方）

㊈治杖瘡腫毒。服童便良。（千金方）

㊉治火燒悶絕。不省人事者。新尿頓服二三升良。（千金方）

㊊治刺在肉中。用溫小便漬之。（千金方）

㊋治人咬手指。瘡盛。熱尿浸一夜即愈。（通變要法方）

㊌治蛇犬咬傷。以熱尿淋患處。（日華子）治蝮蛇傷人。令婦人尿於瘡上。最妙法。（千金方）

㊍治蛇纏人足。就令尿之便解。（肘後方）

㊎治蜂蠆螫毒。人尿洗之。（肘後方）

㊏治蜘蛛咬毒。久臭人溺。於大甕中坐浸。仍取烏雞屎炒浸酒服之。不爾。恐毒殺人。（陳藏器本草方）

㊐治百蟲入耳。小便少少滴入。（聖惠方）

㊑治勞瘵已久。童子小便。乘熱少少頻滴之。（聖惠方）

㊒治赤目腫痛。自己小便。乘熱抹洗。即閉目少頃。此以眞氣退去邪熱也。（普濟方）

㊓治腋下狐臭。用自己小便乘熱洗兩腋下。日洗數次。久則自愈。（集簡方）

㊔治傷胎血結。心腹痛。取童子小便。日服二升良。（楊氏產乳方）

㊕治子死腹中。以夫尿二升。煮沸飲之。（千金方）

㊖治中土菌毒。合口椒毒。人尿飲之。（肘後方）

㊗解諸菜毒。小兒尿和乳汁服二升。（海上方）

㊘治催生下胞。用人溺一升。入葱薑各一分。煎二三沸。熱飲便下。（日華本草方）

㊙治痔瘡腫毒。用熱童尿入礬三分。洗之。一日二三次效。（救急方）

用量　一盞或一杯。

施用宜忌　凡脾腎虛寒而無火者禁用。

著名方劑　白通加人尿豬膽汁湯。治傷寒少陰下痢。服白通湯後。利不止。汗出而厥逆。無脈。乾嘔而煩者。此方主之。服後脈暴出者死。微續者生。（傷寒論）葱白四莖。乾姜一兩。附子一枚。（生用去皮破八片）上三味。以水三升。煮取一升。去滓。納入人尿五合。猪膽汁一合。分溫再服。

【童桑葉】即嫩桑葉之處方用名。詳『桑葉』條。

【童腸】即紫參之古籍別名。典見別錄。詳『紫參』條。

【筆竹茹】**主治**　勞熱。

【筆管菜】㊀即黃精之俗名。詳『黃精』條。㊁即魚腥草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『魚腥草』條。

【筋子】**古籍別名**　根子。（陳藏器）

產地　生山野間。

形態　筋子爲雜草類之一種。莖高尺餘。葉圓厚光潤。凌冬不凋。其根大如指。可供藥用。

性質　苦。溫。無毒。

主治　心腹痛。不問冷熱遠近。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

惡鬼氣注刺痛。霍亂蠱毒。暴下血。酒癉服。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論筋子根曰。主心中結塊久積氣。攻臍下痛。

【筋根】卽旋花之古籍別名。典見本經。詳『旋花』條。

【筋骨草】卽夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夏枯草』條。

【筋退】卽人爪甲之古籍別名。典見綱目。詳『人爪甲』條。

【筒桂】卽箇桂之古籍別名。典見唐本草。詳『肉桂』條。

【筐柳】卽水楊之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水楊』條。

【答刺不花】卽土撥鼠之古籍別名。典見飲膳正要。詳『土撥鼠』條。

【答遜果】卽倒吊果之古籍別名。典見張揖廣雅。詳『倒吊果』條。

【粟奴】**命名**　本品卽粟穗成熟時所生之黑黴。故名。

主治　利小腸。除煩懣。

【粟米】**原名**　粱。

命名　粟者。續也。謂續於穀。故名。

古籍別名　中熟者名八月黃。小米。寒露粟。（綱目）趕麥黃。秫粟。（別錄）



粟米

基本　係禾本科粟屬。爲粟之子實。

形態　粟爲穀類之一年生草本。高四五尺。葉長爲玉蜀黍之葉相類而較狹。花小而密集。作圓錐花序。果實爲穎果。小粒狀。帶有黃色。

採取　孟秋及初冬採之。

製法　採得曝乾。杵去殼用。

用法　水煮或磨粉和藥。

性質　鹹。微寒。無毒。

效能　清熱。解毒。補脾腎。和腸胃。用作滋養藥。

主治　養腎氣。去脾胃中熱。益氣。陳者苦寒。治胃熱消渴。利小便。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論粟米曰。止痢。壓丹石熱。

【唐】陳藏器本草拾遺論粟米曰。水煮服。治熱腹痛。及鼻衄。爲粉和水濾汁。解諸毒。治霍亂及轉筋入腹。又治卒得鬼打。【唐】陳士良食性本草論粟米曰。解小麥毒發熱。

【明】李時珍本草綱目論粟米曰。治反胃熱痢。煮粥食。益丹田。補虛損。開腸胃。【清】王士雄隨息居飲食譜論粟米曰。粟米功用與秫稻二米略同。而性較涼。病人食之爲宜。稬者亦名秫。汪謝城曰。粱之黏者固可稱秫。而實非治不寐之秫。

近人學說　丁福保曰。粟於穀類中養分最富。爲人生所必需。其成分含有蛋白質。澱粉。糖分。脂肪等。就中植物纖維。鹽分尤多。其他含幾分之水。其味微鹹而爲無毒性之食品。

配合應用　㈠治胃熱消渴。以陳粟米炊飯乾食之良。（醫方心鑑方）

㈡治反胃吐食。脾胃氣弱。食不消化。湯飲不下。用粟半升。杵粉。水丸梧子大。七枚。煮熟。入少鹽。空心和汁吞下。或云納醋中吞之。得下便已。（醫方心鑑方）

㈢治鼻衄不止。粟米粉水煮服之。（普濟方）

㈣治嬰孩初生七日。助穀神以導達腸胃。研粟米煮粥如餡。每日哺少許。（姚和衆方）

㈤治孩子赤丹。嚼粟米以傅之。（兵部手集方）

㈥治小兒重舌。嚼粟米以哺之。（子母祕錄方）

㈦治雜物眯目不出。用生粟米七粒。嚼爛。取汁洗之。卽出。（聖濟總錄方）

㈧治湯火灼傷。粟米炒焦。投水澄取汁。煎稠如糖。頻傅之。能止痛滅瘢痕。一方半生半炒。研末酒調傅之。（崔行功纂要方）

㈨治熊虎爪傷。嚼粟米以塗之。（葛氏方）

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡胃寒者禁用。

參攷資料　㈠陳粟及三五年。尤解煩悶。服食家亦將食之。（陶弘景）㈡粟米利小便。故能益脾胃。（寇宗奭）㈢粟之味鹹。淡。氣寒。下滲腎之穀也。腎病宜食之。虛熱消濁洩痢。皆腎病也。滲利小便。所以洩腎邪也。降胃火而脾胃之病宜食之。（李時珍）㈣生者難化。熟

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者滯氣。隔食生蟲。（寇宗奭）㊄與杏仁同食。令人吐瀉。雁食粟。足重不能飛。（吳瑞）㊅粟古文作稟。象穗在禾上之形。而春秋題辭云。粟乃金所立。米爲陽之精。故西字合米爲粟。此繫說也。許愼云。粟之爲言續也。續於穀也。古者以粟爲黍稷粱秫之總稱。而今之粟在古但呼爲粱。後人乃專以粱之細者名粟。故唐孟詵本草言人不識粟。而近世皆不識粱也。大抵黏者爲秫。不黏者爲粟。故呼此爲秔粟。以別秫而配秈。北人謂之小米也。（李時珍）㊆粟。即粱也。穗大而毛長。粒粗者爲粱。穗小而毛短。粒細者爲粟。苗俱似茅。種類凡數十。有青赤黃白黑諸色。或因姓氏地名。或因形似時令。隨義賦名。故早則有趕麥黃、百日糧之類。中則有八月黃、老軍頭之類。晚則有雁頭青、寒露粟之類。按賈思勰齊民要術云。粟之成熟有早晚。苗稈有高低。收實有息耗。質性有强弱。米味有美惡。山澤有異宜。順天時。量地利。則用力少而成功多。任性返道。勞而無穫。大抵早粟皮薄米實。晚粟皮厚米小。（李時珍）

【粟米粥】**性質**　甘。溫。平。無毒。

主治　利小便。止煩渴。養腸胃。

【粟泔汁】**基本**　本品卽淘洗粟米之泔水。

主治　霍亂卒熱。心煩渴。飲數升立瘥。臭泔止消渴尤良。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論粟泔汁曰。醱泔及澱洗皮膚瘙疥。殺蟲。飲之主五痔。和臭椿皮煎服。治小兒瘕痢。

【粟芽】**古籍別名**　粟蘗。（綱目）

性質　苦。溫。無毒。

主治　寒中下氣。除熱。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論粟芽曰。爲末和脂傅面。令皮膚悅澤。【宋】日華諸家本草論粟芽曰。除煩。消宿食。開胃。

參攷資料　㊀粟黍穀麥豆諸蘗。皆以水浸脹。候生芽曝乾用。其功皆主消導。（李時珍）㊁粟芽穀神散中用之。性溫於麥蘗。（寇宗奭）

【粟殼】卽罌粟殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『罌粟殼』條。

【粟糠】**基本**　本品卽粟米之糠皮。

主治　痔漏脫肛。和諸藥薰之。

【粟蘗】卽粟芽之古籍別名。典見綱目。詳『粟芽』條。

【粟】卽稷米之古籍別名。典見綱目。詳『稷米』條。

【結瓜子】卽冬瓜子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬瓜子』條。

【結紅花】卽紅花之處方用名。詳『紅花』條。

【結殺】**產地**　出西域諸地。

基本　結殺爲香木類之一種。花極馨香。熬之成膏。可供藥用。

主治　去頭風白屑。同胡桃仁和香油塗之。

【結留子】卽枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【絡石】**命名**　本品耐冬而包絡石木而生。故名。

處方用名　絡石藤。

古籍別名　石鯪。鯪石。雲花。雲英。雲母丹。（吳普）石龍藤。明石。礜。懸石。（別錄）石血。耐冬。（蘇恭）略石。領石。雲珠。（和漢藥考）鬼繫腰。（外科精要）

外國名稱　Trachelospermum jasminoides, Lemaire.

基本　係屬夾竹桃科。爲絡石之莖葉。

產地　絡石生山谷間之巖石上。或陰濕處之樹木上。

形態　絡石爲山野自生之常綠蔓草。莖作木質狀。葉對生。作長橢圓形。質强韌。有光澤。入冬變紅紫色。花爲乳白色。合瓣花冠。上綠五裂。各片作回旋狀。以聚繖花序排列。實爲細長莢果。長五六寸。



絡石

種類　㊀絡石與薜荔極相似。但薜荔附木而生。且其狀亦大於絡石。㊁絡石蔓於石上者葉細厚而圓短。繞於樹上者葉大而薄。但

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

在石上者良。㊂石血葉尖。一頭赤色。絡石葉圓正青。有謂石血。卽絡石之小者云。㊃絡石帖石而生。其莖折之有白汁。其葉小於指頭。厚實木强。面青背淡。濇而不光。然有尖葉圓葉兩種。惟功用相同耳。

採取　每年六七月間。採其莖葉日乾。

製法　雷敩曰。凡採得用粗布揩去毛子。以熟甘草水浸一伏時。切曬用。

性質　苦。溫。無毒。

效能　通經絡。利關節。治痺痛。療癰毒。用作强壯藥。

主治　風熱死肌。癰傷口乾。舌焦。癰腫不消。喉舌腫閉。水漿不下等。（本經）大驚入腹。除邪氣。養腎主腰髖痛。堅筋。利關節。久服輕身明目。潤澤好顏色。不老延年。通神。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論絡石曰。主一切風。變白宜老。【唐】蘇恭新修本草論絡石曰。蝮蛇瘡毒。心悶服汁。并洗之。刀斧傷瘡。傅之立瘥。【明】繆希雍本草經疏論絡石曰。絡石稟少陽之令。兼得地之陰氣。其味苦。其氣溫。微寒而無毒。入足陽明手足少陰。足厥陰少陽經。故主風熱死肌。癰傷口乾舌焦。癰腫不消。喉舌腫。水漿不下。皆苦溫通氣血。血屬陰。陰寒入血而除熱之效也。又能除邪氣。養腎主腰髖痛。堅筋骨。利關節。療蛇毒。心悶。刀斧傷。搗封立差。皆涼血除熱之功也。本經久服輕身明目。潤澤好顏色。不老延年。陳藏器以爲能變白。亦指益陰涼血而言也。生石上者良。

近人學說　張山雷曰。絡石氣味。本經謂之苦溫。蓋以隆冬不凋。而功能通經絡活血言之。故以爲溫。然本經主治。純是熱症。則非溫熱可知。故別錄改作微寒。而御覽引李當之說。且以爲大寒也。此物莖生而甚堅韌。節節生根。故善走經脈。通達肢節。本經主風熱死肌。別錄養腎主腰髖痛。堅筋。利關節。皆卽此義。其治癰腫喉舌腫口乾舌焦。皆苦寒泄降之功用也。別錄謂其除邪氣。則以邪熱而言。凡本經別錄邪氣二字。所賅最廣。其實各有所主。並非泛辭。讀者當以意逆之。自能悟到。不可混作一例看。惟大驚入腹四字。則不甚可解。當付闕疑。又曰。蘇恭謂療產後血結大良。蓋以瘀露不通而言。苦泄破瘀。且善通絡。是以主之。又謂主蝮蛇瘡毒。心悶。則清熱泄降。固解毒之良藥。又謂刀斧傷瘡。傅之立瘥。則又外治活血之神丹矣。藏器謂主一切風。卽本經治風熱死肌。別錄利關節之義。今用以舒節活絡。宜通痺痛甚驗。

配合應用　㊀治小便白濁。緣心腎不濟。或由酒色。遂至已甚。謂之上淫。蓋有虛熱而腎不足。故土邪干水。史載之言。夏則土燥水濁。冬則土堅水清。卽此理也。醫者往往峻補。其疾反甚。惟服博金散。則水火旣濟。源潔而流清矣。用絡石、人參、茯苓各二兩。龍骨煅一兩爲末。每服二錢。空心米飲下。日二服。（仁存堂方）

㊁治發背癰疽。用絡石搗汁。入諸解毒藥。神效。

㊂治喉痺喘息不通。須臾欲絕。以絡石一兩。水一升。煎取一大盞。去滓。細細喫。須臾卽通。（外臺祕要方）

㊃治癰疽瘍痛。止痛癒膿。散用鬼臼、膿、竹癰、陰澀、石岸間。絡石而生者好。絡木者無用。其藤柔細。兩葉相對。形生三角。用莖葉一兩。洗曬。勿見火。卓菱剌一兩。新瓦炒黃。甘草節半兩。大栝樓一箇。取仁炒香。乳香沒藥各三錢。每服二錢。水一盞。酒半盞。慢火煎至一盞。溫服。（外科精要方）

用量　一錢至四錢。

施用宜忌　陽虛畏寒。及脾虛易泄者。禁用。惡鐵落、貝母、萇蒲、殺殷藥毒。杜仲、丹皮爲之使。

著名方劑　博金散。治心腎不濟。或酒色過度。腎不足而有虛熱。小便不清。遺精白濁等症。（仁存堂方）絡石、人參、茯苓各二兩。煅龍骨一兩。共研末。每服二錢。空心米飲下。日二服。

參攷資料　㊀絡石在木者。隨木性。功與薜荔相似。更有石血、地錦等。十餘種。藤並是其類。大略皆主風血。暖膝。膝變白不老。（陳藏器）㊁絡石生木石間。凌冬不凋。葉似細橘葉。莖節着地。卽生根鬚。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

包絡石旁。花白子黑。（韓保昇）㊂絡石性質耐冬。氣味平和。神農列之上品。李當之稱爲藥中之君。其功主筋骨關節風熱。癰腫。變白耐老。卽醫家少知用者。豈以其近賤而忽之耶。服之當浸酒耳。（李時珍）㊃所在有之。生木石間。凌冬不凋。葉似細橘葉。莖節著處卽生根鬚。包絡石旁。花白子黑。六七月採莖葉日乾。（韓保昇）㊄絡石貼石而生。其蔓折之有白汁。其葉小於指頭。厚實木强。面青背淡。濇而不光。有尖葉圓葉兩種。功用相同。蓋不一物也。（李時珍）

【絡石簏】卽絡石之處方用名。詳『絡石』條。

【給客橙】卽金橘之古籍別名。典見花木志。詳『金橘』條。

【給敦羅】卽羊刺蜜之古籍別名。典見綱目。詳『羊刺蜜』條。

【統草】卽甘草之細者之別名。詳『甘草』條。

【統青蒿】卽青蒿之處方用名。詳『青蒿』條。

【絲瓜】命名　本品老則筋絲羅織。象人經絡。故名。

處方用名　絲瓜絡。

古籍別名　魚鰻（綱目）天絲瓜。蠻瓜（本事）天羅布瓜（事類合璧）天羅勒。洗鍋羅瓜（和漢藥考）烏牛子（綱目拾遺）。

基本　屬胡蘆科蔬果類。爲絲瓜之筋膜。其藤根葉詳見各條。



絲瓜

產地　陳仁山藥物生產辨云。絲瓜絡產廣東各屬有出。各省均有出。但江浙來者。去淨外衣。作洗身用。此種俱水瓜絡。公司有沽。

形態　絲瓜爲園圃栽種之一年生蔓草。莖有細長之刺毛。自葉間生出卷鬚。分歧而纏繞他物。攀登而上。可及丈餘。葉爲心臟形。有五裂至七裂。厥狀如掌。周圍有鋸齒。葉間有刺毛。夏日開五瓣黃花。其狀如鐘。皆單性。雌雄同株而生。果實爲細長之瓜。長可二尺餘。迨成熟已久。遂生强靱如網之纖維。嫩時多取供食用。熟而生出之纖維。謂之絲瓜絡。可以代海綿。入藥。取老絲瓜燒焦。謂之絲瓜霜。

採取　九十月經霜乃枯。採之。

製法　凡入藥用老者。去外皮。取筋膜用。尤以潔白者佳。

用法　與他藥水煎。或煅焦劑末用。

性質　甘。平。無毒。

效能　涼血。解毒。通經絡。行血脈。用爲痘瘡之要藥。又作祛痰。鎮痛通乳藥。

主治　痘瘡不快。枯者燒存性。入硃砂研末。蜜水調服甚妙。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論絲瓜絡曰。絲瓜煮食除熱利腸。老者燒存性服。去風化痰。涼血解毒。殺蟲。通經絡。行血脈。下乳汁。治大小便下血痔漏。崩中。黃積。疝痛。卵腫。血氣作痛。癰疽瘡腫。齒蠹。痘疹胎毒。【明】李士材本草圖解論絲瓜絡曰。絲瓜性冷解毒。多食敗陽。【清】黃宮繡本草求眞論絲瓜絡曰。絲瓜性屬寒物。味甘體滑。其瓜經絡貫穿。風隔連屬。凡人風痰澀熱。蟲毒血積。留滯經絡。發爲癰疽瘡瘍。崩漏腸風。水腫等症者。服之立能有效。以其通經達絡。無處不至。小兒痘出不快。用此近蒂三寸。連皮燒灰存性。爲末。沙糖水調服。並可以敷脚腫。鼻淵。時流濁水。用此瓜藤近根三寸。燒灰存性。爲末。酒服方寸匕。亦效。小兒預防出痘。於立冬後。用小絲瓜煅入硃砂服之。亦應。皆以借其寒滑通達之性耳。但過服亦能滑腸作泄。故書有言。此屬菜中不足食之。當視臟氣以爲可否也。葉搗汁生服。可解一切蛇傷之毒。淬敷患處亦佳。【清】王士雄隨息居飲食譜論絲瓜絡曰。絲瓜（一名天羅）甘涼清熱。解毒安胎。行乳調營。補陽通絡。殺蟲理痘。消腫化痰。婦者宜常宜素。老者入藥。能補能通。化澀除黃。息風止血。

國外學說　日本一本堂藥選曰。選絲瓜須以全熟者爲佳。勿用未熟者。臨採時。卽剉細。曬乾。收貯。聽用。久懸風處。則輕虛枯瘦。性味俱脫。不堪用。子燒焦存性。不如生用。近得異種。呼長絲瓜。始自琉球來。其長三倍於尋常絲瓜。此品入藥最覺有力。俗呼蠮螉未。又大和

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本草曰。絲瓜功用極多。本草附方可見。葉與藤根皆有效用。無遺屏棄者。又草木育種曰。四月初下種。薤竹便纏繞。以人糞魚腥汁、河泥等培壅其根。大絲瓜切段入水煎汁。作祛痰藥甚有效。

配合應用　㊀治痘瘡不快。初出或未出。多者令少。少者令稀。老絲瓜近蒂三寸。連皮燒存性。研末。砂糖水服。（直指方）

㊁治癰疽不斂。瘡口太深。用絲瓜擂汁頻抹之。（直指方）

㊂治風熱腮腫。絲瓜燒存性。研末。水調搽之。（嚴月軒方）

㊃治肺熱面瘡。苦絲瓜牙皂莢。並燒灰等分。油調搽。（摘玄方）

㊄治玉莖瘡潰。絲瓜連子擂汁。和五倍子末頻搽之。（丹溪方）

㊅治坐板瘡疥。絲瓜皮焙乾爲末。燒酒調搽之。（攝生衆妙方）

㊆治天泡濕瘡。絲瓜汁調辰粉頻搽之。

㊇治手足凍瘡。老絲瓜燒存性。和臘猪脂塗之。（海上方）

㊈治肛門酒痔。絲瓜燒存性。研末。酒服二錢。（嚴月軒方）

㊉治痔漏脫肛。絲瓜燒灰。多年石灰、雄黃各五錢爲末。以猪膽、雞子清及香油和調貼之。收上乃止。（孫氏集效方）

㊊治腸風下血。經霜後乾絲瓜燒存性爲末。空心酒服二錢。一名虌瓜。一名天羅。一名天絲瓜是矣。（許叔微本事方）

㊋治下血危篤不可救者。絲瓜即天羅一個燒存性。槐花減半爲末。每空心米飲服二錢。（普濟方）

㊌治酒痢便血腹痛。或如魚腦五色者。乾絲瓜一枚。連皮燒研。空心酒服二錢。一方煨食之。俗名魚鰫是也。（經驗良方）

㊍治血崩不止。老絲瓜燒灰、棕櫚燒灰等分。鹽酒或鹽湯服。（奇效良方）

㊎治經脈不通。乾絲瓜一個爲末。用白鴿血調成餅。日乾研末。每服二錢。空心酒下。先服四物湯三服。（海上名方）

㊏治乳汁不通。絲瓜連子燒存性。研。酒服一二錢。被覆取汗。即通。（簡便單方）

㊐治乾血氣痛。婦人血氣不行。上衝心膈。變爲乾血氣者。用絲瓜一枚。燒存性。空心溫酒服。（壽域神方）

㊑治小腸氣痛。繞臍衝心。連帶老絲瓜。燒存性。研末。每服三錢。熱酒調下。甚者不過二三服即消。

㊒治卵腫偏墜。絲瓜架上初結者。留下。待瓜結盡。葉落取下。燒存性爲末。煉蜜調成膏。每晚好酒服一匙。如在左左睡。在右右睡。（劉松石保壽堂方）

㊓治喉閉腫痛。天羅瓜研汁灌之。（普濟方）

㊔治化痰止嗽。天羅即絲瓜。燒存性爲末。棗肉和丸彈子大。每服一丸。溫酒化下。（攝生妙用方）

㊕治風蟲牙痛。經霜乾絲瓜燒存性。爲末擦之。（直指方）

㊖治風氣牙痛百藥不效者。用此大能去風。惟蛀牙不效。天羅即生絲瓜一個。擦鹽火燒存性。研末。類擦。涎盡即愈。腮腫以水調貼之。

㊗治食積黃疸。絲瓜連子燒存性。研。酒服一二錢。被覆取汗。即通。（簡便單方）

㊘治乾血氣痛。婦人血氣不行。上衝心膈。變爲乾血氣者。用絲瓜一枚。燒存性。空心溫酒服。（壽域神方）

㊙治小兒浮腫。天羅、燈草、葱白等分。煎濃汁服。并洗之。（普濟方）

㊚治水蠱腹脹。老絲瓜去皮一枚。剪碎。巴豆十四粒。同炒豆黃去豆。以瓜同陳倉米再炒熟。去瓜研米爲末。糊丸梧子大。每服百丸。白湯下。蓋米收胃氣。巴豆逐水。絲瓜象人脈絡。借其氣以引之也。此乃元時杭州名醫宋會之之方。（鮮于樞鈎玄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡血虛液涸而絡不利者禁用。

參攷資料　㊀絲瓜本草諸書無考。惟痘瘡及脚癬方中燒灰用之。亦取其性冷解毒耳。（王穎）㊁絲瓜老者筋絡貫串房隔聯屬。故能通人脈絡臟腑而去風解毒消腫化痰祛痛殺蟲。及治諸血病也。（李時珍）㊂絲瓜唐宋以前無聞。今南北皆有之。以爲常蔬。二月下種。生苗引蔓延樹竹或作棚架。其葉大如蜀葵而多子。尖有細毛。刺取汁。可染絲。其莖有稜。六七月開黃花。五出。微似胡瓜。花蕊瓣俱黃。其瓜大寸許。長一二尺。甚則三四

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

尺。深綠色。有皺點。瓜頭如鼈首。嫩時去皮。可烹可曝。點茶充蔬。老則大如杵。筋絡纏紐如織。成經霜乃枯。惟可藉鞾履滌釜器。故村人呼爲洗鍋羅瓜。內有隔。子在隔中。狀如苦婁子。黑色而扁。其花苞及嫩葉卷鬚。皆可食也。（李時珍）

【絲瓜絡】卽絲瓜之處方用名。詳『絲瓜』條。

【絲瓜葉】**主治**　癬瘡。類按摻之。療癰疽丁腫。卵癤。

【絲瓜藤及根】**主治**　齒蠹。腦漏。殺蟲解毒。

【絲茅】卽白茅之古籍別名。典見綱目。詳『白茅』條。

【絲禽】卽鸕鷀之古籍別名。典見綱目。詳『鸕鷀』條。

【絲綿】**原名**　綿。

命名　本品乃繭絲之綿。故名。

採取　絲綿爲服器類之一種。當蠶吐絲時。不與以製繭之支架物。而置於平處。則所吐之絲不能成硬殼之繭。而成平輾散漫之綿。置於衣中。比木棉絮爲輕暖。但現

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

採取　五月至七月間。採葉陰乾。

製法　雷敦曰。凡使葉勿用尖及擘生者。取葉細剉。以生甘草、水蔘二味。同盛入生稀絹袋中。甑中蒸一日。去二件。焙乾用。

用法　恒作外治藥用。或煎湯以含漱。及熏洗。或剉末以塗傅及摩擦。

性質　辛。溫。有毒。

成分　爲揮發油、脂肪油、樹脂、單寧、糖質等。

效能　消癰腫。理疝痕。用爲消散瘡疥癬藥及爲殺蟲藥。

主治　風頭。癰腫。乳癰。疝痕。除結氣。疥癘。殺蟲魚。(本經)療喉痺不通。乳癰。頭風瘡。可用沐。勿令入眼。(別錄)

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論莽草曰。治風疽疝氣。腫墜凝血。治瘰癧。除溼風。不入湯服。主頭瘡白禿。殺蟲。與白斂、赤小豆爲末。雞子白調如糊。塗毒腫。乾更易上。【宋】大明諸家本草論莽草曰。治皮膚麻痺。煎濃湯。淋風蟲牙痛。

國外學說　日本和漢藥考曰。日本或書作椚。蓋因日俗用其枝葉供佛前或墓前之故。譯曰爲抹香。或爲製造線香原料。子實中含有一種揮發油。香氣類蕙澄茄。歐美諸國用以製造香油。日本每年輸出額達五十萬斤云。又舊東京大學教師愛葵曼氏。嘗從莽草實中。發見一種毒性結晶物。名之爲西基民(Sikimin)。又云。子實含有揮發油一%。其中又含有名「沙夫洛爾」(Safrol)之芳香性化合物云。又相川藥學士蒸溜莽草油之實驗云。將莽草葉與水蒸氣一同蒸溜。初得較水爲輕。氣味類似線香而極毒之油質。吸收此油之蒸氣。則致發嘔。極感不快。惟此極易揮發置空氣中。其臭氣須臾即行消失。此物殆即愛葵曼氏所言莽草實中之毒物歟。繼上述有毒性揮發油而來者爲一種較水爲重之揮發油。不易逸散。此物殆即愛葵曼氏所言之沙夫洛爾歟。又關於莽草實之效能。已故理學博士伊藤圭介翁所著小石川植物園草木圖說。述之頗爲詳盡。今摘錄於左。中國賈人近亦於崎陽多購此實去。或云用以溜製香水。和方書之記莽草實藥效者頗多。如狐臭用此葉濃煎。時時洗之。金創打撲。用此葉與大黃小麥粉和飯研和貼之。鼠咬。將此花燒爲霜貼之。或將葉陰乾爲末摻之。婦人乳腫。用此葉末與蕎麥粉調水貼之。瘋疽用此葉末調繭繅汁貼之。丹毒用此葉煎服。齒齦腫用抹香貼之。又洗眼水方。於爐甘石加莽草實煎用之。有效云。又逃蜍之功用。曰蜍之香氣清淨。可供神佛。除不淨。墓上插蜍則獸懼。近山田園。恐園中物爲猪猿所竊。多植蜍以懼之。掘出之莖。折蜍枝覆之。則獸不敢取。此外尚多功用。去眼病熱。取落於墓上水中腐爛之蜍露點之。立愈。煎蜍葉用之亦佳。藤祐仙所經驗。確係有效。人之往禱於本法寺境內熊谷氏之墓。取其墓水治眼病。即霍然愈者。蓋亦由蜍之功用耳。本法寺在本願寺前寺町。有熊谷稻荷祉。犬咬名灸。爲病犬所咬。立於創口置蜍葉。從其上灸之。則有水自創口出。灸至水出而後已。甚爲奇妙。此法用於鼠咬亦佳。

配合應用　㈠治賊風腫痺。風入五臟。恍惚。宜莽草膏主之。莽草一斤。烏頭、附子、蹲躅各二兩。切。以水和醋一升。漬一宿。猪脂一斤。煎三上三下。絞如滓。向火以手摩病上三百度。應手即瘥。若耳鼻疾。可以綿裹塞之。疥癬雜瘡。並宜摩之。(肘後方)

㈡治小兒風癇。驚癡戴眼。極者日數十發。又治大人賊風。莽草、雷丸各一雞子黃大。化猪脂一斤。煎七沸。去滓。摩痛處。勿近目及陰。日凡三四次。(外臺祕要方)

㈢治頭風久痛。莽草煎湯沐之。勿令入目。(聖惠方)

㈣治風蟲牙痛。用莽草煎湯。熱漱冷吐。一加山椒皮。一加獨活。一加鄧李仁。一加芫花。一加川椒。細辛各等分。煎湯熱漱冷吐。(肘後方)又用莽草半兩。皂角三挺。去皮子。漢椒七粒爲末。棗肉爲丸。芥子大。每以一丸塞孔中。吐涎取效。(聖惠方)

405／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈤治瘰癧結核。用商草一兩爲末。雞子白調塗帛上貼之。日二易。取效止。亦治癰瘡未潰。得痛爲良。（聖惠方）㈥治乳腫不消。莽草、小豆等分爲末。苦酒和傅之。（衞生易簡方）㈦治狗咬昏悶。浸椒水。調莽草末傅之。（便民圖纂方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡癰瘍已潰者禁用。

參攷資料　㈠古方治風毒痺厥。諸酒皆用商草。今醫家取葉煎湯熱含。少頃吐之。治牙齒風蟲及喉痺甚效。（蘇頌）㈡濃煎湯淋滯皮膚麻痺。周禮煎氏掌除蠹物。以商草熏之則死。（寇宗奭）㈢古方治小兒傷寒。有莽草湯。又瑣碎錄云。思村王氏之子。生七日而兩腎縮入。二醫云。此受寒氣而然也。以硫黃、菜莧大蒜研塗其腹。以商草、蛇床子燒烟熏其下部而愈也。（李時珍）㈣莽草制雌黃雄黃而有毒。誤食害人。惟紫河車磨水服。及黑豆煮汁服可解。豆汁澆其根即爛。性相制也。（李時珍）

【莽草子油】卽八角油之別名。詳『八角油』條。

【茆】卽蓮肉之古籍別名。典見爾雅。詳『蓮肉』條。

【茆菽】卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【菁茅】卽香茅之古籍別名。典見別錄。詳『香茅』條。

【菅松】卽天門冬之古籍別名。典見抱朴子。詳『天門冬』條。

【菅茅】卽白茅之一種。葉細長而尖。有並行脈。如白茅。秋開青白花。成穗。穗有長芒。實尖而黑。長分許。常黏人衣。根短硬如細竹。無節。味微甘。效能與白茅同。參見『白茅』條。

【菅根】卽地筋之古籍別名。典見別錄。詳『地筋』條。

【菈蘧】卽萊菔之古籍別名。典見廣韻。詳『萊菔』條。

【菉竹】卽箘草之古籍別名。典見詩經小雅篇。詳『箘草』條。

【菉豆】卽綠豆之處方用名。詳『綠豆』條。

【菉笋】

基本　本品係用茅竹筍淡煮曬乾者。

古籍別名　草鞋底、蝴蝶尖、玉版、闊綠、泥裏黃。（綱目拾遺）

產地　浙、閩、江西諸省多有之。

性質　甘、平。無毒。

主治　利水消水腫。豁痰。平實喘。葶藶丸用之。

【菉葹】卽蒼耳草之古籍別名。典見唐本草。詳『蒼耳』條。

【菊】卽菊花。詳『菊花』條。

【菊米】

命名　本品卽野菊之蕊。如米狀者。故名。

產地　出浙江遂昌縣石練山中。

形態　菊米爲野生之菊蕊。乾之。大如半粒綠豆。輕圓黃亮而有香氣。可供藥用。

主治　去風。清火。明目。敗毒。散疔。

【菊花】

命名　菊本作鞠。鞠也。月令九月菊有黃華。華事至此而窮。故名。

處方用名　杭菊花。白菊花。白菊蘤。野菊花。滁菊花。甘菊花。甜菊花。黃菊花。池菊花。

古籍別名　節華。（本經）女節。女華。女莖。日精。更生。傳延年。陰成。周盈。（別錄）治癰。（爾雅）金蕊。牡菊。（綱目）女花。（和漢藥考）

外國名詞　Chrysanthemum Sinense, Sab.

基本　屬菊科。爲甘菊之花。

產地　陳仁山藥物生產辨云。菊花有黃白之分。白者以產安徽亳州爲最。其次河南懷慶府。又其次則產廣東潮州。色黑味苦。又有一種白杭菊。產浙江杭州府。合藥用少。菜用居多。又有一種黃杭菊。亦產浙江杭州府。又有一種大朶者。名黃菊王。亦產浙江杭州府。黃菊近日廣東小欖有種。花瓣略大。色黃而帶紅。味不香。杭州產者。色黃而帶青。味溫香。大有可別。白菊再有一種名綠蒂菊。產安徽滁州。又名滁州菊。味最清涼。不甜不苦。白菊之中。以此味合藥爲適當。



菊花（一）

形態　菊花爲多年生草本。品類不一。形色不同。茲以甘菊而言。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬日生苗葉如艾葉色綠。夏秋漸高至二三尺。秋深開黃花。瓣長而無心。味微苦者眞。



菊花（二）

採取　正月採根。三月採葉。五月採莖。九月採花。十一月採實。俱陰乾用。

製法　採摘花瓣曬乾。或陰乾。其新鮮者尤良。

性質　苦。平。無毒。

效能　疏風熱。清頭目。用作驅風解熱藥。又爲眼科藥。

主治　諸風頭眩腫痛。目欲脫。淚出。皮膚死肌。惡風澁痺。久服利血氣。輕身耐老。延年。（本經）療腰痛去來。陶。除胸中煩熱。安腸胃。利五脈。調四肢。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權：菊性本草論甘菊。治頭目風熱。風旋倒地。腦骨疼痛。身上一切游風。令消散。利血脈。並無所忌。【宋】大明：諸家本草論甘菊曰。作枕明目。葉亦明目。生熟並可食。【金】張元素：珍珠囊論甘菊曰。養目血。去翳膜。【元】王好古：湯液本草論甘菊曰。主肝氣不足。【明】繆希雍：本草經疏論甘菊曰。菊花爲去風之要藥。苦可泄熱。甘能益血。甘可解毒。平則兼辛。故亦散結。苦入心小腸。甘入脾胃。平辛走肝膽。兼入肺與大腸。其主風頭眩腫痛。目欲脫。淚出。皮膚死肌。惡風澁痺者。諸風掉眩。皆屬肝木。風藥先入肝。肝開竅於目。風爲陽邪。勢必走上。血虛則熱。熱則生風。風火相搏故也。腰痛去來。陶陶者。乃血虛氣滯之候。苦以泄滯結。甘以益血脈。辛平以散虛熱也。其除胸中煩熱者。心主血虛則病煩。陰虛則熱收於內。故熱在胸中。血益則陰生。陰生則煩止。苦辛能泄熱。故煩熱並解。安腸胃。利五脈。調四肢。利血氣者。卽除熱。祛風。益血。入心入脾入肝之驗也。久服輕身耐老。延年者。物久則力專。力專則氣化。化則變。常其釀酒延齡。和藥變白。皆服餌專氣之功。故亦爲仙經所錄矣。【明】李士材：本草圖解論甘菊曰。甘菊花味甘性平。入肺腎兩經。清頭目。風熱。定風。虛眩暈。利血脈。安腸胃。悅皮膚。止腰痛。翳膜遮睛。冷淚流溢。珍爲要品。鍾會贊菊有五美云。圓花高懸。準天極也。純黃不雜。合土色也。早植晚發。君子德也。冒霜吐英。象貞質也。味和體輕。神仙食也。甘者功用弘多。苦者但可理。癰白者入氣。赤者行血。神而明之。存乎其人。耳忌火。去蒂。漿過曬乾。乘燥入磨。【清】黃宮繡本草求眞論甘菊曰。甘菊生於春。長於夏。秀於秋。得天地之清芳。稟金精之正氣。其味辛。故能祛風而明目。其味甘。故能保肺以滋水。其味苦。故能解熱以除燥。凡風熱內熾。而致眼目失養。翳膜遮睛。與頭眩暈。風浮澁痺等症。服此甘和輕劑。以平木。制火。養肺。滋腎。俾木平則風熄。火除則熱除。而病無不愈矣。是以除目翳膜有同枸杞相對。蜜丸。久服永無目疾。以單瓣味甘者入藥。黃入陰分。白入陽分。紫入血分。【清】徐洄溪本草經百種錄論甘菊曰。凡芳香之物。皆治頭目肌表之疾。但香則無不辛燥者。惟菊花不甚燥烈。故於頭目風火之疾尤相宜焉。【清】黃元御玉秘藥解論甘菊曰。甘菊花清利頭目。治疼痛眩暈之證。庸工凡治頭目。無不用之。今古相承。不見其效。不知頭目眩暈。由澀盛上逆。濁氣充塞。相火失根。升浮旋轉。而成愚妄。以爲頭風。而用發散之藥。此千試不靈之方也。【清】王士雄：隨息居飲食譜論甘菊曰。甜菊花甘涼。清利頭目。養血息風。消疔腫。點茶蒸露。釀酒皆佳。苦者勿用。餘如野薔薇、金銀花。功用略同。可類推也。【清】賈九如：辨藥指南論甘菊曰。甘菊得秋氣之深。應候而開。受金正氣。秋金本白。故取白色者。其體輕。味微苦。性氣和平。至清之品。經曰。治溫以清。凡病熱退。其氣尚溫。以此同桑皮理頭痛。除餘邪。佐黃芪治眼昏。去翳障。助沙參療腸紅。止下血。頷石斛扁豆。明目聰耳。調達四肢。是以肺氣虛。須用白甘菊。如黃色者。其味苦重。氣香散。主清肺火。凡頭風眩暈。鼻塞熱壅。肌膚澀痺。四肢遊風。肩背疼痛。皆緣肺氣熱。以此清順肺金。且清金則肝木有制。又治暴赤眼腫。目

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痛淚出。是以清肺熱須用黃甘菊。古來未悉此義。予姑訂之以俟同志辨正。

國外學說　古方藥品考曰。菊花有數百種。唯稱甘菊者堪入藥。其花黃色。長瓣。味微苦者眞。宜自製。市中販者多僞品。須選用。又陳久者亦不堪用。更有野菊一名苦薏。花亦作黃色。惟瓣短小。且味苦氣香。此與甘菊功用不同。甘菊冬日生苗。葉如艾葉。色綠。夏秋漸高二三尺。秋深開黃花。瓣長而無心。採之曬乾。又用藥須知。曰菊花有白紅黃三種。俱入藥。而以色黃味甘者爲上。若辣者不用。一種千瓣小朵。味甚甘。尤稱佳品。蓋珠子菊之類也。單瓣味苦者。乃野菊之屬。厥名苦薏。實雜菊也。更有冒菊之名而實非菊者。或則以野菊充菊花。此皆市販貪得以欺人也。又本草辨疑曰。菊有數種。藥舖所出售者。形雖極似。實是野菊。味苦不堪入藥。山中自出之菊。小而味甘者眞。有黃白二種。俱可用。又本草綱目啓蒙曰。菊花種類極多。大率可分爲二。一入藥用者。一供賞玩者。藥用之菊。祇甘菊一種。本草所說。蓋專指此甘菊不論黃白。味甘者皆可用。但現今所種者。均係黃色。九月開花。大寸許。或寸半。瓣如常菊。作細筒子。其末五出。瓣多重心。變爲闊瓣。則黃色略淡。中有小心。此種花與葉均無苦味。故可作藥料。今藥肆所賣。乃奧州仙臺出產之尋常黃菊。味苦入藥非宜。至供賞玩之菊。則有春夏秋冬之分。皆以花開時爲名。冬菊即寒菊。漏盧條內有單葉寒菊之名。秋後花葉澆酒。再一經霜。則盡變紅紫色。鮮豔奪目。餘詳見范成大、劉蒙泉、史正志等之菊譜。及花史佐編。羣芳譜。祕傳花鏡。及日本之菊經。又從前日本醫家每製爲菊酒或菊油用之。菊酒昔人謂有養脾腎之效。製法有數種。茲記其一法。以乾菊花四兩。熟地黃二兩。人參末一錢。冰糖屑四兩。入燒酒一斤中。密封瓶口。經七十日。漉去渣。即成菊油。出日本之薩摩。遐邇馳名。製造此油。乃不用家菊而用野菊。立冬前後。入山採摘野菊。曬乾。用水蒸氣蒸餾之。使成揮發油。質透映。帶綠色。爲有野菊香之液體。味微苦。比重約〇・九三三。酒精。伊打等。不拘多少。能溶解之。有衝動。鎭痙之效。世稱薩摩菊油。醫治功用極多。頭痛。塗擦頭部。仍服用。眩暈。塗擦頭部及胸膛。仍服用。齒痛。塗布頰部。痛處。腹痛。下瀉。塗擦腹部。仍服用。眼病。和水傳之。金瘡。湯火傷。螫傷等。各塗擦傷口。淋痛。尿道閉塞。塗布尿道孔。仍服用。陰虱。塗毛上。虱盡死。用量。內服。大人每次三滴至五滴。入開水中。攪和服。又一本堂藥選。菊花條有辨論。藥用甘菊之謬。曰。菊花之味本苦。神農本草已言之。自名醫別錄出。始曰味甘。陶弘景且以甘者爲眞。菊苦者爲苦薏。按菊之專尙甘者。乃道家勸誘之故技。以其帶甘易餌故爾。方士炫人。醫家亦爲所惑。遂有輕身耐老延年好顏色。服之成仙。髮白變黑。齒落再生等語。放誕不經。殊爲可笑。醫人又主張甘補脾胃。苦寒涌泄之說。皆以甘者爲良。其誤益甚。殊不知菊花之苦。此其本味。其帶甘者。乃肥養之所變。非天性也。豈入藥用哉。

辨僞　㈠鄭肖巖曰。黃菊卽黃色之茶菊。較家菊朶小。心多而色紫。杭州錢塘所屬各鄉。多種菊爲業。九十月取花挑入城市以售。有高脚黃等名色。味苦微甘。性平而香。去風除熱。明目疎肝。能清眩暈頭風。其浙省城頭一帶所產名城頭菊。皆野生城上石縫中。至秋開花。花小如茶菊。香氣沁脾。點茶更佳。聞有以本地圓中所種之陶愛一名滿天星僞充。形雖似而性不同。且少香味。又安能療病乎。㈡曹炳章曰。按菊花種類甚雜。惟黃菊產杭州海寧等處。味苦兼甜。香氣甚雅。有蒸曬二種。蒸菊將鮮菊入蒸籠內先蒸熟再曬。烘焙至燥。其色老黃。收藏朶瓣不散。曬菊以鮮花烈日曬乾。其色嫩黃。朶鬆花瓣易散。皆道地。城頭菊野生城牆陰處。色黃。朶較少。浙名野菊花。亦蒸曬爲善。味苦性涼。香氣亦佳。以散風清火。解毒消瘡腫。凡生危險疔毒。用野菊搗汁一大碗飲之。可免毒氣攻心。以燥花作枕。永免頭風瘡癤。其他如滁菊白菊眞。贛關係。較黃菊猶重。白滁菊出安徽滁州

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者。其採法先剪枝連花帶葉倒掛簷下陰乾後再摘花故氣味更足。其花瓣細輭千層。花蕊小嫩黃色。花蒂綠尖小而平。氣芬芳。味先微苦後微甘。口含後香氣甚久不散。爲最佳出浙江德清縣者。花瓣闊而糙。蕊心微黃。帶大柄膚凹陷。氣味香不濃。爲略次。白菊河南出者。爲亳菊。蒂綠千瓣細輭無心蕊。氣清香。味苦微甘。爲最佳。蘇州滸墅關出。爲杜菊。色白味甘。又出單瓣亦佳。海寧出者。名白茶菊。色白瓣粗心蕊黃。味甜多茶葉店買亦佳。江西南昌府出。名淮菊。朵小色白帶紅。味苦氣濁。梗多亦次。廣門出者。曰洋菊。朵大而扁。心亦大。氣濁味甘。更次。

近人學說　張山雷曰。菊在古時。似止有黃華一種。而近則園林之蒔藝。千紅萬紫。色相最多。可謂百卉中絕無僅有之奇品。蓋自經騷人韻士矜賞孤芳。而扦接之法最多。遂覺變化離奇。不可方物。其實則花色雖殊。而氣味性情。亦尙無甚大別。（吾嘉戟菊。自明季以來。頗有研究。流風遺韻。至今猶存。其以極大花朵。養之極老。纔冬不蘸。聽其自乾。明年卽以此枯花播種。亦茁新芽。是爲子種。兩三年後。方能着花。則形色必與老花不同。以此知菊之花色最多。殆古人卽以此法造成也。）惟正名定分。仍當屬之黃華。而近今藥物恒用之品。則以杭產之黃色小花爲正。而杭產色白之小花。其氣醇靜。味最甘緩。清香幽韻。尤爲過之。若白色大花之產於古亳者。氣味殊覺辛烈。則功力亦未免不純。是在用之者量能器使。必不可作一例觀也。此外更有野菊一種。花尤小而氣尤烈。味尤苦。葉瘦而老。僅可作搗科數藥。自檜以下。殊不足道。雖亦是晚節之附庸。然婢學夫人。終不脫小家伎倆者也。又曰。菊之花色最多。種以百計。然古稱鞠有黃華。則黃者其正色也。今之雜色奇花。蓋皆後人扦接所變化。入藥亦有數種。黃者味甘。白者味苦。惟滁菊花。白茶菊。味甘而清芬撲鼻。沁人心脾。尤爲上品。其他雜色。味俱苦烈。不入藥用。野菊尤苦。古名苦薏。祇可裝入枕囊。功能清腦明目。經久彌佳。黃甘菊、白茶菊、滁菊三種。以滁菊爲尤良。凡清芬之藥。氣輕而升。多能治頭目之疾。但香氣勝者。無不辛燥。惟菊花稟秋金肅降之氣。清芬不濁。絕無燥烈之弊。故治頭目。疏風清泄。抑降肝膽木火炎上之病。尤爲剔良。

配合應用　㊀甘菊花爲祛風要藥。風木通肝。肝開竅於目。故爲明目之主。同地黃、黃檗、枸杞子、白蒺藜、五味子、山茱萸、當歸、羚羊角、羊肝。治肝腎俱虛。目痛加決明子、木賊草、穀精草、柴胡。可以去外翳。㊁治風熱目痛。菊花、黃連、玄參、甘草、生地、黃荊芥穗、決明子、連翹、桔梗、柴胡、川芎、羌活、童便。㊂治血虛頭痛。菊花、川芎、細辛、藁本、當歸、生熟地、黃天麥門冬、白芍藥、甘草、童便。亦主頭眩暈因痰結而作者。無痰藥不效。㊃與枸杞子相對蜜丸。久服則終身無目疾。兼不中風及生疔疽。

主治　疔瘡菊花連根生用。紫花地丁、金母草、金銀花、牛枝連、貝母、連翹、生地黃、梧樓根、白芷及蒼耳子、夏枯草。甚者以蟾酥丸發汗。大便閉者。汗後以玉樞丹下之。如無玉樞丹。以大戟加蚤休、棗肉丸。服三錢必下矣。忌甘草。犯之則死。爲有大戟故也。

服食　㊀服食甘菊。王子喬變白增年方。用甘菊三月上寅日採苗。名曰玉英。六月上寅日採葉。名曰容成。九月上寅日採花。名曰金精。十二月上寅日採根莖。名曰長生。四物並陰乾。五日取等分。以成日合擣杵爲末。每酒服一錢七。或以蜜丸。梧子大。酒服七丸。一日三服。百日輕潤。一年髮白變黑。服之二年。齒落再生。五年八十歲老翁變爲兒童也。孟詵云。正月採葉。五月五日採莖。九月九日採花。（玉函方）

㊁服食白菊。引九月九日白菊花二斤。茯苓一斤。並擣羅爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。或以凍過松脂和丸。雞子大。每服一丸。主頭眩。久服令人好顏色。不老。（太清靈寶方）

㊂白菊花酒。天寶單方。治丈夫婦人。久患頭風眩暈。頭髮乾落。胸中痰壅。每發卽頭旋眼昏。不覺欲倒者。是其候也。先灸兩風池各二

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

七壯。并服此酒及散永瘥。其法春末夏初。收白菊顬苗陰乾。擣末。空腹取一方寸匕。和無灰酒服之。日再服。漸加三方寸匕。若不飲酒者。但和羹粥汁服亦得。秋八月合花收曝乾。初取三大斤。以生絹袋盛。貯三大斗酒中。經七日服之。日三次。常令酒氣相續爲佳。（圖經方）

㈨治風熱頭痛。菊花白膏川芎各三錢爲末。每服一錢半。茶調下。（簡便方）

㈩治膝風疼痛。菊花、陳艾葉作護膝。久則自除也。（吳旻扶壽方）

㈠治瘕痘入目生翳障。用白菊花、穀精草、綠豆皮等分爲末。每用一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一盞。同煮。候泔盡。食柿。日食三枚。淺者五七日。遠者半月見效。（仁齋直指方）

㈡治病後生翳。白菊花、蟬脫等分爲散。每用二三錢。入蜜少許。水煎服。大人小兒皆宜。屢驗。（急救方）

㈢治疔腫垂死。菊花一握。搗汁一升。入口卽活。此神驗方也。冬月採根。（肘後方）

㈣治女人陰腫。甘菊苗搗爛煎湯。先熏後洗。（危氏得效方）

㈤治酒醉不醒。九月九日眞菊花爲末。飲服方寸匕。（外臺祕要方）

㈥治眼目昏花。雙美丸。用甘菊花一斤。紅椒去目六兩爲末。用新地黃汁和丸。梧子大。每服五十丸。臨臥茶清下。（瑞竹堂方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　忌火炙及枸杞根、桑根白皮爲之使。

參攷資料　㈠菊苗可蔬。葉可啜。花可餌。根實可藥。囊之可枕。釀之可飲。自本至末。罔不有功。宜乎前賢比之君子。神農列之上品。隱士採入酒斝。騷人餐其落英。費長房言九月飲菊酒。可以辟不祥。神仙傳言康風子朱孺子皆以服菊花成仙。荊州記言湖廣久病風羸。飲菊潭水多壽。菊之貴重如此。是豈羣芳可伍哉。西京雜記言採菊花莖葉雜秫米釀酒。至次年九月始熟用之。（李時珍）㈡菊有兩種。一種莖紫氣香而味甘。葉可作羹食者爲眞菊。一種青莖而大。作蒿艾氣。味苦不堪食者。名苦薏。非眞菊也。葉正相似。惟以甘苦別之。南陽酈縣最多。今近道處處有之。取種便得。又有白菊。莖葉都相似。惟花自五月取之。仙經以菊爲妙用。但難多得。宜常服之。（陶弘景）㈢菊之品凡百種。宿根自生莖葉。花色品不同。宋人劉蒙泉、范至能、史正志皆有菊譜。亦不能盡收也。其莖有株蔓紫赤青綠之殊。其葉有大小厚薄尖禿之異。其花有千葉單葉。有心無心。有子無子。黃白紅紫間色。深淺大小之別。其味有甘苦辛之辨。又有夏菊、秋菊、冬菊之別。大抵惟以單葉者味甘入藥。菊譜所載甘菊、鄧州黃、鄧州白者是矣。甘菊始生於山野。今則人皆栽植之。其花細碎。品不甚高。蕊如蜂窠者。中有細子。亦可捺種。嫩葉及花皆可燦食。白菊花稍大。味不甚甘。亦秋月採之。菊之無子者。謂之牡菊。燒灰撒地中。能死蕾蝨。說固出自周禮也。（李時珍）㈣本經言菊花味苦。別錄言菊花味甘。諸家以甘者爲菊。苦者爲苦薏。惟取甘者入藥。謹按張華博物志言菊有兩種。苗花如一。惟味小異。苦者不中食。范至能譜序言。惟甘菊一種可食。仍入藥。餌其餘黃白二花皆味苦。雖不可餌。皆可入藥。其治頭風則白者尤良。據此二說。則是菊類自有甘苦二種。食品須用甘菊。入藥則諸菊皆可。但不得用野菊。名苦薏者爾。故景煥牧豎閑談云。眞菊延齡。野菊泄人。正如黃精益壽。鉤吻殺人之意。（李時珍）㈤菊葉泄風祛熱。與花略同。而苦降有餘。清芬不及。肝膽火旺者。可入煎劑。泄降內蘊之風火。力量尤勝於花。輕用一錢。重用亦可至二三錢。不拘何種菊葉。功用大略相似。而滁州白菊之葉尤良。惟野菊葉其苦尤甚。則止可搗敷熱毒癰腫。丁瘡。不入煎劑。（張山雷）

【菊花酒】製法　用菊花煎汁。同麴米釀酒飲。或加地黃、當歸、枸杞諸藥亦佳。

主治　頭風明目。去蟲痺。消百病。

【菊花參】命名　因其葉似菊花。故名。

產地　雲南東川府巧家汛江

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

邊。

主治　功同人參力較遜。

【菊花露】即甘菊花露之處方用名。詳『甘菊花露』條。

【菊婢子】即鳳仙子之古籍別名。詳『鳳仙子』條。

【菌芝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【菖蒲】

命名　本品乃蒲類之昌盛者。故名方士隱爲水劍草者。因葉形也。

處方用名　石菖蒲。鮮菖蒲。乾菖蒲。九節菖。菖蒲根。

古籍別名　昌陽（別錄）堯韭（吳普）水劍草（隱名）荃白菖。昌本昌羊。宅護。泥蒲。莖蒲。紫耳。溪蓀。薕蒲。石上草。松衣。介。望見消。陽春雪。蘭蓀。芷。綠劍眞人（和漢藥考）

外國名詞　Calamus

基本　屬天南星科之宿根草本。爲 Acorus calamus 之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。菖蒲以產四川者爲最。節密。身結而清香。又廣東產者。清遠三坑、石潭等處多出。近水者名水菖蒲。大條。身鬆浮。節疎。味香帶闊。近山上出者。名石菖蒲。質結節密。細條。氣味清香。與川菖蒲不差上下。西藥名劍草。又有一種名外菖蒲者。即九節小菖蒲。味略辛而不甚香。嚼之有辛辣味。產陝西漢中。河南禹州。

形態　石菖蒲。屬天南星科。入藥用地下莖。爲多年生草本。自生於溪澗之濱。葉爲劍狀。雖有並行脈。無中肋。線長約尺許。至夏葉間抽出花梗。開綠褐色細花。排列而爲圓柱狀之肉穗。花序後結綠果。往往盆種。用作玩品。以變種矮小者爲貴。其根莖匍匐。似蜈蚣背者。入藥用。從前以一寸九節者爲良品。又水菖蒲。溪蓀。乃生於溪澗。葉瘦。根亦高二三尺者。



菖蒲

種類　㊀石菖蒲。乃生水石之間。葉有劍脊。瘦根。密節。高尺餘者。㊁泥菖蒲。白菖。乃生於池澤。葉肥。根高二三尺者。㊂水菖蒲。溪蓀。乃生於溪澗。葉瘦。根亦高二三尺者。

種植　恒用瓦石器。以砂土移栽於盆中。至春剪洗。愈剪愈細。高四五寸。葉如韭。根如匙柄。粗者甚則根長二三分。葉長寸許。謂之錢蒲。亦堪服食入藥。

採取　五月十二月採取陰乾。用鮮者。隨時採。

製法　雷敦曰。凡使菖蒲。勿用泥菖。夏菖二件。如竹根鞭形。黑氣穢味。腥。惟石上生者。根條嫩黃緊硬。節稠。一寸九節者是眞也。採得以銅刀刮去黃黑硬節皮一重。以檄桑枝條相拌。蒸熟。曝乾。剉用。

性質　辛。溫。無毒。

成分　西洋產菖蒲之根中。除含多量之澱粉外。尚有揮發油、樹脂、及一種苦味之亞哥寧（Acorin）。日本產菖蒲。含有揮發油、澱粉、苛烈芳香性之樹脂、極微之鞣酸、鐵性物質、亞哥寧、及一種亞爾加羅伊特。即加拉明（Calamin）。惟石菖根之成分。尚未詳悉。

效能　辟穢。開竅。宣氣。逐痰。又治神經衰弱之消化不良症。

作用　入胃。即能刺激胃神經。使其分泌增加。消化力加大。且一部由腸壁吸入血中。微有興奮精神之能。

主治　風寒溼痺。咳逆上氣。開心孔。補五臟。通九竅。明耳目。出音聲。主耳聾癰瘡。溫腸胃。止小便利。久服輕身不忘。不迷惑。延年益心智。高志不老。（本經）四肢溼痺不得屈伸。小兒溫癎。身積熱不解。可作浴湯。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論菖蒲曰。治耳鳴頭風。淚下。鬼氣。殺諸蟲。惡瘡疥瘙等。【宋】大明日華諸家本草論菖蒲曰。除風下氣。丈夫水臟。女人血海冷敗。多忘。除煩悶。止心腹痛。霍亂轉筋。及耳痛者。作末炒。乘熱裹。譬甚驗。【元】王好古湯液本草論菖蒲曰。心積伏梁。【明】李時珍本草綱目論菖蒲曰。治中惡卒死。客忤。癲癎。下血崩中。安胎。漏。散癰腫。搗汁服。解巴豆、大戟毒。【明】繆希雍本草經疏論菖蒲曰。菖蒲味苦辛。其氣大溫。陽精芳草。故無毒。陽氣開發。外充百骸。辛能四達。以散邪結。此通利心脾二經之要藥也。蓋苦可

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

燥。溫能辟寒。辛可散結。風寒溼三者。合而成痺。去此三邪。痺自愈矣。陽氣開發。芬芳輕揚。氣重於味。辛兼橫走。故能下氣開心。咳逆者。氣逆之候也。下氣則咳逆上氣可去。五臟之壅竭。既徹九竅應之而通。故聰明耳目出音聲。主耳聾。辛以散之。故治癰瘡。氣味辛溫。氣厚發熱。故溫腸胃。膀胱虛寒。則小便不禁。腸胃既溫。則膀胱與焉。故止小便。脾主四肢。脾溼既祛。則四肢溼痺之得風伸自利。山嵐瘴氣。最能使小兒發癉。寒溼之甚。莫過山嵐。既散其邪。則病本已拔。癉焉得而不已焉。作浴湯。及久服輕身者。除溼之驗也。不迷惑益心智。高志者。心竅開利也。其曰補五臟延年者。單指巖棲修煉之士。辟穀服餌之用。以其助發陽氣。辟除陰嵐。兼可參合養性諸藥。如黃精青黏地黃。天門冬之屬。其宜導臻乎太和。故亦爲仙經要藥。至於世俗之人。五慾熾然。六淫迭至。詛可窮年卒歲。久餌偏燥之物乎。【明】李士材本草圖解。論菖蒲曰。菖蒲辛溫。心肝藥也。開心竅。消伏梁。除痰

嗽。通九竅。明耳目。出音聲。散風溼。止心痛。殺諸蟲。辟鬼邪。理惡瘡。按仙經歷稱菖蒲爲水草之精英。神仙之靈藥。然石磧水生。莖細節密。不沾土者。方爲上種。銅刀刮去粗皮。米泔浸之。飯上蒸之。藉穀氣而臻於中和。眞有殊常之效。【清】黃宮繡本草求眞。論菖蒲曰。石菖蒲辛苦而溫。香芳而散。諸書尙論未透。惟張璐發揮本經最明。指此實爲心氣不足要劑。其言能補五臟。以心爲君主。五臟係焉。首言治寒溼痺。是取其辛溫開發。脚氣之力。治咳逆上氣者。痰溼壅滯之喘咳。故宜搜滌。若肺胃虛燥之喘咳。非菖蒲可治也。其開心孔。利九竅。明耳目。出聲音。總取辛溫利竅之力。心孔開。九竅利。則癰瘡之毒可解。腸胃喜溫惡寒。腸胃既溫。則膀胱之虛寒。小便不禁自止。久服輕身者。除溼之驗也。不忘不惑。延年益智。高壽不老。皆補五臟。通九竅。氣之力也。其釋本經如此。又言能主肝虛心腹痛。霍亂轉筋。消伏梁癰瘤。喜通心脾痰溼。可知千金治胎動不安。牛產漏下或搶心下血及

產後崩中不止。並以菖蒲一味煎服。皆取辛能開竅。血氣安養之意。觀此菖蒲實爲宣氣通竅之劑。故在楊士瀛亦謂噤口下痢。可用石菖蒲加於參苓白朮散內。以開其胸。則其義亦著。但陽亢陰虛。羹竇失合者禁用。以其能動心胞之火耳。取一寸九節紫花根搜者佳。去皮微炒用。

國外學說　日本學說謂菖蒲之有效成分。名曰「アコリン」之一種苦味質。及獨逸局方收載之一種揮發油。卽菖蒲油是也。シュチーデルマン氏之說云。「アコリン」及菖蒲油之外。尙含有安息香酸澱粉。菖蒲根殊無嫩忌其服用者。小兒亦然。對於弛緩性之消化不良。及胃加答兒最有效驗。故用爲清涼健胃藥。殊有驅風之效。用量以菖蒲根〇・五至二・〇。（一回）爲內用粉劑。或以之爲浸劑。（一分與十分之比例）。又酒精製或糖藏菖蒲根。亦爲消化藥。菖蒲丁幾一回十五滴至五・〇。英美學說謂水菖蒲又名白菖。產中國。印度。歐羅巴及北亞美利

加等處。該草每滋生水溼之處。其根本可藥。其根頭大約五分。長約數尺。形狀似分數截。而實則相連。由根頭發生直立之葉。該葉闊約八分。長約二三尺。英國昔時亦以此草之根作藥。品近已廢棄而不用。水菖蒲頗爲通行之藥。恒以別藥相合。而作補劑。其功用能補身。開胃。暖胃。止肚疼。治氣臌。兼治飯不消。化作膏酒等服之。用量每服一分半至三分。研末服之。

近人學說　張山雷曰。本經之菖蒲。卽今之石菖蒲根也。御覽引經有生石上及一寸九節云云。是其明證。且本經上品別有香蒲。云生池澤。是石菖蒲與池沼之香蒲。截然不同。則吾臭土語。亦名池沼中之香蒲爲菖蒲者。非是。菖蒲芳香清冽。以氣用事。故能振動清陽。而辟除四時穢濁。不正之氣。但香蒲者之氣味情性。殊與菖蒲相近。故本經必以生石上及一寸九節別之。味辛氣溫。故主風寒溼邪之痺著。治咳逆上氣者。以寒飲溼痰之壅塞膈上。氣窒不通者言之。辛能開泄。溫勝溼寒。凡停痰積飲。溼

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

濁蒙蔽。胸痺氣滯。舌苔白膩垢穢。或黃厚者。非此芬利竅。不能疏通。非肺胃燥咳。及腎虛之咳逆上氣可比。開心孔。補五臟者。亦以痰濁壅而言。蕩滌邪穢。則九竅通靈。而臟氣自得其補益。非溫燥之物。能補五臟眞陰也。而俗人謬謂菖蒲能開心竅。及反以導引痰涎。直入心包。比之開門迎賊者過矣。且清芬之氣。能助人振刷精神。故使耳目聰明。九竅通利。凡寒飲閉塞。肺氣不宣。則令人音瘖。菖蒲能逐飲宣竅。而聲自開。以視虛勞金破之不鳴。顯然有別。圭耳壘以下十二字。其義殊與上文不類。大觀本不在白之例。恐是後人羼入。姑存而不論。其止小便利一說。蓋指清氣下陷。取攝無權之症。辛溫能升舉下陷之氣。或可治之。別錄主肢脾痺。不得屈伸。則即本經之主風寒濕痺。複疊無別。殊是蛇足。溫瘧亦時行之戾氣。而兼有溼痰蒙蔽。菖蒲滌痰辟穢。助正氣。故能治之。然瘧之虛實寒熱。各各不同。偏舉小兒似嫌泛濫。且作浴湯外治。其效亦趁。別錄此條。皆非精要。

大是可疑。或後人有所點竄歟。又曰。甄權治耳鳴。則溼痰蒙其清氣。而甲木少陽之氣。鬱而不伸者。即開通九竅之功效也。若肝腎陰虛。浮陽上擾之耳鳴。則非辛溫所宜矣。甄權又治頭風淚下。亦惟寒風外束者爲宜。若肝陽自擾之頭風。又不可一例論治。甄氏又謂治鬼氣。瀕湖謂治中惡卒死。客忤。則皆陰靈不正之氣。固芳香辟穢之正治也。大明謂除煩悶。止心腹痛。霍亂轉筋。皆指寒溼交互。汨沒眞陽者。菖蒲秉芳冽之正氣。自能勝邪而行氣定痛。後人薷香正氣等方。以及臙脂等疫諸丸散。皆即此例。然菖蒲雖溫。辟惡可言。而溫中尙嫌不足。其直中三陰之大痛吐瀉。轉筋冷汗。脈伏色青等症。亦非此所能獨當大任。

配合應用　㊀菖蒲同熟地黃、黃檗作丸。治腎虛耳聾。若中年預服。可使老而聰聰。㊁菖蒲同二冗、木瓜、惡仁、石斛、蕙蓉、黃檗。爲除溼強步之要藥。兼治下部膿窠溼瘡如神。㊂菖蒲佐人參、麥門冬、酸棗仁、茯神、遠志、生熟地黃。爲補心之劑。如心氣鬱結者加沈香。能益火以開心。㊃菖蒲可辟蚤蝨。㊄功能聰耳明目。益智不忘。於甲子日取菖蒲一寸九節者。陰乾。百日爲末。每酒服方寸匕。日三服。（千金方服食法）㊅七月七日取菖蒲爲末。酒服方寸匕。飲酒不醉。好事者服而驗之。久服聰明。（千金方）㊆治三十六風。有不治者。服之悉效。菖蒲薄切三斤。盛於絹袋。玄水一斛。即清酒也。懸浸之。密封百日。視之如漆綠色。以一斗熟黍米納其中。封十四日。取出日飲。（夏禹神仙經方）㊇治癲癎風疾。以九節菖蒲不聞鷄犬聲者。去毛。水白搗末。以黑猪豬心一個。批開。砂礶煮湯。調服三錢。日一服。（醫學正傳方）㊈凡尸厥之病。卒死脈猶動。聽其耳目中如微語聲。腹間煖者是也。魘死之病。臥忽不寤。勿以火照。但痛齧其踵及足拇趾甲際。唾其面即甦。仍以菖蒲末吹鼻中。桂末納舌下。幷以菖蒲汁灌之。（肘後方）㊉治卒中客忤。用菖蒲根搗汁含之立止。（肘後方）㊀除一切惡用端午日切菖蒲漬酒飲之。或加雄黃少許。（洞天保生錄方）㊁治喉痺腫痛。用菖蒲根嚼汁。燒鐵秤錘淬酒一盃飲之。（聖濟總錄方）㊂治霍亂脹痛。生菖蒲剉四兩。和搗汁分溫四服。（聖惠方）㊃治諸積癖脹。如食積、氣積、血積之類。石菖蒲八兩。剉。班蝥四兩。去翅足。同炒黃。去蝥。以布袋盛搗去蝥屑。爲末。醋和丸。梧子大。每服三五十丸。溫白湯下。治腫脹尤妙。或入香附二錢。（奇效方）㊄治肺損吐血。九節菖蒲末、白麵等分。每服三錢。新汲水下。一日一服。（聖濟總錄方）㊅解一切毒。石菖蒲、白礬等分爲末。新汲水下。（事林廣記方）㊆治赤白帶下。石菖蒲、破故紙等分。炒爲末。每服二錢。更以菖蒲浸酒調服。日一服。（婦人良方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊎治胎動半產。卒動不安。或腰痛胎轉。搶心。下血不止。或日月未足而欲產。並以菖蒲根搗一二升服之。（千金方）

㊏治產後崩中。下血不止。菖蒲一兩半。酒二盞。煎取一盞。去滓。分三服。食前溫下。（千金方）

㊐治耳卒壟閉。菖蒲根一寸。巴豆一粒。去心。同搗作七丸。綿裹一丸。塞耳。日一換。一方不用巴豆用蔥麻仁。（肘後方）

㊑治病後耳壟。生菖蒲汁滴之。（聖惠方）

㊒治蚤虱入耳。菖蒲末炒熱。袋盛枕之。即愈。（聖濟總錄方）

㊓治諸般赤眼。攀睛雲翳。用菖蒲自然汁。文武火熬作膏。日點之。（聖濟總錄方）

㊔治眼瞼挑鐵。獨生菖蒲根同鹽研敷。（壽域聖方）

㊕治癰疽發背。生菖蒲搗貼之。瘡乾者。爲末水調塗之。（孫用和祕寶方）

㊖治熱毒溼瘡。有人遍體生瘡。痛而不痒。手足尤甚。黏着衣被。曉夕不得睡。有人教以菖蒲三斗。日乾爲末。撒布席上臥之。仍以衣被覆之。既不黏衣。又復得睡。不五七日。其瘡如失。後以治人。應手如驗。（衍義本草方）

㊗治風癬有蟲。菖蒲末五斤。酒浸釜中。蒸之使味出。先絕酒一日。每服一升或半升。（千金方）

㊘治陰汗溼瘙。石菖蒲、蛇床子等分爲末。日搽二三次。（濟急仙方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡陰血不足。精滑汗多者禁用。惡麻黃、地膽、忌羊肉、飴糖。勿犯鐵器。犯之令人吐逆。秦皮、秦艽爲之使。

著名方劑　㊀枕中方。治好忘。（千金）菖蒲、龜甲、遠志（去心）龍骨等分。上四味治下篩。酒服方寸匕。日三。常服令人大聰。㊁鎮心省睡益智方。（千金翼）菖蒲、益智子各八兩。遠志（去心）五十兩。三味爲末。以淳糯米酒服方寸匕。百日有效。祕不令人知。

參攷資料　㊀菖蒲世又謂之蘭蓀。生水次。失水則枯。根節密者。氣味足。若菖蒲根絡石而生者。節乃密。入藥須用此等。（寇宗奭）㊁古方有單服菖蒲法。蜀人治心腹冷氣攪痛者。取一二寸。槌碎。同吳茱萸煎湯飲之。亦將隨行卒患心痛嘔一二寸。熱湯或酒送下亦效。（蘇頌）㊂菖蒲氣溫味辛。乃手少陰足厥陰之藥。心氣不足者用之。虛則補其母也。肝苦急。以辛補之是矣。道藏經有菖蒲傳一卷。其語粗陋。今略節其要云。菖蒲者。水草之精英。神仙之靈藥也。其法採緊小似魚鱗者一斤。以水及米泔浸各一宿。刮去皮。切曝乾。擣篩以糯米粥和勻。更入熟蜜搜和丸。如梧子大。稀葛袋盛。置當風處令乾。每旦酒飲任下三十丸。臨臥更服三十丸。服至一月消食。二月痰除。服至五年。骨髓充。顏色澤。白髮黑。落齒更生。其藥以五德配五行。葉青花赤。節白心黃。根黑。能治一切諸風。手足頑痺攣緩不遂。五勞七傷。填血補腦。堅骨髓。長精神。潤五臟。裨六腑。開胃口。和血脈。益口齒。明耳目。澤皮膚。去寒熱。除三尸九蟲。天行時疾。瘴癘瘦病。瀉痢痔漏。婦人帶下。產後血暈。並以酒服。河內乾菖蒲葉。敬母中風。服之一年而百病愈。寇天師服之得道。至今廟前猶生菖蒲。鄭魚曾原等。皆以服此得道也。又按葛洪抱朴子云。韓衆服菖蒲十三年。身上生毛。冬袒不寒。日記萬言。商丘子不娶。惟食菖蒲根不饑不老。不知所終。神仙傳云。咸陽王典食菖蒲得長生。安期生採一寸九節菖蒲。服仙去。又按雕仙神隱書云。石菖蒲置一盆於几上。夜間觀書。則收烟無害目之患。或置星露之下。至旦取葉尖露水洗目。大能明視。久則白晝見星。端午日以服酒尤妙。蘇東坡云。凡草生石上。必須微土以附其根。惟石菖蒲濯去泥土。渍以清水。置盆中可數十年不枯。節葉堅瘦。根鬚連絡。蒼然於几案間。久更可喜。其延年終身之力。既非昌陽可比。至於忍寒淡泊。不待泥土而生。又豈昌陽所能彷彿哉。（李時珍）㊂下痢禁口。雖是脾虛。亦熱氣閉隔心胸所致。俗用木香失之溫。用山藥失之閉。惟參苓白朮散。加石菖蒲粳米飲調下。或用參苓石蓮肉少入菖蒲服。胸次一開。自然思食。（楊士

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瀛）㊄石菖蒲舒心氣。暢心神。怡心情。益心志。妙藥也。而世俗有散心之說。不知創自何人。審是則文王嗜此。何以多男而壽。考耶。故清解藥用之。賴以祛痰穢之濁而衛宮城。滋養藥用之。藉以宣心思之結而通神明。（王秉衡）㊅菖蒲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利十二字。瀕湖綱目以爲出於本經。而問經堂輯本無之。徐洄溪本經百種亦不錄。御覽引本經。有生石上一寸九節者。久服輕身云云。大觀本則無生石上三字。有一寸九節者良六字。作黑字。則大觀本以此六字爲出於名醫別錄者也。昌今本作菖。考左氏傳享有昌歜。杜注。昌歜。昌蒲葅。周禮醢人。朝事之豆。其實有昌本。鄭注。昌本。昌蒲根。切之四寸爲葅。說文。菹。昌蒲也。廣雅。邛。昌陽。菖蒲也。呂氏春秋。冬至後五旬七日。昌始生。淮南說山訓。昌羊去蚤蝨而來蛉窠。字皆作昌。則從章之菖。孳生後矣。（張山雷）㊆上洛郡。蜀梁州嚴道縣。在蜀郡。今乃處處有生。石磧上。概節爲好。在下溼地。大根者。名昌陽。不堪服食。眞菖蒲葉有脊。一如劍刃。四月五月亦作小簇花也。東閩溪澤。又有名溪蓀者。根形氣色。極似石上菖蒲。而葉正如蒲。無脊。俗人多呼此爲石上菖蒲者。謬矣。此止主咳逆斷蚤虱。不入服食用。詩詠多云蘭蓀芷。謂此也。（陶弘景）㊇菖蒲處處有之。而池州。戎州者佳。春生青葉。長一二尺許。其葉中心有脊。狀如劍。無花實。今以五月五日收之。其根盤屈有節。狀如馬鞭大。一根旁引三四根。旁根節尤密。亦有一寸十二節者。採之。初虛軃。曝乾方堅實。折之中心色微赤。嚼之辛香少滓。人多植於乾燥沙石土中。臘月移之。尤易活。黔蜀蠻人。常將隨行以治卒患心痛。其生蠻谷中者尤佳。人家移種者亦堪用。但乾後辛香堅實。不及蠻人持來者。此皆醫方所用石菖蒲也。又有水菖蒲。生溪澗水澤中。不堪入藥。今藥肆所貨多以二種相雜。尤難辨也。（蘇頌）㊈菖蒲今陽羨山中生水石間者。其葉逆水而生。根鬚絡石。略無少泥土。根葉極緊細。一寸不啻九節。入藥極佳。兩浙人家以瓦器種之。且暮易水則茂。水濁及有泥滓則萎。近方多用石菖蒲。必此類也。其池澤所生。肥大節疏粗慢。恐不可入藥。唯可作果盤氣味不烈而和淡爾。（馬志）㊉菖蒲新舊相代。四時常青。羅浮山記言山中菖蒲一寸二十節。抱朴子言服食以一寸九節紫花者尤善。蘇頌言無花實。然今菖蒲二三月間抽莖開細黃花成穗。而昔人言菖蒲難得見花。非謂無花也。應劭風俗通云。菖蒲放花。人得食之長年是矣。（李時珍）㊀石菖根多節者良。一寸九節者。名石上菖蒲。今單稱曰菖蒲。卽石上菖蒲也。名白菖者。乃端陽菖蒲也。（手板發蒙）㊁石菖多栽水盆。常灌水。則能繁茂。眼病人見其蒼色爲快。春抽莖。開細黃花成穗。凡石菖。菖蒲之類。葉有劍脊。氣甚芳香。白菖、燕子花之類。葉無劍脊。輭而靯色亦較淡。無香氣。謂之錢蒲。又一種鼠菖。一名高蒻。菖葉長一二寸。甚細小。爲貴品。（和漢三才圖會）

【菖蒲根】卽菖蒲之處方用名。詳『菖蒲』條。

【菖蒲酒】基本　本品係用菖蒲煎汁。和麴米釀或浸成之酒。

主治　三十六風。一十二痺。通血脈。治骨蒸。久服耳目聰明。

【菘】卽白菜之原名。詳『白菜』條。

【菘子】卽白菜子之原名。詳『白菜子』條。

【菘藍】㊀爲藍之一種。其葉色白如菘。故名。㊁卽大青之古籍別名。典見綱目。詳『大青』條。

【菘瓜】卽越瓜之古籍別名。典見綱目。詳『越瓜』條。

【菜伯】卽葱白之古籍別名。典見綱目。詳『葱白』條。

【菜油】卽蓫薹子之油之古籍別名。典見綱目。詳『蓫薹』條。

【菜芝】卽薤之古籍別名。典見別錄。詳『薤』條。

【菜花魚】卽杜父魚之俗名。詳『杜父魚』條。

【菜花銅】基本　此乃天生黃色之銅。今之黃銅。乃赤銅合爐甘石煉成。

性質　味辛。

主治　斂金瘡傷口。强脾益肺。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

除一切風痺。

【菜藍】 **產地**　廣信多出。

形態　黑根有鬚。叢生。綠莖。微有疏節。葉似大葉柴胡。粗紋疎齒。可供藥用。



菜藍

主治　治跌打損傷。

【蔌奠】 **原名**　蔌蕵。

命名　蔌蕵猶矮結。矮結者。短也。本品莖莖雖堅強。但短而小。故名。江浙人遂謂之蔌奠。

古籍別名　金剛根。王瓜草。（日華）鐵菱角。（綱目）拔穀。金剛刺。金剛骨。金剛拙。荊崗沙。老君鬚。鼈兒攙。（和漢藥考）矮結。（綱目）

基本　屬百合科蔌奠之地下莖。

產地　多在山野間。

形態　蔌奠爲山野自生之上昇蔓草。蔓莖細而堅。每節歪有光澤。高自二三尺至六尺。有曲刺葉互生。作卵圓形或橢圓形。惟托葉變爲卷鬚。恒纏繞他物。夏季於葉腋綴黃綠色六瓣小花。作繖形。雌雄異株。花後結紅色漿果。如豆大。其根爲木質狀或粉狀之地下莖。有節塊。稍有鬚根。長六七寸。粗一二寸。外面褐色。內部淡紅色。稍有不快苦味。市上用以混充土茯苓。



蔌奠

採取　二月八月間。採根曝乾。

製法　凡使以米泔浸。削去皮用。

性質

成分　甘。酸。平。溫。無毒。含有斯密拉辛。樹脂。色素。單寧。澱粉等。斯密拉辛爲白色無臭之結晶體。有苦味。稍溶於水。善溶於酒精。伊打等。逢强硫酸。初變紅色。次變紫色。終變黃色。

效能　止渴。治痢。用作發汗劑。

主治　腰背寒痛。風痺。益血氣。止小便利。

歷代記述攷證　【宋】大明日華諸家本草。論蔌奠曰。治時疾瘟瘴。【元】王好古湯液本草。論蔌奠曰。補肝經風虛。【明】李時珍本草綱目。論蔌奠曰。治消渴。月崩。下利。

配合應用　㈠治小便滑數。金剛骨爲末。每服三錢。溫酒下。睡時。（儒門事親方）

㈡治沙石淋疾。重者取去根本用。蔌奠二兩爲末。每米飲服二錢。後以地椒煎湯浴腰腹。須臾即通也。（聖濟總錄方）

㈢治消渴不止。拔穀即蔌奠。咬咀。半兩。水三盞。烏梅一個。煎一盞。溫服。（普濟方）

㈣治下痢赤白。金剛根、蠟茶等分。爲末。白梅肉搗丸。茨子大。每服五七丸。小兒三丸。白痢甘草湯下。赤痢烏梅湯下。（衛生易簡方）

㈤治風毒脚弱痺滿。上氣。田舍貧家。用此最良。用蔌奠洗剉一斛。以水三斛。煮取九斗。漬麴。去滓。取一斛。漬飲。如常釀酒。任意日飲之。（肘後方）

用量　三錢至四錢。

參攷資料　㈠取根浸赤汁。煮粉食。辟瘴（蘇頌）㈡今近道及江浙州郡多有之。苗莖成蔓。長二三尺。有刺。其葉如冬青。烏桑葉而差大。秋生黃花。結黑子。如櫻桃大。其根作塊。人呼金剛根。（蘇頌）㈢蔌奠山野中甚多。其莖似蔓而堅強。直生有刺。其葉團大。狀如馬蹄。光澤。似柿葉。不類冬青。秋開黃花。結紅子。其根甚硬。有硬鬚。如刺。其葉煎飲。酸滯。野人採其根。葉入染家用。名鐵菱角。吳普本草。以蔌奠爲狗脊非矣。（李時珍）㈣歲時記曰。昔有道士。每年除夜。至閭里。各贈藥一劑。將此納入紅袋。浸置井中。元旦自水中取出。和酒飲之。則不染瘟疫。名曰屠蘇酒。蓋卽屠去邪氣而蘇之意。其藥用赤朮。桂心各七錢半。防風一兩。蔌奠。蜀椒。桔梗。大黃各五錢七分。烏頭二錢半。赤小豆十四枚。配合而成。

【蔌荿】 卽薄荷之古籍別名。典見揚雄甘泉賦。詳『薄荷』條。

【蔌蕵】 卽蔌奠之原名。詳『蔌奠』條。

【蔌蕘】 卽薄荷之原名。詳『薄荷』條。

【蔌蕘】 卽薄荷之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

和漢藥考。詳『薄荷』條。

【菟丘】卽菟絲子之古籍別名。見廣雅。詳『菟絲子』條。

【菟竹】卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳『黃精』條。

【菟奚】卽款冬花之古籍別名。典見爾雅。詳『款冬花』條。

【菟絲子】**命名**　菟絲之根。其形似兔。故名。

處方用名　兔絲子。兔絲餅。

古籍別名　菟蘆（本經）菟縷。菟纍。赤網（別錄）菟丘（廣雅）玉女。唐蒙。（爾雅）火殃。草野狐絲。（綱目）烏麻。金菟。狐絲。老兔。鵌迎陽子。雞火蘭。無根藤。金線藤。金線草。金錢草。天碧草。（和漢藥考）

外國名詞　Guscuta japonica, choisi. var. thyrsoidea Engelm.（拉丁）Dodder.（英）

基本　屬旋花科。爲菟絲之子實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。以遼陽蓋平出產爲多。山東、河南、安徽、湖北均有產。冬季新。

形態　菟絲爲山野自生之蔓草。春季於地上伸莖如絲。得他植物而纏繞之。自絕其根。而由被纏之植物吸取滋養料以生長。莖細。初白色。後呈黃白色。不含葉綠素。莖之分枝。纏掛植物之梢。狀如掛麵。葉細小作鱗狀。驟視之若無葉。晚夏開花。大二三寸。帶赤白色。後結實。大一分餘。熟則呈黑褐色。內有種子二三粒。形似蘿蔔子。



菟絲子（一）



菟絲子（二）

採取　每年九月採實曬乾。

製法　雷敎曰。凡使勿用天碧草子。眞相似。只是味酸澁井黏也。菟絲採得去殼。用苦酒浸一二日。漉出。以黃精自然汁相對。浸一宿。至明。用微火煎至乾。入臼中燒熱。鐵杵舂去三千餘杵。成粉用之。李時珍曰。凡用以溫水淘去沙泥。酒浸一宿。曝乾。搗之。不盡者。再浸曝。搗須臾。悉細。又法。酒浸四五日。蒸曝四五次。研作餅。焙乾。再研末。或云曝乾。時入紙條數枚。同搗卽刻成粉。且省力也。

性質　辛。甘。平。無毒。

效能　補肝腎。生精髓。用作強壯收斂藥。

主治　續絕傷。補不足。益氣力。肥健人。（本經）養肌強陰。堅筋骨。主莖中寒。精自出。溺有餘瀝。口苦燥渴。寒血爲積。久服明目。輕身延年。（別錄）

歷代記述效證　【唐】甄權藥性本草論菟絲子曰。治男女虛冷。添精益髓。去腰疼膝冷。治消渴熱中。久服去面黯。悅顏色。【宋】大明日華諸家本草論菟絲子曰。補五勞七傷。治鬼交泄精。尿血。潤心肺。【元】王好古湯液本草論菟絲子曰。補肝臟風虛。【明】繆希雍本草經疏論菟絲子曰。菟絲子本經言其味辛平。別錄益之以甘者。正雷公所謂熏中和凝。正陽之氣而結者也。其爲無毒明矣。五味之中。惟辛通四氣。復兼四味。經曰。腎苦燥。急食辛以潤之。菟絲子之屬是也。與辛香燥熱之辛。迥乎不同矣。學者不以辭害義可也。爲補脾腎肝三經要藥。主續絕傷。補不足。益氣力。肥健者。三經俱實。則絕傷續而不足補矣。脾統血。合肌肉而主四肢。足陽明太陰之氣盛。則力長而肥健。補脾故養肌。益肝腎故強陰。堅筋骨。煖而能補腎中陽氣。故主莖中寒。精自出。溺有餘瀝。口苦燥渴者。脾腎虛而生內熱。津液因之不足也。二臟得補。則二病自愈。寒血爲積者。勞傷則血瘀。陽氣之絕則內寒。血隨氣行。氣弱不能統血以行。久而爲積矣。凡勞傷。皆脾腎肝三臟主之。肝脾氣旺。則瘀血自行也。久服明目輕身延年者。目得血而能視。肝開竅於目。瞳子神光屬腎。肝腎實。則目自明。臟實精滿。則身自輕。延年可必矣。【清】黃宮繡本草求眞論菟絲子曰。菟絲辛甘溫平。質黏。溫而不燥。補而不滯。得天地中和之氣。故書稱爲補髓添精。強筋健骨。止遺固泄。煖腰溫膝。明目祛風。爲補肝腎脾氣要劑。合補骨脂、杜仲用之。最爲得宜。但

417／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

杜仲、補骨脂、氣味辛溫。性昌趨下。不似菟絲氣味甘平。而不重降耳。若服之而見陽強不痿。其便燥結。小水赤澁者。以性主補故也。但菟絲子最難得眞。賈者有以水犀草子種出。形像絕似。藥肆所賣多屬此物。然服之亦有微功。浸酒煮爛作餅曝乾【清】。買九如辨藥指南論菟絲子曰。菟絲子蔓延草上。無根假氣而生。凝仲春正陽之氣。方始結實。稟氣中和。性味甘平。取子主於降。用之入腎。善補而不峻。益陰而固陽。凡滑精便濁。尿血餘瀝。虛損勞傷。腰膝痠痛。頑痲無力。皆緣腎虛所致。以此調養。無不奏效。又因味甘。甘能助脾。療脾虛久瀉。飲食不化。四肢困倦。脾氣漸旺。則衛氣自冲。肌肉得養矣。

配合應用　㈠菟絲子、蓮實、山藥、人參。能實脾止泄。嗜食加五味子、肉豆蔻、砂仁。能治腎泄。

㈡菟絲子、五味子、沙苑蒺藜、覆盆子、蓮鬚、山萊萸、巴戟天、車前子、沒食子、枸杞子。能益脾腎。固精種子。

㈢菟絲子、甘菊花、沙苑蒺藜、甘枸杞子、熟地黃、羚羊角、穀精草、決明子。能明目。

㈣治丈夫腰膝積冷痛。或頑痲無力。菟絲子、兎人參、牛膝、胡麻仁。

㈤單服。補人衛氣。能助人筋脈。

㈥王好古云。能補肝臟虛。故去風。專主腰膝。腰膝者。肝腎之所治也。

㈦治消渴不止。菟絲子煎汁。任意飲之。以止爲度。（事林廣記方）

㈧治陽氣虛損。用菟絲子、熟地黃等分爲末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。氣虛人參湯下。氣逆沈香湯下。（簡便方）又用菟絲子酒浸十日。水淘。杜仲焙。研。蜜炙。一兩。以薯蕷末酒煮糊丸。梧子大。每空心酒下五十丸。（經驗方）

㈨治白濁。遺精。茯菟丸。治思慮太過。心腎虛損。眞陽不固。漸有遺瀝。小便白濁。夢寐頻泄。菟絲子五兩。白茯苓三兩。石蓮肉二兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每服三五十丸。空心鹽湯下。（和劑局方）

㈩治小便淋瀝。菟絲子煮汁飲。

(11)治小便赤濁。心腎不足。精少血燥。口乾煩熱。頭暈怔忡。菟絲子、麥鬱冬等分爲末。蜜丸。梧子大。鹽湯每下七十丸。

(12)治腰膝疼痛。或頑痲無力。菟絲子洗一兩。牛膝二兩。同入銀器內。酒浸一寸五分。曝爲末。將原酒煮糊丸。梧子大。每空心酒服三二十丸。（經驗方）

(13)治肝傷目暗。菟絲子三兩。酒浸三日。曝乾爲末。雞子白和丸。梧子大。空心溫酒下二十丸。（聖惠方）

(14)治身面卒腫洪大。用菟絲子一升。酒五升。漬二三宿。每飲一升。日三服。不消再造。（肘後方）

(15)治婦人橫生。菟絲子末。酒服二錢。一加車前子等分。（聖惠方）

(16)治眉鍊癬瘡。菟絲子炒研。油調傅之。（山居四要方）

(17)治穀道赤痛。菟絲子熬黃黑爲末。雞子白和塗之。亦治痔如蟲咬。（肘後方）

用量　一錢至三錢。

施用宜忌　凡腎家多火。陽強不痿。以及大便燥結者。禁用。惡灌菌。蕈。預。松枝爲使。得酒良。

著名方劑　㈠茯菟丸。治強中消渴。（局方）菟絲子（酒浸）十兩。茯苓三兩。石蓮子三兩。五味子八兩。山藥六兩。上以酒煮山藥。搗和藥末爲丸。㈡大菟絲子丸。治腎氣虛損。五勞七傷。脚膝痠疼。面目黧黑。目眩耳鳴。心衝氣短。時有盜汗。小便數滑。（局方）菟絲子、鹿茸（酥炙去毛）、澤瀉、石龍芮、桂枝、附子各一兩。石斛、熟地、茯苓、牛膝（酒浸焙）、山萸肉、續斷、防風、杜仲、蓯蓉（酒浸焙）、補骨脂（酒炒）、蕈蓯、茄、巴戟、沉香、茴香各七錢半。五味子、川芎、桑螵蛸、覆盆子各五錢。上爲細末。麵糊爲丸。

參攷資料　㈠抱朴子仙方單服法。取實一斗。酒一斗。浸曝乾。再浸又曝。令酒盡乃止。搗篩。每酒服二錢。日二服。此藥治腰膝去風。兼能明目。久服令人光澤。老變爲少。十日外飲喫。如湯沃雪也。（蘇頌）㈡菟絲蔓生。施於草上。柔細且長。而極堅韌。子又多脂。故爲養陰通絡上品。其味微辛。則陰中有陽。守而能走。與其他滋陰諸藥之偏於

（范汪方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膩滯者絕異。繆仲醇謂五味之中。辛通四氣。經言辛以潤之。菟絲子之屬是也。與辛香燥熱之辛迥乎不同。所解極爲剴切。本經續絕傷。補不足。益氣力。肥健人。於滋補之中。皆有宣通百脈。溫運陽和之意。不僅以物質主治。而含天然之氣味性情。此吾國藥物之學。不言理化。而實得理化學之最上乘者。汁去面皯。亦柔潤肌膚之功用。久服則陰液足而目自明。陽氣長而身自輕。皆有至理。弗疑爲仙佛家欺人之語。別錄所謂養陰強肌。堅筋骨。亦陰陽兩調之義。壅寒精滑。則元陽不遏而至陰不攝也。瀉有餘瀝。則腎陽不布而大氣不舉也。若夫口苦燥渴。明爲陰液之枯涸。寒血成積。亦爲陽氣之不宣。惟此善滋陰液。而又敷布陽和。流通百脈。所以治之。以視地黃輩之專於補陰。守而不走者。固有間矣。（張山雷）

【菟絲子苗】　性質　甘。平。無毒。

主治　研汁塗面。去面黯。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論菟絲子苗曰。搓碎煎湯浴小兒。療熱瘡。

參攷資料　菟絲子苗汁。伏三黃。硫、汞、結草砂。（綱目）

【菟葵】　古籍別名　天葵。（圖經）落雷丸草。（外丹本草）節分草。（植物學大辭典）

外國名詞　Eranthis pinnatifida, Maxim.（拉丁）セツブンサウ（日本）

基本　係毛茛科菟葵屬。藥用其苗莖。

產地　凡山野樹陰平原澤田間有出。

形態　菟葵爲濕草類之多年生草本。莖高三寸或五寸。葉爲掌狀深裂。有長葉柄。三四月間在葉之總苞間抽出一梗。開白色五瓣花於莖頂。其莖紫黑。堪供藥用。

採取　六七月間採莖葉。日乾用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　下諸石五淋。止虎蛇毒。諸瘡搗汁飲之。塗瘡能解毒止痛。

參攷資料　㈠菟葵苗如石龍芮而葉光澤。花白似梅。其莖紫黑。煮啜極滑。所在下濕田間皆有。人多識之。六月七月採莖葉。曝乾入藥。（蘇恭）㈡郭璞注爾雅云。菟葵似葵而小。葉狀如藜。有毛。灼之可食。而滑。（掌禹錫）㈢菟葵絲葉如黃蜀葵。其花似拒霜甚雅。其形至小。如初開單葉蜀葵。有檀心。色如牡丹。姚黃。其葉則蜀葵也。唐劉夢得所謂菟葵燕麥動搖春風者是也。（寇宗奭）㈣按鄭樵通志云。菟葵天葵也。狀如葵菜。葉大如錢而厚。面青背微紫。生於崖石。凡丹石之類。得此而後能神。所以雷公炮炙論云。如要形堅。豈忘紫背。謂其能堅鎖也。此說得於天台一僧。又按南宮從崎嶇神書云。紫背天葵出蜀中。黳草也。生於水際。取自然汁煮汞則堅。亦能煮八石拒火也。又按初虞世古今錄驗云。五月五前齋戒。看桑下有菟葵者。至五日午時。至桑下咒曰。蟠黎乎。俱當蘇婆訶。咒畢。乃以手摩桑陰一遍。口齧菟葵及五葉草。嚼熟。以唾塗手。熱搯令徧。再齋七日。不得洗手。後有蛇蟲蠍蜃咬傷者。以此手摩之。即愈也。李時珍稱謂古有祝由一科。此亦其類。但不知必用菟葵。取何義也。若謂其相制。則治毒蟲之草亦多矣。（李時珍）

【菟桃】　即苦參之古籍別名。典見別錄。詳『苦參』條。

【菟縷】　即菟絲子之古籍別名。典見別錄。詳『菟絲子』條。

【菟蘆】　即菟絲子之古籍別名。典見本經。詳『菟絲子』條。

【菟蔞】　即菟絲子之古籍別名。典見別錄。詳『菟絲子』條。

【菠菜】　原名　波薐。

古籍別名　波斯草。波斯菜。赤根菜。（綱目）洋菜。紅菜。（綱目拾遺）

外國名詞　Spinacea oleracea, Mill.（拉丁）ハウレンサウ（日本）

基本　係藜科菠薐屬。爲菠菜之莖葉。

形態　菠薐爲菜類之一年生或越年生草本。高二尺許。葉互生。作卵圓形而尖。如三角狀。其基部之兩側有尖部。花小。黃綠色。花單性。雄花與雌花異株。其根色赤而味甜。實有刺。狀如蒺藜。

419／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



菠菜

性質 甘。冷滑。無毒。

主治 利五臟。通腸胃。熱。解酒毒。服丹石人食之佳。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論菠菜曰。通血脈。開胸膈。下氣調中。止渴潤燥。菜根尤良。【清】黃宮繡本草求眞論菠菜曰。菠薐出自西域。何書皆言能利腸胃。蓋因滑則通竅。菠薐實滑而利。凡人久病大便不通。及痔漏關塞之人。宜咸用之。又言能解熱毒酒毒。蓋因寒則療熱。菠薐氣味既冷。凡因癰腫毒發。並因酒遲成毒者。須宜用此以服。且毒與熱未有不先由胃而始。及腸。故藥多從甘入。菠薐既滑且冷。而味又甘。故能入胃清解。而使其熱與毒。盡從腸胃而出矣。然此服之過多。爲害不淺。張璐云。凡蔬菜皆能疎利腸胃。而菠薐冷滑尤甚。又曰。多食令人脚弱。發腰痛。動冷氣。與鮓魚同食。發霍亂。則知此卽可以供蔬。而用又當斟酌於其中也。【清】王士雄隨息居飲食譜論菠菜曰。菠薐甘辛溫。開胸膈。通腸胃。潤燥活血。大便澀滯及患痔人宜食之。根味尤美。秋種者良。驚蟄後不宜食。病人忌之。【清】趙學敏本草綱目拾遺論菠菜曰。止血治刑杖瘀血攻心。擣汁沖酒服卽散。可理跌打。

參攷資料 ㊀北人食肉麵。食之卽平。南人食魚鼈水米。食之卽冷。故多食必冷大小腸也。(孟詵) ㊁按張從正儒門事親云。凡人久病大便澀滯不通。及痔漏之人。宜常食菠薐菜之類。滑以養竅。自然通利。(李時珍) ㊂按掌禹錫嘉話錄云。菠薐種出自西國。有僧將其子來。云本是頗陵國之種。語訛爲菠薐耳。(唐愼微) ㊃按唐會要云。太宗時。尼波羅國獻菠薐菜類紅藍。實如蒺藜。火熟之。能益食味。卽是此也。方士隱名爲波斯草云。(李時珍) ㊄菠薐八月九月種者可備冬食。正月二月種者。可備春蔬。其莖柔脆中空。其葉綠膩柔厚。直出一尖。旁出兩尖。似鼓子花葉狀而長大。其根長數寸。大如桔梗而色赤。味更甘美。四月起薹尺許。有雄雌。就莖開碎紅花叢簇。不顯雌者結實。有刺。狀如蒺藜。子種時須砑開。易浸脹。必過月朔乃生。亦一異也。(李時珍) ㊅菠菜粥。乃以菠菜和米煮成之粥。功用和中潤燥。(醫學大辭典)

【菠薐】卽菠菜之原名。詳「菠菜」條。

【芣子】卽馬蘭子之處方用名。詳『馬蘭子』條。

【菡萏】卽蓮花之古籍別名。典見綱目。詳『蓮花』條。

【蔽】卽青蒿之古籍別名。典見『本草』。詳『青蒿』條。

【耕葉】 古籍別名 大薟。(本經)大薟。(別錄)析目。梨目。馬駒。(吳普)馬辛。(綱目)老薟。(新修本草圖經)

基本 係十字花科薺屬。爲薪葉之子實。其苗詳見該條。

產地 生原野間。

性質 辛。微溫。無毒。

主治 明目目痛淚出。除蟁。補五臟。益精氣。(本經)療心腹膿痛。

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論耕葉子曰。治肝家積聚。眼目赤腫。

配合宜忌 惡乾薑、苦參。或謂苦參爲之使。得蓽茇、細辛良。

【耕葉】卽薺菜之莖梗有毛者。典見綱目。詳『薺菜』條。

【耕葉苗】 性質 甘。平。無毒。

主治 和中益氣。利肝明目。

【蕙茞】卽薺茞之古籍別名。典見『爾雅』。詳『薺茞』條。

【菩提子】卽無患子之古籍別名。典見綱目。詳『無患子』條。

【菩薩石】 古籍別名 放光石。陰精石。(綱目)

形態 菩薩石爲石類石英屬之一種。其質六稜。大如棗栗。色白瑩潔。映日有光彩微芒。其有小如櫻珠。五色燦然可喜。可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 解藥毒。蠱毒。及金石藥發動。作癰疽。渴疾。消痰。損瘀血。止熱狂。驚癎。通月經。解風腫。除淋。並水蠱。服蛇蟲蜂蠍。狼犬毒。箭等傷。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

並末傳之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論菩薩石曰明目去翳。

【菩薩豆】卽續隨子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『續隨子』條。

【菩薩草】　**產地**　生江浙諸省之山野間。

形態　菩薩草爲草類之一種。四時不凋。秋冬有花。結赤子如翦頭。其根可供藥用。

採取　冬月採之。

性質　苦。無毒。

主治　中諸食毒。酒研服。諸蟲傷。搗汁飲。并傳患處。妊娠咳嗽。搗篩蜜丸服。

【華水】卽芙蓉之古籍別名。典見綱目。詳『芙蓉』條。

【華草】卽陸英之古籍別名。典見別錄。詳『陸英』條。

【華蓋】卽黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃丹』條。

【華蟲】卽雉之古籍別名。典見綱目。詳『雉』條。

【菰】卽茭白之原名。詳『茭白』條。

【菰子】卽土茵之古籍別名。典見食物本草。詳『土茵』條。

【菰手】卽茭耙之原名。詳『茭耙』條。

【菰米】卽茭米之原名。詳『茭米』條。

【菰首】卽茭耙之古籍別名。典見蜀本草。詳『茭耙』條。

【菰根】卽茭白根之別名。詳『茭白根』條。

【菰筍】卽茭白之芽。典見綱目。詳『茭白』條。

【菰菜】卽茭白之古籍別名。典見圖經本草。詳『茭白』條。

【菰蔣】卽茭白根之古籍別名。典見綱目。詳『茭白根』條。

【菰蔣草】卽茭白之苗有莖梗者。典見本草拾遺。詳『茭白』條。

【菱】　**原名**　芰實。

命名　本品苗葉支散。故字從支。其角棱峭。故謂之菱。

處方用名　菱角。菱肉。

古籍別名　薢（別錄）水栗。（風俗通）厥樝。薢茩（爾雅）沙角。薩野菱。家薩。折腰薩。郢城薩。浮根薩。青水薩（綱目）烏薩（俗名）

外國名稱　Trapa natans, L.（拉丁）ヒシ　ヒシノミ（日本）



菱

基本　係菱科菱屬。藥用其角實。

產地　多在池澤陂塘中。

形態　菱爲水草類之一年生草本。根生土中。其莖自水中達水面及細裂之根狀葉。漂於水中。葉略作三角形。有鋸齒。葉柄長。浮水面中部膨大爲浮囊。夏月開花。花白有四瓣。雄蕊四枚。單生於葉腋。果實爲兩角形。有青紅二色。與花、殼、帶、粉皆可療疾。詳各該條。

採取　夏秋採之。

用法　生食或蒸煮。或搗爛澄粉用。

性質　甘。平。無毒。

效能　清暑泄熱。用作解熱毒藥。又爲滋補劑。

主治　安中補五臟。不飢。輕身。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論菱曰。蒸暴和蜜餌之。可斷穀長生。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論菱曰。解丹石毒。【明】李時珍本草綱目論菱曰。解暑。解傷寒積熱。止消渴。解酒毒。射菌毒。【淸】黃宮繡本草求眞論菱曰。菱角種類雖多。氣滯則一。卽書有言安中消水。止渴解酒。療癘治痢。及有紅瀉白補。生熟降升之說。然亦止供食品。而於治療則無。且於過食則有腹滿塡腹。損腸痿瘁之慮。必取麝香生薑臭茱萸作湯。及或沉香磨汁以導。是亦味甘性寒。助濕增滯之一證也乎。性平之說。似不足信。【淸】王士雄隨息居飲食譜論菱曰。澤芰鮮者甘涼。析醒淸熱。多食損腸助濕。胃寒脾弱人忌之。老者風乾。肉反輕嫩。熟者甘平。充飢代穀。亦可澄粉。補氣厚腸。多食滯氣。胸腹痞脹者忌之。茨花向日。菱花向月。故茨燥而菱寒。鑢號菱花。謂女人容貌如月也。

參攷資料　㈠搗爛澄粉食。補中延年。（陳仙）㈡生食性冷利。多食傷人臟腑。損陽氣。痿瘁。生蟯蟲。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水族中此物最不治病。若過食腹脹者。可煅灰酒服之。即消。亦可含臭茶黃咽津。（孟詵）㊂仇池筆記。言蔆花開背日。茨花開向日。故蔆寒而茨暖。別錄言芰實性平。豈生者性冷而乾者則性平歟。（李時珍）㊃芰葉支散。故字從支。其角棱峭。故謂之蔆。而俗呼爲蔆角也。昔人多不分別。淮王安貧武陵記。以三角四角者爲芰。兩角者爲蔆。左傳風到嗜芰。即此物也。爾雅謂之厥櫺。音眉。又許愼說文云。蔆楚謂之芰。秦謂之薢茩。楊氏丹鉛錄。以芰爲雞頭。引醴陵縣緝芰荷以爲衣。言蔆葉不可緝衣。皆誤矣。按爾雅薢茩。乃決明之名。非厥櫺也。又爾雅芰荷。乃藕。上出水生花之莖。非雞頭也。與蔆同名異物。（李時珍）㊄芰蔆有湖澨處則有之。蔆落泥中。最易生發。有野蔆家蔆。皆三月生。蔓延引葉浮水上。扁而有尖。光而如鏡。葉下之莖。有股如蝦股。一莖一葉。兩兩相差。如蝶翅狀。五六月開小白花。背日而生。晝合宵炕。隨月輕移。其實有數種。或三角四角。或兩角無角。野蔆自生湖中。葉實俱小。其角硬直。刺人。其色嫩青老黑。嫩時剝食甘美。老則蒸煮食之。野人曝乾。剝米爲飯爲粥。爲餻爲果。皆可代糧。其莖亦可曝收。和米作飯。以度荒歉。蓋澤農有利之物也。家蔆種於陂塘。葉實俱大。角奧而脆。亦有兩角彎卷如弓形者。其色有青有紅有紫。嫩時剝食。皮脆肉美。蓋佳果也。老則殼黑而硬。墜入江中。謂之烏蔆。冬月取之。風乾爲果。生熟皆佳。夏月以糞水澆其葉。則實更肥美。按段成式酉陽雜俎云。蘇州折要菱多兩角。荊州鄖城菱三角無刺。可以按涉。漢武帝昆明池有浮根菱。亦曰青水蔆。葉沒水下。蔓出水上。或云玄都有雞翔菱。碧色。狀如雞飛。仙人飛伯子常食之。（李時珍）

【菱肉】即菱之處方用名。詳『菱』條。

【菱弟】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【菱角】即菱之處方用名。詳『菱』條。

【菱粉】基本　本品係用菱實搗浸澄出之粉。

製法　同藕粉條。

主治　補脾胃。强脚膝。益氣耐饑。健力行水。去暑解毒。

參攷資料　菱粉食之。腹脹者。用薑湯或酒可解之。（趙學敏）

【菱殼】採取　以老而堅黑者入藥良。

性質　濇。無毒。

主治　頭面黃水瘡。無名腫毒。指頭天蛇。燒灰香油調敷。脫肛。先以麻洞澄腸頭塗。再以菱殼水洗之。染鬚髮。

【菱蒂】主治　去疣子。取鮮者搽之。

【菱實粉粥】基本　本品係用菱實粉和米煮成之粥。

主治　益腸胃。解內熱。

【菲根】即羊蹄之古籍別名。典見和漢藥考。詳『羊蹄』條。

【莫草】即蘁草之古籍別名。典見許愼說文。詳『蘁草』條。

【菴摩勒】古籍別名　餘甘子。（唐本）菴摩落迦果。（梵書）

基本　係大戟科神子木屬。爲菴摩勒之實與仁。

產地　生山谷中。

形態　菴摩勒爲喬木類之落葉木本。葉長五六分。爲線狀橢圓形。葉端鈍。對生於纖枝上。並列而如羽狀。覆葉。雄花雌花。生於同株。花細小。黃色。雄花叢生。有花梗。雌花少數。無梗。花被五六片。爲卵長形。結實爲肉實。形圓而帶六稜。大如梅子。色青白。連核作五六瓣。乾則並核皆裂。至冬成熟。其實與仁俱可供藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　風虛熱氣。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論菴摩勒實與仁曰。補益强氣。合鐵粉一斤用。變白不老。取子壓汁。和油塗頭。生髮。去風癢。令髮生如漆黑。【唐】李珣海藥本草論菴摩勒實與仁曰。主丹石傷。肺上氣。咳嗽。久服輕身延年長生。服乳石人宜常食之。【宋】寇宗奭本草衍義論菴摩勒實與仁曰。爲末點湯服。解金石毒。【明】李時珍本草綱目論菴摩勒實與仁曰。解硫黃毒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【菴摩落迦果】即菴摩勒之古籍別名。典見梵書。詳『菴摩勒』條。

【菴摩邏迦果】即菴羅果之古籍別名。典見佛書。詳『菴羅果』條。

【菴羅果】古籍別名　菴摩羅迦果（佛書）香盞。（綱目）

基本　出西域諸地。安南諸番地亦有之。

形態　菴羅果爲果類中屬之一種。葉似茶葉。實似北梨。夏月乃成熟。可供食與藥用。其葉詳見該條。

採取　五月六月採之。

性質　甘。溫。無毒。

主治　食之止渴。

歷代記述攷證　【唐】陸士良食性本草論菴羅果曰。主婦人經脈不通。丈夫瞥衛中血脈不行。久食令人不飢。

參攷資料　菴羅果動風。凡天行病及食飽後。俱不可食。同大蒜辛物食之。令人患黃病。（馬志）

【菴羅葉】基本　本品即菴羅果之葉也。

主治　渴疾。煎湯飲。

【菴蕳子】命名　菴草堂也。閭里門也。本品老莖可以蓋覆菴閭。故名。

處方用名　菴蕳實。蕳蒿子。菴蕳蒿。

古籍別名　覆蕳（綱目）犬蓬（日本）

基本　係菊科艾屬。爲菴蕳之子實。

產地　凡山野川澤及平原溼地。恒有生焉。

形態　菴蕳爲溼草類之多年生草本。高數尺。莖白如艾而粗。葉如菊而缺刻不深。質厚。梢葉較細。通常有三尖。夏秋間自葉腋出細莖。開小頭狀花。排列作穗狀。色淡黃或淡褐色。似牡蒿而微大。其實小如艾。中有細子。極易繁衍。採得子實。供藥用。

採取　九十月間採之。

製法　採得陰乾用。

性質　苦。微寒。無毒。

效能　散瘀血止痛。逐水邪。消腫。用作利尿藥。又爲活血鎮痛藥。

主治　五臟瘀血。腹中水氣。膿腹留熱。風寒溼痺。身體諸痛。久服輕身延年不老。（本經）又療心下堅。腸中寒熱。周痺。婦人月水不通。消食明目。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論菴蕳子曰。益氣。主男子陰瘡不起。治心腹脹滿。【宋】大明諸家本草論菴蕳子曰。腰脚重痛。膀胱痛。及骨節煩痛。不下食。【明】李時珍本草綱目論菴蕳子曰。擂酒飲。治閃挫腰痛。及婦人產後血氣痛。【明】李士材本草圖解論菴蕳子曰。菴蕳子味苦。微寒。無毒。主風寒溼痺水腫。

配合應用　㈠菴蕳子同牛膝、茜草、白茅。消腹癥。去留血。又主瘀血腹脹。俗呼爲單腹脹。四肢不腫者。是其候也。

㈡善辟蛇。蛇著之即爛。

㈢治瘀血不散。變成癰腫。生菴蕳蒿搗汁一升。服之。（廣利方）

㈣治月水不通。婦人宿有風冷。留血積聚。月水不通。菴蕳子一升。桃仁二升。酒浸去皮尖。研勻。入瓶內。以酒二升。浸封五日後。每飲三合。日三服。（聖惠方）

㈤治產後血痛。菴蕳子一兩。水一升。童子小便二盃。煎服。（瀕湖集簡方）

用量　錢半至二錢。

施用宜忌　凡無瘀滯溼阻者禁用。荊實慈茨爲之使。

參攷資料　㈠本經言久服輕身不老。而古方少有服食者。惟入諸雜治藥中。如胡治治鬻邪狸骨丸之類。大方中用之。孫思邈千金翼。菴蕳宜獨行方。主蹉折瘀血。並單用菴蕳煮汁服。亦可末服。今人治打撲多用此法。或飲或散。其效最速。（蘇頌）㈡貞元廣利方謂之菴蕳蒿云。又史注云。菴廬。菴行宿室也。則閭似當作廬。（李時珍）㈢菴蕳子生雍州川谷。亦生上黨及道邊。十月採實陰乾。（別錄）㈣今江淮亦有之。春生苗。葉如艾。蒿高二三尺。七月開花。八月結實。九月採實。（蘇頌）㈤狀如蒿艾之類。近道處處有之。仙經亦時用之。人家種此辟蛇也。（陶弘景）㈥菴蕳葉不似艾。似菊葉而薄。多細丫面背皆青。高者四五尺。其莖白色如艾。實中有細子。極易繁衍。葉花者以之接菊。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【菴蕳實】卽菴蕳子之處方用名。詳『菴蕳子』條。

【菴蕳蒿】卽菴蕳子之處方用名。詳『菴蕳子』條。

【菸草】卽烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烟草』條。

【菁】卽蜀葵之古籍別名。典見爾雅。詳『蜀葵』條。

【菽】卽黑大豆之俗名。詳『黑大豆』條。

【菽乳】卽豆腐乳之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『豆腐乳』條。

【菻菜】命名　菻典甜通。以其味甜故名。

古籍別名　蒼蓮菜。蓼葉根色紅紫者名火筷菜。（植物學大辭典）

外國名詞　Beta vulgaris, L.（拉丁）フダンサウ（日本）

基本　係藜科菻菜屬。爲菻菜之莖葉。其根、子詳見各該條。

產地　生田野間園圃中。

形態　菻菜爲菜類之一年生或越年生草本。春秋兩期。可以下種。莖高二尺餘。根肥大。有黃赤白等色。葉大互生。長卵形。微帶紫色。花小黃綠色。蓼五裂。雄蕊五。雌蕊一。有苞作穗狀花序。結實內有細子。其莖葉可供食與藥用。

性質　甘苦。大寒。滑。無毒。

主治　時行壯熱。解風熱毒。搗汁飲之。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論菻菜曰。夏月以菜作粥食。解熱止熱毒痢。搗爛傅炙瘡止痛易瘥。【唐】陳藏器本草拾遺論菻菜曰。搗汁服。主寒熱痢止血生肌。及諸禽獸傷。傅之立愈。【宋】大明諸家本草論菻菜曰。煎湯飲。開胃通心膈。宜婦人。【明】李時珍本草綱目論菻菜曰。補中下氣。理脾氣。去頭風。利五臟。

參攷資料　菻菜性平微毒。冷氣人不可多食。動氣。患腹冷者食之必破腹作瀉。（掌禹錫）

【菻菜子】主治　麥牛生搗汁服。治小兒熱。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論菻菜子曰。醋浸揩面。去粉滓。潤澤有光。

【菻菜根】性質　甘。平。無毒。

主治　通經脈。下氣。開胸膈。

【菻菜粥】基本　本品係用菻菜和米煮成之粥。

主治　健胃益脾。

【草勃】卽藁本。詳『藁本』條。

【草麻子】卽蓖麻子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓖麻子』條。

【草決】卽草決之古籍別名。典見和漢藥考。詳『草決』條。

【草蔴子】卽蓖麻子之處方用名。詳『蓖麻子』條。

【草蘜】處方用名　川草蘜。粉草蘜。

古籍別名　赤節（別錄）百枝（吳普）竹木（炮炙論）白拔奠（綱目）土瓜野老。蕊蘜。草決。飯頭（和漢藥考）

基本　爲草蘜之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。草蘜產四川、湖南、江西、均稱川草蘜。產廣東西北兩江連州等處爲土太。質硬。四川者質綿。產安南東京者質亦硬。不及四川。但勝於廣東之土太。

形態　草蘜爲蔓生草本。苗葉俱青。葉作三叉似山蓥叉似綠豆葉。花有黃紅白數色。亦有無花而結白子者。其根爲黃白色。多節之根。粗四五分。狀如山藥。

採取　二月八月。採根曝乾。

製法　凡使須以其根。細長淺白而虛韌者佳。酒浸一宿。焙乾或鹽水炒用。

性質　苦。平。無毒。

效能　瀉血分溼熱。療淋濁水瀉。用爲治風利溼。及諸瘡藥。

主治　腰脊痛。强骨節。風寒溼周痺。惡瘡不瘳。熱氣（本經）傷中。恚怒陰痿失溺。老人五緩。關節老血。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論草蘜曰。冷風癖痺。腰脚癱緩不遂。手足攣掣。男子臂腰痛久冷。腎間有膀胱宿水。【宋】大明諸家本草論草蘜曰。頭旋癎疾。補水臟。堅筋骨。益精中風失音。【元】王好古湯液本草論草蘜曰。補肝虛。【明】李時珍本草綱目論草蘜曰。治白濁。莖中痛。痔瘻壞瘡。【明】

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

繆希雍本草經疏論草蘗曰。草蘗味苦甘平。無毒。爲祛風除溼補益下元之要藥。故主腰背痛。强骨節。風寒溼周痺。惡瘡不瘳。熱氣傷中。恚怒。陰痿失溺。關節老血。老人五緩。正以苦能燥溼。甘入脾而益血。故悉主之。甄權又主冷風癘痺腰脚癱緩不遂。手足驚掣。男子腰痛久冷。腎間有溼。膀胱宿水。日華子主頭旋癇疾。補水臟。堅筋骨。益精明目。中風失音。海藏主肝虛李氏治白濁塞中痛。痔漏壞瘡。已上諸證。無非陽明溼熱流入下焦。客於肝腎所致。此藥祛陽明之溼熱。以固下焦。故能去濁分清而療下元虛冷溼邪爲病也。【明】李士材本草圖經論草蘗曰。草蘗苦平。胃與肝藥也。搜風去溼。補腎强筋。主白濁塞中痛。陰痿失溺。惡瘡入肝搜。風。故能理風與筋之病。入胃祛溼。故能理濁與瘡之病。古人或稱其攝溺之功。或稱其逐水之效。何兩說相懸耶。不知腎爲閉藏之本。腎氣强旺。則自能收攝而妄水亦無容藏之地。且善清胃家溼熱。故能去濁分清也。楊氏草蘗分清飲。正得此意。【清】黃宮繡本草求眞。論草蘗曰。草蘗味苦氣平。功當祛風除溼。固腎。凡人大便燥結。小便頻數。每於便時痛不可忍者。此必大便熱閉。積熱腐瘀等物同液乘虛流入小腸。故於便時卽作痛也。且水道不清。則溼熱不除。而肝火愈熾。筋骨愈痿。草蘗氣味苦平。既能入肝祛風。復能引水歸入大腸。以通穀道。俾水液澄清。而無痛苦之患矣。又安有痺痛腰冷。膀胱宿水。與陰痿失溺痔瘡惡瘡之累乎。昔人云。既有逐水之功。復有攝精之力。洵不誣耳。拔葜、土茯苓與草蘗雖不相類。而功用不遠。白虛輾者良。【清】貫九如辨藥指南論草蘗曰。草蘗性味淡薄。長於滲溼。帶苦亦能降下。主治風寒溼痺。男子白濁。塞中作痛。女人白帶。病緜。胃中濁氣下流所致。以此入胃。驅溼。其症自愈。又治瘡痒惡厲。溼爛。肌膩。營衛不得宣行。致經脈拘攣。手足不便。以此滲去脾溼。能令血脈調和也。

近人學說　張山雷曰。草蘗蔓生。故性能流通脈絡。而利筋骨。入藥用根。則沈墜下降。故主治下焦。雖微苦能泄。而質輕氣清。色味皆淡。則清熱理溼。多入氣分。少入血分。本經主腰背痛。乃腎有溼熱濁氣不去。而腰膂爲之疼痛。非腎虛無溼之腰痛。所可渾同施治。强骨節者。宣通百脈。溼濁去而正氣自强。非能補益。以助其强固。此藥理之至易辨者。楊氏有草蘗分清飲。專治溼熱淋濁。正是此意。惟方中有益智仁溫而且澁。性正相反。不能並列。殊有誤會。瀕湖綱目謂草蘗能治陽明之溼。而固下焦。故能去濁分清。立說甚允。然又謂楊氏此方。治眞元不足。下焦虛寒。小便頻數云云。則與草蘗性情。兩相背謬。殆爲智仁一物而展轉誤認。甚非藥理之眞。讀古人書。愼勿爲其所眩。本經又主風寒溼周痺。頤謂惟溼熱痺著。最爲合宜。若曰風寒。必非此苦泄滲者所能俾效。又治惡瘡不瘳。熱氣者。豈非爲溼與熱蒸之主藥乎。別錄謂主傷中。亦惟脾爲溼困者宜之。決非補中之藥。又治恚怒。頗不可解。又謂陰萎失溺。則溼熱閉結者。亦有萎蹙不仁。溲溺不利之症。必非可以起虛痿。又謂治老人五緩。關節老血。則語太浮泛。且與草蘗眞性。不相符合。何可輕信。不謂繆仲淳因此二語。竟謂此物爲補益下元之要藥。又謂甘入脾而益血。以滲泄利溼之效用。而說到補陰上去。可謂顚頇已極。不如石頑逢原。謂古人或稱攝精。或稱利水。何其兩說相懸。不知溼濁去而腎無邪熱之擾。腎氣藥能收攝。顚能窺見玄奧也。甄權謂主冷氣癘痺腰脚癱緩不遂。男子臀腰痛久冷。（臀公對切。音憒。玉篇謂腰忽痛也。）壽頤按此卽周痺陰萎之症。然惟溼熱爲患。乃宜此藥。甄氏冷氣久冷之說大誤。甄又謂治腎間有溼。膀胱宿水。是也。而今本瀕湖綱目引此二句。脫一溼字。乃作腎間有膀胱宿水。遂令人無從索解。俗本誤人。眞是不小。繆氏經疏引此不誤。王好古謂補肝虛亦不可訓。尤奇者莫如日華本草。竟謂補水臟。堅筋骨。益精明目。頭旋癇疾。中風失音云云。龐雜之極。最爲蕪穢。頤每謂唐宋人藥物之學。固多有未可盡信者。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

而必以大明氏爲荒謬之尤。不知瀕湖何所取裁。亦爲之作抄書胥。而不加芟薙耶。

配合應用　㈠革薢得牛膝、木瓜、蕙苡仁、黃檗、骨碎補、續斷、杜仲、石斛、生地黃、狗脊。治腰脊痛。强骨節。加朮、菖蒲、茯苓。治周痺。

㈡革薢同黃耆、生地黃、金銀花、皂角刺、皂莢子、牛膝、木瓜、石斛、薏苡仁、海風藤、白殭蠶、胡麻。治惡瘡久不瘳。

㈢革薢同蓮子、茯苓、車前子、木通、澤瀉、牛膝、黃檗、甘草。可分清除濕。

㈣治腰脚痺輭。行履不穩者。革薢二十四分。杜仲八分。搗篩。每旦溫酒服三錢匕。禁牛肉。（唐德宗貞元廣利方）

㈤治小便頻數。川革薢一斤爲末。酒糊丸。梧子大。每鹽酒下七十丸。（集玄方）

㈥治白濁頻數。漩面如油。澄下如膏。乃眞元不足。下焦虛寒。革薢分清飲。用革薢、石菖蒲、益智仁、烏藥等分。每服四錢。水一盞。入鹽一撮。煎七分。食前溫服。日一服。效乃止。

㈦治腸風痔漏。如聖散。用革薢、貫衆去土等分爲末。每服三錢。溫酒空心服之。（孫尙藥傳家祕寶方）

㈧治頭痛發汗。革薢、旋覆花、虎頭骨。酥炙。等分爲散。欲發時。以溫酒服二錢。暖臥取汗立瘥。（聖濟總錄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛而無濕熱者禁用。畏葵根、大黃、柴胡、前胡。忌茗醋。惡苡爲之使。

參攷資料　㈠革薢、拔葜、土茯苓。三物形雖不同。而主治之功不相遠。豈亦一類數種乎。雷敩炮炙論序云。蟇皺漩多。夜煎竹木。竹木革薢也。漩多白濁。皆是濕氣下流。革薢能治陽明之濕。而固下焦。故能去濁分清。楊倓家藏方。治眞元不足。下焦虛寒。小便頻數。白濁如膏。有革薢分清飲。正此意也。又楊子建萬全護命方云。凡人小便頻數不計度數。便莖內痛不可忍者。此疾必先大腑祕熱。不通水液。只就小腸大腑愈加乾竭。甚則渾身熱。心躁思涼水。如此即重症也。此疾本因貪酒色。積有餘毒。腐物瘀血之類。隨虛水入於小腸。故便時作痛也。不飲酒者。必平生過食辛熱葷膩之物。又因色傷而然。此乃小便頻數而痛。與淋證澀而痛者不同也。宜用革薢一兩。水浸少時。以鹽半兩同炒。去鹽爲末。每服二錢。用水一盞。煎八分。和滓服之。使水道轉大大腸。仍以葱湯頻洗穀道。令氣得通。則小便數及痛自減也。（李時珍）㈡此有二種。莖有刺者。根白實。無刺者。根虛輭。輭者爲勝。莖生葉似菝葜而大如盌。其根硬大者如商陸而堅。今人皆以土茯苓爲革薢誤矣。莖葉根苗皆不同。（李時珍）㈢土茯苓與革薢形雖不同。功用相倣。亦善祛風除濕。去濁分清。均治惡瘡化毒。東山經言食之已風。此頭風方中所以用之神效歟。俗稱寒冷。服之無子。不知本草謂其甘淡性平。有健脾胃。止泄瀉。補下焦。治陰痿之功也。（顧松園）

【蔓楚】　卽羊桃之古籍別名。典見爾雅。詳『羊桃』條。

【蔤麻子】　卽蔥麻子。詳『蔥麻子』條。

【莱】　卽藜之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『藜』條。

【莱菔】

命名　本品在上古謂之蘆葩。中古轉爲莱菔。後世遂訛爲蘿蔔。蘿蔔乃俗名也。

古籍別名　蘆葩。蘿蔔。雹突。紫花菘。沙蘿蔔。（綱目）溫菘。土酥。（爾雅）蕭蘧。（廣韻）楚菘。秦菘。（圖經）破地錐。夏生。（王禎農書）

外國名詞　Rhaphanus Sativus, L.（拉丁）Radishseed.（英）

基本　屬十字花科。爲蘿蔔之根。

產地　莱菔各省均有。江蘇以宜興者爲佳。



莱菔（一）

形態　蘿蔔爲一年或越年生草本。莖高達三四尺。葉作羽狀分

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

裂。剛硬而有毛茸。梢上分歧。開淡紫或白色四瓣十字花。作總狀花序排列。後結莢形閉果。根長大白色多肉。



菜菔（二）

種植　田園恒以栽植。乃供菜茹食用。每年五六月或八九月下種。約經百日採食。

採取　秋採苗。冬採根。夏採子。

用法　搗汁用。

性質　辛甘。無毒。

效能　破氣。化痰。清熱。消食。

主治　散服及炮麥服。食大下氣。消穀和中。去痰癖。肥健人。生搗汁服。止消渴。試大有驗。

歷代記述攷證　【唐】蕭炳四聲本草論萊菔曰。利關節。理顏色。練五臟惡氣。制麵毒。行風氣。去除邪熱氣。【唐】孟詵食療本草論萊菔曰。利五臟。輕身。令人白淨肌細。【宋】日華諸家本草論萊菔曰。消痰止咳。兼治肺瘻吐血。溫中。補不足。同羊肉銀魚煮食。治勞瘦咳嗽。【元】吳瑞日用本草論萊菔曰。搗汁服。治吐血衄血。【明】汪頴食物本草論萊菔曰。同猪肉食益人。生搗服。治禁口痢。【明】寧原食鑑本草論萊菔曰。寬胸膈。利大小便。生食止渴。寬中。煮食化痰消導。【明】汪機本草會編論萊菔曰。殺魚腥氣。治豆腐積。【明】李時珍本草綱目論萊菔曰。生吞酸化積滯。解酒毒。散瘀血甚效。末服治五淋。丸服治白濁。煎湯洗脚氣。飲汁治下痢及失音。并烟熏欲死。生搗塗打撲湯火傷。【明】繆希雍本草經疏論萊菔曰。萊菔根味辛甘。氣溫。無毒。孟詵云。性冷。大明云。平。詳其功用。應是生者味辛性冷。熟者味甘溫平。故本經下氣消穀。去痰癖。肥健人。及溫中補不足。寬胸膈。利大小便。化痰消導者。煮熟之用也。止消渴。制麵毒。行風氣。去邪熱氣。治肺瘻。吐血。肺熱痰嗽。下痢者。生食之用也。大抵入手足太陰手足陽明經。故所主皆脾肺腸胃之病。【明】李士材本草圖解論萊菔曰。萊菔辛甘。下氣消食。和中化痰。解酲散血。大治吞酸。搗汁服。治吐衄血。消渴。塗跌打湯火傷。解麵毒。楊億云。種莘三十畝。省米三十斛。種蔔三十畝。益米三十斛。則蘿蔔果能消食也。服地黃何首烏。忌食蘿蔔。令人髭髮白。有人被賊火燕垂死。以蘿蔔菜生嚼汁嚥。即甦。子能定喘消痰。消食除脹。利大小便。消癰腫毒。生用能升。熟用能降。

配合應用　㈠治年遠脾泄。百藥不效。單煮白萊菔。終日啖之。不輟。必差。

㈡治食物作酸。蘿蔔生嚼數片。或生菜嚼之。亦佳。絕妙。乾者熟者。鹽醃者。及人胃冷者。皆不效。（集簡方）

㈢治反胃噎疾。蘿蔔蜜煎浸。細細嚼嚥良。（普濟方）

㈣治消渴飲水。獨勝散。用出了子蘿蔔三枚。淨洗。切片。日乾爲末。每服二錢。煎猪肉湯。澄清調下。日三服。漸增至三錢。生者搗汁亦可。或以汁煮粥食之。（圖經方）

㈤治肺瘻咳血。蘿蔔和羊肉或鯽魚煮熟。頓食。（普濟方）

㈥治鼻衄不止。蘿蔔搗汁半盞。入酒少許。熱服。并以汁注鼻中。皆良。或以酒煎沸入蘿蔔再煎飲之。（易簡方）

㈦治下痢禁口。蘿蔔搗汁一小盞。蜜一盞。水一盞同煎。早一服。午一服。日暗米飲吞阿膠丸百粒。如無蘿蔔。以子擂汁亦可。一方加枯礬七分同煎。一方只用蘿蔔菜煎湯。日日飲之。又用蘿蔔片。不拘新舊。染蜜噙之。嚥汁。味淡再換。覺思食。以肉煮粥與食。食不可過多。亦治痢後腸痛。（普濟方）

㈧治大腸便血。大蘿蔔皮燒存性。荷葉燒存性。蒲黃生用。等分爲末。每服一錢。米飲下。（普濟方）

㈨治腸風下血。蜜炙蘿蔔。任意食之。昔一婦人服此有效。（百一選方）

㈩治酒痔下血。連旬不止。用大蘿蔔二十枚。留青葉寸餘。以井水入罐中。煮十分爛。入淡醋。空心任食。（壽親養老方）

⑪治大腸脫肛。生萊菔搗。實脾中束之。覺有痰。即除。（摘玄方）

⑫治小便白濁。生蘿蔔剜空。留蓋。入臭柒莫填滿。蓋定。簽住。糯米

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

飯上蒸熟。取去菜萸。以蘿蔔焙研末。糊丸。梧子大。每服五十丸。鹽湯下。日三服。（普濟方）

㈢治沙石諸淋。疼不可忍。用蘿蔔切片。蜜浸少時。炙乾數次。不可過焦。細嚼。鹽湯下。日三服。名瞑眩膏。（普濟方）

㈣治遍身浮腫。出了子蘿蔔、浮麥等分。浸湯飲之。（聖濟總錄方）

㈤治脚氣走痛。蘿蔔煎湯洗之。仍以蘿蔔曬乾爲末。餡饅內。（聖濟總錄方）

㈥治偏正頭痛。生蘿蔔汁一蜆殼。仰臥。隨左右注鼻中。神效。王荊公病頭痛。有道人傳此方。移時遂愈也。以此治人。不可勝數。（如宜方）

㈦治失音不語。蘿蔔生擣汁。入薑汁同服。（普濟方）

㈧治喉痺腫痛。蘿蔔汁和皂莢漿服取吐。（普濟方）

㈨治滿口爛瘡。蘿蔔自然汁頻漱去涎妙。（集簡方）

㈩治湯火傷灼。生蘿蔔擣塗之。子亦可。亦治花火傷肌。烟熏欲死。（聖濟總錄方）

㈪治打撲血聚。皮不破者。用蘿蔔或葉搗封之。（邵氏方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡氣虛血虧諸症禁用。服首烏地黃者忌之。

參攷資料　㈠萊菔功同燕菁。然力猛。更出其右。斷下方亦用其根。燒熟入藥。尤能制麵毒。昔有婆羅門僧東來。見食麥麵者。驚云。此大熱。何以食之。又見食中有蘆菔。乃云。賴有此以解其性。自此相傳。食麵必啖蘆菔。（蘇頌）㈡萊菔擣爛制麵作餺飥食之。最佳。飽食亦不發熱。酥煎食之。下氣。凡人飲食過度。生嚼嚥之便消。（蘿炳）㈢洞微志云。齊州有人病狂。云夢中見紅裳女子。引入宮殿中。小姑令歌。每日遂歌云。五鼎樓閣曉玲瓏。天府由來是此中。惆悵悶懷不盡。一丸蘿蔔火吾宮。有一道士云。此犯大麥毒也。少女心神。小姑脾神。醫經言蘿蔔制麵毒。故曰火吾宮。火者毀也。遂以藥并蘿蔔治之。果愈。又按張杲醫說云。饒民李七病鼻衄甚危。醫以蘿蔔自然汁和無灰酒飲之。即止。蓋血隨氣運。氣滯故血妄行。蘿蔔下氣而酒導之故也。又云。有人好食豆腐中毒。醫治不效。忽見賣豆腐人。言其妻誤以蘿蔔湯入鍋中。遂致不成。其人心悟。乃以蘿蔔湯飲之而癒。物理之妙如此。又延壽書載李師逃難入石窟中。賊以烟熏之。垂死。摸得蘿蔔菜一束。嚼汁嚥下。甦。此法備急。不可不知。（李時珍）㈣萊菔俗名蘿蔔。按爾雅云。突蘧麥。孫炎註云。紫花菘也。俗呼溫菘。似蕪菁大。根俗名雹突。一名蘆菔是也。（韓保昇）㈤紫花菘、溫菘皆南人所呼。臭人呼楚菘。廣南人呼秦菘。（蘇頌）㈥萊菔南北通有。北土尤多。有大小二種。大者肉堅。宜蒸食。小者白而脆。宜生啖。河朔極有大者。而江南安州、洪州、信陽者甚大。重至五六斤。或近一秤。亦一時種蒔之力也。（蘇頌）㈦萊菔今天下通有之。昔人以蕪菁萊菔二物混註。圖人種萊菔。六月下種。秋採苗。冬掘根。春末抽高薹。開小花。紫碧色。夏初結角。其子大如大蒜子。圓長不等。黃赤色。五月亦可再種。其葉有大者如蕪菁。細者如花芥。皆有細柔毛。其根有紅白二色。其狀有長圓二類。大抵生沙壤者脆而甘。生瘠地者堅而辣。根葉皆可生可熟。可菹可醬。可豉可醋。可糖可臘。可飯。乃蔬中之最有利益者。而古人不深詳之。豈因其賤而忽之耶。抑未諳其利耶。（李時珍）

【萊菔子】古籍別名　溫菘子。土酥子。（爾雅）唐菁子。羌精子。登菘子。楚菘子。菖蠶子。蘿白子。蘿卜子。蘆菔子。蘆菔子。紫花菘子。（和漢藥考）

形態　萊菔子爲蘿蔔之扁平長圓形種子。大如麻子。表面呈黃赤色。

性質　辛。甘。平。無毒。

效能　用作健胃祛痰藥。及爲消化藥。又治惡臭性枝氣管炎。慢性消化不良症。

作用　入胃能助胃液消化澱粉。使造成多量之糖類。至腸始漸次吸入腸壁而達血中。令血液氣化增進。全身熱量增高。肺臟之呼吸作用。亦同進行。痰貨遂被迫而出。

主治　研汁服。吐風痰。同醋研。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

消腫毒。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論萊菔子曰下氣定喘。治痰消食。除脹。利大小便。止氣痛。下痢後重。發瘡疹。【清】黃宮繡本草求眞論萊菔子曰萊菔子氣味甚辛。生用研汁。能吐風痰。有倒牆推壁之功。迅利莫禦。若醋研數則癒腫立消。炒熟則下氣定喘。消食寬膨。一生一熟。性氣懸殊。

參攷資料　㈠萊菔子治痰。有推牆倒壁之功。(朱丹溪)㈡萊菔子之功。長於利氣。生能升。熟能降。升則吐風痰。散風寒。發瘡疹。降則定痰喘咳嗽。調下痢後重。止內痛。皆是利氣之效。予曾用果有殊績。(李時珍)

【萊菔花】主治　用糟下酒藏。食之甚美。明目。

【萊菔粥】基本　本品係萊菔和米煮成之粥。

主治　消食利膈。

【萋高】　卽青葙子之古籍別名。典見本經。詳『青葙子』條。

【萌】　卽竹筍之古籍別名。典見僧贊寧。詳『竹筍』條。

【萌葛皮】　卽合歡皮之古籍別名。典見綱目。詳『合歡皮』條。

【萍蓬草】原名　水粟。

命名　本品結子如粟。如蓬子。故名。

處方用名　水粟根。

古籍別名　水粟子。水粟包。水筮(綱目)。凫葵。骨蓬。川骨。(和漢藥考)

外國名詞　Nuphar japonicum, DC.(拉丁)

基本　屬睡蓮科。爲萍蓬草之根。

產地　凡池澤河流之淺水間。恒有生焉。

形態　萍蓬草爲多年生草本。春日根間叢生多葉。葉分二種。出水上之葉作箭形。似里芋葉而長。質稍厚。在水中之葉則大而柔軟。色亦較淡。且大小不同。大者可尺許。小者纔二三寸。夏秋之交。水面自抽出花梗。開五瓣之黃花。大寸許。形似梅花。根爲多節之長根。頗似腐骨。外面粗糙。色帶褐。處處有黑斑。內部帶白色。質輕如粉。藥舖所售者。多截作二三寸長。更縱破爲二。



萍蓬草

採取　冬十月間採之。

製法　採得去粗皮。曬乾。

性質　甘。寒。無毒。

效能　和血行瘀。用爲清血藥。

主治　煑食補虛益氣。力久食不饑。厚腸胃。

國外學說　日本一本堂藥選曰。萍蓬根在水中如骨狀。故謂之川骨。亦有栽植池中以賞玩者。與荷花同。故日本所在多有。藥舖所售皆眞用時去粗皮。水洗。剉細。破瘀血。導新血。治跌打損傷。癥毒。痼結。產後瘀血諸症。又和漢三才圖會曰。根甘寒如藕。凶年人亦食之。香味如藕。煑食如栗。補虛益氣力。厚腸胃。按萍蓬草根如腐骨。(味鹹。大冷。)花黃色。莖頭著葉。夏月採根切片。曝於暑熱石上。如值陰雨。則色變黑。不堪用。略似腐骨。故俗呼川骨。葉似款冬葉而稍軟。日本方多用之。入金瘡、跌傷及胎前產後藥中。爲破血止血之要藥。

用量　錢半至三錢。

參攷資料　㈠萍蓬草生南方池澤。葉大如荇。花亦黃。未開時狀如筭袋。其根如藕。飢年可以當穀。(陳藏器)㈡水粟三月出水。莖大如指。葉似荇葉而大。徑四五寸。初生如荷葉。六七月開黃花。結實狀如角黍。長二寸許。內有細子一包。如罌粟。澤農採之。洗擦去皮。蒸曝。舂取米。作粥飯食之。其根大如栗。亦如雞頭子根。歉年人亦食之。作藕香味。如栗子。昔楚王渡江。得萍實。大如斗。赤如日。食之甜如蜜者。蓋此類也。若水萍安得有實耶。三四月採莖葉取汁。煑硫黃。能拒火。又段公路北戶錄有睡蓮。亦此類也。其葉如荇而大。其花布葉數重。當夏盡開花。夜縮入水。晝復出。(李時珍)

【萍蓬草子】　**性質**　甘。澀。平。無毒。

主治　助脾厚腸。令人不饑。

【萎香】　卽玉竹之古籍別名。典見綱目。詳『玉竹』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【萎陵菜】卽柴胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『柴胡』條。

【萎蕤】卽白蘞之古籍別名。典見中國醫學大辭典。詳『白蘞』條。

【萎移】卽玉竹之古籍別名。典見爾雅。詳『玉竹』條。

【萎蕤】卽玉竹之原名。詳『玉竹』條。

【莖】卽五味子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五味子』條。

【落】卽蒜之生於水中者。典見呂悅宇林。詳『山蒜』條。

【葛花】卽商陸花之原名。詳『商陸花』條。

【莉草】卽薷麻之日本別名。詳『薷麻』條。

【虛中】卽鐘乳石之古籍別名。典見吳普本草。詳『鐘乳石』條。

【虛飯】卽冰片之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冰片』條。

【蛔】卽蚘蟲之古籍別名。典見綱目。詳『蚘蟲』條。

【蛸】卽蚘蟲之古籍別名。典見綱目。詳『蚘蟲』條。

【蛸】卽蚘蟲之古籍別名。典見『蛸』條。

【蛸蠐】卽蚘蟲之別名。詳『蟲蠐』條。

【蛙食】卽浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【蛑螺】卽全蠍之古籍別名。典見開寶本草。詳『全蠍』條。

【蛑蠏】卽鼠婦之古籍別名。典見本經。詳『鼠婦』條。

【蛑螺】卽全蠍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『全蠍』條。

【蛾蝗】卽雄蟹之古籍別名。典見綱目。詳『蟹』條。

【蛞斗】卽蝌蚪之古籍別名。典見綱目。見『蝌蚪』條。

【蛞蝓】古籍別名　陵蠡（本經）附蝸蝓蠡土蝸（別錄）托胎蟲蔡絛鐵圍叢語）鼻涕蟲（俗名）蜒蚰（綱目）附蝸蛉窮窶偷石夾子無殼月拔伊（和漢藥考）無殼蝸蠡（爾雅）

外國名詞　Slug.（英）

基本　屬腹足類之蛞蝓。

產地　凡池澤間及牆壁石垣之陰溼地方恒多生焉。

形態　蛞蝓爲溼生之軟體動物。體闊三四分。長二寸餘。背面有網羅狀黑縞。呈褐灰、褐黑或赤褐等色。觸角爲黑色。分泌多量黏液。其所經之處。留下銀色線。此蟲晝伏暮出。概食菌類爲生。冬季潛伏地下。若用食鹽、砂糖等撒於其體。則分泌黏液甚多。終發痙攣而斃。



蛞　蝓

穢類　貝殼者爲蝸牛。無殼者爲蛞蝓。

用法　生搗塗數。或焙研調傅。

性質　鹹。寒。無毒。

效能　塗腫瘍消腫痛。用作解蜈蚣毒之要藥。

主治　賊風喎僻。軟及脫肛。驚癲。攣縮。

歷代記述致證　【宋】寇宗奭本草衍義論蛞蝓曰。解蜈蚣蠍毒。【明】李時珍本草綱目論蛞蝓曰。腫毒瘡癤。熱痛腫痛。【明】繆希雍本草經疏論蛞蝓曰。蛞蝓蝸牛稟陰溼之氣而生。故味鹹氣寒無毒。經曰。清靜則肉腠閉。拒雖大風寄毒。弗能害也。如陰血虧竭。陽氣躁擾。則腠理不密。賊風乘虛而入。風主搖動。中於經絡。故喎僻、攣縮、軟筋。筋急所自來矣。又風爲陽邪。筋脈得之。皆燥急。鹹寒能益陰潤燥。軟堅則筋脈舒緩。經絡通達而諸證除矣。驚癇者。風熱也。脫肛者。大腸熱也。腕跌者。血脈傷。必發熱也。鹹寒總除諸熱。所以主之。蜈蚣性畏二物。不敢過其所行之路。觸其身。卽死。故人取以治蜈蚣毒。【清】張隱菴本草崇原論蛞蝓曰。蜒蚰感雨溼之氣而生。故氣味鹹寒。主定驚清熱。解毒輸筋。寇宗奭曰。蛞蝓能解蜈蚣毒。近時治咽喉腫痛。風熱喉痺。用簪脚撿之。內入喉中。冷吞下卽愈。

近人學說　馬叔循曰。驗方新編治癤條下有蛞蝓和搗銅錢合罨之方。予初欲試其方。而雖碎其蝓。一日捉蛞蝓數十條。選青錢五六枚。於小臼中搗之。頃刻而糜。抹之錢如粉而亮如金。帷治癤不見大效。因念物性相制。誠不可理測。而其斃銅之功。當遠勝於胡桃掌

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

喬也。

配合應用　㊀治脚脛爛瘡。臭穢不可近。用蜬蚰十條。瓦焙研末。油調傅之立效。（救急方）　㊁治痔熱腫痛。用大蛞蝓一箇。研泥。入片腦一字。燕脂坯子半錢。同傅之。（大全良方）

施用宜忌　凡無實火熱毒者禁用。

參攷資料　按蔡絛鐵圍叢語云。嶠南地多蜮蚣。大者二三尺。緻人覓死。惟見托胎蟲則踴僵不行。蟲乃登其首。陷其腦而死。故以此蟲生搗塗蜮蚣傷。立時疼痛止也。又大全方云。痔熱腫痛。用大蛞蝓一箇。研泥。入龍腦一字。燕脂坯子半錢。同傅之。先以石蘚煮水熏洗尤妙。五羊大帥趙尚書夫人病此。止以蛞蝓京墨研塗亦妙。大抵與蝸牛同功。（李時珍）

【蛞蜣】　卽蜣蜋之古籍別名。典見本草集註。詳『蜣蜋』條。

【蛞蝓】　卽木蠹蟲之古籍別名。典見綱目。詳『木蠹蟲』條。

【蛤粉】　原名　蛤蜊粉。

命名　蛤類之有利於人者。故名蛤蜊。蛤粉。卽用蛤蜊殼煆剉末所成之粉。

古籍別名　蛤蜊粉。海蛤粉。（綱目）

基本　係水族動物介類蚌蛤屬。用海蛤蜊殼煆成之粉。

產地　陳仁山藥物生產辨云。海蛤粉產廣東鹹水海。新安平海一帶多出。

形態　蛤蜊大者二三寸。其殼幾爲正圓形。外面黃褐色。輪紋稍高。疊內面白色。煆研之成爲極細之白粉末。

採取　春夏間採之。

製法　朱震亨曰。蛤粉用蛤蜊燒煆成粉。不入煎劑。李時珍曰。按吳球云。凡用蛤粉。取紫口蛤蜊殼炭火煆成。以熟栝樓連子同搗和成團。風乾用。最妙。

用法　恒以劑末和藥。

性質　鹹。寒。無毒。

效能　清熱利溼。化痰。散結。用作收斂劑。又爲軟堅藥。

主治　熱痰溼痰。老痰頑痰。疝氣。白濁帶下。同香附末。薑汁調服。主心痛。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論蛤粉曰。清熱利溼。化痰飲。定喘嗽。止嘔逆。消浮腫。利小便。止遺精白濁。心脾疼痛。化積塊。解結氣。消癥核。散腫毒。治婦人血病。油調塗湯火傷。【清】黃宮繡本草求眞論蛤粉曰。蛤蜊粉卽海內水蚌殼。煆而爲粉也。與黃海淡水蚌殼不同。功與牡蠣相似。但此止有斂濇化堅解熱之力。故能消痰止嗽。治腫。昔宋徽宗寵妃患此。李防禦覓得市人海蚌蛤蜊粉。少加青黛。以淡薑水加麻油數滴。調服而愈。亦是斂肺清熱之意。無他治也。肉鹹冷。解酒熱。文蛤背有紫斑紋。比較蛤蜊殼稍厚。性味主治顏近。但此性兼利水止渴除煩。並治血熱崩中帶下。總取其寒鹹滌飲之義耳。海蛤係海內爛壳。混雜沙泥。火煆爲粉。亦屬利水消腫止嗽之品。然總不類牡蠣。功專收濇固脫。解熱爲事也。

配合應用　㊀治氣虛水腫。昔滁州酒庫攢司陳通。患水腫垂死。諸醫不治。一嫗令以大蒜十個。搗如泥。入蛤粉丸梧子大。每食前白湯下二十丸。服盡小便下數桶而愈。（普濟方）　㊁治心氣疼痛。眞蛤粉炒過白。佐以香附末等分。白湯淬服。（聖惠方）　㊂治白濁遺精。潔古云。陽盛陰虛。故精泄也。眞珠粉丸主之。用蛤粉煆一斤。黃柏新瓦炒過一斤。爲細末。白水丸。如梧子大。每服一百丸。空心用溫酒下。日二次。蛤粉味鹹而且能補腎陰。黃柏苦而降心火也。　㊃治雀目夜盲。眞蛤粉炒黃爲末。以油蠟化和丸。皂子大。內於猪腰子中。麻紮定。蒸食之。一日一服。（儒門事親方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡脾胃虛寒者禁用。

參攷資料　㊀蛤粉能降能消。能與能燥。（朱震亨）　㊁寒制火而鹹潤下。故能降焉。寒散熱而鹹走血。故能消焉。堅者與之以鹹。取其屬水而性潤也。溼者燥之以滲。取其經火化而利小便也。（李時珍）　㊂海蛤粉者。海中諸蛤之粉。以別

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

江湖之蛤粉蚌粉也。今人指稱但曰海粉、蛤粉。寇氏所謂衆蛤之灰是矣。近世獨取蛤蜊粉入藥。然貨者亦多衆蛤也。大抵海中蚌蛤蚶蠣。性味鹹寒不甚相遠。功能軟散小異大同。非若江湖蚌蛤無鹹水浸漬。但能清熱利溼而已。今藥肆有一種狀如線粉者。謂之海粉。得水則易爛。蓋後人因參售物也。然出海中沙石間。故功亦能化痰與堅。（李時珍）㊀蛤蜊生東南海中。白殼紫唇。大二三寸者。閩浙人以其肉充海錯。亦作爲醬醯。其殼火煆作粉。名曰蛤蜊粉也。（汪機）

【蛤粉炒阿膠】卽阿膠以蛤粉拌炒成者之處方用名。詳『阿膠』條。

【蛤蚧】命名　本品雄者爲蛤。雌者爲蚧。夜闇其鳴聲。一曰蛤。一曰蚧。遂因其聲而命其名也。

處方用名　蛤蚧尾。對蛤蚧。

古籍別名　蛤蟹（日華）僊蟾（綱目）

基本　係爬蟲類脊椎動物蜥蜴屬之蛤蚧。

產地　陳仁山藥物生產辨云。蛤蚧產廣西。以龍州爲多。其次瀘墟、貴縣、南寧、百色等均有出。梧州乃聚處貨非梧州所產。

形態　蛤蚧爲蜥蜴同類異種。長四五寸。首如蝦蟆。背綠色。有白點或鮮紅斑紋。其鱗如米粟。爲十二行。居梁棟破壁間。夜出食蟲。雄者皮粗口大。身小尾短。雌者皮細口尖。身大尾小。雌雄相呼。累日相交。兩兩互抱。捕者擘之。雖死不開。故入藥其尾功效尤著。

製法　雷敩曰。其毒在眼。須去眼及甲上尾上腹上肉毛。以酒浸透。隔兩重紙緩焙令乾。以甕器盛。懸屋東角上一夜用之。力可十倍。勿傷尾也。日華曰。凡用頭足。洗去鹽汚不淨。以酥炙用。或用蜜炙。李珣曰。凡用須炙令黃色。熟搗口含少許。奔走不喘息者爲眞也。宜丸散中用。

性質　鹹。平。有小毒。

效能　補肺腎。定喘嗽。用作滋養强壯藥。

主治　久咳嗽。肺勞傳尸。殺鬼物邪氣。下淋瀝。通水道。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論蛤蚧曰。肺癆咯血。咳嗽上氣。治折傷。【宋】日華諸家本草論蛤蚧曰。下石淋。通月經。治肺氣。療咳血。【明】李時珍本草綱目論蛤蚧曰。肺氣益精。血定喘止嗽。療肺癰消渴。助陽道。【明】繆希雍本草經疏論蛤蚧曰。蛤蚧味鹹。氣平。有小毒。其主久咳勞傷尸。鬼物邪氣。咳嗽。淋瀝者。皆肺腎爲病。勞極則肺腎虛而生熱。故外邪易侵。內證乘發也。蛤蚧屬陰。能補水之上源。則肺腎皆得所養。而勞熱咳嗽自除。邪物鬼氣自去。炙肺朝百脈。通調水道。下輸膀胱。肺氣清故淋瀝水道自通也。又顧玠海槎錄云。廣西橫州甚多蛤蚧。牝牡上下相呼。累日情洽。乃交。兩相抱負。自墮於地。人往捕之。亦不知覺。以手分劈。雖死不開。乃用熟稿草細纏。蒸過。暴乾售之。煉爲房中之藥。甚效。尋常捕者。不論雌雄。但可爲雜藥用。【淸】黃宮繡本草求眞論蛤蚧曰。蛤蚧絕與蛤蜥不類。生於廣南。身長七八寸。首如蟾蜍。背綠色斑。頭圓肉滿。鱗小而厚。鳴則上下相呼。雌雄相應。情洽乃交。兩相抱負。自墜於地。往捕劈之。至死不開。大助命門相火。故書載爲房術要藥。且色白入肺。功兼人參羊肉之用。故用能治虛損羸弱。消渴喘嗽。肺癰吐沫等症。專取交合肺腎諸氣。入藥去頭留尾。酥炙口含少許。疾走而氣不喘。則知益之功爲莫大焉。但市多以龍子混冒。舉世亦不深辨。如龍子則剖開而身多赤斑。皆助陽火。雖治陽痿。性少止濇。蛤蚧則纔束多對。通身白鱗。兼濇肺氣。故補氣喘乏最宜。其藥不論牝牡皆可。卽非相抱時捕之。功用亦同。但其藥力在尾。尾不全者不效。去頭足。

辨僞　㊀鄭肖巖曰。蛤蚧生嶺南山谷及城牆或大樹間。形如大守宮。身長四五寸。尾與身等。自惜其尾。見人取之。多自嚙斷。其尾而去。藥力在尾。尾不全者不效。北戶錄云。其首如蟾蜍。背綠色。上有黃斑點。如古錦紋。其聲最大。蘇頌云。入藥肆須雌雄兩用。最靈。或云。陽人用雄。陰人用雌。雷敩曰。雄爲蛤。身小尾粗。雌爲蚧。皮細口尖。身大尾小。氣味鹹平。有小毒。治虛勞嗽

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

喘。助陽益精。大有奇功。李珣曰。凡用須炙令黃色。熟搗。口含少許。奔走不喘息者爲眞也。今市肆有一種紅點蛤蚧者有大毒。萬不可服。用者須揀尾全者。細驗皮色。有無紅點方可入藥。㊁曹炳章曰。按籀曝日記云。蛤蚧蛇身而四足。形如虺虎。身有癩。五色俱備。其疥處又似蝦蟆。最臭惡。余初入鎭安路旁見之。疑爲四足蛇。甚惡之。問土人乃知爲蛤蚧也。郡衙後山。處處有之。夜輒聞其鳴。一聲曰蛤。一聲曰蚧。能叫至十三聲方止者乃佳。其物每年一聲。十三聲則年久而有力也。能潤肺納氣。壯陽益氣。口咬物則至死不釋。故捕者輒以小竹片劃之使咬。即携之來。雖已入石縫中。亦可乘其咬而擊出也。遇其雌雄相接時取之。則有用於房中術。然不易遇也。藥肆中所售兩兩成對者。乃取其兩身聯屬之耳。其力在尾而頭足有毒。故用之者。必尾全而去其頭足。鄭君云紅點。或指活時言。其活時身上五色俱備。在市上通行者。色皆青綠色。有鱗。僞而無紅點也。

近人學說　程登瀛云。蛤蚧入爬蟲類與蜥蜴同類異種。英文名作 Lizard。謂有烏紅二種。體細長。作圓筒狀。四肢短小。無蹼趾。爪銳利。趾間有鱗片。善附着他物。首似蝦蟆。兩顎有細齒。頸旁有發音膜。膜後各有一小竅。若雞耳。此發音器之構成。與蝦蟆異。意其發聲不從口出也。背被以細鱗。青綠色。有黃紅點。或黃褐灰暗色。上有鮮紅斑點。居櫺棟破壁間。舊謂產於廣西。余見自安南至暹屬宋卡。處處有之。宋卡以下英屬馬來各地則無此物。惟中國地產者色暗。而暹地產色較淺。淡爲稍異耳。余初至暹境。一夜忽聞吭厲之鳴聲。審視之。一爬蟲長可五六寸。遊行於牆隅。爲前所不曾見者。詢問同儕。或云壁虎。或云本頭公雞。（本頭公即助坡之大伯公）察其形態。絕似蛤蚧。佛寺路亭。每座必有一對。多則三四對。鳴一聲轉兩音。若『獨架』『獨架』。聲隆而蹙厲。非雌雄互叫也。暹人擬呼爲 Tokai。譯音即獨架。華儒亦多從之。傳說。此物棲於屋內主輿旺。又謂暹國十三省。能聞其連鳴十三聲『常叫七八聲即止』方止者。爲將來富冠全國之徵兆。暹爲佛教國。此物神祕意思。故擾人清夢而人不甚惡之。有惡之者。則以紅烟和紅灰爲餌誘捕之。年來在暹地見詩歌筆記之詠志此物者。名人人殊。余欲知其在載籍作何名。乃從書本上抄錄蜥蜴類。如大守宮。壁虎。虺虎。草龍。石龍。蛇醫。四脚蛇等。凡三年積二十七條。錯綜互見。形態習性皆與此不符。惟名之曰『蛤蚧』。最爲恰當。但未聞有人稱爲蛤蚧。捉之入藥。故不敢告人。但以蛤蚧示暹人。皆躭口答曰獨架。其相像之點。亦可想見矣。嗣後捉兩隻曬乾。與蛤蚧比勘。色帶灰褐。紅綠斑點亦較鮮明。惟辨物須從固形之特徵。區劃色彩小異。不足爲區別標準。嘗如人固一望而知其爲人。若細察其色相。蓋無一絕相肖者。近見暹醫採入藥。就詢之。據云入酒浸劑。功能去風澀。益氣力。翻查英暹文動物學書。暹名獨架。英文名作 Lizard。與蛤蚧英名 Lizard。有烏紅二種之說。全相吻合。至是我以爲 Poktaer 即蛤蚧之疑。想可得證實矣。鄭君云市上有紅點蛤蚧。殆即此物。但謂有大毒。萬不可服。則尙須研究。方書載蛤蚧有小毒。紅蛤蚧當然亦有毒。用時祇須修淨酒製便可穩當。蓋毒之大小。頗難分別。要在用量與炮製爲異耳。毒蛇至毒也。去頭皮脊髓。同玉桂明矾煲食。閩人視爲清補妙品。潮人竟成條焙焦入酒。以治癩瘋。暹人取毒蛇頭散服。以治蠱脹。初見之莫不駭怪。詎知適量毒素正所以治病也。況蜥蜴類大多無毒不傷人。南洋華僑勞動界常採用四脚蛇。蚺蛇浸酒者。亦以此類物體中含有特種呵碘液。利去風溼。可以從化驗證實之。故余以爲涓公河以南所產之紅蛤蚧。亦可以入藥也。暹人用之亟稱其功效甚著。可爲左證。按南洋所謂四脚蛇者。長二尺以上重至六七斤。皮堅韌可製錢袋。卵大如鵝蛋。拾獲將出殼之蛇胎一窠四五粒者。值三四元。爲主治風痺之要藥。與辭書所載『蜥蜴胎生長六七寸。尾易斷。斷後復生。常棲於石

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

壁之隙。又名石龍。俗稱四脚蛇』之說。頗不相符。還地平原尚多原野草木茂密。熱帶產之爬蟲處處有之。蜥蜴類尤爲蕃盛。此類多無毒。不咬人。嘗經目睹者有十餘種。昨天還童捉一物到寓。頭身形態似蛤蚧。長六七寸。尾長尺許。作三稜狀。身上被以無色透明之薄鱗。（能自脫換。若蛇退。不成條）背赤褐。有淺黃色星點。肢短。五趾長而屈曲。爪勾利（頗似圖畫之龍爪）蛇舌。不能鳴。棲於山野石壁間。還名蟆甲入藥。我疑此即石龍、蜥蜴也。唯其舌分歧。常自伸縮如蛇。與載籍微有不同耳。

配合應用　㈠治久嗽肺癰。寇宗奭曰。久嗽不愈。肺積虛熱成癰。咳出膿血。曉夕不止。喉中氣塞。胸膈噎痛。用蛤蚧、阿膠、鹿角膠、生犀角、羚羊角各二錢半。用河水三升。銀石器內文火熬至半升。濾汁。時時仰臥細呷。日一服。

㈡治喘嗽面浮。并四肢浮者。蛤蚧一雌一雄。頭尾全者。法酒和蜜塗之。炙熟。紫團人參似人形者半兩。爲末。化蜘四兩。和作六餅。每煮糯米薄粥一盞。投入一餅。攪化。細細熱呷之。（普濟方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡非關脾腎兩虛。而有風寒實邪者禁用。

參攷資料　㈠昔人言補虛弱。人參羊肉之屬。蛤蚧補肺氣。定喘止渴。功同人參。益陰血。助精扶羸。功同羊肉。近世治勞損弱。許叔微治消渴皆用之。俱取其滋補也。劉純云。氣液衰陰血竭者宜用之。何大英云。定喘止嗽。莫佳於此。（李時珍）㈡蛤蚧生嶺南山谷及城牆或大樹間。形如大守宮。身長四五寸。尾與身等。最惜其尾。見人取之。多自嚙斷其尾而去。藥力在尾。尾不全者不效。揚雄方言云。桂林之中守宮能鳴者。俗謂之蛤蚧。蓋相似也。（馬志）㈢生廣南水中。夜即居於榕樹上。雌雄相隨。投一獲二。近日西路亦有之。其狀雖小。滋力一般。但人採之。割腹以竹張開。曝乾。鬻之。（李珣）㈣人欲得首尾全者。以兩股長柄鐵叉如黏糊等狀。伺於榕木間。以叉刺之。一股中腦。一股着尾。故不能嚙也。入藥須雌雄兩用。或云陽人用雄。陰人用雌。（蘇頌）㈤蛤蚧一物。確是生息於牆隅屋角者。試審察其足短、趾薄、爪利。便知是爲遊緣之用。若生於山地池塘。即爲兩棲類。必須具備善走善躍之足。兼有潛水習性。乃能適應生存。此物類之公例也。據說『嘗於勿坡京菓舖酒樓前看過生活者。以小竹籠拘禁放於水桶裏。插標發售曰。梧州生蛤蚧。以是可知其爲水產物云』。我亦曾見過。那似乎是鬼蛤而非蛤蚧。其形相似而實不同也。（程登瀛）㈥鬼蛤。一作桂蛤。亦以廣西蒼梧產爲最著。岡南嶺東亦有之。俗名爲鬼魚。學名疑即蠑螈。山澗池中常見之。形色似蝦蟆。身滑無鱗。色黑。腹赤白有黑斑。四足短小。不適於步行。尾長而扁。爲便於游泳之用。此屬兩棲類大蛙之有尾者。與蛤蚧之屬蜥蜴類。科屬亦不相同也。想不僅足下一人有此懷疑。故公開答辯。尚望勿坡同志。往粵人京菓舖審視之。放水桶中者。果爲蛤蚧乎。抑如上述之桂蛤乎。（程登瀛）

【蛤蚧尾】　即蛤蚧之處方用名。詳『蛤蚧』條。

【蛤魚】　即田雞之古籍別名。典見綱目。詳『田雞』條。

【蛤蜊肉】　性質　鹹。冷。無毒。

主治　煮食醒酒。



蛤蜊肉

歷代記述攷證　【宋】掌禹錫　嘉祐補註本草論蛤蜊肉曰。潤五臟。止消渴。開胃。治老癬。爲寒熱。婦人血塊。宜煮食之。

參攷資料　㈠高武瘡疹正宗云。俗言蛤蜊海錯。能發疹。多致傷損肺胃。生痰作嘔。作瀉。此皆嘻笑作罪也。又言瘡毒入目者。以蛤蚧汁點之。可代空青。夫空青得銅之精氣。而生性寒。可治赤目。若瘡毒是臟腑毒氣上衝。非空青可治。蛤蜊雖寒。而澀中有火。亦不可不知矣。（李時珍）㈡蛤蜊肉性雖冷。乃與丹石人相反。食之令腹結痛。（陳藏器）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【蛤蜊粉】卽蛤粉之原名。詳『蛤粉』條。

【蛤蔞】卽蓽撥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓽撥』條。

【蛤蟆】卽蛤蚧之古籍別名。典見諸家本草。詳『蛤蚧』條。

【蛩】卽馬陸之古籍別名。典見綱目。詳『馬陸』條。

【蛫】卽蟹之古籍別名。典見綱目。詳『蟹』條。

【訶子】**原名** 訶黎勒。

命名 訶黎勒梵言。天主持來也。

處方用名 訶子炭。訶子肉。

古籍別名 苛子。呵子。柯子。（椎實亦一名柯子）瀝翁。（和漢藥考）隨風子。（圖經）

外國名詞 Terminalia chebula, Retz.（拉丁）Myrobalan.（英）

基本 屬使君子科。爲訶梨勒之實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。訶子來自架喇吉打。九月新向日中國有出。味質更佳。和漢藥考曰。係產印度地方。

形態 爲褐色卵圓形之石實。類櫏實。縱有六稜。皮厚而有皺紋及光澤。內部堅實。帶黃色。味苦。

採取 七八月間採六路者。

製法 雷敩曰。凡使訶子。須以酒浸後蒸一伏時。以刀劖去路。取細剉焙用。用肉則去核。

性質 苦。溫。無毒。

成分 主要素含有沒食子酸（$C_6H_2OH_3CO_2H_5\%$）單寧酸（$C_{14}H_{10}O_9.2H_2O_9\%$）及沒食子鞣酸。故印度地方用於染色及鞣皮術等。

效能 斂肺。濇腸。用爲瀉痢藥。及作收斂藥。又治赤痢腸黏膜炎。

作用 入胃後。令胃內之 Pepsin 及蛋白質皆凝固而消化力被阻。且能將胃黏膜收縮。使分泌減退。至腸能收縮腸壁之微血管。減輕下痢。且微有殺菌之功。由腸壁吸入血中。能使血液流動之血管收縮。阻止血液及白血球之滲出。故有間接止血之功。又能使腸收縮而減下痢。

主治 冷氣心腹脹滿。下食。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論訶子曰。破胸膈結氣。通利津液。止水道。黑髭髮。【唐】蕭炳四聲本草論訶子曰。下宿物。止腸澼久洩。赤白痢。【唐】蘇恭新修本草論訶子曰。治痰嗽。咽喉不利。含三數枚殊勝。【宋】大明日華諸家本草論訶子曰。消痰下氣。化食開胃。除煩治水。調中止嘔吐。霍亂心腹虛痛。奔豚腎氣。肺喘急。五膈氣。腸風瀉血。崩中帶下。懷孕漏胎及胎動欲生腹悶。氣喘。并患痢人。肛門急痛。產婦陰痛。和蠟燒烟熏之。及煎湯熏洗。【元】朱丹溪本草衍義補遺論訶子曰。實大腸。斂肺降火。【明】繆希雍本草經疏論訶子曰。訶黎勒其味苦濇。其氣溫而無毒。苦所以洩。濇所以收。溫所以通。惟斂故能主冷氣。心腹脹滿。惟溫故能下食。甄權用以止水道。蕭炳用以止腸澼久洩。蘇頌用以療腸風瀉血。帶下。朱震亨用以實大腸。無非苦濇收斂。皆治標之功也。【明】李士材本草圖解論訶子曰。訶黎勒卽訶子。酸苦濇溫。肺與大腸藥也。酸濇能固腸止瀉。苦溫可下氣寬中。止嗽化痰。亦下氣之功。腸風止血。亦固腸之力。生用則能清金行氣。煨熟則能溫胃固腸。波斯國大魚放涎。水中凝滑。船不能通。投訶子湯尋化爲水。則其化痰可知。麵裹煨去核。【清】黃宮繡本草求眞論訶子曰。訶子味苦酸濇。氣溫無毒。雖有收脫止瀉之功。然味苦居多。服之反使氣下泄。故書載能消痰降火。止嗽定逆。且於虛人不宜獨用。至於嗽痢初起。用最切忌。以其止有劫截之功耳。服此能平胃和中。亦能消膨去脹。使中自和。用非脾胃虛弱。於中實有補也。波斯國人行舟。遇大魚涎滑數里。舟不能行。投以訶子。其滑卽化。則其化涎消痰。概可見矣。第性兼收濇。外邪未除。其切禁焉。出番船及嶺南色黑肉厚者良。酒蒸去核用肉。生清肺氣。熟溫胃固腸。【清】楊時泰本草述鉤元論訶子曰。方書於訶子有止用皮者。有止用肉者。其肉先濇次苦。而濇不敵苦。又次酸。及甘乃甚微。是肉之爲用。降瀉居多。而瀉中猶有收義。更合於中土之氣而不盡瀉也。其皮濇與苦等。次止有甘亦甚微。是皮之濇

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

能敵苦瀉猶未極。又止帶則瀉中尤有緩也。二者須索其肉之有異以施治。乃爲得之。再按訶子下逆氣。瀉結氣。通積聚。利咽喉。歷考成方。如息賁之枳實散。伏梁之半夏散。奔豚之木香檳榔散。便閉之七宣丸。又聾瘖之訶子湯。梅核氣之清咽屑。或止同於降瀉從邪之實者論治。或更同於寒涼之降瀉從實邪之有熱者論治也。又如胸痞氣滯。脇肋刺痛之沉香升降散。胸痺喘息之利膈散。息賁之半夏湯。喘證之蘇杏散。或兼補劑。從虛中有實者論治。或更兼溫補。從虛中有寒者論治也。是其降瀉爲功。豈得畏氣虛而不用乎。至又有用其酸與澁者。義固非與降瀉相戾也。人身肺氣猶天。其職司降。而有降即有收。自飛門至於魄門。皆一氣之所貫。經故曰。魄門亦爲五臟使。言臟腑糟粕。固由其瀉而臟氣升降。亦藉以調。訶子入手太陰陽明。其味始於澹苦。終於酸甘。降與收隨所合而爲用。是以丹溪治久嗽斂劑。則同於百藥煎、荊芥穗。河間治失音發聲。則同於桔梗、木通、童便、東垣以止久痢。則同於御米殼、乾薑、陳皮、寶鑑則合於椿白皮、母丁香。其通便閉也。合杏仁、麻仁、枳殼爲二仁丸。協柴胡、枳實、桃仁、大黃、木香爲七宣丸。繹此不可以識訶子之長技。亦惟我所使。斂總之用以降瀉。宜於氣實。實者邪氣實。用以收澁。則宜於氣虛。虛者正氣虛。此中後先主輔。惟當適事爲故耳。至繆氏致愼於火嗽澁熱痢立論。良是。第丹溪治火嗽久病。有同杏仁、青黛、海粉、皂角、膽星而用者。又治澁熱久痢。有同地榆、當歸、木香、黃連、阿膠、烏梅而用者。正可推此類以盡變也。又如滑瀉之治。有訶子散以治熱。更有訶子丸以治寒。舉寒熱而皆宜。其故可思矣。再河間治熱滑。訶子散用訶子、木香、黃連、甘草。其云腹痛漸止。瀉下漸少。宜此藥止之。如止之不已。宜因其歸而送之。加厚樸一兩。竭其邪氣也。玩此則主輔應有合宜之味。而火嗽澁熱痢又何不宜於訶子耶。【清】賈九如辨藥指南論訶子曰。訶子味苦而帶酸澁。能降能收。兼得其善。蓋令空則鳴肺氣爲火邪鬱遏。以致吼喘咳嗽。或至聲啞。用此降火斂肺。則肺竅無壅塞。聲音清嘹矣。取其澁可去脫。若久瀉久痢。則實邪去而元氣脫。用此同健脾之藥。固澁大腸。瀉痢自止。但苦能泄氣。眞氣太虛者。宜少用之。

配合應用 ㊀治肺虛受寒喘嗽。用訶子、人參。㊁訶子得橘皮、砂仁。主冷氣入內。心腹脹滿。及因寒食不下。㊂訶子得益智。止氣虛寒。小水不禁。㊃訶子佐楮根白皮。止腸澼瀉血。㊄訶子佐白朮、蓮實。止久洩因於虛寒。㊅訶子同蛇牀子、五味子、山茱萸、杜仲續斷。止虛寒帶下。㊆訶子同人參、肉荳蔻。則實大腸。㊇治下氣消食。訶黎一枚爲末。瓦器中水一大升。煎三兩沸。下藥更煎三五沸。如麴塵色。入少鹽飲之。（食醫心鏡方）㊈治一切氣疾。宿食不消。訶黎一枚。入夜含之。至明嚼嚥。又訶黎三枚。濕紙包煨熟。取核細嚼。以牛乳下。（千金方）㊉治氣嗽日久。生訶黎一枚。含之。嚥汁。痊後口爽。不知食味。却煎檳榔湯一盌服。立便有味。此知連州成密方也。（經驗方）㊊治嘔逆不食。訶黎勒皮二兩。炒研糊丸。梧子大。空心湯服二十丸。日三服。（廣濟方）㊋治風痰霍亂。食不消。大便澁。訶黎三枚。取皮爲末。和酒頓服。三五次。妙。（外臺祕要方）㊌治小兒風痰。壅閉語音不出。氣促喘悶。手足搖動。訶子半生半炮。去核。大腹皮等分。水煎服。名二聖散。（全幼心鑑方）㊍治風熱衝頂。熱悶。訶黎二枚爲末。芒硝一錢。同入醋中攪令消。塗熱處。（外臺祕要方）㊎治氣痢水瀉。訶黎勒十枚。麵裹。煻火煨熟。去核研末。粥飲頓服。亦可飯丸服。一加木香。又長服方

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

訶黎勒陳橘皮厚朴各三兩搗篩蜜丸大如梧子每服二三十丸白湯下卽愈（圖經本草方）

㊂治水瀉下痢訶黎勒炮二分肉豆蔻一分爲末米飲每服二錢（聖惠方）

㊃治下痢轉白訶子三箇二炮一生爲末沸湯調服水痢加甘草末一錢（普濟方）

㊄治赤白下痢訶子十二箇六生六煨去核焙爲末赤痢生甘草湯下白痢炙甘草湯下不過再服（趙原陽濟急方）

㊅治妬精下疳大訶子燒灰入麝香少許先以米泔水洗後搽之或以荊芥黃蘗甘草馬鞭草葱白煎湯洗亦可昔方士周守眞醫唐靖爛莖一二寸用此取效也（洪邁夷堅志方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡肺脾有實火與實邪者禁用。

著名方劑 ㊀訶黎勒散治氣痢（金匱方）訶黎勒十枚（煨）杵爲散粥飲和頓服㊁訶黎勒丸治腸胃積寒久痢純白或有青黑日夜無度（局方）肉豆蔻（去皮）木香乾姜（泡）各二十兩縮砂仁訶黎勒皮川烏頭（泡去皮臍）白礬（煨）各十分龍骨（洗赤石脂各八十兩爲末用粟米飯爲丸如梧子大每服二十丸至三十丸溫粟米飲下食前服甚者加倍㊂訶黎勒丸治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食不化（濟生方）訶黎勒（麵包煨）附子（泡）肉豆蔻（麵包煨）木香臭柒黃（炒）龍骨（生用）茯苓蕪荑等分爲末生姜汁煮麵糊丸如梧子大每服七十丸空心米飲下。

參攷資料 ㊀訶黎勒氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物雖濇腸而又泄氣其味苦濇故爾（寇宗奭）㊁肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸補之訶子苦重瀉氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用（李杲）㊂訶子同烏梅五倍子用則收斂同橘皮厚朴用則下氣同人參用則能補肺治咳嗽東垣云嗽藥不用者非矣但咳嗽未久者不可驟用爾嵇含草木狀言作飲久服令髭髮白者變黑亦取其濇也（李時珍）㊃訶黎皮主嗽肉主眼濇痛波斯人將訶黎勒大腹等在舶上用防不虞或遇大魚放涎滑水中數里船不能通乃煑此洗其涎滑尋化爲水則其治氣消痰功力可知矣（李珣）㊄金光明經言流水長者除病品云熱病下藥服訶黎勒又廣異記云高仙芝在大食國得訶黎勒長三寸置抹肚下便覺腹中痛因大痢十餘行疑訶黎勒爲祟後問火食長老云此物人帶一切病消利者乃出惡物爾仙芝寶之後被誅失所在（唐愼微）㊅今嶺南皆有而廣州最盛樹似木槵花白子形似梔子橄欖青黃色皮肉相着七八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣川法性寺有四十五株子極小而味不濇皆是六路每歲州貢只以此寺者寺有古井木根灌水水味不鹹每子熟時有佳客至則院僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草一寸破之汲井水同煎色若新茶今其寺謂之乾明古寺尙在舊木猶有六七株南海風俗尙貴此湯然煎之不必盡如昔時之法也訶子未熟時風飄墮者謂之隨風子曝乾收之益小者佳彼人尤珍貴之（蘇頌）㊆凡使勿用皺黎勒個個頭也若訶黎勒文具有六路或多或少並是雜路勒皆圓而露文或入路至十三路號曰椰精勒濇不堪用（雷敎）

【訶子炭】卽訶子炒黑者之處方用名詳『訶子』條。

【訶子核】**主治** 磨白蜜注目去風赤痛神良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論訶子核曰止咳及洩痢。

【訶子葉】**主治** 下氣消痰止渴及洩痢煎飲服功同訶黎。

【訶梨子】卽橄欖之古籍別名。見和漢藥考。詳『橄欖』條。

【訶梨勒】卽訶子之古籍別名。見和漢藥考。詳『訶子』條。

【訶黎勒】卽訶子之原名。詳『訶子』條。

【象毛】卽金鎖銀開之古籍別名。典見汪連仕採藥書。詳『金鎖銀開』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【象牙】處方用名　象牙屑。象牙絲。

古籍別名　伽耶牙。（戶北錄）

基本　爲哺乳動物類象之牙齒。

產地　陳仁山藥物生產辨云。象牙產自暹羅安南。其屑廣東象牙店有沽。

形態　象爲獸類。乃陸生動物中之最大者。體長丈餘。被毛極精。鼻長八尺許。爲圓筒狀。屈伸自然。食物賴鼻送口。先端有小塊突起。如人指。能拾纖介之物。頗覺銳利。眼細小。上顎之門齒有二。延長而挺出口外者。象牙也。下顎無門齒。四肢皆大。各有五趾。趾端有蹄。其尾稍小。先端爲總狀。其皮牙等俱可供藥用。

製法　刉末用。

性質　甘。寒。無毒。

效能　止血斂瘡。拔毒生肌。用作收斂藥及清熱藥。

主治　諸鐵及雜物入肉。刮牙屑和水敷之。立出。治癇病。刮齒屑炒黃。研末飲服。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論象牙曰。諸物刺咽中。磨水服之亦出。若舊梳屑尤佳。【明】李時珍本草綱目論象牙曰。主風癇驚悸。一切邪魅精物。熱疾骨蒸。及諸瘡並宜生屑入藥。【清】黃宮繡本草求眞論象牙曰。象牙味甘性寒。按象性主剛猛。而牙則善脫。故凡皮肉間有形滯物。及邪魅驚悸風癇並惡瘡。內有毒未拔者。服之立能有效。以其具有脫性。故能以脫引脫耳。是以癰腫不解。用牙磨水服之。并挫末蜜塗之。即效。諸鐵竹木刺入肉。刮削煎湯。溫服即愈。諸骨鯁入於喉。刮下薄片。頻服即吐。不吐再服。以吐出爲度。【清】張石頑張氏醫通曰。象牙甘寒。能解癰腫諸毒。磨水服之。造筋磨礪之末。生蜜調塗。治諸鐵雜物入肉。舊梳刮薄片屑。溫湯頻服。治竹木刺及諸魚骨鯁。即時吐出。不吐再服。以吐出爲度。非刮下薄片不能應手也。【清】張景岳景岳全書曰。味甘氣涼。能清心腎之火。可療驚悸風狂。骨蒸痰熱。鬼精邪氣。

配合應用　㈠治小便不通脹急者。象牙生煎服之。（救急方）

㈡治小便過多。象牙燒灰飲服之。（聖濟總錄方）

㈢治瘡瘍不收。象牙屑。銅銚炒黃紅色。爲末。每服七八分或一錢。白水下。（王氏瘡疹方）

㈣治諸獸骨鯁。象牙磨水吞之。（永類鈐方）

㈤治骨刺入肉。象牙刮末。以水煮白梅肉調塗自軟。（簡要濟衆方）

㈥治鐵箭入肉。象牙刮末。水和敷之。即出也。

用量　五分至八分。

參攷資料　㈠眞臘風土記云。象牙殺取者上也。自死者次之。蛻於山中多年者下矣。或謂一歲一換牙者。非也。（蘇頌）㈡西域重象牙。用飾牀座。中國貴之。以爲笏。象每蛻牙。自埋藏之。昆崙諸國人。以木牙潛易取焉。（甄權）㈢象牙取口兩邊各出一牙。下垂夾鼻者。非口內食齒別入藥。今爲象笏者。是牙也。（慈宗奭）

【象牙屑】即象牙之處方用名。詳『象牙』條。

【象牙絲】即象牙之處方用名。詳『象牙』條。

【象皮】主治　下疳燒灰和油敷之。又治金瘡不合。

參攷資料　象肉壅腫人以斧刃刺之。半日即合。故近時治金瘡不合者。用其皮灰。（李時珍）

【象肉】性質　甘。淡。平。無毒。

主治　燒灰和油塗禿瘡。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論象肉曰。生煮汁服。治小便不利。燒灰飲服。治小便多。

參攷資料　㈠象肉多食令人體重。（開寶）㈡象肉肥脆。少類豬肉。味淡而含滑。則其通小便者。亦淡滲滑竅之義。燒之則從火化。故又能縮小便也。（李時珍）

【象尾毛】參攷資料　象尾毛可去火。並可作別牙籤。（趙學敏）

【象豆】即槐藤子之古籍別名。典見開寶本草。詳『槐藤子』條。

【象貝母】即浙貝母之處方用名。詳『浙貝母』條。

【象馬】即當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『當歸』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【象骨】主治　解毒。
參攷資料　胸前小橫骨。燒灰酒服。令人能浮。（開寶）

【象睛】主治　目疾。和人乳滴之。

【象鼻草】基本　象鼻草爲雜草類之一種。可供藥用。
產地　出舊雲南府境。
主治　丹毒。跌撲損傷。

【象穀】即罌粟子之古籍別名。典見綱目。詳『罌粟子』條。

【象頭花】即由跋之古籍別名。典見植物名實圖考。詳『由跋』條。

【象膽】用雜膽。其象膽乾後上有青竹文斑。光膩。其味微帶甘。入藥勿便和衆藥。須先搗成粉。乃和衆藥。
性質　苦。寒。微毒。
主治　明目。治疳。
歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論象膽曰。治瘡腫。以水化塗之。治口臭。以綿裹少許。貼齒根。平旦漱去數度。即癒。
參攷資料　象膽明目。能去塵膜也。與熊膽同功。雷敎炮炙論云。象膽揮黏是矣。（李時珍）

【象膽】即蘆薈之俗名。詳『蘆薈』條。

【象糞】採取　以野象者良。
主治　燒熏鷄掌風。和升麻水煎服。發瘟疹瘡。

【貂】即貂鼠之古籍別名。典見綱目。詳『貂鼠』條。

【貂尾】基本　貂出西北塞外。食松栗。即南中松狗之類。其行捷穿樹枝如飛。蓋以尾爲用者。故其力在尾。
主治　凍瘡。用貂尾燒存性爲末。摻爛處。自愈。未破者。用舊貂皮毛煅研。香油和搽。

【貂鼠】古籍別名　栗鼠。（爾雅）松狗。貂。銀貂。（綱目）
基本　係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。食肉類。裂脚類。鼬鼠科。爲貂鼠之肉。其毛皮詳見該條。
產地　出北寒帶諸地。如東三省三姓。琿春。寧古塔等處之山林中多有之。
形態　貂鼠爲鼠類之一種。大如獺。尾粗。毛長寸許。體狹長約二尺。形如鼬。口吻尖銳。有黑鬚。耳殼短而圓。四肢短。前比後更短。趾有鉤爪。毛色黃或紫黑。可作裘服。甚貴。其肉可供藥用。
種類　㊀毛色帶黃者名黃貂。㊁毛色帶白者名銀貂。
性質　甘。平。無毒。
主治　功用同鼠肉。

【貂鼠毛皮】主治　塵沙眯目。以裘袖拭之。即出。凍瘡未潰。以舊者煅研和塗。

【貊獸】即胍肭臍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胍肭臍』條。

【貴老】即橘皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橘皮』條。

【貿子木】即賣子木之古籍別名。典見綱目。詳『賣子木』條。

【買麻藤】命名　本品堅韌如麻。言買其藤猶得麻也。故名。
產地　出廣東高要縣一帶。
形態　買麻藤爲蔓草類之一種。綠樹而生。莖多汁液。折斷飲之。可以止渴。結子味苦。可食。其藤又可製履。與供藥用。

【貽】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【貽貝】即淡菜之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『淡菜』條。

【貲龜】古籍別名　三足龜。（爾雅）
基本　貲龜爲龜類之一種。身有三足。其肉可供藥用。
主治　消腹脾時疾。

【越王蛇】即兩頭蛇之古籍別名。典見綱目。詳『兩頭蛇』條。

【越王約髮】即兩頭蛇之古籍別名。典見綱目。詳『兩頭蛇』條。

【越王鳥】即蠻蠻之古籍別名。典見綱目。詳『蠻蠻』條。

【越王頭】即椰子之古籍別名。典見綱目。詳『椰子』條。

【越王餘算】命名　相傳本品爲晉安越王渡南海。將黑角白骨作算籌。其有餘者。棄水中而生此物。故名。
古籍別名　白珊瑚。
產地　生海中。
形態　越王餘算爲水草類之一種。其質堅緻。似珊瑚。惟色白幹

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

直。無枝。可供藥用。

性質　鹹。溫。無毒。

主治　水腫浮氣結聚。宿滯不消。腹中虛鳴。並煮服之。

【越瓜】　**命名**　本品出於越地。故名。

古籍別名　稍瓜。(食物)菜瓜。(綱目)長者名羊角瓜。醬瓜。(俗名)白瓜。淺瓜。(日本)

外國名詞　Cucumis Conomon, Thunb.(拉丁)シロウリアサウリ(日本)

基本　係葫蘆科胡瓜屬。爲越瓜之果實。

產地　原產越中。今南北皆有之。

形態　越瓜爲菜類之一年生草本。就地蔓生。全體與甜瓜相似。花期花色亦相同。夏秋間結瓜。實橢圓形。長自七八寸至尺許。外皮淡綠色。越產者則白色。子如胡瓜子。大如麥粒。其果實可供食與藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　利腸胃。止煩渴。

歷代記述攷證　【明】常效先心鏡篇論越瓜曰。和飯作鮓。久食益腸胃。

參攷資料　㈠越瓜生食多冷中。動氣。令人心痛。脾下瘕結。發諸瘡。又令人虛弱。不能行。不益小兒。天行病後不可食。又不得與牛乳酪及鮓同食。(孟詵)㈡越瓜生食可充果蔬。醬豉糖醋藏浸皆宜。亦可作菹。按蕭子眞云。菜瓜能暗人耳目。觀驢馬食之即眼爛。可知矣。(李時珍)

【越砂】　即硃砂之古籍別名。典見本草集註。詳『硃砂』條。

【越桃】　即山梔子之古籍別名。典見別錄。詳『山梔子』條。

【越桐】　即山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【越砥】　即羊肝石之古籍別名。典見別錄。詳『羊肝石』條。

【越鳥】　即孔雀之古籍別名。典見綱目。詳『孔雀』條。

【越椒】　即食茱萸之古籍別名。典見博雅。詳『食茱萸』條。

【越雉】　即鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳『鷓鴣』條。

【跗蝠】　即蝠蝙之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝠蝙』條。

【軸脂】　即車脂之古籍別名。典見綱目。詳『車脂』條。

【軹】　即連翹之古籍別名。典見漢藥考。詳『連翹』條。

【進賢菜子】　即蒼耳子之古籍別名。典見記事珠。詳『蒼耳子』條。

【都勾樹】　即莎木麵之古籍別名。典見綱目。詳『莎木麵』條。

【都念子】　**古籍別名**　倒捻子。(綱目)

產地　出粵省諸地。

形態　都念子爲灌木類之一種。樹高丈餘。樸皺叢生。枝柯細長。似蜀葵。小而深紫。中心黃色。葉如白楊。花如芍藥而小。春月開花。有紅白兩色。色鮮可愛。結實如柿。有四葉承之。外紫內赤。小而無核。味甚甘美。或謂有細核。嚼之惡悉有聲。味帶苦。沁子實可供食與藥用。

性質　甘酸。小溫。無毒。

主治　痰嗽噦氣。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論都念子曰。暖腹腸益肌肉。

參攷資料　都念子爲補血良品。小兒食之則大便難暢。其產羅浮者尤佳。其皮漬之。得膠可以代柿。名海漆。與漆同功。功逾青黏。汁若膩脂。可作染料。其花可以釀酒。(醫學大辭典)

【都念子】　即倒捻子之古籍別名。典見綱目。詳『倒捻子』條。

【都念葉】　**主治**　夏秋暑溼下痢。亦可爲麵用。

【都咸子】　**產地**　出嶺南山谷間。

形態　都咸子爲喬木類之一種。樹如李。三月開花。結實大如指。長三寸。秋月成熟。色正黑。其子及木皮與葉俱可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　火乾作飲。止渴潤肺。去煩除痰。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論都咸子及木皮與葉曰。去傷寒清澁。嗽逆上氣。宜煎服之。

【都馬蛇】　即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【都椁子】　**古籍別名**　槠子。(綱目)

產地　生嶺南山谷中。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態　都桷爲喬木類之一種。樹高丈餘。二月開花赤色。結實似木瓜。大如鷄卵。狀若青梅。秋月成熟。鹽漬蜜餞。可供食與藥用。



都桷子

性質　酸澀。平。無毒。

主治　久食益氣止洩。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論都桷子曰。安神溫腸。治痔久服無損。【明】李時珍本草綱目論都桷子曰。解酒止煩渴。

【都梁香葉】卽澤蘭葉之古籍別名。典見本草集註詳『澤蘭葉』條。

【都淋藤】卽馬兜鈴之古籍別名。典見肘後方。詳『馬兜鈴』條。

【都管草】古籍別名　香毬。（圖經）

學名　Angelica kiusiana, Max.

基本　係繖形科。爲都管草之根。

產地　多在山谷田野間。

形態　都管草爲山草類之多年生草本。高尺許。其葉一似土當歸。其根似羌活。亦有莖作蔓生者。採得可供藥用。

性質　苦。辛。無毒。

主治　風腫癰毒赤疣。以醋調塗之。亦治咽喉腫痛。切片含之立愈。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論都管草曰。解蝮蛇蛇毒。

近人學說　袁淑範曰。都管草依魏美氏謂其有效成分。恐係一種油類（Angelicaöl）或係一種苦味質（Angelikabitter）

參攷資料　㊀都管草生宜州田野。根似羌活。頭歲長一節。苗高一尺許。葉似土當歸。有重臺二月八月採根。陰乾。施州生者作蔓。又名香毬。蔓長丈餘。赤色。秋結紅實。四時皆有。採其根枝。淋洗風毒痛腫（蘇頌）。㊁按范成大桂海志云。廣西出之一莖六葉（李時珍）

【鞯芝】卽天麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天麻』條。

【酢】卽醋之古籍別名。典見綱目。詳『醋』條。

【酢桶】卽鹽麩子之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鹽麩子』條。

【酢漿】卽地榆之古籍別名。典見綱目。詳『地榆』條。

【酢漿草】命名　本品莖葉皆有酸味。故名。

古籍別名　酸漿。赤孫施。（圖經）。醋母。小酸茅。鳩酸（蘇恭）。酸箕（李當之）。三葉酸。三角酸。酸母。雀兒酸。雀林草。（綱目）

外國名詞　Oxalis corniculata, L.（拉丁）カタバミ（日本）スイモノクサ（日本）

基本　係酢漿草科酢漿草屬。爲酢漿草之莖葉。

產地　生原野道旁及田澤之陰濕諸地。

形態　酢漿草爲石草類之多年生草本。莖傾臥地上。嫩者匍匐長三四寸。葉爲掌狀複葉。小葉三片。倒心臟形。葉柄頗長。互生。夜則小葉閉合下垂。翌朝復展。秋抽花軸。着一花或數花。花小五瓣。黃色。結實爲蒴果。熟則裂。能散其種子。其莖葉可供藥用。



酢漿草

採取　四月五月採陰乾。

性質　酸。寒。無毒。

主治　殺諸小蟲。惡瘡瘧瘧。搗傅之。食之解熱渴。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論酢漿草曰。亦孩嬰治娠人血結。用一撮洗。煖酒服之。【明】李時珍本草綱目論酢漿草曰。主小便諸淋。赤白帶下。同地錢地龍。治沙石淋。煎湯洗痔痛脫肛甚效。搗塗湯火蛇蠍傷。

參攷資料　㊀酢漿草嫩時用搭石器令白如銀（蘇頌）。㊁酢漿草能制砂汞。硇鬱。砒石（李時珍）

【酥】命名　本品尋常多用牛羊乳合煮煉取之油。故名。

古籍別名　酥油。馬思哥油。（綱目）

種類　㊀以水牛乳製成者名水牛酥。㊁以白羊乳製成者名白

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

羊酥。㊂以犂牛乳製成者名犂牛酥。㊃以犛牛乳製成者名犛牛酥。

採取　用牛羊之乳汁入鍋煮二三沸。傾入盆內。冷定。待其上面結皮。取皮再煎。油出去渣。入鍋即成酥油。或以桶盛乳。以木棍攪半日。俟焦沫出。撇取。煎去焦皮。亦成酥油。

製法　凡入藥以微火溶化。濾淨用之良。

主治　療眯目。隨左右納鼻中。垂頭少頃。令流入。則目中物與淚俱出。塗蜂螫蟲咬。

參攷資料　㊀酥乃酪作。其性與酪異。然牛酥功勝羊酥。犛牛酥復勝家牛酥。（蘇恭）㊁酥以犂牛犛牛乳者爲上。白羊者次之。（孫思邈）㊂牛乳冷。羊牛溫。牛酥不離寒。病之兼熱者宜之。羊酥不離溫。病之兼寒者宜之。蓋各有所長。惟犛酥功雖勝於羊而難得。（汪機）㊃酥乃酪之浮而所成。今人多以白羊脂雜之。不可不辨。（李時珍）

【酥油】　卽酥之別名。典見綱目。詳『酥』條。

【酥蜜粥】　**基本**　本品卽以酥蜜和米煮成之粥。

主治　養心肺。

【鉍粉】　卽白粉之古籍別名。典見綱目。詳『白粉』條。

主治　參攷『白粉』條。

【鉍華】　㊀卽白粉之古籍別名。典見綱目。詳『白粉』條。㊁卽黃丹之古籍別名。典見綱目。詳『黃丹』條。

【鈑】　卽金之古籍別名。典見爾雅。詳『金』條。

【釗】　卽錫之古籍別名。典見綱目。詳『錫』條。

【開口川椒】　卽川椒之處方用名。詳『川椒』條。

【開口吳萸】　卽吳茱萸之處方用名。詳『吳茱萸』條。

【開口花椒】　卽花椒之處方用名。詳『花椒』條。

【開水】　卽熱湯之俗名。詳『熱湯』條。

【開元錢】　**基本**　唐開元時所鑄之古錢。印有開元通寶四字者是。

主治　禁口痢。折傷接骨。兼療驚風。

【開金鎖】　**產地**　出江浙兩省。

形態　爲山草類之一種。高三四尺。葉如車前。根如首烏而無稜。肉白色而無紋。略似薤無刺。可供藥用。

性質　苦。平。無毒。

主治　祛風濕。療手足不遂。筋骨疼痛。同蒼朮當歸用。

【開屏鳳尾】　卽翠雲草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『翠羽草』條。

【開鬱半夏麴】　**原名**　開鬱麴。

製法　用半夏末。合香附、蒼朮、撫芎各等分。煮煎成膏。草龕七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取　以陳久者良。

主治　療鬱痰。

【開鬱麴】　卽開鬱半夏麴之原名。詳『開鬱半夏麴』條。

【閏月樓皮】　**命名**　本品卽樓櫚值閏月增生之皮。故名。

採取　以陳久者入藥良。

主治　血症。煅研服。

【閑客】　卽白鷳之古籍別名。典見綱目。詳『白鷳』條。

【陽古米】　卽罌粟子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『罌粟子』條。

【陽明子】　卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【陽侯】　卽石硫黃之古籍別名。典見外家。詳『石硫黃』條。

【陽春雪】　卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【陽桃】　㊀卽五斂子之古籍別名。典見綱目。詳『五斂子』條。㊁卽獼猴桃之古籍別名。典見日用本草。詳『獼猴桃』條。

【陽烏】　**古籍別名**　陽鴉。（拾遺）

產地　出建州諸地。

形態　陽烏爲水禽類之一種。形似鶴而小。身黑。頸長。面白。其嘴可供藥用。

主治　療惡蟲咬成瘡。燒灰酒服。

【陽起石】　**命名**　本品能起陽之不能起者故名。

古籍別名　羊起石（別錄）白石（本經）石生五精。金五精陰華。五色芙蓉（和漢藥考）

外國名詞　Asbestos tremo-

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

lite（拉丁）Tremolite.（英）

基本　屬礦石類。爲似針狀之石塊。

產地　陳仁山藥物生產辨云。產山東山西。

形態　陽起石爲東針狀之塊。色白或灰。或淡綠。餐石膏之光澤。質柔軟易破碎。作細絲狀。胎生於寒水石及苦灰石中。間有透明者。入藥以白色者爲上。

製法　大明曰。凡使陽起石入藥。燒後水煅用之。凝白者佳。李時珍曰。凡用火中煅赤。酒淬七次。研細水飛過。日乾。亦有用燒酒浸過。同樟腦入罐升煉取粉用者。

用法　與他藥末糊丸。不入湯劑。

性質　鹹。微溫。無毒。

成分　昔人以陽起石爲雲母之根。主要之成分。爲無水珪酸及苦土。此外尚含有加爾叟謨及鐵等。

效能　强陽事。療陰痿。消癥瘕。治崩漏。用作陰痿藥。

主治　崩中漏下。破子臟中血癥瘕結氣。寒熱腹痛。無子。陰痿不起。補不足。（本經）療男子莖頭寒。陰下溼痒。去臭汗。消水腫。久服不饑。令人有子。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論。陽起石曰。補腎氣。精乏腰痛。膝寒。溼痺。子宮久冷。冷癥。寒瘕。止月水不定。【宋】大明日華諸家本草論。陽起石曰。治帶下。溫疫。冷氣。補五勞七傷。【元】王好古湯液本草論。陽起石曰。補命門不足。【明】李時珍本草綱目論。陽起石曰。散諸熱腫。【明】繆希雍本草經疏論。陽起石曰。陽起石眞純陽之氣以生。本經味鹹氣微溫無毒。觀圖經所載齊州陽起山。其山常有煖氣。雖盛冬大雪。徧境獨此山無少積。蓋石氣熏蒸也。其爲氣之溫煖。當不甚微矣。味鹹而氣溫。入右腎命門。補助陽氣。并除積寒宿血。留滯下焦之聖藥。故能主崩中漏下。及破子臟中血癥瘕結氣。寒熱腹痛。及男子莖頭寒。陰痿不起。陰下溼痒。令人有子也。眞陽足。則五臟之氣充溢。邪溼之氣外散。故久服不飢。并去臭汗也。別錄又主消水腫者。蓋指眞火歸元。則能煖下焦。熏蒸糟粕。化精微。助脾土以制水也。【明】李士材本草圖解論。陽起石曰。陽起石鹹溫。主下部虛寒。助陽種子。火煅水飛。陰虛火旺者忌之。陽痿屬於失志。以致火氣閉密。不得發越而然。及崩中漏下。由於火盛而非虛寒者。並不宜服也。【清】黃宮繡本草求眞。論。陽起石曰。陽起石即雲母根也。雖大雪遍境。此山獨無。眞純陽之氣以生。味鹹氣溫。無毒。能補命門相火。凡因火衰寒氣內停。宿血留滯。而見陰痿精滑。子宮虛冷。腰膝冷痺。水腫癥瘕。服此即能有效。以其性眞純陽故耳。是以育龜丸用此以爲嗣續宗祧之基。不可以房術論也。功雖類於硫黃。但硫黃大熱。號爲火精。此則其力稍遜。而於陽之不能起者。克起。陽起之號。於是而名出。齊州雲頭雨脚。鷺鷥毛。色白滋潤者良。火煅醋淬七次。研粉。水飛用。【清】張隱菴本草崇原論。陽起石曰。主治崩中漏下者。崩漏爲陰。今隨陽氣而上升也。破子臟中血及癥瘕結氣者。陽長陰消。陽氣透發。則癥結破散矣。婦人月事不以時下。則寒熱腹痛而無子。陽起石眞下啓元。陰中有陽。陰陽和而寒熱除。月事調而生息繁矣。男子精虛。則陰痿不起。陽起石助陰中之陽。故治陰痿不起。而補腎精之不足。【清】黃元御玉楸藥解論。陽起石曰。陽起石溫暖肝腎。强健宗筋。治寒疝。冷痕。崩漏。帶下。陰下溼癢。腰膝酸疼。腹痛。無子。經期不定。

國外學說　英美學說謂陽起石內含鎂鈣鐵養玻酸等質。別無功用。不可作藥品云。

辨僞　李時珍曰。陽起石眞者頗少。以雲頭雨脚。輕鬆如狼牙者爲佳。其鋪茸茜角者不佳。王建平典術乃云。黃白而赤。重厚者佳。雲母之根也。庚辛玉册云。陽起陽石也。齊州棟金山出者。勝其尖似筍簇者力强。如狗牙者力微。置大雪中。儼然沒者爲眞。

配合應用　㊀陽起石同破故紙、鹿茸、胞脢、菟絲子、狗陰莖、肉蓯蓉、巴戟天、治命門虛寒。陰痿不起。精寒無嗣。服之能令陽道豐隆。使人有子。總治男子九醜之疾。㊁治丹毒腫痒。陽起石煅研。新

443／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

汲水調塗。(儒門事親方)

㈢治元氣虛寒。精滑不禁。大腑溏瀉。手足厥冷。陽起石煅研、鍾乳粉各等分。酒麥附子末同麵糊丸。梧子大。每空心米飲下五十丸。以愈爲度。(濟生方)

㈣治陰痿陰汗。陽起石煅爲末。每服二錢。鹽酒下。(普濟方)

用量　一錢至錢半。

施用宜忌　陰虛火旺者。以及陽痿屬於失志者。崩漏由於火盛而非虛寒者。禁用。惡澤瀉、茵桂、雷丸、石葵、蛇蛻、長蒐、絲子、忌羊血、桑螵蛸爲之使。

參攷資料　㈠陽起石如狼牙者佳。其外色不白如薑石。其大塊者亦內白。治男子婦人下部虛冷。腎氣乏絕。子臟久寒者。須水飛研用。凡石藥冷熱皆有毒。正宜斟酌。(蘇恭)㈡陽起石右腎命門氣分藥也。下焦虛寒者宜用之。然亦非久服之物。張子和儒門事親云。喉痺相火急速之病也。相火龍火也。宜以火逐之。一男子病纏喉風腫。表裏皆藥不能下。以涼藥灌入鼻中。下十餘行。外以陽起石燒赤。伏龍肝等分。研極細末。日以新汲水調。掃百遍。三日熱始退。腫始消。此亦從合之道也。(李時珍)㈢陽起石所出與雲母同。而甚似雲母。但厚異耳。今用乃出益州。與礬石同處。色小黃黑。但礬石雲母根未知孰是。俗用乃稀。仙經服之。(陶弘景)㈣陽起石以白色肌理似殷孽。乃夾帶雲母滋潤者爲良。故本經一名白石。今用純黑如炭者。誤矣。雲母之黑者名雲膽。服之損人。則黑陽起石亦必惡矣。今齊山在齊州西北。無陽起石。石乃在齊山西北六七里。盧山出之。本經雲山或盧字訛也。太山沂州惟有黑者。其白者獨出於齊州。(蘇恭)㈤陽起石今惟出齊州。他處不復有。齊州惟一土山。石出其中。彼人謂之陽起山。其山常有溫暖氣。雖盛冬大雪徧境。獨此山無積白。蓋石氣熏蒸使然也。山惟一穴。官中常禁閉。至初冬則州發丁夫。遣人監取。歲月積久。其穴益深。鑱鑿他石。得之甚難。以白色明瑩若狼牙者爲上。亦有挾他石作塊者。不堪。每歲採擇上供。剩餘州中貨之。不爾。無由得也。貨者雖多。而精好者亦難得。舊說是雲母根。其中猶帶雲母。今不復見此矣。古方服食不見用者。今補下藥多用之。(蘇頌)

【陽荷】　卽蘘荷之古籍別名。典見黔志。詳『蘘荷』條。

【陽雀】　卽杜鵑之古籍別名。典見綱目。詳『杜鵑』條。

【陽精】　卽大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大生地』條。

【陽鴈】　卽陽鳥之古籍別名。典見本草拾遺。詳『陽鳥』條。

【陽燧】　卽鹿梨之古籍別名。典見爾雅。詳『鹿梨』條。

【陽鱎】　卽白魚之別名。詳『白魚』條。

【陽燧錠】

製法　趙氏集要古有烙法。今罕用之。不但粗工不知用法。抑且患者見之駭然。故以此代之。法用乾蟾酥刮薄片。焙研。硃砂水飛。川烏、草烏各五分。麝一條。各研細。將硫黃一兩五錢置杓內。微火鎔化。入藥末攪勻。急攪爲要。遲則凝矣。傾入磁盆內。速掀成片。待冷收用。

主治　治溼痰流注。附骨陰疽。寒溼瘡毒。經久不消。內潰不痛者。能使未成卽消。已成卽潰。已潰卽斂。如若風痺。用竹篦點之。有酸痛處。筆囊雜錄記之。照墨上灸。若腿膝疼痛。灸鬼眼穴。諸瘡初起。灸三五壯卽痊。

【陽蘗】　卽蘘荷之別名。典見植物圖考。詳『蘘荷』條。

【隕支】

產地　出江蘇邳縣。及四川邛縣。

形態　隕支爲灌木類之一種。樹高丈餘。枝修而弱。開白花。結實大如雀卵。狀似荔枝。其肉黃色。可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　七種疝氣。一切瘡瘍疥癬。

【隊隊】

產地　出雲南緬甸諸地。

形態　隊隊爲溼生蟲類之一種。狀如蟞蟲。生有定偶。出必雌雄相隨。可供藥用。

主治　夫婦不和。入媚藥用。

【階砂】　卽硃砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硃砂』條。

【階前草】　卽麥門冬之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com


小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見綱目。詳『麥門冬』條。

【雁】古籍別名　鴻。（綱目）僧娑（梵書）江鵝。（俗名）

產地　出江湖池澤間。

形態　雁爲水禽類之一種。其狀如鵝。體長二尺許。嘴長微黃。背部褐色。翼帶青灰色。胸腹有黑斑。爪白。脚橙黃色。首長而尾羽短。鳴聲嘹喨。飛時自成行列。爲春去秋來之候鳥。其肉可供食與藥用。



雁

性質　甘。平。無毒。

主治　祛風。療痲痺。壯筋骨。

歷代記述攷證　【宋】寇宗奭本草衍義論雁肉曰。食之治諸風。【明】李時珍本草綱目論雁肉曰。利臟腑。解丹石毒。

參攷資料　雁肉七月勿食。食之傷人神。禮云。食雁去腎不利人。（孫思邈）

【雁毛】主治　喉下白毛。療小兒癇有效。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論雁毛曰。自落翎毛。小兒佩之辟驚癇。

參攷資料　按西陽雜俎云。臨邑人春夏羅取鴻雁毛以禦暑。又淮南萬畢術云。鴻毛作囊。可以渡江。此亦中流一壺之意。水行者不可不知。（李時珍）

【雁來紅】古籍別名　老少年。（綱目拾遺）

形態　老少年苗初出。似莧莖葉。穗子與雞冠無異。至深秋本高六七尺。則脚葉深紫而頂葉大。鮮紅可愛。愈久愈妍。此花秋色之最佳者。



雁來紅

主治　鼻淵。

參攷資料　㈠雁來紅一名老少年。無有用入藥者。惟急救方有治腦漏法。用老少年煎湯。熱熏鼻內。然後將湯服二三口。大妙。冬間用根。㈡瀕湖綱目青葙下附雁來紅。無主治。土宿眞君本草雁來紅制汞。㈢眼科要覽。老少年。銀杏部。殼爲君。官渣根。大葉者佳。千里光。雄楊梅樹根皮爲臣。煎成濃膏。量加製甘石、冰片。又方加茶樹根皮爲膏。子眼藥去遠年障翳。㈣有一種少年老。頂黃紅而脚葉綠。爲別一種。枝頭亂叢生。有紅紫黃綠相雜。葉雜出者。名十樣錦。一種根下葉綠。頂上葉純黃者。名雁來黃。

【雁肪】古籍別名　鶖肪。（綱目）

性質　甘。平。無毒。

主治　風擊拘急。偏枯。血氣不通。利久服益氣。不飢。輕身耐老。（本經）長毛髮。鬚眉。（別錄）

歷代記述攷證　【魏】吳普本草論雁肪曰。殺諸石藥毒。【宋】日華諸家本草論雁肪曰。治耳聾。和豆黃作丸。補勞瘦。肥白人。【明】李時珍本草綱目論雁肪曰。塗癰腫耳疳。又治結熱胸痞嘔吐。

【雁屎白】主治　炙瘡腫痛。塗之。

【雁音草】即鶖草之日本別名。詳『鶖草』條。

【雁骨】主治　燒灰。和米泔沐頭長髮。

【雁喙】即茨實之古籍別名。典見古今注。詳『茨實』條。

【雁喙實】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【雁鳴】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【雁實】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【雁膳】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【雁頭】即茨實之古籍別名。典見古今注。詳『茨實』條。

【雄狐屎】即狐屎之原名。詳『狐屎』條。

【雄雀屎】即白丁香之原名。詳『白丁香』條。

【雄魚白】即烏魚蛋之古籍別名。典見藥性考。詳『烏魚蛋』條。

【雄豬眼梢肉】主治　能拔癮肉。散毒滯。對口瘡用雄豬眼梢肉三錢。剉爛如泥。加滑石末四錢。和勻敷患處。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

頂上。以膏藥蓋之。拔去殭肉。放出黃水卽愈。

【雄黃】命名　本品生山之陽。是丹之雄。故名。

處方用名　雄精。

古籍別名　黃金石（本經）石黃。（唐本）熏黃。（綱目）白陵。丹山地精。夜金。男精。男生。黃奴。朱雀。金天陽石。帝男。血帝男精。迄利加。柔黃雄。丹山月魂。太旬首中石。雞冠石。（和漢藥考）

外國名詞　Realgar, Orpiment.（英）

基本　屬砷礦斜方系。爲紅黃色之不透明固體。

產地　陳仁山藥物生產辨云。雄黃產湖南津市。以蘇片紅熟爲好。和漢藥考曰。日本之石狩、陸奥、陸前岩代、下野等地產此。

形態　雄黃係產於黏土或噴火口附近之美黃色或橙黃色小板狀結晶礦石。時或作粒狀。又有作葡萄狀、鐘乳狀等者。其面有線痕。有眞珠光。半透明。硬度一·五。溶於硝酸。苛性亞爾加里、安母尼亞等。

製法　雷敩曰。凡使雄黃。須以三兩爲率。用甘草、紫背天葵、地膽、碧稜花各五兩。細剉。取東流水入坩鍋中。煮三伏時。濾出。搗如粉。水飛澄去黑者。曬乾再研用。其內有刼鐵石。又號赴矢黃。能刼於鐵。并不入藥用。孫思邈曰。凡服食用武都雄黃。須以油煎九日九夜。乃可入藥。不然有毒。李時珍曰。又有用醋入蘿蔔汁煮乾用。妙抱朴子曰。或以豬脂裹燕之於赤土下。或以松脂和之。或以三物煉之。或布帛如水服之。令人長生。除百病。殺三蟲。伏火者可點銅成金。變銀成金。

用法　恒以剉末和作丸散用。

性質　苦。平。寒。有毒。

成分　爲三硫化砒（As2S3）。

效能　燥澀殺蟲。療疥癬。刼痰。解毒。治鷺瘺。用作腐蝕藥。脫毛藥。又治鼠瘻。痔疾。惡瘡。及毒蛇毒蟲螫傷之解毒藥。

作用　與砒石同。但內服較砒石之刺激性爲少。外用之效。則較勝於砒石。

主治　寒熱。鼠瘻。惡瘡。疽痔。死肌。殺精物。惡鬼。邪氣。百蟲毒。勝五兵。練食之。輕身神仙。（本經）療疥蟲。蠹瘡。目痛。鼻中息肉。及絕筋破骨。百節中大風積聚。癬氣。中惡腹痛。鬼疰。殺諸蛇鳥毒。解藜蘆毒。悅澤人面。餌服之者。皆飛入腦中。勝鬼神。延年益壽。保中不饑。得銅可作金。（別錄）

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論雄黃曰。主疥癬。風邪。癲癇。瘋瘡。一切蟲獸傷。【元】王好古湯液本草論雄黃曰。搜肝氣。瀉肝風。消涎積。【明】李時珍本草綱目論雄黃曰。治瘡疾寒熱。伏暑泄痢。酒飲成癖。鬻癇。頭風眩暈。化腹中瘀血。殺勞蟲疳蟲。【明】繆希雍本草經疏論雄黃曰。雄黃味苦平。氣寒有毒。別錄加甘大溫。甄權言辛大毒。察其功用。應是辛苦溫之藥。而甘寒則非也。氣味俱厚。升也陽也。入足陽明經。其主殺精物。惡鬼邪氣。及中惡腹痛鬼疰者。蓋以陽明虛則邪惡易侵。陰氣勝則精鬼易憑。得陽氣之正者。能破幽暗。所以殺一切鬼邪。勝五兵也。寒熱。鼠瘻。惡瘡。疽痔。死肌。疥蟲。蠹瘡諸證。皆濕熱留滯。肌肉所致。久則浸淫而生蟲。此藥苦辛。能燥濕殺蟲。故爲瘡家要藥。其主鼻中息肉者。肺氣結也。癬氣者。大腸積滯也。筋骨斷絕者。氣血不續也。辛能散結滯。溫能通行氣血。辛溫相合。而殺蟲故能搜剔百節中大風積聚也。鬼蛇陰物。藜蘆陰草。雄黃稟純陽之氣。所以善殺百蟲。蛇鳥毒。及解藜蘆毒也。別錄復有目痛及悅澤人面之語。悉非正治。練餌之法。出自仙經。以銅爲金。亦黃白術中事耳。【明】李士材本草圖解論雄黃曰。雄黃辛溫有毒。肝家藥也。搜肝氣。瀉肝風。消涎積。解百毒。辟百邪。殺百蟲。截邪瘧。理蛇傷。然能化血爲水。血虛大忌用之。當歸、白芷、藤黃、地黃、紫河車均能制其毒。【清】黃宮繡本草求眞。論雄黃曰。雄黃生山之陽。得氣之正。味辛而苦。氣溫有毒。凡人陽氣虛則邪易侵。陰氣勝則鬼易憑。負二氣之精者。能破羣妖。受陽氣之正者。能辟幽暗。故能治寒熱鼠瘻。惡瘡疽痔。死肌疥蟲。蠹瘡諸症。皆由濕熱侵於肌肉而成。服此辛以散結。溫以行氣。辛溫相合。而蟲殺。故能搜剔百節中

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

風寒積聚也。是以聖惠方之治狐惑肝後方之治陰腫如斗。家祕方之治癮母。急救方之治風狗咬傷。聖濟之治白禿頭瘡。何一不用雄黃以爲調治。至云能解蛇虺蠆蘆等毒。以其蛇屬陰物。蠆屬陰草也。癮肉癬氣。能治者。以其一屬氣結。一屬積滯也。目痛能愈者。以其肝得辛散之意也。明徹不臭者良。醋浸入菜腹汁煮乾用。生山陰者名雌黃。燒之則臭。止可薰瘡瘍。殺蟲虱。

配合應用　㈠治卒中邪魘。雄黃末吹鼻中。（集驗方）

㈡治鬼擊成病。腹中煩滿欲絕。雄黃粉酒服一刀圭。日三服。化血爲水也。（千金方）

㈢治辟穢魘魅。可用雄黃帶頭上。或以棗許繫左腋下。終身不魘。（張文仲方）

㈣治家有邪氣。用真雄黃三錢。水一碗。以東南桃枝呪酒滿屋則絕迹。（集簡方）

㈤治女人病邪。女人與邪物交通。獨言獨笑。悲思恍惚者。雄黃一兩。松脂二兩。溶化。以虎爪攪之。丸如彈子。夜燒於籠中。令女坐其上。以被蒙之。露頭在外。不過三劑自斷。仍以雄黃、人參、防風、五味子等分爲末。每旦井水服方寸匕。取愈。（肘後方）

㈥小丹服法。雄黃、柏子仁各二斤。松脂煉過十斤。合搗爲丸。每旦北向服五丸。百日後。拘魂制魄。與神人交見。（太上變玄經方）

㈦轉女爲男。婦人覺有妊。以雄黃一兩。絳襲盛之。養胎。轉女成男。取陽精之全於地產也。（千金方）

㈧治小兒諸癇。雄黃、硃砂等分爲末。每服一錢。豬心血入蜜水調下。（直指方）

㈨治骨蒸發熱。雄黃末一兩。入小便一升。研如粉。乃取黃理石一枚。方圓一尺者。炭火燒之。三食頃。濃淋汁於石上。置薄氈於上。患人脫衣坐之。衣被圍住。勿令洩氣。三五度瘥。（外臺祕要方）

㈩治傷寒咳逆。服藥無效。雄黃二錢。酒一盞。煎七分。乘熱嗅其氣即止。（活人方）

⑪治傷寒狐惑。蟲蝕下部。痛痒不止。雄黃半兩。燒於瓶中。熏其下部。（聖惠方）

⑫治偏頭風病。至驗。散用雄黃、細辛等分爲末。每以一字吹鼻。左痛吹右。右痛吹左。（博濟方）

⑬治五尸注病。發則痛變無常。脅光沉重。纏結臟腑。上衝心脇。即身中尸鬼接引爲害也。雄黃、大蒜各一兩。杵丸。彈子大。每熱酒服一丸。（肘後方）

⑭治腹脇痞塊。雄黃一兩。白礬一兩。爲末。麵糊調膏攤貼。即見功效。未效再貼。（集玄方）

⑮治脇下痃癖及傷飲食。煮黃丸。用雄黃一兩。巴豆五錢。同研。入白麵二兩。滴水爲丸。梧子大。每服二十四丸。漿水煮三十沸。入冷漿水沉冷吞下。以利爲度。如神。（保命集方）

⑯治飲酒成癖。酒癥丸。治飲酒過度。頭旋。惡心嘔吐。及酒停積於胃間。遇飲即吐。久而成癖。雄黃皂角子大六個。巴豆連皮油十五個。蛾梢十五個。同研。入白麵五兩。半。滴水丸。豌豆大。將乾入麩內炒香。將一粒放水試之。浮則取起收之。每服二丸。溫酒下。（和濟局方）

⑰治髮癥飲油。有飲油五升以來。方快者。不爾則病。此是髮入於胃。氣血裹之。化爲蟲也。雄黃半兩。爲末。水調服之。蟲自出。（夏子益奇疾方）

⑱治癥瘕積聚。去三尸。益氣延年。卻老。雄黃二兩。爲末。水飛九度。入新竹筒內。以蒸餅一塊塞口。蒸七度。用好粉脂一兩。和丸。綠豆大。每服七丸。酒下。日三服。（千金方）

⑲治小腹痛滿。不得小便。雄黃末蜜丸。塞陰孔中。（傷寒類要方）

⑳治陰腫如斗。痛不可忍。雄黃、礬石各二兩。甘草一尺。水五升。煮二升。浸之。（肘後方）

㉑治中飲食毒。雄黃、青黛等分。爲末。每服二錢。新汲水下。（鄧筆峯方）

㉒治蟲毒蟲毒。雄黃、生礬等分。端午日研化。蠟丸。梧子大。每服七丸。（蘇東坡方）

㉓治結陰便血。雄黃不拘多少。入棗內。線繫定。煎湯。用鹽一兩。化汁。傾入湯內。同煮。自早至晚。不住添沸湯。取出爲末。共棗杵和丸。梧子大。每服三十丸。煎黑豉湯空心

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

下。只三服止。（普濟方）

㊀治中成舌强正舌散。用雄黃、荊芥穗等分爲末。豆淋酒服二錢。（衛生寶鑑方）

㊁治破傷中風。雄黃、白芷等分爲末。酒煎灌之卽甦。（鄧眞人經驗方）

㊂治瘋狗咬傷。雄黃五錢。麝香二錢爲末。酒下。作二服。（救急良方）

㊃治百蟲入耳。雄黃燒燃熏之自出。（十便良方）

㊄治馬汗入瘡。雄黃、白礬各一錢。烏梅三個。巴豆一個。合研。以油調半錢傅之良。（經驗方）

㊅治蜘蛛傷人。用雄黃末傅之。（朝野僉載方）

㊆治金瘡內漏。雄黃半豆大。納之。仍以小便服五錢。血皆化爲水。（肘後方）

㊇治杖瘡腫痛。雄黃二分。蜜陀僧一分。研末。水調傅之極妙。（救急方）

㊈治中藥箭毒。雄黃末傅之。沸汁出愈。（外臺祕要方）

㊉解藜蘆毒。水服雄黃末一錢。（外臺祕要方）

㊀治小兒痘疔。雄黃一錢。紫草三錢爲末。猪脂汁調。先以銀簪挑破搽之極妙。（痘疹證治方）

㊁治白禿頭瘡。雄黃、豬膽汁和傅之。（聖濟總錄方）

㊂治眉毛脫落。雄黃末一兩。醋和塗之。（聖濟總錄方）

㊃治筋肉化蟲。有蟲如蟹。走於皮下。作聲如小兒啼。爲筋肉之化。雄黃、雷丸各一兩爲末。摻豬肉上。炙熱。喫盡自安。（夏氏奇疾方）

㊄治風痒如蟲成煉。雄黃、松脂等分。研末。蜜丸梧桐子大。每飲下十丸。日三服。百日愈。忌酒肉鹽豉。（千金方）

㊅治疔瘡惡毒。刺四邊及中心。以雄黃末傅之。神效。（千金方）又用雄黃、蠟、酥各五分爲末。葱蜜搗丸。小米大。以針刺破瘡頂。插入甚妙。（積德堂方）

㊆治廣東惡瘡。雄黃一錢半。杏仁三十粒去皮。輕粉一錢爲末。洗淨。以雄豬膽汁調上。二三日卽愈。百發百中。天下第一方。（積德堂方）

㊇治蛇纏惡瘡。雄黃末酷調傅之。（普濟方）

㊈治經喉風痺。雄黃磨新汲水一盞服。取吐下愈。（千金方）

㊉治風熱痛。用雄黃、乾薑各等分爲末。嚥鼻左痛嚥右。右痛嚥左。

㊀治牙齒蟲痛。雄黃末和棗肉丸。塞孔中。（傷寒類要方）

㊁治走馬牙疳。臭爛出血。雄黃豆大七粒。每粒以淮棗去核包之。鐵線串於燈上燒化爲末。每以少許摻之。去涎。以愈爲度。（全幼心鑑方）

㊂治小兒牙疳。雄黃一錢。銅綠二錢爲末。貼之。（陳氏小兒方）

㊃治疳蟲蝕鼻。雄黃、孛硇等分研末。獺豬膽和用。槐枝點之。（金匱方）

㊄治耳出臭膿。雄黃、雌黃、硫黃等分爲末。吹之。（聖濟總錄方）

㊅治臁瘡日久。雄黃二錢。陳皮五錢。青布捲作大撚。燒烟熏之。熱水流出數次愈。（鄧筆峯方）

㊆治鼻準赤色。雄黃、硫黃各五錢。水粉二錢。用頭生乳汁調傅。不過三五次愈。（攝生妙用方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡陰虧血虛者禁用。忌鐵及火。

參攷資料　㊀帶雄黃入山林。卽不畏蛇。若蛇中人。以少許傅之。登時愈。臭蟞之地。暑溼鬱蒸。多毒蟲及射工沙虱之類。但以雄黃大蒜等分合搗一丸。佩之。或已中者。塗之亦良。（抱朴子）㊁雄黃治瘡痍。尙矣。周禮瘍醫療瘍。以五毒攻之。鄭康成注云。今醫方有五毒之藥。作之。合黃蜜、置石膽、丹砂、雄黃、礬石、慈石其中燒之。三日三夜。其烟上着雞羽。掃取以注瘡惡肉。破骨則盡出也。楊億筆記載楊嗣少時。有瘡生於頰。連齒輔車外。腫若覆甌。內潰出膿血。痛楚難忍。百療弗年不差。人令依鄭法燒藥注之。少頃。朽骨連牙潰出。遂愈。信古方攻病之速也。黃蜜音武。卽今有蓋瓦合也。（蘇頌）㊂五毒藥。范注東陽方變爲飛黃散。治緩疽惡瘡。蝕惡肉。其法取瓦盆一個。安雌黃於中。丹砂居南。慈石居北。曾青居東。白石英居西。礬石居上。石膏次之。鐘乳居下。雄黃覆之。雲母布於下。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

各二兩末。以一盆蓋之。羊毛泥固濟。作三隅竈。以陳蓽燒一日。取其飛黃用之。大雄黃乃治瘡殺毒要藥也。而入肝經氣分。故肝風肝氣。驚癎痰涎。頭痛眩暈。暑癘泄痢。積聚諸病用之有殊功。又能化血爲水。而方士乃鍊治服餌。神異其說。被其毒者多矣。按洪邁夷堅志云。虞雍公允文感暑痢。連月不瘥。忽夢至一處。見一人如仙官。延之坐。壁間有藥方。其辭云。暑毒在脾。溼氣連脚。不泄則痢。不痢則瘧。獨鍊雄黃。蒸餅和藥。別作治療。醫者大錯。公依方用雄黃水飛九度。竹筒盛。蒸七次。研末。蒸餅和丸梧子大。每甘草湯下七丸。日三服。果愈。太平廣記載成都劉無名。服雄黃長生之說。方士言爾。不可信。（李時珍）㊱今人敲取石黃中精明者爲雄黃。外黑者爲熏黃。雄黃燒之不臭。熏黃燒之則臭。以此分別也。（陳藏器）㊲今階州卽古武都山中有之。形塊如丹砂。明徹不夾石。其色如雞冠者眞。有青黑色而堅者名熏黃。有形色似眞而氣臭者名臭黃。並不入服食。只可療瘡疥。其臭以醋洗之便去。足以亂眞。尤宜辨。又階州接西戎界出一種水窟雄黃。生於山岩中有水流處。其石名青煙石。白鮮石。雄黃出其中。其塊大者如胡桃。小者如粟豆。上有孔竅。其色深紅而微紫。體極輕虛。而功用更勝。丹竈家尤貴重之。（蘇頌）㊳武都水窟雄黃。北人以充丹砂。但研細色帶黃爾。（李時珍）

【雄黃油】卽石腦油之古籍別名。典見綱目。詳『石腦油』條。

【雄黃蟲】**基本**　雄黃蟲爲卵蠃蛤。可供藥用。

主治　明目。益氣力。

【雄精】卽雄黃之處方用名。詳『雄黃』條。

【雄膽】**性質**　詳雄黃條。

主治　殺三蟲毒。除痼疾。駐容延年。

參攷資料　王存思太僕貴陽人。云其土多山。出雄黃。有大至數百觔者。中有浮沙成團。如鵝卵曰雄膽。破之有清水盈許。急飲之。沉痾俱消。壽二百歲。特以山民頑獷。遇之不謹。卽散漫不得飲耳。有一人飲之。至今猶在。健如三十許人。自言百五十餘歲矣。（六研齋筆記）

【雄雞冠血】卽雞冠血之處方用名。詳『雞冠血』條。

【雅友】卽茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茉莉花』條。

【雅客】卽水仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水仙』條。

【雅梨】卽梨之處方用名。詳『梨』條。

【雅連】卽黃連之處方用名。詳『黃連』條。

【雅蒜】卽水仙之古籍別名。典見本草會編。詳『水仙』條。

【雲丹】卽絡石之古籍別名。典見吳普本草。詳『絡石』條。

【雲母】**命名**　莉南志云。華容方壟山出雲母。土人候雲以出之處。於下掘取。無不大獲。有長五六尺可爲屏風者。但掘時忌作聲也。據此則此石乃雲之根。故得雲母之名。

處方用名　雲母石。

古籍別名　雲華。雲珠。雲英。雲液。雲砂。（本經）磷石。（綱目）地涿。貝石。雲膽。千層紙。金星石。（和漢藥考）

外國名詞　Glimmer

基本　屬巖石類。爲雲母之一種。

產地　陳仁山藥物生產辨云。雲母石產自雲南省。和漢藥考曰。日本之三河。若狹。甲斐。近江。美濃。磐城諸處產此。

形態　雲母爲斜方柱狀礦石。常有銳角。劈開完全。沿其薄面剝離之。則作有彈力性薄片狀。又有作板狀。鱗皮狀者。色有白。淡黃。綠。褐。黑等。硬度二至三。略有眞珠光。

種類　抱朴子云向日視之色青白多黑者。名雲母。宜冬服。色黃白多青者。名雲英。宜春服。色青白多赤者。名雲珠。宜夏服。色如冰露。午黃午白者。名雲砂。宜季夏服。色黃白晶晶者。名雲液。宜秋服。皎然純白明澈者。名磷石。四時可服。其黯黯純黑有文斑斑鐵色者。名雲膽。其色雜黑而强肥者。名地涿。以上二種不可服食。又和漢藥考曰。雲母種類頗多。大別之爲加里雲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

母（白雲母）及鐵雲母（黑雲母）二種。又由形態、色彩、成分等區分之。其主要者爲羽狀雲母、柱狀雲母、絲雲母、鐵雲母等。

製法　雷敩曰。凡使雲母。須用黃黑者厚而頑赤色者輕。婦人手把者。並不中用。須要光瑩如水色者爲上。每一片用小地膽草紫背天葵生甘草。地黃汁各一盞。乾者細剉。漫者取汁。放入瓷鍋中安置。取天池水三盞。著水煮七日七夜。水火勿令失度。雲母自然成碧玉漿。在鍋底。却以天池水猛投其中攪之。浮如蝸涎者即去之。如此三度。淘淨。取沉香一兩搗作末。以天池水煎沉香湯二升。以末分爲三度。再淘雲母漿盡。日曬任用。抱朴子曰。服雲之法。或以桂葱水玉化之爲水。或以露於鐵器中。以原水煞之爲水。或以消石合於筒中埋之爲水。或以蜜漬爲酪。或以秋露漬之百日。韋囊挺以爲粉。或以無顏草樗血合餌之。服至一年。百病俱除。至三年返老成童。五年可以役使鬼神。胡演曰。鍊粉法。八九月間。取雲母以礬石拌勻。入瓦罐內封口。三伏日則自柔輭。去礬。次日取百草頭上露水漬之百日。用韋囊挺以爲粉。李時珍曰。道書言鹽湯煮雲母。亦可爲粉。又云。雲母一觔。鹽一斗。漬之。銅器中蒸一日。臼中搗成粉。又云。雲母一觔。白鹽一升。同搗細。入布袋捺之。沃令鹽味盡。懸高處風吹。自然成粉。

用法　恒以剉末和作丸散用。

性質　甘。平。無毒。

成分　爲珪酸、礬土、鉀、鈉、鎂、鈣、氟（少量）、水氣等。

效能　補中理勞傷。補腎治瘡痢。用作緩和强壯藥。又爲瘡瘍癰疽藥。內服治肺結核。動脈硬化症。外用壅膿瘡。

作用　入胃後有中和酸液之能。使胃內過多之鹽酸化爲有用之消化酵素。一部分至小腸始被吸收而入血。血液中此硅質。白血球之繁殖。卽行增加。血液之凝固力亦同時加大。能使被結核菌侵腐之周圍包圍。減殺其蔓延之能力。而於動脈硬化尤有防止之功效。

主治　身皮死肌。中風寒熱。如在車船上。除邪氣。安五臟。益子精。明目。（本經）下氣。堅肌。續絕補中。療五勞七傷。虛損少氣。止痢。久服悅澤不老。耐寒暑。志高神仙。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論雲母曰。主下痢腸癖。補腎冷。【明】繆希雍本草經疏論雲母曰。雲母本經載其味甘氣平。詳其主治。亦應有溫。韓保昇曰。雲母色白而主肺。此石藥中溫良之品也。以其法金故主身皮死肌。及中風寒熱。如在車船上。甘能緩。溫能和。故除邪氣。石性鎮墜。能使火下。火下則水上。是既濟之象也。故安五臟。益子精。明目。久服輕身延年。別錄主下氣堅肌。續絕補中。療五勞七傷。虛損少氣。久服悅澤不老。耐寒暑。志高神仙。皆此意也。其曰止痢者。久痢則腸胃俱虛。甘溫足以回其虛。下墜足以去其積。故亦主之也。【清】黃宮繡本草求眞論雲母曰。雲母生於泰山山谷。氣味甘平而溫。諸書皆言達肌溫肉。安臟定魄。補中絕續。故凡死肌敗肉。惡毒陰症。及車船眩暈。痰飲頭痛。皆當用此調治。以其溫有陽和之力。重有鎮攝之能。故能使之辟邪而鎮怯也。但書有言。久服身輕屍解。不過極爲贊揚。且因是物經時不焦。入土不腐。故云服可長生。其說卽出本經。豈眞事哉。但此性屬助陽。陰虛火炎者。勿服。以色白光瑩者良。

配合應用　㈠雲母得鉛丹煞成膏。可貼一切癰疽瘡毒。和以昇丹細末。更著奇效。

㈡服食雲母。上白雲母二十斤。薄擘。以露水八斗。作湯。分半淘洗一次。又作二斗。作湯。納芒硝十斤。木器中漬二十日。取出。絹袋盛。懸屋上。勿見風日。令燥。以鹿皮爲囊揉之。從旦至午。篩滓復揉。得好粉五斗。餘者棄之。以粉一斗。納崖蜜二升。攪糊。入竹筒內。漆削封口。漆固。埋北垣南厓下。入地六尺。覆土。春夏四十日。秋冬三十日出之。當成水。若洞洞不消。更埋三十日。此水能治萬病。及勞氣風疼。每以溫水一合和服之。日三服。十日小便當變黃。二十日腹中寒癖消。三十日齲齒更生。四十日不畏風寒。五

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十日諸病皆愈。顏色日少。長生神仙。（千金方）

㈢治痰飲頭痛。往來寒熱。用雲母粉二兩。鍊過桓山一兩爲末。每服方寸匕。湯服取吐。忌生葱生菜。（深師方）

㈣治牝瘧多寒。雲母燒二日夜。龍骨。蜀漆燒去腥。等分爲散。未發前。漿水服半錢。（金匱方）

㈤治小兒下痢赤白。及水痢。雲母粉半兩。煮白粥調食之。（食醫心鏡方）

㈥治赤白久痢。積年不愈。飲調雲母粉方寸匕。服二服立見神效。（千金方）

㈦治婦人帶下。水和雲母粉方寸匕。服立見神效。（千金方）

㈧治小便淋疾。溫水和雲母粉服三錢。（千金方）

㈨治婦人難產。經日不生。雲母粉半兩。溫酒調服。入口即產。不順者即順。萬不失一。陸氏云。此是何德揚方也。已救三五十人。（積德堂方）

㈩治粉滓面黑。雲母粉、杏仁等分爲末。黃牛乳拌。略蒸。夜塗旦洗。（聖濟總錄方）

(一)治風瘡遍身。百治不愈。煅雲母粉。清水調服二錢良。（千金方）

(二)治一切惡瘡。用雲母粉傅之。（千金方）

(三)治火瘡敗壞。雲母粉和生羊髓塗之。（聖惠方）

(四)治金瘡出血。雲母粉傅之。絕妙。（事林廣記方）

(五)治風熱汗出。水和雲母粉服三錢。不過再服。立愈。（千金方）

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡非實症者禁用。惡徐長卿。忌羊肉。粉畏鮀甲及流水。澤瀉爲之使。

參攷資料　㈠古雖有服鍊法。今人服者至少。謹之至也。惟合雲母膏。治一切癰毒瘡等。方見和劑局方。（寇宗奭）㈡明皇雜錄云。開元中名醫紀朋。親人顏色談笑。知病淺深。不待診脈。帝召入掖庭看一宮人。每日晨則笑歌啼號。若狂疾。而足不能履地。朋視之曰。此必因食飽而大促力。頓仆於地而然。乃飲雲母湯。熟寐而失所苦。問之。乃言太華公主戮。誤某當主謚懼擊不能清長。因喫狻蹄羹飽而臥。大曲唱罷。覺胸中甚熱。戲於砌臺。因墜下。久而方甦。遂病此也。又經效方云。青城山大人觀主康道豐。治百病。雲母粉。方用雲母一斤。折開。揉入大瓶內。築實。上澆水銀一兩。封固。以十斤頂火煅赤。取出。卻拌香葱。紫蓮翹草二件。合搗如泥。後以夾絹袋盛於大水盆內。搦取粉餘滓未盡。再添草藥重搗取粉。以木盤一面於灰上印一淺坑。鋪紙傾粉在內。候乾。烙之。以麵糊丸。梧子大。遇有病者。服之無不效。知成都府辛諫議。嘗患大風。衆醫不愈。道豐進此。服之神驗。（唐愼微）㈢他物埋之即朽。着火即焦。而五雲入猛火中。經時不焦。埋之不腐。故服之者長生。入水不濡。入火不燒。踐棘不害。（抱朴子）㈣昔人言雲母蟄尸。亡人不朽。盜發馮貴人冢。形貌如生。因共姦之。發晉幽公塚。百尸縱橫及衣服。皆如生人。中並有雲母蟄之故也。（李時珍）㈤雲母生太山山谷。齊山。廬山及琅琊北定山石間。二月採之。雲華五色。具雲英色多青。雲珠色多赤。雲液色多白。雲砂色青黃。磷石色正白。（別錄）

【雲母石】　卽雲母之處方用名。詳『雲母』條。

【雲母砂】　卽碎砂之古籍別名。見本草集註。詳『碎砂』條。

【雲母礬】　卽明雲礬之古籍別名。典見綱目。詳『礬石』條。

【雲芝茶】　**基本**　本品名茶而實非茶。乃山石所生石衣。如苔蘚之屬。

產地　山東蒙山。在蒙陰縣城南三十里。高二十里許。周圍約三百餘里。產茶曰雲芝茶。土人售於市。曰蒙山茶。

性質　寒冷。

主治　胃熱消穀。

【雲花】　卽絡石之古籍別名。典見吳普本草。詳『絡石』條。

【雲花草】　**原名**　雲花子。

形態　雲花草爲雜草類之一種。狀如麻黃而中堅實。可供藥用。

主治　療馬疥。

【雲南根】　㈠卽馬兜鈴根之古籍別名。典見綱目。詳『馬兜鈴』條。㈡

451／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

卽青木香之古籍別名。典見綱目。詳『青木香』條。

【雲砂】卽雲母之古籍別名。典見本經。詳『雲母』條。

【雲膽】卽雲母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雲母』條。

【雲苓】卽茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【雲苓塊】卽茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【雲英】㊀卽雲母之古籍別名。典見本經。詳『雲母』條。㊁卽絡石之古籍別名。典見吳普本草。詳『絡石』條。㊂卽雲實之古籍別名。典見別錄。詳『雲實』條。

【雲香】卽楓香脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楓香脂』條。

【雲核】產地 羅浮山中。

形態 色黃白如雲母。

性質 平。

主治 却疾延年。餘同雲母。

【雲珠】㊀卽雲母之古籍別名。典見本經。詳『雲母』條。㊁卽絡石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『絡石』條。

【雲茯苓】卽茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【雲茯神】卽茯神之處方用名。詳『茯神』條。

【雲茶】卽石蕊之古籍別名。典見綱目。詳『石蕊』條。

【雲液】卽雲母之古籍別名。典見本經。詳『雲母』條。

【雲華】卽雲母之古籍別名。典見本經。詳『雲母』條。

【雲實】古籍別名 員實。雲英。(別錄)天豆。(吳普)馬豆。羊石子。(吳草(圖經))檟刺。粘刺。(綱目)苗名草雲母。(唐本)

基本 係屬豆科雲實之種子。

產地 別錄曰。雲實生河間川谷。凡山野間恒多生焉。



雲實

形態 雲實係落葉灌木。直立或橫伸。長達丈餘。葉爲多數小葉所成之羽狀複葉。葉葉俱有刺。夏月於梢上抽花莖。長達尺餘。開黃色花。類藤花。相綴作總狀花。後結莢果。類藤豆。大二寸許。中有褐色種子。大如豆。似蔥麻子。

採取 三四月採苗。九十月採實。曝乾。

製法 雷敎曰。凡採得粗搗。相對拌渾。順條實。蒸一日。揀出曝乾。

性質 辛。溫。無毒。

效能 治痢。療瘡。

主治 疰痢腸澼。殺蟲蠱毒。去邪惡結氣。止痛。除寒熱。(本經)消渴。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論雲實曰。治瘡多用。【明】李時珍本草綱目論雲實曰。主下墜膿血。

配合應用 治墜下不止。雲實、女萎各一兩。桂半兩。川烏頭二兩。爲末。蜜丸。梧子大。每服五丸。水下。日三服。(肘後方)

用量 一錢至錢半。

參攷資料 ㊀員亦音雲。其義未詳。豆以子形名。羊石當作羊矢。其子肖之故也。(李時珍)㊁處處有之。子細如荳。麤而小黑。其實亦類莧。嚙燒之致鬼。未見其法術。(陶弘景)㊂雲實大如黍及麻子。黃黑似豆。故名天豆。叢生澤旁。高五六尺。葉如細槐。亦如苜蓿。枝間微刺。俗謂苗爲草雲母。陶云似葶藶者非也。(蘇恭)㊃葉如槐而狹長。枝上有刺。苗名臭草。又名羊石子。草實名馬豆。三月四月採苗。十月採實。過時卽枯落也。(蘇頌)㊄此草山原甚多。俗名枯刺。赤莖中空。有刺。高者如蔓。其葉如槐。三月開黃花。纍然滿枝。莢長三寸許。狀如肥皂莢。內有子五六粒。正如鵲豆。兩頭微尖。有黃黑斑紋。厚殼白仁。咬之極堅。重有腥氣。(李時珍)

【雲實花】主治 見鬼精多食精物。下水燒之致鬼。(別錄)

【雲實根】主治 骨哽及咽喉痛。研汁嚥之。

【雲蕎】卽茶葉之別名。詳『茶葉』條。

【順流水】卽流水之古籍別名。典見綱目。詳『流水』條。

【須丸】卽代赭石之古籍別名。典見本經。詳『代赭石』條。

【須薩折羅婆香】卽楓香脂之古籍別名。典見金光明經。詳『楓香

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膽』條。

【須贏】卽鵁鶄之古籍別名。典見爾雅翼『鵁鶄』條。

【鬆脰】卽螺之古籍別名。典見綱目詳『螺』條。

【髮】卽蟑螂之古籍別名。典見揚雄方言。詳『蟑螂』條。

【黃土】命名 本品卽土之黃色者。故名。

製法 陳藏器曰。凡使黃土。當去土上惡物用。

性質 甘。平。無毒。

主治 洩痢冷熱赤白。腹內熱毒。絞結痛。下血。取乾土水煮三五沸。絞去滓。暖服一二升。又解諸藥毒。中肉毒。合口椒毒。野菌毒。

參攷資料 按劉跋錢乙傳云。元豐中皇子儀國公病瘛瘲。國醫未能治。長公主舉乙入進黃土湯而愈。神宗召見。問黃土愈疾之狀。乙對曰。以土勝水。水得其平則風自退爾。上悅。擢太醫丞。又夷堅志云。吳少師得疾。數月消瘦。每日飲食入咽。如萬蟲攢攻。且痒且病。皆以爲勞瘵。迎明醫銳診之。銳令明旦勿食。遣卒詣十里外取行路黃土至。以溫酒二升攪之。投藥百粒飲之。覺痛幾不堪。及登溷。下馬蝗千餘。宛轉其中。已困死。吳亦應甚。調理三日乃安。因言夏月出師。燥渴。飲澗水一盃。似有物入咽。遂得此病。銳曰。蟲入人臟。勢必孳生。饑則聚噬精血。飽則散處臟腑。苟知殺之而不能掃取。終無益也。是以請公椸腹以誘之。因蟲久不得土味。又喜酒。故乘饑畢一洗而空之。公大喜。厚賂謝之。以禮送歸。（李時珍）

【黃土】卽落花生出於福建興化實粒滿而味甜者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『落花生』條。

【黃大豆】命名 本品乃大豆之色黃者。故名。

古籍別名 黃豆（寧原）

外國名稱 Glycine hispida, Maxim（拉丁）グイヅ マメ ミソマメ オホマメ（日本）

基本 係豆科大豆屬。爲黃大豆之子實。

形態 黃大豆爲穀類之一年生草本。高二尺餘。莖葉皆有毛。葉互生。複葉自三小葉成小葉。邊緣無齒牙。夏秋開小花。作蝶形花冠。色白或帶紫。雄蕊二。雌蕊一。果實爲莢。有毛。其子實形如大豆而色淡黃。供食用。亦可充藥用。



黃大豆

採取 夏秋採之。

用法 恒以水煮。調味供食。入藥水煎。或到末用。

性質 甘。溫。無毒。

效能 消水腫。塗瘡毒。用作緩和滋養藥。

主治 寬中下氣。利大腸。消水脹腫毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論黃大豆曰。研末。熱水和塗瘡後癰。【淸】黃宮繡本草求眞。論黃大豆曰。黃大豆按書既言味甘。服多壅氣。生痰動嗽。又曰。寬中下氣。利大腸。消水脹腫毒。其理似屬兩歧。詎知書言甘壅如滯。是卽炒熟而氣不洩之意也。書言寬中下氣利腸。是卽生冷未炒之意也。凡物生則疎泄。熟則壅滯。大豆其味雖甘。其性雖溫。然生則水氣未泄。服之多有疎泄之害。故豆須分生熟而治。則有補瀉之爲別耳。是以書載誤食毒物。須生搗研水塗之。諸菌毒不得吐者。濃煎汁飲。試內癰及臭毒腹痛。並與生黃豆嚼。甜而不惡心者是。卽上部結有癰膿。及中其毒發瘕之眞候。惟有瘡後餘毒發癰。並瘡後風癬。瘡後生瘡。腫癢背瘡等症。則或煎湯炒黑爲末以治。用補則須假以炒熟。然必少食則宜。若使多服不節。則必見有生痰壅氣動嗽之弊矣。豆油辛甘而熱。與豆氣味稍別。能塗瘡疥。解髮疽。萬燒灰。點惡痣。去惡肉。【淸】王士雄隨息居飲食譜論黃大豆曰。黃大豆甘平。補中解毒。宜煮食。炒食則壅氣。浸罨發芽。搗根爲蔬。味最鮮美。肺癰痿氣生嘔。不腥。疑似之間。試之甚驗。瘡後癰毒。嘔生黃豆塗之。卽消。浸胖搗塗諸癰瘡亦妙。

【黃大豆油】基本 本品係用黃大豆所榨取之油。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　辛甘。熱。微毒。

主治　塗瘡疥。解髮脢。

【黃大豆稍】　**主治**　燒灰。入點痣去惡肉藥。

【黃大戟】　即芫花之根有毒。功能消腫。詳『芫花』條。

【黃子】　即女麴之古籍別名。與見綱目。詳『女麴』條。

【黃丹】　**原名**　鉛丹。

命名　本品係用黑鉛和硝黃。鹽礬煆煉而成黃色之丹藥。故名。

處方用名　丹粉。

古籍別名　朱粉。鉛華。（綱目）丹。赤丹。金柳。軍門。國丹。華蓋。龍汁。鈲丹。鉛黃華。（和漢藥考）

外國名稱　Minium.（拉丁）Red Lead.（英）Mennige.（德）

基本　係金屬礦石類。爲黑鉛煉成之丹。

產地　產鉛諸地。均有法製出沽。

形態　黃丹爲黃赤色重粉末。熾熱之。放出養氣一部分。變爲養化鉛。置於普通溶解劑。不能溶解。逢硝酸。則溶解一部分成爲硝酸鉛。餘則留下褐色之過養化鉛。

採取　採無時。

製法　李時珍曰。按獨孤滔丹房鑑源云。炒鉛丹法。用鉛一斤。土硫黃十兩。消石一兩。鉛成汁。下醋點之。滾沸時。下硫一塊。少頓下消黃。待沸定。再點醋。依前下少許消黃。待爲末。則成丹矣。今人以作鉛粉。不盡者用消石。礬石炒成丹。若轉丹爲鉛。只用連鬚葱白汁。拌丹慢煎。煆成金汁。傾出。卽還鉛矣。貨者多以鹽消砂石雜之。凡用以水漂去消鹽。飛去砂石。澄乾。微火炒紫色。地上去火毒。入藥。會典云。黑鉛一斤。燒丹一斤五錢三分也。

用法　恒剉末。和作丸散。或和入外治傳藥。

性質　辛。微寒。無毒。

效能　內服墜痰鎭心。外傅拔毒生肌。用作解熱解毒藥。又爲專供外科製造膏藥之要品。

主治　吐逆胃反。驚癎癲疾。除熱下氣。鍊化還成丸。久服通神明。（本經）止小便。除毒熱。脾。變金瘡血溢。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論黃丹曰。驚悸狂走。消渴。煎膏用。止痛生肌。【宋】大明諸家本草論黃丹曰。鎭心安神。止吐血及嗽。傅瘡長肉。及湯火瘡染。【宋】寇宗奭本草衍義論黃丹曰。治癰及久積。【明】李時珍本草綱目論黃丹曰。墜痰殺蟲。去怯。除忤惡。止痢明目。【清】黃宮繡本草求眞論黃丹曰。鉛丹卽名黃丹。係用黑鉛。硝黃。鹽礬煆煉而成。故味兼鹹而走血。其性亦能殺蟲解熱。墜痰祛積。且更拔毒去瘀。長肉生肌。膏藥每取爲用。目暴赤痛。鉛丹調貼太陽立效。

配合應用　㈠治消渴煩亂。黃丹新汲水服一錢。以蕎麥粥壓之。（聖惠方）

㈡治吐逆不止。碧霞丹。用北黃丹四兩。米醋半升。煎乾。炭火三秤。就銚內煆紅。冷定爲末。粟米飯丸梧子大。每服七丸。醋湯下。（集驗方）

㈢治小兒吐逆不止。宜此清鎭。燒針丸。用黃丹研末。小棗肉和丸。炙子大。每以一丸。針簽於燈上燒過。研細。乳汁調下。一加硃砂、枯礬等分。（謝氏小兒方）

㈣治反胃氣逆。胃虛。鉛丹二兩。白礬二兩。生石亭脂半兩。以丹礬研勻。入坩鍋內。以炭半秤。煆赤。更養一夜。出毒兩日。入亭脂同研。粟米飯和丸。綠豆大。每日米飲下十五丸。（聖濟總錄方）

㈤治泄瀉下痢赤白。用棗肉搗爛。入黃丹。白礬各皂子大。糝米飯一團和丸。彈子大。線穿於燈上燒過爲末。米飲服之。（摘玄方）

㈥治赤白痢下。黃丹炒紫。黃連炒等分爲末。以糊丸麻子大。每服五十丸。生薑甘草湯下。（普濟方）

㈦治妊娠下利疼痛。可用烏雞卵一箇。開孔。去白。留黃。入鉛丹五錢。攪勻。泥裹。煆乾。研末。每服二錢。米飲下。一服愈。是男。二服愈。是女。（三因方）

㈧治吐血。咯血。咳血。黃丹新汲水服一錢。（經驗方）

㈨治寒熱瘧疾。體虛汗多者。黃丹、百草霜等分爲末。發日空心。米飲服三錢。不過二服愈。或糊丸。或蒜丸皆效。又用飛炒黃丹一兩。恒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山末三兩。蜜丸。梧子大。每服五十丸。溫酒下。平旦及未發將發時各一服。無不效。（肘後方）端午日用黃丹炒二兩。獨蒜一百箇。搗丸梧子大。每服九丸。空心長流水面東下。二三發後乃用神效。亦治痢疾。（普濟方）又用黃丹炒建茶等分。爲末。溫酒服二錢。又黃丹飛焙麵糊丸。炭子大。每棗子一枚去核包一丸。紙裹煨熟食之。（三因方）

㊁治溫癘不止。黃丹炒半兩。青蒿童尿浸二兩。爲末。每服二錢。棗多酒服。熱多茶服。（仁存堂方）

㊂治小兒癍癮壯熱不寒。黃丹二錢。蜜水和服。冷者酒服。名鬼哭丹。（劉涓子遺方）

㊃治風癇發止。驅風散用鉛丹二兩。白礬二兩。爲末。用三角磚相合。以七層紙鋪磚上。鋪丹於紙上。礬鋪丹上。以十斤柳木柴燒過。爲度。取研。每服二錢。溫酒下。（王氏博濟方）

㊄治客忤中惡。道間門外得之。令人心腹刺痛。氣衝心胸。脹滿不治。害人。眞丹方寸匕。蜜三合。和灌之。（肘後方）

㊅治赤眼痛。黃丹、蜂蜜調貼太陽穴。立效。（明目經驗方）

㊆治赤目及瞽。鉛丹、白礬等分。爲末。點之。又方。鉛丹、烏賊骨等分。合研。白蜜蒸點之。（千金方）

㊇治眼生珠管。鉛丹半兩。鯉魚膽汁和如膏。日點三五次。（聖惠方）

㊈治痘疹生瞽。黃丹、輕粉等分。爲末。吹少許入耳內。左患吹右。右患吹左。（參痘方）

㊉治小兒重舌。黃丹一豆大。安舌下。（子母祕錄方）

㊊治小兒口瘡糜爛。黃丹一錢。生蜜一兩相和。蒸熟。每以雞毛蘸搽。甚效。（普濟方）

㊋治脫下胡臭。黃丹入輕粉。唾調糊摻之。（普濟方）

㊌治婦人逆產。眞丹塗兒足下。（集驗方）

㊍治蜒蚰入耳。黃丹、酥蜜、杏仁等分。熬膏。綿裹包塞之。聞香即出。抽取。（聖惠方）

㊎治蜈蚣螫人。醋調黃丹塗之。（肘後方）

㊏治金瘡出血。不可以藥速合。則內潰傷肉。只以黃丹、滑石等分。爲末。傅之。（集元方）

㊐治外痔腫痛。黃丹、滑石等分。爲末。新汲水調。日五上之。（聖童百問方）

㊑治血風臁瘡。黃丹一兩。黃蠟一兩。香油五錢。熬膏。先以葱椒湯洗貼之。（陸氏積德堂方）

㊒治遲近臁瘡。黃丹飛炒。黃檗酒浸七日。焙。各一兩。輕粉半兩。研細。以苦茶洗淨。輕粉塘滿。次用黃丹摻之。外以蘚末攤膏貼之。勿揭動。一七見效。（孫氏集效方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡屬虛寒及無實熱者禁用。

參攷資料　㈠仲景龍骨牡蠣湯中用鉛丹。乃收斂神氣以鎭驚也。（成無己）㈡丹係用鉛養化所製。法詳理化集談第三十二號。（明治十二年三月刊行。茲述其梗概如下。於鐵皿中投入鉛及明礬少許。熱之。用棒攪拌。經八小時至十小時。使之冷定。卽得養化之鉛塊。乃置入石臼。搗爲粉末。更用淘汰法而得細粉。曬乾之。再入鐵鍋。徐徐燒熱。二十四小時後。復入石臼。搗碎。用篩篩過。卽納入鐵壺中。加蓋熱四日間。以成鮮紅色爲度。（和漢藥考）㈢日藥舖所售之丹。向由泉州堺及大阪出產。上品者。謂之長吉丹。用作丸藥之衣。或用於膏藥等。下品者。由製白粉鉛渣製出。今摘錄手板簽蒙所載品類如下。丹。燒鉛成黃色。俗謂之黃丹。再燒成丹。則有上、中、普通三種。單呼丹者。係指辰砂。呼光明丹者。爲中品。呼菊丹者。爲下品。皆係泉州堺及大阪所燒。有丹屋長吉、丹屋市兵衞、鉛屋市兵衞越後屋丹藏、粹屋九郎右衞門等。乘久爲極上品。長吉上品。光明丹中品。勝久。中品。市兵衞下品。此有丹屋及鉛屋二名。卽普通丹。亦呼菊丹。第四版改正日本藥局方。曰鉛丹爲赤色重粉。末不溶於水。於本品加鹽酸熱之。則發出綠氣。生白色結晶性物質。（和漢藥考）

【黃心】卽木蘭之古籍別名。典見綱目。詳『木蘭』條。

【黃芝】卽黃芩之古籍別名。典見別錄。詳『黃芩』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【黃斤】卽葛根之古籍別名。典見別錄。詳『葛根』條。

【黃牙】㊀卽石硫黃之古籍別名。典見綱目。詳『石硫黃』條。㊁卽金之古籍別名。典見鏡源。詳『金』條。

【黃牙石】卽金牙石之古籍別名。典見綱目。詳『金牙石』條。

【黃牛肉】卽牛肉之處方用名。詳『牛肉』條。

【黃牛根】卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【黃占】卽黃蠟之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃蠟』條。

【黃奴】卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【黃瓜】**原名**　胡瓜。

命名　本品來自西域。故曰胡瓜。後因避諱。遂改爲黃瓜。

外國名詞　Cucumis sativus. L.（拉丁）キウリ（日本）

基本　係葫蘆科胡瓜屬之果實。

形態　黃瓜爲菜類之一年生草本。由卷鬚而上昇。葉爲心臟形。邊裂如掌狀。有葉柄互生。夏日開花。花單性。合瓣花冠黃色。雄花與雌花同株。雄花三。雌花子房下位。有三個膜胎座。果實細長爲瓠果。有刺。甚多。恒供食用。亦可充藥用。


黃瓜

性質　甘。寒。有小毒。

主治　清熱解渴。利水道。

歷代記述攷證　【清】黃宮繡本草求眞。論黃瓜曰。胡瓜氣味甘寒。服此止能清熱利水。別無裨益。故南人坐坑用此以爲席珍。南人值暑用此以爲供蔬。井或咽喉腫痛。用此入藥。以爲吹消。杖瘡火眼。用此納硝刮粉。以爲點茶湯。火傷灼。用此搗碎入瓶。取水以爲刷敷。水病肚脹。用此連子醋煮。空心以爲投服。小兒熱痢。用此投蜜。以爲投治。皆以取其甘寒解毒之意。然使臟寒氣陰。復則能以動氣。發熱作癘。且發脚氣生瘡。小兒過服。尤易作瀉生痢。不可不愼。葉則苦平。小毒。能治小兒閃癖。【清】王士雄隨息居飲食譜。論黃瓜曰。黃瓜生食甘寒。清熱利水。可荳可饌。兼蔬蔬之用。而發風動熱。天行病後痢瘧瀉痢。脚氣瘡疥。產後痔痘。皆忌之。

參攷資料　㊀北人避石勒諱。改呼黃瓜。至今因之。（陳藏器）㊁張騫使西域。得種。故名胡瓜。按杜寶拾遺錄云。隋大業四年。避諱改胡瓜爲黃瓜。與陳氏之說微異。今俗以月令王瓜生卽此誤矣。王瓜土瓜也。（李時珍）㊂胡瓜處處有之。正二月下種。三月生苗引蔓。葉如冬瓜葉。亦有毛。四五月開黃花。結瓜圍二三寸。長者至尺許。青色。皮上有痞瘧如疣子。至老則黃赤色。其子與菜瓜子同一種。五月種者。霜時結瓜。白色而短。並生熟可食。兼蔬蔬之用。糟醬不及菜瓜也。（李時珍）㊃黃瓜善解火毒。北方坐臥坑床。用此或爲珍品。南人以之供蔬。不甚有益。惟值暑時用此爲蔬。亦可稍清暑熱。生食者不可多用。醋和蜜同食。可治小兒熱痢。（陸晃菟）

【黃瓜仁】卽瓜蔞仁之古籍別名。典見別錄。詳『瓜蔞仁』條。

【黃瓜根】**主治**　搗傅狐刺毒腫。

【黃瓜菜】**命名**　本品花黃。其氣如瓜。故又名黃瓜菜。

古籍別名　黃花菜。（食療）黃鵝菜。（救荒）苦菜。（日本）

外國名詞　Lactuca Thunbergiana, Maxim.（拉丁）ニガナ（日本）

基本　係菊科萵苣屬。黃瓜菜之莖葉。

產地　生山野田澤間。

形態　黃瓜菜爲雜草類之一種。高一二尺。葉形不一。大抵細長披針形。有缺刻。不整齊。根葉有長柄。莖葉則無柄。基脚抱莖。上初夏分枝開花。舌狀花冠黃色。結實小而平滑。有冠毛。其莖葉可供藥用。

性質　甘。微苦。微寒。無毒。

主治　通結氣。利腸胃。

【黃瓜葉】**性質**　苦。平。有小毒。

主治　小兒閃癖。一歲用一葉。生搗攪汁服。得吐下良。

【黃皮果】**古籍別名**　黃彈子。（綱目拾遺）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產地　廣東、廣西及熱帶諸地多有之。

形態　黃皮爲夷果類之一種。其果大如龍眼。皮色黃白有微毛。瓤白如肪。有青核數枚。或似棟子及小棗狀。可供食與藥用。

性質　酸。平。無毒。

主治　消食順氣。除暑止嘔逆痰水。胸膈滿痛。蚘蟲上攻。心下作痛。

參攷資料　廣東瑣語。載果中有白蠐子。與黃皮果絕相似。而味尤勝。諺有云。黃皮白蠐。甜酸相雜。想功亦不甚遠也。食荔支太多。用黃皮果解之。(趙學敏)

【黃皮核】產地　以廣府屬爲最多。

主治　塗小兒頭上瘡癤。疝氣。

【黃石】㊀卽人參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人參』條。㊁卽方解石之原名。詳『方解石』條。

【黃石脂】命名　本品爲石脂之黃色者。故名。

性質　苦。平。無毒。

主治　養脾氣。安五臟。調中。大人小兒洩痢腸澼。下膿血。去白蟲。除黃疸癰疽。久服輕身延年。

施用宜忌　惡細辛。畏蜚蠊。黃連、甘草。曾青爲之使。

【黃石華】產地　山中。生山東半島。

形態　黃石華爲石類之一種。其色黃。可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　陰痿。消渴。腸中熱。解百毒。

【黃安】卽雌黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雌黃』條。

【黃米】㊀卽秫之古籍別名。典見綱目。詳『秫』條。㊁卽稷米之俗名。詳『稷米』條。

【黃羊】命名　本品腹帶黃色而幼稚肥小者故名。

古籍別名　繭耳羊(綱目)

產地　出關西西番及桂林諸地。

形態　黃羊爲獸類羊屬之一種。其狀與羊同。但低小。細肋。腹下黃色。羊如麢羊。數十成羣。喜臥沙漠地及野草中。其出桂林者。則深褐色。黑脊白斑。與鹿相近。皮可爲裘褥。肉可食。與藥用。其髓詳見該條。

性質　甘。溫。無毒。

主治　補中益氣。並治勞傷虛寒。

參攷資料　黃羊肉煮汁無味。其腦不可食。(綱目)

【黃羊髓】主治　補益。功同羊髓。

【黃衣】㊀卽黃蒸麴之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『黃蒸麴』條。㊁卽黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃精』條。

【黃伯勞】卽鶯之古籍別名。典見綱目。詳『鶯』條。

【黃杜】卽苦蜜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『苦蜜』條。

【黃杜鵑】卽羊躑躅之古籍別名。典見本草蒙筌。詳『羊躑躅』條。

【黃沈香】卽沈香之別名。詳『沈香』條。

【黃沙石】卽鐘乳石之古籍別名。典見藥性。詳『鐘乳石』條。

【黃狗】卽香薷之一種。典見綱目。詳『香薷』條。

【黃良】卽大黃之古籍別名。典見本經。詳『大黃』條。

【黃豆】卽黃大豆之古籍別名。典見寧原。詳『黃大豆』條。

【黃防風】卽防風之處方用名。詳『防風』條。

【黃卷皮】卽大豆卷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大豆卷』條。

【黃姑魚】卽黃鯽魚之古籍別名。典見綱目。詳『黃鯽魚』條。

【黃明膠】命名　本品卽用牛皮熬成之膠。其色黃明。故名。

古籍別名　牛皮膠。(食療本草)水膠。(外臺祕要)海犀膏(綱目)青膠。

性質　甘。平。無毒。

主治　吐血。衄血。下血。血淋。下痢。妊婦胎動血下。風瀉走注疼痛。打撲傷損。湯火灼瘡。一切癰疽腫毒。活血止痛。潤燥。利大小腸。

參攷資料　本經白膠。一名鹿角膠。煮鹿角作之。阿膠一名傳致膠。煮牛皮作之。其說甚明。黃明膠卽今水膠。乃牛皮所作。其色黃明。非白膠也。但非阿井水所作耳。但其功用亦與阿膠彷彿。苟阿膠難得。則眞牛皮膠亦可權用。其性味

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

皆平補。宜於虛熱。若鹿角膠則性味熱補。非虛熱者所宜。不可不致辨也。(李時珍)

【黃昏】卽王孫之古籍別名。典見別錄。詳『王孫』條。

【黃杏影子】卽山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【黃松節】卽茯神木之原名。詳『茯神木』條。

【黃果】卽黃葛樹之古籍別名。典見居易錄。詳『黃葛樹』條。

【黃泥螺】卽吐鐵之古籍別名。典見海味索隱。詳『吐鐵』條。

【黃物】卽金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『金』條。

【黃芝】命名　本品爲芝之黃色者。故名。

古籍別名　金芝(本經)

性質　甘平。無毒。

主治　心腹五邪。益脾氣。安神。忠信和樂。久食輕身延年。

【黃芝】㊀卽黃精之古籍別名。典見瑞草經。詳『黃精』條。㊁卽玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玉竹』條。

【黃芩】命名　芩說文作莟。謂其色黃也。又芩者黔也。黔乃黃黑之色也。故名。

處方用名　條芩。子芩。淡子芩。淡黃芩。酒芩。東芩。

古籍別名　腐腸(本經)空腸。內虛經芩。黃文。(別錄)宿芩。(陶弘景)妬婦。印頭。(吳普本草)苦督郵。(記事)猳尾芩。鳳尾芩。(唐本草)條芩。(綱目)枯芩。北芩。片芩。枯腸。裏腐草。裏朽草。杠谷樹裏朽斤草。(和漢藥考)

學名　Scutellaria baicalensis, Georgy

基本　屬玄參科。爲黃芩之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。黃芩山西、直隸、熱河一帶均有出。俱野生。春以清明節前收成。秋以立秋後收成。

形態　黃芩爲多年自生之宿根草。春季自宿根抽出方莖。高二三尺。葉對生。作披針形。類柳葉。有毛茸。無葉柄。夏月於莖上及枝梢開紫色或白色唇形花。花後結乾果。中有球圓形黑色種子。根長大。呈深黃色。長約五六寸。大者達尺餘。外面暗灰色。內部暗褐色。木部粗糙。呈淡黃色。其髓稍緻密。呈褐黃色。皮部與木部易於剝離。概無香氣。稍有苦味。

種類　㊀宿芩。乃舊根也。中多空。外黃內黑。卽今所謂片芩、枯芩。㊁子芩。乃新根也。中多堅實而細。卽今所謂條芩。鼠尾芩。

採取　二月九月間採根。陰乾。

製法　李時珍曰。凡使黃芩。得酒上行。得豬膽汁除肝膽火。得柴胡退寒熱。得芍藥治下痢。得桑白皮瀉肺火。得白朮安胎。

性質　苦。平。無毒。

成分　高橋醫學博士。試驗黃芩根。發見有作黃色針狀或板狀結晶體之一種植物鹽基。名爲司克胎拉林(Scutellarin $C_{10}H_8O_8$)

效能　瀉實火。清溼熱。治泄痢。療瘡瘍。用作清涼解熱藥。又治流行性感冒。破傷風。

作用　在胃內能增胃酸之不足。以助長消化之功能。至腸中略有激腸蠕動之效。入血內能減退組織細胞之氣化機能。以阻止體溫之增高。

主治　諸熱。黃疸。腸澼洩痢。逐水。下血閉。惡瘡疽蝕火瘡。(本經)療痰熱。胃中熱。小腹絞痛。消穀利小腸。女子血閉。淋露下血。小兒腹痛。(別錄)

歷代記述攷證　【唐】甄權云。黃芩本草論黃芩曰。治熱毒骨蒸。寒熱往來。腸胃不利。破癰氣。治五淋。令人宣暢。去關節煩悶。解熱渴。【宋】大明諸家本草論黃芩曰。下氣。主天行熱疾。疔瘡排膿。治乳癰發背。【金】張元素珍珠囊論黃芩曰。涼心。治肺中溼熱。瀉肺火上逆。療上熱。目中腫赤。瘀血壅盛上部。積血補腎。除寒水。安胎。養陰退陽。【明】李時珍本草綱目論黃芩曰。治風熱溼熱。頭疼奔豚。熱痛火咳。肺癰喉腥。諸失血。【明】繆希雍本草經疏論黃芩曰。黃芩味苦平無毒。別錄益之以大寒。味厚氣薄。入手太陰少陰太陽陽明。亦入足少陽。其性清肅。所以除邪。味苦所以燥溼。陰寒所以勝熱。故主諸熱。諸熱者。邪熱與溼熱也。黃疸腸澼洩痢。皆溼熱勝之病也。折其本則諸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

病自瘥矣。苦寒能除溼熱。所以小腸利而水自逐。源清則流潔也。血閉者實熱在血分。卽熱入血室令人經閉不通。溼熱解則榮氣清而自行也。惡瘡疽蝕者。血熱則留結而爲癰腫潰爛也。火瘍者。火氣傷血也。涼血除熱則自愈也。別錄消痰熱者。熱在胸中則生痰。火在少腹則絞痛。小兒內熱則腹痛。胃中溼熱去則胃安而消穀也。淋露下血。是熱在陰分也。其治往來寒熱者。邪在少陽也。五淋者。溼熱勝所致也。苦寒清肅之氣勝。則邪氣自解。是伐其本也。【明】李士材本草圖解論黃芩曰。黃芩苦寒輕飄者入肺。堅實者入大腸。主風熱溼熱痰熱骨蒸火咳下利喉閒腥氣上部積血寒熱往來。失血癰疽。安胎療淋。養陰退陽。得酒上行。得豬膽除肝膽火。得柴胡退寒熱。得芍藥治下利。得桑皮瀉肺火。得白朮安胎。稍挾虛者。切勿輕用。【清】黃宮繡本草求眞論黃芩曰。黃芩書載味苦入心。又載入肺瀉火入脾除溼入大腸。以治腸澼腹痛入小腸膀胱。以治淋閉。且治中焦實火。及邪在少陽膽經。得此以爲清理。三藥而上下表裏皆治。其功力之泛滲。殆有難爲喻主者耳。不知內火衝激。外邪傳入。皆能恣害。上如胸膈咽喉。下如肚腹二便。中如表裏之所。陰陽之界。無不病症悉形。以故腹痛腸癖。寒熱往來。黃疸淋閉。胸高氣喘。癰疽瘡瘍。火嗽喉腥。經閉胎漏。口渴津枯。一皆溼之所淫。熱之所浸。火之所勝。黃芩味苦性寒。枯而大者。輕飄上升。以清肺肺清則痰自理矣。實而細者。沉重下降。以利便。便利則腸澼自去。酒炒則膈熱可除。而肝膽火熄。生用則實熱堪投。而腹痛斯愈。且得白朮、砂仁以安胎。得厚朴、黃連以除腹痛。得芍藥以治痢。得柴胡以治寒熱往來。此雖合上與下表裏皆治。而究止爲上中二焦瀉火除熱與溼之味矣。但肺虛腹痛屬寒者切忌。黃明者良。中虛者爲枯。苓、卽片芩。內實者爲條芩。卽子芩。上行酒炒。瀉肝膽火。【清】張隱菴本草崇原論黃芩曰。黃芩色黃內空。能清腸胃之熱。外肌皮而性寒。能清肌表之熱。乃手足陽明兼手太陰之藥也。主治諸熱。黃疸腸澼洩痢者。主諸經之熱。歸於胃土而爲黃疸。歸於大腸而爲洩痢。黃芩中空。主清腸胃之熱。故能治之。腸胃受濁。得肺氣通調。則水津四布。血氣運行。逐水下血閉者。黃芩外肌皮而清肌表。清則肺氣和。而留水可逐。血閉自下矣。火熱之氣留於肌肉皮膚。則爲惡瘡疽蝕。惡瘡疽蝕。名曰火瘡。黃芩治之。清肌表也。【清】葉天士本草經解論黃芩曰。黃芩氣平。稟天秋涼之金氣。入手太陰肺經。其味無毒。得南方之火味。入手少陰心經。氣味俱降陰也。心者火臟也。十二官之君。諸熱之主也。苦平清心。故主諸熱黃疸者。溼熱乘脾之症也。脾爲太陰溼土。土溼熱則本色現而發黃疸。黃芩苦平清肺。肺亦太陰。太陰溼熱退而脾疸亦平也。肺與大腸相裏。裏大腸溼熱。則腸澼洩痢。黃芩清肺。肺清則通調水道。而溼熱下逐。腸肺復其燥金之性。而洩痢愈矣。肺司水道。熱則肺失清肅之令。而水道不通。水因而蓄。爲黃芩清肺則氣化。下及膀胱。而水下逐矣。血閉者。實熱在血分。而經閉不通也。心主血。味苦清心。則能下洩。所以主之。惡瘡疽蝕者。係瘡疽敗壞潰腐而不收口也。火瘍。火傷皮也。皆心火有餘。而腐壞肺之皮毛也。苦平清心肺。所以主諸痛痒瘡瘍也。【清】陳修園本草經讀論黃芩曰。黃芩與黃連黃檗。皆氣寒味苦而色黃。主治大略相似。大抵氣寒皆能除熱。味苦皆能燥溼。色黃者皆屬於土。黃而明亮者則屬於金。金借土之色以爲色。故五金以黃金爲貴也。但黃芩中空。似腸胃。爲手陽明胃爲足陽明。其主諸熱者。指腸胃諸熱病而言也。黃疸爲大腸經中之鬱熱。逐水者。逐腸中之水也。下血閉者。攻腸中之蓄血。惡瘡疽蝕火瘍者。爲肌肉之熱毒。陽明主肌肉。瀉陽明之火。卽所以解毒也。本經主治之言如此。仲景於少陽經用之。於心下悸易疾苓。於腹痛易芍藥。又於本經言外別有會悟也。【清】鄒澍本經疏證論黃芩曰。仲景用黃芩有三耦。爲氣分熱結者。與柴胡爲耦。（小柴胡湯、大柴胡湯。）柴胡桂枝乾薑湯。柴胡桂枝湯。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一血分熱結者與芍藥爲耦。（桂枝柴胡湯黃芩湯大柴胡湯黃連阿膠湯鼈甲煎丸大黃䗪蟲丸奔豚湯王不留行散當歸散）溼熱阻中者與黃連爲耦。（半夏瀉心湯甘草瀉心湯生薑瀉心湯葛根黃芩黃連湯乾薑黃芩黃連人蔘湯）以柴胡能開氣分之結。不能洩氣分之熱。芍藥能開血分之結。不能清血之熱。黃連能治溼生之熱。不能治熱生之溼。譬之解鬬。但去其鬬者。未平其致鬬之怒。鬬終未已也。故黃芩協柴胡能清氣分之熱。協芍藥能洩迫血之熱。協黃連能解熱生之溼也。小柴胡證腹中痛者去黃芩。加芍藥。心下悸小便不利者去黃芩。加茯苓。夫腹中痛。未必非氣血之結。而心下悸小便不利。亦何以決知其非氣熱而生之水。且本經明言黃芩能逐水。別錄明言黃芩能除小腹絞痛利小腸。而遽去之何耶。殊不知治腹滿痛。腹痛繞臍痛。少腹疝痛。有可用寒藥者。惟腹中痛者。必無中熱之理。仲景是以於厥陰篇特標其旨曰。腹中痛。若轉氣下趨少腹者。此欲自利也。其他如眞武湯之腹痛。小便不利。小建中湯之腹中急痛。附子粳米湯之腹中寒氣雷鳴切痛。當歸生薑羊肉湯之腹中痛。及脇痛裏急。抵當烏頭桂枝湯之腹中痛。逆冷手足不仁。致痛雖殊。治痛亦異。用溫藥則同。以是知腹痛下一中字。則與凡痛有別。用黃芩諸方。必無此矣。彼小腹絞痛者。乃熱氣迫血。血結少腹而痛。與鼈甲煎丸大黃䗪蟲丸王不留行散之用黃芩不殊也。小便不利。原不必忌黃芩。小便不利而心下悸。則不容更用黃芩。何則。仲景云。太陽病。小便利者。以飲水多。必心下悸。小便少者。必苦裏急也。彼雖論血結。此亦可借以喻氣結。曰飲水多而心下悸。則非熱阻所化之水矣。熱阻所化之水。可以黃芩逐飲水。而停蓄者。其可以黃芩逐之耶。蓋水氣凌心爲悸。必寒水乃然。若熱化之水氣。則脾家上升瀰漫之氣中。焦變化取赤之汁。終日周流於膚中。而稟命於心君。若均能致悸。則無病人有不悸時耶。李瀕湖言有人素多酒慾。少腹絞痛不可忍。小便如淋。諸藥不效。偶用黃芩、木通、甘草三味煎服。遂止。王海藏言有人因虛服附子藥多。病小便閟。服芩連藥而愈。大抵黃芩之用。凡氣分有餘。挾熱攻衝他所者。乃爲的對。若他所自病。不係熱氣攻衝者。則不可服。服之必益虛其氣。他所之病。反足以攻衝於氣矣。或問黃芩湯治何等證。其證腹痛與否。若腹痛何以用黃芩。若腹不痛何以用芍藥。曰。其證身熱不惡風。亦不惡熱。或下利。或嘔。腹則不痛。蓋芍藥甘草大棗桂枝湯裏藥也。以不惡風。故不用薑桂。黃芩甘草大棗小柴胡湯裏藥也。以不往來寒熱。故不用柴胡。以其常熱。故不用人蔘。若不嘔。則并不用半夏生薑。至芍藥則並不因腹痛而用。以桂枝湯證原無腹痛也。亦不心下痞鞕。以不去大棗也。夫芍藥甘草湯治傷寒汗出誤服桂枝湯後。足脛拘急。已見其能破陽邪於陰分矣。加以黃芩。不益可見陽分之熱甚盛。攻於陰分爲利。非陰中自有慾陽之結耶。仲景於厥陰篇云。傷寒脈遲。與黃芩湯除其熱。腹中則冷不能食。可知黃芩湯證之脈必數。黃芩所治之熱。必自裏達外。不治但在表分之熱矣。黃芩治自裏達外之熱。千金歷有明文。芍藥湯治產後虛熱頭痛。若通身發熱者。加黃芩。愼火草散。治崩中漏下赤白青黑。腐臭不可近。熱多者加知母、黃芩。道人深師增損腎瀝湯。治風虛勞損挾毒。脚弱疼痛。下焦虛冷。胸中有熱。其熱多者。加黃芩。又可知陰虛氣盛。熱自內出者。黃芩亦能治之。而不但治感觸所化。鬰中達外之熱矣。李瀕湖自緣感冒咳嗽。既久且犯戒。遂病骨蒸發熱。膚如火燎。每日吐痰盈椀。晕月煩渴。嬗食幾歷。脈浮洪。徧服柴胡、麥蘆、冬、荊瀝諸藥月餘。益劇。昔以爲必死。其尊人以謂李東垣治肺熱如火燎煩躁引飲。宜甚者。宜一味黃芩。以瀉肺經氣分之火。遂按方用黃芩一兩煎服。次日身熱盡退。痰嗽皆愈。於此益可知黃芩所治。必肺經氣分之熱。肺經氣分之熱。必晝甚於夜。也。黃芩本經主黃疸。腸澼洩利。金匱要略及傷寒論發黃證皆不用。洩利證兩書除諸瀉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

心湯外。亦絕不用。今以千金方參合而考之。亦頗有意義可尋也。千金治黃方。凡有黃芩者。多云一身面目悉黃。金匱要略中所載有身體盡黃者。有額上黑者。有面青目黑者。可知症證非一。身面目悉黃者。不可用矣。千金治熱利冷利痢澼利。小兒利。用黃芩方多有壯熱一語。可知洩利無熱者。不可用矣。大抵氣主充周。無處不到。凡病有彼此不相侔者。必非氣分之病。黃芩主氣分之熱。於此不可以相證乎。千金治小兒核腫壯熱有實方。及治小兒熱毒入膀胱中。忽患小便不通。欲小便則澀痛不出。出少如血。須臾復出。地膚子湯。治小兒落牀墮地。如有瘀血。腹中陰陰寒熱。不肯乳哺。但啼哭叫喚。蒲黃湯。皆有黃芩。考茲數證。均爲氣熱攻血。亦徹其病本之治。別錄所謂黃芩治小兒腹痛者。於此可明其旨矣。即其治小腹絞痛。亦當與此不異。蓋傷寒金匱兩書。僅有腹痛去黃芩之文。大率黃芩所治之小腹絞痛。必煩熱。必口渴。必小便有異於常。拎此則非所宜矣。【清】賈九如辨藥指南論黃芩曰。黃芩中枯者名枯芩。條細者名條芩。一品宜分兩用。蓋枯芩體輕主浮。專瀉肺胃上焦之火。主治胸中逆氣。腸上熱痰。咳嗽喘急。目赤齒痛。吐衄失血。發斑發黃。痘疹瘡毒。以其大能涼膈也。其條芩體重主降。專瀉大腸下焦之火。主治大便閉結。小便淋濁。小腹急脹。腸紅痢疾。血熱崩中。胎漏下血。挾熱腹痛。譫語狂言。以其大能清腸也。同枳實。紫朴能消穀食。因邪熱不殺穀。以此清胃。則穀易消。同柴胡退熱。爲柴胡散火之標。以此折火之本。同白朮安胎。蓋白朮健脾。但胎坐中宮。氣不運行。易生鬱熱。以此清氣。胎動自安。用猪膽汁拌製。入厥陰肝經。以清抑鬱之火。止胎前瘧寒戰振動。不使墮胎。

國外學說　日本學說謂黃芩漢醫頗珍重之。稱爲有清涼解熱利尿之效。磯子氏因漢醫珍重黃芩。苦於不明其理。由高橋學士發見一種結晶性物質。附以『スクテラリン』之名稱。然於治療上無特殊之作用。黃芩果爲有效典否。暫時尚爲一疑問而已。（中外醫事新報和漢藥論）又和漢藥考用爲清涼解熱藥。用量二、〇至六、〇。又曰。藥肆所售黃芩。有漢、朝鮮、和三種。漢種呈黃黑色。有苦味。爲上品。其中老根色頗黑。內部空虛。味苦。日本呼眞鹼手。其嫩根形細長。內部充實。日本呼軸手。朝鮮種呈鮮黃色。苦味薄。爲中品。日本種根細長而有縱皺。往往分歧。外面灰黃色。內部鮮黃色。味稍苦。舍樹脂質。爲下品。

近人學說　袁淑範曰。按黃芩爲屬脣形科宿根植物。美國藥制中早已揭載。有一種黃芩。其有效成分。據日人高橋順太郎氏之研究。則爲一種呈黃色針狀或板狀無臭無味之結晶體也。因其原植物之名爲 Scutellaria baica. lonsis 故雖命名爲『Scutellarin』（黃芩精）將切碎之黃芩。用以太冷浸蒸餾其浸出液。則析去黃色之結晶塊。再將此結晶塊溶解於沸騰酒精中。放置數時間後。即能析出黃色針狀或板狀之黃芩精結晶也。

配合應用　㈠治瀉熱作泄腹痛。黃芩、芍藥、黃連、炙甘草、車前子、防風、升麻。

㈡治滯下腹痛。黃芩、芍藥、黃連、炙甘草、滑石、升麻。

㈢三黃丸。孫思邈千金方云。巴郡太守奏加減三黃丸。療男子五癆七傷。消渴。不生肌肉。婦人帶下。手足寒熱。瀉五臟火。春三月。黃芩四兩。大黃三兩。黃連四兩。夏三月。黃芩六兩。大黃一兩。黃連七兩。秋三月。黃芩六兩。大黃三兩。黃連三兩。冬三月。黃芩三兩。大黃五兩。黃連二兩。三物隨時合搗。下篩。蜜丸。烏豆大。米飲下。每服五丸。日三。不知。增至七丸。服一月。病愈。久服走及奔馬。人用有驗。禁食豬肉。（圖經本草方）

㈣三補丸。治上焦積熱。瀉五臟。大黃、黃連、黃檗等分。爲末。蒸餅丸。梧子大。每服二三十丸。白湯下。（丹溪方）

㈤治肺中有火。清金丸。用片芩炒爲末。水丸。梧子大。每服二三十丸。白湯下。（丹溪方）

㈥治小兒驚啼。黃芩、人參等分

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲末。每服一字。水飲下。（普濟方）

㊐治肝熱生翳。不拘大人小兒。黃芩一兩。淡豉三兩爲末。每服三錢。以熟豬肝裹煨。溫湯送下。日二服。忌酒麵。（衛生家寶方）

㊑治少陽頭痛。亦治太陽頭痛。不拘偏正。小清空膏用片黃芩酒浸透。曬乾爲末。每服一錢。茶酒任下。（東垣方）

㊒治眉眶作痛。風熱有痰。黃芩酒浸。白芷等分爲末。每服二錢。茶下。（潔古方）

㊓治吐血衄血。或發或止。積熱所致。黃芩一兩。去中心黑朽者爲末。每服三錢。水一盞。煎六分。和滓溫服。（聖惠方）

㊔治吐衄下血。黃芩三兩。水三升。煎一升半。每溫服一錢。亦治婦人漏下血。（龐安時卒病論方）

㊕治血淋熱痛。黃芩一兩。水煎熱服。（千金方）

㊖治經水不斷。芩心丸。治婦人四十九歲已後。天癸當住。每月却行。或過多不止。用條芩心二兩。米醋浸七日。炙乾。又浸。如此七次爲末。醋糊丸。梧子大。每服七十丸。空心溫酒下。日二次。（瑞竹堂方）

㊗治崩中下血。黃芩爲細末。每服一錢。露薑酒下。以秤錘燒赤。淬酒中。也許學士云。崩中多用止血及補血藥。此方乃治陽乘於陰。所謂天暑地熱。經水沸溢者也。（本事方）

㊘安胎清熱。條芩、白朮等分。炒爲末。米飲和丸。梧子大。每服五十丸。白湯下。或加神麴。凡妊娠調理。以四物去地黃。加白朮、黃芩爲末。常服甚良。（丹溪）

㊙治產後血渴。飲水不止。黃芩、麥門冬等分。水煎溫服。無時。（楊氏家藏方）

㊚治灸瘡血出。一人灸火至五壯。血出不止。如尿。手冷欲絕。以酒炒黃芩二錢爲末。酒服即止。（李樓怪證奇方）

㊛治老小火丹。黃芩末水調塗之。（梅師方）

用量　錢半至二錢。

施用宜忌　凡脾胃虛寒及無溼熱實火者禁用。惡葱實、長丹砂、牡丹、黎蘆、山茱萸、龍骨爲之使。

著名方劑　黃芩湯（太陽與少陽合病。自下痢者。此主之。（傷寒論）黃芩三兩。甘草芍藥各二兩。大棗十二枚。上四味。水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。）

參攷資料　㈠黃芩之中枯而飄者。瀉肺火。利氣消痰。除風熱。清肌表之熱。細實而堅者。瀉大腸火。養陰退陽。補膀胱寒水。滋其化源。高下之分。與枳殼同例。（李杲）㈡黃芩之用有九。瀉肺熱一也。上焦皮膚風熱。風溼二也。去諸熱三也。利胸中氣四也。消痰膈五也。除脾經諸溼六也。夏月須用七也。婦人產後養陰退陽八也。安胎九也。酒炒上行。主上部積血。非此不能除下痢膿血。腹痛後重身熱。久不能止者。與芍藥甘草同用之。凡諸痛瘡不可忍者。宜芩連苦寒之藥。詳上下分身稍及引經藥用之。（張元素）㈢黃芩降痰。假其降火也。凡去上焦溼熱。須以酒洗過用。片芩瀉肺火。須用桑白皮佐之。若肺虛者。多用則傷肺。必先以天門冬保定肺氣。而後用之。黃芩白朮。乃安胎聖藥。俗以黃芩爲寒。而不敢用。蓋不知胎孕宜清熱涼血。血不妄行。乃能養胎。黃芩乃上中二焦藥。能降火下行。白朮能補脾也。（朱震亨）㈣張仲景治傷寒心下痞滿。瀉心湯用四方。皆用黃芩。以其主諸熱。利小腸故也。又太陽病下之利不止。喘而汗出者。有葛根黃芩黃連湯。及主妊娠安胎散亦多用之。（蘇頌）㈤得厚朴、黃連止腹痛。得五味子、牡蠣。令人有子。得黃芪、白斂、赤小豆。療鼠瘻。（徐之才）㈥得酒上行。得豬膽汁除肝膽火。得柴胡退寒熱。得芍藥治下痢。得桑白皮瀉肺火。得白朮安胎。（李時珍）㈦圖者名子芩。破者名宿芩。其腹中皆爛。故名腐腸。（陶弘景）㈧宿芩乃舊根。多中空。外黃內黑。即今所謂片芩。乃又有腐腸妬婦諸名。妬婦心黯。故以比之。子芩乃新根。多內實。即今所謂條芩。或云西芩多中空而色黯。比芩多內實而深黃。（李時珍）㈨今出宜州、鄜州、溼州者佳。兗州大實亦好。名狗尾芩。（蘇恭）㈩今川蜀河東陝西近郡皆有之。苗長尺餘。莖幹粗如筋。葉從地四面作叢生。類紫草。高一尺許。亦有獨莖者。葉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

細長青色。兩兩相對。六月開紫花。根如知母粗細。長四五寸。二月八月採根曝乾。吳普本草云。二月生赤黃葉。兩兩四面相値。其莖空中或方圓。高三四尺。四月花紫紅赤。六月花實黑。根黃。二月至九月採。與今所說有小異也。（蘇頌）

【黃芩子】 主治　腸澼膿血。

【黃芪】 卽黃耆之處方用名。詳『黃芪』條。

【黃芫花】 ㊀卽蕘花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕘花』條。㊁卽芫花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芫花』條。

【黃花了】 形態　黃花了爲雜草類之一種。春生青葉。開花似辣菜花。黃色。秋日結實。可供藥用。

主治　咽喉齒痛諸病。

【黃花子草】 卽綿絮頭草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『綿絮頭草』條。

【黃花母】 卽山柳菊之別名。詳『山柳菊』條。

【黃花地丁】 卽蒲公英之原名。詳『蒲公英』條。

【黃花苗】 卽蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【黃花草】 卽千里光之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『千里光』條。

【黃花耶草】 卽蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【黃花魚】 卽石首魚之古籍別名。典見臨海志。詳『石首魚』條。

【黃花菜】 ㊀卽萱草之古籍別名。典見綱目。詳『萱草』條。㊁卽黃瓜菜之古籍別名。典見食療本草。詳『黃瓜菜』條。㊂卽白花菜之黃花者。詳『白花菜』條。

【黃花演】 卽千里光之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『千里光』條。

【黃花蒿】 命名　本品形似青蒿而色淡黃。故名。

古籍別名　臭蒿。草蒿（綱目）

外國名詞　Artemisia annua, L.（拉丁）クリニンジン（日本）

基本　係菊科艾屬。爲黃花蒿之葉。

產地　在原野田澤間。

形態　黃花蒿爲溼草類之一年生草本。高三四尺。覆葉細裂。花小筒狀。花冠帶黃色。頭狀花序甚圓。其葉擦碎之則發辛惡臭氣。其葉與子。俱可供藥用。



黃花蒿

性質　辛。苦。涼。無毒。

主治　小兒風寒驚熱。

參攷資料　㊀黃花蒿一名臭蕽。臭蒿一名草蒿（大明）㊁香蒿臭蒿通可名草蒿。此蒿與青蒿相似。但此蒿色綠帶淡黃。氣辛臭不可食。人家採以曬醬黃酒麴者是也。（李時珍）

【黃花蒿子】 性質　辛。涼。無毒。

主治　治勞下氣。開胃止盜汗。及邪氣鬼毒。

【黃芽菜】 ㊀卽白菜之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『白菜』條。㊁卽黃矮菜之原名。詳『黃矮菜』條。

【黃金石】 卽雄黃之古籍別名。典見本經。詳『雄黃』條。

【黃金花】 卽百脈根之日本名。詳『百脈根』條。

【黃金粉】 卽鍋焦之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鍋焦』條。

【黃柏】 原名　檗木。檗皮。

命名　黃柏。後人簡寫之名也。

處方用名　黃檗。黃柏炭。川黃柏。眞川柏。

古籍別名　山屠（和漢藥考）

根名　檀（綱目）

外國名詞　Evodia Glauca

基本　屬芸香科之落葉喬木。爲 Phellodendron amurense 之樹皮。

產地　陳仁山藥物生產辨云。黃柏以北江、星子、連州爲最。廣西桂林亦可。身結色青黃。可惜薄些。產日本者厚。但其身鬆色黃而無嬬青。橫濱好些。神戶次之。又有產錦州者。由烟台牛莊運來。與日本產者同類。更薄而劣。

形態　黃檗爲深山自生之落葉喬木。寒地最多。高達三四丈。葉對生。爲羽狀複葉。其小葉作橢圓

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形。前端尖。長二三寸。表面綠色。背帶白色。夏月開黃綠色五瓣聚繖花。花爲單性。雌雄異株。果實爲漿果。作球圓形。大二三分。熟則呈黑色。有苦味。其皮表面黃褐色。有深裂痕。皺紋。內面作黃色而光滑。



黃柏

採取　二月五月採皮。日乾。

製法　雷敩曰。凡使黃蘗皮。削去中粗皮。用生蜜水浸半日。漉出。曬乾。用蜜塗炙。武火炙令蜜盡爲度。每五兩用蜜三兩。張元素曰。二製治上焦。單製治中焦。不製治下焦也。李時珍曰。黃柏性寒而沉。生用則降實火。熟用則不傷胃。酒製則治上。鹽製則治下。蜜製則治中。

性質　苦。寒。無毒。

成分　黃柏之有效成分。亦爲小檗鹼(Berberin)。與黃連同。

效能　瀉相火。清濕熱。用作變質。強壯健胃藥。及用以增進食慾。又可外用爲眼科藥。與皮膚病藥。又治糖尿病。腎臟炎。

作用　有增進胃液。促進消化之能。至腸有刺激腸壁神經。使腸吸收增加。入血後。能使血液循環有標準之次數。而神經亦同時振興。

主治　五臟腸胃中結熱。黃疸。腸痔。止洩痢。女子漏下赤白。陰陽蝕瘡(本經)。療驚氣。在皮間肌膚熱赤起。目熱赤痛。口瘡。久服通神。(別錄)

歷代記述攷畫　【唐】陳藏器本草拾遺論黃柏曰。熱瘡皰起。蟲瘡血痢。止消渴。殺蛀蟲。【唐】甄權藥性本草論黃柏曰。男子陰瘡及傅塗上瘡。治下血如鷄鴨肝片。【宋】大明日華諸家本草論黃柏曰。安心除勞。治骨蒸。洗肝明目。多淚口乾。心熱殺疳蟲。治疣心痛。鼻齦腸風。下血後急。熱腫痛。【金】張元素珍珠囊論黃柏曰。瀉膀胱相火。補腎水不足。堅腎壯骨。髓療下焦虛。諸瘡瘍瘙。痢下竅除熱。【元】李東垣用藥法象論黃柏曰。瀉伏火。救腎水。治衝脈氣逆。不渴而小便不通。諸瘡痛不可忍。【元】朱丹溪本草衍義補遺論黃柏曰。得知母。滋陰降火。得蒼朮除濕清熱。爲治瘡要藥。得細辛瀉膀胱火。治口舌生瘡。【明】李時珍本草綱目論黃柏曰。傅小兒頭瘡。【明】李士材本草圖解論黃柏曰。黃蘗苦寒沉而下降。爲足少陰足太陽引經之劑。瀉濟龍雷之火。滋濡腎水之枯。疏小便癃結。祛下焦溼腫。凡目赤耳鳴。口瘡消渴。血痢吐衄。腸風腰膝瘡軟者。咸資其用。愚謂黃蘗制下焦命門陰中之火。知母滋上焦肺金生水之源。蓋邪火熾明。則眞陰消涸。眞陰消涸。則邪火益烈。取知柏之苦寒。以抑南扶北。誠如久旱甘霖。然惟火旺胃強者當之。乃稱合劑。倘中氣已殘。則邪火雖亢。命日虛炎。從事勿衰。將有寒中之變。非與甘溫。則大熱不除。近世殊昧斯旨。而致天枉者。不可勝數矣。【明】繆希雍本草經疏論黃柏曰。黃檗稟至陰之氣。而得清寒之性者也。其味苦。其氣寒。其性無毒。故應主五臟腸胃中結熱。蓋陰不足。則熱始結於腸胃。黃檗雖由溼熱。然必發於眞陰不足之人。腸癖痔漏。亦皆溼熱傷血所致。洩痢者。濕下也。亦溼熱干犯腸胃之病。女子漏下赤白。陰傷蝕瘡。皆溼熱乘陰虛流客下部而成。膚熱赤起。目熱赤痛口瘡。皆陰虛血熱所生病也。以至陰之氣。補至陰之不足。虛則補之。以類相從。故陰回熱解。溼燥而諸證自除矣。乃足少陰腎經之要藥。專治陰虛生內熱諸證。功烈甚偉。非常藥可比也。潔古用以瀉膀胱相火。補腎水不足。堅腎壯骨。療下焦虛。諸瘡瘍痢。利下竅除熱。東垣用以瀉伏火。救腎水。治衝脈氣逆。不渴而小便不通。諸瘡痛不可忍。丹溪謂得知母滋陰降火。得蒼朮除溼清熱。爲治瘡要藥。得細辛瀉膀胱火。治口舌生瘡。【清】黃宮繡本草求眞論黃柏曰。黃蘗昔人同知母用於六味丸中。名爲知蘗八味丸。又同知蘗各一兩。酒洗焙研入桂。名爲滋腎丸。謂其可滋眞陰。此說一出。而天下翕然宗之。以至於今。牢不可破。詎知黃蘗性稟至陰。味苦性寒。行陰冬藏殺之令。故獨入少陰瀉火。入膀胱瀉熱。凡人病因火亢。而見骨蒸勞熱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

自去。耳鳴消渴便閉。及瀉熱爲病。而見諸痿癰瘍水瀉熱利。黃疸水腫。痔血腸風。漏下赤白。與夫諸痛瘡瘙。蚘蟲內攻。診其尺果洪大。按之而有力。可炒黑暫用。使其瀉熱順流而下。陰火因而潛伏。則陰不受煎熬。而陰乃得長矣。非謂眞陰虛損。服此卽有滋潤之力也。故於實熱實火則宜。而於虛熱虛火。則徒有損而無益。奈今天下人不問虛實。竟有爲去熱治勞之妙藥。而不知陰寒之性。能損人氣。滅人食。命門眞元之火。一見而消亡。脾胃運行之職。一見而阻喪。元氣既虛。又用苦寒遏絕生機。莫此爲甚。川產肉厚色深者良。生用降實火。蜜炙則不傷胃。炒黑能止崩帶。酒製治上。鹽製治中。鹽製治下。【清】賈九如辨藥指南論黃柏曰。黃柏樹高數丈。其皮從上直下。味苦入骨。是以降火能自頂至踵。淪膚徹髓。無不週到。專瀉腎與膀胱之火。蓋腎屬寒水。水少則漸消。涸竭則變熱。若氣從臍下起者。陰火也。內經曰。腎欲堅以苦堅之。堅卽爲補。丹溪以此一味名大補丸。用鹽水製。使鹽以入腎。主降陰火。以救腎水。用蜜湯拌炒。取其懋腸而不驟下。治五心煩熱。目痛口瘡諸症。單炒褐色。治腸紅痔漏。遺精白濁。瀝熱黃疸。及膀胱熱。脾腹內痛。凡屬相火。用此抑之。腎自堅固而無狂蕩之患。因味苦能走骨。能沉下。用酒拌炒四物湯調服。領入血分。治四肢骨節走痛。足膝酸疼無力。遍身惡瘡。及脚氣攻沖。嘔逆惡心。陰虛血熱。火氣於足者。蓋此一味名潛行散。能瀉陰中之火。亦能安蛔蟲。以苦降之之義也。

國外學說　日本學說謂黃柏與黃連同。含有『ベルベリン』。然其含量。比黃連爲劣。故治療上之價值。亦因之而少。緒子氏就二三古書。調查關於黃柏之事項。知凡供外用時。多爲火傷皮膚之炎症等。廣益本草大成第十二卷第四葉曰。小兒臍生瘡不合者。黃檗末塗之。(子母祕傳)人冬月向火。火氣內入兩股。瘡生汁出不止者。黃檗末塗立瘥。(醫說)藥性能善大成第二卷第三十五頁曰。除下部之濕瘡。毒腫。蜜炒爲末塗於口瘡。甚佳。緒子氏欲探其原因。試取黃柏之一定量。灑水而浸出之。則浸液呈膠狀。通過濾紙甚難。(於濾液中加亞爾個兒亦不沈降。是與護謨相反)又嘗其少量。但覺辛味(因含有『ベルベリン』之外。尙有黏液之味。氏因察所謂植物性黏液之存在否。製出而定其量。則黃柏中約含七至八%之植物性黏液。故以黃柏供外用者。唯因其含有植物性黏液也。然則如亞爾答。亞麻仁。錦葵等。於表皮剝脫。皮膚炎等。殆可供甚布。瀉溫罨法之用。又依此理由。於急心腸胃炎。咽喉炎等。當可內服。氏又試驗植物性黏液之外。並無護謨類之存在。蓋黃檗之主成分。爲祕魯培林。其試驗成績。有已故醫學博士緒子吉人氏之報告。詳載東京醫學會雜誌第二卷第十二號。又日本市上有售所謂陀羅尼助者。爲有光澤之黑色板狀塊。係煎熬黃檗而成之一種水製越幾斯用代熊膽。言海云。昔有僧誦陀羅尼時。製此用爲防睡之助。云其味極苦。製於吉野大峯之洞川。俗稱係大峯所燒香煙煤。加百草製成。或用胡黃連(千振)根製者云。又藥學雜誌第二百十四號載有藥學得業士平井方澄氏之『烏取縣產煉熊之試驗報告』一文。詳述煉熊之功效。形態。及其成分等。其言曰。煉熊在東國地方。呼陀羅尼助。內服治膿痛。腹痛等。外用點充血目。爛目等。或用以貼於打傷。刀傷等。農家則用作牛馬脾藥。試驗其成分。可證明其中含有祕魯培林。古來使用煉熊。其主效亦卽在此祕魯培林。加之含有多量樹膠類。與祕魯培林相並。故於內服外用。能奏上述功效。而民間用此。亦確實有效。故煉熊實爲不可輕視之民間藥。以余觀之。本品之製法。能加以改良。將可得有力之製品云。詳細請再參閱該雜誌。

辨僞　(一)鄭肖巖曰。黃栢本出漢中山谷。今以蜀中產者皮厚色深爲佳。樹高數丈。葉似紫椿。經冬不凋。皮外白裏深黃色。入藥用其根。結塊如松下茯苓。氣味苦寒無毒。近有一種僞品。色黃而黑。味竟不苦。不知何物假充。用之得無害

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乎。㊂曹炳章曰按黃柏。四川順慶府南充縣出者爲川柏。色老黃。內外皮黃黑。塊片小者佳。可作染料用。湖南及關東出者爲關柏。塊片甚大而薄。色淡黃者次。東洋出者爲洋柏。色亦淡黃。質鬆更不入藥。

配合應用　㊀黃檗爲足少陰腎經藥。然以柴胡引之。則入膽。以黃連、葛根、升麻引之。則入腸胃及太陰脾經。治溼熱滯下。佐牛膝、枸杞、地黃、五味子、鼈甲、青蒿。則益陰除熱。佐甘菊、枸杞、地黃、蒺藜、女貞實。則益精明目。得猪膽汁、水銀粉。則主諸熱瘡有蟲。久不合口。得鉛丹。則生肌止痛。得木瓜、茯苓、二朮、石斛、地黃。則除溼健步。佐白芍藥、甘草。則主火熱腹痛。

㊁治口中及舌上生瘡。剉黃檗含之。（外臺祕要方）

㊂治小兒重舌。以黃檗、苦竹瀝。浸點舌上。（千金方）

㊃治咽喉卒腫。食飲不通。黃檗搗末。苦酒和敷腫上。佳。（肘後方）

㊄治傷寒時氣。溫病毒攻手足。腫痛。欲斷亦治毒攻陰腫。細剉黃檗五斤。以水三斗煮潰之。（傷寒類要方）

㊅治食自死六畜肉中毒。黃檗末服方寸匕。未解再服之。（葛氏方）

㊆治嘔血。黃檗蜜塗炙乾。杵爲末。麥冬湯調下二錢匕。立瘥。（經驗方）

㊇治癰疽發背。或發乳房。初起微赤。不急治之。卽殺人。搗黃檗末和雞子白塗之。（梅師方）

㊈治吐血熱極。用黃檗二兩。蜜炙。搗末。每服二錢。溫糯米飲調下。（簡要濟衆方）

㊉治小兒熱瀉。黃檗削皮。煅爲末。用薄米飲丸如粟大。每服十丸。米飲下。（十全博救方）

㊊治傷寒熱病口瘡。黃檗削去麤皮。蜜漬一宿。唯欲令濃。含其汁良久。吐更含。若胸中熱有瘡時。飲三五合尤佳。（深師方）

㊋術義云。檗木今用皮。以蜜炙。與青黛各一分同爲末。入生龍腦一字。研勻。治心脾熱。舌頰生瘡。當摻瘡上。有涎卽吐。又張仲景檗皮湯。無不驗。傷寒論中已著。

㊌治妊娠下痢白色。晝夜三五十行。根黃厚者。蜜炒令焦爲末。大蒜煨熟去皮。搗爛如泥。和丸梧子大。每空心米飲下三五十丸。日三服。神妙不可述。（婦人良方）

㊍治赤白濁淫及夢洩精滑。眞珠粉丸。黃檗炒眞蛤粉各一斤爲末。煉蜜丸。菉豆大。每服一百丸。空心溫酒下。黃檗苦而降火。蛤粉鹹而補腎也。又方加知母炒、牡蠣煅、山藥炒等分爲末。糊丸梧子大。每服八十丸。鹽湯下。（潔古家珍方）

㊎治積熱夢遺。心悸恍惚。膈中有熱。宜清心丸主之。黃檗末一兩。片腦一錢。煉蜜丸梧子大。每服十五丸。麥冬湯下。此大智禪師方也。（許學士本事方）

㊏治口瘡臭爛。綠雲散。用黃檗五錢。銅綠二錢。爲末。摻之。漱去涎。（三因方）

㊐治鼻痔有蟲。黃檗二兩。冷水浸一宿。絞汁溫服。（聖惠方）

㊑治鬚毛毒瘡生頭中。初生如蒲桃。痛甚。黃檗一兩。乳香二錢半。爲末。桃花煎水調作餅。貼於瘡上。（普濟方）

㊒治小兒脾瘡不合者。黃檗末塗之。又方。治膿瘡熱瘡。黃檗末一兩。輕粉三錢。豬膽汁調搽之。或只用蜜炙黃檗末一味。（子母祕錄方）

㊓治火毒生瘡。凡人冬月向火。火氣入內。兩股生瘡。其汁淋漓。用黃檗末摻之立愈。一婦生此。人無識者。用此而愈。（張杲醫說方）

㊔斂瘡生肌。黃檗末麵糊調塗。效。（宣明方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡非實火諸症及脾虛多瀉。胃薄少食者。禁用。惡乾漆。

書名方劑　㊀滋腎丸。治肺痿。聲嘶。喉痺。咳血。煩躁及溼熱下注。小便祕澁等症。（東垣方）黃柏（酒炒）二兩。知母（酒浸炒）二兩。肉桂一錢。爲細末。熟水丸梧子大。每服五十丸。空心下。㊁二妙散。治溼熱下注。足軟脚腫及筋骨疼痛。（丹溪方）黃柏（炒）蒼朮（炒去皮）各等分。爲末。生姜研。沸湯調服。

參攷資料　㊀黃蘗之用有六。瀉膀胱心火一也。利小便結二也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

除下焦濕腫三也。痢疾先見血四也。膵中痛五也。補腎不足壯骨髓六也。凡腎水膀胱不足。諸痿厥腰無力。於黃芪湯中加用之。使兩足膝中氣力涌出。痿軟即便去也。乃癱瘓必用之藥。蜜炒研末。治口瘡如神。故雷公炮炙論云。口瘡舌折立愈。黃酥謂以酥炙根黃含之也。（張元素）㈡黃蘗蒼朮。乃治痿要藥。凡去下焦濕熱作腫及痛。并膀胱有火邪。并小便不利。及黃瀝者。並用酒洗黃蘗。知母爲君。茯苓澤瀉爲佐。凡小便不通而口渴者。邪熱在氣分。肺中伏熱。不能生水。是絕小便之源也。法當用氣味俱薄淡滲之藥。豬苓澤瀉之類。瀉肺火而清肺金。滋水之化源。若邪熱在下焦血分。不渴而小便不通者。乃素問所謂無陰則陽無以生。無陽則陰無以化。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。法當用氣味俱厚。陰中之陰藥治之。黃蘗知母是也。長安王善夫病小便不通。漸成中滿。腹堅如石。脚腿裂破出水。雙睛凸出。飲食不下。痛苦不可名狀。治滿利小便滲洩之藥服遍矣。予診之曰。此乃奉養太過。膏粱積熱。損傷腎水。致膀胱久而乾涸。小便不化。火又逆上而爲嘔噦。難經所謂關則不得小便。格則吐逆者。潔古老人言熱在下焦。但治下焦。其病必愈。遂處以北方寒水所化大苦寒之藥。黃蘗知母各一兩。酒洗焙碾。入桂一錢爲引。熱水丸如芡子大。每服二百丸。沸湯下。少時如刀刺前陰火燒之狀。溺如瀝泉湧出。牀下成流。顧盼之間。腫脹消散。內經云。熱者寒之。腎惡燥。急食辛以潤之。以黃蘗之苦寒。瀉熱補水。潤燥爲君。知母之苦寒。瀉腎火爲佐。肉桂甘熱爲使。寒因熱引也。（李杲）㈢古書言知母佐黃蘗。滋陰降火。有金水相生之義。黃蘗無知母。猶水母之無蝦也。蓋黃蘗能制膀胱命門陰中之火。知母能清肺金滋腎水之化源。故潔古東垣丹溪皆以爲滋陰降火要藥。上古所未言也。蓋氣爲陽。血爲陰。邪火煎熬。則陰血漸涸。故陰虛火動之病須之。然必少壯氣盛能食者。用之相宜。若中氣不足。而邪火熾盛者。久服則有寒中之變。近時虛損及縱慾求嗣之人。用補陰藥。往往以此二味爲君。日日服餌。降令太過。脾胃受傷。真陽暗損。積氣不暖。致生他病。豈不知此物苦寒而滑滲。且苦味久服。有反從火化之害。故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘗。久服傷胃。不能生陰之戒。（李時珍）㈣黃蘗本經言蘗木及根。不言蘗皮。豈古時木與皮通用乎。（李時珍）㈤蘗木今出邵陵者。輕薄色深爲勝。出東山者。厚而色淺。其根於道家入木芝品。今人不知取服。（陶弘景）㈥子蘗亦名山石榴。子似女貞皮白不黃。亦名小蘗。所在有之。今云皮黃謬矣。按今俗用子蘗。皆多刺小樹。名刺蘗。非小蘗也。（蘇恭）㈦黃蘗樹高數丈。葉似吳茱萸。亦如紫椿。經冬不凋。皮外白裏深黃色。其根結塊。如松下茯苓。今所在有之。出房商合等州山谷中。皮鬆厚二三分。鮮黃者上。二月五月採皮日乾。（掌禹錫）㈧黃蘗處處有之。以蜀中出肉厚色深者爲佳。（蘇頌）㈨黃芩栀子入肺。黃連入心。黃蘗入腎。燥濕所歸。各從其類也。故活人書四味解毒湯。乃上下內外通治之藥。（王好古）

【黃柏炭】卽黃柏炒過者之處方用名。詳『黃柏』條。

【黃柏根】原命　檀桓。

性質　苦寒。無毒。

主治　心腹百病。安魂魄。耐饑渴。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論黃柏根曰。去萬病爲散飲服。

【黃矾】卽雌黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雌黃』條。

【黃苔】卽連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【黃英】卽石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【黃英香】卽檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『檀香』條。

【黃屑】形態　黃屑爲雜木類之一種。其樹如檀。可供藥用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　心腹痛。霍亂。破血。酒煎服。酒疸目黃。及野雞病。熱痢下血。水煮服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【黃茄水】製法　秋天黃老茄子不計多少，以新瓶盛埋地中，年化爲水，取出應用。

主治　大風熱痰，能消痰成水。

【黃茅根】㊀卽白茅根之一種，參詳『白茅根』條。㊁卽地筋之處方用名，詳『地筋』條。

【黃香】卽松脂之古籍別名，典見和漢藥考，詳『松脂』條。

【黃孫】㊀卽王孫之古籍別名，典見別錄，詳『王孫』條。㊁卽黃精之古籍別名，典見和漢藥考，詳『黃精』條。

【黃桐】卽桐之古籍別名，典見圖經本草，詳『桐』條。

【黃秫】形態　黃秫爲雜草類之一種，形如桐根，可供藥用。

性質　苦，無毒。

主治　除心煩，止汗出。

【黃耆】命名　耆長也，本品色黃，爲補藥之長，故名。

處方用名　黃芪，生黃耆，炙黃耆，清炙耆，蜜炙耆，大有耆，綿黃芪。

古籍別名　戴糝（本經），戴椹，蜀脂（百本），芰草，芰草，獨椹（別錄），王孫（藥性），羊肉（日華），黃嗜，綿耆，戴粉（綱目），茹嬭，甘板麻，百藥綿（和漢藥考）

外國名稱　Astragalus, hirsutus, Mak.（拉丁）

藥商隱名　上有芪，西上芪，芪面，又有因產地而名者，如白水黃芪，赤水黃芪，木黃芪，土黃芪，岩黃芪。

基本　黃耆屬荳科，中國產者，用黃耆之地下莖，日本產者，用岩黃耆之地下莖，黃耆葉似槐葉而微尖小，又似蔘葉而微闊大，青白色，開黃紫花，大如槐花，結小尖角，長寸許，根長二三尺，以緊實如箭鏑者爲良，嫩苗亦可喫食，其子收之，十月下種，如種菜法。

產地　㊀黃耆之產地，在昔日中國醫籍，多謂出自隴西，如秦州記曰，隴西襄武縣出黃耆，又唐愼微證類本草及李時珍本草綱目，皆引證陶宏景之言曰，第一出隴西洮陽，李氏在綱目集解中，又引陳承言曰，黃耆本出綿上爲良，而圖經繪憲州黃耆者，實爲地與綿上相鄰故也，元王好古曰，綿上卽山西沁州，而白水在陝西同州，明陳嘉謨亦謂綿上沁州鄉名白水赤水二鄉，俱屬隴西，如是黃芪在昔時似皆謂出自陝西及山西，卽赤水鄉白水鄉與綿上，故有赤水耆白水耆與綿耆之稱也，今吾東耆亦出，如奉天之法庫縣，及東蒙古臨西一帶，黃耆皆上品。㊁和漢藥考云，白水赤水者，俱陝西之鄉名，綿者出於山西沁州綿上，故名，或云用其皮折之柔韌如綿者爲良，乃謂之綿黃芪，木黃芪者，短而理橫，今人多以苜蓿根假之，俗呼爲土黃芪，但堅而脆，味苦，令人瘦，黃芪柔而味甘，令人肥大，異用者宜審，木黃芪亦勿用，碧黃者產加賀國白山，和泉國金剛山，及安藝廣島等，爲宿根草，春季抽莖，高三四尺，葉爲多數小葉所成之複葉，有毛茸，秋季開類小豆花之淡黃色花，後結莢實，中有小子，一種呼富士黃耆者，產駿河國富士山，莖如蔓，花淺黃色，結莢角，又有一種紫色者，根莖俱小而硬，謂之本黃耆。㊂陳仁山藥物生產辨云，正芪產區分三處，一關東三寧古塔，三卜奎，產東三省伊黎，吉林，三姓地方，清明後收成，入山採掘，至六七月間，乃上市，冲口芪，產區亦廣，產於山西省渾源州，近陽高縣一帶，收穫在秋後冬前，擇出勻滑直强者，先製粉芪，綿芪，專消三江一帶，次下者，乃製冲口芪，染成黑皮，而渾耆芪，牛莊芪，卽此芪製剩原來生芪而來，是以不黑皮，又有一種，名晉芪，實爲川芪，原產四川碧江，汶縣，灌縣，江油縣等處，又有一種，名禹州芪，乃由口外運至禹州，扎把而來，原色白皮，亦是生芪，非產禹州，粉芪原出陝西岷州，大同，宣化等處。

形態　黃耆爲荳科植物（Leguminosae）中蝴蝶花形科植物（Papilionacea）宿根草 Astragalus Henryi oliv 之根，同種類之植物有數種，卽因其產地亦別其形狀及種類，如陶弘景謂出隴西洮陽者，色黃白味甜美，出黑水宕昌者，色白肌理粗新者亦甘，又蘇頌曰，黃耆之出綿上者，其皮折之柔韌如綿，故謂之綿黃耆，本草綱目謂今市場販者，多切成六

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

七寸許之短棒狀。外面呈淡褐色。有螺旋狀之隆起線。內部爲黃白色。折之柔韌如綿。破折面爲纖維狀。其味微甘稍帶芳香性。世多採首蓿根充賣。假黃耆俗呼爲土黃耆。不知首蓿根堅而脆。肉色黃。味亦苦。黃耆軟而綿。肉白味甘。此爲異耳。又按本草圖譜引草木圖說謂。開淡黃花者名曰木黃。學名則爲 Astragalus reflexistipulus Miq. 產自日本安藝廣島地方。綱目記木耆。短而理橫。又爲開紫花者。產自駿州富士名之曰富士黃耆。學名則爲 Astragalus Adsurgens Pall. 莖如蔓。根亦白。二者皆屬下品。

採取　二月十月間採之。

製法　雷敩曰。凡使勿用木耆。草眞相似。只是生時葉短。井根橫也。須去頭上皺皮。蒸半日。擘細於槐砧上剉用。李時珍曰。今人但槌扁。以蜜水塗炙。數次。以熟爲度。亦有以鹽湯潤透。器盛。於湯瓶蒸熟切用者。

性質　甘。微溫。無毒。

效能　益氣。固衛。托瘡。生肌。用作和緩强壯藥。及利尿止痛排膿劑。又爲瘡瘍癰疽。以及瘡證不起之要藥。

作用　入胃後。能助胃之消化力。而能與胃酸化合。至小腸被其吸入血中。促進血液之進行。故能托瘡排膿。振興精神。增高體力。

主治　癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛小兒百病。（本經）婦人子臟風邪氣。逐五臟間惡血。補丈夫虛損。五勞羸瘦。止渴。腹痛洩痢。益氣利陰氣。（別錄）

張仲景之證明　黃耆一藥。經張仲景氏之實驗。認爲能治肌表之水。故能治黃汗盜汗皮水及勞治身體重及麻木不仁者。考證如下。㊀耆芍桂枝苦酒湯證曰。身體腫。發熱汗出而渴。又云。汗沾衣。色正黃如蘗汁。㊁防己黃耆湯證曰。身重。汗出惡風。（以上二方。黃耆皆五兩）㊂防己茯苓湯證曰。四肢腫。水氣在皮膚中。㊃黃耆桂枝五物湯證曰。身體不仁。（以上二方。黃耆皆三兩）㊄桂枝加黃耆湯證曰。身常暮盜汗出者。又云。從腰以上必汗出。下無汗。腰腹弛痛。如有物在皮中狀。（以上一方。黃耆二兩）㊅黃耆建中湯證。不具也。（以上一方。黃耆一兩半）歷觀上諸方。黃耆主治肌表之水也。故能治黃汗盜汗皮水。又能治身體腫或不仁者。是腫與不仁。亦皆肌表之水也。

歷代記述攷證　【唐】甄權云。黃耆性本草論黃耆曰。主虛喘。腎衰耳聾。療寒熱。治發背內補。【宋】日華諸家本草論黃耆曰。黃耆助氣壯筋骨。長肉補血。破癥癖瘰癧癰贅。腸風血崩。帶下赤白痢。產前後一切病。月候不勻。痰嗽頭風。熱毒赤目。【金】張元素珍珠囊論黃耆曰。治虛勞。自汗。補肺氣。瀉肺火心火。實皮毛。益胃氣。去肌熱。及諸經之痛。【元】王好古湯液本草論黃耆曰。主大陰瘧疾。陽維爲病。苦寒熱。督脈爲病。逆氣襄急。又曰。黃芪治盜汗。并自汗。及膚痛。是表皮之藥。治咯血。柔脾胃。是中州之藥。治傷寒尺脈不至。補腎臟元氣。是裏藥。乃上中下內外三焦之藥也。【元】李東垣用藥法象論黃耆曰。黃耆補三焦。實衛氣。與桂同功。特比桂甘平不辛熱爲異耳。蓋桂則通血脈。能破血。而實衛氣。芪則益氣也。【明】陳嘉謨本草蒙筌論黃耆曰。參芪俱益虛損。但人參惟補元氣調中。黃芪兼補衛氣實表。如共辯而用。須別主輔。凡內傷脾胃。發熱惡寒。怠惰。嗜臥。嘔吐。洩瀉。及膜滿痞塞。形羸力乏。脈微神短。參爲君。耆爲臣。若表虛而自汗盜汗。漸至亡陽。諸潰瘍多耗膿血。嬰兒痘疹未灌全漿。一切陰毒不起之疾。治之又須實衛護營。當以芪爲君。參爲臣。【清】楊時泰本草述鉤元論黃耆曰。黃耆味甘。氣微溫。氣厚於味。可升可降。陰中之陽也。入手足太陰氣分。甘溫純陽。主益肺氣。溫分肉。實皮毛。固腠理。大補表之元氣。虛弱。通和陽氣。利陰氣。泄火邪。能活血脈。生血助胃氣。（治脾胃虛弱。脈弦。血脈不行。羸瘦腹痛。）益三焦元陽。補五臟諸虛不足。丈夫虛損羸瘦。短氣虛喘。腎衰耳聾。瀉久腸風。老人氣虛腸閙。更治虛煩肌熱。虛勞自汗盜汗。若表虛有邪。發汗不出服之。自汗。并內托陰

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

疽排膿止痛。長肉生肌。爲瘡家聖藥。又治女子月候不勻。血崩帶下。胎前產後氣耗血虛並療小兒百病。【清】張隱菴本草崇原論黃耆曰。黃耆色黃。味甘微溫。稟火土相生之氣化。土主肌肉。火主經脈。故主治肌肉之癰經脈之疽也。癰疽日久。正氣衰微。至三焦之氣不溫肌肉。則爲久敗瘡。黃耆助三焦出氣以溫肌肉。故可治也。癰疽未潰。化血爲膿。痛不可忍。黃耆補氣助陽。陽氣化血而排膿。膿排則痛止。火風癩疾。謂之瘋瘍。乃風寒客於脈而不去。鼻柱壞而色敗。皮膚潰癩者是也。今夫五痔者。牡痔、牝痔、腸痔、脈痔、血痔。是熱邪淫於下也。鼠瘻者。腎臟水毒。上淫於脈。致頸項潰腫。或空或凸。是寒邪客於上也。夫癩疾五痔鼠瘻乃邪在經脈。而證見於肌肉皮膚。黃耆內資經脈。外資肌肉。是以三證咸宜。又曰補虛者。乃補正氣之虛。而經脈調和。肌肉充足也。小兒經脈未盛。肌肉未盈。血氣皆微。故治小兒百病。【清】鄒澍本經疏證。證論黃耆曰。黃耆根莖。皆旁無歧互。獨上獨下。其根中央黃。次層白。外層褐。顯然三層界畫分明。又其味甘其氣微溫。直入中土。而行三焦。故能內補中氣。則本經所謂補虛。別錄所謂補丈夫虛損。五勞羸瘦。益氣也。能中行營氣。則本經所謂主癰疽。久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。別錄所謂逐五臟間惡血也。能下行衛氣。則本經所謂五痔鼠瘻。別錄所謂婦人子臟風。邪氣腹痛洩利也。癰疽篇。寒邪客於經絡之中。則血泣不通。衛氣歸之。不得復反。故癰腫寒氣化爲熱。熱勝則肉腐爲膿。素問風論。風氣與太陽俱入。行諸脈俞。散於分肉。與衛氣相干。其道不利。故使肌肉憤瞋。有瘡。衛氣有所凝。故肉有不仁。營氣熱胕不清。故使鼻柱壞而色敗。名曰瘋風。生氣通天論。營氣不從。逆於肉理。乃生癰腫。歷歷明徵。莫非營衛之病。而營衛所以屬三焦。三焦所以屬中土者。靈樞營衛生會篇。上焦出於胃上口。貫膈。竝咽布胸中。以發呼吸。而行營衛。是爲中氣。中焦亦竝胃中出上焦之後。此所受氣。泌糟粕。蒸津液。上注於肺。乃化爲血。是爲營氣。下焦別迴腸。濟泌別汁。注於膀胱。是爲衛氣。三者皆本於水穀。是三焦爲營衛之本。脾胃之蒸腐變化。又爲三焦之本。黃耆一源三派。潛三焦之根。利營衛之氣。故凡營衛間阻滯。無不盡通。所謂源清流自潔者也。【清】黃宮繡本草求眞。論黃耆曰。黃耆味甘性溫質輕。皮黃肉白。故能入脾補氣。入表實衛。爲補氣諸藥之最。是以有耆之稱。且耆其功曰。生用則能固表。無汗能發。有汗能收。是明指其表實則邪可逐。故無汗能發。表固則氣不外洩。故有汗能止耳。又著其功曰。熟則生血生肌。排膿內托。是蓋指其氣足則血與肉皆生。毒化成膿。而爲瘡瘍聖藥矣。至於豆瘡不起。陽虛無熱。書言於耆最宜。皆是取其質輕達表。功專實衛。而能升氣於表。又言力能補腎。以治崩帶淋濁。是蓋取其補中升氣。則腎受陰。而崩帶淋濁自止。然與人參比較。則參氣味甘平。陽兼有陰。耆則秉性純陽。而陰氣絕少。蓋一宜於中虛而泄瀉痞滿倦怠可除。一更宜於表虛而自汗亡陽。潰瘍不起。可治。且一宜於水虧。而氣不得宣發。一更宜於火衰。而氣不得上達之爲異耳。書言黃耆性畏防風。其功益大。蓋謂能以助耆達表。相畏而更相依。是以如斯。若使陽盛陰虛。上焦熱甚。下焦虛寒。肝氣不和。肺脈洪大者。則並戒其勿用矣。出山西黎民。大而肥潤。箭直良瘦。小色黑堅硬。不軟者。服之令人胸滿。血虛肺燥。趙扁鵲炙。發表生用。氣虛肺寒。酒炒。腎虛氣薄。鹽湯蒸潤。切片用。【清】賈九如辨藥指南。論黃耆曰。黃芪皮黃入脾。肉白走肺。性溫能升陽。味甘淡。用蜜炒又能溫中。主健脾。故內傷氣虛少用。以佐人參。使補中益氣。治脾虛泄瀉。癆痢日久。吐衄腸紅。諸久失血後。及瘡瘡慘白。主補肺。故表疎衛虛多用。以君人參。作斂汗固表。治自汗盜汗。諸毒潰後。收口生肌。及瘡瘡貫膿癰疽久不愈者。從骨托毒而出。必須鹽炒。瘡科虛不發者。在表助氣爲先。又宜生用。若氣有餘。表邪旺。腠理實。三焦餘熱未淨。萬不可加。

國外學說　荷蘭藥鏡曰。黃耆

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

治痢疾。及梅毒。頗有效。其拉丁名爲『阿斯篤拉格留斯。愛基斯加卑斯。』用根及子。味微甘。收濇水煎服。治下痢赤痢。利小便。又作漱藥。能刷淨斷顎腐爛。使之治愈。又爲末。摻經久潰瘍及瘡傷。使排膿而愈。或用治梅毒諸症。左方多有效。

辨僞　㊀鄭肖巖曰。黃芪僞名介芪。介或作蓋。條硬無味。色白不黃。按黃芪以山西綿上出者爲佳。故一名綿芪。色黃帶白。緊實如箭竿。故又名北箭芪。折之柔韌如綿。故能入肌腠而補氣。若介芪之呆劣。又安可用乎。聞蓋芪性極發散。有人誤服。汗流不止。其性與綿芪大相反。用者當明辨之。㊁曹炳章曰。按黃芪冬季出新山西太原府里陵地方出者。名上芪。其質直長。糯軟而無細枝。細皮皺紋。切斷有菊花紋。兼有金井玉欄杆之紋。色白黃。味甜鮮潔。帶有豇豆氣。爲最道地。又大同府五台山出。粗皮細硬。枝短味淡。作小把。爲台芪。俗稱小把芪。略次。亳州出者。性硬筋多。韌而肉色黃。爲亳芪。俗稱全芪。亦次。陝西出者。爲西芪。性更硬。味極甜。更次。蛟城出者。爲蛟芪。枝短皮粗。無枝極次。四川出者。爲川芪。小把。皮紅黑色。性硬筋韌如麻。味青草氣。爲最下品。服之致腹滿。最能害人。凡外症瘡瘍用黃芪。如陽癰托毒化膿。及虛體瘡瘡凹陷。皆用生。陰疽補托轉陽用炙。皆須太原產之上芪。立能見效。若以側路雜芪充用。則爲害甚烈。不可不辨矣。

近人學說　徐錫年曰。黃芪味甘性溫。氣升質降。爲溫養脾胃益氣固表之品。本經論其功用。有治癰疽久敗。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛小兒百病等文。後人用之。如補中益氣湯。當歸補血湯。黃芪建中湯諸方。皆以黃芪爲補中溫裏益氣實表之品。誠足以發明黃芪之功用矣。迨夫後賢繼起。議論紛紜。以致本經意旨。愈說愈晦。愈趨愈下。如金元大家張潔古者。以本經主治癰疽久敗。排膿止痛二語。遂倡出黃芪爲瘡家聖藥之說。味者不察。一律治襲。於是治瘍諸家。不問症情。不辨虛實。竟以黃芪一味。視同神聖。無往不用。以致補住邪火。增長毒炎者。比比皆然也。瘍症暴發。毒勢方張。或爲痰火互結。或爲溼毒蘊熱。始則燃腫堅大。繼則潰爛膿。滲溼攻痰。化毒清火。此其治也。乃一用黃芪。甘溫升發。實表固裏。助其蘊釀之資。增其羹癰之患。甚至於燎原而莫可救。是素稱爲瘡家之聖藥者。今爲瘍症之砒鴆矣。雖然。此非黃芪之咎也。乃用之者不識其時耳。然則黃芪果何時而可用乎。曰。潰瘍久敗。肌肉難生。濃水不淨。此久病元虛。脾陽衰弱。瘡口潰塌。不能輿其生發之機。能黃芪甘溫。補益元氣。且走肌腠。投於此際。可謂有利無弊。誠爲聖品矣。是故本經以治癰疽久敗。排膿止痛者。即此意也。張隱庵曰。癰疽日久。正氣衰微。故曰久敗。不意高明如潔古者。竟抹煞本經久敗兩字。倡此籠統之說。致後人有濫用之弊。殆亦其本意所不及料者。敢貢一得。用者審之。㊂張山雷曰。黃芪具春令升發之性。味甘氣溫。色黃。皆得中和之正。故能補益中土。溫養脾胃。凡中氣不振。脾土虛弱。清氣下陷者。最宜。其皮味濃實厚。力量皆在皮中。故能直達人之膚表肌肉。固護衞陽。充實表分。是其專長。所以表虛諸病。最爲神劑。但升舉有餘。偏於陽分。氣虛陽虛者。宜升宜提。而陰虛火擾者。宜禁。若肝腎不足。不可誤與升陽。伐其根本。故凡飢飽勞役。脾陽下陷。氣怯神疲者。及癆久脾虛。清氣不升。寒熱不止者。授以東垣之補中益氣湯。無不捷效。正以黃芪爲參朮之佐。而又得升柴以升舉之。則脾陽復辟。而中州之大氣斡旋矣。(正譌)黃芪爲固表主藥。甘溫之性。專走肌肉皮膚。本草經之癰疽久敗瘡排膿止痛明謂其專治癰疽之久敗者。則排膿止痛。蓋久敗之潰瘍。肌肉久壞。膿水頻仍。表氣大虛。黃芪益氣固表。以療其虛。斯能排膿止痛耳。張隱菴亦謂癰疽日久。正氣衰微。故爲久敗。乃後人習焉不察。誤認其通治癰疽。置久敗二字於不問。張潔古則稱其內托陰疽。爲瘡家聖藥。經仲醇則稱其治小兒胎毒瘡癤。張景岳則稱其生者可治癰疽。張石頑則稱其托已潰瘡。餘子碌碌。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

無不節取本經排膿止痛四字。泛指爲瘡家必用之藥。所以庸俗之書。治瘍各方。類皆不問虛實。插入黃芪一味。自謂能讀本草。而富貴家亦喜其堂皇冠冕。信之不疑。不知毒勢方張。而用實表之藥。爲虎傅翼。適以愈張其燄。則腫瘍難消。潰瘍毒熾。排膿適以生膿。止痛乃以增痛。皆誤讀本經之咎矣。潔古所謂內托阻陰疽。注重陰證。猶可說也。然堅腫而實其表。亦以助邪。終屬非法。且瘡家聖藥四字。即爲後人沿訛襲謬之根。而繆氏經疏。竟謂其治小兒胎毒瘡癤。則皆熱毒溼火之病。而投甘溫固表。直是抱薪救火。誤讀古書。抑何至於此極。景岳石頑。皆高明之士。所謂藥物。皆有經驗。而猶仍斯謬。又何怪庸耳俗目之人。云亦云葫蘆依樣耶。壽頤於瘍科一門。具有師承。凡在腫瘍及潰瘍之毒勢未清者。概不滇投補劑。以取悅富貴之家。惟潰久元虛。或虛寒之體。始以四君六君保元歸脾等方。隨宜擇用。非矯異於庸俗也。亦澄清之不容不爾者也。敢揭而出之。爲世俗之治瘍者告。俾知本草經固未嘗不可信。恃不可爲誤讀古書者所惑。庶幾令病人少受痛楚。亦治醫者之陰德也。白朮條中。昔人曾有潰瘍禁用之說。以其能生膿作痛也。張石頑亦信之。試問同是補益肌肉之品。何以一忌一宜。大相刺謬如此。豈有朮之補脾。必生膿作痛。而芪之固表。反有消膿止痛之理。則後先虛實。不加辨別。而混爲一例之過也。須知藥之治病。全在用之得當。同此一病。而前後之虛實不同。斯攻補即當異治。若但執一病名。而不問虛實。不問寒熱。泛泛然號於衆曰。某藥爲宜。某藥爲忌。豈理也哉。甄權治虛喘腎衰。蓋誤認其補氣之過也。要知升舉之品。正與喘證之氣逆上奔相反。且腎衰作喘。本是氣虛不攝陰火上衝。攝納歸元。猶恐不及。乃復舉而升之。則根本既搖。而遽之蹶矣。此東垣之補中益氣湯。所以最不宜於肝腎之虛也。張潔古謂其瀉肺火。蓋亦指氣虛發熱言之。虛火不藏。面赤發熱。有似肺家之火。則芪以補脾益氣。能退大熱。若火熱刑金。而妄投補益。則謬矣。東垣謂防風能制黃芪。而芪得防風。則功愈大云云。頤謂既以制之而反能大其功。自盾自矛。最爲可笑。蓋既惑於前人相制之謬說。而又無解於許鳳宗之以黃芪防風湯。薰愈柳太后中風口噤之病。乃欲申一說以解其紛。而不悟。適以造成怪誕支離之弊。蓋防風黃芪。均是行表之藥。適合志同。何云相制。鳳宗之法。自有巧思。不意東垣倡此奇談。殊爲可駭。要知徒逞臆見。毫不足徵。後學萬弗泥此。庶不汨沒性靈。蜜塞智巧。中風口噤不語。最多氣升痰升。內因之病。風藥表藥。直是鴆毒。古人多作外風治療。皆是誤認。所以古之治案。多難盡信。許氏此案。見舊唐書本傳。治法新穎。獨闢蹊徑。如謂果能取效。恐亦未必。蓋史乘中所載醫家治驗。大都意想之辭。試爲細覈醫理用法。多難符合。良由乘筆者傳聞得之。而文人又皆不知醫學。則人云亦云。但知其新奇可喜。又安能辨得醫理病理之確當與否。子長孟堅之倉公等傳。尙多不可索解。更何論乎范曄陳壽以下。如華陀傳等。皆是。孔子中風一證。卒仆昏迷。本非外受之風。素問謂是血菀於上。名以薄厥。又謂氣血交并於上。名以大厥。今西醫謂之血沖腦經。皆不可妄用風藥。壽頤編有中風斠論三卷。專論此病。以實驗爲主。一說古書。辛散溫藥之誤。鳳宗此案。果是外風。則不服而薰。已覺有意矜奇。效否亦殊難必。若是內因。則爲害必甚。雖入正史。頤終不敢深信。而東垣黃芪之說。更是匪夷所思。出乎情理之外。潔古有黃芪無汗發之。有汗止之一說。而後人之編本草者。多循例照錄。無汗能發。有汗能止二句。幾以此物爲發汗止汗之專藥。亦知二者之功用。一散一收。正如冰炭之相反而不相合。天下安有一物而具有水火二性之理。乃黃芪之效力如此。寧非絕大怪異。抑知黃芪能達表而補益衛陽。明係固表之藥。何以能發汗奏績。惟衛分充溢。而陽氣流通。固亦有時而微汗津津者。潔古意中。固自有說。然約而稱之。則非立言之體矣。㊂袁淑範曰。黃芪學名之商榷。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

依余個人所閱之參考書皆謂產自我國及日本。從未有記自歐洲亦產者。其學名因此亦紛紛不一。西人則多譯自日本如 Chinese Materia Medica. 及 Botanical Chemical and Pharmacological reference list to Chinese Materia Medica 等則記其學名爲 Astragalus Hoangtchy. 黎 "Hoangtchy" 是日人讀黃芪之音。又如稱爲 Astragalus hiroshimanus Mak 者。因黃芪在日本多產自安藝。卽今之廣島之地方。因命名謂廣島黃芪。日人讀廣島之音爲 "Hiroshima"。故西人卽譯爲 Astragalus hiroshimanus. 如是吾人如稱爲 Astragalus huang-chi. 似亦未嘗不可。且黃芪本產地而異其功效。如李時珍在本草綱目發明中引陶弘景之言曰。出隴西者溫補。出白水者冷補。如是吾人何能以日本產之 Astragalus hiroshimanus 表示中國黃芪。此鄙意以爲如果稱爲 Astragalus hiroshimanus. 何如稱之謂 Astragalus huang-chi 爲妥。又素稱精通湖北產植物名之英人 Henry 氏在彼所著之 Analphabetical list of Chinese names of plants 中記黃芪之學名爲 Astragalus Henry oliv. 故日人多以之爲中國黃芪之學名。如 Chinoyama Pharmakognosie 及 Pharmaceutishe Botanik 等書多記爲 Astragalus Henryi oliv. 又和漢藥考則記中國產者爲 Astragalus Henryi oliv. 日本產者爲 Hedysarum esculentum. Lodeb. 而國人又有以 Astragalus-hiroshimanus. Mak 或 Hoangtchy 爲中國黃芪之學名者。其屬背謬錯誤者。不言可喻矣。今姑就余個人之意見。釐定學名及其種類於次。黃芪 Huang-chi. (中) 黃芪 Hoangtchy. (日) (一) Astragalus Huang-chi 產自中國 (Astragalus Hoangtchy) (Astragalus Henryi oliv) (甲) Astragalus Chih-shui-Huangchi. 陝西同州赤水鄉 (乙) Astragalus Pe-shui-Huangchi. 陝西同州白水鄉 (丙) Astragalus Mien-Huang-chi 山西沁州綿上 (丁) Astragalus Man-chou-Huang chi. 產自滿洲 (戊) Astragalus Mu-Huang-chi (二) Astragalus hiroshimanus. Mak. 產自日本廣島 (二) Astragalus roflexistipulus Miq. 產自日本 (四) Astragalus adsurgens pell. 產自日本富士 (五) Hedysarum esculentum, Ledl 產自日本。總之吾人研究國藥。固應先擇其功效卓著。富有興味者研究之。然如甘草黃耆人參等中醫常用之藥。似亦不可屏棄不道。因研究最終之目的。爲解決實地之問題故也。至黃耆之種類及學名。皆因產地而異。吾人不應以日本產之 Astragalus hiroshimanus. Mak. 表示國產黃耆。況我國黃耆。又有赤水、白水、綿耆等之區別也。昔日醫籍雖記黃耆爲補虛延長氣息之聖藥。然依余之不完備之試驗成績判斷時。黃耆至少亦不能有強壯之功效。其有效之主要成分。雖不敢斷言。然屬 Alkaloid 爲不可少疑之事實也。

配合應用 (一) 黃耆在補中益氣湯甘溫能除大熱。爲治勞倦發熱之要劑。

(二) 黃耆同生熟地、黃藥、黃芩、黃連、當歸、加酸棗仁炒熟研。爲治陰虛盜汗之正法。本方去三黃加人參、五味子、酸棗仁。治表虛自汗。

(三) 黃耆同桂枝、白芍藥、防風、炙甘草。能實表。治表虛畏風傷風自汗。

(四) 黃耆與茅山朮、生地黃等分。牛膝、黃蘗、減半。作丸。治積年瀝毒癰瘡。百藥不效。

(五) 主甲疽瘡腫。生脚指甲邊。赤肉出。黃耆二兩。薤菊三兩。苦酒漬一宿。豬脂五合。微火上煎取三合。絞去滓。以封瘡上。日三度易。其肉卽消。(外臺祕要方)

(六) 黃耆同白芷及甘草、金銀花、皂角刺。排膿止痛。

(七) 黃耆同人參、甘草。治天行瘡瘡。陽虛無熱證。

(八) 治小便不通。綿黃耆二錢。水二盞。煎一盞。溫服。小兒減半。(綿

473／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

救論方）

㊈治酒疸黃疾。心下懊痛。足脛滿。小便黃。飲酒發赤黑黃斑。由大醉當風。入水所致。用黃耆二兩。木蘭一兩。爲末。酒服方寸匕。日三服。（肘後方）

㊉治氣虛白濁。黃芪鹽炒半兩。茯苓一兩。爲末。每服一錢。白湯下。（經驗良方）

㊊治渴補虛。男子婦人諸虛不足。煩悸。焦渴面色萎黃。不能飲食。或先渴而後發瘡癰。或先癰疽而後發渴。並宜常服此藥。平補氣血。安和臟腑。終身可免癰疽之疾。用綿黃耆箭鋒者去蘆六兩。一半生焙。一半以鹽水潤溼。飯上蒸三次。焙剉。粉甘草一兩。一半生用。一半炙黃爲末。每服二錢。白湯點服。早晨日午各一服。亦可煎服。名黃耆六一湯。（外科精要方）

㊋治老人悶塞。綿黃耆、陳皮去白各半兩。爲末。每服三錢。用大麻子一合。研爛。以水濾漿煎至乳起。入白蜜一匙。再煎沸。調藥空心服。甚者不過二服。此藥不冷不熱。常服無祕塞之患。其效如神。（和劑局方）

㊌治腸風瀉血。黃耆、黃連等分。爲末。麵糊丸。綠豆大。每服三十丸。米飲下。（孫用和祕寶方）

㊍治尿血沙淋。痛不可忍。黃耆、人參等分。爲末。以大蘿蔔一個。切一指厚大。四五片。蜜二兩。淹炙令盡。不令焦。點末食。無時。以鹽湯下。（永類鈐方）

㊎治吐血不止。黃耆二錢。牛紫背浮萍五錢。爲末。每服一錢。蜜蜜水下。（聖濟總錄方）

㊏治咳嗽膿血。咽乾。乃因虛中有熱。不可服涼藥。以好黃耆四兩。甘草一兩。爲末。每服二錢。點湯服。（席延賞方）

㊐治肺癰。得吐。黃耆二兩。爲末。每服二錢。水一盞。煎至六分。溫服。日三四服。（聖惠方）

㊑治胎動不安。腹痛下黃汁。黃耆、川芎、麪各一兩。糯米一合。水一升。煎半升。分服。（婦人良方）

㊒治陰汗溼痒。綿黃耆酒炒爲末。以熟豬心點喫。妙。（濟急方）

㊓治痒疽內固。黃耆、人參各一兩。爲末。入眞龍腦一錢。用生藕汁和丸。綠豆大。每服二十丸。溫水下。日日服。（本事方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡非氣虛而表裏有實邪者禁用。惡龜甲、白鮮皮。長防風、茯苓爲之使。

著名方劑　㊀玉屏風散。治自汗不止。氣虛表弱。易感風寒。（潔古方）黃芪（炙）防風各一兩。白朮（炒）三兩。共研末。服。㊁保元湯。治小兒慢驚痘證。險惡不起。以及虛寒雜病。（東垣方）黃芪三錢。人參二錢。炙甘草一錢。生薑一片。肉桂（春夏二三分。秋冬六七分）。水煎服。

參攷資料　㊀黃耆治氣虛盜汗并自汗及膚痛。是皮表之藥。治咯血。柔脾胃。是中州之藥。治傷寒尺脈不至。補腎臟元氣。是裏藥。乃上中下內外三焦之藥也。（王好古）㊁黃耆補元氣。肥白而多汗者爲宜。若面黑形實而瘦者服之。令人胸滿。宜以三拗湯瀉之。（朱震亨）㊂黃耆、防風。世多相須而用。唐許胤宗爲新蔡王外兵參軍。王太后病風。不能言。脈沉。難對醫。告衛窮胤宗曰。餌液不可進。卽以黃耆、防風、麥湯數十斛。置床下。氣如霧熏蒸之。是夕語。（本草衍義）㊃黃耆出隴西者。溫補。出白水者。冷補。又有赤色者。可作膏用。消癰腫。（陶弘景）㊄凡虛而有客熱者。用白水黃耆。虛而有客冷者。用隴西黃耆。（陳藏器）㊅黃耆藥中補益。呼爲羊肉。（一）白水者涼。無毒。排膿活血。及治煩悶熱毒。骨蒸。（二）赤水者涼。無毒。治血退熱毒。（三）木者涼。無毒。治煩排膿之力較遜。（大明日華本草）㊆黃耆甘溫純陽。其用有五。補諸虛不足一也。益元氣二也。壯脾胃三也。去肌熱四也。排膿止痛。活血生血。內托癰疽。爲瘡家聖藥五也。又補五臟諸虛。治脈弦自汗。瀉陰火。去虛風。無汗則發之。有汗則止之。（張元素）㊇防風能制黃耆。黃耆得防風其功愈大。乃相畏而相使也。（李東垣）㊈凡氣實內塞。胸膈閉悶。腸胃有積滯及多怒。肝氣不和者。勿服。其陽盛陰虛。上焦熱甚。下焦虛寒者忌之。痘瘡血分熱甚者禁用。（繆仲淳）㊉黃耆獨莖叢生。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

作葉扶疏。百本戴在首。如衛氣出目行頭。（衛出下焦其行始晴明穴）自上而下。從外而內。百骸百脈。咸衛外而固矣。其行可久可速。能知衛氣出入之道路。便能了知黃芪之功用矣。（盧不遠）

【黃茶菊】命名 本品卽茶菊之黃花者故名。

採取 以紫蒂者爲佳。

性質 苦。微甘。平。無毒。

主治 去風明目。搜肝氣。發肺腎。治頭暈目眩。補血潤容。入血分。

【黃荊】卽蔓荊子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蔓荊子』條。

【黃荊實】卽牡荊實之古籍別名。典見圖經本草。詳『牡荊實』條。

【黃草】㊀卽蘆草之古籍別名。典見吳普本草。詳『蘆草』條。㊁卽艾葉之古籍別名。典見埤雅。詳『艾葉』條。

【黃骨魚】卽黃鰂魚之古籍別名。典見綱目。詳『黃鰂魚』條。

【黃婆婆】卽胡頹子之古籍別名。典見綱目。詳『胡頹子』條。

【黃梅】卽迎春花之日本名。詳『迎春花』條。

【黃梅花】卽蠟梅花之古籍別名。典見綱目。詳『蠟梅花』條。

【黃梔子】卽山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【黃礬砂】卽石硫黃之古籍別名。典見藥性。詳『石硫黃』條。

【黃脰雀】卽巧婦鳥之古籍別名。典見綱目。詳『巧婦鳥』條。

【黃袍】卽鶺之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『鶺』條。

【黃連】命名 本品根如連珠而色黃。故名。

處方用名 川黃連。小川連。川雅連。川連。上川連。雅連。古勇連。眞川連。

古籍別名 王連。（本經）支連。（藥性）水連。（名彙）宣連。上草。棟連。淨黃連。滴膽芝。（和漢藥考）

學名 Coptis teeta, Wall.

外國名稱 Radix coptidis, （拉丁）Coptis-root.（英）Koptis würzel.（德）

基本 黃連屬毛茛科。此係採掘其曾經七八年之根莖。去鬚根曬乾而用之者。

產地 黃連爲治療上之要藥。隨地皆產。且有野生種植之別。惟四川野生者爲最佳。故名川連。茲將其產別形態。詳別於下。四川峨嵋山產者。曰峨嵋連。蘆瞼而綠。刺硬皮黃。切開空心。有菊花紋。金黃色者爲最上品。潼州野生者。曰潼州連。蘆頭中空而圓。有硬刺色黃帶青。頭尾均勻。切開亦有菊紋亦佳。馬湖所出者。亦瞼蘆硬刺。皮色青帶黑。首尾一樣有節。均爲佳。紫岩溝瓦屋山出者。瘦小有蜂腰。皮毛柔。瞼蘆硬刺。亦佳。以上皆野山出品。打箭爐出者。亦曰水連。皮黑刺少。無蘆頭。有杈枝。色黃略次。重慶種出者。曰毋珠連。硬蘆而扁頭粗。尾細。色黃更次。峒山種出者。曰峒連。蘆扁硬刺。略瞼。色黃。切開空鬆者。亦次。四川石柱。酆種出者。曰味連。形似鷄爪。連亦次。嘉定管高廟所出者。曰嘉定連。俗名毋連。種後五年出土。皮如鱗甲。肉色黃而帶紅。亦次。南川金佛山產者。曰金山連。蘆長連少亦次。岡山種出者。曰岡連。皆次。以上皆四川產也。雲南野出者。曰雲景連。體鬆蘆瞼。形似鴨脚爪。皮黑肉色黃。亦次。種者蘆硬刺瞼。更次。廣西產者。曰新山連。皮光色黃。質重。斷則淡黃色。甚次。處州出產。曰土連。皮色黃肉實。心淡色。味雖苦。兼甜。亦極次。劣。奇會工出者。曰會連。形似毋連。皮略黑。肉空鬆。乃馬所食。不入藥用。鷄屎連。色黑。細小。斷則綠色而淡。亦極次。劣。不入藥。近有日本產者。曰洋連。形色與川連相同。皮光而毛刺。肉黃。取汁可爲染色。故又曰色連。性更次。劣。不堪入藥。自雲連至洋連。終俱屬側路僞品。服之甚爲害人。望藥界注意爲幸。

形態 ㊀黃連爲生長山野宿根草。其種類甚多。莖高自二三寸至尺餘。四時不凋。春季於舊葉旁抽花莖。其上部簇生白色花。葉由種類而異。而其載於日本藥局方。以 Coptis anemonaefolia S. et Z. 及其他 Coptis 屬根莖充之。其形態以丹波黃連規定之。載於日本藥局方者如次。黃連。粗約一至五寸。密米。長約至四仙米。多彎曲。有細小多數副根。處處有疣狀隆起。外面呈黃灰色。破折面尖銳。粗糙。橫斷面則現出厚暗橙黃色

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之皮部及淡黃色之木部。木部中有大髓心。或髓心空洞。本品無臭而味極苦。



黃連

種類　㈠菊葉黃連（Coptis anemonaefolia S. et Z.）葉類菊葉。早春抽莖。長四寸至一尺許。分出數梗。皆互生。每梢開白花。花後生新葉。㈡芹葉黃連一名長葉黃連（Coptis brachypetala, S. et Z.）爲二回羽狀複葉。類芹葉。㈢細葉黃連（Coptis brachypetala, S. et Z. Var pygmaea. Miq.）爲數回羽狀複葉。爲前者之變種。㈣大葉黃連一名薩摩黃連（Coptis orientalis, Maxim.）葉類菊葉而粗大。㈤五加葉黃連一名梅花黃連（Coptis quinquefolia, Miq.）葉爲五片狀小葉。似五加葉而小。㈥三葉黃連一名酷漿草黃連（Coptis trifolia, Salisb.）莖高二三寸。葉爲倒卵圓形三小葉。邊緣有銳齒。

種植　栽培黃連。有分根栽培。與下種栽培二種之別。分根栽培者。以其株下根部。分其根而植之也。下種栽培者。以其種子播下於地。而後漸漸生長者也。總之分根與下種。無甚差異。不過分根取其生長速。下種取其種實多而已。欲栽培者。皆可取其法而行之。㈠氣候及適地。栽培黃連。氣候以溫和少寒冷者爲最適。若寒冷過甚地方及熱帶地方。均不適其生長。土質則澀潤之砂質土爲最佳。次之則腐植質土。尚能生育。餘若黏土、重黏土、石灰土等。皆不能生長也。故氣候土質。爲栽培黃連者應究之事項。否則不察氣候。不辨土質。而妄栽於不適之土地。不宜之氣候。則徒耗多量之資本。費多時之勞力。恐難得其良果也。㈡產地及種類。黃連產地甚少。吾國僅揚子江一帶。如湖北安徽四川等地方。略有產出。然其品質。不無優劣。產於四川者爲最佳。產於湖北者次之。產於安徽者爲最劣。故藥品上所用黃連。以四川爲最多。爲其品質優佳。凡黃連所需要之氣候土質。正適其當也。至於種類。以產出地名之。㈢治地。耕起砂質地之土塊。使之細碎。而後可以作畦。若不作畦。則排水須易。不使停滯積水。若排水不易。積水停滯。則土中之空氣難以流通。有礙黃連之生長。以致結果不良。以上所述。乃分根栽培之治地也。下種栽培則否。先作冷床。而後播種於其中。迨其稍長。再移植於他土。㈣栽種。欲以分根栽培黃連者。於秋時分其根。而栽培於砂質土中可也。種子栽培者。治地作床。既畢之後。下種於冷床中疎鬆之。以待春期之假植也。假植之後。苗生長至二三年。然後於秋時八九月之交。乃作畦以移植之。畦幅三尺五寸至四尺五寸。株與株相隔約一尺。㈤管理。黃連爲木本植物。其管理較草本植物爲易。故除草等項。可毋庸十分注意。惟有暇時除之。則更佳。㈥施肥。黃連所需肥料。以堆肥油粕二種爲主。餘若窒素燐酸加里等肥料。皆不適於黃連之生長。故可不施。每黃連一畝地積。當需堆肥二百斤左右。用油粕約五十斤左右。且未施以先。堆肥與油粕二肥。互相混和堆積之。以待其腐熟。而後施之。時期分三次。第一次在下種後施之。第二次在假植後施之。第三次在移植後施之可也。㈦收穫調製。收穫之期。在定植後四五年。於秋季八九月之間採收之。既刈穫後。去其毛根。不可洗滌。卽曝於日中。待乾燥之後。藏於木製之箱中。而置於高燥處。以待市價可也。㈧計算。因栽培之巧拙。亦有優劣之分。優者每畝之收量。約百餘斤。劣者亦可得七八十斤。其價以品質之優劣而定。且其市價。又不一律。故不贅述。

採取　七八月間根繁。乃堪採之。

製法　雷敩曰。凡使黃連。以布拭去肉毛。用漿浸二伏時。漉出。於柳木火上焙乾用。李時珍曰。五臟六腑皆有火。平則治。動則病。故有君火相火之說。其實一氣而已。黃連入手少陰經。爲治火主藥。本臟火則生用。治肝膽實火。則以猪膽汁浸炒。治肝膽虛火。則以醋浸炒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

治上焦火。則以酒炒。治中焦火。則以童汁炒。治下焦火。則以鹽水炒。或朴硝炒。治氣分濕熱火。則以萊菔湯浸炒。治血分塊中伏火。則以乾漆水炒。治食積火。則以黃土炒。諸法不獨爲之引導。蓋辛熱能製其苦寒。鹹寒能制其燥性。在用者詳酌之。

性質　苦。寒。無毒。

成分　黃連含有『祕魯培林』(Berberin $C_{20}H_{17}NO_4$)與格倫僕根中所含主成分相同。故其效用亦與格倫僕根同。祕魯培林爲美麗、微細、黃色星狀結晶體之植物鹽基。無臭而味極苦。對於試驗紙呈中性反應。冷水及冷酒精難溶。但用溫湯及溫酒精。則易溶而成黃色液。將其熱至百度。初變赤色。終復返爲黃色。若再加高熱。則分解發出黃色蒸氣。

效能　清心火。燥脾濕。涼血。消熱。厚腸。止瀉。用作瀉火燥濕之健胃藥。又治胃酸缺乏之消化不良症。初期赤痢。慢性腸炎。瀰膿眼等。

作用　加增胃液之不足。使消化機能亢進。又能刺激脈管運動之中樞神經。而使腸壁之脈管收縮。如與痢病菌相遇。有制其繁殖力。并能限止其本身之活動力。

主治　熱氣目痛。皆傷泣出。明目。腸澼。腸痛。下痢。婦人陰腫痛。久服令人不忘。(本經)又主五臟冷熱。久下洩澼。膿血。止消渴。大驚。除水利骨。調胃厚腸。益膽。並療口瘡。(別錄)

張仲景之發明　黃連一味。經張仲景之實驗。認爲主治中心煩悸。旁治心下痞。吐下。腹中痛。茲考徵如下。㈠黃連阿膠湯證曰。心中煩。不得臥。(以上黃連四兩)㈡黃連湯證曰。胸中有熱。腹中痛。欲嘔吐。㈢乾薑黃連黃芩人蔘湯證曰。吐下。㈣葛根黃連黃芩湯證曰。利遂不吐。㈤白頭翁湯證曰。下利欲飲水。(以上黃連皆三兩)㈥大黃黃連瀉心湯證曰。心下痞。按之濡。㈦瀉心湯證曰。心氣不足。㈧附子瀉心湯證曰。心下痞。(以上黃連皆一兩。而亦三兩之例)歷觀上諸方。黃連治心中煩悸也明矣。故心中煩悸而痞者。吐者。利者。腹痛者。用此皆治也。此外用黃連一兩方多。其比餘藥分量差少。但舉心胸之微疾。不足取而徵爲。故不枚舉也。

歷代記述弦證　【唐】陳藏器本草拾遺論黃連曰。治羸瘦氣急。【宋】大明日華諸家本草論黃連曰。治五勞七傷。益氣。止心腹痛。驚悸煩躁。潤心肺。長肉。止血。天行熱疾。止盜汗。并瘡疥。豬肚燕爲丸。治小兒疳氣。殺蟲。【金】張元素珍珠囊論黃連曰。治鬱熱在中。煩躁惡心。兀兀欲吐。心下痞滿。【元】王好古湯液本草論黃連曰。主心病逆而盛。心積伏梁。【明】李時珍本草綱目論黃連曰。去心窠惡血。解服藥過劑煩悶。及巴豆輕粉毒。【明】李士材本草圖解論黃連曰。黃連苦寒入心。爲治火之主藥。瀉心火而除痞滿。療痢疾而止腹痛。清肝膽而明耳目。祛濕熱而理瘡瘍。利水道而厚腸胃。去心窠之惡血。消心積之伏梁。愚謂黃連大苦大寒。行陰冬嚴殺之令。譬如聖世不廢刑威。惟不得已而後敢用。若概施之。則暴虐甚而德意窮。民不堪命矣。喜用寒涼者。尙其戒諸。黃連止入心家。言清肝膽者。實則瀉子之法也。清心火者。生用。清肝膽火者。臭茱萸拌炒。上焦之火。宜酒炒。下焦之火。宜鹽水炒。中焦之火。宜童汁炒。蓋辛熱能制其苦寒。鹽潤能制其燥。耳【明】繆希雍本草經疏論黃連曰。黃連氣味苦寒而無毒。味厚於氣。味苦而厚陰也。宜其下洩。欲使上行。須加引導。入手少陰陽明。足少陽厥陰。足陽明太陰。爲病酒之仙藥。滯下之神草。六經所至。各有殊功。其主熱氣目痛。皆傷淚出。明目大驚。益膽者。涼心清肝膽也。腸澼腹痛下痢。別錄兼主泄澼者。瀉利也。澼者。大腸下血也。俗呼爲臟毒。除水利骨。厚腸胃。療口瘡者。滌除腸胃。脾三家之濕熱也。久服令人不忘者。心家無火則清。清則明。故不忘。禪家習定多飲苦茗。亦此義爾。【清】黃宮繡本草求眞論黃連曰。黃連大苦大寒。據書所載治功。備極表著。且以別錄中有厚腸胃一語。互爲傳播。以至於今。謬尤莫闢。貽害無窮。詎知黃連止屬瀉心之品。除濕之味。卽云腸澼能止。口乾能除。痞滿腹痛能

477／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

消。癰疽瘡瘡能愈。肝虛能鑽。與婦人陰蝕。小兒疳積。並火眼赤痛。吐血衄血諸瘧等症。亦無不由此調治。亦何莫不因瀉熱火退而言。豈於瀉除火退之外。尚有治效之著哉。況此性寒純陰。在人腸胃素厚。挾有燥濕火熱。服之過多。尚有偏性爲害。而致胃陽頓絕。生氣澌滅。矧有脾陽素弱。因此一言流播。而可恃爲常服者乎。今人一見火熾。不論是寒是熱。是虛是實。輒以取投。以致偏勝貽害。暗受天折。殊堪嘆惜。出四川瘦小狀類鷹爪連爪連珠者良。薑汁炒【清】鄒澍本經疏證。論黃連曰。徐洄溪曰。苦屬火。性皆熱者。常理也。黃連至苦而反至寒。則得火之味。與水之性。故能除水火相亂之病。水火相亂者。瀉熱是也。是故熱氣目痛。胥傷淚出。目不明。乃瀉熱在上。腸澼腹痛下利。乃瀉熱在中。婦人陰中腫痛。乃瀉熱在下者。悉能除之矣。凡藥能去瀉者。必增熱。能除熱者。必不能去瀉。惟黃連能以苦燥濕。以寒除熱。一舉而兩得焉。黃連根株叢延蔓引相屬。有數百株共一莖者。故名連。其治亦多蔓延淹久之證。如浸淫瘡。黃連粉主之是矣。夫名浸淫。則非初起暴得之疾。亦非一治可瘳之候。故傷寒論金匱要略兩書。從未有新得之病用黃連者。黃連根。黃花黃實。黃皆具土色。四月開花。六月結實。七月根緊。適逢太陰濕土陽明燥金主令時。宜乎爲入脾胃之藥矣。乃仲景諸瀉心湯。以之爲關鍵何歟。夫仲景溯諸瀉心湯證之源。曰病發於陽。而反下之。熱入因作結胸。病發於陰。而反下之。因作痞結胸。稱熱入痞不稱熱入。可見所入之邪。非陽邪矣。陰邪結於陽位。心下痞硬。非心病而何。心自病。不能燥土。土遂不運。而乾噫食臭。乾嘔心煩。下利矣。腹中雷鳴者。心氣被遏。不能上行。下走腸間也。夫心之爲體。於卦象離。今被邪逼。則外陽內伐。內陰騰沸。故半夏甘草生薑三瀉心湯。治陰邪之未化者也。大黃黃連附子二瀉心湯。治陰邪之已化者也。陰邪已化。不逼心陽。則在內之沸亂略定。惟在外之邪氣尚阻。則取二黃之泄熱。湯去其邪。邪去正自安矣。惡寒汗出者。在上之陰邪纔化。在下之陰氣復逆。故輕取二黃之氣。以蕩熱除穢。重任附子之威。以追逐逆陰。使之異趨同歸相成。而不相背也。其未化者。陽餒胸於陽位。而恣肆於陰分。邪盤踞於清道。而潰泄於下焦。非乾薑半夏生薑之振散陰霾。不足以廓清心之外郭。非人蔘黃連之養陰泄熱。不足以安撫心之內訌。然則直謂之補心可也。而曰瀉心何哉。夫稱謂當循其實。補者益其虛。瀉者泄其實。今者明因邪氣入伐。心臟內訌。若曰補則嫌於無邪矣。顧可乎。本經所謂腸澼腹痛下利者。與此正同。蓋腸澼腹痛下利。多發於夏秋濕熱之交。盛暑之時。心氣發舒。其驗在汗。所謂汗爲心液也。當此之時。或由口食寒膩。阻遏其發舒之氣。或由乘風取涼。使汗不得暢。於是火鬱於中。陰凝於外。因遂生濕。濕復生熱。寒熱與濕。膠輾膠固。故後世所製香連丸。香連等法。均仿此意爲之。傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛欲嘔吐者。黃連湯主之。少陰病二三日已上。心中煩。不得臥。黃連阿膠湯主之。二方皆以黃連爲君。二證皆發於心。可見黃連爲瀉心火之劑矣。成無己曰。陰不得升。獨治於下。爲腹中痛。陽不得降。獨治於上。爲胸中熱。欲嘔吐。夫陰之升。其體由腎。其用由肝。陽之降。其源由肺。其責由心。然脾胃爲升降之樞。脾提腎肝之氣以升。胃曳心肺之氣而降。故治陰之不升。必兼治脾。治陽之不降。必兼治胃。是於黃連湯又可參黃連爲心胃之劑。嘔吐爲胃病。故後世治嘔用黃連。其效最捷。蓋上升皆火之變。見入身之火。惟欲其降。升則爲病。即所謂諸嘔吐酸。諸逆沖上。皆屬於火者也。尤在涇曰。陽經之寒變爲熱。則歸於氣。陰經之寒變爲熱。則歸於血。陽經之熱。或有歸於血者。惟陰經之熱。則必不歸於氣。故三陰有熱結證。不用調胃承氣小承氣。而獨用大承氣。諸下利證不已。必便膿血。是其驗也。心中煩。不得臥。熱證也。至二三日已上。乃心中煩。不得臥。則非始即屬熱矣。始即屬熱。心中煩。不得臥者。爲陰虛。陰虛則不得瀉火。今至二三日已上始見。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

則爲陽盛。陽盛則宜瀉火。然致此陽盛。亦必其陰本虛。故阿膠芍藥雞子黃無非救陰之品。瀉火則惟特芩連。而芩止一兩。連乃四兩。此黃連之任獨冠一方。無可議矣。通二方而觀。又可悟黃連一味。在黃連湯爲溫劑中寒藥。在黃連阿膠湯爲補劑中瀉藥矣。【淸】賈九如辨藥指南論黃連曰。黃連味苦。苦能燥濕而去垢。性寒。能勝熱而不滯。善理心脾之火。凡口瘡牙疼。耳鳴目痛。煩躁惡心。中焦鬱熱。嘔吐痞閉。腸澼下痢。小兒疳積。傷寒吐蛔。諸痛瘡瘍。皆不可缺。入香連丸。祛腸中積滯。有厚腸之功。入吳茱丸。除吞吐酸水。有淸胃之力。此皆一寒一熱。陰陽相濟。最得制方之妙。若喜製以和其寒。少變其性。引至熟所。不至抵悟。則能止嘔。酒炒。引上焦淸頭目。豬膽拌炒。瀉肝膽火。畢炒黑用。脾虛熱瀉。獨爲妙劑。生用癰腫解毒。尤其所宜。但胃中停食及胃虛作嘔。傷寒下早致痞。皆宜禁用。

國外學說　日本藥學博士猪子吉人氏言其根中含有祕魯培林（Berberin $C_{20}H_{17}NO_4$）。與格倫僕根中所含主成分相同。故其效用。亦與格倫僕根同。祕魯培林爲美麗微細黃色星狀結晶體之植物鹽基。無臭而味極苦。並言其根中。平均含有一五%。又用普通煎法。其湯中含有九%。其醫治之用。試驗於動物。見有收縮子宮之作用。因其有制酵及收斂作用。故對目膜腸胃之炎證。確能奏效。據臨床經驗。以諸般消化器病及腸加答兒。最爲奏效。且爾貝林爲一種亞爾加魯兒度。廣存於植物界中。在一八三五年始經普西納爾氏自 Berberis vulgaris, L. 中發現。依原植物之名。始命名爲貝爾貝林（Berberin）。溫度至攝氏百二十度時。則熔融變爲赤褐色之樹脂樣物。而依須密都氏及西路巴哈氏（Arch. d. pharma. 1887. Heft. 4.）之研究。謂貝爾貝林之鹹性液中。加過錳酸加里。酸化時。則能發生可令人注目之一種分解產物。卽 Hemipinsäure 而在 Gmelin; Handb. d. Organ. Chem. IV. anft, 4. p. 336 中則載有雅片鹽基納爾科琴（Narcotin）酸化時亦發生 Hemipinsäure。如此則 Berberin 與 Narcotin 在化學上既有如斯之關係。而在生理作用似亦應有相當之關係也。依佛爾古氏（Falk: 1554）就家兎之研究曰。投以致死量〇・五乃至一・〇瓦時。則呼吸起障礙。後肢痺痲。終陷於搐弱而死。然後再又與 Gmelin 等就犬重複試驗。則雖用至二・七五瓦亦不能致死。故 Gmelin 氏在其有機化學第四卷中則記 Berberin 爲無毒之物質。且爾貝林對人體之毒亦甚輕微。不足介意。況且依且爾古路及普西納路兩氏謂其〇・二至〇・六具有亢進食慾之功效。依基電路氏研究曰。且爾貝林雖有制止醱酵作用。而毫無防腐作用。黃連中雖無鞣酸而有收斂作用。槪屬貝爾貝林之功也。普西納爾嘗用黃連爲健胃藥。特別是對於熱性病之恢復期有效。其外如消化不良。胃病各種下痢加答兒性黃疸等皆有功效。一回常用其一・二至一・八製成煎劑九〇・〇用之。由是觀之。我國古時治目。治痢用黃連之所以有效者明矣。卽因黃連之有效成分貝爾貝林有收斂作用。故對於眼目之炎性疾患有效。因其有制酵及收斂作用。故能奏止泄之功。況且依包路氏（Pohl）謂一般苦味質藥皆能刺戟腸黏膜。及其附近之淋巴裝置。使淋巴球卽白血球增殖亢進人體之防禦力。而黃連卽屬一種苦味藥。當然亦能使白血球增殖亢進其止痢之功效也。而黃連因其刺戟腸黏膜及其附近之淋巴裝置之作用。故亦能增進食慾。能亢進其吸收作用。此黃連在今日醫界。猶能保存其地位。在歐美藥制中之所以收爲苦味健胃止泄劑也。

辨僞　㊀鄭肖巖曰。黃連僞名廣連。卽洋川連。色不黃。中有花點。皮黑而有毛。按黃連以四川雅州出者爲佳。故名雅連。形如雞距。故又名雞爪連。氣味苦寒。色極黃。易於辨識。近有辨峨眉山所產者。價值甚昂。漳泉人最喜購之。若此種

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

廣連。色不黃則名不稱。性味既殊。功用自劣。誤服之則貽害多矣。㊁寶炳章曰。按黃連背陰草根也。苗似茶叢。經冬不凋。生於深山窮谷。幽僻無日照之處。必得凝寒之氣者爲上。八九月出新種類甚多。隨地皆產。且有野生種植之別。惟四川野生者多佳品。爲治療上之要藥。

近人學說　㊀顧子靜曰。黃連爲毛茛科植物黃連之根莖。秋日採集。除去鬚根。而乾燥用之。色黃無臭。氣味頗苦。日本猪子氏施精密試驗。得下之結論。(一)黃連之有效成分。爲備利備林。(二)備利備林於諸種之消化器病最有效。(三)黃連之療治器病功效甚著。片山寬助氏謂虎列拉(卽霍亂)之初期。用黃連三分至五分。以一茶杯水煎出一次服食。一日五六次。有特效。高橋正純氏謂腸炎用黃連一錢。煎一茶杯水。分四次。一日服下。頓止。二三日全治。數多之患者試用。均有良效。豐村讓氏謂黃連之功效有四。(一)大人及小兒之急性腸炎。用黃連四分。煎一茶杯水。分三次。一日服。有大效。(但此爲成人量。小兒宜按年齡酌減)小兒並無中毒之恐。(二)赤痢最初一二日間。投下劑後。與黃連有效。(三)腸窒扶斯(卽傷寒)之下痢。亦由黃連而治。(四)腸結核(亦稱腸癆)之下痢。用黃連亦得美滿之結果。黃連之用量。一日量。約爲一分五釐至四分五釐。㊂張山雷曰。黃連苦寒。所主皆濕積熱鬱之證。目痛眥傷泣出。濕熱之鬱於上者也。目爲肝之竅。肝家鬱熱。目爲之病。苦寒清肝。則目自明。腸澼腹痛。乃膿血交黏之滯下病。澼古止作辟。卽幃裳襞積之襞。故辟字有積聚之義。腸辟者。謂腸間積聚之濕熱也。燥濕清熱。故黃連爲治療滯下之主藥。下痢則泄瀉也。惟泄瀉之病。有因於暑熱。亦有因於脾虛。暑熱者。宜苦以堅之。而脾虛則非其治矣。婦人陰中腫痛。亦濕滯熱鬱證也。別錄主五臟冷熱。久下洩澼膿血。卽本經之腸澼也。消渴爲胃腸之熱證。大黃爲心月之熱證。苦寒清熱。是以主之除水者。以熱結之水道不通。言之非通治脾胃虛寒之水病也。利骨者。苦以堅之耳。調胃厚腸。謂泄化濕熱。而腸胃調和。益膽者。清肝熱。卽所以祛膽邪。卽上文主大驚之意。療口瘡者。亦清脾胃之熱邪也。又曰。黃連大苦大寒。苦燥濕寒勝熱。能泄降一切有餘之濕火。而心脾肝腎之熱。膽胃大小腸之火。無不治之。上以清風火之目病。中以平肝胃之嘔吐。下以通腹痛之滯下。皆燥濕清熱之效也。又苦先入心。清滌血熱。故血家諸病。如吐衄溲血。便血淋濁。痔漏崩帶等證。及癰瘍瘡疹丹毒。並皆仰給於此。但目疾須合泄風行血。滯下須兼行氣導濁。嘔吐須兼鎮墜化痰。方有捷效。僅恃苦寒。亦不能操必勝之券。且連之苦寒。尤以苦勝。故燥濕之功獨顯。凡諸證之必需於連者。類皆濕熱鬱蒸。恃以爲苦燥泄降之資。不僅以清熱見長。凡非舌厚苔黃膩濁滿布者。亦不任此大苦大燥之品。卽瘡瘍一科。世人幾視爲陽證通用之藥。實則惟疔毒一證。發於實火。需連最多。餘惟濕熱交結。亦所恒用。此外血熱血毒之不挾濕邪者。自有清血解毒之劑。亦非專恃黃連。可以通治也。

配合應用　㊀治瘡癰已透而煩躁不止有神。用黃連同赤櫨木葉入三黃石膏湯。㊁治盜汗有神。用黃連入當歸六黃湯加棗仁、龍眼。㊂治風熱上攻。目赤痛。用黃連同地黃、甘菊、荊芥穗、甘草梢、萼翹、柴胡、蟬蛻、木通。㊃黃連末一兩。同雄羊肝一具生搗勻。衆手丸如桐子。每服以滾漿水吞廿一丸。諸眼目疾及障翳青盲。皆主之。禁食豬肉、雞油汁亦勿入口。作六劑必效矣。㊄黃連同當歸、甘菊花、人乳浸蒸。入明礬銅綠各少許。洗目甚效。㊅治一切滯下膿血。用黃連同芍藥、蓮子、蠶豆、升麻、甘草、滑石、紅麴。㊆治滯下純血。腹痛。用黃連同桃花、枳殼、乳香、沒藥。㊇治小兒一切疳熱。用黃連同五穀蟲、廬薈、白蕪荑、青黛、白檀花、白芙蓉花、如神。㊈黃連同赤小豆爲細末。傅痔

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瘡妙

㈤治痔瘻後泄瀉。用黃連同乾薑、甘草、升麻、芍藥。

㈠治酒病酒傷。用黃連同五味子、麥門冬、乾葛神效。

㈡治口糜口瘡。用黃連同五味子、甘草煮濃汁漱口良。

㈢治卒消渴。小便多。用黃連同麥門冬五味子。

㈣治盧人患滯下。及老人產婦滯下不止。用黃連、人參、蓮子。

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡病人血少氣虛。脾胃薄弱。血不足以致鬻悸不眠。而兼煩熱燥渴。及產後不眠。血虛發熱。泄瀉腹痛。小兒痘瘡。陽虛作泄。行漿後泄瀉。老人脾胃虛寒作瀉。陰虛人天明瀉泄。病名腎泄。眞陰不足。內熱煩躁。諸證禁用。惡菊花、玄參、白蘚皮、芫花、白殭蠶、畏款冬、牛膝、忌豬肉、黃芩、龍骨爲之使。

著名方劑　㈠左金丸。治肝臟火實。左脇作痛者。（丹溪）黃連六兩。吳茱萸一兩。上爲細末。粥丸。煎白朮、橘皮湯下。㈡黃連散。治大人小兒熱氣盛。熱乘於血。血乘熱氣溢於鼻。衄血。得寒則凝。瀝結聚。得熱則流散。妄行。黃連、黃芩、柏葉、甘草各等分。爲末。煎去滓。溫服。㈢香連丸。治一切痢疾。黃連五兩。甘草三兩。上以蜜水略拌。澄置鍋中。重湯蒸。良久。取出晒乾。如此者九次。㈣入木香一兩。爲末。糊丸。㈤小陷胸湯。治病在心下。按之則痛。脈浮滑者。（傷寒論）黃連一兩。半夏（洗）半升。栝蔞實一個。三味。水六升。先煮栝蔞。取三升。去滓。納諸藥。煮取二升。去滓。分溫三服。㈥三黃湯。治三焦實熱。一切有餘火症。及大便祕結者。（本事方）黃連、黃芩、大黃各等分。水煎服。

參攷資料　㈠黃連性寒。味苦。氣味俱厚。可升可降。陰中陽也。入手少陰經。其用有六。瀉心臟火一也。去中焦溼熱二也。諸瘡必用三也。去風溼四也。赤眼暴發五也。止中部見血六也。張仲景治九種心下痞。五等瀉心湯。皆用之。（張元素）㈡黃連苦燥。苦入心。火就燥。瀉心者。其實瀉脾也。實則瀉其子也。（王好古）㈢黃連去中焦溼熱。而瀉心火。若脾胃氣虛。不能轉運者。則以柴苓、黃芩代之。以豬膽汁拌炒。佐以龍膽草。則大瀉肝膽之火。下痢胃口熱。禁口者。用黃連人參煎湯。終日呷之。如吐再強飲。但得一呷下咽便好。（朱震亨）㈣古方以黃連爲治痢之最。蓋治痢之宜辛苦寒藥。辛能發散。開通鬱結。苦能燥溼。寒能勝熱。使氣宣平而已。諸苦寒藥多泄。惟黃連兼性冷而燥。能降火去溼。而止瀉痢。故治痢以之爲君。（張元素）㈤今人多用黃連治痢。蓋執以苦燥之義。下俚。但見腸虛滲泄。微似有血。便即用之。又不顧寒熱多少。惟欲盡劑。由是多致危困。若氣實初病熱多。血痢服之。便止。不必盡劑。虛而冷者。愼勿輕用。（寇宗奭）㈥諸痛瘙瘡。皆屬心火。凡諸瘡宜以黃連當歸爲君。甘草黃芩爲佐。凡服暴發赤腫痛。不可忍者。宜黃連當歸以酒浸煎之。宿食不消。心下痞滿者。須用連枳。（李杲）㈦黃連治目方多。而羊肝丸尤奇異。今醫家洗眼。以黃連當歸芍藥等分。用雪水。或甜水煎湯。洗之。冷卽再溫。甚益眼目。但是鳳毒赤目花翳用之。無不神效。蓋眼目之病。皆是血脈凝滯使然。故以行血藥合黃連治之。血得熱則行。故乘熱洗也。（蘇頌）㈧火分之病。黃連爲主。不但瀉心火。而與芩蘗諸苦藥列稱者。此也。比目疾人。以人乳浸蒸。或點或服之。生用爲君。佐以官桂少許。煎百沸。入蜜空心服之。能使心腎交於頃刻。入五苓滑石。大治夢遺。以黃土罈汁酒蜜四炒爲君。以使君子爲臣。白芍藥酒煮爲佐。廣木香爲使。治小兒五疳。以萊菔炒。加木香等分。生大黃倍之。水丸治五痢。此皆得制方之法也。（韓懋）㈨黃連治目及痢爲要藥。古方治痢香連丸。用黃連木香。薑連散。用乾薑黃連。變通丸。用黃連萊菔。薑黃散。用黃連生薑。治消渴。用酒蒸黃連。治伏暑。用酒煮黃連。治下血。用黃連大蒜。治肝火。用黃連萊菔。治口瘡。用黃連細辛。是一冷一熱。一陰一陽。寒因熱用。熱因寒用。君臣相佐。陰陽相濟。最得制方之妙。所以有成功而無偏勝之害也。（李時珍）㈩本經別錄。並無黃連。久服長生之說。惟陶弘景言道方

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

久服長生。神仙傳載。封君達黑穴公。並服黃連五十年。得仙。竊謂黃連大苦大寒之藥。用之降火燥溼。中病即當止。豈可久服。使腸綏之令常行。而伐其生發沖和之氣乎。素問載岐伯言。五味入胃。各歸所喜。攻久而增氣。物化之常也。氣增而久。天之由也。王冰註云。酸入肝爲溫。苦入心爲熱。辛入肺爲清。鹹入腎爲寒。甘入脾爲至陰。而四氣衆之。皆增其味。而益其氣。故各從本臟之氣爲用。所以久服黃連苦參反熱從火化也。餘味皆然。久則臟氣偏勝。即有偏絕。則有暴天之道。是以絕粒服餌之人。不暴亡者。無五味偏助也。又秦觀與喬希聖論黃連書云。聞公以眼疾。餌黃連至十斛。雨猶不已。殆不可也。醫經有久服黃連苦參反熱之說。此雖大寒。其味至苦。入胃則先歸於心。久而不已。心火偏勝。則熱乃其理也。況眼疾本於肝熱。肝與心爲子母。心火也。肝亦火也。腎孤臟也。人愚一水不勝二火。豈可久服苦藥。使心有所偏勝。是以火救火。其可乎。秦公此書。蓋因王公之說而推詳之也。我明蔣端王素多火病。醫令服金花丸。乃苓連梔檗四味。餌至數年。其火愈熾。遂至內障喪明。觀此則寒苦之藥。不但使人不能長生。久則氣增偏勝。速天之由矣。當以素問之言爲法。陶氏道書。久服長生之說。皆謬談也。誤人最甚。醫宜知之。楊士瀛云。黃連能去心竅惡血。（李時珍）

【黃連芽】卽黃練藤芽之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃練藤芽』條。

【黃連祖】卽淫羊藿之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『淫羊藿』條。

【黃連頭】卽黃練藤芽之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃練藤芽』條。

【黃雀】卽雀之小而黃口者。典見綱目。詳『雀』條。

【黃雀花】卽金雀花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金雀花』條。

【黃魚】卽石首魚之處方用名。詳『石首魚』條。

【黃魚】卽鱸魚之古籍別名。典見食療本草。詳『鱸魚』條。

【黃鳥】卽鶯之古籍別名。典見詩經。詳『鶯』條。

【黃麻】

古籍別名　牛泥荚。三珠草。天紫蘇。（綱目拾遺）

外國名詞　Corchorus capsularis, L.（拉丁）ツナソ　カナヒキラ（日本）

基本　係田麻科黃麻屬。爲黃麻之皮。

產地　出東印度及北省諸地。

形態　黃麻爲麻之一種。一年生草本。高二三尺。三月生苗。葉爲長卵形。端尖互生。有微毛。大葉旁有兩小葉。如杏葉。夏秋間葉腋開小花。黃色。五瓣。至秋每葉生子三粒。如粟米子。內有一粒如菜子。嫩青老黑。其莖皮之纖維。可製繩袋等物。並可供藥用。其根、子、葉詳見各該條。



黃麻

性質　苦。溫。無毒。

主治　專破血。通小便。陳者燒研酒服。

【黃麻子】

性質　熱。

主治　行血。治咳傷肺。

參攷資料　黃麻子功能行血。同風茄可製麻藥。（醫學大辭典）

【黃麻仁】卽大麻仁之俗名。詳『大麻仁』條。

【黃麻根】

基本　本品卽大麻之根與葉。

主治　搗汁或煮汁服。主瘀血石淋。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論麻根曰。治產難衣不出。破血墮腹。帶下崩中止者。以水煮服之效。【唐】甄權藥性本草論麻根曰。治熱淋下血不止。取三九枚。洗淨。水五升。煮三升。分服。血止。神驗。【宋】蘇頌圖經本草論麻根曰。根及葉搗汁服。治撾打瘀血。心腹滿氣短。及跌折骨痛不可忍者。皆效。無則以麻煮汁代之。

【黃麻葉】

性質　苦。微辛。無毒。

主治　婦人血崩漏

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

根搗爛。酒煎露一宿。次早服之。氣鬱心疼。肚疼痢疾。痞結。竝一切血症。同虎杖龍芽用。爲治諸血之聖藥。

【黃麻蟲】基本　本品係生於黃麻梗內之一種幼蟲。

採取　秋時收取。以葱管藏之。

性質　溫。

主治　疔毒。

配合應用　㊀用黃麻梗內蟲。以葱葉包貯。掛風頭令乾。將疔瘡挑破。以麻蟲少許。入於所挑之處。瘡卽化爲水而愈。（程林卽得方）㊁治疔。蟻螂膏。用蟻螂三個。肚白者佳。黃麻蟲十個。二味搗勻。發破患處貼之。如患在手足有紅絲上臂。絲盡處。將針挑斷。出血仍用前藥。毒重者。更服敗毒藥。（陶節菴方）㊂用黃麻梗中蟲一條。焙乾爲末。酒調服下。疔化爲水。（葉氏方）

參攷資料　百草鏡。麻蟲生麻梗近根上一節中。二月化爲飛蟲。穿穴去。山左人每於刈麻時。將蟲連麻梗寸斷。布袋裝盛。帶至南方。貨與養禽鳥家。飼畫眉百靈之用。云其蟲性暖。去風。行血。鳥食之。可以禦寒。蟲形如小蠶。細長明淨。入藥須連麻梗燕焙用。如用生者。須以葱藏。

【黃喉蛇】卽黃頷蛇之古籍別名。典見綱目。詳『黃頷蛇』條。

【黃筍】卽桃竹筍之別名。詳『桃竹筍』條。

【黃結】卽山豆根之古籍別名。典見綱目。詳『山豆根』條。

【黃菊花】卽菊花之處方用名。詳『菊花』條。

【黃菊花】卽野菊花之處方用名。詳『野菊花』條。

【黃雅菜】卽黃矮菜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃矮菜』條。

【黃魚】卽黃顙魚之古籍別名。典見綱目。詳『黃顙魚』條。

【黃黍】卽黍之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳『黍』條。

【黃嗜】卽黃耆之古籍別名。典見綱目。詳『黃耆』條。

【黃楊木】基本　楊屬。

形態　黃楊木爲灌木類之常綠木本。枝條繁茂。高二尺許。不易長大。俗謂歲長一寸。葉如初生桃芽。卵形。對生而青厚。四時不凋。春開小花。淡黃色。其木材堅膩。可作梳剋印等。最良。幷可供藥用。

採取　凡取木於陰晦夜無星時。伐之則裂者良。

性質　苦。平。無毒。

主治　婦人難產。入達生散中用。又主暈月生瘢。搗爛塗之。

【黃矮菜】原名　黃芽菜。

命名　本品鮮葉質細無澤。故名。

古籍別名　黃雅菜。花交菜。（綱目拾遺）膠菜。（俗名）

形態　黃矮菜爲菜類菘之變種。莖葉皆扁。層層圍裹。全體成圓柱形。頂成圓形。葉色淡黑。柔輭甘美。可供蔬茹與藥用。

性質　甘。溫。滑。無毒。

主治　利腸胃。除胸煩。解酒渴。補虛羸。和中止嗽。滑竅降氣。

施用宜忌　凡患洩痢者禁用。

參攷資料　黃短矮菜有南北二種。南產者惟杭城太平門外沙地產者爲最。他處悉高大粗鬆。絕無捲心。密葉。味亦較遜。北產糧艘帶來者。味更美。質更細。且無粗筋。有重至十餘斤一棵者。南中亦不易得也。凍。嚥齏云。食之潤肌膚。利五臟。且能降氣清音聲。（趙學敏）

【黃稞】爲青稞之一種。功用詳『青稞』條。

【黃粱米】命名　本品卽粱米之黃色者。故名。

性質　甘。平。無毒。

主治　益氣和中。止洩。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論黃粱米曰。去客風頑痺。【明】李時珍本草綱目論黃粱米曰。止霍亂。下痢。利小便。除煩熱。

參攷資料　㊀青粱白粱。性皆微涼。獨黃粱性味甘平。豈非得土之中和氣多耶。（寇宗奭）㊁諸粱比之他穀。最益脾胃。（蘇頌）

【黃葛樹】古籍別名　嘉樹。（綱目拾遺）黃果。（居易錄）

形態　黃葛樹爲喬木類之一種。種有三。其出羅目縣者。兩樹對植。圍各二三尺。上引橫枝。亘二丈。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

相援連理。陰庇百夫。其出雲南者。似海棠。稍大。香似佛手。甘脆如梨。多津液。其出蜀中者。樹而不結實。皮類川楝。葉似桂葉而稍大。形團圞。四時不凋。幹則擁腫。根皆蟠露土上。至於石崖之側。全不藉土氣而生。於某月種植。每歲必於某月始芽。其根皮可供藥用。

主治　疥癬。煎湯浴之。

【黃葵子】即黃蜀葵子之簡稱。詳『黃蜀葵』條。

【黃蜀葵】**古籍別名**　側金盞　花（綱目）棉花葵

（植物圖考）

外國名詞　Hibiscus Manihot L.（拉丁）トロロアフヒオソ（日本）

基本　係錦葵科木槿屬。爲黃蜀葵之花書。

產地　在原野間。

形態　黃蜀葵爲溼草類之越年或一年生草本。春月下種生苗。莖高三四尺。其矮者高不及尺。根長而肥大。葉互生。掌狀深裂。裂花大。瓣有五。黃色。下部帶有紅色。總苞四片至七片。其根肥大有黏液。供製紙之糊料。結角大如拇指。長二寸許。本大末尖。六棱有毛。老則色黑。其棱自裂。中有六房。如芝蔴房。房內有子如苘麻子。色亦黑。花子及根俱可供藥用。



黃蜀葵

性質　甘。寒。滑。無毒。

主治　小便淋及催生。治諸惡瘡。膿水久不瘥者。作末傅之。卽愈。爲瘡家要藥。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論黃蜀葵花曰。消癰腫。浸油塗湯火傷。

近人學說　張山雷曰。此又別是一種。非卽蜀葵之黃花者。葉似鷄爪。秋深開花。今之所謂秋葵花也。性亦寒涼。潤利。因之亦以葵名。嘉祐本草謂其花主小便淋。催生。治惡瘡膿水。不差。作末敷之。瀕湖謂其花消癰腫。其子亦消癰腫。治五淋水腫。通乳汁。爲催生利小便要藥。瀕湖引經驗方。黃蜀葵花。麻油浸蜜收。治湯火灼傷。今有預製以備緩急者。頗能止痛定腐。甚有效也。

參攷資料　㈠冬葵、黃葵、蜀葵。形狀雖各不同。而性俱寒滑。故所主療不甚相遠（蘇頌）㈡黃葵子古方少用。今爲催生及利小便要藥。或用或入湯散皆宜。蓋其性滑與冬葵子同功故也。花子與根性功相同。可以互用。無花用子。無子用根（李時珍）㈢黃蜀葵花近道處處有之。春生苗葉。頗似蜀而葉尖狹。多刻缺。夏末開花。淺黃色。六七月採陰乾之（禹錫）㈣黃蜀葵與蜀葵別種。非是蜀葵中黃者也。葉心下有紫檀色。摘下剔散。日乾之不爾。卽浥爛也（寇宗奭）㈤黃葵二月下種。或宿子在土自生。至夏始長。葉大如蓖麻葉。深綠色。開歧丫有五尖。如人爪形。旁有小尖。六月開花。大如椀。鵝黃色。紫心。六瓣而側。旦開午收。暮落。人亦呼爲側金盞花。隨卽結角。大如拇指。長二寸許。本大末尖。六稜有毛。老則黑色。其稜自綻。內有六房。如芝麻房。其子累累在房內。狀如苘麻子。

色黑。其莖長者六七尺。剝皮可作繩索（李時珍）

【黃蜀葵子及根】**性質**　甘。寒。滑。無毒。

主治　癰腫。利小便。五淋水腫。產難。通乳汁。

【黃蜂】卽大黃蜂之簡稱。詳『黃蜂』條。

【黃蜂蠟】卽黃蠟之處方用名。詳『黃蠟』條。

【黃雌雞肉】**性質**　甘。酸。鹹。平。無毒。

主治　傷中。消渴。小便數而不禁。腸澼洩痢。補益五臟。絕傷。療五勞。益氣力。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論黃雌雞肉曰。補丈夫陽氣。治冷氣。疾著牀者。漸漸食之良。以光粉諸石末和飯飼雞。煑食甚補益。【宋】日華諸家本草論黃雌雞肉曰。治勞冬。添體補精。助陽氣。暖小腸。止洩精。補水氣。【明】李時珍本草綱目論黃雌雞肉曰。治產後虛羸。煑汁煎藥服佳。

【黃零草】卽佩蘭之古籍別名。典見庚辛玉册。詳『佩蘭』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【黃鼠】古籍別名　禮鼠。拱鼠。（韓文）鼵鼠。銀鼠。青鼠。貌貍（綱目）

產地　出山西、陝西沙漠諸地。

形態　黃鼠爲獸類鼠屬之一種。體如大鼠。尾足俱短。毛黃色。見人則交其前足於頸。拱而如揖。乃竄入穴。穴於沙漠土中。皮可爲裘領。肉味美。可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　潤肺生津。煎膏貼瘡腫。解毒止痛。

參攷資料　㊀黃鼠肉多食發瘡。（正要）㊁黃鼠北方所食之物。而方書無載。按經驗良方有鱉鼠膏。云治諸瘡腫毒。去痛退熱。用大黃鼠一箇。清油一斤。慢火煎焦。水上試油不散。乃濾滓。澄清再煎。次入炒紫黃丹五兩。柳枝不住攪勻。漠水成珠。下黃蠟一兩。熬黑乃成。去火毒三日。如常攤貼。（李時珍）

【黃鼠狼】即鼬鼠之古籍別名。典見綱目。詳『鼬鼠』條。

【黃精】命名　昔人以本品得坤土之氣。獲天地之精。故名。

處方用名　製黃精。

古籍別名　黃芝（瑞草經）戊己芝（五符經）菟竹。鹿竹。救窮草。重樓。鳥格。垂珠。馬箭。白及。荷格。蕨。以上別錄）仙人餘糧（陶弘景）米脯。野生薑（蒙筌）龍銜（廣雅）救荒草（綱目拾遺）黃孫。黃衣。黃獨。飛英。卑菜。玉芝。草。太陽草。竹大根。沙田薯（和漢藥考）筆管菜（俗名）

學名　Polygonatum Canaliculatum

基本　屬百合科。黃精之根莖。

產地　陳仁山藥物生產辨云。黃精以湖南產者爲正。形象菱角。肉色黑。其餘連州、樂昌、西江、八屬、廣西、南寧。均有出產。但種類不同。形如玉竹頭。長身瓜藤樣。而味略有辛辣。湖南產之正黃精。一片純甜。切開肉紋亦有別。



黃精（一）

形態　黃精爲山野自生之宿根草。種類頗多。莖高自一二尺至四五尺。葉由種類而異。五月間。於莖頂及葉腋。開青白色花。下垂如懸鳴子。鳴子乃日本農家用以驅逐田園鳥雀之物。於板面懸細竹。以繩引之則鳴。故一名鳴子百合。（因葉狀如百合葉）其根爲黑褐色。地下莖有節。年久者肥大。販賣品中。混有萎蕤。別之之法。以有節者爲生薑手黃精。（眞黃精）無節者爲地黃手黃精。（萎蕤）



黃精（二）

採取　二月八月採之。陰乾。

製法　雷敩曰。凡採得。以溪水洗淨。蒸之。從巳至子。薄切。曝乾。用。蘇頌曰。羊公服黃精法。二月三月採根。入地八九寸爲上。細切一石。以水二石五斗。煮去苦味。漉出。囊中壓取汁。澄清。再煎如膏乃止。以炒黑黃豆末相和得所。捏作餅子。如錢大。初服二枚。日益之。亦可焙乾。飾末水服。孟詵曰。餌黃精法。取甕子去底。釜內安置得所。入黃精令滿。密蓋。蒸至氣溜。卽曝之。如此九蒸九曝。若生則刺人咽喉。

用法　與他藥水煎或酒浸。或蒸搗和作丸散。

性質　甘。平。無毒。

成分　黃精之化學成分的研究。日本中尾博士曾於南滿洲藥學會發表之。今介紹於左。取五〇乃至一〇〇瓦之黃精粉末。用郤哥雷氏浸出器。以以脫浸出之至無移行於以脫之物時爲止。蒸餾其以脫液。稀其殘渣。爲以脫越幾斯。次乃蒸散殘留於試料中之以脫。使之乾燥。後更以强酒精浸出之。至無浸出物爲止。蒸發其酒精溶液。稀其殘渣。爲酒精越幾斯。同樣更乾燥其殘留試料。後用熱湯浸出之。作成水性越幾斯後乃用鹽酸酸性水。溶解其以脫越幾斯。濾過以以脫振盪之。棄其溶於以脫之部分。取其透明之鹽酸酸性液。（以下畧稱之爲酸性液）次更溶其鹽酸酸性水抽出後之殘渣於炭酸鹹性水。濾過。更用以脫振盪之。同樣取其透明之溶液。（以

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

下簡稱之爲鹹性液）以下更檢此兩樣浸出液對於各種試藥之反應如次。酸性液依鹽化白金水素酸現淡褐色絮狀晶單寧酸現白色。馬耶路氏試藥初現白色繼則急變爲褐色之沈澱。沃度鉀現赤褐色絮狀沈澱。昇汞現帶褐色絮狀沈澱。燐毛利浦淀酸初現白色後乃變灰色絮狀沈澱。鹽化金水素酸初現白色後變褐色之沈澱。沃度蒼鉛現帶褐色絮狀沈澱。依皮苦林酸初現淡黃色。繼則急變爲褐色之絮狀沈澱。武奧佛耶酸現初白後褐之沈澱。燐武奧佛耶酸初現白色。後乃急變爲褐色之絮狀沈澱。沃度卡特米謨現帶褐色絮狀沈澱。毛利浦淀酸亦現帶褐色之絮狀沈澱也。鹹性液依鹽化白金水素酸。燐毛利浦淀酸。毛利浦淀酸。燐武奧佛耶酸。武奧佛耶酸等具現與上同樣之沈澱。

效能　潤肺生津。治勞傷墮精髓。用作滋養緩和藥。

主治　補中益氣。除風溼。安五臟。久服輕身延年不饑。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論黃精曰。補五勞七傷。助筋骨。耐寒暑。益脾胃。潤心肺。單服九蒸九曝。食之駐顏斷穀。【明】李時珍本草綱目論黃精曰。補諸虛止寒熱。填精髓。下三尸蟲。【清】黃宮繡本草求眞論黃精曰。黃精書極稱羨。謂其氣平味甘。治能補中益五臟。補脾胃。潤心肺。填精補助筋骨。除風溼。下三蟲。且得坤土之精粹。久服不飢。其言極是。但究其氣味。止能入脾補陰。若使挾有痰濕。則食之反更助痰。根紫花黃葉如竹葉者。是俗名山薑。九蒸九曝用。

國外學說　日本和漢薬考曰。黃精種類頗多。分述於下。㈠黃精生山中陰地。有數種。春皆自宿根生苗。初出土時。有鞘包之。狀如小筍。惟不直立。葉圓嫩綠。有光澤。似百合葉。細瘦而互生。㈡竹葉黃精。葉形狹長。如竹葉。又似百合葉。柔薄光滑。有細縱理。長三五寸。四五月於葉間開花。作筒狀。末分五瓣。形如沙參花。無蒂色白。瓣微綠。皆下垂。後結圓實。較南天燭子爲大。熟則成黑色。中有細子。其根白色。橫生而有節。歲增一節。積年漸長。本草原始言生剌人喉。是爲玉竹。黃精。㈢大葉黃精。葉長大。苗粗高四五尺。根節圓扁。大一寸餘。相連橫生。形如白及。根山農炙熟食之。味如薯蕷。是爲白及黃精。㈣圓葉黃精。苗高一二尺。莖較竹葉黃精爲細。葉較萎蕤葉爲短。堅硬有光。其花亦小。根與竹葉黃精無異。㈤唐種黃精。享保年中傳入日本。其狀與玉竹黃精無異。惟其葉或互生。或兩葉相對。或五七葉相對。雜生一莖。如紹興本草所繪爲異耳。是爲正精。藏器說云。『偏精功用。不如正精。』據此當以唐種爲上品。日產皆偏精也。此外品類尙多。日本藥舖所售。皆本國產。以澳州南部所出者爲上品。其形最肥大。又出蒸黃精。黑色。味如熟地黃。用供果食。本草原始云。『熟。味甘堪食。深黑色。象地黃。有二三歧者。有一二歧者。』卽此。熟指九蒸九曝也。

近人學說　㈠袁淑範曰。黃精之學名。極不一致。蓋因產地不一。其形狀亦遂之而異之故也。例如 Polygonatum macropodum, Polygonatum giganteum, Polygonatum multiflorum, Polygonatum chinense, 及 Polygonatum latifolium, Polygonatum falcatum, 等皆爲其學名。今姑以 Polygonatum canaliculatum 爲其學名。㈡張山雷曰。黃精不載於本經。今產於徽州。徽人常以爲饋贈之品。蒸之極熟。隨時可食。味甘而厚。膩頗類熟地黃。古今醫方極少用此。蓋平居服食之品。非去病之藥物也。按其功用。亦大類熟地。補血補陰。而養脾胃。是其專長。但膩滯之物。有溼痰者弗服。而胃納不旺者。亦必避之。

配合應用　㈠補肝明目。黃精二斤。蔓菁一升。淘同。和九蒸九曝爲末。空心每米飲下二錢。日二服。延年益壽。（聖惠方）

㈡治大風癩瘡。營氣不清。久風入脈。因而成癩。鼻壞色敗。用黃精根。去皮。潔淨。溪水洗二斤。曝。納粟米飯中。蒸至米熟。時時食之。（聖濟總錄方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊂補虛精氣。黃精、枸杞子等分。搗作餅。日乾爲末。煉蜜丸梧子大。每湯下五十丸（奇效良方）

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡脾胃虛寒。大便滑瀉者禁用。忌梅實、花、葉、子並同。

參攷資料　㊀神仙芝草經云。黃精寬中益氣。使五臟調良。肌肉充盛。骨髓堅強。其力增倍。多年不老。顏色鮮明。髮白更黑。齒落更生。又能先下三尸蟲。上尸名彭矯。好五寶物。百廿日下。中尸名彭居。好五味。六十日下。下尸名彭好。五色三十日下。皆爛出也。根爲精氣。花實爲飛英。皆可服食。又按雷氏炮炙論序云。駐色延年。精煎神錦註云。以黃精自然汁拌研細神錦。於柳木甑中蒸七日。以木蜜丸服之。木蜜枳椇也。神錦不知是何物。或云磁砂也。（李時珍）㊁按抱朴子云。黃精服其花。勝其實。服其實。勝其根。但花難得。得其生花十斛。乾之纔可得五六斗爾。非大有力者不能辦也。日服三合。服之十年。乃得其益。其斷穀不及朮餌。令人肥健。可以負重涉險。但不及黃精之甘美易食。凶年可與老少代糧。謂之米餔也。（禹錫）㊂徐鉉稽神錄云。臨川士家一婢。逃入深山中。久之。見野草枝葉可愛。取根食之。久久不饑。夜息大樹下。聞草中動。以爲虎攫上樹避之。及曉下地。其身歘然凌空而去。若飛鳥焉。數歲。家人採薪見之。捕之不得。臨絕壁下網圍之。俄而騰上山頂。或云。此婢安有仙骨。不過靈藥服食爾。遂以酒餌置往來之路。果來食訖。遂不能去。擒之。具述其故。指所食之草。即是黃精也。（唐愼微）㊃黃精爲服食要藥。故別錄列於草部之首。仙家以爲芝草之類。以其得坤土之精粹。故謂之黃精。五符經云。黃精獲天地之淳精。故名爲戊己芝。是此義也。餘糧救窮。以功名也。鹿竹、菟竹。因葉似竹而鹿菟食之也。垂珠。以子形也。陳氏拾遺救荒草。即此也。（李時珍）㊄根似嫩薑。俗名野生薑。九蒸九曝。可以代糧。又名米餔。（陳嘉謨）㊅今處處有之。二月始生一枝。多葉。葉狀似竹而短。根似萎蕤。萎蕤根如萩根及菖蒲。概節而平直。黃精根如鬼臼。黃連。大節而不平。雖燥並柔。有脂潤。俗方無用此。而爲仙經所貴。根葉花實。皆可餌服。酒散隨宜。具在斷穀方中。其葉乃與鉤吻相似。惟莖不紫花不黃爲異。而人多惑之。其類乃殊。遂致死生之反。亦爲奇事。（陶弘景）㊆鉤吻眞似黃精。只是葉頭尖有毛鉤子一箇。若誤服之害人。黃精葉似竹也。（蘇敬）㊇黃精肥地生者。即大如拳。薄地生者。猶如拇指。萎蕤肥根。頗同小者。肌理形色大都相似。今以鬼臼黃連爲比。殊無彷彿。黃精葉似柳及龍膽。徐長卿輩而堅。其鉤吻蔓生。葉如柿葉。殊非比類。（蘇恭）㊈黃精南北皆有。以嵩山茅山者爲佳。三月生苗。高一二尺以來。葉如竹葉而短。兩兩相對。莖梗柔脆。頗似桃枝。本黃末赤。四月開青白花。狀如小豆花。結子白如黍粒。亦有無子者。根如嫩生薑而黃色。二月採根。蒸過曝乾用。今遇八月採。山中人九蒸九曝。作果賣。黃黑色而甚甘美。其苗初生時人多採爲菜茹。謂之旱菜。味極美。江南人說黃精苗葉稍類鉤吻。但鉤吻葉頭極尖而根細。而蘇恭言鉤吻蔓生。恐南北所產之異耳。（蘇頌）㊉黃精野生山中。亦可劈根長二寸。稀種之。一年後極稠。子亦可種。其葉似竹而不尖。或兩葉三葉四五葉。俱對節而生。其根橫行。狀如萎蕤。俗採其苗爛熟。淘去苦味。食之。名爲管菜。

【黃精】卽人參之古籍別名。典見吳普本草。詳『人參』條。

【黃精酒】**劑法**　用黃精、蒼朮各四斤。枸杞根、柏葉各五斤。天門冬三斤。麥汁一石。同麴十斤。糯米一石。如常釀酒飲。

主治　壯筋骨。益精髓。變白髮。治百病。

【黃漿】卽酸漿之古籍別名。典見爾雅。詳『酸漿』條。

【黃蒸】卽黃蒸麴之原名。詳『黃蒸麴』條。

【黃蒸麴】**原名**　黃蒸。

命名　本品係以米麥粉和罨。待其黴蒸成黃者。故名。

古籍別名　黃衣（蘇恭）麥黃（綱目）

採取　於六七月作而生絲麼

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者佳。

製法　用米麥合磨成粉。和水成餅。麻葉裹之。待生黃衣。取出曬乾用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　功同女麴。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論黃蒸麴曰。溫補。能消諸生物。【宋】日華諸家本草論黃蒸麴曰。溫中下氣。消食除煩。【明】李時珍本草綱目論黃蒸麴曰。治食黃汗。

【黃蒿】　即艾麴草之古籍別名。見本草會編。詳『艾麴草』條。

【黃蜜】　即蜂蜜之黃色者。詳『蜂蜜』條。

【黃蜜蠟】　即黃蠟之處方用名。詳『黃蠟』條。

【黃蜡】　即黃蠟之處方用名。詳『黃蠟』條。

【黃遠】　即射干之古籍別名。見吳普本草。詳『射干』條。

【黃蕈】　即香蕈之一種。詳『香蕈』條。

【黃寮郎】　古籍別名　倒摘刺。（綱目）

產地　生山野間。

形態　黃寮郎爲雜草類之一種。冬夏常青。其根可供藥用。

主治　風疾。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論黃寮郎根曰。治咽痛。擂汁入酒滴之。牙痛刀上燒取煙。煤綿裹塞痛處。

【黃彈子】　即黃皮果之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃皮果』條。

【黃德祖】　產地　本品生圯上。

形態　黃德祖爲雜草類之一種。葉如尖刀。獨梗如芋。花紅色。白頭。如何首烏。可供藥用。

主治　瘡癬。

【黃德祖】　即淫羊藿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『淫羊藿』條。

【黃練藤皮】　主治　霍亂。痢疾。合諸香丸服。

命名　本品味苦。濇如黃連。故名。

【黃練藤芽】　古籍別名　回昧。黃連頭。黃連芽。（綱目拾遺）

形態　黃練爲蔓草類藤屬之一種。蔓生大樹間。葉似桑。寄生又似槐葉。尖長柔滑。肥厚光澤。二三月間。枯枝生芽。淡紅色。如椿芽。生食之。苦中帶甘。清香可口。醃以爲菜。與芹芽、椿芽、蘆芽並重。採乾代茶。又勝於茗。可供藥用。其藤皮詳見該條。

性質　苦。濇。寒。無毒。

主治　解暑止渴。利便。生津。明目。清熱。解毒。治喉痛咽喫。醒酒香爛口。糜嚼汁可解。

【黃蓬草】　即蒼草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蓬草子』條。

【黃楊侯】　即青鷳之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『青鷳』條。

【黃橘皮】　即橘皮之原名。詳『橘皮』條。

【黃獨】　㊀即土芋之古籍別名。典見綱目。詳『土芋』條。㊁即黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃精』條。

【黃獨子】　即土芋根之別名。詳『土芋』條。

【黃礪石】　即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【黃蕈】　即香蕈叢生色黃者之古籍別名。典見陳仁玉菌譜。詳『香蕈』條。

【黃顙魚】　㊀即鯷魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯷魚』條。㊁即黃頷魚之古籍別名。典見詩注。詳『黃頷魚』條。

【黃龍尾】　即金頂龍芽草之古籍別名。典見滇南本草。詳『仙鶴草』條。

【黃頷蛇】　命名　頷。喉下也。本品喉下色黃。故名。

古籍別名　黃喉蛇。色赤者名赤棟蛇。桑根蛇。（綱目）青大蛇。（動物學大辭典）

外國名詞　Elaphe climacophora Schleg. 或 Elaphe virgatus（拉丁）アオダイショー（日本）

基本　係脊椎動物爬蟲類蛇類闕口類黃頷蛇科。爲黃頷蛇之肉。其頭、骨、所吞鼠、所吞蛙。詳見各該條。

產地　在原野間。

形態　黃頷蛇爲蛇類之一種。頭部較小。舌分歧。無毒牙。吻端頗闊。鼻間鱗小。額鱗前方頗闊。後方尖狹。鼻孔圓大。上脣鱗八枚。脣鱗

488／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

四枚。體鱗二十列。腹鱗二百二十八枚。肛門鱗分裂。尾下鱗一百十一對。體暗綠色。背有淡黑色條紋。長四尺七寸。其行緩遲。常入人家捕食鼠類。丐兒養爲玩物。其肉可供食與藥用。



黃頷蛇

性質　甘。溫。有小毒。

主治　釀酒或入丸散。主風癩頑癬惡瘡。自死蛇瀆汁塗大疥。煮汁浸臂腕作痛。燒灰同豬脂塗風癬漏瘡。婦人妬乳。猘犬咬傷。

【黃頷蛇吞鼠】　**基本**　黃頷蛇吞入腹中之鼠。尚未消化者。

主治　鼠瘺蟻瘻有細孔如鍼者。以臘月豬脂煎焦。去滓塗之。

【黃頷蛇吞蠶】　**基本**　黃頷蛇吞入腹中之蠶。尚未消化者。

主治　噎膈勞嗽。蛇瘧。

【黃頷蛇骨】　**主治**　久瘡勞瘡。疹入丸散用。

【黃頷蛇頭】　**主治**　燒灰。主久瘡。及小腸癰。入丸散用。

【黃魽】　即黃顙魚之古籍別名。典見綱目。詳『黃顙魚』條。

【黃鮹魚】　即杜父魚之古籍別名。典見綱目。詳『杜父魚』條。

【黃鮹】　即鱓魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱓魚』條。

【黃鴨】　即鴛鴦之古籍別名。典見綱目。詳『鴛鴦』條。

【黃龍湯】　即金汁之古籍別名。典見本草集註。詳『金汁』條。

【黃環】　**命名**　本品葉黃而圓。故名。

古籍別名　凌泉大就（本經）實名狼跋子（別錄）就葛度穀（唐本）生芻根韭（吳普）

產地　生山野平原間。

形態　黃環爲蔓草類之一種。莖長二尺許。葉圓色黃。花紫色。結實有子。其根形似葛。可供藥用。其子詳見『狼跋子』條。

採取　三月間採根用。

性質　苦。平。無毒。

主治　蠱毒鬼疰。鬼魅。邪氣在臟中。除咳逆寒熱。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論黃環根曰。治上氣急及百邪。【明】李時珍本草綱目論黃環根曰。治痰嗽。消水腫。利小便。

施用宜忌　惡茯苓、防己、乾薑。

使尾爲之使。

【黃環子】　即狼跋子之原名。詳『狼跋子』條。

【黃薑】　即薑黃之處方用名。詳『薑黃』條。

【黃藍】　即紅藍之古籍別名。典見開寶本草。詳『紅藍花』條。

【黃藍花】　即紅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紅花』條。

【黃蟲】　**產地**　生溼地間。

形態　黃蟲爲溼生蟲類之一種。赤頭長足有角。羣集而居。可供藥用。

採取　七月七日採之。

性質　苦。

主治　療寒熱。

【黃雖】　即黃色鯉魚。典見圖經本草。詳『鯉魚』條。

【黃鵠】　即鵠之古籍別名。典見綱目。詳『鵠』條。

【黃犢子臍屎】　**基本**　本品即黃色小牛之臍中屎。

採取　以新生未食草者收乾之。

主治　九竅四肢指歧間血出。乃暴怒所爲。燒此末水服方寸匕。日四五服良。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論黃犢子臍屎曰。主中惡霍亂。及鬼擊吐血。以一升和酒三升煮汁服。

【黃藜蘆】　即木藜蘆之古籍別名。典見綱目。詳『木藜蘆』條。

【黃藤】　**性質**　甘。苦。平。無毒。

主治　飲食中毒。利小便。煮汁類服即解。

參攷資料　黃藤生嶺南。狀若防己。俚人常服此藤。縱飲食有毒。亦自然不發。席辨刺史云甚有效。（李時珍）

【黃藤】　即鉤吻之古籍別名。典見綱目。詳『鉤吻』條。

489／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【黃藥子】古籍別名　赤藥。（圖經）木藥子大苦。紅藥子。（綱目）

產地　在山野間。

形態　黃藥子爲蔓草類之一種。莖高二三尺。柔而有節。形似藤。實非藤。葉大作掌狀。長三寸許。開細白花。其根長尺許。大者圍二三寸。外褐內黃赤。可供藥用。

採取　十月間採根用。

性質　苦。平。無毒。

主治　諸惡腫瘡癭。喉痺。蛇犬咬毒。研水服之。亦含亦塗。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論黃藥子曰。涼血降火。消癭解毒。

參攷資料　孫思邈千金月令方。療忽生癭疾二三年者。以萬州黃藥子半斤。須緊重者爲上。如輕虛。卽是他州者。力慢。須用加倍。取無灰酒一斗。投藥入中。固濟瓶。以糠火燒一伏時。待酒冷。乃開。時時飲一杯。不令絕。酒氣經三五日後。常把鑑自照。覺消。卽停飲。不爾便令人項細也。劉禹錫傳信方亦著其效。云得之邕州從事張茗。茗目擊有效。復試其驗如神。其方並同。惟小有異處。是燒酒候香出外。瓶頭有津出。卽止。不待一宿。火不可得猛耳。（蘇頌）

【黃藥酒】命名　藥子製成之酒。故名。

製法　用萬縣緊重者之黃藥子三斤。無灰酒一斗。以藥納入。固封瓶口。以糠火緩燒一伏時。至酒氣香出。瓶頭有津。卽止。候冷。取酒服。或將藥切片。袋盛。浸酒煮服。

主治　諸瘰癧結氣。

【黃顙魚】古籍別名　黃鱓魚。黃鮎。黃鮸。（綱目）

外國名詞　Pseudobagrus aurantiacus Temm and schlegel.（拉丁）ギギ或ギバチ（日本）

基本　係脊椎動物魚類喉鰾類鮎魚科之黃顙魚。

產地　生江湖淡水中。

形態　黃顙魚爲無鱗類魚屬之一種。體長。形略似鮎。尾甚側扁。頭闊扁。口吻短。眼小。分生爲上位而被薄皮。上下兩顎皆有毛狀之鬚齒列一帶。口蓋亦有齒。鼻旁有觸鬚一對。上下顎亦有一對。兩眼間廣闊而隆起。全體甚黏滑。脊臀皆有鰭刺。其棘甚强。力能飛躍。背青黃色。腹色黃。其肉可供食與藥用。

性質　甘。平。微毒。

主治　醒酒。

歷代記述攷證　【明】吳瑞日用本草論黃顙魚肉曰祛風。【明】李時珍本草綱目論黃顙魚肉曰。煮食消水腫。利小便。燒灰治瘰癧。久潰不收斂。及諸惡瘡。

施用宜忌　反荊芥。同食害人。

參攷資料　黃顙魚爲無鱗魚類。無鱗之魚。不益人。發瘡疥。（孟詵）

【黃顙魚涎】採取　翅下取之。

主治　消渴。

參攷資料　凡消渴飲水無度。以黃顙魚涎和青蛤粉滑石等分。和丸服。粟米湯下三十丸。（綱目）

【黃顙魚頰骨】主治　喉痺腫痛。燒研塞服三錢。

【黃鰂魚】命名　魚腸肥曰鰂。本品腸腹多脂。故名。

古籍別名　黃骨魚。黃姑魚。（綱目）

產地　生江湖中。

形態　黃鰂魚爲鱗類魚屬之一種。狀如白鰷而頭尾不昂。身扁。鱗細。色白。闊不踰寸。長不盈尺。腸腹多脂。味美。肉可供藥用。其油詳見該條。

性質　甘。溫。無毒。

主治　白麥汁飲。止胃寒洩瀉。

【黃鰂魚油】主治　瘡癬殺蟲。

參攷資料　黃鰂魚油燃燈。令人目昏。（李時珍）

【黃櫨】外國名詞　Rhus cotinus, L.（拉丁）ワウロ（日本）

基本　係漆樹科漆樹屬之黃櫨。

產地　出豫蜀諸省。

形態　黃櫨爲喬木類之落葉木本。高一二丈。葉作羽狀複葉。小者爲長卵形。有光澤。春夏間開小花。花爲圓錐形花序。結實圓扁而

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小可採蠟。其木材黃色。可作染料與藥用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　除煩熱。解酒渣目黃。水煮服之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論黃櫨木曰。洗赤眼及湯火漆瘡。

【黃礬】命名　本品卽礬石之黃色者。故名。

性質　酸。澁。鹹。有毒。

主治　療瘡生肉。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論黃礬曰。野雞癩痔惡瘡疥癬。【元】李東垣用藥法象論黃礬曰。治陽明風熱牙疼。

參攷資料　㊀黃礬丹竈家所須。亦入染皮用。（蘇恭）㊁黃礬出陝西瓜州沙州。及舶上來者爲上。黃色。狀如胡桐淚。入於綠礬中。揀出黃色者充之。非眞也。波斯出者。打破中有金絲文。謂之金線礬。磨刀劍。顯花文。丹房鑑源云。五色山脂。吳黃礬也。（李時珍）

【黃糯】卽秫之古籍別名。典見綱目詳『秫』條。

【黃蠟蜂窠】卽露蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳『露蜂房』條。

【黃蘗】卽黃柏之處方用名。詳『黃柏』條。

【黃蠟】原名　蜜蠟。

命名　本品生於蜜中。故曰蜜蠟。乃蜂蜜之底。其色黃。故又名之曰黃蠟。

處方用名　黃蜡。黃蜂蠟。蜂蠟。黃蜜蠟。

古籍別名　黃占。（和漢藥考）

外國名詞　Cera flava（拉丁）Yellow wax. Bees wax（英）Gelb Wachs.（德）

基本　黃蠟由蜜蜂腹部輪節狀處分泌觸空氣而凝結。係用以造成蜂巢及蜜槽者。

產地　陳仁山藥物生產辨云。黃蠟產湖北涇陽爲最。沙市次之。雲南又次之。廣東瓊州。欽州。北海均有出。但去蜜糖不清。味香易生蟲。又有一種洋蠟。由咖喇吉打運來。蠟質略硬。其餘日本出之魚油蠟。又有用火水渣而製成者。非有閱歷。不易辨別。

形態　黃蠟爲有甘味狀氣味之黃色或褐色蠟狀固塊。破折面作細粒狀。於四十九度至五十五度柔軟。於六十度至六十四度融解。比重〇・九六二至〇・九六七。不溶於水及冷酒精。溶於煮沸酒精及伊打。

種類　㊀黃蠟乃取蜜後。將殘蜂房煉過。濾入水中。候其凝結色黃者。㊁白蠟係用黃蠟更用水煮溶化。以好絲紙摺作數層。入冷水內。輕貼蠟上。一吸卽起。仍投冷水中。有蠟凝紙上。卽剝取之。再吸再剝。以盡爲度。鋪於竹器中曬之。乾則類酒以水久之。凝結色白者。㊂蟲白蠟。係小蟲所作。其蟲食冬青樹汁。吐涎黏嫩枝上。至秋刮取。以水煮溶。置冷水中。則凝聚成塊。色白。此卽所謂蟲白蠟。與蜜蠟之白者不同。

用法　水煎或剉末。或水化和作丸散用。

性質　甘。溫。無毒。

成分　黃蠟成分。由產地而異。但其主要者爲密里辛（Myricin $C_{30}H_{62}O_2$）。塞林（Cerin $C_{54}H_{108}O_2$）及塞洛列因（Cerolein）。此三物。用煮沸酒精處理之。可使分離。卽甲不溶於煮沸酒精。乙則溶。冷卽析出。丙則溶存而不析出。

效能　續絕傷金瘡。治下瘀膿血。用作賦形藥。又爲生肌定痛之瘡傷止血藥。專治創傷腸出血。徹毒。

作用　有直接凝固血液之功。且有制腐滅菌之效。

主治　蜜蠟主下痢膿血。補中。續絕傷金瘡。血氣不饑耐老。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論黃蠟曰。孕婦胎動。下血不絕欲死。以雞子大煎三五沸。投美酒半升。服立瘥。又主白髮鑷去。消蠟點孔中。卽生黑者。【明】李士材本草圖解論黃蠟曰。蠟主下痢。貼瘡。生肌止痛。【清】黃元御玉楸藥解論黃蠟曰。黃蠟凝聚收澁。治泄痢便膿。胎動下血。跌打金刃湯火蛇咬凍裂。一切諸瘡。愈破風。

國外學說　英美學說謂黃蠟各處產之。乃取蜜後。煉渣濾水中。候凝取之。以其色黃。故名黃蠟。有數種植物能生蠟質。如棕櫚樹及數種楊梅樹之類。中國與日本國。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

亦有產蠟之樹。如烏桕樹等。在西國多未知之。昔人以爲蜂從花中取蜜。遥帶至窩內作蜂房。今時始知蜂腹內之鱗形處有核。能結成此質。用此質造成蜂房。而其蠟必爲所食之物變成。又製法。將蜂房切碎。壓出蜂蜜。將其餘質在沸水中融化之。加熱若干時。則其異質或能消化。或能分開。待冷。則其蠟結成定質。再融化之。濾之。待冷則成塊。成餅形。色暗黃。其臭則奇而有趣。涼水不化。濃酒微化。熱松香油全化。加熱至一百四十六度則自化。其作用爲潤皮藥。合於他質成膏。則能在腐蝕或刺戟之處。作一蓋護之。令不遇空氣或他質。如傷風或久延赤痢。用此最佳。外科之用處。在作蠟膏硬膏油膏。用時以黃蠟一分。煉猪油四分。先將黃蠟鎔化。再加猪油調勻至涼爲度。配油膏類用。此方較白油膏易存。故美國常用之。（黃油膏方）日本和漢藥考曰。從蜂巢採取蜂蜜。而以殘巢製黃蠟。法將殘巢放入釜中。和水於火上煎沸。盛囊中壓搾。如此則蠟質浮於水上。此時再和水煎數次。後祛熔化蠟質。移於他器。使之成塊。更注沸湯數次。使脫去黃色。漸次成爲白色堅塊。初製者謂之黃蠟。再製者謂之蠟蠟。（日本和歌山縣之製法）又第四版改正日本藥局方曰。黃蠟係蜂巢採取蜂蜜後。注意熔成者。本品爲淡黃色或黃色塊。於六十三度至六十四度熔融。成爲帶有蜂蜜香氣之澄明液。比重〇・九六二至〇・九七二。又遠西名物考曰。黃蠟外敷。能使堅硬者化軟。解凝結。緩和急迫。消散釀膿或腫瘍乳頭燃熱腫痛及坼裂等。塗之極有效。多用作膏藥。白蠟之性狀功用。大抵與黃蠟相同。但須清涼症多用白蠟。較黃蠟少緩和急迫功效。赤痢用下方。多見效。瑰蠟昆設爾弗方。玫瑰昆設爾弗二盎斯。黃蠟四錢。甘扁桃油一盎斯半。將蠟及油置文火上細烊。和玫瑰昆設爾弗服之。或視其症加阿芙蓉少許。有殊效。勞瘵之症。或體質薄弱。肺之運營罷勞。患咳嗽喘急。吐血聲嗄等症。或傷冷毒之痰咳甚者。用左方多效。蕭蠟方。於黃蠟加松香或乳香沒藥等分。或加香膏（Bal. peru）適宜入小鍋。置文火上。漸次融解之。則生佳香。患者常以口受其蒸氣吸入之。

配合應用　㊀治赤白痢。小腹痛不可忍。下重或面青手足俱變者。用黃蠟三錢。阿膠三錢。同溶化。入黃連末五錢。攪勻。分三次熱服。神效。（仲景調氣方）

㊁治熱痢及婦人產後下痢。用蠟二棊子大。阿膠二錢。當歸二錢。半黃連三錢。黃蘗一錢。陳廩米半升。水三鍾。煮米至一升。去米入藥。煎至一鍾。溫服神效。（千金膠蠟湯）

㊂治急心疼痛。用黃蠟燈上燒化。丸芡子大。百草霜爲衣。井水下三丸。

㊃立效丸。治肺虛腸熱。咳嗽氣急。煩滿咽乾。燥渴欲飲冷水。體倦肌瘦。發熱減食。喉音嘶不出。黃蠟溶濾令淨。摝水麥過八兩。再化作一百二十丸。以蛤粉四兩爲衣。養藥每服一丸。胡桃半箇細嚼。溫水下。卽臥閉口不語。日二。（普濟方）

㊄治肝虛雀目。黃蠟不拘多少。溶汁取出。入蛤粉相和得所。每用刀子切下二錢。以猪肝二兩批開。摻藥在內。麻繩扎定。水一椀同入銚子內煮熟。取出。乘熱熏眼。至溫。并肝食之。日二。以平安爲度。其效如神。（集驗方）

㊅治頭風壓疼。湖南押衙顏思退傳方。用蠟二斤。鹽半斤相和。於鐺羅中。溶令相入。捏作一兜鍪勢。可合腦大小。空頭至額。其痛立止也。（經驗方）

㊆治脚上轉筋。劉禹錫續傳信方。用蠟半斤銷之。塗舊絹帛上。隨患大小闊狹。乘熱纏脚。須當脚心。便着穬裹之。冷卽易。仍貼兩手心。（圖經方）

㊇治暴風身冷。暴風。通身水冷如癱緩者。用上方法。隨所患大小闊狹攤貼。幷裹手足心。亦治風毒驚悸。

㊈治破傷風。瀝如癘者。以黃蠟一塊。熱酒化開。服立效。與玉眞散對用尤妙。（瑞竹堂方）

㊉治代指疼痛。以蠟松膠相和。火炙籠指。卽痊。（千金方）

㊊治脚上凍瘡。濃煎黃蠟塗之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（姚和濟崇方）

㊂治狐尿刺人腫痛。用熱蠟着瘡。并烟薰之。令汗出卽愈。（肘後方）

㊃治犬咬瘡發。以蠟炙溶灌入瘡中。（葛氏方）

㊄治蛇毒螫傷。以竹筒合瘡上溶蠟灌之。效。（徐玉方）

㊅治湯火傷瘡。燃赤疼痛。毒腐成膿。用此拔熱毒。止疼痛。斂瘡口。用麻油四兩。當歸一兩。煎焦去滓。入黃蠟一兩。攪化放冷。攤帛貼之。神效。（醫林集要方）

㊆治臁脛爛瘡。用桃柳槐楮棟五枝。同荊芥煎湯。洗拭淨。以生黃蠟攤油紙上。隨瘡大小貼十層。以帛拴定。三日一洗。除去一層不用。一月痊愈。（醫林集要方）

㊇治妊娠胎漏。黃蠟一兩。老酒一盞。二物在慢火上溶化。熱服。頃刻卽止。

㊈治咂逆不止。黃蠟燒烟熏二三次。卽止。（醫方摘要方）

㊉治霍亂吐利。蠟一彈丸。熱酒一升。化服。卽止。（肘後方）

㊊治諸般瘡毒。臁瘡金瘡湯火等瘡。用黃蠟一兩。香油二兩。黃丹半兩。同化開。頓冷。瓶收。攤貼。（王仲勉經驗方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡有溼滯痰鬱者禁用。惡芫花、齊蛤。

參攷資料　㊀蜜成於蠟。而萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚於此。必薄於彼耶。蜜之氣味俱厚。故養脾。蠟之氣味俱薄。故養胃。厚者味甘而性緩。質柔。故潤臟腑。薄者味淡而性斂。質堅。故止洩痢。張仲景治痢有調氣飲。千金方治痢有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此歟。又華陀治老小下痢。食入卽吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒。髮灰。黃連末各半雞子殼。先煎蜜蠟。苦酒。雞子四味。令勻。乃納連髮煞。至可丸。乃止。二日服盡。神效。無比也。此方用之屢經效驗。乃知本經主下痢膿血之方。深當膺服也。（李時珍）㊁和松脂、杏仁、棗肉、茯苓等分。合成。食後服五十丸。便不飢。（甄權）㊂古人荒歲多食蠟以度飢。但合大棗咀嚼。卽易爛也。（蘇頌）

【黃護草】

基本　黃護草爲雜草類之一種。可供藥用。

產地　生隴西諸地。

性質　無毒。

主治　除痺。益氣。令人嗜食。

【黃辯】

古籍別名　經辯。（別錄）

基本　黃辯爲雜草類之一種。可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　主心腹痛。疝瘕。口瘡。臍傷。

【黃蹢躅】卽羊躑躅之古籍別名。典見綱目。詳『羊躑躅』條。

【黃顙】卽鱯魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱯魚』條。

【黃蠟菜】卽黃瓜菜之古籍別名。典見救荒本草。詳『黃瓜菜』條。

【黃櫨蕈】卽黃蕈之俗名。詳『黃蕈』條。

【黃鱯魚】卽黃顙魚之古籍別名。典見詩注。詳『黃顙魚』條。

【黃鵰】卽白色鯉魚。典見圖經本草。詳『鯉魚』條。

【黃鸝】卽鶯之古籍別名。典見說文。詳『鶯』條。

【黃鸝鶹】卽鶯之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『鶯』條。

【黍】　**命名**　黍從禾從氽。象細粒散珠之形。而黍者暑也。待暑而生。暑後而成。故名。

古籍別名　赤黍名糜。白黍名芑。黑黍名秬。一稃二米名秫。（爾雅）黃黍。大黑黍。牛黍。燕頷。馬革。驢皮。稻尾。（郭義恭廣志）餅黍。（日本）

外國名詞　Panicum miliaceum L.（拉丁）モチキビ（日本）

基本　係禾本科稷屬。爲黍之子實。莖根詳見該條。

產地　溫帶熱帶諸地皆有之。

形態　黍爲穀類之一年生草本。高四五尺。葉細長而尖。有並行脈。及粗毛。花有三雄蕊。單花爲穗狀花序。實有赤白黃黑茶等色。粒勻無參差。性黏。可供食與釀酒及藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　益氣補中。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

療本草論黍米曰燒灰和油塗杖瘡止痛不作癥【明】李時珍本草綱目論黍米曰嚼濃汁塗小兒鵝口瘡有效。

參攷資料　㈠黍米肺之穀也。肺病宜食之主益氣（孫思邈）㈡黍者暑也以其象火爲南方之穀。蓋黍最黏滯與糯米同性其氣溫暖故功能補肺而多食作煩熱緩筋骨也孟氏謂其性寒非矣（李時珍）㈢黍米性寒有小毒發故疾久食昏五臟令人好睡緩人筋骨絕血脈小兒多食令久不能行。小貓犬食之其腳跼屈合葵菜食成瘤疾合牛肉白酒食則生寸白蟲（孟詵）㈣穬之黏者爲黍粟之黏者爲穄糜之黏者爲糯別錄本文著黍穄糯稻之性味功用甚明（李時珍）

【黍石】卽文石之古籍別名。典見別錄詳『文石』條。

【黍米粥】**性質**　甘。溫。無毒。

主治　益氣。治脾胃虛寒。洩痢吐逆。小兒痘瘡白色。

【黍莖根】**性質**　辛。熱。有小毒。

主治　煮汁飲之解苦瓠毒。浴身去浮腫。和小豆煮汁服下小便。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論黍莖根曰燒灰酒服方寸匕治妊娠尿血丹黍根莖煮汁服利小便止上喘。

參攷資料　醉臥黍穰令人生厲人家取其莖穗作提拂掃地用以煮汁入藥更佳（孟詵）

【黍蜋蜣】卽沙米之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『沙米』條。

【黍黏子】卽牛蒡子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛蒡子』條。

【黍麴草】卽鼠麴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠麴草』條。

【黑三稜】㈠卽三稜之古籍別名。典見圖經本草。詳『三稜』條。㈡卽荸薺之古籍別名。典見博濟方。詳『荸薺』條。

【黑三稜粉】卽荸薺粉之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『荸薺粉』條。

【黑大豆】**原名**　大豆。

命名　本品有黑白二種。入藥用其色黑者故名。

處方用名　黑豆。烏豆。

古籍別名　大豆。（本經）菽。（俗名）末。（綱目）

外國名詞　Black Soja-bean.（英）

基本　屬豆科。爲黑大豆之種子。

產地　凡江、浙、湘、鄂諸地之原野間。恒多產焉。

形態　黑大豆爲一年生草本。廣種於亞洲之東部。莖高二三尺。葉爲三片複葉。其小葉作卵圓形。頭端尖。莖與葉俱密生茸毛。花開於夏日。色白或帶紫。形似蛺蝶。果實爲莢果。亦生茸毛。中藏種子四五粒。其種類極多。以其成熟有早晚。種子有大小。色又各不相同。故名稱遂異也。

種植　每年夏至前後下種。凡田野園圃間恒多栽植。

採取　九月間採之。

製法　採得去莢殼。曬乾。炒用。或生用。

性質　甘。平。無毒。

成分　黑大豆中含有植物性蛋白質極多。故食料必需之。於其營養上分析之。得各成分如下。水分一六・〇　九蛋白質四〇・二　五脂肪一八・二　六無窒素物二一・九　七纖維三・八　六灰分四・五四。

效能　祛風熱。解諸毒。兼有滋養之效。

主治　生研塗癰腫。煮汁飲。殺鬼毒止痛。（本經）逐水脹。除胃中熱痺。傷中淋露。下瘀血。散五臟結積。內寒。殺烏豆毒。炒爲屑。主胃中熱。除痺。去腫止腹脹。消穀。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論黑大豆曰。煮食。治溫毒水腫【唐】陳藏器本草拾遺論黑大豆曰。炒黑熱。投酒中飲之。治風痺癰緩口噤。產後頭風。食罷生吞半兩。去心胸煩熱。熱風恍惚。明目鎮心。溫補。久服好顏色。變白不老。煮食性寒。下熱氣腫。壓丹石煩熱。消腫【唐】孟詵食療本草論黑大豆曰。主中風腳弱。產後諸疾。同甘草煮湯飲。去一切熱毒氣。治風毒脚氣。煮食治心痛。筋攣。膝痛腹滿。同桑柴灰煮食。下水鼓腹腫。和飯搗塗一切毒腫。療男女人陰腫。以綿裹納之【宋】日華諸家本草論黑大豆曰。調中下氣。通關脈。制金

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石藥毒。牛馬溫毒。【明】李時珍本草綱目論黑大豆。曰。煮汁解礬石、砒石、甘遂、天雄、附子、射罔、巴豆、芫青、斑蝥、百藥之毒。及蠱毒。入藥治下痢臍痛。衝酒治風痙及陰毒腹痛。牛膽貯之。止消渴。治腎病。利水下氣。制諸風熱。活血。解諸毒。

配合應用　㊀服食大豆。令人長肌膚。益顏色。填骨髓。加氣力。補虛能食。不過兩劑。用大豆五升。如作醬法。取黃搗末。以猪肪煉膏和丸。梧子大。每服五十丸。至百丸。溫酒下。神驗。祕方也。肥人不可服之。（延年祕錄方）

㊁救荒濟饑。博物志云。左慈荒年法。用大豆粒細調勻者。生熟按令光暖。飲豆內。先日不食。以冷水頓服訖。一切魚肉菜菜不得復經口。渴即飲冷水。初小困。十數日後。體力壯健。不復思食也。黃山谷救荒法。黑豆、貫衆各一升。煮熟。去衆。曬乾。每日空心啖五七粒。食百水枝。藥皆有味。可飽也。王氏農書云。昔晉惠帝永寧二年。黃門侍郎劉景先。表奏臣遇太白山隱民傳濟饑辟穀仙方。臣家大小七十餘口。更不食別物。若不如斯。臣一家甘受刑戮。其方用大豆五斗。淘淨。蒸三遍。去皮。用大麻子三斗。浸一宿。亦蒸三遍。令口開。取仁。各搗爲末。和搗作團。如拳大。入甑內蒸。從戌至子時止。寅時出甑。午時曬乾爲末。乾服之。以飽爲度。不得食一切物。第一頓得七日不饑。第二頓得四十九日不饑。第三頓得三百日不饑。第四頓得二千四百日不饑。更不必服。永不饑也。不問老少。但依法服食。令人强壯。容貌紅白。永不憔悴。口渴即研大麻子湯飲之。轉更滋潤臟腑。若要重喫物用爽子三合。研末。煎湯冷服。取下藥如金色。任喫諸物。並無所損。前知隨州朱頌敎民用之有驗。序其首尾。勒石於漢陽大別山太平興國寺。又方用黑豆五斗。淘淨。蒸三遍。曬乾。去皮爲末。秋麻子三升。浸去皮。曬研。糯米三斗。做粥和搗爲劑。如拳大。入甑中。蒸一宿。取曬爲末。用紅小棗五斗。煮去皮核。和爲劑。如拳大。再蒸一夜。服之。至飽爲度。如渴飲麻子水。便滋潤臟腑也。脂麻亦可。但不得食一切之物。

㊂炒豆紫湯。蘇頌曰。古方有紫湯。破血去風。除氣防熱。產後兩日尤宜服之。用烏豆五升。清酒一斗。炒令烟絕。投酒中。待酒紫赤色。去豆。量性服之。可日夜三盞。神驗。中風口噤。加雞屎白二升。和炒投之。

㊃豆淋酒法。寇宗奭曰。治產後百病。或血熱覺有餘血水氣。或中風困篤。或背强口噤。或但煩熱瘛瘲。口渴。或身頭皆腫。或身痒嘔逆。直視。或手足頑痺。頭旋眼眩。此皆虛熱中風也。用大豆三升。熬熟至微烟出。入瓶中。以酒五升沃之。經一日以上。服酒一升。溫覆。令少汗出。身潤即愈。口噤者。加獨活半斤。微微搥破同沃之。產後宜常服。以防風氣。又消結血。

㊄治中風口噤。即上方日服一升。（千金方）

㊅治頭風頭痛。即上方密封七日溫服。（千金方）

㊆治破傷中風口噤。用大豆一升。熬去腥氣。勿使太熟。杵末。蒸令氣遍。取下甑。以酒一升淋之。溫服一升。取汗。傅膏瘡上。即愈。（千金方）又用黑豆四十枚。硃砂二十文。同研末。以酒半盞調服之。（經驗方）

㊇治頸項强硬。不得顧視。大豆一升。蒸變色。裹枕之。（千金方）

㊈治暴得風疾。四肢攣縮不能行動。取大豆三升。淘淨。蒸以醋二升。傾入瓶中。鋪於地上。設席豆上。令病人臥之。仍重蓋五六層衣。豆冷漸漸却衣。仍令一人於被內引挽攣急處。更蒸豆再作。併飲荊瀝湯。如此三日三夜即休。（崔氏纂要方）

㊉風入臟中。治新久腫。風入臟中。以大豆一斗。水五斗。煮取一斗二升。去滓。入美酒半斗。煎取九升。旦服取汗。神驗。（千金方）

㊊治風毒攻心煩躁恍惚。大豆半升。淘淨。以水二升。煮取七合。食後服之。（心鏡方）

㊋治卒風不語。大豆煮汁。煎稠如飴。含之。并飲汁。（肘後方）又治喉痺不語。（千金方）

㊌治卒然失音。用大生豆一升。青竹筭子四十九枚。長四寸。闊一分。水煮熟。日夜二服。瘥。（孟詵方）

㊍治熱毒攻眼。赤痛瞼浮。用黑

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

豆一升。分作十袋。沸湯中蒸過。更互熨之。三遍則愈。（普濟方）

㊁治卒然中惡。大豆二七枚。雞子黃一箇。酒半升。和勻頓服。（千金方）

㊂治陰毒傷寒危篤者。用黑豆炒乾。投酒熱飲。或灌之。吐則復飲。汗出爲度。（居家必用方）

㊃治腸痛如打。大豆半升。熬焦。入酒一升。煮沸飲。取醉。（肘後方）

㊄治腸脇卒痛。大豆炒二升。酒三升。煮二升。頓服。（肘後方）

㊅治卒然腰痛。大豆六升。水并澱。炒熱。布裹熨之。冷即易。乃張文仲所處方也。（延年祕錄方）

㊆治脚氣衝心。煩悶不識人。以大豆一升。水三升。濃煮取汁。服未定。再服。（廣利方）

㊇治身面浮腫。烏豆一升。水五升。煮汁三升。入酒五升。更煮三升。分溫三服。不瘥再合。（千金方）又用烏豆煮至皮乾。爲末。每服二錢。米飲下。（百一選方）

㊈治新久水腫。大豆一斗。清水一斗。煮取八升。去豆。入薄酒八升。再煎取八升。服之。再三服。水當從小便中出。（范汪方）

㊉治腹中痞氣。夏秋之交。露坐夜久。腹中痞。如鞏石在腹。用大豆半升。生薑八分。水三升。煎一升。已來。頓服。瘥。（經驗方）

㊊治霍亂腹痛。大豆生研。水服方寸匕。（普濟方）

㊋治水病不止。用大豆一升。炒白朮半兩。爲末。每服三錢。米飲下。（指南方）

㊌治赤痢臍痛。黑豆、菜萸子二件。搗摩吞嚥之良。（經驗方）

㊍治男子便血。用黑豆一升。炒焦。研末。熱酒淋之。去豆。飲酒。神效。（活人心鏡方）

㊎治一切下血。雄黑豆緊小者。以皂角湯微浸。炒熟。去皮。爲末。煉豬脂和丸。梧子大。每服三十丸。陳米飲下。（中藏經方）

㊏治小兒沙淋。黑豆一百二十箇。生甘草一寸。新水煮熟。入滑石末。乘熱飲之良。（全幼心鑑方）

㊐治腎虛消渴難治者。黑大豆炒、天花粉等分爲末。糊丸。梧子大。每黑豆湯下七十丸。日二。名救活丸。（普濟方）

㊑治消渴飲水。烏豆置牛膽中陰乾。百日吞盡。即瘥。（肘後方）

㊒治晝夜不眠。以新布火炙熨目并蒸大豆。更番囊盛枕之。冷即易。終夜常枕之。即愈。（肘後方）

㊓治疫癘發腫。大黑豆二合。炒熟。炙甘草一錢。水一盞。煎汁。時時飲之。夷堅志云。靖康二年春。京師大疫。有異人書此方於壁間。用之立驗也。

㊔治乳石發熱。烏豆二升。水九升。銅器煮五升。汁熬稠一升。飲之。（外臺祕要方）

㊕解礬砒毒。大豆煮汁飲之良。（肘後方）

㊖治酒食諸毒。大豆一升。煮汁服。得吐即愈。（廣記方）

㊗解諸魚毒。用大豆煮汁飲之。（衛生方）

㊘解巴豆毒。下利不止。大豆煮汁一升飲之。（肘後方）

㊙治惡刺瘡痛。大豆煮汁漬之。即差。（千金方）

㊚治湯火灼瘡。大豆煮汁飲之。易愈。無瘢。（毒祕錄方）

㊛治打顛青腫。用豆黃末傅之。（千金方）

㊜治折傷墮墜。瘀血在腹。氣短。大豆五升。水一斗。煮汁二升。頓服。劇者不過三作。（千金方）

㊝治跣瘡煩躁。大豆煮汁飲之佳。（子母祕錄方）

㊞治瘡瘡溼爛。黑大豆研末傅之。

㊟治小兒頭瘡。黑豆炒存性。研水調傅之。（普濟方）

㊠治染髮令烏。醋煮黑大豆去豆煎稠。染之。（千金方）

㊡治牙齒不生。不拘大人小兒。年多者。用黑豆三十粒。牛糞火內燒令烟盡。研入麝香少許。先以針挑破血出。以少許揩之。不得見風。忌酸鹹物。（經驗方）

㊢治牙齒疼痛。黑豆煮酒。類漱之良。（周密治然齋抄方）

㊣治妊娠腰痛。大豆一升。酒三升。煮七合。空心飲之。（心鏡方）

㊤治子死腹中。月數未足。母欲悶絕者。用大豆三升。以醋煮濃汁。頓服立出。（產乳方）

㊥治胞衣不下。大豆半升。醇酒三升。煮一升半。分三服。（產書方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊱辟穢時氣。以新布盛大豆一斗。納井中一宿取出。每服七粒佳。（領要方）

㊲治菜中蛇蟲。蛇毒入菜果中食之。令人得病。名蛇蟲。又豆爲末。酒漬絞汁服半升。

㊳治身如蟲行。用大豆水漬絞漿。旦旦洗之。或加少麵沐髮亦良。（千金方）

㊴治小兒丹毒。濃煮大豆汁。塗之甚良。（千金方）

㊵治風疽瘡疥。凡脚膿及膿漱中痒。搗則黃汁出者是也。以青竹筒三尺。着大豆一升在內。以馬屎糠火燒熏。以器兩頭取汁擦之。先以淡清和鹽洗之。不過三度極效。（千金方）

㊶治肝虛目暗。迎風下淚。用膿月牯牛膽盛黑豆。懸風處。取出每夜吞三七粒。久久自明。（龍木論方）

㊷治小兒胎熱。黑豆二錢。甘草一錢。入燈心七寸。淡竹葉一片。水煎。（全幼心鑑方）

㊸治天蛇頭指痛。臭甚者。黑豆生研末。入鼈內籠之。（濟急方）

用量　三錢至一兩。

施用宜忌　凡脾胃虛寒及無熱毒者禁用。畏五參、龍膽、忌豬肉、厚朴、葶藶子。得前胡、烏喙、杏仁、牡蠣及諸膽汁良。

參攷資料　㊀仙方修治末服之。可以辟穀度饑。然多食令人體重。久則如故也。（蘇頌）㊁按養老書云。李守愚每晨水吞黑豆二七枚。謂之五臟穀。到老不衰。大豆有五色。各治五臟。惟黑豆屬水性寒。爲腎之穀。入腎功多。故能治水。消脹下氣。制風熱而活血解毒。所謂同氣相求也。又按古方稱大豆解百藥毒。予每試之。大不然。又加甘草。其驗乃奇。如此之事。不可不知。（李時珍）㊂大豆性平。炒食極熱。煮食甚寒。作豉極冷。造醬及生黃卷則平。牛食之溫。馬食之冷。一體之中。用之數變。（陳藏器）㊃服葶藶子者忌炒豆。犯之脹滿致死。服葶朴者亦忌之。動氣也。（李時珍）㊄豆木皆莢穀之總稱也。篆文木象莢生附莖下垂之形。豆象子在莢中之形。廣雅云。大豆菽也。小豆苔也。（李時珍）㊅大豆有黑白黃褐青斑數色。黑者名烏豆。可入藥。及充食作豉。黃者可作腐搾油造醬。餘但可作腐及炒食而已。皆以夏至前後下種。苗高三四尺。葉團有尖。秋開小白花。成叢結莢長寸餘。經霜乃枯。按呂氏春秋云。得時之豆長莖短足。其莢二七爲族。多枝數節。大菽則圓。小菽則團。先時者必長蔓浮葉。疎節小莢。不實。後時者必短莖。疎節。本虛不實。又范勝之種植書云。夏至種豆。不用深耕。豆花憎見日。則黃爛而根焦矣。知歲所宜。以甕盛豆子。平量埋陰地。冬至後十五日發取。量之最多者種焉。蓋大豆保歲易得。可以備凶年。小豆不保歲而難得也。（李時珍）

【黑大豆皮】　**主治**　生用療瘡瘡目翳。嚼爛傅小兒尿灰瘡。

【黑大豆花】　**主治**　目盲翳膜。

【黑大豆苗】　**效能**　止渴。

【黑大豆葉】　**主治**　搗傅蛇咬。頗易取差。

參攷資料　按抱朴子內篇云。相國張文爵莊內有鼠狼穴。養四子。爲蛇所吞。鼠狼雌雄情切。乃於穴外扮土壅穴。俟蛇出頭。度其回轉不便。當腰咬斷。而劈腹啣出四子。尚有氣。置於穴外。啣豆葉嚼而傅之。皆活。後人以豆葉治蛇咬。蓋本於此。（李時珍）

【黑小豆】　卽穭豆之古籍別名。見綱目。詳『穭豆』條。

【黑山梔】　卽山梔子焙炒成者之處方用名。詳『山梔子』條。

【黑丑】　卽牽牛子之古籍別名。見綱目。詳『牽牛子』條。

【黑元參】　卽玄參之處方用名。詳『玄參』條。

【黑升麻】　卽升麻之日本名。詳『升麻』條。

【黑火柴頭魚】　卽鱧魚之古籍別名。典見醫林集要。詳『鱧魚』條。

【黑牛皃】　卽蝦蟆之古籍別名。典見綱目。詳『蝦蟆』條。

【黑司命】　卽肉蓯蓉之古籍別名。典見吳普本草。詳『肉蓯蓉』條。

【黑尻】　卽鸐之古籍別名。典見綱目。詳『鸐』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【黑玉】卽玉之色黑如純漆者。功用詳『玉』條。

【黑石】卽膽礬之古籍別名。典見本經。詳『膽礬』條。

【黑石子】卽無名異之俗名。詳『無名異』條。

【黑石脂】命名　本品卽石脂之黑色者。故名。

古籍別名　石墨。石涅。畫眉石。（綱目）

性質　鹹。平。無毒。

主治　養腎氣。强陰。主陰蝕瘡。止腸澼洩痢。療口瘡咽痛。久服益氣。不饑延年。

參攷資料　黑石脂亦可爲墨。其性黏舌。與石灰不同。南人謂之畫眉石。卽許氏說文所謂黛畫眉石也。（李時珍）

【黑石華】基本　黑石華爲石類之一種。可供藥用。

產地　生山東半島山中陰石間。

性質　甘。無毒。

主治　陰痿消渴。去熱。療婦人月水不調。

【黑羊石】產地　出山東膏兗州府宮山中。

形態　黑羊石爲石類之一種。以色黑有牆壁光瑩者可供藥用。

採取　春月掘地採之。

性質　淡。生涼。熱。無毒。

主治　解藥毒。

【黑老虎】產地　廣東北江、英德清遠等處。

主治　產後半身不遂。

【黑豆】卽黑大豆之處方用名。詳『黑大豆』條。

【黑辛夷】卽白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芍』條。

【黑林檎】卽林檎實之紫黑色者。詳『林檎』條。

【黑狗脊】㊀卽狗脊根之黑色者。功用詳『狗脊』條。㊁卽貫衆之古籍別名。典見綱目。詳『貫衆』條。

【黑芝】命名　本品卽芝草之黑色者。故名。

古籍別名　玄芝（本經）

性質　鹹。平。無毒。

主治　癰。利水道。益腎氣。通九竅。聰察。久服輕身不老。延年神仙。

【黑花蛇】卽烏梢蛇之古籍別名。典見綱目。詳『烏梢蛇』條。

【黑虎】卽黑蝦蟆之原名。詳『黑蝦蟆』條。

【黑金】卽鐵之古籍別名。典見綱目。詳『鐵』條。

【黑附子】命名　本品係用附子炮黑者。故名。

性質　辛。甘。大熱。有毒。

主治　溫通元陽。峻補虛寒。但非若生用者功能發散耳。

【黑附子】卽附子之古籍別名。典見綱目。詳『附子』條。

【黑胡椒】卽胡椒實之乾而色黑者。詳『胡椒』條。

【黑砂星】卽夜明砂之古籍別名。典見綱目。詳『夜明砂』條。

【黑風蛇】卽烏梢蛇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏梢蛇』條。

【黑料豆】卽檳豆之古籍別名。典見綱目。詳『檳豆』條。

【黑桑椹】卽桑椹之處方用名。詳『桑椹』條。

【黑荊芥】卽荊芥黑色者之處方用名。詳『荊芥』條。

【黑兜蟲】卽九香蟲之古籍別名。典見綱目。詳『九香蟲』條。

【黑參】卽玄參之古籍別名。典見綱目。詳『玄參』條。

【黑梢蛇】卽烏梢蛇之產於江東者。能經物至死。性質效能。與烏梢蛇同。詳『烏梢蛇』條。

【黑殺屋】卽夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夜明砂』條。

【黑細豆】卽檳豆之古籍別名。典見綱目。詳『檳豆』條。

【黑蛇根】卽升麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『升麻』條。

【黑魚】㊀卽鮸魚之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鮸魚』條。㊁卽鱧魚之俗名。詳『鱧魚』條。

【黑犀角】卽犀角之處方用名。詳『犀角』條。

【黑棗】卽大棗黑者之處方用名。詳『大棗』條。

【黑塌香】卽乳香之色黑者。爲乳香中之下品。效能詳『乳香』條。

【黑蜂】卽竹蜂之古籍別名。典見揚雄方言。詳『竹蜂』條。

【黑鉛】卽鉛之古籍別名。典見新集藥錄。詳『鉛』條。

【黑雌雞肉】基本　本品卽黑色毛羽雌雞

498／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之肉。

性質 甘。酸。溫。平。無毒。

主治 作羹食。治風寒溼痺。五緩六急。安胎。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論黑雌雞肉曰。治反胃及腹痛。腰折骨痛。乳癰。又新產婦以一隻治淨。和五味炒香。投二升酒中。封一宿取飲。又和烏油麻二升熬香。入酒中極效。【宋】日華諸家本草論黑雌雞肉曰。安心定志。除邪辟惡氣。治血邪破心中宿血。治癰疽。排膿。補新血。及產後虛贏。益色助氣。

【黑漆】卽乾漆之別名。詳『乾漆』條。

【黑篤耨】卽篤耨香之色黑者。詳『篤耨香』條。

【黑錫】卽鉛之處方用名。詳『鉛』條。

【黑錫灰】㊀卽鉛灰之古籍別名。㊁卽鉛灰之原名。詳『鉛』條。㊂卽鉛灰之別名。詳『鉛灰』條。

【黑頭草】卽鱧腸之古籍別名。典見綱目。詳『鱧腸』條。

【黑龍衣】卽鼈甲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼈甲』條。

十二畫 黑

十三畫 亂催僂勤嘔嗅嗎圓塊塌塔

【黑薑】卽炮薑之原名。詳『炮薑』條。

【黑穭豆】卽小豆之色黑者。功效詳『穭豆』條。

【黑鰱】卽鰱魚之古籍別名。典見綱目。詳『鰱魚』條。

【黑鱧】卽鱧魚之古籍別名。典見圖經本草。詳『鱧魚』條。

十三畫

【亂銀絲】卽杜仲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜仲』條。

【亂髮灰】卽血餘炭之原名。詳『血餘炭』條。

【催生草】卽雙頭蓮之古籍別名。典見綱目。詳『雙頭蓮』條。

【催生蘭】（綱目拾遺）**古籍別名** 報喜蘭。

形態 催生蘭爲蘭之一種。懸生樹間。勿侵地氣。種法以空爲根。以露爲命。形與蘭相似。每莖作七八枝。開花似蝴蝶。紅紫色。香味亦同。相傳謂其花遇有吉事則開。可供藥用。

主治 催生寤生者。以花懸戶上。卽生。

【催風使】 **產地** 生山地間。

基本 催風使爲雜草類之一種。冬夏常青。其葉可供藥用。

主治 療風疾。

【催歸】卽杜鵑之古籍別名。典見綱目。詳『杜鵑』條。

【僂蟾】卽蛤蚧之古籍別名。典見綱目。詳『蛤蚧』條。

【勤母】卽貝母之古籍別名。典見別錄。詳『貝母』條。

【嗢尸羅】卽茅香之古籍別名。典見金光明經。詳『茅香』條。

【嗅魚】卽河豚之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『河豚』條。

【嗎提口】（譯音）**古籍別名** 瑪替哥。

產地 此藥產於南亞美利加之祕魯國。

基本 屬芳香類。藥用根。

效能 活血行氣。壯陽强腎。

主治 腎虛白濁。白帶。白淋。

【圓三七】卽三七圓形者之別名。詳『三七』條。

【圓眼】卽龍眼之俗名。詳『龍眼』條。

上卽生。

【圓筍】卽冬筍之已出土者。長尺許。以其蘑圓。故名。性質功能。與冬筍同。詳『筍』條。

【圓蛤】卽蛤蜊圓者之別名。詳『蛤蜊』條。

【圓黃】卽牛黃成塊形者之別名。詳『牛黃』條。

【圓藥】卽落葉松茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『落葉松茸』條。

【圓荽子】卽胡荽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡荽』條。

【塊砂】卽硃砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硃砂』條。

【塊辰砂】卽硃砂之處方用名。詳『硃砂』條。

【塊沉香】卽沉香之處方用名。詳『沉香』條。

【塊滑石】卽滑石之處方用名。詳『滑石』條。

【塌香】卽乳香溶化在地者之別名。詳『乳香』條。

【塌橘】卽橘實之外皮綠色。內瓤紅色。瓣巨多液者之別名。性質效能。與尋常橘同。詳『橘實』條。

【塔頂石灰】卽天龍骨之原名。詳

499／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

『天龍骨』條。

【嫁茄】卽茄子之古籍別名。典見綱目。詳『茄子』條。

【壘瘻酸】卽石蒜之古籍別名。典見綱目。詳『石蒜』條。

【屬盤蟲】卽行夜之古籍別名。典見本草集註。詳『行夜』條。

【盧藥】基本　盧藥爲雜草類之一種。莖如乾茅。色帶黃赤。可供藥用。

性質　鹹。溫。無毒。

主治　折傷內損。瘀血。生膚止痛。治五臟。除邪氣。補虛損。產後血病。水煮服。亦可搗傅。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目。論盧藥曰。治墜馬內損。取末一兩。牛乳一錢。煎服。

【廉薑】古籍別名　薑葉。蕨蔑。（綱目）

性質　辛。熱。無毒。

主治　胃中冷。吐水。不下食。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目。論廉薑曰。溫中下氣。消食益智。

參攷資料　㈠廉薑似薑。生嶺南。劍南人多食之。（陳藏器）㈡按『蠪蝮』條。異物志云。生沙石中。似薑。大如贏。氣猛。近於臭。南人以爲蠱。其法。陳皮以黑梅及鹽汁漬之。乃成也。又鄭樵云。廉薑似山薑而根大。（李時珍）

【藁皮】卽刺蝟皮之古籍別名。典見爾雅。詳『刺蝟皮』條。

【微莖】卽藁本之古籍別名。典見別錄。詳『藁本』條。

【愛老】卽佛桑花重瓣者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『佛桑花』條。

【愛韭】卽麥門冬之齊名。典見綱目。詳『麥門冬』條。

【感米】卽苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苡仁』條。

【感藤】卽甘藤之古籍別名。典見綱目。詳『甘藤』條。

【愾火】卽景天之古籍別名。典見本經。詳『景天』條。

【搖車】卽翹搖之古籍別名。典見爾雅。詳『翹搖』條。

【搜山虎】卽羊蹄蹋根之古籍別名。典見綱目。詳『羊蹄蹋』條。

【搜夾子】卽蠪蝮之古籍別名。詳『蠪蝮』條。

【搜筵】卽吳茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『吳茱萸』條。

【搥胡根】主治　澗五臟。止消渴。除煩去熱。明目。功用與麥門冬相等。

參攷資料　生江南川谷蔭地。苗如萱草。其根似天門冬。凡用抽去心。（陳藏器）

【搬薑】卽茄連之古籍別名。詳『茄連』條。

【新坑砂】卽硇砂之古籍別名。典見綱目。詳『硇砂』條。

【新汲水】命名　本品卽井中新汲之水。故名。

主治　消渴。反胃。熱痢。熱淋。小便赤澀。卻邪調中。下熱氣。並宜飲之。射罔腫。令散。洗漆瘡。治墜損腸出。冷噴其身面。則腸自入也。又解閉口椒毒。下魚骨哽。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目。論新汲水曰。解砒石、烏喙、燒酒、煤炭、馬刀毒。治熱悶昏豬煩渴。

參攷資料　凡飲水療疾。皆取新汲清泉。不用停汚濁暖。非直無效。亦且損人。虞摶曰。新汲井華水。取天一眞氣。浮於水面。用以煎補陰之劑。及鍊丹煮茗。性味同於雪水也。（掌禹錫）

【新拿】卽旃那之別名。典見藥物大成。詳『番瀉葉』條。

【新麻布】命名　本品係麻質所織之新布。故名。

主治　能逐瘀血。婦人血閉。腹痛。產後血痛。以數重包白鹽一合。煅研。溫酒服之。

【新會皮】卽橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【新會橙】卽橙之產於廣東新會縣者。在橙類中爲最佳。詳『橙』條。

【新絲綿】主治　五野鷄病。燒灰。每服二錢。

【新雉木】形態　新雉木爲雜木之一種。結實如桃。可供藥用。

採取　七月採。陰乾用。

性質　苦。溫。無毒。

主治　風眩頭痛。煎湯沐之。

【新羅白肉】卽白附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白附子』條。

【新羅松子】卽海松子之古籍別

500／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名。典見綱目。詳『海松子』條。

【新羅芥】卽荊芥之古籍別名。典見綱目。詳『荊芥』條。

【新羅參】卽高麗參產於朝鮮新羅地方者。詳『高麗參』條。

【新羅葛】卽王瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王瓜』條。

【新羅薄荷】卽連錢草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連錢草』條。

【暈石】產地 生海底。

形態 暈石爲石類之一種。狀如石。紫褐色。乃海中鹹水所結成。自然生暈。可供藥用。

性質 鹹。寒。無毒。

主治 石淋。磨汁飲之。或燒赤投酒中飲。

【會及】卽五味子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五味子』條。

【會州白藥】形態 會州白藥爲草類之一種。葉如白蘞。可供藥用。

主治 療金瘡。止血生肌。碎末傅之。

【椰子】古籍別名 越王頭。胥餘。(綱目)南洋椰子。錫蘭椰子。西貢椰子。鳳凰椰子。帝王椰子。胥耶。(植物學大辭典)

外國名詞 Cocos nucifera, ト。(拉丁)ヤシ ポンヤシ ヤシホ ヤギ(日本)

基本 係棕櫚科椰子屬。爲椰子之子瓤。其子皮子殼。子漿。油。膏。肉。根皮。詳見各該條。



椰子

產地 亞非利加洲與東印度爲原產地。凡熱帶諸處皆有之。

形態 椰子爲喬木類之常綠木本。幹高五丈。或十丈。圍三尺許。葉大。羽狀分裂。叢生於樹幹頂上。花單性。雌雄同株。果實每年生數十枚。長形。有三稜。長八九寸。徑四五寸。大如斗。狀似瓠。繫房房相連。一房二十八實。或三十實。不等。有黃毛。韌皮。甚粗厚。苞包之。卽椰衣。中有殼。類似檳榔。殼上有二穴。殼中似蘿蔔。肉極甘脆。瓢白如雪。核圓黑堅。潤。長三寸。與膚肉皆緊着於皮。中空有清液。甘美而有酒氣。可製酒。木材堅緻。可供建築。其瓤可入藥用。

採取 六七月間實熟時採之。

性質 甘。平。無毒。

主治 益氣。

歷代記述弦證 【明】汪穎食物本草論椰子瓤曰。治風。【明】李時珍本草綱目論椰子瓤曰。令人面澤不饑。

【椰子皮】製法 蘇頌曰。不拘時月。採其根皮。入藥炙用。一云其實皮亦可用。

性質 苦。平。無毒。

主治 止血。療鼻衄。吐逆霍亂。煮汁飲之。

歷代記述弦證 【明】李時珍本草綱目論椰子皮曰。治卒心痛。燒存性。研。以新汲水服一錢。極驗。

【椰子油】基本 本品係用椰子果核榨取之油。

外國名詞 Oleum Cocois. (拉丁) Cocoa-nut Oil Corps Oil. (英) Kokosnusol. (德)

形態 椰子油爲類似豚脂之脂肪油。色白或微帶黃。帶一種臭氣。比重〇・八一至〇・八三。凝固點十六至十八度。融解點二十四至二十八度。酒精難於溶解。置空氣中易於變性。

製法 壓搾果核。絞出其油。或與水同煮。候沸。將浮於液面之油。放冷收取。是爲粗製油。若更將粗製油融解。加熱。通以蒸氣。除淨揮散之分。再加白土。細細攪拌。更用熱水洗滌。收取其油。卽成精製油。

成分 椰子油中含加布洛酸、(Caproic Acid.)加布渤克酸(Caprylic Acid.)老渤克酸(Laurie Acid.)迷利歇克酸(Myristic Acid.)薄爾密知克酸(Palumitic Acid)諸成分。因以構成倔利失林與伊打。

主治 塗擦皮膚腫脹變硬。及瘡疥癬疾。

【椰子肉】主治 益氣生風。筋骨疼痛。楊梅下疳。

【椰子殼】主治 楊梅瘡。筋骨痛。燒存性。臨時炒熱。以漬酒泡服二三錢。暖覆取汗。其痛卽止。神驗。

【椰子漿】古籍別名 椰中酒。(俗名)樹頭酒。

501／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　甘。溫。無毒。

主治　止消渴。塗頭益髮令黑。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論椰子漿曰。治吐血水腫。去風熱。

參攷資料　㊀椰子漿性熱。故飲之者多昏如醉狀。異物志云。食其肉則不饑。飲其漿則增渴。（李時珍）㊁椰子生海南極熱之地。土人賴此解夏月毒渴。天之生物。各因其材也。（朱丹溪）

【椰子膏】**基本**　本品係以椰子殼熬成黑色之膏。

主治　塗癬疾。

【椰中酒】卽椰子漿之俗名。詳『椰子漿』條。

【椰根皮】**製法**　實皮亦可入藥。俱宜炙用。

性質　苦。平。無毒。

主治　麥汁飲。止吐衄霍亂。燒研。新汲水服。止卒心痛。

【椰樹油】**基本**　本品卽椰樹以火炙出之油。

主治　祛暑止渴。療齒痛。鳥髭髮。塗凍瘡。

【椶】㊀卽木棕之古籍別名。典見爾雅。詳『木棕』條。㊁卽柚之古籍別名。典見綱目。詳『柚』條。

【椶魚】卽椶櫚子之古籍別名。典見綱目。詳『椶櫚子』條。

【椶筍】㊀卽椶櫚子之古籍別名。典見綱目。詳『椶櫚子』條。㊁卽椶櫚子之嫩者。詳『椶櫚子及花』條。

【椶蟲】**主治**　赤白帶腸紅血痢。其行血而又能補血。功同當歸。

參攷資料　滇南各甸土司記。椶蟲產騰越州外各土司中。穴居椶櫚木中。食其根脂汁。狀如海參。粗如臂。色黑。土人以爲珍饌。土司餽貴客。必向各峒丁索取此蟲作供。連椶木數尺解送。剖木取之。作羹味絕鮮美。肉亦堅飄而腴。絕似遼東海參。云食之增髓益血。尤治帶下。彼土婦人無患帶者。以食此蟲也。（趙恕軒）

【椶櫚】**命名**　本品皮中毛縴如馬之鬉鬣。故名。

處方用名　棕櫚皮。棕櫚炭。

古籍別名　栟櫚（綱目）椶鬣。

棕袒。棕櫚（俗名）子名椶筍或椶魚。（醫學大辭典）

外國名稱　Trachycarpus excelsa, Wendl.（拉丁）シュロ（日本）

基本　係椶櫚科。爲椶櫚之樹皮。

產地　凡暖地山野及川廣諸地均有出。



椶櫚

形態　椶櫚爲常綠喬木。幹直立。似圓柱。高二三丈。無枝條。幹之周圍全面。留有舊葉柄之基脚部。徑四寸至八寸。葉甚大。作掌狀分裂。有長柄叢生幹端外向。四面花小。色淡黃。集生於分枝之花軸上。由苞以包被之。其苞大。色亦淡黃。雄花形如粟粒。雌花結實。呈核果狀。大似蚓豆。其在葉之基部而包幹之皮中。有絲毛。頗强韌。稱爲椶毛。可供器具繩帶箱簞之材料。其皮月生一瓣。歲生十二瓣。如當閏月。多生一瓣。惟此瓣較小。中間有界紋。且瓣無完成者。與常瓣有別。稱爲閏月椶櫚皮。

採取　九月十月間。採皮陰乾。

製法　大明曰。凡使椶櫚皮。宜燒存性用。

性質　苦。澁。平。無毒。

效能　澁腸固脫。瀉熱止血。專作收斂藥。

主治　止鼻衄吐血。破癥。治腸風赤白痢。崩中帶下。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論椶櫚皮曰。主金瘡疥癬。生肌止血。【明】繆希雍本草經疏論椶櫚皮曰。椶櫚皮。味苦澁。氣平無毒。本經主諸病。皆燒灰用者。凡血得熱則行。得黑灰則止。故主鼻衄吐血。苦能瀉熱。澁可去脫。故主崩中帶下。及腸風赤白痢也。止血固脫之性。而能消瘀血。故能破癥也。凡失血過多。內無瘀滯者用之。切當與亂髮灰同入更良。如暴得吐血。瘀滯方動。暴得崩中。惡露未竭。澁熱下痢。初發腸風帶下方熾。悉不宜遽用。卽用亦無效。入藥須年久敗者良。

配合應用　㊀治鼻血不止。椶

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

櫚灰。隨左右吹之。(黎居士方)

㈡治血崩不止。櫚櫚皮。燒存性。空心淡酒服三錢。一方加根白。(攀等分。(婦人良方)

㈢治血淋不止。櫚櫚皮半燒半炒。爲末。每服二錢。甚效。(衛生家寶方)

㈣治下血不止。櫚櫚皮半斤。栝樓一箇。燒灰。每服二錢。米飲調下。(百一選方)

㈤治水穀痢下。櫚櫚皮。燒研。水服方寸匕。(近效方)

㈥治小便不通。櫚皮毛燒存性。以水酒服二錢。即通。利。累試甚驗。(攝生方)

用量　錢半至二錢。

施用宜忌　凡無瘀滯及有實邪者禁用。

參攷資料　㈠櫚皮燒黑。治婦人血露。及婦人吐血。須佐以他藥。(寇宗奭)㈡櫚灰性澀。若失血過多。瘀滯已盡者。用之切當。所謂澀可去脫也。與亂髮同用。更良。年久敗櫚入藥尤妙。(李時珍)㈢櫚櫚川廣甚多。今江南亦種之。最難長。初生葉如白及。葉高二三尺。則木端數葉。大如扇。上擘四散。歧裂。其莖三稜。四時不凋。其幹正直。無枝。近葉有皮裹之。每長一層。即爲一節。幹身赤黑。皆筋絡。宜爲鐘杵。亦可旋爲器物。其皮有絲毛。錯縱如織。剝取。縷解。可織衣帽褥椅之屬。大爲時利。每歲必兩三剝之。否則樹死。或不長也。三月於木端莖中出數黃苞。苞中有細子成列。乃花之孕也。狀如魚腹孕子。謂之櫚魚。亦曰櫚筍。漸長出苞。則成花穗。黃白色。結實。纍纍大如豆。生黃熟黑。甚堅實。或云南方此木有兩種。一種有皮絲可作繩。一種小而無絲。惟葉可作帚。鄭樵通志以爲王彗者非也。王彗乃落帚之名。即地膚子。別有蒲葵。葉與此相似而柔薄。可爲扇笠。許愼說文以爲櫚櫚亦誤矣。(李時珍)

【櫚櫚子及花】　古籍別名　子嫩者名櫚筍。(綱目)

性質　苦澀。平。無毒。

主治　澀腸止瀉。痢腸風。崩中帶下。及養血。

參攷資料　㈠櫚櫚子有小毒。戟人喉。未可輕服。(陳藏器)㈡櫚櫚子溫。有大毒。不堪食。(李珣)㈢櫚魚皆言有毒。不可食。而廣蜀人蜜煮醋浸。以供佛寄遠。蘇東坡亦有食櫚筍詩。乃制去其毒爾。(李時珍)

【櫚蠹】　即櫚櫚之俗名。詳『櫚櫚』條。

【櫚桑】　即椹之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『椹』條。

【椹聖】　即蟦撥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蟦撥』條。

【椿】　即椿樗白皮之簡稱。詳『樗白皮』條。

【椿根白皮】　即椿樗白皮之處方用名。詳『樗根白皮』條。

【椿樗白皮】　原名　香者名椿。臭者名樗。山樗名栲。

處方用名　椿根白皮。臭樗皮。香椿皮。

古籍別名　大眼桐。(綱目)虎目樹。山椿虎眼。(綱目拾遺)

外國名稱　Ailanthus glandulosa, Desf.

基本　屬楝科香椿之根皮。



椿　樗　白　皮

產地　陳仁山藥物生產辨云。樗白皮產直隸西山齋堂地方。收成限於五月初一至十五日爲止。過此時期。則難以剝削也。

形態　香椿爲落葉喬木。高達三四丈。葉爲羽狀複葉。小葉作平滑長橢圓形。前端尖。嫩時呈紅色。與枝俱有氣味。五六月間。開五瓣小白花。後結黃褐色鐘狀實。根皮厚。作淡褐色。內面有布紋。藥舖往往有以山茶花根皮混充者。

採取　五月間剝採木皮及根皮。陰乾。

製法　雷敩曰。凡使椿根皮。須用不近西頭者爲上。採出以生葱拌蒸半日。剉細。以袋盛。掛屋南畔陰乾用。李時珍曰。椿樗木皮根。並刮去粗皮。陰乾。臨用時。切焙入用更佳。

性質　苦。溫。無毒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

效能　燥溼。清熱。滌腸。固下。專作收斂藥。

主治　疳蠹。樗根尤良。

歷代記述致歷　【南北朝】雷敩雷公炮炙論椿樗白皮曰。利溺溫。【唐】陳藏器本草拾遺論椿樗白皮曰。去口鼻疳蟲。殺蚘蟲疥蠹。鬼疰傳尸蠱毒下血。及赤白久痢。【唐】蕭炳四聲本草論椿樗白皮曰。得地榆止疳痢。【宋】大明日華諸家本草論椿樗白皮曰。止女子血崩產後血不止。赤帶腸風。瀉血不住。腸滑瀉縮小便。蜜炙用。【元】朱丹溪本草衍義補遺論椿樗白皮曰。治赤白濁。赤白帶。溼氣下痢。精滑夢遺。燥下溼。去肺胃陳積痰。【明】繆希雍本草經疏論椿樗白皮曰。椿味苦有毒。甄權言微熱。震亨言涼而燥。然考其用。必是微寒苦燥之藥。入手足陽明經。本經主甘蠹及洗疥瘡風疽。藏器去口鼻疳蟲疥蠹者。因腸胃有溼熱。故現是證。苦涼而燥。所以外治皆得也。藏器又主殺蚘蟲蟲毒下血。及赤白久痢。日華子主腸風瀉血。蕭炳云。得地榆主疳痢。孟詵云。止女子血崩及產後血不止。赤帶。皆取其苦能燥溼。寒能除熱。澁能收斂之功耳。採得去粗皮蜜炙用。【明】李士材本草圖解論椿樗白皮曰。樗白皮苦而微溫。專以固攝爲用。故瀉痢腸風。遺濁崩帶者。並主之。然必病久而滑。始爲相宜。若新病蚤服。強勉固澁。必變他症而成痼疾矣。凡用刮去粗皮。生用則能通利。酸醋炙。能固澁。

國外學說　英美學說謂臭樗產中國。印度。國取該樹根皮可爲藥品。第藥肆中所出售者。則係此樹皮而非純根皮。其功用。能開胃收斂。驅蟲。處方以臭樗根皮一分。沸水二十分。泡兩點鐘。濾渣爲度。每服一兩至二兩。（臭樗泡水方）又臭樗鮮根皮汁三分。濃酒一分。和勻。候七天過淋紙爲度。宜存陰涼處。每服二錢。一分至三錢一分半。（臭樗汁方）

配合應用　㊀治下血經年。樗根白皮三錢。水一盞。煎七分。入酒半盞服。（存仁方）

㊁治小兒疳痢困重者。用樗根白皮搗粉。以水和棗作大餌飩子。日曬少時。又搗。如此三遍。以水煮熟。空腹吞七枚。重者不過七服愈。（外臺祕要方）

㊂治小兒疳疾。樗根白皮日乾二兩爲末。以粟米淘淨。研濃汁和丸。梧子大。十歲兒二四丸。米飲下。量大小加減。仍以一丸納竹筒中。吹入鼻內。二度良。（子母祕錄方）

㊃治下利清血。腹中刺痛。樗根皮。洗刮麤研。醋糊丸。梧子大。空心米飲下三四十丸。（經驗方）

㊄治產後腸脫不能收拾者。樗根取皮。焙乾。一握。水五升。連根葱五莖。漢椒一撮。同煎至三升。去渣。傾盆內。乘熱熏洗。冷則再熱。一服可作五次用。洗後睡少時。忌鹽醋醬麵發風毒物。及用心勞力等事。（婦人良方）

㊅治女人白帶。椿根白皮、滑石等分爲末。粥丸。梧子大。空腹白湯下一百丸。（丹溪方）

㊆寇宗奭云。洛陽一女子。年四十六七。耽飲無度。多食魚蟹。畜毒在臟。日夜二三十瀉。大便與膿血雜下。大腸連肛門痛不堪。忍醫以止血痢藥不效。又以腸風藥則益甚。蓋腸風則有血無膿。如此半年。氣血漸弱。食減肌瘦。服熱藥則腹愈痛。血愈下。服冷藥則注泄食減。服溫平藥則病不知。如此期年。垂命待盡。或人教服人參散一服知。二服減。三服膿血皆定。遂常服之而愈。其方治大腸風虛。飲酒過度。挾熱下痢。膿血痛甚。多日不瘥。用樗根白皮一兩。人參一兩。爲末。每服二錢。空心米飲調服。忌油膩。溼麵。青菜。菓子。甜物。雞。豬。魚。羊。蒜。雞等。

㊇治休息痢疾。日夜無度。腥臭不可近。臍腹撮痛。東垣脾胃論用椿根白皮。詞黎勒各半兩。母丁香三十箇。爲末。醋和丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。又用椿根白皮。東南行者。長流水內漂三日。去黃皮。稍爲末。每一兩加木香二錢。粳米飯爲丸。每服一錢二分。空腹米飲下。（唐瑤經驗方）

㊈治水穀下痢。及每至立秋前後。即患痢。兼腰痛。取樗根一大兩。擣篩。以好麵捻作餌飩。如皁子大。水煮熟。每日空心服十枚。並無禁忌。神良。（劉禹錫傳信方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治下利清血。腹中刺痛。椿根白皮洗刮曬研。醋和丸。梧子大。每空心米飲下三四十丸。一加蒼朮枳殼減半。（經驗方）

㊁治臟毒下痢赤白。用香椿洗刮取皮。日乾爲末。飲下一錢立效。（經驗方）

㊂治臟毒下血。溫白丸。用椿根白皮去粗皮酒浸曬研。棗肉和丸。梧子大。每淡酒服五十丸。或酒糊丸亦可。（儒門事親方）

㊃治血痢下血。臚月未出時。取背陰地北引樗根皮。東流水洗淨。掛風處陰乾爲末。每二兩入寒食麵一兩。新汲水丸。梧子大。陰乾。每服三十丸。水煮漿傾出。溫水送下。忌見日則無效。名如神丸。（普濟方）

㊄治脾毒腸風。因營衛虛弱。風氣襲之。熱氣乘之。血滲腸間。故大便下血。用臭椿根刮去粗皮。焙乾四兩。蒼朮米泔浸。焙、枳殼。麩炒。各一兩。爲末。醋糊丸。如梧子大。每服五十丸。米飲下。日三服。（本事方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛而積滯未盡者禁用。

參攷資料　㊀椿根白皮性涼而能澀血。凡澀熱爲病。瀉痢濁帶精滑夢遺諸證無不用之。有燥下澀及去肺胃陳痰之功。治泄瀉有除澀實腸之力。但痢疾滯氣未盡者。不可遽用。宜入丸散。亦可煎服。不見有害。予每用炒研糊丸。看病作湯使。名固腸丸也。（朱震亨）㊁椿皮色赤而香。樗皮色白而臭。多服微利人。蓋椿皮入血分而性濇。樗皮入氣分而性利。不可不辨。其主治之功雖同。而濇利之效則異。正如茯苓芍藥赤白顏殊也。凡血分受病不足者。宜用椿皮。氣分受病有鬱者。宜用樗皮。此心得之微也。乾坤生意治瘡腫下藥用樗皮以無根水研汁服二三碗。取利數行。是其驗矣。故陳藏器言樗皮有小毒。蓋有所試也。（李時珍）㊂椿樗易長而多壽。考故有椿樗之稱。莊子言大椿以八千歲爲春。秋是矣。椿香而樗臭。故椿字又作櫄。其氣熏也。樗字從虐。其氣臭人。呵嘘之也。樗亦椿音之轉。爾雅藏器曰。俗呼椿爲豬椿。北人呼樗爲山椿。江東呼爲虎目樹。亦名虎眼。謂葉脫處有痕。如虎之眼目。又如樗蒲子。故得此名。（李時珍）㊃二木南北皆有之。形幹大抵相類。但椿木實而葉香可啖。樗木疏而氣臭。膳夫亦能熬去氣。並採無時。樗木最爲無用。莊子所謂吾有大木。人謂之樗。其木擁腫。不中繩墨。小枝曲拳。不中規矩者。爾雅云。椿山樗。郭璞註云。椿似樗。色小白。生山中。因名。亦類漆樹。俗語云。櫹樗椿漆。相似如一。陸璣詩疏云。山椿與田樗無異。葉差狹爾。吳人以葉爲茗。（蘇頌）㊄樗之有花者無莢。有莢者無花。其莢夏月常生臭樗上。未見椿上有莢者。然世俗不辨椿樗之異。故呼樗莢爲椿莢爾。（掌禹錫）㊅椿樗椿乃一木三種也。椿木皮細肌實而赤。嫩葉香甘。可茹。樗木皮粗肌虛而白。其葉臭惡。歉年人或採食。椿木即樗之生山中者。木亦虛大。梓人亦或用之。然爪之如腐朽。故古人以爲不材之木。不似椿木堅實。可入棟樑也。（李時珍）

【椿樗莢子】　古籍別名　鳳眼草（綱目）

主治　腸風便血。小便下血。療骨鯁。

【椿樗葉】　性質　苦。溫。有小毒。

主治　煮水洗瘡疥風疽。樗木根葉尤良。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論椿樗葉曰。白禿不生髮。取椿桃楸葉心。搗汁頻塗之。

參攷資料　㊀椿葉無毒。樗葉有小毒。（李時珍）㊁椿樗之嫩芽。瘉食。消風祛毒。（生生編）㊂椿芽多食動風。熏十二經脈。五臟六腑。令人神昏。血氣微若。和豬肉熱麵頻食。則中滿。蓋攤經絡也。（孟詵）

【楊氏子】　卽楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楊梅』條。

【楊妃垢】　卽古鏡鏽之古籍別名。典見綱目。詳『古鏡鏽』條。

【楊妃粉】　產地　出陝西西安府馬嵬坡上。去浮土三尺。再下有此粉。膩滑光潔。

主治　拭面去黯斑雀斑。美顏色。

【楊果】　卽楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楊梅』條。

【楊枹】　卽古朮之古籍別名。典見。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

綱目。詳『白朮』條。

【楊柳】卽柳之古籍別名。典見綱目。詳『柳』條。

【楊桐】卽南天燭之古籍別名。典見綱目。詳『南天燭』條。

【楊家果】卽楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楊梅』條。

【楊梅】**命名**　本品形如水楊子而味酸似梅。故名。

古籍別名　杭子（綱目）火實。火齊金丸。楊果。龍睛。楊氏子。楊家果。鶴頭紅。鶴頂紅。日精曹公。（和漢藥考）

外國名稱　Myrica rubra, S. et Z（拉丁）

基本　屬楊梅科。爲楊梅之果實。

產地　凡山野川谷間恒有產焉。

形態　楊梅爲常綠樹。產暖地。寒冷處鮮有之。樹高二丈餘。葉作倒卵圓形。或長橢圓形。彼此互生。初夏開褐色小花。雄雌異株而生。入秋則結核果。球圓形。色帶白或紅紫。大三四分許。外有無數之乳頭突起。厥狀頗似蛇莓。味酸甘。樹皮頗厚。外現黃灰黑色。有縱裂之淺溝。內作暗褐色。味具收斂之性。入水煎之則得紅褐色之液汁。其中含有鞣酸及黃色素等。



楊梅

採取　五月採實。

性質　酸甘。溫。無毒。

效能　用爲收斂藥及調氣和胃藥。

主治　鹽藏食。去痰。止嘔噦。消食。下酒乾作屑。臨飲酒時服方寸匕。止吐酒。

歷代記述攷證　【宋】孟詵食療本草。論楊梅曰。止渴和五臟。能滌腸胃。除煩憒惡氣。燒灰服。斷下痢甚驗。鹽者常含一枚。咽汁。利五臟下氣。【清】王士雄隨息居飲食譜。論楊梅曰。楊梅甘酸溫。宜醃鹽少許。食析醒止渴。活血消痰。滌腸胃。除煩懣惡氣。鹽藏蜜漬。酒浸糖收。爲脯爲乾。消食止痢。大而純甜者。勝多食動血。酸者尤甚。諸病挾熱者忌之。

國外學說　本草食鑑曰。楊梅實氣味酸甘溫。無毒。主治消食。止嘔及渴。滌腸胃。除惡氣。又大和本草曰。楊梅五月實熟。實大色紫黑。味甘美。本草云。鹽藏食之。能去疾。止嘔噦。消食。下酒。常含鹹楊梅一枚。利咽汁。五臟下氣。人家多儲之。

配合應用　㊀治下痢不止。用楊梅燒研。每米飲服二錢。日二服。（普濟方）

㊁治頭痛不止。楊梅爲末。以少許嚏鼻。取嚏妙。

㊂治頭風作痛。楊梅爲末。每食後薄荷茶服二錢。或以消風散同煎服。或同搗末。以白梅肉和丸。彈子大。每食後葱茶嚼下一丸。（朱氏集驗方）

㊃治一切損傷。止血生肌。令無瘢痕。用鹽藏楊梅和核搗如泥。敷成挺子。以竹筒收之。凡遇破傷研末傳之。神聖絕妙。（經驗方）

參攷資料　㊀楊梅生江南嶺南山谷。樹若荔枝樹。而葉細陰青。子形似水楊子而生青熟紅。肉在核上。無皮殼。四月五月採之。南人醃藏爲果。寄至北方。（馬志）㊁楊梅樹葉如龍眼及紫瑞香。冬月不凋。二月開花結實。形如楮實子。五月熟。有紅白紫三種。紅勝於白。紫勝於紅。顆大而核細。鹽藏蜜漬餡收。皆佳。東方朔林邑記云。邑有楊梅。其大如盂盌。青時極酸。熟則如蜜。用以釀酒。號爲梅香酎。甚珍重之。贊寧物類相感志云。桑上接楊梅。則不酸。楊梅樹生癩。以甘草釘之。則無。皆物理之妙也。（李時珍）㊂熱微毒。久食令人發熱損齒及筋。忌生葱同食。（孟詵）

【楊梅青】卽空青之古籍別名。典見綱目。詳『空青』條。

【楊梅核仁】**採取**　以柿漆拌核曝之。則核自裂。取仁用。

主治　腳氣。

【楊梅樹皮及根】**主治**　煎湯洗疥癬惡瘡。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論楊梅樹皮及根曰。煎水漱牙痛。服之解砒毒。燒灰油調。塗湯火傷。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【楊梅樹皮及根皮】　主治　煎湯洗惡瘡疥癬。

歷代記述弦證　【明】李時珍本草綱目論楊梅樹皮及根皮曰。煎水漱牙痛。服之解砒毒。燒灰油調。塗湯火傷。

配合應用　㊀治中砒毒。心腹絞痛。欲吐不吐。面青肢冷。用楊梅樹皮煎湯二三盞。服之即愈。（王碩易簡方）

㊁治風蟲牙痛。用楊梅根皮厚者。焙一兩。川芎。藁五錢。麝香少許。研末。每用半錢。鼻內嚏之。口中含水。涎出痛止。（普濟方）又用楊梅根皮。韭菜根。廚案上油泥等分。搗勻。貼於兩腮上。半時辰。其蟲從眼角出也。屢用有效之方。（摘要方）

【楊溪瓜】即西瓜之秋生冬熟者。功效較尋常西瓜良。詳『西瓜』條。

【楊櫨】　古籍別名　空疏。（唐本草）

外國名詞　Diervilla japonica, DC.（拉丁）タニウツギ（日本）

基本　係忍冬科楊櫨屬。爲楊櫨之葉。

產地　生山野及籬垣間。

形態　楊櫨爲灌木類之落葉木本。高六七尺餘。葉大。對生。卵形而尖。有鋸齒。下面生毛。六月間開花。合瓣花序。甚長。帶赤色。花冠之筒上部膨大。花柱亦長。而略短於花冠。雄蕊五。雌蕊一。常以數花攢簇而生。結實爲莢果。其葉可供藥用。



楊櫨

性質　苦。寒。有毒。

主治　疽瘍惡瘡。水煮汁洗之。立瘥。

【楊櫨耳】　基本　本品係楊櫨木上所生之木耳。

性質　平。無毒。

主治　老血結塊。破血止血。煮服之。

【楓人】即楓香脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楓香脂』條。

【楓子鬼】即楓香脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楓香脂』條。

【楓上寄生】　原名　風木藤。

古籍別名　吊殺猢猻。上樹猢猻。鐵角猴兒。（綱目拾遺）

基本　係屬漆樹科。爲楓樹枝節處附着之寄生物。

形態　楓上寄生。即楓樹間之蔓藤。年遠結成連珠如傀儡者。可供藥用。

主治　追風。燕酒服。爲治癱瘓。勾急之要藥。同金雀根、土當歸、石牀花根、石蠶。燕酒服。

【楓木上毬】即楓果之別名。典見綱目。詳『楓果』條。

【楓木皮】　性質　辛。平。有小毒。

主治　止水痢。煎飲。

歷代記述弦證　【宋】大明諸家本草論楓木皮曰。止霍亂。刺風。冷風。煎湯浴之。

參攷資料　楓皮性澀。能止水痢。蘇恭云。下水腫。水腫非澀藥所療也。（陳藏器）

【楓皮】即楓香脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楓香脂』條。

【楓乳】即楓香脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楓香脂』條。

【楓果】　原名　楓實。

命名　本品即楓樹所結之果實。故名。

古籍別名　攝子。路路通。（綱目拾遺）九空子。（俗名）

形態　楓果外有刺球如栗殼。內有核多孔穴。如蜂窠。可供藥用。

採取　以產浙江臨安及安樂山者良。入藥尤以無蟲陳久者用。

主治　辟瘴卻穢。明目除濕。舒經絡拘攣。周身痺痛。手足及腰痛。焚之嗅其烟氣。皆愈。熏衣被可除蚤。

配合應用　㊀治癬。楓木上毬十個。燒灰存性。白礬五釐。共末。香油搽上。即愈。（德勝堂方）

㊁治臟毒。路路通一個。煅存性。研末。酒煎服。（古今良方）

參攷資料　楓果俗名路路通。村廛簪於髮。云可明目。宜老焚之。香郁可爛衣辟邪。出雲南者焚之。殺鬼。去邪辟瘴。溼而其性大能通十二經穴。故治水腫脹用之。以其能逐伏水也。（綱目拾遺）

【楓香果】即楓果之別名。詳『楓

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

果』條。

【楓柳皮】產地　寄生楓樹間。

形態　楓柳爲寓木類之一種。其葉似槐。莖赤根黃結實。六月成熟。色綠而細。其莖皮剝取可供藥用。

性質　辛。大熱。有毒。

主治　風齲齒痛。

歷代記述弦證　【明】李時珍本草綱目論楓柳皮曰。積年痛風不可忍。久治無效者。細剉焙。不限多少。入臘糜浸酒。常服。以醉爲度。

【楓香脂】命名　本品乃楓樹之脂。色白氣香。其狀如膠。故又謂之白膠香。

古籍別名　白膠香(綱目)。須薩折羅婆香(金光明經)。楓脂。楓乳。楓人。楓皮。楓子鬼。雲香。(和漢藥考)。攝攝(爾雅)。香楓(俗名)。

外國名詞　Mastix.(拉丁)(德)Mastiche.(英)

基本　屬漆樹科。爲楓樹枝幹損傷處。其脂滲出。凝結之塊。

產地　凡中國南方。及南歐北非等處之山野岩谷間。恒有生焉。

形態　楓爲灌木。本產於中國及南歐、北非等處。高一丈至丈五。葉爲羽狀複葉。小葉形如披針。或爲長卵圓形。葉腋開極小之花。形狀似房。後結小果。其成熟者作紅褐色。其香脂作顆粒。小者如芝麻。大者若小豆。形橢圓或卵圓。色黃似枸櫞。微透明。有時亦作灰褐等色。比重約一・〇七四。質脆易破。碎之面光澤。若玻璃。遇熱則發臭。頗似拔爾撒謨。咀嚼之覺似蠟。其味苦。

採取　五月斫樹爲坎。十一月採之。

製法　李時珍曰。凡用以蘆水煮二十沸。入冷水中。揉扯數十次。曬乾用。

用法　恒以剉末和作丸散。

性質　辛。苦。平。無毒。

成分　含有瑪斯知克酸約九十分。及瑪斯知涅約十分。前者酒精能溶解。後者酒精不能溶解。

效能　調氣血。消癰疽。止吐衄。治瘡疥。用作收斂藥。爲外科要藥。

主治　癮疹風痒。浮腫。麥水浴之。又生齒痛。

歷代記述弦證　【明】李時珍本草綱目論楓香脂曰。一切癰疽瘡疥。金瘡吐衄。咯血活血。生肌止痛。解毒。燒過揩牙。永無牙疾。【明】繆希雍本草經疏論楓香脂曰。楓香脂味辛苦。氣平無毒。爲活血涼血之藥。凡熱則生風。又血熱則壅而發癢。癢風爲木化。風火相搏則爲浮腫。苦平能涼血熱。兼辛又能散風。故主血熱生風之證。風火既散。則肌肉和而浮腫自消。膿痛亦因風熱上攻。風熱既散。則痛自止矣。【清】黃宮繡本草求眞論楓香脂曰。楓香係楓膏脂所成。結而爲香。故曰楓香。又曰白膠者。按楓性最疎通。故木易蛀。外科用以透毒。金瘡末敷即效。筋斷即續。齒頰腫痛。燒灰揩牙甚工。咳唾膿血。同藥服之。即止。皆取透發病氣之意。故能見其皆治也。以鹽水煮二十沸。入冷水中。揉扯數十次。曬乾用。

國外學說　日本和漢藥考曰。楓香脂製爲拔爾撒謨藥。用以治氣管枝粘液漏諸症。拔爾撒謨藥。一稱樹脂性收斂藥。具有限制分泌及凝固組織之作用。其收斂之效。在於樹脂酸類與其揮發油之化爲樹脂。惟此藥並無凝固蛋白質及膠質之性。又手板發蒙曰。日本之有楓樹。始自享保間。乃中國種也。葉大。可四五寸。有三尖。夏末結實。名楓林。楓香脂其樹脂也。名白膠香。或單稱白膠。亦曰鹿角膠。

配合應用　㈠治吐血不止。白膠香爲散。每服二錢。新汲水調下。(簡要濟衆方)

㈡治吐血衄血。白膠香、蛤粉等分爲末。姜汁調服。(王璆百一選方)

㈢治吐血咯血。用白膠香、銅青各一錢爲末。入乾柿內。紙包煨熟食之。(澹寮方)又用白膠香切片。炙黃一兩。新綿一兩。燒灰爲末。每服一錢。米飲下。(聖惠方)

㈣治金瘡斷筋。用楓香末傅之。(危氏得效方)

㈤治便癰膿血。白膠香一兩爲末。入麝香輕粉少許。摻之。(袖珍方)

㈥治小兒奶瘡生面上。用楓香爲膏。攤貼之。(活幼全書方)

㈦治瘰癧。瘭白膠香一兩。化開。以蓖麻子六十四粒。研入。待成

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膏攤貼之。(儒門事親方)

(八)治諸瘡不合。白膠香、輕粉、各二錢。猪脂和塗。(直指方)

(九)治一切惡瘡。水沉金絲膏。用白膠香、瀝青各一兩。以麻油、黃蠟各二錢半。同溶化。入冷水中扯千遍。攤貼之。(儒門事親方)

(十)治惡瘡疼痛。楓香膩粉等分爲末。漿水洗淨貼之。(壽親養老書方)

(十一)治久近腫瘡。白膠香爲末。以酒瓶上箬葉夾末貼之。(袖珍方)

(十二)治小兒疥癬。白膠香、黃蘗、輕粉等分爲末。羊骨髓和傅之。(儒門事親方)

(十三)治大便不通。白膠香牛棗大。鼠糞二枚。研勻。水和作挺。納入肛門。良久自通。(普濟方)

(十四)治年久牙疼。楓香脂爲末。以香爐內灰和勻。每旦揩擦。(危氏得效方)

(十五)治魚骨哽咽。白膠香細細吞之。(聖惠方)

用量 八分至一錢半。

施用宜忌 凡無瘀濁者禁用。

參攷資料 (一)楓香松脂皆可亂乳香。但楓香微白黃色。燒之可見眞爲。(寇宗奭)(二)楓香松脂皆可亂乳香。其功雖次於乳香。而亦彷彿不遠。(李時珍)(三)今南方及關陝甚多。樹甚高大。似白楊葉圓而作岐。有三角而香。二月有花白色。乃連着實。大如鴨卵。八月九月熟時曝乾可燒。南方草木狀云。楓實惟九眞有之。用之有神。乃難得之物。其脂爲白膠香。五月斫爲坎。十一月採之。說文解字云。楓木厚葉弱枝。善搖。漢宮殿中多植之。至霜後。葉丹可愛。故稱楓宸。任昉述異記云。南中有楓子鬼。木之老者爲人形。亦呼爲靈楓。蓋瘤癭也。至今越巫有得之者。以雕刻鬼神可致靈異。(蘇頌)(四)王璠軒轅本紀云。黃帝殺蚩尤於黎山之邱。鄉其械於大荒之中。化爲楓木之林。爾雅注云。其脂入地千年爲琥珀。(韓保昇)(五)楓木枝幹修攣大者連數圍。其木甚堅。有赤有白。白者細膩。其實成穗。有柔刺。穗含言楓實。惟出九眞者。不知卽此楓否。孫炎爾雅正義云。楓子鬼。乃攝木上寄生。枝高三四尺。天旱以泥塗之卽雨也。荀伯子臨川記云。嶺南楓木。歲久生瘤。如人形。遇暴雷大雨則暗長。三五尺。謂之楓人。宋齊丘化書云。老楓化爲羽人。數說不同。大抵癭瘤之說。猶有理也。(李時珍)

【楓寄生】卽楓上寄生之簡稱。詳『楓上寄生』條。

【楓脂】卽楓香脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楓香脂』條。

【楓脂香】卽蘇合香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘇合香』條。

【楓菌】**性質** 有毒。

參攷資料 楓菌食之。令人笑不止。地漿解之。(陶弘景)

【楓實】卽楓果之原名。詳『楓果』條。



楓樹

【楓樹根及葉】**主治** 癮疹。已成。擂酒飲。并以滓貼之。

【楩楠】卽君遷子之古籍別名。典見千金食治。詳『君遷子』條。

【楔】卽櫻桃之別名。典見爾雅。詳『櫻桃』條。

【楸】卽木瓜之古籍別名。典見綱目。詳『木瓜』條。

【楚烏】卽烏鴉之古籍別名。典見綱目。詳『烏鴉』條。

【楚雀】卽鶯之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『鶯』條。

【楚葵】卽萊菔之古籍別名。典見圖經本草。詳『萊菔』條。

【楚葵子】卽萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊菔子』條。

【楚葵】(一)卽水芹菜之古籍別名。典見爾雅。詳『水芹菜』條。(二)卽紫堇之古籍別名。典見圖經本草。詳『紫堇』條。

【楚鳩】卽斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳『斑鳩』條。

【楚衡】卽杜若之古籍別名。典見廣雅。詳『杜若』條。

【楚實】卽牡荊實之古籍別名。典見綱目。詳『牡荊實』條。

【楛】卽牡荊實之古籍別名。典見綱目。詳『牡荊實』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【楳實】卽烏梅之古籍別名。典見本經。詳『烏梅』條。

【楝子】卽金鈴子之古籍別名。典見本經。詳『金鈴子』條。

【楝參】卽人參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人參』條。

【楝連】卽黃連之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃連』條。

【楞蔥】卽沙蔥之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『沙蔥』條。

【楠木】命名　本品乃南方之木。故名。

古籍別名　楠(綱目)交讓木。(植物學大辭典)假柏南(俗名)

外國名詞　Machilus Nanmu, Hemsl.(拉丁)ナンボク(日本)

基本　係樟科大樟屬。藥用楠之枝葉。

產地　生黔蜀諸地之山中。

形態　楠木爲香木類之常綠喬木。幹直立。高者十餘丈。童童如蓋。葉長橢圓形。新舊迭生。花開淡綠色。或赤黃色。結實紫黑如丁香。木色赤者堅。白者脆。密緻芳香。可供棟梁器具之用。枝葉可供藥用。


楠木

性質　辛。微溫。無毒。

主治　霍亂吐下不止。煮汁服。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論楠木材與枝葉曰。煎湯洗轉筋及足腫。枝下同功。

【楠木皮】性質　苦。溫。無毒。

主治　霍亂吐瀉。小兒吐乳。暖胃正氣。并宜煎服。

【楡仁醬】古籍別名　醬醷。(綱目)

採取　以陳久者入藥用。

製法　李時珍曰。造法。取楡仁水浸一伏時。發盛。揉洗去涎。以麥汁拌晒。如此七次。同發過麵麴。如造醬法。下鹽晒之。每一升。麴四斤。鹽一斤。水五斤。

性質　辛。溫。無毒。

主治　利大小便。心腹惡氣。殺諸蟲。不宜多食。

【楡白皮】古籍別名　零楡皮。(本經)白者名枌。山楡。(綱目)刺楡。(爾雅)

外國名詞　Ulmi Cortex (Elm Bark.)

基本　屬楡科。爲喬楡之枝皮。

形態　春楡爲落葉喬木。多生於寒溼之地。老樹幹高十丈。周圍可一丈五尺。小樹之分枝向上。大樹則下垂。葉互生。作橢圓或倒卵圓形。末端尖。底部狹窄如楔。邊緣有重鋸齒。大葉長三寸半。闊二寸半。面深綠。背淡綠。脈上有細軟毛。花先新葉而開。大約三四月間。已簇生暗紫綠色之小花。花冠作鐘形。邊緣有四裂至八裂。單性花及兩性花俱有之。果實扁圓。大三四分。有似膜之翅。中藏扁平之種子。本品爲楡樹之內皮。色白。作扁平之長片。味帶收斂性。


楡白皮

採取　二月採皮取白。曝乾。

製法　去粗皮取白。剉焙用。

性質　甘。平。滑。利。無毒。

效能　滲溼。熱。通二便。用作利水及祛痰藥。

主治　大小便不通。利水道。除邪氣。久服斷穀。輕身不饑。其實尤良。(本經)療腸胃邪熱氣。消腫。治小兒頭瘡痂疕。(別錄)

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論楡白皮曰。滑。胎利五淋。治齁喘。療不眠。【唐】孟詵食療本草論楡白皮曰。生皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳腫。日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論楡白皮曰。通經脈。搗涎傅癬瘡。【明】李時珍本草綱目論楡白皮曰。利關竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。【清】黃宮繡本草求眞論楡白皮曰。楡白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿及胎產不下。皆宜服此以治。但楡有二種。曰赤曰白。白楡皮服能止喘除咳。而使人睡。較之赤楡皮之除邪氣。稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之。恐損眞耳。

國外學說　英美學說謂楡皮產中國西國等處。去其外層粗皮。取其內層嫩皮。可爲藥品。能作瀉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

角。利小便。作漿及煮水服之。治水蠱癩外用能作濶皮劑。解炎。處方以榆皮一分切片。沸汽水十六分。共入有蓋器內浸二點鐘。濾渣。外用能治大頭瘟。火眼。每服二兩至四兩（榆皮漿方）又荷蘭藥鑑云。春日採榆樹細枝。去外面之粗皮。用裏面之白皮。惟過於細嫩之梢枝無效。藥舖清雅云。進口貨之榆白皮。非純白皮。乃連外皮售之。其功效。皮性收濇。爲愈瘡。發汗之良藥。凡疥癬。乾癬等不甚經久之症。並一切皮膚病用之極有神效。或異常頑惡險重之疥癬。雖用水銀劑及吐涎法而不治者。用此則愈。方用榆皮八盎斯。水四磅。煎至減半。去滓。每日早晚服八盎斯。連服數日。煎時須慢火久熬。令不甚稠黏。名榆皮排毒煎。某醫云。患乾癬、頑癬、禿瘡、惡毒頭瘡、雁瘡等經久之頑固皮膚病。用對症之藥劑不驗。施水銀吐涎法不治者。改用此藥。無不有效。已治愈者。難僂指算。予用此方。略有加減。方用榆白皮四盎斯。水四磅。煎至減半。令服。但服後往往大便祕結。故時時兼用緩下劑。又此藥煎濃。則藥汁稠黏。味惡難服。須如前述。則稍帶收斂之味。已耳。若製成越幾斯劑。收濇極甚。服此藥而奏效者。初時瘡反加甚。須久服乃逐漸乾愈。世人每求速效。故旋服旋輟。果能持之以恒。耐心守候。則無不應驗如神。惟受毒已深者。卽幸而治愈。終恐復發。防遏之法。宜每逢春秋。連服前方數日。庶其毒可除淨也。

配合應用　㊀斷穀不饑。榆皮、檀皮爲末。日服數合。（救荒本草方）

㊁治齁喘不止。榆白皮。陰乾。焙爲末。每日旦夜用水五合。末二錢。煎如膠服。（食療本草方）

㊂治久嗽欲死。許明則有效方。用厚榆皮。削如指大。長尺餘。納喉中。頻出入。當吐膿血而愈。（古今錄驗方）

㊃治虛勞白濁。榆白皮二升。水用三斗。煮取五升分之五服。（千金方）

㊄治小便氣淋。榆枝、石燕子。煎水日服。（普濟方）

㊅治五淋澀痛。榆白皮、陰乾焙研。每以二錢。水五合。煎如膠。日二服。（普濟方）

㊆治渴而尿多。非淋也。用榆皮二片。去黑皮。以水一斗。煮取五升。一服三合。日三服之。甚效。（外臺祕要方）

㊇治身體暴腫。榆皮搗末。同米作粥食之。小便良。（備急方）

㊈治臨月易產。榆皮焙爲末。臨月日三服。方寸匕。令產極易。（陳承本草別說方）

㊉治墮胎下血不止。用榆白皮、當歸焙各半兩。入生薑水煎服之。（普濟方）

㊀治胎死腹中。或母病欲下胎。榆白皮煮汁服二升。（子母祕錄方）

㊁治身首生瘡。榆白皮末。油和塗之。蟲當出。（子母祕錄方）

㊂治火灼爛瘡。榆白皮嚼塗之。（千金方）

㊃治五色丹毒。俗名遊腫。犯者多死。不可輕視。以榆白皮末。鷄子白和塗之。（千金方）

㊄治小兒蟲瘡。榆皮末。和豬脂塗綿上。覆之。蟲出立瘥。（千金方）

㊅治癰疽發背。榆皮白皮切。清水洗搗極爛。和香油傅之。留頭出氣。燥則以苦茶頻潤。不黏更換新者。將愈以桑葉嚼爛。隨大小貼之。口合乃止。神效。（救急方）

㊆治小兒瘰癧。榆白皮生搗如泥。封之。頻易。（必效方）

㊇治小兒禿瘡。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。（產乳方）

用量　一錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾胃虛寒而無濕熱者禁用。

參攷資料　㊀高昌人多搗白皮爲末。和菜麨食。甚美。令人能食。仙家長服。服丹石人亦服之。取利關節故也。（孟詵）㊁榆皮榆葉性皆滑利下降。手足太陽手陽明經是也。故人小便不通。五淋腫滿。喘欬不眠。經脈胎產諸證。宜之。本草十劑云。滑可去著。冬葵子、榆白皮之屬。蓋亦取其利竅滲濕熱。消留著有形之物爾。氣盛而壅者宜之。若胃寒而虛者。久服滲利。恐洩眞氣。本經所謂久服輕身不饑。蘇頌所謂榆粉多食。不損人者。恐非確論也。（李時珍）㊂按王安石字說

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

云。榆濇俞柔故謂之榆。其粉則有分之之道。故謂之粉。其莢飄零故曰零榆。（李時珍）㊃此卽今之榆樹取皮刮去上赤皮。亦可臨時用之。性至滑利。初生莢仁。以作糜羹。令人多睡。（陶弘景）㊄榆三月實熟。尋卽落矣。今云八月採實。恐誤也。（蘇恭）㊅江東無大榆。有刺榆。秋實。故經云八月採者誤也。刺榆皮不滑利。（陳藏器）㊆榆三月生莢。古人採仁以作糜羹。今無復食者。惟用陳老實作麪耳。按爾雅疏云。榆類有數十種。葉皆相似。但皮及木理有異耳。刺榆有針刺如柘。其葉如榆。瀹爲蔬羹。滑於白榆。卽爾雅所謂樞。郭璞注所謂山有樞是也。白榆先生葉。卻着莢。皮白色。二月剝皮。刮去粗皺。中極滑白。卽爾雅所謂榆白枌是也。荒歲農人取皮爲粉食之。當粮不損人。四月採實。（蘇頌）㊇邢昺爾雅疏云。榆有數十種。今人不能盡別。惟知莢榆、白榆、刺榆、榔榆數者而已。莢榆白榆。皆大榆也。有赤白二種。白者名枌。其木甚高大。未生葉時。枝條間先生榆莢。形狀似錢而小。色白成串。俗呼榆錢。後方生葉。似山茱萸葉而長尖。觜潤澤。嫩葉燁浸。淘過可食。故內則云。堇荁枌榆。兔藁瀡酒以滑之。三月採榆錢。可作羹。亦可收至冬釀酒。瀹過晒乾。可爲麪。卽榆仁麪也。崔寔月令。謂之饊。饊音牟偷者是也。山榆之莢名蕪荑。與此相近。但味稍苦耳。諸榆性皆扇地。故其下五穀不植。古人春取榆火。今人採其白皮爲榆麵。水調和香劑。黏滑勝於膠漆。承曰。榆皮澱揚如糊。用黏瓦石極有力。汴洛人以石爲碓嘴。用此膠之。（李時珍）

【榆耳】　基本　本品卽係榆樹上之木耳。

採取　八月採之。

主治　令人不飢。

參攷資料　八月榆熟。以美酒漬曝。同青粱米、紫菀實、蒸熟爲末。每服三撮。酒下。令人辟穀不飢。（淮南萬畢）

【榆花】　主治　小兒癇疾。小便不利。傷熱。

【榆莢仁】　性質　微辛。平。無毒。

主治　作糜羹食令人多睡。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論榆仁曰。主婦人帶下。和牛肉作羹食。【唐】孟詵食療本草論榆仁曰。子醬似蕪荑。能助肺殺諸蟲。下氣。令人能食。消心腹間惡氣。卒心痛。塗諸瘡癬。以陳者良。

【榆葉】　主治　嫩葉作羹及麪食。消水腫。利小便。下石淋。壓丹石。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論榆葉曰。煎汁洗酒齇鼻。同酸棗仁等分。蜜丸。日服。治膽熱虛勞不眠。

參攷資料　榆葉曝乾爲末。淡鹽水拌或炙或曬乾。拌菜食之。亦宜滑下水氣。（李時珍）

【槲木】　古籍別名　吻頭。（拾遺）鵲不踏。（綱目）

外國名詞　Aralia sinensis, L.（拉丁）タラノキ（日本）

基本　係五加科槲木屬。藥用槲木之白皮。

產地　生山野間。

形態　槲木爲灌木類之落葉木本。幹高丈餘。莖與葉有銳刺。葉爲二回羽狀複葉。小葉甚多。卵形。花小。白色。花五瓣。雄蕊與花瓣同數。互生。圓錐花序。嫩枝嫩葉有芳香。



槲木

性質　辛。平。有小毒。

主治　水癃。煮汁服。

參攷資料　槲木白皮能爛齒牙。有蟲者取片許。內牙中。當自爛落。（陳藏器）

【樠】　卽蕪荑之木幹。生於山中。狀似榆葉。圓而厚。皮有細刺。性質效能與其子實無異。詳『蕪荑』條。

【楮耳】　基本　本品卽楮樹上之木耳。

主治　功同木耳。

【楮李】　卽鼠李子之古籍別名。典見錢氏。詳『鼠李子』條。

【楮桃】　卽楮實子之古籍別名。典見集簡方。詳『楮實子』條。

【楮紙】　命名　本品係用楮皮製成之紙。故名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　甘。平。無毒。

主治　止吐衄。血痢。婦人血崩。月經不絕。產後血暈。金瘡出血。

【楮葉】　**性質**　甘。涼。無毒。

主治　小兒身熱。食不生肌。可作浴湯。又主惡瘡生肉。

歷代記述弦證　【唐】蘇恭新修本草論楮葉曰。治鼻衄。數升不斷者。搗汁三升。再三服之。良久即止。嫩茄之去四肢風痺及赤白下痢。【唐】甄權藥性本草論楮葉曰。炒研搜麵作餺飥食之。主水痢。【宋】大明諸家本草論楮葉曰。治刺風身癢。【明】李時珍本草綱目論楮葉曰。利小便。去風澀腫脹。白濁疝氣。癬瘡。

【楮實子】　**原名**　穀實。

命名　楮本作杶。其皮可續爲紵故也。又楚人呼乳爲穀。因木中白汁如乳。故名。

古籍別名　穀實（別錄）穀桑（陸璣詩疏）楮桃（綱目）穀（圖經本草）斑殼（唐本草）

學名　Broussonetia Kasinoki. Sieb.

基本　係屬桑科楮樹之實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。楮實子產江蘇蘇州之山野間。七月新。

形態　楮爲落葉灌木。高五六尺。葉類桑而面粗糙。長四五寸。邊緣有細鋸齒。花爲單性。雌雄異株。雄花長寸許。花穗下垂。呈黃白色。雌花相聚作球狀。呈紫色。實大寸許。類蛇莓（Indianstrawberry）熟則作紅色。樹皮爲製紙原料。



楮實子

採取　㈠楮樹花。歉歲人採食以充饑。㈡楮實半熟時。採取蜜煎可作果食。㈢楮樹嫩芽。採之可當菜茹。㈣楮實子成熟時色深紅。每年八九月採之。

製法　雷敩曰。採得後水浸三日。攪旋投水浮者去之。曬乾。以酒浸一伏時。了蒸之。從巳至亥。焙乾用。又經驗方。煎法。六月六日。取穀子五升。以水一斗。煮取五升。去滓。微火煎如餳用。

性質　甘。寒。無毒。

效能　消水腫。壯筋骨。明目。輭堅。用作强壯藥。

主治　陰痿。水腫。益氣充肌。明目。久服不飢。不老。輕身。

歷代記述弦證　【宋】大明日華諸家本草論楮實子曰。壯筋骨。助陽氣。補虛勞。又健腰膝。益顏色。【明】繆希雍本草經疏論楮實子曰。楮實味甘。氣寒無毒。氣薄味厚。陰也。降也。入足太陰經。其主水腫。益氣充肌。膚者。脾爲土臟。而主肌肉。脾虛則肌肉不充。土虛則水溼泛濫。甘爲土化。能入脾堅土。則水腫消。肌肉充。氣自益矣。明目者。目得血而能視。脾旺自能生血也。陰痿者。精氣竭也。脾實則能生精。而灌注於腎。故陰自强也。補脾益氣。則五臟皆實。不饑耐老。輕身是其驗矣。【明】李士材本草圖解論楮實子曰。楮實甘平。益腎助陽。療腫去水。能軟骨治哽。【清】黃宮繡本草求眞。論楮實子曰。楮實書言味甘氣寒。雖於諸臟陰血有補。得此腫消。以致陰痿起。陽氣助。是明指其陽旺陰弱。得此陰血有補。故能使陽不勝而助之。非云陽痿由於陽衰。得此可以助陽也。若以純陰之品。可以補陽。則於理甚不合矣。況書又云。骨哽可用楮實煎湯以服。及紙燒灰存性調服。以治血崩血暈。並用衙門牌紙燒吞。以斷婦人生育。與脾胃虛人禁用。久服令人骨痿。豈非性屬陰寒。虛則受其益。過則增其害之意乎。輾骨之說。未嘗不是。取浸水中不浮者。濃蒸用。

配合應用　㈠治水氣蠱脹。楮實子丸。以潔淨府。用楮實一斗。水三升。熬成膏。茯苓三兩。白丁香一兩。半爲末。以膏和丸。梧子大。從少至多。至小便清利。脹減爲度。後服治中湯。養之。忌甘苦。峻補及發動之物。（活法機要方）

㈡治女子月經不絕。來無時者。取案紙三十張。燒灰。以清酒半升。和調服之。頓定。尋中血暈服之立驗。已驗者。去板廚灌之。經一日亦活。（劉禹錫傳信方）

㈢治癬瘙癢。用楮葉搗爛。傅上。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（聖惠方）

㊃治天行病後兩脇脹滿。臍下如水腫。以穀枝汁隨意服愈。（外臺祕要方）

㊄治鼻衄。小勞瓠出。楮葉取汁飲三升良。（肘後方）

㊅治小兒下痢赤白。作渴。得水又嘔逆者。搗葉炙香。以飲漿半升。浸至水綠。去葉。以木瓜一箇。切內汁中。煮二三沸。去木瓜。細細飲之。（子母祕錄方）

㊆治通身水腫。楮枝葉煎如餳。空腹服一七日三服。（聖惠方）

㊇治肝熱生翳。楮實研細。食後蜜湯服一錢。日再服。（直指方）

㊈治金瘡出血。用穀子搗傅之。（外臺祕要方）

㊉治喉痺喉風。五月五日。或六月六日七日。採楮桃陰乾。每用一個。爲末。井華水服之。重者兩個。（集簡方）

㊀治身面石疽。狀如痤癤而皮厚。穀子搗傅之。（外臺祕要方）

㊁治金瘡出血。用穀子搗傅之。（外臺祕要方）

㊂治目睛雞視。楮桃、荊芥穗各五百枚。爲末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼一丸。薄荷湯送下。一日三服。（衞生易簡方）

用量　一錢至四錢。

施用宜忌　凡脾胃虛寒者禁用。

著名方劑　還少丹。大補心腎。治發熱盜汗。遺精白濁。及眞氣虧損。肌體羸瘦。枝節倦怠等症。（楊氏方）山藥、牛膝、遠志、萸肉、茯苓、五味子、楮實子、巴戟（酒浸去心）菟絲（酒浸一宿。舂蒲杜仲（姜汁酒同炒拌）茴香各一兩。枸杞熟地各二兩。共爲末。煉蜜同棗肉糊丸。梧子大。每服三十丸。溫酒或淡鹽湯下。日三服。

參攷資料　㊀仙方單服。其實正赤。時收子陰乾。篩末。水服二錢匕。乃佳。抱朴子云。柠木實赤者。服之老者成少。令人徹視見鬼神。道士梁須年七十。服之更少壯。到百四十歲。能行及走馬。（蘇頌）㊁別錄載楮實功用大補益。而修眞祕旨書言。久服令人成骨輭之變。濟生祕覽治骨哽。用楮實煎湯服之。豈非輭骨之徵乎。按南唐書云。烈祖食餘。喉中噎。國醫莫能愈。吳廷紹獨請進楮實湯。一服疾失去。羣醫他日取用。皆不驗。吳廷紹答云。噎因甘起。故以此治之。愚謂此乃治骨哽堅輭之義爾。羣醫用治他噎。故不驗也。（李時珍）㊂楮樹雨樹易生。葉多澀毛。南人剝皮擣爰造紙。亦緝練爲布。不堅易朽。裴淵廣州記言。蠻夷取穀皮熟搗爲揭裏屨布。以擬毡。甚煖也。其木腐後生菌耳。味甚佳好。（許愼）㊃陸璣詩疏云。楮。幽州謂之穀。桑或曰楮桑。荊揚交廣謂之穀。（蘇頌）㊄陸佃埤雅作穀。米之穀。訓爲善者。誤矣。或以楮楮別爲二物者。亦誤矣。（李時珍）㊅此有二種。一種皮有斑花文。謂之斑穀。今人用皮爲冠者。一種皮白無花。枝葉大相類。但取其葉似葡萄葉。作瓣而有子者爲佳。其實初夏生。大如彈丸。青綠色。至六七月。漸深紅色。乃成熟。八九月採。水浸去皮穰。取中子。段成式西陽雜俎云。穀田久廢。必生楮葉。有瓣曰楮。無曰楮。陸璣詩疏云。江南人績其皮以爲布。又搗以爲紙。長數丈。光澤甚好。又食其嫩芽以當菜茹。今楮紙用之最博。楮布不見有之。醫方但貴楮實。餘亦稀用。（蘇恭）㊆按許愼說文言楮穀乃一種也。不必分別。惟辨雌雄耳。雄者皮斑而葉無椏。又三月開花成長穗。如柳花狀。不結實。歛年人採花食之。雌者皮白而葉有椏叉。亦開碎花。結實如楊梅。半熟時水澡去子。蜜煎作果食。二種樹並易生。葉多澀毛。南人剝皮搗爰造紙。亦緝練爲布。不堅易朽。裴淵廣州記言。蠻夷取穀皮熟搗爲揭裏屨布。以擬毡。甚煖也。其木腐後生菌耳。味甚佳好。（李時珍）

【楮樹白皮】　性質　甘。寒。無毒。

主治　逐水。利小便。

歷代記述攷證　【魏】吳普本草論楮樹皮曰。治喉痺。【唐】甄權藥性本草論楮樹皮曰。治水腫氣滿。【明】李時珍本草綱目論楮樹皮曰。爰汁釀酒飲。治水腫入腹。短氣咳嗽。爲散服。治下血血崩。

【楮樹皮中白汁】　古籍別名　構膠。五金膠漆。（綱目）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質 甘平無毒。

主治 療癬。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論楮樹皮白汁曰傳蛇蟲蜂蠍犬咬。

參攷資料 ㊀楮皮中白汁。能合硃砂爲圓。故名五金膠漆。（大明）㊁構汁最黏。今人用黏金薄。古法黏經書。以楮樹汁和白茂飛麵調糊接紙。永不脫解。過於膠漆。（李時珍）

【楮樹枝莖】 **主治** 癮疹攻。煮湯洗浴。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論楮樹枝莖曰搗濃汁服。治小便不通。

【楸】 **命名** 本品葉大而早脫。至秋已呈凋狀。故名。

古籍別名 刺楸。角楸。

外國名詞 Mallotus japonicus, Muel. Arg.（拉丁）アカメガシハ（日本）

基本 係大戟科楸屬。爲楸樹之木皮。其子枝葉詳見各該條。

形態 楸爲喬木類之落葉木本。高七八丈。葉大約三四寸。圓形或廣卵形。有尖端。掌狀淺裂。嫩葉及葉柄帶赤色。夏月枝梢開細小黃綠色花。穗狀花序。有萼無花瓣。單性。雌雄異株。結實外面多輭刺。熟則開裂。吐出種子。色紅黃黑如櫻桃。味甚清香可食。



楸

性質 苦。小寒。無毒。

主治 吐逆。殺三蟲。及皮膚蟲。煎膏黏傅惡瘡疽瘰癧腫疳痔。除臃血。生肌膚長筋骨。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論楸木皮曰。消食澁腸。下氣。治上氣咳嗽。亦入面藥。【明】李時珍本草綱目論楸木皮曰。口吻生瘡。貼之。頗易取效。

【楸子】 **製法** 凡使須去盡子仁。用否則食之令人心煩。

性質 甘。酸。無毒。

主治 多食滯氣。令人好睡。

【楸枝】 **主治** 煎湯洗疽瘡。

【楸葉】 **性質** 苦。小寒。無毒。

主治 搗傅瘡腫。煮湯洗膿血。冬取乾葉用之。諸癰腫潰及內有刺不出者。取葉十重貼之。

參攷資料 楸乃外科要藥。而近人少知。葛常之韻語陽秋云。有人患發背潰壞。腸胃可窺。百方不痊。一醫用於秋日太陽未升時。採楸樹葉熬之爲膏。傅其外。內以雲母膏作小丸服。盡四兩。不累日而愈也。東晉范汪名醫也。亦稱楸葉治瘡腫之功。則楸有拔毒排膿之力可知。（李時珍）

【楸樹】 卽枳椇之古籍別名。典見廣記。詳『枳椇』條。

【殿春客】 卽白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芍』條。

【溫泉】 **原名** 溫湯。

命名 以其泉水比其他岩泉溫度較高。故名。

古籍別名 沸泉（陳藏器）湊泉。溫泉。湯泉（綱目）

基本 係泉水中含有各種鑛物質之泉流。

產地 溫泉世界各國之凡哦近火山熱地者。多有之。中國陝西臨潼縣之驪山溫泉。北平之湯山。閩侯之福州。雲南元江之溫玉泉。均爲有名之湯泉。

形態 溫泉爲地層岩之空隙處。噴裂之岩泉。以其毗連火山熱地。故泉流溫。泉源自山腹石中流出。傾瀉下流。其色清澈且碧。熱如沸湯。甚之有攝氏寒暑表七八十度之高。故必和以冷水。然後可浴。惟湯池開鑿較久者。則其溫度亦漸漸減低。尋常患皮膚病者。以硫黃泉入浴爲最佳。

用法 溫泉水可供飲料。煮茗入浴均可。

性質 辛。溫。微毒。

成分 溫泉所含鑛物之成分。以地質之異。所以有種種不同之泉流發見。有含鹽性鹽類者。有含硫黃者。有含食鹽鐵或炭酸者。尙有含其他物質者。細析甚多。大略不過如此。

作用 浴後能使皮膚之上皮細胞膨脹輭化。而表皮外之老廢物。亦同時容易剝離。卽皮脂與汗

515／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

液之附着物。亦隨皮垢以俱除。且以其高溫作用。調節皮膚之體溫。同時刺戟皮膚之神經。以促進其生理之機能。使血液循環皆形旺盛。並能促進新陳代謝。如頭部鬱血等。皆得導之以下行。尤於女子之月經不調等症。可作未發之預防。此外更能增進食慾。舒暢精神。如於硫黃泉浴後。尤能驅除皮膚病之微生物。故於各種慢性皮膚病尤奏功效。

主治　諸風。筋骨攣縮。肌膚頑痺。手足不遂。眉髮脫落。楊梅瘡疥。風癩諸癖。

國外學說　日本藤浪剛一云。溫泉混有種種之藥物。保有溫度。含有稀少之瓦斯。爲今日理學的醫治唯一療法。茲將各溫泉質之作用效果。述之如次。㈠炭酸泉。可供飲料。若入此泉水於口中。則有一種特殊之氣味。同時入胃。則刺戟胃之黏膜神經筋層。以助鹽酸之分泌。促進食慾。強健胃之運動。促進乳糜之流通。又腸之移動。亦同樣強健而助消化。胃之黏膜因充血之結果。使泉水與含於其內之成分。容易吸收。遂至顯利尿之效。靡波之分泌亦增多。但此爲間接之影響也。又對於呼吸器黏膜之卡他亦有效。而使呼吸爲愉快。將炭酸泉浸於溫牛乳而飲之。最佳。又適宜於消化不良。但一時飲以大量。或持續的飲用時。則反有害於消化。㈡鹼泉。胃酸過多時。若鹼酸則能中和之。且有抑止醱酵之異常。促進腸之運動。又鼻腔咽頭喉頭等。可除去其附着之黏膜。本泉是有溶解尿酸及蓚酸結石、及利尿之效。於腎臟結石、膀胱結石、膽石症、膽囊炎之治療。亦有同樣之效。又有抑止糖尿病之糖量。但患肺結核惡性腫瘍者。則此泉宜忌避之。因鹼炭酸泉。若長使用。則有害於營養。易陷於消化不良。故虛弱及元氣虧乏者。宜忌飲之。當飲本泉時。以擇空腹時爲佳。尿之發現鹼質者亦早。一日之飲用量。爲二百瓦。分爲二回或六回飲之。若食事之間飲之。則胃酸之中和爲強。故須避之。慢性胃潰瘍亦以早晨空腹時飲用爲宜。至炭酸泉。或鹼炭酸泉。若含有多量炭酸瓦斯時。則作爲炭酸湯而利用之。入浴於此種炭酸湯時。忽然在皮膚表面。有無數微點之小空泡密着之。但經數分間。則皮膚潮紅而至感有溫暖。本泉於心臟瓣膜不全閉鎖心臟之過緊張。動脈硬化症。狹心症之心臟病。每多奏效。故在西洋方面著名之心臟病專門溫泉池甚夥。其由各國而往訪之。不絕於道。其他如病後之恢復衰弱。神經痛。知覺過敏。痙攣。末梢神經麻痺。陰萎症。不妊症及有流產之習慣者。均宜適用。入浴於少含炭酸瓦斯之鹼泉。則因溶解皮膚之分泌物而刺戟。故對於皮膚爲有效。㈢鐵泉。鐵泉爲活動於血液者。即赤血球增殖。血色素增多。體重增加。體溫亦昇高半度至一度。脈搏充實而有力。使搏數亦多。一般血液病。物質代謝病。雖可使用此鐵泉。但亦有宜禁者。鐵泉之增加血液者。若爲高山之溫泉。則其受土地氣候之影響而更爲顯效。若選擇五百米之高山。則比之低地之效力強有二三倍。因氣壓之低者。對於造血作用最佳也。其他如貧血萎黃病。癌病後。腎臟炎。精神過勞。又重病後之衰弱。慢性神經疾患。性慾之疾患。及有流產習慣之婦女等。則以本泉爲宜。飲用鐵泉時。以每朝用四百至六百瓦。如在食時飲之。則鐵質易吸收。但鐵泉有使消化不良之傾向。故消化不良宜注意用之。因飲用後每有使胃停滯之感。全身異和。易起便祕。又牙齒每至染黑色。糞便亦爲黑色。又如肺結核。或咯血時。心臟病。小循環之鬱積。胃腸之潰瘍等。則本泉爲禁忌。施行入浴法。則刺戟末梢神經。促進溫感與亢奮。而皮膚潮紅。知覺銳敏。脈搏充實。而强壯。故適應於麻痺。神經衰弱。小兒之飲量。比大人少。通常用西洋湯匙三四杯。一日三四回。飲之更佳。㈣硫黃泉。硫黃泉是可行飲用、入浴、吸入之三法。飲用法。可單飲其泉水。或混於牛乳。及其他之清涼水飲之。通常一日量。由一百五十至三百五十瓦。每朝空腹時飲之。本泉成分中之硫化水素。是由胃腸吸收入浴時。溫度愈高。皮膚充血。而其機能愈增高。硫黃之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

由皮膚吸收。亦易催取。治痛風。藥參皮膚病。瘡後之餘病。腺病梅毒等疾患者。則以浴此泉爲佳。吸入法。是由呼吸器黏膜之吸收而作用於上氣道。以奏效。古來所稱爲痰之湯之理由。卽因吸入此溫泉所含之硫水素刺戟粘膜。使祛痰容易。咯痰爲多。故以此而得名也。(ロ)食鹽泉。食鹽泉之效。則基因於鈉鹽鹽與其他之固形成分及瓦斯也。飲用則因刺戟口腔及胃黏膜之神經結果。唾液胃液之分泌爲反射作用的增加。以助消化。及强壯胃之運動。在腸管則促進其蠕動及分泌。故食慾旺盛。其作用於血液則赤血球及血色素增多。物質代謝。尤以窒素(Nitrogen)之代謝爲良好。胃之運動及分泌有障礙時。慢性胃炎。十二指腸炎。膽囊炎。腸蠕動障礙等症。及肝之充血。腺病脾腫用之。均奏效果。若入浴則食鹽刺戟皮膚。促進皮脂腺汗腺之分泌。但他方面又因食鹽之細結晶。附着於皮膚表面。皮膚爲器械之刺戟。防止體溫放散。故浴後覺溫暖。

近人學說　祝振綱云。人體皮膚。如無糜爛創傷。則湯火難以侵入。因之行溫泉浴時。其泉中之成分。皮膚亦未必吸收於體內。卽能透入其量亦微。世人以爲溫泉中所含之藥物。能被吸收於皮內。此其觀念錯誤。但溫泉之於皮膚病。卻能直接奏效。然濫用溫泉浴法。亦不無流弊。故所患之皮膚病。是否適宜溫泉。於俗輩仍在捉摸之中。漫無準則。蓋皮膚病中。往往有因澄澗之刺戟。以致病勢增劇者。況溫度較高。而含有藥物之溫泉。其更富於刺戟性。而能使病增劇。不尤可慮乎。彼因入浴治療。以致病勢增劇之患者。屢見不鮮。凡此皆因不明浴治之理。濫用高溫度之溫泉浴所致也。蓋溫泉種類甚多。其中對於皮膚病認爲最有效力者。厥惟硫黃泉。因其溫度有高低。所含硫黃有多寡。而其效力亦未必一定。要之。急性皮膚病患者。對於任何溫泉。均不宜浴。爲是慢性皮膚病。卻不妨用硫黃泉或鈉泉浴。治但高溫亦非所宜耳。

參攷資料　(一)雲南宵洱縣城西北二十里。四季之中。泉水滾熱。近之者無不流汗。煙鷄犬之屬。毛無不脫落者。是以人不敢入其中沐浴。(樸廛)(二)溫泉下有硫黃。卽令水熱。猶有硫黃臭。硫黃主治諸瘡。故水亦宜然。當其熱處。可燖豬羊熱鷄子也。(陳藏器)(三)溫泉有處甚多。按胡仔漁隱叢話云。湯泉多作硫黃氣。浴之則襲人肌膚。惟新安黃山。是朱砂泉。春時水卽微紅。可煑茗。長安驪山。是礬石泉。不甚作氣也。硃砂雖紅不熱。當是雄黃爾。有砒石處亦有湯泉。浴之有毒。(李時珍)(四)廬山有溫泉。方士往往敎患疥癬風癩楊梅瘡者。飽食入池。久浴得汗出乃止。旬日自愈也。(汪穎)

【溫湯】卽溫泉之原名。詳『溫泉』條。

【溫室】卽萊菔之古籍別名。典見爾雅。詳『萊菔』條。

【溫藤】　產地　生山谷間。

形態　溫藤爲蔓草類之一種。蔓纏樹木。四時不凋。其莖葉可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　氣血積冷。浸酒服。

【溪狗】　產地　生南方溪澗中。

形態　溪狗爲溼生蟲類之一種。狀如蝦蟆。尾長三四寸。可供藥用。

性質　有小毒。

主治　溪毒及遊蟲。燒末水服。

【溪砂】卽硃砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硃砂』條。

【溪鬼蟲】　古籍別名　射工。(拾遺)射影。水弩。蜮。(綱目)抱槍。(雜俎)含沙。(詩註)短狐。(廣雅)水狐。(玄記)

產地　生南方溪澗中。

形態　溪鬼蟲爲溼生蟲類甲蟲屬之一種。體長二三寸。廣一寸。形扁。前闊後狹。似蟬。腹軟。背硬如甕。貧殼黑色。下有翅。能飛。作鮫鮫聲。頭闊喙尖。有二骨。眼頭目醜黑。如狐。如鬼。喙頭有尖角。如爪。長一二分。六足。如蟹二足在喙下者大。而一爪四足在腹下者小而歧爪。時或雙屈前足。抱拱其喙。正如橫弩上矢之狀。或含沙射人。形影。冬日伏蟄谷間。所居之處大雪不積。氣起如蒸。掘下一尺可得之。其角

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

可供藥用。

主治　帶之辟溪毒。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論溪鬼蟲角曰陰乾爲末佩之亦辟射工毒。

參攷資料　㈠溪鬼蟲。蠑螈。鴛鴦能食之。鵝鴨亦辟之。(李時珍)　㈡溪毒中人一名中水。一名中溪。一名水病。似射工而無物。春月多病之。頭痛惡寒。狀如傷寒。二三日則腹中生蟲。食人下部。漸蝕五臟。注下不禁。雖良醫不能療也。初得則下部若有瘡。正赤如截肉。爲陽毒。最急若瘡如蟲囓。爲陰毒。少緩皆殺人。不過二十日。方家用藥與傷寒溫病相似。或以小蒜煮湯浴之。及諸藥方。又云江南射工毒蟲在山間水中人行或浴。則此蟲含沙射人。形影則病。有四種。初得皆如傷寒。或似中惡。一種偏身有黑靨子。四邊悉赤。犯之如刺。一種作瘡。久即穿陷。一種突起如石。一種如火灼爍瘡也。療之並無方法。王充論衡云。短狐含太陽毒氣而生。故有弓矢射人中人如火灼也。(李時珍)

【溪孫】　卽白菖之古籍別名。典見本草拾遺。詳『白菖』條。

【溪楓】　卽水楊柳之古籍別名。詳『水楊柳』條。

【溪蓀】　係菖蒲之生於溪澗。根瘦而赤。節稍密者。性質效能同菖蒲。詳『菖蒲』條。

【溪鴨】　卽鸊鷉之古籍別名。典見異物志。詳『鸊鷉』條。

【溲】　卽童便之古籍別名。典見素問。詳『童便』條。

【溲疏】　**古籍別名**　巨骨。(別錄)

性質　生田野間。

形態　溲疏爲灌木類之一種。高丈餘。與枸杞相類。有刺。皮白中空。結實亦似杞子。兩兩相對。秋月熟則色赤。可供藥用。



溲疏

採取　八月九月間採之。

性質　辛。寒。無毒。

主治　皮膚中熱。除邪氣。止遺溺。利水道。(本經)除胃中熱。下氣。可作浴湯。(別錄)

參攷資料　㈠溲疏以漏蘆爲之使。㈡千金方。治婦人下焦三十六疾之承澤丸中用之。(李時珍)

【溶魚】　卽鱘魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱘魚』條。

【溺白堊】　卽人中白之原名。詳『人中白』條。

【溼生蟲】　卽鳳嬭之古籍別名。典見圖經本草。詳『鳳嬭』條。

【滂藤】　卽扶芳藤之古籍別名。典見綱目。詳『扶芳藤』條。

【滋草】　卽繁縷之古籍別名。典見千金食治。詳『繁縷』條。

【滑石】　**命名**　本品性滑利竅。質又滑膩。故名。

處方用名　原滑石。飛滑石。塊滑石。滑石粉。

古籍別名　液石。番石。(別錄)桂林滑石。桂府滑石。(綱目)幷石。脫石。冷石。(陶弘景)盡石。(本草衍義)久冷。白滑石。液石。稜利竅。共石。活石。斑石。磏石。白玉粉。白仲寧立制。石雷河督子。(和漢藥考)

外國名詞　Talcum.(拉丁)Talc.(英)Talk.(德)

基本　爲單斜形之鑛石。

產地　陳仁山藥物生產辨云。滑石又名畫石。原產四川雲南廣東亦有出。和漢藥考曰。日本之石見越前越中阿波備前伯耆上野等處產此。

形態　滑石多數爲纖維狀、塊狀、粒狀、或葉狀。間有爲斜方柱狀。結晶體者。無色者少。多爲青白、黃白、灰綠、或銀灰諸色。有脂肪狀或眞珠狀光澤。質柔輭。硬度一·〇。爲岩石中硬度之最低者。比重爲二·六至二·八。其面光滑如油。故名。

製法　雷敎曰。凡使滑石。須用白滑石。以刀刮淨研粉。以牡丹皮同煮一伏時。去牡丹皮。取滑石。以東流水淘過。曬乾用。

性質　甘。寒。無毒。

成分　主成分爲含水珪酸鎂。此外含有少許雜物。

效能　滑利竅。逐溼熱。治瀉痢。通淋閉。用作淋病藥及黃疸水腫藥。其精製者有滑澤皮膚。防共糜

518／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爛之效。

主治　身熱洩瀉。女子乳難。癰閉。利小便。蕩胃中積聚寒熱。益精氣。久服輕身。耐饑長年。（本經）通九竅六腑津液。去留結。止渴令人利中。（別錄）

張仲景之證明　滑石一味。經張仲景之實驗。認爲『主治小便不利。旁治渴』。茲考徵如下。猪苓湯證曰。渴欲飲水。小便不利。（以上一方。滑石一兩）此一方。可見滑石所主治也。滑石白魚散證曰。小便不利。蒲灰散證曰。小便不利。余未試二方。是以不取徵焉。

歷代記述攷證　【元】朱丹溪本草衍義補遺論。滑石曰。燥澀分水道。實大腸。化食毒。行積滯。逐瘀血。解燥渴。補脾胃。降心火。偏主石淋。爲要藥。【明】李時珍本草綱目論。滑石曰。療黃疸水腫。脚氣。吐血衄血。金瘡血出。諸瘡腫毒。【明】繆希雍本草經疏論。滑石曰。滑石中之得冲氣者也。故味甘淡氣寒而無毒。滑以利竅。通壅滯下垢膩。甘以和胃氣。寒以散積熱。甘寒滑利。以合共用。是爲祛暑散熱。利水除澀。消積滯。利下竅之要藥。本經用以主身熱洩瀉。女子乳難。蕩胃中積聚寒熱者。解足陽明胃家之熱也。利小便癃閉者。通膀胱利陰竅也。其曰益精氣。久服輕身耐飢長年。此則必無是理矣。別錄通九竅津液。去留結。止渴令人利中者。澀熱解則胃氣和而津液自生。下竅通則諸壅自洩也。丹溪用以燥澀分水道。實大腸。化食毒。行積滯。逐瘀血。解燥渴。補脾胃。降心火。偏主石淋。皆此意耳。【清】黃宮繡本草求眞。論滑石曰。滑石何以滑名。因其性滑而名之也。滑石味甘。氣寒色白。服則能以清熱降火。通竅利便。生津止渴。爲足太陽膀胱經藥。故凡中暑積熱。嘔吐煩渴。黃疸水腫。脚氣淋閉。水澀渴利。吐血衄血。諸症腫毒。乳汁不通。胎產難下。服此皆能蕩熱除澀。通汁滑胎。然其開竅利澀。不獨盡由小便而下。蓋能上開腠理而發表。是除上中之澀熱。下利便溺而行。是除中下之澀熱。澀去則三焦寧而表裏安。澀去則關門通而陰陽利矣。河間益元散。用此通治上下表裏諸病。其意在此。滑石既屬滲利。如何又言止渴。因其澀熱既滲。則脾胃中和。而渴自止耳。故書又載能理脾胃義。亦由此。白而潤者良。

國外學說　日本和漢藥考曰。滑石種類頗多。由其色澤形狀及品質等。而別爲蠟石、溫石、凍石、石鹼石等。又日本藥局方曰。滑石爲微細粉碎之珪酸鎂。於指間捻之。覺如脂肪。不溶於水及酒精。漢醫以爲淋病之主藥。扶氏藥物學云。於『インテルトリ』用爲撒布粉劑。或爲丸劑之衣。用量四・〇至一六・〇。又英美學說。謂滑石中西國均產。內含鎂養玻養鈣養等。其功用。惟腹具酸者服之。則能合酸作瀉。又能作撲粉用。本草綱目謂其能療治石淋。黃疸。水腫。脚氣。吐血。鼻血。諸瘡腫痛。且去身熱。補脾胃。能通九竅六腑津液。未知其何所據而云然。

近人學說　黎伯概曰。滑石有三種。二種是眞。一種是假。其者一種是川滑石。出四川。一種是漳滑石。出漳州。質皆甚滑。名實相負。細驗之。漳滑石質輕鬆。色微紅。川滑石質堅緻。色微青。在藥性爲通利小便。消解血液與淋巴液中之炎熱。從小便而解。正是利用其滑性。滑石在化學上之元質爲鎂。爲輕金屬之鹽類。能中和酸性液。熱病卽酸性液發炎。滑石收其酸性液排泄於尿。非常靈敏。當用眞滑石。漳產質鬆而輕。易通達腸膜之液。川產質緻而密。下行通利之力尤銳。二者比較。實以川產爲勝。惟一種僞滑石。質粗鈍澁。並不見滑。實另一種土石。其元質不必爲鎂。究不知出產何處。查其來源。已研成粉。而用紙包裹。以其不滑而澁。則不惟無益。而反有害。醫家處方。但書滑石。藥店率以此物應之。余問之藥店。俱云若要眞滑石。須加書川滑字樣。卽得眞物。余復驗藥店所製之六一散。亦多用澁石者。而用眞滑石者亦有之。並不一致。以手捻之。一澁一滑。卽可立辨。

配合應用　㊀滑石和甘草爲益元散。又名天水散。六一散。太白散。解中暑傷寒疫癘。并汗後遺熱。勞復諸疾。兼解兩感傷寒。百藥酒食邪熱毒。煩滿短氣。腹脹悶痛。淋

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鬧瀝痛。療身熱嘔吐。洩瀉腸癖。下痢赤白。除煩熱。胸中積聚寒熱。止消渴蓄水。婦人催生下乳。治吹乳乳癰。牙痛齒疳。此藥大養脾胃之氣。通九竅六腑。去留結。通經脈。消水穀。安魂定魄。乃神驗之仙藥也。劉河間傷寒直格本方。白滑石水飛過六兩。粉甘草一兩爲末。每服三錢。蜜少許。溫水調下。實熱則用新汲水下。解利則蔥豉湯下。通乳用猪肉麵湯調下。催生用香油漿水調下。凡難產或死胎不下。皆由風熱燥瀝。結滯緊斂。不能舒緩故也。此藥力至則結滯頓開而瘥矣。如用以治痢。照雷公炮製用牡丹皮同煮過。加丹砂水飛細末。每兩一錢。名辰砂六一散。治心經伏暑。下痢純血煩躁口渴。神昏不爽。

㊁治腸上煩熱。多渴。利九竅。滑石二兩。搗水三大盞。煎二盞。去滓。入粳米煮粥食。（聖惠方）

㊂治女勞黃疸。日晡發熱。惡寒。少腹急。大便溏黑。額黑。滑石、石膏等分。研末。大麥汁服方寸匕。日三。小便大利。愈。腹滿者難治。（千金方）

㊃治乳石發動。煩熱煩渴。滑石粉半兩。水一盞。絞白汁頓服。（聖惠方）

㊄治氣壅關格不通。小便淋結。臍下妨悶。脈痛。滑石粉水調服一兩。（廣利方）

㊅治小便不通。滑石末一升。車前汁和塗臍之四畔。方四寸。乾即易之。冬月水和。（楊氏產乳方）

㊆治婦人轉胞。因過忍小便而致。滑石末蔥湯服二錢。（聖惠方）

㊇伏暑水泄。白龍丸。滑石火煅過一兩。硫黃四錢。爲末。麵糊丸。漆豆大。每用淡薑湯隨大小服。又方。治伏暑。或吐或瀉或瘧。小便赤煩渴。玉液散。用桂府滑石燒四兩。麝香一錢。丁香一錢。爲末。米湯服二錢。亦治霍亂。（普濟方）

㊈治痘瘡狂亂。循衣摸牀。大渴引飲。用益元散一兩。加朱砂飛過二錢。冰片三分。麝香一分。用燈心湯調二三錢服。（王氏痘疹方）

㊉治風毒熱瘡。遍身出黃水。用桂府滑石末傅之。次日愈。先以虎杖、豌豆甘草等分煎湯。洗後乃搽。（普濟方）

㊊治腳指縫爛。滑石一兩。石膏煅半兩。枯礬少許。研摻之。亦治陰下溼汗。（集簡方）

㊋治傷寒衄血。滑石末。飯丸梧子大。每服十丸。微嚼破。新水嚥下。立止。湯晦叔云。鼻衄乃當汗不汗所致。其血紫黑時不以多少。不可止之。且服溫和藥。調其營衛。待血鮮時。急服此藥止之也。（本事方）

㊌治暴得吐逆。不下食。生滑石末二錢七。溫水服。仍以細麵半盞押定。（本草衍義方）

㊍治妊娠子淋。不得小便。滑石末水和泥臍下二寸。（外臺祕要方）

㊎治杖瘡腫痛。滑石、赤石脂、大黃等分爲末。茶湯洗淨貼。（趙氏經驗方）

㊏治熱毒怪病。目赤鼻腫大喘。渾身出斑。毛髮如鐵。乃因中熱毒氣結於下焦。用滑石、白礬各一兩爲末。作一服。水三盞。煎減半。不住飲之。（夏子益奇疾方）

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡陰虛而無溼熱者禁用。惡曾青。制雄黃以石葦爲之使。

著名方劑　㊀滑石代赭湯。治百合病下之後者主之。（金匱）百合七枚。擘。滑石三兩。（碎綿裹）代赭石如彈丸大一枚。（碎綿裹）以水洗百合漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石、代赭取一升。去滓。合和。重煎取一升五合。分溫服。㊁滑石白魚散。主小便不利。（金匱）滑石二分。亂髮二分。（燒）白魚二分。上三味。杵爲散。飲服半錢匕。日三服。

參攷資料　㊀古方治淋瀝多單使滑石。又與石葦同搗末。飲服。刀圭更驗。又主石淋。取十二分。研粉。分作兩服。水調下。煩熱定。卽停後服。（蘇頌）㊁入足太陽經。滑能利竅。以通水道。爲至燥之劑。舒著湯用滑石、阿膠。同爲滑劑。以利水道。蔥豉生薑同煎去滓。澄清。以解利淡味滲洩。爲陽。故解表利小便也。若小便自利者不宜用。（王好古）㊂始安披縣所出二石。形實既異。所用又殊。始安者輭滑而白。宜入藥。東萊者硬澁而青。乃作器

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石也。（陳藏器）㊀凡使有多般。其白滑石如方解石。色似冰白畫石。上有白膩文者眞也。烏滑石似墨畫石。上有青白膩文入用亦妙。綠滑石性寒有毒。不入藥用。黃滑石似金顆顆圓。畫石上有青黑色者勿用。殺人。冷滑石青蒼色。畫石上作白膩文。亦勿用之。（雷敎）㊁今道永萊濠州皆有之。凡二種。道永州出者白滑如凝脂。南城志云。贛成縣出。嘗石卽滑石也。土人以爲燒器。烹魚食是也。萊濠州出者理粗質青。有黑點。亦謂之斑石。二種皆可作器。甚精好。初出軟柔。彼人就穴中制作。用力殊少也。本草所載土地皆是北方。而今醫家所用白色者。自南方來。或云沂州所出。甚白佳。與本草所云太山之陰相合。而彼土不取爲藥。今濠州所供青滑石。云性寒無毒。主心氣滯滯。與本經大同小異。又張勃吳錄地理志。及大康地記云。鬱林州布山縣馬湖馬嶺山皆有虺。甚毒殺人。有冷石可以解之。石色赤黑。味苦。層之著瘡中。并以切齒立蘇。一名切齒石。今人多用冷石作粉。治痿瘡。或云卽滑石也。但味之甘苦不同爾。（蘇頌）㊂滑石廣之桂林各邑及猺峒中皆出之。卽古之始安也。白黑二種。功皆相似。山東蓬萊縣桂府村所出者亦佳。故醫方有桂府滑石。與桂林者同稱也。今人亦以刻圖書。不甚堅牢。滑石之根。爲不灰木。滑石中有光明黃子爲石腦芝。（李時珍）

【滑石粉】卽滑石之處方用名。詳『滑石』條。

【滑胡麻】卽亞麻之日本名。詳『亞麻』條。

【滑珠】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【滑菜】卽冬葵子之俗名。詳『冬葵子』條。

【滑葵子】卽冬葵子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬葵子』條。

【滑蟲】卽蜚蠊之古籍別名。典見唐本草。詳『蜚蠊』條。

【源草】卽狼牙之日本名。詳『狼牙』條。

【溜魚】卽鮫魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮫魚』條。

【滁菊花】卽菊花之處方用名。詳『菊花』條。

【煎香】卽沈香之肌理有黑脈紋。入水半浮半沈者。爲沈香中之次品。詳『沈香』條。

【煎澤草】卽蘭草之古籍別名。典見本草集註。詳『蘭草』條。

【煙】卽烟草之簡稱。詳『烟草』條。

【煤油】卽石油之別名。詳『石油』條。

【煤炭】卽石炭之別名。典見綱目。詳『石炭』條。

【煤參】命名　形如參。皮心俱青黑。故名。

產地　出陝西安等處。

性質　味微苦甘。

主治　功力同人參。但較薄耳。

參致資料　煤參出陝西華山。食之多吐。其性亦劣。（施柳南）

【煤赭】卽土墾之別名。詳『土墾』條。

【煆人牙】卽人牙煆成者之處方用名。詳『人牙』條。

【煆牙齒】卽人牙煆成者之處方用名。詳『人牙』條。

【煆石決明】卽石決明煆成者之處方用名。詳『石決明』條。

【煆石燕】卽石燕煆成者之處方用名。詳『石燕』條。

【煆牡蠣】卽牡蠣之處方用名。詳『牡蠣』條。

【煆赭石】卽代赭石煆成者之處方用名。詳『代赭石』條。

【煆龍骨】卽龍骨煆成者之處方用名。詳『龍骨』條。

【煆磁石】卽慈石煆過者之處方用名。詳『慈石』條。

【煆礞石】卽礞石煆成者之處方用名。詳『礞石』條。

【煆礬石】卽礬石煆成者之處方用名。詳『礬石』條。

【煉牛膽汁】卽牛膽煉成汁者之處方用名。詳『牛膽』條。

【煉蜜】卽蜂蜜之已煉過者。詳『蜂蜜』條。

【煉豬油】卽豬脂之處方用名。詳『豬脂』條。

【黏】卽杉材之古籍別名。典見綱目。詳『杉材』條。

【照子】卽古銅鏡之古籍別名。典見綱目。詳『古銅鏡』條。

【煑岸】卽馬刀之古籍別名。典見綱目。詳『馬刀』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【煨天麻】卽天麻用火煨成者之處方用名。詳『天麻』條。

【煨木香】卽木香煨成者之處方用名。詳『木香』條。

【煨石膏】卽石膏煨成者之處方用名。詳『石膏』條。

【煨肉果】卽肉豆蔻煨成者之處方用名。詳『肉豆蔻』條。

【煨草果】卽草豆蔻以火煨成者之處方用名。詳『草豆蔻』條。

【煨葛根】卽葛根之處方用名。如治泄利。將葛根煨熟用之。詳『葛根』條。

【煨薑】製法　以薑洗淨。外裹溼紙。入炭火煨。令紙焦及薑外皮微焦。中心呈深黃色則透矣。

主治　和中止嘔。及與大棗並用。能行脾胃津液而和營衛。（吳遵程）

【煸牛】卽牷牛之古籍別名。典見綱目。詳『牷牛』條。

【猱桂】卽肉桂之處方用名。詳『肉桂』條。

【猾頁】卽龔荷之古籍別名。典見說文。詳『龔荷』條。

【猿柿】卽君遷子之日本名。詳『君遷子』條。


【獅】　古籍別名　狻猊。虓。（綱目）

外國名詞　Felis leo L.（拉丁）Lion（英）シシ（日本）

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類裂脚類貓科之獅。

產地　出非洲及南美之巴西國諸地。

形態　獅爲獸類之一種。形略似貓。頭部圓。肩部最壯大。至後方漸狹小。四肢强健。有鉤爪。掌有肉塊。行走無聲。尾細長。末端具叢毛。雄者頸間有長鬃毛。毛色淡黃帶褐。體長丈許。雌者較小。而尤猙獰。棲山林。食諸獸。吼聲可達數里。稱爲百獸之王。其屎可供藥用。



獅

主治　燒之殺百蟲。辟鬼氣。塗一切惡瘡。卽結痂而愈。

參攷資料　獅屎堅如鐵石。磨之作紅色。燒之有臭氣。須用鐵匣盛之。周圍護以鐵屑。否則易於朽爛。（醫學大辭典）

【獅子朮】卽於朮之盤結而生。醜怪猙獰。如獸形者。典見萬歷杭州府志。詳『於朮』條。

【獅子草】卽九龍草之古籍別名。典見百草鏡。詳『九龍草』條。

【獅子盤頭蔆】卽黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳『黨參』條。

【獅子聹】卽耳草葉之別名。詳『耳草葉』條。

【獅血】　主治　燒之殺百蟲。去鬼氣。

【獅油】　命名　本品係以獅脂熬取之油。故名。

形態　獅油冷凝時則堅硬如石。熔熱時。則可挑絲一二尺長不斷。可供藥用。

辨僞　以微黑色者及塗指甲上涼透指甲者眞。又方以黍許入沸湯。湯卽不沸。

性質　辛。溫。有毒。

主治　消熱結。療腸塞。通二便不利。酒服一三釐自效。

參攷資料　㊀獅爲百獸之長。性最難馴。一吼則百獸辟易。爾雅言其食虎豹熊。太古言其乳入牛羊馬乳中皆化爲水。西域人捕得。取其油入貢。以供宮人滌除衣垢之用。又能去紙上墨跡。刮少許。隔紙熨之。卽脫。予嘗試用。垢雖去而衣易毀。紙易脆。僅供一時之用。雖係方物。方藥罕用。近世醫者以之治噎膈病。蓋噎膈皆鬱疾。瘀積所致。用取滌痰之意。試之輒驗。由是方家爭爲奇物。但性最猛利。力能墮胎。孕婦忌用。象油亦能去垢滌痰。但不能去墨跡耳。（逢原）㊁獅子油白膩如猪肪。氣味俱薄。利小便。凡人小便不通。雖腹脹羣痛病在危急者。以酒或白湯送下三四釐。或半分。卽通。嘗有一丐。因受暑熱。遂致小便不通。每月一發。發至二三日後。羣痛如割。至不可忍。屢投纍斬死人。或以獅油少許投之。片刻卽通。奏效之速。無逾於此。而本草不著其功用何哉。豈當時求知用歟。第盧祕者似宜酌而用之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（朱排山柑園小識）㈢獅油性最猛烈內服尤不可單用。更勿多服。嘉慶元年三月。予友鄧某得獅油少許。因病欲服之未果。爲一鄉人轉乞去。市於人獲重價。其人市得服半黍許。夜半而死。鄉人懼罪。亦投水死。蓋外用不妨。內服尤宜審愼。以人之腸胃太弱。不任峻利之攻劑耳。善透經絡。凡用勿多。（趙學敏）

【獅頭參】卽防風。黨參之別名。典見翁有良辨誤。詳『黨參』條。

【璉瑄】卽玳瑁之原名。詳『玳瑁』條。

【瑒花】卽山礬之古籍別名。典見綱目。詳『山礬』條。

【瑞香】原名　睡香。

命名　相傳廬山一比丘僧。晝寢岩下。夢中但聞異香酷烈。覺而尋之。因得此。故名。後有好事者聞而奇之。以爲祥瑞之徵。迺改名瑞香。

古籍別名　世英。佳客。花賊。珠友。奪皮香。風流樹。紫丁香。紫風流。錦被堆。蓬萊花。七里香。沈丁花。露甲。蓬萊紫（和漢藥考）



瑞香（一）

基本　屬瑞香科。爲瑞香之根皮。

形態　瑞香爲常綠小灌木。人家庭園常種之。莖高四五尺。極枝有兩叉至三叉。外皮平滑。色灰褐。枝葉繁茂。葉形長橢圓或廣披針形。全緣。長二三寸。末端帶尖。基底部次第狹小。遂成葉柄。皆互生。質厚而瞬。面深綠色。有光澤。背淡綠色。冬月葉腋發生花蕾。春分前後。開類似莞花之四瓣合瓣花。相綴而爲頭狀花序。一簇約有十朶至十六朶。花被內面粉紅色。外面紫紅色。有馥鬱香氣。極甚。其開白花者。謂之白瑞香。果實每不能結成。



瑞香（二）

製法　採得洗淨日乾。

性質　甘。鹹。無毒。

效能　治骨痛。療喉痺。用作驅除黴毒藥。

主治　急喉風。用白花者。研水灌之。

用量　八分至一錢半。

參攷資料　南土處處山中有之。枝幹婆娑。柔條厚葉。四時不凋。冬春之交。開花成簇。長三四分。如丁香狀。有黃白紫三色。格古論云。瑞香高者三四尺。有數種。有枇杷葉者。楊梅葉者。柯葉者。毬子者。攣枝者。惟攣枝者花紫香烈。枇杷葉者結子。其始出於廬山。宋時人家栽之。始著名。攣枝者其節攣曲如斷折之狀。也。其根綿軟而香。（李時珍）

【瑞香花】古籍別名　睪香花。

睪花（綱目拾遺）

性質　甘。無毒。

主治　含之清頭目。止齒痛。及稀痘瘍乳岩初起。

【瑞草】卽四方如意草之別名。詳『如意草』條。

【瑞鷺】卽梧櫚根之別名。典見綱目。詳『天花粉』條。

【瑞蓮】卽睡蓮之別名。詳『睡蓮』條。

【瑞聖奴】卽柑之古籍別名。典見綱目。詳『柑』條。

【瑞蓮花】卽睡菜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『睡菜』條。

【瑞龍腦】卽龍腦香之別名。典見天寶本草。詳『龍腦香』條。

【瑞鳳】卽鳳凰之別名。典見禽經。詳『鳳凰』條。

【瑟瑟】卽靛子之別名。典見山海經。詳『寶石』條。

【瓶香】　性質　微寒。無毒。

主治　天行時毒。水腫浮氣。水煎洗風瘡。

參攷資料　㈠瓶香係芳香類排草香之一種。爲熱帶地之產品也。㈡卽乳香之以瓶收者。性質功效較尋常乳香力遜。詳『乳香』條。

【當石】卽三葉之古籍別名。典見別錄。詳『三葉』條。

【當門子】卽麝香之處方用名。詳『麝香』條。

【當郎】卽蟑螂之古籍別名。典見綱目。詳『蟑螂』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【當陸】卽商陸之古籍別名。見開寶本草。詳『商陸』條。

【當道】卽車前草之古籍別名。典見本經。詳『車前草』條。

【當歸】命名　本品功能調氣養血使氣血各有所歸。故名。

處方用名　全當歸。白當歸。西當歸。川當歸。大當歸。秦當歸。白歸身。當歸鬚。歸尾。油當歸。

古籍別名　乾歸（本經）山薪。白薪（爾雅）文無秦歸（綱目）草頭歸（陶弘景）馬尾歸。大芹。名薛。衆馬。綸綍。女二天。地仙圓。夷靈芝。僧庵草（和漢藥考）

外國名詞　Aralia Edulis. (Araliu Cordata)

基本　屬繖形科當歸之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。

當歸以陝西漢中府興安縣西固等爲最。其次則四川階州龍安大寧。廠甘肅等。近日雲南有來。味帶苦辣。與西歸之香甜純味有別。四川甘肅河南產者。亦可用之。但雲南產者。不適用。

形態　當歸爲一年生之草本。春月生苗。莖高三四尺。葉爲由多數分裂小葉而成之羽狀複葉。深綠色。有光澤。夏月於梢頭開小白花。作複繖形花序排列。秋季結淡綠色瘦果。其根有分歧。天然生根。小而香氣强。栽植者反之。根粗而氣味異。藥用以天然根爲佳。販賣品有生乾、蒸乾二種。但多爲蒸乾品。長概四五寸。外部黃褐色。內部類白色。中有黃色木心。常溼潤。味辛甘。

種類　秦產者。力柔而善補。川產者。力剛而善攻。秦歸狀似大葉芎藭。頭圓尾多。色紫氣香。肥潤者。卽所謂馬尾歸。其餘如川產者。狀似細葉芎藭。頭大尾粗。色白堅枯。卽所謂蠡頭歸。

採取　二月八月間。採根陰乾。

製法　雷敩曰。凡使當歸。須去頭蘆。以酒浸一宿入藥。張元素曰。先以酒洗淨土。治上酒浸。治外酒洗過。或火乾。日乾入藥。李時珍曰。凡曬乾乘熱紙封甕收之。不蛀。聖濟總錄。墮胎下血不止。當歸焙用。

用法　與他藥水煎。或酒浸。或熬膏。或剉末和作丸散。

性質　苦。溫。無毒。

成分　其中含有多量蔗糖。

效能　補血。活血。潤燥。滑腸。用作調血通經。爲女科要藥。

作用　在胃中僅能促進胃液之分泌。增多至腸始漸被吸入血中。同時又能激腸之黏膜。使腸壁吸收力强大。本品入血中。其作用專在刺激血液中之氯化酵素。令血液之氯化迅速。細胞之新陳作用亦隨之而增進。血歷亦較爲增高。同時卵巢亦能誘起充血之作用。

主治　欬逆上氣。溫瘧寒熱。洗洗在皮膚中。婦人漏下絕子。溫中止痛。除客血內塞。中風痙。汗不出。溼痺。中惡客氣。虛冷。補五臟。生肌肉。諸惡瘡瘍金瘡。煑汁飲之。

歷代記述弦證　【唐】甄權　藥性本草論當歸曰。止嘔。逆。虛勞寒熱。下痢腹痛。齒痛。女人漏血腰痛。崩中。補諸不足。【宋】大明諸家本草論當歸曰。治一切風。一切氣。補一切勞。破惡血。養新血。及癰癬。腸胃冷。【元】王好古湯液本草論當歸曰。主痿痹嗜臥。足下熱而痛。衝脈爲病。氣逆裏急。帶脈爲病。腹痛。腰溶溶如坐水中。【明】李時珍本草綱目論當歸曰。治頭痛。心腹諸痛。潤腸胃筋骨皮膚。治癰疽。排膿止痛。和血補血。【明】繆希雍本草經疏論當歸曰。當歸辛大溫無毒。甘以緩之。辛以散之。潤之。溫以通之。暢之。入手少陰足厥陰。亦入足太陰。活血補血之要藥。故主欬逆上氣也。溫瘧寒熱。洗洗在皮膚中者。邪在厥陰也。行血則厥陰之邪自解。故寒熱洗洗隨愈也。婦人以血爲主。漏下絕子。血枯故也。諸惡瘡瘍其已潰者。溫補內塞。則補血而生肌肉也。金瘡以活血補血爲要。破傷風亦然。並煑飲之。內虛則中寒。甘溫益血。故能溫中。血凝則痛。活血故痛自止。血溢出膜外。或在腸胃。曰客血。得溫得辛則客血自散也。內塞者。甘溫益血之效也。中風痙痙卽角弓反張也。汗不出者。風邪乘虛客血分也。得辛溫則血行而和。故痙自柔而汗自出也。痺者。血分爲邪所客。故拘攣而痛也。風寒溼三者合而成痺。血行則邪不能客。故痺自除也。中惡者內

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

虛。故猝中於邪也。客氣者。外來之寒氣也。溫中則寒氣自散矣。虛冷者。內虛血不營於肉分。故冷也。補五臟生肌肉者。臟皆屬陰。陰者血也。陰氣足則營血旺而肌肉長也。患人虛冷。加而用之。【明】李士材本草圖解論當歸曰。當歸甘辛微溫。入心肝脾三經。主一切風。一切氣。一切血。溫中止頭目心腹諸痛。破惡血。養心血。潤腸胃。養筋骨。澤皮膚。癰疽。排膿止痛。生肌氣血。昏亂。服之而定。能領諸血各歸其所當之經。故名當歸。脾胃瀉者忌之。去蘆酒洗微焙。【清】黃宮繡本草求眞論當歸曰。當歸辛甘溫潤。諸書載爲入心生血上品。緣脈爲血府。諸脈皆屬於心。心無血養。則脈不通。血無氣附。則血滯而不行。當歸氣味辛甘。既不慮其過散。復不慮其過緩。得其溫中之潤。陰中之陽。故能通心而血生。存爲血中氣藥。故凡一切血症。陰虛。陽無所附。而見血枯血燥。血脫血閉等症。則當用此主治。按當歸頭則止血上行。身則養血中守。尾則破血下流。全則活血不走。古方合白芍、芎藭、地黃同用。名爲四物湯。總劑。蓋謂得芎以爲長養生發之機。地黃以爲滋補化源之自。白芍以爲救陰斂陽之本。則血始能以生。若血虛而氣不固。則當佐以人參、黃芪。血熱。佐以條芩、梔連。血積。佐以大黃、牽牛。與夫營虛而表不解。則當佐以柴葛升麻桂衞。熱而表不斂。則當佐以大黃。隨其病之所向。以爲出入加減。要使血滯能通。血虛能補。血枯能潤。血亂能撫。俾血與氣附。氣與血固。而不致散亂。而無所歸耳。書命其名曰歸。卽是此意。是以氣逆而見欬逆上開者。則當用此以和血。血和而氣則降矣。寒鬱而見瘧痢。腰腹頭痛者。則當用此以散寒。寒散而血則和矣。血虛而見風痙無汗者。則當用此以養血。血養而風則散矣。他如瘡瘍癰疽。而見痛苦異常。肌肉失養。而見皮膚不潤。並衝脈爲病。而見氣逆裏急。帶脈爲病。而見腹痛。腰如坐水。亦何莫不因血虛氣無所附之意。得此則排膿止痛。癰消毒去。膚澤。皮潤。而無枯槁不榮之患矣。然此味辛則散。氣虛火盛者切忌。味甘則壅。脾胃虛寒者則忌。體潤性滑。大腸泄瀉者則忌。不可不熟晰而明辨耳。至書既言當歸入心。而又曰入肝入脾。無非因其血補而肝與脾皆有統臟之意。秦產頭圓尾多。色紫氣香肥潤。名馬尾當歸。其性力柔善補。川產尾粗堅枯。名蠶頭當歸。其性力剛善攻。只宜發散。收貯嚥乾。乘熱紙封。甕內。宜用酒洗。【清】張隱菴本草崇原論當歸曰。當歸花紅根黑者。氣味苦溫。稟少陰水火之氣。上下相交。各有所歸。則欬逆上氣自平矣。治溫瘧寒熱。洗洗在皮膚中者。助心主之血液。從經脈而外充於皮膚。則溫瘧之寒熱洗洗然而在皮膚中者可治也。治婦人漏下絕子者。助腎臟之精氣。從下而上交於心包。則婦人漏下無時而絕子可治也。治諸惡瘡瘍者。養血解毒也。治金瘡。養血生肌也。凡藥皆可煮飲。獨當歸言煮汁飲者。以中焦取汁變化而赤。則爲血。當歸滋中焦之汁以養血。故曰煮汁。謂煮汁飲之。得其專精矣。【清】徐洄溪本草經百種錄論當歸曰。當歸辛香而潤。香則走脾。潤則補血。故能透入中焦。營氣之分。而爲補營之聖藥。又曰。當歸爲血家必用之藥。而本經無一字及於補血養血者何也。蓋氣無形可驟生。血有形難速長。凡通閉順氣。和陰清火。降逆生津。去風利竅。一切滋潤通利之品。皆能令陰氣流通。不使亢陽致害。卽所以生血也。當歸辛芳溫潤。兼比數長。實爲養血之要品。惟苦其血充之效。則血之得所養。不待言而可知。此等當參全經。而悟其理。【清】賈九如辨藥指南論當歸曰。當歸性溫能散。帶甘能緩。經曰。肝欲散。以辛散之。肝苦急。以甘緩之。緩之散之。肝性所喜。卽所爲補。故專入肝以助血海。使血流行。凡藥體性。分根升梢降。中守。此獨一物而全備。頭補血上行。身養血中守。梢破血下行。全活血。運行周身。治血虛不足。縱慾耗精。陰虛勞怯。去血過多。癰毒潰後。此皆血脫。用歸頭以補血也。治精神困倦。腰痛腿酸。女人血漏。目痛牙疼。瘡久虛證。純血痢疾。此皆血少。用歸身以養血也。治諸腫毒。跌撲金瘡。皮膚澁癢。溼痺瘕

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

癖。經閉瘀蓄。此皆血聚。用歸尾以破血也。若全用治血虛昏亂者。服之卽安。有各歸氣血於經絡之功。故名當歸。取其氣香體潤。同參朮用滋脾陰。如脾虛者米拌炒用。使無便滑之虞。凡痰涎者恐其黏膩。泄瀉者恐其滑腸。嘔吐者恐其泥膈。氣喘擊噯者恐其辛溫。心性喜斂。肺氣欲收。切宜忌之。

國外學說 日本學說謂當歸者。以中國產爲最良。在日本則產於兵庫福島縣等。漢醫用之爲通經清涼藥。能領諸血各歸其所當歸之經。故名。卽補血之聖藥也。然其作用甚可疑。毫無確實之根據。其成分亦尙未明瞭。用量大約六・〇至一六・〇。又日本大和國宇陀郡栽植當歸。於十一月採掘其經二年之根。曬乾之。浸置熱湯中片時。懸簷下乾曬二個月。將其乾定者。約一斤爲一束。收藏至清明。再曬二三日。每百斤用樟腦半斤。密封櫃中。至九月乃開櫃取出售之。英美學說謂當歸產中國之四川陝西及江寧府滁州等處。其根可入藥。其功用能開胃暖胃處方。以當歸一分。濃酒八分。先用酒六分浸二天。間時搖動。裝淋菁淋乾。再加餘酒漂淋。仍足八分爲度。每服一錢零五釐。以至二錢一分。

（當歸酒方）

近人學說 ㊀荊武蒙曰。拙荊戴英。生來健康。向無經病。民國十四年春。曾舉一子。臨盆非常困難。經施種種注射手術。母子得慶俱全。然已衰頹不勝矣。嗣後場力調護。母體漸臻健康。小兒亦强壯活潑。越六閱月而經再行。覺下腹部發牽引性疼痛。下紫黑色錠狀血塊。經淨痛止。展轉不愈。已兩越寒暑矣。婦人畏羞。祕而不言。嗣經覺察。堅詢所苦。答如上稱。幷謂心身康泰時痛少瘥。頗倦時則增劇。且遭前移後甚不規則云云。當投以强壯劑及治經痛最新製劑。如「佛里爾珠」"Valyl" 安濟室閥"Andysmen" 凡拉蒙 "Yo-ramon" 等等。或則收效一時。或則效力毫無。訴之新醫藥。伎已窮焉。病者謂余曰。子曷不以中藥療我乎。余唯唯。因思當歸一物。中國古醫籍上。盛稱能調經種子。有補血補氣之功。婦科產科方上。鮮有不用當歸者。乃不雜他藥。於舊藥舖中單購當歸若干。每日煎煮五錢。數次分服。約十餘日。紅潮旋至。痛苦大減。因更持續煎服一星期。其後準期經至。痛苦若失。纏綿頑疾。一旦而除。驚喜莫名。詎料第三月經又停止。心滋疑焉。以爲藥性已失。越數星期而現全身疲乏。暈眩嘔惡之象。知又撤下孽根矣。去年春。欣然復舉一男。因更嘆當歸之眞有調經種子之偉功也。按當歸一物。中醫固奉爲補劑。怪品。最近據外人報告。亦謂婦人月經失常。當歸能統治之。可知當歸確有調經之主要功能。種子則爲偶然之結果耳。凡因經病而患嗣續艱難者。殆有試服之價值矣。開德國怡默克 "E. Merck" 大藥廠。將當歸運諸中國。經精良化學的操作。去其渣滓。存其菁華。製成藥劑。名之曰當歸精。想其效力偉大。當更倍蓰矣。㊁張山雷曰。當歸是血家氣藥。以辛升運行爲用。以溫和燠然爲功。氣血虛寒者得之。則血隨氣行。而歸其所歸。此當歸命名之正義也。昔人每謂身能補血。頭能止血。尾能行血。全能和血。徹上徹下。可補可攻。頭尾之情性不同。斯攻守之取效自別。吾國藥物學之精細。所以異乎西人之專論物質。而無投不利者。其神髓在是。頗謂歸身主守。補固有功。歸尾主通。逐瘀自驗。而歸頭乘上行之性。便血溺血腸中淋帶等之陰隨陽陷者。升之固宜。若吐血衄血之氣火升浮者。助以溫升。豈不爲虎傅翼。是止血二字之所當因症而施。固不可拘守其止之一字而誤謂其無所不可也。且凡失血之症。氣火沖激。擾動血絡。而循行不守故道者。實居多數。歸之氣味俱厚。行則有餘。守則不足。亦不可過信歸所當歸一語。而有循名失實之咎。卽如局方四物一湯。舉國醫家。孰不知其是血家聖藥。且自海藏種種加味。而六合諸方。可謂五花八門。無美不備。極盡醫林能事。究竟卽以四物言之。已是走者太走。守者太守。各有專主。未必水乳交融。更何論信手拈來者之合宜與否。此則泥於迹象。太嫌呆板。去神化二字。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

暖乎後矣。

配合應用　㊀治婦人產後百病。當歸、川芎、芍藥、地黃名四物湯。主婦人血分百病。加炒黑乾薑、炒黑豆、澤蘭、牛膝、益母草、蒲黃。㊁當歸、桂枝、兀菊花、牛膝、主痺。㊂治癰在陰分久不止。當歸、牛膝、鼈甲、橘皮、生薑。㊃治心血虛不得眠。當歸、酸棗仁、遠志、人參、茯神。㊄治盜汗。當歸、黃耆、生熟地黃、黃芩、黃連、黃檗。㊅治破傷風。當歸、荊芥、白芷、芎藭、地黃。㊆治一切折傷、腕跌、挫閃作疼。當歸、續斷、牛膝、杜仲、地黃、鹿角屑、桂。㊇治難產及倒生。當歸、川芎、人參。㊈治產後血上薄心。當歸、益母草、紅藍花、蒲黃、牛膝。㊉治婦人血閉無子。當歸、白膠、地黃、芍藥、續斷、杜仲。㊊治滯下純血。裹急後重。當歸、地榆、金銀花、滑石、紅麴。㊋治血虛發熱。當歸補血湯。治肌熱燥熱、困渴引飲、目赤面紅、晝夜不息、其脈洪大而虛、重按全無力、此血虛之候也。得於肌困勞役。證象白虎。但脈不長實為異耳。若誤服白虎湯、即死。宜此主之。當歸身酒洗二錢、綿黃芪蜜炙一兩。作一服、水二鍾、煎一鍾、空心溫服。日再服。（東垣蘭室祕藏方）

㊌治失血眩暈。凡傷胎去血。產後去血。崩中去血。金瘡去血。拔牙去血。一切去血過多。心煩眩暈。悶絕不省人事。當歸二兩、芎藭一兩。每用五錢、水七分、酒三分、煎七分。熱服。日二。（婦人良方）

㊍治衄血不止。當歸焙研末。每服一錢、米飲調下。（聖濟總錄方）

㊎治小便出血。當歸四兩、剉、酒三升、煮取一升、頓服。（肘後方）

㊏治頭痛欲裂。當歸二兩、酒一升、煮取六合、飲之。日再服。（外臺祕要方）

㊐治內虛目暗。補氣養血。用當歸生曬六兩、附子火炮一兩、為末。煉蜜丸、梧子大。每服三十丸、溫酒下。名六一丸。（聖濟總錄方）

㊑治心下痛刺。當歸為末。酒服方寸匕。（必效方）

㊒治手臂疼痛。當歸三兩、切。酒浸三日、溫飲之。飲盡、別以三兩再浸。以瘥為度。（事林廣記方）

㊓治溫瘧不止。當歸一兩、水煎飲。日一服。（聖濟總錄方）

㊔治久痢不止。當歸二兩、吳萸一兩、同炒香、去萸不用、為末。蜜丸、桐子大。每服三十丸、米飲下。名勝金丸。（普濟方）

㊕治大便不通。當歸、白芷等分、為末。每服二錢、米湯下。（聖濟總錄方）

㊖治婦人百病。諸虛不足者。當歸四兩、地黃二兩、為末。蜜丸、梧子大。每食前米飲下十五丸。（太醫支法存方）

㊗治月經逆行。從口鼻出。先以京墨磨汁服止之。次用當歸尾、紅花各三錢、水一鍾半、煎八分、溫服。其經即通。簡便方）

㊘治室女經閉。當歸尾、沒藥各一錢、為末。紅花浸酒面北飲之。一日一服。（普濟方）

㊙治婦人血氣、臍下氣脹。月經不利。血氣上攻、欲嘔、不得睡。用當歸四錢、乾漆燒存性二錢、為末。煉蜜丸、梧子大。每服十五丸、溫酒下。（永類鈐方）

㊚治墮胎下血不止。當歸焙一兩、葱白一握、每服五錢、酒一盞半、煎八分、溫服。（聖濟總錄方）

㊛治妊娠胎動。神妙佛手散。治婦人妊娠傷動、或子死腹中、血下疼痛、口噤欲死。服此探之、不損則痛止。已損便立下。此乃徐玉神驗方也。當歸二兩、芎藭一兩、為粗末。每服三錢、水一盞、煎令泣泣欲乾。投酒一盞、再煎一沸、溫服。或灌之。如人行五里、再服。不過三五服便效。（備急方）

㊜治產難胎死橫生倒生。用當歸三兩、芎藭一兩、為末。先以大黑豆炒焦、入流水一盞、童便一盞、煎至一盞、分為二服。未效再服。（婦人良方）

㊝治倒產子死不出。當歸末。酒服方寸匕。（子母祕錄方）

㊞治產後血脹。腹痛引脇。當歸二錢、乾薑炮五分、為末。每服三錢、水一盞、煎八分、入麝酥少許、熱服。（婦人良方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊂治產後腹痛如絞。當歸末五錢。白蜜一合。水一盞。煎一盞。分爲二服。未效再服。（婦人良方）

㊂治產後自汗。壯熱。氣短。腰脚痛不可轉。當歸三錢。黃芪、白芍藥酒炒各二錢。生薑五片。水一盞半。煎七分。溫服。（和劑局方）

㊃治產後中風。不省人事。口吐涎沫。手足瘛瘲。當歸、荊芥穗等分爲末。每服二錢。水一盞。酒少許。童尿少許。煎七分。灌之。下咽即有生意。神效。（聖惠方）

㊄治小兒胎寒好啼。晝夜不止。因此成癇。當歸末一小豆大。以乳汁灌之。日夜三四度。（肘後方）

㊅治小兒臍溼不早治。成臍風。或腫赤。或出水。用當歸末傅之。一方入麝香少許。一方用胡粉等分。試之最驗。若愈後因尿入復作。再傅即愈。（聖惠方）

㊆治湯火傷瘡。燄赤潰爛。用此生肌拔熱止痛。當歸、黃蠟各一兩。麻油四兩。以油煎當歸焦黃。去滓。納蠟攪成膏。出火毒攤貼之。（和劑局方）

㊇治白黃色枯。舌縮恍惚。若語亂者。死。當歸、白朮二兩。水煎。入生芋汁、蜜和服。（三十六黃方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾虛溏瀉及大便滑瀉者禁用。惡醎茹溼。麵長蒼蒲海藻牡蠣生薑制雄黃。

著名方劑　㊀當歸生姜羊肉湯。治產後腹中疗痛。並腹中寒疝。虛勞不足。（金匱方）當歸三兩。生姜五兩。羊肉一斤。上以水八升。煮取三升。溫服七合。日三服。㊁當歸補血湯。治男婦血虛似白虎症。肌熱面赤。煩渴引飲。脈來洪大而虛。重按則微。此方主之。（實鑑方）當歸二錢。黃耆一兩。上二味。水煎服。㊂當歸六黃湯。治陰虛有火。盜汗發熱。（古方）當歸、生地、熟地、黃芩、黃連、黃柏各等分。黃耆加倍上藥以水煎服。㊃當歸龍薈丸。治肝經實火。大便祕結。小便澁滯。或胸膈作痛。陰囊腫脹。凡屬肝經實火皆宜服之。（宣明方）當歸、龍膽草、黃連、黃芩、山梔各一兩。大黃、蘆薈、青黛各五錢。木香二錢半。麝香五分。（另研）上爲末。炒神麴糊丸。每服二十丸。姜湯下。㊄當歸四逆湯。治手足厥冷。脈細欲絕。脈浮革因而腸鳴者。（傷寒方）當歸、桂枝、白芍各三兩。細辛二兩。大棗念五枚。甘草、通草各二兩。上七味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。㊅當歸芍藥散。治婦人懷娠。腹中疗痛。（金匱方）當歸三兩。芍藥一斤。茯苓四兩。白朮四兩。澤瀉半斤。芎藭三兩。右杵爲散。取方寸匕。酒和日三服。㊆當歸貝母苦參丸。治妊娠小便難。飲食如故者。（金匱方）當歸、貝母、苦參各等分。上三味末之。蜜丸如小豆大。飲服三丸。加至十丸。㊇當歸散。婦人妊娠宜常服。（金匱方）當歸、黃芩、芍藥、芎藭各一斤。白朮半斤。上五味杵爲散。酒服方寸匕。日再服。妊娠常服。即易產。胎無苦疾。產後百病悉主之。

參攷資料　㊀世俗多謂惟能治血而金匱外臺千金諸方。皆爲人補不足。決取立效之藥。古方用治婦人產後惡血上衝取效。無急於此。凡氣血昏亂者。服之即定。可以補虛備產後要藥也。（陳承）㊁其用有三。一心經本藥。二和血。三治諸病夜甚。凡血受病。必須用之。血壅而不流則痛。當歸之甘溫能和血。辛溫能散內寒。苦溫能助心散寒。使氣血各有所歸。（張元素）㊂入手少陰以其心生血也。入足太陰以其脾裹血也。入足厥陰以其肝藏血也。頭能破血。身能養血。尾能行血。全用同人參黃芪則補氣而生血。同牽牛大黃則行氣而破血。從桂附茱萸則熱。從大黃芒硝則寒。佐使分定。用者當知。酒蒸治頭痛。諸痛皆屬火。故以血藥主之。（王好古）㊃按爾雅薜山蘼。又云薜白蘼。薜音百蘼。即古芹字。郭璞註云。當歸也。似芹而粗大。許愼說文云。生山中者名薜。一名山蘼。然則當歸芹類也。在平地者名芹。生山中粗大者名當歸也。（蘇頌）㊄當歸本非芹類。特以花葉似芹。故得芹名。古人娶妻爲嗣續也。當歸調血。爲女人要藥。有思夫之意。故有當歸之名。正與唐詩胡麻好種無人種。正是歸時又不歸之旨。相同。崔豹古今注云。古人相贈以芍藥。相招以文無。文無一名當歸。芍藥一名將離。故也。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

今隴西四陽黑水當歸多肉少枝。氣香名馬尾當歸。西川北部當歸多根枝而細。歷陽所出者色白而氣味薄。不相似。呼爲草當歸。缺少時亦用之。（陶弘景）㊐今出當州宕州翼州松州。以宕州者最勝。有二種。一種似大葉芎藭者名馬尾當歸。今人多用。一種似細葉芎藭者名蠶頭當歸。即陶稱歷陽者。不堪用。莖葉並卑下於芎藭。（蘇恭）㊑今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之。以蜀中者爲勝。春生苗。綠葉有三瓣。七八月開花似蒔蘿。淺紫色。根黑黃色。以肉厚而不枯者爲勝。（蘇頌）㊒今陝蜀秦州汶州諸處人多栽蒔爲貨。以秦歸頭圓尾多色淡氣香肥潤者名馬尾歸。最勝他處頭大尾粗色白堅枯者爲饒頭歸。止宜入發散藥爾。（韓悉言）川產者力剛而善攻。秦產者力柔而善補是矣。（李時珍）

【當歸酒】基本　本品係用當歸煎汁。或浸酒。

主治　和血脈。堅筋骨。止諸痛。調經水。

【當歸鬚】即當歸之處方用名。詳『當歸』條。

【當藥】即酸模之古籍別名。典見綱目。詳『酸模』條。

【當藥】即苦草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦草』條。

【痰切豆】即鹿鼈之日本名。詳『鹿鼈』條。

【痰宮劈歷】即半夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『半夏』條。

【睡香】即瑞香之原名。詳『瑞香』條。

【睡菜】命名　本品土人採根爲鹽菹食之好睡。故名。

古籍別名　瞑菜。綽菜。醉草。嬾婦蕉。（綱目）水柏。（日本）

外國名詞　Menianthes trifoliata, L.（拉丁）ミツガシハ（日本）

基本　係龍膽科睡菜屬。爲睡菜之根。

產地　生池沼間。

形態　睡菜爲水菜類之一種。葉類慈姑。由三小葉成。小葉有鈍鋸齒。夏月自根間抽莖。長尺餘。梢上著二寸許之疎穗。而開花。花冠呈白色。內面密生白色。其根可供藥用。



睡蓮

採取　須於雞鳴時採之。

主治　消暑解醒。佩之好眠。

【睡蓮菜】即睡蓮之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『睡蓮』條。

【睡蟲】即砂挼子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『砂挼子』條。

【睢鳩】即鸚之古籍別名。典見周詩。詳『鸚』條。

【矮菜】即紫金牛之古籍別名。典見植物名彙。詳『紫金牛』條。

【矮脚樟】㊀即烏藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏藥』條。㊁即葉底紅之別名。典見綱目拾遺。詳『葉底紅』條。

【矮脚鳳尾】即翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『翠羽草』條。

【矮樟】即烏藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏藥』條。

【碇草】即淫羊藿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『淫羊藿』條。

【碗兒胭脂】即油胭脂之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『油胭脂』條。

【硃礪石】即辰砂之古籍別名。典見綱目。詳『辰砂』條。

【硼砂】即蓬砂之處方用名。詳『蓬砂』條。

【硼酸】Acidum Boricum

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(Boracic Acid)卽蓬砂製煉者之化學名稱。功能勝尋常蓬砂。見『蓬砂』條。

【碎米柴】**基本**　碎米柴爲雜草類之一種。可供藥用。

主治　癰腫發背。入傅藥用。

【碎骨子】卽淡竹根之古籍別名。典見綱目。詳『淡竹葉』條。

【禁生】卽石斛之古籍別名。典見本經。詳『石斛』條。

【禁宮花】卽王不留行之古籍別名。典見諸家本草。詳『王不留行』條。

【稗】**命名**　稗乃卑賤之義。本品爲禾之卑賤者。故名。

古籍別名　水稗。旱稗。紫黑色者名烏木。(綱目)

外國名詞　Panicum Crus Galli. L.(拉丁)ノビエ　イヌビエ(日本)

基本　係禾本科稷屬。

產地　田野處處有之。

形態　稗爲穀類之一。年生草本。水生者莖扁。上青下紫。旱生者則綠色。高一二尺或三四尺。葉細長而尖。有平行脈。葉柄爲鞘狀而抱莖。初秋小花。圓錐花序。穀上有芒。與糜相似而較小。色紫黑或淡綠色。子茶褐色。其米可供食與藥用。

性質　辛。甘。苦。微寒。無毒。

主治　煮食。益氣宣脾。

【稗苗根】**主治**　金瘡及傷損。血出不已。搗傅或研末摻之。卽止。甚驗。

【稠梨】卽櫻額之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『櫻額』條。

【稠膏蕈】係香蕈之一種。生於山間絕頂樹杪。初如蕊珠。圓墜。淺黃白色。味尤甘美。老則味減。烹時參和衆味。加以酒。勿攪動。動則涎腥不可食。性質效能。與香蕈同。參見『香蕈』條。

【稚蓴】卽蓴之嫩莖。典見綱目。詳『蓴』條。

【稔棗】卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【窟莽樹】卽無漏子之樹名。典見西陽雜俎。詳『無漏子』條。

【窠屑】卽桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【窠童】卽桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【堵】卽魚狗之古籍別名。典見爾雅。詳『魚狗』條。

【筧冬】卽麥門冬之處方用名。詳『麥門冬』條。

【筵門冬】卽天門冬之古籍別名。典見嘉祐本草。詳『天門冬』條。

【粱】卽粟米之原名。詳『粟米』條。

【粱米粥】**性質**　甘。溫。平。無毒。

主治　利小便。止煩渴。養腸胃。

【粳米】**命名**　粳者硬也。本品性剛少黏。故名。

處方用名　粳稻米。粳米粉。

古籍別名　秔米。粳米。(綱目)

外國名詞　Oryza sativa, L.(拉丁)イネ　ウルチ　コメ　ウルゴソ　ウルシネ(日本)

基本　係禾本科稻屬。爲粳稻之子實。

產地　各省皆有出。原產於東印度。

形態　粳稻爲栽於水田中之一年生草本。莖高三四尺。作圓柱狀。直立而中空。有節。葉狹長有尖端。葉脈平行。葉柄包圍於莖外。如鞘狀互生。秋月莖梢抽穗而着小花。無萼及花冠。有內外兩穀。雄蕊六枚。雌蕊一枚。柱頭呈羽狀。果實爲穎果。有旱中晚三收。其米供食。又充藥用。



粳米

採取　八九月刈收之。

製法　收得曬乾。舂去殼。杵去糠。

性質　甘。苦。平。無毒。

效能　補肺脾。益腸胃。專作滋養強壯藥。

主治　益氣。止煩。止渴。止洩。

歷代記述攷證　【唐】韓保昇曰。本草論粳米。溫中。和胃氣。長肌肉。【唐】孟詵食療本草論粳米曰。煮汁主心痛。止渴。斷熱毒下痢。【唐】孫思邈千金翼論粳米曰。常食乾粳飯。令人不噎。【宋】日華諸家本草論粳米曰。補中。壯筋骨。益腸胃。【元】王好古湯液本草論粳

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

米曰。合炭實作粥食。益精。强志。聰耳明目【明】李時珍本草綱目論粳米曰。能通血脈。和五臟。好顏色。【明】繆希雍本草經疏論粳米曰。粳米卽人所常食米。感天地沖和之氣。同造化生育之功。爲五穀之長。人相賴以爲命者也。經曰。安穀則昌。絕穀則亡。仲景曰。人受氣於水穀。以養神。水穀盡而神去。自上古聖人樹藝至今。不可一日無此也。稟土德之正。其味甘而淡。其性平而無毒。雖專主脾胃。而五臟生氣。血脈精髓。因之以充溢。周身筋骨肌肉皮膚。因之而强健。本經益氣止煩止洩。特其餘事耳。【明】李士材本草圖解論粳米曰。粳米味甘苦平。無毒。主益氣。止煩止泄。溫中和胃氣。長肌肉。穀芽卽大米穀水浸生芽者。啓脾進食。寬中消穀。【清】黃宮繡本草求眞論粳米曰。粳米卽人常食之米也。稟天地中和之氣。味甘性平。人非此物不能養生。故性善主脾胃。而兼及他臟。凡五臟血脈。靡不因此而灌溉。五臟積液。靡不因此而充溢。他如周身筋骨肌肉皮膚。靡不因此而强健。故凡白虎桃花竹葉石膏等湯。靡不因此以爲固中清熱。然米既有早晚之不同。復有地土出處之各異。早米受氣既早。性雖溫而質多黏。食之反能鬱膈。晚米受氣既遲。其性稍涼。服之不無稍清。而白晚性滯。尤覺滋害。出於高地。則米硬而質潔。出於窪處。則米潤而性陰。然總於中是固。諸方用此佐助。蓋恐藥性苦寒。得此甘緩同入。俾胃氣不致頓損。而熱與煩亦得與之俱安矣。此雖常食之物。不甚有益。而一參以藥投。則其力甚巨。未可等爲泛常而忽視也。【清】王士雄隨息居飲食譜論粳米曰。秔米（亦作粳）甘平。宜煮粥食。功與稬同。稬亦可粥。而秔較糯。秔亦可飯而稬耐飢。粥飯爲世間第一補人之物。强食亦能致病。戕生。易云節飲食。論語云食無求飽。尊生者能繹其義。不必別求他法也。惟患停飲者。不宜啜粥。矰脹霍亂。雖米湯不可入口。以其性補。能閉塞隧絡也。故貧人患虛證。以濃米飲代參湯。每收奇績。若人衆之家。大鍋煮粥時。俟粥鍋滾起沫圓。釅滑如膏者。名曰米油。亦曰粥油。撇取淡服。或加煉過食鹽少許服亦可。大能補液壯精。有裨羸老。至病人產婦。粥羹最宜。以其較秔爲柔而較糝不黏也。亦可磨粉作糕。而嘉興人不善藏穀。收米入囤。蒸焐變紅。名曰冬舂。米精華盡去。糟粕徒存。暴殄天物。莫此爲甚。炒米雖香性燥。助火。非中寒便瀉者忌之。又有一種香秔米。自然有香。亦名香珠米。煮粥時稍加入之。香美異常。尤能醒胃。凡煮粥宜用井泉水。則味更佳也。

近人學說　丁福保曰。米粒之中。蛋白質七・八。脂肪二・一。灰分一・二。水分一三・二。除去水分之時。則其成分蛋白質爲第一。脂肪次之。灰分又次之。蛋白質與鷄卵之白相同。爲第一滋養人體之物。其他二成分。亦不可缺少。多數食物中。米爲最要。吾人以米爲常食。由於習慣而適於人體。近時肉食盛行以來。有謂食獸肉鳥肉。較米食爲優者。然但食肉類而廢食米。斷不能保其健康。以米中之蛋白質與鷄卵及肉類中所含者。爲同一之成分。縱令不食肉類鷄卵。亦有同一之效能。米中之脂肪質有强壯身體。使之肥滿之效。而其消化大抵於食後一時間已竟其功。

配合應用　㊀治霍亂吐瀉。煩渴欲絕。用粳米二合。研粉。入水二盞。研汁。和淡竹瀝一合。頓服。（普濟方）

㊁治赤痢熱躁。粳米半升。水研取汁。入油瓷瓶中。蠟紙封口。沉井底一夜。平旦服之。吳內翰家乳母病此。服之有效。（普濟方）

㊂治自汗不止。粳米粉絹包。頻頻撲之。

㊃治五種尸病。粳米二升。水六升。煮一沸。服日三。（肘後方）

㊄治卒心氣痛。粳米一升。水六升。煮六七沸。服。（肘後方）

㊅治米癥嗜米。有入好噉米。久則成癥。不得米則吐出清水。得米卽止。米不消化。久亦斃人。用白米五合。雞屎一升。同炒焦爲末。水一升。頓服。少時吐出癥如研米汁。或白沫淡水乃愈也。（千金方）

㊆治小兒初生三日。應開腸胃

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

助穀神者。碎米濃作汁飲如乳酪。類以豆許與兒飲之。二七日可與哺。愼不得與雜藥也。（肘後方）

㈧治初生無皮色赤。但有紅筋。乃受胎未足也。用早白米粉撲之。肌膚自生。（聖濟總錄方）

㈨治小兒甜瘡。生於面耳。令母類嚼白米。臥時塗之。不過三五次即愈。

㈩荒年辟穀。粳米一升。酒三升。漬之曝乾。又漬酒浸取出。稍食之。可辟三十日。足一斗三升。辟穀一年。（肘後方）

(一一)治胎動腹痛。急下黃汁。用粳米五升。黃芪六兩。水七升。煎二升。分四服。（聖惠方）

(一二)治赤根丁腫。白粉熬黑和蜜傅之。（千金方）

參攷資料　(一)粳米赤者粒大而香。水漬之有味。益人。大抵新熟者動氣。經年者亦發病。惟江南人多收火稻貯倉。燒去毛。至春舂米食之。即不發病。宜人。溫中益氣。補下元也。（孟詵）(二)粳有早中晚三收。以晚白米爲第一。各處所產種類甚多。氣味不能無少異。而亦不大相遠也。(三)粳稻六七月收者爲早粳。止可充食。八九月收者爲遲粳。十月收者爲晚粳。北方氣寒。粳性多涼。八九月收者。即可入藥。南方氣熱。粳性多溫。惟十月晚稻氣涼。乃可入藥。（李時珍）(四)北粳涼。南粳溫。赤粳熱。白粳涼。晚白粳寒。新粳熱。陳粳涼。凡人嗜生米。久成米癥者。治之以雞屎白。（李時珍）(五)常食乾粳飯。令人熱中唇口乾。不可同馬肉食。發痼疾。不可和蒼耳食。令人卒心痛。急燒倉米灰。和蜜漿服之。不爾即死。（孟詵）(六)粳有水旱二稻。南方土下塗泥多宜水稻。北方地平惟澤土宜旱稻。西南夷亦有燒山地爲畬田。種旱稻者。謂之火米。古者惟下種成畦。故祭祀謂稻爲嘉蔬。今人皆拔秧栽插矣。其種近百。各各不同。俱隨土地所宜也。其穀之光芒長短大細。百不同也。其米之赤白紫烏堅鬆香否不同也。其性之溫涼寒熱亦因土產形色而異也。眞膩有水稻。高丈許。隨水而長。南方有一歲再熟之稻。蘇頌之。香粳長白如玉。可充御貢。皆粳之稍異者也。（李時珍）

【粳米禾稈】　主治　解砒毒。燒灰。新汲水淋汁。濾清。冷服一椀。毒當下出。

【粳米泔水】　命名　浙二泔。浙洗米也。泔。甘汁也。蓋謂泔水宜取第二次者。清而可用。故名。（綱目）

古籍別名　米瀋

性質　甘。寒。無毒。

主治　清熱止煩渴。利小便。涼血。

參攷資料　風熱赤眼。以浙二泔。睡時冷調洗肝。散菊花散之類服之。（戴原禮）

【粳米粉】　即粳米之處方用名。詳『粳米』條。

【粳米穀奴】　基本　本品即穀穗煤黑者。

主治　走馬喉痺。燒研。酒服方寸匕。立效。

【粳米湯】　原名　炒米湯。

基本　本品係用炒粳米煮成之湯。

主治　益胃除溼。不去火毒。令人作渴。

【粳米粥】　性質　甘。溫。平。無毒。

主治　利小便。止煩渴。養腸胃。

參攷資料　按羅天益寶鑑云。粳粟米粥。氣薄味淡。陽中之陰也。所以淡滲下行。能利小便。韓悉醫通云。一人病淋。素不服藥。予令專啖粟米粥。絕去他味。旬餘減。月餘痊。此五穀治病之理也。又張耒粥記云。每日起食粥一大椀。空腹胃虛。穀氣便作。所補不細。又極柔膩。與腸胃相得。最爲飲食之妙訣。齊和尙說山中僧。每將旦一粥。甚緊利害。如不食。則終日覺臟腑燥澁。蓋粥能暢胃氣。生津液也。大抵養生求安樂。亦無深遠難知之事。不過寢食之間爾。故作此勸人。每日食粥。勿大笑也。又蘇軾帖云。夜饑甚。與子野勸食白粥。云能推陳致新。利腸益胃。粥既快美。粥後一覺。妙不可言也。此皆著粥之有益如此。（李時珍）

【粳稻米】　即粳米之處方用名。詳『粳米』條。

【絹】　基本　本品乃素帛也。生曰絹。熟曰練。用灰之黃絲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

所織成者。非染色也。

古籍別名　練（綱目）

採取　以黃絲絹入藥用。

主治　黃絲絹煮汁服。止消渴。產婦胎損。洗瘡潰爛。燒灰止血痢下血。吐血血崩。

【經赤】卽臙脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『臙脂』條。

【經芩】卽黃芩之古籍別名。典見別錄。詳『黃芩』條。

【經粉】卽臙脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『臙脂』條。

【經霜老茶葉】參玫瓷料　患羊癲瘋者。用一兩爲末。同生明礬五錢爲細末。水法丸。硃砂作衣。每服三錢。白湯送下。三服全愈。又好吃茶葉者。卽以茶葉入肉汁湯內。飯鍋上蒸吃。二三次。卽不喜吃。（家寶方）

【經辯】卽黃辯之古籍別名。典見別錄。詳『黃辯』條。

【綸絲】卽當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『當歸』條。

【義竹】卽慈竹之古籍別名。典見綱目。詳『慈竹』條。

【聖石】卽光明鹽之古籍別名。典見蜀本草。詳『光明鹽』條。

【聖先子】卽預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『預知子』條。

【聖知子】卽預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『預知子』條。

【聖僧】卽楊梅子實色白者之別名。典見綱目。詳『楊梅』條。

【聖鐵】卽天靈蓋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天靈蓋』條。

【聖籠草子】卽罌粟之古籍別名。典見和漢藥考。詳『罌粟』條。

【腦子】卽冰片之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冰片』條。

【腦荷】卽龍腦薄荷之簡稱。詳『龍腦薄荷』條。

【腦膏】卽人耳垢之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『人耳垢』條。

【腦蓋骨】卽天靈蓋之古籍別名。典見綱目。詳『天靈蓋』條。

【腰黃】卽雄黃之別名。詳『雄黃』條。

【腹皮】卽大腹皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大腹皮』條。

【腹蟄】卽蟬蛻之古籍別名。典見別錄。詳『蟬蛻』條。

【萬一藤】**古籍別名**　萬吉。（綱目拾遺）

產地　生嶺南諸地。

基本　萬一藤爲蔓草類之一種。蔓如小豆。可供藥用。

主治　蛇咬。杵末。水和傅之。

【萬吉】卽萬一藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『萬一藤』條。

【萬年灰】卽石灰之陳者。效能詳『石灰』條。

【萬年松】㊀卽卷柏之俗名。詳『卷柏』條。㊁卽玉柏之古籍別名。典見綱目。詳『玉柏』條。

【萬年枝】卽女青之別名。詳『女青』條。

【萬年青】**古籍別名**　千年蒜。冬不凋草。（綱目拾遺）

形態　萬年青爲澀草類多年生之常綠草本。葉厚闊大而叢生。有平行脈。每枝獨擁。無歧梗。葉頗青厚。花莖生於葉叢之中央。長四五寸。夏月生蕊。如玉黍狀。開小花。色淡綠。叢簇蕊上。作穗狀花序。入冬結子。形圓。色黃或紅。惟喜山土人多栽種。其根可供藥用。子花葉詳見各該條。



性質　甘。苦。寒。無毒。

主治　咽喉急閉。搗汁和醋灌之。吐痰而愈。並療火丹。收濕熱。洗腳氣。湯火傷。天泡瘡。白蛇纏。解中滿。蠱脹。黃疸。心疼。哮喘。咳嗽。打傷膈噎。

配合應用　㊀白火丹。萬年青搗汁服。（祝氏效方）

㊁霹靂丹。治頭風如神。用萬年青根削尖。蘸硃砂塞鼻孔內。左塞右。右塞左。兩邊痛者齊塞。神效。取清水鼻涕下。須一週時妙。（當崖雜記方）

㊂治老幼脫肛。萬年青連根煎湯洗。用五棓子末敷上立效。（活人書方）

㊃蛇毒。用萬年青磨塗渣罨皆妙。（德勝堂方）

㊄治陰囊大。用萬年青根搗汁。

533／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱沖陳酒服三次卽愈。

㊀治痔瘡腫痛難行。豬腿骨去兩頭。同萬年青入砂鍋內。水煮一炷香。乘熱熏溫洗。日三次。數日愈。永不發。（活人書方）

㊁治纏喉風。用萬年青根頭切碎。打爛絞汁灌下。吐出痰涎卽好。倘口閉用牙刷挖開灌下。不吐再用髮梢進喉間探之。（經驗方）

參攷資料　萬年青以葉短尾圓者爲眞。多作草熏氣入腹。令人嘔吐。（趙學敏）

【萬年青子】　**主治**　催生。用乳香湯下一粒。

【萬年青花】　**主治**　一切跌打損傷。同山芝麻、橡實樹花、威靈仙汁。和丸酒下。

【萬年青葉】　**採取**　以嫩者陰乾用。

性質　苦。微甘。無毒。

主治　解毒。清胃降火。止吐血。同紅棗七枚煎飲。坐板瘡四月八日採之煎洗。痔瘡取汁搽之。能制汞。

【萬年草】　卽法製青皮之古籍別名。典見易簡方。詳『青皮』條。

【萬年霜】　卽人中白之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人中白』條。

【萬年藤】　卽木通之古籍別名。典見藥性本草。詳『木通』條。

【萬兩】　卽硃砂根之日本名。詳『硃砂根』條。

【萬岑精】　卽茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茯苓』條。

【萬貞鹿】　卽豬脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豬脂』條。

【萬金茸】　卽紫菀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫菀』條。

【萬歷龍鳳錢】　**基本**　明萬歷年所鑄之錢。上鑄龍鳳之形者。

主治　婦人臨產置錢一文手掌內。可催生。

【萬歲】　卽卷柏之古籍別名。典見別錄。詳『卷柏』條。

【萬歲粟】　卽無漏子之古籍別名。典見一統志。詳『無漏子』條。

【萬歲藤】　卽天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天門冬』條。

【萬歲藤】　卽天門冬之古籍別名。典見綱目。詳『天門冬』條。

【萬壽果】　卽枳椇子之古籍別名。典見藥物生產辨。詳『枳椇子』條。

【萱】　卽芒之日本名。詳『芒』條。

【萱花】　卽萱草之處方用名。詳『萱草』條。

【萱草】　**處方用名**　蘐草。（詩經）

古籍別名　忘憂。（說文）丹棘。（古今注）鹿蔥。（嘉祐本草）諼草。（毛詩）鹿劍。（土宿）妓女。（吳普）療愁。宜男。（綱目）忘草。（日本）黃花菜。金針菜。（隨息居飲食譜）

外國名詞　Hemerocallis fava, L.（拉丁）ワスレグサヒルメ（日本）

基本　係百合科萱草屬。爲萱草之苗花。

產地　凡山野平原之溼地恒有生焉。

形態　萱草爲溼草類之多年生草本。葉如蒲蒜而柔弱。新舊相代。四時青翠。夏月抽莖高二三尺。莖端著以數花。花瓣六出四垂。朝開暮萎。花有紅黃紫等色。亦有單瓣重瓣之別。至秋深花乃盡結果。細似三角形。內有子。大如梧子。色黑而光澤。其嫩芽及花。柔輭而味甘。皆可供食。並可充藥用。

採取　五月採花。八月採根。採得後曬乾用。

用法　恒以麥熟調味供食。入藥水煎或剉末用。

性質　甘。涼。無毒。

效能　祛溼熱。利胸膈。用作利尿藥。

主治　作葅利胸膈。安五臟。令人好歡樂。無憂。輕身明目。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論萱草曰。麥食治小便赤澀。身體煩熱。除酒疸。【明】李時珍本草綱目論萱草曰。消食利溼熱。【明】李士材本草圖解論萱草曰。萱草一名鹿蔥。性涼無毒。處處有之。孕婦佩帶其花。卽生男子。故又名宜男草。【清】黃宮繡本草求眞論萱草曰。萱草何以萱名。以其草屬蔚茂。植之可以解憂。苗如葱葉。烹食可以適口。味甘而氣微涼。能去溼利水。除熱通淋。止渴消煩。開胸寬膈。令人心平氣和。無有憂鬱。是以命名。但氣味清淡。服之功未卽驟。不似氣猛烈。藥一入口而卽見其有效也。【清】王士雄隨息居

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

飲食譜論萱草曰。萱萼甘平利膈。清熱養心。解憂釋怨。醒酒除黃。葷素宜之。與病無忌。

近人學說　張山雷曰。萱草爲涼降之品。專於清熱利水。陳藏器稱其根主沙淋下水氣。酒疸偏身黃者。搗汁服。寇宗奭稱其主大熱衄血。研搗和生姜汁細呷之。景岳稱其幷治帶濁。丹溪謂其善於下走。皆導熱利溼之用也。其花今爲恒食之品。亦稟涼降之性。日華謂治小便赤澀。身體煩熱。蘇頌謂利胸膈。安五臟。瀕湖謂消食利溼熱。其旨皆同。又今人恒以治氣火上升。夜少安寐。其效頗著。蓋其花亦朝開夜合。能順陰陽噓吸之宜。而又能涼降泄火。以療陰火上浮。暮不歸合之證。固其宜也。

配合應用　㈠治通身水腫。鹿葱根葉曬乾爲末。每服二錢。入席下塵半錢。食前米飲服。（聖惠方）㈡治小便不通。萱草根煎水頻飲。（杏林摘要方）㈢治大便後血。萱草根和生薑油炒酒衝服。（聖濟總錄方）㈣治食丹藥毒。萱草根研汁服之。（事林廣記方）

用量　錢半至三錢。

參攷資料　㈠萱本作諼。諼。忘也。詩云。焉得諼草。言樹之背。謂憂不能自遣。故欲樹此草。玩味以忘憂也。吳人謂之療愁。董子云。欲忘人之憂。則贈之丹棘一名忘憂。故也。其苗烹食。氣味如葱而鹿食九種解毒之草。萱乃其一。故又名鹿葱。周處風土記云。懷妊婦人佩其花則生男。故名宜男。李九華延壽書云。嫩苗爲蔬。食之動風。令人昏然如醉。因名忘憂。此亦一說也。嵇康養生論神農經言中藥養性。故合歡蠲忿。萱草忘憂。亦謂食之也。鄭樵通志乃言萱草一名合歡者誤矣。（李時珍）㈡萱草處處田野有之。俗名鹿葱。五月採花。八月採根。今人多採其嫩苗及花蕾作蔬食。（蘇頌）

【萱草根】主治　沙淋。下水氣。酒疸。黃色遍身者。搗汁服。

歷代記述攷證　【宋】寇宗奭本草衍義論萱草根曰。大熱衄血。研汁一大盃。和生薑汁半盃。細呷之。【明】李時珍本草綱目論萱草根曰。吹乳。乳癰腫痛。搗酒服。以滓封之。

【萬荳】命名　本品來自高國。故名。

古籍別名　高菜。千金菜。（綱目）嫩根名高筍。（俗名）

外國名詞　Lactuca Sativa, Bisch.（拉丁）チシヤ　チサ（日本）

基本　係菊科高苣屬。爲高苣之根葉。其子詳見該條。

產地　生原野園圃間。

形態　高苣爲菜類之一年或越年生草本。高三尺餘。上部之葉無柄而尖。抱於莖上。下部之葉廣而長。折之有白色黏汁。春末梢頭分枝。開花。舌狀花冠黃色。



萵苣

性質　苦。冷。微毒。

主治　利五臟。通經脈。開胸膈。功同白苣。

歷代記述攷證　【明】寧原食鑑本草論高苣根葉曰。利氣。堅筋骨。去口氣。白齒牙。明眼目。【明】李時珍本草綱目論高苣根葉曰。通乳汁。利小便。殺蟲蛇毒。

參攷資料　㈠高苣有白者紫者。其紫者入燒煉藥用。（陳藏器）㈡久食昏人目。患冷人不宜食也。（李廷飛）㈢按彭乘云。高苣有毒。百蟲不敢近。蛇虺觸之。則目瞑不見物。人中其毒。以萱汁解之。（李時珍）㈣紫高苣有毒。入燒煉用。丹房鑑源曰。高苣用硫黃種結砂子。制硃砂。又曰。紫色高苣。和土作器。火煅如銅也。（陳藏器）

【萵苣子】製法　入藥宜炒用。

主治　下乳汁。通小便。治陰腫痔漏。下血。傷損作痛。

【萵筍】即高苣之嫩根。詳『高苣』條。

【高菜】即高苣之古籍別名。典見綱目。詳『高苣』條。

【篇筑】即萹蓄之古籍別名。典見

535／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

和漢藥考。詳『萹蓄』條。

【萹蓄】　處方用名　萹蓄草。地扁蓄。

古籍別名　扁竹。（陶弘景）扁辨。扁莖（吳普本草）粉節草。道生草。（綱目）萹竹。萹筑。王翁。百節草。猪牙草。鐵綿草。（和漢藥考）殘竹草。（藥物生產辨）

外國名稱　Knot; grass.（英）

基本　屬麥科庭柳類。爲萹蓄之葉莖。

產地　陳仁山藥物生產辨云。萹蓄產廣東龍門、從化、新安、惠州等處。各省亦有。產南順地方俗稱其爲殘竹草。牛最喜啖之。其頭即萹蓄也。

形態　扁蓄爲草本植物。多繁殖路旁。高達一尺。全體類藜。葉厚互生。夏季於葉腋簇開淡紅色或帶青色之小花。花後結黑色三角形小實。根强韌。深入土中。吸收肥料。

採取　五月間採之。

製法　採得陰乾用。

用法　水煎。或生搗飲。

性質　苦。平。無毒。

效能　殺蟲治蚘痛。通淋利小便。

主治　浸淫疥癘。疽痔。殺三蟲。（本經）療女子陰蝕。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論扁蓄曰。煮汁飲。小兒療蚘蟲有驗。【明】李時珍本草綱目論扁蓄曰。治霍亂黃疸。利小便。小兒蝕病。【明】李士材本草圖解論扁蓄曰。萹蓄苦寒。利小便。驅溼熱。殺諸蟲。【清】黃宮繡本草求眞論扁蓄曰。扁蓄味苦氣平。功能利水清熱。除溼殺蟲。是以小兒蝕病。女子陰蝕。浸淫瘙癢。疽痔諸病。無不藉此以爲主治耳。以其味苦則熱泄。味苦則蟲伏。但此止屬標治。不能益人。勿常用也。葉細如竹。翦莖莫引。促節有粉。三月開細紅花。

近人學說　張山雷曰。萹蓄味辛。爲燥溼殺蟲之品。今本皆作苦。惟孫本作辛。攝今本作瘧本經別錄。皆以卻除溼熱爲治。浸淫疥癘。疽痔。陰蝕。三蟲。皆溼熱爲病也。後人以其泄化溼熱。故并治溲濇淋濁瀕湖以治黃疸霍亂。皆卽清熱利溼之功用。然亦惟溼阻熱結爲宜。而氣虛之病。皆非其治。若溼熱瘡瘍。浸淫痛痒。紅腫四溢。膿水淋漓等證。尤其專職。

配合應用　㈠治熱淋濇痛。扁竹煎湯類飲。（生生編方）

㈡治熱黃疸疾。扁竹搗汁頓服一升。多年者日再服之。（藥性論方）

㈢治霍亂吐利。扁竹入豉汁中。下五味煮羹食。（食醫心鏡方）

㈣治丹石衝眼。服丹石人毒發。衝眼腫痛。扁竹根一握。洗搗汁服之。（食療本草方）

㈤治蚘咬心痛。治小兒蚘咬心痛。面青。口中涎出。臨死者。取扁竹十斤。剉以水一石。煎至一斗。去滓。煎如錫。隔宿勿食。空服一升。蟲卽下也。仍煮羹汁作飯食。海上歌云。心頭急痛不能當。我有仙人海上方。萹蓄醋煎通口嚥。嘗教時刻便安康。（食療本草方）

㈥治蟲食下部。蟲狀如蝸牛。食下部作痒。取扁竹一把。水二升。煮熟。五歲兒空腹服三五合。（楊氏產乳方）

㈦治痔發腫痛。扁竹搗汁。服一升。一二服未瘥。再服。亦取汁和鱉作簿飪。煮食。日三次。（藥性論方）

㈧治蝨瘡痂痒作痛。扁竹搗封痂落卽瘥。（肘後方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無蟲積及中虛溲便不利者禁用。

參攷料資　㈠許慎說文作扁筑。與竹同音。節間有粉。多生道旁。故方士呼爲粉節草。（李時珍）㈡處處有之。布地而生。花節間白。葉細綠。人呼爲扁竹。（陶弘景）㈢春中布地生。道旁。苗似瞿麥。葉細綠如竹。赤莖如釵股。節間花出。甚細微。青黃色。根如蒿根。四五月採苗陰乾。蜀圖經云。二月日乾。郭璞注爾雅云。似小藜。赤莖節。好生道旁。可食。殺蟲是也。或云爾雅王芻卽此也。（蘇頌）㈣其葉似落帚葉而不尖。翦莖引蔓。促節。三月開細紅花。如藜藍花。結細子。爐火家燒灰煉霜。用一種水扁筑。名蘧音督。出說文。（李時珍）

【落地生】　卽落花生之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『落花生』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【落帚】卽地膚子之古籍別名。典見諸家本草詳『地膚子』條。

【落帚毒】卽地膚子之古籍別名。典見和漢藥考詳『地膚子』條。

【落花生】命名　花謝落地。其中心有絲垂入土而結實。故名。

古籍別名　番豆（物理小識）落地生　土露子　長生果　土豆　香芋（食物便覽）

外國名稱　Arachis hypogaea, L.（拉丁）Pea-nut; Earth-nut; Ground-nut.（英）

基本　係屬豆科落花生之種子。

產地　落花生原係南美熱帶地方之產物。我國閩省產者出與化爲第一。味甘而粒滿。名黃土出。臺灣者味澁而粒細。名白土。江浙亦有出。日本以紀伊地方最多。

形態　落花生爲一年生草本。莖高一二尺。其枝蔓延地上。葉爲由四小葉而成之羽狀複葉。於夏秋間開黃色小蝶形花。受精後花托伸長向地。終伸入地下一二寸處。子房或熟結成革質爾狀莢實。故名落花生。莢實長一寸餘。作灰白色。外有紋理。中藏種子一粒至四粒。種子爲白色。被有淡紅色薄膜。



落花生

採取　每年冬初掘土挖取洗淨曝乾。

用法　炒食或煮食。

性質　甘辛無毒。

效能　悅脾和胃。潤肺化痰。有滋養功效。

主治　潤肺。解毒。化痰。炒食甘溫。養胃。調氣。耐飢。入饌頗佳。榨油甚劣。以肥白香甘者良。有火者但宜煮食。

歷代記述攷證　【清】汪訒庵本草備要論花生曰。辛能潤肺。香能舒脾。果中佳品。【清】吳儀洛本草從新論花生曰。潤肺補脾。和平可貴。【清】黃宮繡本草求眞論花生曰。花生味甘而辛。體潤氣香。性平無毒。按書言此。香可舒脾。辛可潤肺。果中佳品。誠佳品也。然云炒食無害。論亦未周。蓋此氣味雖純。既不等於胡桃肉之熱。復不類烏芋菱角之涼。食則清香可愛。適口助茗。最爲得宜。第此體潤實滑。施於體燥堅實則可。施於體寒溼滯。中氣不運。恣啖不休。保無害脾滑腸之弊乎。仍當從其體氣以爲辨別。則得之矣。

配合應用　㈠止用花生淨肉。炒極焦。研極細。撚丸二錢。日後色黑如漆。（俞友梁烏鬚簡便方）㈡安定臣云。昔曾患四日兩頭瘧。諸方莫效。有人喜食炒花生。每日食三兩。不半月而愈。

施用宜忌　性能動火。生痰。不宜多食。切勿與黃熟瓜同食。食之必死。被馬踢傷者。忌服。服之瘡更增痛。

參攷資料　㈠落花生本草未收。本無當醫藥之用。然能益脾潤肺。實佳果也。因世人謗之者多。故附見於此。明其有利無害也。（汪訒庵）㈡花生本有滌痰之功。予家凡患咳咽。止用生花生。去殼膜。取淨肉。沖湯服。痰嗽自安。豈非化痰之功。善於瓜姜貝母。世俗以火炒食。反能生痰矣。（童鹿泉）㈢生研用下痰。炒熟用開胃。醒脾。滑腸。乾嗽者宜鹽滋。燥潤火。按花生乃花謝落土。感土氣而成實。故有入脾和胃之功。又能通肺氣。（藥性考）㈣長生果產閩地。花落土中卽生。從古無此。近始有之。味甘氣香。能健脾胃。飲食難消者宜之。或云與王瓜相反。予曾二者同食。未蒙其害。因表出之。（逢原）㈤花生殼焙研極細末。著人身體。沾肉卽生奇痒。（韓柳生）㈥花生不可與黃熟瓜同吃。吃則立死。所謂黃熟瓜卽香瓜。非長而白色。可以醃吃之黃瓜也。始知俗傳之誤。（劉啓堂經驗方）㈦花生昔年無之。自清康熙初年。僧應元往扶桑覓種寄回。始有此品。（趙學敏）

【落花生油】　原名　果油。

基本　本品卽以落花生果實。榨取白色之脂肪油。

形態　落花生油。係將落花生種子。用冷壓榨出者。爲白色或淡黃色液。比重〇・九一二。氣味俱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不甚烈。在空氣中亦不變化。逢攝氏零度之冷氣則凝結如橄欖油。至零下二十六度則全冰結。

性質　甘平。氣腥。無毒。

成分　爲脂肪油、蛋白質、炭水化物、纖維、灰質等。其脂肪油爲落花生主成分。含有四十二至五十%由阿拉吉琪克酸(Arachidic acid $C_{20}H_{40}O_2$)及里克諾里克酸(Liquoric acid. $C_{24}H_{46}O_2$)之不飽和性油酸類而成。

主治　滑腸下積。功同橄欖油。

【落迴】　卽博落迴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『博落迴』條。

【落首】　卽海藻之古籍別名。典見本經。詳『海藻』條。

【落得打】　**古籍別名**　土木香。山雄黃。五香草。珍珠倒捲簾。(綱目拾遺)

形態　落得打爲山草類之一種。苗長二三尺。葉細碎如蒿艾。又如薄荷。有清香。秋開小花。白色。結子亦白色。成穗纍纍如水紅花狀。其根似玉竹而無節。搗爛有黏性。可供藥用。花、莖詳見各該條。

性質　甘平。無毒。

主治　跌打損傷。及金瘡出血。煎服搗傅之。

參攷資料　㊀落得打行血宜酒炒止血宜醋炒。(醫學大辭典)　㊁落得打治跌打損傷神效。曾記辛巳年小婢失足從樓梯墜下。瘀血積滯。因採此擣汁沖酒服。以渣罨傷處。一飯頃。疼塊卽散。內瘀亦瀉出。葉有清香者是。此藥以家種隔二三年者入藥用良。野產者入藥有草氣。胃弱者服之多吐。(趙學敏)

【落得打】　卽七葉草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『七葉草』條。

【落得打花】　**主治**　擦牙疼。治頭風風氣。

【落得咬】　卽蛇草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蛇草』條。

【落得打莖枝】　**採取**　五月間採嫩枝用。

性質　甘平。溫。無毒。

主治　去風調氣活血。療跌打損傷。無名腫毒。去瘡瘍瘀血死肉。令人不痛。

【落葵】　**命名**　本品葉冷滑如葵。故名。

古籍別名　天葵。繁露。(別錄)　蘩葵。(爾雅)　藤葵。(食鑑)　藤菜。御菜。燕脂菜。胡燕脂。承露。(綱目)　蔓紫。(日本)

外國名詞　Basella alba, L. (拉丁)　ツルムラサキ(日本)

基本　係落葵科落葵屬。爲落葵之葉。其子詳見該條。

產地　生原野園圃間。

形態　落葵爲菜之一年生草本。莖葉俱柔軟。葉互生。卵形。夏秋葉腋抽出長梗。開花。初白繼紅。內外二瓣中綴以雌雄蕊。花後結小圓實。熟則深紫色或黑色。

性質　酸寒。滑。無毒。

主治　滑中散熱。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論落葵葉曰。利大小腸。

參攷資料　㊀落葵甘微酸冷滑。脾冷人不可食。(李時珍)　㊁曾爲狗齧者。食之終身不瘥。(陶弘景)

【落葵子】　**製法**　取子蒸過。烈日中曝乾。挼去皮。取仁細研。和白蜜調勻。作面脂用。

主治　悅澤人面。

【落葉松茸】　**古籍別名**　圓葉白木茸。落葉松菌。落葉松寄生。(和漢藥考)

外國名詞　Fungus laricis, (拉丁)　Agaric of larch. (英)　Larchenschwamm. (德)

基本　係寄生於一種落葉松之菌。

產地　和漢藥考曰。落葉松茸產日本寒地。尤以北海道爲最多。土人珍之爲靈藥。

形態　落葉松茸形類木耳。作半圈狀。大小不一。上面平滑。有白色或黃褐色之輪紋。下面則有橙黃色或褐色之無數鬚孔。上品者裏面白色。質堅而輕。味苦辛。次者使人作嘔。或爲粉末吸之。使人發嚏。

用法　去外膜。曬乾爲粉末用。(欲爲粉末。可加糊漿。搗爲泥。乾後研末。)

成分　爲苦味性樹脂、有機酸、膠質、蛋白質等。

效能　用作制汗藥。日本北海道人用治腹痛、積痛等。

國外學說　荷蘭藥鏡曰。性收

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

濾。能下黏液、膽液。利小便。通經閉。治痛風、傷冷毒痛。及冒寒傷冷毒黏液壅塞。頭胸諸症。疏滌神思鬱憂病、脾病、黃疸汚液。散劑用半錢至一錢。泡劑。浸劑。或作越幾斯用至二錢。但不能迅速下瀉。而使人惡心腹痛。故宜加桂丁香、乾薑、益智等香竄藥用之。或云此藥止漏汗有殊效。亦能止勞瘵狀消耗汗。又東京醫事新誌第六百六十號。載有猪子本田兩氏之北海道靈藥託波西一文。對於落葉松茸有詳細報告。轉錄於下。託波西一名愛布里古。爲一種菌蕈。寄生於落葉松。形稍圓。表面帶黃白或黃褐色。凸凹不平。切斷之內部充實。毫無空虛。其色潔白。實如陶土。試取一小片嘗之。初無特異之味。後則漸苦。北海道人頗珍重之。用之於諸種疾病云。分析托波西。可得二種物質。一爲有機酸。一爲華爾斯狀化合物。有機酸爲無色結晶物。冷水難溶。逢熱湯則漸漸發生泡沫而溶化。但冷則復行析出。逢酒精最易溶化。但其鹼鹽溶而重金屬鹽（卽銀鹽銀鹽等）不溶。此性質與阿格里克斯酸大抵相同。華爾斯狀物質。可從上述酒精溶液製造之。服下大量托波西。則發吐瀉。試以三・〇與犬服下。經半小時卽行嘔吐。著者猪子博士嘗試服〇・二。半日後卽瀉下。輒便。氏又嘗試驗托波西之刺戟消化器。究係何種成分。卽用分析而得之有機酸〇・五。製成乳劑。使一犬服之。又將華爾斯狀物質一・〇。亦製成乳劑。使另一犬服之。甲犬經二十分鐘卽發嘔吐。乙犬無異狀。因知有刺戟性者。實爲有機酸也。又用此酸就赤蛙試驗。確定其有壓抑汗腺分泌之作用。卽於赤蛙注入此酸〇・〇三。經二十分鐘後。見其皮膚初漸減少黏滑性。次漸乾燥。在觸診上尤易感知。此性質與阿格里克斯酸完全相同。由以上試驗。知托波西確有制汗作用。因試用於盜汗。頗有效果。嘗有一三十五歲之梅毒患者。每夜盜汗。使服托波西〇・〇六。盜汗如故。次日再服同量。盜汗稍減。第三日服〇・〇八。盜汗全止。又有一三十四歲之脚氣患者。衰弱盜汗。服托波西〇・〇六。稍減。次日服同量。盜汗全止。患者服此。概未現出不快副作用。用量一回〇・〇六至〇・一。處方如下。托波西末〇・〇六至〇・一。白糖〇・三。臨臥頓服。一次不效。可連服數日。但服多量。往往有下痢之虞。宜加阿片用之。

【落葉松菌】卽落葉松茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『落葉松茸』條。

【落葉松寄生】卽落葉松茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『落葉松茸』條。

【落鴈木】命名　本品藤高丈餘。雁過皆綴其中。故名。或謂鴈啣至代州鴈門而生。遂有是稱。

產地　生南海山野中。

形態　落鴈木爲蔓草類之一種。莖莖四邊。如刀削。纏繞木上。葉如茶。無花實。其莖葉可供藥用。

採取　四月採之。

性質　甘。平。溫。無毒。

主治　風痛傷折。脚氣腫。腹滿虛腹。以粉木皮同煮汁洗之。立效。又婦人陰瘡浮泡。以椿木皮同煮汁洗之。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論落鴈木曰。產後血氣痛。幷折傷內損諸疾。煮汁服。

【落蘇】卽茄子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『茄子』條。㊁卽金絲草之古籍別名。典見救急方。詳『金絲草』條。

【葙】卽白蒿之古籍別名。典見綱目。詳『白蒿』條。

【葙菜】卽魚腥草之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『魚腥草』條。

【葉下紅】卽葉底紅之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『葉底紅』條。

【葉子金】卽金之產於蜀中者之別名。典見寶貨辨疑。詳『金』條。

【葉子香】卽沈香之一種。性質效能。詳『沈香』條。

【葉子雌黃】與雄黃同類。出於山之陰者。爲雌黃。葉子者。文理層疊也。典見素問刺法論。詳『雌黃』條。

【葉牡丹】卽甘藍之日本別名。詳『甘藍』條。

【葉底紅】古籍別名　平地木。（李氏草祕）矮脚樟。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

葉下紅。（綱目拾遺）

形態　乃小木也。生山土。長不過一二尺。葉如石楠。四月生蕊。五六朵。成簇。垂如芝麻鈴樣。花作青白色。六七月結小子。如天竺子。霜後色紅。僅如天竺子而大。俗呼矮脚樟。以其樹樟葉而本短也。山人每掘之入市。售作盆玩。又名葉下紅。

主治　吐血疝氣。

配合應用　㊀治吐血。葉底紅即矮脚樟。用二兩。洗淨。木槌搗爛。猪肺一個。洗血淨。將葉入肺管內。河井水各三碗。煮爛。至五更去葉。連湯食之。一二次愈。多食絕後患。（楊春涯經驗方）

㊁某撫軍得宮傳祕方。治吐血勞傷怯症垂危。久嗽成勞。無不立愈。曾經試驗多人。用平地木葉乾者三錢。猪肺連心一具。水洗淨。血用白湯焯過。以瓦片挑開肺管。將葉包裹。麻線縛好。再入水煮熟。先吃肺湯。然後去葉食肺。若嫌味淡。以清漿調食。食一肺後。病勢自減。食三肺無不愈者。但所用乃平地木。與葉下紅有別。或一類相同。其性本通耶。（陶殿元方）

㊂治偏墜疝氣。平地木搗汁沖酒服。半碗屢效。（李氏草祕方）

【葉底紅】　卽兎耳一枝箭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『兎耳一枝箭』條。

【葉金草】　卽金莖之古籍別名。典見別錄。詳『金莖』條。

【葉柳草】　卽巴戟天之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴戟天』條。

【葉蘭】　卽蜘蛛香之日本名。詳『蜘蛛香』條。

【葛苴】　卽蕺荷之古籍別名。典見說文。詳『蕺荷』條。

【葛蒿子】　卽萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊菔子』條。

【葎草】

古籍別名　勒草。來苺草。（別錄）葛勒蔓。（蜀圖經）

基本　係屬桑科葎草之實。

產地　凡故墟道旁。與山野間恒多生焉。

形態　葎草爲山野自生之多年生草。春月生苗。纏絡他物。莖略帶四角形。有毛刺。葉對生。作掌狀分裂。類大麻葉。有剛毛及長葉柄。邊緣有鋸齒。花無花冠。且係單性。雌雄異株。雄者作圓錐花序排列。長五六寸。萼片及雄蕊各五。雌者數個集合。作粗梗穗狀。成實則爲卵圓形或橢圓形之瘦果。呈淡綠色。有香氣及苦味。種子黑色如大麻子。



葎草

性質　苦。寒。無毒。

成分　爲揮發油、單寧、樹脂質等。

效能　用作苦味健胃藥。

主治　主瘀血。止精。益盛氣。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論葎草曰。葎草主五淋。利小便。止水痢。除癉虛熱渴。煮汁或生搗汁服。【宋】寇宗奭本草衍義論葎草曰。生汁一合服。治傷寒汗後虛熱。【宋】蘇頌圖經本草論葎草曰。療膏淋。久痢。疥癩。【明】李時珍本草綱目論葎草曰。潤三焦。消五穀。益五臟。除九蟲。辟瘟疫。傅蛇蠍傷。

配合應用　㊀治小便石淋。葛葎掘出根。挽斷。以盃於坎中承取汁。服一升。石當出。不出更服。（范汪方）

㊁治小便膏淋。葎草擣生汁三升。酢二合。合和。頓服。當尿下白汁。亦治尿血淋瀝。及產婦汗血污衣赤色。（范汪方）

㊂治久痢成疳。葛勒蔓末。以管吹入肛門中。不過數次如神。

㊃治新久癉疾。用葛葎草一握。一名勒蔓。去兩頭。秋冬用乾者。恒山末等分。以淡漿水二大盞。浸藥。星月下露一宿。五更煎一盞。分二服。以吐痰愈。

㊄治遍體癮疹。葎草一擔。以水二石。煮取一石。漬之。不過三作愈。（韋宙獨行方）

㊅治烏癩風。葛葎草三秤。洗。益母草一秤。切。以水二石五斗。煮取一石五斗。去滓。入甕中。浸浴一時。方出坐密室中。又暖湯浴一時。乃出。暗臥取汗。勿令見風。明日又浴。如浴時瘡痒不可忍。切勿搔

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

動。少頃漸定。後隔三日一作。以愈爲度。（聖濟總錄方）

用量 三分至五分。

參攷資料 ㊀葎草生故墟道旁。葉似蓖麻而小且薄。蔓生有細刺。亦名葛葎蔓古方亦時有用之。（蘇恭）㊁葎草二月生苗莖有細刺。葉對節生。一葉五尖。微似蓖麻而有細齒。八九月開細紫花成簇。結子狀如黃麻子。（李時珍）㊂葎草莖有細刺。善勒入膚。故名勒草。訛爲葎草。又訛爲來苺。皆方音也。別錄勒草卽此草也。（李時珍）

【莇田】 卽菰莇之古籍別名。典見菰莇之古籍別名。典見綱目詳「菰莇」條。

【葚】 卽桑椹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑椹」條。

【荘草】 **古籍別名** 鴻薀。龍古。龍鼓。游龍。（詩經）石龍。天蓼。（別錄）大蓼。（綱目）大毛蓼。（日本）葱湏。（千金方）

外國名稱 Polygonum orientale, L. var. pilosum, Meisn.（拉丁）オホケタデ ホルタデ（日本）

基本 係蓼科蓼屬。爲荘草之子實。

產地 原產東印度。凡田野水澤間恒有生焉。

形態 荘草爲溼草類之一年生草本。高五六尺。莖與葉密生毛茸。葉大卵形。而尖。葉柄長。秋月莖頭與枝梢開花。花帶紅色。密生成穗狀。其子扁如酸棗仁而小。色赤黑而肉白。與花莖葉俱可供藥用。



荘草

性質 鹹。微寒。無毒。

主治 消渴。去熱。明目。益氣。

歷代述記攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論荘草曰。治瘰癧。

參攷資料 ㊀此蓼甚大。而花亦繁紅。故曰荘。曰鴻。鴻亦大也。別錄有名未用。草部中有天蓼。云一名石龍。生水中。陳藏器解云。天蓼卽水荘。一名大游龍。一名大蓼。據此則二條乃一指其實。一指莖葉而言也。（李時珍）㊁荘生水旁。如馬蓼而大。五月採實。（別錄）㊂今生下溼地甚多。極似馬蓼而甚長大。詩稗疏有游龍。郭璞云。卽龍古也。（陶弘景）㊃荘。卽水荘也。似蓼而葉大。赤白色。高丈餘。爾雅云。荘。龍古。其大者曰蘿。音詭。陸璣云。游龍一名馬蓼。然馬蓼自是一種也。（蘇頌）㊄荘草莖粗如拇指。有毛。其葉大如商陸。葉色淺紅。成穗。秋深子成。扁如酸棗仁而小。其色赤黑而肉白。不甚辛。炊爛可食。（李時珍）

【荘草花】 **主治** 散血消積。止痛。

【荘草莖根葉】 **性質** 辛。有毒。

主治 惡瘡。去瘴氣。

歷代述記攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論天蓼曰。根莖除惡瘡腫水氣。腳氣黃濃汁漬之。

【葛上亭長】 **命名** 本品黑身赤頭。如亭長之着玄衣赤帽。故名。

古籍別名 豆蚿。（動物辭典）

外國名稱 Epicauta gorhami, Marsh.（拉丁）マメハンメウ（日本）

基本 係節肢動物昆蟲類鞘翅類地膽科之葛上亭長蟲。

產地 生葛上。處處有之。

形態 葛上亭長爲卵生蟲類甲蟲屬之一種。其體黑色。額頰及後頭赤褐。被黃短毛。眼呈腎臟形。觸角側扁。雄之觸角中央膨大。前胸比頭狹。前方爲頸狀而細小。中央有直列黃毛。翅輭細長。稍呈圓柱形。兩翅之周圍。密被短黃毛。中央各有黃毛之直列。翅面密被黑色短毛。腹下各節有黃毛直紋。腳長。各被黃毛。體長六七分。葛蔓藤汁及豆葉等爲食。捕得可供藥用。

採取 七月間在葛上採之。曝乾用。

製法 與斑蝥同。

性質 辛。微溫。有毒。

主治 蠱毒鬼疰。破淋結積聚。墮胎。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論葛上亭長曰。通血閉瘕塊。鬼胎。餘功同斑蝥。

施用宜忌 惡長同斑蝥。

參攷資料 深師療淋用亭長之說。最詳。云取葛上亭長。折斷腹。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

腹中有白子如小米三二分。安白板上。陰二三日收之。若有人患十年淋。服三枚。八九年以還服二枚。服時以水如棗許。着小盃中。爪用研之。當扁於水中仰面吞之。勿令近牙齒間。藥雖微小。下喉自覺至下焦淋所。有頃藥作大煩急不可堪者。飲乾麥飯汁。則藥熱止也。若無乾麥飯。但水亦可耳。老小服三分之一。當下淋疾如膿血。連連爾去者。或如指頭。或青或黃不拘。男女皆愈。若藥不快淋不下。以意節度。更增服之。此蟲五六月爲亭長。頭赤身黑。七月爲斑蚿。九月爲地膽。隨時變耳。（蘇頌）

【葛公藤】古籍別名　家母藤。（葛祖方）

形態　葉似蛇卵草。又似吉慶子。面青有蒙。背白色。三葉分枝。梗似薔薇。有刺。四月間結子。

配合應用　㊀血症將葛公根一兩。忌鐵器。用木擊碎。以水二大盃。煎作一盃。加好酒一盃。再煎至茶杯八分。臥時服。服後蓋暖周身。以手磨胸膈脾腹數遍。明晚如前再服一兩。後日亦如前服一兩。連服三日愈。（傳信方）

㊁葛公草一名家母藤。治腳氣腫疼。沙木腿搗汁。熬成膏。鷄翎掃患處。乾卽潤之。（葛祖方）

【葛仙米】命名　本品昔爲葛洪隱居乏食採充糧米而食。故名。

古籍別名　鮮者名天仙菜。乾者名天仙米。（綱目拾遺）

產地　多生南省諸山之山陰石間。

形態　葛仙米爲菜類石耳屬之一種。狀似木耳。其色紫綠。採而乾之。粒圓如黍。揉麪釀酒。氣極芳香。煮熟爲羹。優如青蠣。可供菜茹與藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　利臟胃胸膈。解熱清神。去痰火。久服延年。

【葛豆】卽刀豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『刀豆』條。

【葛乳】古籍別名　葛花菜。葛蕈。（綱目拾遺）

性質　甘。寒。無毒。

主治　利臟胃胸膈。解熱清神。去痰火。久服延年。

用法　解肌熱。散風火。

主治　風熱瘡疹。醒酒。解酒積。

參考資料　一名葛花菜。名山皆有。亦產高州。粵志高州多種葛。雷州人市之爲絺綌。秋霜時有葛乳涌生地上。如芝如菌。赤色。味甘脆。微苦。乃葛之精華也。亦曰葛蕈。李濱湖僅據太和山志載其醒酒與酒積成疾。他皆未及。故特補之。（趙恕軒）

【葛花】性質　甘。平。無毒。

主治　消酒。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論葛花曰。腸風下血。

參攷資料　葛花同小豆花乾末。酒服。飲酒不醉也。（陶弘景）

【葛花菜】卽葛乳之別名。典見綱目拾遺。詳『葛乳』條。

【葛根】原名　乾葛。

命名　葛從曷。諧聲也。

入藥用根。故名。

處方用名　煨葛根。粉葛根。葛根炭。

古籍別名　雞齊。（本經）鹿藿。黃斤。（別錄）鹿豆。鹿豆忠。葛藤根。鐵葛。藤雞齊根。（和漢藥考）

外國名詞　Pachyrhizus angulatus

基本　屬豆科爲葛之根。

產地　各省均有出。江浙尤多。

形態　葛爲多年之自生蔓草。長達二三丈。恒纏繞木石。葉互生。爲大形複葉。由三小葉而成。表面綠色。內面帶白色。與莖莖俱有褐色毛茸。初秋於葉腋生五六寸穗狀梗。開赤紫色蝶形花。作總狀花序。排列花後結扁形之莢實。其種子嚼之有腥氣。根外面淡紫色。內部白色。根爲類似薯蕷之紡錘狀。最大者。直徑七八寸。長達一丈。販賣品有曬乾及生乾二種。前者白色帶白粉。後者呈黃褐色。



葛根

採取　五六月間採根曝乾。

製法　凡使須揀雪白多粉者佳。去皮用。陳仁山云。廣東現所沽葛。由喃嘸庄客將葛切開。用一池約可容葛七八擔者。葛放池中。用蠔殼灰生鹽兩味。開水浸之。所有

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

葛內精汁盡行漂出。浸兩晝夜。取出用山坑水泡之。泡後略爲曬爽。即入硫磺櫃燻之。務使其色白不計其合用與否。造起開片食之。酸且鹹。清甜之味全無。想葛根乃表散清涼之品。其味既鹹且酸。不敢已幸矣。尙望其能解表乎。此等乾葛。應在淘汰之列。正當造法。將葛去皮。用水洗淨。用大盆滿貯清水。將葛切片。如骨牌形。放落清水盆。略浸五分鐘。取起曬乾用。服時覺煎成之水。有甘涼之味。實無上之珍品也。何必多端弄巧。貪其好色。貽害多人。故須從速改良爲要。兩湖、安徽、江浙均有到過港沽。原枝開直片。煎水飲之。猶有原葛清甜之味。惟開片不好看。故無人買之。可知乾葛一味。各省均合製法。獨廣東弄巧取色。至爲不合衞生。至製葛粉之法。於春日發芽時。用長鏃採掘葛根。洗去土氣。於石盤上用木槌或鐵槌細加打爛。盛水於桶。於其中採出粉漿。乃入布袋絞去粗屑。復用木綿袋濾。靜置一日。去上面之水。曬乾。凝固物。用刀切開。並削去底面黑粉。再置入桶中。加多量之水攪之。待其沈降。乃使流出上面之水。如此數次。待其已乾。用鐵匙鉋取。攤於鋪灰及布之曬盒中曬乾。之謂之灰葛。若欲使潔白。可再將灰葛置入桶中。注水攪和。用細袋濾過。放置一日。再換水使之沈降。如此七八次。乃去水氣。移於鋪有乾白紙之曬盒。數日曬乾。則成潔白塊。是卽葛粉。其形態爲純白色。無氣味之粉末。於顯微鏡下檢之。見有大小不等之顆粒。直徑自〇・〇〇二至〇・〇一八密米。

性質　甘。辛。平。無毒。

成分　葛根中含有多量澱粉。謂之葛粉。（一呼水粉）供藥用同天花粉。

效能　升陽。解肌。生津。止渴。用作清涼發汗解熱藥。

主治　消渴。身大熱。嘔吐諸瘅。起陰氣。解諸毒。（本經）療傷寒中風。頭痛。解肌發表。出汗。開腠理。療金瘡止脇風痛。（別錄）

張仲景之發明　葛根一味。經張仲景之實驗。認爲『主治項背强。兼治喘而汗出』。茲考徵如下。

㊀葛根黃連黃芩湯證曰。喘而汗出。（以上一方。葛根半斤。）㊁葛根湯證曰。項背强。㊂葛根加半夏湯證曰。葛根加半夏湯條曰。太陽與陽明合病。此須疾醫之言也。不取焉。葛根湯證而嘔者。此方卽主之也。㊃桂枝加葛根湯證曰。項背强。（以上三方。葛根皆四兩）爲則曰。葛根主治項背强急也。葛根湯及桂枝加葛根湯。皆足以徵焉。

歷代記述攷證　【南北朝】徐之才雷公藥對論葛根曰。殺野葛之才。雷公藥對論葛根曰。殺野葛巴豆百藥毒。【唐】甄權藥性本草論葛根曰。治天行上氣嘔逆。開胃下食。解酒毒。【唐】陳藏器本草拾遺論葛根曰。生者墮胎。蒸食消酒毒。可斷穀不饑。作粉尤妙。【唐】蘇恭新修本草論葛根曰。瀕狗傷。搗汁飲。并末傅之。【宋】大明諸家本草論葛根曰。治胸膈煩熱。發狂。止血痢。通小腸。排膿破血。傅蛇蟲噬毒。瘡傷。【宋】開寶重定新本草論葛根曰。作粉止渴。利大小便。解酒。去煩熱。壓丹石。傅小兒熱瘡。搗汁飲。治小兒熱痞。【明】李時珍本草綱目論葛根曰。散鬱火。【明】李士材本草圖解論葛根曰。葛根辛甘。陽明藥也。主頭額痛。解肌止渴。宣斑發痘。消毒解醒。【清】黃宮繡本草求眞論葛根曰。葛根辛者性平。輕揚升發。能入足陽明胃經。鼓其胃氣上行。生津止渴。兼入脾經。開腠發汗。解肌退熱。緣傷寒太陽病罷。傳入陽明。則頭痛循經而痛。胃被寒蔽而氣不得上升。入肺則渴。胃主肌肉。氣不宣通則熱。故當用此以治。俾其氣升津生。肌解熱退。而無復傳之勢矣。但葛根一味。必其於頭額狹之處。痛如刀劈。方謂邪傳陽明。其藥可用。若使未入陽明。又是引邪入內。不可用也。卽邪在於太陽。而略見於陽明。則以方來之陽明爲重。故必用葛根以絕其路。若使陽明症備。而止兼有太陽。則又以未罷之太陽爲重。故又不用葛根。且陽明主肌肉者也。而用乾葛大開肌肉。則津液盡從外泄。恐胃愈燥而陰立亡。至於瘡痘未發。則可用此升提。酒醉則可用此解醒。火鬱則可用此升散。但亦須審中病輒止。不可過用。以致胃氣有傷也。【清】賈九如辨藥指南

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

論葛根曰。葛根根主上升。甘主散表。若多用二三錢。能理肌肉之邪。開發腠理而出汗。屬足陽明胃經藥。治傷寒發熱。鼻乾口燥。目痛不眠。瘧疾熱重。蓋麻黃柴葫。專能攻表。而葛根獨能解肌耳。因其性味甘涼。能鼓舞胃氣。若少用五六分。治胃虛熱渴。酒毒嘔吐。胃中鬱火。牙疼口臭。或佐健脾藥。有醒脾之力。且脾主肌肉。又主四肢。如陽氣鬱遏於脾胃之中。狀非表症。飲食如常。但肌表及四肢發熱如火。以此同升麻、柴胡、防風、羌活。升陽散火。清肌退熱。薛立齋常用神劑也。若金瘡若中風。若痙病。以致口噤者。搗生葛根汁。同竹瀝灌下即醒。乾者爲末。酒調服亦可。瘡瘡難出。以此發之甚捷。

近人學說　張山雷曰。葛根氣味皆薄。質輕且鬆。春生之時。發育極速。最能升發脾胃清陽之氣。傷寒論以爲陽明主藥。正惟表寒過鬱於外。胃家陽氣不能散布。故以此輕揚升舉之藥。捷動清陽。捍禦外寒。斯表邪解而胃陽舒展。所以葛根湯中仍有麻黃。明爲陽明表寒之主藥。非陽明裏熱之專司。若已內傳而爲陽明熱症。則仲景自有白虎諸法。非葛根湯之所宜用。其葛根黃芩黃連湯方。則主陽明協熱下利。貌視之頗似專爲裏有實熱而設。故任用芩連之苦寒。則葛根似亦爲清裏之品。抑知本條爲太陽病桂枝證誤反下之之變。邪熱因誤下而入裏。裏雖宜清。而利遂不止。即以脾胃清陽下陷之候。葛根祇以升舉陷下之氣。並非爲清裏而設。此皆仲師選用葛根之眞旨。由此推之。而知本經之主消渴者。亦以燥令太過。降氣迅速。故飲雖多而渴不解。此藥治之非特潤燥。亦以升清。又主嘔吐者。亦以胃氣不能敷布。致令食不得入。非可概治胃火上逆之嘔吐而淺者視之。僅知爲清胃生津。甘潤退熱之普通藥劑。則似是實非。寧獨臺釐之差。直是千里之謬矣。宋人之用葛根柴胡。往往認作解散表熱通塞之藥。可謂不辨菽麥。此其精義。惟東垣氏知之最詳。蓋李氏於脾胃氣弱一症。研究獨深。是其生平唯一無二之絕大經驗。閘明此藥眞詮。誠非朱奉議劉河間輩所可幾及。李之言曰。葛根其氣輕浮。鼓舞胃氣上行。以生津液。又解肌熱。爲治脾胃虛弱泄瀉之聖藥。

配合應用　㊀葛根湯治陽明胃經溫病。邪熱頭疼發渴。煩悶。鼻乾。不得眠。如渴甚嘔甚。則加石膏、麥門冬、知母、竹葉。葛根升麻湯治斑瘡初發。點粒未形。㊁同一切補腎益精藥作丸餌。則起陰。令人有子。㊂同升麻入升陽散火、升陽除濕、升陽益胃、清暑益氣、補中益氣等湯用。㊃治數種傷寒。庸人不能分別。今取一藥。兼治天行時氣。初覺頭痛內熱。脈洪者。葛根四兩。水二升。入豉一升。煮取半升。服。生薑汁尤佳。（傷寒類要方）㊄治時氣頭痛。壯熱。生葛根洗淨。搗汁一大盞。豉一合。煎六分。去滓。分服。汗出即瘥。未汗再服。若心熱加梔子仁十枚。（聖惠方）㊅治傷寒頭痛。二三日發熱者。葛根五兩。香豉一升。以童子小便八升。煎取二升。分三服。食葱粥取汗。（梅師方）㊆治妊娠發熱。葛根汁二升。分三服。（傷寒類要方）㊇預防熱病。急黃賊風。葛粉二升。生地黃一升。香豉半升。爲散。每食後米飲服方寸匕。日三服。有病五服。（龐安常傷寒論方）㊈治辟瘴不染。生葛搗汁一小盞。服。去熱毒氣也。（聖惠方）㊉治煩躁熱渴。葛粉四兩。先以水浸粟米半升。一夜濾出。拌勻煮熟。以糜飲和食。（食醫心鏡方）㊊治小兒熱渴。久不止。葛根半兩。水煎服。（聖惠方）㊋治乾嘔不息。葛根搗汁。服一升。瘥。㊌治小兒嘔吐。壯熱食癇。葛粉二兩。水二合。調勻。傾入錫鍋中。重湯煆熟。以糜飲和食。（食醫心鏡方）㊍治心熱吐血不止。生葛搗汁半升。頓服立瘥。（廣利方）㊎治衄血不止。生葛搗汁服。三服卽止。（聖惠方）㊏治熱毒下血。因食熱物發者。生葛根二斤。搗汁一升。入藕一升

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

和服。（梅師方）

㊀治傷筋出血。葛根搗汁飲。乾者煎服。仍熬屑傅之。（外臺祕要方）

㊁治臟腑疼痛。生葛根嚼之嚥汁。取效乃止。（肘後方）

㊂治金創中風。痙强欲死。生葛根四大兩。以水三升。煮取一升。去滓。分服。口噤者灌之。若乾者搗末。調三指撮。仍以此及竹瀝多服取效。（廣利方）

㊃治服藥過劑。苦煩。生葛汁飲之。乾者煎汁服。（肘後方）

㊄治酒醉不醒。生葛汁飲二升便愈。（千金方）

㊅治諸藥中毒。發狂煩闊。吐下欲死。葛根煮汁服。（肘後方）

㊆解中熇毒氣欲絕者。葛粉三合。水三盞調服。口噤者灌之。（聖惠方）

㊇治虎傷人瘡。生葛煮濃汁洗之。仍搗末水服方匕。日夜五六服。（梅師方）

用量　一錢至二錢。

施用宜忌　凡陰虛火炎與上盛下虛者禁用。

十三畫　葛薯

著名方劑　葛根湯。治太陽病項背强。無汗惡風者。又治太陽陽明合病自下痢者。（傷寒論方）葛根四兩。麻黃三兩（去節）。桂枝二兩。芍藥二兩。炙甘草二兩。生姜三兩。大棗十二枚。上七味。㕮咀。以水一斗。先煮麻黃葛根。減二升。去沫。納諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息及禁忌。

參攷資料　㊀生葛搗汁飲。解溫病發熱。五月五日中時取根爲屑。療金瘡斷血爲要藥。亦療瘧及瘡至良。（陶弘景）㊁凡瘧痘已見紅點。不可用葛根升麻湯。恐表虛反增癍爛也。（朱震亨）㊂乾葛其氣輕浮。鼓舞胃氣上行。生津液。又解肌熱。治脾胃虛弱泄瀉聖藥也。（李杲）㊃葛根氣味俱薄。輕而上行。浮而微降。陽中陰也。其用有四。止渴一也。解酒二也。發散表邪三也。發瘡疹難出四也。（徐用誠）㊄本草十劑云。輕可去實。麻黃葛根之屬。蓋麻黃乃太陽經藥。兼入肺經。肺主皮毛。葛根乃陽明經藥。兼入脾經。脾主肌肉。所以二味藥皆輕揚發散。而所入適然不同。（李時珍）㊅葛雖除毒。其根入土五六寸已上者。名葛脭。脭者脛也。服之令人吐。以有微毒也。本經葛穀。卽是其實也。（蘇恭）㊆今處處有之。江浙尤多。春生苗。引藤蔓長一二丈。紫色。葉頗似楸葉而小。色青。七月著花。粉紫色。似豌豆花。不結實。根形大。如手臂。紫黑色。五月五日午時採根。曝乾。以入土深者爲佳。今人多作粉食。（蘇頌）㊇溫鼎之間。冬月取生葛搗爛。入水中揉出粉。澄成塊。入沸湯中良久。色如膠。其體甚韌。以蜜拌食。捺入生薑少許。尤妙。又切入菜中。待賓雖甘而無益。又將生葛根煮熟作果實賣。吉州南安亦然。（寇宗奭）㊈葛有野生有家種。其蔓延長。取治可作絺綌。其根外紫內白。長者七八尺。其葉有三尖。如楓葉而長。面青背淡。其花成穗。纍纍相綴。紅紫色。其莢如小黃豆。莢亦有毛。其子綠色。扁扁如鹽梅子。核生臍腥氣。八九月採之。本經所謂葛穀是也。唐蘇恭亦言葛穀是實。而宋蘇頌謂葛花不結實。誤矣。其花曝乾亦可炼食。（李時珍）

【葛根炭】　卽煨葛根。詳『葛根』條。

【葛根葉】　主治　金瘡止血。搗傅之。

【葛根蔓】　主治　卒然喉痺燒。研水服。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論葛根藤曰。消癰腫。

【葛覃】　卽葛乳之別名。典見綱目拾遺。詳『葛乳』條。

【葛勒蔓】　卽葬草之古籍別名。典見蜀圃經。詳『葬草』條。

【葛殼】　性質　甘。平。無毒。

主治　下痢。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論葛殼。卽葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『葛根』條。

【葛籠】　卽蜀羊泉之日本名。詳『蜀羊泉』條。

【葛纂】　卽千歲蠆之古籍別名。典見毛詩。詳『千歲蠆』條。

【蝪】　卽鼠尾草之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

吳普本草。詳『鳳尾草』條。

【蕾】卽白薇之古籍別名。典見綱目。詳『白薇』條。

【葡萄】

命名　本品可以造酒。人酣飲之則醺然而醉。故名。

處方用名　葡萄實。葡萄汁。葡萄乾。葡萄酒。

古籍別名　蒲桃。草龍珠。蒲萄。蒲陶。賜紫櫻桃。馬乳葡萄。水晶葡萄。紫葡萄(綱目)。綠葡萄。

外國名詞　Vitis vinifera, L.(拉丁) Uvae(Graepes)(英) ブタウ(日本)

基本　係葡萄科葡萄屬結成之子實。

產地　葡萄原產西域。現在各省各屬均有出。陳仁山藥物生產辨云。葡萄乾產自廣東石龍東莞。

形態　葡萄爲蔓生之落葉植物。莖有卷鬚。藉以攀登於他物。其粗者周圍有數寸。葉互生。作掌狀分裂。嫩時有毛。如綿襟。至老則似平滑。初夏新枝之葉腋抽出花穗。花小。淡綠色。而作圓錐形。花序花瓣五片。在頂上略結合。不開而脫落。雄蕊與花瓣同數。雌蕊一。至秋結實爲漿果。多肉味美。至成熟則一朵之數凡六七十粒以上。一果之大約六七分。呈橢圓形或圓形或長橢圓形。外皮綠色。生紫暈。別有紫黑白諸色。可供食藥兩用。



葡萄

採取　秋季採之。

製法　採得搗取自然汁用。

性質　甘。平。濇。無毒。

效能　利筋骨。治痿痺。用作滋養藥。

主治　筋骨溼痺。益氣。倍力。强志。令人肥健。耐饑。忍風寒。逐水。利小便。久食輕身不老延年。可作酒。

歷代記述弦證　【唐】甄權藥性本草論葡萄曰。除腸間水。調中治淋。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論葡萄曰。時氣瘕瘡不出。食之或研酒飲。甚效。【清】黃宮繡本草求眞論葡萄曰。葡萄種類不一。此以眞貨名者。因其形似葡萄。琅細不大。故以眞貨名也。張璐論之甚詳。然此生於漠北。南方亦間有之。其幹類木而條木。其子生青熟赤。乾則紫黑。氣味甘鹹而溫。能攝精氣。歸宿腎臟。與五味子功用不甚相遠。凡藤蔓之類。皆屬於筋。草木之實。皆達於臟。不獨此味爲然。此物向供食品。不入湯藥。故本草不載。近時北人以之强腎。南人以之稀豆各有攸宜。强腎方用眞貨葡萄。人參各一錢。火酒浸一宿。清晨塗手心。摩擦腰脊。能助筋力。强壯若臥時摩擦腰脊。力助陽事。堅强。服之尤爲得力。稀痘方用眞貨葡萄一歲一錢。神黃豆一歲一粒。杵爲細末。一晝夜蜜水調服。并擦心窩腰眼。能助腎祛邪。以北地方物。喜助東南生氣之不足也。然秉質素弱者宜服。反是則不免有助火之害矣。

國外學說　英美學訊謂葡萄產中國西國等處。種種不一。其汁可釀酒。其樹之產處極多。古之埃及、猶太、希臘等國。俱種植此樹。有人疑此樹爲波斯國之原產。近則裏海南岸等處有野生之葡萄樹。而其種植於田園中者亦甚多。至樹身之大小。與果之美劣。各處不同。間有生長甚大。能蔓延至最高之頂。如意大利國與印度國常有葡萄樹。能活多年。間亦有存至三四百年者。其性涼。能微利利小便。於其熟時作水果食之。則能得其潤內皮之益。又爲養身適口之食物。第食時宜去其皮。因皮難消化。并可用爲藥品。如身熱發熱病食之。卽能解渴。又可作葡萄乾葡萄酒之用。作葡萄乾之法。或將葡萄在日光內曬之。或置爐中烘之。或將其藤燒成灰。將灰浸於水中得鹼性之水。加熱令沸。將葡萄浸於此水內數秒時。取出曬十四五日卽成。或將葡萄串之莖乘其將熟時割至將斷。則葡萄在樹上自乾。如西班牙國等處。與地中海東邊士麥拿等處。作葡萄乾均依此法。又阿富汗國作葡萄乾亦依此法。運往印度國出售。有一種葡萄乾。大而肉多。其色紫棕。玉葡萄乾之作用。能養身體。虛弱人食之最宜。第乾者連皮多食。恐腸胃發氣。似不及新者之佳。其功用能作潤劑。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

配造他藥。則取其味美。

配合應用 ㈠除煩止渴。生葡萄搗濾取汁。以瓦器熬稠。入熟蜜少許同收。點湯飲甚良。（居家必用方）㈡治熱淋澀痛。葡萄擣取自然汁、生藕擣取自然汁、生地黃擣取自然汁、白沙蜜各五合。每服一盞。石器溫服。（聖惠方）㈢治胎中衝心。葡萄煎湯飲之。即下。（聖惠方）

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡有風熱實邪者禁用。

參攷資料 ㈠按魏文帝詔華臣曰。蒲桃當夏未涉秋。尚有餘暑。醉酒宿食。掩露而食。甘而不飴。酸而不酢。冷而不寒。味長汁多。除煩解渴。又釀以爲酒。甘於麴藥。善醉而易醒。他方之果。實有匹之者乎。（蘇頌）㈡甘酸溫。多食令人卒煩悶眼暗。（孟詵）㈢今河東及近汴州郡皆有之。苗作藤蔓而極長大。盛者一二本。綿被山谷。開花極細而黃白色。其實有紫白二色。有圓如珠者。有長似馬乳者。有無核者。皆七月八月熟。取汁可釀酒。按史記云。大宛以葡萄釀酒。富人藏酒萬餘石。久者十數年不敗。張騫使西域。得其種還中國。始有。蓋北果之最珍者。今太原尙作此酒寄遠也。其根莖中空相通。暮澆其根。而晨朝水浸子中矣。故俗呼其苗爲木通。以利小腸。江東出一種實細而酸者。名蘡薁子。（蘇頌）㈣葡萄折藤壓之最易生。春月萌芽生葉。頗似栝樓葉而有五尖。生鬚延蔓。引數十丈。三月開小花。成穗。黃白色。仍連着實。星編珠聚。七八月熟。有紫白二色西人及太原平陽皆作葡萄乾。貨之四方。蜀中有綠葡萄。熟時色綠。雲南所出者。大如棗。味尤長。西邊有琅琅葡萄。大如五味子而無核。按物類相感志云。甘草作釘。釘葡萄立死。以麝香入葡萄皮內。則葡萄盡作香氣。其愛憎異於他草如此。又言其藤穿過棗樹則實味更美也。三元延壽書言葡萄架下不可飲酒。恐蟲屎傷人也。（李時珍）

【葡萄汁】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄根及藤葉】性質 甘。平。濇。無毒。

主治 黃疸汁細飲。止嘔噦。及霍亂後惡心。孕婦子上衝心。飲之卽下胎安。（孟詵）

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論葡萄根及藤葉曰。治腰腳肢腿痛。煎湯淋洗之良。又飲其汁。利小便。通小腸。消腫滿。

【葡萄酒】基本

本品係用葡萄實。或以藤汁和麴如常法釀成之酒。

性質 甘。辛。熱。微毒。

主治 暖腰腎。駐顏色。耐寒。

參攷資料 葡萄釀酒。有熱疾及齒疾瘡疹人。不可飲之。（李時珍）

【葡萄乾】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄燒酒】製法

以葡萄和麴入甑蒸之。以器承其滴露。卽爲葡萄燒酒。

性質 辛。甘。大熱。大毒。

主治 益氣調中。耐飢。强志。消痰。破癖。

參攷資料 葡萄燒酒。性熱甚於燒酒。切忌多飲。（醫學大辭典）

【葡萄實】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡蘆】卽玆仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玆仁』條。

【蕫慢子】卽桄榔子之古籍別名。典見楊愼卮言。詳『桄榔子』條。

【蔔子】卽懸鉤子之古籍別名。典見爾雅。詳『懸鉤子』條。

【葦子草根】卽蘆根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘆根』條。

【葦根】卽蘆根之古籍別名。典見毛萇詩疏。詳『蘆根』條。

【葦莖】係汀洲間蘆荻之粗種。性質效能。詳『蘆』條。

【葫】卽大蒜之原名。詳『大蒜』條。

【葫蘆】卽壺盧之古籍別名。詳『壺盧』條。

【蔣】卽白茝之古籍別名。典見綱目詳『白茝』條。

【蔑根】卽蘆根之古籍別名。典見毛萇詩疏。詳『蘆根』條。

【葱子】性質

辛。大溫。無毒。

主治 明目。補中。氣不足。（本經）

歷代記述攷證 【宋】日華諸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

家本草論葱子曰。溫中益精。

【葱汁】　性質　辛。溫。滑。無毒。

主治　溺血飲之解黎蘆及桂毒。

歷代記述弦雅　【南北朝】陶弘景本草集註論葱汁曰。能消玉爲水。化五石。仙方所用。【明】李時珍本草綱目論葱汁曰。散瘀血止衄止痛。治頭痛耳聾。消痔漏。解衆藥毒。

配合應用　㈠治金瘡出血不止。取葱炙熱。按汁塗之卽止。（梅師方）

㈡治火焰丹毒。從頭起者。生葱汁塗之。

㈢治痔瘻作痛。葱涎白蜜和塗之。先以木鱉子煎湯熏洗。其冷如水卽效。一人苦此。早間用之。午刻卽安也。（唐仲舉方）

㈣治解鉤吻毒。面青口噤欲死。以葱涕啖之卽解。（千金方）

參攷資料　㈠葱汁卽葱涕。功同葱白。古方多用葱涎丸藥。亦取其通散上焦風氣也。勝金方取汁入酒少許。滴鼻中。治衄血不止云。卽覺血從腦散下也。又唐瑤經驗方。以葱汁和蜜少許服之。亦佳。云鄰媳用此甚效。老僕試之亦驗。二物同食害人。向以能治此疾。恐人脾胃不同。非甚急則不可輕試也。（李時珍）㈡三洞要錄云。葱者。菜之伯也。能消金鍚玉石。神仙消金玉漿法。於冬至日以蜜盧盛葱汁及根。埋庭中。次年夏至發出。盡化爲水。以法鍊金玉銀青石各三分。自消矣。曝乾如飴。食之可休糧。亦曰金漿也。（唐愼微）

【葱白】　命名　葱從忽。外直中空。有忽通之象。故名。而藥用其葉底之白色根莖。遂稱爲葱白也。

處方用名　葱莖白。葱頭。

古籍別名　乳菜。伯和事草。鹿胎。（綱目）

外國名詞　Shoe-leek. Welsh-onion.（英）

基本　屬百合科。爲青葱葉底之球根。

形態　青葱爲多年生草本。用作蔬菜。世人所盡知也。葉與普通之葉不同。亦無葉柄可見。但中空成管。末端尖而直立。有並行之縱脈。然無中筋。色青綠可愛。高一二尺。葉底因在土中。不受日光。遂爲白色。莖短縮。沒入土中。花自葉上抽出。頂端生如囊之苞。初現綠色。旋成無數之小花。三瓣雙層。帶白色。相簇而爲一團。



葱白

類種　㈠冬葱卽凍葱。慈葱或名大官葱。夏衰冬盛。其莖柔細而香。㈡漢葱卽木葱。冬則葉枯。其莖硬粗。故有木名。㈢胡葱卽菱葱。亦名絲葱。或稱紫葱。莖葉粗硬而根若金燈。㈣蒼葱卽山葱。乃生於山谷者。不入藥用。㈤樓葱亦冬葱之類。卽龍角葱。亦卽龍爪葱。亦名羊慈葱。莖上生根。可以移下蒔之。

採取　採無時。入藥以冬葱爲良。

製法　雷敩曰。凡使葱。須採來依紋擘碎。用綠梅子相對拌蒸一伏時。去梅子。砂盆中研如膏。瓦器曬乾用。

用法　水煎或生搗。

性質　辛。平。無毒。

效能　發表和裏。通陽活血。用爲發汗利尿藥。竈痛殺蟲藥。又爲興奮祛痰藥。兼作瘡瘍痛風諸症之包攝創面藥。

作用　入胃後。能刺激胃黏膜。使胃液分泌增加。至腸能激腸黏膜。令其吸收作用强大。同時又能減少腸液之分泌。使大便燥結。并可殺死小部分之赤痢菌。入血中驟使血行增速。血壓加高。腎臟之血管充血。而利尿作用十分增進。令全身積蓄之過量水分。迅速向腎臟迫出。同時氣枝管黏膜之分泌。亦被激而增多。故可助痰之咳出。

主治　作湯治傷寒寒熱中風。面目浮腫。能出汗。又治傷寒骨肉碎痛。喉痺不通。安胎。歸目。益目睛。除肝中邪氣。安中利五臟。殺百藥毒。根治傷寒頭痛。

歷代記述弦雅　【唐】陳士良食性本草論葱白曰。殺一切魚肉毒。【唐】孟詵食療本草論葱白曰。通關節。止衄血。利大小便。【宋】大

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

明諸家本草論蔥白曰。主天行時疾。頭痛熱狂。霍亂轉筋。及奔豚氣。脚氣。心腹痛。目眩。止心迷悶。【元】李東垣用藥法象論蔥白曰。治陽明下痢下血。【明】寧原食鑑本草論蔥白曰。達表和裏。止血。【明】李時珍本草綱目論蔥白曰。除風溼。身痛麻痺。蟲積心痛。止大人陽脫。陰毒腹痛。小兒盤腸內釣。婦人妊娠漏血。通乳汁。散乳癰。利耳鳴。塗瘋犬傷。制蚯蚓毒。【明】繆希雍本草經疏論蔥白曰。蔥味辛平。平卽涼也。而性無毒。辛能發散。能解肌。能通上下陽氣。故外來佛鬱諸證。悉皆主之。傷寒寒熱。邪氣幷也。中風面目腫。風熱鬱也。傷寒骨肉痛。邪始中也。喉痺不通。君相二火上乘於肺也。辛涼發散。得汗則火自散。而喉痺通也。肝開竅於目。散肝中邪熱。故云歸目。除肝邪氣。邪氣散則正氣通。血自和調。而有安胎安中利五臟之功矣。其曰益目睛。殺百藥毒者。則是辛潤利竅而兼解散通氣之力也。【明】李士材本草圖解論蔥白曰。蔥白辛溫。入手太陰足陽明經。專主發散。以通上下陽氣。故傷寒頭痛用之。少陰下利清穀。裏寒外熱。厥逆脈微。白通湯主之。亦有蔥白。面赤者四逆湯加蔥白。成註云。腎惡燥。急食辛以潤之。蔥白辛溫以通陽氣也。陰症厥逆。唇青。用蔥一束。去根及青。留白二寸。烘熱安臍上。以熨斗熨之。蔥壞則易。熱氣透入。服四逆湯卽癒。蔥同蜜食能殺人。【清】黃宮繡本草求眞論蔥白曰。蔥葉生辛而散。熱甘而溫。外實中空。能入肺經。發汗解肌。以通上下之陽。故書號爲肺菜。其力則能明目利耳通便。及治傷寒頭痛。時疾熱狂。陰毒腹痛之謂。又氣通則血活。故書又載能止諸般血出不調。且氣通則毒解。故書又言。能治諸般惡毒。卽是以思。則和氣血之凝聚。是卽寒氣之未散。寒氣之旣散。是血氣之旣理。又安有毒氣不解。而云是藥之莫治乎。陽春一回。草木甲坼。其勢誠然也。故蔥號爲蔥伯。又曰和事草。其意在斯。取白連鬚用。亦有用青者。但過食亦損鬚髮。及有虛氣上沖。汗出不止之弊。同蜜食。如何殺人。以蜜性最脹。蔥性最發。同蔥則腹益發。而不可解矣。不死何待。同棗食。亦令人病。其義可以例推。因幷記之。【清】王士雄隨息居飲食譜論蔥白曰。辛甘平。利肺通陽。散癰腫。祛風達表。安胎止痛。通乳和營。主霍亂轉筋。奔豚脚氣。調二便。殺諸蟲。理跌撲金瘡。制魚肉諸毒。四季不調。味辛帶甘而不臭者良。氣虛易汗者。不可單食。又忌同蜜食。【清】賈九如辨藥指南論蔥白曰。蔥頭去青。止用白頭。辛溫通竅。專主發散。凡一切表邪之症。大能發汗逐邪。疏通關節。盡風寒溼之氣。感於皮膚經絡之間。而未深入臟腑之內。宜速去之。開發毛竅。放邪氣出路。則營衞通暢。但發表之意。用法不同。須知溫熱寒涼。皆能通表解散。若外感風寒邪止在表。加入麻黃、羌活、紫蘇、白芷、辛溫之劑。專主發散。若內蓄鬱熱。邪遏在表。加入寒涼與辛溫並用之劑。一則清腸胃而祛積熱。一則開玄府而逐鬱邪。故有雙解通解之義。若邪在半表半裏。加入柴胡、葛根、苦涼之劑。以和解之。如用之無法。留邪於內。則費力不易治矣。

國外學說　日本大和本草曰。日本蔥有四種。大蔥、小蔥、冬蔥、朝蔥是也。大蔥五月結實。八九月栽苗。冬春可食。深種肥地。白根長大。味佳美。蔥中佳品也。煮熟去臭氣。再煮可食。溫補。多食能塞氣。因太甘也。二月後莖葉老枯。刈其莖新葉常生。但不如冬春之美。小蔥有二種。分取其根。謂之冬蔥。性味勝於夏蔥。三月後老不堪食。本草所謂凍蔥冬枯是也。夏月則食刈蔥。本草所謂漢蔥冬枯是也。一名夏蔥。又稱五月蔥。六月後不堪食。味不如冬蔥。凡蔥煮熟去臭氣。再煮可食。不如此則臭難食。生蔥不可食。傷神損性。本草云。蔥殺一切魚肉毒。但不可與蜜同食。又服地黃人不可食。若頓死之人。以蔥莖刺入鼻七八寸。血出立甦。男左女右。又刺入耳中五寸。鼻血出卽活。不出血死。小兒則以蔥白入肛門。幷兩鼻孔。此扁鵲祕方也。又圓央。蔥宜培以雞糞。又曰。蔥忌稻稈。蔥根不可用藁包之。包則立枯不生。試之果然。中國農書所不載也。蔥摺去後。一夜便生萌芽。成長極速。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

病人以韭、大葱、小葱鹽淹數日食之味良佳小葱乃葱之最細者也形味俱似夏葱祇大小異爾五月收採八月下種一如冬葱朝葱即胡葱也似食葱而根莖皆細且白李時珍曰根似蒜又如薤不甚臭又和漢三才圖會曰葱葉圓長無枝故呼一文字冬葱漢葱均十月中下種初生葉細如針正月刈葉和鱠醋醬食之因再三刈故俗有刈葱之名夏月葉硬不可食所謂漢葱是也刈葱稍長者八月可移植灌水培糞則肥盛莖根長白色俗呼根葱又名根深經霜則柔輭堪煮食味甚甘美性溫能除寒氣所謂冬葱是也四月葉端圓脹青白色似花而不開中有細子如雞頭子七月熟時取之十月種之成刈葱一物而如二種日本下野州梅澤濃州宮代之葱白其白處近尺長於葉也上野鹿沼產亦良近來畿內夏根葱肥大無異冬葱此蓋春時不刈而移栽於他處灌水培糞作之豪貴人需不時之美菜故然爾但其味究不如經霜者又卷懷食鑑曰葱主發散多食令人神昏葱宜冬月不可多食能損鬚髮發人虛氣五臟悶絕正月食生葱令人面上起遊風燒葱同蜜食壅氣殺人生葱和棗食令人病合犬雉肉食多令人血病服地黃常山人須忌之生葱不可與鯉合食能成病

近人學說　張山雷曰鮮葱白輕用二三枚重至五枚以柔細者爲佳吾吳謂之綿葱其粗壯者則曰胡葱氣濁力薄不如柔細之佳去青用白取其輕清或連鬚用欲其兼通百脈若單用青葱莖則以疏通肝絡之鬱窒與葱白專主發散不同

配合應用　㊀治感冒風寒初起卽用葱白一握淡豆豉半合泡湯服之取汗（瀕湖集簡方）

㊁治傷寒頭痛如破者連鬚葱白半斤生薑二兩水煮溫服（活人書方）

㊂治時疾頭痛發熱者以連根葱白二十根和米煮粥入醋少許熱食取汗卽解（濟生祕覽方）

㊃治數種傷寒初起一二日不能分別者用上法取汗

㊄治傷寒勞復因交接者腹痛卵腫用葱白擣爛苦酒一盞和服之（千金方）

㊅治風溼身痛生葱搗爛入香油數點水煎調川芎麝鬱金末一錢服取吐（丹溪心法方）

㊆治妊娠傷寒赤斑變爲黑斑尿血者以葱白一把水三升煮熱服汁食葱令盡取汁（傷寒類要方）

㊇治六月孕動困篤難救者葱白一大握水三升煎一升去滓頓服（楊氏產乳方）

㊈治胎動下血病痛搶心用葱白煮濃汁飲之未死卽安已死卽出未效再服一方加川芎一方用銀器同米煮粥及羹食（宋帥方）

㊉治卒中惡死或先病或平居寢臥奄忽而死皆是中惡急取葱心黃剌入鼻孔中男左女右入七八寸鼻目血出卽甦又法用葱剌入耳中五寸以鼻中血出卽活也如無血出卽不可治矣相傳此扁鵲祕方也（崔氏纂要方）

㊊治小兒卒死無故者取葱白納入下部及兩鼻孔中氣通或噯卽活（陳氏經驗方）

㊋治小兒盤腸內釣腹痛用葱湯洗兒腹仍以炒葱擣貼臍上良久尿出痛止（湯氏嬰孩寶鑑方）

㊌治陰毒腹痛厥逆唇青卵縮六脈欲絕者用葱一束去根及青留白二寸烘熱安臍上以熨斗火熨之葱壞則易良久熱氣透入手足溫有汗卽瘥乃服四逆湯若熨而手足不溫不可治（活人書方）

㊍治脫陽危症凡人大吐大泄之後四肢厥冷不省人事或與女子交後小腹腎痛外腎擔縮冷汗出厥逆須臾不救先以葱白炒熱熨臍後以葱白三七莖擣爛用酒煮灌之陽氣卽回此華佗救卒病方也（華佗方）

㊎治卒心急痛牙關緊閉欲絕以葱白五莖去皮鬚擣膏以匙送入咽中灌以麻油四兩但得下咽卽甦少頃蟲積皆化黃水而下永不再發累得救人（瑞竹堂方）

㊏治霍亂煩躁坐臥不安葱白二十莖大棗二十枚水三升煎二升分服（深師方）

㊐治蛟蟲心痛用葱莖白二寸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

錯粉二錢。搗丸服之卽止。葱能通氣。粉能殺蟲也。（楊氏經驗方）

㊀治腹皮麻痺不仁者。多煮葱白食之。卽自愈。（危氏方）

㊁治小便閉脹。不治殺人。葱白三斤。剉炒。帕盛二個。更互熨小腹。氣透卽通也。（許學士本事方）

㊂治大小便閉。搗葱白和醋。封小腹上。仍灸七壯。（外臺祕要方）

㊃治大腸虛閉。勻氣散。用連鬚葱一根。薑一塊。鹽一撮。淡豉三七粒。搗作餅。烘捺臍中。紮定。良久氣卽通。不通再作。（楊氏直指方）

㊄治小兒虛閉。葱白三根。煎湯。調生蜜阿膠末服。仍以葱頭染蜜。插入肛門。少頃卽通。（全幼心鑑方）

㊅治急淋陰腫。泥葱半斤。煨熱。杵爛。貼臍上。（外臺祕要方）

㊆治小便淋瀝。或有白者。以赤根樓葱。近根截一寸許。安臍中。以艾灸七壯。（經驗方）

㊇治小兒不尿。乃胎熱也。用大葱白切四片。用乳汁半盞同煎。片時。分作四服。卽通。不飲乳者。服之卽飲乳。若臍四旁有青黑色及口撮者。不可救也。（全幼心鑑方）

㊈治腫毒尿閉。因腫毒未潰。小便不通。用葱切入蘇油煎至黑色。去葱。取油時塗腫處。卽通。（普濟方）

㊉治水癌病腫。葱根白皮煮汁服一盞。當下水出。病已困者。取根搗爛。坐之。取氣水自下。（聖濟總錄方）

㊊治陰囊腫痛。葱白、乳香搗塗。卽時痛止。腫消。又方用煨葱。入鹽杵如泥。塗之。

㊋治小便溺血。葱白一握。鬱金一兩。水一升。煎二合。溫服。一日三次。（普濟方）

㊌治腸痔有血。葱白三斤。煮湯熏洗立效。（外臺祕要方）

㊍治赤白下痢。葱白一握。細切。和米煮粥。日日食之。（食醫心鏡方）

㊎治便毒初起。葱白炒熱。布包熨數次。乃用傅藥卽消。又用葱根和蜜搗傅。以紙密護之。外服通氣藥卽愈。（永類鈐方）

㊏治癰疽腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

㊐治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

㊑治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

㊒治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

㊓治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

㊔治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

㊕治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

㊖治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

㊗解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

㊘治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

㊙治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

㊚治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

㊛治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

㊜治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

㊝治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

㊞治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

㊟治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

㊠解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

㊡治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

㊢治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

㊣治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

㊤治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

㊥治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

㊦治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

㊧治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

㊨治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

㊩解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

㊪治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

㊫治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

㊬治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

㊭治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

㊮治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

㊯治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

㊰治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

㊱治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

㊲解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

㊳治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

㊴治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

㊵治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

㊶治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

㊷治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

㊸治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

㊹治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

㊺治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

㊻解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

㊼治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

㊽治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

㊾治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

㊿治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(51)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(52)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(53)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(54)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(55)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(56)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(57)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(58)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(59)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(60)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(61)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(62)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(63)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(64)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(65)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(66)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(67)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(68)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(69)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(70)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(71)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(72)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(73)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(74)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(75)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(76)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(77)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(78)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(79)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(80)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(81)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(82)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(83)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(84)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(85)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(86)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(87)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(88)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(89)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(90)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(91)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(92)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(93)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(94)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(95)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(96)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(97)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(98)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(99)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(100)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(101)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(102)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(103)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(104)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(105)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(106)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(107)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(108)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(109)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(110)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(111)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(112)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(113)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(114)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(115)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(116)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(117)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(118)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(119)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(120)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(121)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(122)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(123)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(124)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(125)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(126)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(127)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(128)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(129)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(130)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(131)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(132)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(133)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(134)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(135)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(136)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(137)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(138)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(139)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(140)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(141)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(142)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(143)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(144)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(145)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(146)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(147)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(148)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(149)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(150)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(151)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(152)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(153)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(154)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(155)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(156)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(157)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(158)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(159)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(160)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(161)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(162)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(163)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(164)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(165)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(166)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(167)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(168)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(169)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(170)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(171)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(172)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(173)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(174)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(175)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(176)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(177)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(178)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(179)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(180)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(181)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(182)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(183)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(184)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(185)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(186)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(187)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(188)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(189)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(190)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(191)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(192)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(193)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(194)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(195)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(196)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(197)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(198)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(199)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(200)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(201)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(202)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(203)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(204)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(205)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(206)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(207)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(208)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(209)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(210)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(211)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(212)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(213)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(214)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(215)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(216)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(217)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(218)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(219)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(220)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(221)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(222)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(223)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(224)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(225)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(226)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(227)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(228)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(229)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(230)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(231)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(232)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(233)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(234)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(235)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(236)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(237)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(238)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(239)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(240)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(241)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(242)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(243)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(244)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(245)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(246)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(247)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(248)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(249)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(250)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(251)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(252)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(253)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(254)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(255)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(256)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(257)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(258)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(259)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。（千金方）

(260)治金瘡瘀血在腹者。大葱白二十枚。蔴子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。（千金方）

(261)治血瘤怪病。人偏身忽然肉出。如錐。旣痒且痛。不能飲食。名血瘤。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲豉湯數盞自安。（夏子益怪病方）

(262)解金銀毒。用葱白煮汁飲之。（外臺祕要方）

(263)治臁瘡腫硬。烏金散。治癰癤腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。（外科精義方）

(264)治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。（千金方）

(265)治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。（千金方）

(266)治疔瘡惡腫刺破。以老葱、生蜜杵貼。兩時疔出。以醋湯洗之神效。（聖濟總錄方）

(267)治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。（楊氏方）

(268)治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

食生葱令人面上起遊風。生葱同蜜食作下利。燒葱同蜜食壅氣殺人。（孫思邈）㊃生葱合棗食令人病。令犬雉肉食多令人病血。（張仲景）㊄服地黃常山人忌食葱。（李時珍）

【葱花】主治　心脾痛如錐刀刺腹脹。用一升同吳茱萸一升。水八合。煎七合。去滓。分三服立效。

【葱苺】即黎蘆之古籍別名。典見別錄。詳『黎蘆』條。

【葱涕】即葱汁之古籍別名。典見千金食治。詳『葱汁』條。

【葱豉酒】基本　本品係用葱根白與豆豉浸成之酒。

主治　解煩熱。補虛勞。又治傷寒頭痛。寒熱。解肌發汗。及冷痢腸澼。

【葱豉粥】基本　本品即用葱白與豆豉和米煮成之粥。

主治　發汗。解肌。

【葱莢】即黎蘆之古籍別名。典見吳普本草。詳『黎蘆』條。

【葱葉】性質　微溫。無毒。

主治　利五臟。益目精。發黃疸。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論葱葉曰。主療水病足腫。【宋】日華諸家本草論葱葉曰。煨研傅金瘡。水入鼓腫。鹽研傅蛇蟲傷及中射工溪毒。

配合應用　㊀治水病足痛。葱莖葉煮湯漬之。日三五次妙。（韋宙獨行方）

㊁治小便不通。葱白連葉擣爛。入蜜合外臍上。即通。（永類鈐方）

㊂治瘡傷風水腫毒。取葱青葉和乾薑黃蘗等分。煮湯浸洗。立愈。（食療本草方）

㊃治蜘蛛咬瘡。偏身生瘡。青葱葉一莖。去尖。入蚯蚓一條在內。待化成水。取點咬處。即愈。（李絳兵部手集方）

㊄治代指毒痛。取萎黃葱葉煮汁熱漬之。（千金方）

參攷資料　㊀煨葱治打撲損。見劉禹錫傳信方。云得於崔給事。取葱新坼者。熁火煨熱。剝皮。其間有涕。便將罨損處。仍多煨續續易熱者。崔云。頃在澤潞與李抱眞作判官。李相方以毬杖按毬子。其軍將以杖相格。因傷李相拇指。幷爪甲劈裂。遽索金創藥裹之。強索酒飲。而面色愈青。忍痛不止。有軍吏言此方。遂用之。三易面色卻赤。斯須云已不痛。凡十數度。用熱葱幷溺纏裹其指。遂辜席笑語。（蘇頌）㊁按張氏經驗方云。金創折傷血出。用葱白連葉煨熱。或鍋烘炒熱。擣爛傅之。冷即再易。石城尉戴堯臣試馬損大指。血出淋漓。余用此方。再易而痛止。翌日洗面。不見痕跡。宋推官鮑縣尹皆得此方。每有殺傷氣未絕者。亟食用此。活人甚衆。又凡人頭目重腫疼痛。李時珍每用葱葉插入鼻內二三寸。幷耳內。氣通即便清爽也。（李時珍）

【葱葵】即黎蘆之古籍別名。典見吳普本草。詳『黎蘆』條。

【葱苺白】即葱白之處方用名。詳『葱白』條。

【葱頭】即葱白之處方用名。詳『葱白』條。

【葱鬚】主治　通氣。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論葱鬚曰。療飽食房勞。血滲入大腸。便血腸澼成痔。口乾。研末。每服二錢。溫酒下。

【葳蕤】㊀即黃精之古籍別名。典見別錄。詳『黃精』條。㊁即玉竹之古籍別名。典見吳普本草。詳『玉竹』條。

【葵子】即冬葵子之原名。詳『冬葵子』條。

【葵菜粥】主治　潤燥寬腸。

【葵尊】即蓴之秋老者。典見綱目。詳『蓴』條。

【葶藶】處方用名　甜葶藶。

古籍別名　菫薁。大室。大適。（本經）丁歷。狗薺。（別錄）丁樂。公薺。帝力。苦草。良醫匕首。（和漢藥考）

外國名稱　Draba nemorosa, L. Var. hebecarpa, Ledeb.（拉丁）

基本　屬十字花科。爲葶藶之種子。

產地　陳仁山藥物生產辨云。葶藶產河南禹州。安徽。江蘇等處。山東兗州亦有產。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態　葶藶爲二年生草本。莖高六七寸至尺許。葉皆互生。作卵圓或長橢圓形。無葉柄。莖與葉俱生茸毛。花在莖間分歧爲二三枝。色黃四瓣。綴於梢頭。叢集而爲總狀花序。果實爲莢果。作長橢圓形。頗似米粒。中藏無數小種子。色茶褐。似罌粟子。



葶藶

種類　葶藶有甜苦二種。甜葶藶粒極細。色紅黃。味淡甘而性緩。泄肺不傷胃。苦葶藶粒似蓼蓽形。不甚味微苦而性峻。泄肺又傷胃。

採取　二三月間採實陰乾。

製法　雷敩曰。凡使以葶藶糯米相合。置於甑上。微焙。待米熟去米搗用。

性質　辛。寒。無毒。

效能　瀉肺行水。下氣。定喘。用爲利尿及祛痰藥。

主治　癥瘕積聚。結氣飲食。寒熱。破堅逐邪。通利水道。（本經）下膀胱水。伏留熱氣。皮間邪水上出。面目浮腫。身暖中風熱。拂擾。利小腹。久服令人虛。（別錄）

張仲景之證明　葶藶一味。經張仲景之實驗認爲『主治水病旁治肺癰結胸』。茲考徵如下。㈠葶藶大棗湯證曰。肺癰。胸滿膨一身面目浮腫。（以上一方葶藶搗丸如彈丸大。）㈡大陷胸丸證曰。結胸。（以上一方葶藶半升。）㈢已椒藶黃丸證曰。腸間有水氣。（以上一方葶藶一兩。）歷觀上諸方。一皆是主治水病也。而二方云水病。一方特云結胸。其所謂結胸者。用大陷胸丸則水利而疾愈。然則葶藶之治水也明矣。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論葶藶曰。療肺壅上氣欬嗽。及止喘促。除胸中痰飲。【明】李時珍本草綱目論葶藶曰。通月經。【明】李士材本草圖解論葶藶曰。葶藶子辛寒。入肺瀉氣。主肺壅上氣欬嗽喘促。痰氣結聚。通身水氣。按本草十劑云。瀉可去閉。葶藶大黃之屬。此二味皆大苦大寒。大黃瀉血閉。葶藶瀉氣閉。夫葶藶之峻利。不減大黃。惟急逐水。殊動眞氣。稍涉虛者。宜痛戒之。有甜苦二種。苦者專瀉。甜者少緩。然肺家水氣急滿。非此莫能療。但不敢多用耳。酒炒或糯米拌炒。待米熟去米用。【清】黃宮繡本草求眞論葶藶曰。葶藶辛苦大寒。性急不減硝黃。大瀉肺中水氣。膜急下行。膀胱故凡癥聚癥結。伏留熱氣。水腫痰壅。嗽喘經閉。便塞。至極等症。無不當用。此調昔本草十劑篇云。瀉可去閉。葶藶大黃之屬。但大黃則瀉脾胃陰分血閉。葶藶則瀉肺經陽分氣閉。葶藶有苦有甜。甜者性緩。雖瀉而不傷苦者性急。既瀉肺而復傷胃。故必用以大棗補土以制水。但水去則止。不可過劑。觀金匱所云。用葶藶以治頭癰。氣入腦殺人。其意大可知矣。子如黍米微長。色黃。糯米微炒用。

國外學說　日本古方藥品考曰。衍義云。經既言味辛苦。則苦者自不復入藥也。大抵治體皆以行水走泄爲用。蓋取苦泄之義耳。惟苦葶藶自來絕跡。不論進口貨與本國產皆無之。今藥舖稱甜葶藶者。粒極細。色紅黃。味淡甘。此實子。或薺實子也。其稱苦葶藶者。粒似蓼蓽子。不圓。味微苦。此救荒遏藍子也。皆非眞品。全白芥子代用之。最有效。又甜葶藶苗有大小二種。甜葶藶自冬生苗。葉似薺而小。有微毛。至夏抽莖三五寸。開小黃花。漸次結綠莢。扁如胡瓜子形。其子極細。如海金砂。又用藥須知曰。葶藶正二月著花。子宜早收。遲則脫落。形狀似薺。葉有茸毛。但苦味少。其來自中國之種。味極苦。此眞苦葶藶也。本草所謂苦徹頂者是。然甚難得。日本所產。殆甜葶藶之類歟。又日用藥品考曰。有甜苦二種。方書單稱葶藶。皆苦葶藶也。藥肆所列。不論中日產。皆以薺子或莽實子混充。卽所謂甜葶藶也。苦葶藶。味至苦。其子苦尤甚。日本竟不見此物。又手板發蒙曰。葶藶子。今稱苦葶藶者。乃遏藍子之子。非眞品也。蓋甜葶藶有來自中國者。苦葶藶則無之。又和漢三才圖會曰。葶藶俗稱狗薺。出於日本之攝州者良。播州產次之。市中所售多非眞葶藶子。係採薺子充之。又大和

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本草曰。葶藶大於薺。葉似之。三四月開細黃花。有甜苦二種。甜者可食。且柔輭實圓。又本草綱目啓蒙曰。葶藶乃一種小草。生原野向陽之地。葉似雞兒腸而厚。色淺有毛。就地叢生。入春漸次抽莖。長四五寸。亦或近尺。面綠背紫。莖與葉皆互生。莖端生長穗。開細花。四瓣類薺花。惟此作黃色。且花後結莢形似米粒而扁。不作三角形。爲不同耳。初夏子熟。自然從莢中散落。苗根亦與之俱枯。其子視罌粟爲小。色茶褐。味微辛。又古今要覽稿曰。岡村尙謙云。採葶藶子。頗有遲早。隨土地而異。大約至二月杪以迄三月最爲相宜。過遲則莢開。子落地上。不可得矣。（和漢三才圖會、正字通）一種有紅花。葉似薺花。極細。莖高至尺餘。柔輭而難於特立。仲夏開細白花。六月結實。形圓扁。小而味辛入秋。莖葉俱枯。（本草臆斷）大和本草指此種卽葶藶之類。四月柔輭不老。實平而圓。郭璞注爾雅云。葖葉似薺。葉細。俗呼老薺。與紅毛薺同種。凡葶藶入夏便枯。此薺至秋尙存。故有老薺之稱。一種名遏藍菜。秋始生苗。至春蕃盛。葉小而互生。莖高至二尺許。梢頭有穗。花後結莢。花白。莢正圓。大如指頭。太田證元曰。葶藶有甜苦二種。甜者多在近郊。苦者不詳。或曰。來自西國。未知孰是。春秋繁露云。葶藶枯於仲夏。款冬華於嚴霜。由此考之。苦者卽救荒本草所稱之遏藍菜。俗呼葷配。至四月必枯。形狀較甜者更大。春開白花。實圓扁。似紅毛薺而大。中藏細子。如蘇子。味苦辛。然有可疑者。遏藍菜之果莢。舍有臭氣。甚於葱蒜。又其脚葉似雲盞葉而小。其卽古之惡薺歟。若謂卽係葶藶。殆未免附會也。

近人學說　張山雷曰。葶藶子苦降辛散。而性寒涼。故能破滯開結。定逆止喘。利水消腫。本經主治。皆以破泄爲義。至別錄則專通水道矣。甄權謂療肺壅上氣咳嗽。止喘促。除胸中痰飲。瀕湖謂通月經。景岳謂泄氣閉。善逐水。乃氣行而水自行也。故肺中水氣臌滿脹急者。非此不除。石頑謂其專泄肺氣。而能通膀胱之氣化。蓋惟上竅閉塞。下竅不通。因而積水泛溢。爲喘滿。爲腫脹。爲積聚。辛以散之。苦以泄之。大寒以沈降之。則下行逐水。既泄肺氣。卽通膀胱。爲其體輕而性降也。惟寒泄之品。能通利邪氣之有餘。不能補益正氣之不足。苟非實熱鬱窒。自當知所顧忌。別錄久服令人虛。本是至理。然肺家痰火壅塞及寒飲瀰漫。喘急氣促。或爲腫脹等證。亦必賴此拔堅執銳之才。以成搗穴犁庭之績。自徐氏之才。論十劑之泄以去閉。偶以大黃葶藶二物並舉。而東垣遂謂葶藶氣味俱厚。不減大黃。景岳從而和之。石頑且謂苦寒不減硝黃。丹溪亦有葶藶性急。病涉虛者。殺人甚捷之說。遂令俗人不辨是否。畏如蛇蝎。卽尋常肺氣喘滿痰飲壅塞之證。亦幾有不敢輕試之意。其亦知實在性質。不過開泄二字。且體質本輕。故能上行入肺。而味又甚淡。何至猛烈乃爾。臨症以來。所用甚夥。開肺之效。久已共見。而傷肺之弊。尙是無聞。抑且通調水道。固有其功。而傷肺作瀉。未見其罪。乃古書多與大黃並論者。則皆因徐氏偶舉之例。而瞻者不察。和而唱之。竟爲應聲之蟲。無識盲從。可爲浩歎。盍亦試以二物分麥而嘗之。當可恍然於其氣味厚薄之何似矣。

配合應用　㈠治肺癰喘急不得臥。葶藶大棗瀉肺湯主之。葶藶炒黃。搗末。蜜丸。彈子大。每用大棗二十枚。水三升。煎取二升。入葶藶一丸。更煎取一升。頓服。亦主支飲不得息。（金匱方）

㈡治通身腫滿。苦葶藶炒四兩。爲末。棗肉和丸。梧子大。每服十五丸。桑白皮湯下。日三次效。（外臺祕要方）

㈢治腹脹積聚。葶藶子一升。熬。以酒五升。浸七日。日服三合。（千金方）

㈣治痰飲咳嗽。含奇丸。用葶藶子一兩。紙裹炒令黑。知母、貝母各一兩。棗肉半兩。砂糖一兩半。和丸。彈子大。每以新綿裹一丸含之。嚥津。甚者不過三丸。（簡中方）

㈤治陽水暴腫。面赤煩渴喘急。小便澀。其效如神。甜葶藶一兩半。炒研末。漢防己末二兩。以綠頭鴨

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

血及頭合搗萬杵。丸梧子大。甚者空腹白湯下十丸。輕者五丸。日三四服。五日止。小便利爲驗。一加猪苓末二兩。（外臺祕要方）

㈥治通身腫滿。苦葶藶炒四兩爲末。棗肉和丸。梧子大。每服十五丸。桑白皮湯下。日三服。此方人不甚信。試之自驗。

㈦治水腫尿澀。用甜葶藶二兩炒爲末。以大棗二十枚。水一大升。煎一升。去棗入葶藶末。煎至可丸。如梧子大。每飲服六十丸。漸加。以微利爲度。（梅師方）又方用葶藶三兩。絹包。飯上蒸熟。搗萬杵。丸梧子大。不須蜜和。每服五丸。漸加至七丸。以微利爲佳。不可多服。令人不堪。若氣發服之得利。氣下卽止。水氣無比。（肅駙馬水腫。服此得瘥。（崔氏方）又治男女大小頭面手足腫。用苦葶藶炒研。棗肉和丸。小豆大。每服十丸。煎麻子湯下。日三服。五七日小便多。則消腫也。忌鹹酸生冷。（外科精義方）

㈧治大腹水腫。用苦葶藶二升。炒爲末。割鷄雄雞血及頭合搗丸。梧子大。每小豆湯下十丸。日三服。又方。葶藶二升。春酒五升。漬一夜。稍服一合。小便當利。又方。葶藶一兩。杏仁二十枚。並熬黃色。搗分十服。小便去當瘥。（肘後方）

㈨治肺溼痰喘。甜葶藶炒爲末。棗肉丸服。（摘玄方）

㈩治欬嗽上氣不得臥。或偏體氣腫。或單面腫。鼓足腫。並主之。葶藶子三升。微火熬研。以絹袋盛。浸清酒五升中。冬七日。夏三日。初服如桃許大。日三夜一。冬月日二夜一。量其氣力。取微利下爲度。如患急者。不待日滿。亦可絞服。（崔知悌方）

⑪治月水不通。葶藶一升爲末。蜜丸。彈子大。綿裹納陰中二寸。一宿易之。有汗出止。（千金方）

⑫治卒發顛狂。葶藶一升。搗三千杵。取白犬血和丸。麻子大。酒服二丸。三服卽瘥。（肘後方）

⑬治頭風疼痛。葶藶子爲末。以湯淋汁沐頭。三四度卽愈。（肘後方）

⑭治疳蝕齒齦。葶藶、雄黃等分爲末。臘月猪脂和成。以綿裹槐枝齦點。（金匱方）

⑮治白禿頭瘡。用葶藶末塗之。（聖惠方）

⑯治瘰癧已潰。葶藶二合。豉一升。搗作餅子。如錢大。厚二分。安瘡孔上。艾作炷灸之。令溫熱。不可破肉。數易之而灸。但不可灸初起之瘡。恐葶藶氣入腸傷人也。（永類鈐方）

⑰治馬汗毒氣入腹。葶藶子一兩。炒研。水一升。煮湯服。取下惡血。（續十全方）

用量　一錢至三錢。

施用宜忌　凡肺脾氣虛而無實邪者禁用。惡白殭蠶。石龍芮。得酒良。榆皮爲之使。

著名方劑　葶藶丸。治水腫及脚並虛腫。（外臺祕要方）葶藶子半兩。牽牛子半兩。（生熟各半）澤漆葉、海藻（洗去鹽炙）、昆布（洗去鹽炙）桑白皮、甘遂（熬）椒目、郁李仁各三分。桂心一分。上爲末。蜜丸。桐子大。一服十五丸。日再。加至二十丸。

參攷資料　㈠苦甜二味。主治不同。仲景瀉肺湯用苦。餘方或有用甜者。或有不言甜苦者。大抵苦則下泄。甜則少緩。量病人虛實用之。不可不審。本草雖云治同。而甜苦之味。安得不異。（王好古）㈡甘苦二種。正如牽牛黑白二色。急緩不同。又如葫蘆甘苦二味。良毒亦異。大抵甜者下泄之性緩。雖泄肺而不傷胃。苦者下泄之性急。既肺泄而易傷胃。故以大棗輔之。然肺中水氣臌滿急者。非此不能除。但水去則止。不可過劑。爾既不久服。何至殺人。淮南子云大戟去水。葶藶愈腹。用之不節。乃反成病。亦在用之有節。（李時珍）

【葶】卽大蒜之古籍別名。典見綱目。詳『大蒜』條。

【葶菜】㈠卽小蒜之古籍別名。典見綱目。詳『小蒜』條。㈡卽大蒜之古籍別名。典見綱目。詳『大蒜』條。

【蓳子】卽蒼耳子之古籍別名。典見本草集註。詳『蒼耳子』條。

【蔓】卽遠志之古籍別名。典見和漢藥考。詳『遠志』條。

【蔓食蠶】卽桑白皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑白皮』條。

【蔓繞】卽遠志之古籍別名。典見本經。詳『遠志』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【莛】㊀卽蓬蕘朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬蕘朮』條。㊁卽薑黃之古籍別名。典見綱目。詳『薑黃』條。

【蓬藥】卽蓬蕘朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬蕘朮』條。

【蓯】卽香薷之古籍別名。典見土篇。詳『香薷』條。

【蒨母】卽知母之古籍別名。典見本經。詳『知母』條。

【蒨耳子】卽蒼耳子之古籍別名。詳『蒼耳子』條。

【勢膂】卽孛蓉之古籍別名。典見本草衍義。詳『孛蓉』條。

【虞刺】卽絲瓜之古籍別名。典見綱目。詳『絲瓜』條。

【虞美人草花】卽蘼春花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘼春花』條。

【虞蓼】卽水蓼之古籍別名。典見爾雅。詳『水蓼』條。

【虺骨】卽虎骨之古籍別名。典見綱目。詳『虎骨』條。

【號筒草】卽博落迴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『博落迴』條。

【蛱蝶】卽蝴蝶之原名。詳『蝴蝶』條。

【蛾眉豆】卽白扁豆之古籍別名。典見綱目。詳『白扁豆』條。

【蛾眉茶】係茶之產於四川蛾眉山者。性質效能。與茶同。詳『茶』條。

【蛘蛘】卽螳螂之古籍別名。典見揚雄方言。詳『螳螂』條。

【蜀】卽雞之古籍別名。典見綱目。詳『雞』條。

【蜀大黃】卽大黃之產於四川者。其根形如牛舌。入藥最良。詳『大黃』條。

【蜀水花】卽鷓鴣屎之原名。詳『鷓鴣屎』條。

【蜀羊泉】**古籍別名**　羊泉。羊飴。（別錄）漆姑草。（綱目）青杞。（救荒）鴨上月葛。（日本）

外國名詞　Sagina Linnæi, Presl. var. maxima, Maxim.（拉丁）ヒヨドリジヤウゴ　ホロシ　ツツラコ（日本）

基本　係茄科茄屬。爲蜀羊泉之莖葉。

產地　多在山野原澤間。

形態　蜀羊泉爲溼草類之多年蔓生草本。莖細長。有毛。卷絡於他物之上。葉長卵形。基部有大缺刻。夏月葉腋抽出花梗。分極開花。花小帶白色。雄蕊之藥。近集於雌蕊花柱之周圍。其構造與茄花相類。結實小。爲漿果。球形。赤色。莖葉俱可供藥用。



蜀羊泉

性質　苦。微寒。無毒。

主治　禿瘡。惡瘡。熱氣。疥瘙。痂癬。蟲。（本經）療齲齒。女子陰中內傷。皮間實積。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論蜀羊泉曰。主小兒驚生毛髮。搗塗漆瘡。【明】李時珍本草綱目論蜀羊泉曰。蚯蚓氣味者。搗爛入黃丹盒之。

參攷資料　㊀此草俗名漆姑。葉似菊花。紫色。子類枸杞子。根如遠志。無心有鬚。所在平澤皆有之。生陰溼地。三月四月採苗葉陰乾。（蘇恭）㊁陶注杉材云漆姑葉細。多生石邊。能療漆瘡。蘇云漆姑是羊泉。按羊泉乃大草。漆姑草如鼠跡。大。生階墀間陰處。氣辛烈。接付漆瘡。亦主溪毒。乃同名也。（陳藏器）㊂或言老鴉眼睛草。卽漆姑草。漆姑乃蜀羊泉。人不能決識。（蘇頌）㊃漆姑有二種。蘇恭所說是羊泉。陶陳所說是小草。蘇頌所說老鴉眼睛草。乃龍葵也。又黃峰作窠。卿漆姑草汁爲帶。卽此草也。（李時珍）

【蜀芥】卽白芥子之古籍別名。典見綱目。詳『白芥子』條。

【蜀庐】卽紫堇之古籍別名。典見圖經本草。詳『紫堇』條。

【蜀柳】卽檉柳之古籍別名。典見綱目。詳『檉柳』條。

【蜀胡爛】**產地**　生安南諸地。

基本　蜀胡爛爲菜類之一種。實如茴香。子可供食與藥用。

性質　辛。平。無毒。

主治　冷氣心腹脹滿。補腎。除婦人血氣。下痢殺牙齒蟲。

【蜀格】**產地**　生山野之陽處。

形態　蜀格爲雜草類

556／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之一種。形如蓯菌而有刺。可供藥用。

性質　苦。平。無毒。

主治　寒熱瘧痺癰腫。女子帶下。

【蜀桑】㊀卽莞花之古籍別名。典見別錄。詳『莞花』條。㊁卽莞花之根。詳『黃大戟』條。

【蜀秫】卽蜀黍之俗名。詳『蜀黍』條。

【蜀脂】卽黃蕷之古籍別名。典見別錄。詳『黃蕷』條。

【蜀椒】卽川椒之原名。詳『川椒』條。

【蜀黍】**命名**　本品種始自蜀。故名。

古籍別名　蘆穄(食物)木稷。荻粱(廣雅)蜀秫。蘆粟(俗名)

外國名詞　Andropogon Sorghum, Brot. Var. vulgaris, Hack.(拉丁)モロコシ　タウキビ(日本)

基本　係禾本科蜀黍屬。爲蜀黍之米。其根詳見該條。

產地　生田澤中。北省多有之。

形態　蜀黍爲穀類黍屬之一年生草本。莖高五尺至七尺。亭亭直立。有茸毛。葉稍呈心臟形。具有五裂至七裂。皆互生。六月開花。葉腋間大似木槿花。或五瓣。或重瓣。色有紅紫白數種。頗美觀。頂上之花。厥狀如穗。但葉形卵圓。或作心臟形。邊緣有不整之鋸齒。具有葉柄。色綠。兩面密生茸毛。乾者色暗。或爲黃綠色。易破折。根入藥用。尋常多採用剝去外皮之副根。色帶白。無臭。味帶黏滑性。



蜀葵

【蜀葵】**命名**　本品自蜀戎吳諸處所來。而形如葵。故名。惟吳者乃胡之訛也。

古籍別名　菴戎葵(爾雅)吳葵。(別錄)胡葵。(爾雅翼)戎杖。石杖紅。杖葵。荻葵。衛足。一文紅。衛足葵。(和漢藥考)

外國名詞　Althea rosea, cav.(拉丁)

基本　屬錦葵科。爲蜀葵之苗根莖與花子。

產地　李時珍曰。蜀葵處處有之。凡郊野間恒多生焉。

形態　蜀葵爲二年生草本。莖高五尺至七尺。亭亭直立。有茸毛。葉稍呈心臟形。具有五裂至七裂。皆互生。六月開花。葉腋間大似木槿花。或五瓣。或重瓣。色有紅紫白數種。頗美觀。頂上之花。厥狀如穗。但葉形卵圓。或作心臟形。邊緣有不整之鋸齒。具有葉柄。色綠。兩面密生茸毛。乾者色暗。或爲黃綠色。易破折。根入藥用。尋常多採用剝去外皮之副根。色帶白。無臭。味帶黏滑性。

採取　取四時紅色單葉者陰乾。

性質　甘。微寒。滑。無毒。

成分　亞爾答亞根之成分。爲植物黏液、(約百分之三十五)澱粉、亞斯拍拉根(約百分之二)等。蜀葵根所含之成分。與此相同。惟黏液質不多耳。至葉中之成分。亦與根無異。

效能　根葉爲治疝氣淋病痢疾藥。

主治　根莖除客熱。利小便。散膿血惡汁。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論蜀葵苗曰。除客熱。利腸胃。【唐】陳藏器本草拾遺論蜀葵苗曰。煮食治丹石發熱。大人小兒熱毒下痢。【宋】大明日華諸家本草論蜀葵苗曰。搗爛塗火瘡。燒研傅金瘡。【明】李時珍本草綱目論蜀葵苗曰。作蔬食滑竅。治淋潤燥易產。

國外學說　亞爾答亞根。爲屬於錦葵科植物之宿根。產於歐洲中部地中海沿岸地方及亞洲。前人譯爲蜀葵。實則同名異種。日本藥局方曾採用蜀葵根。旋因該植物黏液不多。改用亞爾答亞根。第四版改正日本藥局方記載如下。亞爾答亞根者。乃採其副根。剝去枹層。乾而用之。色帶白。附有似贅疣之瘢痕。與細微之纖維。其木質及皮。均多澱粉粒。具有排列之纖維束。並蓚酸鹽細胞。黏液細胞。黏液堆積於細胞膜之內面。其橫斷面除新生組織帶褐色外。其餘均

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

帶白色。以此根一分。加水十分。卽成帶黃色之黏漿。黏漿味淡。無酸性及安母尼亞性之臭氣。若現穢白色。或已變木質者。俱不堪用。蓋亞爾答亞根之供藥用。以其黏液質極多故也。葵類中雖亦含黏液質。然終不及亞爾答亞根之多。因此日本產之葵根。不能入藥。一說蜀葵開白花者。其根頗多黏液質。葵此層尙須研究。又藥學博士石津利作。嘗將黃蜀葵根試驗。據稱確可代亞爾答亞根用。錄其說如下。亞爾答亞根。係取屬錦葵科二年生植物之主根及副根。剝去外部之枹層。乾而製之。此根含有極多之澱粉。黏液質及亞斯拍拉根約二%。能緩解腸胃之刺戟。故用爲黏滑性之佐使藥。前藥局方本以蜀葵根定爲藥用品。尋以其根質頗堅。靱含粘液質尙少。不適醫家之用。故改正藥局方。改用亞爾答亞根。惟現今盛行之亞爾答亞根。仍非該植物之根。依然習用從前之蜀葵根。初不計藥局方之准與否也。所以然者。因亞爾答亞根。在日本甚不易得。曾取黃蜀葵根爲藥學之實習。以時日匆促。研究尙有缺漏之處。惟所得成績。有足述者。黃蜀葵屬錦葵科植物。含有黏液質極多。水浸其根片時。便成黏漿。從前日本美濃。駿河等處。向用爲製紙之原料。考黃蜀葵初生葉祇有三尖。漸長始有五尖。至梢缺刻極深。似大麻葉。柄底有如針之托葉。至秋。每梢頭之葉腋。必開花一朶。夢重複如蜀葵花五瓣淡黃。爪呈深紫色。似草棉花而大。被覆柱筒狀子室之上。頭爲暗紅之五珠雄蕊滿布其體。莖與葉柄俱帶毛。後結角果。如桐子。長寸許。爲鈍五稜。亦有毛。中分五室。藏多數種子。形似茜麻子。色褐。頗肖蘇頭。此草有大小二種。小者高二三尺。大者六七尺。形狀相似。惟大者葉之缺刻更深。儼如五指中分。小者根之黏液較多。製紙專用此種。大者僅賞其花而已。又黃蜀葵根爲長圓錐形。旁生細小之分枝。乾則外面現汚灰色。有縱紋。質柔韌。不易破折。曾將其根行解剖學之檢查。與亞爾答亞根相較。先取此根浸六十%之稀酒精。經兩星期後。視其橫斷面。則見其構造。與亞爾答亞根大略相同。全面幾皆呈白色。僅新生組織褐色。皮部約占長徑五分之一。至十分之一。有纖細之白色髓線。於木質部爲放線狀而貫徹。後以單顯微鏡檢視皮部。則見其纖維束。排列若輪圈。內皮纖維爲長枹束。至木質部之髓線。則顯然可見也。再以顯微鏡檢視其橫斷面。見其皮部。與木質部之構造。亦與亞爾答亞根無異。處處有黏液細胞。以水溼之。立卽膨脹。分外顯明。此黏液細胞中。實含有代表生藥功用之黏液。又曾取此黏液。檢查其化學之本性。法先以黃蜀葵根洗淨。候乾。搗碎。入廣闊之玻璃瓶。約加蒸餾水十倍。未幾卽見膨脹。漸因黏液質分泌而成黏漿。一宿後。再視之。全液變爲濃稠。卽用力搖之。亦不易動。乃用粗布絞搾。除淨汚物。遂得透明帶白色之黏液。於此欲分取純粹之黏液質。須多加酒精。而取其沈澱之黏液分。再反覆加濃酒精。搓捏洗淨。置生石灰上乾之。則得灰白色之黏液。此灰白色之黏液。加硝酸而溫之。俄卽發生紅褐色之氣體。約三四時。幾全溶解。止餘灰白色之絮狀物質而已。迨紅褐色之氣體。發生終止。仍煮沸片刻。濾過放置。俟冷。便可析出巨大之針狀結晶。與細小之白色結晶性粉末。於此一面分取。一面使再三結晶。最後檢視該結晶之本質。大都不外蓚酸。其蓚酸而發生之白粉物質。檢其熔點等。純然爲黏液酸。據此性質考之。是該黏液乃眞正黏液。與亞爾答亞根所含者無異。亞爾答亞根之功效。在於黏液。則黃蜀葵根可以代用。決然無疑。且黃蜀葵日本隨在皆有。其黏液既多。是功效益可信其確實也。

近人學說　張山雷曰。蜀葵雖大於葵。而氣味甘寒。性亦滑利。與葵不異。其苗則孫思邈稱其除客熱。利腸胃。藏器謂治丹石發熱。熱毒下痢。日華謂搗塗火傷。瀕湖謂滑竅治淋。潤燥易產。其花則別錄謂理心氣。不足潔古謂治帶下。赤者主赤帶。白者主白帶。赤治血燥。白治氣燥。皆取其寒滑潤利也。瀕湖謂和血潤燥。利大小腸。其子則

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

日華謂主淋瀝。通小腸。催生。墮胎。療水腫。治瘡疥。皆以寒滑見長。惟宜於燥熱之證而虛者忌之。

配合應用　㊀治小便淋痛。葵花根洗剉。水煎五七沸。服之如神。（衛生寶鑑方）

㊁治小便血淋。葵花根二錢。車前子一錢。水煮。日服之。（簡便單方）

㊂治小便尿血。葵莖。無灰酒服方寸匕。日三。（千金方）

㊃治腸胃生癰。懷忠丹。治內癰有敗血。腥穢殊甚。臍腹冷痛。用此排膿下血。單葉紅蜀葵根。白芷各一兩。白枯礬。白芍藥各五錢。爲末。黃蠟溶化和丸。梧子大。每空心米飲下二十丸。待膿血出盡。服十宣散補之。（坦仙普效方）

㊄治諸瘡腫痛。不可忍者。葵花根去黑皮。搗爛。入井華水調稠貼之。（普濟方）

㊅治小兒吻瘡。經年欲腐。葵根燒研傅之。（聖惠方）

㊆治小兒口瘡。赤葵莖炙乾爲末。蜜和含之。（聖惠方）

用量　一錢至三錢。

參攷資料　㊀蜀葵四時紅色單葉者。根陰乾。治帶下、排膿血、惡物極驗也。（蕉宗奭）㊁蜀葵苗不可久食。鈍人志性。若被狗齧者。食之永不瘥也。（孫思邈）㊂蜀葵苗合猪肉食。令人無顏色。（李廷飛）㊃爾雅云。菺。音堅。戎葵也。郭璞注云。今蜀葵也。葉似葵。花如木槿花。戎蜀其所自來。因以名之。（陳藏器）㊄蜀葵處處人家植之。春初種子。冬月宿根亦自生。苗嫩時亦可茹食。葉似葵菜而大。亦似絲瓜葉。有岐叉。過小滿後長莖高五六尺。花似木槿而大。有深紅淺紅紫黑白色。單葉千葉之異。昔人謂其疎莖密葉。翠萼豔花。金粉檀心者。顏善狀之。惟紅白二色入藥。其實大如指頭。皮薄而扁。內仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁。輕虛易種。其楷剝皮可緝。布作繩。一種小者名錦葵。卽荊葵也。爾雅謂之菺。音喬。其花大如五銖錢。粉紅色。有紫繢文。掌禹錫補注本草。謂此卽戎葵非矣。然功用亦相似。（李時珍）㊅五月花開。莖高數尺。花有淡紅、鮮紅、黑白各色。又有單瓣、千瓣之別。堪供玩賞。鮮紅者最佳。皆自宿根發生。蒔子者二年開花。以其莖水浸二日。剝離其皮。可製爲繩。亦可織布。枯莖作薪。耐火力。雖成灰。久不熄。見酉陽雜俎。（太和本草）㊆日本藥局方所收之亞爾答亞根。卽係採用日本產之蜀葵製之。蜀葵根一名亞爾答亞根。爲大如手指之長根。其帶灰黃色之枹層已剝去之。外面帶粉白色。內皮層爲長纖維性。其橫斷面之皮部。白色稍厚。木心部作放線狀。味淡泊而黏滑。（和漢藥考）

【蜀葵子】

性質　甘。冷。無毒。

主治　淋瀝。通小腸。催生落胎。療水腫。治一切瘡疥。并癰疽赤腫。

配合應用　㊀治大小便閉不通者。用白花胡葵子爲末。麥濃汁服之。（千金方）

㊁治石淋破血。五月五日收葵子。炒研。食前溫酒下一錢。當下石出。（聖惠方）

㊂治癰腫無頭。蜀葵子爲末。水調傅之。（經驗後方）

參攷資料　按楊士瀛直指方云。蜀葵子炒入宣毒藥中最驗。又催生方用子二錢。滑石三錢爲末。順流水服五錢。卽下。（李時珍）

【蜀葵花】

原名　吳葵華。

性質　鹹。寒。無毒。

主治　理心氣不足。

歷代記述攷證　【宋】嘉祐圖經本草論蜀葵花曰。小兒風癎。咳嗽【明】李時珍本草綱目論蜀葵花曰。治帶下。目中溜火。和血潤燥。通竅。利大小腸。

【蜀葵根】

外國名稱　Radix Althæ（拉丁）

採取　以紅花單葉者。陰乾用。

主治　利小便。治淋痛。祛客熱。酒服止尿血。婦人帶下惡物。排膿血。

【蜀葵莖】

性質　甘。微寒。無毒。

主治　作蔬茹。潤燥滑竅。麥食。除客熱。利腸胃。治丹石發熱。酒服止熱毒下痢。淋疾尿血。搗塗口瘡火瘡。

參攷資料　蜀葵莖能鈍人性志。不可久食。狗咬者食之。永不瘥。合豬肉食。令人無顏色。（綱目）

【蜀漆】

卽常山之原名。今以蜀漆

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之根名常山。而處方多用常山。少用蜀漆。其功力效能。蓋相同也。詳『常山』條。

【蜀酸棗】卽山棗黃之古籍別名。典見本經。詳『山棗黃』條。

【蜀隨子】卽續隨子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『續隨子』條。

【蜂白臘】卽白蠟之處方用名。詳『白蠟』條。

【蜂衣仙子】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【蜂房】卽露蜂房之處方用名。詳『露蜂房』條。

【蜂虎】古籍別名　蜜虎。古路哥。喝唭哥。(綱目拾遺)

產地　山東多有之。

形態　蜂虎爲卵生類之一種。似蜂而大。首尖身圓。狀如橄欖形。有兩翼。亦如蜂翅。遍身生毛。花斑色。尾有短毫。鋪張如鵝尾。鼻上有鬚二根。喜入花心中。以鬚鉤取花蜜而出。其鬚能伸縮屈曲如象鼻。然以捲物而喜入鳳仙花叢中。散子於葉背。日久生小灰色蟲。如青蠅。體上有黑白斑暈。食其花葉長大。及老。則下根底。變爲蛹。頭粗尾尖。如海螵狀。作老黃色。久則蛹出爲蛾。卽成蜜虎。如此循環。生生不已。可供藥用。

採取　以雄者入藥用。

製法　捕得。裝入布袋。掛簷下陰乾。瓦上火焙。去其周身絨毛。翦去頭足翅尾。再以火焙爲末。喉症加冰片少許。合研用。

主治　咽喉腫痛。單雙喉蛾吹之。心腹痛。焙酒服一二枚卽止。

參攷資料　蜂虎有雌雄。雄者身瘦小。雌者腹大。入藥用雄者。以線穿陰乾。可合房術藥用。山東極多。能食蜂。養蜂家最忌之。其蟲口中有黑絲。常捲若入蜂窩。卽吐直其絲以刺蜂。蜂卽斃。然後食之。蓋蜂針在尾。而此蟲之針在首。想亦有毒。故蜂爲所刺。無不立斃。其蟲於初秋散子在豆莢中。則爲豆蟲。如青蠖狀。食豆在黍穗上。則爲朝天猴。如刺蛾狀。後黍葉自下食而上。最爲莊田之患。然可食。莊人候日未出時。此蟲着露體重翅輕。不能飛。易於撲取。人捕得。去其翅翦置瓦罐內。令其自相撲斷。其體上細毛自落。然後以油鹽椒薑炒食之。味膠甘。蛹。但其體上毛不可着人眼。着眼卽目損。(綱目拾遺)

【蜂勃】卽露蜂房之古籍別名。典見別錄。詳『露蜂房』條。

【蜂家】卽露蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳『露蜂房』條。

【蜂腸】卽露蜂房之古籍別名。典見本經。詳『露蜂房』條。

【蜂巢】卽露蜂房之處方用名。詳『露蜂房』條。

【蜂蜜】**原名**　石蜜。

命名　蜜以密成。故名。本經名石蜜。蓋謂生於巖石者良也。

處方用名　蜜糖。黃蜜。白蜜。生蜜。煉蜜。

古籍別名　石飴。(本經)巖蜜。赤蜜。崖蜂。(綱目)蜂糖。卉釀。食蜜。百花蘗。百花精。衆口芝。(和漢藥考)

外國名稱　Mel(拉) Honey(英) Honig(德)

基本　屬膜翅類蜜蜂之勞動蜂。(職蜂工蜂)吸收花之糖質。後由一種嘔吐作用。釀貯於蜜巢者。

產地　陳仁山藥物生產辨云。

蜜糖。以產廣東增城爲第一。瓊州嘉積爲第二。俱運往江門沽。東莞、新安、惠州爲第三。南寧百色爲第四。其次則廣西桂林、江口。廣東北江、連州、樂昌、西山、下四府。瓊州、海口等。均有出。南寧百色蜜。前二三十年來者甚佳。但前十五年至今所到者。無一不混雜。有其名。無其實。

形態　蜜之純良品爲淡黃色。濃稠液體。經時稍久。則成顆粒狀。有清香及甘味。比重一・四二五至一・四三四。溶於水及稀酒精。

種類　㈠生蜜。卽白蜜。乃割取蜂房受爐火或日光之熱。自然溶解滴下之蜜液。㈡熟蜜。卽黃蜜。乃雜取新舊之房。同碎入鍋。加水溫煮。盛袋榨出之蜜液。㈢採自高山大樹之自然空穴。或大石間。曾經數年之蜂巢者。謂之山蜜。石蜜。岩蜜。爲上。㈣採於人家或野外置箱或桶等養蜂釀成者。謂之飼蜜。或家蜜。爲次。

採取　春夏秋三季間採之。尤以春季爲佳。以春時適其去舊營造新巢之際。貯蜜較他時爲多。故

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。其在毒草近側之蜂房。不宜採取。恐其蜜含有毒質耳。

製法　雷敩曰。凡煉蜜一觔。只得十二兩半。是數若太少太過。並用不得。李時珍曰。凡煉砂蜜每兩入水四兩。銀石器內以桑柴火慢煉。掠去浮沫。至滴水成珠不散。乃用。謂之水火煉法。又法以器盛置湼湯中煮一日。候滴水不散取用亦佳。且不傷火也。

用法　水煎或水化。或浸藥外傅。或和藥爲丸。

性質　甘。平。無毒。

成分　蜂蜜之主成分爲糖類。其他有含淡物花粉及水氣等。

效能　補中益氣。潤燥滑腸。有鎮咳通便之效。用於泌尿器病。喘息。慢性氣管枝加答兒等。其他用作丸劑佐藥及調味藥。

主治　心腹邪氣。諸驚癇痙。安五臟。諸不足。益氣補中。養脾氣。除心煩。飲食不下。止腸澼。肌中疼痛。口瘡。明耳目。止痛。解毒。除衆病。和百藥。久服強志輕身。不饑不老。延年神仙。

張仲景之試驗　石蜜一味。經張仲景之實驗。認爲『主治結毒急痛。兼助諸藥之毒』。茲考徵如下。㈠大烏頭煎證曰。寒疝繞臍痛。㈡烏頭湯證曰。歷節不可屈伸疼痛。又曰。脚氣疼痛不可屈伸。又曰。寒疝。腹中絞痛。㈢烏頭桂枝湯證曰。寒疝腹中痛。（以上三方。蜜各二升）㈣大陷胸丸證曰。結胸。項亦强。（上方白蜜二合）㈤大半夏湯證曰。嘔。心下痞鞕。（上方白蜜一升）㈥甘草粉蜜湯證曰。心痛。（上方蜜四兩）㈦下瘀血湯證曰。產婦腹痛。（上方蜜和爲丸。酒煎。又與諸藥等分之例）㈧甘遂半夏湯證不具。（上方蜜半升）據上諸方。則蜜能治諸結毒急迫疼痛明矣。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論蜂蜜曰。牙齒疳蝕。口瘡。目膚赤障。殺蟲。【唐】甄權藥性本草論蜂蜜曰。治卒心痛。及赤白痢。水作蜜漿。頓服一椀。止或以薑汁同蜜各一合。水和頓服。常服面如紅花。【唐】孟詵食療本草論蜂蜜曰。治心腹血刺痛及赤白痢。同生地黃汁各一匙。服卽下。【宋】寇宗奭本草衍義論蜂蜜曰。同雄白搗塗湯火傷。卽時痛止。【明】李時珍本草綱目論蜂蜜曰。和營衛。潤臟腑。通三焦。調脾胃。【明】繆希雍本草經疏論蜂蜜曰。石蜜蜂採百花釀成。故本經味甘氣平。別錄微溫無毒。得草木之精華。合露氣以釀成。故其氣清和。其味純甘。施之精神氣血。虛實寒熱。陰陽內外諸病。罔不相宜。經曰。寒不足者。以甘補之。石蜜具天地間至甘之味。故能安五臟諸不足。益氣補中除衆病也。心經有熱則爲諸驚癇痙。得甘緩之氣。則心火降。煩熱除。諸驚癇痙。平矣。諸痛瘡瘡瘍瘍。皆屬心火。故又能止肌中疼痛及口瘡也。甘主解毒。故能和百藥。甘主入脾。故能養脾氣。脾氣得所養而飲食自下。腸澼止矣。五臟足。氣血充。則耳目聰明。不飢不老。輕身强志。延年神仙所自來矣。【明】李士材本草圖解論蜂蜜曰。蜂蜜甘平。和營衛。潤臟腑。通三焦。理脾胃。解諸毒。和百藥。導便結。生能清熱。熟則補中。凡煉蜜一觔。入水四兩。銀石器內慢火煎。掠去浮沫。至滴水不散爲度。【清】黃宮繡本草求眞論蜂蜜曰。蜜本花木精英。春生露氣噓得釀而成。生則性涼清熱。熟則性溫補中。爲至純粹之味。凡人五臟不足。燥結不解。營衛不調。三焦失職。心腹急痛。肌肉瘡瘍。咳嗽熱痢。眼目眩花。形色枯槁。無不借其潤色以投。如仲景治陽明燥結。大便不解。用蜜煎導。取其能通結燥。而不傷脾胃也。滋補藥俱用白蜜爲丸。取其和胃潤肺也。至於赤蜜。食之使人心煩。以其味酸。故惟降火藥用之。白蜜雖補脾肺。然性涼質潤。若脾氣不實。腎氣虛滑。及濕熱痰滯胸痞不寬者。咸須忌之。白如清者良。用銀石器。每蜜一斤。入水四兩。桑火慢熬。掠去浮沫。至滴水成珠用。忌煮鮓萵苣同食。

國外學說　英美學說謂蜂蜜產中國西國等處。係蜜蜂在其窩內所釀之糖質。此糖質先成於花心內。蜜蜂食之。入其肫內。則改變其形性。吐出於蜂房之內。蜂房內自行流出之蜜。則爲極細之蜂蜜。如其蜜蜂窩中尚未分窠。則所得之蜂蜜謂之清蜜。上等之蜂蜜食

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之令人喉中不安。似覺少有粹味。存若干時則蜂蜜變濃而成白色顆粒。至下等之蜂蜜其內有顆粒與雜質。尋常之取蜜法。則由壓蜂房而得之。故蜂蜜以自房中取出者爲佳。中國藥肆中所出售之蜂蜜。蜜中恒見有死蜂。甚污。不可入藥用。蜂蜜之上等者。爲黏性透明之流質。其嗅香而奇。味甜而美。下等則係棕紅色。其作用爲潤內皮。藥微利藥。如小兒便祕。服之最宜。多食令人肚疼。宜佐他藥和服。治咳嗽。藥亦有效。外用能敷惡瘡。漱咽喉等。處方。以蜂蜜四錢。硼砂五分。末。調勻。搽小兒口瘡。（硼砂蜜方）又用蜂蜜與甘草末。微火煎凝。捻作銳端長圓丸。藥納入肛門。導引屎出。尤佳。（蜂蜜甘草方）又日本和漢藥考曰。日本香川德島。鹿兒島。宮崎。和歌山。沖繩等諸縣產此。養蜂在日本爲農家副業。法。倘幼稚。故所獲蜂蜜不多。品質亦劣。養蜂者及業業者。欲加以研究。可參閱日農商務省農事試驗所出版第五次內國勸業博覽會出品說明書蜜蜂。及藥學雜誌第二百六十九號。佐藤捨次郎氏之蜂蜜及黃蠟談。對於養蜂法。蜂蜜收集法等。可閱東京博物館出版敎草第二十四蜂蜜一覽。及玉利農學博士所著養蜂改良說等。又曰。取蜂蜜宜於春夏及秋季。春季蜂力最旺。爲去舊巢營新巢之時。貯蜜尤多。故收取以此季最佳。日本採收蜂蜜法。卽切取蜂房三分之二。入篩或籃置桶上。於爐邊或日光下熱之。則蜜液滴下。日本謂之一番。卽漢名生蜜。（白蜜）次將巢房盛於布囊搾之。謂之二番。雜有蜂仔等。其質甚劣。又有不論蜂房新陳。同碎入鍋。加水少許溫之。入布袋搾出。漢名熟蜜。（黃蜜）搾出後之糟滓。可製黃蠟。又精製蜂蜜法。將蜂蜜入磁皿蓋之。靜置寒暖適中處三四日。間將表面所生泡沫掬出數次。至已完全不發泡沫而後已。又法。於蜂蜜加水四分之一。至六分之一。入雞子白攪拌。用文火熱之。掬去上面發出泡沫。投下雞卵至上浮稠度。乃用毛篩濾過。卽成精品。又曰。蜂蜜用於火傷有效例。有六歲小孩。嘗誤將其兩手置竈火中。其老祖母尙壯健。立抱之奔廚下。擬將兩手傷處置之水中。時適他室有盛新製蜂蜜之甕。因小孩痛楚異常。無法可施。卽將其兩手。插置甕中。痛楚頓解。翌日復插置蜜中。及第三日。已告全愈。創處並無損傷。亦全不起水泡。（日本安政七年刊行宇田川興齋譯萬寶新書）又第三版改正日本藥局方云。精製蜂蜜。係取蜂蜜二分。加蒸餾水三分。於重湯煎上溫一時間。俟其冷至約五十度。用綴密絨布濾過。復急於重湯煎上熬發。使成比重一・二三而止。（第四版改正日本藥局方云。加白陶土精製）本品有良快香氣。又第四版改正日本藥局方曰。蜂蜜概無色。或作淡黃色。或帶褐黃色。新鮮時爲透映黏稠液。味甘美。經久漸析出顆粒。本品微呈酸性反應。於顯微鏡下檢視。可見糖晶及花粉等質。又東洞益吉曰。仲景甘草粉蜜湯證曰。毒不止。千金翼方。毒藥作藥毒爲是。此方本主緩結毒急痛。故兼治一切藥毒不止煩悶者。路世見之。以爲蜜能解百藥毒。蜜若解百藥毒。則仲景之方。何其用蜜之多乎。夫蜜之於諸藥也。能助其毒。又於其病毒也。能緩其急。猶粳米與小麥乎。甘草及粉。亦其功大抵相似。故如此方則爲緩其急用之。凡蜜之爲物。同諸藥用之。則能助其毒。今同甘草及粉用之。則又能緩其急痛也。煩悶。豈非藥毒之急乎。又所以兼治蚘蟲心痛也。柯又按。所謂藥毒者。非攻病毒毒藥之藥毒。而必是害人毒藥之藥毒矣。故曰藥毒不止煩悶者。所謂煩悶者。非攻病毒毒藥之煩悶而害人藥毒之煩悶也。有止攻病毒毒藥之煩悶者。非疾醫之義矣。煩悶。是毒藥之瞑眩也。豈其止之可乎。余故曰。此藥毒者。非攻病毒毒藥之藥毒矣。由此觀之。則蜜之功可以知矣。（害人毒藥者。蓋非醫人誤治之毒藥）

配合應用　㊀治大便不通。陽明病自汗。小便反利。大便硬者。津液內竭也。蜜煎導之。用蜜二合。銅器中微火煎之。候凝如飴狀。至可丸。乘熱捻作挺。令頭銳。大如指。長寸半許。候冷卽硬。納便道中。少頃

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

卽通也。一法加皂角細辛爲末少許。尤速。（傷寒論方）

㈡治噫不下食。取崖蜜含微微嚥下。（廣利方）

㈢治產後口渴。用煉過蜜不計多少。熟水調服卽止。（產書方）

㈣治難產橫生。蜂蜜眞麻油各半椀。煎減半服立下。（海上方）

㈤治天行瘡瘡。比歲有病天行斑瘡。頭面及身須臾周匝。狀如火瘡。皆戴白漿。隨決隨生。不卽療數日必死。差後瘡癥黯色。一歲方滅。此惡毒之氣。世人云。建武中南陽擊虜所得。仍呼爲虜瘡。諸醫參詳療之。取好蜜通摩瘡上。以蜜煎升麻數數拭之。（肘後方）

㈥治痘疹作癢難忍。抓成瘡及疱。欲落不落。百花膏用上等石蜜不拘多少。湯和。時時以翎刷之。其瘡易落。自無癍痕。（全幼心鑑方）

㈦治癩瘡瘙痒。白蜜不拘多少。好酒調下有效。

㈧治五色丹毒。蜜和乾薑末傅之。（肘後方）

㈨治口中生瘡。蜜浸大青乘含之。（藥性論方）

㈩治陰頭生瘡。以蜜煎甘草塗之。（外臺祕要方）

⑪治肛門生瘡。肛門主肺。肺熱卽肛塞腫縮生瘡。白蜜一斤。猪膽汁一枚。相和。微火煎令可丸。丸三寸長。作挺。塗油納下部。臥令後重。須臾通泄。（梅師方）

⑫熱油燒痛。以白蜜塗之。（梅師方）

⑬治疔腫惡毒。用生蜜與隔年葱研膏。先刺破塗之。如人行五里許。則疔出。後以熱醋湯洗去。（濟急仙方）

⑭面上黑點。取白蜜和茯苓末塗之。七日便瘥也。（孫眞人食忌方）

⑮治目生珠管。以生蜜塗目仰臥半日。乃可洗之。日一次。（肘後方）

⑯治誤吞銅錢。煉蜜服二升。可出矣。（葛氏方）

⑰治諸魚骨鯁。以好蜜稍稍服之。令下。（葛氏方）

⑱治年少髮白。拔去白髮。以白蜜塗毛孔中。卽生黑髮。不生取梧桐子搗汁塗上。必生黑者。（蔡師方）

用量　三錢至一兩。

施用宜忌　凡脾寒便瀉及有溼邪中滿者禁用。與生葱蒿苣同食則下痢。與鮓同食則暴死。

參攷資料　㈠蜂蜜入藥之功有五。清熱也。補中也。解毒也。潤燥也。止痛也。生則性涼。故能清熱。熟則性溫。故能補中。甘而和平。故能解毒。柔而濡澤。故能潤燥。緩可以去急。故能止心腹肌肉瘡瘍之痛。和可以致中。故能調和百藥而與甘草同功。張仲景治陽明結燥。大便不通。蜜煎導法。誠千古神方也。（李時珍）㈡但凡覺有熱。四肢不和。卽服蜜漿一椀。甚良。又點目中熱膜。以家養白蜜爲上。木蜜次之。崖蜜更次之也。與薑汁熬煉治癩甚效。（孟詵）㈢諸蜜氣味。當以花爲主。冬夏爲上。秋次之。春則易變而酸。閩廣蜜極熱。以南方少霜雪。諸花多熱也。川蜜溫。西蜜則涼矣。（王穎）㈣蜜喜入脾。西北高燥。故人食之有益。東南卑溼。多食則害生於脾也。（朱震亨）

【蜂糖】卽蜂蜜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜂蜜』條。

【蜂蠟】卽黃蠟之處方用名。詳『黃蠟』條。

【蜃】卽車螯肉之古籍別名。典見綱目。詳『車螯肉』條。

【蜆】

命名　蜆。晛也。本品殼內光耀如日初出。故名。

古籍別名　扁螺（綱目）金口蜆。

外國名詞　Corbicula leana Prime 或 Cyelina orientalis（拉丁）シジミ或マシジ（日本）

基本　係軟體動物瓣鰓類有管類全緣類蜆科之蜆。

產地　出溪湖中淡水間。



蜆

形態　蜆爲介類蚌蛤屬之一種。殼形略似心臟。右左兩殼同形。殼外有同心之輪紋約三十層。表皮暗褐。稍帶黃。殼內肉紫白色。殼頂膨起。色黑。但多脫去。表皮露出石灰質。鉸合部有主齒三。外靱帶堅強。殼緣呈鋸齒狀。外套膜厚。其

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痕稍彎曲。大者一寸。殼高六七分。其肉可供食與藥用。

性質　甘鹹。冷。無毒。

主治　治時氣。開胃。壓丹石藥毒。及疔瘡。下瀝氣。通乳。糟煮食良。生浸取汁。洗疔瘡。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論蜆肉曰。去暴熱。明目。利小便。下熱氣。脚氣。瀝毒。解酒毒目黃。浸汁服。治消渴。【明】李時珍本草綱目論蜆肉曰。生蜆浸水。洗痘瘡。無癍痕。

參攷資料　蜆肉微毒。多食發嗽。及冷氣消腎。(陳藏器)

【蜆蛤】　**命名**　本品爲蜆肉之乾者。故名。

主治　解蠱毒。療水土不服。

【蜆爛殼】　**性質**　鹹。溫。無毒。

主治　止痢。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論蜆爛殼曰。治陰瘡。【唐】陳藏器本草拾遺論蜆爛殼曰。燒灰飲服。治反胃吐食。除心胸痰水。【宋】日華諸家本草論蜆爛殼曰。療失精反胃。【明】李時珍本草綱目論蜆爛殼曰。化痰止嘔。治吞酸心痛。及暴嗽。燒灰塗一切瀝瘡。與蚌粉同功。


【蜈蚣】　**古籍別名**　蔈蠭。蝑蚰。(爾雅)天龍。(綱目)百足蟲。百脚。(俗名)

外國名詞　Scolopendra(拉丁) Centipede (英)

基本　屬節足動物多足類中之蜈蚣。

產地　陳仁山藥物生產辨云。蜈蚣產湖北武昌。洪山。宜昌等處。春季出新。傳聞將鵝毛瀝透。於地上掘一大穴。放鵝毛於穴中。瀝蓆蓋之。久而久之。則產生此種蜈蚣矣。

形態　蜈蚣爲外觀厭惡之蟲類。春日徘徊各處。覓食動物性之食物。冬則蟄伏軀體扁平。細長。全長五六寸。頭及下面爲黃褐色。背作嗜綠色。全身有多數環節。每一環節生脚一對。末端如鉤。脚凡十五至二十對。呼吸口開於環節之兩旁。與氣管相通。此蟲卵生。幼時與母蟲異。初孵化時。纔六環節。後每蛻化一次。其環節與脚。皆增多一次。頭部具單眼數個。并鞭狀觸角一對。口有上顎。下顎。顎脚。顎脚乃第一環節之變形物。其尖端具毒腺。便於嚙刺。人若被其螫傷。即起劇甚之疼痛。



蜈蚣

採取　七月八月間採捕。黑頭赤足者良。

製法　雷敩曰。凡使蜈蚣。勿用千足蟲。眞相似。只是頭上有白肉面。并嘴尖。若誤用。併把著腥臭氣入頂。能致死也。凡治蜈蚣。先以蜈蚣本末。或柳蛙末。於土器中炒令木末焦黑。去木末。以竹刀刮去足甲用。李時珍曰。蜈蚣本不知是何物也。今人惟以火炙去頭足用。或去尾足。以薄荷葉火煨用之。

用法　恒以焙剉和作外治藥。間有和入內服藥。

性質　辛。溫。有毒。

效能　祛風。治驚癇。解毒療瘡傷。用治小兒撮口驚風藥。

主治　鬼疰。蠱毒。噉諸蛇蟲魚毒。殺鬼物老精。溫瘧。去三蟲。(本經)療心腹寒熱積聚。墮胎。去惡血。(別錄)

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論蜈蚣曰。治癇癖。【明】李時珍本草綱目論蜈蚣曰。小兒驚癇風搐。臍風口噤。丹毒。禿瘡。瘰癧。便毒。痔漏。蛇寢。蛇瘴。蛇傷。【明】繆希雍本草經疏論蜈蚣曰。蜈蚣味辛。氣溫有毒。乃屬陽之毒蟲。足厥陰經藥也。善能制蛇。見大蛇便緣上噉其腦。淮南子云。騰蛇游霧而殆於蝍蛆。正指此也。故本經主噉諸蛇蟲魚毒。及去三蟲蠱毒也。性復走竄。辟邪所以能療鬼疰溫瘧。殺鬼物老精。辛主散結。溫主通行。故又治心腹寒熱結聚。墮胎去惡血也。今世又以之治小兒驚癇風搐。臍風口噤。與夫瘰癧便毒痔漏等證。皆用之。【清】黃宮繡本草求眞。論蜈蚣曰。蜈蚣本屬毒物。性善噉蛇。故治蛇瘧毒者。無越是物。且其性善走竄。故瘟疫鬼怪。得此則療。又其味辛。辛則能以散風。故凡小兒驚癇風搐。臍風噤口。得此入肝。則治。又其性溫。溫則能以療結

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

故凡瘀血墮胎。心腹寒熱結聚。得此則祛。至於瘰癧便毒等症。書載能以調治。亦是以毒攻毒之意耳。赤足黑頭者佳。火煅用。畏蜘蛛蜒蚰。

辨僞　㊀鄭肯巖曰。蜈蚣以蘇州產者爲良。閒蘇人採取生草堆積腐爛。日久便生爆乾外貨。背光脊綠。足赤腹黃。此易辨物也。舍蘇蚣均不可用。市肆有以本地所產混售。閒有一種千足蟲。一名馬陸。形最相似。若誤用之。并把着腥臭氣入頂。皆能毒發致死。不可不愼。㊁曹炳章曰。按蜈蚣江蘇蘇州洞庭山出者多。頭紅身黑有光。大者最佳。常州吳江縣鎮山出者少。頭紅身黃色略次。四川出者。頭黃褐色。身黑褐色。小多力薄亦次。浙江餘姚縣出者。頭亦紅。身黑褐色。略次。大抵用者須擇長大頭尾全。全身黑而有光者爲道地。項元鱗曰。近時有一種千足蟲。其形相似。惟頭上有白肉嘴尖者最毒。不宜作蜈蚣用。

近人學說　張山雷曰。蜈蚣亦是毒蟲。而能治幼科驚癎。臍風抽搐者。瀕湖謂善行而迅疾者。惟風與蛇而蜈蚣乃能制蛇。則亦能定風。足厥陰經藥也。入煎藥不過一二分而止。究是毒物。不可率用。亦作外治末藥。則炒炙研之。皆無頭足。卽其毒之所在處也。

配合應用　㊀金頭蜈蚣。得牛角鰓、象牙末、猪懸蹄刺、蜈皮、蛀竹屑。能去通腸漏管。

㊁治瘭瘡。一名蛇瘴。欝烟瘴雨之鄉。多毒蛇。氣人有不伏水土風氣而感觸之者。數月以還。必發蛇瘴。惟赤足蜈蚣最能伏蛇。爲上藥。白芷次之。（直指方）

㊂治嶺南外蛇瘴。一名瘴喉瘴。項大腫痛。連喉。用赤足蜈蚣一二節。研細。水下卽愈。（聖濟總錄方）

㊃治初生小兒口噤不開。不能乳者。用赤足蜈蚣去足炙研末。以猪乳二合調半錢。分三四服。溫灌之效。（圖經方）

㊄治小兒撮口。但看舌上有瘡如粟米大是也。以蜈蚣汁、刮破指甲研傅。兩頭肉卽愈。如無生者。乾者亦可。（子母祕錄方）

㊅萬金散。治小兒急驚。蜈蚣一條。全者去足。炙爲末。丹砂、輕粉等分研勻。陰陽乳汁和丸。菉豆大。每歲一丸。乳汁下。（聖惠方）

㊆治天弔驚風。月久不下。眼見白睛。及角弓反張。聲不出者。雙金散主之。用大蜈蚣一條。去頭足。酥炙。用竹刀批開。記定左右。又以射香一錢。亦分左右。各記明。研末包定。每用左邊者吹左鼻。右邊者吹右鼻。各少許。不可過多。若眼未下再吹。些須眼下乃止。（直指方）

㊇治破傷中風欲死。用蜈蚣研末擦牙。追去瘡沫立瘥。（聖惠方）又用蜈蚣頭、烏頭尖、附子底、焰消等分爲末。每用一字或半字。熱酒灌之。仍貼瘡上。取汗愈。（儒門事親方）

㊈治口眼㖞斜。口內麻木者。用蜈蚣三條。一蜜炙。一酒浸。一紙裹煨。並去頭足。天南星一箇。切作四片。一蜜炙。一酒浸。一紙裹煨。一生用。半夏、白芷各五錢。通爲末。入麝香少許。每服一錢。熱調下。日一服。（通變要法方）

㊉治腹內蛇癥。誤食菜中蛇精。成蛇瘕。或食蛇肉成瘕。腹內常饑。食物卽吐。以赤足蜈蚣一條。炙研末。酒服。（衞生易簡方）

㊀治蟆蛇鰲傷。蜈蚣燒末傅之。

㊁治射工毒瘡。大蜈蚣一枚。炙研和醋傅之。（千金方）

㊂治天蛇頭瘡。生手指頭上。用蜈蚣一條。燒烟熏。一二次卽愈。或爲末。猪膽汁調塗之。（奇效方）

㊃治丹毒瘤腫。用蜈蚣一條。白礬一皂子大。搥丸一箇。百部二錢。研末調醋傅之。（本草衍義方）

㊄治瘰癧潰瘡。茶、蜈蚣二味。炙至香熟。搗篩爲末。先以甘草湯洗淨。傅之。（枕中方）

㊅治聤耳出膿。用蜈蚣末吹之。（鮑方氏）

㊆治小兒禿瘡。大蜈蚣一條。鹽一分。入油內浸七日。取油搽之。極效。（海上方）

㊇治便毒初起。黃腳蜈蚣一條。瓦焙存性爲末。酒調服。取汗卽散。（濟生祕要方）

㊈治痔瘡疼痛。用赤足蜈蚣焙爲末。入片腦少許。唾調傅之。（直指方）又用蜈蚣三四條。香油煮二二沸浸之。再入五倍子末二三

565／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

錢。餅取密封。如遇痛不可忍。點上油。卽時痛止。大效。(孫氏集效方)

㈡治腹大如箕。用蜈蚣三五條。酒炙研末。每服一錢。以雞子二箇。打開。入末在內。攪勻。紙糊沸湯煮熟。食之。日一服。連進三服。瘳。(活人心統方)

㈢治脚肚轉筋。蜈蚣燒猪脂和傅。(肘後方)

㈣治女人趾痛。甲內惡肉突出不愈。蜈蚣一條。焙研傅之。外以南星末醋和傅四圍。(醫方摘要方)

用量　一條至三條。或五分至一錢半。

施用宜忌　凡無嵐瘴實邪及孕婦病者禁用。長蛞蝓、蜘蛛、鷄屎、桑皮白鹽。

製法　以活蜈蚣浸胡麻油中。二十日後收用。通稱蜈蚣油。相傳有治愈創傷之效。故凡一切毒蟲毒獸咬傷作痛者。取塗之。立能止痛消腫。火傷亦可用之。

參攷資料　㈠蜈蚣背光黑綠色。足赤。腹黃。有被毒者。以爲雞屎或大蒜塗之。效。性畏蛞蝓。不敢過所行之路。觸其身卽死。故蛞蝓能治蜈蚣毒。(寇宗奭)　㈡蜈蚣西南處處有之。春出冬蟄。節節有足。雙鬚歧尾。性畏蜘蛛。以溺射之卽斷爛也。南方有極大者。而本草失載。按段成式酉陽雜俎云。綏定縣蜈蚣大者。能以氣吸蜥蜴。相去三四尺。骨肉自消。沈懷遠南越志云。南方晉安有山出蜈蚣大者長丈餘。能啖牛。俚人燃炬。遂得以皮鞔鼓。肉曝爲脯。美於牛肉。葛洪遐覽賦云。南方蜈蚣大者長百步。頭如車箱。肉白如瓠。越人爭買爲羹炙。張采明道雜志云。黃州岐亭有拘羅山。出大蜈蚣。麥丈尺。土人捕得熏乾。商人販入北方貨之。有致富者。蔡絛叢話云。嶠南蜈蚣大者二三尺。噬人至死。惟見託胎蟲則局縮不敢行。蟲乃登首嚼其腦而食之。故被蜈蚣傷者。搗蟲塗之。痛立止也。珍按託胎蟲卽蛞蝓也。蜈蚣能制龍蛇蜥蜴而畏蝦蟆、蛞蝓、蜘蛛。亦莊子所謂物畏其天陰符經所謂禽之制在氣也。(李時珍)

【蜈蚣草】卽神仙對坐草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『神仙對坐草』條。

【蜈蚣萍】**命名**　本品葉狀儼似蜈蚣。故名。

古籍別名　邊箕萍。麻藻萍。(綱目拾遺)

產地　多生溪澗田港止水間。

形態　蜈蚣萍爲水草類萍屬之一種。形如蕨葉。一莖細葉兩房。攢對而生。葉頗粗澁。不似萍之光澤。點點輕清。採得可供藥用。

主治　辟一切跳蚤蟲蟣。晒乾。燒烟熏之。

【蜉蝣】係蜣蜋之一種。惟略似蜣蜋而小。大如指頭。身狹而長。有角。黃黑色。甲下有翅。能飛。夏月雨後叢生糞土中。朝生暮死。性質效能。詳『蜣蜋』條。

【蜈蝣】係蟬之具五色者。性質效能。與尋常蟬同。詳『蟬』條。

【蜚】卽馬刀之古籍別名。典見爾雅。詳『馬刀』條。

【蜒蚰】卽蛞蝓之古籍別名。典見綱目。詳『蛞蝓』條。

【蜒蚰蠃】卽蝸牛之俗名。詳『蝸牛』條。

【蜊蛤石】**外國名詞**　Oculi cancrorum, Lapides cancrorum (拉丁) Crab-stone. (英)

基本　屬胸甲類之蜊蛤。胃之兩側。每歲新生二粒石灰質。卽取以入藥。

產地　和漢藥考曰。蜊蛤日本東北地方溪流中產之。北海道尤多。

形態　蜊蛤爲蟹類之一種。大一寸至三寸許。體形似蝦。八足兩螯。向後退行。其味似蝦或呼蝦蟹。胃之內面。兩側有用以咀嚼之炭酸石灰質之突起物。謂之蜊蛤石。(一說此石灰質係每歲新生皮殼之原料云。)捕時或用手。或用鐵穿畦捕之。剝去其甲。而取其體中小石。爲白色。淡青色。或微赤色之扁圓形物。大三四分。一面稍扁平。粗糙。一面尖起。作輪層狀。硬固滑澤。無氣味。不溶於水。逢酸類則沸騰溶化。遺留軟膏狀物質。

成分　爲燐酸鈣、燐酸鎂、炭酸鈣、鈉鹽類、膠質等。

效能　專作利水劑。

國外學說　遠西名物考曰。性收濇乾燥。土質而含有鹼性鹽。爲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

專消剋酷厲酸敗液之良藥。其質多含黏液。而夾石灰質土鹼性不烈。不刺戟胃故較他土質制酸藥爲佳。亦如他土質藥能閉大便。故宜兼用大黃或適宜瀉劑使之通利。是爲至要。此藥含黏液有軟化性。故用於兼有疼痛諸症尤有效。其功效不下於鉍。遏爾拔。故一切酸敗液所起之症。卽吞酸嘈囃。胸脇心腹刺痛或小兒癇瘛諸症。諸骨軟弱。佝僂病等。用之皆有奇效。利小便。發汗止下痢。稀釋黏稠。疏解凝結。服量爲末用至一錢。日服數次。加瓦老別里鹽用之。能驅諸病毒惡液。從汗與小便泄出。加入橙汁或蒸餾醋。待其沸動已止用之。善能發汗。江馬天江輯譯青囊珍珠（日本安政四年刊行）所載配合蜊蛤石之處方如下。治小兒痙攣喘急。金硫黃（自牛克冷至一克冷）菲沃斯越幾斯（自一克冷至二克冷）蜊蛤石、砂糖各半克冷。上研和。分十二包。每四分鐘或半小時服一包。肺勞有熱者宜此方。硝石等劑以促衰弱有害。

蜊蛤石二打蘭枸櫞汁加蜊蛤石飽和爲度。菩提樹花水六盎斯。甘草舍別利一盎斯。上調和。每一時服二食匕。

用量　一分至四分。

參攷資料　㈠蜊蛤石爲荷蘭藥拉丁語謂之 Oculus Cancer ㈡遠西名物考曰。日本長門之赤間關及豐前中津附近河中所產之蟹有小石。狀如薏苡仁。上凸下凹。此種蟹於七八月間脫舊殼生新殼。於其已脫殼時捕之。其兩眼之間。必有二白石。惟須窺其脫殼而體仍軟。未能行走時速取之。否則其石頃刻溶化如米泔汁。使殼硬固。此爲蜊蛤石之一種。其性質功效亦同云。㈢捕得蜊蛤。卽時剝去甲殼。取出之石帶青色。爲上品。煮過後取出者色白。爲下品云。

【蛤】卽鹿精之古籍別名。典見韓悉醫通。詳『鹿精』條。

【裏朽草】卽黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃芩』條。

【裏朽斤草】卽黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃芩』條。

【裏腐草】卽黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃芩』條。

【裙帶魚】卽帶魚之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『帶魚』條。

【補骨脂】

原名　胡人呼爲婆固脂。俗訛爲破故紙。

命名　補骨脂。言其功也。胡韭子。因其子之狀相似。非胡地之韭子也。

處方用名　破故紙。

古籍別名　破故紙（開寶）婆固脂（藥性）胡韭子（日華）天豆反古紙。破故芷。婆固紙。補骨鴟（和漢藥考）

基本　係屬荳科。爲補骨脂之種子。

產地　補骨脂生嶺南諸州及波斯國。陳仁山藥物生產辨云。產四川爲最。河南、安徽次之。架喇吉打來者又次。名洋故紙。五月新。

形態　補骨脂爲高達三四尺之草本。植物葉作橢圓形。夏秋間於葉間生穗一寸許。開淡紫色花。後結球圓形大一分許之實。成熟則外皮變爲黑色。中有黑褐色扁圓形類似麻子之種子。香氣而腥。

採取　每年九月間採。

製法　雷敩曰。凡使補骨脂。此性燥毒。須用酒浸一宿。瀝出。以東流水浸三日夜。蒸之從巳至申。日乾用。一法以鹽同炒過曝用。

性質　辛。大溫。無毒。

效能　補命門。納腎氣。用作强壯藥。

主治　五勞七傷。風虛冷。骨髓傷敗。腎冷精流及婦人血氣墮胎。

歷代記述　【唐】甄權藥性本草論補骨脂曰。男子腰疼膝冷。囊濕。逐諸冷痺頑止小便。腹中冷。【宋】大明曰。華諸家本草論補骨脂曰。興陽事。明耳目。【明】繆希雍本草經疏論補骨脂曰。補骨脂味辛。其氣大溫。性則無毒。陽中微陰。降多升少。入手厥陰心包絡。命門。足太陰脾經。能煖水臟。陰中生陽。壯火益土之要藥也。其主五勞七傷者。蓋緣勞傷之病。多起於脾腎兩虛。以其能煖水臟。補火以生土。則腎中眞陽之氣得補而上升。則能腐熟水穀。蒸糟粕而化精微。脾氣散精上歸於肺。以榮養乎五臟。故主五臟之勞七情之傷所生病。風虛冷者。因陽氣衰敗。則風冷乘虛而客之。以致骨髓傷敗。腎冷

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

精流。腎主骨而藏精。髓乃精之本。眞陽之氣不固。卽前證見矣。固其本而陽氣生。則前證自除。男子以精爲主。婦人以血爲主。婦人血氣者。亦猶男子陽衰腎冷而爲血脫氣陷之病。同乎男子之腎冷精流也。大溫而辛。火能消物。故能墮胎。【明】李時珍本草綱目論補骨脂曰。治腎泄。通命門。煖丹田。斂精神。【清】黃元御玉楸藥解論補骨脂曰。補骨脂味辛苦。氣溫。入足太陰脾。足少陰腎。手陽明大腸。經。溫脾暖腎。消水化食。治膝冷腰疼。腸滑腎泄。能安胎。澁善止遺精收小兒遺溺。丈夫痿陽。除陰囊之溼。愈關節之涼。溫暖水土。消化飲食。升達肝脾。收斂滑泄。遺精帶下。溺多。便滑諸證。甚有功效。方書稱其延年益壽。雖未必信。然要亦佳善之品也。【清】黃宮繡本草求眞論補骨脂曰。補骨脂辛苦大溫。色黑。何書皆載能斂神明。使心胞之火與命門之火相通。因而元陽堅固。骨髓充實。以其氣味溫苦。濇以止脫。故也。凡五勞七傷。因於火衰而見腰膝冷痛。腎冷流精。腎虛泄瀉。及婦人腎虛胎滑。用此最爲得宜。若認症不眞。或因氣陷氣短。而見胎墮。水衰火勝。而見精流泄瀉。妄用補骨脂止脫。則殺人慘於利器矣。

配合應用　㊀治精氣不固。用破故紙、青鹽等分。同炒爲末。每服二錢。米飲下。（三因方）

㊁治小便無度。腎氣虛寒。用破故紙十兩。酒蒸。茴香十兩。鹽炒。爲末。酒糊丸。梧子大。每服百丸。鹽酒下。或以末摻豬腎煨食之。（普濟方）

㊂治小兒遺尿。膀胱冷也。夜屬陰。故嬰便不禁。用破故紙炒爲末。每夜熱湯服五分。（嬰童百問方）

㊃補骨脂丸。治下元虛敗。脚手沈重。夜多盜汗。縱慾所致。此藥壯筋骨。益元氣。補骨脂四兩。炒香。菟絲子四兩。酒蒸。胡桃肉一兩。去皮。沈香研細一錢。牛煉蜜丸。如梧子大。每服二三十丸。空心鹽湯。溫酒任下。自夏至起。冬至止。日一服。此乃唐宣宗時張壽太尉知廣州得方。於南番人有詩云。三年時節向邊隅。人信方知藥力殊。奪得春光來在手。青娥休笑白髭鬚。（和劑局方）

㊄治虛勞。男子女人。五勞七傷。下元虛冷。一切風病。四肢疼痛。駐顏壯氣。烏髭鬚。用補骨脂一斤。酒浸一宿。曬乾。卻用烏油麻一升。和炒。令麻子聲絕。簸去。只用補骨脂爲末。醋麪糊丸。如梧子大。每服二三十丸。空心溫酒鹽湯任下。又方。治腎虛腰痛。用破故紙一兩。炒爲末。溫酒服三錢。神效。或加木香一錢。（經驗方）

㊅青娥丸。治腎氣虛弱。風冷乘之。或血氣相搏。腰痛如折。俛仰不利。或因勞役傷腎。或溼痺傷腰。或墮跌損傷。或風寒客搏。或氣滯不散。皆令腰痛。或腰間如物重墜。用破故紙酒浸。炒一斤。杜仲去皮。切片。薑汁炒一斤。胡桃肉去皮二十箇。爲末。以蒜搗膏一兩。和丸。梧子大。每空心溫酒服二十丸。婦人淡醋湯下。常服壯筋骨。活血脈。烏髭鬚。益顏色。（和劑局方）

㊆治玉莖不痿。精滑無歇。時時如鍼刺。捏之則脫。此名腎漏。用破故紙、韭子各一兩。爲末。每用三錢。水二盞。煎六分。服。日三次。愈則止。（夏子益奇疾方）

㊇二神丸。治脾腎虛瀉。用破故紙炒半斤。肉豆蔻生用四兩。爲末。肥棗研膏和丸。梧子大。每服五七十丸。空心米飲下。加木香二兩。名三神丸。（本事方）

㊈治打墜腰痛。瘀血凝滯。用破故紙炒。茴香炒。辣桂等分。爲末。每熱酒服二錢。（直指方）

㊉唐鄭相國自敘云。予爲南海節度。年七十五。粵地卑溼。傷於內外。衆疾俱作。陽氣衰絕。服乳石補藥。百端不應。元和七年。有訶陵國舶主李摩訶。知予病狀。遂傳此方。并藥。予初疑而未服。摩訶稽首固請。遂服之。經七八日而覺應驗。自爾常服。其功神效。十年二月。罷郡歸京。錄方傳之。用破故紙十兩。淨去皮。洗過曝乾。酒浸蒸。再曝。搗篩。令細。胡桃瓤二十兩。湯浸去皮。細研如泥。更以好蜜和令。如飴糖。瓷器盛之。旦日以煖酒二合調下十匙。服之。便以飯壓。如不飲酒人。以煖熟水調之。餌久則延年。益氣悅心。明目。補添筋骨。但禁蜜。薑羊肉。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

餘無所忌。此物本自外番隨海舶而來。非中華所有。番人呼爲補骨脂。語譌傳爲破故紙也。王紹顏續傳信方載其事頗詳。故錄之。

㊁治婦娠腰痛。通氣散。用破故紙二兩。炒香爲末。先嚼胡桃肉半箇。空心溫酒調下二錢。此藥神效。（婦人良方）

㊂養血返精丸。定心補腎。破故紙炒二兩。白茯苓一兩。爲末。沒藥五錢。以無灰酒浸。高一指。煮化和末。丸梧子大。每服三十丸。白湯下。昔有人服此。至老不衰。蓋故紙補腎。茯苓補心。沒藥養血。三者既壯。自然身安。（朱氏集驗方）

㊃治水瀉久痢。破故紙炒一兩。棗煎炙四兩爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。薑棗同水煎服。（百一選方）

㊄牙痛日久。腎虛也。補骨脂二兩。青鹽半兩。炒研擦之。（御藥院方）

㊅風蟲牙痛。上連頭腦。補骨脂炒半兩。乳香二錢半。爲末。擦之。或爲丸塞孔內。日用有效。（傳信適用方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡病陰虛火動。陽道妄舉。夢遺尿血。小便短澁。及目赤口苦。舌乾大便燥結。內熱作渴。火升目赤。易飢嘈雜。溼熱成瘡。以致骨乏無力者。禁用。忌蠶蛩及羊血。諸血得胡桃、胡麻良。

參攷資料　㊀補骨脂生嶺南諸州及波斯國。（馬志）㊁今嶺外山坂間多有之。四川合州亦有。皆不及番舶者佳。莖高三四尺。葉小似薄荷。花微紫色。實如麻子。圓扁而黑。九月採。（蘇頌）

【補骨鴉】　卽補骨脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『補骨脂』條。

【解毒】　㊀卽鬼臼之古籍別名。典見別錄。詳『鬼臼』條。㊁卽山豆根之古籍別名。典見綱目。詳『山豆根』條。

【解毒子】　古籍別名　地不容。（唐本）苦藥子。（圖經）

產地　出川蜀山野間。

形態　解毒子爲蔓草類之野生草本。葉青似杏葉而厚硬。作卵形而尖。凌冬不凋。無花實。其根黃白色。外皮微粗褐。累累相連而圓大。可供藥用。

性質　苦。大寒。無毒。

主治　解蠱毒。止煩熱。辟瘴癘。利喉閉及痰毒。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經。本草論解毒子根曰。治五臟邪氣。清肺熘熱。【明】李時珍本草綱目論解毒子根曰。消痰降火。利咽喉。退目赤。

【解蚳草】　卽吉祥草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『吉祥草』條。

【解錫】　卽白粉之古籍別名。典見本經。詳『白粉』條。

【解離】　卽防己之古籍別名。典見本經。詳『防己』條。

【解蠱】　卽豉仁之古籍別名。典見本經。詳『豉仁』條。

【詹香】　卽必栗香之古籍別名。典見綱目。詳『必栗香』條。

【詹諸】　卽蟾蜍之古籍別名。典見說文。詳『蟾蜍』條。

【詹糖香】　命名　詹言其黏。糖言其狀。本品實黏似糖。故名。

產地　出閩粵諸省。

形態　詹糖爲香木類之一種。花香如茉莉。樹幹如橘。其枝葉焚之成香。似沙糖而黑色。可供藥用。

採取　以淳而軟者良。

性質　苦。微溫。無毒。

主治　風水毒腫。去惡氣伏尸。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論詹糖香曰。治惡核惡瘡。【明】李時珍本草綱目論詹糖香曰。和胡桃、青皮搗塗髮令黑如漆。

參攷資料　詹糖香眞淳者難得。多以其皮及廳屎雜之。爲合香家要用。（陶弘景）

【蹄躈】　㊀卽豇豆之古籍別名。典見綱目。詳『豇豆』條。㊁卽白扁豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白扁豆』條。

【貊】　卽貘之古籍別名。典見綱目。詳『貘』條。

【貉貉】　卽豪豬之古籍別名。典見綱目。詳『豪豬』條。

【貉】　命名　本品與獾同穴各處。故字從各而命貉。

產地　生山野中。

形態　貉爲獸類之一種。狀如

569／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

貍。頭銳鼻尖。有斑色。而毛黃褐。又似小狐。日伏夜出。捕食蟲物。出則獾隨之。其性好睡。毛深厚溫滑。可爲裘服。肉可食。與兔用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　元臟虛勞。及女子虛憊。

【賊參】　卽薺苨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薺苨』條。

【路石】　古籍別名　陵石。（別錄）

產地　寄生石間。

形態　路石爲雜草類之一種。天雨獨乾。日出獨濕。花黃莖赤。三歲一實。赤如麻子。其莖葉可供藥用。

採取　五月十月間採之。

性質　甘。酸。無毒。

主治　心腹病。實骨髓。止汗生肌。益氣耐寒。

【路路通】　卽楓果之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『楓果』條。

【路頭花】　卽露花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『露花』條。

【跳蝦蟲】　卽淮東子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『淮東子』條。

【跳蟲】　卽淮東子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『淮東子』條。

【跳鐵】　卽鋼鐵之原名。詳『鋼鐵』條。

【載】　基本　載爲雜草類之一種。可供藥用。

性質　酸。無毒。

主治　辟諸惡氣。

【載丹】　卽丹雄雞之古籍別名。典見吳普本草。詳『丹雄雞』條。

【載君行】　卽防己之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防己』條。

【辟火】　卽景天之古籍別名。典見綱目。詳『景天』條。

【辟邪】　卽安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『安息香』條。

【辟邪翁】　卽吳茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『吳茱萸』條。

【辟虱胡麻】　卽牛蒡子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛蒡子』條。

【辟虺雷】　命名　本品辟蛇虺有威。故以雷名。

古籍別名　辟蛇雷（綱目）

基本　係山草類。爲辟虺雷之根。

性質　苦。大寒。無毒。

主治　解百毒。消痰。祛大熱頭痛。辟瘟疫。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論辟虺雷曰。治咽喉痛。痺。解蛇虺毒。

參攷資料　㈠辟虺雷狀如粗塊。蒼朮。節中有眼。（蘇恭）㈡今川中峨眉鵝鳴諸山皆有之。根狀如蒼朮。大者若拳。（李時珍）

【辟蛇雷】　卽辟虺雷之古籍別名。典見綱目。詳『辟虺雷』條。

【辟鼻】　卽斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳『斑鳩』條。

【辟瘟草】　古籍別名　鷄鴨脚金星。劍脊金星。七星草。骨牌草。（綱目拾遺）

性質　性平。味苦。氣香。

主治　傷寒瘧痢。風氣腫毒。時氣惡氣。散邪風。乳癰熱瘡。小兒痘眼疳。喉閉生蛾。同金鎖匙汁醋漱。痧脹。香竄疎經絡。治疳。

參攷資料　㈠百草鏡。治痧脹。用鴨脚金星草曬乾爲末。取少許噙鼻中。或煎服亦可。小泉驗方。疔腫用鴨脚金星草煎酒一服。卽消。㈡一名獨脚金雞。又名鴨脚金星。佩帶之。可辟疫氣。近見市者有小葉而短狹。大葉而長狹者。皆非辟瘟草也。小者名七星草。俗呼骨牌草。惟無五六。蓋五六乃天地之中。不易結寄。生石樹間。大者名劍脊金星。長一二尺。生山溪澗旁。老則葉背皆起星。此二種東雙綱目已收載。辟瘟草葉如鴨脚。有三歧。一莖一葉。氣味清香。老則有星。香氣亦減。（趙恕軒）㈢鴨脚金星。卽辟瘟草。葉如鴨脚。大而薄。背生星點。至八九月間。星老乃黃。乾之其氣香。洌不變。若葉太老及經水者便不香。端午採嫩者陰乾用。勿見火。（百草鏡）

【辟驚石】　古籍別名　避驚風石。（綱目拾遺）

產地　西巴尼亞國。

主治　治急慢驚風。一切天釣尸痓。

參攷資料　西巴尼亞國有一處土中產石。色黑而光嫩。取而琢之。或大或小。佩孩童胸前。遇邪風而起。慢驚急驚。此石代受其患。邪氣盡收於石。自然裂破。孩童無恙。必須常佩。永遠方可無虞。眞可寶之物也。（本草補）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【遂石】基本　遂石爲石類之一種。可供藥用。

產地　生太山。

性質　甘。無毒。

主治　消渴傷中。益氣。

【遂陽木】產地　生山中。

形態　遂陽木爲雜木類之一種。葉如白楊葉。三月結實。十月成熟。色赤。可食。與供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　益氣。

【遂蓂】卽商陸之原名。詳『商陸』條。

【遍撥】卽蓽撥之古籍別名。典見扶南傳。詳『蓽撥』條。

【遊蟲珠】基本　係昆蟲類夜行蟲之屎也。

產地　粵西福建諸省境內均有產之。

效能　解宿滯。蕩垢積。

主治　上焦血滯。腹內脹滿。癥結等症。

【遊龍】卽菰草之古籍別名。典見毛詩。詳『菰草』條。

【運日】卽雄鴆之古籍別名。典見綱目。詳『鴆』條。

【運屎蟲】卽蜣螂之古籍別名。典見綱目。詳『蜣螂』條。

【遍地金】基本　本品卽乳藤之細莖者。

古籍別名　雞眞草（綱目拾遺）

性質　寒。涼。無毒。

主治　小兒一切疳眼。

【遍地金錢】卽金錢草之俗名。詳『金錢草』條。

【遍地香】卽金錢草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金錢草』條。

【過山紅】卽茜草根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茜草根』條。

【過山龍】㊀卽茜草之古籍別名。典見本草衍義補遺。詳『茜草根』條。㊁卽土茯苓之古籍別名。典見吳氏集驗方。詳『土茯苓』條。㊂卽土茜草之別名。典見綱目拾遺。詳『土茜草』條。

【過冬青】㊀卽荔枝草之古籍別名。典見經驗廣集。詳『荔枝草』條。㊁卽雪裏青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雪裏青』條。

【過東藤】卽忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『忍冬藤』條。

【過岡龍】卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【過崗龍】產地　粵東珠江兩岸沼澤田野間常有出之。

性質　甘。辛。微溫。

效能　理氣活血。祛風散溼。解鬱積。壯筋骨。

主治　除疳疔。理跌打。內傷痰火。痔漏管瘡。

【過街】卽蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳『蜈蚣』條。

【過路蜈蚣】卽地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳『地蜈蚣草』條。

【過羅】卽皂蘆之古籍別名。典見綱目。詳『皂蘆』條。

【道乙阿叱】卽桔梗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桔梗』條。

【道人頭】㊀卽蒼耳子之古籍別名。典見圖經本草。詳『蒼耳子』條。㊁卽牛蒡子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛蒡子』條。

【道止】卽麻伯之古籍別名。典見別錄。詳『麻伯』條。

【道生草】卽鼠麴之古籍別名。典見綱目。詳『鼠麴』條。

【達節】卽節華之古籍別名。典見別錄。詳『節華』條。

【酪】古籍別名　濃（綱目）

製法　先以牛馬羊駝之乳汁半杓。鍋內炒過。再入餘乳。蒸數十沸。熬時常以杓縱橫攪之。乃傾出罐盛。待冷。掠取浮皮以爲酥。入舊酪少許。紙封放之。是謂溼酪。再以酪凹結。掠取浮皮。再晒至皮盡。置釜中。炒少時。以器盛之。曝令作塊。是謂乾酪。俱可供藥用。其酥詳見該條。

性質　甘。酸。寒。無毒。

主治　熱毒止渴。解散發利。除胸中虛熱。身面上熱瘡肌瘡。

歷代記述致證　【宋】日華諸家本草論酪曰。止煩渴熱悶。心膈熱痛。【明】李時珍本草綱目論酪曰。潤燥利腸。靡膩生精。血補虛損。壯顏色。

參攷資料　㊀按戴原禮云。乳酪血液之屬。血燥所宜也。酪濃北人多造之。水牛、犛牛、羊、馬、駝之乳。皆可作之。入藥以牛酪爲勝。水牛、馬、駝之酪冷。犛牛、羊乳酪溫。（李時珍）㊁患冷患痢人勿食羊

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乳酪。合酢食。成上痕。（孟詵）

【酪酥】卽茄子之古籍別名。典見五代貽子錄。詳『茄子』條。

【鈴兒草】卽沙參之古籍別名。典見別錄。詳『沙參』條。

【鈴柴胡】卽徐長卿之日本名。詳『徐長卿』條。

【鈸兒草】卽杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜衡』條。

【鉛】　命名　鉛易沿流。故名。

處方用名　黑錫。青鉛。鉛條。

古籍別名　青金。（說文）金公。水中金。黑鉛。（新集藥錄）灰名黑錫灰。（綱目）五金銼汙。追魂使者。（土宿眞言本草）草節鉛。

基本　係金屬化學原質之一。

產地　在山礦中。

形態　鉛色灰白。其質柔軟。抓之有痕。置空氣中卽生薄鏽。而多延展性。可爲細絲薄片。用途至廣。不僅藥用而已。

製法　李時珍曰。凡用以鐵銚鎔化。瀉瓦上。濾去渣脚。如此數次。收用。其黑錫灰。則以鉛沙取黑灰。白錫灰不入藥。

用法　恒以焙對和藥。亦有水煎。

性質　甘。寒。無毒。

效能　降氣逆。墜痰涎。用作鎭靜藥。

主治　鎭心安神。治傷寒毒氣。反胃嘔噦。蛇蝎所咬。炙熨之。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺。論鉛曰。療瘰癧瘤。鬼氣疰忤。鍚爲末。和青木香傅瘡腫惡毒。【明】李時珍本草綱目。論鉛曰。消瘰癧癰腫。明目固牙。烏鬚髮。治實女殺蟲墜痰。治噎膈。消渴鳳癇。解金石藥毒。

配合應用　㈠烏鬚明目。黑鉛半斤。鍋內鎔汁。旋入桑條灰。柳木攪成沙。篩末。每早揩牙。以水漱口洗目。能固牙明目。黑鬚髮。（勝金方）

㈡揩牙烏髭。黑鉛消化。以不灶皂莢寸切。投入炒成炭。入鹽少許。研勻。日用揩牙。擩去白髭。黑者更不白也。又方。黑錫一斤。炒灰。埋地中五日。入升麻。細辛。訶子同炒黑。日用揩牙。百日效。亦治牙齒動搖。（普濟方）

㈢烏鬚鉛梳。鉛十兩。錫三兩。婆羅得三箇。針砂。熟地。黃牛兩。茜根。胡桃皮一兩。沒石子。訶黎勒皮。硫黃。石榴皮。慈石。皂礬。烏麻油各二錢半。爲末。先化鉛錫。入末一半。柳木攪勻。傾入梳模子印成脩齒。餘末同水煮。梳三日三夜。水耗加之。取出。放帛重包五日。每以熱皮襯手梳一百下。須先以皂莢水洗淨拭乾。（普濟方）

㈣治腎臟氣發攻心。面黑欲死。及諸氣奔豚喘急。鉛二兩。石亭脂二兩。木香一兩。麝香一錢。先化鉛炒乾。入亭脂急炒炤起。以醋噀之。傾入地坑內。覆住。待冷取研。粟飯丸。茨子大。每用二丸。熱酒化服。取汗。或下。或通氣自愈。如大便不通。再用一丸。入元明粉五分。服。亦治婦人血氣冷痛攻心。（聖濟總錄方）

㈤治風癇吐沫。反目抽掣。久患者。黑鉛。水銀結砂。南星炮各一兩爲末。糯飯丸。菉豆大。一歲一丸。乳汁下。（普濟方）

㈥反胃噦逆。黑鉛化汁。以柳木搗研成粉一兩。入米醋一升。砂鍋熬膏。入蒸餅末少許。搗丸小豆大。每服一丸。薑湯下。（聖濟方）

㈦治多年反胃不止。紫背鉛二兩。石亭脂二兩。鹽鹵汁五兩。燒鉛。以鹵汁淬盡。與亭脂同炒炤起。挑於水上。炤止。研勻。蒸餅和丸。梧子大。每服二十丸。煎石蓮乾柿湯下。（聖濟方）

㈧治消渴煩悶。黑鉛。水銀等分。結如泥。常含豆許。吞津。（聖惠方）

㈨治寸白蟲病。先食豬肉一斤。乃以沙鹽水調黑鉛灰四錢。五更服之。蟲盡下。食白粥一日。（本事方）

㈩治水腫浮滿。烏鍚五兩。皂莢一挺。炙。酒二斗。煮大沸。頻服。至小便出二三升卽消。（千金方）

㈠㈠治小便不通。黑鉛錯末一兩。生薑半兩。煙心一握。井水煎服。先以炒葱貼臍。（聖惠方）

㈠㈡治卒然咳嗽。爐中鉛屑。柱心。皂莢等分。爲末。蜜丸。如梧子大。每飲下十五丸。忌葱。（備急方）

㈠㈢治瘰癧結核。鉛三兩。鐵器炒取黑灰。醋和塗上。故帛貼之。頻換。去惡汁。如此半月。不痛不破。內消

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲水而愈。（劉禹錫傳信方）

㊀治癰疽發背。黑鉛一斤。甘草三兩。微炙。搗。酒一斗。浸甘草乃鎔鉛投酒中。如此九度。去滓。飲酒醉臥即愈。（經驗方）

㊁治金石藥毒。黑鉛一斤。鎔化。投酒一升。如此十餘次。待酒至半升。頓飲。（勝金方）

㊂取輕粉毒。出山黑鉛五斤。打碎。盛燒酒十五斤。納土茯苓半斤。乳香三錢。封固。重湯煮一日夜。埋土中。出火毒。每日早晚任性飲數杯。後用瓦盆接小便。自有粉出。爲驗。服至筋骨不痛乃止。（醫方摘要方）

㊃解砒霜毒。煩燥如狂。心腹疼痛。四肢厥冷。命在須臾。黑鉛四兩。磨水一盞灌之。（華陀危病方）

㊄解硫黃毒。黑錫煎湯服即解。（集簡方）

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡無實邪者禁用。

參攷資料　㊀鉛變化爲胡粉、黃丹、密陀僧、鉛白霜。其功皆與鉛同。但胡粉入氣分。黃丹入血分。密陀僧鎮墜下行。鉛白霜專治上焦胸膈。此爲異耳。方士又鑄爲梳。梳鬚髮可令光黑。或用藥煮之尤佳。（李時珍）㊁鉛生山穴石間。人挾油燈尋至數里。隨礦脈上下曲折斫取之。其氣毒人。若連月不出。則皮膚變黃。腹脹不能食。多致疾而死。地鏡圖云。草青莖赤。其下多鉛。鉛錫之精爲老嫗。（李時珍）㊂嘉州利州出草節鉛。生鉛未煆者也。打破胞燒之。氣如硫黃。紫背。鉛熟鉛。鉛之精華也。有變化。能碎金剛鑽。雅州出釣脚鉛。形如皂子大。又如蝌斗子。黑色。生山澗沙中。可乾汞。盧氏鉛粗惡力劣。信州鉛雜銅氣。陰平鉛出劍州。是銅鐵之苗。並不可用。寶藏論云。鉛有數種。波斯鉛堅白。爲天下第一。草節鉛出犍爲。銀之精也。衡銀鉛銀坑中之鉛也。內含五色。並妙。上饒樂平鉛。次於波斯草節。貧版鉛。鐵苗也。不可用。倭鉛可勾金。土宿真言本草云。鉛乃五金之祖。故有五金悲犴。追魂使者之稱。言其能伏五金而死入石也。雌黃乃金之苗。而中有鉛氣。是黃金之祖矣。銀坑有鉛。是白金之祖矣。信鉛雜銅。是赤金之祖矣。與錫同氣。是青金之祖矣。硃砂伏於鉛而死於硫。硫繼於鉛而伏於礦。鐵繼於礦而死於鉛。雄繼於鉛而死於五。知故金公變化最多。一變而成胡粉。再變而成黃丹。三變而成密陀僧。四變而爲白霜。雷氏炮炙論云。令鉛住火。須伏脩天。如要形堅。豈忘紫背。註云。脩天補天石也。紫熒。天熒也。（獨孤滔）

【鉛丹】即黃丹之原名。詳『黃丹』條。

【鉛白】即鉛粉之別名。詳『白粉』條。

【鉛白霜】即鉛霜之古籍別名。典見綱目。詳『鉛霜』條。

【鉛光石】**基本**　鉛光石爲石類之一種。可供藥用。

主治　骨鯁。

【鉛灰】**原名**　黑錫灰。

製法　用未經煆冶之新鉛。熔淨去渣。再鎔成液。同硫黃煆煮。起以醋洒之。候成黑灰。研之。以不黏滯爲度。用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　積聚殺蟲。同檳榔末等分。五更米飲服。

【鉛粉】即白粉之原名。詳『白粉』條。

【鉛條】即鉛之處方用名。詳『鉛』條。

【鉛華】㊀即鉛粉之古籍別名。典見綱目。詳『白粉』條。㊁即鉛霜之古籍別名。典見綱目。詳『鉛霜』條。

【鉛黃華】即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃丹』條。

【鉛霜】**命名**　本品係以鉛雜水銀合煉而成之粉末。故名。

古籍別名　鉛白霜。神符白雪。（綱目）

製法　蘇頌曰。鉛霜用鉛雜水銀十五分之一。合鍊作片。置醋甕中。密封經久。成霜。李時珍曰。以鉛打成錢。穿成串。瓦盆盛生醋。以串橫盆中。離醋三寸。仍以瓦盆覆之。置陰處。候生霜刷下。仍合住。

性質　甘。酸。冷。無毒。

主治　消痰止驚悸。解酒毒。去胸膈煩悶。中風痰實。止渴。

歷代記述攷證　【宋】寇宗奭本草衍義。鉛霜曰。去膈熱涎塞。【明】李時珍本草綱目。論鉛霜曰。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

治吐逆。鎮驚去怯。黑鬚髮。

參攷資料　㈠鉛霜性極冷。治風痰及嬰孺驚滯藥。今醫家用之尤多。（蘇頌）㈡鉛霜乃鉛汞之氣交感英華所結。道家謂之神符白雪。其墜痰去熱。定驚止瀉。蓋有奇效。但非久服常用之物。爾病在上焦者。宜此清鎮。（李時珍）

【鉛精】　卽水銀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水銀』條。

【鉛養】　卽白粉之化學別名。詳『白粉』條。

【鉛礬】　卽黑礬之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『礬石』條。

【鉢恒羅香】　卽薝香之古籍別名。典見金光明經。詳『薝香』條。

【鉢擺娑福羅】　卽珊瑚之古籍別名。典見梵書。詳『珊瑚』條。

【鉤吻】

命名　本品入口則鉤人喉吻。故名。

古籍別名　野葛（本經）毒根。除辛（本草）吳普。胡蔓草（圖經本草）斷腸草。黃藤。火把花。冶葛。折之有青烟出。者名固活。（綱目）爛腸草。水莽草。（俗名）

外國名詞　Rhus toxicodendron, L. var. radicans, Miq.（拉丁）ッタウルシ（日本）

基本　係漆樹科漆樹屬。爲鉤吻之根。

產地　生山野中。

形態　鉤吻爲毒草類之一種。有草本木本兩種。草本者蔓生。葉爲長卵形。端尖。花黃而小。木本者高四五尺。葉似黃精。但有毛。鉤子二個。初夏開單性花。黃綠色。雌雄異株。結實紅色。其根可供藥用。



鉤吻

採取　二月八月採之。

性質　辛。溫。有大毒。

主治　金瘡乳痓。中惡風。咳逆上氣。水腫。殺鬼疰蠱毒。（本經）破癥積。除脚膝痺痛。四肢拘攣。惡瘡疥蟲。殺鳥獸。搗汁入膏中。不入湯飲。（別錄）

歷代記述攷證　【魏】吳普本草論鉤吻曰。主喉痺咽塞。聲音變。施用宜忌　惡黃芩。半夏爲之使。

參攷資料　㈠鉤吻食藥。飲冷水卽死。冷水發其毒也。彼土毒死人。懸尸樹上。汁滴地上。生菌子。收之。名菌藥。烈於野葛也。雜菜搗汁。解野葛毒。取汁滴野葛苗。卽萎死。南人先食雜菜。後食野葛。二物相伏。自然無苦。魏武帝嗽野葛至尺。先食此菜也。（陳藏器）㈡按李石續博物志云。胡蔓草出二廣。廣人貧儐。急。每食此草而死。以誣人。以急水吞卽死。急慢水吞死稍緩。或取毒蛇殺之。覆以此草。澆水生菌。爲毒藥害人。葛洪肘後方云。凡中野葛毒。口不可開者。取大竹筒洞節。以頭柱其兩脇及臍中。灌冷水入筒中。數易水。須臾口開。乃可下藥解之。惟多飲甘草汁。人屎汁。白鴨或白鷄斷頭瀝血入口中。或羊血灌之。嶺南衞生方云。卽時取雞卵抱未成雛者。研爛和麻油灌之。吐出毒物乃生。稍遲卽死也。（李時珍）

【鉤芙】　卽苦芙之古籍別名。典見爾雅。詳『苦芙』條。

【鉤栗】

古籍別名　巢鉤子。（拾遺）甜橘子。（吳瑞）

產地　生山野間。

形態　鉤栗爲喬木類之一種。木大數圍。凌冬不凋。實如栗而圓小。亦有如雀子圓卵者。其實中仁可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　食之不飢。厚腸胃。令人肥健。

【鉤鉤】　卽鉤藤之處方用名。詳『鉤藤』條。

【鉤樸】　卽鉤栗之別名。詳『鉤栗』條。

【鉤薑】　卽王瓜之古籍別名。典見郭璞賦。詳『王瓜』條。

【鉤鴴】　卽鴟鴞之古籍別名。典見綱目。詳『鴟鴞』條。

【鉤藤】

命名　本品刺曲如鉤。故名。

處方用名　鉤鉤。純鉤鉤。嫩鉤藤。淨雙鉤。雙鉤鉤。

古籍別名　鉤藤鉤。韋藤鉤。（和漢藥考）

外國名詞　Uncaria rhynchophylla, Miq.（拉丁）

574／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

基本　屬茜草科。爲鉤藤之鉤棘。

產地　陳仁山藥物生產辨云。鉤藤以產廣西桂林者爲最好。廣東北江、星子亦佳。其次則連州、清遠、三坑、多江。廣西賀縣等亦有出。

形態　鉤藤爲自生之蔓性草本。葉腋生兩鉤棘。以攀緣於他物。高達丈許。葉對生。作卵圓形。頭端尖。夏間開淡黃褐色之小花。相綴若球。其嫩莖略方。老則變圓而成木質。鉤棘對生於葉腋之間。向下彎曲。初時色綠。至秋則變紅褐色。質堅强。狀似魚鉤。味爲收斂性。



鉤藤

採取　三月採之。

用法　凡入煎劑。須俟他藥煎就。投入二三沸。頗得效力。否則無力。去梗。純用嫩鉤。其功十倍。

性質　甘。微寒。無毒。

效能　熄風。滌熱。定驚癇。止眩暈。專作鎮痙藥。

主治　小兒寒熱。十二驚癇。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論鉤藤曰。小兒驚啼癡癎。熱壅客忤胎風。【明】李時珍本草綱目論鉤藤曰。大人頭旋目眩。平肝風。除心熱。小兒釣腹痛。發斑疹。【清】黃宮繡本草求眞論鉤藤曰。鉤藤味甘微苦。氣平微寒。爲手少陰心厥陰肝經要藥。絲肝主風。心主火。風火相煽。則風因火而愈盛。火亦因風而益熾。其在小兒。則病必在驚癇瘛瘲。眼翻抽掣。大人則病必見頭旋目眩。婦人則病必見赤白帶下。故必用此輕平宣泄。以爲下降。則風靜火熄。而驚風熱自爾克除矣。此爲小兒風熱初熱。病未見甚者。用之得宜。若使風火至極。勢難驟遏。則此輕平疎泄。效難克奏。又當細審所因。用以重劑。以爲投服。則藥始與病當。而無病重藥輕之弊矣。取藤細多鉤者良。但久煎則無力。

近人學說　張山雷曰。鉤藤其質甚輕。氣味俱薄。自別錄即以爲專治小兒寒熱。弘景且謂療小兒不入餘方。蓋氣本輕清。而性甘寒。最合於幼兒稚陰未充。稚陽易旺之體質。能治驚癇者。癇病皆肝動生風。氣火上燔。沖激腦神經之病。此物輕清而涼。能泄火而能定風。甄權謂主小兒驚啼。癒瘛熱壅。客忤胎風。瀕湖謂治大人頭旋目眩。平肝風。除心熱。皆一以貫之。惟瀕湖又謂其發斑疹。則本於錢仲陽之紫草散。方用鉤藤鉤子、紫草茸等分爲末。溫酒調服。壽頤按仲陽之所謂斑疹。卽是痘瘡及瘡子。非今人時病中之所謂發斑。鉤藤輕能透發。清能解熱。而佐以紫草涼血活血。助其流動。又以酒輔之。能發亦能清火。洵是不亢不卑穩妥之法。

配合應用　㊀治小兒驚癇瘛瘲。用鉤藤、遠志、茯神、琥珀、棗仁、丹砂、牛黃、天竺黃、犀角屑、生地黃、龍齒、麥門冬、金箔。有痰加竹瀝、南星、橘紅。

㊁治小兒驚熱。鉤藤一兩。消石半兩。炙甘草二錢五分。爲散。每服半錢。溫水服。日三服。（聖濟錄方）

㊂治卒得癇疾。鉤藤炙甘草各二錢。水五合。煎二合。每服棗許。日五夜三。（聖惠方）

㊃治斑疹不快。鉤藤鉤子、紫草茸等分。爲末。每服一字或半錢。溫酒服。（錢氏方）

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡無風熱及實火者禁用。

參攷資料　㊀鉤藤出梁州。葉細長。其莖間有刺。若釣鉤。（蘇恭）

㊁湖南、湖北、江南、江北山中皆有之。藤長八九尺。或一二丈。大如拇指。其中空。小人用致酒甕中盜取酒。以氣吸之。消消不斷。（寇宗奭）

㊂狀如葡萄藤而有鉤。紫色。古方多用皮。後世多用鉤。蓋取其力銳爾。（李時珍）

㊃祛肝風而不燥。幼科珍之用。治寒熱驚啼瘛瘲諸疾。（顧松園）

【隔山消】產地　生山地。

基本　隔山消爲雜草類之一種。白色。可供藥用。

主治　腹脹積聚。氣膈噎食。

【隔冬青】卽荔枝草之古籍別名。典見草藥方。詳『荔枝草』條。

【隔河仙】卽海芋之古籍別名。典見綱目。詳『海芋』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【隔刺虎】卽伏牛花之古籍別名。典見綱目。詳『伏牛花』條。

【隔虎刺花】卽伏牛花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『伏牛花』條。

【雉】命名　雉飛若矢。一往而墮。故字從矢。而名曰雉。

古籍別名　野雞。疏趾。華蟲。（綱目）

外國名詞　Phasianus torquatus Gm（拉丁）Chinese ring-necked pheasant Pheasant（英）Fasan（德）カウラーギシ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類鷄鷄類雉科。爲雉之肉。其腦、嘴、尾、屎、黃詳見各該條。

產地　山林原野間。

形態　雉爲原禽類之一種。雌雄異色。雄者羽羙。頭頸黑紺色。有綠光。面部赤色。頭項青綠色。眉斑白。頸之一部。周圍有白色頸輪。嘴黃白色。胸腹銅赤色。有光澤。腹部中央黑色。肩黃色。混有黑斑。背之上部銅赤色。有白斑。彩色頗複雜。翼長約八寸。尾長約一尺六。雌之羽毛地色淡黃褐。胸腹部有黑色之大斑。或有微細之暗色小斑。棲山野。食穀類及昆蟲。其肉可供食與藥用。



雉

性質　酸。微寒。無毒。

主治　補中益氣。力止洩痢。除蟻瘡。

參攷資料　㊀雉肉諸家言其發痔下痢人不可食。而別錄用治痢瘧。何邪。蓋雉在禽上。應胃土。故能補中。而又食蟲蟻。故能治蟻瘻。取其制伏耳。若久食及食非其時。則生蟲有毒。故不宜也。（李時珍）㊁周禮庖人供六禽。雉是其一。亦食品之貴。然有小毒。不可常食。損多益少。（蘇頌）㊂雉肉久服令人瘦。九月至十一月稍有補。他月則發五痔諸瘡疥。不與胡桃同食。發頭風眩運。及心痛。與菌蕈木耳同食。發五痔。立下血。同蕎麥食生肥蟲卵。同葱食生寸白蟲。自死爪甲不伸者殺人。（孟詵）

【雉毛奴邑】卽牛夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛夏』條。

【雉毛邑】卽牛夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛夏』條。

【雉骨木】卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【雉鳥老草】卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【雉麻】卽升麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『升麻』條。

【雉脚】卽升麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『升麻』條。

【雉黃】基本　本品爲雉窠中所生之黃。猶鷄窠中之磬也。

採取　採掘時。先以溺繞窠三匝。從而掘之。尤以明透而質重一兩者佳。

主治　療一切毒蛇咬傷。辟邪魅。解產厄。

【雉雞尾】主治　天火丹毒。燒灰。和麻油調傅。

【雉雞尿】主治　久瘡。

【雉雞腦】主治　塗凍瘡。

【雉雞嘴】主治　療蟻瘻。

【雌黃】命名　本品生山之陰。故曰雌黃。

古籍別名　鼻端黃。（綱目）石黃。王雄。黃安。黃砒。砒黃。帝女血。（和漢藥考）

外國名詞　Auripigmentum.（拉丁）Orpiment.（英）Auripigment, Operment.（德）

基本　係砷礦之斜方系屬。爲紅黃色之不透明固體。

產地　同雄黃。但以黃亮者爲好。各國俱有出。

形態　雌黃爲黏土質或產於噴火口之近旁。狀似鐘乳。或如葡萄。或如粒。或若板片。色鮮黃或橙黃。有眞珠光澤。質半透明或透明。硬度一·五至二·〇。比重三·四至三·五。水不溶解。亞兒加里及硝酸俱善溶解。又熱於炭火上。則分解爲亞硫酸與砒酸而蒸昇。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

製法　雷敩曰。凡使雌黃。勿令婦人鷄犬犯之。一切穢惡之處。亦不宜近。否則雌黃卽變如黑鐵色。不堪用也。反以損人。或以四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩。入甕中細煮三伏時。其色如金汁一樣在鍋底下。用東流水猛投於中。如此淘三度。去水拭乾。臼中舂碎。篩研如塵用方好。又曰。雌得芹花。立刻便成庚芹花。一名立起草。形如芍藥。有雌能住火也。

用法　恒以劑末和作丸散。或以和入外治藥中。

性質　辛平無毒。

成分　百分中含砒素六十一分。硫黃三十九分。化學上謂之三硫化砒素(As2S3)。三硫化砒素爲人工品。以亞砒酸溶液。亞砒酸鹽溶液。砒酸溶液。通硫化水素而製之。爲鮮豔之枸櫞黃色粉末。水不溶解。亞兒加里能溶解之。畫工用爲黃色顏料。然有毒。一名王黃。又名中國黃。

效能　殺蟲。解毒。燥濕。療瘡。用爲殺蟲藥。又治惡瘡。

主治　蝕鼻內息肉。下部壞瘡。身面白駁。散皮膚死肌。及恍惚邪氣。殺蜂蛇毒。惡瘡頭禿。痂疥。殺毒蟲風身痒。邪氣諸毒。練之久服。令人腦滿。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論雌黃曰。治冷痰勞嗽。血氣蟲積。心腹痛。癲癎。解毒。

國外學說　日本和漢藥考曰。雄黃。雌黃。俱天產硫化砒素化合物之名稱。近今學者皆以 Orpiment. 爲雄黃。以 Realgar 爲雞冠石。或以 Orpiment. 爲雌黃。而以 Realgar. 爲雄黃。或以 Orpiment. 爲石黃。以 Realgar. 爲雞冠石。畫工所用之黃色顏料有兩種。一爲雌黃。二爲藤黃。販賣者遂呼藤黃爲雌黃。而呼雌黃爲石黃。言海云。石黃卽生雌黃之意。又按古書。雄黃。雌黃。爲同種類之物。唯硫化砒素化合物之種屬相異。故名稱各別耳。本草綱目云。雄黃生武都山谷者良。凡生山之陽者。其形如丹砂塊。明徹不夾石色如雞冠石。此爲上品。其青黑色而堅者名熏黃。形色似眞而氣臭者名臭黃。以上二品。均不堪服食。只可療瘡疥。其臭。以醋洗之便去。足以亂眞。尤宜辨一云驗之可以炀蟲死者爲眞。雌黃生武都山。與雄黃同。生山之陰。又云。陽石氣未定者爲雌。已足者爲雄。相距五百年而結爲石。造化有夫婦之道。故曰雌雄。其雌黃試法。但於甲上磨之。土色者好。又燒熏斗底。以雌劃之。如赤黃線一道者好。和漢三才圖會云。雄黃今絕不出。從前以東京產者爲佳。外色黯。帶黃破之。內如鐵釘折口微黑有光。雌黃以金色而薄片者良。凡水解畫物入鹽少許。則水不散。染又與青黛合。則成綠青色。物類品隲云。雄黃。雌黃。一類二種。日俗以用作顏料之藤黃。呼爲雌黃。非眞雌黃也。此編參考諸書。以 Orpiment 爲雌黃。以 Realgar 爲雄黃。以上品之雄黃爲雞冠石。辨析旣明。庶免謬誤。

配合應用　㈠治反胃吐食。雌黃一分。甘草生半分。爲末。飯丸。梧子大。以五葉草。糯米煎湯。每服四丸。(聖濟總錄方)

㈡治停痰在胃。喘息不通。呼吸欲絕。雌黃一兩。雄黃一錢。爲末。化蠟丸。彈子大。每服一丸。半夜時投熱糯米粥中食之。(濟生方)

㈢治心痛吐水。不下飲食。發止不定。雌黃二兩。醋二斤。慢火煎成膏。用乾蒸餅和丸。梧子大。每服七丸。薑湯下。(聖惠方)

㈣治婦人久冷。血氣攻心。痛不止。以葉子雌黃二兩。細研。醋一升。煎濃。和丸。小豆大。每服十五丸。醋湯下。(聖惠方)

㈤治小腹痛滿。天行病。小腹滿。不得小便。雌黃末。蜜丸。納尿孔中。入半寸。(肘後方)

㈥治癲癎癡癌。眼暗。嚼舌。雌黃。黃丹炒各一兩。爲末。入麝香少許。以牛乳汁半升。熬成膏。和杵千下。丸麻子大。每溫水服三五丸。(直指方)

㈦治肺勞咳嗽。用雌黃一兩。入瓦合內不固濟。坐地上。以火焙之。厚二寸。以炭一斤。簇定。頂火煅三分去。一退火出。毒爲末。糖酥和丸。粟米大。每日空心杏仁湯下三丸。(斗門方)

㈧治久嗽暴嗽。金粟丸。用葉子雌黃一兩。研。以紙筋泥固濟。小合

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子一個。令乾。盛藥。水調赤石脂封口。更以泥封待乾。架在地上。炭火十斤簇煨。候火消三分之一去火。候冷。取出。當如鏡面光明紅色鉢內細研。蒸餅丸粟米大。每服三丸五丸。甘草水服。服後睡良久。（勝金方）

㈣治腎消尿數。乾薑半兩。以鹽四錢。炒黃。成末。雌黃一兩半。爲末。蒸餅和丸。綠豆大。每服十丸至三十丸。空心鹽湯下。（聖濟總錄方）

㈤治小便不禁。用雌塊雌黃一兩半。研。乾薑半兩。鹽四錢。同炒。薑色黃爲末。水和蒸餅丸。綠豆大。每服十丸至二十丸。空心鹽湯下之。（經驗方）

㈥治烏癩蟲瘡。雌黃粉醋和雞子黃調塗之。（聖惠方）

㈦治牛皮頑癬。雌黃末入輕粉和豬脊傅之。（直指方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡血虛者禁用。

參攷資料　㈠雌黃氣味大寒不入湯用。（別錄）㈡芎藭、地黃、獨帶、益母、羊不食草、地榆、五加皮、瓦松、冬瓜汁皆可制伏。又雌見鉛及胡粉則黑。（王宿眞君）㈢今雌黃出武都仇池者。謂之武都仇池黃。色小赤。出扶南林邑者。謂之扈揩黃。色如金而似雲母甲錯畫家所重。既有雌雄之名。又同山之陰陽合藥。便當以武都爲勝。仙經無單服法。惟以合丹砂雄黃飛鍊爲丹爾。金精是雌黃。銅精是空青。而服空青反勝於雌黃。其義難了。（陶弘景）㈣雌黃一塊重四兩。拆開得子重。軟如爛金者佳。其夾石及黑如鐵色者不可用。（雷敩）

【雌檳榔】　卽大腹子之別名。詳『大腹子』條。

【雷烏豆】　卽檀豆之細而扁者。典見綱目拾遺。詳『檀豆』條。

【雷陵】　卽代赭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『代赭石』條。

【雷陵香】　卽佩蘭之古籍別名。典見開寶本草。詳『佩蘭』條。

【雷楠皮】　卽楠白皮之古籍別名。典見本經。詳『楠白皮』條。

【雷餘子】

基本　本品係結於蘗蕨葉腋之小球。

性質　甘溫。無毒。

主治　補虛損。强腰脚。益腎。食之不饑。

參攷資料　㈠雷餘子大者如雞子。小者如彈丸。在葉下生。曬乾。功用强於蘗蕨。蘗蕨有數種。此其一也。（陳藏器）㈡此卽山藥臁上所結子也。長圓不一。皮黃肉白。煮熟去皮食之。勝於山藥。美於芋子。霜後收之。墜落在地者。亦易生根。（李時珍）㈢按獨孤滔丹房鑑源云。背陰者雌黃也。淄成者卽黑色。輕乾如焦錫塊。臭黃作者。硬而無衣。試法。但於甲上磨之。上色者好。又燒熨斗底。以雌劃之。如赤黃線一道者好。舶上來如噀血者上。湘南者次之。青者尤佳。葉子者爲上。造化莒金。非此不成。亦能柔五金乾汞。轉硫黃。伏粉霜。又云。雄黃變鐵。雌黃變錫。（李時珍）

【雷丸】

命名　本品乃竹之餘氣所結。由雷震而成。無葉無蔓。形圓色黑。猶雷之丸也。故名。狀如豬苓。又名之曰竹苓。

處方用名　白雷丸。

古籍別名　雷實。雷矢。（別錄）竹苓（綱目）

外國名詞　Mylitt Lapides-cens

基本　係菌蕈類。爲概生於竹林土中之一種菌蕈。

產地　陳仁山藥物生產辨云。雷丸產四川、湖南、貴州等處。秋季新。

形態　雷丸似豬苓而小。其大者如栗。小者如零餘子。外皮黑褐色或赤褐色。內部白色。質堅硬。

採取　八月採根。曝乾。

製法　雷敩曰。凡使用甘草水浸一夜。銅刀刮去黑皮。破作四五片。以甘草水再浸一宿。蒸之。從巳至未。日乾。酒拌。再蒸。日乾用。大明曰。入藥炮用。

性質　苦。寒。有小毒。

效能　殺蟲。消積。用作小兒解熱。療疳藥。又治癲癎狂走等。

主治　殺三蟲。逐毒氣。胃中熱。利丈夫不利女子。（本經）作摩膏。除小兒百病。逐邪氣。惡風汗出。除皮中熱結。積蟲毒。白蟲寸白。自出不止。久服令人陰痿。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論雷丸曰。逐風。主癲癎狂走。【明】繆希雍本草經疏論雷丸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

曰。雷丸味苦氣寒。別錄加鹹。有小毒。黃帝岐伯桐君扁鵲云甘。詳其所主。應是苦鹹爲勝。氣薄味厚。入手足陽明經。其主殺三蟲白蟲。寸白自出者。腸胃溼熱甚也。逐毒氣。胃中熱邪氣。惡風汗出。皮中熱結。積者。腸胃邪熱盛也。苦寒能除二經溼熱邪氣。則上來諸證自除。作麋膏治小兒百病者。以小兒好食甘肥。腸胃類多溼熱。蟲積。苦能殺蟲除溼。鹹寒能清熱消積。故主之也。凡蟲毒必熱。必辛苦寒能除辛熱。故又主解蟲毒也。別錄又云。久服令人陰痿。正見其過於苦寒偏至之氣。能令陽道痿也。【清】黃宮繡本草求眞論雷丸味苦而鹹。性寒小毒。本竹餘氣所結。得霹靂而生。故有雷丸之號。功出入胃。除熱消積。化蟲。故凡溼熱內鬱。癲痼狂走。汗出惡風。蟲積殆甚。腹大氣脹。蟲作人聲者。服之即能有效。以其秉性純陰。兼味至苦。感其霹靂。故能去其邪魅也。所云惟利男子。不利婦人。亦以婦人屬陰。故於陰物不宜耳。究之果屬腎熱。亦又何礙。但無蟲積。不得妄用。皮黑肉白者良。若肉紫黑者殺人。甘草水浸一宿。酒拌蒸或炮用。

配合應用　㊀治小兒疳虫。雷丸、燕粟使君子、鷰蒼五穀蟲、胡黃連、青黛。㊁殺腸胃一切蟲。雷丸、檳榔、鶴蟲、楝根、貫衆、牽牛、錫灰、蔥根。㊂小兒出汗有熱。雷丸四兩。粉半斤。爲末撲之。(千金方)㊃下寸白蟲。雷丸水浸。去皮切焙爲末。五更初食炙肉少許。以稀粥飲服一錢匕。須上半月服。蟲乃下。(經驗良方)

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無蟲積者禁用。惡葛根。忌火。荔實厚朴。蓍根。莞花爲之使。

參攷資料　㊀按陳正敏遯齋閑覽云。楊劭中年得異疾。每發語腹中有小聲應之。久漸聲大。有道士見之曰。此應聲蟲也。但讀本草。取不應者治之。讀至雷丸不應。遂頓服數粒而愈。(李時珍)㊁雷丸氣味鹹微寒。有小毒。赤者殺人。白者善。(別錄)㊂雷丸生石城山谷。及漢中土中。八月採根曝乾。(別錄)㊃雷丸。竹之苓也。無有苗葉。皆零而無相連者。今出房州金州。(蘇恭)㊄雷丸大小如栗。狀如礪苓而圓。皮黑肉白。堅實。(李時珍)㊅大楓子油亦名雷丸油。但以雷丸充大楓子則不可。(和漢藥考)

【雷丸草】卽菟葵之古籍別名。典見外丹本草。詳『菟葵』條。

【雷公墨】卽雷墨之古籍別名。典見綱目。詳『雷墨』條。

【雷公頭】卽香附子之古籍別名。典見綱目。詳『香附子』條。

【雷公藤】古籍別名　板扛歸。

蔕龍草。震龍根。露蠶木。方勝板。倒金鉤。烙鐵草。倒挂紫金鉤。河白草。犂尖草。括耙草。龍仙草。魚尾花。三木棉。(綱目拾遺)犂頭刺藤。(物理小識)

產地　多生山蘢陰處及籬落間。

形態　雷公藤爲蔓草類之一種。獨莖蔓生。莖穿葉心上又發葉。葉上圓下尖。三尖形。如犂耙。又似三角風。色青。枝梗有刺。每年四五月間生苗。至九月經霜而枯。結實。圓如珠。生時青色。熟則黑而味酸。其莖葉可供藥用。

主治　蠱脹水腫。痞積。黃白疸。癰疾。魚口便毒。癮疹。跌打。除壁蟲。莖燒牀下。一切毒蛇傷。翻胃噎膈。吐血便血。喉痺。食積。心疼。虛飽。腹脹。陰囊腫大。發背疔瘡。乳癰。產後遍身浮腫。

配合應用　㊀白火丹用雷公藤五錢。平地木三錢。車前四錢。天青地白葉。三白草各三錢。煎服。又洗方。雷公藤河白草煎浴。(救生苦海方)㊁治水腫脹。平地木三錢。雷公藤五錢。車前草四錢。天青地白草三錢。路路通五個。打碎煎服。重者十服愈。(救生苦海方)㊂治坐板瘡。烏賊骨五錢。雷公藤三錢。共爲細末。搽之。乾則以菜油調敷。(秋泉家祕方)

參攷資料　雷公藤出江西者。力大。土人採之。毒魚。凡蚌螺之屬亦死。其性最烈。以其草烟熏蠶子。則不生。養蠶家忌之。用酒煎服。治風氣。合巴山虎爲龍虎丹。入水藥魚。人多服卽昏。(綱目拾遺)

【雷矢】卽雷丸之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

別錄。詳『雷丸』條。

【雷芝】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【雷河督子】卽滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【雷楔】卽靡蕪根之古籍別名。典見綱目。詳『靡蕪根』條。

【雷菌】係雞壅之一種。遇雷過卽生。須疾採之。稍遲則腐。以之作羹。味甚美。性質效能。與雞壅同。參見『雞壅』條。

【雷實】卽雷丸之古籍別名。典見別錄。詳『雷丸』條。

【雷墨】古籍別名　雷公墨。

（綱目）

產地　出廣東海康縣境。

形態　雷墨爲石類之一種。每當雷雨大作之際。飛下如沙石大者如塊。小者如指。堅硬如石。黑色光豔。體重。叩之錚然。可供藥用。

主治　小兒驚癇。邪魔諸病。磨服卽安。

【雷燒松】卽松化石之古籍別名。典見輿地紀。詳『松化石』條。

【雹】形態　雹爲冰類之一種。當雷雨時。雲氣爲電所衝激。而入高空。凝爲冰點。雪片復旋轉。團結而成冰塊。與雨雜下。小者如豆。大者如拳。

性質　鹹冷。有毒。

主治　解溫熱狂亂。

【雹突】卽菜菔之古籍別名。典見爾雅。詳『菜菔』條。

【靴筒朴】卽厚朴捲作靴筒形者之處方用名。詳『厚樸』條。

【斬刺】卽石刺木之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『石刺木』條

【預知子】命名　本品相傳取子二枚。或雙仁者。緻衣領上。遇有蠱毒。則聞其發聲。當預知之故名。

古籍別名　聖知子。聖先子。盍合子。仙沼子。（日華）八月扎。（俗名）

形態　預知爲蔓草類之野生草本。引蔓木上。葉爲三角形。色綠面深。背淡。七八月結實。作房生。青熟深紅。每房有子五六枚。如皂莢子。色斑褐而光潤。可供藥用。其根詳見該條。

性質　苦。寒。無毒。

主治　殺蟲療蠱。治諸毒。去皮研服有效。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論預知子曰。治一切風。補五勞七傷。其功不可備述。治痃癖氣塊。消宿食。止煩悶。利小便。催生。中惡失音。髮落。天行溫疾。塗一切蛇蟲蜚咬。治一切病。每日吞二七粒。不過三十粒永瘥。

【預知子根】採取之　冬月採

性質　苦。冷。無毒。

主治　解蠱毒。搗細。溫水服。

【頑荊】卽蔓荊之古籍別名。典見圖經本草。詳『蔓荊』條。

【飯豆】卽白豆之古籍別名。典見綱目。詳『白豆』條。

【飯匙倩草】卽望江南之古籍別名。典見和漢藥考。詳『望江南』條。

【飯頭】卽草蘇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『草蘇』條。

【飯鍋粑】卽鍋焦之古籍別名。典見不藥良方。詳『鍋焦』條。

【飯鍋焦】卽鍋焦之原名。詳『鍋焦』條。

【駁駮】係牡獸交牛而生者之別名。典見綱目。性質效能。與騾同。參見『騾』條。

【劒魚】卽鱘魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱘魚』條。

【梟】古籍別名　野鴨。野鶩。（詩疏）鸐沉。梟。（綱目）

外國名稱　Anas boschas L.（拉丁）Duck 或 wild duck Mallard（英）Ente（德）カモ或マカモ或アラクビ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類游禽類鴨科之梟。

產地　江海湖泊中皆有之。

形態　梟爲水禽類之一種。狀如鴨而小。在夏季雄之頭頸皆紫綠黑。肩胸皆赤。腹淡白。略帶紫黑點。背灰白。亦有黑斑。翼蒼黑雜以綠黑白等色。嘴黃而扁。脚短。位於後端。趾有蹼。雌者多淡黑色。有黑斑。至冬。雄之頭部似雌。肩胸赤色亦消滅。常數百爲羣。飛翔蔽天。亦如雁之排列成行。又爲候鳥之一。但後雁而來。亦後雁而去。棲水邊。食小魚蟲。體肥多脂。其肉可供食與藥用。

採取　冬月採之。

性質　甘。涼。無毒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　補中益氣。平胃消食。除十二種蟲。身上有諸小熱瘡。年久不愈者。但多食之即瘥。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論鳧肉曰。治熱毒風。及惡瘡癰。殺腹臟一切蟲。治水腫。

參攷資料　㊀鳧於九月以後。立春以前。即中食。大益病人。全勝家者。(孟詵)㊁鳧肉不可合胡桃木耳。豆豉同食。(日華)

【鳧公英】即蒲公英之古籍別名。典見千金食治。詳『蒲公英』條。

【鳧血】主治　解挑生蟲毒。熱飲探吐。

【鳧茈】即荸薺之古籍別名。典本草衍義。詳『荸薺』條。

【鳧茨】即荸薺之古籍別名。典本草衍義。詳『荸薺』條。

【鳧葵】㊀即蓍菜之古籍別名。典見唐本草。詳『蓍菜』條。㊁即萍蓬草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萍蓬草』條。

【鳧頭】即茨實之古籍別名。典和漢藥考。詳『茨實』條。

【鳧酸】即酢漿草之古籍別名。典見蘇恭新修本草。詳『酢漿草』條。

【鵝】

命名　山中有虎。則鵝必鳴以告。其聲凡九然故名。

古籍別名　鷹(爾雅)大者名鵰(山海經)

外國名詞　Moschus chinensis (拉丁)

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類反芻偶蹄類麝科之鵝。

產地　生山野林間。

形態　鵝爲獸類之一種。其形略似麝。頭似鹿。又似狗。口有長牙。牡者有短角。脚細而力勁。善跳越。性好鬥。毛黃黑色。皮極細軟。其肉可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　五痔病。燻熱。以熹醋進之。大有效。

【鵝皮】

主治　除溼氣。脚痺。作靴韈著之。

【鵝目】

命名　本品狀如鵝之目。故名。

古籍別名　鬼目。(綱目)

產地　出嶺南諸地。

形態　鵝目爲果類之一種。樹幹高大。如棠梨。葉似楮而皮白。春開花。結實大如木瓜。小者如梅李而不圓。正七八月成熟。色黃味酸。以蜜浸之。可供食用。

性質　酸。甘。小冷。無毒。

參攷資料　鵝目多食。發冷痰。(陳藏器)

【鵝頭骨】

性質　辛。平。無毒。

主治　飛尸燒灰服。

【鼓子花】即旋花之古籍別名。典見圖經本草。詳『旋花』條。

【鼓釘】即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【鼓槌草】即穀精草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『穀精草』條。

【鼠】

外國名詞　Mus (Apodemus) decumanus Hall. 或 Musnorvegicus Erxl Brownnot 或 Grey rat (拉丁)ネズミ或シチラウネズミ(日本)

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類齧齒類。爲鼠科之鼠。

形態　鼠爲獸類鼠屬之一種。其體小。頭圓口吻突出。軀幹圓長。四肢短。尾長。脣有鬚。眼圓。耳殼小。門牙上下各二枚。其前面被黃色琺瑯質。犬牙缺失。但留空隙。臼齒之嚙面有橫紋。前肢比後肢短。有五趾。各趾具鉤爪。其毛輭。背暗褐。腹灰白。腹旁略帶黃。尾間被鱗狀物。瘢生粗毛。日匿穴中。夜出竊食。生殖力甚大。生百日。即能產子。每年可四產。一產有五頭至十頭。其肉、骨、血、糞等。均可供藥用。



鼠

採取　凡入煎須取雄者用。

性質　甘。微溫。無毒。

主治　療墜折。續筋骨。生搗傅之。三日一易。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論鼠曰。煎膏治諸瘡瘦。臘月燒之。辟惡氣。【唐】孟詵食療本草論鼠曰。磓脂煎膏。治打撲折傷。凍瘡湯火傷。臘月以油煎枯。去滓。熬膏收用。【宋】蘇頌圖經本草論鼠曰。油煎入蠟。傅湯火傷。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

滅瘢極良。【宋】日華諸家本草論鼠曰。煎油治小兒瘡癩。【明】李時珍本草綱目論鼠曰。五月五日同石灰搗收。傅金瘡神效。

【鼠王】卽隱鼠之古籍別名。典見本草集註。詳『隱鼠』條。

【鼠矢】卽山茱萸之古籍別名。典見吳普本草。詳『山茱萸』條。

【鼠母】卽隱鼠之古籍別名。典見綱目。詳『隱鼠』條。

【鼠印】卽鼠外腎之原名。詳『鼠外腎』條。

【鼠外腎】原名　鼠印。鼠卵。

命名　本品乃雄鼠之睾丸。故名。

採取　以雄鼠外腎之上。有文似印。兩腎相對。有符篆朱文九遍者尤佳。以十二月或五月五日七月七日正月朔旦子時面北向子位。刮取陰乾。如篆刻下佩於青囊中。男左女右。繫臂上。人見之無不歡悅。所求如心也。

主治　令人媚悅。

【鼠牙半支】產地　多生高山石壁間。

形態　鼠牙半支爲半支類之一種。立夏後發苗葉。細如米粒。三瓣一聚。蔓延石間。根入石罅中。色白如鼠牙。四月開花。黃色。如瓦松花後卽枯。可供藥用。

性質　寒。無毒。

主治　消癰腫。溼鬱水腫。解諸毒。及湯烙傷。蟲蛇螫咬。並一切發背、對口、冬瓜、騎馬等症。搗汁酒服。渣傅之。

參攷資料　鼠牙半支能治一切癰毒蛇傷。故有稱蛇傷之仙草。（綱目拾遺）

【鼠肉】採取　以牡鼠者良。

性質　甘。熱。無毒。

主治　小兒哺露大腹疾食之。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論鼠肉曰。小兒疳疾腹大食食者。黃泥裹燒熟。去骨取肉。和五味豉汁作羹食之。勿食骨。甚瘦人。【宋】蘇頌圖經本草論鼠肉曰。主骨蒸勞極。四肢勞瘦。殺蟲及小兒疳瘦。酒煞入藥。【明】李時珍本草綱目論鼠肉曰。疾食治小兒寒熱諸疳。

【鼠血】採取　以牡者良。

主治　療牙宣。龋青盬擦之。

【鼠耳】卽鼠麴草之古籍別名。典見別錄。詳『鼠麴草』條。

【鼠卵】卽鼠外腎之原名。詳『鼠外腎』條。

【鼠尾牛】卽黃芩之古籍別名。典見唐本草。詳『黃芩』條。

【鼠尾草】命名　本品穗狀如鼠尾。故名。

古籍別名　勤山陵翹（吳普）烏草。水香水青（拾遺）鼠菊（救荒）

外國名詞　Salvia japonica, Thunb. var. bipinnata, Fr. et Sav.（拉丁）アキノタムラサウ（日本）

基本　係脣形科鼠尾草屬。

用其花葉。

產地　山野田澤恒多有出。



鼠尾草

形態　鼠尾草爲溼草類之多年生草本。高二三尺。莖方形。葉爲羽狀複葉。對生。小葉五片或七片。初秋開花。穗狀花序。花小。脣形花冠。呈淡紫色。雄蕊二枚。雌蕊一枚。其莖可作染料。花葉與根俱可供藥用。

種類　鼠尾草種類頗多。春季開花者。謂之春鼠尾草。夏季開花者。謂之夏鼠尾草。和方書以千屈菜（Lythrum salicaria, L.）作鼠尾草。現時襲用者仍不少。

性質　苦。微寒。無毒。

主治　鼠瘻寒熱。下痢膿血不止。白花者主白下。赤花者主赤下。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鼠尾草曰。主癰疾。水蠱。

用量　八分至錢半。

參攷資料　㈠古方療痢多用之。當濃煎令可丸服之。或煎如飴服之。今人亦用作飲或末服。亦得。日三服。（陶弘景）㈡鼠尾以穗形命名。爾雅云。蔹。鼠尾也。可以染皂。故名爲草。又曰水青。蘇頌圖經謂鼠尾一名陵時者。乃陵翹之誤也。（李時珍）㈢鼠尾生平澤中。四月採葉。七月採花陰乾。（別錄）㈣所

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

在下濕地有之。惟黔中人採爲藥。葉如薺。莖端夏生四五穗。穗若車前花有赤白種。（韓保昇）㊀鼠尾草根主治反花惡瘡。（總錄）

【鼠李子】古籍別名　鼠梓。牛李。（別錄）山李子。鳥巢子。（圖經）皂李。趙李。（蘇恭）牛皂子。烏槎子。（綱目）楮李。（錢氏）椑牛筋子。牛誦子。烏岡子。無實子。錄子。薷子。（和漢藥考）綠子。鳥綠子。

外國名稱　Rhamnus japonicus, Maxim. var. genuina, Maxim（拉丁）Buckthorn.（英）

基本　係屬鼠李科。爲鼠李之果實。

產地　別錄曰。鼠李生田野間。蘇頌曰。今蜀川多有之。寇宗奭曰。今關陝湖南甚多。

形態　鼠李爲山野自生之落葉樹。高六尺至一丈。枝有刺。葉作橢圓形或卵圓形。前端尖。頂端之葉對生。花爲淡黃綠色小花。生於葉腋。果實黑色。如小豆大。其子爲有光澤之褐黑色漿果。作球圓形。有皺紋。往往留有圓形萼。果肉由二房而成。房各有直立之種子一。作褐色。果肉質鬆粗。味辛苦。



鼠李子

採取　八九月間採其熟實。日乾。其皮採無時。

用法　嫩者取汁。用以染色。熟者或生杵用。或剉末或水煎服。

性質　苦。涼。微毒。

成分　含有拉姆諾加答里涅（Rhamno catharine.）

效能　用作瀉劑。爲慢性便祕藥。

作用　在胃中僅能略助胃液之作用。至腸內能激腸之黏膜。使分泌增多。蠕動加速。其功尤顯著於大腸。

主治　寒熱。療瘧瘡。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論鼠李曰。下血及碎肉。除疝瘕積冷。九蒸酒漬。服三合。日再服。又搗傅牛馬六畜瘡中生蟲。【宋】大明日華諸家本草論鼠李子曰。水腫腹脹滿。【明】李時珍本草綱目論鼠李子曰。痘瘡黑陷及疥癬有蟲。

配合應用　㊀治瘡瘧寒熱。毒瘧及六畜蟲瘡。用鼠李生搗傅之。（聖惠方）㊁齒齦腫痛。牛李麥汁。空腹飲一盞。仍頻含漱。（聖濟總錄方）

用量　五分至一錢。

施用宜忌　忌鐵。

參攷資料　㊀牛李治痘瘡黑陷及出不快或觸穢氣黑陷古昔無知之者。惟錢乙小兒直訣必勝膏用之云。牛李子卽鼠李子。九月後採黑熟者。入砂盆槌爛。生絹捩汁。用銀石器熬成膏。瓷瓶收貯。常令透風。每服一皂子大。煎桃膠湯化下。如人行二十里再進一服。其瘡自然紅活。入麝香少許尤妙。如無生者。以乾者爲末。水熬成膏。又九蒸衞生方亦云。痘瘡黑陷者用牛李子一兩炒研。挑膠半兩。每服一錢。水七分。煎四分。溫服。（李時珍）㊁卽鳥巢子也。今蜀川多有之。枝葉如李。其實若五味子。色黯黑。其汁紫色。熟時採。日乾用。皮採無時。（蘇頌）㊂卽牛李也。木高七八尺。葉如李。但狹而不澤。子於條上四邊生。生時青。熟則紫黑色。至秋葉落。子尙在枝。隨處皆有。今關陝及湖南江南北甚多。（寇宗奭）

【鼠李皮】性質　苦。微寒。無毒。

主治　身皮熱毒。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論鼠李皮曰。口瘡齲齒及瘡蟲蝕人脊骨者。羹濃汁灌之神良。【唐】蘇恭新修本草論鼠李皮曰。治諸瘡寒熱。【宋】大明諸家本草論鼠李皮曰。祛風痺。

參攷資料　劉禹錫傳信方。治大人口中瘡瘡發背。萬不失一。用山李子根一名牛李子。薔薇根野外者。各細切五升。水五大斗。煎半日。汁濃。卽於銀銅器中盛之。重湯煎至二升。待稠。瓷瓶收貯。每少少含嚥。必瘥。忌醬醋油膩熱麵及肉。如發背以帛塗貼之。神效。襄州軍事柳崖妻竇氏。患口瘡十五年。齒盡落。斷不可近。用此而愈。（蘇頌）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鼠肝】主治　箭鏃不出。搗塗之。聆耳出汁。每用棗核大乘熱塞之。能引蟲也。

【鼠肝】即灌草之古籍別名。典見別錄。詳『灌草』條。

【鼠豆】即黎豆之滇南別名。詳『黎豆』條。

【鼠姑】古籍別名　蠷生丹水。（別錄）

基本　鼠姑爲芳草類之一種。可供藥用。

性質　苦。平。無毒。

主治　欬逆上氣。寒熱邪氣。鼠瘻惡瘡。

【鼠姑】即鼠婦之古籍別名。典見本草集註。詳『鼠婦』條。

【鼠姑皮】即牡丹皮之古籍別名。典見本經。詳『牡丹皮』條。

【鼠怕草】即十大功勞之別名。詳『枸骨』條。

【鼠毒】即特生礜石之古籍別名。典見綱目。詳『特生礜石』條。

【鼠法】即夜明砂之古籍別名。典見本經。詳『夜明砂』條。

【鼠直】即鼠麴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠麴草』條。

【鼠貧】即鼠婦之古籍別名。典見本草集註。詳『鼠婦』條。

【鼠韭】即垣衣之古籍別名。典見別錄。詳『垣衣』條。

【鼠脂】主治　湯火傷。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鼠脂曰。治耳聾。

【鼠婦】命名　本品一作鼠貧。蓋言鼠多在坎中背黏貧之故名。

古籍別名　蚡蜣（本經）蝛螻（別錄）鼠貧。鼠姑（弘景）鼠黏（蜀本）貧蟲（爾雅）溼生蟲（圖經）地雞。地虱（綱目）

外國名稱　Saw-bug. wood-louse.（英）

基本　係將彈尾類之鼠婦焙殺者。

產地　凡卑溼地。甕器下。及土坎中。恒多生焉。

形態　鼠婦爲棲息溼地土窖中或甕底等之昆蟲。全體呈灰綠色。長二三分。卷縮作球圓形。下腹扁平。多足。尾端有棒狀具。能彈地跳行。

採取　五月間採之。

製法　凡採得焙乾。

用法　恒以剉末用。

性質　酸。溫。無毒。

成分　或云含有蟻酸。

效能　破血瘀。消癥瘕。用作引赤發泡藥。

主治　氣癃不得小便。婦人月閉。血瘕癥痙。寒熱。利水道。墮胎。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鼠婦曰。治久瘧寒熱。風蟲牙齒疼痛。小兒撮口驚風。鵝口瘡。痘瘡倒靨。解射工毒。蜘蛛毒。蜒蚰入耳。【明】李士材本草圖解論鼠婦曰。鼠婦酸溫無毒。生人家地上。通月閉。利便癃。仲景用以醫久瘧。【清】黃元御長沙藥解論鼠婦曰。善通經脈。能化癥瘕。金匱鱉甲煎丸用之。治病瘧日久。結爲癥瘕。以其破血而消堅也。炒枯存性。研細用。

配合應用　㊀治產婦尿祕。鼠婦七枚。熬研末。酒服。（千金方）

㊁治撮口臍風。用鼠貧蟲杵絞汁少許。灌之。陳氏生杵鼠貧及雀糞汁服之。（聖惠方）

㊂治鵝口白瘡。地雞研水塗之即愈。（壽域方）

㊃治風蟲牙痛。溼生蟲一枚。綿裹咬之。勿令人知。（聖惠方）

㊄治風牙疼痛。溼生蟲。巴豆仁。胡椒各一枚。研勻。飯丸。綠豆大。綿裹一丸。咬之。良久。涎出吐去。效不可言。（經效濟世方）

㊅治瘡倒靨。溼生蟲爲末。酒服一字。即起。（瘡疹論方）

㊆治蜒蚰入耳。溼生蟲研爛。塗耳邊。自出。或攤紙上作撚。安入耳中亦出。（衛生寶鑑方）

㊇治射工溪毒。鼠婦、豉、巴豆各三枚。脂和塗之。（肘後方）

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡無瘀滯者禁用。

參攷資料　㊀古方治驚癎血病多用之。蓋厥陰經藥也。太平御覽載葛洪癎方。用鼠貧蟲十四枚。各以糟釀之。丸十四丸。發時水吞下。便愈。而葛洪肘後方治癎疾寒熱。用鼠貧四枚。簡裹爲丸。水下便斷。又用鼠貧豆豉各十四枚。搗丸。茨子大。未發前日湯服二丸。將發時再服二丸。便止。又蜘蛛毒人或

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瘡。取此蟲食其絲。卽愈。（李時珍）㊀按陸佃埤雅云。鼠負食之令人善淫。故有婦名。又名鼠姑。猶鼠婦也。鼠黏猶鼠負也。然則婦負二義俱通矣。因淫化生故俗名淫生蟲。曰地雞地虱者。象形。（李時珍）㊁今處處有之。多在下溼處甕器底及土坎中。詩云。蜉蝣在室。鄭玄言家無人則生故也。（蘇頌）㊂溼生蟲多足。大者長三四分。其色如蚓。背有橫紋。蹙起。用處絕少。（寇宗奭）㊃形似衣魚稍大。灰色。（李時珍）

【鼠黏】卽鼠婦之古籍別名。典見蜀本草。詳『鼠婦』條。

【鼠黏子】卽牛蒡子之處方用名。詳『牛蒡子』條。

【鼠眞】卽夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夜明砂』條。

【鼠梓】卽鼠李子之古籍別名。見別錄。詳『鼠李子』條。

【鼠梓木】卽女貞之古籍別名。典見和漢藥考。詳『女貞』條。

【鼠菊】卽鼠尾草之古籍別名。典見救荒本草。詳『鼠尾草』條。

【鼠鄉】卽礬石之古籍別名。典見吳普本草。詳『礬石』條。

【鼠糞】卽荊芥之古籍別名。典見本經。詳『荊芥』條。

【鼠麴】卽山查之古籍別名。典見唐本草。詳『山查』條。

【鼠齒莧】卽馬齒莧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬齒莧』條。

【鼠梨】卽鹿梨之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『鹿梨』條。

【鼠莞】卽龍常草之古籍別名。典見爾雅。詳『龍常草』條。

【鼠莽】卽莽草之古籍別名。典見綱目。詳『莽草』條。

【鼠莎】卽香附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香附子』條。

【鼠李】㊀卽參果根之古籍別名。典見別錄。詳『參果根』條。㊁卽藜蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藜蘆』條。

【鼠頭】**主治**　瘻瘡鼻痣。湯火傷瘡。煅末。豬脂調傅。

【鼠腦】**主治**　針刺竹木諸刺。在內中不出。搗爛厚塗之。卽出。箭鏃針刃在咽喉胸膈諸隱處者。同肝搗塗之。又塗小兒解顱。以綿裹塞耳。治聾。

採取　捕得活鼠縛住。以熱湯泡死。破喉取之。其色眞紅者是也。

主治　目暗。

歷代記述弦鑒　【明】李時珍本草綱目論鼠膽曰。點目治青盲雀目。不見物。滴耳治聾。

參攷資料　諸家本草不言鼠膽治聾。而葛洪肘後方甚稱其妙。云能治三十年老聾。若卒聾者不過三度也。有人倒臥。瀝膽入耳。盡一個。須臾。汁從下耳出。卽時更聾。十日乃痊矣。後世率方祖此。亦多用之。（李時珍）

【鼠糞】**處方用名**　兩頭尖。鼢鼠矢。牡鼠尿。

古籍別名　定心草。

基本　係獸類齧齒動物鼠屬鼢鼠之屎。

產地　陝仁山藥物生產辨云。兩頭尖產自陝西省。各省各屬咸有出。

形態　作橢圓形。兩頭較尖。故有兩頭尖之名。較米粒稍大。色黑。

製法　採得陰乾用。

性質　甘。微寒。無毒。

效能　治傷寒勞復。消乳癰瘡。用作解熱解毒藥。

主治　小兒疳疾。大腹。蔥豉同煎服。治時行勞復。

歷代記述弦鑒　【宋】日華諸家本草論牡鼠糞曰。治癎疾明目。【明】李時珍本草綱目論牡鼠糞曰。煮服治傷寒勞復發熱。男子陰易腹痛。通女子月經。下死胎。研末服。治吹奶乳癰。解馬肝毒。塗鼠瘡。瘡燒存性。傅折傷疔腫諸瘡。貓犬傷。【明】繆希雍本草經疏論牡鼠糞曰。牡鼠糞本經諸家不言咊。但云微寒無毒。然詳其所自。應是苦鹹之物。蓋鼠屬水而凡糞必苦者也。入足陽明足厥陰經。其主小兒癎疾大腹及時行勞復者。皆熱邪在陽明也。苦寒能除是經之熱。所以主之。古方治男子陰易腹痛。婦人吹乳乳癰。皆取其除熱輭堅滯結。走肝入胃之功耳。

配合應用　㊀治傷寒勞復。用雄鼠屎二十枚。豉五合。水二升。煮一升頓服。（外臺祕要方）又鼠屎豉湯治勞復發熱。用雄鼠屎二七枚。梔子十四枚。枳殼三枚。爲粗末。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水一盞。葱白二寸。豉三十粒。煎一盞。分三服。(活人書方)

㈡男子陰易及勞復。搥鼠屎湯。用搥鼠屎兩頭尖者十四枚。韭根一大把。水二盞。煎一盞。溫服。得汗爲效。未汗再服。(南陽活人方)

㈢治大小便祕。雄鼠屎末傅臍中立效。(普濟方)

㈣治室女經閉。牡鼠屎一兩。炒研。空心溫酒服二錢。(千金方)

㈤治子死腹中。雄鼠屎二七枚。水三升。煮一升。取汁作粥食。胎卽下。

㈥治產後陰脫。以溫水洗。輭用雄鼠屎燒烟熏之。卽入。(熊氏方)

㈦治婦人吹奶。鼠屎七粒。紅棗七枚。去核。包屎燒存性。入麝香少許。溫酒調服。(集要方)

㈧治乳癰初起。雄鼠屎七枚。研末。溫酒服。取汗卽散。(壽域方)

㈨治乳癰已成。用新溼鼠屎、黃連、大黃各等分爲末。以黍米粥清和塗四邊。卽散。(姚僧垣方)

㈩治鼠瘡潰壞。新鼠屎一百粒。收密器中。五六十日杵碎。卽傅之效。(千金方)

㈠治疔瘡惡腫。鼠屎、亂髮等分燒灰。針瘡頭納入大良。(普濟方)

㈡治鬼擊吐血。胸腹刺痛。用鼠屎燒末。水服方寸匕。不省者灌之。(肘後方)

㈢治折傷瘀血。傷損筋骨疼痛。鼠屎燒末。豬脂和傅。急裹。不過半日痛止。(梅師方)

㈣治中馬肝毒。雄鼠屎三七枚。和水研飲之。(梅師方)

㈤治馬咬踏瘡腫痛作熱。鼠屎二七枚。故馬鞘五寸。和燒研末。豬脂調敷之。(梅師方)

㈥治狂犬咬傷。鼠屎二升。燒末傅之。(梅師方)

㈦治貓咬成瘡。雄鼠屎燒灰。油和傅之。曾經效驗。(壽域方)

㈧治兒齒不生。雌鼠屎兩頭圓者三七枚。一日一枚。拭其齒。勿食鹹酸。或入麝香少許尤妙。(小品方)

㈨治小兒白禿。鼠屎瓦煨存性。同輕粉、麻油塗之。(百一選方)

㈩治小兒鑞齁。鼠屎燒研。水酒空心服之。一歲一錢。

㈠治小兒燕窩生瘡。鼠屎研末。香油調搽。

㈡治毒蛇傷螫。野鼠屎水調塗之。(邵眞人經驗方)

用量　錢半至二錢。

參攷資料　㈠有小毒。食中誤食。令人目黃成疸。(李時珍)㈡此卽人家常鼠也。以其尖喙善穴。故南陽人謂之鼹鼠。其壽最長。故俗稱老鼠。其性疑而不果。故曰首鼠。嶺南人食而諱之。謂爲家鹿。字篆文象其頭齒腹尾之形。(李時珍)

【鼠藤】

命名　本品鼠喜食之。故名。

產地　生山野間。

形態　鼠藤爲草本類之一種。其莖纏他木。莖葉滑淨。似枸杞花白有節。苗頭有毛。其藤莖可供藥用。

採取　以鼠所咬處之莖。採入藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　丈夫五勞七傷。陰痿。益陽道。小便數白。腰脚痛冷。除風氣。壯筋骨。補衰老。好顏色。濃煎服之。取徹汗。亦浸酒服。性溫。稍令人悶。

無苦也。

【鼠麴草】

命名　本品葉形似如鼠耳。其花黃似麴色。且可和米粉食之。故名。

古籍別名　鼠耳。無心草。(別錄)香茅(拾遺)佛耳草(法象)黃蒿。(會編)米麴。毛耳朵。茸母。(綱目)鼠直茸母草。黍麴草。毛女兒菜。(和漢藥考)蚍蜉酒草。(酉陽雜俎)

基本　屬菊科爲鼠麴草之葉莖。



鼠麴草

產地　凡山野間及陰溼地恒多生焉。

形態　鼠麴草莖高尺餘。莖葉俱柔軟。葉稍作倒披針形。長寸餘。有毛茸。花爲麴黃色。小筒狀花冠。作頭狀花序排列。

採取　二三月間。採取莖葉。

性質　甘。平。無毒。

效能　用作祛痰藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　鼠耳。主痺寒。寒熱止欬。

歷代記述弦證　【宋】大明諸家本草論鼠麴草曰。鼠麴調中益氣。止洩除痰。壓時氣。去熱嗽。雜米粉作糗食。甜美。【元】李東垣用藥法象論佛耳草曰。佛耳治寒嗽及痰。除肺中寒。大升肺氣。

用量　八分至錢半。

施用宜忌　欬冬花爲之使。

參攷資料　㈠治寒痰嗽。宜用佛耳草。熟痰嗽。宜用燈籠草。（朱震亨）㈡別錄云。治寒熱止欬。東垣云。治寒嗽。言其標也。日華云。治熱嗽。言其本也。大抵重嗽多是火鬱於內。而寒覆於外也。按陳氏經驗方云。三奇散治一切欬嗽。不問久近。晝夜無時。用佛耳草五十文。欬冬花二百文。熟地黃二兩。焙研末。每用二錢。於爐中燒之。以筒吸烟嚥下。有涎吐去。予家一嫂久病此。醫治不效。偶在沅州得一婢。用此法兩服而愈也。（李時珍）㈢麴言其花黃如麴色。又可和米粉食也。鼠耳言其葉形如鼠耳。又有白毛。蒙茸似之。故北人呼爲茸母。佛耳則鼠耳之訛也。今淮人呼爲毛耳朵。則香茅之茅。似當作毛。按段成式雜俎云。蚍蜉酒草。鼠耳也。一名無心草。豈蚍蜉食此。故有是名者耶。（李時珍）㈣鼠麴草生平岡熟地。高尺餘。葉有白毛。黃花。荊楚歲時記云。三月三日取鼠麴汁蜜和爲粉。謂之龍舌粹。以壓時氣粹音板。米餅也。山南人呼爲香茅。取花雜擇皮。染褐至破猶鮮。江西人呼爲鼠耳草也。（陳藏器）㈤佛耳草擷人謂之黃蒿。二三月苗長尺許。葉似馬齒莧而綢。有微白毛。花黃。土人採莖葉和米粉搗作粑果食。（汪機）㈥日華本草鼠麴。即別錄鼠耳也。唐宋諸家不知。乃退鼠耳入有名未用中。李杲藥類法象用佛耳草。亦不知其即鼠耳也。原野間甚多。二月生苗。莖葉柔輭。葉長寸許。白茸如鼠耳之毛。開小黃花。成穗。結細子。楚人呼爲米麴。北人呼爲茸母。故邵桂子雪天語云。北方寒食採茸母草和粉食。宋徽宗詩云。茸母初生認禁煙者是也。（李時珍）

【鼠壤土】　**基本**　本品爲土之柔鬆而無塊者。

主治　中風。筋骨不隨。冷痺。骨節疼。手足拘急。風製痛偏枯死肌。多收曝乾。蒸熱袋盛。更互熨之。

歷代記述弦證　【唐】孫思邈千金翼論鼠壤土曰。小兒尿和塗疔腫。

十四畫

【僕公罌】　卽蒲公英之古籍別名。典見圖經本草。詳『蒲公英』條。

【僕蔂】　卽麥門冬之古籍別名。典見吳普本草。詳『麥門冬』條。

【僧法實】　卽蔓荊子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蔓荊子』條。

【僧婆】　卽雁之古籍別名。典見梵書。詳『雁』條。

【僧庵草】　卽當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『當歸』條。

【僧鞋菊】　㈠卽浙烏頭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『浙烏頭』條。㈡卽草烏頭之吳俗名。詳『草烏頭』條。

【嗽神】　卽五味子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五味子』條。

【嗽藥】　㈠卽白前之古籍別名。典見唐本草。詳『白前』條。㈡卽百部之古籍別名。典見和漢藥考。詳『百部』條。

【嘉香肉】　**古籍別名**　家鄉肉。（綱目拾遺）

性質　味鹹甘。性平。

主治　補虛開胃。

參攷資料　㈠家鄉肉。金華屬邑俱有之。秋卽醃。給客販入省城市賣。其肉皮白肉紅。鮮氣香美。不似他處醃豬肉。色少鮮澤也。但一入杭城。店便加硝滷。投缸中浸透。然後出售。盡不爾則肉味淡。反不美。而秋時尚暖。不漬透硝滷。又易腐臭也。肉爲硝漬。食之恐乏補益。不似火腿冬醃陳久者爲佳。然今店中所售火腿。均以家鄉肉腿風乾。至次年度上起綠衣。充陳火腿賣。人多不察。若療病作食餌。須眞金華腿方有效也。（藥鑑）㈡未經杭肆滷漬之肉。故能補虛。若經滷漬透便能燥肺。凡肺痿陰虛咳嗽者。恐非所宜。產婦虛勞須補者亦忌。其肥肉得硝滷入腹。卽成痰。體肥作痰者。亦不宜多食。倘食之作痰。杏仁研食可解。附治箭鏃不出方如下。用陳年醃肉去皮。取紅活

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

美好者。同其肥細切剉濃將象牙末及人所退爪甲爲末。共爲研細末。拌入所剉肉內。再爲勻剉。令其合一厚敷簪鐵周圍。約一飯頃。其鐵卽自迸脫。竟有迸至二三尺遠者。（趙恕軒）

【嘉草】㊀卽蕺荷之古籍別名。見綱目。詳『蕺荷』條。㊁卽茜草之別名。詳『茜草』條。

【嘉魚】命名　嘉者美也。言魚味美故名。

古籍別名　鮛魚。拙魚。丙穴魚。（綱目）

外國名稱　Salvelinus plurius或S. kundscha pallas.（拉丁）イワナ或アメマス（日本）

基本　係脊椎動物魚類喉鰾類鮭科。爲嘉魚之肉。

產地　出四川雅安縣及廣西蒼梧縣江湖間。

形態　嘉魚爲鱒類魚屬之一種。形如鱒。頭鈍圓。鱗細小而圓滑。皮面富有黏液。體長一尺三寸。脊鰭有十四五刺。後方又有一脂鰭。臀鰭亦有十二刺。背及體旁灰青。多淡黑斑。惟背面略帶煤黑色。腹部灰白。微帶橙色。春則隨水出穴。秋則逆水入穴。其肉白如玉。脂多味美。可供食與藥用。



嘉魚

性質　甘。溫。無毒。

主治　煮食。療腎虛消渴。勞瘦虛損。

歷代記述攷證　【宋】開寶重定新本草。論嘉魚肉曰。食之令人肥健悅澤。

參攷資料　㊀嘉魚食乳水。功用同乳。能久食之。力强於乳。（馬志）㊁嘉魚常於崖下孔中食乳石沫。故補益也。（孟詵）

【嘉賓】卽雀之古籍別名。典見綱目。詳『雀』條。

【嘉慶子】卽李子之別名。詳『李子』條。

【嘉樹】卽黃葛樹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃葛樹』條。

【嘓嘓哥】卽蜂虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蜂虎』條。

【團魚】卽鼈甲之俗名。詳『鼈甲』條。

【團慈姑】卽山慈姑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山慈姑』條。

【墓頭回】基本　墓頭回爲雜草類之一種。可供藥用。

主治　婦人崩中赤白帶下。同紅花入酒。水童便煎服。

【壽星桃】卽桃之古籍別名。典見綱目。詳『桃』條。

【壽星草】㊀卽刺虎之古籍別名。典見綱目。詳『刺虎』條。㊁卽伏牛之別名。詳『伏牛花』條。

【壽祖】卽威靈仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳『威靈仙』條。

【奪命丹】卽接骨仙桃之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『接骨仙桃』條。

【奪香花】卽瑞香花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『瑞香花』條。

【奪皮香】卽瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【嫩柴胡】卽柴胡之處方用名。詳『柴胡』條。

【嫩桑枝】卽桑枝之處方用名。詳『桑枝』條。

【嫩前胡】卽前胡之處方用名。詳『前胡』條。

【嫩鹿茸】卽鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿茸』條。

【嫩鈎藤】卽鈎藤之處方用名。詳『鈎藤』條。

【夢神】卽胡麻之苗。典見別錄。詳『胡麻』條。

【實棗皃樹】卽山茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山茱萸』條。

【實除雙牙】卽玳瑁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玳瑁』條。

【對蛤蚧】卽蛤蚧之處方用名。詳『蛤蚧』條。

【對節菜】卽牛膝之古籍別名。典見綱目。詳『牛膝』條。

【對廬】基本　對廬爲澀草類之一種。形加菴閭。可供藥用。

採取　八月採之。

性質　苦。寒。無毒。

主治　除大熱。療疥瘡。煮汁洗

588／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之。

【對鍛】命名　本品卽鍛之成對者故名。

產地　出鹹水中。

形態　對鍛大者長五六寸肉肥色白兩兩乾之勾結如環或謂雌雄鍛之成對者須於懷子時別之子散後無從辨其出於正月望後至三月大盛端節後卽杳不可得其肉可供食與藥用。

主治　補腎興陽燒酒浸服並療痰火後半身不遂筋骨疼痛。

【慈母枝葉】產地　生山林間。

形態　慈母爲雜木類之一種。樹高丈餘葉如櫻桃而小其枝葉可供藥用。

主治　下氣止渴令人不睡。小兒痰痞疾香作飯食。

【慈石】命名　慈石取鐵如慈母之招子故名後人加石遂稱爲磁石。

處方用名　鹽磁石。活磁石。煆磁石。呆磁石。

古籍別名　玄石。(本經)處石。(別錄)煬鐵石。(本草衍義)吸鐵石(直指方)指南石。(和漢藥考)

攝石。(藥物生產辨)

外國名詞　Magnetite.(英)　Magneteisstein.(德)

基本　屬礦石類爲色黑成粒之石塊。

產地　蘇頌云凡今慈州、徐州及南海傍山中皆有之。陳仁山藥物生產辨云慈石廣東花縣多出。西北江均有出。和漢藥考曰日本則產於陸中羽後越中越後飛彈美濃等處。

形態　或如粒或成塊其成晶形者爲八面體或斜方十二面體黑鐵色不透明有金屬光澤質緻密而脆條痕現黑色硬度五·五至六·五比重四·九至五·二具吸鐵之特性諸酸類俱能溶解之。

種類　㈠玄石。乃慈石之不能吸鐵者亦卽慈石之黑色者。㈡慈石毛。乃慈石中有孔孔中有黃赤色其上之細毛。功用更勝其毛輕紫。石上頗濇可吸連鐵俗謂之蚋鐵石也。㈢玄中石。中麻石。俱似慈石惟不能吸鐵。況中麻石心有赤皮粗如鐵。乃山石也。勿誤服令人生惡瘡不可療。㈣眞磁石一片四面吸鐵一斤者名延年沙四面只吸鐵八兩者名續採石四面吸五兩者名慈石。

製法　雷敩曰凡使慈石或一斤用五花皮一錠地榆一錠取綿十五兩二件幷剉於石上搥碎作二三十塊將石入甕甑中下草藥以東流水煑三日三夜漉出拭乾布裹再搥細乃碾入塵水飛過再碾用窓宗奭曰入藥須用火燒醋淬研爲末水飛或醋煑三日夜

用法　與他藥水煎服或剉末糊丸又用以漬酒優於丸散。

性質　辛寒無毒。

成分　慈石之成分百分中含六十九分之第二酸化鐵與三十一分之第一酸化鐵化學上謂之酸化亞酸化鐵(Fe_3O_4)礦石名磁鐵礦。

效能　補腎潛陽納衝氣平喘逆。用作强壯藥。

主治　周痺風溼肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾(本經)養腎臟强骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癎練水飲之亦令人有子(別錄)

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論磁石曰補男子腎虛風虛身强腰中不利加而用之【宋】大明日華諸家本草論磁石曰治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤吞針鐵等卽研細末以筋肉莫令斷與末同吞下之【明】李時珍本草綱目論磁石曰明目聰耳止金瘡血明繆希雍本草經疏論磁石曰磁石生於有鐵處得金之氣以生本經味辛氣寒無毒別錄甄權有小毒大明甘濇平藏器鹹溫今詳其用應是辛鹹微溫之藥而甘寒非也氣味俱厚沈而降陽中陰也入足少陰兼入足厥陰經其主周痺風溼肢節中痛不可持物洗洗酸者皆風寒溼三氣所致而風氣尤勝也風淫末疾發於四肢故肢節痛不能持物風溼相搏久則從火化而骨節皮膚中洗洗酸也辛能散風寒溫能通關節故主之也鹹爲水化能潤下輭堅辛能散毒微溫能通行

589／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

除熱。故主大熱煩滿。及消癰腫。鼠瘻頸核。喉痛者。足少陽少陰虛火上攻所致。鹹以入腎。其性鎮墜而下吸。則火歸元。而痛自止也。夫腎爲水臟。磁石色黑而法水。故能入腎。養腎臟。腎主骨。故能强骨。腎藏精。故能益精。腎開竅於耳。故能療耳聾。腎主施泄。久祕固而精氣盈益。故能令人有子。小兒驚癇。心氣怯。痰熱盛也。鹹能潤下。重可去怯。是以主之。甄權云補男子腎虛風虛。身强腰中不利。加而用之。【明】李士材本草圖解論磁石曰。慈石辛鹹色黑入腎。養腎益精明目聰耳。諸藥石皆有毒。且不宜久服。獨磁石性稟沖和。無猛悍之氣。有補腎益精之功。大都潰酒優於丸散。石性體重故爾。【清】黃宮繡本草求眞論磁石曰。磁石即俗爲石磁爲鐵母。故見鐵即能以引。是以有磁之說也。磁石味辛而鹹。微寒無毒。得中和之氣。能入腎鎮陰。使陰氣龍火不得上升。故千金磁硃丸用此以治耳鳴嘈嘈。腎虛瞳神散大。謂有磁以鎮養精神。使眞水不得外移。硃砂入心鎮養心血。使邪火不得上侵耳目。腎受誑矣。且磁入腎。腎主骨。磁味辛辛主散。磁味鹹。鹹輭堅。磁質重。重鎮怯。故凡周痺風溼。而見肢體酸痛。驚癇腫核。誤吞針鐵。金瘡血出者。何一不用此以爲調治。昔徐之才十劑篇云。重可去怯。磁石鐵粉之屬是也。故怯則氣浮。宜重劑以鎮之。然亦不可與鐵同用。色黑能吸鐵者眞。火煅醋拌。磯末水飛用。【清】楊時泰本草述鈎元論磁石曰。慈石孕二百年而成鐵。則其生化之氣所畢萃者金也。腎水之母。氣所獨鍾。而感召特異。故能益腎之氣以療虛。即其上通耳目之竅。而益聰明。固可思矣。夫腎氣陰中之陽也。腎氣足。是以更療風虛蓋腎乃肝之化原。腎氣虛而肝亦因之。風屬陽也。肝之氣虛。故曰風虛。張雞峯有云。臂細無力。不能任重者。此乃肝腎氣虛風邪客於營衛之間。使氣血不能周養故也。肝主項背與臂膊。腎主腰胯與腳膝。此證乃肝氣偏虛。宜專補肝補腎。雞峯此說。不正與本經所指周痺風溼。肢節中痛。不可持物。洗洗酸消者。相發明歟。

別錄消癰腫鼠瘻頸核。此皆通關節之所及。而其本由於補腎虛風虛。如止補腎虛。而不補風虛。則亦不能通關節。以療諸證矣。蓋肝以腎爲體。腎又以肝爲用也。總之慈石主治。所以於腎氣爲切者。由其腎中母氣。確有感召之精。能通於氣血之中耳。如止云重可去怯。不泛然而同諸石之用哉。又按獨孤滔云。慈石乃堅頑之物。無融化之氣。止可假其氣。不可服食。是以繆氏云用之潰酒。優於丸散。觀慈石丸治精氣虛極。乃以酒煮碎磁良久嘗之。酒有石味。將石拌諸藥。曬乾再拌再曬。如此數次。務令石味入諸藥中和透。更以此酒搗和諸藥爲丸。庶幾得之。

辨僞　湖南祁陽呂雲和曰。查磁石祁陽亦產。並無若何眞僞分別。但有頑與活者之辨。活者確有吸鐵引針能力。試盛鐵砂於銅質薄盤內。盤下以磁石引之。則盤內之砂。可鑒直如毛。或用盞碗盛水。水面浮一小薄紙。再置針於紙上。外以磁石隔誘。而磁內之針。即隨其順逆轉動。然初採之於山中。未能全活。須用鐵砂蓄養。若藏之於枕畔。使其得沾人體熱度。尤爲更佳。

近人學說　㈠張銘德曰。磁石一味。有死活之分。根尖之別。活磁石試驗之法。取磁石一塊。再用銅盤秤之。銅盤上面。攪勻針砂。銅盤下面。再用磁石靠盤底亂動。磁石到何處。則上面針砂即豎立。但磁石年深日久。亦就不靈。即爲死磁石。因在藥店內。年久不能吸受天地之精氣。故無吸鐵之能。但磁石根。無論新取年久之貨。均無吸鐵之能。體實本堅結。與赭石不同。赭石體鬆。打碎有層層凸頂色赤。磁石如用火煅醋製。亦乏吸鐵之能。但磁石研粉。又非用醋製不可。㈡張山雷曰。西人謂磁石琥珀。內有電氣。其能吸引者。皆是電氣發力。能收引之也。琥珀能拾芥。而不能吸鐵。磁石能吸鐵。而不能拾芥。以所含之電氣不同也。然單以氣論。不如兼以質論。磁石之質類鐵。故以類相從而吸鐵。琥珀之質能黏。故以質爲用而拾芥。辨藥性者。所貴體用兼論也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

配合應用　㊀治耳卒聾閉。吸鐵石半錢。入病耳內。鐵砂末入不病耳內。自然通透。（直指方）　㊁治陽事不起。磁石五斤。研清酒。漬二七日。每服三合。日二夜一。（千金方）　㊂磁硃丸。治眼昏內障。神光寬大。漸散。昏如霧露中行。漸睹空花物成二體。久則光不收。及內障。眞磁石火煅。醋淬七次。二兩。硃砂一兩。神麴生用三兩。爲末。更以神麴末一兩。煮糊加蜜丸。梧子大。每服二十丸。空心飯湯下。（倪徵德原機啓微集方）　㊃治金瘡血出。磁石末傅之。止痛斷血。（千金方）　㊄治腎虛耳聾。眞慈石一豆大。穿山甲燒存性。研一字。新棉塞耳內。口含生鐵一塊。覺耳中如風雨聲。即通。（濟生方）　㊅治老人耳聾。慈石一斤。搗末。水淘去赤汁。綿裹之。豬腎一具。於露地。每日取水作粥食。經年氣力強盛。顏如童子。（養老書方）　㊆治小兒驚癎。用慈石鍊水飲。（聖惠方）　㊇慈石丸。治子宮不收。名瘕疾。痛不可忍。用慈石酒浸煅研末。米糊丸。梧子大。每臥時。滑石湯下四十丸。次早用慈石散。米湯服二錢。散用慈石酒浸半兩。鐵粉二錢半。當歸五錢。爲末。　㊈治大腸脫肛。慈石半兩。火煅醋淬七次。爲末。每空心米飲服一錢。（直指方）又用慈石末。麵糊調塗頗上。入後洗去。（簡便方）　㊉治金瘡腸出納入。以慈石、滑石各三兩。爲末。米飲服方寸匕。日再。（劉涓子鬼遺方）　㊊治誤吞針鐵。眞慈石棗核大。鑽孔線穿。吞拽之立出。（錢相公篋中方）　㊋治疔腫熱毒。慈石末。酢和封之。拔根立出。（外臺祕要方）　㊌治諸般腫毒。吸鐵石三錢。金銀藤四兩。黃丹八兩。香油一斤。如常熬膏。貼之。（乾坤祕韞方）

用量　三錢至一兩。

施用宜忌　重鎭之品。類多傷氣。故可暫用。而不可久服。惡丹皮、莽草、畏黃石脂。殺鐵毒。消金柴胡爲之使。

著名方劑　㊀磁石豬腎羹。治老人久患耳聾。養腎臟。强骨氣。（養老書方）磁石一斤。（杵碎水淘去赤汁綿裹）豬腎一對。（去脂膜細切）上以水五升。煮磁石。取二升。去磁石。投腎調和。以葱、豉、姜、椒作羹。空腹食之。或作粥及入酒並佳。㊁磁硃丸。治神水寬大漸散。昏如霧露中行。漸覩空中有黑花。視物成二及內障。神光淡綠淡白色。及治耳鳴耳聾。（倪徵德原機啓微集方）磁石二兩。辰砂一兩。神麴三兩。（生）上三味。更以一兩水和作餅。煮浮入前藥。煉蜜丸。每服十丸。加至三十丸。空心米飲下。

參攷資料　㊀慈石養腎氣。塡精髓。腎虛耳聾。目昏者。皆用之。（寇宗奭）㊁慈石重可去怯。與鐵粉之類是也。（陳藏器）㊂慈石法水色黑。而入腎。故治腎家諸病。而通耳明目。一士子類病目漸覺昏暗生翳。時珍用東垣羌活勝風湯加減法。與服。而以磁硃丸佐之。兩月遂如故。蓋磁石入腎。鎭養眞精。使神光不外移。硃砂入心。鎭養心血。使邪火不上侵。而佐以神麴消化滯氣。生熟並用。溫養脾胃。發生之氣。乃道家黃婆媒合嬰姹之理。制方者。宜窺造化之奧乎。方見孫眞人千金石神麴丸。但云明目。百歲可讀細書。而未發出藥微義也。執謂古方不可治今病耶。獨孤滔云。慈石乃堅確之物。無融化之氣。止可假其氣服食。不可久服。渣滓必有大患。夫藥以治病。中病則止。砒礵猶可餌服。何獨慈石不可服耶。慈石既煉末。亦非堅頑之物。惟在用者。能得病情而中的爾。淮南萬畢術云。慈石懸井。亡人自歸。註云。以亡人衣裹慈石。懸於井中。逃人自反也。（李時珍）㊃今慈州、徐州及南海傍山中皆有之。慈州者歲貢最佳。能吸鐵盧連數十鐵。或一二斤刀器。回轉不落者尤良。採無時。其石中有孔。孔中有黃赤色。其上有細毛。功用更勝。按南川異物志云。漲海崎頭水淺而多慈石。徵外大舟。以鐵葉固之者。至此皆不得過。以此言之。海南所出尤多也。（蘇頌）㊄慈石共毛輕紫石上顚瀹可吸連鐵。俗謂之煽鐵石。其

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

玄石卽慈石之黑色者。慈磨鐵鋒。則能指南。然常偏東不全南也。其法取新繅中獨繅。以牛芥子許。蠟裹於鐵腰無風處垂之。則針常指南。以針橫貫燈心。浮水上。亦指南。然常偏丙位。土宿眞君曰。鐵受太陽之氣。始生之初。石產焉。一百五十年而成慈石。又二百年孕而成鐵。（寇宗奭）

【慈石毛】**性質**　鹹。溫。無毒。

主治　補絕傷。益陽道。止小便白數。治腰脚。去瘡瘻。長肌膚。令人有子。宜入酒。

參攷資料　本經言石不言毛。毛石功狀殊也。（陳藏器）

【慈石酒】**製法**　用慈石、水通、菖蒲等分。袋盛。浸酒飲。

主治　腎虛耳聾。

【慈竹瀝】**主治**　療熱風。和粥飲服。

【慈竹籐】**主治**　小兒頭身瘡瘡。燒散和油塗之。或入輕粉少許。

【慈姑】**命名**　本品一根。歲生十二子。如慈姑之乳諸子故名。

古籍別名　藉姑。水葌。（別錄）梗了草。（蘇恭）燕尾草。（大明）河鳧花。白地栗。（圖經）箭搭草。（救荒）

外國名稱　Sagittaria Sagittifolia, L.（拉丁）

產地　生水田間。

形態　慈姑爲水草類之一種。高三四尺。青莖中空。葉如燕尾。前尖後歧。秋開白花。爲圓錐花序。蒴後葉枯。根乃練結作橢圓形。色白而瑩滑。可供藥用。花、葉詳各該條。



慈姑

採取　冬春採之。

性質　苦。甘。微寒。無毒。

主治　百毒。產後血悶攻心。欲死。產難胞衣不出。搗汁服一升。又下石淋。

參攷資料　㊀慈姑冷有毒。多食發虛熱及腸風。痔漏。崩中帶下。瘡瘍。以生姜同煮佳。懷孕人不可食。（大明）㊁吳人常食之。令人發脚氣。癰緩。風齒。失顏色。皮肉乾燥。卒食之。使人乾嘔也。（孟詵）

【慈姑花】**主治**　明目去翳。治一切疔腫。痔漏。

採取　夏秋間採之。

【慈姑葉】**主治**　諸惡瘡腫。小兒遊瘤丹毒。搗爛塗之。卽便消退。甚佳。

歷代配伍應證　【宋】大明諸家本草論慈姑葉曰。治蛇蟲咬。搗爛封之。【明】李時珍本草綱目論慈姑葉曰。調蚌粉塗瘧瘡。

【慈烏】**命名**　烏字篆文象其形也。而其初生母哺長則反哺。不忘慈母。故名。

古籍別名　慈鴉（嘉祐）孝烏。（說文）寒鴉（綱目）

外國名稱　Corvus negloctus Sch.（拉丁）タウガラス（日本）

基本　係脊椎動物鳥類鳴禽類烏鴉科。藥用慈烏之肉。

產地　北方山林中尤多。

形態　慈烏爲林禽類之一種。乃烏之別稱。似鴉而稍小。嘴之尖端。較細。體黑色。而有紫綠色之光澤。多鳴於早晨。好食田園農作物害鳥之屬。肉可供藥用。

性質　酸。鹹。平。無毒。

主治　補勞治瘦。助氣止咳嗽。骨蒸羸弱者。和五味淹炙食之良。

【慈烏膽汁】**採取**　伺慈烏夜睡時。以利刃斷其頭。急剖其腹。則膽汁全飽。並無漏溢。然後以線穿陰乾。入藥用。若取之不得法。或被驚覺。縱殺得其膽。亦空皮無汁矣。

主治　明目開瞽。治青盲。翳障。眼弦風爛。並點之。解藤黃毒。

【慈菇】卽慈姑。詳該條。

【慈菇花】卽雨韭之原名。詳『雨韭』條。

【慈鴉】卽慈烏之古籍別名。典見嘉祐補註本草。詳『慈烏』條。

【慈謀勒】卽小茴香之古籍別名。典見開寶本草。詳『小茴香』條。

【慈鱗鱷】卽海鱗鱷之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『海鱗鱷』條。

【截子瑪瑙】卽瑪瑙黑白相間者之古籍別名。典見綱目。詳『瑪瑙』

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

條。

【摘花】卽紅花之古籍別名。典見和漢藥考詳『紅花』條。

【摘綠】卽綠豆皮厚而粉少者之古籍別名。典見和漢藥考詳『綠豆』條。

【斯木鳥】卽劉木鳥。詳該條。

【旗鎗】卽雨前茶之別名。典見綱目拾遺。詳『雨前茶』條。

【竭伽角】卽犀角之古籍別名。典見番書。詳『犀角』條。

【榕】古籍別名　倒生樹。不死樹。(綱目拾遺)赤榕。(泉州志)



榕

產地　出閩廣熱帶諸地。

形態　榕爲喬木類之常綠木本。其色有紅白及葉有大小諸種。高四五丈。葉橢圓。平滑。狀似大麻。葉顏繁茂。木本稜凹。枝幹拳曲。大者廣蔭十餘畝。枝條節節如藤。垂下枝上生根。連綿拂地。根又生枝枝幹互相連屬。上下皆成連理。可以倒插。能生枝根。開花淡紅色。結實細圓。狀似無花果。子如冬青子。其根鬚可供藥用。

主治　固齒。止牙痛。摘取入竹筒。將鹽塞滿。泥封火煅存性。去竹筒。研末擦之。

參攷資料　㈠榕葉似大薊。子如冬青。枝幹拳曲。木本稜凹。不成材器。而結奇香。其脂與漆相似。可以貼金。膠物。勝於楮脂。(藥性考)㈡榕樹閩廣最多。他省則無。故紅梅驛以北無榕。大者蔭十餘畝。離奇古怪。備木之異。然體曲不中梁柱。理斜不中材用。質虛不中薪爨。莊子所謂以不材而壽者也。漳浦黃石齋先生有榕頌。其木年久者。常結伽南香。焚之致鷄楠於水際。其子可以肥魚。細枝曝乾束爲炬。風雨不滅。其脂乳可以貼金接物。與漆同。其鬚可入藥用。(嶺南雜記)㈢說文以㮚爲古松字。六書故以古松字爲榕。而㮚爲南方之榕。通雅云。榕當別出。狀木始於裕。含分字始於戴侗。柳宗元詩。榕葉滿庭鶯亂啼。後山叢談言。蔡州雍公觀。有大木四垂傍出。人莫能識。張殘間人嘗至蔡。爲余言。乃榕木。此木無用。惟枝上垂根。曝之可作火繩。以發炮。又可染黑。贊寧志所云。倒生木不死樹。橫枝生根下地。如柱。卽榕無疑。粵志榕之怪在根。自上生下。語曰榕木倒生根。(趙學敏)㈣榕樹可以倒插。以枝爲根。復以根爲枝。故一名倒生樹。榦多中空不堅。無所用。離之木也。其象如離之大腹。其中空處。常產香木。炎精所結。往往有伽南焉。粵人以其香可來鸜子。可肥魚。多植於水際。其樹脂可以貼金接物。與漆相似。性畏寒。嶺梅嶺則不生。故紅梅嶺有數榕爲炎寒之界。有紅、白、大葉小葉數種。(粵志)㈤按泉州府志。榕有二種。一種矮而盤桓。其鬚著地。復生爲樹。一種名赤榕。上舉廣大二種。蔭最寬。廣入藥用有鬚者。(趙學敏)

【榛】命名　本品產關中秦地。故名。

古籍別名　蓁。(綱目)棻。(植物學大辭典)

外國名稱　Corylus heterophylla, Fisch.(拉丁)ハシバシ　キンチャクハシバミ(日本)

基本　係樺木科榛屬。爲榛之實中仁。

產地　生山野間。

形態　榛爲灌木類之落葉木本。高七八尺至二三丈。葉互生。葉身甚闊。呈圓心臟形。有尖端。邊緣有重鋸齒。早春開花。花小單性。雌雄同株。雄花長穗狀花序。雌花少數相聚。常構成頭狀花叢。結實爲堅果。至秋成熟。大五六分。外殼厚。形圓而狹。下有穀斗包被其果。實中仁可供藥用。



榛

性質　甘。平。無毒。

主治　益氣力。實腸胃。令人不飢。健行。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論榛實仁曰。止飢。調中。開胃。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【楨楘】古籍別名　蠶楘。（通志）蔥楘（綱目拾遺）木李。（詩經）木梨。（埤雅）唐梨。紅林檎。（日本）

外國名詞　Cydonia sinensis, Thouin.（拉丁）クワリンカラナシ　ベニリンゴ（日本）

基本　係薔薇科棠梨屬。爲楨楘之實。

形態　楨楘爲喬木類之落葉木本。高二三丈。樹皮每年常自剝落。痕如雲紋。又如鱗狀。葉卵形而尖。互生。春末隨葉開花。生於枝之頂端。萼之外面平滑。花冠五瓣。紅花結實。橢圓頭尖。色黃。狀如木瓜而大。蒂平滑。可供藥用。



楨　楘

性質　酸。平。無毒。

主治　解酒去痰。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論楨楘實曰。食之去惡心。止心中酸水。【宋】大明諸家本草論楨楘實曰。煨食止痢。浸油梳頭。治髮白髮赤。【明】吳瑞日用本草論楨楘實曰。煮汁服。治霍亂轉筋。

參攷資料　㈠楨楘氣辛香。致衣箱中殺蠹蟲。（孟詵）㈡楨楘乃木瓜之大而黃色無重蒂者也。楘子乃木瓜之短小而味酢濇者也。楘榟則楘類之生於北土者也。三物與木瓜皆是一類各種。故其形狀功用不甚相遠。但木瓜得木之正氣。爲可貴耳。（李時珍）

【櫻木】古籍別名　水松。水杉。（綱目拾遺）

產地　出粵中潮州。多植於水旁平堤曲岸間。

形態　櫻爲喬木類之一種。其幹得杉十之六。枝葉得松十之四。故以幹名爲水杉。枝葉爲水松。其皮實頗堅韌。可製履與藥用。

主治　澀腳氣。辟邪風。作履著之。

【榧子】卽榧實之處方用名。詳『榧實』條。

【榧花】卽榧華。詳該條。

【榧華】基本　本品卽榧子之華也。

採取　春月採之。

性質　苦。

主治　療水氣。去赤蟲。令人好色。不可久服。

處方用名　榧子。

【榧實】古籍別名　柀子。（本經）赤果。玉榧。（日用）玉山果。野杉。（綱目）

外國名詞　Torreya nucifera, S. et Z.（拉丁）カヤ　カハ（日本）

基本　係松柏科榧屬。爲榧之果實。

產地　凡山野平原恒有生焉。



榧　實

形態　榧爲果類之常綠喬木。高數丈。葉濃綠色。作線形而扁平。前端甚尖銳。硬如針。互生。成二縱列。春夏間開花。花單性。雄花與雌花異株。種子如核果狀。秋末成熟。作橢圓形。長八九分。淡褐色。外部有多脂之肉。內有尖長之核。亦有橢圓之核。供食外。亦可充藥用。

採取　秋冬間採之。

用法　生食炒食。或和棗水煎服。

性質　甘。平。濇。無毒。

效能　殺蟲。療痔。

主治　常食治五痔。去三蟲。毒。鬼疰惡毒。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論榧實曰。食之療寸白蟲。【唐】孟詵食療本草論榧實曰。消穀助筋骨。行營衛。明目輕身。令人能食。多食一二升。亦不發病。【宋】寇宗奭本草衍義論榧實曰。多食滑腸。五痔人宜之。【明】李士材本草圖解論榧實曰。榧子消穀進食。殺蟲化積。止嗽助陽。療痔止濁。【清】黃宮繡本草求眞論榧實曰。榧實甘濇微苦。體潤而滑。性平無毒。按據諸書。有言氣味苦寒。能瀉濕熱。爲肺家之果。又云性溫散氣。能去腹中邪氣。及殺諸蟲。皆無定論。余按榧實甘潤。是其本質。凡肺不潤而燥者。得此則宜。故有

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

解燥除熱之功。非書所云能除溼熱之意乎。又其燥熱內撄。則蟲自爾見蝕。而五痔腹腹等症。自爾悉形。服此燥氣悉除。腸胃頓清。其氣自爾不結。非書所謂溫能散氣之意乎。又書所載有毒無毒。在人食。既無病。又能以此療病。毒何由見。非書所云無毒之說乎。又其苦澁兼備。既能清燥潤肺。復於蟲蝕性味不合。令其即水化水。非書所云有毒之說乎。究之止屬潤肺解心殺蟲之品。其言有毒止是毒蟲之毒。而非毒人之毒。而爲毒蟲之毒也。故凡一切肺燥而見咳嗽不寧。腹中不和。五痔惡毒。並小兒黃瘦便閉不解等症。服之無不奏效。昔東坡詩云。驅除三彭蟲愈我心腹疾。義正是矣。但多食則有滑腸之慮。炒食味即香酥甘美。更有引火入肺大腸受傷之慮。不可不細察耳。

配合應用　㈠治寸白蟲。日食楹子七顆。滿七日蟲皆化爲水也。（孟詵方）又用楹子一百枚去皮。火燃啖之。經宿蟲消下也。胃弱者。啖五十枚。（外臺祕要方）㈡治好食茶葉。面黃者。每日食楹子七枚。以愈爲度。（楊起簡便方）㈢令髮不落。楹子三箇。胡桃二箇。側柏葉一兩。搗浸雪水。梳頭髮。永不落。且潤也。（聖惠方）㈣治卒吐血。出先食蒸餅兩三箇。以楹子爲末。白湯服三錢。日三服。（聖濟總錄方）㈤治尸咽痛痒。語言不出。楹實半兩。燕麦一兩。杏仁。桂各半兩。爲末。蜜丸。彈子大。含嚥。（聖濟總錄方）

用量　一錢半至三錢。

參攷資料　㈠楹實治咳嗽白濁。助陽道。生生編）㈡楹子肺家果也。火炒食之。香酥甘美。但多食則引火入肺。大腸受傷爾。（朱震亨）㈢楹子殺腹間大小蟲。小兒黃瘦有蟲積者宜食之。（寧原）㈣楹實被子治療相同。當爲一物無疑。但本經被子有毒。似有不同。亦因其能殺蟲蟲爾。汪穎以粗楹爲被子。紗是一類。不甚相遠也。（李時珍）㈤性熱。同鵝肉食。生斷筋。風。又上塵人忌火氣。（吳瑞）㈥按物類相感志云。楹煮素羹。味更甜美。豬脂炒楹。黑皮自脫。同甘蔗食。其渣自嚥。又云。楹子皮反棄豆。能殺人。（李時珍）㈦棱亦作稜。其木名文木。斐然章采。故謂之楹。信州玉山縣者爲佳。故蘇東坡詩云。彼美玉山果。粲爲金盤實。（李時珍）㈧楹實大如橄欖。殼色紫褐而脆。其中子有一重黑粗衣。其仁黃白色。嚼久漸甘美也。（寇宗奭）㈨楹有一種粗楹。其木與楹相似。但理粗色赤耳。其子稍肥大。僅圓不尖。神農本草被子即粗楹也。（汪穎）㈩楹生深山中。人呼爲野杉。按羅願爾雅翼云。被似杉而異於杉。彼有美實。而木有文采。其木似桐而葉似杉。絕難長。木有牝牡。牡者華而牝者實。冬月開黃圓花。結實大小如棗。其核長如橄欖核。有尖者不尖者。無稜而殼薄。黃白色。其仁可生啖。亦可焙收。以小而心實者爲佳。一樹不下數十斛。陶氏不識被子。惟蘇恭能辨爲一物也。（李時珍）

【榮目】即荊葉之古籍別名。典見吳普本草。詳『荊葉』條。

【榮花樹皮】即合歡皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『合歡皮』條。

【榮桐】即桐之古籍別名。典見綱目。詳『桐』條。

【榮莫】即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【楫柱】

命名　本品性溫而氣香。故名。

形態　楫柱爲喬木類之一種。樹如林檎。花白綠色。結實如槖子而小。氣甚香。肉鬆而多毛。可供藥用。其木皮詳該條。

性質　酸。甘。微寒。無毒。

主治　主水瀉。腸虛煩熱。散酒氣。並宜生食。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論楫柱實曰。去胸膈積食。止渴除煩。將臥時嗽一兩枚。生熟皆宜。【宋】開寶重定新本草論楫柱實曰。溫中下氣。消食除心間酸水。去臭辟衣魚。

參攷資料　㈠楫柱實臥時嗽之。太多。亦痞塞胃脘也。（寇宗奭）㈡楫柱實發毒熱。祕大小腸。聚胸中痰。壅澀血脈。不宜多食。（陳士良）㈢楫柱實同車螯食。發痼氣。

595／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（吳瑞）

【楹桲木皮】　主治　搗末傅瘡瘍。

【櫰桃】　即桃之古籍別名。典見綱目詳『桃』條。

【楹子】　即楹藤子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『楹藤子』條。

【楹藤子】　命名　本品子象楹形故名。

古籍別名　合子（綱目拾遺）　象豆（開寶本草）楹子（日華）

外國名詞　Psoralea scandens, L.（拉丁）モダマ（日本）

基本　係豆科楹藤子屬爲楹藤之子仁。

產地　野生山林間。

形態　楹藤爲蔓草類之多年生草本。藤如通草。繞纏樹木。結實三年方熟。形如弓袋。其子仁圓扁。長一二寸。色紫黑。微光。可供藥用。

製法　凡使取其子中仁入藥炙用。

性質　清。甘。平。無毒。

主治　五痔蟲毒。飛尸喉痺。以仁爲粉。微熬。水服一二匕。亦和大豆澡面去黯黯。

歷代記述攷證　【宋】開寶重定新本草。論楹藤子仁曰。治小兒脫肛。血痢瀉血。並燒灰服。或以一枚。割瓤熬研。空腹熱酒服二錢。不過三服必效。【明】李時珍本草綱目論楹藤子仁曰。解諸藥毒。

【藥香】　即冰片之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冰片』條。

【構子】　即都柁子之別名。詳『都柁子』條。

【構膠】　即楮樹皮中白汁之古籍別名。典見綱目。詳『楮樹皮中白汁』條。

【槌胸靈】　即枳實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳實』條。

【槎了草】　即慈姑之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『慈姑』條。

【槐子】　即槐實之處方用名。詳『槐實』條。

【槐木皮根皮】　性質　苦。平。無毒。

主治　爛瘡。喉痺。寒熱。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論槐木皮根皮曰。煮汁淋陰。囊墜腫。氣痛。煮漿水漱口。齒風疳蟲血。【宋】大明諸家本草論槐木皮根皮曰。治中風。皮膚不仁。浴男子陰疝卵腫。浸洗五痔。一切惡瘡。婦人產門痒痛。及湯火瘡。煎膏止痛。長肉。消癰腫。【宋】蘇頌圖經本草論槐木皮根皮曰。煮汁服。治下血。

【槐生】　即續斷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『續斷』條。

【槐米】　即槐花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『槐花』條。

【槐米炭】　即槐花炒黑者之處方用名。詳『槐花』條。

【槐耳】　古籍別名　槐槐。櫃菌。赤雞。槐蛾（綱目）

性質　苦。辛。平。無毒。

主治　五痔。脫肛。下血。心痛。婦人陰中瘡痛。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論槐耳曰。治風破血。益力。

參攷資料　㊀槐耳。槐樹上菌也。當取堅如桑耳者。㊁以煮漿粥。安槐木上。草覆之。即生。亶耳。（甄權）

【槐角】　即槐實之處方用名。詳『槐實』條。

【槐角子】　即槐實之處方用名。詳『槐實』條。

【槐豆】　即決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『決明子』條。

【槐枝】　採取　以東行者良。

性質　苦。平。無毒。

主治　洗瘡及陰囊下溼痒。八月斷大枝。候生嫩蘗。煮汁釀酒。療大風瘙痒甚效。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論槐枝曰。炮熱可熨蠍毒。【唐】陳藏器本草拾遺論槐枝曰。燒灰沐頭。長髮。【宋】蘇頌圖經本草論槐枝曰。青枝燒灑塗癬。煨黑搨牙。去蟲。煎湯洗痔核。【明】李時珍本草綱目論槐枝曰。治赤目崩漏。

參攷資料　劉禹錫傳信方。著硃州王及郎中。槐湯灸痔法甚詳。以槐枝濃煎湯。先洗痔。便以艾灸其上七壯。以知爲度。王及素有痔疾。充西川安撫使判官。乘驟入駱谷。其痔大作。狀如胡瓜。熱氣如火。至驛僵仆。郵吏用此法。灸至三五壯。忽覺熱氣一道入腸中。因大轉瀉。先血後穢。其痛甚楚。瀉後遂失

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

胡瓜所在登驟而馳矣。（蘇頌）

【槐枝酒】命名　本品係用槐樹枝煎汁和麴如常釀成之酒。故名。

主治　大麻瘋痺。

【槐花】處方用名　槐花炭。槐米炭。

古籍別名　槐米。槐花米。槐塵米。（和漢藥考）

外國名詞　Cassiae Pulpa. (Cassia, Sophora or Tora.) (Cassia Pulp.)

基本　豆科槐樹之花蕾。

產地　陳仁山藥物生產辨云。槐花以廣西桂林產者爲最。廣東連州、東陂、樂昌出者爲佳。染料必須用之。山東青州更多出產。但其實色不及兩廣之好。九月新。



槐花（一）

形態　槐爲落葉喬木。高二三丈。葉作羽狀複葉。小葉作長尖卵圓形。夏季於葉腋間開黃白色蝶形花。作圓錐花序排列。後結類豆之莢果。長二三寸。作連珠狀。莢內有扁平種子。卽是槐實。



槐花（二）

採取　四五月採花曝乾。

製法　寇宗奭曰。凡使槐花。須未開時採收。陳久者良。入藥炒用。染家以水煮一沸出之。其稠滓爲餅。染色更鮮。

性質　苦。平。無毒。

效能　瀉熱。涼血。用治五痔及作一切下血藥。

主治　五痔。眼赤。殺腹臟蟲。及皮膚風熱。腸風瀉血。赤白痢。並炒研服。

歷代記述攷證　【金】張元素　珍珠囊論槐花曰。涼大腸。【明】李時珍本草綱目論槐花曰。炒香頻嚼。治失音及喉痺。又療吐血衄。崩中漏下。【清】賈九如辨藥指南論槐花曰。槐花體輕。色淡黃。氣和。味苦。性寒。能洗。力涼血。性氣薄而味厚。入肺大腸二經。二三月萌蘖。四五月開放。從木令生而成於火。月火性味苦寒。能直下。且味厚能沈。主清腸紅下血。痔瘡腫痛。臟毒淋瀝。此涼血之功。獨在大腸也。大腸與肺爲表裏。能疏皮膚風熱。是泄肺金之氣也。

配合應用　㈠治衄血不止。槐花、烏賊魚骨等分。牛牛炒爲末。吹之。（普濟方）

㈡治舌衄不止。槐花末傅之。卽止。（朱氏集驗方）

㈢治吐血不止。用槐花燒存性。入麝香少許。研勻。糯米飲下三錢。（普濟方）

㈣治咯血唾血。用槐花炒研。每服三錢。糯米飲下。仰臥一時取效。（朱氏方）

㈤治小便尿血。槐花炒、鬱金煨各一兩爲末。每服二錢。淡豉湯下立效。（簡中祕密方）

㈥治大腸下血。用槐花、荊芥穗等分爲末。酒服一錢七。（經驗方）用柏葉三錢。槐花六錢。煎湯日服。（集簡方）又槐花枳殼等分。炒存性爲末。新汲水服二錢。（柚珍方）

㈦治暴熱下血。用生藤臟一條。洗淨控乾。以炒槐花末塡滿扎定。米醋沙鍋內煮爛。擂丸彈子大。日乾。每服一丸。空心嘗歸煎酒化下。（永類鈐方）

㈧治酒毒下血。槐花牛生牛炒一兩。山梔子五錢爲末。新汲水服二服。（經驗良方）

㈨治臟毒下血。新槐花炒研。酒服三錢。日三服。或用槐白皮煎湯服。（普濟方）

㈩治婦人漏血不止。用槐花燒存性研。每服二三錢。食前溫酒下。（聖惠方）

㈠治血崩不止。槐花三兩。黃芩二兩爲末。每服半兩。酒一盞。銅秤錘一枚。桑柴火燒紅。浸入酒內。調服。忌口。（乾坤祕韞方）

㈡治中風失音。炒槐花三更後仰臥嚼咽。（危氏得效方）

㈢治癰疽發背。凡人中熱毒。眼花頭暈。口乾舌苦。心鬲背熱。四肢麻木。覺有紅暈在背後者。卽取槐花子一大抄。鐵杓炒褐色。以好酒一盞漬之。乘熱飲酒。一汗卽愈。如未退再炒。一服極效。縱成膿者。亦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

無不愈。彭宰蕃云。此方三十年屢效者。（劉松石保壽堂方）

㊀治楊梅毒瘡。乃陽明積熱所生。槐花四兩。略炒。入酒二盞。煎十餘沸。熱服。胃虛寒者勿用。（集簡方）

㊁治外痔長寸。用槐花煎湯熏洗。并服之。數日自縮。（集簡方）

㊂治疔瘡腫毒。一切癰疽發背。不論已成未成。但煩痛者皆治。槐花微炒。核桃仁二兩。無灰酒一鐺。煎十餘沸。熱服。未成者二三服。已成者一二服見效。（醫方摘要方）

㊃治發背散血。槐花、秦艽粉各一升。同炒。象牙色。研末。用細茶一兩。煎一盞。露一夜。調末三錢。傅之。留頭。（攝生妙用方）

㊄治下血血崩。用槐花一兩。煅灰二錢。鹽一錢。水三鍾。煎減半服。（摘玄方）

㊅治白帶不止。槐花炒。牡蠣煅等分。爲末。每酒服三錢。取效。（摘玄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無實火實熱者禁用。忌鐵。

著名方劑　槐花散。治腸風、臟毒、下血。（古方）槐花（炒）側柏葉（炒）枳殼（炒）各等分爲末。米飲下。

參攷資料　槐花今染家亦用。收時折其未開花。煮一沸出之。釜中有所澄下稠黃滓。滲濾爲餅。染色更鮮明。治腸風熱瀉血甚佳。不可過劑。（寇宗奭）

【槐花米】卽槐花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『槐花』條。

【槐花炭】卽槐花炒黑者之處方用名。詳『槐花』條。

【槐菌】卽槐耳之古籍別名。典見唐本草。詳『槐耳』條。

【槐實】

處方用名　槐角。槐子。

古籍別名　櫰子。（蠶芳譜）

外國名稱　Sophora japonica L.（拉丁）エンジュ　エンジュ（日本）

基本　屬豆科。爲槐之子實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。槐角產廣東北江。樂昌八步等處。

植物學大辭典曰。產於東部亞細亞。

形態　槐爲落葉喬木。高二三丈。葉爲羽狀複葉。而互生。小葉數奇而作長尖卵圓形。下面帶白色。夏季於葉腋開黃白色蝶形花。作圓錐花序。排列雄蕊十枚。各自離生。雌蕊一枚。秋結類角豆之莢果。長二三寸。作連珠狀。莢內有扁平種子。

採取　七月採嫩實。十月採老實。

製法　雷敩曰。凡採得去單子。并五子者。只取兩子三子者。以銅槌搥破。用烏牛乳浸一宿。蒸過用。

用法　與他藥水煎。或剉末。和作丸散。其嫩實可生搗用。

性質　苦。寒。無毒。

效能　治腸風便血。療內外五痔。用作祛風解熱藥。

主治　療五內邪氣。熱止涎唾。補絕傷。火瘡婦人乳癰。子臟急痛。（本經）久服明目益氣。顏不白。延年。治五痔瘡瘻。以七月七日取之。搗汁。銅器盛之。日煎令可丸。如鼠屎大。納竅中。日三易。乃愈。又墮胎。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論槐實曰。治大熱及難產。【唐】陳藏器本草拾遺論槐實曰。殺蟲。去風。合房陰乾。煮飲。治目除熱。淚頭腦心胸間熱。風煩悶。風眩欲倒。心頭吐涎如醉。瀡瀡如舡車上者。【宋】大明諸家本草論槐實曰。治丈夫女人陰瘡。溼瘁。催生吞七粒。【宋】寇宗奭本草衍義論槐實曰。疎導風熱。【元】李東垣用藥法象論槐實曰。治口齒風。涼大腸。潤肝燥。【明】繆希雍本草經疏論槐實曰。槐實味苦。氣寒而無毒。別錄益以酸鹹宜矣。入手足陽明。兼入足厥陰經。其主五內邪氣熱者。乃熱邪實也。涎唾多者。脾胃有熱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。傷絕之病。其血必熱。五痔由於大腸火熱。火瘡乃血爲火傷婦人乳癰。肝家氣結血熱所成。子臟急痛。由於血熱燥火。槐爲苦寒純陰之藥。爲涼血要品。故能除一切熱。散一切結。清一切火。如上諸病。莫不由斯三者而成。故悉主之。久服明目益氣。頭不白。延年者。血分無熱。則目自明矣。熱能傷氣。除火熱則氣自益矣。涼血則髮不白。熱去則陰精不損。故延年也。其花味以苦勝。故除手足陽明足厥陰諸熱證。尤長耳。【清】黃宮繡本草求眞論槐實曰。槐角卽槐實。味苦酸鹹。氣寒無毒。入手足陽明大腸胃及入足厥陰肝。凡因肝經熱鬱而致風眩煩悶。痔血腸風並陰瘡瀝癢。目淚不止者。服此治無不效。以其氣皆純陰。爲涼血要藥。故能除一切熱。散一切結。清一切火也。至書所云能疏肝經風熱者非是。具有表性。得此則疎實。因熱除而風自息之意。凡書所著治功。多有如此立說。不可不細體會而詳究耳。去單子及五子者。銅槌碎。牛乳拌熬。槐花味苦獨勝。其涼大腸血分更甚。凡大小便血。及目赤腫痛舌衄。並皆用之。

配合應用　㈠治大腸脫肛。槐角、槐花各等分炒爲末。用羊血調藥炙熟食之。以酒送下。豬腰子去皮薤炙亦可。（百一選方）

㈡治內痔外痔。許仁則方。用槐角子一斗。搗汁酒調。取地膽爲末。同煎丸。梧子大。每飲服十丸。兼作挺子。納下部。或以苦參末代地膽亦可。（外臺祕要方）

㈢治目熱昏暗。槐子、黃連二兩爲末。蜜丸。梧子大。每漿水下二十丸。日二服。（聖濟總錄方）

㈣治大熱心悶。槐子燒末。酒服方寸匕。（千金方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾胃虛寒及無濕熱者禁用。忌鐵。景天爲之使。

著名方劑　槐角丸。治五極腸風瀉血。糞前下血。名外痔。糞後有血。名內痔。大腸不收。名脫肛。穀道四面瘙肉如爛。名舉痔。痔頭有孔。名瘻瘡。內有蟲爲蟲痔。並皆治之。（和劑局方）槐角去梗炒。（一兩）地榆、當歸、（酒焙）防風、黃芩、枳殼。（麩炒）上藥各半兩爲末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。

參攷資料　㈠槐子以十月巳日採相連多者。新盆盛。合泥。百日皮爛。爲水。核如大豆。服之令腦滿。髮不白而長生。（陶弘景）㈡折傲房角作湯代茗。主頭風明目補腦。水吞黑子。以變白髮。扁鵲明目使髮不落法。十月上巳日。取槐子去皮。納新瓶中。封口。二七日初服一枚。再服二枚。日加一枚。至十日又從一枚起。週而復始。令人可夜讀書。延年益氣力大良。（蘇頌）㈢按太清草木方云。槐者虛星之精。十月上巳日採子服之。去百病。長生通神。梁書言庾肩吾常服槐實。年七十餘。髮鬢皆黑。目看細字。此其驗也。古方以子入冬月牛膽中漬之。陰乾百日。每食後吞一枚。云久服明目通神。白髮還黑。有痔及下血者尤宜服之。（李時珍）㈣按周禮外朝之法。面三槐。三公位焉。吳澄注云。槐之言懷也。懷來人於此也。王安石釋云。槐黃中懷其美。故三公位之。春秋元命苞云。槐之言歸也。古者樹槐聽訟。其下使情歸實也。（李時珍）㈤槐實生河南平澤。可作神燭。（別錄）㈥今處處有之。其木有極高大者。按爾雅槐有數種。葉大而黑者名櫰。槐。晝合夜開者名守宮槐。葉細而青綠者但謂之槐。其功用不言有別。四月五月開黃花。六月七月結實。七月七日採嫩實。搗汁作煎。十月採老實入藥。皮根採無時。醫家用之最多。（蘇頌）㈦槐之生也。季春五日而兔目。十日而鼠耳。更旬而始規。二旬而葉成。初生嫩芽。可煉熟水淘過食。亦可作飲代茶。或採槐子種畦中。採苗食之亦良。其木材堅重。有青黃白黑色。其花未開時狀如米粒。炒過煎水。染黃蓝鮮。其實作莢。連珠中有黑子。以子連多者爲好。周禮秋取槐檀之火。淮南子老槐生火。天玄主物簿云。老槐生丹。槐之神異如此。（李時珍）

【槐槐生】　卽續斷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『續斷』條。

【槐膠】　**主治**　一切風化痓。肝臟風。筋脈抽掣。及急風口噤。或四肢不收。頑痺。或毒風周身如蟲行。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

或破傷風口眼偏斜。腰背強硬。任作湯散丸煎。雜諸藥用之。亦可水煮和藥爲丸。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論槐膠曰。煨熱綿裹塞耳。治風熱壅閉。

【槐櫃】　卽槐耳之古籍別名。典見唐本草。詳『槐耳』條。

【槐雞】　卽槐耳之古籍別名。典見蜀本草。詳『槐耳』條。

【槐藤】　卽決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『決明子』條。

【槲桐】　產地　多生山谷間。

形態　狀似青桐。葉有極。皮可供藥用。其葉亦可療疾。詳該條。

性質　甘。溫。無毒。

主治　療瘧。咬毒氣入腹。研末服。

【槲桐葉】　性質　甘。溫。無毒。

主治　療蛇蟲蜘蛛咬毒。搗敷。

【歌女】　卽蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳『蚯蚓』條。

【滴乳石】　卽鐘乳石之別名。詳『鐘乳石』條。

【滴乳香】　卽乳香之處方用名。詳『乳香』條。

【滴金卵】　卽延胡索之古籍別名。典見和漢藥考。詳『延胡索』條。

【滴滴金】　卽旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋覆花』條。

【滴漏】　卽旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋覆花』條。

【滴膽芝】　卽黃連之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃連』條。

【滴露】　卽草石蠶之古籍別名。典見綱目。詳『草石蠶』條。

【滾水】　卽熱湯之俗名。詳『熱湯』條。



滿山香

【滿山香】　產地　西江爲最多。

性質　辛。溫。

效能　止痛。消腫毒。通竅。止瘡癢。去風。殺瘙疥。

主治　跌打傷。

【滿地金錢】　卽蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【滿江紅】　基本　滿江紅爲雜草類之一種。可供藥用。

主治　療癰疽。入膏用。

【滿條紅】　卽紫荊花之古籍別名。典見羣芳譜。詳『紫荊花』條。

【滿陰實】　產地　生山野或園中。

形態　滿陰實爲雜草類之一種。莖如芥。或如瓜藤。葉小。七月結實如櫻桃。可供藥用。

性質　酸。平。無毒。

主治　益氣延年。除熱。止渴。利小便。

【漂搖草】　卽翹搖之古籍別名。典見陸放翁詩序。詳『翹搖』條。

【漂青黛】　卽青黛之處方用名。詳『青黛』條。

【漆子】　主治　下血。

【漆姑草】　卽蜀羊泉之古籍別名。典見綱目。詳『蜀羊泉』條。

【漆花】　主治　小兒解顱腹脹。交脛不行。

【漆柿】　卽柹柿之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『柹柿』條。

【漆萃】　卽澤漆之古籍別名。典見本經。詳『澤漆』條。

【漆葉】　基本　係漆樹科漆樹屬爲漆樹之葉。其花子詳各該條。



漆葉

主治　五尸勞疾。殺蟲。曝乾研末。日用酒服一錢七。

參攷資料　㈠華佗傳載彭城樊阿少師事佗。佗授以漆葉青黏散方。云服之去三蟲。利五臟。輕身益氣。使人頭不白。阿從其言。年五百餘歲。漆葉所在有之。青黏生豐沛彭城及朝歌。一名地節。一名黃芝。主理五臟。益精氣。本出於迷人入山見仙人服之。以告佗。佗以爲佳。語阿。阿祕之。近者人見阿之壽而氣力强盛。問之。因醉誤說。人服多驗。後無復人識。青黏或云卽黃精之正葉者也。(蘇頌)㈡按葛洪抱朴子云。漆葉青黏。凡藪之草也。樊阿服之。得壽二百歲而耳目聰

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

明。猶能持鐵治病。此近代之實事。良史所記往者也。洪說猶近於理。前言可年五百歲者誤也。或云青黏卽葳蕤。(李時珍)

【漆樹斗】卽乾漆。詳該條。

【漆頭】卽薤茄之古籍別名。典見本草集註。詳『薤茄』條。

【漏天機】卽龜版之古籍別名。典見圖經本草。詳『龜版』條。

【漏蘆】命名　屋之西北黑處謂之漏。凡物之色黑者謂之盧。本品秋後卽黑而異於衆草。故有漏盧之稱。

處方用名　漏蘆。

古籍別名　野菰(本經)。茨菰。(蘇恭)鬼油麻(日華)北漏老翁花(伐曲大應驪根(和漢藥考)。

基本　屬玄參科漏蘆之根。

產地　凡山谷間恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。漏蘆產江蘇鎮江。

形態　漏蘆生於向陽之地。爲草本植物。高二三尺。葉似艾葉。惟小且薄。夏秋間。梢葉間開黃色似赤小豆之脣形花。花後結實。子較罌粟子爲小。此草秋後則枯而變黑。異乎他草。

採取　八月採根陰乾。

製法　雷敎曰。凡採得漏蘆細剉。以生甘草相對拌蒸之。從巳至申。揀出晒乾用。

性質　鹹寒無毒。

效能　解熱毒。通乳汁。有去瘀之功效。用治諸惡瘡痔漏。乳主治　皮膚熱毒。惡瘡瘙痔。瘰癧。腫。下乳汁。久服輕身益氣。耳目聰明。不老延年。(本經)止遺溺。熱氣瘡痒如麻豆可作浴湯。(別錄)

歷代記述攷證　【宋】大明曰。華諸家本草論漏蘆曰。通小腸。泄精尿血。腸風赤眼。小兒壯熱。撲損續筋骨。乳癰瘰癧。金瘡止血排膿。補血長肉。通經脈。【明】繆希雍本草經疏論漏蘆曰。漏蘆苦鹹無毒。苦能下洩。鹹能軟堅。寒能除熱。入足陽明。少陽。太陽。手太陰。陽明。寒而通利之藥也。故主皮膚熱。惡瘡瘙痔。瘰癧。下乳汁。別錄又主止遺溺熱氣。瘡瘍如麻豆可作浴湯。又本經久服輕身益氣。耳目聰明。不老延年者。蓋亦通指熱散病除。則臟腑自安。精神自倍。而臻乎壽考也。【清】黃宮繡本草求眞。論漏蘆曰。漏蘆味苦而鹹。氣寒有毒。凡苦則下泄。鹹則軟堅。寒則勝熱。漏蘆氣味俱備。其性專入陽明胃經。故凡癰疽發背。乳汁不通。及預解時行瘟毒者。咸須服此以解毒邪。俾邪盡從便出而解矣。然書又云。遺精尿血能止。亦因毒解熱除自止之意。非因漏蘆寓有收澁之功也。但氣虛瘡潰不起。及孕婦有病者切忌。出閫中。塗如油。麻枯黑如漆者。眞甘草拌連翹爲使。

近人學說　張山雷曰。漏蘆滑利泄熱。與王不留行功用最近。而寒苦直泄。尤其過之。苟非實熱。不可輕用。不獨耗陰尤損正氣。日華謂通小腸。治泄精溺血。腸風乳癰。排膿止痛。通經脈。皆惟實熱之症。可以暫用。石頑謂苦寒解毒利竅。殺蟲。排膿消腫。古治癰瘍。以漏蘆湯爲主藥。蓋鹹能軟堅。苦寒清熱。解毒之功。然服之必瀉。則熱從下出。故氣虛者非其所宜。而妊婦尤爲切禁。附漏蘆湯方。漏蘆連翹生草、大黃、生黃芪。治癰疽熱證。頤按此湯惟實熱壅結者宜之。其用黃芪。蓋欲以盪卻其迅利。然補氣之藥。以治癰腫。究屬非宜。若曰彼此牽制。欲其虛實二家。無投不利。則模稜兩可。必無桴應之理。此成方之所以不可混用也。惟在臨證時審其虛實寒熱。而知所損益。然後可以恰當病機耳。

配合應用　㈠治乳巖乳癰。漏蘆、貝母、連翹、甘草、金銀花、橘葉、瓜蔞、白芷、山豆根、山茨菇、夏枯草。㈡治發背瘰癧。排膿止痛。漏蘆、連翹、生甘菊、紫花地丁、貝母、金銀花、甘草、夏枯草。㈢漏蘆同黃耆、人參。排膿長肉。加狗蹄、豬蹄汁。能下乳。㈣治腹中虻蟲。漏蘆爲末。以餅臛和方寸匕服之。(外臺祕要方)㈤治小兒無辜痛病肚脹。或時泄痢。冷熱不調。以漏蘆一兩。杵爲散。每服一錢。以豬肝一兩。入鹽少許。日煑熟。空心頓食之。(聖惠方)㈥治冷勞泄痢。漏蘆一兩。艾葉炒四兩爲末。米醋三升。入藥末一半。同煑成膏。入後末和丸梧子大。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

每溫水下三十丸。亦治產後帶下。（聖濟總錄方）

㊐治乳汁不下。乃氣脈壅塞也。又治經絡凝滯。乳內脹痛。邪蓄成癰。服之自然內消。漏蘆二兩半。蛇退十條。炙焦。瓜蔞十個。燒灰存性。爲細末。每服二錢。用溫酒調下。良久。再以熱羹湯投之。總之以通爲度。（和劑局方）

㊑治脈節風痛。筋脈拘攣。古聖散。用漏蘆銼炒半兩。地龍去土炒半兩。爲末。生薑二兩。取汁。入蜜三兩。同煎三五沸。入好酒五合。盛之。每以二盃調水一錢。溫服。（聖濟總錄方）

㊒治一切癰疽。發背初發二日。但有熱證。便宜服漏蘆湯。退毒下膿。乃是宜熱拔毒之劑。熱退即住服。漏蘆用有白茸者。連翹、生黃芪、沉香各一兩。生粉草半兩。大黃微炒一兩。爲細末。每服二錢。用薑漿湯調飲下。（集驗方）

㊓治白禿頭瘡。五月收漏蘆草燒灰。豬膏和塗之。（聖濟總錄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡瘡瘍之屬於陰症而氣虛不起及孕婦禁用。連翹爲之使。

參攷資料　㊀此藥久服甚益人。而服食方罕見用之。近道出者。惟療瘻疥耳。市人皆取苗用。（陶弘景）㊁漏蘆下乳汁。消熱毒。排膿止血。生肌殺蟲。故東垣以爲手足陽明藥。而古方治癰疽發背。以漏蘆湯爲首稱也。龐安常傷寒論。治癰疽及預解時行痘疹熱。用漏蘆葉云。無則以山梔子代之。亦取其寒能解熱。蓋不知其能入陽明之故也。（李時珍）㊂漏蘆生喬山山谷。八月採根陰乾。（別錄）㊃喬山應是黃帝所葬處。乃在上郡及出近道。市人取苗用之。俗中取根名鹿驪根。苦酒磨以療瘡疥。（陶弘景）㊄此藥俗名萹蓄。莖葉似白蒿。花黃生莢。長似細麻之莢。大如筋許。有四五瓣。七八月後皆黑。異於衆草蒿之類也。常用其莖葉及子。未見用根。其鹿驪山南謂之本黎蘆。有毒。非漏蘆也。今人以馬薊似苦芙者爲漏蘆。亦非也。（蘇恭）㊅別本言漏蘆莖大如筯。高四五尺。子房似油麻房而小。江東人取其苗用。勝於根。江寧及上黨者佳。陶云鹿驪。蘇云木黎蘆。亦非也。漏蘆自別。（馬志）㊆南人用苗。北土用根。乃樹生如茱萸樹。高二三尺。有毒。殺蟲。山人用以洗瘡疥。（陳藏器）㊇葉似角蒿。今晉兗州下濕處最多。六月七月採莖日乾。黑於衆草。（韓保昇）㊈今汴東州郡及奉海州皆有之。舊說莖葉似白蒿。花黃白。莖莖者筋大。房類油麻而小。今諸郡所圖上。惟單州者差相類。沂州者花葉頗似牡丹。秦州者花似單葉寒菊。紫色。五七枝同一幹。海州者花紫碧。如單葉蓮花。花萼下及根旁有白茸褭之。根如蔓青而細。又類慈本。黑色。淮甸人呼爲老翁花。三州所生。花雖別而葉頗相類。但秦海州者葉更作鉅齒狀。一物而殊類。如此醫家何所適從。當依舊說似單州出者爲勝。又本草飛廉名漏蘆。云與苦芙相類。其根生則肉白皮黑。乾則黑如玄參。七八月採花陰乾用。所說與秦州海州所圖漏蘆花葉及根頗相近。然彼人但名漏盧。不曰飛廉也。（蘇頌）㊉按沈存中筆談云。今方家所用漏盧。乃眞飛廉也。飛廉一名漏盧。苗似苦芙。根如牛蒡。綿頭者是也。採時用根。今蜀中所謂漏盧。莖如油麻。高六七尺。秋深枯黑如漆。採時用苗。乃眞漏蘆者也。（李時珍）

【漏盧】　卽飛廉之古籍別名。典見別錄「與飛廉」條。

【漏藍子】

命名　本品乃附子之瑣細未成者。小而漏藍。故名。

古籍別名　木鼈子。（炮炙論）虎掌。（日華）

基本　屬毛茛科。爲附子之未成者。

採取　八月間採。

用法　恒以剉研和入外治藥用。

性質　苦。辛。有毒。

效能　祛風。療瘡。用作麻醉性之瘡瘍藥。

主治　惡瘡。冷漏瘡。惡瘡。癘風。

配合應用　百歲丸。治一切惡瘡雜下及休息痢。用漏藍子一個大者。阿膠。木香。黃連。罌粟殼各半兩。俱炒。焦存性。入乳香少許爲末。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

糊丸。梧子大。每一歲一丸。米飲下。（羅天益衛生寶鑑方）

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡非實症者禁用。

參攷資料　㊀南星之最小者名虎掌。此物類之。故亦同名。大明會典載四川成都府歲貢天雄二十對。附子五十對。烏頭五十對。漏蘆二十斤。不知何用。（李時珍）㊁服之令人喪目。（雷斅）㊂按楊士瀛直指方云。凡漏瘡年久者。復其元陽。當用漏蘆子輩加減用之。如不當用而輕用之。又恐熱氣乘虛變移結核。而爲害尤甚也。又按類編云。一人兩足生瘡。臭潰難近。夜宿五夫人祠下。夢神授方。用漏蘆子一枚。生研爲末。入膩粉少許。井水調塗。依法治之。果愈。蓋此物不堪服餌。止宜入瘡科也。（李時珍）

【漏藍子】　卽木鼈子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木鼈子』條。

【漏蘆】　卽漏盧之處方用名。詳『漏盧』條。

【漏蘆苗】　卽漏盧之苗。性質功用與根同。詳『漏盧』條。

【漏蘆根】　卽漏盧之根。詳『漏盧』條。

【漚麻汁】　**基本**　本品卽久漬黃麻之水。

主治　止消渴。治瘀血。

【漢防己】　卽防己之處方用名。詳『防己』條。

【漢麻仁】　卽大麻仁之古籍別名。典見爾雅。詳『大麻仁』條。

【漢椒】　卽川椒之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『川椒』條。

【漫漿】　卽鱧鱺之古籍別名。典見綱目。詳『鱧鱺』條。

【榮】　係陸英不榮而實者之別名。典見爾雅。詳『陸英』條。

【漬菜】　卽白菜之日本名。詳『白菜』條。

【熔鐵石】　卽焰鐵石。詳『慈石』條。

【熊】　**命名**　熊字篆文象形。故名。

外國名詞　Ursus torquatus Schinz.（拉丁）Bear 或 Black bear（英）クマ或クログマ（日本）

基本　脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類蹠腳類熊科。

產地　生深山巖谷間。

形態　熊爲獸類之一種。其體肥滿。頭大。額闊。耳殼短圓。鼻端略鈍。眼露凶光。嘴突出上脣中央有分裂。四肢短。後比前長。能直立以蹂踏地。各五趾。具鉤爪。爪不能伸縮。尾短小。毛深密而剛硬。色黑光澤。咽喉部有白色月形紋。體長四五尺。宍居樹洞土窖中。冬蟄春出。晝隱夜出。覓食果實芋藷等物。其肉可供食與藥用。



熊

性質　甘。平。無毒。

主治　風痺。筋骨不仁。功與脂同。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論熊肉曰。補虛羸。

參攷資料　㊀有痼疾。不可食熊肉。令終身不除。（陶弘景）㊁若腹中有積聚。寒熱者。食之永不除也。十月勿食之。傷神。（張鼎）㊂按劉河間云。熊肉振羸。冤目明眵。因其氣有餘。以補不足也。（李時珍）

【熊白】　卽熊脂之古籍別名。典見綱目。詳『熊脂』條。

【熊血】　**主治**　小兒客忤。

【熊脂】　**古籍別名**　熊白。（綱目）

製法　凡取得每一斤。入生椒十四粒。同煉。器盛收之。用。

性質　甘。微寒。無毒。

主治　風痺不仁。筋急五驚。腹中積聚。寒熱羸瘦。頭傷白禿。面上皯皰。久服强志。不飢。輕身延年。（本經）飲食嘔吐。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論熊脂曰。治面上黯黶及瘡。【唐】蘇恭新修本草論熊脂曰。長髮令黑。悅澤人面。【宋】日華諸家本草論熊脂曰。治風。補虛損。殺勞蟲。酒鍊服之。

參攷資料　㊀熊白乃背上肪。色白如玉。味甚美。寒月則有。夏月則無。其膂肪及身中脂。煎煉過。亦可作藥。而不中嗽。（陶弘景）㊁

603／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熊膽涼。其脂燃燈。烟損人眼。令失光明。(日華)

【熊骨】　主治　煎湯浴歷節風。及小兒客忤。

製法　以酒醋水同煮。

【熊掌】　主治　禦風寒。益氣力。作肴食之。

【熊腦髓】　主治　諸耳聾。歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論熊膽髓曰。療頭旋摩項。去白禿。風屑生髮。

【熊膽】　外國名稱　Bear-gall. (英) Barengall. (德)

基本　係食肉類獸熊之膽囊。

產地　陳仁山藥物生產辨云。熊膽產雲南爲正地道。近日來者。以印度西藏爲多。

形態　其形如茄。外面作淡赭色。如皮革。膽口附着纖維質。內部附有金黃之細粒。若松香之粉末。蓋卽膽液風乾後留剩之膽質也。

採取　冬夏兩季間採之。

製法　採得以細竹片挾持膽囊。文火炙五六日。懸高處十日許。風乾候膽汁漸凝。乃以小板微壓令扁。然後出售。

用法　恒以剉研。和作丸散用。

性質　苦寒無毒。

效能　去翳明目。殺蟲治疳。用作健胃殺蟲。鎭痙。興奮藥。又爲膽汁補償藥。

主治　時氣熱盛。變爲黃疸。暑月久痢。疳蟲心痛狂忤。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論熊膽曰。小兒驚癇瘈瘲。以竹瀝化兩豆許服之。去心中涎。甚良。【宋】大明日華諸家本草論熊膽曰。治諸疳耳鼻瘡惡瘡殺蟲。【明】李時珍本草綱目論熊膽曰。退熱清心。平肝明目去翳。殺蛔蟯蟲。【清】黃宮繡本草求眞論熊膽曰。熊膽味苦性寒無毒。功能涼心平肝。惟其涼心。故能治心。鱉疳忤熱邪等症。惟其平肝。所以能治目赤翳障。惡瘡痔漏等症。且能入脾而治黃疸。瀉邪入大腸而治久痢疳蟲。瀉熱并治小兒風痰癮瘧。發作驚癇。要皆除熱涼血而病自愈。耳凡此只可作丸。勿煎湯。通明者佳。性善辟塵。撲水上投。膽少許。則塵埃然而開。又取少許。研滴水中。掛如線。直至水底而不散者眞。

國外學說　日本產之熊膽有岡膽。島膽二種。岡膽爲產於深山之熊膽。上品也。島膽爲北海道海濱所產熊膽。有一種腥臭。品不佳。又因採製時期而有夏膽冬膽之別。夏膽作紅黃色。能透映。囊皮厚。膽汁少。謂之琥珀手。推爲佳品。冬膽黑色。有光澤。囊皮薄。膽汁滿。謂之黑膽。此非佳品。又有現綠褐色者。謂之青茶手。大抵琥珀手多採於秋間。黑膽多採於春間。又夏採之琥珀手。至秋每變爲茶褐色。秋採之琥珀手。至春每變爲黑色。又一本堂藥選曰。熊膽療癥瘕。疝痞。痃癖。心胸痛。腹痛。傷食腹痛。不吐不瀉。諸癲癇疾。痢疾。殺蟲。止嘔。發痘瘡。治疳疾。驚癎。妊娠腹痛。產後腹痛。催生。點眼去翳。塗痔止痛。一切卒患。急病用以鼓舞元氣。開通蔽塞。前人以熊膽爲小兒藥。並救急藥。出產無多。價值殊昂。從而僞藥亦夥。往往以豬膽。猴膽。牛膽等混充。甚者竟有以植物性苦味藥。煉製越幾斯。爲魚目混珠之計。茲將僞製法並試驗法摘錄如下。以資辨別。山海名產圖會曰。熊膽僞製法。以黃柏。山梔子。毛黃連三味。同研粉末。先炙山梔子。去其香。再與兩味混和。入水濃煎。則成黑色。有光澤之物質。乾後與熊膽無二。洋皮紙兩層包之。此紙先用水仙花根汁拖過。令變色。然後用。包妥之後。挾入榨板。陰乾。紙便發皺。且藥汁滲入。宛如眞膽皮。冬日製者。突暴氣爛。因此必夏間製之。日本僞製熊膽出於備後。他國之贋品大率如此。又世事百談曰。孕婦月數多。身重。猝然氣絕。隕仆。目定。齒噤。舌人事不知。若發癲癎然。是名子癎。急以眞熊膽溫水化開。灌入口中。頻頻用之。旋見蘇甦。效驗確實。如此。誠婦人救命丹也。凡有家室者。不可不備。然必眞者乃效。世稱琥珀手。爲斯中上品。試驗之法。以熊膽粟粒大許。入水椀中。如一線引散者。眞。其入水卽旋轉如飛者。尤佳。若引散旋轉俱遲緩者。皆他獸膽也。

配合應用　㊀熊膽丸。治赤目障翳。每以膽少許。化開。入冰片一二片。銅器點之。絕奇。或淚痒加生

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

豈粉豈須。(齊東野語方)

㈡治初生目閉由胎中受熱也。以熊膽少許。燕水洗之。一日七八次。如三日不開。服四物加甘草天花粉。(全幼心鑑方)

㈢治小兒鼻蝕。熊膽半分。湯化抹之。(聖惠方)

㈣治十年痔瘡。熊膽塗之。神效。一切方不及也。(外臺祕要方)

㈤治腸風痔瘻。熊膽半兩。入片腦少許。研和豬膽汁塗之。(壽域方)

㈥蛔蟲心痛。熊膽一大豆。和水服之。大效。(外臺祕要方)

㈦治風蟲牙痛。熊膽三錢。片腦四分。每以豬膽汁和調少許。擦之。(孫氏生方)

㈧治水弩射人。熊膽塗之。更以雄黃同酒磨服卽愈。(斗門方)

㈨治諸疳羸瘦。熊膽使君子末等分。研勻。瓷器燕溶。燕餅丸。麻子大。每米飲下二十丸。(保幼大全方)

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡無實熱鬱火者禁用。惡防己。忌地黃。

【熏黃】

基本　本品係雄黃之青黑色而堅者。

性質　苦。平。寒。有毒。

主治　惡瘡疥癬。殺蟲虱。和諸藥熏嗽。

【熏黃】卽雄黃之古籍別名。典見綱目。詳『雄黃』條。

【熒】卽玉竹之古籍別名。典見爾雅。詳『玉竹』條。

【鍰牛】卽牛生於北方者之別名。體頗大。有黃黑赤白駁雜數色。肉之性質功用。與尋常牛肉同。詳『牛肉』條。

【犗牛】卽牛最小者之別名。產廣南。肉之性質功用。與尋常牛肉同。詳『牛肉』條。

【獾子薑】卽杜若之古籍別名。典見藥性。詳『杜若』條。

【獐耳草】卽竹葉細辛之別名。典見綱目拾遺。詳『竹葉細辛』條。

【獐耳細辛】卽及己之古籍別名。典見綱目。詳『及己』條。

【獐頭】卽土茜之古籍別名。典見綱目。詳『土茜』條。

【獙苴】卽蕙蒨之古籍別名。典見說文。詳『蕙蒨』條。

【瑿瑿葡萄】

古籍別名　公領孫(拾遺)

形態　回疆志葡萄一根數本。藤蔓牽長。花極細而黃白色。其實有紫白青黑數種。形有圓長大小。味有酸甜不同。一種色綠而無核。較黃豆微大。味甘美。一種色紫而小。如胡椒。卽瑿瑿葡萄。一種色黑。形長寸許。一種色白而大。皆七八月熟。晾乾可致遠。

性質　甘。酸。溫。平。無毒。

主治　筋骨溼痛。能利小便。

配合應用　㈠強腎。瑿瑿葡萄、人參各一錢。火酒浸一宿。侵晨塗手心。摩擦腰脊。能助脊力。強壯。若夙時磨擦腰脊。力助陽事。堅強。尤爲得力。

㈡稀痘。瑿瑿葡萄一歲一錢。神黃豆一歲一粒。杵爲細末。蜜水調服。并擦心窩腰眼。能助腎祛邪。以北地方物。專助東南生氣之不足也。然惟稟實素弱者。用之有益。若氣壯偏陽者。勿服。恐其助長淫火之毒也。

參攷資料　㈠本經逢原云。瑿瑿葡萄。似葡萄而瑿細。故名生漠北。南方間亦有之。其蔓類木而係藤。本其子生青熟赤。乾則紫黑。能攝精氣。歸宿腎臟。與五味功用相近。凡藤蔓之類。皆屬於筋。草木之實。皆達於臟。不獨此味爲然。此物向供食品。不入湯藥。故本草不載。近時北人以之強腎。南人以之稀痘。各有攸宜。㈡五雜俎西域自葡萄生者不可見。其乾者味殊奇甘。有兔眼葡萄。無核。又有瑿瑿葡萄。形似紫黃。小兒食之。能解痘毒。于文定筆塵云。瑿瑿卽駿娑之訛。㈢黎媯曾仁恕堂筆記。瑿瑿葡萄。于文定引西京羽獵賦。謂瑿瑿當爲駿娑。固屬附會。而以爲別有一種。亦非河西葡萄。雖引根牽蔓不異。中土而結實大長如馬乳。色深紫。味亦殊甘。一枝千百顆。大者在上。細者下垂。取而乾之。大者爲白葡萄。細者名瑿瑿。非兩種也。故俗呼爲公領孫。惟綠葡萄則來自西域。非中土所有。㈣按紫桃軒雜綴。瑿瑿葡萄。神農九草之一。中土久有。不俟博望從西域帶來也。吾里東塔朱貫臣墓有之。戊子余曾歷平湖幕署。有一枝蔓延滿架。夏開瑿

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

碎花。結實如蓇豆。望不可見。吾杭螺螄山汪姓家亦有此。然食之味澀。不若甘肅者味厚也。入藥自宜以西北者爲優。（趙恕軒）

【瑤池沙】主治　稀痘。取沙與小兒常食之。永不出痘。

參攷資料　柑園雜識。喇嘛嘗進瑤池水。水香蓮色。白而重。以琉璃器貯之。數百年不涸不變。人飲之能療百病。康熙五十三年。遣理藩院員外盛柱取之。自京出西寧口。望西北行凡七千里。至星宿海。即世所稱火敦臘兒也。更西北行三千里。達崑崙山。山形如桃。皆積雪。人不能上。測影高三百餘丈。山前名孔雀門。後名馬門。左名獅門。右名象門。山四隅各有一山。皆低於崑崙。孔雀門內有池。名麻蓬達。噶華言天河也。四山之水合流於天河。河水伏流至星宿海。復流出入中國。去崑崙西北四五里。即瑤池。池匝百八十里。岸傍皆雪。水中有五色細砂。滑膩可食。取水一瓶。并圖山川風土而歸。往返凡二年零六月。

【瑤桂】即猪桂之訛。詳『肉桂』條。

【瑪瑙】外國名國　Achatt（德）　Agate（英）

命名　本品色頗炯紅。文理交錯。一似馬之腦狀。故名。

古籍別名　文石。摩羅迦隸。（一綱目）夾胎瑪瑙。（衍義）

形態　瑪瑙爲石英類石類礦物之一種。與玉髓同質。時有赤白灰各色相間成平行層。多圓形。中心常空洞。水晶簇生其中。品類甚多。以矽木不熟者爲眞。可供藥用。

性質　辛。寒。無毒。

主治　辟惡。熨目赤爛。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論瑪瑙曰。目生瘴霧爲末點之。

【瑰蓴】即蓴之別名。典見綱目。詳『蓴』條。

【穀】即青玉之古籍別名。典見綱目詳『青玉』條。

【儳蠭】即大黃蜂之古籍別名。典見綱目。詳『大黃蜂』條。

【碧水龍】即肉蓯蓉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉蓯蓉』條。

【碧玉草】即燈心草之古籍別名。典見綱目。詳『燈心草』條。

【碧石青】基本　碧石青爲石類之一種。可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　益精明目。去白翳。久服延年。

【碧竹子】即鴨跖草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鴨跖草』條。

【碧貝】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【碧靑】即白靑之古籍別名。典見唐本草。詳『白靑』條。

【碧飛】古籍別名　方勝板。土錦灰地匾。（綱目拾遺）

形態　碧飛爲爬蟲類蝮蛇屬之一種。大者粗如圈。羨小者粗亦如杯。斧頭突目。鋸齒紋方而綬色。雄者赤紫。雌者青黑。光曄熠如蜃甲。目亦如之。夏春布絲草篠。人物觸之。激射迅於矢。忽然不見。已攫肉而去。殺人至死。霜降絲脆。高升樹杪。施吐白涎。鳥鵲下啄則吞之。性畏鹿豬。冬蟄地中。其肉可供藥用。

性質　大熱。有毒。

主治　惡風頑痺。蝮蛇傷。

參攷資料　碧飛惟鹿以爲膳。獵獲之前。左足扼其腰中。首尾盤繞右足。叉趾寸解。啖無餘者。人得而腊之。可入藥。野猪亦能食之。土人言冬日蛇蟄地中。野豕嗅其氣。輒翻石掘土。出而啖之。蛇性大熱。野猪惡風頑痺。非此猛烈積熱之性軀之。則肢廢者不能復舉。殆以毒攻毒之義而被其嚙者。還食其肉則生。（趙學敏）

【碧桃】即桃之碧色者之古籍別名。典見綱目。詳『桃』條。

【碧海水】命名　係海水之碧色者故名。

性質　鹹。微溫。有小毒。

主治　臚脹。下宿食。

【碧犀】即蛇角之古籍別名。典見綱目。詳『蛇角』條。

【碧魚】即鱒魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱒魚』條。

【碧澗】即茶之產於四川者之別名。詳『茶葉』條。

【碧霞石】基本　碧霞石爲石類之一種。可供藥用。

主治　明目去瞖障。

【碧蟬兒花】即耳環草之古籍別

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名。典見綱目。詳『耳環草』條。

【碧蟬花】 卽鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳『鴨跖草』條。

【碩鼠】 卽鼫鼠之古籍別名。典見周易。詳『鼫鼠』條。

【福果】 卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【福桑花】 卽佛桑花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『佛桑花』條。

【福參】 卽建參之別名。典見綱目拾遺。詳『建參』條。

【福橘皮】 卽橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【福澤瀉】 卽澤瀉之處方用名。詳『澤瀉』條。

【種黨蔘】 卽黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳『黨參』條。

【端】 卽玄參之古籍別名。典見別錄。詳『玄參』條。

【箠】 卽蒲扇之古籍別名。典見綱目。詳『蒲扇』條。

【箇桂皮】 性質 辛。溫。無毒。

效能 養精神。和顏色。輕身延年。

參致資料 箇桂皮辛而不熱。薄而能宣。善走胸脇。不能直達下焦。爲諸藥之先導。故能治百病。

【劉耳草】 基本 劉耳草爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 氣聾。

【管仲】 卽貫衆之處方用名。詳『貫衆』條。

【管貝齒】 卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【管松】 卽天門冬之古籍別名。典見嘉祐本草。詳『天門冬』條。

【精理黃石】 卽理石之別名。詳『理石』條。

【綟木】 命名 本品木文側戾。故名。

基本 綟木爲喬木類之一種。可供藥用。

產地 生山野林澤間。

性質 甘。溫。無毒。

主治 風血羸瘦。補腰脚。益陽道。宜浸酒飲。

【綠子】 卽鼠李子之別名。詳『鼠李子』條。

【綠升麻】 命名 本品卽升麻之綠色者。故名。

主治 痢疾下傷。

參致資料 本草從新謂綠升麻。乃升麻之別一種。拾遺則云升麻色綠者佳。非另一種也。經仲醇用治下痢。每每有驗。(趙學敏)

【綠毛龜】 古籍別名 綠衣使者。(綱目)

產地 出南海。

形態 綠毛龜爲介類龜之一種。大者如五銖錢。背生綠色絲狀之海藻。以中有金線者爲眞。脊骨有三稜。底甲如象牙。小者經寸。雜以金色。擺棄可玩。可供藥用。

製法 李時珍曰。劉氏先天丸用龜九枚。以活鯉二尾。安釜中。入水覆以米篩。安龜在篩上。蒸熟。取肉曬乾。其甲仍以酥炙黃。入藥用。又有連甲肉頭頸俱用者。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 通任脈。動陽道。補陰血。益精氣。治痿弱。

歷代記述攷證 【明】陳嘉謨本草蒙筌論綠毛龜曰。總置廣端。能禁邪癘。收藏書筒。可辟蠹蟲。

【綠白】 卽苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦參』條。

【綠衣使者】 卽綠毛龜之古籍別名。典見綱目。詳『綠毛龜』條。

【綠李】 卽李之古籍別名。典見唐本草。詳『李子』條。

【綠豆】 命名 本品爲豆類而色綠。故名。俗作菉豆。

處方用名 菜豆。

古籍別名 文豆。拔綠。摘綠。植豆。青小豆。(和漢藥考)

外國名稱 Green Bean(英)

基本 屬豆科。爲綠豆之種子。

產地 凡原野間處處生焉。

形態 綠豆莖高尺餘。莖葉花莢俱類赤小豆。自夏季至冬季不絕結實。將其早熟者再種之。至秋季已復結實。故日本有八重生之別名。八重卽重疊意。其實爲外面綠色或褐綠色之種子。似赤小豆而小。

種類 (一)莢粒粗而色鮮綠者爲官綠。其皮薄而粉多。(二)莢粒小而色褐綠者爲油綠。其皮厚而粉少。(三)早種者爲摘綠。蓋謂可頻摘也。(四)遲種者爲拔綠。蓋謂一拔而已也。

種植 三四月下種。田圃間恒多栽植。

607／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

採取　夏秋兩季採之。

製法　馬志曰。凡使綠豆。以圓小者佳。粉作餌炙食之良。大者名植豆。苗子相似。亦能下氣治霍亂。陳藏器曰。用之宜連皮。去皮則令人少壅氣。蓋皮寒而肉平也。

用法　水煮或搗剉用。

性質　甘。寒。無毒。

效能　消積熱。解百毒。

主治　煮食消腫。下氣壓解熱毒。生研絞汁服。治丹毒煩熱風癮。藥石發動。熱氣奔豚。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論綠豆曰。補益元氣。和調五臟。安精神。行十二經脈。去浮風。潤皮膚。宜常食之。煮汁能止消渴。【唐】孫思邈千金翼論綠豆曰。治寒熱熱中止泄痢。卒癰利。小便腹滿。【宋】日華諸家本草論綠豆曰。厚腸胃。作枕能明目。治頭風頭痛。除吐逆。【明】寧原食鑑本草論綠豆曰。解一切藥草牛馬金石諸毒。【明】李時珍本草綱目論綠豆曰。治瘡毒。利膿腹。【明】繆希雍本草經疏論綠豆曰。綠豆味甘氣寒無毒。入足陽明經。夫丹石之藥。氣悍而性熱。多服則火動上升。爲煩熱。甚則口鼻出血。狂悶躁擾。甘寒能除熱下氣。解毒。故主服丹石藥人毒發煩熱也。陽明客熱則發出風癮。以胃主肌肉。熱極生風。故也。解陽明之熱。則風癮自除。腹滿者。溼熱侵於脾胃也。熱氣奔豚者。溼熱客於胃經也。除溼則腫消。壓熱則氣下。益脾胃而腎邪亦自平也。孫思邈主寒熱熱中止泄痢。卒癰利。小便腹滿。日華子主厚腸胃。作枕明目。治頭風頭痛。益氣除熱毒風。孟詵主去浮風。益氣力。治消渴。和五臟。安精神。可常食之。功效不可備述。【清】黃宮繡本草求眞論綠豆曰。綠豆味甘性寒。據書備極稱善。有言能厚腸胃。潤皮膚。和五臟。及資脾胃。按此雖用參苡歸朮。不是過也。第書所言。能厚能潤。能和能資者。緣因毒邪內熾。凡臟腑經絡皮膚脾胃。無一不受毒擾。服此性善解毒。故凡一切癰腫等症。無不用此奏效。煮汁則止消渴。磨粉合以乳香丹砂。則能護心使毒不入。築枕夜臥。則能明目疎風。杖瘡疼痛。則用雞子白調敷。即愈。皮尤涼於菉豆。退翳明目如神。粉撲瘡潰尤妙。有除熱解毒之功。而無補益資助之力。且與梗子相反。同食則殺人。【清】王士雄隨息居飲食譜論綠豆曰。綠豆甘涼。煮食清膽養胃。解暑止渴。潤皮膚。消浮腫。利小便。已瀉痢。析醒弭痘。浸發芽。摘根爲蔬。味極清美。生研絞汁服。解一切草木金石諸藥牛馬肉毒。或急火煎清湯冷飲。亦可。

配合應用　㈠扁鵲三豆飲。治天行瘡瘡。預服此飲。疎解熱毒。縱出亦少。用綠豆赤小豆。黑大豆。一升。甘草節二兩。以水八升。煮極熟。任意食豆飲汁七日乃止。一方加黃大豆。白大豆。名五豆飲。

㈡治瘡後癰癤。初起以三豆膏治之。神效。綠豆赤小豆。黑大豆等分。爲末。醋調。時時掃塗。即消。（醫學正傳方）

㈢治防瘡入眼。用綠豆七粒。令兒自投井中。頻視七遍乃還。（全幼心鑑方）

㈣治小兒丹腫。綠豆五錢。大黃二錢。爲末。用生薄荷汁入蜜調塗。（全幼心鑑方）

㈤治赤痢不止。以大麻子水研濾汁。煮綠豆食之。極效。粥食亦可。（必效方）

㈥治老人淋痛。青豆二升。橘皮二兩。煮豆粥下麻子汁一升。空心漸食之。併飲其汁。甚驗。（養老書方）

㈦治消渴飲水。綠豆煮汁。並作粥食。（普濟方）

㈧治心氣疼痛。綠豆廿一粒。胡椒十四粒。同研。白湯調服。即止。

㈨治多食易饑。綠豆。黃麥。糯米各一升。炒熟。磨粉。每以白湯服一盃。三五日見效。

㈩十種水氣。用綠豆二合。半大附子一隻。去皮臍。切作兩片。水三碗。煮熟。空心臥時食豆。次日將附子兩片作四片。再以綠豆二合。半如前煮食。第三日別以綠豆附子如前煮食。第四日如第二日法煮食。水從小便下。腫自消。未消再服。忌生冷毒物鹽酒六十日。無不效者。（朱氏集驗方）

用量　三錢至五錢。

施用宜忌　凡無熱毒者禁用。反棗子。忌鯉魚。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料　㈠綠豆肉平皮寒。解金石砒霜草木一切諸毒。宜連皮生研。水服。按夷堅志云。有人服附子酒多。頭腫如斗。脣裂血流。急求綠豆黑豆各數合。嚼食。井煎湯飲之。乃解也。(李時珍)㈡綠豆處處種之。三四月下種。苗高尺許。葉小而有毛。至秋開小花。莢如赤豆莢。粒粗而色鮮者爲官綠。皮薄而粉多。粒小而色深者爲油綠。皮厚而粉少。早種者呼爲摘綠。可頻摘也。遲種呼爲拔綠。一拔而已。北人用之甚廣。可作豆粥。豆飯。豆酒。燔食。麪食。磨而爲麪。澄濾取粉。可以作餌。頓餻。澱皮。搓索。爲食中要物。以水浸澀。生白芽。又爲菜中佳品。牛馬之食亦多賴之。眞濟世之良穀也。(李時珍)

【綠豆皮】性　甘寒。無毒。
主治　解熱毒。退目翳。

【綠豆花】主治　解酒毒。

【綠豆芽】性　甘平。無毒。
主治　解酒毒。熱毒。利三焦。

參攷資料　諸豆生芽。皆腥穢不堪。惟此豆之芽。白美獨異。今人視爲尋常。而古人未知者也。但受溼熱鬱浥之氣。故頗發瘡動氣。與綠豆之性。稍有不同。(李時珍)

【綠豆青】卽曲節草之古籍別名。典見圖經本草。詳『曲節草』條。

【綠豆粉】性　甘涼。平。無毒。
主治　解諸熱。益氣。解酒食諸毒。治發背。癰疽。瘡腫及湯火灼傷。

歷代記述攷證　【明】寧原食鑑本草論綠豆粉曰。痘瘡溼爛。不結痂疙者。乾撲之良。【明】汪穎食物本草論綠豆粉曰。解菰菌砒毒。【明】李時珍本草綱目論綠豆粉曰。新水調服。治霍亂轉筋。解諸藥毒死。心頭尙溫者。【明】繆希雍本草經疏論綠豆粉曰。菜豆粉所稟氣味。與菜豆同。故能解諸熱及酒食毒。湯火傷灼也。發背。癰疽。瘡腫。皆熱毒所致。甘寒解陽明之熱。則毒氣不至犯胃而嘔惡。腸胃清涼。而諸腫散矣。熱傷氣。除熱故能益氣也。

臨用宜忌　菜豆粉性涼。脾胃虛寒易泄者。勿多食。

參攷資料　㈠勿近杏仁。則爛不能作索。(吳瑞)㈡綠豆色綠小豆之屬。木者也。通於厥陰。陽明。其性稍平。消腫治痘之功。雖同赤豆。而壓熱解毒之力過之。且益氣。厚腸胃。通經脈。無久服枯人之忌。但以作涼粉。造豆酒。或偏於冷。或偏於熱。能致人病。皆人所爲。非豆之咎也。豆粉須以綠色黏膩者爲眞。外科治癰疽。有內托護心散。極言其神效。丹溪朱氏。有論發揮。(李時珍)㈢外科精要謂內托散。一日至三日。進十數服。可免毒氣內攻臟腑。切詳綠豆解丹毒。治石毒。味甘入陽明。性寒。能補爲君。以乳香去惡腫。入少陰。性溫善導爲佐。甘草性緩。解五金八石百藥毒爲使。想北方專爲服丹石發疽者設也。若夫年老者。病深者。證備者。體虛者。綠豆雖補。將有不勝其任之患。五香連翹湯亦非必用之劑。必當助氣壯胃。使根本堅固而行經活血。爲佐參以經絡時令。使毒氣外發。此則內托之本意。治施之早。可以內消也。(朱震亨)

【綠豆莢】主治　赤痢經年不愈。蒸熟隨意食之。

【綠豆粥】基本　本品係綠豆和米煮成之粥。
主治　解熱毒。止煩渴。

【綠豆葉】主治　霍亂吐下。絞汁和醋少許。溫服。

【綠青】命名　本品乃山之陰石生銅坑中。其色綠青或黑綠。故名。
處方用名　石綠。
古籍別名　大綠。泥綠。(綱目)
國外學說　Verdigris (英)
基本　係金屬礦石類。爲銅礦中綠色之塊粒或粉末。
產地　凡山谷之銅礦中恒有生焉。
形態　綠青爲淡綠色之塊粒或粉末。不溶於水。溶於酸液中。則成青綠色之溶液。
種類　㈠質堅硬如石塊者。名石綠。爲上品。㈡質脆爛如碎土者。名泥綠。爲下品。
製法　採得淘取淨綠用。
用法　研細爲末。和作丸散。或入水或化和作外傅藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　苦酸有小毒。

成分　主要成分爲鹽基性醋酸銅及亞砒酸之毒物等。

效能　吐風痰治疥癬專作皮膚病之殺蟲藥又治黃癬。

作用　能使微血管收縮減少黏膜之分泌遇疥癬等菌皆能殺死之。

主治　益氣止洩痢痰眩鼻。

歷代記述及證【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論綠青曰吐風痰甚效。

配合應用　㈠治急癎昏迷不省人事石綠四兩輕粉一錢爲末薄荷汁入酒調一字服取吐。（全嬰方）

㈡治風痰迷悶碧霞丹用石綠十兩烏頭尖附子尖蝎梢各七十箇爲末糊丸芡子大每服一丸薄荷汁入酒半合化下吐出痰涎甚效驗。（和劑局方）

㈢治小兒疳瘡、臀疳、鼻疳、頭瘡、耳瘡久不差者石綠白芷等分爲末先以甘草水洗瘡拭淨傅之一日愈。（集玄方）

㈣治脫下胡臭石綠三錢輕粉一錢濃醋調塗五次斷根。（集玄方）

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。

參攷資料　㈠今醫家多用吐風痰其法揀上色綠好者研篩水飛再研如風痰眩悶取二三錢同生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服之俯臥須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速於他藥今人用之比比皆效故著之。（蘇頌）㈡痰在上宜吐之在下宜利之亦須觀人之虛實强弱而察其脈乃可投之初虞世有金虎碧霞之戒正此意也金虎丹治風痰用天雄胭粉諸藥者（李時珍）㈢按此味善吐風痰以其爲銅之祖氣取金氣之精能使木平者莫是過也合龍腦名碧霞散不可以治溼痰惟同附子尖烏頭尖蝎梢用者名碧霞丹乃可治之中風之痰風溼有異此陽中陰中之分也世人憒憒者多（楊時泰）㈣舊不著所出州土但云生山之陰穴中次空青條上云生益州山谷及越崙山有銅處此物當是生其山之陰爾今出韶州信州其色青白畫工用爲綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人琢爲腰帶器物及婦人服飾其入藥當用顆塊如乳香者最佳（蘇頌）㈤石綠陰石也生銅坑中乃銅之祖氣也銅得紫陽之氣而生綠綠久則成石謂之石綠而銅生於中與空青曾青同一根源也今人呼爲大綠范成大桂海志云石綠銅之苗也出廣西古江有銅處生石中實如石者名石綠一種脆爛如碎土者名泥綠品最下大明會典云青綠石鑛淘淨綠一十一兩四錢暗色綠每礦一斤淘淨綠一十兩八錢硇砂一斤燒造硇砂綠一十五兩五錢（李時珍）

【綠柹】即捭柹之古籍別名典見日用本草詳『捭柹』條。

【綠柰】即蘋果色青者之古籍別名典見綱目詳『蘋果』條。

【綠益子】

產地　出遼東諸地。

形態　綠益爲喬木類之一種樹高丈餘其葉兩兩相對開花大如盞色黃花落結實亦兩兩相對大如木瓜綠色春生夏熟其子實可供藥用。

性質　大毒。

主治　腐骨碎齒外科方術家用之。

參攷資料　綠益子人不可食誤食之入口即齒落如屑舌黑如漆滿口裂碎血出如水終日不能食經旬方止又能碎骨如泥彼處棗毬初生取以潤其蹄則千里可行否則不能行其性剛利如錐舉而刺之利如刀鋸凡作角器必用此。（趙學敏）

【綠茶】即茶葉之一種詳『茶葉』條。

【綠袍草】即龍鬚草之古籍別名典見綱目拾遺詳『龍鬚草』條。

【綠梅花】即梅花之處方用名詳『梅花』條。

【綠結】即伽倆香色如鴨頭綠者之古籍別名典見綱目拾遺詳『伽倆香』條。

【綠葉綠花草】即澤漆之古籍別名典見綱目詳『澤漆』條。

【綠葡萄】即葡萄之實綠色者之別名詳『葡萄』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【綠鳩】即青鷰之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『青鷰』條。

【綠劍眞人】即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【綠膚青】古籍別名　推青。推石（別錄）

基本　綠膚青爲雜草類之一種。可供藥用。

產地　生山谷間。

性質　辛。鹹。平。無毒。

主治　蟲毒惡瘡及解蛇菜肉諸毒。

參攷資料　綠膚青不可久服。令人瘦（別錄）

【綠萼梅】即梅花之處方用名。詳『梅花』條。

【綠礬】命名　本品可以染皂色故又謂之皂礬。

古籍別名　青礬。絳礬。（唐本）礬紅。皂礬（綱目）青明礬。皂莢礬。（和漢藥考）

外國名詞　Green Vitriol（英）Eisen-vitriol（德）

基本　係鐵鑛類結晶屬。爲鐘乳形或纖維形之塊。

產地　陳仁山藥物生產辨云。青礬又名煉綠礬。西藥名磺鐵。化名鐵磺。養輕養鐵。養硫養產廣東各屬。均有此礬。用鐵質與黃鐵水製成者。又有用黑礬煉出者。結冰色淡綠。而遇光曬空氣略化。和漢藥考曰。日本備中及長門都產此。

形態　綠礬爲淡綠色稜柱狀結晶體。放置空氣中則養化。於表面生黃褐色銹。入水善溶。入酒精不溶。熱之則分解生鐵丹。味酸澁微甘。刺戟舌。

製法　注水於天產黃鐵鑛。放置空氣中。使之養化。將所化生者。再溶於水中。濾過。將濾液蒸發。使成結晶。即爲本品。現時及金銀精練處之副產物。將其精製即可。

性質　酸涼。無毒。

成分　綠礬爲粗製硫酸鐵（$Fe_2SO_4.7H_2O$）其黃褐色銹爲第二硫酸鐵（$Fe_2(SO_4)_3$）綠礬中時含有硫酸銅（$Cu\ SO_4.5H_2O$）作青綠色結晶體。

效能　燥澀化痰。功遜白礬。用作蝕腐及止血藥。又爲强壯藥。但易起消化障礙。又治貧血。創口出血。

作用　入胃後與胃內之鹽酸化合。而成氯化鐵。或與蛋白化合而成蛋白化鐵。至小腸首段。鐵即化成爲酸碳鐵。而次第被腸壁吸收。同時又能阻止腸黏膜之分泌。故久服有釀成大便燥結之弊。在血中能增進赤血球之數量。使全身熱量增高。精神健康。體力强壯。若服量過多。則反惹起腸胃炎。與血液相遇。有直接凝固血液之功。效亦甚迅速。

主治　疳及諸瘡。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論綠礬曰。喉痺蟲牙。口瘡惡瘡疥癬。醃鯽魚。燒灰服。療腸風瀉血。【明】李時珍本草綱目論綠礬曰。消積滯。燥脾溼。化痰涎。除腹滿黃腫。癗利。風眼口齒諸病。【明】繆希雍本草經疏論綠礬曰。綠礬氣味所禀。與白礬同。其酸涌澀收。燥溼解毒。化涎之功。亦與白礬相似。而力差緩。本經主喉痺者。酸涌化涎之功也。蛀牙口瘡。惡瘡疥癬者。燥溼除熱解毒之功也。腸風瀉血者。消散溼熱之後。復有收澀之功也。然而諸治之外。又善消積滯。凡腹中堅肉積。諸藥不能化者。以礬紅同健脾消食藥爲丸。投之。輒消。【清】黃宮繡本草求眞論綠礬曰。皂礬等於白礬。味亦酸鹹而澹。有收痰除溼。去蟲殺蟲之功。但力差於白礬。而稍緩耳。且此色綠味酸。燒之則赤。以破血分之積垢。其效甚速。如金匱之治女勞黑瘧。硝石礬石丸。專取皂礬以破積瘀之血。且治喉痺。用此以取酸涌化涎之力。惡瘡疥癬。用以收燥溼解毒之功。腸風瀉血。並用此以收消散溼熱之後。又有收澀之功也。然而諸治之外。又善消積滯。凡腹中堅積。諸藥不能化者。以紅礬同健脾消食藥爲丸。投之輒消。胃弱人不宜多用。服此者終身忌食薺麥。犯之立斃。

國外學說　日本學說謂綠礬爲消毒作用極强之鐵劑。亦可爲腐蝕藥。止血藥。其稀薄液用爲收斂藥。作軟膏用於丹毒。擦爛。膿泡。疹。梅毒潰瘍。作注射料用於淋病。白帶。又可用爲浴料。若內服過久。則害消化。若用大量則發腸胃炎。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

通常用爲收斂藥。治慢性腸加答兒、腸出血、尿道出血、肺出血等用量以五・〇一〇・〇溶於一〇〇・〇水內。可爲灌法料。以〇・五一二・〇溶於一〇〇・〇水內。可作注射料。以一・〇與五・〇〇獸脂相和。可作軟膏。以三〇・〇一五〇・〇可爲全身浴料。內服每次〇・〇五一〇・二五。又英美學說。謂青礬有從鐵質與礦强水製成。更有從黑礬煉成。露空氣則略化。印度國人俱用此質造墨。水古時羅馬人亦言此質能造墨。其天生者亦有之。俗名皂礬。其作用爲惹胃而兼收斂之鐵劑。又可爲行經藥。其補斂於鐵劑中爲上品。如血弱身虛者宜服。第不宜過服多服。以過服則肚疼作嘔。或至壞身。又如血少面白者。宜合龍膽草、青及蘆薈、硫礦等藥作丸服之。甚驗。或以青礬水化。並加礦强水少許。同服均妙。此藥雖與他類鐵劑。功用相同。然能惹腸胃。單服者甚少。處方以青礬一分、二釐。啞嘞一分、二釐。肉桂末三分、二釐。以水和勻。作丸八粒。每日飯後服二粒。治身弱血少心跳。及婦人月經不行等症。（青礬丸方）又青礬五釐、二毫半。水一兩。化勻爲度。洗火眼或作射水亦可。并治白帶白濁。（青礬洗水方）又青礬一分、黃油膏三十分。以調勻爲度。治金錢癬。（青礬油膏方）每服一釐七毫半至八釐七毫半。

近人學說　鄒爾凱曰。綠礬產天然之礦物或溶鐵於硫酸之中。或燒黃鐵鑛後。使爆於空中製之。呈綠色之結晶。故名綠礬。又名皂礬或稱青礬。化學記號爲 $FeSO_4 7H_2O$。故又名硫酸鐵。味酸鹹而帶澁。古書謂能收痰除濕。殺蟲破血。分積垢。近代西醫則多用爲補血劑。工業上常用爲製墨水之顏料。易溶於水。不溶於酒精。其主要成分。既爲鐵質。則爲補血劑無疑。惟含鐵質之藥品甚多。綠礬乃其劣等。故醫藥上不見常用。（市上售者不良。西藥房有精製者）又綠礬之用量。不能過多。通常以二釐至五釐爲止。如服過量。則起嘔吐。與腹痛等。及古人所謂除痰破血者也。大凡服鐵質之藥。入胃後即共胃酸發生變化。然後破入血中。惟患熱病者。消化不良者。則不宜用之。又綠礬與五倍子混和。可得良好之顏料。綠礬之配合和適應症。（一）綠礬二釐、大黃末一分。肉桂五釐。作一次服。日服三次。凡身弱血少心跳。及因血虛而致月經不調者宜之。（二）綠礬三分。金雞納霜三分。黃連末五分。研和。合成丸藥十五粒。每日早晚午各服一粒。爲血虛之補劑。（三）綠礬五釐。冷開水一兩。化勻。患火眼者。每日用此水洗滌二次。因綠礬有收斂及防腐之功也。（四）綠礬石灰木炭末各一斤。混和之。夏秋之間。隨意撒於便所。痰盂。陰溝等處。能使臭氣消滅。可爲臭藥水之代替品。

配合應用　㊀治重舌木舌。皂礬二錢。鐵上燒紅研摻之。（陸氏積德堂方）

㊁治喉風腫閉。皂礬一斤。米醋三斤。拌曬乾。末吹之。痰涎出盡。用良薑末少許。入茶內。漱口嚥之即愈。（孫氏集效方）

㊂治眼暴赤爛。紅棗五箇。入綠礬在內。火煨熟。以河水井水各一盌。桃柳心各七個。煎稠。每點少許入背上。（摘玄方）

㊃治爛弦風眼。青礬火煆出毒。細研。泡湯。澄清。點洗。亦治倒睫拳毛。（永類鈐方）

㊄治瘧疾寒熱。礬紅、獨蒜頭煨等分。搗丸。茨子大。每白湯嚼下一丸。端午日合之。（普濟方）

㊅治少陰瘧疾。嘔吐。綠礬一錢。乾薑炮半夏薑製半兩。爲末。每服半錢。發日早以醋湯下。（聖濟總錄方）

㊆治翻胃吐食。白麵二斤半。蒸作大饅頭一個。頭上開口。剜孔。將皂礬填滿。以新瓦園注。鹽泥封固。瓷土窰安放。文武火燒一日夜。取出研末。棗肉爲丸。梧子大。每服二十丸。空心酒湯任下。忌酒色。（醫方摘要方）

㊇治大便不通。皂礬一錢。巴霜二個。同研。入雞子內攪勻。封頭。溼紙裹。煨熟食之。酒下即通。（集玄方）

㊈治腸風下血。積年不止。虛弱甚者。一服取效。綠礬四兩。入砂鍋

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

內。新瓦盞定。鹽泥固濟。煅赤。取出。入青鹽、生硫黃各一兩研勻。再入鍋中。固濟煅赤。取出。去火毒。研。入熟附子末一兩。粟米粥糊丸。梧子大。每空心米飲溫酒任下三十丸。（永類鈐方）

㊀治婦人血崩。青礬二兩。輕粉一錢。爲末。水丸。梧子大。每服二三十丸。新汲水下。（摘玄方）

㊁治血證黃腫。綠礬四兩。百草霜一升。炒麵半升。爲末。沙糖和丸。梧子大。每服三四十丸。食後薑湯下。鄭時舉所傳。又方。小麥淘淨一升。皂礬半斤。同炒黃。爲末。黑棗肉半斤。搗勻。米醋打糊丸。梧子大。每薑湯下八九十丸。日三服。（簡便方）

㊂治脾病黃腫。青礬四兩。煅成赤珠子。當歸四兩。酒醋浸七日。焙。百草霜三兩。爲末。以浸藥酒打糊丸。梧子大。每服五丸至七丸。溫水下。一月後。黃去正效。又方。綠礬四兩。百草霜、五倍子各一兩。木香一錢。爲末。酒煎飛麪丸。梧子大。每空心酒下五丸。又方。平胃散。青礬二兩。爲末。醋糊丸。米飲下。或加烏沉湯四兩。酒糊丸亦可。（潔古方）

㊃治酒黃水腫。黃腫積痛。用青礬半斤。醋一大盞。和勻。瓦盆內煅乾。爲度。平胃散。烏藥順氣散各半兩。爲末。醋煮糊丸。梧子大。每酒或薑湯下二三十丸。不忌口。加鍋灰。（趙原楊眞人濟急方）

㊄治食勞黃病。身目俱黃。青礬鍋內安。炭煅赤。米醋拌爲末。棗肉和丸。梧子大。每服二三十丸。食後薑湯下。（救急方）

㊅治腹中食積。綠礬二兩。研末。醋一大盞。瓷器煎之。柳條攪成膏。入赤脚烏一兩。研丸。綠豆大。每空心溫酒下五丸。（聖惠方）

㊆治疳蟲食土及生物。研綠礬末。搭膽汁丸。綠豆大。每米飲下五七丸。（保幼大全方）

㊇治小兒疳氣不可療者。綠礬煅赤。醋淬三次。爲末。棗肉和丸。綠豆大。每服十丸。溫水下日三。（集驗方）

㊈治走馬疳瘡。綠礬放入鍋內。炭火煅紅。以醋拌勻。如此三次。爲末。入麝香少許。溫漱水漱淨摻之。（談野翁試效方）

㊉治白禿頭瘡。皂礬、楝樹子燒研搽之。（普濟方）

㊊治小兒頭瘡。綠礬一兩。淡豉一兩。炒黑。膩粉二錢。研勻。以桑灰湯洗淨摻之良。

㊋治小兒甜瘡。大棗去核。填入綠礬。燒存性。研貼之。（拔萃方）

㊌治耳生爛瘡。殭子去核。包青礬。煅研。香油調傅之。（摘玄方）

㊍治蜈蚣入耳。水調綠礬灌之。（普濟方）

㊎治蛆入耳中。綠礬摻之。卽化爲水。（摘玄方）

㊏治瘡中生蛆。綠礬末摻貼。卽化爲水。（摘玄方）

㊐治湯火傷灼。皂礬和涼水澆之。其疼卽止。腫亦消。（楊誠經驗方）

㊑治癬瘡作痒。螺螄十四個。槌碎。入鹽少許。研爛。擦之。（孫氏集效方）

㊒治甲疽延爛。崔氏方。治甲疽或因割甲傷肌。或因甲長侵肉。遂成瘡腫。黃水浸淫相染。五指俱爛。漸上脚趺。泡漿四邊起。如火燒瘡。日夜怪悶。醫不能療。綠礬石五兩。燒至汁盡。研末。色如黃丹。收之。每以鹽湯洗拭。用末厚傅之。以軟帛煖裹。當日卽汁斷瘡乾。每日一遍。鹽湯洗瀉。有膿處使淨。傅其痂乾處。不須近。但有急痛處。塗酥少許。令潤。五日卽覺上痂起。依前洗傅。十日痂漸剝盡。軟處或更生白膿泡。卽擦破。傅之。自然癒也。張侍郎病此。臥經六十日。京醫並處方無效。得此法如神。（外臺秘要方）

㊓治婦人甲疽。婦人趾甲內生瘡。惡肉突出。久不愈。名臭田螺。用皂礬日晒夜露。每以一兩煎湯浸洗。仍以礬末一兩。加雄黃二錢。硫黃一錢。乳香、沒藥各一錢。研勻。摻之。（醫方摘要方）

㊔治塗染白髮。綠礬、薄荷、烏頭等分。爲末。以錢漿水浸。日日染之。（相感志方）

㊕治腋下胡氣。綠礬半生半煅。爲末。入少輕粉。以半錢。浴後薑汁調摻。候十分熱痛。乃止。（直指方）

用量　五分至錢半。

施用宜忌　凡脾胃虛寒及無積滯者禁用。

參攷資料　㊀綠礬酸涌瀉收。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

燥澀解毒。化涎之功。與自礬同而力差緩。按張三丰仙傳方載伐木丸云。此方乃上清金蓬頭祖師所傳。治脾土衰弱。肝木氣盛。木來尅土。病心腹中滿。或黃腫如土色。服此能助土益元。用蒼朮二斤。米泔水浸二宿。同黃酒麵麴四兩。炒赤色。皂礬一斤。醋拌晒乾。入瓶火煅爲末。醋糊丸。梧子大。每服三四十丸。好酒米湯任下。日二三服。李時珍曰。綠礬可以染皂色。故謂之皂礬。又黑礬亦名皂礬。不堪服食。惟療家用之。赤者俗名礬紅。以別朱紅。（李時珍）㈢綠礬出隰州溫泉縣。池州銅陵縣。並煎礬處生焉。初生皆石也。煎煉乃成其形。似朴硝而綠色。取置鐵板上。聚炭燒之。礬沸流出。色赤如金汁者是眞也。沸定時汁盡。則色如黃丹。又有皂礬。或云卽綠礬也。（蘇頌）㈣綠礬新出窟未見風者。正如琉璃色。人以爲石膽燒之赤色。故名綠礬。出瓜州者良。（蘇恭）㈤綠礬晉地、河內、西安、沙州皆出之。狀如硇消。其中揀出深青瑩淨者。卽爲青礬。煆過變赤。則爲絳礬。入坊場及漆匠家多用之。然貨者亦雜以沙土爲塊。昔人往往以青礬爲石膽誤矣。（李時珍）

【綠鬚薑】卽細辛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『細辛』條。

【綠鹽】命名　本品爲鹽之綠色者故名。

古籍別名　鹽綠。石綠。（綱目）

產地　出波斯。或謂出新疆。

採取　以久藏而色不變陰雨時。仍乾燥而不溼者爲眞。入藥用。

性質　鹹。苦。辛。平。無毒。

主治　目赤。淚出。膚瞖昏暗。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論綠鹽曰。點眼明目消瞖。療小兒疳氣。

【綠槐】卽槐槐綠色者之古籍別名。典見綱目。詳『槐槐』條。

【網草】卽秦艽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『秦艽』條。

【綸】卽昆布之古籍別名。典見爾雅。詳『昆布』條。

【綸布】卽昆布之古籍別名。典見吳普本草。詳『昆布』條。

【綻殼芽】卽穀芽之處方用名。詳『穀芽』條。

【綽菜】卽睡菜之古籍別名。典見綱目。詳『睡菜』條。

【綿】卽絲綿之原名。詳『絲綿』條。

【綿大戟】卽大戟之處方用名。詳『大戟』條。

【綿灰】主治　吐血衄血。下血崩中。赤白帶下。疳瘡。臍瘡。聤耳。

【綿羊】卽羊之一種。肉之功用。詳『羊肉』條。

【綿杜仲】卽杜仲之處方用名。詳『杜仲』條。

【綿耆】卽黃耆之古籍別名。典見綱目。詳『黃耆』條。

【綿桃】卽桃之古籍別名。典見綱目。詳『桃』條。

【綿茵陳】卽茵陳蒿之處方用名。詳『茵陳蒿』條。

【綿梨】卽梨之古籍別名。典見綱目。詳『梨』條。

【綿絮頭草】古籍別名　金沸草。地蓯。黃花子草。（綱目拾遺）

產地　生山野間。

形態　綿絮頭草爲山草類之一種。立春後發苗。布地生葉。葉似槐。火而薄。有白毛。並有白絲色。青白。質堅。觳氣清香。立夏後開黃花成簇。一莖直上。本小如翦刀草。其莖葉可供藥用。

性質　酸。寒。有小毒。

主治　癰風溼痺。梅瘡下疳。同甘草煎洗。並療小兒疳疾。揉粉作饘食。

參攷資料　綿絮頭草多食損目。（趙學敏）

【緊骨香】卽紅木香之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見綱目拾遺。詳『紅木香』條。

【緋帛】　命名　本品係用染絲造成之帛。卽紅色之綢也。故名。

主治　燒研傅初生兒臍未落時腫痛。又療惡瘡疔腫諸瘡。有根者入膏用爲上。仍以掌大一片。用露蜂房、棘刺鉤、爛草節、亂髮等分燒研。空腹服方寸匕。

歷代記述弘畧　【元】王好古湯液本草論緋帛曰。主墜馬及一切筋骨損。【明】李時珍本草綱目論緋帛曰。燒研療血崩。金瘡出血。白駁風。

【緋桃】　卽桃之古籍別名。典見綱目詳『桃』條。

【緋絹】　基本　本品爲絹之赤色者。

主治　燒灰服。療癎疾。

【翠羽草】　命名　本品葉細。攢簇如羽狀而有翠斑。故名。

古籍別名　翠雲草。孔雀花。神錦花。鷄翎草。鳳尾草。矮脚鳳尾。翠翎草。金雞獨立草。（綱目拾遺）開屏鳳尾。（綱目拾遺）

產地　生山野陰濕諸地。

形態　翠羽草爲澀草類之多年生隱花植物。獨莖成瓣。無直梗。其莖細長。倒懸或平鋪於地。其根遇土卽生。見日卽萎。故生陰濕之地。採得可供藥用。

主治　止吐血。散喉風。辟暑邪。解火毒。同胡桃葉煎洗痔瘡。

參攷資料　㈠翠羽草爲散喉癰之聖藥。（採藥志）㈡嘉慶癸亥。予寓西溪吳氏家次子。年十五。忽腹背患起紅瘡。蔓延及腰。如帶或云蛇纏瘡。或云丹毒。乃風火所結。血凝滯而成。予疑其入山樵採。染蟲毒。乃以蟾酥犀黃錠塗之不效。二三日瘡愈大。作膿復與以如意金黃散敷之亦不效。次日瘡旁復起紅暈。更爲闊大。有者廻敎以用開屏鳳毛。卽翠雲草也。搗汁塗上。一夕立消。此草解火毒如此。又不特治血神效也。（綱目拾遺）

【翠梅草】　卽毛葉仙橘之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『毛葉仙橘』條。

【翠翎草】　㈠卽金鳳毛之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金鳳毛』條。㈡卽翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『翠羽草』條。

【翠蛇】　形態　翠蛇爲爬蟲類蛇屬之一種。長達五六寸。形如曲蟮。蟠旋作圈。可供藥用。

主治　癰疽瘰癧。毒。

【翠鳥舌】　卽魚狗舌之原名。詳『魚狗舌』條。

【翠雲草】　卽翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『翠羽草』條。

【翠碧鳥】　卽魚狗之古籍別名。典見綱目詳『魚狗』條。

【翠顆】　卽橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橄欖』條。

【翡翠】　形態　翡翠爲水禽類之一種。形如魚狗。稍大。常在水畔作穴而居。亦巢於木。前身翡。後身翠。如鵝。翠雌翠之狀。或謂雄爲翡。色多赤。雌爲翠。色多青。可供藥用。

主治　功用同魚狗肉。

【聚藻】　水藻之一種。產於淡水中。多年生草本。葉叉狀分裂。或二回。或三回。其裂片細長而尖。有小鋸齒。形花小。單性。生於葉腋。金魚好生卵於此。性質功用與水藻同。詳『水藻』條。

【腐】　卽豆腐之簡稱。詳『豆腐』條。

【腐巴】　卽腐粑。

【腐皮】　卽豆腐皮之簡稱。詳『豆腐皮』條。

【腐乳】　卽豆腐乳之簡稱。詳『豆腐乳』條。

【腐泐】　卽豆腐泐之簡稱。詳『豆腐泐』條。

【腐泔】　卽豆腐泔水之簡稱。詳『豆腐泔水』條。

【腐粑】　卽豆腐粑之簡稱。詳『豆腐粑』條。

【腐婢】　卽赤豆花之原名。詳『赤豆花』條。

【腐渣】　卽豆腐渣之簡稱。詳『豆腐渣』條。

【腐腸】　卽黃芩之古籍別名。典見本經。詳『黃芩』條

【腐漿】　卽豆腐漿之簡稱。詳『豆腐漿』條。

【膘肭脂】　異名　海狗油。

形態　膘肭脂色綠。狀如乾糊。可供藥用。

性質　熱。無毒。

主治　善降三焦濁逆之氣。能

615／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

清水臙。積寒停飲。塗皮膚皸瘃。

參攷資料 ㈠蓬萊李金什言其地登州海口出海狗。皮可作裘帽。俗美其稱曰海龍。卽此。其腎乃藥中臙肭臍。土人取海狗名曰打狗。此物晝夜潛海底。惟孳乳時登島。產子稍大。卽相率入水。人不可得。須冬月極凍時。海中水口結冰。天晴海狗暈出處冰上曝日。必候其入水時。驟入水以木棍擊其腰。方可得之。若冰裂或步履有聲。非其睡時。皆不可得。然每年打狗。墮水溺死。亦多因利重。人亦不惜軀命以往。(趙學敏)㈡觀近海人取鰌魚海參者。用其油滴海面。海水卽清見底。砂石畢見。可知其性之分利也。(趙學敏)

【臙肭臍】命名 本品乃臙肭之臍。故名。實則與腎同用者。

處方用名 海狗腎。

古籍別名 骨納。海狗腎。(綱目)阿慈勃他。(陳藏器)骨魂。骨訥。紲獸。(和漢藥考)

外國名稱 Castoreum.(拉丁)(Castor.)(英)カストレウム(日本)

基本 係將鰭脚類臙肭臍之陰莖睾丸及臍連同切取者。

產地 ㈠甄權謂臙肭臍是新羅國海內狗。臨海志謂臙肭臍出東海水中。寇宗奭謂臙肭臍今出登萊州。李時珍謂臙肭臍出遼西營州及結骨國與三佛國等處。㈡陳仁山藥物生產辨云。臙肭臍產美國大呂宋爲最。中國北邊近俄國等處亦有出。

形態 臙肭臍爲棲息海上之獸類。形如狗。有咊鬚。四肢悉作鰭狀。尾短小。適於游泳。牡者體長五六尺。牝者祇及其半。幼時毛色黑。漸長則變茶褐色。有青黑色斑點。腹部生白毛。動作活潑。感覺銳敏。

製法 海狗之陰莖與睾丸。用酒浸一日。紙裹炙香。剉搗或置銀器中。以酒煎熟炙脆。李時珍曰。以漢椒、樟腦同收則不壞。

用法 細剉搗用。合藥爲丸服。

性質 鹹。大熱。無毒。

效能 固精。强陽。煖腎。補肝。有溫補滋養之效。而功近蓯蓉、鎖陽。

主治 治男子宿癥氣塊。積冷勞氣。腎精衰損。多色成勞。瘦悴。

歷代述記攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論海狗腎曰。治鬼氣尸疰。夢與鬼交。鬼魅。狐魅。心腹痛。中惡邪氣。宿血結塊。症癖羸瘦。【唐】李珣海藥本草論海狗腎曰。治五勞七傷。陰痿少力。腎虛。背膊勞悶。面黑精冷。【宋】食華子諸家本草論海狗腎曰。補中益腎氣。暖腰膝。助陽氣。破癥結。療狂驚癇疾。【清】黃宮繡本草求眞論臙肭臍曰。海狗腎卽臙肭臍。係西番獸物。足似狗而魚尾。今東海亦有。味甘而鹹。其腎卽獸之臍。投於睡熟犬邊。犬卽驚跳。臙月浸置水內不凍。其性之熱。殆可見矣。故書載治宿血症癖疙瘕症者。取其鹹能入血軟堅。溫能通行消散也。用其佐房術者。取鹹溫入腎。補虛固精。壯陽道也。此藥雖置器中長年溫潤。然能入水不凍。大不同於他藥。若云功近蓯蓉、鎖陽。潤雖相若。氣實不同。不無重視蓯蓉、鎖陽而輕視此物也。但脾胃挾有寒溼者亦忌。以溼過溼故耳。恐相礙也。酒浸紙裹炙香。剉搗。或於銀器中以酒煎熟。合藥用。

國外學說 英美學說謂臙肭臍產中國之北方。北亞美利加。俄羅斯國等處。係海狗腎眼前之小囊。與其內所結成之實。海狗之腎。與麝香有相似處。古時卽以此入藥品。其產北亞美利加者。能以泥。與木成窩。便於居住。最靈巧。其產歐羅巴之北者。則不以泥木造窩。而惟挖地作洞。西國尋常出售之海狗腎。有二種。一爲北亞美利加產來。一爲俄羅斯國所產。如欲分辨之。可將其一分在純酒十六分內浸之。如變黃色者。卽知爲俄羅斯所產。如係深棕色者。卽知爲北亞美利加所產。臙肭臍頗有行氣治轉筋之性。能治數種腦筋病。與肉筋跳痛等病。過服令人脈數發熱。少服能平脈。治鬱病。羊癇風。熱症類瘧類病。可配酒用。日本日用藥品考曰。此由蝦夷松前津輕等出產。惟眞品甚少。多用海獺僞充。凡用臙肭臍。係用睾丸。綱目諸說。皆然。獨日本則向來沿用陰莖。謂之臙肭臍鞭(Takori)。眞者赤色。長二三寸。根有毛。今藥舖所售

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者。長七八寸至尺餘。有名百尋鞭。一名筋鞭(Gujitsukeri)者。俱非眞品。又有以鹽醃者亦然。又日本山海名產圖繪曰。書膃肭獸作膃肭臍者誤。獺名膃肭也。書作膃肭臍。係指外腎卽睾丸也。藥用頗少用肉。其以陰莖售賣者。當係此外腎之誤。由津輕南部出產。種類頗多。眞僞難辨。或云海獺海豹。卽其總稱。其曰海豹者。皮有黑斑點。似膃肭。當係葦鹿同種。海獺形狀全與膃肭相似。其前齒二重者爲眞膃肭。一說祇上齒爲二重齒。頭上有吹水之孔。隱毛間不易見肉。或百尋鞭投水中而水溫不凍者爲眞品。陰莖亦有僞者。以百尋製成。故無毛。號百尋鞭。眞者長三寸許。赤色。根有毛。全身灰黑。似水獺而微長。形似貓而小。口之吻鬚甚大。腳次左右有足。似大鰭。後足在尾前俱長一尺。其端有五爪。尾頗細。居海底最深處。或於海邊石上結伴鮮睡。惟其中必有一隻不睡。見有船來。立發聲醒睡者。匿入水中。性善游泳。越潮甚疾。此種爲眞膃肭。但海獺亦一切與之相同。故今所謂膃肭者。多爲海獺。眞者甚難得。本草集解言此出東海水中。可見中華亦甚少此物。係運自日本者也。蝦夷呼其大者爲浧資夫(Netsuf)。中者爲招基(Choki)。小者爲烏浧烏(Unei)。是爲眞膃肭。呼鰭爲鐵資熙(Tetsuki)。呼一隻爲一羽。津輕取此鐵資熙爲肴。呼其中之大者爲托(To)。今女孩呼魚爲托托(Toto)。或本於此。亦未可知。中華亦有此語云。又夫木集雜十八。夢有建長八年百首歌合衣笠內大臣所詠詩云。我之戀愛。有若海驢(托托)睡流未醒之夢云云。此所謂海驢者爲海馬之一種。非膃肭之類也。又海驢。日本紀神代卷龍宮章下訓作三千皮。蝦夷人之捕此。乘用繩纏絡之船。見有睾睡漂流者。則揮狐尾以驚其睡之一隻。使不敢擊而遁去。乃用矢或魚叉射捕睡者。其技至精。頗不易及。船概不用棹。而於前後搖之。或曰膃肭臍當係指臍。何爲指外腎。某書載有欲得其臍者。托松前部之南人覓之。終難得。詢之土人。乃云臍與陰莖甚邇。取陰莖必損臍。故無有全者云。或云此當是雄者。若雌必有臍。

辨僞 膃肭臍。以臍置於臘月衝風處。水中浸之。不凍者眞也。蓋本品多僞者。因海中有獸。號曰水烏龍。土人取其腎以充膃肭臍也。然眞僞有別。不難分辨。眞者有一對。則兩重薄皮裹丸核。其皮上自有肉。黃毛。一穴三莖。收之器中。年年溼潤如新。或置睡犬頭上。其犬忽驚跳若狂者眞也。

配合應用 ㊀同陽起石、肉蓯蓉、巴戟天、菟絲子、山萊萸、鹿茸、能壯陽益精。㊁有膃肭臍丸。治諸虛勞損。鬼疰邪惡。夢與鬼交。精氣乏絕等證。(和劑局方)

用量 每服八釐七毫半至一分七釐半。

施用宜忌 凡陽事易舉。以及骨蒸勞嗽者忌服。

參攷資料 ㊀膃肭臍鹹熱之品。本入命門補火。脾家所快者。肭熱也。故亦入之。助陽之功。獨甲羣劑。今出登萊州。卽海狗腎也。其狀頭似豕。尾似魚。止生兩足。價殊貴。類多僞者。須細辨之。(李士材)㊁膃肭臍或謂連臍取下。故名臍。或謂膃肭獸之臍也。按兩名不類。恐一是海魚之腎。一是山獸之臍也。綱目以此條入獸部。(汪訒庵)㊂膃肭臍今出登萊州。棄性論以謂是海內狗外腎。日華子又謂之獸。今觀其狀。非狗非獸。亦非魚也。但前卽似獸。尾卽魚。其身有短密淡青白毛。腹脇下全白。仍相間於淡青白毛。上有深青黑點。久則色復淡。皮厚且韌。如牛皮。邊將多取以飾鞍韉。其臍治臍腹積冷精衰。脾腎勞極有功。不待別試也。似狐長尾之說。蓋今人多不識麅獐之屬。又小於獐。但口兩邊有長牙。好鬬。則用其牙皮爲第一。無出其右者。然多牙僞痕。四方皆有。山深處則頗多。其聲如擊破鈸。(蓬宗奭)㊃骨納獸生西番突厥國。胡人呼爲阿慈勃他。你其狀似狐而大。長尾。臍似麝香。黃赤色。有如爛骨。(陳藏器)㊄按臨海志云。出東海水中。狀若鹿形。頭似狗。長尾。每日出卽浮在水面。島嵩家以弓矢射之。取其外腎。陰乾百日。味甘香美也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（李珣）㊀今出登萊州。其狀非狗非獸。亦非魚。但前脚似獸。而尾即魚。身有短密淡青白毛。毛上有深青黑點。久則亦淡。腹脇下全白色。皮厚韌如牛皮。邊將多取以飾鞍韉。其臍治臍腹積冷精衰。脾腎勞極有功。不待別試也。似狐長尾之說。今人多不識之。（寇宗奭）㊁按唐書云。骨咄出遼西營州及結骨國。一統志云。膃肭臍出女眞及三佛齊國。獸似狐。脚高如犬。走如飛。取其腎瀆油。名膃肭臍。觀此則似狐之說非無也。蓋似狐似鹿者。其毛色爾似狗者。其足形也。似魚者。其尾形也。入藥用外腎而曰臍者。連臍取之也。又異物志。納獸出朝鮮。似貍蒼黑色。無前兩足。能捕鼠。郭璞云。晉時召陵扶夷縣獲一獸。似狗豹文。有角兩脚。據此則納有水陸二種。而藏器所謂似狐長尾者。其此類與（李時珍）

【膃肭臍酒】　基本　本品係浸搗爛和麴米如常釀成之酒。

主治　助陽氣益精髓。破癥結冷氣。大補益人。

【膃肭獸】　卽膃肭臍之原名。詳『膃肭臍』條。

【臍石】　卽滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【臍肉】　卽雞內金之原名。詳『雞內金』條。

【膏石】　卽石脾之古籍別名。典見綱目。詳『石脾』條。

【膏魚】　卽父陛根之古籍別名。典見別錄。詳『父陛根』條。

【臺七里】　原名　七里香。

基本　臺七里爲雜草類之一種。可供藥用。

產地　出臺灣島中。

主治　辟烟瘴。

參攷資料　臺七里所產之地。蚊蚋不生。焚其烟薰則化蚊蚋爲水。（趙學敏）

【臺麻】　卽烏藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏藥』條。

【臺覃】　卽香覃之古籍別名。典見陳仁玉菌譜。詳『香覃』條。

【臺黨】　卽黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳『黨參』條。

【艙船油石灰】　原名　水龍骨。

主治　金瘡跌撲傷損。破皮出血。及諸瘡瘻止血殺蟲。

【蓪草】　古籍別名　自然穀。（海藥本草）禹餘糧。（綱目）海米。（方孝孺集）

外國名詞　Carex macrocephala, willd.

產地　生於海濱間。

形態　蓪草爲穀類植物之一種。其實如麻。八月收之。其子可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　不飢輕身。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論蓪草子曰。補虛羸損乏。溫腸胃。止嘔逆。久食健人。

【蒔蘿】　卽小茴香之原名。詳『小茴香』條。

【蒙山茶】　卽雲芝茶之別名。詳『雲芝茶』條。

【蒙頂茶】　卽石蕊之古籍別名。典見綱目。詳『石蕊』條。

【蒙鳩】　卽巧婦鳥之古籍別名。典見荀子。詳『巧婦鳥』條。

【蒿】㊀卽山蒜之古籍別名。典見爾雅。詳『山蒜』條。㊁卽小蒜之古籍別名。典見爾雅。詳『小蒜』條。

【蘞】　卽白芷葉之古籍別名。典見綱目。詳『白芷』條。

【蘞蓋】　卽缺盆。詳『覆盆子』條。

【蒜】　卽小蒜之原名。詳『小蒜』條。

【蒜臍藷】　卽百合之古籍別名。典見綱目。詳『百合』條。

【蒜葱】　卽胡葱之古籍別名。典見綱目。詳『胡葱』條。

【蒜頭】　卽大蒜之處方用名。詳『大蒜』條。

【蒜頭草】　卽石蒜之古籍別名。典見綱目。詳『石蒜』條。

【蒗葵子】　卽胡葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡葵』條。

【蒴】　卽蓑之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蓑』條。

【蒴子】　卽蒴薈之古籍別名。典見廣志。詳『蒴薈』條。

【蒴乾】　產地　廣東下四府。瓊州海南等處。

性質　辛。溫。

效能　下氣溫中。破痰。散結氣。祛風解瘴癘。

【蒴藋】　古籍別名　藋頭。（開寶）鬼芋。（圖經）鬼頭。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（綱目）

外國名詞　Hydrosme Rivieri, Engl.（拉丁）コンニヤクモイ（日本）

基本　係天南星科。藥用蒟蒻之根。

產地　在原野川澤間。

形態　蒟蒻爲毒草類之多年生草本。高至二尺餘。葉爲掌狀複葉。由羽狀之裂片而成。葉脈呈網狀。葉柄長。夏日開單性花穗狀花序。肉質莖長。有苞頗大。其地下肥大之球狀部。味最蓁。製爲褐腐。可供食用。或用球狀部所採之粉末。供輕氣球及空氣枕之塗料。以防氣體之漏泄。其根圓如珠。亦可供藥用。



蒟蒻

性質　辛。寒。有毒。

主治　癰腫風毒。摩傳腫上。搗碎。以灰汁麥成餅。五味調食。主消渴。

參攷資料　㈠按三元延壽書云。有人患瘵。百物不忌。見隣家修蒟蒻求食之。美。遂多食而瘵愈。又有病腳癰者。數人多食之。亦皆愈。（汪機）㈡性冷甚。不益人。冷氣人少食之。生則戟入喉出血。（李廷飛）㈢蒟頭出吳蜀。葉似由跋半夏。根大如碗。生陰地。雨滴葉下生子。又有斑杖。苗相似。至秋有花直出。生赤子。根如蒟頭。毒猛不堪食。虎杖亦名斑杖。與此不同。（馬志）㈣江南吳中出白蒟蒻。亦曰鬼芋。生平澤極多。人採以爲天南星了。不可辨。市中所收。往往是此。但南星肌細膩。而蒟蒻莖斑花紫。南星莖無斑。花黃爲異爾。（蘇頌）㈤蒟蒻出蜀中。施州亦有之。呼爲鬼頭。閩中人亦種之。宜樹陰下掘坑積糞。春時生苗。至五月移之。長一二尺。與南星苗相似。但多斑點。宿根亦自生苗。其滴露之說。蓋不然。經二年者根大如碗。及芋魁。其外理白。味亦麻人。秋後採根頭淨。擦或搗。或片段。以醞灰汁煮十餘沸。以水淘洗。換水更煮五六遍。卽成凍子。切片。以苦酒五味淹食。不以灰汁則不成也。切作細絲。沸湯泡過。五味調食。狀如水母絲。馬志言其苗似半夏。楊愼丹鉛錄言蒟醬卽此者。皆誤也。王楨農書云。救荒之法。山有粉葛蒟蒻橡栗之利。則此物亦有益於民者也。其斑杖卽天南星之類有斑者。（李時珍）

【蒟醬】

命名　本品可以調味。故謂之醬。

處方用名　蒟醬子。蒟醬葉。蒟醬根。

古籍別名　蒟子。（廣志）土藿。茇。扶留藤。扶檷。浮留。（孟詵）其苗名蕃土蔞藤。蔞葉。（綱目）浮留藤。（植物學大辭典）

外國名詞　Piper Betle, L.（拉丁）キンマ（日本）

基本　係胡椒科土蔞藤屬。藥用蒟醬之根。葉與子。

產地　凡兩廣滇南及川南等處恒多有出。

形態　蒟醬爲芳草類之蔓生草本。葉似王瓜而厚大。有光澤。實似桑椹。皮黑肉白。其根葉子。採得可供藥用。

採取　春夏採之。

製法　曹敦曰。凡採得後。以刀刮上粗皮。擣細。每五錢。用生薑自然汁五兩。拌之。蒸一日。曝乾用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　下氣。溫中。破痰。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論蒟醬曰。咳逆上氣。心腹蟲痛。胃弱虛瀉。霍亂吐逆。解酒食味。【唐】孟詵食療本草論蒟醬曰。散結氣。心腹冷痛。消穀。【明】李時珍本草綱目論蒟醬曰。解瘴癘。去胸中惡邪氣。溫脾燥熱。

參攷資料　㈠按嵇含云。蒟子可以調食。故謂之醬。乃藁茇之類也。故孟詵食療謂之土藁茇。其葉葉名扶留藤。一作扶檷。一作浮留。莫解其義。蕙則留字之訛也。（李時珍）㈡今夔川嶺南皆有之。昔漢武帝使唐蒙曉諭南越。越王食蒙以蒟醬。曰。此出番禺城下。武帝感之。遂開牂牁越雋也。劉淵林注蜀都賦云。蒟醬緣木而生。其子如桑椹。熟時正青。長二三寸。以蜜及鹽藏而食之。辛香與蘇荏所說大同小異。蓋淵林所云乃蜀產。蘇荏所云乃海南者爾。今惟貴藁麥而

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不尙蒟醬。故鮮有用者（蘇頌）㊀廣州記云。出波斯國。實狀若桑椹。紫褐色者爲尙。黑者是老根不堪。然近多黑色。少見褐者。黔中亦有。形狀滋味一般（李珣）㊁蒟醬今兩廣滇南及川南瀘州威茂施諸州皆有之。其苗謂之蓼葉。蔓生依樹。根大如筯。彼人食檳榔者。以此葉及蚌灰少許同嚼食之。云辟瘴癘。去胸中惡氣。故諺曰。檳榔浮留。可以忘憂。其花實即蒟子也。按陶含草木狀云。蒟醬即蔓菱也。生於蕃國者大而紫。謂之蔓菱。生於番禺者小而青。謂之蒟子。本草以蒟易蓼子非矣。蓼子一名扶留。其草形全不相同。李時珍竊謂蒟子蔓生。蔓菱草生。雖同類而非一物。然其花實氣味功用則一也。陳氏以二物爲一物。謂蒟子非扶留。蓋不知扶留非一種也。劉歆期交州記云。扶留有三種。一名荻留。其根香美。一名扶留。其藤味亦辛。一名南扶留。其葉青味辛是矣。今蜀人惟取蔓葉作酒麴。云香美（李時珍）

【蒟醬子】卽蒟醬之處方用名。詳『蒟醬』條。

【蒟醬根】卽蒟醬之處方用名。詳『蒟醬』條。

【蒟醬葉】卽蒟醬之處方用名。詳『蒟醬』條。

【蒡翁菜】卽牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳『牛蒡子』條。

【蒨】卽茜草之古籍別名。典見別錄。詳『茜草根』條。

【蒼實】卽蒼耳實之原名。詳『蒼耳』條。

【蒲】卽菖蒲之簡稱。詳『菖蒲』條。

【蒲公丁】卽蒲公英之俗名。詳『蒲公英』條。

【蒲公英】

原名　黃花地丁。

命名　本品花黃而獨脚如丁。故名。

處方用名　蒲公草。

古籍別名　耬耨草。蒲公罌。（綱目）堯公英。（千金方）僕公罌。（圖經本草）太奈。陸英。大丁草。鵝鴨英。（庚辛玉册）蒲公丁。燒金草。蒲英。鼓釘。波波丁。地丁草。不知奈。白鼓釘。耳癢草。（土宿本草）黃花苗。石長生。奶汁草。狗乳草。（俗名）金簪草。金鼓草。黃花耶草。滿地金錢。孛孛丁菜。（和漢藥考）

學名　Taraxacum officinale, wigg. var. glaucescens, Koch.

外國名詞　Taraxaci（拉丁）Dandelion（英）Lowenzahn（德）

基本　屬菊科爲蒲公英之葉莖及根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。蒲公英各省均有。但以江蘇省之鎭江來者爲正。廣東土貨店所沽之公英。實係地胆頭。切要分別。



蒲公英（一）

形態　蒲公英爲生於原野路傍之多年生草。葉作倒披針形。邊緣有下向大鋸齒。叢生地上。作車輪狀。春末抽莖。高五六寸。於頂上開黃色花。類菊花。花後蕚成白色冠毛。結實如球。作放線狀裂開。種子乘風飛散。葉莖根俱有苦味。白汁根部尤多。藥用以未乾燥生鮮者爲佳。



蒲公英（二）

種類　黃花者名黃花地丁。紫花者名紫花地丁。又名大丁草。無花者名地胆草。白花者名白鼓釘。

採取　四五月間採之。

製法　凡採得洗淨陰乾。

性質　甘。平。無毒。

成分　爲泰拉基沙丁（Taraxatin）苦味質）膠質。糖質。加里。鈣鹽等。

效能　解熱毒滯氣。消乳癰結核。有健胃强壯及清血之效。用於胆汁過多之腸炎及胃弱症。乳房腫痛。乳汁分泌之不足症。又爲變質利尿之緩和瀉劑。

作用　加增胃液之不足。促進消化功能。并能激腸之蠕動。使大便容易排出。

主治　婦人乳癰。水腫。麦汁飲及封之立消。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蒲公英曰。白汁黏

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

惡刺孤尿刺瘡。卽愈。【元】朱丹溪本草衍義補遺論蒲公英曰。解食毒。散滯氣。化熱毒。消惡腫結核。疔腫。【明】李時珍本草綱目論蒲公英曰。搽牙烏鬚髮。壯筋骨。【明】經疏雅本草經疏論蒲公英曰。蒲公英味甘平。其性無毒。當是入肝入胃。解熱涼血之要藥。乳癰屬肝經。婦人經行後。肝經主事。故婦人乳癰腫乳毒。竝宜生啖之良。【清】黃宮繡本草求眞論蒲公英曰。蒲公英卽黃花地丁草也。味甘性平。能入陽明胃厥陰肝。涼血解熱。故乳癰乳巖。爲首重焉。且能通淋。擦牙染鬚。塗刺及解食毒疔毒。綠乳頭屬肝。乳房屬胃。乳癰乳巖。多因熱盛血滯。用此直入二經。外敷散腫發效。內消須同夏枯、貝母、連翹、白芷等藥同治。況此屬土花黃。故於食滯可解。毒氣可散。又能入腎涼血。故於鬚髮可染。獨堊一花者是。有極者非。【清】王士雄隨息居飲食譜論蒲公英曰。蒲公英甘平清肺。利膈化痰。散結消癰。養陰涼血。舒筋。固齒。通乳。益精。姨可爲蔬。老則入藥。洵爲上品。今人但以治乳患。抑何陋耶。別有紫花地丁。一名如意草。甘涼清熱。補虛。消癰涼血。耐飢益氣。爲救荒仙草。以生嚼無草氣。故可同諸草木菜咀食充飢也。

國外學說　日本學說謂漢醫於黃疸皮瘡。消化不良。用蒲公英根而西醫亦有用者。日本藥局方之主效。爲苦味健胃緩下等。卽爲苦味健胃藥。於消化不良。與他藥配用。自五・〇至一〇・〇。又製爲越幾斯。每一回自〇・五至一・五。亦爲苦味健胃藥。又日本藥局方曰。蒲公英係將蒲公英草全部。於春季開花前採取。晒乾者。此草之葉作大鋸齒狀缺裂。根長一至二特西米突。粗〇・五至二・五仙米。呈褐色。帶縱溝。其橫截面現非放線狀之黃色木心。皮部厚。有同心性並列之多數乳脈管。英美學說謂蒲公英西國名獅牙草。產中國歐羅巴美國等處。其根無論鮮乾。均可入藥。酒水均能提出功力。根長約六寸至一尺。餘橫約四分至八分。內汁甚多。宜在中秋節後取之。此草於歐羅巴爲野生之草。其用爲藥物。亦已多年。有植物學家曾查常出售之蒲公英根內。含有人參根、龍膽草根、苦菜根等實。用此根最合宜之法。將其汁熬成膏。有人將其根炒之。代咖啡之用。又有人將其乾粉與咖啡相雜。其作用爲輕瀉藥。收血藥。散炎化瘤藥。又爲利小便藥。如肝與內腎之病。並皮膚久病等。均可用之。然性最輕。其平和之性。略與土茯苓相同。其功用又能動膽汁。作煮水膏等服之。均效。治胃不消化。大便結。肝積血。肝寒生厥症。（須佐瀉藥同服。）瘧疾。（須發過後服之。）處方蒲公英乾根八錢。切片。搗爛。清水十六兩八錢。煮沸至一刻鐘之久。隔淨。隔時再加沸水。收足十六兩八錢爲度。每服一兩二錢六分至二兩五錢二分。治胃不消化等患極效。（蒲公英煮水方。）又蒲公英鮮根四斤。搗爛。扭汁候澄清。將上面淨者抒出入鍋。熬十分鐘。熱不過二百一十二度。濾渣。再入燙鍋散氣。熱不過一百六十度。成膏爲度。每服八釐至二分六釐。（蒲公英膏方。）又蒲公英乾根四十分。粗末。淡酒八十分。汽水酌用。先用酒浸蒲公英二天。扭出二十分另存。再用水四十分。浸二天。用絞盤絞渣。過布入燙鍋散氣。餘十八分爲止。加前留之二十分調勻。再加汽水。仍足四十分爲度。每服五分至二錢。（蒲公英流膏方。）按本草綱目謂其甘平無毒。主治婦人乳癰。煮汁飲及封之。立消。解毒散滯氣。消惡腫結核。丁腫蛇螫腫痛。恐未必能有此功力。

近人學說　㊀顧子靜曰。蒲公英爲菊科植物。蒲公英之宿根草。於春季開花前採其根及全草。乾燥而用之。含苦味質及鉀鹽鈣鹽。其新鮮植物中流出之乳汁。則含樹脂質。春季含鹽類多。苦味質少。秋季則反之。蒲公英之作用。苦味質可健胃。鹽類有緩下之效。製爲稠厚之膏用之。膏之用量。每服一分三釐至四分。一日服三次。㊁張山雷曰。蒲公英莖葉皆似萵苣。吾鄉甚多。折其莖葉。有白汁溢出如乳汁。故俗呼爲羊奶奶草。瀕湖謂關中謂之狗乳草。亦此意也。其性清涼。治一切疔瘡癰瘍紅腫熱毒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

請證。可服可敷。頗有應驗。而治乳癰乳癤。紅腫堅塊。尤爲捷效。鮮者搗汁溫服。乾者煎服。一味亦可治之。而煎藥方中。必不可缺此。蘇恭唐本草。謂甘平無毒。治婦人乳癰。水腫。煮汁飲。及封之立消。痴不誣也。丹溪亦謂解食毒。散滯氣。化熱毒。消惡腫結核。丁腫。石癭。頑癤。治乳癰。必鮮者取汁和酒服。服後欲睡。是其功驗。微汗而愈。頓按乳癰乳核。單方古法。多用酒服。蓋欲其迅行及於患處。然此惟堅塊初起。其形未大。未變色時。間或可施。而乳症多兼肝胆湯多。酒能助火。未可概投。若形勢漸巨。本欲釀膿者。適以速成其潰耶。自來著內科書者。多不習瘍科。所以不知其弊。實則內外二科。理本相同。且內外病之聯屬者。尤非少數。不知內科固萬不能治瘍。卽不知瘍科。則治內亦時有養癰貽害之弊。無如長於治內者。輒謂吾是大方專家。彼污穢齷齪之瘡瘍。又豈肯降格從事。然遇一內外相兼之症。勢必束手無措。敷衍了事。捫心清夜。能無遺憾。須知治瘍雖似小伎。要知非精於治內者。亦不可與語此中神化也。

配合應用　㊀治一切乳癰毒腫痛及乳巖。用蒲公草、夏枯草、貝母、連翹、白芷、梓樓根、橘葉、甘草頭、垣牡鼠糞、山豆根、山慈菰等。

㊁治惡刺及狐尿刺。摘取根莖白汁塗之。惟多塗立差。此方出孫思邈千金方。其序云。余以貞觀五年七月十五日夜。以左手中指背觸着庭木。至曉遂患痛不可忍。經十日。痛日深。瘡日高大。色如熟小豆色。嘗聞長者之論有此方。遂依治之。手下卽愈。痛亦除。瘡亦卽瘥。未十日而平復如故。楊炎南行方亦著其效云。（圖經方）

㊂治產後不自乳兒。畜積乳汁。結作癰。取蒲公草搗傅腫上。日三四度易之。（梅師方）

㊃還少丹。昔日越王嘗遇異人得此方。極能固齒牙。壯筋骨。生腎水。凡年未及八十者。服之鬚髮返黑。齒落更生。年少服之。至老不衰。得遇此者。宿有仙緣。當珍重之。不可輕泄。用蒲公英一斤。一名鼓槖草。又名蒲公罌。生平澤中。三四月甚有之。秋後亦有放花者。連根帶葉取一斤。洗淨。勿令見天日。曝乾。入斗子。解碾一兩。香附子五錢。二味爲細末。入蒲公草內。淹一宿。分爲二十團。用皮紙三四層裹扎定。用六一泥。卽蚯蚓糞。如法固濟。入鼈內焙乾。乃以武火煅通紅爲度。冷定取出。去泥爲末。早晚擦牙漱之。吐嚥任便。久久方效。（瑞竹堂方）

㊄治乳癰紅腫。蒲公英一兩。忍冬藤二兩。擣爛。水二鍾。煎一鍾。食前服。睡覺。病卽去矣。（積德堂方）

㊅治疳瘡疔毒。蒲公英擣爛。覆之。卽黃花地丁也。別更擣汁和酒煎服取汗。（唐氏方）

㊆治多年惡瘡。蒲公英擣爛貼。亦治蛇螫腫痛。（救急方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無濕熱癰毒者禁用。

參攷資料　㊀此草開黃花。味甘。解食毒。散滯氣。可入陽明太陰經。化熱毒。消腫核。有奇功。同忍冬藤煎湯入少酒佐服。治乳癰。服罷欲睡。是其功也。睡覺微汗。病卽安矣。（朱震亨）㊁採思邈千金方作鼓公英。蘇頌圖經作僕公罌。庚辛玉册作鵝鴿英。俗呼蒲公丁。又呼黃花地丁。淮人謂之白鼓釘。蜀人謂之耳瘢草。閩中謂之狗乳草。案土宿本草云。金簪草一名地丁花。如金簪頭獨脚如丁。故以丁名之。（李時珍）㊂蒲公英草生平澤田園中。莖葉似苦苣。斷之有白汁。堪生啖。花如單菊而大。四五月採之。（韓保昇）㊃蒲公英春初生苗。葉如苦苣。有細刺。中心抽一莖。莖端出一花。色黃如金錢。俗訛爲僕公罌。是也。（蘇頌）㊄地丁江之南北頗多。他處亦有之。嶺南絕無小科。布地四散而生。莖葉花絮。並似苦苣。但小耳。嫩苗可食。庚辛玉册云。地丁葉似小萵苣。花似大旋蕾。一莖獨上三四寸。斷之有白汁。二月採花。三月採根。可制汞伏三黃。有紫花者名大丁草。出太行王屋諸山。陳州亦有。名燒金草。能煅硃砂。一種相類而無花者。名地膽草。亦可伏三黃汞霜。（李時珍）

【蒲公草】卽蒲公英之處方用名。詳『蒲公英』條。

【蒲公罌】卽蒲公英之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見綱目。詳『蒲公英』條。

【蒲包草】古籍別名　水蠟燭草（綱目拾遺）實名　鬼蠟燭。蒲萼。板枝（汪蓮仕採藥書）

產地　多生野塘間及蘆葦叢中。

形態　蒲包草爲水草類之一種。秋杪結實。紅色宛如蠟燭。其根可供藥用。子詳見該條。

主治　療瘰癧。洗淨寸段。砂鍋煎湯飲。

參考資料　蒲包草根。婦人服之終不受孕。須服北京眞益母丸四五兩可解之（趙學敏）

【蒲包草實】主治　療金瘡。刃傷止血用。

【蒲州豆豉】命名　本品爲西蕃蒲州府境者。故名。豆豉之出於山

製法　先以酒醋浸透。蒸之曝乾。入麻油再蒸晒如是三次。再加畫椒末拌貯藏之用。

性質　鹹。寒。無毒。

主治　解煩熱熱毒。寒熱。虛勞。調中。發汗。通關節。殺腥氣。傷寒。鼻塞。

【蒲兒根】卽蒲蕫之古籍別名。典見野菜譜。詳『蒲蕫』條。

【蒲柳】卽水楊之古籍別名。典見爾雅。詳『水楊』條。

【蒲英】卽蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【蒲菄】卽青蚨之古籍別名。典見綱目。詳『青蚨』條。

【蒲席】命名　本品係用菖蒲所編之席。故名。

古籍別名　薦（綱目）

採取　以年久陳敗者用之良。

性質　平。無毒。

主治　筋溼惡瘡。

歷代記述攷證　【唐】甄權　葉性本草論蒲席曰。單用破血。治墜損瘀血在腹。刺痛。取久臥者燒灰酒服。【唐】陳藏器本草拾遺論蒲席曰。治霍亂轉筋。入腹。取編席之索。燒研酒服。

參考資料　㈠蒲席惟船家用之。狀如蒲帆。人家所用席。皆是嘗草（陶弘景）㈡席皆以蒲及稻藁爲之。有精粗之異。吳人有以龍鬚草爲席（李時珍）

【蒲扇】命名　上古以羽爲扇。故扇字從羽。後世有以蒲所編者。故名。

古籍別名　箑（綱目）

採取　以年久而陳敗者用之良。

主治　止汗。燒灰和粉撲身。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論蒲扇曰。止盜汗。及婦人血崩。經水不斷。燒灰酒服。

【蒲杉】卽水楊之古籍別名。典見古今注。詳『水楊』條。

【蒲根白】卽水楊之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水楊』條。

【蒲桃】卽蒲萄之古籍別名。典見綱目。詳『蒲萄』條。

【蒲桃殼】主治　止呃忒如神。

【蒲草】卽蒲包草之簡稱。詳『蒲包草』條。

【蒲陶】卽葡萄之古籍別名。典見綱目。詳『葡萄』條。

【蒲筍】卽蒲蕫之古籍別名。典見食物本草。詳『蒲蕫』條。

【蒲萄】卽葡萄之古籍別名。典見綱目。詳『葡萄』條。

【蒲黃】命名　本品係香蒲花蕊之粉。色淡黃。故名。

處方用名　生蒲黃。炒蒲黃。蒲黃炭。

外國名稱　Typha

基本　屬香蒲科。爲蒲草之花粉。

產地　凡池澤間。恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。蒲黃產湖北、山東兩省。

形態　蒲爲生於池沼之宿根草。葉叢生。長四尺至五尺。闊九分許。厚而柔軟。有平行脈。秋季取之。爲蒲席。夏季抽圓莖。於頂上開花。成長穗。狀如蠟燭。謂之蒲槌。花粉作黃褐色。

採取　四月採日乾。

製法　雷敩曰。凡使勿用松黃并黃蕊。其二件全似。只是味甜及吐人。眞蒲黃須隔三重紙焙令色黃。蒸半日。卽再焙乾用之。妙。大明曰。破血消腫者生用之。補血止血者須炒用。

性質　甘。平。無毒。

效能　行血祛瘀。止血和營。用作止血藥。

623／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　心腹膀胱寒熱。利小便。止血。消瘀血。久服輕身益氣。力延年神仙。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論蒲黃曰。治痢血。鼻衄。吐血。尿血。瀉血。利水道。通經絡。止女子崩中。【宋】大明日華諸家本草論蒲黃曰。婦人帶下月候不勻。血氣心腹痛。妊婦下血墜胎。血暈血癥。兒枕氣痛。顛撲血悶。排膿瘡癤。遊風腫毒。下乳汁止洩瀉。【明】李時珍本草綱目論蒲黃曰。涼血活血。止心腹諸痛。【清】鄒澍本經疏證論蒲黃曰。金匱要略用蒲灰散。利小便。治厥而皮水解者。或以爲香蒲。或以爲蒲席燒灰。香蒲但能清上熱。不云能利水敗。蒲席別錄主筋溢惡瘡。亦非利水之物。蒲黃本經主利小便。且本事方芝隱方。皆逸其治舌腫神驗。予亦曾治多人。黍錄無爽。不正有合治水之腫於皮乎。夫皮水爲膚腠間病。不應有厥。厥者下焦病也。膀胱與腎爲表裏。膀胱以水氣歸皮。致小便不利。氣阻而成寒熱。則腎亦承其弊。爲之陰邃而陽不得達。遂成厥爲病本在外。非可用溫。又屬皮水。無從發散。計惟解心腹膀胱之寒熱。使小便得利。又何厥逆之有。以是知其爲蒲黃無疑也。曰蒲灰者。蒲黃之質。固有似於灰也。趙以德金匱衍義亦云。

近人學說　㈠賈九如曰。蒲黃色黃氣香。專入脾經。若諸失血久者。炒用之。可以助補脾之藥。攝血歸源。使不妄行。又取體輕行滯。味甘和血。上治吐衄咯血。下治腸紅崩漏。但爲收功之藥。在失血之初用之無益。若生用亦能涼血消腫。㈡陳中權曰。中醫學術之退步。在因循苟且。不求眞理。其於藥物亦然。不究其所以能治病之理。反穿鑿附會。從色形上着想。卒至病愈而不知所以愈。不愈亦不知所以不愈。此可爲嘆息痛恨者也。如蒲黃各本草言其生用行血。炒用止血。考蒲黃性味甘涼帶滑。生用涼血散血固矣。失笑散是也。然炒黑能止血。以紅見黑則止。爲水勝火。此眞荒謬之談。須知失血之症。在上多由肺胃之傷。下則多由脾胃之傷。血管綻裂。血不行其經。遂致失血。止血之藥。但當取其有膠黏之質。或乾澀之性。能收斂血液者。則血自凝聚而可止。於色之紅黑固無有也。如阿膠補血。亦能治一切失血。濃墨亦止血。鱉甲炙研服亦止血。甚至外症出血。以灰塵膏粉塗之亦能止。且亦不限黑色。如明礬和白糖同服。止血亦效。此數物者。色黑白不齊。而紅見之亦止者何也。亦惟各有其膠黏之質性。故主治亦同耳。如必謂紅見黑止。則諸失血症。皆可以煤炭屑或黑水止之矣。此又不通之論也。吾謂凡膠黏乾澀之品。均可止血。按之事理。自有可通者。炒蒲黃止血。確有特效。曾見有人外症出血不止。以蒲黃炭研細傅之。即止者。然局方黑神散。主治行血下胎。（見醫方集解）方中用炒蒲黃。不知何故。疑是生蒲黃之誤。㈢張山雷曰。蒲黃專入血分。以清香之氣。兼行氣分。故能導瘀結而治氣血凝滯之痛。東璧李氏雖謂其涼血活血。亦以水產之品。因謂之涼。頗謂蒲本清香。亦有辛味。以本經菖蒲辛溫例之。必不可以爲寒涼。蒲黃又爲蒲之精華所聚。既能逐瘀。則辛散之力可知。況心腹結滯之痛。新產瘀露之凝。失笑一投。捷於影響。雖曰黴腊導濁。是其專職。然使蒲黃有瘀可用。若舌瘡口瘡皮膚澀痒諸病。傅以生蒲黃細粉可愈。則以細膩黏凝。自有生肌之力。非僅涼也。取其清涼也。

辨僞　㈠鄭肖巖曰。蒲水草也。蒲黃乃香蒲花中之蕊。屑細若金粉。始出河東澤中。今處處有之。以秦州出者爲良。近今藥肆中。或以松花僞充。按松花氣味辛溫。蒲黃氣味甘平。松花能除風。蒲黃能消痰。性既不同。功亦各異。胡得僞充以害人乎。況失笑散中。有用蒲黃爲治產後瘀血攻心之妙方。若用松花僞充。則貽誤不少矣。㈡曹炳章曰。按蒲黃乃蒲草之花蕊。色淡黃。是花茸花蕊相合。名草蒲黃爲佳。又有一種蘇州來者。曰蒲黃面。色老黃。屑細滑若粉。入罐煎之如糊。膠一般。服之令人作嘔。且不能入喉。吾紹初到時。人人以此爲道地。各大藥舖爭先置備。後因病人不能服。向醫生責問。始識受蒲黃

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

面之害。乃通告各藥舖。禁其沿用。今仍用草蒲黃。鄭君所云屑細若金粉。或亦是此物。不識以何物僞作。亦非松花粉。蓋松花粉色淡黃。質輕。蒲黃面質重色老黃。然總是害人贋品。應當革除之。

配合應用　㈠治產後諸血病。蒲黃、炒黑乾薑、炒黑豆、澤蘭、當歸、川芎、牛膝、生地黃。㈡治溺血。蒲黃車前子、牛膝、生地黃、麥門冬。㈢治血崩血淋。蒲黃、阿膠、白膠、人參、麥門冬、赤茯苓、車前子、杜仲、川續斷。㈣生蒲黃納舌下。數數易之。能消重舌。㈤治一切跌撲傷損。瘀血停滯腹中。生蒲黃煮濃和童便飲之良。㈥蒲黃能破血。故治癥結。五勞七傷。停積瘀血。胸前痛。卽發吐衄。悉和涼血行血藥主之。㈦治肺熱衄血。蒲黃、青黛各一錢。新汲水服之。或去青黛。入油髮灰等分。生地黃汁調下。（簡便單方）㈧治吐血唾血。蒲黃末二兩。每日溫酒或冷水服三錢妙。（簡要濟衆方）㈨治老幼吐血。蒲黃末每服半錢。生地黃汁調下。量人加減。或入髮灰等分。亦治小便出血。（聖濟總錄方）㈩治小便轉胞。以布包蒲黃。裹腰腎令頭致地。數次取通。（肘後方）⑪治金瘡出血。悶絕。蒲黃半兩。熱酒灌下。危氏得效方）⑫治瘀血內漏。蒲黃末二兩。每服方寸匕。水調下。服盡止。（肘後方）⑬治腸痔出血。蒲黃末方寸匕。水服之。日三服。（肘後方）⑭治脫肛不收。蒲黃和豬脂傅。日三五度。（子母祕錄）⑮治胎動欲產。日月未足者。蒲黃二錢。井華水服。（集一方）⑯治產婦催生。蒲黃、地龍洗焙、陳橘皮等分爲末。另收。臨時各炒一錢。新汲水調服。立產。此常親用。甚妙。（唐愼微方）⑰治胞衣不下。蒲黃二錢。井水服之。（集驗方）⑱治產後下血。羸瘦造死。蒲黃二兩。水二升。煎八合。頓服。（產寶方）⑲治產後血瘀。蒲黃三兩。水三升。煎一升。頓服。（梅師方）⑳治兒枕血瘕。蒲黃三錢。米飲服。（產寶方）㉑治產後煩悶。蒲黃方寸匕。東流水服極良。（產寶方）㉒治墜傷撲損。瘀血在內煩悶者。蒲黃末空心溫酒服三錢。（塞上方）㉓治關節疼痛。蒲黃八兩。熟附子一兩爲末。每服一錢。涼水下。日一。（肘後方）㉔治陰下溼瘡。蒲黃末傅三四度。痊。（千金方）㉕治聤耳出膿。用蒲黃末摻之。（聖惠方）㉖治口耳大衄。蒲黃、阿膠炙各半兩。每用二錢。水一盞。生地黃汁一合。煎至六分。溫服。急以帛繫兩乳止乃已。（聖惠方）㉗治耳中出血。蒲黃炒黑。研末摻入。（簡便方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡陰虛及無瘀者禁用。

參攷資料　㈠香蒲生南海池澤。蒲黃生河東池澤。四五月採之。（別錄）㈡蒲黃卽蒲廳花上黃粉也。甚療血。仙經亦用之。（陶弘景）㈢汁人初得。羅去滓。以水調爲膏。塗爲塊。人多食之。以解心臟虛熱。小兒尤嗜之。過月則燥。色味皆淡。須蜜水和。不可多食。令人自利。極能虛人。（慈宗奭）㈣蒲黃手足厥陰血分藥也。故能治血治痛。生則能行。熟則能止。與五靈脂同用。能治一切心腹諸痛。按許叔微本事方云。有士人妻舌忽腫滿口。不能出聲。一老曳教以蒲黃頻摻。比曉乃愈。又芝隱方云。宋度宗欲賞花。一夜忽舌腫滿口。蔡御醫用蒲黃乾薑末等分。乾擦而愈。據此二說。則蒲黃之涼血活血可證矣。蓋舌乃心之外候。而手厥陰相火乃心之臣使。得乾薑是陰陽能相濟也。（李時珍）㈤香蒲卽甘蒲。可作菰者。春初生。取白爲菹。亦堪蒸食。山南人謂之香蒲。以昌蒲爲臭蒲也。蒲黃卽此蒲之花也。（蘇恭）㈥香

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蒲。蒲黃苗也。處處有之。以秦州者爲良。春初生嫩葉。出水時紅白色。葦葦然。取其中心入地白蔣大如匕柄者。生啖之甘脆。又以醋浸。如食筍大美。周禮謂之蒲菹。今人罕有食之者。至夏抽梗於叢葉中。花抱梗端。如武士捧杵。故俚俗謂之蒲槌。亦曰蒲棒。花黃即花中蕊屑也。細若金粉。當欲開時便取之。市鷹以蜜搜作果食貨賣。（蘇頌）㊁蒲叢生水際。似莞而褊有脊。而柔。二三月苗。採其嫩根。瀹過作鮓。一宿可食。亦可燔食蒸食。及曬乾磨粉作飲食。詩云其蔌伊何。惟筍及蒲是矣。八九月收葉以爲席。亦可作扇。軟滑而溫。（李時珍）

【蒲黃滓】命名　本品乃蒲黃中篩出之赤滓。故名。

古籍別名　蒲萼（綱目）

主治　炒用。澀腸止瀉。血血痢。

【蒲黃炒阿膠】卽阿膠用蒲黃拌炒成者之處方用名。詳『阿膠』條。

【蒲黃炭】卽蒲黃炒成炭者之處方用名。詳『蒲黃』條。

【蒲楊】卽水楊之古籍別名。典見古今注。詳『水楊』條。

【蒲萼】㊀卽蒲黃滓之古籍別名。典見綱目。詳『蒲黃滓』條。㊁卽蒲黃之古籍別名。典見綱目。詳『蒲黃』條。

【蒲種殼】性質　淡。

效能　下水。消腫。

主治　腹脹。

【蒲蒻】原名　香蒲。甘蒲。醮石。

命名　本品乃香蒲之嫩莖。故名。

古籍別名　蒲筍。（食物）蒲見根。（野菜譜）

產地　生池澤中。

形態　香蒲爲水草類之一種。高五六尺。莖圓。葉細長三四尺。有平行脈。其嫩莖謂之蒲蒻。可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　五臟心下邪氣。口中爛臭。堅齒明目聰耳。久服輕身耐老。

歷代記述攷證　【明】寧原食鑑本草論蒲蒻曰。去熱燥。利小便。

【明】汪穎食物本草論蒲蒻曰。生啖止消渴。【明】李時珍本草綱目論蒲蒻曰。搗汁服。治妊婦勞熱煩躁。胎動下血。

【蒲蕤】卽蒲黃。詳『青蚨』條。

【蒲盧】卽蠐螬之古籍別名。典見爾雅。詳『蠐螬』條。

【蒲盧子】卽無食子之古籍別名。典見綱目。詳『無食子』條。

【蒲頹子】卽胡頹子之古籍別名。典見綱目。詳『胡頹子』條。

【蒲蘆】卽蝤蛑之古籍別名。典見綱目。詳『蝤蛑』條。

【蒲蘆根】卽蘆根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘆根』條。

【蒴子】卽檳榔之古籍別名。典見本草集註。詳『檳榔』條。

【蒴藋】古籍別名　烏頭苗。（郭璞）陸英。（綱目）茇葥草。（爾雅）葦草。茇。（別錄）蒴藋接骨草。（綱目）眞珠花。珊瑚花。排風。色鐵雞笆。（植物名實圖考）

外國名詞　Sambucus javanica. Bl.（拉丁）ソクシ（日本）

基本　係忍冬科接骨木屬。葉用蒴藋之根葉。

產地　山野田澤間。

形態　蒴藋爲澤草類之多年生草本。莖高七八尺。葉對生。羽狀複葉。小葉廣披針形。有鋸齒。缺邊。夏日開花。繖房花序。花小白色。雄蕊五枚。與花冠之裂片同數。互生。雌蕊一枚。花間雜以黃色小體。如杯狀。果實爲小粒形。十月熟則色紅。其莖葉花子俱可供藥用。



蒴藋

性質　酸。溫。有毒。

主治　風瘧癰瘍。身痒澀痺。可作浴湯。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論蒴藋曰。浴瘋癩。療風痺。

【淸】黃元御長沙藥解論蒴藋曰。味酸微涼。入足厥陰肝經。行血通經。消瘀化凝。金匱王不留行散。用之治病金瘡。以其行血而消瘀也。

配合應用　㊀治手足偏風。風溼冷痺。寒溼腰痛。取蒴藋葉。火煖厚鋪床上。熱眠於中。冷復易之。冬月取根。舂碎熬熱用。（外臺祕要方）

㊁治脚氣脛腫骨痛。取蒴藋根

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

研碎酒醋共三分。根下合蒸熟。封裹脛上。一二日卽消。並治肌膚不仁。（千金方）

㈢治渾身水腫。坐臥不得。取蒴藋根去皮搗汁一合。和酒一合。煖服。當微吐利以後卽愈。（梅師方）

㈣治頭風旋暈。起倒無定。蒴藋、鵝抬、白石脂各一兩。枳實炒七錢半。每服三錢。酒一盞。煎六分。溫服。（聖惠方）

㈤治產後血暈。心悶煩熱。用蒴藋。破如算子一握。水一升。煎半升。分二服。或小便出血者。服之亦瘥。（衞生易簡方）

㈥治寒熱往來。癉疾不止。取蒴藋一大握。炙令赤色。以水煎濃汁一盞。欲發前服。服後卽愈。（斗門方）

㈦治卒暴癥塊。堅硬如石。作痛欲死者。取蒴藋根一小束。洗淨細擘。以酒二升。漬三宿。溫服五合。至一升。日三服。若欲速用。於熱灰中溫出。乘暖服之。此方無毒。已愈多人矣。（古今驗方）

㈧癰腫惡肉。頑固不消者。取蒴藋灰、石灰各淋取汁。合煎如膏。傳之能蝕惡肉。亦去痣疵。此藥過十日卽無效也。（千金方）

【蒸龍草】卽雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【蒸餅】命名　本品係用小麥麪加酵糟蒸成食品之餅。故名。

採取　以臘月及寒食日。蒸之至皮裂。去皮懸之風乾。臨時以水浸脹。搥爛。濾過用。其以果菜油膩諸物爲餌者。不堪入藥。

性質　甘。平。無毒。

主治　消食。養脾胃。溫中化滯。益氣和血。止汗和三焦。通水道。

參攷資料　㈠蒸餅和脾胃及三焦。藥甚易消化。且夥已過性。不助濕熱。（李時珍）㈡按夔竹談藪云。宋寧宗爲鄱王時。病淋。日夜凡三百起。國醫罔措。或舉孫琳治之。琳用蒸餅、大蒜、淡豆豉三物搗丸。令以溫水下三十丸。曰今日進三服。病當減三之一。明日亦然。三日病除。已而果然。賜以千緡。或問其說。琳曰。小兒何緣有淋。只是水道不利。三物皆能通利故爾。若琳者其可與語醫矣。（李時珍）

【蒺藜】卽刺蒺藜之原名。詳『刺蒺藜』條。

【蒺藜】㈠卽刺蒺藜之簡稱。詳『刺蒺藜』條。㈡卽蜈蚣之古籍別名。典見爾雅。詳『蜈蚣』條。

【蔥頭】卽蒟蒻之古籍別名。典見開寶本草。詳『蒟蒻』條。

【蔥麻子】命名　本品葉似大麻。形如牛蜱。故名。又蔥麻亦作蜣蜋牛虱也。子有麻點。曰蔥麻子。

處方用名　蔥麻仁。蔥麻子。

古籍別名　遠近子。脾麻子。草麻子。（和漢藥考）

學名　Ricinus communis, L.

外國名詞　Semen Ricini（拉丁）Ricinus Leaves.（英）Ricini Folia.（德）

基本　屬大戟科爲蔥麻之種子。

產地　陳仁山藥物生產辨云。草麻子產區甚廣。以安南東京內埠爲多。廣東北江清遠下四府各省均有出。

形態　蔥麻爲一年生草本。莖高六七尺。甚者長丈餘。莖圓而中空如竹。葉巨大。其狀如楯。而深裂似掌。邊緣有粗鋸齒。具長葉柄。皆互生。葉與莖俱帶白粉。傷之則滲出白汁。梢端或葉腋抽出花梗。長五六寸至尺許。於此開單性之花。相綴而爲總狀花序。雌花之花柱在上。色淡紅。雄花在下。色淡黃。果實爲有刺之蒴果。中分三房。房藏三子。子形扁平。橢圓。色黑褐而雜以白。有光澤。長三分至五六分。上半有灰白色之小嘴。底部有臍。胚乳色白如油。味辛烈。



蔥麻子

採取　夏採莖葉。秋採實。冬採根。日乾。

製法　雷敩曰。凡使蔥麻子。勿用黑天赤利子。緣在地裏上。是顛兩頭尖有毒。其蔥麻子節有黃黑斑。凡使以鹽湯煮半日。去皮取子研用。李時珍曰。取蔥麻油法。用蔥麻子仁五升。搗爛。以水一斗煮

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之。有沫撇起。俟沫盡乃止。去水以沫煎至點燈不作。滴水不散方美。

性質　甘。辛。平。有小毒。

成分　主要之成分爲脂肪油。即謂之蓖麻子油。

效能　通竅。道瀉積滯。用作瀉下藥。又爲外傅藥。治老年及虛人便祕。

作用　在胃不起作用。至小腸首段。被膵液化合而成蓖麻油酸。能激腸之黏膜。使腸液分泌增加。能將胃內未消化之食物。及腸中之積糞瀉下。既少刺激性。而性又和平。誠極安全之緩下劑也。若服不純潔者。或服量過多。則亦能惹起胃黏膜炎。

主治　水癌。以水研二十枚服之。吐惡沫。加至三十枚。三日一服。

瘧則止。又主風虛寒熱。身體瘡痒浮腫。尸疰惡氣。搾取油塗之。

歷代記述攷證　【宋】大明日華諸家本草論蓖麻子曰。研傅瘡瘕疥癩。塗手足心催生。【宋】寇宗奭本草衍義論蓖麻子曰。治瘰癧取子炒熟去皮。每臥時嚼服二三枚。漸加至十數枚。有效。【明】李時珍本草綱目論蓖麻子曰。主偏風不遂。口眼喎斜。失音口噤。頭風耳聾。舌腫喉痺。癚齁喘。脚氣毒腫。丹瘤。湯火傷。鍼刺入肉。女人胎衣不下。子腸挺出。開通關竅。經絡。能止諸痛。消腫追膿拔毒。【明】經希雍本草經疏論蓖麻子曰。蓖麻甘辛而其氣則平。性有小毒。其力長於收吸。故能拔病氣出外。其性善收。故能追膿取毒。能出有形之滯物。又能通利關竅。故主水癥。又主風虛寒熱。身體瘡痒浮腫。尸疰惡氣。搾取油塗之。研塗手足心。催生。寇氏主癚癧。李氏主偏風半身不遂。口眼喎斜。頭風。脚氣。毒腫。丹瘤。火傷。鍼刺入肉。女人胞衣不下。及子腸挺出。皆從外治。不經內服。良有見也。子無刺者良。子有刺者毒。【明】李士材本草圖解論蓖麻子曰。蓖麻子辛熱有毒。服者一生勿食炒豆。犯即脹死。且有毒損人。故不可輕服。但取外治。其用甚多。研傅瘡癰癚癧。塗足心催生。口眼歪邪。右歪貼左。左歪貼右。塞鼻治痙。塞耳治聾。小便不通。三粒研細。入紙撚插竅。即通。子宮脫下。塗頂即收。丹溪曰。追膿拔毒。爲外科要藥。鵝鴨油能引藥氣入內。蓖麻油能拔病氣出外。偏風手足不舉。同羊脂麝香穿山甲煎作膏。日摩數次。手臂腫痛。蓖麻搗膏貼之。一日愈。偏頭風同乳香搗塗即止。取油法。研爛入水煮之。有沫撇起。沫盡乃止。取沫煎至滴水不散爲度。善收善走。氣味頗類巴豆。外用頗奏奇功。內服不可輕率。【清】黃宮繡本草求眞。論蓖麻子曰。蓖麻子甘辛有熱。性味頗類巴豆。既有收引拔毒之能。復有開竅通利之力。觀書所言搗膏以貼手臂腫痛。一夜即效。子宮脫下。用此研膏以塗頂心即入。胞衣不出。用此研膏以塗脚心即下。中風口眼喎斜。偏左貼右手心。偏右貼左手心。即止。至於口噤鼻塞。耳聾。喉痺。舌脹。用油烟薰即開。水癥浮腫。用仁研服一枚即消。針刺好肉。用仁搗敷。患處即拔。瘰癧惡瘡。用仁外敷立愈。凡此皆屬外用。以奏奇功。但不宜於服耳。昔人有以汁點畜舌根下。即不能食。點畜肛門內。即下血死。并云服蓖麻者一生不得服豆。犯即脹死。其毒可知。鹽水煮取皮研取油用。忌鐵。

國外學說　日本猪子氏之和漢藥論云。蓖麻子者。原產於印度。有下泄之效。其有效成分爲蓖麻子油。及一種醱酵素。即コーベルト氏所謂「リチン」是也。「リチン」有劇毒。亦與他醱酵素同。加百度之溫。則全無毒。溪醫輩之處本藥也。先以鹽湯煮半日。而棄皮用之。（和語本草卷之九）故「リチン」已化爲無毒。經驗與理論相符合。可謂奇矣。而蓖麻子之效分。爲一種有機酸。所謂「リチール」酸是也。

近人學說　張山雷曰。蓖麻子氣味甘平。瀕湖以爲甘辛平。其實全無辛味。石頑以爲溫。頗且恒用以消散外癰紅腫。煩熱各症。則可證其性必曾清涼。石頑之說亦非是。其性善走。善散。丹溪以爲能追膿取毒。拔邪外出。甚是。不確。壽頤業師朱氏。世以兼治外癰名。凡拔毒提膿藥中。從不用此。惟退消陽毒紅腫及發頤瘰癧乳癰等症。有家製千趙膏一方。專用蓖麻子仁杵細。和乳香膠香銀珠麝香成膏。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

卽有紅赤燄高勢且釀膿者亦可十消八九。則明是消散之功。何可誤認提毒外出。瀕湖以治偏風不擧。口目喎斜。蓋亦用其走竄入絡。可以通痺。非能拔出血絡經脈之風邪。且偏風喎斜等證。本是腦經爲病。何嘗有外風入絡。認症本錯。而用藥又是隔膜一誤再誤。頗謂此法亦必無效。據綱目所載一人偏風。手足不擧。瀕湖以此油同麝香鱧鯉甲等作膏。摩之而愈。則眞是風寒溫三氣雜至之痺着關節者。所以有驗。此辨症之不可糢糊籠約者也。丹溪又以爲能出有形之滯物。故取胎產胞衣。剩骨膿血者用之。則亦因其善走而速之使動耳。瀕湖又謂一人病手臂一塊腫痛。以此搗膏貼之。一夜而愈。則卽走竄消散之功耳。又謂一婦產後。子腸不收。搗仁貼其丹田。一夜而上。頗謂此藥性情止能流動而使之行。不能收攝而使之斂。古書謂產後腸出。子宮不上。用蔥麻仁搗塗頂心百會穴。立刻收上云云。卻已陳陳相因。數見不一見。均是空中樓閣。瀕湖此說。亦是依託古書欺人之語。蓋蔥麻散腫之功極驗。如果子宮子腸不收而亦用之。豈不使其正氣愈散。理當益復下墜。萬無可愈之道。此徵之實驗而鑿鑿有據者。何得比附古人之空談。而陷害病家於實禍。吾國醫籍。最多此等荒唐之說。苟非確有至理。已覺不可輕信。況似此走散之品。而反謂之能收。正是大相矛盾者耶。石頑謂研塗瘰癧痘毒癰腫卽消。則是實驗。此散之力而非收之功也。且瀕湖綱目於主治正文中。連綴治女人胎衣不下。子腸挺出。開通關竅經絡三句。則不下者必使之下。挺出者必使之收。此物既能下胎衣而開通關竅經絡。又何以能收子腸一行之中。出爾反爾。更是可駭。似此信手拈來。實是誤人不小。又主治中以消腫追膿拔毒六字并作一氣。則消者欲其內消。追者拔者欲其外出。凡能內消之藥。必不能拔毒而拔毒之藥。以敷未潰之瘡。適以提之成膿。必不能消腫。亦是兩相矛盾。萬不可通。蓋瀕湖本不諳治瘍之原理。以致措辭乖悟如是。究竟蔥麻治瘍。內消最有奇功。拔毒實無能力。此頗所以謂內外分科之不足恃也。又古書皆謂蔥麻有毒。不可內服。瀕湖且謂服蔥麻者一生不得食炒豆。犯之必脹死。一似此物必是大毒之品。所以綱目列於毒草門中。然頗幼時家園中種此數年。當時并不知其卽是蔥麻子。但見人家炒熟食之。如落花生者然。頗全家亦炒食麌矣。約計其數。實是不少。而全家未蒙其害。至今已將四十年。亦未嘗不食炒豆。乃知宋元以後。醫書苟非親驗。多是空談。嗚呼。安得更有神農氏作而再一一親嘗之耶。

配合應用　㊀蔥麻子去殼。同棗肉天葵等分。清水入砂器中煮半日。空腹時與病人嚼下。自十五枚至廿一枚。瘰癧久久自消。

㊁李氏云。一人病偏風。手足不擧。用此油同羊脂、麝香、鱧鯉甲等藥。煎作摩膏。日摩數次。一月餘漸復。兼服搜風養血化痰之劑。三月而愈。又一人病手臂一塊腫痛。亦用蔥麻搗膏貼之。一夜而愈。又一人病氣鬱偏頭痛。用此同乳香食鹽搗。熨太陽穴。一夜痛止。又一婦產後子腸不收。搗仁貼其丹田。一夜而上。此藥外用累奏奇功。但內服不可輕率耳。或言搗膏以筋點於鵝馬六畜舌根下。卽不能食。或點肚內。卽下血死。其毒可知矣。

㊂治口眼喎斜。蔥麻子仁搗膏。左貼右貼左卽正。

㊃又用蔥麻子仁七七粒。研作餅。右喎安在左手心。左喎安在右手心。卻以銅盂盛熱水坐藥上。冷卽換。五六次卽正也。（婦人良方）

㊄治風氣頭痛不可忍者。乳香、蔥麻仁等分。搗餅。隨左右貼太陽穴。解髮出氣甚驗。

㊅又方。蔥麻仁半兩。聚肉十五枚。搗塗紙上。捲筒插入鼻中。下清水涕。頭痛卽止。

㊆治鼻塞不通。用蔥麻仁三十粒。大棗去皮一枚。搗勻。綿裹塞之。一日一易。三十日聞香臭也。（聖濟總錄方）

㊇治舌上出血。用蔥麻子油紙撚燒煙熏鼻中自止。（摘玄方）

㊈治舌脹塞口。用蔥麻仁四十粒。去殼研油。塗紙上作撚燒煙熏

629／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之。未退再熏。以愈爲度。有人舌腫出口外。一村人用此法而愈。（經驗良方）

㊀治急喉痺。牙關緊急不通。用此即破。以蔥麻子仁研爛。紙卷作筒。燒煙熏吸。即通。或只取油作撚尤妙。名聖煙筒。

㊁治催生下胞。用蔥麻子七粒。去殼研膏。塗脚心。若胎及衣下。便速洗去。不爾則子腸出。即以此膏塗頂。腸自入也。（崔元亮海上集驗方）

㊂治產難。取蔥麻子十四枚。每手各把七枚。須臾立下也。（肘後方）

㊃治子宮脫下。用蔥麻仁、枯礬等分爲末。安紙上托入。仍以蔥麻仁十四枚研膏塗頂心。即入。（摘玄方）

㊄又治盤腸生產。塗頂。方同上。（摘玄方）

㊅治一切腫毒痛不可忍。用蔥麻子搗敷。即止也。（肘後方）

㊆治中身不遂。失音不語。取蔥麻子油一升。陳酒一斗。銅鍋盛油。著酒中一日。煮之令熟。細細服之。（外臺祕要方）

㊇治八種頭風。蔥麻子、剛子各四十九粒去殼。雀腦芎一大塊。搗如泥。糊丸梧子大。線穿掛風處陰乾。用時先將好末茶調成膏子。塗盃內。後將灰火燒前藥烟起。以盃覆之。待烟盡。以百沸葱湯點盃內茶藥服之。後以綿被裹頭臥。汗出避風。（袖珍方）

㊈治天柱骨倒。小兒疳疾。及諸病後天柱骨倒。乃體虛所致。宜生筋散貼之。木鼈子六箇去殼。蔥麻子六十粒去殼。研勻。先包頭擦頂上。令熱。以津調藥貼之。（鄭氏小兒方）

㊉治五種風癎。不問年月遠近。用蔥麻子仁二兩。黃連一兩。石膏水一碗。文武火煮之。乾即添水。三日兩夜。取出黃連。只用蔥麻。風乾勿令見日。以竹刀每個切作四段。每服二十段。食後荊芥湯下。日二服。終身忌食豆。犯之必腹脹而死。（衞生寶鑑方）

㊊治喉中瘡腫。用蔥麻子仁一枚。朴硝一錢。同研。新汲水服之。連進二三服效。（杜任方）又用蔥麻仁、荊芥穗等分爲末。蜜丸綿包噙嚥之。（三因方）

㊋治水氣脹滿。蔥麻子仁研水解得三合。清旦一頓服盡。日中當下青黃水也。或云壯人止可服五粒。（外臺祕要方）

㊌治脚氣作痛。蔥麻子七粒。去殼研爛。同蘇合香丸貼足心。痛即止也。（外臺祕要方）

㊍治小便不通。蔥麻仁三粒。研細。入紙撚內插入竅中即通。（摘玄方）

㊎齁喘咳嗽。蔥麻子去殼。炒熟。揀甜者食之。須多服見效。終身不可食炒豆。（衞生易簡方）

㊏治催生下胎。不拘生胎死胎。蔥麻二個。巴豆二個。麝香一分。研貼臍中。井足心。又下生胎。一月一粒。溫酒吞下。（集簡方）

㊐治瘋風鼻塌。手指攣曲。節間痛不可忍。漸至斷落。用蔥麻子一兩。去皮。黃連一兩。剉豆大。以小瓶子入水一升。同浸。春夏二日。秋冬五日後。取蔥麻子一枚。劈破。面東以浸藥水吞之。漸加至四五枚。若有微利。不妨。瓶中水盡更添。兩月後。喫大蒜猪肉試之。如不發是效也。若發動再服。直候至不發乃止。（杜任方）

㊑治小兒丹瘤。用蔥麻子五個。去皮研。入麪一匙。水調塗之甚效。（修眞祕旨方）

㊒治瘰癧結核。蔥麻炒去皮。每睡時服二三枚。取效。一生不可喫炒豆。（經驗方）

㊓治瘰癧惡瘡及軟癩。用白膠香一兩。瓦器溶化。去滓。以蔥麻子六十四個。去殼研膏。溶膠投之。攪勻。入油半匙。頭至點水中。試軟硬。添減膠油得所。以絳帛量瘡大小攤貼。一膏可治三瘢也。（儒門事親方）

㊔肺風面瘡。起白屑或微有赤瘡。用蔥麻子仁四十九粒。白果膠棗各三粒。瓦松三錢。肥皂一個。搗爲丸。洗面用之。良。（扶壽方）

㊕治面上雀斑。蔥麻子仁、蜜陀僧、硫黃各一錢爲末。用羊髓和勻。夜夜傅之。（摘玄方）

㊖耳卒壅閉。蔥麻子一百個。去殼。與大棗十五枚。搗爛。入乳小兒乳汁和丸作餌。每以綿裹一枚塞

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之。瘡中熱爲度。每一日一易。大約二十日可痊。（千金方）

㊂治髮黃不黑。蔥麻子仁香油煎焦。去滓。三日後頻刷之。（摘玄方）

㊃治湯火灼傷。蔥麻子仁、蛤粉等分。研膏。湯傷以油調。火灼以水調塗之。（古今錄驗方）

㊄治鍼刺入肉。蔥麻子去殼一個。先以帛蓋傷處。傅之。頻看。若見刺出。卽拔去。恐藥緊。奪出好肉。或加白梅肉同研尤好。（衞生易簡方）

㊅治竹木骨哽。蔥麻子仁一兩。凝水石二兩。研勻。每以一撮。置舌根。嚥嚥之。自然不見。又方。蔥麻油、紅麵等分。研細。沙糖丸皂子大。綿裹含嚥。痰出大良。

㊆治雞魚骨哽。蔥麻子仁研爛。入百藥煎。研丸彈子大。井花水化下。半丸卽下。

㊇治惡犬咬傷。蔥麻子五十粒。去殼。以井花研膏。先以鹽水洗咬痛處。乃貼此膏。（袖珍方）

㊈治齁喘痰嗽。用九尖蔥麻葉三錢。入飛過白礬二錢。以猪肉四兩薄批。擦藥在內。荷葉裹之。文武火煨熟。細嚼。以白湯送下。名九仙散。儒門事親方。又治咳嗽涎喘。不問年深日淺。用經霜蔥麻葉、經霜桑葉、御米殼、蜜炒各一兩爲末。蜜丸彈子大。每服一丸。白湯化下。日一服。名無憂丸。（普濟方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。忌鐵。

參攷資料　㊀苗葉似蓖草而大厚。莖赤有節。如甘蔗高丈餘。秋生細花。隨便結實。殼上有刺。狀類巴豆。青黃斑褐。夏採莖葉。秋採實。冬採根。日乾用。（韓保昇）㊁蔥麻莖有赤有白。中空。其葉大如瓠葉。每葉凡五尖。夏秋間極裏抽出花穗。纍纍黃色。每枝結實數十顆。上有刺攢簇。如蝟毛而軟。凡三四子合成一顆。枯時劈開。狀如巴豆殼。內有子。大如豆。殼有斑點。狀如牛蠟。再去斑殼。中有仁。黑白如續隨子仁。有油可作印色及油紙。子無刺者良。子有刺者毒。（李時珍）㊂蔥麻產於亞細亞中國甚多。取其子搾取油。每十四兩可得油三兩。其色金黃。其臭濃者有功力。能潤瀉。男女小兒皆可服。瀉後無關係。身虛弱欲令瀉者用此尤宜。初生嬰兒屎不出者可服。婦人產後大便難可服。痢證欲先瀉去宿物者可服。腹痛欲去燥屎者可服。大人每服五錢至一兩。小兒每服一錢至四錢。若嫌氣味用雞蛋黃攪和同服。或八角油一二滴同服。（內科新說）

【蔥麻子油】　外國名詞 Oleum Ricini.

（拉丁）(Castor Oil)（英）ヒマシ油リチヲ油（日本）

性質　有毒。

主治　炎熱熨塗顱上。止鼻衄大驗。

國外學說　英美學說謂蔥麻子油從蔥麻子榨出。（蔥麻俗名大麻）產中國印度美國及亞非利加等處。而蔥麻業亦可入藥。此油在印度埃及希臘阿剌伯各國。古時卽多用之。蔥麻樹原產於印度。故蔥麻樹在印度爲最多。生田邊等處。高約一丈六尺至二丈。樹幹頗大。其油爲上等藥品。又能作點燈之用。蔥麻子有大小二種。其小者含油更多。而成色亦最佳。西國常用之蔥麻油。大半爲印度所產。俗名冷取蔥麻油。英國亦有用蔥麻子榨油之處。間有從北亞美利加與西印度運至英國出售者。色如淡稻柴色。臭淡味輕。如尋常之油。間有少辣者。此油雖較尋常定性油更重。而較水則輕。並有黏性。第蔥麻油之由榨取者。其性略純。以火製成者。其性頗烈。藥肆中所出售之品。必剋爲兩等。製法去盡蔥麻子之皮衣。以淨核入鐵鍋用微火炒之。此鐵鍋須按以手。覺不甚炙痛。炒畢。以螺絲柱壓絞榨而取其汁。再將油加入水和煎。其渣滓雜物。卽由浮沫撇去。而成淨油。時油中有一層白物。隔在油水交界間。恍如衣沫一層。提油時。務須將衣撤去。勿令溷於油中。由是再將油隔淨。稍和以水。同熬。其水熬至化汽散盡。方爲純淨。（其所以必數次和水煎熬者。以熬時可以由水食去油內雜質）油既純淨。雖將油入小瓶而搖動之。亦不起白衣。其色味清而稠。無臭味。惡

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其作用爲輕瀉藥。瀉力速而平和。老幼均可服。治肚腸生炎。積滯。凡應用瀉藥而不可慁其腸者用此油最合宜。故此油爲輕性穩妥微利藥。又如痢症初起。因腸內有不消化之雜質及結糞在內阻塞痒疼。欲下不下。服此油以滑利之。則自然輕鬆。大人每服四錢至六錢。小兒每服一二錢至三四錢。或加檸檬糖。或白糖同服。服後歷三四點鐘時。必輕瀉。況常服此油可由漸減輕。與別藥之當由漸加多者相反。(凡腹中有火。皆宜服此。)處方以蓖麻油二錢。薄荷油一滴。鴉片酒二十滴。和勻治肚疼。如疼甚者。服之可止。(蓖麻油鴉片酒方。)又蓖麻油一兩或二兩。水糖一兩。或雞蛋黃一個。攪勻。共調和。再加溫水足十兩。作一次射之。治大便乾燥。欲藥力速。則加洋肥皂少許。勘之更妙。(蓖麻油射水方。如服汞(二)綠(卽甘汞)之後而猶未瀉。宜服蓖麻油四錢以助之。綠滑利之劑。惟此油最爲上品。而亦惟此油最爲通行。若中國所製之蓖麻油則不純淨。故不入服劑。日本和漢藥考曰。蓖麻子搾去油後。其餘下之渣。不惟瀉下之作用較蓖麻子油爲劇。甚有發胃腸炎。陷於虛脫之狀態者。卽此可知蓖麻子中除脂肪油外。必尙存有瀉下作用之物質。一說係含有倔利克歇特之里企檄 Ricinon, 亞爾加羅伊特之里企寧 Ricinin, 或有毒性蛋白質之里欽 Ricin. 故有上述之作用云。又荷蘭藥鏡曰。蓖麻子有斑紋之殼皮與薄膜。其瀉下之作用。殊爲猛烈。去皮膜用仁。則瀉下之效減弱。故連皮膜者。則用爲峻瀉藥。或以之吐瀉。從前用以滌除腐敗膽液。黏穢留飲等。然在易慁觸之人。則胃腸必發劇甚之煩衝。及腹痛搐搦等症。因是晚近已廢而不用。間有壯實之症。可以峻瀉者。亦每用巴豆油代之矣。

【蓖麻子葉】　性質　有毒。
主治　脚氣風腫不仁。燕搗裹之。日二三易。卽消。

歷代記述弦證　【明】李時珍　本草綱目論蓖麻子葉曰。治痰喘咳嗽。

【蓖麻仁】　卽蓖麻子之處方用名。詳『蓖麻子』條。

【蒼朮】　命名　朮者山之精。服之辟穀長生。故有山精仙朮之名號。又朮字。按六書本意。係篆文。象其根幹枝葉之形也。故名。
處方用名　泔製蒼朮。製茅朮。茅朮。
古籍別名　赤朮(別錄)山精。(抱朴子)仙朮。(綱目)山芥。山薊。天精。天薊。地葵。抱薊。馬薊。茅君寶篋。(和漢藥考)
外國名詞　Atractylis ovata, Thunb.(拉丁)
基本　屬菊花科。爲蒼朮之根。
產地　㊀陳仁山藥物生產辨云。蒼朮產湖北蘄陽、鄖陽、馬山口、紫荊關、京山縣、米河等處。俱由漢口運來。名內行雙朮。身細味香辛。有產河南直隸東西北山。身鬆浮大皮黃。名爲海船津雙朮。味淡不如。清明後出新。㊁凡山林原野。往往自生。以茅山蒿山生者爲佳。
形態　朮爲多年生草本。春日自宿根伸出嫩芽。多被以白色之


蒼朮

輭毛。其莖愈長愈堅。下部變如木質。高可二三尺。葉橢圓。末端尖。邊緣有細鋸齒。皆互生。又分裂爲三爲五。成複葉狀。缺刻極深。至秋梢頭開似薊之花。色白或淡紅。花作筒狀。不分瓣。連綴爲頭狀花序。總苞爲葉狀。排列若覆瓦而圍以似魚骨之刺。其嫩芽與葉根。山民嘗採而燁食之。入伏後結子。至秋苗枯。根似老薑。旁有細根。作蒼黑色。肉黃白色。有油膏。

632／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

州、福建是也。品質以廣西產者爲最佳。貴州、福建產者次之。至於四川所產者又其次也。故四川地方栽培蒼朮之人。日見其少。廣西其產出之品質良好。得利豐厚。故栽培蒼朮者。日增一日。將來吾國蒼朮中之利益。必爲所掌握矣。種類無可區別。惟依栽培之早晚而分之爲早植種晚植種之二種。早植種較晚植種爲劣。故栽培蒼朮。宜取廣西之晚植種爲佳。㈢治地擇定砂質之壤土。而後耕起土塊。使之細碎。乃作高畦。畦間二尺五寸至三尺。長短不拘。畦面耙平勻均。待其栽種可也。㈣期節分早晚二種。早植種於春季二三月之交。從事栽植。晚植種於夏秋七八月之交。栽植之可也。㈤栽種取蒼朮之根。劈破之。而後插植於畦上。插植之後。上覆以細土少許。並輕壓之爲要。㈥施肥。肥料以人糞尿爲主。他若堆肥等。則不宜也。若施與之。反妨其生長。施肥次數。約可四次。第一次在栽種後十餘日時施之。第二次在除草後施之。第三次在中耕後施之。第四次在末次除草後施之。如是則於其生長大有利益也。㈦除草。除草可不限定次數。又不宜拘期而行。蓋或時期未至。雜草叢生。若不刈除其生長已過於蒼朮。而蒼朮爲之枯死矣。故不可拘期而行。其次數亦不可拘定也。㈧中耕。栽植後五六十日時行之。自種至收。施行一次可也。當行中耕之際。不可失度。若耕失其度。則有害於蒼朮。㈨收穫。早種自二三月栽種。至十一二月間採取。晚種自七八月栽種。至翌年三四月收穫。收穫之法。用短柄之小耙。於其株之周圍。漸漸掬鬆而後。用手拔起之。乃去其莖葉。留其根。置於日光中曝乾之。再用木製之方箱或桶。藏於其內。並密閉其蓋。置於乾燥處。如是貯藏。不論何時取用。則與初無異也。㈩計算。每畝收量。佳者可達七八百斤。次者四五百斤。最下者一二百斤。價格之高下。隨品質之良否而定。其市價又無定。總之每畝之利。約可得數十元。

採取　每年二三月八九月採根曝乾。

製法　大明曰。凡使蒼朮。以米泔浸一宿。入粟。寇宗奭曰。蒼朮性烈。須米泔浸洗二日。去上粗皮用。李時珍曰。蒼朮性燥。故以糯米泔浸去其油。切片焙乾用。亦有用脂麻同炒以制其燥者。

性質　苦。溫。無毒。

效能　發汗。燥濕。升陽。解鬱。用作健胃藥。及利水與解熱藥。

主治　風寒濕痺。死肌痰痘。作煎餌。久服輕身延年。（本經）主頭痛。消痰水。逐皮間風水結腫。除心下急滿。及霍亂吐下不止。暖胃消穀嗜食。（別錄）

張仲景之醫明　朮之一味。經張仲景之實驗。認爲「主利水也。故能治小便自利。不利。旁治身煩疼。痰飲。失精眩冒。下利。喜唾」等症。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論蒼朮曰。除惡氣。弭災疹。【唐】甄權藥性本草論蒼朮曰。蒼朮主大風痺痺。心腹脹痛。水腫脹滿。除寒熱。止嘔逆。下泄冷痢。【宋】大明日華諸家本草論蒼朮曰。治筋骨轢弱。痃癖氣塊。婦人冷氣痺。藏山嵐瘴氣。溫疾。【金】張元素珍珠囊論蒼朮曰。明目。暖水臟。【元】李東垣用藥法象論蒼朮曰。除濕發汗。健胃安脾。治痿要藥。【元】朱震亨本草衍義補遺論蒼朮曰。散風益氣。總解諸鬱。【明】李時珍本草綱目論蒼朮曰。治濕痰。留飲。或挾瘀血成窠囊。及脾濕下流。濁濕帶下。清瀉腸風。【明】李士材本草圖解論蒼朮曰。蒼朮甘而辛。烈性溫而燥。入脾胃二經。發汗而去風。寒濕下氣而消痰。食水開鬱。有神功。腫脹爲要藥。化一切積塊。除諸病。吐瀉善逐鬼邪。能弭災診。寬中發汗。其功勝於白朮。補中除濕。其力不及白朮。大抵卑監之土。宜與白朮以培之。敦阜之土。宜與蒼朮以平之。【明】繆希雍本草經疏論蒼朮曰。蒼朮稟初夏之氣以生。其味苦。其氣溫。無毒。其氣芳烈。其味甘濃。其性純陽。爲除風痺之上藥。安脾胃之神品。本經主風寒濕痺。死肌痰痘者。正以風寒濕三者。合而成痺。痺者拘攣而痛者是也。經曰。地之濕氣感則害人皮肉筋骨。死肌者。濕毒侵肌肉也。痙者。風寒乘虛客於肝脾腎所致也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

疸者。脾胃虛而濕熱瘀滯也。如上諸病。莫不由風寒濕而成。兀有除此三邪之功。故能祛其所致之疾也。止汗除熱消食者。濕熱盛則自汗。濕邪客則發熱。濕去而脾胃燥。燥則食自消。汗自止。熱自除也。又主大風在身面者。兀氣芳烈而悍。純陽之物也。風爲陽邪。發於陽部。故主之也。風眩頭痛目淚出者。陽虛則風客之而眩。痰厥則頭痛。風熱壅則目淚出也。消痰水。逐皮間風水。結腫。除心下急痛。及霍亂吐下不止者。濕客於胃則滯而生痰。客於脾則生水。脾虛濕勝。則爲水腫。濕客中焦。則心下急滿。脾胃俱虛。則中焦不治。而濕邪客之。則爲霍亂吐下不止也。利腰臍間血者。血屬陰。濕爲陰邪。下流客之。使腰臍血滯而不得通利。濕去則諸證無不愈矣。益津液。煖胃消穀嗜食者。濕去則胃强。而津液自生。寒濕散則胃自煖。邪去而脾胃健。則消穀而嗜食矣。煎餌久服。輕身延年不飢者。兀爲陽藥。故善除陰濕。濕去則脾胃之氣旺。陽主氣。氣盛則身輕。脾主四肢。濕去則脾健。健則四肢利。故能涉險負重也。仙經云。氣滿不思食。是以延年而不飢也。【清】黃宮繡本草求眞。論蒼兀曰。蒼兀甘苦辛烈。氣溫無毒。雖有升陽散鬱。發汗除濕。燥痰。辟惡。治腫之功。然甘味少而辛苦重。不似白兀性稟中和。直固清陽中氣之爲妙耳。故同香附。則爲散鬱而氣平。同黃柏。則能治下部濕熱。同大棗。則能治脇下飲澼。同二陳加白兀升柴。則可以治脾濕下流。腸風帶濁。然必稟體肥盛多濕者始宜。若形瘦多火切忌。至云服能輕身長生。不過因其濕去之謂。豈眞能入仙境之地哉。出茅山堅小有硃砂點者良。糯米泔浸煙乾。同芝麻炒。以制其燥。防風地榆爲使。【清】張隱菴本草崇原。論蒼兀曰。白兀性優。蒼兀性劣。凡欲補脾。則用白兀。凡欲運脾。則用蒼兀。欲補運相兼。則相兼而用。如補多運少。則白兀多而蒼兀少。運多補少。則蒼兀多而白兀少。品雖有二。實則一也。本經未分蒼白。而仲祖傷寒方中。皆用白兀。金匱方中。又用赤兀。至陶宏景別錄。則分而爲二。須知赤白之分。始於仲祖。非宏景始分之也。赤兀。卽是蒼兀。其功用與白兀略同。故仍以本經兀之主治爲本。但白兀味甘。蒼兀氣苦。白兀止汗。蒼兀發汗。故止汗二字。節去不錄。後人謂蒼兀之味苦。其實蒼兀之味甘而微苦。【清】楊時泰本草述鉤元。論兀曰。兀之用補中益氣。力優在白。除濕快氣。能專於蒼。所謂祛邪之功勝而益陰之效虧者。當以坐蒼不得概敵之白。至於燥腎閉氣。又宜坐白。不能混及於蒼。凡病脾土虛者。無論濕邪之有無。白兀皆所急需。但不宜於胃有實熱者耳。【清】鄒澍本經疏證。論蒼兀曰。兀氣溫。味甘苦而辛。甘能補中。苦能降泄。辛能升散。於人身脾與胃。皆嘗稼穡作甘之德。脾主升舉清陽。胃主通降濁陰。皆屬土而畏濕。兀之爲物。開花於初夏。結實於伏時。偏於濕氣溷漫之際。顯其有猷有爲。確可知其入脾胃。能內固中氣。外禦濕侮矣。風寒濕痺。死肌痙疸。不得盡謂脾病。而以兀爲主劑者。則以濕爲脾所主。濕能爲患。固屬脾氣不治一也。脾主肌肉。介在皮毛筋骨中。痹與痙病。在肌肉內死肌及疸病。在肌肉外旁。病則當取中二也。筋骨皮毛。均非駐濕之所。惟肌肉間爲可駐濕三也。知此。則凡痺死肌痙疸之係乎風寒濕者。皆兀主之矣。仲景治風寒濕痺方多。有不用兀者。則用兀者。當必有故矣。痺論風寒濕三氣雜至。合而成痺。其風氣勝者爲行痺。寒氣勝者爲痛痺。濕氣勝者爲著痺。白兀之效於風勝濕勝者爲最宜。寒勝者爲差減。何以知之。蓋風勝必煩。濕勝必重。檢金匱要略中。治痺諸方。其用兀者。非兼煩必兼重。如麻黃加兀湯下云。身煩疼。防已黃芪湯下云。身重。桂枝附子湯去桂加白兀湯下云。身體疼煩。甘草附子湯下云。骨節煩疼。掣痛。或身微腫。甘乾苔兀湯下云。腹冀如帶五千錢。桂枝芍藥知母湯下云。肢節疼痛。脚腫如脫。附近效方。兀附湯下云。頭重。其他若麻黃杏仁薏苡甘草湯。烏頭湯。抵當烏頭桂枝湯。大烏頭煎等方。何嘗不治痛治痺。絕不用兀。雖然。謂兀功擅於風與濕。則可。謂於寒有所忌。則不可。傷

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

寒少陰篇附子湯。治身體疼。手足寒。骨節痛。不煩不重。亦用白朮。蓋濕流關節云骨節痛則未有不兼濕者。矧風濕二者。必挾寒始成痺。不然則否。素問之旨可驗也。或問理中丸。以吐多去朮。乃五苓散豬苓散。茯苓澤瀉湯。偏有吐而用朮。以下多而還用朮。乃桂枝附子去桂枝加白朮湯。偏以大便鞕而用朮。其義何居。夫亦當察其所因也。金匱要略嘔吐篇云。先嘔卻渴者。爲水停心下。此屬飲家。今云中風發熱六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。曰嘔吐而病在膈上後思水者。解急與之。思水者。豬苓散主之。曰胃反吐而渴欲飲水者。茯苓澤瀉湯主之。三證皆有渴。皆欲飲水。而理中丸條。則曰霍亂頭痛發熱。身疼痛。熱多欲飲水者。五苓散主之。寒多不欲水者。理中丸主之。夫熱多欲水而用五苓。中仍有朮。寒多不欲水而用理中。亦不離乎朮。惟因吐多而去之。可見嘔吐之於朮。猶是一大關鍵。必持是定其用舍。不然同爲霍亂證。何以五苓散下不曰吐多去朮耶。卽理中丸下亦云渴。欲得水者。加朮可驗也。雖然用朮治渴。爲嘔吐者言之耳。朮究非治渴之物也。如桂枝附子去桂加白朮湯。曰傷寒八九日風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。若其人大便鞕。小便自利者。去桂加白朮湯主之。獨提不嘔不渴二者。與嘔而渴者。恰相對照。柯韻伯曰。風寒濕三氣雜至。合而成痺。故身體煩疼。不能轉側。病只在表者。用桂枝附子湯。驅風散寒。三氣自平。營衞自和。者其人又兼裏氣不和。大便反鞕。小便反利。此非胃家實。乃脾家虛也。蓋脾家實腐穢當自去。此濕流肌肉。因脾土失職。不能制水。故大便反見燥化。不嘔不渴。是上焦之化源清。故小便自利耳。病本在脾。法當培土以勝濕。故以白朮代桂枝。夫脾虛則濕勝而不運。濕流於內。能使大便不實。濕流於表。更能使大便不濡。脾健則能制水。水在內。能使下輸膀胱。而大便實。水在外。能使還入胃中而大便濡。此理中丸所以下多還用朮。而桂枝附子湯。以大便鞕小便自利而將朮易桂也。白朮治眩。非治眩也。治痰與水耳有痰與水。何以能使人眩。蓋眩者神之動。神依於心。心惡水。水盛則心神搖曳。爲眩。譬如人在舟中。能發眩也。雖然人在舟中。未必盡眩。不在舟中。未必不眩。所以眩證。不必盡用朮。用朮之飲證水證。亦未必盡眩。夫亦各因乎其人耳。飲證水證之兼眩者。在傷寒論有心下逆滿。氣上沖胸。起則頭眩之苓桂朮甘湯證。有汗出不解。仍發熱。心下悸。頭眩。身瞤動。振振欲擗地之眞武湯證。在金匱要略有胸脇支滿目眩之苓桂朮甘湯證。有支飲眩冒之澤瀉湯證。有痩人膵下悸吐涎沫而顚眩之五苓散證。其有飲有水。不眩而用朮者。則指不勝屈。其有飲眩而不用朮者亦多。則係證與朮有忌耳。卽如卒嘔吐心下痞膈間有水。眩悸者。小半夏加茯苓湯主之。則以心下痞。故正與理中丸下註云腹滿者去朮。同一理也。

國外學說　蒼朮白朮爲 Ae. rectylis 之根莖。大小不一。往往分歧如球根狀。上端多有殘莖。有副根或瘤痕等處。皆隆凸不平。外面呈黃暗褐色。有皺紋。其破碎面不平坦。有橙黃色巨大之斑點。其質甚脆。以顯微鏡檢查時。其外部有褐色之皰層。其皮部則甚厚。約等於木部之半徑。在此皮部之外方。則有少數之圓形大油室（O. Iraeume）。含有黃色之油點。依須田氏之檢查。謂此油室自朮多於蒼朮。故氏主張曰。如果此油室內含有之揮發油。爲朮之有效成分時。則白朮之效力當勝於蒼朮也。朮有一種特異之芳香性臭氣。並且如細切蒼朮。放置後。常在其表面上。發生一種微細之白色粉末狀物質。從來中醫常以蒼朮發生此種物質之多寡。判斷其良否。而細檢此物質。則爲多數之細而柔軟之結晶。且具有特異之香氣。故 Shimoyama u. Shirano 二氏遂得蒼朮搗碎。盛入瓶中。付以冷却器。通以水蒸氣。蒸餾氣之得有同樣臭氣之淡褐黃色之揮發油。謂其係一種 Sesquiterpen-

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

alkohol。放置數日後。則化爲柔軟之白色針狀結晶。依青井氏言。其含量之多寡。與蒼朮品質之良否。有重大之關係。最上品約含七乃至五%。下品之含量則極微。復以此白色針狀結晶溶之於酒精。後更加水至生白濁乃止。如是靜置。時則生白色長針狀有光輝之結晶。因其原植物爲 Atractylis。遂命名爲「Atractylol」後經 Ueno 氏之化學的試驗。定其化學式爲 $C_{15}H_{26}O$。至 1903 年 Gadamer u. T. Arne-nomiya 二氏以精細的化學的實驗。改其化學式爲 $C_{15}H_{30}O$。並因其不能成 Esther 及 Urethan。謂其屬於第三級之 Alkohol。又因其如合蟻酸加熱時。則易分解其水分。化爲屬於有二個二重結合 Sesquiterpen 之「Atractylen」故推想爲其屬於雙環性之化合物。至 1904 年 S. Takagi u. G. Hongo 二氏在劃溫蒸餾蒼朮揮發油中。又得一種性質甚合安定之成分。命名爲「Atractylon」用水精精製時。得白色矩形版狀之結晶。易溶於溫水精。難溶於冷水精。具蒼朮特有之香氣。熔融點 42°。沸騰點 131－132°。如接觸其少量於用濃鹽酸浸潤過之松木片時。則呈極新鮮之紫色。又加 Atractylon 之少量於其加過 Vanirin, Heliotropin, Anisealdehyd 之濃鹽中時。則呈極美麗之櫻實紅色。而此等反應恰如纈草中之 Koissylalkohol 之呈色反應。氏又定其化學式爲 $C_{14}H_{18}O$。由是觀之。蒼朮中之有效成分爲 Atractylol（$C_{15}H_{30}O$）及 Atractylon（$C_{14}H_{18}O$）二者明矣。

近人學說　㊀胡九功曰。蒼白朮功能相仿。皆能健脾燥溼。惟强胃燥溼之功。則蒼朮爲勝。補脾甘潤之力。則白朮較優。蒼朮能升陽解鬱。白朮能補氣生血。蒼朮辛燥無遲滯之患。白朮無汗能發。有汗能止。總之。蒼朮辛烈燥溼力足。白朮甘潤補益功多。㊁虞公曰。舊俗於端午日除例置蒲酒艾虎外。並購蒼朮白芷焚燒室內。謂可辟疫癘邪。殺滅蛇蟲。無論貧富。歲必舉行。相沿成習。牢不可破。其意殆與西醫之免疫法相仿。雖然。蛇蟲疾病之來。實有定時。對於平日之清潔衛生。漫不講求。而欲於平安無事之一日。爲此迂遠之預防。不亦愚哉。入夏以後。天氣酷熱。蟲類繁生。病毒流布。霍亂癘痢諸傳染症。蠭起疊出。故預防之道。應以夏初爲始。深秋爲終。庶或近是。焚燒藥品。爲滌蕩空氣之一法。與西醫之蒸氣消毒藥品消毒。其義略同。蓋空氣初本純潔。自動植礦物發生之氣。與人工造出之氣。混和於空中。而空氣始不潔。空氣不潔。始影響於接觸物者。其害甚大。如嵐瘴之氣。病房臥室之氣。動植物腐敗之氣。廢井廢坑之氣。花木之氣。均足以敗壞生理。而發生當然之疾病。惟藥品之氣。能補救之。絲藥品之氣之影響於接觸物者。其效亦偉。故焚燒蒼朮白芷之氣。能辟除空氣之穢惡。確有功效也。稽考蒼朮之性味。本草註云。爲除邪氣之上品。又曰辟一切嵐瘴邪惡鬼氣。陰溼之處。焚之更佳。白芷芳香辛燥。祛風氣。除穢溼。能解砒毒蛇傷。

通竅辟惡。夫所謂邪惡鬼氣者。非眞有邪惡鬼氣之一物。實卽空氣中劇烈之病毒也。陰溼穢溼者。卽陽光不到之處。水分太濃。微生物之出產地也。蒼朮白芷。具此特性。且價廉易得。不妨預爲購置。設遇時疫流行之際。藉此以消弭病毒。詎不美善。並可摻入大黃、降香、雄黃、砒石等。定以限制。將室內門戶緊閉。煨燒若干時。俟煙消焰滅。方可入內居住。則費省事簡。未始不可於治毒法上。別創一格。顧醫藥界其研究之。㊂賈九如曰。蒼朮味辛主散。性溫而燥。燥可去溼。專入脾胃。主治風寒溼痺。山嵐障氣。皮膚水腫。皆辛烈逐邪之功也。統治三部之溼。若溼在上焦。易生溼痰。以此燥溼行痰。溼在中焦。滯氣作瀉。以此寬中健脾。溼在下部。足膝痿軟。以此同黃柏治痿。能令足膝有力。取其辛散氣雄。用之散邪發汗。極其暢快。合六神散。通解春夏溫熱病。佐柴葛解肌湯。表散瘧疾。初起若熱病汗下後。慮熱不解。以此加入白虎湯再解之。一服如神。汗止身涼。繆仲淳用此一味爲末。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

治脾虛蠱脹妙絕。稱爲仙朮。㊂張山雷曰本經別錄。皆無蒼朮白朮之分。而所言朮之主治。風寒溼痺云云。多屬蒼朮之功。陶隱居等且明言求以茅山爲勝。是古人所用。卽蒼朮也。但今旣以蒼白二者分用。則蒼朮芳香尤爲雄厚。祛風逐溼。固以氣味見長。不比白朮沖和。尙在多守少走之例。專以補土爲功也。輕用七八分至一錢五分。如其溼濁壅塞。舌苔垢厚者。可用至三錢。茅山朮味苦氣雄。芳香辟穢。發汗最良。滌飲開痰。胸痞滿悶。奇驗。舉脾家之清氣。助消化。則可加餐。開蒙蔽之陰霾。振精神而醒倦怠。勝四時不正之氣。解山嵐瘴癘之疴。清頭目之昏蒙。健腰膝之重墜。脹滿瀉利腸辟。（辟讀爲襞積也）如屬溼濁。皆是專司霍亂。時行夏秋痧閉。垢膩舌苔。無非主將。脚腫轅翁。痿痺胥蠲。流注瘡瘍。疥癬同治。又曰蒼朮氣味雄厚。較白朮愈猛。能徹上徹下。燥溼而宣化痰飲。芳香辟穢。勝四時不正之氣。故時疫之病多用之。最能驅除穢濁惡心氣。陰霾之域。久曠之屋。宜焚此物而後居人。亦此意也。凡溼困脾陽。倦怠嗜臥。肢體痠轅。胸膈滿悶。甚至腹脹而舌濁厚膩者。非茅朮芳香猛烈。不能開泄。而痰飲瀰漫。亦非此不化。夏秋之交。暑溼交蒸。溼溫病寒熱頭脹如裹。或胸痞嘔噁。皆須茅朮。藿香。佩蘭葉等。芳燥醒脾。其應如響。而脾鬱熱。溼或爲膜脹。或爲腫滿。或爲瀉泄癉痢。或下流而足重。附腫。或積滯而一便不利。及溼熱鬱蒸。發爲瘡瘍流注。或寒溼互結。發爲陰疽痰痛。但有舌濁不渴見證。茅朮一味。最爲必需之品。是合內外各病。皆有大用者。而庸俗每畏其燥烈。而不敢用。亦祇見其識證不清耳。蒼朮求以產茅山者爲佳。故有茅朮之名。氣濃厚。其力尤弘。今所通用。皆茅朮也。

配合應用　㊀朮爲陽草。氣勝黃精。除溼祛寒。疎風辟惡。其功能也。單餌則延年輕身。不飢。兼濟則觀所從。何道故。同人參。茯苓。白芍藥。甘草。橘皮。蓮肉。縮砂。則健脾開胃。消飲食。爲壯脾胃之要劑。調中之正法。㊁同藿香、橘皮、茯苓、人參、木瓜、豬苓、澤瀉、縮砂。則治霍亂吐瀉轉筋。㊂同乾葛、防風、茯苓、炙甘草、車前子、豬苓、澤瀉。則治溼勝作泄若雷奔。㊃同秦艽、蔦蘿、木瓜、薏苡仁、桑寄生、石斛、黃耆、地黃、石菖蒲、桂枝、甘草。晚蠶沙。則治一切痛痺及關節不利。熱者去桂枝。加黃檗。㊄得黃檗、牛膝、木瓜、石斛。能健步。潛行。㊅得苦參、牡蠣。治小兒胃家溼熱。飲食不生肌肉。㊆君人參、芍藥、木瓜、薏苡、茯苓、桑白皮、赤小豆、車前、橘皮。佐以豬苓、澤瀉。能治一切水腫。日重則倍人參。夜重則加地黃、芍藥。俱與朮倍。㊇君枳實、橘皮、砂仁、半夏、人參。則除心腹脹痛。消宿食。開胃去痰涎。除傷食。發寒熱。及泄瀉。㊈同人參、橘紅、白茯苓、木瓜、藿香。治反胃吐逆。因於寒。則加生薑。因於熱。則加竹茹、枇杷葉。逆水蘆根。㊉君黃耆、生地黃、佐以黃檗。治一切臚瘡。溼注。足脛成瘡。久不愈。作丸餌良。㊊倍茯苓。修事。如經驗方。能烏鬚駐顏。㊋同麥門冬、石斛、黃檗、白芍藥、木瓜、薏苡仁、五味子。爲治痿要藥。㊌同生薑、藿香、檳榔。能治山嵐瘴氣。㊍同四物湯。麥門冬、荊芥、防風、地榆。能治腸風下血。㊎同雄羊肝。治雀盲。㊏同補骨脂、川椒、茴香、青鹽、川楝子、黃檗。治疝。㊐同熟地、桑椹。修事。採日精月華。乾則蜜丸。日三服。可變白。㊑爲末。和芝蔴研爛。入水搥勻。絞汁濾淨。曝乾。每三錢。空心酒服。能滋脾腎。㊒服朮法。烏髭髮。駐顏色。壯筋骨。明耳目。除風氣。潤肌膚。久服令人輕健。蒼朮不計多少。採泔水浸三日。逐日換水。取出刮去黑皮。切片。曝乾。慢火炒黃。細搗爲末。每一斤。用蒸過白茯苓末半斤。煉蜜和丸。梧子大。空心。臥時熱水下十五

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丸。別用朮末六兩。甘草末一兩。拌和作湯點之。吞丸尤妙。忌桃李雀蛤及三白諸血。（經驗方）

㊂蒼朮膏 除風澄健脾胃。變白駐顏。補虛損。大有功效。蒼朮新者。刮去皮薄切。米泔水浸二日。一日一換。取出以井華水浸過二寸。春秋五日。夏三日。冬七日。漉出以生絹袋盛之。放在一半原水中。揉洗津液出。扭乾。將渣又搗爛。袋盛於一半原水中。揉至汁盡。爲度。將汁入大砂鍋中。慢火熬成膏。每一斤。入白蜜四兩。熬二炷香。每膏一斤。入水澄白茯苓末半斤。攪勻。瓶收。每服三匙。健早臨臥各一服。以溫酒送下。忌醋及酸物、桃、李、雀、蛤、菘菜、青魚等物。（鄧才筆峯雜興方）

㊂蒼朮膏 治脾經溼氣少食足腫。無力。傷食酒色過度。勞逸有傷。骨熱。用鮮白蒼朮二十斤。浸刮去粗皮。曬切。以米泔浸一宿。取出。同溪水一石。大砂鍋慢火煎半乾。去渣。再入石南葉三斤。刷去紅衣。楮實子一斤。川當歸半斤。甘草四兩。切。同煎黃色。漉去渣。再煎如稀粥。乃入白蜜三斤。熬成膏。每服三五錢。空心好酒調服。（吳球活人心統方）

㊂蒼朮丸 云。清上實下。兼治內外障眼。茅山蒼朮洗刮淨一斤。分作四分。用酒醋糯泔童尿各浸三日。一日一換。取出洗。搗曬焙。以黑脂麻同炒香。共爲研末。酒煮麪糊丸。梧子大。每空心白湯下五十丸。（瑞竹堂方）

㊂八制蒼朮丸 疎風順氣。養腎。治腰脚溼氣痺痛。用蒼朮一斤。洗刮淨。分作四分。用酒醋米泔鹽水各浸三日。曬乾。又分作四分。用川椒、紅茴香、補骨脂、黑牽牛各一兩同炒。香。揀去不用。只取朮研末。醋糊丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽酒送下。五十歲後加沉香末一兩。（永類鈐方）

㊂蒼朮散 治風溼。常服壯筋骨。明目。蒼朮一斤。粟米泔浸過。竹刀刮去皮。半斤。以無灰酒浸。半斤以童子小便浸。春五夏三。秋七冬十日。取出。淨地上掘一坑。炭火煉赤。去炭。將浸藥酒傾入坑內。却放朮在中。以瓦器蓋定。泥封一宿。取出爲末。每服一錢。空心溫酒或鹽湯下。

㊂六制蒼朮散 治下元虛損。偏墜痙痛。茅山蒼朮淨刮六斤。分作六分。一斤倉米泔浸二日。炒一斤。酒浸二日。炒一斤。青鹽半斤。炒黃去鹽。一斤。小茴香四兩。炒黃去茴。一斤。大茴香四兩。炒黃去茴。一斤。用桑椹子汁浸二日。炒。取朮爲末。每服三錢。空心溫酒下。（萬表積善堂方）

㊂固眞丹 燥溼養脾。助胃固眞。茅山蒼朮刮淨一斤。分作四分。一分青鹽一兩炒。一分川椒一兩炒。一分川楝子一兩炒。一分小茴香。破故紙各一兩。炒。並揀朮研末。酒麪糊丸。梧子大。每空心米飲下五十丸。又乾坤生意。平補固眞丹。治元臟久虛。遺精白濁。婦人赤白帶下。崩漏。金州蒼朮刮淨一斤。分作四分。一分川椒一兩炒。一分破故紙一兩炒。一分茴香、食鹽各一兩炒。一分川楝肉一兩炒。取淨朮爲末。入白茯苓末二兩。酒洗當歸末二兩。酒煮麪糊丸。梧子大。每空心鹽酒下五十丸。（瑞竹堂方）

㊂固元丹 治元臟久虛。遺精白濁五淋。及小腸膀胱疝氣。婦人赤白帶下。血崩便血等病。以小便頻數爲效。好蒼朮刮淨一斤。分作四分。一分小茴香、食鹽各一兩同炒。一分川椒、補骨脂各一兩同炒。一分川烏頭、川楝子肉各一兩同炒。一分用醇醋、老酒各半斤同煮乾。焙。速同炒藥通爲末。用酒煮糊丸。梧子大。每服五十丸。男以溫酒。女以醋湯空心下。此高司法祕方也。（百一選方）

㊂少陽丹 蒼朮米泔浸半日。刮皮。曬乾爲末一斤。地骨皮溫水洗淨。去心。曬研一斤。熟桑椹二十斤。入盞盆揉爛。絹袋壓汁。和末如糊。傾入盤內。日曬夜露。採日精月華。待乾研末。煉蜜和丸。赤小豆大。每服二十丸。無灰酒下。日三服。一年變髮返黑。三年面如童子。（劉松石保壽堂方）

㊂補脾滋腎 生精强骨。眞仙方也。蒼朮去皮五斤爲末。米泔水漂澄取底。用脂麻二升。半去殼研爛。絹袋濾去渣。澄漿拌朮。曝乾。每服三錢。米湯或酒空心調服。（孫氏集效方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治面黃食少。男婦面無血色。食少嗜臥。蒼朮一斤。熟地黃半斤。乾薑炮。冬一兩。春秋七錢。夏五錢。爲末。糊丸。梧子大。每溫水下五十丸。（濟生拔萃方）

㊁治小兒癖疾。蒼朮四兩爲末。羊肝一具。竹刀批開。撒朮末線縛。入砂鍋煮熟。搗作丸服。（生生編方）

㊂治男子婦人。因食生熟諸物。留滯腸胃。遂至生蟲。久則好食生米。否則終日不樂。至憔悴萎黃。不思飲食。以害其生。用蒼朮米泔水浸一夜。剉焙爲末。蒸餅丸。梧子大。每服五十丸。食前米飲下。日三服。（經驗方）

㊃治腹中虛冷。不能飲食。食輒不消。羸弱生病。朮二斤。麴一斤。炒爲末。蜜丸。梧子大。每服三十丸。米湯下。日三服。大冷加乾薑三兩。腹痛加當歸三兩。羸弱加甘草二兩。（肘後方）

㊄治脾溼水瀉注下。困弱無力。水穀不化。腹病甚者。用蒼朮二兩。白芍藥一兩。黃芩半兩。淡桂二錢。每服一兩。水一盞半。煎一盞。溫服。

脈絞頭微痛。去芍藥。加防風二兩。（保命集方）

㊅治暑月暴瀉。壯脾溫胃。飲食所傷。麴朮丸。用神麴炒蒼朮。米泔浸一夜。焙等分爲末。糊丸。梧子大。每服三十丸。米飲下。（和劑局方）

㊆治殘瀉久痢。椒朮丹。用蒼朮二兩。川椒一兩爲末。醋糊丸。梧子大。每服二十丸。食前溫水下。惡痢久者加桂。（保命集方）

㊇治脾溼下血。蒼朮二兩。地榆一兩。分作二服。水二盞。煎一盞。食前溫服。久痢虛滑。以此下桃花丸。（保命集方）

㊈治脾溼下血不拘多少。以皂角搥濁汁。浸一宿。麥乾。焙研爲末。麵糊丸。如梧子大。每服五十丸。空心米飲下。日三服。（婦人良方）

㊉治溼氣身痛。蒼朮泔浸切。水煎。取濃汁。熬膏。白湯點服。（簡便方）

㊊補虛明目。健骨和血。蒼朮泔浸四兩。熟地黃焙二兩爲末。酒糊丸。梧子大。每溫酒下三五十丸。日三服。（普濟方）

㊋治眼目昏澁。蒼朮半斤。泔浸七日。去皮。切焙。木賊各二兩爲末。每服一錢。茶酒任下。（聖惠方）

㊌治嬰兒目澁不開。或出血。蒼朮二錢。入豬膽中。扎麥。將藥氣熏眼後。更嚼取汁。與服妙。（幼幼新書方）

㊍治風牙腫痛。蒼朮鹽水浸過。燒存性。研末。揩牙。去風熱。（普濟方）

㊎治脾蟲怪病。腹中如鐵石。臍中水出。旋變作蟲。行遶身匝。痒難忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。（夏子益奇疾方）

三服。（普濟方）

㊏治青盲雀目。用蒼朮四兩。泔浸一夜。切焙研末。每服三錢。豬肝三兩。批開。摻藥在內。扎定。入粟米一合。水一碗。砂鍋煮熟。熏眼。臨臥食肝。飲汁。不拘大人小兒。皆治。又方。不計時月久近。用蒼朮二兩。泔浸焙。搗爲末。每服一錢。以好羊子肝一斤。竹刀切破。摻藥在內。麻扎。以粟米泔煮熟。待冷食之。以愈爲度。（聖惠方）

㊐治眼目昏澁。蒼朮半斤。泔浸七日。去皮。切焙。木賊各二兩爲末。每服一錢。茶酒任下。（聖惠方）

㊑治嬰兒目澁不開。或出血。蒼朮二錢。入豬膽中。扎麥。將藥氣熏眼後。更嚼取汁。與服妙。（幼幼新書方）

㊒治風牙腫痛。蒼朮鹽水浸過。燒存性。研末。揩牙。去風熱。（普濟方）

㊓治脾蟲怪病。腹中如鐵石。臍中水出。旋變作蟲。行遶身匝。痒難忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。（夏子益奇疾方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡陰虛有熱及燥結多汗者禁用。忌桃、李、菘菜、雀肉、青魚、防風、地榆爲之使。

蓄名方劑　㊀三妙丸。治三陰血虛足心如火熱。漸及腰胯。溼熱。痲痺。疼痛。癤癰等症。（丹溪方）蒼朮六兩。黃柏四兩。牛膝二兩。右爲細末。酒糊丸。㊁平胃散。治溼淫於內。脾胃不能尅制。有積飲痞脹中滿者。東垣方。蒼朮四兩。陳皮二兩。厚朴三兩。甘草一兩。右爲粗末。每服五錢。水一盞。煎至七分。去滓。熱服。空心食前。㊂加減平胃散。治胃寒嘔吐。加縮砂、香附。名八味平胃散。治中腕痞塞。加山查、神麴、麥芽。名加味平胃散。消宿食。加香附、枳殼、薑炒砂仁、木香。名香砂平胃散。治傷食。本方加砂仁、薑炒。名神朮散。治時氣發熱。停食。吐瀉等症。㊃越鞠丸。治一切氣血痰火溼食諸鬱。（丹溪方）蒼朮、香附子、撫芎、神麴、梔子各等分。右爲末。水丸。蓖豆大。每服五十丸。

參攷資料　㊀蒼朮長如大拇指。肥實。皮色褐。氣味辛烈。白朮麤促。色微褐。微辛苦而不烈。古方及

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本經止言朮。未分言蒼白。只緣陶隱居言朮有兩種。自此人多貴白者。往往將蒼朮置而不用。如古方平胃散之類。蒼朮爲最要藥。功效尤速。殊不詳本草原無白朮之名。孫康曰。開道人遺言。餌朮黃精。令人久壽。亦無白字。用宜兩蒼。（寇宗奭）㊁脾緩不禁。小便濁淋不止。膀胱背酸疼。宜用蒼朮。以斂脾精。精生於穀。故也。弘景曰。白朮少膏。可作丸散。赤朮多膏。可作煎用。昔劉涓子採取其精丸之。名守中金丸。可作長生。（楊士瀛）㊂服食多單餌朮。或合白茯苓或合石菖蒲。並擣末。但日水服。晚再進。久久彌佳。斷取生朮。去土水浸。再三煎如飴。糖酒調飲之。更善。今茅山所造朮煎。是此法也。陶隱居言取其精而丸之。今乃是膏煎。恐非眞也。（蘇頌）㊃梁庾肩吾答陶隱居賚朮煎啓云。綠葉抽條。紫花標色。百邪外禦。六腑內充。山精見書。華神在錄。木榮火謝。盡採頡之難。啓日移申。窮淋漉之劑。又謝朮蒸啓云。味重金漿。芳踰玉液。足使坐致延生。伏深銘感。又葛洪抱朴子內篇云。南陽文氏。漢末逃難壺山中。饑困欲死。有人教之食朮。遂不饑。數十年乃還鄉里。顏色更少。氣力轉勝。故朮一名山精。神農藥經所謂必欲長生。常服山精是也。（唐愼微）㊄按吐納經云。紫微夫人朮序云。吾察草木之勝。速益於已者。並不及朮之多驗也。可以長生久視。遠而更蠶。山林隱逸。得服朮者。五嶽比肩。又神仙傳云。陳子皇得餌朮要方。其妻姜氏得疫病。服之自愈。顏色氣力。如二十時也。李時珍謹按已上諸說。皆似蒼朮。不獨白朮。今服食家亦呼蒼朮爲仙朮。故皆列於蒼朮之後。（李時珍）㊅按中國二朮。顯然兩種。日本以二朮爲一物。宿根如老薑。蒼色者爲蒼朮。撇根白色者爲白朮。然藥肆皆誤以宿根爲白朮。以嫩根爲蒼朮。或蒼白相混。不可不擇。其苗高一二尺。一朵三葉。末作鋸齒而有毛。四五月開花。青色。結子大如小豆。蓋生山中者。葉硬有微刺。人家栽種者。葉輭無刺。其葉及根形香氣。中日相似。獨花色爲異。且白朮根形不似鼓槌。唯似雲頭朮耳。出備後、三原者良。伊豫、今治次之。武州、江戶、藝州、廣島、奥仙臺又次之。（和漢藥考）㊆蒼朮春生苗。莖多白毛。體二三尺。葉似匕頭而堅。青綠色。有細鋸齒。秋莖端開白花。似小薊花。或有紫赤色者。根如老薑。晚秋苗莖枯。冬日採根。（古方藥品考）㊇中日所產之蒼朮。其形狀微有不同。然亦僅根莖有大小耳。其上部皆留有餘莖。外面爲黃褐色。有皺紋。被以白色之塵粉。內作黃白色。略似生薑。質頗堅。氣芳香。味甘苦。（和漢藥考）㊈蒼朮藏貯日久。則外面生白色之塵粉。試以顯微鏡檢視之。則見爲結晶體。已故下山博士嘗將蒼朮蒸餾。得白色之結晶體。水不能溶解。酒精、伊打始溶解之。與樟腦或第二酒精 $C_{10}H_{18}O_8$ 相類似。惟樟腦之熔融點須百九十五度。沸騰點爲二百十度。相差祇十五度。該結晶則不然。六十二度已熔解。必二百七十一二度始沸騰。（藥學雜誌）㊉中國運來之朮。有蒼白二種。而蒼朮爲勝。形似老薑。皮茶褐色。肉黃赤色。味苦辛。氣芳烈而多膏。剖貯則生白衣。是爲上品。其輕虛少膏者。下品也。白朮形如蒼朮。而瘠小作橛。皮褐色。味甘微苦。氣芳香。所謂雲頭朮是也。日本亦有數種。一種爲佐渡蒼朮。形似中國產。而體重多膏。剖貯便生白衣。味苦辛微甘。氣芳烈。此爲佳品。出佐州。一種爲唐種蒼朮。亦似中國產。而氣味不厚。是爲中品。一種爲和加根白朮。亦呼計豆里白朮。是採蒼朮嫩根。刮去粗皮製之。非白朮也。出和州、丹州、信州、奥州。又有唐種白朮。形味皆與中國產相似。乃享保中攜漢種栽成者。出和州。本經云。朮。一名山薊。卽蒼朮也。詳見圖經。李時珍曰。張仲景辟一切惡氣用赤朮。赤朮卽蒼朮也。由是觀之。張仲景用蒼朮明矣。（古方藥品考）㊁中國產之蒼朮。氣味俱厚。爲上品。日本產次之。蘇頌曰。古方所用之朮。皆白朮也。李時珍曰。古方二朮通用。後人始有蒼白之分。今日本藥舖所稱日本白朮。實皆蒼朮。非白朮也。（日用藥品考）㊂朮有蒼白之別。今藥舖以老根爲蒼朮。嫩根爲白朮。其實不論老嫩。皆是蒼

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

朮。文化年間。有種出中國稱嫩根者。下品也。所謂老根者。根形不一切之。則生白脂。嫩根則無白脂。並不澗澤。中國種。嫩根雖生。宿根不朽。日本產異是。日本種之老根朮。多山中自生。其根至二年。旁生嫩根。此時宿根漸變細長。莖葉俱抽自嫩根。經三年後。宿根遂次第枯朽。此皆老根朮也。採之者往往以嫩根宿根並採。混售。冀圖厚利。不論老嫩。均以甲州郡內所產爲勝。白朮之大者。名雲頭朮。川州產也。別有一種。雖係川州之種。而實出自三好。名三好朮。此則無老根嫩根之別。（手板發蒙）

【蒼朮莖苗】　主治　去水。止自汗。作飲甚香。

【蒼石】　即特生磿石之古籍別名。典見別錄。詳『特生磿石』條。

【蒼耳子】　原名　葈耳子。

命名　本品葉形如葈麻。故有葈耳之稱。即爾雅所謂蒼耳。入藥有用其實者。故曰蒼耳子。

古籍別名　地葵子。胡葈子。（本經）常思。菜子。薅子。羊負來子。（弘景）卷耳子。（詩經）爵耳子。耳璫。（詩疏）豬耳子。喝起草子。野茄。縲絲草子。（綱目）道人頭。（圖經）進賢菜子。（記事珠）璫草子。卷耳。胡蘗子。野落蘇。縲絲菜子。吐吐古个里。（和漢藥考）

基本　屬菊科。爲雄蒼耳之子實。

產地　各處多產之。陳仁山藥物生產辨云。蒼耳子。廣東各屬均有出。但以北江、石潭、清遠爲多出。西江亦有出。

形態　蒼耳爲一年生草本。溫帶地方多有之。自生原野間。莖高四五尺。葉互生。爲卵圓形。末端帶尖。邊緣有缺刻及鋸齒。具葉柄。頗似茄葉。葉莖生有短毛。夏日梢頭及莖端。俱開小花。白而帶綠色。雌雄單性。雌花隱於總苞之底。雄花則密生末端。花後結實。長四分許。外面黃白色。兩端稍尖。被以無數之刺。熟則刺愈堅剛。能鉤著人之衣服。

採取　秋季實熟時採之。

製法　大明曰。入藥炒熟。搗去刺用。或酒拌蒸過用。

性質　甘。溫。有小毒。

效能　輕清發散。祛風化熱。用作發汗藥。及爲鎮痙藥。

主治　風寒頭痛。風溼周痺。四肢拘攣痛。惡肉死肌。（本經）膝痛。溪毒。久服益氣。（別錄）

歷代記述弦證　【唐】甄權藥性本草論蒼耳子曰。治肝熱明目。【宋】大明諸家本草論蒼耳子曰。治一切風。氣。壞。髓。暖腰脚。治瘰癧瘡疥及瘙癢。【明】李時珍本草綱目論蒼耳子曰。炒香浸酒服。去風補益。【明】繆希雍本草經疏論蒼耳子曰。葈耳蒼耳也。味甘溫而別錄益之以苦。當是無毒。葉味苦辛。微寒。有小毒。苦以燥溼。甘以和血。溫則通暢。春氣發生而升。故主風寒頭痛。風溼周痺。四肢拘攣。惡肉死肌。膝痛。溪毒也。祛風療溼之藥。食療聖惠。千金。外臺祕要諸方咸堪選用。【清】黃宮繡本草求眞論蒼耳子曰。蒼耳子味苦而甘。氣溫無毒。凡人風溼內淫。氣血阻滯。則上而腦頂。下而足膝。內而骨髓。外而皮膚。靡不病症。悉形而致症見疥癬。通身周痺。四肢拘攣。骨節癰腫。頂巔風痛。疳蟲瘡蠹。惡肉死肌。疔腫痔漏。腰重膝厥。按此苦能燥溼。溫能通活。爲祛風療溼之聖藥。或作膏。或作湯浴。自然風除溼祛。血活氣行。而症即愈。但此通達腦下達督脈。服此最忌猪肉及風邪觸犯。則遍身發出赤丹。而致病亦增甚。【清】張隱菴本草崇原論蒼耳子曰。蒼耳本經名葈耳。賅莖葉而言也。今時用實名蒼耳子。子內仁肉。氣味甘溫。外多毛刺。故有小毒。花白實黃。稟陽明燥金之氣。金能制風。故主治風寒頭痛。謂頭受風邪爲寒爲痛也。燥能勝溼。故主治風溼周痺。四肢拘攣痛。謂風溼之邪。傷周身血脈而爲痺痙。於四肢而爲拘攣疼痛也。夫周痺則周身血脈不和。周痺可治。則惡肉死肌亦可治也。四肢拘攣痛可治。則膝痛亦可治也。久服則風溼外散。經脈流通。故益氣。

近人學說　㊀張山雷曰。蒼耳子溫和疏達。流利關節。宣通脈絡。偏及孔竅肌膚。而不偏於燥烈。乃主治風寒溼三氣痺著之最有力而馴良者。又獨能上達巔頂。疏通

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膈戶之風寒。爲頭風病之要藥。而無辛香走竄。升泄過度。耗散正氣之慮。以視細辛、羌活等味。功用近似。而儒將風流。迥與鬚髯翕張。戟手怒目者。異其態度。卽例以川芎、白芷等物之以氣爲勝者。猶難同日而語。但和緩有餘。恐未易尅日奏功耳。斗門方謂婦人血風攻腦。頭旋猝倒。不省人事者。用蒼耳草嫩心。陰乾爲末。酒服甚效。此味善通頂門。達腦能走督脈也。頤案頭旋猝倒。不省人事。確是氣血上升。激動腦經之病。斗門方能知是血風攻腦。其善悟誠不可及。但此是內動之風。正惟風陽陡動。所以猝然眩暈。便能傾仆。治法止有潛陽息風。抑之下降。則氣火平而風自息。腦神經不受震撼而其病可愈。斷不可雜以一味動風之藥。助其升騰。爲虎傅翼。蒼耳治風。亦是疏泄外風。非安靜鎭定之實對於此病。亦在禁例。況又助之以酒。爲害後當如何。則論病是而用藥非。仍是古人續命湯之謬。見須知所謂通頂門達腦。善走督脈。皆升騰以泄外來寒風之法。眞是毫釐千里。其誤甚大。雖然。二千年來治內風病者。幾於無一不誤於斗門何尤。頤極佩其血風攻腦四字。頗似識得內風上攻爲病。乃數百年醫家未知之奧義。故備論之。亦春秋責備賢者之意也。

配合應用 ㊀治久瘧不瘥。蒼耳子或根莖亦可。焙研末。酒糊丸。梧子大。每酒服三十丸。日二服。生者搗汁服亦可。（朱氏集驗方）

㊁治大腹水腫。小便不利。蒼耳子、葶藶末等分。每服二錢。水下。日二服。（千金良方）

㊂治風瀉。攣痺一切風氣。蒼耳子三兩。炒爲末。以水一升半。煎取七合。去滓呷之。（食醫心鏡方）

㊃治牙齒痛腫。蒼耳子五升。水一斗。煮取五升。熱含之。冷卽吐去。吐後復含。不過一劑。瘥。莖葉亦可。或入鹽少許。（千金翼方）

㊄治鼻淵流涕。蒼耳子卽纙絲草子。炒研爲末。每白湯點服一二錢。（證治要訣方）

㊅治眼目昏暗。蒼耳實一升爲末。白米半升作粥。日食之。（普濟方）

㊆治嗜酒不已。嵇中蒼耳子七枚燒灰。投酒中飲之。卽不嗜。（陳藏器方）

用量 錢半至二錢。

施用宜忌 凡無風熱之邪者禁用。忌猪肉、馬肉、米泔。

著名方劑 蒼耳散。治鼻流濁涕不止。名曰鼻淵。（陳無擇方）蒼耳子（炒）二錢半。辛夷仁半兩。白芷一兩。薄荷五分。右爲末。每服二錢。用葱茶清食後調服。

參攷資料 ㊀蒼耳藥久服去風。熱有效。最忌猪肉及風邪犯之。則遍身發出赤丹也。按蘇沈良方云。蒺耳根苗葉實。皆洗濯陰乾燒灰。湯淋取濃汁。泥連兩竈煉之。灰汁耗。卽旋取傍釜中熱灰湯益之。一日夜不絕火。乃旋得霜乾。甕瓶收之。每日早晚酒服二錢。補煖去風。駐顏。尤治皮膚風。令人膚革清淨。每澡沐入少許尤佳。宜州學昌從諫服此十餘年。至七八十。紅潤輕健。皆此藥力斗門方云。婦人血風攻腦頭旋。悶絕忽死。倒地不知人事者。用喝起草嫩心陰乾爲末。以酒服一大錢。其功甚效。此物善通頂門。連腦。蓋卽蒼耳也。（李時珍）㊁詩人謂之卷耳。爾雅謂之蒼耳。廣雅謂之蒺耳。皆以實得名也。陸璣詩疏云。其實正如婦人耳璫。今或謂之耳璫草。鄭康成謂是白胡菜。幽州人呼爲爵耳。博物志云。洛中有人驅羊入蜀。胡菜子多刺。黏綴羊毛。遂至中國。故名羊負來。俗呼爲道人頭。（蘇頌）㊂其葉形如菜麻。又如茄。故有菜耳及野茄諸名。其味滑如葵。故名地葵。與地膚同名。詩人思夫賦卷耳之章。故名常思菜。張揖廣雅作常菜。亦通。（李時珍）㊃今處處有之。陸氏詩疏云。其葉青白。似胡荽。白華細莖蔓生。可羹爲茹。滑而少味。四月中生子。正如婦人耳璫。郭璞云。形如鼠耳。叢生如盤。今之所有。皆類此。但不作蔓生。（蘇頌）㊄按此周憲王救荒本草云。蒼耳葉青白。類黏糊菜葉。秋間結實。比桑椹短小而多刺。嫩苗煠熟。水浸淘拌食。可救飢。其子炒去皮。研爲麵。可作燒餅食。亦可熬油點燈。（李時珍）㊅凡人風溼內淫。氣血阻滯。則上而頭腦下而足膝。內而骨髓。外而皮

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膚。膿不受病。惟蒼耳子皆能治之。（盧鷹飛）㊀蒼耳子。治鼻淵鼻痔。斷不可缺。能使清陽之氣上行巔頂也（沈金鰲）

【蒼耳子油】基本　本品係用蒼耳子榨取之油。

主治　瘋疾。

【蒼耳花】主治　白痢頑瘡。

【蒼耳莖葉】製法　雷敩曰。凡採得去心取蒼精。以竹刀細切。并之。蒸從巳至亥時出。去黃精陰乾用。

性質　苦。辛。微寒。有小毒。

主治　中風傷寒頭痛。大風癩癗。頭風濕痺。毒在骨髓。腰膝風毒。夏月採曝。爲末。水服一二匕。冬月酒服或爲丸。每服二三十丸。日三服。滿百病出。如瘡疥成汁出。或疱駁。駁甲錯。皮起皮落。則肌如凝脂。令人省睡。除諸毒。螫。殺蟲疳。瘙蟲。久服益耳目聰明。輕身強志。

配合應用　㊀萬應膏。治一切癰疽發背。無頭惡瘡。毒疔。瘰一切風痒。臟癢。杖瘡。牙疼。喉痺。五月五日。採蒼耳根。葉。敷擣。洗淨。曬蒸。細剉。以大鍋五口。入水煮爛。以篩濾去粗滓。布絹再濾。復入淨鍋。武火煎滾。文火熬稠。攪成膏。以新罐貯封。每以敷貼。即愈。牙疼即敷牙上。喉痺敷舌上。或噙化。二三次即效。每日用酒服一匙。極有效。（集簡方）

㊁治一切風毒。并殺三蟲。腸痔。能進食。若病胃脹滿。心悶發熱。即宜服之。五月五日午時。附地刈取蒼耳葉。洗曝。搗下篩。每服方寸匕。酒或漿水下。日二夜三。若覺吐逆。則以蜜丸服。準計方寸匕數也。風輕者日二服。若身體作粟。或麻豆出。此爲風毒出也。可以針刺潰去黃汁乃止。七月七。九月九。亦可採用。

㊂治一切風氣。蒼耳嫩葉一石。切。和麥蘗五升。作塊。於蒿艾中罨二十日。成麴。取米一斗。炊作飯。看冷暖。入麴三升。釀之。封二七日。成熟後。每日空心暖服。神驗。封此酒可兩重布。不得令密。密則溢出。忌馬肉猪肉。（孟詵食療方）

㊃治諸風頭疊。蒼耳葉曬乾爲末。每服一錢。酒調下。日三服。若吐則以蜜丸。梧子大。每服二十丸。十日全好矣。（楊氏經驗方）

㊄治毒攻手足腫痛。欲斷。蒼耳搗汁漬之。并以滓傅之。立效。春用心。冬用子。（千金方）

㊅治卒中水毒。初覺頭目微痛。惡寒。骨節強急。日醒暮劇。手足逆冷。三日則蟲蝕下部。六七日膿潰。食至五臟。殺人也。搗常思草。絞汁服一二升。并以綿染導其下部也。（肘後方）

㊆治毒蛇溪毒。沙虱射工等所傷。口噤眼黑。手足强直。毒攻腹內成塊。逶迤不救。用蒼耳嫩苗一握。取汁。和酒溫灌之。以滓厚傅傷處。（勝金方）

㊇疫病不染。五月五日午時。多採蒼耳嫩葉陰乾收之。臨時爲末。冷水服二錢。或水煎舉家皆服。能辟邪惡。（千金方）

㊈治風瘙癮疹。身痒不止。用蒼耳莖葉子等分爲末。每服二錢。豆淋酒調下。（聖惠方）

㊉治面上黑斑。蒼耳葉焙爲末。食後米飲調服一錢。一月愈。（摘玄方）

㊊治赤白汗斑。蒼耳嫩葉尖和青鹽擂爛。五六月間擦之。五七次效。（摘玄方）

㊋治大風癘疾。用嫩蒼耳、荷葉等分爲末。每服二錢。溫酒下。日二服。（袖珍方）又用蒼耳葉爲末。以大楓子油和丸。梧子大。每服三四十丸。以茶湯下。日二服。（乾坤生意方）又方。五月五日或六月六日。五更帶露蒼耳草。搗取汁。熬作錠子。服半斤。鯉魚一尾。剖開。不去肚腸。入藥一錠。線縫。以酒二盞。慢火煮熟。令喫。不過三五箇魚。即愈也。忌鹽一百日。

㊌治卒得惡瘡。蒼耳、桃皮作屑。納瘡中。

㊍治反花惡瘡。有肉如飯粒。破之。血出。隨生反出。用蒼耳葉搗汁服三合。并塗之。日二上。（聖濟總錄方）

㊎治一切丁腫。危困者。用蒼耳根葉。搗和小兒尿。絞汁。冷服一升。日三服。拔根甚驗。（孟詵方）又用蒼耳根苗燒灰。和醋。淀塗之。乾再上。不十次。即拔根出。（養生方）又

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蒼耳根三兩半。烏梅肉五箇。連鬚葱三根。酒二鍾。煎一鍾。熱服取汗。（邵眞人方）

㊀治齒風動痛。蒼耳一握。以漿水煮入鹽含漱。（外臺祕要方）

㊁治纏喉風病。蒼耳根一把。老薑一塊。研汁入酒服。（聖濟總錄方）

㊂治赤目生痛作痛。道人頭末二兩。乳香一錢。每用一錢。燒烟嗆鼻。（聖濟總錄方）

㊃治鼻衄不止。蒼耳莖葉搗汁一小盞服。（聖惠方）

㊄治五痔下血。五月五日採蒼耳莖葉搗爲末。水服方寸匕。甚效。（千金方）

㊅治赤白下痢。用蒼耳草不拘多少。洗淨。以水煮爛。去滓。入蜜。用武火熬成膏。每服一二匙。白湯下。（醫方摘玄方）

㊆治產後諸痢。蒼耳葉搗絞汁溫服半中盞。日三四服。（聖惠方）

㊇治誤吞銅錢。用蒼耳頭一把。以水一升。浸水中十餘度。飲水愈。（肘後方）

㊈治花蜘蛛毒咬人與毒蛇無異。用野蘘絲。卽道人頭搗汁一盞服。仍以渣傅之。（摘玄方）

施用宜忌 忌猪肉、馬肉、米泔。伏硇砂。

【蒼耳蟲蟲】 **基本** 本品卽蒼耳草梗中狀如小蠶之蠶蟲。

古籍別名 麻蟲（本草綱目）

採取 見梗上有大粒眼者。以刀截去兩端。不蛀梗多。取之線縛掛簷下。其蟲在內經年不死。用時取出三條。同用之。

主治 疔腫惡毒。燒存性。研末。油調塗之。卽效。或以麻油浸死。收貯。每用一二枚。搗傅。卽時毒散。大有神效。

參攷資料 蒼耳治疔腫。腫毒。故蟲亦與之同功。古方不見用。近時方法每用之。（李時珍）

【蒼龍腦】 **古籍別名** 冰片。（本草綱目）

基本 爲龍腦之一種。

主治 風瘡瘙癢。入膏煎良。不可點眼。傷人。

【蒼鵝屎】 **基本** 本品爲鵝之黑羽者之糞便。

主治 傅蛇蟲咬毒。

【蒼礬石】卽特生礬石之古籍別名。典見別錄。詳『特生礬石』條。

【蒼蠅翅】卽小青草之別名。詳『金鎖銀開』條。

【蒼鷹】卽鷹之原名。詳『鷹』條。

【蒿雀】 **命名** 本品常在蒿間故名。

古籍別名 草雀。

外國名詞 Emberiza pervonata T.（拉丁）（Temminck's japanese bunting）（英）アオジ或アラジ或ラシトド（日本）

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類雀科。

產地 出山林原野間。

形態 蒿雀爲原禽類之一種。其體小於黃雀。頭部微綠色。頸黑色。嘴亦黑。背部赤褐有黑條紋。翼赤褐有暗綠條紋。體下概黃色。散布多數之暗色點。夏棲山林。遊原野。營巢於地或草叢中。其肉可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 食之益陽道。補精髓。

【蒿雀腦】 **主治** 塗凍瘡手足不皸。

【蒿蘇】 卽豪豬之古籍別名。典見唐本草。詳『豪豬』條。

【蓍】 卽羊蹄之古籍別名。典見本經。詳『羊蹄』條。

【蓋果】 卽防葵之古籍別名。典見吳普本草。詳『防葵』條。

【蓍】 （日本）

古籍別名 鋸草。羽衣草。

外國名詞 Achilloea sibirica, Ledeb.（拉丁）ノユギリサウハ ゴロモサウ（日本）

基本 係菊科。蓍屬之實。

產地 多在山野間。

形態 蓍爲溼草類之多年生草本。體二三尺。葉互生。細長。作羽狀分裂。其形與鋸相類。秋月莖頭着花。白色。或淡紅色。作頭狀花序。甚小。周圍之花。舌狀花冠。中部之花。筒狀花冠。其莖生處。如蒿作叢。莖多者一株有五十餘莖。形皆直立。古人用爲占筮。其葉可供藥用。

採取 八九月採實。日乾。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　苦。酸。平。無毒。

主治　益氣充肌膚。明目。聰慧先知。久服不饑。不老輕身。

參攷資料　㈠按班固白虎通載孔子云。蓍之爲言耆也。老人歷年多。更事久。事能盡知也。陸佃埤雅云。草之多壽者。故字從耆。博物志言。蓍千歲而三百莖。其本老。故知吉凶。（李時珍）㈡蓍實生少室山谷。八月九月採實。日乾。（別錄）㈢今蔡州上蔡縣白龜祠旁。其生如蒿。作叢。高五六尺。一本二三十莖。至多者五十莖。生便絲條直。所以異於衆蒿也。秋後有花。出於枝端。紅紫色。形如菊花。結實如艾實。史記龜筴傳云。龜千秋。乃遊於蓮葉之上。蓍百莖共一根。所生之處。獸無虎狼。蟲無毒螫。徐廣註云。劉向言龜千歲而靈。蓍百年而一本生百莖也。禮先生云。蓍滿百莖。其下必有神龜守之。上則常有青雲覆之。傳云。天下和平。王道得。而蓍莖長丈。其叢生滿百莖。方今取蓍者。八十莖已上。長八尺者。卽已難得。但得滿六十莖以上。長六尺者。卽可用矣。今蔡州所上皆不言如此。則此類亦屬神物。故不常有也。（蘇頌）㈣蓍乃蒿屬神草也。故易曰。蓍之德圓而神。天子蓍長九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。張華博物志言。以末大於本者爲主。次蒿次荊。皆以月望日浴之。然則無蓍撰卦。亦可以荊蒿代之矣。（李時珍）

【蓍母】　卽知母之古籍別名。典見本經。詳『知母』條。

【蓍葉】　主治　痞疾。

【蓍蒿】　卽茵陳蒿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茵陳蒿』條。

【蒿蕧】　卽川椒之古籍別名。典見綱目。詳『川椒』條。

【蓀】　卽虎杖之古籍別名。典見爾雅。詳『虎杖』條。

【蒮】　卽山韭之古籍別名。典見綱目。詳『山韭』條。

【蒌】　卽酸模之古籍別名。典見綱目。詳『酸模』條。

【藪】　卽繁縷之古籍別名。典見郭璞賦。詳『繁縷』條。

【蒺】　卽水蕨之古籍別名。典見綱目。詳『水蕨』條。

【蓁葉】　卽箬葉之古籍別名。典見綱目。詳『箬葉』條。

【蓼木麪】　命名　本品葉離披如莎衣之狀。而木中有白粉。水淋之似麪。故名。

古籍別名　櫟木。（本草綱目）

產地　出嶺南山野間。

形態　蓼木爲喬木類之一種。幹高十餘丈。經四五圍。頂生葉。兩邊行列。如鳥張翼。其幹皮中有白麪。可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　補益虛冷。消食。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論蓼木麪曰。溫補。久食不飢。長生。

【蒟香菜】　卽前胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『前胡』條。


【蜘蛛】　古籍別名　次蠶。蠾蝓。

蜘蛛（本草綱目）蠾蛸。（揚雄方言）

外國名詞　Aranea（拉丁）Spider（英）クモ（日本）

基本　係節肢動物蜘蛛類眞蜘蛛類之蜘蛛。

產地　生家檐屋角。籬頭陋巷間多有之。



蜘蛛

形態　蜘蛛爲卵生蟲類之一種。體形圓。或橢圓。或長。全體分頭、胸、及腹三部。頭之前端有口。背面有單眼二至八大顆分二節。末端爲鉤狀。能運動。尖端開一毒腺口。是謂毒鉤。下顎呈板狀。觸鬚分數節。胸部有脚四對。肚門前有瘤狀突起之物。由此抽絲製網。以捕食昆蟲。性殘忍。同類亦相食。其種類甚多。以懸網如魚罾者。及身小尻大者。與腹內有蒼黃膿者。可供藥用。

製法　雷敎曰。凡使去頭足。研用。

性質　微寒。有小毒。

主治　大人小兒癲。及小兒大腹丁奚。三年不能行者。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論蜘蛛曰。蜈蚣蜂

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蜚蠊人。取置咬處。吸其毒。【唐】蘇恭新修本草論蜘蛛曰。主蛇毒溫瘧。止嘔逆霍亂。【宋】蘇頌圖經本草論蜘蛛曰。取汁塗蛇傷。燒唉治小兒腹脹。【宋】日華諸家本草論蜘蛛曰。療者治瘧疾。疔腫。【明】李時珍本草綱目論蜘蛛曰。主口喝脫肛。瘡腫胡臭。齒齲。

施用宜忌　畏蔓青。雄黃。

參攷資料　㈠別錄言蜘蛛治癭。張仲景治陰狐疝氣。偏有大小。時時上下者。蜘蛛散主之。蜘蛛十四枚。炒。焦。桂半兩。爲散。每服八分。日再。或以蜜丸亦通。（蘇頌）㈡蜘蛛能制蛇。故治蛇毒而本條無此。（蘇恭）㈢鶴林玉露載蜘蛛能制蜈蚣。以溺射之。節節斷爛。則陶氏言蜘蛛治蜈蚣傷。亦相伏爾。沈括筆談載蛛爲蜂螫。能囓芋梗。麝創而愈。今蛛又能治蜂蠆螫何哉。又劉義慶幽明錄云。張甲與司徒蔡謨有親。謨晝寢。夢甲曰。忽暴病。心腹痛脹滿。不得吐下。名乾霍亂。惟用蜘蛛生斷脚。吞之則愈。但人不知甲某時死矣。謨覺。使人驗之。甲果死矣。後用此治乾霍亂。輒驗也。按此說雖怪。正合唐註治嘔逆霍亂之文。當亦不謬。蓋蜘蛛服之。能令人利也。（李時珍）㈣凡五色者。及大身有刺毛者。并薄小者。並不入藥。（雷敩）㈤蜘蛛布網。其絲右繞。其類甚多。大小顏色不一。爾雅但分蜘蛛。草土及蠨蛸四種而已。蜘蛛嚼人甚毒。往往見於典籍。按劉禹錫傳信方云。判官張延賞爲斑蜘蛛咬頸上。一宿有二赤脈繞項下。至心前。頭面腫如數斗。幾至不救。一人以大藍汁入麝香。雄黃。取一蛛投入。隨化爲水。遂以點咬處。兩日悉愈。又云。貞元十年。崔從質員外。言有人被蜘蛛咬腹。大如孕婦。有僧教飲羊乳數日而平。又李絳兵部手集云。蜘蛛咬人。遍身成瘡者。飲好酒至醉。則蟲於肉中似小米自出也。劉郁西域記云。赤木兒城。有蟲如蛛。毒中人。則煩渴。飲水立死。惟飲葡萄酒至醉。吐則解。此與李絳所言蜘蛛毒人。飲酒至醉則愈之意同。蓋亦蜘蛛也。鄭曉吾學編云。西域賓藍地方。夏秋間。草生小黑蜘蛛。甚毒。囓爲瘡。聲徹地。土人誦咒以薄荷枝拂之。或以羊肝遍擦其體。經一日夜痛方止。愈後皮脫如蛻。牛馬被傷。輒死也。元稹長慶集云。巴中蜘蛛大而毒。甚者身運數寸。跨長數倍。竹木被網。皆死。中人瘡痒痛倍常。惟以苦酒調雄黃塗之。仍用鼠負蟲食其絲。則愈。不急救之。毒及心能死人也。段成式酉陽雜俎云。深山蜘蛛。有大如車輪者。能食人物。若比數說。皆不可不知。淮南萬畢術言赤斑蜘蛛。食以猪肪百日。殺以塗布。雨不能濡。殺以塗足。可履水上。抱朴子言蜘蛛、水馬、合鴈、夷水仙丸。服。可居水中。皆方士幻誕之談。不足信也。（李時珍）

【蜘蛛抱蛋】　卽蜘蛛香之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『蜘蛛香』條。

【蜘蛛香】　**命名**　本品根鬚狀如蜘蛛。而氣極芳香。故名。又其根鬚團結似卵狀。遂有蜘蛛抱蛋之稱。

古籍別名　蜘蛛抱蛋。飛天蜈蚣。哈薩剌。一帆青。一葉。（植物學大辭典）葉蘭。（日本）

外國名詞　Aspidistra elatior, Bl.（拉丁）バラン　バラン（日本）

基本　係百合科蜘蛛抱蛋屬。藥用其根。

產地　四川茂縣。及江西舊建昌、贛州等處。均有出。

形態　蜘蛛抱蛋香爲香草類之多年生常綠草本。葉扁大。長橢圓形。兩端尖。葉脈平行。葉柄長。其葉分狹葉與闊葉二種。狹葉直立。闊葉尖頭傾斜。春月開花。花被暗紫色。單生於短花莖之頂上。花後結實。青色。如拇指大。其根色青黑如卵狀。周圍密根糾結。

性質　辛。溫。無毒。

主治　辟瘟疫。中惡。邪精鬼氣。尸疰。

參攷資料　蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中。草根也。黑色有粗鬚。狀如蜘蛛及薑。本草翦氣味芳香。彼人亦重之。或云貓喜食之。（李時珍）

【蜘蛛絲】　卽蜘蛛網。詳『蜘蛛網』條。

【蜘蛛黃】　**原名**　蠒蚕黃。

命名　本品卽蜘蛛

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

腹中之黃。故名。

製法　捕蜘蛛之小者。飼之大。久之復以硃砂飼大者。數十日後。漸至滿腹通赤。其腹中便有黃。可供藥用。

主治　去翳開瞖。

【蜘蛛蛻殼】　主治　蟲牙。綿裹塞之。牙疼。研末傅之。

【蜘蛛網】　主治　喜忘。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論蜘蛛網曰。以纏挑贅七日消落。有驗。【明】李時珍本草綱目論蜘蛛網曰。療瘡毒。止金瘡血出。炒黃研末。酒服。治吐血。

參攷資料　按侯延賞退齋閑錄云。凡人卒暴吐血者。用大蜘蛛網搓成小團。米飲吞之。一服立止。此乃孫紹先所傳方也。又西陽雜俎云。裴旻山行。見蜘蛛結網如疋布。引弓射殺。斷其絲數尺。收之。部下有金瘡者。剪方寸貼之。血立止。親此則蛛網蓋止血之物也。（李時珍）

【蜘蛛膜】　功用與網同。詳該條。

【蜘蠋】　即蟬之俗名。詳『蟬』條。

【蜵蝶】　即蝴蝶之古籍別名。與見綱目。詳『蝴蝶』條。

【蜚蠊】　即蠊蟲之原名。詳『蠊蟲』條。

【蜚零】　即土蜂之古籍別名。與見本經。詳『土蜂』條。

【蜚厲】　基本　蜚屬爲溼生蟲類之一種。可供藥用。

主治　婦人寒熱。

【蜚蝛】　即蜚蠊。詳『蠊蟲』條。

【蜚蠊】　命名　本品以有廉薑氣者爲眞。故名。

古籍別名　石薑。盧蟹。負螫。滑蟲。唐本草。蟅（爾雅）。茶婆蟲。香娠子（綱目）。蟑螂。（綱目拾遺）

外國名詞　Stylopyga conucina, Hagh. 或 Periplaneta americana L.（拉丁）　ユキプリ或アプラムシ（日本）

基本　係節肢動物昆蟲類直翅類蜚蠊科。

產地　多生於人家庖廚炊竈間。

形態　蜚蠊爲化生蟲類之一種。體形橢圓。色黑褐有油光。頭小。隱於前胸下。觸角長如絲。爲鞭狀。前後翅皆爲膜質。但前翅小而形長。後翅大而爲扇狀。尾端有二長二短之小突起。脚側扁。有跗節五。大者體長一寸。晝伏夜出。盜食棲於庖廚陰暗諸處。觸之有一種惡臭。其屎尤臭。可供藥用。

採取　二月八月間採之。

性質　鹹。寒。有毒。

主治　瘀血。癥堅。寒熱。破積聚。喉咽閉。內寒無子。（本經）通利血脈。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論蜚蠊曰。食之下氣。

配合應用　㊀拔疔竈上蟑螂。不拘多少。擣爛敷之。其疔根自出。（集驗方）蟑螂蟲其黃紫色。甚臭者取數個。用患者自吐唾沫幾口。研爛敷瘡四圍。上露孔使毒氣從孔出。一日愈。（廻子妙方）治疔瘡。取蟑螂大者七個。去頭足。殼。將砂糖少許。同擣爛敷疔四圍。露出頭。晝夜即愈。（邵仲達方）又藥性考。竈馬拔刺。擣塗有效。

㊁解諸疔毒。竈上紅蟑螂五個。研爛熱酒沖服。取汗爲度。（傳信方）

㊂治紅絲疔。蟑螂一個。去頭和青糖擣爛。摻上即效。（傳信方）

㊃白火丹。用蟑螂瓦上焙乾爲末。白湌湯服一二個。立效。兼治疔瘡。（葉氏方）

㊄治對口。桂州荔枝肉二三枚。蟑螂二三個。同搗如泥。敷露頭。數次即散。（活人書方）

㊅治無名腫毒。蟑螂十個。鹽一撮。同擣爛敷之留頭。（慈航活人書方）

㊆治諸毒惡瘡。蟑螂擣石灰敷之。（嚴氏家藏方）

㊇治痧症。活蟑螂蟲二三個。用紙包。竈上焙乾。研細。冷水和灌。或吐或瀉即愈。（周廷園方）

㊈治吐血。取蟑螂五個。止去翅淨。在火盆淨瓦上焙乾爲末。紙包安土上存性。用澀瘡皮包一個。滾湯吞下。每日如此。吞五日不可間斷。（徐雲生方）

㊉治氣虛中滿。以蟑螂七個爲末。用地骷髏煎湯送數服愈。（醫宗粹編方）

㊊治癰腫。蟑螂一個。焙乾。蘿蔔

647／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子一撮。共炒爲末。好酒吞十日全愈。（家寶方）

㊁治一切兒疳。凡小兒患疳疾。不拘何等疳蟲死者皆效。取竈上焙蟑螂乾與之。食患者但聞其香。不知有腥臭之氣。猶中蟲者。食豆無辛。含礬不苦也。有患此症治之無不效。只須食一二次。即愈。愈後體更肥白。且屢試屢驗。（集聽方）

兒疳初起。用蟑螂去頭足翅。新瓦焙乾。常與食之。百個病愈。（百草鏡方）

參攷資料　畫蠟吳普本草載神農云。主婦人癥堅寒熱。尤爲有理。此物乃血藥。故宜於婦人。（李時珍）

【蜜丁】　卽瓦楞子之古籍別名。典見綱目。詳『瓦楞子』條。

【蜜父】　卽梨之古籍別名。典見綱目。詳『梨』條。

【蜜甘】　卽甘草之古籍別名。典見別錄。詳『甘草』條。

【蜜姑魚】　**命名**　本品性喜食蜜故名。

古籍別名　蜜鮎。（綱目拾遺）

產地　出浙江鄞縣山溪間。

形態　蜜姑魚爲鱗類魚屬之一種。其鱗光閃爍。如千片碎金。雜珠顆中。狀隨風散灑。觀之莫不目眩。其肉可供食與藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　生胃津。益肺氣。補血脈。增精髓。去熱除虛羸。壯筋骨。止咳嗽。定喘逆。功同燕窩蛤蚧。

參攷資料　宦遊筆記。自光溪入四明二十餘里。有蜜巖峭壁千尋。下臨深溪。曾洞無底。巖巔舊有蜂窠。聚蜂數百萬。其蜜滴下溪魚食之。故魚味甘絕。曰蜜姑魚。性極喜苔。須緪懸崖下。有水衣演漾深碧而細者。剜以爲餌。魚性暴。遇鉤則跳宕。卒不可制。而蜜巖下溪水清甚。用粗綆則恐魚之瞥見而竄遊也。用細絲則又恐不足以勝魚跳宕之力。釣者乃取絲長十餘丈。盤於竿上。遙望見深波中。魚翻翅鼓鬣而至。則取絲徐徐放之。如小兒之送紙鳶者。使得縱其所往。魚入鉤。果一躍數尺。翻波跋浪。橫激溪面。久乃倦。取之。按此魚最潔。惟食苔蜜。苔寒而蜜溫。得水火飪濟之力。大能補土生金。燕窩性清肅而下行。蛤蚧性和中而溫臟。此則故能兼之。眞勞嗽虛羸之食品上藥也。柳崖外編載。張方海浙人。少年讀書四明山。斷炊者數月。山碉谷多竹。峭壁有蜜。蜜入江化爲魚。名蜜鮎。張遂掘筍釣鮎而食。自言筍味淡以清。蜜鮎濃而美。有天台胡麻所不如者。嗣後遂輕身耐寒。暑不復思烟火味。據此則其功用信不誣也。（趙學敏）

【蜜屈律】　卽枳椇子之古籍別名。典見廣記。詳『枳椇子』條。

【蜜房】　卽露蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳『露蜂房』條。

【蜜林檎】　卽林檎實之味如蜜者。功用詳『林檎』條。

【蜜果】　卽無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳『無花果』條。

【蜜炙白前】　卽白前之處方用名。詳『白前』條。

【蜜炙桂枝】　卽桂枝用蜜炙炒成者之處方用名。詳『桂枝』條。

【蜜炙桔梗】　卽桔梗之處方用名。詳『桔梗』條。

【蜜炙者】　卽黃耆之用蜜炙者之處方用名。詳『黃耆』條。

【蜜炙馬兜鈴】　卽馬兜鈴之處方用名。詳『馬兜鈴』條。

【蜜炙款冬】　卽款冬花之處方用名。詳『款冬花』條。

【蜜炙薑】　卽生薑用蜜炙成者之處方用名。詳『生薑』條。

【蜜虎】　卽蜂虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蜂虎』條。

【蜜香】　**古籍別名**　木蜜。（內典）沒香。多香木阿蹉。（綱目）

產地　出南方諸省。

形態　蜜香爲香木類之一種。樹高丈餘。皮青色。白葉似槐而長。花似橘而大。子黑色。大如山茱萸。甜酸可食。其木堅韌而香。乃沉香之類。可供藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　去臭。除鬼氣。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論蜜香曰。辟惡去鬼邪尸注心氣。

【蜜香】　㊀卽沉香之古籍別名。典見南越志。詳『沉香』條。㊁卽木香之原名。詳『木香』條。

【蜜香草】　卽土常山之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見圖經本草。詳『土常山』條。

【蜜栗子】　産地　産金坑中。

形態　蜜栗子爲石類之一種。狀如蛇。黃而有刺。有金線纏之。色紫褐。亦無名異之類。可供藥用。

主治　金瘡折傷有效。

參攷資料　蜜栗子丹爐家採作五金匱藥。制三黃。(李時珍)

【蜜草】　卽甘草之古籍別名。典見別錄。詳『甘草』條。

【蜜酒】　製法　用沙蜜一斤。糯飯一升。麪麴五兩。熱水五升。同入瓶內。封七日成酒。尋常以蜜入酒代之亦良。

主治　風疹風癬。

【蜜噉花】　卽忍冬藤之古籍別名。典見和藥漢考。詳『忍冬藤』條。

【蜜望】　命名　本品蜜蜂望之而喜。故名。

古籍別名　天桃。(綱目)子名一棐果。望果。(綱目拾遺)棐果。(璧慶志)

産地　出粵中。

形態　蜜望爲喬木類之一種。高數丈。二月開花極繁。夏秋子實成熟。黃色。其果實可供藥用。

性質　甘酸無毒。

主治　益胃氣。療船暈嘔吐。

參攷資料　船暈北人謂之苦船。多嘔吐不食。登岸則已。胃弱人多有之。蜜望果甘酸益胃。能止之。故飄洋渡海者多購之。其類有天桃。與相類。六七月熟。大如木瓜。味甜酢。以羹魚尤善。凡渡海者食之不嘔。淚則結實愈多。粵諺云。來價高。食天桃。故廣人貴望果而賤天桃。貴之故望之。蜂望其花。人望其果也。(趙學敏)

【蜜桶藤】　卽忍冬藤之古籍別名。典見土宿本草。詳『忍冬藤』條。

【蜜棗】　卽棗之一種。以蜜糖拌蒸者。詳『大棗』條。

【蜜榲櫨】　卽枳椇子之古籍別名。典見廣記。詳『枳椇子』條。

【蜜結】　卽伽倆香之昧辛辣。嗅之香甜。柔嫩而體質輕者。爲伽倆香之上品。詳『伽倆香』條。

【蜜脾】　卽龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【蜜筒】　卽柚之古籍別名。典見綱目。詳『柚』條。

【蜜蜂】　命名　本品尾有垂鋒。因謂之蜂。其能採花釀蜜。故曰蜜蜂。

古籍別名　蠭。蜂。蠆。(綱目)

外國名詞　Apis chinensis (拉丁)　(Bee) (英)　ミツバチ (日本)

基本　係節肢動物。昆蟲類膜翅類爲蜜蜂之子。



形態　蜜蜂爲蜂類之一種。有雌蜂、雄蜂、職蜂三種。聚羣而居。雌雄蜂皆黑色。翅灰色而透明。雌者尾有毒針。以產卵管而兼禦敵之用。職蜂暗褐色。全體皆密生長毛。雌者每羣一頭。體長五分許。通稱蜂王。雄者亦少數。體較雌者爲短。而翅大。但營生殖作用。不事工作。亦稱遊蜂。職蜂最多。爲不完全之雌體。專事營築巢窠。採蜜育兒等。並保護其羣。亦稱工蜂。雌者所產之子。可供藥用。其蜂蜜蜜蠟。詳見各條。

採取　以頭足未成時。狀如白蛹者用。

性質　甘。平。微寒。無毒。

主治　治頭瘡。除蟲毒。補虛羸。傷中。久服令人光澤好顏色。不老。(本經)輕身益氣。治心腹痛。面目黃。大人小兒。腹中五蟲。從口吐者。(別錄)

歷代記述攷證　【唐】陳藏器　本草拾遺。論蜜蜂子曰。主丹毒風癰。腹內留熱。利大小便。瀉去浮血。下乳汁。婦人帶下病。【明】李時珍　本草綱目。論蜜蜂子曰。治大風瘡疾。

施用宜忌　長黃芩、芍藥、牡蠣、白前。

參攷資料　㈠蜂子涼有毒。須以冬瓜苦蕒。生姜紫蘇。制其毒食之。(大明)㈡蜂子古人以充饌品。故本經別錄。著其功效。而聖濟總錄。治大風疾。兼用諸蜂子。蓋亦足陽明太陰之藥也。(李時珍)㈢蜂

649／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子以酒漬傅。面。令人悅白。（陶弘景）

【蜜蜂草】卽香薷之古籍別名。見綱目。詳『香薷』條。

【蜜銀花】卽金銀花之處方用名。詳『金銀花』條。

【蜜糖】卽蜂蜜之處方用名。詳『蜂蜜』條。

【蜜鮎】卽蜜姑魚之古籍別名。見綱目拾遺。詳『蜜姑魚』條。

【蜜蘭】卽建蘭之別名。詳『建蘭』條。

【蜜蠟】㊀卽黃蠟之原名。詳『黃蠟』條。㊁卽白蠟之原名。詳『白蠟』條。

【蜈】卽貝子之古籍別名。見綱目。詳『貝子』條。

蜣娘【命名】本品深目高鼻。狀如羌胡。故名。

處方用名　蜣蜋。蜣蜋。胡蜣蜋。

古籍別名　蜣蜋推丸（弘景）

推車客。渠（本草綱目）黑牛兒。鐵甲將軍。夜遊將軍。推車蟲（綱目）

推屎蟲（孫氏集效方）矢甲弄丸。天仙子。天社蟲。俠客。螂。馬叱。同仇火。乃（和漢藥考）烏殼硬蟲。

外國名詞　Geotrupes laevistriatus, Motsch.

基本　屬化生類。爲甲蟲中之蜣蜋。

產地　凡池澤間恒多生焉。

形態　蜣蜋形似金龜子。長四五分。全身黑如漆。有光澤。背有剛甲。晝伏土中。夜見燈火。則飛出。猝然受驚。則縮脚伏頭。作如死狀。徐徐仍飛去。

採取　五六月間採捕之。

製法　別錄曰。凡使蜣螂。須是五月五日採取。蒸藏之。臨用去足火炙。勿置水中。令人吐。

用法　恒以焙剉研末。和作丸散。

性質　鹹。寒。有毒。

效能　破癥結。治癲癎。用治驚癎藥。

主治　小兒驚癎。瘛瘲。腹脹寒熱。大人癲疾狂陽（本經）手足端寒。肢滿。黃腫。搗丸塞下部。引痔蟲出盡。永瘥（別錄）

歷代記述　【唐】甄權　藥性本草論蜣蜋曰。治小兒疳蝕。火炙末和醋傅蜂瘡。【宋】日華諸家本草論蜣蜋曰。能墮胎。治疰忤。和乾薑傅惡瘡。出箭頭。【明】李時珍本草綱目論蜣蜋曰。治大小便不通。下痢赤白。脫肛。一切痔瘻丁腫。附骨疽。瘡癰。瘍風。炎瘡。出血不止。鼻中息肉。小兒重舌。【明】李士材本草圖解論蜣蜋曰。蜣螂鹹寒有毒。主小兒驚癎。瘛瘲。腹脹寒熱。大人癲疾狂陽。手足端寒。支滿。黃腫。蜣螂稟陰溼之氣。鹹寒除肝胃大腸三經邪熱。則諸證自瘳。古今方書以之治一切痔瘻。及疔腫疽瘡。出箭鏃之用。外用易臻厥功。內服非虛人所宜。非不得已。愼勿輕試。【清】鄒澍本經疏證論蜣蜋曰。蜣螂喜撲火。且善取糞爲丸。包以土推曳而埋之坎中。得毋以是二者。遂謂能息腸胃之火。去其宿滯而已。大人癲疾狂易。耶。則於小兒驚癎瘛瘲。腹脹寒熱。又當作何解。諸說者謂痙與癎不甚相遠。痙之胸滿口噤。臥不著席。脚攣急。齘齒者。可大承氣湯與。驚癎瘛瘲。腹脹寒熱。亦不甚相遠也。以病患有久暫之殊。正氣有盛衰之異。故有承氣蜣螂之別。爾。然則承氣。蜣螂。竟可混稱。並視耶。不知承氣之汗出。小便自利。轉矢氣。皆用蜣螂者所無。別錄所云。蜣螂治手足端寒。肢滿。黃腫。又爲承氣證所不有。以是爲別。猶不可乎。夫是亦豈不有理。第承氣與蜣螂。爲用懸殊。其可不相比而證明之耶。驚癎癲狂。神識必不慧。然必與陽明譫語有別。腹脹。與腹滿痛有別。寒與熱。與潮熱又有別。所以然者。承氣證是邪傷陽明之陰。蜣螂證是邪傷陽明之陽。傷其陰故燕逼津液。四射而出。傷其陽故蛾道泣灑。四支寒滿。四支者諸陽之本。寒則非火。滿則爲虛。自與四支實能登高者有間也。蜣螂者。昧鹹氣。寒。巢至不潔之地。其性見火則怒。怒則飛。飛之力甚猛。撲火既息。猶不已也。必觸物乃墮。是其秉氣於陰。以追赴撲滅陰中之陽邪。仍折旋反覆。酋生氣於腸胃糞穢之中。不使決裂潰敗。又恰與久瘧結根於下。陰陽戰亂於上者有似。故仲景於鱉甲煎丸用之。其風溫被火。有驚癎瘛瘲。太陽被火。有驚狂起臥不安。皆非是物所

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

宜。正以其病在陽而不結根於陰故也。

國外學說　古方藥品考曰。蜣螂有數種。長四五分。形似金龜子。光黑者名胡蜣螂。眞間有長寸許。在牛屎上者亦可用。其小甲無光者下品也。又曰。蜣螂味鹹寒。主治小兒驚癇瘛瘲。腹脹寒熱。大人顛疾狂陽。按蜣螂晝伏糞土間。夜乃飛行。其性陰寒有毒。故能解熱毒也。大和本草曰。蜣螂爲化生類。乃糞中黑蟲也。一名蛣蜣。莊子云。蛣蜣之智。在於轉丸。轉丸者。乃以土包糞而成丸也。

配合應用　㈠治小兒驚風。不拘急慢。用蜣螂一枚。炸爛。以水一小盞。於百沸湯中盪熱。去滓飲之。

㈡治小兒疳疾。土裹蜣螂煨熟與食之。（韓氏醫通方）

㈢治小兒重舌。蜣螂燒末。唾和傅舌上。（子母祕錄方）

㈣治腸氣吐食。用地牛兒二箇。推屎盡。一公一母。同入罐中。待蟲食盡牛兒。以泥裹煨存性。用去白陳皮二錢。以巴豆同炒過去豆。將陳皮及蟲爲末。每用一二分。吹入咽中。吐痰三四次。卽愈。（孫氏集效方）

㈤治赤白下痢。黑牛散。治赤白痢。噤口痢。及泄瀉用黑牛兒卽蜣螂。一名鐵甲將軍。燒研。每服半錢。或一錢。燒酒調服。小兒以黃酒服。立效。（李延壽方）

㈥治大腸脫肛。蜣螂燒存性爲末。入冰片研勻。摻肛上。托之卽入。（醫學集成方）

㈦治大小便閉。經月欲死者。本事推車散。用推車客七個。男用頭。女用身。土狗七箇。男用身。女用頭。新瓦焙研末。用虎目樹南向皮。煎汁調服。只一服卽通。又治大小便不通。六七月尋牛糞中大蜣螂十餘枚。線穿陰乾收之。臨時取一箇。全者放淨磚上。四面以灰火烘乾。當腰切斷。如大便不通用上截。小便不通用下截。各爲細末。取井華水服之。二便不通。全用卽解。（楊氏經驗方）

㈧治大腸祕塞。蜣螂炒去翅足爲末。熱酒服一錢。（聖惠方）

㈨治小便轉胞不通。用死蜣螂二枚。燒末。井華水一盞調服。（千金方）

㈩治小便血淋。蜣螂研末水服。（鮑氏方）

⑪治痔漏出水。用蜣螂一枚。陰乾。入冰片少許爲細末。紙撚蘸末。入孔內。漸漸生肉。藥自退出卽愈。（唐氏方）又用蜣螂焙乾研末。先以攀湯洗過貼之。（柚珍方）

⑫治一切漏瘡。不拘蜂癆鼠瘺。蜣螂燒末。醋和傅。（千金方）

⑬治附骨疽漏。蜣螂七枚。同大麥搗傅。（劉涓子方）

⑭治一切惡瘡。及沙虱水弩惡疽。五月五日取蜣螂蒸過陰乾爲末。油和傅之。（聖惠方）

⑮治丁腫惡瘡。楊柳上大烏殼硬蟲。或地上新糞內及泥堆中者。生取。以蜜湯浸死。新瓦焙焦爲末。先以燒過針撥開。用好醋調傅之。（普濟方）

⑯治無名惡瘡。忽得不識者。用死蜣螂杵汁塗之。（廣利方）

⑰治炙瘡血出不止。用死蜣螂燒研。猪脂和塗。（千金方）

⑱治大赫瘡疾。急防毒氣入心。先以燒過針撥開。用好醋調傅之。（普濟方）

⑲治無名惡瘡。忽得不識者。用死蜣螂杵汁塗之。（廣利方）

⑳治炙瘡血出不止。用死蜣螂燒研。猪脂和塗。（千金方）

㉑治大赫瘡疾。急防毒氣入心。先炙。後用乾蜣螂爲末。和鹽水傅四圍。如韭菜闊。日一上之。（肘後方）

㉒治癰瘡風病。取塗中死蜣螂杵爛。揩瘡令熱。封之。一宿瘥。（外臺祕要方）

㉓治鼻中息肉。蜣螂十枚。納青竹筒中。油紙密封。置廁坑內。四十九日。取出晒乾。入麝香少許爲末。塗之。當化爲水也。（聖惠方）

㉔治沙塵入目。取生蜣螂一枚。以其背於眼上影之。自出。（肘後方）

㉕治下部蠶蟲痛痒。膿血。勞生乳痰。蜣螂七枚。五月五日收者。新牛糞中兩肥羊肉一兩。炒黃。同搗成膏。丸蓮子大。炙熱。綿裹納肛中。半日卽在大便中蟲出。四度永瘥。（薑炳集驗方）

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。畏羊角、羊肉、石膏。

參攷資料　㈠箭鏃入骨。不可移者。楊氏家藏方。用巴豆微炒。同蜣螂搗塗。斯須痛定。必微痒。忍之待極痒不可忍。乃撼動拔之。立出。此方傳於夏侯郾。郾初爲閬州有

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

人額有瘡痕。問之云。從馬侍中征田悅中箭。侍中與此藥立出。後以生肌膏傅之乃愈。因以方付鄴云。凡諸瘡皆可療也。鄴至洪州。逆旅主人妻患瘡呻吟。用此立愈。又翰院叢記云。李定言石藏用近世良醫也。有人承簷溜浣手。覺物入爪甲內。初若線髮。數日如絲。伸縮不能。始悟其爲龍伏藏也。乃叩藏用求治。藏用曰。方書無此。以意治之耳。末蜣螂塗指庶免。震厄其人如其言。後因雷火逃身。急針挑之。果見一物躍出。亦不爲災。（醫說亦載此事。蘇頌）㊁莊子云。蜣蜋之智。在於轉丸。喜入糞土中取屎丸而推却之。故俗名推丸。（陶弘景）㊂崔豹古今注。謂之轉丸。弄丸。俗呼推車客。皆取此義也。其蟲深目高鼻。狀如羌胡。背負黑甲。狀如武士。故有蜣螂將軍之稱。（李時珍）㊃其類有三四種。以大而鼻頭扁者爲眞。（陶弘景）㊄蜣螂有大小二種。大者名胡蜣螂。身黑而光。腹翼下有小黃子。附母而飛。晝伏夜出。見燈光則來。宜入藥用。小者身黑而暗。晝飛夜伏。狐並喜食之。小者不堪用。惟牛馬腹結以三十枚研水灌之。絕佳。（寇宗奭）㊅蜣螂以土包裹轉而成丸。雄曳雌推。置於坎中。覆之而去。數日有小蜣螂出。蓋腐乳於中也。（李時珍）㊆蜉蝣一名渠略。似蜻蜓而小。大如指頭。身狹而長。有角。黃黑色。甲下有翅。能飛。夏月雨後。叢生糞土中。朝生暮死。猪好啖之。人取炙食。云美於蟬也。蓋蜣螂、蜉蝣、腹蛸、天牛、皆蟑蠹。蝎所化。此亦蜣之一種。不可不知也。或曰。蜉蝣水蟲也。狀似蠶蛾。朝生暮死。（李時珍）

【蜣螂心】 主治　疔瘡。

參攷資料　按劉禹錫纂柳州救三死方云。元和十一年。得丁瘡。凡十四日。益篤。善藥傅之莫效。長慶貫方伯。教用蜣螂心。一夕百苦皆已。明年正月。食羊肉又大作。再用如神。驗其法用蜣螂心。在腹下度取之。其肉稍白是也。貼瘡中。日許。再易。血盡根出。即愈。蜣螂畏羊肉。故食之即發。其法蓋出葛洪肘後方。（蘇頌）

【蜣螂魚】 產地　出雲南撫仙湖中。

形態　蜣螂魚爲介類之一種。狀如龜殼。青其大如盤。無尾。腹白。有八足。可供藥用。

主治　食之辟瘴毒。

【蜣螂蟲】　卽蜣螂之處方用名。詳『蜣螂』條。

【蜣螂轉丸】 基本　本品爲蜣螂所推之土。正圓如人捻作者。

古籍別名　土消。（綱目）

性質　鹹。苦。大寒。無毒。

主治　湯淋。絞汁服。療傷寒時氣。黃疸煩熱及霍亂吐瀉。燒存性。酒服。治項癭。塗一切癭瘡。

【蜣螂】　卽蜣螂。見該條。

【蜣蠭】　卽蠭蠭之古籍別名。典見綱目。詳『蟲蠭』條。

【蜥蜴】　卽石龍子。見『石龍子』條。

【蜞】　卽水蛭之古籍別名。典見別錄。詳『水蛭』條。

【蜦】㊀卽田父之古籍別名。典見綱目。詳『田父』條。㊁卽蝦蟆之別名。詳『蝦蟆』條。

【蜩】　卽蟬之古籍別名。典見綱目。詳『蟬』條。

【蜩甲】　卽蟬蛻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蟬蛻』條。

【蜮】　卽貝子在水中者之古籍別名。典見爾雅。詳『貝子』條。

【蜮】　卽溪鬼蟲之古籍別名。典見綱目。詳『溪鬼蟲』條。

【蜃】　卽蜃蠣之古籍別名。典見爾雅。詳『蜃蠣』條。

【蜃蟶】　卽肥蟶。詳『蟶蟧』條。

【蜱蛸】　卽桑螵蛸之古籍別名。典見爾雅。詳『桑螵蛸』條。

【蜧蟧】　卽鼠婦之古籍別名。典見別錄。詳『鼠婦』條。

【蜻蛉】　卽蜻蜓之古籍別名。典見爾雅。詳『蜻蜓』條。

【蜻蛉】　卽蜻蜓之原名。詳『蜻蜓』條。

【蜻蜓】　卽蟋蟀之別名。詳『蟋蟀』條。

【蜻蜓】 原名　蜻蛉。

命名　本品尾好亭而挺。故名。

古籍別名　蜻虹。蜻蜺。虹蜺。負勞。（爾雅）天雞。（綱目）絳綃。蟣。諸雉。（陶弘景）紗羊。赤者名赤卒。蠭蜻。小而黃者名胡梨。（古今注）

外國名詞　Anax parthenope

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

pe, Selys（拉丁）トンボ（日本）

基本　係節肢動物昆蟲類脈翅類蜻蛉科之蜻蛉。

產地　生原野水澤間。

形態　蜻蜓爲卵生蟲類之一種。其體分頭、胸、腹、三部。頭甚大。有複眼一對。口器甚强。便於咀嚼。胸背有膜質翅兩對。腹面有足三對。腹部細長分數節。各節形狀不同。性活潑。喜羣飛。雨時或夜間則靜息而平披其翅。產卵時以尾點水。使附水草之莖。夏產卵至秋孵化。捕得可供藥用。



蜻蜓

採取　以青色大眼者。腰間有碧色者及赤色者入藥用。

性質　微寒。無毒。

主治　强陰止精。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論蜻蜓曰。壯陽暖水臟。

【蜻蜓草】卽小青草之別名。詳『金鎖銀開』條。

【蜻蛉】卽蜻蜓之古籍別名。典見爾雅。詳『蜻蜓』條。

【蜂】卽果然之古籍別名。典見綱目。詳『果然』條。

【蜂螂】卽全蠍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『全蠍』條。

【蜾蠃】卽蠮螉之古籍別名。典見詩經。詳『蠮螉』條。

【蠛蠓】卽蚋蠓。詳『蠮螉』條。

【蜘蛛黃】卽蜘蛛黃之原名。詳『蜘蛛黃』條。

【豚皮】卽刺蝟皮之古籍別名。典見綱目。詳『刺蝟皮』條。

【蟅蝑】卽玳瑁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玳瑁』條。

【蝸蝓】卽蝸牛之古籍別名。典見爾雅。詳『蝸牛』條。

【蚼蠐】卽蟾蜍之古籍別名。典見綱目。詳『蟾蜍』條。

【製女貞】卽女貞製成者之處方用名。詳『女貞』條。

【製小朴】卽厚樸製成者之處方用名。詳『厚樸』條。

【製川朴】卽厚樸製成者之處方用名。詳『厚樸』條。

【製天雄】卽天雄製成者之處方用名。詳『天雄』條。

【製天蟲】卽白殭蠶之處方用名。詳『白殭蠶』條。

【製玉竹】卽玉竹之處方用名。詳『玉竹』條。

【製甘石】卽爐甘石製成者之處方用名。詳『爐甘石』條。

【製沒藥】卽沒藥之處方用名。詳『沒藥』條。

【製豆豉】卽淡豆豉之處方用名。詳『淡豆豉』條。

【製乳香】卽乳香之處方用名。詳『乳香』條。

【製於朮】卽白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【製金柑】卽藥製柑橘餅之處方用名。詳『藥製柑橘餅』條。

【製茅朮】卽蒼朮製過者之處方用名。詳『蒼朮』條。

【製軍】卽大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【製首烏】卽何首烏之處方用名。詳『何首烏』條。

【製香附】卽香附子之處方用名。詳『香附子』條。

【製茯苓】卽茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【製側子】卽側子製成者之處方用名。詳『側子』條。

【製捲朴】卽厚樸之處方用名。詳『厚樸』條。

【製硫黃】卽石硫黃之處方用名。詳『石硫黃』條。

【製黃精】卽黃精之處方用名。詳『黃精』條。

【製蜀漆】卽常山之處方用名。詳『常山』條。

【製熟地】卽熟地黃製成者之處方用名。詳『熟地黃』條。

【製礞砂】卽礞砂製成者之處方用名。詳『礞砂』條。

【製蔥仁】卽蔥仁製成者之處方用名。詳『蔥仁』條。

【製錦紋】卽大黃製成者之處方用名。詳『大黃』條。

【製膽星】卽天南星製成者之處方用名。詳『天南星』條。

【製鎖陽】卽鎖陽製過者之處方用名。詳『鎖陽』條。

【豨肉】卽豬肉之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

綱目詳『豬肉』條。

【豨首】卽天名精之古籍別名。典見綱目詳『天名精』條。

【豨椒】卽蔓椒之古籍別名。典見本草集註詳『蔓椒』條。

【豨薟草】命名　楚人呼豬爲豨。豨呼草之氣味辛臭者爲薟。本品氣臭如豬而味薟鹽。故名。

古籍別名　火枚草。豬膏母。虎脊。狗脊(唐本草)黏糊菜(救荒本草)希仙(本草綱目)次獻。希賢。虎薟。類鼻白花菜羊屎菜。蟛薟衿(和漢藥考)

外國名詞　Siegesbeckia orientalis, L.(拉丁)

基本　屬菊科爲豨薟之苗葉。

產地　在山野田澤間。

形態　豨薟爲一年生草本。山野多有之。春日生苗。至夏莖高二三尺。大者達五六尺。莖方有茸毛。葉爲卵形。前端尖。邊緣有粗鋸齒。自其底部出三大葉脈。色淺綠質柔軟而薄。有茸毛如莖。皆對生。入秋。枝梢開小黃花。排列爲頭狀花序。在花序之周圍者爲舌狀花冠。在其中央者爲筒狀花冠。花下有苞五瓣。皆狹長如匙。亦生有茸毛。花後結瘦果。果有黏液腺。具一種臭氣。善附著他物以傳播其種子。

採取　三四月間採苗葉。曝乾。

製法　蘇頌云。凡使豨薟。須用蜀人單服豨薟法。五月五日六月六日九月九日。採葉去根莖花實。淨洗。曝乾。入甑中層層酒酒與蜜蒸之。又曝。如此九過。則氣味香美。然搗篩末。蜜丸服之。甚益元氣。治肝腎風氣。四肢麻痺。骨間冷。腰膝無力者。又能行大腸氣。

性質　苦寒。有小毒。

效能　祛風溼。治麻痺。用治散風燥溼藥。及作瘡瘍藥。

主治　治熱鬱煩滿。不能食。生擣汁三合服。多則令人吐。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論豨薟草曰。主久癘疾。瘧。搗汁服。取吐。搗傅虎傷。狗咬。蜘蛛咬。蠆咬。蠷蝮溺瘡。【明】李時珍本草綱目論豨薟草曰。治肝腎風氣。四肢麻痺。骨痛膝弱。風溼諸瘡。【明】李士材本草圖解論豨薟草曰。豨薟苦寒入肝。主風氣麻痺。骨痛膝弱。風溼諸瘡。按豨薟苦寒之品。且有毒。令人吐。以爲生寒熟溫。理或有之。以爲生瀉熟補。未敢盡信。豈有苦寒搜風之劑。蒸煮便有補益之功耶。世俗見慣微本草。譬之太過。遂誤認爲風家至寶。余少時亦信之。及悟誠修事。久用無效。始知方書未可盡憑也。古人所謂補者。亦以邪風去則正氣昌。非謂其本性能補耳。酒蜜潤蒸。【清】黃宮繡本草求眞論豨薟草曰。豨薟草味苦而辛。性寒不溫。故書載須蒸曬至九。加以酒蜜同製。則濁陰之氣可除。而清香之氣始見。是以主治。亦止宜於肝腎風溼。而見四肢麻木。筋骨冷痛。腰膝無力。風溼瘡瘍等症。以其苦能燥溼。寒能除熱。辛能散風故也。若使非爲風溼而見腰膝無力等症。則又屬於血虛。而不可用辛散之味矣。然熟用猶可。其性不甚傷正。若生用不製。則又令人作泄。不可不知。以五月五六月六七月七八月八九月九採者尤佳。至云服能益氣。止是風溼既除之驗。宋張詠表進輕身之說。亦是渾同膚廓之語。非實詮也。

去粗莖。留枝葉花實。酒拌蒸曬九次。蜜丸。搗汁熬膏。煉蜜三味收之。加以酒治。始可投服。

近人學說　張山雷曰。豨薟之草。微有臭味。故得豨名。豨者豕也。言此草之氣。其臭如豕。古人又有豬膏母之名。其義一也。唐本草始載之。言其氣味苦寒。治熱鬱煩滿。不能食。生搗汁飲三合。多則令人吐。又謂豬膏母氣味辛苦。平主金瘡止痛。除諸惡瘡。消浮腫。搗封之。湯漬散敷。並良。藏器謂主久癘疾瘡。搗汁服。取吐。又搗敷虎傷。狗咬。蜘蛛咬。蠆咬。蠷蝮溺瘡。蘇頌謂蜀人單服豨薟。以五月五日六月六日九月九日。採葉淨洗。入甑中層層灑酒與蜜。蒸之又曝。凡九次。氣味極香。搗末。蜜丸服之。云甚益元氣。治肝腎風。氣四肢麻痺。骨間冷。腰膝無力者。亦能行大腸氣。安五臟。生毛髮。兼主風溼瘡。肌肉頑痺。婦人久冷尤宜。又江陵節度成訥及知益州張詠。皆有進豨薟丸表。極言其治中風大效。頗按此物。生時氣臭味濃。多服引吐。蓋性本寒滯而氣猛烈。長於走竄開泄。故能

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

治熱煩癰毒而吐痰癮及其九次蜜酒蒸曬和蜜爲丸則氣味已鄙而通利機關和調血脈尤爲純粹凡風寒溼熱諸痺多服均獲其效洵是微賤藥中之良品也

配合應用 ㈠治風寒泄瀉火枕丸治風氣行於腸胃泄瀉火枕草爲末醋糊丸梧子大每服三十丸白湯下（聖濟總錄方）

㈡治癰疽腫毒一切惡瘡豨薟草端午採者一兩乳香一兩白礬燒半兩爲末每服二錢熱酒調下善重者連進三服得汗妙（乾坤祕韞方）

㈢治發背丁瘡豨薟草、五葉草、（卽五爪龍）野紅花（卽小薊）大蒜等分搗爛入熱酒一盌絞汁服得汗立效（乾坤生意方）

㈣治丁瘡腫毒端午採豨薟草日乾爲末每服半兩熱酒調下汗出卽愈極有效驗（集簡方）

㈤治反胃吐食用火枕草焙爲末蜜丸梧子大每沸湯下五十丸（百一選方）

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡無風溼而屬陰虛者禁用。忌鐵。

著名方劑 豨薟丸治口眼喎斜偏風失音不語時時吐涎久服眼目清明髭髮烏黑節骨强健（本事方）豨薟草五月中取葉及嫩枝洗九蒸九曬微焙爲末煉蜜丸桐子大溫酒或米湯下三四十丸。

參攷資料 ㈠蜀人單服豨薟法五月五日六月六日九月九日採葉去根莖花實淨洗曬乾入甑中層層灑酒與蜜蒸之又曝如此九遍則氣味極香美焙搗篩末蜜丸服之云甚益元氣治肝腎風氣四肢麻痺骨間冷腰膝無力者亦能行大腸氣諸州所說皆云性寒有小毒與唐本同惟文州及高郵州云性熱無毒服之補益安五臟生毛髮兼主風溼瘡肌肉頑痺婦人久冷尤宜用須去粗莖留枝葉花實蒸曝爾說不同豈單用葉則寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎抑土地所產不同而然歟（蘇頌）㈡生搗汁服則令人吐故云有小毒九蒸九曬則補人去痺故云無毒生則性寒熟則性溫云熱者非也（李時珍）㈢按江陵府節度成訥進豨薟丸方表略云臣有弟訢年二十一中風伏枕五年百醫不痊有道人鑷針因覩此患曰可餌豨薟丸必愈其草多生沃壤高三尺許節葉相對當夏五月以來收之每去地五寸剪刈以溫水洗去泥土摘葉及枝頭凡九蒸九曝不必太燥但以取足爲度仍熬搗爲末煉蜜丸如梧子大空心酒溫或米飲下二三十丸服至二千丸所患愈加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復至五千丸當復丁壯臣依法修合令訢服之果如其言服後須喫飯三五匙歷之五月五日採者佳奉勑宣付醫院詳錄又知益州張詠進豨薟丸表略云竊以餐石飲水可作充腸之饌餌松含枏亦成救病之功是以療飢者不在於羞珍愈病者何煩於異術倘獲濟時之藥輒陳鄙物之形不恥管窺輒干天聽臣因換龍興觀掘得一碑內說修養氣術并藥方二件依方差人訪問採覓其草頗有異金稜銀線秉莖紫莖對節而生蜀號火枕莖葉頗同蒼耳不費登高歷險每常求少獲多急採非難廣收甚易倘勤久服旋見神功誰知至賤之中乃有殊常之效臣自服至百服眼目清明卽至千服髭鬚烏黑筋力輕健效驗多端臣本州有都押衙羅守一曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病立瘥又和尙智嚴年七十忽患偏風口眼喎斜時時吐涎臣與十服亦便得痊今合一百劑差職貢史元奏進（唐愼微）㊀豨薟田野皆食之一名火枕葉似酸漿而狹長花黃白色三月四月採苗葉曝乾又曰豨膏母生平澤下溼地所在皆有一名虎膏一名狗膏葉似蒼耳莖圓有毛（蘇恭）㊁豨薟處處有之春生苗葉似芥葉而狹長文粗莖高二三尺秋初有花如菊結實頗似鵝虱夏採葉曝乾用（蘇頌）㊂按蘇恭唐本草謂豨薟似酸漿豬膏母似蒼耳列爲二種而成訥進豨薟丸表言此藥與本草所述相異多生沃壤高三尺許節葉相對張詠豨薟丸表言此草金稜銀線秉莖紫蕊對節而生蜀號火枕莖葉頗同蒼耳又按沈

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

捂筆談云。世人妄認地菘爲火杖。有單服火杖法者。乃是地菘。不當用火杖。乃本草名豬胥母者。後人不識。重複出條也。按此數說各異。而今人風痺多用豨薟丸。將何適從耶。時珍常聚諸草訂視。則豬胥草素莖有直稜。兼有斑點。葉似苣耳而微長。似地菘而稍薄。對節而生。莖葉皆有細毛。肥嫩一株。分枝數十。八九月開小花。深黃色。中有長子。如同蒿子。外萼有細刺黏人。地菘則青莖。圓而無稜。無斑無毛。葉皺似菘芥。亦不對節。觀此則似與成張二氏所說相合。今河南陝州採豨薟充方物。其狀亦似豬胥草。則沈氏謂豨薟即豬胥母者。其說無疑矣。蘇恭所謂似酸漿者。乃龍葵。非豨薟。蓋誤認爾。但沈氏言世間單服火杖。乃是地菘。不當用豬胥母。似與成張之說相反。今按豨薟豬胥母條。並無治風之說。惟本經地菘條有去痺除熱久服輕身耐老之語。則治風似當用地菘。然成張進御之方。必無虛謬之理。或者二草皆有治風之功乎。而今服豬胥母之豨薟者。復往往有效。其地菘不見有服之者。則豨薟之爲豬胥丸。尤不必疑矣。（李時珍）

【豪豬】 **命名** 說文云。豪豕鬣如箠者。能激毫射人。故名。

古籍別名 蒿豬（唐本草）山豬（通志）獐豬（貔豬（綱目）簡豬（動物學大辭典）

外國名詞 Hystrix cristata L. 或 H. suberistata Swinhol（拉丁）（Common porcupine 或 Porcupine）（英）ヤマアラシ（日本）

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類齧類豪豬科。

產地 出廣西及印度諸地之山中。美洲亦有出。

形態 豪豬爲獸類之一種。頭大眼小。耳短。口吻圓鈍。上顎具堅強之門牙。脣上有硬強之長鬚。四肢短。前肢四趾。後肢五趾。趾具短爪。背臀腿密生硬刺毛。毛色黑或蒼褐。長刺毛尖端更有倒鉤。體長二三尺。穴居土中。晝伏夜出。覓樹皮木根及果實爲食。其肉可供藥用。



豪豬

性質 甘。大寒。有毒。

主治 多胥利大腸。

參攷資料 豪豬肉不可多食。發風令人虛贏。（蘇頌）

【豪豬肚及屎】 **性質** 寒。無毒。

主治 水病熱風。鼓脹。同燒存性。空心溫酒服二錢七。用一具即消。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論豪豬肚及屎曰。治黃疸。乾燒研服【明】李時珍本草綱目論豪豬肚及屎曰。通屎燒研。酒服。治水腫。脚氣奔豚。

參攷資料 此豬多食苦蒙。故能治熱風水脹。而不能治冷脹也。（孟詵）

【綵豆】 卽黎豆之古籍別名。典見綱目。詳『黎豆』條。

【賓門】 卽檳榔之古籍別名。典見李氏藥錄。詳『檳榔』條。

【賓雀】 卽雀之古籍別名。典見綱目。詳『雀』條。

【趙麥黃】 卽粟米之古籍別名。典見綱目。詳『粟米』條。

【趙李】 卽鼠李子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『鼠李子』條。

【輕粉】 **命名** 本品由水銀升鍊而成。質輕如粉。故又名之曰水銀粉。

古籍別名 水銀粉（嘉祐）汞粉。峭粉（日華本草）膩粉（本草綱目）水粉。銀粉。水銀膩。伊勢白粉（和漢藥考）不重（生產辨）

外國名詞 Calomel

基本 係汞礦屬。爲水銀結晶性之疏鬆粉末。

形態 輕粉爲水銀升鍊。係結晶性之粉末。作板狀針狀。或錐狀之白色固體。而有光澤。其不甚純潔者。僅供外用。內服者須以純潔色白之細粉末。

製法 李時珍曰。升鍊輕粉法。用水銀一兩。白礬二兩。食鹽一兩。同研。不見星。鋪於鐵器內。以小烏

656／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

盆覆之。飾竈灰。鹽水和封固盆口。以炭打二炷香。取開則粉升於盆上矣。其白如雪。輕盈可愛。一兩汞可升粉八錢。又法水銀一兩。皂礬七錢。白鹽五錢。同研如上升鍊。又法先以皂礬四兩。鹽一兩。煆硝五錢。共炒黃爲麪。水銀一兩。又麪二兩。白礬一錢。研勻如上升鍊。

用法 剉研和入內服外敷之丸散。

性質 辛冷。無毒。

成分 輕粉爲實地疎鬆之甘汞H_2Cl_2。

效能 殺蟲治疥瘡。却痰消積。服用作驅儺藥。又作下劑。能治疥瘡。蛔蟲便祕。外用有直接撲滅細菌及寄生蟲之功。且於局部無刺激性。內服能激腸之蠕動增速及多故有通便之功。且在腹

本草綱目論輕粉曰。治痰涎積滯。水腫鼓脹。毒瘡。【明】繆希雍本草經疏論輕粉曰。水銀粉升鍊水銀而成。其味本辛。氣冷無毒。療體與水銀相似。第其性稍輕浮。爾大腸熱燥則不通。小兒疳瘴因多食甘肥腸胃結滯所致。辛涼總除腸胃積滯熱結。故主之也。其主瘕瘧瘡疥癬蟲及鼻上酒皶風瘡瘙痒者。皆從外治。無非取其除熱殺蟲之功耳。【明】李士材本草圖解論輕粉曰。輕粉辛溫有毒。治痰涎積滯。鼓脹毒瘡。殺蟲搜風。輕粉乃鹽礬煉水銀而成。其氣燥烈。其性走竄。善劫痰涎。消積滯。故水腫風痰。溼熱楊梅毒瘡服之。則涎從齒齦而出。邪鬱漸開而愈。若服之過劑及用之失宜。則毒氣被逼竄入經絡筋骨。莫之能出。變爲筋攣骨痛。發爲癰腫疳瘡。經年累月。遂成廢疾。

風邪溼熱。從牙齦而出。暫得寬解。然毒氣竄入筋骨。血液耗散。久久發爲結毒。遂成廢人。仍須用水銀升煉。入三白丹引拔毒之藥。同氣搜逐瘡風。醉仙丹通天再造散。用以搜剔毒邪。仍從齒縫而出。再以錢氏利驚丸。白餅子並用。取痰積從大便而出矣。【清】黃元御玉楸藥解論輕粉曰。輕粉辛冷毒烈。服之筋骨拘攣。齒牙脫落。庸工用治楊梅惡瘡。多被其毒。不可入湯丸也。本草謂其治痰涎積滯。氣臟水脹。良藥自多。何爲用此。

國外學說 日本三重縣射和村爲輕粉特產區。因該村朱中山產有一種土質名朱色土。爲製造輕粉不可少之原料。故輕粉之生產。祇限於該處和漢藥考曰。精製水銀之法。以食鹽與朱色土。煉水銀使固。入鐵鍋中。烈火熱之。使之昇華。黏附於蓋。乃採取之。製造輕粉之原料有三。一水銀。二鹽之滷汁。三赤土。拌和入鐵鍋內。並列竈上。共六十個。鍋內空隙處。以赤土各鐵鍋均蓋以黏土製之。

既妥。徐徐加熱。候溫度逐漸上昇。水銀與滷汁中之酸性鹽及空氣中之酸素。滷汁中之食鹽。先後起化學反應。輕粉則成美麗之結晶。黏附兜之內面。約一二時。提煉即可告竣。乃以羽毛掃拂輕粉於紙上。隨即裝罐發售。其鐵鍋內餘剩之赤土。尚含有粗製之輕粉不少。於此再加水。銀滷汁。便爲二次製造輕粉之原料。依此所得之輕粉。係細小色白之鱗片。且有光耀。毫無猛汞之質。又甚輕。故其粉末易與他藥混和。以製散劑或丸藥。均極相宜也。又輕粉雖係結晶性之白粉。然用放大三百二十五倍之顯微鏡照之。則見爲大小不同之板狀結晶。其質輕有光輝。起脂肪狀之感覺。無臭無味。其反應呈中性。水及酒精伊打俱不溶解。加安母尼亞水。則變黑色。若與苛性亞爾加里土類亞爾加里炭酸亞爾加里、煆製苦土。同以水爲媒介。冷則變成黑色之亞酸化汞。加沃度加里液少許。立卽化生黃綠色之亞沃度汞。再加多量。卽析出水銀之一分。溶解而爲沃度加里與沃

657／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

配煮沸之加濃厚之硫酸冷化煮沸之則發生亞硫酸而溶解國分平次郎之製造輕粉說明書云據內務省試驗輕粉之成績（其一）以射和所出之輕粉實行化學試驗毫無可溶解之水銀化合物又可完全昇華絕不混雜安母尼亞鹽與其他諸鹽更試其醫治作用則驅徽及瀉利之功堪與第一絲化汞相匹所異者輕粉結晶如鱗屑耐光而不變色查歐洲製造之第一絲化汞結晶頗大受光較遲故大率臨用研末其尋常者恐不免含有可溶性之水銀化合物故不如以大結晶之第一絲化汞和水研末洗淨夾雜物用之較爲穩妥惟射和所製之輕粉實地純潔無異本國製之第一絲化汞用於醫藥特許發賣（其二）此藥爲鱗屑狀無色有光澤

綫下劑一日用〇・一至一・〇丹波藥學博士曾託橘田醫學士用輕粉爲下劑迭次試驗其用量據橘田報告如左第一次用量爲〇・五瓦服後小腹覺痛經四時半下瀉一次第二次用量仍係〇・五瓦服後稍覺腹痛四時中瀉兩次第三次用量如前服後仍覺腹痛經十時始瀉一次第四次用量如前服後不覺腹痛經七時瀉一次和漢藥考曰國分平次郎製造輕粉並著有說明書詳述射和輕粉之歷史摘錄如左射和輕粉之製造爲自古異人傳授之奇法緣我鄉之艮位有山名朱中山天然產一種朱色土俗呼實土和以水銀即可製成輕粉相傳此土能解水銀峻烈之毒他處竟不能倣造此藥因此射和輕粉名聞遐邇蓋他處無此實土也當時發明之早尙在持統天皇御極之

相同內用爲〇・〇二至〇・

考曰

明在西曆千七百七十四年距今纔百有餘年誠我國特有之良劑也當四百五十餘年前卽文安永錄年間此藥最爲盛行時製造者有八十三家之多國家恐有濫造之弊嚴行限制遂減至十六家復嚴訂章程以防之故醫學博士橈村清德嘗試驗輕粉之醫治功用詳見明治十二年十一月東京醫事新誌第八十四號又藥學博士丹波敬三製造射和輕粉之意見書詳見明治二十七年三月藥學雜誌第百四十五號錄之如左橈村醫學博士檢查輕粉效用之成績和漢醫之應用輕粉於徽毒症也亦已久矣前人謂其成分中不免攙雜猛汞實不盡然茲者日本大學醫學部教授柴田承桂精密檢查始知其成分爲亞綠化汞與甘汞相同至是嚮日之疑團乃一旦氷釋今也余之檢查則在輕粉之效力是否與甘汞相同抑有差異之處故第一試其驅徽之功效第二試其泄瀉之作用

年若歐洲之

毒之醫案（一）某男子年二十七營養本不佳良二年前患徽毒至今不治頭部有潰瘍數處陰莖生疳瘡侵蝕極深龜頭腐脫咽喉亦有潰瘍數處嚥下困難聲音嘶嗄某醫連用沃陳劑外部潰瘍塗布五十倍石炭酸油經已數月毫無寸效試以輕粉〇・〇三和白糖〇・三投之與灰白水銀軟膏塗擦法替換外部潰瘍則以輕粉一分豚脂八分調和攤貼約三星期諸症頓減潰瘍幾於全愈其間兼用綠酸加里液含漱頗遂滋養物該病者自來食慾缺乏消化不良衰弱頗甚齒齦微有紅腫現惡液質之徵後更投以規那煎居然强健異於常人（二）某男子年二十二體格中等親屬向有神經系病四年前始患徽毒一年前發腦徽毒由是諸症蠭起如神思不寧頭痛耳鳴眩暈健忘等續續而至又卒然昏憊搖搦狀若發癎且雨眼失明亦令服輕粉一日三次每次服〇・〇三與灰白水銀軟膏塗擦法替換頭痛及發癎症狀俄而遽退神思爽適連服約十餘日漸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

起消化不良。齒齦微腫。但不流涎。遂即停服。約數旬後。前症又連發三次。仍服輕粉。徵毒果愈。惟兩目已瞽。不能重明耳。

配合應用　㊀小兒初生。浴湯中入鹽少許。拭乾以膩粉少許摩其身。既不畏風。又散諸氣。（全幼心鑑方）

㊁治初生鎖肛。證由胎中熱毒。結於肛門。兒生之後。閉而不通。三日者急令婦人咂兒前後心。手足心。并臍七處。四五次。以輕粉半錢。蜜少許。溫水化開。時時與少許。以通爲度。（全幼心鑑方）

㊂治小兒誤喘服藥不退者。用無雄雞子一個。取清。入輕粉抄十錢。拌和。銀器盛。置湯瓶上蒸熟。三歲兒盡食。當吐痰或泄而愈。氣實者。乃可用。（活幼口議方）

㊃治幼兒嗅乳不止。服此立效。膩粉一錢。鹽豉七粒。去皮研勻。丸麻子大。每服三丸。薑香湯下。（活幼口議方）

㊄治小兒喫泥及臌肚。用膩粉一分。沙糖和丸麻子大。空心米飲下一丸。良久泄出泥土痰。（經驗方）

㊅治大小便閉。脹悶欲死。二三日則殺人。膩粉一錢。生麻油一合。相和空心服。（聖惠方）

㊆治大便壅結。膩粉半錢。沙糖一彈丸。研丸梧子大。每服五丸。臨臥溫水下。又方。膩粉二錢。黃丹一錢。爲末。每米飲服一錢。（普濟方）

㊇治血痢腹痛。膩粉五錢。定粉三錢。同研。水浸蒸餅心少許。和丸綠豆大。每服七丸。或十丸。艾一枚。水一盞。煎湯下。（孫用和祕寶方）

㊈治消中嗜食。多因外傷脾熱。內積憂思。喫食鹹物及酸。致脾胃乾燥。飲食倍常。不生肌肉。大便反堅。小便無度。輕粉一錢爲末。蘆汁拌勻。長流水下。齒浮是效。後服豬肚丸補之。（危氏得效方）

㊉治一切虛風。不二散。用膩粉一兩。湯煎五度。如麻脚。慢火焙乾。麝香半兩。細研。每服一字。溫水調下。（孫用和祕寶方）

㊊治水氣腫滿。汞粉一錢。烏雞子去黃盛粉。蒸餅包。蒸熟取出。苦楝麪炒一錢。同蒸餅杵丸。綠豆大。每車前湯下三五丸。日三服。神效。（譬喻元戎方）

㊋治痘瘡生瞖。輕粉、黃丹等分。爲末。左目患吹右耳。右目吹左耳。即退。（王氏痘疹方）

㊌治女人面脂。太眞紅玉膏。輕粉、滑石、杏仁、去皮等分。爲末。蒸過。入膩麝少許。以雞子清調勻洗面。畢傅之。旬日後色如紅玉。（閨閣事宜方）

㊍治抓破面皮。生瞖自然汁。調輕粉末搽之。更無痕迹。（救急方）

㊎治牙齒疼痛。輕粉一錢。大蒜一瓣。杵餅。安腮骨前陷中。先以銅錢隔之。用蜆殼蓋定。扎住一宿愈。左疼安右。右疼安左。（摘玄方）

㊏治風蟲牙疳。膿血有蟲。輕粉一錢。黃連一兩。爲末。摻之。（普濟方）

㊐治小兒耳爛。輕粉、蛴子灰等分。研。油調傅。（摘玄方）

㊑治底耳腫痛。汁水不絕。輕粉一錢。麝香一分。爲末。摻之。（簡便方）

㊒治爛弦風眼。膩粉末口津和點大。臂日二三次。（聖惠方）

㊓治小兒頭瘡。葱汁調膩粉塗之。又方。雞子黃炒出油。入麻油及膩粉末傅之。（集簡方）

㊔治小兒生瓣。豬脂和輕粉抹之。（直指方）

㊕治牛皮惡瓣。五更食炙牛肉一片。少刻以輕粉半錢。溫酒調下。（直指方）

㊖治楊梅瘡瓣。用汞粉、大風子肉等分。爲末。塗之即愈。（嶺南衛生方）用輕粉二錢。杏仁四十二個。去皮洗瘡。拭乾。搽之。不過三次即愈。乾則以鵝膽汁調。（譬方摘玄方）

㊗治楊梅毒瘡。用輕粉一錢、雄黃、丹砂各二錢半。槐花炒龜版炭各一兩。爲末。糊丸。梧子大。每服一錢。冷茶下。日二服。七日愈。（醫學統旨方）又用輕粉、胡桃仁、槐花炒研。紅棗肉各二錢。搗丸。分作三服。初日雞湯下。二日酒下。三日菜下。三日服盡。五日瘡乾。七日痂落。（楊誠經驗方）一方用豬腎一對。去膜。批開。各摻輕粉一錢。扎定。麻油二兩。爛熟頓食。不破口腫牙。仍服金銀花藥。一方用大雞卵一個。去黃。留白。入輕粉一錢。攪勻。紙

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

糊。飯上蒸熟食。

㊁治下疳陰瘡。輕粉末乾摻之。即結靨而愈。（萬表積善堂方）

㊂治應瘡不合。以薑汁溫洗拭乾。用葱汁調輕粉傅之。一方輕粉五分。黃蠟一兩。以粉摻紙上。以蠟鋪之。縛在瘡上。黃水出即愈。（永類鈐方）

㊃治癰疽惡瘡。楊梅諸瘡。水銀一兩。朱砂。雄黃各二錢半。白礬。綠礬各二兩半。研勻。罐盛。燈盞蓋定。鹽泥固濟。文武火鍊升。罐口掃收。每以三錢。入乳香、沒藥各五分。酒。太乙膏上貼之。絕效。名曰五寶霜。

用法　八分至錢半。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。畏慈石、石黃。忌一切血。

參攷資料　㊀輕言其實。啗言其狀。胍言其性。昔蕭史與秦穆公鍊飛雲丹第一轉乃輕粉。即此也。（李時珍）㊁溫燥有毒。升也浮也。黃連、土茯苓、陳醬黑鉛、鐵漿可制其毒。（李時珍）㊂水銀粉下腸涎。并小兒涎潮癒瘧藥多用。然不可常服。及過多。多則損人。若兼驚則危。須審之。蓋驚爲心氣不足。不可下。下之裏虛。驚氣入心不可治。其人本虛。更須禁此。愼之至也。（寇宗奭）㊃水銀乃至陰毒物。因火煆丹砂而出。加以鹽礬鍊而爲輕粉。加以硫黃升而爲銀朱。輕飛靈變。化純陰爲燥烈。其性走而不守。善蝕痰涎。消積滯。故水腫風痰。溼熱毒瘡。被蝕涎從齒縫而出。邪鬱爲之暫開。而疾因之亦愈。若服之過劑。或不得法。則毒氣被蒸。竄入經絡。筋骨。莫之能出。痰涎既去。血液耗亡。筋失所養。營衞不從。變爲筋攣骨痛。發爲癰腫疳漏。或手足瘛瘲。蟲蝕。潰裂。蟲蝕。潰瘍。經年累月。遂成廢痼。其害無窮。觀丹客升鍊水銀輕粉。鼎器稍失固濟。鐵石撼透。況人之筋骨皮肉乎。陳文中言輕粉下痰而損心氣。小兒不可輕用。傷脾敗陽。必變他證。初生尤宜愼之。而演山氏謂小兒在胎。受母飲食熱毒之氣。蓄在胸膈。故生下個個發驚。宜三日之內。與黃連去熱。腻粉散毒。又與人參朱砂蜜湯。解清心肺。積毒既化。兒可免此患。二說不同。各有所見。一謂無胎毒者不可輕服。一謂有胎毒者宜預解之。用者宜審。（李時珍）

【輕馬勃】卽馬勃之處方用名。詳『馬勃』條。

【辣子】卽食茱萸楚地之俗名。詳『食茱萸』條。

【辣米菜】卽薤菜之古籍別名。典見綱目。詳『薤菜』條。

【辣米粥】**基本**　本品係用辣茄和米煮成之粥。

主治　治心腹疼痛。

【辣芥子】卽芥子之處方用名。詳『芥子』條。

【辣虎】卽蕃椒之古籍別名。典見龍柏藥性考。詳『蕃椒』條。

【辣茄】卽蕃椒之原名。詳『蕃椒』條。

【辣椒】卽辣茄之俗名。詳『蕃椒』條。

【辣蓼】卽水蓼之古籍別名。典見綱目。詳『水蓼』條。

【辣薤】卽薤之日本名。詳『薤』條。

【辣醬】卽蕃椒製成醬者之處方用名。詳『蕃椒』條。

【遠志】**命名**　本品功能益智強志。故有遠志之稱。

處方用名　遠志肉。炙遠志。

古籍別名　棘菀。葽繞。（本經）葽苦。葽餘糧。阿只草。（和漢藥考）醒心杖。（記事珠）

外國名詞　Polygala, tenuifolia, Willd.

基本　屬遠志科遠志之根與葉。

產地　陳仁山藥物生產辨云。遠志產山西曲沃縣。河南禹州府。

形態　遠志爲山野自生之常綠草。一根抽數莖。高達七八寸。葉互生。作卵圓形或橢圓形。夏月於葉腋開花。有不整齊之紫色花冠。酷似蔌花。後結大二三分扁圓形之實。中有小黑子。市上出售者。其根有許多殘莖。且彎曲而有多數歧根。長約七八寸。粗約三四分。外面呈灰褐色。處處有副根之切痕。及不正之皺縮。皮部粗糙易剝去。稍有苦味。



遠志

採取　三四月間採根。葉陰乾。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

製法　雷敩曰。凡使遠志。須去心。否則令人煩悶。仍用甘草湯浸一宿。曝乾。或炒乾用。

性質　苦。溫。無毒。

效能　交通心腎而安神。散鬱化痰而消癰。治老年氣枝管炎。因其入胃後卽與胃液起作用而將 Senegin 析出。此實能刺激胃黏膜。使胃部覺煖慾至腸徹。能制腸之蠕動。使積糞不易排出。由腸壁吸入血中。能激血液之流動。令心跳强盛。血壓增高。氣管之四周黏膜。亦均被激而增多分泌。且氣管之傳入系被激從反應而起咳嗽。使痰沫混分泌液而咳出。故用爲祛痰利尿藥。凡氣管枝炎喘息及其他痰咳皆用之。但古書則作强壯藥。

主治　咳逆傷中。補不足。除邪氣。利九竅。益智慧。耳目聰明。不忘。强志。倍力。久服輕身不老。（本經）利丈夫定心氣。止驚悸。益精。去心下膈氣。皮膚中熱。面目黃。（別錄）

歷代記述攷證　【南北朝】徐之才雷公藥對論遠志曰。殺天雄、附子、烏頭毒。煎汁飲之。【唐】甄權藥性本草論遠志曰。治健忘。安魂魄。令人不迷。堅壯陽道。【宋】日華諸家本草論遠志曰。長肌肉。助筋骨。婦人血噤失音。小兒客忤。【元】王好古湯液本草論遠志曰。治腎積奔豚。【明】李時珍本草綱目論遠志曰。治一切癰疽。【明】繆希雍本草經疏論遠志曰。遠志感天之陽氣。得地之芳烈而生。故無毒。亦陽草也。其菖蒲之流乎。其味苦溫。兼微辛。爲手少陰經君藥。兼入足太陰經。苦能洩熱。溫能壯氣。辛能散鬱。故主邪逆傷中。補不足。養性全神明。故除邪氣。陽主發散。故利九竅。心氣開通。則智慧自益。經曰。心爲君主之官。神明出焉。天君旣定。五官自明。故耳目聰明。不忘强志。陽氣盛。則力增長。男子屬陽。故利丈夫。定心氣。止驚悸。者心臟得補而實。故心氣定而驚悸止也。心火不妄動。則陽不妄舉。精不搖矣。故益精。心下膈氣。是心氣鬱而不舒也。皮膚中熱。面目黃者。濕熱在上部也。苦以洩之。溫以暢之。辛以散之。則二證自去矣。久服輕身不老。好顏色延年者。心主血。心氣足則血色華於面。君主强明。則十一官皆得職。故延年不老。陽氣日積。故身輕也。人之心臂。晝夜必交。心家氣血旺盛。則腎亦因之而實。腎藏精與志。腎實故志强也。【明】李士材本草圖解論遠志曰。遠志微溫味苦。腎經氣分藥也。强志益精。治善忘。蓋精與志。皆腎所藏者。精不足則志衰。不能上交於心。故善忘。精足志强。而善忘愈矣。壯陽固精。明目聰耳。長肌肉。助筋骨。理一切癰疽。破腎積奔豚。主治雖多。總不出補腎之功。或以爲心經藥則未也。甘草湯浸一宿。去心焙。【清】黃宮繡本草求眞論遠志曰。遠志辛甘而溫。入足少陰腎經氣分。强志益精。凡夢遺善忘。喉痺失音。小便赤濇。因腎水衰薄而致者。宜用是藥以補之。蓋精與志。皆藏於腎。腎氣充則九竅利。智慧生。耳目聰明。邪氣不能爲害。腎氣不足。則志氣衰。不能上通於心。故迷惑善忘。不能豁閉封藏。故精氣不固也。昔人治喉痺失音作痛。遠志末吹之。涎出爲度。非取其通腎氣而開竅乎。一切癰疽發背。從七情憂鬱而得。單煎酒服。其渣外敷。投之皆效。非苦以泄之。辛以散之之意乎。小便赤濇。用遠志、甘草、茯神、益智、爲丸。棗湯服。效。非取遠志歸陰。以爲嚮導之藥乎。但一切陰虛火旺。便濁遺精。喉痺癰腫。愼勿妄用。去心用甘草水浸一宿。曝乾焙用。

國外學說　日本學說謂遠志爲類於擄湟瓦之生藥。日本藥局方採用外國之擄湟瓦者。蓋因遠志之成分未詳故也。漢醫於祛痰利尿藥用之。遠志之成分。依藥學雜誌云。下山平野兩氏之研究成績。爲血色結晶樣之粉末。而稱之爲 Onsiain $C_{32}H_{52}O_{12}$。與擄湟瓦之成分 $C_{32}H_{52}O_{18}$ 稍異。猪子氏以コーベルト教授之所謂鉛法。試驗遠志。得檢明 Senegin 云。又擄湟瓦根、據藥學雜誌第九十一號所記云。凡二世紀以來。出現於藥物學上之生藥。今日尙占樞要之位置。雖蒙新藥之侵擊。亦不失其位置者甚不多。擄湟瓦根者。蓋藥物學上可敬愛之忠臣之一也。何則。今日尙有多數之局方採用之。可證其爲有效。其爲健胃劑。尤

661／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

數數稱用。就此生藥。始喚起世人之注意者。蘇格蘭之醫師テンチツト也『セチカ』之印度人種屬爲『クラツペル』蛇所咀時。用之此爲其起因。千七百三十四年及千七百三十五年。攝涅瓦於胸膜炎及肺炎。爲必需之藥品。可由試驗證明之。本根之成分。依從前散見於書籍者。列如左。(一)脂肪油及樹脂。(二)痕跡之揮發油。(三)糖分七%。(四)セチギン。(卽ザポニン)二至五%。(五)黃色素。(六)林檎酸鹽。澱粉。全缺乏。而依某藥物學云。貼本品於黏膜。則麻痺局處之神經及筋實。內服大量。則一時甚興奮。後至麻醉而死。適量則刺戟氣道。而發咳嗽。更增加黏液之分泌。醫治作用爲祛痰藥。用於炎性不烈之氣管枝炎及肺炎。用量自三・〇至八・〇。(水一〇〇・〇煎出)英美學說謂遠志產中國之山西河南及亞美利加等處。其根可入藥。此根爲英國醫士於雍正十三年得之於亞美利加。以其能治蛇毒。卽亞美利加之響尾蛇。故此草爲亞美利加之本草。其大半得之於西南方。每年用此根之數甚多。尋常出售之遠志根。束縛成捆。每捆五十磅至四百磅不定。其形色與氣味。遠志根塊之小者。細如鵝毛管。大者則粗如小指。色棕黃。其臭頗奇。在新鮮之根則臭更甚。味初覺淡。後則變爲苦與辛。惹喉。令口內多生津液。其作用爲化痰藥。有行血氣之性。蓋辛味之物。大率如此。能令大半津液多生。又能生口津。化痰發汗。利小便。調經。食其大服。則爲吐藥。與瓜蔞藥品中多用以治咳嗽。處方以遠志一分。細末。淡酒八分。先用酒六分浸二天。間時搖動。裝淋筒淋乾。加餘酒漂淋。用絞盤絞渣。過淋紙。再加淡酒仍足八分爲度。每服一錢至二錢。(遠志酒方)用量遠志末每服三分半至五分二釐半。又和漢藥考曰。販賣品有數種。日用藥品考云。日藥舖呼肉遠志或姬遠志者。柔潤。爲上品。呼鬼遠志者。硬而不潤。爲下品。呼朝鮮遠志者。大而硬。亦爲下品。間有售本國產者。其根細小。氣味極薄。實不堪用云。

近人學說　㈠賈九如曰。遠志味辛重大雄。入心開竅。宣散之藥。凡痰涎沃心。壅塞心竅。致心氣實熱。爲昏憒神呆。語言蹇澁。爲睡臥不寧。爲恍惚驚怖。爲健忘。爲夢魘。爲小兒客忤。皆以此豁痰利竅。使心氣開通。則神魂自寧也。又取其辛能醒發脾氣。治脾虛久困思慮鬱結。故歸脾湯中用之。及精神短少。竟有虛痰作孽。亦須量用。若心血不足。以致神氣虛怯。無痰涎可祛。卽考歸味辛尙宜忌用。況此大辛者乎。諸本草謂味辛潤腎用之。益精强志。不知辛重暴悍。戟喉刺舌。與南星半夏相類。經曰腎惡燥。烏可入腎耶。特爲訂誤。幸同志者辨之。㈡張山雷曰。遠志味苦入心。氣溫行血。而芳香清竅。又能通行氣分。其專主心經。者心本血之總匯。辛溫以通利之。宜其振作心陽。而益人智慧矣。古今主治。無一非補助心陽之功效。而李瀕湖獨謂其專入腎家。未免故爲矯異。張石頑和之。非篤論也。本經主疥逆。則苦泄溫通辛散。斯寒飲之咳逆自平。此遠志又有消痰飲止咳嗽之功。別錄去心下膈氣。亦卽此意。今東瀛醫者。專用以化痰止嗽。頗有奇功。而中醫多未知之。可謂數典忘祖。能不令人幽冷。惟外臺載古今錄驗。胸痺心痛一方中有遠志。顏合此旨。而張石頑反疑本經疥逆爲誤字。蓋亦未達其苦能泄化。溫能滌飲之旨。三因方治一切癰疽。最合溫通行血之義。而今之瘍科。亦皆不知。率貧好方。大是可惜。頤恒用於寒凝氣滯。痰澀入絡。發爲癰腫等證。其效最捷。惟血熱涇熱之毒。亦不必一例亂投。無分彼此耳。又曰。遠志辛溫。能利血之運行。而以爲心家補益之品者。振動而流利之。斯心陽敷布而不窒滯。此補心之眞旨也。然溫升之品。必不宜於實熱。如誤用於熱痰蒙蔽心包之證。得毋益張其熾。又所謂安魂魄。定驚悸者。亦謂補助心陽。則心氣充而魂夢自寧。驚悸自定。非養液寧神以安宅之者可比。如因熱生驚。及相火擾攘。而亦與以溫升。其弊亦與痰熱相等。又有遠志能交通心腎之說。則心陽不振。清氣下陷。及腎氣虛寒。不能上升

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者。以遠志之溫升。舉其下陷。而引起腎陽。本是正治。然俗人不察。每遇腎陽不藏。淫夢失精等證。亦曰此屬坎離之不交。須以遠志引之。使其水火交接。則相火愈浮。腎愈不攝。利九竅者。適以滑精竅。益精者。將反以失精矣。此不辨寒溫虛實。而徒讀古書之咎也。豈古人之欺吾哉。

配合應用　㊀遠志、茯神、人參、地黃、酸棗仁、丹砂、爲鎮心定驚要藥。

㊁治小兒心虛易驚。遠志、人參、白芍藥、酸棗仁、茯神、炙甘草、天竺黃、鉤藤鉤、加白檀香治一切驚及慢驚。

㊂治小兒急驚。遠志、茯神、天竺黃、鉤藤鉤、丹砂、金箔、眞珠、琥珀、膽星、犀角。

㊃治心氣弱。心血少。餒怯易驚。夢寐多魘。神不守舍。症仲健忘。失志陽痿。遠志、人參、柏子仁、酸棗仁、麥門冬、五味子、當歸、身、茯神、茯苓、益智仁、生地黃、甘草、沈香。

㊄遠志、茯神、人參、白朮、龍眼、酸棗仁、木香、炙甘草、能歸脾益智。

㊅入當歸六黃湯。能止陰虛盜汗。

㊆加甘草。治婦人血噤失音。小兒客忤。

㊇遠志一味煎酒。治一切癰疽發背。病從七情憂鬱惱怒而得者。服之皆愈。

㊈遠志酒治一切癰疽發背惡候。浸大有死血陰毒在中則不痛。傅之卽痛。有憂怒等氣積怒攻則痛不可忍。傅之卽不痛。或蘊熱在內。熱逼人手不可近。傅之卽清涼。或氣虛冷潰而不斂。傅之卽斂。此本韓大夫宅用以救人。方極驗。若七情內鬱。不問虛實寒熱。治之皆愈。用遠志不拘多寡。米泔浸洗。槌去心爲末。每服三錢。溫酒一盞。調澄少頃。飲其清。以滓敷患處。（陳言三因方）

㊉治心孔憒塞。多忘善誤。丁酉日密自至市買遠志。着巾角中。還爲末服之。勿令人知。（肘後方）

㊊治喉痺作痛。遠志肉爲末。吹之涎出爲度。（直指方）

㊋治腦風頭痛不可忍。遠志末嗑鼻。（宣明方）

㊌治吹乳腫痛。遠志焙研。酒服二錢。以滓傅之。（袖珍方）

㊍治小便赤濁。遠志、甘草水煮半斤。茯神、益智仁各二兩爲末。酒糊丸梧子大。每空心棗湯下五十丸。（普濟方）

用量　一錢至錢半。

施用宜忌　凡虛而無滯。及有實火者禁用。畏珍珠、黍蘆、薑、蠟、齊蛤、忌鐵。得茯苓、冬葵子、龍骨良。

著名方劑　定志丸。治目不能遠視。但能近視。（千金方）遠志、菖蒲各二兩。人參、茯苓各一兩。蜜丸。硃砂爲衣。

參攷資料　㊀遠志生大山及寃句川谷。四月採根。葉陰乾。（別錄）㊁寃句屬兗州濟陰郡。今此藥猶從彭城北蘭陵來用之。去心。取皮一斤。止得三兩爾。亦入仙方。用小草。狀似麻黃而青。（陶弘景）㊂今河陝洛西州郡亦有之。根形如薤。根黃色。苗似麻黃而青。又如畢豆葉。亦有似大青而小者。三月開白花。根長及一尺。泗州出者花紅。根葉俱大於他處。南州出者根又黑色。俗傳夷門出者最佳。四月採根曬乾。古方通用遠志小草。今醫但用遠志。稀用小草。（蘇頌）㊃按爾雅云。蕄繞棘薇。郭璞注云。今遠志也。似麻黃赤華。葉銳而黃。其上謂之小草。（掌禹錫）㊄遠志入足少陰腎經。非心經藥也。其功專於强志益精。治善忘。蓋精與志皆腎經之所藏也。腎精不足。則志氣衰。不能上通於心。故迷惑善忘。蠻樞經云。腎藏精。精合志。腎盛怒而不止。則傷志。志傷則喜忘。其前言腰脊不可以俛仰屈伸。毛悴色夭。又云。人之善忘者。上氣不足。下氣有餘。腸胃實而心肺虛。則營衛留於下。久之不以時上。故善忘也。陳言三因方。遠志酒治癰疽。云有奇功。蓋亦補腎之力爾。葛洪抱朴子云。陵陽子仲服遠志二十年。有子三十七人。能坐在立亡也。（李時珍）㊅遠志有大葉小葉二種。陶弘景所說者小葉也。馬志所說者大葉也。大葉者花紅。（李時珍）㊆此草服之能益智强志。故有遠志之稱。世說載謝安云。處則爲遠志。出則爲小草。記事珠謂之醒心杖。（李時珍）㊇本經言治咳逆傷

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中。詳遠志性溫助火。非咳逆所宜。當是嘔逆之誤。別錄云去心下膈氣。非嘔逆之類乎。按張氏之說。尚未完足。夫形寒飲冷則傷肺。人豈無寒咳。而須性溫助火之藥者乎。遠志於嘔逆固宜。而於咳逆亦合。且外國學說。遠志功用能化痰。可代西藥辛衣格。然則本經云主治咳逆。更可無疑矣。(張路玉)

【遠志肉】卽遠志之處方用名。詳『遠志』條。

【遠志葉】**主治**　益精。補陰氣。止虛損夢洩。

【遠近子】卽蔥麻子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蔥麻子』條。

【遠客】卽茉莉花之古籍別名。典見綱目。詳『茉莉花』條。

【酸母】㊀卽酢漿草之古籍別名。典見綱目。詳『酢漿草』條。㊁卽酸模之古籍別名。典見綱目。詳『酸模』條。

【酸石榴】**原名**　安石榴。**命名**　榴者瘤也。丹實垂垂如贅瘤也。故名。**古籍別名**　若榴(廣雅)丹若。(古今注)金罌。(綱目)三尸酒。

(道書)

基本　屬安石榴科。爲酸榴之果實。

形態　石榴爲落葉灌木。多自生暖地。或植於庭園。作賞玩之品。樹高七八尺至九尺餘。矮小者多作盆景。葉作長橢圓形。全緣平滑。有光澤。皆對生。梅雨之時。枝端著花。色朱紅。其形如筒。末端五裂至七裂。萼亦鮮紅。其數多於花瓣。每枝開花一朵至三朵。果實爲漿果。惟上端有萼緣。其大如橙。熟則果皮若革質。爲不規則之綻裂。種子充滿果實內。但有膜隔分。又略帶三角形。種子透明。色如石竹。有肉質多汁之外皮。味甘酸。供食用。此物變種頗多。花瓣有單瓣、重瓣之別。花色有紅、白、黃諸種。



酸石榴

採取　秋季採之。

用法　生搗取汁。或火煅存性。研末和藥。

性質　酸。溫。濇。無毒。

成分　石榴根皮及其枝幹皮中含有配來推林 Pelletierin $C_8H_{15}NO$ 一名普尼欽 Punicin 爲一種植物鹽基。無色或微黃。狀如油。有麻醉性臭氣。

效能　止瀉痢。療崩帶。專作收斂藥。

主治　赤白痢腹痛。連子搗汁。頓服一枚。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論石榴曰。止瀉痢。崩中帶下。【清】王士雄隨息居飲食譜論石榴曰。石榴甘酸溫澀。解渴析醒。多食損肺傷齒。助火生痰。最不益人。但供觀美而已。皮可染皂。

配合應用　㊀治腸滑久痢。黑神散。用酸石榴一個。煅煙盡。出火毒。一夜研末。仍以酸榴一塊。煎湯服。神效無比。亦治久瀉不止。(普濟方)

㊁治痢血五色。或膿或水。冷熱不調。酸石榴五枚。連子搗汁二升。每服五合。神妙。(聖濟總錄方)

㊂治小便不禁。酸石榴燒存性。無則用枝燒灰。代之。每服二錢。用

柏白皮切焙四錢。煎湯一盞。入榴灰再煎至八分。空心溫服。晚再服。(聖惠方)

㊃治撚鬚令黑。酸石榴結成時。就東南枝上揀大者一個。頂上開一孔。內水銀半兩於中。原皮封之。麻扎定。牛屎封護。待經霜摘下。傾出汚內水。以魚鱖籠指。蘸水撚鬚。久久自黑也。(普濟方)

用量　一枚至二枚。

施用宜忌　凡瀉痢初起而有實邪者禁用。

參攷資料　㊀榴受少陽之氣。而榮於四月。盛於五月。實於盛夏。熟於深秋。丹花赤實。其味甘酸。其氣溫濇。多食損肺齒而生痰涎。酸者則兼收斂之氣。故入斷下崩中之藥。或云白榴皮治白痢。紅榴皮治紅痢。亦通。(李時珍)㊁博物志云。漢張騫出使西域。得塗林安石國榴種以歸。故名安石榴。又按齊民要術云。凡種石榴者。須安僵石枯骨於根下。卽花實繁茂。則安石之名義。或取此也。若木及扶桑之名。榴花丹顏。似之。故亦有丹若之稱。傅玄榴賦所謂灼若旭日栖扶

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

桑者是矣。筆衡云。五代吳越王錢鏐改榴爲金罌。酉陽雜俎言榴甜者名天漿。道家書謂榴爲三尸酒。言三尸蟲得此果則醉也。故范成大詩云。玉池咽清肥三彭迹如掃。（李時珍）㈢石榴花赤可愛。故人多植之。尤爲外國所重。有甘酢二種。醫家惟用酢者之根。殼。榴子乃服食者所忌。（陶弘景）㈣榴五月開花。有紅黃白三色。單葉者結實。千葉者不結實。或結亦無子也。實有甜酸苦三種。抱朴子言苦者出積石山。或云卽山石榴也。酉陽雜俎言南詔石榴。皮薄如紙。瑣碎錄言河陰石榴。名三十八者。其中只有三十八子也。又南中有四季榴。四時開花。秋月結實。實方綻。隨復開花。有火石榴。赤色如火。海石榴高一二尺。卽結實。皆異種也。按事類合璧云。榴大如盂。赤色有黑斑點。皮中如蜂窠。有黃膜隔之。子形如人齒。淡紅色。亦有潔白如雪者。潘岳賦云。榴者天下之奇樹。九州之名果。千房同膜。千子如一。饑飢療渴。解醒止醉。（李時珍）㈤按諸花忌浇熱水。惟此花可以烈日中灌漑。併宜以童濁熱湯浇之。則益茂。但勿著鹹味耳。正月二十日分枝。則當年卽花。物性之難測如此。余幼時見業師王煖中先生善養此花。而人罕知其法。故附識以傳於世。（王士雄）

【酸石榴皮】　命名　本品卽酸石榴之皮。故名。

性質　酸。溫。澀。無毒。

效能　澀腸。染鬚。

主治　溏下。（取汁點目）筋骨風。腰脚不遂。步行攣急。疼痛。脫肛。瀉痢。漏精。下血。婦女崩中帶下。

【酸石榴根】　命名　本品卽酸石榴之根。故名。

性質　酸。溫。澀。無毒。

主治　口齒病。瀉痢。婦女帶下。染鬚。

【酸白芍】　卽白芍之處方用名。詳『白芍』條。

【酸杖】　卽虎杖之古籍別名。典見綱目。詳『虎杖』條。

【酸草】　原名　醜草。

產地　生名山醴泉之陰崖間。

形態　酸草爲雜草類之一種。莖有五棱。色青澤。根赤黃。可供藥用。

主治　輕身。延年。並可消玉。

【酸迷迭】　形態　酸迷迭草爲澤草類之一種。有赤白兩種。可供藥用。

主治　婦女赤白帶下。（赤帶用赤者。白帶用白者。搗汁和紹酒羹服。）

【酸桶】　卽鹽麩子之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鹽麩子』條。

【酸桶草】　卽虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『虎杖』條。

【酸梅草】　形態　酸梅草多生田隴間。春生莖葉小。色碧。可供藥用。

性質　酸。

主治　痰飲。（擦舌上取吐）

【酸惡】　產地　生水旁。

形態　酸惡爲水草類之一種。狀如澤瀉。可供藥用。

主治　惡瘡去白蟲。

【酸惡俞】　卽澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『澤瀉』條。

【酸棗】　㈠卽山查之古籍別名。典見百一選方。詳『山查』條。㈡卽酸棗仁。詳『酸棗仁』條。

【酸棗仁】　命名　本品形似棗而味酸。藥用核中之仁。故名。

處方用名　炒棗仁。生棗仁。

古籍別名　小者名棘實。（新修本草圖經）㤼仁。（爾雅）山棗仁。（綱目）調睡參軍。（和漢藥考）羊棗仁。（新本草）

外國名詞　Rhamnus Soperiforus. (Zizyphus Vulgaris.) (Buckthorn.)

基本　屬鼠李科爲酸棗之子仁。

產地　陳仁山藥物生產辨云。棗仁產直隸順德府。山東濟寧府。冬季出新。

形態　酸棗爲落葉灌木。生於山中。高四五尺。間達丈餘。處處有銳利之短刺。葉互生。爲卵圓形。或倒卵圓形。邊緣有鋸齒。葉柄短。葉脈現三大縱線。花作淡綠黃色。開五瓣。似棗之小花。果實爲球圓形之核果。大於棗實。生綠熟紅。有酸

665／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

味。供食用。然不及棗遠甚。種子堅硬碎之。中藏稍扁圓形之仁。採之供藥用。

採取　八月採實。陰乾四十日成。

製法　雷敩曰。凡使酸棗仁。以葉拌蒸半日。去皮尖。後人有炒用者。

性質　酸。平。無毒。

效能　補肝膽。寧心神。斂汗。醒脾。用爲健胃鎮靜。滋養安眠藥。

主治　心腹寒熱。邪結氣聚。四肢酸痛。溼痺。久服安五臟。輕身延年。（本經）煩心不得眠。臍上下痛。血轉。久洩。虛汗煩渴。補中。益肝氣。堅筋骨。助陰氣。能令人肥健。（別錄）

張仲景之證明　酸棗仁一味。經張仲景之實驗。認爲主治『胸腹煩燥。不能眠也。』茲考徵如下。

酸棗仁湯證曰。虛煩。不得眠。（爲則按虛煩當作煩燥。）（以上一方。酸棗仁用二升。）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論酸棗仁曰。筋骨風。炒仁研湯服。【明】經希雍本草經疏論酸棗仁曰。酸棗仁其實酸平。仁則兼甘。氣味勻齊。其性無毒。爲陽中之陰。入足少陽手少陰足厥陰太陰之經。專補肝膽。亦復醒脾。從其類也。熟則芳香。香氣入脾。故能歸脾。能補膽氣。故可溫膽。母子之氣相通。故亦主虛煩。煩心不得眠。其主心腹寒熱。邪結氣聚。及四肢酸疼酸痺者。皆脾虛受邪之病。脾主四肢。故也。膽爲諸臟之首。十一臟皆取決於膽。五臟之精氣。皆稟於脾。故久服之。功能安五臟。輕身延年也。別錄主煩心不得眠。臍上下痛。血轉。久洩。虛汗煩渴。補中。益肝氣。堅筋骨。助陰氣。能令人肥健者。緣酸證悉由肝膽脾三臟虛而發。膽主升。肝藏血。脾統血。三臟得補。久而氣增。氣增則滿。是故主如上功能也。【明】李士材本草圖解論酸棗仁曰。酸棗仁味酸性收。故其主治多在肝膽二經。肝虛則陰傷。而煩心不臥。肝藏魂。臥則魂歸於肝。肝不能藏魂。故目不得瞑。棗仁酸味歸肝。肝受養。故熟寐也。其寒熱結氣。痿痛溼痺。臍下痛。煩渴虛汗。何一非東方之症。而有不療者乎。世俗不知其用。誤以爲心家之藥。非其性矣。【清】黃宮繡本草求眞。論酸棗仁曰。酸棗仁甘酸而潤。仍有生熟之分。生則能導虛熱。故療肝熱。好眠神昏煩倦之症。熟則收斂津液。故療膽虛不眠。煩渴虛汗之症。本肝膽二經要藥。因其氣香味甘。故又能舒太陰之脾。按肝虛則陰傷。而心煩。而魂不能藏。是以不得眠也。故凡傷寒虛煩。多汗及虛人盜汗。皆炒熟用之。取其收斂肝脾之津液也。歸脾湯用以滋營氣。亦以營氣得養。則肝自藏魂而彌安。血自歸脾而臥見矣。其曰膽熱好眠。可療。因其膽被熱淫。神志昏冒。故似好眠。其症仍兼煩燥。用此以療熱。熱退則神清氣爽。又安有好眠之弊乎。但仁性多潤。滑泄最忌。縱使香能舒脾。難免澗不受滑矣。炒研用。【清】鄒澍本經疏證。論酸棗仁曰。古來於大棗、酸棗、棘刺棗仁。紛紛聚訟。或以爲酸棗即大棗之酸者。或以爲酸棗亦大木。或以爲嗽酸棗能醒睡。或以爲服棗仁。治不眠。殊不知皆是也。而皆非也。夫喬生曰棗。叢生曰棘。是一類二種。設使棗叢生。亦不得不爲棘。棘即養而大之。終不得爲棗。如橘年久則葉生刻而變爲枳。不聞枳得培植亦可變爲橘。物類之性固如是。耳試以本經大棗主治與酸棗主治較之。惟其喬生則氣力厚。惟其叢生。遂氣力薄厚則甘薄則酸。陰陽應象大論云。辛甘爲陽。酸苦爲陰。又曰味薄則洩。厚則通。氣薄則發洩。厚則發熱。故大棗主心腹邪氣。是振其中而使之外達。酸棗主心腹寒熱邪結氣聚。是疏其中而導之外洩。大棗主四支重。是助其經氣。使其轉接之間。阻礙不生。酸棗主四支痿疼溼痺。是鼓其經氣。使其轉接之間。留著解散。惟其力厚。則既助十二經之行。仍能使全氣內轉。故復補少氣少津液。身中不足。力薄則鼓蕩經氣。使外達。遂不能復歸。致衛氣行於陽。不得入於陰。此陶隱居謂嗽之能醒睡。不爲無故矣。由此觀之。本經酸棗主治。是酸棗之功能。非酸棗仁之功能。酸棗自醒睡。酸棗仁自治不眠。故本經於酸棗氣味上并不著仁字。而隱居亦不言嗽其

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

仁。可見別錄主治。乃酸棗仁之主治。卽其味甘而不酸可證也。杏爲心果。其仁入肺而宣氣。桃爲肺果。其仁入肝而宣血。則棗爲脾果。其仁入腎而宣水決矣。雖然棗仁用酸棗之仁。不用大棗之仁何也。蓋大棗補而仁則洩。酸棗洩而仁則補。別錄云。陳棗核中仁味苦燔之。主腹痛邪氣。酸棗仁則甘。以是酸棗仁之用。廣於大棗仁矣。煩心不得睡。水不上濟於心也。臍上下痛。水不宣而停於所治也。血轉久洩者。肝無所藉而不藏。虛汗煩渴者。心無所資而不潤。水氣能涵木。木得涵而筋骨遂堅。筋骨堅而陰氣有所守。陰氣有所守則陽亦充於外。而肌肉豐氣力優矣。心中煩不得臥。黃連阿膠湯主之。虛煩不得眠。酸棗仁湯主之。同是心煩。同是不寐。兩方無一味之同。豈不得臥不得眠有異耶。抑心中煩與虛煩固不同耶。夫寐證也。靜證無聲也。眠猶瞑也。泯也。泯泯無知也。臥猶息也。僵也。是寐者能臥。而未必安靜。眠者且能熟寐而無知。不得臥則或起或寢。幷不能安於牀席矣。於此見虛煩不得眠。雖亦靜證。但時多擾亂也。心中煩不得臥。則常多擾亂。且不得靜證矣。夫寐係心與腎相交。能靜證而時多擾亂。乃腎之陰不繼。不能常濟於心。常多擾亂。而不得靜證。乃邪火熾盛。縱有腎陰相濟。不給其燔。況一爲傷寒。本係急疾之病。且少陰病僅在二三日已上。其急疾抑又可想。一爲虛勞。則本緩疴虛證。故其治法瀉火滋陰。相去霄壤。一以阿膠雞子黃安心定血而外。幷主以苦燥之芩連。開陰之芍藥。一以酸棗仁茯苓啓水上滋而外。更益以甘潤之知母。開陽之萸肉。豈可同日語哉。故後世用酸棗仁諸方。始終只治不睡。幷無他歧相攙。乃立異者或以爲生用能醒睡。是牽合陶隱居之說。以簡要濟衆一方爲據。不知其方用酸棗仁止一兩。用蠟茱至二兩。且以生薑汁塗炙。是以茱醒醒。用酸棗仁爲反佐。若據此爲醒睡之典。則麻黃湯中有治中風自汗之桂枝。亦可謂爲止汗耶。或以爲酸棗仁治不寐。乃治邪結氣聚之不寐。是牽合本經之文。且謂未有散邪結氣聚之物。能使衞氣入臟。而就安寢者。不思仲景用酸棗仁湯。明明著虛勞虛煩不得眠之語。虛煩不得眠。猶可目爲邪結氣聚耶。虛勞亦豈邪結氣聚可成者耶。縱邪結氣聚。亦可成虛勞。則此不得眠且將與梔子豉湯證相比矣。若謂衞氣不得歸臟。又與半夏秫米湯相比矣。仲景又何別用酸棗仁湯爲哉。

近人學說　賈九如曰。棗仁仁主補。皮赤類心。用益心血。其氣炒香。化爲微溫。藉香以透心氣。得溫以助心神。凡志苦傷血用智損神。致心虛不足。精神失守。驚悸怔忡。恍惚多忘。虛汗煩渴。所當必用。又取香溫。以溫肝膽。若膽虛血少。心煩不寐。用此使肝膽血足。則五臟安和。睡臥自寧。如膽有實熱則多睡。宜生用。以平膽氣。因其味甘炒香。香氣入脾。能醒脾。陰用治思慮傷脾及久瀉者。皆能奏效。

配合應用　㈠治驚悸。幷一切膽虛易驚。酸棗仁、茯神、遠志、麥門冬、石斛、五味子、龍眼人參。㈡治病後膽虛不眠。用酸棗仁、加入溫脾湯。㈢治脾家氣血虛。自汗不眠。驚悸不嗜食。酸棗仁、加入歸脾湯。㈣治骨蒸不眠。心煩。用酸棗仁一兩。炒研。水二盞。研絞取汁。煮粥熟。下地黃汁一合。再煮勻食。（太平聖惠方）㈤凡服固表藥而汗不止者。用棗仁一兩。炒研。同地黃、白芍藥、麥冬、五味子、龍眼肉、竹葉煎服。多服取效。汗乃心液故爾。㈥治膽風沉睡。膽風毒氣。虛實不調。昏沉多睡。用酸棗仁一兩。生用。全蝎蠳茶二兩。以生薑汁塗炙。微焦爲散。每服二錢。水七分。煎六分。溫服。（簡要濟衆方）㈦治膽虛不眠。心多驚悸。用酸棗仁二兩。炒香。搗爲散。每服二錢。竹葉湯調下。加人參一兩。辰砂半兩。乳香二錢半。煉蜜丸服。（和劑局方）㈧治振悸不眠。胡洽方。酸棗仁湯。用酸棗仁二升。白茯苓、生白朮、人參、生甘草各二兩。生薑六兩。水八升。煮三升。（圖經本草方）㈨治虛煩不眠。深師方。酸棗仁

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

湯。用酸棗仁二升。蜈母、乾薑、茯苓、芎藭、各二兩。甘草炙一兩。以水一斗。先煮棗仁減三升。乃同煮。取三升分服。（圖經本草方）

㈡治骨蒸不眠。心煩。用酸棗仁一兩。水二盞。研絞取汁。下粳米二合。煮粥。候熟。下地黃汁一合。再煮勻食。（聖惠方）

㈢治睡中汗出。用酸棗仁、人參、茯苓等分。爲末。每服一錢。米飲下。（簡便方）

㈣治刺入肉中。酸棗核燒末。水服立出。（外臺祕要方）

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡有實邪鬱火者禁用。惡防己。

參攷資料　㈠本經用實。療不得眠。不用言仁。今方皆用仁。補中益肝。堅筋骨。助陰氣。皆酸棗仁之功也。（蘇恭）㈡按五代史後唐刊石藥驗云。酸棗仁睡多生使。不得睡。炒熟。陶云食之醒睡。而經云療不得眠。蓋其子肉味酸。食之使不思睡。核中仁服之療不得眠。正如麻黃發汗根節止汗也。（馬志）㈢酸棗實味酸性收。故主肝病。寒熱結氣。酸痺久泄。臍下滿痛之症。其仁甘而潤。故熟用療膽虛不得眠。煩渴虛汗之證。生用療膽熱好眠。皆足厥陰少陽藥也。今人專以爲心家藥。殊昧此理。（李時珍）㈣嵩陽子云。余家於滑臺。今酸棗縣即滑之屬邑也。其樹高數丈。徑圍一二尺。木理極細堅而且重。可爲車軸及匙筯等。其樹皮亦細而硬。文似蛇鱗。其棗圓小而味酸。其核微圓而仁稍長。色赤如丹。此醫之所重。居人不易得。今市人賣者皆棘子也。又云。山棗樹如棘。其子如生棗。其核如骨。其肉酸滑。好食。山人以當果。（陳藏器）㈤今近汴洛及西北州郡皆有之。野生。多在坡坂及城壘間。似棗而皮細。其木心赤色。莖葉俱青。花似棗花。八片。結實紫紅。似棗而圓小。味酸。當月採實。取核中仁。孟子曰。養其樅棘是也。嵩陽子言酸棗縣所出爲眞。今之貨者。皆是棘實。用者尤宜詳辨。（蘇頌）㈥天下皆有之。但以土產宜與不宜爾。嵩陽子言酸棗木高大。今貨者皆棘子。此說未盡。蓋不知小則爲棘。大則爲酸棗。平地則易長。居崖壅則難生。故棘多生崖壅上。久不樵。則成輳。人方呼爲酸棗。頁不言棘。其實一本也。此物纔及三尺。便開花結子。但科小者氣味薄。木大者氣味厚。今陝西臨潼山野所出者亦好。乃土地所宜也。（慈宗奭）㈦日本之有酸棗。始於享保中。係得自中國。以其仁入藥用。其後日本亦種之。（和漢藥考）㈧凡平地則易長大。居崖壅則難生。而其不長大者。名白棘。白棘多生於崖壅上。及至成長。其刺亦多。（和漢藥考）㈨酸棗樹高二三丈。枝葉頗似棗而美。圓如龍眼大。其核亦似棗核而圓。中國產之酸棗仁。形似棗仁而扁圓者。眞。日本所產。乃棗仁也。氣味形狀甚相近。無時間以代用。（和漢藥考）

【酸棗仁粥】　**基本**　本品係以酸棗仁和米煮成之粥。

主治　治煩熱。益膽氣。

【酸筍】　**性質**　酸涼。無毒。

主治　作湯食。止渴解醒。利腸。

參攷資料　酸筍出粵南。顧玠海槎錄云。筍大如臂。摘至。用沸湯泡去苦水。投冷井水中。浸二三日。取出。纖如絲繩。醋煮可食。好事者攜入中州。成罕物云。（李時珍）

【酸箕】　即酢漿草之古籍別名。典見李氏藥錄。詳『酢漿草』條。

【酸模】　**命名**　本品味酸。以味而名也。

古籍別名　山大黃。（拾遺）羊蹄。（爾雅）蕎。酸母。山羊蹄。當藥。（綱目）雞蘇。鷹舌。牛舌實。杜雞脚黃連。（和漢藥考）

外國名詞　Rumex acetosa, L.（拉丁）

基本　屬蓼科爲酸模之根。

產地　凡山野平原間恒有生焉。



酸模（一）

形態　酸模爲山野自生之多年生草本。莖高二三尺。似草狀羊蹄而小。葉爲長卵圓形。末端尖銳。脚部稍作箭形。抱莖而生。花雌雄

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

異株。色淡綠帶紅。小朵六瓣。叢簇而生。莖葉俱帶赤色。有酸味。嫩莖堪食。小兒採而生食之。山民燻莖葉。去其酸味。亦供食用。每株簇生細長之根。視羊蹄根爲輕。色紅黃。乾則現黑褐色。



酸模（二）

種類　羊蹄葉大而味苦。酸模葉小而味酸。

採取　葉茂時採。葉枯時採根。

性質　酸寒無毒。

成分　含有蓚酸鹽類、佩利索芬酸單寧酸等。

效能　殺蟲。治瘡。用治疥癬諸惡瘡藥。

主治　暴熱腹脹。生搗汁服。當下利。殺皮膚小蟲。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論酸模曰。治疥癬【唐】韓保昇蜀本草論酸模曰。療痢乃佳。【明】李時珍本草綱目論酸模曰。去汙斑。同紫苄搗擦數日即沒。

國外學說　荷蘭藥鑑曰。須用生葉根及其絞汁。乾則失其酸味。便無效。根葉均有酸味。宜擇而採之。清涼收斂。止血液之沸騰。解壯熱。潤燥渴。止煩渴。制惡毒。收縮脈管。治血液腐敗諸病。故以之用於壯熱、煩衝諸症。及膽液熱、腐敗熱。良驗。此藥有酸涼、疏解、清血之效。蕩滌血中之惡液。故以治惡液實諸病。及疥癬惡瘡等。俱稱妙藥。當以生根、葉水煎服。或作蔬菜食之。吐血、下血、痔血、赤痢。俱能止之。以其有涼解血熱之功也。絞生葉根汁。濾取上澄清者。或和入糖漿。白糖等。作熱病之清涼飲料。可以涼解壯熱。防護腐敗。

配合應用　瘰疬毒瘡。肉中忽生黯子。如粟豆大者。如梅李。或赤或黑。或青或白。其中有核。核有深根。應心腫。泡漿黑色。能爛筋骨。毒人臟腑。殺人。宜灸黯上百壯。以酸模葉薄其四面。防其長也。內服葵根汁。其毒自愈。（千金方）

用量　八分至錢半。

參攷資料　㈠蕨蕪乃酸模之音轉。酸模又酸母之轉。皆以味而名。與三葉酸母草同名。掌禹錫以蕨蕪爲蔓菁菜誤矣。（李時珍）㈡卽是山大黃。一名當藥。其葉酸美。人亦採食其英。爾雅食蕨蕪郭璞注云。似羊蹄而稍細。味酸可食。一名蓄也。（陳藏器）㈢所在有之。生山岡上。狀似羊蹄葉而小。黃莖葉俱細。節間生子。若莧蔚子。（大明）㈣食魚介鳥獸肉中毒。絞酸模葉汁飲之立愈。（和漢藥考）

【酸漿】　**古籍別名**　醋漿。（本經）燈籠草。（唐本草）苦蔵。苦耽。王母珠。洛神珠。（圖經）皮弁草。（食療本草）天泡草。小者名苦蠶。（綱目）姑嫂菜。（救荒）黃蕊。（爾雅）金鐙籠草。（俗名）蘵子。（古今注）

外國名稱　Physalis Alkekengi, L.（拉丁）ホホヅキ（日本）

基本　係茄科酸漿屬。藥用其苗葉莖根。

產地　在原野川澤間。

形態　酸漿爲溼草類之多年生草本。春自宿根生苗。高至二三尺。葉卵形。葉端尖。夏月開花。合瓣花冠白色。微帶綠。雄蕊五枚。與花冠裂片之數同。藥呈淡黃色。雌蕊一枚。結實爲漿果。赤色。包被於萼內。此萼帶赤色。在花後生長如囊狀。最爲美觀。



酸漿

性質　苦寒無毒。

主治　酸漿治熱煩滿。定志益氣。利水道。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論酸漿曰。搗汁服。治黃病多效。【唐】蘇恭新修本草論酸漿曰。燈籠草治上氣咳嗽。風熱明目。根莖花實並宜。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論酸漿曰。苦耽苗子。治傳尸伏連。鬼氣疰忤。邪氣腹內熱結。目黃。不下食。大小便澀。骨熱咳嗽。多睡。勞乏。嘔逆痰壅。痃癖。痞滿。小兒無辜。癮疹。寒熱。大腹。殺蟲。落胎。去蟲毒。並煮汁飲。亦生搗汁服。研膏傅小兒閃癖。【明】李士

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

材本草圖解論酸漿曰。酸漿味酸。平寒無毒。主熱除煩。通淋止崩。產難胎衣不下者。若吞其實即出。

近人學說　張山雷曰。酸漿之苗葉形色。頗與老鴉眼睛草近似。李瀕湖謂本是一類二種。但龍葵莖光無毛。五月以後開小白花五出。黃蘆結子無殼。累累然數顆同枝。子有帶蓋。生青熟紫黑。而酸漿則同時開小花。黃白色。紫心白蘆。其花如盃。無瓣而有五尖。結一五稜之鈴。一枝一顆。懸如燈籠。殼中一子。生青熟赤。庚辛玉冊謂燈籠草產於川陝者最大。葉似龍葵。結實有四葉盛之。如燈籠。河北呼爲酸漿。陶弘景謂酸漿之子作房。房中有子。大如梅李。黃赤色。著蓋。土宜不同。所產微異。嘉祐本草作苦耽。以其苗之味也。本經言其味酸辛平。主熱煩滿。定志益氣。利水道。產難吞其實。立產則亦寒涼泄熱滑利之功用。弘景謂搗汁服。治黃病。唐本草謂燈籠草。治上氣咳嗽。風熱明目。根莖花實並宜。嘉祐本草謂苦耽苗子。治鬼疰邪氣。熱結目黃。大小便澀。骨熱勞乏。嘔逆痰壅。瘧瘧。癖痞滿。小兒無辜疳瘧。大腹殺蟲。落胎去蟲毒。並煮汁飲。并生搗汁服。丹溪謂苦能除溼熱。輕能治上焦。主熱咳咽痛。故此草治熱痰之咳嗽。佛耳草治寒痰之咳嗽。瀕湖謂寒能除熱。故清肺除咳。滑能利溼。故降氣化痰。蘇頌謂其子除熱治黃。嘉祐謂其治骨蒸勞熱。尸疰瘕。痰癖熱結。與莖苗同功。然寒降滑泄。皆實熱者爲宜。中氣虛寒弗用。丹灶家以伏丹砂汞毒。亦清涼以制其剛烈也。

參攷資料　㈠燈籠草苦能除溼熱。輕能治上焦。故主熱咳咽痛。此草治熱痰咳嗽。佛耳草治寒痰咳嗽也。與片芩清金丸同用更效。（朱震亨）㈡酸漿利溼除熱。故清肺治咳。利溼。故能化痰治疸。一人病虛乏咳嗽有痰。愚以此加入湯中用之。效如神。（李時珍）㈢方士取汁煮丹砂。伏白礬。煮三黃煉消硫。（李時珍）㈣爾雅苦蔵寒漿也。郭璞注云。即今酸漿。江東人呼爲苦蔵。小者爲苦。蔵亦呼爲小苦耽。崔豹古今注云。酸一名醋子。實形如皮弁。其子圓如珠。（陳藏器）㈤酸漿以子之味名也。苦蔵、苦耽。以苗之味名也。燈籠、皮弁。以角之形名也。王母洛神珠。以子之形名也。按楊愼卮言云。本草燈籠草、苦耽、酸漿。皆一物也。修本草者。非一時一人。故重複耳。燕京野果名紅姑嬭。外垂絳囊。中含赤子如珠。酸甘可食。盈盈遶砌。與翠草同芳。亦自可愛。蓋姑嬭乃瓜瓤之訛。古者瓜姑同音。嬭囊之音亦相近耳。此說得之。故今以本經酸漿。唐本草燈籠草。宋嘉祐本草苦耽。俱爲一焉。（李時珍）㈥酸漿處處多有。苗似水茄而小。葉亦可食。子作房。房中有子。如梅李大。皆黃赤色。小兒食之。（陶弘景）㈦苦耽生故墟垣壍間。高二三尺。子作角如撮口袋。中有子如珠。熟則赤色。關中人謂之洛神珠。一名王母珠。一名皮弁草。一種小者名苦蔵。爾雅謂之黃藸。（掌禹錫）㈧龍葵、酸漿。一類二種也。酸漿苦蔵。一種二物也。但大者爲酸漿。小者爲苦蔵。以此爲別。敗醬亦名苦蔵。與此不同。其龍葵、酸漿。苗葉一樣。但龍葵莖光無毛。五月入秋開小白花。五出。黃蘆結子無殼。纍纍數顆。同枝子有帶。蓋生青熟紫黑。其酸漿同時開小花。黃白色。紫心白蘆。其花如盃狀。無瓣。但有五尖。結一鈴殼。凡五稜一枝。一顆懸如燈籠之狀。殼中一子。狀如龍葵子。生青熟赤。以此分別。便自明白。按庚辛玉冊云。燈籠草四方皆有。惟川陝者最大。葉似龍葵。嫩時可食。四五月開花結實。有四葉盛之。如燈籠。河北呼爲酸漿。據此及楊愼之說。則燈籠酸漿之爲一物。尤可證矣。唐愼微以三葉酸草附於酸漿之後。蓋不知其名同物異也。（李時珍）

【酸漿】卽漿水之古籍別名。典見綱目詳『漿水』條。

【酸漿子】**性質**　酸。平。無毒。

主治　熱煩。定志益氣。利水道。產難吞之立產。

歷代記述攷證　【宋】掌禹錫　嘉祐補註本草論酸漿子曰。治骨蒸勞熱。尸疰瘕瘦。痰癖熱結。與苗莖同功。【宋】蘇頌圖經本草論酸漿子曰。食之除熱。治黃病尤益小兒。

【酸漿草】卽酢漿草之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見圖經本草。詳『酢漿草』條。

【酸醋】卽醋之處方用名。詳『醋』條。

【酸榴皮】卽石榴皮之原名。詳『石榴皮』條。

【酸榴東行根】卽石榴根之原名。詳『石榴根』條。

【酸赭】卽地楡之古籍別名。典見別錄。詳『地楡』條。

【酸頭草】卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【酸漿】卽酸漿。詳『酸漿』條。

【銀牙】卽銀之未經煉者之古籍別名。典見綱目。詳『銀箔』條。

【銀朱】**命名**　本品係用水銀煉成紅色。故名。

處方用名　銀硃。

古籍別名　猩紅。紫粉霜。（綱目）

外國名詞　Hydrargyri Sulphidum Rubrum Levigatum（拉丁）（Vermillion.）（英）

基本　係礦石類。爲水銀鍊成之粉末。

形態　銀朱爲體重質細色赤之粉末。

製法　胡演丹藥祕訣云。升鍊銀朱用石亭脂二斤。新鍋內鎔化。次下水銀一斤。炒作青砂頭。炒不見星。研末。罐盛。石版蓋住。鐵線縛定。鹽泥固濟。大火煅之。待冷取出。貼罐者爲銀朱。貼口者爲丹砂。今人多以黃丹及礬紅雜之。其色黃黯。宜辨之。眞者謂之水華朱。每水銀一斤。燒朱一十四兩八分。次朱三兩五錢。

性質　辛。溫。有毒。

效能　劫痰。破積。殺蟲。治瘡。用作疥癬藥。又爲攻劫藥。

主治　破積滯。劫痰涎。散結胸。療疥癬惡瘡。殺蟲及虱。功同粉霜。

歷代記述攷證　【明】繆希雍本草經疏論銀朱曰。銀朱乃硫黃同汞升鍊而成。其性燥烈。過服能使人鬱爛筋攣。其味辛。氣溫有毒。亦能破積滯。散結。療癬疥惡瘡。殺蟲。不宜服食。今人多以黃丹礬紅雜之。不堪用。【清】黃宮繡本草求眞。論銀朱曰。銀硃與水銀同煅煉成硃。性燥昧辛。方書用以殺蟲治瘡。亦是以毒解毒而已。用以食服。古人切戒。謂其性悍烈。良非所宜。且同蜜煅燒之。則臭蟲絕跡。和雷肉熏之。則瘡疥枯頓。於此可徵其概矣。

配合應用　㈠治小兒內釣多啼。銀朱半錢。乳香、煨蒜各一錢。爲末。研丸。黍米大。半歲五丸。薄荷湯下。（全幼心鑑方）

㈡治男女陰毒。銀朱、輕粉各一錢。用五日獨蒜一枚。搗和作餅。貼手心。男左女右。兩手合定。放陰下。頃間氣回。汗出卽愈。但口中微有氣卽活。（唐瑤經驗方）

㈢治痰氣結胸。鶴頂丹不問陰陽虛實。服炒過陷胸湯心等藥。用銀朱半兩。明礬一兩。同碾。以熨斗盛火。瓦盞盛藥。鎔化。急括搓丸。每服一錢。眞茶入薑汁少許服之。心上隱隱有聲。結胸自散。不動臟腑。不傷眞氣。明礬化痰。銀朱破積。故也。（活幼全書方）

㈣治正水腫病。大便利者。銀朱半兩。硫黃煅四兩。爲末。麵糊丸。梧子大。每飲下三十丸。（普濟方）

㈤治咽喉疼痛。銀朱、海螵蛸末等分。吹之取涎。（急救良方）

㈥治火焰丹毒。銀朱調雞子清塗之。（李樓怪症方）

㈦治湯火灼傷。銀朱研細。菜油調傅二次愈。（多能鄙事方）

㈧治疽瘡發背。銀朱、白礬等分。煎湯溫洗。却用桑柴火遠遠炙之。日三次。甚效。（救急方）

㈨治魚脐丁瘡。四面赤。中央黑。銀朱水和丸。每服一丸。溫酒下。名走馬丹。（普濟方）

㈩治楊梅毒瘡。銀朱、官香、等分爲末。以紙卷作撚。點燈。置桶中。以鼻吸煙。一日一作。七日愈。又方。銀朱二錢。孩兒茶一錢。龍掛香一錢。皂角子一錢爲末。如上法用。又方。銀朱輕粉各一錢。黃蠟清油各一兩。化開和收。以油紙攤貼瘡痂自脫也。

⑪治筋骨疼痛。用猩紅三錢。枯礬四錢爲末。作三紙撚。每日以一撚藥油點火。熏腫破。覆臥之。取汗。（纂要奇方）

⑫治日久頑瘡不收者。銀朱一錢。千年地下石灰五分。松香五錢。香油一兩爲末。化攤紙上。貼之。亦治臁瘡不斂。（應急良方）

⑬治血風臁瘡。生脚股上。乃濕

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

毒成風也。黃蠟一兩。鎔化入銀朱一兩。攪攤紙上。刺孔貼之。（簡便方）

㊃治黃水濕瘡。銀朱鹽梅和搗傅之。（集玄方）

㊄治癬瘡有蟲。銀朱牛骨髓桐油調搽。（醫方摘要方）

㊅治頭上生虱。銀朱浸醋。日日梳頭。包銀朱紙以盆覆燒之。茶清洗下煙子。搽之。包頭一夜。至旦虱盡死。（積德堂方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無蟲積實結者禁用。

參攷資料　銀朱乃硫黃同汞升鍊而成。其性燥烈。亦能爛齦攣筋。其功過與輕粉同也。今廚人往往以之染色。供饌宜去之。（李時珍）

【銀池】卽蜜陀僧之古籍別名。典見藥物生產辨詳『蜜陀僧』條。

【銀耳】卽白木耳之處方用名。詳『白木耳』條。

【銀杏】卽白果之原名。詳『白果』條。

【銀花】卽金銀花之簡稱。詳『金銀花』條。

【銀花炭】卽金銀花煅炒成者之處方用名。詳『金銀花』條。

【銀花藤】卽忍冬藤之處方用名。詳『忍冬藤』條。

【銀花露】卽金銀露之處方用名。詳『金銀露』條。

【銀星石】卽金星石上有銀花斑點者之古籍別名。典見本草衍義。詳『金星石』條。

【銀星礬石】卽礬石上有銀星者之古籍別名。典見綱目。詳『礬石』條。

【銀柴胡】**命名**　本品係出於銀州而色白故名。

外國名詞　Bupleurum

產地　陝西甯夏鎮。山西大同府皆產之。

性質　甘。微寒。無毒。

主治　勞熱骨蒸。勞瘧。熱從髓出。小兒五疳羸熱。

歷代記述攷證　【明】繆希雍本草經疏論銀柴胡曰。柴胡有二種。一種色白黃而大者。名銀柴胡。專用治勞熱骨蒸。色微黑而細者。用以解表發散。本經並無二種之說。功用亦無分別。但云銀州者爲最。則知其優於發散。而非治虛熱之藥明矣。本草匯柴胡產銀夏者。色微白而韌。爲銀柴胡。用以治勞瘧骨蒸。以黃牯牛溺浸一宿。曬乾治勞熱誠驗。【清】黃宮繡本草求眞。論銀柴胡曰。銀柴胡味甘微寒。無毒。功用等於石斛。皆能入胃而除虛熱。但石斛則兼入腎。濟氣固筋骨。此則入腎涼血之爲異耳。故和劑局方用此治上下諸血及於虛勞方中。參入同治。如肝癆之必用此爲主。且不類於北胡。蓋北胡能升少陽清氣上行。此則氣味下達。與彼迥不相符。若用北胡以治虛癆。則咳嗽發熱愈無寧日。可不辨而混用乎。出銀州者良。故以銀胡號之。

近人學說　張山雷曰。銀柴胡。古以銀州產者爲勝。宋之蘇頌已有是說。陳承亦謂銀夏者最良。然雖有其說。而尚未分用。故瀕湖綱目仍未顯爲區別。仲醇經疏則已稱俗有二種。色白黃而大者。爲銀柴胡。以治勞熱骨蒸。色微黑而細者。韌者。爲北柴胡。以解表發散。然經氏又謂其優於升散。而非治虛熱之藥。至張石頑逢原。乃特出銀柴胡一種。稱其甘而微寒。清熱而能涼血。謂和劑局方治上下諸血。龍腦雞蘇丸中用之。凡入虛勞方中。惟銀州者爲宜。北柴胡則升動虛陽。發熱喘嗽。愈無寧孚。不可混用。且又謂本經推陳致新。明目益精。皆指銀夏產者而言。其推崇銀柴胡可謂極至。今之二種分用者。蓋卽石頑提倡之力。而以今之功用言之。治虛熱骨蒸。自有實效。斷非北柴胡之升陽泄汗可比。然則古人謂柴胡爲虛勞之藥者。亦指銀柴胡言之也。趙恕軒綱目拾遺。謂熱在骨髓。非銀柴胡莫療。用以治虛勞肌熱骨蒸。勞瘧熱從髓出。及小兒五疳羸熱。蓋退熱而不苦泄。理陰而不升騰。固虛熱之良藥。苟勞怯而未至血液枯絕。以此清理虛火之爆灼。再合之青陰補脾。尙可徐圖挽救。非北柴胡之發泄者所可同日語也。

辨僞　㈠鄭肯巖曰。銀柴胡味淡。蘆頭又大。不知何物僞充。按銀柴胡以銀州及甯夏出者爲勝。氣

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

味甘微寒無毒。薔長尺餘。色微白。力弱於北柴胡。即銀州之鞕柴胡。專治骨蒸勞熱。不但清熱。兼能凉血。和劑局方治上下諸血。龍膽雞蘇丸中用之。凡入虛勞方中。最爲相宜。用者須購眞銀柴胡爲要。㊀曹炳章曰。按銀柴胡陝西甯夏府甘肅州及山西大同府皆產。還肥大堅實。色白鞕糯。無沙心者爲佳。僞者尙無。又按經疏云。柴胡有二種。一種色白而大者。名銀柴胡。蓬原云。銀柴胡野州者良。今延安五原城所產者。長尺餘。肥白而軟。百草鏡云。出陝西甯夏。二月採葉。名芸蒿。長尺餘。根微白。即銀柴胡。藥辨云。銀柴胡出甯夏。形似黃耆。參合諸說。與近今市肆所備。亦相符合。據余實驗。凡治虛勞肌熱。骨蒸勞熱。熱從髓出。及小兒五疳羸熱。用之頗效。若用北柴胡。則升動虛陽。發熱喘咳。嗽愈無寧乎。周一士云。熱在骨髓者。非銀柴胡莫瘳。前人有不識藥品之形態。往往妄評銀柴胡爲贋物。豈可不辨。以淆惑後人。而使無從遵循乎。

用量　八分至錢半。

參攷資料　㊀今關陝江湖間近道皆有之。以銀州者爲勝。二月生苗。甚香。莖青紫。堅硬。微有細線。葉似竹葉而稍緊小。亦有似斜蒿者。亦有似麥門冬葉而短者。七月開黃花。根淡赤色。似前胡而强生。丹州者結青子。與他處者不類。其根似蘆頭。有赤毛如鼠尾。獨窠長者好。（蘇頌）㊁翁有良云。銀柴胡產銀州者佳。有二種。但辨形如鼠尾。與前胡相等。查前胡與柴胡相類。皆以西北出產者爲勝。形既相同。當以湖廣古城柴胡爲準。今銀柴胡粗細不等。大如拇指。長數尺。形不類鼠尾。又不似前胡。較本草不對。治病難分。兩用究非的確。用者詳之。㊂銀州柴胡。鞕而白。北產亦有白色者。今人以充白頭翁。此種亦可謂銀柴胡。蓋銀指色言。不指地言。猶金銀花白色者。曰銀花是也。銀柴胡原有西產北產之分。不必定以銀夏者爲銀柴胡也。然入藥以西產者勝。（金御乘）㊃羅元英談藪云。張知閎久病癉熱。時如火。年餘骨立。醫用茸附諸藥。熱益甚。召醫官孫琳診之。琳投柴胡湯一帖。熱減十之九。三服脫然。琳曰。此名勞癉。熱從髓出。加以劑劑。氣血愈虧。安得不瘦。蓋熱有在皮膚。在臟腑。在骨髓。非柴胡不可。若得銀柴胡。只須一服。南方者力減。服故三服乃效也。（李時珍）

【銀紅】　即硃砂之別名。詳『硃砂』條。

【銀芧】　即野芧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『野芧麻』條。

【銀茄】　即茄子之古籍別名。典見圖經本草。詳『茄子』條。

【銀屑】　即銀箔之原名。詳『銀箔』條。

【銀桂】　即木犀白花者之別名。詳『木犀』條。

【銀桃】　即桃之古籍別名。典見綱目。詳『桃』條。

【銀煖】　即銀鎖之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『銀鎖』條。

【銀箏】　即銀牙。詳『銀箔』條。

【銀粉】　即輕粉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『輕粉』條。

【銀茶匙】　即兎耳一枝箭之古籍別名。典見百草鏡。詳『兎耳一枝箭』條。

【銀條德里】　即山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。

【銀硃】　即銀朱之處方用名。詳『銀朱』條。

【銀蛇】　即金蛇之古籍別名。典見綱目。詳『金蛇』條。

【銀魚】　即鱠殘魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱠殘魚』條。

【銀貂】　即貂鼠皮毛白色者之古籍別名。典見綱目。詳『貂鼠』條。

【銀華】　即白石英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白石英』條。

【銀釉】　即銀鎖之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『銀鎖』條。

【銀脚鸂鶒】　即望江青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『望江青』條。

【銀鼠】　即鼬鼠作白色者之古籍別名。典見綱目。詳『黃鼠』條。

【銀箔】

原名　銀屑。

命名　本品生石鉢中。狀如硬錫者曰生銀。採得生銀。以鉛再三煎煉而成者曰熟銀。其以銀屑而製成箔可以入藥者曰銀箔。

處方用名　紋銀。銀薄。

古籍別名　白金。鏹（爾雅）。鋑。

673／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

阿路巴(說文)(梵書)銀牙。(綱目)山凝白衣。白物。白貴。白鑞。白邏丹精。朱提。金妃。龍鬚。女石下水。(和漢藥考)

外國名詞　Argentum.(拉丁) Silver.(英) Silber.(德)

形態　銀爲有光輝白色之金屬。置空氣中不變化。然置於含有硫化水素之氣中。則逐漸變黑。富有引伸。延展兩性。入硝酸。卽液解。

種類　㈠自然銀。在古層之石脈中。如毛。如線。如苔蘚。如樹枝。如板片。間有成結晶形者。爲銀白色。或微帶他色。斷面作鋸齒狀。有引伸。延展兩性。略減。硬度二・五比重一〇・四。其中常含有銅、鐵、金等質。㈡輝銀鑛。一名光銀鑛。在火山岩及凝灰岩中。間有暗灰色之結晶大半如毛。如線。如齒。如樹枝。條痕現灰黑色。延展性略減。硬度二・〇至二・五。比重七・〇至七・五。鑛中有銀及硫黃。Ag_2S 此採銀之佳鑛也。㈢脆銀鑛。一名輝銀安鑛。爲六角之板狀結晶。色黑。有金剛光澤。斷面作鋸齒狀。或貝殼狀。條痕現黑色。硬度二・〇至二・五。比重六・二。此鑛成於銀、安質母尼與硫黃 Ag_5Sb_4。㈣紅銀鑛。此鑛有明暗二種。明者名淡紅銀鑛。爲朱紅色之鑛石。條痕現紅色。或黃色。硬度二・五比重五・五。成於銀、砒、硫黃 $Ag_3As_3S_3$。暗者名深紅銀礦。有黑色稜角。透過赤色之鑛石。條痕現紫黑色。硬度二・〇至二・五。比重五・八。成於銀、安質母尼與硫黃 Ag_3SbS_3。二者皆謂之紅質銀。㈤角銀。南美及墨西哥爲其主產地。爲似蠟之鑛石。色灰。或灰綠。質如角。無光澤。成於銀與鹽素 $AgCl$ 乃硫化銀之變體也。

製法　陶弘景曰。醫方鎮心丸用之。不可正服。爲屑。當以水銀研令消也。蘇恭曰。方家用銀屑。取現成銀薄。以水銀消之。爲泥。合消石及鹽研爲粉。燒出水銀。淘去鹽石。爲粉。極細用之。乃佳。不得只磨取屑耳。李時珍曰。入藥只用銀薄。易細。若用水銀鹽消制者。反有毒矣。龍木論謂之銀液。又有錫薄可僞。宜辨之。

性質　辛。平。有毒。

效能　鎮心神。定驚悸。祛風熱。治癲癎。明目。安胎。用作解熱解毒藥。

主治　安五臟。定心神。止驚悸。除邪氣。久服輕身長年。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論銀屑曰。定志。去驚癎。小兒癲疾狂走。【唐】李珣海藥本草論銀屑曰。銀薄堅骨。鎮心明目。去風熱癲癎。入丸散用。

國外學說　新藥百品考曰。生銀(第五十六品)銀鑛常含有銅或金。精鍊之法有種種。或將酸化銀熾紅提鍊。或以硫酸鐵分析硫酸銀。其功用頗有可疑。有用之腹痛者。恐係混有銅質故也。專治黴毒。用法。以〇・〇一二・至〇・〇六。製爲丸或錠服之。外用塗敷舌上。每次用〇・〇一五。製造輭膏。以銀〇・六至一・〇。和脂四錢。調製而成。又和漢藥考曰。精鍊銀質之法有數種。近時將方鉛鑛黃銅鑛用電氣分解法。鍊得其中所含之銀。而以鉛、銅爲其副產物。於精鍊銀質之銀鑛中。和入鉛鑛。使在爐內一併熔化。製成含銀鉛。再用灰吹法。將鉛酸化。復除去之。則得純銀。或將含銀鉛熔化。候冷。鉛之結晶較速。則反覆除去之。迨鉛所存無多。續用灰吹法。收採純銀。鍊角銀法。可和入鐵片、水銀。再用阿瑪爾加謨法。收採純銀。

配合應用　㈠治妊娠腰痛如折者。銀一兩。水三升。煎二升。服之。(子母祕錄方)

㈡治胎動欲墮。痛不可忍。銀五兩。苧根二兩。清酒一盞。水一大盞。煎一盞。溫服。(婦人良方)

㈢治胎熱橫悶。生銀五兩。葱白三寸。阿膠炒半兩。水一盞。煎服。亦可入糯米作粥食。(聖惠方)

㈣治風牙疼痛。紋銀一兩。燒紅淬燒酒一盞。熱漱飲之。立止。(集簡方)

㈤治口鼻瘡蝕。穿脣透頰。銀屑一兩。水三升。銅器煎一升。日洗三四次。(聖濟總錄方)

㈥治身面赤疵。常以銀揩令熱。久久自消。(千金方)

用量　銀箔三分至八分。紋銀三錢至八錢。

施用宜忌　凡非實熱者禁用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

長黃連甘草飛廉石亭脂礜石羊血馬目毒公慈石惡鍚忌生血。

參攷資料　㈠銀屑葛洪肘後方。治癰腫五石湯中用之。（蘇頌）㈡本草言銀屑有毒。生銀無毒。釋者略漏不言。蓋生銀已發於外。無蘊鬱之氣。是以無毒。鉛銀蘊於石中。鬱結之氣。全未敷暢。故有毒也。（寇宗奭）㈢此說非矣。生銀初煎出如糝。理乃其天眞。故無毒。鎔者投以少銅。則成絲文。金花銅多則反敗。銀去銅則復還銀而初入少銅。終不能出。作僞者又制以藥石鉛鍚。且古法用水銀煎消制銀薄。成泥入藥。所以銀屑有毒。銀本無毒。其毒則諸物之毒也。今人用銀器飲食。遇毒則變黑。中毒死者。亦以銀物探試之。則銀之無毒可徵矣。其入藥亦是平肝鎭怯之義。故太清服鍊書言銀稟西方辛陰之神。結精爲質。性剛戾。服之能傷肝是也。抱朴子言銀化水服。可成地僊者。亦方士謬言也。不足信。（李時珍）㈣爾雅白金謂之銀。其美者曰鏐。說文云。銀白金也。梵書謂之阿路巴。（李時珍）㈤生銀出饒州樂平諸坑。銀鉚中狀如硬錫。文理粗錯。自然者眞。（馬志）㈥銀在鉚中。與銅相雜。土人採得。以鉛再三煎鍊方成。故爲熟銀。生銀則生銀鉚中狀如硬錫。其金坑中所得。乃在土石中滲漏成條。若絲髮狀。土人謂之老翁鬚。極難得。方書用生銀。必得此乃眞。（蘇頌）㈦按南越志。波斯國有天生藥銀。用爲試藥指環。又燒朱粉鬱下。多年沈積。有銀號盃鉛銀。光輭甚好。與波斯銀功力相似。祇是難得。今時燒鍊家每一斤生鉛。只得一二銖。山海經云。東北樂平郡堂少山出銀甚多。黔中生銀。體硬不堪入藥。（李珣）㈧閩浙荊湖饒信廣滇黃州交趾諸處山中皆產銀。有鉚中鍊出者。有沙土中鍊出者。其生銀俗稱銀箏銀牙者也。亦曰出山銀。獨孤滔丹房鏡源所謂鉛坑中出褐色石。形如箏。打破卽白。名曰自然牙。曰自然鉛。亦曰生鉛。此有變化之道。不堪服食者是也。管子云。上有鉛。下有銀。地饒圖云。山有葱。下有銀。銀之氣。入夜正白。流散在地。其精變爲白雄雞。寶藏論云。銀有十七種。又外國四種。天生牙生銀坑內石縫中。狀如亂絲。色紅者上。入火紫白如草根者次之。衙黑石者最奇。生樂平鄱陽產鉛之山。一名龍牙。一名龍鬚。是正生銀無毒。爲至藥根本也。生銀生石鉚中成片塊。大小不定。狀如硬錫。母砂銀生五溪丹砂穴中。色理紅光。黑鉛銀得子母之氣。此四種爲眞銀。有水銀銀草。砂銀曾青銀。石線銀雄黃銀。雌黃銀。硫黃銀。膽礬銀。鷹草銀。皆是以藥制成者。丹陽銀。銅銀。鐵銀。白鍚銀。皆以藥點化者。十三種皆假銀也。外國四種。新羅銀。波斯銀。林邑銀。雲南銀。並精好。（李時珍）㈨按方勺泊宅編云。黃銀出弱中。色與金無異。但土石則白色。熊太古冀越集云。黃銀絕少。道家言鬼神畏之。六帖載唐太宗賜房元齡帶云。世傳黃銀。鬼神畏之。春秋運斗樞云。人君乘金德而生。則黃銀見。世人以鍮石爲黃銀非也。鍮石卽藥成黃銅也。（李時珍）㈩烏銀今人用硫黃熏銀再宿鴆之。則色黑矣。工人用爲器養生者。醴飲之。長年辟惡。（陳藏器）

【銀膏】　命名　本品係白鍚和銀薄與水銀合成之光明如銀。凝硬如膏。故名。

性質　辛。大寒。有毒。

主治　熱風心虛驚悸恍惚。狂走。腸上熱。頭面熱。風衝心上下。安神定志。鎭心明目。利水道。治人心風健忘。亦補牙齒缺落。

【銀薹】　卽水仙之日本別名。詳『水仙』條。

【銀鋪】　古籍別名　銀釉。銀焰。（綱目拾遺）

基本　本品卽銀鋪中鎔銀罐底所餘之黑滓。

主治　瘰癧癬。取盛磁盤內安置。露天將盤微側。使鋪粘露。有水流下。抓破取塗之。

配合應用　㈠治一切無名腫毒。癬瘡痔漏。發背疔瘡。用銀鋪一斤。黑芝麻油二斤。先將鋪浸油內。浸十日。敲碎。同油煎至四五分熟。以綿袋濾去鋪。入炒過飛東丹一斤。熬成膏。一貼卽愈。（內府萬應膏方）㈡治馬刀瘰癧。及鼠瘡已潰者。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用銀鋌子四兩。搥碎。黃丹八兩。飛淨。香油二十兩。用砂鍋盛油。待油溫熱。卽入鋌子桃柳桑槐棗五枝攪之。候起珍珠花。撈去渣。濾淨後將油下鍋。慢慢將黃丹篩入油內。仍以五枝不住攪之。以滴水成珠爲度。取出收貯。用時勿見火。於重湯炖化。攤貼用之。（五靈膏方）

參攷資料　凡銀入罐。必多用硝及硼砂黃砂。以去鉛銅雜質。沉於罐底。其上則爲十足之紋銀。罐底所餘之黑色滓渣。名謂鉛。有毒不可食。食則能墜人腸。急用黃泥水服二茶盞。可解。或每日用飴糖四兩。作小丸。不時以芝麻油吞下。俱可瀉其毒。須服至百日外無患。或用烏梅湯灌之。卽解。或用帶皮綠柿連吃數十枚。冬日吃柿餅炙菇汁可解。（綱目拾遺）

【銀剪刀】卽玉如意之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉如意』條。

【銀薄】卽銀箔之處方用名。詳『銀箔』條。

【銀黝】卽銀錆。詳『銀錆』條。

【銀鮎趾】卽老鴉蒜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『老鴉蒜』條。

【銀鑾】卽鑾之毛白色者之古籍別名。典見綱目。詳『鑾』條。

【銀礦石】卽礦石之處方用名。詳『礦石』條。

【銀鱸】卽鱸魚之白色者。功用較尋常鱸魚爲良。

【銅末】卽銅屑之古籍別名。典見綱目。詳『銅屑』條。

【銅皮鐵骨】卽昭參外皮青黃。內肉青黑色質堅重者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『昭參』條。

【銅花】卽銅屑之古籍別名。典見綱目。詳『銅屑』條。

【銅青】　**命名**　本品係銅鏽衣。色青綠。故名。

處方用名　銅綠。粉。銅青末。

古籍別名　銅綠。（綱目）

基本　係礦石屬。爲銅之鏽衣。

產地　陳仁山藥物生產辨云。銅青係由廢銅久貯鹹溼地方。發霉而成。各處均有。銅青餅由舊銅與酸醋製出之。顏料店均有沽。

形態　銅爲金屬化學原質之一。色紅機。若在含炭氣之潮溼空氣中腐蝕之。則變生青綠色之鏽衣。成爲炭酸銅。其鏽衣卽名銅青、銅綠。質鬆不堅。狀如粉末。

製法　或置銅於溼地。或塗醋於銅上。使生綠後刮取。或淘取晒乾用。但市肆以枯礬和青藍而成。不可用。

用法　恒以剉研和作丸散。

性質　酸。平。微毒。

效能　祛風。痰。治惡瘡。明目。殺蟲。用作瘡毒藥。又作祛痰。蝕腐藥。

主治　婦人血氣心痛。合金瘡止血。明目。去膚赤息肉。

歷代記述攷證　【南北朝】徐之才雷公藥對論銅青曰。主風爛眼淚出。【明】李時珍本草綱目論銅青曰。治惡瘡瘡。吐風痰。殺蟲。【明】李士材本草圖解論銅青曰。銅青酸走厥陰。主吐利風痰。明目祛瘡殺蟲。服之最能損血。宜酌之。【清】黃宮繡本草求眞論銅青曰。銅青卽俗所云銅綠者是也。與空青所產不同。銅青氣稟地陰。英華外見。蓄醋結成。故味酸苦澁。氣寒。能入肝膽二經。按酸入肝而斂。所以能合金瘡止血。苦寒能除風熱。所以能去膚赤及鼻瘡肉。苦能洩結。所以醋醃喉中。則吐風痰而使血氣心痛皆止。爲散能療喉痺牙疳。醋調搽肢下。治胡臭。臺汁調點爛弦風眼。去瘡殺蟲。所治皆厥陰之病。

配合應用　㈠治風痰卒中。碧林丹。治痰涎潮盛。卒中不語。及一身風癱。用生綠二兩。乳細。水化去石。慢火熬乾。再研。入麝香一分。糯米粉糊和丸。彈子大。陰乾。卒中者每丸作二服。薄荷酒研下。餘風疹砂酒化下。吐出青碧涎。瀉下惡物大效。又治小兒用綠雲丹。銅綠不計多少。研粉。醋麵糊丸。芡子大。每薄荷酒化服一丸。須臾吐涎。（經驗方）

㈡治爛弦風眼。銅青水調塗盌底。以艾熏乾。刮下塗爛處。（衞生易簡方）

㈢治赤髮禿落。油磨銅錢末塗之。卽生。（普濟方）

㈣治面黯黑痣。以草劃破銅綠末傅之。三日勿洗水。自落。厚者再上之。（聖濟總錄方）

㈤治走馬牙疳。銅青、滑石、杏仁、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

等分爲末。搽之立愈。（邵眞人經驗方）

㊎治口鼻疳瘡。銅青、枯礬等分研傅之。又方。人中白一錢。銅綠三分研傅之。

㊐治楊梅毒瘡。銅綠醋煮研末。燒酒調搽。極痛出水。次日卽乾。或加白礬等分。研摻。（簡便方）

㊑治臁瘡頑癬。銅綠七分。研黃蠟一兩。化熬。以厚紙拖過。表裏別以紙隔貼之。出水妙。亦治楊梅瘡毒及蟲咬。

㊒治諸蛇蠆毒。銅青傅之。（千金方）

㊓治百蟲入耳。生油調銅綠滴入。（衞生家寶方）

㊔治頭上生虱。銅青、明礬末摻之。（摘玄方）

用量　五分至八分。

施用宜忌　凡無實邪者禁用。

參攷資料　㊀銅青乃銅之液氣所結。酸而有小毒。能入肝膽。故吐利風痰。明目殺疳。皆肝膽之病也。抱朴子云。銅青塗水入水不腐。（李時珍）㊁生熟銅皆有青。卽是銅之精華。大者卽空綠。以次空青。銅青則是銅器上綠色者。淘洗用之。（陳藏器）㊂近時人以醋制銅生綠。收取曬乾貨之。（李時珍）㊃銅綠係酸水與銅相遇而生。外用能殺毒。或用銅綠細末灑瘡上。殺浮肉良。（內科新說）㊄銅綠不但有去腐之功。並有防腐之性也。（盧鵬飛）

【銅青末】卽銅青之處方用名。詳『銅青』條。

【銅砂】卽銅屑之古籍別名。典見綱目。詳『銅屑』條。

【銅吮魚】卽鰄魚之古籍別名。典見臨海志。詳『鰄魚』條。

【銅屑】**命名**　銅與金同。故字从金而名銅。入藥用其屑。故名銅屑。

古籍別名　銅落。銅末。銅花。銅粉。銅砂。（綱目）

形態　銅爲金類金屬原質之一。其色慢紅。性能伸展延長。又能傳熱及電。近時常以製鍋及電線諸物。所謂銅屑者。卽打赤銅時落下之細屑也。可供藥用。

製法　凡使或用打銅落下之屑。或以銅火煆淬水中。其屑亦自落下。以水淘淨用。好酒入沙鍋內炒。見火星取出。研末用。

性質　苦。辛。微毒。

主治　賊風反折。慇使極熱。投酒中服五合。日三。或以五斤燒赤。納二斗酒中。百遍。如上服之。又治腋臭。以醋和如麥飯。袋盛。先刺腋下脈去血。封之神效。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論銅屑曰。明目治風眼。接骨續筋。療女人血氣及心痛。【明】李時珍本草綱目論銅屑曰。同五倍子能染鬚髮。

參攷資料　㊀蒼耳能粉銅。巴豆牛脂能軟銅。慈姑乳香能啞銅。此物性然也。（李時珍）㊁赤銅屑主傷寒。能銲人骨及六畜有損者。細研酒服。直入骨損處。六畜死後。取骨視之。猶有銲痕可驗。打熟銅不堪用。（陳藏器）㊂朝野僉載云。定州崔務墜馬折足。醫者取銅末和酒服之。遂痊。及亡後十年改葬。視其脛骨折處。猶有銅束之痕也。（唐愼微）

【銅粉】卽銅屑之古籍別名。典見綱目。詳『銅屑』條。

【銅勒】卽膽礬之古籍別名。典見吳普本草。詳『膽礬』條。

【銅黃】卽藤黃之訛。詳『藤黃』條。

【銅落】卽銅屑之古籍別名。典見綱目。詳『銅屑』條。

【銅皷草】**形態**　銅皷草爲雜草類之一種。結實如瓜。可供藥用。

主治　瘴毒。

【銅綠】卽銅青之古籍別名。典見綱目。詳『銅青』條。

【銅綠粉】卽銅青之處方用名。詳『銅青』條。

【銅錢草】卽金錢草之別名。詳金錢草條。

【銅礦石】**命名**　礦粗惡也。五金皆有粗石銜之。卽鑛石之含有銅質者。故名。

形態　銅礦石爲鑛類之一種。乃銅之天然生者。多與硫黃、砷鋅等混合。狀如薑石。而有銅星鎔之。可取純銅。其石可供藥用。

性質　酸。寒。有小毒。

主治　丁腫惡瘡。爲末傅之。馬脊瘡。臭腋。麝汁塗。

【銚弋】卽鬼桃。詳『羊桃』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【銑芒】卽羊桃之古籍別名。典見綱目。詳『羊桃』條。

【韶子】古籍別名　山韶子。藤韶子(綱目)

形態　韶子爲果類之一種。葉如栗。色赤。其實夏日成熟。紅色肉如荔枝。可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　暴痢。心腹冷氣。

【韶腦】卽樟腦之古籍別名。典見綱目。詳『樟腦』條。

【頗兒必】卽羊脛骨之別名。詳『羊脛骨』條。

【頗黎】卽玻璃之古籍別名。典見綱目。詳『玻璃』條。

【頷石】卽絡石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『絡石』條。

【飴糖】卽飴餹之處方用名。參見『飴餹』條。

【飴餹】命名　餹之清者曰飴。稠者曰餳。如餳而濁者曰餔。

處方用名　膠飴。飴糖。

古籍別名　餳(綱目)餔。軟餹。餹餌(和漢藥考)

基本　蒸糵米、糯米、大麥、小麥、粟(黃小米)玉蜀黍、薏苡仁等澱粉質。加麥蘗子(麥芽)使之糖化卽成。

產地　中國各地均有出產。今日本各地產此。其著名者爲越後(高田水飴)肥後(朝鮮飴)讚岐(琴平飴)相模(浦賀水飴)等處所產。

形態　飴餹有硬軟之別。軟者爲淡黃色富黏質之濃稠液體。硬者爲黃褐色塊。俱有甘味。將黏稠者牽引使混入空氣。則成爲多孔質。變成缺乏黏性之白色塊。但一帶潮氣。則再發黏性。其精製品經數年亦不變壞。

種類　將糖化黏汁煎熬。第一次所得之飴餹。日本謂之一號飴。將殘餘納入布袋。搾出黏汁。再行煎熬。此第二次所得之飴餹。謂之二號飴。更類別之。有左列數種。㈠水飴。將糖化黏汁煎熬使成濃稠者。㈡膠飴。一名地黃煎或呼朝鮮飴。卽將水飴再煎熬使成膏藥狀者。㈢痰切飴。卽膠飴之更熬硬者。概須用鑿斷之。㈣糲。一呼白玉飴。卽將膠飴牽引數十次。使生孔成爲白色者。

製法　㈠飴化有種種製法。今述其一斑。先將糯米一斗搗之。蒸成硬飯。加麥芽之去粹粉末一升五合。善加攪拌。再注入溫湯一斗五升。保持約攝氏四十五度至五十五度之溫度二小時。則澱粉質受釀母之作用而糖化溶解。乃去其殘渣。將所得黏汁煎熬。使成適度之稠狀。㈡凡穀之黏者。皆可製飴。濱過蒸熟。每一石。用大麥蘗一斗八升。和水磨汁。傾入其中。少假。卽生飴。如蜜而稀。色如膠。所謂膠飴是也。其稍乾者。謂之餳。其然令乾。鞕牽而色白者。謂之餹。

用法　膠飴卽可下嚥。或溶於溫湯中飲之。或沖入於湯藥中服之。

性質　甘。大溫。無毒。

成分　主成分爲麥芽糖。糊精。此外含有蛋白質。脂肪及少許鹽質。

效能　和中。潤腸。補虛。止痛。爲炭水化物之可溶性物。易消化。向用作小孩產婦滋養物。又用以配合藥物。製飴劑。

主治　補虛乏。止渴。去血。

張仲景之證明　飴糖一味。經張仲景之實驗。認爲緩急之要藥。茲考徵如下。㈠小建中湯證曰。腹中急痛。又曰裏急。又曰婦人腹中痛。㈡大建中湯證曰。上下痛。而不可觸近。㈢黃耆建中湯證曰。裏急。以上三方。膠飴各一升。能治裏急。夫腹中急痛。腹中痛。豈非裏急矣乎。故曰膠飴之功。與甘草及蜜相似矣。

歷代記述弦疆　【唐】孫思邈千金翼論膠飴曰。補虛冷。益氣力。止腸鳴。咽痛。治唾血。消痰。潤肺。止嗽。【唐】孟詵食療本草論膠飴曰。健脾胃。補中。治吐血。打損。瘀血者。煞焦酒服。能下惡血。又傷寒大毒嗽。於蔓菁薤汁中煮一沸。頓服之良。【宋】寇宗奭本草衍義論膠飴曰。脾弱不思食人。少用能和胃氣。亦用和藥。【元】王好古湯液本草論膠飴曰。乃脾經氣分藥也。甘能補脾之不足。【明】李時珍本草綱目論膠飴曰。解附子草烏頭等毒。【明】李士材本草圖解論膠飴曰。飴糖甘溫。補中健胃。潤肺止嗽。消

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痰止血。解渴解毒。熬焦酒服。能下惡血。邪曹進飛矢中目。拔矢而鏃留於中。痛困俟死。一僧教以寒食飴點之。至夜瘡癒。一鉼而出。旬日瘥。【明】繆希雍本草經疏論膠飴曰。飴糖用麥蘗或穀蘗同諸米漬熬煉而成。故其味甘。氣溫無毒。入足太陰。亦入手太陰經。甘入脾而米麥皆養脾胃之物。故主補虛乏。仲景建中湯用之是也。肺胃有火則發渴。火上炎迫血妄行則吐血。甘能緩火之標。則火之下降。而渴自止。血自去也。孫思邈又謂其有消痰潤肺止嗽。治咽痛吐血等功。【清】鄒澍本草疏證論膠飴曰。陶隱居云。酒與餳並米麥所爲。而品分中上。良緣餳以和潤而優。酒以醞亂而劣。愚謂麴蘗雖皆麥所爲。然麴先屑粉而後盦造。爲拘折其生氣。蘗浸令生芽而後磨粉。爲引動其生機。然皆令消米實。使成液也。酒釀久方成。餳片時便就。久釀者性反迅。速成者性反緩。何歟。夫拘折者。鬱瀰久而性益猖。生發者。萌旋達而氣已暢。故酒爲緩物之報使。餳實急劑之柔佐也。然虛煩、虛痞、虛腫、虛滿、俱有確證。可指其籠統言之者。有虛勞虛損、虛羸、虛弱、能知熇熱之爲勞。傳變之爲損。危瘠之爲羸。疲輭之爲弱。則乏之爲乏。亦可擬議得之。夫行而無資謂之乏。人身之行者。非氣血而何。夫反正爲乏。非氣血之當行不行而何。人身一天地也。噓故納新。環周不休。氣之道也。十二經。脈。十五大絡。血之道也。其資皆稟於脾。則虛乏者。不可謂非脾氣不給矣。脾氣不給。蔥芫草。皆能資助之。此獨何藉於飴餳。夫補虛乏已下。遂繼之以止渴去血。則蔥芫者。皆與渴無干。且尤能去溼。不能滋燥。蔥能充外。不能充內。澤草能充內。且滋燥矣。又與血無干。以是見此虛此乏。斷非澤蔥芫草所能補矣。雖然虛乏。而氣不能行。且渴者固多。又何以知有當去不去之血。夫仲景用飴餳。多在建中湯。建中湯證。多有腹痛。此血當行不行之驗也。是故飴餳非能去瘀血也。能治血當行不行爲腹痛者耳。故傷寒論、金匱要略。用建中處甚多。然止云治腹痛。不云下瘀血。或謂本太陽病。譬反下之。因爾腹滿時痛者。桂枝加芍藥湯主之。則治腹痛者。芍藥之功。非飴餳之力也。此誠有辨焉。何則。傷寒陽脈濇。陰脈弦。法當腹中急痛者。先與小建中湯。虛勞裏急。悸衄。腹中痛。夢失精。四肢痠疼。手足煩熱。咽乾口燥。小建中湯主之。虛勞裏急諸不足。黃芪建中湯主之。婦人腹中痛。小建中湯主之。是知婦人腹中痛。小建中湯主之。婦人產後虛羸不足。腹中刺痛。吸吸少氣。或苦少腹中急。摩痛引腰背內補。當歸建中湯主之。是知桂枝加芍藥湯所主。是滿痛。小建中湯所主。是急痛矣。桂枝加芍藥湯。即小建中湯少飴餳耳。下後邪氣內傳爲滿痛。是實。虛勞產後腹痛。是虛。僅飴餳一味之轉移。治證遂虛實不侔。猶不可見飴餳善補虛乏耶。桂枝湯。在傷寒所治證多矣。茲則吸吸少氣也。咽乾口燥也。裏急腹痛也。腹中刺痛也。少腹急摩也。皆非桂枝湯所曾治。自是知即飴餳之功矣。蓋土滯以木而疏。土虛以木而困。故少氣。咽乾口燥。是脾乏穀氣。裏急腹痛。乃肝氣侮脾。飴餳之柔潤芳甘。正合脾家土德。而即以緩肝之急。以肝固罷極之本。虛乏之所從來也。是故桂枝加芍藥湯。無飴餳。即不名建中。桂枝加黃芪湯。不加芍藥。不用飴餳。即不名黃芪建中。而蜀椒、乾薑、人蔘、協以飴餳。即名大建中。是知建中固以飴餳得名耳。然則其所謂大小者。究何義耶。夫以勢合勢分。分大小。則小建中用芍藥桂甘生薑得十五兩。又益大棗十二枚。大建中用人蔘乾薑僅五兩。止益以蜀椒二合。乃同用飴餳一升。則飴餳在大建中湯獨多。而勢合在小建中湯。體均而勢分。此一說也。若以力專力薄分大小。則辛甘爲陽。酸苦爲陰。大建中純用甘辛。則力厚氣熏。小建中兼用酸苦。則力微氣薄。此又一說也。總之兩建中皆以飴餳爲君。君尊而臣從命。則爲大。君卑而臣擅命。則爲小。此實大小得名之確指歟。而飴餳之所以尊於此。益可徵悟矣。【清】楊時泰本草述鉤元論膠飴曰。味甘酸。氣大溫。脾經氣分藥。補虛冷。健脾。補中。治脾弱不思飲食。潤肺。消痰。止渴。療吐血。由打損成瘀者。熬焦酒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

服。能下惡血。少用能和胃氣。解附子草烏毒。【清】黃宮繡本草求眞論膠飴曰。飴糖氣味甘溫。據書言能補脾潤肺。化痰止嗽。並仲景建中湯用此以爲補中緩脾。蓋以米麥本屬脾胃之穀。而飴糖屬穀麥所造。凡脾虛而肺不潤者。用此氣味甘緩。以補脾氣之不足。兼因甘潤。以制肺燥之有餘。是以脾虛而痰不化。固可用此以除痰。脾虛而嗽不止。亦可用此以除嗽。卽中虛而邪不解。亦得用此以發表。中虛而煩渴時見。亦得用此以除煩止渴。他如草烏毒中。其性橫烈。固可用此以爲甘緩芒刺誤吞。痛楚異常。更可用此以爲柔輭。然糖經煉成。澀而且熟。其在氣虛痰盛中虛火發。固可用此消除。若使中滿氣逆。實火實痰。非惟治火。且更動痰。非惟治痰。且更生火。至於小兒多食。尤易損傷生蟲。不可不愼。牽白者不入藥用。

國外學說　日本醫學士古川榮氏論用飴糖可製糖漿。（單舍利別）載東京醫事新誌第三百六十四號。今錄其一段如左。據聞此次編纂日本藥局方。有提議用飴製糖漿者。終恐患者不以爲藥。因而否決。其果然耶否耶。若果如此。雖曰民智尚未盡開。而現有之良佳代用品。仍不能舍糖漿而他求。誠爲憾事。倘告於衆曰。糖漿亦不過白糖之濃厚溶液耳。亦將卽墮其信用耶。草野元養先生。根據醫士柏魯資氏處方。於飴中加二分之一至一%乳酸鐵或燐酸鐵。（枸櫞酸鐵及鐵金雞納霜。價高益少）特名之爲含鐵麥芽糖漿（Ext. malti ferratum.）可謂妙矣。第一醫院所用。普通名稱雖爲含鐵麥芽糖漿。惟麥魯資並非飴。乃麥芽越幾斯。故毋寧名爲鐵飴煎。似較適當。

配合應用　㊀治老人煩渴。寒食大麥一升。水七升。煎五升。入赤餳二合。渴卽飮之。（奉親書方）

㊁治蛟龍瀦病。凡人正二月食芹菜。誤食蛟龍精者。爲蛟龍病。發則似癎。面色青黃。每服寒食餳五合。日三服。吐出蛟龍有兩頭可驗。吐虵者勿用。（金匱方）

㊂治魚脾疔瘡。寒食餳塗之良。乾者燒灰。（千金方）

㊃治漂疱毒瘡。臘月飴餹。晝夜塗之。數日則愈。（千金方）

㊄治誤吞稻芒。白餳頻食。（簡便方）

㊅治魚骨鯁咽。不能出。用飴餹丸。雞子黃大吞之。不下再吞。（肘後方）

㊆治誤吞錢釵及竹木。取飴餹一斤。漸漸食盡便出。（外臺祕要方）

㊇治服藥過劑。悶亂者。飴餹食之。（千金方）

㊈治草烏頭毒。及天雄附子毒。並食飴餹卽解。（聖濟總錄方）

㊉治手足瘡瘡。炒膽月餹傅之。（千金方）

㊊治火燒成瘡。白餹燒灰。粉之。卽燥易瘥。（小品方）

用量　一匙至二匙。

施用宜忌　有濕熱內鬱諸病者禁用。少用補脾潤肺。過用有損無益。

著名方劑　㊀小建中湯。虛勞裏急悸衄。腹中痛。夢失精。四肢酸痛。手足煩熱。咽乾口燥。此湯主之。（金匱）桂枝三兩。（去皮）甘草三兩。（炙）大棗十二枚。芍藥六兩。生薑三兩。膠飴一升。上六味。以水七升。煮取三升。去滓。納膠飴。微火消解。溫服一升。日三服。㊁黃耆建中湯。虛勞裏急。諸不足者主之。（金匱）卽小建中湯內加黃耆一兩半。餘依前法。

參玫資料　㊀飴糖。卽餳也。多食動脾風。今醫家用以和藥。糯與粟米作者佳。餘不堪用。蜀黍米亦可造。不思食人。少食之。亦使脾胃氣和。唐白樂天詩。一榼較牙餳者是此。（本草衍義）㊁謂餹與酒。皆用米蘗而餹以和潤爲優。盧子由謂蘗米作飴。宛似水殺入胃醞釀作汁。而出入未定之會。夫五穀分養五臟。如稻之甘。自是脾穀。而爲脾益。乃從烹鍊後。氣之溫者。更爲大溫暢中。土生發之氣。卽從氣取汁。變化精微。和而且潤。俾中土之生者。能化若痰之凝。血之瘀。胥以化液化血者對待之。液能化。則氣益生。此胃所以和。而虛乏所以能補也。（陶貞白）㊂內經曰。脾欲緩。急食甘以緩之。膠飴之甘。以緩

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中也。(成無己)㈣膠飴之醫治作用。酷似甘草之治急迫作用。二者殆相伯仲。甘草性平。通用於表裏陰陽虛實各症。本品藥性大溫。惟可用於陽虛症。然陽實陰虛及寒實證。不可用之。有適於裏症而不適於表症。又甘草無營養分。而本藥如上說。有豐富之滋養分。亦是其別也。(皇漢醫學)㈤按劉熙釋名云。餳之清名曰飴。形怡怡然也。稠者曰餳。強硬如錫也。如餳而濁者曰餔。方言謂之餵餵。音長皇楚辭云。粔籹蜜餌。用餵餵是也。(李時珍)

【飴鹽】卽食鹽產於戎地者之古籍別名。典見綱目。詳『食鹽』條。

【飴】卽醋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『醋』條。

【飫饜】卽饜之古籍別名。典見綱目。詳『饜』條。

【骰柏楠】卽楠木之俗名。詳『楠木』條。

【魁實】卽山茱萸之古籍別名。典見別錄。詳『山茱萸』條。

【魁陸】卽瓦楞子之古籍別名。典見別錄。詳『瓦楞子』條。

【魁蛤】卽瓦楞子之古籍別名。典見別錄。詳『瓦楞子』條。

【魁圓】卽龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【魂常】卽木賊之古籍別名。典見本經。詳『木賊』條。

【鮀魚】

外國名詞 Girella punctata



鮀魚


【鳲鳩】

古籍別名 布穀。(列子)鵠鵴。獲穀。(爾雅)郭公。(綱目)

外國名詞 Cuculus canorus Linn. (拉丁) (Cuckoo) (英) カクワコウ或カンコドリ或カツボウ或カッユク或サンユドリ或タチマキドリ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類攀禽類杜鵑科爲鳲鳩之肉。

形態 鳲鳩爲原禽類鳩之一種。形如杜鵑而大。又如鳩。全身淡黃綠色。穀雨後始鳴。夏至後乃止。其鳴聲如呼割麥插禾。性拙不能營巢。多居樹穴及鵲巢中。其肉可供藥用。



鳲鳩

性質 甘。溫。無毒。

主治 安神定志。令人少睡。

【鳳仙子】

命名 本品花如鳳狀。故名。

處方用名 急性子。

古籍別名 小桃紅。子。夾竹桃子。海葯子。染指甲草子。(救荒本草)旱珍珠。羽客子。金鳳花子。菊婢子。(綱目)

基本 屬鳳仙花科鳳仙花之種子。

形態 鳳仙花爲一年生植物。高尺餘。莖圓。葉爲長橢圓形或披針形。邊緣有細鋸齒。互生頗密。夏月葉腋開不整齊花。狀如飛鳥。其色或紅或紫或白。頗爲美麗。後結蒴果。子皮有彈性。猛烈裂開。散放細小種子。中國以此花染指甲。日本肥前長崎及筑前等。亦有此俗。故又有爪紅之名。



鳳仙子

種植 園圃間恒多栽植。二月下種。五月可以再種之。

採取 八九月間採之。

681／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　微苦。溫。有小毒。

效能　消積塊。下骨哽。有通經之作用。用於月經不順或月經困難與閉止。

主治　產難積塊。噎膈。下骨哽。透骨通痰。

歷代記述攷證　【清】黃宮繡本草求眞論鳳仙子曰。鳳仙子又名急性。是俗所謂金鳳花子是也。其性急猛異常。味苦氣溫。小毒。凡人病患頑痰積塊。噎膈骨哽。服之立刻見效。以其氣味急迫。能於骨穴堅硬處所。極力搜治。是以勝金丹。用之以治狂癡。取其急領祛毒吐泄。同砒以點牙疼。即落。同獨蒜搗汁以塗痞塊。即消。加麝香。阿魏尤捷。投子以煮硬肉。即爛。但此生不蟲蠹。蜂蝶不近。且多食則戟人喉。似非無毒。用之當細審量可耳。【清】黃元御玉楸藥解論鳳仙子曰。鳳仙子其性最急。能化骨鯁。落牙齒。催生產。消癖塊。與玉簪根性略同。而迅烈過之。作油。以少許滴蟹上。其殼立碎。崩落釜中。

近人學說　張山雷曰。金鳳花子成熟時。其殼一動。即自分裂。其性最急。故有急性子之名。其氣味則瀕湖綱目謂微苦溫。有小毒。主治產難催生。積塊噎膈。下骨哽。透骨取齒牙。皆取其迅速直達為義。頃治外瘍堅塊。疫痛麻木。陰發大症。研末熬膏貼患處。極能軟堅消腫如神。

配合應用　㈠治產難催生。鳳仙子二錢。研末。水服。勿近牙。外以蓖麻子。隨年數搗塗足心。（集簡方）

㈡治噎食不下。鳳仙花子酒浸三宿。曬乾為末。酒丸綠豆大。每服八粒。溫酒下。不可多用。即急性子也。（摘玄方）

㈢治咽中骨哽欲死者。用白鳳仙子研水一大呷。以竹筒灌入咽。其物即軟。不可經牙。或為末吹之。（普濟方）

㈣治牙齒欲取。金鳳花子研末。入砒少許。點疼牙根取之。（摘玄方）

㈤治小兒痞積。急性子、水莊花子、大黃各一兩。俱生研末。每味取五錢。外用皮消一兩。拌勻。將白鴿鴿一箇。或白鴨亦可。去毛屎。剖腹。勿犯水。以布拭淨。將末裝入內。用線紮定。沙鍋內入水三碗。重重紙封。以小火煮乾。將鴿鴨翻調。焙黃色。冷定。早晨食之。日西時疾。軟三日大便下血。病去矣。忌冷物百日。（孫天仁集效方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無積滯者禁用。

參攷資料　㈠鳳仙子其性急速。故能透骨軟堅。庖人烹魚肉。硬者投數粒。即易軟爛。是其驗也。緣其透骨最能損齒。與玉簪根同。凡服者不可着齒也。多用亦戟人咽。（李時珍）㈡其花頭翅尾足具翹然如鳳狀。故以名之。女人採其花及葉包染指甲。其實狀如小桃。老則迸裂。故有指甲急性小桃諸名。宋光宗李后諱鳳。宮中呼為好女兒花。張宛丘呼為菊婢。韋居呼為羽客。（李時珍）㈢鳳仙人家多種之。極易生。二月下子。五月可再種。苗高二三尺。莖有紅白二色。其大如指。中空而脆。葉長如尖似桃柳葉而有鋸齒。椏間開花。或黃或白。或紅或紫。或碧或雜色。亦自變易。狀如飛禽。自夏初至秋盡。開謝相

續。結實纍纍然。大如櫻桃。其形微長。色如毛桃。生青熟黃。狐之即自裂。皮卷如拳。苞中有子。似蘿蔔子而小。褐色。人採其肥莖灼醃。以充蔬茹。嫩華酒浸一宿。亦可食。但此草不生蟲蠹。蜂蝶亦不近。恐亦不能無毒也。（李時珍）

【鳳仙花】古籍別名　好女兒花（綱目）



鳳仙花

性質　甘。滑。溫。無毒。

主治　蛇傷。搗酒服。即解。又治腰脇引痛。不可忍者。研餅曬乾為末。空心每酒服三錢。活血消積。

【鳳仙根葉】　性質　苦。甘。辛。有小毒。

主治　雞魚骨哽。誤吞銅鐵。杖撲腫痛。散血通經。軟堅透骨。

【鳳尾竹】　即竹之葉細僅三分者。典見綱目。詳『竹』條。

【鳳尾松】　即無漏子之樹名。典見和漢藥考。詳『無漏子』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鳳尾筠】卽仙人掌之別名。詳『仙人掌』條。

【鳳尾金星】古籍別名　寶劍草。

形態　根類竹根。黃色有鬚。葉類建蕉而短。長不滿尺。春月發苗。背有點子兩行。相對有數十粒。極密。秋霜後。乃黃生石山下。其根蔓生。

性質　涼。

主治　吐血咽喉火毒。諸丹毒。發背癰疽。

參攷資料　㊀金星鳳尾。其葉細碎。形似鳳尾。三月發苗。葉有星作細白點子。秋後乃黃生古牆石甃中。背日者佳。惟實熱症可用。又癰疽。非陽毒及非金石藥毒者戒用。謝雲溪云。性太涼。男女忌服。雖取效一時。但精血受寒。不能生育。爲虞耳。(百草鏡)㊁治喉癬。金星鳳尾草。搗汁加米醋數匙。和勻用竹筋裹新棉花。蘸汁。點患處。稠痰隨筋而出。亦治喉風。(家寶方)

【鳳尾草】㊀卽金星草之古籍別名。典見綱目。詳『金星草』條。㊁卽翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『翠羽草』條。㊂卽貫衆之原名。詳『貫衆』條。

【鳳尾蕉】命名　本品葉出細尖。瓣如鳳尾。故名。

古籍別名　番蕉。鐵樹。(綱目拾遺)

產地　贛閩諸省。多生於鐵山間。

形態　鳳尾蕉爲蕉類之一種。本粗巨。高丈餘。莖有鱗片。被之葉生莖頂。長四五尺。色深青。入冬不凋。作羽狀分裂。密如魚刺。雌雄異株。雌花叢生。雄花如松球。長二尺許。其葉可供藥用。

主治　平肝。療一切肝氣雜症。水煎服。

參攷資料　鳳尾蕉又名番蕉。亦名鐵樹。以鐵樹葉形如筐箕。其樹須壅以鐵屑乃盛。實則番蕉葉也。以其食鐵故亦名鐵樹。其性亦平肝。取其相制爲用。亦頗驗。謝肇淛五雜俎。番蕉能辟火患。將枯時。以鐵屑糞之。或以鐵釘釘其根。則復活。蓋金能生水也。種盆中不甚長。一年纔落下一葉。計長不能以寸。亦不甚作花。三十年僅見兩度花耳。花亦似芭蕉。而色黃不實。蓁芳譜。鳳尾蕉一名番蕉。產於鐵山。如少萎以鐵燒紅穿之。卽活。平常以鐵屑和泥壅之。則茂而生子。分種易活。江西袁州有之。花鑱。鳳尾蕉一名番蕉。產於鐵山。江西福建皆有。葉長二三尺。每葉出細尖。瓣如鳳尾之狀。色深青。冬亦不凋。如少萎黃。以鐵燒紅釘其本上。則依然生活。平常不澆壅。以生鐵屑和泥壅之。自茂且能生子。分種易活。極能辟火患。人多盆種庭中。以爲奇玩。友人唐振聲。在東甌見鳳尾蕉。土人皆呼爲鐵樹。則知今人所用及洋舶帶來之葉。皆番蕉葉而非眞正鐵樹葉也。(趙學敏)

【鳳尾蕉子】卽海蟑子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『海蟑子』條。

【鳳油刺】卽伏牛花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『伏牛花』條。

【鳳栗】卽仙人掌之別名。詳『仙人掌』條。

【鳳凰衣】卽雞卵殼中白皮之俗名。詳『雞卵殼中白皮』條。

【鳳凰退】卽鳳凰蛻。詳該條。

【鳳凰梔子】卽梔子之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『梔子』條。

【鳳凰蛻】卽雞抱出卵殼之別名。典見綱目。詳『雞抱出卵殼』條。

【鳳眼草】命名　本品兩葉中心。秋後色白。儼如鳳眼。故名。

形態　鳳眼草爲溼草類之一種。穀雨節後生苗。苗如薄荷。而葉微圓。長五六寸。立夏後枝極復生二葉。節節皆生。芒種節後枝極間二小葉。中心各起蕾一枚。如人兩眼。細碎如石胡荽子。小暑後色轉紅黃。漸抽長。其花如鬚。長一二寸。紫黃色。自苗至老。葉皆有淡紅暈。可供藥用。其花上粉。詳該條。

主治　活血祛風。療一切風痺。酒煎服。

配合應用　㊀治室女乾血勞。用鳳眼草連根葉。鮮者一兩。加紅花三錢。酒煎服。通經自愈。㊁治四日兩頭癇。用鳳眼草。煮紅棗。飲汁自愈。婦女經閉不通。發熱勞症。鳳眼草爲末一兩。紅花炒二錢。水三鍾。煎一鍾。入黑糖五錢。空心服。三五劑。見血方止。(醫學指南方)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊂治遺精白濁。鳳眼草炒乾研末五錢。沖熱黃酒服。（醫學指南方）

參攷資料　按經驗廣集。治小便不通。有皂角湯熏法。方中用鳳眼草。乃臭椿葉別名。與此名同物異。又荔支草亦名鳳眼草。與此亦異。（趙學敏）

【鳳眼草】㊀即椿樗莢子之古籍別名。典見綱目。詳『椿樗莢子』條。㊁即荔枝草之古籍別名。典見草藥方。詳『荔枝草』條。

【鳳眼草花上粉】**主治**　殺蟲定癇。入癬藥用。

【鳳頭蓮】**命名**　本品狀似鳳頭。故名。

產地　出臺灣島內山間。

形態　鳳頭蓮爲雜草類之一種。形如黃連。色紫而多細鬚。茸茸然分歧如鳳頭。可供藥用。

性質　平。

主治　咽喉一切諸症。

【鳳頭草】即馬鞭草之古籍別名。典見綱目。詳『馬鞭草』條。

【鳳翼】即射干之古籍別名。典見本草拾遺。詳『射干』條。

【鳴砌】即蚯蚓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蚯蚓』條。

【鳶】即鴟之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『鴟』條。

【鳶尾】**古籍別名**　烏園（本經）烏扇（別錄）紫蝴蝶（植物圖考）紫蘿欄（花鏡）扁竹（俗名）鴟尾草（日本）

外國名詞　Iris tectorum, Maxim.（拉丁）イチハツ（日本）

基本　係鳶尾科。藥用其根莖。

產地　山野川谷間。

形態　鳶尾爲毒草類之多年生草本。春月抽莖。高一二尺。葉劍狀。淡綠色。互生。各葉相擁抱。初夏花軸自葉間生。其上端常綴以三花。花大。淡青紫色。處處有紫色小點。又有白色者。花蓋大小六片。外屬三片較大。在其上面下端之中央。有一雞冠狀突起。花柱之上部扁平如花瓣。其與蝴蝶花相異者。因鳶尾之花軸單一或分歧。花蓋之片上無毛狀之鋸齒。蝴蝶花之花軸恒分數枝。花蓋之片上有毛狀之鋸齒也。其根如鳶頭。可供藥用。


鳶尾

性質　苦。平。有毒。

主治　蠱毒邪氣。鬼疰諸毒。破癥瘕積聚。去水。下三蟲。（本經）殺鬼魅。療頭眩。（別錄）

參攷資料　㊀此草所在有之。人家亦種。葉似射干而闊短。不抽長莖。花紫碧色。根似高良薑。皮黃肉白。嚼之戟人咽喉。與射干全別。射干花紅。抽莖長。根黃有臼。（蘇恭）㊁本名鳶尾。根名鳶頭。亦謂之鳶根。葉似射干。布地生。黑根。似高良薑而節大。數個相連。九月十月採根日乾。（韓保昇）㊂此卽射干之苗。非別一種也。肥地者莖長根粗。瘠地者莖短。根瘦。其花自有數色。諸家皆是强分。陳延之小品方言東海鳶頭。卽由跋者。亦訛也。東海出之故耳。（李時珍）

【鳶頭】即鳶尾。詳『鳶尾』條。

【鼻涕團】即山査之古籍別名。典見百一選方。詳『山査』條。

【鼻涕蟲】即蛞蝓之俗名。詳『蛞蝓』條。

【鼻烟】**外國名詞**　Pulvis Tabaci.（Snuff.）

製法　造鼻烟法。香白芷二分。北細辛八分。焙乾。豬牙皂角二分。焙乾研。薄荷二分。冰片三釐。乾烟絲爲君。乾絲一錢。必配福烟六七分許。右藥各爲細末。酌量配合。不必拘分兩。以色如槐色者佳。

種類　鼻烟鴨綠者最佳。玫瑰色者次之。醬色者爲下。陳久而枯者不堪用。

主治　通關竅。治鬚風。明目。定頭痛。辟疫尤驗。

參攷資料　㊀近京師有製鼻烟者。可明目。尤有辟瘧之功。以玻璃爲瓶貯之。象牙爲匙。就鼻嗅之。皆內府製造。民間不及。張王叔云。近有廣東來者。較內府造者尤勝。有五色以蘋果色爲上。（香祖筆記）㊁西洋出鼻烟。上品曰飛烟。稍次則鴨頭綠色。厥味微醎。謂之豆烟。紅者爲下。（澳門紀略）㊂鼻

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

烟或冒風寒。或受穢氣。以少許引之。使噓。則邪穢疏散。積瀦亦解。若刻不少間。反有致疾者。烟有多品。總以洋烟爲上。取其滋潤不烈。所以爲佳。（常中丞筆記）

【齊女】卽蟬之古籍別名。典見綱目詳『蟬』條。

【齊蛤】卽馬刀之古籍別名。典見吳普本草。詳『馬刀』條。

【齊頭蒿】卽牡蒿之古籍別名。典見唐本草。詳『牡蒿』條。

十五畫

【劇草子】卽馬蘭子之古籍別名。典見本經。詳『馬蘭子』條。

【勞砂】卽硇砂之處方用名。詳『硇砂』條。

【劉寄奴草】**命名**　本品爲宋高祖劉裕所發明。其小字寄奴。故名。

古籍別名　金寄奴（大明）烏藤菜（綱目）鴨脚九里光六月雪。六月雪大葉蒿子（和漢藥考）

外國名稱　Senecio palmatus, Pall.

基本　屬菊科。爲劉寄奴草之莖葉與花子。

產地　陳仁山藥物生產辨云。劉寄奴生廣東。但各屬山野原澤間。恒有生焉。

形態　劉寄奴草爲自生或人家栽植之宿根草。春季抽苗。高四五尺。葉互生。作掌狀分裂。似艾葉而厚。粗糙。邊緣有細鋸齒。夏季莖端分歧。開大五六分之黃色單瓣花。類紫菀花。

採取　六七月間採之。

製法　雷敎曰。凡採得去莖葉。只用實。以布拭去薄殼。令淨。拌酒蒸。從巳至申。曝乾用。李時珍曰。莖葉花子皆可用。

性質　苦。溫。無毒。

效能　破瘀。通血。通月經。療金瘡。用治產後餘疾及金瘡藥。

主治　下血止痛。治產後餘疾。止金瘡血極效。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論劉寄奴曰。破血下腹多服令人下痢。【宋】大明諸家本草論劉寄奴曰。心腹痛。下氣水脹。血氣通。婦人經脈癥結。止霍亂水瀉。【明】李時珍本草綱目論劉寄奴曰。小兒尿血。新者研末服。【明】穆希雍本草經疏論劉寄奴曰。劉寄奴草。其味苦其氣溫。揉之有香氣。故應兼辛苦能降下。辛溫通行。血得熱則行。故能主破血下腹。然善走之性。又在血分。故多服則令人痢矣。昔人謂爲金瘡要藥。又治產後餘疾。下血止痛者。正以其行血迅速故也。【明】李士材本草圖解論劉寄奴曰。劉寄奴苦溫無毒。主破血下腹。多服令人痢下。血止痛。同骨碎補。延胡索等分。水煎。入酒及童便。頓溫服。治折傷瘀血在腹。通行走散血分之性。凡病人氣血虛。脾胃弱。易作泄者。勿服。【清】黃宮繡本草求眞論劉寄奴曰。劉寄奴因何而有是名。據書載是劉裕小子寄奴。曾射一蛇目。見童子搗藥。問之。答爲寄奴所傷。裕罵而收藥。故每遇金瘡數之。卽愈。故以寄奴爲名。但此雖非屬眞而藥味苦微溫。多能破瘀通經。除癥下腹。及止金瘡血出。大小便血。湯火傷毒。緣血之在人身。本貴通活。滯而不行。則血益滯而不出。而癥瘕腹滿愈甚。行而不止。則血亦滯而不收。而使血出益甚。寄奴總爲破血之品。故能使滯者破而卽通。而通者破而卽收也。古書止言治功。而不詳釋其義。殊覺疎漏。但性多走泄。不可過服。令人吐利不止。莖葉花子皆可用。

近人學說　張山雷曰。此草以劉裕小字得名。南史所謂搗藥治傷者也。其性苦溫。善於破瘀宣通。專爲逐血攻脹之用。幷以外敷止血定痛治傷。亦治產後血瘀未淨諸疾。及大小便血。心腹結痛。癥瘕經閉。然專於攻破。非實證不可妄用。

配合應用　㊀治大小便血。劉寄奴爲末。茶調。空心服二錢。卽止。（集簡方）

㊁治折傷瘀血。在腹內者。劉寄奴、骨碎補、延胡索各一兩。水二升。煎七合。入酒及童子小便各一合。頓溫服之。（千金方）

㊂治血氣脹滿。劉寄奴穗實爲末。每服三錢。酒煎服。不可過多。令人吐利。此破血之仙藥也。（衛生易簡方）

㊃治霍亂成痢。劉寄奴草煎汁

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

飲。（聖濟總錄方）

㊄治湯火傷灼。劉寄奴搗末。先以糯米漿雞翎掃上。後乃摻末。並不痛。亦無瘢。大驗之方。凡湯火傷。先以鹽末摻之。護肉不壞。後乃摻之藥妙。（本事方）

㊅治風入瘖口腫痛。劉寄奴爲末。摻之卽止。（聖惠方）

㊆治小兒夜啼。劉寄奴半兩。地龍炒一寸。甘草一寸。水煎灌少許。（聖濟總錄方）

㊇治赤白下痢。陰陽交帶。不問赤白。劉寄奴、烏梅、白薑等分。水煎服。赤加梅、白加薑。（艾元英如宜方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡非實症及無瘀滯者禁用。

參攷資料　㈠按李延壽南史云。宋高祖劉裕。小字寄奴。微時伐荻新州。遇一大蛇。射之。明日往聞杵臼聲。尋之。見童子數人。皆青衣。於檉林中搗藥。問其故。答曰。我主爲劉寄奴所射。今合藥傳之。裕曰。神何不殺之。曰寄奴王者。不可殺也。裕叱之。童子皆散。乃收藥而反。每遇金瘡。傅之卽愈。人皆以此故。因稱此草爲劉寄奴草。鄭樵通志云。江南人困漢時謂劉爲卯金刀。乃呼劉爲金。或又謂金寄奴。江東人又謂烏藤菜。（李時珍）㈡劉寄奴草。生江南。莖似艾蒿。長三四尺。葉似山蘭草而尖長。一莖直上。有穗。葉互生。其子似稗而細。（蘇恭）㈢今出越州。蒿之類也。高四五尺。葉似菊。其花白色。其實黃白色。作穗。夏月收苗乾之。（韓保昇）㈣今河中府孟州。漢中滁州亦有之。春生苗莖。似艾蒿。上有四稜。高二三尺以來。葉青似柳。四月開碎小黃白花。形如瓦松。七月結實。似黍而細。根淡紫色。似萵苣。六月七月採苗及花子通用。（蘇頌）㈤劉寄奴一莖直上。葉似蒼朮。尖長糙澀而深。背淡。九月莖端分開數枝。一枝攢簇十朵小花。白瓣黃蕊。如小菊花狀。花罷有白絮。如苦實花之絮。其子細長。亦如苦實子。所云實如黍稗者。似與此不同。其葉亦非萵類。（李時珍）

【劉懷草】卽天名精之古籍別名。典見綱目。詳『天名精』條。

【劍脊金星】卽辟瘟草大者之別名。典見綱目拾遺。詳『辟瘟草』條。

【劍脊烏梢蛇】卽烏梢蛇劍脊而尾細者之別名。典見綱目。詳『烏梢蛇』條。

【劍脊硝】卽朴硝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『朴硝』條。

【墟棗】卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【墨】

命名　本品古以黑土爲之。故字從黑。土而名。

處方用名　墨汁。墨水。陳墨。

古籍別名　烏金。陳玄。玄香。烏玉。（綱目）

基本　係用松之煙炭和膠質凝成者。

產地　醫學大辭典曰。墨以安徽歙縣所產者最有名。京墨尤良。

形態　墨之原料。乃似輕細之塵末。製成錠後。則質堅硬。其色烏黑。亦有光澤如漆者。

製法　凡使須用年遠松煙墨。餘皆不堪入藥。而光澤如漆且香者更勿用。

用法　磨汁和服。入丸散火煅。細研。或水浸軟紙包煨剉用。

性質　辛。溫。無毒。

效能　止血化瘀。

主治　止血生肌膚。合金瘡。產後血暈崩中。卒下血。醋磨服之。又止血痢。及小兒客忤。揭篩。溫水服之。又眯目物芒入目。點磨瞳子上。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論墨曰。利小便。通月經。治癰腫。【淸】黃宮繡本草求眞論墨曰。墨易能以止血。以其色黑味辛。氣溫而止之也。蓋黑能勝紅。紅見黑而卽止。以火不勝水者故耳。辛能散血。血散則血歸經而不外溢。是以遇辛而卽止也。溫能行血。血行則血周流經絡而血不聚於所傷之處。是以得溫而卽止也。故凡血熱過下。如瘟疫鼻衄。產後血暈崩脫。金瘡並絲纏眼中。皆可以治。如止血則以苦酒送韭汁投。消腫則以豬膽汁。醯醋調。並眼有絲纏。則以墨磨雞血速點。客忤中腹。則磨地漿汁吞。各隨病症所用而治之耳。但瘟疫熱病初覺。遽用此以止血。則非所宜。

配合應用　㈠治吐血不止。金

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

墨磨汁同萊菔汁飲。或生地黃汁亦可。（集簡方）

㈡治衄血不止。眩冒欲死。濃墨汁滴入鼻中。（梅師方）

㈢治熱病衄血出數升者。取好墨爲末。雞子白丸梧子大。用生地黃汁下一二十丸。少頃再服。仍以葱汁磨墨。滴入鼻內卽止。（外臺祕要方）

㈣治大小便血。用好墨細末二錢。阿膠化湯調服。熱多者尤相宜。（寇氏本草衍義方）

㈤治卒淋不通。好墨燒一兩爲末。每服一字。溫水服之。（普濟方）

㈥治赤白下痢。靣墨丸。用乾靣、好墨各五兩爲末。醋漿和丸梧子大。每服三四十丸。米飲下。日夜六七服愈。（肘後方）

㈦治崩中漏下。青黃赤白。使人無子。好墨一錢。水服。日二服。（肘後方）

㈧治墮胎血溢不止。墨三兩。火燒醋淬三次。出火毒。沒藥一兩爲末。每服二錢。醋湯下。（普濟方）

㈨治婦人難產。墨一寸。末之。水服立瘥。（肘後方）

㈩治胎死腹中。新汲水磨金墨服之。（普濟方）

㈠治胞衣不下。痛引腰脊。好墨溫酒服二錢。（肘後方）

㈡治癰腫發背。醋磨濃墨塗四圍。中以豬膽汁塗之。乾又上。一夜卽消。（趙氏方）

㈢治客忤中惡。多於道間門外得之。令人心腹絞痛。脹滿。氣冲心胸。不卽治。殺人。搗墨水和服二錢。（肘後方）

㈣治飛絲入目。磨濃墨點之。卽出。亦治塵物入目。（千金方）

㈤治產後血暈。心悶氣絕。以丈夫小便研濃墨一升服。（子母祕錄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡溫疫熱病之吐衄初起者禁用。

參攷資料　㈠古者以黑土爲墨。故字從黑土。許愼說文云。墨烟煤所成土之類也。故從黑土。劉熙釋名云。墨者晦也。（李時珍）㈡墨松之烟也。世有以粟草灰僞爲者。不可用。須松烟墨方可入藥。年遠烟細者爲佳。粗者不可用。今高麗國每貢墨於中國。不知何物合。不宜入藥。鄙延有石油。其烟甚濃。其煤可爲墨。黑光如漆。不可入藥也。（寇宗奭）㈢上墨以松烟用榫皮汁解膠和造。或加香藥等物。今人多以窑突中墨烟。再三以麻油入內。用火燒過造墨。謂之墨烟。墨光雖黑。而非松烟矣。用者詳之。（李時珍）

【墨水】卽墨和水浸化者之處方用名。詳『墨』條。

【墨汁】卽墨磨成汁者之處方用名。詳『墨』條。

【墨石子】卽無食子之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『無食子』條。

【墨克爾】卽山穀根之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『山穀根』條。

【墨旱蓮】卽鱉腸含有黑汁者之處方用名。詳『鱉腸』條。

【墨荔】卽荔枝實之產於廣西平樂縣之萬山中者。賀縣及荔浦、修仁二縣山中亦均有之。其皮肉俱黑。如墨。味臭而苦辣。不可喫。且有大毒。誤食之。必致心腸腐爛而死。餘詳『荔』條。

【墨烏骨】卽烏鯽骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏鯽骨』條。

【墨記草】卽馬蓼之古籍別名。典見綱目。詳『馬蓼』條。

【墨魚骨】卽烏鯽骨之古籍別名。典見綱目。詳『烏鯽骨』條。

【墨晶】卽水晶之雜有植物質而成墨色者。功用與尋常水晶同。參看『水晶』條。

【墨菜】卽鱉腸之古籍別名。典見綱目。詳『鱉腸』條。

【墨煙草】卽鱉腸之古籍別名。典見綱目。詳『鱉腸』條。

【墨飯草】卽南天燭之古籍別名。典見綱目。詳『南天燭』條。

【墨頭草】卽鱉腸之古籍別名。典見綱目。詳『鱉腸』條。

【墨蘭】卽建蘭花之黑色者。風乾之可治瞽目。能生瞳神。而治青盲尤佳。餘詳『建蘭花』條。

【寬筋藤】

產地　出廣東龍門、從化、博羅等處。

性質　腥。甘。濇。平。

效能　除風。逐痰。消腫滿。舒筋活絡。散瘀熱。

【廣木香】卽木香之處方用名。詳『木香』條。

687／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【廣皮】卽橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【廣皮炭】卽橘皮焙炒成炭者之處方用名。詳『橘皮』條。

【廣石】卽白石英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白石英』條。

【廣東萬年青】卽吉祥草之原名。詳『吉祥草』條。

【廣茂】卽蓬莪朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬莪朮』條。

【廣參】卽海參產於廣東者之別名。典見綱目拾遺。詳『海參』條。

【廣陳皮】卽橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【廣黃】卽牛黃之出於廣南者。藥力較薄。詳『牛黃』條。

【廣福藤】卽紅木香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『紅木香』條。

【廣橘皮】卽橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【廣藿者】卽藿香之處方用名。詳『藿香』條。

【廣藿梗】卽藿香之處方用名。詳『藿香』條。

【廣鬱金】卽鬱金之處方用名。詳『鬱金』條。

【德兒】卽杏仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杏仁』條。

【慶】基本　慶爲雜草類之一種。可供藥用。

性質　苦。無毒。

主治　咳嗽。

【藪薰】卽幷苦之古籍別名。典見別錄。詳『幷苦』條。

【摩田邏】卽孔雀之古籍別名。典見綱目。詳『孔雀』條。

【摩娑石】卽婆娑石之古籍別名。典見綱目。詳『婆娑石』條。

【摩勒香】卽乳香之古籍別名。典見綱目。詳『乳香』條。

【摩廚子】產地　生西域。

形態　摩廚子爲果類之一種。二月開花。四五月結實。如瓜狀。汁味香美。肥潤可茹。又供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　益氣。潤五臟。久服令人肥健。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論摩廚子曰。安神養血生肌。久服輕健。

【摩斯咤】卽獼猴之古籍別名。典見梵書。詳『獼猴』條。

【摩澤樹】卽無食子之古籍別名。典見西陽雜俎。詳『無食子』條。

【摩羅】卽百合之古籍別名。典見別錄。詳『百合』條。

【摩羅迦隸】卽瑪瑙之古籍別名。典見綱目。詳『瑪瑙』條。

【撇藍】卽茄逮之別名。典見綱目拾遺。詳『茄逮』條。

【撒法耶】卽番紅花之古籍別名。典見綱目。詳『番紅花』條。

【撥火杖】古籍別名　火柴頭。（綱目）火檜頭。（綱目拾遺）

基本　本品卽撥火用之木杖。曁燒殘之柴頭。

主治　療金瘡。刮取黑炭數之。

【撥掉子】卽蟾蜍之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『蟾蜍』條。

【撫芎】命名　本品爲芎藭之出於江西撫州者。故名。

性質　辛。溫。無毒。

主治　開鬱。寬胸。通行經脈。

配合應用　㊀治失血湧吐。因飽食用力或因持重。努傷脈絡。用當歸二兩或三兩。酒浸洗。用撫芎一兩。微炒。水三碗。酒一碗。半煎至八分。作二次服之。取其引血歸經。並治跌撲墮打而傷脈絡。令人大吐者。二症中如有瘀血或加大黃下之。或加桃仁紅花破之。或加鬱金黃酒行之。審症酌加。其效更速。（不藥良方）

㊁治一切熱癎時毒腫痛。撫芎煨研。入輕粉麻油調塗。（普濟方）

用量　八分至二錢。

參攷資料　蜀產曰川芎。秦產曰西芎。江西爲撫芎。綱目取川芎列名。而西芎撫芎僅於註中一見。亦不分其功用。蓋芎藭以蜀產爲上。味辛而甘。他產氣味辛烈。遠不逮矣。殊不知西芎與川芎。性不甚遠。俱爲血中理氣之藥。第西產不及川產者。力厚而功大。至撫芎。則性專於開鬱。上升逈然不同。故石頑於川芎下。另立撫芎一條。以明不可混。今從之。（趙恕軒）

【播羅子】卽胡桃之古籍別名。典見梵書。詳『胡桃』條。

【撮石合草】產地　生原野間。

形態　撮石合草爲雜草類之

688／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一種。莖高二尺餘。葉似穀葉。十二月萌芽。二月有花。不結實。其苗可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　療金瘡。

【撲落酥】　卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【擺擺活】　卽七葉黃荊之俗名。詳『七葉黃荊』條。

【數常】　卽螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

【數低】　**產地**　生西番北土。

形態　數低爲菜類之一種。形如茴香。其子可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　冷風冷氣。下宿食。消脹滿。

【槲】　**古籍別名**　槲樕。樸樕。（爾雅）大葉櫟。櫟樕子。金雞樹。枹。（綱目）櫟。柞（日本）

外國名詞　Quercus dentata, Thunb.（拉丁）カシハ　ハハソ　モチガシハ　コガシハ（日本）

基本　係殼斗科槲屬。葉用槲之實。

產地　生山野森林間。



槲（一）



槲（二）



槲（三）



槲（四）

形態　槲。爲喬木類之落葉木本。高二三丈。葉大長倒卵形。約四五寸。邊緣有波狀之鋸齒。下面有褐色之毛。葉柄短。互生。春日隨新葉開花。花單性。雌雄同株。其雄花所成之穗狀花序。常下垂。結實爲堅果。圓形。大如拇指。有椀狀之殼斗。其實仁可供藥用。

採取　採得剝取淨仁。入藥用。

性質　苦澀。平。無毒。

主治　蒸麥作粉。澀腸止痢。功同橡子。

【槲木皮】　**別名**　赤龍皮。（俗名）

性質　苦。澀。無毒。

主治　煎服除蟲及瘟甚效。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論槲木皮曰。煎湯洗惡瘡良。【宋】大明諸家本草論槲木皮曰。能吐瘧癘五臟。【明】李時珍本草綱目論槲木皮曰。止赤白痢。腸風下血。

【槲若】　卽槲葉之原名。詳『槲葉』條。

【槲根】　**別名**　獨龍鬚根。

主治　除瘴止痛。

【槲葉】　**原名**　槲若。

製法　蘇頌曰。入藥須微炙令焦用。

性質　甘苦平。無毒。

主治　療痔止血。及血痢止渴。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論槲葉曰。活血利小便。除面上皺赤。

【槲樕】　卽槲之古籍別名。典見爾雅。詳『槲』條。

【槽頭肉】　卽豬項肉之原名。詳『豬項肉』條。

【槳山茶】　**產地**　鄂州樂山。

主治　食之止頭痛。

參攷資料　鄂州東山出茶。黑色如韭。又云。出鄂州東山。名東山茶。色黑如韭。性與韭相反。

【棚梅】　**形態**　棚梅爲梅之別種。結實如杏。鬚脆適口。核如桃。可供藥用。

性質　甘。酸。平。無毒。

主治　生津止渴。清神下氣。消酒。

【棚檢皮】　**產地**　生山野中。

形態　棚檢爲雜木之一種。狀如榆。秋八月生莢。如大榆。其皮有滑汁。可供藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　下熱淋。利水道。令人睡。

歷代記述攷證　【明】李時珍

689／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本草綱目論櫰榆皮曰。治皃解顱。【樊櫰皮】卽秦皮之古籍別名。典見本草集註。詳『秦皮』條。

【樝】 產地 出安南及熱帶諸地。

形態 樝爲夷果類之一種。二月開花。連着子。結實如桃。五月熟。黃色。鹽藏食之。味酸如梅。可供食與藥用。

性質 酸。涼。平。無毒。

主治 清心。潤肺。生津。止渴。制亢極之陽光。消炎熇之譽氣。降三焦實火。療鼻衄牙宣齒齦出血。連核仁燒存性。調水含咽。卽止。

【樝活仁】卽瓜蔞仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瓜蔞仁』條。

【樓梯草】 產地 生南安。

形態 獨莖。高不盈尺。長葉。略似枇杷葉。齒尖稍粗。紋橫斜而青。背黃綠。可供藥用。



樓梯草

主治 酒煎服。治風痛。跌打損傷。

【樗】詳『椿樗白皮』條。

【樗蒲魚】卽海蛇之古籍別名。典見本草拾遺。詳『海蛇』條。

【樗雞】 古籍別名 紅娘子。灰花蛩。(綱目)

產地 生川谷臭樗樹間。

形態 樗雞爲卵生蟲類之一種。扁方而扁尖。喙向下。六足四翼。全體黑色。長則始飛。翼灰黃有斑。下面五色相間。居樹上。布置成行。秋深產卵於樗皮上。捕得可供藥用。

採取 七月間採之。

製法 凡使去翅足。以糯米或用麵炒黃色。去米麵用。

性質 苦。平。有小毒。

主治 心腹邪氣。陰痿益精。強志。生子好色。補中輕身。(本經)腰痛。下氣。強陰多精。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論樗雞曰。通血閉。行瘀血。【明】李時珍本草綱目論樗雞曰。主療癰散目中結翳。辟邪氣。療猘犬傷。

參攷資料 (一)樗雞不可近目。(別錄)(二)樗雞方藥中稀用。惟大麝香丸用之。(陶弘景)(三)樗雞古方辟瘟殺鬼丸中用之。近世方中多用。蓋厥陰經藥能行血活血也。普濟方治目翳撥雲膏中。與芫菁斑蝥同用。亦是活血散結之義也。(李時珍)

【槖木】卽醉魚草之古籍別名。典見綱目。詳『醉魚草』條。

【槖子】 命名 本品味酢澀而多渣。故名。

古籍別名 木桃(埤雅)和圓子。(綱目)

外國名稱 Cydonia japonica, Pers. var. pygmaea, Maxim.(拉丁)クサボケ ノボケ シドミ ヂナシ(日本)

基本 係薔薇科棠梨屬。爲槖之子實。

產地 生山野間。

形態 槖爲灌木類之落葉木本。高一二尺。枝有刺。葉小倒卵形。有托葉。早春隨葉開花。黃赤色。或白色。結實類似木瓜。圓形有凹凸。較小而色微黃。帶核皆粗。入蜜湯煮食。香美過於木瓜。亦可供藥用。



槖子

性質 酸。濇。平。無毒。

主治 斷痢。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論槖子曰。去惡心咽酸。止酒痰黃水。【唐】孟詵食療本草論槖子曰。煎汁飲。治霍亂轉筋。功與木瓜相近。

參攷資料 槖子乃木瓜之酢澀者。多食傷氣。損齒及筋。(綱目)

【樟】 命名 本品木理多文章。故名。

外國名稱 Cinnamomum camphora, Nees.(拉丁)クスノキ(日本)

基本 係樟科樟屬。爲樟之木材。

產地 出黔蜀閩廣等處。

形態 樟爲香木類之常綠喬木。高五六丈。大者十圍。葉卵形。革質。有葉脈三條。甚顯著。葉端尖。葉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

柄長。互生。初夏葉腋抽出長軸。綴以小花。黃白色。結實黑色。球形。大如豌豆。其木材細密。灰白。老則堅硬。帶褐色。有香氣。可供雕刻與藥用。



樟

性質　辛。溫。無毒。

主治　惡氣中惡。心腹痛。鬼疰。霍亂。腹脹。宿食不消。常吐酸臭水。酒煮服。無藥處用之。煎湯浴腳氣。疥癬風瘙。作履除腳氣。

參攷資料　霍亂及乾霍亂。須吐者。以樟木屑煎濃汁吐之甚良。又中惡鬼氣。卒死者。以樟木燒烟熏之。待甦乃用藥。此物辛烈香竄。能去溼氣。辟邪惡故也。（李時珍）

【樟木皮】採取　以年久樹上者佳。採得去外面黑色。取內層用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　天行瘟疫。霍亂吐瀉。中惡心痛。煎服之。澄毒流注。脚疥癬。浴洗之。

【樟木油】基本　本品係用樟木榨取之油。

形態　樟木油。色淡紫中帶微黃。氣甚辛烈。作樟腦氣。能溶充丁香油。可供藥用。

性質　辛。

主治　辟汗。以洗衣或佩之。及爲防臭藥。

【樟木葉】主治　脚上生瘡。嚼爛敷之。

【樟木瘤】原名　樟梨。

命名　本品爲千年樟樹枝椏間所結之物。以形如梨。故名。

古籍別名　香樟子。（綱目拾遺）

產地　出浙江省舊處州府遂昌縣福羅鴞仙人壩之周公園中。又廣東省清遠縣從化等處亦均有出。

採取　八九月新。以大者爲佳。入藥良。

主治　磨塗腫毒。及心胃脘痛皆效。

【樟木癭節】主治　風疰。鬼邪。

本品卽香樟樹之皮。

【樟皮】基本

採取　以年久老樹者。入藥良。

性質　辛。溫。無毒。

主治　天行瘟疫。澄毒流注。浴疥癬。洗脚氣。

配合應用　㈠治心疼。香樟樹皮。取時去面上黑色者。用內第二層皮搗碎。煎湯服卽止。永不再發。（玉局方）

㈡治刑杖傷。樟樹皮用老酒燉出味。調老公雞冠血食。止痛散血。立效。（神錦方）

㈢治霍亂上吐下瀉。樟樹皮一把。水煎溫服立止。（傳信方）

㈣治脚上生瘡。此瘡個個如小筆管大者。用樟樹葉牙咬熟。略摻拔毒丹。外貼樟樹葉。連換數次卽愈。（家寶方）

參攷資料　樟木綱目言辛溫香竄。性能除溼。故山居人患病多宜之。象山縣志。萬歷中邑大疫。有一道人。教人取千年老樟樹皮。煎飲可愈。并言樹老久飲霜雪。其性轉清涼。可消疫氣。此卽陳藏器所云樟木能治惡氣中惡鬼疰之意。（趙學敏）

【樟冰】卽樟腦之古籍別名。典見和漢藥考。詳『樟腦』條。

【樟柳根】卽商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『商陸』條。

【樟梨】卽樟木瘤之原名。詳『樟木瘤』條。

【樟腦】命名　本品色白如雪。狀似龍腦。乃樟樹脂膏所凝成。故名。

處方用名　潮腦。

古籍別名　韶腦（綱目）朝腦。樟冰。（和漢藥考）

外國名詞　Camphora.（拉丁）Camphor（英）Kampher.（德）

基本　屬樟科。爲樟樹之脂膏。

產地　陳仁山藥物生產辨云。樟腦中國各省均有產。但以福州爲最。係用樟樹蒸煉而成。粗砂力猛。東江增城惠州南江羅定廣西各屬。均用樟樹葉蒸煉。幼砂力弱。日本各國均有出。每年出新兩次。四月十一月出新。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態　樟樹爲常綠喬木。高可十餘丈。周圍有四丈。外皮灰褐色。有龜裂。木質帶紅白色。紋理顯然。葉互生。形卵圓或如長披針。末端帶尖。其質似紙。又似皮革。有細長之葉柄。面作深綠色。無茸毛。背帶藍色。有似手之脈理三層或五層。花穗軸立。短於葉。其末枝有花一朶至五朶。花苞帶黃色。分六瓣。有鈍端。面無茸毛。內則雄蕊與雌毛。密布其間。雄蕊多數叢生。具有腺體。粉囊分爲四房。雌蕊細而長。有圓板狀之柱頭。果實爲漿果。有薄皮。形圓如球。大若豌豆。色紅黑。有光澤。惟樟樹爲物異於他樹。雖破葉亦有樟腦之香氣。全樹幾無有不含樟腦之處。惟含量之多少。隨樹之種類而異。葉芽與葉柄帶紅色者。謂之赤樟。樟腦最多。葉芽與葉柄現綠色者次之。此外尙有臭樟、黃樟各種。全樹所含之樟腦。初非各處均平。有此少彼多者。大抵樹之下部所含最多。有五・七四。中部略少。約四・二三。枝部三・七〇。枝梢二・二三。葉內三至四%。蓋愈下愈多。愈上愈少也。其精製樟腦。（精製樟腦一名片腦。）$C_{10}H_{18}O$ 爲白色透映之塊片或粗末。有脂肪光澤。質柔靱。不易成粉。加酒精研和。易成白色之粉末。置空氣中。則發散而不留餘滓。比重〇・九八至〇・九九五。溶融點約在百七十五度。沸騰點須二百零四度。試燃以火。則放明焰與煤煙而燃燒。水不能溶解。然浮於水面。有回旋運動之性。酒精、伊打、哥羅仿、謨、硫化炭素、冰醋酸、亞揑登、脂肪油等俱能溶解之。有特異之芳香。味初如灼。後轉有清涼之氣。於分極光線具右旋之性。

製法　用樟樹之根、葉、枝、幹。截爲薄片。置器中蒸之。蒸氣着於蓋上。冷之。卽結爲晶。更加石灰與酒精製之。則成白色之粉末。香氣甚烈。易化氣而散失。遇火卽燃。可製無煙火藥。與供藥用。

用法　恒以剉末和入外治藥用。

性質　辛。熱。無毒。

成分　含有一種凝固之揮發油。

效能　殺蟲辟蠹。通竅辟惡。祛寒。澄治癬疥。用作興奮回蘇藥。又治陰瘧蟲亂。初期疥癬。

作用　入口內。能刺激唾液神經。使唾液及口腔黏液之分泌增加。入胃中。卽誘起胃部之溫感增加。令人噯氣。然不與胃液變化。至腸始次第吸入而至血中。一部分仍不變化而由肺臟排出。一部分變爲 A-und B-Camphoglykuronsaure 及 Vramido-camphoglykursaure 二種。使血液循環迅速。大腦神經被激而興奮。全身體溫增高。精神活潑。尿汗之排泄亦同時增多。若服過量。則腦部被劇激而麻醉。甚由昏睡而死。

主治　通關竅。利滯氣。治中惡邪氣。霍亂。心腹痛。寒澄腳氣。疥癬風瘙齲齒。殺蟲辟蠹。着衣中去脚氣。

歷代記述弦璽　【明】繆希雍本草經疏論樟腦曰。得純陽之氣。其味辛。其氣熱。初時以水煎成後。得火則發熾不息。其稟龍火之性者乎。氣亦香竄。能通利關竅。逐中惡邪氣。復能去澄殺蟲。凡一切疥癬風瘙澄毒瘡瘍等證。皆所須用。【淸】黃宮繡本草求眞論樟腦曰。樟腦性稟龍火。辛熱香竄。能於水中發火。其蒸益熾。治能通關利竅。凡中惡卒死者。可用樟木燒烟薰之。并能除澄殺蟲。置鞋中除脚氣。方書每和烏頭爲末。醋丸彈子大。置於足心。火烘汗出爲效。且能薰衣。饌。辟蛀蟲出韶郡諸山。以樟木蒸汁。煎煉結成樟腦。升打得法。能亂冰片。

國外學說　英美學說謂樟腦原產中國之廣東。而臺灣等處亦產之。乃始由樟木提出。後經升煉而成者。樟樹高而大。經冬不凋。其樹無論切碎何處。皆發樟腦香。其木白色。略香。中國多用以作箱櫃等物。樟腦樹之葉與皮。均有樟腦之質。以木作片。浸甑。卽能成樟腦。然此猶未淨。必用法提淨之。樟腦一質。其產中國與日本者爲眞樟腦樹。西國古人所知之藥料。向東方所取者。以印度爲止。由印度而東而南之各國。向不知其有樟腦。而阿剌伯人則能知此質。前葡萄與日本常有往來之時。在七年內。運入歐羅巴之樟腦。共三十一萬

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五百二十磅。聞有從噶囉巴運至英國。至今西國所用之樟腦。大半出於中國與日本國。本品之形色與氣味。實脆色白。臭烈。別具一種氣息。其味辛。用水九百分能化一分。濃酒則五分能化四分。哥羅方則一分能化四分。伊打則七分能化十二分。洋橄油則四分能化一分。松香油則三分能化二分。冰醋酸則一分能化二分。反酸類不化。若樟腦酒而入以少許之水。旋即變白。恍如牛奶。其餘各淡強水均能化之。惟濃強水則能敗是物。其作用能行氣。又能治小便熱疼或閉。白濁慧痛。泄瀉霍亂。宜少服。過服則頭昏困倦。受毒狀如風癎。面紫昏迷。小便不通等。急宜解救。其藥性大率從腦筋顯出。如服數不過大。能令人舒暢而減腦筋之慧。人自得以安靜。初服令腹之內皮發熱。後則能入腦而壯腦力。間或發表。惟不至令脈洪數。約服一二次。即能平腦安身。如食更大之服。能令心之動法平和。後從皮膚與肺散出。不從溺中而出。蓋此藥能令脈動加力。令人出汗。如身多著衣服。或用厚被擁護。則多出汗。而能減發熱之病。此後能平火安心。如食其大服。則有寧睡性。或有毒性。尋常用此藥治腦筋病。作安肚腹腦筋與止痛藥。如婦女妄言笑病。用之有益。或因腦筋病而發熱與慮發熱。用之最合宜。若過服則壞人。始則作鬧作吐。繼則譫語神昏。至沉睡而死。務宜愼用。凡熱症炎症忌服。如轉筋症則服之最驗。第必須先服涼劑。後服此藥方妙。又如身弱四肢不安及婦人月經不調與酒醉過度。均宜服。又如以此藥久擦於皮膚細軟處。則爲慈性藥。又如以此藥用酒調化。或用油亦可。外擦風溼頗效。若加鴉片酒少許尤佳。又如神昏作鬧。嗅樟腦或樟腦酒亦妙。至解藥之解此毒。須先服吐劑。或用抽水節。後服行氣藥。如酒及咖啡精等均可。處方以樟腦一分。濃酒九分。化勻爲度。加白糖或牛奶同服。每服一分七釐半至五分二釐半。又方。樟腦服者甚少。又方。樟腦一分。濃酒十八分。沒藥酒二分。共和勻爲度。治新肚瀉。每服八釐七毫半。每一刻鐘服一次。又方。樟腦四分。濃酒五分。化勻爲度。加白樹膠漿和服。或滴於白糖內服之。治新肚瀉。每服三釐半至五釐二毫半。又方。樟腦二分。白蜂蠟三分。煉猪油四分。杏仁油三分。共入鍋鎔化。調至冷爲度。止痛用之。又方。樟腦二兩四錢。橄欖油十兩零八分。攪和擦之。療治風溼骨疼。又方。樟腦二分。辣椒半分。研末。火酒二十分。共入瓶浸七天。過布去渣爲度。治風溼疼頭痛。用量每服一釐七毫半至一分七釐半。加白糖白樹膠作勻水服之。日本學說謂樟腦者爲由樟樹製出之結晶物。夙輸出於泰西。爲彼國藥局方所採用。西人稱之曰カンフエル。又曰。日本樟腦甚珍重。之其化學上及治療上之研究。已詳盡無遺矣。依日本藥局方云。樟腦奏興奮劑或防腐之效。如爲刺戟藥而於癲痲質斯神經痛。外用之。如爲興奮藥用於皮下注射。或爲防腐性繃帶水。間有內用者。每一回〇・五至二・〇。日本從前製造樟腦。須選八十年以上之老樹。因樟腦最多也。造後原料遞少。價值步漲。即四十年未滿之樟樹。亦伐之而充需用。消乎近年。搜刮愈工。雖破棄亦收集而採取樟腦矣。

近人學說　張山雷曰。樟腦由樟木提鍊而成。味辛氣烈。瀕湖雖謂無毒。然古人從未以爲內服之藥。惟西國醫家。謂能治泄瀉霍亂轉筋。蓋以氣用事而性辛熱。觀其著火即燃。猛烈可知。故善治眞寒之霍亂吐瀉轉筋。西藥書謂受其毒者。狀如風癎。面紫昏迷。即此藥峻厲。尤其可見。西書雖謂每服可用一林士至十林士。然十林士合中稱已一分七釐半。頗嫌太多。不如樟腦酒法。以樟腦一分。和濃酒二十分。每服五林士之合宜也。一方。樟腦一分。和淨沒藥二分。明乳香三分。研勻。茶調服三釐。治疥穢腹痛甚效。壽頤自製霍亂藥酒亦用之。皆惟眞寒爲宜。溼熱症弗用。

配合應用　㊀治小兒禿瘡。韶腦一錢。花椒二錢。脂麻二兩爲末。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以退猪湯。洗後揩之。(簡便方)

㊁治牙齒蟲痛用韶腦、硃砂等分。擦之神效。(普濟方)又用樟腦、黃丹、肥皂去皮核等分研勻。蜜丸棗孔中。(余居士選奇方)

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡非眞寒及有濕熱者禁用。

參攷資料　㊀樟腦純陽。與焰硝同性。水中生火。其焰益熾。今丹爐及烟火家多用之。辛熱香窜。稟龍火之氣。去濕殺蟲。此其所長。故燒烟熏衣。筐席。驅壁虱蟲蛀。李石續博物志云。脚弱病人。用杉木爲桶。溷足。排樟腦於兩股間。用帛繃定。月餘甚妙。王璽醫林集要方。治脚氣腫痛。用樟腦二兩。烏頭三兩爲末。醋糊丸。彈子大。每置一丸於足心踏之。下以微火烘之。衣被圍覆。汗出如涎。爲效。(李時珍)

㊁樟腦出韶州。漳州。狀似龍腦。白色如雪。樟樹脂膏也。胡演升鍊方云。煎樟腦法。用樟木新者。切片。以井水浸三日三夜。入鍋煎之。柳木攪。待汁減半。柳上有白霜。卽濾去滓。傾汁入瓦盆內。經宿自然結成塊也。他處雖有樟木。不解取腦。又鍊樟腦法。用銅盆以陳壁土爲粉。糝之。後糝樟腦一重。又糝壁土。如此四五重。以薄荷安土上。再用一盆覆之。貴泥封固。於火上款款炙之。須以意度之。不可太過不及。勿令走氣。候冷取出。則腦皆升於上盆。如此升兩三次。可充片腦也。(李時珍)

【樟腦精】製法　以樟腦溶於酒精中。加燕水製之。卽成無色澄明之液體。可供藥用。

主治　調中引氣。宣和强力。通關開胃。止渴。霍亂。洩利。消宿食。宜作粥。薄暮啜之。解煩。去睡。調理腑臟。煎令醞。止嘔噦。白人膚體如繪帛。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論漿水曰。利小便。

參攷資料　㊀漿水性涼善走。故解煩渴而化滯物。(朱丹溪)㊁漿水浸至敗者害人。(陳嘉謨)㊂漿水不可同李食。令人霍亂吐利。妊婦勿食。令兒骨瘦。水漿尤不可飲。令絕產。醉後飲之失音。(寇宗奭)

性質　甘。酸。微溫。無毒。

主治　調中引氣。宣和强力。通關開胃。止渴。霍亂。洩利。消宿食。宜作粥。薄暮啜之。解煩。去睡。調理腑臟。煎令醞。止嘔噦。白人膚體如繪帛。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論漿水曰。利小便。

參攷資料　㊀漿水性涼善走。故解煩渴而化滯物。(朱丹溪)㊁漿水浸至敗者害人。(陳嘉謨)㊂漿水不可同李食。令人霍亂吐利。妊婦勿食。令兒骨瘦。水漿尤不可飲。令絕產。醉後飲之失音。(寇宗奭)

【樟巖】基本　本品係石之生於樟樹內者。

主治　治心痛。能通五經。煅研煎酒服。

【楓皮】卽土骨皮之古籍別名。見和漢藥考。詳『土骨皮』條。

【樫】卽櫧之日本名。詳『櫧子』條。

【櫧子】卽食茱萸之古籍別名。典見圖經本草。詳『食茱萸』條。

【漿水】命名　本品乃炊粟米熟。投冷水中。浸五六日。味酢生白花。色類漿者。故名。

古籍別名　酸漿(綱目)

【潮腦】卽樟腦之處方用名。詳『樟腦』條。

【潼】卽酪之古籍別名。典見綱目。詳『酪』條。

【潼木通】卽木通之處方用名。詳『木通』條。

【潼沙苑】卽刺蒺藜之處方用名。詳『刺蒺藜』條。

【潼蒺藜】卽刺蒺藜之處方用名。詳『刺蒺藜』條。

【澀翁】卽訶子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『訶子』條。

【澄水砂】卽硃砂經水中飛過者之別名。典見雷公炮炙論。詳『硃砂』條。

【熵】卽水銀之古籍別名。典見別錄。詳『水銀』條。

【熟女貞】卽女貞製熟者之處方用名。詳『女貞』條。

【熟女實】卽女貞之處方用名。詳『女貞』條。

【熟牛夏】卽牛夏煨熟者之處方用名。詳『牛夏』條。

【熟皮硝】卽朴硝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『朴硝』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【熟石灰】卽石灰之加水化合而成者。乃化學中所稱之輕養化鈣也。功用詳『石灰』條。

【熟地黃】**命名**　本品係地黃蒸曬製熟者。故名。

處方用名　大熟地。製熟地。蠟水炒熟地。砂仁炒熟地。九製熟地。

基本　屬玄參科。爲地黃之製熟者。

形態　地黃九經蒸曬而成。熟地則較生乾者不同。質地愈重而柔軟。色亦烏黑而光澤。味轉甘性轉溫。

採取　二月八月採製之。

製法　蘇頌曰。作熟地黃法。取肥地黃三二十斤。淨洗。別以揀下瘦短者三二十斤。搗絞取汁。投石器中。浸漉令浹。甑上浸三四遍。時時浸濾。轉蒸訖。又曝使汁盡。其地黃當光黑如漆。味甘如飴。須甕器收之。以其脂柔喜潤也。雷敩曰。採生地黃去皮。甕鍋上柳木甑蒸之。攤令氣歇。拌酒再蒸。又出令乾。勿犯銅鐵器。令人腎消。并髮白。男損營。女損衝也。李時珍曰。近時造法。揀取沉水肥大者。以好酒入縮砂仁末在內。拌勻。柳木甑於瓦鍋內蒸令氣透。暈乾。再以砂仁酒拌蒸。暈如此九蒸九暈。乃止。蓋地黃性泥。得砂仁之香而竄。合和五臟沖和之氣。歸宿丹田故也。今市中惟以酒煮熟售者。不可用。

性質　甘。微苦。微溫。無毒。

效能　補精髓。養肝腎。明耳目。烏鬚髮。用作滋養强壯藥。

主治　傷中逐血痺。填骨髓。長肌肉。作湯除寒熱積聚。除痺痠折跌絕筋。久服輕身不老。（本經）主男子五勞七傷。女子傷中胞漏。下血破惡血。溺血。利大小腸。去胃中宿食。飽力斷絕。補五臟內傷不足。通血脈。益氣力。利耳目。（別錄）

歷代記述攷證　【金】張元素珍珠囊論。熟地黃曰。補血氣。滋腎水。益陰。去脾腹急痛。病後脛股酸痛。【元】王好古湯液本草論熟地黃曰。坐而欲起。目瞤瞤無所見。【明】李時珍本草綱目論熟地黃曰。填骨髓。長肌肉。生精血。補五臟內傷不足。通血脈。利耳目。黑鬚髮。男子五勞七傷。女子傷中胞漏。經候不調。胎產百病。【清】黃宮繡本草求眞論熟地黃曰。熟地黃甘而微溫。味厚氣薄。專補腎臟眞水。兼培黃庭后土。土厚載物。諸臟皆受其陰。故又曰能補五臟之眞陰。熟地功力甚鉅。在景岳謂其眞陰虧損。有爲發熱。爲頭痛。爲焦渴。爲喉痺。爲嗽痰。爲喘氣。或脾腎寒逆。爲嘔吐。或虛火載血於口鼻。或水泛於皮膚。或陰虛而瀉利。陽浮而狂燥。或陰脫而仆地。陰虛而神散者。非熟地之守不足以聚之。陰虛而火升者。非熟地之重。不足以降之。陰虛而燥動者。非熟地之靜。不足以鎭之。陰虛而剛急者。非熟地之甘。不足以緩之。陰虛而水邪上沸者。舍熟地何以自制。舍熟地何以歸元。陰虛而精血俱損。脂膏殘薄者。舍熟地何以厚腸胃。且猶有最玄最妙者。則熟地兼散劑。能發汗。以汗化於血。而無陰不作汗也。熟地兼澀劑。能回陽。以陽生於下。而無陰不回也。然而陽性速。故人參少用。亦可成功。陰性緩。熟地不多。難以收效。而今人有畏其滯膩者。則崔氏何以用於胃氣丸而治痰浮。長其滑澀者。則仲景何以用於八味丸而腎泄。有謂陽能生陰。陰不能生陽者。則陰陽之理。原自互根。彼此相須。缺一不可。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。內經曰。精化爲氣。得非陰亦生陽乎。景岳尙論熟地。最爲明確。獨中所論脾胃寒逆爲嘔。可用地黃以治。是亦千慮一失者耳。夫旣脾胃虛寒。則脾與胃已受寒累。正宜用以辛熱。以爲掃除。如太陽旣至。堅冰自解。乃復堅以霜雪。投以陰劑。不更使寒滋甚乎。讀景岳全書見其所論語語透闢。字字箴規。可爲法守。獨於所論地黃。有脾腎虛寒。尙有未及。雖曰熟地性溫。寒從溫散。然寒至上逆爲嘔。則寒已甚。豈有熟地之溫。而可令寒外散乎。但或陽盛陰微。陽藉陰化。偶有感冒。用此雜於溫散之中。或有見效。若眞純陰無火。厥氣上逆。則嘔。則此又爲深忌。至於製用地黃。宜用好酒砂仁末同入。久蒸久曬。使其轉苦爲甘。變紫爲黑。方能直入腎經。耳出讓慶肥大者佳。【淸】張景岳景岳全書論熟地曰。凡諸眞陰虧損者。有爲發熱。爲頭疼。爲焦渴。爲喉痺。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲嗽痰。爲喘氣。或脾腎寒。逆爲嘔吐。或虛火載血於口鼻。或水泛於皮膚。或陰虛而泄利。或陽浮而狂躁。或陰脫而仆地。陰虛而神散者。非熟地之守不足以聚之。陰虛而火升者。非熟地之重不足以降之。陰而躁動者。非熟地之靜不足以鎭之。陰虛而剛急者。非熟地之甘不足以緩之。陰虛而水邪泛濫者。舍熟地何以自制。陰虛而眞氣散失者。非熟地何以歸源。陰虛而精血俱損。脂膏殘薄者。舍熟地何以厚腸胃。且猶有最玄最妙者。則熟地兼散劑。方能發汗。何也。以汗化於血。而無陰不作汗也。熟地兼溫劑。始能回陽。何也。以陽生於下。而無復不成乾也。然而陽性速。故人參少用。亦可成功。陰性緩。熟地非多。難以奏效。而今人有畏其滯膩者。則崔氏何以用腎氣丸而治痰浮。有畏其滑澤者。則仲景何以用八味丸而醫腎泄。有謂陽能生陰。陰不能生陽。則陰陽之理。原自互根。彼此相須。缺一不可。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。故內經曰。精化爲氣。得非陰亦生陽乎。孰謂陽之能生而陰之不能長也。

近人學說 ㊀閻立陞曰。熟地黃氣味相同。畏惡忌使。亦不少異。但假酒力曬蒸。稍除寒氣。則微溫而大補。入少陰腎經。大補血衰。滋培腎水。本經主填骨髓。長肌肉。生精血。補五臟。內傷不足。通血脈。利耳目。黑鬚髮。男子五勞七傷。女子傷中胞漏。經候不調。胎產百病。皆渾著於乾地黃之下。而時珍則別之於熟地黃。元素又云。熟地補血氣。滋腎水。益眞陰。去臍腹急痛。病後脛股酸痛。王好古曰。坐而欲起。目眩。眩無所見。詳味厥旨。蓋皆以熟地黃能補腎水。益眞陰。有養血壯陰之義。血旺陰足。故悉如上功也。昔仲景製八味丸。專補腎中元氣。爲諸藥首。取天一所生之源也。東垣製四物湯。治藏血之臟。以此爲君。取癸水乙木同歸一治也。合而論之。生熟之劑。皆爲血家神藥。生者寒而涼。血血熱者須用。熟則溫而補。腎血衰者須用。故王易簡謂男子多陰虛。宜熟地黃。女子多血熱。宜生地黃。又云生地黃能生精血。天門冬引入所生之處。熟地黃能補精血。用麥門冬引入所補之處。生地黃生血而性甘寒。氣弱者服之。恐以陰寒而妨食。熟地補血而氣滯。痰飲結者服之。恐泥膈而滯痰。故不得已而必用者。生用酒炒。則妨胃。熟用姜製。則不泥膈。此皆得用之精微者也。㊁賈九如曰。熟地產於中州。獨受中央土戊土之色。黃。故名地黃。藉酒蒸熟製黑。而爲純陰。味苦化甘。性涼變溫。專入肝臟。補血。因肝苦急。用甘緩之。兼主溫膽。又心爲肝之子。能益心血。取色黑走腎。更補腎水。凡內傷不足。苦志勞神。憂患傷血。縱慾耗精。調經胎產。皆宜用此。安五臟。和血脈。潤肌膚。養心神。寧魂魄。滋補眞陰。封塡骨髓。爲聖藥也。取其氣味濃厚。爲濁中濁品。以補肝腎。故凡生熟地黃、天麥門冬、炙龜板、當歸、身、山萸肉、枸杞、牛膝皆黏膩濡潤之劑。用滋陰血所謂陰不足者。補之以味也。㊂張山雷曰。熟地黃。潔古補血氣。滋腎水。益眞陰。去臍腹急痛。病後脛股痠痛。石頑謂臍下痛。屬腎臟精傷。脛股痠。係腎虛深。填補眞陰。兼培中州脾土。則土厚載物。諸臟皆受其蔭。

用量 三錢至八錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒者禁用。

參攷資料 ㊀地黃生則大寒而涼。血熱者須用之。熟則微溫而補腎。血衰者須用之。又臍下痛。脛股痠痛。皆以肝腎眞陰久傷。下元欲竭之症而言。故宜於滋塡。頗有捷效。繆仲醇廣筆記之集驗。胥魏柳洲之一貫煎。皆治此等之最有驗者。非泛治諸般之腹痛脛股痛。不可不知區別。寇宗奭謂血虛勞熱。產後虛熱。老人中虛燥熱。若與生地。當慮其寒。故蒸熟曝之。則其功自別。海藏治腎水不足。目眩。疏無所見。瀕湖謂塡骨髓。長肌肉。益精血。補五臟。內傷不足。黑鬚髮。女子傷中胞漏。經候不調。虛搏。謂熟地補血。而痰飲之人。恐其泥膈。宜用姜汁炒。治目眩。眩如無所見。謂水虧不能鑒物。是腎所主之病。非熟地不效。又謂地黃本心家血藥。久經蒸曝。得水火既濟之功。變黃紫爲深黑。可直入腎臟。塡補眞陰。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

腎經。非熟地黃不能除。乃通腎之藥也。（張元素）㊁按王碩易簡方云。男子多陰虛。宜用熟地黃。女子多血熱。宜用生地黃。又云生地黃能生精血。天門冬引入所生之處。熟地黃能補精血。用麥門冬引入所補之處。虞搏醫學正傳云。生地黃生血而胃氣弱者服之。恐妨食。熟地黃補血而痰飲多者服之。恐泥膈。或云生地黃酒炒。則不妨胃。熟地黃薑汁炒。則不泥膈。此皆得用地黃之精微者也。（李時珍）㊂甘微苦寒。假酒力酒蒸。則微溫而大補。味厚氣薄。陰中之陽沉也。入手足少陰厥陰之經。治外治上。須酒製。忌蘿蔔葱蒜諸血。得牡丹皮當歸和血生血。涼血滋陰補髓。（張元素）

【熟艾】卽以陳久艾葉揉搗如棉。焙乾似熟。爲針科着火灸病之用。餘詳『艾葉』條。

【熟附子】卽附子炮熟者之處方用名。詳『附子』條。

【熟南星】卽天南星製熟者之處方用名。詳『天南星』條。

【熟結】卽沈香及伽倆香之膏脈凝結而自朽者。二者之功用各詳本條。

【熟鐵】卽生鐵復經鍛鍊而再三銷拍可製器具者。功用詳『鐵』條。

【熟蠶蛾】卽原蠶蛾之古籍別名。典見綱目。詳『原蠶蛾』條。

【熱湯】**命名**　本品係煎煮多沸之水。故名。

古籍別名　麻沸湯（仲景）百沸湯　太和湯（綱目）　滾水　開水（俗名）

性質　甘。平。無毒。

主治　助陽氣行經絡。

歷代記述攷證　【宋】嘉祐補註本草論熱湯水曰。熨霍亂轉筋。入腹及客忤卒死。

參攷資料　㊀熱湯能通經絡。患風冷氣痺之人。以湯淋脚至膝上。厚覆取汗。周身然。別有藥亦假陽氣而行爾。四時暴泄痢。四肢冷。臍腹疼。深湯中坐浸至腹上。類頗作之。生陽諸藥無速於此。虛寒人始坐湯中。必顫。仍常令人伺守之。（寇宗奭）㊁按汪頴云。熱湯須百沸者佳。若半沸者飲之。反傷元氣。作脹。或云熱湯漱口。損齒。病目人勿以熱湯洗浴。凍僵人勿以熱湯灌之。能脫指甲。銅瓶煎湯服。損人之聲。（李時珍）㊂張仲景治心下痞。按之濡。關上脈浮。大黃黃連瀉心湯用麻沸湯煎之。取其氣薄而浚。虛熱也。朱眞人靈驗篇云。有人患風痰數年。掘坑令坐坑內。解衣以熱湯淋之良久。以簟蓋之。汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍常推此意。治寒溼。加芟煎湯。治風虛。加五枝或五加。煎湯淋洗。覺效更速也。（李時珍）㊃凡傷寒傷風。傷食傷酒。初起無藥。便飲大和湯。益許。或酸醬汁亦可。以手揉肚。覺恍惚。再飲。再揉。至無所容。探吐汗出則已。（張從正）

【熠燿】卽螢火之古籍別名。典見吳普本草。詳『螢火』條。

【犛牛】卽犛牛之古籍別名。典見昨夢錄。詳『犛牛』條。

【犛牛】卽獨峯駝之古籍別名。典見綱目。詳『獨峯駝』條。

【犛牛】**命名**　犛者。旄也。其髦可爲旌旄也。故名。

古籍別名　毛犀（廣志）　貓牛。（漢書）　摩牛　氂牛　竹牛（昨夢錄）　犛牛。（綱目）

外國名詞　Bos grunniens 或 Poëphagus grunniens L.（Yak 或 Grunting ox）（拉丁）　ヤク或ヤアク（日本）

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類反芻偶蹄類牛科之犛牛。

產地　野生於西南徼外諸深山中。

形態　犛牛爲獸類野牛之一種。其體大如牛。角長殆爲圓筒狀。角端尖。表面滑。亦有彎曲者。其有家養而無角者。肩隆起。頸至脊上。密生叢狀柔毛。面部耳部及四肢下部之毛雖短。而體旁及四肢外側之毛密而長。垂下以被短矮之四肢。毛有絲光。或白或黑或黑白相混。尾長亦生長毛。狀與牦牛相同。但牦小而犛大。有重至千餘觔者。其角可供藥用。

性質　酸。鹹。涼。無毒。

主治　驚癎熱毒。諸血病。

參攷資料　犛牛角可亂犀角。但無渠紋耳。（李時珍）

697／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【瘵牛酥】性質　甘。平。無毒。
主治　去諸風溼痺。除熱利大便。去宿食。
歷代記述弦證　【唐】陳藏器本草拾遺論瘵牛酥曰。合諸膏。摩風腫跛跌血瘀。
參攷資料　酥本乳液。潤燥調營。與血同功。按生生編云。酥能除腹內塵垢。又追毒氣。發出毛孔間也。（李時珍）

【瘵牛黃】性質　苦。平。無毒。
主治　驚癇癲狂。
參攷資料　瘵牛黃可亂牛黃但堅而不香。功用相近也。（李時珍）

【瘧鑪】即楞鑪之古籍別名。典見本草拾遺『楞鑪』條。

【瘟蔗】即茶之產於福建舊福寧府境者。以其治瘟疫最著。故名。

【瘡瘢】即鰣魚之古籍別名。典見綱目。詳『鰣魚』條。

【瘡帶】即何首烏之古籍別名。典見綱目。詳『何首烏』條。

【瘡草】即王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王不留行』條。

【瘦客】即月季花之古籍別名。典見綱目。詳『月季花』條。

【瘧香】即丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『丁香』條。

【瘧香嬌】即丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『丁香』條。

【瘧香婦】即丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『丁香』條。

【瘧子花】即木槿之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『木槿』條。

【瘡龜】地產　生高山石下。
形態　瘡龜爲介類龜之一種。扁頭大嘴。可供藥用。
性質　無毒。
主治　老瘧發作無時。名瘧瘡。俚人呼爲妖瘡。用此燒灰。頓服二錢。當微利。用頭彌佳。或發時煮湯坐於中。或懸於病人臥處。

【皴玉天漿】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【皴皮葱】㊀即荔枝草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『荔枝草』條。㊁即紫接骨之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『紫接骨』條。

【皴面草】即天名精之古籍別名。典見綱目。詳『天名精』條。

【皴面還丹】即人參之古籍別名。典見廣雅。詳『人參』條。

【皴葉芥】即大芥之古籍別名。典見綱目。詳『大芥』條。

【瞎梅條】即合歡皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『合歡皮』條。

【瞑菜】㊀即睡菜之古籍別名。典見綱目。詳『睡菜』條。㊁即睡蓮之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『睡蓮』條。

【磉玉砂】即含玉石之古籍別名。典見綱目。詳『含玉石』條。

【磍石】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【稷米】命名　稷字從禾從畟。畟音即。意即稻禾之屬。諧聲也。故名稷。
古籍別名　穄。粢。赤者名穱。白者名芑。黑者名秬。（綱目）黃米。蘆穄。高粱。蘆粟。（俗名）
外國名詞　Panicum miliaceum, L.（拉丁）キビ（日本）
基本　係禾本科稷屬。爲稷之子實。
產地　稷原產東印度。現各國均有出。
形態　稷爲穀類之一年生草本。高四五尺。葉綢長而尖。有平行脈。生粗毛。花有三雄蕊。作小穗狀。花序自一花成。復構成下垂之圓錐花序。果實爲穎果。其中米粒。粗硬不黏。供食用。



採取　五六月或七八月採收之。
製法　採得。曝乾。去殼用。
性質　甘。寒。無毒。
效能　和胃。健脾。用作緩和滋養藥。
主治　益氣。補不足。
歷代記述弦證　【宋】日華諸家本草論稷米曰。治熱壓丹石毒。發熱。解苦瓠毒。【明】李時珍本草綱目論稷米曰。涼血解毒。【清】黃宮繡本草求眞論稷米曰。稷有蘆稷黍稷之分。蘆稷者。其形高如蘆。實既香美。性復中和。所以爲五穀之長。而先王以之名官也。味甘氣平。故食可以益氣和中。宜脾利胃。煎湯以治霍亂。吐瀉如神。用此燒酒。可治腹中沉痾。啾唧若黍稷之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

稷。形狀似粟。但粟聚則叢聚攢簇。黍稷之粒。則疎散成枝。黍與黍稷分別。則黏者爲黍。而不黏者爲黍。稷之稷。昔人於此紛紛置辨。而不畫一。是亦未分二稷之說矣。黍稷味甘性寒。作飯疎爽。香美可愛。服之可以清熱涼血。解暑止渴。故書載治癰疽發背瘟疫之症。但多食則有冷氣內發。燒黍稷則瓠必死。忌同附子死。【清】王士雄隨息居飲食譜論稷米曰。稷米甘涼清胃。補氣養脾。稷者名秫。治陽盛陰虛。夜不得寢。及食鵝鴨成癥。凡黍稷粟之稗者。皆可釀酒。造餳而南方稷米但有不黏者耳。

近人學說　丁福保曰。稷爲黍之無黏着性者。含有多量糖分與水分。而爲無毒質之食品。其效力補胃涼血。有消暑之功。但能令腹中發冷。故不可多食。尤忌爲小兒之食料云。

配合應用　㊀補中益氣。羊肉一脚。熬湯入河西稷米。薤白、麥粥食之。(飲膳正要方)　㊁治卒嘔不止。粟米粉。井華水服之良。(肘後方)　㊂治癰疽發背。粟米粉熬黑。以雞子白和塗練上。剪孔貼之。乾則神效。(葛氏方)　㊃辟除瘟疫。令不相染。以穄米爲末。頓服之。(肘後方)

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡有宿癖者禁用。惡瓠子、附子。

參攷資料　㊀作飯食。安中。利胃宜脾。(心鏡)　㊁按孫眞人云。稷脾之穀也。脾病宜食之。氾勝之云。燒黍稷則瓠死。此物性相制也。稷米黍穰。能解苦瓠之毒。淮南萬畢術云。祠竈之黍。啖兒令不思母。此亦有所厭耶。(李時珍)　㊂稷從禾從夐。夐音卽諧聲也。又進力治稼也。詩云。夐夐良耜。是矣。種稷者。必夐夐進力也。南人承北音呼稷爲穄。謂其米可供祭也。禮記祭宗廟稷曰明粢。爾雅云。粢稷也。說文云。稷乃五穀長田正也。此乃官名。非穀號也。先儒以稷爲粟類。或言粟之上者。皆說其義而不知其實也。按氾勝之種植書。有黍不言穄。本草有稷不載穄。穄卽稷也。楚人謂之稷。關中謂之糜。呼其米爲黃米。其苗與黍同類。故呼黍爲秫。陶言與黍相似者得之矣。(蘇恭)　㊃稷在八穀之中。最爲下苗。黍乃作酒。此乃作飯。用之殊塗。(孟詵)　㊄稷米出粟處皆能種之。今人不甚珍此。惟祠事用之。農家惟以備他穀之不熟則爲糧耳。(蘇頌)　㊅稷與黍一類二種也。黏者爲黍。不黏者爲稷。稷可作飯。黍可釀酒。猶稻之有粳與糯也。陳藏器獨指黑黍爲稷。亦偏矣。稷黍之苗似粟而低小。有毛。結子成枝而殊散。其粒如粟而光滑。三月下種。五六月可收。亦有七八月收者。其色有赤白黃黑蒭麥。此八穀也。俗猶莫能辨證。況芝英乎。(陶弘景)　㊆呂氏春秋云。飯之美者。有陽山之穄。高誘註云。關西謂之糜。音糜。冀州謂之礜。音牽去聲。廣雅云。礜穄也。禮記云。稷曰明粢。爾雅云。粢稷也。說文云。稷乃五穀長田正也。此乃官名。非穀號也。先儒以稷爲粟類。或言粟之上者。皆說其義而不知其實也。按氾勝之種植書。有黍不言穄。本草有稷不載穄。穄卽稷也。楚人謂之稷。關中謂之糜。呼其米爲黃米。其苗與黍同類。故呼黍爲秫。陶言與黍相似者得之矣。(蘇恭)　㊇稷在八穀之中。最爲下苗。黍乃作酒。此乃作飯。用之殊塗。(孟詵)　㊈稷米出粟處皆能種之。今人不甚珍此。惟祠事用之。農家惟以備他穀之不熟則爲糧耳。(蘇頌)　㊉稷與黍一類二種也。黏者爲黍。不黏者爲稷。稷可作飯。黍可釀酒。猶稻之有粳與糯也。陳藏器獨指黑黍爲稷。亦偏矣。稷黍之苗似粟而低小。有毛。結子成枝而殊散。其粒如粟而光滑。三月下種。五六月可收。亦有七八月收者。其色有赤白黃黑數種。黑者禾稍高。今俗通呼爲黍。子不復呼穄矣。北邊地寒種之有補。河西出者顆粒尤硬。穄熟最早。作飯疎爽香美。爲五穀之長而屬土。故祀穀神者。以稷配社。五穀不可遍祭。祭其長以該之也。上古以厲山氏之子爲稷主。至成湯始易以后稷。皆有功於農事者云。(李時珍)

【稷根】卽稷稻根之簡稱。詳『稷稻根』條。

【稷稻根】古籍別名　爪龍。(綱目)

主治　心氣作疼。產難橫生。

【稻米】卽糯米之原名。詳『糯米』條。

【稻尾】卽黍之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳『黍』條。

【稻穗】卽糯稻稈之原名。詳『糯稻稈』條。

【稻藥】卽穀芽之古籍別名。典見綱目。詳『穀芽』條。

【穀】卽楮實子之古籍別名。典見圖經本草。詳『楮實子』條。

【穀玉】卽青玉之古籍別名。典見綱目。詳『青玉』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【穀芽】原名　藥米。
命名　本品爲稻穀初生之細芽故名。
處方用名　生穀芽。炒穀芽。綻穀芽。香穀芽。
古籍別名　稻蘗(綱目)
性質　甘。溫。無毒。
主治　快脾。開胃。下氣。和中。消食。化積。
參攷資料　阿開美氏(Akemine)試驗穀芽所得之結果如下(一)稻芽發生以三十至三十五(攝氏度)之溫度爲適宜。倘高至四十度或低至十三度均無發生之望(二)稻能芽生於水中或空氣中。水中含養氣與否。或穀殼之脫除與否。均無關係(三)稻芽之發生於空氣中。較於水中爲速。(四)穀粒能吸收之水量等於其重量之二十五倍至三十倍。苟其吸收之水量不及其重量之二十五倍。稻芽不能發生。

【穀芽】即茶之產於四川蒼雅州府境者。功用詳『茶』條。

【穀芽露】基本　本品即穀芽所蒸取之露。
性質　甘。淡。無毒。
主治　健脾。消食。開胃。和中。生津液。益元氣。
參攷資料　凡病後脾胃不健。津液未復者。用以代茶頗宜。

【穀桑】即楮實子之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『楮實子』條。

【穀菜】即白莧之古籍別名。典見別錄。詳『白莧』條。

【穀實】即楮實子之原名。詳『楮實子』條。

【穀精珠】即穀精草之處方用名。詳『穀精草』條。

【穀精草】命名　本品爲穀田之餘氣所生故名。
處方用名　穀精珠。
古籍別名　戴星草。(開寶)文星草。流星草。(綱目)戴精草。巴斯草。虢槌草。(和漢藥考)
外國名詞　Eriocaulon Sexangulare, L. (Eriocaulon Sieboldianum, Steud.)
基本　屬穀精科。藥用其花。
產地　穀精產區甚廣。凡田野間恒有生焉。
形態　穀精雜草也。自生於池沼。或水田之附近。雖爲小草。頗饒風韻。故多作盆栽。或養於水盤。葉叢生一株。岐分數條。頭端尖似薤。草長三四寸。入秋。葉間抽出數莖。長五六寸。頂著小球。爲多數鱗片集合而成。每片之間。藏綠白色之小花。開則點點如星。花後結實。既熟。隨即墮落。此草在刈稻之後。生於水田。故有穀精草之名。
採取　九月採之。採得花似白星者良。陰乾用。
性質　辛。溫。無毒。
效能　散風熱。明眼目。用作解除翳膜之眼科藥。
主治　喉痺。齒風痛。諸瘡疥。
歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目。論穀精草曰。頭風痛目盲翳膜。瘡後生翳。止血。【明】李士材本草圖解。論穀精草曰。穀精草甘平。陽明藥也。主頭風翳膜。瘡後目翳。此草收穀後荒田中生之。得穀之餘氣。獨行陽明。分野明目退翳之功。似在菊花之上。【清】黃宮繡本草求眞。論穀精草曰。穀精草本穀餘氣而成。得天地中和之氣。味辛微苦。氣溫。故能入足厥陰肝及足陽明胃。按此辛能散結。溫能通達。凡一切風火齒痛。喉痺。血熱瘡瘍。痛瘡。肝虛目翳。澁淚雀盲。至晚不見。並瘡病傷目。瘡後星障。服之立能有效。且退翳明目。功力殆於白菊而去星明目。尤爲專劑。試看望月砂。係兎所食此草而成。望月砂亦能治眼。則知此更爲眼家要藥矣。取嫩秧花如白星者良。
近人學說　張山雷曰。穀精草生於稻田中。刈稻之後。得穀之餘氣。故名穀精。其質輕清。故專行上焦。直達巔頂。能疏散頭部風熱。治目疾頭風。幷療風氣痺痛者。亦以輕清之性。善於外達也。又生於秋季。禾苗秀實之後。能開花結實。不畏秋涼。是以性溫味辛。故能上升外散。非其他明目之藥。以涼降爲功之比。則散風火而無寒涼遏抑之虞。尤爲良劑。開寶本草。稱其辛溫。主喉痺。齒風痛。諸瘡疥。瀕湖謂主頭風痛。目盲翳膜。皆辛以散之之意。今人僅以治風熱目赤。尚未足盡其功用也。
配合應用　(一)穀精草得決明子、木賊草、甘菊花、蜜蒙花、生地黃、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

專除目病障翳。

㈡治腦痛眉痛。穀精草二錢。地龍三錢。乳香一錢爲末。每用半錢。燒煙筒中。隨左右熏鼻。（聖濟總錄方）

㈢治偏正頭痛。用穀精草一兩爲末。以白麵糊調攤紙花上。貼痛處。乾換。（集驗方）又用穀精草末、銅綠各一錢。硝石半分。隨左右嗑鼻。（聖濟總錄方）

㈣治鼻衄不止。穀精草爲末。熟麵湯服二錢。（聖惠方）

㈤治目中翳膜。穀精草、防風等分爲末。米飲服之甚驗。（明目方）

㈥治瘡後目翳。隱澀淚出。久而不退。用穀精草爲末。以柿或猪肝片蘸食。一方加蛤粉等分。同入豬肝內煮熟。日食之。（邵眞人濟衆方）

㈦治小兒雀盲。至晚忽不見物。用羯羊肺一具。不用水洗。竹刀剖開。入穀精草一撮。瓦罐煮熟。日食之。屢效。忌鐵器。如不肯食。炙熟。搗作丸。如綠豆大。每服三十丸。茶下。（衛生家寶方）

㈧治小兒中暑。吐泄煩渴。穀精草燒存性。用器覆之。放冷爲末。每冷米飲服半錢。（保幼大全方）

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡無風熱者禁用。忌鐵。

參弦資料　㈠穀精體輕性浮。能上行陽明分野。凡治目中諸病。加而用之甚良。明目退翳之功。似在菊花之上也。（李時珍）㈡處處有之。春生於穀田中。葉莖俱青。根花並白色。二月三月採花用。花白小圓似星。可餧馬令肥。主蟲頸毛焦。病又有一種莖梗長有節。根微赤。出秦隴間。（蘇頌）㈢此草收穀後。荒田中生之。江湖南北多有。一科叢生。葉似嫩穀秧。抽細莖。高四五寸。莖頭有小白花。點點如亂星。九月採花陰乾。云二三月採者誤也。（李時珍）

【穀蘚】卽糯穀芒之原名。詳『糯穀芒』條。

【箬竹】卽箬葉之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『箬葉』條。

【箬葉】**古籍別名**　篛。秦葉。遼葉。（綱目）箬竹。鬼箬。小箬。（植物學大辭典）

外國名詞　Bambusa Veitchii, Gaer.（拉丁）ヤキバザサ　クマザサ　チマキザサ（日本）

基本　係禾本科山白竹屬。爲箬竹之葉。

產地　多在山野原澤間。

形態　箬爲澤草類之多年生常綠草本。根莖似小竹。其節縛與葉皆類蘆荻。葉面青背淡。質柔而韌。新舊相代。四時常青。可供藥用。

性質　甘寒無毒。

主治　男女吐血衄血嘔血咯血。下血。並燒存性。溫湯服一錢七。又通小便。利肺氣。喉痺。消癰疽。

參弦資料　㈠箬若竹而弱。故名。其生疎邃。故又謂之邃。（李時珍）㈡箬生南方平澤。其根與莖皆似小竹。其節縛與葉皆似蘆荻。而葉之面青背淡。柔而韌。新舊相代。四時常青。南人取葉作笠及裹茶鹽。包米糭。女人以襯鞾底。（李時珍）㈢箬爲山白竹類中之著名者。幹高五六尺。葉闊大長七八寸。肥大者高及一丈。稱爲鬼箬。小者高尺餘。稱爲小箬。其幹細長強韌。需用甚多。有時結實。亦可食云。（植物學大辭典）

【箬葉魚】卽比目魚之古籍別名。典見南方異物志。詳『比目魚』條。

【箬鬚】卽白茂之古籍別名。典見羣芳譜。詳『白茂』條。

【箭幹】卽白幷之古籍別名。典見別錄。詳『白幷』條。

【箭搭草】卽慈姑之古籍別名。典見救荒本草。詳『慈姑』條。

【箭豬】卽豪豬之別名。典見動物學大辭典。詳『豪豬』條。

【箭頭風】**產地**　出廣西舊南寧府境山中。

形態　箭頭風爲山草類之一種。花如箭鏃。可供藥用。

主治　風疾。四肢骨節痛。煎水薰洗之愈。消痰定喘。同肉煨熟。去草以肉淡食。忌鹽醬。

【箭頭草】㈠卽紫花地丁之古籍別名。典見綱目。詳『紫花地丁』條。㈡卽玉如意之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉如意』條。㈢卽金不換之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金不換』條。

【箭鏃砂】卽硃砂狀如箭鏃者之

701／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『稼砂』條。

【篔竹】卽竹之大至數圍而肉厚可爲梁棟者。功用詳『竹』條。

【箱根山椒魚】卽鯢魚之別名。典見和漢藥考。詳『鯢魚』條。

【節人參】卽粉沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『粉沙參』條。

【節分草】卽菟葵之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『菟葵』條。

【節瓜】**命名**　節瓜乃冬瓜中一種小者。白皮。蔓地生。一節生一瓜。故名。

主治　止渴生津。健腸利大小腸。

【節華】**古籍別名**　山節。達節。通漆（別錄）

基本　節華爲雜草類之一種。可供藥用。其皮詳見該條。

性質　苦。無毒。

主治　傷中痿痺。溢腫。

【節華】卽菊花之古籍別名。典見本經。詳『菊花』條。

【節華皮】**主治**　脾中客熱。

【葱筲】卽百葉竹之性澀可以錯甲者。功用詳『百葉竹』條。

【篔竹】卽竹之一尺數節者。功用詳『竹』條。

【篆愁君】卽蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【篆壁】卽蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【樓心草】卽龍常草之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『龍常草』條。

【糊椒】卽胡椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡椒』條。

【細枝】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【線香】**古籍別名**　龍挂香。（綱目）

性質　辛溫無毒。

主治　熏諸瘡癬。

參玆資料　今人合香之法甚多。惟線香可入瘡科。用其料加減不等。大抵多用白芷。芎藭。獨活。甘松。三柰。丁香。麝香。藁本。高良薑。角茴香。連翹。大黃。黃芩。柏木。梵婆香末之類爲末。以榆皮麵作糊和劑。以卽前擠成線香。成條如線也。亦或盤成物。象字形。用鐵銅絲懸燕。者。名龍挂香。（李時珍）

【線桑蠃】**命名**　本品於小雨後。好援桑葉故名。

古籍別名　桑牛。天螺。（綱目）

基本　係軟體動物腹足類有肺類椎實螺科之線桑蠃。

形態　線桑蠃爲溼生蟲類之一種。形似蝸牛。殼色黃而小。可供藥用。

採取　諸木上皆有之。入藥獨取桑上者用。

主治　大腸脫肛。燒研。和豬脂塗之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論線桑蠃曰。治小兒驚風。用七枚焙研。米飲服。

參玆資料　㊀小兒驚風。每以蜜丸通聖散服之。間以桑樹上牛兒陰乾焙研爲末。服之。以平其風。（朱丹溪）㊁桑牛。蝸牛。蛞蝓。三物皆一類。而形略殊。故其性味功用皆相彷彿。而桑牛治驚又與殭蠶。蠮螉同功。皆食桑者。其氣能入肝平風也。（李時珍）

【編笠百合】卽貝母之日本名。詳『貝母』條。

【緬豆】**產地**　雲南。

形態　蔓生。如豆。子大如栗。斑文點點。

主治　咀之。傅惡瘡良。

參玆資料　滇略云。緬豆性迅惡。誤服之。吐瀉致死。五雜俎云。滇中有神黃豆。似五倍子。能令兒童稀痘。然亦不甚驗也。

【緬茄】**古籍別名**　洒茄。（高濂珍異藥品）

產地　滇南及緬甸。

形態　枝葉皆似家茄。結實形大如栗。色紫。上有罩帽如畫皮樣。蒂圓鼇。堅如石。

主治　水磨。治牙痛。抹眼胭去火毒。又能解百藥毒。疔瘡走黃。

參玆資料　凡疔瘡走黃毒攻入內。不知人事。但有氣者可救。用緬茄一枚。以磁碗盛黃酒。將茄放碗內。磨得下磨不下。只管於酒內磨一鍾。約熟。菜時將酒裝入長頸錫壺內。再入連鬚葱二根。牙咬不令斷。白丑頭七粒。如蕎麥開花時。加蕎麥七粒。別時不用。又用小麥令衆人口嚼成麵筋。封固壺口。放

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水鍋內煮一炷香。取出熱服。出汗即愈。(良朋彙集)

【練】卽絹之古籍別名。典見綱目。詳『絹』條。

【練石草】卽馬光蒿之古籍別名。典見別錄。詳『馬光蒿』條。

【練鵲】**命名** 本品尾如鵲而長。毛白如練。帶故名。


古籍別名 帶鳥(禽經)三光鳥(動物學大辭典)拖白練(俗名)

外國名詞 Terpsiphone princeps Temm. Japanese paradise flycatcher (拉丁)或Longtailed flycatcher (英)サンコーチョー或サンクワウテウ或サンジヤク(日本)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類鶲科之練鵲。

產地 出山林間。

形態 練鵲爲林禽類之一種。其體比雀稍大。雄者頭部喉部黑色。有紺靛色之光澤。嘴青色。口緣有粗毛如髭。頭頂有長冠毛。背面紫黑。翼尾皆黑。尾羽中央有二羽特長。達尺餘。其雌者頭黑喉灰黑。背黃赤。翼尾皆暗褐。尾羽不及雄者之長。巢居山林。春遊原野。覓食蟲類及苔蘚等物。其肉可供藥用。



練鵲

採取 冬春採之。以食槐子者良。

性質 甘。溫。平。無毒。

主治 益氣治風疾。細剉炒香。袋盛浸酒中。取酒飲之。

【羯羊肉】卽羯羊肉之處方用名。詳『羊肉』條。

【羯肉】卽羊肉之古籍別名。典見綱目。詳『羊肉』條。

【羯婆羅香】卽冰片之古籍別名。典見本草衍義。詳『冰片』條。

【臧角】卽羚羊角之古籍別名。典見山海經。詳『羚羊角』條。

【翦刀草】卽玉如意之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉如意』條。

【翦口參】卽以東洋參之尾。蒸熟乾之。大尾中尾細尾夾尾等類皆從船廠參(卽石蠶子扁剛參)傍枝剪下。以枝條之粗細。分大中細夾等尾名目。近今市售僞名別條是也。又有別折一種。以扁剛參之形態不正者。剪去頭尾。名曰參頭。其中身名曰別折。皆爲側路。藉以混亂別直參也。若中虛者誤服之。立時胸腹脹滿。醫者不可不知也。其種類甚多。如參頭、東條、別折、大尾、中尾、細尾、夾尾之類是已。所云剪口者。乃是閩地藥家之命名耳。

【翦春羅】**古籍別名** 翦紅羅(綱目)松本仙翁花(日本)

外國名詞 Lychnis fulgens, Eisch. var. Cognata, Maxim. (拉丁)マツモト マツモトセンラウ(日本)

基本 係石竹科剪春羅屬。爲剪春羅之花葉。

產地 在山野平原間。

形態 剪春羅爲澀草類之宿根草。根莖葉俱似剪秋羅。高二尺許。葉卵圓作披針狀。無柄。微有毛。四月間莖梢開花。有紅白雜色。其莖葉可供藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 火帶瘡。遶腰生者。採花或葉。搗爛。蜜調塗之。爲末亦可。

參攷資料 剪春羅二月生苗。高尺餘。柔莖綠葉。葉對生。抱莖入夏開花。深紅色。花大如錢。凡六出。周迴如剪成。可愛。結實大如豆。內有細子。人家多種之爲玩。又有剪紅紗花。莖高三尺。葉旋覆夏秋開花。狀如石竹花稍大。四圍如剪。色紅。結穗似石竹。穗中有細子。方書不見用者。計其功。亦應利小便主癰腫也。(李時珍)

【翦紅羅】卽翦春羅之古籍別名。典見綱目。詳『翦春羅』條。

【翦草】卽剪草之原名。詳『剪草』條。

【翫月砂】卽兎屎之古籍別名。典見集驗方。詳『兎屎』條。

【膚如】卽大黃之古籍別名。典見吳普本草。詳『大黃』條。

【膠棗】卽大棗產於山東膠縣者之別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【膠菜】卽黃矮菜之俗名。詳『黃矮菜』條。

703／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【膠飴】卽飴餹之處方用名。詳『飴餹』條。

【薜牆仁】卽無漚之古籍別名。典見和漢藥考。詳『無漚』條。

【蓬】卽羊蹄之古籍別名。典見詩經小雅。詳『羊蹄』條。

【蓬茫】卽南陸之原名。詳『南陸』條。

【蓬芫】卽蓬莪芫之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬莪芫』條。

【蓬砂】

處方用名 硼砂。

古籍別名 鵬砂。(日華)盆砂。(綱目)南鹽砂。(和漢藥考)

外國名詞 Borax.(Borax)

基本 爲硼礦無色透明稜柱狀之小晶塊。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蓬砂原以四川產爲正。近日少到。因洋硼砂多到價平。多由咖喇吉打來。產西藏、印度、南北亞美利加等處。以石榴子紫茶色爲好。近日新到一種色黃白。係化學製成。形如白礬。萬國藥方卷三十一篇名爲硼酸。又名月石。和漢藥考曰。中國、印度、波斯、意大利、祕魯等產此。

形態 蓬砂卽化學上之硼酸鈉($Na_2B_4O_7.10H_2O$)爲無色透明稜柱狀結晶體。於空氣中風化。能溶於水。味鹹微甘。熱之則失却結晶水。成爲白色海綿狀物質。再加熱。則熔化成爲透明玻璃狀塊。

製法 凡使以白如明礬者良。研如飛塵用。

性質 苦。辛。暖。無毒。

效能 去痰熱。消癥核。有殺菌消毒之效。用於眼病。創傷痒瘡。又有收斂之效。用於口內炎。齒齦炎。咽喉炎。更爲黏滑保痲料。在胃中能激胃液之增加。至腸略有安撫作用。少量由大便排出。大半由胃中游離而達腎臟。能增進利尿之功。且可制止尿道及膀胱之炎症。外用有直接滅菌及寄生蟲之效。惟力頗緩弱。常用以治鼻炎與黏膜炎。及作防腐利尿通經等藥。

主治 消痰止嗽。破瘕結喉痺。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蓬砂曰。上焦痰熱。生津液。去口氣。消障翳。除噎膈反胃。積塊。結瘕肉陰潰骨哽。惡瘡及口齒諸病。【明】繆希雍本草經疏論蓬砂曰。蓬砂出於西南番。採取煎淋而結。亦如硝石礬砂之類。本經味苦辛。氣煖無毒。然詳其用。味應有鹹。氣亦微煖。色白而體輕。能解上焦胸膈肺分之痰熱。辛能散。苦能洩。鹹能軟。故主消痰止嗽。喉痺及破癥結也。蹇宗奭云。含化嚥津。治喉中腫痛。膈上痰熱。初覺便治。不能成喉痺也。兼能去口氣。消障翳。除噎膈。反胃。積塊。瘀肉。陰潰骨哽。惡瘡折傷。及口齒諸病。【淸】黃宮繡本草求眞。論蓬砂曰。蓬砂又名鵬砂。辛甘微鹹。氣溫色白。質輕。功專入上除熱。故云能除胸膈熱痰也。是以痰嗽喉痺。噎膈積聚。骨哽結核。眼目翳障。口齒諸病。凡在胸膈以上者。無不可以投治。況性能消金。豈有垢膩塊積。而不可以消導乎。第當審實而治。勿輕投也。出西番者。白如明礬。出南番者。黃如桃膠。打草湯煮化。微火炒鬆用。

國外學說 英美學說謂硼砂產西藏、印度、及南北亞美利加等處。內含一酸卽硼酸。其生成而經煉者。結冰無色。過光露空。則微化。此質能凝結成塊。與麝香大黃等物並運至遠處出售。其運至印度國者。必過雪山。謂之丁乾莽。又謂之生硼砂。如加熱則放水發腫。成鬆定質。謂之煅硼砂。加熱至紅。則熔如玻璃。謂之玻璃硼砂。此質可作銲藥之用。又有一種硼砂。於工藝中用之。此藥不常含有雜質。故其爲者亦甚少。其形與珠相類。或作八面珠形。或作三角珠形。色白。半過光。若夜間將兩珠互擦。則發生光亮。如用火烘去其所含之水。遂變爲枯硼砂。硼砂之味始則略甜。繼則略鹹而苦。以冷水二十二分。能化一分。甘油則一分。能化一分。沸水則一分。能化二分。濃酒則不能化。如用硼砂五釐。而以樹膠水一兩浸之。卽能令溶化爲膏。其作用微有收斂性。能洗去皮膚上污穢。又能利小便。調經。如婦人臨盆。服此藥則能令子宮發力。又如小兒口爛並生白點。宜以此藥外擦內服。其功用又能解熱。令子宮收縮。外用能治皮類病。治白屑風及遲瘢癥。宜將此藥入水內。至濃而不化。然後洗之。方效。處方以硼

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

砂二分細末。煉蜂蜜十六分。甘油一分和。共研勻爲度。治口瘡。又硼砂末及冰花糖或蜜糖各等分。研勻如小兒口爛。外用此塗之。又硼砂一錢。蜂蜜二錢。水足五兩。共化勻爲度。治咽喉類病。又硼砂一分。甘油一分。薔薇花汽水十六分。共化勻爲度。婦人洗面用之。又硼砂一分。豬油膏八分。研勻爲度。治凍瘡。外吹乳。又硼砂一錢。白醋一兩六錢八分。和勻。搽金錢癬。又硼砂八錢末。甘油四兩二錢。和勻。如瘡口瘡及皮膚癬症。即以此塗之。又硼砂末調水。或以甘油相和。搽嬰兒吮乳而致乳頭爛。勻妙。如潰爛瘡則宜塗以硼砂水。又硼砂二分末。清水二兩五錢二分。和化。如婦人白帶。則用水節射入。其用量大人每服一分至八分。至小兒則須量其大小用之。每服五釐至一分半。以沸水調服。又有一種名硼酸。係從硼砂與鹽强水製煉而成。更有生成在火山中。後經煉而成。西國所用之硼酸。大半爲地產。如多斯加納與里伯利海島等處。地面有開裂之處。常噴水汽。汽中有硼酸。將開裂處四面挖深。以磚與灰作內面。引水入其中。則水汽噴入水內。令水漸沸。待水收硼酸飽足。隨取其水熬至將乾。待冷。凝成顆粒。曬乾。則爲尋常出售之硼酸。其作用能去臭。殺除微細生物。止發霉腐變。搽爛瘡。止膿。與架波匿酸（石炭酸）略同。如打傷。割毒瘤傷口。用此藥水洗之。能解毒去微細生物。免其發膿。（西國割症後所用壓傷口之棉紗。可用硼酸沸水化至不能化。乃透溼其布。焙乾用之。）又如瘡。水蠐螬。沸水傷。皮膚作癢。肛門作癢。用以或搽或洗。均效。又如熱症中喉內生假皮。以新筆蘸藥水搽之。能殺假皮之細蟲。至小兒亦可用。照冷水二十五分化藥一分用之。則於喉內便無損礙。其功用又能治胃內發釀。外用能治火眼。及惡瘡潰瘡等。如用此藥一分。沸水三分化合。將麻絨布加入浸透。提出曬乾。敷患處。治瘡症最妙。

配合應用　㊀治鼻血不止。硼砂一錢。水服立止。（集簡方）

㊁治勞瘵有蟲。硼砂、硇砂、兔屎等分爲末。蜜丸梧子大。每服七丸。生甘草一分。新水一鍾。揉汁送下。自朔至望。五更時令病人勿言服之。（乾坤祕韞方）

㊂治木舌腫强。硼砂末、生薑片蘸搽。少時卽消。（普濟方）

㊃治咽喉穀賊。腫痛。蓬砂、牙消等分爲末。蜜和半錢。含嚥。（直指方）

㊄治咽喉腫痛。破棺丹、用蓬砂、白梅等分。搗丸。茨子大。每噙化一丸。（經驗方）

㊅治喉痺牙疳。盆砂末吹並擦之。（集簡方）

㊆治小兒陰瘡。腫大不消。硼砂一分。水研塗之。大有效。（集玄方）

㊇治飲酒不醉。先服硼砂二錢妙。（相感志方）

㊈治飲食毒物。硼砂四兩。甘草四兩。眞香油一斤。瓶內浸之。遇有毒者。服油一小盞。久浸尤佳。及一切惡瘡。（瑞竹堂經驗方）

㊉治喜肉瘀突。南硼砂黃色者一錢。片腦少許。研末。燈草蘸點之。（直指方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡非有餘實症者禁用。

參攷資料　㊀今醫家用硼砂治咽喉最爲要切。（蘇頌）㊁硼砂味甘微鹹而氣涼。色白而質輕。故能去胸膈上焦之熱。素問云。熱淫於內。治以鹹寒。以甘緩之。是也。其性能柔五金而去垢膩。故治噎膈積聚。骨哽結核。惡肉陰瘡用之者。取其柔物也。治痰熱眼目障翳用之者。取其去垢也。洪邁夷堅志云。鄱陽汪友良因食誤吞一骨。哽於咽中。百計不下。恍惚夢一朱衣人曰。惟南蓬砂最妙。遂取一塊。含化嚥汁。脫然而失。此輭堅之徵也。日華言其苦辛腥諛矣。（李時珍）㊂硼砂出南海。其狀甚光瑩。亦有極大塊者。諸方稀用。可銲金銀。（蘇頌）㊃南番者色重褐。其味和。入藥其效速。西戎者其色白。其味焦。入藥其功緩。（寇宗奭）㊄硼砂生西南番。有黃白二種。西者白如明礬。南者黃如桃膠。皆是煉結成如砌砂之類。西者柔物去垢。殺五金。與硇石同功。與砒石相得也。（李時珍）㊅製造之工。用硼砂以作

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

錠藥。有人以爲硼砂與腸胃之內皮相遇。可以得益。小兒口內生白點。可將硼砂一錢。蜜糖一兩和勻。搽於患處。(儒門事親方)

【蓬活】卽沙蓬之古籍別名。典見萬畢術。詳「蓬」條。

【蓬草子】古籍別名　飛蓬草。

(綱目)大米。黃蓬草。(本草拾遺)

產地　生田野間。

形態　蓬草爲穀類之一種。種類甚多。莖高尺餘。葉如柳葉有鋸齒。花甚小。色白。秋枯根拔。風捲而飛。其子可供藥用。

性質　酸澀。平。無毒。

主治　療飢。作飯食。

【蓬莪朮】處方用名　莪朮。蓬莪蒁。

古籍別名　蓬莪茂。蓬藥。蓬。莪茂。莪藥。廣茂。波殺。青薑。蓬朮。蓬蓬。破關符。(和漢藥考)

外國名詞　Zedoaria(拉丁)　Zedoary(英)　Zitwer.(德)

基本　屬薑荷科。藥用莪朮之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。莪朮產南寧、田州。大粒光滑者佳。安南、東京亦有出。

形態　莪朮春季自宿根抽莖。與葉俱類薑。黃葉稍狹。有紫色斑點。夏季於莖旁開紅色花。與鬱金花相似。藥用爲芋狀地下莖。曬乾者。外部黃褐色。內部暗色。大一二寸。中含澱粉頗多。其質亦作粉狀。味緩和。如樟腦而微苦。

種類　㈠名蓬莪者。黑色。㈡名莖者黃色。㈢名波殺者。味甘有大毒。㈣莪朮在根下。並生一好一惡。惡者有毒。西戎人取之。先飼羊食。羊不食者。藥之。㈤莪朮。卽南中薑黃根也。生海南者。名蓬莪蒁。

採取　八九月間。採根削去粗皮。蒸熟或曝乾。

製法　雷敩曰。凡使莪朮。於砂盆中以醋磨令盡。然後於火畔燻乾。重篩過。用蘇頌曰。此物極堅硬難搗。治時熱灰火中煨令透。乘熱搗之。卽碎如粉。李時珍曰。今人多以醋炒。或煮熟入藥。取其引入血分也。

性質　苦。辛。溫。無毒。

成分　含有淡黃色濃稠揮發油、樹脂、澱粉等。

效能　破血瘀。散氣結。治癥瘕。療疮癬。用作芳香性之健胃藥。治消化不良症。及作祛痰藥。亦有用爲通經藥。

主治　心腹痛。中惡痓。忤鬼氣。霍亂冷氣。吐酸水。解毒。食飲不消。酒研服之。又療婦人血氣結積。丈夫奔豚。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論。莪朮曰。破瘀癖冷氣。以酒醋磨服。【宋】大明日華諸家本草論。莪朮曰。治一切氣。開胃消食。通月經。消瘀血。止撲損痛。下血及內損惡血。【元】王好古湯液本草論。莪朮曰。通肝經。聚血。【明】李士材本草圖解論。莪朮曰。蓬莪迭苦辛而溫。專走肝家。破積聚惡血。疏痰食作痛。【明】繆希雍本草經疏論。莪朮曰。蓬莪茂味苦辛。其氣溫。能破氣中之血。入氣藥。發諸香主。積聚諸氣。爲最要之藥。與京三稜同用之。良。心腹痛者。非血氣不得調和。卽是邪客中焦所致。中惡痓。忤鬼。氣。皆由氣不調和。臟腑壅滯。陰陽乖隔。則疫癘痓忤鬼氣。得以

憑之。茂氣香烈。能調氣通痰。痰利則邪無所容而散矣。解毒之義。亦同乎是。其主霍亂冷氣吐酸水。及飲食不消。皆行氣之功也。故多用酒磨。又療婦人血氣結積。丈夫奔豚。入肝破血。行氣故也。多用醋磨。鬱金入心亦入肝。專主血分。亦散肝鬱。茂與三稜專能行氣破積。薑黃行氣破血。入脾爲多。【清】黃宮繡本草求眞。論莪朮曰。莪朮辛苦氣溫。大破肝經氣分之血。蓋人血氣安和。則氣與血通。血與氣附。一有所偏。非氣盛而血礙。卽血壅而氣滯。三稜氣味苦平。既於肝經血分逐氣。莪朮氣味辛溫。復於氣分逐血。故凡氣因血窒而見積痛不解。吐酸奔豚。痞癖癥瘕等症者。須當用此調治。俾氣自血而順。而不致閉結不解矣。但蓬朮雖屬磨積之味。若虛人服之。最屬可危。須得參朮補助爲妙。大者爲廣朮。灰火煨透。乘熱搗之。或醋磨酒磨。或煮熟用。

近人學說　㈠買九如曰。蓬朮色紫入肝。屬血分。以其味辛性烈。專攻氣中之血。主破積削堅。有星

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

移電閃之能。去積聚癖塊。經閉血瘀。撲損疼痛。與三稜功用頗同。亦勿過服。㊁張山雷曰。蓬莪茂今作蓬莪亦作蓬莪。朮茂字從艸從茂。而讀如朮。義不可曉。字書惟一見於字彙補。亦不詳其義。此藥生於根下。質極堅硬。味苦辛溫。故爲下氣除痰。消食逐飲。破積攻堅。通瘀行血。亦除癥瘕之藥。開寶本草謂治小腹痛。霍亂冷氣。吐酸水。解毒。食飲不消。婦人血氣結積。丈夫奔豚。甄權謂破症癖冷氣。藏謂通肝經。聚血。大明謂治一切氣。開胃消食。通月經。消瘀血。止撲損痛下血。及內損惡血。無非一溫通攻劫作用。惟實症爲宜。故石頑謂虛人得之。積不去而眞已竭。殊爲可慮。須得參朮健運補中。寓瀉。乃爲得力。

配合應用　㊀蓬莪朮得人參、橘皮、縮砂蜜、京三稜、肉豆蔻、青皮、麥蘗、穀蘗、木香。消一切飲食停滯積聚及小兒癥癖甚良。㊁治一切冷氣衝心切痛。發即欲死。久患心腹痛時發者。蓬莪茂酷煮二兩。木香煨一兩爲末。淡醋湯下半錢。（楊子建護命方）㊂治婦人血氣遊走作痛。及腰痛。茂同乾漆等分爲末。酒服二錢。腰痛核桃酒下。（普濟方）㊃治小兒盤腸內釣痛。以茂半兩。用阿魏一錢。化水浸過時。焙研。紫蘇湯下一字。（保幼大全方）㊄治小兒氣痛。以茂泡熟爲末。熱酒服一錢。（十全普救方）㊅治初生吐乳不止。用茂少許。鹽二釐。乳一合。煎三五沸。去滓。入牛黃二釐。服之甚效。（保幼大全方）㊆治渾身燎泡。每箇出水。有髒一片。如指甲大。其泡復生。抽盡肌肉。卽不可治。用茂同三稜各五錢爲末。分三服。酒調連進愈。（危氏得效方）㊇治小腸臟氣非時痛不可忍。用蓬莪茂研末。空心葱酒服一錢。（楊子建護命方）㊈治上氣喘急。蓬莪茂五錢。酒一盞半。煎八分服。（衛生方）㊉正元散。治氣不接續。兼治滑泄。及小便熱。王丞相服之有驗。用蓬莪茂一兩。金鈴子去核一兩爲末。入蓬砂一錢。煉過研細。每服二錢。溫酒或鹽湯空心服。（孫用和祕寶方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡體虛有積者禁用。如欲用之。須與參朮同施。

書名方劑　易簡紅丸。破癥消瘕。又治小兒脾胃之症。極有神效。（古方新解）蓬莪、三稜、橘皮、青皮、胡椒、乾薑、阿魏、蘗紅。上水泛爲丸。每服六十丸。薑湯下。

參攷資料　㊀蓬莪茂古方不見用者。今醫家治積聚諸氣。爲最要之藥。與荊三稜同用之。良婦人藥中亦多使。（蘇頌）㊁蓬莪色黑。破氣中之血。入氣藥。發諸香。雖爲泄劑。亦能益氣。故孫尙藥用治氣短不能接續。及大小七香丸、集香丸諸湯散。多用此也。又爲肝經血分藥。（王好古）㊂鬱金入心。專治血分之病。薑黃入脾。兼治血中之氣。蓬入肝。治氣中之血。稍爲不同。按王執中資生經云。執中久患心脾疼。服醒脾藥反服。用書城所載蓬莪蓬麵裹泡熟研末。以水與酒酷煎服立愈。蓋此藥能破氣中之血也。（李時珍）㊃蓬莪朮得酒醋良。（大明）㊄今浙江或有之。三月生苗在田野中。其莖如錢大。高二三尺。葉青白色。長一二尺。大五寸以來。頗類蘘荷。五月有花作穗。黃色。頭微紫。根如生薑而茂在根下。似雞鴨卵大小不常。九月採。削去粗皮。蒸熟曝乾用。（蘇頌）㊅蓬莪茂生西戎及廣南諸州。葉似蘘荷。子似乾椹。（李時珍）㊆蓬莪茂行氣破血。散結。是其功能之所長。若夫婦人小兒氣血兩虛。脾胃素弱。而無積滯者。用之反能損眞氣。使食愈不消。而脾胃益弱。卽有血氣凝結。飲食積滯。亦當與健脾開胃補益元氣藥同用。乃無損耳。（繆希雍）㊇日本藥局方曰。莪朮係採掘其球形之根莖。多從橫徑或縱徑切斷者。本品直徑二・五至四仙米。外面灰色。有多數根癥。切斷面亦爲灰色。皮厚約二至五密米。作圓板形者。概現有凹陷脈管束。筒其柔韌組織中。含有巨大扁平呈偏心性層紋之澱粉粒。本品氣味如樟腦而帶苦味。（和漢藥考）㊈莪朮原爲東印度產。日本

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

於明和年間從琉球傳入。（和漢藥考）

【蓬莪茂】卽蓬莪朮之古籍別名。典見開寶本草。詳『蓬莪朮』條。

【蓬莪蓯】卽蓬莪朮之處方用名。詳『蓬莪朮』條。

【蓬萊】卽木天蓼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木天蓼』條。

【蓬萊花】卽瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【蓬萊香】卽沈香大如竺者之古籍別名。典見綱目。詳『沈香』條。

【蓬萊紫】卽瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【蓬蔆】卽蓬莪朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬莪朮』條。

【蓬蕽】㈠卽南蒿之古籍別名。典見綱目。詳『南蒿』條。㈡卽沙米之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『沙米』條。

【蓬蒿】卽蘆花之原名。詳『蘆花』條。

【蓬藁】卽蓬蘽之古籍別名。典見綱目。詳『蓬蘽』條。

【蓬藥】命名　本品藤葉繁衍。蓬蓬纍纍故名。

處方用名　蓬藁子。蓬藁葉。

古籍別名　覆盆。陵藁。陰藁。（別錄）寒莓。（會編）割田薦。（綱目）草莓（日名）

外國名稱　Rubus Thunbergii, S. et Z.（拉丁）クサイチゴ　ヤブイチゴ　ワセイチゴ　ナベイチゴ　カンスイイチゴ（日本）

基本　係薔薇科。爲懸鉤子屬。

藥用蓬藁之子實與莖葉。

產地　在山野川澤間。

形態　蓬藁爲多年蔓生草本。莖有倒刺。逐節生葉。葉有三小葉。作橢圓形。大如掌。面青背白。有缺刻。莖與葉俱生細長之輭毛。夏秋間枝梢開五瓣之白花。花後就帶。結實成簇。與蛇莓相似。生則青黃。熟則紫黯。微有黑毛。其狀亦似熟楛而扁。經冬不凋。

採取　八九月間採實。莖葉採無時。採得陰乾。

性質　酸。平。無毒。

效能　補陰氣。益精力。用爲强壯藥。

主治　安五臟。益精氣。長陰。令人堅强志。倍力。有子。久服輕身不老。（本經）療暴中風。身熱大驚。（別錄）寒莓。（會編）割田薦。（綱目）草莓（日名）

外國名稱　Rubus Thunbergii, S. et Z.（拉丁）クサイチゴ　ヤブイチゴ　ワセイチゴ　ナベイチゴ　カンスイイチゴ（日本）

基本　係薔薇科。爲懸鉤子屬。

藥用蓬藁之子實與莖葉。

產地　在山野川澤間。

形態　蓬藁爲多年蔓生草本。莖有倒刺。逐節生葉。葉有三小葉。作橢圓形。大如掌。面青背白。有缺刻。莖與葉俱生細長之輭毛。夏秋間枝梢開五瓣之白花。花後就帶。結實成簇。與蛇莓相似。生則青黃。熟則紫黯。微有黑毛。其狀亦似熟楛而扁。經冬不凋。

採取　八九月間採實。莖葉採無時。採得陰乾。

性質　酸。平。無毒。

效能　補陰氣。益精力。用爲强壯藥。

主治　安五臟。益精氣。長陰。令人堅强志。倍力。有子。久服輕身不老。（本經）療暴中風。身熱大驚。

（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭（新修本草）論蓬藁子曰。益顏色。長髮。耐寒濕。

配合應用　長髮不落。蓬藁子榨油日塗之。（聖惠方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡有濕熱者禁用。

參攷資料　㈠蓬藁與覆盆同類。故別錄謂一名覆盆。此種生於丘陵之間。藤葉繁衍。蓬藁纍纍。異於覆盆。故曰蓬藁。陵藁。卽藤也。其實八月始熟。俚人名割田薦。（李時珍）㈡蓬藁是根名。方家不用。乃昌容所服以易顏者也。覆盆是實名。李當之云。是人所食莓子。以津汁爲昧。其核微細。今藥中用覆盆小異。未詳孰是。（陶弘景）㈢覆盆蓬藁。乃一物異名。本謂實非根也。李云莓子者近之矣。然生處不同。沃地則子大而甘。瘠地則子細而酸。此乃子有酸味。根無酸味。（蘇恭）㈣蓬藁乃覆盆之苗。莖覆盆乃蓬藁之子也。按切韻莓音茂。其子覆盆也。藁者藤也。則蓬藁明是藤蔓矣。陶言蓬藁是根。蘇言是子。一物異名。皆非矣。（馬志）㈤蓬藁是覆盆。苗處處有之。秦吳尤多。苗短不過尺。莖葉皆有刺。花白子赤黃。如半彈丸大。而下有蒂承之。如柿蒂。小兒多食之。五月採實。其苗葉採無時。江南謂之莓。然其地所生差晚。三月始有苗。八九月花開。十月實。用則同。（蘇頌）㈥今親採取之家說。蓬藁似蘡薁子。紅色而大。其味酸甘。葉似野薔薇。有刺。覆盆子小。其苗各別。諸家本草不識。故皆說蓬藁是覆盆子之根。（陳士良）㈦莓子是蓬藁子也。樹莓是覆盆子也。（大明）㈧蓬藁非覆盆也。別是一種。雖枯敗而枝梗不散。今人不見用此。（寇宗奭）㈨其類有三種。惟四月熟。狀如覆盆而味甘美者。爲是覆盆子。餘不堪入藥。（陳藏器）㈩蓬藁撇人謂之寒莓。沿塹作叢。莖生莖小葉密多刺。其實四五十顆作一朵。一朵大如盞面。霜後始紅。蘇恭圖經以此註覆盆誤矣。江南覆盆。亦四五月熟。何嘗差晚耶。覆盆莖粗葉疎。結實大而疎散。不似寒莓莖細葉密。結實小而成朵。一則夏熟。一則秋

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熟。豈得同哉。（汪機）㊁此類凡五種。予嘗親採。以爾雅所列者校之。始得其的。諸家所說。皆未可信也。

一種蔓藤繁衍。莖有倒刺。逐節生葉。葉大如掌狀。類小葵葉。面青背白。厚而有毛。六七月開小白花。就蒂結實。三四十顆成簇。生則青黃。熟則紫黯。微有黑毛。狀如熟椹而扁。冬月苗葉不凋者。俗名割田蕨。卽本草所謂蓬蘞也。一種蔓小於蓬蘞。亦有鉤刺。一枝五葉。葉小而面背皆青。光潭而無毛。開白花。四五月實成。子亦小於蓬蘞而疎稀。生則青黃。熟則爲赤。冬月苗凋者。俗名插田蕨。卽本草所謂覆盆子。爾雅所謂蓫缺盆也。此二者俱可入藥。一種蔓小於蓬蘞。一枝三葉。葉面青背淡白而微有毛。開小白花。四月實熟。其色紅如櫻桃者。俗名樗田蕨。卽爾雅所謂蘪者也。故郭璞註云。蘪卽莓也。子似覆盆而大。赤色。酢甜可食。此種不入藥用。

一種樹生者。樹高四五尺。葉似櫻桃葉而狹長。四月開小白花。結實與覆盆子一樣。但色紅爲異。俗亦名蘪。卽爾雅所謂山莓。陳藏器本草所謂懸鉤子者也。詳見本條。一種就地生。蔓長數寸。開黃花。結實如覆盆而鮮紅。不可食者。本草所謂蛇莓也。見本條。如此辨析。則蓬蘞覆盆自定矣。李當之、陳士良、陳藏器、寇宗奭、汪機五說。近是而欠明悉。陶弘景以蓬蘞爲根。覆盆爲子。馬志、蘇頌以蓬蘞爲苗。覆盆爲子。蘇恭以爲一物。大明以樹生者爲覆盆。皆臆說。不可據。（李時珍）

【蓬蘞子】卽蓬蘞之處方用名。詳『蓬蘞』條。

【蓬蘞葉】卽蓬蘞之處方用名。詳『蓬蘞』條。

【蓬鹽】卽鹽之產於草上者。功用詳『食鹽』條。

【蓮子粉粥】**基本**　本品卽蓮實粉和米煮成之粥。

主治　健脾。止洩痢。

【蓮子草】卽鱧腸之古籍別名。典見唐本草。詳『鱧腸』條。

【蓮中薏】卽蓮薏之處方用名。詳『蓮薏』條。

【蓮心】㊀卽蓮薏之處方用名。詳『蓮薏』條。㊁卽雨前茶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雨前茶』條。

【蓮肉】

原名　蓮實。藕實。

命名　蓮者。連也。花實相連而出。故名。其實俗稱曰蓮子。

處方用名　湘蓮肉。湘蓮。白蓮子。白蓮肉。建蓮。建蓮肉。

古籍別名　水芝（本經）。菡萏（爾雅）。玉擎。玉蜨。蒼葱。荷蓮。藕。珠實。珠蠶。湖目。紫的。澤芝。藕子。（和漢藥考）

外國名稱　Nelumbo nucifera, Gaertn.（拉丁）

基本　屬睡蓮科。其所結之蓮。蓬中有子。供藥用。卽蓮肉也。

產地　陳仁山藥物生產辨云。白蓮產江西玉山縣。原色者爲最。其餘浙江省金華府。安徽省均有出。巳上名白蓮。建蓮產福建。觀其外實似醜漏。皮色老紅。但實味之甘甜。居首。湘蓮產湖南湘潭。肉實幼嫩。宮粉紅皮色。食譜喜用之。安南東京產者。名東京蓮。類似湘蓮。但粒細小。岳州洞庭湖所產者。爲湖蓮。細粒皮瘦。紅且味劣。湖北省宋河、朱河、江西省都陽、饒州等。遲羅所產者。名遲蓮。與湘蓮同類。略爲大粒。



形態　蓮肉爲類殼斗之實。外呈綠色。未熟者柔軟而味甘。破之。中有苦味之青芽。有至秋季成熟者。作褐黑色。堅硬如石。實謂之石蓮子。

種植　以蓮子種者生遲。以藕芽種者最易生長。其芽穿泥成白藕。卽密也。嚙者乃莖下白藕在泥中者。

採取　紅花者蓮優。藕劣。白花者蓮劣。藕優。故採實宜紅花者。採藕宜白花者。各取其得氣之盛也。其子於六七月間採嫩者。生食之。味頗脆美。老者。八九月採取。曬乾。

製法　陶弘景曰。凡使蓮子。須八九月採。黑堅如石者。乾搥破。舂。頌曰。其蒂至秋黑而沉水。爲石蓮子。可磨爲飯食。李時珍曰。剝其黑殼。謂之蓮肉。以水浸去赤皮。青心。入藥須蒸熟去心。或曬或焙乾用。

709／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

亦有每一斤用豬胰肚一個盛貯煮熟搗焙用。

性質　甘平。濇。無毒。

效能　補心益脾。治泄固精。用作强壯滋養藥。

主治　補中養神。益氣力。除百疾。久服輕身耐老。不飢延年。

歷代記述致證　【唐】孟詵食療本草論蓮肉曰。主五臟不足。傷中益十二經脈血氣。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蓮肉曰。擣碎和米作粥飯食。輕身益氣。令人强健。【宋】大明日華諸家本草論蓮肉曰。止渴去熱。安心止痢。治腰痛及泄精。多食令人歡喜。【明】李時珍本草綱目論蓮肉曰。交心腎。厚腸胃。固精氣。强筋骨。補虛損。利耳目。除寒濕。止脾泄。久痢赤白濁。女人帶下崩中。諸血病。【明】陳嘉謨本草蒙筌論蓮肉曰。安靖上下君相火邪。【明】繆希雍本草經疏論蓮肉曰。藕實得天地清芳之氣。稟土中沖和之味。故味甘氣平。別錄寒無毒。入足太陰陽明。兼入手少陰經。土爲萬物之母。後天之元氣藉此以生化者也。母氣既和。則血氣生。神得所養。而疾病無由來矣。藕實正稟稼穡之化。乃脾家之果。故主補中養神。益氣力。除百疾。及久服輕身耐老。不飢延年也。孟詵主五臟不足。傷中益十二經脈血氣。大明主止渴去熱。安心止痢。治腰痛及洩精。多食令人喜。皆資其補益心脾之功也。【明】李士材本草圖解論蓮肉曰。蓮子甘平。補中養神。清心固精。定瀉。除崩帶。止赤白濁。安靖上下君相火邪。使心腎交而成既濟之妙。【清】黃宮繡本草求眞論蓮肉曰。蓮子書載。能入心脾腎三經。然稟氣清芳。味得中和。甘溫而濇。究皆脾家藥耳。中和則上下安養。君令臣恭。而無不交之患矣。故書載。能補心輿腎及通十二經絡。血脈。卽是此意。且其味濇。則能使氣不走。而夢遺崩帶失血等症可理。味濇則腸胃亦固。而無五更洞泄之虞。惟大便燥者勿服。去心皮。蒸熟焙乾用。得茯苓、山藥、白朮、枸杞良。蓮心味苦性寒。能治心熱。故產後血竭者。最宜石蓮色黑。入水則沈。入鹵則浮。煎鹽用。此鹹味苦性寒。能除噤口熱毒淋濁。果因熟成。亦可以解。然必本於蓮實。老於蓮房。墜入汙泥。經久堅黑。如石者方佳。若使出自粵東。產於樹上。大苦大寒。不宜入藥。【清】王士雄隨息居飲食譜論蓮肉曰。藕實（卽蓮子）鮮者甘平清心養胃。治噤口痢。生熟皆宜。乾者甘溫。可生可熟。安神補氣。鎮逆止嘔。固下焦。已崩帶遺精。厚腸胃。愈二便。不禁。可磨以和粉作餈。或同米煮爲粥。飯。健脾益腎。顏著奇勛。以紅花所結肉厚而軟者良。但性澀滯氣。生食須細嚼。熟食須開水泡。剝衣挑心。煨極爛。

近人學說　賈九如曰。蓮肉生於水澤。長於夏令。凝純陽而結。得天陽地陰。浹洽之氣。稟性和平。成清芳之質。用之去炙。主醒脾和胃。益肺厚腸。養精神。補元氣。利耳目。長肌肉。止脾瀉。瀉痢後宜倍用之。若連衣色類於血。味澀能斂諸失血後。佐參苓以補脾陰。使統血歸經。妙甚。

配合應用　㈠蓮子得川黃連、白芍藥、白藉豆、乾葛、升麻、紅麴、橘紅、甘草、滑石、烏梅爲丸。治滯下如神。㈡治下痢飲食不入。俗名噤口痢。此證大危。用鮮蓮肉一兩。黃連五錢。人參五錢。水煎濃。細細與。呷服。完思食便癒。㈢治脾腎俱虛。五更瀉。蓮子、菟絲子、五味子、山萊萸、山藥、車前子、肉豆蔻、砂仁、橘紅、茯實、人參、補骨脂、巴戟天。有肺熱者去人參、肉豆蔻。㈣治服食不饑。石蓮肉蒸熟去心。爲末。煉蜜丸。梧子大。日服三十丸。此仙家方也。（孟詵食療方）㈤補中强志。耳目聰明。用蓮實半兩。去皮心。研末。水煮熟。以粳米三合。作粥入末。攪勻食。（聖惠方）㈥補虛益損。水芝丹用蓮實半升。酒浸二宿。以牙猪肚一箇。洗淨。入蓮在內。縫定。煮熟。取出曬乾。爲末。酒煮米糊丸。梧子大。每服五十丸。食前溫酒送下。（醫學發明方）㈦治小便頻數。下焦眞氣虛弱者。用上方醋糊丸服。㈧治白精遺精。用蓮肉、白茯苓等分。爲末。白湯調服。（普濟方）㈨治眼赤作痛。用蓮實去皮研

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

末一盞。糜米半升。以水煮粥。常食。（普濟方）

㊄治小兒熱渴。蓮實二十枚。炒浮萍二錢半。生薑少許。水煎分三服。（聖濟總錄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡大便燥結者禁用。

著名方劑　清心蓮子飲。治心虛有熱。小便赤澀。（局方）黃芪、麥冬（去心）地骨皮、甘草（炙）車前子各半兩。石蓮子（去心）茯苓（去皮）黃耆（蜜炙）人參各七錢半。上剉末。每服三錢。另用麥冬十粒。水煎八分。水中沉冷。空心服。發熱加柴胡、薄荷。（此以散作湯飲）

參攷資料　㈠蓮產於淤泥而不爲泥染。居於水中而不爲水沒。根莖花實。凡品難同。清淨濟用。羣美兼得。自翦蔕而節節生蔈。生葉生花生藕。由藭蓄而生蓮。生蓮生藥。生藥生蔈。其蓮藥則始而黃。黃而青。青而綠。綠而黑。中含白肉。肉隱青心。石蓮堅剛。可歷永久。蔈藏生意。藕復萌芽。展轉生生。造化不息。故釋氏用爲引譬。妙理具存。醫家取爲服食。百病可却。蓋蓮之味甘氣溫。而性清稟清芳之氣。得稼穡之味。乃脾之果也。脾者黃宮所以交媾水火。會合木金者也。土爲元氣之母。母氣既和。津液相成。神乃自生。久視耐老。此其權輿也。昔人治心腎不交。勞傷白濁。有清心蓮子飲。補心腎益精血。有瑞蓮丸。皆得此理。（李時珍）㈡陳蓮子雖久煮不糜者。取蓮根新出嫩芽同煮。則爛矣。（汪謝成）㈢蓮子交心腎不可去心。然能滯氣。單用心則大降心火。（王秉衡）㈣蓮子最補胃氣而鎮虛。逆若反胃由於胃虛。而氣衝不納者。但日以乾蓮子細嚼而咽之。勝於他藥多矣。至痢症噤口熱邪傷其胃中清和之氣。故以黃連苦泄其邪。卽伏蓮子甘鎮其胃。今肆中石蓮皆僞。味苦反能傷胃。切不可用。惟鮮蓮子煎之。清香不渾。鎮胃之功獨勝。如無鮮蓮。乾蓮亦可。（王孟英）㈤藕生水中。其葉名荷。按爾雅云。荷芙蕖。其莖茄。其葉蕸。其木蕳。其華菡萏。其實蓮。其根藕。其中的。的中薏。邢昺註云。芙蕖總名也。別名芙蓉。江東人呼爲荷。菡萏。蓮花也。的。蓮實也。薏。的中青心也。郭璞註云。蔤。乃莖下白蒻在泥中者。蓮乃房也。的乃子也。薏乃中心苦薏也。江東人呼荷花爲芙蓉。北人以藕爲荷。亦以蓮爲荷。蜀人以藕爲茄。此皆習俗傳誤也。陸璣詩疏云。其莖爲荷。其花未發爲菡萏。已發爲芙蕖。其實蓮。蓮之皮青裏白。其子肥。肥之說青肉白。的內青心二三分。爲苦薏也。（韓保昇）㈥爾雅以荷爲根名。韓氏以荷爲葉名。陸璣以荷爲莖名。按莖乃負葉者也。有負荷之義。當從陸說。蔤乃嫩蒻如竹之行鞭者。節生二莖。一爲葉。一爲花。盡處乃生藕。爲花葉根實之本。顯仁藏用。功成不居。可謂退藏於密矣。故謂之蔤。花葉當偶生。不偶不生。故根曰藕。或云藕善耕泥。故字從耦。耦者耕也。茄音加。加於蔤上也。蔤音遐。遠於密也。菡萏函含未發之意。芙蓉敷布容豔之意。蓮者連也。花實相連而出也。的者的也。子在房中。點點如的的也。的乃凡物點註之名。薏猶意也。含苦在內也。古詩云。食子心無藥苦心生意存是矣。（李時珍）

【蓮房】處方用名　蓮蓬。蓮殼。蓮蓬。

基本　屬睡蓮科。爲蓮實之果殼。

產地　陳仁山藥物生產辨云。蓮蓬中西各省各屬均有。

形態　蓮房形圓。極似蜂房。蒂部隆起。肉藏果實。生時色青。熟則色轉黃褐。

採取　七八月採之。

製法　凡使以陳久者良。入研用或焙用。

性質　苦。澀。濕。無毒。

效能　化瘀止血。用作收澀藥。

主治　治血脹腹痛及產後胎衣不下。酒煮服之。水煮服之。解野菌毒。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草。論蓮房曰。破血。【明】李時珍本草綱目。論蓮房曰。止血崩下血。溺血。【清】王士雄隨息居飲食譜。論蓮房曰。蓮房破血。亦能止血。酒煮服治胎衣不下。水煎飲解野菌毒。

711／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

配合應用 ㊀治經血不止。瑞蓮散。用陳蓮蓬殼。燒存性。研末。每服二錢。熱酒下。（婦人經驗方）㊁治血崩不止。不拘冷熱。用蓮蓬殼、荊芥穗各燒存性等分。爲末。每服二錢。米飲下。（聖惠方）㊂治產後血崩。蓮蓬殼五箇。香附二兩。各燒存性。爲末。每服二錢。米飲下。日二。（婦人良方）㊃治漏胎下血。蓮房燒研。麵糊丸。梧子大。每服百丸。湯酒任下。日二。（朱氏集驗方）㊄治小便血淋。蓮房燒存性爲末。入麝香少許。每服二錢。空心米飲調下。日二。（經驗方）㊅治天泡濕瘡。蓮蓬殼燒存性研末。井泥調塗神效。（海上方）

用量 錢半至三錢。

參攷資料 蓮房入厥陰血分。治瘀散血。與荷葉同功。亦急則治標之意也。（李時珍）

【蓮花】

處方用名 蓮花瓣。荷花瓣。

古籍別名 芙蓉。芙蕖。（古今注）水華。菡萏。（綱目）

基本 屬睡蓮科。爲蓮藕之花。

產地 凡栽蓮藕之池澤間恒有之。

採取 六七月間採之。陰乾用。

性質 苦甘溫。無毒。

效能 利濕貼瘡。用作濕瘡藥。

主治 鎮心。益色。駐顏。輕身。

配合應用 ㊀服食駐顏。七月七日採蓮花七分。八月八日採根八分。九月九日採實九分。陰乾。搗篩。每服方寸匕。溫酒調服。（太清草木方）㊁治天泡濕瘡。荷花貼之。（簡便方）㊂難產催生。蓮花一瓣。書人字吞之。卽易產。（肘後方）㊃治墜損。嘔血。墜跌積血心胃。嘔血不止。用乾荷花爲末。每酒服方寸匕。其效如神。（楊洪鑒方摘要方）

用量 三分至八分。

施用宜忌 忌地黃、葱、蒜。

【蓮花瓣】卽蓮花之處方用名。詳『蓮花』條。

【蓮蓬】卽蓮房之處方用名。詳『蓮房』條。

【蓮蓬殼】卽蓮房之處方用名。詳『蓮房』條。

【蓮蓬鬚】卽蓮鬚之原名。詳『蓮鬚』條。

【蓮薏】

命名 薏猶意。含意在內之義。乃蓮子中之青心。故名。

處方用名 蓮心。蓮中薏。

古籍別名 苦薏。（綱目）

基本 屬睡蓮科。爲蓮實中心之仁。

性質 苦。寒。無毒。

效能 清熱。解渴。

主治 血渴。產後渴。生研末。米飲服二錢。立愈。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論蓮薏曰。止霍亂。【明】李時珍本草綱目論蓮薏曰。清心去熱。【淸】汪訒庵本草備要論蓮薏曰。蓮心爲末。米飲下。療產後血竭。【淸】王士雄隨息居飲食譜論蓮薏曰。薏蓮子中青心也。苦涼。斂液止汗。淸熱養神。止血固精。所謂能令人作吐。（陳藏器）㊁蓮心甘苦鹹。倒生根。由心走腎。能使心火下通於腎。又回環上升。能使腎水上潮於心。（王棄衡）

【蓮藕】卽藕之處方用名。詳『藕』條。

【蓮鬚】

原名 蓮蓬鬚。

命名 本品乃蓮之花鬚。故名。

處方用名 白蓮鬚。淨蓮鬚。

古籍別名 佛座鬚。（綱目）

外國名詞 Lotus Stemens.

基本 屬睡蓮科。爲蓮花中間之蓬鬚。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蓮鬚各省均有出。以廣東各屬爲最好。安南東京爲最多出。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態　蓮鬚長僅寸餘。實輾如綿。生時色黃。乾則色白。

採取　夏季開花時。晨早採之。採得陰乾待用。

性質　甘。濇。溫。無毒。

效能　固腎。濇精。用作收濇藥。

主治　清心通腎。固精氣。烏鬚髮。悅顏色。益血止血。血崩吐血。

歷代記述攷證　【明】繆希雍本草經疏論蓮鬚曰。蓮蓬鬚一名佛座鬚。味甘澀。氣溫。本經不收。而古方固眞。補益方中。往往用之。詳其主治。乃是足少陰經藥。亦能通手少陰經。能清心入腎。固精氣。烏鬚髮。止吐血。療滑泄。同黃蘗、砂仁、沙苑蒺藜、魚膠、五味子、覆盆子、生甘草、牡蠣作丸。治夢遺精滑最良。【明】李士材本草圖解論蓮鬚曰。蓮鬚甘濇。清心止血。通腎固精。男子腎泄。女子崩帶。【清】黃宮繡本草求眞論蓮鬚曰。蓮鬚甘溫而濇。功與蓮子略同。但濇性居多。服之能清心通腎。益血固精。烏鬚黑髮。止崩住帶。如三因固眞丸。巨勝子丸。並皆用之。凡慾動精薄而見滑脫不禁。治當用此。祕濇但不似龍骨寒濇。有收陰定魂安魄之妙。牡蠣鹹澁微寒。兼有化堅解熱之功。金櫻徒有阻濇之力。而無清心通堅之理耳。

辨僞　陳仁山曰。蓮鬚有眞有僞。僞者葵花也。蓮鬚身帶扁闊而軟。葵花原來一球散開像蓮鬚。但條子幼而帶硬。若氣味則難分也。

配合應用　治久近痔漏三十年者。三服除根。用蓮鬚黑牽牛頭末各兩半。當歸五錢。爲末。每空心酒服二錢。忌熱物。五日見效。（孫氏集效方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡小便不利者禁用。忌地黃葱蒜。

參攷資料　㈠蓮鬚溫而不熱。血家瀉家。尊爲上品也。（孫思邈）㈡蓮鬚甘濇清心而諸竅之血出可止。固腎而丹田之精氣無遺可止洩瀉。能黑鬚髮。（陳默齋）

【蓯蓉】　卽肉蓯蓉之簡稱。詳『肉蓯蓉』條。

【蓴】　**命名**　蓴字本作蒓。純乃絲名。其莖似之故名。

古籍別名　蓴菜（別錄）。蒪水葵（詩疏）。露葵。馬蹄草。錦帶。缺盆草。嫩莖名稚蓴。舒長者名絲蓴。秋老者名葵蓴。駭蓴。瑰蓴。龜蓴。（綱目）

外國名詞　Brasenia Purpurea, casp.（拉丁）ジュンサイ ヌナハ（日本）

基本　係睡蓮科蓴屬。藥用蓴菜之莖葉。

產地　生江浙湖澤中。

形態　蓴菜爲水草類之多年生草本。亦爲蔬類植物之一種。其嫩莖嫩葉。被以黏液。葉楕圓形如楯狀。浮水面。有長葉柄。着生於葉身下面之近中央處。夏月花生於葉腋。萼三片。花冠三瓣。俱呈赤褐色。雄蕊紫赤色。花而數多。結實如棠梨。中有細子。其莖葉可供食與藥用。



蓴

性質　甘。寒。無毒。

主治　消渴。熱痺。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論蓴菜曰。和鯽魚作羹食。下氣止嘔。多食壓丹石。補大小腸虛氣。不宜過多。【宋】大明諸家本草論蓴菜曰。治熱痙。痔腸。胃安下焦。逐水解百藥毒。幷蟲氣。

參攷資料　㈠蓴性冷而補下氣。雜鱧魚作羹食。亦逐水而性滑。服食家不可多用。（陶弘景）㈡蓴久食大宜人。合鮒魚作羹食。主胃弱。不下食者至效。又宜老人。應入上品。故張翰臨秋風思吳中之鱸蓴羹也。（蘇恭）㈢蓴體滑。常食發氣。令關節急。嗜睡。脚氣論中令人食之。此誤極深也。溫病後脾弱不能磨化。食者多死。予所居近湖。湖中有蓴藕。年中疫甚。飢人取蓴食之。雖病瘥者。亦死。至秋大旱。人多血痢。湖中水竭。掘藕食之。闔境無他。蓴藕之功於斯見矣。（陳藏器）㈣蓴雖冷。補熱食及多食。亦攏氣。不下。甚損人胃及齒。令人顏色惡。損毛髮。和醋食。令人骨蹇。（孟詵）

【蓴菜】　卽蓴之古籍別名。典見別錄。詳『蓴』條。

【蓓】　卽白花益母草之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見爾雅。詳㕮益母草下條。

【蔓根】主治　血氣攻心。洗剉浸酒飲。

【蔓酒】基本　本品爲蔓汁和麴米所釀之酒。

主治　久服聰耳明目健脾强胃。

【蔓莖葉】性質　辛。溫。無毒。

歸舌除大小腸邪氣。利中益志。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論蔓莖葉曰。乾之釀酒。主治風冷大良。【唐】陳藏器本草拾遺論蔓莖葉曰。作生菜食。能入腰脚。煑湯浸脚。治霍亂轉筋。煑汁日飲。治疫癘。搗爛傅狐尿瘡。【宋】大明諸家本草論蔓莖葉曰。脚暴轉。赤蔓燒灰淋汁浸之。以桑葉蒸暑立愈。【明】李時珍本草綱目論蔓莖葉曰。殺蟲伏癗。

參攷資料　黃帝云。食蔓過多有毒。發心痛。和生魚食。令人脫氣陰核痛。求死。二月食蔓傷人胃。扁鵲云。久食令人寒熱。損髓減氣。少精。婦人月事來時。食蔓蒜變爲淋。與大麥麵相宜（孫思邈）

【蔓實】命名　蔓類皆高揚。故字從蔓。高飛貌也。古人種蔓爲蔬。收子入藥。故名。

基本　屬蔓科。藥用蔓之子實。

產地　湖澤水濱間恒有生焉。

形態　蔓屬澀草類中爲一年之生草本。種類甚多。花色皆紅白。子大亦皆似胡麻。色黑而尖扁。採供藥用。

採取　秋季採實。尤以青紫香三者佳。採得陰乾用。

性質　辛。溫。無毒。

效能　明眼目。消癰腫。用作眼科藥。又爲瘡毒藥。

主治　明目溫中。耐風寒。下水氣。面浮腫。癰瘍。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論蔓實曰。歸鼻除腎氣。去癰瘍。止霍亂。治小兒頭瘡。

近人學說　張山雷曰。蔓之種類不一。有宜於高燥之地。有產於下溼之旁。高者枝葉扶疏。迷離簇蔭。核痛求死。二月食蔓傷人胃扁鵲云。久食令人寒熱。損髓減氣。少精。婦人月事來時。食蔓蒜變爲淋。與大麥麵相宜（孫思邈）

【蔓莖葉】性質　辛。溫。無毒。

歸舌除大小腸邪氣。利中益志。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論蔓莖葉曰。乾之釀酒。主治風冷大良。【唐】陳藏器本草拾遺論蔓莖葉曰。作生菜食。能入腰脚。煑湯浸脚。治霍亂轉筋。煑汁日飲。治疫癘。搗爛傅狐尿瘡。【宋】大明諸家本草論蔓莖葉曰。脚暴轉。赤蔓燒灰淋汁浸之。以桑葉蒸暑立愈。【明】李時珍本草綱目論蔓莖葉曰。殺蟲伏癗。

參攷資料　黃帝云。食蔓過多有毒。發心痛。和生魚食。令人脫氣陰核痛。求死。二月食蔓傷人胃扁鵲云。久食令人寒熱。損髓減氣。少精。婦人月事來時。食蔓蒜變爲淋。與大麥麵相宜（孫思邈）

【蔓實】命名　蔓類皆高揚。故字從蔓。高飛貌也。古人種蔓爲蔬。收子入藥。故名。

基本　屬蔓科。藥用蔓之子實。

產地　湖澤水濱間恒有生焉。

形態　蔓屬澀草類中爲一年之生草本。種類甚多。花色皆紅白。子大亦皆似胡麻。色黑而尖扁。採供藥用。

採取　秋季採實。尤以青紫香三者佳。採得陰乾用。

性質　辛。溫。無毒。

效能　明眼目。消癰腫。用作眼科藥。又爲瘡毒藥。

主治　明目溫中。耐風寒。下水氣。面浮腫。癰瘍。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論蔓實曰。歸鼻除腎氣。去癰瘍。止霍亂。治小兒頭瘡。

近人學說　張山雷曰。蔓之種類不一。有宜於高燥之地。有產於下溼之旁。高者枝葉扶疏。迷離簇蔭。核痛求死。二月食蔓傷人胃。扁鵲云。久食令人寒熱。損髓減氣。少精。婦人月事來時。食蔓蒜變爲淋。與大麥麵相宜（孫思邈）

其味皆辛。生長極易。故皆善於走竄。爲利水消腫之猛藥。又莖葉紫赤。花穗殷紅。則又入血分。而破瘀逐血。癥積消瘕。本經止有蔓實。別錄乃增以莖草。至瀕湖綱目則羅列四五種。其氣味本經謂之辛溫。所以後世有蔓辣草之名。別錄以紅草爲味鹹微寒。似不可據。本經蔓實稱其下水氣。治面浮腫癰瘍。甄權謂其治癥瘍止霍亂。弘景謂蔓葉乾之釀酒。主風冷。藏器謂蔓葉治霍亂轉筋。煑汁日飲。治疫癘。日華謂赤蔓燒灰淋汁浸足。治暴轆。唐本草謂水蔓葉搗敷蛇傷。絞汁服之。解蛇毒入腹心悶。又治脚氣腫痛成瘡。水煎漬之。瀕湖謂水莊花散血消積止痛。凡此主治。皆是通泄宣導利水破血之用。石頑謂婦人月事來時。不可食蔓及蒜。易爲血淋帶下。亦以辛泄過度。破氣傷血故也。又謂蔓實水莊花子。破瘀消積。力量甚峻。最易墮胎。娠婦必不可犯。亦有血氣素虛而月事濇少。非因於瘀滯者。亦不可誤與也。

配合應用　㈠治傷寒勞復。因突後卵腫。或縮入腹痛。蔓子一把。水挼汁飲一升。（肘後方）

㈡治霍亂煩渴。蔓子一兩。香薷二兩。每服二錢。水煎服。（聖惠方）

㈢治小兒頭瘡。蔓子爲末。窰和雞子白同塗之。蟲出不作痕。（藥性論方）

㈣治蝸牛咬毒。行徧身者。蔓子煎水浸之立愈。不可近陰令弱也。（陳藏器方）

用量　錢半至三錢。

參攷資料　㈠蔓實多食。吐水穀氣。損陽。（甄權）㈡此類多人所食。有三種。一是青蔓。人家常用。其葉有圓有尖。以圓者爲勝。所用卽此也。一是紫蔓。相似而紫色。一是香蔓。相似而香。並不甚辛。好食。（陶弘景）㈢蔓類甚多。有青蔓。香蔓。水蔓。馬蔓。紫蔓。赤蔓。木蔓七種。紫赤二蔓。葉小狹而厚。青香二蔓。葉亦相似而俱薄。馬水二蔓。葉俱闊大。上有黑點。水蔓一名天蔓。蔓生。葉似柘葉。六蔓花皆紅白。子皆大。如胡麻。赤黑而尖扁。惟木蔓花黃白。子皮青滑。諸蔓並冬死。惟香蔓宿根重生。可爲生菜。（韓保昇）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊃木蓼亦有大小二種。皆蔓生。陶氏以青蓼入藥。餘亦無用。三茅君傳有作白蓼醬方。藥譜無白蓼。疑即青蓼也。(蘇頌)㊄韓保昇所說甚明。古人種蓼爲蔬。收子入藥。故禮記烹雞豚魚鱉皆實蓼於其腹中。而和羹膾亦須切蓼也。後世飲食不用。人亦不復栽。惟造酒麴者用其汁耳。今但以平澤所生香蓼青蓼紫蓼爲良。(李時珍)㊅蓼實。即神農本經第十一卷中水蓼之子也。彼言蓼則用莖。此言實。即用子。故此復論子之功。故分爲二條。春初以葫蘆盛水浸澤。高掛於火上。晝夜使煖。遂生紅芽。取以爲蔬。以備五辛盤。又一種水紅。與此相類。但苗莖高及丈。取子微炒。磨爲細末。薄酒調二三錢服。治瘧癘久則效。效則已。(寇宗奭)

【蓼蕎】原名　山蘿。

產地　生平澤麥田間。

形態　蓼蕎爲菜類之一種。苗如葱韭。但葉比常蘿爲小。力較常蘿爲大。可供藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　霍亂。腹冷脹滿。冷氣攻擊。腹痛不調。婦人產後。血攻胸膈刺痛。煮服之。

【蓼螺】命名　本品味辛辣如蓼。故名。

古籍別名　蓼蠃(本草拾遺)

產地　生海中。

形態　蓼螺爲蟲類之一種。其色紫。有錦紋。肉可食。與供藥用。

性質　辛。平。無毒。

主治　飛尸遊蟲。生食之。或浸以醯醋食。彌佳。

【蓼藍】卽藍之古籍別名。與見嘉祐圖經本草。詳『藍實』條。

【蓼蠃】卽蓼螺之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『蓼螺』條。

【蕈勃泛】卽蕈撥根之原名。詳『蕈撥根』條。

【蕈茇】卽蕈撥之原名。詳『蕈撥』條。

【蕈撥】原名　蕈茇。

古籍別名　蛤蓌。椎聖。(和漢藥考)阿利訶陀。(酉陽雜俎)蕈勃。(藏器)逼撥。(扶南傳)蕈發。(大明會典)

外國名詞　Piper longum

基本　屬胡椒科。爲蕈撥之實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。蕈撥安南石叻均有出。仍以石叻爲上。九十月新。和漢藥考曰。日本無產。係產東印度及其餘熱帶地方。

形態　蕈撥爲多年生草本。春發苗作叢。莖高三四尺。其莖如箸。葉青圓如葵。榮闊二三寸。如桑面光而厚。三月間開白花。七月結子。如小指長。色青黑。爲無數細實密綴而生。類似赤楊之葉。黃花長一二寸。粗二三分。味辛。有胡椒之香氣。

採取　九十月間採之。

製法　雷敩曰。凡使蕈撥。須去挺用頭。以醋浸一宿焙乾。以刀刮去皮。粟子令淨。乃用。免傷人肺。令人上氣。

性質　辛。大溫。無毒。

成分　蕈茇林(Piperin. $C_{17}H_{19}NO_3$)爲其主要之成分。

效能　溫中止胃脘寒痛。下氣。治水飲嘔逆。用作鎭痛藥。用於頭痛、牙痛、脘痛諸症。又爲鼻淵之要藥。

主治　溫中下氣。補腰脚。殺腥氣。消食。除胃冷。陰疝癖。

歷代記述弦證　【唐】李珣海藥本草論蕈撥曰。水瀉虛痢。嘔逆。醋心。產後洩痢。與阿魏和合良。得訶子、人參、桂心、乾薑。治臟腑虛冷。腸鳴。神效。【宋】大明諸家本草論蕈撥曰。霍亂冷氣。心痛血氣。【明】李時珍本草綱目論蕈撥曰。治頭痛。鼻淵。牙痛。【明】李士材本草圖解論蕈撥曰。蕈撥辛熱。入肺脾經。溫痺而除嘔逆。定瀉而理心痛。【清】黃宮繡本草求眞論蕈撥曰。蕈撥氣味辛熱。凡一切風寒內積。逆於胸膈而見惡心嘔吐。見於下部而見腸鳴冷痢水瀉。發於頭面而見齒牙頭痛鼻淵。停於肚腹而見中滿痞塞疼痛。俱可用此投治。以其氣味辛溫。則寒自爾見除。其曰鼻淵頭痛。亦是取其辛熱。能入陽明。以散浮熱之意。是以病患偏頭痛風。須先口含溫水。隨左右以此末吹鼻。最效。牙疼必同乾薑細辛調治。亦取能以除寒之意。總之氣味既辛。則凡病屬寒起者。皆可以投。然亦泄人眞氣。不可任意多服。以致喘咳目昏。腸虛下重。喪其眞

715／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

氣也。

近人學說　張山雷曰。藁茭亦作藁撥。原出波斯。蓋亦彼中方言故無正字。氣味辛溫。固亦脾腎虛寒之主藥。藏器謂溫中下氣。補腰腳。消食。除胃冷。陰疝癖。則功用可知。（藏器別有藁勃沒一條。亦言辛溫。治冷氣嘔逆。心腹脹滿。食不消化。陰汗寒疝。核腫。婦人內冷。無子。除腰腎冷云云。藥名主治同。蓋本是覆出之未及刪除者。而瀕湖亦引之。附入藁茭之後。蓋亦失檢。）李珣謂治水瀉虛痢。嘔逆醋心。臟腑虛冷。腸鳴。大明謂治霍亂冷氣心痛。其旨皆同。惟瀕湖謂是頭痛鼻淵牙痛要藥。取其辛熱能入陽明而散浮熱。頗按頭痛固有眞寒一症之宜用大辛大溫者。但鼻淵牙痛。本皆火症。古人偶用辛散之藥。蓋亦反佐之義。用作嚮導。瀕湖竟以爲散浮熱。恐是誤會。石頑和之。非也。

配合應用　㊀治冷痰惡心。藁茭一兩爲末。食前用米湯服半錢。（聖惠方）

㊁治暴泄身冷。自汗。甚則欲嘔。小便清。脈微弱。宜已寒丸。治之。藁茭、肉桂各二錢半。高良薑、乾薑各三錢半。爲末。糊丸。梧子大。每服三十丸。薑湯下。（和劑局方）

㊂治胃冷口酸。流清水。心下連臍痛。用藁茭半兩。厚朴薑汁浸炙一兩。爲末。入熱鯽魚肉。研和丸。綠豆大。每米飲下二十丸。立效。（余居士選奇方）

㊃瘧氣成塊。在腹不散。用藁茭一兩。大黃一兩。並生爲末。入麝香少許。煉蜜丸。梧子大。每冷酒服三十丸。（永類鈐方）

㊄治婦人血氣作痛。及下血無時。月水不調。用藁茭鹽炒、蒲黃炒等分。爲末。煉蜜丸。梧子大。每空心溫酒服三十丸。兩服卽止。名二神丸。（陳氏方）

㊅治偏頭風痛。藁茭爲末。令患者口含溫水。隨左右痛。以左右鼻吸一字。有效。（經驗良方）

㊆治鼻流清涕。藁茭末吹之。有效。（衛生易簡方）

㊇治風蟲牙痛。藁茭末揩之。煎蒼耳湯漱去涎。本草權度。又用藁茭末、木鼈子肉研膏。化開嗑鼻。又用藁茭、胡椒等分。爲末。化蠟丸。麻子大。每以一丸塞孔中。（聖濟總錄方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡肺脾有實熱鬱火者禁用。

參攷資料　㊀藁茭走腸胃。冷氣嘔吐。心腹滿痛者宜之。多服走泄眞氣。令人腸虛下重。（寇宗奭）

㊁按唐太宗實錄云。貞觀中。上以氣痢久未痊。服名醫藥不應。因詔訪求其方。有術士進黃牛乳煎藁茭方。御用有效。掌禹錫亦記其事云。後累試於虛冷者必效。（蘇頌）

㊂藁撥當作藁茭。出南方草木狀。番語也。陳藏器本草作拏勃。扶南傳作逼撥。大明會典作藁撥。又段成式酉陽雜俎云。摩伽陀國呼爲藁撥梨。拂菻國呼爲阿梨訶陀。（李時珍）㊃藁撥生波斯國。叢生。莖葉似蒟醬。其子緊細。味辛烈於蒟醬。胡人將來入食味用也。（蘇恭）㊄其根名拏勃泥。似柴胡而黑硬。（陳藏器）㊅今嶺南特有之。多生竹林內。正月發苗。作叢。高三四尺。其莖如筋。葉青圓如薤。葉闊二三寸。如桑面光而厚。三月開花。白色。在表。七月結子。如小指大。長二寸已來。青黑色。類楛子而長。九月收。米曬曝。乾。南人愛其辛香。或取葉生茹之。復有舶上來者。更辛香。（蘇頌）㊆段成式言。青州防風子可亂藁茭。蓋亦不然。藁茭氣味正如胡椒。其形長一二寸。防風子圓如胡荽子。大不相侔也。（李時珍）

【藁撥根】原名　藁勃泛。

性質　辛。溫。無毒。

主治　五勞七傷。冷氣嘔逆。心腹脹滿。食不消化。陰汗寒疝。核腫。婦人內冷無子。治腰腎冷。除血氣。

【藁澄茄】　卽蒟之古籍別名。典見綱目。詳『蒟』條。

【蓬】　卽蒟之古籍別名。典見別錄。詳『蒟』條。

【蓬茇花】性質　濇。無毒。

主治　入染鬚髮方。

【蓬茇殼】主治　入染鬚髮方。

【蓬】　卽蒟之古籍別名。典見綱目。詳『蒟』條。

【蓬子】　卽決明子之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見和漢藥考』詳『決明子』條。

【蕘瓜仁】卽瓜蔞仁之原名。詳『瓜蔞仁』條。

【蕙菜】命名　本品味辛辣如火蕙人。故名。

古籍別名　蕙菜。辣米菜。（綱目）犬芥（日本）

外國名詞　Nasturtium montanum, Wall.（拉丁）イヌガラシ　アセダイコン（日本）

基本　係十字花科蕙菜屬藥用蕙菜之莖葉。

產地　野生田圃間。

形態　蕙菜爲菜類之多年生雜草本。其根深入於地。芟除頗難。莖隨土地之肥瘠大小不一。高二三寸至一二尺。葉長橢圓形。羽狀分裂。亦有不分裂者。葉緣有不齊之鋸刻及鋸齒。春季開花。總狀花序。花小黃色。四花瓣。四强雄蕊。結實爲細角。乾果細而長。呈線形。約五六分。熟則裂。其莖葉可供食與藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　去冷氣。腹內久寒。飲食不消。令人能食。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論蕙菜曰。利胸膈。醫冷痰。心腹痛。

參攷資料　蕙菜爲細切。以生蜜洗拌。或略灼。食之爽口消食。多食發痼疾。生熱。（李廷飛）

【薔】卽白薔之古籍別名。典見綱目詳『白薔』條。

【蕨母】卽貝母之古籍別名。典見和漢藥考詳『貝母』條。

【蕤于】卽蠶草之古籍別名。典見爾雅。詳『蠶草』條。

【蕤女蘿】卽松蘿之古籍別名。典見和漢藥考詳『松蘿』條。

【蕤延】卽王孫之古籍別名。典見吳普本草。詳『王孫』條。

【蕤芋】卽芋子之古籍別名。典見綱目詳『芋子』條。

【蕤荔枝】卽苦瓜之日本名。詳『苦瓜』條。

【蔓荊子】命名　蔓荊苗蔓生。故名。

古籍別名　黃荊。大荊子。僧法實。陸績丸（和漢藥考）

外國名詞　Vitex trifolia, L. var. unifoliolata, Schauer.（拉丁）

基本　屬馬鞭草科。藥用蔓荊之子實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。產山東牟平縣爲多。各省均有出。四月新。

形態　蔓荊屬灌木。高三四尺。枝皆蔓延地上。狀似葛藤。處處生有鬚根。葉形橢圓。大一二寸。面深綠。背灰白。夏月梢上開紫碧色之脣形花。皓似荳花。後則結實。形圓若小球。似胡椒子。始綠終黑。有帶五瓣子皮。頗厚。中係白色之仁。

採取　每年六七月採實。陰乾。

製法　雷敩曰。凡使去蒂子下白膜。一重用酒浸一伏時。蒸之。從巳至未。熬乾用。李時珍曰。尋常只去膜打碎用之。

性質　苦。微寒。無毒。

效能　散風熱。治頭痛。用作清涼强壯藥。

主治　筋骨間寒熱。溼痺拘攣。明目堅齒。利九竅。去白蟲。久服輕身耐老。小荊實亦等。（本經）風頭痛腦鳴。目淚出。益氣。令人光澤脂

穀。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論蔓荊子曰。治賊風。長髭髮。【宋】大明曰。華諸家本草論蔓荊子曰。利關節。治攣疾。赤目。【金】張元素珍珠囊論蔓荊子曰。太陽頭痛。頭沈昏悶。除昏暗。散風邪涼諸經血止目睛內痛。【元】王好古湯液本草論蔓荊子曰。搜肝風。【明】繆希雍本草經疏論蔓荊子曰。蔓荊實味苦微寒。無毒。別錄加辛平。溫。察其功用。應是苦溫辛散之性。而寒則甚少也。氣清味薄。浮而升陽也。入足太陽足厥陰。兼入足陽明經。其主筋骨間寒熱。溼痺拘攣。風頭痛腦鳴。目淚出者。蓋以六淫之邪。風則傷筋。寒則傷骨。而爲寒熱。甚則或成溼痺。或爲拘攣。又足太陽之脈。夾脊循項而絡於腦。目爲厥陰開竅之位。邪傷二經。則頭痛腦鳴。目淚出。此藥味辛氣溫入二臟。而散風寒溼之邪。則諸證悉除矣。邪去則九竅自通。痺散則光澤脂榦。其主堅齒者。齒雖屬腎。而牀屬陽明。陽明客風熱則上攻。牙齒爲動搖腫痛。散陽明之風

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱。則齒自堅矣。去白蟲長蟲者。假其苦辛之味耳。益氣輕身耐老。必非風藥所能也。【明】李時珍本草綱目論蔓荊子曰。蔓荊氣輕味辛。體輕而浮。上行而散。故所主皆頭面風虛之症。【明】李士材本草圖解論蔓荊子曰。蔓荊子辛而微溫。足太陽經藥也。主太陽頭風頂痛。目痛腠淚。亦能固齒去白膜。酒炒打碎。【清】黃宮繡本草求眞論蔓荊子曰。蔓荊子辛苦微溫。書言主治太陽膀胱兼理足陽明胃足厥陰肝。緣太陽本屬寒水之經。因風邪內客。而致巔頂痛腦鳴。肝屬風。巔風既內犯。則風必挾肝木上侵。而致淚出不止。筋藉血養。則血亦被風犯。而致筋亦不榮。齒亦不堅矣。有風自必有濕。濕與風搏。則胃亦受濕。累而致肉痺筋攣。由是三氣交合。則九竅蔽塞。而病斯劇。蔓荊輕體而浮。故能可治筋骨間寒熱。而令濕痺拘急。斯去氣升而散。復能祛風除寒。而令頭面虛風之症悉治。且使九竅皆利。白蟲能殺。是亦風寒濕熱俱除之一驗耳。但氣虛血虛等症。用此編必旋踵。不可不知。

近人學說　㈠賈九如曰。蔓荊味苦兼辛。能疏風涼血利竅。凡太陽經頭痛及頭風腦鳴。目淚目昏。皆血熱風淫所致。以此涼之散之。取其氣薄主升。佐神效黃芪湯。疏去障翳。使目復光。爲肝經勝藥。㈡張山雷曰。蔓荊枝條柔細。有似於蔓。故得此名。蘇恭唐本草竟謂其苗蔓生。微有誤會。李濒湖謂其枝小弱。如蔓是也。本經稱其氣味苦而微寒。別錄則曰辛平。壽頤按。凡草木之子。多堅實沈重。性皆下行。蔓荊之實。雖不甚重。然其性必降。本經謂主治筋骨間寒熱。痙痺拘攣。明目堅齒。利九竅。固皆清泄降火之功用。別錄雖加以辛字。而主治風頭痛腦鳴目淚出。仍是內風升騰之病。用以清降。斷非疏散外風之品。日華子謂治赤目。張潔古謂治頭沈昏悶。止目睛內痛。王海藏謂搜肝風。皆是息風降火。其義甚明。獨甄權謂治賊風。潔古又謂治太陽頭痛。散風邪。則誤作疏散之藥。絕非本經別錄眞旨。蓋內風外風治法。含渾久爲漢魏以來通病。甄權等此說。實屬誤認。奈何濒湖綱目亦謂其氣清味辛。體輕而浮。上行而散。竟以甄權等之誤說。反加附會而爲之證實。適以疑誤後學。而近三百年。更無人能知蔓荊子之眞實功用矣。然濒湖亦謂所主者皆頭面風虛之證。則試問風而屬虛。豈有再用浮散主治之理。自矛自盾。亦可謂不思之甚矣。千金方以一味蔓荊子爲末。浸酒服。治頭風作痛。亦是內風。非祛散外風之法。其用酒者。乃借酒力引之上行。使藥力達於頭腦之意。學者不可誤會。茲因世俗之見。無不謂此藥專散風熱。姑錄於此。而糾正之。如右。輕用一錢五分。重用可至三四錢。

配合應用　㈠同甘菊花、荊芥、酒炒、黃芩、烏梅、芽茶、白蒺藜、川芎、羌活、黑豆、土茯苓、治偏頭風痛。目將損者。㈡令髮長黑。蔓荊子、熊脂等分。醋調塗之。（聖惠方）㈢治頭風作痛。蔓荊子一升爲末。絹袋浸一斗酒中。七日溫服。日三次。（千金方）㈣治乳癰初起。蔓荊子炒爲末。酒服方寸匕。渣敷之。（危氏得效方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　頭目痛不因風邪。而由於血虛有火者。忌之。張元素云。胃虛人不可服。恐生痰疾。惡烏頭、石膏。

著名方劑　益氣聰明湯。治中氣不足。清陽不升。則耳鼻目障者。（李東垣）蔓荊子、葛根各三錢。人參、黃耆各五錢。黃柏、芍藥各二錢。綠升麻錢半。炙草一錢。水煎服。

參攷資料　㈠蔓荊實諸家所解。蔓荊牡荊。紛糺不一。經既言蔓荊明知是蔓生。卽非高木也。既言牡荊。則自是木上生者。況漢書郊祀志所言。以牡荊蔥爲幡竿。故知蔓荊卽子大者。是又何疑爲後條有纍荊。此卽便是牡荊也。子青色如菜黃。不合更立纍荊條。故文中云。本草不載。亦無別名。但有纍花。功用又別。斷無疑爲注中妄稱石荊當之。其說轉見穿鑿。（寇宗奭衍）㈡蔓荊生水濱。苗莖延長丈餘。春因舊枝而生小葉。五月葉成。似

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

杏葉。六月有花紅白色。黃蕊。九月有實黑斑。大如梧子而虛。輕。冬則葉凋。今人誤以小荊爲蔓荊。遂將蔓荊爲牡荊也。（蘇恭）㈢近汴京及秦隴明越州多有之。苗莖高四五尺。對節生枝。葉類小棟。至盛茂有花作穗。淡紅色。蕊黃白色。花下有青萼。至秋結子。舊說蔓生而今所有。並非蔓也。（蘇頌）㈣其枝小弱如蔓。故名蔓生。（李時珍）

【蔓紫】即落葵之日本別名。詳『落葵』條。

【蔓椒】**命名**　本品蔓生子葉皆似椒。故名。

古籍別名　豬椒。豕椒。鼠椒。狗椒。（別錄）豨椒。（陶弘景）金椒。（圖經）

產地　生山野林箐間。

形態　蔓椒爲椒之一種。枝蔓如蔓子。葉如椒。子實可供藥用。其根枝葉詳見各條。

性質　苦。溫。無毒。

主治　風寒濕痺。歷節痛。除四肢厥氣。膝痛。煎湯燕浴取汗。

【蔓椒枝葉】**性質**　苦。溫。無毒。

主治　通身水腫。用枝葉煎如飴。熬如錫狀。每空心服一匙。日三服。

【蔓椒根】**性質**　苦。溫。無毒。

主治　療痔疾。燒末服。并煮汁浸之。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論蔓椒根曰。治賊風。攣急。

【蔓菁】即無菁之古籍別名。典見唐本草。詳『無菁』條。

【蔓楚】即女萎之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『女萎』條。

【蔓蘿】即松蘿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『松蘿』條。

【蔗汁】即甘蔗之處方用名。詳『甘蔗』條。

【蔗蛄】**基本**　本品係種蔗田中所出之蟲。食蔗根可食。味甚甘美。

主治　發痘。行漿。托瘡。清毒。化痰。醒酒。和中。利小便。

【蔵麻】即苘麻之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『苘麻』條。

【蔚】即牡蒿之古籍別名。典見爾雅。詳『牡蒿』條。

【蔚金】即鬱金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鬱金』條。

【蔚草】**古籍別名**　蔚菜。（蘇恭）蔚槃。（綱目）

產地　生於水濱。

形態　蔚草爲水草類之一種。葉似澤瀉而小。花青白色。其莖可供藥用。

採取　五月六月間採之。曝乾用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　暴熱喘息。小兒丹腫。

【蔚菜】即蔚草之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『蔚草』條。

【蔚槃】即蔚草之古籍別名。典見綱目。詳『蔚草』條。

【蓑】**古籍別名**　蒘。（綱目拾遺）

形態　蓑爲蔓草類藤屬之一種。葉尖而柔。葉中有汁。結子如桑椹。熟時色正青。作醬可和五味。其葉可製成油。以供藥用。

主治　疏積滯。消瘰癧。探傷手足。紅腫作痛。刀傷刺傷。背癰瘡毒初起。即散。成則膿潰。亦可傅。並貼楊梅瘡。痔漏。滴耳止耳痛。

參攷資料　蓑葉嶺南人取其葉合檳榔食。今人名櫓葉。用其葉封固。曬半載收貯。待用。可留數十年。非獨疏積滯。消瘰癧。治病亦夥。（趙學敏）

【蓑葉】即蒘醬之古籍別名。典見綱目。詳『蒘醬』條。

【蓑蒿】即白蒿之古籍別名。典見食療本草。詳『白蒿』條。

【蓑蒿子】即青蒿子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青蒿子』條。

【蔌蒸】即廉薑之古籍別名。典見綱目。詳『廉薑』條。

【蔌葵】即落葵之古籍別名。典見爾雅。詳『落葵』條。

【蔣草】即茭白之古籍別名。典見綱目。詳『茭白』條。

【蔦】即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【蔦蘿】㈠即金鳳毛之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金鳳毛』條。㈡即松蘿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『松蘿』條。

【蓴菜】即蓴菜之古籍別名。典見綱目。詳『蓴菜』條。

【蕢】即王瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王瓜』條。

719／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【蘇樞果】**主治**　胎疝。

參攷資料　凡小兒初生發疝。止見啼哭。不見病形。延至一周兩歲。始知是疝。諸醫不效。用蘇擺樹上之鴛鴦果一對。其果連樹皮取下。可辨眞假。一對果可治三人。荔枝核七枚。杵碎。平地木三錢。同煎飲。卽痊。亦不復發。（毛世洪）

【酸】卽茶葉之古籍別名。典見綱目詳『茶葉』條。

【蒌荷】卽薄荷之古籍別名。典見和漢藥考詳『薄荷』條。

【蒴古菌】**產地**　廣東各屬均有出。

主治　止熱痢。

【號丹】卽黃丹之古籍別名。典見和漢藥考詳『黃丹』條。

【蝌蚪】**命名**　本品狀如魚。其尾如針。幷其頭尾觀之有似斗形。故名。

古籍別名　活師（山海經）活東（爾雅）玄魚。懸針（古今注）蛞斗。蝦蟆。蟇。蝦蟆青蠶胨子（綱目）水仙子（俗名）蝦蟆兒。蝦蟆子。（本草拾遺）

【蝌蚪卵】**主治**　明目。

【螂蛆】卽蜈蚣之古籍別名。典見爾雅詳『蜈蚣』條。

【蝎】卽木蠹蟲之古籍別名。典見綱目詳『木蠹蟲』條。

【蜓】卽馬刀之古籍別名。典見綱目詳『馬刀』條。

【蜓馬蜩】卽蟬之最大者之古籍別名。典見爾雅詳『蟬蛻』條。

【蝕肬】㊀卽桑螵蛸之古籍別名。典見別錄。詳『桑螵蛸』條。㊁卽螳螂之古籍別名。典見別錄。詳『螳螂』條。

【蝘】卽蟬花之古籍別名。典見綱目詳『蟬花』條。

【蝘蜓】卽壁虎之古籍別名。典見綱目詳『壁虎』條。

【蝙蝠】**原名**　伏翼。

命名　本品身有翼。以其晝伏夜出故名。

古籍別名　天鼠（本經）服翼。（爾雅）仙鼠（唐本）飛鼠。（宋本）夜燕。（綱目）

外國名稱　Vesperugo noctula Schreb. 或 Nyctalus noctula Noctula (Bat)（拉丁）コーモリ或カハホリ（日本）

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類翼手類食蟲類蝙蝠科。

產地　出山谷巖洞及諸古屋暗隙間。

形態　蝙蝠爲原禽類之一種。實屬飛行於空中之小獸。頭小而略扁。吻鈍。耳殼短闊。呈三角形。常向內曲。齒具門。犬白三種。皆小而鈍。後肢細而短。有鉤爪。前後肢連尾間皆張飛膜。體被暗色柔毛。胸骨隆起。捕食蚊蠅止息。以爪鉤物而懸身。口吻飛膜感覺頗銳敏。其肉可供藥用。



蝙蝠

採取　十一月十二月採之。

製法　雷敩曰。凡使要重一斤者。先拭去肉上毛及其爪腸。留肉翅幷嘴脚。以好酒浸一宿。取出以黃精自然汁五兩。塗炙至盡。炙乾用。李時珍曰。近世用者多假存性耳。

性質　鹹。平。無毒。

720／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　目瞑羶痛。明目。夜視有精光。久服令人喜樂。媚好無憂。（本經）療五淋。利水道。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論蝙蝠肉曰。主女人生子餘疾。帶下病無子。【明】李時珍本草綱目論蝙蝠肉曰。治久咳上氣。久癰瘰癧。金瘡內漏。小兒慈病驚風。

參攷資料　㈠五月五日。取倒懸者。曬乾。和桂心、薰陸香、燒烟。辟蚊子。夜明砂、鼈甲爲末。燒烟。亦辟蚊。（陳藏器）㈡蝙蝠性能瀉人。故陳子眞等服之。皆致死。觀後治金瘡方。皆致下利。其毒可知。本經謂其無毒。久服喜樂無憂。日華云久服解愁者。皆誤後世之言。適足以增憂益愁而已。治病可也。服食不可也。（李時珍）

【蝙蝠血及膽】主治　滴目令人不睡。夜能見物。

【蝙蝠刺】　卽牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳『牛蒡子』條。

【蝙蝠腦】主治　癰疽內陷。服之令毒不攻心。入丸劑用之。

參攷資料　塗面去女子面皰。服之令人不忘。（陳藏器）

【蝙蝠藤】命名　本品葉形絕似蝙蝠。故名。

產地　附生於巖崖峭壁及喬木間多有之。

形態　蝙蝠藤爲蔓草類之一種。葉類葡萄而小。多歧。勁厚。青滑。其藤可供藥用。

主治　腰痛。療癧。酒煎服。

參攷資料　蝙蝠藤療腰痛。痛止。不可再服。多服則腰反傾倒不支。（瀋寮方）

【蝟刺香】　卽沈香之上有刺紋者。性質功用。詳『沈香』條。

【蝟油火】基本　以刺蝟脂熬成。

效能　能縮人筋骨。燈照能攝毒使小。

【蝟鼠皮】　卽刺蝟皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『刺蝟皮』條。

【蝤蛑】古籍別名　撥掉子。蟳。

形態　蝤蛑爲介類之一種。卽蟹之扁大而後足較闊者。可供藥用。

性質　鹹。寒。無毒。

主治　解熱氣。治小兒痞氣。煮食之。

【蝤蠐】　卽木蠹蟲之古籍別名。典見綱目。詳『木蠹蟲』條。

【蝦】　卽鰕之俗名。詳『鰕』條。

【蝦蟆】原名　土蛙。

命名　蝦者遐也。蟆者幕也。本品懷土。取置遠處一夕。復還復其所。雖或遐之。常幕而返。故名。

古籍別名　鱉蟆。蝦嘛（綱目）蝻。

外國名詞　Rana rugosa Schleg.（拉丁）ッチガヘル（日本）

基本　係脊椎動物兩棲類無尾類蛙科之蝦蟆。

產地　出陂澤間。

形態　蝦蟆爲蛙屬之一種。其體暗褐色。背有黑點。亦有疣如蟾蜍。善跳躍。鳴聲呷呷。捕得可供藥用。其肝、膽、腦詳見各該條。

製法　雷敩曰。凡使蝦蟆。先去皮并腸及爪子。陰乾。每箇用眞牛酥一分。塗炙乾。若使黑虎。卽連頭尾皮爪。並陰乾。酒浸三日。漉出焙用。

性質　辛。寒。有毒。

主治　邪氣破癥堅。血癰腫。陰瘡。服之不患熱病。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論蝦蟆曰。主百邪鬼魅。蠱癰腫。及熱結腫。【宋】日華諸家本草論蝦蟆曰。治熱狂。貼惡瘡。解煩熱。治犬咬。

參攷資料　㈠古方多用蝦蟆。近方多用蟾蜍。蓋古人通稱蟾爲蝦蟆耳。今考二物。功用亦不甚遠。則古人所用。多是蟾蜍。且今人亦只用蟾蜍有效。而蝦蟆不復入藥矣。按張杲醫說載撫青雜說云。有人患脚瘡。冬月頓然無事。夏月臭爛。痛不可言。遇一道人云。爾因行草上。惹蛇交遺瀝。瘡中有蛇兒。冬伏夏出故也。以生蝦蟆搗傅之。日三卽換。凡三日一小蛇自瘡中出。以鐵鉗取之。其病遂愈。（李時珍）㈡蝦蟆屬土。與水味甘性寒。南人喜食之。本草言服之不患熱病。由是病人亦煮食之。本草之意。或炙

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

或乾、或燒入藥用之。非若世人煮熟入椒鹽而啜其湯也。此物本濕化火能發濕。久則濕化熱。此乃土氣厚自然生火也（朱丹溪）

【蝦蟆子】卽蝌蚪之古籍別名。典見綱目拾遺「蝌蚪」條。

【蝦蟆肉蛆】採取　端午日取金眼大腹不跳不鳴者之蝦蟆。趁死置瀉器中。候生蛆食盡取蛆。水漂淨焙用。

主治　治小兒諸疳。

【蝦蟆衣】卽車前草之古籍別名。典見別錄。詳「車前草」條。

【蝦蟆肝】主治　蛇螫人。牙入肉中痛不可堪。搗傅之立出。

【蝦蟆見】卽蝌蚪之古籍別名。典見綱目拾遺「蝌蚪」條。

【蝦蟆青龍】卽蝌蚪之古籍別名。典見綱目「蝌蚪」條。

【蝦蟆草】命名　本品葉面狀形如蝦蟆之背。故名。

基本　係蝦蟆草科蝦蟆草屬。爲蝦蟆草之莖葉根。

產地　多生濕地。各處多有之。

形態　蝦蟆草爲濕草類之二年生草本。秋日或春日生苗。根出葉平鋪地面。葉稍圓形。網脈。葉緣鋸齒。葉表凸凹不平。狀如蝦蟆之背。故名蝦蟆草。至夏由中心抽出方莖。高數寸至尺許。其葉對生由莖端及葉腋分椏。開小花。總狀花序。結實。小如車前子。成熟後。卽枯死。

採取　夏月採之。採得陰乾。固藏勿洩氣。

性質　苦。無毒。

效能　利水。消腫。治陰痒。療風疹。

主治　楊亭華曰。濕熱風疹。陰癢。腎囊風。消腫。利水。服洗皆有功效。女子如受濕熱在陰道外部。用此藥薰洗卽愈。若癢於陰道內。於洗方內加枯礬約錢許。將藥汁煎好。遇以布淋。乘熱薰於患處。待溫度適宜。用大水節一端置於藥水內。一端置於陰道。射而洗之。如受孕後。患陰癢症。洗之尤效。幼女常患於大陰腎小兒。常於陽莖頭忽腫（俗謂對蟻穴小便所致）以上幼女小兒。單用蝦蟆草數兩薰洗。約二次卽愈。

用量　三錢至一兩。

參攷資料　車前又名蝦蟆衣。天名精又名蝦蟆藍。皆非蝦蟆草也。惟本草綱目有名葉下紅者。植物圖考。言其形態與繪圖。頗與蝦蟆草相似。但蝦蟆草葉背不紅。或此物亦爲蝦蟆草之一種。因產地不同而形態稍異耶。則未敢言定。今北方藥市。誤以本經之蔆蠃爲蝦蟆草。沿襲多年。竟無正之者。亦醫藥界之遺憾也。考蔆蠃係多年莖生草。莖生倒針葉。爲羽狀複葉。自三小葉構成。每小葉如掌狀。葉緣缺刻及鋸齒。面青背白。密生絨毛。夏日枝端分椏。開小紫花。花冠五瓣。近世入藥用葉。其葉味濇。內含鞣酸。爲收斂之劑。與蝦蟆草之利濕熱者適異。故不得不詳細說明。以悉二藥之性大相悖謬。醫家不可不知（楊亭華）

【蝦蟆腦】主治　明目。治青盲。

【蝦蟆壅】卽蝌蚪之古籍別名。典見綱目「蝌蚪」條。

【蝦蟆膽】主治　小兒失音不語。取汁點舌上。立愈。

【蝦蟆藍】卽天名精之古籍別名。典見本經。詳「天名精」條。

【蝦蟆】卽蝦蟆之古籍別名。典見綱目。詳「蝦蟆」條。

【蝦醬】產地　粵語云。蝦醬以番山所造爲美。宦遊筆記云。遼東大凌河出蝦醬。蝦細皆甘美。平海又出一種小蝦。名紅毛小。作蝦醬尤佳。今浙江寧波及蘇皆有。咪亦佳。

製法　製蝦醬法。初醃時。每蝦百斤。用鹽三斤。封定缸口。候蝦身潰爛。乃加至四十斤鹽。於是味大佳。可以久食。

主治　解毒。樹蠹。因廣東有毒樹蟲。其樹無花結子。如牛奶。食之立死。以蝦醬解之。

【蜆建草】形態　生山下濕地。高一二尺。葉似山丹而微赤。

性質　苦。無毒。

主治　搗汁服。治吞蟲致病。搓汁洗蟲瘡。殺蠐螬。

【蠐胡麻】卽胡麻之處方用名。詳「胡麻」條。

【蜆母】卽知母之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本經。詳『知母』條。

【蝮蛇】　**處方用名**　蝮蛇肉。

古籍別名　反鼻蛇。（本草綱目）反鼻地扁蛇。（和漢藥考）

外國名詞　Viper.（英、德）

基本　屬爬蟲類爲蛇類管狀毒牙族蝮蛇之肉。

產地　凡南方之山野間恒有之。



蝮蛇

形態　蝮蛇爲毒蛇之一種。夏月棲息於山野或樹中陰處。卵在胎內孵化。比無毒蛇小。體粗長達一尺五六寸。色灰褐。背有黑色或紅褐色之斑紋。其狀如錢。頭大口尖。上顎之左右兩側各生毒牙一枚。平時向內橫轉。一旦張口兩毒牙卽突出噬嚙他物。於時毒腺中之毒液。卽自牙前面之孔。迸射而出。用以毒人。此蛇見人。並不奔竄。若誤踐之。立躍起而嚙人。其毒之猛烈。世人盡知之。

採取　捕法。春夏入山。手裂葛蔓。蝮蛇聞聲來集。則壓其頸捕之。捕得剝去皮及內腸。風乾入藥。

性質　甘。溫。有毒。

成分　勝呂清一嘗購市販剝皮風乾之蝮蛇三百條。一一試驗其成分。於其脂肪中發見拍爾迷眞及斯台亞林之混合物。又用酒精浸之。於其浸出液中檢得結晶體兩種。其一種爲塔烏林（Taurin. $C_2H_7NSO_3$）見藥學雜誌。

效能　療癩疾惡瘡。治頑痺惡風。用作嘯除徵菌惡毒藥。又爲强壯藥。

主治　釀作酒。療癩疾。諸瘧。心腹痛。下結氣。除蟲毒。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論蝮蛇曰。五痔腸風瀉血。【明】李時珍本草綱目論蝮蛇曰。大風諸惡風。惡瘡瘰癧。皮膚頑痺。半身枯死。手足臘腑間重疾。

國外學說　日本和漢藥考曰。以蝮蛇焙枯。名反鼻霜。亦名五八霜。其隱名曰五八草。又名十三草。充藥用。能止血。治惡瘡。其以酒浸蝮蛇。爲蝮蛇酒。以油漬之。爲蝮蛇油。蝮蛇酒之製法。取蝮蛇活者一條。以醇酒一斗浸封埋馬溺處。周年取開。蛇已消化。酒味猶存。不過飲一升。當覺身習習而病愈。最治癩病。此感天地肅殺之氣而成之惡疾。蝮蛇稟天地陰陽毒烈之氣而生之惡物。乃以毒物攻毒病也。又法。蝮蛇去其首尾。刳腹除腸。刳浸油中。五十日後。微燕取用。外塗一般腫痛。善治創傷潰爛。雖久遠不治之外症。用此亦愈。

配合應用　治白癩。大蝮蛇一條。勿令傷。以酒一斗漬之。糠火溫令稍熱。取蛇一寸。和臘月豬脂搗傅。（肘後方）

用量　五分至錢半。

施用宜忌　凡非惡風癩疾者禁用。

參攷資料　㈠取活蛇一枚。着器中。投以醇酒一斗。封定埋馬溺處。周年取開。蛇已消化。酒味猶存。有患諸症者。不過服一升以來。當覺身習習而愈。然有小毒。不可頓服。他藥不復得力。又曰。生癩者。取一枚。或他蛇亦可。燒熟。坐上。當有赤蟲如馬尾出。仍取蛇肉塞鼻中。（陳藏器）㈡癩疾感天地肅殺之氣而成。惡疾也。蝮蛇稟天地陰陽毒烈之氣而生。惡物也。以毒物而攻毒病。蓋從其類也。（李時珍）㈢蝮蛇作地色。鼻反口長。身短。頭尾相似。山南漢沔間多有之。一名虺蛇。無二種也。（蘇恭）㈣蝮蛇形不長。頭扁口尖。頭斑身赤文斑。亦有背黑色者。人犯之。頭足貼着。東間諸山甚多。草行不可不愼。（蘇頌）㈤蝮蛇錦文。亦有與地同色者。衆蛇之中。彼獨胎產。着足斷足。着手斷手。不爾全身糜爛。七八月毒盛時。嚙樹以洩其毒。樹便死。又吐涎沫於草木上。着人成瘡。身腫。名曰蛇漠瘡。卒難治。療方與蛇驚同。（陳藏器）

【蝮蛇皮】　**主治**　燒灰。療疔腫。惡瘡。骨疽。

『蝮蛇肉』卽蝮蛇之處方用名。詳『蝮蛇』條。

【蝮蛇屎】　**採取**　以蝮蛇置器中養取之。

主治　痔瘻。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【蝮蛇脂】**主治**　綿裹塞耳聾。亦傳腫毒。

辨僞　以摩着物皆透者眞。

【蝮蛇酒】**製法**　用活蝮蛇一條。同醇酒一斗。封埋馬溺處。周年取出。蛇已消化。以供藥用。

主治　惡瘡諸瘻。惡風頑痺。癩疾。每服數杯。當身體習習而愈。

【蝮蛇骨】**主治**　赤痢。燒灰飲服三錢。雞蛇亦可。

【蝮蛇蛻】**主治**　身瘡。疥癬。瘡。

【蝮蛇膽】**性質**　苦。微寒。有毒。

主治　鼠瘡。

歷代記述攷證　【唐】甄權　藥性本草論蝮蛇膽曰。殺下部蟲。

【明】李時珍本草綱目論蝮蛇膽曰。療諸漏。研傅之。若作痛。杵杏仁摩之。

【蠆】　卽蜜蜂之古籍別名。典見綱目詳『蜜蜂』條。

【蜮蛤】　卽蜮蠣之古籍別名。典見水土記。詳『蜮蠣』條。

【蜮蠣】　**古籍別名**　生蠣。（嘉祐）蜮蛤（水土記）

產地　生海中。

形態　蜮蠣爲介類之一種。形如蛤而長。身扁有毛。其殼可供藥用。

主治　痔疾燒末服。

參攷資料　蜮蠣與馬刀相似。其肉頗冷。人以作鮓食。不堪致遠。而多食發風。（蘇宗奭）

【蝨】　卽貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝母』條。

【蝴蝶】　**原名**　蛺蝶

命名　本品輕薄夾翅而飛。葉葉然也。故名。蝶美於鬢。蛾美於眉。故又名蝴蝶。蓋俗謂鬢爲胡也。

古籍別名　蠬蝶。（綱目）蛺蝶。（俗名）

外國名稱　Vanessa xanthomelas, Esper.（拉丁）ヒオドシテフ（日本）

基本　節肢動物昆蟲類鱗翅類蛺蝶科之蛺蝶。

形態　蝴蝶爲卵生蟲類之一種。種類甚多。皆爲蛤蜊烏蠅羽化而成。其體形長。色黃褐。複眼褐。觸角爲棍棒狀。翅黃赤。翅緣有角狀或波狀之凹凸。前肢有大小黑紋七八枚。沿外緣有波狀黑緣在內側者。褐色有藍彩。後翅緣有一大黑紋。其色彩同前翅。內緣闊。遮蔽腹部。春夏飛翔各處花間。遺黃色小卵於葭葉間。成蛹後。始化爲蝶。捕得可供藥用。



蝴蝶

主治　小兒脫肛。陰乾爲末。唾調塗手心。以瘥爲度。

【蝴蝶尖】　卽蓑笋之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蓑笋』條。

【蝘蜓】　卽沙蝨之古籍別名。典見廣雅。詳『沙蝨』條。

【蝸牛】　**命名**　本品形似瓜字。而有角如牛。故名。

古籍別名　蠃牛（藥性）蚹蠃。蜾蠃蜾蠃（爾雅）山蝸（弘景）負壳蜒蚰（日華）蝸蠃（山海經）蜒蚰蠃（俗名）瓜牛。寄居海羊書。蜒

種類　㊀負殼者名蝸牛。卽蜒



蝸牛

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蚰㊀無殼名蛞蝓。即鼻涕蟲。

性質　鹹。寒。有小毒。

效能　用治小便不通。及作痔漏脫肛藥。

主治　賊風喎僻。跛跌。大腸脫肛。筋急及癜瘋。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論蝸牛曰。生研汁飲止消渴。【明】李時珍本草綱目論蝸牛曰。治小兒臍風撮口。利小便。消喉痺。止鼻衄。通耳聾。治諸腫毒。痔漏。制蜈蚣蝎蠆毒。研爛塗之。【明】李士材本草圖解論蝸牛曰。蝸牛、蛞蝓鹹寒無毒。主賊風喎僻。及脫肛驚癎。蠻痛。蝸牛蛞蝓。皆寒陰溼之氣而生。氣味相同。主療無別。惟形稍異。蛞蝓無殼。蝸牛有殼。耳鹹寒總除諸熱。益陰潤燥。韌堅。故治如上諸證。蜈蚣性畏二物。不敢過其所行之路。觸其身即死。故人取以治蜈蚣毒。其氣大寒。非真有風熱者不宜用。小兒薄弱多泄者忌用。【清】黃宮繡本草求眞論蝸牛曰。蝸牛即帶殼大蜒蚰是也。生下溼地。陰雨即出。稟性至陰。味鹹小毒。故古方用此以治眞陰虧損。腠理不密。致風中於絡。而見口眼喎斜。筋脈攣拘。及風熱脫肛。痔瘡腫痛。瘡疽。被背疔腫等症。皆能見效。總以取其鹹寒。解其諸熱之性耳。并解蜈蚣毒。取形尖小。絲桑木佳。

配合應用　㊁治小便不通。蝸牛搗貼臍下。以手摩之。加麝香少許。更妙。（簡易方）

㊂治大腸脫肛。治大腸久積虛冷。每因大便脫肛。用蝸牛一兩。燒灰。豬脂和傅立縮。又治上證及痢後脫肛。用乾蝸牛一百枚。炒研。每用一錢。以飛過赤汁磁石末五錢。水一盞。煎半盞。調服日三。（聖惠方）

㊃治痔瘡腫痛。用蝸牛浸油塗之。或燒研傅之。（丹溪方）又用蝸牛一枚。入麝香少許在內。碗盛。次日取水塗之。（濟生方）

㊄治發背初起。活蝸牛二百箇。以新汲水二盞。湯瓶中封一夜。取涎水。入眞蛤粉。旋調。掃傅瘡上。日十餘度。熱痛止。則瘡便愈。（集驗方）

㊅治瘰癧未潰。連殼蝸牛七箇。丁香七粒。同燒研。紙花貼之。（危氏得效方）

㊆治瘰癧已潰。蝸牛燒研。輕粉少許。用豬脊髓調傅。（危氏得效方）

㊇治喉痺腫塞。用蝸牛綿裹。水浸含嚥。須臾立通。又用蝸牛七枚。白梅肉三枚。研爛。綿裹。含嚥立效。

㊈治喉風腫痛。端午日午時。取蜒蚰十餘條。同鹽三四箇。小瓶內封固。俟化成水。收水點之。（唐氏方）

㊉治喉塞口噤。蜒蚰炙二七枚。白梅肉炒二七枚。白礬半生半燒。二錢。研爲末。每水調半錢服。得吐立通。（聖惠方）

㊊治耳腮痄腫。及喉下諸腫。用蝸牛同麵研傅之。

㊋治面上毒瘡初起者。急尋水蜒蚰一二條。用薑少許。共搗塗紙上。貼之。即退。紙上留一小孔出氣。此乃浚漢章祕傳極效方也。（談墜齋試驗方）

㊌治赤白腎瘼。生蝸牛一枚。擣丹砂末於內。火上炙沸。以綿染汁傅臂中。日二。（聖惠方）

㊍治鼻血不止。蝸牛爆乾一枚。烏賊骨半錢。研末吹之。（聖濟總錄方）

㊎治撮口臍風。乃胎熱也。用蝸牛五枚。去殼研汁。塗口取效。乃止。又方。用蝸牛十枚。去殼研爛。入蒔蘿末半分。研勻塗之。取效甚良。

㊏滴耳聾閉。蝸牛膏用蝸牛一兩。石膽鐘乳粉各二錢半。爲末。瓷盒盛之。火煨。亦研末入片腦一字。每以油調一字。滴入耳中。無不愈者。（聖惠方）

㊐治蚰蜒入耳。蝸牛椎爛。置於耳邊。即出也。（瑞竹堂方）

㊑染鬚方。用蜒蚰四十條。以京墨水養之。三日。埋馬屎中。一月取出。以白絲頭試之。如即黑到尾。再入馬屎中埋七日。再取試之。性緩。乃以擦鬚。庶不致黑皮膚也。（普濟方）

㊒治消渴引飲不止。用蝸牛十四枚。形圓而大者。以水三合。密器浸一宿。取水飲之。不過一劑而愈。（海上方）又用蝸牛焙半兩。蛤粉。龍膽草。桑根白皮。炒。各二錢半。研末。每服一錢。椿葉湯下。（聖惠方）

施用宜忌　畏鹽。

725／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料　㈠蝸牛所主諸病。大抵取其解熱消毒之功耳。（李時珍）㈡其頭偏戾。如喎其形盤旋如渦。故有喎渦二者。不獨如瓜字而已。其行延引。故曰蜒蚰。爾雅謂之蜥蠑。孫炎註云。以其負蠑殼而行。故名蜥蠑。（李時珍）㈢蝸牛生池澤草樹間。形似小螺。白色。頭有四黑角。行則頭出。寫則首尾俱縮入殼中。（韓保昇）㈣凡用蝸牛。以形圓而大者爲勝。久雨乍晴。竹林池沼間多有之。其城墻陰處。一種扁而小者。無力不堪用。（蘇頌）㈤蝸身有涎。能制蜈蝣。夏熱則自懸葉下。往往升高涎枯則自死也。（李時珍）

【蝸牛殼】主治　一切疳疾。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論蝸牛殼曰。牙齲面上赤瘡。鼻上酒瘡。人利下脫肛。

【蝸舍】卽蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【蝸蟲】卽蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【蝸蠃】㈠卽螺蜦之原名。詳『螺蜦』條。㈡卽蝸之古籍別名。典見山海經。詳『蝸牛』條。

【蝸蠃】卽蛞蝓之古籍別名。典見別錄。詳『蛞蝓』條。

【螻】卽蜥蜴之古籍別名。典見本草集註。詳『蜥蜴』條。

【衝洞根】產地　生嶺南諸地。

形態　衝洞爲蔓草類之一種。莖根一似土瓜。其根可供藥用。

採取　採根陰乾用。

性質　苦。平。無毒。

主治　熱毒。蛇犬蟲毒。瘴癘瘡。水蠱服。

參攷資料　衝洞根。功同陳家白藥。（陳藏器）

【褐苣】卽苦菜之古籍別名。典見日用本草。詳『苦菜』條。

【調睡參軍】卽酸棗仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『酸棗仁』條。

【豌豆】命名　本品莖苗柔弱宛宛。故名。

古籍別名　青豆。斑（別錄）胡豆。水寒豆。（拾遺）戎菽。（爾雅）回鶻豆。（遼志）回回豆。（飲膳正要）畢豆。（唐史）蹕豆。（崔寔月令）青小豆。（千金）麻累。淮豆。國豆。（綱目）小寒豆。（俗名）

外國名詞　Pisum sativum, L.（拉丁）エンドウ　エンドウ　エンドウマメ（日本）

基本　係豆科豌豆屬。爲豌豆之子實。

產地　在原野園圃間。

形態　豌豆爲穀類豆屬之越年生蔓草本。莖長五六尺。葉爲羽狀複葉。尖端有卷鬚。基部有托葉。三四月間。葉腋抽出花軸。着蝶形花。而色白。或淡紫色。結實爲莢果。莢長寸許。中有種子。可供食與藥用。



豌豆

性質　甘。平。無毒。

主治　消渴。淡煮食之良。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論豌豆曰。治寒熱熱中。除吐逆。止泄痢。辟下。利小便。腹脹滿。【明】吳瑞日用本草論豌豆曰。調營衛。益中平氣。煮食下乳汁。可作醬用。【明】李時珍本草綱目論豌豆曰。煮食殺鬼毒。心病。解乳石毒。發研末。塗癰腫。瘡瘡。作澡豆。去黯。令人面光澤。

參攷資料　㈠豌豆多食發病。（吳瑞）㈡豌豆屬土。故其所主病多係脾胃。元時飲膳每用此豆。擣去皮。同羊肉治食。云補中益氣。今爲日用之物。而唐宋本草見遺。可謂缺典矣。千金外臺洗面澡豆方。盛用畢豆麵。亦取其白膩耳。（李時珍）

【豲】卽貓狸子之古籍別名。典見爾雅。詳『貓狸』條。

【賜紫櫻桃】卽葡萄之古籍別名。典見綱目。詳『葡萄』條。

【賜婆】卽木綿之古籍別名。典見梵書。詳『木綿』條。

【賣子木】古籍別名　買子木。（綱目）

外國名詞　Ixora chinensis, Lam.（拉丁）サンダンクワ（日本）

基本　係西草科賣子木屬。

產地　生嶺南暖地山野中。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態 實子木爲灌木類常綠木本。高五六尺。春生嫩枝。葉尖長約一二寸。背綠色。枝梢淡紫色。五六月開碎花百十枚。圍攢作大朶。深紅色。雖花結實。如椒目。在花瓣中黑色光澤。其木可供藥用。

製法 雷敎曰。凡採得粗搗。每一兩用酥五錢。同炒乾。入藥。

性質 甘。微鹹。平。無毒。

主治 折傷。血內溜續絕。補骨。止痛。安胎。

【質汗】 **命名** 汗音寒。乃番語之譯音。

產地 出西番諸地。

製法 以檉乳。松淚。甘草。地黃等藥同熱血煎成用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 金瘡傷折。療血內損。補筋肉。消惡血。下血氣。婦人產後諸血結。腹痛內冷。不下食。竝以酒消服之。亦傳病處。

參攷資料 番人試藥。以小兒斷一足。以藥納口中。將足踢之。當時能走者良。爲傷折之要藥。（陳藏器）

【輪迴酒】 卽童便之古籍別名。典見綱目。詳『童便』條。

【鄭芥】 卽荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荊芥』條。

【醂柿】 **基本** 本品爲柿之用法修藏者。

製法 吳瑞曰。水藏者性冷。鹽藏者有毒。李時珍曰。醂藏柿也。水收鹽浸之外。又有以熟柿用灰汁澡三四度。令汁盡。着器中。經十餘日。卽可食用。

主治 濡下焦。健脾胃。消宿血。

【醃魚】 卽鮑魚之以鹽漬成者。典見綱目。詳『鮑魚』條。

【醉仙桃】 卽曼陀羅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『曼陀羅』條。

【醉草】 卽睡菜之古籍別名。典見綱目。詳『睡菜』條。

【醉魚草】 **命名** 本品花葉可以毒魚。故名。

古籍別名 鬧魚花。魚尾草。檛木。（綱目）

外國名詞 Baddlea japonica, Hemsl.（拉丁）フヂウツギ（日本）

基本 係馬錢科醉魚草屬。爲醉魚草之花葉。

產地 生山野間及河澤邊。

形態 醉魚草爲毒草類之落葉灌木本。莖高三四尺。其節間有縱行之翅。葉對生。廣披針形。有鋸齒。夏月莖梢抽穗。着花。花冠筒狀。不整齊。如唇形。帶紫紅色。雄蕊四。其莖葉可供藥用。



醉魚草

性質 辛。苦。溫。有小毒。

主治 痰飲成餚。遇寒便發。取花研末。和米粉作糍。炙熟食之。卽效。又治誤食石斑魚子中毒。吐不止。及諸魚骨鯁者。搗汁和冷水少許。嚥之。吐卽止。骨卽化也。久瘧成癖者。以花塡鯽魚腹中。溼紙裹煨熟。空心食之。仍以花和海粉搗貼便消。

【醉醒草】 **產地** 植池邊。

形態 醉醒草爲雜草類之一種。葉紫色而叢生。可供藥用。

主治 醒酒。摘草嗅之。

【醋】 **原名** 米醋。

命名 醋者措也。能措置食毒。故名。米醋比諸醋最醲。又名醲醋。

處方用名 醋。醋。

古籍別名 酢。醶苦酒。（綱目）

酢。花地左味。（和漢藥考）醲醋。乾醋。（新本草）

外國名詞 Acetum.（Vinegar）

基本 係用米麥或果實以澱粉類或酒類加醋母使發酵變酸而釀成者。入藥須用米醋二三年者良。

產地 黃勞逸新中藥曰。醋產浙江杭紹二縣者爲最佳。實則以江蘇鎭江產爲最。

形態 醋爲澄明之液體。色淡黃或深黃。氣香味酸。比重一·〇〇五·至一·〇一二。水及酒精不論多少。可溶解之。

製法 ㊀米醋。三伏時用倉米一斗。淘淨。蒸飯。攤冷。舍黃晒。簸水淋淨。別以倉米二斗。蒸飯和勻。入甕。以水淹過。密封。暖處。三七日成矣。㊁糯米醋。秋社日用糯米一斗。

727／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

淘蒸。用六月六日造成小麥大麴和勻。用水二斗入甕封釀三七日成矣。㊁粟米醋。用陳粟米一斗淘浸七日再蒸淘熟入甕。密封日夕攪之。七日成矣。㊂小麥醋。用小麥水浸三日。蒸熟舀黃入甕。水淹七七日成矣。㊃大麥醋。用大麥米一斗。水浸蒸飯。舀黃曬乾。水淋過再以麥飯二斗和勻。入水封閉三七日成矣。㊄錫醋。用錫一斤。水三升。煎化。入白麴末二兩。瓶封曬成。

用法　恒以外治塗傅。內服祇用少許和飲。

性質　酸苦。溫。無毒。

成分　醋之主要成分爲醋酸($C_2H_4O_2$)。餘則略含醋酸伊打、糖分、護謨、色素、灰分等。

效能　散瘀血。消癰腫。用爲消散積塊藥。及解魚肉蔬菜與諸蟲毒。又治腸窒扶斯。結核性盜汗。

作用　入胃時。能刺激胃神經。使胃分泌稍強。然亦能制止 Pepsin 之醱酵作用。至腸內能刺激腸黏膜。使腸之斂性增加。同時又能凝固巳消化之蛋白。由腸壁吸入血中。又能令血管收縮。汗液減少。體溫略降。

主治　消癰腫。散水氣。殺邪毒。理諸藥消毒。

歷代記述　【唐】陳藏器本草拾遺論醋曰。治產後血暈。除癥塊。堅積。消食殺惡毒。破結氣。心中酸水。痰飲。【唐】孟詵食療本草論醋曰。醋磨青木香。止卒心痛。血氣痛。浸黃蘗含之。治口瘡。調大黃末塗腫毒。煎生大黃服。治疫癍甚良。【宋】日華諸家本草論醋曰。下氣除煩。治婦人心痛。血氣。并產後及傷損。金瘡出血昏暈。殺一切魚肉菜毒。【元】王好古湯液本草論醋曰。散瘀血。治黃疸黃汗。【明】繆希雍本草經疏論醋曰。醋惟米造者入藥。得溫熱之氣。故從木化。其味酸。氣溫無毒。酸入肝。肝主血。血逆熱壅則生癰腫。酸能斂壅熱。溫能行逆血。故主消癰腫。其治產後血暈癥塊血積。亦此意耳。散水氣者。水性泛濫。得收斂而寧謐也。殺邪毒者。酸苦湧瀉。能吐出一切邪氣毒物也。日華子主下氣除煩。婦人心痛血氣。并產後及傷損。金瘡出血。迷悶。殺一切魚肉菜毒。取其酸收而又有散瘀解毒之功也。故外科傳藥中多資用。【清】黃宮繡本草求眞論醋曰。米醋本澀熱之氣而成。味則酸苦。氣溫。酸主斂。故書多載散瘀解毒。下氣消食。且同木香磨服。則治心腹血氣諸痛。以火淬醋入鼻。則治產後血暈。且合外科藥散。則治癥結痰癖。疸黃癰腫。暨口噤。以治舌瘡。麵塗以散損傷積血。及殺魚肉菜蕈諸毒。至醋既酸又云。能散癰腫。以消則內散。潰則外散。收處卽是散處。故耳。且多食傷筋轆齒。以酸入筋過斂。則於筋有傷。過酸則木強水弱。而於齒多輒。米造陳久者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論醋曰。醋酸溫。開胃養肝。強筋煖骨。醒酒消食。下氣辟邪。解魚蟹鱗介諸毒。陳久而味厚。氣香者良。性主收斂。風寒咳嗽。外感瘟痢初病皆忌。續文獻云。獅子日食醋酪各一缾。故俗謂獅吼爲喫醋云。

國外學說　英美學說謂釀醋又名乾醋。製法有粟米或果實及別物之不同。其濃淡則以醋精之多寡爲定。英國藥肆中所售之醶醋。每百分中計含醋精五分有奇。如百分中計含醋精三分至六分者。則爲通行之品。釀醋之功用。能收斂。解熱。利小便。主治熱症。自汗。盜汗。乾渴。外用能治跌打損傷。因腰扭挫石灰迷目。處方以釀醋一兩。荊芥泡水一兩。共和勻。仰漱。治咽喉類病。每服一錢至一兩。加水用之。又和漢藥考曰。醋係酒變酸而成。其原料用米。麥。馬鈴薯。酒糟。敗酒等物。木醋亦可爲原料。日本用以調味及入藥者。以用玄米作原料者爲佳。品茲述各種製法於下。(一)用玄米製醋法。蒸玄米加白麴三倍攪和。入新製桶中。以手壓緊。厚紙覆令平。徐徐注水。如麴之半。注水時勿令飯麴漂浮。如是靜置七八日。俟晴天。以竹竿攪拌之。依此每七日一次。至二十八日。桶加木蓋。且縛以繩。還暖處置之。忌近不潔之物。經七十五日。釀造告成。然亦可隨氣候之寒暖而遲速之。既熟之後。去滓。密封。埋貯涼處地下。經年香味俱烈。(二)用酒糟製醋法。酒糟水浸十五日。搾醬搾其液汁。投釜中一沸。試浸以手

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

至不能堪爲度。隨移入桶中。加清醋以搾取量三分之一爲率。然後密封其桶。靜置二十五日。換桶一次。連換四桶。釀造告成。又曰。醋之種類有梅醋。萬年醋等。梅醋卽梅汁也。六月製梅乾時取之。用生梅黃熟者一斗。漬水一日。苦汁出便取出。以鹽三升。摻梅。壓石一晝夜。梅汁出。取梅曬乾至再三。則梅乾成矣。取其梅汁。盛甕收用。便成梅醋。經年不敗。病人食之亦良。惟不入藥。用萬年醋。夏月取變味之酒與米醋水三品等分。和合盛甕。投堅炭爐於內。取出炭。急封口。經月成醋。以後有變味酒。則加入其甕。民間簡便之法也。

配合應用　㊀衍義云。產婦房中。常以火炭沃醋氣爲佳。酸氣能飲血使下也。

㊁治卒心痛。青木香以醋磨汁服。（孟詵食療方）

㊂治口瘡。醋浸黃蘗含之。

㊃治身體卒腫。醋和蚯蚓屎傅之。（千金方）

㊄治舌腫不消。以醋和釜底墨厚傅舌之上下。脫則更傅。須臾卽消。（千金方）

㊅湯火傷灼。卽以醋泥塗之良。亦無瘢痕。喉痺咽痛。以醷醋探吐之。（千金方）

㊆治風毒。以三年醷醋五升。煎五沸。切葱白三升。煎一沸。漉出。以布染乘熱裹之。痛止乃已。（外臺祕要方）

㊇治霍亂吐利。醷醋煎服甚良。（如宜方）

㊈治霍亂煩脹。未得吐下。以好苦酒三升飲之。（千金方）

㊉治足上轉筋。以故綿浸醋中。甑蒸熱裹之。冷卽易。勿停。取瘥止。（外臺祕要方）

㊊治出汗不適。瘦却腰脚。并耳聾者。米醋浸荊三稜。夏四日。冬六日爲末。醋湯調下二錢。卽瘥。（經驗後方）

㊋治腋下胡臭。三年醯酢和石灰傅之。（外臺祕要方）

㊌治癜瘡風病。酢和硫黃末傅之。（外臺祕要方）

㊍治癰疽不潰。苦酒和雀屎如小豆大。傅瘡頭上。卽穿也。（肘後方）

㊎治木舌腫強。醷醋時時含漱。（普濟方）

㊏治牙齒疼痛。大醋煮枸杞白皮一升。取半升。含漱。卽瘥。（肘後方）

㊐治鼻中出血。酢和胡粉半棗許。服。又法。用醋和土塗陰囊。乾卽易之。（千金方）

㊑治塞耳治聾。以醇醋微火炙附子。削尖塞之。（千金方）

㊒治面黯雀卵。苦酒漬水。常常拭之。（肘後方）

㊓中砒石毒。飲醷醋得吐。卽愈。不可飲水。（廣記方）

㊔治服硫黃癮。酢和豉研膏傅之。燥則易。（千金方）

㊕治食鷄子毒。飲醋少許。卽消。（廣記方）

㊖治毒殺傷螫。清醋急飲一二盞。令毒氣不散。然後用藥。（濟急方）

㊗治蜘刺螫人。酢磨附子汁傅之。（醫學心鏡方）

㊘治蜈蚣咬毒。醋磨生鐵傅之。亦治蜘蛛咬毒。（錢相公篋中方）

㊙治蠱毒。屎瘡。以醋和胡粉傅之。（千金方）

㊚治諸蟲入耳。凡百節、蚰蜒、蟻入耳。以苦酒注入。起行卽出。（錢相公篋中方）

㊛治猳烟入口。以醋少許飲之。（祕方）

㊜治足上凍瘡。以醋洗足研藕傅之。

㊝治胎死不下。月未足者。大豆煮醋服三升。立便分解。未下再服。（子母祕錄方）

㊞治胞衣不下。腹滿則殺人。以水入醋少許。噀面神效。（聖惠方）

㊟治鬼擊卒死。吹醋少許入鼻中。（千金方）

㊠治乳癰堅硬。以鐺成醋。燒熱石投之。二次溫漬之。冷則更燒石投之。不過三次卽愈。（千金方）

㊡治疔腫初起。用麵圍住。以針亂刺瘡上。銅器煎醋沸。傾入圍中。令容一盞。冷卽易。三度根卽出也。

用量　三錢至八錢。或一匙至三匙。

施用宜忌　凡脾癉胃藥。及服丹參、茯苓者。禁用。反蛤蟆、爐甘石、蜆殼、石灰。

729／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

著名方劑　㈠苦酒湯。治少陰病。咽中生瘡。擊不出者。（金匱方）半夏（洗破）十四枚。鷄子（去黃納苦酒著殼中）一枚。上二味。納半夏著苦酒中。以鷄子殼置刀環中。安火上令三沸。去滓。少少含嚥之。不差更作三劑服之。㈡黃耆芍藥桂枝苦酒湯。治黃汗之爲病。身體腫。發熱汗出而渴。狀如風水。汗沾衣。色正黃如檗汁。脈自沉。以汗出入水中浴。水從汗孔入得之。此湯主之。（金匱方）黃耆五兩。芍藥三兩。桂枝三兩。上三味。以苦酒一升。水七升。相和。煮取三升。溫服一升。當心煩。服至六七日乃解。若心煩不止者。以苦酒阻故也。一方以美生醴代苦酒。此病在表不在裏。

參攷資料　㈠米醋比諸醋最醲。入藥多用之。穀氣全也。故勝精醋。產婦房中常以火炭沃醋氣爲佳。酸益血也。以磨雄黃塗蜂蠆毒。亦取其收而不散之義。今人食醯則齒齲。謂其水生木。水氣弱。木氣強。故知是造靴皮者。須得醋而紋皺。故知其性收斂。不貧醯收之意。（寇宗奭）㈡按孫光憲北夢瑣言云。一婢抱兒落炭火上燒灼。以醋泥傅之。旋愈無痕。又一少年眼中常見一鐵趙卿謂之曰。來晨以魚鮹奉候。及期延至。從容久之。少年飢甚。見檐上一甄。并醋。旋旋啜之。遂覺胸中豁然。眼花不見。卿云。君喫魚鮹太多。魚長并醋。故櫪誅而愈。其疾也。觀此二事。可證別錄治癰腫殺邪毒之驗也。大抵醋治諸瘡腫積塊。心腹疼痛。痰水血病。殺魚肉菜及諸蟲毒氣。無非取其酸收之意。而又有散瘀解毒之功。李廷飛云。醋能少飲辟寒。勝酒。王戩自幼不食醋。年踰八十。猶能傳神也。（李時珍）㈢醋酒爲用。無所不入。愈久愈良。亦謂之醯。以有苦味。俗呼苦酒。丹家又加餘物。謂爲華池左味。（陶弘景）㈣劉熙釋名云。醋酢也。能措置食毒也。古方多用酢字也。（李時珍）㈤凡患熱病者。虛羸煩渴。津液燥竭。以醋一匙至二兩服之。頗佳。痘瘡。麻疹之帶腐敗者。以及爲狂犬蝮蛇等咬傷。用醋俱有速效。腐敗熱。痘瘡等。血液腐壞。溶崩。穿蝕血脈。因而患下血。吐血。衄血。尿血等症者。用此則能阻邊腐敗。收斂血液。因血液運行意慢而起之壞血病。（如航海之人。身體不運動。每發此病。）醋能治之。醋之氣味。竄透。性清涼。收斂。有鎭痙之效。以蒸餾醋與糖漿。並密浸刺蝟。鎭痛。液少許。混和。用於諸痙攣症。及上衝頭痛。失眠。憂鬱病。狂癇殊驗。又有涼爽降鎭之效。凡用阿片難治之症。用此尤妙。醋、橙汁。及醋之製劑。並解酒醉。醋內加水服之。或塗鼻孔。皆良。服阿片瞶眩者。飲醋亦奏速效。他如因服亞兒加里性辛熱酷厲能令人麻痺。昏睡。發狂諸藥。或服鴆鴆菊矢鴆。答。顚茄。莨菪諸藥。或誤食甲介等物。因而中毒者。醋能解之。惟中毒甚者。須先服吐劑。令得大吐。後再用醋。又爲烟氣所熏。致呼吸窒塞者。飲醋少許。立效。醋雖溶解凝血。然遇乳汁或脂油質。則立即凝結。故服乳汁者及乳養之兒。不可服醋。飲則乳汁必凝結。胃中而不消化。停滯而爲醱敗之液。致起病患。頭旋。眩暈。或昏冒。卒倒。速令嗅醋。或以醋塗撚鼻孔。或以醋噀其面。便能醒解。此因醋性竄透故也。醋中入銅青末少許。燃之。以不至沸騰爲度。入磁製之格兒。弗舂篩之。則甚爲猛烈。以玻璃瓶收貯。密閉備用。凡腐蝕諸金用之。劇烈頭痛。以醋溫熱。使頻嗅之。或醋內加水。研和硝石。礬砂各少許。布片蘸貼。或周匝頭部。有奇效。衄血。棉花蘸醋。深納鼻孔中。立止。或以布片蘸醋。縛頭上。亦佳。口中出血。醋水含漱。亦止。外傷輕出血。以此貼之。良。婦人崩漏。孕婦及產後血崩。醋內加水沖淡。以水唧注入子宮。自愈。或產後子宮不收縮。血崩不止。布片蘸冷醋。貼腹部。效。醋有溶解凝血之效。故跌打損傷。血絡破裂。其血汎溢皮中。發而爲青紫斑及諸瘀腫者。用此自能消腫止痛。法於水中滴醋少許。微溫。布片溼透。貼類頰。替換。或加燒酒。並研和硝石。礬砂各少許用之。亦妙。金瘡洗滌。醋中須多沖溫水。否則刺戟太甚。必發瘢。熱醋能使骨變輭。硬骨變如輭骨。故骨傷者。外敷過久。骨遂失其堅剛之質。不能復元。患佝僂病之小兒。如給以酸味之飲食物。諸骨倍形輭弱。而增加其疾病。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

惟類似胼胝之硬腫。以此外敷。善能變輭而消散。（骨爲土質所成。酸物能溶化土質。故魚骨等浸以醯醋。即可變輭。燒酒則反之。能使纖維變硬。故輭肉可成胼胝。）醋中加苦味收澁之藥品。用以外敷。善能防止腐敗。加規那末其效尤甚。各種潰瘍有腐壞之慮者。宜以此防之。（或云夏月醃肉加醋貯之。便不腐敗。其有防腐之效可知。）眞珠、蜥蜴石、珊瑚、蠣殼、卵殼等。浸以醯醋。亦即變輭。疫癘流行之時。燒石澆醋。以其蒸氣熏蒸居室。善能驅逐傳染之疫氣。（遠西醫方名物考）

【醋母】即酢漿草之古籍別名。詳『酢漿草』條。

【醋炒青皮】即青皮以醋拌炒成者之處方用名。詳『青皮』條。

【醋林子】**命名**　本品味酸如醋。故名。

產地　生山野林箐中。

形態　醋林爲果類之一種。高丈餘。枝葉繁茂。三月開白花四出。九月十月間其實成熟。纍纍數十枚。生青熟赤。類櫻桃而蒂短。其實可供食與藥用。

採取　採得陰乾。連核用。

性質　酸溫。無毒。

主治　久痢不瘥及痔漏下血。虵咬心痛。小兒疳虵心痛。腹滿黃瘦。下寸白蟲。單擣爲末。酒服一錢匕。甚效。鹽醋藏者食之生津液。醒酒止渴。多食令人口舌粗拆也。

【醋梨】即梨之以醋煮熟者。功用詳『梨』條。

【醋倚草】即虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『虎杖』條。

【醋漿】即酸漿之古籍別名。典見本經。詳『酸漿』條。

【銷恨客】即白桃花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白桃花』條。

【銷根花】即白桃花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白桃花』條。

【鉦草】即木賊草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木賊草』條。

【鍪】即銀箔之古籍別名。典見綱目。詳『銀箔』條。

【錠】即白芍之古籍別名。典見別錄。詳『白芍』條。

【震龍根】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【鞋底魚】即比目魚之古籍別名。典見綱目。詳『比目魚』條。

【廁鼈】即鼉之古籍別名。典見綱目。詳『鼉』條。

【駕】即錫之古籍別名。典見綱目。詳『錫』條。

【駝】即駱駝之原名。詳『駱駝』條。

【駝脂】即駱駝脂之原名。詳『駱駝脂』條。

【駝鳥】**命名**　本品形如駱駝。故名。

古籍別名　駝蹄雞。食火雞。骨托禽（綱目）非洲能（動物學大辭典）

外國名稱　Struthio camelus L.（拉丁）Ostrich 或 Somali ostrich（英）Struthio molybdophanes（德）ダチョー或ダテウ或アフリカダテウ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類走禽類駝鳥科。

產地　出澳非二洲及沙漠諸地。

形態　駝鳥爲林禽類禽屬之最大者。嘴扁而短。似三角形。頭及頸裸出淡紅色之皮膚。頸長軀幹短。翼短小而輭弱。脚長。脛部半裸。出跗蹠部。表面粗糙。具二趾。一長者有爪。一短者無爪。尾短。全體羽毛柔輭。羽枝皆分離。更有缺羽枝爲捲髮狀者。體高七八尺。不能飛而善走。馬不及之。產卵沙漠中。其羽歐人用以裝飾。屎可供藥用。



駝鳥

性質　無毒。

主治　人誤吞鐵石入腹。食之立消。

【駝鹿】即鹿之極大而色蒼黃無斑者。詳『鹿角』條。

【駝蹄雞】即駝鳥之古籍別名。典見綱目。詳『駝鳥』條。

【駝鵝】即鵜鶘之古籍別名。典見綱目。詳『鵜鶘』條。

【髮晶】即水晶之雜有他石而成髮紋者。功用與尋常水晶同。詳『水晶』條。

【鬧羊花】即羊躑躅之古籍別名。

731／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見綱目。詳『羊躑躅』條。

【鬧魚花】卽醉魚草之古籍別名。典見綱目。詳『醉魚草』條。

【魷魚】卽貝子大者之古籍別名。典見綱目。詳『貝子』條。

【魨】卽河豚魚之別名。典見字書。詳『河豚魚』條。

【魨魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮑魚』條。

【魯果能】卽石龍芮之古籍別名。典見別錄。詳『石龍芮』條。

【魴魚】卽比目魚之古籍別名。典見吳都賦。詳『比目魚』條。

【魨魚】卽鯸魚之原名。詳『鯸魚』條。

【魨才】卽納鼈之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『納鼈』條。

【魶魚】卽鯢魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯢魚』條。

【鴆】卽鵝之古籍別名。典見綱目。詳『鵝』條。

【鴻】卽鴻鵠之古籍別名。典見綱目。詳『鴻鵠』條。

【鴉】卽鵝之古籍別名。典見綱目。

【鴆】卽伯勞之古籍別名。典見孟子。詳『伯勞』條。

【鴆】古籍別名　鴆日（別錄）　同力鳥（弘景）　雌名陰諧。雄名運日（綱目）

形態　鴆爲山禽類之一種。似鷹而大。狀如鸐。紫黑色。喙赤。眼黑。頸長七八寸。雄者鳴則晴。雌者鳴則雨。性喜啖蛇及橡實。故其肉氣腥而有毒。食之立死。其睒亦有毒。可供藥用。

性質　有大毒。

主治　帶之殺蝮蛇毒。被咬。刮末塗之。

【鴆毛】性質　大熱。大毒。

參考資料　鴆毛入五臟。爛殺人。（別錄）

【鴆鳥漿】命名　本品功能解毒。故名。

產地　生山林間。

形態　鴆鳥漿爲雜草類之一種。高一二尺。葉陰紫色。凌冬不凋。秋日開花。淡黃色。狀如蓬蒿菜花。結子赤色。如珠。莖葉可供藥用。其子詳見該條。

性質　甘。溫。無毒。

主治　風血羸老。浸酒服。解諸毒。

【鴆鳥漿子】性質　甘。溫。無毒。

主治　療癰腫。瘡毒。

【鴆】古籍別名　獨豹。（綱目）　野雁（動物學大辭典）

外國名詞　Otis dybowskii Taez（拉丁）Chinese bustard Eastern great bustard（英）Trappe（德）ノガン（日本）

基本　係脊椎動物鳥類涉禽類鴆科。

產地　出北方平原及西比利亞等處。

形態　鴆爲水禽類之一種。體比雁略大。狀亦似雁。頭部扁。耳羽長。與頸部皆青灰色。背部有黃褐與黑色斑紋。腹面概灰白。翼較雁爲小。故飛力雖弱。而脚健善走。亦常羣居。產卵地上。食蠕蟲穀類等。其肉柔味美。可供食與藥用。

性質　甘平。無毒。

主治　補益虛人。去風痺氣。

【鴆肪】主治　塗癰腫。潔肌膚。長毛髮。

【鴉片】古籍別名　阿片。阿芙蓉（綱目）　罌片。罌粟泡。罌粟脂。罌粟津液（和漢藥考）洋烟（俗名）

外國名詞　Opium.（拉丁、英、德）Meconium.（拉丁）Laudanium.（法）

基本　屬罌粟科。爲罌粟未經成熟之果漿。

產地　陳仁山藥物生產辨云。鴉片原產印度。運入中國作藥用。後人用火燒吸食。耗財損身。害不可言。和漢藥考曰。產於東印度。土耳其埃及。波斯。中國等處。日本主要之產地。在大阪之三重岡山。山梨。神奈川諸縣。

形態　鴉片爲暗褐色不整之塊。初時柔輭。乾則質脆。弱其粉末作黃褐色。破碎面色褐。有似蠟之光澤。掀紙上摩之。則留淡褐色之痕。試燃以火。立卽膨脹。而變炭分及灰分。比重約一・三。水大半能溶解之。現酸性之反應。酒精尤善溶解。味苦辣。而帶麻醉性。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

採取　七八月間。花謝後半月內。罌粟結青苞時。午後以大針刺其外面青皮。勿損裏面硬皮三五處。次晨津出。以竹刀刮收取之。入甕器陰乾用。

用法　燒熟成泡。水化服。或劑和作丸散。

性質　酸。澀。溫。微毒。

成分　阿片含有主成分之嗎啡。此外尚有植物鹽基約十餘種。并護謨、樹脂、脂肪、蠟分、糖分、黏液素、蛋白質、灰分等。

效能　止瀉痢。定諸痛。爲麻醉藥。有鎮靜腸蠕動機之功用。常用於下利、赤痢、霍亂、腸出血、急性腸閉塞諸症。又治腸結核胃黏膜炎。

作用　入胃時。能刺激胃壁神經。令人發嘔。旋即被麻醉。疼餓等知覺。均行消失。胃分泌亦減少。至腸亦能刺激腸壁神經。使腸壁失去知覺。同時分泌減少。蠕動遲緩。及由腸壁次第吸入血中。已成爲 Oxymorphine $C_{34}H_{36}N_2O_6$，由末梢神經而達腦部。腦迴先受其激。旋即被阻。蓋由 Oxymorphine 直接行於腦血中。非自腦中之神經所致。其激腦功程所顯之狀。如令人感情隆重。志願暢達。幻想異常。敏銳過人。同時亦雜有亂亂之思想。性慾亦異常亢進。若服大量或服時過久。竟能令大腦完全麻醉。全身知覺成失。心跳緩慢。呼吸促迫而死。

主治　瀉痢脫肛不止。能澀丈夫精氣。

歷代記述攷證　【清】黃元御玉楸藥解論鴉片曰。鴉片煙收濇。斂固。治泄痢脫肛。精滑夢遺。本草謂鴉片即罌粟未開。鍼刺青苞。津出刮收。陰乾而成。名阿芙蓉。今洋船至閩。多帶此物。閩中無賴之徒。以及不肖子弟。宮宦長隨。優伶娼妓。以爲服之添筋力。長精神。御淫女。抱孌童。十倍尋常。但壽命不永。難逃五年。此煙非延年養生之品。斷宜戒之。【清】王士雄隨息居飲食譜論鴉片曰。亞片入藥。亦始前明。李濒湖本草綱目收之。清乾隆間始有吸其烟者。初則富貴人吸之。不過自速其敗亡。繼則貧賤皆吸之。因而失業破家者衆。而盜賊滿天下。以口腹之欲。致毒流宇內。塗炭生民。洵妖物也。智者遠之。亦有因衰病而誤服其中者。以吸之入口。直行清道。頃刻而徧一身。壅者能宣。鬱者能舒。陷者能舉。脫者能收。凡他藥所不能治之病。間有一吸而暫效者。人不知其爲劫劑。遂詫以爲神丹。而日病吸此。尤易成引。迨引既成。臟氣已與相習。嗣後舊疾復作。必較前更劇。而烟亦不能奏效矣。欲罷不能。噬臍莫及。乃致速死。余見貧多敢告世人。毋蹈覆轍。徐松龕云。天竺自六朝後。皆稱印度。今五印度爲英吉利所轄。進口貨物。近以亞片爲主。宇宙浮孽之氣。乃獨鍾於佛國。何其怪也。戒法。斷癮之方。驗者甚少。且用烟或烟灰者居多。似乎烟可少吸。一不服藥。癮即如故。惟此方日服。仍可吸烟。旬餘癮自漸減。又不傷身。蓋物性相制。此藥專制亞片之毒。故能斷癮。絕無他患也。方用鮮松毛數斤。略杵。井水熬稀膏。每晨開水化服一二錢。或每土一斤。用松樹皮半斤。煎湯熬烟。如常吸食。癮亦漸斷。或以一味甘草熬爲膏。調入烟內。初且少入。漸以加多。如常吸之。斷癮極效。【清】黃宮繡本草求眞論鴉片曰。阿芙蓉即鶯粟花之津液也。一名鴉片。一名阿片。出於天方國。氣味與粟殼相似。而酸濇更甚。用阿芙蓉一分。糯米飯搗作丸。通治虛寒百病。凡瀉痢脫肛。久痢虛滑。用一二分。米飲送下。其功勝於粟殼。又瘟瘧行瘧時。泄瀉不止。用四五釐至一分。未有不止。但不可多服。忌酸醋。犯之斷腸。及忌葱蒜漿水。奈今有以房術爲用。無論病症虛實。輒爲輕投縱慾。以致腎火愈熾。吁誤矣。

國外學說　英美學說謂鴉片產中國、波斯、埃及、印度、土耳其等國。即白罌粟未熟者。割裂其殼。後流出汁液。所成之乾膏。阿剌伯國名曰阿非思。印度名曰鴉片末。自古以來。即有人能知其形性與功用。酒、水淡强水類均能提出功力。歐羅巴尋常出售之鴉片。即土耳其國所產者。謂之土耳其鴉片。大半從士麥拿之口岸運出。間有帶至土耳其京都。發至歐羅巴各處。故英國藥品中之所用。係土耳其國之鴉片。又用埃及國之鴉片。亞

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

波斯國之鴉片。在英人幾不及知。其他如印度國所產之鴉片。多運至中國出售。第印度國所產之鴉片有二種。一作球形而大如柚。俗呼爲公。一作餅塊而無皮。俗呼爲白。中國之雲南所產者亦呼爲白。然功力之峻。則究以公爲最。藥品中必以乾者爲合用。否則濃淡不能一定。惟鴉片膏則不必用其乾品。且鴉片以產土耳其者爲上。其次爲印度。中國若將業經取汁液之漿。熬水成膏而用以攙入。其品最下。鴉片內含十八精二酸。內惟麼啡精爲最要之質。鴉片內所含之麼啡。最多者爲法國鴉片。與日耳曼國鴉片。每百分中計有麼啡十六分至二十分。評論其品之高下。卽以內含麼啡之多寡而定。麼啡多則力峻而價昂。且鴉片每百分則以內含麼啡六七分者方可入藥。若過少便不足於用。其作用爲寧睡藥之首。初服則大感動腦線。以後則減腦線之知覺。又能特意感動腦髓。令睡。如爲外科之用。初時能行血氣。令其覺痛。卽如用於眼睛。先覺痛。後覺平火安心。爲內科之用。食一小服。則先行血氣。令脈加數。皮膚加熱。不久則知覺減少。心中安穩。則欲睡而其痛減。輕身體內失生津液之功用。惟皮膚仍如故。如食過大之服。則爲令人寧睡之毒藥。常用之爲止痛令睡。平火安心。或放出津液過限。然不免有頭痛煩渴便燥嘔吐等狀。如泄瀉病與霍亂吐瀉病。能令其停止。常服則使人胃弱不化。呼吸短少。致血內養氣不足。又可用爲發汗藥。治轉筋藥。治發熱藥。又酒狂病。食大服能得其益處。生炎病。可合於汞（二）綠（甘汞）或汞必格（吐根）服之。依尋常而論。生炎或發大熱。服鴉片爲相反之治法。以鴉片爲各種藥品中之最要。故較他種藥品用之更多。且如服各種瀉劑而加鴉片少許。以鴉片能制其猛烈。如用汞（二）綠汞藍丸等作改血藥（變質劑）而必合鴉片同服。以鴉片能助其力。如用衣必格作表藥而必偕以鴉片。以鴉片能助其發汗。如用樟腦療痛而亦加以鴉片者。以鴉片能助其止痛。又如平人略服。則益腦提神。脈快有力。遍體筋肉。皆覺收澀。惟腦則受功力最多。故至略醉。未幾則自覺心神舒暢。又劇痛之症。服之則可止痛。如膿腑發炎作痛。先用涼劑去炎。隨用鴉片止痛。甚驗。惟身尚有大熱者。俟熱退方可服。如心痛肚疼。係由胃不消化者。須先服吐瀉等藥。後服鴉片。其痛可止。如膽淋及內腎淋等症作痛者。先以熱水浸身。次服鴉片。以止其痛。如小便痛及婦人經痛者。亦先以熱水浸下身。後亦加服鴉片。庶易全愈。如牙痛耳痛。服之亦佳。或用棉花蘸鴉片酒塞入患處。如初患風溼時。或作痛。服之可治。或用鴉片酒射入竅門。如有等毒瘡。雖不可療治。當劇痛時。服之亦可緩痛。又如有等不能安寢之症。服之能治。如或發酒顛。或發瘋顛。竟夕喧嘩。服之亦可就寢。又如抽筋一症。有由羊癇而發者。有因產後而起者。實係腦力妄發。服之卽可平腦。又如紅白痢。須先服大黃等藥以去其積滯。後服鴉片丸。或鴉片酒或麼啡。均效。又如咳嗽。凡乾咳無痰者。服之方合。如痰多用此。恐至痰塞氣管。宜佐以祛痰藥爲妥。如鴉片表散（拖布兒私散）是也。其他如誤服過多。或求自殺者。始則頭昏繼則不醒人事。或五六點鐘或十二十二點鐘而氣絕。第鴉片除內服外。或取以化水。用水節射入肛門。或用小水節刺入皮內。以藥水射之。均能奏效。如止痛寧睡及治各症。以一釐或二釐爲一服。有煙癮者宜重服。然或多服而仍不驗。則以藥水由肛門射入卽驗。如嘔吐不止。及大腸痛。內腎痛。膀胱痛等症。亦宜以藥水射入糞門。至解藥之解此毒。須先用吐劑。如膽礬一分七釐半。或白礬半兩。或芥末半兩。用溫水一碗化服令吐。後再多飲溫水助嘔。至吐清水爲止。後再飲咖啡茶或濃細茶或服咖啡精。又扶助行走。勿寐。倘患者不能服藥。用抽水節以抽淨其毒。次將濃咖啡茶或咖啡精送入胃內。若其狀仍昏迷。再用空針射入刀邊精水八釐七毫半至一分七釐半入皮內。以敗其毒。外用冷水洗面及前後心。或用手巾蘸水拍打亦可。行此數法。如氣息仍不舒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

展。急將患者二臂向前後屈伸。以助呼吸。(人工呼吸法)或用電機以震動其身。日本學說謂鴉片之主成分。爲莫兒比涅(即嗎啡)。其主治爲麻醉止瀉藥。於莫兒比涅之適症間有用之者。鴉片之特效。爲諸般下痢。如由感冒之下痢。(於飲食不愼之下痢當禁)虎列剌(霍亂)等。一日數回○、○○五至○、二(自一毫三絲至二釐六毫)爲散丸與之。此外於腹膜炎。蜜尿病。(三消病)鉛毒便祕。某種精神病。酒客譫妄等亦適用。極量一回○、一五(三釐九毫)一日○、五(一分三釐)又和漢藥考曰。罌粟爲一年生或二年生草本。多栽種於園圃。作藥及賞玩之用。莖高四五尺。葉爲長橢圓或長卵圓形。邊緣有缺裂。或生鋸齒。葉面平滑。包以莖無葉柄。花梗生長茸毛。花四瓣大朵。色有白、紅、赤、紫各種。皆鮮豔異常。有多數雄蕊與壺狀之雌蕊。果實爲蒴果。形亦如壺。頂端戴雌蕊頭之圓片。房室少者七。多者十五。中藏種子無數。種子色白或青黑。收採阿片之法。各國雖不一致。要亦大同小異。日本收採之法。大抵在花謝後七日至十日。蒴果未熟之際。於其縱凸處。自下向柱頭部劃破果被。至不割斷爲度。則其內自有漿汁滲出。一受空氣。立卽凝結。變黑如糊。乃以竹篦刮下。湊集煉合。盛以器置室中陰乾。照法令獻諸政府。收穫之量。視罌粟之種類及栽種法收採法而不同。大約每地十畝。可得阿片三十至四十兩。最多六十兩。又曰。阿片製劑有數種。如阿片越幾斯。阿片酒。阿片安息香酒。阿片吐根散。阿片吐根錠。阿片坐藥。芳香阿片酒。以上皆爲日本藥局方(第四版改正本)所收載者。阿片水。阿片精漿。番紅花阿片酒。阿片輭膏。阿片硬膏。鹵痛丸。狄里亞加舐劑。以上皆日本藥局方所未收載。

配合應用　㈠治久痢。阿芙蓉小豆許。空心溫水化下。日一服。忌葱蒜漿水。若渴飲蜜水解之。(集要方)

㈡治赤白痢下。鴉片、木香、黃連、白芷各一分。研末。飯丸小豆大。壯者一分。老幼半分。空心米飲下。忌酸物生冷油膩菜酒麵。無不止者。(口渴略飲米湯)

㈢鴉片土十六兩切薄片。汽水一百二十兩。先用水四十兩浸鴉片一天。過布絞渣。再用水四十兩。製如前法。三次亦如之。共將三水合一。過呢布。入熬鍋散氣。臘八兩爲度。每服八毫七絲半至一釐七毫半。此膏行氣之力較鴉片土略小。惟用爲平火安心則最良。如人跌仆或被毆打痛劇。服此膏二三釐。能飲血止痛。不效則再服一二次。如發狂而不欲睡。每服此膏四五釐。服二三次。

㈣鴉片一分半。粗末。淡酒二十分。浸七天。濾渣。用絞盤絞之。過淋紙。再加淡酒仍足二十分爲度。能止痛寧睡。比鴉片略速。每服八釐七毫半至七分。(鴉片酒方)

㈤鴉片膏一兩。肉桂一錢半。搗爛。丁香一錢半。搗爛。白蘭酒二十兩。共浸七天。間時搖動。過淋紙。再加酒淋渣。仍足二十兩爲度。與鴉片酒同用。第其力則較遜。每服一分七釐至七分。

㈥治新泄瀉新痢疾。鴉片八毫。研末。樟腦三釐。辣椒八毫。共研勻。加蜂蜜作一丸。

用量　五釐至一分。

施用宜忌　凡外有風寒實邪者禁用。

參攷資料　㈠俗人房中術用之。京師售一粒金丹云。通治百病。皆方技家之術耳。(李時珍)㈡阿芙蓉前代罕聞。近方有用者。云是罌粟花之津液也。罌粟結青苞時。午後以大針剌其外面青皮。勿損裏面硬皮。或三五處。次早津出。以竹刀剖收入甕器。陰乾用之。故今市者。猶有苞片在內。王氏醫林集要言。是天方國種。紅罌粟花不令水淹頭。至七八月花謝後。以大針剌其外面青皮而取之者。按此花五月實枯。安得七八月後尙有青皮在者。或方土不同乎。(李時珍)㈢鴉片止痢功勝粟殼。但忌常服。久反無驗。且耗陰液。雖提助精神。而損折人壽。切戒之。(本草述)㈣阿片之入藥用。太古時已知之。洎於中古。又知其爲麻醉藥。繼此而吸食鴉片之風。漸播及於土耳其

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以及東亞諸國。(和漢藥考)㉟按吸食阿片。以其麻醉故。有能使心神愉快之效。故染之者多。久則中嗎啡之毒。因之志氣消沈。精力喪失。凡人有此嗜好。則於國家之消長關係甚重。故各國皆禁止其貿易。且防止吸食焉。(和漢藥考)㊱鴉片爲罌粟花結實時。刺出之汁。略有半乾如曬乾麪之則得黃櫨色之粉。凡身內有大痛。則鴉片爲最妙之止痛藥。如病者不能安睡。則鴉片爲最妙之安神藥。如動筋時痛。鴉片亦能治之。凡發熱之病。皮膚乾熱。脈數。舌有厚苔。不可服鴉片。因鴉片之性能補火。凡中風膈炎等病。亦不可服鴉片。因鴉片能令血聚於腦也。小兒之病。切不可用之。因其性猛烈。小兒不能當也。(儒門事親)㊲鴉片以產土耳其者爲上。次則印度。再次則中國。功用能止痛。補腦。平腦。每服一釐或二三釐。(內科新說)

【鴉目】卽石硫黃之別名。見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【鴉烏】卽烏鴉之古籍別名。典見爾雅。詳『烏鴉』條。

【鴉草】**產地**　出河北各屬。

採取　三伏後新採之。

性質　淡。苦。辛。微溫。

功用　祛風消腫。壯筋活絡。

主治　風痰。

【鴉銜草】卽紫草之古籍別名。典見吳普本草。詳『紫草』條。

【鴉膽子】卽苦參子之處方用名。詳『苦參子』條。

【鴉鵲翻】**產地**　生南安。

形態　叢生。藉莖。對葉。如地榆而尖。結小子成攢。嬌紫可愛。並可供藥用。



鴉鵲翻

【麩米】**基本**　本品或以米。或以麥炒成。其味香。

古籍別名　糗。麩米花。乾糗糧。(綱目)

性質　甘。苦。微寒。無毒。

主治　和水服。解煩熱。止洩。實大腸。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論麩米曰。麩米治寒中除熱渴。消石無。【明】李時珍本草綱目論麩米曰。炒米湯止煩渴。

參攷資料　㈠麩。蒸米或麥熬過。舂作之。(蘇恭)㈡河東人以麥爲之。北人以粟爲之。東人以粳米爲之。炒乾飯舂成也。(陳藏器)

【麩米花】卽麩米之古籍別名。典見綱目。詳『麩米』條。

【麩炒枳殼】卽枳殼用麥麩焙炒成者之處方用名。詳『枳殼』條。

【麩炒枳實】卽枳實用麥麩焙炒成者之處方用名。詳『枳實』條。

【麩金】卽金之出水沙中而形如麩片者。功用詳『金』條。

【麩麥】卽浮小麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮小麥』條。

【麩木子】卽桄榔子之古籍別名。典見伽藍記。詳『桄榔子』條。

【麪筋】**基本**　本品卽以小麥粉和水揉洗而凝結成團者。

性質　甘。涼。無毒。

主治　解熱和中。勞熱人宜煮食之。

歷代記述攷證　【明】寧原食鑑本草論小麥麪筋曰。寬中益氣。

參攷資料　㈠麪筋以麪與麩水中揉洗而成者。古人罕知。今爲素食要物。煮食甚良。今人多以油炒。則性熱矣。(李時珍)㈡生嚼白麪成筋。可黏禽蟲。(寇宗奭)

【麪麴】**製法**　三伏時。用白麪、綠豆。以麥汁麥爛。辣蓼末。杏仁泥。和踏成餅。楮葉包。懸風處。候生黃收用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　消食積。酒積。糯米積。研末。酒服。立愈。餘功同小麥麴。

【麪櫧】卽櫧之古籍別名。典見綱目。詳『櫧子』條。

【黎豆】**命名**　黎亦黑色之稱。本品莢老則黑。煮汁亦黑。故名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名　貍豆。虎豆（綱目）　鳳豆（滇南名）八升豆（日本）

外國名稱　Mucuna capitata, W. et A.（拉丁）ハツシヨウマメ　オシヤラクマメ　フチマメ　テンテクマメ（日本）

基本　係豆科黎豆屬。爲黎豆之子實。

產地　生山野田園間。

形態　黎豆爲穀類豆屬之一年生蔓草。本莖條引蔓。葉如豇豆。但葉脈偏斜。夏秋間開花成簇。花大呈紫色如藊豆花。十餘莢同生一處。長三四寸。大如拇指。有白茸毛。老則黑而露筋。其種子大如刀豆。淡紫色有斑點。如貍文。可供食與藥用。

性質　甘。微苦。溫。有小毒。

主治　溫中益氣。

參攷資料　黎豆煮去黑汁。同豬雞肉再煮食之。味乃佳。但多食令人悶（綱目）

【黎椒】**別名**　抱娃子椒。（俗名）

性質　辛。熱。

主治　同川椒。

參攷資料　㈠川椒故有名。產自黎大所城隅者尤香烈。大小必雙。肉理細密。皺裂而子不墮。俗呼抱娃子椒。（邊州閒見錄）㈡四川志各州縣多出椒。惟茂州出者最佳。其殼一開一合者尤妙。按黎椒近日亦罕有眞者。外方所得俱屬彼土人以他產僞充。其功效亦僅與川椒相埒。據劉少府抱清云。眞者含一二粒口中。可辟瘴毒。解魚蝦食毒。更可爲導淫具。彼土中有一種生惡瘡妓女。人不敢近。惟吞黎椒三粒。與之接。則無害。次日便出。椒內盡包其毒。不入人臟腑也。故眞者彼土亦珍貴之。罕有出售於外者。（趙恕軒）

【黎朦子】卽宜母果之古籍別名。典見綱目拾遺詳『宜母果』條。

【齒逕】卽人齒垢之原名。詳『人齒垢』條。

十六畫

【凝水石】卽寒水石之原名。詳『寒水石』條。

【凝海菜】卽石花菜之日本名。詳『石花菜』條。

【噤婁】卽無患子之古籍別名。典見本草拾遺。詳『無患子』條。

【壁虎】**原名**　守宮。

命名　本品善捕蝎蠅。棲止壁間。故名。

古籍別名　壁宮。蝘虎（蘇頌）蜓蜴。蝘蜓（揚子方言）

外國名稱　Platydactylus chinensis 或 Gecko chinensis（Gecko）

基本　係脊椎動物爬蟲類蜥蜴類守宮科之守宮。

產地　牆壁及樹木間。處處有之。

形態　壁虎爲爬蟲類之一種。形似石龍子而較扁。頭部扁口大。舌肥厚。吻被方鱗。鱗在上唇者有十一枚。下唇九枚。頸大有五角鱗。頤下鱗一對。兩鼻孔相隔離。眼大無瞼。脊暗黑。有黑小點多粟狀突起。腹黃白。四肢短。各具五趾。除第一趾外。多有鉤爪。趾有橫褶襞。藉其排除空氣之作用。能爬行牆壁等處。尾尖長。頗脆易斷。而亦易復生。體長三四寸。捕食蜘蛛蚊蠅等。



壁虎

性質　鹹。寒。有小毒。

主治　中風癱瘓。手足不舉。或歷節風痛。及風痙驚癇。小兒疳瘌。血積成痞。癩風瘰癧。療蝎螫。

參攷資料　守宮舊附見於石龍下。云不入藥用。近時方術多用之。楊仁齋言。驚癇皆心血不足。其血與心血相類。故治驚癇。取其血以補心。其說近似。而實不然。蓋守宮食蝎蠆。蝎蠆乃治風要藥。故守宮所治風痙驚癇諸病。亦猶蜈蝎之性能透經絡也。且入血分。故又治血病瘡瘍。守宮祛風。石龍利水。功用自別。不可不知。（李時珍）

【壁虎羹】**主治**　聖濟總錄曰。胎赤爛眼昏暗。用活者數枚。以罐盛黃土。按實入蝎虎在內。勿令損傷。以紙封口。穿數孔有益於人。亦可供藥用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

出氣。候有糞數粒。去糞上一點黑者。只取一顆白者。唾津研成膏。塗眼睫周回。不得揩拭。來早溫漿水洗三次效。

【壁虱胡麻】卽亞麻之古籍別名。典見綱目。詳『亞麻』條。

【壁宮】卽壁虎之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『壁虎』條。

【壁魚】卽衣魚之古籍別名。典見圖經本草。詳『衣魚』條。


【壁蝨】古籍別名　蚌。（動物學大辭典）臭蟲壁虱。（綱目拾遺）蔗蟲。（俗名）

外國名稱　Ixod & ricinus L. Cattle tick 或 Tick Zecke 或 Holzoock（拉丁）ダニ（日本）

基本　係節肢動物屬蜘蛛類壁蝨類壁蝨科。

產地　產南方濕溼之地。今江南北人家多有之。稍不潔卽生此物。旅店驛舍中尤多。帶入衣被歸家卽生。多藏蔥蔥中及壁內或梟機牀縫間。其身扁而易入。至冬則入蟄。多藏壁隙桌縫及泥沙山穴中。及古樹根下。交春皆啓蟄而出。

形態　壁蝨屬昆蟲類。體橢圓色棕黑。皮爲革質。現條紋。間有毛或刺。口適於吮吸。及刺螫。顎有鉤。觸角短小。腹大無環節。脚分七節。尖端具鉤爪。或有圓盤。無心臟。亦無脈管。脚四對。幼時三對。體長三分餘。細小如蟻。其生殖極速。頗易蕃育。白色卵生。雌雄異體。初生便嚙人。生一二日卽能褪殼。愈褪愈大。漸漸而老。色由紫紅而轉棕黑。常隱伏牀褥障中。晝伏夜出。吸血時注入毒汁。故被吸者痛痒赤腫。塊粒纍纍。搔則愈大。疼痒難禁。幼兒皮膚嬌嫩。其苦尤甚。捕得可供藥用。



壁蝨

主治　治咽腫。小兒驚風。療眼生偷針。疔瘡。臁瘡。

配合應用　㈠治咽腫。用壁蝨十枚。滴花燒酒浸服。（集聽方）

㈡治臁瘡臭爛。用臭蟲同水龍骨搗。和麻油調敷。出靈黃水立愈。（西亭藥鏡方）

㈢治眼生偷針。臭蟲血點之卽散。又方。治小兒驚風。用壁蝨於淨水中漂去臭氣。烙乾入藥。（海上方）

㈣拔疔。臭蟲同米飯搗勻。搽疔上。能立拔疔根外出。（楊氏經驗方）

㈤治鮒魚刺戳。叫谷苗香葉使爛。花燒酒搗糊。瘡上如口久爛。用臭蟲劃去頭傅之。（醫宗粹編方）

參攷資料　壁蝨卽臭蟲。狀如酸漿仁。唾入食血。與蚤皆爲牀榻之害。古人多於蓆下置麝香、雄黃或菖蒲或藿香末。或楝花末。或夢沫。或燒木瓜烟。黃檗烟。牛角烟。馬蹄烟以熏之也。

【壁蝨胡麻】卽壁虱胡麻。參見『亞麻』條。

【壁虱】卽壁蝨之古籍別名。典見綱目。詳『壁蝨』條。

製法　凡入藥須置溫水中。令臭氣洩盡用。

性質　氣腥。味微鹹。性平。在土者有毒。

【壁錢】命名　本品窠形如錢。故名。

古籍別名　壁鏡（綱目）壁嬭。（俗名）壁蟲蟢子。

外國名稱　Tegenaria domestica L.（拉丁）ヒラタグモ或ウチグモ（日本）

基本　屬節肢動物蜘蛛類。其窠幕詳見該條。

產地　牆壁屋角間多有之。

形態　壁錢爲卵生蟲類之一種。其體扁。色灰褐。頭背具單眼四。分爲二列。腹多小黑點。脚長而有四對。卵囊色白而圓扁。固着於壁間。常守護之。夜間徘徊壁上覓食。捕得可供藥用。



壁錢

性質　無毒。

738／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　鼻衄及金瘡出血不止。捺取蟲汁。注鼻中及點瘡上。亦療五野雞病下血。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論壁錢窠幕曰。產後咳逆三五日不止。欲死者。取三五個。煎汁呷之。良久止。金瘡諸瘡出血不止。及治瘡口不斂。取兩類貼之止蟲牙痛。

【壁蘭】　卽壁錢窠幕之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『壁錢窠幕』條。

【壁蟢】　卽壁錢之俗名。詳『壁錢』條。

【壁蟲】　卽壁錢之別名。詳『壁錢』條。

【壁鏡】　卽壁錢之古籍別名。典見綱目『壁錢』條。

【擘木】　**形態**　擘木爲雜木類之一種。其核如棗核。可供藥用。

採取　五月採之。陰乾用。

性質　甘寒無毒。

主治　脇下留飲。胃氣不平。除熱。

【導河】　卽茵芋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茵芋』條。

【導河梯】　卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【躑躅】　卽百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳『百合』條。

【懲葱】　卽藜蘆之古籍別名。典見綱目。詳『藜蘆』條。

【獨搖】　卽枎杷之古籍別名。典見綱目。詳『枎杷』條。

【擁劍】　卽蟹之古籍別名。典見綱目。詳『蟹』條。

【擔不歸】　卽淡芭菰。參見『烟草』條。

【擔羅】　**基本**　擔羅爲介類蛤類之一種。可供藥用。

性質　甘平無毒。

主治　熱氣消食。雜昆布作羹。

主結氣。

【據火】　㊀卽螢火之古籍別名。典見吳普本草。詳『螢火』條。㊁卽景天之古籍別名。典見別錄。詳『景天』條。

【遲遲燕】　卽燕窩之處方用名。詳『燕窩』條。

【槭仁】　卽酸棗仁之古籍別名。典見爾雅。詳『酸棗仁』條。

【樗皮】　卽秦皮之古籍別名。典見別錄。詳『秦皮』條。

【樸樕】　卽樹之古籍別名。典見爾雅。詳『樹』條。

【樹毒子】　卽懸鉤子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『懸鉤子』條。

【樹梨】　卽鹿梨之古籍別名。典見綱目。詳『鹿梨』條。

【樹蜜】　卽枳椇子之古籍別名。典見古今注。詳『枳椇子』條。

【樹頭酒】　卽椰子漿之別名。詳『椰子漿』條。

【樹雞】　卽木耳之古籍別名。典見韓文。詳『木耳』條。

【樹蠐】　卽蟲白蠐之處方用名。詳『蟲白蠐』條。

【樺木】　**命名**　本品畫工以皮燒烟熏紙作古畫字畫。本作樺。俗省作爲樺。

古籍別名　擩木。

外國名稱　Betula alba, L. var. vulgaris, DC.（拉丁）シラカンバ　シラカバ（日本）

基本　係樺木科樺木屬爲樺木之皮。其脂詳見該條。

產地　出遼東及西北諸地。

形態　樺木爲落葉喬木。高三四丈。樹皮白色。有紫黑斑紋。厚而輕軟。易剝。葉卵形而尖。有長柄。互生。夏月開花。單性。雌雄同株。皆排列爲穗狀花序。結實如球狀。鱗間多細子。其皮古以裹弓、鞍、鞍鐙、刀靶等物。亦可供藥用。



樺木

性質　苦平無毒。

主治　諸黃疸。濃煮汁飲之良。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本草拾遺論樺木皮曰。煮汁冷飲。主傷寒。時行熱毒瘡特良。卽今疏豆瘡也。【宋】寇宗奭本草衍義論樺木皮曰。燒灰。合他藥治肺風毒。【明】李時珍本草綱目論樺木皮曰。治乳癰。

【樺木脂】主治　燒之。辟鬼邪。

【橄欖】卽橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橄欖』條。

【橄欖】處方用名　青果。橄欖。古籍別名　青果。（梅聖俞集。忠果。（記事珠）諫果。（農書）青子。次斯。忠臣。南威。栗果。味諫。橄核。回甘子。訶梨子。梨頭。（和漢藥考）綠欖。方橄。（綱目）

外國名詞　Canarium album.（拉丁）Chinese Olive（英）

基本　屬橄欖科橄欖樹之果實。

產地　凡閩、廣等省及熱帶地方之山野平原間。恒有產焉。其產於西藏者。名西藏青果。尤爲珍品。和漢藥考曰。產安南及中國南部。

形態　橄欖爲落葉喬木。高丈餘。葉爲奇數羽狀複葉。花攢簇成穗狀。枝節間有脂如膠。子實爲堅硬肉果。以帶白色者爲上品。內有六稜紡錘狀核。頗堅硬。破之。有三房。房各有細長仁。謂之欖仁。

採取　八九月間採之。

製法　凡使須揀小者佳。並去尖。以火煆存性。研剉用。亦有切斷煎入湯藥。

性質　酸。甘。溫。無毒。

效能　生津。止渴。清咽解毒。用作緩和滋養藥。又解酒毒及魚鼈毒。

主治　生食煮飲。並消酒毒。解鯸鮧魚毒。

歷代記述弘覽　【宋】寇宗奭本草衍義論橄欖曰。嚼汁嚥之。治魚鯁。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論橄欖曰。生啖煮汁。能解諸毒。【宋】大明諸家本草論橄欖曰。開胃下氣。止渴。【明】李時珍本草綱目論橄欖曰。生津液。止煩渴。治咽喉痛。咀嚼嚥汁。能解一切魚鼈毒。【明】繆希雍本草經疏論橄欖曰。橄欖本經味酸甘。今嘗之。先澀而後甘。得土中之陽氣。氣溫無毒。肺胃家果也。能生津液。酒後嚼之。不渴。故主消酒。甘能解毒。故療鯸鮧毒也。馬志云。鯸鮧卽河豚也。人誤食此魚肝及子。必迷悶至死。惟橄欖汁煮服之。必解。其木作櫼。撥著魚皆浮出。故知物有相畏如此。不特味甘解毒之義也。【明】李士材本草圖解論橄欖曰。橄欖澁而甘平。生津止渴。清咽止咳。開胃下氣。止瀉固精。解一切魚毒及酒毒。【清】黃宮繡本草求眞論橄欖曰。橄欖稟受土陽。其味先酸後甘。氣溫無毒。肺胃家藥也。性能生津止渴。酒後嚼之。最宜。故書載能解酒毒也。人服河豚魚肝及子。迷悶至死。取此煮汁飲卽解。故書又載能解諸魚之毒。及治魚骨之鯁。至於痘瘡不起。並痘抓碎成瘡。腸風下血。耳足凍瘡。初生胎毒。唇裂生瘡。牙齒風疳。下部疳瘡。陰腎癰腫等症。用此無不皆效。以其具有溫行酸斂之性耳。但此性喘嗽胎毒。過服則有嘔吐泄瀉之虞。性喘聚火。濟氣寒嗽。用之得宜。熱嗽則不免有熱氣上蒸之弊也。【清】王士雄隨息居飲食譜論橄欖曰。橄欖酸甘平。開胃生津。化痰滌濁。除煩止渴。涼膽息驚。清利咽喉。解魚酒野蕈毒。鹽藏糖製。功用良多。點茶亦佳。以香輭多汁者勝。

國外學說　橄欖爲產於熱帶地方之喬木。有綠欖、白欖、及青欖、烏欖數種。葉作長橢圓形。披針狀。花爲總狀花。果實爲卵形肉果。長一寸許。未熟時呈黃綠色。成熟則呈黃白色（白欖）或紫黑（烏欖）。

弊害　爲清解之品。入於肺胃。以清香而小者爲良。大而酸澀者。不可食。其兩頭之尖端。食時宜切去。因其性熱也。又市上所售者。大都用礬水浸過。以其能保護其常青之顏色也。但礬水性澀且燥烈。非徙無益。且又害之。而於喉痛等症。更有極大不利。故市上所售之物。宜細細辨之。其色稍黃有黑點者。卽其日期已久。已經礬水浸過。不可食。卽青者亦宜用水洗淨。方免危險。

配合應用　㊀治河豚魚鼈諸毒。諸魚骨鯁。用橄欖擂汁。或煎濃湯飲。無橄欖。以核研末。或磨汁服。（隨息居方）

㊁治腸風下血。橄欖燒存性。研

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

末每服二錢陳米飲調下（直指方）㊂治耳足凍瘡。橄欖核燒研。油調塗之。（乾坤生意方）㊃治初生胎毒。小兒落地時。用橄欖一箇燒研。硃砂末五分和勻。嚼生脂麻一口。吐唾和藥。絹包如棗核大。安兒口中。待咂一个時頃。方可與乳。此藥取下腸胃穢毒。令兒少疾。及出痘稀少也。（孫氏集效方）㊄治唇裂生瘡。橄欖炒研。豬脂和塗之。㊅治牙齒風疳。膿血有蟲。用橄欖燒研。麝香少許貼之。（聖惠方）㊆治下部疳瘡。用橄欖燒存性。研末油調敷之。或加孩兒茶等分。（乾坤生意方）

用量　錢半至三錢。

參攷資料　㈠按名醫錄云。吳江一富人食鱖魚。被鯁橫在胸中。不上不下。痛聲動隣里。半月餘幾死。忽遇漁人張九。令取橄欖與食。時無此果。以核研末。急流水調服。骨遂下而愈。張九云。我父老相傳。橄欖木作取魚棹篦。魚觸着即浮出。所以知魚畏橄欖也。今人煑河豚、團魚。皆用橄欖。乃知橄欖能治一切魚鼈之毒也。（李時珍）㈡味澀而甘。醉飽宜之。然性熱。多食能致上壅。（朱震亨）㈢橄欖鹽過時不苦澀。同栗子食甚香。按延壽書云。凡食橄欖。必去兩頭。其性熱也。過白露摘食。庶不病痞。（李時珍）㈣橄欖名義未詳。此果雖熟。其色亦青。故俗呼青果。其有色黃者不堪。病物也。王禎云。其味苦澀。久之方回甘。味王元之作詩比之忠言逆耳。亂乃思之。故時人名爲諫果。（李時珍）㈤橄欖生嶺南。樹似木槵子樹而高。端直可愛。結子形如生訶子。無稜瓣。八九月採之。又有一種波斯橄欖。生邕州。色類相似。但核作兩瓣。蜜漬食之。（馬志）㈥其樹大數圍。實長寸許。先生者向下。後生者漸高。熟時生食。味酢。蜜漬極甜。（孟詵）㈦按南州異物志云。閩廣諸郡及綠海浦嶼間。皆有之。樹高丈餘。葉似櫸柳。二月開花。八月成實。狀如長棗。兩頭尖。青色。核亦兩頭尖。而有稜。核內有三竅。中有仁。可食。（李珣）㈧按劉恂嶺表錄異云。橄欖樹枝皆高拳。其子深秋方熟。南人重之。生咀嚼之。味雖苦澀。而芬香勝於含鷄舌香也。有野生者。子繁而樹峻。不可梯緣。但刻根下方寸許。納鹽入內。一夕子皆自落。木亦無損。其枝節間有脂膏。如桃膠。南人採取和皮葉煎汁。熬如黑餳。謂之橄糖。用泥船隨牢。如膠漆。着水益乾也。（蘇頌）㈨橄欖樹高。將熟時。以木釘釘之。或納鹽少許於皮內。其實一夕自落。亦物理之妙也。其子生食甚佳。蜜漬鹽藏。皆可致遠。其木脂狀如黑膠者。土人採取燕之。清烈。謂之橄香。雜以牛皮膠者。卽不佳矣。又有綠橄色綠。烏橄色青黑。肉爛而甘。取肉搥碎。乾放。自有霜。如白鹽。謂之橄醬。青橄核內仁乾小。惟烏橄仁最肥大。有文脣疊如海螺蛸狀。而味甘美。謂之橄仁。又有一種方橄。出廣西兩江峒中。似橄欖而有三角或四角。卽是波斯橄欖之類也。（李時珍）

【橄欖子】卽檳榔之古籍別名。典見綱目。詳『檳榔』條。

【橄欖仁】**性質**　甘。平。無毒。**主治**　唇吻燥痛。研爛傅之。

【橄欖金】卽金之一種。性質功用。詳『金』條。

【橄欖核】**性質**　甘。溫。無毒。**主治**　磨汁服。治諸魚骨鯁。及食鮓成積。又治小兒瘡瘡倒靨。燒研服之。治下血。

【橄欖露】**效能**　清肺。開胃。下氣。除煩。生津。解酒。利咽喉。解諸毒及河豚毒。**主治**　喉症。

【檳木】

古籍別名　檀木。檳筋木。（綱目）

產地　生江南山野中。

形態　檳木爲喬木類之一種。木質堅硬。葉厚而大。花白色。與葉可釀酒。其木麥汁。可染綠色。而木灰可供藥用。

性質　甘。溫。小毒。

主治　卒心腹癥瘕堅滿。痃癖。淋汁八升。釀米一斗。待酒熟。每溫飲半合。漸增至一二盞。卽愈。

【檳筋木】卽檳木之古籍別名。典見綱目。詳『檳木』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【榴皮炭】卽石榴皮之處方用名。詳『石榴皮』條。

【橐吾】卽款冬花之古籍別名。見本經。詳『款冬花』條。

【橐駝】卽駱駝之古籍別名。典見漢書詳『駱駝』條。

【橐籥尊師】卽淫羊藿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『淫羊藿』條。

【橙橘果】卽弔搭果之別名。詳『弔搭果』條。

【橘子】古籍別名　沙橘。（綱目）綿橘。（橘譜）

性質　甘。酸。溫。無毒。

主治　甘者潤肺。酸者聚痰。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論橘實曰止消渴開胃。除胸中膈氣。【宋】王士雄隨息居飲食譜論橘實曰橘子甘平潤肺。析醒解渴。閩產者名福橘。黃巖所產。皮薄色黃者名蜜橘。俱無酸味而少核。皆爲佳品。然多食生痰聚飲。風寒咳嗽及有痰飲者。勿食。味酸者戀膈滯肺。尤不益人。並可精醃作脯。名曰橘餅。以其連皮造成。故甘辛而溫。和中開膈。溫肺散寒。治噦化痰。醒酒消食。

參攷資料　㈠橘皮下氣消痰。其肉生痰聚飲。表裏之異如此。凡物皆然。今人以蜜煎橘充果食。甚佳。亦可醬菹也。（李時珍）㈡多食戀膈生痰。滯肺氣。（寧原）㈢同蜞蟹食。令人患軟癱。（吳瑞）

【橘白】基本　卽橘皮之去紅者。

性質　苦。辛。溫。無毒。

主治　和胃。化濁膩。

【橘皮】處方用名　陳廣皮。廣橘皮。陳新會皮。廣橘皮。福橘皮。上廣皮。甜廣皮。上中廣廣皮。陳皮。桔皮。廣皮炭。青鹽陳皮。參貝陳皮。杭橘皮。

古籍別名　紅皮。（湯液）黃老。（和漢藥考）

外國名詞　Peel of sweet orange.（英）

基本　係芸香科桔屬漿果之果皮。

產地　陳仁山藥物生產辨云。陳皮產廣東新會爲最。四會、潮州、四川所產者俱不適用。以十一月冬至前後收者爲合宜。陳皮之名稱最多。最好者頭紅皮。第二大紅皮。第三極紅皮。第四蘇紅皮。第五式紅皮。第六揀紅皮。第七舉水皮。第八青皮。

形態　橘樹屬山果木。樹高丈許。枝多生刺。刺出莖間。與枳無辨。其葉兩頭尖。色綠面光。大寸餘。長二寸許。四月開小白花。甚香。六七月間結實。至冬黃熟。大者如盃。包中有瓣。瓣中有核。其皮紋細而薄。色紅。內多筋脈。味苦辛。

種植　園圃中恒有移植。

採取　十月採皮。曝乾。

製法　雷敩曰。凡使勿用桔皮。橘子皮。二件用不得。凡修事須去白膜一重。剉細。以鯉魚皮裹一宿。至明取用。李時珍曰。凡橘皮入和中理胃藥。則留白。入下氣消痰藥。則去白。其說出於聖濟經。去白者。以白湯入鹽。先潤透。刮去筋膜。曬乾用。亦有煮焙者。各隨本方。

性質　苦。辛。溫。無毒。

成分　含有揮發油。

效能　理氣。化痰。燥溼。行滯。用作芳香健胃藥及發汗藥。與祛痰主治　胸中痞熱。逆氣。利水穀。久服去臭。下氣通神。（本經）下氣止嘔咳。治氣衝胸中。吐逆霍亂。療脾不能消穀。止洩。除膀胱留熱。停水。起淋。和小便。去寸白蟲。（別錄）

張仲景之醫明　橘皮一味。經張仲景之實驗。認爲主治。嘔逆也。旁治胸痺停痰。茲考徵如下。㈠橘皮竹茹湯證曰。噦逆。（噦者。嘔之謂也）（以上一方橘皮二斤。）㈡橘皮枳實生姜湯證曰。胸痺。（以上一方橘皮一斤。）㈢橘皮湯證曰。噦。（以上一方橘皮四兩。）㈣茯苓飲證曰。心胸中有停痰。（以上一方橘皮二兩半。）歷觀上諸方。橘皮之主治。嘔逆也明矣。胸痺者。停痰也。其有嘔逆之證。則橘皮所能治也。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論橘皮曰。清痰涎。治上氣咳嗽。開胃主氣痢。破癥瘕痃癖。【明】李時珍本草綱目論橘皮曰。療噦噦反胃嘈雜。時吐清水。痰痞痰癖。大腸閉塞。婦人乳癰。入食料解魚鱉毒。【明】李士材本草圖解論橘皮曰。陳皮苦辛而溫。入太陰

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

經。健脾開胃。下氣消痰。消穀進食。定嘔止瀉。能補能消。能散能降。調中理氣。功在諸藥之上。宜於肺。香烈於脾。肺爲攝氣之籥。脾爲元氣之母。陳皮理氣。故爲二經要藥。同補藥即補。同瀉藥即瀉。同升藥即升。同降藥即降。故利用最弘。去白者理肺氣。留白者和胃氣。筋膜及帶並去之。芳香之品。不見火則力全也。【明】繆希雍本草經疏論橘皮曰。橘皮味辛苦。氣溫無毒。其主胸中痰熱。逆氣衝胸中嘔咳者。以肺主氣。氣常則順。氣變則逆。逆則熱聚於胸中而成痰者假也。如痞滿鬱悶之類也。辛能散。苦能泄。溫能通行。則逆氣下嘔咳止。胸中痰熱消矣。脾爲運動磨物之臟。氣滯則不能消化水穀。爲吐逆、霍亂、泄瀉等證。苦溫能燥脾家之濕。使滯氣運行。諸證自愈矣。肺爲水之上源。源竭則下流不利。熱結膀胱。肺得所養。而津液貫輸。氣化運動。故膀胱留熱停水淋皆通也。去臭及寸白者。辛能散邪。苦能殺蟲也。通神輕身長年者。利脾肺之極功也。【清】黃宮繡本草求眞論橘皮曰。橘皮味辛而溫。治雖崙主脾肺。調中快膈。導痰消滯。利水破癥。宣五臟。理氣燥濕。然同補劑則補。同瀉劑則瀉。同升劑則升。同降劑則降。各隨所配。而得其宜。且同生薑則能止嘔。同半夏則豁痰。同杏仁則治大腸氣閉。同桃仁則治大腸血閉。至其利氣。雖有類於青皮。但此氣味辛溫。則入脾肺而宣壅。不如青皮崙入肝疎泄。而無入脾燥濕。入肺理氣之故也。然多服亦能損氣。用補留白。下氣消痰除白。卽書所名橘紅。然亦寓有發明之意。核治疝痛偏墜。葉散癰腫。取廣陳久者良。治久痰童便製。寒痰薑汁製。治下焦蓄水。製核去皮炒用。【清】王士雄隨息居飲食譜論橘皮曰。橘皮解魚蟹毒。化痰下氣。治咳逆、嘔噦、噫噎、脹悶、霍亂、疳瘧、瀉痢、便祕、脚氣諸病皆效。去白者名橘紅。陳久愈良。福橘皮爲勝。或瀹茗時入一片亦妙。惟化州無橘。俗尙化州橘紅。其色不紅。皆柚皮也。【清】賈九如辨藥指南論橘皮曰。陳皮留白。取其色白入肺。氣香入脾。因體大則緩緩則遲下。故主二部而和中。味辛則散。散則分解。故泄逆氣而快膈。用治膈痰嘔逆。穀食酒毒。功在蘇梗枳殼之上。以其性溫能補肺脾。須藉監制之藥用之。助參芩煖胃。佐白朮健脾。和甘草益肺。同半夏滲濕。合青皮去滯。參竹茹治呃。且辛香泄氣。如目痛脇脹。盛怒動氣。俱忌用之。因主至高之分。故曰陳皮治高氣。青皮治低氣。此言大略。然亦通用。

圖外學說　英美學說謂苦陳皮產中國、呂宋及印度、法國、西班牙等處。該樹所結之果。其皮無論鮮乾。均可入藥。鮮苦陳皮可配酒油等。乾苦陳皮則可配酒、糖、泡水等。其醫治作用。宜合他藥同服。能助別藥功力。其功用能溫補行血。開胃暖胃。以助消化。治肚疼及祛風。處方如下。乾苦陳皮一分切搗。淡酒十分浸七天。間時搖動。裝淋筲淋乾。用絞盤絞渣過淋紙再加酒仍足十分爲度。每服一錢至二錢。（陳皮酒方）至其所以能行血、祛風、溫補、開胃、暖胃以助胃消化、治肚疼等症者。以其內尙含有油也。如該油全行洩去。其功力遂減。凡用藥者宜知之。日本學說謂唐柑皮爲中國所產。卽廣東蜜橘（C. bigaradia, Duham, var, Sinense, Gall.）之果皮。由塘漏拾聚曬乾。俗呼廣皮。又有青皮。亦稱青橘皮及橘皮。卽剝取未熟蜜橘之果皮曬乾者。又柑皮。卽蜜柑（C. nobilis, Lour）皮。爲日本產藥學雜誌第二百零四號載有谷井專太郎氏所著『柑皮中之欵司祕里仁』一文。氏嘗研究日本產橘屬果皮中。是否亦如西洋橘含有一種名欵司祕里仁（Hesperdin）之中性、無色、無味、結晶體之糖原質。由其試驗結果。確知日本橘亦含有此物。因以公表。詳細可參閱該雜誌。

辨僞　㊀鄭肯堂曰。蘇州宋公祠創製陳皮醬。爲理嗽化痰妙藥。馳名天下。近上海多有僞品。卽福州亦有僞製。假充味辛辣。雖甜不潤。其色粗淡。不堪入藥。誤服之反見咳嗽。勿用爲是。㊁曾炳章曰。按百草鏡。製青鹽陳皮。卽蘇州宋公祠之遺法也。能消痰降氣。生津開鬱。運脾調胃。解毒安神。方用陳皮

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

二斤。河水浸一日。竹刀輕刮去渣白。貯竹筐內。沸湯淋三四次。用冷水洗淨。不苦爲度。曬之半乾。可得淨皮一斤。初次用甘草、烏梅肉各四兩。煎濃汁拌。日曬夜露。俟酥捻碎如豆大。再用川貝母去心四兩。青鹽三兩。研爲細末。拌勻。再曬露。候乾收貯。或名參貝陳皮。亦同此法。

近人學說　㈠張山雷曰。新會皮。橘皮也。以陳年者辛辣之氣稍和爲佳。故曰陳皮。市肆中有多種。以廣東化州產者爲最佳。有茸毛。故曰毛橘紅。亦曰化州橘紅。今有所謂賴家園橘紅者。則化州賴氏所植者也。其通用者則新會所產。故通稱曰新會皮。味和而辛。不甚烈。其福州及浙衢之產。味苦而氣亦濁。且辛辣更烈。鄉僻市廛中多用之。非佳品矣。留白者通稱陳皮。去白則曰橘紅。降氣和中。泄化痰飲。宜留白爲佳。若專作疏散用。取其氣勝。則宜橘紅。連白者用一錢至一錢五。去白者不當過一錢以上。若刮下之白。無味無氣。實是廢材。今世俗上有以橘白作化痰降氣用者。甚屬無謂。又凡用陳皮。無非取其芳香而味辛者。力能開泄疏通。今俗子且有蜜炙之例。以黏膩減其芬芳。尤爲可咽。

配合應用　㈠橘皮留白。補脾胃和中。去白。消痰理肺。氣同白朮則補脾。同甘草則補肺。同補氣藥則益氣。同泄氣藥則破氣。同消痰藥則能去痰。同消食藥則能化食。各從其類以爲用也。

㈡治三日瘧寒多。橘皮、人參、何首烏、桂枝、當歸、薑皮。

㈢治胃家有寒痰。或偶感寒氣。傷冷食。嘔吐不止。用橘皮、白豆蔻、生薑、薑香、半夏。

㈣治脾胃虛。飲食不化。或不欲食。食亦無味。用橘皮、人參、白朮、白茯苓、甘草、山藥、白豆蔻、薑香、麥芽、山查、白扁豆。

㈤治上氣咳嗽。用橘皮、蘇子、貝母、枇杷葉、麥門冬、桑根白皮、沙參、栝樓根五味子、百部。能消痰下氣。

㈥治氣實。人暴氣壅。腹用橘皮、枳殼、烏藥、木香、草豆蔻、檳榔。

㈦治胸中脹滿。用橘皮、蒼朮、厚朴、甘草爲平胃散。

㈧治脾胃濕痰及寒痰痰飲。橘皮入二陳湯。

㈨橘皮湯。治男女傷寒。并一切雜病嘔噦。手足逆冷者。用橘皮四兩。生薑一兩。水二升。煎一升。徐徐呷之。卽止。（仲景方）

㈩治霍亂吐瀉。但有一點胃氣存者。服之卽生。廣陳皮去白五錢。眞藿香五錢。水二盞。煎一盞。時時溫服。（百一選方）

⑪治脚氣衝心。或心下結硬。腹中虛冷。陳皮一斤。和杏仁五兩。去皮尖。熬少許。蜜搗和丸。如梧桐子大。每日食前米飲下三十丸。（食療方）

⑫大腸閉塞。陳皮連白。酒煮。焙乾。研末。每服二錢。米飲下。（普濟方）

⑬脾寒諸瘧。不拘老少孕婦。只兩服便止。眞橘皮去白切。生薑自然汁浸過一指。銀石器內重湯煮。焙乾。研末。每服三錢。用隔年青州棗十箇。去核。水一盞。煎半盞。發前服。以棗下之。（通用方）

⑭治婦人乳癰。未成者卽散。已成者卽潰。痛極者不痛。神驗不可言。用眞橘皮湯浸去白。曬乾。麵炒微黃爲末。每服一錢。麝香調酒下。初發一服見效。（張氏方）

⑮治嘈雜吐水。眞橘皮去白爲末。五更安五分於掌心。舐之。卽睡。三日必效。皮不眞則不驗。（怪症奇方）

⑯治反胃吐食。眞橘皮以日照西壁土炒香爲末。每服二錢。生薑三片。棗肉一枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。（直指方）

⑰治卒然食噎。橘皮一兩。湯浸去瓤。焙爲末。以水一大盞。煎半盞。熱服。（食醫心鏡方）

⑱治諸氣痞噫。橘皮二兩。去瓤。水一升。煎五合。頓服。或加枳殼尤良。（孫尚藥方）

⑲治痰膈氣脹。陳皮三錢。水煎熱服。（簡便方）

⑳治卒然失聲。橘皮半兩。水煎。徐呷。（肘後方）

㉑治經年氣嗽。橘皮、神麴、生薑焙乾等分爲末。蒸餅和丸。梧子大。每服三五十丸。食後夜臥各一服。有人患此服之。兼舊患膀胱氣皆愈也。（衍義方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊂化食消痰。胸中熱氣。用橘皮半兩。微熬爲末。水煎代茶細細呷。（心鏡方）

㊃治下焦冷氣。乾陳橘皮一斤爲末。蜜丸。梧子大。每食前溫酒下三十丸。（食療方）

㊄治途中心痛。食魚蟹毒。橘皮並湯飲之甚良。（談藪錄方）

㊅治風痰麻木。凡手及十指麻木。大風麻木。皆是溼痰死血。用橘紅一斤。逆流水五碗。煮爛去滓。再煮至一盌。頓服取吐。乃吐痰聖藥也。不吐。加瓜蒂末。（摘玄方）

㊆治小兒疳瘦。用陳橘皮一兩。黃連以米泔水浸一日。一兩半。研末。入麝三分。用豬膽盛藥。以漿水煮熟取出。用粟米飯和丸。綠豆大。每服一二十丸。米飲下。（錢氏小兒方）

㊇治產後尿閉不通者。陳皮一兩。去白爲末。每空心溫酒服二錢。一服卽通。此張不愚方也。（婦人良方）

㊈治產後吹奶。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服。卽散。

㊉治脣耳出汁。陳皮燒研一錢。

麝香少許爲末。日摻。名立效散。

㊊治嵌甲作病。不能行履者。濃煎陳皮湯浸良久。甲肉自離。輕手剪去。以虎骨末傅之。卽安。（醫林集要方）

㊋治魚骨鯁咽。橘皮常含。咽汁卽下。（聖惠方）

㊌寬中丸。治脾氣不和。冷氣客於中宮。壅遏不通。是爲脹滿。用橘皮四兩。白朮二兩爲末。酒糊丸。梧子大。每食前木香湯下三十丸。日三服。（指迷方）

用量　一錢至二錢。

施用宜忌　凡無溼無滯、無痰者禁用。

著名方劑　㊀二陳湯。治肥盛之人。溼痰爲患。喘嗽脹滿者。（局方）陳皮（去白）二錢。製半夏茯苓各三錢。甘草一錢。上四味。姜三片。水煎服。㊁潤下丸。治溼痰因火上泛。停滯胸膈。咳唾稠黏。（丹溪方）陳橘皮半斤。鹽五錢。甘草二兩（去皮蜜炙）。上以橘皮入砂鍋內。與鹽化水淹過。煮乾。同甘草共研淨末。蒸餅和丸。梧子大。每服百丸。白湯下。

參攷資料　㊀橘皮氣薄味厚。陽中之陰也。可升可降。爲脾肺二經氣分藥。留白則補脾胃。去白則理肺氣。同白朮則補脾胃。同甘草則補肺。獨用則瀉肺損脾。其體輕浮。一能導胸中塞邪二破滯氣。三益脾胃。加青皮減半用之。去滯氣推陳致新。但多用久服。能損元氣也。（李杲）㊁橘皮能散、能瀉、能溫、能補、能和、化痰治嗽。順氣理中。調脾快膈。通五淋。療酒病。其功當在諸藥之上。（寧原）㊂橘皮苦。能泄能燥。辛能散。溫能和。其治百病總是取其理氣燥溼之功。同補藥則補。同瀉藥則瀉。同升藥則升。同降藥則降。脾乃元氣之母。肺乃攝氣之籥。故橘皮爲二經氣分之藥。但隨所配而補瀉升降也。潔古張氏云。陳皮、枳殼、利其氣而痰自下。蓋此義也。同杏仁治大腸氣閼。同桃仁治大腸血閼。皆取其通義也。詳見杏仁下。按方勺泊宅編云。橘皮寬膈降氣。消痰飲。極有殊功。他藥貴新。惟此貴陳。外舅莫強中令豐城時得疾。凡食已。輒胸滿不下。百方不效。偶家人合橘紅湯。因取嘗之。似相宜。連日飲之。一日忽覺胸中有物墜下。大驚目瞪。自汗如雨。須臾腹痛下數塊。如鐵彈子。臭不可聞。自此胸次廓然。其疾頓愈。蓋脾之冷積也。其方用橘皮去穰一斤。甘草鹽花各四兩。水五椀。慢火煮乾。焙研爲末。白湯點服。名二賢散。治一切痰氣特驗。世醫徒知半夏、南星之屬。何足以語此哉。珍按二賢散。丹溪變之爲潤下丸。用治痰氣有效。惟氣實人服之相宜。氣不足者不宜用之也。（李時珍）㊃橘皮療氣大勝。以東橘爲好。西江者不如。須陳久者爲良。（陶弘景）㊄橘皮以色紅日久者爲佳。故曰紅皮陳皮去白者。曰橘紅也。（王好古）㊅本草橘柚作一條。蓋傳譌也。後世不知。以柚皮爲橘皮。是貽無窮之患矣。此乃六陳之一。天下日用所須。今人又多以乳柑皮亂之。不可不擇也。柑皮不甚苦。橘皮極苦。至熟亦苦。或以皮之緊慢分別。又因方土不同。亦互有緊慢也。（寇宗奭）㊆橘皮紋細而薄。色紅。內多筋脈。其味苦辛。柑皮紋粗而厚。色黃。內多白膜。其味辛甘。柚

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

皮最厚而虛。紋更粗。色黃。內多膜無筋。其味甘多辛少。但以此別之。則不差矣。橘皮性溫。柑柚皮性冷。不可不知。今天下多以廣中來者爲勝。江西者次之。然亦多以柑皮雜之。柑皮猶可用。柚皮則懸絕矣。（李時珍）㈦橘皮味辛氣溫。能耗散眞氣。中氣虛氣不歸元者。忌與耗氣藥同用。胃虛有火。嘔吐不宜。與溫熱香燥藥同用。陰虛咳嗽生痰。不宜與半夏南星等同用。瘡非寒甚者。亦勿施。（繆希雍）㈧橘從喬。音鵬。諧聲也。又雲五色爲慶。二色爲喬。喬雲外赤內黃。非烟非霧。郁郁紛紛之象。橘實外赤內黃。剖之香霧紛郁。有似乎喬雲橘之從喬。又取此意也。（李時珍）㈨柚之皮厚味甘。不似橘皮味辛苦。其肉亦如橘。有甘有酸。酸者名相柑。今俗謂橙爲柚。非矣。按郭璞云。柚似橙而實酢大於橘。孔安國云。小曰橘。大曰柚。皆爲柑也。（蘇恭）㈩橘、柚。今江、浙、荊、襄、湖、嶺皆有之。木高一二丈。與枳無辨。刺出莖間。夏初生白花。六七月成實。至冬黃熟。舊說小爲橘。大爲柚。今醫家乃用黃橘、青橘。不言柚。豈青橘是柚之類乎。（蘇頌）㈠橘柚自是兩種。本草云。一名橘皮。後人誤加柚字。妄生分別。且青橘、黃橘治療尙殊。況柚爲別種乎。惟郭璞所言。乃眞識橘柚者。若不如此分別。誤以柚皮爲橘皮。是貽無窮之患矣。（寇宗奭）㈡橘、柚、蘇恭所說甚是。蘇頌不知。青橘卽橘之未黃者。乃以爲柚。誤矣。夫橘、柚、柑三者。相類而不同。橘實小。其瓣味微酢。其皮薄而紅。味辛而苦。柑大於橘。其瓣味甘。其皮稍厚而黃。味辛而甘。柚大小皆如橙。其瓣味酢。其皮最厚而黃。味甘而不甚辛。如此分之。卽不誤矣。按事類合璧云。橘樹高丈許。枝多生刺。其葉兩頭尖。綠色。光面。大寸餘。長二寸許。四月著小白花。甚香。結實至冬黃熟。大者如盃。包中有瓣。瓣中有核。宋翰彥直著橘譜三卷。甚詳。其略云。柑、橘出蘇州洞庭山。西出荊州。南出閩、廣、撫州。皆不如溫州者爲上也。柑品有八。橘品十有四。多是接成。惟種成者氣味尤勝。黃橘扁小。而多香雾。乃橘之上品也。朱橘小而色赤如火。綠橘紺碧。不待霜後。色味已佳。隆冬採之。生意如新。乳橘狀似乳。柑皮堅。瓤多味。絕酸芳。榻橘狀大而扁。外綠心紅。瓣巨多液。經春乃甘美。包橘外薄內盈。其脈瓣隔皮可數。綿橘微小。極軟美可愛。而不多結。沙橘細小。甘美。油橘皮似油。飾中堅外黑。乃橘之下品也。早黃橘。秋半已丹。凍橘。八月開花。冬結春採。穿心橘實大皮光。而心虛可穿。荔枝橘出橫陽。膚理皺密。如荔子也。俗傳橘下埋凰。則結實加倍。故物類相感志云。橘見尸而實繁。涅槃經云。如橘見凰。其果實多。周禮言橘路之。而自變爲枳。地氣然也。餘見柑下。（李時珍）

【橘紅】 **基本** 卽橘皮之去白者。

性質 苦。辛。溫。無毒。

主治 化痰。利氣。肺寒咳嗽。

【橘苓】 **形態** 橘苓生橘樹上。形如木鼈。色紅如棗。供藥用。

主治 乳癰。煎酒服。

製法 李時珍曰。凡用須以新瓦焙香。去殼取仁。研碎入藥。

性質 苦。平。無毒。

主治 腎痓。腰痛。膀胱氣痛。腎冷。炒研。每溫酒服一錢。或酒煎服之。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論橘核曰。治酒瘡風鼻赤。炒研每服一錢。胡桃肉一箇。擂酒服。以知爲度。【明】李時珍本草綱目論橘核曰。小腸疝氣及陰核腫痛。炒研五錢。老酒煎服。或酒糊丸服。甚效。【明】繆希雍本草經疏論橘核曰。橘核出日華子。其味苦。溫而下氣。所以能入腎與膀胱。除因寒所生之病也。疝氣方中多用之。【清】楊時泰本草述鈎元論橘核曰。橘必成熟之實。乃有核。青橘裏金令之初氣。取其極小者入藥。不得有核。然則核之性味。不可謂其止入肝經。日華子故有腎痓、腰痛、膀胱氣痛之治。後人用治癭疝者。緣疝固肝病。亦因腎與膀胱之氣化鬱以病乎肝也。

著者方劑 橘核丸。治四種疝。卵核腫脹。偏有大小。或堅硬如石。痛引臍腹。甚則肩臂腫脹成瘡。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

時出黃水。或癰腫潰爛。（濟生方）

橘核（炒）海藻昆布海帶（各泡）川楝肉（炒）桃仁（麩炒）各一兩。厚朴、木通、枳實（麩炒）延胡索（炒）桂心、木香各一兩。上爲細末。酒丸桐子大。每服七十丸。酒下或鹽湯下。

參玆資料　橘核入足厥陰。與青皮同功。故治腰痛瘰癧在下之病。不獨取象於核也。和劑局方治諸疝痛。及內卵瘕腫墜。或硬如石。或腫至潰。有橘核丸用之有效。品味頗多。詳見本方（李時珍）

【橘絡】　原命　橘瓤上筋膜。

古籍別名　橘瓤上絲。

（綱目拾遺）

主治　口渴。吐酒。炒熱煎湯飲。甚效。

歷代記述玆證　【清】張隱菴本草崇原論橘絡曰。能行胸中之飲。而行於皮膚。故又能疏達絡氣。【清】趙學敏本草綱目拾遺論橘絡曰。通經絡滯氣。治衝氣逆於肺之脈脹。膈皮裏膜外積痰活血。

辨僞　㊀鄭肯巖曰。橘絡卽橘瓤上筋膜。日華子謂口渴吐酒。煎湯飲之甚效。貨缺之時。聞價值甚昂。射利之徒。用白菜腹細切如絲。晒乾。以橘皮煎濃汁浸潤再曬。僞充橘絡。色香幾無以辨。巧則巧矣。如斲喪天良何。㊁曹炳章曰。按金御乘云。橘絡能宣通經絡滯氣。予屢用以治衝氣逆於肺之脈脹。甚有效。趙恕軒云。通經絡氣滯脈脹。膈皮裏膜外積痰活血。此其效用之實驗也。其種甚多。如出廣東者。名廣橘絡。色白條細。蕊少。出浙江衢州者。名衢橘絡。色白。絡細長。皆佳。出四川者。色白黃。絡粗。略次。出台州者。名台橘絡。絡細。少蕊。蕊爲最次。

【橘葉】　形態　橘葉與柑葉同。均爲長卵形。苦平無毒。

性質

主治　導胸膈逆氣。入厥陰。行肝氣。消腫散毒。乳癰脇痛。用之行經。

歷代記述玆證　【明】繆希雍本草經疏論橘葉曰。橘葉能散陽明厥陰經滯氣。婦人妬乳內外吹。乳巖、乳癌。用之皆效。以諸證皆二經所生之病也。

【橘實】　卽橘子之原名。詳『橘子』條。

【橘餅】　命名　本品係以大福橘入蜜糖釀製而乾之餅。故名。

古籍別名　出閩中漳泉者。名麥芽橘餅（綱目拾遺）

形態　橘餅圓徑四五寸。面有白霜。肉厚味重。以閩產者爲第一。其出浙省者爲衢橘所作。圓徑不及三寸。且皮色黯黑而肉薄。味亦苦劣。又出杭屬之塘棲者。味勝。俱可供食與藥用。

性質　甘溫無毒。

主治　下氣寬中。消痰。運食。黃疸。膨脹。除胎止消。

配合應用　㊀治諸色痢。用橘餅一兩。圓眼肉五錢。冰糖五錢。水二碗。煎一碗。露一宿。溫服。不露亦可。至重者不過二三服。無不神驗。（行篋檢祕方）

㊁治瀉。夏月喫瓜菓太多。以致洩瀉不休。用漳州好橘餅一枚。細切薄片。分作二次。放茶鍾內沖服。（梁氏集驗方）

㊂橘餅湯。治傷食生冷瓜菓。泄瀉不休。橘餅一個。切薄片。放碗內。以沸湯潑蓋。住泡汁出。卽餘湯遞餅食。一餅可作數次服。（經驗廣集方）

㊃百葉酒。香橘、佛手各二個。核桃肉、圓眼肉、蓮肉、橘餅各半觔。柏子仁四兩。松子三兩。紅棗二十兩。黑糖三觔。燒酒五十觔。浸此酒補虛益腎。（李太守祕方）

【橘瓤上絲】　卽橘絡之古籍別名。典見綱目拾遺『橘絡』條。

【橙子肉】　性質　酸寒無毒。

主治　洗去酸汁。切和鹽、蜜、煎成。貯食。止惡心。能去胃中浮風惡氣。

歷代記述玆證　【唐】陳士良食性本草論橙肉曰。行風氣。療癰氣。發瘡癤。殺魚蟹毒。

參玆資料　㊀橙多食傷肝氣。發虛熱。與獶肉同食。發頭旋惡心。（陳士良）㊁獶乃水獺之屬也。諸家本草皆作檳榔誤矣。（李時珍）

【橙子核】　**主治**　面黑粉刺。澄研。夜夜塗之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【橙皮】**命名**　按陸佃埤雅云。橙柚屬也。可登而成之。故字從登。又譜擊也。（李時珍）　**古籍別名**　金毬皮鵲殼皮。（和漢藥考）　**外國名詞**　Cortex aurantii fructus.（拉丁）Orange peel.（英）Pomerazenschale.（德）　**基本**　爲芸香科柑屬橙之果皮。

產地　凡江、浙、閩、廣諸省。及印度、西班牙、法國均有出。

形態　橙爲適於暖地之常綠樹。高丈餘。嫩樹有刺。老樹則無。葉互生。似革質。作尖卵圓形。有半透明小斑點。其柄具有翼葉。初夏開白色五瓣花。果實爲球形。上下稍扁。平表面滑澤。熟則呈黃赤色。入藥係將成熟橙實之外皮。縱斷剝下。使之乾燥者。外面呈黃褐色。有皺紋。凹陷小點。生有油胞。內部爲肉瓤。氣味芳香而苦。

採取　八月採皮日乾。

用法　水煎或浸酒用。

性質　苦辛。溫。無毒。

成分　含有發揮油及苦味越幾斯等。

效能　專用作健胃藥。及胃弛緩症。急性胃加答兒。急性腸加答兒。

作用　刺激胃黏膜。使分泌增多。運動加速。而一部分之 Heperidin 由微血管而達中樞神經。使大腦被激而興奮。全身血液流動因是而增速。

主治　作醬醋香美。散腸胃惡氣。消食下氣。去胃中浮風氣。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論橙皮曰。和鹽貯食。止惡心。解酒病。【明】李時珍本草綱目論橙皮曰。糖作橙丁。甘美。消痰下氣。利腸胃。中解酒。

配合應用　㊀治痔瘡腫痛。隔年風乾橙子。桶內燒煙熏之。神效。（摘要方）

㊁香橙湯。寬中。快氣。消酒。用橙皮二斤。切片。生薑五兩。切焙。擂爛。入炙甘草末一兩。檀香末半兩。和作小餅。每嚼一餅。沸湯入鹽送下。（奇效良方）

用量　一錢至錢半。

施用宜忌　胃液溢反南星。

參攷資料　㊀橙餅主治消頑痰。降氣。和中。開胃。寬腸。健脾。解魚蟹毒。醒酒。若氣虛瘧癉者。勿服。其製法。擇半黃無傷損。橙子太青者。性硬難酥。將小刀切成稜。入淨水浸去酸澁。水一二天。每日須換水。待軟取起。擠去核。再浸一二天取起。將簪腳插入每縫。觸碎內瓤。然後入鍋。用清水煮之。勿令焦。約有七八分爛。取出。拌上潔白洋糖。須乘熱即拌。即日曬之。待糖吃進。再摻再曬。令糖吃足。將乾糖再塞入橙肚內。略壓扁之。入瓶貯用。亦可點湯服。（壽錄方）㊁橙樹似橘而葉大。形圓大於橘而香。皮厚而皺。八月熟。（馬志）㊂橙產南土。其實似柚而香。葉有兩刻缺如兩段。亦有一種氣臭者。柚乃柑屬之大者。早黃難留。橙乃橘屬之大者。晚熟耐久。皆有大小二種。按事類合璧云。橙樹高不甚類橘。亦有刺。其實大者如盌。顏似朱欒。經霜早熟色黃。皮厚。蹙皺如沸。香氣馥郁。其皮可以熏衣。可以茗鮮。可以和葅醋。可以爲醬齏。可以蜜煎。可以糖製爲橙丁。可以蜜製爲橙膏。嗅之則香。食之則美。誠佳果也。（李時珍）㊃橙皮今比以爲果。或合湯待賓。未見入藥。宿酒未解者。食之速醒。（寇宗奭）㊄第三版改正日本藥局方曰。橙皮係將成熟橙實之外皮剝離。而切斷乾燥者。本品外面呈褐色。現粗糙凹點。內面類於白色。氣味芳香而甚苦。用時浸冷水十五分鐘。待其軟化。取出去其水分。復將軟化海綿狀組織除去。乾燥用之。（和漢藥考）㊅第四版改正日本藥局方曰。橙皮應去內皮用之。（和漢藥考）㊆橙皮酸寒無毒。降氣。消積。殺疝積蟲。（和漢藥考）

【樟木】卽樟木之古籍別名。典見綱目。詳『樟木』條。

【橡斗】卽橡實之古籍別名。典見說文。詳『橡實』條。

【橡斗殼】**製法**　大明曰。入藥並宜擣細炒焦。或燒存性研用。

性質　澀。溫。無毒。

主治　爲散及煮汁服。止下痢。并可染皂。

歷代記述攷證　【宋】大明諸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

家本草論橡斗殼曰。止腸風。崩中帶下。冷熱瀉痢。并染鬚髮。

【橡木皮根皮】　性質　苦。平。無毒。

主治　惡瘡。因風犯露致腫者。煎汁洗。令膿血盡乃止。亦治痢。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論橡木皮及根皮曰。止水痢。消瘀癰。

【橡實】　原命　櫟。

古籍別名　橡斗。皂斗。（說文）櫟椎柞子栩（綱目）芧。

外國名詞　Quercus serrata, Thunb.（拉丁）クヌギ（日本）

基本　係殼斗科槲屬。橡樹之子實。

產地　山谷原野多有之。

形態　橡爲落葉喬木。高數丈。樹皮灰褐色。粗而厚。縱裂甚深。葉與栗相似。而針形。嫩枝之葉倒卵形。有尖端。緣邊有鋸齒。新葉表裏皆有白毛。老葉無之。初夏新葉間生花。花單性。雌雄同株。穗狀花序。雄者常下垂。結實爲堅果。小而圓。大如拇指頭。在椀狀之殼斗內。其殼內之子實可供藥用。

採取　於霜後採之。

製法　雷敩曰。凡使去殼蒸之。從巳至未。剉作五斤。日乾用。周憲王曰。取子。換水浸十五次。淘去澀味。蒸極熟。食之可以濟飢。

性質　苦。微溫。無毒。

主治　下痢。厚腸胃。肥健人。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論橡實子曰。澀腸止瀉。煮食止飢。禦歉歲。

參攷資料　㈠橡子。非果非穀。而最益人。服食未能斷穀。啖之尤佳。無氣而受氣。無味而受味。消食止痢。令人强健不飢。（孫思邈）㈡木實爲果。橡蓋果也。歉歲人皆取以充飢。昔擊虞入南山。飢甚。拾橡實而食。唐杜甫客秦州。採橡栗自給。是矣。（李時珍）

【橫行介士】　卽蟹之古籍別名。典見蟹譜。詳『蟹』條。

【橫唐】　卽莧菪子之古籍別名。典見本經。詳『莧菪子』條。

【檯木】　卽樺木之古籍別名。詳『樺木』條。

【檉】　卽椿之古籍別名。典見左傳。詳『椿樗白皮』條。

【欷兀】　卽白兀之一種。產安徽歙縣之黃山脈中者。其根白而瘦小。功用較尋常白兀良。詳『白兀』條。

【欷墨】　墨之一種。產於安徽歙縣者。詳『墨』條。

【澤小車】　卽狗舌草之日本名。詳『狗舌草』條。

【澤半支】　形態　澤半支爲山牙半支。生山澗處。葉皆對節。夏開黃花如瓦松。

主治　蛇咬。疔腫。

【澤乳】　卽碧石之古籍別名。典見吳普本草。詳『碧石』條。

【澤姑】　卽瓜蔞仁之古籍別名。典見別錄。詳『瓜蔞仁』條。

【澤芝】　㈠卽澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『澤瀉』條。㈡卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【澤芬】　卽白芷之古籍別名。典見別錄。詳『白芷』條。

【澤茹仁】　卽瓜蔞仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瓜蔞仁』條。

【澤敗】　卽敗醬之古籍別名。典見別錄。詳『敗醬』條。

【澤蕙】　卽大戟之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大戟』條。

【澤漆】　原名　大戟苗。

命名　本品生時摘葉有白汁如漆。故名。

處方用名　澤漆葉。

古籍別名　漆莖（本經）貓兒眼睛草。綠葉綠花草。五瓜草。（綱目）奶奶草。五苦頭。燈臺草。（俗名）

基本　屬大戟科。爲澤漆之葉莖。

產地　凡山谷川澤間恒多生焉。

形態　澤漆爲有毒草本植物。路旁邊地。往往自生。莖高尺許。有白汁。葉互生。作倒卵圓形。類馬齒莧。五月間於莖端對生五葉。分五枝。開淡綠色四瓣小花。狀類燭臺。故俗呼爲燈臺草。

採取　三月七月間。採莖葉陰乾。

用法　水煎或剉末用。

性質　苦。微寒。無毒。

效能　通便利水。消腫。逐痰。用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

作水腫業。及祛痰業。

主治　皮膚熱。大腹水氣。四肢面目浮腫。丈夫陰氣不足。（本經）利大小腸。明目輕身。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論澤瀉曰。主蠱毒。【宋】大明日華諸家本草論澤瀉曰。止瘧疾。消痰。【清】鄒澍本經疏證論澤瀉曰。歷考澤瀉治水。非不暫與防己大黃葶藶甘遂輩相合成方。而決壅瀉實。然終共人蘊白朮茯苓桂心懲苡等。治因虛成水者居多。如千金與鯉魚人蘊甘草生薑赤小豆茯苓麥門冬同用。治或從消渴。或從黃疸。致內虛不足。譬衛不通。血氣不化。氣實皮膚中。徧身洪腫。四肢無堪。喘息不安。腹中膨膨脹滿。眼不得視。崔氏與白朮生薑橘皮桑根白皮元菴都李仁杏仁同用。治水腫盛滿。氣急喘咳。小便澀如血。古今錄驗與鯉魚人蘊甘草茯苓麥門冬同用。治水在五臟。令人咳喘上氣。腫大膨膨。兩足腫。目下臥蠶。胸滿隱痛。吸吸寒熱。小便數少。甚至古今錄驗與鯉魚人蘊甘草茯苓澤瀉杏仁同用。治緣三焦決漏。精液不通。水氣都行。致通身手足面目浮腫。食飲減少。且云年八十。病大困者。服此亦差。可見澤漆所治之大腹水氣。四肢面目浮腫。必兼喘咳上氣。小便不利者。澤漆誠行水中返顧根本之劑也。

配合應用　㈠治心下伏寢。大如盂。不得食。澤漆四兩。大黃葶藶熬三兩。搗篩。蜜丸梧子大。每服二丸。日三服。（肘後方）

㈡治十種水氣。澤漆十斤。夏月取嫩莖葉。入水一斗。研汁約二斗。於銀鍋內慢火熬如稀餳。入瓶內收。每日空心溫酒調下一盞。以愈爲度。（聖惠方）

㈢治水氣蠱病。生鮮貓眼睛草曬乾爲末。乘肉丸彈子大。每服二丸。白湯下。日二服。覺腹中暖。小便利爲度。（乾坤祕韞方）

㈣治脚氣赤腫。行步脚病。貓兒喂睛草。鷺鷥藤。蜂窠等分。每服一兩。水五碗。煎三碗。熬洗之。（易簡方）

㈤治牙齒疼痛。貓兒眼睛草一攔。研爛。湯泡取汁。含漱吐涎。（易簡方）

㈥治男婦瘰癧。貓兒眼睛草一二綑。井水二桶。五月五日午時。鍋內熬至一桶。去滓。澄清。再熬至一碗。瓶收。每以椒、葱、桃枝煎湯洗瘡淨。乃搽此膏數次。愈。（便民圖纂方）

㈦治癬瘡有蟲。貓兒眼睛草曬乾爲末。香油調塗之。（易簡方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　惡薯蕷。小豆爲之使。

著名方劑　澤漆湯。治咳而脈沉者。此湯主之。（金匱）半夏半升。紫參（一作紫苑）五兩。澤漆三斤。（以東流水煮取一斗五升）生姜、前胡各五兩。甘草、黃芩、人參、桂枝各三兩。上九味。㕮咀。納澤漆汁中。煮五升。溫服五合。至夜盡。

參攷資料　㈠澤漆利水。功類大戟。故人見其莖有白汁。遂誤以爲大戟。然大戟根皆有毒。而苗皆有毒洩人。而澤漆根硬不可用。苗亦無毒。可作菜食。而利丈夫陰氣。盛不相侔也。（李時珍）㈡澤漆、大戟苗也。生太山川澤。三月三日七月七日。採莖葉陰乾。（別錄）㈢此卽大戟花。川澤中有。莖梗小。花黃色。葉似嫩菜。五月採之。（大明）㈣今冀州、鼎州、明州及近道皆有之。（蘇頌）㈤別錄陶氏皆言澤漆是大戟苗。日華又言是大戟花。其苗可食。然大戟苗能洩人。不可爲菜。今考土宿本草及寶藏論諸書。並云澤漆是貓兒眼睛草。一名綠葉綠花草。一名五鳳草。江湖原澤平陸多有之。春生苗。一科分枝。成叢柔莖。如馬齒莧。綠葉如苜蓿葉。葉圓而黃綠。頗似貓睛。故名貓兒眼。莖頭凡五葉中分。中抽小莖五枝。每枝開細花。青綠色。復有小葉承之。齊整如一。故又名五鳳草。綠葉綠花草。稍莖有白汁黏人。其根白色。有硬骨。或以此爲大戟苗者。誤也。五月採汁煮雄黃伏鐘乳。結草砂。據此則澤漆是貓兒眼睛草。非大戟苗也。今方家用治水蠱脚氣有效。尤與神農本文相合。自漢人集別錄。誤以爲大戟苗。故諸家翻之爾。用者宜審。（李時珍）

【澤漆葉】卽澤漆之處方用名。詳『澤漆』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【澤蒜】㊀卽小蒜之古籍別名。典見王禎農書。詳『小蒜』條。㊁卽蒜之生於澤畔者。典見和漢藥考。詳『山蒜』條。

【澤蓼】卽水蓼之古籍別名。典見綱目。詳『水蓼』條。

【澤瀉】**命名**　去水曰瀉。如澤水之瀉也。故名澤瀉。又夏禹治水。故又名禹孫。

處方用名　福澤瀉。澤瀉炭。

古籍別名　水瀉。鵠瀉（本經）及瀉芒芋（別錄）。瀉禹孫。禹瀉。澤芝。蘭江。牛耳。榮。酸豚。俞（和漢藥考）。如意菜（綱目）

外國名詞　Alisma Plantago（拉丁）Water-plantain.（英）

基本　屬澤瀉科。藥用係取水澤瀉之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。澤瀉產福建省建寧府爲上。其次江西省。四川省均有出。但甜味以四川爲濃厚。市上所用者。以福建爲多。

形態　水澤瀉爲生於水澤池沼之宿根草。葉叢生。作匙形。似車前葉而大。有葉柄。夏末抽花莖。高三四尺。每節分三枝。每枝復三分。開三瓣白色小花。後結球圓形瘦果。爲黃色球圓形根。大四五分至寸許。有根鬚。味鹹。生根汁峻烈。

採取　九月採根曝乾。

製法　雷敎曰。不計多少。細剉酒浸一宿。取出曝乾。任用。

用法　與他藥水煎。或剉糊作丸散。

性質　甘。寒。無毒。

效能　利溼熱。治瀉痢。消腫。通淋。用作利尿及治水腫中暑藥。

主治　風寒溼痺。乳難。養五臟。益氣力。肥健。消水久服。耳目聰明。不饑延年。輕身面生光。能行水上。（本經）補虛損。五臟痞滿。起陰氣。止洩精。消渴。淋瀝。逐膀胱三焦停水（別錄）

張仲景之發明　澤瀉一味。經張仲景之實驗。認爲主治小便不利。冒眩。旁治渴。茲考徵如下。㊀澤瀉湯證曰。心下有支飮。其人苦冒眩。㊁五苓散證曰。小便不利。微熱消渴。（以上二方。以澤瀉爲君藥）澤瀉湯。澤瀉五兩。五苓散。一兩六銖半）。㊂茯苓澤瀉湯證曰。吐而渴。欲飮水。（以上一方。澤瀉四兩）㊃八味丸證曰。小便不利。又曰。消渴。小便反多。（以上一方。澤瀉三兩）㊄豬苓湯證曰。渴欲飮水。小便不利。（以上一方。澤瀉一兩）㊅牡蠣澤瀉散證曰。從腰以下有水氣。（以上一方。用澤瀉。與餘藥等分。茯苓澤瀉湯以下四方。以澤瀉爲佐藥也。）歷觀上諸方。澤瀉所主治也。不辨而明矣。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論澤瀉曰。主腎虛精自出。治五淋。宣通水道。【宋】大明日華諸家本草論澤瀉曰。主頭旋耳虛鳴。筋骨攣縮。通小腸止尿血。主難產。補女人血海。令人有子。【金】張元素珍珠囊論澤瀉曰。入腎經。去舊水。養新水。利小便。消腫脹。滲洩止渴。【元】李東垣用藥法象論澤瀉曰。去脬中留垢。心下水痞。【明】李時珍本草綱目論澤瀉曰。滲溼熱。行痰飮。止嘔吐。瀉痢。疝痛。脚氣。【明】李士材本草圖解論澤瀉曰。澤瀉甘鹹微寒。腎與膀胱藥也。利水道。通小便。補虛損。理脚氣。按本經云。久服明目而扁鵲云。多服病眼。何相反耶。蓋水道利。則邪火不干空竅。故云明目。水道過於利。則腎氣虛。故云病眼。又別錄稱其止遺泄。而寇氏謂泄精者不敢用。抑何相刺謬也。蓋相火妄動而遺泄者。得澤瀉清之。而精自藏矣。氣虛下陷。而精滑者。得澤瀉降之。而精愈滑矣。況滑竅之劑。腎虛失閉藏之職者。亦宜禁也。夫一藥也。一症也。而或禁。或取。變化殊途。自非博洽而神明者。未免對卷而疑。臨症而眩。若格於理者。變變化化。而不離乎宗。故曰。醫不執方。合宜而用。斯言至矣。【明】繆希雍本草經疏論澤瀉曰。澤瀉味甘寒。別錄益之。以鹹。腎與膀胱爲表裏。鹹能入腎。甘能入脾。寒能去熱。蓋淡滲利竅之藥也。其曰主風寒溼痺乳難消水。養五臟。皆以利水燥溼。則脾得所養。脾得所養。則五臟皆得所養。益氣力。肥健者。皆水利則溼去。溼去則脾强之功效也。又云主腹痞滿。淋瀝。逐膀胱三焦停水。共能利水祛溼。益無疑矣。洩精者。溼熱下流。客腎與膀胱。是民火扇君火也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

故精搖而洩。病在脾胃。澀熱盡則洩精自止矣。止消渴者。單指澀熱侵脾脾爲邪所干則不能致津液也。總之其性利水除澀。則因澀熱所生之病。靡不除矣。【明】黃宮繡本草求眞論澤瀉曰。澤瀉甘淡微寒。能入膀胱氣分。以瀉腎經火邪。功尚利水除澀。故五苓散用此以除澀熱。八味丸用此以瀉腎經澀火。俾其補不偏勝。則補始無礙耳。豈曰澤瀉補陰。功同於地黃之列哉。第其澀熱不除。則病症莫測。故有消渴嘔吐。痰飲腫脹。脚氣陰汗。尿血洩精種種等症。用此甘淡微鹹。以爲滲泄。則濁氣既降。而清氣上行。所謂一除而百病與之俱除也。但小便過利。則腎水愈虛。而目必昏。此一定之理耳。鹽水炒。或酒拌。忌鐵。【清】葉天士本草經解論澤瀉曰。澤瀉氣寒。甘味無毒。其主風寒澀痺者。風寒澀三者合而成痺。痺則血閉。而肌肉麻木也。澤瀉味甘益脾。脾澀去則血行而肌肉活。痺症瘳矣。其主乳難者。脾統血。血不化乳。所以難也。味甘益脾。脾澀行則血運而乳通也。其主養五臟益氣力肥健者。蓋五臟藏陰者也。而脾爲之原。脾主肌肉而性惡澀。澤瀉澀去則脾健。脾乃後天之本。所以肌肉長而氣力益。陰氣充而五臟得所養也。其消水者。入膀胱氣寒下洩也。久服耳目聰明。不飢延年輕身者。腎與膀胱爲表裏。膀胱水道通。則腎之精道固。精足則氣充。腎開竅於耳。所以耳聰。水之精爲目瞳子。所以明目。腎者胃之關。關門固。所以不饑。腎氣納所以延年輕身也。其言面生光。能行水上者。脾爲澀土。澀則重燥。則輕輕則能行水上。脾統血。血充則面有光彩也。蓋表其有利水固腎之功。燥澀健脾之效也。【清】徐洄溪本草經百種錄論澤瀉曰。澤瀉乃通利脾胃之藥。以其淡滲。能利土中之水。水去則土燥而氣充。脾惡澀故也。但澀氣必自膀胱而出。澤瀉能下達膀胱。故又爲膀胱之藥。【清】黃元御玉楸藥解論澤瀉曰。澤瀉味鹹微寒。燥土泄澀。利水通淋。除飲家之眩冒。療經病之燥渴。氣鼓水脹皆靈。腸噎反胃俱效。【清】吳儀洛本草從新論澤瀉曰。澤瀉甘鹹微寒。入膀胱。利小便。瀉腎經之火邪。功尚利澀。行水治消渴痰飲。嘔噦瀉痢。腫脹水痞。脚氣痾痛。淋瀝陰汗。尿血洩精一切澀熱之病。澀熱既除。則清氣上行。又能止頭旋。有聰耳明目之功。

近人學說　㊀賈九如曰。澤瀉色白微苦入肺。味鹹以利膀胱。凡屬瀉病。小水必短數。以此清潤肺氣。通調水道。下輸膀胱。主治水瀉澀瀉。使大便得實。則脾氣自健也。因能利水道。令邪水去。則眞水得養。故消渴能止。又能除澀熱。通淋瀝。分消痞滿。透三焦蓄熱。停水。此爲利水第一良品。金爲腎水之母。故云水出高源。此能引肺氣從上順下。如雨露之膏。澤故名澤瀉。所以六味丸中。同茯苓山藥補肺金導引於上源。降下而生腎水。用療精泄。退陰汗。去虛煩。又有熟地、山茱、丹皮補肝木。以生心火。上下相生。陰陽交互。取易理地天泰水火濟之義。如斯玄妙。非達造化之微者。孰能制此良方。昧者誤爲泄腎減之。若小便不通。而口渴者。熱在上焦。氣分。宜用澤瀉、茯苓以清肺氣。滋水之上源也。如口不渴者。熱在下焦血分。則用知母、黃柏以瀉膀胱。滋水之下源也。須分別而用。㊁張山雷曰。澤瀉產於水中。氣味淡泊。而體實又輕。故最善滲泄水道。專能通行小便。本經氣味雖曰甘寒。兼以其生長水澤。因謂之寒。其實輕淡無味。甘於何有。此藥功用。惟在淡則能通。本經稱其治風寒澀痺。亦以輕能入絡。淡能導澀耳。云治風寒。殊非其任。其能治乳難者。當以娩後無乳者言。此能通絡滲泄。則可下乳汁。非產乳百病之通用品。故別錄亦言葉主乳汁不出。若曰養五臟益氣力肥健。則以澀弗不容。而痺運自健。斯有養臟益氣之效。蓋已屬充分太過之辭。壽頤案本經此藥主治。太燥浮泛。殊無精當之義。恐已屬漢魏間敷淺之說。頗與本經辭旨不類。故原文更有久服耳目聰明、不饑延年、輕身面生光、能行水上云云。豈獨非藥理之眞。抑亦怪誕太甚。雖本經諸藥。間亦有輕身延年等溢分之語。然從無如能行水上之荒唐者。其爲方士羼雜。不問可知。瀕

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

湖謂經言面生光。能行水上。與術又云久服身輕。日行五百里。走水上諸說。陶貞白蘇恭之愚竊疑之。蓋澤瀉行水瀉腎。久服且不可安得有此神功云云。壽頤謂瀕湖綱目於古書最多篤信。時且失之穿鑿。而獨於此條能見其眞。知荒誕不經之說。固不可爲天下後世法也。別錄謂治五臟痞滿。蓋祇以澀阻之痞滿而言。止泄精者亦惟澀熱蘊於下焦。而相火妄行其疏泄之令者。乃宜此滲去澀熱而龍雷自安。非可以概虛人之滑泄而又謂補虛損。起陰氣。則大與滲泄傷陰之義矛盾矣。又曰澤瀉味淡體輕。故性善滑泄。生長水中。故善利水逐溼。此藥性情功用。卽此兩言而已足。更無條義可言。其兼能滑痰化飲者。痰飲亦積水停溼爲痛。惟其滑利。故可消痰總之滲泄滑瀉之藥。必無補養之理。本經養五臟。益氣力云云。已屬溢美太過。而甄權竟謂可治腎虛精自出。大明且謂補女人血海。令人有子。潔古亦謂入腎經。去舊水。養新水。皆非藥理之眞。徒眩初學耳目。殊堪詫異。若仲景八味丸用之者。原爲小水不利而設。金匱中屢有明文。後人妄謂六味專於補腎。則未學之謬見。非古人製方眞意也。

配合應用　㊀水腫晝劇夜平者。陽水也。澤瀉同豬苓白茯苓人參白朮白芍藥赤小豆桑白皮橘皮治之。多服必愈。夜劇晝平者。陰水也。同車前子赤茯苓生地黃白芍藥赤小豆桑根白皮木瓜石斛薏苡仁治之。多服必愈。

㊁治一切溼熱。澤瀉入五苓散、四苓散。

㊂治陰虛病有溼熱者。澤瀉入六味地黃丸。

㊃治一切停飲停水。澤瀉同人參白朮半夏茯苓橘皮紫蘇豬苓爲治飲之要藥。

㊄仲景治心下支飲。澤瀉五兩。朮二兩。水二升。煎取半升。分溫再服。

㊅素問身熱解墮。汗出如浴。惡風少氣。名曰酒風。服之以澤瀉朮各十分。廉薑五分。合以二指撮。食後服之。

㊆治飲證病甚欲眩者。用澤瀉五兩。炒朮二兩。水三升。煮濃服。必效。

㊇仲景治水蓄湯瘕。小便不利。或吐或瀉。五苓散主之。

㊈治水溼腫脹。白朮。澤瀉各一兩爲末。或爲丸。每服三錢。茯苓湯下。（保命集方）

㊉治胃虛霍亂。小便不利。頭暈引飲。三白散。用澤瀉。白朮。白茯苓各三錢。水一盞。薑五片。燈心十莖。煎八分。溫服。

㊊治腎臟風瘡。澤瀉皂莢水煮爛。焙研煉蜜丸。如梧子大。空心溫酒下十五丸。至二十丸。（經驗方）

㊋治癰後怪症。口鼻中氣出。盤旋不散。凝如黑蓋色。過十日漸至肩與肉相連。堅勝金石。無由飲食。煎澤瀉湯。日飲三盞。連服五日愈。（夏子益奇疾方）

用量　二錢至四錢。

施用宜忌　肝腎虛而無溼熱者禁用。畏海蛤。文蛤。忌鐵。

參攷資料　㊀素問。治酒風身熱汗出。用澤瀉朮。深師方。治支飲亦用澤瀉朮。但煮法小別耳。張仲景治雜病。心下有支飲苦冒。有澤瀉湯。治傷寒有大小澤瀉湯、五苓散。皆用澤瀉行利停水。爲最要藥。（蘇頌）㊁澤瀉乃除溼之聖藥。入腎經。治小便淋瀝。去陰間汗。無此疾服之。令人目盲。（張元素）㊂澤瀉之功。長於行水。張仲景治水蓄瀉煩。小便不利。或吐或瀉。五苓散主之。方用澤瀉。故知其長於行水。本草引扁鵲云。多服病人眼。誠爲行去其水也。凡服澤瀉散人。未有不小便多者。小便既多。腎氣焉得復實。令人止洩精。多不敢用之。仲景八味丸用之者。亦不過引接桂附等歸就腎經。別無他意。（寇宗奭）㊃本經云。久服明目扁鵲云。多服昏目。何也。易老云。去腎中留垢。以其味鹹。能瀉伏水故也。瀉伏水去留垢。故明目。小便利。腎氣虛。故昏目。（王好古）㊄寇宗奭之說。王好古鹽之。竊謂八味丸以地黃爲君。餘藥佐之。非止補血。兼補氣也。所謂陽旺則能生陰血也。地黃、山茱萸、茯苓、牡丹皮。皆腎經之藥。附子、官桂。乃右腎命門之藥。皆不待澤瀉之接引而後至也。則八味丸之用此。蓋取其瀉腎邪。養五

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

臟。益氣力。起陰氣。補虛損、五勞之功而已。雖能瀉腎。從於諸補藥中。衆之中。則亦不能瀉矣。（王履）㊀澤瀉氣平。味甘而淡。能滲洩。氣味俱薄。所以利水而洩下。脾胃有濕熱。則頭重而目昏耳鳴。澤瀉滲去其濕。則熱亦隨去。而土氣得令。清氣上行。天氣明爽。故澤瀉有養五臟。益氣力。治頭旋。聰明耳目之功。若久服則降令太過。清氣不升。眞陰潛耗。安得不目昏耶。仲景地黃丸用茯苓、澤瀉者。乃取其瀉膀胱之邪氣。非引接也。古人用補藥必兼瀉邪。邪去則補藥得力。一闔一闢。此乃玄妙。後世不知此理。專一於補。所以久服必至偏勝之害也。（李時珍）㊁澤瀉生汝南池澤。五月採葉。八月採根。九月採實。陰乾。（別錄）㊂汝南郡屬豫州。今近道亦有。不堪用。惟用漢中、南鄭、青州、代州者。形大而長。尾間必有兩歧。爲好。此物易朽蠹。常須密藏之。叢生淺水中。葉狹而長。（陶弘景）㊃今汝南不復採。惟以涇州、華州者爲善。（蘇恭）㊄今山東、河陝、江淮亦有之。漢中者爲佳。春生苗。多在淺水中。葉似牛舌。獨莖而長。秋時開白花作叢。似穀精草。秋末採根曝乾。（蘇頌）㊅肺金爲氣化之源。伏火蒸灼。則水道必淤。淤則金氣不行。而金益病。且水停下流。則中土濡溼。而奉上無力。故余治勞嗽吐血之症。未有不以導水爲先務者。古人每稱澤瀉有神禹治水之功。夫亦嘗究其命名之義矣。蓋澤者。澤其不足之水。瀉者。瀉其有餘之火。惟其澤也。故能使生地、白芍、阿膠、人參種種補益之品。得其前導。則補而不滯。惟其瀉也。故但走濁道而不走清道。非若猪苓、木通、腹皮等味之劑。陰破氣。直走無餘。要知澤瀉一用。肺脾腎三部咸宜。所謂功同神禹者此也。（理虛元鑑）

【澤瀉炭】卽澤瀉炒成炭者之處方用名。詳『澤瀉』條。

【澤瀉葉】**性質**　鹹。平。無毒。

主治　大風。乳汁不出。產難。強陰。氣久服輕身。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論澤瀉葉曰。壯水臟。通血脈。

【澤瀉實】**性質**　甘。平。無毒。

主治　風痺。消渴。益腎氣。強陰。補不足。除邪澁。久服面生光。令人無子。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論澤瀉實曰。別錄言澤瀉葉及實。強陰氣。久服令人無子。而日華子言澤瀉催生。補女人血海。令人有子。似有不同。既云強陰。何以令人無子。既能催生。何以令人有子。蓋澤瀉同補藥。能逐下焦溼熱邪垢。邪氣既去。陰強海淨。謂之有子可也。若久服則腎氣大洩。血海反寒。謂之無子可也。所以證書不可執一。

【澤蘭子】**性質**　苦。微溫。無毒。

主治　婦人三十六疾。

【澤蘭根】**原名**　地笋。

性質　甘。辛。溫。無毒。

主治　利九竅。通血脈。排膿。治血。

歷代記述攷證　【宋】大明日華諸家本草論澤蘭根曰。止鼻洪。吐血。產後心腹痛。產婦可作蔬菜食。佳。

【澤蘭葉】**命名**　本品生於淺水沼澤旁。葉形如蘭。故名。

古籍別名　虎蘭。葉。龍棗葉。（本經）虎蒲葉。（別錄）水香葉。（吳普）都梁香葉。（陶弘景）孩兒菊葉。風桑葉。孤兒菊葉。（綱目）九畹菜葉。（和漢藥考）

外國名稱　Aretiusa japonica, A. Gr.

基本　屬菊花科澤蘭之葉莖。

產地　凡溪澗池澤間。恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。澤蘭產廣東清遠、石潭等處。

形態　澤蘭爲草本植物。春抽莖。高二三尺。呈紫赤色。葉類薄荷。枝節對生。四葉。秋季開白色或淡紫色花。其根爲紫黑色。

採取　三月間採其莖葉陰乾用。

製法　雷敦曰。凡使澤蘭。須別雌雄。大澤蘭莖葉皆圓。根青黃。能生血調氣。與小澤蘭迥別。小澤蘭葉上斑。根頭尖。能破血通久積。須採來細剉。以絹袋盛。懸於屋南畔角上。令乾用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用法　與他藥水煎。或對末和作丸散。

性質　苦。微溫。無毒。

成分　澤蘭之成分爲揮發油、豐寧酸。

效能　行血。行水。用作婦人調經藥。及治水腫藥。並治月經過多。

作用　在胃中。微能阻止 Pepsin 之功用。入腸能激腸黏膜。使吸收力增加。并能減少黏膜之分泌。由腸壁而至血中。微能凝固血液。使進行緩慢。更能激子宮神經。使子宮四周之黏膜收縮。

主治　金瘡癰腫瘡膿（本經）產後金瘡內塞（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論澤蘭曰。產後腹痛頻產。血氣衰冷成勞瘦羸。婦人血瀝腰痛。【宋】大明日華諸家本草論澤蘭曰。產前產後百病。通九竅。利關節。養血氣。破宿血。消癥瘕。通小腸。長肌肉。消撲損瘀血。治鼻血吐血。頭風目痛。婦人勞瘦。丈夫面黃。【明】繆希雍本草經疏論澤蘭曰。澤蘭感土澤之氣。故味苦甘而入血。微溫而無毒。桐君兼酸。苦能洩熱。甘能和血。酸能入肝。溫通營血。故又主癰腫瘡膿及婦人吹乳乳結止衄。血并中風餘疾。佐以益脾土之藥。而用防己爲之使。則主大腹水腫。身面四肢浮腫。骨節中水氣。日華子云。澤蘭通九竅。利關脈。養血氣。破宿血。消癥瘕。產前產後百病。通小腸。長肉生肌。消撲損瘀血。治鼻洪。吐血。頭風目痛。婦人勞瘦丈夫面黃。又藥性論云。澤蘭使味苦。辛。主產後腹痛。頻產。血氣衰冷。成勞瘦羸。又治通身面目浮腫。主婦人血瀝腰痛。總其洩熱和血行而帶補之能也。【明】李士材本草圖解論澤蘭曰。澤蘭芳香悅脾。可以快氣。疎利悅肝。可以行血。流行營衛。暢達膚竅。遂爲女科上劑。【清】黃宮繡本草求眞論澤蘭曰。澤蘭苦甘而平。即今婦人採置髮中除垢者是也。玩書所論澤蘭。與本經蘭草同爲一體。其生澤旁。紫莖。素枝。赤節。綠葉。對節生。有細齒。但蘭草則莖圓節長。葉光有歧。澤蘭則莖微短節方。葉有毛之爲異耳。二物並於嫩時。皆可刈佩。以其花葉皆香。置於髮中。能以辟邪省頭。故雖呼爲香草。俗則呼爲孩兒菊。與於山蘭。其花雖香。而葉絕無氣者。迥不相同。蘭草莖圓葉光。其性專主入氣。雖書載有久服益氣輕身。不老膚語。然究止屬利水除痰。殺蟲辟惡。而爲消渴良藥。即內經所謂數食肥甘。傳爲消渴。治之以蘭。以除陳氣是也。澤蘭莖方葉毛。雖書載有和血舒脾。長養肌肉之妙。然究皆屬入脾行水。入肝治血之味。是以九竅能通。關節能利。宿食能破。月經能調。癥瘕能消。水腫能散。產後血淋腰痛能止。吐血衄血。目痛風癰瘡毒。撲損能治。觀此則書所云舒脾和血。不過因其水消血除之意。豈眞舒脾和血之味也乎。入補氣補血之味同投。則消中有補。不致損眞。誠佳品也。

近人學說　張山雷曰。澤蘭產下隰大澤之旁。本與蘭草相似。故主治亦頗相近。本經大腹水腫。身面四肢浮腫。骨節中水。皆苦溫勝溼之功效。亦即蘭草利水道之意。其治金瘡癰腫瘡膿者。專入血分而行瘀排膿消腫也。惟本經所謂產通瘀之意。別錄內塞。當亦以瘀露不通言之。（廣義）甄權謂治產後腹痛。固苦溫行瘀之功。又謂治類產血氣衰冷。成勞瘦羸。婦人瀝血腰痛。則以溫和能利血脈言之。然通利之品。能走未必能守。此當以意逆之。而可知其非虛症久服之藥矣。瀕湖謂澤蘭氣香而溫。味辛而散。陰中之陽。脾喜芳香。肝宜辛散。脾氣舒則三焦通利。肝鬱散則營衛流行。蘭草走氣道。故能利水道。除痰癖。殺蟲惡而爲消渴良藥。澤蘭走血分。故能治水腫。逐癰毒。破瘀血。消癥瘕。而爲婦人要藥。雖是一類。而功用稍殊。石頑謂入肝脾二經血分。專治產後血敗流於腰股。拘攣疼痛。破宿血消癥瘕。皆散血之功。爲產科要藥。

配合應用　㈠澤蘭。婦人方中最爲急用。古人治婦人。澤蘭丸甚多。

㈡澤蘭得炒黑豆、炮乾薑、當歸、芎藭、乾地黃、牛膝、益母草、赤芍藥、蒲黃、五靈脂。治產後惡露不盡。少腹作痛。俗名兒枕痛。數月加桂多火及內熱虛勞人去桂加童便去

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五靈脂加人參、鱉甲、香附、麥門冬。治產後諸虛百病熱者去人參。㈢治產後水腫血虛浮腫。澤蘭、防己等分爲末每服二錢酸酒下。（張文仲備急方）㈣治小兒尊癉。嚼澤蘭心封之良。（子母祕錄方）㈤治癉腫初起。澤蘭搗封之良。亦治損傷瘀腫。（集簡方）㈥治產後陰翻。產後陰戶燥熱。遂成翻花。澤蘭四兩。煎湯熏洗二三次。再入枯礬煎洗之卽安。（集簡方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無瘀血者禁用。

參攷資料　㈠蘭草、澤蘭氣香而溫。味辛而散。陰中之陽。足太陰厥陰經藥也。脾喜芳香。肝宜辛散。脾氣舒。則三焦通利而正氣和。肝鬱散。則營衞流行而病邪解。蘭草走氣道。故能利水道。除痰癖。殺蟲辟惡。而爲消渴良藥。澤蘭走血分。故能治水腫。塗癰毒。破瘀血。消癥瘕。而爲婦人要藥。雖是一類。而功用稍殊。正如赤白茯苓、芍藥、補瀉皆不同也。雷敎言雌者調氣生血。雄者破血通積。正合二蘭主治。大澤蘭之爲蘭草。尤可憑據。血生於氣。故曰調氣生血也。又荀子云。澤芷以養鼻。謂澤蘭白芷之氣芳香。通乎肺也。（李時珍）㈡齊安人呼爲風藥。吳普本草一名水香。陶氏云。亦名都梁香。今俗通呼爲孩兒菊。則其與蘭草爲一物二種。尤可證矣。其根可食。故曰地笋。（李時珍）㈢生地下水旁。葉如蘭。二月生苗。赤節四葉相植。支節間。（吳普）㈣今荊徐隨蜀梧州河中府皆有之。根紫黑色。如粟根。二月生苗。高二三尺。莖幹青紫色。作四稜。葉生相對。如薄荷。微香。七月開花。帶紫白色。專通紫色。亦似薄荷花。三月採苗。陰乾。荊湖嶺南人家多種之。蘄州出者無花。于此與蘭草大抵相類。但蘭草生水旁。葉光潤。根小紫。五六月盛。而澤蘭生水澤中及下濕地。葉尖微有毛。不光潤。方莖紫節。七月八月初採。微辛。此爲異爾。（蘇頌）

【澤鹽】卽澤中結凝之鹽也。性質功用與海鹽同。詳『食鹽』條。

【澱花】卽青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青黛』條。

【濃沙】卽礵砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礵砂』條。

【餚窶】卽石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【燈心草】

處方用名　燈芯。燈草。

古籍別名　虎鬚草。碧玉草。（綱目）燈草。蔺草。赤鬚。古乙心。（和漢藥考）

外國名稱　Juncus effusus, L. var. decipiens, F. Bu.（拉丁）

基本　屬燈心草科。爲燈心之莖、根。

產地　凡江南澤地。恒多叢生。陝西亦有出。



燈心草

形態　燈心爲多年生草。莖圓作綠色細線狀。高達四五尺。中有白瓤。葉在莖之基部作鱗狀。夏月於莖之上部生多數花梗。開黃綠色小花。燈心草用以織蔺。莖中白瓤。卽入藥之燈心草。

採取　六七月採莖。取穰日乾。

製法　李時珍曰。凡用燈心草雖研。以粳米粉漿染過。曬乾研末。入水澄之。浮者是燈心也。曬乾用。

用法　水煎或蜊末用。

性質　甘。寒。無毒。

效能　利水通淋。清熱安神。專作利尿劑。

主治　五淋生熇服之。敗蔺煑服更良。

歷代記述攷證　【金】張元素珍珠囊論。燈心曰。瀉肺。治陰痿濇不利行水。除水腫癃閉。【元】朱丹溪本草衍義補遺論。燈心曰。治急喉痺。燒灰吹之。甚捷。燒灰塗乳上。飼小兒止夜啼。【明】李時珍本草綱目論。燈心曰。降心火。止血通氣。散腫止渴。燒灰入輕粉麝香。治陰疳。【淸】黃宮繡本草求眞論。燈心曰。燈草味淡而寒。體小氣微。諸書皆稱能降心火。以其心治心也。心火淸則肺金肅。心與小腸相表裏。則熱盡從小便而出矣。且熱去而血亦寧。故能止血通淋。淸上焦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

伏熱。五淋之聖藥也。燒可治喉痺。及以灰塗乳上。則兒飼不夜啼。縛把擦癬。則蟲從草出。浮水可見。且能斷根矣。氣虛小便不禁者忌服。

【清】賈九如辨藥指南論燈心曰。燈心氣味俱輕。輕者上浮。專入心肺。其味最淡。淡能利竅。使上部鬱熱下行。從小便而出。主治咳嗽咽痛。眼赤目昏。淋閉水腫。小便不利。暑熱便濁。小兒夜啼。皆清熱之功也。世疑輕淡之物。以爲力薄而忽之。不知輕可去實。淡生於滲。惟此能導心肺之熱。自上順下。通調水道。下輸膀胱。其力獨勝。

近人學說　張山雷曰。本經止有石龍芻。云一名龍鬚。即今織蓆之草也。宋開寶本草。乃有燈心草。其形較之織蓆者爲粗。其質較鬆。今剖其穰爲燈心。而以其殼爲簑衣。二草雖非一種。然是同類。皆生於下濕之地。味淡質輕。故專於通利。能泄濕熱而清導小水。亦降心肺之火。本經謂石龍芻味苦微寒。主心腹邪氣。小便不利。淋閉。風溼鬼疰。惡毒。其所謂邪氣惡毒者。即以濕熱之邪言之也。治風溼者。亦取其利溼之意。別錄謂治瘀滿。除壅中熱痛。仍是泄熱利水之義。陳藏器謂敗蓆治淋及小便卒不通。開寶本草謂燈心草主五淋。織蓆更良。潔古謂瀉肺通溺。癰閉。行水治腫。丹溪謂治急喉痺。燒灰吹之。以灰餉小兒。止夜啼。瀕湖謂降心血。止血熱。通氣滑腫。又無一非泄熱利水之用。又燈心之實。尤爲輕虛。故開肺泄水。尤其專長。以開喉痺其義在此。但研末燒灰。其法甚難。以米粉漿之。則可研塞。緊於竹節中。糠火煨之。則成炭。要之質賤而味淡。除利水以外。無用。韓氏醫通有天一丸。必以燈心爲末。合滑石二苓、猪苓、澤瀉、再用人參膏爲丸。其用亦不過通利小水而已。可謂矯揉造作。是亦醫界之覽矣。

配合應用　㈠治被傷出血。燈心草嚼爛傅之立止。（勝金方）

㈡治衄血不止。燈心一兩爲末。入丹砂一錢。米飲每服二錢。（聖濟總錄方）

㈢治喉風痺塞。用燈心一握。陰陽瓦燒存性。又炒蠶一匙。每吹捻數次立愈。一方用燈心灰二錢。蓬砂末一錢。吹之。一方燈心管一方燈心管葉灰等分。（瑞竹堂方）又用燈心草紅花燒灰酒服一錢。即消。（惠濟方）

㈣治痘瘡煩喘。小便不利者。燈心一把。鼈甲二兩。水一升半。煎六合。分二服。（龐安常傷寒論方）

㈤治夜不合眼。難睡。燈草煎湯代茶飲。即得睡。（集簡方）

㈥治通利水道。白飛霞自制天一丸。用燈心十斤。米粉漿染。曬乾。研末。入水澄去粉。取浮者。曬乾。二兩五錢。赤茯苓去皮。共五兩。滑石水飛五兩。猪苓二兩。澤瀉三兩。人參一斤。切片。熬膏。和藥丸。如龍眼大。硃砂爲衣。每用一丸。（韓氏醫通方）

㈦治溼熱黃疸。燈草根四兩。酒水各半。入瓶內。煮半日。露一夜。溫服。（集玄方）

用量　五分至八分。

施用宜忌　凡中寒而小便不禁者禁用。

參攷資料　㈠燈草降心火。通氣。爲燈草專長。心火降。則肺氣下行而氣通。故曰瀉肺心主血火降。氣通。則血和而水源暢矣。其治喉痺最捷者。降心火。下肺氣。和血散氣之義也。（劉潛江）㈡燈心草生江南澤地。叢生莖圓細而長。直入將爲蓆。（馬志）㈢陝西亦有之。蒸熟待乾。折取中心白穰。燃燈者。是謂熟草。又有不蒸者。但生乾剝取爲生草。入藥宜用生草。（寇宗奭）㈣此卽龍鬚之類。但龍鬚緊小而圓實。此草稍粗而圓虛白。吳人栽蒔之。取圓爲燈炷。以草織蓆及簑。他處野生者不多。外丹家以之伏硫砂。雷公炮炙論序云。礵遇赤鬚。永留金鼎。注云。赤鬚亦呼虎鬚草。煑礵住火。不知是否卽此虎鬚也。（李時珍）

【燈芯】卽燈心草之處方用名。詳『燈心草』條。

【燈草】卽燈心草之處方用名。詳『燈心草』條。

【燈盞殘油】　基本　燈盞內燃火餘殘之油。古以麻油燃燈。所謂殘油者。指殘餘之麻油而言。若棉油、菜油、及近日之煤油。皆不在本條範圍之內。

主治　能吐風痰。食毒。塗癰腫。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱毒。又治瀏大咬傷灌口甚良。

配合應用　㊀治髮瘕飲油。外塗云病髮瘕者。欲得飲油。用油一升入香澤煎之。盛置病人頭邊。令氣入口鼻。勿與飲之。疲極眠睡蟲當從口出。急以石灰粉手捉取抽盡。即是髮也。又云治胸喉間覺有瘕蟲上下。嘗聞葱豉食香。此乃髮瘕蟲也。二日不食。開口而臥。以油煎葱豉令香。置口邊。蟲當出。以物引去之。必愈。

㊁治髮瘕腰痛。南史云。宋明帝宮人腰痛牽心。發則氣絕。徐文伯診曰。髮瘕也。以油灌之。吐物如髮。引之長三尺。頭已成蛇。能動搖。懸之滴盡。唯一髮爾。

㊂治吐解蠱毒。以清油多飲取吐。（嶺南方）

㊃解河豚毒。一時倉卒無藥。急以清麻油多灌取吐。出毒物即愈。（衛生易簡方）

㊄解砒石毒。用麻油一盌灌之。（衛生方）

㊅治大風熱疾。近效方云。婆羅門僧。療大風疾并熱風。手足不遂。壓丹石熱毒。用消石一兩。生烏麻油二大升。同納鑵中。以土墼蓋口。紙泥固濟。細火煎之。初煎氣腥。藥熟則香氣發。更以生脂麻油二大升。和合微煎之。以意斟量得所。即內不津器中。凡大風人用紙屋子坐病人外面。燒火發汗。日服一大合。壯者日二服。三七日頭面瘡瘡皆滅也。（圖經方）

㊆治傷寒發黃。用生烏麻油一盞。水半盞。雞子白一枚。和攪服盡。（外臺祕要方）

㊇治小兒發熱。不拘風寒飲食。時行痘疹並宜用之。以葱涎入香油內。手指蘸油。摩擦小兒五心頭面項背諸處。最能解毒涼肌。（直指方）

㊈預解痘毒。時行喧嗄。恐發痘瘡。用生麻油一小盞。水一盞。旋旋傾下油內。柳枝攪稠如蜜。每服二三蜆殼。大人二合。臥時服之。三五服。大便快利。瘡自不生矣。此扁鵲油劑法也。（外臺祕要方）又或用麻油童便各半盞。如上法服。（直指方）

㊉治小兒初生。大小便不通。用眞香油一兩。皮消少許。同煎滾冷。定。徐徐灌入口中。嚥下即通。（簡氏經驗方）

㊁治卒熱心痛。生麻油一合服之良。（肘後方）

㊂治鼻衄不止。紙條蘸眞麻油入鼻。取嚥即愈。有人一夕衄血盈盆。用此而效。（普濟方）

㊃治胎死腹中。清油和蜜等分。入湯頓服。（普濟方）

㊄治漏胎難產。因血乾澀也。用清油半兩。好蜜一兩。同煎數十沸。溫服。胎滑即下。他藥無益。以此助血爲效。（胎產須知方）

㊅治產腸不收。用油五斤。煉熟盆盛。令婦坐盆中。飯久。先用皁角炙去皮。研末。吹少許入鼻。作嚏立上。（斗門方）

㊆治癰疽發背。初作即服此。使毒氣不內攻。以麻油一斤。銀器煎二十沸。和醇醋二盞。分五次。一日服盡。（直指方）

㊇治腫毒初起。麻油煎葱黑色。趁熱通手旋塗自消。（百一選方）

㊈治喉痺腫痛。生油一合。灌之立愈。（總錄方）

㊉治丹石毒發發熱者。不得食熱物。不用火爲。使但著厚衣。暖臥。取油一匙。含嚥。戒怒二七日也。（枕中記云。服丹石人。先宜以麻油一升。薤白三升。切納油中。微火煎黑。去滓。合酒。每服三合。百日氣血充盛也。亦治身面瘡疥。）

㊁治梅花禿癬。用清油一盌。以小竹子燒火入內煎沸。瀝豬膽汁一箇。和勻。剃頭擦之。二三日即愈。勿令日曬。（普濟方）

㊂治赤禿髮落。用香油水等分。以銀鍥攪和。日日擦之。髮生乃止。（普濟方）

㊃治髮落不生。生胡麻油塗之。（普濟方）

㊄令髮長黑。生麻油桑葉煎過。去滓。沐髮。令長數尺。（普濟方）

㊅治聾。生油日滴耳中三五次。候耳中塞出即愈。（普濟方）

㊆治蚰蜒入耳。用胡麻油作煎餅。枕臥。須臾自出。李元淳尚書在河陽。日蚰蜒入耳。無計可爲。腦悶有聲。至以頭擊門柱。奏狀危困。因發御醫療之。不驗。忽有人獻此方乃愈。（劉禹錫傳信方）

㊇治蜘蛛咬毒。香油和鹽搽之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（普濟方）㈡治冬月唇裂。香油頻頻抹之。（相感志方）㈢治身面白癜。以酒服生胡麻油一合。一日三服。至五斗瘥。忌生冷雞魚蒜等百日。（千金方）㈣治小兒丹毒。用生麻油塗之。（千金方）㈤治打撲傷腫。熟麻油和酒飲之。以火燒熱地臥之。覺即疼腫俱消。松陽民相毆。用此法。經官驗之。了無痕迹。（趙褒行營錄方）㈥治虎爪傷人。先吃清油一盞。仍以油淋洗瘡口。（趙原陽濟急方）㈦治毒蛇螫傷。急飲好清油一二瓷。解毒然後用藥也。（濟急良方）

參攷資料　㈠大寒。乃常食所用。而發冷疾。滑精。髓發臟腑渴困。脾臟。令人體重損聲。（陳藏器）㈡有牙齒疾及脾胃疾人。切不可吃。治飲食物須逐日熬熟用之。若經宿即動氣也。（陳士良）㈢油生於麻。麻溫而油寒。同實而異性也。（劉完素）㈣香油乃炒熟脂麻所出。食之美。且不致疾。若煎煉過。與火無異矣。（朱震亨）㈤張華博物志言。積油滿百石。則自能生火。陳霆墨談言。衣絹有油蒸熱。則出火星。是油與火同性矣。用以煎煉食物。尤能動火生痰。陳氏謂之大寒。珍意不然。但生用之有潤燥解毒。止痛消腫之功。似乎寒耳。且香油能殺蟲。而病瘡瘡者。嗜油。煉油能自焚。而氣盡則反冷。此又物之玄理也。（李時珍）

【燈蛾】原名　飛蛾。

命名　本品爲蛾之能飛而喜撲燈火者。故名

外國名詞　Arctia caja, L.（拉丁）



燈蛾

形態　燈蛾爲卵生蟲類鱗蛾屬之一種。其體肥大。密生暖毛。前翅赤褐色。白色粗條。後翅赤有黑紋。幼蟲白色。密生赤黑色長毛。有脚八對。夏月疾行路中。能爲植物之害。長成便爲飛蛾。捕得可供藥用。

主治　趙學敏曰。治痔管。法用蟷螂一個。同搥燈蛾十個。放罐內一宿。加麝香一錢。陰乾爲末。吹入管內。自能出水。水乾即愈。

【燈窩油】即燈盞殘油。詳『燈盞殘油』條。

【燈臺草】即澤漆之俗名。詳『澤漆』條。

【燈籠花】即山慈姑之俗名。詳『山慈姑』條。

【燈籠草】即酸漿之古籍別名。見唐本草。詳『酸漿』條。

【燒金草】即蒲公英之古籍別名。典見士宿本草。詳『蒲公英』條。

【燒酒】**基本**　本品係用糯米或粳米或黍稷或大麥蒸熟。和麴釀甕中。七日以甑蒸取汁。所成之酒。故名。

古籍別名　火酒。氣酒。（綱目）阿剌吉酒。（飲膳正要）

性質　辛甘大熱。有大毒。

主治　李時珍曰。消冷積寒氣。燥溼痰。開鬱結。止水瀉。治霍亂。癖疾。噎膈。心腹冷痛。陰毒欲死。殺蟲。辟瘴。利小便。堅大便。洗赤目腫痛。有效。

配合應用　㈠治冷氣心痛。燒酒入飛鹽飲。即止。㈡治陰毒腹痛。燒酒溫飲。汗出即止。㈢治嘔逆不止。眞火酒一盃。新汲井水一杯。和服甚妙。㈣治寒溼泄瀉。小便清者。以頭燒酒飲之。即止。㈤治耳中有核。如棗核大。痛不可動者。以火酒滴入。仰之半時。即可銜出。（李樓奇方）㈥治風蟲牙痛。燒酒浸花椒。頻頻漱之。㈦治寒疼咳嗽。用燒酒四兩。猪脂、蜜、香油、菜末各四兩。同浸酒內。煮成一處。每日挑食。以茶下之。效。

參攷資料　㈠燒酒純陽毒物也。面有細花者爲眞。與火同性。得火即燃。同乎焰消。北人四時飲之。南人止暑月飲之。其味辛甘。升陽發散。其氣燥熱。勝溼祛寒。故能開

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

佛鬱而消沉積。通腸噎而散痰飲。治泄瘧而止冷痛也。辛先入肺和水飲之。則抑使下行。通調水道。而小便長白。熱能燥金耗血。大腸受刑。故令大便燥結。與薑蒜同飲。卽生痔也。若夫暑月飲之。汗出而腸快身涼。赤目洗之。淚出而腫消赤散。此乃從治之方。焉過飲不節。殺人頃刻。近之市沽。又加以砒石草烏辣灰香藥助而引之。是假盜以方矣。善攝生者宜戒之。按劉克用病機賦云。有人病赤目。以燒酒入鹽飲之。而痛止腫消。蓋燒酒性走。引鹽通行經絡。使鬱結開而邪熱散。此亦反治劫劑也。（李時珍）㊁過飲敗胃。傷膽喪心。損壽甚則黑腸腐胃而死。與薑蒜同食。令人生痔。鹽冷水綠豆粉解其毒。（李時珍）㊂燒酒非古法也。自元時始創。其法用濃酒和糟入甑蒸。令氣上。用器承取滴露。凡酸壞之酒。皆可蒸燒。近時惟以糯米或粳米或黍或秫或大麥蒸熟。和麴釀甕中。七日以甑蒸取。其清如水。味極濃烈。蓋酒露也。（李時珍）㊃暹羅酒以燒酒復燒二次。入珍寶異香。其壘每個以檀香十數斤燒烟薰令如漆。然後入酒蠟封。埋土中二三年。絕去燒氣。取出用之。曾有人攜至船。能飲三四盃卽醉。價直數倍也。有積病飲一二盃卽愈。且殺蟲。予親見二人飲此。打下活蟲長二寸許。謂之魚蟲云。（汪頴）

【燒酒火】**性質**　大熱。辛。甘。

主治　溫中行氣。動血。入十二經。

參攷資料　酒本米麴之精華。屬陽。燒酒則又爲酒之精華。乃陽中之陽。燃之色綠。陽極陰生之象。與石硫性同。皆以陽爲體。藏陰於用也。故其光照人面。皆作青灰色。照鬾魅則不能遁形。以陰爲用者。多含毒。令人率以此酒冬月爲火。疏用以熯物代炭。火久食則發癰毒。默受其毒而不覺。然維臟寒者宜之。氣能透達骨髓。轆堅燥溼。熏衣著之。能發骨髓中汗。（趙恕軒）

【燒鹽】**命名**　本品爲鹽之燒過者。故名。

主治　入粥食。止血痢。

【燕】**古籍別名**　乙鳥（說文）玄鳥（禮記）鷰鳥（古今注）鵖碣（莊子）游波（炮炙論）天女（易占）

外國名詞　Hirundo rustica gutturalis Scop.（拉丁）（Eastern chimney swallow 或 Swallow）（英）Schwalbe.（德）ツバメ或ツハクロ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類鳴禽類燕科。

形態　燕爲原禽類燕屬之一種。體大似雀。頭頂背及翼黑色。有青光。額與喉栗色。胸有黑條紋。腹純白。形闊而凹。頸短。嘴短闊。脚細小。目之視力甚銳。翼甚長而狹小。稍呈鑽狀。尾翼十二枚。分歧爲叉狀。亦黑色。每年春分前後來自暖地。銜泥作巢於屋宇。秋分後復去。伏蟄窟中。其肉可供藥用。



燕

性質　酸。平。有毒。

主治　殺痔蟲。瘡蟲。

參攷資料　燕肉不可食。損人神氣。（陶弘景）

【燕口香】卽沉香形如燕口者之古籍別名。典見綱目。詳『沉香』條。

【燕支】卽臙脂。詳『臙脂』條。

【燕卵】卽龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【燕尾香】卽草蘭之古籍別名。典見開寶本草。詳『草蘭』條。

【燕尾草】卽蕘姑之古籍別名。典見大明本草。詳『蕘姑』條。

【燕屎】**性質**　辛。平。有毒。

主治　蠱毒鬼疰。逐不祥邪氣。破五癃利小便。熬香用之。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論燕屎曰。作湯浴小兒驚癇【唐】蘇恭新修本草論燕屎曰。療痔殺蟲去目翳【唐】孫思邈千金翼論燕屎曰。治口瘡瘡疾。

【燕面】卽夏枯草之古籍別名。典見別錄。詳『夏枯草』條。

【燕胎子】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【燕脂】卽臙脂。詳『臙脂』條。

760／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【燕脂菜】卽落葵之古籍別名。典見綱目詳『落葵』條。

【燕草】卽佩蘭之古籍別名。典見綱目詳『佩蘭』條。

【燕麥】卽雀麥之古籍別名。典見唐本草詳『雀麥』條。

【燕窠】卽燕窩詳『燕窩』條。

【燕窠中草】卽燕尊草詳『燕尊草』條。

【燕窩】**命名**　本品係雨燕科中之金絲燕食海生物所化之唾液吐出營造之窩巢故名。

處方用名　上官燕。淨毛燕。暹邏燕。龍牙燕。牡丹毛燕。光燕。

古籍別名　燕蔬菜。（綱目拾遺）

產地　產於閩廣漳泉沿海等處。南洋之婆羅洲。紐幾尼亞。馬達加斯加。蘇門答臘。馬來羣島。與爪哇、西伯里斯、暹邏、印度、日本亦均有出之。

基本　屬脊椎動物鳥類鳴禽類雨燕科。爲金絲燕之窩。

形態　燕窩爲金絲燕以唾液及其他物質所釀成之窩巢。係營於斷崖峭壁之上。形狀如兜。其純粹由唾液造成者。則爲內包纖維質。類如海綿珊瑚之着生。排列無序。其質白色之細條。浸水則柔輭漲大。蘇門答臘產者其色鮮白。不耐火。暹邏產者稍間黃黯。最耐燉。大香。氣甚烈。爲貴重之補劑。並可供藥用。

種類　天然燕窩之品質不一。上品者曰頭水。暹邏燕。質白光潔透明。窶厚內有網絲。落水膨漲力甚强。一錢能漲至一兩七八錢。此爲第一次營巢。故曰頭水燕。其精力最足。第二三次營巢。則窶薄。色白黃帶灰色。或間有紅斑。雖亦產暹邏。質性已薄弱。膨漲力亦大減。每錢剩發至七八錢。產南洋爪哇各島巖穴者。曰洞燕。在飼養室營巢者。曰厝燕。洞燕糙米色。質堅間有細毛。厝燕色白。質鬆毛少。落水漲力雖亦有以一分至十分可漲。然一煮卽爛。其力不及天然頭水燕之强。歷燕。產龍牙島者。曰龍牙燕。以窶厚色白有神。內有網絲絪滿者爲優。福建泉漳沿海產者。夾毛者多。名曰毛燕。（外國格里斯亦產之。）亦以肉厚色白有神。紅根毛輕。每隻有簷串眼者。曰牡丹毛燕。爲最佳。其他窶薄毛重。色白帶灰黑者次。大抵採下之後。不加精製。亦不整齊。乃浸於水中。弛其結合。除去羽毛及其他夾雜物。再乾燥之。他如天然燕窩。與日本人造燕窩。凡有經驗者。亦各有區別。若天然燕窩。色澤較潤。有神光。雖夾雜有毛。出於自然。且有鯛魚味。人造燕窩。色呆白無神。質粗略堅硬。有海藻氣。或全無氣味。以此分辨。一無遁形。凡天然燕窩。以帶紅紫色者爲最上品。白色者亦佳。帶黑色多毛者最下也。

採取　㊀採取時期。金絲燕爲維持自身生活之安寧計。營窩於斷崖絕壁。非常危險之海島上。約費三月之工作。方能成功一窩。土人於其未產卵以前採取之。而海燕再築第二窩。一月落成。復被採取。又再築第三次之窩。燕居窩中產卵。不數日孵化成雛。發育甚速。其產卵分早春近冬二時期。俟雛燕完全成長之時。母子卽離去。近海尋南方暖陸飛去。採集者復攀登絕壁。從事第三次之採集。動物學大辭典云。燕窩品質之高下。與該燕所棲之洞穴。及採取之時節。有關係。欲得上品。須於雛之羽毛未發育時。併窩中之卵而採取之。若雛已發育而飛去者。則呈黑色。且帶血痕。甚或羽毛交雜。幾不可用。其採取期。概在四月八月十二月間爲優。㊁採取方法。蠻餘云。燕窩產危巖絕壁。採取非易業。此者每尋鮑魚爲導線。蓋燕窩下必有鮑魚。自海岸起。相離數尺。則銜一介。捕者先持鐵鏟。輕擊鮑魚。鮑卽緊吸石壁。其勁力甚大。乃足踐其一手。持其一陸續緣之而上。燕窩既得。卽順緣而下。隨下隨將鮑魚剝下。故燕窩所得。鮑魚值亦稍之。茶餘客話云。許青巖方伯語予云。燕窩產海島中。窮巖邃谷。足力繩竿之所不及。故舶養小猿猴。善解人意。至山島間。以小布囊繫猿背上。縱之往。升木深巖。盡剝窩巢中而歸。猿之去也。若不得食三數日。始返。海客治果餌充囊中。俾之遠出。不饑。拙者出卽剝窩巢囊中。歸卽傾囊不過數片。爲果餌與地也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其黠者將果餌傾巖竇間。剝塞滿囊盡燕窩矣。空而復去。尤爲便值。猿一值數百金。貧數倍於拙者云。

張祿燕窩談云。南洋暨島土人常乘小舟。見巖礁絕壁下有燕窩。即背掛網籃。腰帶長刀。用繩之一端。繫巖壁草木上。一端胯於腿。依繩上去。採得後。放背籃內。復依繩而下。但此法非常危險。偶不小心。即落於海中。而飽魚腹。如天然燕窩採取方法。雖各有不同。然營巢於危巖絕壁則無異。採得不易。故更珍貴。不若飼養燕窩。隨時採取。無甚爲難也。

製法 人造燕窩之原料及製法。日本島國四面環海。故海產植物亦不少。被用種種方法。爲人造燕窩。所取原料。即海藻之屬。乃係海索麵類之石花菜。鳥足藻等。其法即以此類海藻。曬於海畧陸地。俟其將乾。以淡水洒之。如是一曬一洒。約至七八次。則海藻變爲淡黃色。俗名漂白。於是商人等買此漂白海藻。用水煮後。以布袋濾之。以所得濾液。冷却凝固。即成爲瓊脂質（俗名洋菜）是實除做燕窩輸入吾國外。且輸出法德等國。作絲織物之原料。每年出口值銀一百五六十萬元云。

性質 甘平無毒。

成分 據張祿燕窩談考得。自海燕之唾腺分泌一種黏液。製成之天然燕窩。分析之結果。其成分爲水分一〇・四〇%。一含窒素物質五七・四〇%。脂肪〇〇・〇九%。一無窒素越幾斯二二・〇〇%。纖維一・四〇%。一灰分八・七四%。又以水蒸氣處理之。溶解於水者爲有機物質七四・三〇%。一無機物質七・一四%。又據美國生物化學雜誌載吾國王女士對於燕窩之研究大要謂淨去燕窩之毛。加以試驗。其灰分之平均百分數爲二・五二。此灰分溶於鹽酸。其中有燐百分〇・〇三五。有硫百分之一・一〇。當燕窩起加水分解時。得還原性炭水化合物至少百分之一七・四。其所含之蛋白質有數種。其量之分佈。約略如下。總硷氮乏〇・〇八%。肥泥蛋白質氮乏六・六八%。黏膠蛋白質氮乏三・九五%。尿鹼蛋白質氮乏二・三九%。單硷基氮乏五・一九%。水解乾酪蛋白質氮乏二四・六%。組織蛋白質氮乏六・二二%。非硷基氮乏七・二二%。據研究所得。胃液酸質及膵液酸質。解消化燕窩。惟不如消化煮過雞蛋白之易用之。以飼動物實驗之結果。表示燕窩蛋白質。亦非佳滋養品。不足代替其他緊要之蛋白質。爲食物之原料云。

主治 大養肺陰。化痰止嗽。補而能清。爲調理虛損勞瘵之聖藥。一切病之由於肺虛。不能清肅下行者。用此皆可治之。

近人學說 ㈠曹炳章曰。海燕御鱟。螺海粉魚蟲小生物。經胃中甜肉汁酸汁。化爲唾液。吐而作窩。得風日陽和之氣。其味甘淡微鹹。能使金水相生。俾腎氣上滋於肺。而胃氣亦得以安。爲食補品中之最馴良者矣。如養胃液滋肺津。潤燥澤枯。生津益血。止虛嗽虛痢。理腸上熱痰病後諸虛。尤爲妙品。治高年虛嗽虛癆。小兒胎熱及痘疹元虛頂陷者爲最效。今人以之調補虛損勞瘵。咳吐紅痰。每兼涕糖煮食。往往見效。一切病由肺脾氣虛。肝陽上撥。不能清肅下行。皆可治之。久任斯優。若陰火方熾。血逆上奔。雖服無濟。以其幽柔無剛毅之力耳。飲食辨錄云。性能補氣。凡脾肺虛弱。及一切虛在氣分者宜之。又能固表。表虛漏汗。畏風者服之。最佳。每枚可重在一兩以上。色白如銀。瓊州人呼爲崖燕。力猶大。一種色紅者。名血燕。能治血痢。兼補血液。有表邪人切忌從新云。今人用以煮粥。或用雞汁煮之。雖甚可口。然亂其清補之本性。豈能已痰耶。有與冰糖同煮。則甘壅矣。亦豈能助肺金清肅下行耶。此皆圖於燕窩效用宜忌之發明大要也。服之者宜注意之。㈡程登瀛曰。燕窩者小海燕所營之巢也。遲遲年產二百餘擔。大部分運銷於我國。顧交人學者到暹遊歷者。罕有樂意到那懸崖絕壁去考察燕之形態。與吐窩狀況者。而本地人習見無奇。又以爲細事。不值記錄。故書籍所載。都語焉不詳。不揣詞拙。爰就耳目所及。屑細誌之。使本品之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

取實情。得以隨貨物報告於諸君之前。想亦醫藥界所樂聞也。燕鳥之種類。大別分爲吐窩與營窠二者。不吐窩者有烏燕、紅頷燕二種。春分前後。羣遷至我國沿海各地。含泥草築巢以營生殖。秋分後回歸熱帶地。以是國人稱之爲季鳥。有種種神話傳說。吐窩者舊稱金絲燕。宛其羽毛絕不像金絲。我暫時簡稱爲小燕。因爲牠是燕類中之最小者。小燕之外另有土種燕。依其棲息地以區別其窩。大別有洞燕、厝燕、毛燕三種。細目繁多。另分逃於後。小燕之形態。背灰黑色。腹部灰白或褐赤。大體上都不似烏燕之烏黑青光。其翼不尖。飛時尾平圓如紙扇狀。尾椎部平列一行白星點。其性喜羣居。終年不遷居異地。雌者在吐窩前最肥大。約有二三錢重。雄較小。吐涎亦較少。但其性善飛。常飛翔於海空覓食。歸宿洞穴中。陰雨天亦飛入陸地。朝出夕歸。從不曾見其棲息於陸地或沙灘。舊說謂其食海粉、海藻、蠶螺者誤也。以其飛行空間所食必是飛蟲之類。有時撲水亦僅能得浮游之小魚。不能啄食植物或固著之動物也。（燕屎似蝙蝠屎。可確定其食蚊蟲之類。不食植物也。）至於何以能吐涎成窩。則非愚所能索解矣。大概如蠶能吐絲。亦自然物之奇妙也。燕窠遷地產甚多。遷西勢兩海濱各島。年產二百五六十擔。遷邏灣平常產額計。呈養埠一百二十擔。高崙、宋卡共七八十擔。西海岸臨印度洋。自馬里灣至實突。約五六十擔。此項權利屬國有。由政府招商投承。以三年爲一期。現期爲萬興公司。以六十四萬投得。南路東海收取權。設總機關於曼咯。分設收燕廊於呈養埠、萬崙、宋卡。正月初即用人守管燕窩。島由公司船運送飲食。法禁森嚴。外船不得駛進其界內。出產地不零售。食已疲倦。其毛易於脫落。口涎未乾燥。便黏伏於其中。故細毛交錯。且必待新鳥出洞才收取。經過日期較久。凡窩色灰黃。中心薄而邊厚。細毛黏雜有血絲狀者。即爲第三水燕。即通銷我國市肆所謂毛燕是也。至土種云者。所以別於正種之燕鳥也。其形色與小燕稍異。另佔洞穴。啄小燕之毛及自撏其毛。攙雜做成之窩。本地稱毛燕。烏燕含唾涎之成份。各地不同。呈養年產五六擔。毛草居大半。不堪食。只煅研調油。搽湯火灼傷。頗有效。宋卡十餘擔。下西勢活吞。大年等地出窩三十餘擔。幾全爲毛。其含涎成分較多。此種毛燕。概售與香港製造廠。（據報由香港轉運之燕窩。十八年全年達五百三十擔。）該製燕廠專收南洋各地之毛燕。將窩溶解。濾去粗毛草。復以藥物消溶其細毛。加海菜粉類做成塊。曰燕餅。其色呆白。無毛無盞緣。無纖條。國內市肆每謂有一種假貨。殆即此物。抑另有不含燕涎之贋貨。亦未可知。但稍留意。不難立辨眞假。燕鳥皆棲息於海濱。但以距淡水港較遠者。曰鹹水燕。其質較佳。價值恒較昂。暹屬普吉省會。曰通扣。年產十餘擔。其地榜孟加拉海北與緬甸接壤。羣島錯列。離淡水地極遠。出品最佳。惟無適當之大洞穴。使鳥羣集於其中。故地方遼闊。出產無多。收獲管理殊不易。前幾年招商投承。納餉萬銖。便能投得專買權。設機關於沿海各地。無論何人。向其領取牌照。便可出島覓食。惟採得概以平價售與專買人。因收取時候不一致。故其燕盞新舊大小駁雜。此殆因地域廣闊使然。暹產之外。安南、緬甸亦有。但產量不若暹之多且良也。厝燕就海濱築屋宇使燕鳥集於其中。營窩於人家屋簷下。故曰厝燕。產日里、亞齊各地。荷屬亦採洞燕。燕之色質與時價。蘇門答臘產者。以及日里阿齊之厝燕。其色鮮白不耐火。食時只以淡水泡浸。若燉煮二小時。則完全溶化。不知者或以爲假貨。其價較暹產爲低。暹產呈養色稍黃。最耐燉。香氣甚濃。正閹嚴大燕一斤。值百元。普通四五十元。較石叻報紙所報荷屬之厝燕洞燕之行情爲高。燕窩收入後。略吹嘘使乾燥。即剪削盞蒂及邊緣之尖突者。所剪下之燕腳。分赤角、白角二種。窩被鹹水淋溼。則變紅硬化。浸泡不開。赤角乃所貼之石有鹹氣所致。窩鳥囝未生羽毛之鳥囝。味甘微鹹。氣溫。功能補血生精。祛風勝

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

澀。爲療治痛風輿痺之要藥。燕之身有寄生物曰燕虱。遺留於窩中甚多。嚙人能使紅腫。發寒熱。收窩者多祝髮如僧。以避其棲息。燕窩之本質無味。而有蛋香氣。含炭分平均二〇五。能全溶於鹽液中。加水分解時。發生還原性之炭水化合物。此化合物中含蛋白質最多。凡津液涸竭。對於多澱粉質之米穀類食難下咽者。（胃燥惡食）以及肺炎乾咳。以此爲食養。其滋陰養液之功。遠非無情草木所能比擬。蓋以鳥之唾液。故得有奇妙之特效也。燕所營窩之巖壁。櫛比鱗疊之窟凹。各佔一窟。究其構成之原因。殆此巖壁初係灰土質。經鳥之爬搔及歷次以鐵匙括窩所握成者。歷年既久。窟漸深而巖已成石。以是乃有種種傳說。以爲天造地設之神境。不足信也。

配合應用　㈠治腦上熱痰。燕窩入雅梨。加冰糖蒸食。（嶺南雜記方）

㈡治老年痰喘。秋白梨一個去心。入燕窩一錢。先用滾水泡。再入冰糖一錢。蒸熟。每日早晨服下。勿間斷。神效。（文堂集驗方）

㈢治噤口痢。白燕窩二錢。人參四分。水十分。隔湯頓熟。徐徐食之。立效。救生苦海方）

㈣治老年癆疾及久癆小兒虛癆胎熱。燕窩二錢。冰糖錢半。頓食數次。（試驗方）

㈤治翻胃久吐。服人乳兼吃燕窩而愈。（文堂集驗方）

㈥治小兒氣液不足。痘頂凹陷。燕窩二錢。生黃耆錢半。煎濃汁服。（經驗方）

參攷資料　㈠遠海近番處有燕。名金絲燕。旨尾似燕而甚小。毛如金絲。臨卵育子時。啄蠶螺而食。土番云。蠶螺背上肉有兩筋。爲楓蠶絲。堅潔而白。可補虛損已勞。痢。燕食之肉化而筋不化。併津液嘔出。結爲小窩。附石上。久之燕雛能飛。海人俟時拾之。（泉南雜誌）㈡燕窩有數種。乃海燕食海邊蟲。其筋不化。復吐出而爲燕窩。綴山海石壁上。土人攀援取之。春取者白。夏取者黃。秋冬不可取之。則燕無所棲。凍餓而死。次年無窩矣。（嶺南雜記）㈢燕窩出廣東乃海燕食小魚。吐涎液營巢於巖石。故名燕窩。（湖海樓奇）㈣崖州海中石島有玳瑁山。其洞穴皆燕所巢。大者如鳥。啖魚。輒吐涎沫。以備冬月退毛之食。土人皮衣皮帽。乘炬採之。是爲燕窩。（崖州志）㈤燕含取小魚。黏之於石。久而成窩。有黑白紅三色。黑最下。紅最難得。能益小兒痘疹。白色能愈痰疾。（閩小記）㈥海燕拾海上無毒香蔬結巢。燕去人取而煮食之。（庶物異名疏）㈦海燕大如鳩。春日巢於危巖絕壁。葦蓁乃白海窩也。島夷伺其秋去。以修竿接鏟取而鬻之。（華夷鳥獸讀考）㈧燕窩乃燕窠。燕食海菜。吐而成窩。歲冬夏二收。如取蜂蜜。多收則敗矣。（海島逸志）㈨金絲燕。燕之異種也。體小於燕。背褐色。尾腹間白色。產我國及印度。恒居巖穴中。營巢即燕窩。（清科類鈔）㈩海濱石上有海粉積結之苔。燕啄食之。吐出爲窩。蠻巖壁間。島人俟其秋去。以竹竿接鏟取之。海粉性寒。而爲燕所吞吐則暖。海粉味鹹。而爲燕所吞吐則甘。其形質盡化。故可以清痰開胃云。他如蠶餘錄。茶餘客話。亦云產絕壁或云窮巖邃谷。均言黏著石壁或洞穴。不能移動。其間雖有云啄蠶螺。或云食海邊蟲。或云食小魚。或云食無毒香蔬。或云採海菜。或云食海粉。然皆屬海產小生物。皆經過海燕胃中消化而吐出。唾腺分泌一種黏液所造成。皆營巢於危崖絕壁而爲天然燕窩之生誠無疑。然諸說中。猶以一二七八十五說理由較爲詳實。（粵錄）㈡海際砂洲生蠶螺。背有兩筋。堅潔而白。燕啄食之。肉化而筋不化。幷津液吐出。結爲小窩。啣飛渡海。倦則漂水上。身棲其中。少頃。又含以飛。海人俟時拾之以貨。王世懋閩部疏云。燕窩海燕所築。啣之飛渡於海。翩倦則擲置海面。身坐其中。久之復啣以飛。查浦輯聞云。海燕南海歸。海外水邊難達。因啄小魚肉作窩。口啣之而飛。倦即投窩水中。棲止其上。少息。復含之而飛。故東南風則颺掠近岸。人就取之。（威鉞窗牘）㈢海燕營巢於沿海石壁。土人取其巢爲食品。故原其始。燕窩實野生之物也。南洋燕窩。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

既盛銷於中國。能售高價。以博厚利。故吾國人之僑爪哇、婆羅洲等地者。特建築適宜之屋宇。以飼養海燕。而取償於其所營之窩。爪哇之東有城市。曰格利斯者。人口約有一萬。飼養海燕之業。十分發達。欲參觀飼養屋。往往見拒於主人。一因海燕見生人。不免驚擾飛散。既逸之海燕。勢將不復歸巢。一因地方上有盜取海燕之惡習。爲盜之人。間有借端入室。窺察路徑。使其盜劫之技。盡奪其燕窩者。有此二因。故不得當地人之介紹。不易入室參觀。海燕飼養室。大抵兩層樓房。樓下僅有入口。設以堅固之板門。四壁粉刷白堊。不設窗戶。亦無樓梯。僅於樓板上開一方四五尺之戶口。樓上亦無窗戶。開小孔一二。僅足容海燕之出入。故室內光線甚弱。所以防盜賊也。樓上下天花板之高度。約在一丈三四尺左右。天花板之下面。每格一尺二三寸之距離。側置木板。廣約五六寸。厚約七八分許。形如樓楞。供海燕營巢之基礎。一室之內。可營巢至三百以上。巢板之側。又處處支以橫桿。爲海燕息足之所。海燕之棲止於室中者。皆甚安靜。僅微動其首而已。據飼養海燕者之言。謂海燕皆盲其目。雖登梯採取其巢穴。亦不知逃避。設以海燕自甲巢移至乙巢。當立足未穩時。必拍其兩翼。如欲下墜。由此觀之。似海燕之盲目。當屬非虛。但其目既盲。勢必無以覓食。是所謂盲目。必非眞盲也。（顧紹衣）㈢海濱涯岸。石齒嵯峨。多洞窟。海燕千百成羣。巢於洞中。自萬丹、巴城、三寶壠、竭力石、南旺、馬辰、貓盤、把實不下數十處。皆荷蘭之有力者掌握焉。天然燕窩。營巢於海外斷崖絕壁。如邏邏燕、毛燕是也。近來南洋爪哇等處。以天然採取甚艱險。有築室培養營巢。如龍牙燕、大峙燕是也。其色白嫩質鬆。因不見天日故也。其產額以婆羅洲爲最多。後由此地方輸入我國。據十年前之統計。每年運入值銀有三百五十萬兩之多云。（海島逸志）㈣海燕爲海濱所產之燕。巢營於沿海之巖壁。故南洋羣島土人見礁巖絕壁下有燕窩。即負籃帶刀。懸繩冒險採取。時有落於海中。而飽魚腹者。是故爪哇一帶之華僑。多用人工設燕場。飼養海燕。安安逸逸。取其窩而販賣之。其法用堅牢煉瓦。作成倉庫形狀。周圍留有多數小窗。以便燕之出入。內部則甚陰暗。內壁以木材製成方格。海燕即於方格之隅。營巢育雛。至成飛而至他處。翌年復尋舊巢。聞爪哇地方。經營此業者。以華僑爲最多。日人亦間有之。所產燕窩。每年由新嘉坡輸出。價值達四十萬元云。（張祿）㈤燕窩乃海燕所營之巢。富於膠質之物也。非若普通燕巢。疊積柴草泥土而成。而此種海燕之巢。則從口內泌出唾液狀之物質而成。試觀燕窩之實物。色白而强韌。光澤甚顯。略如黏著牢固之纖維。可知燕窩之材料。決非直接採取於外界。而吐出於口中者也。考其膠狀質之成因。有謂海燕能採海邊所生之海藻。如眞珠苔等而成之者。先取藻類吞入胃中。經胃液醞釀後吐出。遂成膠狀質。或謂此乃該燕口中分泌之黏液也。或謂海燕啣海藻等物質於口中而溶解之。復以其瓊脂質混合他物而成。依此說則燕窩純爲海藻之瓊脂質所製成。然燕窩一物。經化學方法分析之結果所得之成分。與海藻大不相同。亦有謂將燕窩染色。而窺察於顯微鏡之下。毫無細胞膜與細胞核等。可認植物之組織。惟有黏液之凝固物。全體均一。成所謂無構造之物而已。由前說則海藻之變爲膠質物。依何作用。尚未明瞭。由後說則與實物之狀態相符。故燕窩可決其爲海燕之唾腺分泌一種纖細黏液凝合而成。決無疑義。㈥海燕在生殖期內。舌下亦唾腺特形發達。善於分泌黏液濃厚。如阿剌伯樹膠。能膠著紙片等物。設膠著此黏液於棒上而迴轉之。能自其口中續續引出不啻飴糖之卷繞指端。且此黏液實自舌下唾腺之開口分泌而出。要言燕窩乃海燕之自身產出物。略似蠶之吐絲以作繭。亦如蜂之釀蜜而營巢。當其營巢之際。先由其嘴之作用。逢著黏液於巖石或板上。然後引黏液腺於左右。漸次疊積。以成燕窩。亦有採集毛髮等物。混入唾

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

液之凝固物而成者。如巢之後壁。卽草片毛髮較多之處也。此皆天然燕窩成因之原委耳。

【燕蓂草】命名　本品卽燕窠中之草。故名。

性質　無毒。

主治　眠中遺尿。亦止嘔噦。研末水服。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論燕蓂草曰。治丈夫婦人無故尿血。用胡燕窠中草。燒末。酒服之。【明】李時珍本草綱目論燕蓂草曰。消渴。飲水一切瘡瘕不滅。及浸淫瘡出黃水。燒灰傅之。

【燕蔬菜】卽燕窩之古籍別名。典見綱目拾遺『燕窩』條。

【燕齒】基本　燕齒爲雜草類之一種。可供藥用。

採取　五月五日採之。

主治　寒熱小兒癇疾。

【燕奠】卽壑奠之古籍別名。典見毛詩『瞻奠』條。

【燕頷】卽黍之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳『黍』條。

【燕覆子】卽木通子之古籍別名。典見綱目。詳『木通』條。

【燔豬湯】基本　本品卽洗豬刮毛之熱水。

主治　解諸毒蟲毒。

歷代記述攷證　【明】汪機本草會編論燔豬湯曰。產後血刺心痛欲死。溫飲一盞。【明】李時珍本草綱目論燔豬湯曰。治消渴。濾淨飲一碗。勿令病人知。又洗諸瘡良。

【燔雞湯】基本　本品卽洗雞之水。故名。

主治　消渴。飲水無度。濾澄服之。

【獨占釘子】卽決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『決明子』條。

【獨用將軍】基本　屬澤蘭類。爲獨用將軍之根葉。

產地　林野有出。

性質　辛。無毒。

主治　毒腫乳癰。解毒。破惡血。

參攷資料　生林野中。節節穿葉。心生苗。其葉似楠。不時採根葉用。（蘇恭）

【獨用藤】形態　獨用藤爲藤類之一種。野地叢生。四時有葉。無花。葉有倒刺。其藤皮可供藥用。

性質　苦。辛。熱。無毒。

主治　心氣痛。研末酒服。

【獨白草】卽草烏頭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『草烏頭』條。

【獨行虎】卽紫花地丁之古籍別名。典見綱目。詳『紫花地丁』條。

【獨行根】卽青木香之古籍別名。典見唐本草。詳『青木香』條。

【獨行散】卽荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荊芥』條。

【獨角仙】卽天牛之一角者。典見綱目。詳『天牛』條。

【獨帚】卽地膚子之古籍別名。典見圖經本草。詳『地膚子』條。

【獨活】命名　本品一莖直上。不爲風搖。故曰獨活。

處方用名　川獨活。

古籍別名　羌活。羌青。護羌使者。（本經）獨搖草。（別錄）胡王使者。（吳普）長生草。（綱目）獨滑。天名精山前獨活。地頭乙戶邑。（和漢藥考）

外國名詞　Archangelica gmelini, DC.（拉丁）

學名　Coelopleurum Gmelini, Ledeb. Angelica Gelabora, Mak.

基本　屬繖形科獨活之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。獨活產湖北。與山縣、巴東縣、沙市、內賓、邛山爲最。四川夔州府板橋山次之。有產廣東北江。名爲水活。全不適用。獨銷東京。安南人用之。

形態　獨活爲山野自生之二年生草。春季抽苗。莖葉俱類土當歸。富毛茸。夏月莖高達六七尺。葉柔輭。爲分歧數回之羽狀複葉。作橢圓或卵圓形。前端尖。邊緣有鋸齒。其葉鞘頗大。秋季於枝梢簇生多數小白花。作繖形花序排列。實作橢圓形。大二分許。根在生鮮時呈白色。臭氣甚烈。噫乾則外皮作灰黑色。內部淡黃色。其質輕虛。有辛味。

採取　二月八月。採根曝乾。

製法　雷敎曰。採得細剉。以淫羊藿拌挹二日。曝乾。去藿用。免煩人心。李時珍曰。此乃服食家治法。尋常去皮或焙用爾。

用法　與他藥水煎。或酒浸。或剉末和作丸散。

766／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　苦。甘。平無毒。

效能　搜伏風。燥寒溼。專作風氣藥。

主治　風寒所繫。金瘡止痛。奔豚痛症。女子疝瘕。久服輕身耐老。（本經）療諸賊風。百節痛風。無問久新。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論獨活曰。獨活治諸中風溼冷。奔喘逆氣。皮膚苦痒。手足攣痛。勞損風毒。齒痛。【清】黃宮繡本草求眞論獨活曰。獨活辛苦微溫。比之羌活。其性稍緩。凡因風干足少陰腎經。伏而不出。發爲頭痛。則能善搜而治矣。以故兩足溼痺不能動履。非此莫除。風毒齒痛。頭眩目暈。非此莫攻。緣此有風不動。無風反搖。故名獨搖草。因其所勝而爲制也。且有風自必有溼。故羌則療水溼。遊風。而獨則療水溼伏風也。羌之氣清。行氣而發散營衞之邪。獨之氣濁。行血而溫養營衞之氣。羌有發表之功。獨有助表之力。羌行上焦而上理。則遊風頭痛。風溼骨節疼痛可治。獨行下焦而下理。則伏風頭痛。兩足溼痺可治。二活雖屬治風。而用各有別。不可不細審耳。去皮焙用。

近人學說　㊀賈九如曰。獨活氣香而濁。味苦而沉。能宣通氣道。自頂至膝。以散腎經伏風。凡頭項難舒。腎腿疼痛。兩足痿痺。不能動移。非此莫能效也。取其香氣透心。用爲心經引藥。療赤眼痛。因其枝莖遇風不搖。能治風。風則勝溼。專疏溼氣。若腰背酸重。四肢攣痿。肌黃作塊。稱爲良劑。又佐血藥。活血舒筋。殊爲神妙。㊁張山雷曰。獨活氣味雄烈。芳香四溢。故能宣通百脈。調和經絡。通筋骨而利機關。凡寒溼邪之痺於肌肉。着於關節者。非利用此氣雄味烈之品。不能直達於經脈骨節之間。故爲風痺痿瞤諸大證。必不可少之藥。惟古時羌活獨活。未嘗分別。故古書以獨活通治內外上下諸證。凡頭面肢體。無一不在獨活範圍之內。自宋以來。則羌活別爲一條。而芳香之氣。尤爲濃郁。則散上窮行。合讓羌活占其優勝。而獨活之味較厚。則以專治腰膝足脛等證。雖古人尚未明言。而海藏已謂羌活氣雄。獨活氣細。石頑亦稱其升中有降。皆隱然有上下之別。頗業師朱氏家法。恒以獨活治下。凡自腰及少腹以下。通用獨活。不僅風寒溼氣痺痺酸痛。可以立已。即癆證之發於陰分者。未潰易消。已潰易斂。功績顯然。確乎可信。此古人未嘗明言之奧旨也。互詳下文羌活條。又曰。羌獨活皆辛溫之質。主治風邪。以外來之寒風言之。故所治皆寒溼之證。古恒以羌活治傷寒表病。并及四時不正之表邪。固皆指寒邪而言也。若大江以南地氣溫暖。寒風恒少。昔人久稱南方無眞傷寒病。而四時外感。又皆溫熱。雖有表邪。亦非羌活等之辛散溫升所宜。此荊防敗毒散。九味羌活湯。柴葛解肌湯等方。古書皆稱四時感冒之神劑。而江浙所不任用者。亦病情病證之使然也。且辛溫之不宜於東南。又非僅時病已也。即如羌獨本屬風寒溼邪痺着痿躄之良藥。而在此邦之人。陰血素薄。即有是證。亦半由於血虛而來。果屬風寒。亦係血虛生風。氣虛生寒。與西北之風痺。悉因於賊風大寒者。證情亦復大異。而一味辛溫剛燥之藥。又須隨時留意。不容信筆塗鴉。無所顧忌矣。而李東垣竟謂獨活治諸風掉眩。潔古亦謂與細辛同用。治少陰頭痛眩暈。海藏又謂搜肝風。瀉肝氣。則所治諸病。皆屬陰不涵陽。肝腎不攝之證。明是內虛生風。非外來賊邪可比。當藏鎮定之爲宜。何乃以溫升之藥。助其狂肆。抱薪救火之禍。捷於影響。最宜愼用。然如着痺痿躄諸候。又多氣血虛寒。不得流利。苟非羌獨辛散。亦難速效。則病本雖屬血虛。又宜於養血滋液之中。參入宣絡溫運。徐圖奏績。而石頑逢原又謂氣血虛者之痺痿肢節痛。禁用羌獨。又未免一偏之見。非通論矣。蓋羌獨治風。本治外邪侵入之寒風。非能治血虛內發之熱風。所以肝陽眩暈。必非辛溫升泄所能妄治。若犯斯禁。則烈燄愈騰。燎原可畏。然氣血虛寒。而痿躄不仁。非吹以和煦之氣。亦不能振作有爲。春回黍谷。所以滋調血液之劑。亦必以宣通溫煦之藥相輔而行。但佐使之功。止可少少參加。用作引導。不得喧

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

賓奪主耳。石淵乃欲一例禁絕之何耶。

配合應用　㈠君麻黃、甘草。主冬月即病傷寒。太陽經頭疼。發汗解表。㈡君麥門冬、前胡、黃芩。佐以甘草。治春時瘟疫。邪在太陽頭痛。㈢入葛根湯治太陽陽明頭痛。衆遍身骨痛。口渴煩熱。不得眠。若渴甚煩熱甚。頭痛甚。則加石膏。知母、竹葉各兩許。㈣癌發太陽經。頭痛者。於治癌藥中加之。痛止則去之。㈤同白朮、蒼朮、秦艽、生地黃、薏苡仁、木瓜、石斛、黃檗。治下部一切風濕濕熱。㈥同生地黃、赤芍藥、生甘草、牡丹皮、石膏等水煎。治風熱上攻牙腫痛。㈦治中風口噤。通身冷。不知人。用獨活四兩。好酒一升。煎半升服。（千金方）㈧治中風不語。獨活一兩。酒二升。煎一升。大豆五合。炒有聲。以藥酒熱投蓋之。良久溫服三合。未差再服。（陳延之小品方）㈨治產後風虛。獨活、白鮮皮各三兩。水三升。煮二升。分三服。耐酒者入酒同煮。（小品方）㈩治風牙腫痛。用獨活煮酒熱漱之。（肘後方）文潞公藥。準用獨活、地黃各三兩。爲末。每服三錢。水一盞。煎和滓。溫服。臥時再服。

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡血虛而無風寒實邪者禁用。豚實（即蠶實）爲之使。

著名方劑　獨活寄生湯。治風寒濕痺。偏枯脚氣。（千金方）獨活三兩。桑寄生、秦艽、細辛、歸身、生地、白芍、川芎、桂心、茯苓、杜仲、牛膝、人參、甘草各等分。上十四味。爲粗末。每服四錢。煎服。一方用防風。

參攷資料　㈠療風宜用獨活。衆水宜用羌活。劉完素曰。獨活不搖風而治風。浮萍不沉水而利水。因其所勝而爲制也。（蘇恭）㈡風能勝濕。故羌活能治水濕。獨活與細辛同用。治少陰頭痛。頭目眩。非此不能除。羌活與川芎同用。治太陽少陰頭痛。透關利節。治督脈爲病。脊强而厥。（張元素）㈢羌活獨活。皆能逐風勝濕。透關利節。但氣有剛柔。不同爾。雷公問云。從下上者引而去之。二味苦辛而溫。味之薄者陰中之陽。故能引氣上升。通達周身而散風勝濕。按文系曰。唐劉師貞之兄病風。夢神人曰。但取胡王使者浸酒服。便愈。師貞訪問。皆不復夢。曉其母曰。胡王使者。即羌活也。求而用之。兄疾遂愈。（李時珍）㈣獨活是羌活母也。（大明）㈤獨活以羌中來者爲良。故有羌活、胡王使者諸名。一物二種也。正如川芎、撫芎、白朮、蒼朮之義。入用微有不同。後人以爲二物者非矣。（李時珍）㈥獨活生雍州川谷。或隴西南冀。二月八月採根。曝乾。（別錄）㈦此州郡縣並是羌地。羌活形細而多節。輭潤。氣息極猛烈。出益州北都西川者爲獨活。色微白。形虛大。爲用亦相似。而小不如。至易蛀。宜密器藏之。（陶弘景）㈧獨活羌活。今出蜀漢者。佳。春生苗。葉如青麻。六月開花作叢。或黃或紫。結實。時葉黃者是。夾石上所生。葉青者是。土脈中所生。本經云。者爲羌活。黃色而作塊者爲獨活。而陶隱居言。獨活色微白。形虛大。用與羌活相似。今蜀中乃有大獨活。類桔梗而大。氣味亦不與羌相類。用之微寒而少效。今又有獨活亦自蜀中來。類羌活。微黃而極大。收時寸解乾之。氣味亦芳烈。小類羌活。又有槐葉氣者。今京下多用之。極效驗。意此爲眞者。而市人或擇羌活之大者爲獨活。殊未爲當。大抵此物有兩種。西蜀者黃色。香如蜜。隴西者紫色。秦隴人呼爲山前獨活。古方但用獨活。今方既用獨活。而又用羌活。茲爲謬矣。（蘇頌）㈨本經獨活一名羌活。本非二物。後人見其形色氣味不同。故爲異論。然物多不齊。一種之中。自有不同。仲景治少陽所用獨活。必用羌活。今方俱用。不知病宜兩用耶。抑未之考耶。（汪機）㈩獨活羌活。乃一類二種。以中國者爲獨活。西羌者爲羌活。蘇頌所說頗明。按王

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

覩易簡方云。羌活須用紫色有蠶頭鞭節者。獨活是極大羌活。有口如鬼眼者。尋常皆以老宿前胡爲獨活者非矣。近時江淮山中出一種土當歸。長近尺許。白肉黑皮。氣亦芳香如白芷氣。人亦謂之水白芷。用充獨活。解散亦或用之。不可不辨。（李時珍）

【獨茅】卽仙茅之古籍別名。典見開寶本草。詳『仙茅』條。

【獨豹】卽鴞之古籍別名。典見綱目。詳『鴞』條。

【獨眼龍】**產地**　各屬均有出。

主治　跌打。

【獨春屎】卽五靈脂之古籍別名。典見綱目。詳『五靈脂』條。

【獨荷草】卽鬼臼之古籍別名。典見土宿本草。詳『鬼臼』條。

【獨搖】㊀卽白楊之古籍別名。典見綱目。詳『白楊』條。㊁卽杕杨之古籍別名。典見綱目。詳『杕杨』條。

【獨搖芝】卽天麻之古籍別名。典見抱朴子。詳『天麻』條。

【獨搖草】卽獨活之古籍別名。典見別錄。詳『獨活』條。

【獨椎】卽黃耆之古籍別名。典見別錄。詳『黃耆』條。

【獨滑】卽獨活之古籍別名。典見和漢藥考。詳『獨活』條。

【獨腳一枝蓮】

形態　山間有之。二三月苗發。生莖。莖俗名乾苘。叢中獨莖無葉。高尺許。莖細强。青白色。莖端有一疙瘩。至晚秋時。疙瘩生花類蓮。其根與黃麻根相似。

主治　疔腫癰毒。流注。

【獨腳仙】

產地　生山林間或陰溼地亦多有之。

形態　獨腳仙爲雜草類之一種。春生苗。葉圓形。下有紫葉如腳。長三四寸。秋冬葉落。其根葉可供藥用。

採取　夏月採之。焙乾爲末用。

主治　婦人血塊。

【獨腳金錢】卽辟瘟草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『辟瘟草』條。

【獨腳馬蘭】

形態　此草生河澤邊。葉如柳。對葉圓梗。根下微紅。

主治　治發背諸腫毒。熱癤。搗汁一杯。入酒二杯。服之。未成膿者。卽消。有膿者。卽出。重極者。服半碗或一碗。再劑渣滓。

【獨腳連】

古籍別名　獨葉一枝花（祝氏效方）

產地　廣東。

形態　根大如拳。春月發苗。經霜雪則死。若善藏過冬。則來年宿根復發苗。高丈許。葉大如杯。宛似荷葉。色綠柔厚。莖有細毛。六七月起莖。莖有白色。開花微垂。似山蘭而小。其色微紅。

主治　治疔腫癰疽。以根或醋酒磨塗。葉貼癰腫能消。

配合應用　㊀治蛇咬。用獨葉一枝。花生溪灘浮土上。根如鼠糞。用根口嚼擦瘡上。（祝氏效方）㊁退疔奪命丹。專治疔瘡。防風八分。青皮七分。羌活。獨活。黃連各一錢。赤芍六分。細辛八分。殭蠶一錢。蟬退四分。澤蘭葉五分。金銀花七分。甘草節一錢。獨腳連七分。紫河車卽金線重樓七分。上剉五錢。先服倍金銀花一兩。澤蘭一兩。少用葉。生薑十片。同搗爛。好酒燄熱泡之。去渣。熱服。不飲酒者。水煎亦可。然後用酒水各一半煎。生薑十片。熱服出汗。病退減後。再加大黃五錢。同煎熱服。以利二三次。去餘毒。如有膿。加何首烏、白芷、梢在脚加檳榔、木瓜要通利。加青皮、木香、大黃梔子、牽牛。（萬病回春方）

參攷資料　㊀稗史。鄱陽山間生一種草。始萌芽時。便似蓮蓬。俗呼爲獨腳連。移植於居宅隙地及園圃中。蛇虺不敢過其下。王季光宅後檾莽叢中有蛇穴。常出爲人害。乃種此草數本於穴外。自是其患不作。至暑月間。穴內臭甚。使園丁掘土訪求。得死蛇十數。蓋爲草氣所熏潰也。又一小蛇來到草旁。立化爲水矣。㊁粵西偶記。生廣西。草如黃連。根極大。持入藥肆。則諸藥香氣盡消。爲眞三腳五腳者次之。㊂按綱目。鬼臼亦名獨腳連。無治疔之說。至集解下註形狀又小有異同。故仍爲補之。庚戌予在臨安。有醫士盛天然。言其地古城與餘杭接界。產獨葉花。生山坑。不見天日。其形一葉中含紅花一朵。儼如蓮花狀。其花從葉心透出。下有根。作獨蒜狀。其花葉聞人聲。輒縮入根內。不可見。遇之者記其處掘之。亦止有根。其花與葉。雖剖根覓

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之。亦無形迹。倘得之者。不論何等毒蛇咬。以根擦摩。蛇毒即盡。如有誤服蛇蠻繁者。以少許煎湯服之。即癒。併能解一切毒蟲咬螫。一切蠱毒。草木毒。咽喉一十八症。皆驗。如神。凡人鼻發紅色。生瘡癤。掀瘡異常者。名疳蟲食鼻。以此根磨塗立愈。此乃天生神物。有山行遇之者。不論持何物先擲之。以鎮住。然後再掘。即不能遁形。凡生獨葉花地。四圍約尺許無草。其上不可手取。亦勿以鐵刀取。須用竹掘取。則不傷根。蓋此草蛇最喜蟠其旁。凡蛇咬人。亦中人毒。必退殼。若覓此物臥其旁一宿。則人毒解。可免退殼之患。大毒蛇都喜蟠其根旁。故土最毒。近人手則手爛。然得其根。反能解百種大惡蛇毒。丐者覓此以爲得寶云。

【獨腳蜂】**產地**　出嶺南諸地。

形態　獨腳蜂爲蜂之一種。狀如小而蜂色黑。一足連樹根。不得去。亦不能動搖。可供藥用。

主治　疔腫。癰疽。燒研油塗。

【獨腳蓮】即鬼臼之古籍別名。典見土宿本草。詳『鬼臼』條。

【獨腳蟾蜍】即金線釣蝦蟆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金線釣蝦蟆』條。

【獨葉一枝花】㊀即八角連之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『八角連』條。㊁即獨腳連之古籍別名。典見祝氏效方。詳『獨腳連』條。

【獨葉一枝鎗】**產地**　多生深山高原諸地。

形態　獨葉一枝鎗爲山草類之一種。清明時節發苗。長約二三寸。一莖二梗。一梗有葉。其葉如兔耳。又似箭頭。一梗細尖。如新抽竹芽。花如椎鑽。至穀雨便枯。可供藥用。

採取　四五月採之。

性質　甘。淡。無毒。

主治　諸毒蟲咬。生擦之即愈。功與兎耳一枝箭同。

【獨蜂窠】即露蜂房之古籍別名。典見綱目。詳『露蜂房』條。

【獨龍鬚根】即槲根之別名。詳『槲根』條。

【獫】即狼子之別名。典見爾雅。詳『狼』條。

【蟹】**命名**　蠏是衆珀之長。故之色黑。故名。

古籍別名　蟹珀。（綱目）木蟹。（新修本草圖經）

形態　蟹爲琥珀之一種。狀如玄石。色潤而質輕。可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　補心安神。破血。生肌。治婦人癥瘕。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論蟹珀曰。小兒帶之辟惡。磨滴目翳赤障。

參攷資料　㊀古來相傳。松脂千年爲茯苓。又千年爲琥珀。又千年爲蟹。二物燒之。皆有松氣。狀似玄玉而輕。出西戎。而有茯苓處無此物。今西州南三百黑磧中。得者大則方尺。黑潤而輕。燒之腥臭高昌人名爲木蟹。謂玄玉爲石蟹。共州土石間得者。燒作松氣。功同琥珀。見風折破。不堪爲器。恐此二種及琥珀。或非松脂所爲也。（蘇恭）㊁梁公子傳。崇公云。交河之間平磧中。掘深一丈。下有蟹珀。黑逾純漆。或大如車輪。末服。攻婦人小腸瘕瘕諸疾。（唐慎微）㊂蟹即琥珀之黑色者。或因土色薰染。或是一種木濡結成。未必是千年琥珀復化也。玉簶經言。松脂千年作茯苓。茯苓千年作琥珀。琥珀千年作石膽。石膽千年作威喜。大抵皆是神異之說。未可深憑。（李時珍）

【蟹珀】㊀即蟹之古籍別名。典見綱目。詳『蟹』條。㊁即珀琥之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『琥珀』條。

【瑤田草】即鬼臼之古籍別名。典見圖經本草。詳『鬼臼』條。

【瑤枝】即石花菜之古籍別名。典見綱目。詳『石花菜』條。

【瑤茅】即紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫草』條。

【瑤漿】即玉泉之古籍別名。典見綱目。詳『玉泉』條。

【盧茹】即桔梗之古籍別名。典見吳普本草。詳『桔梗』條。

【盧都子】即胡頹子之古籍別名。典見綱目。詳『胡頹子』條。

【盧會】即蘆薈之古籍別名。典見開寶本草。詳『蘆薈』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【盧精】基本　盧精爲雜草類之一種。可供藥用。

性質　平。

主治　蠱毒。

【盧甿】卽蔈蘆之古籍別名。典見唐本草。詳『蔈蘆』條。

【盧橘】卽金橘之古籍別名。典見漢書。詳『金橘』條。

【盧橘葉】卽枇杷葉之古籍別名。典見文選。詳『枇杷葉』條。

【腎子草】卽羅勒之古籍別名。典見綱目。詳『羅勒』條。

【礵砂】原名　硇砂。

命名　本品性毒。服之令人礵亂。故名。

處方用名　硇砂。霜。製礵砂。

古籍別名　磩砂。狄鹽。(日華)北庭砂。(四聲)氣砂。(圖經)透骨將軍。(土宿)神砂。戎鹽。戎爲金賊。硇砌狃砂。濃沙。無情子。白海精。(和漢藥考)

外國名稱　Sal ammoniac. Salmiac. (英) Salmiak. (德)

基本　係非金屬之鹽類。爲等軸系八面體之礦物。

產地　陳仁山藥物生產辨云。礵砂產廣東新安、平海。亦入鹽馬藥用。

形態　礵砂爲白色結晶性粉末。或纖維狀堅硬結晶塊。無氣。味。在空氣中並不變化。熱之則發散。溶於三分之水及等量之沸湯。酒精難溶。

製法　寇宗奭曰。凡用須水飛過去塵穢。入瓷器中。重湯煮乾。則殺其毒。李時珍曰。今時人多用水飛淨。醋煮乾。如霜。刮下用之。

用法　恒以剉研和入外治藥。間有和作丸散用。

性質　鹹。苦。辛。溫。有毒。

效能　消癥瘕癖積。去目翳。膃肉。用作發汗祛痰及通經藥。又治氣管枝加答兒。急性喉頭炎。

作用　在胃中能解除胃黏液之滯積。而助消化。至腸中能激腸之蠕動。及分泌之增加。使積糞易於排出。入血中能促進血液之循環。使血壓增高。心跳有力。中樞神經興奮。而增加氣枝管黏膜及汗腺之分泌。使積痰易於咯出。而胃腸亦被激而增進排泄之功。

主治　積聚。破結血。止痛。下氣。療咳嗽。宿冷。去惡肉。生好肌。爛胎。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺。論礵砂曰。主婦人丈夫羸瘦。積病。血氣不調。腸鳴。食飲不消。腰脚痛冷。痃癖痰飲。喉中結氣。反胃吐水。令人能食。肥健。【唐】甄權藥性本草。論礵砂曰。除冷病。大益陽事。【宋】大明諸家本草。論礵砂曰。補水臟。煖子宮。消瘀血。宿食不消。食肉飽脹。夜多小便。丈夫腰胯酸重。四肢不仁。婦人血氣疼痛。氣塊痃癖。及血崩帶下。惡瘡息肉。傅金瘡生肉。【宋】寇宗奭本草衍義。論礵砂曰。去目翳。膃肉。【元】王好古湯液本草。論礵砂曰。消內積。【明】李時珍本草綱目。論礵砂曰。治噎膈痰癖。積痢。骨哽。除痣黶疣贅。【明】繆希雍本草經疏。論礵砂曰。礵砂乃鹵液所結。秉陰毒之氣。含陽毒之精。其味極鹹。極苦。極辛。氣溫有毒。甄權酸鹹有大毒。能消五金八石。腐壞人腸胃。生食之化人心爲血。其毒之猛烈如此。可畏矣。其主積聚結血宿冷者。以鹹能入血。輭堅。辛能散結。溫能除冷故也。積聚散則痛自止。氣自下。因寒以致頑痰壅結。則咳嗽作。故暫用以散之。柔金化石之性。故能爛胎及去惡肉也。金石見之卽化。其能生好肌乎。此前人之誤耳。【清】黃宮繡本草求眞。論礵砂曰。礵砂係鹵液所結而成。兼秉陰毒之氣。合陽毒之精。其味苦鹹。與辛。其性大熱。五金八石俱能消。膠硬肉難化。入砂卽爛。其性猛烈。殆不可言。況人腸胃薄弱。其堪用此消導乎。第或藥與病對。有非峻迫投治。不能奏效。如穀不消。則必處以麴蘗。魚鱉不消。則必用以橘葉。紫蘇。生薑。菜菓不消。則必用以丁香。桂心。飲水不消。則必用以牽牛。芫花。至於肉食不消。又安能舍此阿魏。礵砂而不用乎。第當詳其虛實。審其輕重緩急。以求藥與病當耳。如其審症不明。妄爲投治。禍由指掌。不可不愼。出西戎。如牙礵。光淨者良。用水飛過。醋煮乾。如霜。刮下用之。

國外學說　和漢藥考曰。埃及乏薪炭。以駱駝糞爲燃料。因之煙突自然附有礵砂。卽綠化安母尼亞是也。(NH_4Cl.) 乃取而再製。運銷他國。日本昔時亦有運入用

771／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

於醫藥及釩藥等。今則專從煤炭之煤黑油（Coal tar）製造之。

辨僞　㊀鄭肖嚴曰。李時珍曰。礪砂性毒。服之使人礪亂。故名。蘇恭曰。礪砂出西戎。形似牙硝。光淨者良。蘇頌曰。西戎來者。顆塊光明大者。有如拳。重三四兩。小者如指。而入藥。近有一種如秋石。味鹹。又一種如豬肝色。有星點。不知是何石所混充。皆爲贋品。不用爲善。㊁曹炳章曰。按石雅云。礪砂者。何即綠化阿麻尼亞是也。或作礬。方書一名狄鹽（日華本草）。一名北庭砂（薰炳四聲）。又名氣砂。（圖經本草）或作礪砂。礪砂古以出北庭爲顯。故名北庭砂。北庭即西域火州。在漢爲東師前王地。隋爲高昌。唐置西州。宋時回鶻居之。元時始名火州。明史云。其地多山。青紅者火。故名火州。方輿紀要云。火燄山在柳陳城東。連亙火州。是火州殆以火燄山得名也。高昌國傳云。北庭山中出礪砂。山中常有煙氣湧起。無雲雾。至日光燄若炬火。照見禽鼠皆赤。採者着木底靴取之。皮底者即焦。下有穴生青泥。出穴外即變爲砂石。土人取以治皮。蘇頌圖經云。今西涼夏國及河東陝邊州郡亦有之。西戎來者顆粒光明。大者如拳。重三四兩。小者如指。邊界出者。雜砂如麻豆粒。彼土人爲之氣砂。方輿紀要謂鄯州南四十五里。有礪砂洞。出礪砂。又太原府河曲縣西五里。有火山。上有礪砂窟。下有氣砂窟。若然則礪砂亦出內地。邊界矣。然而碎如麻豆。又雜砂石。則疑與西土來者。精粗或異矣。於今所見形塊粗末。色帶黃赤。味辛鹹。多孔。遇火白煙如雲起。古曰氣砂。洵可謂名符其實矣。新疆礦產調查記云。礪砂產于闐之魯村達爾烏蘭布孫山及拜城礪砂山者。爲紅礪砂。產於庫車者爲白礪砂。新疆雜記云。礪砂產于闐之礪村達爾烏蘭布孫山及拜城之礪砂山。庫車之大鵲山。徐星伯云。其山極熱。望之若列燈。取礪沙者。春夏不敢近。惟嚴寒時取之。入山採取。亦必去其衣服。著以衣包僅露二目。至洞內鑿之。不過二時。皮包已焦。取出砂石。每千斤得純砂石少許。著石上紅色星星。攙此必用瓦罐盛之。但罐不可太滿。滿則受火氣蒸蒸。致於破裂。礪砂善揮發。受風受溼。皆可襲揮淨盡。故罐藏必須密閉。買人在此時行數日。遇天氣晴明無風時。則稍揭其封口。以出火氣。又云。運庫車時。曾攙數十罐。行抵伊犂。則石皆化爲黃粉。而純砂不見矣。若白色成塊者。不易化。可以及遠。內地所謂礪砂。即此是也。以上所辨爲上品之淡礪。內地不能可得。近今所通行者。皆鹹礪石礪。爲不道地。亦有高下不同。如色如硃砂。或淡紅起鏡面。西土產者佳。如豬肝色者名豬肝礪。或曰祥礪者次之。山西出者爲石礪。亦次。陝西出者爲香礪。紅色者亦佳。湖廣出者爲鹹礪。又名江砂。其色要白者佳。食鹽色者次。

配合應用　㊀服食法。礪砂丸。礪砂不計多少。入鑵子內。上面更坐鑵子一箇。紙筋白土上下通泥。曬乾。上面鑵子內盛水。以蒼耳乾葉爲末。鋪頭蓋底。以火燒之。火盡旋添火。水盡旋添水。從辰初起至戌止。一伏時。住火勿動。次日取出研。米醋麵糊和丸。梧子大。每服四五丸。溫酒或米飲下。並無忌。久服進食無痰。（經驗方）

㊁治元臟虛冷。氣攻臍腹疼痛。用礪砂一兩。以纖鼠草末二兩和勻。用小砂鑵不固濟。漫火燒赤。乃入礪在鑵內。不蓋口頂。待火盡爐寒。取出。用川烏頭去皮臍。生研末二兩。和勻。湯浸蒸餅丸。梧子大。每服三丸。木香湯醋湯任下。日一服。（陳巽方）

㊂治腎臟積冷。氣攻心腹疼痛。面青足冷。礪砂二兩。桃仁一兩。去皮。酒一小盞。煎礪十餘沸。去礪砂入桃仁。泥旋旋煎成膏。蒸餅和丸梧子大。每。熟酒下二十丸。（聖惠方）

㊃治積年氣塊。臍腹疼痛。礪砂醋煮二兩。木瓜三枚。切。須去瓤。入礪在內。盞盛。置於日中。曬至瓜爛。研勻。以米醋五升。煎如稀餳。蜜收。用時旋以附子末和丸。梧子大。熱酒化下一丸。（聖惠方）

㊄治痃癖癥塊。礪砂丸。治痃癖癥塊。煆水臟。殺三蟲。婦人血塊。子宮冷。臍月收。桑條灰。淋去苦汁。日乾。每礪砂一兩。用水三兩。以水化

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

礪拌灰。乾溼得所。以瓶盛灰半寸。入礪於內。以灰壅蓋固濟。文武火煅赤。冷定取出。研以箕。鋪紙三重。安藥於上。以熱水淋之。直待礪味盡。即止。以鉢盛汁。於熱灰火中養之。常令魚眼沸。待汁乾入瓶。再煅一食頃。取出重研。以粟飯和丸。綠豆大。每空心酒下五丸。病去即止。（聖惠方）

㊅治噎膈反胃。鄧才清與用北礬砂二錢。水和蕎麥麵包之。煅焦。待冷。取中間溼者焙乾一錢。入檳榔二錢。丁香二箇。研勻。每服七釐。燒酒送下。日三服。愈即止。後喫白粥半月。仍服助胃丸藥。又方平胃散各一錢。入礪砂。生薑各五分。爲末。沸湯點服二錢。當吐出黑物如石屑驗。

㊆治一切積痢。靈砂丹。用礪砂、朱砂各二錢半。爲末。用黃蠟半兩。巴豆仁三七粒。去膜。同入石器內。重湯煮一伏時。候豆紫色爲度。去二七粒。止將一七粒同二砂研勻。溶蠟和收。每旋丸綠豆大。或三丸五丸。淡薑湯下。（本事方）

㊇治月水不通。臍腹積聚疼痛。礪砂一兩。皂角五挺。去皮子。剉爲末。以頭醋大一盞。熬膏。入陳橘皮末三兩。搗三百杵。丸梧子大。每溫酒下五丸。（聖惠方）

㊈治死胎不下。礪砂、當歸各半兩爲末。分作二服。溫酒調下。如人行五里再一服。（瑞竹堂方）

㊉治喉痺口噤。礪砂、馬牙消等分。研勻點之。（聖濟方）

㊊治熨癰卒腫。礪砂半兩。綿裹含之。嚥津即安。（聖惠方）

㊋治牙齒腫痛。老鼠一箇。去皮。以礪砂掩擦三日。肉爛化盡。取骨放瓦上焙乾爲末。入樟腦一錢。蟾酥二分。每以少許點牙根上立止。（採氏集效方）

㊌治偏頭風痛。礪砂末一分。水潤蔽心一分。搗丸皂子大。綿包。露出一頭。隨左右內鼻中立效。（聖惠方）

㊍治損目生瘀。赤肉聳出不退。杏仁百箇。熬熟去皮尖。研。濾取淨汁。入礪砂末一錢。水煮化。日點一二次。自落。（普濟方）

㊎治鼻中息肉。礪砂點之即落。（白飛霞方）

㊏治鼻中毛出。晝夜可長一二尺。漸漸粗圓如繩。痛不可忍。摘去復生。此因食豬羊血過多所致。用生乳香、礪砂各一兩爲末。飯丸梧子大。每空心臨臥各服十丸。水下自然退落。（夏子益奇疾方）

㊐治魚骨哽咽。礪砂少許。嚼嚥立下。（外臺祕要方）

㊑治蚰蜒入耳。礪砂、膽礬等分爲末。每吹一字。蟲化爲水。（聖濟總錄方）

㊒治割甲侵肉。久不瘥。礪砂、礬石爲末。裹之。以瘥爲度。（外臺方）

㊓治蠍蟄叮螫。水調礪砂塗之。立愈。（千金方）

㊔治代指腫痛。喉和白礪砂。以麵作盌子。套指入內。一日瘥。（千金方）

㊕治面上疣目。礪砂、硼砂、鐵鏽、麝香等分。研擦三次。自落。（集效方）

㊖治疔瘡腫毒。好礪砂、雄黃等分。研。以銀篦剌破瘡口。擠去惡血。安藥一豆入內。抵花貼住。即效。毒氣入腹嘔吐者。服護心散。（瑞竹堂方）

㊗治疝氣。卵腫。脹痛不可忍。念珠丸。用礪砂、乳香各二錢。黃蠟一兩。研溶和丸。分作一百單八丸。以綿繼露一夜。次日取出。蛤粉爲衣。每用一丸。乳香湯吞下。日二服。取效。（本事方）

用量　三分至八分。或〇・三至一・〇瓦。

施用宜忌　凡非邪實氣壯之惡瘡等症。及內服藥中禁用、畏藥、水忌羊肉、反昆布、海帶、銀粉、錫、鉛丹、密陀僧。

參攷資料　㈠一飛爲酸砂。二飛爲伏翼。三飛爲定精色如鵝兒黃。入諸補藥爲丸服之。有暴熱。（陳藏器）㈡金銀有僞。投礪砂鍋中。僞物盡消化。況人腹中。有久積豈不腐潰。（寇宗奭）㈢礪砂破堅癖。不可獨用。須入羣隊藥中用之。（張元素）㈣礪砂大熱有毒之物。噎膈反胃積塊內癥之病用之則有神功。蓋此疾皆起於七情飲食所致。痰氣鬱結。遂成有形。妨礙道路。吐食痛膈。非此物化消。豈能去之。其性善爛金銀銅錫。庖人煮硬肉入礪砂少許即爛。可以類推矣。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

所謂化人心爲血者。亦甚言其不可多服爾。張杲玉洞要訣云。北庭砂秉陰石之氣。舍陽毒之精。能化五金八石。去穢益陽。其功甚著。力並硫黃。獨孤滔丹房鑑源云。礪砂性有大毒。爲五金之賊。有沉冷之疾。則可服之。疾減便止。多服則成擁塞癰腫。二說甚明。而唐宋醫方乃有單服之法。蓋欲得其助陽以縱慾。而不慮其損陰以發禍也。其方唐愼微已收附本草後。今亦存之。以備考者知警。（李時珍）㊈伏礪藥甚多。牡蠣、海螵蛸、晚蠶沙、羊胆骨、河豚魚膠、魚腥草、蘿蔔、獨帶卷柏、羊蹄、商陸、冬瓜、羊躑躅、蒼耳、烏梅、（抱朴子）㊉礪砂性毒。服之使人硝亂。故曰硝砂狄人以當鹽食。土宿本草云。礪性透物。五金藉之以爲先鋒。故號爲透骨將軍。炳曰。生北庭者爲上。人呼爲北庭砂。（李時珍）㊉礪砂出西戎。形如牙消。以光淨者良。（蘇恭）㊊今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之。然西戎來者。顆塊光明。大者有如拳。重三五兩。小者如指。而入藥最緊。邊界出者雜碎如麻豆粒。又夾砂石。用之須水飛。澄去土石。迄亦無方。彼人謂之氣砂。（蘇頌）㊋礪砂亦消石之類。乃鹵液所結。出於青海。與月華相射而生。附鹽而成。實虜人採取淋鍊而成。狀如鹽塊。以白淨者爲良。其性至透。用黝籠盛懸火上。則常乾。或加乾薑同收亦良。若近冷及得溼即化爲水。或滲失也。一統志云。臨洮蘭縣有洞出礪砂。張匡鄴行程記云。高昌北庭山中。常有煙氣湧起。而無雲霧。至夕光焰若炬火。照見禽鼠皆赤色。謂之火蹙山。採礪砂者。乘木展取之。若皮底即焦矣。北庭即今西域火州也。（李時珍）

【磨刀石】　即羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『羊肝石』條。

【磨刀近】　**命名**　本品乃磨刀器水中澄下之澱垢故名。

古籍別名　龍白泉粉。（綱目）

主治　傅蠷螋尿瘡有效。

歷代記述弦證　【明】李時珍　本草綱目論磨刀近曰。塗瘰癧結核。

【磨利花】　即茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茉莉花』條。

【磨沈香】　即沈香之處方用名。詳『沈香』條。

【磨盆草】　**產地**　南海屬。

主治　跌打。

【磨羚羊角】　羚羊角之處方用名。詳『羚羊角』條。

【磨犀光】　即犀角之處方用名。詳『犀角』條。

【磨熨草】　**產地**　以南海大瀝多出。

性質　甘。平。

效能　散風血熱。

主治　跌打。耳鳴。耳聾。

【磬口梅】　即蠟梅花之巳接者。典見綱目。詳『蠟梅花』條。

【禦兒梨】　即梨之古籍別名。典見綱目。詳『梨』條。

【穄】　即稷米之古籍別名。典見綱目。詳『稷米』條。

【積雪草】　即連錢草之古籍別名。典見本經。詳『連錢草』條。

歷代記述弦證　【明】李時珍

【穆】　**命名**　穆乃不黏之稱。亦不實之貌。本品子粒似之。故名。

古籍別名　龍爪粟。鴨爪稗。（綱目）龍爪穇。（救荒本草）

外國名詞　Panicum frumentaceum, Roxb.（拉丁）ヒエ（日本）

基本　係禾本科穇屬。爲穆之子實。

產地　山東、河南諸地。田野間多有之。

形態　穆爲穀類之一年生草本。高三四尺。葉細長而尖。有平行脈。初秋生花。作圓錐花序。穗狀。彎曲有芒者。有無芒者。所結子實。如黍粒而細。赤色。穃甚薄。味粗澀。可炊粥飯食。與供藥用。



穆

性質　甘。濇。無毒。

主治　補中益氣。厚腸胃。濟飢。

【簣】　即竹之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『竹』條。

【籟】　㊀即箬葉之古籍別名。典見綱目。詳『箬葉』條。㊁即竹筍之古籍別名。典見僧贊寧。詳『竹筍』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【篤迦】卽栗之古籍別名。典見梵書。詳『栗』條。

【篤耨香】基本　本品卽篤耨樹之木脂色白氣香。

古籍別名　黑色者名黑篤耨。（綱目）

外國名詞　Pistacia Terebinthus, L.（拉丁）トクノウカウ（日本）

基本　係漆樹科。爲篤耨樹之香脂。

產地　出眞臘國。

形態　篤耨樹爲香木類之一種。樹形如松。其香脂老則溢出。色白而透明。盛夏不融。香氣清遠。可供藥用。

採取　採香後。夏月以火炙樹。令脂液再溢。至冬乃凝。復採收之。以瓠瓢盛置陰涼處乃得。

主治　面黯黑鼾。同白附子、冬瓜子、白及、石榴皮等分爲末。酒浸三日。洗面後傅之。久則面瑩如玉。

【糖結】卽伽倆香木死本存。蜜氣膏於枯根。潤若餳片而質韌。色黑或黃。或黃黑相兼。或黑質白點者。其功用較伽倆香爲良。

【糖穗子】卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【糖橘紅】命名　本品係蜜橘皮去白。切小塊。用糖霜餞製而成之橘紅。故名。

採取　以產浙江杭屬塘棲鎭者良。

性質　甘。辛。溫。無毒。

主治　理氣。快膈。消痰。止嗽。參弦盜料。糖橘紅清香入肺。經。性不峻。削消痰之功。不下化產。其效力與橘餅相同。南人體弱者宜之。（醫學大辭典）

【糖精】基本　本品卽製糖剩下之澄滓也。

性質　甘。溫。無毒。

效能　益氣。緩中。暖脾胃。化食。

主治　反胃吐食。

【糗】㊀卽麨米之古籍別名。典見綱目。詳『麨米』條。㊁卽麥麨之古籍別名。典見綱目。詳『麥麨』條。㊂卽小麥麨之原名。詳『小麥麨』條。

【縉雲草】卽石龍芻之古籍別名。典見綱目。詳『石龍芻』條。

【縑】卽帛之古籍別名。典見綱目。詳『帛』條。

【縑絲草子】卽蒼耳子之古籍別名。典見綱目。詳『蒼耳子』條。

【縑綠菜子】卽蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼耳子』條。

【縛木藤】卽省藤之別名。詳『省藤』條。

【縠菜】卽白莢之古籍別名。典見別錄。詳『白莢』條。

【羵羊】卽山羊之古籍別名。典見綱目。詳『山羊』條。

【羵羊角】卽羚羊角之古籍別名。典見和漢藥考。詳『羚羊角』條。

【糝糝草】卽蒲公英之古籍別名。典見綱目。詳『蒲公英』條。

【膩粉】卽輕粉之古籍別名。典見綱目。詳『輕粉』條。

【蕎子】卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【蕎草】卽煙草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『煙草』條。

【蕎菔】卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【蓼麻】古籍別名　毛蕨。（綱目）薊草。痛痛草。眞蟲草。（日本）

外國名詞　Urtica Thunbergiana, S. et Z.（拉丁）イラクサ　イタイダグサ　マムシグ（日本）

基本　係蓼麻科蓼麻屬。

產地　生山野間。

形態　蓼麻爲毒草類之多年生草本。春月抽莖。高二三尺。莖葉皆生毛。有刺戟性。觸之卽毛端分泌液汁。能傷筋肉。如蜂螫蠆螫。溜以人溺卽解。葉作卵形。端尖。緣邊有粗鋸齒。柄長。對生。托葉互相結合。夏秋間。葉腋穗狀花序。單性。雌雄同株。花小色白。無花瓣。萼有四片。有花無實。秋日剝取其皮之纖維色白有絹光。可供織物原料。其葉可供藥用。



蓼麻

性質　辛。苦。寒。有大毒。

主治　蛇咬。搗塗之。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論蓼麻葉曰。風露初起。取汁點之。一夜皆失。又投水中。能

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

殺魚。

參攷資料 蕁麻葉。不可服。令人吐利不止。(綱目)

【蕃荷菜】即薄荷之古籍別名。與見食性本草。詳「薄荷」條。

【蕃椒】**原名** 辣茄。

命名 本品莖葉花序一似茄狀。而子味極辛辣。故稱辣茄。番人常帶殼啖之。故名蕃椒。

處方用名 辣茄。辣膏。

古籍別名 番椒。番姜。(范成臺海府志)番薑。(綱目拾遺)海癆藤。(花鏡)秦椒。辣虎。(龍柏藥性考)赤椒。海椒。臘茄。山珊瑚。地珊瑚。海風藤。南蠻胡椒。高麗胡椒。(和漢藥考)

外國名詞 Fructus Capsici (拉丁) Red Pepper. Capsicum Fruit. (英) Spanischer Pfeffere. (德)

基本 屬茄科蕃椒之實。

形態 蕃椒為一年生草。高有至二三尺者。葉作卵圓形或長卵圓形。略帶尖。有長葉柄。夏季開花。為淡黃色或白色合瓣花冠。有長花梗。實概細長。初綠色。熟則呈赤色而下垂。為長圓形莢果。粗如小指。有赤色或黃褐色薄膜作革質狀。有光澤。莢中大半為空洞。中有無數黃色心臟形種子。新鮮者有惡臭。但乾後則消失。味辛烈如灼。貼於皮膚則刺戟該部分而充血。多食則發諸瘡云。



蕃椒

採取 臘月實熟時採之。其嫩者秋季採之。曬乾。

性質 辛苦。大熱。無毒。

成分 為辛味樹脂、蠟質、色素、鹽類等。為辛味轆性樹脂。將蕃椒用酒精及伊打混和液浸出。將液蒸發。可得黃赤色或赤褐色之濃稠液體。即此物也。放置空氣中。即行凝結。逢水及醋稍溶。逢酒精、伊打、松節油、苛性鈉液。善能溶解。熱之則變為稀薄液體。再加熱則發煙揮散。

效能 溫中。散寒。殺蟲。擦癬。用於消化器衰弱。水腫。咽喉煩衝。風痛等。又用以代樟腦。藏置箱籠中。

主治 溫中下氣。散寒除溼。開鬱去痰。消食殺蟲。治嘔逆。療噎膈。止瀉痢。祛脚氣。

國外學說 英美學說謂辣椒一名大椒。產中國西國等處。其乾熟之果。可為藥品。酒、水、油類均能提出功力。此草高約一二尺。果內之子極繁。辣椒有數種。其原產地在南亞美利加。從該處傳至歐羅巴。亞西亞等各處。因東方各國之人。喜用辣味之質。故其傳布甚速。印度人雖多種辣椒。尚未特設一名。故謂之紅椒。凡椒類必種於各熱地。所以西國之種辣椒。常在玻璃房內有一種辣椒。俗名幾尼椒。產亞非利加。又有一種辣椒。名萊椒。產印度與西印度列島各處。今西國所用者。係產印度亞非利加等處。其體小如豆粒。而其力則較大。其形狀不等。有圓形、有橢圓形、有心形、有牛角形。色或紅或黃。入藥則用其尖長者。宜用酒及水浸之。其臭略香。味最辣者有之。稍辣者亦有之。其作用為引火藥。又為粹性行氣藥。能開胃暖胃。治肚瀉。霍亂。黃熱症。吐黑水。積滯。暈船。瘧熱症。宜和金雞納霜同服。在熱地則多用為加味之料。又如喉失音。則用為漱喉藥。又作糖片服之。蓋內服辣椒。能令腹暖。及能助胃消化。塗在皮膚能發紅熱。久則並作水泡。又如外擦風溼骨疼。跌打等症。甚驗。處方以辣椒半分。搗爛。濃酒四十分。先用酒三十分浸二天。間時搖動。裝淋筒淋乾。加餘酒漂淋。用絞盤絞渣。過淋紙。再加酒仍足四十分為度。每服一分七釐半至三分半。(辣椒酒方)(此酒不適口。宜加陳皮酒或陳皮糖和服)又方。辣椒酒五分二釐半至一錢零五釐。玫瑰泡水八兩和勻為度。治咽喉類症。(辣椒漱水方)又方。辣椒一分。濃酒三分。浸七天。過淋紙為度。治凍瘡用。呢子布蘸酒擦患處。治牙痛用。棉花蘸酒塞牙穴內。(辣椒擦酒方)辣椒內含有精而其功力則全在此精。西醫之所謂夾西先者。即係該精之名。如用法取出。則有臭常之辣若將半釐放於座上。凡嗅其臭者莫不噴嚏。日本藥局方曰。蕃椒係採取

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本種植物之成熟果實曬乾者。本品呈赤色或赤褐色。作長圓錐形或紡錘形。有光澤。往往弧曲。粗一仙米。長至十仙米。有附有萼及果梗者。果殼內面空洞。通常分爲二室。黃色扁平。粗至五密米。藏有多數種子。又和漢藥考曰。蕃椒製劑有蕃椒酒。用於蛮扶斯來期。惡性咽喉炎及衰弱諸病。日本向用以調味之七色蕃椒。（七色唐辛係用下方配成）將蕃椒分爲二一用炭火焙。一卽用臼搗碎爲末。另將陳皮、罌粟、胡麻、麻子、蜀椒、青海苔用鐵鍋焙烝。然後搗碎篩過。每蕃椒末三匙。加前六味各二匙。入桶混和。納墻藏之。日本之有蕃椒。在慶長十年。與煙草同由南蠻傳入。故有南蠻胡椒之名。又豐臣太閤征朝鮮時。由加藤清正攜歸。故又有高麗胡椒之名。

配合應用 ㈠治外痔。以皀牙辣茄紅熟者。剉細。甜醬拌食。（百草鏡方）

㈡治蝮蛇傷。用辣茄生嚼十一二枚。卽消腫定痛。傷處起小泡。出黃水而愈。食此昧反甘而不辣。或嚼爛敷傷口。亦消腫定痛。（百草鏡方）

㈢祛臭蟲方。用羊頭骨一個。蕃椒半斤。共入火盆內。同鋸木屑燒之。門窗閉緊。勿令出烟。其蟲自死。敏按木屑用樟木者佳。（經驗廣集方）

㈣治凍瘃。剝辣茄皮貼上。卽愈。（蔡白雲方）

㈤治痢積水瀉。用辣茄一個爲衣。清晨以熱豆腐皮裹吞下。卽愈。（醫宗粹編方）

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡陰虛有火者禁用。

參攷資料 ㈠人家園圃多種之。深秋山人多挑販入市貨賣。取以熬辣醬及洗凍瘡用之。所用甚廣。而綱目不載其功用。陳臭堯食物宜忌云。食菜莧卽辣茄。陳者爲良。其種類大小方圓黃紅不一。惟一種尖長者。名象芽辣茄。入藥用。（趙恕軒）㈡又一種本本者。名番薑。范成臺灣府志。番薑木本。種自荷蘭。開花白瓣。綠實尖長。熟時朱紅奪目。中有子辛辣。番人帶殼啖之。內地名番椒。更有一種結實圓而微尖。似柰種出咬嚼吧。內地無所出也。（趙恕軒）㈢辣茄一名臘茄。臘月熟。故名。亦入食料。苗葉似茄葉而小。莖高尺許。至夏乃花。白色五出。倒垂如茄。花結實青色。其實有如柿形。如秤錘形。有小如豆者。有大如橘者。有仰生於頂者。有倒垂葉下者。種種不一。入藥惟取細長如象牙。又如人指者。作食料皆可用。（藥檢）㈣食之走風動火。病目發瘡痔。（陳臭堯）㈤味辛。性大熱。入口卽辣舌。能祛風行血。散寒解鬱。導滯止瀉。潰擦癬。（藥檢）㈥煮壁虱。洗凍瘃。浴冷芥。瀉大腸寒瀉。（百草鏡）㈦按花鐵蕃椒一名海風藤。俗呼辣茄。木高一二尺。夏生白花。秋來結子。儼如禿筆頭倒垂。初綠後朱紅。懸掛可觀。其味最辣。人多採用。研極細。冬月以代胡椒。蓋其性熱而散。能入心脾二經。亦能祛水濕。癸亥予在臨安有小僕於暑月食冷水。臥陰地。至秋瘧發。百藥罔效。延至初冬。偶食辣醬。頗適口。每食需此。又用以煎粥食。未幾瘧自愈。良由胸膈積水變爲冷痰。得辛以散之。故如湯沃雪耳。又名秦椒。李成裕遼載。秦椒一名蕃椒。形如馬乳。色似珊瑚。非本草。秦地之花椒。卽中土之辣茄也。（趙恕軒）㈧秦地乃草本辣椒。綱目諸註。誤爲秦地花椒。不知卽今之辣茄。又名辣虎。性熱味辣。溫中散寒。除風發汗。去冷癬。行痰逐瀉。多食眩旋。動火故也。久食發痔。令人齒痛咽腫。（龍柏藥性考）

【蕃蠟魚】卽海鷂魚之古籍別名。典見綱目。詳『海鷂魚』條。

【蕈】卽菌之一種。性質功效與菌同。詳『菌』條。

【蕉子】卽芭蕉實之簡稱。詳『芭蕉』條。

【蕺】卽澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『澤瀉』條。

【蕎】卽大戟之古籍別名。典見爾雅。詳『大戟』條。

【蕎麥】 **命名** 本品莖幹柔弱而翹然。易長易收。其實磨麵如麥。故名。

處方用名 蕎麥粉。甜蕎麥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蕎麥

古籍別名　莜麥。烏麥。（吳瑞）花蕎。甜蕎。（綱目）

外國名稱　Fagopyrum esculentum, Moench.（拉丁）ソバ（日本）

基本　係蓼科蕎麥屬。藥用其子實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。蕎麥產廣東東西江等處。植物學大辭典曰。中央亞細亞及東印度爲原產地。

形態　蕎麥爲麥類之一年或越年生草本。莖高一二尺。葉爲心臟形。如三角狀。有長柄而互生。邊緣生細毛。晚秋葉頂葉腋出花梗。開小白花。列爲錐圓花序。果實爲乾果。作三稜形。熟則色黑。其中澱粉可供麵粉醬油等之原料。又與莖葉俱可充藥用。



蕎麥

採取　八九月採之。採得曝乾去殼用。

用法　恒以磨粉和藥。

性質　甘。平。寒。無毒。

效能　下氣利腸。消積寬胸。用作健胃消化藥。

主治　實腸胃。益氣力。續精神。能鍊五臟滓穢。

歷代記述攷證　【唐】蘇炳四聲本草論蕎麥曰。作飯食。壓丹石毒甚良。【明】吳瑞日用本草論蕎麥曰。以醋調粉塗小兒丹毒赤腫熱瘡。【明】李時珍本草綱目論蕎麥曰。降氣寬腸。壓積滯。消熱腫風痛。除白濁白帶。脾積洩瀉。以沙糖水調炒麵二錢。服治痢疾。炒焦熱水衝服。治絞腸痧痛。【清】黃宮繡本草求眞論蕎麥曰。蕎麥味甘性寒。治能降氣寬腸。消積去穢。凡白帶白濁泄痢。痘瘡潰爛。湯火灼傷。氣盛溼熱等症。是其所宜。且炒焦熱水衝服。以治絞腸痧腹痛。醋調塗之。以治小兒丹毒赤腫亦妙。蓋以味甘入腸。性寒瀉熱氣。動而降。能使五臟滓滯。皆鍊而去也。若使脾胃虛弱。不堪服食。食則令人頭眩。作麵和猪羊肉食。食則令人鬚眉脫落。又不可合黃魚以食。皆是其性動降之故。燒灰淋汁飲。能化石灰。能去醫肉。【清】王士雄隨息居飲食譜論蕎麥曰。莜麥甘溫。羅麵麥食。開胃寬腸。益氣力。禦風寒。鍊滓穢。磨積滯。與薑腹同食良。以性有微毒而發痼疾。薑腹能制之也。而易長易收。尤爲救荒極品。各處皆宜廣種爲是。另有一種味苦者。雖不堪食。亦可濟荒。

近人學說　丁福保曰。蕎麥含一種之加里性。且有黏滑性。故爲一種疏滌劑。功能滑潤腸裏面而通大便。吸收於血中。則循行黏膜入腎而有利尿之效。

配合應用　㊀治咳嗽上氣。蕎麥粉四兩。茶末二錢。生蜜二兩。水一碗。順手攪千下。飲之。良久下氣不止。卽愈。（儒門事親方）

㊁治十水腫喘。生大蒜一錢。蕎麥麵二錢。水和作餅。炙熟。爲末。空心茶服。以大小便利爲度。（聖惠方）

㊂治男子白濁。用蕎麥炒焦爲末。雞子白和丸。梧子大。每服五十丸。鹽湯下。日三服。亦治赤白帶下。（魏元君濟生丹方）

㊃治禁口痢疾。蕎麥麵每服二錢。炒糖水調下。（坦仙方）

㊄治癰疽發背。一切腫毒。蕎麥麵、硫黃各二兩。爲末。井華水和作餅。曬收。每用一餅。磨水傅之。痛則令不痛。不痛則令痛。卽愈。（直指方）

㊅治瘡頭黑凹。蕎麥麵煮食之。卽發起。（直指方）

㊆治痘瘡潰爛。用蕎麥粉糊頻傅之。（痘疹論方）

㊇治湯火傷灼。用蕎麥麵炒黃研末。水和傅之。卽神。（奇效方）

㊈治蛇盤癰癤。圍接項上。用蕎麥炒去殼。海藻、白殭蠶炒去絲等分。爲末。白梅浸湯。取肉搗和丸。綠豆大。每服六七十丸。食後臨臥。米飲下。日五服。其毒當從大便泄去。若與淡菜連服尤好。淡菜生於海藻上。亦治此也。忌豆腐、雞、羊、酒、麵。（阮氏方）

㊉通仙散。治男子敗精。女人敗血。不動眞氣。用蕎麥麵三錢。大黃二錢。半爲末。臥時酒調服之。（多能鄙事方）

㊊治頭風畏冷。李樓云。一人頭

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

風。首裹重綿三十年不愈。予以蕎麥粉二升。水調作二餅。更互合頭上。微汗即愈。（怪證奇方）

㊁頭風風眼。蕎麥作錢大餅。貼眼四角。以米大艾炷灸之。即效如神。

㊂染髮令黑。蕎麥針砂二錢。醋和。先以漿水洗淨塗之。荷葉包至一更洗去。再以無食子、訶子皮、大麥麵二錢。醋和塗之。荷葉包至天明。洗去即黑。（普濟方）

㊃治絞腸痧痛。蕎麥麵一撮。炒黃。水煮服。（簡便方）

㊄治小腸疝氣。蕎麥仁炒去尖、胡盧巴酒浸。曬乾各四兩。小茴香炒一兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每空心鹽酒下五十丸。兩月大便出白膿。去根。（孫天仁集效方）

用量　三錢至五錢。

施用宜忌　凡脾胃虛寒者禁用。

參考資料　㊀本草言蕎麥能鍊五臟滓穢。俗言一年沉積在腸胃者。食之亦消去也。（王穎）㊁蕎麥最降氣寬腸。故能鍊腸胃滓滯。而治濁帶洩痢。止氣之疾。氣盛有溼熱者宜之。若脾胃虛寒人食之。則大脫元氣。而落鬚眉。非所宜矣。孟詵云。益氣力者。殆未然也。按楊起簡便方云。肚腹微微作痛。出即瀉。瀉亦不多。日夜數行者。用蕎麥麵一味作飯。連食三四次。即愈。予壯年患此。兩月瘦怯尤甚。用消食化氣藥俱不效。一僧授此而愈。轉用皆效。此可徵其鍊積滯之功矣。普濟治小兒天弔及歷節風方中亦用。（李時珍）㊂醯微寒。食之難消。久食動風。令人頭眩。作麵和豬羊肉熟食。不過八九頓。即患熱風。鬚眉脫落。還生亦希。涇邠以北多此疾。又不可合黃魚食。（孫思邈）㊃蕎麥南北皆有。立秋前後下種。八九月收刈。性最畏霜。苗高一二尺。赤莖綠葉。如烏桕葉。開小白花。繁密。粟粟然。結實纍纍如羊蹄實。有三稜。老則烏黑色。王禎農書云。北方多種。磨而爲麵。作煎餅。配蒜食。或作湯餅。謂之河漏。以供常食。滑細如粉。亞於麵麥。南方一種但作粉餌食。乃農家居冬穀也。（李時珍）

【蕎麥粉】即蕎麥之處方用名。詳『蕎麥』條。

【蕎麥葉】**主治**　作蔬食。下氣。利耳目。多食。即微洩。

參考資料　蕎麥葉生食。動刺風。令人身痒。（千金）

【蕎葱】即蓮之俗名。詳『蓮』條。

【蕎麥稭】**主治**　燒灰淋汁。取鹼熬乾。同石灰等分。蜜收。能爛癰疽。蝕惡肉。去醫痣。最良。種作蔗。辟蟄虱。

參考資料　㊀燒灰淋汁。洗六畜瘡。并驢馬騾蹄。（日華）

【蔏】即草蘭之古籍別名。典見本經。詳『草蘭』條。

【蔏子】**產地**　出粵、桂、安南及熱帶諸地。

形態　蔏子爲夷果類之一種。藤緣樹木而生。正二月開花。四五月實熟。如梨。赤如雞冠。核如魚鱗。可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　中惡蠱邪。心腹卒痛。疫癘狂邪。心神顛倒不寧。昏冒如癡。以及驚癲恍惚。或言語不倫。歌笑不徹。燒研七枚。入硃砂少許。薑湯下。

【蔏根】即防風之古籍別名。典見別錄。詳『防風』條。

【蔏華】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【蔏薹】**處方用名**　蔏薹葉。油菜葉。

古籍別名　寒菜。胡菜。（胡居士）薹菜。（埤雅）薹芥。（沛志）油菜。油名菜油。（綱目）眞菜。（和漢藥考）

外國名詞　Brassica campestris, L.（拉丁）

基本　屬十字花科。爲蔏薹之莖葉。



蔏薹

形態　蔏薹爲二年生草。各地多栽培之。莖高四五尺。葉大而互生。作廣披針形。呈濃綠色。稍帶紫色。葉之基部包莖。四月梢上開黃色四瓣花。作總狀花序排列。花後結角。實熟則裂開。中有黑色小粒狀種子。搾其種子。得脂肪油。謂之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

菜子油。

採取　二月間採之。

性質　辛。溫。無毒。

效能　散血消腫毒。瀉熱。治遊丹。用作破瘀藥。

主治　風遊丹腫。乳癰。

歷代記述弦證　【唐】陳藏器本草拾遺論蔓菁曰。煮食。治腰脚痺。搗葉傅女人吹奶。【宋】開寶重定新本草論蔓菁曰。破癥瘕。結血。【宋】日華諸家本草論蔓菁曰。治產後血風及瘀血。【明】李時珍本草綱目論蔓菁曰。治瘧疽。疳瘡。散血消腫。伏蔆砂。【清】王士雄隨息居飲食譜論蔓菁曰。蔓菁辛滑甘溫。烹食可口。散血消腫。破結通腸。子可榨油。故一名油菜。形似菘而本削莖狹葉銳。俗呼青菜。以色較深也。發風動氣。凡患腰脚口齒諸病及產後瘍瘡家錮疾目證時感皆忌之。

配合應用　㈠治天火熱瘡。初起似皰。漸如水泡。似火燒瘡。赤色。急速。能殺人。蔓菁葉搗汁。調大黃芒硝。生鐵衣等分塗之。（近效方）㈡治風熱腫毒。蔓菁苗葉根。蔓菁根各三兩爲末。以雞子清和勻貼之。卽消。無蔓菁。卽以商陸根代之。亦甚效也。（近效方）㈢治手足癭瘤。此疽喜着手足肩背。累累如赤豆。剝之汁出。用蔓菁葉煮汁服一升。井食乾熟菜數頓。少與鹽醬。冬月可用子研水服。（千金方）㈣治異疽似癰。而小有異。膿如小豆汁。今日去。明日滿。用蔓菁搗熱。布袋盛。於熱灰中煨熟。更互熨之。不過三二度。無藥用乾者。（千金方）㈤治踠豆斑瘡。蔓菁葉煎湯洗之。（外臺秘要方）㈥治血痢腹痛。日夜不止。以蔓菁葉搗汁二合。入蜜一合。溫服。亦治腸風下血。（聖惠方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無瘀滯及腸滑者禁用。

參攷資料　㈠蔓菁破血。故產婦宜食之。（陳藏器）㈡貞觀七年三月。予在內江縣飲。多至夜覺四體骨肉疼痛。至曉頭痛額角有丹如彈丸。腫痛至午。通腫目不能開。經日幾斃。予思本草蔓菁治風遊丹腫。遂取葉搗傅。隨手卽消。其驗如神也。亦可搗汁服之。（孫思邈）㈢春月食之。能發膝痼疾。（別錄）㈣先患腰脚者。不可多食。食之加劇。又損陽氣。發瘡及口齒病。胡臭人不可食。又能生腹中諸蟲。道家特忌。以爲五葷之一。（孟詵）㈤此菜易起薹。須採其薹食。則分枝多。故名蔓菁。而淮人謂之薹芥。卽今油菜。爲其子可榨油也。羌隴氏胡。其地苦寒。冬月多種此菜。能歷霜雪。種自胡來。故服虔通俗文謂之胡菜。而胡洽居士百病方謂之寒菜。皆取此義也。或云塞外有地名蔓菁戍。始種此菜。故名。亦通。（李時珍）㈥別錄云。蔓菁乃人間所啜菜也。（蘇恭）㈦蔓菁不甚香。經冬根不死。胖蠹於諸菜中。亦不甚佳。（寇宗奭）㈧蔓菁方藥多用。諸家註亦不明。令人不識爲何菜。珍訪考之。乃今油菜也。九月十月下種生葉。形色微似白菜。冬春採薹心爲茹。三月則老。不可食。開小黃花。四瓣。如芥花。結莢收子。亦如芥子。灰赤色。炒過榨油。黃色。燃燈甚明。食之不及蘇油。近人因有油利。種者亦廣云。（李時珍）

【蔓菁子】　**命名**　本品易起薹。須採其薹食。則分枝必多。故名。

處方用名　蔓菁子。油菜子。

外國名稱　Rape（英）

基本　屬十字花科蔓菁之種子。

產地　凡江浙諸省之田野間。恒有產焉。

採取　三四月間採之。採得曝乾用。

性質　辛。溫。無毒。

效能　行血。利產。消腫。治痔。用作利產下瘀藥。

主治　風遊丹腫。乳癰。

歷代記述弦證　【唐】孫思邈千金翼論蔓菁子曰。夢中洩精。與鬼交。【唐】陳藏器本草拾遺論蔓菁子曰。取油傅頭。令髮長黑。【明】李時珍本草綱目論蔓菁子曰。行滯血。破冷氣。消腫散結。治產難。產後心腹諸疾。赤丹熱腫。金瘡血痔。

配合應用　㈠蔓菁散。治產後惡露不下。血結衝心刺痛。將來纔

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

過胃寒踏冷。其血必往來心腹間。刺痛不可忍。謂之血母。并治產後心腹諸疾。產後三日不可無此用。

薯蕷子炒。當歸。桂心。赤芍藥等分。每酒服二錢。趕下惡物。（楊氏產乳方）

㈡治產後血暈。薯蕷子、生地黃、等分爲末。每服三錢。薑七片。酒水各半盞。童便半盞。煎七分。溫服即甦。（溫隱居海上方）

㈢追氣丸。治婦人血刺。小腹痛不可忍。亦可常服。補血虛。破氣塊。甚效。用薯蕷子微炒。桂心各一兩。高良薑半兩爲末。醋糊丸。梧子大。每淡醋湯下五丸。（沈存中靈苑方）

㈣治腸風臟毒下血。薯蕷子生用。甘草炙爲末。每服二錢。水煎服之。（普濟方）

㈤治頭風作痛。薯蕷子一分。大黃三分爲末。嚏鼻。

㈥治風熱牙痛。薯蕷子、白芥子、角茴香等分爲末。嚏鼻左嚏右。右嚏左。（聖惠方）

㈦治小兒天釣。薯蕷子、生烏頭、去皮尖各二錢爲末。每用一錢。水調塗頂上。名塗頂散。（聖濟總錄方）

㈧治風瘡不愈。陳菜子油同穿山甲末。熬成膏。塗之即愈。（攝生衆妙方）

㈨治熱瘡腫毒。薯蕷子、狗頭骨、等分爲末。醋和傅之。（千金方）

㈩治傷損接骨。薯蕷子一兩。小黃米炒二合。龍骨少許。爲末。醋調成膏。攤紙上貼之。（乾坤祕韞方）

⑪治湯火傷灼。菜子油調蚯蚓屎搽之。（楊起簡便單方）

⑫治蜈蚣螫傷。菜子油傾地上。擦地上油摻之即好。（陸氏積德堂方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無瘀滯及腸滑者禁用。

參攷資料　薯蕷菜子葉同功。其味辛氣溫。能溫能散。其用長於行血滯。破結氣。故古方消腫散結。治產後一切心腹氣血痛。諸遊風丹毒熱腫。瘡痔諸藥咸用之。經水行後。加入四物湯服之。云能斷產。又治小兒驚風。貼其頂顖。則引氣上出也。婦人方治產難歌云。黃金花結粟米實。細研酒下十五粒。靈丹功效妙如神。難產之時能救急。（李時珍）

【薯】即薯蕷之古籍別名。典見本草拾遺詳「薯蕷」條。

【薯蕷】古籍別名　馬唐。馬飯。羊痲。羊粟。（別錄）薯。（拾遺）蔓于（爾雅）軒于（綱目）雁音草。（日本）

外國名詞　Caryopteris divaricata, Maxim.（拉丁）カリガネサウ　ホカケサウ　ヤマドリサウ　ムラチドリモモチドリ（日本）

基本　係馬鞭科段菊屬。爲薯蕷草之根葉。



薯蕷草

產地　山野原澤間。

形態　薯蕷爲澤草類之野生雜草。有臭氣。莖方形。高至三四尺。葉卵形而尖。有鋸齒。對生。秋日枝梢分叉。開花。穗形花冠。青紫色。雌雄蕊突出於花外。花序比段菊大數倍。着花疎散而不密。

性質　甘。寒。無毒。

主治　調中。明耳目。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論薯蕷草曰。煎取汁。明目潤肺。又曰。薯消水氣。溼痺。脚氣。頑痺。虛腫。小腹急。小便赤澀。並合赤小豆煮食。勿與鹽豉汁服。止消渴。搗葉傅毒腫。

參攷資料　㈠馬食之。如餧如飯。故名馬唐。馬飯。（陳藏器）㈡羊亦食之。故曰羊痲。羊粟。其氣瘡臭。故謂之薯。薯者。瘡也。朽木臭也。此草莖頗似薏而臭。故左傳云。一薰一薯。十年尚猶有臭是也。孫升談圃。以爲香需者。誤矣。即別錄馬唐也。今并爲一。（李時珍）㈢馬唐生於溼地。莖有節。生根。五月採。（別錄）㈣生南方。麪稻田中。節節有根。着土。如結縷草。堪飼馬。又曰。薯生水田中。狀如結縷草而葉長。馬食之。（陳藏器）㈤薯蕷草與馬唐本分列二種。本草綱目始併爲一。但考馬唐。係禾本科植物。與薯實非一物也。（植物學大辭典）

781／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【薤草】卽甘草之古籍別名。典見別錄。詳『甘草』條。

【蕎花】　命名　蕎者饒也。其花繁饒故名。

古籍別名　黃茫花。（和漢藥考）

外國名詞　Wikstroemia japonica, Miq.（拉丁）

基本　屬瑞香科。爲蕎花之花。

產地　凡山野川谷間恒多生焉。

形態　蕎花爲落葉小灌木。山地自生之植物也。高三四尺。其樹皮爲製紙之原料。故暖地亦栽種之。春季發芽。葉爲楕圓形。末端尖銳。長五六分至寸許。枝葉皆對生。入秋枝楴與葉腋之間。俱抽花梗。開黃色四瓣之花。其狀如筒。長二分許。

採取　六月間採花陰乾。

性質　苦。寒。有毒。

效能　利水。破積。用治水腫。及祛痰藥。

主治　傷寒溫瘧。下十二水。破積聚。大堅癥瘕。蕩滌胸中留癖飲食。寒熱邪氣。利水道。（本經）療痰飲咳嗽。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論蕎花曰。治咳逆上氣。喉中腫滿。痃氣蟲毒。痃癖氣塊。【清】黃宮繡本草求眞論蕎花曰。蕎花雖與荒花形色相同。而究絕不相似。蓋荒花葉尖如柳。花紫似荊。蕎花苗莖無刺。花細色黃。至其性味。荒花辛苦而溫。此則辛苦而寒。若論主治。則荒花辛溫。多有達表行水之力。此則氣寒。多有入裏走泄之效。故書載能治痢。然要皆屬破結逐水之品。未可分途而別視也。但藥肆混收。亦可見效。以其主治差同故耳。【清】鄒澍本經疏證論蕎花曰。傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而咳。若微利者。去麻黃。加蕎花。如雞子大。熬令赤色。注云。下利者。不可攻其表。汗出必腹滿。去麻黃。惡發汗。夫太陽與陽明合病。下利者。與葛根湯。其中未嘗無麻黃。不慮其腹滿。何哉。蓋葛根湯所治證。其表但有風寒。風寒者。標在外。本亦在外。小青龍湯證。則本雖風寒。標已化水。風寒雖仍在外。水飲則已內連。若徒發其外。則在外之風寒。纔散。內連之水氣。必隨出於表。於是水入經隧。爲腹滿。不可與葛根湯同論也。雖然。治水之出於表者。有防已有大戟。治水之爲咳喘者。有荒花。此則用蕎花者何。蓋防已主傷寒溫瘧熱氣。此則未化爲熱也。大戟治風與水在皮膚疼痛。此則不疼痛也。荒花治因水咳喘。僅能下氣。不能治利。故主以蕎花。然主治惟與荒花爲近。故後世或有以荒花代者。爲於此見蕎花與荒花。功用略同。而荒花惟下氣行水。蕎花兼破飲食積聚。利水道差有別矣。

用量　八分至錢半。

參攷資料　㈠張仲景傷寒論以蕎花治利者。取其行水也。水去則利止。其意如此。今用之當斟酌。不可過使與不及也。須有是證乃用之。（寇宗奭）㈡蕎花生咸陽川谷及河南中弁。六月採花陰乾。（別錄）㈢中弁者。時從河上來。形似荒花而極細白色。（陶弘景）㈣蕎似胡荽。莖無刺。花細黃色。四月五月收與荒花全不相似也。（蘇恭）㈤所在有之。以雍州者爲好。生岡原上。苗高二尺許。（韓保昇）㈥按蘇頌圖經言。絳州所出荒花黃色。謂之黃荒花。其圖小株花成簇生。恐卽此蕎花也。生時色黃。乾則如白。故陶氏言細白也。或言無蕎花。以桃花代之。取其利耳。（李時珍）㈦蕎花形如荒花而小。色黃者是。又有白花者。藥舖無此。可以荒花代之。按其味甘辛。利水之功。一如荒花。（和漢藥考）

【蕙草】卽佩蘭之古籍別名。典見別錄。詳『佩蘭』條。

【蕙蘭】卽建蘭之古籍別名。典見綱目。詳『建蘭花』條。

【藕車香】　性質　辛。溫。無毒。

主治　鬼氣去臭。及蟲魚蛀蠹。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論藕車香曰。治霍亂。辟惡氣。薰衣佳。

參攷資料　㈠藕車香。氣味微寒。（李珣）㈡藕車香。廣志云。藕車香生徐州。高數尺。黃葉白花。爾雅藕車乞與。郭璞云。香草也。（陳藏器）㈢藕車香。生海南山谷。齊民要術云。凡諸樹木蟲蛀者。煎此香

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冷淋之。卽辟也。（李珣）㊃蕺車香。楚詞。蛀留夷與蕺車別。昔人常栽蕙之與今蘼香零陵相類也。（李時珍）

【蕢】㊀卽羊蹄之古籍別名。典見和漢藥考。詳『羊蹄』條。㊁卽益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益母草』條。

【葬】卽木槿之古籍別名。典見詩經。詳『木槿』條。

【蕘仁】原名　蕘核。

命名　本品花實蕘蕘下垂。而藥用其核仁。故名。

處方用名　蕘核仁。製蕘仁。

古籍別名　白椄仁。椵仁。（爾雅）

基本　爲蕘之核仁。

產地　陳仁山藥物生產辨云。蕘仁產河南禹州。

形態　蕘屬灌木類之叢生小木。高數尺。莖多刺。虛狹而長。開白花。實附莖生。色紫赤。圓扁有紋。大如五味子。可供食用。

採取　五六月實熟時。採之日乾。

製法　雷敩曰。凡使蕘核仁。以湯浸去皮尖。擘作兩片。每四兩用芒硝一兩。木通草七兩。同水煮一伏時。取仁研膏入藥。

性質　甘溫無毒。

效能　祛風熱。明耳目。專作眼科藥。

主治　心腹邪熱結氣。明目目赤痛傷淚。出目腫。皆爛。久服輕身益氣。不飢。（本經）破心下結痰痞氣。鼾鼻。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】吳普蜀本草論蕘仁曰。强志。明耳目。【唐】甄權藥性本草論蕘仁曰。治鼻齆。【唐】陳藏器本草拾遺論蕘仁曰。生治足睡。熟治不眠。【明】繆希雍本草經疏論蕘仁曰。蕘核神農味甘氣溫。別錄加微寒。無毒。氣薄味厚。入足厥陰經。厥陰爲風木之臟。開竅於目。風熱乘肝。則肝血虛而目爲之病。或爲赤痛腫傷。或爲淚出。皆爛。此藥溫能散風。寒能除熱。甘能補血。肝氣和而目疾悉瘳矣。其主心腹邪結氣者。卽邪熱氣也。熱則生痰。痰礙中焦。氣爲之痞。甘寒除熱。溫主通行。熱邪去而痰自不生。痰結解而氣自通暢矣。鼻齆者。熱在上焦心肺之分也。甘寒總能除上下之熱。故亦主之。非養性益精之藥。而云輕身益氣不飢者。未必然也。【清】黃宮繡本草求眞論蕘仁曰。蕘核眼科藥也。凡眼病多因風熱乘肝。以致血虛而目不得明。故病必見上下眼胞風腫弦爛。左右皆熱障翳。得此溫能散風。寒能勝熱。甘能補血。俾火退淚止。而目疾瘳矣。赤筋在翳膜外者。得此則宜。湯浸去皮尖。擘作兩片。芒硝、木通、通草同煎。一伏時。取出研膏入藥。

配合應用　㊀春雪膏。治肝虛風熱上攻。眼目昏暗。痒痛。隱澀。赤腫羞明。不能遠視。迎風有淚。多見黑花。用蕘仁去皮。壓去油二兩。腦子二錢半。研勻。生蜜六錢。和收點眼。（和劑局方）

㊁百點膏。治一切眼疾。蕘仁去油三錢。甘草。防風各六錢。黃連五錢。以三味煞取濃汁。次下蕘仁膏。日點。（孫氏集效方）

㊂撥雲膏。取下翳膜。蕘仁去油五分。青鹽一分。搗脆子五錢。共搗二千下。如泥。纏收點之。又方。蕘仁一兩。去油。入白蓬砂一錢。麝香二分。研勻收之。去翳妙不可言。

㊃飛血眼。蕘仁一兩。去皮。細辛半兩。苦竹葉三握。洗水二升。煎一升。濾汁。頻澄洗之。（聖濟總錄方）

㊄治赤爛眼。用蕘仁四十九個。去皮。胡粉煆如金色。一雞子大。研勻。入酥一杏仁許。龍腦三豆許。研勻。油紙裹收。每以麻子許。塗大小眥上。頻用取效。（近效方）又用蕘仁、杏仁各一兩。去皮研勻。入膩粉少許。爲丸。每用熱湯化洗。（經驗良方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無風熱者禁用。

參攷資料　㊀醫方惟以療眼。仙經以合守中丸也。（陶弘景）㊁按劉禹錫傳信方。所著治眼法最奇。云眼風痒。或生翳。或赤眥。一切皆主之。宣州黃連末。蕘核仁去皮。研膏。等分和勻。取無蚘乾棗二枚。割下頭。去核。以二物塡滿。却以割下頭合定。用少薄綿包之。大茶盞盛。於銀器中文武火煎。取一雞子大。以綿濾罐收。點眼。萬萬不失。前後試驗十數人。皆應。今醫家亦多

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用得效也。（蘇頌）㈢爾雅。槭。白椄。卽此也。其花實蕤蕤下垂。故謂之椄。後人作蕤。柞木亦名槭而物異。（李時珍）㈣蕤核生函谷川谷巴西（別錄）㈤今出彭城。大如烏豆。形圓而扁。有文理。狀似胡桃核。今人皆合殼用。此應破取仁秤之。（陶弘景）㈥今出雍州。樹生細葉。似栴杞而狹長。花白。子附莖生。紫赤色。大如五味子。莖多細刺。五月六月熟。採實日乾。（韓保昇）㈦今河東幷州亦有之。木高五七尺。莖間有刺。（蘇頌）㈧郭璞云。白椄小木也。叢生有刺。實如耳璫。紫赤可食。卽此也。（李時珍）

【蕤核】卽蕤仁之原名。詳『蕤仁』條。

【蕤核仁】卽蕤仁之處方用名。詳『蕤仁』條。

【蕨】

命名　本品初生無葉。狀如雀足之拳。又如人足之蹶。故名。

古籍別名　鼈。苗名蕨芽。（綱目）

外國名詞　Pteridium aquilinum, Kuhn.（拉丁）ワラビ

（日本）

基本　係羊齒科蕨屬。爲蕨之根。

產地　山野多有之。

形態　蕨爲菜類之多年生草本。莖長個個於地。隨處生葉。葉大。爲數回複葉。長三四尺。小葉有缺刻。初夏葉之下面緣邊生繁殖器。根甚長。色紫。皮內有白色澱粉。搗爛澄取。謂之蕨粉。色淡紫。故根可供食與藥用。

性質　甘。寒。滑。無毒。

主治　燒灰油調傅蛇蟲螫傷。

【蕨芽】

基本　本品爲蕨苗與莖之乾者。

採取　春夏間採苗莖之嫩者。以灰湯煠去涎滑。曬乾作蔬茹與藥用。

性質　甘。寒。滑。無毒。

主治　去暴熱。利水道。令人睡。

歷代記述弦證　【唐】孟詵食療本草論蕨芽曰。補五臟。不足氣。壅經絡。筋骨間毒氣。

參弦資料　㈠蕨久食令人目暗。鼻塞。髮落。又冷氣人食多腹脹。小兒食之。脚弱不能行。（孟詵）㈡蕨多食消陽氣。故令人睡。弱人脚。四皓食芝而壽。夷齊食蕨而夭。固非良物。干寶搜神記云。郤鑑鑛丹徒。二月出獵。有甲士折蕨一枝食之。覺心中淡淡成疾。後吐一小蛇。縣屋前。漸乾成蕨。遂明此物不可生食也。（陳藏器）㈢蕨之無益。爲其性冷而滑。能利水道。洩陽氣。降而不升。耗人眞元也。四皓採芝而心逸。夷齊採蕨而心憂。其壽其夭。於蕨何與焉。陳公之言。可謂迂哉。然饑人瀕死。賴蕨延活。又不無濟世之功。（李時珍）

【蕩部】卽蕩魚之俗名。詳『蕩魚』條。

【蕩魚】卽杜父魚之別名。詳『杜父魚』條。

【蕪荑】

原名　蕪荑。

命名　本品乃榆樹之莢。莢者實也。故名。

處方用名　臭蕪荑。白蕪荑。

古籍別名　蕪荑仁（爾雅）。無姑仁（本經）。麋謨。仁。山榆莢。（綱目）姑榆仁。凝藤仁。（和漢藥考）

基本　屬山榆科。爲蕪荑之子仁。

產地　陳仁山藥物生產辨云。蕪荑產直隸西陵。乃柯樹之花開殘落地。卽用該地之泥。弄成片塊。曬乾是也。氣味臭而撲鼻。

形態　蕪荑爲落葉喬木。自生於山野川谷。其狀如榆。葉圓而厚。莢氣臭如狐。

採取　三月採實陰乾。

用法　凡使當用大者。蓋小者榆莢仁也。尤以陳久者良。炒去殼用。其氣羶。

性質　辛。平。無毒。

效能　散風澄消蟲積。用爲小兒殺蟲消疳藥。

主治　五內邪氣。散皮膚骨節中淫淫溫行毒。去三蟲。化食。（本經）逐寸白。散腸中喘喘息。（別錄）

歷代記述弦證　【唐】韓保昇曰。本草論蕪荑曰。主積冷氣。心腹癥痛。除肌膚節中風。淫淫如蟲行。【唐】孟詵食療本草論蕪荑曰。五臟皮膚肢節邪氣。長食治五痔。殺中惡蟲毒。諸病不生。【唐】李珣海藥本草論蕪荑曰。殺蟲止痛。治婦人子宮風虛。孩子疳瀉冷痢。得訶

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子、豆蔻良。【宋】大明諸家本草論蕪荑曰。治腸風痔瘻及惡瘡疥癬【明】繆希雍本草經疏論蕪荑曰。蕪荑本經咏辛氣平。無毒。甄權加苦。李珣加溫。詳其功用。應是苦辛溫平之藥。非辛溫則不能散。五臟皮膚骨節中邪毒氣。非苦平則不能去。三蟲化食逐寸白。療腸中唱唱喘息。然察其所主。雖能除風淫邪氣之爲害。而其功則長於走腸胃。殺諸蟲消食積也。故小兒疳瀉冷痢爲必資之藥。【清】黃宮繡本草求眞。論蕪荑曰。蕪荑味辛而苦。氣溫無毒。功專燥脾去風。化食殺蟲。緣蟲生於人腹。多口涎爲之兆。濕爲之得。風爲之助。寒爲之成。直指方云。嗜酒人血入於酒爲酒鼈。多氣人血入於氣爲氣鼈。虛勞人敗血雜痰爲血鼈。搖頭掉尾。如蟲之行。上侵人咽。下蝕人肛。或附脇背。或隱胸腹。大則如鼈。小則如錢。治法惟當用此煎服。兼用煖胃益氣理中之類。乃可殺之。且不獨殺蟲。如是即其皮膚骨節。溼熱內入。留連不解。以致穢垢不清。得以合其辛散等藥。亦能去風除溼。而使氣血調和。肢節安養。而無攣瘓痺之候矣。奈世僅知掃蟲殺蟲。而不知此更散皮膚骨節淫溼。其亦未達本經之旨耳。形類榆莢。陳久氣味者良。

配合應用　㊀和豬脂搗塗熱瘡。和蜜治溼癬。和猪牛酪或馬酪治一切瘡。

㊁同肉豆蔻、胡黃連、訶子、青黛、五穀蟲、雷丸、檳榔、橘皮治小兒疳熱瀉痢及腹大羸瘦。面黃好喫泥土。

㊂治脾胃有蟲。食卽作痛。面黃無色。以石州蕪荑仁二兩。和麵炒黃色。研爲末。非時米飲服二錢七。（千金方）

㊃制殺諸蟲。生蕪荑、生檳榔各四兩爲末。蒸餅丸梧子大。每服二十丸。白湯下。（本事方）

㊄治疳熱有蟲。瘦悴久服。充肥。用榆仁一兩。黃連一兩爲末。豬膽汁七枚。和入盌內。飯上蒸之。一日蒸一次。九蒸乃入麝香半錢。湯浸蒸餅和丸。綠豆大。每服五七丸。至二十丸。米飲下。（錢氏小兒方）

㊅治小兒蟲癇。胃寒蟲上諸證。危惡與癇相似。用白蕪荑、乾漆、燒存性。等分爲末。米飲調服一字至一錢。（杜壬方）

㊆治結陰下血。蕪荑一兩。搗爛。紙歷去油爲末。以雄豬膽汁丸梧子大。每服九丸。甘草湯下。日五服。三日斷根。（普濟方）

㊇治脾胃氣泄。久患不止。蕪荑五兩。搗末。飯丸梧子大。每日空心午飯前陳米飲下三十丸。久服去三尸。益神駐顏。（王紹顏續傳信方）

㊈治膀胱氣急。宜下氣。用蕪荑搗和食鹽末等分。以綿裹如棗大。納下部。或下惡汁。並下氣佳。（外臺祕要方）

㊉肥兒丸。治嬰孩齩齒。風後失痞。不能言。用蕪荑炒神麴炒。麥蘗炒。黃連炒各一錢爲末。猪膽汁打糊丸。黍米大。每服十丸。木通湯下。黃連能去心竅惡血。（全幼心鑑方）

㊊治蟲牙作痛。以蕪荑仁安蛀孔中及縫中甚效。（危氏得效方）

㊋治腹中鼈瘕。平時嗜酒。血入於酒則爲酒鼈。平時多氣。血凝於氣則爲氣鼈。虛勞痼冷。敗血雜痰。則爲血鼈。搖頭掉尾。如蟲之行。上侵人咽。下蝕人肛。或附脇背。或隱胸腹。大則如鼈。小或如錢。治法惟用蕪荑煎服之。兼用暖胃益血理中之類。乃可殺之。若徒事雷丸錫灰之類。無益也。（仁齋直指方）

用量　錢半至二錢。

施用宜忌　凡脾胃虛弱及無蟲積者禁用。

著名方劑　蕪荑散。治蟲咬心痛。欲驗之。大痛不可忍。或吐青黃綠水涎沫。或吐蟲發有休止。（古方）蕪荑雷丸各半兩。乾漆（研碎炒烟盡）一兩。上共爲末。每服三錢。調和服。

參攷資料　㊀按說文云。櫰山枌榆也。有刺。實爲蕪荑。爾雅云。無姑。其實蕪。又云。蕪荑。蔫櫰。則此物乃櫰樹之實。故名也。（李時珍）㊁蘘蕘乃蕘蘼二字之誤。（蘇頌）㊂蕪荑生晉山川谷。三月採實陰乾。（別錄）㊃今惟出高麗。狀如榆莢。氣臭如狐。彼人皆以作醬食之。性能殺蟲置物中。亦辟蛀。但患其臭。（陶弘景）㊄今延州同州者甚好。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（蘇恭）㈥河東河西。處處有之。（馬志）㈦近道亦有之。以太原者良。大抵榆類而差小。其實亦早成。此榆乃大氣臭。郭璞爾雅注云。無姑姑榆也。生山中。葉圓而厚。剝取皮合漬之。其味辛香。所謂蕪荑也。採實陰乾用。今人又多取作屑。以荄五味。惟陳者良。人收藏之多以鹽漬。則失氣味。但宜食品。不堪入藥。（蘇頌）㈧按廣州記云。生大秦國。是波斯蕪荑也。（李珣）㈨蕪荑有大小兩種。小者即榆莢也。採取仁。醃爲醬。味尤辛。人多以外物相和。不可不擇去之。入藥皆用大蕪荑。別有種。（李時珍）

【蕪荑醬】性　質　辛。溫。微臭。無毒。

主　治　殺三蟲。功力强於榆仁醬。

參攷資料　㈠蕪荑醬多食落髮。（綱目）㈡北人亦多食乳酪酥脯。甘美之物。皆生蟲之萌也。而不生蟲者。蓋食中多胡荽。蕪荑。鹵汁。殺九蟲之物也。（張從正）

【蕪菁】古籍別名　蔓菁。（唐本草）九英菘（食療）諸葛菜。（綱目）大芥。（揚雄方言）

外國名稱　Brassica campestris, L.（拉丁）カブラ（日本）

基　本　係十字花科。蔓菁屬之蕪菁。

產　地　園圃多有之。

形　態　蕪菁爲菜類之一年或越年生草本。根多肉。有扁圓或稍長者。葉大。略似匙狀。緣邊微有缺刻。春開黃花。總狀花序。似薹薹花。結實爲長莢。莢中有種子。其根可供藥用。



蕪菁

性　質　苦。溫。無毒。

主　治　利五臟。輕身益氣。可長食之。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論蕪菁曰。消食下氣。治噦止。消渴。去心腹冷痛及熱毒風腫。乳癰。妬乳。寒熱。【宋】蘇頌圖經本草論蕪菁曰。常食通中。令人肥健。

參攷資料　㈠蔓菁是芥屬。根長而白。其味辛苦而短。莖粗葉大而厚。闊。夏初起薹。開黃花。四出如芥。結角亦如芥。其子均圓。宛似芥子。而紫赤色。蘆頭是菘屬。根圓。亦有長者。有紅白二色。其味辛甘而永。葉不甚大而糙。亦有花葉者。夏初起薹。開淡紫花。結角如蟲狀。腹大尾尖。子似胡虛巴。不均不圓。黃赤色。如此分之。自明白矣。其蔓菁六月種者。根大而葉蠹。八月種者。葉美而根小。惟七月初種者。根葉俱良。擬賣者。純種九英。九英。根大而味短。創淨爲菹。甚佳。今燕京人以瓶醃藏。謂之閉瓮菜。（李時珍）㈡九英菘出河西。葉大根亦粗長。和羊肉食甚美。常食都不見發病。冬日作菹煮羹食。消宿食。下氣。治噦。諸家商略其性冷。而本草云溫。恐誤也。（孟詵）㈢蕪菁多食動氣。（寇宗奭）

【蕪菁子】性　質　苦。辛。平。無毒。

主　治　明目。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論蕪菁子曰。療黃疸。利小便。水煮汁服。主癥瘕積聚。少少飲汁。治蠱亂。心腹脹。爲末服之。主目暗。爲油入面膏。去黑黯皺文。【唐】陳藏器本草拾遺論蕪菁子曰。和油傅蜘蛛咬。【唐】孟詵食療本草論蕪菁子曰。壓油塗頭。能變蒜髮。【唐】薦炳四聲本草論蕪菁子曰。入丸藥服。令人肥健。尤宜婦人。

參攷資料　㈠仙經言。蔓菁子九蒸九曝。擣末長服。可斷穀長生。蜘蛛咬者。恐毒入內。擣末酒服。亦以油和傅之。蔓菁園中無蜘蛛。是其相畏也。（陳藏器）㈡蔓菁子可升可降。能汗。能吐。能下。能利小便。又能明目。解毒。其功甚偉。而世罕知用之。何哉。夏初採子。炒過榨油。同蔴油鍊熟。一色無異。西人多食之。點燈甚明。但烟亦損目。北魏祖瑗囚地窖中。因蕪菁子油燈傷明。即此也。（李時珍）

【蕪菁花】採　取　三月間採之。採得陰乾。研末用。

性　質　辛。平。無毒。

主　治　療虛勞。明眼目。久服長生。

【蕪菁葉】性　質　苦。溫。無毒。

主　治　消食下氣。利

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

臟腑。治咳嗽。塗小兒頭禿。點飛絲入目。

【蠆草】卽狼尾草之古籍別名。典見爾雅。詳『狼尾草』條。

【蕭折魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮑魚』條。

【蔘纏】卽蔘纏之古籍別名。典見郭璞賦。詳『蔘纏』條。

【蕺】卽商麻之古籍別名。典見綱目。詳『商麻』條。

【蘋纏】卽蔘纏之古籍別名。典見爾雅。詳『蔘纏』條。

【蘆藤】卽木通之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木通』條。

【蘑】卽三稜之古籍別名。典見呂忱字林。詳『三稜』條。

【蘑】卽萹蓄之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萹蓄』條。

【蘑】卽萱草之古籍別名。典見詩經。詳『萱草』條。

【蘑根】卽蘆根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘆根』條。

【蠑貓骨】卽虎骨之古籍別名。典見綱目。詳『虎骨』條。

【螬蛎】卽蟲蠹之古籍別名。典見爾雅。詳『蟲蠹』條。

【螃蟹】卽蟹之古籍別名。典見蟹譜。詳『蟹』條。

【螬蛮蟲】卽斑貓之古籍別名。典見本草拾遺。詳『斑貓』條。

【螗蟷】卽桑螵蛸之古籍別名。典見綱目。詳『桑螵蛸』條。

【螞蝓】卽蝸牛之古籍別名。典見爾雅。詳『蝸牛』條。

【螞蜂】卽寄居蟲之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『寄居蟲』條。

【螗蜩】卽蟬花之古籍別名。典見毛詩。詳『蟬花』條。

【螞蝪】卽蟲蠹之古籍別名。典見王立人簡易方。詳『蟲蠹』條。

【螞螳】卽水蛭之俗名。詳『水蛭』條。

【螢火】

古籍別名　夜光。（本經）燐燿卽炤夜炤景天。救火。擾火。挾火。（吳普）宵燭。（古今注）丹鳥。（綱目）

外國名稱　Luciola Vittico-ollis, Kies. Eire-ry（拉丁）ホタル或ケンジボタル或オホホタル（日本）

基本　係節肢動物昆蟲類鞘翅類螢科之蟲。

產地　生原澤溼地間。

形態　螢爲化生蟲類之一種。其體狹長。長約三分。雄者體黃頭黑。有複眼。翅鞘柔輭。點線密布。雌者無翅。其形如蚓。尾端皆有發光器。呼吸時空氣傳生養化作用。而發燐光。晝隱草叢。入夜飛出。約月許則化爲蟲。蟲能覓食害蟲。亦爲益蟲之一。又可供藥用。

種類　㈠小而背飛腹下光明。乃茅根所化。所謂腐草化爲螢者是也。㈡長如蚓蠋。尾後有光。無翼不飛。乃竹根所化。一名蠋。俗名螢蚓。所謂腐草化爲蠋者是也。㈢居水畔池邊者。所謂水螢是也。

採取　凡入藥須以飛螢七月七日採之。陰乾用。

性質　辛。微溫。無毒。

主治　明目。（本經）小兒火瘡傷熱氣。蟲毒鬼疰。通神精。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論螢曰。療青盲。

參攷資料　螢火能辟邪明目。蓋取其炤幽夜明之義耳。神仙感應篇載務成螢火丸事蹟甚詳。而龐安常總病論。亦極言其效驗云。曾試用之。一家五十餘口。俱染疫病。惟四人帶此者不病也。許叔微傷寒歌亦稱之。予亦恒欲試之。因循未暇耳。羅翁爲蘇黃器重友。想不虛言。神仙感應篇云。務成子螢火丸主辟疾病。惡氣。百鬼。虎狼。蛇鴞。蜂蠆諸毒。五兵白刃。盜賊兇害。昔漢冠軍將軍武威太守劉子南。從道士尹公受得此方。永平十二年於北界與虜戰。敗績。士卒略盡。子南被圍。矢下如雨。未至子南馬數尺。矢輒墜地。虜以爲神。乃解去。子南以方敎子弟爲將。皆未嘗被傷也。漢末。青年道士得之。以傳安定皇甫隆。隆以傳魏武帝。乃稍有人得之。故一名冠將丸。又名武威丸。用螢火。鬼箭羽。蒺藜各一兩。雄黃。雌黃各二兩。斐羊角煨。存性。一兩半。礬石火燒二兩。鐵鉼柄入鐵處燒。焦一兩半。俱爲末。以雞子黃丹雄雞冠一具。和搗千下。丸如杏仁。作三角絳囊盛五丸。帶於左臂上。從軍繫腰中。居家掛戶上。可辟盜賊也。（李時珍）

【螯休】卽甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘遂』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鼓】卽蠔蛤之古籍別名。典見本經。詳『蠔蛤』條。

【衛矛】命名　本品幹有直羽。如箭矛刃自衛之狀故名。

處方用名　鬼箭羽。

古籍別名　鬼箭（別錄）神箭（廣雅）錦木（日本）六月凌（俚名）枸骨（綱目）

外國名詞　Euonymus alatus, K. Koch.（拉丁）ニシキギ（日本）マユミ（日本）

基本　係衛矛科。衛矛之枝幹。

產地　陳仁山藥物生產辨云。鬼箭羽以廣東陽江、惠州、博羅等處產者爲幼細。廣西各屬產者粗條。



衛矛

形態　衛矛爲落葉灌木。高丈許。莖有羽狀突起。葉對生。橢圓形。邊緣有鋸齒。至秋葉色變紅。頗豔美。夏月開小花。黃綠色。作聚繖花序。果爲蒴果。至秋成熟則開裂。現出種子。外圍有赤色之被包。樹皮供製紙料。木材供細小工之料。亦充藥用。

採取　八月採之。陰乾。

製法　雷敎曰。採得只使箭頭。用拭去赤毛。以酥拌緩炒。每一兩用酥二錢半。

性質　苦。寒。無毒。

效能　破瘀。行血。用作通經藥。又爲殺蟲辟惡藥。

主治　女子崩中下血。腹滿汗出。除邪殺鬼毒蟲疰（本經）中惡腹痛。去白蟲。消皮膚風毒腫。令陰中解（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭　新修本草論衛矛曰。療婦人血氣大效。【唐】甄權　藥性本草論衛矛曰。破陳血。能落胎。主百邪鬼魅。【宋】大明　諸家本草論衛矛曰。通月經。破癥結。止血崩帶下。殺腹臟蟲及產後血咬腹痛。【明】李士材　本草圖解論衛矛曰。衛矛卽鬼箭羽。苦寒無毒。攻腹痛。破瘕結。【清】楊時泰　本草述鈎元論衛矛曰。本經鬼箭羽。似專功於女子之血分。蘇頌所述古方。更似專功於惡疰及中惡氣之毒。以病於血者。第方書治女子經閉有牡丹皮散。而治男子脹滿有見凌丸。則固非專治女子血病也。大抵其功力專於血分。女子以血爲主。較之取效於男子更爲切中耳。

配合應用　㊀治產後敗血。兒枕塊硬。疼痛發歇。及新產乘虛。風寒內搏。惡露不快。臍腹堅脹。當歸散。用當歸炒。鬼箭去心中木。紅藍花各一兩。每服三錢。酒一大盞。煎七分。食前溫服。（和劑局方）㊁治鬼瘧日發。鬼箭羽、鯽鯉甲、燒灰二錢半。爲末。每以一字。發時嗑鼻。又法。鬼箭羽末一分。砒霜一錢。五靈脂一兩。爲末。發時冷水服一錢。（聖濟總錄方）

用量　錢半至二錢。

施用宜忌　凡無瘀積者禁用。

參攷資料　㊀古方　崔氏療惡疰在心。痛不可忍。有鬼箭羽湯。姚僧垣集驗方。療卒暴心痛。忽中惡氣毒痛。大黃湯亦用之。並大方也。見外臺祕要千金諸書中。（蘇頌）胸中。或偏於少腹。或連於脇肘者。四物湯四兩。倍當歸。加鬼箭、紅花、玄胡索各一兩。爲末。煎服。（李時珍）㊁衛矛生霍山山谷。八月採陰乾。（別錄）㊂葉如桃。箭如羽。正月二月七月採。陰乾。或生用。野間（吳普）㊃山野處處有之。削取皮羽入藥。爲用甚稀。（陶弘景）㊄今江淮州郡亦或有之。三月以後生莖。莖長四五尺許。其幹有二羽狀如箭翎。葉似山茶。青色。八月十一月十二月採。條莖陰乾。其木亦名枸骨。（蘇頌）㊅所在山谷皆有。平陸未嘗見也。葉經少。其莖黃褐色。若蘗皮。三面如鋒刃。人家多燔之。遺崇方藥少用。（寇宗奭）㊆鬼箭生山石間。小株成叢。春長嫩條。條上四面有羽。如箭羽。視之若三羽。耳。青葉狀似野茶。對生。味酸澁。三四月開碎花。萎綠色。結實大如冬青子。山人不識。惟樵採之。（李時珍）㊇衛矛　湖南俚醫謂之六月凌。又植物名實圖考。曲節草條下謂鬼箭羽。湖南呼爲六月冷。或恐一物。因本草綱目有曲節草一名六月凌。六月雪。故疑曲節草與衛

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

矛爲一物也。按本草綱目曲節草又有綠豆青蛇藍諸名。與衞矛分列。衞矛入木部。曲節草入草部。植物名實圖考亦列衞矛入木類。曲節草入濕草類。徒以二物均有六月凌之名。故疑爲一物。實則二書所載曲節草。圖與衞矛之形態不同。當非同物也。（植物學大辭典）

【衞足】　卽蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜀葵』條。

【衞足葵】　卽蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜀葵』條。

【衞輿】　卽茵芧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茵芧』條。

【褥水簾】　卽浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【褰鼻蛇】　卽白花蛇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白花蛇』條。

【親晨粧】　卽白桃花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白桃花』條。

【諫果】　卽橄欖之古籍別名。典見農書。詳『橄欖』條。

【諸乘】　卽蜻蜓之古籍別名。典見本草集註。詳『蜻蜓』條。

【諸葛菜】　卽蕪菁之古籍別名。典見綱目。詳『蕪菁』條。

【諼草】　卽萱草之古籍別名。典見毛詩。詳『諼草』條。

【諸藤斷】　卽續斷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『續斷』條。

【豫】　卽烏桕之古籍別名。典見綱目。詳『烏桕』條。

【豬心】　性質　甘。鹹。平。無毒。

主治　驚邪憂志。

歷代記述致證　【唐】孫思邈千金翼論豬心曰。虛悸氣逆婦人產後中風。血氣驚恐。【唐】蘇恭新修本草論豬心曰。五臟主小兒驚癎。【宋】蘇頌圖經本草論豬心曰。補血不足虛劣。

參致資料　豬心多食耗心氣。不可合臭柒黃食。（蘇頌）豬水畜也。故心可以鎭恍惚。（劉完素）

【豬心血】　主治　驚癎癲疾。調硃砂末服。

歷代記述致證　【明】李時珍本草綱目論豬心血曰。治卒惡死。及痘瘡倒靨。

參致資料　古方治驚風。癲癎。痘疾。多用豬心血。蓋以心歸心。以血導血之意。用尾血者。取其動而不息也。豬爲水畜。其血性寒。而能解毒制陽故也。韓飛霞云。豬心血能引藥入本經。實非其補。沈存中云。豬血得龍腦直入心經。是矣。（李時珍）

【豬毛】　主治　燒灰。麻油調塗湯火傷。留毿出毒。則無瘢。

【豬牙石】　命名　本品文理如豬牙。故名。

產地　出西番諸地。

形態　豬牙石爲石類之一種。其色棗紅。可供藥用。

主治　明目去翳。

【豬牙皁莢】　卽皁莢之小如豬牙者。詳『皁莢』條。

【豬牙草】　卽鱧腸之古籍別名。典見綱目。詳『鱧腸』條。

【豬石子】　卽豬卵之古籍別名。典見別錄。詳『豬卵』條。


【豬耳子】　卽蒼耳子之古籍別名。典見綱目。詳『蒼耳子』條。

【豬耳垢】　主治　蛇傷狗咬。塗之。

【豬肉】　命名　豕爲豬類之總稱。字象毛足而後有尾形。故名豬。本品爲豬之肌肉。

古蹟別名　豕肉。豚肉。（本經）璅肉。猳肉。豨肉。腶肉。（綱目）剛鬣肉。（禮記）參軍肉。（雀豹古今注）

形態　豬爲家畜類動物。乃野豬之變種。其體肥滿。鼻長尾短。全身黑色。毛粗且硬。性喜不潔。恒在穢泥水溼之地而臥伏。取冷。每年生產二次。每次可產十餘頭。故繁殖甚速。肉供吾人食用。常品。其臟腑骨髓皮毛等。又可供藥用。



豬

製法　凡使豬肉。煮取清汁。或煮成膏用。

性質　酸。冷。無毒。

效能　益胃陰。補虛羸。用作滋養强壯藥。

主治　療狂病久不愈。

歷代記述致證　【唐】陳藏器本草拾遺論豬肉曰。壓丹石。解熱毒。宜肥熱人食之。【唐】孫思邈千

789／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金匱論豬肉曰。補胃氣虛竭。【宋】日華諸家本草論豬肉曰。療水銀風。并中土坑惡氣。【清】黃宮繡本草求眞論豬肉曰。豬肉味雖鹹。永食之能潤腸胃。生津液。豐肌體。澤皮膚。爲補肉補形之要味。然性屬陰物。凡人臟氣純陽。火盛水衰。服則以水濟火。血脈周流。自有豐體澤膚之妙。若使臟體純陰。少食或未見損。多食必有阻滯。助熱生痰。動風作瀉之虞耳。況風寒初感。血脈有礙。其於豬肉固不可食。久病初愈。血後。其於豬肉更不宜食。雖曰先王敎民。畜爲先。非是厲民。又胡不聞大易之頤有云。宜節飲食乎。

近人學說　丁福保曰。豬肉爲亞於牛肉之貴重肉類。歐洲諸國消費之額。平均之每日每人當於二十八錢餘。日本則有嫌忌之風。而需用甚稀。蓋豬肉常因一種之寄生蟲而生條蟲食之殊爲危險。其原因多由飼法之不熟練。或不注意之所致也。然豬肉最富於脂肪。食用以外。得其利益者頗多。分析之則其成分爲水分五五蛋白質一四。脂肪二八。鹽類二六。比之牛肉雖稍劣。而亦不至遽下。最適於貯藏。爲食肉中之第一等。又適於臘乾或鹽漬。外人之貴重豬肉良有以也。其效能不獨供於食用。且其脂肪於器械上亦大有效用。屠一頭之豚。可得多量之肉骨腸皮毛等。可爲特效之肥料。其他用途甚多。無用而廢棄者殊少。其飼育法甚易。人人得而爲之。除金石以外。無不可爲其食料。又因其爲動物。故以廢棄物爲飼料已可。世俗常言無家畜者無肥料。蓋農家肥料第一之製造者。實家畜也。惟對於豚肉之調理不得相宜。則與不消化物相同。無益於營養。而反有害。故食豚肉者宜選精良之品。於高度之熱而煮熟。注意以調理爲要。飼料雖用廢棄物而已足。然亦不可不加選擇。凡脂肪質最强者。必因飼料之惡劣。其肉食之有害。最良而最適當者。以小麥、玉蜀黍粉甘藷、馬鈴薯等爲第一。魚獸肉之腐敗者。使多量食之。則僅增其脂肪分。而不能得良肉。於製造臘乾最不適當。故以甘藷馬鈴薯之莖根蕪菁南瓜醬油渣之類。溶和於水而與食爲良。其他富於澱粉者爲最良。但喜胡椒之類。決不可與食。

配合應用　㊀治禁口痢疾。臘肉臛煨熟食之妙。（李樓奇方）

㊁治小兒刮腸痢疾禁口閉目。至重者。精豬肉一兩。薄切炙香。以腻粉末半錢。鋪上令食。或置鼻頭聞香。自然要食也。（活幼口議方）

㊂治上氣咳嗽煩滿。用豬肉切作鎚子。豬脂煎熟食之。（食醫心鏡方）

㊃治浮腫脹滿不食。用豬脊肉一雙。切生以蒜薤食之。（食醫心鏡方）

㊄治身腫攻心。用生豬肉以漿水洗壓乾。切膾。蒜薤啖之。一日三次。下氣去風。乃外國方也。（張文仲方）

㊅治破傷風腫。新殺豬肉。乘熱割片。貼患處。連換三片。其腫立消。（簡便方）

㊆治風狂歌笑。行走不休。用腹豬肉一斤。煮熟切膾。和醬食。或羹粥炒任服之。（食醫心鏡方）

㊇解丹石毒。發熱困篤。用肥豬肉五斤。葱薤半斤。煮食。或作臛食。必腹鳴毒下。以水潮之。沙石盡則愈。（千金方）

㊈解鐘乳毒。下利不止。食豬肉則愈。（千金方）

㊉服石英法。白石英一斤。袋盛。水三斗。煎四升。以豬肉一斤。鹽豉煮食。一日一作。（千金方）

㊊治傷損不食。凡打撲傷損三五日。水食不入口。用生豬肉二大錢。打爛。溫水洗去血水。再擂爛。以陰陽湯打和。以半錢用雞毛送入咽內。却以陰陽湯灌下之。其食蟲聞香覺開。瘀血而上。胸中自然開解。此乃損血凝聚。心間蟲食血飽。他物蟲不來探故也。謂之驅通之法。（邵氏方）

㊋治打傷青腫。用炙豬肉揚之。（千金方）

㊌治小兒重舌。取三家屠肉。切指大。摩舌上。兒立啼。（千金方）

㊍治小兒瘡瘡。豬肉煮汁洗之。（譚氏方）

㊎小兒火丹。豬肉切片貼之。

㊏治漆瘡作瘡。宜啖豬肉嚼葉。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

穀塗之(千金方)

㊐治男女陰蝕。肥豬肉煮汁洗。不過二十斤瘥。(千金方)

㊑治山行辟蛭。山中草木枝上。有石蛭着人足。則穿肌入肉中害人。但以臘豬膏和鹽塗足脛趾。即不着人也。(千金方)

㊒治竹刺入肉多年。爛肉。切片包裹之。即出。(救急方)

用量　一匙至二匙。

施用宜忌　凡有風熱痰火者禁用。反烏梅。桔梗。黃連。犯之則瀉痢。

參攷資料　㈠按錢乙法。小兒疳病。麝香丸。以豬膽和丸。豬肝湯服。疳渴者。以豬肉湯或煉豬湯服。其意蓋以豬屬水而氣寒。能去火熱耶。(李時珍)㈡豬爲用最多。惟肉不宜多食。令人暴肥。蓋虛風所致也。(陶弘景)㈢豬肉滯氣。世俗以爲補誤矣。惟補陽爾。今之虛損者不在陽而在陰。以肉補陰。是以火濟水。蓋肉性入胃。便作溼熱。熱生痰。痰生則氣不降。而諸證作矣。諺云。豬不喪食之。發大風。中年氣血衰。面發黑黯也。(朱震亨)㈣凡肉有補。惟豬肉無補。人習之訛也。(韓悉)㈤服豬肉治疾。凡豬肉能閉血脈。弱筋骨。虛人肌不可久食。病人金瘡者尤甚。(別錄)㈥他豬肉久食。令人少子精。發宿病。豚肉久食。令人漏體筋肉碎痛乏氣。江豬多食。令人體重。作脯少有腥氣。(孫思邈)㈦久食殺藥動風發疾。傷寒癘疾疾病痔漏諸疾食之必再發。(孟詵)㈧按揚雄方言曰。燕朝鮮之間謂豬爲豭。東謂之豶。或曰豕。南楚曰豨。吳揚曰豬。其實一種也。禮記謂之剛鬣。崔豹古今注謂之參軍。(蘇頌)㈨凡豬骨細筋多高大。有重百餘斤。食物至夏甚易畜養。甚易生息。(蘇頌)㈩豬雖天下畜之。而各有不同。生青兗徐淮者耳大。生燕冀者皮厚。生梁雍者足短。生遼東者頭白。生豫州者味短。生江南者耳小。謂之江豬。生嶺南者白而極肥。豬孕四月而生。在畜屬水。在卦屬坎。在禽應室星。(李時珍)(11)溫疫症邪火已衰。津不能回者。宜用鮮豬肉數斤。切大塊。急火煮清湯。吹淨浮油。恣意涼飲。乃急救津液之無上妙品也。(溫熱經緯)(12)汪赤厓治張姓夏月遂行受暑。醫藥半月。水漿不入。大便不通。唇焦舌黑。骨立皮乾。目合肢冷。診脈模糊。此因邪熱薰灼。津血已枯。形肉已脫。亡可立待。若僅以草木根皮滋養氣血。何能速生。囑市豬肉與粳米煮汁一晝夜。呷盡。目微開。手足微動。喉間略有呻吟。如是者三日。脣舌轉潤。退去黑殼一層。始開目能言。是夜下燥屎。脈稍應指。再與養陰匝月而愈。(名醫類案)

【豬舌】　主治　健脾。補不足。令人能食。和五味煮汁食。

【豬血】　性質　鹹。平。無毒。

主治　生血。療貧豚暴氣。及海外瘴氣。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論豬血曰。中風絕傷。頭風眩暈。及淋瀝。【唐】孫思邈千金翼論豬血曰。卒下血不止。清酒和炒食之。【明】吳瑞日用本草論豬血曰。壓丹石。解諸毒。【明】李時珍本草綱目論豬血曰。清油炒食。治嘈雜有蟲。

參攷資料　㈠服地黃。何首烏諸補藥者忌之。云能損陽也。同黃豆食。滯氣。(李時珍)㈡按陳自明云。婦人嘈雜。皆血液涎汗變而爲痰。或言是血嘈。多以豬血炒食而愈。蓋以血導血歸原之意爾。此固一說。然亦有蚘蟲作嘈雜者。蟲得血腥。則飽而伏也。(李時珍)

【豬血丹參】　即丹參用豬血拌成者之處方用名。詳『丹參』條。

【豬卵】　基本　本品即牡豬之外腎。

古籍別名　豚顛。(本經)豬石子。(別錄)

採取　以幼豬者良。

製法　採得陰乾藏之。勿令敗壞用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　驚癇。癲疾。鬼疰。蠱毒。除寒熱。賁豚。五癰。邪氣。變緒。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論豬卵曰。除陰蝨中痛。【明】李時珍本草綱目論豬卵曰。治陰陽易病。少腹急痛。用熱酒吞二枚即瘥。

【豬尾】　主治　臘月者燒灰。水服。治喉痺。和豬脂塗赤

791／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

禿髮落。

【豬肚】原名　豬胃。

性質　甘。微溫。無毒。

主治　補中益氣。止渴斷暴痢。虛弱。

歷代記述攷證　【魏】吳普本草論豬肚曰消積聚。癥瘕。治惡瘡。【宋】日華諸家本草論豬肚曰補虛損。殺勞蟲。釀黃糯米蒸搗爲丸。治勞氣。幷小兒疳蚘黃瘦病。【宋】蘇頌圖經本草論豬肚曰主骨蒸熱勞。血脈不行。補羸助氣。四季宜食。

配合應用　㊀治水瀉不止。用豬肚一枚煮爛。入平胃散搗丸服效。（普濟方）㊁豬肚黃連丸。治消渴。用雌豬肚一枚。入黃連末五兩。梧樓根白粱米各四兩。知母三兩。麥門冬二兩。縫定。蒸熟搗丸。梧子大。每服三十丸。米飲下。（仲景方）

參攷資料　㊀豬水畜而胃屬土。故方藥用之補虛以胃治胃也。（李時珍）㊁豬胃乃豬一身無害之物。爲補胃之要品。脾胃得補。則中氣益利。自止矣。日華子主補虛損。蘇頌主骨蒸勞熱。血脈不行。皆取其補益脾胃。則精血自生。虛勞自愈。根本固而後五臟皆安也。（纂希雍）

【豬肝】性質　苦。溫。無毒。

主治　小兒驚癇。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論豬肝曰。作生臉。以薑醋食。主腳氣。當微洩。若先利。卽勿服。【宋】蘇頌圖經本草論豬肝曰。治冷勞臟虛。洩久滑。赤白帶下。以一葉薄批掘着。訶子末炙之。再掘再炙。盡末半兩。空腹細嚼。陳米飲送下。【明】李時珍本草綱目論豬肝曰。補汗明目。療肝虛浮腫。

參攷資料　㊀肝主藏血。故諸血病用爲嚮導。入肝子金。治痢疾有豬肝丸。治脫肛有豬肝散。諸眼目方多有豬肝散。皆此意也。（李時珍）㊁餌藥人不可食之。合魚繪食生癰疽。合鯉魚腸子食。傷人神。合鷄鵝食生面黯。延壽書云。豬臨殺驚氣入心。絕氣歸肝。俱不可多食。必傷人。（李時珍）

【豬肝赤】卽赤豆之別名。詳『赤小豆』條。

【豬乳】採取　李時珍曰。取法須剔豬。待兒飲乳時。提後脚。急以手捋而承之。非此法不得也。

性質　甘。鹹。寒。無毒。

主治　小兒驚癇及鬼毒。去來寒熱。五癆。蘸綿吮之。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論豬乳曰。小兒天弔。大人豬。雞。癇病。

參攷資料　小兒體屬純陽。其驚癇亦生於風熱。豬乳氣寒。以寒治熱。謂之正治。故錢乙云。初生小兒至滿月。以豬乳頓滿之最佳。張渙云。小兒初生無乳。以豬乳代之。出月可免驚癇痘疹之患。楊士瀛云。小兒口噤不開。豬乳飲之甚良。月內胎驚。同硃砂牛乳少許。抹口中甚妙。此法諸家方書未知用。予傳之東宮吳觀察子病此。用之有效。（李時珍）

【豬兒牙皂】卽皂莢之處方用名。詳『皂莢』條。

【豬油】卽豬膏之古籍別名。典見綱目。詳『豬脂』條。

【豬肺】性質　甘。微寒。無毒。

主治　補肺。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論豬肺曰。療肺虛咳嗽。以一具竹刀切片。麻油炒熟。同粥食。又治肺虛嗽血。麥蘗慈菀仁末食之。

參攷資料　豬肺得大麻仁良。若與白花菜合食。令人氣滯發霍亂。八月和餡食。至冬發疽。（蘇頌）

【豬臥草】卽七葉黃荊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『七葉黃荊』條。

【豬咽舌】卽豬懸之古籍別名。典見王璽。詳『豬懸』條。

【豬屎】原名　豬矢。

性質　寒。熱。黃疸。澀痺。

主治　寒熱黃疸。澀痺。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論豬屎曰。主蠱毒。天行熱病。並取一升。浸汁。頓服。【明】李時珍本草綱目論豬屎曰。燒灰。發痘瘡。治驚癇。除熱。解毒。治瘡。【明】吳瑞曰。用本草論豬屎曰。血溺出血不止。取新屎壓之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料　御藥院方。治瘡瘡黑陷無膿散。錢仲陽治急驚風癇惺惺丸。皆用之。取其除熱解毒也。（李時珍）

【豬屎草】卽玉淨瓶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉淨瓶』條。

【豬胃】卽豬肚之原名。詳『豬肚』條。

【豬胞】卽豬脬之古籍別名。典見綱目詳『豬脬』條。

【豬苓】　**命名**　本品塊黑而零落。似豬屎。故名。

處方用名　粉豬苓。

古籍別名　豘豬屎（本經）豕橐（莊子）地烏桃（圖經）苓蔱苓朱苓豬矜豬零。導河椽（和漢藥考）

外國名詞　Pigs tuber.（英）

基本　係生於楓樹根部之一種茸類。但他樹根部亦生之。

產地　陳仁山藥物生藥辨云。豬苓產舊陝西省與安縣漢中府等爲上。四川亦可。雲南次之。一產河北齊堂地方。乃山下之朽木變化而生。俗云樹根菌也。

形態　爲不正圓塊。狀類豬屎。質輕。外皮黑色。或深褐色。內部白色。

採取　二月八月採。陰乾。

製法　雷敎曰。凡使豬苓。採得用銅刀刮去粗皮。薄切。以東流水浸一夜。至明漉出。細切。以升麻葉對蒸一日。去葉。曬乾用。李時珍曰。豬苓取其行瀉。生用更佳。

性質　甘。平。無毒。

效能　行水。利瀉。消腫。止渴。專作利尿藥。

主治　痎瘧。解毒蠱疰不祥。利水道。久服輕身耐老。

張仲景之發明　豬苓一味。經張仲景之實驗。認爲『主治渴而小便不利』。茲考徵如下。豬苓湯證曰。渴欲飲水。小便不利。豬苓散證曰。思水者。（以上二方。豬苓諸藥等分。）五苓散證曰。小便不利。微熱消渴。（以上一方。豬苓十八銖。）歷觀此三方。豬苓所主治。渴而小便不利也明矣。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論豬苓曰。解傷寒溫疫大熱。發汗。主腫脹滿。腹急痛。【金】張元素珍珠囊論豬苓曰。治渴。除瀉。去心中懊憹。【元】王好古湯液本草論豬苓曰。瀉膀胱。【明】李時珍本草綱目論豬苓曰。開腠理。治淋腫。脚氣。白濁。帶下。妊娠子淋胎腫。小便不利。【明】繆希雍本草經疏論豬苓曰。豬苓本經謂其味甘。應苦兼淡。其氣平而無毒。氣味俱薄。其主痎瘧者。瘧必由暑。暑必兼溼。淡以利竅。引暑溼之氣從小便出。所以分消之也。淡滲之性。故利水道。溼勝則身重。溼去則身輕。利竅之藥。必能走泄精氣。其曰久服耐老。必無是理矣。解蠱毒疰不祥。義將安出。亦未可盡信也。【清】黃宮繡本草求眞論豬苓曰。豬苓甘淡微苦。性平無毒。得楓根之餘氣以成。形如豬屎。故以豬名。凡四苓五苓等。方並皆用此。性雖有類澤瀉。同入膀胱腎經。解熱除溼。行竅利水。然水消則脾必燥。水盡則氣必走。澤瀉雖同利水。性亦類燥。然鹹性居多。尙有潤存。澤雖治火。性亦損氣。然潤能滋陰。尙有補在。故豬苓必合澤瀉同用。則潤燥適均。而無偏陂之患矣。至於茯苓雖屬滲劑。有澄自可以去。然茯則入氣而上行。此則入血而下降。且與澤瀉利水消腫。治瘧止痢等藥。實屬暑邪。溼熱內閉。無不藉此以爲宣導之需。古人已云。清利小便。無若此駛。以故滋陰藥中。止有澤瀉。而不用及豬苓。正謂此耳。但此專司引水。津液易耗。久服多致損目。白而實者良。去皮用。【清】鄒澍本經疏證論豬苓曰。茯苓、豬苓。得木氣而生於地下。既不茁萌挺莖。又不潰腐消敗。是其卻溼可知。乃復久而不變。則非特能卻溼。且能化溼氣爲生氣矣。雖然。茯苓可利水道。豬苓亦利水道。則凡木之苓。皆能利水道。是豬苓不必定以生楓下者。且茯苓、豬苓。各自爲功。又每相連中。茯苓、豬苓。各自爲功。又每相連爲用。似若斷難相混者。何哉。蓋亦可察物理而知之矣。夫松之概挺拔勁正。楓之概柔翦易搖。松之理麤疎。楓之理堅細。松之葉至冬益蒼翠而不凋。楓之葉至冬遂鮮赤而卽落。是其一柔一剛。顯然殊致。茯苓屬陽。治停蓄之水。不從陰化者。豬苓屬陰。治鼓盪之水。不從陰化者。是故仲景以豬苓名方者。其

793／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

所治之證曰陽明病脈浮。發熱。渴欲飲水。小便不利者。豬苓湯主之。曰少陰病下利。咳而嘔渴。心煩不得臥者。豬苓湯主之。曰諸病在臟。欲攻之。當隨其所得而攻之。如渴者與豬苓湯。曰嘔吐而病在膈上後思水者。豬苓散主之。統而觀之。莫不有渴。若五苓散則其治有渴者。有不渴者。至茯苓入他方所治之病。則不渴者居多。蓋渴者水氣被陽逼迫。欲得陰和而不能也。與之豬苓。使起陰氣以和陽化水。譬之楓葉巳丹。遂能卽落也。

近人學說　賈九如曰。豬苓味淡。淡主於滲。入脾以利水道。用治水瀉溼瀉。通淋除溼。消水腫。療黃疸。獨此爲最捷。故云與琥珀同功。但不能爲主劑。助補藥以實脾。頷泄藥以理脾。佐溫藥以煖脾。同涼藥以清脾。凡脾虛甚者。恐泄元氣。愼之。

配合應用　㊀入五苓散。爲除溼之要藥。㊁佐白芍藥。白茯苓、人參、橘皮、朮、澤瀉。治水腫之屬陽分者。㊂佐白芍藥。生地黃、桑寄生、桑根白皮、茯苓、澤瀉、琥珀、石斛、薏苡仁、肉桂。治水腫之屬陰分者。均爲要藥。其功長於利水。故善除溼。

㊃治傷寒口渴。邪在臟也。豬苓湯主之。豬苓、茯苓、澤瀉、滑石、附膠各一兩。以水四升。煮取二升。每服七合。日三服。嘔而思水者。亦主之。（張仲景方）

㊄治小兒祕結。用豬苓一兩。以水少許。煮雞屎白一錢。調服立通。（外臺祕要方）

㊅治通身腫滿。小便不利。豬苓五兩爲末。熟水服方寸匕。日三服。（楊氏產乳方）

㊆治妊娠腫渴。從脚至腹。小便不通。微渴引飲。方同上法。（子母祕錄方）

㊇治妊娠子淋。方同上法。日三夜二。以通爲度。（小品方）

用量　二錢至四錢。

施用宜忌　凡脾腎虛而無溼熱者禁用。忌火及鐵氣。

參攷資料　㊀豬苓淡滲氣升。而又能降。故能開腠理。利小便。與茯苓同功。但入補藥不如茯苓也。（李時珍）㊁豬苓生衡山山谷及濟陰冤句。二月八月採陰乾。（別錄）㊂是楓樹苓。其皮黑色。內白而實者佳。削去皮用。（陶弘景）㊃今蜀州習州亦有之。生土底。不必楓根下始有也。（蘇頌）㊄豬苓亦是木之餘氣所結。如松之餘氣結茯苓之義。他木皆有。楓木爲多耳。（李時珍）

【豬桃】卽山梔子之古籍別名。典見和漢藥考詳『山梔子』條。

【豬氣子】卽豬腎之古籍別名。典見綱目詳『豬腎』條。

【豬胰】卽豬脬之古籍別名。典見綱目詳『豬脬』條。

【豬脂】

命名　凡凝者爲肪。爲脂。釋者爲膏。爲油。本品乃豬腹中凝聚之脂肪。故名。

處方用名　煉豬油。板油。豬膏。

古籍別名　豬肪。（綱目）豚脂。家豬脂。陰龍膏。萬貞鹿。（和漢藥考）熟豬油。熟火油。（俗名）豬臙。項下膏。名貢革肪。（本草集註）

外國名詞　Adeps Praeparatus.（拉丁）Prepared Lard.（英）

基本　屬偶蹄類。爲豕腹網膜及腎臟周圍之脂肪。

形態　豬脂色純白。有緩和之甘味。比重約〇・九三八。熟至三十五至四十度。卽融解而爲無色透明之油。遇無水酒精。伊打。硫化炭素。偏蘇爾等。俱溶解。

採取　每年臘月煉淨收用者佳。

製法　蘇恭曰。十二月上亥日。取入新瓶埋亥地百日用之。名臛脂。每升入雞子白十四枚。更良陶弘景曰。勿令中水。臘月者。歷年不壞。項下膏謂之貢革肪。入道家煉五金用。

性質　甘。微寒。無毒。

成分　豚脂爲三種成分構造而成。一爲沃來茵 $Olein\ C_3H_5(OC_{18}H_{33}O_2)$ 占百分之六十二。二爲瑪爾加林 $Margarine\ C_3H_5(OC_{17}H_{33}O)_3$ 爲斯推阿林 $Starine\ C_3H_5(OC_{18}H_{35}O)_3$ 均百分之三十八。然因熔解點有高低。各成分遂有多少。故亦不定也。

效能　殺蟲療惡瘡。解毒益血。脈用作製造膏藥之原料。又爲緩和滋養藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　煎膏藥。解斑蝥、芫青毒。

膏脊生髮悅面。

歷代記述攷畫　【南北朝】徐之才雷公藥對論豬脂曰悅皮膚作手膏不皸裂。【唐】蘇恭新修本草論豬脂曰治癰疽。【唐】孫思邈千金翼論豬脂曰破冷結。散宿血。【宋】日華諸家本草論豬脂曰殺蟲治皮膚風。塗惡瘡。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論豬脂曰利血脈。散風熱。潤肺。入膏藥主諸瘡。【明】李時珍本草綱目論豬脂曰解地膽。亭長。野葛。硫黃毒。諸肝毒。利腸胃。通小便。除五疸水腫生毛髮。【明】繆希雍本草經疏論豬脂曰肪膏即脂油也。味甘寒。性滑澤。能涼血解毒潤燥。故主煎諸膏藥及解斑蝥芫青毒也。又能利腸胃。通大小便。能散風熱。療惡瘡。【清】王士雄隨息居飲食譜論豬脂曰豬脂甘涼。潤肺。澤槁。濡枯。滋液生津。息風化毒。殺蟲清熱。消腫散癰。通腸除黃。滑胎長髮。以白厚而不腥臊者良。

國外學說　英美學說謂煉豬油係提淨之豬油。有醫士喜用近於膜子之油。因較他處之油堅固。至於板油與胰子油。亦有人用之。又有不用豬身之外層油者。尋常出售之豬油。大率含鹽。故不合於作藥品。必在沸水內化之。去其鹽方爲合用。藥品內準用之豬油。爲腹內之油。去其各膜質。融化而濾之。必加熱至一百二十度。持續多時。調之不停。方其融化時。能助蠟與松香之融化。又合於蠟類。能變爲肥皂。遇空氣則能變酸。味粹而臭。近時出售之豬油。謀利者常以異質加入。曾有人將數種出售之豬油化分之。每百分中計得小粉與麵等二十分。又有稱爲美國豬油。其實則係英國之所作者。故凡用豬油作藥料。必先試其含異質與否。更不可含有鹽類。製法用鮮豬脂十四斤。將其胞膜除去。懸掛而風乾之。切成碎塊。入石臼搗勻。再入燙鍋（加熱不過一百三十度。或用磁盆浮開水鍋內亦可）化透。過細呢子布爲度。（照此製成以配藥最合宜。如加大熱則變形）。其作用爲潤外皮藥。與他種油類同。能爲數種蠟膏與油膏之本質。又有時用爲外導瀉藥之配料。用敷藥類。將此油攤上。易於取去。若搽髮際某功用能藥虱。又和漢藥考曰。取豚體中脂肪最多之組織。細剉。洗淨血液及黏液質等。入鍋中。與水同熱熔之。脂肪即浮其上。因取而精製之。又日本藥局方云。豚脂得自壯健之豕。其大網膜及腎臟周圍之脂肪組織。可製出脂油。但須擇新鮮者。並宜洗淨。方可製之。製成之後。爲色白柔軟。通體均勻之凝塊。臭氣微弱。毫無腐敗性。熱至四十三至五十一・五度。即熔融。變澄清之液。在厚一仙米以下之層。液即無色。其沃度數四十六至八十。酸度二以下。

配合應用　㈠治傷寒時氣。豬膏如彈丸。溫水化服。日三次。（肘後方）

㈡治五種疸疾。黃疸。穀疸。酒疸。黑疸。女勞疸。黃汗如黃蘗汁。用豬脂一斤。溫熱服。日三。當利乃愈也。（肘後方）

㈢治赤白帶下。煉豬脂三合。酒五合。煎沸頓服。（千金方）

㈣治小便不通。豬脂一斤。水二升。煎三沸。飲之立通。（千金方）

㈤治關格閉塞。豬脂。薑汁各二升。微火煎至二升。下酒五合。和煎分服。（千金方）

㈥治瘡瘡便祕。四五日。用肥豬膿一塊。水煮熟。切如豆大。與食。自然臟腑滋潤。痂疕易落。無損於皃。（陳文中方）

㈦治卒中五尸。仲景用豬脂一雞子。苦酒一升。煮沸灌之。（肘後方）

㈧治中諸肝毒。豬膏頓服一升。（千金方）

㈨治食噎成癌。心腹作痛。咽間如有蟲上下。嗜食與油者。是也。用豬脂二升。酒三升。煮三沸。服日三次。

㈩治上氣咳嗽。豬肪四兩。煮百沸。以來切。和醬醋食之。（食醫心鑑方）

⑪治肺熱暴瘖。豬脂油一斤。煉過。入白蜜一斤。再煉少頃。濾淨冷定。不時挑服一匙。即愈。無疾常服。亦潤肺。（萬氏方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治小兒噤風。小兒百日內風噤。口中有物如蝸牛。或如黃頭白蟲者。薄豬肪擦之即消（聖惠方）。㊁治小兒蚘病羸瘦。豬膏服之（千金方）。㊂治產後虛汗。豬膏、姜汁、白蜜各一升。酒五合。煎五上五下。每服方寸匕（千金方）。㊃治胞衣不下。豬脂一兩。水一盞。煎五七沸。服之當下（聖惠方）。㊄治吹奶寒熱。用豬肪冷水浸揚。熱即易之。立效（子母秘錄方）。㊅治髮落不生。以酢泔洗淨。布揩令熱。以臘豬脂入生鐵麥三沸塗之。遍生（千金方）。㊆治冬月唇裂。煉過豬脂。日日塗之（十便良方）。㊇治熱毒攻手。腫痛欲脫。豬膏和羊屎塗之（外臺祕要方）。㊈治手足皴破。豬脂煮熱酒中洗之（千金方）。㊉治代指疼痛。豬膏和白堊土傅之（小品方）。㊊治口瘡塞咽。用豬膏、白蜜一斤。黃連末一兩。合煎取汁熬稠。每服棗許。日五服（千金方）。㊋治疥瘡有蟲。豬膏煎莞花塗之（肘後方）。㊌治鼠瘻瘰癧。用豬膏淹生地黃。炙六七沸塗之。㊍治漏瘡不合。以紙黏臘豬脂納瘡中。日五夜三（千金方）。㊎治漆瘡作痒。用豬膏頻塗之（千金方）。㊏治咽喉骨哽。吞脂膏一團。不瘥更吞之（千金方）。㊐治身面疣目。以豬脂揩之。令血出少許。神驗。不可加（千金方）。㊑治誤吞鐵釘。豬脂多食令飽。自然裹出（普濟方）。㊒治雜物入目。豬脂煮取水面如油者。仰臥去枕。點目中。不過數度。與物俱出（聖惠方）。㊓治鰍蚘入耳。炙豬肪掩耳。自出。亦治蟲蟻入耳（梅師方）。㊔治發背發乳。豬脂切片。冷水浸貼。日易四五十片。甚妙（急救方）。

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾虛溼滯腹滿便滑者禁用。反烏梅、梅子。

參攷資料　臘月煉之盛器收藏。每油一斤。入糖霜一錢於內。經久不壞。曝月生豬脂。以糖霜醃之。亦可久藏。此物性之相制也。外感諸病大便滑瀉者均忌（王士雄）。

【豬退】　即豬懸蹄甲之原名。詳『豬懸蹄甲』條。

【豬骨】　**主治**　中馬肝漏脯菓菜諸毒。燒灰水服方寸匕。日三服。頰骨燒灰。治瘡陷。煎汁服。解丹藥毒。

【豬婆蛇】　即石龍子之古籍別名。典見綱目。詳『石龍子』條。

【豬婆龍】　即鼉之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『鼉』條。

【豬栎椰】　即大腹皮之古籍別名。典見綱目。詳『大腹皮』條。

【豬肶】　**古籍別名**　豬胞（綱目）。

性質　甘。鹹。寒。無毒。

主治　夢中遺溺。疝氣墜痛。陰囊溼痒。玉莖生瘡。

參攷資料　豬胞所主。皆下焦病。亦以類從爾。蘄有一妓病轉肶。小便不通。腹脹如鼓。數月垂死。一醫用猪肶吹脹。以翎管安上。插入陰孔。捻肶氣吹入。即大尿而愈。此法載在羅天益衛生寶鑑中。知者頗少。亦機巧妙術也（李時珍）。

【豬莧】　即野莧之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。見『莧』條。

【豬麻】　即益母草之古籍別名。典見綱目。詳『益母草』條。

【豬椒】　即蔓椒之古籍別名。典見別錄。詳『蔓椒』條。

【豬胵】　**原名**　豬胰。

命名　本品生兩腎中間。似脂非脂。似肉非肉。乃人物之命門三焦發原處也。肥則多痩。則少。蓋頤養賴之。故謂之頤。

古籍別名　豬腎脂。豬頤。

性質　甘。平。無毒。

主治　通乳汁。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺。論豬胵曰。肺癆咳嗽。和棗肉浸酒服。亦治痃癖。羸瘦。【宋】蘇頌圖經本草。論豬胵曰。療肺氣乾脹。喘急。潤五臟。去皴皰。黯黣。殺斑蝨。地膽毒。治冷痢成虛。【明】常效先食醫心鑑。論豬胵曰。一切肺病。咳嗽。膿血不止。以薄竹筒盛於塘火中煨熟。食上啖之良。

參攷資料　㊀豬胵男子多食

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

損陽。（蘇頌）㊁豬脛爲甘寒滑澤之物。甘寒則津液生。滑澤則垢膩去。故主如上諸證也。男子多食損陽。薄大腸。其能專在去垢膩。可用以洗垢衣。（繆希雍）㊂豬爲食味中常用之物。臟腑腸胃。咸無棄焉。然其一身除肚膏外。餘皆有毒發病。人習之而不察也。壯實者或暫食無害。有疾者。不可不知其忌。故利其害於後。肉多食。令人虛肥生痰。熱病後食之。復發。不宜與薑同食。食則發大風。病頭肉有病者食之。生風發疾。腦食之損男子陽道。臨房不能行事。酒後尤不可食。血能敗血。損陽。服地黃何首烏諸補藥者尤忌之。多食耗心氣。不可合吳茱萸食。肝病藥人不可食。合魚鱠食。生癰疽。合鯉魚腸子食。傷人神。延壽書云。豬臨宰驚氣入心。絕氣歸肝。俱不可多食。必傷人脾。孫思邈云。凡六畜脾。人一生莫食之。肺不可與白花菜合食。令人氣滯發霍亂。八月和飴食。至冬發疽。腎久食。令人傷腎少子。冬月不可食。損人眞氣。兼發虛瘧。腸多食動冷氣。鼻唇多食動風。舌多食損心。

（繆希雍）

【豬脾】原名　鄰貼。

主治　脾胃虛熱。同陳橘紅、人參、生姜、葱白、陳米煮羹食之。

參攷資料　凡六畜之脾。人宜一生莫食之。（孫思邈）

【豬腎】原名　豬腰子。

性質　鹹冷。無毒。

主治　理腎氣。通膀胱。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論豬腎曰。除冷氣。【宋】大明曰。華諸家本草論豬腎曰。補膀胱水臟。暖腰膝。治耳聾。【宋】蘇頌圖經本草論豬腎曰。補虛壯氣。消積滯。【明】李時珍本草綱目論豬腎曰。止消渴。治產勞虛汗。下痢崩中。

參攷資料　㊀豬腎別錄謂其理腎氣。通膀胱。日華亦曰。補水臟。膀胱。暖腰膝。而又曰。雖補腎。久食令人少子。孟詵亦曰。久食令人腎虛。兩相矛盾。如此何哉。蓋豬腎性寒。不能補命門精氣。方藥所用。借其引導而已。別錄理字通字。最爲有理。日華暖腰膝。補膀胱水臟之說。爲非矣。腎有虛熱者。宜食之。若腎氣虛寒者。非所宜矣。今人不達此意。往往食豬腎爲補。不可不審。又千金治消渴。有豬腎薤葱湯。補腎虛勞損諸病。有腎瀝湯。方甚多。皆用豬羊腎煮湯煎藥。俱是引導之意。（李時珍）㊁豬腎味鹹氣冷。能瀉腎氣。腎虛寒者不宜食。本經主理腎氣。乃借其同氣以引導之耳。不言補而言理。其意有在矣。腎與膀胱爲表裏。故復能利膀胱也。今人誤認以爲補腎。恣意食之。大爲差謬。不親日華子云。久食令人無子。孟詵云。久食令人傷腎。其非補腎之物。明矣。（本草經疏）

【豬腎脂】即豬脛之原名。詳『豬脛』條。

【豬腎粥】基本　腎和米煮成之粥。

主治　補腎虛諸疾。

【豬耨聰】即耳草之別名。詳『耳草』條。

【豬爺】即豬爺之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豬爺』條。

【豬項肉】原名　槽頭肉。

主治　酒積面黃腹脹。以一兩切如泥。合甘遂末一錢作丸。紙裹煨香食之。酒下。當利出酒布袋也。

參攷資料　豬項肉肥脆。能動風。（綱目）

【豬腦】性質　甘。寒。有毒。

主治　風眩。腦鳴。凍瘡。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論豬腦曰。主癰腫。塗紙上貼之。乾則易。治手足皸裂出血。以酒化洗併塗之。

參攷資料　㊀禮記云。食豚去腦。孫眞人食忌云。豬腦損男子陽道。臨房不能行事。酒後尤不可食。延壽書云。今人以鹽酒食豬腦。是自引賊也。（李時珍）㊁喉痺已破。瘡口痛者。豬腦髓蒸熟。入薑醋食之。即愈。（普濟方）

【豬腰子】命名　本品莢生其子大。狀若豬之內腎。故名。

產地　出廣西諸地。

形態　豬腰爲灌木類之一種。其莖蔓生。實爲莢。果中有子。長三四寸。色紫。肉堅白。可供食與藥用。

性質　甘。微辛。無毒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　一切瘡毒箭傷。研細酒服。幷塗之。

【豬腰子】　卽豬腎之原名。詳『豬腎』條。

【豬腸】　性質　甘。微寒。無毒。

主治　虛渴。小便數。補下焦虛竭。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論豬腸曰。洞腸治洞腸挺出下血。【宋】日華諸家本草論豬腸曰。止小便。【宋】蘇頌圖經本草論豬腸曰。去大小腸風熱。宜食之。【明】李時珍本草綱目論豬腸曰。潤腸治燥。調血痢。驅毒。

【豬苓】　㊀卽豬苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豬苓』條。㊁卽豬屎之原名。詳『豬屎』條。

【豬肓】　卽豬脂之處方用名。詳『豬脂』條。

【豬膏母】　卽豨薟草之古籍別名。典見唐本草。詳『豬薟草』條。

【豬膏母草】　性質　辛。苦。平。有小毒。

主治　金瘡。止痛。斷血。生肉。除諸惡瘡。消浮腫。搗封之。湯漬散傳。並良。

【豬鼻唇】　性質　甘。鹹。微寒。無毒。

主治　上唇治凍瘡痛痒。

歷代記述攷證　【宋】寇宗奭本草衍義論豬鼻唇曰。煎湯調蜀椒目末半錢。夜服。治盜汗。【明】李時珍本草綱目論豬鼻唇曰。鼻治目中風翳。燒灰水服。

參攷資料　豬鼻唇多食動氣。（綱目）

【豬槽頭肉】　卽豬項肉之別名。詳『豬項肉』條。

【豬膚】　基本　本品卽豬膚草外之薄皮淺膚。

性質　甘。寒。無毒。

主治　少陰下痢咽痛。

參攷資料　㊀少陰下痢咽痛。胸滿心煩者。豬膚湯主之。用豬膚一斤。水一斗。煮五升。取汁入白蜜一升。白粉五合。熬香。分六服。（張仲景）㊁豬水蓄也。其氣先入腎。解少陰客熱。加白蜜以潤燥除煩。白粉以益氣斷利也。（成無己）

【豬蓐】　卽蓐之古籍別名。典見綱目詳『蓐』條。

【豬頗】　卽豬脛之別名。詳『豬脛』條。

【豬鼻】　性質　甘。鹹。小寒。無毒。

主治　小兒驚癇。五月五日取燒灰服。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論豬齒曰。治蛇咬。【明】李時珍本草綱目論豬齒曰。中牛肉毒者。燒灰水服一錢。又治瘡瘡倒陷。

【豬蹄】　性質　甘。鹹。小寒。無毒。

主治　煮汁服。下乳汁。解百藥毒。洗傷挫諸敗瘡。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論豬蹄曰。滑肌膚。去寒熱。【明】李時珍本草綱目論豬蹄曰。煮羹。通乳脈。托癰疽。壓丹石。煮清汁。洗癰疽。瘡熱毒。消毒氣。去惡肉有效。

參攷資料　外科精要。洗癰疽。有豬蹄湯數方。用豬蹄煮汁。去油。煎衆藥。薰洗也。（李時珍）

【豬頭肉】　採取　以腹豬者良。

性質　有毒。

主治　寒熱。五癰鬼毒。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論豬頭肉曰。同五味子煮食。補虛。足氣力。去驚癇。五痔。下丹石。亦發風氣。

參攷資料　豬肉毒惟在首。故有病者食之。生風發痰。（李時珍）

【豬膽】　性質　苦。寒。無毒。

主治　傷寒熱渴。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論豬膽曰。骨熱勞極。消渴。小兒五疳殺蟲。【宋】蘇頌圖經本草論豬膽曰。敷小兒頭瘡。治大便不通。以葦筒納入下部三寸。灌之立下。【明】李時珍本草綱目論豬膽曰。通小便。敷惡瘡。殺疳蟲。治目赤目翳。明目。清心臟。涼肝脾。入湯沐。髮去膩光澤。

參攷資料　㊀仲景以豬膽汁和醋少許。灌穀道中。通大便神效。蓋酸苦益陰潤燥而瀉便也。又治少陰下利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。以白通湯加豬膽汁主之。若調寒熱之逆者。令熱必行。則熱物冷服。下嗌之後。冷體既消。熱性便發。故病氣自愈。此所以和入尿豬膽鹹苦之物。於白通熱劑之中。使其氣相從。而無拒格之患也。又云雷

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

亂病吐下已斷。汗出而厥。四肢厥急。脈微欲絕者。通脈四逆湯加豬膽汁主之。蓋陽氣太虛。陰氣獨勝。純與陽藥。恐陰氣格拒不得入。故加豬膽汁苦入心而通脈。寒補肝而和陰。不致格拒也。（成無己）㊀朱奉議治傷寒五六日癍出。有豬膽雞子湯。（汪機）㊁方家用豬膽取其寒能勝熱。滑能潤燥。苦能入心。又能去肝膽之火也。（李時珍）

【豬膽皮】主治　目翳如重者。取皮曝乾。作兩股繩如筋大。燒灰出火毒點之。不過三五度瘥。

【豬檳榔】即大腹子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『大腹子』條。

【豬藍子】基本　豬藍子。爲雜草類之一種。可供藥用。

主治　聤耳。研末吹之。

【豬膿】即豬脂之別名。詳『豬脂』條。

【豬懸蹄甲】原名　豬退。

製法　孫思邈曰。酒浸半日。炙焦用。

性質　鹹。平。無毒。

主治　五痔。伏熱在腹中。腸癰內蝕。

參攷資料　豬懸蹄同赤木燒烟薰。辟一切惡瘡。（張仲景）

【豬臟】即豬腸。詳『豬腸』條。

【豬膈】古籍別名　豬氣子。（綱目）豬咽舌。（王璽）

形態　豬膈在豬喉系下。肉團一枚。大如棗。微扁。色紅者是。可供藥用。

主治　項下癭氣。瓦焙研末。每夜酒服一錢。

【豬髓】性質　甘。寒。無毒。

主治　撲損惡瘡。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論豬髓曰。塗小兒解顱頭瘡及臍腫。眉瘡瘍疥。服之補骨髓。益虛勞。

參攷資料　按丹溪治虛損補陰。凡多用豬脊髓和丸。取其通腎命。以骨入骨。以髓補髓也。（李時珍）

【豬玀】原名　貙。

命名　貙圓也。其狀圓肥。故名。

古籍別名　攜狗。（本草拾遺）

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類野豬科之豬玀。

產地　山野間處處有之。

形態　豬玀爲獸類之一種。其形似豬而喙尖。足尾皆短。前肢有銳爪。便以掘地。毛黃褐色。脊上有黑毛一道。體肥行鈍。性甚敏捷。穴土而居。夜出覓食小動物及瓜果。其肉可供食與藥用。

性質　甘。酸。平。無毒。

主治　水腫久不瘥。垂死者。作羹食之。下水大效。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論豬玀肉曰。服丹石動熱。下痢赤白。久不瘥。煮肉露一宿。空腹和醬食。一頓即瘥。瘦人煑和五味食。長肌肉。【明】吳瑞日用本草論豬玀肉曰。治上氣虛乏。咳逆勞熱。和五味羹食。

【豬玀胞】主治　蠱毒。以臘月乾者。湯磨如雞子許。空腹服之。

【豬玀脂】原名　貙油。

基本　本品即豬玀之脂肪油。

主治　塗一切內外痔瘡。和酒服。止咳血。胸中噫噎。怵怵如蟲行。及以火烤。擦頭上白禿。並煎服。枸杞子湯。能生髮。入膏中用。能拔瘡。又解蛇蝮蟲毒。

參攷資料　豬玀脂油。舊時煤廠作地燈。非此不可。他油輒爲地風吹滅。惟貙油作燈。能禦地風也。（趙學敏）

【豬玀脂膏】主治　蛇蝮蟲毒。胸中噫噎。怵怵如蟲行。咳血。以酒和服。或下或吐。或自消也。

【豬玀骨】主治　上氣咳嗽。多研酒服三合。日二。取瘥。

【豭肉】即豬肉之古籍別名。典見綱目。詳『豬肉』條。

【豭虱矢】即虱糞之處方用名。詳『虱糞』條。

【豭豬肉】即豬肉之處方用名。詳『豬肉』條。

【豭豬屎】即豬苓之古籍別名。典見本經。詳『豬苓』條。

【貙】即豬玀之原名。詳『豬玀』條。

【貙油】即豬貙油之原名。詳『豬

799／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

貓油』條。

【貓】　命名　鼠害苗而貓捕之。故字從苗而貓乃苗茅二音。其名自呼故名。

古籍別名　家貓（綱目）

外國名詞　Felis domestica Briss（拉丁）（Cat）（英）

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類裂腳類貓科。

形態　貓爲家畜類之一種。面略圓。軀幹長。四肢短。尾有長短之別。耳殼短小。末端尖。常向前能自由轉動。以兜聲。故善聽。眼大。瞳孔能感光之强弱而收放。午則收縮如線。夜則放大而圓。唇有鬚。舌面糙。密生逆鉤。適於舐食。鼻善嗅。前肢五趾。後肢四趾。皆有伸縮之銳爪。掌部有肉塊如墊。行走無聲。舉動輕捷。毛輾色有白、黑、灰、褐等。齒凡三十。犬齒及臼齒均發達。善捕鼠。人多畜之。其肉可供藥用。

性質　甘、酸、溫、無毒。

主治　勞症。鼠瘻。蟲毒。

參考資料　本草以貓狸爲一類。註解然狸肉入食。貓肉不佳。亦不入食品。故用之者稀。胡澒易簡方云。凡預防蟲毒。自少食貓肉。則蟲不能害。此亦隋書所謂貓鬼野道之蟲乎。肘後治癧鼠核腫。或已潰出膿血者。取貓肉如常作羹。空心食之。云不傳之法也。昔人皆以癧子爲鼠涎毒所致。此乃淮南子所謂狸頭治癧。及鼠囓人瘡。又云狐目狸膽。鼠去其穴。皆取其相制之義耳。（李時珍）

【貓牙】　主治　小兒痘瘡。倒靨欲死。同人牙、豬牙、犬牙燒灰。等分研末。蜜水服一匙。即便發起。

參考資料　痘瘡歸腎則變黑。凡牙皆腎之標。能入腎發毒也。內有貓牙。又能解毒。而熱證亦可用云。（李時珍）

【貓牛】　即犛牛之古籍別名。典見漢書。詳『犛牛』條。

【貓古都】　即白頭翁之古籍別名。典見植物名實圖考。詳『白頭翁』條。

【貓皮毛】　主治　瘰癧諸瘻。癰疽潰爛。

【貓舌】　主治　瘰癧鼠瘻。生嚼研敷。

【貓舌仙橋】　産地　多生水澤旁。

形態　貓舌仙橋爲雜草類之一種。葉面生刺。塲地而生。花色青紫。可供藥用。

主治　疔瘡。理黃疸。及一切溼火。

【貓尾血】　主治　急驚風。剪破貓尾。滴血淡水沖下。

【貓尿】　採取　以薑或蔥擦牙鼻。或生蔥紅鼻中。即遣出。

主治　蜈蚣諸蟲入耳。滴入即出。煎塗蠍毒。螫傷。及瘡偷糞老鼠和井底泥圍之立愈。

【貓肝】　主治　勞瘵。殺蟲。取黑朔望五更酒調服之。

【貓卵】　即白歛之古籍別名。典見綱目。詳『白歛』條。

【貓兒刺】　即枸骨之古籍別名。典見綱目。詳『枸骨』條。

【貓兒眼】　即貓睛石之別名。詳『貓睛石』條。

【貓兒眼睛草】　即澤漆之古籍別名。典見綱目。詳『澤漆』條。

【貓兒頭】　即毛笋之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『毛笋』條。

【貓屎】　採取　臘月收乾之。

製法　凡使以泥固封。燒存性。研用。

主治　燒灰水服。治寒熱。鬼瘧。發無期度者極驗。

歷代記述及證　【明】李時珍本草綱目論貓屎曰。治痘瘡倒陷。瘰癧潰爛。惡瘡。蟲疰。蠍螫。鼠咬。

【貓胎】　主治　療癰痔。泥裹煅研。棗油調搽。

【貓胞衣】　採取　貓將産時。以木枷枷之。恐生出即爲所食。取得焙乾。

主治　反胃吐食。燒灰。入硃砂末少許。壓舌下。甚效。

配合應用　㊀治膈噫。用貓初生胞衣。以新瓦焙乾。研細末。每服一二分。好酒送下。口含竹筆管。睡恐咬牙及咳嗽。米不下者。五六服即愈。（同壽錄方）

㊁治翻胃。貓胞衣三個。好酒洗。用豬肉四兩。淡麥熟。服之數年立效。（鳳聯堂方）

施用宜忌　忌燒酒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料　莫際華云。胃脘痛。非服貓胞不能除根。金御乘云。貓胞衣。凡患小產婦於產後或爲羹。或爲末服。卽不小產。（綱目拾遺）

【貓涎】　**主治**　瘰癧。刺破塗之。

【貓眼睛】　**主治**　瘰癧。鼠瘻。燒灰。井華水服方寸匕。日三。

【貓睛石】　**產地**　雲南、緬甸、寶井中多有之。

古籍別名　貓兒眼。

主治　解蠱毒。

參攷資料　宣和間外夷貢方物。有石圓如龍眼。寶色若綠葡萄。號貓眼睛。能息火。燃炭方熾。投之卽滅。按此卽寶石中又一種貓兒眼也。（墨莊漫錄）

【貓腦】　**製法**　於紙上陰乾用。

主治　瘰癧。鼠瘻。瘡爛。同莽草等分爲末。納孔中。

【貓貍】　**命名**　本品形似貓而穴居。趣伏之獸。故名。

古籍別名　野貓（綱目）。其子名隸（爾雅）。海貍（廣雅）。虎貍（正字通）

基本　係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。食肉類。裂腳類。貓科。爲貓貍之肉。其骨。脂。肝。屎。陰莖。詳各條。

產地　生山林及原野間之土窩中。

形態　貓貍爲獸類之一種。種類亦多。其體比狐稍小。頭圓。四肢皆短。口吻尖。耳短而廣。尾長。大爲總狀。達於足踵。毛褐帶淡黑色。有斑紋。目邊白色。性殘暴。晝伏夜出。捕食魚鼠。尤善竊食雞鶩。其肉可供藥用。

種類　㊀大小如狐。毛雜黃黑有斑如貓。而圓頭大尾者。爲貓貍。善竊鷄鴨。其氣臭。肉不可食。㊁有斑如貙虎。而尖頭方口者。爲虎貍。善食蟲鼠。果實。其肉不臭可食。㊂似虎貍而尾有黑白錢文相間者。爲九節貍。皮可供裘。㊃有文如豹。而作麝香氣者。爲香貍。卽貙貓（注）有白面而尾似牛者。爲牛尾貍。亦曰玉面貍。專上樹木。食百果。冬月極肥。人多糟爲珍品。大能醒酒。捕畜之。鼠皆帖伏不敢出。㊄似貓貍而絕小。黃斑色。居澤中。食蟲鼠及草根者。名狐。㊅海島上有貍頭而魚尾者。爲海貍。

採取　以文如連錢及虎文者。入藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　諸疰。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論貓貍肉曰。補中益氣。去遊風。【宋】蘇頌圖經本草論貓貍肉曰。作羹臛。治痔及鼠瘻。不過三頓甚妙。【明】李時珍本草綱目論貓貍肉曰。治溫鬼毒氣。皮中如針刺。

施用宜忌　反棗藘。

參攷資料　㊀貓貍肉。正月勿食。食之傷神。（孟詵）㊁貓貍肉。宜留正脊食。去之不利人。（李時珍）

【貓貍肝】　**主治**　鬼癆。

【貓貍屎】　**採取**　五月間收乾用。

主治　燒灰水服。主鬼癆寒熱。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論貓貍屎曰。燒灰和膿磁脂。傅小兒鬼舐頭瘡。

【貓貍脂】　**主治**　鼷鼠咬人成瘡。用此摩之。并食貍肉。

【貓貍骨】　**採取**　頭骨尤良。

性質　甘。溫。無毒。

主治　風疰。尸疰。鬼疰。毒氣在皮中。淫淫如針刺。著心腹痛。走無常處。及鼠瘻惡瘡。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論貓貍骨曰。炒末。治噎病。不通飲食。【唐】孟詵食療本草論貓貍骨曰。燒灰水服。治食野鳥肉中毒。頭骨炙研。或燒灰酒服二錢。治尸疰邪氣。腹痛。及痔瘻。十服後見驗。【宋】寇宗奭本草衍義論貓貍骨曰。炙骨和雄黃麝香爲丸服。治痔瘻。【明】李時珍本草綱目論貓貍骨曰。殺蟲。治疳。瘰癧。及燒灰酒服。治一切遊風。

參攷資料　㊀華陀治尸疰。有貍骨散。用其頭（蘇頌）。㊁貍骨。貓骨。性相近。可通用之。衞生寶鑑。治諸風。心癲。神應丹。用貍全身。燒過入藥。（李時珍）

【貓貍陰莖】　**主治**　女人月癆。燒灰。東流水服。

水不通。男子陰

【貓頭花】　卽白頭翁之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見植物名實圖考。詳『白頭翁』條。

【貓頭骨】**性質**　甘。溫。無毒。

主治　鬼疰。蠱毒。心腹痛。殺蟲。治瘧及瘧瘡變黑。瘰癧惡瘡。

參攷資料　古方多用狸。今人多用貓。雖是二種。性氣相同。故可通用。孫氏治瘧瘡倒靨。用人貓豬犬四頭骨。方見人類。(李時珍)

【貓頭鷹】卽鴟鴞之俗名。詳『鴟鴞』條。

【貓薊】卽大薊之古籍別名。典見本草集註。詳『大薊』條。

【貘豸】卽蛞蝓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛞蝓』條。

【賴師草】卽荔枝草之古籍別名。典見草藥方。詳『荔枝草』條。

【趕敕】卽臙脂之古籍別名。典見綱目。詳『臙脂』條。

【赭丹】卽鮓荅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鮓荅』條。

【輾魁】**命名**　本品其根如魁。魁乃酒器。有汁如赭。故名。

產地　生山野間。

形態　赭魁爲蔓草類之一種。葉似薤。根如魁。皮紫黑。肉黃赤。可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　心腹積聚。除三蟲。

【轢石膏】卽石膏之鬆柔易碎者。詳『石膏』條。

【辦佐匿酸】卽安息香之西名。詳『安息香』條。

【辨慶草】卽景天之古籍別名。典見和漢藥考。詳『景天』條。

【遺尿窩】卽桑螵蛸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑螵蛸』條。

【遼參】**原名**　遼東參。

基本　本品卽人參產於遼東各地者。

古籍別名　紅旗參。

產地　出奉天、吉林等處。

形態　遼參形似人參。其根黃潤。纖長。子粒大如黃豆。根可供藥用。

性質　甘。微寒。無毒。

主治　補五臟。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目開心。益智。久服輕身延年。

近人學說　張山雷曰。遼參產於遼瀋。卽奉天、吉林等處。地屬北方陰寒之域。且其秉性背陽而向陰。氣味皆清。色淡黃或白。故稟陰凝之氣而微寒。功能養陰而清虛火。今用之於陰虛有火。及吐衄失血後之宜於清養。或汗家失精家。陰液耗損。虛陽偏熾者。甚有經驗。以遼參稟性向陰。味甘而微苦。確含有清淨性質。多見風日則易蛀。喜陰惡陽。尤其明證。故富有養液而爲補陰之最。脫血脫汗失精家宜之。固也。而肺燥乾咳。胃枯燥渴。或乾嘔惡逆者。皆賴以滋液生津。而無寒降戕伐。黏膩濁滯之弊。功在沙參、玉竹、二冬、二母之上。奚啻倍蓰。此其稟中和之氣。不升不降。不倚不偏。所以可貴。或以有爲陽藥而補陽者固非。卽以爲補氣而能挽回元氣者亦妄也。

【遼參條】**基本**　本品係生於遼參蘆上之橫條。

主治　生津止渴。

參攷資料　遼參條。得參之餘氣。其力甚薄。止可調理常病。性能橫行手臂。凡指臂無力者。服之甚效。(本草從新)

【遼參鬚】**基本**　本品卽生遼參蘆上較其橫條而更細如鬚者。

性質　苦。無毒。

主治　胃虛嘔逆。咳嗽。失血。

配合應用　㊀治脚瘡潛爛。同芽茶等分。研末摻之。㊁固牙補腎。用生熟石膏各五錢。甘松、山柰、各三錢。細辛三錢。寒水石二錢。升麻一錢五分。青鹽。參鬚各三錢。北五味子五十粒。畢澄茄四十五粒。共研末。每晨擦牙漱口。甚效。(祝氏方)

參攷資料　㊀遼參鬚性與參條相同。而力尤薄。(本草從新)㊁遼參鬚性專下行。若久痢滑精。崩中下血。每至增劇。以其味苦降洩也。(逢原)

【遼葉】卽箬葉之古籍別名。典見綱目。詳『箬葉』條。

【遼蔘】卽黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳『黨參』條。

【醍醐】**基本**　本品出酥中。乃酥之精液。

製法　以好酥一石。熬之。可得醍醐三四升。盛冬不凝。盛夏不融。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其性滑利。能透盛器。惟以鷄子殼及壺蘆盛之。乃不滲漏。凡使入藥。以重綿濾過。銅器煎兩三沸用。

性質 甘冷。利。無毒。

主治 風邪痺氣。通潤骨髓。可爲摩藥。功優於酥。

歷代記述弦證 【唐】孫思邈千金翼論醍醐曰。添精補髓。益中填骨。久服延年。百煉彌佳。【宋】日華諸家本草論醍醐曰。主驚悸。心熱。頭疼。明目。傳腦頂心。【宋】寇宗奭本草衍義論醍醐曰。治月蝕瘡。潤養瘡痂最宜。

施用宜忌 凡脾胃虛寒者禁用。

參攷資料 酥酪醍醐。大抵性皆潤滑。宜於血熱枯燥之人。其功亦不甚相遠也。（汪機）

【醍醐菜】形態 醍醐菜爲菜類之一種。其莖摺之有乳汁。氣香味甜。葉似蒼耳。根本如水芹。可供藥用。

製法 採得。以苦竹刀細切。入砂盆中研如膏用。或生絹搾汁用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 月水不利。搗汁酒服之。

【醍醐】 即楡仁醬之古籍別名。典見綱目。詳『楡仁醬』條。

【醒心杖】 即遠志之古籍別名。典見記事珠。詳『遠志』條。

【醒酒花】 即金盞草之古籍別名。典見救荒本草。詳『金盞草』條。

【醒頭草】 即草蘭之處方用名。詳『草蘭』條。

【鋸草】 即蒼之日本名。詳『蒼』條。

【鋼鐵】 原名 跳鐵。

命名 本品乃熟鐵中再經鍛鍊而成堅剛之鐵。故名。

形態 鋼鐵有黃褐、鮮紫、暗綠、諸色。出火而急冷之者則堅脆。若緩冷之者則輭而有彈性。以供製造器械亦入藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 金瘡煩滿。熱中。胸膈氣塞。食不化。

參攷資料 鋼鐵有三種。有生鐵夾熟鐵鍊成者。有精鐵百鍊成鋼者。有西南海山中生成狀如紫石英者。凡刀劍斧鑿諸刃。皆是鋼鐵。其鐵砂鐵粉鐵精。亦皆用鋼鐵者。按沈括筆談云。世用鋼鐵以柔鐵包生鐵。泥封鍊。令相入。謂之團鋼。亦曰灌鋼。此乃僞鋼也。眞鋼是鐵精百鍊至斤兩不耗者。純鋼也。此乃鐵之精純。其色明瑩。磨之黯然。青且黑。與常鐵異。亦有鍊盡無鋼者。地產不同也。又有地漫淬柔鐵。二三次即成鋼。可切玉者。（李時珍）

【錄子】 即鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠李子』條。

【錐栗】 即栗之古籍別名。典見綱目。詳『栗』條。

【錢莧箭】 即馬鞭草之別名。詳『馬鞭草』條。

【錢葛】 即連錢草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連錢草』條。

【錢蒲】 即菖蒲之根葉俱短者。詳『菖蒲』條。

【錦木】 即衛矛之日本名。詳『衛矛』條。

【錦地羅】 基本 錦地羅之根。

性質 微苦。平。無毒。

主治 山嵐瘴毒。瘡毒。并中諸毒。以根研生酒服一錢七即解。

參攷資料 錦地羅出廣西慶遠山巖間。鎮安、歸順、柳州皆有之。根似葦薥及栝樓根狀。彼人頗重之。以充方物。（李時珍）

【錦江瑪瑙】 即瑪瑙之色如錦者。性質功效。詳『瑪瑙』條。

【錦紋】 即大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【錦紋大黃】 即大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【錦荔枝】 即苦瓜之古籍別名。見救荒本草。詳『苦瓜』條。

【錦帶】 即蓴之古籍別名。典見綱目。詳『蓴』條。

【錦莊黃】 即大黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大黃』條。

【錦被花】 即蘸春花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘸春花』條。

【錦被堆】 即瑞香之古籍別名。見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【錦鳩】 即斑鳩之古籍別名。典見范汪方。詳『斑鳩』條。

【錦雞】 即鷩雉之古籍別名。典見禽經。詳『鷩雉』條。

【錦繡根】 即白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芍』條。

【錫】 古籍別名 白鑞。鋌。鼮。（綱目）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態　錫爲金類金屬原質之一種。由天產之錫石內提取之。白色。光如銀質。硬於鉛。但黏靱而易融解。置空氣中及水中皆不鏽。可供工業中之需用。以製器具。亦可供藥用。

性質　甘。寒。微毒。

主治　惡毒風瘡。

參攷資料　㈠錫遇羚羊角、五靈脂則伏。遇伏龍肝、馬鞭草則縮。遇礞砂則硬。遇巴豆、蔥、麻、薑汁、地黃則伏。（獨孤滔）㈡洪邁夷堅志云。汝人多病癭。地饒風沙。沙入井中。飲其水則生癭。故金房間人家。以錫爲井闌。皆夾錫錢墮之。或沈錫井中。乃免此患。（李時珍）

【錫悸脂】　**基本**　本品乃波斯國之銀鉢也。

古籍別名　悉酮脂（綱目）

主治　目生翳膜。用火燒銅針輕點。乃傳之不痛。又主一切風氣。及三焦消渴。飲水煎入丸藥用。

【錫蛇】　卽金蛇之古籍別名。典見綱目。詳『金蛇』條。

【錫銅鏡鼻】　卽古鏡鼻之原名。詳『古鏡鼻』條。

【錫蘭椰子】　卽椰子之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『椰子』條。

【隨岐伯】　卽白石脂之古籍別名。典見吳普本草。詳『白石脂』條。

【隨風子】　卽訶子熟後隨風飄墮者。典見嘉祐圖經本草。詳『訶子』條。

【隨脂】　卽麥門冬之古籍別名。典見吳普本草。詳『麥門冬』條。

【隨湯給事中】　卽甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘遂』條。

【霍山石斛】　㈠卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。㈡卽霍石斛之處方用名。詳『霍石斛』條。

【霍石斛】　**處方用名**　霍山石斛。風石斛。

產地　出江南霍山。

形態　較鈃斛細小。色黃而形曲不直。有成毬者。

性質　甘。平。咏。鹹。無毒。

主治　清胃除虛熱生津。已勞損。定驚。療風。能鎭涎。解暑。甘芳降氣。

辨僞　風斛眞者甚少。市賈每以風蘭根僞充。但風蘭形直不縮。色青黯。嚼之不黏齒。味微辛。石斛則嚼之微有漿黏齒。味甘微鹹。形縮者眞。

參攷資料　㈠石斛近時有一種形短。祇寸許。細如燈心。色青黃。咀之味甘。微有滑涎。係出六安州及潁州府霍山縣。名霍山石斛。最佳。咀之無涎者。係生木上。不可用。其功長於淸胃熱。惟胃腎有虛熱者宜之。虛而無火者忌用。（百草鏡）㈡集驗良方。長生丹用甜石斛。卽霍石斛也。范瑤初云。霍山屬六安州。其地所產石斛。名米心石斛。以其形如累米。多節。類竹鞭。乾之成團。他產者不能米心。亦不成團也。（年希堯）㈢本草多言石斛甘淡入脾。鹹平入胃。今市中金釵及諸斛。俱苦而不甘。性亦寒。且形不似金釵。當以霍斛爲眞金釵斛。（陳延慶）

【霍石斛】　卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【靛花】　卽靑黛之古籍別名。典見綱目。詳『靑黛』條。

【頭痛花】　卽莞花之古籍別名。典見綱目。詳『莞花』條。

【頭黃】　卽煙草葉之次於蓋露者。性質功效與煙草葉同。詳『煙草葉』條。

【頭顱骨】　卽天靈蓋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天靈蓋』條。

【頰蛇珠】　卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【頻婆】　卽蘋果之古籍別名。典見綱目。詳『蘋果』條。

【餓馬黃】　卽鹿鬱之俗名。詳『鹿鬱』條。

【餔】　卽餔餟之古籍別名。典見和漢藥考。詳『餔餟』條。

【餘子】　卽山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。

【餘甘子】　卽菴摩勒之古籍別名。典見唐本草。詳『菴摩勒』條。

【餘泉】　卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【餘眷】　卽白芍之古籍別名。典見別錄。詳『白芍』條。

【餘糧】　卽遠志之古籍別名。典見和漢藥考。詳『遠志』條。

【餘糧石】　卽禹餘糧之處方用名。詳『禹餘糧』條。

【駱駝】　**原名**　駝。

古籍別名　橐駝。（漢

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



駱駝

會）

外國名稱 Camelus（拉丁）Camel（英）ラクダ（日本）

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類反芻偶蹄類駱駝科。

產地 出亞洲中部之沙漠諸地。

形態 駱駝爲家畜類之一種。其體大頭較小耳亦小眼有重瞼。鼻能開閉開爲大孔閉爲裂隙。上脣中尖分裂。下脣較長頸長。上方彎形。軀幹膨大。胸肩膝有厚皮。背有一或二之肉峯。四肢細長。每肢具二蹄。蹄不包蹴。蹴有厚皮如墊。趾相連。便於履沙。尾細長。裸出端有叢毛。毛色赤褐不長。胃中有小囊。累累可貯水以解渴。故能數日可不飲水。性馴力强。能重負遠涉沙漠諸地。人多豢養。其肉可供藥用。

採取 入藥以野駝者良。

性質 甘溫無毒。

主治 諸風下氣壯筋骨。潤肌膚。主惡瘡。

【駱駝毛】**主治** 婦人赤白帶下最良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論駱駝毛曰。頷毛療痔。燒灰。酒服方寸匕。

【駱駝乳】**性質** 甘冷無毒。

主治 補中益氣壯筋骨。令人不饑。

【駱駝屎】**主治** 蚘。乾研。嗑鼻止

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論駱駝屎曰。燒煙殺蚊虱。

【駱駝脂】**原名** 駝脂。

基本 脂油也。此乃駝峯中之脂。

古籍別名 峯子油。（綱目）

採取 入藥以野駝者良。

性質 甘溫無毒。

主治 頑痺風。瘧惡瘡毒腫。死肌。筋皮攣縮。疏損筋骨。火炙摩之。取熱氣透肉。亦和米粉作煎餅食之。療痔。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論駱駝脂曰。治一切風疾。皮膚痺急。及惡瘡腫爛。並和藥傅之。【明】李時珍本草綱目論駱駝脂曰。主虛勞風。有冷積者。以燒酒調服之。

參攷資料 ㊀家駝。舉蹄最精。人多煑熟糟食。（寇宗奭）㊁駱駝脂。能柔五金。（醫源）

【駱駝黃】**性質** 苦平。微毒。

主治 風熱驚疾。

參攷資料 駱駝黃似牛黃而不香。戎人以飢牛黃而功不及也。（李時珍）

【鮀魚】即鯊魚之古籍別名。典見爾雅。詳『鯊魚』條。

【鱘魚】即鰉魚之古籍別名。典見綱目。詳『鰉魚』條。

【鮎魚】即白魚之古籍別名。典見綱目。詳『白魚』條。

【鮎魚】即鰋魚之古籍別名。典見綱目。詳『鰋魚』條。

【鮎魚鬚】**形態** 鮎魚鬚爲草類之一種。梗葉青色。面起直紋。沿藤如豆葉二丫。內生二鬚。其根如竹鞭形。狀色白而粗。可供藥用。



鮎魚鬚

【鮑魚】**命名** 鮑卽古之乾魚也。乃魚之可包者。故字從包。遂名之曰鮑。

古籍別名 薨魚。（禮記）簪折魚。乾魚。溲溲爲腊者名溲魚。鱐魚。以物穿風乾者名法魚。鰒魚。以鹽漬成者名醃魚。鹹魚。鮑魚。鰡魚。（綱目）

形態 鮑魚爲無鱗魚類之一種。腹無鱗有殼。一面附石。細孔纍纍。其數多至十二。其肉可供食與藥用。

性質 辛。臭。溫。無毒。

主治 療瘵墜墮。骸蹶。腕折。瘀

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

血。血痺。在四肢不散者。女子崩中血不止。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鮑魚肉曰。煮汁治女子血枯病。傷肝。利腸。同麻仁。蔥豉煮。潤乳汁。

參攷資料　古言僔鮑魚爲人體重要之健康要素。日人白根敏郎氏。發見鮑魚對於不治之肺病有非常之效果。此可怕之亡國肺病。謂有全愈之可能。是否確實可信。則未敢必。茲將其事實約略介紹於下。白根氏在廿年前。慨國產鮑魚有多量之營養素。而其極優秀之肉盾。輸出甚少。懷發奮研究之決心。遂想單身視察中國及美國之沿岸。後因在大磯創立鮑魚研究所而作罷論。但其時偶然發見鮑魚中有名福鮑之一種中含福壽該物在人體中。助白血球之活動。有極大撲滅結核菌之作用。其結果。重腦之肺病。可治愈於一個月左右。可怕之肺病。在此情形之下。可謂不足懼矣。未咯血及下痢氣味之肺結核。極易治愈。此種症狀。即至二三期亦無妨礙。但血腺血炎之程度至咯血及喉頭結核。腸結核。腎臟結核。膀胱結核。睾丸結核等。雖在初期。難在一月中治愈之。雖然。因體質之不同。自服用始經四五日後。即現效果者。再越二十日其效能始能顯著。此爲患者表面的簡單之作用。在殺菌程度。無甚變化。但因病症之緩然輕重。在全身有衰弱程度之差異者。全癒上當然有多少之差異。

【鮑魚頭】　**主治**　煮汁治眯目。燒灰。療疔腫瘟氣。

【鮒魚】　即鯽魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯽魚』條。

【鮭荅】　**古籍別名**　石蠶。馬蠶石。藉丹。(和漢藥考)

基本　係牛馬腸內之結石。由生病或食物等關係而生者。

產地　鮭荅不僅生於牛馬腸中。凡諸獸腸內亦往往生之。例如有鐵片等入腸內。則漸次重疊生成一石質塊。和漢藥考曰。在習慣上則概稱爲馬蠶石者。即鮭荅也。

形態　鮭荅形狀大小不一。小者如豆。大者如雞卵。更有大如西瓜者。其質質或重或輕。未有一定。外觀作灰色、油色、褐色、黑色等。剖之。單有渦文。輕虛者。中有褐色或黃色毛。謂之毛毬。

性質　甘。鹹。平。無毒。

成分　其無機質爲燐酸鎂、炭酸鈣、炭酸鎂等。

效能　用治驚癎藥。

主治　驚癎。毒瘡。

國外學說　增補手板發蒙曰。鮭荅來自渤泥。巴爾齊亞。應帝亞等國者。謂之「柏曹亞魯斯典」。俗謂之「歇依沙拉末沙拉」。即檀達石也。作黃褐色而有光。刮而燒之。有香氣。乃駝羊腹中鮭荅。非出自牛馬腹中。原名「末沙魯」。誤呼「末沙拉」。又和漢三才圖會曰。自阿蘭陀來。其形如鳥卵。長寸許。淺褐色。潤澤。似石非石。重可五六錢。研磨之。有層層理如卷成者。主治瘡瘡危症。解諸毒。俗傳云。婆爲獵人所傷。其疵痕成贅肉塊。實則此亦鮭荅也。俗說不可信。

參攷資料　㈠鮭荅生走獸及牛馬諸畜肝膽之間。有肉囊裹之。多至升許。大者如鷄子。小者如栗。如棣。其狀白色。似石非石。似骨非骨。打破層疊。嘉靖庚子年。薪州侯屠殺一黃牛。得此物。人無識者。有番僧云此至寶也。牛馬豬畜皆有之。可以祈雨。西域有密呪。則霖雨立至。不知呪者。但以水浸攪弄亦能致雨。後考陶九成輟耕錄所載。鮭荅即此物也。其言曰。蒙古人禱雨。惟以淨水一盆。浸石子數枚。淘漉玩弄。密持呪語良久。輒雨。石子名鮭荅。大者如雞卵。小者不等。乃走獸腹中所產。獨牛馬者最良。蓋牛黃狗寶之類也。又按京房易占曰。兵强主武。則牛腹生石。據此則鮭荅狗寶同一類也。但生於狗腹者爲狗寶耳。(李時珍)㈡鮭荅即馬寶。眞者難得。主治癲癎。(李士材)

【鮦魚】　㈠即鱯魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱯魚』條。㈡即鰷魚之古籍別名。典見綱目。詳『鰷魚』條。

【鮪魚】　即海鷂魚之古籍別名。典見綱目。詳『海鷂魚』條。

【鮫魚】　即黃顙魚之古籍別名。典見綱目。詳『黃顙魚』條。

【鮫魚】　即鱘魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱘魚』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鮹】卽瓦楞子之古籍別名。典見劉珣嶺表錄。詳『瓦楞子』條。

【鯠】卽比目魚之古籍別名。典見上林賦。詳『比目魚』條。

【鰈】卽比目魚之別名。典見動物學大辭典。詳『比目魚』條。

【鯠魚】卽嘉魚之古籍別名。典見綱目。詳『嘉魚』條。


【鴛鴦】命名 本品雄曰鴛。雌曰鴦。終日並游。有宛在水中央之意。故名。

古籍別名 黃鴨。匹鳥。(綱目)

外國名詞 Aix galericulata L.(拉丁)Mandarin duck(英) Brautente(德)オシドリ或ラシドリ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類游禽類鴨亞科。爲鴛鴦之肉。

形態 鴛鴦爲水禽類之一種。形似鴨而小。嘴扁頸長。翼長能飛。趾有蹼。雄者羽毛美麗。頭有紫黑色毛冠。翼之上部有黃褐色飾羽一對。形如銀杏葉。嘴紅。足黃。其雌者之羽毛不及雄者鮮美。全體蒼褐。腹胸間有白斑。常偶居池沼。其肉可供食與藥用。



鴛鴦

性質 鹹。平。有小毒。

主治 諸瘡疥癬。以酒浸炙令熱。傅貼瘡上。冷卽易。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鴛鴦肉曰。清酒炙食。治瘦瘡。作羹臛食之。令人肥麗。夫婦不和者。私與食之。卽相愛憐。【唐】孫思邈千金翼論鴛鴦肉曰。炙食。治夢寐思慕者。

參攷資料 鴛鴦肉多食。令人患大風。(孟詵)

【鴛鴦木蠶】卽天毬草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『天毬草』條。

【鴛鴦梅】卽梅花之一蒂雙實者。功用詳『梅實』條。

【鴛鴦菊】卽草烏頭之古籍別名。典見綱目。詳『草烏頭』條。

【鴛鴦藤】卽忍冬藤之古籍別名。典見綱目。詳『忍冬藤』條。

【鴛鴦】【唐】孟詵食療本草論鴛鴦肉曰。清酒炙食。治瘦瘡。作羹臛食之。令人肥麗。夫婦不和者。私與食之。卽相愛憐。【唐】孫思邈千金翼論鴛鴦肉曰。炙食。治夢寐思慕者。

參攷資料 鴛鴦肉多食。令人患大風。(孟詵)

【鴛鴦木蠶】卽天毬草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『天毬草』條。

【鴛鴦梅】卽梅花之一蒂雙實者。功用詳『梅實』條。

【鴛鴦菊】卽草烏頭之古籍別名。典見綱目。詳『草烏頭』條。

【鴛鴦藤】卽忍冬藤之古籍別名。典見綱目。詳『忍冬藤』條。

【鴛鴦】卽鴛鴦之古籍別名。典見綱目。詳『鴛鴦

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　頭風。目眩。顛倒癇疾。

主治　癲癎之卽愈。

【鴟肉】　**歷代記述攷證**　【明】李時珍本草綱目論鴟肉曰。食之消雞肉鵝鴨成積。

【鴟尾草】　卽鳶尾之日本名。詳『鳶尾』條。

【鴟骨】　**主治**　鼻衄不止。取老鴟翅關大骨。微炙研末吹之。

【鴟脚莎】　卽蓋草之古籍別名。典見綱目。詳『蓋草』條。

【鴟鴞】　**命名**　本品狀似鴟而有毛角。故名。

古籍別名　角鴟（說文）怪鴟。鴟老。兔（爾雅）鉤鴟。鶚。鵂鶹。穀蠭。鷹呼唶。鷹夜食。鷹快扛鳥。車載板（綱目）。鴟木兔（動物學大辭典）。貓頭鷹（俗名）

外國名詞　Scops sermitorques T. & S.（拉丁）Feathered-tood（英）ミミヅク或オホユノハヅク（日本）

基本　係脊椎動物鳥類猛禽類鴟科之鴟鴞。

產地　出山野森林間。

形態　鴟鴞爲山禽類之一種。其頭圓。上嘴鉤曲。尖端銳。以覆下嘴。眼圓大。周圍有毛圈。頭之兩旁有角羽。突出如耳。頭形似貓。體色概淡褐。多黑斑。後頸有蒼色闊紋。足趾亦被羽毛。爪銳利。與嘴俱黑色。晝伏夜出。能於暗中視物。捕小鳥、兎、鼠爲食。其肝法術家用之。肉可供藥用。

性質　酸。微鹹。有小毒。

主治　癆疾。去毛腸。油煠食。風虛眩暈。煮食。以骨燒存性。酒服。

參攷資料　鴟鴞肉酒煮焙乾。同大鰻鱺擂薄。荷上蒸爛。和蘗搗。焙爲細末。空腹酒下。能治傳屍勞。瘵者。蓋取陰毒毒味。以殺陰毒之蟲。其功與獺肝彷彿。古方罕用。（醫學大辭典）

【鴛龜】　卽攝龜之古籍別名。典見本草集註。詳『攝龜』條。

【鴨】　**原名**　鶩。

命名　本品鳴聲呷呷。故名曰鴨。

古籍別名　鶩。（別錄）舒鳧。（爾雅）家鳧。糯鴨。（廣雅）

基本　係水禽類鴨屬之肉。

形態　鴨爲禽類之一。有家野之分。家畜者其頸長。嘴扁平。尾脚皆短。兩翼皆小。拙於飛翔。趾有連蹼。善游水。恒棲於海川池沼。雄者頭綠文。翅雌者黃斑色。亦有純黑純白者。性木鈍。產卵不擇地。其肉既可供食。亦可供藥用。

採取　秋冬兩季採用之。良。

製法　凡藥用以老而白者及白而烏骨者更佳。

用法　煮取汁。或焙乾研刺和藥。

性質　甘。大寒。無毒。

效能　滋陰。補虛。用作滋補强壯藥。

主治　補虛。除客熱。和臟腑及水道。療小兒驚癎。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草。論鴨肉曰。頭生瘡腫和葱豉煮汁飲之。去卒然煩熱。【宋】日華諸家本草論鴨肉曰。解丹毒。止熱痢。【明】李士材本草圖解論鴨肉曰。鴨味甘性平。主虛勞骨蒸。惟白毛黑嘴者。方有其功。取金瘡水寒之象也。嫩者毒。老者良。【清】黃宮繡本草求眞論鴨肉曰。鴨肉氣味甘溫。逼火而生。嗟水而長。未出卵時。先得火氣。故不憚冰雪。偏喜淫雨。而尾膵膻濁最甚。故雄一被其氣。皆得化生之機。不待鵝尾之遍也。溫中補虛。扶陽利水。是其本性。此主性溫而言者也。有言其性微冷。能入肺腎血分。滋陰補虛。除痿止嗽。化痰利水。消腫爲要。服之陰虛亦不見燥。陽虛亦不見冷。非其性平。烏能若是乎。但雌則微溫。而雄則微冷。不可不辨。若黑骨白毛者。爲虛癆聖藥。亦金水相生之義耳。老者良。鴨血解金銀丹石砒霜百毒。及中惡溺死者。【清】王士雄隨息居飲食譜論鴨肉曰。鴨甘涼滋五臟之陰。清虛勞之熱。補血行水。養胃生津。止嗽息驚。消螺蛳積。雄而肥大極老者良。同火腿海參煨食。補力尤勝。多食滯氣滑腸。凡陽虛脾弱。外感未清。痞脹。脚氣。便溏。腸風。皆忌之。

配合應用　㊀白鳳膏。葛可久云。治久虛發熱。咳嗽吐痰。咳血。火乘金位者。用黑嘴白鴨一隻。取血入溫酒量飲。使直入肺經。以酒補之。將鴨乾掲去毛。胁下開竅。去腸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

拭淨。入大棗肉二升。參苓平骨散末一升。總定。用沙甕一箇。置鴨在內。以炭火慢煨。將陳酒一瓶。作三次入之。酒乾爲度。取起食鴨及棗。類作取愈。（十藥神書方）

㈢治大腹水病。小便短少。百一方。用青頭雄鴨煮汁飲。厚蓋取汗。又治十種水病垂死。用青頭鴨一隻。如常治切。和米。并五味煮作粥食。又方。用白鴨一隻。治淨。以豉半升。同薑椒入鴨腹中。縫定。蒸熟食之。（食醫心鏡方）

參攷資料　㈠鴨。水禽也。治水利小便。宜用青頭雄鴨。取水木生發之象。治虛勞熱毒。宜用烏骨白鴨。取金水寒肅之象也。（李時珍）㈡鶖通作木。鶩性質木而無他心。故庶人以爲贄。曲禮云。庶人執匹。匹雙鶩也。匹夫卑末。故廣雅謂鴨爲鶩。禽經云。鴨鳴啁啁。其名自呼。鳧能高飛。而鴨舒緩不能飛。故曰舒鳧。（李時珍）㈢按格物論云。鴨雄者綠頭文翅。雌者黃斑色。但有純黑純白者。又有白而烏骨者。藥食更佳。鴨皆雄瘖雌鳴。重陽後乃肥膩味美。清明後生卵。則內陷不滿。伏卵聞雷磨之聲。則孵而不成。無雌抱伏。則以牛屎遮而出之。此皆物理之不可曉者也。（李時珍）㈣黃雌鴨爲補最勝。（陶弘景）㈤白鴨肉最良。黑鴨肉有毒。滑中發冷。利脚氣。不可食。目白者殺人。（孟詵）㈥腸風下血人不可食。（吳瑞）㈦嫩者毒。老者良。尾胖不可食。見禮記。昔有人食鴨肉成癥。用秫米治之而愈。（李時珍）

【鴨子】卽鴨卵之古籍別名。典見綱目。詳『鴨卵』條。

【鴨爪稗】卽穆子之古籍別名。典見綱目。詳『穆』條。

【鴨汁粥】基本　本品係以鴨肉汁和米煮成之粥。

主治　消水腫。

【鴨舌】主治　痔瘡。殺蟲。

【鴨舌草】卽地膚子之古籍別名。典見圖經本草。詳『地膚子』條。

【鴨血】性質　鹹冷。無毒。

主治　解諸毒。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草。論鴨血曰。熱血。解中生金銀丹石砒霜諸毒。射工毒。又治中惡及溺水死者。灌之卽活。蚯蚓咬瘡塗之卽愈。

【鴨卵】古籍別名　鴨子。（綱目）鴨蛋（俗名）

性質　甘。鹹。微寒。無毒。

主治　心腹胸脇熱。

參攷資料　㈠鴨卵多食發冷氣。令人氣短背悶。小兒多食脚軟。鹽藏食之。卽宜人。（孟詵）㈡生瘡毒者食之。令惡肉突出。（陳士良）㈢鴨卵不可合鱉肉李子食。害人。合棓食。令人生子不順。（陶弘景）㈣今人鹽藏鴨子。其法多端。俗傳小兒泄痢。炙鹹卵食之。亦問有愈者。蓋鴨肉能治痢。而炒鹽亦治血痢故耳。（李時珍）

【鴨尿草】卽常山之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『常山』條。

【鴨兒芹】卽三葉之原名。詳『三葉』條。

【鴨肪】原名　鶖肪。

命名　本品卽鴨之脂肪。故名。

製法　凡使鍊過入藥用。

性質　甘。大寒。無毒。

主治　風虛寒熱。水腫。

【鴨肫衣】命名　本品卽鴨肫內之皮。故名。

主治　諸骨哽。炙研。水服一錢。卽愈。取其消導也。

【鴨青】卽野靛青之俗名。詳『野靛青』條。

【鴨屎】原名　白鴨通。

性質　冷。無毒。

主治　殺石藥毒。解結總。散畜熱。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草。論鴨屎曰。主熱毒毒痢。又和雞子白塗熱瘡腫毒。卽消。塗蚯蚓咬亦效。【明】李時珍本草綱目論鴨屎曰。絞汁服。解金、銀、銅、鐵毒。

【鴨屎草】卽常山之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『常山』條。

【鴨屎蠀】卽明蠀之有雜色。如鴨屎者。性質功用。詳『明蠀』條。

【鴨涎】主治　小兒痙風。頭及四肢皆往後。以鴨涎滴之。又治蚵蚓吹小兒陰腫。取雄鴨抹之卽消。

【鴨蛋】卽鴨卵之俗名。詳『鴨卵』

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

條。

【鴨跖草】古籍別名　芣雞舌。草碧竹子。（拾遺）竹雞草。竹葉菜。淡竹葉。耳環草。碧蟬花。藍姑草。（綱目）露草。帽子花。（日本）

外國名詞　Commelina communis, L.（拉丁）ツユクサ　バウシバナ（日本）

基本　係鴨跖草科。藥用其苗莖。



鴨跖草

產地　山野原澤及路旁水田間恒有出。

形態　鴨跖草爲溼草類之多年生草本。莖高尺餘。質柔。常傾臥於地面。葉廣披針形。與竹相似。鞘厚而柔闊。有平行脈。葉柄如鞘狀。圍於莖上。互生。夏日莖梢着花。花冠藍色。花瓣二片。不整齊。外部有大苞。呈佛燄狀。自晨開放。至午後即萎縮。此花所榨出之藍汁。浸紙。則爲藍紙。故可供繪具之顏料。花後結角。如鳥喙。實在角中。大如小豆。中有細子。灰黑而皺狀如蠶屎。其苗莖可供藥用。

性質　苦。大寒。無毒。

主治　寒熱瘴癘。痰飲。疔腫。肉癥。瀝滯。小兒丹毒。發熱狂癲。大腹痞滿。身面氣腫。熱病。蛇犬咬。癰疽等毒。

歷代記載證　【宋】大明諸家本草論鴨跖草曰。和赤小豆煮食。下水氣溼痺。利小便。【明】李時珍本草綱目論鴨跖草曰。消喉痺。

參攷資料　㊀鴨跖生江東淮南平地。葉如竹。高一二尺。花深碧色。有角如鳥嘴。（陳藏器）㊁竹葉菜處處平地有之。三四月生苗。紫莖。竹葉嫩時可食。四五月開花。如蛾形。兩葉如翅。碧色可愛。結角尖曲如鳥喙。實在角中。大如小豆。豆中有細子。灰黑而皺狀如蠶屎。巧匠採其花取汁。作畫色及彩羊皮燈。青碧如黛也。（李時珍）

【鴨腦】　主治　凍瘡。取塗之良。

【鴨脚】即劉寄奴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『劉寄奴草』條。

【鴨脚子】即白果之古籍別名。典見綱目。詳『白果』條。

【鴨脚皮】產地　廣東各屬。以東江爲多出。

性質　淡。甘。辛。溫。

主治　酒瘕。洗爛脚。敷跌打。

【鴨脚金星】即辟瘟草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『辟瘟草』條。

【鴨脚青】基本　鴨脚青爲雜草類之一種。可供藥用。

採取　以如連珠者良。

主治　疔瘡。

【鴨脚葵】即葵之最小者。功用詳『冬葵子』條。

【鴨蓱】即浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【鴨頭】主治　煮服。治水腫。通利小便。

【鴨膽汁】性質　苦。辛。寒。無毒。

主治　塗痔核良。又點赤目初起。亦效。

【鵯鴝】即鴝之古籍別名。典見廣雅。詳『鴝』條。

【鴝鵒】即鸜鵒之古籍別名。典見周禮。詳『鸜鵒』條。

【麋】即麋子之別名。典見綱目。詳『麋』條。

【黔蛇】即白花蛇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白花蛇』條。

【鼢鼠】即鼹鼠之古籍別名。典見廣雅。詳『鼹鼠』條。

【龍子皮】即蛇蛻之古籍別名。典見別錄。詳『蛇蛻』條。

【龍子衣】即蛇蛻之古籍別名。典見本經。詳『蛇蛻』條。

【龍井茶】即雨前茶之產於浙江龍井者。功用詳『雨前茶』條。

【龍公竹】即竹之葉若芭蕉者。功用詳『竹』條。

【龍手藤】產地　生石間。

形態　龍手藤爲雜草類之一種。莖如龍手。莖如藤狀。可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　偏風口喎。手足攣緩。補虛。益陽。去冷氣風痺。以醇酒浸近火令溫。空心服之。取微汗。

【龍月】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【龍爪粟】即穆子之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見綱目。詳『穇』條。

【龍爪稗】卽穇子之古籍別名。典見救荒本草。詳『穇』條。

【龍牙】卽天生牙之別名。典見綱目。詳『天生牙』條。

【龍牙草】卽馬鞭草之古籍別名。典見圖經本草。詳『馬鞭草』條。

【龍牙燕】卽燕窩之處方用名。詳『燕窩』條。

【龍仙石】卽龍涎石之古籍別名。典見綱目。詳『龍涎石』條。

【龍仙草】卽雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【龍汁】卽黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃丹』條。

【龍白泉粉】卽膠刀塗之古籍別名。典見綱目。詳『膠刀塗』條。

【龍目】卽龍眼之古籍別名。典見吳普本草。詳『龍眼』條。

【龍石膏】**產地**　產杜陵。

形態　龍石膏爲石類之一種。狀如鐵脂。黃色。可供藥用。

性質　無毒。

主治　消渴。益壽。

【龍立】卽續斷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『續斷』條。

【龍吐珠】**產地**　以南海屬多出。

主治　跌打。洗蛇茸。燜肉。散毒。乾水。

【龍羊草】卽醜春花之古籍別名。典見圖經本草。詳『醜春花』條。

【龍舌草】**產地**　生池澤湖泊間。

形態　龍舌草爲水草類之一種。葉如大棗。慈菜。或如栗苔狀。根生水底。抽莖出水。開白花。其根似胡蘿蔔根。而氣香。搗汁。能轆鵝鴨卵。可供藥用。

性質　甘。鹹。寒。無毒。

主治　癰疽。湯火灼傷。搗塗之。

參攷資料　龍舌草根可煮丹砂。煆白礬。制三黃。(李時珍)

【龍衣】卽蛇蛻之處方用名。詳『蛇蛻』條。

【龍沙】卽麻黃之古籍別名。典見本經。詳『麻黃』條。

【龍角】**性質**　甘。平。無毒。

主治　驚癎痰癖。身熱如火。腹中堅。及熱洩久服。輕身通神明延年。

歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論龍角曰。小兒大熱。【宋】蘇頌圖經本草論龍角曰。心熱風癎。以烟角磨濃汁二合。食上服。日二次。

施用宜忌　畏乾漆、蜀椒、理石。

參攷資料　骨齒醫家常用。角則稀使。惟深師五邪丸用之。云無角用齒而千金治心病。有角齒同用者。(蘇頌)

【龍豆】卽續斷之古籍別名。典見別錄。詳『續斷』條。

【龍泄】卽龍涎香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『龍涎香』條。

【龍芝】㊀卽青芝之古籍別名。典見別錄。詳『青芝』條。㊁卽五靈脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五靈脂』條。

【龍花】卽那耆悉之古籍別名。典見綱目。詳『那耆悉』條。

【龍芽草】卽石打穿之古籍別名。典見綱目。詳『石打穿』條。

【龍挂香】卽線香之古籍別名。典見綱目。詳『線香』條。

【龍泉粉】卽龍白泉粉之簡稱。詳『龍白泉粉』條。

【龍胎】**古籍別名**　龍胞。(綱目)

產地　出蜀中山澗。

形態　龍胎大類乾魚鱗。煎時氣甚腥臊。可供藥用。

主治　產後餘疾。婦女經閉。年不通。同瓦松、景天各少許。以水兩盞。煎一盞。去滓。分二服。少頃。腹中轉動。便下。按此物方家罕知。而昔人曾用。世當有識者。(蘇頌)㊁龍胎、龍胞俱出巴蜀。皆下血疾。蓋一物也。(李時珍)

【龍胞】卽龍胎之古籍別名。典見綱目。詳『龍胎』條。

【龍修】卽石龍芻之古籍別名。典見山海經。詳『石龍芻』條。

【龍涎】**命名**　本品卽龍所吐之涎沫。故名。

產地　出西南海洋島中。

形態　龍涎初出。形若脂膠。黃白色。乾則成塊。黃黑色。如百藥煎而膩。理久則紫黑如五靈脂而光澤。其體輕飄。似浮石而腥臊。可供藥用。

性質　微酸。鹹。無毒。

811／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　活血利水。助陽道。益精髓。通利血脈。治氣結。癥結。心痛。諸淋。辟精魅鬼邪。逐勞蟲尸疰。

參攷資料　㊀龍涎可以製香。(汪機)㊁龍涎方藥鮮用。惟入諸香。能收臍麝。數十年不散。焚之則翠煙浮空。(李時珍)

【龍涎石】古籍別名　龍仙石。(綱目)

基本　龍涎石爲石類之一種。可供藥用。

主治　大風癩瘡。

【龍涎香】古籍別名　龍泄。(綱目拾遺)鯨糞。(和漢藥考)龍腹香。(新中藥)

外國名詞　Ambergris.(英)Ambra.(德)

基本　屬游水類抹香鯨(眞甲鯨)Physter Macrocephalus, L.之腸及膀胱所分泌之凝結物。浮漾海上。爲人所採取者。

產地　陳仁山藥物生產辨云。龍涎香產南洋羣島之山邊海巖。山打根亦有出。乃鰍魚鯨魚所吐之涎云。

形態　抹香鯨爲鯨之一種。春夏間羣集日本之太平洋沿岸。頭位於其體之三分之一處。牡者大至十五尋。牝者約其半。噴潮不直立。以四十五度傾向前方。與他鯨類異。其所謂龍涎香爲不透明蠟狀固塊。大者有重至一百五十斤者。有白色、灰色、淡赤色、黑白相間者。有暗褐色而有黑斑者。有各雜色層相疊作大理石狀者。質脆弱而輕浮水上。嚼之如蠟。黏著齒牙。不溶於水。遙溫湯酒精。則溶解過半。伊打善能溶解。無何氣味。摩擦之或置掌中溫之。則柔軟如蠟。稍發甘味。狀香氣。投入火中則燃燒。發灰色煙。有佳香。

性質　味甘。氣腥。性濇。

效能　利氣。和血。止痛。辟穢。效能與麝香無大異。惟較劣耳。多用作香料。又能治神經衰弱。陰痿等症。

主治　活血。益精髓。助陽道。通利血脈。

近人學說　程登瀛曰。龍涎香之藥效。尙有待事實來證驗者。據海濱漁人傳說。爲海王或海和尙所吐之唾涎。究其所謂海王、海和尙者。形狀何若。乃泛指名稱。無定或稀有之海大魚而言。究實是眞甲鯨腹裏之脂肪。說爲可靠。海人以旋風所捲起之水柱。曰龍車水。鯨爲水族之甚大者。於一定時間須浮水面呼氣。噴水如霧。或誤以爲龍。因此而有龍涎之名。亦未可定。眞甲鯨腹裏之脂肪。能如海燕之吐涎成窩一樣。底自行吐出。漂浮近岸。與草木結合。拾得之。是爲龍涎。一堆有多至三五擔者。余昔年漫游南洋。得華僑之贈送者。凡五塊。色質各異。大別有二。(一)青藥狀。灰黑色。質重。有膠黏性。恰似丹油膏藥一樣。灼使溶解。魚腥氣甚濃。以紙條拌燃之。有煙。(二)水波狀。黃褐色。似土塊。質輕飄如海棉。以指壓之成粉。取一塊大與杯等者。放杯中溶解之。約剩二分之油液。不黏。無甚氣味。和鴉片煙吸之。才能感覺其固有之臭氣。上述兩種色質不同。乃經過許久天然力所造成的。得還屬鹿哥港一炭廊拾得之例證。可以推知其變化之原因。該炭廊在海濱拾水流樹燒炭。嘗發見一大堆黑而稠黏有腥氣者。或以爲龍涎。乃收拾純油部份。餘仍棄置港濱。經日曝水浸數月之後。漸變乾硬。柴隙間較稀薄者。已成輕鬆質。準此可知脂涎受過日光海水之曬浣分析。於是黏質腥氣逐漸減少。同時受太陽之適度溫熱。(火熱灼之卽溶解)熬起微細泡沫。凝固而成爲輕鬆的固體。前人或專以色質辨眞僞者。明乎變化之歷程。可無須辨矣。願拾得此物所以不甚寶貴者。因攜出都市各藥行大多託故不買。有時或以賤價售出少許。且純屬油質。氣腥不香。或謂可供製香料。想亦有名無實耳。故傳說甚珍貴。而實際上絕無價值可言。其所以無價值。不能通銷於市面者。因本品治療上無著明之效用故也。余嘗以之治嗓喘嗽。瘋癇諸病。毫無功效。

用量　一分至五分。

參攷資料　㊀質品有用蠟加蘇合香、安息香及芳香油製成者。亦有於蘇合香、松脂、蠟等加麝香製成者。(和漢藥考)㊁通雅龍涎有嗅在花面國饒獨立南海中。彼

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

人言於樹收之。最收香氣。今大內甜香用之。（綱目拾遺）㊂大食國產龍涎香。爲上西洋產。於伯西兒海焚之。則翠煙浮空。結而不散。坐客可用一蘭以分煙縷。（澳門記略）㊃嶠南瑣記。龍涎香新者色白。久則紫。又久則黑。白者如百藥煎。黑者次之。似五靈脂。其氣近膘。和香焚之。則翠煙浮空不散。試法將結塊者。奮力投沒水中。須臾突起浮水面。卽取一錢口含之。微有腥氣。經宿其細沫已嚥。餘膠結舌上。取出就瀝秤之。仍重一錢。又乾之。其重如故。雖極乾枯。用銀簪燒極熱。鑽入枯中。乘暖抽出。其涎引絲不絕。驗此不分褐白褐黑俱眞。海東札記。海翁魚大者三四千斤。小者千餘斤。卽海獃也。皮生砂石。刀箭不入。或言其魚口中噴涎。常自爲吞吐。有遺於海濱者。黑色淺黃色不一。卽龍涎香也。聞上淡水有之。欲辨眞贋。研入水攪之。浮水面如膏。以口沫撚成丸。擲案有聲。噙之通宵不耗分毫者爲眞。每兩值數十金。廣志。新安有龍穴洲。每風雨卽有龍起。去地不數丈。朱鬣金鱗。兩目如電。其精華在浮沫時。噴薄如濟泉。如雨土人爭承取之。稍緩則入地中。是爲龍涎。或謂龍涎多積於海上枯木。如鳥遺狀。其色青黧。其香腥。雜百和焚之。翠煙千結。蜿蜒空。經時不散。可以薰分香縷。然多不眞。從番舶來者。出大秦波斯。於雨中焚之。腥膿有聲者眞。坤輿圖記。龍涎香。黑人國與伯西兒兩海最多。有大塊重千餘斤者。望之如島。每爲風濤湧泊於岸。諸蟲鳥獸亟喜食之。汪機本草。龍吐涎沫可制香。（嶠南瑣記）㊄龍涎香傳爲獃魚精液。泡水面。凝爲涎。能止心痛。助精氣。以淡黃色。嚼而不化者爲佳。出淡水者皆淡黃色。無黑色。（范成臺灣府志）㊅龍涎香出蘇門答臘國。西有龍涎嶼。峙南巫里大洋之中。羣龍交戲其上。遺涎焉。國人駕獨木舟伺採之。舟如龍形。浮水面。人伏其中。隨風潮上下。停亦用槳。龍遇之亦不吞也。每一斤值其國金錢一百九十二枚。准中國銅錢九千文。嘉靖三十四年。下戶部取香百斤。遍市京師不得。下廣東藩司採買部文至臺司集議。懸價每斤銀一千二百兩。僅得十一兩。上進內驗不同。姑存之。亟取眞者。部文再至。廣州夷囚馬那別的。貯有一兩三錢上之。黑褐色。密地都密地山夷人繼上六兩。白褐色。細問狀之黑者。採在水。白者採在山。皆眞不贋。尋有密地山商再上。通前共得十七兩二錢五分。次年進入內辨驗。是眞。許留用。自後夷船聞上供。稍稍挾來。市始定價。每一兩價百金。龍涎之爲用也。入香合和。能收斂腦麝。清氣雖數十年。香味仍存。得其眞者。和香焚之。翠煙裊空。不散。涎沫有三品。曰汎水。曰滲沙。曰魚食。汎水則輕浮水面。善水者伺龍出取之。滲沙則凝結。年久氣滲沙中。魚食。則化糞於沙礫。惟汎水者可食香用。又言魚食亦有二種。海旁有花。若木芙蓉。春夏間盛開。花落海大魚吞之。若腹腸先食。龍涎花嚥食。久卽脹悶。昂頭向石上吐沫。乾枯可用。惟糞者不佳。（朱國楨大政記）㊆諸香龍涎最貴。市值每兩不下百千。次亦五六十。出大食國近海。有雲氣罩上。間知有龍睡下。或半年一二載。土人守視雲散。則龍已去。必得其涎五七兩。或十餘兩。衆共分之。又大洋中有渦旋處。龍在其下。湧出之。涎。日煤成片。風漂至岸。取之。又嶺外雜記。龍枕石而睡。涎浮水積而堅。新者色白。久紫。甚久者黑。氣近膘。形如浮石而輕。膩理光澤。入香焚之。翠煙浮空。結而不散。又出沒海上。吐出涎沫。有三品。一汎水。二滲沙。三魚食。汎水輕浮水面。善水者伺龍出。隨取。滲沙凡風浪飄泊舟嶼。積年氣盡於沙土中。魚食涎作糞。散沙礫。氣腥穢。進貢亦不過四兩。（嶺南雜記）㊇按龍涎論色則瑣記言有白與紫黑之分。而札記又有淺黃色。廣志有黑青色。辨眞僞亦諸說互異。大抵不必論其色。總以含之不耗。投水不沒。雨中焚之能爆者良。東壁綱目鱗部龍下。龍腦龍胎俱有主治。而於龍涎獨遺之。惟附其名云。龍涎。方藥鮮用。惟入諸香。云能收腦麝。數十年不散。出西南海洋。春間羣龍所吐涎沫浮出者。番人採貨之。亦有從大魚腹中剖得者。其狀初若脂膠。黃白色。乾

813／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

則成塊。黃黑色。如百藥煎而膩理。久則紫黑。如五靈脂而光澤。其體細瓢以浮石而腥臊。其說亦未確。核蓋所云魚腹中得者。卽札記所云海鰍魚之精也。亦名龍涎。出臺灣。不若大洋中產者佳。夫龍腦龍胎。世上所無。龍涎則閩粵貨售者多。東壁何得於罕見者載之。於所有者反略之耶。則甚矣該博之難也。入藥用隔湯頓化。如膠糖狀者佳。(綱目拾遺)㈨龍涎遇煙煤則不散。入藥忌鐵器。及石膏。(西陽雜俎)㈩在澳門見倭夷用合舶硫。及他藥作種子丸。云漢時術士和丹用此。倭夷皆有其方。祕不傳中國。(陳良士)(11)出淡水者。止心痛。助精氣。(札記)(12)龍涎能生口中津液。凡口患乾燥者。含之能津流。益頰。徵若有腥氣。粵中夷人合龍涎丸。和以他藥。便不腥。入口亦不耗減。一丸可用數十年不敗。如單用龍涎入藥。須先用雞湯將龍制涎死。則入腹便化。否則入腹絲毫不損。蓋極難尅化者。方書云焚之其煙能入水盂。予嘗試之。多不驗。(周曲大)

【龍珠】**命名**　本品卽龍葵子之色赤者。象形也。故名。

古籍別名　赤珠。(綱目)

外國名詞　Capsicum annuum, Er. et Sav.(拉丁)

基本　係茄科番椒屬。爲龍葵之子實。

產地　山野有出。

形態　龍珠爲澤草類之一年生草本。葉長卵形。夏日開花。有花柄。常二花叢生於葉腋。亦有兩花以上者。花冠淡黃色。果實紅色。球形而多汁。其子與根。俱可供藥用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　能變白髮。令人不睡。主諸熱毒。石氣發動。調中解煩。

參攷資料　㈠龍珠服之變白。令黑。耐老。若能生食。得苦者不食。他菜十日後。卽有鱷異也。不與葱薤同嗽。根亦入藥用。(甄權)㈡龍葵赤珠者。名龍珠。搥去汁可食。能變白令黑。(甄權)㈢龍珠生道旁。子圓似龍葵。但熟時正赤耳。(陳藏器)㈣龍珠龍葵。雖以子之黑赤分別。其實一物二色。強分爲二者也。(李時珍)

【龍珠子】**性質**　苦。寒。無毒。

主治　疔腫。(陳藏器)

【龍脊茶】**產地**　出廣西。

主治　除瘴。解毒。治赤白痢。

【龍芻草】卽石龍芻之處方用名。詳『石龍芻』條。

【龍荔】**命名**　本品狀如荔枝。而味似龍眼。其木及葉亦似二果。故名。

產地　出嶺南諸地。

形態　龍荔爲果類之一種。三月間開小白花。結實與荔枝同時成熟。不可生啖。但可蒸食。

性質　甘。熱。有小毒。

參攷資料　龍荔實。生食之令人發癲。或見鬼物。(李時珍)

【龍蛭】卽斑蝥之古籍別名。典見綱目。詳『斑蝥』條。

【龍退】卽蛇蛻之古籍別名。典見綱目。詳『蛇蛻』條。

【龍骨】**處方用名**　煆龍骨。花龍骨。

古籍別名　陸虎遺生。(和漢藥考)那伽骨。(梵書)青花龍骨。

基本　爲象類動物之骨埋沒土中化石者。往往從地下掘出。謂之龍骨。

產地　陳仁山藥物生產辨云。龍骨產直隸、山西、岱州、五臺山等處。一經在山尋獲全條。總在數十擔之多。所謂在天成象。在地成形。覩此亦不謬也。和漢藥考曰。概產四川成都。山東沂州。山西太原等處。

形態　其骨細文廣者。是雌。骨粗文狹者。是雄。亦有五色者。又有白色黃色黑色者。其形有九形。頭似駝。角似鹿。眼似鬼。耳似牛。項似蛇。腹似蜃。鱗似鯉。爪似鷹。掌似虎。背有八十一鱗。其聲如戛銅盤。口旁有鬚。頷下有明珠。喉下有逆鱗。頭上有博山。

製法　雷敩曰。凡使龍骨。先煮香草湯浴兩度。搗粉絹袋盛之。用燕子一對去腸肚。安袋於內。懸井面上一宿。取出研粉。入補腎藥中。其效如神。李時珍曰。近世方法。但煆赤爲粉。亦有生用者。事林廣記云。用酒浸一宿。焙乾研粉。水飛三度用。如急用。以酒煮焙乾。或云。凡

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

入藥須用水飛過曬乾。每斤用黑豆一斗。蒸一伏時。曬乾。否則着人腸胃。晚作熱也。

性質　甘。平。無毒。

效能　斂心神。澄浮陽。固精。燥濕。鎮驚。安寐。用作强壯藥。

主治　心腹鬼疰。精物老魅。咳逆洩痢膿血。女子漏下。癥瘕堅結。小兒熱氣驚癇（本經）心腹煩滿。恚怒氣伏在心下不得喘息。腸癰內疽。陰蝕。四肢痿枯。夜臥自驚汗出。止汗。縮小便。溺血。養精神。定魂魄。安五臟。白龍骨主多寐洩精。小便洩精（別錄）

歷代記述弦證　【唐】甄權藥性本草論龍骨曰。逐邪氣。安心神。止夜夢鬼交。虛而多夢紛紜。止冷痢下膿血。女子崩中帶下。【宋】日華諸家本草論龍骨曰。懷孕漏胎。止腸風下血。鼻洪吐血。止瀉痢渴疾。健脾澀腸胃。【明】李時珍本草綱目論龍骨曰。益腎鎮驚。止陰癒。收澀氣脫。肛肌斂瘡。【明】繆希雍本草經疏論龍骨曰。龍真陽氣以生。而伏於陰。爲東方之神。乃陰中之陽。鱗蟲之長。神靈之物也。故其骨味甘平。氣微寒。無毒。內應乎肝。入足厥陰少陽少陰。兼入手少陰陽明經。神也者。兩精相合。陰陽不測之謂也。神則靈。靈則能辟邪惡。蠱毒。魘魅之氣。及心腹鬼疰。精物老魅。遇之則散也。咳逆者。陽虛而氣不歸元也。氣得斂攝而歸元。則咳逆自止。其性澀以止脫。故能止洩痢膿血。因於大腸虛而久不得止。及女子漏下也。小兒心肝二臟。虛則發熱。熱則發驚癇。驚氣入腹。則心腹煩滿。斂攝二經之神氣。而平之以清其熱。則熱氣散。其驚癇及心腹煩滿皆自除也。肝氣賊脾。脾主四肢。故四肢痿枯。肝寧則熱退。而脾亦獲安。故主之也。汗者心之液也。心氣不收。則汗出。肝心腎三經虛。則神魂不安而自驚。收斂三經之神氣。則神魂自安。氣得歸元。勿降利而喘息自平。汗自止也。肝主怒。肝氣獨盛。則善悲怒。魂返乎肝。則悲怒自除。小腸爲心之腑。膀胱爲腎之腑。二經之氣虛脫。則小便多而不禁。臟氣斂。則腑亦隨之。故能縮小便。及止夢寐洩精。小便洩精。兼主瀉血也。其主養精神。定魂魄。安五臟者。乃收攝神魂。閉澀精氣之極功也。又主癥瘕堅結。腸癰內疽。陰蝕者。以其能引所治之藥。黏着於所患之處也。【明】李士材本草圖解論龍骨曰。龍骨甘平。性澀。澀可去脫。故能收斂浮越之氣。固大腸。止遺泄。下血定驚。止汗除崩帶。煆赤。研細。水飛。稍不細。則沾着腸胃。晚年作熱。【清】黃宮繡本草求眞論龍骨曰。龍骨甘濇微寒。功能入肝斂魂。不令浮越之氣。遊散於外。故書載能鎮驚辟邪。止汗定喘。濇可去脫。故書載能以治脫肛。遺結。崩帶。瘡口不斂等症。功與牡蠣相同。但牡蠣鹹濇入腎。有軟堅化痰清熱之功。此屬甘濇入肝。有收斂止脫鎮驚安魂之妙。如徐之才所謂濇可止脫。龍骨牡蠣之屬。白地錦紋。砥之黏舌者佳。【清】黃元御長沙藥解論龍骨曰。龍骨。味鹹微寒。性濇。斂神魂而定驚悸。保精血而收滑脫。傷寒桂枝甘草。龍骨牡蠣湯。治太陽傷寒火逆下後。因燒鍼煩躁者。火逆之證。下之亡其襄陽。又後燒鍼發汗。亡其表陽。神氣離根。因之煩躁不安。龍骨斂神氣而除煩躁也。柴胡加龍骨牡蠣湯。治少陽傷寒下後。胸滿煩驚譫語。小便不利。一身盡重。不可轉側者。以下敗襄陽。膽氣拔根。是以驚生。膽木逆衝。是以胸滿。相火升炎。故心煩而語妄。水泛土溼。故身重而便癃。龍骨斂魂而鎮逆也。

辨僞　白地錦紋。砥之黏舌者眞。

配合應用　㈠同牡蠣。入柴胡桂枝各湯內。取其收斂浮越之正氣。固脫而鎮驚。（張仲景方）

㈡治勞心夢遺。同遠志等分爲末。煉蜜丸如梧子大。硃砂爲衣。每服三十丸。蓮心湯下。睡卽洩精。白龍骨四分。韭子五合。爲散。空心酒服方寸匕。（梅師方）

㈢又方。治泄瀉不止。白龍骨、白石脂等分。爲末。水丸梧子大。紫蘇木瓜湯下。壯大人小兒用。亦治久痢休息。

㈣治久痢脫肛。白龍骨粉撲之。（姚和衆方）

㈤龍齒同荊芥、澤瀉、牡丹皮、蘇木、人參、牛膝、紅花、蒲黃、當歸、童便、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

治產後噩血撲心。妄語癲狂。如傷寒發狂者。切不可認作傷寒治。誤則殺人。

㈧同牛黃、犀角、鉤藤鉤、丹砂、生地黃、茯神、琥珀、金箔、竹瀝、天竹黃、蘇合香治大人小兒驚癇癲疾。

㈦治健忘。久服聰明益智慧。用白龍骨、遠志等分爲末。食後酒服方寸匕。日三。（千金方）

㈥治勞心夢洩。龍骨、遠志等分爲末。煉蜜丸如梧子大。硃砂爲衣。每服三十丸。蓮子湯下。（食醫心鏡方）

㈤暖精益陽。前方去硃砂。每冷水空心下三十丸。（經驗方）

㈣治遺尿淋瀝。白龍骨、桑螵蛸等分爲末。每鹽湯服二錢。（梅師方）

㈢治老癰不止。龍骨末方寸匕。先發一時。酒一升半。煮三沸。及熱服盡。溫覆取汗。即效。（肘後方）

㈡治傷寒毒痢。傷寒八九日至十餘日。大煩渴作。熱三焦有瘡。膿下痢。或張口吐舌。自爛口舌生瘡。不識人。用此除熱毒止痢。龍骨半斤。水一斗。煮四升。沉之井底。冷服五合。漸漸進之。（外臺祕要方）

㈠治熱病下痢欲死者。龍骨半斤研。水一斗。煮取五升。候極冷。稍欲得汗。即愈。效。（肘後方）

㈩治久痢休息不止者。龍骨四兩打碎。水五升。煮取二升半。分五服。冷飲。仍以米飲和丸。每服十丸。（肘後方）

㈨治鼻衄眩冒欲死者。龍骨末吹之。（梅師方）

㈧治吐血衄血。九竅出血。並以龍骨末吹入鼻中。昔有人衄血一斛。衆方不止。用此即斷。（三因方）

㈦治耳中出血。龍骨末吹入之。（三因方）

㈥治男婦溺血。龍骨末水服方寸匕。日三。（千金方）

㈤治小兒臍瘡。龍骨煆研傅之。（聖惠方）

㈣治陰囊汗瘡。龍骨、牡蠣粉撲之。（醫宗三法方）

用量　三錢至一兩。

施用宜忌　凡洩痢腸澼崩漏諸症。並屬於虛。而由於熱鬱積滯者。禁用。是長石膏、川椒忌魚及鐵。得牛黃人參良。

參攷資料　㈠氣入丈夫腎臟中。故益腎藥宜用之。（雷敩）㈡澀可去脫。故成氏云。龍骨能收斂浮越之正氣。固大腸而鎮驚。又主帶脈爲病。（李時珍）㈢許洪云。牛黃惡龍骨。而龍骨得牛黃更良。有以制伏也。其氣收陽中之陰。入手足少陰厥陰經。（李時珍）㈣龍骨又名尺水龍。無尺水不能升天。呵氣成雲。既能變水。又能變火。陸佃埤雅云。龍火得濕則焰。得水則熄。以人火逐之。則息。故人之相火似之。龍卵生思抱。雄鳴上風。雌鳴下風。因風而化。釋典云龍交則變爲二小蛇。又小說載。龍性粗猥。而愛美玉空青。喜嗜燕肉。長鐵及茜草。蜈蚣棟葉五色絲。故食燕者忌渡水。祈雨者用燕。鎮水患者用鐵。激龍者用茜草。祭屈原者用楝葉色絲。裹糭投江。醫家用龍骨者。亦當知其性之愛惡如此。（李時珍）㈤生晉地川谷。及太山巖水岸土穴中。死龍處。採無時。（別錄）㈥剡州、滄州、太原者爲上。其骨細文廣是雌。骨粗文狹者是雄。五色具者上。白色黃色者中。黑色者下。凡經落不淨。及婦人採者不用。（雷敩）㈦龍骨色青白者良。（吳普）㈧今河東州郡多有之。李肇國史補云。春水至時。魚登龍門。蛟骨甚多。人採爲藥。有五色者。龍門是晉地。與本經合。豈龍骨即此魚之骨乎。又孫光憲北夢瑣言云。五代時。鎮州劚殺一龍。鄉豪曹寬取其雙角。角前一物。如藍色文。如氍毹。人莫之識。則龍亦有死者矣。（蘇頌）㈨諸說不一。終是臆度。曾有崖中崩出一副皮骨。頭角皆備。不知蛻耶。斃耶。謂之蛻。斃則有形之物。不得生見。死方可見。謂之化。則其形獨不可化耶。（寇宗奭）㈩經文言死龍之骨。若以爲蛻。終是臆說。（汪機）(11)龍骨本經以爲死龍。陶氏以爲蛻骨。蘇寇諸說。皆兩疑之。稱謂龍神物也。似無自死之理。然觀蘇氏所引鬬死之龍。及左傳云。豢龍氏醢龍以食。述異記云。漢和帝時。大雨龍墮宮中。帝命作羹賜羣臣。博物志云。張華得龍肉。酢。言得醋則生五色等說。是龍固有自死者矣。當以本經爲正。（李時珍）(12)東洋學藝雜誌第三號載有日本讀岐國小

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

豆島掘出俗所謂龍骨者經東京大學教授布瑪恩氏之鑑定實係漂積期中所棲息之牛族一種名 Bison Priscus. 者之頭骨又手板發蒙亦載有小豆島所掘出者當係大魚之骨云。

【龍常草】古籍別名　薄。鼠莞。（爾雅）棕心草。（綱目）機心草。（植物學大辭典）

外國名詞　Diarrhena japonica, Cry. var. Koenigii, Hack.（拉丁）タツノヒゲ（日本）

基本　禾本科龍常草屬。藥用其莖。

產地　凡山川河澤均有出。

形態　龍常草爲澀草類之多年生草本。莖初略臥地自下部之節生根。高一二尺。葉頗長大。廣亦四五分。葉端尖銳。七八月間梢端抽穗。疎着長形之小穗。花作綠色。其莖冬夏俱生。如龍鬚。亦可織席。

性質　鹹。溫。無毒。

主治　輕身益陰氣。療痺寒澀。

參攷資料　㊀俚俗五月採繫角黍之心。呼爲粽心草是也。（李時珍）㊁生河水旁。狀如龍鬚。冬夏生。（李時珍）㊂按爾雅云。薄。鼠莞也。郭璞云。纖細似龍鬚。可爲席。蜀中出者好。恐即此龍常也。蓋是龍鬚之小者爾。故其功用亦相近云。（李時珍）

【龍眼】命名　形象龍目。故名。

處方用名　桂圓肉。

古籍別名　龍目。（吳普）圓眼。（俗名）益智。（別錄）木彈。荔奴。（圖經）亞荔枝。（開寶）魁圓。比目。龍月。荔草。荔椑。細荔。益志。蜜脾。燕卵。鮫淚。驪珠。海珠。蠻海珠。蔈龍眼。錦龍眼巾。荔珠奴。川彈子。繡水團。（和漢藥考）鬼眼。（俗名）

外國名詞　Nephelium Longana, Camb.（拉丁）

基本　係屬無患樹科龍眼樹之果肉。

產地　產東印度、中國福建、廣東諸省及臺灣琉球等。陳仁山藥物生產辨云。桂圓肉。以廣西鬱林爲最好。其次則廣東、廣利。三則廣州、北海。四則廣西北流、貴縣。五則江口。六則羅定。瓊州、海口來者澀。但其味最清甜。俱銷於北省。臺灣來者味淡。水東陽江來者。亦澀而色黑。



龍眼

形態　龍眼係產熱帶地方之常綠喬木。枝葉繁茂。高三四丈。葉互生。爲羽狀複葉。小葉作革質。卵圓形。五月間開白色五瓣花。有香氣。果實大四分至六分許。作帶赤色或紫紅色球圓形。表面有皺紋。乾燥則成褐色。破之空虛。正中有類似枇杷核之種子。其種子被其暗褐色柔韌肉質。是爲龍眼肉。味甘。類葡萄。其實外被有剛毛。種子具肉質之假種皮。其肉薄於荔枝。色白有漿。凝而結實作穗。每穗生實五六十顆。

種類　販賣品中。大粒者謂之虎眼。中粒者謂之龍眼。小粒者謂之人眼。最小粒者謂之鬼眼。去核仁者。謂之桂圓肉。從臺灣打狗港輸出者。呼福圓。

採取　龍眼木長。寒白露後。方可採摘曬乾。

用法　剝去外殼及核。入水煎。或酒浸。或搗爛和丸。

性質　甘。平。無毒。

成分　水〇・八四五。乾燥殘渣九九・一四五。（內可溶性成分七九・七七。不溶成分一九・三八五）灰三・三六。（內得自可溶性成分者二・八七三）葡萄糖二四・九一。蔗糖〇・二二。埃幾斯篤林一・〇五三。纖維素二・一八五。醱類（假定作酒石酸等）一・二六。含淡物六・三〇九。脂肪二・四九四等。

效能　補心脾。療虛羸。用作緩和滋養藥。又治神經衰弱。貧血。

作用　入胃後與胃酸化合。成爲消化蛋白與澱粉之酵素。一部分仍不被化合。及至小腸。始漸次由腸壁吸而達血中。能增加血液之熱量。與酵素之作用。

主治　五臟邪氣。安志厭食。除蟲毒。去三蟲。久服強魂聰明。輕身不老。通神明。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論龍眼曰。開胃益脾。補

817／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

虛。長智。【明】繆希雍本草經疏論龍眼曰。龍眼稟稼穡之化。故其味甘氣平無毒。入足太陰手少陰經。少陰爲君主之官。藏神而主血。甘能益血補心。則君主强。神明通。五臟邪氣俱除矣。甘味補脾。脾得補則食自享而飫。心得補則火下降而坎離交。故能安志。肝藏魂。主納血。心家血滿。則肝有所受而魂强。甘能解毒。故主去毒。久服聰明耳目。輕身不老。總之補益心脾之驗也。至於除蟲。非其所能。略之可也。【清】黃宮繡本草求眞。論龍眼曰。龍眼氣味甘溫。多有似於大棗。但此甘味更重。潤氣尤多。於補氣之中。又更存有補血之力。故書載能益脾長智。養心保血。爲心脾要藥。是以心思勞傷。而見健忘怔忡驚悸。膻腸風下血。俱可用此爲治。蓋血雖屬心生。而亦賴脾以統。思慮而氣既耗。則非甘者不能以補。思慮而神更損。則非潤者不能以濟。龍眼甘而兼潤。既能補脾固氣。復能保血不耗。則神氣自爾長養。而無驚悸健忘之病矣。按古歸脾湯。有用龍眼肉以治心脾傷損。義實基此。非若大棗力專補脾。氣味雖甘。其性稍燥。而無甘潤和柔。以至於極之妙也。至書有言。久服令人輕身不老。百邪俱辟。豈止神智長養之謂。蟲毒可除。三蟲可殺。豈止氣血充足。而蟲不食之謂。但此味甘體潤。凡中滿氣壅。腸滑泄利爲大忌耳。桂產者佳。粵東者性熱。不堪入藥。【清】王士雄隨息居飲食譜論龍眼曰。龍眼甘溫。補心氣。定志安神。益脾陰。滋營充液。果中神品。老弱宜之。以核小肉厚。味純甘者良。

國外學說　日本學說謂龍眼肉者。在漢藥中殊貴重。價亦不廉。爲各種練藥類之主藥。習慣用之。又爲緩和營養品。其用量自二・〇至六・〇。又謂龍眼肉呈酸性反應。味甚甘。香味俱稍似棗與乾葡萄。依藥學士村山長之助氏及藥劑師伊藤禎次郎氏之試驗云。龍眼肉中含有之成分。爲葡萄糖。蔗糖。澱粉。埃幾斯篤林。纖維素。酸類。含窒素物。脂肪等。而舉其百分中所含之數。且有纖維素之定量試驗等。

配合應用　㈠同生地黃、天麥冬、丹參、柏子仁、遠志、蓮實、五味子、茯神、人參。能補心保神。益氣强志。㈡方外服龍眼法。五更將不見水。乾龍眼。以舌在齒上取肉去核。(卽舌攪華池法)細細嚼至渣如膏。連口中津。汩汩嚥之。如嚥甚硬物。舉又如前法。食第二枚。共服九枚。約一時許。服畢方起。辰巳二時未申及臨臥。一日服四次。服時氣和心靜。且漱津納嚥。是取坎納離之法。勞證勤行一月自愈。㈢玉靈膏(一名代參膏)。自剝好龍眼肉盛竹筒式瓷椀內。每肉一兩入白洋糖一錢。素體多火者。再入西洋參片如糖之數。椀口罨以絲絛一層。日日於飯鍋上蒸之。蒸至百次。凡衰羸老弱別無痰火便滑之病者。每以開水淪服一匙。大補氣血。力勝參耆。產婦臨盆服之尤妙。

用量　一錢至三錢。

施用宜忌　外有瘀邪。內有鬱火。以及停飲脹滿等症。禁用。

著名方劑　歸脾湯。治思慮過度。勞傷心脾。健忘怔忡。虛煩不眠。

自汗。驚悸。(濟生方)龍眼肉、酸棗仁(炒)、炙黃耆、炒白朮、茯神各一兩。木香半兩。炙甘草二錢。右藥㕮咀。每服五錢。薑三片。棗一枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。

參攷資料　㈠龍眼本經名曰益智。今專爲果。未見入藥。補注不言。神農本草。編入木部中品。果部中復不曾收入。今除爲果之外。別無龍眼。若謂爲益智子。則專調諸氣。今爲果者。復不能也。矧自有益智條。遠不相當。故知木部龍眼。卽便是今爲果者。按今注云。甘味歸脾而能益智。此說甚當。㈡食品以荔枝爲貴。而資益則龍眼爲良。蓋荔枝性熱。而龍眼性和平也。嚴用和濟生方。治思慮勞傷。有歸脾湯。取甘味歸脾。能益人智之義。㈢龍眼生者沸湯淪過食。不動脾。(李廷飛)㈣荔枝纔過。龍眼卽熟。故南人目爲荔枝奴。又名木彈。曬乾寄遠。北人以爲佳果。目爲亞荔枝。(蘇頌)㈤今閩廣蜀道出荔枝處。皆有之。稽含南方草木狀云。木高二三丈。似荔枝而枝葉微小。凌冬不凋。春末夏初。開細白花。七月實

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

方性。抄入圓腸【龍見【龍銜而生眼°志。朶。寒。之。羌南每荔彈熟。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見新中藥。詳『龍涎香』條。

【龍葛】卽烏蘞莓之古籍別名。典見爾雅。詳『烏蘞莓』條。

【龍葵】古籍別名　苦菜。（唐本草）苦葵。天茄子。老鴉眼睛草。（圖經）水茄。天泡草。老鴉酸漿草。（綱目）犬酸漿。牛酸漿。（日本）外國名稱　Solanum nigrum, L.（拉丁）イヌホホヅキ　ヤマホホヅキ　ウシホホヅキ（日本）

基本　係茄科茄屬。爲龍葵之苗。



龍葵

產地　原野溼地恒多有出。

形態　龍葵爲溼草類之一年生草本。春月萌生。高約二三尺。葉卵形。全邊或呈波狀。夏日梢葉之中間。抽出花莖。花小白色。花冠五裂。雄蕊之葯。近集於雌蕊花柱之周圍。作纖形花序。果實小。爲漿果球形。生青熟黑色。大與綠豆之種子略等。此與龍珠相異者。以龍珠常以兩花集生於葉腋。果實紅熟。爲不同耳。其子根莖葉俱可供藥用。

性質　苦。微甘。滑。寒。無毒。

主治　食之解勞少睡。去虛熱腫。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論龍葵曰。治風。補益男子元氣。婦人敗血。【明】李時珍本草綱目論龍葵曰。消熱散血。壓丹石毒。宜食之。

近人學說　張山雷曰。此草性實。亦寒涼滑利。故亦名葵。莖柔而嫩。似蔓非蔓。延引甚長。故以龍爲名。言其蜿蜒不已也。吾吳土俗。亦呼爲老鴉眼睛。藤結子渾圓。一簇數顆。生青熟黃。故有老鴉眼睛之名。亦有生青熟紅者。其莖葉花蕊皆同。蘇頌圖經謂之赤珠。陳藏器本草拾遺謂之龍珠。實卽一類二種。唐本草謂龍葵去熱退腫。蘇頌謂治婦人敗血。瀕湖謂消熱散血。壓丹石毒。療癰疽腫毒。跌仆傷損。敷以清熱通利爲用。故并治跌仆血瘀。尤爲外科退熱消腫之良品也。

參攷資料　㊀龍葵言其性滑如葵也。苦以菜味名。茄以葉形名。天泡、老鴉眼睛、皆以子形名也。與酸漿相類。故加老鴉以別之。五爪龍亦名老鴉眼睛草。敗醬苦苣並名苦菜。名同物異也。（李時珍）㊁龍葵龍珠。一類二種也。皆處處有之。四月生苗。嫩時可食。柔滑漸高二三尺。莖大如筯。似燈籠草而無毛。葉似茄葉而小。五月以後。開小白花。五出。黃蕊。結子正圓。大如五味子。上有小蒂。數顆同綴。其味酸。中有細子。亦如茄子之子。但生青熟黑者爲龍葵。生青熟赤者爲龍珠。功用亦相彷彿。不甚遼遠。

【龍葵子】採取　七月採之。

主治　疔腫。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論龍葵子曰。明目。輕身。【宋】蘇頌圖經本草論龍葵子曰。治風。益男子元氣。婦人敗血。

【龍葵根】主治　通利小便。同木通胡麥煎湯服。

【龍葵莖葉】性質　苦。微甘。滑。寒。無毒。

主治　擣爛。和土傅疔腫火丹瘡良。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論龍葵莖葉曰。療癰疽腫毒。跌撲傷損。消腫散血。

【龍齒石】古籍別名　勝志。（綱目拾遺）

產地　廬山溪中。

性質　大寒。無毒。

主治　癲面。能滅瘢痕。解熱瘡毒。煅粉撲。暑痧立消。

參攷資料　深山有龍蟄處。皆有之。土人俟龍升去。乃跡而獲之。有五色。以透明者煅用。生用有毒。敲碎投醋中。片片能動而相合者良。（王伯厚）

【龍衙】㊀卽黃精之古籍別名。典見廣雅。詳『黃精』條。㊁卽女青大者之別名。典見綱目。詳『女青』條。

【龍鳳團】卽茶之產於福建舊建寧府境者。功用詳『茶』條。

【龍撫芎】卽川芎之處方用名。詳『川芎』條。

【龍腦香脅】卽婆律香脅之原名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

詳『婆律香膏』條。

【龍孔蛻】形態　龍蛻爲卵生蟲類甲蟲屬之一種。其體扁平如卵形。似小蟑螂及金龜子。長六七分。前翅小而色黑褐。後翅甚扁。雄者膨大而圓。性善游泳。常居水中。覓食小魚。夜出飛翔。亦能嚙人。可供藥用。

主治　除面上黯斲赤氣。美顏色。

【龍齒】性質　澀。涼。無毒。

主治　殺精物。大人驚癇。諸癎癲疾狂走。心下結氣。不能喘息。小兒五驚。十二癇。(本經)小兒身熱不可近。大人骨間寒熱。殺蠱毒。(別錄)

歷代記述攷證　【唐】甄權　藥性本草論龍齒曰。鎭心安魂魄。【宋】日華諸家本草論龍齒曰。治煩悶熱狂鬼魅。

施用宜忌　長石膏、鐵器。得人參、牛黃良。

參攷資料　龍者。東方之神。故其骨與角、齒皆主肝病。許叔微云。肝藏魂能變化。故魂遊不定者。治之以龍齒。卽此義也。(李時珍)

【龍爾爾】卽香牙蕉之汁也。功用詳『香牙蕉』條。

【龍膽】命名　本品葉如龍葵。味苦如膽。故名。

處方用名　龍膽草。

古籍別名　陵游。(本經)苦膽。膽草。觀音草。斜枝大夫。斜枝大士。(和漢藥考)笹龍膽。(日本)草龍膽。山龍膽。(俗名)

外國名詞　Radix Gentianae Scabrae,(拉丁) Japanes, gentian-root(英) Japanisch Gonzianwurzel (德)

學名　Gentiana Scabra, Bge var. Buergeri, Maxim.

基本　屬龍膽科。爲龍膽草之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。龍膽西產名眞仙。產安徽省。由漢口運來。一產江蘇鎭江府。由上海運來。一產吉林奉天。洮南由山東煙臺。牛莊幫運來。各處出產味不相上下。春秋兩次出新。

形態　龍膽爲山野自生之宿根草。莖直立。高達一二尺。葉似竹葉。作廣披針形或長卵圓形。對生而無葉柄。十月間於莖之頂部及上部葉腋。開藍青色合瓣花。三五朶。晝展而夜合。其根形如牛膝。



龍膽(一)



龍膽(二)

採取　每年八月、十一月、十二月。採根陰乾。

製法　雷敎曰。凡使龍膽。採得陰乾。用時銅刀切去蠹上頭子。剉細。甘草湯浸一宿。漉出曝乾。用。龍膽苦寒。空腹餌之。令人溺不禁。

性質　苦。濇。大寒。無毒。

成分　爲苦味越幾斯賈、黃色素、脂肪油等。

效能　瀉肝火。清濕熱。用係瀉火燥濕之健胃藥。又治慢性胃黏膜炎。

作用　助胃液分泌之不足。以促進消化之功能。并能激腸壁神經。使腸之微血管收縮。且含有糖質。能助長酵素之作用。

主治　骨間寒熱。驚癇邪氣。續絕。傷定。五臟殺蟲毒。(本經)除胃中伏熱。時氣溫熱。熱泄下痢。去腸中小蟲。益肝膽氣。止驚惕。久服益智不忘。輕身耐老。(別錄)

歷代記述攷證　【唐】甄權　藥性本草論龍膽曰。治小兒壯熱。骨熱驚癇。入心。時疾熱黃。癰腫口乾。【宋】大明日華諸家本草論龍膽曰。客忤疰氣。熱狂。明目止煩。治瘡疥。【金】張元素珍珠囊論龍膽曰。去目中黃及睛赤。腫脹。瘀肉高起。痛不可忍。【元】李東垣用藥法象論龍膽曰。退肝經邪熱。除下焦溼熱之腫。瀉膀胱火。【明】李時珍本草綱目論龍膽曰。療咽喉痛。風熱盜汗。【明】繆希雍本草經疏論龍膽曰。草龍膽其味大苦濇。其性大寒。而無毒。足厥陰足少陰足陽明三經。藥入足少陰。除本經之熱。腎主骨。故主骨間寒熱。熱極生風。則發驚搐。重則變爲癇病。溼熱邪氣

821／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之在中下二焦者。非此不去。熱去則諸證自解。五臟有熱。則不安。熱除則五臟自定。苦泄而寒。故殺蟲毒。大苦大寒。故能滌除胃中所伏實熱。及時氣溫熱。洩下痢。去腸中小蟲。熱清則肝膽之氣亦清。故益肝膽氣而止驚惕也。久服益智不忘。輕身耐老。則非其任矣。【明】李士材本草圖解論龍膽曰。龍膽苦濇大寒。肝膽經藥也。主肝經邪熱。下焦溼熱。目病赤腫瘀肉。小兒客忤痙氣。去腸中小蟲。【清】黃宮繡本草求眞論膽曰。龍膽草大苦大寒。性稟純陰。大瀉肝膽火邪。兼入膀胱腎經。除下焦溼熱。與防己功用相同。故書載治骨間寒熱。驚癇蠱膈。天行瘟疫。熱利黃疸。寒溼脚氣。咽喉風痺。並酒炒同柴胡則治赤睛胬肉。但此苦寒至極。馮兆張云。其等於嚴冬。黯淡慘重。萬草凋殘。苦寒伐標。宜暫而不宜久。如聖世不廢刑罰。所以佐德意之無窮。苟非氣壯實熱者。率爾輕投。其敗也必矣。

國外學說　和漢藥考曰。龍膽根莖長約十仙米。粗約五密米作暗灰褐色。有不整輪節。上面帶莖痕。間附有殘莖兩側及下面簇生多數副根。橫斷面作暗褐色。其木心中有錯亂脈管束。副根則帶黃褐色。有縱皺。橫斷面呈褐色。木部有暗色。其邊緣有作放線狀排列之脈管。本品不含澱粉。味甚苦。又依日本藥局方云。龍膽（即健質亞那根）者。爲苦味健胃劑。於癡的性消化不良。無胃加答兒症狀之消化不良。酒客之消化不良等。均用之。一日數回。自〇・三至一・〇爲浸劑。乳劑。散劑。製劑如左。一健質亞那越幾斯〇・五至二・〇丸劑。溶劑。二健質亞那丁幾一・〇至二・〇水劑。三苦味丁幾一・〇至二・〇水劑。英美學說謂龍膽草產中國之齊胸山谷。及歐羅巴之南方等處。該草高約三尺。其根可入藥。內含一精。即珍提昆盡。近藥肆中所出售者多爲次等。惟切成大片者。爲上品有數種。常出售之龍膽草根。如紫色龍膽草。有點龍膽草。藍緣形龍膽草等。而植物學家或以爲紫色龍膽草根。即藥肆中常出售之紅色龍膽草根也。英國出售之龍膽草根。多從日耳曼與瑞士運至。而瑞士人喜用此爲補胃藥。其作用爲苦性補藥。如胃不消化。並病方退而欲補其精神。惟此爲有名之藥。間有人用以治依時而作之病。並用爲驅蟲藥。與他種苦性藥相同。用水泡酒泡均可。處方以龍膽草一分切片。沸汽水十分。泡兩點鐘。再加火熬一刻鐘去渣。用絞盤絞之。入燙鍋散氣成膏爲度。常用以配藥丸。每服四釐至二分。（龍膽草膏方）又方龍膽草膏、大黃末、番瞿各等分。卽以龍膽草膏加水和勻爲丸。每服丸一二粒。如身弱胃不消化服之甚效。（龍膽草丸方）又方龍膽草二錢。枳皮五分末。大茴香五分末。火酒二兩。清水六兩五錢。先以火酒浸龍膽草、枳皮、大茴香。待兩點鐘後。然後將水加入濾淨。每服四錢至八錢。能開胃補身。如虛弱神氣不足。胃不消化。及病後熱度太低。服之均妥。（龍膽草枳皮茴香方）

近人學說　㊀賈九如曰。龍膽草秋開花。得金令司權。金能制木。且味苦如膽。故專瀉肝膽之火。主治目痛頸癰。兩脇疼痛。驚癇邪氣。小兒疳積。凡屬肝經熱邪爲患。用之神妙。其氣味厚重而沉下。善清下焦溼熱。若瘡癰便毒下疳。及小便澁滯。男子陽挺腫脹。或光亮出膿。或莖中痒痛。女人陰癢作痛。或發痒生瘡。以此入龍膽瀉肝湯治之。皆苦寒勝熱之力也。亦能除胃熱。止蛔蟲。蓋蛔得苦卽安耳。但脾胃虛者少用。㊁張山雷曰。龍膽草亦大苦大寒之品。純以清熱見長。主骨間熱者。大寒能清骨熱也。主驚癇。止驚惕。皆清熱寧心之效。邪氣者。卽邪熱之氣也。續絕傷定五臟。則因其却熱除邪而甚言之耳。蠱毒。是南方溼毒之厲氣。腸中之蟲。皆溼熱蘊蓄所生也。大苦大寒。燥溼勝熱。自能辟蠱殺蟲。別錄主胃中伏熱。時氣溫熱。皆苦寒之用。主熱泄下利。亦苦燥溼。寒勝熱。與芩連之治溼熱泄瀉。而并治積滯熱痢同義。益肝膽氣者。清其邪熱。卽所以益其正氣。非謂苦寒之品。能補肝膽也。又曰。龍膽草大苦大寒。亦與連芩同功。但本經稱其味

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瀉。則其性能守而行之於內。故獨以治骨熱着。餘則清泄肝膽有餘之火。疏通下焦濕熱之結。足以盡其能事。而癰瘡之毒。疳瘍之傷。皆屬相火猖狂。非此等大苦大寒。不足以瀉其烈燄。是又疏泄下焦之餘義矣。

配合應用　㊀草龍膽同白芍藥、甘草、茯神、麥門冬、木通、生小兒驚癇入心。壯熱骨熱。時疾熱。黃口瘡。㊁同苦參、牛膽、治穀疸。㊂同苦參、蛆蟲灰、青黛、治小兒一切疳熱狂語及瘡疥。㊃治蚘蟲攻心如刺。吐清水。龍膽二兩去頭剉水二盞。煎取一盞。去滓。隔宿勿進食。平旦時一頓服之即差。㊄同生地黃等分。治溼熱傷血分。使大腸以致卒下血。多服必效。

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡脾胃虛弱作瀉。與無溼熱實火者禁用。及空心餌之。令人溺不禁。惡地黃小豆貫衆爲之使。

著名方劑　龍膽瀉肝湯。治脇痛口苦。耳聾。耳腫。筋痿。陰溼熱痒。陰腫。白濁。瀆血（局方）龍膽三分。（酒炒）黃芩（炒）梔子（酒炒）澤瀉各一錢。木通車前子各五分。當歸二分。柴胡一錢。甘草生地各三分。（酒炒）右十味水煎服。

參攷資料　㊀龍膽味苦性寒。氣味俱厚。沉而降。陰也。足厥陰少陽經氣分藥也。其用有四。除下部風溼一也。及溼熱二也。脾下至足腫痛三也。寒熱脚氣四也。下行之功。與防己同。酒浸則能上行外行。以柴胡爲主。龍膽爲使。治眼中疾必用之藥。（張元素）㊁相火寄在肝膽。有瀉無補。故龍膽之益肝膽之氣。正以其能瀉肝膽之邪熱也。但大苦大寒。過服恐傷胃中生發之氣。反助火邪。亦久服黃連反從火化之義。別錄久服輕身之說。恐不足信。（李時珍）㊂胃氣虛者。服之必嘔。脾氣虛者。服之必瀉。（張石頑）

【龍膽草】即龍膽之處方用名。詳『龍膽』條。

【龍鱗甲】即穿山甲之古籍別名。典見郭璞賦。詳『穿山甲』條。

【龍鬚】㊀即石龍芻之古籍別名。典見本經。詳『石龍芻』條。㊁即天生牙之別名。典見綱目。詳『天生牙』條。㊂即銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀箔』條。

【龍鬚草】**古籍別名**　又雞筒人字草。棒槌草。了雞草。鹿跑草。（綱目拾遺）草龍芻（逃異記）

產地　多生山澤間。

形態　龍鬚草爲澤草類之一種。穀雨後發苗。似扁蓄而小。又似野席草相類。橫生布地。小滿時抽莖開花。色青細。可供藥用。

性質　溫。無毒。

主治　散風火。理溼熱。療一切瘡疥口咽諸毒。火症牙痛。

【龍鬚草】㊀即野席草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『野席草』條。㊁即石龍芻之處方用名。詳『石龍芻』條。

【龍鬚菜】**產地**　生海邊石間。

形態　龍鬚菜爲菜類之一種。叢生無枝葉。狀如柳根。鬚細如絲。長者尺餘。如髮菜而色白。可供藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　癭結。熱氣。利小便。

【龍鬚菜】㊀即鹿角菜之古籍別名。典見盛京誌。詳『鹿角菜』條。㊁即魚腥草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『魚腥草』條。

【龍鬚藤】**產地**　出廣東東莞縣境。

形態　龍鬚藤爲蔓草類之一種。其藤微細如髮。直起數丈。而無一節。飛越數樹。如千百游絲牽綴。或紅或紫。或具有五色。生無根。掛樹長發。帶其花與子。可供藥用。

主治　補筋骨。祛風。解毒。能循經絡。無微不到。浸酒服。

參攷資料　龍鬚藤之液汁。和細土石灰。塗覆搪釜。其堅如鐵。雖猛火不裂。（趙學敏）

【龍鱗香】即沈香之埋土中日久。不待削而成薄片者。功用詳『沈香』條。

【龍鱗草】即景天之古籍別名。典見和漢藥考。詳『景天』條。

【龍鱗蓂莢】即常春藤之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『常春藤』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【龜甲】卽龜版之原名。詳『龜版』條。

【龜肉】性質　甘。酸。溫。無毒。

主治　煮食除濕痺。風痺。身腫。蹉折。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論龜肉曰。治筋骨疼痛。及一二十年寒嗽。止瀉。血痢。

參攷資料　㈠龜肉作羹臛大補而多神靈。不可輕殺。書家所載甚多。此不具說。（陶弘景）㈡六甲日十二月俱不可食。損人神。不可合豬肉、菰米、瓜苽食。害人。（孫思邈）㈢按周處風土記云。江南五月五日。煮肥龜入鹽豉、蒜、椒食之。名曰苴龜。取陰內陽外之義也。（李時珍）

【龜肉酒】基本　本品係用水龜肉和麴釀成之酒。

主治　多年咳嗽。大風緩急。四肢拘攣。或久癱緩不收。皆癒。

【龜血】性質　鹹。寒。無毒。

主治　塗脫肛。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論龜血曰。治打撲傷損。和酒飲之。仍搗生龜肉塗之。

【龜兒草】卽天毬草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『天毬草』條。

【龜版】原名　龜甲。

命名　說文龜頭與蛇同。故從它。下象其甲足尾之形。故曰龜。（它古蛇字）藥用其甲。故俗名之曰龜版。

處方用名　元武版。敗龜版。炙坎版。生龜版。

古籍別名　玄衣督郵。神屋。（本經）敗將。（日華）漏天機。（圖經）下甲。（和漢藥考）水馬兒。（綱目）

外國名稱　Tortoise-shell.（英）

基本　龜屬於爬蟲類之龜族。板者。其甲殼也。

產地　陳仁山藥物生產辨云。湖北安徽、沿揚子江下游一帶均有出。江蘇鎮江府亦有出。三月新。又有一種產自暹邏。名爲洋版。

形態　龜棲息於川澤池沼。以蠕蟲及小魚類爲其食餌。亦脊椎動物之一也。（龜爲兩棲動物。血溫頗低。較氣中溫度僅高約一二度）體軀扁平。略帶橢圓形。背腹兩面俱有堅甲。連結若匡。內具骨骼。其背腹兩甲。係變性之皮膚所成。頭部形如圓錐。口無齒。而有如鳥之角嘴。四趾皆短。趾端有爪。便掘土之用。各趾間有蹼相連。便泳水之用。背甲有六角紋十三。分三行並列。周圍有六角紋二十五。繞其邊緣。腹甲有縱橫溝。作暗黑色。一旦遇敵。則其頭尾四肢俱縮入甲中。故有六藏之名。性質愚鈍。運動亦甚遲緩。然生活頗強。雖數月斷食。亦可不死。且得保五百歲之長壽。（龜之長壽。與鶴相並。人皆重之。中國自古以龜占吉凶。謂之龜卜）春日掘穴地中。產卵其間。覆以落葉。更覆以砂。受太陽之熱。自然孵化。至冬則蟄伏不出。

採取　靈山諸谷。因風壞自敗者。最佳。田池自敗者次之。打壞者。又次之。近時恒在秋冬間採殺取之。

製法　以龜甲鋸去四邊。石上磨淨。更以灰火炮過。塗醋炙黃用。亦有酒炙、醋炙、豬脂炙、燒灰用者。

性質　甘。平。有毒。

效能　養陰液。潛風陽。用作強壯藥。

主治　甲。治漏下赤白。破癥瘕。瘕癥。五痔。陰蝕。濕痺。四肢重弱。小兒顖不合。久服輕身不飢。（本經）驚悸。氣心腹痛。不可久立。骨中寒熱。傷寒勞復。或肌體寒熱欲死。以作湯良。久服益氣。資智。使人能食。燒灰治小兒顖瘡難燥。女子陰瘡。（別錄）

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論龜版曰。殼主久嗽。斷瘧。【唐】甄權藥性本草論龜版曰。燒灰治脫肛。【宋】日華諸家本草論龜版曰。版治血痲痺。【元】朱丹溪本草衍義補遺論龜版曰。下甲補陰。主陰血不足。去瘀血。止血痢。續筋骨。治勞倦。及四肢無力。【明】李時珍本草綱目論龜版曰。治腰脚酸痛。補心腎。益大腸。止久痢。久洩。主難產。消癰腫。燒灰傅臁瘡。【明】繆希雍本草經疏論龜版曰。介蟲三百六十。而龜爲之長。稟金水之氣。故咸鹹而甘。氣平。其性神靈。能變化。凡入藥勿令中溼。中溼則遂其變化之性。而成瘕寢於腹中。故言有毒也。氣味俱陰。入足

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

少陰經。方家多入補心藥用。以心藏神而龜性有神。借其氣以相通。且得水火既濟之義。實非補心之正藥也。其主骨中寒熱。及傷寒勞復。肌體寒熱欲死。痰癊者。皆陰虛而邪熱爲病。經曰。傷於濕者。下先受之。濕痺四肢重弱。亦腎陰虛而邪氣易犯。腎主骨。腎虛則小兒顖門不合。腎爲五臟陰中之陰。陰虛則火熱偏至。而爲驚恚。氣心腹痛。此藥補腎家之眞陰。則火氣自降。而寒熱邪氣俱除矣。益陰除熱。輭堅。故主漏下赤白。瘕瘕五痔。陰蝕陰瘡。及小兒顖瘡也。經曰。邪熱不殺穀。熱去故令人能食。能食則脾胃得所養而能思。思作睿故資智。久服益氣。輕身不飢者。除熱益陰之功也。【明】李士材本草圖解論龜版曰。龜甲鹹平。腎經藥也。稟北方純陰之氣而生。大有補水制火之功。故能强筋骨。益心智。止咳嗽。截久瘧。去瘀血。止新血。大凡滋陰降火之藥。多是寒涼損胃。惟龜甲益大腸。止泄瀉。使人進食。眞神良之品也。龜鹿皆靈而壽。龜首藏向腹。能通任脈。故取其甲以養陰。鹿鼻反向尾。能通督脈。故取其角以養陽。去脇用底。去黑皮酥炙。【清】黃宮繡本草求眞論龜版曰。龜版甘鹹微寒。稟北方之氣而生。乃陰中至陰之物。入足少陰腎經。兼龜性有神。故能入心以通腎。凡心虛血弱。而見勞熱骨蒸。腰脚酸疼。老瘧痞塊。瘧痕崩漏。帶痢。五漏。難產。小兒顖門不合等症。服此皆能見效。李時珍云。龜鹿鱉而壽。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其腹以通心。補腎補血。皆養陰也。鹿鼻常反向尾。能通督脈。故取其角以補命補精。補氣。皆養陽也。龜性治與繁甲相類。但繁甲色青應木。走肝益腎。以除熱。龜甲色黑應水。通心入腎。以滋陰。然皆至陰大寒。多用必傷脾土。龜大自死者良。酥炙煆灰用。惡人參。龜尿走竅。透骨。染鬚髮。治啞聲。服板不宜中溼。則板末變爲瘕瘕。

近人學說　賈九如曰。龜甲。龜之性善靜。常居土中。近水澤。遇陰雨則出行。其頭常縮。眼耳口鼻皆伏於地。得地之陰氣最厚。其底甲純陰。氣味厚濁。爲濁中濁品。專入腎臟。主治咽痛口燥。乾喘咳嗽。或勞熱骨蒸。四肢發熱。產婦陰脫發燥。病緜腎水虛。致相火無依。此非氣柔貞靜者。不能息其炎上之火。古云至靜而能制動。誠爲妙理。又取其汁潤滋陰。味鹹養脈。主治朝涼夜熱。盜汗遺精。神疲力怯。腰痛腿酸。癱瘓拘攣。手足虛弱。久瘧血枯。小兒顖顱不合。病由眞臟衰。致元陰不生。非此味濁純陰者。不能補其不足之陰。古云。寒養腎精。職此義耳。

配合應用　㊀治瘧疾不止。龜版燒存性。研末。酒服方寸匕。（海上名方）

㊁治抑結不散。用龜下甲酒炙五兩。側柏葉炒一兩。半香附童便浸炒一兩。爲末。米糊丸。梧子大。每空心溫酒服一百丸。

㊂治胎產下痢。用龜甲一枚。醋炙爲末。水飲服一錢。日一。（經驗方）

㊃治難產催生。祕錄用龜甲燒末。酒服方寸匕。摘玄治產三五日不下。垂死。及矮小女子交骨不開者。用乾龜殼一個。酥炙。婦人頭髮一握。燒灰。川芎。當歸各一兩。每服秤七錢。水煎服。如人行五里許。再一服生胞死胎俱下。

㊄治腫毒初起。敗龜甲一枚。燒研。酒服四錢。亦治婦人乳毒。（小品方）

㊅治小兒顖瘡。用龜甲燒灰。敷之。亦治月蝕耳瘡。又治口吻生瘡。（聖濟方）

㊆治臁瘡朽臭。生龜一枚。取殼。醋炙。黃更煆存性。出火氣。入輕粉、麝香、葱湯洗淨。搽敷之。（急救方）

㊇治人咬傷瘡。龜版骨。鼈肚骨各一片。燒研。油調搽之。（葉氏摘玄方）

㊈治磉咬成瘡。龜版燒研。香油調搽之。（葉氏摘玄方）

用量　三錢至八錢。

施用宜忌　陰虛而無熱者禁用。惡沙參。畫蠐螬。畏狗肉。瘦銀。凡入丸散藥中。須研極細。否則留滯腸胃。能生瘕瘕。並須勿令中溼。中溼即有毒。

著名方劑　㊀大補陰丸。治陰虛火旺。骨蒸勞熱。耳鼈耳鳴。脈洪大。不能峻補者。（丹溪方）敗龜版、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（酒炙）熟地黃各六兩。黃柏、知母各四兩。右爲末。以猪脊髓搗和爲丸。梧子大。每服百丸。空心溫酒或鹽湯下。㈡龜鹿二仙膠。大補精血。益氣養神。鹿角（血者）十斤。龜版（自敗者）五斤。甘杞子三十兩。人參十五兩。右用鉛鐔如法熬膠。初服酒化一錢。五分漸加至三錢。空心下。

參攷資料　㈠龜版膠用自敗龜版洗淨搗碎。浸三日。以桑柴火熬煎二晝夜。其膏始成。（今人熬膏止在釜中煎一晝夜。如何能成膠）夫龜之爲物。至靈多壽。靈可供卜。壽至千年。其甲名敗龜版。以此入藥。大有補陰之功。常居水中。稟北方之氣以生。故能補陰、治陰、治勞也。凡有陰虛血弱。寒熱傷勞。瘧瘕。咳嗽。五痔。瀉痺。以及婦兒一切虛勞風瘡。服之最宜。㈡秦龜即生於秦者。秦地山中多老龜。極大而壽。龜甲即非止秦地有。四方皆有之。但取秦地所出大者爲勝。今河北獨流釣臺甚多。取龜筒治瘡。亦入衆藥。止此二種。各逐本條。以其靈於物。方家故用以補心。然甚有驗。（寇宗奭）㈢格物考云。天有先春之震。山多自死之龜。龜聞雷音則口中所含以蟄者便吐而昂首。因時令尚早。無蟲可食。多致餓死。血肉腐爛。滲入下甲。此眞敗龜版也。故取水龜。當用下甲。（李士材）㈣龜鼈二甲。本經所主大略相似。今人有喜用鼈甲。惡用龜甲者。皆一偏之見也。二者咸至陰之物。鼈甲走肝益腎以除熱。龜甲通心入腎以滋陰。第鼈甲無毒可多用。龜甲非千年自死者則有毒。故方書所用曰敗龜版者。取其長年則得陰氣多。故有益陰之功用耳。若今新剖之甲。斷乎有毒。不宜頻使用者。不可不詳辨也。（繆希雍）㈤龜版爲治痛風要藥。丹溪於陰火痛風必用之。蓋因其多屬血虛。實取其能益陰氣。按丹溪更取龜版以治痿。觀於虎潛丸而益見。意龜版善滋肝腎之陰。故於筋骨之病。無不宜之歟。龜膠以龜版煎就。本草載版不如膠之說。以版灸酥煅用。氣味俱淡。而膠之味較濃。故用版不如用膠耳。合鹿膠名龜鹿二仙膏。

爲一陰一陽。鹿膠峻補腎陰中之陽。龜膠峻補腎陰中之陰也。（劉潛江）㈥龜鹿皆靈而有壽。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其甲以補心補腎。補血皆以養陰也。鹿鼻常反向尾。能通督脈。故取其角以補命補精補氣。皆以養陽也。乃物理之玄微。神工之能事。觀龜甲所主諸病。皆屬陰虛血弱。自可心解矣。（李時珍）

【龜背玄精石】卽玄精石之處方用名。詳『玄精石』條。

【龜溺】　採取　取龜置瓦盆中。以鑑照之。龜見其影。則淫發失尿。急以物收取之。又法以紙炷火。以點其尿。亦致失尿。但差緩耳。李時珍曰。今人惟以豬鬃或松葉刺其鼻。卽尿出。似更簡捷也。

主治　滴耳。治聾。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論龜溺曰。點舌下。治大人中風舌瘖。小兒驚風不語。摩胸背。治龜胸龜背。

參攷資料　龜尿走竅透骨。故能治瘖聾及龜背。染髭髮也。按崐嶁神書。言龜尿磨瓷器。能令轆磨墨書石。能入數分。卽此可推知矣。（李時珍）

【龜筒】卽蠟龜皮之原名。詳『蠟龜皮』條。

【龜腳】卽石蜞之古籍別名。典見綱目。詳『石蜞』條。

【龜腳螳】卽石蜞之俗名。詳『石蜞』條。

【龜尊】卽尊之古籍別名。典見綱目。詳『尊』條。

【龜膽汁】　性　寶　苦。寒。無毒。　主治　痘後目腫。經月不開。取點之良。

十七畫

【優曇華】卽芭蕉之古籍別名。典見梵語。詳『芭蕉』條。

【優曇鉢】卽無花果之古籍別名。典見廣州志。詳『無花果』條。

【壓驚】卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【壓驚螺】卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【嬭汁】卽人乳之古籍別名。典見綱目。詳『人乳』條。

【嬭孩兒】卽嬭醋草之俗名。詳『

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

嫻酣草』條。

【嫻孩草】卽香草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『香草』條。

【嫻酣草】古籍別名　香草。（綱目拾遺）嫻孩兒。（俗名）

形態　嫻酣草爲芳草類之一種。葉尖大如指甲。有枝梗。夏月開細花成簇。結子亦細。植於盆內。暑月採置髮際。芳香可辟膩。匜亦供藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　辟惡行氣。和中活血。止霍亂吐瀉。去臭氣。發癮者塞鼻。能令寒漸輕。

【嬰舌】卽嬰奧之古籍別名。典見廣雅。詳『嬰奧』條。

【應條】卽蠐螬之古籍別名。典見吳普本草。詳『蠐螬』條。

【懋角】卽羚羊角之古籍別名。典見和漢藥考。詳『羚羊角』條。

【鐵】卽山韭之古籍別名。典見綱目。詳『山韭』條。

【擊正】卽鴟之古籍別名。典見綱目。詳『鴟』條。

【擘李子】卽李子熟而自裂者之別名。典見綱目。詳『李子』條。

【擘藍】卽甘藍之古籍別名。典見農政。詳『甘藍』條。

【檯】卽檳之日本名。詳『檳子』條。

【檀】命名　本品善木也。故字從亶而名之曰檀。

形態　檀爲喬木類之一種。有黃白兩色。皮青而澤。肌細而膩。質重而堅。狀與梓榆相似。惟無香氣。木材常爲杵。椿。槌。器之用。其木皮可供藥用。

性質　辛。平。有小毒。

主治　和榆皮爲粉食。可斷穀救荒。

【檀香】原名　旃檀。

命名　檀。善木也。故字從亶。亶者善也。而氣芬芳馥郁。故名。

處方用名　檀香片。

古籍別名　浴香。旃檀。（綱目）眞檀。檟。檀白。銀香。黃英香。旃檀娜。（和漢藥考）

外國名詞　Santalum album, L.（拉丁）—Lignum Santali album（英）

基本　屬檀香科。爲檀之木質。

產地　陳仁山藥物生產辨云。檀香產美國屬地。們爲正。英國雪梨等埠次之。和漢藥考曰。無日本產。多係產生東印度及馬來半島。

形態　白檀樹爲常綠喬木之寄生性植物。樹幹高二丈至三丈。葉作長卵圓形。末端尖銳。基部亦作銳形。具短葉柄。皆對生。花爲裸花。有四裂或五裂之萼。果實爲核果。檀香爲四五寸粗之幹木。色黃褐或淡黃。質緻密。有一種芳香。販賣品中。有橫斷薄片。如煎餅狀者。最良品木質堅硬。色帶黃。燒之發一種異香。甚爽適。



檀香

製法　宜以紙封收。不令洩氣。

性質　辛。溫。無毒。

成分　爲揮發油及樹脂等。

效能　理氣止痛。溫中和胃。用作香篆衝劑藥。

主治　消風熱腫毒。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論檀香曰。治中惡鬼氣。殺蟲。【宋】大明日華諸家本草論檀香曰。煎服止心腹痛。霍亂。腎氣痛。水磨塗外腎。并腰腎痛處。【金】張元素珍珠囊論檀香曰。散冷氣。引胃氣上升。進飲食。【明】李時珍本草綱目論檀香曰。噎膈吐食。又面生黑子。每夜以漿水洗拭令赤。磨汁塗之甚良。【明】繆希雍本草經疏論檀香曰。本經無正文。弘景云。白檀消熱腫。藏器主心腹霍亂。中惡鬼氣。殺蟲。日華子云。檀香熱無毒。治心痛。霍亂。腎氣腹痛。濃煎服。水磨傅外腎。并腰腎痛處。詳其所主諸證。亦是芬芳開發。辟惡散結。除冷之藥也。今人多供燃爇。非上乘沈水者不入藥。【清】黃宮繡本草求眞。論檀香曰。白檀香氣味辛溫。薰之清爽可愛。凡因冷氣上結。飲食不進。氣逆上吐。抑鬱不舒。服之能引胃氣上升。且能散風辟邪。消痛住腫。功專入脾與肺。不似沉香力專主降。而能引氣下行也。但此動火耗氣。陰虛火盛者切忌。取白潔色白者佳。紫色爲紫檀。氣

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

寒味鹹。專入血分。

國外學說　賀易備考（日本大藏省記錄局藏版。明治十八年十月刊行）云。白檀爲檀香之一種。檀香本有白檀。黃檀二種。進口貨中。黃色者呼白檀。油色者呼黃檀。皆上品也。惟內黃外白者爲下品。多供佛前燃燒用。又其輕而脆者曰沙檀。其下者曰星香。又曰破漏香。日本所稱之白檀木有二種。一種樹葉似樅。俗呼奇楠香。一種類似扁柏。幹必左撓。木理似白檀。微有香氣。然實非白檀。所謂左紐柏是也。白檀雖亦名檀香。其實與黃檀顯然不同。白檀專用木心。黃檀專用外層。其基本植物亦全異。以白檀木製出之油。不惟色澤香味有別。即其含有之成分亦各殊也。又日本藥局方曰。白檀爲白檀樹級密堅硬之木材。以顯微鏡檢視橫斷面。見有細胞一二列構成之髓線。其細胞延長爲半徑性木纖維有堅厚之壁。脈管或單獨。或二三連合。內含黃色之油滴。木細胞中含有菱形之蓚酸鹽單晶。受熱則發固有之芳香。又和漢藥考曰。白檀油。以白檀木削片。與水一同蒸餾。遂得淡黃之濃稠液體。有特異之芳香。味苛烈稍苦。比重〇・九七五至〇・九八五。於分極光線爲左旋性。水難溶解。酒精則易溶。現中性或弱酸性之反應。又荷蘭藥鏡載有檀香之產地。形態、效能等。錄之如左。（產地）檀香有二種。一種產印度之地木兒島最多。而印度南海之馬羅克諸島及爪哇島亦產之。一種產美洲。（形態）產印度者。樹高如胡桃樹數枝歧分。葉對生。如十字。色綠如梨葉。長四指橫徑許。廣三指橫徑許。老樹則葉色帶黃。花單瓣。鐘狀四出。色深紫黑。雄蕊八。雌蕊一。實如櫻子。又似杏子。初綠色。熟則青黑。味淡。產美洲者。樹高一丈五尺許。亦分枝。葉橢圓。末微尖。色暗綠。有光澤。長三拇指橫徑。花生葉底。攢簇如車輪。芳香可愛。花瓣六。雄蕊五。（一說。雄蕊六）。雌蕊一。萼六出。子圓。微有稜。色紫。有二室。仁圓如卵。樹幹之中心爲黃檀。外層爲白檀。黃檀質重實。有光澤。色淡黃。或帶微赤脈理。味微苦。有佳香。摩擦或截斷之。氣尤馥郁。若合薔薇、麝香、栴檀諸香於一處者。或云根亦香者。方爲上品。或云黃色如雞子黃。帶微赤之脈理。香氣烈者。乃稱上品。白檀白色。質亦重實。微有香氣。或無香氣。生樹及新伐者。皆無香氣。乾則生香。地木兒島所產之嫩木。色白。無香氣。經年中心變黃。或云島北多產黃檀。運銷中國及印度。或云爪哇島所產皆白檀。下品爲多。（效能）白檀。黃檀俱用。黃檀尤效。欲稀釋血液。或令其發汗。宜製爲泡劑用。以之解散冒寒及傷冷毒。徹毒。宜製爲煎劑用。兼治諸症。發汗利小便。治頭旋眩冒。心動悸。使頭腦健。運精神活潑。白檀有稀釋瘀血之效。善治脾病及心氣病。煎劑用錢半至二錢。散劑爲末。用一錢已足。此藥因有佳香。故多用爲香料。以水與黃檀蒸餾而取其油。冷則稠厚。香氣似龍涎香。以燒酒蒸餾則得有佳香之華爾斯。均以製香料用。

用量　五分至八分。

施用宜忌　凡陰虛火盛者禁用。忌火。

參攷資料　㈠白檀調氣。引芳香之物。上至極高之分。最宜橙橘之屬。佐以薑棗。輔以葛根。縮砂。益智。豆蔻。通行陽明之經。在胸膈之上處。咽嗌之間。爲理氣要藥。（李杲）㈡楞嚴經云。白旃檀塗身。能除一切熱惱。今西南諸番皆用諸香塗身。取此義也。杜寶大業錄云。隋有壽禪師妙醫術。作五香飲濟人。沉香飲。檀香飲。丁香飲。澤蘭飲。甘松飲。皆以香爲主。更加別藥。有味而止渴。兼補益人。北道書檀香。謂之浴香。不可燒供上眞。（李時珍）㈢檀善木也。故字從亶。亶善也。釋氏呼爲旃檀。以爲湯沐。猶言離垢也。番人訛爲眞檀。雲南人呼紫檀爲勝沉香。卽赤檀也。（李時珍）㈣白檀出海南。其樹如檀。（陳藏器）㈤紫眞檀出島嶺盤國。雖不生中華。人間遍有之。（蘇恭）㈥檀香有數種。黃白紫之異。今人盛用之。江淮河朔所生檀木。卽其類。但不香爾。（蘇頌）㈦按大明一統志云。檀香出廣東、雲南及古城、眞臘、爪哇、渤泥、暹邏、三佛齊、回回等國。今嶺南諸地亦皆有之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

樹葉皆似荔枝。皮青色而澤滑。葉廷珪香譜云。皮實而色黃者爲黃檀。皮潔而色白者爲白檀。皮腐而色紫者爲紫檀。其木並堅重清香。而白檀尤良。宜以紙封收則不洩氣。正佐格古論云。紫檀諸溪峒出之。性堅。新者色紅。舊者色紫。有蟹爪文新者。以水浸之可染物。眞者搭壁上色紫。故有紫檀色。黃檀最香。俱可作帶髁扇骨等物。（李時珍）㊀白檀香善調膈上諸氣。散冷氣。引胃氣上升。進飲食。兼通陽明之經。鬱抑不舒。嘔逆吐食宜之。（張石頑）

【檀香片】卽檀香之處方用名。詳『檀香』條。

【檀香百合】卽山百合之一種。詳『山百合』條。

【檀香油】**性質**　味苦。

主治　除惡開胃。止吐逆。并治白濁。

【檀香泥】**基本**　檀香心中所含脂垢。

主治　胃氣滯痛。肝鬱不舒。

【檀香梅】卽蠟梅花之香濃色如紫檀者。功用詳『蠟梅花』條。

【檀根皮】**性質**　辛。平。有小毒。

主治　塗瘡疥。殺蟲。

【檀桓】卽黃柏根之原名。詳『黃柏』條。

【檀刺】卽雲實之古籍別名。典見綱目。詳『雲實』條。

【檀乳】卽檉柳脂之原名。詳『檉柳脂』條。

【檉柳】**命名**　本品爲木之聖故名。

處方用名　西河柳。

古籍別名　赤檉（日華）赤楊（古今注）河柳（爾雅）雨師（詩疏）三眠柳（衍義）雨絲垂絲柳。蜀柳。人柳。觀音柳。長壽仙人柳。三春柳（綱目）御柳（日本）

外國名稱　Tamarix chinensis, Lour.（拉丁）ギョリウ（日本）

基本　係檉柳科檉柳屬。藥用其柔條。

產地　陳仁山藥物生產辨云。各省有出。廣東番禺及河南多有種植。

形態　檉柳爲落葉喬木。高丈餘。皮色赤。枝細長。密生小葉如鱗狀。夏月自枝梢抽出花軸。作總狀花序。如穗狀。花小。萼片五枚。綠色。花瓣五枚。紫紅色。五雄蕊。一雌蕊。此植物更有特性。至秋能再開花。可供玩賞。



檉柳

採取　夏秋間採得枝木葉。陰乾用。

性質　甘。鹹。溫。無毒。

效能　發疹。解毒。專作透發痲疹藥。

主治　疎散。驅風。解表。發痲疹。瘡痲不出。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論檉柳曰。枝葉消痞。解酒毒。利小便。【明】李士材本草圖解論檉柳曰。檉柳卽西河柳。甘鹹而平。治痧瘴熱毒。消痞療風。

近人學說　張山雷曰。檉柳似柳色赤。古名赤檉。爾雅謂之河柳。此吾吳俗所以皆名之爲西河柳也。枝葉極細。垂垂如絲。輕揚之最盛者。而經霜不凋。其色轉綠。故性溫入血。而善於發泄。治痲疹之不能透發者甚效。乃瀕湖綱目所未詳者。但透達之性極速。入煎劑不當過二錢。俗又以此煎湯作薰蒸。搨洗外治之法。則痲疹既不透發。最忌慘寒冒風。而乃脫衣露體。雖用熱湯。必有流弊。不可輕試。如在春冬天寒。尤爲大忌。

配合應用　㊀治腹中痞積。觀音柳煎湯露一夜。五更空心飲數次。痞自消。（衞生簡易方）

㊁治一切諸風。不問近遠。檉葉半斤。切枝亦可。荊芥半斤。水五升。煮二升。澄清入白蜜五合。竹瀝五合。新瓶盛之。油紙封。入重湯煮一伏時。每服一小盞。日三服。（普濟方）

㊂治酒多致病。長壽仙人柳。晒乾爲末。每服一錢。溫酒調下。（衞生易簡方）

㊃治痧疹瘡痲。或因風而閉者。俱用西河柳葉同櫻桃核。煎湯洗之。卽透出。（經驗方）

㊄治小兒痧疹不出。喘嗽。煩悶。躁亂。用西河柳葉風乾爲末。水調

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

四錢。頓服立定。（急救方）

㈣治酒積成病。河柳曬乾爲末。每服一錢。溫酒送下。（良方要集方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡非實邪束表者禁用。

參攷資料　㈠赤檉木生河西沙地。皮赤色。細葉。（馬志）㈡爾雅檉河柳也。郭璞注云。今河旁赤莖小楊也。陸璣詩疏云。生水旁。皮赤如絳。枝葉如松。（掌禹錫）㈢檉柳小幹弱枝。插之易生。赤皮細葉如絲。婀娜可愛。一年三次作花。花穗長三四寸。水紅色。如蓼花色。南齊時益州獻蜀柳條。長狀若絲縷者。卽此柳也。段成式酉陽雜俎言涼州有赤白檉。大者爲炭。其灰汁可以煮銅。故沈炯賦云。檉似柏而香。王禎農書云。山柳赤而脆。河柳白而明。則檉又有白色者也。（李時珍）㈣檉柳甘得土氣。鹹得水氣。故能解血之毒。消痞利便。是其本功。近世往往以治痧疹熱毒不出。用爲發散。（本草匯）㈤檉柳獨入陽明。故其功專發痲疹。兼解酒毒。去風。煎湯洗浴。風症身痒效。（逢原）

【檉柳木】　性　甘。鹹。溫。無毒。

主治　剝驢馬血入肉毒。取木片火炙熨之。并煮汁浸之。餘同脂藥條。

【檉柳脂】　原名　檉乳。

主治　合質汗藥。治金瘡。

【檉柳葉】　主治　疹後痢疾。和沙糖調服。及疹發不透。煎湯去渣洗擦之。但勿洗頭面。及勿夜間洗擦。

【檕迷】　卽茨藋之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『茨藋』條。

【檕梅】　卽山查之古籍別名。典見爾雅。詳『山查』條。

【檛】　卽茶葉之古籍別名。典見爾雅。詳『茶葉』條。

【檄木】　卽杉材之古籍別名。典見綱目。詳『杉材』條。

【擫木皮】　卽土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土骨皮』條。

【檥】　卽花椒之古籍別名。典見綱目。詳『花椒』條。

【殭蠶】　卽白殭蠶之簡稱。詳『白殭蠶』條。

【氈】　卽烏氈之原名。詳『烏氈』條。

【濟銀花】　卽金銀花之處方用名。詳『金銀花』條。

【濯貝】　卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【營實】　原名　薔薇實。

命名　本品蔓柔依牆而生。故名。而子成簇。如營星然。故曰營實。

古籍別名　牛棘實。（本經）薔薇子。山棘實。牛勒實。（別錄）刺花實。（綱目）英實。狗薔薇實。（和漢藥考）

外國名詞　Rosa Centifolia.（拉丁）Rosa Indica.（英）

基本　屬薔薇科。爲野薔薇之子實。

產地　別錄曰。營實生零陵川谷及蜀郡。李時珍曰。薔薇野生林藪間。凡山野間恒多生焉。

形態　營實卽野薔薇之子。係落葉灌木。高二三尺。有時達四五尺。幹細而蔓繁。莖特甚。枝多尖刺。葉爲奇數羽狀複葉。小葉作橢圓或倒卵圓形。五七葉相集而生。花五瓣。色白。或帶紅。大五六分。芳香異常。秋結核果。色紅。圓如球而長。有光澤。味甘酸。

採取　八九月採實。以半青半紅未熟者佳。熟者力弱。採得陰乾後。須密貯器中。勿使洩氣。其根採無時。

性質　酸。溫。無毒。

效能　除風溼。療癰疽。用作瀉藥。及利水藥。

主治　癰疽惡瘡。結肉跌筋。敗瘡熱氣。陰蝕不瘳。利關節。（本經）久服輕身益氣。（別錄）

歷代記述　【明】李時珍本草綱目論營實曰。治上焦有熱。好眠。

配合應用　治眼熱昏暗。營實、杷子、地膚子各二兩爲末。每服三錢。溫酒下。（聖惠方）

用法　一錢至錢半。

參攷資料　㈠此草蔓柔靡。依牆援而生。故名牆靡。其莖多棘刺。勒人牛喜食之。故有山刺、牛勒諸名。其子成簇而生。如營星然。故謂之營實。（李時珍）㈡所在有之。蔓生莖間多刺。其花有百葉八出六

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

出。或赤或白。子若杜棠子。（韓保昇）㊁薔薇野生林壑間。春抽嫩蘖。小兒摘去皮刺食之。既長則成叢以蔓而莖硬多刺。小葉尖薄有細齒。四五月開花四出。黃心有白色粉紅二者。結子成簇。生青熟紅。其核有白毛。如金櫻子核。八月採之。根採無時。人家栽玩者。莖細葉大。延長數丈。花亦厚大。有白黃紅紫數色。花最大者。名佛見笑。小者名木香。皆香豔可入。不入藥用。南番有薔薇露。云是此花之露水。香馥異常。（李時珍）㊂禹功湯。行水之效最著。故以禹功湯名之。方用營實三錢。水一盞半。煎至一盞。空心頓服。大禹功湯。即於原方加大黃八分。大禹功丸。營實六錢。大黃一錢六分。研末糊丸。綠豆大。白湯下。按營實新效方經驗主治條云。百般水腫。屬實者。可悉用之。但脚氣衝心。病後產後。老幼諸腫。須斟酌。又徽疽結疥。毒癬瘡風。諸瘡毒。用之皆效。又諸瘡用外數之藥。或製爲藥湯洗浴。凡毒氣內攻。致腫滿咳嗽喘急。呼吸迫促。大小便不通。心腹脹悶垂死者。非此湯不奏起死回生之效。又徽毒咽喉腐爛。久年不愈。男女膿血淋下。疳痛瘙無常。痔疾翻花疼痛。大便祕結。瘡瘍爛疼痛。頭瘡。白禿。當合諸藥用之。又男女諸疝。肩背胸脇强痛。自腰脚牽引小腹。攣急難於屈伸。烏附之劑。不能奏效者。用此殊有奇效。又婦人素有瘀血。或經水前後。熱入血室。或子宮熱腫脫下。皆使小腹攣急疼痛。腰脚不伸。此症世俗誤認爲寸白。與此湯多瀉水。則子宮腫消痛除。又婦人經閉半年或一年。腹滿拘攣。用之妙不可言。又諸中毒症。腹脹悶亂。或乾霍亂。悉效。風眼疼痛。天行赤眼。積年頭痛欲裂。小便頻數。小兒遺尿諸症。俱有效。又凡男婦身體壯實者。病係危急者。或徽家。或常服瀉藥。難瀉者。俱宜大禹功湯。稟賦虛弱者。疾病緩久者。宜禹功湯。患諸雜症。或須合諸藥用。不能煎湯者。宜大禹功丸。加減而用。其餘則隨時應變酌用。（和漢藥考）

【營實葉】**主治** 下疳瘡。焙研洗傅之。黃花者更良。

【燭夜】即雞之古籍別名。典見綱目。詳『雞』條。

【牆靡】即蛇牀子之古籍別名。典見別錄。詳『蛇牀子』條。

【瓗】即水獺肝之古籍別名。典見綱目。詳『水獺肝』條。

【獲】即木天蓼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木天蓼』條。

【獲穀】即鳲鳩之古籍別名。典見爾雅。詳『鳲鳩』條。

【鏖】即金之古籍別名。典見爾雅。詳『金』條。

【瑁章子】即蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼耳子』條。

【環良花】即忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『忍冬藤』條。

【環蛇】**產地** 出三佛齊國。

形態 環蛇形如環。大數圍。以至數十圍。逐獸則疾行如轉車輪。若獸入環中。即聾口眼俱生。環之半。與尻相對。其脂可供藥用。

主治 其皮可以禦刀劍。臨陣服之。刀劍不能傷。

【環腸草】**基本** 環腸草爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 蠱脹。晒乾水煎服。以小便利爲度。

【環餅】即寒具之古籍別名。典見要術。詳『寒具』條。

【瓗珠】即眞珠之處方用名。詳『眞珠』條。

【瓗珠粉】即眞珠之處方用名。詳『眞珠』條。

【療愁】即萱草之古籍別名。典見綱目。詳『萱草』條。

【瘤卵石】**主治** 治痞結腸症。

參攷資料 高陽民家子。方十餘歲。忽臂上生宿癰。痛痒不可忍。醫皆不辨何症。一日忽潰。中有圓卵墜出。尋化爲石。劉工部霧以一金售之。用治腸症如神。（池北偶談）

【皤蒿】即白蒿之古籍別名。典見爾雅。詳『白蒿』條。

【磷石】即雲母之古籍別名。典見綱目。詳『雲母』條。

【礵黃】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【篁竹根】**主治** 作湯。益氣止渴。補虛下氣。（本經）消毒。（別錄）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【篁竹葉】性質　苦。平。無毒。

主治　咳逆上氣溢筋急惡瘡。殺小蟲（本經）除煩熱風痙喉痺嘔吐（別錄）

歷代記述弦證　【明】李時珍本草綱目論篁竹葉曰煎湯熨霍亂轉筋。

【篁竹筍】主治　消渴風熱。益氣力消腹脹蒸煮炒食皆宜。

【篁竹茹】主治　勞熱。傷寒勞復。齒血不止。婦女月水不斷。小兒熱痛。

【篁竹瀝】主治　風痙。

【篁竹】即百葉竹之柔輭可爲繩索者。功用詳『百葉竹』條。

【糜御草】即鹿御草之古籍別名。典見本經。詳『鹿御草』條。

【糞金子】命名　本品係蠆蠆中。不過數十粒。以其貴重。故名。

採取　於枯時採之。有聲。收種子時。剖其中幹內取出。形如鼠糞而色黑。大小如麥粒。田種者尤佳。

主治　血症。炒研白湯下。並療小兒慢驚神效。

【糞霜】即白秋霜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『白秋霜』條。

【糞清】即金汁之原名。詳『金汁』條。

【糞蛆】即五穀蟲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五穀蟲』條。

【糞藍】基本　糞藍爲雜草類之一種。可供藥用。

性質　苦。

主治　療瘧瘡白禿。洗漆瘡。

【糞蟲】即五穀蟲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五穀蟲』條。

【糟】即酒糟之原名。詳『酒糟』條。

【糟底酒】基本　本品即經過三年臘糟下之酒。

主治　止嘔噦。摩風瘧。膝膝疼痛。

歷代記述弦證　【宋】日華諸家本草論糟底酒曰。開胃下食。暖水臟。溫腸胃。消宿食。禦風寒。殺一切蔬菜毒。

【糟油】主治　摩風瘧。膝膝痛。開胃煖臟。止嘔噦。解蔬菜毒。

【糟茄】製法　以茄子切條。晒乾。淹於酒糟中。半月後。可以取用。

主治　此茄燒灰存性。可塗鵝口瘡。

【糟筍節中酒】性質　鹹。平。無毒。

主治　飲之。主療噦氣嘔逆。或加小兒乳及牛乳同服。又摩瘧瘡風。

【糠蒬】即野蒬之俗名。詳『野蒬』條。

【糠鳩】即斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳『斑鳩』條。

【縮砂仁】即砂仁之處方用名。詳『砂仁』條。

【縮砂殼】即砂仁之殼。性味較砂仁爲差。功用同於砂仁。

【縮砂蔤】即砂仁之原名。詳『砂仁』條。

【縵華】即茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茉莉花』條。

【繁露】即落葵之古籍別名。典見別錄。詳『落葵』條。

【繅膠】即鰾膠之古籍別名。典見綱目。詳『鰾膠』條。

【繅絲湯】主治　止消渴。殺膚瘙。

【鱕魚】即鰰魚之別名。典見動物學大辭典。詳『鰰魚』條。

【聯步】即續隨子之古籍別名。典見斗門方。詳『續隨子』條。

【聯貼】即豬脾之原名。詳『豬脾』條。

【膽八香】產地　生安南諸地。

形態　膽八爲香木類之一種。幹如稚木犀。葉鮮紅色。類霜楓。其實榨油。以和諸香。可供藥用。

主治　辟惡氣。

【膽星】即天南星之處方用名。詳『天南星』條。

【膽草】即龍膽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍膽』條。

【膽南星】即天南星之處方用名。詳『天南星』條。

【膽瓶蕉】即芭蕉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芭蕉』條。

【膽礬】原名　石膽。

命名　本品色味似膽。故名。俗因其狀似礬。遂呼爲膽礬也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名　黑石。石礬。皁石。（本經）君石。（當之）銅勒。（吳普）立制石。丹礬。青石子。（和漢藥考）

外國名詞　Sulfus cupricus.（拉丁）Copper-vitriol, blue Vitriol.（英）Blauer Vitriol.（德）

基本　係銅礦中自然生成。或藍青色玻璃狀光澤之結晶塊。或垂下作鐘乳狀。

產地　陳仁山藥物生產辨云。膽礬產德國爲上。架喇吉打來者亦可。日本來者次之。和漢藥考曰。日本各地銅山岩孔或洞穴中產此。

形態　膽礬卽化學上之硫酸銅（$CuSO_4 \cdot 5H_2O$）爲藍青色透映斜方柱稜柱狀結晶體。（黃膽礬或熟礬）放置乾燥空氣中。卽漸漸風化。變爲白色（生礬）溶於冷水熱湯尤易。但不溶於酒精。味爲收斂性。

採取　春季採之。須採形似空青鴨嘴色。磨鐵作銅色者良。昔時用天產品。現時概用金銀精鍊處副產物精製。供藥用。

性質　酸。辛。寒。有毒。

效能　吐風痰毒物。治喉痺咳逆。外用作腐蝕藥。內服作催吐藥。及爲收斂性眼科藥。

主治　明目目痛。金瘡。諸瘡瘕。女子陰蝕痛。石淋寒熱。崩中下血。諸邪毒氣。令人有子。練餌服之不老。久服增壽神仙。（本經）散癥積。咳逆上氣。及風瘧惡瘡。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇頌新修本草論膽礬曰。帶下赤白。面黃。女子臟急。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論膽礬曰。加入吐風痰藥最快。【宋】大明諸家本草論膽礬曰。治蟲牙。鼻內息肉。【清】黃宮繡本草求眞論膽礬曰。膽礬又名石膽。產於銅坑之中。得銅精氣而成。味酸而辛。氣寒而澀。功專入膽。涌吐風熱痰涎。使之上出。蓋五味惟辛爲散。惟酸爲收。五性惟寒勝熱。風熱盛於少陽。結於痰。垢汗之氣。橫而不解。下之沉寒而益甚。凡因澀熱淫火。見爲陰蝕崩淋。寒熱風痰。毒氣結聚牢固。見爲咽齒喉痺。乳蛾風熱。痰垢結聚。見爲咳逆癲癎。目痛難忍。及金瘡不愈。諸毒內閉。膠結。見爲蟲痛。牙疳。種種等症。服此力能涌吐上出。去其膠痰。化其結聚。則諸症悉除。故古人之治喉痺乳蛾。用米醋煮眞鴨嘴礬。膽爲末。醋調。探吐膠痰卽癒。又治紫白癜風。同牡蠣生研。醋調摩之。卽愈。又治胃脘蟲痛。以茶清調膽礬末。吐之。卽除。又治馬牙疳。紅棗去核。入膽礬煅赤。研末敷之。追去痰涎。卽效。百蟲入耳。用膽礬和醋灌。卽出。按此功專涌吐。何書又言酸寒能收。不知書言收斂。乃是取辛收其熱毒。上涌而出。非以收其入內。而不宣散出表之意也。凡書所論藥性。每有以收爲散。以散作補。不爲剖析明白。多有意義難明。以致用之者之誤耳。磨鐵作銅色者眞。形似空青之色爲上。【清】黃元御玉楸藥解論膽礬曰。膽礬酸濇燥收。能尅化癥結。消散腫毒。治齒痛。牙疳。喉痺。牙蟲。鼻內陰蝕。脚疽。痔瘻。楊梅。金瘡。白癜。一切腫痛。療帶下。崩中。治上氣。眼疼。弦爛瘋狗咬傷。百蟲入耳。腋下狐臭。吐風痰最捷。

國外學說　日本藥局方曰。硫酸銅爲藍色透映結晶。於乾燥空氣中。徐徐風化。溶於三・五分之水。及一分沸湯。現酸性反應。不溶於酒精。

近人學說　鄒爾凱曰。膽礬產地和製法。產于銅坑內。倘用人工製法。可將銅與濃硫酸加熱。或使黃銅養化而多量製出之。其成分。在化學上的記號是 $CuSO_4$。故又稱爲硫酸銅。爲酸性反應。其性質和效能。係青藍色之結晶。味酸而辛。澀。極易溶于水。但不甚溶于酒精。普通多用爲催吐腐蝕收斂諸劑。其作用。（一）此物因能刺戟胃之知覺神經。反射延髓而惹起惡心。故爲催吐良劑。又因他種催吐藥。或使吐大久。常致腦呈不安。惟膽礬可免此弊。尤其對於服燐毒者。苟將膽礬四厘。溶溫水一碗服之。則膽礬所含之銅質。細末包圍燐之表面。可妨燐之劇烈作用。倘燐已吐出。可服陳松節油少許。和生雞蛋白四五枚。以解餘毒。此爲救解燐毒最便利最簡便之法。附帶錄出。惟此法只宜於服毒之最短期間。如過時稍久。則不適用。當以瀉藥爲宜矣。（二）膽礬稀薄

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

溶液。則爲收斂劑。因其能收縮細胞及血管。消退炎症之效。故用於注入白帶、淋病、慢性膀胱炎等。患慢性瀉症者亦可以一服也。(三)膽礬用濃厚溶液。則變爲殺菌和腐蝕作用。普通腐蝕用十倍至二十倍之溶液。殺菌用百倍至千倍之溶液。凡患顆粒性結膜炎惡性潰瘍。及水瘡贅等宜之。膽礬之配合和適應症。(一)治喉痺乳蛾。用米醋煮眞鴨嘴。膽礬爲末。醋調。探吐膠痰即癒。(二)治紫白癜風。膽礬和牡蠣生研。醋調。磨磨之即愈。(三)治走馬牙疳。用紅棗去核。入膽礬煅赤。研末敷之。追出痰即效。(四)治胃脘蟲痛。以茶清調膽礬末吐之即除。(五)膽礬二分。開水八十分。糖漿四十分。每隔五分鐘服一匙。得吐即止。可解鴉片黃燐各種毒藥。

配合應用　㈠治老小風痰。膽礬末一錢。小兒一字。溫醋湯調下。立吐出涎。便自醒。(譚氏小兒方)　㈡治女人頭暈。天地轉動。名曰心眩。非血風也。膽子礬一兩。細研。用胡餅劑子一箇。按平一指厚。以筯子勒成骰子大塊。勿界斷。於瓦上焙乾。每服一骰子爲末。燈心竹茹湯調下。(許學士本事方)　㈢治喉痺喉風。二聖散。用鴨嘴膽礬二錢半。白僵蠶炒五錢。研末。每以少許吹之。立吐痰涎。(濟生方)　㈣治齒痛及落。研細石膽。以人乳和膏擦之。日三四次。止痛復生。齒百日後復故。乃止。每日以新汲水漱淨。(玉龕外科祕要方)　㈤治口舌生瘡。衆療不差。膽礬半兩。入銀鍋內。火煅赤。出毒一夜。細研。每以少許傅之。吐出酸涎水。二三次。瘥。(勝金方)　㈥治走馬牙疳。北棗一枚去核。入鴨嘴膽礬。紙包煨赤。出火毒。研末傅之。追涎。(楊起簡便方)　㈦治小兒齒疳。鴨嘴膽礬一錢。匙上煉紅。麝香少許。研勻傅於齦上。立效。(活幼口議方)　㈧治小兒鼻疳蝕爛。膽礬燒烟盡。研末摻之。一二日愈。(簡要方)　㈨治風眼赤爛。礬膽二錢。燒研泡湯日洗。(明目經驗方)　㈩治百蟲入耳。礬膽末和醋灌之即出。(千金方)　(一)治風犬咬毒。膽礬末敷之立愈。(濟急方)　(二)治一切諸毒。膽子礬末。糯米糊丸。如雞頭子大。外以朱砂爲衣。每以少許吹之。冷水化一丸服愈。(勝金方)　(三)治挑生蟲毒。胸口痛者。膽礬二錢。茶清泡服即吐出。(嶺南衛生方)　(四)治腋下胡臭。膽礬半生半熟。入胭粉少許爲末。每用半錢。以自然薑汁調塗十分熱痛乃止。數日一用。以愈爲度。(黎居士簡易方)　(五)治赤白癜風。膽礬、牡蠣粉各半兩。生研醋調摩之。(聖濟總錄方)　(六)治甲疽腫痛。石膽一兩。燒烟盡。研末傅之。不過四五度瘥。(梅師方)　(七)治痔瘡熱腫。鴨嘴背膽礬根研。蜜水調敷。可以消脫。(直指方)　(八)治腫毒不破。膽礬雀屎各少許。點之。(直指方)　(九)治楊梅毒瘡。醋調膽礬末搽之。痛甚者。加乳香、沒藥出惡水一二上即乾。又方。膽礬、白礬各三錢半。水銀三錢半。研不見星。入香油津唾各少許。和勻。坐帳內。取藥塗兩足心。以兩手心對足心摩擦良久。再塗再擦。盡即臥。汗出或大便去垢。口出穢涎爲驗。每一次强者用四錢。弱者二錢。連用三日。外服疎風散。并澡洗。(劉氏經驗方)

用量　三分至五分。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。畏牡桂、菌桂、芫花、辛夷、白薇。水英爲之使。

參攷資料　㈠石膽氣寒味酸而辛。入少陽膽經。其性收斂上行。能涌風熱痰涎。發散風木相火。又能殺蟲。故治咽喉口齒瘡毒有奇功也。周密齊東野語云。密過南浦有老醫授治喉痺極速垂死方。用眞鴨嘴膽礬末。醋調灌之。大吐膠痰數升。即蘇。臨汀一老兵妻苦此。絕水粒三日矣。如法用之。即癒。屢用無不立驗。神方也。又周必大陰德錄云。治蟲膜及水腫祕方。有用蒲州信州膽礬。明亮如翠琉璃似鴨嘴者。米醋煮以君臣之藥服之。勝於鐵沙鐵蛾。蓋膽礬乃銅之精

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

液。味辛酸入肝膽。制脾鬼故也。（李時珍）㈡石膽生秦州羌道山谷大石間或羌里旬青山。二月庚子辛丑採爲石也。青色多白文。易破。狀空青。能化鐵爲銅。合成金銀（別錄）㈢仙經時用。俗方甚少。此藥殆絕。今人時有採者。色青綠。狀如玻璃而有白文。易破折。梁州信都無復有。俗乃以青色礬當之。殊無髣髴（陶弘景）㈣此物出銅處有之。形似層青。兼綠相間。味極酸苦。鑪鐵作銅色。此是眞者。出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中。有塊如雞卵者爲眞。向云似玻璃者。乃絳礬也。比來人亦以有之。又以醋揉青礬僞之。並僞矣。（蘇恭）㈤今惟信州鉛山縣有之。生於銅坑中。採得煎煉而成。又有自然生者。尤爲珍貴。並深碧色。今南方醫人多使之。又著其說云。石膽最上出蒲州。大者如拳。小者如桃栗。擊之縱橫解皆成彙。文色青見。用久則綠。擊破其中亦青。其次出上饒曲江銅坑間者。粒細有廉稜。如鈒股米粒。本草言僞者以醋揉青礬爲之。全不然。但取粗惡石膽合消石消溶而成之塊。大色淺渾渾無脈理。擊之則碎。無廉稜者是也。亦氣扶石者。乃削取石膽牀。溶造時投消石中。乃凝則相著也。（蘇頌）㈥石膽出蒲州穴中。鴨嘴色者爲上。俗呼膽礬。出羌里者。色少黑。次之。信州又次之。此物乃生於石。其經煎鍊者。即多僞也。但以火燒之成汁者僞也。塗於鐵及銅上燒之紅者眞也。又以銅器盛水。投少許入中。及不青碧數日不異者眞也。玉洞要訣云。石膽陽石也。出嵩岳及蒲州中條山。稟靈石異氣。形如憨憨。其性流通。精感入石。能化五金。變化無窮。沈括筆談載鉛山有苦泉流爲澗。挹水熬之。則成膽礬。所熬之釜。久亦化爲銅也。此乃煎熬作僞。非眞石膽也。不可入藥。（李時珍）㈦膽礬功力。能嘔能補。能收斂。外用殺浮肉。內服一釐至二釐。補而收斂。治發羊鈞久痢。作嘔。藥每服七釐至一分。眼炎證用膽礬四釐至八釐。酌溫水八錢洗。（內科新說）

【膃肭】即獺鵡之古籍別名。典見梵書詳『獺鵡』條。

【舉卑茶】即茶之產於浙江舊金華府境者。性質功用。詳『茶葉』條。

【舉卿古拜散】即荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荊芥』條。

【藾菜】古籍別名　空心菜。

外國名稱　Ipomaea aquatica, Forsk.（拉丁）ヨウサイ（日本）

基本　係旋花科牽牛子屬。爲藾菜之莖葉。

產地　水陸諸地多有之。

形態　藾菜爲菜類之一種。性宜溼地。長霜雪。九月藏於土窖中。三四月取出。種以糞。即節節生芽。一本可成一畦。幹柔如蔓而中空。葉似菠薐。秋開白花。其菜可供蔬茹。典藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　解胡蔓草毒。即野葛毒。煮食之。亦生搗服。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論藾菜曰。搗汁和酒服。治產難。

【藪】即魚腥草之原名。詳『魚腥草』條。

【藪草】即魚腥草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『魚腥草』條。

【藪菜】即魚腥草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『魚腥草』條。

【藪菜】即魚腥草之處方用名。詳『魚腥草』條。

【藿菜】即山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。

【藿李】即郁李仁之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『郁李仁』條。

【薄】即芒之日本名。詳『芒』條。

【薄荷】原名　菝蔏。

命名　薄荷爲菝蔏之音訛。

處方用名　薄荷葉。薄荷梗。薄荷腦。

古籍別名　蕃荷菜。臭菝蔏。（食性）菝蔏（楊雄甘泉賦）菝茷。（呂忱字林）南薄荷（衍義）金錢薄荷（綱目）番荷（千金方）連錢草（天賓單方）英生菝藶菱荷冬蘇。雞蘇。石薄荷。冰喉尉。（和漢藥考）

外國名稱　Folia menthae（拉丁）pepper-mint（英）Pfeffermünze（德）

基本　屬脣形科薄荷之莖葉。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產地 陳仁山藥物生產辨云。薄荷產江西吉安府。湖南尤州府。河南禹州府。江蘇太倉州。夏季出新。

形態 薄荷爲山野自生或栽植之宿根草。春從宿根生。面莖方形。高一二尺。葉對生。作卵圓形而尖。有淺銳鋸齒。採揉嗅之。有辛涼香氣。表面深綠色。背面紫色。長則作綠色。秋季於葉腋叢生淡紫色脣形花。其葉作卵圓形或長橢圓形而帶尖。長一二寸。邊緣有銳鋸齒。有葉柄。葉莖有軟毛。有芳香及清涼味。



薄荷

種植 (一)氣候及土質。凡溫帶濕潤之氣候。皆合其生育。而過溼亦不佳。又稍寒地方。亦可使其生育。土地以膏沃之黏質壤土爲最適。其生長無黏質壤土之處。而欲栽培。則土壤亦可。或者砂質之壤土。亦可使其生長。惟品質則必較栽於黏質壤土者爲劣。其餘土質。皆不適於栽培。(二)產地及種類。產地極廣。僅以吾國言之。幾無省不有。吾國產出之品質。亦有上中下之分。產於南省者爲最劣。產於中省者爲最優。產於北省者次之。外國以美國產出者爲最佳。法國產出者次之。其種類有赤質青質二種。赤質者。因莖帶赤色。油腦多而枝葉茂。爲佳良種。青質者。因莖帶青色。枝葉雖茂。而品質不良。油腦較少。故栽培薄荷者。多取赤質種。而不取青質種。亦其宜也。吾國中省所產。雖較南北各省爲佳。然亦有優劣之分。如四川湖北。江西。浙江等所產出者爲佳良。餘若湖南。安徽。江蘇等所產出者次之。故欲栽培薄荷。當取四川或湖北或江西或浙江之赤質種而栽之。爲佳也。選擇品種既畢。乃可整理土地。擇定時期而後栽植。未栽以前。當注意整理土地之事。且時期亦不可悞忽也。(三)整地。耕起黏質之壤土。必須耕深至七八寸方可。而打碎土塊。使成粉細。並耙平土面。再作畦幅一尺五寸至二尺。作畦既畢。可以擇時栽種也。(四)期節。栽植有春秋二季之分。秋植與春植。各有不同。今分條述之。一、春植者。於冬季卽宜耕地作畦。畦之幅約一尺二寸至一尺五寸。每株距離約三寸。於三月下旬。可栽植其種。是爲適期。二、秋植者。畦稍闊於春植。約一尺七寸至二尺。每枝距離約四寸。於七月下旬八月上旬。是其適宜之種植期。以上二種。春植爲佳。欲栽薄荷。宜栽春植種爲要。(五)栽植。栽植之法。取薄荷每隔四五寸處切斷之。而後栽植於既竣之畦上。俟其漸漸生長可也。(六)施肥。肥料以人糞尿油粕堆肥爲主。每畝地積約需人糞尿七百餘兩。堆肥六七百斤。油粕八九百兩。油粕與堆肥混和而堆積之。使之腐熟。而後於未植以前施之。作爲基肥。待既栽之後。施以稀薄之人糞尿。分作三次換之可也。(七)中耕。中耕於栽後三四十日時行之爲宜。(八)除草。栽後二十日間。卽宜除草。除草之際。見有根大之草。宜用手拔去。不可用器削除。蓋根大之草。其根之根株。故用手拔之爲佳。

採取 採取之期。因其供用之目的而不同。例如供食用者。當五六月之交。取其葉以供肉汁中之用。若充製油之用者。則分七月上旬與十月上中旬二次採取。以上皆就春植者之採收而言。採取之法。專以銳鑱刈採。亦間有拔取者。採得陰乾用。

用法 與他藥水煎。或剉末和作丸散。但入煎藥中。宜後下數沸。則氣味全而功效足。與鉤藤同。

性質 辛。溫。無毒。

成分 含有一種揮發油。及單寧少許。

效能 發汗散風。熱。解鬱治傷寒。爲驅風防腐藥。用於腸之異常醱酵。又爲清涼藥。用於夏日之中暑及霍亂。並可作眼藥。癮痙。健胃。通經藥。又治偏頭痛。肺支管炎。

作用 由腸壁吸入血中。能減少白血球之數。同時由交感神經而傳達大腦。使之麻醉。

主治 賊風傷寒。發汗。惡氣。心腹脹滿。霍亂宿食。不消。下氣。煮汁服之。發汗大解勞乏。亦堪生食。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

千金翼論薄荷曰。作菜久食。卻腎氣。辟邪毒。除勞氣。令人口氣香潔。煎湯洗漆瘡。【唐】甄權藥性本草論薄荷曰。通利關節。發毒汗。去憒氣。破血止痢。【唐】陳士良食性本草論薄荷曰。療陰陽毒。傷寒頭痛。四季宜食。【唐】孟詵食療本草論薄荷曰。杵汁服。去心臟風熱。【宋】日華諸家本草論薄荷曰。治中風失音。吐痰。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論薄荷曰。主傷風頭腦風。通關格。及小兒風涎。爲要藥。【元】李東垣用藥法象論薄荷曰。清頭目。除風熱。【明】李時珍本草綱目論薄荷曰。利咽喉口齒諸病。治瘰癧瘡疥。風瘙癮疹。搗汁含漱。去舌胎語澀。按葉塞鼻。止衄血。塗蜂螫蛇傷。【清】黃宮繡本草求眞論薄荷曰。薄荷氣味辛涼。功專入肝與肺。故書載辛能發散。而於頭痛頭風。發熱惡寒則宜。辛亦能通氣。而於心腹惡氣痰結則治。涼能清熱。而於咽喉口齒眼耳。癮疹瘡疥。驚熱骨蒸。衄血則妙。是以古方遵遁。用此以爲開鬱散氣之具。小兒驚癇。用此以爲宣風向導之能。腸風血痢。用此以爲疎氣清利之法。然亦不敢多用。所用不過二三分而止。恐其有泄眞元耳。蘇產氣芳者良。貓傷用汁塗之最妙。【清】王士雄隨息居飲食譜論薄荷曰。薄荷葉辛甘苦溫。散風熱。清利頭目。咽喉口齒諸病。和中下氣。消食化痰。開音聲。舒鬱懿。辟穢惡邪氣。療霍亂瘴癘。釀酒蒸餻。熬糖造露均妙。惟虛弱多汗者忌之。

國外學說　日本學說謂薄荷各國皆有。藥中所用。卽薄荷之乾燥葉也。其主治用量。爲健胃驅風劑。又能靜止胃痛腸痛。一日數回。自一、〇至二、〇爲剉劑。散劑浸劑。及製劑以薄荷油。薄荷水。薄荷精。各一滴至三滴。爲調味藥。又薄荷腦。爲鎭痛藥。齒痛時。入其結晶於齒腔內。偏頭痛時。塗擦其杆。又爲防腐藥。於肺結核等。爲丸劑或酒精劑。內服之。一日數回。自〇、〇五至〇、二。又日本藥局方曰。薄荷葉係採取薄荷（Mentha Arvensis L. var. Piperascens, Benth）之葉陰乾者。本品爲卵圓形或披針形。長三至七仙米上端尖銳。邊緣有不等銳鋸齒。葉面散有毛茸。附有多數腺鱗。本品氣味特異。芳香峻烈而清涼。又和漢藥考曰。日本之主要產地。爲山形縣。岡山、廣島二縣次之。此外新瀉。長野。愛知千葉諸縣亦產之。惟不多。但日本產薄荷。有赤莖。青莖二種。赤莖所含薄荷霜量。較青莖爲多。

辨僞　㊀鄭肯慶曰。土薄荷色淡。無香味。不若蘇州所蒔者佳。莖小氣芳。方堪入藥。故陳士良食性本草謂之臭菠薐（菠薐音拔活）。可見薄荷當以臭產者爲上品。㊁曹炳章曰。按薄荷六七月出新。蘇州學宮內出者。其葉小而茂。梗細短。頭有螺螄帶。形似龍頭。故名龍腦薄荷。氣清香。味涼沁。爲最道地。太倉常州產者。葉略大。梗亦細。一莖直上。無龍頭形。氣味亦略淡。有頭二刀之分。頭刀力全。葉粗梗長。香氣濃厚。二刀乃頭刀割去後。留原根抽莖再長。故莖梗亦細。葉亦小。氣味亦略薄。尙佳。杭州莧橋產者。梗紅而粗長。氣濁臭。味辣甚次。山東產者。梗粗葉少。不香。更次。二種皆爲側路。不宜入藥。

近人學說　㊀顧子靜曰。薄荷爲唇形科植物薄荷之葉。有特異苛烈之香氣。味始如灼。後清涼。含一種揮發油。其內更含一種固體。名薄荷腦。日本產之薄荷。含薄荷腦較多。於製得之薄荷油中。寒冷之後。卽有薄荷腦析出。沉於器底。薄荷之醫療應用。以其葉一錢三分。浸於一茶杯之熱水中。分三次一日服用。以治胃痛痾痛。㊁張山雷曰。薄荷方莖而色紫帶赤。可以子種。宿根亦能自生。氣味芳烈。頗與紫蘇相類。但葉不赤而無鋸齒。氣味雖濃。而入口清冽爲異。故孫星衍輯刻本草經。逕謂薄荷蘇類。確乎可信。唐本草謂爲辛溫。亦以蘇類例之。然冷冽之氣。能散風熱。決非溫藥。故潔古直謂之辛涼。其主治則唐本謂賊風傷寒。惡氣心腹脹滿。霍亂。宿食不消。下氣。又皆與紫蘇大略相近。惟辛而涼降。微與溫散者不同耳。蘇頌謂主傷風頭腦風。東垣謂清頭目。除風熱。瀕湖謂利喉。驗口齒諸病。石頑謂辛

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

能發散。專於消散風熱。涼能清利。故治咳嗽失音。性浮上升。能開鬱散氣。然所用不過二三分。以其辛香伐氣。非久服多服之品。按外治風熱生瘡。煮汁和入消腫末藥敷之。涼入肌膚。立能止痛。今西藥製精成錠。外擦頭痛。能泄外風。能抑肝陽。皆有捷驗。

配合應用　㈠清上化痰。利咽膈。治風熱。以薄荷末煉蜜丸如茨子大。每嚥一丸。白沙糖和之亦可。（簡便單方）

㈡治風氣瘙痒。用大薄荷、蟬蛻等分。爲末。每溫酒調服一錢。（永類鈐方）

㈢治舌胎語澀。薄荷自然汁。和白蜜薑汁擦之。（醫學集成方）

㈣治眼眩赤爛。薄荷以生薑汁浸一宿。晒乾爲末。每用一錢。沸湯泡洗。（明目經驗方）

㈤治瘰癧結核。或破未破。以新薄荷二斤。取汁。皂莢一挺。水浸去皮。搗取汁。同於銀石器內熬膏。入連翹末半兩。連白青皮。陳皮。黑牽牛。半生半炒。各一兩。皂莢仁一兩半。同搗和丸。梧子大。每服三十丸。煎連翹湯下。（濟生方）

㈥治衄血不止。薄荷汁滴之。或以乾者水煮。綿裹塞鼻。（許學士本事方）

㈦治血痢不止。薄荷葉煎湯常服。（普濟方）

㈧治水入耳中。薄荷汁滴入立效。（外臺祕要方）

㈨治蜂蜜螫傷。薄荷葉搥貼之。（外臺祕要方）

㈩治火毒生瘡如炙。火毒氣入內。兩股生瘡。汁水淋漓者。用薄荷煎汁頻塗立愈。（張杲醫說方）

用量　入分至錢半。

施用宜忌　凡氣虛血燥。及無外感風寒熱邪者禁用。

參攷資料　㈠薄荷能引諸藥入營衞。故能發散風寒。（陳士良）㈡小兒驚狂壯熱。須此引藥。又治骨蒸熱勞。用其汁與衆藥熬爲膏。貓食薄荷則醉。物相感爾。（寇宗奭）㈢薄荷手足厥陰氣分藥也。能搜肝氣。又主肺盛有餘。肩背痛。及風寒汗出。（王好古）㈣薄荷辛能發散。涼能清利。專於消風散熱。故頭痛頭風。眼目咽喉口齒諸病。小兒驚熱及瘰癧瘡疥爲要藥。戴原禮氏治貓咬。取其汁塗之有效。蓋取其相制也。（李時珍）㈤薄荷貓之酒也。犬虎之酒也。桑椹鴆之酒也。茵草魚之酒也。皆殿食醒心鏡云。薄荷煎豉湯煖酒和飲。煎茶生食並宜。蓋菜之有益者也。（陸農師）㈥同雞作羹食相宜。新病癒人勿食之。令人虛汗不止。瘦弱人久食之。動消湯病。（甄權）㈦薄荷處處有之。莖葉似荏而尖長。經冬根不死。夏秋採莖葉曝乾。古方稀用。或與雞作羹食。近世治風寒爲要藥。故人家多蒔之。又有胡薄荷與此相類。但味少甘爲別。生江浙間。彼人多以作茶飲之。俗呼新羅薄荷。近汴洛僧寺或植一二本。部。天寶單方所謂連錢草者是也。又有石薄荷。生江南山石間。葉微小。至冬紫色。不聞有別功用。（蘇頌）㈧薄荷人多栽蒔。二月宿根生苗。清明前後分之。方莖赤色。其葉對生。初蒔形長而頭圓。及長則尖。吳越川湖人多以代茶。蘇州所蒔者莖小而氣芳。江西者稍粗。川蜀者更粗。入藥以蘇產爲勝。物類相感志云。凡收薄荷須隔夜以糞水澆之。雨後乃悉刈收。則性涼。不爾則不涼也。野生者莖葉氣味都相似。（李時珍）

【薄荷水】即由薄荷油而製成者。詳『薄荷油』條。

【薄荷油】**基本**　本品係用薄荷葉蒸溜所取之揮發油。

外國名詞　Oleum menthae (拉J) Peppermint oil. (英)

形態　薄荷油含有同質異性體二種。一爲液體。（薄荷油）一爲固體。（薄荷霜或呼薄荷圓）薄荷油爲無色透明或淡黃色液。一般帶綠色。經久漸成黃色。有薄荷葉香氣。味初如灼。後變清涼。比重約〇・九。不溶於水。逢酒精及冰醋酸等。則善能溶解。沸點爲二百〇四度至二百十度。薄荷霜 Menthol. $C_{10}H_{19}(OH)$ 爲無色針狀結晶體。氣味俱同薄荷油。稍溶於水。投入時。於水面旋轉。逢酒精。伊打哥羅仿謨。冰醋酸等。善能溶化。又熱至四十三度則融化。二百十三度則沸騰。逢碘則呈藍紫色。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

製法　以薄荷油可製爲薄荷精、薄荷水、薄荷錠三種。

性質　辛涼無毒。

效能　油與霜俱作衝動藥鎮痙與驅風藥並爲殺菌藥。

主治　散風熱。清頭目。治咽痛牙痛。擦皮膚風痒及金瘡湯火傷。塗搽之。

參攷資料　據日本農商務省農務局調查輸出重要品要覽薄荷油薄荷霜部所載山形縣薄荷油製法云。於有水利之處。藥釜安置大釜。上覆蒸桶。蒸桶長約四尺五寸。上部直徑約三尺五寸。底之中央有孔。於此桶裝積乾葉八貫至十二貫（每貫爲六斤四兩）。架置盛水大釜之上。更於其上置一底面作圓錐形之釜。滿盛冷水。然後燃火。使下釜之湯沸騰。則蒸氣經蒸桶。與薄荷質共達上釜底面。由其圓錐形尖端。流下受器。滴下另置於水槽中之磁製壺中。此壺口徑六寸。高約一尺。其底有小孔。上釜由貯水桶用管不斷補給冷水。使與溫水調和。蒸溜已注滿壺中時。卽用指頭塞住底孔。一面注視壺中。徐徐從水槽中取上。一面放去指頭。則水從小孔流出。祇餘薄荷液留於壺中。再用指將孔塞住。移於他器。如此所得之液。爲霜與油之混合物。日本名爲取卸薄荷。將此取卸薄荷移於罐或壺。使接觸華氏驗溫器四十五度以下之冷氣。經二三小時。卽開始結晶。用網杓子掏取此結晶。移於他器。一二次後。卽於殘留之油中。再加取卸薄荷。稍用文火熔化。再照前法冷卻。則再開始結晶。如此則可將霜與油分離。又法將取卸薄荷置入銅製蒸溜器（Retort）中。通蒸氣蒸溜之。將溜出物。置入鉾製鐘（高一尺五寸方一尺）中。復置入盛冰之大木箱（可置八罐）中。夏置寒冷處。冬置溫暖處。約經三日。則成結晶體。將此傾注別器。則油滴下。祇留結晶體。卽薄荷霜也。再將餘留結晶體之鐘。列置於有管之斜形棚上斜置之。則油質自然流出。經管而滴下受器。結晶體由三層而成。上層斜立。中層直立。下層作綿狀。油質悉已流出。將鐘取下。祇取其中層（卽直立部分）。盛於木製淺箱。放置空氣中。乾燥三日。則得純粹薄荷霜。又將殘餘上層及下層部分。再加入取卸薄荷。照前法爲之。大約乾葉百貫。可得取卸薄荷一貫。左右。取卸薄荷一貫。可得霜四十兩。油五十三兩。

【薄荷梗】卽薄荷之處方用名。詳『薄荷』條。

【薄荷圓】卽薄荷霜之別名。詳『薄荷霜』條。

【薄荷腦】卽薄荷之處方用名。詳『薄荷』條。

【薄荷葉】卽薄荷之處方用名。詳『薄荷』條。

【薄荷精】卽由薄荷油而製成者。詳『薄荷油』條。

【薄荷錠】卽由薄荷油而製成者。詳『薄荷油』條。

【薄荷霜】卽薄荷油之固體者。詳『薄荷油』條。

【薄荷露】基本　本品係用薄荷梗及葉所蒸取之露。

性質　辛涼無毒。

主治　清涼解熱。發散風寒。

【薇】命名　本品似藿乃菜之微者。故名。

古籍別名　垂水（爾雅）野豌豆（大葉菜（綱目）

外國名詞　Osmunda regalis, L. var. japonica, Milde.（拉丁）センマイ（日本）

基本　係羊齒門羊齒類薇科。爲薇之莖葉。

產地　原野田澤間多有之。

形態　薇爲菜類之一年生草本。高二三尺。無地上莖。其葉自地下莖叢出。尖端卷曲如漩渦。葉有二種。一爲綠色二回羽狀複葉。由長卵形之小葉而成。一爲褐色。由細長小葉而成。葉間着生多數胞子囊。其莖葉可供食與藥用。



薇

性質　甘寒無毒。

主治　久食不飢。調中利大小腸。

839／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論薇曰。利水道。下浮腫。潤大腸。

【薇草】　卽白薇之古籍別名。典見別錄。詳『白薇』條。

【薇御草】　卽鹿御草之古籍別名。典見本經。詳『鹿御草』條。

【薇銜】　卽薇銜子。詳『薇銜子』條。

【薇銜子】　**原名**　延壽果。　**古籍別名**　棗銜子。（綱目）無顯。（吳普本草）

性質　甘。微濇。溫。無毒。

主治　理血中邪淫。溫補下元。祛風痺。歷節痛。定小兒驚悸。

參攷資料　薇銜子不特有益老人。而嬰兒先天不足者。尤爲上藥。惜乎南方罕得。（本草逢原）

【薇蕪】　卽蘼蕪之古籍別名。典見別錄。詳『蘼蕪』條。

【藪】　卽蓮肉之古籍別名。典見爾雅。詳『蓮肉』條。

【藁】　卽香附子之古籍別名。典見爾雅。詳『香附子』條。

【藏】　㊀卽蘆之短小中空。皮厚色青者。功用詳『蘆』條。㊁卽小蒜之古籍別名。典見蜀本草。詳『小蒜』條。

【薏米仁】　卽苡仁之處方用名。詳『苡仁』條。

【薏苡蘘】　卽苡蘘之原名。詳『苡蘘』條。

【薏珠子】　卽苡仁之古籍別名。典見圖經本草。詳『苡仁』條。

【薏黍】　卽苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苡仁』條。

【薑半夏】　**製法**　用大半夏。照法半夏法製。復以生薑自然汁漬焙乾用。

主治　寒痰者宜之。

【薑汁】　**性質**　辛。溫。潤。無毒。

主治　噎膈反胃。救暴卒。療狐臭。搽手足凍瘡。貼風溼痺痛。

【薑皮】　**處方用名**　薑衣。　**外國名詞**　Zingiber officinale, Rosc.（拉丁）

性質　辛。涼。無毒。

主治　消浮腫。腹脹。痞滿。和脾胃。去翳。

歷代記述攷證　【明】李士材本草圖解論薑皮曰。薑皮性涼。和脾胃。消水腫。除脹滿。去目翳。【清】黃宮繡本草求眞論薑皮曰。薑皮辛涼。和脾利水。消腫。取其以皮行皮之義。

配合應用　蘇頌圖經本草治拔白換黑方。用刮老生薑皮一大升。於久用油膩鍋內。不須洗刷。固濟勿令通氣。令精細人守之。文武火煎之。不得火急。自旦至夕卽成矣。研爲末。拔白後。先以小物點蔴子大。入孔中。或先點鬚下。然後拔之。以指撚入。三日後。當生黑者。神效。季卿用之有驗。

用量　三分至五分。

著名方劑　五皮散。治風溼客於脾經。氣血凝滯。以致面目虛浮。四肢腫滿。心腹膨脹。上氣促急。兼治皮水。及妊娠胎水。（局方）生薑皮、五加皮、地骨皮、大腹皮、茯苓皮等分。右五味。每用三錢。水煎熱服。一方加白朮。磨沉香。木香。

【薑石】　**命名**　本品形似薑狀。故名。　**古籍別名**　磉礎石。礓礫。（綱目）

產地　出土石間。

形態　薑石爲石類之一種。狀似薑根。可供藥用。

採取　以不見日光色白而燥不黲者良。

性質　鹹。寒。無毒。

主治　熱跳豆瘡疔毒等腫。

【薑汁炒山梔】　卽山梔子經薑汁焙炒成者之處方用名。詳『山梔子』條。

【薑衣】　卽薑皮之處方用名。詳『薑皮』條。

【薑芥】　卽荊芥之古籍別名。典見別錄。詳『荊芥』條。

【薑根】　卽生薑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『生薑』條。

【薑酒】　**基本**　本品係用薑塊浸成之酒。或以薑汁和麴釀者。

主治　偏風。中惡疰忤。心腹冷痛。

【薑黃】　**外國名詞**　Curcuma longa, L.（拉丁）

處方用名　片薑黃。黃薑。

古籍別名　莪蓯。鼎香。嫩芽相連者名子母薑黃。（綱目）

基本　屬薑科。爲薑黃之根莖。

產地　陳仁山藥物生產辨云。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黃薑產四川、湖北老河口、廣東番禺、高塘司等西北江各屬均有出。安南印度亦均有出。

形態　薑黃產於中國及東印度地方。爲多年生草本。有野生者。有栽種者。葉形橢圓。有長柄。背生軟毛。一窠生四五葉。四五月發芽。花莖同生。高五七寸。下有二小葉包之。全體互生鱗狀之苞。苞內開花兩朵。黃色。狀如喇叭。其根莖色黃褐。作橢圓或長橢圓形。長約一二寸。微扁平。外面被有塵粉。有如輪之突起或結節。頗爲緻密。內面作黃色或橙黃色。似鬱金而色略淡。味芳香而苦。然緩和咀嚼之。唾液亦變黃色。

採取　八月間採之。採得切片曝乾。不宜見火。

性質　辛苦大寒。無毒。

成分　爲揮發油、脂肪、黃色素等。黃色素名曰克兒克明。

效能　專行氣破血。治風痺臂痛。用作風痛藥。

主治　心腹結積。疰忤下氣。破血除風熱。消癰腫。功力烈於鬱金。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論薑黃曰。治癥瘕血塊。通月經。治撲損瘀血。止暴風痛。冷氣下食。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論薑黃曰。祛邪辟惡。治氣脹。產後敗血攻心。【明】李時珍本草綱目論薑黃曰。治風痺臂痛。【清】黃宮繡本草求眞論薑黃曰。薑黃味辛而苦。氣溫色黃。功用頗類鬱金、三稜、蓬朮、延胡索。但鬱金入心。專瀉心胞之血。我朮入肝。治氣中之血。三稜入肝。治血中之氣。延胡索則於心肝血分行氣。氣分行血。此則入脾既治氣中之血。復兼血中之氣耳。陳藏器曰。此藥辛少苦多。性氣過於鬱金。破血立通。下氣最速。凡一切結氣積氣。癥瘕瘀血。血閉癰疽。並皆有效。以其氣血兼理耳。若血虛腹痛臂痛。而非瘀血凝滯者。用之反劇。蜀川產者。色黃質嫩。有鬚折之。中空有眼。切之分爲兩片者。爲片子薑黃。廣生者。質粗形扁。如乾薑僅可染色。不可入藥。服之有損無益。

辨僞　㈠鄭肖巖曰。子薑黃氣味辛苦而溫。是經種三年以上老薑所生。色黃入脾兼治氣。匪特破血除風。閒有以黃北薑僞充。則貽害多矣。㈡曹炳章曰。按子薑黃。福建邵武出者。色黃皮黃黑色。有節皺紋者佳。四川產者。名川黃。略次。江南北地產者。色深黃。作顏料用之。廣西柳州產者。形似蟬肚。色深黃兼黑者次。作香料用之。㈢鄭肖巖曰。李時珍云。以扁如乾薑形者爲片子薑黃。治風痺臂痛有奇功。今肆中有僞品。卽薑黃假充。粒大皮粗。味辣內不結澗。非片子也。勿用爲是。㈣曹炳章曰。按片薑黃與子薑黃。大小塊色皆不同。片薑黃比子薑黃大六七倍。切厚片。色淡黃兼黑。邊有鬚根。廣東潮州、浙江溫州俱出。

近人學說　張山雷曰。薑黃始見唐本草。稱其辛苦大寒。藏器已辨其非。謂辛少苦多。性熱不冷。則唐本寒字。蓋亦傳寫之誤。石頑謂有二種。川蜀生者。色黃質嫩。有鬚。折之中空有眼。切之分爲兩片者。爲片子薑黃。江廣生者。質粗形扁。爲乾薑。僅可染色。不入湯藥。藥肆混市。誤人。徒有耗氣之患。則無治療之功。頗按今市肆薑黃。確有兩種。名片薑黃者。是本已切爲厚片。而後晒乾。形似乾薑。色不黃。質亦不堅。治風寒溼者。卽此。又一種則堅實光亮。其色深黃。乃如鬱金。是爲染色之用。不入藥劑者。唐本謂治心腹結積。疰忤。下氣破血。蓋辛能散。溫能通。故可破結辟惡。消瘀下氣。是物功用。卽在此數者之中。然又謂除風熱。消癰腫。功力烈於鬱金。則正以入血泄散。故癰瘍之堅腫可消。瘍科普通數藥之如意金。薑散用之。卽是此意。固非疎風清熱之作用。而乃竟以爲除風熱。宜乎有辛苦大寒之誤矣。大明謂治癥瘕血塊。撲損瘀血。通月經。止暴風痛冷氣。下食。蘇頌謂治氣脹。產後敗血攻心。藏器原禮謂片子薑黃入手臂治痛。石頑謂血虛臂痛者。服之必增劇。蓋辛溫本以祛寒澀。而血虛者更得此迅利流動以耗其氣。則非徒無益而又害之矣。

配合應用　㈠薑黃得當歸、生地、牛膝、延胡索、肉桂。治一切積血在腹中作痛。㈡治心痛難忍。薑黃一兩。桂三兩。爲末。醋湯服一錢。（經驗方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊂治胎寒腹痛。啼哭吐乳。大便色青。狀若鷰糞出冷汗。薑黃一錢。沒藥、乳香二錢爲末。蜜丸。茨子大。每服一丸。鉤藤煎湯化下。（和劑局方）

㊃治產後血痛。有塊。用薑黃、桂心等分爲末。酒服方寸匕。血下盡卽愈。（普濟方）

㊄治瘡癬初生。薑黃末摻之妙。（千金方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無瘀滯及非氣壯邪實者禁用。忌火。

參攷資料　㊀薑黃、鬱金、莪蒁三物。形狀功用皆相近。但鬱金入心治血。而薑黃兼入脾。兼治氣。莪蒁則入肝。兼治氣中之血。爲不同爾。古方五痺湯用片子薑黃。治風寒溼氣。手臂痛。戴原禮要訣云。片子薑黃能入手臂。治痛。其兼理血中之氣可知。（李時珍）㊁薑黃根葉都似鬱金。其花春生於根與苗並出。入夏花爛無子。根有黃青白三色。其作之方法與鬱金同。西戎人謂之蒁。其味辛少苦多。亦與鬱金同。惟花生異耳。（蘇恭）㊂薑黃眞者是經種三年以上老薑。花花在根際。一如蓑荷。根節堅硬。氣味辛辣。種薑處有之。終是難得。西番亦有來者。與鬱金莪蒁相似。如蘇恭所說。卽是莪蒁而非薑黃。又言薑黃是莪鬱金是胡莪。如此則三物無別。遞相連名。總稱爲莪。則功狀當不殊。而今鬱金味苦寒。色赤。主馬熱病。薑黃味辛溫。色黃。莪味苦。色青。三物不同。所用各別。（陳藏器）㊃海南生者卽爲薑黃。（大明）㊄薑黃今江廣蜀川多有之。葉青綠。長一二尺許。闊三四寸。有斜文如紅蕉葉而小。花紅白色。至中秋漸凋。春末方生。其花先生。次方生葉。不結實。根盤屈黃色。類生薑而圓有節。八月採根。片切曬乾。蜀人以治氣腹及產後敗血攻心。甚驗。蠻人生噉。云可以祛邪辟惡。按鬱金、薑黃、莪蒁三物相近。蘇恭不能分別。乃爲一物。陳藏器以色味分別三物。又言薑黃是三年老薑所生。近年汴都多種薑往往有薑黃出賣。乃是老薑。市人貿鬻云治氣最大。方亦時用之。又有廉薑。亦是其類。而自是一物。（蘇頌）㊅近時以扁如乾薑形者爲片子薑黃。圓如蟬腹形者爲蟬肚鬱金。並可浸水染色。蓪形雖似鬱金。而色不黃也。（李時珍）㊆試嘗之。果辛多苦少。詳其功用。似辛勝者爲是。又曰。此味有云不宜見火。者良然。蓋此味之辛勝者。是其功用之微。見火則去其辛矣。（劉潛江）㊇有二種。蜀川生者。色黃質嫩有鬚。折之中空有眼。切之分爲兩片者爲片子薑黃。江廣生者。質粗形扁如乾薑僅可染色。不入湯藥。今藥肆混市誤人。徒有耗氣之患。而無治療之功也。（張石頑）

【薑葉】　性質　辛。溫。無毒。

主治　食鱠成癥。搗汁飲。卽消。

【薑棗】　卽廉薑之古籍別名。典見綱目。詳『廉薑』條。

【薑露】　基本　本品係用生薑蒸取之露。

性質　味辛。性熱。

主治　辟寒。解中霜雪毒。驅瘴消食化痰。

【薔】　卽水蓼之古籍別名。典見爾雅。詳『水蓼』條。

【薔薇子】　卽營實之古籍別名。典見別錄。詳『營實』條。

【薔薇根】　性質　苦。濇。冷。無毒。

主治　止洩痢腹痛。五臟客熱。除邪逆氣。疽癰。諸惡瘡。金瘡傷趐。生肉復肌。

歷代記述匯證　【唐】甄權藥性本草論薔薇根曰。治頭瘡白禿。【宋】大明日華諸家本草論薔薇根曰。治熱毒風。除邪氣。止赤白痢。腸風瀉血。通結血。治牙齒痛。小兒疳蟲肚痛。癰疽疥癬。【明】李時珍本草綱目論薔薇根曰。除風熱。澀熱。縮小便。止消渴。

國外學說　英美學說謂薔薇花各國均有。取該花之瓣可爲藥品。其功用能作汽水。配香水等用。取其味美。處方以鮮薔薇花瓣一分。水五分。入甑蒸出一分。作洗水類常用之。配他藥取其臭香。每服一兩至二兩。（薔薇花汽水又名薔薇露方。）

配合應用　㊀治金瘡發熱。用薔薇根灰一方寸匕。日三。（葛洪方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈡治骨鯁。薔薇根末。水服方寸匕。日三。（外臺祕要方）

㈢治小兒睡中遺尿不自覺。以薔薇根剉。以酒飲之。（外臺祕要方）

㈣治口瘡。以根煮濃汁。溫含冷易。神驗。（肘後方）

㈤治消渴尿多。薔薇根一把。水煎日服之。（千金方）

㈥治小便失禁。用薔薇根煮汁飲。或爲末酒服。野生白花者更良。（聖惠方）

㈦治小兒疳瘡頰敷。用生薔薇根洗切。煎濃汁。細飲之。以愈爲度。（千金方）

㈧治口咽痛痒。語聲不出。薔薇根皮。剉。甘草炙半兩。每服二錢。水煎服之。（普濟方）

㈨治小兒月蝕。薔薇根四兩。地榆二錢。爲末。先以鹽湯洗過。傅之。（全幼心鑑方）

㈩治癰腫瘰癧毒。潰爛疼痛。用薔薇皮更炙熨之。（千金方）

(一)治筋骨毒痛。因患楊梅瘡。服輕粉毒藥成者。野薔薇根白皮洗三斤。水酒十斤。煮一炷香。每日任飲。以愈爲度。又用刺薔薇根三錢。五加皮、木瓜、當歸、茯苓各二錢。以酒二盞。煎一盞。日服一次。（鄧筆峯雜興方）

(二)治箭刺入肉。膿血不出。以薔薇根末摻之。服鼠糞十日。卽穿皮出也。（外臺祕要方）

【薔薇露】基本　係薔薇花蒸取之露。

性質　氣芳香。味辛散。

主治　建中達表。解散風邪。驅除客熱。

【蘼蕪仁】卽蘼蕪之古籍別名。典見綱目。詳『蘼蕪』條。

【薙蕪】卽酸模之古籍別名。典見和漢藥考。詳『酸模』條。

【薜荔】卽木蓮之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『木蓮』條。

【蕎蒲】卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【薜蕎】卽蕎之古籍別名。典見爾雅。詳『蕎』條。

【薜扈子】卽決明子之古籍別名。典見爾雅。詳『決明子』條。

【薜蕪】卽酸模之古籍別名。典見爾雅。詳『酸模』條。

【薙】

命名　本品韭類。故字從韭。藥用其白者之鱗莖。故名曰薙白。

處方用名　薙白。薙白頭。

古籍別名　菜芝（別錄）。蔏子。茯子。火葱（綱目）。鴻薈（說文）。天薙。野薙。蕎葱（俗名）。山薙（爾雅）。辣薙（日本）

外國名稱　Allium Bakeri, Reg.（拉丁）ラッキヤウ　ギヤウジヤヒル（日本）

基本　係百合科葱屬。藥用薙之鱗莖。

產地　凡山野平原間恒有生焉。陳仁山藥物生產辨云。薙白以產江蘇浙江爲正。廣東產者係薤頭耳。



薙

形態　薙爲菜類之多年生草本。高尺許。葉細而長。稍爲三角形。有平行脈。色深綠。葉莖均有臭氣。秋日葉間抽花莖。高尺餘。開紫色花。作繖形花序。有六瓣。雄蕊比花稍長。其地下鱗莖叢生。其色白如指大者。卽薙白頭也。入藥用。又可供食用。

種植　園圃四野恒有栽蒔。八月下種。正月分之。植於肥壤者則易繁茂。

採取　夏五月間採之。採得鱗根。去淨泥。陰乾用。

用法　與他藥水煎。或生搗取汁。亦可浸酒與焙剉爲末。

性質　辛。苦。溫。滑。無毒。

效能　通陽泄濁。利竅滑腸。開胸痺。散結氣。用作鎭痛及健胃藥。

主治　金瘡瘡敗。輕身不飢。耐老。（本經）。蹔骨。除寒熱。去水氣。溫中散結氣。作羹食。利病人。諸瘡中風。寒水氣。腫痛搗塗之。（別錄）

張仲景之證明　薙白一味。經張仲景之實驗。認爲主治『心胸痛而喘息咳唾也。旁治背痛心中痞』。茲考徵如下。㈠栝蔞薙白白酒湯證曰。喘息咳唾。胸背痛。㈡枳實薙白桂枝湯證曰。胸痺。心中痞。（以上二方。薙白皆用半升。）㈢栝蔞薙白半夏湯證曰。心痛徹背。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（以上一方。薤白三兩。）歷觀上列三方。則薤白所主治也。不辨而自明矣。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論薤白曰。治女人帶下赤白。作羹食之。骨哽在咽不去者。食之即下。【唐】孫思邈千金翼論薤白曰。心病宜食之。利產婦。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論薤白曰。補虛解毒。【宋】日華諸家本草論薤白曰。麥食耐寒。調中補不足。止久痢冷瀉。肥健人。【元】李東垣用藥法象論薤白曰。治洩痢下重。能泄下焦陽明氣滯。【明】李時珍本草綱目論薤白曰。治少陰病厥逆洩痢。及胸痺刺痛。下氣散血安胎。【清】黃宮繡本草求眞論薤白曰。薤亦動滑藥耳。故書皆載調中助陽散血疏滯。定喘安胎利產。及治陽火傷損。緣薤味辛則散。散則能使在上寒滯立消。味苦則降。降則能使在下寒滯立下。氣溫則散。散則能使在中寒滯立除。體滑則通。通則能使久痼寒滯立解。是以下痢可除。瘀血可散。喘急可止。水腫可敷。胸痺刺痛可愈。胎產可治。湯火及中惡卒死可救。實通氣滑竅。助陽佳品也。功用有類於韭。但韭則入血行氣。及補腎陽。此則專通寒滯。及兼滑竅之爲異耳。取白用。【清】王士雄隨息居飲食譜論薤白曰。薤辛溫散結。定痛寬胸。止帶安胎。活血治痢。多食發熱。忌與韭同。

辨僞　㊀鄭肖巖曰。薤白氣味辛溫無毒。根如小蒜。色白者辛而不苦。近有以鬼蒜僞充。擘開無瓣。噉薤白爲處處皆有之藥。值亦甚賤。胡昧良者。偏以僞亂眞乎。㊁曹炳章曰。按薤白各處皆產。生土墳上。卽俗謂秉葱之根。葉如細韭菜。色綠空心。根如小蒜頭。若採時去鬚莖蒸熟晒乾。則實堅緊。不致脫皮。且晒之易燥。若生晒則質鬆。層層脫皮。且不易乾燥。故近今皆用蒸曬者多。惟僞者少見。

近人學說　㊀謝安之曰。薤白爲菜類尋常之食品。用之利竅宣陽。泄瀉活血。頗奏奇效。觸縣諸醫棄之不用。甚可惜也。考仲景方用能引涕唾。杜甫薤詩云。衰年關膈冷。味暖並無愛。可見辛溫而散胸膈中之結氣。又陶弘景謂仙方。王孟英謂辛溫散結。定痛寬胸。止帶。胎產。治血治痢等症。及服食家皆須之。張石頑謂諸瘡中風寒水腫。生搗敷之。能吐胃中痰食。蟲積屢驗。金匱救卒死。搗汁灌鼻中效。薤葉治肺氣喘急。喻嘉言棄天士輩。讚其宣陽疏滯。而不傷胃氣。亦爲中風門左宜右有之捷品。此外如王肯堂治產後胸中煩熱氣逆之薤白湯。沈金鰲治嘔吐老人冷痢之薤白粥。王孟英治霍亂之獨行方。張文仲治傷寒下利如爛肉汁。赤滑伏氣腹痛之豉薤湯。（卽仲景梔子豉湯加薤白一兩）儀禮士相見禮曰。摯薤之屬。食之止臥。韓雄詩薤葉照人呈夏蘥。魏文帝塘上行。念君常苦悲。夜夜不能寐。莫以魚肉賤。棄捐蔥與薤。說文。薤鴻薈也。因薤似韭。故功用相類。總之薤白辛通滑利。上能開胸痺。下能泄大腸氣滯。實肺與陽明藥也。然多食發熱。神昏目暗。能發宿疾。無滯者亦當禁用。俗謂補虛之說。尤是逢說。深望醫界同志。勿以尋常菜蔬之品。咸因價賤。不足以治大病。棄之不用。並望吾縣醫家及病家。萬勿誤認薤字爲韭字。以致

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

物品功用各殊。如起而研究。藥理昭然。病證亦恃效。則幸甚矣。㊁朱石華曰。神農嘗百草而辨性之寒溫。質之浮沉。示人以大關節目。至其藥力之大小。藥品之複雜。以及性之果屬燥熱寒涼。質之果屬升降浮沉。病至幾分。脈至幾動。而可用麻黃大黃於分量適中而能達其汗下之目的。不至蹈於過汗亡陽。過下亡陰之覆轍。總在吾人歷鍊揣摩。詳細研究。穎悟心得之所從出。渾而言之。無論何種藥品。而一藥必有一藥之升降宣散。窺之以理想。證之以實驗。庶乎可耳。固古人有大匠使人規矩。不能使人巧之斷語。歷鍊研究。誠爲萬世不易之定理也。僕於蘆白三致意焉。夫蘆白之功用。爲利竅宣陽之妙品。疏窒活鬱之良藥。而世人竟不及察。以爲蘆菜本食料之品。烏能治大病。藥店置之敝屣。醫生視爲無用。嗚呼。蘆白何其不幸之甚也。僕在醫界中每嘗詳細剖解。不敢研究一有用之品。拋爲己得而不公開者也。人聞之有掩耳而走者。有不以理而駁者。謂草芥之類。豈能療沉疴之病乎。豈不知仲景三用其方。曰栝蔞蘆白白酒湯。曰栝蔞蘆白半夏湯。曰枳實蘆白桂枝湯。而論胸痺之證。洞若觀火。詳解蘆白之性。大有發明。故僕恪守金匱。一隅三反。而於胸痺之外。與斯症同源而異流者。無論其爲寒爲火。無一病而不用之者。因寒而重用因火而少用。寒之爲患。每兼凝滯。故蘆白氣味辛溫。其性又能從下而上。主助生陽之氣上升者也。仲聖三用之。皆取自下而上從陰出陽之義也。因火者亦用之。不過爲寒劑之反佐。以作嚮導之義耳。百用而百效。誠爲利竅宣陽活血潤澤之須臾不可缺少之良品也。有清葉天士亦有發明。謂其氣溫稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味辛苦滑無毒。得地西南金火之味。而有潤澤之性。入手太陰肺經。味升多降也。至若常用以應敵禦侮者。如王肯堂借用以治產後胸中煩熱氣逆。以成蘆白湯。沈金鰲借用以治嘔。又借用以治老人冷痢。以成蘆白粥。王孟英專用以治霍亂。名之曰獨行方。種種功用。不待研究而後知。不第此也。明末大家喻嘉言。謂其宣陽疏滯而不傷胃氣。爲中風門中左宣右有之捷品也。

配合應用　㊀治胸痺刺痛。張仲景栝樓蘆白湯。治胸痺痛徹心背。喘息欬唾。短氣。喉中燥痒。寸脈沉遲。關脈弦數。不治殺人。用栝樓實一枚。蘆白半升。白酒七升。煮二升。分二服。千金治胸痺。半夏蘆白湯。用蘆白四兩。半夏一合。枳實半兩。生薑一兩。栝樓實半枚。咬咀。以白飲漿三升。煮一升。溫服。日三。治胸痛痺而復奮。蘆根五升。擣汁飲之。立瘥。飲音在醉漿也。（肘後方）㊁治卒中惡死。卒死。或先病或平居寢臥。奄忽而死。皆是中惡。以蘆汁灌入鼻中便省。（肘後方）㊂治霍亂乾嘔不止者。以蘆一虎口。水三升。煮取一半。頓服。不過三作即已。（韋宙獨行方）㊃治奔豚氣痛。蘆白擣汁飲之。（肘後方）㊄治赤痢不止。蘆同黃檗煮汁服之。（藏器方）㊅治赤白痢下。蘆白一握。同米煮粥日食之。（食醫心鏡方）㊆治小兒疳痢。蘆白生擣如泥。以粳米粉和蜜作餅炙熟與食。不過三兩服。（楊氏產乳方）㊇治產後諸痢。多煮蘆白食。仍以羊腎脂同炒食之。（范汪方）㊈治妊娠胎動。腹內冷痛。蘆白一升。當歸四兩。水五升。煮二升。分三服。（古今錄驗方）㊉治鬱肉脯毒。杵蘆汁服二三升良。（葛洪方）㊀治瘡犯惡露。甚者殺人。蘆白擣爛。以帛裹煨熱。去帛傅之。冷卽易。換亦可擣作餅。以艾灸之。熱氣入瘡。水出卽瘥也。（梅師方）㊁治手指赤色。隨月生死。以生蘆一把。苦酒煮熟。擣爛塗之。愈乃止。（肘後方）㊂治瘡疥痛癢。煮蘆葉擣爛塗之。（肘後方）㊃治炎瘡腫痛。蘆白一升。豬脂一斤。切。以苦酒浸一宿。微火煎三上三下。去滓塗之。（梅師方）㊄治手足癰瘡。生蘆一把。以熱醋投入。以封瘡上。取效。（千金方）㊅治毒蛇螫傷。蘆白擣傅。（徐

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

玉方）

㊱治虎犬咬傷。薙白擣汁飲之并塗之。日三服。瘥乃止。（葛洪方）

㊲治諸魚骨哽。薙白嚼柔。以繩繫中。吞到哽處。引之即出。（葛洪方）

㊳治誤吞釵鐶。取薙白曝萎。煮熟切食一大束。釵即隨出。（葛洪方）

㊴治目中風翳作痛。取薙白截斷。安膜上。令偏痛作。復爲之。（范汪方）

㊵治咽喉腫痛。薙根醋擣。傅腫處。冷即易之。（聖惠方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡氣虛無滯者禁用。

參攷資料　㈠薙性溫補。仙方及服食家皆須之。偏入諸膏用。不可生嚼。葷辛爲忌。（陶弘景）㈡薙白色者最好。雖有辛不葷。五臟。學道人長服之。可通神。安魂魄。益氣。續筋力。（孟詵）㈢白薙之白性冷而補。又曰莜子麥與蓐婦飲。易產。亦主脚氣。（蘇頌）㈣薙味辛氣溫。諸家言其溫補。而蘇頌圖經獨謂其冷補。按杜甫薙詩云。東比青芻色。圓齊玉筯頭。衰年關膈冷。味暖並無憂。亦言其溫補。與經文相合。則冷補之說。蓋不然也。又按王禎云。薙生則氣辛。熟則甘美。種之不蠹。食之有益。故學道人寶之。老人宜之。然道家以薙爲五辈之一。而諸氏言其不辈何耶。薛用弱齊諧志云。安陸郭坦。凡得天行病後。遂能大餐。每日食至一斛。五年家貧。行乞。一日大饑。至一園。食薙一畦。大蒜一畦。便閉棟臥地。吐一物如籠。漸漸縮小。有人撮飯於上。即消成水。而病尋瘳也。按此亦薙散結。蒜消癥之驗也。（李時珍）㈤發熱病者不宜多食。三四月勿食生者。（孟詵）㈥生食引涎唾。不可與牛肉同食。令人作癥瘕。（大明）㈦薙本文作薙。韭類也。故字從韭從叡音。譜聲也。今人因其根白呼爲葛子。江南人訛爲莜子。其葉類葱而根如蒜。收種宜火熏。故俗人稱爲火葱。羅願云。物莫美於芝。故薙爲菜芝。（李時珍）㈧薙是韭類。葉似韭而闊。多白而無實。有赤白二種。白者補而味美。赤者苦而無味。（蘇頌）㈨薙處處有之。春秋分蒔。至冬葉枯。爾雅云。勤山薙也。生山中。莖葉與家薙相類。而根差長。葉差大。僅若鹿葱。體性亦與家薙同。今人少用。（蘇頌）㈩薙葉如金燈葉。差狹而更光。故古人言薙露者。以其光滑難貯之義。（寇宗奭）(一)薙八月栽根。正月分蒔。宜肥壤。數枝一本。則茂而根大。葉壯似韭。韭葉中實而扁。有劍脊。薙葉中空。似細葱葉而有稜氣。亦如葱。二月開細花。紫白色。根如小蒜。一本數顆。相依而生。五月葉青則掘之。否則肉不滿也。其根煮食。老酒糟藏。醋浸皆宜。故內則云。切葱薙實。諸醢以柔之。白樂天詩云。酥煖薙白酒。謂以酥炒薙白。投酒中也。一種水晶葱。葱葉蒜根。與薙相似而不臭。亦其類也。按王禎農書云。野薙俗名天薙。生麥原中。葉似薙而小。味益辛。亦可供食。但不多。有即爾雅山薙是也。（李時珍）(二)薙白者補益。赤者療金瘡及風。生肌肉。與蜜同擣。塗湯火傷甚速。溫補助陽道。（李時珍）(三)薙葉光滑。露亦難貯。古方用治肺氣喘急。亦取其滑泄之義。（寇宗奭）

【薙白】　即薙之白色蘚莖也。供藥用。詳『薙』條。

【薙白粥】　**基本**　本品係以薙白和米煮成之粥。

主治　老人冷利。

【薙白頭】　即白薙之處方用名。詳『薙』條。

【薦】　即蒲席之古籍別名。典見綱目。詳『蒲席』條。

【薦蝮】　即壁蟢之俗名。詳『壁蟢』條。

【薦魚】　即鮑魚之古籍別名。典見禮記。詳『鮑魚』條。

【薩摩藷】　即番藷之日本名。詳『番藷』條。

【蓴】　即龍常草之古籍別名。典見爾雅。詳『龍常草』條。

【蓎草】　即甘草之古籍別名。典見別錄。詳『甘草』條。

【蘋休】　即蚤休之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『蚤休』條。

【藜烈】　即石芛之古籍別名。典見別錄。詳『石芛』條。

【蟬蟾】　古籍別名　顏當蠡。（拾遺）蛱蝶（爾雅）蛱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

母土蜘蛛。(綱目)

外國名詞　Ctenizia fodiens Trap-door spider(拉丁)トタテグモ(日本)

基本　係節肢動物蜘蛛類之螳螂蟲。


形態　螳螂爲卵生蟲類之一種。體呈長楕圓形。頭胸部比腹部稍大。上面圓色黑有光澤。胸中有溝。腹卵圓形。有白色横紋七條。尾端有大小紡績突起二對。體長不足五分。營巢土中。爲圓筒狀。上有楕圓形之蓋一方。連於筒壁內面。滿附蛛絲。甚光澤。蓋上附有苔蘚。與地面同平。時或仰開其蓋。伺他蟲誤入而攫食之。捕得可供藥用。

性質　有毒。

主治　一切疔腫。附骨疽蝕等。瘡宿肉贅瘤。燒爲末。和臘月豬脂傅之。亦可同諸藥傅疔腫出根爲上。

【螳螂】　**命名**　本品兩臂如斧。當轍不避。故有當郎之名也。

古籍別名　蟷蜋。刀蜋。(綱目)　拒斧。(說文)不過。(爾雅)蝕肱。(別錄)野狐鼻涕。(西陽雜俎)髮羊七。(揚雄方言)當郎。敷常。刀娘。(綱目)天馬。天蠭。(和漢藥考)石蜋。(俗名)



螳螂(一)

外國名詞　Tenodera aridifolia, Stoll

基本　屬直翅類之螳螂。

産地　凡原野樹木上恒多産焉。



螳螂(二)

形態　螳螂體細長。前胸頗長。腹部肥滿。背有翅。前翅作角質。全體淡綠色。時或作褐色。頭小。作三角形。觸角爲鞭狀。由多數之節而成。有六脚。前脚長。末端彎曲作鐮狀。有鋸齒。爲捕捉他蟲之具。中脚短。後脚長。適於跳躍。夏秋間潛伏樹葉下。捕食農家害蟲。

採取　三四月採之。

製法　採得焙乾用。但恒以刺末用。

效能　定驚風。療創傷。用作創傷刺傷藥。

主治　小兒急驚風。搐搦。又出箭鏃。生者能食挑目。

配合應用　㊀驚風定搐。中分散。用螳蜋一箇。蜥蜴一條。赤足蜈蚣一條。各中分之。隨左右研末記定。男用左。女用右。每以一字吹鼻內搐之。吹左卽左定。吹右卽右定也。(普濟方)　㊁箭鏃入肉。不可拔者。用螳螂一箇。巴豆半箇。同搗研。傷處瘢痒。且忍極痒。乃撼拔之。以黃連黃柔湯洗拭。石灰傅之。

用量　一個至三個。

施用宜忌　同桑螵蛸。

參攷資料　㊀螳蜋俗名石蜋。蓬樹便產。惟以桑上者爲好。是兼得桑皮之津氣也。以連枝斷取者爲眞。僞者亦以膠着桑枝之上也。(陶弘景)　㊁螳螂古方不見用者。惟普濟方治驚風。吹鼻定搐法中用之。蓋亦鎭定搐之義。古方風藥。多用螵蛸。則螳螂治風。同一理也。又醫林集要方出箭鏃。亦用之。(李時珍)　㊂螳蜋臙首奮臂。修頸大腹。二手四足。善絲而捷。以鬚代鼻。喜食人髮。能翳葉捕蟬。或云衝家取翳作法。可以引形。深秋乳子作房。黏着枝上。卽螵蛸也。房長寸許。大如拇指。其內重重有隔房。每房有子如蚍。卽至芒種節後一齊出。故月令有云。仲夏螳蜋生是也。(李時珍)

【螵蛸】　卽桑螵蛸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑螵蛸』條。

【螵子黃】　卽青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青黛』條。

【螵巴】　卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【螵兒青】　卽青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青黛』條。

【螵青】　卽青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青黛』條。

【螺螄】　**原名**　蝸贏。

命名　師衆多也。形似

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蝸牛。其類衆多。故名。

產地　生湖澤淡水中。

形態　螺螄爲介類螺屬之一種。大如指頭。長寸許。殼色黑而厚。於田螺肉可供食與藥用。其殼、泥詳見各該條。

性質　甘。寒。無毒。

主治　明目下水。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論螺螄肉曰止渴。【明】李時珍本草綱目論螺螄曰。醒酒。解熱。利大小便。消黃疸水腫。治反胃痢疾。脫肛。痔漏。

參攷資料　螺螄於清明後殼中有蟲。不堪食用。（李時珍）

【螺螄泥】**採取**　用螺螄一斗。水浸之。澄泥。晒乾用。

性質　涼。

主治　反胃吐食。酒服之。

【螺螄殼】（綱目）**古籍別名**　鬼眼睛。

採取　以泥中及牆壁上年久者良。

製法　凡使火煆過用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　痰飲積。及胃脘痛。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論螺螄殼曰。反胃膈氣。痰嗽。鼻淵。脫肛。痔疾。瘡癬。下疳。湯火傷。

參攷資料　螺乃蚌蛤之類。其殼大抵與蚌粉、蛤粉、蚶蜆之類同功。合而觀之。自可神悟。（李時珍）

【螺靡草】**命名**　本品葉蔓狀如螺靡。故名。

古籍別名　鏡面草。（綱目）

外國名詞　Drymoglossum subcordatum, Fee.（拉丁）ヤメヅタ（日本）

基本　係羊齒門羊齒類水龍骨科。螺靡草屬之螺靡草。

產地　蔓生石間。

形態　螺靡草爲石草類之一種。根莖爲絲狀而徧匐。有長達數尺者。莖面有鱗片狀之暗褐色毛。葉有裸葉實葉。裸葉通常爲卵圓形或圓形。實葉狹長。採得可供藥用。

性質　辛。

主治　癰腫風疹。脚氣腫搗爛傅之。亦煑湯洗腫處。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論螺靡草曰。治小便出血。吐血。衄血。齲齒痛。

參攷資料　按陳日華經驗方云。年二十六。忽病小便後出鮮血數點。而不疼。如是一月。飲酒則甚。市醫張康。以草藥汁一器。入少蜜水。進兩服而愈。求其方。乃鏡面草也。（李時珍）

【螻蛄】**命名**　螻者。臭也。本品氣臭。故得螻名。

古籍別名　蟪蛄。天螻。螻。（本經）螻蟈。（月令）仙姑。石鼠。（古今注）梧鼠。（荀子）砧鼠。土狗。（和漢藥考）土狗。（普濟方）

外國名詞　Mole cricet.（英）

基本　屬直翅類中蟋蟀科之螻蛄。

產地　凡平澤卑溼之地均產。

形態　螻蛄爲有害植物之昆蟲。作巢於枯死植物之根間。全身黑褐色。長一寸許。形似蝗。首圓而長。其翅雄長雌短。不能高飛。雄者喜撲燈火。雌者則否。春秋善鳴。入冬棲息土中。掘土而行。頗爲捷速。此蟲於七月上旬產卵土中。多至二三百顆。同月中旬孵化。至翌年四五月間。已全長成。

採取　夏至捕取。夜出者曝乾。

製法　大明曰。去翅足。炒用。水煎。或對末。

性質　鹹。寒。無毒。

效能　逐水。邪通二便。用作利尿藥。

主治　產難。出肉中刺。潰癰腫。下哽噎。解毒。除惡瘡。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論螻蛄曰。治水腫。頭面腫。【元】朱丹溪本草衍義補遺論螻蛄曰。治口瘡甚效。【明】李時珍本草綱目論螻蛄曰。利大小便。通石淋。治瘰癧骨哽。【清】黃宮繡本草求眞論螻蛄曰。螻蛄氣味寒鹹。性甚奇特。書言將此分爲上下左右四截。若以上截治腫。則腫即見上消。下截治腫。則腫即見下消。左截治腫。則腫即見左消。右截治腫。則腫即見右消。又截自腰以上以治。則能拔水上行。而使二便皆濟。自腰以下以治。則能使便立下。婦人難產。亦可照此以治。而產即解。癰腫瘰癧肉刺。若生搗汁以塗。則刺與腫皆治。骨鯁入喉不下。末吹即

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

能見愈。外此箭鏃入肉。用此塗貼患處。則箭即克見拔。究其治效。總因性善攻穴。其性急迫。故能如此取效也。味鹹氣寒。俗名土狗。凡用此藥。宜審其體實。方可刮取。若使體虛氣薄。但見書載治功。任意妄施。其不傷人性命者鮮矣。此與草麻子等藥同爲一類。用時須當細審。取雄。去翅足炒用。

配合應用 ㊀治十種水病。腹滿喘促不得臥。以螻蛄五枚。焙乾爲末。食前白湯服一錢。小便利爲效。楊氏加甘遂末一錢。商陸汁一匙。取下水爲效。忌鹽一百日。小便祕者。用螻蛄下截。焙研。水服半錢。立通。（聖惠方）又用螻蛄一箇。葡萄心七箇。同研。露一夜。日乾研末。酒服。（保命集方）又用端午日取螻蛄陰乾。分頭尾焙收。治上身用頭。末七箇。治中用腹。末七箇。治下用尾。末七箇。食前酒服。（乾坤祕韞方）

㊁治大腹水病。用螻蛄炙熱。日食十箇。（肘後方）又半邊散。治水病。用大戟、芫花、甘遂、大黃各三錢爲末。以土狗七枚。五月能飛者。搗蔥鋪新瓦上焙之。待乾去翅足。每箇剪作兩半邊。分左右記收。欲退左即以左邊七片。焙研。入前末二錢。以淡竹葉、天門冬煎湯。五更調服。候左退。三日後服右邊。如前法。（普濟方）

㊂治嗑鼻消水。面浮甚者。用土狗一箇。輕粉二分半爲末。每嗑少許。入鼻內。黃水出盡爲妙。（楊氏家藏方）

㊃治小便不通。用大螻蛄二枚。取小體。以水一升漬飲。須臾即通。（葛洪方）又用土狗下截。焙研。調服半錢。生研亦可。（壽域方）又加車前草同搗汁服。（談埜翁方）又用土狗後截和麝搗納臍中。綿定。即通。（唐氏經驗方）又用土狗一箇。炙研。入冰片、麝香少許。翎管吹入莖內。（醫方摘要方）

㊄治大小便閉。經月欲死。用土狗、推車客各七枚。並男用頭。女用身。瓦焙焦爲末。以向南樗皮煎汁飲一服。神效。（普濟方）

㊅治胞衣不下。困極腹脹則殺人。螻蛄一枚。水煮二十沸。灌入下喉。即出也。（延年方）

㊆治臍風出汗。螻蛄、甘草等分。並炙爲末。傅之。（聖濟總錄方）

㊇治齒牙疼痛。土狗一箇。舊糟裹定。瀝紙包煨。焦去糟。研末。傅之。立止。（本事方）

㊈治緊唇裂痛。螻蛄燒灰。傅之。（千金方）

㊉治耳治聾。螻蛄五錢。穿山甲炮五錢。麝香少許。爲末。蔥汁和丸。塞之。外用嗑鼻藥即通。（普濟方）

㊊治頸項瘰癧。用帶殼螻蛄七枚。生取肉。入丁香七粒。於殼內燒過。與肉同研。用紙花貼之。（救急方）

㊋治箭鏃入肉。以螻蛄杵汁滴上三五度。自出。亦能治鍼刺在咽。（千金方）

㊌治誤吞鉤線。螻蛄去身。吞其頭數枚。勿令本人知。（聖惠方）

用量 七隻或三對。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用。

參攷資料 ㊀自腰以前甚澀。能止大小便。自腰以後甚利。能下大小便。（陶弘景）㊁今方家治石淋。導水用螻蛄七枚。鹽二兩。新瓦上鋪蓋。焙乾研末。每溫酒服一錢。七即愈也。（蘇頌）㊂今處處有之。穴地糞壤中而生。夜則出外求食。荀子所謂梧鼠五技而窮。蔡邕所謂碩鼠五能不成一技者。皆指此也。魏詩碩鼠乃大鼠。與此同名而技不窮。固不同耳。五技者能飛不能過屋。能緣不能窮木。能游不能度谷。能穴不能掩身。能走不能免人。（蘇頌）㊃此蟲立夏後至夜則鳴。聲如蚯蚓。月令螻蟈鳴者是矣。（寇宗奭）㊄螻蛄治水甚效。但其性急。虛人戒之。（朱丹溪）㊅螻蛄穴土而居。有短翅四足。雄者善鳴而飛。雌者腹大羽小。不善飛翔。吸風食土。喜就燈光。入藥用雄。或云用火燒地赤。置螻於上。任其跳死。覆者雄。仰者雌也。類從云。磨鐵致蛄。汗鼈引兔。物相感也。（李時珍）

【螻蟈】 即螻蛄之古籍別名。典見月令。詳『螻蛄』條

【螽斯】 係蟲螽之同類。爲草螽之大者。體長色綠或褐。觸角爲鞭狀。複眼在觸角之基部。無單眼。大顎強壯。翅半透明。前翅右下左上互相重疊。接合處成堅硬之發聲器。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

故能作聲。雌者長一寸許。色濃綠。微雜褐色。翅短於雄。尾端有產卵器突出。性質效能見『蟲鑫』條。



螽斯

脚、夥鋪、油坊、並陰溼之地恒有生焉。

形態　蠽蟲體長寸許。前狹後闊。色黑而亮。大小不等。頭小六足。背有橫紋錯起。伏土而善攻陰穴。傷之不易死。

採取　十月間採之。

製法　採得用沸水泡洗。曝乾用。

性質　鹹。寒。有毒。

效能　破血瘀。消堅癖。專作通經藥。

主治　心腹寒熱洗洗。血積癥瘕。破堅下血閉。生子大良。

張仲景之證明　蠽蟲一味。經張仲景之實驗。認爲『主治乾血。故兼治少腹滿痛。及婦人經水不利』。茲考徵如下。瘀血湯證曰。產婦腹痛。土瓜根散證曰。帶下。經水不利。少腹滿痛。又曰。經一月再見者。右二方。皆以蠽蟲爲主藥。似爲婦人血毒設之。雖然。或云治癲。或云內有乾血。肌膚甲錯。何必婦人血毒之治乎。由此觀之。則蠽蟲及此三方。不啻治婦人血毒矣。雖男子亦可用之。但臍下有血毒者。婦人最多。故仲景嘗立此方法。以治婦人。是其遺法耳。凡一身之內。有血毒所著者。必見肌膚甲錯證。若著臍下。則有兩目黯黑。羸瘦。腹滿。不能飲食證。後世不知此證。名曰五勞。爲爾申約。其審聽之曰。七傷。曰虛勞。曰勞瘵。皆屬空談理義。我們所不取也。是以如下瘀血湯。亦治男子少腹滿痛。小便不利。及淋瀝或血自下者。此人當必有肌膚甲錯等證。又按此方服法曰。頓服之。新血下如豚肝。然亦謂腹中有乾血著臍下。則似言相矛盾。此方本爲乾血而設之。今服此方而其血下。謂之新血可乎。凡用蠽蟲三方。皆爲治乾血之方。蓋乾血乃久瘀血也。若治新血不下證。則別有桃仁承氣湯。大黃牡丹皮湯。大黃甘遂湯。若治蓄血。則有抵當湯。及丸。故治乾血。則有此方。及土瓜根散。大蠽蟲丸。是皆以蠽蟲爲主藥。此爲蠽蟲能破久瘀血之用也。由是觀之。則新血下如豚肝者。是蓋蓄結之血。新下如豚肝色之謂乎。土瓜根散證曰。經水不利。少腹痛。經一月再見者。下瘀血湯證曰。乾血著臍下。經水不利者。然則經水不利者。是乾血所爲明矣。又曰。主陰癲腫。按丈夫陰器連少腹。急痛謂之癲也。此證亦瘀血所爲也。此雖其證不具。然據少腹急痛證。則自有此方證具矣。大蠽蟲丸證曰。羸瘦。腹滿不能飲食。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。此證者。乃後世所謂勞瘵。五勞七傷。是也。皆是世醫常談。其說屬臆度也。但羸瘦腹滿。至兩目黯黑。其證不可廢也。其證不可廢。則此方亦不可廢也。是必仲景遺方。而有所可徵者。至五勞虛極。及七傷及緩中虛補敷證。則後人妄添。不俟余言矣。李時珍本草蠽蟲附方有之。大黃蠽蟲丸。治產婦腹痛。有乾血者。用蠽蟲二十枚去足。桃仁二十枚。大黃二兩爲末。煉蜜杵和。分爲四丸。每以一丸。酒一升。煮取二合。溫服。當下血也。張仲景方云云。按是下瘀血湯之方。而非大黃蠽蟲丸之方也。李時珍何以稱此方而謂大黃蠽蟲丸乎。其文亦大同小異。蓋時珍所見金匱要略有別所傳之本乎。又本草傳寫之謬誤乎。若夫本草

產地　凡米糠及碓臼倉下、竈

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之謬。則大黃蠱蟲丸下。必脫金匱要略五勞以下法語。而本草治產婦腹痛條上。脫下瘀血湯四字矣。大觀本草所引蘇頌圖經蟅蟧條曰。張仲景治雜病方。大蠱蟲丸中用蟅蟧。以其主脇下堅滿也。由此觀之。則十二味方者。名大蠱蟲丸。而大字之下無黃字。此非大黃蠱蟲丸也。又蠱蟲條曰。張仲景治雜病方。主久寢積結。有大黃蠱蟲丸。乃今下瘀血湯也。然則本是二方。而金匱要略十二味方者。蓋古名大蠱蟲丸。猶大柴胡湯。大承氣湯。大青龍湯。大半夏湯。大建中湯。大陷胸湯之大也。當須別有小蠱蟲丸之方矣。疑今下瘀血湯。蓋名大黃蠱蟲丸。故以大黃蠱蟲爲主藥也。且今名下瘀血湯者。疑非方之名。而當須以下此瘀血之湯主之之意矣乎。後之錄方者。誤脫大黃蠱蟲丸五字。而稱之曰下瘀血湯乎。又後之輯金匱要略者。遂謂之下瘀血湯。而名此方者矣。猶抵當烏頭桂枝湯。救逆湯。新加湯類乎。況此方是丸方。猶抵當丸。以水煮之。然則此方亦不可名湯也。由此觀之。下瘀血湯。宜稱大黃蠱蟲丸。而十二味大黃蠱蟲丸。宜稱大蠱蟲丸矣。東洞翁嘗謂大黃蠱蟲丸。（乃十二味之方）說非疾醫之言。蓋指五勞虛極。及七傷緩中補虛之語乎。夫羸瘦腹滿。不能飲食。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑數語。可謂此方之證具矣。若按其腹狀。而內外諸證。診察相應。則此方當須奏其功耳。明者其謂之何矣。

歷代記述弦證　【唐】甄權藥性本草論蠱蟲曰。月水不通。破留血積聚。【宋】寇宗奭本草衍義論蠱蟲曰。通乳脈用一枚。搥水半合濾服。勿令知之。【明】李時珍本草綱目論蠱蟲曰。行產後血積。折傷瘀血。治重舌木舌口瘡。小兒腹痛夜啼。【明】繆希雍本草經疏論蠱蟲曰。蠱蟲生於下溼土壤之中。故其味鹹氣寒。得幽暗之氣。故其性有小毒。以刀斷之。中有白汁如漿。湊接即連。復能行走。故今人以之治跌撲損傷。續筋骨有奇效。乃足厥陰經藥也。夫血者身中之眞陰也。灌溉百骸。周流經絡者也。血若凝滯。則經絡不通。陰陽之用互乖。而寒熱洗洗生焉。鹹寒能入血輒堅。故主心腹血積。癥瘕血閉諸證。血和而營衞通暢。寒熱自除。經脈調勻。月事時至而令婦人生子也。又治癰母爲必用之藥。【清】黃宮繡本草求眞論蠱蟲曰。蠱蟲即屬地鼈。又名土鼈者是也。味鹹性寒。其物生於土中。伏而不出。善攻隙穴。以刀斷之。中有汁如漿。關接即連。復能行走。故書載跌撲損傷。續筋接骨。義由此耳。眞奇物也。且人陰血貫於周身。雖賴陽和。亦忌燥烈。若熱氣內鬱。則陰陽阻隔。而經絡不通。因而寒熱頓生。得此鹹寒。入血輒堅。則凡血聚積塊癥癰。不因是而除。而血脈調和。營衞暢達。月事時至。又安有血枯血閉。而不見其生育者乎。故又能治諸般血症。而使挾孕而有子也。是以古人用此。以治跌撲損傷。則多令自然銅。龍骨。血竭。乳香。沒藥。五錢錢。黃荊子。麻皮灰。狗頭骨。以治下腹痛血痛血閉。則合桃仁。大黃以治。各隨病症所因而用之耳。陰乾臨時研入。

辨僞　㊀鄭肖巖曰。蠱蟲本經名地鼈。別錄名土鼈。形扁如鼈。有甲不能飛。小有臭氣。此物好生鼠窠。及屋壁地棚之下。氣味鹹寒有毒。專破癥瘕。考仲景金匱鼈甲煎丸用之。殆病癥日久。結爲癥瘕。大黃蠱蟲丸用之。治虛勞腹滿。內有乾血。下瘀血湯用之。治產後腹痛。內有瘀血。土瓜根散用之。治經水不利。少腹滿痛。以其消癥而破瘀也。去冬因用蔗蟲以催痘漿。調查各藥舖方知所製鼈甲煎丸。大黃蠱蟲丸。皆用蔗蟲。以訛傳訛。皆由吾國藥劑師互相傳授。未覩方書。不明本草。以致貽誤匪少。堪發一嘆。不觀夫古人制字。蠱字其下從蟲。蔗字其上從草。（或作蔗。旁從木）足證蔗蟲由草木而化生。非如蠱蟲之從溼土而出也。又按蔗蟲氣味甘微寒。爲發痘行漿。托癰清毒之妙品。且能化痰醒酒。和中利小便。產廣東潮州及福建漳泉蔗田中。形如蠶蛹。食蔗根而化生。土名蔗蛄。其味甘美。土人有用之以佐酒席。考本草拾遺及南京醫學報。均有發明。可見蔗蟲與蠱蟲。性味不同。形質亦異。古人定方用

851／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藥。各有主義。胡得妄行配製。以失效用。伏望熱心同道與藥商知好者。將此通告。苦勸改良。幸勿再蹈故轍。是所企禱。㈡曹炳章曰。按王士雄云。潮州蔗田接壤。食蔗之蟲。形如蠶蛹而小。味極甘美。性涼。解熱毒。助痘漿。可與蘭蟲並傳。施可齋閩雜記云。漳泉各處。二三月間。市上賣生熟甘蔗蟲。甘蔗老根中生也。生者如蠶而細。灰白色。光潤無茸毛。熟者以油灼過。拳曲如蜂。淡黃色。味極鮮。佐酒尤佳。考甘蔗性寒。故王維謝賜櫻桃詩。飽食不須愁內熱。大官還有蔗漿寒。此蟲既生蔗中。宜亦性寒矣。而吾鄉醫者。治小兒痘漿不起。多用之。或有云性熱。本草不載。不能辨也。又據兩般秋雨庵隨筆載姚承憲咏甘蔗蟲詩。蘊隆連日賦蟲蟲。渴念寒漿解熱中。佳境不須愁有蟲。底生原可慶斯螽。似誰折節吟腰細。笑彼含花蜜口空。畢竟冰心難共語。一樽愁絕對蠻風。玩詩次句。似亦謂其性寒。惟云蘊隆連日則是夏月方有。詩在粵中所作。豈粵中夏月始賈而漳泉獨早在二三月耶。而鄭君出產時期。亦未辨明。惟氣味甘微寒。療痘行漿等效用。確與王施二君發明吻合。鄭君所言。可見皆從實驗。吾於斯益信。惟蠐螬確是地鼈蟲。即仲景大黃蠐螬丸等用之。以化癥瘕去瘀血。端不能以甘蔗蟲代之。吾謂以後業藥者。暇時亦宜閱覽本草。參對方書。庶不致再誤人命矣。

配合應用 ㈠大黃蠐螬丸。治產婦腹痛有乾血。用蠐螬二十枚。去足。桃仁二十枚。大黃二兩。爲末。煉蜜杵和。分爲四丸。每以一丸酒一升煮取二合。溫服。即當下血也。（張仲景方）㈡治木舌腫強。塞口。不治殺人。蠐螬炙五枚。食鹽半兩。爲末。水二盞。煎十沸。時時熱含。吐涎。瘥乃止。（聖惠方）㈢治腫舌塞痛。地鼈蟲和生薄荷研汁。帛包捻舌下腫處。一名地蜂蟲也。（鮑氏方）㈣治腹痛夜啼。蠐螬炙、芍藥、蒺藜各二錢爲末。每用一字。乳汁調下。（聖惠方）

㈤折傷接骨。用土鼈焙存性爲末。每服二三錢。接骨神效。一方生者搗汁酒服。（楊拱摘要方）用蚵蛝即土鼈。六錢。隔紙砂鍋內焙乾。自然銅二兩。用火煅醋淬七次爲末。每服二錢。溫酒調下。病在上食後。病在下食前神效。（袖珍方）用土鼈陰乾一箇。臨時旋研入藥。乳香、沒藥、龍骨、自然銅、火煉醋淬各等分。麝香少許爲末。每服三分。入土鼈末。以酒調下。須先整定骨乃服藥。否則接挫也。此乃家傳祕方。愼之。又可代杖。（董炳集驗方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡有瘀滯積結者禁用。畏皂莢。菖蒲。屋遊。

參攷資料 ㈠生河東川澤及沙中。人家牆壁下土中。濕處。十月採。曝乾。（別錄）㈡形扁如鼈。有甲不能飛。小有臭氣。（陶弘景）㈢此物好生鼠壞土中及屋壁下。狀似鼠婦而大。者寸餘。形小似鼈。無甲而有鱗。小兒多捕捉以貢物爲戲。（蘇恭）

【蟋蟀】

處方用名 將軍乾。

古籍別名 促織。（綱目拾遺）鬬雞。（俗名）蜻蜊。（韻會）吟蛩。（埤雅）

外國名詞 Gryllodes bertrhellus, Sauss（拉丁）Cricket.（英）

產地 多生原野陰溼諸地。

形態 蟋蟀爲化生蟲類之一種。全體黑色。長約六七分。雄者能鳴善鬬。前翅翼左右上相重疊。連接處有剛強之聲器。末端有尾毛二。較長。雌者尾毛間又有產卵管一。能穿地穴居。捕得可供藥用。



蟋蟀

採取 以成對者入藥。

性質 辛。鹹。溫。無毒。

主治 通小便。發痘瘡。解蟲毒。

配合應用 ㈠治小兒遺尿。取全蟋蟀一個。焙末。滾水下。照歲服。如兒十一歲者。每次服一個。服至十一個爲止。慈航活人書方）㈡治男婦小水不通。脹不止。蟋蟀一個。陰陽瓦焙乾爲末。白滾湯下。小兒半個即通。（集驗方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊂鬪蟲之戲。蟋蟀最盛。其百戰百勝者。俗呼爲將軍。其蟲至冬必死。勿輕棄去。留以救產厄神驗。凡產不下。用乾者一枚。煎湯服卽生。并無橫倒之患。（趙際昌）

㊃促織可治水蠱。昔有人患水蠱。百治不效。一日偶飲開水。水中先有促織一對在內。其人倉卒一併吞之。越數日。其病漸消。方知促織可治此症。後傳此方數人。無不驗者。一對不足。連服二三對自效。（朱煥齋任城日鈔方）

【蟑螂】卽蜚蠊之古籍別名。典見綱目拾遺詳『蜚蠊』條。

【蟑螂花根】卽老鴉蒜之古籍別名。典見王都官方。詳『老鴉蒜』條。

【螭蟟】卽桑螵蛸之古籍別名。典見別錄。詳『桑螵蛸』條。

【衡薇草】卽杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜衡』條。

【謝婆菜】卽水苦蕒之古籍別名。典見圖經本草。詳『水苦蕒』條。

【豁鷄】卽鸂鶒之古籍別名。典見說文。詳『鸂鶒』條。

【豁雞】命名　本品鳴聲豁豁。故名。　產地　出粵中。

形態　豁雞爲雞類之一種。雞頭鳥喙。色黃。腹毛純黑。尾長下垂。性嗜蛇。其哺子時。取雞折其兩足。乃以蛇飼之。三日卽復。屢折屢復。故可供藥用。

主治　骨節折傷。捕食之。

【豐豆】卽穭豆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『穭豆』條。㊁卽鹿藿之俗名。詳『鹿藿』條。

【獐豝】卽豪豬之古籍別名。典見綱目。詳『豪豬』條。

【貔貅】卽黃鼠之古籍別名。典見綱目。詳『黃鼠』條。

【賽牡丹】卽蠟春花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蠟春花』條。

【賽空靑】卽空靑之處方用名。詳『空靑』條。

【賽桂香】卽砂仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『砂仁』條。

【轂轆鷹】卽鴟鴞之古籍別名。典見綱目。詳『鴟鴞』條。

【轄脂】卽車脂之古籍別名。典見綱目。詳『車脂』條。

【避役】卽蜥虎之古籍別名。典見綱目。詳『蜥虎』條。

【避鷙鳳石】卽辟鷙石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『辟鷙石』條。

【還丹金】卽金之生於丹穴中。體質丹硃。色尤赤。可合丹服者。性質功用。詳『金』條。

【還元大品】卽大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大生地』條。

【還元水】卽金汁之古籍別名。典見救園記。詳『金汁』條。

【還元湯】卽童便之古籍別名。典見綱目。詳『童便』條。

【還筒子】卽天麻子之原名。詳『天麻子』條。

【還精草】卽望江靑之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『望江靑』條。

還魂丹



還魂丹

【還魂丹】產地　以四川山中爲多出。

形態　還魂丹根如大蒜。黑褐色。葉似荸薺而更細密。可供藥用。

主治　跌打損傷。

【還魂酒】卽童便之古籍別名。典見和漢藥考。詳『童便』條。

【還瞳子】卽靑葙子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『靑葙子』條。

【醜草】卽酸草之原名。詳『酸草』條。

【鍋底墨】卽釜臍墨之古籍別名。典見綱目。詳『釜臍墨』條。

【鍋炙】卽豆腐粑之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『豆腐粑』條。

【鍋焦】原名　飯鍋焦。基本　本品卽煮飯時。附着於鍋底之焦飯。

古籍別名　黃金粉。（綱目拾遺）

採取　以僧寺中米多焦厚者。入藥用良。

性質　苦。甘。平。無毒。

主治　補氣運脾。消食積。止泄瀉。八珍粉中用之。

配合應用　㊀鍋焦丸。小兒常用。健脾消食。用鍋焦炒黃三斤。神麴炒四兩。砂仁炒二兩。山查四兩。蒸蓮肉去心四兩。雞肫皮一兩炒。共爲細末。加白糖米粉和勻。焙作餅用。（家寶方）

㊁治老幼脾瀉久不愈。鍋焦爲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

末四兩。蓮肉去心淨末四兩。白糖四兩。共和勻。每服三五貼。日三次。食遠下。（梁侯瀛集驗方）

㈢治白濁不止。乾飯鍋粑二兩。松花二兩。炒臘肉骨頭五錢。烘脆。共爲末。砂糖調。不拘時服。（種福堂方）

㈣治脾胃不健。鍋焦二斤。蓮肉一斤。白糖半斤。蜜一斤。丸如桐子大。每服數十丸。空心白湯下。（祝氏效方）

㈤玉露霜。治老人脾泄最效。白朮炒二兩。陳皮一兩五錢。蓮肉去心四兩。薏苡仁四兩炒。糯米一升炒。棗肉一升炒熟。陳米鍋粑一升炒。糖霜量加。共爲末。每用二三錢。滾水調勻服之。（行箧檢祕方）

㈥治預稀痘疹。銀花陰乾。鍋粑每一升入銀花一兩。共研末。用洋糖或做糕餅。或開水調和。每日令小兒食之。（不藥良方）

【鍛石】即石灰之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『石灰』條。

【鍛樹】產地　出吉林等處。

形態　鍛樹爲喬木類之一種。其樹似杜仲。葉如烏桕。葉而大。如團扇。邊有鋸齒。嫩時可裹餅餌蒸食。霜後鮮赤。若丹楓。照耀巖谷。其皮紅色。柔韌如麻。作繩可燃。作魚網入水不濡。可供藥用。

主治　小兒胎疝。及一切折傷。肉破骨斷。搗碎酒煎服。渣傅患處。

參攷資料　有人取鍛樹皮包切肉數臠。抵家啓視。則合成一片。始見其皮能合肉接骨。爲治折傷要藥。（綱目拾遺）

【鍛樹葉】主治　小兒胎疝。皮膜開裂。腸入腎囊。疼痛難忍者貼之。

參攷資料　幼兒患疝。由於胎中得者。亦能戕命。此葉久貼皮膜裂處。自然復合。永無患矣。但非幼童之年。則不可治。方用鍛樹皮或搗爛。或削片。以油潤溼。黏布上貼患處。外以布牢繫腰間。或半年三個月方愈。（趙學敏）

【鍼石】即砭石之古籍別名。典見綱目。詳『砭石』條。

【鍼砂】命名　本品乃鍼家磨鏃之細末。如砂。故名。

基本性質　酸。辛。無毒。

效能　消水腫。治黃疸。用作利尿消腫藥。

主治　功同鐵粉。和沒食子染鬚至黑。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鍼砂曰。消積聚。腫滿黃疸。平肝氣。散癮。（李時珍）

配合應用　㈠治風溼脚痛。鍼砂。川烏頭爲末。和勻。炒熱。綿包熨之。（摘玄方）

㈡治風痺腰手。鍼砂四兩。硇砂三錢。黑脚白蠻六錢。研末。以熱醋或米拌。溼油紙裹。置袋內。任意執之。冷再拌。（聖濟總錄方）

㈢治脾勞黃瘦。鍼砂四兩。醋炒七次。乾。漆燒存性三錢。香附三錢。平胃散五錢。爲末。蒸餅丸梧子大。任湯使下。（摘玄方）

㈣治溼熱黃瘡。助脾去溼。鍼砂丸。用鍼砂不拘多少。擂盡。鏽淘洗白色。以米醋於鐵銚內浸過一指。炒乾。再炒三五次。候通紅取出。用陳糠米半升。水浸一夜。搗粉作塊。煮半熟。杵爛。入鍼砂二兩。半百草霜炒一兩半。搗千下。梧子大。每服五十丸。用五加皮、牛膝根、木瓜浸酒下。初服若泄瀉。其病源即去也。（乾坤生意方）

㈤治水腫尿少。用鍼砂醋煮炒乾。豬苓、生地龍各三錢。爲末。蔥涎研和。傅臍中。約一寸厚。縛之。待小便多爲度。日二易之。入甘遂更妙。（鑑生堂方）

㈥治泄瀉無度。諸藥不效。方同上之水腫尿少方。惟不用甘遂耳。（醫學正傳方）

㈦治虛寒下痢腸滑不禁。鍼砂七錢半。官桂一錢。枯礬一錢。爲末。以涼水調攤臍上。下縛之。當覺大熱。以水潤之。可用三四次。名玉脆肚。（仁存方）

㈧治項下氣瘰。鍼砂入水缸中浸之。飲食皆用此水。十日一換。砂半年自消散。（楊仁齋直指方）

㈨染白鬚髮。鍼砂醋炒七次。一兩。訶子。白芨各四錢。百藥煎六錢。綠礬二錢。爲末。用熱醋調刷鬚髮。菜葉包住。次早酸漿洗去。此不壞鬚。亦不作紅。又方。鍼砂、蕎麥各一兩。百藥煎爲末。茶調夜塗。且洗。再以訶子五錢。沒石子醋炒一箇。百藥煎少許。水和塗一夜。溫漿洗去。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黑而且光。

用量　三錢至四錢。

參攷資料　㈠是作鍼家磨濾之細末也。須眞鋼砂乃堪用。人多以柔鐵砂雜和之。飛爲粉。大莫能辨也。亦堪染皂。(陳藏器)㈡鍼砂酸辛。是作鍼家磨鑢細末也。鍼砂寒降。善治澁熱。爲消脾胃堅積黃腫之專藥。丹溪溫中丸用之。(盧飛鵬)

【闊絲】　卽菜蓡之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『菜蓡』條。

【闍莫伽】　卽川芎之古籍別名。典見金光明經。詳『川芎』條。

【隰上座】　卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『郁李仁』條。

【隰忍葉】　卽薺苨莖之原名。詳『隰忍葉』條。

【隰展】　卽阿魏根之古籍別名。典見綱目。詳『阿魏』條。

【隱鼠】　古籍別名　偃鼠。鼠母。鼷。(綱目)王鼠。(本草集註)

產地　出山林間。

形態　隱鼠爲獸類之一種。其狀頭脚似鼠。口銳色蒼。大如水牛。褲脚類象而驢啼。毛色灰赤。胸部及尾白色。有力而鈍。肉可食。味如牛肉。其脂可供藥用。

主治　痔瘻惡瘡。

【霜】　卽冬霜水之簡稱。詳『冬霜水』條。

【霜花】　卽朴硝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『朴硝』條。

【霜桃】　卽桃之花開於冬霜時者。功用詳『冬桃』條。

【霜桑葉】　卽經霜桑葉之處方用名。詳『桑葉』條。

【霜桑葉露】　性質　甘。苦。微寒。無毒。

效能　去風。明目。清熱。潤燥。

主治　頭痛。咳嗽。消渴。盜汗。

參攷資料　桑葉經霜者。得金氣之全。故清燥救肺之功爲尤多。

【霞天半夏麴】　基本　本品爲半夏麴之一種。係和牛汁製成者。

製法　用半夏爲末。和入霞天膏。草龍七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取　以陳久者良。

主治　療癇疾沈痾。

【霞天膏】　卽霞天膠之原名。詳『霞天膠』條。

【霞天膠】　原名　霞天膏。

製法　用嫩黃牛肉三四十斤。洗極淨。水煎成糜。濾去渣。再熬成膏用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　中風偏廢。口眼歪斜。痰涎壅塞。五臟六腑留痰宿飲癖塊。手足皮膚中痰核。

配合應用　霞天膠。橘皮。白茯苓。蘇子。白荳蔻仁。半夏。蒼朮爲麴。治脾胃積痰。以橘皮、蘇子、貝母、栝樓根及仁。蓬砂爲麴。治積熱痰結。(本草經疏)

【霞天麴】　製法　霞天麴爲麴之一種。用霞天膏四兩。川貝母八兩。將膏烊化。和入貝母粉成餅用。

主治　健脾胃。消痰飲。

【霞片】　卽鴉片之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鴉片』條。

【霞貝】　卽貝子之黃黑文相間者。功能殺蛆蟲。餘詳『貝子』條。

【霞雀花】　卽金雀花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金雀花』條。

【韓信草】　產地　出粵省南海大瀝。

採取　三四月新時採之。

性質　甘。辛。平。

效能　治跌打。祛風。散血。消腫。壯筋骨。理蛇傷。

【韓國參】　卽高麗參之別名。詳『高麗參』條。

【顆凍】　卽款冬花之古籍別名。典見爾雅。詳『款冬花』條。

【顆塊】　卽硃砂之古籍別名。典見圖經本草。詳『硃砂』條。

【顆鹽】　卽鹽之出於池而未經煉治者。其鹽爲顆。其味鹹苦。餘詳『食鹽』條。

【餛飩青】　原名　餛餛蕘。

命名　本品卽蔆實之產於嘉興而形似餛飩者。故名。

形態　餛飩青爲蔆實之一種。較小於他蔆。而大於沙角。可供藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　生食解積暑。煩熱。生津。麥食健脾。和胃益氣。

【餛飩蕘】　卽餛飩青之原名。詳『餛飩青』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【餅黍】卽黍之日本名。詳『黍』條。

【鱷魂】卽鵐之古籍別名。典見綱目。詳『鵐』條。

【鮠魚】古籍別名　鯽魚。鯫魚。鯇魚。鯽魚。鰂魚(綱目)

產地　生湖澤淡水中。

形態　鮠魚爲無鱗魚類之一種。形似鮎而大。長者達三四尺。色青白。背有肉鬐。其肉可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　開胃。下膀胱水。

參攷資料　鮠魚能動痼疾。不可合野鴈野雞肉同食。令人生癩。(蘇頌)

【鱖魚】卽鱖魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱖魚』條。

【鯛魚】卽鱧魚之古籍別名。典見本經。詳『鱧魚』條。

【鮥子】卽叔鮪之更小者。典見郭璞賦。詳『鱘魚』條。

【鯛魚】命名　本品額平夷低偃。其涎黏滑。故名。

古籍別名　鯉魚。鱧魚。鮎魚。(綱目)

產地　生湖澤淡水中。

形態　鯛魚爲無鱗類之一種。體圓長。頭大尾扁。身無鱗而多黏質。口曲而闊。兩頷生細齒。有鬚。背色蒼黑。腹部白色。肉可供食與藥用。其涎、目肝。詳見各該條。

性質　甘。溫。無毒。

主治　療百病。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論鱖魚肉曰。作臛補人。【唐】蘇恭新修本草論鱖魚肉曰。療水腫。利小便。【明】李時珍本草綱目論鱖魚肉曰。治口眼喎斜。活鮎切尾尖。朝吻貼之。卽正。又五痔下血。肛痛。同葱煮食之。

施用宜忌　反荊芥。

參攷資料　㊀鱖魚肉不可合鹿肉食。令人筋甲縮。(陶弘景)　㊁鱖魚肉寒而有毒。非佳品也。赤目赤鬚無腮者。並殺人。不可合牛肝食。令人患風噎。涎不可合野豬肉食。令人吐瀉。(蘇頌)

【鱖魚目】主治　刺傷中水作痛。燒灰塗之。

【鱖魚肝】主治　骨鯁。

【鱖魚涎】主治　三消渴疾。和黃連末爲丸。烏梅湯每服五七丸。日三服效。

【鮪魚】卽鱘魚之古籍別名。典見爾雅。詳『鱘魚』條。

【鮪珠】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【鮪淚】卽龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【鮫魚】命名　本品皮有沙。而文交錯。故名。

古籍別名　沙魚。(拾遺)鱶魚。鰝魚。溜魚。(綱目)青沙虎沙。(辭源)

外國名詞　Selachoidei Shark(拉丁)サメ或フカ(日本)

基本　係脊椎動物魚類板鰓類橫口類鮫類之鮫魚。

產地　出洋海中。

形態　鮫魚爲無鱗魚類之一種。體呈圓錐形。稍扁。脊鰭分前後兩基。胸腹兩鰭皆大。尾鰭爲刃狀。口橫裂在頭下。列生銳齒。鼻孔開於前方。咽喉兩旁有鰓五對至七對。無鰓蓋。頭有一噴水孔。皮面有粒狀鱗。粗糙而堅。體長者有二丈餘。其肉可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　補五臟。作鱠食。功亞于鯽魚。亦可作鱠鮓。甚益人。

【鮫魚皮】性質　甘。鹹。平。無毒。

主治　心氣鬼疰。蟲毒。吐血。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論鮫魚皮曰。治蟲氣蟲疰。【唐】陳藏器本草拾遺論鮫魚皮曰。燒灰水服。主食魚中毒。【明】李時珍本草綱目論鮫魚皮曰。燒研水服。解鱖鱠魚毒。治食魚鱠成積不消。

【鮫魚翅】古籍別名　沙魚翅。沙刺片。(綱目拾遺)

性質　甘。平。無毒。

主治　補五臟。消魚積。解蟲毒。益氣開膈。托毒長腰力。清痰開胃進食。

參攷資料　沙魚卽鮫魚。種類甚多。皆可食。凡宴會餚饌必設此物。其翅乾者成片。有大小。率以三爲對。蓋脊翅一划。水翅二也。煲之。拆去硬骨。檢取輭刺色如金者。瀹以雞湯。佐饌味最美。漳泉有煲好剔取純輭刺作成圓如胭脂餅狀。名沙刺片。更佳。(趙學敏)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鮫魚膽】採取　臘月採收之。
主治　喉痺和白礬灰爲丸。綿裹納喉中。吐去惡涎卽愈。

【鮭魚】卽河豚之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『河豚』條。

【鮑魚】卽餽魚之古籍別名。典見綱目。詳『餽魚』條。

【鮴】卽魚子之古籍別名。典見綱目。詳『魚子』條。

【鮮大靑】卽大靑之處方用名。詳『大靑』條。

【鮮子】卽山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【鮮支】卽山梔子之古籍別名。典見綱目。詳『山梔子』條。

【鮮毛薑】卽骨碎補之處方用名。詳『骨碎補』條。

【鮮生地】卽生地黃之處方用名。詳『生地黃』條。

【鮮石斛】卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【鮮竹茹】卽竹茹之處方用名。詳『竹茹』條。

【鮮竹葉】卽竹葉之處方用名。詳『竹葉』條。

【鮮沙參】卽沙參之處方用名。詳『沙參』條。

【鮮奇良】卽土茯苓之處方用名。詳『土茯苓』條。

【鮮金石斛】卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【鮮扁斛】卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【鮮首烏】卽何首烏之處方用名。詳『何首烏』條。

【鮮草果】古籍別名　杜若。（綱目拾遺）
形態　粵志云。廣人多種之爲香料。卽杜若。非藥中草果也。其苗似縮砂。三月開花作穗。色白微紅。五六月結子。其根勝於葉。
性質　辛。溫。無毒。
主治　除瘴氣。益精明目。

【鮮荷葉】卽荷葉之處方用名。詳『荷葉』條。

【鮮菖蒲】卽菖蒲之處方用名。詳『菖蒲』條。

【鮮藕節】卽藕節之處方用名。詳『藕節』條。

【鮮薑香】卽薑香之處方用名。詳『薑香』條。

【鮮蘆根】卽蘆根之處方用名。詳『蘆根』條。

【鵡鹿】卽雛雞之古籍別名。典見爾雅。詳『雛雞』條。

【鵡】卽啄木鳥之古籍別名。典見綱目。詳『啄木鳥』條。

【鴻】卽雁之大者。其功用詳『雁』條。

【鴻頭】卽茨實之古籍別名。典見韓愈文。詳『茨實』條。

【鴻薈】卽雉之古籍別名。典見說文。詳『雉』條。

【鴻藏】卽胡麻之古籍別名。典見別錄。詳『胡麻』條。

【鴻薀】卽紅草之古籍別名。典見類篇。詳『紅草』條。

【鵯母】卽鸚之別名。典見綱目。詳『鸚』條。

【鷲】卽鸚之古籍別名。典見綱目。詳『鸚』條。

【鴿】卽鵓鴿之原名。詳『鵓鴿』條。

【鴿鶉】命名　禽經云。白鷳相睨而孕。本品交睛而孕。故名。
古籍別名　交嚧（說文）茭雞。鴒（綱目）赤頭鷵（動物學大辭典）

外國名詞　Nycticorax pra-inosceles Swinh（拉丁）Chinese squacco heron（英）アカクビゴヰ或アカガシラサギ（日本）
基本　係脊椎動物鳥類涉禽類鷺科之鴿鶉。
產地　出南方池澤間。及印度等處。
形態　鴿鶉爲水禽類鷺屬之一種。其體之上面概白色。頭頸赤褐。胸背之蓑毛混交。綠色。狀如野鴨。喙長。脚高。趾無蹼。翼與尾灰白色。腹白。脚灰黃。恒棲河川池畔。捕食魚蛙。其肉可供藥用。
性質　甘。鹹。平。無毒。
主治　解諸魚蝦毒。炙食之。

【鵠鴴】卽鳧鴨之古籍別名。典見爾雅。詳『鳧鴨』條。

【鵯】卽鷺鳳之古籍別名。典見禽經。詳『鷺鳳』條。

【鶇鶇】卽鵝鴨之古籍別名。典見綱目。詳『鵝鴨』條。

【麋】
基本　係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。有蹄類。反芻偶蹄類。鹿科之獸。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名　牡者名麐。牝者名麋。子名麂。沙鹿。

外國名詞　Alces machlis. Ellc 或 Moose（拉丁）オホシカ（日本）

產地　出俄國那威、瑞典及北美洲亞洲之北方諸地。

形態　麋爲獸類鹿屬之一種。其體似鹿而大。高七尺。四肢較長。全體暗赤褐色。眼小耳闊。頸有短鬣。胸及喉下密生長毛而下垂。牡者生後九月而生角。逐年脫換而生枝。枝短而粗。枝末分族。目下有二竅。爲夜目。能夜視。常至叢林中食樹皮樹葉及嫩芽等。其肉可供食與藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　益氣補中。治腰脚。

歷代記述攷證　【宋】掌禹錫補註本草論麋肉曰。補五臟不足氣。

參攷資料　㈠麋肉不可合豬肉。雖肉食發癇疾。合蝦及生菜梅李食。損男子精氣。（陶弘景）㈡多食令人弱房。發脚氣。妊婦食之。令子目病。（孟詵）㈢按陸農師云。鹿以陽爲體。其肉食之熱。麋以陰爲體。其肉食之寒。觀此則別錄麋脂令人陰痿。孟詵解多食肉令人弱房及角肉不同功之說。亦此意也。（李時珍）

【麋皮】　**主治**　除脚氣。作靴韉著之。

【麋角】　**製法**　雷敩曰。麋角以頂根上有黃毛若金線。兼旁生小尖色蒼白者爲上。孟詵曰。凡用麋角。可五寸截之。中破炙黃爲末。入藥。李時珍曰。造麋角膠與麋角霜。並與鹿角膠鹿角霜同法。又集靈方云。用麋角一雙。水浸七日。刮去皮。錯屑。以銀瓶盛。牛乳浸一日。乳耗再加。至不耗乃止。用油紙密封瓶口。別用大麥鋪鍋中。三寸上安瓶。再以麥四周壅滿。入水浸一伏時。水耗旋加。待屑軟如糜。取出。焙研成霜用。

性質　甘。熱。無毒。

主治　風痺止血。益氣力。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論麋角曰。刮屑熬香。酒服大益人。【唐】孟詵食療本草論麋角曰。作粉常服。治丈夫冷氣及風筋骨疼痛。若卒心痛。一服立瘥。漿水磨泥塗面。令人光華。赤白如玉可愛。【宋】日華諸家本草論麋角曰。酒服補虛勞。添精益髓。益血脈。暖腰膝。壯陽悅色。療風氣。偏治丈夫。【明】李時珍本草綱目論麋角曰。滋陰養血。功與茸同。

參攷資料　㈠麋角常服大益陽道。不知何因與肉功不同也。煎膠與鹿角膠同功。茸亦勝鹿茸。仙方甚重之。（孟詵）㈡鹿之茸角補陽。右腎精氣不足者宜之。麋之茸角補陰。左腎血液不足者宜之。此乃千古之徵祕。前人方法難具而理未發出。故論者紛紜。又楊氏家藏方治虛損有二至丸兩角並用。但其藥性過溫。止宜於陽虛寒溼血痺者耳。於左腎無與焉。孫思邈千金方言。麋角丸凡一百一十方。惟容成子煞所服者特出衆方之外。子煞服之羽化。（李時珍）

【麋角霜】　性質效能及製法均與鹿角霜同。參見該條。補益陰血之功則過之。詳『鹿角膠』條。

【麋角膠】　卽取麋角煎熬製膠者。性質效能及製法均與鹿角膠同。

【麋脂】　**古籍別名**　實脂。（本經）

採取　十月間取脂。煉過收用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　癰腫惡瘡。死肌寒熱。風寒溼痺。四肢拘緩不收。風頭腫氣。通腠理。（本經）柔皮膚。不可近陰。令痿。（別錄）

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論麋脂曰。治少年氣盛。面生瘡皰。化脂塗之。

施用宜忌　長大黃忌桃李。

【麋茸】　**製法**　詳鹿茸條。

性質　甘。溫。無毒。

主治　陰虛勞損。一切血病。筋骨腰膝酸痛。滋陰益腎。

【麋骨】　**主治**　虛勞至良。麥汁釀酒飲。令肥白美顏色。

【麋骨酒】　**基本**　本品係用麋骨麥汁。同麴米如常釀成之酒。

主治　陰虛腎弱。久服令人肥白。

【麋衡】　卽薇衡之古籍別名。典見本經。詳『薇衡』條。

【麋鵝】　卽雒鵝之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爾雅。詳『麋鹿』條。

【麝】即麋之古籍別名。詳『麋』條。

【麥芽】即麥芽之古籍別名。詳『麥芽』條。

【黏子】即倒捻子之古籍別名。典見新本草。詳『倒捻子』條。

【黏糊菜】即稀薟草之古籍別名。典見救荒本草。詳『稀薟草』條。

【黏鴉】即枸骨之古籍別名。典見綱目。詳『枸骨』條。

【黛赭石】即代赭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『代赭石』條。

【點椒】即川椒之古籍別名。典見綱目。詳『川椒』條。

【點蒼石】即理石。因產於大理之點蒼山。故名。功用詳『理石』條。

【龜】 命名 本品爲甲蟲類中之最大者。故字從元。元者大也。

產地 出江湖中。

形態 龜爲介類鼈屬之一種。其狀似鼈而大。大者圍一二丈。頭大有冡塊。頸黃背青。腸屬於首。以鼈爲雌。其卵大如鷄子。每產有一二百枚。其肉有五色。而色白者多。可供藥用。甲、脂、膽詳見各該條。

性質 甘。平。無毒。

主治 食之補益。解溼氣。邪氣。諸蟲毒。

【龜甲】 性質 甘。平。無毒。

主治 炙黃酒浸。治癆瘵。殺蟲逐風。噩痔痔瘻。風頑疥蝕。功同鼈甲。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論龜甲曰。五臟邪氣。殺百蟲毒。百藥毒。續筋骨。【宋】蘇頌圖經本草論龜甲曰。婦人血熱。

【龜脂】 主治 摩風及惡瘡。

【龍膽】 性質 苦。寒。有毒。

主治 喉痺。以生薑薄荷汁化少許服。取吐。

【鼠】 即鼷鼠之古籍別名。典見綱目。詳『鼷鼠』條。

十八畫

【叢柏葉】 即柏葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『柏葉』條。

【叢蘭花】 即蘸春花之古籍別名。詳『蘸春花』條。

【叢蘭艾花】 即蘸春花之古籍別名。典見圖經本草。詳『蘸春花』條。

【膈】 即草鞋之古籍別名。典見綱目。詳『草鞋』條。

【戴文玉】 形態 戴文玉爲雜草類之一種。其色黃。形如金釵。可供藥用。

主治 療血疾。

【戴星草】 即穀精草之古籍別名。典見開寶本草。詳『穀精草』條。

【戴粉】 即黃耆之古籍別名。典見綱目。詳『黃耆』條。

【戴椹】 ㊀即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳『黃耆』條。㊁即旋覆花之古籍別名。典見別錄。詳『旋覆花』條。

【戴精草】 即穀精草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『穀精草』條。

【戴糝】 即黃耆之古籍別名。典見本經。詳『黃耆』條。

【斷草烏】 產地 出粵中。

形態 斷草烏爲烏蛇類之一種。大僅指許。長五六寸。頭如龍形。而小。其身純烏。其行百草沾之立斷。人見斷草。得跡輒獲之。故蛇每雜地丈許。使身如矢。直以入穴。不沾草。則人莫得其跡而難人捕捕得。可供藥用。

主治 大麻風。麥酒服。

【斷腸花】 即秋海棠之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『秋海棠』條。

【斷腸草】 ㊀即秋海棠之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『秋海棠』條。㊁即鉤吻之古籍別名。典見綱目。詳『鉤吻』條。

【斷鏟草】 基本 斷鏟草爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 疔瘡。

【檞】 即杜仲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜仲』條。

【檞芽】 即杜仲嫩芽之原名。詳『杜仲嫩芽』條。

【檳榔】 命名 賓與郎。皆貴客之稱。南方草木狀言。廣人凡貴勝族客。必先呈此爲果。若遲逅不設。用相嫌恨。則檳榔名義。蓋取於此耳。

處方用名 花檳榔。尖檳榔。連皮檳。鷄心檳。索兒檳。海南檳。

古籍別名 賓門（李當之）仁頻。洗瘴丹。橄欖子（綱目）仁榔。檳榔孫（和漢藥考）。藕子。（本草集註）

859／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

外國名稱　Semen Areca.（拉丁）Areca-nut Betel-nut.（英）Arekanuss. Betelnuss.（德）

基本　屬棕櫚科。爲檳榔之子實。

産地　以廣東瓊州。海南産者爲最。名南尖。卽鷄心檳也。小粒如鷄心也。其次則印度。安南。南洋羣島均有出。大粒名西尖。功力不及南尖三分一也。和漢藥考曰。産於亞洲之熱帶地方。如東印度。馬來半島。是臺灣之南方亦有之。



檳榔

形態　檳榔。喬木也。似椰子。細而長。高至四五丈。無枝。梢端生類似芭蕉葉之羽狀複葉。葉花爲六片花被。雌雄異株而生。葉底出花梗三四。相綴而爲穗狀。果實爲卵大之漿果。外有帶黃色之薄殼皮包之。一穗約結實三四百顆。每樹結實最多者。自第五年至三十年而止。其子形球圓或卵圓。長寸餘。直徑約五分。多附有纖維之毛冠。外面色灰褐。內堅實有紋理。味甘而爲收斂性。

種類　大腹檳榔。形扁圓。卽母栎。豬栎。榔鷄心檳榔。形細長。卽公檳榔。棗兒檳榔。棱身檳榔。卽兩頭尖如橄欖者。亦四尖檳榔。檳榔孫。卽檳榔之小者。亦曰蔴子。又卽所謂山檳榔。又有馬檳榔。一名紫檳榔者。乃蔓生結實。大如葡萄。色紫味甘。核仁亦甜。功用與此不同。

採取　五月採之。

製法　雷敦曰。凡使檳榔。頭圓矮吐者爲榔。形尖紫文者爲檳。檳力小。榔力大。凡使用白檳及存坐穩正心堅有錦文者爲妙。半白半黑并心虛者不入藥。用以刀刮去底細切之。勿令經火。恐無力。若熟使不如不用。李時珍曰。近時方藥。亦有以火煨剉用者。然初生白檳榔。須本境可得。若他處者。必經煮熏。安得生者耶。又檳榔生食。必以扶留藤古貲灰爲使。相合嚼之。吐出紅水一口。乃滑美不澁。下氣消食。此三物相去甚遠。爲物各異而相成相合如此。亦爲異矣。俗謂檳榔爲命賴扶留以此。古貲灰卽蠣蛤灰也。貲乃蠣孛之訛。瓦屋於灰亦可用。

性質　苦。辛。溫。澀。無毒。

成分　檳榔子中有阿萊可林（Arecorin. $C_8H_{13}NO_2$）及阿萊加茵（Arecain. $C_7H_{11}NO_2+H_2O$）之植物鹽基。其構造有人發明。爲水分一三・三五。窒素總量一・五三。咖啡涅二・〇八。伊打製越幾斯一・三五。澱粉四五・四四。鞣酸三・七九。木纖維七・〇一。其餘無窒素物一八・二一。無機物二・九〇。見藥學雜誌第一百五十九號。

效能　瀉氣攻積。殺蟲行水。用作消化及殺蟲藥。

作用　在胃中能激胃黏膜。使分泌增加。至腸與絲蟲相遇。能殺死之。或混於大便內排出。同時又能刺激迷走神經。使腸之蠕動迅速。入血中有縮小瞳孔之能。

主治　消穀逐水。除痰癖。殺三蟲。伏尸寸白。

歷代記述致證　【唐】蘇恭新修本草論檳榔子曰。治腹脹。生搗末服。利水穀道。傳瘡。生肌肉。止痛。燒灰傅口吻白瘡。【唐】甄權藥性本草論檳榔子曰。宣利五臟六腑壅滯。破胸中氣。下水腫。治心痛積聚。【唐】李珣海藥本草論檳榔子曰。主貲脈膀胱諸氣。五膈氣。冷氣。脚氣。宿食不消。【宋】大明諸家本草論檳榔子曰。除一切風。下一切氣。通關節。利九竅。補五勞七傷。健脾調中。除煩。破癥結。【元】王好古湯液本草論檳榔子曰。治衝脈爲病。氣逆裏急。【明】李時珍本草綱目論檳榔子曰。治瀉痢後重。心腹諸痛。大小便氣祕。痰氣喘急。瘴諸瘧。禦瘴癘。【明】繆希雍本草經疏論檳榔子曰。檳榔味辛氣溫無毒。大明言澀。元素言苦。入手足陽明經。夫足陽明爲水穀之海。手陽明爲傳道之官。二經相爲貫輸。以運化精微者也。二經病則水穀不能以時消化。鬱留而成痰癖。或溼熱停久。則變生諸蟲。此藥辛能散結破滯。苦能下泄殺蟲。故主如上諸證也。甄權宣利五臟六腑壅滯。破胸中氣。下水腫。治心痛積聚。日

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

華子下一切氣。通關節。利九竅。健脾調中。破癥結。李珣主貫腸氣。五膈氣。風冷氣。脚氣。宿食不消。皆取其辛溫走散。破氣墜積。能下腸胃有形之物耳。【清】黃宮繡本草求眞。論檳榔子曰。檳榔辛苦而溫。書何言其至高之氣。彼獨能瀉使之下行。以至於極。以其味苦主降。性如鐵石之重。故爾有墜下之力耳。是以無堅不破。無脹不消。無食不化。無痰不行。無水不下。無氣不降。無蟲不殺。無便不開。故凡裏急後重。嵐瘴瘧癘。並水腫脚氣。酒醉不醒。無不因其苦溫辛瀝之性。以爲開泄行氣破滯之地耳。至書所云。飽能使之餓。醉能使之醒。醒能使之醉者。以檳榔必用蒟葉裹嚼。蒟葉氣味辛溫。得此能除中外之氣。以散瘴癘之邪也。然非瘴之地。不可常服。恐其能洩眞氣耳。鷄心尖長。劈之作錦紋者良。【清】王士雄隨息居飲食譜。論檳榔子曰。檳榔苦甘溫瀝。下氣消痰。辟瘴殺蟲。析醒化食。除脹泄滿。宣滯破堅。定痛和中。通腸逐水。制肥甘之毒。胥藥家宜之。尖長實鞕。轆色紫而香。俗呼棗皃檳榔者良。且能堅齒解口氣。惟虛弱人及澹泊家忌食。【清】賈九如辨藥指南。論檳榔曰。檳榔體重而實。味厚而沈。沈實主降。專墜諸藥以導中焦下焦結滯之氣也。故能逐水氣。消穀食。除痰癖。削積塊。追諸蟲。攻脚氣。通痢疾。後重數症之功。性若鐵石。驗如奔馬。東垣言之詳矣。但瀉至高之氣。鞕枳實青皮尤甚。不可過服。

國外學說　英美學說。謂檳榔子一名仁頓。產中國之交州、廣州、愛州等處。而印度國亦產之。樹高約五丈至七丈。九丈不等。取該樹之子。可爲藥品。至其醫治作用。內能收斂驅蟲。治腹內蛔蟲。外則能燒成炭研末。以作刷牙散。每服半兩至一兩。日本學說。謂近時獨逸ヤーンス氏。分析本藥。檢明三種類鹽基。一稱爲「アレコリン」。一稱爲「アレカイン」。一甚少。而其性狀不明。右三種中。唯「アレコリン」有效。依コルメ氏之試驗云。其作用與「ペレチーリン」（石榴根皮之成分）或「ピロカルピン」相髣髴。驅蟲劑之用量。檳榔子末或其流動越幾斯四・〇至六・〇止。一回內服。（猪子氏和漢藥論）蓋檳榔子者乃驅除條蟲之藥也。前有中村俊士者。日本三河人。以檳榔浸（檳榔三・〇）三〇・〇。治惡阻病。一日分六次服。連服八日。惡心嘔吐。全然消退。其治法。經過等。詳見明治二十七年十二月東京醫事新誌第八百七十二號古方藥品考。曰檳榔有二種。來自中國者。形扁圓。味澁斂。爲大腹檳榔佳品也。大腹皮即其殼。（形圓通體白毛。宛如筆毫。味淡）來自外番者。頭尖微長。澁味不厚。此爲下品。又一本堂藥選曰。凡選檳榔子。以存坐穩正。心堅有文。白而新者爲佳。此乃輸舶所來。祇此一種。本國絕無此物。其心虛及帶黑色者。皆弗用。用時水洗剉細。不用煨。熱麵煨。焙等法。此物剉細。經七八日必作饅氣。可惡。故須臨用方剉。不可剉置經日。又和漢藥考曰。檳榔子之細長者。曰雞心檳榔。又名公檳榔。扁平而大者。曰大腹子。又名母檳榔。亦呼豬檳榔。兩頭尖如棃實者。曰梭身檳榔。

配合應用　㊀治食癥。用檳榔、草果、枳實、橘皮。消一切堅硬肉食。及諸米麵生冷食積成塊作痛。加三稜、蓬朮、礬紅、紅麴、山查、麥蘗。㊁治滯下後重。檳榔、黃連、鶴豆、蓮肉、橘紅、白芍藥、紅麴、烏梅、葛根、枳殼。㊂治小兒疳蚘。檳榔、雷丸、使君子、白蕪荑、蘆薈、肉豆蔻、胡黃連。㊃治一切寸白蟲。用檳榔、楝根、鶴蝨、鵝灰、蔥莖根、貫衆、烏梅。㊄治山嵐瘴氣發癘。用檳榔、蒼朮、草果、青皮、甘草。㊅治痰涎爲害。檳榔爲末。白湯每服一錢。（御藥院方）㊆治嘔吐痰水。白檳榔一顆。煨熱。橘皮二錢半。炙爲末。水一盞。煎半盞。溫服。（千金方）㊇治醋心吐水。檳榔四兩。橘皮一兩。爲末。每服方寸匕。空心生薑湯調下。（梅師方）㊈治傷寒痞滿。陰病下早成痞。按之虛鞕而不痛。檳榔枳實等分。爲末。每服二錢。黃連煎湯下。（宣

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

明方）

㈢治傷寒結胸。已經汗下後者。檳榔二兩。酒二盞。煎一盞。分二服。亦治蛔厥腹痛。（龐安時傷寒論方）

㈡治心脾作痛。雞心檳榔、高良薑各一錢半。陳米百粒。同以水煎服之。（直指方）

㈢治膀胱諸氣。檳榔十二枚。一生一熟爲末。酒煎服之良。此太醫秦鳴鶴方也。（海藥本草方）

㈢治本臟氣痛。雞心檳榔。以小便磨半箇服。或用熱酒調末一錢服之。（斗門方）

㈣治腰重作痛。檳榔爲末。酒服一錢。（斗門方）

㈤治脚氣壅痛。以沙牛尿一盞。磨檳榔一枚。空心暖服。（梅師脚氣論方）

㈥治脚氣衝心。悶亂不識人。用白檳榔十二枚爲末。分二服。空心暖小便五合。調下日二服。或入麝汁溫酒同服。（廣利方）

㈦治脚氣腹滿。非冷非熱。或老人弱人病。此用檳榔仁爲末。以檳榔殼煎汁。或茶飲蘇湯。或豉汁調服二錢。甚利。（外臺秘要方）

㈧治乾霍亂病。心腹脹痛。不吐不利。煩悶欲死。用檳榔末五錢。童子小便半盞。水一盞。煎服。（聖濟總錄方）

㈨治大腸澼悶。腸胃有澼。大便祕塞。大檳榔一枚。麥門冬煎湯。磨汁溫服。或以蜜湯調末二錢服。亦可。（普濟方）

㈩治大小便悶。檳榔爲末。蜜湯調服二錢。或以童子小便。葱白同煎服之。亦良。（普濟方）

㈠治小便淋痛。麵煨檳榔、赤芍藥各半兩爲末。每服三錢。入燈心水煎。空心服。日二服。（十便良方）

㈡治血淋作痛。檳榔一枚。以麥門冬煎湯。細磨濃汁一盞。頓熱空心服。日二服。

㈢治蟲痔裹急。檳榔爲末。每日空心以白湯調服二錢。

㈣治寸白蟲病。檳榔二七枚爲末。先以水二升半。煮檳榔皮。取一升。空心調末方寸匕服之。經日蟲盡出。未盡再服。以盡爲度。（千金方）

㈤治諸蟲在臟。久不瘥者。檳榔半兩。炮爲末。每服二錢。以葱蜜煎湯調服一錢。（聖惠方）

㈥治令瘡惡心。白檳榔四兩。橘皮一兩。爲末。每空心生蜜湯服二錢。（聖惠方）

㈦治丹從臍起。檳榔末醋調傅之。（本事方）

㈧治小兒頭瘡。木磨檳榔。嚥取粉。和生油塗之。（聖惠方）

㈨治口吻生瘡。檳榔燒研入輕粉末傅之良。

㈩治瘭耳出膿。檳榔研末吹之。（鮑氏方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡氣虛下陷。及無積滯者禁用。忌火。

參攷資料　㈠按羅大經鶴林玉露云。嶺南人以檳榔代茶。禦瘴。其功有四。一曰醒。能使之醉。蓋食之久。則熏然頰赤。若飲酒然。蘇東坡所謂紅潮登頰醉檳榔也。二曰醉。能使之醒。蓋酒後嚼之。則寬氣下痰。餘暨頓解。朱晦菴所謂檳榔收得爲祛痰也。三曰饑。能使之飽。四曰飽。能使之饑。蓋空腹食之。則充然氣盛如飽。飽後食之。則飲食快然易消。又且賦性疏通。而不洩氣。稟味嚴正。而更有餘甘。有是德。故有是功也。又按吳興章傑瘴說云。嶺表之俗。多食檳榔。日至十數。夫瘴癘之作。率因飲食過度。氣痞積結。而檳榔最能下氣消食去痰。故人明於近利。而闇於遠患也。夫幡南地熱。四時出汗。人多黃瘠。食之則臟器疏洩。一旦病瘴。不敢發散攻下。豈盡氣候所致。檳榔蓋亦爲患。殆未思爾。又東陽盧和云。閩廣人常服檳榔。云能祛瘴。有瘴服之。可也。無瘴而服之。寧不損正氣。而有開門延寇之禍乎。南人喜食此果。故備考諸說。以見其功過焉。又朱晦菴檳榔詩云。憶昔南遊日初嘗面發紅。藥籠知有用。茗盌詎能同。鎮疾收殊效。修眞錄異功。三彭如不避。糜爛七非中。亦與其治疾殺蟲之功。而不滿其代茶之俗也。（李時珍）㈡檳榔樹初生若筍竿。積硬引莖直上。莖幹頗似桃椰子。而有節旁無枝柯。條從心生。端頂有葉如甘蕉。條開破。風至則如羽扇掃天之狀。三月葉中抽起一房。因自折裂出穗。凡數百顆。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大如桃李。又生刺重累於下。以護衛其實。五月成熟。剝去其皮。煮其肉而乾之。皮皆筋絲。與大腹皮同也。按漢俞益期與韓康伯牋云。檳榔子既非常木亦特異。大者三圍。高者九丈。葉叢樹端。房棟葉下。華秀房中。子結房外。其攜戀似黍。其綴實似穀。其皮似桐而厚。其節似竹而概。其內空。其外勁。其屈如伏虹。其申如組繩。本不大。末不小。上不傾。下不斜。調直亭亭千百如一。步其林則寥朗庇其陰則蕭條。信可長吟遠想。但性不奈霜。不得比植。必當遐樹海南。遂然萬里。弗遇長者之目。令人悵深也。又竺法眞羅山疏云。山檳榔。一名藕子。生日南。樹似栟櫚而小。與檳榔同狀。一叢十餘莖。一幹十餘房。一房數百子。子長寸餘。五月採。味近苦甘。觀此則山檳榔。卽藕子。非檳榔。卽大腹子也。蘇頌以味甘者爲山檳榔。澀者爲藉檳榔。似欠分明。（李時珍）㊁此物與烟性略同。但烟性峻勇。用以散表逐寒。則煙勝於此。檳榔稍緩。用以和中燧胃。則此勝於烟。二者皆壯氣辟邪之要藥。故濱廣中人。一日不可少也。（張景岳）㊂檳榔是木之子。其性能沉。然沉降之性。自上而下。且性不烈。故降性亦緩。按此說似與張石頑不同。然彼以鐵石比其堅。非喻其速。則沉而降。降而緩。二說固未有參商也。（唐容川）㊃嶺南人常食代茶。交州、廣州人。凡有貴客。必先呈之。若遲逗不設。往往銜恨。名曰檳榔。取義由此。蓋南方地溼。不食之無以祛瘴。嚼生食味苦澁。與蠣蛤等灰同咀。嚼之則柔輭甘美。（和漢三才圖會）㊄暹羅交趾國俗。客來。必先出檳榔食之。一若他處以煙草餉客者然。後乃出茶菓。因彼國於南方。檳榔能去溼熱故也。本草云。嶺南人當作果食。嶺南者。中國之漳州、福州等處也。該處人食檳榔法。以之與石灰或蜆灰同咀。則不澀。嘗以銀錫製小盒。貯剉碎之檳榔。出以敬客。見范石湖桂海志。（大和本草）㊅東印度及馬來半島土人。常以檳榔細切。包以似胡椒之葉而食之。若嚼煙草然。故土人口中色鮮紅。齒則作黑色。以多食檳榔故也。中國人亦有嗜之者。據云嚼此則呼吸清涼。齒牙堅固。胃及神經並强壯云。（和漢藥考）

【檳榔孫】卽檳榔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『檳榔』條。

【糜】卽蔴痲之古籍別名。典見綱目。詳『蔴痲』條。

【檳】卽椿之古籍別名。典見集韻。詳『椿樗白皮』條。

【歸尾】卽當歸之處方用名。詳『當歸』條。

【歸梢】卽當歸梢之處方用名。詳『當歸』條。

【歸澤麻】卽五母麻之古籍別名。典見別錄。詳『五母麻』條。

【歸鬚】卽當歸鬚之處方用名。詳『當歸』條。

【瀉利鹽】古籍別名　舍利鹽。（和漢藥考）

外國名詞　Epsomite.（英）

產地　瀉利鹽生於石灰洞中。附石而面如絲。有玻璃光澤。又或爲土壤自然出產之數甚少。今皆以人工製成之。

形態　爲稜柱狀之結晶體。無色透明。水能溶解。而不溶解於酒精。

製法　以苦土石入硫酸內。使起硫化作用。再以水溶解。蠟蒸發其溶液。而使結晶。復精製之。

性質　味苦而鹹。

成分　瀉利鹽。化學上謂之硫酸痲個涅曳謨 $MgSO_4 \cdot 7H_2O$。

效能　專用爲緩下劑。

國外學說　日本藥局方述曰。瀉利鹽一名硫酸苦土。爲無色之稜柱狀小結晶。置空氣中。無何變化。味清涼苦鹹。以等分之水。并〇・三分之熱。能溶解之。現中性反應。酒精不能溶解。

用量　四錢至八錢。

【瀉葉】卽番瀉葉之處方用名。詳『番瀉葉』條。

【濼】卽貫衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貫衆』條。

【爵耳子】卽蒼耳子之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『蒼耳子』條。

【爵李仁】卽郁李仁之古籍別名。典見本經。詳『郁李仁』條。

【爵牀】古籍別名　爵麻。（吳普）香蘇（別錄）赤眼老母草。（唐本草）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爵牀



外國名詞 Justicia procumbens, L.（拉丁）キッネノマゴ カグラサウ（日本）

基本 係爵牀科爵牀屬。藥用其莖葉。

產地 別錄云。出漢中川谷田野。蘇恭云。生平澤熟田近道旁。

形態 爵牀爲芳草類之一年生草本。莖高尺餘。節稍膨大。葉長橢圓形。或廣披針形。對生。葉與莖微有毛。夏日葉腋出小梗。開小花。集合如穗狀。長寸許。花冠淡紫色。呈脣形。下脣大。有三尖。雄蕊二枚。雌蕊一枚。（李時珍）㈡此草生平澤熟田近道旁似香薷。葉長而大。或如荏且細。俗名赤眼老母草。（蘇恭）㈢原野甚多。方莖對節。與大葉香薷一樣。但香薷搓之氣香而爵牀搓之不香。微臭。以此爲別。（李時珍）㈣爵牀莖葉之汁液。治充血之症。甚有功效。（植物學大辭典）

性質 鹹。寒。無毒。

主治 腰脊痛。不得揹牀。俛仰艱難。除熱。可作浴湯。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論爵牀曰。療血脹下氣。治杖瘡。搗汁塗之立瘥。

參攷資料 ㈠爵牀氣味辛。

【爵牀】卽雀梅之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雀梅』條。

【爵犀】卽鬼臼之古籍別名。典見本經。詳『鬼臼』條。

【爵麻】卽爵牀之古籍別名。典見吳普本草。詳『爵牀』條。

【爵離方】卽防葵之古籍別名。典見吳普本草。詳『防葵』條。

【璧玉】卽玉之一種。性質功用詳『玉』條。

【瓣珠】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【瞿陵花】卽凌霄花之古籍別名。典見吳普本草。詳『凌霄花』條。

瞿麥

古籍別名 巨句麥。（本經）大蘭。（別錄）蘧麥。菖蒪。（廣雅）大菊。（爾雅）石竹。（日華）洛陽南天竺草。（綱目）地麵。龍鬚。大菊子。大蘭子。四時美。杜老草子。聖龍草子。南天竺草子。（和漢藥考）

外國名詞 Dianthus superbus, L.

基本 屬石竹科爲瞿麥之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。瞿麥產廣東北江。連州等處。外省亦有出。實則凡山谷田野間恒多生焉。

瞿麥



形態 瞿麥爲宿根草。山野河磧。往往自生。莖高一二尺。葉作長披針形。攅節對生。夏季於梢上開淡紅色花。常二朵集生。花瓣五裂。邊緣復有複雜之深裂。結小圓形長角。實熟則角頂自綻。散落黑色扁平類胡麻子之種子。謂之瞿麥子。

採取 每年立秋節前後採。陰乾。

製法 雷敩曰。凡使只用蓬殼。不用莖葉。若一時同使。卽空心令人氣噎。小便不禁也。用時。以葦竹漉浸一伏時。漉囉。

性質 苦。寒。無毒。

效能 利水通淋。清熱破血。用作利尿通經藥。

主治 關格諸癃。小便不通。出刺。決癰腫。明目去翳。破胎墮子下閉血。（本經）養腎氣。逐膀胱邪逆。止霍亂。長毛髮。（別錄）

歷代記述效證 【宋】大明日華諸家本草論瞿麥曰。主五淋。月經不通。破血塊。排膿。【明】繆希雍本草經疏論瞿麥曰。瞿麥禀陰寒之氣而生。故味苦寒。別錄兼辛無毒。苦辛能破血。陰寒而降。能通利下竅。而行小便。均主關格諸癃結。小便不通。因於小腸熱甚者。寒能散熱。辛能散結。故決癰腫。除溼熱。故明目去翳。辛寒破血。故破胎墮子而下閉血也。去腎家溼熱。故云養腎氣。逐膀胱邪逆者。亦洩溼熱

864／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

故也。澀熱客中焦。則清濁不分而爲霍亂。通利澀熱。則霍亂自解矣。【明】李士材本草圖解論薏麥曰。薏麥之功用。惟破血利竅四字。可以盡其效能。非久任之品也。炒用。【清】黃宮繡本草求眞論薏麥曰。薏麥味苦性寒。功專瀉心利水。故書載利小便。決腫癰。去癰閉。拔肉刺。下胎產。除目翳。然其氣稟純陽。必其小腸氣厚。服此疏泄之味。病始克除。若使小腸素虛。經云。心屬有熱。不惟其熱不除。則虛而益虛。必致變生他疾矣。妊娠產後。小便不利。及脾虛水腫。均並禁焉。【清】鄒澍本經疏證論薏麥曰。鰒浮小便不利。微熱消渴者。五苓散主之。鰒浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。豬苓湯主之。小便不利。有水氣。其人若渴。栝樓薏麥丸主之。夫均用利水。則皆有水氣可知。且同爲小便不利而渴。其用藥殊異。乃爾何也。然此固有傷寒雜證之分。亦卽此可見豬苓澤瀉。能治動而不化之水。薏麥則能治停而不行之水矣。夫五苓散證。其上有太陽病。發汗後。大汗出。胃中乾煩躁不得眠之源。可見係胃乾求助於水。水不行而爲患。病自寒來。仍不能離辛甘發散之旨。豬苓湯證。其上有陽明病。鰒浮緊。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重之源。可見亦係胃熱飲水而停。特以陽明屬燥金。不比太陽寒水之化。故辛甘不用。改參入鹹味湧洩以除熱也。栝樓薏麥丸證。固係水停爲患。特其方下注云。以腹中溫爲知。又可見其爲本寒標熱矣。本寒標熱。用辛甘則嫌於助熱。用鹹湯又嫌其助寒。故別出清上溫下之法。以薏麥茯苓二味。抉作病之由。此固難與前兩證並言者也。以是知水之動而不定者。非薏麥所能治矣。

近人學說　張山雷曰。薏麥卽今恒蒔之所謂洛陽花。花色紅紫斑斕。其性陰寒。泄降利水。除導澀逐熱外。無他用。本經謂其明目去翳。別錄謂其養腎。則邪熱清而眞陰復。非通利之品。果能養陰也。出刺決癰。墮胎其力猛矣。別錄又稱其主霍亂。則澀熱內阻。清濁不分者。以爲分泄逐澀之用。非主陰寒之霍亂也。日華謂其主五淋。月經不通。景岳謂合涼藥。亦消眼目腫痛。合血藥。則通經破血。下胎宣導下焦澀熱。石頑謂利小便之君藥。日華又謂其葉主痔漏。瀉血。解丹石藥發。搗敷腫毒浸淫瘡。無一非清熱利導之用。然必實有澀熱壅滯者爲宜。寇宗奭謂專通小腸。若心經有熱。而小腸虛者弗用。辨別最爲清澈。石頑亦謂妊娠產後小水不利。及脾虛水腫者禁用。頤按又有老人虛人。氣化不利。而爲癰閉溲少等證。亦非澀熱蘊積。治宜宣化氣分。五苓八正。徒耗津液。皆爲禁藥。

配合應用　㈠入八正散。利小腸實熱結閉。㈡立效散。治下焦結熱。小便淋閉。或有血出。或大小便出血。薏麥穗一兩。炙甘草七錢五分。山梔仁炒半兩。爲末。每服七錢。連鬚葱白七箇。燈心五十莖。生薑五片。水二盞。煎至七分。時溫服。(千金方)㈢治小便石淋。宜破血。薏麥子搗爲末。酒服方寸匕。日三服。三日當下石。(外臺祕要方)㈣治小便不利。有水氣。栝樓薏麥丸主之。薏麥二錢半。栝樓根二兩。大雞子一箇。茯苓山芋各三兩。爲末。蜜和丸。梧子大。一服三丸。日三。未知。益至七八丸。以小便利。腹中溫爲知也。(張仲景金匱方)㈤治子死腹中。或產經數日不下。以薏麥煮濃汁服之。(千金方)㈥治九竅出血。服藥不止者。南天竺草。卽薏麥拇指大一把。山梔子仁三十個。生薑一塊。甘草炙半兩。煙草一小把。大棗五枚。水煎服。(聖濟總錄方)㈦治目赤腫痛。浸淫等瘡。薏麥炒黃爲末。以鵝涎調塗。瘡頭卽開。或搗汁塗之。(普濟方)㈧治眯目生翳。其物不出者。生青翳者。薏麥、乾薑炮爲末。井華水調服二錢。日二服。(聖惠方)㈨治魚脣疔瘡。薏麥燒灰和油傅之甚佳。(崔氏方)㈩治咽喉骨哽。薏麥爲末。水服一寸匕。日二。(外臺祕要方)(一)治竹木入肉。薏麥爲末。水服方寸匕。或煮汁日飲三次。(梅師方)(二)治箭刀在肉。及咽喉胸膈諸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

隱處不出。酒服瞿麥末方寸匕。日三服。(千金方)

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾胃虛而無溼熱者禁用。惡螺蛸。

著名方劑　栝蔞瞿麥丸。治小便不利者有水氣。其人苦渴。此湯主之。(金匱方)栝蔞根二兩。茯苓三兩。薯蕷三兩。附子一枚。炮。瞿麥一兩。五味末之。煉蜜丸梧子大。飲服三丸。日三服。不知增至七八丸。以小便利。腹中溫爲知。八正散。治諸淋。(賣鑑方)瞿麥、梔子、萹蓄、大黃、滑石、木通、車前子、甘草各一錢。加燈芯一錢。煎服。

參攷資料　㈠古今方通心經。利小腸爲最要。(蘇頌)㈡八正散用瞿麥今人爲至要藥。若心經雖有熱而小腸虛者。服之則心熱未退。而小腸別作病矣。蓋小腸與心爲傳送。故用此入小腸。本草並不治心熱。若心無大熱。止治其心。或制之不盡。當求其屬以衰之可也。(寇宗奭)㈢近古方家治產難。有石竹花湯。治九孔出血有南天竺飲。皆取其破血利竅也。(李時珍)㈣瞿麥蓑草牡丹爲之使。惡螺蛸。伏丹砂。(徐之才)㈤瞿麥生太山山谷。立秋採陰乾。(別錄)㈥今出近道。一莖生細葉。花紅紫赤色可愛。合子葉刈取之。子頗似麥子。有兩種。一種徽大。花逸有乂極。未知何者是也。今市人皆用小者。復一種葉莖相似而有毛。花晚而莖赤。按經云採實其中子。細燥熱便脫盡矣。(陶弘景)㈦今處處有之。苗高一尺以來。葉尖小。青色。根紫黑色。形如細蓧菁。花紅紫赤色。亦似映山紅。二月至五月開。七月結實。作穗。子頗似麥。河陽河中府出者。苗可用。淮甸出者。根細。村民取作刷帶。爾雅謂之天菊。廣雅謂之蒢蒫是也。(蘇頌)㈧石竹葉似地膚葉而尖小。又似初生小竹葉而細窄。其莖纖細有節。高尺餘。梢間開花。田野生者。花大如錢。紅紫色。人家栽者。花稍小而嫵媚。有細白粉紅紫赤斑斕數色。俗呼爲洛陽花。結實如燕麥。內有小黑子。其嫩苗燻熟。水淘過。可食。(李時珍)

【瞿麥子】　卽瞿麥之處方用名。詳『瞿麥』條。

【瞿麥草】　卽瞿麥之處方用名。詳『瞿麥』條。

【瞿麥】　**主治**　痔瘻。并瀉血。作湯粥食。又治小兒蛔蟲。及丹石藥發。并眼目腫痛。及腫毒。搗傅治浸淫瘡。并婦人陰瘡。

【瞿麥穗】　卽瞿麥之處方用名。詳『瞿麥』條。

【瞿摩帝肉】　卽牛肉之古籍別名。典見梵書。詳『牛肉』條。

【瞿盧折娜】　卽牛黃之古籍別名。典見金光明經。詳『牛黃』條。

【礦砂】　卽礪砂之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『礪砂』條。

【礦礫】　卽鹽石之古籍別名。典見綱目。詳『鹽石』條。

【禮鼠】　卽黃鼠之古籍別名。典見韓文。詳『黃鼠』條。

【繪】　卽帛之古籍別名。典見綱目。詳『帛』條。

【織女苑】　卽女菀之古籍別名。典見別錄。詳『女菀』條。

【織布娘】　卽草蠭之別名。功效與蠭同。詳『蠭』條。

【繡水團】　卽龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【繡連花】　卽荷花之開時如錦繡者。性質效能與蓮花同。詳『蓮花』條。

【羶羊】　卽黃羊之古籍別名。典見綱目。詳『黃羊』條。

【翹車】　卽翹搖之古籍別名。典見綱目。詳『翹搖』條。

【翹搖】　**命名**　本品莖葉柔婉。有翹然飄搖之狀。故名。

古籍別名　搖車。(爾雅。野蠶豆。小巢菜。苕搖。翹車。(綱目。紫雲英。(植物學大辭典)元修菜。(東坡文集)漂搖草。(陸放翁詩序)

外國名稱　Astragalus sinicus, L.(拉丁)ゲンゲ(日本)

基本　係豆科紫雲英屬。爲翹搖之莖葉。

產地　原野田間多有之。



翹搖

形態　翹搖爲藥類之越年生草本。莖爲羽狀複葉。小葉全邊。春月抽出長花軸。翹然直立。頂端着

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以短總狀花序。花冠紅紫色。實爲莢果。黑中有子。似豌豆。粒小。色綠。農家播種田間。翌年埋入土中。以爲肥料。其莖葉可供食與藥用。

性質　辛平無毒。

主治　破血止血。生肌。擣汁服之。療五種黃病。以瘥爲度。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論翹搖曰。利五臟。明耳目。去熱風。令人輕健。長食不厭。甚益人。【明】李時珍本草綱目論翹搖曰。止熱痛。活血平胃。

參攷資料　翹搖煮食佳。生食令人吐水。（孟詵）

【翹搖子】　**主治**　活血明目。爲末甘草湯下。

【翻山虎】　卽羊躑躅根之別名。詳『羊躑躅』條。

【翻白草】　**古籍別名**　雞腿根。（救荒）天藕。（野菜譜）湖雞腿。（本草綱目）

外國名詞　Potentilla discolor, Bge.（拉丁）ッチグリッチナ　ブクレウサウ（日本）

基本　係薔薇科委陵菜屬爲翻白草之根。

產地　生原野田澤間。

形態　翻白草爲菜類之多年生草本。地下有塊根。早春羽狀複葉布地叢生。各小葉邊緣有齒牙。葉背及柄白毛最多。初夏葉間抽莖。攀頭高達尺餘。莖端分歧。綴以散花。花冠黃色。花後結實。實中有細子。其塊根大如指。長數寸。皮赤。肉白有粉。可供食與藥用。

性質　甘。微苦。平。無毒。

主治　吐血下血。崩中。癰瘍。癤瘡。

【翻翅雞】　卽反毛雞之別名。功效與反毛雞同。詳『反毛雞』條。

【翻胃木】　卽常山之古籍別名。典見和漢藥考。詳『常山』條。

【臍香】　卽麝香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麝香』條。

【臍堂】　卽麝香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麝香』條。

【臍帶】　**命名**　胎在母腹。臍連於胞。胎息隨母。胎出母腹。臍帶旣剪。一點眞元。屬之命門丹田。臍乾自落。如瓜脫蒂。故臍者。人之命蒂也。以其當心腎之中。前直神闕。後直命門。故謂之臍。臍之爲言齊也。

古籍別名　命蒂。坎烝。（綱目）

主治　燒末飲服。止癎。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論臍帶曰。解胎毒。傅臍瘡。

【舊坑砂】　卽硃砂之古籍別名。典見綱目。詳『硃砂』條。

【舊麻布】　**命名**　本品係麻質所織之舊布。故名。

主治　同旱蓮草等分。瓶內泥固煅研。日用揩齒。能固牙烏鬚。

【薯蕷】　**產地**　閩廣諸山中均有出焉。

形態　薯蕷爲蔓草類之一種。葉尖長。節節生小刺。根圓如芋子。又似柚。大小不一。有鬚叢生。皮紫黑。肉紅黃。其根可供藥用。

主治　活血浸酒服。

參攷資料　薯蕷煮汁可染紗絹之屬。爲暑用之衣。謂之薯蕷綢。亦謂之拷綢。（醫學大辭典）

【薯藥】　卽山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。

【薯蕷】　卽山藥之原名。詳『山藥』條。

【薺苨】　**命名**　本品多有濟涫之狀。濟涫者。濃露也。故以名之。

處方用名　空沙參。

古籍別名　杏參（圖經）。蔵苨。（爾雅）杏葉沙參。甜桔梗。（綱目）白麵根。地參。（救荒）土桔梗。（原始）臭蘇賊參。（和漢藥考）

學名　Adenophora remotifolia. Adenophora polymorpha, var alternifolia.

基本　屬桔梗科。爲薺苨之根。

產地　凡山野平原恒有生焉。



薺苨

形態　薺苨爲多年生草本。春日生苗。似桔梗。莖高三四尺。葉作橢圓或長卵圓形。末端帶尖。邊緣有粗鋸齒。長三寸許。有長柄。皆互生。傷其莖葉。則有白汁滲出。夏間梢頭開淡紫色喇叭花。連綴而爲穗狀花序。但多不開足。便已下垂。果實爲圓形之蒴果。根形似紡錘。

867／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

類沙參根。

採取　二八月間採根曝乾。

製法　凡採得水洗。曬乾或蒸製之。

性質　甘。寒。無毒。

效能　利肺止欬嗽。解毒療瘡腫。專作解毒藥。

主治　解百藥毒。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論薺苨曰。食之壓丹石發動。【宋】大明諸家本草論薺苨曰。殺蟲毒。治蛇蟲咬。熱狂溫疾。暑毒箭。【明】李時珍本草綱目論薺苨曰。主咳嗽。消渴。強中。瘡毒丁腫。辟沙蝨。短狐毒。【清】黃宮繡本草求眞論薺苨曰。薺苨卽甜桔梗。似人參而體虛無心。似桔梗而味甘不苦。按據諸書。有因味甘。載能和中止嗽消渴。然力專主解毒。以毒性急迫。甘以和之。故也。觀葛洪肘後方云。一藥而解衆毒者。惟薺苨汁濃飲一升。或煮喝之。亦可作散服。此藥在諸藥中。毒皆自解也。又張鷟朝野僉載云。名醫言虎中藥箭。食清泥而解。野猪中藥箭。壓薺苨而食。物猶知解毒。何況於人乎。觀此。知爲解毒之最。且更能治强中精出。消渴之後。發爲癰疽之症。亦以取其清熱解毒之功。無他義耳。但市肆多取此苗。以僞人參。不可不察。

近人學說　袁淑範曰。試驗液之調製法。取市中販賣之普通純良薺苨一〇〇。搗爲粗末。用蒸餾水再三溫浸之。集合其濾液。用電扇於蒸鍋上蒸發使之乾燥。然後再以五〇・〇之水溶之。後乃更改爲中性液。以供試驗。以下稱之謂水製越幾斯。薺苨之毒力及作用。皆不鮮明。故簡略述之於左。讀者如能明其眞相。亦云足矣。注射其溶液於蛙及小白鼠時。動物雖有時陷於安靜狀態中。然經數分後。無不恢復者。況其大多數。並不現何等之異常症候。如注射其極大量後。動物則先陷於麻痺狀態。經數小時後。乃死去。蓋薺苨對動物之毒性極微弱。用其大量後。對於中樞乃現麻痺之作用也。次乃檢查其對於心臟之作用。依費納氏（Straub-Fehmer）之方法。先將青蛙之心臟提出。用林格氏（Ringer）液灌養之。後乃加薺苨水製越幾斯時。用少量則不現何等作用。大量時則現心臟搏動慢而且小之作用。然於此時加阿刀冰（Atropin）時。搏動則卽恢復。加 $Ba Cl_2$ 時。心臟搏動則卽停止。如此得知薺苨對於心臟之作用。亦只攻擊其支配神經而已。後更檢查其對於血壓及呼吸之作用。此則用家兎試驗之。注射其溶液於靜脈內時。少則不現作用。多則亦不過血壓少少下降。呼吸微許增大而已。皆不堪令人注意者也。至其血壓下降之原因。恐因後逃之血球溶解作用也。薺苨依上述之動物試驗。既知其毒性及作用皆極微弱。次乃更進而追求其成分。以各種之植物鹽基試藥（Alkaloidreagens）試驗。定其成分非屬於植物鹽基。因振盪其水溶液。易生泡沫。疑其爲一種配糖體。乃更用費林氏（Feling）液檢其有無還元力時。則現陽性之反應。後將此水溶液加鑛酸煑沸後。更檢其還元力時。則比先更增大。故其成分爲一種配糖體之證據愈多。次更檢查其有無赤血球溶解作用時。則現著明之血球溶解作用。因此吾人則思其有效成分。恐爲一種 Saponinkorper 故用次之方法提取之。取市中販賣之薺苨。研爲粗末。用熱水 Methyl-alkohol 浸出之。乘熱濾過之。待濾液冷後。再用以脫（Aether）沈澱之。後乃乾燥其沈澱。再溶於 Methyl-alkohol 濾過。再以以脫沈澱之。後乃乾燥其沈澱。再溶之於 Methyl-alkohol 濾過。再以以脫沈澱之。如斯再三反復後。乃得白色無結晶之粉末。本粉末富於引溼性。易溶於水及熱酒精。不溶於以脫奔實。哥羅仿等。溶融點爲一六〇－一八〇度。本粉末之水溶液。有還元費林氏液之力。並且如加鑛酸煑沸後。其還元力亦更增加。本粉末依 Lasaigne 氏法檢查時。並未含有窒素本品之水溶液與薺苨之水製越幾斯同樣。振盪易生泡沫。並能溶解赤血球。依以上之化學及物理的性狀。本粉末爲一種 Saponinkoerper 似無疑意也。薺苨

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中醫雖以爲解毒利肺之要藥。然依余之試驗。其作用不甚鮮明。似不能謂之有特殊之利肺作用也。然則中醫往昔之經驗。豈有謬乎。是則不然。吾人欲强爲之解說時。其解毒作用。因薺苨含有多量之黏滑性物質。能緩和諸種刺戟。並能防礙諸種物質之吸收。故時現解毒之作用。至其利肺之作用。因薺苨含有多量之甘味物質。故如一般糖質同。在矯正藥味之外。能促進咽喉氣管之分泌。使咯痰容易。故如氣管支加答兒等。未嘗不可用之。亦未嘗必不能奏效也。

配合應用　㈠强中消渴。豬腎薺苨湯。治强中之病。壅長興盛。不交精液自出。消渴之後。卽發癰疽。皆由恣意色慾。或餌金石所致。宜此以制腎中熱也。用豬腎一具。薺苨、石膏各三兩。人參、茯苓、磁石、知母、葛根、黃芩、栝樓根、甘草各二兩。黑大豆一升。水一斗半。先煮豬腎。大豆。取汁一斗。去滓下藥。再煮三升。分三服。後人名爲石子薺苨湯。

又薺苨丸。用薺苨、大豆、茯神、磁石、栝樓根、熟地黃、地骨皮、玄參、石斛、鹿茸各一兩。人參、沉香各半兩爲末。以豬肚治淨煮爛。杵和丸梧子大。每服七十丸。空心鹽湯下。（千金方）

㈡治丁瘡腫毒。生薺苨根。搗汁服一合。以滓傅之。不過三度。（金匱方）

㈢治面上皯皰。薺苨、肉桂各一兩爲末。每用方寸匕。酢漿服之。日一服。又滅瘢痣。（聖濟總錄方）

㈣解諸蟲毒。薺苨根搗末。飲服方寸匕立瘥。（陳延之小品方）

㈤解鉤吻毒。鉤吻葉與芹葉相似。誤食之殺人。惟以薺苨八兩。水六升。煮取三升。每服五合。日五服。（金匱方）

㈥解五石毒。薺苨生搗汁多服之立瘥。（圖經方）

用量　八分至錢半。

參弦盜料　㈠薺苨根莖似人參。而葉小異。根味甜。絕能殺毒。以其與毒藥共處。皆自然獃。不正入方家用也。又曰。魏文帝言薺苨亂人參。卽此也。薺苨葉甚似桔梗。但葉下光明。滑澤無毛爲異。又不如人參相對耳。（陶弘景）㈡人參苗似五加而闊短。莖圓有三四極。極頭有五葉。陶引薺苨亂人參誤矣。且薺苨桔梗又有葉互者。亦有葉三四對者。皆一莖直上。葉旣相亂。惟以根有心爲別爾。（蘇恭）㈢今川蜀江浙皆有之。春生苗莖都似人參而小異。根似桔梗。但無心爲異。潤州陝州尤多。人家收以爲果。或作脯喫。味甚甘美。兼可寄遠。二月八月採根曝乾。（蘇頌）㈣薺苨苗似桔梗。根似沙參。故奸商往往以沙參薺苨通亂人參。蘇頌圖經所謂杏參。周憲王救荒本草所謂杏葉沙參。皆此薺苨也。圖經云。杏參生淄州田野。根如小菜根。土人五月採苗葉。治咳嗽上氣。救荒本草云。杏葉沙參。一名白沙根。苗高一二尺。莖色清白。葉似杏葉而小。微尖而背白。邊有人牙。杪間開五瓣白盌子花。根形如野胡蘿蔔。頗肥。皮色灰黝。中間白毛。味甜微寒。亦有開碧花者。嫩苗爆熟。水淘。油鹽拌食。根換水煮亦可食。人以蜜煎充果。又陶弘景註桔梗言其葉名隱忍。可煮食之。治蠱毒。謹按爾雅云。蒠。隱忍也。郭璞註云。似蘇有色。江東人藏以爲菹。亦可瀹食。葛洪肘後方云。隱忍草苗似桔梗。人皆食之。搗汁飲。治蠱毒。據此則隱忍非桔梗。乃薺苨苗也。薺苨苗甘可食。桔梗苗苦不可食。尤爲可證。神農本經無薺苨。止有桔梗。一名薺苨。至別錄始出薺苨。蓋薺苨桔梗乃一類。有甜苦二種。則其苗亦可呼爲隱忍也。（李時珍）㈤愚按神農本經無薺苨。止有桔梗一名薺苨。至別錄始出薺苨。另爲一種。是則可以形似相亂者。在桔梗與薺苨也。第二味俱用根。乃桔梗味苦辛。而薺苨味甘寒。因味以別之。固易明也。卽就時珍所云。薺苨根與沙參根相似。然亦就其味別之。沙參甘淡而寒。且有言其甘而微苦者。若薺苨根。在弘景謂其根味甜絕。能解毒。夫甘能解毒。而味之絕甘而且寒者。更解百藥之毒。是雖與沙參同有甘。而甘之各具者亦大殊。蓋甘而微苦者。卽不能解毒。此別錄之言解百藥毒不爲無據也。故細究其形似。而更精審於味。則庶乎無誤。不致用而罔功矣。（劉潛江）㈥李時珍本草綱目

869／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

薺苨釋名杏參亦名杏葉沙參言其根似沙參葉似杏葉也黃宮繡本草求眞云似人參而無心似桔梗而味甘今市上無薺苨人亦少有識者吾鄉有草葉似杏葉花紫形如鈴鋒根似萊菔時人名之曰鮮沙參採而曝乾入藥名爲南沙參按本草載沙參本無南北之別綱目只云產於沙土者根長而大產於黃土者根矮而小蓋土性之鬆堅使然也吳儀洛本草從新分南北兩種復出一空沙參註即薺苨今人徒知有薺苨之名無復能識薺苨之藥豈不惑哉余考諸本草驗諸藥物爲辨今市上之南沙參即古之薺苨南北沙參功用同毋須泯分人人繫諸口實則榮陽與海南非沙土產者皆可稱之爲南矣

【薺苨】即桔梗之古籍別名。典見本經。詳『桔梗』條。

【薺苨莖】原名　隱忍。葉。

性質　甘。苦。寒。無毒。

主治　主腹臟風壅咳嗽上氣

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論薺苨莖曰。蠱毒腹痛。面目青黃。林露骨立。煮汁一二升飲。

【薺菜】命名　本品濟濟而生。故名。

古籍別名　護生草。細小者名沙薺。莖梗有毛者名莙薘。（綱目）

外國名詞　Capsella Bursa pastoris, Moench.（拉丁）ナツナ　ペンペングサ（日本）

基本　係十字花科薺屬。爲薺菜之莖葉。其子。花詳見各條。

產地　原野間處處有之。

形態　薺菜爲菜類之一。年或越年生草本。莖高數寸至尺餘。下部葉叢生而作羽狀分裂。上部葉作箭形。無柄有缺刻。春夏間開花。花小白色。作總狀花序。結實爲裂果。扁平三角形。中有細子。其嫩莖葉有一種香氣。可供蔬茹與藥用。



薺菜

性質　甘。溫。無毒。

主治　利肝和中。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論薺菜曰。根葉燒灰。治赤白痢極效。【宋】大明諸家本草論薺菜曰。利五臟。根治目痛。【明】李時珍本草綱目論薺菜曰。明目益胃。

【薺菜子】原名　蕘實。

採取　三月三日。四月八日。採之陰乾。

性質　甘。平。無毒。

主治　明目目痛。

歷代記述攷證　【魏】吳普本草論薺菜子曰。治腹脹。【唐】甄權藥性本草論薺菜子曰。補五臟不足。治青盲不見物。【唐】陳士良食性本草論薺菜子曰。去風毒邪氣。治蠱去翳。解熱毒。久服視物鮮明。

參攷資料　㊀薺菜子水調成塊。煮粥作餅。甚黏滑。可充飢。（綱目）㊁薺菜子患氣人食之動冷痰。（甄權）㊂薺菜子不可與鱉同食。令人胸悶。服丹石人不可食。（孟詵）

【薺菜花】主治　療久痢。陰乾研末。煮湯下。

參攷資料　薺菜花布席下。辟

蟲。又辟蚊蠅。（陳士良）

【薺菜粥】主治　明目利肝。

【薺蓼】古籍別名　臭蘇。（日華）青白蘇。（綱目）

外國名詞　Mosla grosseserrata, Maxim.（拉丁）ヒメジソ（日本）

基本　係脣形科薺蓼屬。藥用其莖葉。

產地　多出林野原澤間。

形態　薺蓼爲芳草類之野生草本。莖高尺許。單葉對生。有柄。葉身略作斜方形。葉腋分枝。秋日梢上開脣形花。綴成穗狀。花淡紅色。有香氣。其香略似紫蘇。其莖葉可供藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　冷氣洩痢。生食除胸間酸水。搗碎傅蟻瘻。

參攷資料　㊀薺蓼蘇恭言江左名水蘇爲薺蓼。按水蘇葉有雁齒。氣香而辛。薺蓼葉稍長。其上有毛。氣臭。亦可爲生菜。（陳藏器）㊁薺蓼處處平地有之。葉似野蘇而稍長。有毛。氣臭。山人茹之。味不甚

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

佳。(李時珍)㊁蘇頌葉功用與莖同而發散力較多。(醫學大辭典)

【蘞桑】卽蘿藦之古籍別名。詳『蘿藦』條。

【蘞草】卽佩蘭之處方用名。詳『佩蘭』條。

【蘞梅】卽烏梅之古籍別名。典見綱目。詳『烏梅』條。

【蘞金紙】卽烏金紙之古籍別名。性質功效與烏金紙同。詳『烏金紙』條。

【蘞麥子】卽胡麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡麥』條。

【蘞陸香】卽乳香之原名。詳『乳香』條。

【蘞渠】卽阿魏之古籍別名。典見唐本草。詳『阿魏』條。

【蘞蹄】卽火腿之古籍別名。典見東陽縣志。詳『火腿』條。

【薹】卽香附子之古籍別名。典見爾雅。詳『香附子』條。

【薹芥】卽蕓薹子之古籍別名。典見沛志。詳『蕓薹子』條。

【薹菜】卽蕓薹子之古籍別名。典見埤雅。詳『蕓薹子』條。

【藁本】**命名**　本品根上苗下而似禾藁故名。本者根之謂也。

處方用名　川藁本。

古籍別名　鬼卿鬼新(本經)徽莖(別錄)藁茇(山海經)土芎地新鬼神兒痈山薑蒚保生蘆。(和漢藥考)

外國名稱　Notiosmyrnium japonicum, Miq.(拉丁)

基本　屬繖形科。爲藁本之根。

產地　陳仁山業物生產辨云。藁本產廣東北江樂昌、城口等處。實則凡山野川谷間恒多生焉。

形態　藁本爲深山自生之草本。高三四尺。形狀略類川芎。莖葉俱有疎毛。夏月開白色五瓣花。至秋季結平圓形一分餘之果實。藁本爲經數年亦不枯死大如箸之簇生根。作角質狀。長六七寸。外面呈灰褐色。處處疣起。皮部之厚殆與木部同。內部呈黃白色。味有一種不快收斂性。此謂之眞藁本。或當歸狀藁本。

採取　正二月間採根曝乾。三十日成。

製法　去蘆頭。水洗淨用。

性質　辛。溫。無毒。

效能　散風寒濕邪。療頭腦作痛。用作驅風燥濕藥。又爲癰疽疥癬藥。

主治　婦人疝瘕。陰中寒腫痛。腹中急。除風頭痛。長肌膚。悅顏色。(本經)辟雰露。潤澤。療風邪。鞭曳金瘡。可作沐藥面脂。(別錄)

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論藁本曰。治一百六十種惡風。鬼疰。流入腰痛冷。能化小便通。血去頭風。【宋】大明諸家本草論藁本曰。治皮膚疵虾。酒齄粉刺。瘨疾。【金】張元素珍珠囊論藁本曰。治太陽頭痛。巔頂痛。大寒犯腦痛。連齒煩。【元】李東垣用藥法象論藁本曰。頭面身體皮膚風溼。【元】王好古湯液本草論藁本曰。督脈病。脊强而厥。【明】李時珍本草綱目論藁本曰。治癰疽。排膿內潰。【明】經希雍本草經疏論藁本曰。藁本味辛氣溫。別錄兼苦。從火化也。無毒。入足太陽經。溫能通。苦能洩。大辛則善散。氣厚則上升。婦人疝瘕。陰中寒腫痛。腹中急。皆太陽經寒溼邪爲病也。風頭痛者。風中於太陽經也。此藥正入本經。故悉主之。凡癰疽皆血熱壅滯。毒氣浸淫於肌肉。以致潰爛不收。辛散苦洩。則毒解滯消。肌肉自長矣。悅顏色者。卽去風作面脂之義也。脾雰露療風邪者。辛溫芬芳開發升散之力也。鞭曳金瘡。及甄權治一百六十種惡風。鬼疰流入腰痛冷。能化小便。通血。作沐藥面脂。日華子去皮膚疵虾。酒齄粉刺。元素主太陽經頭痛。巔頂痛。及大寒犯腦。痛連齒煩。東垣主頭面身體皮膚風溼。皆風邪溼氣。干犯太陽經。肋致也。好古主督脈爲病。脊强而厥者。督脈並足太陽經。夾脊而上故也。【清】黃宮繡本草求眞論藁本曰。藁本據青載屬辛溫氣雄。能治太陽風犯巔頂。腦後俱痛。號爲是經要藥。且復言治脊强而厥。並婦人疝瘕。急迫腫痛。此雖病屬下見。及係太陽本經寒溼所致。然非風邪內犯。則病易形。藁本氣味辛溫。性雖上行。而亦下達。非謂用此以治太陽巔頂。頭齒煩痛。功止上建。而於脊强而厥。竟不循經下行

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。且據書言。能治胃風泄瀉。又治粉剌酒鼾。亦是風於太陽。連累而及。治則與之俱治。豈但治風頭痛而已哉。或謂其性頗有類於芎藭。皆能以治頭痛。然一主於肝膽。雖行頭目。而不及於巔頂。一主太陽及督。雖其上下皆通。而不兼及肝膽之爲異耳。但春夏溫熱頭痛。及血虛火炎頭痛者切忌。根紫色。似芎藭而輕虛。氣香味麻。

近人學說　張山雷曰。藁本味辛氣溫。上行升散。專主太陽太陰之寒風寒溼。而能疏達厥陰鬱滯。功用與細辛、川芎、羌活近似。本經主婦人疝瘕。陰中寒。腫痛。腹中急。皆清陽不振。厥陰之氣鬱窒不伸爲病。溫以和之。升以舉之。解結除寒。斯急痛可已。疝瘕可除。而陰虛內熱。肝絡結滯之疝瘕急痛。非其治也。除風頭痛者。升陽以散太陽之寒。正與細辛、芎藭之主頭痛同例。而肝膽陽邪。化風上升之頭痛。正是背道而馳。長肌膚者。亦寒溼除而陽和敷布。氣血乃調。若血虛多火。而肌肉消瘦者。寧非鴆毒。悅顏色者。作爲外治敷藥。亦所以搜肌表之寒溼。別錄所謂沐藥面脂。即是長肌膚之意。若多火而面色虧鬱者。又豈所宜。別錄謂辟穀露潤澤者。溫升助陽。能勝寒溼。此即仲景所謂清邪中上之病。亦即經言陽中穀露之氣也。又謂療風邪。蟬曳。則風寒襲絡而經掣不仁。步履無力之症。庶幾近之。亦有陰虛與力憊覺不用。而肢體蟬曳者。則更非風藥所可妄試。此皆讀古書之不可死於字句間者。若不分虛實。不辨病因。而昧然從事。亦何往而不爲古人所誤耶。

配合應用　㊀治寒邪鬱於足太陽經。頭痛巔頂痛。用藁本、羌活、細辛、川芎、葱白。

㊁治穀露療清邪中於上焦。藁本與木香同用。

㊂治大實心痛。已用利藥。用此激其毒。藁本半兩。蒼朮一兩。作二服。水二鍾。煎一鍾。溫服。（活法機要方）

㊃乾洗頭屑。藁本、白芷等分爲末。夜擦。旦梳垢自去。亦可作面脂。（便民圖纂方）

㊄治小兒疥癬。藁本煎湯浴之。井以浣衣。（保幼大全方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡陰虛火炎及無風寒實邪者禁用。惡薤菇。長青葙子。

參攷資料　㊀邵氏聞見錄云。夏英公病泄。太醫以虛治不效。蜀翁曰。風客於胃也。欲以藁本湯而止。蓋藁本能去風溼故耳。（李時珍）㊁俗中皆用芎藭根鬚。其形氣乃相類。而桐君藥錄說芎藭苗似藁本。論說花實皆不同。所生處又異。今東山別有藁本。形氣甚相似。惟長大耳。（陶弘景）㊂藁本莖葉根味與芎藭小別。今出宕州者佳。（蘇恭）㊃今西川河東州郡及兗州、杭州皆有之。葉似白芷香。又似芎藭。但芎藭似水芹而大。藁本葉細爾。五月有白花。七八月結子。根紫色。（蘇頌）㊄江南深山中皆有之。根似芎藭而輕虛。味麻。不堪作飲也。（李時珍）㊅藁本於流行性腦脊髓膜炎。能緩解劇甚之頭痛與頸部强直。有特效。通常俱應用於婦人之頭痛。（日本漢醫學說）㊆今人只知藁本爲治巔頂頭腦之聖藥。而本經治婦人疝瘕。腹中急。陰中寒等證。皆太陽經寒溼爲病。亦屬客邪內犯之候。故用藁本去風除溼。則中外之疾皆痊。豈特除風頭痛而已哉。（張石頑）

【葉本實】主治　風邪流入四肢。

【藁茇】　即藁本之古籍別名。典見山海經。詳『藁本』條。

【藉姑】　即慈姑之古籍別名。典見別錄。詳『慈姑』條。

【藉豆】　即白扁豆之原名。詳『白扁豆』條。

【藍布裙】基本　藍布裙爲雜草類之一種。可供藥用。

產地　出四川。

主治　脚氣。壯筋骨。

【藍姑草】　即鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳『鴨跖草』條。

【藍青】　即青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青黛』條。

【藍蛇】古籍別名　藍藥（綱目拾遺）

產地　出廣西蒼梧縣諸地。

形態　藍蛇爲蛇類之一種。狀

872／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

如蝮蛇而有約。其尾可供藥用。

採取　從約斷之。頭有毒。取尾用良。

主治　用頭合毒藥。毒人至死。以尾作脯。食之卽解。

【藍菜】卽甘藍之古籍別名。典見千金食治。詳『甘藍』條。

【藍葉】

原名　藍葉汁。

製法　採葉搗汁用。

性質　苦甘寒。無毒。

主治　殺百藥毒。解狼毒。射罔毒。

歷代記述弘證　【南北朝】陶弘景本草集註論藍葉曰。汁塗五心。止煩悶。療蜂螫毒。【明】李時珍本草綱目論藍葉曰。斑蝥芫青。樗雞毒。朱砂。砒石毒。

近人學說　張山雷曰。藍草味苦氣寒。爲清熱解毒之上品。專治溼邪熱病。實熱蘊結。及癰瘍腫毒諸證。可以內服。可以外敷。其用甚廣。又能殺蟲。療諸蟲毒。螫者。盡百蟲之毒。皆由溼熱凝結而成。故凡清熱之品。卽爲解毒殺蟲之品。并能殺蟲者。蟲亦南方溼熱之毒。本爲毒蟲之類。又凡苦寒之物。其性多燥。苟有熱盛津枯之病。苦寒在所顧忌。而藍之鮮者。大寒勝熱而不燥。尤爲清火除中驅良品也。

配合應用　㈠治上氣咳嗽。呷呀息氣。喉中作聲。唾黏。以藍葉水浸搗汁一升。空腹頓服。須臾。以杏仁研汁。煮粥食之。一兩日將息。依前法更服。吐痰盡方瘥。（梅師方）

㈡治飛血赤目。熱痛。乾藍葉切二升。車前草半兩。淡竹葉切三握。水四升。煎二升。去滓。溫洗。冷卽再煖。以瘥爲度。（聖濟總錄方）

㈢治腹中鼈瘕。藍葉一升。搗。以水三升。絞汁服一升。日二次。（千金方）

㈣治天泡熱瘡。藍葉搗傅之良。（集簡方）

㈤治唇邊生瘡。連年不瘥。以八月藍葉一升。搗汁洗之。不過三度瘥。（千金方）

㈥治小兒赤痢。搗青藍汁二升。分四服。（子母祕錄方）

㈦治小兒中蠱。下血欲死。搗青藍汁頻服之。（聖惠方）

㈧治陰陽易病。傷寒初愈交合。陰陽必病。拘急手足拳。小腹急熱。頭不能舉。名陰陽易。當汗之。滿四日難治。藍一把。雄鼠屎三七枚。水煎服取汁。（聖惠方）

㈨治驚癇發熱。乾藍、凝水石等分爲末。水調傅頭上。（聖惠方）

㈩治應聲蟲病。腹中有物作聲。隨人語言。名應聲蟲。病用板藍汁一盃。分五服效。（夏子益奇疾方）

(一)治卒中水毒。搗藍青汁。傅頭身令匝。（肘後方）

(二)治服藥過劑煩悶。及中毒煩悶欲死。搗藍汁服數升。（肘後方）

(三)治卒自縊死。以藍葉汁灌之。（千金方）

(四)治毒箭傷人。藍青搗飲并傅之。如無藍。以青布濃汁飲。（肘後方）

(五)治瘡瘇不快。板藍根一兩。甘草一分。爲末。每服半錢或一錢。取雄雞冠血三二點。同溫酒少許調下。（錢氏小兒方）

(六)治齒齲腫痛。紫藍燒灰敷之。日五度。（聖惠方）

(七)治白頭禿瘡。藍煎汁類洗。（聖濟總錄方）

參攷資料　㈠解毒不得生藍汁。以青襟布濃汁亦善。（陶弘景）

㈡藍汁治蟲多傷。劉禹錫傳信方著其法云。取大藍汁一盃。入雄黃、麝香二物少許。以黏咬處。仍細服其汁。神異之極也。張薦員外住劍南。張延賞判官忽被斑蜘蛛咬頭上。一宿咬處有二道赤色。細如箸。繞項上。從胸前下至心經。兩宿頭面腫疼。大如數升盆。肚漸腫。幾至不救。張公出錢五百千。并薦家財又數百千。募能療者。忽一人應召云可治。張公甚不信之。欲驗其方。其人云不請方。但療人性命爾。遂取大藍汁一盆。以蜘蛛投之。至汁而死。又取藍汁。加麝香、雄黃。更以一蛛投入。隨化爲水。張公因甚異之。遂令點於咬處。兩日悉平。作小瘡而愈。（蘇頌）㈢諸藍形雖不同。而性味不遠。故能解毒除熱。惟木藍葉力似少劣。藍子則專用蓼藍者也。至於用澱與青布。則是刈藍浸水入石灰澄成者。性味不能不少異。不可與藍汁一槩論也。有人病嘔吐。服玉壺諸丸不效。用藍汁入口卽定。蓋亦取其殺蟲降火爾。如此之類。不可不知。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【藍葉汁】卽藍葉搗取之汁。詳『藍葉』條。

【藍實】**命名**　本品莖葉可染碧色故名。

古籍別名　大青子。青黛實。（和漢藥考）蓼藍（嘉祐圖經本草）

外國名詞　Polygonum tinctorium, Lour.

基本　屬蓼科爲蓼藍之實。



藍實（一）



藍實（二）

形態　藍爲遲草類之一年生草本栽植者頗多。莖高一二尺。葉互生。作楕圓或卵圓形。葉柄基部有膜狀鞘。將莖包擁。夏月於莖頂葉腋抽出長梗。開淡紅色小花。相簇作穗狀。花被爲五裂花蓋。花後結赤褐色有光澤之小閉果。可供藥用。

採取　五月六月間採之。

製法　採得洗淨曬乾用。

性質　苦。寒。無毒。

效能　清熱毒。消腫痛。專作解毒藥。

主治　解諸毒。殺蟲蚊疰鬼蠱毒。久服頭不白。輕身。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論藍實曰。塡骨髓。明耳目。利五臟。調六腑。通關節。治經絡中結氣。使人强健少睡。益心力。【唐】蘇恭新修本草論藍實曰。療毒腫。【明】繆希雍本草經疏論藍實曰。藍實味苦寒而無毒。其用主解諸毒。殺蟲蚊疰鬼蠱毒。久服頭不白。頭白者血熱也。藍能涼血而解熱。故令髮不白也。熱去而血得所養。故身輕。其葉汁解百藥毒。解狼毒。射罔毒藥。性論云。藍實味甘。能塡骨髓。益心力。汁止心煩躁。由此觀之。苦寒而兼甘可知矣。日華子又云。治天行熱狂。疔瘡遊風。熱毒腫毒。風瘴。除煩止渴。殺疳。解毒藥毒。箭金瘡血鬪。排膿。小兒熱疳。小兒丹熱。最爲要藥。其功用之廣。具如本草所載。蓼藍最堪入藥。甘藍人食去熱黃。

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無實熱火毒者禁用。

參攷資料　㊀按陸佃埤雅云。月令仲夏令民無刈藍以染。鄭玄言恐傷長養之氣也。然則刈藍先王有禁。制字從監。以此故也。（李時珍）㊁藍實生河內平澤。其莖葉可以染青（別錄）㊂藍有三種。一種葉圓徑二寸許。厚三四分者。堪染青。出嶺南。太常名爲木藍子。陶氏所說。乃是葸藍。其汁抨爲澱。甚青者。本經所用。乃是蓼藍實也。其苗似蓼而味不辛。爲澱。惟作碧色爾（蘇恭）㊃藍處處有之。人家蔬圃作畦種。至三月四月生苗。高二三尺許。葉似水蓼。花紅白色。實亦若蓼子而大。黑色。五月六月採實。但可染碧。不堪作澱。此名蓼藍。卽醫方所用者也。別有木藍。出嶺南。不入藥。有葸藍。可爲澱。亦名馬藍。爾雅所謂箴馬藍是也。又揚州一種馬藍。四時俱有。葉類苦賣菜。土人連根採。服治敗血。江寧一種吳藍。二月內生。如蒿。葉青花白。亦解熱毒。此二種雖不類。而俱有藍名。且古方多用吳藍。或恐是此。故并附之。（蘇頌）㊄藍實卽大藍實也。謂之蓼藍者。非是。乃爾所謂馬藍者。解諸藥毒。不可悶也。實與葉兩用。（寇宗奭）㊅藍凡五種。各有主治。惟藍實專取蓼藍者。蓼藍葉如蓼。五六月開花成穗。細小淺紅色。子亦如蓼。歲可三刈。故先王禁之。葸藍葉如白菘。馬藍葉如苦蕒。卽郭璞所謂大葉冬藍。俗中所謂板藍者。二藍花子並如蓼。藍吳藍長莖如蒿。而花白。吳人種之。木藍長莖如決明。高者三四尺。分枝布葉。葉如槐葉。七月開淡紅花。結角長寸許。蠶蠁如小豆角。其子亦如馬蹄決明子而微小。迥與諸藍不同。而作澱則一也。別有甘藍可食。蘇恭以馬藍爲木藍。蘇頌以葸藍爲馬藍。宗奭以藍實爲大葉藍之實。皆非矣。（李時珍）㊆世上所熟知之藍。蓼藍之外。尚有主要者四種如下。（一）葸藍（大青）係屬十字花科之大青（Isatis tino-

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

loria, L.）爲一年生或越年生草本。莖高二三尺。葉在下部者爲倒卵圓形有柄。在上部者爲披針形無柄。花爲黃色四瓣花。作總狀花序排列。果實爲扁平翅果。日本於享保年中始傳入云。(二)山藍係屬大戟科之山藍（Mercurialis Leiocarva, S. et Z.）產台灣及琉球。爲常綠草本。自生於陰地。莖高一二尺。葉對生。爲橢圓形有長柄。花爲單性花。呈黃綠色也。(三)琉球藍（馬藍）係屬爵牀科之琉球藍（Strobilanthes Flaccidifolius, Nees.）多產於熱帶地方。莖粗有節。葉對生。花爲紫色。(四)木藍係屬豆科之木藍（Indigofela Tinctoria, L.）適於熱帶地方。台灣產頗多。莖作灌木狀。葉爲倒卵圓形小葉合成之羽狀複葉。類槐葉。花爲雜黃色及赤色之蝶形花。俗呼印度藍顏料。即從此植物葉採製之青色天然顏料。玉藍澱之製法。先刈取藍之莖葉。曬乾取葉。葉名揉藍。鋪置棧房中。地板上灑水使之醱酵。經數週後。則葉中所含糖原質分解。生出藍素（Indigotin.）名爲藍將此和水共置臼搗。使成一團。名爲藍球。染坊於藍或藍球加石灰。水灰。麩及水入藍甕。使起乳酸醱酵。則藍素受還元作用。變成白藍。以之溶於鹼液中。於液面浮上藍青色一塊者。卽謂之藍澱或藍花。其味辛苦。性寒無毒。並能解諸毒。小兒禿瘡、熱腫。止血殺蟲。又治噎膈。染坊藍液亦有解諸毒功效。如中河豚毒。服藍液一二碗。其毒卽解。（和漢藥考）

【藍澱】 **命名** 本品係以藍與石灰製成之澄澱物。故名。

性質 辛。苦。寒。無毒。

主治 解諸毒。傳熱瘡。小兒禿瘡。熱腫。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論藍澱曰。止血殺蟲。治噎膈。

配合應用 ㈠治時行熱毒。心神煩躁。用藍澱一匙。新汲水一盞服。（聖惠方）

㈡治小兒熱丹。藍靛傅之。（祕錄方）

㈢治口鼻急瘡。數日欲死。以藍澱敷之。令徧日十度。夜四度。（千金方）

㈣治誤吞水蛭。青靛調水飲。卽瀉出。（普濟方）

參攷資料 ㈠澱。石殿也。其滓澄澱在下也。亦作淀。俗作靛。南人掘地作坑。以藍浸水一宿。入石灰攪至千下。澄去水。則青黑色。亦可乾收。用染青碧。其攪瀏浮沫掠出陰乾。謂之靛花。卽青黛。（李時珍）

㈡澱乃藍與石灰作成。其氣味與藍稍有不同。而其止血拔毒殺蟲之功。似勝於藍。按廣五行記云。唐永徽中。絳州一僧病噎。不可食數年。臨終。命其徒曰。吾死後可開吾胸喉。視有何物。苦我如此。及死。其徒依命開視。胸中得一物。形似魚而有兩頭。徧體悉似肉鱗。安鉢中。跳躍不已。戲投諸昧。雖不見食。皆化爲水。又投諸毒物。亦皆消化。一僧方作藍澱。因以少澱投之。卽怖懼奔走。須臾化成水。世傳澱水能治噎疾。蓋本於此。今方上或以染水厭飲人治噎膈。皆取其殺蟲也。（李時珍）

【藍藤】 **形態** 藍藤爲蔓草類之一種。根如細辛。可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 冷氣咳嗽。煮汁服。

產地 出朝鮮半島。

【藍藥】卽藍蛇之古籍別名。典見本草拾遺。詳「藍蛇」條。

【藍露】卽青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青黛」條。

【藍草】 **古籍別名** 菉竹。（詩小雅）菉葹。（唐本草）黃草。（吳普）鼈草。王芻。（爾雅）蔤草。（許氏說文）鴟脚莎。（綱目）

外國名詞 Arthraxon ciliare, Beauv.（拉丁）コブナグサ　ハチヂヤウカリヤス（日本）

基本 禾本科藍草屬。爲藍草之花、葉、莖、根。

產地 山野川谷均有出。

形態 藍草爲溼草類之越年或一年生草本。細莖布地。莖末豎立。分歧爲數枝。高一二尺。葉廣披針形。或長卵形。有尖端。九月間枝梢着花。集成長穗狀花序。約一寸許。與芒之穗相似。褐紫色。且數花

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



薑草

序常叢生。其汁可作染料。花葉莖等亦可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 久欬上氣喘逆。久寒驚悸。痂疥。白禿瘡氣。殺皮膚小蟲。

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論薑草曰。治身熱邪氣。小兒身熱【宋】大明諸家本草論薑草曰。洗一切惡瘡有效。

參攷資料 (一)薑草生青衣川谷。九月十月採取。可以染作金色。(別錄)(二)青衣縣名。在益州。今處處平澤溪澗側皆有。葉似竹而細薄。莖亦圓小。今荊襄人煮以染黃色。極鮮好。俗名綠蓉草。(蘇恭)

【藏紅花】(一)卽西藏紅花之處方用名。詳『西藏紅花』條。(二)卽紅花之處方用名。詳『紅花』條。

【藏香】**命名** 本品出西藏而香。故名。

古籍別名 吉吉香。(拾遺)

製法 趙恕軒云。王景略曾製藏香。其方云得自拉藏。予求得其法。用速香二片。沉香、黃熟香、黃檀香、廣木香各四兩。春花甘松三柰、玫瑰瓣、母丁香、細辛、檜皮、生軍、排草、乳香、金顏香、唵叭檳油、蘇合油、伽倆水安息各二兩。冰片一兩。右各爲極細末。以頂好榆麵二斤。火硝十兩。化水加老醇酒調和爲香。

主治 殺邪治祟。透斑愈瘡。催生明目。透發痘瘡。

參攷資料 (一)出西藏作團成餅者良。如香炷者次之。色紫黃色。氣甚猛烈。焚之香聞百步外者佳。僞者名京香。不入藥用。又有出打箭爐者。不及西藏出者第一。有紅藏黃藏紫藏之分。藏香有紫黃二色。粗細二種。各處皆有。惟產於巴塘者爲最。(蕭騰鳞)(二)藏香中有一種白色小丸子。焚之氣頗幽爽。亦係番僧所貢。不知何名。其氣香。嗅之可治老人腸燥氣虛便閉。入廁時焚一二丸最妙。亦可治痘。(葉明齋)(三)藏香有黑如墨者。燃之催生甚妙。(朱大駿)(四)藏香有綠色者。云最貴。焚之嗅其烟可清目。不知彼中何草合成。(聞人達遠)

【藏棗】**命名** 本品爲棗樹之產於西藏者。故名。

形態 藏棗爲棗類之一種。其實大者長二寸許。形味絕如南棗。核似蜜蜩形而無仁。其實可供藥用。

主治 補虛勞。定神志。療怯如神。益氣功同人參。

【藐】卽紫草之古籍別名。典見爾雅。詳『紫草』條。

【蕎】卽雀麥之古籍別名。典見外臺。詳『雀麥』條。

【蠐王蛇】卽蠐蛇之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蠐蛇』條。

【蠐蛇】**古籍別名** 王蛇。蠐王蛇。王孛蛇。黑色者名烏蠐。(綱目拾遺)

產地 深山間處處多有之。

形態 蠐蛇爲蛇類之最大者。全體長達二丈餘。有鱗。背鱗小。頭部及眼部鱗大。背色黃褐。有褐色大斑。腹部白色。肛門兩側尙存後脚之跡。額部有天生王字。常蟠居樹間。以伺食物。體大如麋鹿。亦能絞殺而食之。其脂肪熬取之油。可供藥用。

製法 收蠐油銅鍋內熬熟。隨將黃蠟入油內攪勻。油紙攤膏用。

主治 漏瘡貼之。

【蠔蛇草】卽赤車使者之日本名。詳『赤車使者』條。

【蠔蜡】卽蟾蠩之古籍別名。典見漢書。詳『蠩龜』條。

【蠔】卽蟾蠩之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『蟾蠩』條。

【蠔蜞】**基本** 本品卽蟹之生於陂池中。似蠔蠣而大者。

外國名稱 Grapsus sp.



蠔蜞

性質 鹹。冷。有毒。

主治 取膏塗溼癬疽瘡。

【蠔蜞】卽蟹之古籍別名。典見綱目。詳『蟹』條。

【蠔蜡】**基本** 本品卽蟹之小而無毛者。

876／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　功同蟹

【蜷蝑】即蟹之古籍別名。典見綱目詳『蟹』條。

【蟠桃草】即接骨仙桃之古籍別名。典見綱目拾遺詳『接骨仙桃』條。

【蟲蚵】古籍別名　蜈蚣。（爾雅）負勞。蜇蟲。蚱蜢。蟲蟓。（本草綱目）螞蜡。（王立人簡易方）小而色灰者名土磔。（綱目拾遺）

外國名詞　Oxya velox, Fab.

形態　蟲爲卵生蟲類蝗屬之一種。種類甚多。體長寸許。有深灰、黃綠、青黑等色。頭爲三角形。翅爲革質。能飛。後肢腿脚甚大。能跳。夏月卵化而出。長七八分。綠色。冬月蟄土產卵。好食禾稻穀類。實爲農田之害蟲。可供藥用。

種類　㈠在草上者名草蟲。一名負蠜。㈡在土中者名土蟲。一名蠐螬。㈢似草蟲而大者名蟲斯。一名螽蟖。㈣似蟲斯而細長者名蟙蟲。一名蜮蚱。

採取　以大而青黑者入藥用。

性質　辛。平。微毒。

主治　咳嗽驚風。破傷。療折損。凍瘡。瘰癧不出。

配合應用　㈠治鷄驚瘟。其症咳嗽不已。連作數十聲。類哮非哮。似喘非喘。小兒多患此。取穀田內蚱蜢十個。煎湯服。三劑愈。（王氏效方）鷄驚鬱小兒有之。其症如物哽咽。欲吐難出之狀。久之出痰少許。日久必死。治以乾蚱蜢。煎湯服。（百草鏡方）

㈡治破傷風。用霜降後稻田內收方頭灰色蚱蜢。同穀裝入布袋內。曬乾。勿令受濕。致生蟲蛀壞。常曬爲要。遇此症。用十數個。瓦上煅存性。酒下立愈。（救生苦海方）

㈢治痧脹。用蚱蜢五六個。煎湯溫服。（養素園驗方）

㈣治凍瘡。用方頭黃色蚱蜢風乾。煅研。香油和搽。摻亦可。（養素園驗方）

㈤治小兒驚風。用蚱蜢不拘多少。煅存性。砂糖和服。立愈。一方。治急慢驚。量大小人多寡用之。煎服。（李氏表方）用螞蜡焙乾爲末。臺湯調服少許。立愈。（王立人易簡方）

【蟠蟲】即蟲蟓之古籍別名。典見綱目詳『蟲蟓』條。

【蟥蛭】即蛭之古籍別名。典見本經詳『蛭』條。

【蟫魚】即衣魚之古籍別名。典見圖經本草詳『衣魚』條。

【蟬】古籍別名　蚱蟬（本經）蜩。齊女。（本草綱目）馬蜩。最大者名緬馬蟬。（爾雅）蜘蛛。（俗名）

基本　係節肢動物昆蟲類有吻類蟬科之蟬。

形態　蟬爲化生蟲類之一種。種類甚多。體長。頭短。觸角亦短。計有七節。複眼突出。單眼三。吻爲針狀。長短不一。胸背多斑紋。腹部分七節。雄者腹部有鳴器一對。雌者無之。故不能鳴。稱爲啞蟬。翅翼有透明者。有具五色者。前翅比後翅大。前肢腿部粗大。下面有齒。可供藥用。其蛻詳見該條。



蟬

採取　五月間採之。蒸乾。勿令蟲用。

性質　鹹。甘。寒。無毒。

主治　小兒驚癇夜啼。癲病寒熱。（本經）驚悸。婦人乳難。胞衣不出。能墮胎。（別錄）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論蟬曰。小兒癇絕不能言。【唐】甄權藥性本草論蟬曰。小兒驚哭不止。殺疳蟲。去壯熱。治腸中幽幽作聲。

參攷資料　㊀蟬腦煮汁服之。主產後胞衣不下。自有正傳。（陳藏器）㊁蟬主產難下胞衣。亦取其能退蛻之義。聖惠治小兒發癇。有蚱蟬湯。蚱蟬散。蚱蟬丸等方。今人只知用蛻。而不知用蟬也。（李時珍）

【蟬皮】卽蟬蛻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蟬蛻』條。

【蟬衣】卽蟬蛻之處方用名。詳『蟬蛻』條。

【蟬花】　**命名**　本品以其形象花故名。

古籍別名　冠蟬。（禮記）胡蟬。螗蜩。（毛詩）蠽。（綱目）

產地　出蜀中。

形態　蟬花爲蟬類之一種。其頭上有一角。如花冠狀。可供藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　小兒天弔。驚癇。瘈瘲。夜啼。心悸。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論蟬花曰。功同蟬蛻。又止瘧疾。

【蟬退】卽蟬蛻之處方用名。詳『蟬蛻』條。

【蟬殼】卽蟬蛻之處方用名。詳『蟬蛻』條。

【蟬蛻】　**命名**　蟬者。禪也。變化相禪之謂。蓋蠐螬化腹蜣腹蛸者。蟬也。而蛻乃蟬之殼。故名。

處方用名　蟬退。蟬衣。蟬殼。

古籍別名　枯蟬。腹蛸。（別錄）金牛兒。（綱目）蜩甲。蟬皮。（和漢藥考）

外國名稱　Cicada shell.（英）

基本　屬昆蟲類中有吻類。爲幼蟬出地時脫下之皮殼。

產地　陳仁山藥物生產辨云。蟬蛻以浙江省金華府蘭溪縣等爲上。福建次之。惟黃背嶺產者亦佳。

形態　蟬之種類極多。故形態、大小、色彩等亦皆不同。大抵頭部稍方。有一雙複眼與單眼。小觸角。口作吻狀。便於吸收液汁。胸部如簪。腹略作三角式。背部色茶褐或黑。腹部作白粉狀。胸部有翅兩對。足三對。翅透明如膜。而有黑色之網眼與斑點。便於飛翔。止則疊翅作屋脊狀。雄者胸腹間具有起皺鼓之小膜。依呼吸作用而發喧聲。長鳴而使雌者知其所在。雌者產卵樹上。卵孵化爲幼蟲。下樹而入地中。幼蟲之期間。有長至數年者。形狀類似蟋蟀。頭大。觸角長。吸收樹根之液汁而發育。幼蟲之將爲成蟲也。必出地上。至樹上一二尺高處。首足具備。終自背部綻裂而脫皮。此時呼爲木蟬。其皮殼乾燥。則現茶褐色。堅硬而黏有泥土。以之入藥。下品也。又經數日。更上樹三五尺。脫皮如前。且生翅而飛去。此二次所脫之皮殼。較前所脫者。軟而且清浮。藥用乃爲上品。

種類　夏月始鳴大而色黑者曰蚱蟬。曰蜺。曰馬蜩。頭上有花冠者曰螗蜩。曰蠽。曰胡蟬。具五色者曰蜆蜩。此數種之皮殼皆可入藥。小而有文者曰蟟。曰麥蚩。小而色青綠者曰茅蜩。曰茅蠽。秋月鳴而色青紫者曰蟪蛄。曰蛁蟟。曰蜓蚞。曰蛄蛹。其小而色青赤者曰寒蟬。曰寒蜩。曰寒蠍。曰蜆。未得秋風則痞不能鳴者曰啞蟬。曰瘖蟬。二三月間鳴而小於寒蠍者曰蟬母。此數種之皮殼。皆不入藥。

採取　五六月間採收之。

製法　李時珍曰。凡用蛻殼。沸湯洗去泥土翅足。漿水煮過。曬乾用。

性質　鹹。甘。寒。無毒。

效能　散風熱。宣肺氣。發疹痧。治驚癇。用作熱病藥。及爲小兒瘛瘲藥。

主治　鹹甘寒無毒。主治小兒驚癇。婦人生子不下。燒灰水服。治久痢。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論蟬蛻曰。小兒壯熱。驚癇。止渴。【唐】陳藏器本草拾遺論蟬蛻曰。研末一錢。井華水服。治啞病。【宋】寇宗奭本草衍義論蟬蛻曰。除目昏障翳。以水煎汁服。治小兒瘡疹出不快甚良。【明】李時珍本草綱目論蟬蛻曰。治頭風眩暈。皮膚風熱。瘡疹作癢。破傷風及丁腫毒瘡。大人失音。小兒噤風。天弔。驚

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

哭夜啼。陰腫。〔清〕黃宮繡本草求眞。論蟬蛻曰。蟬蛻止一蟲殼。味甘氣寒。如何主治甚多。蓋蟬本木餘氣所化。飲風露而不食。其言能治肝經風熱者。因體氣輕虛。而味甘寒之意也。其言能治婦人生子不下。及退翳膜。浸睛聳肉。滿眥者。因其性有善脫之意也。其言能治皮膚瘡疥癮疹者。以其所取在殼之意也。其言能治中風不語者。以其蟬聲清響之意也。其言能治小兒夜啼者。以其晝鳴夜息之意也。古人立藥治病。何在不有義存。惟在人細自審用耳。色黑而大者良。入藥洗去泥土。翅足漿水煮。曬乾用。

近人學說　張山雷曰。蟬蛻亦作蟬退。一稱蟬衣。王充論衡。謂蟒蟺化腹蝸。腹蝸蜻析背出而爲蟬。近之講昆蟲學者。謂蟬在土中。約有二年之久。造出土蛻殼。生翼而飛。其生命不過二十日。蓋此蟲蟄土最久。得陰氣甚深。故其性寒涼。本經謂蚱蟬主小兒驚癇夜啼。癮病寒熱。別錄謂蚱蟬主驚悸。蟬蛻主小兒驚癇。蓋幼科驚癇內熱爲多。即素問之所謂血與氣并。交走於上。則爲薄厥。（薄音博。迫也。言氣血上壅。迫之爲厥。）亦即西學家之所謂血冲腦。治以寒涼。降其氣火。使不上冲。此所以能治癮癇之眞義也。甄權謂蟬蛻治小兒肚熱。其意亦同。宗奭謂除目昏障翳。治小兒瘡疹出不快。則以此蟲出土即蛻。取其速脫之意。且目之翳膜。兒之痘瘡實熱爲多。寒能勝熱。是以主之。按之古義。本無祛外風。療聲嘶之說。惟陳藏器始有治啞病一說。則是臆見。若謂詩稱鳴蜩。當能助人聲音。抑知蟬以翼鳴。豈能發人之聲。且蟬之有蛻。尙在未飛未鳴之時。而謂能治啞病。可笑孰甚。此未嘗研究物理之眞。而作牛面理想。似是實非。最爲可吃。古人誤會。恒有此蔽。原不足美。今當開明之世。學者必須識得此中眞相。李氏瀕湖。更謂蟬之爲物。飲風吸露。其氣清虛。故主一切風熱。遂於蟬蛻主治條中。加入頭風眩暈。皮膚風熱。破傷風。及大人失音。小兒噤風天吊云云。又是添出許多風病。豈知方其蛻時。風尙未發。露亦未吸也耶。惟蛻是外皮。而性則涼。若謂能療皮膚輕淺之風熱。庶乎近之。瀕湖又謂治痘疹作痒。則實熱有餘者宜之。如其氣虛作痒。不混用。迨至楊氏玉衡。竭力爲此物鼓吹。竟謂輕清疎透。爲治血病聖藥。又謂蛻者退也。脫然無恙云云。措辭尤其鄙陋。究竟無氣無味。豈有能當大任之理。乃偏有以臭腐爲神奇。如楊氏者。不知何以聾障至此。要之不學無術。欺人適以自欺耳。實地極輕。止可偶作佐使之用。自二三分至四五分而止。或用五六枚至十枚亦可。今人恒去嘴足用之。蓋惟取輕揚者耳。

配合應用　㊀治目盲障翳。用蟬蛻、羚羊角、蠶蒙花、白蒺藜、草決明、木賊草、穀精草、甘菊花、夜明沙、生地黃、黃連、女貞實。

㊁治小兒風熱。急驚癇病。用蟬蛻、丹砂、茯神、眞珠、牛黃、雄黃、天竺黃、鉤藤鉤、犀角、珀、琥、全蠍。

㊂治痘瘡血熱。出不快。用蟬蛻、犀角、生地黃、紫草、麥門冬、連翹、金銀花。

㊃治大人小兒痧、癨。用蟬蛻、石膏、鼠黏子、赤檀木、薄荷、玄參、甘草、葛根、梧樓根、麥門冬。

㊄治小兒夜啼。小兒一百二十日內夜啼。用蟬蛻四十九個。去前截用後截爲末。分四服。鉤藤湯調灌之。（心鑑方）普濟蟬花散。治小兒夜啼不止。狀若鬼祟。用蟬蛻下半截爲末一字。薄荷湯入酒少許調下。或者不信。將上半截爲末。煎湯調下。即復啼也。古人立方。莫知其妙。

㊅治小兒驚啼。啼而不哭。煩也。哭而不啼。躁也。用蟬蛻二七枚。去翅足爲末。入硃砂末一字。蜜調與吮之。（活幼口議方）

㊆治小兒天弔。頭目仰視。痰塞內熱。用金牛兒即蟬蛻。以漿水煮一日。曬乾爲末。每用一字。冷水調下。（衛生易簡方）

㊇治小兒噤風。初生口噤不乳。用蟬蛻二七枚。全蠍去毒二七枚。爲末。入輕粉末少許。用乳汁調灌。（全幼心鑑方）

㊈治破傷風病發熱。用蟬蛻炒研。酒服一錢。神效。（醫學正傳方）

又用蟬蛻爲末。葱涎調塗破處。即時取去惡水立效。名追風散。（普

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

濟方）

㈢治頭風旋暈。用蟬殼一兩。微炒爲末。不時酒下一錢。白湯亦可。（聖惠方）

㈡治皮膚風瘙。蟬蛻、薄荷葉等分爲末。酒服一錢。日三。（集驗方）

㈢治痘瘡作癢。蟬蛻三七枚。甘草炙各一錢。水煎服之。（心鑑方）

㈢治痘後目翳。蟬蛻爲末。每服一錢。羊肝煎湯下。（二錢氏方）

㈣治聤耳出膿。蟬蛻半兩燒存性。麝香半錢。炒。共爲末。綿裹塞之。追出惡物效。（海上方）

㈤治小兒陰腫。多因坐地風襲。及蟲蟻所吹。用蟬蛻半兩。煎水洗。仍服五苓散。卽腫消痛止。（危氏方）

㈥治胃熱吐食。清膈散。用蟬蛻五十個。去泥滑石一兩。爲末。每服二錢。水一盞。入蜜調服。（衞生家寶方）

㈦治丁瘡毒腫。不破則毒入腹。用蟬蛻炒爲末。蜜水調服一錢。外以津和塗之。（青囊雜纂方）又用蟬蛻、僵蠶等分爲末。醋調塗瘡四圍。候根出拔去再塗。（醫方大成方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無風熱者禁用。

著名方劑　蟬花散。治肝經蘊熱風毒之氣。內搏上攻。眼目赤腫。翳膜疼痛。昏濶內外障翳。咸治之。（局方）蟬蛻、穀精草、刺蒺藜、甘菊、防風、草決明、蜜蒙花、甘草、羌活、黃芩、蔓荊子、川芎、木賊、草、荊芥等分爲末。每服二錢。菜清調。食後臨臥各一服。

【蟬蝸】卽青蛉之古籍別名。典見綱目詳『青蛉』條。

【蟲白蠟】

命名　本品非蜂蜜之蠟。乃小蟲所作於樹枝間之蠟質。故名。

處方用名　蟲蠟、樹蠟、白蠟。

古籍別名　木蠟（和漢藥考）

外國名詞　Cera Chinensis.（拉丁）（Chinese or Insect Wax.）White wax.（英）

基本　屬漆樹科。爲落葉喬木冬青（shusuocdanee）之果實漿液所成。

產地　凡四川、安徽、雲南、湖南諸省之山谷原野間。恒有生焉。

形態　白蠟爲黃白色有光澤之固塊。比重〇・九七至〇・九八。不溶於水及冷酒精。溶於沸騰酒精、伊打脂肪油等。蓬五十二度至五十五度之溫度熔化。一百五十度而沸騰。蓬苛性鹼則鹼化。

採取　採蠟之法。各國不同。但皆大同小異。今述其一斑如左。冬青十月間葉落。果實成熟時。採取之。入白搗碎。用簀簸分粉與核。於釜中列置木材。上鋪蓆。將粉撒布其上。蒸之。次入麻袋。再蒸。用壓搾器壓搾。採收流出之蠟。入盆冷成餅。謂之生蠟。再恃其入鍋熔化。另用大桶盛冷水。浮置小箱。箱下邊隅有孔。將熔化蠟傾入箱內。則蠟從箱孔流入水中。乃以手揉之。次將其蠟列置蓆上。置日光下曬乾。約二星期。卽變爲白色。謂之曬蠟。（黃蠟之曬白者。亦呼曬蠟。不可與此混同）。櫨蠟曬白法中。有加灰汁法。

性質　甘。溫。無毒。

成分　概爲軟脂（Palmitine $C_3H_5(C_{16}H_{31}O_2)_3$）

效能　續筋接骨。生肌止血。專作膏藥原料。治創傷出血。爲外科要藥。

作用　有直接凝固血液之功。

主治　生肌止血。定痛補虛。續筋接骨。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論蟲白蠟曰。入丸散服。殺瘵蟲。

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無蟲積者禁用。

參攷資料　㈠白蠟爲外科要藥。與合歡皮同入長肌肉膏中。用之神效。但未試其可服否也。（朱震亨）㈡蠟樹葉亦治瘡腫。故白蠟爲外科要藥。正如桑螵蛸與桑木之氣相通也。（李時珍）㈢蟲白蠟與蜜蠟之白者不同。乃小蟲所作也。其蟲食冬青樹汁。久而化爲白脂。黏敷樹枝。人謂蟲尿著樹而然。非也。至秋刮取。以水煮溶。濾置冷水中。則凝聚成塊矣。碎之文理如白石膏而瑩徹。人以和油澆燭。火勝蜜蠟也。（汪機）㈣唐宋以前澆燭。入藥所用白蠟。皆蜜蠟也。此蟲白蠟。則自元以來。人始知之。今則爲日用物矣。四川、湖廣、滇、南、閩

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

嶺、吳越東南諸郡皆有之。以用濆衡永產者爲勝。蠟樹枝葉狀類冬青。四時不凋。五月開白花成叢。結實纍纍大如蔓荊子。生青熟紫。冬青樹子則紅色也。其蟲大如虮虱。芒種後則延緣樹枝。食汁吐涎。黏於嫩莖。化爲白脂。乃結成蠟狀。如凝霜。處暑後則剝取。謂之蠟渣。若過白露。卽黏住難刮矣。其渣煉化濾淨。或甑中蒸化瀝下器中。待凝成塊。卽爲蠟也。其蟲嫩時白色作蠟。及老則赤黑色。乃結苞於樹枝。初若黍米大。入春漸長大如雞頭子。紫赤色。纍纍抱枝。宛若樹之結實也。蓋蟲將遣卵作房。正如雀甕螺蛸之類爾。俗呼爲蠟種。亦曰蠟子。子內皆白卵。如細虮。一包數百。次年立夏日摘下。以箬葉包之。分繫各樹芒種後苞坼。卵化。蟲乃延出葉底。復上樹作蠟。也。樹下要灑淨。防蟻食其蟲。又有水蠟樹。葉微似榆。亦可放蟲生蠟。甜櫧樹亦可產蠟。（李時珍）㊀白蠟係從漆樹科之黃櫨樹（Rhus Succedanea, L.）及漆樹（Rhus Vernicifera, DC.）實所採取之蠟質。此外或從山漆樹（Rhus Trichocarpa, Miq.）等樹實亦可採取。日本藥局方之白蠟係黃蠟。蠟白者。漆樹日本陸羽地方頗多。爲落葉樹。老大者高及三丈。葉爲羽狀複葉。附有七葉至九葉。小葉作卵圓形或橢圓形。六月間開花。垂長穗。呈黃色。果實作扁圓形。大三分許。作黃褐色。鋸傷樹皮。則有漆汁滲出。黃樹櫨爲落葉樹。日本九州及中國產此。老大者高及三丈。葉作羽狀複葉。小葉作長卵圓形。附有九葉至十七葉。六月間於梢頭下垂穗。開黃色小花。果實作扁圓形。大二三分。作黃色。（黃櫨樹或呼黃櫨漆。或呼蠟樹）（和漢藥考）

【蟲損】卽青雌之古籍別名。典見別錄。詳『青雌』條。

【蟲積】卽青雌之古籍別名。典見別錄。詳『青雌』條。

【蟲蟬】卽玉竹之古籍別名。典見吳普本草。詳『玉竹』條。

【蟲蠟】卽蟲白蠟之處方用名。詳『蟲白蠟』條。

【蟛】卽蟹之古籍別名。典見爾雅。詳『蟹』條。

【蟻蝎】卽青蚨之古籍別名。典見綱目。詳『青蚨』條。

【蟻蝎】卽蓬蘽之古籍別名。典見別錄。詳『蓬蘽』條。

【覆盆子】

命名　子似覆盆之形。故名。

古籍別名　茎子。缺盆子。（爾雅）西國草子。蓽撥伽子。（圖經）大麥蓷子。插田藨子。烏藨子。栽秧藨子。馬摶子。陸荊子。（綱目）蘇密那子。（藏器）

外國名稱　Rubus Tokkura, Zieb.

基本　屬薔薇科。其所結之果實。卽覆盆子。

產地　凡山野向陽之林中。恒多產焉。陳仁山藥物生產辨云。產浙江寧波府。六月新。

形態　覆盆子爲亞灌木本。其莖有刺。葉爲複葉。小葉作卵圓形。其邊緣有鋸齒。花紫白色。五出。相綴而爲複繖狀花。雌雄兩全。果實小而攢簇。形如圓錐。或若彈丸。初時色綠。熟則暗紅。

種類　覆盆子。卽莓也。品類甚夥。產於歐美者。凡百五十有餘種。產於日本者。亦四十有餘種。或名之曰蓬蘽。日本向入藥用。歐洲製造之覆盆子糖漿。覆盆子水。覆盆子醋等。其原料係取成熟之新鮮果實爲之。其母植物是否爲莓不可知。學者往往譯作蓬蘽云。㊀一種藤蔓繁衍。莖有倒刺。逐節生葉。葉大如掌。狀類小葵葉。面青背白。厚而有毛。六七月開小白花。就帶結實。三四十顆成簇。生則青黃。熟則紫黯。微有黑毛。狀如熟棣而扁。冬月苗葉不凋者。俗名割田藨。卽本草所謂蓬蘽也。㊁一種蔓小於蓬蘽。亦有鉤刺。一枝五葉。葉小而面背皆青。光潤而無毛。開白花。四五月實成。子亦小於蓬蘽而稀疎。生則青黃。熟則烏赤。冬月苗凋者。俗名插田藨。卽本草所謂覆盆子。爾雅所謂茎。缺盆也。此二種者。俱可入藥。㊂一種蔓小於蓬蘽。一枝三葉。葉面青背淡白。而微有毛。開小白花。四月實熟。其色紅如櫻桃者。俗名蘇田藨。卽爾雅所謂藨者也。故郭璞註云。藨。卽莓也。子似覆盆而大。赤色。酢甜可食。此種不入

881／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藥用。㊀一種樹生者。樹高四五尺。葉似櫻桃葉而狹長。四月開小白花。結實與覆盆子一樣。但色紅爲異。俗亦名蘪。卽爾雅所謂山莓。陳藏器本草所謂懸鉤子者也。蓋懸鉤是樹生。而色紅赤。覆盆是藤生。而色烏赤故也。㊁一種就地引細蔓。節節生根。每枝三葉。葉有齒刻。四五月開小黃花。五出。結實鮮紅。狀似覆盆。而面與蒂則不同也。其根甚細。本草用汁。當是取其莖葉。並根也。仇遠稗史訛作蛇莓。草言有五葉七葉者。又言俗傳食之能殺人。亦不然。止發冷涎耳。

採取　每年四五月間採收。綠色未熟者。烈日曝乾。不爾易爛。若樹莓則不可混採也。

製法　雷敩曰。凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂。取子以酒拌蒸一宿。以東流水淘兩遍。又曬乾方用。李時珍曰。採得搗作薄餅曬乾。蜜貯臨時。以酒拌蒸尤妙。

性質　甘。平。無毒。

成分　爲林檎酸、酒石酸、揮發油、糖分等。

效能　補肝腎。縮小便。强陽事。療陰瘡。用爲滋養强壯藥。

主治　益氣。輕身。令髮不白。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論覆盆子曰。男子腎精虛竭。陰瘡。能令堅長。女子食之有子。【唐】陳藏器本草拾遺論覆盆子曰。食之令人好顏色。榨汁塗髮不白。【宋】馬志開寶新詳定本草論覆盆子曰。補虛續絕。强陰健陽。悅澤肌膚。安和五臟。溫中益力。療勞損。風虛。補肝明目。並宜擣篩。每旦水服三錢。【宋】寇宗奭本草衍義論覆盆子曰。益腎臟。縮小便。取汁同少蜜煎爲稀膏。煎服。治肺氣虛寒。【明】繆希雍本草經疏論覆盆子曰。覆盆子得木氣而生。本經味甘氣平。無毒。甄權微熱。寇宗奭酸甘。深得其義。入足少陰經。其主益氣者。言益精氣也。腎藏精。腎納氣。精氣充足。則身自輕。髮不白也。蘇恭主補虛。續絕。强陰。建陽。悅澤肌膚及和臟腑。甄權主男子腎精虛竭。陰痿。女子食之有子。大明主安五臟。益顏色。養精氣。長髮。强志。皆取其益腎添精。甘酸收斂之義耳。【明】李士材本草圖解論覆盆子曰。覆盆子甘平入腎。起陽治痿。固精攝溺。强腎而無燥熱之偏。固精而無凝澁之害。金玉之品也。【清】黃宮繡本草求眞論覆盆子曰。覆盆子甘酸微溫。性稟中和。功能溫腎而不燥。固精而不凝。故服之陰痿能强。肌膚能澤。臟腑能和。鬚髮不白。女子服之多孕。既有補益之功。復多收斂之義。名爲覆盆子者。服之能使溺盆皆覆也。

辨僞　藥肆中恒以樹莓代充。故多僞品。欲辨眞僞。以酒浸之。其色紅者是眞。

近人學說　張山雷曰。本經止有蓬藟而曰一名覆盆。至別錄乃別出覆盆子。雖氣味主治。與本經蓬藟不同。而性情功用。可以相通。其爲一物。蓋無可疑。御覽引吳普本草。缺盆一名決盆。又引甄氏本草。覆盆子一名陸荊。考說文。藟木也。藟草也。二字有別。二物雖同爲蔓生。然草本藤本各異。覆盆屬蔓草類。則宇當作藟。而本草俱作蓬藟。恐傳寫有僞。又說文。茥。缺盆也。廣雅。蕤。盆陸英莓也。爾雅。蕤。盆。郭注覆盆也。毛詩葛藟纍之。陸璣詩疏。似燕奧亦連蔓。是覆盆、缺盆、陸英、陸荊。皆卽古之所謂藟也。李濒湖綱目詳言一類五種。雖微有別。然亦自言覆盆蓬藟。功用相近。又言實是一類而二種。茲故以本經別錄二者合爲一條。李氏綱目謂蓬藟一名覆盆。出於別錄。茲據孫淵如問經堂輯刻本草經。則出於本經。蓋所據大觀本黑白字之白字。定爲本經也。長陰令堅。綱目引本經令下衍人字。遂不成句。茲據孫本無人字。又曰覆盆爲滋養眞陰之藥。味帶微酸。能收攝耗散之陰氣。而生精液。故寇宗奭謂益腎縮小便。服之當覆其溺器。語雖附會。尙爲有理。本經主安五臟。臟者陰也。凡子皆堅實。多能補中。況有酸收之力。自能補五臟之陰。而益精氣。凡子皆重。多能益腎。而此又專入腎陰。能堅腎氣。故曰長陰令堅。强志倍力有子。皆補益腎陰之效也。久服輕身不老。則極言其功耳。別錄益氣輕身。令髮不白。仍卽本經之意。惟此專養陰。非以助陽。本經別錄並未言溫。其以爲微溫微熱者。皆後人臆測之辭。一似

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

凡補腎者皆屬溫藥。不知腎陰腎陽藥物各有專主。滋養眞陰者。必非溫藥。讀本草者。必以本經爲主。而別錄輔之。後人雜說。徒多紛亂。不可不分別觀之。

配合應用 ㈠治夢遺洩精。用覆盆子、黃蘗、沙苑蒺藜、蓮鬚五味子、砂仁、魚膠、山萊萸。㈡治男子精氣虧乏。中年無子。用覆盆子、車前子、五味子、菟絲子、蒺藜、爲五子衍宗丸。㈢加入巴戟天、鹿腎、補骨脂、鹿茸、白膠、山萊萸、肉蓯蓉、治陽虛陰痿。臨房不舉。或精寒精薄。㈣治陽事不起。覆盆子酒浸焙研爲末。每旦酒服三錢。（集簡方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陽强不倒。小便不利者禁用。

參攷資料 ㈠覆盆蓬蘞。功用大抵相近。雖是二物。其實一類而二種也。一早熟。一晚熟。兼用無妨。其補益與桑椹同功。若樹莓則不可混採者也。（李時珍）㈡佛說蘇密那花點燈。正言此花也。此花有三種。以四月熟。狀如覆盆。味甘美者爲是。餘不堪入藥。今人取茅莓當覆盆誤矣。（陳藏器）㈢處處有之。秦、州、永興、華州尤多。長條。四五月紅熟。山中人及時採來賣。其味酸甘。外如荔枝。大如櫻桃。軟紅可愛。失時則就枝生蛆。食之多熱。收時五六分熟便可採。烈日曝乾。今人取汁作煎爲果。採時着水。則不堪煎。（寇宗奭）㈣蓬蘞子以八九月熟。故謂之割田藨。覆盆以四五月熟。故謂之插田藨。正與別錄五月採相合。二藨熟時色皆烏赤。故能補腎。其四五月熟而色紅者。乃蘇田藨也。不入藥用。陳氏所謂以茅莓當覆盆者。蓋指此也。（李時珍）

【覆盆根】 主治　痘後目翳。取根洗搗澄粉。日乾。蜜和少許。點於翳丁上。日二三次。自散。百日內治之。久即難療。

【覆盆葉】 性質　鹹平。微酸。無毒。

主治　挼絞取汁。滴目中。去膚赤。出蟲如絲線。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論覆盆葉曰。明目止淚。收濕氣。

參攷資料 ㈠按崔元亮海上集驗方。治目暗不見物。冷淚浸淫不止。及青盲天行目暗等疾。取西國草一名畢楞伽。一名覆盆子。日曬乾。搗極細。以薄絹裹之。用飲男乳汁浸。如人行八九里。久用點目中。即仰臥。不過三四日。視物如少年。禁酒麵油物。（蘇頌）㈡按洪邁夷堅志云。潭州趙太尉母病爛弦瘡眼二十年。有老嫗云。此中有蟲。吾當除之。入山取草蔓葉咀嚼留汁。入筒中。還以皁紗蒙眼。滴汁漬下弦。轉盼閒蟲從紗上出。數日下弦乾。復如法滴上弦。又得蟲數十而愈。後以治人多驗。乃覆盆子葉也。蓋治眼妙品。（李時珍）

【覆盆膠】 即阿膠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『阿膠』條。

【覆蕉】 即蘘荷之古籍別名。典見別錄。詳『蘘荷』條。

【覆蘆】 即蒴藋子之古籍別名。典見綱目。詳『蒴藋子』條。

【豐本】 即韭之古籍別名。典見禮記。詳『韭』條。

【豐蘆】 即藜蘆之古籍別名。典見吳普本草。詳『藜蘆』條。

貘 mò

【貘】 命名　本品皮爲坐褥臥氈。能消膜外之氣。故名。

古籍別名　貊（綱目）

外國名詞　Tapirus Tapir（拉丁）バク（日本）

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類之奇蹄類貘科。

產地　出印度、南美諸地之山林及水邊。

形態　貘爲獸類之一種。體形似豚。大小不一。四肢長。短適中。前肢有四趾。後肢有三趾。皆有蹄。皮厚而厚毛短而粗。耳短眼小。尾亦小。鼻長向前突出。爲吻狀。能隨意伸縮。常夜出覓食草木嫩莖幼芽。性柔易馴。其皮可供藥用。

主治　痰之可驅溫癘。辟溼氣邪氣。

【貘屎】 主治　吞銅鐵入腹者。水和服之。卽化爲水。

【貘膏】 主治　癰腫。能透肌膏。

參攷資料　貘膏性利。銅鐵瓦器。庶之悉透。惟以骨盛則不漏。（李時珍）

蹕 bì

【蹕豆】 卽豌豆之古籍別名。典見

883／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

崔實月令。詳『豌豆』條。

【醪醴】卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【醫草】卽艾葉之古籍別名。典見別錄。詳『艾葉』條。

【醬】　命名　本品係用麥、麵豆、米等罨黃加鹽曝而成之調味品。其所以呼爲醬者。以其能制食物之毒。如將之能平暴惡也。

種類　㈠用大豆三升水煮糜。以麵二十四斤。拌罨成黃。每十斤入鹽八斤。井水四十斤。攪囫成油收取之者。名豆醬油。㈡用豆炒磨成粉一斗。入麵三斗。和勻。切片罨黃囫之。每十斤入鹽五斤。井水淹過囫成收之者。名大豆醬。㈢用豆磨淨。和麵罨黃。次年再磨。每十斤入鹽五斤。以臘水淹過囫成收之者。名小豆醬。㈣用豆水浸蒸軟囫乾。去皮。每一斗入小麥一斗。磨麵和切。蒸過舍黃囫乾。每十斤入鹽五斤。水二十斤。囫成收之者。名豌豆醬。㈤用小麥麩蒸熟罨黃囫乾。磨碎。每十斤入鹽三斤。熟湯二十斤。囫成收之者。名麩醬。㈥用小麥麵和劑切片。蒸熟舍黃囫。鋌每十斤入鹽三斤。熟水二十斤。囫成收之者。名甜醬。㈦用麥麵以麵和勻。舍黃囫。搗每一斗入鹽二斤。井水八斤。囫成黑甜而汁清者。名大麥醬。㈧用麻姑餅搗蒸。以麵和勻。舍黃如常。用鹽水囫成。色味甘美者。名麻滓醬。

採取　入藥用以豆醬及陳久者良。

性質　鹹。冷。利。無毒。

主治　除熱止煩。殺百藥及熱湯火毒。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論醬曰。殺一切魚肉菜蔬蕈毒。并治蛇蟲蜂蠆等毒。【明】李時珍本草綱目論醬曰。醬汁灌入下部。治大便不通。灌耳中。治飛蛾蟲蟻入耳。塗瘋犬咬及湯火傷灼。未成瘡者有效。又中砒毒。調水服卽解。【明】繆希雍本草經疏論醬曰。按醬之品不一。惟豆醬陳久者入藥。其味鹹酸冷利。故主除熱止煩滿及湯火傷毒也。能殺一切魚肉菜蔬蕈毒。本經云。殺百藥毒者。誤也。聖人不得其醬不食。朱子云。食肉用醬。各有所宜。玩一宜字。則不宜者必有傷害於人。非特悅口而已。如食蟹用橙醬或蘆醬。食魚用柴胡醬。取其能殺毒之義耳。又有榆仁醬。味辛美。殺諸蟲。利大小便。心腹惡氣。無黃醬主療相同。菜黃醬作法。不用麵豆。鹽。只以河水量菜黃多少。稍稍加石灰。摻入拌勻。甕藏。殺一切魚腥毒。用時洗去石灰。擂爛。烹水族入之良。【清】黃宮繡本草求眞論醬曰。醬本豆與麵熟罨。加鹽與水囫成。雖曰經火經日煎熬。然味鹹性冷。火不勝水。仍爲解熱解毒瀉火之劑耳。是以書載一切魚肉菜蔬蕈毒。皆當用此。以調蛇蟲蜂蠆犬咬毒火砒霜蠱毒。皆當用此以解。與夫手指擊痛。瘡瘍風駁。大便不通。飛蟲入耳。浸淫瘡癬。輕粉毒中。身土乾燥。妊娠下血尿血等症。無不當用此以治。但此氣鹹性冷。小兒過服。則恐生痰動氣。妊娠合雀肉以食。則恐令兒面黑。所當避也。取豆醬陳久者佳。【清】王士雄飲食譜論醬曰。醬純以白麵造者。鹹甘而平。調饌最勝。豆醬以金華蘭谿造者佳。鹹平。菉油則豆醬爲宜。日曬三伏。晴則夜露。深秋第一篘者勝。名秋油。卽母油。調和食味。葷素皆宜。痘痂新脫時食之。則瘢黑。嘉興造者鹹寒。以少日曬之功也。油亦質薄味淡。不耐久藏。瘡及湯火傷未成瘡者。以醬塗之。中砒毒。豆醬調水服。胎氣上衝及虛逆嘔吐。好醬油開水調服。亦解雅片毒。

參攷資料　㈠小麥醬殺藥力不如豆醬。又有麋鹿兎雉及鱧魚醬。皆不可久食也。（孟詵）㈡聖人不得醬不食。意欲五味和五臟。悅而受之。此亦安樂之一端也。（寇宗奭）㈢麵醬、鹹豆醬、甜醬、豆油、大麥醬、麩醬。皆鹹甘。（李時珍）㈣多食發小兒無辜生痰動氣。妊娠合雀肉食之。令兒面黑。（孟詵）㈤麥醬和鯉魚食。生白瘖。（蘇頌）

【醬瓜】卽越瓜之俗名。詳『越瓜』條。

【醬瓜天麻】卽天麻之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見綱目。詳『天麻』條。

【醬板豆草】卽馬牙半支之古籍別名。典見家寶方。詳『馬牙半支』條。

【醬茄】基本 此卽人家醬中食茄也。陳年者佳。

主治 擠汁滴入耳內。治耳膿。燒灰爲末。擦牙疼。燒灰和麝香輕粉。貼腹內鼈瘕。

【醬瓣半支】卽馬牙半支之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『馬牙半支』條。

【醬瓣草】㊀卽醬瓣半支之別名。詳『馬牙半支』條。㊁卽地錦之別名。詳『地錦』條。

【鎊羊角】卽羚羊角之處方用名。詳『羚羊角』條。

【鎖陽】命名 本品功能與陽起固精故名。

處方用名 製鎖陽。

外國名詞 Balanophora

基本 爲菌類生化之一種。

產地 陳仁山藥物生產辨云。鎖陽山西、陝西、河南等省均有出產。

形態 鎖陽發起如筍。上豐下儉。鱗甲櫛比。筋脈達絡。狀類男子陽具。卽肉蓯蓉之一類。

製法 掘取洗淨。去皮。薄切。曬乾用。

性質 甘。溫。無毒。

效能 潤腸通便。祕。補陽起陰。痿。用作滋養强壯藥。

主治 大補陰氣。益精血。利大便。虛人大便燥結者。啖之。可代蓯蓉。煮粥彌佳。不燥結者勿用。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目。鎖陽曰。潤燥養筋。治痿弱。【明】李士材本草圖解。論鎖陽曰。鎖陽甘溫入腎。補陰益精。潤燥養筋。凡大便燥結。腰膝軟弱。珍爲要藥。酒潤焙用。【清】黃宮繡本草求眞。論鎖陽曰。鎖陽本與蓯蓉同爲一類。甘鹹性溫。潤燥養筋。凡陰氣虛損。精血衰敗。大便燥結。治可用此以啖。幷代蓯蓉。煮粥彌佳。則知其性雖溫。其體仍潤。未可云爲命門火衰必用之藥也。故書有載大便不燥結者勿用。益知性屬陰類。卽有云可補陽。亦不過云其陰補而陽自興之意。豈眞性等桂附而爲燥熱之品哉。但古人表著藥功。多有隔一隔二立說。以致茫若觀火。究之細從藥之氣味形質考求。則執陰執陽自爾立見。又奚必沾沾於書之治功是求者乎。狀類男陽。宜用酥炙。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡便瀉不實及陽易舉者禁用。

書名方劑 鎖陽丹。治脫精滑泄。(沈氏尊生方)桑螵蛸三兩。龍骨。茯苓各一兩。共研末。煉蜜爲丸。梧子大。每服七十丸。鹽湯下。

【鎮山威】卽鹿角之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿角』條。

【鎮風石】卽明礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『明礬』條。

【鎮頭迦】卽柿之古籍別名。典見綱目。詳『柿』條。

【雙珠草】卽狗卵草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『狗卵草』條。

【雙鉤鉤】卽鉤藤之處方用名。詳『鉤藤』條。

【雙頭蓮】古籍別名 催生草。(綱目)

基本 雙頭蓮爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 搗貼牙疳。並利小便。消腫脹。

【雙鬱菊】卽草烏頭之日名。詳『草烏頭』條。

【蓑】㊀卽蘼蕪之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『蘼蕪』條。㊁卽鴟鴞之古籍別名。典見爾雅。詳『鴟鴞』條。

【蓑苻】卽水楊之古籍別名。典見綱目。詳『水楊』條。

【蓬菌】命名 蓬作蚩。乃蘆蓬之屬。本品生於其下。故名。

古籍別名 蓬蘆。(本經)

產地 生蘆葦池澤中。鹹鹵地亦多有之。

形態 蓬菌爲菜類菌類之一種。其菌色白。輕虛。表裏相似。與菜菌不同。秋雨時行。卽生。天旱久雨。卽稀。採得可供藥用。

採取 八月採之。陰乾。

性質 鹹。平。有小毒。

主治 心痛。溫中。去長蟲。白癜。蟲蛇螫毒。癥瘕諸蟲。(本經)疽。蝎。去蚘蟲。寸白。噩瘡。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

885／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性本草論蕈菌曰除腹內冷痛。治白禿。

施用宜忌　長雞子。得苦酒良。

【蕈蘑】卽蕈菌之古籍別名。典見本經。詳『蕈菌』條。

【雞】

命名　雞者。稽也。能稽時也。故名。

處方用名　雞汁。雞肉。

古籍別名　燭夜。蜀莉。鴟角雞。（綱目）

基本　屬鳥雞類。藥用諸雞之肉。

產地　各處咸有產焉。

形態　雞本爲產於東印度、爪哇地方之野雞（Gallus bankiva, Briss）捕歸而飼養之。後大加改良。始成現在之家雞。雞之形狀及大小。均不一致。頭上皆有肉冠。或頂毛冠。嘴極堅硬。尖端頗銳。便於啄食蟲類或穀實。脚亦强健。恃以抓地而覓食。物雄者羽毛美麗。姿勢亦甚雄壯。嘴下懸有血色之肉垂。且則啼而報時。其脚有距。用爲禦敵之具。雌者矮小。羽毛不如雄之可觀。每產卵後往往須抱卵十枚內外。約經二十一日。卽孵化爲雞。

性質　甘。溫。無毒。

效能　溫中氣。補虛羸。用作滋養强壯藥。

主治　女人崩中漏下。赤白帶。通經。殺惡毒。辟不祥。（本經）補虛溫中。止血。能愈久傷乏瘡不瘥者。（別錄）

歷代記述攷證　【清】王士雄隨息居飲食譜論雞肉曰。雞甘溫。補虛煖胃。强筋骨。續絕傷。活血調經。拓癰疽。止崩帶。節小便類數。主娩後虛羸。以驅過細皮肥大而嫩者勝。肥大雌雞亦良。若老雌雞熬汁最佳。烏骨雞滋補功優。多食生熱動風。凡時感前後。痘疹後。瘡瘍後。癆瘵、痢疾、肝氣、目疾、喉證、腳氣、諸風病皆忌之。未驅者愈老愈毒。諸病均不可食。惟辟邪宜用丹雄雞也。

近人學說　丁福保曰。雞有棲息山野與飼養人家者之二種。其生育之法各異。故其成分亦稍有不同。然大都甘溫無毒。且頗有美味。丹雞之肉。能補虛黃雞有益於老人。要之皆有滋養之大益者也。

參攷資料　㈠雞類甚多。五方所產大小形色。往往亦異。朝鮮一種長尾雞。尾長三四尺。遼陽一種食雞。一種角雞。味俱肥美。大勝諸雞。南越一種長鳴雞。晝夜啼叫。南海一種石雞。潮至卽鳴。蜀中一種鸑雞。楚中一種倉雞。並高三四尺。江南一種矮雞。脚纔二寸許也。雞在卦屬巽。在星應昴。無外腎而廚小腸。凡人家無故羣雞夜鳴者。謂之荒雞。主不祥。若黃昏獨啼者。主有天恩。謂之盜啼。老雞能人言者。牝雞雄鳴者。雄雞生卵者。並殺之。卽已俚人畜雞無雄。卽以雞卵告竈而伏出之。南人以雞卵畫墨煮熟。驗其黃以卜吉凶。又以雞骨占年。其鳴也知時刻。其棲也知陰晴。太清外術。言蓄蟲家之雞。輒飛去。萬畢術言其羽焚之。可以致風。五行志言雄雞毛燒着酒中酒飲之。所求必得。古人言雞能辟邪。則雞亦靈禽也。不獨充庖而已。（李時珍）㈡雞有五色者。玄雞白首者。六指者。四距者。雞死足不中者。並不可食。害人。（孟詵）㈢延壽書云。肉令人作癰成漏。男女虛乏。（李時珍）㈣小兒五歲以下食雞生蚘蟲。雞肉不可合葫蒜芥李食。不可合犬肝犬腎食。並令人洩痢。同兎食成痢。同魚汁食成心痕。同鯉魚食成癰瘍。同獺肉食成遁尸。同生葱食成蟲痔。同糯米食生蚘蟲。（陶弘景）

【雞子】卽雞蛋之原名。詳『雞蛋』條。

【雞子白】

原名　卵白。

命名　本品係雞卵中之白質。故名。

別名　蛋青。蛋精。（新中藥）

外國名詞　Ori Albumen.（拉丁）Egg Albumen.（英）

形態　色白而潔。質稠如水。煮熟則凝結而起玉色。

性質　甘。微寒。無毒。

成分　雞卵之白部。自八十三至八十九分之水分。十二至十五分之蛋白質。及砂糖脂肪、曹達鹽、炭酸鹽、硫酸鹽等各種之成分而成。

效能　清風熱。治腫毒。用作解熱瘡瘍藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　目熱赤痛。除心下伏熱。止煩滿。咳逆。小兒下泄。婦人產難。胞衣不出。並生吞之。醋浸一宿。療黃疸。破大煩熱。

歷代配伍應用　【唐】陳藏器本草拾遺論雞子白曰。產後血閉不下。取雞子白一枚入醋一半攪服。【明】李時珍本草綱目論雞子白曰。和赤小豆末塗一切熱毒、丹腫、顯痛神效。冬月以新生者酒漬之。密封七日取出。每夜塗面去黯。鹽炮。令人悅色。【清】黃元御長沙藥解論雞子白曰。雞子白味甘氣腥。微寒入手太陰肺經。療咽喉之腫痛。發聲音之暗啞。傷寒苦酒方。（方在苦酒）治少陰病。咽中生瘡。聲音不出用之。以其消腫痛而發聲音也。其諸圭治塗鼻瘡。治發黃。傅腫痛。洗燒灼。

國外學說　英美學說謂雞蛋青之質。不特卵屬有之。即精血乳內與動物植物汁內皆有之。血內所含者爲血精。乳內所含者爲乳精。蛋內所含者爲蛋精。動物內所含者總稱動物精。植物內所含者總稱植物精。雞蛋青之功用。能作潤劑。養生。解汞綠及膽礬（一名藍礬）之毒。配水藥類之混濁者。若加以蛋青少許。即可變清。

配合應用　㈠治時行發黃。醋酒浸雞子一宿。吞其白數枚。（肘後方）

㈡治下痢赤白。生雞子一個取白。攤連紙上。日乾。摺作四重。包肥烏梅十個。安熨斗中。以白炭燒存性。取出。椀覆冷定。研末。入水銀粉少許。大人分二服。小兒三服。空心井華水調下。如覺微利。不須再服。（類證方）

㈢治虻蟲攻心。口吐清水。以雞子一枚去黃。納好漆入雞子殼中。和合。仰頭吞之。蟲即出也。（古今錄驗方）

㈣治五種遁尸。其狀腹脹。氣急沖心。或磉磈踊起。或牽腰脊。以雞卵白七枚。頓吞之良。（千金方）

㈤治咽塞。鼻瘡及乾嘔。頭痛。食不下。用雞子一枚。開一竅。去黃留白。着米醋。煖火燉沸。取下。更燉如此三次。乘熱飲之。不過一二度即愈。（普濟方）

㈥治面生皰瘡。雞子以三歲苦酒浸之。三宿。待軟。取白塗之。（肘後方）

㈦治湯火燒灼。雞子清和酒調洗。勤洗。即易生肌。忌發物。或生傅之亦可。（經驗祕方）

㈧治頭髮垢膩。雞子白塗之。少頃洗去。光澤不燥。（瀕湖方）

㈨面黑。令白。雞子三枚。酒浸。密封四七日。每夜以白傅面。如雪白也。（普濟方）

㈩塗面駐顏。雞子一枚開孔。去黃留白。入金華胭脂及砂少許。紙封。與雞抱之。俟別卵抱出。以塗面。洗之不落。半年尚紅也。（普濟方）

用量　一枚至二枚。

施用宜忌　凡無風熱鬱火者禁用。

參攷資料　㈠產後血暈。身瘛直口目向上。牽急不知人。取雞子一枚。去殼。分清。以荊芥末二錢調服。即安。甚敏捷。爲雞子尤善。（寇宗奭）㈡雞蛋清又名蛋精。西名阿布門。化名炭輕淡養磺。此質不但卵屬有之。精血乳內亦含之。且舉凡動物植物汁內皆有。書中所云蛋清類者。即此。醫家所云此質血內所含爲血精。乳內所含爲乳精。蛋內所含爲蛋精。動物所含總爲動物精。植物所含總爲植物精。功用詳萬國藥方卷五・一百零三篇。（陳仁山）

【雞子苹】　即苹子之古籍別名。典見綱目。詳『苹子』條。

【雞子黃】　**原名**　卵黃。雞卵黃。

命名　本品係雞卵中之黃。故名。

產地　各地咸有出。

形態　卵黃形圓如球。色黃質厚。煑熱則體尤膩重。

性質　甘。溫。無毒。

成分　雞卵之黃部。自五十四分之水。七十一分之蛋白質。二十九分之含酸脂肪。及剝篤亞斯新。巍燐酸。鹽酸。酸化等而成。

效能　清熱。補陰。用作解熱解毒藥。

歷代配伍應用　【宋】日華諸家本草論雞子黃曰。炒取油和粉。傅頭瘡。【明】李時珍本草綱目論雞子黃曰。辛。乾嘔者。生吞數枚良。小便不通者。亦生吞數枚次效。補

887／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

陰血。解熱毒。治下痢甚驗。【清】黃元御長沙藥解論雞子黃曰。雞子黃味甘微溫。入足太陰脾。足陽明胃經。補脾精而益胃液。止泄利而斷嘔吐。傷寒黃連阿膠湯用之。治少陰病心中煩。不得臥者。以其補脾而潤燥也。金匱百合雞子湯用之。治百合病吐之後者。以其滌胃而降逆也。排膿散用之。以其補中脫而生血肉也。

配合應用 ㈠治赤白下痢。雞卵一枚。取黃去白。入胡粉滿殼。燒存性。以酒服一錢匕。(葛氏方)

㈡治妊娠下痢絞痛。用烏雞子一枚開孔。去白留黃。入黃丹一錢。在內。厚紙裹定。泥固煨乾。爲末。每服三錢。米飲下。一服愈者是男。兩服愈者是女。(三因方)

㈢治子死腹中。雞子黃一枚。薑汁一合。和服當下。

㈣治小腸疝氣。雞子黃攪。溫水服之。三服效。

㈤治小兒癇疾。乳子黃和乳汁攪服。不過三兩枚自定。(普濟方)

㈥治小兒頭瘡。煮熟雞子黃。炒令油出。以麻油膩粉搽之。(事林廣記方)

㈦治鼠瘻已潰。雞卵一枚。米下蒸半日。取黃熬令黑。先拭瘡令乾。以藥納孔中。三度即愈。(千金方)

㈧治腳上臭瘡。熟雞子黃一個。黃蠟一錢。煎油塗之。

㈨治湯火傷瘡。熟雞子一個。取黃炒取油。入膩粉十文。攪勻。掃上。三五日。永除癜痕。(集驗方)

㈩治杖瘡已破。雞子黃熬油搽之。甚效。亦治天泡水瘡。(唐瑤經驗方)

(一)治消滅癜痕。雞子五七枚。煮熟取黃炒黑。拭塗。日三。久久自滅。(聖惠方)

(二)治妊娠胎漏。血下不止。血盡則子死。用雞子黃十四枚。以好酒二升。煮如餳服之。未瘥再作。以瘥爲度。(普濟方)

(三)治耳疳出汁。雞子黃炒油塗之甚妙。(談埜翁方)

用量 一枚至二枚。

施用宜忌 凡脾胃有溼滯者禁用。

參攷資料 (一)雞子黃氣味俱厚。陰中之陰。故能補形。昔人謂其與阿膠同功。正此意也。其治嘔逆諸瘡。則取其除熱引蟲而已。(李時珍)(二)雞子入藥最多。而髮煎方特奇。劉禹錫傳信方云。亂髮雞子膏。治孩子熱瘡。用雞子五枚。煮熟去白。取黃。亂髮如雞子大。相和於鐵銚中。炭火熬之。初甚乾。少頃即髮焦。乃有液出。旋取置椀中。以液盡爲度。取塗瘡上。即以苦參末粉之。頃在武陵生子尊內。便有熱瘡。塗諸藥無益。而日益劇。蔓延半身。晝夜號啼。不乳不睡。因閱本草。髮髮條云。合雞子黃煎之。消爲水。療小兒驚熱下痢。註云。俗中嫗母。爲小兒作雞子煎用髮雜熬之。良久。得汁。與小兒服。去痰熱。主有病。又雞子條云。療火瘡因是用之。果如神效也。(蘇頌)

【雞內金】原名 膍胵裏黃皮。

命名 膍胵音脾鴟。雞肫皮也。近俗諱之。肫內黃皮。爲雞內金者。以其色黃。質韌如金。故名。

處方用名 雞肫皮。炙內金。

古籍別名 雞膍胵(綱目)

外國名詞 Ingluvin.(拉丁) Gizzard Pepsin(英)

基本 爲雞脾中之黃皮。

產地 各地均有出。

形態 雞內金色黃。質韌而有皺紋。乾則堅硬。火煅之。其體胖發。且有臭穢之氣。

性質 甘。平。無毒。

效能 消水穀。治瀉痢。理脾胃。療腫脹。與胃醱相同。用作消化健胃藥。

主治 溲痢。小便頻遺。除熱止煩。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論雞內金曰。止泄精。並尿血。崩中帶下。腸風瀉血。【明】李時珍本草綱目論雞內金曰。治小兒食癪。療大人淋瀝。反胃消酒積。主喉閉乳蛾。一切口瘡及牙疳諸瘡。【明】繆希雍本草經疏論雞內金曰。膍胵卽肫內黃皮。一名雞內金。是也。肫是雞之脾。乃消化水穀之所。其氣通達大腸膀胱。二經有熱。則溲痢遺溺。得微寒之氣。則熱除。而溲痢遺溺自愈矣。煩因熱而生。熱去故煩自止也。今世又以之治諸疳瘡多效。

888／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

配合應用　㊀治小便遺矢。用雞膱胵一具。幷腸燒存性。酒調服。男用雌。女用雄。（集驗方）　㊁治小便淋瀝痛不可忍。雞肫內黃皮五錢。陰乾燒存性。作一服。白湯下立愈。（醫林集要方）　㊂治腸消飲水。雞內金洗曬乾。栝樓根炒五兩。爲末。糊丸梧桐子大。每服三十丸。溫水下日三。（聖濟總錄方）　㊃治反胃吐食。雞膱胵一具。燒存性。酒調服。男用雌。女用雄。（千金方）　㊄治消導酒積。雞膱胵。乾葛爲末等分。麵糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。（袖珍方）　㊅治噤口痢疾。雞內金焙研。乳汁服之。　㊆治小兒瘡疾。用雞膱胵黃皮燒存性。乳服。男用雌。女用雄。（千金方）　㊇治喉閉乳蛾。雞肫黃皮勿洗。陰乾燒末。用竹管吹之。卽破而愈。（青囊方）　㊈治一切口瘡。雞內金燒灰。傅之立效。（活幼新書方）　㊉治鵝口白瘡。雞肫黃皮爲末。乳服半錢。（子母祕錄方）　㊊治走馬牙疳。經驗用雞肫黃皮不落水者五枚。枯礬五錢。研搽立愈。心鑑用雞肫黃皮。燈上燒存性。入枯礬黃柏末等分。麝香少許。先以米泔洗漱後貼之。　㊋治陰頭疳蝕。雞內金不落水拭淨。新瓦焙脆。出火毒爲細末。先以米泔水洗瘡乃搽之。亦治口瘡。（經驗方）　㊌治瘻道生瘡。久不愈。用雞膱胵燒存性爲末。乾貼之如神。（聖濟總錄方）　㊍治脚脛生瘡。雄雞肫內皮洗淨。貼之。一日一易。十日愈。（小山奇方）　㊎治瘡口不合。雞膱胵皮日貼之。　㊏治發背初起。用雞肫黃皮不落水者。陰乾。臨時溫水潤開貼之。隨乾隨潤。不過三五個卽消。（楊氏經驗方）　㊐治發背已潰。用雞肫黃皮同綿絮焙末搽之。　㊑治金瘡瘡蝕。初生如米豆。久則穿蝕。用雞內金焙鬱金等分爲末。鹽漿漱了貼之。忌米食。（聖濟總錄方）　㊒治小兒疣目。雞肫黃皮擦之自落。（集要方）　㊓治雞骨哽咽。活雞一隻打死。取出雞內金洗淨。燈草裹於火上燒存性。竹筒吹入咽內卽消。不可見肉。（攝生方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾弱無積者禁用。

【雞公柴】產地　江西山中皆有之。

形態　叢生緒莖。大根深褐色。葉似鳳仙花葉而寬。葉邊有鋸齒。形對生。梢結紅實。如天竹子而大。其根可供藥用。



雞公柴

主治　和酒煎服。治白濁。

【雞心】別名　大棗（和漢藥考）

主治　辟五邪。

【雞心檳】卽檳榔之處方用名。詳『檳榔』條。

【雞心檳榔】卽大腹子之古籍別名。典見本草綱目。詳『大腹子』條。

【雞爪三稜】卽三稜之古籍別名。典見開寶本草。詳『三稜』條。

【雞爪子】卽枳椇子之俗名。詳『枳椇子』條。

【雞爪花】卽雞脚草之古籍別名。典見汪連仕採藥書。詳『雞脚草』條。

【雞爪蘭花】卽珠蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『珠蘭』條。

【雞汁】㊀卽雞之處方用名。詳『雞』條。㊁卽雞露之原名。詳『雞露』條。

【雞汁粥】基本　本品係以雞肉汁和米煮成之粥。

主治　勞損。

【雞矢】卽雞屎白之古籍別名。典見素問。詳『雞屎白』條。

【雞肉】卽雞之處方用名。詳『雞』條。

【雞肋骨】主治　小兒羸瘦。食不生肌。

889／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【雞舌香】命名　本品卽丁香之雌者。實擊破有順理。解而爲兩形如雞舌故名。

性質　辛。微溫。無毒。

主治　風水毒腫。霍亂心痛。去惡熱。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論雞舌香曰。吹鼻殺腦疳。入諸香中。令人身香。【唐】陳藏器本草拾遺論雞舌香曰。同麝汁塗拔去白鬚。孔中卽生黑者。【雞舌香】卽丁香之古籍別名。典見別錄。詳『丁香』條。

【雞血】性質　鹹。平。無毒。

主治　蹉折骨痛及瘕瘀。中惡腹痛。乳難。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論雞血曰。治刺驢馬被傷。及馬咬人。以熱血浸之。白癜風。癰瘍風。以雄雞翅下血塗之。【明】李時珍本草綱目論雞血曰。熱血服之。主小兒下血及驚風。解丹毒蠱毒。鬼排陰毒。安神定志。

【雞血藤】命名　本品藤汁紅如雞血。故名。

產地　出自雲南順寧境地。蔓生山巖間。

形態　雞血藤爲藤屬之一種。其莖綿亙。長達數十里。粗如椽。細如蓋莖。中空如竹。剖斷流汁。汁色赤如血。皮實細潔。而色淡黃。切開中起六角稜。紅色。如菊花狀。四圍白色。乾之紅處轉突出二三分許。亦有中心作小紅點。乾之而不突起者。其藤可供藥用。膠詳見該條。

主治　補血。行血。通經。活絡。暖腰膝。已風癱。健筋骨。除痠痛。功遜於膠。

【雞血藤膠】基本　本品係用雞血藤汁熬成之膠。

形態　雞血藤膠。於端午日攜斧入山。斫藤取汁。一莖可得汁數升。熬膠。色如渥紅。成塊。儼如赤玉。光潤可愛。以供藥用。

採取　以少許入沸水中。有一線如鷄血走散者爲眞。入藥良。

主治　大補氣血。壯健筋骨。療手足麻木癱瘓。男子遺精白濁。婦女經水不調。赤白帶下。乾血勞症。並男女不能生育。及跌打損傷。心胃氣痛。瘡瘍毒瘀痛。虛損百病。

參攷資料　㈠雞血藤膠。大補氣血。與老人婦女更爲得益。或不飲酒者。早晚用開水化服。亦能奏效。（雲南志）㈡按順寧刊售業單云。順寧府順寧縣阿度吾山產此。又云阿度吾里萬名山寺。龍潭箐所產。載於郡志有二種。其一種起鼓丁。刺者尤佳。或盤屈於地。或附樹而生。伐之中通細竅汁。凝如脂。煮之有香者眞。然云兩種糯者爲雌。放者爲雄。（趙學敏）㈢雞血藤膠治風痛濕痺。性活血舒筋。患在上部。飽食後服在下部。空心酒服。不飲酒者。滾水調服。其色帶微綠。有清香氣。酒服亦能興陽。尤明府（佩蓮）云。此膠治跌打如神。其太夫人一日偶閃跌傷臂。痛不可忍。用山羊血。參三七治之。多不驗。有客教服此膠沖酒一服。其疾如失。其性捷走血分可知。（滇志）㈣順寧土人加藥料煎熬。雞血膏。統治百病。能生血和血。補血破血。又能通七孔。走五臟。宣筋絡。治婦人經水不調。四物湯加減八珍湯加元胡。棗爲引。婦女勞傷氣血。筋骨酸痛。轉筋。牛膝。杜仲。沉香。桂枝。佛手乾。木瓜。穿山甲。五加皮。沙仁。茴香爲引。大腸下血。棒根皮煎湯送下。男子虛弱。八味加減爲引。服此膠忌食酸冷。（趙學敏）

【雞卵】卽雞蛋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雞蛋』條。

【雞卵殼皮】命名　本品卽雞卵殼中之薄白皮。故名。

古籍別名　鳳凰衣（俗名）

主治　久嗽氣結。得麻黃紫苑服立效。

參攷資料　按仙傳外科云。有人偶含刀在口。割舌已垂未斷。一人用鷄子白皮袋之。掇止血藥於舌根。血止。以蠟化蜜調沖和膏敷鷄子皮上。三日接住。乃去皮。只用蜜蠟勤敷七日。全安若無速效。以金鎗藥掇治之。此用鷄子白皮無他。但取其柔輭而薄。護舌而透藥也。（李時珍）

【雞尾毛】主治　小便不禁。雄雞翎燒研酒服。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論鷄尾毛曰。治刺入肉中。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

和男子乳封當出。【明】李時珍本草綱目論鷄尾毛曰。解蜀椒毒。燒煙吸之。并以水調灰服。又治小兒痘瘡後生癰。燒灰和水傅之。

【雞枸子】卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【雞肝】性質　甘。苦。溫。無毒。

主治　起陰。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論雞肝曰。補腎。治心腹痛。安漏胎下血。以一具切。和酒五合服之。【明】李時珍本草綱目論雞肝曰。療風虛目暗。治女人陰蝕瘡。切片納入引蟲出盡良。

【雞肝草】卽兎肝草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『兎肝草』條。

【雞肝粥】基本　本品係以雞肝和米煑成之粥。

主治　補肝虛明目。

【雞豆】卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【雞足】㊀卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。㊁卽山茶黃之古籍別名。典見臭普本草。詳『山茶黃』條。

【雞足草】卽井口邊草之日本別名。詳『井口邊草』條。

【雞味兒】卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【雞抱出卵殼】命名　本品乃雞雛蛻脫之卵殼。故名。

古籍別名　混沌池。鳳凰蛻。（綱目）

主治　研末。磨障翳。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論雞抱出卵殼曰。傷寒勞復。煮令黃黑。爲末。熱湯和一合服。取汁出卽愈。【明】李時珍本草綱目論雞抱出卵殼曰。燒灰油調塗癬。及小兒頭身諸瘡。酒服二錢。治反胃。

【雞盲草】卽遍地金之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『遍地金』條。

【雞肪】性質　甘。寒。無毒。

主治　耳聾。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論雞肪曰。治頭禿髮落。

【雞侯菜】命名　本品宜與雞糞食之。故名。

產地　生嶺南諸地。

形態　雞侯菜爲雜草類之一種。二月生苗。其形如芝。可供藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　溫中益氣。

【雞冠】卽雞冠花之原名。詳『雞冠花』條。

【雞冠石】卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【雞冠血】處方用名　雄雞冠血。

基本　屬鳩鷄類。爲雄鷄頭冠中之血液。

採取　採無時。以三年雄雞之冠血尤良。外塗或內飲用。

性質　鹹。平。無毒。

效能　治中惡驚癎。塗諸瘡蟲毒。用作解毒藥。

主治　烏鷄者主乳難。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論雞冠血曰。治目淚不止。每日點三次良。【宋】日華諸家本草論雞冠血曰。丹雞者。治白癜風。【明】李時珍本草綱目論雞冠血曰。亦點暴赤目。並療經絡間風熱。塗頰治口喎不正。塗面治中惡卒死。飲之治縊死欲絕。及小兒卒驚客忤。塗諸瘡癬蜈蚣蜘蛛毒。馬嚙瘡。百蟲入耳。【明】繆希雍本草經疏論雞冠血曰。雞冠血主乳難。用三年老雄者。取其陽氣充溢也。凡風中血脈。則口角僻喎。冠血鹹而走血。透肌肉。故以之治中風口喎不正。塗頰上效。丹雄雞爲陽禽。冠血乃諸陽之所聚。故能治中惡客忤邪氣。高武瘡疹正宗云。雞冠血和酒服。發瘡最佳。【清】黃宮繡本草求眞論雞冠血曰。雞冠位處至高。精華所聚。凡年久雄雞色赤。尤爲陽氣充盛。故可刺血以治中惡驚悸。及或中風口眼喎斜。用血塗其頰上。卽正。雞血和酒調服。可以使瘡卽發。對口毒瘡。可用血塗卽散。中蜈蚣毒。舌脹出口。可用冠血浸舌。并咽卽消。其效甚衆。

配合應用　㊀治鬼擊卒死。烏雞冠血瀝口中。令嚥。仍破此雞揚心下。冷乃棄之。道邊妙。（肘後方）㊁治卒死。寢死或寢臥。奄忽而絕。皆是中惡。用雄雞冠血塗面上。乾則再上。仍吹入鼻中。并以灰營死人一周。（肘後方）㊂治卒然忤死。不能言。用雞冠血和眞珠丸小豆大。納三四丸入

891／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

口中效。（肘後方）

㈣治卒縊垂死。心口猶溫者。勿斷繩。刺雞冠血滴口中。以安心神。或云男用雌。女用雄。（肘後方）

㈤治小兒卒驚。似有痛處。不知疾狀。用雄雞冠血少許。滴口中妙。（譚氏小兒方）

㈥治小兒解顱。丹雄雞冠上血滴之。以赤芍藥末粉之。甚良。（普濟方）

㈦治陰毒卒痛。用雄雞冠血入熱酒中飲之。暖臥取汗。（傷寒蘊要方）

㈧治女人陰血。女人交接違理血出。用雄雞冠血塗之。（集驗方）

㈨治爛弦風眼。雞冠血點之。日三五度。（聖惠方）

㈩治對口毒瘡。熱雞血頻塗之。取散。（皆效方）

⑪治發背癰疽。用雄雞冠血滴疽上。血盡再換。不過五六雞。痛止毒散。數日自愈。（保壽堂方）

⑫治浸淫瘡毒。不早治。周身殺人。以雞冠血塗之。日四五度。（肘後方）

⑬治燥癬作痒。雄雞冠血頻頻塗之。（汪范方）

⑭治馬咬成瘡。腫痛。可用雞冠血塗之。駁馬用雌雞。牝馬用雄雞。（肘後方）

⑮治蜈蚣咬瘡。雞冠血塗之。亦治蜘蛛咬瘡。（錢相公篋中方）

⑯治中蜈蚣毒舌脹出口是也。雄雞冠血浸舌并咽之。（青囊雜纂方）

⑰治諸蟲入耳。雞冠血滴入即出。（勝金方）

用量　一點至數點。

施用宜忌　凡無實邪者禁用。

【雞冠花】

命名　本品花狀如雞冠。故名。

外國名詞　Celosia cristata, L.（拉丁）

基本　屬莧科。爲雞冠之花與種子。

產地　雞冠花各處皆有。陳仁山藥物生產辨云。雞冠花分紅黃白各色。論雞冠花兩字。本成一球。乃爲雞冠。以市止所賣插瓶之雞冠花爲正。現藥肆所沽之雞冠花。乃單尾直上。不成球體。焉得謂之雞冠花。查確此種係門青花。各處海灘野生。無限之多。既錯於前。勿錯於後。

形態　雞冠爲一年生草本。莖高達二三尺。葉互生。作長卵圓形。或廣披針形。花朵頗小。秋日開於梢頭。色有紅、白、黃三種。聚生爲雞冠花序。種子色黑。粒甚微細。



雞冠花

種植　園圃間恒有栽植。以供玩賞者。

採取　七八月間採花曬乾。

製法　凡使花焙炙。子微炒用。

性質　甘涼無毒。

效能　治痔止痢。用爲痔疾及下痢藥。

主治　痔漏下血赤白。下痢崩中。赤白帶下。分赤白用。

歷代記述攷證　【清】黃元御玉楸藥解論雞冠花曰。雞冠止九竅失血吐血崩漏淋痢。諸血皆止。並治帶淋之證。花與子同功。

配合應用　㈠治吐血不止。白雞冠花、醋浸、炙七次爲末。每服二錢。熱酒下。（經驗方）

㈡治結陰便血。雞冠花、椿根白皮、等分爲末。煉蜜爲丸。梧子大。每服三十丸。黃芪湯下。日二服。（聖濟總錄方）

㈢治囊後下血。白雞冠花并子。炒煎服。（聖惠方）

㈣治五痔紅腫。久不愈。變成瘻瘡。用雞冠花、鳳眼草各一兩。水二盌。煎湯頻洗。（衞生寶鑑方）

㈤治下血脫肛。白雞冠花、防風、等分爲末。糊丸。梧子大。空心米飲每服七十丸。一方白雞冠花炒。慢火燃灰。羌活一兩爲末。每服二錢。米飲下。（永類鈐方）

㈥治經水不止。紅雞冠花一味。乾曬爲末。每服二錢。空心酒調下。忌魚腥豬肉。

㈦治產後血痛。白雞冠花酒煎服之。（李樓奇方）

㈧治婦人白帶。白雞冠花曬乾爲末。每旦空心酒服三錢。赤帶用紅者。（孫氏集效方）

㈨治白帶沙淋。用白雞冠花、苦壺蘆、等分燒存性。空心火酒服之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（摘玄方）

㊀治赤白下痢。雞冠花煎酒服。赤用紅白用白。（集簡方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡非虛症而有積滯者禁用。

參攷資料　雞冠處處有之。三月生苗。入夏高者五六尺。矮者纔數寸。其葉青柔。頗似白莧。榮而窄。梢有赤脈。其莖赤色。或圓或扁。有筋起。六七月梢間開花。有紅白三色。其穗圓長而尖者。儼如青葙子。穗扁卷而平者。儼如雄雞之冠。花大有圍一二寸者。層層卷出可愛。子在穗中。黑細光滑。與莧實一樣。其穗如秕麥狀。花最耐久。霜後始焦。（李時珍）

【雞冠花子】　**性質**　甘。涼。無毒。

主治　止腸風瀉血。赤白痢。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論雞冠花子曰。炒用治崩中帶下。

【雞冠花苗】　**性質**　甘。涼。無毒。

主治　痔疾及血病。

【雞冠蒐子】　即青葙子之古籍別名。典見綱目。詳「青葙子」條。

【雞屎白】　**命名**　本品卽雞之屎。雄者色白。

古籍別名　雞矢（素問）

基本　屬鳥鷄類。爲雄鷄排泄之屎白。

採取　臘月收之。尤取白鷄烏骨者良。

製法　普濟方云。凡使雞矢。性寒。利小便。治臟腹。誠千金不傳之寶也。用臘月乾雞矢白半斤。袋盛。以酒酷一斗。漬七日。溫服三盃。日三。或爲末服二錢亦可。

性質　微寒。無毒。

效能　利二便。消臟腹。用作利尿藥。

主治　消渴。傷寒寒熱。破石淋。及轉筋。利小便。阻遺尿。滅瘢痕。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論雞屎白曰。治賊風風痺。破血。和黑豆炒酒浸服。亦治蟲咬毒。【宋】日華諸家本草論雞屎白曰。治中風失音痰迷。炒服治小兒客忤。蠱毒。兼治白虎風。貼風痛。【明】李時珍本草綱目論雞屎白曰。下氣。通利大小便。治心腹臟腹。消瘕瘀。療破傷中風。小兒驚啼。以水淋汁服。解金銀毒。以醋和塗蜈蚣蛇蜊咬毒。【明】繆希雍本草經疏論雞屎白曰。雞屎白微寒。乃腸胃所出之物。故復能走腸胃。治病。素問云。心腹滿。旦食不能暮食。名爲臟腹。治之以雞矢醴一劑知二劑已。王太僕註云。本草雞矢。並不治蠱脹。但能利小便。蓋蠱脹皆生於濕熱。濕熱脹滿。則小便不利。雞屎能通利下泄。則濕熱從小便而出。臟腹自愈。故曰治濕不利小便。非其治也。本經主石淋。利小便。止遺溺者。正此意耳。轉筋者。血熱也。傷寒寒熱及消渴者。熱在陽明也。瘢痕者。血熱壅滯肌肉也。寒能總除諸熱。故主之也。日華子炒服治中風失音痰迷。陳藏器和黑豆炒酒浸服。治賊風風痺。蓋風爲陽邪。因熱而生。雞屎寒能除熱。雞本與風木之氣相通。取其性本從類之義也。【清】黃宮繡本草求眞論雞屎白曰。雞屎白性寒不溫。用之以治臟腹。石淋。瘢痕。風痺。亦以取其消導利濕。清熱除風之義。

配合應用　㊀治臟腹。旦食不能暮食。由脾虛不能制水。水反勝土。水穀不運。氣不宣流。故令中滿。其脈則沉實而滑。宜雞矢醴主之。（普濟方）諸腹脹大。皆屬於熱。精氣不得滲入膀胱。別走於腑。溢於皮裏膜外。故成脹滿。小便短澁。雞矢性寒。利小便。誠萬金不傳之寶也。用臘月乾雞矢白半斤。袋盛。以酒酷一斗。漬七日。溫服三盃。日三。或爲末服二錢亦可。（何大英）又用雞矢桃仁。大黃各一錢。水煎服。（宣明方）用雞矢炒研。沸湯淋汁。調木香檳榔末二錢服。（正傳方）一方用雞矢。川芎。藭等分爲末。酒糊丸服。

㊁牽牛酒。治一切肚腹。四肢腫脹。不拘臟腹。氣脹。溼腫。水脹等。有蛾眉一個。用此治人得效。其人牽牛來謝。故名。用乾雞矢一升。炒黃。以酒酷三椀。煮一椀。濾汁飲之。少頃。腹中氣大轉動。利下。卽自脚下皮鍼消也。未盡。隔日再作。仍以田螺二枚。滾酒煸食。後用白粥調理。（積善堂經驗方）

㊂治小兒腹脹黃瘦。用乾雞矢

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一兩。丁香一錢爲末。蒸餅丸。小豆大。每米湯下十丸。日三服。（活幼全書方）

㊃治心腹鼈瘕。及宿癥。幷卒得癥。以飯飼白雄雞。取糞同小便於瓦器中。熬黃爲末。每服方寸匕。溫酒服之。日四五服。或雞飯飼之。以消爲度。亦佳。（集驗方）

㊄治食米成瘕。好食生米。口中出清水。以雞矢同白米各半合。炒爲末。以水一鍾調服之。良久。吐出如米形。卽瘥。昔愼恭道病此。飢瘦如勞。蜀僧道廣處此方而愈。（醫說方）

㊅治反胃吐食。以烏骨雞一隻。與水飲四五日。勿與食。將五蒲蛇二條。竹刀切。與食。待雞下糞。取陰乾爲末。水丸。米粟大。每服一分。桃仁湯下五七服。卽愈。（證治發明方）

㊆治中諸菜毒。發狂吐下欲死。用雞矢燒末。水服方寸匕。（葛氏方）

㊇治石淋疼痛。雞矢白。日中半乾。炒香爲末。以酸漿飲服方寸匕。日二。當下石出。（古今錄驗方）

㊈治小兒血淋。雞矢尖白如粉者。炒研糊丸。菉豆大。每服三五丸。酒下四五服效。

㊉治產後遺溺不禁。雞矢燒灰。酒服方寸匕。（產寶方）

㊊治轉筋入腹。其人臂脚直。其脈上下行。微弦。用雞矢爲末。水六合。和方寸匕。溫服。（仲景方）

㊋治中風寒。痙口噤不知人。以雞矢白一升。炒黃。入酒三升。攪澄清。飲。（葛氏方）

㊌治白虎風痛。鋪飯於患處。以丹雄雞食之。良久。取熱糞。封之。取訖。使伏於患人牀下。（孟詵方）

㊍治破傷中風。腰脊反張。牙緊口噤。四肢强直。用雞矢白一升。大豆五升。炒黃。以酒沃之。微烹。令豆澀。下。隨量飲。取汗。避風。（經驗方）

㊎治產後中風。口噤。瘛瘲。角弓反張。黑豆二升。半。同雞矢白一升。炒熟。入清酒一升半。浸取一升。入竹瀝服。取汗。（產寶方）

㊏治角弓反張。四肢不隨。煩亂欲死。雞矢白一升。清酒五升。搗篩。合揚千遍。乃飲。大人服一升。少小五合。日二服。（肘後方）

㊐治小兒口噤。面赤者。屬心。白者。屬肺。用雞矢白如棗大。綿裹。以水一合。煮分二服。一方酒研服之。（千金方）

㊑治小兒緊唇。雞矢白研末傅之。有涎易去。（聖惠方）

㊒治小兒驚啼。雞矢白燒灰。米飲服二字。（千金方）

㊓治頭風痺木。用臘月烏雞矢一升。炒黃爲末。絹袋盛。漬三升酒中。頻頻溫服。令醉。（千金方）

㊔治喉痺腫痛。雞矢白舍之嚥汁。（聖惠方）

㊕治牙齒疼痛。雞矢白燒末。綿裹。咬痛處立瘥。（經驗方）

㊖治鼻血不止。雞矢取有白色半載者。燒灰吹之。（唐氏經驗方）

㊗治牙齒不生。不拘大人小兒。用雄雞矢。雌雞矢十五顆。燔研。入麝香少許。先以針挑破出血。傅之。年高者不過二十日。年少者十日必生。（普濟方）但用烏雌雄雞糞。入舊麻鞋底。燒存性等分。入麝香少許。三日夜不住擦。令熱爲佳。

㊘治耳聾不聽。雞矢白炒半斤。烏豆炒一升。以無灰酒二升。乘熱投入服。取汗。耳如鼓聲。勿訝。（外臺祕要方）

㊙治面目黃疸。雞矢白、小豆、秫米各二分。爲末。分作三服。水下。當有黃汁出也。（肘後方）

㊚治子死腹中。雌雞糞二十一枚。水二升。五合煮之。下米作粥食。（產寶方）

㊛治乳妬乳癰。雞矢白炒研。酒服方寸匕。三服愈。亦治乳頭破裂。（產寶方）

㊜治內癰未成。取伏雞屎。水和服。卽瘥。（千金方）

㊝治頭瘡白禿。雄雞屎末。和陳醬苦酒洗之。（千金方）

㊞消滅瘢痕。以豬脂三升。飼烏雞一隻。三日後取矢。同白芷當歸各一兩。煎十沸。去滓。入鷹矢白半兩。調傅。（外臺祕要方）

㊟治耳中惡瘡。雞矢白炒研傅之。（聖惠方）

㊠治瘰癧瘭瘡。雄雞燒灰。矢。臘豬脂和傅之。（千金方）

㊡治食金中毒未死。取雞矢半升。水淋取汁一升。飲之。日三。（肘後方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊁治絞死未絕。雞矢白如棗大。酒半盞和灌口鼻。（肘後方）

㊂治尸腳坼裂無冬夏者。雞屎煮湯。漬半日。取瘥乃止。（千金方）

㊃治射工溪毒。白雞矢白者二枚。以錫和塗瘡上。（肘後方）

㊄治骨疽不合。骨從孔中出。掘地作坑。口小裏大。深三尺許。以乾雞屎二升。同艾及荊葉搗碎。入坑內。燒令烟出。以疽口就熏。用衣擁之。勿令洩氣。半日。當有蟲出。甚效。（千金方）

㊅治陰毒腹痛。雞糞、烏豆、地膚子。各一把。亂髮一團。同炒烟起。傾入好酒一椀。浸之。去滓。熱服。即止。（生生編方）

㊆治小兒心痛。白烏骨雞屎五錢。曝研。松脂五錢。爲末。葱頭汁和丸。梧子大。黃丹爲衣。每醋湯服五丸。忌生冷硬物。三四日立效。（嬰童百問方）

用量　錢半至三錢。

【雞屎草】卽常山之古籍別名。典見諸家本草。詳『常山』條。

【雞屎礬】卽礬石之有雜色如雞屎者。性質功效與礬石同。詳『礬石』條。

【雞栖子】卽皂莢之古籍別名。典見綱目。詳『皂莢』條。

【雞格】卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳『黃精』條。

【雞桐】產地　生嶺南山野間。

形態　雞桐爲桐之一種。其葉如楝。可供藥用。

主治　足膝風溼痺痛。煮湯洗漾。

【雞神水】製法　擇大雞蛋一個。開一大孔。近莖邊一頭開。勿傷其根。方可活。孔內入雞蛋一枚。仍種地上。俟其發葉。取雞蛋內水。卽雞神水。

性質　甘。涼。

主治　明目去瘴。

【雞桑】卽桑之花葉俱薄者。性質功效與尋常桑葉同。詳『桑葉』條。

【雞翁藤】形態　雞翁藤爲蔓草類之一種。蔓延木上。有葉無花。其莖根可供藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　功同崖椒根。

【雞翅木子】卽相思子之別名。詳『相思子』條。

【雞骨升麻】卽升麻之皮細色青綠者。詳『升麻』條。

【雞骨香】卽降眞香之古籍別名。典見綱目。詳『降眞香』條。

【雞蛋】古籍別名　雞卵。（和漢藥考）雞子。（俗名）

外國名詞　Ovum gallinaceum.（拉丁）

基本　屬鳥鷄類。爲雌鷄所產之卵子。

產地　各地咸有出焉。

形態　卵之形狀。人所共知。卵殼之內。被以白膜。中存卵黃與卵白。卵黃俗呼雞子黃。卵白俗呼雞子白。卵殼色白或作淡褐黃色。有無數細孔。孵化之際。由此流通空氣。若有黴菌自此細孔侵入。卽令全卵腐敗。卵殼內有一層白色強靱之膜。謂卵殼膜。卵白成白蛋白質。內部較外部易於流動。別有薄膜包之。謂之卵白膜。卵黃係白色卵黃與黃色卵黃二種重疊間層而成。因卵黃膜而爲球形。胚盤在卵黃中。爲原形質與核。孵化之際。核自分裂。漸化爲雛。以卵黃與卵白爲其養料。氣室在卵之鈍端。介於卵殼膜與卵白膜之間。爲貯藏空氣之處。產卵後經時過久。其氣室愈增大。

製法　凡採得須密藏。以防壞變。入藥破殼去衣用。

性質　甘。平。無毒。

成分　各種雞卵之成分。頗不一定。然大致相同。卵殼約含炭酸鈣九〇%。燐酸鈣五七%。膠質少許。卵白約含蛋白質一一至一四%。水分若干。卵黃約含卵黃素一五・七%。無燐之蛋白質及脂肪。鹽類各少許。青木清一曾取雞卵十六種。鴨卵兩種。各試驗其成分。檢定之結果。刻於藥學雜誌第二百二十號。茲摘錄如下。（各數字係指各卵之瓦量而言）甲種成分。計水分三九・九二。蛋白質六・九三。脂肪五・〇五。灰分〇・四五。全卵共約五三・六五。乙種計水分三四・一七。蛋白質六・〇八。脂肪六・〇八。灰分〇・三五。全卵共約四七・六〇。丙種計水分三三・一七。蛋白質五・一八。脂肪四・三八。灰分〇・四四。全卵成分四四・一〇。丁種計水

895／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

分二五・七六。蛋白質四・六四。脂肪四・八五。灰分〇三・二。全卵共約三六・一〇。戊種計水分一三・一五。蛋白質二・三五。脂肪三・一一。灰分〇・一六。全卵共約一九・三〇。

效能　鎮心定驚。潤肺寧嗽。用作滋養強壯藥。

主治　除熱火灼。爛瘡癰癤。可作虎魄神物。

歷代記述弦證　【唐】孟詵食療本草論雞子曰。小兒發熱。以白蜜一合。和三顆。攪服立瘥。【唐】陳藏器本草拾遺論雞子曰。益氣。以濁水煮一枚。連水服之。主產後痢。和蠟煎。止小兒痢。【宋】日華諸家本草論雞子曰。鎮心安五臟。止驚安胎。治妊娠天行熱疾。狂走。男子陰囊溼痒。及開喉聲失音。醋煮食之。治赤白久痢。及產後虛痢。光粉同炒乾。止痢痢。及婦人陰瘡。和豆淋酒服。治賊風痲痺。醋浸令壞。傅疵黯。作酒止產後血暈。暖水臟。縮小便。止耳鳴。和蠟炒治耳鳴。聾及痢痢。【明】繆希雍本草經疏論雞子曰。雞子稟生化最初之氣。如混沌未分之形。故卵白象天。其氣清。其性微寒。卵黃象地。其氣濁。其性微溫。卵則兼清濁而爲體。其味甘氣平無毒。丹癇瘛皆火熱爲病。雞子之甘。能緩火之標。平卽兼涼。能除熱。故主癇瘛及火瘡。并治傷寒少陰咽痛神效。【清】黃宮繡本草求眞論雞子曰。雞子性稟生化最初之氣。兼清濁而爲體。味甘氣寒。性專除熱。療火爲風熱癇痙。及傷寒少陰咽痛必用之藥。卽清微寒。性專治熱。解毒。爲目痛赤痛煩滿咳逆。小兒下洩。婦人難產。胞衣不出。癰疽敗腫必用之藥。卽黃微溫。性專利產安胎。但多食則滯。【清】王士雄隨息居飲食譜論雞子曰。雞卵甘平。補血。安胎。鎮心。清熱。開音。止渴。潤燥。除煩。解毒。息風。潤下。止逆。新下者良。並宜打散。以白湯或米飲或豆腐漿攪熟服。若囫圇煮食。性極難熟。雖可果腹。甚不易消。惟帶殼略煮之後。將殼擊碎。再入瓷罐內。多加粗茶葉同煨三日。茶汁既入。蛋亦熟透。剝殼食之。色黑而味香美。不甚閉滯也。多食動風阻氣。諸外感及癰疽疥瘡腫滿肝鬱痰飲。脚氣瘡瘍皆不可食。小兒產婦氣壯者。幸食無恙。弱者多因此成疾。不可不知。

近人學說　㊀丁福保曰。雞子爲健康上有裨益之食物。然依母雞之種類與飼料及飼養法。常生種種之變化。則不免稍有差違。但雞子之有益於人身。而營養上效力甚多。爲世人所確認。惟多量食之。則有妨消化。害胃部。誘起下痢。且其滋味縱豐。非半生半熟者。亦不能以有效。又曰。因自己之食用而飼養雌雞。使之產卵者。若待雌雞產二三卵後而取出之。則不如產後卽次第取出爲宜。如斯取集之卵。雖久經日數。亦無腐敗之虞。蓋雌雞產卵之際。常有多量之熱度者也。又雞性善忤而多疑。產卵之際。疑怖益甚。往往倉皇奔走。選擇產所。故產卵時。尤宜遠離其產所。使之絕無恐怖之念。慮否則致折角產卵。而中止於中途。㊁徐綸曰。雞蛋者。雞之卵子（Ei）也。故一名雞卵。在胎生學上屬於多黃卵子（Dottereichen Ei）。以其富有養卵黃（Dotter）也。亦屬於局在卵黃卵子（Telocithales Ei）。因其養卵黃偏在於一側也。雞卵分卵子與被膜二種。被膜有三。在外者色淡紅而微帶黃色。質堅而脆。名曰卵殼（Schale）。其百分之九十八。由石灰鹽類而成。細察之。見有無數之小孔。爲交通內外。供給卵之呼吸而設。若以沙塗抹之。則卵之死亡。可立而待也。其次曰殼膜（Schalenhant）。爲堅硬白色之膜。凡二層。常互相密結。惟在鈍端則分離。在外者曰殼膜外層。在內者曰殼膜內層。內外二層之間。蓄有空氣。爲卵發育時呼吸之用。名曰氣室。內層最軟。曰蛋白。卽俗所稱雞蛋清是也。由蛋白質、脂肪、鹽類與水而成。爲無色透明輭滑之流動體。中心之眞卵受其保護者也。卵子者。黃色柔輭之流動體。卽俗所謂蛋黃是也。其兩端有紐狀之核。各一條。名曰繫帶（Hakschale）。亦名卵索（Chalazon）。侵入於蛋白之內。以固定卵之位置。使不致旋轉傾覆也。卵子之上方有一核。名曰胚小胞（Kein bloschen）。由Den-

896／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

toplasma 而成。猶人卵之胚小胞。乃雛雞之母細胞也。胚小胞之外爲卵黃名曰養卵黃(Dotter)由多數之卵黃小球而成。可以顯微鏡窺得之。取熟雞蛋切開。見養卵黃作黃色與淡黃色層層相間而成。其淡黃色者名曰白色卵黃(Weisse Dotter)黃色者曰黃色卵黃(Gelbe Dotter)白色卵黃。不甚凝固。黃色卵黃。凝固甚堅。白色卵黃之在胚小胞之下者。形如電燈泡。深入卵子之中央。特名之曰隧宮(Latebra)隧宮與胚小胞之間。爲狀略狹。名曰彭氏核(Pander' sche Kern)胚小胞卽安置於其上。隧宮之周圍。有菲薄之膜。卽由白色卵黃而成。其外卽爲黃色卵黃。黃色卵黃之外。再爲白色卵黃。如此層層相間。而成養卵黃。當卵發育之時。以之爲營養物者也。眞卵與被膜之間。(卽蛋黃與蛋白之間)又有一皺襞膜。名曰卵黃膜。所以包圍眞卵者也。

配合應用 ㊀治天行不解。已汗者。用新生雞子五枚。傾盞中入水。一雞子攪渾。以水一升。煮沸。投入。納少鹽嗳之。令汗出愈。(許仁則方)

㊁治天行嘔逆。食入卽吐。雞子一枚。水煮三五沸。冷水浸。少頃吞之。(外臺祕要方)

㊂治傷寒發狂。煩燥熱極。吞生雞子一枚效。(食鑑方)

㊃治三十六黃急救方。用雞子一顆。連殼燒灰。研。酢一合。和之。溫服。鼻中蟲出爲效。身體極黃者。不過三枚神效。(外臺祕要方)

㊄治身面腫滿。雞子黃白相和。塗腫處。乾再上。(肘後方)

㊅治年深嗽喘。以雞子略敲損。浸尿缸中三四日。煮食。能去風痰。(集成方)

㊆治心氣作痛。雞子一枚。打破。醋二合調服。(肘後方)

㊇治小兒疳痢。肚脹。用雞子一箇。開孔。入巴豆一粒。輕粉一錢。用紙五十重。裹於飯上。蒸三度。放冷。去殼。研。入麝香少許。糊和丸。米粒大。食後溫湯下二丸至三丸。(經驗方)

㊈治預解痘毒。用雞卵一枚。活地龍一條。入卵內。飯上蒸熟。去地龍。與兒食。每歲立春日食一枚。終身不出痘也。(保和方)李氏用雞卵一枚。童便浸七日。水煮食之。永不出痘。李捷用頭生雞子三五枚。浸廁坑內五七日。取出煮熟。與食。數日再食一枚。永不出痘。徐都司得於浙人之方。

㊉治痘瘡赤癍。雞子一箇。酒醋浸七日。白殭蠶二七枚和勻。搽赤塗之甚效。(聖惠方)

㊊治雀卵面皰。雞卵醋浸壞。取出傅之。(聖惠方)

㊋治妊娠時疾。冷胎不動。以雞子七枚。納井中。令冷。取出打破吞之。(子母祕錄方)

㊌病欲去胎。雞子一枚。入鹽三指撮。服。(張文仲方)

㊍治胎動下血。雞子二枚。打破。以白粉和稀食之。(藏器方)

㊎治產後血多不止。烏雞子三枚。醋半升。酒二升。和攪煮取一升。分四服。(拾遺方)

㊏治產後口乾舌縮。用雞子一枚。打破。水一盞攪服。(經驗方)

㊐治婦人白帶。用酒及艾葉煮雞卵。日食之。(袖珍方)

㊑治頭風白屑。新下烏雞子三枚。沸湯五升。攪作三度。沐之甚良。(集驗方)

㊒腋下胡臭。雞子兩枚。煮熟去殼。熱夾。待冷。寒之三叉路上。勿回顧。如此三次效。(肘後方)

㊓治癰疽發背初作。及經十日以上。腫赤燃熱。日夜疼痛。百藥不效者。用孵雞子一枚。新狗屎如雞子大。攪勻。微火熬令稀稠得所。捻作餅子。於腫頭上貼之。以帛包抹。時時看視。覺餅熱卽易。勿令轉動。及歇氣。經一宿。定如日多者。三日貼之。一日一易。至瘥乃止。(千金方)

㊔治蛔蠍蛇傷。用雞子一箇。輕敲小孔。合之。立瘥。亦治蠷螋尿瘡。(兵部手集方)

用量 一枚至二枚。

施用宜忌 凡消化不良而有澀滯者禁用。畏醋醋。

參攷資料 雞蛋油。最能殺蟲。諸瘡破爛癢不可忍。或不收口者。搽之大有神效。其法用雞蛋數個。煮熟剝去殼及蛋白。用黃乾煎枯

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

焦。以淡水半杯沖入。油浮水面。取出冷透用。

【雞項草】卽大薊之古籍別名。典見圖經本草。詳『大薊』條。

【雞涅】古籍別名　陰洛。（別錄）

基本　雞涅爲雜草類之一種。可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　補中止洩痢。療女子白沃。明目。消水腫。祛風寒邪氣。

【雞翔蔆】卽菱實之色碧狀如雞飛者。性質功效與菱同。詳『菱』條。

【雞腎】俗名　雞腰。

主治　齆鼻作臭用一對。與膞前肉等分。入豉七粒。新瓦剖研。以雞子清和作餅。安鼻前引蟲出。

【雞菌】卽雞堶之古籍別名。典見綱目。詳『雞堶』條。

【雞距子】卽枳椇子之處方用名。詳『枳椇子』條。

【雞痴粘】卽天芥菜之古籍別名。典見綱目。詳『天芥菜』條。

【雞嗉】主治　小便不禁。及氣噎食不消。

【雞腦】主治　小兒驚癇。燒灰酒服。治雞產。

【雞腰】卽雞腎之俗名。詳『雞腎』條。

【雞脚草】古籍別名　子名勝光子。（綱目拾遺）雞爪花。（汪連仕採藥書）



雞脚草

產地　多生澤畔間。

形態　雞脚草爲雜草類之一種。赤莖對葉。狀似百合。其子可供藥用。根詳見該條。

效能　清肝。去星翳。明目。

主治　赤白久痢成疳。

【雞脚草根】效能　祛風。行血。

主治　療大麻瘋。鶴膝瘋。雞爪瘋。

【雞脚菜】卽石花菜稍粗如雞爪者之古籍別名。典見綱目。詳『石花菜』條。

【雞脚黃連】卽黃連之形如雞爪者。詳『黃連』條。

【雞脚膠】產地　出雲南雞足山近地土中。

形態　雞脚膠爲土類之一種。狀如碎甎。入火卽炸如膠。

主治　風疾。

【雞腸】主治　遺溺。小便數不禁。燒存性。每服三指酒下。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論雞腸曰。止遺精白濁。消渴。

【雞腸】卽蘿蔔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘿蔔』條。

【雞腸草】別名　附地菜。

產地　原野溼地多有之。

形態　雞腸草爲菜類之一種。三月生苗。莖高七八尺。葉帶紫色。而爲橢圓形。四月開五出小紫花。作卷縐花序。花軸之端。拳曲至秋結小實。實中有細子。其苗可供蔬茹典藥用。

性質　微辛。苦。平。無毒。

主治　毒腫。止小便利。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論雞腸草曰。療蠷蝮溺瘡。【唐】甄權藥性本草論雞腸草曰。主遺溺。洗手足。傷水爛。【唐】孟詵食療本草論雞腸草曰。五月五日作灰和鹽。療一切瘡及風丹。遍身痒痛。亦可搗封。日五六易之。作菜食益人。去脂膏毒氣。又燒傅疳瘺。取汁和蜜服。療小兒赤白痢。甚良。【宋】蘇頌圖經本草論雞腸草曰。研末或燒灰揩齒。去宣露。

【雞腸草】卽石胡荽之古籍別名。典見千金方。詳『石胡荽』條。

【雞雍】卽茨實之古籍別名。典見莊子。詳『茨實』條。

【雞墶】命名　本品味似雞。故名。

古籍別名　雞菌。丁蕈。（綱目）

產地　多生沙地間。

形態　雞墶爲菜類蕈屬之一種。高脚緻頭。味勝香蕈。可供食典藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　益胃。清神。治痔。

【雞精】卽姑活之古籍別名。典見別錄。詳『姑活』條。

898／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【雞腿朮】卽朮之產於孝豐境內。天目山脈之仙丈峯者。肉蘆肥嫩。形似雞腿。效能勝尋常朮類。用之入藥最佳。典見西吳里語。詳『於朮』條。

【雞腿根】卽翻白草之古籍別名。典見救荒本草。詳『翻白草』條。

【雞腿菱】卽菱之產於浙江省德清縣境內者。性質功效與尋常菱同。詳『菱』條。

【雞腿蘑菰】卽蘑菰之俗名。詳『蘑菰』條。

【雞膽胚】卽雞肫皮之古籍別名。典見綱目。詳『雞內金』條。

【雞齊】卽葛根之古籍別名。典見本經。詳『葛根』條。

【雞齊根】卽葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『葛根』條。

【雞蝨草】產地　原野濕地多有之。

形態　雞蝨草爲濕草類之一種。葉似苧麻而氣臭。深秋開紫花。結子如椒核。其草可供藥用。

主治　風毒流火疼痛。酒煮去渣服。

【雞壅】卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【雞橘子】卽枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【雞翮翎】主治　下血閉。左翅毛能起陰。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論雞翮翎曰。治婦人小便不禁。消陰癨。療骨哽。蝕癰疽。止小兒夜啼。安席下。勿令母知。

【雞蕉子】卽芭蕉實之小於牛蕉。四季結實者。性質功效與芭蕉實同。詳『芭蕉實』條。

【雞頭】卽茨實之古籍別名。典見本經。詳『茨實』條。

【雞頭菜】基本　本品卽茨實之莖葉。

古籍別名　蔆菜（綱目）

性質　鹹。甘。平。無毒。

主治　止煩渴。除虛熱。生熟皆宜。

【雞頭菜】卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【雞頭菱】卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【雞頭蓮】卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【雞頭盤】卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【雞鴨脚艾】命名　葉細多歧。間有闕者。雞之蹼。象如鷄鴨脚然。故名。搓之作艾香。

主治　脚氣疝氣。

性質　苦。微寒。無毒。

【雞膽】主治　目不明。肌瘡。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草。論雞膽曰。月蝕瘡透耳根。日三塗之。【明】李時珍本草綱目論雞膽曰。燈心燕。點胎赤眼甚良。水化搽痔瘡亦效。

【雞頭鶺】卽竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞鴞】卽鴟之古籍別名。典見國史。詳『鴟』條。

【雞蘇】原名　水蘇。

命名　本品莖葉似蘇。而好生於水旁。故名。

處方用名　水蘇葉。雞蘇葉。龍腦薄荷葉。

古籍別名　芥蘵。芥苴。（別錄）香蘇（肘後）。龍腦薄荷（日用）。犬胡麻（日本）

外國名詞　Stachys aspera, Michx. var. japonica, Maxim.（拉丁）イヌゴマ　チヨロギ　タマシ（日本）

基本　係脣形科水蘇屬。爲水蘇之莖葉。

產地　凡山野原澤間恒有出。

形態　水蘇爲芳草類之生草本。高二三尺。春生苗。其莖方形。中空。直立。密生粗毛。葉如蘇葉而粗糙。爲簇鏃形。生鋸紋。有涎。齒而色青。亦有毛。葉柄短而對生。氣甚辛烈。夏日莖端開脣形之花。花色淡紅。微紫。成穗。其花叢生於莖之上部。葉腋間如輪狀。凡數層。花穗中有細子如芥。



雞蘇

採取　六七月間採之。

製法　採得陰乾用。

性質　辛。微溫。無毒。

效能　散風。澀止吐衄。用作解熱止血藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　下氣殺穀。除飲食。辟口臭。去邪毒。辟惡氣。久服通神明。輕身耐老。（本經）主吐血衄血血崩。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論水蘇曰。釀酒清酒及酒煮汁常服。治頭風目眩及產後中風。惡血不止。服之彌妙。【宋】日華諸家本草論水蘇曰。治肺痿血痢。崩中帶下。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論水蘇曰。主諸氣疾及脚腫。【明】李時珍本草綱目論水蘇曰。作生菜食。除胃間酸水。【清】黃宮繡本草求眞論水蘇曰。雞蘇即龍腦薄荷也。又名水蘇。係野生之物。味辛微溫。功有類於蘇薄。但蘇薄其性稍涼。水蘇其性稍溫。蘇薄其性主升。水蘇其性主降。蘇薄多於氣分疎散。水蘇多於血分溫利。故凡肺氣上逆而見頭風目眩。與血瘀血熱。而見肺痿血痢。吐衄崩淋。喉腥口臭。邪熱等病者。皆當用此宣泄。俾熱除血止。而病自可以愈矣。但表疏汗出。其切忌焉。方萃中慮似蘇葉而微長。齒面皺。氣甚辛烈。

配合應用　㈠治漏血欲死。雞蘇煮汁一升服之。（梅師方）㈡治吐血下血。雞蘇莖葉。煎汁飲之。（梅師方）㈢治吐血咳嗽。龍腦薄荷焙研末。米飲服一錢。取效。㈣治衄血不止。用雞蘇五合。同擣搓如棗核大。納鼻孔中即止。（梅師方）用雞蘇二兩。防風一兩爲末。每服二錢。溫水下。仍以葉塞鼻。（聖惠方）用龍腦薄荷。生地黃等分爲末。冷水服。（普濟方）㈤治腦熱鼻衄。肺壅多涕。雞蘇葉、麥門冬、川芎藭、桑白皮炒、黃耆炙、甘草炙、生地黃焙等分爲末。煉蜜丸梧子大。每服四十丸。人參湯下。（聖濟總錄方）㈥治風熱頭痛。熱結上焦。致生風氣痰厥頭痛。用水蘇葉五兩。皂莢炙去皮子三兩。芫花醋炒焦一兩爲末。煉蜜丸梧子大。每服二十丸。食後荊芥湯下。（聖惠方）㈦治耳卒壅閉。雞蘇葉生搗。綿裹塞之。（孟詵方）㈧沐髮冷香。雞蘇煮汁。或燒灰淋汁沐之。亦治頭生白屑。（普濟方）㈨治暑月目昏。多眵淚生。龍腦薄荷葉搗爛。生絹絞汁點之。（聖濟總錄方）㈩治霍亂困篤。雞蘇三兩。水二升。煎一升。分三服。（聖惠方）(一一)治中諸魚毒。香蘇濃煮汁飲之良。（肘後方）(一二)治蛇虺螫傷。龍腦薄荷葉研末。酒服并塗之。（易簡方）

用量　一錢至二錢。

施用宜忌　凡氣虛無實邪者禁用。

參攷資料　㈠水蘇處處有之。多生水岸旁。南人多以作菜。江北甚多。而人不取食。又江左人謂雞蘇。水蘇是兩種。陳藏器謂薝蔔自是一物。非水蘇。水蘇葉有雁齒。氣香而辛。薝蔔葉上有毛。稍長。氣臭也。又茵蔯註云。江南所用茵蔯莖葉都似家茵蔯而大。高三四尺。氣極芬香。味甘辛。俗名龍腦薄荷也。（蘇頌）㈡水蘇氣味與紫蘇不同。辛而不和。然狀一如蘇。但面不紫。及周圍稜牙如雁齒耳。瑞曰。水蘇即雞蘇。俗呼爲龍腦薄荷。（寇宗奭）㈢水蘇薝蔔一類二種爾。水蘇氣香。薝蔔氣臭爲異。水蘇三月生苗。方莖中空。葉似蘇而微長。密齒面皺。色青。對節生。氣甚辛烈。六七月開花成穗。如蘇穗。水紅色。穗中有細子。狀如荊芥子。可種易生。宿根亦自生。沃地者苗高四五尺。（李時珍）㈣大都逆上之血用之得宜。的有殊效。似施於下行之血不宜。在方書中治下血者亦少也。（劉潛江）

【雞蘇】　即薄荷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薄荷』條。

【雞蘇葉】　即雞蘇之處方用名。詳『雞蘇』條。

【雞露】　**性質**　味甘。平。**主治**　消痰。益血。助脾。長力。生津。明目。爲五損虛癆神藥。

【鞭笋】　**命名**　本品爲茅竹筍之發於竹邊者。形如鞭。故名。**古籍別名**　邊笋。竹邊。四月生者名梅邊。（綱目拾遺）**形態**　鞭笋爲筍類之伏生於地中者。非若笋之生長出於土上。故地肥者鞭嫩。長者尺許。其箨白

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色。味淡而鮮。氣香而蘊藉。夏秋多有之。其於四月間感受梅雨濕蒸之氣而生。頗早者。爲之梅邊。味淡肉硬。不及秋生者佳。可供藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　開胃利腸。治痰渴。

【題肩】　卽鴟之古籍別名。典見爾雅。詳『鴟』條。

【鍚】　卽飴餹之古籍別名。典見綱目。詳『飴餹』條。

【馥草】　卽玄參之古籍別名。典見開寶本經。詳『玄參』條。

【騏驎竭】　卽血竭之原名。詳『血竭』條。

【魏去疾】　卽阿魏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『阿魏』條。

【魏鼆蛾】　卽原鼆蛾之古籍別名。典見唐志。詳『原鼆蛾』條。

【鮜師】　卽海豚魚之古籍別名。典見綱目。詳『海豚魚』條。

【鯢魚】　卽石首魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳『石首魚』條。

【鮪魚】　**命名**　本品形似鞭鞘。故名。

產地　生江湖中。

形態　鮪魚爲無鱗魚類。狀若馬鞭。尾有兩歧。其肉可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　五痔下血。瘀血在腹。

【鮶魚】　**命名**　本品卽鮑魚之鹽漬而成者。

性質　鹹。溫。無毒。

主治　小兒頭瘡出膿水。以麻油煎熟。取油頻塗。

【鯆魚】　卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮑魚』條。

【鮪魚】　卽鮪魚之簡稱。詳『鮪魚』條。

【鮪魚】　卽海鷂魚之古籍別名。典見綱目。詳『海鷂魚』條。

【鯉魚】　**命名**　本品鱗有十字文理。故名。


古籍別名　赤鯉曰玄駒。白鯉曰黃驪。黃鯉曰黃騮。(蘇頌)烏鯉魚。

外國名稱　Cyprinus carpio L.(拉丁)Carp(英)。

基本　係水族動物。爲鱗屬之鯉魚。

產地　凡江湖池澤之淡水中處處恒有出。

形態　本品大者長三四尺。體扁而肥。鱗有黑點。其脇鱗一道。從頭至尾。爲數三十六。口之前端有觸鬚二對。背色蒼黑。腹淡黃。諸魚惟此供食最佳。其肉脂皮骨等俱可入藥用。



鯉魚

性質　甘。平。無毒。

效能　行水。消腫。理脚氣。治黃疸。用作利尿藥。

主治　煮食治咳逆上氣。黃疸止渴。治水腫脚滿下氣。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論鯉魚曰。作鱠溫補。去冷氣。痃癖氣塊。橫關伏梁。結在心腹。【宋】日華諸家本草論鯉魚曰。治懷妊身腫。及胎氣不安。【明】李時珍本草綱目論鯉魚曰。煮食下水氣。利小便。燒末能發汗。定氣喘咳嗽。下乳汁。消腫。米飲調服。治大人小兒暴痢。用童便浸煨。止反胃。及惡風入腹。【清】黃宮繡本草求眞論鯉魚曰。鯉魚氣味甘平。每於急流之水。跳躍而下。是鯉已有治水之功。且甘能入脾。故書載能下氣利水。凡因水氣內停。而見咳氣上逆。黃疸水腫脚氣等症。服此則能以消。河間云鯉之治水。因其氣以相感。是以外臺祕要。用赤小豆一升。水二升。煮作三升。餘去渣。頓盡服。利利盡卽愈。又治孕婦水腫亦效。然性稟六陰。陽氣初生。故多食則能動風發熱也。魚鱗燒灰存性。可治產後血滯。鯉骨燒灰。可療魚骨哽。【清】王士雄隨息居飲食譜論鯉魚曰。鯉魚甘溫下氣。功專行水。通乳。利小便。滌飲止咳嗽。治妊娠子腫。傅癰腫骨疽。可鮮可脯。多食熱中。熱則生風。變生諸病。蓋諸魚在水。無一息之停。發風動疾。不獨鯉也。以鯉脊上有兩筋。故能神變而飛越江湖。爲諸魚之長。品雖拔萃。性不益人。杭俗以其爲聖子之諱。相戒勿食。最通其兩筋及黑血。皆有毒。天行病後及有宿癥者。均忌。醉者尤甚。蠹余遊鄴見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

烹此者。必先抽去其筋。而他處不知也。甚以醉鯉爲病人珍味。豈不誤人。

配合應用 ㈠治水腫。范汪用大鯉魚一頭。醋三升。煑乾食。一日一作。（范汪方）又用大鯉一尾。赤小豆一升。水二斗。煑食飲汁。一頓服盡。當下利。盡即瘥。（外臺祕要方）亦治妊娠水腫。㈡治水腫脹滿。赤尾鯉魚一頭。破開。不見水及鹽。以生礬五錢。研末入腹內。丸紙包裹。外以黃土泥包放竈內。煨熟取出。去紙泥。送粥食。頭者上消。食身尾者下消。一日用盡。屢試經驗。（醫方摘要）㈢治妊娠感寒。用鯉魚一頭燒末。酒服方寸匕。令汗出。（祕錄方）㈣治胎氣不長。用鯉魚肉同鹽棗煑汁飲之。（集驗方）㈤治胎動不安及婦人數傷胎。下血不止。用鯉魚一箇。治淨。阿膠炒一兩。糯米二合。水二升。入葱。薑。橘皮。鹽各少許。煑。臨食五七日效。（聖惠方）㈥治乳汁不通。用鯉魚一頭。燒末。每服一錢。酒調下。（產寶方）㈦治咳嗽氣喘。用鯉魚一頭。去鱗。紙裹炮熟。去刺。研末。同糯米煑粥。空心食。（食醫心鏡方）㈧治久腫惡風入腹。及女人新產。風入產戶內。如馬鞭。噓吸短氣。咳嗽者。用鯉魚長一尺五寸。以尿浸一宿。平旦以木篦從頭貫至尾。文火頓熟。去皮。空心頓食。勿用鹽醋。（外臺祕要方）㈨治反胃吐食。用鯉魚一頭。童便浸一夜。炮。焦。研末。同米煑粥食之。（壽域方）㈩治一切腫毒。無論已潰未潰者。用鯉魚燒灰。醋和塗之。以愈爲度。（外臺祕要方）㈪治積年骨疽。一捏一汁出者。熬飴餬。勃瘡上。仍破生鯉魚遍之。頃時刮視蟲出。更洗。傅藥。蟲盡則愈。（肘後方）㈫治小兒木舌。長大滿口。鯉魚肉切片貼之。以帛繫定。（聖惠方）

施用宜忌　凡有風熱諸病者禁用。

參攷資料 ㈠鯉乃陰中之陽。其功長於利小便。故能消腫脹黃疸。脚氣。喘嗽。溼熱之病。作鱠則性溫。故能去痰結冷氣之病。燒之則從火化。故能發散風寒。平肺通乳。解腸胃及腫毒之邪。按劉河間云。鯉之治水。驚之利水。所謂因其氣相感也。（李時珍）㈡鯉脊上兩筋及黑血有毒。溪澗中者毒在腦。俱不可食。凡鯉炙魚不可使烟入目。損目光。則三日內必驗也。天行病後下痢及宿癥。俱不可食。服天門冬。硃砂人不可食。不可合犬肉及葵菜食。（孟詵）

【鯉魚汁粥】 纂本　本品係用鯉魚汁和米煑成之粥。

主治　消水腫。

【鯉魚皮】 **主治**　癮疹。

歷代記述攷證

【明】李時珍本草綱目論鯉魚皮曰。燒灰水服。治魚鯁不出。

【鯉魚目】 **主治**　刺瘡傷。風傷。水作腫。燒灰傅之。汁出卽愈。

【鯉魚血】 **主治**　小兒火瘡丹腫瘡毒。塗之立瘥。

參攷資料　鯉魚鮓不可合豆豬同食。令成消渴。（陶弘景）

性質　苦。寒。無毒。

【鯉魚膽】 **主治**　目熱赤痛。青盲。明目。久服强悍。益志氣。

【鯉魚骨】 **主治**　女子赤白帶下。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論鯉魚骨曰。治陰瘡。魚鯁不出。

【鯉魚腦髓】 **主治**　諸癰。

歷代記述攷證

【宋】大明諸家本草論鯉魚腦髓曰。煑粥食。治暴聾。【明】李時珍本草綱目論鯉魚腦髓曰。和膽頻點目。督治青盲。

【鯉魚腸】 **主治**　小兒肌瘡。

歷代記述攷證

【明】李時珍本草綱目論鯉魚腸曰。聹耳有蟲。同酢擣爛。帛裹塞之。痔瘻有蟲。切斷炙熟。帛裹之。坐俱以蟲盡爲度。

【鯉魚齒】 **主治**　石淋爲末。陳醋調服。卒淋酒服。

【鯉魚鮓】 **性質**　鹹。平。無毒。

主治　殺蟲。

參攷資料　鯉魚鮓不可合豆

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論鯉魚膽曰。點眼治赤腫翳痛。塗小兒熱腫。【唐】陳藏器本草拾遺論鯉魚膽曰。滴耳治聾。【明】李時珍本草綱目論鯉魚膽曰。點雀目燥痛即明。【明】繆希雍本草經疏論鯉魚膽曰。凡膽皆苦寒走厥陰。故鯉魚膽亦主明目及目熱赤痛青盲也。肝爲將軍之官。腎爲作强之官。二經有熱則虛怯。志氣衰苦寒除二經之熱。故久服强悍益志氣也。

【鯉魚鱗】主治　產婦滯血腹痛。燒灰酒服。亦治血氣。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鯉魚鱗曰。燒灰治吐血崩中。漏下帶下。痔瘻魚鯁。

參攷資料　古方多以皮鱗燒灰。入崩漏痔瘻藥中。蓋取其行滯血耳。治魚鯁者。從其類也。（李時珍）

【鯊條魚】　即鱓魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱓魚』條。

【鯊魚】　即鯊條魚之簡稱。詳『鱓魚』條。

【鯊魚】命名　本品非海中之沙魚。乃南方溪間之小魚。因居沙溝中吹沙而游。唼沙而食。故名。

古籍別名　鮀魚（爾雅）吹沙（郭璞）沙溝魚。沙鯽。阿溳魚。（綱目）

產地　生溪澗中。

形態　鯊魚爲魚鱗類之一種。大者長四五寸。頭狀如鯽。體圓似鯉。厚肉重骨。口廣闊而鰓與鰭大。鱗細。黃白色。有黑點斑紋。背有鰭刺甚硬。尾不分歧。腹鰭能吸附於他物。幼時腹內即有子。有時張口吹沙。故又名吹沙魚。其肉頗美。可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　暖中益氣。

【鮀魚】　即鱓魚之原名。詳『鱓魚』條。

【鱓】　即魚鮓之小者。典見綱目。詳『魚鮓』條。

【鶉鳩】　即斑鳩之古籍別名。典見左傳。詳『斑鳩』條。

【鶉鳩莢】　即蒲公英之古籍別名。典見庚辛玉册。詳『蒲公英』條。

【鶉鳩】原名　鳩。

命名　鶉者。其孽也。本品性淫而易合。故名。

古籍別名　飛奴（綱目）迦布德迦（梵書）

外國名詞　Columba Pigeon Felstaube（拉丁）ハト（日本）

基本　係脊椎動物鳥類鳩鴿類鳩鴿科之鶉鳩。

形態　鶉鳩爲原禽類之一種。種類甚多。即家鴿亦有多種。以家鴿之普通形狀而言。其足赤而短。小。後趾與他趾相平。嘴亦短。體之上面灰黑。頸胸皆暗紅。體之下面黑色或灰黑。亦有純白茶褐及黑白交雜諸色。記憶力與生殖力皆强。故可傳書。而每月一孕。每孕二卵。其肉可供食與藥用。

採取　以白鴿之肉入藥用。

性質　鹹。平。無毒。

主治　調精益氣。治惡瘡疥癬。風瘡白癜。癘瘍風。炒熟酒服。雖益人。食多恐減藥力。

歷代記述攷證　【宋】嘉祐補註本草論白鴿肉曰。解諸藥毒及人馬久患疥。食之立愈。

【鶉鴿卵】主治　解瘡毒。痘毒。

【鶉鴿血】主治　解諸藥毒。蠱毒。

【鶉鴿屎】原名　左盤龍。

命名　鴿屎皆左盤。故名。

採取　以野鴿者良。

性質　辛。溫。微毒。

主治　人馬疥瘡。炒研傅之。驢馬和草飼之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鶉鴿屎曰。消瘰癧諸瘡。療破傷風及陰毒垂死者。殺蟲。【明】汪頴食物本草論鶉鴿屎曰。消腫及腹中痞塊。

【鶫鶇】　即鷫雉之古籍別名。典見綱目。詳『鷫雉』條。

【鵝鶖】命名　凡鳥至秋毛必脫禿。本品頭禿如秋鶖。故名。又如老人頭童及扶杖之狀。遂有諸名。

古籍別名　扶老。古今注）鶖。鵝。鵞。禿鶖（綱目）

產地　出南方湖泊中。

形態　鵝鶖爲水禽類之一種。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乃水鳥之大者。其狀如鵝而大。青蒼色。翼展廣五六尺。頭舉高六七尺。長頸。赤目。頭頸無毛。頭有三寸許之紅皮。如鵝頂。喙深黃色而扁直。長尺餘。頷下亦有皮囊。如鵝鶘狀。足爪如雞而黑色。性極食惡。能與人鬥。好啖魚蛇及鳥雛等物。其肉可供藥用。髓、喙、毛。詳見該條。

性質　鹹。微寒。無毒。

主治　中蠱魚毒。

歷代記述弦證　【明】李時珍本草綱目論鵜鶘肉曰。補中益氣。甚益人。炙食尤美。作脯餚食。強氣力。令人走及奔馬。

【鵜鶘毛】　**主治**　解水蠱毒。

【鵜鶘髓】　**性質**　甘。溫。無毒。

主治　補精髓。

【鵜鶘喙】　**主治**　魚骨哽。

【鵜】　卽伯勞之古籍別名。典見孟子。詳『伯勞』條。

【鵜】　卽鵜鶘之簡稱。詳『鵜鶘』條。

【鵜鶘】　**原名**　犁鶘。

命名　山海經云。沙水多犁鶘。其名自呼。後人轉爲鵜鶘也。

古籍別名　鵜鶘。逌河。淘鵝。鵅鶘。（綱目）淘河。伽藍鳥。（動物學大辭典）黎鶘。（本草綱目）

外國名詞　Pelecanus Onocrotalus Pelican 或 White Pelican 或 Roseate Pelican Pelikan カランテウ或ペリカン或コンガラテウ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類游禽類鵜鶘科。

產地　出溫熱兩帶諸地之淺海中。

形態　鵜鶘爲水禽類鵝屬之一種。體大。翼長。嘴亦長。約尺餘。直而闊。嘴下有奧。嘴長之大皮囊。伸縮自如。體概白色。略帶赤。翼上撥風羽色黑。好羣居善游泳。常以嘴淘水啣魚。得魚則閉口而收縮嘴下皮囊。以出水吞魚。其肉可食。味不美。脂油可供藥用。

製法　李時珍曰。剝取其脂。熬化。掠取。就以其嚥盛之。則不滲漏。他物卽透走也。

性質　鹹。溫。滑。無毒。

主治　塗癰腫。治風痺。透經絡。通耳聾。

參弦資料　淘鵝油性走。能引諸藥透入病所。拔毒。故能治聾痺腫毒諸病。（李時珍）

【鵜鶘毛及皮】　**主治**　反胃吐食。燒存性。酒服。

【鵜鶘舌】　**主治**　疔瘡。

【鵜鶘嘴】　**性質**　鹹。平。無毒。

主治　赤白久痢成疳。燒存性。研末水服。

【鵝】　**命名**　鵝名自呼。故名。

古籍別名　家雁。舒雁。

外國名詞　Anser domestica Geese（拉丁）ガチョー或ガテウ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類游禽類鴨科之鵝。

形態　鵝爲家畜類水禽類之一種。種類甚多。乃雁之變種。故形似雄而大。頸長。尾足皆短。嘴扁闊。嘴根有肉疣。雄者則較膨大。羽色有蒼白兩種。嘴足肉疣亦有黃及黑褐之分。脚大有蹼。體長約二尺有餘。翼不能飛。足行亦拙。聽覺敏捷而性好鬥。人多豢養於河湖池畔。覓穀類及魚蟲爲食。其肉可供餚茹與藥用。



鵝

採取　以白鵝者良。

性質　甘。平。無毒。

主治　利五臟。

歷代記述弦證　【唐】孟詵食療本草論鵝肉曰。解五臟熱。服丹石人宜之。【唐】陳藏器本草拾遺論鵝肉曰。煑汁止消渴。

參弦資料　㈠蒼鵝食蟲。主射工毒。爲良。白鵝不食蟲。止渴爲勝。（陳藏器）㈡鵝氣味俱厚。發風發瘡。莫此爲甚。火熏者尤毒。曾目擊其害。而本草謂其性涼。利五臟。韓懋醫通謂其疎風。豈其然哉。又葛洪肘後方云。人家養白鵝白鴨。可辟食射工。則謂白鵝不食蟲不發病之說。亦非矣。但比蒼鵝薄乎云

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

耳。若夫止渴。凡發胃氣者。皆能生津。豈獨止渴哉。便曰性涼乎。參苓白朮散。乃治渴要藥。何嘗寒涼耶。（李時珍）㊁白鵝辛涼無毒。蒼鵝冷有毒。發瘡腫。（日華）㊂鵝肉性冷。多食令人霍亂發痼疾。（孟詵）㊃嫩鵝毒。老鵝良。（李廷飛）

【鵝不食草】即石胡荽之古籍別名。典見食性本草。詳「石胡荽」條。

【鵝毛】主治　解射工水毒。蘇恭新修本草論鵝毛曰。治小兒驚癇。又治噎疾。燒灰酒服。

配合應用　㊀治癰毒。用鵝毛煨灰一兩。明礬二兩。研末。麪糊爲丸。每服二錢。好酒下。（集驗方）

㊁參毛丸。治大麻風神效。苦參一斤。鵝毛八兩。煨存性爲末。陳米糊爲丸。桐子大。每服五十丸。酒送下。一日二次。（赤水玄珠方）

㊂神功至寶丹。專治男婦溺膿肥瘡。膿窠瘡。膿梨頭。遍身風癩癮疹。疥癬。瘙癢異常。麻木不仁。諸風手足酸痛。皮膚破爛。陰蝨瘡極。并婦女陰瘡。溼瘡。酒丸散。擦藥洗貼如神。隨病上下。茶湯送下。日進二次。戒暴怒房勞。炙煿發毒之物。苦參一斤爲末。鵝毛香油炒存性六兩。黃米糊丸。硃砂爲衣。此方與元珠治大麻風所用大同小異。因並存之。（秋泉方）

㊃用血管鵝毛燒灰、百草霜、各一錢。行經後。以酒調下。終身無孕。（保和堂祕方）又用鵝毛一把。煅細。茶煎湯。經後服。永不生。（周氏家寶方）又有受打不痛法。用血管鵝毛七根。地龍七條。煅過。同乳香白蠟爲丸。好酒送下。（寶生論）

㊄治瘰癧初起。白鵝大者二隻。取週身毛。翎并口脚黃皮。新瓦焙焦爲末。分作十服。每日食後服之。服完卽愈。（傳信方）

㊅治腫毒。用血管鵝毛一握。銅鍋炒焦。腐皮包裹。酒吞下。卽內消。初起者效。（救生苦海方）諸腫毒痛甚。有膿卽潰。無膿卽消。用鵝毛燒灰一兩。雄黃三錢。川烏。草烏各錢半。黃蠟鎔化。入前藥爲丸。每服一錢。好酒送下。（嚴氏方）吳澍宇用鵝毛二個。炒蜈蚣十條。醋炒。穿山甲一兩炒。殭蠶一兩炒。全蝎五錢。洗。廣膠二兩炒。桑黃二兩炒。羊角屑二兩炒。共爲末。每服三錢。砂糖調好酒下。以醉爲度。（諸毒內消方）

㊆治發背疔瘡。對口風毒。穿山甲。蛇蛻。蟬退。蜈蚣俱爲末。鵝毛全副。燒灰存性。全蝎。血管雞毛二翅。燒灰。人指甲用十分之一。敗龜板一個。殭蠶俱爲末。每用一錢。酒下。（醫宗粹編方）

㊇治慢吞銅錢及釣線。用鵝毛一錢。燒灰。磁石。皂角子火煅。象牙一錢。燒存性爲末。每服五分。新汲水下。（慈惠方）

㊈治艾火帶及炙火所傷。爛痛不可忍。用雄雞毛同鵝毛燒灰。敷之效。（同壽錄方）

㊉治喉蛾癬。用鵝毛灰三分。兒茶二錢。牛黃三厘。雄黃一錢。人中白一錢半。煅存性。如吃深。加珍珠煅存性一分爲末。先將生桐油探刷一番。後用藥吹入。加膽礬更妙。（傳信方）

參攷資料　㊀東川多溪毒。養鵝以辟之。毛羽亦佳。并飲其血。鵝未必食射工。蓋以威相制耳。（陶弘景）㊁禽經云。鵝飛則蝕沉。蝕卽射工也。又嶺南異物志云。邕州蠻人。選鵝腹毳毛爲衣被。絮暖而性冷。嬰兒尤宜之。能辟驚癇。柳子厚詩云。鵝毛禦臘縫山罽。卽此。蓋毛與肉性不同也。（李時珍）

【鵝毛筵】卽鱘魚之腊者。典見綱目。詳「鱘魚」條。

【鵝血】性質　鹹。平。微毒。

主治　中射工毒者飲之。并塗其身。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論鵝血曰。解藥毒。

【鵝卵】性質　甘。溫。無毒。

主治　補中益氣。多食發痼疾。

【鵝卵殼】主治　癰疽無頭。煅末。醋調傅。

【鵝兒腸菜】卽鱉繅之古籍別名。典見綱目。詳「鱉繅」條。

【鵝抱】形態　鵝抱爲蔓草類之一種。附石而生。蔓如大豆。其根形如菜菔。小者如拳。可供藥用。

採取　二月八月間採根。切片陰乾用。

性質　苦。寒。無毒。

905／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　風熱上壅。咽喉腫痛。及解鬱箭藥毒。搗末酒服有效。亦消風熱結毒。酒摩塗之立愈。

【鵝屎】　主治　絞汁服。療小兒鵝口瘡。並傅狗咬傷。

【鵝涎】　主治　咽喉穀賊。

歷代記述攷證　【清】趙學敏本草綱目拾遺論鵝涎曰。小兒鵝口瘡甚效。

參攷資料　按洪邁夷堅志云。小兒誤吞稻芒。着咽喉中不能出者。名曰穀賊。惟以鵝涎灌之即愈。蓋鵝涎化穀相制耳。（李時珍）

【鵝脚草】　即土荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土荊芥』條。

【鵝喉管】　主治　婦人赤白帶下。煆末服之。咽喉痛。煆末和冰片吹之。

【鵝掌上黃皮】　主治　燒研爛。焙研油調。塗凍瘡良。

【鵝掌金星草】　即金星草之古籍別名。典見植物名實圖考。詳『金星草』條。

【鵝黎】　即黎之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『黎』條。

【鵝項草】　基本　鵝項草爲雜草類之一種。其花可供藥用。

主治　咽喉生瘡。同白芷、椒根皮。研末吹之。

【鵝腸菜】　即繁縷之古籍別名。典見千金食治。詳『繁縷』條。

【鵝管石】　即鐘乳石之處方用名。詳『鐘乳石』條。

【鵝腿骨】　主治　犬傷日久發者。煆末摻之。

【鵝膏】　原名　白鵝膏。

命名　本品宜以白鵝者良。故名。

採取　臘月煉收之。

性質　甘。微寒。無毒。

主治　灌耳治卒聾。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論白鵝膏曰。潤皮膚。可令面脂。【明】李時珍本草綱目論白鵝膏曰。塗面急令人悅白。唇瘡手足皴裂。消癰腫。解礜石毒。

【鵝膏蕈】　產地　生深山野間。

形態　鵝膏蕈爲菜類香蕈屬之一種。狀似鵝卵。老則散開。惟與土菌長易相混。可供藥用。

性質　甘。滑。

主治　與香蕈同功。

【鵝膽】　性質　苦。寒。無毒。

主治　解熱毒。及痔瘡初起。類塗抹之自消。

【鵝膍】　基本　本品乃鵝之尾肉。

古籍別名　尾罌（綱目）

主治　塗手足皴裂。納耳中。治聾及聆耳。

【鵠】　命名　本品鳴聲皓皓。故名。

古籍別名　天鵝（綱目）黃鵠（本草綱目）

外國名詞　Cygnus bewicki Yarrell Swan 或 Bewicks Swan Schwan ハクチョー或ハクテウ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類游禽類鴨科鵠亞科之鵠。

產地　河湖海濱間多有之。

形態　鵠爲水禽類之一種。其形似鵝而體大。頸長。嘴前橙黃色。嘴根有突起黑色之瘤狀。全體長三尺有餘。羽毛純白。脚尾俱短而脚黑色。鳴聲洪亮。飛翔極高。尤善行走。夏棲湖澤。冬居海濱。覓食水草昆蟲等物。其肉可供食與藥用。



鵠

性質　甘。平。無毒。

主治　益氣力。利臟腑。醃炙食之。

【鵠油】　基本　本品爲鵠之脂肪油。

採取　冬月取肪煉收之。

主治　塗癰腫。治小兒痘耳。

【鵠殼皮】　即橙皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橙皮』條。

【鵠絨毛】　主治　刀杖金瘡貼之。

【鵠頭】　即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【鵠瀉】　即澤瀉之古籍別名。典見本經。詳『澤瀉』條。

【鶉鵝】　即烏鶖之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

綱目。詳『烏鴉』條。

【鵓鳩】卽斑鳩之子。詳『斑鳩』條。

【鵓鴣】卽鴟鴞之古籍別名。典見綱目詳『鴟鴞』條。

【麏】卽牡麚之別名。典見綱目。詳『麚』條。

【麏】卽麚之古籍別名。典見綱目。詳『麚』條。

【麏】卽牝麚之別名。典見爾雅。詳『麚』條。

【麅】卽女麅之古籍別名。典見綱目詳『女麅』條。

【龜鶉】卽蠵龜之古籍別名。典見綱目。詳『蠵龜』條。

【黿鼉】卽蠵蜧之古籍別名。典見爾雅。詳『蠵蜧』條。

【鼯鼠】㊀卽土撥鼠之古籍別名。典見飲膳正要。詳『土撥鼠』條。㊁卽土撥鼠之原名。詳『土撥鼠』條。

【鼬鼠】卽鼬鼠之古籍別名。典見綱目。詳『鼬鼠』條。

【鼫鼠】古籍別名　碩鼠。（詩經）鼩鼠。（廣雅）雀鼠。（埤雅）鼬鼠。（綱目）

產地　土穴樹孔中。處處有之。

形態　鼫鼠爲鼠類之一種。形大於鼠。頭似兎。尾有毛。青黃色。眼紅。全體毛有黑白褐等色。善鳴。能如人立。交前兩足而舞。好食粟豆。爲農田之害蟲。其毛可作筆。肚可供藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　咽喉痺痛。一切熱氣。研末含嚥神效。

【鼪鼠】命名　本品毛色黃赤如柚故名。

古籍別名　黃鼠狼。鼬鼠。鼵鼠。地猴。（綱目）

外國名稱　Mustela itatis Temm. Chinese Weasel.（英）イタチ或シタチ（日本）

基本　屬脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類裂脚類鼬鼠科。

產地　山林原野處處有之。

形態　鼪鼠爲獸類鼠屬之一種。其頭略圓。軀長。脚短。半蹠踏地。吻稍銳。脣有鬚。耳殼小。毛色黃褐而稍硬。腹淡褐。面喑褐。腹稍白。長約一尺。晝伏夜出。覓食鼠鳥等物。吸其血。不食其肉。常爲鴨雞之害。若遇追迫。則肛門之皮脂腺中放出惡臭。藉以脫逃。其毛可製筆。名狼毫。肉可供藥用。



鼪鼠

【鼪鼠心及肝】性質　臭。微毒。

主治　心腹痛。殺蟲。

【鼪筋草】卽石長生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石長生』條。

【鼩】卽山鵲之古籍別名。典見爾雅。詳『山鵲』條。

十九畫

【嬾人菜】卽韭之俗名。詳『韭』條。

【嬾婦菜】卽睡菜之古籍別名。典見綱目。詳『睡菜』條。

【懷山藥】卽山藥之處方用名。詳『山藥』條。

【懷牛膝】卽牛膝之處方用名。詳『牛膝』條。

【攀倒甑】古籍別名　斑杖。接骨。（圖經本草）

基本　屬隱草類。爲攀倒甑之莖葉。

產地　原野有出。蘇頌云。生宜州郊野。葉莖如薄荷。

性質　苦。寒。無毒。

主治　解利風熱。煩渴狂躁。搗汁服甚效。

【攙攙活】卽攙攙活。詳『七葉黃荊』條。

【曠石】產地　江南諸地多有生焉。

形態　曠石爲雜草類之一種。狀如石草。可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　益氣養神。除熱止渴。

907／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【櫓罟】　産地　出廣西。

形態　櫓罟爲夷果類之一種。其果大如半升碗。數十房攢聚成毬。每房有縫。冬生色青。至夏紅熟。其子實可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　補脾胃。固元氣。壯精神。益血脈。寬痞。消痰。解酒毒。止酒後發渴。利頭目。開心益。婦人不孕。用櫓罟子浸入好酒內。三日日日飲之。百日有效。又目生翳障。漸漸昏暗。視物不明。櫓罟子浸白蜜內。每日連蜜嗽一枚。一月卽退。

【櫚木】　古籍別名　花櫚木。（綱目）

産地　出安南及南海諸地。

形態　櫚木爲喬木類之常綠木本。木質堅而色紫紅如紫檀。亦有花紋者。謂之花櫚。可爲器皿桌几。亦可供藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　產後惡露衝心。癥瘕結氣。赤白漏下。並刮煎服。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論櫚木曰。破血塊冷嗽。煮汁熱服。爲枕令人頭痛。性熱故也。

【櫛】　卽梳篦之古籍別名。典見綱目詳『梳篦』條。

【櫟】　㊀卽柞之日本別名。詳『柞』條。㊁卽橡之原名。詳『橡實』條。

【櫟皮】　卽土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土骨皮』條。

【櫟梂】　卽橡實之古籍別名。典見綱目詳『橡實』條。

【櫟樑子】　卽柞實之古籍別名。典見綱目。詳『柞』條。

【櫪】　卽柚之古籍別名。典見綱目詳『柚』條。

【瀘茶】　基本　茶葉之產於四川瀘州者。

性質　味辛。性熱。

主治　療風氣。

【瀝油】　卽松油之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『松油』條。

【瀝青】　卽松脂之古籍別名。典見綱目詳『松脂』條。

【犦牛】　卽犏牛之古籍別名。典見爾雅。詳『犏牛』條。

【獸目】　卽茶葉之一種。產雲南舊東川府境者。詳『茶葉』條。

【瓊珠】　卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【癘竹】　卽仙人杖之別名。詳『仙人杖』條。

【礬石】　處方用名　白礬石。煅礬石。

古籍別名　立制石。青介石。固羊石。（本經）石鹽。太白石。（別錄）澤乳。鼠鄰。（吳普本草）毒砂。肉羊石。（和漢藥考）銀星礬石。金星礬石。（綱目）

外國名詞　Arsenopyrites.（英）

基本　係金屬爲鐵礦類之神礦。鐵巖。

産地　凡四川、浙江、及英國之山谷間。恒多生焉。和漢藥考曰。日本石見伊勢下野信濃越後等諸國產此。

形態　礬石係生於巖石間之銀白色或灰黑色粒狀或樹枝狀礦石。斷面不滑澤。硬度五・五。比重約六・〇。質脆。煅之發蒜臭。

採取　採無時。或十二月採之。

製法　採得以黃泥包炭火燒之。一日一夕。則解可用。

性質　辛。大熱。有毒。

成分　爲砒硫化鐵之鑛石。卽由硫黃（二〇%）砒（三四%）鐵（四六%）而成。

效能　燥寒濕。消冷積。專作殺蟲殺鼠藥。並治癬瘡。

作用　與癬菌相遇。直接有致死之能。

主治　寒熱。鼠瘻。蝕死肌。風痺。腹中堅癖。邪氣。（本經）除熱明目。下氣。除腦中熱。止消渴。益肝氣。破積聚痼冷。腹痛。去鼻中息肉。久服令人筋鑽。火煉百日。服一刀圭。不煉服則殺人。及百獸。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論礬石曰。除胸膈間積氣。去冷澼風痺。瘧瘁積年者。

配合應用　治風冷脚氣。白礬石煅二斤。酒三斗。濱三日。稍稍飲之。

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰枯陽亢者禁用。惡羊血。馬目毒。公鷄屎。虎掌。細辛。畏水銷丹。棘針爲之使。得火良。

參攷資料　㊀常取生礬石納水令水不冰。如此說則生者性亦大熱矣。張仲景云。生用破人心肝。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（陶弘景）㊁此藥攻擊積冷之病爲良。若以餘物代之。療病無效。正爲此也。（蘇恭）㊂治久積及久病腹冷功用。直須愼用。其毒不可試也。（寇宗奭）㊃礬石性氣與砒石相近。蓋亦其類也。古方礬石攀石。常相渾書。蓋二字相似。故誤耳。然攀石性寒。無毒。礬石性熱。有毒。不可不審。陸農師云。礬石之力十倍鍾乳。按洪容齋隨筆云。王子敬靜息帖言礬石深是可疑。凡喜散者。飜發癰。蓋散者寒食散也。古人多服之。中有礬石。性熱有毒。故云深可疑也。劉表在荊州與王粲登鄢山。見一岡。不生百草。王粲曰。此必古冢。其人在世服生礬石。熱不出外。故草木焦滅。表掘之。果有礬石滿塹。又今洛水不冰。下亦有礬石。人謂之溫洛是也。取此石安甕中。水亦不冰。文鸎伏卵。取石置巢中。以助溫氣。其性如此。豈可服乎。見文安公鑛金陵。秋暑減食。醫者湯三盒。教服礬石丸。已而飲啖日進。遂加意服之。越十月而毒作。齦血斗餘。自是數數不止。竟至精液皆竭而死。李時珍竊謂洪文安之病。未必是礬石毒發。蓋亦因其儳啖。自恃厚味。房勞縱嗜無忌。以致精竭而死。夫因感食而服石。食既進。則病去藥當止矣。而猶服之不已。特藥妄作。是果藥之罪與。（李時珍）㊄礬義不解。許氏說文云。礬。毒石也。西山經云。皐塗之山有白石。其名白礬。可以毒鼠。郭璞注云。鼠食則死。蠶食而肥。則鼠鄉之意以此。（李時珍）㊅礬石生漢中山谷及少室。採無時。（別錄）㊆今蜀漢亦有。而好者出南康南野溪及彭城界中汝陽縣南塹及湖東新寧。及零陵皆有。白礬石能柔金以黃泥包炭火燒之。一日一夕。則解可用。丹房及黃白術多用之。（陶弘景）㊇此石能拒火。久燒但解散。不可脫其堅。今市人乃取潔白理石當之。燒卽爲灰也。今漢川武當西遂坂名礬石谷。卽是眞出處。少室有粒細理不如漢中者。（蘇恭）㊈今台州臨州亦有之。（蘇頌）

礬石。銀礫石。

【礬石】

命名　本品之色濛濛然故名。

基本　係石類爲山石之一種。

產地　陳仁山藥物生產辨云。金礦石各省有出。但以四川、湖北兩處來者爲好。銀礦石各省有出。安南會安等亦有出。

形態　礦石質堅而細。體重擊碎。中有白星點。煅後則色星黃如鈆金。其無星點者不入藥。入藥以青者爲佳。故有青礦石之稱。蓋有青白兩種耳。

製法　李時珍曰。用大坩鍋一箇。以石四兩。打碎入硝石四兩。拌勻。炭火十五斤。簇定煅至消盡。其石色如金爲度。取出研末。水飛去消毒。曬乾用。

性質　甘鹹。平。無毒。

效能　瀉痰熱。破癥積。用作祛痰藥。又爲鎮痙藥。

主治　食積不消。留滯臟腑。宿食癥塊。久不痊。小兒食積羸瘦。婦人積年食癥。攻刺心腹。得巴豆、礞砂、大黃、荊三稜。作丸服良。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論礦石曰。治積痰驚癎。咳嗽喘急。【明】繆希雍本草經疏論礦石曰。礦石稟石中剛猛之性。體重而降。能消一切積聚痰結。其味辛鹹。氣平無毒。辛主散結。鹹主軟堅。重主墜下。故本經所主諸證。皆出一貫也。今世又以之治小兒驚痰喘急。入滾痰丸。治諸痰怪證。【清】黃宮繡本草求眞論礦石曰。礦石稟石中剛猛之性。沉墜下降。味辛而鹹。色青氣平。功尚入肝。平木下氣。爲治驚利痰要藥。蓋風木太過。脾土受制。氣不運化。積氣生痰。壅塞膈上。變生風熱。治宜用此重墜下泄。則風木氣平。而痰積自除。今人以王隱君滾痰丸內用礦石。通治諸般痰怪症。殊爲未是。不知痰因熱盛。風木挾熱而脾不運。故爾痰積如膠如漆。用此誠爲合劑。如其肺胃虛弱。食少便溏。服此泄利不止。小兒服之。多成慢症。以致束手待斃。可不愼歟。硝煅水飛研用。

配合應用　㊀滾痰丸。通治痰爲百病。惟水瀉雙娠者不可服。礦石、焰硝各二兩。煅過研飛曬乾。一兩大黃酒蒸八兩。黃芩酒洗八兩。沉香五錢。爲末。水丸梧子大。常服

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一二十丸。欲利大便。則服一二百丸。溫水下。（王隱君養生主論方）

㈢金寶神丹。治一切虛冷久積。滑泄久痢。癖塊血刺心腹下痢。及婦人崩中漏下。青礞石半斤爲末。消石末二斤。坩鍋內鋪頭蓋底。按實炭火二十斤。煅過取出。入赤石脂末二兩。滴水丸。茨子大。候乾。入坩鍋內。小火煅之。每服一丸至二三丸。空心溫水下。少許壓之。久病瀉痢。加至五七丸。（楊氏家藏方）

㈢奪命散。治急慢驚風。痰涎壅塞咽喉。命在須臾。服此墜下風痰。乃治驚利痰之聖藥也。眞礞石一兩。焰消一兩。同煅過爲末。每服半錢或一錢。急驚痰熱者。薄荷自然汁入生蜜調下。慢驚脾虛者。木香湯入熟蜜調下。亦或雪糕丸綠豆大。每服二三丸。（湯氏嬰孩寶鑑方）

㈣治小兒急驚。青礞石磨水服。（衞生方）

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡虛弱而非實症者禁用。

參攷資料　㈠湯衡嬰孩寶鑑言礞石乃治驚利痰之聖藥。吐痰在水上。以石末糝之。痰即隨水而下。則其沉墜之性可知。然止可用之救急。氣弱脾虛者。不宜久服。楊士瀛謂其功能利痰。而性非胃家所好。如慢驚之類。皆宜佐以木香而王隱君則謂痰爲百病。不論虛實寒熱。概用滾痰丸。通治百病。豈理也哉。朱丹溪言一老人。忽病目盲。乃大虛證。一醫與礞石藥服。至夜乃死。此乃盲醫虛虛之過。礞石豈殺人者乎。況目盲之病。與礞石並不相干。（李時珍）㈡礞石江北諸山往往有之。以盱山出者爲佳。有青白二種。以青者爲佳。堅細而青黑。打開中有白星點。煅後則星黃如鈒金。其無星點者不入藥用。通城縣一山產之。工人製爲器物。（李時珍）㈢礞石必用火硝煅過。性始能發。乃能墜痰。不煅則石質不化。藥性不發。故必用煅。（唐容川）

【糝米】卽茯仁之古籍別名。典見雷氏。詳『茯仁』條。

【簿珠】卽薏苡之古籍別名。典見本草集註。詳『茯仁』條。

【簸箕蟲】卽廢蟲之古籍別名。典見本草衍義。詳『蠮蟲』條。

【繩毒】卽蛇牀子之古籍別名。典見本經。詳『蛇牀子』條。

【繫彌子】**形態**　狀圓而細。色赤如轆麥。

性質　味苦。甘。平。無毒。

主治　益五臟。去頭面諸風。產後痢疾不止。用此藥一合。酒水各半煎。空心服立效。

【繭耳羊】卽黃羊之古籍別名。典見綱目。詳『黃羊』條。

【繭栗香】卽沉香之一種。典見綱目。詳『沉香』條。

【羅】卽鹿梨之古籍別名。典見綱目。詳『鹿梨』條。

【羅青】卽青黛之古籍別名。典見本草集註。詳『青黛』條。

【羅卜】**性質**　甘。平。氣香。

主治　滌痰。止咳。清肺。除煩。消癖脹。

參攷資料　長興羅岭。疑卽古人顧渚紫笋也。介於山中。謂之岭。羅氏隱焉。故名。羅西吳枝。乘湖人。於茗不數顧渚。而數羅岭。顧渚之佳者。其風味已遜龍井。岭梢清徤。然葉粗而作草氣。嘉靖長興志。羅岭在互通山西土地廟後。產茶最佳。吳人珍重之。凡茶以初生雨前者佳。惟羅岭立夏開園。梗粗葉厚。微有蕭箬之氣。還是夏前六七日。如雀舌者。最不易得。然廟後山西。向故稱佳。總不如洞山南向。獨受陽氣。專稱仙品。只數十畝而已。凡茶產平地。多受土氣。故其質濁。羅茗產高山巖石。純是風露清虛之氣。故可尚。又長物志云。浙之長興者佳。價亦甚高。今所最重。荊溪稍下。採茶不必太細。細則芽初萌而味欠足。不必太青。青則茶已老而味欠嫩。惟成帶葉綠色而圓厚者爲上。不宜以日曬炭火焙過。扇冷以箬襯。舉貯高處。蓋茶最喜溫燥而忌冷溼也。（趙恕軒）

【繭栗】卽蠶豆之古籍別名。典見綱目。詳『蠶豆』條。

【羅勒】**性質**　甘。平。氣香。

主治　下氣。消食。利小便。去惡氣。

參攷資料　㈠羅勒。一名蘭香。一名蘭蓉。一名蘭薰。一名蘭生。一名蘭草。一名石蘭。一名水蘭。一名香蘭。一名香蘇。一名香菜。一名香薷。一名香菜。一名香蘇。一名香薷。一名香菜。一名香蘇。一名香薷。一名香菜。一名香蘇

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【羅晃】古籍別名　九層皮果。（綱目拾遺）

產地　出廣西山中。

形態　羅晃爲夷果類之一種。結實狀似橄欖。又似蠶豆。至夏成熟。外有黑殼。連肉有皮七層或九層。肉味如栗。可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　養肝膽。明目。去翳。止渴。退熱。解利風邪。消煩降火。翻胃吐食。或食下卽吐。或朝食暮吐。暮食朝吐。用七枚煅存性。每日酒調下。臟腑生蟲。及小兒食泥土。腹痛癖痞積。硬腹中蚘蟲上攻心下。痛欲死。面有白斑。同牽牛子各七枚。水煎服。

【羅浮香】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考詳『米酒』條。

【羅浮參】**產地**　產於羅浮。

形態　如山茅。葉細。莖圓有紫花。三葉一花者爲仙茅。一葉一花者爲人參。根如人字。色如珂玉。煮汁食。味與參無別。但微有膠漿耳。可供藥用。

性質　味甘。帶苦。無毒。

主治　生津。養胃。補虛羸。潤肺。

【羅勒】古籍別名　蘭香。（嘉祐）香菜。臀子草。（綱目）

外國名詞　Ocimum basilicum, L.（拉丁）メバウキ（日本）

基本　係唇形科羅勒屬。爲羅勒之莖葉。其子詳見該條。

產地　生田野間。

形態　羅勒爲菜類之一種。種有三。其葉有似紫蘇者。有葉大於二十步內卽聞香氣者。有堪作生菜者。其莖葉俱可供藥用。

性質　辛。溫。微毒。

主治　調中消食。去惡氣。消水氣。宜生食。療齒根爛瘡。使用之甚良。患嗽嘔者。取汁服半合。冬月用乾者煮汁。其根燒灰。傅小兒黃爛瘡。

歷代記述攷證　【明】吳瑞曰用本草論羅勒曰。主辟飛尸鬼疰蠱毒。

參攷資料　㊀羅勒不可多食。壅關節。澀營衞。令人血脈不行。又動風發脚氣。（孟詵）㊁按羅天益云。蘭香味辛。氣溫。能和血潤燥。而掌禹錫言多食澀營衞。血脈不行。何耶。又東垣李氏治牙疼口臭神功丸中用蘭香云。無則以藿香代之。此但取其去惡氣而已。故飲膳正要云。與諸菜同食。味辛香。能辟腥氣。皆此意也。（李時珍）㊂香菜須三月耑葉生時種之。乃生。否則不生。常以魚腥水米泔水。泥溝水澆之。則香而茂。不宜糞水。（李時珍）

【羅勒子】**形態**　羅勒子大如蚤。而褐色不光澤。可供藥用。

採取　七月間採收之。

主治　目翳及塵物入目。以三五顆安目中。少頃。當澀脹。與物俱出。又主風赤眵淚。

參攷資料　按普濟方云。昔盧州知錄彭大辨。在臨安暴得赤眼。後生翳。一僧用蘭香子洗嚥。每納一粒入眥內。閉目少頃。連膜而出也。一方爲末點之。李時珍常取子試之。水中亦脹大。蓋此子得澀卽脹。故能染惹眵淚。浮膜爾。然目中不可着一塵。而此子可納三五顆亦不妨。礙蓋一異也。（李時珍）

【羅野梨】卽鹿梨之古籍別名。詳『鹿梨』條。

【羅裙帶】**產地**　出於廣西南寧府。

形態　葉滑嫩。長二寸許。似帶。可供藥用。

主治　折傷損手足者。取葉火煨。微熱。貼之卽愈。

【羅漢松】**命名**　本品結實熟之服袈裟。故名。

古籍別名　金錢松。徑松。長者名長青。短者名短青。（綱目拾遺）

外國名詞　Podocarpus chinensis, Wall

產地　多生山野高地。



羅漢松

形態　羅漢松爲松屬之一種。常綠喬木。高數丈。葉厚而狹長。互生。花單性。瓣闕。老則結實。長四五分。大者如雞子。小者如豆。底平上銳。色紫黑。熟則紅色。可供藥用。皮

911／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

詳見該條。

性質　甘。無毒。

主治　補腎益肺止心胃痛。

參攷資料　羅漢松實。味甘。氣香。能大補氣血。（趙學敏）

【羅漢松皮】主治　一切血病殺蟲。葱薤。合薦薈油調搽。

【羅漢柏】外國名詞　Thuja-psis dolabata, S. etZ

基本　屬松杉科羅漢柏之葉。

形態　羅漢柏爲常綠樹。生於深山陰溼之地。幹高達十丈餘。徑達二尺餘。葉類檜葉。作鱗片狀。但粗大。表面呈深綠色。裏面類白色。花爲單性花。果實作毬形。

採取　採葉曬乾。

效能　用爲黃疸藥。

用量　二錢至四錢。

【羅漢條】　卽普賢線之古籍別名。典見綱目拾遺詳『普賢線』條。

【羅漢菓】產地　廣西桂林。

主治　止咳清熱。

【蠃魚】　卽鱖魚之古籍別名。典見開寶本草。詳『鱖魚』條。

【臘茄】　卽蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕃椒』條。

【臘茶】　卽茶葉之陳久者。功用較尋常茶葉爲良。

【臘雪水】基本　本品乃冬至後第三戊日臘月所降之雪水。

性質　甘。冷。無毒。

主治　解一切毒。治天行時氣溫疫。小兒熱癎狂啼。大人丹石發動。酒後暴熱。黃疸。仍小溫服之。

歷代記述攷證　【明】吳瑞曰用本草論臘雪水曰。煎茶煮粥。解熱止渴。【明】李時珍本草綱目論臘雪水曰。宜煎傷寒火喝之藥。抹痧亦良。

參攷資料　㈠臘雪水。洗目退赤。（張從正）㈡雪洗也。洗除瘴癘蟲蝗也。凡花五出。雪花六出。陰之成數也。大宜菜麥。又殺蟲蝗。臘雪密封陰處。數十年亦不壞。用水浸五穀種。則耐旱不生蟲。洒几席間。則蠅自去。淹藏一切果食。不至蛀蠹。豈非除蟲蝗之驗乎。（李時珍）㈢春雪有蟲。水亦易敗。所以不收。（陳藏器）

【臘菜】　卽芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【臘黃】　卽海藤花之就樹採者之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳『藤黃』條。

【蔺藕】　卽蒉實。詳『蒉實子』條

【藕】命名　本品乃蓮之根。蓮之花葉常偶生。不偶不生。故其根名曰藕。藕者耦也。

處方用名　蓮藕。藕汁。

古籍別名　藕蔤。藕絲菜。（綱目）

基本　屬睡蓮科。爲蓮之地下莖。

產地　凡池澤間恒多生焉。

形態　藕色白。裏有孔而有絲。大者如肱。長六七尺。凡五六節。每節生二莖。一爲花。一爲葉。盡處乃生藕。大抵野生及紅花者。蓮多藕劣。種植及白花者。蓮少藕佳也。

採取　冬春間採之。

製法　凡採得洗淨泥土用。

性質　甘平。無毒。

效能　生用涼血散瘀。熟用補心益胃。用作清涼解熱藥。

主治　熱渴。散留血生肌。久服令人心歡。

歷代記述攷證　【南北朝】徐之才雷公藥對論藕曰。汁解射罔毒。蟹毒。【唐】陳藏器本草拾遺論藕曰。止怒止洩。消食。解酒毒及病後乾渴。【唐】孟詵食療本草論藕曰。生食治霍亂後虛渴。蒸食甚補五臟。實下馬同蜜食。令人腹臟肥。不生諸蟲。亦可休糧。【宋】大明諸家本草論藕曰。擣汁服。止悶除煩。開胃。治蠱亂。破產後血悶。擣膏。署金瘡。并傷折。止暴痛。蒸煮食之。大能開胃。【明】繆希雍本草經疏論藕曰。藕稟土氣以生。其味甘。生寒熟溫。入心脾胃三經。生者甘寒。能涼血止血。除熱清胃。故主消散瘀血。吐血口鼻出血。產後血悶。醫金瘡傷折及止熱渴。霍亂煩悶。解酒等功。熟者甘溫。能健脾開胃。益血補心。故主補五臟。實下焦。消食止洩。生肌。及久服令人心懽止怒也。本生於污泥之中。而體至潔白。味甚甘脆。孔竅玲瓏。絲綸內隱。療血止渴。補益心脾。眞水果中之嘉品也。又能解蟹毒。【清】王士雄隨息居飲食譜論藕曰。藕性甘平。生食

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

生津。行瘀止渴。除煩開胃。消食析醒。治霍亂口乾。療產後悶亂。暨金瘡止血定痛。殺射罔魚蟹諸毒。熟食補虛。養心生血。開胃舒鬱。止瀉充飢。擣罨凍瘡。亦可入饌。果中靈品。久食休糧。以肥白純甘者良。生食宜鮮嫩。煮食宜壯老。用砂鍋桑柴緩火煨極爛。入煉白蜜收乾食之。最補心脾。若陰虛肝旺。內熱血少及諸失血證。但且熬濃藕湯飲之。久久自愈。不服他藥可也。老藕擣浸澄粉。爲產後病後衰老虛勞妙品。但須自製。市中物恐雜不眞也。市中熟藕多雜穢物。故易糜爛。最不宜食。諸病皆忌。藕節入藥。功專止血。

配合應用 ㈠治時氣煩渴。用生藕汁一盞。生蜜一合。和勻細服。（聖惠方）

㈡治傷寒口渴。用生藕汁、生地黃汁、童子小便各半盞。煎溫服之。（扁安時傷寒論方）

㈢治霍亂煩渴。藕汁一鍾。薑汁半鍾。和勻飲。（聖濟總錄方）

㈣治霍亂吐利。生藕搗絞汁服。（聖惠方）

㈤治上焦痰熱。藕汁、梨汁各半盞。和服。（簡便方）

㈥治產後悶亂。血氣上衝。口乾腹痛。用生藕汁三升飲之。（梅師方）用藕汁、地黃汁、童便等分煎服。（扁安時）

㈦治小便熱淋。生藕汁、地黃汁、蒲萄汁各等分。每服半盞。入蜜溫服。

㈧治墜馬。血瘀積在胸腹。嗽血無數者。乾藕根爲末。酒服方寸匕。日二次。（千金方）

㈨治食蟹中毒。生藕搗汁飲之。（聖惠方）

㈩治凍脚裂坼。蒸熟藕搗爛塗之。

⑪治塵芒入目。大藕洗搗。綿裹。滴汁入目中即出。（普濟方）

用量 三錢至一兩。

施用宜忌 凡非血熱而有瘀滯者禁用。忌鐵器。

著名方劑 藕汁膏。滋養胃液。（沈氏尊生書方）藕汁、生地黃汁二味。加牛乳黃連末、天花粉末、生薑汁。白蜜爲膏。用時挑取留舌上。徐徐熟湯送之。日三四次。

參攷資料 ㈠根入神仙家。宋時太官作血蛤。（音勘）庖人創藕皮誤落血中。遂散渙不凝。故醫家用以破血多效也。蛤者。血羹也。孟詵曰。產後忌生冷物。獨藕不同生冷者。爲能破血也。（陶弘景）㈡白花藕大而孔扁者。生食味甘。煮食不美。紅花及野藕。生食味澀。煮蒸則佳。夫藕生於卑污。而潔白自若。質柔而穿堅。居下而有節。孔竅玲瓏。絲綸內隱。生於嫩蕸而發爲莖葉花實。又復生芽。以續生生之脈。四時可食。令人心歡。可謂靈根矣。故其所主者。皆心脾血分之疾。與蓮之功稍不同云。（李時珍）㈢藕熬濃汁服。既能補血。亦能通氣。故無膩滯之偏。（王秉衡）㈣陰虛肝旺。內熱血少及諸失血證。但曰熬濃藕湯飲之。久久自愈。不服他藥可也。（王孟英）㈤相感志云。藕與鹽水共食。則不損口。同油爆麵米果食。則無渣。（李時珍）

【藕子】即蓮肉之古籍別名。與見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【藕汁】即藕之處方用名。詳『藕』條。

【藕粉】

基本 本品係以老藕搗浸澄取之粉。

採取 冬日擷取老藕。擣汁澄粉。乾之。以刀削片。潔白如鵝羽。或取粗藕。不限多少。洗淨截斷。浸三日夜。每日換水。看極淨。濾出搗如泥。以布絞淨。汁又將藕渣搗細。又絞汁盡。卻輕濾去渾脚。以清水少和攪之。然後澄去清水。下卽爲粉。曬乾收貯。和糯米粉白糖蒸食之。或以白糖開水沖服俱可。菱粉茨粉。俱用此法。

性質 甘。平。無毒。

主治 調中。開胃。補髓。益血。通氣分。清表熱。常食安神。生智慧。解暑。生津。消食止瀉。

配合應用 ㈠八仙藕粉。此粉滋胃保元。治一切虛勞雜症。白花藕粉、白茯苓、白扁豆炒、蓮肉、川貝母、山藥、白蜜各等分。人乳另入滾水沖。不拘時食。（經驗廣集方）

㈡人紅丸。專治童子勞怯神驗之極。用人胞二十一條。（卽虻蟲）童便洗淨。瓦焙。勿令黑。研末）不破皮紅棗三十個。（飯上蒸熟去皮核）蘿蔔子一錢五分。（炒研）

913／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大熟地五錢。(煮爛杵膏)眞藕粉一兩五錢。(研)眞川連六分。(酒拌炒研末)右將紅棗肉、熟地膏和諸藥末搗勻爲丸如桐子大。每早以白滾湯送下七粒。逐日加增二粒。至二十一粒止。以後不必再加。服一料全愈。予多試皆效。切勿泛視。(濟世養生集方)

參攷資料　㈠藕粉味甘。氣又芬芳。作食輕身延年。而其功用更喜益血止血也。凡一切症皆不忌。可服。(趙學敏)㈡淮以南皆澤國。居人蒔藕。暇則濾爲粉。淘汰既淨。去其渣滓。存其甘液。風吹日曝。漸成碎琼。以湯沃而食之。純任天然。別有風味。亦野物之可尙者矣。尤著名者曰片粉。擇藕之極佳者。淘曬人工十倍尋常。及其既成。則如白雲片片。纖塵不染。味亦絕勝。非大有力者。不能製也。(宦遊筆記)

【藕梢菜】卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【藕荷葉】卽荷葉貼水之古籍別名。典見綱目。詳『荷葉』條。

【藕絲菜】

原名　藕蕷。

採取　五月六月間嫩時採茹之。老則爲藕。不堪爲蔬。

性質　甘。平。無毒。

主治　生食療霍亂後虛渴。煮食開不能食。煎解酒食毒。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論藕絲菜曰。功與藕同。【明】汪頴食物本草論藕絲菜曰。解煩毒。下瘀血。

【藕絲菜】卽藕之古籍別名。典見綱目。詳『藕』條。

【藕節】

處方用名　鮮藕節。藕節炭。

基本　屬睡蓮科。爲藕莖間之節。

產地　凡池澤間恒有生焉。陳仁山藥物生產辨云。各省各屬均有出。廣東以南番順香山等處爲多。

形態　藕節狀如竹節。而外圍有無數細莖。

採取　採藕時採之。

製法　採得洗淨。或曝乾。

性質　澀。平。無毒。

效能　止血。化瘀。主治　搗汁飲。主吐血不止。及口鼻出血。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論藕節曰。消瘀血。解熱毒。產後血悶。和地黃研汁。入熱酒小便飲。【明】李時珍本草綱目論藕節曰。能止咳血。唾血。血淋。溺血。下血。血痢。血崩。【淸】唐容川本草問答論藕節曰。藕節中空。能行水。故用以行血分之瀝。熱而淸瘀血。藕在水中。節又結束極細。而其中仍能通水氣。是水竅通而不通。藕節在水中不通而通。且色能回紫變紅。又入血分。以治淋症尤宜。

配合應用　㈠治鼻衄不止。藕節搗汁飲。并滴鼻中。㈡治卒暴吐血。雙荷散。用藕節、荷蒂各七箇。以蜜少許。搗爛。用水二鍾。煎八分。去滓溫服。或爲末丸服亦可。(聖惠方)㈢治大便下血。藕節嚼麥研末。人參白蜜煎湯調服二錢。日二服。(全幼心鑑方)㈣金鎖玉開丸。治遺精白濁。心虛不寧。用藕節、蓮花鬚、蓮子肉、茨實肉、山藥、白茯苓、白茯神、各二兩爲末。用金櫻子二斤。搥碎。以水一斗。煮八分。去滓再煮成膏。入少麵和藥丸。梧子大。每服七十丸。米飲下。㈤治鼻淵腦瀉。藕節、苧麻、焙研爲末。每服二錢。米飲下。(普濟方)

用量　錢半至三錢。

參攷資料　㈠一男子病血淋。痛脹欲死。予以藕汁調髮灰。每服二錢。三日而血止痛除。按趙潛養病漫筆云。宋孝宗患痢。衆醫不效。高宗偶見一小藥肆。召而問之。其人問得病之由。乃食湖蟹所致。遂診脈曰。此冷痢也。乃用新採藕節搗爛。熱酒調下。數服卽愈。高宗大喜。就以搗藥金杵曰賜之。人遂稱爲金杵曰。殿防禦家。可謂不世之遇也。大抵藕能消瘀血。解熱開胃。而又解蟹毒故也。(李時珍)㈡藕節性冷。伏硫黃。㈢藕節濟平。主吐血不止。及口鼻出血。(王孟英)㈣經云。血者神氣也。又云。所言節者。神氣之所遊行出入也。卽此可悟藕節大療血證之義矣。(劉潛江)

【藕蕊】㈠卽藕之古籍別名。典見綱目。詳『藕』條。㈡卽藕絲菜之原

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名。詳『藕絲菜』條。

【藕節炭】卽藕節焙成炭者之處方用名。詳『藕節』條。

【藕節粉】基本　本品係以藕節搗碎之粉。

性質　甘。微苦。平。無毒。

主治　開胸。補腰腎。和血脈。散一切瘀血。生一切新血。產後及吐血者。食之尤佳。

【蘆茹】卽茄蘆。

【蘆菉】卽蘆茹之古籍別名。典見綱目。詳『蘆茹』條。

【蘞】卽食菜莧之古籍別名。典見圖經本草。詳『食菜莧』條。

【蔺茹】處方用名　蔺茹根。蔺茹草。

古籍別名　離婁。(別錄)掘據。蘆蒌。白者名草蔺茹。(綱目)漆頭。(本草集注)

產地　凡山野川谷及原澤恒有出。

形態　蔺茹爲毒草類之一年生草本。莖高二三尺。葉爲長卵形。莖葉中有汁。折時黃白。旋卽凝黑如漆。春開淡紅或紫色小花。夏日結實如豆。一顆三粒。生青熟黑。中有仁。其根可供藥用。

採取　四五月採之。

製法　採得陰乾用。

性質　辛。寒。有小毒。

效能　破血。殺蟲。蝕惡肉。治瘡疥。用作腐蝕藥。又爲疥癬頑瘡藥。

主治　蝕惡肉。敗瘡。死肌。殺疥蟲。排膿。惡血。除大風熱氣。善忘不寐。(本經)去熱痺。破癥瘕。除息肉。(別錄)

配合應用　㈠緩疽腫痛。蔺茹一兩爲散。溫水服二錢七。(聖惠方)

㈡治傷寒咽痛。毒攻作腫。眞蔺茹爪甲大。納口嚼汁嚥之。當微覺爲佳。(備急方)

㈢治中焦熱痞。善忘不禁。蔺茹二分。甘草二兩。消石爲末。每服一錢。雞鳴時溫酒下。以知爲度。(聖惠方)

㈣治疥瘡瘙癢。蔺茹末入輕粉香油調塗之。(多能鄙事方)

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無實邪者禁用。惡門冬。甘草爲之使。

參攷資料　㈠治馬疥。尤善服食。方用至少。(寇宗奭)㈡孟詵必效方。治甲疽生於脚趾邊腫爛。用蔺茹三兩。黃芪二兩。苦酒浸一宿。以豬脂五合。合煎取膏。三合。日三塗之。卽消。又聖惠方治頭風旋眩。鴟頭丸中亦用之。(李時珍)㈢草高四五尺。葉圓黃。四四相當。四月花。五月實。黑。根黃。有汁亦黃色。三月採葉。四月五月採根。(吳普)㈣今第一出高麗。色黃。初斷時汁出。凝黑如漆。故云漆頭。次出近道。名草蔺茹。色白。皆燒鐵爍頭令黑。以當漆。非眞也。(陶弘景)㈤今河陽淄齊州亦有之。二月生苗。葉似大戟。而花黃色。根如蘿蔔。皮赤。黃肉白。初斷時汁出。凝黑如漆。三月開淺紅花。亦淡黃色。不着子。陶隱居謂出高麗者此近之。又有一種草蔺茹。色白。古方兩用之。故姚僧垣治癰疽生惡肉。有白蔺茹散。傅之。看肉盡便停止。但傅諸膏藥。若不生肉。又傅黃芪散。惡肉仍不盡者。可以漆頭赤皮蔺茹爲散。半錢。和白蔺茹散三錢。和傅之。觀此則赤白皆可用也。(蘇頌)㈥范子計然云。蘆茹出武都。黃色者善。(草蔺茹出建康。色白。今處處有之。生山原中。春初生苗。高二三尺。根長大如蘿蔔。蔓菁。肚。或有歧出者。皮黃赤。肉白色。破之有黃漿汁。莖葉如大戟。而葉長微闊。不甚尖。折之有白汁。抱莖有短葉相對。圓而出尖。葉中出莖。莖中分二三小枝。二三月開細紫花。結實如豆大。一顆三粒相合。生青熟黑。中有白仁。如纓隨子之狀。今人往往呼其根爲狼毒。誤矣。狼毒似南陸大黃。擧根無漿汁也。(李時珍)

【蔺茹根】卽蔺茹之處方用名。詳『蔺茹』條。

【蔺茹草】卽蔺茹之處方用名。詳『蔺茹』條。

【蔺蒿子】卽菴蔺子之處方用名。詳『菴蔺子』條。

【藜】古籍別名　萊。(詩疏)紅心灰藋。(玉册)鵝頂草。(土宿)臙脂菜。(綱目)

外國名詞　Chenopodium album, L. (拉丁)アカザ(日本)

基本　係藜科藜屬。爲藜之葉。其莖詳見該條。

915／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產地　生田野間。

形態　藜爲菜類之一年生草本。高五六尺。莖實柔而形圓。緣邊有少數之缺刻。與鋸齒。葉面有粉狀之小體。葉柄長。夏初梢頭攢簇細花。無瓣。具黃綠色之小形萼。其葉可供藥用。


藜

採取　八九月間。和子採收之。

性質　甘平。微毒。

主治　殺蟲。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論藜葉曰。煎湯洗蟲瘡。漱齒。醫攜爛。塗諸蟲傷。去瘕風。

參攷資料　鵝項陰草也。搗汁煮粉霜。燒灰淋汁。煎粉霜。伏礬石。結草砂。制硫伏汞及雌黃砒石。（李時珍）

【藜茹萩】　即秦萩藜之古籍別名。典見山海經。詳「秦萩藜」條。

主治　燒灰和萩灰、蕎灰等分。水和蒸取汁煎。膏。點疣贅黑子。蝕惡肉。

【藜蘆】　**命名**　黑色曰藜。其蘆有黑皮裹之故名。

古籍別名　山葱。葱苒。（別錄）葱葵。葱奠。（吳普本草）慈葱。鹿葱。（綱目）山櫾。鼠莖。烏蓼。爰茈。朴草。藜蘿。棕櫚草。朴烏伊。（和漢藥考）

外國名詞　Veratrum nigrum, L.（拉丁）

基本　屬百合科藜蘆之地下莖。

產地　陳仁山藥物生產辨云。藜蘆出北亞美利加。我國江蘇省鎮江縣亦有出。

形態　藜蘆爲山地自生之多年生毒草。春季自宿根叢生數葉。夏月抽生二三莖。高達二三尺。葉長。作細披針形。有平行脈。小葉互生。花爲大三四分之紫黑色六瓣花。作圓錐花序排列。根莖被有類似櫚毛之細毛。故一名棕櫚草。其根爲肥短直行之地下莖。有許多鬚根。外部黃褐色。內部白色。無臭。有強烈辛味。若吸入此粉末。則發噴嚏甚烈。誤服少許。則立發嘔吐。混於飯中。蠅食之即死。故一名蠅毒。


藜蘆

採取　二三月間。採掘陰乾。

製法　雷敦曰。凡採得去頭用。糯米泔汁煮之。從巳至未。曬乾用。

性質　辛。寒。有毒。

成分　含有撮魯文（Jelvin.）梵拉篤洛伊仁（Veratroidim.）梵拉篤拉魯濱（Veratralbin.）塞凡仁（Cevadin.）澱粉等。

效能　吐風痰。療中風癲癇。殺諸蟲。治疥癬惡瘡。用作催吐藥。又作殺蟲藥。

主治　蠱毒咳逆。洩痢腸癖。頭瘍。疥瘙惡瘡。殺諸蟲毒。去死肌。（本經）療噦逆。喉痺不通。鼻中息肉。馬刀爛瘡。不入湯用。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論藜蘆曰。主上氣。去積年膿血。泄痢。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論藜蘆曰。吐上膈風涎。暗風癇病。小兒鷄齁痰。疾。【宋】寇宗奭本草衍義論藜蘆曰。研末治馬疥癬。【明】繆希雍本草經疏論藜蘆曰。藜蘆味辛氣寒。別錄苦微寒有毒。入手太陰足陽明經。本經主蠱毒咳逆。及別錄療噦逆。喉痺不通者。皆取其宣壅導滯之力。苦爲涌劑。故能使邪氣痰熱。胸膈部分之病。悉皆吐出也。辛能散結。故主鼻中息肉。苦能泄熱殺蟲。故主洩痢腸癖。頭瘍疥瘙。殺諸蟲毒也。瘡瘍皆濕熱所生。濕熱不去。則肌肉潰爛。苦寒能瀉濕熱。則馬刀惡瘡爛瘡死肌皆愈也。味至苦。入口即吐。故不入湯。【清】黃宮繡本草求眞論藜蘆曰。藜蘆能反五參。細辛芍藥。及一服即吐。其意何居。蓋緣苦雖屬降。而亦善涌。藜蘆辛少苦多。故能入口即吐。是以風痰膈結而見咳逆上氣者。當用是藥以投。使其膈部之邪。悉從上出也。但此宜作散劑以投。切勿湯藥以服。至於腸癖泄痢。如何書載克治。亦是因吐除其實積。積去而利與癖亦可止矣。吐雖等於常山、瓜蒂、烏附尖、萊菔子。但常山則吐瘧痰。瓜蒂則吐

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱痰。烏附尖則吐澀痰。此則專吐風痰者也。況此氣善通頂。治喉痺及鼻中瘜肉。爲末吹效。然亦並非得已。卽有中蠱等毒。及或老痰積塊。止可借其宣泄。切勿沾口以自損其津液耳。取根去頭。

國外學說　日本學說謂漢醫用爲解熱清涼藥。其用量自〇・一至〇・二。猪子氏曰。藜蘆雖爲吐藥然含「ウエラトリン」或類似之鹽基。其性極劇烈。故不適於吐劑。亦非治療上必用之品。（中外醫事新報）藜蘆根中之亞爾加魯乙度。依アークレーメル氏之定量云。用善良之根末五瓦。於浸出裝置之定量。可得成白色鱗屑。或細小柱之亞爾加魯乙度「エルヴイン」及「ヴエラトロイデイン」一・三瓦至一・五瓦。（藥學雜誌第九十號）和漢藥考曰。藜蘆產日本高山。近江之伊吹山。下野之日光山尤多。故一名日光蘭。藜蘆有二種。一種爲黑藜蘆。卽今所述者。一種爲白藜蘆（V. Album, L.）產歐洲及亞洲北部。亦供藥用。又有一種曰木藜蘆者。係屬石南科。葉互生作卵圓形。爲有毒植物。將此乾葉末少許吹入鼻孔。立發噴嚏。如用多量。雖至鼻孔出血。噴嚏仍不止。但飲冷水則立已。煎湯。則得淡褐色液。服之。腹部突然膨脹。但經片時卽愈。藜蘆或呼萬年青草。有以萬年青根充藜蘆根者。非。英美學說謂白藜蘆產中國。歐羅巴南方等處。高約三尺至四尺。其根可爲藥品。根內含有霜。西醫所謂匪嬉地丫者。卽此物。用法取出其霜。甚毒。故醫士鮮用之。英國藥肆中常出售之白藜蘆。多從日耳曼國運來。藜蘆根如指大。色白。嗅之令人掩鼻。惟乾者無臭。味初嘗覺少甜。後最苦而辛。則掩其甜味。至其醫治作用則爲平腦藥。平脈藥。又爲慧胃毒藥。研末服之。則吐瀉。前時用爲引水瀉藥。又用以治痛風。今用此以殺皮膚毛髮內之蟲。間用之爲取嚏藥。其用法。將此藥一二釐合於小粉或白芷粉嗅之。其功用能去火除煩。與青藜蘆同。或代以酒亦可。其處方如白藜蘆酒方用白藜蘆根八兩切碎。白衝酒二斤。浸七天。濾渣爲度。每服十滴。每日服三次。合於鴉片酒少許服之。此爲吐藥。瀉藥。寧睡藥。間有痛風與風溼病用之。用量每一釐須分四十服。又青藜蘆英美學說謂亦產中國。及北亞美利加。加拿大等處。其言曰。此草所產之處。爲卑溼地或溼草地或河邊。高約三尺至六尺。形狀與白藜蘆同。惟白藜蘆則產於岡陵。此爲青藜蘆與白藜蘆之不同處。其根厚而軟。上半似有切斷形。下半厚而多白色小根。味苦而辛。嗅之令人噴嚏。可爲藥品。醫治作用。則食大服必嘔吐大作。間有服後作瀉。其平脈甚速。服少許。俟兩點鐘再服。可使脈弦數轉爲遲緩。如痛風。風溼。或腦氣筋疼。可用最小之服。又如心肌肉生厚。跳動逾常有力。服之可減緩略安。倘心房門有壞。則不宜服。又如心跳症之或因飲濃咖啡。或因吸生熟煙而致者。服之可止。又如腦部肺肝各臟腑積血多。其未發炎之先。服之可以免其發炎。亦可佐別法以散其積血。既發炎則不宜服。又如跳血竅宜用此藥以減少心力跳動。兼以外治法療治之。（其外治法。須按定患在何處。或用綿綁紮。或用拇指摘緊。或夾束以壓止之。若此則可以令血竅內之血易於凝結而漸就見效）又如以此藥搽皮膚。則立見紅熱。嗅其霜能令人噴嚏不休。其功用能去火。除煩。生津液。平脈。緩氣。治酒風。腳偏誤服此藥過多。可服鴉片火酒等解之。處方如下。青藜蘆四分細末。濃酒二十分。先用酒十五分浸二天。間時搖動。裝淋筒淋乾。加餘酒漂淋用絞盤絞渣。過淋紙。再加酒仍足二十分爲度。如服至作嘔。或服至寸脈已緩。宜停止勿服。至放血或瀉劑。欲減輕其血脈急迫之患。此藥皆足以佐之。每服八釐七毫半至三分半。（青藜蘆酒方）用量則每服七釐至一分半。釐多服則昏暈無力。不可妄用。研末或配酒用。再者青藜蘆不可用爲吐藥。以其藥性過於猛烈。吐後必煩服不堪也。

配合應用　㊀治諸風痰飲。藜蘆十分。鬱金一分爲末。每以一字。溫藥水一盞。和服探吐。（經驗方）

917／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈡治中風不省。牙關緊急者。藜蘆一兩。去苗頭。濃煎。防風湯浴過。焙乾。切。炒微褐色。爲末。每服半錢。小兒減半。溫水調灌。以吐風涎爲效。未吐再服。（簡要濟衆方）

㈢治中風不語。喉中如曳鋸。口中涎沫。取藜蘆一分。天南星一個。去浮皮。於臍上剜一坑。納入陳醋二椽。斗四面火逼黃色。研爲末。生麵丸。小豆大。每服三丸。溫酒下之。甚效。（經驗方）

㈣治諸風頭痛。和州藜蘆一塹。日乾。研末。入麝香少許。吹鼻。又方。通頂散。藜蘆半兩。黃連三分。嗑鼻。（聖惠方）

㈤治久瘧痰多。不食。欲吐不吐。藜蘆研末半錢。溫蜜水調下。探吐。（保命集方）

㈥治痰癇積癖。藜蘆、皂莢炙各一兩。巴豆二十五枚。熬。研末。蜜丸。小豆大。每空心服一丸。未發時一丸。臨發時又服一丸。勿用飲食。（肘後方）

㈦治黃疸腫疾。藜蘆灰中炮爲末。水服半錢匕。小吐。不過數服效。

㈧治胸中結聚。如駭駭不去者。巴豆半兩。去皮心。炒搗如泥。藜蘆炙研一兩。蜜和搗丸。麻子大。每服一二丸。取效。（肘後方）

㈨治身面黑痣。用藜蘆灰五兩。水一大碗。淋汁。銅器重湯煮成黑膏。以針微刺破點之。不過三次效。（聖惠方）

㈩治鼻中息肉。藜蘆三分。雄黃一分。爲末。蜜和點之。每日三上。自消。勿點兩眸。（聖惠方）

(一)治牙齒蟲痛。藜蘆末內入孔中。勿吞汁。神效。（千金翼方）

(二)治白禿蟲瘡。藜蘆末。豬脂調塗之。（肘後方）

(三)治頭生蟣虱。以藜蘆末摻之。（直指方）

(四)治頭風白屑痒甚。藜蘆末沐頭。摻之。緊包二日夜。避風效。（本事方）

(五)治反花惡瘡。惡肉反出。如米。藜蘆末豬脂傅。每日三五上。（聖濟總錄方）

(六)治疥癬蟲瘡。藜蘆末生油和塗。

(七)治羊疳瘡痒。藜蘆二分。附子八分。爲末。傅之。蟲自出也。（陶隱居方）

(八)治誤吞水蛭。藜蘆炒爲末。水服一錢。必吐出。（德生堂方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者。禁用。畏葱白。反細辛、芍藥、人參、沙參、紫參、丹參、苦參、惡大黃、黃連爲之使。

參攷資料　(一)藜蘆服錢七一字。則嘔吐人。又用通頂令人噦。別本云。治噦逆甚效。（蘇頌）(二)噦逆用吐藥。亦反胃用吐法去痰積之義。吐藥不一。常山吐瘧痰。瓜蒂吐熱痰。烏附尖吐溼痰。萊菔子吐氣痰。藜蘆則吐風痰也。按張子和儒門事親云。一婦病風癇。自六七年得驚風後。每一二年一作。至五七年五七作。三十歲至四十歲則日作。或甚至一日十餘作。遂昏癡健忘。求死而已。值歲大飢。採百草食。於野中見草若葱狀。採歸煮熟。飽食。至更忽覺心中不安。吐涎如膠。連日不止。約一二斗。汗出如洗。甚昏困。三日後遂輕健。病去食進。百脈皆和。以所食葱訪人。乃愁葱苗也。卽本草藜蘆是矣。圖經言能吐風病。此亦偶得吐法耳。我朝荊和王妃劉氏。年七十。病中風。不省人事。牙關緊閉。鞫醫束手。先考太醫吏目月池翁診視。藥不能入。自午至子。不獲已。打去一齒。濃煎藜蘆湯灌之。少頃。噫氣一聲。遂吐痰而甦。調理而安。藥弗瞑眩。厥疾弗瘳。誠然。（李時珍）(三)藜蘆生太山山谷。三月採根陰乾。（別錄）(四)所在山谷皆有。葉似鬱金、秦艽、薤荷等。根若龍膽。莖下多毛。夏生冬凋。八月採根。（韓保昇）(五)今陝西山南東西州郡皆有之。遂州、均州、解州者尤佳。三月生苗。葉似初出櫻心。又似車前。莖似葱白。青紫色。高五六寸。上有黑皮裹莖。似櫻皮。有花。肉紅色。根似馬腸根。長四五寸許。黃白色。二月三月採根陰乾。此有二種。一種水藜蘆。莖葉大同。只是生在近水溪澗石上。根鬚百餘莖。不中藥用。今用者名葱白藜蘆。根鬚甚少。只是二三十莖。生高山者爲佳。均州土俗亦呼爲鹿葱。范子計然云。出河東黃白者善。（蘇頌）(六)眞中風。痰涎壅盛。無汗表實。用三聖散。卽防風藜蘆瓜蒂吐之。甚

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

則用五元散。乃藜蘆赤小豆皂角白礬臍礬吐之。然則藜蘆乃救急之藥。不可不知。而又不可不備者也。（盧鵬飛）㊉藜蘆擦外皮立見紅熱。其霜嗅之令人噴嚏不休。內服則嘔吐大作。間有服後作瀉者。其平脈甚速。服少許。俟兩點鐘再服。可使脈弦數者轉爲遲緩。腦部肺肝各臟腑積血多尙未發炎之先。服此藥能免其成炎。亦可佐別法以散其積血。（西藥略釋）

【藜蘆】卽藜蘆之古籍別名。典見和漢藥考詳『藜蘆』條。

【藤弘】卽胡麻之古籍別名。典見張揖廣雅。見『胡麻』條。

【藤紙】**命名** 本品係用藤製成之紙。故名。

採取 陳舊者良。

主治 內熱衄血。破傷出血。餘與楮紙同。

【藤梨】卽獼猴桃之古籍別名。典見開寶本草。詳『獼猴桃』條。

【藤菜】卽落葵之古籍別名。典見綱目。詳『落葵』條。

【藤菜子】卽冬葵子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬葵子』條。

【藤黃】**命名** 本品乃海藤樹之膠質脂液結成。其色黃澤。故名藤黃。

古籍別名 海藤。（郭義恭廣志）

外國名詞 Gutti（拉丁） Gamboge.（英） Gammigutt.（德）

基本 係將屬金絲桃科藤黃樹（Garcinia Morella, desv.）之幹皮。於開花前。鑽取其滲出之濃稠乳狀液。曬乾之結爲膠質。華爾斯用以入藥。

產地 陳仁山藥物生產辨云。藤黃西藥名干薄折。產眞臘、安南、暹羅等處。乃洋海藤樹脂結成。色黃。味辛。無臭。以暹羅出者爲上。八九月新。

形態 藤黃樹爲生於熱帶地方之喬木。高五六丈。枝分歧繁茂。作傘形。葉厚硬而對生。作尖卵圓形。花爲黃赤色。單性四瓣花。後結橙狀漿果。其脂液所結成之藤黃。作圓筒形或管狀。直徑六分至一寸五分許。時或作不正固塊。外面綠黃色。有縱紋。並被有黃色之粉霜。質堅而脆。破碎而作貝殼狀。呈黃褐色。發類蠟之光澤。能溶於鹼液。伊打。酒精則不能完全溶解。用水研和。則成黃色乳劑。投火中則燃燒。本品無臭氣。咀嚼之初黏稠無味。後漸辛。口中似乾燥。



藤黃

採取 以形似筆管而色嫩純明者良。

製法 以水蒸化。濾去渣。盛磁器內。隔氷煮之。水少時再添煮乾。以三炷香爲度。以帛紮磁器口。埋土中七日。取出。如此七次。曬乾用。

性質 酸澁有毒。

成分 上品藤黃含有樹脂七十至七十五%及可溶性膠質三十至二十五%。

效能 用作峻下劑。用於繼蟲及水腫等。

作用 在胃時能乾刺胃壁神經。使胃液分泌增加。至腸中則腸黏膜被而腸分泌增多。膽汁亦因激增加。腸之蠕動亦驟然迅速。可使積囊急下。若服量稍多。則起腸胃炎。甚至腸出血。嘔吐腹痛頭昏而死。

主治 蛀牙蛀齒。點之便落。

歷代記述攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論藤黃曰。治癰疽止血化毒。飲金瘡亦能殺蟲。治刀斧木石傷及湯火傷。竹木刺入肉。一切諸傷。

國外學說 英美學說謂藤黃西名干薄折。爲膠香類之質。原產安南、眞臘、暹羅等國。係將洋海藤樹研其樹身皮裂液流。接以竹筒。卽凝結成條。原西國之得此物。曾有西人由中國帶至西國。至西國之用藤黃代眞大黃膏。則不知始於何時。蓋自英國醫士遊歷西藏得此物。土人謂之大黃膏。尋常出售之藤黃有二種。一產暹羅。一產錫蘭。暹羅所產之藤黃。似錫蘭所產。原質與性情亦復大略相同。其條成柱形。心或實或空不定。其所以成爲圓柱形者。殆因其液收於竹內。比凝結時取出。故成此形。至錫蘭所產之藤黃。在印度街市出

919／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

售。以此歐羅巴人不能多見。而加西尼亞等所產之藤黃。可代邏羅與錫蘭所產者。咸豐五年時。法國博物院中。存有印度買索爾所產之藤黃。亦屬甚佳。其質脆而易碎。長約六寸。徑約一寸。色橙黃。和水色亦黃。無臭味。頗辣。服後若干時。猶覺喉內粘而不適。又搗碎時所成細粉。能惹鼻流涕。藤黃爲重性水瀉藥。驅蟲藥。如大便久不通。經閉。水臌等病。用此藥均能有益。然獨用則不及合於汞（二）綠等藥用之。且不宜過服。過服則使人嘔吐。肚疼。有大毒而危險。故在此項用途上最好避之。而代以他品。此其醫治外用之大概也。至用量則每服一釐七毫半至八釐七毫半。驅蟲每服五釐二毫半至一分七釐半。過服使人嘔吐肚疼。故單服者少。又日本和漢藥考曰。藤黃係藤黃樹（Garcinia Hanburyi, Hook, fil）之膠質樹脂。大七仙米爲圓柱形或彎曲狀之熔合塊。帶綠黃色。易破碎爲暗栆欒黃色扁平貝殼狀之不透明片。用本品一分加水二分研磨之。則成鮮黃色之乳劑。其味如灼。再和以安母尼亞水一分。則變澄明液。初呈鮮赤色。最後變褐色。將此混和液中之安母尼亞中和時。則液失色。而析出黃色絮狀物。藥舖所售藤黃有二種。甲種日本呼辨天印。係將脂液入竹筒硬固者。其狀如蛇之蟠屈。謂之竹管黃。爲上品。乙種日本呼爲盤。樣作不正塊狀。外面有竹籠紋。破碎面之色不一。恐係煎熬數種脂液所成之混和物。謂之沙黃。爲下品。

近人學說　張山雷曰。瀕湖綱目謂藤黃點蛀牙自落。石頑謂性毒而能攻毒。點牙即落。毒能傷骨傷腎。可知趙氏綱目拾遺謂三黃寶蠟丸。黎峒丸俱用藤黃。以其善解毒也。中藤黃毒者。食海蜇即解。趙氏又引百草鏡謂藤黃出外洋及粵中。乃藤指也。形似筆管者良。大塊者不佳。又引粵志。廣中產黃藤。熬汁即藤黃。性最寒。以青魚膽和之。治眼疾。治癰疽。止血。化毒。斂金瘡。亦能殺蟲。治刀斧木石傷及湯火傷。有治一切諸傷神效方。金不換治跌打刀傷方。治外科一筆消之毒散等方。皆佳。詳見趙氏本書。茲不具錄。壽頤案藤黃雖曰有毒。然除寶蠟丸、黎峒丸外。本不入口。其能退消外瘍癰腫及止血定痛。斂金瘡則粵志謂其性最寒者是矣。且本是藤之脂膏。煮成性極黏膩。故能生肌止血。且藤本蔓延。善入經絡。此又治跌打傷消癰腫之原理。究屬有毒。故又殺蟲。能療癬疥。

配合應用　㈠風氣膏。治一切無名腫毒。藤黃四兩。白蠟八兩。小磨麻油十二兩。先將油煎熱。將成珠。入水不散。再加黃白攪勻。磁瓶收面上。仍以麻油養之。臨用攤貼。（不藥良方）

㈡一筆消。用大黃二兩。藤黃一兩。明礬、蟾酥各五錢。麝香、乳香、沒藥各二錢。用蝸牛搗爛作錠。遇小癤毒未出癤頭。以此醋磨。新筆蘸藥圈外。愈圈愈小。圈毒盡消而止。（祝氏效方）

㈢治一切癰腫。雄黃、膽礬、硼砂、藤黃、銅綠、皮硝、草烏各一兩。麝香二錢。爲細末。和蟾酥爲條。如筆管大。金箔爲衣。用時以醋磨濃。新筆蘸藥塗毒四圍。數次即愈。（祝氏一筆消方）

㈣消毒散。消癰疽瘰癧毒。及初生多骨疽。大黃一兩。芙蓉葉曬乾爲末。五倍子各一兩。麝香、冰片各三分。藤黃三錢。生礬三錢。共爲末。米醋調成如厚糊。塗於多骨疽之四週。中留一頭如豆大。以醋用鵝翎不時掃之。若不掃任圍則無益。一日夜即內消。其餘癰癤亦以此敷之。神效。又方。雄黃二兩。麝香三錢。藤黃一兩。人中白五錢。硃砂、白芨、生白斂各二錢。蟾酥一兩。共研末。用廣膠三錢。烊化和藥末爲錠。遇毒將此藥磨醋水塗之。（良方彙選方）

㈤消毒方。治一切無名腫毒。及對口發背。用滴花燒酒。磨藤黃敷。不住手敷之。不至半日即消。（救生苦海方）

㈥無回丹。治一切疔癰腦疽。用鹼、藤黃、雄黃、大黃各一兩。蟾酥、麝香各二錢。血竭甲片炒各五錢。醋磨塗立效。（衆妙方）

㈦救生苦海云。如毒生在肢節穴道險要處。不成漏症。即爲廢人。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

須用此藥。只塗半圈。即移過一邊。用白芨、白蘞、三七、五倍子、大皂角、山茨菰、藤黃各等分。俱剉薄片。除藤黃餘皆入砂鍋內水浸一日。煎汁傾出。入水再煎。如此數次。濾淨熬膏。以藤黃將水蒸烊。加入攪勻。再熬。入碗曬乾。用時以雞蛋清磨出濃汁。新筆調塗。又方。藤黃、銀硃等分。醋和敷。趕毒至他處出膿。如用穀樹汁調。可探癬一二次即消。（移毒方）

㊈大提藥方。圖毒初起。凡對口發背惡疽。四五日即消。雄黃、藤黃、麝香各一錢。硃砂三分。草麻肉三錢。紅昇丹一錢五分。先將草麻研如泥。後和各藥研爛。用象牙匣封藏。外以虎皮包之。方不泄氣。（良方彙選方）治諸毒不起。敷之立起。藤黃、雄黃各三錢。蟾酥、紅藥各二錢。冰片、麝香各一錢。草麻肉一兩。先將草麻肉去皮。打如魚凍。水入諸藥。打成膏。磁罐收貯。勿令洩氣。或云宜紅藥三錢。冰片、蟾酥勿用。止加麝三分。辰砂一錢。（種福堂提藥方）又方。鬱金、雄黃、藤黃各二錢。牛黃、蟾酥、硃砂、冰麝各五分。巴豆肉八錢。草麻肉一兩。共搗爛。磁瓶貯。遇症放膏藥上少許貼之。治一切惡毒。未成可消。已成用之化腐。疔毒更妙。（黃提藥方）

㊉諸毒圖藥。用南星炒四兩。五倍子炒黑。白芨炒各二兩。藤黃、薑黃炒各一兩。共爲細末。醋調塗重者。加牛黃一錢。鹿茸五錢。（祝氏效方）又無膿即消。有膿即潰。五倍子一兩。白芷六錢。藤黃、百草霜各三錢。生半夏、生南星、白芨、陳小粉、飛麪各四錢。共爲末。紅醋調敷。（種福堂方）

㊀箍毒五倍子略焙一兩。藤黃四兩。銅青少許。小粉炒八兩。作錠。用時醋磨塗。（活人書方）

㊁治一切無名腫毒。藤黃五錢。五倍子二兩。白蜜、葱頭各一兩。用米醋調圖患處。留頂勿敷。

㊂五色蟾酥。墨能立消膿毒。雄黃、銀硃、膽礬、韶粉、藤黃、銅綠、硼砂各一兩。麝香一錢。共爲末。蟾酥爲條。如筆管大。水磨塗。

㊃治疔瘡。銀硃、蜈蚣、白甘菊、人中白、苧根內白心。雄黃、藤黃、大黃、共搗數上即退。（楊氏便易方）

㊄治坐板瘡。藤黃搗碎。用雄豬網油。青布一長條。將藤黃糝在網油之上。青布捲成條子。用線紮緊。浸柴油內。一夜火燃取滴下油。杯積埋土中。一夜出火毒。塗瘡即效。（仙遺拾珠方）

㊅五黃散。治一切頑癬。雞脚大黃、硫黃、雄黃、輕粉、藤黃各等分。爲細末。菜油調塗患處。七日勿洗浴。全愈。

㊆金氏離洞膏。治臁瘡如神。萬應油五兩。藤黃一兩五錢。淨黃蠟二兩。共熬黑變色。攤貼。熬萬應油法。香油六十兩。以十六兩官秤作準。浸桃枝一兩。柳枝一兩。槐枝一兩。桑枝一兩。葱一兩。男髮四兩。花椒五錢。草麻二兩。馬前四兩。輕粉五錢。桂枝一兩。白芷二兩。夏浸三日。冬七日。春秋五日。然後熬至渣枯。去渣。每劑生油熬熟。汁得八折。此油凡一切膏藥可作地子。

參攷資料　㊀按郭義恭廣志云。出岳鄂等州諸山崖。樹名海藤花。有蔕。散落石上。彼人收之。謂之沙黃。就樹採者。輕妙。謂之蠟黃。今人訛爲銅黃、銅藤。音譯也。此與石淚採之無異。畫家及丹竈家時用之。（李珣）㊁今畫家所用藤黃。皆經煎煉成者。舐之麻人。按周達觀眞臘記云。國有畫黃。乃樹脂。番人以刀斫樹枝滴下。次年收之。似與郭氏說微不同。不知即一物否也。（李時珍）㊂藤黃性毒。而能攻毒。故治牙蟲蛀齒點之即落。毒能損骨。傷腎可知。葉氏得宜本草云。服藤黃藥。忌吃烟。按三黃寶蠟丸、黎峒丸。俱用藤黃。以其善解毒也。有中藤黃毒者。食海蜇即解。（張石頑）

【藤奏】即落奏之古籍別名。典見食鑑本草。詳『落奏』條。

【藤韶子】即韶子之古籍別名。典見『韶子』條。詳

【藥子】即海藥子之簡稱。詳『海藥子』條。

【藥王草】形態　藥王草類。雜草類之一種。苗莖青色。摘之有汁。可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　解一切毒。止鼻衄。吐血。祛煩躁。

【藥本】即五靈脂之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典和漢藥考。詳『五靈脂』條。

【藥果】卽宜母果之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『宜母果』條。

【藥芹】卽川芎之古籍別名。典見和漢藥考。詳『川芎』條。

【藥珠】卽眞珠細碎可入藥者。詳『眞珠』條。

【藥茱萸】卽吳茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『吳茱萸』條。

【藥蜂針】命名　本品係以蜂針和藥製成者。故名。

製法　取黃蜂針。合硫煉。加冰片用。

主治　疥瘡癩。以溼紙覆瘡。其先乾處。卽瘡頭用針置瘡灸之。

【藥實】卽貝母之古籍別名。典見綱目。詳『貝母』條。

【藥製柑橘餅】命名　本品係柑之以藥製成餅者。故名。

處方用名　製金柑。

製法　用元明粉、半夏、青鹽、百藥草、天花粉、白茯苓各五錢。訶子、甘草、烏梅去核各二錢。硼砂、桔梗各三錢。以上俱用雪水煎半乾。去渣。澄清。取湯煮柑橘。炭盛。微火烘日翻二次。每次輕輕細捻。使藥味盡入皮內。如捻破則不佳。待乾入藥用。

主治　清火。化痰。寬中。降氣。

【藥藻】卽貫衆之古籍別名。典見別錄。詳『貫衆』條。

【藩籬草】卽木槿之古籍別名。典見綱目。詳『木槿』條。

【蘊莖】卽刺楡之別名。詳『楡白皮』條。

【藪柑子】卽紫金牛之日本名。詳『紫金牛』條。

【藪】卽紅花益母草之古籍別名。典見爾雅。詳『益母草』條。

【薄】㊀卽陟釐之古籍別名。典見綱目。詳『陟釐』條。㊁卽海藻之古籍別名。典見別錄。詳『海藻』條。

【蕃子】卽蓖之古籍別名。典見綱目。詳『蓖』條。

【蘧根】卽蘆根之古籍別名。典見新修本草。詳『蘆根』條。

【蟬】外國名詞　Solecurtus Constricta Lamarck.(拉丁)アゲマキ(日本)

基本　係軟體動物瓣鰓類有管類四緣類竹蟬科之蟬。

產地　生海濱沙土中。

形態　蟬爲介類蚌屬之一種。其殼稍呈長方形而膨大。前後開放。表皮薄。長二寸餘。右殼有主齒二。左殼有主齒三。殼頂有外靱殼。外淡茶褐色。內面白色。體之一端。有細長之水管二條。伸出殼外。棲於淤泥之海中。其肉似蠣。色白味美。可供食與藥用。



蟬

性質　甘。溫。無毒。

主治　補虛。主冷病。煮食之。去胸中邪熱煩悶。飯後食之。與服丹石人相宜。治婦人產後虛損。

參攷資料　蟬肉。天行時病後。不可食之。(孟詵)

【蟬殼】製法　用蟬殼置瓦上。日曬夜露。經年取下。色白如雪。擣細。水漂淨。末曬乾。入冰片。固藏待用。

主治　喉風。急痺。

【蟬唬】卽螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

【蟬蜕窠】卽桑螵蛸之古籍別名。典見綱目。詳『桑螵蛸』條。

【蟹】處方用名　蟹爪。蟹殼。蟹肉。

古籍別名　螃蟹。橫行介士。(蟹譜)郭索。(揚雄)無腸公子。(抱朴子)雄者名蜎蠉。雌者名博帶。雹牝。蠘。撥掉子。擁劍。桀步。執火。蟛蜞。蟛蜎。(綱目)

外國名詞　Brachyura sp. (Crab)(拉丁)

基本　係爬蟲類節足動物類之蟹。

產地　凡池沼湖澤中恒有出。



蟹

形態　蟹爲介類。棲息水岸穴窟。頭胸部甲甚闊。腹甲扁平。屈折於胸部之下。有橫紋。雄者小而尖。雌者大而圓。複眼在背甲前緣之深窩。有柄承之。大顎堅硬如鹵。便於咀嚼。內臟在背甲下。脚五對。第

922／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一對變形爲螯。橫行甚速。

採取　八九月採捕之。

製法　李時珍曰。凡蟹生烹鹽藏。糟收酒浸。醬汁浸。皆爲佳品。但久留易沙。見燈亦沙。得椒易脆。得皂莢或蒜及韶粉可免沙脆。得白芷則黃不散。得葱及五味子同煮。則色不變。

性質　鹹。寒。有小毒。

效能　散血結。瀉諸熱。其殼用作疥癬漆瘡藥。

主治　胸中邪氣熱結痛。喝僻面腫。能敗漆。燒之致鼠。（本經）解結散血。愈漆瘡。養筋益氣。（別錄）

歷代記述弦證　【唐】孟詵食療本草論蟹曰。散諸熱。治胃氣理經脈。消食。以醋食之。利腑節。去五臟中煩悶氣。益人。【唐】陳藏器本草拾遺論蟹曰。能續斷絕筋骨。去殼同黃搗爛。微炒。納入瘡中。即連也。【宋】日華諸家本草論蟹曰。產前肚痛。血不下者。以酒食之。筋骨折傷者。生搗炒暑之。【宋】寇宗奭本草衍義論蟹曰。小兒解顱不合。以螯同白及末搗塗。以合爲度。【明】李時珍本草綱目論蟹曰。殺蔑蓉毒。解鱠魚毒。漆毒。治癩及黃疸。搗膏塗疥瘡癬瘡。搗汁滴耳聾。【明】經希雍本草經疏論蟹曰。蟹味鹹氣寒。本經雖云有毒。然今人多食之。卒無害。其有毒者。大抵形質怪異。入足陽明足厥陰經。經曰。熱淫於內。治以鹹寒。故主胸中邪氣熱結痛也。喝僻者。厥陰風熱也。面腫者。陽明熱壅也。解二經之熱。則筋得養。而氣自益。喝僻面腫俱除矣。鹹走血而軟堅。故能解結散血。漆得蟹則化爲水。燒之可集鼠。於庭。此物性之相感相制。莫能究其義也。愈漆瘡者。以其能解漆毒故也。爪性迅利。故能破胞墮胎也。【清】黃宮繡本草求眞論蟹曰。蝑蟹最屬陰寒。故書所述利弊。大令人瞰。如蟹與柿同食。則令人泄瀉。及發癥瘕。與孕婦食。則能使胎即下。而爪尤甚。以蟹燒烟。則能集鼠於庭。同銀硃燒烟。則能使臭蟲即斃。蟹近於漆。則化漆而爲水。筋骨損斷。用蟹搗爛。微炒。納入瘡中。則能使筋即連。他如胸中熱積。喝僻面腫。及瘡血發黃。婦人乳癰硬腫。小兒顱解。凡因熱結熱滯而成者。無不用之立效。其化血爲水。逐熱消瘀。未有若是其神者矣。總原性屬鹹寒。外骨內肉。生青熱赤。陽包陰象。陰氣純佈。故克其迅利耳。若血因寒滯。及腹中疼痛。喜熱而惡寒者。其切忌焉。醃蟹宜入蒜頭則不沙。蔽中蟹毒者。宜搗藕節。熱酒調服。【清】張隱菴本草崇原論蟹曰。今外科多用蟹殼。搗細篩末爲鐵箍散。毒散。大抵蟹殼爲攻毒、散風、消積、行瘀之用。學者以意會之可也。【清】王士雄隨息居飲食譜論蟹曰。蟹甘鹹寒。補骨髓。利肢節。續絕復。滋肝陰。充胃液。養筋活血。治疽愈痰。療跌打骨折筋斷諸傷。解鱠魚莧菪。漆毒。殺主胎邪破血。爪可催產墮胎。種類甚繁。名號不一。以吳江烏程秀水嘉興海昌等處河中所產。霜後大而脂滿者勝。和以薑醋。風味絕倫。多食發風積冷。孕婦及中氣虛寒。時感未清。痰嗽便瀉者。均忌。別種更寒。尤不益人。中其毒者。紫蘇冬瓜蘆根蒜汁皆可解之。反荊芥。又忌同柿食。誤犯則腹痛吐利。急以丁香木香解之。海產者黃堅滿而無膏不鮮。並可鹽漬。酒浸糟醬。久藏。得皂莢則不沙。

配合應用　㊀治瀝熱黃疸。以蟹燒存性研末。酒糊丸。如梧桐子大。每服五十丸。白湯下。日服二次。（集簡方）

㊁治骨節離脫。生蟹搗爛。以熱酒傾入。連飲數椀。其渣塗之。半日內。骨內骨谷谷有聲。即好。乾蟹燒灰酒服亦好。（唐瑤經驗方）

㊂治中鱠魚毒。食蟹即解。（董炳驗方）

㊃千金神造湯。治子死腹中。幷雙胎一死一生。服之令死者出。生者安。神驗方也。用蟹爪一升。甘草二尺。東流水一斗。以葦薪煮至二升。濾去滓。入眞阿膠三兩。令烊頓服。或分二服。若人困不能服者。灌入即活。

㊄下胎蟹爪散。治妊婦有病欲去胎。用蟹爪二合。桂心、豐麥各一兩。牛膝二兩。爲末。空心溫酒服一錢。（千金方）

㊅治崩中腹痛。毛蟹殼燒存性。米飲服一錢。（證治要訣方）

㊆治蜂蠆螫傷。蟹殼燒存性研

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

末。蜜調塗之。（證治要訣方）

㈧熏辟壁虱。用蟹殼燒烟熏之。（摘玄方）

施用宜忌　凡脾胃虛寒者禁用。不可與柿同食。食之損人。

參攷資料　㈠仙方用之化漆爲水。服之長生。以黑犬血灌之。三日燒之。諸鼠畢至。（陶弘景）㈡未被霜。甚有毒。云食水莧所致。人中之不療多死。也獨螯獨目。兩目相向。六足四足。腹下有毛。腹中有骨。頭背有星點。足斑目赤者。並不可食。有毒害人。冬瓜汁、紫蘇汁、薤汁、荻汁、蘆根汁皆可解之。（陶弘景）㈢不可同柿及荊芥食。發霍亂動風。木香汁可解。（李時珍）㈣按傅玄蟹譜云。蟹水蟲也。故字從蟲亦魚屬也。故古人從魚以其橫行。則曰螃蟹。以其行聲。則曰郭索。以其外骨。則曰介士。以其內空。則曰無腸。（李時珍）㈤蟹類甚多。蝤蛑、擁劍、蠏婦皆是。並不入藥。海邊又有蠏蜞。似蠏蝑而大。似蟹而小。不可食。蔡謨初渡江不識蠏蜞。啖之幾死。嘆曰。讀爾雅不熟。爲學者所誤也。（陶弘景）㈥今淮海、汴、京、河北陂澤中多有之。伊洛乃反難得也。今人以爲食品佳味。俗傳八月一日取稻芒兩枝。長一二寸許。東行輸送其長。故今南方捕蟹。差早則有衡芒。須霜後輸芒。方可食之。否則毒尤猛也。其類甚多。六足者名蜞。（音跪）四足者名牠。皆有大毒。不可食。其殼闊而多黃者名蟻。生南海中。其螯最銳。斷物如芟刈也。食之行風。氣其扁而最大。後足闊者蝤蛑。南人謂之撥掉子。以其後腳如掉也。一名蝑。隨潮退殼。一退一長。其大者如升。小者如盞。螯兩螯如手。所以異於衆蟹也。其力至強。八月能與虎鬬。虎不如也。一螯大。一螯小者名擁劍。一名桀步。常以大螯鬬小螯食物。又名執火。以其螯赤也。其最小無毛者名蠏蝑。（音越）吳人訛爲彭越。爾雅云。蝑蠏小者蛖。郭璞註云。卽蠏蝑也。（蘇頌）㈦蟹橫行甲蟲也。外剛內柔。於卦象離。骨眼螷腹。螯腳鱟足。二螯八跪。利鉗尖爪。殼脆而堅。有十二星點。雄者臍長。雌者臍圓。腹中之黃。應月盈虧。其性多躁。引聲嘆沫。至死乃已。生於流水者色黃而腥。生於止水者色紺而鞕。佛書言其散子後。卽自枯死。霜前食物。故有毒。霜後將蟄。故味美。所謂入海輸芒者。亦謬談也。蠏蜞大於蠏蝑。生於陂池田港中。故有毒。令人吐下。似蠏蜞而生於沙穴中。見人便走者。沙狗也。不可食。似蠏蜞而生海中。潮至出穴而望者。望潮也。可食。兩螯極小如石者。蚌江也。不可食。生溪澗石穴中。小而殼堅赤者。石蟹也。野人食之。又海中有紅蟹。大而色紅。飛蟹能飛。善化國有百足之蟹。海中蟹大如錢。而腹下又有小蟹如榆莢者。醋奴也。居蚌腹者蠣奴也。又名寄居蟹。並不可食。蟹腹中有蟲。如小木鼈子而白者。亦不可食。大能發風者也。（李時珍）

【蟹爪】　**主治**　破胞。墮胎。

歷代記述　**弦螳**　【宋】

日華諸家本草論蟹爪曰。能破宿血。止產後血閉。酒及醋湯煎服良。

【明】李時珍本草綱目論蟹爪曰。墮生胎。下死胎。辟邪魅。

【蟹肉】　卽蟹之處方用名。詳『蟹』條。

【蟹殼】　**主治**　燒存性。蜜調。塗凍瘡及蜂蠆傷。酒服。治婦人兒枕痛及血崩。腹痛。消癥。

【蠭蜂】　卽土蜂之古籍別名。典見本經。詳『土蜂』條。

【蟻垤土】　**命名**　蛭。高起也。本品爲蟻所爬起之土。故名。

古籍別名　蟻封。（綱目）

主治　狐刺瘡。取七粒和醋搽。又死胎在腹及胞衣不下。炒三升。囊盛。揣心下自出。

【蟻封】　卽蟻垤土之古籍別名。典見綱目。詳『蟻垤土』條。

【蟻螻】　卽白蟻之古籍別名。典見綱目。詳『白蟻』條。

【蟻蛭子】　卽白殭蠶之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白殭蠶』條。

【螫蟆】　卽蝦蟆之古籍別名。典見綱目見『蝦蟆』條。

【蟾】　卽蟾蜍之簡稱。詳『蟾蜍』條。

【蟾酥】　**命名**　本品乃蟾蜍之眉間白汁。採治陰乾。如酥。故名。

古籍別名　月魄。（綱目）月魂。蟾實。（和漢藥考）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

外國名詞　Toad-cake.（英）

基本　爲蟾蜍分泌之白色乳狀毒液。

產地　陳仁山藥物生產辨云。蟾蜍以產河北省北平東便之豐閏、玉田兩縣者爲最好。亦多出山東產者次之。六七月收成。和漢藥考曰。中國之江蘇、四川。皆其主產地。

形態　蟾酥爲蟾酥分泌之毒汁。與麵粉泥和之煉合物。其形狀不一。惟外面稍覺滑澤。現黑褐色。其破碎片之尖端。透映而作褐色。味辛烈。其粉末如入眼內及鼻中。即發腫痛。水能次第溶解。市上出售者。多作扁圓形。大九分許。中心凹陷。有一小孔。此蓋串以麻線。令得風乾也。亦有爲半圓形。徑一寸。高六七分。中亦穿孔。又或扁平。展延若板片者。製造處及品質俱各不同。故其形狀亦異。就中以番木鼈子形者爲最佳。

採取　六月七月採治之。其法有三焉。㈠刺戟蟾蜍之眉間。使分泌白汁。㈡以蟾蜍入水缸中。覆以有孔之蓋。孔中插細竹枝。以刺戟蟾蜍。使其痛苦。蟾蜍遂憤怒不勝。自皮腺分泌多量之毒液。乃從而收集之。㈢以蟾蜍置中央。四面架鏡。使起受困之感。因分泌多數毒液以保護己之身體。吾人即利其所有。與麵粉混合煉製。前人不知爲外皮分泌之液汁。每誤以爲油。故有蝦蟆油之稱。

製法　寇宗奭曰。凡使蟾酥。須眉間白汁。謂之蟾酥。以油單紙裹眉裂之。酥出紙上。陰乾用。李時珍曰。取蟾酥不一。或以手捏眉稜取白汁。於油紙上及桑葉上插背陰處一宿。即白乾。白安置竹筒內盛之。眞者輕浮。入口味甜也。或以蒜及胡椒等辣物納口中。則蟾身白汁出。以竹篦刮下。麵和成塊。乾之。其汁不可入人目。令人赤腫盲。或以紫草汁洗點即消。

性質　甘辛。溫。有毒。

成分　爲開梅因。但有毒。

效能　散風火癰毒。治發背疔腫。有强心之效。爲清涼性興奮藥。又外用消散疔癰腫毒藥。

主治　小兒疳疾臍疳。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蟾酥曰。主蚘牙及小兒疳瘦。【宋】日華諸家本草論蟾酥曰。酥同牛酥或吳茱萸苗汁調。摩腰眼陰囊。治腰腎冷。幷助陽氣。又療蟲牙。【宋】寇宗奭本草衍義論蟾酥曰。治齒縫出血及牙疼。以紙紮少許按之立止。【明】李時珍本草綱目論蟾酥曰。發背疔瘡。一切惡腫。【清】黃宮繡本草求眞論蟾酥曰。蟾酥味辛氣溫有毒。能拔一切風火熱毒之邪。使之外出。蓋邪氣着人肌肉。鬱而不解。則或見爲疔腫發背。陰瘡陰蝕。疽癌惡瘡。故必用此辛溫以治。蓋辛主散。溫主行。使邪盡從汗出。不留內入。而熱自可以除矣。性有毒。止可外治取效。即或用丸劑。亦止二三四厘而已。多則能使毒人。其用作丸。投服。亦宜雜他藥內入。如牛黃、明礬、乳香、沒藥之類。毋單服也。故書載拔諸毒。只宜用酥一錢。白麵二錢。硃砂少許。作錠。諒病輕重酌與。不可盡服。又治背發無名等毒。取酥三五分。廣膠水化。米醋入銚火化。乘熱手刷不已。以散爲度。刻玉塗之。等於刻蠟房術用之更善。總皆外科奪命之功。輕用爛人肌肉。至若蟾蜍氣味辛寒。凡瘧瘕積塊。風犬咬傷。小兒疳積。瘟疫發斑。瘡疽發背。用之與酥略同。以其辛有發散之能。寒有逐熱之功。外服固見神功。內服除去頭足腸腹垢。亦能去積除熱。如風狗咬傷。用蟾蜍後足。搗汁生食。先於患人頂心拔去血髮三四莖。於小便內見沫。其毒即解。發背初腫。用活蟾數個。更易。繫於腫上。則其毒亦散矣。總皆具有外拔內攻之力。勿輕用也。蟾酥以油單紙裹眉裂之。酥出紙上陰乾。用蟾蜍焙乾。去皮爪。酒浸去肉用。

國外學說　日本藥學博士石津利作及上遠野與作兩氏。同將蟾蜍皮腺之分泌物。以化學研究之。遂名其毒分曰加瑪茵。並舉其生理作用如下。加瑪茵者。爲日本內地產蟾蜍皮腺分泌物中之一種成分。其作用極似實芰答利斯。有使心臟作用强盛之效。用此藥後。脈搏減少。脈之容積加大。血液上昇。尿量增加。若其作用再稍加劇。即誘起心臟收縮性之休止。然

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

無使血球溶崩之作用。又動物對此毒質。不能享受免疫性。其毒力遠不若實芰託扣希與地瑪林。此毒質三分之一。約當實芰託扣希與地瑪林四分之一。而其有效量與中毒量之相差。又較他種強心藥爲甚。即如實芰答利斯之製劑。雖奏強心之效。然常有蓄積作用。而此則無之。試投加瑪茵其心臟作用。尤爲迅速。以其易於吸收故也。若夫局部之腫痛作用。必多用始然。設僅用治療之量。則決無誘起腫痛之弊害。說見衞生試驗彙報第十五號。

辨僞　㊀鄭肯堪曰。蟾蜍生江溯池澤間。其眉間白汁謂之蟾酥。以油單紙裹眉裂之。酥出紙上陰乾用。或以蒜及胡椒等辣物納口中。則蟾身白汁出。以竹篦刮下。麵和成塊。乾之。聞有一種假酥。係麵粉及別藥僞造。萬不可用。㊁曹炳章曰。按鮑叔眞醫方約說云。蟾酥乃治諸毒之要藥也。製合得宜。傅服皆可用。蛤蚧皮即蟾皮也。大能收毒外貼。不可缺也。嘉興縣志云。宮中用蟾酥錠。於每年端午日修合。各坊車蝦蟆至醫院者。億萬計。往時取用後。率斃。蓋兩目俱廢。不能跳躍也。東山朱公典院事。命止剌其一偏。得斃者甚多。此事似微。然發念甚眞。爲德不淺。王文讓碎金方。取蟾酥法。先將牙皂角三兩。煎水三沸。旋候冷。用大口甕或缸盛水。將癩蝦蟆不拘多少入中。以稀物覆之。勿令跳出。過一宿。其酥即浮水面。若未浮。其酥即在身上矣。可用竹刀刮下用之。本草明辨云。端午日以大蛤殼未離帶者。合於蝦蟆眉上腫處。用力一捻。則酥出殼內。貯於油紙候乾。江南出者爲杜酥。要無麵塊。神色起亮光者佳。無錫出者。中有竹節痕。浙江杭紹出者。爲片子酥。粉質少者亦佳。山東出者爲東酥。色黃黑。味麻辣。不上二層之貨。蓋酥本無定色。但驗其粉之輕重以爲衡。如看成色。以水一碗。將酥化開。放入水。如烏見水即變色。水面有泡沫者。眞。僞者見水不動。而粉質漸露矣。

配合應用　㊀爛疔根。用蟾酥同鐵鏽、桑磩、麝香、牛黃、冰片。以金鐵鉞入疔根。抹入前藥。其疔根即爛出。

㊁治疔丸。用蟾酥、硃砂、冰片、牛黃、明礬、白殭蠶、麝香、黃蠟溶化作丸。麻子大。用葱頭白酒吞下。取汗。不過二三小丸。

㊂拔取疔黃用蟾酥以麵丸。梧子大。每用一丸。安舌下。即黃出也。（青囊雜纂方）

㊃拔取疔毒。蟾酥以白麵黃丹。搜作劑。每丸麥粒大。挑破納入。仍以水澄膏貼之。（危氏方）

㊄治一切瘡毒。蟾酥一錢。白麵二錢。硃砂少許。井水調成小錠子。如麥大。每用一錠。葱湯服。汗出即愈。如瘡勢緊急。用三四錠。（保命集方）

㊅凡癰疽發背。無名腫毒初起者。急取蟾酥三五分。廣膠一塊。米醋一二碗。入銚內火化開。用筆蘸。乘熱令人不住手周圍潤之。以散爲度。（萬氏家抄方）

㊆治疔瘡惡腫。蟾酥一錢。巴豆四箇。搗爛。飯丸錠子。如綠豆大。每服一丸。薑湯下。良久以蒿蕎根黃荊子。研酒半碗服。取行四五次。以粥補之。（乾坤祕韞方）

㊇治諸瘡腫硬。針頭散。用蟾酥、麝香各一錢。研勻。以乳汁調和。入罐中待乾。每用少許。津調傅之。外以膏護住。毒氣自出。不能爲害也。（保命集方）

㊈治喉痺乳蛾等證。用癩蝦蟆眉酥。和草烏尖末。豬牙皂角末等分。丸小豆大。每研一丸。點患處。神效。（活人心統方）

㊉治一切齒痛。疳蝕齦齒瘀腫。用蚵蛾一枚。鞭其頭背。以竹篦刮眉間。即有汁出。取少許點之。即止也。（類編方）

㊀治風蟲牙痛不可忍。用蟾酥一片。水浸軟。入麝香少許。研勻。以粟米大綿裹咬定。吐涎愈。一方用胡椒代麝香。一方用蟾酥染絲綿上。剪一分。紮入齒縫根裏。忌熱物。半日效。乾者以熱湯化開。（聖惠方）

㊁治破傷風病。蟾酥二錢。湯化爲糊。乾蟾酒炒。天麻各半兩。爲末。合搗丸。綠豆大。每服一丸至二丸。豆淋酒下。（惠聖方）

用量　二釐至五釐。

施用宜忌　凡非實症者禁用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【蟾蜍】處方用名　乾蟾腹。蟾蜍皮。炙乾蟾。

古籍別名　蟲魚(爾雅)鼁鼀。(詩經)若蠪蝀龍若蠪蚵蛾。蠙蝦蟆。(綱目)戚施。(韓詩註)詹諸。(說文)

外國名詞　Bufo vulgaris Laur (拉丁) Bull-forg. (英) Krote. (德)

基本　係兩棲類。無尾屬中之尖指類之蟾蜍。

產地　凡江湖池澤及屋隅階石之溼地間。恒有生焉。

形態　蟾蜍各地皆產。多棲息於人家之溼地。夏秋之交。薄暮或黃昏。即匐出庭園。覓食昆蟲。蛙類中此爲最大。背暗褐或黑。常溼潤有塊磊。具毒腺。腹肥大。色黃白而雜黑色之斑紋。眼放金光。較蛙類略大。口亦闊大。趾端無蹼。性愚鈍。步行緩慢。不善跳躍。且不能鳴。平時陸棲。非產卵期。不入水中。入冬則蟄伏穴內。

採取　五月間採之。

製法　蜀圖經曰。凡使蟾蜍。須五月五日。取得日乾或烘乾用。一法去皮。瓜子浸一宿。又用黃精自然汁浸一宿。塗酥炙乾用。李時珍曰。今人皆於端午日捕取風乾。黃泥固濟。煅性存用之。永類鈐方云。蟾目赤腹無八字者不可用。崔寓四民月令云。五月五日取蟾蜍可治惡瘡。即此也。亦有酒浸取肉者。錢仲陽治小兒冷熱疳瀉如聖丸。用乾者酒煮成膏丸。藥一法也。

性質　辛。涼。微毒。

效能　殺蟲。治驚疳。拔毒。療瘡瘍。用作小兒五疳驚風藥。又爲殺蟲解毒藥。

主治　陰蝕疽瘡。惡瘡。瘋犬傷瘡。能合玉石。

歷代記述弦要　【南北朝】陶弘景本草集註論蟾蜍曰。燒灰傅瘡立驗。又治溫病發斑困篤者。去腸生搗食一二枚。無不瘥者。(搗爛絞汁飲或燒末服)【唐】甄權藥性本草論蟾蜍曰。殺疳蟲。治鼠漏惡瘡。燒灰傅一切有蟲惡瘡。滋胤瘡。【宋】日華諸家本草論蟾蜍曰。治疳氣。小兒面黃癖氣。破癥結。燒灰油調傅惡瘡。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蟾蜍曰。主小兒勞瘦疳疾最良。【明】李時珍本草綱目論蟾蜍曰。治一切五疳八痢。腫毒。破傷風。病脫肛。【明】繆希雍本草經疏論蟾蜍曰。蝦蟆。蟾蜍。本是二物。經云一名蟾蜍者。蓋古人通稱。蟾爲蝦蟆耳。經文雖名蝦蟆。其用實則蟾蜍也。今世所用者。皆蟾蜍。而非蝦蟆。其功益可見矣。味辛氣寒。毒在眉稜皮汁中。其主癰腫。陰瘡。陰蝕。疽瘡。惡瘡。瘋犬傷瘡者。皆熱毒氣傷肌肉也。辛寒能散熱解毒。其性急速。以毒攻毒。則毒易解。毒解則肌肉和。諸證去矣。凡瘟疫邪氣。得汗則解。其味大辛。性善發汗。辛主散毒。寒主除熱。故能使邪氣散而不留。邪去則胃氣安而熱病退矣。破癥堅血者。亦以其辛寒能散血熱。壅滯也。陶隱居云。其肪塗玉則刻之如蠟。故云能合玉石。近世治小兒疳疾多用。以其走腸明而能消積滯也。

國外學說　日本學說謂蟾蜍者。古來用於種種疾患。謂治內外諸病。(蟲便祕。胃病。水腫。恐水病。惡性潰瘍)有效。又シーボルト氏所著日本動物篇中論其醫治效用。頗有可觀者。(中略)自其皮膚腺分泌之液。爲白色乳糜樣有黏着性。其反應爲弱酸性。於顯微鏡下照之。見脂肪顆粒及脂化上皮。其效用全與蠆芰多利斯(毛地黃)相同。故欲以蟾蜍供治療之用。宜用其皮膚而其適症爲血行器病(和漢藥論)又晉國人治疳疾及疔毒惡腫等時。採收蟾蜍之唾液。與麵粉混合爲小餅狀用之。又日本廣橋正三郎氏。曾取蟾蜍之表皮。試驗其毒性。將所得成績。載入藥學雜誌第三百五十八號。一曰表皮所得之量。與其水分。二曰表皮之毒。三曰腺液之毒。四曰毒質之溶解性。五曰毒質之分析法。六曰蟾蜍之血清。與其毒質之關係。中國醫書載有治愈瘋犬病法。以蟾蜍肉爲膾食之。因此水戶醫官原克昌著有瘋狗傷考。亦載蟾蜍膾之說。此書於天保七年印行。茲摘錄如左。小品方云。生食蟾蜍膾絕良。張猋曰。以蟾蜍一二枚搗汁服。肘後方云。治瘋犬傷。每七日一發。食蝦蟆膾絕良。亦可炙食。但勿令本人知之。後永不復發

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。袖珍云。治瘋犬傷。即用蝦蟆後足搗爛。水調服之。昌克按李中梓亦於蝦蟆條說猘犬之效。又沈約宋書載張收（或作牧）爲猘犬所傷。人云宜噉蝦蟆膽食之遂愈。實一奇方也。野呂玄亦有蝦蟆膽之說。又有瘴毒蛇咬。急取癩蝦蟆搗爛敷上。以帛紮之。法如諸書所載。蝦蟆蓋即癩蝦蟆也。鄭樵通志云。蝦蟆類多。以蟾蜍爲上。昌克頃游久慈郡。訪慈雲寺。語次道及犬毒之事。上人語我曰。郡中遇其患者。乃作蛙膾食之。遂無至危篤者。因知此物善治毒。不必有蝦蟆、蟾蜍之分也。上人又曰。噉蝦蟆後。其頭上有發物如癩蚵蛂狀者。亦一奇也。經月餘便脫去。

配合應用　㊀治腹中冷癖。水穀陰結。心下停痰。兩脇痞滿。按之鳴轉。逆害飲食。大蟾蜍一枚。去皮腸。支解之。芒硝强入一升。中人七合。翳人五合。水七升。麥四升。頓服得下爲度。（肘後方）

㊁治小兒疳積。腹大。黃瘦骨立。頭生瘡。結如麥穗。用立秋後大蝦蟆。去首足腸。以清油塗之。陰陽瓦炙熟食之。積穢自下。連服五六枚。一月之後。形容改變。妙不可言。

㊂治五疳八痢。面黃肌瘦。好食泥土。不思乳食。用大乾蟾蜍一枚。燒存性。皂角去皮弦一錢。燒存性。蛤粉水飛三錢。麝香一錢。爲末。糊丸。粟米大。每空心米飲下三四十丸。日二服。名五疳保童丸。（全嬰方）

㊃治小兒疳泄下痢。用蝦蟆燒存性。研飲服方寸匕。（子母祕錄方）

㊄治走馬牙疳。侵蝕口鼻。乾蛂蛂黃泥裹固。煅過。黃連各二錢半。青黛一錢。爲末。入麝香少許。和研傅之。（鄭氏小兒方）

㊅金鞭散。治疳瘡顋穿牙落。以抱退雞子軟白皮。包活土狗一箇。放入大蝦蟆口內。草縛。泥固。煅過。取出研末。貼之。以愈爲度。（普濟方）

㊆治小兒口瘡。五月五日。蝦蟆炙研末傅之。即瘥。（子母祕錄方）

㊇治一切疳蠹。無問去處。皆能治之。蝦蟆燒灰。醋和傅。一日三五度。（梅師方）

㊈治陰蝕欲盡。蝦蟆灰、兔屎等分爲末傅之。（肘後方）

㊉治月蝕耳瘡。五月五日。蝦蟆燒末。豬膏和傅。（外臺祕要方）

㊊治小兒脣瘡。五月五日。取蟾蜍炙研末。傅之。即瘥。（子母祕錄方）

㊋治小兒臍瘡出汁。久不瘥。蝦蟆燒末傅之。日三。甚驗。一加牡蠣等分。（外臺祕要方）

㊌治一切溼瘡。蟾蜍燒灰。豬脂和傅。（千金方）

㊍治小兒癬瘡。蟾蜍燒灰。豬脂和傅。（外臺祕要方）

㊎治癩風蟲瘡。蝦蟆一雨炙。長肥皂一條炙去皮子。釀酒。再炙爲末。以竹管引入羊腸內。繫定。以麩鋪甑內。置藥。麩上。蒸熟。入麝香半錢。去麩。同搗爲丸。如梧子大。每溫酒服二十一丸。（直指方）

㊏治附骨壞瘡。久不瘥。膿汁不已。或骨從瘡孔中出。用大蝦蟆一箇。亂頭髮一雞子大。豬油四兩。煎枯去滓。待凝如膏。先以桑根皮。烏頭煎湯洗拭。乾。取龍骨末糝四邊。以前膏貼之。（錦囊祕覽方）

㊐治發背膿毒未成者。用活蟾一箇。聚放瘡上。半日。蟾必昏憒。置水中。以救其命。再易一箇。如前法。其蟾必踉蹡。再易一箇。其蟾如舊。則毒散矣。累驗極效。若勢重者。以活蟾一箇或二三箇。破開連肚乘熱合瘡上。不久必臭不可聞。再易二三次。即愈。愼勿以物微見輕也。（醫林集要方）

㊑治腫毒初起。用大蝦蟆一箇。剝碎同炒。石灰研如泥。傅之。頗易。（余居士方）

㊒治破傷風病。用蟾二兩半。切剝如泥。入花椒一兩。同酒炒熟。再入酒二盞半。溫熱服之。少頃。通身汗出神效。

㊓治猘犬咬傷。每七日一發。生食蝦蟆膽絕良。亦可燒炙食之。勿令本人知之。自後再不發也。（肘後方）治瘋犬傷。即用蝦蟆後足搗爛。水調服之。先於頂心拔去血髮三兩根。則小便內見沫也。（袖珍方）

㊔治腸頭挺出。蟾蜍皮一片。瓶內燒烟燻之。并傅之。（孫眞人方）

㊕佩襪瘡疾。五月五日。收大蝦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蟆曬乾。紙封縫甕貯之。男左女右。繫臂上。勿令知之。（楊氏家藏方）

㊂折傷接骨。大蝦蟆生研如泥。野竹裹縛。其骨自痊。（奚囊備急方）

㊃治大腸痔疾。蟾蜍一箇。以磚砌四方。安於內。泥住火煅存性爲末。以豬廣腸一截。扎定兩頭。煮熟切碎。蘸蟾末食之。如此三四次。其痔自落。

用量　錢半至二錢。

施用宜忌　凡無蟲積熱毒者禁用。

參攷資料　㊀別錄云。治猘犬傷。肘後亦有方法。按沈約宋書云。張收爲猘犬所傷。人云宜噉蝦蟆膾食之遂愈。此亦治癰疽疔腫之意。大抵是物能攻毒拔毒。古今諸方所用蝦蟆。不甚分別。多是蟾蜍。讀者當審用之。不可因名迷實也。（李時珍）㊁此是腹大皮上多痱磊者。其皮汁甚有毒。大噉之口皆腫。五月五日取東行者五枚。反縛着密室中閉之。明旦視自解者。取爲術用。能使人縛亦自解。蕭炳曰。腹下有丹書八字。以足畫地者。眞

蟾蜍也。（陶弘景）㊂今處處有之。別錄謂蝦蟆一名蟾蜍。以爲一物非也。按爾雅。蠪蠪。蟾蜍也。郭璞云。似蝦蟆居陸地。則非一物明矣。蟾蜍多在人家下溼處。形大。背上多痱磊。行極遲緩。不能跳躍。亦不解鳴。蝦蟆多在陂澤間。形小。皮上多黑斑點。能跳接百蟲。舉動極急。二物雖一類而功用小別。亦當分而用之。蟾蜍屎謂之上枿。椰下溼處往往有之。亦能主疾。寇宗奭曰。世傳三足者爲蟾。人遂爲三足枯蟾以罔衆。但以水洗半日。其僞自見。蓋無三足者也。（蘇頌）㊃蟾蜍銳頭幅腹。促眉濁聲。上形有大如盤。自然論云。蟾蜍吐生鄭糞。自其口出也。抱朴子云。蟾蜍千歲。頭上有角。腹下丹書。名曰肉芝。能食山精。人得食之可仙。術家取用。以起雰祈雨。辟兵解縛。今有技者聚蟾爲戲。能聽指使。物性有靈。於此可推。許氏說文謂三足者爲蟾。而寇氏非之。似是但龜鼈皆有三足。則蟾之三足非怪也。若謂入藥必用三足則謬矣。岫嚧神書載蟾竇之法。用大蟾一枚。以長尺鐵釘四箇。釘

脚四下。以炭火自早炙至午。去火。放水一盞於前。當吐物如皂莢子大。有金光人吞之。可越江湖也。愚謂縱有此術。誰敢吞之。方技誣說。未足深信。漫記於此。以備祛疑耳。（李時珍）

【蟾蜍皮】主治　貼大毒。能拔毒收毒。

配合應用　㊀治腸頭推出。用蟾皮一片。燒熏并傅。（千金方）㊁指頭紅腫生毒。用活蟾一隻。生剝皮。將皮外面向患處包好。明日其毒一齊拔出。或發背對口等症。毒忽收內。如又起再貼。切記不可將其皮裏面着肉。卽咬牢難揭。凡瘡疹後回毒。亦可用此治。（黃汝良行篋驗祕方）㊂瘰癧斂口膏藥。治瘰癧。膿已盡。腫已平。瘡口未斂。以此貼之。用蝦蟆皮二個。要活剝者。鼠皮二張。蛇退二條。蜂房大者一個。上四味俱煅灰。將水膠一兩。用井花水一酒鍾化開。後加蜜一兩。蜈蚣煎麻油一小鍾。攪勻。前四味灰。臨起入麝香一分。將絹攤來不溼爲度。㊃凡患癰疽瘡毒者。用土中大

蝦蟆一個。剝全身癩皮。蓋貼瘡口。於蟆皮上用針將皮刺數孔。以出毒氣。自覺安靜。且能爬住瘡口。不令長大。又可免蜈蚣鬬氣來侵。神妙。（靈祕丹云）

【蟾蜍皮】卽蟾蜍之處方用名。詳『蟾蜍』條。

【蟾蜍舌】主治　拔疔瘡。研爛。傅瘡上。以蟾肚皮蓋貼。根自出。

【蟾蜍屎】古籍別名　土檳榔。（嘉祐圖經本草）

產地　卑溼處多有之。

主治　療惡瘡。

【蟾蜍蘭】卽天名精之古籍別名。典見別錄。詳『天名精』條。

【蟾薪衿】卽稀薟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『稀薟草』條。

【蟾竇】卽蟾酥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蟾酥』條。

【蠁蠁】卽蟲蠱之細而長者。性質功用參詳『蟲蠱』條。

【蠶蟲】卽乳蟲之古籍別名。典見廣雅。詳『乳蟲』條。

【蠅狐】卽蠅虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蠅虎』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【蠅虎】命名　本品善捕蠅。蠅畏如虎。故名。

古籍別名　蠅豹。蠅狐。蠅蝗。（綱目拾遺）

形態　蠅虎爲卵生蟲類蜘蛛屬之一種。其形如蜘蛛。色灰白或灰褐。腹亦有絲。而不能結網。惟居牆壁。捕蠅。身有微毛。嘴有兩鉗。翕吸類動。跳躍如虎。亦有純白色而兩目朱色者。俱可供藥用。

主治　跌打損傷。研爛酒下。

參攷資料　蠅虎性類動而不靜。取以調和血脈。故治跌打。（趙學敏）

【蠅豹】即蠅虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蠅虎』條。

【蠅蝗】即蠅虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蠅虎』條。

【蠅虎】即蠅虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蠅虎』條。

【蠆尾蟲】即全蠍之古籍別名。典見廣雅。詳『全蠍』條。

【蠅】即枸杞蟲之古籍別名。典見爾雅。詳『枸杞蟲』條。

【蠍】即全蠍之原名。詳『全蠍』條。

【蠍子草】即藪草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『藪草』條。

【蠍尾】即全蠍之處方用名。詳『全蠍』條。

【蠍虎】即壁虎之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『壁虎』條。

【蠍梢】即全蠍尾之處方用名。詳『全蠍』條。

【識美】即沙參之古籍別名。典見別錄。詳『沙參』條。

【獺肉】即豬肉之古籍別名。典見綱目。詳『豬肉』條。

【蹲鴟】即芋子之古籍別名。典見綱目。詳『芋子』條。

【蹶泄】㊀即苦棗之古籍別名。典見爾雅。詳『苦棗』條。㊁即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【邊桂】即肉桂之產於粵邊者之別名。詳『肉桂』條。

【邊笋】即鞭笋之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鞭笋』條。

【邊箕萍】即蜈蚣萍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蜈蚣萍』條。

【醮石】即蒲黃之原名。詳『蒲黃』條。

【醯】即醋之古籍別名。典見綱目。詳『醋』條。

【鏐】㊀即銀箔之古籍別名。典見綱目。詳『銀箔』條。㊁即金之古籍別名。典見爾雅。詳『金』條。

【鏡面砂】即硃砂之處方用名。詳『硃砂』條。

【鏡面草】原名　螺厥草。（綱目）

古籍別名　蠔兒草。地連錢。（綱目拾遺）

產地　出滇中。

性質　涼。無毒。

主治　肺火。結成膿血。癰疽。兼通月經。

參攷資料　按此草今處處有之。多生階砌石畔。葉如指面大而圓。其邊微作碎齒。葉面光如鏡。深綠色。土人呼爲蠔兒草。又名地連錢。不見開花。止一葉而已。亦呼鏡面草。不知滇中所產。即此類否。（趙恕軒）

【鏡草】即白斂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白斂』條。

【鏡鐵】即代赭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『代赭石』條。

【鼜菜】㊀即白花益母草之古籍別名。典見本草拾遺。詳『益母草』條。㊁即益母草苗之原名。詳『益母草苗』條。

【關茸】即鹿茸之處方用名。詳『鹿茸』條。

【關鹿茸】即鹿茸之處方用名。詳『鹿茸』條。

【隴客】即鸚鵡之古籍別名。典見綱目。詳『鸚鵡』條。

【離母】即天麻之古籍別名。典見本經。詳『天麻』條。

【離枝】即荔枝之原名。詳『荔枝』條。

【離芝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【離南】即通草之古籍別名。典見爾雅。詳『通草』條。

【離兩草】產地　多生於階庭間及溼地。

形態　離兩草爲石草類之一種。高二三寸。其苗與葉俱可供藥用。

性質　辛。寒。有小毒。

主治　瘰癧丹毒。小兒無辜寒熱。大腹痞滿。痰飲。臍上熱。生研汁服一合。當吐出宿物。去癉爲上。

【離婁】即鬧茄之古籍別名。典見別錄。詳『鬧茄』條。

930／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【離樓草】基本　離樓草爲雜草類之一種其實可供藥用。

採取　七月八月採之。

性質　鹹。平。無毒。

主治　益氣力多子。輕身長年。

【難火蘭】原名　菟絲子。（和漢藥考）

形態　難火蘭爲雜草類之一種。狀如菟絲子而微長。可供藥用。

性質　酸。溫。無毒。

主治　冷氣風痺。開胃。下食。消腹脹。明眼目。

【霧犬骨】卽虎骨之古籍別名。見和漢藥考。詳『虎骨』條。

【顚茄】卽莨菪子之別名。典見新本草敎本。詳『莨菪子』條。

【顚茄子】產地　各處均有出。

效能　止痛發表轉筋。利小便。補陽。

主治　風癎。腦氣筋痛。哮喘咳嗽。風癱。便閉。遺尿。陽痿。遺精。風溼。

【顚勒】卽天門冬之古籍別名。典見嘉祐補註本草。詳『天門冬』條。

【顚棘】卽顚勒之古籍別名。典見爾雅。詳『天門冬』條。

【顚當蟲】卽蠟蟬之古籍別名。典見本草拾遺。詳『蠟蟬』條。

【類香】卽靈貓香之古籍別名。典見綱目。詳『靈貓香』條。

【類鼻】原名　豨薟草。（和漢藥考）

主治　生田野高地。

形態　類鼻爲溼草類之一種。葉如天名精。其根可供藥用。

採取　五月採之。

性質　酸。溫。無毒。

主治　痿痺。

【餹餻】卽飴餻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『飴餻』條。


【餻李子】卽李子之肥黏如餻者。典見綱目。詳『李子』條。

【鰡魚】命名　古籍別名　子魚。（綱目）

外國名稱　Mugil cephalus Linn. 或 Mugil oeur Forsk. (Grey mullet)（拉丁）ボラ或イナ或オボコ（日本）

基本　係脊椎動物魚類硬鰭類鰡科。

產地　生江海中。



鰡魚

形態　鰡魚爲魚鱗類之一種。體長側扁。腹底彎曲。頭部闊大被鱗。口低。齒小。脊鰭四棘。後脊鰭二棘七刺。臀鰭亦脊鰭同數。鱗爲櫛狀。背色暗灰。側面有淡黑之條紋。腹白色。骨軟如鯽。有黃脂。長者達尺餘。其肉可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　開胃。利五臟。令人肥健。與百藥無忌。

【鰡魚膽】卽青魚膽之古籍別名。典見綱目。詳『青魚膽』條。

【鰡魚】卽石首魚乾者之古籍別名。典見綱目。詳『石首魚』條。

【鯢魚】命名　本品鯢聲如小兒。故名。又其全身分泌之一種黏液。臭如山椒。遂有山椒魚之稱焉。

古籍別名　人魚。（山海經）鯑魚。鰋魚。鰕。（綱目）黑魚。山生魚。山椒魚。箱根山椒魚。高山源黑魚。（和漢藥考）



鯢魚

基本　屬有尾兩棲類中蠑螈族之鯢魚。

產地　凡山谷溪澗中。恒有產焉。和漢藥考曰。黑魚棲息於山間溪流。水質清潔。日光不到之處。夜則上陸。日本產黑魚地方。爲箱根、日光、天城等處。而以箱根湖所產最爲人所稱道。

形態　鯢魚嘗棲息於溪流。屬於有尾兩棲類中之魚形族。幼時頸旁有鰓。老則以肺呼吸。體似鯰無鬚。長四尺許。大可七八尺。性愚鈍。運動遲緩。背有突起物。似疣。色灰褐。雜以黑斑。腹黃。口大。食蛙魚類以生存。全身分泌一種黏液。臭似山椒。故又名山椒魚。此物生活

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

力極強。雖割其全身之半。放入水中。仍可完成全身。烹食其肉味殊甘美云。並可供藥用。

採取　採無時。其捕法當於夜間照松枝火。候其攀上岩石之時。以布袋張口伺之。能自入袋中。

製法　捕獲後。炙以火或陰乾。俟其黏液分泌已盡。然後烹而食之。

用法　去其足目。烹食外。間有焙剉和入跌打損傷藥中。

性質　甘有毒。

主治　食之已痰疾。

配合應用　跌打損傷。不論新久。悉以鯪魚二錢。大黃四分。當歸、川芎各五分。水二合。煮取一合服之。(和漢藥考方)

用量　每尾可用兩次。

參攷資料　鯪魚生山溪中。似鮎。有四足。長尾。能上樹。大旱則含水上山。以草葉覆身。張口鳥來飲水。因吸食之。聲如小兒啼。(陳藏器)㊁按郭璞云。鯪魚似鮎。四脚前脚似猴。後脚似狗。聲如兒啼。大者長八九尺。山海經云。決水有人魚。狀如鯰。食之已痰疾。蜀志云。雅州西山溪谷出鯪魚。似鮎。有足。能緣木。聲如嬰兒。可食。西陽雜俎云。峽中人食鯪魚。縛樹上。鞭至白汁出。如稱汁。方可治食。不爾有毒也。(李時珍)


【鯪魚】　**命名**　本品游泳於水。羣魚隨之。食其涎沫。有類於娼。故名。

古籍別名　鰼魚。鯪鯸魚。昌魚。(拾遺)狗嗑睡魚。(綱目)昌魚。(本草拾遺)

外國名詞　Stromateoides argenteus Euphrasen (拉丁)　マナガツオ(日本)

基本　係脊椎動物魚類硬鰭類鯪科。

產地　產遠洋。及閩、浙、廣東之江海中。



鯪魚

形態　鯪魚爲鱗類魚屬之一種。體側扁。略呈斜方形。體高幾近於體長。頭眼皆小。無齒。鱗細。骨少。脊鰭有四十六刺。臀鰭有四十五刺。尾分叉如燕尾。體黃白。或背蒼色。頭與鰭皆淡黑。而有細黑點。腹淡色。其肉白多脂。可供食與藥用。

性質　甘平。無毒。

主治　令人肥健。益氣力。

參攷資料　鯪魚腹中子有毒。令人痢下。(陳藏器)

【鯪鯸魚】　卽鯪魚之古籍別名。見本草拾遺『鯪魚』條。

【鯨鰥】　卽龍涎香之古籍別名。見和漢藥考。詳『龍涎香』條。

【鯽石】　卽絡石之古籍別名。見吳普本草。詳『絡石』條。

【鰓鯉甲】　卽穿山甲之原名。詳『穿山甲』條。

【鯨魚】　卽鯢魚之古籍別名。見食療本草。詳『鯢魚』條。

【鰂魚】　卽鮥魚之古籍別名。見綱目。詳『鮥魚』條。

【鰃魚】　卽鮫魚之古籍別名。見綱目。詳『鮫魚』條。

【鵬】　古籍別名　鶚。(山海經)鸙。(說文)揭羅國。(梵書)狗鷲。皂鵰。(綱目)

外國名詞　Aquila Chrysaetus Linn Eagle 或 Golden eagle 或 Blacle eagle Adler (拉丁)ワシ或イヌワシ(日本)

基本　係脊椎動物鳥類猛禽類鷹科之鵰。

產地　生深山林野間。

形態　鵰爲林禽類鷹屬之一種。嘴强大。呈灰色。嘴根有黃色蠟膜。上嘴鉤曲。眉突出。眼大而深。眼簾淡褐帶金色。毛色概深褐。頭頸混交處色。背面各羽有暗色之陰紋。翼尖達尾端。黃褐色。具白紋。基部有灰色條紋。脚短被毛。羽而色黃。具强銳鉤爪。性悍多力。盤旋空中。搏食獐、鹿、犬、豕、諸生物。羽可製扇。骨可供藥用。

932／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　折傷。斷骨。燒灰。每服二錢。酒下。在上食後。在下食前。骨即接如初。

參攷資料　鷹鸇鵰骨。皆能接骨。蓋鷙鳥之力在骨。故以骨治骨。從其類也。（李時珍）

【鵰屎】　主治　諸鳥獸骨哽。燒灰酒服。

【鵰雞】　即鸇之古籍別名。典見陸璣詩疏。見『鸇』條。

【鵪】　命名　鵪字古文作鴾。而其鳴聲喑喑。故名。


古籍別名　飛駁馬（陶弘景）

喜鵪。（食療）乾鵪。（新語）

外國名稱　Pica Pica Serica Goud Magpie Elster（拉丁）カササギ或テウセンガラス（日本）

基本　係脊椎動物鳥類鳴禽類鳥科之鵪。

形態　鵪爲林禽類之一種。其形如烏。嘴尖。尾長。羽色黑褐。而有青紫色之光澤。肩、頸、腹、及翮、與冠毛之後。皆白色。尾翮則黑白相間。尾長六七寸。與身相等。嘴根有剛毛。蔽於鼻孔。至秋則毛毯頭禿。飛鳴聲如鴉而低。其肉可供藥用。



鵪

採取　以雄鵪者入藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　石淋。消結熱。可燒作灰。以石投中。解散者是雄。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論鵪肉曰。治消渴疾。去風。及大小腸澼。并四肢煩熱。胸膈痰結。婦人不可食。【明】李時珍本草綱目論鵪肉曰。冬至埋鵪於閫前。辟時疾溫氣。

參攷資料　凡鳥之雌雄難別者。其翼左覆右者乃雄。右覆左者乃雌。又燒毛作屑。納水中。沉者是雌。浮者是雄。今云投石。恐止是鵪。餘鳥未必爾。（李時珍）

【鵪不踏】　即椶木之古籍別名。典見綱目。詳『椶木』條。

【鵪巢】　採取　以多年者良。

主治　燒之水服。療顛狂。鬼魅。及蠱毒。仍呼崇物名號。亦傅瘡瘡良。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鵪巢曰。燒研服。治積年漏下不斷。困篤者一月取效。並小便不禁。

【鵪腦】　採取　五月五日採之。

主治　入媚藥。

【鵪白】　即烏柏之古籍別名。典見綱目。詳『烏柏木』條。

【鵪麻】　即亞麻之古籍別名。典見圖經本草。詳『亞麻』條。

【鵪臭】　即烏柏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏柏木』條。

【鶉】　外國名稱　Coturcix Communis Bonn. Common quail or Quail Wachtel（拉丁）ウヅラ或ウヅフ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類鶉雞類雷鳥科之鶉。

產地　多蕃殖於黑龍江等地之原野間。

形態　鶉爲原禽類之一種。形似雞而頭嘴皆小。軀幹肥滿。尾短。全體茶褐色。背濃褐色。翼黃褐有黑斑。腹色赤白。秋從北來。春向北去。夜則鼾。飛晝伏草叢。至秋鳴聲悽愴。性剛。可以豢養。其肉可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　補五臟。益中。續氣。實筋骨。耐寒暑。消結熱。和小豆、生薑煮食。止洩痢。酥煎食。令人下焦肥。

歷代記述攷證　【宋】寇宗奭本草衍義論鶉肉曰。小兒患疳及下痢五色。且食之有效。

參攷資料　㈠四月以前未堪食。不可合藥。肝食令人生黑子。合菌子食。令人發痔。（掌禹錫）㈡按薑炳集驗方云。魏秀才妻。病腹大如鼓。四肢骨立。不能貼席。惟衣被懸臥。穀食不下者數日矣。忽思鶉食。如法進之。遂運劇。少頃雨汗。莫能言。但有更衣狀。扶而圊。小便突出白液。凝如鷄脂。如此數次。下盡遂起。此蓋中焦澀熱積久所致也。詳本草鶉解熱結。療小兒疳。亦理固然也。薑氏所說。如此。時珍謹按。鶉乃蛙化。氣性相同。蛙與蝦蟆皆解熱治疳。利水消腫。則鶉之消鼓

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膜。蓋亦同功云。(李時珍)

【鶉鵝英】卽蒲公英之古籍別名。典見庚辛玉册。詳『蒲公英』條。

【鵝】卽鵝鴨之別名。典見動物學大辭典。詳『鵝鴨』條。

【鴨上戶】卽蜀羊泉之日本名。詳『蜀羊泉』條。

【鴛魚】卽章魚之古籍別名。典見臨海志。詳『章魚』條。

【鷄鳩】卽突厥雀之古籍別名。典見綱目。詳『突厥雀』條。

【雌】卽鵝之古籍別名。典見綱目。詳『鵝』條。

【麒麟血】卽血竭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『血竭』條。

【麒麟草】卽草麒麟。詳該條。

【麒麟菜】卽鹿角菜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鹿角菜』條。

【麒麟竭】卽血竭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『血竭』條。

【麐】卽麞之古籍別名。典見綱目。詳『麞』條。

【麐舌】基本　麐舌爲水草類之一種。可供藥用。

產地　生水間。

採取　五月五日採之。

性質　辛。微溫。無毒。

主治　霍亂腹痛。吐逆心煩。

【麗枝】㈠卽荔枝。詳該條。㈡卽酸模之古籍別名。典見和漢藥考。詳『酸模』條。

【麗春花】古籍別名　仙女蒿　花蕣蘭芠　花龍羊草　花定參草　花(圖經)　孔冠花　賽牡丹　錦被花　虞美人草　花(和漢藥考)　蕣蘭花

外國名稱　Papaver Rhoeas, L.(拉丁) Red Poppy.(英)

基本　屬罌粟科。爲麗春草之花與根。

形態　麗春花爲一年生或越年生草。莖有刺毛。高一二尺。形狀酷類罌粟。葉互生。作羽狀深裂。花蕾傾垂。開時上向。花作深紅色。頗爲美麗。有單瓣、重瓣之別。蕚於開時脫落。新鮮之花有麻醉性氣味及黏滑性苦味。



麗春花

採取　春三月採花陰乾。

用法　水煎或對末用。

成分　含有列阿琪克酸(Rhoeadic acid.)　苹果酸、軟性樹脂、固性油等。

效能　用作緩和鎮痛催眠藥。

主治　癰黃黃疸。

用量　三分至八分。

參攷資料　㈠唐天寶中。縣川耶楊正造方名醫皆用。有效其方云。麗香草療因時患傷熱。變成癰黃。遍身壯熱。小便黃赤。眼如金色。面及青黑。心頭氣痛。逶心如刺。頭旋欲倒。兼脇下有瘕氣及黃疸等。經用有驗。其藥春三月採花陰乾。一升。搗散。每平明空腹取三方寸匕。和生麻油一盞。頓服。日一服。隔五日再進。以知爲度。其根療黃疸。搗汁一盞。空腹頓服。須臾卽利三兩行。其疾立已。一劑不能全愈。隔七日更一劑永瘥。忌酒麵豬魚蒜粉酪等。(蘇頌)㈡麗春草生檀嶋山川谷。檀嶋山在高密界。河南淮陽郡、潁川及譙郡、汝南郡等。並呼爲龍芋草。河北近山鄴郡、汲郡並名叢蘭芠。上黨紫團山亦有。名定參草。又名仙女蒿。今所在有之。甚療癰黃。人莫能知。(蘇頌)㈢此草有殊功。而不著其形狀。今罌粟亦名麗春草。九仙子亦名仙女嬌。與此同名。恐非一物也。(李時珍)

【麗草】卽玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玉竹』條。

【麴】卽小麥麴之原名。詳『小麥麴』條。

【麴米春】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【黷】卽田雞之原名。詳『田雞』條。

【黽】卽牡蠣之別名。典見爾雅。詳『蠣』條。

【鼕】卽麂之古籍別名。詳『麂』條。

二十畫

【寶豆】卽呂宋果之古籍別名。典見本綱拾遺。詳『呂宋果』條。

【寶珠】卽山茶花簇如珠者之古籍別名。典見綱目。詳『山茶花』條。

【寶珠山茶】形態　寶珠山茶爲山茶類之千葉深紅者。其花四瓣大瓣之中。又生碎瓣極多。攢簇如珠。可供藥用。

934／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

採取　二三月採。陰乾用之。若俱是大瓣千葉者。名洋茶。不入藥。單瓣者亦不入藥。

性質　甘。濇。微辛。濇。寒。無毒。

主治　消癰腫跌撲。斷久痢腸風下血。崩帶。血淋。鼻衄。吐血。外敷炙瘡。均焙研七朱。空心酒服。

配合應用　㊀治赤痢。用大紅寶珠山茶花。陰乾。爲末。加白糖拌勻。飯鍋上蒸三四次。服。（救生苦海方）

㊁治鼻中出血。千葉大紅山茶花。二三月採。陰乾。用時取五六朵。煎服即止。（何明遠方）又鼻衄用寶珠山茶大紅者。焙研三五錢。砂鐺滾水和服。（張氏必效方）

㊂治吐血咳嗽。寶珠山茶。瓦焙焦色。調紅砂糖日服。不拘多少。又方。寶珠山茶十朵。紅花五錢。白茯苓二兩。紅棗四兩。水煎一盌。服之。渣再服。紅棗不拘時亦取食之。（不藥良方）又山茶花。吐血衄血。腸風下血之良將。（藥儀藥鑑拾遺賦）又曾見有人患乳頭開花。欲瘡疼痛異常。有教以用寶珠山茶焙研爲末。用麻油調搽。立愈。痔瘡出血。（宋春暉方）又用寶珠山茶研末沖服。（汪子明方）

參攷資料　㊀寶珠山茶。涼血。破血。止血濇劑也。（百草鏡）㊁寶珠山茶可代鬱金研末。麻油調塗湯火灼傷。（羣芳譜）

【寶珠茶花】　卽山茶花之處方用名。詳『山茶花』條。

【寶鼎香】　卽薑黃之古籍別名。見綱目。詳『薑黃』條。

【寶劍草】　卽鳳尾金星之別名。詳『鳳尾金星』條。

【寶蕊】　卽草豆蔻之古籍別名。見和漢藥考。詳『草豆蔻』條。

【懸刀】　卽皂莢之古籍別名。見綱目。詳『皂莢』條。

【懸石】　卽絡石之古籍別名。見別錄。詳『絡石』條。

【懸針】　卽蝌蚪之古籍別名。見古今注。詳『蝌蚪』條。

【懸瓠】　卽壺盧之別名。詳『壺盧』條。

【懸莞】　卽石龍芻之古籍別名。見別錄。詳『石龍芻』條。

【懸鉤子】

命名　本品莖上有刺如懸鉤。故名。



懸鉤子

古籍別名　沿鉤子。（日用）葥子。山莓子。（爾雅）木莓子。（郭璞）樹莓子。（日華）

外國名詞　Rubus palmatus, Thunb.（拉丁）キイチゴサガリイチゴ（日本）

基本　係薔薇科。爲懸鉤屬之子實。

產地　凡山野林澤間。恒有出。

形態　懸鉤爲落葉灌木。恒野生於山野。高四五尺。莖及葉皆有刺。葉作掌狀分裂。裂片自三至五。如有缺刻狀之鋸齒。葉柄長。而互生。初夏葉腋開花。花冠五瓣。色白。其大與棠棣花之花冠相近似。子實爲肉果。呈紅色。由多數之小核果合成。可供藥用。

採取　四五月採實。

製法　凡採得。陰乾或日乾。

性質　酸。平。無毒。

效能　醒酒。解毒。用作祛痰藥。又爲解毒藥。

主治　醒酒止渴。除痰。去酒毒。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論懸鉤子曰。搗汁服。解射工沙蟲毒。

用量　三錢至四錢。

參攷資料　㊀生江淮林澤間。莖上有刺。其子如梅。子酸美。人多食之。（陳藏器）㊁樹莓枝梗柔軟。有刺。顏類金櫻。四五月結實。如覆盆子。採之擘蒂而中實。味酸。覆盆則蒂脫而中虛。味甘爲異。（汪機）㊂懸鉤樹生。高四五尺。其莖白色。有倒刺。其葉有細齒。背色無毛。背後淡青。頗似櫻桃葉而狹長。又似地棠花葉。四月開小白花。結實色紅。今人亦通呼爲蘇子。爾雅云。葥。山莓也。郭璞注云。今之木莓也。實似蔴莓而大。可食。孟詵云。明並以此爲覆盆。誤矣。（李時珍）

【懸鉤根皮】

性質　苦。平。無毒。

主治　子死腹中不下。破血。婦人赤帶下。久患赤白痢。膿血腹痛。殺蟲毒。卒下血。並濃煮汁飲之。

配合應用　㊀血崩不止。木莓

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

根四兩酒一盌煎七分空心溫服。（麗仙乾坤生意方）

㊁治婦人崩中及下痢日夜數十起欲死者以此入腹卽活懸鉤根、薔薇根柿根、拽藪各一斛剉入釜中水淹上四五寸煮減三之一去滓取汁煎至可丸丸梧子大每溫酒服十丸日三服（千金翼方）

【懸鉤葉】主治　燒研水服療喉中塞。

【懸燧】卽馬肝之別名。詳『馬肝』條。

【懸蔓】卽瓜蔞之別名。詳『瓜蔞仁』條。

【懸鍼】卽蝌蚪之古籍別名。典見古今注。詳『蝌蚪』條。

【樝子】古籍別名　麵樝。血樝。鐵樝（綱目）樝橿（日本）

外國名詞　Quercus glauca, Thunb.（拉丁）カシ（日本）

基本　係殼斗科槲屬。爲樝之子仁。其葉、木皮詳見各該條。

產地　生暖地山野間。

形態　樝爲常綠喬木類之一種。種類不一。高三四丈。葉廣披針形。或長橢圓形。端尖。邊緣或有鋸齒。春夏開花。花爲穗狀花序。雌雄同株。結實爲堅果。有椀狀殼斗大如菩提子。霜後殼裂。實出。實中仁如杏仁。木材堅實。難腐。可製器具。其子仁可供藥用。



樝子（一）



樝子（二）

性質　苦澀。平。無毒。

主治　食之不飢。令人健行。止洩痢。破惡血止渴。

參攷資料　樝子酸甘微寒。不可多食（正要）

【樝木皮】主治　婦血。　煮汁飲。止產

【樝木葉】主治　婦血。　煮汁飲。止產

歷代記述攷證

【明】吳瑞曰　用本草論樝木葉曰。嫩葉貼膿瘡。一日三換良。

【櫪皮】卽土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土骨皮』條。

【槻】㊀卽梧桐之古籍別名。典見綱目。詳『梧桐』條。㊁卽木樝之古籍別名。典見爾雅。詳『木樝』條。

【櫰子】卽槐實之古籍別名。典見羣芳譜。詳『槐實』條。

【櫰香】古籍別名　兜婁婆香。（綱目）

產地　生山野間。

形態　櫰香爲香木類之一種。幹高丈許。葉長。色青。有鉅齒之缺刻。似小蘞葉而氣香。對生。其根狀如枸杞根而大。煅燒之亦有香氣。可供藥用。

性質　苦。濇。平。無毒。

主治　頭瘍腫毒。磁末麻脂調塗。七日腐落。

【爐山生】卽爐甘石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『爐甘石』條。

【爐甘石】命名　本品爲爐火所重。其味甘。故名。

處方用名　製甘石。

古籍別名　爐先生。（土宿本草）爐眼石。爐山生。（和漢藥考）

外國名詞　Calamina（拉丁）Smithsonite or Calamine（英）Galmei（德）

基本　係金屬鋅礦類。爲白色或藍色之半透明。或不透明之固體礦石。

產地　陳仁山藥物生產辨云。爐甘石產廣西柳州容縣。長安爐等。和漢藥考曰。日本產於岐阜縣吉城郡等處之硫化鋅鑛及銅鑛脈中。

形態　爐甘石爲白色長方形。或六面形。或成雞冠形。或如葡萄狀。恒團結成球。多作玻璃狀或眞珠狀。有光之殼子。形鐘乳形。塊形物。又有作褐色、青色而稍透明者。

製法　李時珍曰。凡使爐甘石。以炭火煅紅。童子小便淬七次。洗淨研粉。水飛過曬用。

性質　甘。溫。無毒。

成分　爲炭酸鋅。中含有鐵、鈣、鎂及鎘少許。

效能　散風熱。燥濕。治一切目疾。專作眼科藥。

作用　能驅局部之葡萄球菌。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

并能限止其繁殖。

主治　止血消腫毒。生肌。明目去翳。退赤。收濕除爛。同龍腦點治目中一切諸病。

歷代記述攷證　【明】繆希雍本草經疏論爐甘石曰。爐甘石味甘辛。氣溫無毒。其性帶澀。經曰瞥氣不從。逆於肉裏。乃生癰腫。甘溫能通暢血脈。則腫痛散。血自止。肌肉生也。又目得血而能視。風熱上壅。則目爲赤爛腐翳。甘入脾而益血。辛溫能散風熱。性澀則能黏物。故點目翳。及治目中一切病也。【清】黃宮繡本草求眞。論爐甘石曰。爐甘石係金銀之苗。產於金銀坑中。狀如羊腦。緊似石脂。能點赤銅爲黃。甘辛而澀。氣溫無毒。其性專入陽明胃。蓋五味惟甘爲補。惟溫爲暢。是能通和血脈。故脾毒得此則消。而血自能克止。肌亦自能克生也。辛溫能散風熱。性濇能黏翳膜。故凡目翳得此。即能撥雲也。有用此治下疳陰濕。並齒疎陷物者。亦此義耳。李時珍常用甘石煅飛。海螵蛸、硼砂等分爲細末。硃砂依分減半。同入點諸目病皆妙。煅用童便良。

配合應用　㈠治目暴赤腫。爐甘石火煅尿淬、風化消。等分爲末。新水化一粟點之。（御藥院方）

㈡治諸般翳膜。爐甘石、青礞、朴硝。等分爲末。每用一字。沸湯化開。溫洗目三次。（宣明方）

㈢治一切目疾。眞爐甘石半斤。用黃連四兩。剉豆大。銀石器內水二盞。煮二伏時。去黃連爲末。入片腦二錢半。研勻。罐收。每點少許。頻用取效。又方。爐甘石煅一錢。盆消一錢。爲末。用熱湯泡洗。

㈣治目中諸病。石連光明散。治眼中五輪入廓諸證神效。爐甘石半斤。取如羊腦鴨頭色者。以桑柴灰一斗。火煅赤。研末。用雅州黃連各四兩。切片。煎水浸石。澄取粉。曬乾用。鉛粉二定。以二連水浸過炒之。雄黃研末。每用甘石、鉛粉各三分。雄黃一分。片腦半分。研勻點眼甚妙。（張氏方）

㈤治目暗昏花。爐甘石火煅童尿淬七次。代赭石火煅醋淬七次。黃丹水飛各四兩爲末。白沙蜜半斤。以銅鐺鍊去白沫。更添清水五六盞。熬沸下藥。文武火熬至一盞。滴水不散。以夾紙濾入瓷器收之。頻點日用。（衛生易簡方）

㈥治爛弦風眼。風眼流淚。爛弦。白爐甘石四兩。火煅童尿淬七次。放地上出毒三日。細研。每用椒湯洗目後。臨臥點三四次。次早以茶湯洗去甚妙。又方。爐甘石一斤。火煅。黃連四兩。煎水淬七次爲末。入片腦。每用點目。（劉長春方）用爐甘石、石膏各一錢。海螵蛸三分爲末。入片腦麝香各少許收點。（宣明眼科方）用爐甘石二兩。以黃連一兩。煎水。入童尿半盞。再熬下朴消一兩。又熬成。以火煅石淬七次。洗淨爲末。入蜜陀僧末一兩。研勻收點之。（衛生易簡方）

㈦治聤耳出汗。爐甘石、礬石各二錢。胭脂半錢。麝香少許。爲末。綿淨吹之。（普濟方）

㈧治齒疎陷物。爐甘石煅、寒水石等分爲末。每用少許擦牙。忌用刷牙。久久自密。（集玄方）

㈨治漏瘡不合。童尿製爐甘石、牡蠣粉外塞之。內服滋補藥。（雜病治例方）

㈩治下疳陰瘡。爐甘石火煅醋淬五次。一兩。孩兒茶三錢。爲末。麻油調傅立愈。（通妙邵眞人方）

⑪治陰汗濕痒。爐甘石一分。眞蚌粉半分。研粉撲之。（直指方）

用量　八分至錢半。

參攷資料　㈠爐甘石陽明經藥也。受金銀之氣。故治目病爲要藥。李時珍常用爐甘石煅淬。海漂蛸、硼砂各一兩爲細末。以點諸目病甚妙。入朱砂五錢。則性不黏也。（李時珍）㈡爐甘石所在坑冶處皆有。川蜀湘東最多。而太原澤州、陽城、高平、鹽丘、融縣及雲南者爲勝。金銀之苗也。其塊大小不一。狀似羊腦。鬆如石脂。亦黏舌。產於金坑者。其色微黃爲上。產於銀坑者。其色白。或帶青。或帶綠。或粉紅。赤銅得之。即變爲黃。今之黃銅。皆此物點化也。造化指南云。爐甘石受黃金白銀之氣。薰陶三十年。方能結成。以大穢浸及祕煮過。皆可點化。不減三黃。崔昉外丹本草云。用銅一斤。爐甘石一斤。鍊之。即成鉾石一斤半。非石中物取出乎。眞鉾石生波斯。如黃金。燒水赤而不黑。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（李時珍）㊁爐甘石種類頗多。日本以名泡攩者爲上。質軟。呈白色。其形如浮石。謂之羊腦爐甘。名茶疏攩者爲次。品質軟堅。白色微紅。作扁平狀。謂之片子爐甘。名石攩者亦次。品質尤堅。呈青白色。形狀不定。藥用大抵選質軟白色者。帶他色者不佳。（和漢藥考）

【爐先生】卽爐甘石之古籍別名。典見土宿本草。詳『爐甘石』條。

【爐底】卽蜜陀僧之古籍別名。典見綱目。詳『蜜陀僧』條。

【爐眼石】卽爐甘石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『爐甘石』條。

【犨牛】卽犨牛之古籍別名。典見綱目。詳『犨牛』條。

【犨雞】卽栖雞之訛。詳『栖雞』條。

【獼猴】古籍別名　沐猴。（史記）爲猴。（說文）胡孫。（格古論）王孫。（柳文）馬留。（倦游錄）狙。（綱目）摩斯咤。（梵書）

外國名詞　Macaus Monkey 或 Macague（拉丁）サル或ヤエル（日本）

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類纜長類猿類狹鼻類獼猴科。


獼猴

產地　出川廣之深山林野間。

形態　獼猴爲獸類猴屬之一種。頭稍圓。吻略突。眼並列向前。耳殼邊殆圓。而部裸出色赤。頸有頰囊。齒列門臼犬三種。毛色背灰黑或黃。腹部漸淡。臀有臀胼。前肢比後肢爲長。肢形如人手。尾短。體長二三尺。性馴良。可畜。其肉可供藥用。

性質　酸。平。無毒。

主治　諸風勞。釀酒獼佳。作脯食。治久瘧。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論獼猴肉曰。食之辟瘴疫。

【獼猴手】主治　小兒驚癎口禁。

【獼猴皮】主治　辟馬疫。

【獼猴尿】主治　小兒臍風。撮口。急驚風。（燒末。和生蜜少許灌之）

【獼猴桃】命名　本品形如梨。色如桃。而獼猴喜食。故名。

古籍別名　獼猴梨。藤梨。（開寶）陽桃。（日用）木子。（綱目）

外國名詞　Actinidia arguta, Pl.（拉丁）サルナシ　シラクチヅル　ヤブナシ　ユクワ（日本）

基本　係獼猴桃科獼猴桃屬。爲獼猴桃之果實。其藤及葉藤中汁。詳見各該條。

產地　生山野間。


獼猴桃

形態　獼猴桃爲灌木類之落葉蔓生木本。木幹大者圍尺餘。葉橢圓形或心臟形。葉端尖。緣邊有刺狀鋸齒。質硬。有光澤。而互生。五六月間。葉腋出花。花五瓣。爲聚繖花序。色綠白。蕊帶黑色。其樹皮可製紙及繩。與繫筏之用。結實圓形如球。爲漿果。可供食與藥用。

性質　酸。甘。寒。無毒。

主治　止暴渴。解煩熱。墮丹石。下淋石。熱痙。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論獼猴桃曰。調中下氣。主骨節風。癱緩不遂。長年白髮。野雞內痔病。

參攷資料　㊀獼猴桃鹹酸無毒。多食冷脾胃。動洩瀉。（陳藏器）㊁獼猴桃有實熱者宜食之。太過。則令人臟寒作洩。（寇宗奭）

【獼猴桃藤及葉】主治　殺蟲。養汁飼狗。療瘡疥。

【獼猴桃藤汁】性質　甘。滑。寒。無毒。

主治　反胃。和生薑汁服之。又下石淋。

【獼猴梨】卽獼猴桃之古籍別名。典見開寶本草。詳『獼猴桃』條。

【獼猴頭骨】主治　瘧瘧作。湯浴。小兒驚癎。鬼魅。寒熱。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鑿草】卽薑草之古籍別名。典見爾雅。詳『薑草』條。

【礦灰】卽石灰之古籍別名。典見綱目。詳『石灰』條。

【礪石】形態　礪石爲石類。磨粗者爲礪。礪石卽羊肝石之粗礪者。亦供藥用。

主治　破宿血。下石淋。除結痕。伏鬼物惡氣。燒赤投酒中飲之。人言蹋之患。帶下未知所由。

【礪石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目。詳『羊肝石』條。

【攀石牛夏麴】原名　攀麴。

命名　本品狀似大麥。而殼厚粗糙。故名。爲牛夏麴之一種。係和攀水製成者。故名。

產地　北省諸地多有之。

形態　穳麥爲穀類之一種。種有二。有似小麥而大者。有如大麥而小者。葉細長帶尖。有平行脈。結實繁密。芒長。其子實可供食與藥用。

製法　用牛夏入攀水煮透。合生薑草曬七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

性質　甘。微寒。無毒。

採取　以陳久者良。

主治　清水痰。

【攀紅】卽綠攀之古籍別名。典見綱目。詳『綠攀』條。

【攀麴】卽攀石牛夏麴之原名。詳『攀石牛夏麴』條。

【穳麥】命名　本品狀似大麥。而殼厚粗糙。故名。

產地　北省諸地多有之。

形態　穳麥爲穀類之一種。種有二。有似小麥而大者。有如大麥而小者。葉細長帶尖。有平行脈。結實繁密。芒長。其子實可供食與藥用。

性質　甘。微寒。無毒。

主治　輕身除熱。久服令人多力。健行。作麨溫中消食。

歷代記述攷證　【唐】蕭炳四聲本草論穳麥曰。補中。不動風氣。作餅食良。

參攷資料　穳麥暴食。似動冷氣。久乃益人。(大明)

【穳麥葉】命名　本品係用穳麥製成之蘗芽。故名。

主治　見麥蘗條。

【穭豆】命名　本品卽黑穭豆之簡稱。

古籍別名　黑小豆。黑料豆。黑細豆。(本草綱目)馬料豆。(俗名)細黑豆。(蓬原)細而扁者名零烏豆。(綱目拾遺)黑料豆。(本草綱目)黑細豆。(本草綱目)

產地　生田野間。

形態　穭豆爲穀類豆屬之一種。葉爲複葉。夏秋間放紫黑色花。結實爲莢果。長寸餘。霜後乃熟。熟則色紫。莢內有腎狀黑色之種子。可供食與藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　去賊風風痺。婦人產後冷血。炒令焦黑及熱投酒中。漸漸飲之。

歷代記述攷證　【清】趙學敏本草綱目拾遺論穭豆曰。壯筋骨。止盜汗。補腎活血。明目益精。

參攷資料　㊀穭豆入腎經。血分。同青鹽旱蓮草。何首烏蒸熟。但食黑豆則鬚髮不白。其補腎之功可知。今人以製何首烏取以引入腎經也。炒焦淋酒。治頭風腳氣。以其直達腎經血分。煮汁服。解烏附丹石藥毒。又按雨窶翁食記。小黑豆入鹽煮。久食大能補腎。(趙學敏)㊁本經黑大豆。卽今之馬料豆也。其色黑而形如人腰。故入腎經。益水明目。多服令人身重。一年後復原。久服身輕。非花豆中之黑大豆也。凡服豆。忌草麻子。厚樸。磉肉。歌云。黑大豆甘。腰子樣式。所以補腎藥餌宜入。卽是馬料。煮寒炒熱。調中下氣。止痢擊急。利水除脹。追風活血。生研敷腫。吞止煩渴。解一切毒。甘草煎汁。傷中淋露。產後諸疾。明目悅顏。製服有益。又云。穭豆卽小黑豆。因其粒細稱穭豆。別馬料也。治產後血風冷痛。其粒細不及馬料。歌云。穭豆黑。小甘遂。邪風。冷痺血滯。浸酒和融。(藥性考)㊂穭豆。補五臟。益中。助十二經脈。調中燥腸胃。殺鬼氣。舒筋。(儒門事親)

【穭豆衣】命名　本品卽穭豆之豆殼。非莢也。故名。

主治　解肌熱。止盜汗。

【穭豆葉】主治　頸後粉瘤。同辟麝香草搗傅之。

【糯米】原名　稻米。

命名　糯者懦也。本品性格柔黏。故名。

古籍別名　稌(綱目)元米。占米。(飲食譜)

外國名稱　Oryza sativa, L. var. glutinosa, Matsumura (拉丁)　モチゴメ(日本)

939／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

基本　係禾本科稻屬。爲糯稻之子實。

產地　各省皆有出。

形態　糯稻爲栽於水田中之一年生草本。莖高三四尺。中空有節。葉細長而尖。有平行脈。互生。秋月莖梢開花。呈穗狀。花小。有內殼外殼。六雄蕊。一雌蕊。果實爲穎果。其穀顆較黑。性亦較黏。米粒等供食用。亦可充藥物。

採取　十月間刈收之。

製法　收得曬乾。舂去殼。杵去糠用。

性質　苦。溫。無毒。

效能　補肺健脾。專作滋養強壯藥。

主治　作飯。溫中。令人多熱。大便堅。

歷代記述及證　【唐】陳士良食性本草論糯米曰。能行營衛。中血積。解芫青斑蝥毒。【唐】孫思邈千金翼論糯米曰。益氣止泄。【唐】蕭炳四聲本草論糯米曰。以酪酥脂作煎餅食。主痔疾。【唐】陳藏器本草拾遺論糯米曰。作糜一斗食。主消渴。【宋】大明諸家本草論糯米曰。補中益氣。止霍亂後吐逆。不止。以一合研水服。【明】李時珍本草綱目論糯米曰。暖脾胃。止虛寒洩痢。縮小便。收自汗。發痘瘡。【明】繆希雍本草經疏論糯米曰。稻米即今之糯米也。其味應甘。氣應溫無毒。造酒必用之者。以其性近於熱也。爲補脾胃益肺氣之穀。脾胃得補。則中自溫。大便亦堅實。溫能養氣。氣充則身自多熱。大抵脾肺虛寒者宜之。爲其能益氣溫中也。故又有止泄利。縮小便。收自汗。發痘瘡等用。【清】黃宮繡本草求眞論糯米曰。稻米味甘性平。據按諸書。有言性溫性寒性涼之不同。然究此屬陰物。陰即寒聚。故性黏滯而不爽也。是以服之。使人多睡。身軟無力。四肢不收。發風昏昏且使小貓食之。亦脚屈不能行。馬食之足重難移。妊婦雞肉食之。令子不利。使果性溫而熱。則食自有溫和通活之妙。何至陰凝膩滯如此哉。如謂釀酒則熱。熬糖尤甚。且發癰疽瘡瘍。何謂不溫。詎知性如大豆生。亦性溫。何以作豉則涼。可知。稻非性溫。因於造釀而溫始有。至書有云。食之補中益氣。及止虛寒泄瀉。並縮小便。收自汗。發痘瘡。皆是性黏不利。留滯在中。土壅不下之故。非如生者性主溫補。仍兼通活而無如此陰滯之甚也。謂之緩中則可。謂之溫中而熱。豈其可乎。謂之中虛宜服則可。謂之虛寒宜服。亦烏見其可乎。凡老人小兒。久病均忌。【清】王士雄隨息居飲食譜論糯米曰。糯米甘溫補肺氣。充胃津。助痘漿。煖水臟。釀酒熬餳。造作餅餌。若煮粥飯。不可頻餐。以性大黏滯。難化也。小兒病人。尤當忌之。凍米（冬月所製）性不黏滯。止瀉補脾。炒米香燥。助火。多食傷津。

配合應用　㈠治霍亂煩渴不止。用糯米三合。水五升。蜜一合。研汁分服。或煮汁服。亦治消渴飲水。（楊氏產乳方）

㈡治三消渴病。梅花湯。用糯穀炒出白花。桑根白皮等分。每用一兩。水二椀。煎汁飲之。（三因方）

㈢治下痢禁口。糯穀一升。炒出白花去殼。用薑汁拌溼。再炒爲末。每服一匙。湯下三服即止。（經驗良方）

㈣治久洩食減。糯米一升。水浸一宿。瀝乾。慢炒熟。磨篩。入懷慶山藥一兩。每日清晨用半盞。入砂糖二匙。胡椒末少許。以極淡湯調食。其味極佳。大有滋補。久服令人精暖有子。祕方也。（松窗經驗方）

㈤治鼻痕不止。服藥不應。獨聖散。用糯米微炒黃爲末。每服二錢。以新汲水調下。仍吹少許入鼻中。（簡要濟衆方）

㈥治勞心吐血。糯米半兩。蓮子心七枚爲末。酒服。孫仲盈云。曾用多效。或以墨汁作丸服之。（澹寮方）

㈦治自汗不止。糯米小麥麩同炒爲末。每服三錢。米飲下。或煮豬肉點食。

㈧治小便白濁。白糯丸。治入夜小便脚停白濁。老人虛人多此證。令人卒死。大能耗人精液。主頭昏重。用糯米五升。炒赤黑。白芷一兩。爲末。糯粉糊丸。梧子大。每服五十丸。木饅頭煎湯下。無此用局方補腎湯下。若後生稟賦怯弱。房室太過。小便太多。水管差澀。小便如膏脂。入石菖蒲、牡蠣粉甚效。（經驗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

良方）

㊈治女人白淫。糙糯米、花椒等分炒爲末。醋糊丸。梧子大。每服三四十丸。食前醋湯下。（楊起簡便方）

㊉治胎動不安。下黃水。用糯米一合。黃芪、芎藭各五錢。水一升。煎八合分服。（產寶方）

㊊治小兒頭瘡。糯米飯燒灰。入輕粉清油調傅。（普濟方）

㊋治蠏蛇丹毒。糯米粉和鹽嚼塗之。（濟急方）

㊌治打撲傷損諸瘡。寒食日浸糯米。逐日易水。至小滿取出日乾爲末。用水調塗之。（便民圖纂方）

㊍治金瘡癰腫及竹木簽刺等毒。用糯米三升。於端午前四十九日。以冷水浸之。一日兩換。水輕淘轉。勿令攪碎。至端午日取出陰乾。絹袋盛。掛通風處。每月旋取炒黑爲末。冷水調如膏藥。隨瘡大小裹定。瘡口外。以布包定。勿動。直候瘡瘥。若金瘡犯生水作膿腫甚者。急裹一二食久。即不作膿腫也。若癰疽初發。纔解燃腫。急貼之。一夜便消。（瘴苑方）

㊎治喉痺吐腮。用前膏貼項下及腫處。一夜便消。乾卽換之。當令溼爲妙。

㊏治竹木簽刺。用煎膏貼之。一夜刺出在藥內也。

㊐治顛犬咬傷。用糯米一合。斑蝥七枚。同炒蝥黃去之。再入七枚。再炒黃去之。又入七枚。待米出烟。去蝥爲末。油調傅之。小便利下佳。（醫方大成方）

㊑荒年代糧。糯米一斗淘汰。百蒸百曝。搗末。日食一飯。以水調之。服至三十日止。可一年不食。（肘後方）

㊒治虛勞不足。糯米入豬肚內蒸乾。搗作丸子。日日服之。

㊓治腰痛虛寒。糯米二升。炒熱。袋盛。拴靠痛處內。以八角茴香研酒服。（談埜翁試驗方）

施用宜忌　凡有溼熱痰火者禁用。

參攷資料　㊀糯米性溫。釀酒則熱。熬餳尤甚。故脾肺虛寒者宜之。若素有痰熱風病及脾病不能輸轉。食之最能發病成積。孟詵謂蒸頌或言其性涼性寒者。謬說也。別錄已謂其溫中。堅大便。令人多熱。是性豈寒涼者乎。今人冷洩者。炒食卽止。老人小便數者。作糕糕或丸子。夜食亦止。其溫肺暖脾可驗矣。痘證用之。亦取此義。（李時珍）㊁糯米性寒。作酒則熱。糟乃溫平。亦如大豆與豉醬之性不同也。（蒸頌）㊂涼發風動氣。使人多睡。不可多食。（孟詵）㊃久食令人身軟緩。人筋也。小貓犬食之。亦脚屈不能行。馬食之足重。妊婦雞肉食之。令子不利。（陳藏器）㊄久食發心悸。及癰疽瘡瘍中痛。合酒食之。醉難醒。（陳士良）㊅糯性黏滯難化。小兒病人最宜忌之。（李時珍）

【糯米泔水】　**性質**　甘涼無毒。

主治　益氣。止煩渴。霍亂。解食鴨肉不消者。頓飲一盞。卽消。

【糯米粥】　**性質**　甘。溫。無毒。

主治　益氣。治脾胃虛寒。洩痢。吐逆。小兒痘瘡白色。

【糯米糠】　**性質**　辛甘。熱。無毒。

主治　齒黃。燒取白灰。擦之。

【糯秫】　卽秫之古籍別名。典見唐本草。詳『秫』條。

【糯麥】　卽大麥之有黏性者。典見綱目。詳『大麥』條。

【糯粟】　卽秫之古籍別名。典見唐本草。詳『秫』條。

【糯稻花】　**性質**　甘。涼。無毒。

主治　揩牙固齒。烏鬚。陰乾用。

【糯稻稈】　**原名**　稻穰。

性質　辛甘。熱。無毒。

主治　黃病如金色。煮汁浸之。仍以穀芒炒黃爲末。酒服。

歷代記述攷證　【唐】蘇頌新修本草論糯稻稈曰。燒灰治墜撲傷損。【明】李時珍本草綱目論糯稻稈曰。燒灰浸水飲。止消渴。淋汁浸腸痔。按穫藉糠鞂暖足。去寒溼氣。

參攷資料　㊀稻稈灰方。出劉禹錫傳信方。云湖南李從事墜馬損傷。用稻稈燒灰。以新熟酒連糟入鹽拌和。淋取汁。淋痛處。立瘥也。（蘇頌）㊁稻穗煮治作紙。嫩心取以爲鞵。皆大爲民利。其紙不可貼瘡。能令爛肉按江湖紀聞云。有人壁虱入耳。頭痛不可忍。百藥不效。

941／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用稻稈灰煎汁灌入卽死而出也。（李時珍）

【糯稻穎】卽穀穎。參詳『糯穀芒』條。

【糯稻露】基本　本品爲鮮糯稻稈上之露水。

性質　甘。平。

主治　養胃和脾。

參攷資料　俞佳士妙應方治痞塊。八月白露後收糯稻頭上露水。晚作二服。飲下立消。按諸草木皆需天露始潤。惟稻至酉時其根上津潤之氣漸升。入夜乃達葉尖。至曉復自上而降於根。故無露之夜。稻葉獨潤。陳翠虛詞。一些珠露阿誰運上稻花頭是也。（趙恕軒）

【糯稻穰】卽稻穰。參詳『糯糯稈』條。

【糯穀芒】原名　穀穎。

性質　辛。甘。熱。無毒。

主治　黃病。爲末酒服。又解蟲毒。煎汁飲。

【罌子桐】命名　本品實狀似罌子故名。

古籍別名　虎子桐。（拾遺）茬桐。（衍義）油桐。（綱目）

外國名詞　Aleurites cordata, Muell. Arg.（拉丁）アブラギリ（日本）

基本　係大戟科罌子桐屬。爲罌子桐之子油。

產地　出暖地之山野間。園林中亦有之。

形態　罌子桐爲落葉喬木類。桐屬之一種。幹高二丈。雌雄異株。雌樹之葉似楸。雄樹之葉有二尖及四五尖。五月開淡紅色花而聚。梢頭結實如球。內有種子三四粒。取子榨油。可作漆飾之用。並可供藥用。



罌子桐

採取　以篾圈箍起。如鼓面者良。

性質　甘。微辛。寒。有大毒。

主治　瘰疬癬蟲瘡毒腫毒鼠至死。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論罌子桐油曰。傅惡瘡及宣水腫。塗鼠咬處。能辟鼠。【明】李時珍本草綱目論罌子桐油曰。塗脛瘡。湯火傷瘡。吐風痰喉痺及一切諸疾。以水和油。掃入喉中探吐。或以子研末。吹入喉中取吐。又點燈燒銅箸頭。烙鼠熱爛。眼亦妙。

參攷資料　罌子桐油。誤食吐人。得酒卽解。（李時珍）

【罌子粟】卽罌粟子之原名。詳『罌粟子』條。

【罌子殼】卽罌粟殼之原名。詳『罌粟殼』條。

【罌粟子】命名　本品實狀如罌子。其米如粟。乃象乎穀而可以供御。故有諸名。

處方用名　御米。罌粟米。

古籍別名　米囊子。御米。（開寶）象穀。（綱目）白米。羊古米。（和漢藥考）

外國名詞　Seameu Papaveris（拉丁）

基本　屬罌粟科。爲罌粟之種子。

形態　罌粟子爲黃白色或藍黑色之小種子。其形似腎臟。外皮有薄網之皺紋。其一面廣凹。胎芽彎曲作馬蹄形。味甘似油。



罌粟子

製法　生搗或炒。

性質　甘。平。無毒。

成分　含脂肪油四十八至五十%。嗎啡〇・〇六%。

效能　治反胃。療瀉痢。用治下痢及痙攣藥。

主治　丹石發動。不下飲食。和竹瀝麥粥食極美。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論罌粟子曰。行風氣。逐邪熱。治反胃胸中痰滯。【明】李時珍本草綱目論罌粟子曰。治瀉痢潤燥。【明】繆希雍本草經疏論罌粟子曰。罌粟其花至有千葉者。紅白紫黑色。有數種。一罌內子凡數千萬粒。細如葦塵子而色白。本經味甘平無毒。蘇頌性寒止寒。除熱解毒。下氣和中。故主丹石發動。不下食。及圖經行風氣。逐邪熱。止

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

反胃。去胸中痰滯也。

國外學說　和漢藥考曰。罌粟油(Oleum Papaveris.)乃壓搾罌粟子而得之脂肪油也。色黃性燥。酒精能溶解之。比重〇・九二四。可爲油畫家所用油料及製造肥皂原料等。

配合應用　㊀治反胃吐食。罌粟粥。用白罌粟米三合。人參末三大錢。生山芋五寸。細切研。三物以水二升三合。煮取六合。入生薑汁及鹽花少許。和勻分服。不計早晚。亦不妨別服湯丸。(圖經方)　㊁治泄痢赤白。罌粟子炒、罌粟殼炙、等分爲末。煉蜜丸梧子大。每服三十丸。米飲下。有人經驗。(百一選方)

用量　八分至錢半。

參攷資料　㊀服石人研此水煮。加蜜作湯飲。甚宜。(寇宗奭)　㊁高陽子云。罌粟花有四葉。紅白色。上有淺紅暈子。其囊形如鷄頭箭。中有細米。(陳藏器)　㊂處處有之。人多蒔以爲飾。花有紅白二種。微腥氣。其實形如餅子。有米粒極細。

圖人隔年糞地。九月布子。涉冬至春。始生苗。極繁茂。不爾不生。生亦不茂。俟蚍蜉黃乃採之。(蘇頌)　㊃罌粟秋種冬生。嫩苗作蔬食甚佳。葉如白苣。三四月抽薹。結青苞。花開則苞脫。花凡四瓣。大如仰盞。罌在花中。鬚蕊裹之。花開三日即謝。而罌在莖頭。長一二寸。大如馬兜鈴。上有蓋。下有蒂。宛然如酒罌。中有白米。極細。可煮粥和飯。水研濾漿。用綠豆粉作腐食。尤佳。亦可取油。其殼入藥甚多。而本草不載。乃知古人不之用也。江東人呼干葉者爲麗春花。或謂是罌粟別種。蓋亦不然。其花變態。本自不常。有白者。紅者。紫者。粉紅者。杏黃者。半紅者。半紫者。半白者。豔麗可愛。故曰麗春。又曰賽牡丹。曰錦被花。詳見游默齋花譜。(李時珍)　㊄性寒。多食利二便。動膀胱氣。(寇宗奭)

【罌粟米】　卽罌粟子之處方用名。詳『罌粟子』條。

【罌粟泡】　卽鴉片之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鴉片』條。

【罌粟花】　性質功用與鴉片同。參見『鴉片』條。

【罌粟津液】　卽鴉片之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鴉片』條。

【罌粟脂】　卽鴉片之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鴉片』條。

【罌粟殼】　**原名**　罌子殼。

處方用名　御米殼。古籍別名　米殼。粟殼。米囊。芥子殼。罌嗇殼。鶯粟殼。(和漢藥考)

外國名稱　Papaveris Capsulae. (Capsules.)

基本　屬罌粟科。爲罌粟之果殼。

產地　陳仁山藥物生產辨云。罌粟殼原產印度。後流入雲南。至今各省無不有之。其汁卽煮鴉片烟也。

形態　罌粟殼爲壺狀蒴果之皮殼。生者其色綠。乾則變灰綠或茶褐。外面有突出之縱紋十條至十五條。內亦相同。入藥多用果皮已傷。阿片已盡之餘殼。間取成熟之蒴果。除去種子用之。新鮮者有麻醉性之臭氣。其味苦。

採取　入藥須採其未熟者。曬乾。已熟者亦或取之。

製法　李時珍曰。凡用以水洗潤。去蒂及筋膜。取外薄皮。陰乾細切。以米醋拌炒。入藥。亦有蜜炒蜜炙者。

性質　酸。澁。微寒。無毒。

成分　與阿片含相同之成分。但不多耳。

效能　斂肺。澁腸。固精。止痛。用作祛痰鎮痙藥。故有鎮痛鎮咳止瀉之作用。但此爲劇藥。病初者忌服。

主治　主止瀉痢。固脫肛。治遺精。久咳斂肺。澀腸止心腹筋骨諸痛。

歷代記述攷證　【明】李士材本草圖解論罌粟殼曰。粟殼酸澁收斂。其性緊急。非久瀉久嗽者。不可輕投也。世俗聞而畏之。概不肯用。不知久痢滑脫者。非此不效。因噎而廢食。良醫弗爲也。水洗潤去蒂及筋膜。取薄皮醋炒。【清】黃宮繡本草求眞。論罌粟殼曰。御米殼酸澁微寒。功耑斂肺澁腸固腎。凡久瀉久痢肛脫。久嗽氣乏。並心腹筋骨諸痛者最宜。若嗽痢初起。寒熱未淨。用此以爲收澁。致令邪留不解。則殺人如劍。可不愼歟。洗去帶膜。或醋炒。蜜炒取用。得烏梅、陳

943／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

皮良。罌中有米極細。書言氣味甘寒。煮粥能治反胃。亦須分臟偏純。及病症陰陽虛實以治。

國外學說　英美學說謂罌粟原產印度、波斯等國。高約二尺至四尺。後漸流傳至中國之雲南、山西、四川等處。今則各處多栽植之。入藥用其已熟之殼。去盡其子。（子無功力）更有於其殼未熟時。割裂而取其汁液。曬乾以成鴉片。爲藥中要貨。罌粟有二種。一爲黑色。一爲白色。而阿剌伯國與波斯國之醫書中。亦言有二種。近時印度大平原中。多種白色罌粟。而雪山則有一種黑色罌粟。卽深紅色。鴉片大半爲白罌粟所出。間有紅色與紫色者。惟軟白色之罌粟則更少。西國園內所種之罌粟。疑爲波斯國初產。然在各國種植罌粟已有多年。其子且易散至遠處。故所見野生之罌粟甚多。歐羅巴南方恒見有野生之罌粟。罌粟在埃及國早已種之。而法國、土耳其國並歐羅巴他處。亦種植罌粟。有法人言地中海東邊所產之罌粟較最大。其醫治作用。能配膏糖煮水等。而其方則較鴉片大遜。處方。罌粟殼二兩搗碎。汽水三十兩。共入鍋。盞嚴煞十分鐘。濾渣。加汽水淋之。足二十分爲度。用手巾蘸敷患處。治疼痛。跌打外傷。亦治皮類病。熱用方效。有潤皮寧睡之性。如身體有腫大處、或痛處、或生炎處、卽如眼睛、肚腹、交節等處。俱可用之。（罌粟殼煮水方）

配合應用　㈠治熱痢便血。罌粟醋炙一兩。陳皮半兩。爲末。每服三錢。烏梅湯下。

㈡治久痢不止。罌粟殼醋炙爲末。蜜丸彈子大。每服一丸。水一盞。薑三片。煎八分。溫服。又方。粟殼十兩去膜。分作三分。一分醋炒。一分蜜炒。一分生用。並爲末。蜜丸。茨子大。每服三十丸。米湯下。又集要百中散。用粟殼蜜炙。厚朴薑製。各四兩。爲細末。每服一錢。米飲下。忌生冷。

㈢神仙救苦散。治小兒赤白痢。日夜百行不止。用罌粟殼半兩。醋炒爲末。再以銅器炒過。槟榔半兩。炒赤。研末。各收。每用等分。赤痢蜜湯服。白痢沙糖湯下。忌口味。（全幼心鑑方）

㈣治水泄不止。罌粟殼一枚去蒂膜。烏梅肉、大棗肉。各十枚。水一杯。煎七分。溫服。（經驗方）

㈤治久嗽不止。穀氣數壯人用之卽效。罌粟去筋。蜜炙爲末。每服五分。蜜湯送下。（危氏方）

㈥治久咳虛嗽。實同知百勞散。治咳嗽多年。自汗。用罌粟殼二兩。半去蒂膜。醋炒。取一兩。烏梅半兩。焙爲末。每服二錢。臥時以白湯下。（宣明方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡非眞氣虧損而有實邪者禁用。

參攷資料　㈠收斂固氣能入腎。故治骨病尤宜。（李杲）㈡今人虛勞咳嗽。多用粟殼止劫。及澀熱泄痢者用之。止澀。其治病之功雖急。然殺人如劍。宜深戒之。又曰。治嗽多用粟殼不必疑。但要先去病根。此乃收後藥也。治痢亦同。凡痢須先散邪行滯。豈可遽投粟殼龍骨之藥。以閉塞腸胃。邪氣得補而愈甚。所以變症作而淹延不已也。（朱震亨）㈢酸主收澀。故初病不可用之。澀瀉下痢既久。則氣散不固。而腸滑肛脫。咳嗽諸病既久。則氣散不收。而肺脹痛劇。故俱宜此澀之固之收之斂之。按楊氏直指方云。粟殼治痢。人皆薄之。固矣。然下痢日久。腹中無積痛。當止澀者豈容不澀。不有此劑以治之。何以對治乎。但要有輔佐耳。又王碩易簡方云。粟殼治痢如神。但性緊澀多令人嘔逆。故人畏而不敢服。若用醋製。加以烏梅。則用得法矣。或同四君子藥尤不致閉胃妨食。而獲奇功也。（李時珍）㈣得醋烏梅橘皮良。（李時珍）

【罌粟嫩苗】　**毒**。　**性質**　甘。平。無毒。

主治　作蔬食。除熱潤燥。開胃厚腸。

【罌殼】　卽罌粟殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『罌粟殼』條。

【臙肢】　卽臙脂之訛。詳『臙脂』條。

【臙脂】　**命名**　本品初產燕地。而以紅藍花汁凝作之。故名。

古籍別名　經救（綱目）胭脂。

944／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

經亦經粉。（和漢藥考）

外國名詞　Carthaminum.（拉丁）Carthamin.（英）（德）

基本　屬於菊科之紅花。其花瓣中含有之紅色素。卽以之製成臙脂也。

產地　陳仁山藥物生產辨云。棉胭脂廣東廣州市製造而成。

形態　胭脂爲血紅色之糊狀。或有光輝之塊。無臭味。水不溶解。但以水少許。十分混和。則現紅色。受空氣及日光溫熱。則次第分解。

製法　摘取紅花之花瓣。陰乾。浸以適宜之水。使之發酵。造成餅紅。再浸水中。除去可溶性之黃色素。以絞搾者入木灰水中。使紅色素得以溶出。乃於此溶出之液中。注入稀薄之有機酸液。則紅色素自然沈澱。遂採集而製成臙脂。茲更詳述如下。㊀餅紅花之製法。欲以紅花製成餅塊。須將乾紅花入桶灌水。兩足踏出黃汁。傾去約四五次。此黃汁爲花蕊與花瓣中所含之液。煎之可爲黃色染料。黃汁去後。卽以竹笊入流水中振動。且置日中曬之。候紅花半乾時。揑成徑一寸許。厚二分餘之堅塊。置於闊三寸長六尺之框中。框底須先墊濕水之蓆。然後累疊餅紅。約四五寸厚。蓋濕蓆一層。兩足在面上均勻踏緊。蓆上再疊餅紅。蓋蓆。足踏如前。至重疊覆蓆五層而止。每晨灌水少許。約三四日。聽其放置。候餅紅之花瓣變轉。手指捫之。覺現黑色。乃將上面覆蓋之濕蓆與下墊之濕蓆替換。下墊之濕蓆撤去不用。上蓋則易以乾蓆。既而併乾蓆亦撤之。餅紅曬乾收藏。如在陰雨之天。則載以闊三尺長六尺之竹簍或筐。置火上烘乾。亦有不用框而用木架。一面堆置。一面可流去黃汁。其木架亦可疊至五六層。其法大略相同。㊁臙脂製造法。以餅紅花置水中浸一宿。翌日搾以轆轤。以後再浸再搾。凡五六次。至黃汁去盡。再浸以木灰汁。則臙脂悉因木灰而游離。然後入米醋使與灰汁親和。更以苧蔴入水中。將臙脂盡行吸收。是爲第一期。此吸收臙脂之苧蔴。復浸以木灰汁（製下等之物。則用稻藁灰汁）而搾以轆轤。則苧蔴之臙脂亦盡分離。苧蔴仍復其原有之白色。是爲第二期。既而將此臙脂水傾入甕內。加入乾梅之醋。大約臙脂水一升。入乾梅醋一茶碗。隨工人之巧拙而自爲加減。約二時後。臙脂悉數沈澱。乃徐徐撇淨上面之水。包以絹紗兩層。再徐徐搾去其水。是爲第三期。至此臙脂始完成矣。其搾滓可爲熏蚊之香。至臙脂所得之分量。須視紅花之好否與土地之若何而異。大抵餅紅花百分。可得臙脂七分至十分。最佳者得十五分云。

性質　甘。平。無毒。

效能　活血。解毒。用作活血止血藥。

主治　小兒瞎耳。浸汁滴。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論胭脂曰。活血。解痘毒。【清】黃元御玉楸藥解論胭脂曰。胭脂味甘。氣平。入足厥陰肝經。治血行瘀。消腫止疼。此紅藍花所作。活血與花同。

國外學說　日本和漢藥考曰。臙脂以臘月製者爲佳。稱爲寒紅。今日販賣之品。類約如下述。沈降餅紅而得之臙脂。（已除去水分者）謂之豔紅。乾燥之臙脂。謂之乾紅。磁酒杯中投一定之量。周圍抹刷。發綠色之光輝。專供婦人裝飾用者。謂之刷紅。臙脂加葛粉。調成糊狀。自來作糕餅類及錦繪等著色用者。謂之細工紅。又名食料紅。又日本明治四十年間。宮城人山啓內者。提倡一種治病之法。謂之紅療法。以胭脂與拉納林調和。製成輭膏。據云以之塗擦全身皮膚。能治百病。當時認爲效驗極著。其明年且著紅療法講演錄一卷。歷述胭脂之效。謂以胭脂塗擦皮膚。則血液或組織所吸收之酸素。悉被分解而放出。且從而調整全身之營養機能。或奮起其能力。胭脂既有如此之功效。故祇須診查等病起因所在。並關聯之神經系等。卽塗擦之。該病卽可治愈。爲此紅療法。不久卽闐焉無聞。殆其效仍歸於泡影歟。

近人學說　張山雷曰。胭脂卽紅藍花汁製成。閨中以爲面脂潤色之用。製法不止一種。瀕湖綱目載之甚詳。皆以紅汁染成。以活血

945／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲用。仍與紅花同意。惟自海舶交通。西人所造各種顏料。盛行於時。豔麗絕勝土產。而皆含毒質。今之燕脂綿燕脂粉。又皆以洋色製成。萬不可爲入藥之品。不如仍用紅花較爲穩妥。

配合應用 ㊀治乳頭裂破。燕脂蛤粉爲末傅之。(危氏得效方)　㊁治嬰孩鵝口白厚如紙。用胚子燕脂以乳汁調塗之。一宿效。男用女乳。女用男乳。(集簡方)　㊂治漏瘡腫痛。用豬膽七箇。綿燕脂十箇。洗水和勻。搽七次即可。(救急方)　㊃防痘入目。用臙脂嚼汁點之。(集簡方)　㊄治痘瘡倒陷。乾臙脂三錢。胡桃燒存性一箇。研末。用胡荽煎酒服一錢。再服取效。(救急方)

參攷資料 ㊀按伏候中華古今注云。燕胭起自紂。以紅藍花汁凝作之。謂脂飾女面。產於燕地。故名燕脂。或作嚥。敕匈奴人名妻爲閼氏。音同燕脂。謂其顏色可愛。如燕脂也。俗作臙肢、胭支者。並謬也。(李時珍)　㊁燕脂有四種。一種以紅藍花汁染胡粉而成。乃蘇鶚演義所謂燕脂。葉似薊。花似蒲。出西方。中國謂之紅藍。以染粉爲婦人面色者也。一種以山燕脂花汁染粉而成。乃段公路北戶錄所謂端州山間有花叢生。葉類藍。正月開花。似蓼。土人採含苞者爲燕脂粉。亦可染帛。如紅藍者也。一種以山榴花汁作成者。鄭虔胡本草中載之。一種以紫鉚染綿而成者。謂之胡燕脂。李珣南海藥譜載之。今南人多用紫鉚燕脂。俗呼紫梗是也。大抵皆可入血病藥用。又落葵子亦可取汁。和粉勻面。亦謂之胡燕脂。(李時珍)　㊂胭脂須貯於不受日光。不觸空氣之處。故以密藏黑漆小箱或黑漆壺中爲宜。(和漢藥考)

【臙脂花】卽紫茉莉之古籍別名。典見草花譜。詳『紫茉莉』條。

【臙脂菜】卽藜之古籍別名。典見綱目。詳『藜』條。

【藷】卽甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳『甘蔗』條。

【藷糧】卽山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。

【藷蕷】卽山藥之古籍別名。典見吳普本草。詳『山藥』條。

【藷蔗】卽山藥之古籍別名。典見圖經本草。詳『山藥』條。

【蘗】卽赤豆葉之原名。詳『赤豆葉』條。

【蘗去病】卽蘗香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘗香』條。

【蘗香】

命名 豆葉曰蘗。本品葉似之而氣香。故名。

處方用名 廣蘗香。廣蘗梗。鮮蘗香。土蘗香。

古籍別名 合香。(蘇合香亦一名合香)　蘗去病。琉璃蘗去病。(和漢藥考)兜婁婆香。(楞嚴經)多摩羅跋香。(法華經)榆怛羅香。(金光明經)迦算香。(涅槃經)

外國名詞 Lophanthus rugosus, Fisch. et Mey.(拉丁)

基本 屬唇形科排草香之葉與梗。

產地 凡山谷田野恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。產廣東。以番禺河南、寶崗、嘯嘯庄石牌爲好。肇慶六步爲廣香。次之。瓊州屬產者爲南香。更次。

形態 蘗香爲多年生草。莖方。高三四尺。香氣强烈。葉對生。作長心臟形。前端尖。邊緣有鋸齒。夏月於莖頂叢生青紫色唇形花冠。花作穗狀。



蘗香

種類 ㊀運來有葉微青者。稱青葉蘗香。其芬香甚烈。用合香料。殆係採葉未黃者陰乾製之。㊁今有得眞蘗香種栽之者。稱倭蘗香。春生苗高二三尺。節節生葉。似木芙蓉葉而小長。開紫花。似夏枯草花。其香有荏氣而烈。摘葉用糝泥。一宿乾。武州多種之。與唐蘗香無異。

種植 ㊀氣候及土質。寒冷而稍帶溫和之氣候。正適其生育。熱則不宜。土地以鬆沃及排水適宜之砂質土爲最佳。次之則石灰土亦能生長也。其餘一切土地。皆不相宜。㊁產地及種類。蘗香爲吾國最多之藥用作物。其產隨地有之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

種類無甚分別。惟有早晚之別。故曰早種晚種。㈡整地下種栽培者。宜先作溫熱之苗牀。其內之土。必須細碎膨鬆。分切栽培者。作幅四五尺之畦。整地既畢。可以栽種也。㈢栽種。下種栽培。於三月間下種於苗牀。上蓋薰灰。待其生長。可以移植於他處。移植之期。以五月下旬至六月上旬爲常。分切栽培。切其莖爲數段。而後斜插於畦上。待其生長。可毋庸移植也。㈣灌溉。藿香好濕潤。故當灌溉。栽植或播種之後。稍過三四日。卽當灌溉一次。待其生長或苗出時。尤宜灌以冷水。又過二十餘日。見其芽生長至一尺餘時。亦當灌水。以助其蒸發。蓋藿香生長之時。正在天氣溫煖之時。其葉甚多。則蒸發甚烈。若此時不行灌溉。則所需水分不足。葉之蒸發益烈。遂不能免其枯萎之患。故栽培藿香。以灌溉爲必要。然行灌溉時。不可不定時間以灌之。蓋灌水不定時間。則必有害。例如灌水宜行於早晚時。若不依時間。而於日中灌溉之。不惟無益。反致枯死。故亦當注意也。㈤施肥。肥料以人糞尿充之。當其施與時。將人糞尿與水混和至稀薄。人糞尿不可過多。當以適度爲要。（水十擔和人糞尿二擔至二擔半爲度）見其芽出而後於早朝時施行之可也。但不可行於日間。恐害及其全體。自種迄收。當施二次已足。不必多施也。㈥除草。雜草叢生。卽當除去爲要。勿使蔓延。致害藿香生長。惟除時亦當注意於藿香。勿使倒斷。

採取　五六月間。隨時可以採取。或者見其花開葉大時。爲止長期。乃採取之。正適其當採取之法。用銳利之刀。割其莖葉。割取之後。曝日中乾之。而後或賣或貯可也。收穫之量。每畝可得四百斤二三百斤者次之。一百餘斤者爲最下。總隨栽培之巧拙而分之。

用法　與他藥水煎或剉末和作丸散。

性質　辛。微溫。無毒。

效能　醒脾和胃。辟惡止嘔。用治霍亂吐逆要藥。

主治　風水毒腫。去惡氣。止霍亂心腹痛。

歷代記述攷證

【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論藿香曰。脾胃吐逆爲要藥。【金】張元素珍珠囊論藿香曰。助胃氣。開胃口。進飲食。【元】王好古湯液本草論藿香曰。溫中快氣。肺虛有寒。上焦壅熱。飲酒口臭。煎湯漱。【明】繆希雍本草經疏論藿香曰。藿香稟清和芬烈之氣。其味辛。其氣微溫無毒。潔古辛甘。又曰甘苦。入手足太陰。亦入足陽明經。風水毒腫。病在於脾。惡氣內侵。亦由脾虛。邪入霍亂。心腹痛皆中焦不治之證。脾主中焦。香氣先入脾。理脾開胃。正氣通暢。則前證自除矣。蘇甄以爲脾胃吐逆爲要藥。潔古謂其助胃氣開胃口。進飲食。海藏謂其溫中快氣。肺虛有寒。及寒鬱熱壅於上焦。飲酒口臭。煎湯飲之。皆辛溫入肺入脾。清上治中之功也。【清】黃宮繡本草求眞論藿香曰。藿香辛香微溫。香甜不峻。但馨香氣正。能助脾醒胃。以辟諸惡。故凡外來惡氣內侵而見霍亂嘔吐不止者。須用此投服。俾其胸開氣寬。飲食克進。故同烏藥順氣散。則可以利肺。同四君子湯。則可健脾以除口臭。但因熱作嘔勿服。

辨僞　㈠鄭肖巖曰。僞名次藿香。氣味不香。不知何處所產。更有一種洋藿香。性味更別。葉梗皆然。用之無益而有害。按藿香產於嶺南交趾。爲正地道。故近日由廣東辦來者爲良。氣味芬香。功能醒脾和胃。宣氣開鬱。最得天地之正氣。且方莖有節。中虛。葉似柔而小薄。用者當明辨之。㈡曹炳章曰。按藿香本草名兜婁婆香。產嶺南爲最道地。在羊城百里內之河南寶岡村及肇慶者。五六月出新。方梗白毫綠葉。揉之清香氣繞鼻而濃厚。味辛淡者。名廣藿香。廣東省垣各山貨行收買揀淨發行。首推巨昌與泰昌爲最道地。如雷州瓊州等處產者。名海南藿香。卽今所謂洋藿香也。其氣薄而濁。味辛辣燥烈。葉細而小。梗帶圓形。莖長根重爲最次。其他如江浙所產之土藿香。能乘鮮切片。烈日曬乾。貯於缸甕。使香氣收貯不走。入藥效能亦甚強。不亞於廣藿香也。

近人學說　張山雷曰。藿香芳

947／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

香而不嫌其猛烈。溫煦而不偏於燥熱。能祛除陰霾溼邪。而助脾胃正氣。爲溼困脾陽。意倦無力。飲食不甘。舌苔濁垢者。最捷之藥。亦辟穢惡。解時行疫氣。蓋嵐瘴以氣染入。無非溼濁穢腐之薰蒸。感之者由口鼻吸入。胃先受之。芳香得清氣之心。而藿香氣味和平。不嫌辛燥。故助脾胃而無流弊。但必以廣產爲佳。雖以氣勝而沖和可愛。今江浙間遍地產之。則味苦濇而氣亦惡。劣石頑。謂伐胃消食。且能耗氣。而世俗以爲能解暑氣。淪菜多飲。未盡善也。

配合應用　㊀治霍亂。用藿香、縮砂蜜、炒鹽。㊁治吐瀉轉筋。霍亂。用藿香、人參、橘皮、木瓜、茯苓、縮砂蜜。㊂辟惡氣。治中惡心腹疼痛。用藿香、木香、沈水香、乳香、縮砂蜜。㊃補肺。藿香入順氣烏藥散。補脾外入黃耆四君子湯。治中暑吐瀉。入桂苓甘露飲。㊄治暴中寒邪。吐逆不止。用藿香、木香、丁香、紫蘇葉、人參、生薑、炙草一兩。香附炒五兩爲末。每以白湯點服一錢。（經效濟世方）㊅治霍亂吐瀉。垂死者服之回生。用藿香葉、陳皮各半兩。水二盞。煎一盞。溫服。（百一選方）㊆治暑月吐瀉。滑石炒二兩。藿香二錢半。丁香五分爲末。每服一二錢。浙米泔調服。（萬謙師經驗方）㊇治胎氣不安。氣不升降。嘔吐酸水。用香附、藿香、甘草二錢爲末。每服二錢。入鹽少許。沸湯調服之。（聖惠方）㊈香口去臭。藿香洗淨。煎湯。時時嚥漱。（摘玄方）㊉治冷露瘴爛。藿香葉、細茶等分。燒灰。油調塗葉上貼之。（應驗方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛無溼。及胃有鬱熱者禁用。忌火。

著名方劑　藿香正氣散。治外感四時不正之氣。內停飲食。頭痛寒熱。或霍亂吐瀉。或發瘧疾。（局方）厚朴、陳皮、桔梗、半夏各二兩。白芷、茯苓、蘇葉、藿香各三兩。上十味共研末。加薑棗水煎熱服。

參攷資料　㊀芳香之氣。助脾胃。故藿香能止嘔逆。進飲食。（李杲）㊁按廣志云。藿香出海邊國。莖如都梁。葉似水蘇。可著衣服中。穢舍南方草木狀云。出交趾、九眞、武平、興古諸國。吏民自種之。叢生。五六月採日乾。乃芬香。（掌禹錫）㊂藿香嶺南多有之。人家亦多種。二月生苗。莖梗甚密。作叢。葉似桑而小薄。六月七月採之。須黃色。乃可收。金樓子及俞益期牋皆云扶南國人言五香。共是一木。其根是旃檀。節是沉香。花是雞舌。葉是藿香。膠是薰陸。故本草以五香共條。義亦出此。今嶺南中藿香。乃是草類。與穗舍所說正相符合。范曄合香方云。零藿虛燥。古人乃以合香。卽此。扶南之說。似涉欺罔也。（蘇頌）㊃藿香方莖有節中虛。葉微似茄葉。潔古東垣惟用其葉。不用枝梗。今人併枝梗用之。因葉多僞故耳。唐史云。頓遜國出藿香。插枝便生。葉如都良者是也。劉欣期交州記言。藿香似蘇合香者。謂其氣相似。非謂形狀也。（李時珍）㊄藿香入肺經。故古方治鼻淵以之爲君。以其能引清陽之氣。上通顚頂也。（沈金鰲）㊅藿香廣產者良。但葉甚少。土人每以排草葉僞充。最難辨別。（失名）㊆按藿香雖不燥烈。然究是以氣用事。惟舌有濁垢。而濕濕欲泛者。最佳。若舌燥光滑。津液不布者。咸非所宜。凡芳香行氣。醒脾勝溼諸芳草。皆有同情。不僅藿香木香一類爲然也。（張山雷）

【藿香露】基本　本品爲藿香蒸取之露。

性質　涼。散微辛。

主治　清暑止氣。

【藝草】古籍別名　蕺。麻蠍子草。（綱目拾遺。惡草羅。墨莊漫錄）

產地　生田野間。

形態　蕺草爲毒草類之一種。莖高四五尺。葉如麻。嫩時可供馬秣。經霜則辛觸之。螫人腫痛不可忍。甚於蜂蠆蜈蚣。入肌肉卽成瘡。浸淫潰爛。久不能愈。有花無實。雪下猶青。其子可供藥用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　取汁塗蛇毒。點風疹。洗瘟疾。亦可肥家以佩之

【藪麻】卽藪草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『藪草』條。

【薪艾炭】卽艾葉焙炒成者之處方用名。詳『艾葉』條。

【薪艾葉】卽艾葉之處方用名。詳『艾葉』條。

【薪莛】卽蘼蕪之古籍別名。典見爾雅。詳『蘼蕪』條。

【薪蛇】卽白花蛇之古籍別名。典見綱目。詳『白花蛇』條。

【薪蛇肉】卽白花蛇之處方用名。詳『白花蛇』條。



薪　棍

【薪棍】

別名　豆芟。

產地　生建昌。

形態　高不及尺。圓莖長葉。白毛如粉。葉厚而柔。兩兩下垂。惟直紋兩三縷。亦不甚露。可供藥用。

【薔薇香】卽杜若之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『杜若』條。

【薑巴】卽胡盧巴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡盧巴』條。

【薑甘石】卽爐甘石。詳『爐甘石』條。

【薑石】卽鐘乳石之古籍別名。典見別錄。詳『鐘乳石』條。

【薑肥子】卽胡盧巴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡盧巴』條。

【薑花】

原名　薑蘺。

性質　甘。寒。無毒。

主治　霍亂。水煮濃汁服。大驗。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論薑花曰。煮汁服。解中魚蟹毒。【明】李時珍本草綱目論薑花曰。燒灰吹鼻。止衄血。亦入崩中藥。

【薑根】

命名　葦之初生曰葭。未秀曰薑。長成曰葦。本品乃薑之根莖。故名。

處方用名　活薑根。鮮薑根。活水薑根。

古籍別名　葦根。葭根。（毛萇詩疏）蘇根。蘧根。（新修本草）蘆根。蓑根。蒲薑根。葦子草根。（和漢藥考）

外國名詞　Reed root（英）Schilfwurzel（德）

基本　屬禾本科薑（葦）之根。

產地　各省各屬有產。

形態　薑爲草本。多生於水邊。春從舊根生苗。高達丈餘。莖中空。葉互生。類竹葉。秋季於梢上生白色花穗。根爲叢生一株之纖維根。生根白色。柔潤。稍有甘味。但曬乾後。則成黃色。味淡。香氣亦失。故枯敗輕虛之根。不能供藥用。



蘆　根

採取　二月八月採根。日乾。餘者採掘無時。

製法　雷敩曰。薑根須要逆水生。并黃泡肥厚者。去鬚節。并赤黃皮用。

性質　甘。寒。無毒。

成分　薑根中含有糖質、膠質、蛋白質及中性鹽類等。

效能　清胃火。止嘔噦。除煩熱。發疹痘。用爲芳香性健胃藥。又爲解熱祛痰藥。

主治　消渴客熱。止小便利。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論薑根曰。療反胃嘔逆。不下食。胃中熱。傷寒內熱。禦良。【唐】甄權藥性本草論薑根曰。解大熱。開胃。治噎噦不止。【宋】大明諸家本草論薑根曰。寒熱時疾。煩悶渴痢人渴。孕婦心熱。【明】繆希雍本草經疏論薑根曰。薑根味甘氣寒而無毒。消渴者中焦有熱。則脾胃乾燥。津液不生而然也。甘能益胃和中。寒能除熱降火。熱解胃和。則津液流通而渴止矣。客熱者邪熱也。甘寒除邪熱。則客熱自解。肺爲水之上源。脾氣散精。上歸於肺。始能通調水道。下輸膀胱。腎爲水臟。而主二便。三家有熱。則小便頻數。甚至不能少忍。火性急速。故也。肺腎脾三家之熱解。則小便復其常道矣。火升胃熱。則反胃嘔逆不下食。及噎噦不止。傷寒時疾。熱甚則煩悶。不多亡陰。故瀉利人多渴。孕婦血不足。則心熱。甘寒除熱安胃。亦能下氣。故悉主之也。【清】黃宮

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

續本草求眞論蘆根曰。蘆根治無他奇。惟清肺降火。是其所能。凡人胸中有熱。則火升上嘔。逆氣不下。脾肺熱起。則消渴便數。甚至不能少忍。故必得此苦寒以治。則諸症悉除。且解蝦魚中毒酒毒。然此止宜實熱。不宜虛寒。若誤用之。必致見害。取逆水土內甘美者效。若露出水面者損人。去蘆節。

國外學說 荷蘭藥鏡卷五載有蘆根（Triticum repens.）之藥效。摘錄於下。蘆根有清涼淨血。開達利水之效。和解酷厲液。稀釋黏稠液。疏解凝結。爲解凝良藥。疏解內臟壅塞塊腫。開通肝、脾、腎、膀胱等壅塞。治肝之壅塞結腫、黃疸、脾病。依剝昆垤兒。最有效。又能溶解膽液凝石。故用於間歇黃疸。有殊效。用於羸瘦病之兼內臟壅塞者。能津潤滋養。緩和酷厲液。但不適於下痢症。黏液壅塞頑固諸病。用此製根成越幾斯劑。日服五六盎斯。佳能抑制熱病毒之刺戟衝動。用於減損脈管纖維擴張力諸症及熱病之稍傾斃衝症者。甚有效。用於間歇熱稀釋黏液。疏開壅塞。利小便。驅散病毒。用於間歇熱等之兼有內臟壅塞險重症。最佳。用於胸肺咽喉諸症。有緩和疏解清涼功效。遷延病之有酷厲毒而成刺戟症者。例如風痛、流走痛、傷冷痛及頑滯瘡腫、疥癬類。或由黏稠液壅塞而發之黃疸等。用此根加於煎劑長服。有殊效。例如下方。

排毒蘆根煎。用蘆根、山牛蒡根各六盎斯。加水適宜。煎成煎汁六十盎斯。再加後藥。接骨木傑列乙三盎斯。孕礬酒石（或霸王鹽）四錢。攪和。隨意飲服。大便閉者。加瀉藥。

配合應用 ㊀止因熱嘔吐。用蘆根、竹茹、麥門冬、大青、青黛。藥性論云。蘆根能解大熱。開胃。治噎噦不止。皆由甘寒除熱之力也。

㊁治骨蒸肺痿。不能食者。蘇遊蘆根飲主之。蘆根、麥門冬、地骨皮、生薑各十兩。橘皮、茯苓各五兩。水二斗。麥八升。去滓。分五服。取汁乃痊。（外臺祕要方）

㊂治勞復食復欲死。並以蘆根煮濃汁頻飲之。（肘後方）

㊃治嘔噦不止。厥逆者。用蘆根三斤切。水煮濃汁。頻飲二升。必效。若以童子小便煮服。不過三升愈。（肘後方）

㊄治五噎吐逆。心腸氣滯。煩悶不下食。蘆根五兩。剉。以水三大盞。煮取二盞。去滓。溫服下。（金匱玉函方）

㊅治反胃上氣。蘆根、茅根各二兩。水四升。煮二升。分服。（千金方）

㊆治霍亂煩悶。蘆根三錢。麥門冬一錢。水煎服。（千金方）

㊇治霍亂腹腫。蘆根一升。生薑一升。橘皮五兩。水八升。煎三升分服。（太平聖惠方）

㊈治食狗肉毒。心下堅積。或腹脹口乾。忽發熱妄語。蘆根煮汁服。（梅師方）治中馬肉毒。（聖惠方）亦治鯇鯉魚毒。亦治食蟹中毒。亦治中藥箭毒。（千金方）

用量 五錢至一兩。

施用宜忌 凡中寒而無火者禁用。

著名方劑 葦莖湯。治咳。有微熱煩滿。胸中甲錯。是爲肺癰。（千金方）葦莖二升。薏苡仁半升。桃仁五十粒。瓜瓣半升。上四味。以水一斗。煮葦莖。得五升。去滓。納諸藥。煮取二升。服一升。再服。當吐如膿。

參攷資料 ㊀按雷公炮炙論序云。益食加觴須煎蘆朴云。注用逆水蘆根。并厚朴二味等分。煎湯服。蓋蘆根甘能益胃。寒能降火。故也。（李時珍）㊁按毛萇詩疏云。葦之初生曰葭。未秀曰蘆。長成曰葦。葦者偉大也。蘆者色盧黑也。葭者嘉美也。（李時珍）㊂蘆根生下溼地。葦葉似竹。花若蕙。花名蓬蘽。二月八月採根日乾用。（蘇恭）㊃今在處有之。生下隰陂澤中。其狀都似竹而葉抱莖生。無枝。花白作穗。若茅花根。亦若竹根而節疎。其根取水底味甘辛者。其露出及浮水者並不堪用。按郭璞注爾雅云。葭卽蘆也。葦卽蘆之成者。熒氂似葦而小中實。江東呼爲蔗（音邱）或謂之蘸。卽蘇也。至秋堅成。卽謂之萑（音桓）。兼似萑而細長。高數尺。江東謂之蒹。其花皆名芳。（音調）其萌皆名蘿。堪食。如竹筍。若然則蘆葦通爲一物也。所謂蒹乃

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

今作簾者是也。所謂茨者。今以當薪者是也。而人罕能別蕠茨與蘆葦也。又北人以葦與蘆爲二物。水旁下濕所生者皆名葦。其細不及指大。人家池圃所植者皆名蘆。其幹差大深碧色者亦難得。然則蘆葦皆可通用矣。（蘇頌）㊀蘆有數種。其長丈許。中空皮薄色白者謂也。蘆也葦也。短小於葦而中空皮厚色青蒼者。茭也。薍也。荻也。萑也。其最短小而中實者。蕠也。皆以初生已成得其名。身皆如竹。其葉皆長如箬葉。其入藥性味皆同。其未解葉者。古謂之紫籜。（李時珍）㊁入陽明。清熱下降。筍性更佳。能解河豚毒。按根亦能解魚蝦蟹河豚毒。葦莖形如肺管。甘涼清肺。葦莖即蘆之莖也。（顧松園）㊂

別錄止載蘆根。而不及葦莖。大率生水中者。多與水爲事。其根能啓水精上溢。治消渴客熱。則其莖必係導熱痰下流。而治肺癰矣。凡有節之物。能不爲津液隔閡者。於津液之隔閡而生患害。尤能使之通行。此千金所以有葦莖湯歟。（鄒潤安）

【蘆莖葉】

性質　甘。寒。無毒。

主治　霍亂嘔逆。肺癰。煩熱。癰疽。燒灰淋汁煎膏。蝕惡肉。去黑子。

歷代記述攷證　【南北朝】徐之才雷公藥對論蘆籜曰。籜治金瘡。生肉滅瘢。

配合應用　㊀治霍亂煩渴。腹脹。蘆葉一握。水煎服。又方。蘆葉五錢。糯米二錢。半竹茹一錢。水煎。入薑汁蜜各半合。煎兩沸。時時呷之。（聖惠方）

㊁治吐血不止。蘆荻外皮燒灰。勿令白。爲末。入蚌粉少許。研勻。麥門冬湯服一二錢。三服可救一人。（聖惠方）

㊂治肺癰。咳嗽煩滿。微熱。心胸甲錯。葦莖湯用葦莖切二升。水二斗。煮汁五升。入桃仁五十枚。薏苡仁、瓜瓣各半升。煮取二升。服。當吐出膿血而愈。（金匱方）

㊃治發背潰爛。蘆葉爲末。以葱椒湯洗淨。傅之。神效。（乾坤祕韞方）

㊄治癰疽惡肉。白炭灰、白荻灰等分。煎膏塗之。蝕盡惡肉。以生肉膏貼之。亦去黑子。此藥只可留十日。久則不效。（肘後方）

㊅治小兒禿瘡。以鹽湯洗淨。蒲灰傅之。（聖濟總錄方）

參攷資料　古方煎藥。多用勞水及陳蘆火。取其水不强。火不盛也。蘆中空虛。故能入心肺。治上焦虛熱。（李時珍）

【蘆粟】㊀即稷米之別名。詳『稷米』條。㊁即蜀黍之俗名。詳『蜀黍』條。

【蘆菔子】即萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊菔子』條。

【蘆筍】

古籍別名　蘆（綱目）

性質　微苦。冷。無毒。

主治　腸間客熱。止渴。利小便。解河豚及諸蟹毒。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論蘆筍曰。解諸肉毒。

施用宜忌　忌巴豆。

【蘆葩】即萊菔之古籍別名。典見爾雅。詳『萊菔』條。

【蘆菔子】即萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊菔子』條。

【蘆蔍】㊀即蜀黍之古籍別名。典見食物本草。詳『蜀黍』條。㊁即稷米之俗名。詳『稷米』條。

【蘆薈】

命名　蘆黑色也。薈聚也。本品木之脂液凝集色黑如飴。故名。俗呼爲象膽。以其味苦如膽也。

處方用名　眞蘆薈。洋蘆薈。

古籍別名　蘆會。奴會（開寶）訥會（拾遺）。象膽（俗名）。鬼丹。（和漢藥考）

外國名稱　Aloë（拉丁）（德）Aloes.（英）

基本　鐵刺百合科蘆薈族植物之葉。煎熬其所滲出之液汁。製成越幾斯質之蘆薈。

產地　蘆薈產索哥德拉、及巴巴豆好望角等處。近日恒用者。以索哥德拉所產爲上品。功用瀉劑、殺蟲。調經。開胃。動膽汁。又名象膽。由梟喇吉打運來。和漢藥考曰。亞拉伯之蘇哥篤拉島。西印度之巴魯篤巴多斯島。非洲之喜望峯等熱帶地方均產之。

形態　蘆薈爲香木類。係常綠灌木。木葉大而尖。肉質有銳鋸齒。花成穗狀。其葉分泌之脂色黑有光。爲透明或半透明之固塊。其色

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



蘆薈

或黑或暗綠。質堅硬脆弱。研碎之。則成爲黃色或褐色之粉末。沸湯及溫酒精均能溶解。熱灼之初膨脹。繼放明焰而燃燒。氣味頗惡。有苦味。

性質　苦。寒。無毒。

成分　爲蘆薈素（Aloin）越幾斯樹脂等。蘆薈素（$C_{35}H_{36}O_{14}H_2O$）爲蘆薈之有效成分。係淡黃色結晶體。有蘆薈特有之臭氣。味初甘而後苦。冷水難溶。熱湯及酒精易溶。

效能　清疳熱。殺蟲積。能興起大腸蠕動。故有瀉下功效。並能助胃之消化。故用作瀉劑及健胃苦味劑。此外又用作通經藥。並治習慣性便祕經閉。

作用　入胃後能促進胃液分泌增加。使消化增強。至腸能激腸之蠕動加速。黏膜之分泌驟加。令積糞泄出由腸壁而達血中。則血亦受激而循環迅速。而使子宮之充血尤爲有效。故可治一切經閉及衰弱之症。

主治　熱風煩悶。胸膈間熱氣。明目鎭心。小兒癲癎驚風。瘰五疳。殺三蟲及疳病羸瘦。解巴豆毒。

歷代記述弦鑒　【唐】李珣海藥本草論蘆薈曰。主小兒諸疳熱。【唐】甄權藥性本草論蘆薈曰。單用殺疳蚘。吹鼻殺腦疳。及除鼻瘡。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蘆薈曰。研末傅齲齒甚妙。治溼癬出黃汁。【明】繆希雍本草經疏論蘆薈曰。蘆薈味苦。其氣寒。其性無毒。寒能除熱。苦能泄熱燥溼。苦能殺蟲。至苦至寒。故爲除熱殺蟲之要藥。其主熱風煩悶。胸脇間熱氣。明目鎭心。小兒癲癎驚風。瘰五疳殺三蟲者。熱則生風。熱能使人煩悶。熱除則風熱煩悶及胸膈間熱氣自解。涼肝故明目。除煩故鎭心。小兒癲癎驚風。熱所化也。五疳同爲內熱脾胃停滯之證。三蟲生於腸胃。溼熱疳病羸瘦。亦皆溼熱下客腸臟。致血凝滯之所生。故悉主之。能解巴豆毒。亦除熱之力也。詳其功用。是足厥陰足太陰二經藥。亦可兼入手少陰經。【清】黃宮繡本草求眞論蘆薈曰。蘆薈大苦大寒。功專殺蟲。除疳。安心明目。最爲小兒驚癎疳積上品。且能吹鼻殺腦疳及除鼻瘡。然苦雖能殺蟲。寒能瘳熱。而氣甚穢惡。僅可施之藥丸及體質强健者。若胃虛少食人得之。入口便大吐逆。遂致奪食瀉泄。因而羸瘦怯弱者多多矣。如黑錫丹色絲者眞。

國外學說　日本學說謂蘆薈者。產於喜望峯地方 Aloë 屬之諸種也。日本藥局方亦記載之。本品之主成分爲「アロイン」。下泄。通經。健胃之藥也。服少量。能增加食物催進消化。用爲下劑。則於六時至十二時後奏效。有噯氣胃部壓重腹痛等。此際雖達於小骨盤內之臟器。然不害消化。不留便祕。常食亦無習慣之性。因是於慢性便祕適用之。又爲通經藥。於月經閉止。痔血閉止。以下劑量與之。爲誘導下劑。於腦充血肺充血用之。又或用少量。爲健胃藥。若用大量。則起嘔氣。嘔吐腹病。下利。直腸子宮腎之充血。因是患子宮出血。痔出血。尿意頻數。流產。春情亢進等症。亦有之。且能使膽汁。腸液。乳汁之分泌增加。腸之蠕動亢進。甚有發炎性者。本品者爲散布藥。則於弛緩性潰瘍用之。又有於眼病用之者。用量。健胃則用〇、〇一至〇、〇五爲下劑。則用〇、二至一、〇「アロイン」用量。內服〇、一至〇、二四。可爲蘆薈之代用品。爲皮下注入。亦有下劑之效。卽以一分與佩里設林（甘油）八分之比例溶解者。注入一筒至二筒。（日本藥局方藥物學綱要）又和漢藥考曰。蘆薈種類甚多。其中供藥用者。有巴倍屯昔斯蘆薈（Aloe barbadensis）蘇哥篤里那蘆薈（Aloe socotrina.）歇巴吉加蘆薈（Aloe hepatica.）加邊昔斯蘆薈（Aloe capensis.）等。但普通則分爲透映蘆薈（Aloe lucidae）及肝蘆薈（Aloe hepaticae）二種。英美學說謂蘆薈爲瀉藥。專瀉大腸。如食小服則爲補藥。食大服則爲瀉藥。醫士或以爲能感動肝。又如腸內功用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不靈。因膽汁太少之故。則可代膽汁之用。其力似能感動大腸而最易感動肛門。因此令大便能通。設或已有憩動或有痔瘡。則此爲有弊。依此法亦能感動其相近之各處。因此可爲調經藥。又如讀書辛勞。頭痛便祕。婦人腰脊骨痛。月經不行。並宜服此藥。第不宜過服。過服則令肛門痛熱。至孕婦及生痔。與大小腸有炎症。則不宜服。其功用又能驅蟲。開胃。治經脈不調。腸膜核痞。經閉便燥。飯不消化。外用能作射水。助瀉驅蟲。

近人學說　顧子靜曰。蘆薈有兩種。(一)爲喜望峯地方所產。百合科植物蘆薈屬諸種肥厚肉狀之葉。榨取其津汁。煎至濃稠。成暗褐色之塊。易於破碎。其碎面呈貝殼狀。有玻璃狀光澤。邊緣透映視之。呈類赤色或淡褐色。粉碎之成黃色無晶形粉末。有特異之臭氣。與極苦味。難溶解於冷水。入二倍之沸湯中。殆成透明之溶液。是所謂透明蘆薈也。主成分爲阿路愛蘿。有强瀉下作用。并含多量弱瀉下性之蘆薈脂。此外更具沒食子酸、蛋白質狀物質、脂肪等。(二)爲東西印度地方所培植之蘆薈屬植物。製成不透明之塊。是稱肝狀蘆薈。含少量之阿路因。無光澤。色黃褐乃至黑褐。粉末爲橙黃色乃至褐色。此外之性質及成分。與透明蘆薈無異。蘆薈之作用。其少量自三毫至一釐五毫。能興奮食慾。促進消化。但不甚確實。稍大量。自三釐至一分三釐發生噯氣。胃部壓重。服用後經十時至十五時。排粥狀暗色便數次。時或腹痛。其三倍量卽四分。通利較速。排泄液便。腹痛極强。併發裏急後重。但瀉下量因人而異。瀉後毫無便祕之患。久用大量。則下腹臟器易至充血。以腎臟與在小骨盤腔內之直腸并生殖器之血管爲甚。因此誘起子宮出血。尿意頻數。痔疾。痔出血等症。少量久用。亦直腸血管擴張。難於回復。成爲痔疾。是由蘆薈之直接刺戟直腸也。蘆薈之醫療應用。最常用者爲瀉下藥。尤適於常習便祕。可以久服。以無須增大用量也。但有出血之傾向者。(如痔疾、月經期、慢性子宮病、妊娠等)皆當禁用。

配合應用　㈠治小兒諸疳。用蘆薈、厚朴、橘紅、甘草、青黛、無黃、百草霜、旋復花爲末。以砂仁湯吞。一歲一分。甚效。㈡治脾疳。蘆薈、使君子等分爲末。每服一二錢。米飲調下。(衛生易簡方)

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡脾胃虛弱者禁用。

著名方劑　㈠更衣丸。治津液不足。大便不通。(古方)蘆薈七錢(研細)、硃砂五錢(研如飛麵)。滴好酒少許。和丸每服一錢。重至三錢。酒下。㈡當歸龍薈丸。治肝經實火。大便祕結。小便澁滯。或胸脇作痛。陰囊腫脹等症。(古方)當歸、龍膽草、黃連、黃芩、梔子仁各一兩。大黃、蘆薈、青黛各五錢。木香二錢半。麝香五分。(另研)上爲末。炒神麴糊丸。每服二十丸。薑湯下。

參攷資料　㈠唐劉禹錫傳信方云。予少年嘗患癬。初在頸項間。後延上左耳。遂成溼瘡浸淫。用斑蝥、狗膽、桃根諸藥。徒令蝨蟲其瘡轉盛。偶于楚州賣藥人敎用蘆薈一兩。炙甘草半兩。研末。先以溫漿水洗癬。拭淨。傳之。立乾便癒。眞神奇也。(蘇頌)㈡蘆薈生波斯國。狀似黑餳。乃樹脂也。(李珣)㈢今惟廣州有來者。其木生山野中。滴脂滴而成。採之不拘時月。(蘇頌)㈣蘆薈原在草部藥譜及圖經所狀。皆言是木脂。而一統志云。爪哇三佛齊諸國所出者。乃草屬。狀如鱉尾。採之。以玉器搗成膏。與前說不同。何哉。豈亦木質草形乎。(李時珍)㈤蘆薈爲蘆薈族植物。種類頗多。其形狀亦因之而有差異。亞拉伯蘇哥篤拉島(A. socotorina, L.)所產之蘆薈。莖作單圓柱狀。時亦有分岐者。高可四五尺。葉扁平。仰肉質。叢生於莖之枝端。作藍綠色。披鍼形。上有白斑。邊緣有短刺。刺以鑽刺葉則滲出苦味液汁。謂之蘆薈汁。第四版改正日本藥局方曰。蘆薈係從其葉採取液汁煎成。爲暗褐色之固塊。質脆易碎。碎片透明。作貝殼狀。現銳稜。有類似玻璃之光澤。置顯微鏡下觀之。見並非結晶。氣味特異。有苦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

味。本品加哥羅仿姆（Chloroform）麥沸或加伊打（Ether）祇稍呈類黃色將其伊打液蒸發則遺下少許黃色著黏性殘渣又用熱湯溶化加硼酸鈉濃液則呈綠色之螢石光彩（和漢藥考）。

【蘆薈】**命名**　卽蘆薈外之皮。

性質　苦寒無毒。

效能　生肉滅癜。

主治　金瘡。

【蘆蠹蟲】**命名**　本品卽生於蘆稈節中之蠹蟲故名。

形態　蘆蠹蟲爲化生蟲類之一種狀如小蠶可供藥用。

性質　甘寒無毒。

主治　小兒飲乳後吐逆不入腹取蟲二枚煮汁飲之嘔逆與喫乳不同乳飽後喫出者爲喫乳也。

【蘇】卽紫蘇之原名詳『紫蘇』條。

【蘇子霜】卽紫蘇子之處方用名詳『紫蘇子』條。

【蘇方木】卽蘇木之古籍別名。典見唐本草詳『蘇木』條。

原名　蘇方木。

【蘇木】**命名**　本品產於海島之蘇方國故名後世簡稱爲蘇木。

古籍別名　木中尊（綱目）蘇方木（唐本草）多邦蘇枋巴勝虎（和漢藥考）

外國名詞　Sapan-wood.（拉丁）（Sappon wood.）（英）

基本　屬豆科爲蘇枋之樹幹。

產地　陳仁山藥物生產辨云蘇木產中亞美利加與西印度羣島等處東印度暹羅等處亦有出。

形態　蘇枋爲熱帶地方所產之落葉喬木高達五丈餘葉作羽狀複葉其小葉作長橢圓形花爲美麗黃色蛾形花花後結黑實藥用及顏料去樹幹皮取赤色堅實之木部用之。



蘇木

製法　雷敎曰凡使去上粗皮并節若得中心文橫如紫角者號曰木中尊其力倍常百等須細剉重搗拌細梅樹枝煮之從巳至申。用藥法象論蘇木曰破猶瘀死血。陰乾用。

用法　水煮或酒浸或剉末用。

性質　甘鹹平無毒。

成分　含有 Tannic acid $C_{14}H_{10}O_2(2H_2O)$, Fixed Oil, 樹脂, 纖維, 糖素。

效能　祛瘀止痛和血散風用作清血藥。

作用　在胃時微有制酵之功。入腸能促進腸之斂性同時又能減少腸之分泌入血後能收縮發炎之微血管。

主治　破血產後血脹悶欲死者水煮五兩取濃汁服。

歷代記述致證　【唐】陳藏器本草拾遺論蘇木曰霍亂嘔逆及人常嘔吐用水煎服。【唐】李珣海藥本草論蘇木曰虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安心腹攪痛及經絡不通男女中風口噤不語並宜細研乳頭香末方寸匕以酒煎蘇方木調服立吐惡物瘀。【宋】大明諸家本草論蘇木曰婦人血氣心腹痛月候不調及辛勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人失音血噤產後敗血。【明】繆希雍本草經疏論蘇木曰蘇木味甘鹹氣平無毒好古加辛降多於升陽中陰也入足厥陰兼入手少陰足陽明經凡積血與夫產後血脹悶欲死無非心肝二經爲病此藥鹹主入血辛能走散敗濁瘀積之血行則二經清寧而諸證自愈日華子主婦人血氣心腹痛月候不調及辛勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人失音血噤海藥主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不盡心腹攪痛及經絡不通悉取其入血行血辛鹹消散。亦兼有輭堅潤下之功故能祛一切凝滯留結之血婦人產後尤爲所須耳【清】黃宮繡本草求眞論蘇木曰蘇木甘鹹辛涼功用有類紅花少用則能和血多用則能破血但紅花性微溫和此則性微寒涼也故凡病因表裏風起而致血滯不行暨產後血暈腹滿以死及血痛血癥經閉氣壅癰腫跌撲損傷等症皆宜相症合以他藥調治如疎風則與防風同用行血則與乳香同用但性本疎泄產後惡露已盡大便不實者均應禁用出蘇

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

方交愛。

國外學說　英美學說謂蘇木又名赤木。產東印度海島等處。而暹羅國等處亦產之。其木心可爲藥品。內含一精卽巴宇林。其醫治作用。與洋蘇木同。能收斂。而其力則較遜。爲收斂藥。補藥。如日久痢症。服之能治。惟患紅痢及當身熱。則未可遽服。又如患白帶可以內服。及用藥水節射入陰戶此藥爲收斂藥中不可少之藥。惟服後則糞色多屬黑。其功用又能治積滯。胃弱。久瀉。內部血出。處方用蘇木一兩。勞碎。肉桂九分。六釐二毫半。研末。汽水二十兩。先將蘇木入銅鍋內。或用磁鍋亦可。惟鐵器則忌用。熬十分鐘。將畢。加肉桂末調勻。濾渣。再用汽水淋渣。足二十兩爲度。每服一兩至二兩。（蘇木煑水方。）又用蘇木一分。碎屑。沸汽水十分。浸一天。入鍋熬至一半。濾渣。再入煑鍋散氣成膏。爲度。治久瀉久痢。每服一分七釐半至五分二釐半。（蘇木膏方。）又用蘇木煑水足一兩。石灰水三錢一分半。共和勻。爲度。作一服。治瘧病之泄瀉。吐血。（蘇木勻水方。）

配合應用　㈠治產後血暈有神。用蘇木。澤蘭。川芎。麥門冬。生地。黃。蒲黃。人參。童便。益母草。牛膝。黑豆。荊芥穗。

㈡治產後兒枕作痛。用蘇木。山查。延胡索。牡丹皮。澤蘭。當歸。五靈脂。赤芍藥。紅花。加入乳香。沒藥。治產後血辭不淨。因寒而得者。加炒黑乾薑。桂各少許。

㈢治婦人月候不調。用蘇木。延胡索。牡丹皮。牛膝。當歸。地黃。芍藥。續斷。煎濃。汁。加入乳香。沒藥。血竭。自然銅。蜜蟲。麻皮灰。黃荊子等末。量病輕重。調服四五錢。治跌撲損傷如神。

㈣治產後血暈。蘇方木三兩。水五升。煎取二升。分服。

㈤治產後氣喘。面黑欲死。乃血入肺也。用蘇木二兩。水二碗。煑一碗。入人參一兩。服。隨時加減。神效不可言。（胡氏方）

㈥治破傷風病。蘇方木爲散三錢。酒服立效。名『獨聖散』（普濟方）

㈦治脚氣腫痛。蘇方木。鷺鷥藤等分。細剉。入定粉少許。水二斗。煎一斗五升。先熏後洗。（普濟方）

㈧治偏墜腫痛。用蘇方木二兩。好酒一壺。煑熱。頻飲。立愈。（集簡方）

㈨金瘡接指。凡指斷及刀斧傷。用眞蘇木末。敷之外。以靈藺包縛完固。數天如故。（攝生方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無瘀滯者。禁用。忌鐵。石灰。火。

參攷資料　㈠蘇木性涼。味微辛。養散表。裏風氣。宜與防風同用。又能破死血。產後血腫脹滿欲死者宜之。張元素㈡蘇方木乃三陰經血分藥。少用則和血。多用則破血。（李時珍）㈢蘇方木。自南海崑崙來。而交州。愛州亦有之。樹似槐。羅葉若榆葉而無澀。抽條長丈許。花黃。子青熟黑。其木入用染絳色。（蘇恭）㈣按徐表南州記云。生海畔。葉似絳。木若女貞。（李珣）㈤按裕舍南方草木狀云。蘇方樹類槐。黃花黑子。出九眞。煎汁忌鐵器。則色黯。共木蠹之糞。名曰紫納。亦可用。暹羅國人。賤用如薪。（李時珍）

【蘇木中沙】　原名　蘇枋木　中沙。

古籍別名　天成沙。（綱目拾遺）

採取　劈蘇木中取之。但難得。須囑染坊家收存入藥用。

主治　卒心痛。溫酒服。

【蘇木紅】　卽山牛膝之古籍別名。典見綱目拾遺詳『山牛膝』條。

【蘇冬】　卽麥門冬之俗名。詳『麥門冬』條。

【蘇半夏】　**製法**　取頂上半夏十斤。泡清水兩日。每日換水三次。第三日用白礬二兩。生鹽三錢。用滾水溶化。待水涼凍時。卽用此水浸半夏。每四日照法換水一次。以七次爲度。共二十八日。取起曬至五成乾。再用橘紅二兩。陳皮一兩。蘇子二兩。礞石二兩。北味一兩。花粉二兩。杷葉二兩。白前一兩。煎水多少。以漬勻此半夏爲度。曬乾。刮去皮用之。此方原用白礬二兩。朴硝二兩。煎水泡七次。每次七日。共泡四十九日。仍取起曬乾。惟浸至四十九日。每嚼之無味。性之不存。痰何能去。故改轉浸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

二十八日爲適宜。所以用白礬朴硝者。因不用白礬則牛夏卽全用白礬則製起牛夏太實。是以用朴硝佐之。使牛夏不太實。但朴硝入瀉類。不適於用。故將朴硝刪去。轉用生鹽三錢。佐白礬煎水浸之。生鹽亦有除痰之功。寧使其實。亦不如朴硝之瀉也。

主治　除澀。化痰。止嘔。

【蘇伐羅】卽金之古籍別名。典見綱目。詳『金』條。

【蘇合油】卽蘇合香製成之油之處方用名。詳『蘇合香』條。

【蘇合香】**命名**　本品出自蘇合國。故名。

處方用名　蘇合油。

古籍別名　合香（檀香亦一名合香）。帝香。蘇香。楓脂香。（和漢藥考）

外國名詞　Storax（拉丁）（英）（德）

基本　係金縷梅科。爲楓屬蘇合香樹幹內皮所煎出之香膏。

產地　概產於小亞細亞及波斯諸地。

形態　蘇合香樹爲落葉喬木。高達四丈餘。枝柯繁茂。葉作掌狀。邊緣有鋸齒。花爲長圓形頭狀花。開於葉腋。果實爲球形。中藏有扁平種子。蘇合油爲柔軟膠質之濃稠液體。透明而褐色。但含有水氣時。則渾濁而作灰色。較水爲重。溶於伊打哥羅仿。姆。硫化炭等。清香如香膏。味苛辣。



蘇合香

製法　由蘇合香樹中膠汁製成。勿經火。

性質　甘。溫。無毒。

成分　爲司吉諾兒（Styrol）。司吉拉辛（Styracin）。桂皮酸。樹脂等。

效能　通竅。解鬱。辟穢。祛痰。用作衝動性祛痰藥。又爲疥癬塗擦藥。

作用　在胃中僅自行分解。然不起何等作用。至腸次第被吸入血中。能使血行增速。并能激氣管神經。使分泌液透出。

主治　辟惡。殺鬼精物。溫瘧蠱毒。癎痙。去三蟲。除邪。令人無夢魘。久服通神明。輕身長年。

歷代記載攷證　【明】李士材本草圖解論蘇合香曰。蘇合香甘溫。芳香氣竄。通達諸竅。流行百骸。故其主治能辟邪殺鬼。止魘截瘧。【清】黃宮繡本草求眞論蘇合香曰。蘇合香味甘氣溫。出於天竺。崑崙諸國。安南三佛齊亦皆有之。治能辟惡殺鬼。凡溫瘧蠱毒癎痙。並痰積氣厥。山嵐瘴溼。襲於經絡。塞於諸竅者。非此不除。按香皆能辟惡除邪。此合諸香之氣。煎就而成一物。其通竅逐邪。殺鬼通神。除魘絕瘧。祛蠱。宜其然矣。以筋挑起。懸絲不斷者。眞。但血燥氣弱者勿用。

國外學說　日本學說謂流動蘇合香。供藥用時。爲褐色混濁之黏稠液。溶解於酒精中。於防腐殺下等動物之性。因刺戟性少。且價廉。故與等分或倍量之阿列布油混和。或與百露拔爾撒母相混。治疥癬等甚效。或爲防腐性被覆藥。於火傷凍傷潰瘍外用之。又日本藥局方曰。流動蘇合香。係煎蘇合香樹（Liquidambar orientalis, mill.）內皮。壓搾而得。爲灰色黏稠液。有佳香。入水下沉。水面僅有無色油滴浮動。（中略）精製之法。用流動蘇合香於重湯煎上溫熱。除去水氣大半。乃溶於等量酒精。濾過蒸發。使成稠厚越幾斯。本品爲褐色黏稠物質。薄層澄明。溶於等量酒精。澄明溶化。多量則變溷濁。逢伊打。硫化炭。偏蘇爾等。祛略留絮狀物質而溶化。又和漢藥考曰。蘇合香有數種。一爲外面黃赤色。作顆粒狀者。有脂氣。二爲雜有前者之小塊。呈淡褐色。易磨碎。投入水中。其香彌佳。三爲輕質巨塊。混有污物。品最下。四爲蘇合香。卽今之流動蘇合香。又曰司吉諾兒（Styrol C_8H_8）爲無色揮發性液體。比重八〇・九二四。約於攝氏一百三十五度沸騰。蘇合香之香氣。卽從此物發出。司吉拉辛（Styracin $C_9H_9O_2C_9H_{11}$）通常爲羽狀結晶體。時或爲油狀。伊打善能溶解。酒精則稍能溶解。

辨僞　蘇合香色微綠如雉斑者良。微黃者次之。紫赤者又次之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以簪挑起。徑尺不斷如絲。漸風起如鉤者爲上。以少許擦手心。香透手背者眞。按蘇合香爲開透關竅。興奮機能。辟惡達鬱之宣品也。

配合應用　治水氣浮腫。蘇合香、白粉、水銀、等分。搗勻。煉蜜爲丸。小豆大。每服二丸。白湯下。當下水出。(肘後方)

用量　五滴至八滴。或一分至五分。

施用宜忌　凡陰虛火旺。及氣虛多痰者禁用。忌火。

著名方劑　蘇合香丸。療傳屍骨蒸殗瘵。痎忤。鬼氣。卒心痛。霍亂吐利。時氣瘴癘。赤白暴利。瘀血月閉。痃癖。丁腫。鷘瘤。小兒吐乳。大人狐狸等疾。(局方)蘇合香油五錢。(入安息香內)安息香一兩。(另爲末用無灰酒半斤熬膏)丁香、青木香、白檀香、沉香、薰陸香、附子、訶子。(煨去肉)烏犀角、硃砂。(水飛)各一兩。薰陸香、片腦。(研)各五錢。麝香七錢半。上爲細末。入安息香膏。煉蜜和劑。圓如芡實大。每四丸。空心用沸湯化下。溫酒下亦得。

參攷資料　㈠蘇合香氣竄。能通諸竅臟腑。故其功能辟一切不正之氣。按沈括筆談云。太尉王文正公。氣羸多病。宋眞宗面賜藥酒一銼。令空腹飲之。可以和氣血。辟外邪。公飲之大覺安健。次日稱謝。上曰。此蘇合香酒也。每酒一斗。入蘇合香丸一兩。同煮。極能調和五臟。卻腹中諸疾。每冒寒夙興。則宜飲一盃。自此臣庶之家。皆倣爲之。比方盛行於時。其方本出唐玄宗開元廣濟方。謂之白米丸。後人亦編入千金外臺。治疾有殊效。(李時珍)㈡今從西域及嶲崱來。赤紫色。與紫眞檀相似。堅實。極芳香。性重。如石。燒之灰白者好。(蘇恭)㈢今廣州雖有蘇合香。但類蘇木。無香氣。藥中只用如膏油者。極芬烈。陶隱居以爲獅子矢者。亦是指此膏油者言之。爾雅、梁書云。中天竺國出蘇合香。是諸香汁煎成。非自然一物也。又云。大秦國人採得蘇合香。先煎其汁。以爲香膏。乃賫其漳與諸國賈人。是以展轉來達中國者。不大香也。然則廣南貨者。其經煎煑之餘乎。今用如膏油者。乃合治成者爾。(蘇頌)㈣按賓宇志云。蘇合油出安南三佛齊諸番國。樹生膏。可爲藥。以濃而無滓者爲上。葉廷珪香譜云。蘇合香油出大食國。氣味皆類篤耨者。沈括筆談云。今之蘇合香。赤色如堅木。又有蘇合油如飴膠。人多用之。而劉夢得傳信方言。蘇合香多薄葉子如金色。按之卽少。放之卽起。良久不定。如蟲動氣烈者佳。如此則全非今所用者。宜精考之。竊按沈氏所說。亦是油也。不必致疑。(李時珍)㈤蘇合香聚諸香之氣而成。能透諸竅臟。辟一切不正之氣。凡痰積氣厥。必先以此開導。治痰以理氣爲本也。凡山嵐瘴溼之氣。鬱於經絡。拘急弛緩不均者。非此不能除。(張石頑)

【蘇迄米羅細】卽草豆蔻之古籍別名。典見金光明經。詳『草豆蔻』條。

【蘇枋】卽蘇木之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘇木』各條。

【蘇枋木中沙】卽蘇木中沙之原名。詳『蘇木中沙』條。

【蘇芳花】卽紫荊花之日本名。詳『紫荊』條。

【蘇香】卽蘇合香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘇合香』條。

【蘇家三七】卽昭參之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『昭參』條。

【蘇密那子】卽覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳『覆盆子』條。

【蘇梗】　**主治**　下氣。較蘇子稍緩。虛者宜之。

歷代記述攷證　【清】吳儀洛　本草從新論蘇梗曰。順氣安胎。

辨僞　㈠鄭肖巖曰。蘇梗卽紫蘇旁枝小梗。紫原云。氣味辛平無毒。主寬中行氣。消飲食。化痰涎。治噎膈。反胃。止心腹痛。通十二經。關竅脈絡。近市肆有一種白蘇梗。卽白蘇之梗。旣去白葉。無從辨識。葉色旣殊。梗性自別。不堪入藥。用者愼之。㈡曹炳章曰。按紫蘇江浙皆出。葉梗空心。葉雙面皆紫。有皺摺紋。如鷄冠者。故名鷄冠紫蘇。味辛。氣甚香。爲最佳。又一種綠方梗。葉上面綠下面紫。香味較淡薄。俗名單面紅紫蘇。略次。又有一種野生田野。方梗綠葉。惟葉筋紫。氣微香而濁。俗爲野紫蘇。最次。不入藥。乃

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蘇梗多屬野蘇之梗。蓋鷄冠蘇梗在五月間。連葉帶梗嫩時割取。以作蘇葉。其梗未老已收。祇可作蘇梗之用。惟野蘇其葉不採藥用。任其留存至九月間收子。以作蘇子。拔根以作蘇梗。其實乃野蘇之梗。皆不道地。

【蘇梗】　卽紫蘇之處方用名。詳『紫蘇』條。

【蘇葉】　卽紫蘇之處方用名。詳『紫蘇』條。

【蘇鐵】　卽無漏子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『無漏子』條。

【蘑菇】　古籍別名　蘑菰蕈。肉蕈（綱目）雞腿蘑菰羊肚菜（俗名）

性質　甘。寒。無毒。

主治　益腸胃。化痰理氣。

歷代記述攷證　【明】黃宮繡本草求眞。論蘑菰曰。蘑菰本於桑楮諸木。埋於土中。澆以米泔而生。味甘氣寒。色白柔輭。中空。狀如未開玉簪花。品又有形如羊肚蜂窠眼。故又有別其名曰羊肚菜。味甘如鷄。故又有別其名曰鷄腿菰。皆與香蕈諸菰同爲一類。但香蕈色白而平。蘑菰則色白而寒也。香蕈能益胃氣不飢。及治小便不禁。蘑菰則能理氣化痰。而於腸胃亦有功也。然皆體潤性滯。多食均於內氣有阻。而病多發。不獨蘑菰然也。【清】王士雄隨息居飲食譜。論蘑菰曰。蘑菰甘涼。味極鮮美。蕈素皆宜。開胃化痰。燠而無砂者。勝多食發風動氣。諸病人皆忌之。

參攷資料　㊀蘑菰有毒。動氣發病。不可多食。（正要）㊁蘑菰出山東淮北諸處。埋桑楮諸木於土中。澆以米泔。待菰生採之。長二三寸。本小末大。白色柔輭。其中空虛。狀如未開玉簪花。俗名雞腿蘑菰。謂其味如雞也。一種狀如羊肚。有蜂窠眼者。名羊肚菜。（李時珍）

【蘑菰蕈】　卽蘑菰之古籍別名。典見綱目。詳『蘑菰』條。

【蘋】　古籍別名　水花。（拾遺）四葉菜。（唐言）田字草。白蘋。破銅錢。（綱目）水廉。（吳普）

外國名詞　Marsilia quadrifolia, L.（拉丁）デンジサウ　ヨッバウキクサ（日本）

基本　係蘋科蘋屬爲蘋莖葉。

產地　生池澤淺水間。

形態　蘋爲水草類隱花植物類之多年生草本。莖柔細長。深入水底。抽出長柄之葉。上浮水面。葉爲四片合成。狀如田字形。狀夏開小白花。葉柄下部。特生小枝。着以囊狀體之胞子。大如豆而實堅。其莖葉可供藥用。



蘋

採取　三月間採之。日乾用。

性質　甘。寒。滑。無毒。

主治　暴熱。下水氣。利小便。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺。論蘋曰。搗塗熱瘡。搗汁飲。治蛇傷毒。入腹內。曝乾。稻樓等分爲末。人乳和丸服。止消渴。

【蘋果】　原名　柰。

命名　柰字篆文。象子綴於木之形。故名。

古籍別名　平婆。（梵言）頻婆。色白者名素柰。色赤者名丹柰。朱柰。色青者名綠柰。冬熟者名冬柰。

（綱目）

外國名詞　Pirusmalus, L.（拉丁）リンゴ（日本）

基本　係薔薇科梨屬。爲蘋果之果實。

形態　蘋果爲果類之落葉喬木。一似林檎。樹身聳直。而葉色青。其果實如梨而圓滑。生青熟則紅色。或半紅。或半白。光潔可愛。香聞數步。其味甘鬆。未熟者。食之軟如棉絮。過熟則沙爛不堪。可供食與藥用。

性質　苦。寒。有小毒。

主治　補中焦諸不足。氣和脾。卒食飽。氣壅不通者。搗汁服。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼。論蘋果曰。益心氣。耐飢。

參攷資料　㊀蘋果甘。無毒。生津止渴。（正要）㊁蘋果多食。令肺壅臃腫。有病人尤甚。（別錄）

【蘺蒿】　古籍別名　莪蒿。蘿蒿。（爾雅）抱娘蒿。（綱目）

性質　辛。溫。無毒。

主治　破血下氣。煮食之。

參攷資料　㊀陸農師云。蘺之爲言也。高莪亦莪也。莪科高也。可

958／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以覆蠶。故謂之蘿。抱根叢生。故曰抱娘。(李時珍)㊁蘆蒿生高崗。似小薊宿根。先於百草。爾雅云。萩蘿是也。詩小雅云。菁菁者莪。陸璣注云。即莪蒿也。生澤國漸加處。葉似斜蒿而細科。二月生莖葉可食。又可蒸。香美。頗似蔞蒿。但味帶麻。不似蔞蒿香甘。(李時珍)

【蘑】㊀即知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。㊁即海藻之古籍別名。典見爾雅。詳『海藻』條。

【蘑菇】即知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『知母』條。

【蟒蟟】古醫別名　蟥蟒。(本經)肥蟒(別錄)乳齊。(陶弘景)地蠶。(郭璞)應條。(吳普)

形態　蟒蟟爲化生蟲類金龜子之幼蟲。其狀如蠶而大。身短節促。足長有毛。其背滾行。甚速如脚。生於樹根及糞土中者。外黃內黑。生舊茅屋土者。外白內黯。皆係溼熱之氣薰蒸而生。可供藥用。

採取　以出糞土中者入藥良。

製法　雷敩曰。凡收得後。陰乾。與糯米同炒。至米焦黑。取出去米。及身上口畔肉毛并黑厘了。作三四截。研粉用之。李時珍曰。諸方有乾研及生取汁者。又不拘此例也。

性質　鹹。微溫。有毒。

主治　惡血血瘀痺氣。破折血在脇下堅滿痛。月閉。目中淫膚青翳白膜。(本經)療吐血在胸腹不去。破骨蹉折血結。金瘡內塞。產後中寒。下乳汁。(別錄)

歷代記述　【唐】甄權藥性本草論蟒蟟曰。取汁滴目去翳障。主血止痛。【唐】陳藏器本草拾遺論蟒蟟曰。汁主赤白遊瘴。擦破塗之。【宋】日華諸家本草論蟒蟟曰。搗傅惡瘡。【宋】蘇頌圖經本草論蟒蟟曰。取汁點喉痺。得下即開。【明】李時珍本草綱目論蟒蟟曰。主唇緊口瘡。丹瘤。破傷風瘡。竹木入肉。芒物眯目。

近人學說　尤學周曰。蟒蟟治目翳。一見於本經。再見於藥性本草。而陳氏經驗方又引晉書盛沖母失明。其婢素有積恨。私以蟒蟟蒸熟食之。目宜復開。事爲證。一若蟒蟟之力。眞若暗室炬燈。可以大放光明者。及經施用。毫無實效。考其說之由來。實誤會孟子陳仲子章。遂以訛傳訛。後人復踵事增華。所致。陳仲子三日不食。耳無聞。目無見。乃饑餓太過。營養不敷。機能衰退之故。非目有疾患。食井上蟬李三咽。耳聞目見。乃得李充饑之效。與蟲無關。後人附會此說。(本經託名神農所作。實出於孟子之後)謂爲有去目翳之能。其說不足信也。

施用宜忌　惡附子。畏蠟爲之使。

參攷資料　㊀同豬蹄作羹食。甚下乳汁。(陶弘景)㊁張仲景治雜病。大蠶蟲丸方中用之。取其去脇下堅滿也。(蘇頌)㊂許學士本事方。治筋急。養血地黃丸中用之。取其治血瘀痺也。按陳氏經驗方云。晉書吳中書郎盛沖母王氏失明。婢取蟒蟟蒸熟與食。王以爲美。沖還知之。抱母慟哭。母目即開。與本草治目中青翳白膜。藥性論汁滴目中。去翳障之說相合。予嘗以此治人得驗。因錄以傳人。又按魯伯嗣嬰童百問云。張太丼傳治破傷風神效。方用蟒蟟。將黿脊背捏住。待口中吐水。就取抹瘡上。覺身麻汗出。無有不活者。子弟額上跌破。七日成風。依此治之。時間就愈。此又符療腰折。傳惡瘡。金瘡內塞。主血止痛之說也。蓋此藥能行血分。散結滯。故能治已上諸病。(李時珍)

【蠻珠】即眞珠之古籍別名。典見禹貢。詳『眞珠』條。

【蠔】即牡蠣之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牡蠣』條。

【蠔山】即牡蠣之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牡蠣』條。

【蠔甫】即牡蠣之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牡蠣』條。

【蠔蝦】即蝦之一種。產鹹水中。大者長五六寸。出水即死。其性質功用與對蝦同。詳『對蝦』條。

【蠟生丹水】即鼠姑之古籍別名。典見別錄。詳『鼠姑』條。

【蠢舍】即雀甕之古籍別名。典見本經。詳『雀甕』條。

【醴泉】命名　本品即地脈中泉水之精華也。味甘如醴。故名。

959／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　甘。平。無毒。

效能　除熱。止渴。

主治　心腹痛。反胃。霍亂。

【醴泉】卽口津之古籍別名。典見綱目詳『口津』條。

【鏽鐵衣】卽鐵鏽之處方用名。詳『鐵鏽』條。

【鐘乳】卽鐘乳石之簡稱。詳『鐘乳石』條。

【鐘乳石】命名　石之津氣鐘聚成乳。滴溜成石。故名。鐘乳。蘆。形象鵝管而空中。又稱鵝管石。

處方用名　鐘乳粉。鵝管石。

古籍別名　石鐘乳（本經）留公乳。蘆石。夏石（別錄）虛中。（吳普）黃沙石。（藥性）小靈石。乳公。乳竹乳。（和漢藥考）滴乳石。

外國名詞　Stalactite.（英）Stalaktite.（德）

基本　屬礦石類。爲乳狀之石塊。

產地　和漢藥考曰。石鐘乳生洞穴中。仰視石脈涌出處。則有乳牀。白如玉雪。石液融結成者。其乳牀下垂。如倒數峯小山。峯端漸銳。且長如冰柱。柱端輕薄。中空如鵝翎。乳水滴瀝不已。且滴且凝。此乳最精者。以竹管仰承取之。尤輕明如雲母。有爪甲者爲勝。中日各國多產之。下垂於石灰石洞穴中。乃一種極爲可觀之鑛石也。世界產此最聞名者。一爲美國之孟母斯洞。二爲澳州之亞台培克窟。三爲日本之武藏洞。陳仁山藥物生產辨云。中國產廣東新安。平海。汕尾等處。

形態　爲白色或灰白之冰柱狀鑛石。長短不一。其橫斷破碎面。有自中心向外作放線狀之條理。透明。質重。有時中空。凡含有炭酸之水。透過石灰質之地層。溶解爲炭酸石灰。此水自洞穴之上。滴瀝下降之際。接觸空氣。放散溶存之炭酸瓦斯。而析出結晶性之中性炭酸石灰。漸次下垂。凝結而爲冰柱狀。是爲鐘乳石。又其水滴瀝而下。再由下盤旋凝結而上。則爲石筍。亦稱石牀。鐘乳石可作盆玩。以供觀賞。

種類　㈠孔公藥。一名孔公石。次於鐘乳。狀如牛羊角。中有孔。附垂於石。如木之有萌蘖。㈡殷藥。一名薑石。生於石上。如木之蘖。亦盤結如薑。此卽孔公藥之根也。但似附石生而粗者。爲殷藥。接殷藥而生。由漸空通者。爲孔公藥。接孔公藥而生者。爲鐘乳。蓋殷藥如人之乳根。孔公藥如乳房。鐘乳如乳頭也。㈢石牀。一名乳牀。或稱逆石。亦作石筍。生石鐘乳掌中。鐘乳水滴下。凝結而生。巖如竹筍。久則漸與上乳相接爲柱。㈣石花。一名乳花。亦生鐘乳掌中。乳水滴石上。散如霜雪。日久積成如花者是也。㈤土殷藥。一名土乳。卽鐘乳石之生於山崖土中者。南方名山多有之。人亦掘爲石山。以供玩賞。不知其爲土鐘乳也。㈥鐘乳。中國日本多產之。其形如指。色白或褐。又如翅管。中空透明。輕虛者。名鵝管石。俱爲上品。形長大。質粗。中充實者。爲下品。㈦鐘乳石。生深山洞穴中。乳水滴凝如冰柱。其大者如柱。小者如筆管。㈧石乳者。其山洞純石。以石津相滋。陰陽交備。蟬翼紋成。其性溫。㈨竹乳者。其山洞逼生小竹。以竹津相滋。乳如竹狀。其性平。㈩茅山之乳者。其山遍生茅草。以茅津相滋爲乳。乳色稍黑而滑潤。其性微寒。

採取　二三月間採取。陰乾。

製法　雷敎曰。凡使石鐘乳。勿用頭粗厚併尾大者。爲孔公石不用。色黑及經大火鷄過。并久在地上收者。皆經藥物製者。並不得用。須要鮮明潭而有光潤者。以鵝翎個子爲上。有長五六寸者。凡修事法。鐘乳八兩。用沉香、零陵香、藿香、甘松、白茅各一兩。水煮過再煮汁。方用煮乳一伏時。漉出。以甘草、紫背天葵各二兩同煮。漉出拭乾。緩火焙之。入臼杵粉。篩過。入缽中。令有力少壯者二三人。不住研三日三夜。勿歇。然後以水飛澄過。絹籠於日中曬乾。入缽再研二萬遍。乃以甕盒收之。唐愼微曰。太清經鍊鐘乳法。取好細末。置金銀器中。瓦一片。密蓋勿令洩氣。蒸之。自然化作水也。

用法　研爲細末。成爲鐘乳粉。水煎或糊丸散。

性質　甘。溫。無毒。

成分　化學上謂之炭酸加爾

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

重鎮 $CaCO_3$。

效能　助陽。溫肺。化痰。用爲補陽藥。又用作眼科藥。

主治　咳逆上氣。明目益精。安五臟。通百節。利九竅。下乳汁。（本經）益氣補虛。損。療腳弱疼冷。下焦傷竭。強陰。久服延年益壽。好顏色。不老。令人有子。不練服之。令人淋。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論鐘乳曰。主泄精寒嗽。壯元氣。益陽事。通聲。【宋】日華諸家本草論鐘乳曰。補五勞七傷。【明】穆希雍本草經疏論鐘乳曰。石鐘乳稟石之氣而生。本經謂其味甘氣溫無毒。奚普曰。神農辛。斯言近之。甄權以爲有大毒。或是經火之故。應云忌甘辛。氣大溫。其性得火則有大毒。乃爲得之。其主咳逆上氣者。以氣虛則不得歸元。發爲斯證。乳性溫而鐵墜。使氣得歸元。則病自愈。故能主之也。通百節。利九竅。下乳汁者。辛溫之力也。療腳弱疼冷者。亦是陽氣下行之驗也。甄權主寒嗽通聲者。辛以散邪結。溫以祛寒氣。故也。其他種種補益之說。當是前人好事者溢美之辭。夷考其性。恐無是理。未足信也。【清】黃宮繡本草求眞論鐘乳曰。石鐘乳即鵝管石者是也。味辛而甘。氣溫質重。故凡咳氣上逆。腳弱冷痛。虛滑遺精。陽事不舉者。服此立能有效。以其氣不歸元。墜堅鎮虛。得此火不上浮。氣不下脫。而病俱可以愈耳。且以辛溫之力。又兼色白。故能通竅利乳。昔人取名鐘乳。即是此意。但金石性悍。服之陽氣暴充。形體壯盛。飲食倍進。得此肆淫。則精竭火爍。發爲癰疽淋濁。害不勝言。古有焚香透腸散。以治胸膈勞嗽痞滿之病。然暫用則可。久用恐損人氣。出洞穴中石液凝成。下垂如冰柱。通中輕薄如鵝翎管。碎之如爪甲光明者眞。煉合各如本方。【清】黃元御玉楸藥解論鐘乳曰。石鐘乳燥澀悍疾。治脾腎澀寒。遺精。吐血。腸滑。乳閉。虛喘。勞嗽。陽痿。聲啞。其功甚速。寒消澀去。食進氣充。特此縱欲傷精。陽根升泄。往往發爲消渴癰疽之證。固緣金石慓悍。亦因服者恃藥力而雕斲也。【清】張隱菴本草崇原論鐘乳曰。石鐘乳乃石之津液融結而成。氣味甘溫。主滋中焦之汁。上輸於肺。故治咳逆上氣。中焦取汁。奉心化赤而爲血。故明目。流溢於中而爲精。故益精。精氣盛則五臟和。故安五臟。血氣盛則百節和。故通百節。津液濡於空竅。則九竅自利。滋於經脈。則乳汁自下。

配合應用　㊀治廣瘡結毒。爛壞鼻梁。及陰蝕陽物。有神。石鐘乳得牛黃。白蠟。豕牙末。眞珠。乳香。沒藥。樺皮灰。龜板灰。俱存性。細研。枯白礬。蛀竹屑。紅鉛。

㊁鐘乳煎。治風虛勞損。腰脚無力。補益强壯。用鐘乳粉煉成者三兩。以夾絹袋盛之。牛乳一大升。煎減三之一。去袋飲。乳分二服。日一作。不吐不利。虛冷人微漉無所苦。一袋可煮三十度。力盡別作袋。每服訖。須濯淨令通氣。其滓和麵煨雞子食之。此崔尙書方也。（孫眞人千金翼方）

㊂焚香透腸散。治一切勞嗽。胸膈痞滿。用鵝管石、雄黃、佛耳草、款冬花等分爲末。每用一錢。安香爐上焚之。以筒吸煙入喉中。日二次。（宣明方）

㊃治肺虛喘急。連綿不息。生鐘乳粉光明者五錢。蠟三兩。化和。飯甑內蒸熟。研丸。如梧子大。每水下一丸。（聖濟總錄方）

㊄治乳汁不通。氣少血衰。脈澀不行。故少乳。煉成鐘乳粉二錢。濃煎漏蘆湯調下。或通草等分爲末。米飲服方寸匕。日三服。（外臺祕要方）

㊅李補闕服乳法。主治五勞七傷。咳逆上氣。治寒嗽。通聲音。明目益精。安五臟。通百節。利九竅。下乳汁。益氣補虛。損。療腳弱疼冷。下焦傷竭。強陰。久服延年益壽。不老。令人有子。取韶州鐘乳。無問厚薄。但顏色明淨光澤者。卽堪入煉。惟黃赤二色不任用。置於金銀器中。大鐺著水沉器煮之。令如魚眼沸。水減卽添。乳少三日三夜。乳多七日七夜。候乾。色變黃白卽熟。如疑生。更煮滿十日最佳。取出去水。更以清水煮半日。其水色清不變卽止。乳無毒矣。入瓷缽中。玉槌著水研之。候乾濕卽添水。常令如稀米泔狀。研至四五日。揩之光膩如書中

961／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白魚。便以水洗之。不隨水落者即熱。落者更研。乃澄取曝乾。每用一錢半。溫酒空腹調下。兼和丸散用。其羹乳黃濁水切勿服。服之損人咽喉。傷肺。令人頭痛或下痢不止。其有犯者。但食豬肉解之。（千金方）

㊐鐘乳酒。安五臟。通百節。利九竅。主風虛。補下焦。益精明目。鐘乳炼成粉五兩。以夾練袋盛之。清酒六升。瓶封湯內。煮減三之二。取出。添滿。封七日。日飲三合。忌房事葱豉。生食硬食。（外臺祕要方）

㊑鐘乳丸。治丈夫衰老。陽絕。肢冷少氣。減食。腰疼脚痺。下氣消食。和中長肌。鐘乳粉二兩。菟絲子酒浸焙、石斛各一兩。吳黃湯泡七次。炒。牛兩爲末。煉蜜和丸。梧子大。每服七丸。空心溫酒或米湯下。日二服。服訖行數百步。覺胸中熱。稍停。即食乾飯豆醬。忌食粗臭惡物及婦尸穢等氣。初服七日。勿爲陽事。過七日乃可行。不宜傷多。服過半劑。覺有功。乃續服。此曹公卓方也。（和劑局方）

㊒治吐血損肺。鍊成乳粉。每服二錢。糯米湯下立止。（十便良方）

㊓治大腸冷滑不止。鐘乳粉一兩。肉豆蔻煨半兩。爲末。棗棗肉丸。梧子大。每服七十丸。空心米飲下。

用量　三錢至五錢。

施用宜忌　凡陰虛有熱者禁用。反參、朮、惡牡丹、玄石、牡蒙、忌羊血、葱、蒜、胡荽、畏石英、薏草、蛇床爲之使。

著名方劑　鐘乳丸。治丈夫衰老。陽絕。肢冷。少氣減食。腰疼脚痺。下氣消食。和中長肌。（局方）鐘乳粉二兩。菟絲子（酒浸焙）石斛各一兩。吳黃（泡七次炒）牛兩。上研末。煉蜜丸。梧子大。每服七丸。空心溫酒或米湯下。忌食粗臭惡物及勿問尸穢等氣。初服七日。勿爲陽事。

參攷資料　㊀蕭炳云。石鐘乳如蟬翼爪甲者爲上。如鵝管者下。經既言乳。今復不取乳。此何義也。蓋乳取其性下。不用如膺窗者。謂如烏頭附子。不用尖丫角義同。但明白光潤輕鬆色如鍊消石者佳。服鍊別有法。（寇宗奭）㊁石鐘乳爲慓悍之劑。內經云。石藥之氣悍。仁哉言也。凡藥氣之偏者。可用於暫。而不可久。夫石藥又偏之甚者也。自唐時太平日久。膏粱之家。惑於方士。服食致長生之說。以石藥體厚。氣厚。習以成俗。迨宋至今。猶未已也。斯民何幸。受此氣悍之禍。而莫之能救。哀哉。本草讀其久服延年之功。柳子厚又從而述美之。予不得不深言也。（朱震亨）㊂石鐘乳乃陽明經氣分藥也。其氣慓疾。令陽氣暴充。飲食倍進。而形體壯盛。昧者得此。自慶益肆恣。精氣暗損。石氣獨存。孤陽愈熾。久之。警衛不從。發爲淋渴。變爲癰疽。是果乳石之過耶。抑人之自取耶。凡人陽明氣衰。用此合諸藥以救其衰疾。平則止。夫何不可。五穀五肉。久嗜不已。猶有偏絕之弊。況石藥乎。種樹書云。凡果樹作穴。納鐘乳末少許。固密。則子多而味美。納少許於老樹根皮間。則樹復茂。信然。則鐘乳益氣。令人有子之說。亦可類推。但恐嗜欲者。未獲其福。而先受其禍也。然有稟賦異常之人。又不可執一而論。張杲醫說載武帥霈世賢多侍妾。常餌砂母鐘乳。日夜煎鍊。以濟其欲。其妾父苦寒泄。不嗜食。求丹十粒服之。即覺臍腹如火。少焉熱狂。投井中。救出遍身發紫泡。數日而死。而世賢服餌千計。了無病惱。異哉。沈括筆談載夏英公性豪侈。而稟賦異於人。纔睡。即身冷而僵如死者。常服仙茅鐘乳、硫黃。莫知紀極。每晨以鐘乳粉入粥食之。有小吏竊食。遂發疽死。此與終身服附子無恙者。同一例也。沈括又云。醫之爲術。苟非得之於心。未見能臻其妙也。如服鐘乳。當終身忌朮。朮能動鐘乳也。然有藥勢不能蒸。須要其動而激發者。正如火少。必借風藥鼓之。而後發火。盛則鼓之反爲害。此自然之理也。凡服諸藥。皆宜做此。又十便良方云。凡服乳人。服乳三日即三日補之。服乳十日即十日補之。欲飽食以牛羊麋鹿等骨煎汁。在意作羹食之。勿食倉米臭肉及犯房事。一月後。精氣滿盛。百脈流暢。身體覺熱。遂臍肉起。此爲得力。可稍近房事。不可頻數。令藥氣頓竭。彌更害人。戒之愼之。名之爲乳。以其狀人之乳也。與神丹相配。與凡石逈

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

殊。故乳稱石。語云。上士服石。服其精。下士服石。服其滓。滓之與精。其力遠也。此說雖明快。然須眞病。命門火衰者宜之。則當審。（李時珍）㊃柳宗元與崔連州書云。草本之生也。依於土。有居山之陰陽。或近木。或附石。其性移焉。況石鐘乳。直產於石。石之精粗疎密。尋尺特異。而穴之上下。土之厚薄。石之高下。不可知。則其依而產者。固不一性。然由其精密而出者。則油然而清。油然而輝。其發滑以夷。其肌廉以微。食之使人榮華溫柔。其氣宣流。生胃通腸。壽考康寧。其粗疎而下者。則奔突結澀。乍大乍小。色如枯骨。或類死灰。奄頓不發。潰齒積類。重濁頑瑰。食之使人偃蹇壅鬱。泄火生風。戟喉痒肺。幽關不聰。心煩喜怒。肝拳氣剛。不能平和。故君子愼取其色之美。而不必惟土之信。以求其至精。凡爲此也。（唐愼微）㊄石鐘乳光潤而薄。如羅紋。鳥翮。蟬翼。一切皆成白色者可服。非若此者。愼勿服之。殺人甚於鴆毒。（孫眞人）㊅石鐘乳第一出始興。而江陵及東境名山石洞亦皆有。惟通中輕薄如鵝翎管。碎之如爪甲。中無鴈齒光明者爲善。長挺乃有一二尺者。色黃。以苦酒洗刷則白。仙經少用。而俗方所重。（陶弘景）㊆石鐘乳第一始興。其次廣連澧朗郴等州者。雖厚而光潤可愛。餌之並佳。今陝州青溪房州三洞出者。亞於始興。其餘非其土地。不可輕服。每發淋渴。止可搗篩。白練裹之。合諸藥草浸酒服。合陶云。有一二尺者。謬說也。（蘇恭）㊇按范成大桂海志所說甚詳明云。桂林接宜融山洞穴中。鐘乳甚多。仰視石脈涌出處。即有乳狀。白如玉雪。石液融結成者。乳狀下垂。如倒數峯小山峯端漸尖且長。如冰柱。柱端輕薄。中空如鵝翎。乳水滴瀝不已。且滴且凝。此乳之最精者。以竹管仰承取之。鍊治家又以鵝管之端。尤輕明如雲母爪甲者爲勝。（李時珍）

【鐘乳粉】即鐘乳石之處方用名。詳『鐘乳石』條。

【斲木鳥】即啄木鳥之古籍別名。典見爾雅。詳『啄木鳥』條。

【露甲】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【露花】古籍別名　路頭花。寒花（綱目拾遺）

產地　廣東番禺縣境。

形態　露花爲雜草類之一種。狀如菖蒲。其葉節邊有刺。葉落。根以火煨之而成枝幹。開花。花生叢葉中。瓣有大小。亦如葉而色瑩白。柔滑無芒刺。花抱蕊心如穗。朝夕有零露在苞中。夏時成熟。以花覆盆盛曬之。香落茶子油中。其氣馥烈。謂之露花油。其粉可供藥用。其露詳見該條。

主治　止汗。潤肌膚。

【露花露】

主治　解渴。

【露草】即鴨跖草之日本別名。詳『鴨跖草』條。

【露筋草】形態　露筋草爲雜草類之一種。莖高三尺。春生苗葉。隨即開花結子。碧綠色。四時不凋。其根可供藥用。

性質　辛。濇。涼。無毒。

主治　蜘蛛。蜈蚣咬傷。熔研。白礬水調貼之。

【露蒥】㊀即冬葵子之古籍別名。典見綱目。詳『冬葵子』條。㊁即蓴之古籍別名。典見綱目。詳『蓴』條。

【露蜂】即露蜂房之原名。詳『露蜂房』條。

【露蜂房】命名　本品係懸樹上或屋簷間得風露者之蜂巢。故名。

處方用名　蜂房。蜂巢。

古籍別名　蜂腸（本經）蜂勳。百穿（別錄）獨蜂窠。石蜂窠。草蜂窠。紫金沙。草蜂窠（綱目）蜂家。蜜房。牛蜂家。金房。一寸樓臺。黃臺蜂窠（和漢藥考）

基本　即虎頭蜂之蜂房。

產地　凡山野木石間及寺院屋簷端恒有之。

形態　露蜂房爲茶褐色球圓形或瓢形之蜂窠。有褐色斑點。其狀如卷雲。大者周圍達一二丈。破其外皮。則見中有無數巢房重疊。

種類　㊀名革蜂窠。即山中大黃蜂也。其房重重如樓臺狀。大者一二丈。圍在樹上。內窠小隔六百二十六箇。大者至一千二百四十箇。其窠黏木蒂。是七姑木汁。其蓋是牛糞沫。其隔是葉蓋也。㊁名石

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蜂窠。只在人家屋上。大小如拳。色蒼黑。內有青色蜂二十一箇。或只十四箇。其蓋是石垢。其黏處是七姑木汁。其隔是竹蛀也。㈢名獨蜂窠。俗名七里蜂。其毒最猛。其窠大小如鵝卵大。皮厚。蒼黃色。是小蜂并蜂趙盛向裏。只有一箇蜂。大如小石燕子許。人馬被螫着立亡也。㈣名是草蜂窠也。草蜂石蜂。尋常所見之蜂也。㈤又有一種小而色淡黃。窠長六七寸至一尺。闊二三寸。如蜜脾下垂一邊。多在叢木深林之中。謂之牛舌蜂。㈥更有一種。多在高木之上或屋之下。外面圍如三四斗許或一二斗。中有窠如瓠狀。由此得名玄瓠蜂。其色赤黃。大於諸蜂。今人皆兼用之。

採取　七月間或十二月間。採窠陰乾。

製法　雷敩曰。凡使草蜂窠。先以鴉豆枕等同拌蒸。從巳至未時。出鴉豆枕了。曬乾用。大明曰。入藥並炙用。

用法　水煎內服。或剉末外治。亦有和作丸散者。

性質　甘平有毒。

效能　祛風。殺蟲。解毒。療瘡。用作殺蟲解毒藥。

主治　驚癇瘛瘲。寒熱邪氣。癲疾。鬼精蠱毒。腸痔火熱之良。（本經）療蜂毒。毒腫。合亂髮蛇皮燒灰。以酒日服二方寸匕。治惡疽附骨癰。根在臟腑。歷節腫。出丁腫惡脈諸毒皆瘥。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論蜂房曰。療上氣。赤白痢。遺尿失禁。燒灰酒服。主治陰瘡。水煮洗狐尿刺瘡。服汁下乳石毒。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蜂房曰。煎水洗熱病後毒氣衝目炙研。和豬脂塗瘰癧成瘻。【宋】大明諸家本草論蜂房曰。煎水漱牙齒。止風蟲疼痛。又洗乳癰。蜂疔惡瘡。【明】繆希雍本草經疏論蜂房曰。蜂性有毒。螫人則痛極。蜂房味苦氣平。性亦有毒。別錄言鹹。當作辛鹹。辛散苦泄。鹹可軟堅。故主驚癇瘛瘲。寒熱邪氣。癲疾鬼精。蟲毒腸痔等證也。療蜂毒毒腫者。取其氣類相從。以毒攻毒之義也。蘇恭以亂髮蛇皮三物。合燒灰酒服方寸匕。治惡疽附骨癰。根在臟腑。歷節腫。出丁腫惡脈諸毒。大明煎水漱。齒止風蟲疼痛。洗乳癰。蜂疔惡瘡。皆取其攻毒散邪殺蟲之功耳。

配合應用　㈠治小兒卒癇。大蜂房一枚。水三升。煮濃汁浴之。日三四次佳。（千金方）

㈡治臍風溼腫。久不瘥者。蜂房燒末。傅之效。（子母祕錄方）

㈢治手足風瘡。黃蜂窠大者一箇。小者三四箇。燒灰。獨頭蒜一盤。百草霜一錢半。同搗傅上。一時取下。埋在陰處。忌生冷葷腥。（乾坤祕韞方）

㈣治風氣瘙痒及癮疹。蜂房炙、蟬蛻、等分爲末。酒服一錢。日三服。用露蜂房煎汁入芒硝傅之。日五次。（梅師方）

㈤治風熱牙腫。連及頭面。用露蜂房燒存性。研末。以酒少許。調噙漱之。（十便良方）

㈥治風蟲牙痛。露蜂房煎醋熱漱之。用草蜂房一枚。鹽實孔內。燒過。研末擦之。鹽湯漱之。或取一塊咬之。祕方也。（柚珍方）用露蜂房一箇。乳香三塊。煎水漱之。又同細辛煎水漱之。又露蜂房、全蠍同研擦之。（普濟方）用蜂房蒂綿包咬之效。（聖惠方）

㈦治喉痺腫痛。露蜂房灰、白殭蠶、等分爲末。每乳香湯服半錢。又用蜂房燒灰。每以一錢。吹入喉內。不拘大人小兒。（食醫心鏡方）

㈧治重舌腫痛。蜂房炙研。蒿酒塗。日三四次。（聖惠方）

㈨治舌上出血。竅如鍼孔。用紫金沙。卽露蜂房頂上實處一兩。貝母四錢。蘆薈三錢。爲末。蜜和丸雹丸大。每一丸。水一盞。煎至五分。溫服。吐血溫酒調服。亦治吐血衄血。（雲臺方）

㈩治崩中漏下五色。使人無子。蜂房末三指撮。溫酒服。神效。（張文仲方）

⑪治小兒下痢赤白者。蜂房燒末。飲服五分。（子母祕錄方）

⑫治小兒咳嗽。蜂房二兩。洗淨燒研。每服一字。米飲下。（勝金方）

⑬治二便不通。以蜂房燒末。酒服二三錢。日二服。不拘大人小兒。（子母祕錄方）

⑭治陰瘡不興。蜂窠燒研。新汲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

井水服二錢。可御十女。（岭嵎神書方）

㊀治陰寒痿弱。蜂房灰夜傳陰。陰即熱起。（千金方）

㊁治陰毒腹痛。露蜂房三錢燒存性。葱白五寸同研爲丸。男左女右著手中。握陰臥之。汗出愈。

㊂治寸白虫。蟲蜂窠燒存性。酒服一匙。蟲即死出。（生生編方）

㊃治乳石熱毒。壅鬧頭痛。口乾。便漩赤少者。用蜂房煮汁五合服。乳石未從小便下大效。用十二分炙。以水二升。煮八合分服。（圖經方）

㊄如聖散。治藥毒上攻。用蜂房、甘草等分。麩炒黃色。去麩爲末。水二盞。煎八分。臨臥頓服。明日取下惡物。

㊅治鼻外瘡瘤。膿水血出。蜂房炙研。酒服方寸匕。日三服。（肘後方）

㊆治頭上瘡癬。蜂房研末。臘豬脂和塗之效。（聖惠方）

㊇治齆癩類作。露蜂房二枚燒存性。以巴豆二十一粒。煎清油二三沸。去豆用油調傅。（唐氏得效方）

㊈治女人妬乳。乳癰汁不出。內結成腫。名妬乳。用蜂房燒灰研。每服二錢。水一小盞。煎六分。去渣溫服。（濟衆方）

㊉治風瘻不合。用露蜂房一枚。炙黃研末。每以一錢。臘豬脂和塗。（肘後方）

㊊治下部漏痔。大露蜂房燒存性。研摻之。乾以眞菜油調。（唐氏經驗方）

㊋治蜂螫腫疼。蜂房爲末。豬羔和傅。或煎水洗。（千金方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡癰疽已潰。及無蟲積而屬虛寒諸癰者禁用。惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣。

【饅頭柑】卽柑之古籍別名。典見綱目詳『柑』條。

【馨毛】卽馬騣毛之原名。詳『馬騣毛』條。

二十畫　露饅馨鰴鯷鯸鯫鯽

【鰴魚】原名　鯇魚。

古籍別名　草魚。鰀魚。（綱目）

產地　江湖池澤間多有之。

形態　鰴魚爲魚鱗類之一種。形似鯉而身長圓。肉厚而鬆。又類青魚。有青白兩色。而白者味勝。其肉可供食與藥用。膽詳見該條。

性質　甘。溫。無毒。

主治　暖胃和中。

參攷資料　鰴魚肉多食。能發諸瘡。（李廷飛）

【鰴魚膽】採取　膽月收取。陰乾用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　喉痺。飛尸。水和攪服。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鰴魚膽曰。一切骨鯁。竹木刺在喉中。以酒化二枚。溫呷取吐。

【鯷魚】卽鯪魚之古籍別名。典見綱目詳『鯪魚』條。

【鯸鮧】卽河豚之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『河豚』條。

【鯫魚】卽鱒魚之古籍別名。典見漢書詳『鱒魚』條。

【鯽魚】命名　本品性喜嗜魚。其目暍視。故名。

古籍別名　鯽魚。（食療）

產地　生江湖中。

形態　鯽魚爲魚類之一種。其體圓厚而長。似鯪魚而腹稍起。扁額長喙。口在頷上。鱗細腹白。背色微黃。亦能暰魚。大者重有二三十斤。其肉可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　補五臟。益筋骨。和脾胃。多食宜人。作鮓尤宜。曝乾香美。亦不發病。

【鯽魚】命名　鯽魚相卽相附而游。故名。

古籍別名　鮒魚。（綱目）黃色者名金鯽魚。

基本　係水族動物。爲鱗屬之鯽魚。

產地　凡池澤淡水中恒有出。

形態　鯽魚形似小鯉。色黑而體促。肚大而背隆。大者至三四斤。長數尺。其肉既可供食。又可入藥用。

用法　恒以調入五味。蒸煑供食。其入藥則焙剉用。

性質　甘。溫。無毒。

效能　益脾和中。行水。實腸。用作健胃藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　合蓼作羹。主胃弱不下食。調中益五臟。合茨首作羹。主丹石發熱。

歷代記述致證　【唐】陳藏器本草拾遺論鯽魚曰。合五味煮食主虛羸。【唐】韓保昇蜀本草論鯽魚曰。止下痢。腸痔。【唐】蘇恭新修本草論鯽魚曰。生搗塗惡核腫毒不散及瘡瘡同小豆搗塗丹毒。燒灰和醬汁塗諸瘡十年不瘥者。以豬脂煎灰服。治腸癰。【宋】大明諸家本草論鯽魚曰。溫中下氣。【明】李時珍本草綱目論鯽魚曰。合小豆煮汁服。消水腫。炙油塗婦人陰瘡諸瘡。殺蟲止痛。釀白礬燒研飲服。治腸風血痢。釀硫黃煨研釀五倍子。煨研酒服。並治下血。釀茗葉煨服。治消渴。釀胡蒜煨研飲服。治隔氣。釀綠礬煨研飲服。治反胃。釀鹽花燒研。摻齒疼。釀當歸燒研。摻牙烏髭。止血。釀砒燒研。治急疳瘡。釀白礬煨研。探骨疽。釀附子炙焦。同油塗頭瘡白禿。【明】繆希雍本草經疏論鯽魚曰。鯽魚稟土氣以生。故其味甘。其氣溫無毒。是以能入胃。治胃弱不下食。入大腸。治赤白久痢。腸癰。脾胃主肌肉。甘溫能益脾生肌。故主諸瘡久不瘥也。藏器主虛羸。大明主溫中下氣。孟詵云調中益五臟。表其益脾和胃之功也。【清】黃宮繡本草求真論鯽魚曰。鯽魚氣味甘溫。諸魚性多屬火。惟鯽魚則性屬土。土能制水。故書載有和胃實腸行水之功。凡腸風下血腸氣吐食。俱可用此投治。且性與厚朴反。朴則泄氣。鯽則益氣也。至於生搗可塗痰核乳癰堅腫。以豬油煎灰服。可治腸癰。合赤小豆煮汁食。則消水腫。炙油則治婦人陰瘡。同白礬燒煨。則治腸痢血痢。入綠礬泥固煨。則治反胃吐食。與胡蒜煨。則治腸氣痞滿。皆以借其制水之意。但煨不可去鱗。以鱗有止血之功。烏背者味美。忌麥冬。芥菜。沙糖。豬肝。【清】王士雄隨息居飲食譜論鯽魚曰。甘平開胃調氣。生津運食。和營息風。清熱殺蟲。解毒散腫。愈瘡止痢止疼。消疳消痔。大而雄者勝。宜蒸煮食之。外感邪盛時勿食。嫌其補也。餘無所忌。煎食則動火。

配合應用　㈠鵲突羹。治脾胃虛冷不下食。以鯽魚半斤。切碎。用沸豉汁投之。入胡椒。蒜瓣。薑橘末。空心食之。（食醫心鏡方）

㈡治卒病水腫。鯽魚三尾。去腸留鱗。以商陸赤小豆等分。塡滿扎定。水三升。煮熟。去魚。食豆飲汁。二日一作。不過三次。小便利愈。（肘後方）

㈢治消渴飲水。用鯽魚一枚。去腸留鱗。以茱萸塡滿。紙包煨熟食之。不過數枚即愈。（吳氏心統方）

㈣治腸風下血。用活鯽一大尾。去腸留鱗。入五倍子末塡滿。泥固煉存性爲末。酒服一錢。或飯丸日二服。又用硫黃一兩。如上法煨服亦效。（百一選方）

㈤治酒積下血。酒煮鯽魚。常食最效。（便民食療方）

㈥治腸痔瀉血。常以鯽魚作羹食。（外臺祕要方）

㈦治腸風血痔。用活鯽魚。翅側穿孔。去腸留鱗。入白礬末二錢。以棧包紙裹。煨存性研末。每服二錢。米飲下。每日二服。亦治血痢禁口。（直指方）

㈧治反胃吐食。用大鯽魚一尾。去腸留鱗。入綠礬末令滿。泥固煨存性。研末。每米飲服一錢。日二服。（本事方）

㈨治腸氣吐食。用大鯽魚去腸留鱗。以大蒜片塡滿。紙包十重。泥封。曬半乾。炭火煨熟。取肉。和平胃散末一兩。杵丸。梧子大。密收。每服三十丸。米飲服。（經驗方）

㈩治小腸疝氣。每頓用鯽魚十個。同茴香煮食。久食自愈。（生生編方）

⑪治妊娠感寒。時行者。用大鯽之頭。燒灰。酒服方寸匕。無汗。腹中緩痛者。以醋服取汁。（產乳方）

⑫治熱病目暗。因產後食五辛而致。用鯽魚作臛食之。（集驗方）

⑬治目生胬肉。鮮鯽魚取一斤者。中央開竅。貼於匾上。日三五度。（聖濟總錄方）

⑭治婦人血崩。鯽魚一個。長五寸者。去腸入血竭。乳香在內。綿包燒存性。研末。每服三錢。熱酒調服。（集氏摘玄方）

⑮治小兒齁喘。活鯽魚七個。以器盛。令兒自便尿養之。待紅。煨熟食。甚效。一女年十歲。用此永不發

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。（集簡方）

㊀治小兒舌腫。鮮鯽魚切片貼之。類換。（總微論方）

㊁治小兒丹毒。從髀起流下陰頭赤腫出血。用鯽魚肉切五合。以赤小豆末二合。攪勻。入水和傅之。（千金方）

㊂治小兒禿瘡。鯽魚燒灰。醬汁和塗。一用鯽魚去腸入皂礬燒研。搽（千金方）用大鯽去腸入亂髮。填滿。燒研。入雄黃末二錢。先以鹽水洗拭生油調勻搽之。（危氏方）

㊃治小兒頭瘡。盡開出膿。夜卽復合。可用鯽魚長四寸一枚去腸。大附子一枚去皮。研末。填入炙焦。研傅。搗蒜封之效。（聖惠方）

㊄治走馬牙疳。用鯽魚一個去腸。入砒一分。生地黃一兩。紙包燒存性。入枯白礬。麝香少許。爲末。摻之。

㊅治牙疳出血。大鯽魚一尾。去腸留鱗。入當歸末。泥固燒存性。入煆過鹽和勻。日用。亦治搖牙烏鬚。（聖惠方）

㊆刮骨取牙。用鯽魚一個去腸。入砒在內。露於陰地。待有霜刮下。瓶收。以針搜開牙根。點少許。咳嗽自落。又方。用硇砂入鯽魚內煆過。瓶收。待有霜。刮取如上法用。

㊇治諸瘡腫毒。鯽魚一斤者去腸。柏葉塡滿。紙裹泥包。煆存性。入輕粉二錢爲末。麻油調搽。（普濟方）

㊈治浸淫毒瘡。凡卒得毒氣攻身。或腫痛。或赤痒。上下周匝。煩毒欲死。此浸淫毒瘡也。生鯽魚切片。和鹽搗貼。甚易。（聖惠方）

㊉治髓上便毒。鯽魚一枚。山藥五錢。同搗敷之。卽消。（醫林集要方）

㊊治骨疽膿出。黑色。鯽魚一個去腸。入白鹽令滿。扎定。以水一盞。石器內煮至乾。焦爲末。豬油調搽。少痛勿怪。（危氏方）

㊋治手足瘰疬。累累如赤豆。刺之。汁出。大鯽魚長三四寸者。亂髮一雞子大。豬脂一升。同煎膏。塗之。（千金方）

㊌治臁脛生瘡。用中鯽魚三尾。洗淨。穿山甲二錢。以長皂莢一挺。劈開。兩片夾住。扎之。煆存性。研末。先以井水洗淨膿水。用白竹葉刺孔貼之。候水出盡。以麻油輕粉調藥傅之。日一次。（直指方）

㊍治小兒撮口出白沫。以艾灸口之上下四壯。鯽魚燒研。酒調少許灌之。仍摺手足。兒一歲半。則以魚網洗水灌之。（小兒方）

參攷資料　㈠夏熱痢有益。冬月不宜。（本草綱目）㈡和蒜食少熱。同沙糖食生疳蟲。同芥菜食成腫疾。同豬肝雞肉雉肉鹿肉猴肉食生癰疽。同麥門冬食害人。（張鼎）㈢鯽喜假泥。不食雜物。故能補胃。冬月肉厚子多。其味尤美。鄱道元水經注云。蘄州廣濟青林湖鯽魚大二尺。而食之肥美。辟寒暑。東方朔神異經云。南方湖中多鯽魚。長數尺。食之宜暑而辟風寒。呂氏春秋云。魚之美者。有洞庭之鮒。觀此則鯽爲佳品自古尙矣。（李時珍）

【鯽魚子】　主治　調中。益肝氣。施用宜忌　忌豬肝。

【鯽魚骨】　主治　蠶瘡。燒灰傅。數次卽愈。

【鯽魚腦】　主治　耳聾。以竹筒蒸過滴之。

【鯽魚頭】　主治　小兒頭瘡。口瘡。重舌。目瞽。歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論鯽魚曰。燒研飲服。療咳嗽。【明】李時珍本草綱目論鯽魚曰。燒研飲服。治下痢。酒服治脫肛。及女人陰脫。仍以油調搽之。醬汁和塗小兒面上黃水瘡。

【鯽魚鮓】　主治　癌瘡。批片貼之。或同桃葉搗傅。殺其蟲。

【鯽魚膽】　主治　取汁塗疳瘡。陰蝕瘡。殺蟲止痛。點喉中。治骨鯁。竹刺不出。

【鯽魚鮸】　主治　久痢赤白。腸澼痔疾。大人小兒丹毒。風眩。歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論鯽魚鮸曰。治脚風及上氣。【明】李時珍本草綱目論鯽魚鮸曰。溫脾胃。去寒結氣。

【鯸魚】　原名　魬魚。命名　魬者方也。鯸者。扁也。其狀方。其身扁。故名。產地　生湖澤淡水中。形態　魬魚爲魚類鱗鬣之一

967／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

種。頭小尾尖。頸縮鱗細。身扁。腹大。其色青白。腹中有肪。味頗腴美。其肉可供食與藥用。

性質　甘溫無毒。

主治　調胃氣。利五臟。和芥食之。能助肺氣。去胃風。消穀。作鱠食之。助脾氣。令人能食。作羹臛食宜人。功與鯽同。疳病人勿食。

【鰈】㊀即比目魚之古籍別名。典見爾雅。詳『比目魚』條。㊁即比目魚之古籍別名。典見爾雅。詳『比目魚』條。

【鰣魚】即泥鰍之原名。詳『泥鰍』條。

【鰒魚】即鮫魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮫魚』條。

【鯞魚】

命名　本品能啼。聲如孩兒。故有鯞名。

古籍別名　人魚（陶弘景）孩兒魚（綱目）

產地　生江湖中。溪澗亦有之。

形態　鯞魚爲無鱗魚類之一種。形色俱如鮎。脆。翅如足。啼聲如兒。其肉可供藥用。

性質　甘。有毒。

主治　療瘕疾。食之。

歷代記述弦證　【明】李時珍本草綱目論鯞魚肉曰。治蟲疾。【鰳草】即聚藻之別名。詳『水藻』條。

【鰕】

命名　鰕俗作蝦。以入湯則色紅如霞。故名。

基本　屬節肢動物甲殼類胸甲類十脚類長尾類之鰕。

產地　凡江湖池澤中處處有出。

形態　鰕體分頭部。胸部。腹部。背甲爲圓筒狀。色青黑。薄而透明。前端有長棘突出。觸角二對。甚長。俗謂之鬚。腹部有子腸。屬於臍環節六。兩側有游泳器。謂之檢足。其肉等可供藥用。

種類　種類甚多。如龍鰕、斑節鰕、長臂鰕、沼鰕、糠鰕、磯鰕等。尋常食用之鰕。多屬長臂鰕及沼鰕。

性質　甘。溫。有小毒。

效能　補陽氣。吐風痰。用作祛痰殺蟲藥。

主治　五野雞病。小兒赤白遊腫。搗碎傅之。

歷代記述弦證　【明】李時珍本草綱目論鰕曰。作羹治鼈瘕。托瘡瘡。下乳汁。法制壯陽道。羹汁吐風痰。搗膏傅蟲疽。【清】黃宮繡本草求眞論鰕曰。鰕昧最甘。席品所尚。然性善跳躍。風火易動。是以書載小兒切勿妄食。恐其發瘡動氣也。陰虛火動者尤忌。以其性易涸陰也。惟乳汁不下。及風痰不吐。與制藥壯陽爲差宜耳。海馬種亦鰕屬。雌雄勿離。頗類馬。身似鰕。浮於水面。亦主下胎催產。及佐房術之用也。【清】王士雄隨息居飲食譜論鰕曰。鰕性甘溫。微毒。通督壯陽。吐風痰。下乳汁。補胃氣。拓瘡瘡。消鼈瘕。傅丹毒。多食發風動疾。生食尤甚。病人忌之。海鰕性味相同。大小不一。產東洋者尤佳。鹽漬曝乾。乃不發病。名式甚夥。味皆鮮。開胃化痰。病人可食。其子可醃可曝。味亦鮮美。

配合應用　㊀治鼈瘕疼痛。類編云。陳拱病鼈瘕。隱隱見皮內痛。不可忍。外醫洪氏曰。可以鮮鰕作羹食之。久久痛止。明年又作。再如前治而愈。遂絕根本。㊁補腎興陽。用鰕米一斤。蛤蚧一枚。茴香、蜀椒各四兩。並以青鹽化酒炙。炒以木香粗末一兩。和勻。乘熱收根。絣中密封。每服一匙。空心鹽酒嚼下甚妙。㊂治臁瘡生蟲。用小鰕三十尾。去頭足殼。同糯米飯研爛。隔紗貼瘡上。別以紗罩之。一夜解下。挂看。皆小赤蟲。卽以葱椒湯洗淨。用舊苯籠內白竹葉鋪大小。剪貼一日二換。待汁出盡。逐日煎苦楝根湯洗之。以好膏貼之。將生肉勿換膏藥。忌發物（直指方）。㊃治血風臁瘡生蝦、黃丹。搗和貼之。日一換（集簡方）。

施用宜忌　凡有瘡癤宿疾者禁用。

參攷資料　㊀江湖出者大而白。溪池出者小而青。皆鬚鬚鉞鼻。背有斷節。尾有硬鱗。多足而好躍。其腸屬腦。其子在腹外。凡有數種。米鰕、糠鰕。以精粗名也。青鰕白鰕。以色名也。梅鰕以梅雨時有也。泥鰕海鰕。以出產名也。嶺南有天鰕。其鰕大如蟻。秋社後鹽水中化爲鰕。人以作鮓食。凡鰕之大者。蒸曝去殼。謂之鰕米。食以薑醋。饌品所珍（李時珍）。㊁以熱飯盛密器

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中。作鮓食。毒人至死。（陳藏器）㊁無鬚及腹下通黑并煮之色白者並不可食。小兒及雞狗食之。脚屈弱。（陶弘景）

【鰕】即鯢魚之大者。典見綱目。詳『鯢魚』條。

【鰕子】古籍別名　鰕春。（綱目拾遺）

性質　甘。溫。無毒。

主治　助陽通血脈。

參攷資料　鰕子恒在海濱潮退後。於江沙淺水處撈取之。鮮者味甘醃者味鹹甘。人多以腐渣攙和。須取少許置銅銚中。和鹽炒之。色純紅者乃眞。以醃藏貯可供食用。（綱目拾遺）

【鰕米】基本　鰕米即鰕之去殼曬乾而小者。可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　宣逐風疾。

配合應用　㊀胡澄法製編。有蛤蚧蝦製法云。食之補腎益陽。蝦米一斤。蛤蚧二枚。茴香、蜀椒各四兩。並以青鹽化酒炙。炒以木香末一兩和勻。乘熱收新絣中密封。每服一匙。空心鹽酒嚼下甚妙。㊁宣吐風痰。連殼蝦米半斤。入葱、薑、薺煮汁。先吃蝦。後吃汁。緊束肚腹。以雞翎探引取吐。（不藥良方）㊂治赤白遊風。蝦米搗碎敷之。（不藥良方）

【鰕米酒】主治　婦人無乳。及一切乳病。鮮鰕米一斤。取淨肉搗爛。黃酒熱服。少時乳至。再用豬蹄湯飲之。一日幾次。其乳如泉。

【鰕姑】即海馬之屬。形如蜈蚣。燒末服。能治夜遺。餘見『海馬』條。

【鰕春】即鰕子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鰕子』條。

【鯊魚】即鯊魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯊魚』條。

【鯖魚】即鯊魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯊魚』條。

【鰹魚】即鮪魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮪魚』條。

【鰱魚】即鮪魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮪魚』條。

【鰱鯽】即河豚之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『河豚』條。

【鶉】命名　鶉狀可愕故名。

古籍別名　魚鷹（禽經）鶻雞。（詩疏）雎鳩。（周詩）王雎。沸波。下窟鳥。（綱目）

外國名詞　Pandion haliaetus Limn. Osprey 或 Fish-hawk Flussdler（拉丁）ミサユ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類猛禽類鶉科。

產地　海岸湖畔間多有之。



鶉

形態　鶉爲林禽類鶻屬之一種。其翼長。伸出於尾端。嘴短。褐黑色。基部與邊緣藍色。中央有卵狀鼻孔。頭有冠毛。頭頂暗褐色。他部與頸上皆白色。嘴頸兩旁有暗褐闊帶紋。頸下白而有褐條紋。尾上有褐條紋。脚長。被有六角形鱗。爪亦長而屈。色黑。往來湖海間。覓食魚蛇等物。營巢於樹間或巖石凹處。其卵有紅色斑紋。肉腥臭不堪食。骨可供藥用。

用法　取鶉骨燒存性。以古銅錢一箇。煅紅。醋淬七次。爲末。等分。酒服一錢。不可過多。病在下空心服。在上食後服。極有效驗。須先夾縛定。乃服此。

主治　接骨。

【鶉嘴】主治　蛇咬。燒存性。研末。一半酒服。一半塗之。

【鶉龜】產地　出南海。

形態　鶉龜爲介類龜屬之一種。狀如龜。而體長二三尺。兩目在側。如鶉。可供藥用。

性質　無毒。

主治　婦人難產。臨月佩之。臨時燒末。酒服。

【鶉鴝屎】即五靈脂之古籍別名。典見綱目。詳『五靈脂』條。

【鶺雞】命名　本品羽色黑黃而褐故名。

古籍別名　青黑羽色者名鴝。（綱目）

形態　鶺爲原禽類雉屬之一種。其狀類雉而大。黃黑色。首有毛角。如冠。性愛儕黨。有被侵者。直往赴鬥。雖死猶不置。其肉可供食。與

969／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藥用。

性質　甘平。無毒。

主治　炙食令人勇健。

歷代記述弦證　【明】汪穎食物本草論鴞肉曰。炙食令人肥潤。

【鷲】　卽鴨之原名。詳『鴨』條。

【鷲肉】　卽鴨之處方用名。詳『鴨』條。

【鷲肪】　㊀卽雁肪之古籍別名。典見綱目。詳『雁肪』條。㊁卽鴨肪之原名。詳『鴨肪』條。

【鷓鴣】　卽杜鵑之古籍別名。典見綱目。詳『杜鵑』條。

【鹹豆豉】　**性質**　鹹。寒。無毒。

效能　調中發汗。通關節。解腥氣。

主治　寒熱。虛勞。傷寒。鼻塞煩熱。熱毒。

製法　用大豆水浸三日。淘蒸攤晾。俟上黃取出。簸淨。水淘。曬乾。加鹽。薑絲。椒。橘。蘇。茴。杏仁。拌勻。入甕上面水浸。以箬蓋封口。曬一月卽成。

【鹹昆布】　卽昆布之處方用名。詳『昆布』條。

【鹹秋石】　卽秋石之處方用名。詳『秋石』條。

【鹹豉】　卽鹹豆豉之簡稱。詳該條。

【鹹魚】　卽鮑魚之別名。典見綱目。詳『鮑魚』條。

【鹹薤蓉】　卽肉蓯蓉之處方用名。詳『肉蓯蓉』條。

【鹹角】　卽羚羊角之古籍別名。典見綱目。詳『羚羊角』條。

【黨參】　**命名**　本品上黨地方而形如參。故名。

處方用名　潞黨參。西潞黨。文元參。上黨參。

古籍別名　遼黨。臺黨。交黨。大山薊川黨參。南黨。南山薊。野黨薊。種黨。薊。白黨。薊。紅黨。薊。獅子盤頭薊。防風黨。薊。趙薔臣）防黨參。

外國名詞　Companumaea pilosula

基本　屬豆科爲雙子葉植物部離瓣花植物類。爲黨參之根。

產地　凡山野間恒多生焉。趙薔臣黨。薊。新研究云。黨參產中國山西長。治。長子。屯留。壺關。潞城。黎城。襄垣。平順。和順。遼縣。交城。五臺等縣。陝西終南山。四川各山。歸綏大清山等處。

形態　㊀黨參爲山野自生及栽種田園之多年宿根草。根長數寸至數尺不等。鬚根多少不一。苗由地下莖上端蘆頭處發生。多數簇生。長柄。葉枝長三四尺不等。枝葉繁盛。生長稠密。如豌豆之簇生狀。柔枝細長如蔓。葉生時形如杏葉而薄。小葉之主脈明顯。支脈不甚分明。葉柄細長。全苗之葉皆係對生。均呈綠色。微帶碧黃色。季夏枝間開梅花色豆花形之小花。秋季結莢。莢角長約寸餘。剖之內藏數粒豆形種子。名曰黨參豆。初結莢角呈青色。成熟時呈黃褐色。深秋苗則乾枯。如白絲。來年春風一吹。又從宿根而生。㊁大山黨參之鮮者。肥白細膩。身長乳足而粗大。皮顯橫稜。而無順皺紋。內部少植物纖維。味甘而淡。有土香之氣。其嫩如白蘿蔔。用其鮮者入藥。其效最著。陰乾用之。亦無不稱贊。迺產量極少。又不易得耳。其潞安等處之鮮黨參。無論野生與種植。質粗味微濁。均不甚好。㊂野黨參之乾者。其根自蘆至梢長五六寸至三四尺不等。莖根至梢根圓徑八九分。漸至梢漸細。至一二分大小不等。近蘆處周圍有多數橫皺紋。其至下梢有稀疏之深凹順皺紋。蘆頭上有多數葉梢脫落之螺旋突起帶痕。全身周圍有寬一二分至四五分之橫列隆起稜。此稜乃乾野黨之極要點。全身色澤蒼老而瘦。有含而不露之油潤氣象。外皮灰白色。而又罩黑色之薄薄一層土鏽。味甘。而土香之氣稍濁。㊃種黨參之乾者。根長三四寸至三四尺不等。上粗下細之圓徑六七分至一二分。近蘆處有少數橫皺紋。遠蘆處有多數順皺紋及多數毛根。質潤而肥。不甚密緻。外皮牙白色。而又罩灰土色之土鏽。味甘而微有土香之氣。㊄野生鮮黨之橫斷面質嫩軟而無空韓。爲非眞圓之圓面。中心之白色小點。不甚顯明。自中心之輻射紋。略顯白色之最細錢紋。貼表皮之褐色環。其色極淡。圓面全部之色澤。如燈光之黃色。見燈光之色。如見其物之色也。而順斷面之形色組織及莢角之剖面種子。種子之破面胚胎。可參看圖釋。㊅野生乾黨之橫斷面質

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

堅韌而微有空罅。或無之。爲周圍有圓凹沿不規則之圓面。自小白心至表皮處。有直線形輻射紋。貼表皮裏圈周圍。有不足寬一分之褐色一環也。而順斷之面。可想像而類推之。

種類　㈠潞黨參。係產山西潞安府等處者。㈡遼黨係產山西遼縣者。㈢臺黨係產山西五臺縣者。㈣交黨係產山西交城縣者。㈤大山參。係產中國北部歐綏區大清山野者。㈥川黨參。係產四川山野者。㈦南黨參。係由各商自河南彰德業會販來者。㈧南山參。係產陝西終南山者。㈨野黨參。係山野自生。有生長數年而採得者。有生長數十年而採得者。㈩種黨參。係由人工栽種。有一二年而採收者。有三四年而採收者。(一一)白黨參。爲原來之皮色而名。有牙白色者。有骨白色。又有土白色者。(一二)紅黨參。係產山西黎城縣各處者。採收後用紅色之土搓染紅色。非天然之色者。(一三)獅子盤頭參。乃野生黨參之蘆頭。生長數年枝枯之蒂痕。多至十餘個。其蒂上之皮紋。螺旋纏繞。全蘆形狀。如見畫壁獅頭之毛蓬鬆盤繞者。(一四)防風黨參。係黨參全形之小者。如防風形狀也。(一五)黨參各處所產。以山西上黨八縣野產者佳。五臺縣野產者尤佳。大清山野產者更佳。惜產數極微。而人工種植者次之。

種植　㈠土地之選擇。以伏俟石山之土地。或砂土地爲最善。㈡種植之方法。第一年爲秧苗培養期。按各地氣候之寒暖。於植樹節前後。先灌溉土地。耕掘虛鬆。而使平坦。遂播種其種子。待參苗發生齊全。勿令土氣乾燥。寒地冬時。宜以草攤覆之。可免凍傷之害。㈢翌年之分秧。第二年爲栽秧期。挖取第一年之蘆秧。於另一土地。依土地之優劣。相距四五寸或七八寸各種一苗。隨時灌溉。所用肥料。宜以植物肥料。如豆餅類爲最佳。不宜以動物肥料。如骨粉類爲最忌。㈣另地之移植。第三年可以另地移栽。使生長茂盛。如洗澆灌。根莖則堅實矣。生長經過數年後。方可採掘。㈤採掘之方法。採取之年。勿使開花結實。否則實液卽不能充於根莖也。用人工剪去花實。則可更宜注意詳記苗之養生、葉柄、花實生長之節氣。以供藥用之研究。蓋因各地氣候不同。故生長亦不同。則不能預定故耳。

採取　㈠人工栽培者。於八九月間翌年之芽胞發時。或二三月間苗未發生而津液未充苗葉時。採掘其地下根莖。陰乾供藥用。㈡山野自生者。於春秋兩季。須入山採收。務選多年野生者最佳。欲知其歷年多少。須數地下莖之上端近蘆處。橫列凹凸之皺紋。每皺紋有兩層者。必經一年。數得幾雙皺紋。便知經過幾個春秋。此皺紋之生也。每年經氣候之寒暖兩次。因榮枯縮漲之理。必生兩層皺紋。爲自然之理也。採時用鏟具掘取周圍之土。輕輕去其根莖。護防鏟傷其莖。若傷其莖。失去莖間之白色乳汁。藥效必失大半。如誤斷其莖。宜用線繩緊紮其斷處。或可保留其乳汁之津液。採收回遂陰而乾之。

製法　㈠採得陰乾時。當用手隨時揉搦之。使皮肉緊貼而堅實。若不用手揉握。參身皮肉分裂爲兩層。則虛鬆而不堅實。不能耐久。必須揉握至乾。紮分圓錐形之把。而收藏於乾燥之處。時值生蟲之際。宜時晾時晒。以防蟲蝕。而重保存。㈡黨參本年採收者。質柔而潤。藥效充足。出處則可。遠方多不易得。舊存咀片或整把放置於三年以上者。收藏妥當。雖不如新者力強。尚可入藥。若在五六年以上者。不問蟲蝕腐朽與否。均不堪入藥。而橘皮、地黃之宜用陳者。豈可與黨參同日而語哉。例如藥市所售之黨參膏。其內攙雜其他藥品。質不純粹。用無效驗。猶其小者也。往往有蟲蝕腐壞。不能作湯劑用者。製成膏劑出售。妨礙治療。其害之大。不可不知也。

製法　凡使有用土炒者。有用米炒者。概因土氣入脾之義。並可去黨參內之油質也。

性質　甘。平。無毒。

成分　含有澱粉、糖質、及少量脂肪。

效能　補脾胃。生津液。用作強壯健胃藥。用於一切衰弱症有強

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

健身體之效力。又治慢性腸加苔兒。胃弱吞酸。及糖尿病之初期。

作用 能補助胃腸之消化。促進乳糜之吸收。又對淋巴系及血行系。能增進新陳代謝之功用。

主治 補中益氣生津。和脾胃。除煩渴。中氣微虛。用以調補。甚爲平安。

歷代記述攷證 【清】張石頑張氏醫通論黨參曰。黨參產山西太行山者。却有甘平清肺之力。不比人參甘溫。有峻補之功。亦不似沙參性寒。專泄肺氣也。【清】黃宮繡本草求眞論黨參曰。人參而有上黨之號。蓋緣隋文帝時。上黨有人宅後每夜聞人呼。求之不得。去宅一里許。見參異常。掘得人參一如人體。四肢畢備。呼聲遂絕。又上黨人參。根頗纖長。根下垂有芨一尺餘者。或十岐者。其價與銀相等。遼東高麗伯濟諸參。均莫及焉。李時珍云。上黨潞州也。民以人參爲地防害。不復採取。今所用者。皆是遼參。觀此則知諸參。惟上黨爲最美。而上黨既不可採。豈復別有黨參之謂哉。近因遼參價貴。而世好奇居異。乃以山西太行山出之苗。及以防風桔梗薺苨僞造。相繼混行。詎知參有不同。性有各異。防風桔梗。乃屬表散風寒傷氣之味。人參甘溫。乃屬補肺益氣之味。卽山西太行山新出之黨。考之張潞。亦謂甘平清肺。並非等於眞正黨參。確有補益。今人但見參貴。而卽以此代參。不亦大相逕庭乎。且余嘗見虛弱之症。亟當人參峻補。以救垂絕。而醫猥用黨參替代。以致病卒不起。幷令豪貴之家。朝夕代茶。以致膈受剝削。病證滋長。此皆誤用之害。人但習而不察耳。附記以爲世之粗工妄用黨參者戒。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。黨參種類不一。綱目拾遺引翁有良辨誤云。黨參功用。可代人參。皮色黃而橫紋。有類乎防風。故名防黨。江南徽州等處。呼爲獅頭參。因蘆頭大而圓凸也。古名上黨人參。產於山西太行山潞安州等處爲勝。百草鏡有云。亦有白色者。總以淨軟壯實。味甜者佳。嫩而小枝名上黨參。老而大者名防黨參。味甘平。補中益氣。和脾胃。除煩悶。解渴。中氣微虛。用以調補。甚爲平安。今有川黨。蓋陝西毗連移種栽植。皮白味淡。有類桔梗。無獅頭。較山西者適別。入藥亦殊劣。不可用。近肆中一種黃色黨參。有用梔子熬汁染造者。服之涌吐。更有一種小潞黨參。皮色紅者。乃攀紅所染。味淡不甘。皆贋物也。用者宜明辨之。㊁曹炳章曰。按前賢所謂人參產上黨者。卽今黨參是也。考上黨卽今山西長子縣境。蒼屬潞安府。故又稱潞黨參。其所產參之形狀。頭如獅子頭。皮細起皺紋。近頭部皮當有方紋。體糯結黃色。內肉白潤。味甜鮮潔。爲黨參中之最佳品。其他產陝西者。曰介黨。亦皮紋細皺。性糯。肉色白潤。味鮮甜。亦爲佳品。如鳳黨皮紋雖略糙。性亦糯軟。味亦甜。產四川文縣者。曰文元黨。皮直紋。性糯味甜。蘆頭小於身條。皆佳。又一種川黨。俗稱副文元。產川陝毗連處。性糟硬。皮粗寬。紋粗。肉色呆白。味淡。爲次。產禹州者。曰禹黨。產敍富者。曰敍富黨。皆粗皮直紋。性硬肉燥。呆白色。味淡。皆次。產關東吉林者。曰吉林黨。皮寬粗而糙。頭甚大。如獅子頭。肉白燥而心硬。味淡有青草氣。價甚賤。爲黨參中之最次者。其餘種類甚多。未及細辨。總之以皮紋細緻。肉白柔潤。頭小於身。氣帶清香。味甜鮮潔者佳。若皮粗肉堅。或鬆。味淡。氣腥如青草氣者。皆爲側路。以此分別。最爲明晰。如鄭君云。有用梔子煎汁染造者。及皮紅以攀紅所染者云云。此等贋物。我江浙未之見也。

近人學說 ㊀張山雷曰。黨參之名。初不見於古書。僅於張氏之逢原。吳氏之從新。及趙氏之拾遺見之。今則南北通行。凡醫藥中應用人參者。幾於無不用此。則以價值尚廉。而功用堪信耳。惟市肆中亦有數種。以西潞黨爲最佳。枝不必其巨。但以近蘆處橫紋緻密爲眞。皮肉不必其白。但取其柔潤不枯。生嚼之甘味極濃。而多脂膏無渣滓者爲上。其他稱潞黨者。尚有數種。皆遠不逮也。力能補脾養胃。潤肺生津。健運中氣。本與人參不甚相遠。其尤可貴者。則健脾運而不燥。滋胃陰而不澀。潤肺而不犯寒涼。養血而不偏滋膩。鼓舞清陽。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

振動中氣而無剛燥之弊是稟坤土中正之氣柔順之德而無偏無害者且較諸遼參之力量厚重而少偏於陰柔高麗參之氣味雄壯而微嫌於剛烈者尤爲得中和之正宜乎五臟交受其養而無往不宜也特力量較爲薄弱不能持久凡病後元虛每服二三錢止足振動其一日之神氣則信乎和平中正之規模亦有不耐悠久者然補助中州而潤澤四隅與坤土合德亦可謂至德也已故凡古今成方之所用人參無不可以黨參當之即凡百證治之應用人參者亦無不可以黨參投之不僅取其惠而不費可以節用而隱爲斯民造福即論其功德及人亦較彼遼參之價值連城者又何嘗多讓不謂張氏逢原吳氏從新既取之而所用不足以盡其長殆猶未免皮相之見耶㈡今世以黨參號名者就余目前所見有六種一防黨二潞黨三川黨四湘黨五文黨六利黨考參以黨得名原由產自上黨郡自參種移植於各地而仍以黨名之其實地已全非參亦異樣今品其優劣則防黨爲勝其餘五種除潞黨外每混充防黨而實屬遠遜潞黨形體細長與防黨顯然易別不致誤認惟川黨湘黨文黨利黨與防黨髣髴形似往往混充余核驗防黨色較黃赤其獨有之特徵則皮有橫紋整然不紊其餘四種則無橫紋祇有凸凹不平之直皺紋而湘黨文黨色皆晦川黨利黨色皆白包製藥者可以赤糖水助之須試其生藥方有分別余又切視各參橫斷面中俱有一白心旁俱爲腺管惟防黨之腺管極繁管孔分明可見餘四種不及其腺管皆糢糊不辨因此之故防黨之外皮良好端正由於腺孔繁則外皮有其他四種腺孔不繁則外皮不有且防黨全體柔軟其他四種雖大體亦軟然比較之則不及而川黨且硬脆亦折余惟腺管爲液道氣道黨參之補在液與氣其液道氣道分明端正者其所行之液與氣倍有力昧甜走胃腸與脾調和其胃腺腸腺脾腺自然有效古方以此物入四君子湯不爲無功其他四種未必有此氣力然每用以混充防黨則以其價賤較之防黨不啻五與一而以利爲問題則藥效不可問矣㈢趙養臣曰黨參黨是地名即古上黨也又黨所也在於山上其所最高故曰上黨上黨禹貢冀州殷爲鼈國春秋時爲皋落氏地後爲晉有七國時屬趙亦屬魏秦治上黨郡屬井州古上黨關楚漢之時爲西魏地漢上黨郡十四城後漢上黨郡十三城三國魏因之晉及後周北齊仍爲上黨郡隋開皇年別置上黨縣大業初年復爲上黨郡唐武德初改上黨郡爲潞州上黨縣如故後復潞州爲上黨郡乾元又改爲潞州五代梁唐晉漢周爲潞州宋金元互改爲潞州及上黨縣明初省上黨縣入潞州嘉靖八年并州爲潞安府又置冀南道於此清康熙六年併潞安府於冀寧道民國元年廢府道存縣治今長治長子屯留壺關潞城黎城襄垣平順八縣即古上黨也按地理及山脈言在山西省東南部太行山之南端也隋文帝由上黨發見薏名曰黨薏即草名也故徐艸薏聲藥草名也從薏凝同浸浸漸之意即年久浸漸長成之意也薏之名考古本本草載有人薏玄薏沙薏丹薏苦薏紫薏六種獨未載黨薏黨薏爲隋文帝時發明絕對無疑考唐書地理志太原府土貢人薏非黨參而何所貢之參既爲人參何以唐以前未聞太原有貢者何以隋文帝發明時不命名曰人參而曰黨參又曰自民國以來研究薏者夥矣以西醫研究者獨重人參而不重薏參以中國研究者人參黨參多有混合爲一物而不分別之夫人參爲五加科植物黨參爲菊科植物分明兩種而不可混淆俗醫竟以一物而應用哉考神農本草經人參味甘微寒主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年決不是指今日之菊科黨參而言按人參之名詞對五加科人參之根而稱呼也偶而長成人形者可謂之人參不成人形者只可謂之參不可謂之人參豈

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

科參、五加科參同一植物也。何時何地不可生長。在古代中國山西太行山一帶。潞安遼縣等處。爲知不產五加科參。爲知其時莫有豈科參。彼時就已有豈科參而僞成人形者。亦不能謂爲五加科參而混沌稱呼也。以五加科參及豈科參比較。儼別逈然不同。五加科參苗葉生數柄。每葉分五歧。根長數寸。豈科參苗生繁盛。簇生如豌豆。根長數尺。觀察植物形態。顯然兩種。不能認兩種爲一物者一也。五加科參爲興奮劑。豈科參爲强壯健胃劑。實驗藥效成分。功用各異。不能認兩種爲一物者二也。再以中國藥效言之。人參爲溫補峻烈之劑。用以峻補五臟陽氣之君藥。黨參爲平補和緩之劑。用以滋養脾胃之要藥。此又不能認兩種爲一物者三也。若不以爲然。可親採其藥苗而實驗之。自知言之不謬也。考本草所載。隋文帝時。上黨有人宅。後夜夜聞人呼。捕之不得。距宅里許。掘得人參。酷似人形。四肢畢具。呼聲遂絕。在彼時是五加科參根而成人形者。抑是豈科參根而成人形者。或云不敢決定。何以現在上黨所產之參。均爲豈科參。未聞產一二株五加科參也。卽是豈科參能成人形者。亦不稀奇。例如何首烏之根長成童形。枸杞之根長成犬形。橘中二叟。草下一蟲。凡補物之根。能成異形者。爲極尋常之事實也。居今日之文明時代。竟有醫界中人研究五加科參。與豈科參而混爲一物。良可嘆也。要知五加科參。東西各國已研究分析。培養種植。每年得利若干。確有把握。中國不但不知種植而抵禦之。人參、黨參界限。尙且多未分別。歐美諸國。對於豈科參不知研究否。固無論矣。考中國本草。自古迄今。上下數千年。除張璐、吳遵程、黃宮繡、屠道和在應用上大略分別言之。再無醫界中人認黨參爲另一種而詳細研究者。余有感於此。謹就豈科參各項研究。以補先進之缺點。而供醫藥界證明爲二物及博物家之參考也。又曰。以中國研究黨參氣平味甘。爲足太陰脾足陽明胃三經之要藥。而屠道和謂其甘平清肺之藥。用作人參之代用品者。誤也。余在實驗上對於脾胃之虛弱等症。令其多服久服。雖則有效。病減甚緩。惟用於老年人或氣虛之體。下肢瀉腫及四肢面部水腫。配五皮飲加焦冬朮。奏效甚速。總而言之。因其氣平與淡品藥物同用。最爲相宜。尤宜虛寒虛症。不宜於實熱之病。而用量宜輕不宜重。寧可一日內多服數劑。不可一劑內用其大量。恐用大量致有變證也。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡非虛寒而有實邪者禁用。忌鐵劑腻品。

製法 ㈠黨參膏。藥市所製黨參膏。現在只稠厚流膏一種。其內多配伍其他藥品。在商家用意。此藥比別家較好。在病家應用。不免有誤投之弊。而今以純品製成。分爲流膏、硬膏兩種。流動者便於病家服用。乾固者便於旅行攜帶。其功用與黨參同。㈡流動黨參膏之製法。取鮮黨參壓擠其汁液。熬膏最佳。但非在原產地不可。如取乾黨參製膏。切碎用熱水浸數日。煎數次。盛布袋壓榨其汁液。須用粗紙過濾。取其汁液。熬至稠厚爲度。貯瓶中供藥用。㈢硬固黨參膏之製法。取前項熬成之稠厚流膏。盛模型中。入乾燥器內。供乾爲度。貯藏供藥用。

參致資料 ㈠按古本草云。參須上黨者佳。今眞黨參久已難得。肆中所賣之黨參。種類甚多。皆不堪用。唯防風黨參。性味和平足貴。根有獅子盤頭者眞。硬紋者僞也。白黨味微甘而甚淡。功用遠不及爾。(吳遵程)㈡黨參一名黃參。黃潤者良。出山西潞安太原等處。有白色者。總以淨軟壯實味甘者佳。嫩而枝小者名上黨參。老而大者名防黨參。味甘性平。治肺虛能益肺氣。(百草鏡)㈢白參卽將黨參煮晒而成。原汁已出不堪用。(吳遵程)㈣黨參功用可代人參。皮黃色而橫紋有類乎防風。故名防黨。江南徽州等處。呼爲獅頭參。因蘆頭大而圓凸也。古名上黨人參。產於山西太行山潞安州等處爲勝。陝西者次之。味甚甜美。勝如乘肉。近今有川黨。蓋西陝毗連移種栽植。皮白味淡。類乎桔梗。無獅頭。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

較山西者適別。入藥亦殊劣不可用。其味甘平。補中益氣。和脾胃。除煩惱。解渴。中氣微虛用以調補。甚爲平妥。(翁有良)

【鱉黃】卽鱉之古籍別名。典見爾雅。詳『鱉』條。

【鼯鼠】卽鼫鼠之古籍別名。典見爾雅。詳『鼫鼠』條。

【鼹鼠】卽鼩鼠之古籍別名。典見綱目。詳『鼩鼠』條。

【齲草】卽牛蒡草之原名。詳『牛蒡草』條。

二十一畫

【儷鵲】卽水仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水仙』條。

【屬折】卽續斷之古籍別名。典見本經。詳『續斷』條。

【攙香】卽安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『安息香』條。

【攝石】卽慈石之古籍別名。典見藥物生產辨。詳『慈石』條。

【攝龜】古籍別名 呷蛇。鼈夾蛇。龜(日華)陵龜(郭璞)魯龜。陶弘景)蝮龜(抱朴子)

形態 攝龜爲介類龜屬之一種。軀幹狹小。尾長。腹甲小。中心橫折。能自開閤。開閤處相傳能呷蛇。故好食蛇類。其肉可供藥用。尾甲詳各該條。

性質 甘。寒。有毒。

主治 生搗。塗蛇傷。

歷代記述攷證 【唐】陳士良食性本草論攝龜肉曰。生研。塗撲損筋脈傷。

參攷資料 攝龜噉蛇。故肉有毒。不可食。(孟詵)

【攝龜甲】主治 人咬瘡潰爛。燒灰傅之。

【攝龜尾】主治 佩之辟蛇。蛇咬刮末傅之。

【攝攝】卽楓之古籍別名。典見爾雅。詳『楓香脂』條。

【曇伽結】卽波羅蜜之古籍別名。典見綱目。詳『波羅蜜』條。

【欅】命名 本品樹高如擧。故名。

古籍別名 櫟柳。(衍義)鬼柳。(綱目)

外國名稱 Zelkowa acuminata, Pl.(拉丁) ケヤキ(日本)

基本 係榆科欅屬爲欅之木皮。其葉詳該條。



欅

虛地 出山野間。

形態 欅爲喬木類之落葉木本。高五六丈。樹皮堅硬。灰褐色。有粗皺紋。老者則如鱗狀而剝落。葉廣披針形。或長卵形。而尖。有鋸齒。而互生。春隨新葉開花。花小。單性。雌雄同株。花色淡黃綠色。其木材堅韌。可供建築器具。木皮可供藥用。

製法 雷敩曰。凡使勿用三四年者。無力。用二十年以來者。心空。其樹只有半邊向西生者良。剝下去粗皮。細剉蒸之。從巳至未。出焙乾用。

性質 苦。大寒。無毒。

主治 時行頭痛。熱結在腸胃。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論欅木皮曰。夏日煎飲。去熱。【唐】蘇恭新修本草論欅木皮曰。俗用煮汁服。療水氣。斷痢。【宋】大明諸家本草論欅木皮曰。安胎。止妊婦腹痛。山欅皮性平。治熱毒風瘡腫毒。

【欅柳】卽欅之古籍別名。典見本草衍義。詳『欅』條。

【欅葉】性質 苦。冷。無毒。

主治 按貼火爛瘡有效。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論欅葉曰。治腫爛惡瘡。鹽搗敷之。

【櫻桃】命名 本品顆如環珠。故名。

古籍別名 靈桃。(禮注)含桃。(月令)荊桃。朱櫻。紫櫻。蠟櫻。櫻珠。(綱目)山櫻。(日本)崖蜜。(孫炎註解)

外國名稱 Prunus pseudocerasus, Lindl. var. spontanea, Maxim(拉丁) ヤマザクラ(日本)

基本 係薔薇科櫻桃屬爲櫻桃之果實。其枝、葉、花、根。詳各該條。

形態 櫻桃爲果類之落葉喬木。乃櫻之變種。幹高者七八尺。葉橢圓形而潤。有鋸齒。嫩莖嫩葉背

975／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

面密生毛茸。春夏間開小花。色白如梅花。後結小實。如穭。熟則紅。經雨則蟲自內生。目不能見。用水浸之良久。蟲皆出。乃可食。亦供藥用。



櫻桃

性質　甘。熱。濡。無毒。

主治　調中益脾氣。令人好顏色。美志。

歷代記述弦證　【唐】孟詵食療本草論櫻桃曰。止洩精。水穀痢。

參攷資料　㈠櫻桃食多無損。但發虛熱耳。有喑風人不可食。食之立發。（孟詵）㈡櫻桃傷筋骨。敗血氣。有寒熱病人不可食。（李廷飛）㈢按張子和儒門事親云。舞水一富家有二子。好食紫櫻。每日啖一二升。半月後。長者發肺癰。幼者發肺癰。相繼而死。嗚呼。百果之生。所以養人。非欲害人。富貴之家。縱其嗜欲。取死是何。天耶。命耶。邵堯夫詩云。爽口物多終作疾。眞格言哉。王維詩云。餉食不須愁內熱。大官還有蔗漿寒。蓋謂寒物同食。猶可解其熱也。（李時珍）

【櫻桃水】　**基本**　本品係櫻桃中之流質。

性質　甘。辛。熱。

主治　凍瘃瘡及疹發不出。

參攷資料　春日鮮櫻桃。收貯磁瓶內。封口。放在涼處。爛過成水。濾渣。蘸用。（趙恕軒）

【櫻桃枝】　**主治**　去雀卵斑黯。同紫蔕、牙皂、白梅肉研和。日用洗面。

【櫻桃花】　**主治**　去面黑粉滓。

【櫻桃核】　卽山櫻桃之核。可供藥用。非尋常之櫻桃核。詳『山櫻桃核』條。

【櫻桃根】　**採取**　以東行者良。

主治　煮汁服。立下寸白蟲。

【櫻桃葉】　**性質**　甘。平。無毒。

主治　蛇咬搗汁飲。并傅之。

參攷資料　櫻桃葉煮老鵝。則易軟熟。（綱目）

【櫻珠】　卽櫻桃之日本名。詳『櫻桃』條。

【櫻額】　**古籍別名**　稠梨。（綱目拾遺）

產地　出關東烏喇口外。

形態　櫻額爲夷果類之一種。其樹叢生。結實形如野葡萄。色黑而小。鮮時甚美。其果可供藥用。

性質　甘。澀。溫。無毒。

主治　補脾。止洩瀉。

參攷資料　櫻額實晒乾爲末。可以致遠。暑月調水服之更佳。（綱目拾遺）

【欈】　卽柚之古籍別名。典見爾雅。詳『柚』條。

【欉木】　卽莎木麪之古籍別名。典見綱目。詳『莎木麪』條。

【欈檀】　卽檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『檀香』條。

【灌菓】　卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【灌草】　**古籍別名**　鼠肝。（別錄）

形態　灌草爲雜草類之一種。其葉滑而色清白。可供藥用。

主治　療癰腫。

【爛瓜】　卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【爛石草】　卽馬先蒿之古籍別名。典見別錄。詳『馬先蒿』條。

【爛茶葉】　**基本**　本品乃泡過如乾則以茶汁浸入愈久愈妙。

效能　清火。解毒。

配合應用　㈠治無名腫毒。犬咬及火燒成瘡。俱效。如神。搗爛似泥。敷之。乾則以茶汁潤溼。抹去再換。敷五六次。全愈。（救生方）㈡治痘瘡。用泡過茶葉。曬乾爲末。同五棓子各等分。雞子清調敷。（家寶方）㈢治諸毒。努肉不退。硫黃研細末。敷上。卽退。再用後收口藥。爛茶葉五錢。烏梅三個。燒灰。共爲末。敷上。卽收。（保和堂祕方）

【爛砂星】　卽夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夜明砂』條。

【爛紫精】　卽夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夜明砂』條。

【爛腸草】　卽鉤吻之俗名。詳『鉤吻』條。

【爛樝】　卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【獾】㊀卽狠之牡者。典見爾雅。詳『狠』條。㊁卽狗獾之原名。詳『狗獾』條。

【獾狗】卽貉獾之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『貉獾』條。

【癩漢指頭】卽枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【癩葡萄】卽苦瓜之古籍別名。典見救荒本草。詳『苦瓜』條。

【癩蝦蟆】卽蟾蜍之古籍別名。典見綱目。詳『蟾蜍』條。

【竈中黃土】卽伏龍肝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『伏龍肝』條。

【竈心土】卽伏龍肝之原名。詳『伏龍肝』條。

【竈心黃土】卽伏龍肝之處方用名。詳『伏龍肝』條。

【竈突墨】卽百草霜之古籍別名。典見綱目。詳『百草霜』條。

【竈馬】古籍別名　竈雞　竈壁雞（俗名）

外國名詞　Diestrammena japonica, Brum.（拉丁）カマドウマ（日本）

基本　係節肢動物昆蟲類直翅類螽斯科之竈馬。

產地　生陰濕地及竈屋間。

形態　竈馬爲化生蟲類之一種。其體裸出無翅。故無鳴器。亦無聽器。其背駝起。色赤褐。頭小。有絲狀之觸角。後肢强大。尾有長刺。善跳躍。可供藥用。

主治　療竹刺入肉。取一枚搗傅。

【竈煙煤】卽百草霜之處方用名。詳『百草霜』條。

【竈煤】卽百草霜之處方用名。詳『百草霜』條。

【竈壁雞】卽竈馬之俗名。詳『竈馬』條。

【竈雞】卽竈馬之俗名。詳『竈馬』條。

【竈顙墨】卽百草霜之古籍別名。典見綱目。詳『百草霜』條。

【籠】卽竹筍之古籍別名。典見僧贊寧。詳『竹筍』條。

【纈草根】卽甘松之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『甘松』條。

【續命筒】卽乾漆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『乾漆』條。

【續毒】卽狠毒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『狠毒』條。

【續根草】卽香附子之古籍別名。典見圖經本草。詳『香附子』條。

【續骨木】卽接骨木之古籍別名。典見綱目。詳『接骨木』條。

【續絃膠】卽防風之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防風』條。

【續筋根】卽旋花之古籍別名。典見圖經本草。詳『旋花』條。

【續隨子】命名　本品葉中出葉數數相續而生。故名冬月始長。故又名拒冬也。

處方用名　千金子。

古籍別名　拒冬（開寶）千兩金　菩薩豆（日華）　聯步（斗門方）　百兩金　白隨子　反時生　半枝蓮　蜀隨子（和漢藥考）

外國名詞　Semen Euphordiae Lathyris

基本　係屬大戟科續隨子之種子。

產地　馬志曰。續隨子蜀郡處處有之。

形態　續隨子爲一年生草。秋季抽圓莖。高達三四尺。葉初狹長。後變闊大。每節對生。作十字形。葉背及莖呈白色。夏季於葉腋開四瓣。黃紫色花。後結黑褐色扁圓形種子。大四五分。有三溝。成熟則三裂。中有種子三個。爲類似蓖麻子之種子。大約一分五釐。表面呈淡褐色。有紋理。味辛有毒。

採取　八九月採實晒乾。

製法　李時珍曰。凡用去殼取色白者。以紙包壓去油。取霜用之。

性質　辛。溫。有毒。

成分　東京化學會誌第十帙第八册載有藥學博士田原良純氏之漢藥續隨子所含結晶成分實驗一文。言該藥中含有二種結晶性物質。其一爲愛斯克列丁。約含有〇・九%云。

效能　下水。破血。與大戟甘遂功效相同。用作瀉劑。又治疥癬或除疣黑子。

主治　婦人血結月閉。癥血瘕瘵。痰癖。除蟲毒鬼疰。心腹痛。冷氣脹滿。利大小腸。下惡滯物。

歷代記述攷證　【唐】韓保昇曰。蜀本草論續隨子。積聚痰飲。不下食。嘔逆。及腹內諸疾。碎研酒服。不過三顆。當下惡物。【宋】大明曰。華陰家本草論續隨子。曰。宣一切

977／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

滯。治肺氣水氣。日服十粒。瀉多。以酸漿水或薄醋粥喫即止。又塗疥癬瘡。【明】繆希雍本草經疏論續隨子曰。續隨子味辛氣溫。而其性有毒。實攻擊劫伐之藥也。長於解蠱毒鬼疰。以致腹痛脹滿。攻積聚。下惡滯物。及散痰飲。至於婦人月閉癥瘕。痃癖瘀血。大小腸不利。諸病則各有成病之由。當求其本而治。不宜概施。蓋此藥之爲用。乃以毒攻毒之功也。

國外學說　日本藤子氏曰。續隨子與甘遂、大戟、共有峻下之效。其有效成分未詳。田原良純氏於續隨子中離檢出エスクレチン而於治療上亦爲無效。（藥學雜誌第九十三號）然漢醫用之爲下劑之外。治疥癬。或除疣黑子。稱爲有效。其用量自二、八至八、〇。又和漢藥考曰。續隨子者。俗云。爲毒蟲所螫時。壓壞此實。而摩擦之。或於金瘡等用之甚妙。又日本九州土人。中食毒時。食此實。可以吐瀉毒物。見農業雜誌。愛斯克列丁 Aesculetine. $C_9H_6O_4$。爲無色無臭之光耀針狀結晶。無味。稍溶於冷水及冷酒精。遙熱湯與熱酒精。頗易溶化。但遙伊打哥羅仿姆及硫化炭等。概不溶解。熱之約於攝氏二百八十度。漸次分解而溶化。本品溶液由醋酸鉛而生黃色沈澱。（自東京化學會誌第十帙第八册摘錄）結晶性成分之愛斯克列丁。據已故醫學博士猪子吉人氏言。在治療上並無功效云。

配合應用　㈠治小便不通。脾腹脹痛不可忍。用續隨子一兩。鉛丹半兩。同少蜜搗作圓。瓶盛。埋陰處。臘月至春末取出。研蜜丸。梧子大。每服二三十丸。木通湯下。（聖濟總錄方）

㈡治涎積癥塊。用續隨子三十枚。膩粉二錢。青黛炒一錢。研勻。糯米飯丸。芡子大。每服一丸。打碎。以大棗一枚。燒熟。去皮核。同嚼。冷茶送下。半夜後取下積聚惡物爲效。（聖濟總錄方）

㈢治蛇咬腫悶欲死。用重臺六分。續隨仁七粒。搗篩爲散。酒服方寸匕。兼唾和少許。用塗咬處立效。（崔元亮海上方）

㈣治黑子疣贅。續隨子於熱時塗之自落。（普濟方）

㈤治水氣腫脹。聯步一兩。去殼研壓去油。重研。分作七服。每治一人。用一服。丈夫生餅子酒下。婦人荊芥湯。五更服之。當下利。至曉自止。後以厚朴湯補之。頻喫益善。忌臘酸一百日。乃不復作。聯步即續隨子也。（斗門方）

㈥治陽水腫脹。續隨子炒去油二兩。大黃一兩爲末。酒水丸。綠豆大。每服以白湯送下五十丸。以去陳莖。（摘玄方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡非氣壯邪實及脾虛便滑者禁用。

書名方劑　解毒萬病丹。治一切藥毒。疫死牛馬河豚等毒。及瘟疫熱毒。癰疽發背等症。山茨菰（去皮洗淨焙）二兩。川文蛤（搥破洗刮）千金子（去殼研盡油）二兩。麝香（細研）三錢。大戟（洗焙）一兩。上各研末。以糯米粥爲劑。每料分作四十粒。於端午七夕重陽合。如欲急用。辰日亦得。於木臼中杵數百下。

參攷資料　㈠續隨下水最速。然有毒損人。不可過多。（蘇頌）㈡續隨與大戟、澤漆、甘遂、莖葉相似。主療亦相似。其功皆長於利水。惟在用之得法。亦皆要藥也。（李時珍）㈢續隨子生蜀郡。處處亦有之。苗如大戟。（馬志）㈣今南中多有。北土產少。苗如大戟。初生一莖。莖端生葉。葉中復出葉。花亦類大戟。自葉中抽幹而生。實青有殼。人家園庭中多種以爲飾。秋種冬長。春秀秋實。（蘇頌）㈤莖中亦有白汁。可結水銀。（李時珍）㈥續隨子仁最下痰飲。用白者十數粒。研碎。去油服之。痰水即下。又曰。續隨子仁。驅逐痰飲。亦良物也。（黃元御）㈦續隨斷其莖梗。則滲出乳液。觸於皮膚。則局部發疹。若誤食子實。則起刺衝而下痢。（和漢藥考）㈧日本於天文年間。始由葡萄牙傳入。續隨子。故俗有呼爲葡萄草者。（和漢藥考）

【續隨莖】　主治　剝人面皮。去黯證。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論續隨莖曰。傅白斑無驗。

978／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【續隨葉】主治　搗傳蟓螫。

【續斷】命名　本品功能續折接骨。故名。

處方用名　川斷。川斷肉。

古籍別名　屬折（本經）接骨。龍豆（別錄）南草（綱目）桃生龍立。桃桃生諸藤斷續斷藤（和漢藥考）馬薊根（初虞氏古今錄驗方）

外國名詞　Sonchus asper, Vill.（拉丁）

基本　屬骨形科續斷之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。續斷產湖北省沙市內輿山宜都、宜邱市等。名曰川斷。實出自湖北。味微苦而帶甘甜。又有一種產廣東樂昌星子、連州東陂等處。名曰西斷。實出自廣東。

形態　續斷爲原野自生之多年生草。春季自宿根抽出方莖。高達一二尺。葉對生。具有長葉柄。作卵圓形或心臟形。前端尖。邊緣有鋸齒。花爲白色或帶紫色。骨形花冠。開於葉腋。其根爲赤黃色長細根。叢生於一莖。其乾燥者皮部呈黃色。有皺襞。破折則發粉塵。

種類　㊀中國產之續斷根粗。類薊根。謂之南續斷。㊁日本產之續斷根細而長。謂之川續斷。

採取　七八月間採根陰乾。

製法　雷敦曰。凡採得根橫切劑之。又去向裏硬筋。以酒浸一伏時。焙乾入藥用。

性質　苦。微溫。無毒。

效能　補肝腎。續筋骨。通血脈。利關節。爲續筋骨跌折藥。又爲金瘡癰瘍藥。

主治　傷寒補不足。金瘡癰瘍。折跌續筋骨。婦人乳難。久服益氣力（本經）婦人崩中漏血。金瘡血內漏。止痛。生肌肉及跟傷惡血腹痛。關節緩急（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論續斷曰。去諸溫毒。通宣血脈。【宋】大明諸家本草論續斷曰。助氣。補五勞七傷。破癥結瘀血。消腫毒。腸風痔瘻。乳癰瘰癧。婦人產前後一切病。胎漏。子宮冷。面黃虛腫。縮小便。止泄精尿血。【明】繆希雍本草經疏論續斷曰。續斷本經味苦微溫。別錄益之以辛。曾得蜀中者嘗之。其味帶甘。應云味苦甘辛微溫無毒。使非味甘。焉能主傷中補不足。非辛焉能主金瘡癰傷折跌續筋骨。婦人乳難。辛能潤苦溫能散。甘能益血。故別錄又主崩中漏血。金瘡血內漏。止痛。生肌肉。及跟傷惡血。腰痛。關節緩急。本經久服益氣力。傷去血生之效也。入足厥陰少陰。爲治胎產續絕傷補不足。療金瘡。理腰腎之要藥也。【清】黃宮繡本草求眞。論續斷曰。續斷因何以續爲名。蓋緣其味苦。其性溫。能入腎經以補骨。又緣其味辛。能入肝經以補筋。味兼甘。又入中州以補虛。凡跌撲折傷癰腫。暨筋骨曲節血氣滯之處。服此。即能消散。止痛生肌。且審其味濇。故能止血治血。並縮小便。固精安胎。久服能氣力培增。筋斷復續。故曰續斷。實疏通氣血筋骨第一藥也。第因氣薄。而見精脫胎動。溺血失血等症。則又深忌。以性下流者故耳。功與地黃、牛膝、杜仲、巴戟相等。但有溫補細微之別。不可不知。川產者良。狀如雞脚。皮黃鐵節節斷者眞。去裏硬筋。酒浸用。

近人學說　㊀賈九如曰。續斷苦養血脈。辛養皮毛。善理血脈傷損。接續筋骨斷折。故名續斷。外消乳癰瘰癧。內清痔漏腸紅。以其氣和味清。胎產調經。最爲穩當。且苦能堅腎。辛能潤腎。可療小便類數。精滑夢遺。腰背酸疼。足膝無力。此皆腎經症也。若同紫菀用之。調血潤燥。治血枯便閉。大能宣通血氣。而不走泄。㊁張山雷曰。續斷蔓延甚遠。味苦辛而微甘。其氣溫和。氣味俱厚。故兼入氣血。能宣行百脈。通利關節。凡經絡筋骨血脈諸病。無不主之。而通痺起痿。尤有特長。又其味苦而濇。能行能止。則療崩漏帶下血痢淋濁。而女科之胎產經帶。奇經八脈諸病。及傷科跌閃跌仆諸證。外瘍癰腫潰腐。支節痠疼。風伸不利等病。類皆賴以成功。其效甚宏。其用頗廣。加以呈功頗捷。而性又柔和。無燥烈剛暴之弊。是眞名將風流。雍容撝揚。以奏膚功。而殲大敵。洵非猛將之偏鋒陷陣者所可同日語矣。

配合應用　㊀行血理傷。用續斷、當歸、牛膝、肉桂、延胡索。

979／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈢止血。補不足。療崩中。用續斷、白膠、阿膠、地黃、麥門冬、杜仲五味子、山茱萸、人參、枸杞子、黃耆。㈢安胎。續斷涼血補血。與順氣藥同用。㈣療金瘡。續斷與金瘡藥同用。㈤治小便淋瀝。生續斷搗絞汁服。即馬齒根也。（初虞氏古今錄驗方）

㈥治妊娠胎動兩三月墮。預宜服此。川續斷酒浸杜仲薑汁炒去絲各用二兩爲末。棗肉煮爛。杵和丸。梧子大。每服三十丸。米飲下。㈦治產後諸疾。血暈心悶。煩熱煩厭。氣欲絕。心頭硬。乍寒乍熱。續斷皮一握。水三升。煎二升。分三服。如人行一里再服。無所忌。此藥救產後垂死。（子母祕錄方）

㈧治打撲傷損。閃肭骨接。用節骨草葉搗爛。罨之立效。（衞生易簡方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無瘀阻及風寒濕滯者禁用。惡雷丸。地黃爲之使。

參攷資料　㈠宋張潛祕書。知劍州時。其閽下病血痢。一醫用平胃散一兩。入川續斷末二錢半。每二錢。水煎服。即愈。紹興壬子會稽時行痢疾。叔潛之子。以方傳人。往往有驗。小兒痢服之效。（李時珍）㈡按桐君藥錄云。續斷生蔓延。葉細。莖如荏大。根本黃白有汁。七月八月採根。今皆用莖葉節節雞皮黃斑狀如雞脚者。又呼爲桑上寄生。時人又有接骨樹。高丈餘。許葉似蒴藿。皮主金瘡。廣州又有續斷藤。一名諸藤。斷其莖。以器承取汁。飲療虛損絕傷。用沐頭長髮。折枝插地。即生。恐皆非眞。李當之云。是虎痴。與此大乖。但虎痴亦療血。（陶弘景）㈢所在山谷皆有。今俗用者。葉似荨而莖方。根如大薊。黃白色。陶說非也。（蘇恭）㈣今陝西河中興元舒越晉絳諸州亦有之。三月以後生苗。幹四稜。似荨麻。葉兩兩相對而生。四月開花。紅白色。似益母花。根如大薊。赤黃色。謹按范汪方云。續斷即是馬薊。與小薊葉相似。但大於小薊爾。葉似旁翁菜而小厚。兩邊有刺。刺人。其花紫色。與今越州所圖者相類。而市之貨者。亦有數種。少能辨其粗良。醫草茅根緣眞相似。若誤服。令人筋軟。（蘇頌）㈤續斷之說不一。桐君言是蔓生。葉似荏李。當人但以節節斷皮黃斑者爲眞。（李時珍）㈥凡使忽用之。范汪並言是虎痴。日華子言是大薊。一名山牛旁。蘇恭蘇頌皆言葉似荨麻。根似大薊。而名醫別錄復出大小薊條。頗難依據。但自漢以來。皆以大薊爲續斷。相承久矣。究其實則二蘇所云。似與桐君相符。當以爲正。今人所用。以州中來。色赤而瘦。折之有烟塵起者爲良焉。鄭樵通志謂范汪所說者。乃南續斷。不知何據。蓋以別川續斷耳。（雷敩）㈦續斷。舉世用以安胎。而不知續斷味苦。專入血分。活血消腫。故乳癰瘍結腸風痔瘻。金瘡跌仆。一切血瘀之症。皆可用也。雖稍有澁性。行不至泄。然誤施於氣弱氣陷之婦女。則順流而下。奔迫莫禦。而有排山倒海之勢。豈區區澁味所能止其萬一者乎。夫胎壓本忌血行氣陷。則服此味。亦有奏效者。以人身氣血貴乎溫通。胎壓之因不一。亦有因腎氣不溫。經血凝滯。而胞胎失養者。得此一味。則氣煦血濡。不滯不漏。而胎自安矣。止爲下虛上實者設。故胎壓而尺强寸弱者。勿作少氣。表虛惡風。汗時出者。心下懸飢。得食則止者。一身之氣。盡欲下墜者。皆在禁例。（黃宮繡）

【續斷藤】　即續斷之古籍別名。見和漢藥考。詳『續斷』條。

【纈木香】　即乳香之古籍別名。見和漢藥考。詳『乳香』條。

【纈枝牡丹】　即旋花之古籍別名。典見綱目。詳『旋花』條。

【蘘荷】

古籍別名　覆葅。蘘草。（別錄）獗苴。蔕苴。（說文）嘉草。（綱目）茗荷。（日本）陽藿。（植物圖考）陽荷。（點志）

外國名稱　Zingiber Mioga, Rosc.（拉丁）メウガミョーガ（日本）

基本　係蘘荷科。爲蘘荷之根。

產地　凡山野原澤有出。

形態　蘘荷爲溼草類之多年生草本。高二三尺。葉呈長橢圓形。端尖。類似薑葉。長達尺餘。夏秋之間。花軸自地下莖抽出。着以多數之花。如穗狀。由鱗狀葉被包之。花

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

被淡黃色不整齊嫩莖及花序有一種香氣其根與葉可供藥用。



蘘荷

採取　八九月採根。

製法　雷敩曰凡使勿用草牛草眞相似其草牛草腥澀凡使白蘘荷以銅刀刮去粗皮一重細切入砂盆中研如膏取自然汁鍊作煎新器攤冷如乾膠狀刮取用之。

性質　辛溫有小毒。

主治　中蠱及瘧搗汁服。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論蘘荷根曰溪毒沙蟲蛇毒【唐】蘇恭新修本草論蘘荷根曰諸惡瘡根心主稻麥芒入目中不出以汁注目卽出【明】李時珍本草綱目論蘘荷根曰赤眼澀痛擣汁點之。

參攷資料　㊀按干寶搜神記云外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱其家密以蘘荷置於席下忽大笑曰蠱我者張小小也乃收小小小小亡走自此解蠱藥多用之往往驗也周禮庶氏以嘉草除蠱毒宗懍謂嘉草卽蘘荷是也陳藏器云蘘荷舌根爲主蠱之最謂此（蘇頌）㊁本草白蘘荷而今人呼赤者爲蘘荷白者爲覆葅蓋食以赤者爲勝入藥以白者爲良葉同一種爾（陶弘景）㊂蘘荷荊襄湖江間多種之北地亦有春初生葉似甘蕉根直牙而肥其葉冬枯根堪爲葅其性好陰在水下生者尤美潘岳閑居賦云蘘荷依陰時饗向陽是也宗懍荊楚歲時記云仲冬以鹽藏蘘荷用備冬儲又以防蟲史游急就篇云蘘荷冬日藏其來遠矣然有赤白二種白者入藥赤者堪噉及作梅果多用之（蘇頌）㊃蘘荷八九月間淹貯以備冬月作蔬果治病止用白者（寇宗奭）㊄蘇頌圖經言荊襄江湖多種今訪之無復識者惟楊愼丹鉛錄云愈就章註蘘荷卽甘露考之本草形性相同甘露卽芭蕉也崔豹古今注云蘘荷似芭蕉而白色其子花生根中花未敗時可食久則消爛矣根似薑宜陰翳地依陰而生又按王旻山居錄云蘘荷宜樹陰下二月種之一種永生不須鋤耘但加糞耳八月初踏其苗令死則根滋茂九月初取其傍生根以爲葅亦可醬藏十月初中以糠覆其根下則過冬不至於凍死也（李時珍）

【蘘荷草】　**性質**　苦甘寒無毒。

主治　溫瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥。

【蘘草】　卽蘘荷之古籍別名。典見別錄。詳『蘘荷』條。

【蘘木】　卽黃柏之原名。詳『黃柏』條。

【蘘皮】　卽黃柏之原名。詳『黃柏』條。

【蘘蕠】　**古籍別名**　燕蕠（毛詩）婁舌（廣雅）山葡萄（唐註）野葡萄（俗名）藤名木龍（綱目）

外國名詞　Vitis Thunbergii, Sieb. Z.（拉丁）エビヅル　エビカヅラ　イヌエビ（日本）

基本　係葡萄科葡萄屬爲蘠蕠之子實其藤根詳各該條。

產地　生山野間。

形態　蘠蕠爲果類之蔓生草本狀如灌木蔓有卷鬚攀緣樹木葉掌狀淺裂有鋸齒基部呈心臟形表面平滑背面密生淡褐色毛聚如綿狀夏間出花軸於莖開總狀花序花小黃綠色有五瓣結實爲漿果球形色紫黑似葡萄而小可供食與藥用。



蘠蕠

性質　甘酸無毒。

主治　止渴悅氣益氣。

【蘠蕠】　卽千歲藾之古籍別名。典見蘇恭新修本草。詳『千歲藾』條。

【蘠蕠根】　**性質**　甘平無毒。

主治　下焦熱痛淋閟消腫毒。

【蘠蕠藤】　**性質**　甘平無毒。

主治　噦逆傷寒後嘔噦搗汁飲之良。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論蘠蕠藤曰止渴利小便。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【龍草】卽烏蘞莓之古籍別名。典見本草集註詳『烏蘞莓』條。

【龍鼓】卽菰草之古籍別名。典見詩經詳『菰草』條。

【龍蓯】卽馬蓼之古籍別名。典見綱目詳『馬蓼』條。

【龍鬚】卽罌麥之古籍別名。典見和漢藥考詳『罌麥』條。

【蘧麥】卽罌麥之古籍別名。典見爾雅詳『罌麥』條。

【蘧蔬】卽葵粑之古籍別名。典見綱目詳『葵粑』條。

【蘩】卽白蒿之古籍別名。典見爾雅詳『白蒿』條。

【蘩縷】命名　本品蔓莖甚繁。而中有一縷。故名。

古籍別名　蘼蕪。(爾雅)蘪蕪。(郭璞)滋草。(千金)鵝腸菜。(綱目)鵝腸草。(千金食治)

基本　屬石竹科蘩縷之莖莖。

產地　凡山野川澤及溼地間恒有生焉。

形態　蘩縷爲山野自生之一年生草或越年生草。莖細長。蔓延地上。接地處有節。生根。葉對生。作卵圓形。四五月間開白色二深裂五瓣花。後結蒴果。種子破蒴之前端而散布。



蘩縷

種類　㈠鵝腸味甘。莖空。有縷花白色。㈡雞腸味微苦。咀之涎滑。莖中無縷。色微紫。花亦紫色。

採取　五月間採之。

製法　凡使以葉青花白者。採苗晒乾入藥用。

用法　水煎飲。或生搗或剉末用。

性質　酸。平。無毒。

效能　破血。治瘡。用治諸瘡藥。

主治　積年惡瘡痔不愈。

歷代記述考證　【唐】陳藏器本草拾遺論蘩縷曰。破血。下乳汁。產婦宜食之。產後腹有塊痛。以酒炒絞汁溫服。又曝乾爲末。醋糊和丸。空腹服五十丸。取下惡血。

國外學說　和漢三才圖會曰。凡瘡癤之藥。多用鵝腸菜汁傅之。和漢藥考曰。蘩縷。昔時用作牙粉。云有保護齒牙功效。製法於端午日採取葉莖絞汁。與鹽同煉和。後燒製。

配合應用　㈠食治烏髭。蘩縷爲末。久久食之。能烏髭髮。(聖惠方)㈡治小便卒淋。蘩縷草滿兩手。水煮。常常飲之。亦治產婦有塊作痛。(范汪東陽方)㈢治丈夫陰瘡。莖及頭潰爛痛不可忍。久不癒者。以五月五日蘩縷燒焦五分。入新出蚯蚓屎二分。入少水和研。作餅貼之。乾卽易。禁酒麵五辛及熱食等物甚效。(扁鵲方)

用量　錢半至二錢。

參攷資料　㈠此菜五月五日採曝乾。燒作屑。療雜瘡有效。亦雜百草服之。不止此一種也。(陶弘景)㈡治惡瘡有神效之功。搗汁塗之。作菜食。益人。須五月五日者。乃驗。又曰。能去惡血。不可久食。恐血盡。(孟詵)㈢此草莖甚繁。中有一縷。故名。俗呼鵝兒腸菜。象形也。易於滋長。故曰滋草。古樂府云。爲樂當及時。何能待來滋。滋乃草名。卽此也。(李時珍)㈣蘩縷五月五日中採乾用。(別錄)㈤蘩縷卽藤也。又恐白軟草是之。(孟詵)㈥卽雞腸也。南中多有之。生於田野間。近林下濕地。亦或有之。葉似荇菜而小。夏秋間生小白黃花。其莖梗作蔓。斷之有絲縷。又細而中空。似雞腸。因得此名。本草蘩縷。雞腸作兩條。蘇恭以爲一物。謹按郭璞註爾雅云。蘩縷一名雞腸草。實一物也。今南北所生。或肥瘠不同。故人疑爲二物。而葛洪肘後方治卒淋云。用雞腸及蘩縷。如此又似是二物。其用大概主血。故人宜食之。(蘇頌)㈦蘩縷卽鵝腸非鷄腸也。下溼地極多。正月生苗。葉大如指頭。細莖引蔓。斷之中空有一縷如絲。作蔬甘脆。三月以後漸老。開細瓣白花。結小實。大如稗粒。中有細子。如蓼實子。吳瑞本草謂黃花者爲蘩縷。白花者爲雞腸。亦不然。二物蓋相似也。(蓋分明於種類耳)(李時珍)

【蘭江】卽澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考詳『澤瀉』條。

【蘭花】卽白蔑之古籍別名。典見

982／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蕈芳譜。詳『白茂』條。

【蘭花結】卽伽南香之色微綠而黑者。詳『伽南香』條。

【蘭花露】基本　本品係蘭花蒸取之露。

性質　氣薄。味淡。

主治　明目舒鬱。

【蘭香】㊀卽羅勒之古籍別名。典見補註本草。詳『羅勒』條。㊁卽佩蘭之別名。詳『佩蘭』條。

【蘭根】卽白茅根之古籍別名。典見本經。詳『白茅根』條。

【蘭草】卽草蘭之原名。詳『草蘭』條。

【蘭華】卽連翹之古籍別名。典見吳普本草。詳『連翹』條。

【蘭桃】卽白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【蘭蓀】卽白菖之古籍別名。典見本草集註。詳『白菖』條。

【蘭蓀花】卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【蘭澤草】卽草蘭之古籍別名。典見本草集註。詳『草蘭』條。

【蘭薰】卽火腿之古籍別名。典見王士雄飲食譜。詳『火腿』條。

【蘞蘆】卽天門冬之古籍別名。典見爾雅。詳『天門冬』條。

【蘞靡實】卽營實之原名。詳『營實』條。

【蠟子】卽寶石之色紫者。性質功效與寶石同。詳『寶石』條。

【蠟片】卽鹿茸之花名。詳『鹿茸』條。

【蠟珀】卽琥珀之古籍別名。典見綱目。詳『琥珀』條。

【蠟茶】卽茶之別名。性質功效與茶同。詳『茶』條。

【蠟梅花】命名　本品形似梅類。而與梅同時。香又相近。色似蜜蠟。故名。

古籍別名　黃梅花。不經接者。名狗蠅梅。已接者名磬口梅。色如紫檀者。名檀香梅。（綱目）

外國名詞　Calycanthus praecox, L.（拉丁）ラフバイ　カラウメ　ナンキンウメ　ナンキンムメ（日本）

基本　係蠟梅科蠟梅屬。爲蠟梅之花。

形態　蠟梅爲灌木類之落葉木本。高七八尺。大者丈餘。葉對生。作卵圓。有尖端。冬月開花。花有香氣。花色外黃蠟色。內帶紫色。結實如垂鈴。尖長寸許。樹皮浸水磨墨。有光彩。其花可供藥用。



蠟梅花

性質　辛。溫。無毒。

主治　解暑生津。

【蠟魚】卽鱨魚之古籍別名。典見御覽。詳『鱨魚』條。

【蠟背雀】卽桑鳱之古籍別名。典見綱目。詳『桑鳱』條。

【蠟蜂】卽蜜蜂之古籍別名。典見綱目。詳『蜜蜂』條。

【蠟蔗】卽甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳『甘蔗』條。

【蠟樹】卽女貞之古籍別名。典見綱目。詳『女貞』條。

【蠟櫻】卽櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳『櫻桃』條。

【蠢牛】㊀卽蝸牛之古籍別名。典見藥性。詳『蝸牛』條。㊁卽蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【蠢魚】卽鱨魚之古籍別名。典見本經。詳『鱨魚』條。

【蠢實】卽馬藺子之原名。詳『馬藺子』條。

【蠣蛤】卽牡蠣之古籍別名。典見本經。詳『牡蠣』條。

【護火】卽景天之古籍別名。典見綱目。詳『景天』條。

【護生草】卽薺菜之古籍別名。典見綱目。詳『薺菜』條。

【護羌使者】㊀卽羌活之古籍別名。典見本經。詳『羌活』條。㊁卽獨活之古籍別名。典見本經。詳『獨活』條。

【鑛鼄】卽蟷蜘之古籍別名。典見綱目。詳『蟷蜘』條。

【鐵】命名　鐵者。截也。剛可截物。故名。

古籍別名　黑金。烏金。（綱目）

土錠鐵。（圖經本草）

基本　係金屬原質之一種。

產地　凡各省之山礦。咸有出。

形態　鐵質重。色黑。狀類乎石。入爐經煉者。或成條。或成塊。顏不

983／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一致。且磁力甚弱。易於傳電。置溼空氣中。遇三養化炭輒生鏽。遂成紅褐色之養化鐵。其性狀恒因製煉之法而異。

種類　㊀生鐵乃初煉去礦用以鑄器具者。㊁熟鐵乃生鐵再三銷拍。可以作錄。亦謂之鍊鐵者。㊂鋼鐵乃生熟相雜和用。以作刀劍鋒刃者。㊃鐵落乃鍛家燒鐵赤沸。砧上打下細皮屑。㊄鐵精乃鍛竈中飛出如塵色紫而輕虛。可以瑩磨銅器者。㊅鐵砂。乃作鐵家歷爐細末者。㊆鐵漿。乃諸鐵浸水中。經久色青。沫出可以染皂者。㊇鐵華粉。乃鐵塗醋鹽。使生衣。刮取成粉者。㊈鐵粉。乃鐵經火飛鍊而成粉者。㊉鐵線粉。乃溶鐵鍋中浮起之白沫。形如枯礬。色白搗細而成粉者。(一)鐵鏽。乃鐵上自生之赤衣。(二)鐵蒸。乃以竹木蒸火。於刀斧刃上燒之津出。如漆者。

用法　水煎或水浸取汁入藥用。

性質　辛。平。有毒。

效能　墜痰鎮驚。專作鎮逆藥。

主治　堅肌耐痛。(本經)下部及脫肛。(別錄)

歷代記述弦要　【宋】大明諸家本草論鐵曰。鐵心安五臟。治癇疾。黑髮。治癬及惡瘡疥。蜘蛛咬。蒜磨生油調傅。【明】李時珍本草綱目論鐵曰。散瘀血。消丹毒。

配合應用　㊀治脫肛歷年不入者。生鐵二斤。水一斗。煮汁五升。洗之。日再。(集驗方)

㊁熱甚耳聾。燒鐵投酒中飲之。仍以慈石塞耳。日易。夜去之。(千金方)

㊂小兒丹毒。燒鐵淬水。飲一合。(陳氏本草方)

㊃治小兒燥瘡。一名爛瘡。燒鐵淬水中二七遍。浴之。二三起作漿。(子母祕錄方)

㊄打撲瘀血。在骨節及脇外不去。以生鐵一斤。酒三升。煮一升服。(肘後方)

㊅熊虎傷毒。生鐵煮令有味。洗之。(肘後方)

施用宜忌　畏慈石、皂莢。

參攷資料　㊀諸藥療病並不入散。皆煮取汁用之。(蘇恭)㊁鐵砂鐵精。並入丸散。(陳藏器)㊂鐵遇神砂。如泥似粉。(雷敩)㊃鐵畏皂莢、豬犬脂、乳香、朴硝、礜砂、鹽鹵、荔枝、猿食鐵而蛟龍畏鐵。凡諸草木藥皆忌鐵器。而補腎藥尤忌之。否則反消肝腎。蓋肝傷而毋氣愈虛矣。(李時珍)㊄經用平平之鐵。此柔鐵即熟鐵也。(蘇恭)㊅鐵皆取礦土炒成。秦、晉、淮、楚、湖南、閩、廣諸山中皆產鐵。以廣鐵爲良。甘肅土錠鐵色黑性堅。宜作刀劍。西番出賓鐵尤勝。寶藏論云。鐵有五種。莉鐵出當陽。色紫而堅利。上饒鐵次之。賓鐵出波斯。堅利可切金玉。太原蜀山之鐵頑滯。副鐵生西南瘴海中山石上。狀如紫石英。水火不能壞。穿珠切玉如土也。土宿本草云。鐵受太陽之氣。始生之初。鹵石產焉。一百五十年而成慈石。二百年孕而成鐵。又二百年不經採鍊而成銅。銅復化爲白金。白金化爲黃金。是鐵與金銀同一根源也。今取慈石碎之。內有鐵片可驗矣。鐵稟太陽之氣而陰氣不交。故燥而不潔。性與錫相得。管子云。上有赭。下有鐵。(李時珍)㊆凡鐵劑雖性亦不同。但其功用則無異。血之紅色。恃鐵而得之。若血內之紅色。鐵料太少。則有血虛之病。身弱而瘦。無病之時。每血重百分。內含血輪十二分。患血虛者。則少於此比例。血輪內有鐵。能顯紅色。故凡服鐵劑。其意令血中多生血輪。人身更能堅壯。凡有血虛之病。以鐵爲要藥。然鐵劑雖爲補藥。若面色不白。而血內之血輪未減。服鐵劑無益。凡服鐵劑者。雖耐心日久。多食養身之物。又令大便常通。否則不能得鐵之益。按此論鐵之作用。要自確當。不可不參考也。(儒門醫學)㊇鐵礦於礦中鍊出者。謂之生鐵。鐵落斷而落者也。鐵鐵炒熟鐵也。剛鐵鍊鐵去滓者也。鐵精、針沙、鐵漿。已上三等。取汁。各依經用。鐵華粉、鐵粉。已上二等。燒煆取。馬啣、秤錘、車轄、杵鎞。已上四等。特以其意使之耳。其生鐵既自火中煉石而出。世謂之生鐵。亦如炒脂麻取油。謂之生油。其義亦同。白油麻條中已著鐵粉。以生薑汁調擦眉上。生眉毛。鋼鐵今用柔鐵。屈盤乃以生鐵陷其間。泥封煉之。煆令

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

相入。謂之團鋼。又曰澄鋼。此蓋草創之鋼。亦不免僞也。蓋生鐵之堅及三四鍊。則生鐵亦自熟。却是柔鐵。而天下莫以爲非。磁州鍊坊方識眞鋼。凡鐵之有鋼。如麵之有筋。澄洗揉麵既盡。筋乃見。鍊鋼亦然。恒取精鐵一百餘斤。每鍛一火。稱之遂輕。累鍛稱之。至於不減耗。此則純鋼也。實鐵之精純者。雖百鍊不耗矣。其色清明。磨瑩之則黯。黯而清且黑。亦有鍊之盡全無鋼者。聚地之所產。精粗爾。前所謂鐵精者。其說有二。陶隱居言出鍛竈中。如塵紫色。輕者爲佳。亦以磨瑩銅器用之。日華子又云。整鐵尖浸水名爲鐵精。本條既言化銅。則隱居所說是鎏鍛竈中塵紫。磨銅則明。浸整鐵尖水非是。（寇宗奭）

【鐵刀】　主治　蛇咬毒入腹。取兩刃於水中相摩。飲其汁。百蟲入耳。以兩刃於耳門上摩。敲作聲自出。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論鐵刀曰。磨刀水服。利小便。塗脫肛痔核。產腸不上。耳中卒痛。

【鐵刀環】　主治　產難。數日不出。燒赤淬酒一盃頓服。

【鐵木子】　卽桃椰子之古籍別名。典見綱目。詳『桃椰子』條。

【鐵甲將軍】　卽蜣螂之古籍別名。典見綱目。詳『蜣螂』條。

【鐵皮石斛】　卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【鐵朱】　卽代赭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『代赭石』條。

【鐵色草】　卽夏枯草之古籍別名。典見綱目。詳『夏枯草』條。

【鐵色箭】　卽石蒜之古籍別名。典見綱目。詳『石蒜』條。

【鐵衣】　卽鐵鏽之古籍別名。典見綱目。詳『鐵鏽』條。

【鐵角猴兒】　卽楓上寄生之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『楓上寄生』條。

【鐵赤衣】　卽鐵鏽之處方用名。詳『鐵鏽』條。

【鐵花】　卽鐵精之古籍別名。典見綱目。詳『鐵精』條。

【鐵胤粉】　卽鐵華粉之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『鐵華粉』條。

【鐵屑】　卽鐵落之處方用名。詳『鐵落』條。

【鐵指甲】　命名　本品形如指甲故名。

古籍別名　佛指甲。佛甲草。寄生。（綱目拾遺）

產地　常生牆脚石隙間。

主治　諸癤毒火丹。頭面腫脹。少入皮硝搗爲末。擦之。痛煆末擦之。

【鐵炭】㊀卽石炭之古籍別名。典見綱目。詳『石炭』條。㊁卽石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石灰』條。

【鐵胡蜂】　卽金頂龍芽草之古籍別名。典見百草鏡。詳『仙鶴草』條。

【鐵扇子】　命名　本品卽桑葉之採過頭次後其二葉至冬猶青。或乾枯在枝上。而又經霜雪壓過者。風吹作鐵器聲。故名。

採取　冬至後採者良。以線穿懸戶陰乾用。

主治　腸風。目疾。咳嗽。盜汗。

配合應用　㊀洗一切天行時眼。風熱腫痛。目蓋眩赤。取鐵扇子二張。用無油茶碗一隻。要有蓋者。置鐵扇子於中。以滾水沖半盞。蓋好。候湯溫。其色黃綠如濃茶樣爲出味。然後洗眼。拭乾。隔一二時再以藥汁碗隔水頓熱。再洗。每日洗三五次。卽愈。此水一盞可洗三四十人。（養素園驗方）

㊁治中年眼目昏花。復明散。用經霜雪桑葉。葉須臘月在樹不落者。同甘菊側栢葉荊芥穗。桑白皮。如有眵淚。加艾葉蒼朮。發擾加赤芍、川椒爲粗末。等分和勻。煎湯熏洗。惟紅腫者不可洗。（眼科要覽方）

㊂治風眼下淚。臘月不落桑葉煎湯。日日溫洗之。或加入芒硝少許。（不藥良方）

【鐵烏鈴】　古籍別名　鐵鈴草。（綱目拾遺）

形態　鐵烏鈴爲雜草類之一種。其本色黑。葉梗堅實如鐵。其汁亦黑。可供藥用。詳見該條。

主治　楊梅惡瘡。風氣癱瘓。損折筋骨。俱煎酒服。

【鐵烏鈴草汁】　主治　烏鬚。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鐵秤錘】基本　本品卽秤上之鐵錘。

性質　辛。溫。無毒。

主治　賊風。止產後血瘕腹痛。及喉痺熱塞。燒赤淬酒熱飲。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鐵秤錘曰。治男子疝氣。女子心腹妊娠腫滿。漏胎卒下血。

【鐵粉】命名　本品係用鋼鐵入火飛鍊而成粉狀。故名。

外國名詞　Ferrum Pulveratum.（拉丁）Iron Powder.（德）Isenpulder.（英）Isenpulder.

基本　係金屬爲鋼鐵鍊成之粉末。

產地　凡有爐冶之處咸有出。

形態　鐵粉質重而色灰黑。過磁石卽爲攝引。遇稀硫酸或稀鹽酸卽發水素瓦斯而溶解。於此鹽酸酸性溶液中。加水多量而稀釋之。再加以赤色血滷鹽溶液。則生深藍色之沈澱。百分中含有九十八分以上之純鐵。

製法　凡使以搗篩成粉用。

性質　鹹。平。無毒。

效能　安神。鎭心。平肝。定驚。用作鎭痙強壯藥。

主治　安心神。堅骨髓。除百病。變黑潤肌膚。令人不老。體健能食。久服令人身重肥黑。合和諸藥。各有所主。

歷代記述攷證　【清】黃宮繡本草求眞論鐵華粉曰。鐵粉氣辛性平。諸書所著治功。止載定驚療狂。治癰解毒數效。其所云定驚療狂。亦止就鐵重墜之意起見。故云可以定療。豈眞救本求源之治哉。

配合應用　㈠治驚癎發熱。鐵粉水調少許服之。（聖惠方）

㈡治急驚涎潮。壯熱悶亂。鐵粉二錢。硃砂一錢。爲末。每服一字。薄荷湯調下。（楊氏家藏方）

㈢治傷寒陽毒。狂言妄語亂走。毒氣在臟也。鐵粉二兩。龍膽草一兩。爲末。磨刀水調服一錢。小兒五分。（全幼心鑑方）

㈣治頭痛鼻塞。鐵粉二兩。龍腦半分。研勻。每新汲水服一錢。（聖惠方）

㈤治雌雄疔瘡。鐵粉一兩。葱菁根三兩。搗如泥。封之。日二換。（集元方）

㈥治風熱脫肛。鐵粉研。同白斂末。傅上按入。（直指方）

用量　五分至八分。

施用宜忌　凡腎虛及氣陷者禁用。畏磁石、皂莢。

參攷料資　㈠化痰鎭心。抑肝邪特異。（許叔微）㈡乃鋼鐵飛鍊而成者。人多取雜鐵作屑飛之。其體重。眞鋼者不爾也。（蘇恭）

【鐵粉】卽鐵華粉之處方用名。詳『鐵華粉』條。

【鐵拳頭】產地　生南安。

形態　叢生柔莖。細綠。每枝三葉。葉如薄荷。中有赤紋。結實黃如小球。硬尖如蝟。略似石龍芮。惟葉無歧。可供藥用。



鐵拳頭

主治　和筋締。蒸服。治失血。

【鐵骨散】產地　生建昌。

形態　叢生粗根似



鐵骨散

蓋莖赭色有節。對排比似接骨草。而微端亦寬。面綠背微黃。其根可供藥用。

主治　同甘草煎洗脚腫。

【鐵掃帚】卽馬鞭草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬鞭草』條。

【鐵掃帚子】㈠卽馬蔺子之古籍別名。典見救荒本草。詳『馬蔺子』條。㈡卽地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地膚子』條。

【鐵梗牛支】卽馬牙牛支之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『馬牙牛支』條。

【鐵液】卽鐵落之古籍別名。典見別錄。詳『鐵落』條。

【鐵連草】卽鐵樹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鐵樹』條。

【鐵筅草】卽馬鞭草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬鞭草』條。

【鐵筅箒】古籍別名　石打穿。千條針。（綱目拾遺）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

外國名詞　Lespedeza juncea, pers. var. sericea, Hemsl.

形態　山間多有之。綠莖而方。上有紫線紋。葉似紫頂龍芽。微有白毛。七月開小黃花。結實似筅箒形。能刺人手。

主治　風痺血崩。黃疸吐血。跌撲。鬼箭風。如神。搗敷肩癱。鶴膝風。鮮者連根葉。如秋冬根老。取葉汁加飛麵調勻包紮。煎湯浴瘡疥立愈。

配合應用　㈠治黃疸。用此草乾者一兩。白酒煎服四五劑即愈。（種福堂方）

㈡治鶴膝風。石見穿草用根。梗俱紅色者佳。連枝俱用。如秋冬根梗俱老。止用葉半分。俱要當日取新鮮者。隔宿勿用。連同鐵筅箒草一分。加飛麵少許。同打紫膝眼內。（種福堂方）

㈢治面上斑黶。取鐵筅箒地上自落下葉并子。煎湯澄清洗面。三四次其斑自消。（朱子和方）

㈣治腸癰。石打穿草按月取草頭一個。如三月三個。四月四個。以月分爲多寡之數。搗汁。同人乳羊乳汁攪勻服。立效。（蔣雲山傳方）

㈤治跌打傷。用鐵筅箒三兩酒煎服。并治跌打瘋腫。鐵筅箒八角金盤根。白毛藤。蘇木。赭石藤各一兩。酒浸十日用。（金居士選要方）

【鐵結】　卽伽倆香之色黑而質堅者。性質效能較伽南香劣遜。爲伽倆香之最下品。詳『伽倆香』條。

【鐵華粉】

命名　本品係以醋鹽塗鐵生衣。刮取如粉狀者。故名。

處方用名　鐵粉。鐵霜。

古籍別名　鐵胤粉（日華）鐵豔粉（綱目）

外國名詞　Eisenocher

基本　係金屬原質。爲鐵製成之衣末。

製法　馬志曰。作鐵華粉法。取鋼鍛作葉。如笏或圓。平面磨錯。令光淨。以鹽水洒之。於醋甕中。陰處埋之。一百日。鐵上衣生。卽成粉矣。刮取細搗篩。入乳鉢。研如麵。和合諸藥爲丸。散。此鐵之精華功用。强於鐵粉也。又大明曰。懸於醬瓶上生霜者。名鐵胤粉。淘去粗滓鹹味。烘乾用。

性質　鹹。平。無毒。

效能　治驚癎。療瘡瘍。用作鎮逆藥。又爲解毒藥。

主治　安心神。堅骨髓。强志力。除風邪。養血氣。延年變白。去百病。隨所冷熱和諸藥用。煮膏爲丸。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論鐵華粉曰。止驚悸。虛癎。鎮五臟。去邪氣。治健忘。冷氣心痛。痓癖癥結。脫肛痔漏。宿食等。及傅竹木刺入肉。

【鐵菱角】　卽菱之古籍別名。典見綱目。詳『菱』條。

【鐵塔草】　卽茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳『茜草根』條。

【鐵脚威靈仙】　卽威靈仙之處方用名。詳『威靈仙』條。

【鐵脚婆羅門草】　卽瓦松之赤者。古籍別名。典見綱目。詳『瓦松』條。

【鐵脚梨】　卽木瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木瓜』條。

【鐵落】

命名　本品乃鍛家燒鐵赤沸。砧上鍛落之皮甲。故名。

處方用名　生鐵落。鐵屑。

古籍別名　鐵液（別錄）鐵蛾（綱目）

基本　係金屬原質。爲鐵之細屑。

產地　凡爐冶砧旁。恒有之。

用法　水煎或研末用。

性質　辛。平。無毒。

效能　降火。潛陽。用作鎮逆藥。

主治　風熱。惡瘡瘍。疽瘡痂疥。氣在皮膚中。（本經）除胸膈中熱。氣。食不下。止煩。去黑子。可以染皂。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論鐵落曰。主鬼打鬼疰。邪氣。水漬沫出。澄清。暖飲一二盃。【唐】蘇恭新修本草論鐵落曰。炒熱投酒中飲。療賊風瘂。又裹以熨腋下。療胡臭有驗。【宋】大明諸家本草論鐵落曰。治驚邪癲癎。小兒客忤。消食及冷氣。並煎服之。【明】李時珍本草綱目論鐵落曰。平肝去怯。治善怒發狂。【明】繆希雍本草經疏論鐵落曰。鐵落是鍛家燒鐵赤沸。砧上煆之。如皮甲落下者。本出於鐵。不離金象。體重而降。故素問有生鐵落飲。以療病狂怒者。

987／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

云生鐵落下氣疾也。又狂怒屬膊氣暴升。故取金氣以制之也。其主氣在皮膚中及除胸膈中熱氣。食不下止煩者。皆制木散熱之功也。本經又主風熱惡瘡瘑疽瘡痂疥者。皆肝心火熱所致。辛平能除二經之火熱。故主之也。蘇恭以之炒熱投酒中飲。療賊風瘂大明治驚邪癲癎。小兒客忤。並煎服之。悉此意耳。

配合應用　小兒丹毒。煅鐵屑研末。豬脂和傅之。

參攷資料　㈠生鐵打鑄。皆有花出。如蘭如蛾。故俗謂之鐵蛾。今煙火家用之。鐵末浸醋書字於紙。背後塗墨。如碑字也。（李時珍）㈡按素問病態論云。帝曰。有病怒狂者。此病安生。岐伯曰。生於陽也。陽氣者。暴折而不洪。故善怒。病名陽厥。曰何以知之。曰陽明者常動。巨陽少陽不動而動大疾。此其候也。治之當奪其食。則已。夫食入於陰。長氣於陽。故奪其食。即已。以生鐵落爲飲。夫生鐵落者。下氣疾也。此素問本文也。愚嘗釋之云。陽氣拂鬱而不得疏越。少陽膽木挾三焦少陽相火。巨陽陰火上行。故使人易怒。如狂。其巨陽少陽之動脈可診之也。奪其食。不使胃火復助其邪也。飲以生鐵落。金以制木也。木平則火降。故曰下氣疾速。氣即火也。又李一南永類方云。腫藥用鐵蛾及人砂入丸子者。一生須斷鹽。蓋鹽性濡潤。腫若再作。不可爲矣。製法用上等醋煮半日。去鐵蛾。取醋和蒸餅爲丸。每臺湯服三四十丸。以效爲度。亦只借鐵氣爾。故日華子云。煎汁服之。不留滯於臟腑。借鐵虎之氣以制肝木。使不能尅脾土。土不受邪。則水自消矣。鐵精、鐵粉、鐵華粉、鐵漿、鐵砂入藥。皆同此意。（李時珍）

【鐵葛】

產地　生山峽間。

形態　鐵葛爲蔓草類之一種。葉似枸杞。根如葛而黑色。可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　一切風血氣羸弱。久服療風緩偏風。令人壯健。

【鐵葛藤】即葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『葛根』條。

【鐵蛾】

即鐵落之古籍別名。典見綱目。詳『鐵落』條。

【鐵鈴草】

即鐵烏鈴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鐵烏鈴』條。

【鐵精】

命名　本品係鐵經鍛如塵。乃其精華故名。

處方用名　鐵精粉。

古籍別名　鐵花（綱目）

基本　係金屬原質爲鐵鍊成之塵末。

性質　平。微溫。

效能　解毒療瘡。用作鎮逆藥。又作解毒藥。

主治　明目化銅。（本經）療驚悸。定心氣。小兒風癇。陰潰脫肛。（別錄）

配合應用　㈠下痢脫肛。鐵精粉敷之。（至寶方）㈡女人陰脫。鐵精、羊脂布裹炙熱熨之。（聖惠方）㈢男子陰腫。鐵精粉敷之。（子母祕錄方）㈣疔腫拔根。鐵渣一兩。輕粉一錢。麝香少許。爲末。鍼畫十字口。點藥入內。醋調麵糊傅之。神效。（普濟方）㈤食中有蟲。腹內堅痛。面目青黃。淋露骨立。病變無常。用爐中鐵精研末。鷄肝和丸。梧子大。食前酒下五丸。不過十日愈。（肘後方）㈥蛇骨刺人。毒痛。鐵精粉豆許。吹入瘡內。（肘後方）

參攷資料　鐵精。鐵之精華也。出鍛竈中。如塵。紫色。輕者爲佳。亦以磨墜銅器用之。（陶弘景）

【鐵精粉】即鐵精之處方用名。詳『鐵精』條。

【鐵綿草】

即蒴藋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒴藋』條。

【鐵漿】

命名　本品乃鐵浸水中。經久色青。沫出如漿者。故名。

處方用名　鐵漿水。

形態　鐵漿爲紅黃色稍混濁之液。略有酸敗之臭氣。味甘而有收斂性。遇單寧質。則生黑色之沈澱。可供藥用。

製法　以酸敗酒或甘酒之稀薄液。或米屑和水入壺中。投以鐵器之破片。或被燒養化之鐵屑。暫置暖處。不久。鐵繡自生鐵漿。而溶解於醋酸中。凡用取其上層澄清之液水。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　鹹。寒無毒。

成分　爲第一醋鐵酸（Fe $(C_2H_3O_2)_2$）之酸性溶液。

效能　鐵窩癇能解諸毒。用作收斂藥。

主治　鎮心明目。主癲癇。發熱急黃。狂走。六畜顛狂。人爲蛇犬虎狼毒刺惡蟲等嚙。服之毒不入肉也。兼解諸毒入腹。

配合應用　㊀治時氣生瘡。胸中熱。鐵漿飲之。

㊁治一切疔腫。鐵漿日飲一升。（千金方）

㊂治發背初起。鐵漿飲二升取利。（外臺祕要方）

㊃治蛇皮惡瘡。用鐵漿類塗之。（談埜翁方）

㊄治漆瘡作痒。用鐵漿類洗愈。（外臺祕要方）

參攷資料　㊀鐵漿是以生鐵漬水。服餌者旋入新水。日久鐵上生黃膏。則力愈勝。唐太妃所服者。乃此也。（陳承）㊁鐵漿造法。取舊鐵入器中。和米屑少許。漬水。夏三日。冬七日。置暖處。則生鏽汁。作紅黃色。味微甘者佳。（和漢三才圖會）

【鐵漿水】　卽鐵漿之處方用名。詳『鐵漿』條。

【鐵線粉】　**基本**　鐵絲起鏽。用刀刮其鏽。明亮如新。所刮下之鏽末。名鐵線粉。其色黃。另有鎔鐵鍋中。浮起白沫如枯蠻者。其色白。均眞。

主治　兩腿陰面溼癬。

【鐵線草】　**外國名詞**　Adiantum, L.（拉丁）カナクジヤクシダ（日本）

基本　係水龍骨科石長生屬。爲鐵線草之根。



鐵線草

性質　微苦。平。無毒。

主治　療風消腫毒有效。

配合應用　治男女諸風。產後風尤妙。鐵線草根五錢。五加皮一兩。防風二錢。爲末。以烏骨雞一斤重者。水內淹死。去毛腸。砍作肉。生入藥。剝勻。下麻油些少。炒黃色。隨人量入酒煮熟。先以排風藤煎濃湯。沐浴頭身。乃飲酒食雞。發出黏汗卽愈。如不沐浴。必發出風丹乃愈。（滑伯仁櫻寧心要方）

參攷資料　生饒州。三月採根陰乾。（蘇頌）

【鐵線草】　卽龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『龍鬚草』條。

【鐵線筒】　卽龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『龍鬚草』條。

【鐵線透骨草】　卽透骨草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『透骨草』條。

【鐵樹】　古籍別名　鐵蓮草。（綱目拾遺）

外國名詞　Pleasura sp.

產地　出閩粵諸地。

形態　鐵樹爲灌木類之一種。有數種。出廣西馴象衞境者。樹黑色。高數尺。枝細。刀斫不斷。斧之乃折。葉類石楠葉。蓬丁卯年開花四瓣。紫白色。形似瑞香。花圓小。累月不凋。色亦不變。其花可供藥用。

種類　㊀產瓊州島等處者。高一二尺。葉密生。花紅色。狀如鐵絲燈籠。廣張千葉。瓣各一花。枝皆鐵色。枝極穿絡而生。植之盆中。可供玩賞。㊁產廣東者。葉似翦而紫。幹如密節菖蒲。

主治　止血下痰。清痰火。療一切心胃氣痛。煎湯服。

【鐵樹】　卽鳳尾蕉之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鳳尾蕉』條。

【鐵樹開花】　**產地**　生建昌。

形態　一莖一葉。似馬蹄而尖。有微齒。與犁頭尖相類。而葉背白。細根可供藥用。

主治　同豬肺煮。治腸食症。

【鐵燈樹】　**產地**　江西湖南皆有之。



鐵燈樹

形態　鋪地而生。一莖一葉。葉似紫菀而寬。本圓末尖。夏間中抽一莖。長五六寸。頗似枯莖。秋深始從四面發小葉。顆作苞。開細瓣小白花。繖蒂。長二三分。葉蒂攢密青

989／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

赭斑駁。其根可供藥用。

效能　同酒煎服。能止痛活血。

【鐵精】即鐵華粉之處方用名。詳『鐵華粉』條。

【鐵葵】**處方用名**　鐵葵油。刀油。

古籍別名　刀煙（綱目）

基本　以竹木葵火於刀斧刃上。燒之津出如津者是。江東人多用之。

用法　恒以外塗用。

效能　殺蟲治瘡。用作腐蝕瘡藥。

主治　惡瘡蝕匾。金瘡毒物。傷皮肉。止風水。不入水不爛。手足戰折。瘡根結筋。瘭癤毒腫。染髭髮。令永黑。及熱未凝時。塗之少頃。當乾硬。用之須防水。又殺蟲立效。

配合應用　治瘭癤項邊癤子。似桃核。於刀上燒煙熏之。（陳氏本草方）

【鐵幟】**產地**　出南安。

形態　綠莖如蒿。有直紋。旁多細枝。厚葉翠綠。背微紫。似平地木葉而齒圓長。可供藥用。

效能　活氣行血通絡。



鐵　幟

【鐵葵油】即鐵葵之處方用名。詳『鐵葵』條。

【鐵邊箕】即金鎖銀開之古籍別名。典見百草鏡。詳『金鎖銀開』條。

【鐵櫛】即櫛子之古籍別名。典見綱目。詳『櫛子』條。

【鐵礬】即礬石之狀如赤石脂而有金星者。詳『明礬』條。

【鐵鏽】**命名**　本品係鐵之鏽衣。故名。

處方用名　鏽鐵衣。鐵赤衣。

古籍別名　鐵衣（綱目）

基本　係金屬原質。爲鐵之赤衣。

用法　恒以水浸汁。或刮研末用。

性質　辛。寒。無毒。

效能　解毒治瘡。用作外科瘡毒藥。

主治　惡瘡疥癬。和油調塗。蜘蛛蟲咬。蒸臍塗之。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論鐵鏽曰。平肝墜熱。消瘡腫。口舌瘡。醋磨塗蜈蚣咬。【明】繆希雍本草經疏論鐵鏽曰。鐵鏽味應辛苦。氣應寒。惡瘡疥癬。濕熱所生。蛊蜘蟲咬毒。氣傷血。辛苦能除濕熱。寒能解熱毒氣。故主之也。又祕法取露天土者研極細。同蟾酥臘麝。以金鐵刺入疔瘡中。令至根。然後以藥塞入。能拔疔根。甚效。蓋疔腫未有不因肝經風熱所致。此藥屬金。善能平木。故有如是之功。普濟方疔腫初起。多年土內鏽釘。火煅醋淬。刮下鏽末。研細。每用少許。人乳和挑破傅之。

配合應用　㈠治風瘧癇痓。鐵鏽磨水塗之。（集簡方）

㈡治湯火傷瘡。青竹燒油。同鐵鏽搽之。（積德堂方）

㈢治疔腫初起。用多年土內鏽釘。火煅醋淬。刮下鏽末。不論遍次。煅取收之。每用少許。人乳和挑傅之。仍炒研二錢。以齏水煎淡。待冷調服。（普濟方）

㈣治脚腿紅腫。熱如火炙。俗名赤遊風。用鐵鏽水塗解之。（惠濟方）

㈤治重舌腫脹。鐵鏽鎖。燒紅。打下鏽。研末。水調二錢。噙咽。（生生編方）

㈥治小兒口瘡。鐵鏽末水調服之。（集簡方）

㈦治內熱遺精。鐵鏽末冷水調服一錢。三服止。（活人心鏡方）

㈧治婦人難產。雞草燒、鏃、白芷等分爲末。每服一錢。童尿米醋各半和服。見效。（救急方）

【鐵籬笆】即蘋藶之別名。典見植物學大辭典。詳『蘋藶』條。

【鐵艷粉】即鐵華粉之古籍別名。典見綱目。詳『鐵華粉』條。

【鐳墨】即釜臍墨之古籍別名。典見開寶本草。詳『釜臍墨』條。

【鐳柚】即柚之古籍別名。典見綱目。詳『柚』條。

【霹靂木】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【霹靂酒】**基本**　本品係以鐵器用火燒赤所浸淬之酒。

主治　疝氣偏墜。婦人崩中下血。胎產不下。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【靡鏖礎】古籍別名　雷楔。（綱目）靡鏖楔。靡鏖斧。（博物志）

產地　廣東海康縣及河東山澤間皆產之。

形態　靡鏖礎係屬石類。爲經雷電突震之礦石。形似斧刀。色青黑有斑紋。堅硬如玉。上有二孔。取之可供藥用。

性質　辛。溫。無毒。

效能　安神定志。殺勞蟲。解蠱毒。

主治　驚邪。恍惚。瘵疾。魘泄。石淋。魘夢。

【薤】卽百合之古籍別名。典見別錄。詳「百合」條。

【顧啄】卽石芸之古籍別名。典見別錄。詳「石芸」條。

【儵】卽鷁鳥之古籍別名。典見綱目。詳「鷁鳥」條。

【鷁鳥】卽燕之古籍別名。典見古今注。詳「燕」條。

【騾】　命名　騾。古文作贏。從馬從贏。諧聲也。故名。

古籍別名　駃騠。駑騮。騾騾。駏驉。（綱目）

外國名詞　Egrus asinus mulus Mule（拉丁）ラバ（日本）

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類奇蹄類馬科之騾。

產地　北省多豢之。

形態　騾爲獸類家畜類驢馬屬之一種。爲驢父馬母所生之雜種。其頭耳皆長。毛短。鳴聲如驢。而體較大。力健於馬。尾根裸出。力强於驢。毛色黑褐或灰或赤褐。背上有黑褐。食粗糲。能重負遠行。以其力在腰。舊說尾後有鎖骨。故不孕乳。實係其精子不成熟。不能傳種。其肉有毒。不堪食。蹄可供藥用。

主治　難產。燒灰入麝香少許。酒服一錢。

參攷資料　㊀騾性頑劣。肉不益人。孕婦食之。難產（寧原）㊁騾古方未見用者。按呂氏春秋云。趙簡子有白騾甚愛之。其臣陽城渠胥有疾。醫云得白騾肝則生。不得則死。簡子聞之曰。殺畜活人。不亦仁乎。乃殺騾取肝與之。渠胥病愈。此亦剪鬃以救功臣之意。書之於此。以備醫案（李時珍）

【騾屎】主治　打損。諸瘡破傷。中風腫痛。炒焦裹熨之。冷卽易。

【騸騾】卽騾之古籍別名。典見綱目。詳「騾」條。

【鬘華】卽茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【鰱】㊀卽比目魚之古籍別名。典見段氏北戶錄。詳「比目魚」條。㊁卽比目魚之古籍別名。典見綱目。詳「比目魚」條。

【鰣魚】　命名　本品初夏時有之。餘月則無故名。


古籍別名　瘟魚（綱目）

外國名詞　Liisha elongata Bennett（拉丁）ヒラ或ヒラコノシロ（日本）

基本　係脊椎動物魚類喉鰾類鰣科之鰣魚。

產地　江河中多有之。

形態　鰣魚爲鱗類魚屬之一種。其體側扁而長。下顎突出。齒生兩顎骨及口蓋骨及舌上。微小如鑢。脊鰭十六刺。腹鰭小而臀鰭長。尾鰭爲叉狀。腹下有三角鱗。背蒼色而腹白色。體長約三尺許。肉多細刺而富脂肪。可供食與藥用。



鰣魚

性質　甘。平。無毒。

主治　補虛勞。

歷代記述攷證　【明】寧原食鑑本草論鰣魚肉曰。蒸下油。以瓶盛埋土中。取塗湯火傷甚效。

【鰣魚曆】主治　疔瘡。脚趾瘡。並貼之。

【鰣魚鱗】採取　須乘活時拔划水邊二鱗。尖長者佳。若死者便減藥力。

主治　湯火傷。疔瘡。腿瘡並下疳。

配合應用　㊀治湯火傷。用鰣魚鱗香油煞塗。立效。茅集之云。鰣魚鱗貼腿瘡疼痛。立效（逢原方）㊁治疔。疔瘡用鰣魚貼上。則咬緊。先須與酒飯吃飽。然後將魚鱗

991／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

邊略略揭起些須用力急揭去疔根便帶出也但揭出疔根時極痛無比非醉飽卽暈倒也（陳氏傳方）水疔用鱔魚腮下近腹處有划水二瓣瓣間有長鱗二瓣最佳但難得今人以背上大鱗代之貼上卽消（傳氏方）鱔魚骾用手刮下不可見水陰乾收貯此拔疔第一妙藥也用時以銀針撥開疔頭一片貼上以清涼膏蓋之俟一宿揭開其疔連根拔出後用生肌散收功予治兩貴婦大腳趾患瘡二三年不收功將醫一片以銀花湯浸軟拭乾貼之不數日愈（毛世洪經驗集方）

㈢治下疳鱔魚鱗焙乾根研白色名白龍丹敷之卽愈得此可包醫（救生苦海方）

㈣治血痣蔡雲白言人生血痣挑破血出不止者用鱔魚鱗貼之卽痂而愈

【鰨魚】原名　鰦魚。

古籍別名　鮯魚。黃頰魚。（綱目）

產地　生江湖間。

形態　鰨魚爲鱗類魚屬之一種體如鯽而腹平頭如鯇而口大頰如鮎而色黃鱗如鱒而稍細大者三四十斤性喜獨行而喉同類其肉可供藥用。

性質　甘平無毒。

主治　止嘔暖中益胃。

【鰨魚】卽鰨魚之古籍別名。典見綱目詳『鰨魚』條。

【鰨魚】卽鰨魚之古籍別名。典見本草拾遺詳『鰨魚』條。

【鰷魚】卽鳥藥之古籍別名。典見綱目詳『烏藥』條。

【鰫】卽海鰕之古籍別名。典見爾雅詳『海鰕』條。

【鰝鶵】卽鰝雞之古籍別名。典見爾雅詳『鰝雞』條。

【鶺雞】古籍別名　鰝鶵。鸂鶵。鵝鹿（爾雅）麥雞（綱目）

形態　鶺雞爲水禽類之一種。狀如鵪而無丹頂兩頰紅羽色青蒼亦有灰色者頸長而脚高常覓食於田澤洲渚之間其肉可供藥用。

性質　甘溫無毒。

主治　殺蟲解蟲毒。

【鶯】原名　黽。

命名　黽鳴嚶嚶故名。

古籍別名　黃鳥（詩經）黃鸝（說文）黧黃商庚（爾雅）倉庚（月令）青鳥（左傳）黃伯勞（綱目）告春鳥（動物學大辭典）搏黍楚雀黃鸝鴽金衣公子黃袍（詩疏）

外國名詞　Cettia Cantans T. & S. 或 Horeites Cantans Eastern nightingale 或 Large japanese bush-warbler（拉丁）ウグイス或ハルッゲトリ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類鳴禽類鶯科。

產地　山林原野間處處有之。

形態　鶯爲林禽類之一種眼細嘴短尖細嘴色淡黃褐色翼尾俱長體之上面灰黃或帶綠褐腹部灰白或淡黃脚細色茶褐有長爪雌比雄較大夏棲山林冬遊原野立春後卽鳴鳴聲圓滑如織機至夏則不鳴飛翔輕捷覓食蟲類其肉可供食與藥用。

性質　甘溫無毒。

主治　補益陽氣助脾。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論禽肉曰食之不妬。參攷資料　按山海經云黃鳥食之不妬楊孚止妬論云梁武帝郤后性妬或言倉庚爲膳療妬遂令妬之妬果減半（李時珍）

【鶯爪】基本　鶯爪爲鰕之晒乾而大者可供食與藥用。

性質　甘平無毒。

主治　療疣去黶。

【鶯矣蠶】卽夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考詳『夏枯草』條。

【鶯粟殼】卽罌粟殼之古籍別名。典見和漢藥考詳『罌粟殼』條。

【鶯歌綠】卽伽倆香之色如鶯毛者詳『伽倆香』條。

【鶴】命名　鶴字篆文象其翹首短尾之形。

古籍別名　仙禽。胎禽。（綱目）最貴者名丹頂鶴色白者名白鶴色玄蒼者名灰鶴（俗名）

外國名詞　Grus chinensis Crane 或 Secred crane Kranich（拉丁）ツル或タンチヤウ

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（日本）

基本　係脊椎動物鳥類涉禽類鶴科。

產地　出東三省。及西伯利亞諸地。

形態　鶴爲水禽類候鳥之一種。生活最適宜於溫帶地方。冬則南來。春則北返。其形如鸛。嘴長而堅硬。色綠而頭頂赤色。軀幹亦瘦。全體純白。尾端黑色。額頰咽喉及頸與翼尖亦黑色。高約三四尺。足及趾與頸皆長。趾無蹼。翼大飛翔甚捷。又好涉游棲水濱。覓食魚介蟲物。其血可供藥用。



鶴

採取　以白鶴者良。

性質　鹹。平。無毒。

主治　益氣力。補虛乏。去風益肺。

【鶴卵】　**性質**　甘。鹹。平。無毒。

主治　預解瘧毒。多者令少。少者令不出。每用一枚。煮與小兒食之。

【鶴肫中砂石】　**主治**　磨水服。解蠱毒邪。

【鶴骨】　**主治**　酥炙入滋補藥。

【鶴翎草】　卽翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『翠羽草』條。

【鶴頂】　卽鸕鷀之古籍別名。典見綱目。詳『鸕鷀』條。

【鶴頂紅】　卽楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楊梅』條。

【鶴頂草】　卽藜之古籍別名。典見土宿本草。詳『藜』條。

【鶴腦】　**主治**　和天雄葱實服之。令人目明。夜能書字。

【鶴蝨】　**命名**　本品係天名精。卽杜牛膝之所結子實。形小而長。有刺。善螫人衣。勢似於蝨。故名。

基本　屬菊科鶴蝨之子實。

產地　凡山谷山澤及原野間。恒多生焉。

形態　鶴蝨爲山野自生之宿根草。莖高二尺餘。根生葉。叢生地上。形狀似煙草葉。邊緣稍有鋸齒。有皺毛。有一種强烈氣味。夏月於葉腋開黃花。如野菊花。後結實。呈褐黑色。

採取　八月採之。

製法　凡使須微炒香入藥用。

性質　苦。辛。有小毒。

效能　殺蟲。治疳。專作殺滅諸蟲之要藥。

主治　蚘蟯蟲爲散。以肥肉臛汁服方寸匕。亦入丸散用。

歷代記述攷證　【宋】開寶重定新本草論鶴蝨曰。蟲心痛。以淡醋和半七服。立瘥。【宋】大明諸家本草論鶴蝨曰。殺五臟蟲。止癮。傅惡瘡。【淸】黃宮繡本草求眞論鶴蝨曰。鶴蝨氣味苦平。功專入肝除逆。故凡一身痰凝氣滯。得此苦以疎泄。則痰氣頓解。而蟲自無安身之地矣。兒蟲得苦則伏。如小兒蚘嚙腹痛。用以鶴蝨研末。納於肥肉汁中調服。其蟲自下。非其蟲因苦逐曷克有是。但藥肆每以蒴藋莖子代充。不可不辨。

配合應用　㊀治大腸蟲出不斷。斷之復生。行坐不得。鶴蝨末水調半兩服。自愈。（怪疾奇方）

㊁療蚘咬心痛。取鶴蝨十兩。搗篩蜜丸。梧子大。以蜜湯空腹吞四五十丸。忌酒肉。章雲患心痛十年。不瘥。於雜方內合服之便愈。（初虞世古今錄驗方）

㊂治小兒蚘蟲嚙心腹痛。亦單用鶴蝨研末。以肥猪肉汁下之。五歲一服二分。蟲出卽止也。（李絳兵部手集方）

用量　八分至錢半。

【鶴頭紅】　卽楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楊梅』條。

【鶻鳩】　卽鶻嘲之古籍別名。典見左傳。詳『鶻嘲』條。

【鶻嘲】　**命名**　凡鳥朝鳴曰嘲。夜鳴曰咬。鶻喜朝鳴。故名。

古籍別名　鶻鵃。鳳鳩。（爾雅）鶻鳩。（左傳）鸐鳩。阿鵴。黠鶻。（綱目）

產地　出深林間。

形態　鶻嘲爲林禽類之一種。形似山鵲而小。尾短。有青毛冠。羽色青黑。飛翔不遠。春來秋去。好食桑椹。其肉可供藥用。

性質　鹹。平。無毒。

主治　助氣。益脾胃。主頭風目

993／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

眩。炙炙食之。頓盡一枚。至驗。

【鶴鶉】卽鶴鶉之古籍別名。典見爾雅。詳『鶴鶉』條。

【鷓鴣】卽鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳『鷓鴣』條。

【鷃】卽鷃之古籍別名。典見綱目。詳『鷃』條。

【鷂】古籍別名　鴳。鷂。鷷。鴳。鴽。(綱目)

形態　鷂爲原禽類鷄雞屬之一種。與鴽同種而異類。亦爲候鳥之一。羽黑如鴽而無斑點。頭脚皆長。常棲茅葦間。捕食魚蟲諸物。其肉可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　諸瘡陰蝕。燙食去熱。

【鷓雀】卽鷂。詳『鷂』條。

【鷓鴣】卽百舌之古籍別名。典見綱目。詳『百舌』條。

【鼈】卽食鹽之古籍別名。典見綱目。詳『食鹽』條。

【鹹蓬】出河北鹽地。爲雜草類之一種。割取燒灰。淋湯可煎鹽。與鹽蓬同。詳『鹽蓬』條。

【麝干】卽射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳『射干』條。

【麝肉】性質　甘。溫。無毒。

主治　腹中癥病。

參攷資料　麝肉蠻人常食之。似鏖肉而腥氣。云食之不畏蛇毒也。(孟詵)

【麝男】卽甘松之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘松』條。

【麝香】命名　本品之香氣能遠射。故名。麝形似麞。俗有香麞之稱也。

處方用名　原麝香。原寸香。當門子。

古籍別名　射父香。(爾雅)香麝香。(綱目)最佳者名元寸香。臍香。臍堂。麝臍。麝臍香。四味臭。拔萃園。莫訶婆伽。(和漢藥考)

外國名詞　Moschus.(拉丁) Musk.(英) Moschus, Bisam.(德)

基本　屬哺乳獸雙蹄類之麝鹿。爲牡獸臍中與陰部間二腺囊分泌之香物。

產地　陳仁山藥物生產辨云。麝香產四川打箭爐爲正地道。雲南亦可。西藏次之。乃麝狗之臍出無定時。味清香。又有一種名北麝。又名西麝。又名蘇麝。產張家口爲上。牛莊次之。身扁。氣味類像馬尿。比四川雲南西藏者大不如也。

形態　麝體如尋常之鹿。但矮小似野羊。長三尺。高二尺許。全身灰褐色。生長毛。自頸至脚。有白斑二條。無角。無淚竅。耳長如兎。面頗長。上顎之犬齒突出吻外而向下。長及三寸。晝間隱伏不出。入夜始出而覓食芳草。性懦怯。然善跳躍。雖六丈闊之溪崖。亦能一躍而過。逐之過急。則窘而隱竄。牡者有一腺囊。在臍與陰部之中間。充滿分泌物。卽名麝香。其囊謂之香臍。獵者捕獲此獸。立卽割下腺囊。惟因香氣峻烈。須先以布帛遮蔽口鼻。然後採取。否則往往頭痛。甚者致死。故獵者割取腺囊之時。最須留意。萬不可誤損其囊。云。其香臍爲似囊之包皮。腺形卵圓或輪圓。小者如金橘。大者若雞卵。下扁平。上陷凹。有毛被之。中央有一小孔。毛密而迴旋爲放線狀。外皮似革。囊膜殊薄。剝之。有兩層。膜中藏有香液。新鮮之際。稠厚如輭膏。乾則爲大小不等之顆粒。於水可溶解四分之三。於酒精祇溶解二分之一。近嗅之。發一種異常峻烈之臭氣。遠聞之。轉覺芳香可愛。味苦。遇硫黃。水炭。動物炭等。其臭卽消矣。

種類　㈠生香卽遺香。乃麝自別出者。蓋其香滿於臍內。急痛。以自爪剔出。著屎尿中覆之。常在一處不移也。㈡臍香。乃獵人捕殺牡麝取得者。㈢心結香。乃其被大獸捕逐。驚畏失心狂者。墜死被人覓得。破心見血。流出脾上。乾作血塊者。此品不堪入藥。㈣水麝香。乃臍中皆水。以針刺臍。瀝一滴於斗水中。用酒衣物。其香不歇。針臍後捻以眞雄。則臍復合。此品近不復有。或有之。人亦不識矣。

採取　每年春季覓採生者良。餘時獵捕臍香者次之。

製法　雷敦曰。凡使麝香。用當門子尤妙。以子日開之。微研用。不必苦細也。

性質　辛。溫。無毒。

成分　成自揮發性未詳之有效成分。及脂肪。膠質。蛋白質。纖維質。無機鹽類。安母尼亞。水分等。

效能　通竅。辟穢。搜風。逐邪。用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

作興奮及回蘇藥。

作用　至腸被吸收而入血中。使血液流動增速。至腦而激大腦神經。令精神異常興奮。然時間甚短。萬不及番木鼈之能延長數日之久也。

主治　辟惡氣。殺鬼精物。去三蟲蟲毒。溫瘧驚癇。久服除邪。不夢寤魘寐(本經)療諸凶邪鬼氣中惡。心腹暴痛。腹急痞滿。風毒。去面黑。目中膚翳。婦人產難。墮胎。通神仙。(別錄)

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論麝香曰。佩服及置枕間。辟惡夢及尸疰鬼氣。又療蛇毒。【唐】甄權藥性本草論麝香曰。熟水研服一粒。治小兒驚癇客忤。鎮心安神。止小便利。又能蝕一切癰瘡膿水。【唐】孟詵食療本草論麝香曰。除百病。治一切惡氣及驚怖恍惚。【宋】日華諸家本草論麝香曰。治蛇蠱咬。沙蟲溪瘴毒。辟蠱氣。殺臟腑蟲。治瘧疾。風痰。療一切虛損。惡病。納子宮。暖水臟。止冷帶下。【元】王好古湯液本草論麝香曰。療鼻塞不聞香臭。【明】李時珍本草綱目論麝香曰。通諸竅。開經絡。透肌骨。解酒毒。消瓜果食積。治中風中氣。中惡痰厥。積聚癥瘕。【明】繆希雍本草經疏論麝香曰。陶弘景云。麝常食柏葉。又嗽蛇子。以爲其香必非因嗽蛇而結。蘇頌乃云。夏月食蛇多。至寒則香滿。入春臍內急痛。自以爪剔出。陶云五月得香。往往有蛇皮骨。豈有食蛇逾一年。而皮骨尚不化者乎。不知麝乃山獸。好食香木芳草。如柏葉之類。故其氣聚於臍而結成是香。或遇蛇亦嗽。但不結香耳。如必嗽蛇多而後有香。則此藥必大毒。難近之物。安得味辛氣溫無毒耶。甄權言苦辛。其香芳烈。爲通關利竅之上藥。凡邪氣着人。淹伏不起。則關竅閉塞。辛香走竄。自內達外。則毫毛骨節俱開。邪從此而出。故主辟惡氣。殺鬼精物。凶邪蠱毒。溫瘧中惡。心腹暴痛。腹急痞滿。風毒諸證也。其主癲癎者。借其氣以達於病所也。苦辛能殺蟲。故主去三蟲。辛溫主散。故能去面黑。及目中膚翳。性能開竅。故主難產墮胎也。走竄之性。而云久服除邪。不夢寤魘寐通神仙者。凡香皆能辟除惡氣而通神明。故有是功能也。日華子云。納子宮。煖水臟。止冷帶疾。藥性論主小兒驚癇客忤。蝕一切癰疽膿水。今人又用以治中風中氣。中惡痰厥。猝仆。兼入膏藥傳藥。皆取其通竅開經絡。透肌骨之功耳。【清】黃宮繡本草求眞論麝香曰。麝香辛溫芳烈。開關利竅。無處不到。如邪氣着人。淹閉不起。則關竅閉塞。登時眼翻手握。僵仆昏地。故必用此辛香。自內達外。則毫毛骨節俱開。而邪始從外出。是以邪鬼精魅。三蟲諸毒。皆能治也。諸風諸氣。閉之關竅。而不用此驅除。則病安祛。但不可過爲用耳。至於婦人難產墮胎。尤善小兒驚癇客忤。鎮心安神。鼻塞不聞香臭。服此即開。目疾內翳。點此即除。痔漏惡瘡。面黑斑疹。瞥見咬蟲傷成瘡。用麝封固即愈。瘡瘡開之亦驚。服之即發。藥之辛香。雖同冰片。然冰片入口貼肉即冷。稍頃熱性即發。不似麝香香氣裸裂。入耳與肉而不冷耳。欲辨眞僞。須於火炭上有油滾出而成焦黑者。此即肉類屬眞。若假則化白灰。而爲木類也。研用。凡從麝香用當門子尤妙。忌蒜不可近鼻。防蟲入腦。

國外學說　日本學說謂內服少量。不呈作用。服大量則心悸亢進。精機能過敏。胃部起溫熱之感。且被壓迫。又能增多諸腺之分泌。及發汗利尿。甚或頭痛眩暈。據日本藥局方。爲興奮藥用於衰弱症。如熱性病之虛脫。宜用之。一回自〇・〇五至〇・五。和於白糖或爲乳劑。此外爲芳香藥。又第四版改正日本藥局方載麝香爲麝囊中之分泌物。新鮮者稍柔軟。乾則爲顆粒狀之塊。色黑褐或深赤褐。香氣異常峻烈。以松節油浸之。用顯微鏡檢視。則見其碎片及塊片。大略均勻。質半透映。色褐。毫無他物夾雜其間。此物有安母尼亞臭氣。但甚微。試燃燒成灰。其遺留之硬固性。百分中不至八分以上。又和漢藥考曰。麝香之品類。隨麝香鹿棲息地方之氣候。食物而異。兼因麝香乾燥法。調製法等而有不同。雖未能一一辨別。總之品類頗多。在貿易上。則大概分爲兩種。一

995／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

種名中國麝香。出自西藏者。皮囊及毛。俱作緋褐色。出自雲南者。品最佳。一種名俄國麝香。出於西伯利亞及俄國各地。皮囊及毛。俱作鼠白色。至日本所有之麝香。專仰給於中國。從前藥舖處理此物。所分品類極多。詳見遠西醫方名物考。摘錄如下。麝香之香囊與皮毛之形色大小。種種不一。卽係上品。香中尙有毛雜入。其氣味色質等。亦大有出入。由此觀之。香囊不免有以麝皮或他獸皮擬造者。一囊之香。雜以他物。亦竟可分作數十囊。嘗見藥舖所賣之麝香。一斤須香囊三十個。每年運銷日本者。斤數已屬不少。其餘運銷印度及歐美各國者。歲更不知幾千萬斤。香囊亦不知幾萬億。此匿居深山幽谷之異獸。旣非輕易可獲。縱令得之。一麝亦僅有一囊可採。其數鳥得有若此之多。謂非夾雜僞造。其誰信之。姑懸此說。用質疑於來者。或謂中國禁令甚嚴。眞品決不准輸入他邦。且其價貴。與銀對換。故眞者絕少。按今日本藥舖所售之中國產麝香。核諸西說所述。大略相符。因西說大可以鑑別眞贋也。而樂只亭之說。亦足以備考證焉。樂只亭之言曰。麝香在有毛之皮囊中。完全無損。藥舖呼爲臍麝香。其囊皮卽爲麝香皮。麝香在囊中時。形如碎粉。出囊則呼爲麝香。藥舖出售者。有三等。上等曰本口。中等曰間山。下等曰白毛。本品囊圓。煤色。徑一寸二三分。至一寸四五分許。小者約七八分。重四五錢至七八錢。側面有茶褐色之細毛少許。於其無毛處。作十字式切開。內有麝香。如碎粉。色紫黑。如饅頭之細沙餡。一種作黑色。一種香氣極烈。以上碎粉中有大如黑豆之粒。切之覺輭靭。是爲當門子。此粒多者。爲最上品。非本口無此物也。一種帶微赤色者。香色較和。亦屬上等。然僅有碎粉。無當門子。一種黑色。輭而甚黏。如泥。香氣甚。雖可視爲上品。然此必非當門子。是殆間山也。或謂此種多溼潤。其中有如無患子大之圓塊。指按之。則柔輭而扁。卽非當門子。然以其香氣烈。可作上品。若囊乾毫不溼潤。其中之麝香亦乾而香氣甚者。亦屬上等。有貯藏數十年之麝香。其囊圓而小。徑祇六分許。重不過一錢四五分。囊乾而硬。其中麝香如沙。又如白鹽嚼之亦如沙。香氣峻烈者。上品也。若嚼之如沙而覺枯燥者。必係下品。又嘗見有極大者。囊徑有一寸七八分。重一兩一錢許。其麝香當是上品。近來此種已不多見。又囊中如有薄膜二三層。形如竹膜者。色如翠羽。有光澤。則膜內之麝香。亦必純良。近見囊中之麝香。往往雜有細毛或鉛子。雜鉛子者。如黑豆大一囊有三五粒。一說。辨別之法。視其囊割下處。有無線縫爲斷。有線縫者屬本口。無則屬白毛。但此說亦不能拘定。白毛囊扁而橢圓。大如中等之白柿。皮厚而硬。一側有白毛。較本口毛粗而多。且如將長毛剪短者然。一側無毛。皮作茶褐色。其中麝香。色紫黑。或純黑。如碎粉。無當門子。香氣甚弱。與諸藥調和。香氣立卽消失。是白毛之極上品也。曩曾見其尤佳者一枚。囊之外面無毛。皮之包合處。有麻線縫合。形扁圓而大。去線視之。其中空虛。一側遍生白毛。長三寸許。此乃翻轉有毛之皮而包者也。繼割其皮之底。則見皮裏膜間。有最上之麝香。皆小粒如當門子。色紫黑。香氣峻烈。又見一種。呼爲高麗麝香。囊形如白毛。而毛長。所存麝香極少。間山其囊與麝香之形色。一如本口。惟香氣弱而近。貓亦惡臭。不欲捕之。其香雖不似麝。而有麝香鼠之名。又瓊浦偶筆曰。長崎有異鼠。多穴糞穢之旁。體有香似麝。以故上府署之廁。往往香襲人衣。相傳此鼠東踰日觀嶺。便死。有中國人汪姓者告余曰。此鼠一名臭鼠。唐山亦有之。生於陰溼糞汚之地。其目不甚明。往往爲人所擾。或云。見之則有喜事。柳條曰。貓亦惡其臭。而不欲捕之。是殆造物故與以臭。使爲防身之具歟。一說。獵者割取麝香囊。如經兩三日。猶尙未風乾。則其氣之烈。尤勝於臭近之不可當。卽已乾者。設或過多。嗅之且然。惟香氣漸減。倘加入他物。或放置遠處。則芬芳馥郁。誠令人愛不忍釋。或謂麝香脫氣者。掛廁中承塵上。數日香如故。是麝香者。與糞同性之物也。故凡食

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

糞之禽獸。其所遺矢多有麝香氣。後此果捕獲眞鼠。定當割其香囊。風乾試驗。究否與麝香有同一之效云。（錄明治十二年工業新報第六十六號）又和漢藥考曰。麝考云。竹內保德言。唐太島山中有一種香糞。長二三寸。色黃黑。香氣如麝。驗之糞中有毛骨。詢之土人。曰貂糞也。或謂是麝糞者誤。按貂一名松狗。（爾雅）一名松鼠。（留青日札）此獸常食松實。（本草綱目）故其糞香。又好食華金鼠。（松浦弘說）故糞中多毛骨。詳保德所云。其香如麝。因考本草纂疏。及日光志等所載之麝糞。又稱靈貓糞者。其爲貂糞無疑。按麝香贋品。如是之多。若多得貂糞製造。則賢於其他贋品遠矣。又曰。日本及歐美各國。俱不產之。專產於東亞及中亞。如阿爾泰山脈之山中。及北緯三十度至四十度之中國雲南西藏等處。又曰。以化學法試驗麝香。投入沸湯。過半溶解。僅餘四分之一。澄滓而已。此水溶液。遇硝酸及醋酸鉛。則生沈澱。遇昇汞則否。亦不溷濁。燒之餘灰分百分之五六。灰作鼠白色。若雜有他物。多現褐色或黃色。灰分中主爲加里、石灰、苦土、並鐵少許。又曰。相傳中國人僞造麝香。每以香鼠爲混合物。此獸之應用局部。今尙不明。茲錄宮崎柳條之說如左。長崎有物名麝香鼠者。常宿於廚竈之砧板下。一日爲庖人捕三頭。試畜之。形同家鼠。惟目鼻與喙似鼷鼠。目無睫。日中不明。目圓且極小。僅如罌粟子大。後有一穴。莫辨牝牡。食蚯蚓魚肉。或餌以米穀。長崎之東有嶺曰日觀。欲攜去。踰此嶺卽死。乃命工寫眞爲圖。此鼠臭氣衝鼻。啼時尤甚。惟遠嗅之。略似麝香氣。臭入食器。立被傳染。雖屢滌如故。啼聲似蝙蝠而大。如曰吉吉。故崎陽俗諺。謂此鼠啼時必吉。不可殺之。

辨僞　㈠鄭肖巖曰。麝形似麞而小。色黑。常食柏葉及蛇蟲。其香在臍。故名麝臍香。又名當門子。生陰莖前皮內。別有膜袋裹之。至冬香滿。入春臍內急痛。自以爪剔出。覆藏土內。此香最佳。但不易得。今惟得活者看取。必當全眞。出羌夷者最好。出隋郡義陽晉溪諸蠻中。者亞之。出益州者。形扁多僞。凡眞香一子分作三四子。刮取血膜。雜以餘物。裹以四足膝皮而貨之。今貨者又多僞。聞土人多以香貓腎僞充。考劉侑西域記。有云黑契丹出香貓。糞溺皆香。如麝氣。故有取其糞。用雜獸血膜僞造爲麝香。近又有以荔核煅爲灰。裝入眞麝香皮袋中。混售。貽害不淺。凡入藥須辨眞者用之。㈡曹炳章曰。按麝爲牡鹿類而無角。其尾甚短。如山羊。嘴上之稜牙。如野猪。其種大小不一。皮毛之色。生而數變。初臍色與褐黑色。繼變紅褐。至白灰色而老矣。全身生毛。惟嘴無毛。鬚其旁面有縱長之斑點。背多橫紋。然形狀雖笨。而腿力甚迅。故獵捕甚難。腹下之臍。卽名麝囊。割破其囊。卽得麝香矣。其肉因香氣勞烈。土人視爲美味。其囊之大小。關乎麝之年歲。與强弱。產地首推西藏高山中。或喜馬拉亞山。以及雲貴等省之山內。東三省與蒙古亦產之。黃河以南雖產。似麝。其實本草所謂香獐。非麝也。羌海雜誌云。青海江拉希拉之間。重巖複澗。產麝尤多。大抵山有香麝。必有香氣。遠聞之香烈而略帶腥。忽隱忽現。若卽若離。麝穴愈近。而其腥愈不可聞。循其氣味而尋之。百不失一。麝臍最穢。常流血液。天日晴時。必仰臥於草地。而曝其臍。臍眼突出。大如鉢。腥臭異常。蚊蠅蟻蚋飛集。觸之。臍眼突然縮入。微蟲如齏粉。一日數次。脂漸凝厚。此謂草頭麝。藥肆常用之品也。曾吸入蜂蝎蜈蚣毒蟲類者。臍有硃砂點。謂之紅頭麝。其品已高。最貴者曰蛇頭麝。毒蛇吮其臍。麝驚痛而力吸。跳踉狂奔。蛇身伸屈盤結。堅不可脫。須臾蛇身截然而斷。首卽腐爛於內矣。臍有雙紅珠。是爲蛇眼。得此配藥。其香經久不散。醫治毒症。功效無比。經仲淳云。香有三品。一曰遺香。是麝臍閉滿。自於石傍用蹄尖揮落者。爲最佳。其地草木枯焦。二曰膝香。亦佳。三曰心急香。被諸獸驚恐。遺落取得。見心流脾結作一血塊。隔山間亦有香氣。此三者皆爲佳品。今時以陝西哈密出者。其色黃。香味濃厚者佳。山西五台山羊來出

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者。其殼如豬脬亦佳。四川松盤山出。名蝙蝠香。皮厚有毛亦佳。雲南有一種無殼散香。色黑有騷氣者次。大抵聚於蜀之打箭爐者名川香。聚於雲南者名雲香。陝西之蘭州者名芥州香。皆良。其形圓。香氣濃厚。歷久不散。產於張家口以外歸化城以及內外蒙古者。名西口蝙蝠香。產於東三省。聚於營口者名東口蝙蝠香。其形皆扁。氣味微薄而帶騷氣。略次。蓋麝香眞色。乃紫紅與黑色。近世作僞者。將少許蝙蝠香。雜以多數之香料屑末攙入。且加以相當之顏料。形似眞者彷彿。辨別眞僞者。大抵鼻嗅香氣芬烈與微薄。以香料之香。與麝香之香。顯能分別。況眞者氣味不但襲人。且日久不散。僞者香不能襲人。稍久嗅之。已乏香氣。尙有試法。亦可主判眞僞。以熾炭火上將香少許。彈於炭火上。眞者如燃人髮。其質爆烈。奇香四溢。僞者不但無香。且質如灰燼而爆烈。以此試之。立分眞僞。麝香內結有圓粒。或長扁形。外紋光滑。質堅。碎之香氣遜常。卽名當門子。其功力較散香勝數倍。亦有人工造作者。亦可試之。將當門子泡滾水內。眞者俟然堅結。僞者卽化開矣。(三)和漢藥考曰。麝香僞製之品。自昔爲多。業此者百計千方。苦心鑑別。正恐自誤而誤人也。已故藥劑師森島松兵衞者。與其祖俱精斯業。審察眞贋。造詣最深。嘗出其多年之經驗。著爲論說。演之講壇。俾藥業中人。賅獲參考之資料。茲錄其筆記如左。麝香之爲用。入藥材。充香料。大抵粗劣之品。概作香品之原料。若入藥材。則物品之良窳。關係匪細。有人於此。奄奄欲斃。此時醫者處方用麝香、龍腦、俾恃其興奮之效力。得以回蘇。則藥舖之責任重大。果何如哉。此余所以不憚喋喋也。自實際上考察之。一爲本口麝香。日本東京轉銷。一爲本口麝香。亦在東京轉銷。與本口爲相同之物質。惟薄皮者發育極盛。去其表皮。便無他異。一爲雲南麝香。上海出口爲厚皮之物。乃一種同質異形者。一爲括圓麝香。上海出口。以豬膀胱或油紙包裝。賅視之。與除去表皮之本口相仿。實則概係人工製造品。歐美人呼此爲東京產。白毛麝香。產於亞洲北部之西伯利亞及俄國各地。出此香之獸非麝。乃麝也。如上海、高麗、烏拉港等各口岸。俱運銷之。計兩種。其一爲白毛。表皮絲之一側。有硬白毛極多。其似腳之處。內皮薄而軟。皮中充滿麝香。其一亦爲白毛。又名麝香。香味與上一種相似。然有光澤。又或有當門子。品出前種之上。貴物也。其白毛又稀鬆者。囊中充滿白毛、品質粗惡。殆人造物也。要之雲南本口、薄皮、括圓四種。品物大有高下。雲南麝香。表皮與內皮之間。有線縫之。內外俱不能觸知。必割開方能見之。蓋縫於皮與皮之中心也。又有將皮之中心。仿其形狀。穿有薄而深之溝。流入泥土或鉛者。從前囊中僅打進鉛子或鉛條。今則已不多見。此外尙有攙和酸化鉛、鐵粉並其他物質者。凡此作僞多端。均可以指探捫而知之。如皮之厚皮之物。乃一種同質異形者。一爲括圓麝香。上海出口。以豬膀胱或油紙包裝。粗劣愈甚。以刀割開其囊。往往有小蟲走出。狀似蠅而極細。以上諸種。有發異臭者。有作屎臭者。有於夏秋間易流動者。有皮質非常肥厚。如海綿者。有皮薄而麝香實少。卽老練家亦爲所蒙者。要須視麝香之品位與其多少。而定貴賤。耳十年前學術膚淺。曾以麝香試驗。費至半兩之多。當時所得成績。頗爲可觀。今已散失無存。姑舉能記憶者如下。顯微鏡檢查所得。最良之品。於黑褐色不整齊如岩之處。每見有黃色或帶黃褐易流動如樹脂之斑點。斑點其二。可使重量增加。本口麝香。殆無上述諸弊。且本口與白毛。賅視之雖易誤認。實則白毛概有硬白毛。囊爲長形。本口無白毛。外皮較圓。而且扁平。老練家一經寓目。便可斷定。其孰爲劣品。孰爲佳品。大抵皮多而麝香少者。約如雲南之半。價薄。皮麝香。如雲南麝香之縫法。所異者。內尙有同質之皮。將麝香糊封其中。麝香之品位。在中上部與下部之間。至括圓。則不問優劣。要皆係人造之麝香。外以豬膀胱或油紙包裝。粗劣愈甚。以刀割開其囊。往往有小蟲走出。狀似蠅而極細。以上諸種。有發異臭者。有作屎臭者。有於夏秋間易流動者。有皮質非常肥厚。如海綿者。有皮薄而麝香實少。卽老練家亦爲所蒙者。要須視麝香之品位與其多少。而定貴賤。耳十年前學術膚淺。曾以麝香試驗。費至半兩之多。當時所得成績。頗爲可觀。今已散失無存。姑舉能記憶者如下。顯微鏡檢查所得。最良之品。於黑褐色不整齊如岩之處。每見有黃色或帶黃褐易流動如樹脂之斑點。斑點

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

少者。品質必惡。或有僞造之疑。因如雜有澱粉類或草根木皮之粉末等物。在顯微鏡下一覽即可分明也。試藥溶解量用伊打、石油伊打、偏陣、酒精、稀醚類溶解麝香百分中祇溶解八分九至十八分。水溶解量最良之品。可溶解百分之五十至六十。懸此鑑別精粗。最爲便利。灰分量最良之麝香。亦多雜鎔鐵、水銀、砂並其他金屬。若粗劣之品。金屬極微。至多不過在百分之三以上。此即可斷爲人工僞造物。贋品攙和之狀況有屎臭或異臭者。或祇攙皮粉。或加最良之麝香。使之適度。此等僞造物品。欲其色澤逼眞。則以硃砂研和或細磋紫檀木屑拌入。蓋紫檀木理緻密。既可加重。且現紅色。乃有益無害之品也。亦有攙和動物性細粉者。最多即用麝香皮細剉。炒爲粉末。或即用白毛皮或鹿鞭皮製之。誠匪夷所思矣。㊂張澤霖曰。麝之性味辛溫。寒症用以配合。固無妨礙。設熱症而純用一味。或配辛燥之品。則非但無益。而且有害。必也以其他涼性參合。如紫雪牛黃之屬。庶乎無虞。考麝古書言其形狀甚多。特錄數則於下。說文云。『如小麋、臍有香、一名射父。』爾雅釋獸則『麝父麋足。』字林曰。『小鹿有香。其足似螫。故云麋足。』字彙註。『獸如小麋。身有虎豹之文。臍有香。爲人所追。即自投高巖。舉爪剔出其香。就縶且死。猶拱四足保其臍。故象退齒。鹿退角。麝退香。皆輒掩覆。知其珍也。』今人以其價貴。每用贋品混充。以香貓腎囊一個。攙和辛夷、荔枝核等末。辨別之法。(一)嗅其香氣。眞者氣味襲人。且嗅久不散。僞者不但不能襲人。且嗅之稍久。而香氣已散。(二)以火試之。眞者彈於火上。如燃人髮。奇香四溢。其質爆烈。僞者非惟無香。更且如同灰燼。亦不爆烈。

近人學說　鄭訓曰。中國麝香。爲各種麝香冠。以雲南產者爲尤佳。香氣佳良。其氣極烈。毫無尿臭。及阿姆尼亞臭氣。而有永留不散之特性。囊成圓形。接連腹筋之面。平坦無毛。外成凸面。有粗硬之毛。中央開口處。有微褐色旋縮之毛。囊之本身乃由二種筋皮及三層薄膜組成。中含褐色麝香。大如櫻桃或碗豆樣。質極易破碎。白毛麝香。產於蒙古及西伯利亞。經中國輸入日本。經俄國輸入歐洲。西人曰西伯利亞麝香。或加排兒地麝香(Moschus Sibiricus S. Cabardinicus)。此品非採於麝。乃採自麝。白毛非圓形。乃略橢圓形。二面之毛帶白色。周邊之毛類褐色。其內部麝香。柔輭帶有尿臭及阿姆尼亞性臭氣。不及中國麝香遠矣。東京麝香。乃在日本販賣。日本人曰日本麝香。西人曰東京麝香。恐即西藏麝香經中國輸入日本者。此麝囊圓形或略橢圓形。其上面向中央偃伏成穹窿狀。下面平坦。帶類黃色之毛。邊周着白色剛強之毛。大抵帶濕氣有黏着性。其內部麝香。常柔輭呈輭膏樣。間有顆粒狀者。香氣佳良。略帶阿姆尼亞性臭氣。偏加兒麝香。外觀頗類中國產者。麝囊較大。毛棕紅色。香氣薄弱。類西伯利亞產者。波拉哈產麝香。乃採自麝香鼠之腺。名爲美國產麝香。亦有人販賣之。但用途不廣。模造麝香。貼附獸毛。巧做麝囊。充入乾固血液土塊。而略加眞正麝香若干。或加阿姆尼亞共研磨之。或眞正麝囊取出麝香後。充入土塊。乾固血液。獸鬻及熱煮之小豆末等。此外尙加入鎔塊以增加重量。再縫合破口出售於市。此等贋品亦往往發見。購者不可不愼。人工麝香。通名曰托苦阿兒(Tonquiol)。化學上稱之曰三硝基布體兒托兒阿兒(Trinitro Butylotoluol $C_6HCH_3(C_4H_9)(NO_2)_3$)。乃波爾氏所發明。其法先添加哥羅兒阿兒密尼姆($A_{12}C_{26}$)於第三級哥羅兒布體兒($Cl_3-(CH_3)_3$)。使托兒托阿兒($C_6H_5CH_3$)作用之。則生成布體兒托兒阿兒。而後徐徐注入硝酸(比重一·五)一分及發烟硫酸二分所成混合液五倍量中。八乃至十時間水浴上加熱。由此生成三硝基布體兒托兒阿兒。注入水中析出。更加酒精結晶精製之。此乃類黃色針狀結晶。遇九十六乃至九十七度之溫熔融。大有麝香之香氣。如溶解於酒精。加少量阿姆尼亞。其香氣更著。製造化粧

999／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

品。多食其靡而用之。惟此品由種種物質消失或變化其香氣。醫藥用實難代天然麝香也。

配合應用　㈠治心氣虛怯。驚邪癲癎。或夢寐紛紜。鬼交鬼疰。及小兒急驚。大人中惡等證。用麝香、犀角、牛黃、琥珀、龍齒、遠志、丹砂、鉛丹、金箔、菖蒲、眞珠、茯神、天竺黃。㈡傅一切癰疽疔腫有神。用麝香、白及、白斂、紅白藥子、雄黃、烏雞骨、煅乳香、沒藥、冰片爲末。㈢治中風不省。麝香二錢。研末。入清油二兩和勻灌之。其人自甦也。（濟生方）㈣治中惡客忤。項强欲死。麝香少許。乳汁塗兒口中取效。醋調亦可。（廣利方）㈤治小兒驚啼。發歇不定。眞麝香一字。清水調服。日三。（廣利方）㈥治小兒中水。單以麝香如大豆三枚。奶汁調分三四服。㈦治破傷風水毒腫痛不可忍。麝香末一字。納瘡中。出盡膿水便效。（普濟方）㈧治中惡霍亂。麝香一錢。醋半盞調服。（聖惠方）㈨治諸果成積。傷脾作脹。氣急。用麝香一錢。生桂末一兩。飯和丸。兼豆大。大人十五丸。小兒七丸。白湯下。蓋水得麝則落。水得桂卽枯故也。（濟生方）㈩治消渴飲水。因飲酒或食果實過度。雖能食而口渴飲水數尿。以麝香當門子。酒和作十餘丸。枳椇子煎湯送下。蓋麝香敗酒壞果。枳椇亦敗酒也。（濟生方）⑪治偏正頭痛久不除者。晴明時將髮分開。用麝香五分。皂角末一錢。薄紙裹。置患處。以布包炒鹽於上熨之。冷則易。如此數次。永不再發。（簡便單方）⑫治五種蠱毒。麝香、雄黃等分爲末。以生羊肝如指大。以刀割開。裹藥吞之。（衛生方）⑬治口內肉毬有根如線。五寸餘。如釵股。吐出乃能食物。捻之則痛徹心者。麝香一錢。研水服之。日三自消。（夏子益奇疾方）⑭催生易產。麝香一錢。水研服立下。（續千金方）濟生勝金散。治人弱難產。麝香一錢。豆豉一兩。以舊青布裹之。燒紅爲末。以秤錘淬酒服二錢。卽下。郭稽中云。婦人產難及橫逆生者。乃兒枕破而敗血裹子。服勝金散。逐其敗血自生也。⑮治死胎不下。麝香當門子一枚。桂心末二錢。溫酒服。卽下。（本事方）⑯治痔瘡腫毒。麝香當門子、印城鹽等分。塗之。不過三次。（外臺祕要方）⑰治鼠咬成瘡。用麝香封之。妙。（經驗方）⑱治蠶咬成瘡。蜜調麝香傅之。（廣利方）⑲治山嵐瘴氣。水服麝香三分。解之。（集簡方）⑳治蟲牙作痛。香油抹筋頭。薄麝香末。綿裹炙熱。咬之。換二三次。其蟲卽死。斷根甚妙。（醫方摘要方）

用量　三分至一錢。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者。及勞怯與孕婦等禁用。忌大蒜。

參攷資料　㈠麝香入脾。治內病。凡風病在骨髓者。宜用之。使風邪得出。若在肌肉。用之反引風入骨。如油入麵之不能出也。（李杲）㈡五臟之風。不可入麝香。以瀉衛氣。口鼻出血。乃陰盛陽虛。有升無降。當補陽抑陰。不可用臍麝輕揚飛竄之物。婦人以血爲主。凡血海虛而寒熱盜汗者。宜補養之。不可用麝香之散。琥珀之燥。（朱震亨）㈢中風不省者。以麝香清油灌之。先通其關。則後免語蹇癱瘓之證。而他藥亦有效也。（嚴用和）㈣嚴氏言風。風必先用麝香。而丹溪謂風病血病。必不可用。皆非通論。蓋麝香走竄。能通諸竅之不利。開經絡之壅遏。若諸風諸氣。諸血諸痛。驚癇癱瘓諸病。經絡壅閉。孔竅不利者。安得不用爲引導以開之通之耶。非不可用也。但不可過耳。濟生方治飲食瓜果成積作脹者用之。治飲酒成消渴者用之。云果得麝則壞。酒得麝則敗。此得用麝之理者也。（李時珍）㈤麝香不可近鼻。有白蟲入腦患瘡。久帶其香透關。令人成異疾。（李廷飛）㈥麝生中臺山谷及益州雍州山中。春分取香。生者益良。（別錄）㈦麝形似麞而小。黑色。常食柏葉。又噉蛇。其香正在陰莖前皮內。別有膜袋裹之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五月得香。往往有蛇皮骨。今人以蛇蛻皮裹香云彌香。是相使也。麝夏月食蛇蟲多。至寒則香滿。入春臍內急痛。以自爪剔出。著屎溺中覆之。常在一處不移。曾有遇得。乃至一斗五升者。此香絕勝殺取者。昔人云是精溺凝作。殊不爾也。今出羌夷者多。眞好。出隨郡義陽晉溪諸蠻中者亞之。出益州者形扁。仍以皮膜裹之多僞。凡眞香一子。分作三四子。刮去血膜雜以餘物。裹以四足膝皮而貨之。貨者又復僞之。彼人言但破看一片毛共在裏中者爲勝。人惟得活者看取必當全眞耳。（陶弘景）㊀楊億談苑云。商汝山中多麝遺麝。常在一處不移。人以是獲之。其性絕愛其臍。爲人逐急。即投巖舉爪剔裂其香。就斃而死。猶拱四足保其臍。故李商隱詩云。投巖麝自香。許渾詩云。尋麝採生香。（唐愼微）㊁麝居山麓。居澤以此爲別。麝出西北者香結實。出東南者謂土麝。亦可用而力次之。南中靈貓。囊其氣如麝。人以雜之。李時珍）㊂麝香入脾治肉牛黃入肝治筋。冰片入腎治骨。按同是開竅通關之味。而其用異矣。（李杲）㊃麝如小鹿。多產於西藏。及中國四川獵。邊山谷。若麝香一物。蓋由麝臍而取出者也。其色棕黑。其臭噢香。用手撫之。如有油膩。彼藥肆所售者。未免多僞。用藥者宜細辨也。功用壯腦補神。凡腹痛抽筋。作悶作嘔。與及乾咳。服此能治。婦人遇身不安。氣虛血弱。頭昏目眩。心跳肚痛。胃不消化。月經不調等症。每服一分至二分。粥水調服。日服二三次。（西藥略釋）㊄麝香之價極貴。故贋品殊多。就中混和他物而增加其重量者。莫如用乾血塊。惟燒之則發惡臭。故易辨別之。此外和土和砂者亦屬不少。中國人製造僞品。其法至爲巧妙。其夾雜物多用靈貓香。龍涎香。香鼠。馬勃。朽木粉。或蟆。蛇。鹿胎等。（和漢藥考）㊅葱汁浸線。穿針引過。香囊線上之葱臭及味。盡消失者。必係眞品。否則必係僞品。（和漢藥考）

【麝香貓】即靈貓香之別名。詳『靈貓香』條。

【麝乾】即射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳『射干』條。

【麝臍】即麝香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麝香』條。

【麝臍香】即麝香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麝香』條。

【麝髒】即麝香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麝香』條。

【麗】即牝麋之別名。典見綱目。詳『麋』條。

二十二畫

【囊角】即鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿茸』條。

【攣蓳】效能　瀋程記。產雲南百夷中。餌一刀圭。終其世斷絕人道。

【攝子】即楓果之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『楓果』條。

【疊羅漢】即旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋覆花』條。

【竊脂】即桑鴞之古籍別名。典見爾雅。詳『桑鴞』條。

【籠古】即菘草之古籍別名。典見詩經。詳『菘草』條。

【籠葛】即龍草。參詳『烏蘞莓』條。

【藏子】即苦蘵之古籍別名。典見古今注。詳『酸漿』條。

【蘚】即吳茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『吳茱萸』條。

【蘆蠣】即壁虎之古籍別名。典見揚子方言。詳『壁虎』條。

【蠅蜂】產地　廣東陽春縣爲出產地。

形態　蠅蜂爲卵生蟲類之一種。常附橄欖樹而生。雖有首足。與木葉無異。須待木葉凋落時乃得之。置筐筒中。每遇蟲毒必鳴。鳴則自呼。而以其聲之清濁。可卜凶吉。故可供藥用。

主治　佩之辟蟲。

【蠻蟆】即蝦蟆之古籍別名。典見綱目。詳『蝦蟆』條。

【蠶】即馬刀之古籍別名。典見周禮。詳『馬刀』條。

【躑躅花】即羊躑躅花之簡稱。詳『羊躑躅花』條。

【躑躅茶】即山茶花之古籍別名。典見綱目。詳『山茶花』條。

【鑑】即古銅鏡之古籍別名。典見綱目。詳『古銅鏡』條。

【饗豆】命名　本品即槐實之於夜間爆響者。故名。

1001／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　明目悅顏。開心益智。壯筋骨。補腦髓。烏鬚黑髮。

參考資料　㈠有孫公者。年九十。強健如四五十歲人。自言生平惟服響豆。每歲桃子將熟時。輒令人守之。不令鳥雀啄落。既成。即收作二枕。夜聽其有聲者。即響豆也。因棄其餘。如是數月。而得響豆所在。每樹不過一枚。每歲不過服一粒。如是者數十年。無他術。（趙學敏）㈡顏氏家訓。庾肩吾常服桃實。年七十餘。目看細字。鬚髮猶黑。抱朴子云。桃子服之。令人補腦髮不白而長生。殆即此歟。（趙學敏）㈢響豆者。桃實之夜中爆響者也。一樹祇一顆。不可辨識。其法。桃始花時。即以絲網冒樹上。防鳥鵲啄食。結子熟後。多縫布囊貯之。夜以爲枕。聽無聲者。即棄去。如是遞枕。必有一囊作爆聲者。取此一囊。又多分小囊貯之。枕聽如初。得一響者。則又分二枕。如是漸分至僅存二顆。再分枕之。則響豆得矣。（紀曉嵐）

【驕桃】　即苦參之古籍別名。典見本經。詳『苦參』條。

【鰱魚】　**原名**　鱮魚。

命名　酒之美者曰醑。魚之美者曰鱮。鱮魚好羣行。相與相連。故名。

古籍別名　白色者名白鰱。紅色者名紅鰱。（動物學大辭典）

外國名詞　Hypophthalmichthys moritrix C. & V（拉丁）

基本　係脊椎動物魚類喉鰓類之鰱魚。

產地　生池澤淡水中。

形態　鰱魚爲鱗類魚屬之一種。其形似鰋。頭小鱗細。口亦小。體側扁。脊臀兩鰭亦不大。尾鰭分叉。背青黑。腹白色。大者體長三四尺。其肉可供食與藥用。

性質　甘溫無毒。

主治　溫中益氣。多食令人熱中發渴。又發瘡疥。

【鰷】　即勒魚之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『鰷魚』條。

【鰷魚】　**命名**　本品狀如條。故名。

古籍別名　白鰷。鯈魚。鮂魚。鯈魚（本草綱目）

基本　係脊椎動物魚類喉鰓類之鰷魚。

產地　生江湖淡水中。

形態　鰷魚爲鱗類魚屬之一種。其體狹長。側扁而薄。大者長尺許。狀如柳葉。頭小下顎比上顎稍長。肩鰓鼓起。尾鰭分叉。鱗細整而潔白。背色淡黑。微青。性好羣游水面。其肉可供食與藥用。

性質　甘溫無毒。

主治　煮食解瘧煖胃止冷瀉。

【鰷鯊】　即鰷鱷。詳該條。

【鰷鱷】　即鰷鱷。詳該條。

【鰻鱺】　**命名**　本品有雄無雌。以影漫於鱧魚。則其子皆附於鱧鬐而生。故名。

處方用名　鰻鱺魚。鰻鱺肉。

古籍別名　白鱓。蛇魚。漫黎。金絲鰻鱺。乾者名風鰻。（綱目）

外國名詞　Anguilla lostonensis Les 或A. rostrata（拉丁）

基本　係水族動物。爲無鱗魚類之鰻鱺。

產地　凡溪澗湖澤之淡水中恒有出。

形態　鰻鱺體長。爲圓柱形。皮膚甚厚。有膠質之黏液。鱗柔軟細不可辨。大者長至三尺。體色隨居處而異。有蒼黑茶褐等色。腹純白。味濃美。含有滋養料甚富。其肉可供藥用。膏骨血等。各詳該條。



鰻鱺

用法　恒以水煮調入五味供食。其入藥用。炙研爲末。或以燒薰。

性質　甘平有毒。

效能　補虛羸。治瘡癤。用作祛風殺蟲藥。

主治　五痔瘡癤。殺諸蟲。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論鰻鱺曰。療溼腳氣腰腎間溼風痺。常如水洗。以五味煮食。甚補益。患諸瘡癤瘍風人宜長食之。【宋】日華諸家本草論鰻鱺曰。治惡瘡女人陰瘡蟲痒。治傳尸疰氣勞損。暖腰膝。起陽。【明】李時

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

珍本草綱目論鰻鱺曰治小兒疳勞及蟲心痛【明】經希雍本草經疏論鰻鱺曰鰻鱺魚味甘其氣寒其形類蛇常與水蛇同穴故其性有小毒甘寒而善能殺蟲故骨蒸勞瘵及五痔瘡瘻人常食之有大益也燒烟辟蚊熏屋舍竹木斷蛀蟲置骨於衣箱中斷蠹其殺諸蟲之驗可證矣腹下有黑斑背上有白點者毒甚不可食重三四斤及水行昂頭者不可食妊娠食之令胎有疾脾胃薄弱易泄者勿食

配合應用　㈠治諸蟲心痛多吐清水鰻鱺淡煮飽食三五度即差（外臺秘要方）㈡治骨蒸勞瘦用鰻鱺二斤治淨酒二盞煮熟入鹽醋食之亦治腸風下血（聖惠方）㈢治一切惡瘡用蛇魚骨炙爲末入諸色膏藥中貼之外以紙護之（經驗方）

施用宜忌　凡有溼熱時病者禁用

參攷資料　㈠婦人帶下療一切風瘧如蟲行又壓諸草石藥毒不能爲害（張鼎）㈡鰻鱺所主諸病其功專在殺蟲去風耳與蛇同類故主治近之稽神錄云有人病瘵相傳死者數人取病者置棺中棄於江以絕害流至金山漁人引起開視乃一女子猶活取置漁舍每以鰻鱺食之遂愈因爲漁人之妻張鼎云燒烟熏蚊令化爲水熏蜇及屋舍竹木斷蛀蟲置骨於衣箱斷諸蠹觀此則別錄所謂能殺諸蟲之說益可證矣（李時珍）㈢欽州溪潭中出一種其背有五色文者頭似蝮蛇入藥最勝江河中難得五色者（孟詵）㈣鰻鱺其狀如蛇背有肉鬣連尾無鱗有舌腹白大者長數尺脂膏最多背有黃脈者名金絲鰻鱺此魚善穿深穴非若蛟蜃之攻岸也或云鮎亦產鰻或云鰻與蛇通（李時珍）㈤腹下有黑斑者毒甚與銀杏同食患瞿風（吳瑞）㈥小者可食重四五斤及水行昂頭者不可食嘗見舟人食之七日皆死（汪機）

【鰻鱺血】主治　瘡瘡入眼生膚以少許點之

【鰻鱺骨及頭】主治　炙研入藥治疳痢腸風崩帶燒灰敷惡瘡燒熏痔瘻殺諸蟲

【鰻鱺魚】　即鰻鱺之處方用名詳『鰻鱺』條

【鰻鱺膏】主治　諸瘻瘡

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論鰻曰燒灰傅陰瘡瘻瘡月蝕瘡【明】李時珍本草綱目論鰻曰止折傷血出不止

參攷資料　沈括筆談云鰻鱺烏賊魚腸也孫愐唐韻云鱺藏魚腸也南史云齊明帝嗜鰻鱺以蜜漬之一食數升觀此則鰻與腸皆得稱鰻鱺矣（李時珍）

【鰾膠】基本　本品即以諸魚之鰾所作之膠

古籍別名　魚膠魚鰾膠（綱目）

性質　甘鹹平無毒

主治　燒存性治婦人產難產後風搐破傷風痙止嘔血散瘀血消腫毒伏砒砂

參攷資料　㈠魚鰾膠同沙苑蒺藜服之種子蓋取其精血黏聚不致疎泄也其能治難產及散瘀消腫或者魚得天一之氣爲先而脬爲水化之腑用以調陰中之氣化有殊功歟（本草逃餉元）㈡諸鰾皆可以爲膠而海漁多以石首鰾作之名江鰾謂江魚之鰾也黏物甚固此乃工匠日用之物而記籍多略之今人以鰾煮凍作膏切

1003／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

片。以醯醋食之。呼爲魚膏者是也。（綱目）

【鱷魚】即海豚魚之古籍別名。典見綱目。詳『海豚魚』條。

【鱸魚】即鯆魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯆魚』條。

【鯆魚】命名　本品爲魚中之下品。蓋魚之庸常以供饔食者。故名。

古籍別名　鱸魚。溶魚。（綱目）

胖頭。（動物學大辭典）黑鱸。（本草綱目）

基本　係脊椎動物魚類喉鰓之鯆魚。

產地　生江湖中。

形態　鯆魚爲鱗類魚屬之一種。體側扁。其狀如鱸而頭較大。鱗細。口無齒。有舌。背色青黑。較濃。腹白。體長約尺餘。相傳謂鱸之美在腹。而鯆之美在頭。其肉可供食與藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　暖胃益人。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鯆魚肉曰。食之已疣。

參攷資料　㊀鯆魚肉祇可供食。別無功用。（陳藏器）㊁鯆魚肉多食動風。發瘡疥。（李時珍）

【鯀魚】即鰋之原名。詳『鰋』條。

【鰱魚】即鯪魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯪魚』條。

【鯆魚】即河豚之古籍別名。典見本草拾遺。詳『河豚』條。

【鱷魚膽】即青魚膽之古籍別名。典見綱目。詳『青魚膽』條。

【鷓鴣】古籍別名　越雉。（綱目）

外國名詞　Francolinus chinensis（拉丁）シャコ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類鷓雞類雷鳥科之鷓鴣。

形態　鷓鴣爲原禽類之一種。體大如鴿。頭頂暗紫赤色。其體上面灰色或灰褐。嘴紅。頰喉帶黃褐色。眼旁有橫行黑紋。耳璽赤褐。肩翼茶灰。腹黃。短。尾短。璽色灰褐。外側羽尖赤褐。腳深紅。趾長。翼圓短。鳴時常對啼。其聲如曰行不得也哥哥。食昆蟲。畏霜露。早晚稀出。夜棲以木葉蔽身。其肉白而脆。味勝雞雉。可供食與藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　解嶺南野葛菌子毒。生金毒。及溫瘧久病欲死者。合毛熬酒漬服之。或生搗汁服最良。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論鷓鴣肉曰。能利五臟。益心力。聰明。【宋】日華諸家本草論鷓鴣肉曰。酒服主蟲氣欲死。

參攷資料　㊀鷓鴣肉不可與竹筍同食。令人小腹脹。自死者不可食。（孟詵）㊁按南唐書云。丞相馮延己。苦腦痛不已。太醫吳廷紹曰。公多食山鷄。鷓鴣。其毒發也。投以甘草湯而愈。此物多食。烏頭半夏苗。故以此解其毒爾。又類說云。楊玄之通判廣州。歸楚州。因多食鷓鴣。遂病咽喉間生癰。潰而膿血不止。醫食俱廢。醫者束手。適楊吉老赴郡。邀診之。曰。但先啖生薑一斤。乃可投藥。初食覺甘香。至半斤覺稍覺。盡一斤。覺辛辣。粥食入口。了無滯礙。此鳥好啖半夏。毒發耳。故以薑制之也。觀此二說。則鷓鴣多食。亦有微毒矣。而其功用又能解毒。解蠱。功過不相掩也。凡鳥獸自死者。皆有毒。不可食。爲其受厲氣也。何獨鷓鴣。（李時珍）

【鷓鴣脂膏】主治　塗手皸瘃。令不龜裂。

【鷓鴣菜】古籍別名　海人草。海鹿。老毒。海仁草。（和漢藥考）

基本　屬紅色藻門之鷓鴣菜。

產地　凡海石上及海濱間恒多生。爲和漢藥考曰。產於日本九州南部及沖繩諸島沿海岩石。

形態　鷓鴣菜爲海草。叢生一處。高約二三寸。作圓柱狀。多如珊瑚狀分歧。全部被有毛茸如狐尾。質强靭。呈淡綠色。晒乾則變褐黑色。有一種海藻氣味。

成分　含有黏液素。食鹽。苦鹽。礵砂等。

效能　用作驅蟲劑及瀉胎毒藥。

主治　療小兒腹中蟲積。食之即下如神。

國外學說　藥劑誌第七十三號載有藥學士慶松勝左衛門氏之『海人草』一篇。報告其所含之成分。不外植物黏液素。且其種類與加拉健。寒天藻等所含者相同。用硫酸化合。有生『格拉克篤塞』。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之性。其黏液素之性質。尚不十分明瞭。似與纖維素及『阿拉敏』（阿拉伯樹膠之成分）有關名之爲『巴魯阿拉敏』（Pararalin）。其含量約爲三〇%。黏液素究有驅蟲功效與否。殊不敢必。假若有此功效。則如加拉健與寒天藻（涼菜）或亦有同一價值云。中外醫事新報載有田中醫士言。海人草含有名『格拉紐姆』植物鹽基。但慶松藥學士則云不能因此即認爲有機化合體云。和漢三才圖會曰。海人草生琉球海邊。多出於薩州。販於四方。黃色微黯。長一二寸。有歧。無根髭而有微毛。茸輕虛。味甘微鹹。能瀉胎毒。（浸水一夜去土砂）小兒初生三日中。先用海人草甘草二味。（或加蕗根）包帛浸湯令飲之。呼曰甜物。此方不知始於何時。本朝通俗必要之藥也。小兒吞之。即吐涎沫。謂之吐穢汁。可以去腸上胎毒。

用量 五分至錢半。

著名方劑 ㊀鷓鴣菜丸。治一切胎毒。蟲癖。或寒熱如瘧者。下虻蟲尤妙也。（和漢藥考方）鷓鴣菜二錢。蒲黃、大黃各三分。苦楝皮二分。上爲末。糊丸。煎服亦可。㊁鷓鴣菜湯。治腸胃中蟲。方同上。鷓鴣菜二錢半。蒲黃五分。甘草二分。上水煎服。㊂鷓鴣湯。俗呼『麻久里』（按鷓鴣菜日俗稱麻久里）云可下初生兒胎毒。（方同上）甘草十六錢。檳榔四錢。黃連二錢。海人草四錢。將軍四錢。上方若女子則加紅花四錢。

參考資料 ㊀鷓鴣菜生海石上。色微黑。（連江志）㊁鷓鴣菜散碎花。微黑。出漳浦。（漳州府志）

【鷓鴣】即鸇之古籍別名。典見綱目詳『鸇』條。

二十二畫 鷓鴣鷺鸕鷀鷖鷄 二十三畫 巖

【鷺】 **命名** 鷺喜文章。故字從章。而性鷙憚。故名。

古籍別名 麐。麈。牡者名麋。牙麈。白毛者名銀麈。牝者名麋。子名麈。大者名麃。（綱目）

外國名詞 Moschus chinioo

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類反芻偶蹄類麝科之獸。

產地 山野陂澤及淺草叢中有之。

形態 麝爲獸類麝屬之一種。形似鹿。體較小。頭無角。雄者有牙出口外。即名牙麝。色黃黑。大者重二三十斤。秋冬居山。春夏居澤。四肢善跳。其皮細韌。勝於鹿皮。夏月毛稀而皮厚。冬月毛多而皮薄。其肉可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 補益五臟。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論麝肉曰。益氣力。悅澤人面。【明】寧原食鑑本草論麝肉曰。釀酒又有祛風之功。

參考資料 ㊀八月至十一月食之勝羊。十二月至七月食之動氣。多食令人消渴。苦瘦惡者食之發痼疾。不可合鵠肉食。成癥疾。又不可合梅李蝦食。病人。（孟詵）㊁俗云白肉是麝。其膽白易腐怖也。（陶弘景）

【麝骨】 **性質** 甘。微溫。無毒。

主治 虛損洩精。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論麝骨曰。益精髓。悅顏色。

參考資料 千金治產後虛損。有麝骨湯。麥汁煎藥。（李時珍）

【麝髓及腦】 **主治** 益氣力。悅澤人面。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論麝髓及腦曰。治虛風。

參考資料 ㊀千金治暗風之。睪瘡煎及治虛損之天門冬煎。並用之。（李時珍）㊁唐方有麝髓與麝骨酒並補下。（蘇頌）

【麤麈】 即蟾蜍之古籍別名。典見詩經詳『蟾蜍』條。

【麤鼠】 即黃鼠之古籍別名。典見綱目詳『黃鼠』條。

【麤鼠】 即鼹鼠詳『鼹鼠』條。

【麤鼠】 即鼬鼠之古籍別名。典見綱目詳『鼬鼠』條。

二十三畫

【巖苦】 即石耳之日本名。詳『石耳』條。

【巖香】 **俗名** 水碱。

基本 巖洞壁上有泉滴下。年久。其流水處有水結。即是巖香。

性質 寒。無毒。

主治 敷湯火傷。金瘡出血用。

1005／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水碱火煅醋淬。研末。同白果肉水浸搗汁。和服七分。可治白濁。亦入眼科用。

辨僞　以色白如霜灰。置手中冷入骨者眞。

【巖茸】即石耳之日本名。詳『石耳』條。

【巖蜜】即蜂蜜之古籍別名。典見綱目。詳『蜂蜜』條。

【欖枝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【欒茶】**主治**　頭痛。

參攷資料　范石湖集。脩江出欒茶。蓋石楠樹葉也。毛文錫茶譜云。湘人四月採楊桐汁作飯。則必採石楠葉作茶。乃能去風。（趙恕軒）

【欒荊】**古籍別名**　頑荊。（圖經）

形態　欒荊爲灌木類荊之一種。枝莖白色。葉圓青色。似榆葉而長。冬夏不凋。夏開紫白色之花。結實如大麻。其子可供藥用。

採取　八月採之。

性質　辛。苦。溫。有小毒。

主治　大風。頭面手足諸風。癲癇狂癎。瘴寒冷疼痛。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論欒荊子曰。四肢不遂。通血脈。明目益精光。【宋】蘇頌圖經本草論欒荊子曰。合柏油同熬。塗人畜瘡疥。

施用宜忌　惡石膏。決明爲之使。

【欒華】**外國名稱**　Koelreuteria paniculata, Laxm.（拉丁）モクゲンジ（日本）

基本　係無患子科欒樹屬。爲欒樹之花。

產地　生山野間園圃亦或有之。

形態　欒樹爲喬木類之一種。高丈餘。葉爲奇數羽狀複葉。小葉卵形。有不整齊之缺刻及重複之齒牙。而互生。狀如木槿葉而薄。上面平滑。下面有毛。夏開圓錐狀花序。花小黃色。似槐花而稍長大。中心雜以紅色。結實。實之子殼。似酸漿子。實如熟豌豆。圓黑堅硬。可爲數珠。其花可供藥用。

採取　五月六月間採收之。

性質　苦。寒。無毒。

主治　目痛淚出。傷胥。消目腫。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論欒花曰。合黃連作煎。療目赤爛。

【欒米】㊀即粟芽之原名。詳『粟芽』條。㊁即穀芽之原名。詳『穀芽』條。

【纖霞草】**基本**　本品爲雜草類之一種。

主治　腎臟虛冷。氣攻臍腹痛。同砒砂、生烏頭、共研成末。將沙罐燒赤。傾入內。煅之。不蓋罐口。至煙冷取出。再同烏頭末。蒸餅爲丸。如梧子大。醋湯送服。

【襲香】㊀即大茴香之原名。詳『大茴香』條。㊁即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜衡』條。

【蘸子】即鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠李子』條。

【蘺】即白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【蘼蕪】**古籍別名**　薇蕪。江蘺。（別錄）蘄茝（爾雅）

外國名稱　（onioselinum univitatum, Turcz.（拉丁）センキュ（日本）

基本　係繖形科芎藭屬。爲蘼蕪之葉莖。

性質　辛。溫。無毒。

主治　咳逆。定驚氣。辟邪惡。除蟲毒鬼疰。去三蟲。久服通神。（本經）主身中老風。頭中久風。眩。（別錄）

歷代記述攷證　【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蘼蕪曰。作飲。止泄瀉。

參攷資料　㊀蘼蕪一作蘺蕪。其莖葉靡弱而繁蕪。故以名之。當歸名蘄。白芷名蘺。其葉似當歸。其香似白芷。故有蘄茝江蘺之名。王逸云。蘺草生江中。故曰江蘺是也。（李時珍）㊁芎藭葉名蘼蕪。又曰蘼蕪。一名江蘺。芎藭苗也。生雍州川澤及寇句。四月五月採葉曝乾。（別錄）㊂今出歷陽處處人家多種之。葉似蛇牀而香。騷人借以爲譬。方藥稀用。（陶弘景）㊃此有二種。一種似芹葉。一種似蛇牀香氣相似。用亦不殊。（蘇恭）㊄別錄言蘼蕪一名江蘺。芎藭苗也。而司馬相如子虛賦。稱芎藭、蘪蕪、江蘺、蘼蕪、相如、蓋滿、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蕪。上林賦云。被以江蘺。揉以蘼蕪。似非一物何耶。蓋緻苗未結根時則爲蘼蕪。既結根後乃爲芎藭。大葉似芹者爲江蘺。細葉似蛇牀者爲蘼蕪。如此分別自明白矣。淮南子云。亂人者若芎藭之與藁本。蛇牀之與蘼蕪。亦指細葉者言也。廣志云。蘼蕪香草。可藏衣中。管子云。五沃之土生蘼蕪。郭璞贊云。蘼蕪香草。亂之蛇牀。不損其眞。自裂以芳。又海中苔髮。亦名江蘺。與此同名耳。（李時珍）

【蘼蕪花】主治　入面脂用。

【蘼蕪】卽千歲藁之古籍別名。典見別錄。詳『千歲藁』條。

【蘼白子】卽萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊菔子』條。

【蘼爬子】卽萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊菔子』條。

【蘼蕮】卽麗蕮之古籍別名。典見爾雅。詳『麗蕮』條。

【蘼蒫】卽萊菔之古籍別名。典見爾雅。詳『萊菔』條。

【蘼蕪三七】卽旱三七之別名。典見百草鏡。詳『旱三七』條。

【蘿摩】原名　斫合子。

命名　漢高祖用子傳軍士金瘡。故名斫合子。又其實瓣時有漿裂時如瓢。故有雀瓢羊婆奶之稱。每一子有一條白絨。長二寸許。故俗呼婆婆鍼線包及婆婆鍼袋兒等名。

古籍別名　蓫。芜蘭。（詩疏）白環籐。（拾遺）實名雀瓢。（詩疏）斫合子。（拾遺）羊婆奶。（綱目）婆婆鍼線包。（俗名）苦丸雞腸。（和漢藥考）蕭桑。（陳藏器）

外國名稱　牧野富太郎氏定蘿藦學名爲 Metaplexis japonica, Makino

基本　係屬蘿藦科蘿藦之種子及白絨。

產地　山野間多產之。

形態　蘿藦爲山野自生之多年生蔓草。春日從舊根生苗。纏繞他物而生。長葉爲長心臟形。輭而厚。有光澤。大者四寸許。傷葉莖則流出白汁。夏月於葉腋生穗一二寸。叢生五瓣小花。花冠外面白色。內面淡紫色。中有白茸。花後結長圓形。長三四寸之蒴果。殼青紫色。懸轅垂起。成熟則作舟狀綻裂。中有似絹絲光澤之白絨。作針狀。長寸許。其針之根。附有一子。遇風立卽飛散。



蘿藦

種類　㊀斫合子。卽蘿藦子也。有一種莖葉及花。皆似蘿藦。但氣臭。根紫。結子圓大如豆。生青熟赤爲異。此則蘇恭所謂女青似蘿藦。陳藏器所謂二物相似者也。㊁蘇恭謂女青。葉似蘿藦。兩葉相對。子似瓢形。大如雞卵。故名雀瓢。根似白薇。莖葉並臭。生平澤。別錄云。葉嫩時似蘿藦。圓端大。莖實黑。

種植　亦有植於園圃爲籬者。

採取　有採其葉有收其子。

性質　甘辛。溫。無毒。

效能　種子用作強壯藥。絨用作止血藥。

主治　虛勞。補益精氣。強陰道。葉煮食。功同子。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論蘿藦曰。擣子傅金瘡。生膚止血。搗葉傅腫毒。【明】李時珍本草綱目論蘿藦曰。取汁傅丹毒赤腫。及蛇蟲毒。卽消蜘蛛傷。螫治不愈者。搗封二三度。能爛絲毒。卽化作膿也。

配合應用　㊀治一切創傷。採實內綿貼之。則止血。㊁治蜘蛛咬傷。搗汁塗之。㊂治蛇咬。搗汁塗之。

用量　一錢至三錢。

著名方劑　蘿藦散。補益虛損。極益房勞。（千金方）枸杞根皮、五味子、柏子仁、酸棗仁、乾地黃各三兩。上共研末。每服方寸匕。酒化下。日三服。

參攷資料　㊀蘿藦作藤。生摘之。有白乳汁。人家多種之。葉厚而大。可生啖。亦可蒸煮食之。藤云。去家千里。勿食蘿藦枸杞。言其補益精氣。強盛陰道。與枸杞葉同也。（陶弘景）㊁蘿藦一名羌蘭。幽州謂之雀瓢。然雀瓢是女青別名也。蘿藦葉似女青。故亦名雀瓢。（蘇恭）㊂蘿藦。東人呼爲白環藤。生籬落間。折之有白汁。一名雀瓢。其

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

女胄紲非白環。二物相似。不能分別。又研合子作藤生。蔓延籬落間。至秋霜合子如柳絮。一名雞腸。一名熏桑(陳藏器)

【蠻荣水】基本　本品卽作黃蠻菜之水。

性質　酸鹹無毒。

主治　吐諸痰飲宿食。酸苦涌泄之劑也。

【蠐螬】命名　蠐螬。象其聲也。

古籍別名　土蜂(別錄)細腰蜂(莊子)螓蜴(詩經)蒲盧(爾雅)

外國名詞　Ammophila infesta Sm.(拉丁)ヂガバチ(日本)

基本　係節肢動物昆蟲類膜翅類細腰蜂科之蠐螬蟲。

產地　生樹枝牆壁及屋間。

形態　蠐螬爲卵生蟲類蜂屬之一種。其體榮黑色。頭胸疎生黑褐色之細毛。觸角短。複眼呈卵狀。翅爲膜質。前翅較爲大。腹七節。有細腰。雌者尾端有毒針。能螫人物。雄者雄壯。全體長約七八分。常銜泥就樹枝牆壁間作球形之房以產卵。藏蜘蛛蜈蚣等諸小蟲於房中供子食。子大如粟米。色白微黃。可供藥用。

製法　大明曰。入煎須炒用。

性質　辛。平。無毒。

主治　久痢。欬逆。毒氣。出刺。出汗。(本經)療鼻塞(別錄)

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論蠐螬曰。治嘔逆。生研能署竹木刺。

【蠐螬窠】性質　甘。平。無毒。

主治　頭風。婦人難產。小兒雷亂。吐瀉。炙末和乳汁服。療乳蛾。癰腫。疔瘡。同蛇蛻煆研酒服。蜘蛛蜂蠆螫傷。醋調傅之。

【蠣】卽蠐螬之古籍別名。典見爾雅。詳『天牛』條。

【蠣蛤】卽土龜之別名。典見綱目。詳『蟲蟲』條。

形態　蠐螬爲卵生蟲類蜂屬之一種。其體榮黑色。頭胸疎生黑褐色之細毛。觸角短。複眼呈卵狀。翅爲膜質。前翅較爲大。腹七節。有細腰。雌者尾端有毒針。能螫人物。雄者雄壯。全體長約七八分。常銜泥就樹枝牆壁間作球形之房以

【蠱蟲】基本　造蠱者以百蟲置器皿中。俾相啖食。取其存者。卽爲蠱蟲。人中其毒。卽爲蠱毒。

主治　解蠱毒。燒灰服少許立愈。

參攷資料　凡蠱蟲療蠱。是知蠱名。卽可治之。如蛇蠱用蜈蚣蠱。蜈蚣蠱用蝦蟆蠱。蝦蟆蠱用蛇蠱。蠱之類。是相伏者。乃可治之。(陳藏器)

【蠼螋】卽蠣蠱之古籍別名。典見抱朴子。詳『蠣蠱』條。

【醫子菜】卽蒼菜之古籍別名。典見野菜譜。詳『蒼菜』條。

【顯明犯】卽阿膠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『阿膠』條。

【鷺羊花】卽羊躑躅之古籍別名。典見綱目。詳『羊躑躅』條。

【鷺精香】卽返魂香之古籍別名。典見海藥本草。詳『返魂香』條。

【鬻髏骨】卽天靈蓋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天靈蓋』條。

【鱖魚】卽白魚之古籍別名。典見綱目。詳『白魚』條。

【鱣魚】卽鱘魚之古籍別名。典見爾雅。詳『鱘魚』條。

【鱠魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮑魚』條。

【鱘魚】古籍別名　春魚。臆名鵝毛脡。(綱目)

產地　出南方諸地。

形態　鱘魚爲魚類之一種。春月自岩穴中隨水流出。狀如初化魚苗。取收曝乾爲脡。味頗美。煎可作膾。又可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　和中益氣。令人喜悅。

【鱨魚】命名　鱨好獨行。羞與輩伍。故字從尊。

古籍別名　鯫魚。赤眼魚。(綱目)

外國名詞　Oncorhynchus masou Brevoort 或 O. macrosto-mus Gthr.(拉丁)マス或ヤマメ或エゾマス(日本)

基本　係脊椎動物魚類喉鰾類鮭科之鱨魚。

產地　出海中及河湖間。

形態　鱨魚爲魚鱗類之一種。其體側扁而呈紡錘形。狀如鱓而小。赤脈貫瞳。身長。鱗細於鱣。脊鰭有二棘十一刺。臀鰭有三棘十刺。胸腹兩鰭皆小。尾鰭略分歧。兩端鈍圓。近尾背面有脂鰭。背色淡青。稍帶黑。旁面有不規則之黑橢圓紋。側線下白色。長二三尺。棲於海中。好食螺蚌。夏日溯於河流而產卵。於清洌之急湍砂礫中。其肉可

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

供食與藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　暖胃和中。

參攷資料　鱓魚多食動風熱發疥癬。（李時珍）

【鱓魚】　**命名**　本品腹黃。故世有黃鱓之稱。

處方用名　鱓魚肉。鱓魚血。

古籍別名　黃鱔。黃鱓。鱔魚。（綱目）

基本　係水族動物無鱗類。爲鱓魚之肉。

產地　凡水岸泥窟中恒有出。

形態　鱓魚形似鰻鱺而細長。亦似蛇而無鱗。體赤褐或青黃。多涎沫。長二三尺。頭部下有鰓孔二。腹中有肺。或謂之氣囊。其肉血等可供藥用。

性質　甘。大溫。無毒。

效能　祛風。澄補虛羸。用作緩和强壯藥。又爲中風。澄痙藥。

主治　補中益血。療潛唇。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論鱓魚曰。補虛損。療婦人產後惡露淋瀝。血氣不調。羸瘦止血。除腹中冷氣。腸鳴及澄痙氣。【唐】孟詵食療本草論鱓魚曰。補五臟。逐十二風。邪。患澄風惡氣人作臘。空腹飽食。暖臥取汗出如膠。從腰脚中出。候汗乾。暖五枝湯浴之。避風。三五日一作。甚妙。【元】朱丹溪本草衍義補遺論鱓魚曰。善補氣。婦人產後宜食。【明】李時珍本草綱目論鱓魚曰。專貼一切冷漏痔瘻。臁瘡引蟲。【明】繆希雍本草經疏論鱓魚曰。鱓魚味甘氣大溫。甘溫具足。所以能補中益血。甘溫能通經脈。療風邪。故又主療潛唇。及今人用之。以治口眼喎斜也。【清】黃宮繡本草求眞論鱓魚曰。鱓魚稟土陽氣以生。性善穿穴。力堅而銳。無足能竄。與蛇同性。故書皆載通經達絡。能治十二經風邪。並耳目諸竅之病。如風中血脈。口眼喎斜。用尾血同麝少許。右喎塗左。左喎塗右。止即洗去。耳痛鼻衄。瘡後目翳。用血滴點即愈。臁瘡蛀爛。用鱔打死。香油抹腹。繫於瘡上。候痛取下。看鱔有蟲上入即去。產後惡露淋瀉腸鳴。澄痙。用此煮食。即除。老人虛痢不止。用此曝乾。煅灰存性。調服即絕。且能通力壯筋。故大力丸取此同熊筋、虎骨、當歸、人參等分。以進陽道不長。不能續嗣。用此血同蛤蚧等藥以入。皆以借其性力相助。但此味甘性熱。其力能補。若病屬虛熱及時行病後陰虛火熾。食則必有氣弱動風與氣之變。不可不愼。【清】王士雄隨息居飲食譜論鱓魚曰。鱓甘熱。補虛助力。善去風。寒。澄痺。通血脈。利筋骨。治產後虛羸。愈臁瘡痔瘻。肥大腹黃者。勝。宜與猪脂同煨。多食動風發疥。患霍亂。損人時病前後癮疹。腹滿諸病。均大忌。黑者有毒。更有蛇變者。項下有白點。夜以火照之。則通身浮水上或過大者。皆有毒。不可不愼也。其血塗口眼喎斜。赤遊風。滴鼻止衄。滴目治疹後生翳。

配合應用　㈠與黃耆同食。能益氣力。

㈡治火丹赤腫。生鱓血塗之效。

㈢臁瘡蛀爛。用黃鱓魚數條打死。香油抹腹。蟠瘡上。繫定。頃刻痛不可忍。忽然後取下。看腹有針眼。皆蟲也。未盡更作。後以人塵骨灰油調搽之。（奇效方）

參攷資料　㈠鱓魚。黑者有毒。（孫思邈）㈡鱓魚。性熱。能補。時行病後食之多復。（陶弘景）㈢鱓魚。動風。氣多食令人蜜亂。曾見一郎官食此吐利幾死也。（蘇宗奭）㈣鱓魚。黃質黑章。體多涎沫。大者長二三尺。夏出冬蟄。二種蛇變者名蛇鱓。有毒害人。南人驚鱓肆中。以缸貯水。畜數百頭。夜以燈照之。其蛇化者。項下必有白點。通身浮水上。即棄之。或以蒜瓣投缸中。則羣鱓跳擲不已。亦物性相制也。（李時珍）㈤鱓魚。作臘當重煮之。不可用桑柴。亦蛇類也。（陳藏器）

【鱓魚皮】　**主治**　婦人乳核硬痛。燒灰。空心溫酒服。

【鱓魚肉】　即鱓魚之處方用名。詳『鱓魚』條。

【鱓魚血】　**採取**　在尾上取之。

主治　塗瘰及癮。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鱓魚血曰。療口眼喎斜。同麝香少許。左喎塗右。右喎塗左。正即洗去。治耳痛。滴數點入耳。治鼻衄。滴數點入鼻。治疹後生翳。點少許入目。治赤斑。同蒜汁墨汁

1009／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

頰塗之。又塗赤遊鳳。

【鱣魚頭】採取　五月五日採收之。

性質　甘。平。無毒。

主治　燒服止痢。主消渴。去冷氣。除痞癥。食不消。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鱣魚頭曰。同蛇頭、地龍頭。燒灰酒服。治小腸癰有效。百蟲入耳。燒研。綿裹塞之立出。

【鱣魚】卽鱣魚之古籍別名。典見綱目詳『鱣魚』條。

【鱣魚血】卽鱣魚之處方用名。詳『鱣魚』條。

【鱖豚】卽鱖魚之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『鱖魚』條。

【鱖魚】命名　鱖者蹶也。本品體不能屈曲如殭蹶也。故名。

古籍別名　鬾魚。石桂魚。（開寶）水豚。（綱目）鬾魚。（動物學大辭典）鱖豚。（日華）

外國名詞　Heliocolonus Sp.

基本　係脊椎動物魚類喉鰾類之鱖魚。

產地　生江湖中。

形態　鱖爲魚鱗類之一種。體扁腹闊。口大。鱗細。體色淡黃。兼褐。腹白有黑斑。斑紋色明顯者爲雄。稍晦者爲雌。脊鰭十二棘。鰓蓋骨亦有細棘。體長七八寸。小者三四寸。棲江湖。冬日潛伏岸穴中。其肉無細刺。可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　腹內惡血。去腹內小蟲。益氣力。令人肥健。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論鱖魚肉曰。補虛勞。益脾胃。【唐】日華諸家本草論鱖魚肉曰。治腸風瀉血。

參攷資料　按張杲醫說云。越州邵氏女年十八。病勞瘵累年。偶食鱖魚羹遂愈。觀此正與補勞益胃殺蟲之說相符。則仙人劉愚隱士張志和之嗜此魚。非無謂也。（李時珍）

【鱖魚尾】主治　小兒輭癍。貼之良。

【鱖魚膽】採取　臘月採收。懸北簷下。陰乾用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　骨鯁竹木刺入咽喉。酒煎溫服。取吐之。

【鱗蛇】產地　出雲南、安南諸地。

形態　鱗蛇爲蟒蛇之大者。卽所謂巨蟒也。長丈餘。有四足。鱗有黃黑二色。能食麋鹿。亦能傷人。春冬居山。夏秋居水。土人殺而食之。其膽可供藥用。

採取　以黃鱗者良。

性質　苦。寒。有小毒。

主治　解藥毒。治惡疾及牙疼。

【鱗鯷甲】卽石斛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石斛』條。

【鱘魚】命名　本品軀體延長。故字從尋而名曰鱘。

古籍別名　鱏魚。鮪魚。王鮪。（爾雅）碧魚。（綱目）小者名叔鮪。更小者名鮥子。（郭璞）尉魚。（毛詩疏義）鮠鱘。（漢書）乞里麻魚。（飲膳正要）

外國名詞　Peophurus Sp.

基本　係脊椎動物魚類硬鱗類鱏魚科之鱘。

產地　生江河深水間。

形態　鱘魚爲無鱗魚類之一種。體長似鱣。長達二三丈。背無硬鱗。鼻亦長。口在頭下。尾分叉。背色青。腹色白。頗有青斑紋。狀如梅花。肉色潔白。味亞於鱣。可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　補虛益氣。令人肥健。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論鱘魚肉曰。煮汁飲。治血淋。

參攷資料　鱘魚肉有毒。味雖美而發諸藥毒。動風。發一切瘡疥。久食令人心痛腰痛。服丹石人忌之。勿與乾筍同食。發癰瘍風。小兒食之成咳嗽及瘧痢。作鮓雖珍。亦不益人。（孟詵）

【鱘魚子】主治　食之肥美。殺腹內小蟲。

【鱘魚鼻肉】主治　補虛下氣。

參攷資料　鱘魚鼻肉作脯。名鹿頭。亦名鹿肉。壺言其美也。（綱目）

【鱘鰉魚】卽鱣魚之俗名。詳『鱣魚』條。

【鷄雛】形態　本品爲原禽類秩雛科之一種。大如雛

1010／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

而脚長冠紅。雄者大而色褐。雌者稍小而色斑。鳴聲甚大。其肉可供藥用。性質功用。俱同秧雞。詳秧雞條。

【鷓鴣】卽巧婦鳥之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『巧婦鳥』條。

【鷓鴴】卽鷸鷸之古籍別名。典見綱目。詳『鷸鷸』條。

【鷩雉】命名　鷩性慤急耿介。故名。

古籍別名　山雞。錦雞。(禽經)采雞。(周書)金雞。鷄鶵。(綱目)

產地　出諸南越山中。湖南湖北亦多有之。

形態　鷩雉爲原禽類雉屬之一種。形似雉而羽色尤麗。雄者頭色青綠。有金黃色之毛冠。喉部黃色而頸項間又有純白色之輪紋。胸腹紅銅色。甚光澤。背及尾色帶金黃色。全體羽如橄欖色。尾長。先端細。其雌者亦似雉。惟胸腹兩部之黑斑。較爲少耳。其肉可供藥用。

性質　甘。溫。微毒。

主治　食之令人聰慧。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論鷩雉曰。養之禳火災。

【鷯鴂】卽鷸雉之大者。典見綱目。詳『鷯雉』條。

【鷲】卽鷺之古籍別名。典見山海經。詳『鷺』條。

【鷸】　外國名稱　Gallinago caelestris Frenzel Common Snipe (拉丁) シギ或マシキ (日本)

基本　係脊椎動物鳥類涉禽類千鳥科之鷸。

產地　出北方諸地及西比利亞等處。



鷸

肉可供食與藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　補虛。甚暖人。

【鷷】卽鷸鷷之古籍別名。典見爾雅。詳『鷸鷷』條。

【鷷】卽鷸之古籍別名。典見說文。詳『鷸』條。

【鷷】卽鷸之古籍別名。典見綱目。詳『鷸』條。

【鷷】卽鷸之古籍別名。典見綱目。詳『鷸』條。

【鷷】㊀卽黍之古籍別名。典見爾雅。詳『黍』條。㊁卽稷米之赤色者。典見綱目。詳『稷米』條。

【鷷乾菜】卽乾冬菜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『乾冬菜』條。

【鷷鼠】命名　鷷偃也。本品偃行地中。故名。

古籍別名　田鼠。(禮記)鼢鼠。

鼷鼠。(綱目)

外國名稱　Talpa mogura Temm 或 Mogera Wogura Mole 或 Mould Warp (拉丁) ムグラ或モグテ (日本)

基本　係屬脊椎動物哺乳類有胎盤類食蟲類鼷鼠科。

產地　溪山林下土中有之。

形態　鼷鼠爲獸類鼠屬之一種。其體肥滿如鼠。而鼻端尖如錐。嗅覺敏銳。能嗅蟲類之所在。眼小。隱皮毛中。耳殼小。聽覺亦敏。體爲圓筒形而扁平。長五寸許。柔毛密生。色灰黑。有光澤。四肢短而力强。各有五趾。趾具鉤爪。前肢大而闊。爪如鋤而向外。後肢稍小。便於掘土。性畏日光。常棲土中。覓食蚯蚓昆蟲等物。性亦殘忍。時有鬥食同類。其肉可供藥用。



鼷鼠

性質　鹹。寒。無毒。

主治　燔之療癰疽。諸瘻蝕惡瘡。陰濕爛瘡。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論鼷鼠肉曰。久食去風。主瘡疥痔瘻。【宋】蘇頌圖經本草論鼷鼠肉曰。治風熱久積。血脈不

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

行。結成癰疽。可消。又小兒食之。殺蚘蟲。

【鼴鼠脂膏】　主治　摩諸瘡。

【鼴鼠糞】　主治　蛇虺螫傷腫痛。研末。豬脂調塗。

【鼬】　即隱鼠之古籍別名。典見綱目。詳『隱鼠』條。

二十四畫

【欃子】　即食菜黃之古籍別名。典見本草拾遺。詳『食菜黃』條。

【癩茄】　即曼陀羅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『曼陀羅』條。

【籧篨柴】　產地　多生山谷中。形態　籧篨柴爲雜草類之一種。其皮可供藥用。主治　癰瘡。

【蘧】　即山蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山蒜』條。


【蘧骨】　即虎骨之古籍別名。典見綱目。詳『虎骨』條。

【蠵龜】　古籍別名　蠵龜。蠵蠵。（漢書）蠵龜。（郭璞）蠵龜。蚼蠵。最鳳。（綱目）海龜。（動物學大辭典）其食鰮體動物者名赤蠵龜。其食植物者名保蠵龜。（醫學大辭典）

外國名詞　Chelonia quoniana Wagl, Loggerhead turtle（拉丁）ウミガメ或アカウミガメ（日本）

基本　係脊椎動物爬蟲類龜鼈類蠵龜科之蠵龜之肉。

產地　生海中及深澤間。



蠵龜

形態　蠵龜爲介類龜屬之一種。乃龜之巨者。頭大嘴鉤曲。背腹被有硬甲。四肢皆爲蹼狀。每肢祇有一爪。尾短。背褐色。腹面淡黃。體長約六尺。棲海濱間。捕食魚蝦動物或植物。草本夏秋夜間上陸。以後肢搔沙爲穴以產卵。卵藉日光以孵化。其所謂保蠵龜者。背暗綠色。有主紋片十三枚。所謂赤蠵者。背赤褐色。有主紋片十五枚。其肉可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　去風熱。利腸胃。

【蠵龜皮】　原名　龜筒。古籍別名　蠶皮。（綱目）

性質　甘。鹹。平。無毒。

主治　血疾及中刀箭毒。煎汁飲之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論蠵龜皮曰。解藥毒蟲毒。

【蠵龜血】　性質　鹹。平。微毒。

主治　療俚人毒箭傷。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論蠵龜血曰。解燋銅及蛇汁毒。【宋】日華諸家本草論蠵龜血曰。中刀箭鬪絕者。刺取飲之。

【蠵龜筒】　即龜筒。見『蠵龜皮』條。

【蠶】　即白殭蠶之原名。詳『白殭蠶』條。

【蠶子故紙】　即蠶連之古籍別名。典見千金方。詳『蠶連』條。

【蠶豆】　命名　本品豆莢狀如老蠶。又其成熟於蠶時。故名。

處方用名　蠶豆莢。蠶豆苗。蠶豆花。

古籍別名　胡豆。（綱目）佛豆。南豆。（食物）

外國名詞　Vicia Faba, L.（拉丁）ソラマメ（日本）

基本　係豆科蠶豆屬。爲蠶豆之子實。

產地　各省均有出。

形態　蠶豆爲穀類之越年生草本。方莖中空。高二三尺。葉爲羽狀複葉。小葉長作橢圓形。自二片至六片有托葉。葉與莖皆軟柔。有汁。春月葉腋着花。短總狀花序。作蝶形花冠。或白色。或紫色。雜以黑斑紋。二雄蕊。一雌蕊。實爲莢果。向於上面。其子粒大於黃豆而扁。成橢圓。供食用外。亦可充藥用。

採取　四五月採之。

性質　甘。微辛。平。無毒。



蠶豆

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

救能　益脾。和中。用作健胃藥。

主治　快胃和臟腑。

歷代記述弦證　【明】繆希雍本草經疏論蠶豆曰。蠶豆味甘微辛。無毒。能厚腸胃。和臟腑。萬表積善堂方言一女子誤吞針入腹。諸醫不能治。一人教令煮蠶豆同韭菜食之。針自大便同出。今人有誤吞金銀物者。用之皆效。實救急之良方也。【清】黃宮繡本草求眞論蠶豆曰。蠶豆味甘性溫。據書載此服多滯氣。又曰誤吞鐵針。用此即下。蓋緣人受穀食。必伏中氣以爲運行。若使中氣稍振。雖服有形之物。凝於腸胃。用此合以溫藥同投。即能以解。如其中氣既餒。稍服濡滯。即能作脹。況多食乎。此蠶豆之所以有通有不通之說也。但此既能通針。其性疎利。已見一斑。與於陰潤之物。遇人則滯。絕不相同。惟在臨症相人體氣。及多食少食以別耳。【清】王士雄隨息居飲食譜論蠶豆曰。蠶豆甘平。姙時剝爲蔬饌。味甚鮮美。老則煮食。可以代糧。炒食可以爲肴。性主健脾快胃。浸以發芽。更不壅滯。亦可煮糜作饘。餌。肆中磨細摻入小粉。亦可冒充皮搓索。以混綠豆粉。

近人學說　丁福保曰。蠶豆爲多人之嗜食品。需用頗廣。其味稍甘。性平和。微寒。爲無毒性之食品。其功有治胃之效。能但皮厚而硬。難以消化。故胃弱之人及小兒不宜食用。

參攷資料　㈠蠶豆莢狀如老蠶故名。王楨農書謂其蠶時始熟故名。亦通。吳瑞本草以此爲豌豆誤矣。此豆種亦自西胡來。雖與豌豆同名。同時種。而形性迥別。太平御覽云。張騫使外國。得胡豆種歸。指此也。今蜀人呼此爲胡豆。而豌豆不復名胡豆矣。(李時珍)㈡蠶豆南土種之。蜀中尤多。八月下種。冬生嫩苗。可茹。方莖中空。葉狀如匙頭。本圓末尖。面綠背白。柔厚。一枝三葉。二月開花如蛾狀。紫白色。又如豇豆花。結角連綴如大豆。頗似蠶形。蜀人收其子。以備荒歉也。(李時珍)

【蠶豆苗】　性質　苦。微甘。溫。

主治　酒醉不醒。油鹽炒熟。煮湯灌之效。(張卿子外科方)

㊀治吐血以新蠶豆殼四五年陳者。妙。煎湯飲之即愈。(外科方)

㊁治天泡瘡。蠶豆黑殼燒灰存性。研末。加枯礬少許。菜油調敷。一次即愈。

【蠶屎】　卽原蠶沙之俗名。詳『原蠶沙』條。

【蠶莓】　卽蛇莓之古籍別名。與見網目。詳『蛇莓』條。

【蠶退】　卽蠶蛻。詳『蠶蛻』條。

【蠶退紙】　卽蠶蛻紙。詳『蠶連』條。

【蠶連】　**命名**　本品卽蠶種之紙。蠶蛾生卵於紙。常以線綴之。通作一連。故名。

原名　蠶蛻紙。

古籍別名　蠶子故紙。(千金方)

主治　吐血鼻洪。腸風瀉血。崩中帶下。赤白痢。傅疔腫瘡。

歷代記述弦證　【宋】寇宗奭本草衍義論蠶連曰。治婦人血露。【明】李時珍本草綱目論蠶連曰。牙宣牙痛。牙癰牙疳。頭瘡喉痺。風癲狂祟。蠱毒藥毒。沙證腹痛。小便淋閉。婦人難產及吹乳疼痛。

1013／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

配合應用　㈠治吐血不止。蠶蛻紙燒存性。蜜和丸。茨實大。含化嚥津。（集驗方）

㈡治牙宣牙癰及口瘡。並用蠶蛻紙燒灰乾傅之。（集驗方）

㈢治風蟲牙痛。蠶紙燒灰擦之。良久鹽湯漱口。（直指方）

㈣治走馬牙疳。蠶蛻紙灰。入麝香少許。貼之。直指加白僵蠶等分。（集驗方）

㈤治小兒頭瘡。蠶蛻紙燒存性。入輕粉少許。麻油調傅。（聖惠方）

㈥治纏喉風疾。用蠶蛻紙燒存性。煉蜜和丸。如茨實大。含化嚥津。（集驗方）

㈦熏耳治聾。蠶蛻紙作撚。入麝香二錢。入筆筒燒烟熏之。三次即開。

㈧治癲狂邪祟。凡狂發欲走。或自高貴稱神。或悲泣呻吟。此爲邪祟。以蠶紙燒灰。酒水任下方寸匕。亦治風癲。（肘後方）

㈨治沙證壯熱。江南有沙證狀如傷寒。頭痛壯熱。嘔惡。手足指末微厥。或腹痛悶亂。須臾殺人。先用蠶蛻紙剪碎。安於盞中。以碟蓋之。滾湯沃之。封固良久。乘熱服。臥取汗。（活人書方）

㈩中蟲藥毒。雖面青脈絕。腹脹吐血者。服之即活。用蠶蛻紙燒存性爲末。新汲水服一錢。（衛生方）

㈠㈠治中諸藥毒。用蠶紙數張燒灰。冷水服。（易簡方）

㈡治小便澁痛不通。用蠶蛻紙燒存性。入麝香少許。米飲每服二錢。（博濟方）

㈢治熱淋如血。蠶種燒灰。入麝香少許。水服二錢。極效方也。（衛生家寶方）

㈣治崩中不止。蠶故紙一張。剪碎炒焦。槐子炒黃各等分爲末。酒服立愈。（易簡方）

㈤治婦人斷產。蠶子故紙一尺燒爲末。酒服。終身不產。（千金方）

㈥治痔漏下血。蠶紙半張。聳內燒灰。酒服自除。（備急方）

參攷資料　㈠蠶蛻今醫家多用初出蠶子殼在紙上者。東方諸醫用老蠶眠起所蛻之皮。功用相近。當以蛻皮爲正入藥微炒爲用。（掌禹錫）㈡蠶蛻當用眠起時所蛻皮。蠶連燒灰亦可用。（寇宗奭）

㈠馬明退、蠶連紙、功用相同。亦如蟬蛻蛇蛻之義。但古方多用蠶紙者。因其易得耳。（李時珍）

【蠶絲吐頭】功用性實。詳『蠶繭』條。

【蠶蛹】古籍別名　小蜂兒。（日用）

主治　炒食治風及勞瘦。研傅癰瘡惡瘡。

歷代記述攷證　【唐】陳士良　食性本草論蠶蛹曰。治消渴煩亂。

【明】李時珍本草綱目論蠶蛹曰。爲末飲服。治小兒疳瘦。長肌退熱。除虻蟲。煎汁飲。止消渴。

參攷資料　猶犬嚙者。終身忘食。發則難免。（孫思邈）

【蠶蛻】基本　本品即蠶眠起所脫之皮。

古籍別名　馬明退（嘉祐）佛退。（綱目）

性實　甘。平。無毒。

主治　血病。益婦人。

歷代記述攷證　【宋】寇宗奭　本草衍義論蠶蛻曰。治婦人血風。

【明】李時珍本草綱目論蠶蛻曰。治目中翳障及疳瘡。

【蠶蛻紙】即蠶連之原名。詳『蠶連』條。

【蠶頭歸】即蟣頭歸。詳『蟣頭歸』條。

【蠶繭】採取　以巳出蛾者用。

性實　甘。溫。無毒。

主治　燒灰酒服。治癰腫無頭。次日即破。又療諸疳瘡及下血血淋血崩。煮汁飲。止消渴。反胃。除虻蟲。

配合應用　㈠治瘡瘡疳蝕。膿水不絕。用出了蠶蛾繭。以生白礬末填滿。煆枯爲末。擦之甚效。（陳文中小兒方）

㈡治口舌生瘡。蠶繭五個。包蓳砂瓦上焙焦。爲末抹之。

㈢腎黃散。治腸風大小便血。瀝疼痛。用腎黃。蠶蛻紙並燒存性。晚蠶沙。白僵蠶並炒。等分爲末。入麝香少許。每服二錢。用米飲送下。日三服。甚效。亦治婦人血崩。（聖惠方）

㈣治反胃吐食。蠶繭十個。煮汁。煮雞子三枚食之。以無灰酒下。日二服。神效。或以繰絲湯煮粟米粥食之。（惠濟方）

1014／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料。蠶繭方書多用。而諸家本草並不言及。誠缺文也。近世用治癰疽代鍼。用一枚即出一頭。二枚即出二頭。神效無比。煮湯治消渴。古方甚稱之。丹溪朱氏言此物屬火。有陰之用。能瀉膀胱中相火。引清氣上朝於口。故能止渴也。繅絲湯及絲綿煮汁。功並相同。（李時珍）



蠶繭草

【蠶繭草】外國名詞 Polygonum japonicum, Meisn.（拉丁）サクラタデ（日本）

基本 係蓼科蓼屬。爲蠶繭草之莖葉。

產地 原野濕地均有出。

形態 蠶繭草爲濕草類之多年生草本。莖高二三尺。葉披針形。長而稍厚。互生。有托葉如鞘狀。上緣生長剛毛。秋月莖梢抽出花軸。穀以稀疎之長穗狀花。花蓋白色。或帶紅色。五裂甚深。雄蕊八枚。突出於花蓋之外。雌蕊一枚。此爲蓼類中之最大者。其莖葉供藥用。

性質 辛。平。無毒。

主治 諸蟲如蠶類咬人。惡毒入腹。煮服之。亦搗傅諸瘡。

參攷資料 蠶繭草生濕地。如蓼大。莖赤花白。東土有之。（陳藏器）

【蠶繭鹵汁】命名 本品即蠶繭中蛹汁也。故名。

效能 解毒。殺蟲。

主治 露蝕瘡疥。山蛤蜮入肉。蚊子及諸蟲咬毒。小兒疥瘡等。（煮湯浴）

【蠶魚】即衣魚之古籍別名。典見綱目。詳『衣魚』條。

【衝竿乾】基本 本品即以竹筍用鹽湯煮熟。熏乾而成者。

性質 鹹。甘。平。無毒。

主治 利腸化痰。

【讓實】基本 讓實爲雜草類之一種。可供藥用。

採取 十月採之陰乾用。

性質 酸。

主治 喉痺。止洩痢。

【醞】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【羶羊】即大尾羊之古籍別名。典見唐書。詳『大尾羊』條。

【羶山柴】即天靈蓋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天靈蓋』條。

【靈芝】即石耳之古籍別名。典見綱目。詳『石耳』條。

【靈砂】命名 本品以至陽勾至陰。脫陰反陽。故名靈砂。

古籍別名 二氣砂。青金丹。金鼎靈砂。九轉靈砂。老火靈砂。（綱目）神砂。（求真）氣砂。鼾辰砂。（和漢藥考）

形態 靈砂爲鮮紅色針狀結晶。不溶於水及通常溶解劑。熱之則發藍色焰而燃燒。

製法 唐愼微曰。靈砂用水銀一兩。硫黃六錢。細研。炒作青砂頭。後入水火既濟爐抽之。如束鍼紋者成。就也。李時珍曰。按胡演丹藥祕訣云。升靈砂法。用新鍋安逍遙爐上。蜜搭鍋底。文火下燒。入硫黃二兩。鎔化。投水銀半斤。以鐵匙急攪作青砂頭。如有焰起。噴醋解之。待汞不見星。取出細研。盛入水火鼎內。鹽泥固濟。下以自然火升之。乾水十二盞爲度。取出如東鍼紋者成矣。庚辛玉册云。靈砂者。至神之物也。硫汞製而成形。謂之丹基。奪天地造化之功。竊陰陽不測之妙。可以變化五行。鍊成九還。其未升鼎者。謂之青金丹頭。已升鼎者。乃曰靈砂。靈砂有三。以一伏時周天火而成者。謂之金鼎靈砂。以九度抽添。用周天火而成者。謂之九轉靈砂。以地數三十日炒煉而成者。謂之醫家老火靈砂。並宜桑灰淋酷煮伏過用乃良。

性質 甘。溫。無毒。

效能 調陰陽。交水火。安精神。定魂魄。專作鎮墜藥。

主治 五臟百病。養神。安魂魄。益氣明目。通血脈。止煩滿。益精神。殺精魅。惡鬼氣。久服通神明不老。輕身神仙。令人心靈。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論靈砂曰。主上盛下虛。痰涎壅盛。頭旋吐逆。霍亂反胃。心腹冷痛。升降陰陽。既濟水火。調和

1015／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五臟。輔助元氣。研末糯糊爲丸。棗湯服。最能鎭墜神丹也。【淸】黃宮繡本草求眞論。靈砂曰。靈砂又名神砂。係水銀硫黃二物。同水火煅煉而成。蓋水銀性秉最陰。硫黃性稟純陽。同此煎熬。合爲一氣。則水與火交。火與水合。而無亢騰飛越之弊矣。故凡陽邪上浮下不交。而至虛煩狂燥。寤寐不安。精神恍惚者。用此墜陽交陰。則精神鎭攝。而諸病悉去。謂之曰靈。卽見扶危拯急。若有神使之意。後人不明辰砂卽屬丹砂。混以靈砂。入於益元散內。詎知一神一靈。音同字別。一水一火。天淵各判。烏可以此烹煉燥烈之品。以代辰州甘寒之味耶。市肆與醫。妄用如斯。附記以俟高明並參。

配合應用　㈠陰陽丸。治伏熱吐瀉。用硫黃半兩。水銀一錢。研末。棗汁糊丸。小豆大。三歲三丸。冷水下。大人三四十丸。亦治諸般吐逆。（鄭氏小兒方）

㈡治霍亂吐逆。不問虛實冷熱。二氣散。一名青金丹。用水銀、硫黃等分。研不見星。每服一字至半錢。生薑湯調下。（錢氏小兒方）

㈢治脾疼反胃。靈砂一兩。蚌粉一兩。同炒。赤丁香、胡椒各四十九粒。爲末。自然薑汁麥糊丸。梧子大。薑湯下二十丸。（普濟方）

㈣治冷氣心痛。用靈砂三分。五靈脂一分。爲末。稀糊丸。麻子大。每服二十丸。食前石菖蒲、生薑湯下。（直指方）

㈤治九竅出血。因暴驚而得。其脈虛者。靈砂三十粒。人參湯下二服。愈。此證不可錯認血得熱則流。妄用涼藥誤事。（楊仁齋直指方）

㈥養正丹。又名交泰丹。乃寶林眞人谷伯陽方也。卻邪輔正。助陽接眞。治元氣虧虛。陰邪交蕩。上盛下虛。氣不升降。呼吸不足。頭旋氣短。心怯膽悸。虛煩狂言。盜汗腹痛。腰痛。反胃吐食。霍亂轉筋。欬逆。又治中風涎潮。不省人事。陽氣欲脫。四肢厥冷。傷寒陰盛。自汗唇青。脈沉。婦人產後月候不勻。帶下腹痛。用黑鉛一隻。入黑鉛浴汁次下水銀。次下朱砂末。炒不見星。少頃乃下硫黃末。急攪。有鉛酒醋解之。取出研末。糯粉煮糊丸。綠豆大。每服二十丸。鹽湯下。四味皆等分。此藥升降陰陽。既濟心腎。神效不可具述。（局方）

用量　三分至五分。

施用宜忌　凡非實邪暴病者禁用。忌火。

參攷資料　㈠靈砂卽化學上之赤色硫化汞。（和漢藥考）㈡茅享客話載以靈砂餌胡孫、鸚鵡、鼠、犬等。變其心。輒會人言。丹之通爲靈者。（唐愼微）㈢靈砂雖稱水火既濟。陰陽配合。然而硫汞有毒性。亦下墜。止可藉其墜陽交陰。卻病於一時。安能資其養神益氣。通靈於平日哉。凡胃虛嘔吐。傷暑霍亂。肺熱生痰。病屬於虛。非關驟發者。咸在所忌。（繆希雍）

【靈狸香】卽靈貓香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『靈貓香』條。

【靈脂】卽五靈脂之簡稱。詳『五靈脂』條。

【靈草】卽甘草之古籍別名。典見別錄。詳『甘草』條。

【靈液】㈠卽水銀之古籍別名。典見綱目。詳『水銀』條。㈡卽口津之古籍別名。典見綱目。詳『口津』條。

【靈通】卽甘草之古籍別名。典見記事珠。詳『甘草』條。

【靈通草】主治　耳聾。

參攷資料　楚庭稗珠儕建公之徒參悟。患聾。建公謂得羅浮靈通草始瘳。參悟來博館入山。於玉女峯得此草。莖長三尺。如箸。而莖虛中。兩頭皆實。開七葉。取葉煎水服。截其虛者。貫兩耳。中夜一聲若雷。聾遂開。（趙恕軒）

【靈黃】卽石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【靈壽木】古籍別名　扶老杖。（盧楨。綱目）

形態　靈壽木爲灌木類之一種。高八九尺。圍三四寸。莖幹似竹。有節。可爲杖及馬鞭之用。其根皮可供藥用。

性質　苦。平。

主治　止水。

【靈貓】卽靈貓香之簡稱。詳『靈貓香』條。

【靈貓香】古籍別名　香貍香。（雅俗）神經香。（離騷註）類香。（綱目）文狸香。靈狸香。（和漢藥考）心月狐。（星禽眞

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形圖）麝香貓。（別名）

外國名稱　Zibethum.（拉丁）Civet.（英）Zibeth.（德）

基本　屬貓類之靈貓屬。肛門與生殖器間開口腺所分泌之液汁。

產地　靈貓香產非洲諸國、美洲之巴西、祕魯、中國及其他亞洲諸國。穴居山野。多產子。以小獸諸鳥爲食。缺則食果類菜草。

形態　靈貓香爲類黃色輭膏狀物質。經久者變褐色。不溶於水。遂酒精祇能溶一部分。近嗅帶尿臭。遠嗅則類麝香。味苦。點火則發明焰燃燒。靈貓形似貓而大。自鼻端至尾端長二尺餘。頭短。鼻長。鬚稍長而小。耳小似貓耳。惟不尖。牙尖利如狗。脚短小。前脚尤短。約五拇指橫徑有五趾。爪黑而尖直。全身之毛有二種。一種長而粗硬。雜黑白、茶褐三色。成黑斑及條紋。一種短而柔細。灰色帶褐色。縮而廁於長毛中。頭之兩側有大黑斑。將眼圍住。在體軀、頸及尾之毛。皆長而粗硬。頸毛則短。灰色而間黑色。鼻灰白。其端黑色。耳外黑而內白。頸有黑白斑。吭與腹皆黑。尾之上面黑色。兩側及下面則雜白毛。或作黑白輪紋。脚毛短如頭毛。

採取　採無時。採香應由檻前將棍插入。逐至後邊。從檻後格子間把住其尾。卽插二板入檻中。夾其兩脇。使不能動。乃將其後足縛於格子。用小匙徐徐刮取溝內之液。惟液體氣候之寒暖而有多寡。故或每日或二日或三日取一次。（大抵二日出一錢許）此獸在山野時係自觸木石。剔出其液云。

性質　辛溫。無毒。

成分　靈貓香含有脂肪、揮發油、樹脂質等。

效能　宣竅。辟惡。行氣。止痛。與麝香海狸香相同。能使情火熾盛。用作興奮精神藥。又爲鎮痛等藥。並治陰痿偏頭痛。

作用　在胃中不起作用。至小腸及十二指腸始行分解而被吸入。卽刺激中樞神經。使精神奮興。性慾神經亦同時被激感而亢進。如用大量。則神經反被麻醉而昏睡。甚至由血尿盜汗而死。

主治　中惡氣飛尸。蠱疰。心腹卒痛。狂邪鬼神。鬼癘疫氣。夢寐邪魘。鎮心安神。

國外學說　和漢藥考曰。靈貓性兇悍。雖馴人觸之輒被抓咬。自幼畜檻中者。性稍馴。但稍怒亦動輒咬人。其外貌雖若柔弱懶惰。但其捕蟲鼠鳥類。則奔跳飛越。輕敏如貓。其食料以牛乳及雞卵爲最佳。若用肉類及穀果蔬菜等畜之。則靈貓香之性能香氣皆變劣弱。此獸雖輸出他國。若以良食畜之。亦善能生育。可取香。與產地無異。惟此獸本屬暖國產。苟運至寒地或寒暖中和地。則精力稍減。不產子。其香質如蜜爲似牛酪之稠厚液。新鮮上品爲白色或黃白色。其氣烈如麝香。且帶有如琥珀油之氣味。味苦。上品爲白色。但經久則漸變黃色。終成爲赭色。亦有帶黃灰色。或帶赤色者。凡赭色愈多則品愈下。將此勻攤平紙上。無粒塊無如脂之腐敗臭氣者爲上品。有於液內雜酪及脂類假充出售者。用乳汁及雞卵畜者。其香白色。爲上品。用肉類果菜畜者。其液赭色。香氣及功效俱劣。其主治以多油氣揮發鹽有鎮痛、解凝、緩和之功效。能使神經强壯。疝痛、小兒腹痛。子宮硬腫及衝逆等。用此擦臍。頗有奇效。惟婦女多不喜此香氣。多用於香料。取少許加於他香料中。則發佳香如麝香。此物遇燒酒不溶化。溶於油脂類。牝牡皆於陰具與肛門之間。有一披溝內被短毛。其左右有膜囊（卽香囊）隆起皮上。成爲溝唇。其囊約長三拇指橫徑。關約二拇指橫徑。其中約可容鵪卵（或云此囊牡倍於牝）囊之內外。有腺頗多。溝內左右有二腺。俱分泌香液。藏於囊中。溝內之兩側。各有一孔。通於兩囊。將香流溢於溝。

用量　一分至三分。

參攷資料　㊀靈貓生南海山谷。狀如狸。自爲牝牡。其陰如麝。功亦相似。按異物志云。靈貓一體自爲陰陽。剖其水道。連囊以酒洒陰乾。其氣如麝。若雜入麝香中。罕能分別。用之亦如麝爲（陳藏器）㊁按段成式酉陽雜俎云。黑契丹出香狸。有四外臂。則自能牝牡者。或由此也。劉侑西域記云。黑契丹出香狸。文似土豹。其肉

1017／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

可食。糞瀹皆香。如麝氣。楊愼丹鉛錄云。予在大理府見香貓如狸。其文如金錢豹。此卽楚辭所謂乘赤豹兮載文狸。王逸註爲神狸者也。南山經所謂亶爰之山有獸焉。狀如狸而有髦。其名曰類。自爲牝牡。食者不妒。列子亦云。亶爰之獸。自孕而生曰類。疑卽此物也。又星禽眞形圖心月狐有牝牡兩體。其神狸乎。珍按劉楊二說。與異物志所說相合。則類卽靈狸無疑矣。類狸字音亦相近也。（李時珍）㊁靈貓肉氣味甘溫無毒。（綱目）

【靈龜】卽蠵龜之古籍別名。典見郭璞賦。詳『蠵龜』條。

【靈脂子】卽枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枸杞子』條。

【靈磁石】卽慈石之處方用名。詳『慈石』條。

【靈蠵】卽蠵龜之古籍別名。典見漢書。詳『蠵龜』條。

【鬬牛兒】卽犀牛兒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『犀牛兒』條。

【鬬雪紅】卽月季花之古籍別名。典見綱目。詳『月季花』條。

【鬬雞】卽蟋蟀之俗名。詳『蟋蟀』條。

【鱭魚】卽海鷂魚之古籍別名。典見綱目。詳『海鷂魚』條。

【鱭】卽魚子之古籍別名。典見綱目。詳『魚子』條。

【鱖帆】卽鱖魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱖魚』條。

【鱖魚】命名　鱖者候也。鱖善候風故名。

古籍別名　鱖帆。鱖簰。小者名鬼鱖。（綱目）

外國名調　Limulus longispinus V. D. Hoew HorseShoe Crab 或 King Crab Molukkenkrebs（拉丁）カブトガニ（日本）

基本　係節肢動物甲殼類腚口類劍尾類鱖科。

產地　生南海中及南洋羣島。

形態　鱖魚爲介類之一種。全體深褐色。長二三尺。闊約一尺。頭胸部廣闊。前緣形圓。後緣形凹。頭上具無柄眼一對。中間又有小眼。下有口。口緣有脚六對。腹部爲六角形。邊緣有針形突起。腹下具瓣狀肢五對。頭胸與腹部之間有可動之關節。甲殼堅硬。尾成劍狀。雄小雌大。雌常負雄以行。浮游水中。腹中有子如黍米。可爲醫。皮殼甚堅。可爲冠帽。其血碧色。肉白。可供藥用。



鱖魚

性質　辛。鹹。平。微毒。

主治　療痔。殺蟲。

參玆資料　㊀鱖魚肉多食發瘡及瘡癬。（孟詵）㊁鬼鱖食之害人。（綱目）

【鱖魚尾】主治　燒焦。治腸風瀉血。崩中帶下及產後痢。

參玆資料　骨及尾燒灰。米飲服。大主產後痢。但須先服生地黃蜜煎等乾。然後服此。無不斷。（陳藏器）

【鱖魚殼】主治　積年呷噦。

【鱖魚膽】主治　大風癩疾。殺蟲。

【鱖蟆】卽鱖魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱖魚』條。

【鱠殘魚】命名　相傳昔吳王闔閭江行食魚。鱠棄其殘餘於水。化爲此魚。故名。

古籍別名　王爪魚。王餘魚。銀魚。（綱目）

產地　出蘇松浙江諸地。

形態　鱠殘魚爲無鱗類魚屬之一種。大者長四五寸。身圓如筋。潔白如銀。體無鱗。若已鱠之魚。目有兩黑點。其肉可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　作羹食。寬中健胃。

參玆資料　鱠殘魚在清明節前有子。食之甚美。清明節後子散而瘦。可作鮓腊。曝乾亦佳。（李時珍）

【鱧魚】命名　本品肥而不善游。有蓮如之象。故名。

古籍別名　黃魚（食療）。蠟魚（御覽）。玉版魚。含光片。漿（綱目）。鮿魚（俗名）。

外國名調　Acipenser mik-

1018／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

adoi Hilgd 或 A. Sturio Sturgeon（拉丁）チョウザメ或テウザメ（日本）

基本　係脊椎動物魚類硬鱗類鱣魚科之鱣魚。

產地　江淮黃河遼海深水處有之。

形態　鱣魚爲魚鱗類之一種。其體長形呈紡錘狀似鱒長至一二丈口小在頭下位於鰓孔與吻端之中間腎突出爲肉質稍能伸縮下脣狹上脣厚而膨起中央有裂痕觸鬚橫列於口與吻端眼小鼻長四孔在口之前排水孔在鰓端之上頭部密被骨板軀有斜方形硬鱗臀鰭與脊鰭相對胸鰭狹長腹鰭小背色茶褐腹灰黃脂色黃與白色之肉層層相間脊骨及鰓鰭並鼻皆脆軟可食其肉亦可供食與藥用。

性質　甘平有小毒。

主治　利五臟。

參攷資料　㊀鱣魚肉多食難消化服荊芥業者不可食（李時珍）㊁鱣魚肉發氣動風發瘡疥和蕎麥食令人失音（孟詵）㊂鱣魚肉味極肥美楚人尤重之多食生熱痰（寧原）

【鱣魚肝】　性質　無毒。

主治　惡血攻癬。

參攷資料　鱣魚肝切勿以鹽炙食之（陳藏器）

【鰋魚】　即鮎魚之原名詳『鮎魚』條。

【鱧魚】　命名　本品首有七星夜朝北斗有自然之禮故名。

處方用名　鱧魚肉。鱧魚膽。

古籍別名　蠶魚鯛魚（本經）黑鱧（圖經）玄鱧（埤雅）烏鱧文魚七星魚（綱目）黑魚（俗名）黑火柴頭魚（醫林集要）鳥魚。

基本　係水族動物爲無鱗類之鱧魚。

產地　凡江湖池澤之淡水中恒有出。

形態　鱧魚形長體圓頭尾相等細鱗黑色有斑紋腹背兩鰭均連續至尾。

性質　甘寒無毒。

效能　瀉熱行水用作利尿消腫澤瘅藥。

主治　療五痔治溼痺面目浮腫下大水（本經）有瘡者不可食令人瘢白（別錄）

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論鱧魚曰下大小便壅塞氣作鱠與脚氣風氣人食良【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論鱧魚曰主妊娠有水氣【明】李士材本草圖解論鱧魚曰鱧魚甘寒無毒其功專於去溼下水他無所長多食能痼疾【清】黃宮繡本草求眞論鱧魚曰鱧魚膽即屬烏鱧又名七星魚者是也其物伏土勝水味甘性寒無毒凡人身患十種水氣垂死可用肉與冬瓜葱白以治且煮湯浴兒可以稀豆膽味書雖載甘然嘗之終苦凡喉痺將死者點入即愈病深者水調灌之亦可。

配合應用　㊀治十種水氣垂死鱧魚一斤重者麥汁和冬瓜葱白作羹食（食醫心鏡方）

㊁下一切氣用大鱧一條開肚入胡椒末半兩大蒜片二顆縫合同小豆一升煮熟下蘿蔔三五顆葱一握俱切碎煮熟空腹食之至飽并飲汁至夜洩惡氣無限也五日更一作（孟詵方）

㊂治腸痔下血鱧魚作鱠以蒜虀食之忌冷毒物（外臺祕要方）

㊃治一切瘡風癮瘕疥癩年久不愈者不過二三服必愈用黑火柴頭魚一個即烏鱧也去腸肚以蒼耳葉填滿外以蒼耳安鍋底置魚於上少少着水慢火煨熟去皮骨淡食勿入鹽醬功效甚大（醫林集要方）

㊄浴兒免瘡除夕黃昏時用大烏魚一尾小者二三尾煮湯浴兒遍身七竅俱到不可嫌鯉以清水洗去也若不信但留一手或一足不洗過出瘡時則未洗處偏多也此乃異人所傳不可輕易（楊拱醫方摘要方）

參攷資料　㊀鱧魚合小豆白煮療腫滿最效（陶弘景）㊁鱧首有七星夜朝北斗有自然之禮故謂之鱧又與蛇通氣色黑北方之魚也故有玄黑諸名俗呼火柴頭魚即此也其小者名鯽魚蘇頌圖經引毛詩諸注謂鱧即鯇魚未免誤矣（李時珍）㊂形長體圓頭尾相等細鱗玄色有斑點花文頗類

1019／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鱓蛇。有舌。有齒。有肚。背腹有鬣連尾。尾無歧。形狀可憎。氣息腥惡。食品所卑。南人有珍之者。北人尤絕之。道家指爲水厭。齋籙所忌。（李時珍）

【鱓魚肉】即鱓魚之處方用名。詳『鱓魚』條。

【鱓魚腸及肝】主治　以五味炙香。貼痔瘻及蛀骨瘡。引蟲蟲爲度。

【鱓魚膽】採取　臘月收取陰乾用。

性質　甘。平。

主治　喉痺將死者。點入少許。即差。病深者水調灌之。

參攷資料　諸魚膽味苦。惟鱓魚膽味甘。可食爲異也。（日華）

【鱓魚膽】即鱓魚之處方用名。詳『鱓魚』條。

【鱧腸】命名　鱧。烏頭也。其腸亦烏。本品柔韌。斷之有黑汁。如鱓之腸然。故名。

處方用名　鱧腸草。旱蓮草。墨旱蓮。

古籍別名　蓮子草。（唐本）金陵草。（圖經）猢孫頭。（必用）墨煙草。黑頭草。墨菜。豬牙草。（綱目）

外國名稱　Eclipta alba, Hassk.（拉丁）メカサブラウ（日本）

基本　係菊科鱧腸屬之鱧腸草。

產地　凡道旁田畦及水隈溼地間恒有出。

形態　鱧腸爲溼草類之一年生草本。莖高一二尺。枝自葉腋對生。更分小枝。葉對生。質稍厚。披針狀有鋸齒。葉面粗糙生毛茸。八九月間自小枝開小頭狀花。花小色白。外圍之花。作舌狀花冠。中部之花。作筒狀花冠。其果實成熟。即呈黑色。實形如蓮房。斷之有汁。須臾亦呈黑色。其莖葉等可供藥用。



鱧腸

採取　二月八月間採之。

製法　凡採得陰乾用。

性質　甘酸。平。無毒。

效能　補腎陰。烏鬚髮。用作緩和滋養藥。又爲止血藥。

主治　血痢。鍼灸瘡發洪血。不可止者。傅之立已。汁塗眉髮。生速而繁。

歷代記述弘覽　【唐】蕭炳四聲本草論鱧腸曰。青點鼻中。添髓。【宋】大明諸家本草論鱧腸曰。止血排膿。通小腸。傅一切瘡并瘺癌。【明】李時珍本草綱目論鱧腸曰。烏鬚髮。益腎陰。【明】繆希雍本草經疏論鱧腸曰。鱧腸其汁玄黑。其味甘酸。平而無毒。純陰之草也。入腎入肝。亦入胃與大小腸。善涼血。鬚髮白者。血熱也。齒不固者。腎虛有熱也。涼血益血。則鬚髮變黑。而齒亦因之而固矣。故古今變白之草。當以茲爲勝。本經主血痢及鍼灸瘡發洪。血不可止者。傅之立已。塗眉髮生速而繁。蕭炳又謂能止血排膿。通小腸。傅一切瘡。青點鼻中添髓者。蓋以血痢由於血分。爲溼熱所傷。鍼灸瘡發洪血不止。亦緣病人素有血熱。及加艾火則益熾矣。血涼則不出營。血熱蓬則生膿。涼血則自散。小腸屬丙火。有熱則不通。營血熱解。則一切瘡自愈。

腦爲髓之海。熱則消。火能消物故也。鼻竅通氣於腦。故以青點鼻中。使腦中熱散。無邪觸。則腦自益矣。之數者。何非涼血益血之功也。【清】黃宮繡本草求眞論鱧腸曰。旱蓮草即書所云鱧腸草。金陵草者是也。味甘而酸。性平色黑。功尚入肝入腎。爲止血涼血要劑。是以血痢煎膏用之。其血即止。鬚白汁塗。變白爲黑。火瘡發紅。其紅即退。齒牙動搖。擦之即固。合冬青子名二至丸。以補肝腎。但性陰寒。雖善涼血。不益脾胃。若不同以薑汁椒紅相兼修服者。必腹痛作瀉。苗如旋覆。實似蓮房。斷之有汁。須臾而黑。熬膏良。

近人學說　㊀張山雷曰。鱧腸草折其莖汁出。須臾而黑。故以鱧腸爲名。言如鱧魚之腸也。產於下溼地。結實如小蓮房。因有旱蓮之名。古謂之金陵草。亦稱墨菜。汁黑而黏。故入腎補陰而生長毛髮。又能入血爲涼血止血之品。又消熱病癰腫。但黑色之藥。純陰用事。非腸盛之體。不應多用。脾虛泄瀉尤忌。凡勞怯諸症。陰虛火旺者。不可

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以此等陰藥專治其標。須與補中健脾之劑相輔成功。乃爲萬全無弊之策。若止知爲熱。徒事寒涼。則虛火未必安潛。而脾胃之陽先敗。必有過中泄瀉。不食之慮。且虛火縱以逆折得息。而反爲純陰無陽之候。又將何以善其後耶。唐本草謂氣味甘酸而平。主血利。又鍼灸瘡發。血不可止者。傅之立止。汁塗眉髮。生速而繁。日華謂通小腸。治瘡瘍。瀕湖謂爲髭髮益腎陰。㊀祝天一曰。李時珍云。旱蓮有兩種。一是鱧腸。一是小連翹。今市上亦有兩種。一名黑旱蓮。一名紅旱蓮。黑旱蓮者。莖葉皆有毛。枝柔委地。葉對生。如柳葉。斷之有黑汁。花白如小菊。實似覆盆。是鱧腸也。紅旱蓮莖葉實皆紅。無毛。幹硬挺立。葉似麥葉。實房如石蓮子。破之中亦分瓤。似芝麻房然。而無裂紋。亦符李時珍所謂小連翹也。本草旱蓮止一切血。烏髭髮益腎陰。兼治瘡瘍腫毒。鱧腸色黑氣腐。實弱味鹹。止一切血而滋腎陰者。當取鱧腸也。瘡瘍爲濕熱釀成。小翹色赤氣芳。實似心房。入營分而清瘀熱。治瘡瘍者。當取小翹也。古方二至丸註云。夏至採旱蓮。冬至採女貞。按夏至時小翹始成熟。鱧腸尚嫩。茜時也。嫩茜氣味不全。所云夏至採旱蓮者。似指小翹言也。愚以二至丸爲滋補肝腎之藥。理當取鱧腸。其謂二至者。至到也。女貞至肝陰。旱蓮至腎陰。言兩物能益肝腎也。非夏至冬至採藥時之謂也。傷寒論瘀熱發黃有麻黃連翹赤小豆湯方。方解云連翹即連翹根非也。而李時珍宗之。連翹條云。根名連軺。下註仲景二字。不知方解者。後人解仲景之方。非仲景自解其方也。不得云仲景謂連軺即連翹根也。爾雅連異。翹一名連苕。苕與軺通。詩云。苕之華。芸其黃矣。註云。陵苕。生下濕地。疑即翹也。蓫苕軺翹音同而義通。本草多同出異名。異出同名。致後人之滋惑者亦多矣。如大翹小翹同出而異名。鱧腸小翹異出而同名是也。本經又有翹根。陶弘景云。方藥不用。人無識者是矣。好古云即連翹根。臆斷也。而又以爲連軺者。益非矣。

配合應用　㊀金陵煎。益髭髮。

變白爲黑。金陵草一秤。六月以後收採。揀青嫩無泥土者。不用洗。擣去黃葉。爛搗。新布絞取汁。以紗絹濾過。入通油器鉢盛之。日中煎五日。又取生蜜一斤。絞汁。白蜜一斤。合和。日中煎。以柳木篦攪。勿停手。待如稀餳。藥乃成矣。每日及午後各服一匙。以溫酒一盃化下。如欲作丸。日中再煎令可丸。大如梧子。每服三十丸。及時多合爲佳。其效甚速。（千金方）

㊁烏鬚固齒。七月取旱蓮草連根一斤。用無灰酒洗淨。青鹽四兩。淹三宿。同汁入油鍋中炒存性。研末。日用擦牙。連津嚥之。又法。旱連取汁。同鹽煉乾。研末擦牙。（攝生妙用方）旱蓮散。烏髭固牙。溫尉云。納合相公用此方。年七十。鬚髮不白。懇求始得。後遇張經。始傳分兩也。旱蓮草一兩半。麻姑餅三兩。升麻。青鹽各三兩半。訶子連核二十個。皂角三挺。晚蠶沙二兩爲末。薄醋麪糊丸彈子大。曬乾。入泥瓶中。火煨令烟出。存性。取出研末。日用揩牙。（奉親養老書方）

㊂治偏正頭痛。鱧腸草汁滴鼻中。（聖濟總錄方）

㊃治一切眼疾。腎膜遮障。涼腦。治頭痛。能生髮。五月五日平旦合之。蓮子草一握。藍葉一握。油一斤。同浸。密封四十九日。每臥時以纖匙點藥壓頂上四十九遍。久久甚佳。（聖濟總錄方）

㊄繫臂截瘧。旱蓮草搥爛。男左女右。置寸口上。以古文錢壓定。帛繫住良久。起小泡。謂之天灸。其瘧即止。甚效。（王執中資生經方）

㊅治小便血瀝。金陵草一名蜈頭草。車前草各等分。杵取自然汁。每空心服三盃。愈乃止。（醫學眞傳方）

㊆治腸風臟毒。下血不止。旱蓮子草瓦上焙研末。每服二錢。米飲下。（家藏經驗方）

㊇治痔漏瘡發。旱蓮草一把。連根鬚洗淨。用石臼擣如泥。以極熱酒一盞衝入。取汁飲之。滓傅患處。重者不過三服。即安。太僕少卿王鳴鳳患此。饒枝方能移步。服之得癒。累治有驗。（劉松石保壽堂方）

㊈治疔瘡惡腫。五月五日收旱蓮草陰乾。仍露一夜。收。遇疾時嚼

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一葉貼上。外以消毒膏護之。二三日疔脫。（聖濟總錄方）

㊄治風牙疼痛。糊蔡頭草入鹽少許於掌心揉擦即止。（集玄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛無熱。胃寒便瀉者禁用。

參攷資料　㊀鱷腸生下溼地。所在坑渠間多有。苗似旋覆。二月八月採陰乾。（蘇恭）㊁處處有之。南方尤多。此有二種。一種葉似柳而光澤。莖似馬齒莧。高一二尺。開花細而白。其實若小蓮房。蘇恭謂似旋覆者是也。一種苗梗枯瘦。頗似蓮花而黃色。實亦作房而圓。南人謂之連翹者。二種折其苗。皆有汁出。須臾而黑。俗謂之旱蓮子。亦謂之金陵草。（蘇頌）㊂旱蓮有二種。一種苗似旋覆而花白。細者是鱷腸。一種花黃紫而結房如蓮房者。仍是小連翹也。爐火家亦用之。（李時珍）㊃鱷腸性冷陰寒之質。雖善涼血。不益脾胃。病人雖有血熱。一見脾胃虛敗。飲食難消。及易瀉薄作泄者。勿輕與服。孫眞人方用薑汁和劑。蓋防其冷而不利於腸胃故也。不用薑汁、椒、紅相兼修事。服之者必腹痛作泄。宜詳審之。（繆希雍）

【鱷腸草】　卽鱷腸之處方用名。詳『鱷腸』條。

【鷹】　原名　蒼鷹。

命名　本品簡稱爲鷹。鷹以膺擊故名。

古籍別名　角鷹。鷙鳩。（綱目）

外國名詞　Astur palumbarius Linn. Commongos-hawk（拉丁）Eagle（英）タカ或オホクカ（日本）

基本　係屬脊椎動物鳥類猛禽類鷹科。

產地　深山林野間多有之。

形態　鷹爲林禽類之一種。頭扁上嘴鉤曲。下嘴小尖。端呈截斷狀。眼圓。視力頗強。頭頂黑色。頭後具白色。與褐色之雜斑。全體上暗褐色。下面白色。羽軸暗褐有淡褐條紋。脛被毛。蹠蹠黃色。趾皆具鉤爪。羽翼有黑褐與灰色橫紋互相排列。盤翔天空。捕食小類生物。其肉可供藥用。

主治　食之。療野狐邪魅。

【鷹毛】　主治　斷酒。以水煮汁飲。

【鷹吐毛】　基本　鷹食鳥雀。連毛食之。肉消而毛不消。聚成一團。次早吐出。如大茨實。

主治　反胃噎膈。煅末服。

【鷹目】　卽石硫黃之日籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【鷹屎白】　性質　微寒。有小毒。

主治　傷毆滅痕。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論鷹屎白曰。燒灰酒服。治中惡。【唐】蘇恭新修本草論鷹屎白曰。燒灰酒服方寸匕。主邪惡。勿令本人知。【明】李時珍本草綱目論鷹屎白曰。消虛積。殺勞蟲。去面皰野黯。

參攷資料　單用不能滅癤。須合殭蠶衣魚之屬爲膏效。（陶弘景）

【鷹骨】　主治　傷損接骨。燒灰。每服二錢。酒服。隨病上下。食前食後。

【鷹睛】　主治　和乳汁研之。日三注眼中。三日見碧青中物。忌烟熏。

【鷹嘴及爪】　主治　五痔。狐魅。燒灰水服。

【鷹嘴香】　卽特迦香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『特迦香』條。

【鷹頭】　歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鷹頭曰。治痔瘻。燒灰入麝香少許。酥酒服之。治頭風眩暈。一枚燒灰酒服。

【鷺】　卽鷺鷥之原名。詳『鷺鷥』條。

【鷺鷥】　卽鷺鷥之別名。典見動物學大辭典。詳『鷺鷥』條。

【鷺鷥草】　卽忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『忍冬藤』條。

【鷺鷥】　原名　鷺。

命名　禽經云。鷺飛則霜。鷺飛則露。故名。

古籍別名　絲禽。雪客。春鋤。白鳥。（綱目）白鷺鷥。鷥一杯鷺。（動物學大辭典）

基本　係脊椎動物鳥類涉禽類鷺科。

形態　鷺鷥爲水禽類之一種。嘴長色黑。有直溝紋而端尖。頸細長。全體白色。夏月頭後垂有數枚細長之白冠毛。銳鈍如絲。背有白

1022／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色疏鬆之毛。名爲蓑毛。尾翼十二。脚長黑色。趾暗黃有長爪。常在河沼池澤相近之林野間。而水食林棲。覓食魚蟲等物。其肉可供食與藥用。



鷺

性質　鹹。平。無毒。

主治　療虛瘦。益脾補氣。炙熟食。

【鷺鷥頭】　主治　破傷風。肢強。口緊。連尾燒研。以臘豬脂調傅瘡口。

【鷺鷥藤】　卽忍冬藤之古籍別名。典見綱目。詳『忍冬藤』條。

【鷺】　㊀卽烏鴉之古籍別名。典見綱目。詳『烏鴉』條。㊁卽山鵲之古籍別名。典見爾雅。詳『山鵲』條。

【鷺鴒】　卽鶺鴒之古籍別名。典見綱目。詳『鶺鴒』條。

【鴟鴞】　古籍別名　須鬞。（爾雅）水鴞。（正要）鵂鶹。（日用）刁鴨。（食療）油鴨。（綱目俗名）

外國名稱　Podiceps fluviatilis philippensis Bonnat Chinese little grebe 或 Greb Haubentaucher（拉丁）カイツブリ或ニホムグリ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類游禽類鵜鷀科之鵜鷀。

產地　南方湖澤沼池間多有之。



鵜鷀

形態　鵜鷀爲水禽類鴨屬之一種。形似鴨。又似鴨頭背及翼羽色蒼黑有斑點。腹白胸黃。嘴短而黑。喙根黃綠。頭上及頰有長毛。尾短小。趾扁闊無蹼。翼不能高飛。性巧潛水。故見人卽沉入水底少頃。仍浮游於水面。恒以蘆葦營巢。捕魚介爲食。其肉可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　補中益氣。五味炙食甚美。

【鴟鴞膏】　主治　滴耳治聾。塗刀劍不鏽。

【鴟鴞】　古籍別名　鷺鴞。（綱目）

產地　山溪有毒水處多有之。

形態　鴟鴞爲水禽類之一種。其狀如鴨而大。長頸。赤目。斑嘴。毛紫緋色。如鴛鴦。其毛及屎可供藥用。

主治　燒灰水服。治溪鳥毒。砂蝨。水弩射工蜮。短狐。蝦蟆等病亦可將鳥近病人。卽能唼人身。記以物承之。當有沙出。其沙卽含沙射人之箭也。

參攷資料　㊀蝦蟆瘡最毒。十活二三。桂嶺獨名但早覺時。以芋及甘蔗葉屈角入肉。勾出其根。如蝦鬚狀。則愈遲則根入至骨。有如丁腫。最惡。好著人隱處。（陳藏器）㊁水弩。短狐。射工蜮。一物也。陳氏分爲四非矣。溪毒有氣無形。砂蝨。沙中細蟲也。（李時珍）

【鸂鶒】　命名　本品專食短狐。在溪中勒遜害物。故名。

古籍別名　溪鴨（異物志）紫鴛鴦。（綱目　豁鴞。（說文）

形態　鸂鶒爲水禽之一種。其形如鴛鴦而稍大。似鴨而較小。羽色有五彩。多紫色。頭有纓。尾羽蟲如船柁。其肉可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　食之去鷩邪。及解短狐毒。

【鶺】　卽斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳『斑鳩』條。

【鶺鴒】　卽鵜鷀之古籍別名。典見日用本草。詳『鵜鷀』條。

【鶺鴒】　卽燕之古籍別名。典見莊子。詳『燕』條。

【鹼水】　卽石鹼之處方用名。詳『石鹼』條。

【鹽】　卽食鹽。詳『食鹽』條。

【鹽水】　卽食鹽溶於水中者之處方用名。詳『食鹽』條。

【鹽水炒杜仲】　卽杜仲用鹽水炒成者之處方用名。詳『杜仲』條。

【鹽水炒熟地】　卽熟地黃用鹽水炒成者之處方用名。詳『熟地黃』條。

【鹽石】　卽消石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『消石』條。

1023／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鹽豆豉】卽鹽豉之原名。詳『鹽豉』條。

【鹽枕】卽寒水石之古籍別名。見綱目。詳『寒水石』條。

【鹽根】卽寒水石之古籍別名。典見綱目。詳『寒水石』條。

【鹽筍乾】基本　本品卽春筍和鹽湯煮曬而成者。

古籍別名　泥黃烏尖直脚。（綱目拾遺）

性質　鹹甘平無毒。

主治　行氣消痰。

【鹽消】卽鹽硝。詳『朴硝』條。

【鹽梅子】卽鹽麩子之古籍別名。典見綱目。詳『鹽麩子』條。

【鹽棣子】卽鹽麩子之古籍別名。典見綱目。詳『鹽麩子』條。

【鹽菱子】卽胡荽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡荽』條。

【鹽豉】製法　原名　鹽豆豉。用大豆水浸三日。淘蒸攤晾。候生黃取出簸淨。水洵澀乾。加鹽、薑絲、椒、橘、蘇葩、杏仁、拌勻入甕。上面水浸。以箬蓋封口。曬一月乃成。

主治　功同蒲州豆豉。詳見該條。

【鹽鹵】卽鹽膽水之俗名。詳『鹽膽水』條。

【鹽湯】卽食鹽溶於沸水中者之處方用名。詳『食鹽』條。

【鹽硝】卽朴硝之古籍別名。典見綱目。詳『朴硝』條。

【鹽滷】卽鹽鹵。詳『鹽膽水』條。

【鹽精石】卽寒水石之古籍別名。典見綱目。詳『寒水石』條。

【鹽綠】卽綠鹽之古籍別名。典見綱目。詳『綠鹽』條。

【鹽膚子】卽鹽麩子之古籍別名。典見綱目。詳『鹽麩子』條。

【鹽蓬】產地　出河北海濱鹽地有之。

形態　鹽蓬爲雜草類之一種。其葉似蒿而圓長。至秋時葉俱紅色。採之燒灰。淋湯煎鹽。勝於海水煮者。可供藥用。

性質　鹹涼無毒。

主治　清熱消積。

【鹽麩子】命名　本品味酸鹹。故名。

古籍別名　叛奴。鹽酸。酸桶。（綱目拾遺）。五棓。鹽膚子。鹽梅子。鹽棣子。（綱目）木鹽。（通志）天鹽。（靈草篇）酢桶。（本草拾遺）

外國名稱　Rhus semi-alata, Murr. var. osbeckii, DC.（拉丁）ヌルデ（日本）

基本　係漆樹科漆樹屬。爲鹽麩木之子實。

產地　生山野間。

形態　鹽麩爲喬木類之落葉木本。高二丈餘。葉爲奇數羽狀複葉。長尺餘。有鋸齒。面青背白。小葉長卵形。總葉柄在小葉間有翼。其葉之面背有瘤狀之蟲巢。色赤褐。卽五倍子。夏月梢頭開花。作圓錐花序。花小綠白色。七月結小核果。密生紫色或白色之短毛。熟則外附白色粉實。中有子。可供藥用。



鹽麩子

性質　酸鹹。微寒。無毒。

主治　除痰飲。療瘧。喉中熱結。喉痺。止渴。解酒毒。黃疸。飛尸。蠱毒。天行寒熱咳嗽。變白生毛髮。去頭上白屑。搗末服之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鹽麩子曰。生津降火。化痰潤肺。滋腎消毒。止痢收汗。治風濕眼病。

參攷資料　鹽麩子之核外薄皮上有薄鹽。謂之鹽霜。可制汞硫。（綱目）

【鹽麩樹白皮】主治　破血止血。蠱毒血痢。殺蛇蟲。并煎服之。

【鹽麩樹根白皮】主治　酒瘕。搗碎。米泔浸一宿。平旦空腹溫服一二升。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鹽麩樹根皮曰。諸骨鯁。以醋煎濃汁時呷之。

參攷資料　按本草集議云。鹽麩子根。能軟雞骨。岑公云。有人被雞骨哽。項腫可畏。用此根煎醋啜至三椀。便吐出也。又彭醫官治骨哽。以此根搗爛入鹽少許。綿裹以線繫定。吞之。牽引上下。亦釣出骨也。（李時珍）

【鹽龍】產地　生南蠻諸地。

形態　鹽龍爲爬蟲類

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鱗屬之一種。長尺餘。飼以海鹽。則每鱗中流出鹽質。可供藥用。

主治　與陽事。每以鱗中鹽質溫酒服。

【鹽膽水】　**基本**　本品卽煮鹽初熱時槽中瀝下之黑水也。

古籍別名　鹽鹵（俗名）

性質　鹹苦。大毒。

主治　痰厥不省。

用法　灌之卽吐。

【鹽藕節】　**命名**　本品卽取新鮮藕節烘乾。用鹽醃過者。故名。

主治　喉痛。嚼汁嚥之。陰虛喉痛更佳。

【鹽藥】　**產地**　生山谷間。

形態　鹽藥爲鹵石類之一種。形似芒硝。末入口極冷。可供藥用。

性質　鹹冷。無毒。

主治　眼赤。皆爛風赤。細研。水和點之。又水研服。去熱煩。痰滿頭痛。明目鎭心。又主蛇虺惡蟲毒。藥箭鏃毒。疥癬。瘰腫。瘭瘡。並摩傅之。甚者水化服之。又解獨自草箭毒。

【鹽蟹汁】　**基本**　本品卽以鹽醃蟹之鹵汁。

主治　喉風重痛。滿含細嚥卽消。

【鹽鴛草】　卽馬先蒿之日本名。詳『馬先蒿』條。

【鹽鴛菊】　卽馬先蒿之日本名。詳『馬先蒿』條。

【鼈爪】　**主治**　健忘。五月五日收藏衣領中。

【鼈甲】　**命名**　鼈行鼈鼈。故名。

處方用名　淡鼈甲。生鼈甲。炙鼈甲。

古籍別名　圓魚（俗名）。神守。河伯從事（古今注）。上甲。孚乳甲。黑龍衣。鼈津甲（和漢藥考）。守神（淮南子）。

基本　係屬龜鼈類爲鼈之甲。

產地　陳仁山藥物生產辨云。以產暹羅。大隻厚甲爲正。近日各熟藥店所用小隻薄甲。乃水魚殼也。中國各省均有。以長江揚子江一帶爲多出。功力不及厚甲之佳。此乃利其質薄易炒。慳柴火耳。鼈屬一種。水魚另屬一種。不可不知。

形態　鼈體類龜。水居陸生大者六七寸。小者四五寸。但頭尾四肢。俱不能縮藏甲中。尾短而頭頸長。鼻類象鼻。性喜堅巖他物。頗不易脫。其脊甲帶褐黑色。多小斑。祇中央部分硬。邊緣輭。作肉裙。俗稱鼈裙。

製法　蘇頌曰。今處處有之。以岳州、沅江所出甲有九肋者爲勝。入藥以醋炙黃用。陶弘景曰。採得生取甲。剔去肉者爲好。凡有連脈及乾巖者。偽眞。若肋骨出者。是煑熟不可用。雷敩曰。凡使要綠色。九肋多裙。重七兩者爲上。用六一泥固瓶子。底待乾。安甲於中。以物搯起。若治癥塊。定心藥。用頭醋入瓶內。大火煎盡三升。乃去裙肋骨炙乾入用。若治勞去熱藥不用醋。用童子小便煎盡一斗二升。乃去裙留骨。石臼搗粉。以雞膍皮裹之。取東流水三升。盆盛。閣於盆上一宿。取用。力有萬倍也。李時珍曰。按衞生寶鑑云。凡鼈甲以煆竈灰一斗。酒五升浸一夜。煑令爛。如膠漆用。更佳。桑柴灰尤妙。

性質　鹹平。無毒。

效能　補陰氣。潛肝陽。消癥瘕。除寒熱。用於女子血病及勞瘧等。

主治　心腹癥瘕。痎瘧堅積。寒熱去痞。疾息肉。陰蝕。痔核惡肉（本經）。療溫瘧血瘕。腰痛。小兒脇下堅（別錄）。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論鼈甲曰。宿食癥塊。痃癖。冷痺。勞瘦。除骨熱。骨節間勞熱。結實。瘿塞。下氣。婦人漏下五色。下瘀血。【宋】日華諸家本草論鼈甲曰。去血氣。破癥結。惡血。墮胎。消瘡腫。腸癰。幷攲損瘀血。【元】朱丹溪本草衍義補遺論鼈甲曰。補陰。補氣。【元】寇宗奭本草衍義論鼈甲曰。治勞瘦。除骨熱。極佳。【明】李時珍本草綱目論鼈甲曰。除老瘧瘧母。陰毒腹痛。勞復食復。斑痘。煩喘。小兒驚癎。婦人經脈不通。難產。產後陰脫。丈夫陰瘡。石淋。欬潰。癰。【明】繆希雍本草經疏論鼈甲曰。鼈甲味鹹平無毒。潤下作鹹。甲主消散者。以其味兼乎平。平亦辛也。鹹能輭堅。辛能走散。故本經主癥瘕堅積。寒熱。去痞疾。息肉。陰蝕。痔核惡肉。別錄療溫瘧者。以瘧必暑邪爲病。類多陰虛。水衰之人。乃爲暑所

1025／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

深中。邪入陰分。故出併於陽而熱甚。入併於陰而寒甚。元氣虛羸。則邪陷而中焦不治。甚則結爲癥母。甲能益陰除熱而消散。故爲治癥之要藥。亦是退勞熱在骨及陰虛往來寒熱之上品。血痺腰痛。小兒脇下堅。皆陰分血病。宜其悉主之矣。勞復女勞復。爲必須之藥。勞瘦骨蒸。非此不除。產後陰脫。實之尤急。【清】黃宮繡本草求眞論鼈甲曰。鼈甲味鹹氣平。色青。書雖載屬補肝。與龜載屬補腎各別。然究皆屬除熱削肝之品。非眞滋肝藥也。凡厥陰血分積熱。而見勞嗽骨蒸。寒熱往來。溫瘧母。及腰腹脇堅。血痺痔核。經阻產難。瘕癰腫。鷹瘡瘰癧。瘭斑疽等症。服無鹹平能以消除。若肝虛無熱切忌。鼈以七肋九肋者佳。以其得陽之數耳。其用必取乎肋。以肋屬肝故耳。但食品中惟鼈叵測。如三足兩頭。並項强腹赤。皆有大毒。能以殺人。不可不愼也。【清】楊時泰本草述鈎元論鼈甲曰。鼈甲益陰。丹溪更云補氣。夫氣有陽氣陰氣之殊。其說本於內經。經曰陰虛則無氣。無氣則死。蓋惟是眞陰之氣。有化乃有生。有生即有化。故本經首主瘕瘕堅積。而別錄甄權日華子並以溫瘧血痺。宿食。冷塊。痃癖。瘕結爲言也。丹溪揭出補陰補氣而言。可謂探其要矣。本經不言治勞。然虛勞多用之。蓋勞雖五臟皆有。而心腎爲多。心主血。腎主精。精竭血燥。則勞生焉。所以清骨肉羸之除蒸熱。必用而麥煎散。又以治少男室女骨蒸黃瘦。口臭盜汗。七情爲病也。又虛勞發熱。未有不由瘀血者。瘀血未有不由內傷者。凡心下引脇俱痛。皆滯血不消。新血無以養。故麥煎散中用鼈甲。并同於乾漆以化積者。由茲味能以通壅爲滋補也。鼈甲之治癥。尤專於癥母。癥母即邪之結爲癥瘕者。可見諸本草無不以血痺癥塊爲言。固有見於茲味陰氣之專。即化以爲生矣。其次更治脚氣。脚氣之起。惟是陰不升而陽不降耳。足爲三陰所起之地。即三陽所歸之地。（陰爲陽之原）如三陰不足。不能上而召陽之歸。則三陽失守。不能下而和陰之滯。故陰壅於下。陽逆於上。脚氣所由病也。陰不足而不能升。致陽失守而不能降。故大鼈甲湯。以鼈甲之補陰者。爲君。又鼈甲散。木香散。皆治脚氣。心腹脹滿。一則并治小便不利。一則云治堅硬不消。夫心腹脹滿。非陰不升。以致陽不降乎。小便不利。非陽不得陰以歸而達於下乎。堅硬不消。非陰不得陽以化而暢於上乎。二證皆用鼈甲以和陰陽之升降。則其專精於陰氣可知矣。至於積聚之治。靈樞言喜怒不節則傷臟。臟傷則陰虛。虛則風雨襲之。病起於上而生積。清澀襲之。病起於下而生積。此積所由生之要領也。方書治肝積肥氣。（鼈甲丸）心積伏梁。（乾漆丸及牛夏散）脾積痞氣。（又鼈甲丸）統以鼈甲爲之君。則積之本於陰虛而生者。固不能舍專於陰氣之味。以奏效也。又次而治嗽血。（黃芪鼈甲散人參黃芪散）盜汗。（麥煎散青蒿散）凡虛勞之有客熱者。再如男子遺精。女子漏下。皆用鼈甲療之。卻又以行瘀血。總由此味專補陰氣。如漏則陰氣虛而不能固也。瘀亦陰氣虛而不能流貫於經絡也。但就女子經血一證以推所治。即可知其要以盡其變矣。

配合應用　㈠治久瘧。用鼈甲、牛膝、當歸。佐以橘皮、何首烏、知母、麥門冬。

㈡治溫瘧熱甚渴甚。用鼈甲、知母、石膏、麥門冬、貝母、竹葉。無肺熱病者加人參。若瘧發熱甚渴甚。又寒甚汗多。發時指甲黯。狀若欲死。并加桂枝。有神去桂枝。治瘴瘧良。

㈢治骨蒸勞熱。用鼈甲、青蒿、麥門冬、五味子、地黃、枸杞、牛膝。甚則加銀柴胡、地骨皮、胡黃連。

㈣肉主傷中益氣。補不足。腹中結熱。婦人漏下。陰虛羸瘦。性冷。補一切陰虛人宜常食之。

㈤治老瘧勞瘧。用鼈甲醋炙研末。酒服方寸匕。隔夜一服。清早一服。臨時一服。無不斷者。入雄黃少許更佳。（肘後方）

㈥治奔豚氣痛。上沖心腹。鼈甲醋炙三兩。京三稜煨二兩。桃仁去皮尖四兩。湯浸研汁三升。煎二升。入末煎良久。下醋一升。煎如錫。以絆收之。每空心酒服半匙。（聖濟方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊐治血瘕癥癖用鼈甲、琥珀、大黃等分作散。酒服二錢。少時瘧血卽下者。婦人小腸中血下盡卽休服也。（甄權方）

㊑治痃癖癥積。用鼈甲醋炙黃研末。牛乳一合。每調一匙。朝朝服之。（甄權方）

㊒治婦人漏下。鼈甲醋炙研末。清酒服方寸匕。日二。又用乾薑、鼈甲、訶黎勒皮等分爲末。糊丸。空心下三十丸。日再。（甄權方）

㊓治婦人難產。鼈甲燒存性。研末。酒服方寸匕。立出。（梅師方）

㊔治勞復食復。篤病初起。受勞傷食。致復欲死者。鼈甲燒研。水服方寸匕。（肘後方）

㊕治小兒癇疾。用鼈甲炙研。乳服一錢。日二。亦可蜜丸服。（子母祕錄方）

㊖治卒得腰痛。不可俛仰。用鼈甲炙研末。酒服方寸匕。日二。（肘後方）

㊗治沙石淋痛。用九肋鼈甲醋炙研末。酒服方寸匕。日三服。石出卽已。（肘後方）

㊘治陰虛夢泄。九肋鼈甲燒研。每用一字。以酒半盞。童尿半盞。蔥白七寸。同煎去葱。日晡時服之。出臭汗爲度。（醫壘元戎方）

㊙治吐血不止。鼈甲、蛤粉各一兩。同炒色黃。熟地黃一兩半。曬乾爲末。每服二錢。食後茶下。（聖濟總錄方）

㊚治癍痘煩喘。小便不利。用鼈甲二兩。煙心一把。水一升半。煎六合。分二服。凡患大小便有血者。中壞也。黑厥無膿者。十死不治。（龐安時傷寒論方）

㊛治癰疽不斂。不拘發散一切瘡。用鼈甲燒存性。研摻甚妙。（李樓怪症奇方）

㊜治腸癰肉痛。鼈甲燒存性。研。水服一錢。日三。（傳信方）

㊝治陰頭生瘡。人不能治者。鼈甲一枚。燒研。鷄子白和傅。（千金方）

㊞治瘡唇緊裂。用鼈甲及頭燒研傅之。（類要方）

㊟治人咬指爛。久欲脫者。鼈甲燒灰傅之。（葉氏摘玄方）

用量　三錢至四錢。

臨用宜忌　凡陰虛而無熱。以及脾弱而泄瀉禁用。能墜胎。孕婦亦忌。惡礬石。並不可與鷄子、鴨肉、莧菜、猪、兔同食之損人。

著名方劑　鼈甲煎丸。治癥邪結爲瘧瘕。名曰癥母。（金匱方）鼈甲十二分。柴胡六分。黃芩三分。人參一分。半夏一分。桂枝三分。芍藥五分。阿膠三分。乾薑三分。大黃三分。厚樸三分。蜂窠四分。廬蟲五分。爲末。煉。鼈下灰一斗。清酒一斛五斗。浸灰。候酒盡一半。入鼈甲煎化。取汁。入諸藥中。煎爲丸。梧桐子大。空心服七丸。日進三服。

參攷資料　㈠鼈。水居陸生。脊連脇。其甲四圍有肉裙。故曰鼈肉裹甲。無耳。以目爲聽。純雌無雄。與蛇及龜爲匹。夏日生卵於涯。渡河隔水望之。卵自孚化而出。性畏陰。光暴之日中無所置。陰光之下。輒死。又畏蚊。嚙之經夕則死。（李時珍）㈡鼈。蟠動之物。入肝經。至陰之分。既能養陰。又能入絡搜邪。（吳鞠通）㈢金匱鼈甲煎丸。治病瘧一月不差。結爲癥瘕者。以鼈甲行厥陰而消癥瘕也。升麻鼈甲湯。治陽毒陰毒者。以鼈甲排膿穢而行血瘀也。（黃元御）㈣經中不言治勞。惟藥性論言治勞瘦骨熱。故虛勞多用之。然甚有據。但不可過劑耳。（寇宗奭）㈤鼈甲蟲也。與龜同類。四緣有肉裙。故曰龜甲裹肉。鼈肉裹甲。無耳。以目爲聽。純雌無雄。與蛇及龜爲匹。故萬畢術云。燒龜脂。可以致鼈。此夏日孚乳。其抱以影。埠雅云。卵生思抱。其狀隨日影而轉。在水中上必有浮沫。名曰鼈津。人以此取之。今有呼鼈者。作拊撫掌。望津而取。百十不失。管子云。涸水之精名曰蠐。以名呼之。可取魚鼈。正此類也。類從云鼈一鳴而鼈伏。性相制也。又畏蚊。生鼈遇蚊叮則死。死鼈得蚊煑而爛。所以熏蚊者。復用鼈甲物。相報復如此。異哉。淮南子云。脊之殺。鼈類之不可推也。（李時珍）

【鼈肉】　性質　甘。平。無毒。

主治　傷中益氣。補不足。

歷代記述弦證　【唐】陳藏器

1027／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本草拾遺論鼈肉曰。熱氣溼痺。腹中激熱。五味煮食。當微泄【唐】孟詵食療本草論鼈肉曰。婦人漏下五色。羸瘦。宜常食之【宋】日華諸家本草論鼈肉曰。婦人帶下血瘕腰痛【宋】蘇頌圖經本草論鼈肉曰。去血熱。補虛。久食性冷【元】朱丹溪本草衍義補遺論鼈肉曰。補陰【明】李時珍本草綱目論鼈肉曰。作臛食。治久痢。長髭鬚。作丸服。治虛勞痃癖。脚氣【清】王士雄隨息居飲食譜論鼈肉曰。滋肝腎之陰。清虛勞之熱。主脫肛崩帶。癥瘕癥瘕。以潮池所產背黑而光澤。重約斤許者良。宜燕麥食之。或但飲其汁。則益人。多食滯脾。且鼈之陽聚於上甲。久嗜令人患發背。孕婦及中虛寒瀉內盛時邪未淨者切忌之。又忌與莧同食。回回不食鯉鱠。謂之無鱗魚。凡鼈之三足者。赤腹者。赤足者。獨目者。頭足不縮者。其目凹陷者。腹下有王字卜字文者。過大者。在山上者。有蛇文者。並有毒殺人。或云薄荷煮鼈亦害人。其殼入藥。亦不可作丸散服。【清】黃宮繡本草求眞論鼈肉曰。鼈肉止有雌無雄。與蛇與龜爲匹。形多變幻。故書有言鼈有三足一足者。不宜食。獨目者不宜食。頭足不縮者不宜食。目凹陷者不宜食。腹下有王字卜字文。蛇文者不宜食。生於山上者名旱鼈。不宜食。腹赤如血者名礫鼈。不宜食。此有毒殺人。不宜食鼈之說也。又言鼈合鷄子莧菜食。則令人生鼈。同猪兎鴨食。則能損人。同芥子食。則生惡瘡。與妊婦食。則生子項短。同薄荷食。則能殺人。此合他味同食之有見害於人也。至於冷癆食之。則能發冷水病。須合葱與椒薑同煮。並剝鼈甲少許以入。可知鼈性冷。故須假以椒薑以爲之制。鼈肉聚。故須假以鼈甲之散。以爲之佐耳。惟婦人素挾血熱症。見血瘕血漏。並癆痢諸症。服之得宜。若使中氣有虧。謂可補中益氣。縱出別錄。亦屬膚語。不足信也。

參攷資料　㊀禮記食鼈去醜。謂頸下有軟骨如龜形者也。食之令人患水病。凡鼈之三足者。赤足者。獨目者。頭足不縮者。其目凹陷者。腹下有王字卜字文者。腹有蛇文者。是蛇化也。在山上者名旱鼈。並有毒殺人。不可食。（陳藏器）㊁鼈肉不可合鷄子食。莧菜食。昔有人剝鼈。以赤莧同包。置溼地。經旬。皆成生鼈。又有裹鼈甲屑。經五月。皆成鼈者。（陶弘景）㊂鼈肉不可合豬兎鴨肉食。損人。不可合芥子食。生惡瘡。（孫思邈）㊃案三元參贊書。言鼈性冷發水病。有冷勞氣癥瘕人。不宜食之。生生編言鼈性熱。戴原禮言鼈之陽聚於上甲。久食令人生發背。似與冷性之說相反。蓋鼈性本不熱。食之者和以椒薑熱物太多。失其本性耳。鼈性畏葱及桑灰。凡食鼈者。宜取沙河小鼈。斬頭去血。以桑灰湯煮熟。去骨甲。換水再煮。入葱薑作羹膳食乃良。其膽味辣。破入湯中。可代椒而辟腥氣。李九華云。鼈肉主聚。鼈甲主散。食鼈到甲少許入之。庶幾稍平。又言薄荷煮鼈能害人。此皆人之所不知者也。（李時珍）

【鼈血柴胡】卽柴胡用鼈血拌成者之處方用名。詳『柴胡』條。

【鼈卵】**主治**　鹽藏煨食。止小兒下痢。

【鼈津甲】卽鼈甲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼈甲』條。

【鼈珠】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【鼈兒撬】卽拔葜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『拔葜』條。

【鼈脂】**主治**　白髮拔去之。塗孔中。

【鼈頭】**主治**　陰乾燒灰。療小兒諸疾。婦人產後陰脫下墜。尸疰心腹痛。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論鼈頭曰。傳歷年脫肛不愈。

【鼈頭血】**主治**　脫肛年久不收者。塗之卽愈。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論鼈頭血曰。鼈頭血治風中血脈。口眼喎僻。及小兒疳勞潮熱。

參攷資料　按千金方云。目瞤。唇動。口喎。皆風入血脈。急以小續命湯服之。外用鼈血或雞冠血調伏龍肝散塗之。乾則再上。甚妙。蓋鼈血之性急縮走血。故治口喎脫肛之病。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鼈膽】　性質　味辛。
主治　開鬱瞽。除瘢痕疼積。息肉惡瘡。陰蝕痔核。
配合應用　治痔瘡痔漏。以鼈膽一個。取汁磨香墨。入麝香冰片少許。仆臥。乃用鷄毛蘸塗。（家寶方）

【鼈鼎】　即狒狒之古籍別名。典見山海經。詳『狒狒』條。

二十五畫

【欖醬】　即烏欖肉搥碎。日久生霜如白鹽者。性質功用與烏欖同。詳『烏欖』條。

【藷】　即白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【藷莞】　即白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【蘢】　即蘆筍之古籍別名。典見綱目。詳『蘆筍』條。

【欖瓜】　即絲瓜之古籍別名。典見本事。詳『絲瓜』條。

【欖南瓜】　即南瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『南瓜』條。

【欖櫨】　㊀即楓櫨之古籍別名。典見通志。詳『楓櫨』條。㊁即木瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木瓜』條。

【欖薑】　即高良薑之古籍別名。典見綱目。詳『高良薑』條。

【觀音山】　即土人參。詳『粉沙參』條。

【觀音柳】　即檉柳之古籍別名。典見綱目。詳『檉柳』條。

【觀音粉】　古籍別名　大士粉。（綱目拾遺）
性質　甘。苦。平。無毒。
主治　解蟲毒。逐水腫。明目。療溼黃。
參攷資料　雲和山中有白澤泥。以水攪矸而取之。和糯米粉一半。蒸食之。可以療飢。名爲觀音粉。（處州府志）㊁生山土內。白如粉。絕細膩。歲荒。鄉人輒掘取之。和麥麪作餅餌以食。但不可多食。多食能令人便閉腹重。以其土性滯澁腸胃耳。生洞內。不可服。恐其有蛇虺毒。（綱目）

【觀音草】　即龍膽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍膽』條。

【觀音蓮】　即海芋之古籍別名。典見綱目。詳『海芋』條。

【觀桂】　即官桂。詳『肉桂』條。

【鑊頭歸】　即當歸頭大尾粗。色白而堅枯者。力稍劣。祇宜入發散藥用。

【鬣】　即馬騣毛之古籍別名。典見綱目。詳『馬騣毛』條。

【鱭魚】

命名　本品形如劑物裂篾之刀。故名。
古籍別名　鯊魚。鯫魚。鱖魚。鉤魚。鱭魚。鯽魚。望魚。（綱目）
外國名詞　Coilia nasus T. & S.（拉丁）エツ（日本）
基本　係脊椎動物魚類喉鰾類鯷科之鱭魚。
產地　生江湖中。
形態　鱭魚爲鱭魚類之一種。其體狹長側扁。至尾逐漸細狹而甚薄。頭小口大。吻有二硬鬚。鰓下有長鬣。似麥芒。胸鰭有數箇長輻。脊鰭短。臀鰭長而連尾。背黃褐色。腹銀白色。鱗細體長。大者尺許。其肉多細鰔刺骨。雖可食。不益人。鮓可供藥用。
性質　甘。溫。無毒。
主治　貼痔瘻。合田土壁土。入苦酒浸燒紅貼之。
參攷資料　㊀鱭魚肉發疥。不可多食。（孟詵）㊁鱭魚肉助火動痰發疾。（寧原）

【鱖魚】　即鱖魚之原名。詳『鱖魚』條。

【鱸魚】　即鱸魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱸魚』條。

【鱷魚】　即泥鰍之小者。典見綱目。詳『泥鰍』條。

【鱷】　即鱷之原名。詳『鱷』條。

【鱷桃】　即櫻桃之古籍別名。典見禮注。詳『櫻桃』條。

【鷿雉】

命名　翟。美羽貌也。爲雉居原野。鷿居山林。又有山雉之稱。
古籍別名　鷿鷄。山鷄。（禽經）山雉。大者名鷿雉。（綱目）
外國名詞　Phasianus scintillans Gld. Hondo copper Pheasant（拉丁）ヤマドリ（日本）
基本　係脊椎動物鳥類鷄類雉科之鷿雉。
產地　出山林及原野間。
形態　鷿雉爲原禽類雉屬之

1029／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一種。全體羽色銅赤。混雜黑斑而光澤。雌雄異色。雌者羽色不及雄者之美。背羽黑色。有褐色斑紋。尾較短。雄者面部裸出色赤。背部金黃。肩腰腹各有白斑。尾羽長於體之三倍餘。有黑白及栗茶諸色之橫條紋。體長一尺。覓食穀類昆蟲等物。其肉可供食與藥用。

種類 山鷄有四種。名同物異。似雉而尾長三四尺者。鸐雉也。似鸐而尾長五六尺。能走且鳴者。鸐雉也。俗通呼爲鸐矣。其二卽鷩雉錦鷄是也。

性質 甘。平。有小毒。

主治 五臟氣喘不得息。作羹食之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鸐雉肉曰。炙食補中益氣。

【鸐鷄】卽鸐雉之古籍別名。典見食經。詳『鸐雉』條。

【鷩鷄】卽鸐鶏之古籍別名。典見綱目。詳『鸐鶏』條。

【鸐鶏】古籍別名 越王鳥。鵗頂鵗鷄(綱目)

產地 出安南諸地。

形態 鸐體爲水禽類之一種。大如孔雀。喙長尺餘。黃白黑色。光瑩如漆。腳長口勾。末如冠冕。極堅緻。可作飲器。其糞香如薰陸。可供藥用。

主治 水和塗雜瘡。

【鸐】卽鴞之古籍別名。典見綱目。詳『鴞』條。

【鸛】卽鳧之古籍別名。典見綱目。詳『鳧』條。

【鼉】 **原名** 鼉龍。

命名 鼉字象其頭腹足尾之形。

古籍別名 鼉魚。(本經)土龍。(綱目)豬婆龍。(動物學大辭典)

基本 係脊椎動物爬蟲類鱷科之鼉。

產地 生江海湖澤中。

形態 鼉爲鱗類之一種。體長一二丈。有四足。背尾俱有鱗甲。形似鱷魚。惟其後足祇生半蹼。性能橫飛。不能上騰。夜則應更鳴吼。其聲如鼓。故有鼉更鼉鼓之稱。舟人聞之而畏懼。俚人聽之以占雨。其力猛。其穴深。枕骨瑩淨。勝於魚枕。皮可冒鼓。涎沫最毒。其甲可供藥用。

採取 以餌繫鉤。探入其穴中。候其吞鉤。徐徐引出取之。

製法 凡使鼉甲。須酥炙或酒炙用。

性質 酸。微溫。有毒。

主治 心腹癥瘕。伏堅積聚。寒熱。女子小腹陰中相引痛。崩中下血五色。及瘡疥死肌。(本經)五邪淋泣。時鬱。腰中重痛。小兒氣癰。皆潰。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鼉甲曰。小腹氣痛及驚悸。【唐】甄權藥性本草論鼉甲曰。除血積。婦人帶下。百邪魍魎。【唐】陳藏器本草拾遺論鼉甲曰。殺蟲。治瘰癧瘡。風頑瘧疥惡瘡。炙燒酒浸服之。功同鼈甲。【宋】日華諸家本草論鼉甲曰。療牙齒疳蟲宣露。【明】李時珍本草綱目論鼉甲曰。治陰癰。

施用宜忌 畏芫花、甘遂、狗膽。蜀漆爲之使。

參攷資料 鼉甲所主諸證。多屬厥陰。其功只在平肝木。治血殺蟲也。千金方治風癲有鼉甲湯。今藥肆多懸之。云能辟蠱。亦殺蟲之意。(李時珍)

【鼉肉】 **性質** 甘。有小毒。

主治 少氣。吸吸足不立地。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鼉肉曰。澀氣邪氣。諸蟲腹內癥瘕惡瘡。

參攷資料 (一)鼉肉色似鷄而發冷氣痼疾。(蘇頌)(二)梁周興嗣嗜此肉。後爲鼉所噉。便生惡瘡。此物不食更佳。其涎最毒。(陳藏器)(三)鼉肉雖至補益。亦不必食。(陶弘景)

【鼉肝】 **主治** 五尸病。用一具炙熟。同蒜鬱食。

【鼉脂】 **主治** 諸風及惡瘡。

【鼉魚】卽鼉之古籍別名。典見本經。詳『鼉』條。

【鼉龍】卽鼉之原名。詳『鼉』條。

二十六畫

【蘜】卽蒼菜之古籍別名。典見說文。詳『蒼菜』條。

【蘆】卽白芷之古籍別名。典見綱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

目。詳『白芷』條。

【饒魚】即海豚魚之古籍別名。見綱目。詳『海豚魚』條。

【驢毛】主治　骨頭中一切風病。用一斤炒黃。投一斗酒中。漬三日。空心細飲令醉。暖臥取汗。明日更飲如前。忌陳倉米麪。

歷代記述攷證　【唐】王燾外臺秘要論驢毛曰。小兒客忤。剪驢膊上旋毛。乳汁煎飲。【唐】孫思邈千金翼論驢毛曰。禍福中風。取驢背交脊中毛。入麝香少許。和乳汁銅器慢炒爲末。乳汁和灌之。

【驢皮】主治　癘疾。生皮覆之。中風鳴僻。骨疼煩燥。蒸熟。入豉汁。和五味煮食之。牛皮風癬。以朴硝醃過。燒灰。油調搽之。

【驢皮】即黍之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳『黍』條。

【驢皮膠】即阿膠之處方用名。詳『阿膠』條。

【驢耳垢】主治　刮取塗瘰癧。

【驢肉】外國名稱　EQUUS（拉丁）

採取　以烏驢者良。

性質　甘。涼。無毒。

主治　主風狂。憂愁不樂。能安心氣。同五味煮食。或以汁作粥食。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論驢肉曰。解心煩。止風狂。釀酒治一切風。【明】李時珍本草綱目論驢肉曰。補血益氣。治遠年勞損。煮汁空心飲。療痔引蟲。

參攷資料　㊀野驢肉功與家驢同。（正要）㊁食驢肉飲荊芥茶殺人。妊婦食之難產。同兔茄食。令人筋急病死。有毒。（吳瑞）㊂驢肉食之動風。脂肥尤甚。屢試屢驗。日華子以爲止一切風狂。未可憑也。（蓋宗奭）

【驢血】性質　鹹。涼。無毒。

製法　李時珍曰。熱血以麻油一盞和攪。去抹煮熟。卽成白色用。

主治　利大小腸。潤燥結。下熱氣。

【驢尾軸垢】主治　癘疾。

用法　水洗汁。和麪丸如彈子大二枚。作燒餅。未發前食一枚。發後食一枚。

【驢豆】卽稽豆。詳『稽豆』條。

【驢乳】性質　甘。冷。利。無毒。

主治　小兒熱急黃。多服使利。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論驢乳曰。療大熱。止消渴。【唐】蕭炳四聲本草論驢乳曰。小兒熱急驚邪。赤痢。【唐】孟詵食療本草論驢乳曰。卒心痛。連腰臍者。熱服三升。【唐】陳藏器本草拾遺論驢乳曰。蜘蛛咬瘡。器盛浸之。蚰蜒及飛蟲入耳。滴之當化成水。【宋】日華諸家本草論驢乳曰。小兒癇疾。客忤天弔。風疾。【明】李時珍本草綱目論驢乳曰。頻熱飲之。治氣鬱。解小兒熱毒。不生痘疹。浸黃連取汁。點風熱赤眼。

配合應用　㊀治心熱氣癇。黑驢乳暖服三合。日再服。（廣利方）㊁治小兒口噤。驢乳。磉乳各二升。煎一升五合。服。亦治重舌出涎。（千金方）㊂治撮口胎風。先灸兩孔中三壯。後用此方大驗。用烏驢乳一合。以東引槐枝三寸長十根。火煨一頭。出津拭淨。浸乳中。取乳滴口中。（聖惠方）

【驢尿】主治　熬之熨風腫漏瘡。絞汁。主心腹疼痛。諸疰忤。癥癖。反胃不止。牙齒痛。治水腫。每服五合良。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論驢尿曰。燒灰。吹鼻止齆甚效。和油塗惡瘡瘙癬。

【驢胞衣】服。主治　斷酒。煅研酒服。

【驢脂】主治　敷惡瘡疥癬。及風腫。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論驢脂曰。和酒服三升。治狂癲不能語。不識人。和烏梅爲丸。治多年痛。未發時服二十丸。又生脂和生椒搗熟。綿裹塞耳。治積年聾疾。【明】李時珍本草綱目論驢脂曰。和酒等分服。治卒咳嗽。和鹽塗身體。手足風腫。

配合應用　㊀治滴耳治聾。烏驢脂少許。鯽魚膽一箇。生油半兩。和勻。納纖葱管中。七日取滴耳中。日二。（聖惠方）㊁治眼中瘜肉。驢脂、白鹽等分。和勻。注兩目眥頭。日三次。一月癒。（千金方）

1031／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【驢骨】主治　煮湯浴歷節風。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論驢骨曰。牝驢骨煮汁服。治多年消渴極效。

【驢陰莖】性質　甘。溫。無毒。

主治　强陰壯筋。

【驢溺】性質　辛。寒。有小毒。

主治　浸蜘蛛咬瘡良。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論驢溺曰。治反胃噎病。狂犬咬傷。癬瘡惡瘡。並多飲取瘥。風蟲牙痛。頰舍漱之良。

配合應用　㊀治狐尿刺瘡。烏驢尿頓熱塗之。（千金方）

㊁治白玷風。驢尿。薑汁等分和勻。頻洗。（聖濟總錄方）

㊂治耳聾。人中白一分。乾地龍一條。爲末。以烏驢駒尿一合和勻。瓷器盛之。每滴少許入耳。（聖惠方）

參攷資料　㊀一婦病噎。用四物加驢尿與服。以防其生蟲。數十帖而愈。（朱丹溪）㊁張文仲備急方。言幼年患反胃。每食羹粥諸物。須臾吐出。貞觀中許奉御兄弟及柴瘠諸名醫奉勅調治。竟不能療。漸疲困。候絕旦夕。忽一衞士云。服驢小便極驗。遂服二合。後食止吐一半。晡時再服二合。食粥便定。次日奏知。則宮中五六人患反胃者。同服一時俱瘥。此物有毒。服時不可過多。須熱飲之。病深者七日當效。後用屢驗。（李時珍）

【驢溺下泥】主治　敷蜘蛛咬傷。

【驢頭肉】主治　煮汁服二三升。治多年消渴無不瘥者。又以漬麴醞酒服。去大風動搖不伏者。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論驢頭肉曰。洗頭風。風屑。【明】李時珍本草綱目論驢頭肉曰。同薑蒸煮汁日服。治黃疸百藥不治者。【明】常效先心鏡論驢頭肉曰。治中風頭眩。心肺浮熱。肢轅骨痿。語澀身顫。皮汁煮食。

【驢頭骨】主治　燒灰。和油塗小兒顛解。

【驢懸蹄】主治　燒灰。傅癰疽。散膿水。和油傅小兒解顱。以瘥爲度。

配合應用　㊀治腎風下注生瘡。驢蹄二十斤。燒灰。蜜陀僧、輕粉各一錢。麝香半錢。爲末。傅之。（奇效方）

㊁治天柱瘡毒。生脊大椎上。大如錢。赤色。出水。驢蹄二片。胡粉煞一分。麝香少許。爲末。醋和塗之。乾則摻之。（聖惠方）

㊂治飲酒穿腸。飲酒過度。欲至穿腸者。用驢蹄硬處。削下水煮濃汁。冷飲之。襄州散將樂小蠻。得此方有效。（經驗方）

㊃治鬼瘧不止。用白驢蹄刳炒。砒霜各二分。大黃四兩。麥豆三分。雄黃一分。硃砂半分。研丸。梧子大。未發。平旦冷水服二丸。即止。七日忌油。（肘後方）

【驢髓】性質　甘。溫。無毒。

主治　耳聾。

參攷資料　多年耳聾。重者用三兩度。初起者一上便效。用驢前脚脛骨打破。向日中瀝出髓。以瓷盒盛收。每用綿點少許入耳內側臥。候藥行。其髓不可多用。以白色者爲上。黃色者不堪。（普濟方）

【鱖刀】即鱖刀之訛。詳『鱖魚』條。

【鱭魚】命名　本品喉有一鱭。故名。

古籍別名　姜公魚。針魚。（俗名）銅哽魚。（臨海志）

外國名詞　Hyporhamphus gjori. F. & P.（拉丁）サヨリ或ハリラ或サイヨリ或ナガイワシ（日本）

基本　係脊椎動物魚類鱵鰿類鱭魚科之鱭魚。

產地　出江海中。



鱭魚

形態　鱭魚爲鱗魚類之一種。其體狹長而略側扁。鱗細小。腹裸出。眼大。下顎延長而尖如針。占體長七分之一。兩顎有細尖齒牙。脊鰭近尾。臀鰭與脊鰭對生。背色淡黑。旁有深蒼色之直線紋。腹白。全體長尺餘。常隱居於海灣靜水中。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其肉白味淡。可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　食之辟瘧。

【鱴魚】卽石首魚之古籍別名。典見綱目。詳『石首魚』條。

【鼯鼠】命名　本品肉翅連尾。飛不能升。易致殭斃。故名。

古籍別名　鼺鼠。（本經）鼹鼠。夷由。（爾雅）飛生鳥。（弘景）耳鼠。（山海經）鶾。（禽經）鶾鵌。（時珍）

外國名稱　Sciuropterus momonga Temm.或Pteromys momonga Assapan（拉丁）モモンガ或ノブスマ（日本）

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類齧類松鼠科之鼯鼠。

產地　深山杉林間有之。

形態　鼯鼠爲原禽類之一種。其形似鼹鼠。頭小。吻端與兩耳間。鞕闊。腹旁及兩肢間有飛膜。能飛。背與飛膜皆灰色。腹白。尾長。占體之半。作圓柱狀。密生長毛。體長七八寸。營巢樹穴或奪鳥巢居之。晝伏夜出。覓果實小鳥爲食料。捕得可供藥用。

性質　微溫。無毒。

主治　墮胎。令易產。

參攷資料　㈠人取其皮毛與產婦臨蓐時持之。令兒易生。而小品方乃入服藥用。飛生一枚。槐子。故琴箭羽各十四枚。合搗丸。梧子大。以酒服二丸。卽易產。（蘇頌）㈡鼯能飛而且產。故癥其皮懷其爪。皆能催生。其性相感也。濟生方治難產。金液丸用其腹下毛爲丸。以服之。立效。（李時珍）

【鷖】卽雞之古籍別名。典見綱目。詳『雞』條。

【鼈皮】卽蠵龜皮之古籍別名。典見綱目。詳『蠵龜皮』條。

二十七畫

【纜魚骨】卽烏鰂骨之古籍別名。典見諸家本草。詳『烏鰂骨』條。

【蠷螋】卽蜘蛛之古籍別名。典見綱目。詳『蜘蛛』條。

【釅醋】卽醋之古籍別名。典見新本草。詳『醋』條。

【鑽冬】卽款冬花之古籍別名。典見本草衍義。詳『款冬花』條。

【鑿子木】卽柞木之古籍別名。典見綱目。詳『柞木』條。

【鱸魚】卽鮀魚之古籍別名。典見綱目。詳『鮀魚』條。

【鱸魚】命名　黑色曰盧。本品白質黑章。故名。

古籍別名　四鰓魚。（綱目）白色者名銀鱸。

外國名詞　Lateolabrax Common perch（拉丁）スズキ或セイゴ（日本）

基本　係脊椎動物魚類硬鰭類鱸科。

產地　出海中及河流間。

形態　鱸魚爲鱗魚類之一種。體狹扁。口闊大。下顎突出前鰓蓋之邊緣有針狀突起。脊鰭有前後二部。臀鰭與脊部後鰭相對。鰭刺堅硬。鱗甲細小。背色淡蒼。腹淡白。幼時體旁有黑斑。長成漸失。大者長二尺餘。小者長五六寸。春月溯河流而上。則棲淡水中。秋月仍入海居鹹水中。其有出於江蘇蘆松江府者。其魚有四鰓。狀如土附。長祇數寸。其肉俱可供食與藥用。

性質　甘。平。有小毒。

主治　補五臟。益筋骨。和腸胃。治水氣。多食宜人。作鮓尤良。曝乾蒸香美。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食本草論鱸魚肉曰。安胎補中。作鮓尤佳。【宋】寇宗奭本草衍義論鱸魚肉曰。益肝腎。

參攷資料　㈠鱸魚肉雖有小毒。不甚發病。（寇宗奭）㈡鱸魚肉多食發炫癖瘡腫。不可同乳酪食。李廷飛云。肝不可食。剝人面皮。（掌禹錫）㈢中鱸魚毒者。蘆根汁可解之。（孟詵）

【鱸鰽】卽杜父魚之俗名。詳『杜父魚』條。

【鸕鷀】命名　盧與玆皆黑之稱。本品色深黑。故名。

古籍別名　鸀（爾雅）水老鴉。（衍義）烏鬼。（杜甫詩）

外國名詞　Phalacrocorax cepillatus T. & S.（拉丁）Cormorant Temminck's cormorant（英）Kormoran（德）ウ或シマツ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類游禽類鸕鷀科。

產地　海濱及洲渚間多有之。

1033／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態　鷓鴣爲水禽類之一種。其狀似鴉。又似鴨形。上嘴鉤曲而尖。下嘴直扁。色暗黑。頭喉眼綠黃色。眼有光輝。後頭部疏生短黑毛。狀如冠毛。頸與體之下面概黑色。有綠光。腹部稍白。翼尾脚亦黑色。脚有爪蹼。四趾皆前向。性善潛水捕魚。漁人恒多養之。其肉可供藥用。



鷓鴣

性質　酸。鹹。冷。微毒。

主治　大腹脹。利水道。

參攷資料　鷓鴣別錄不見。功用。惟雷氏炮炙論序云。體寒腹大。全賴鷓鴣。註云。治腹大如鼓。體寒者。以鷓鴣燒存性爲末。米飲服之。立愈。藉謂諸腹鼓大。皆屬於熱。衝氣並循於血脈。則體寒。此乃水鳥。其氣寒冷而利水。寒能勝熱。利水能去濕故也。又外臺云。凡魚骨哽者。但密念鷓鴣不已。即下。此乃厭伏之意耳。（李時珍）

【鷓鴣羽】　採取宜以翅羽燒灰用。

主治　魚骨哽噎。

【鷓鴣卵】　主治墜胎。有不欲孕者。取一個白水煮服。胎即化爲血水。從小便出。多則二服。無有不驗。

【鷓鴣涎】　主治腎咳。趙學敏曰。俗呼頓嗆。從小腹下逆上而咳。連嗽數十聲。少住又作。甚或咳發必嘔。牽掣兩脇。涕淚皆出。連月不愈者。是痰水沖服。下咽即止。

【鷓鴣骨】　主治下魚骨哽。燒灰水服。去雀面斑。燒研入白芷末。豬脂和夜塗旦洗。

【鷓鴣嗉】　命名　本品即鷓鴣喉中受食之處。故名。

主治　魚骨哽喉吞之。

【鷓鴣嘴】　主治噎病發。唧之便安。

【鷓鴣頭】　主治哽及噎。燒研酒服。

【鷓鴣糞】　原名　蜀水花。

性質　冷。微毒。

主治　去面上黑黯黧痣。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論鷓鴣糞曰。療面瘢疵。及湯火瘡痕。和脂油傅疔瘡。【宋】蘇頌圖經本草論鷓鴣糞曰。南人治小兒疳虻。乾研爲末。炙豬肉蘸食。云有奇效。【明】李時珍本草綱目論鷓鴣糞曰。殺蟲。

配合應用　㈠治鼻面酒皶。鷓鴣屎一合。研末。以膩月猪脂和之。每夜塗旦洗。（千金方）

㈡治魚骨哽咽。鷓鴣屎研。水服方寸匕。并以水和塗喉外。（范汪方）

㈢斷酒。鷓鴣屎灰研水服方寸匕。日一服。（外臺祕要方）

二十八畫

【鸘米】　即苡仁之古籍別名。見別錄。詳『苡仁』條。

【鸘菜】　即香薷之古籍別名。見和漢藥考。詳『香薷』條。

【鸘友】　即白芍之古籍別名。見和漢藥考。詳『白芍』條。

【鸘魚】　即鱔魚之古籍別名。見綱目。詳『鱔魚』條。

【鸚哥】　即鸚鵡之古籍別名。見綱目。詳『鸚鵡』條。

【鸚哥菊】　即斑鳥頭之俗名。詳『斑鳥頭』條。

【鸚鵡】　即鸚鵡之原名。詳『鸚鵡』條。

【鸚鵡】　原名　鸚鵡。

命名　本品能學人語。猶嬰兒之學母語。故名。

古籍別名　鸚哥。乾皐。隴客。（綱目）。牒陀（梵書）

外國名詞　Psittacus　或　Psittaci（拉丁）Parrot（英）Papagei.（德）オーム或アウム（日本）

基本　係屬脊椎動物鳥類攀禽類鸚鵡科。

產地　出美、澳兩洲。及南方熱帶諸地。



鸚鵡

形態　鸚鵡爲林禽類之一種。種類甚多。其頭圓。嘴强大。下嘴短小。上嘴鉤曲。舌肥大而輭。能效人

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

語。羽色豔美。有白赤黃綠等色。脚具四趾。二前二後。能攀木握物。性伶俐。可馴養。巢於岩洞樹穴。覓食果實等物。其肉可供藥用。

性質 甘。鹹。溫。無毒。

主治 食之已虛吷。

【鸚鵡螺】卽海螺之一種。性質功效與海螺同。詳『海螺』條。

【鸚羊角】卽羚羊角之古籍別名。典見綱目。詳『羚羊角』條。

【鸚】卽厥之古籍別名。典見綱目。詳『厥』條。

【鸚鼠】卽鼷鼠之古籍別名。典見本經。詳『鼷鼠』條。

二十九畫

【鬱】㊀卽丹黍米之古籍別名。典見綱目。詳『丹黍米』條。㊁卽黍之色赤者別名。典見爾雅。詳『黍』條。

【鬱冬】㊀卽麥門冬之古籍別名。典見別錄。詳『麥門冬』條。㊁卽天門冬之原名。詳『天門冬』條。

【鬱珠】卽龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【鬱李仁】卽郁李仁之古籍別名。典見別錄。詳『郁李仁』條。

二十八畫 鬻 靨 鬣 鬮

二十九畫 聾 曬 鬱

【鬱金】 **原名** 馬蓮。

命名 本品根形似莪蓯而醫馬病。故名。又能解肺金之鬱。遂名鬱金。

處方用名 廣鬱金。川鬱金。

古籍別名 乙金。玉金。深黃蔚金。鬱肥。金毋蛻。(和漢藥考)

外國名詞 Curcuma. (拉丁) Turmeric.(英) Kurkuma. (德)

基本 屬薑荷科。爲鬱金之地下莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。鬱金產四川爲正地道。好氣味。色金黃。有產兩廣者。名土金。色淡白無味。不適用。和漢藥考曰。產東印度、中國臺灣、琉球、日本九州地方。



鬱金 (一)

形態 鬱金爲多年生宿根草。高二三尺。葉類蠻薑。花稍似茗荷而大。多小苞。作鱗狀。其間有三四黃蕊。鬱金入香料。能使其香及遠。其根爲芋狀主根。長五分至一寸五分許。葉痕作輪狀。環繞周圍。外面灰褐色。內部暗褐色或黃色。作角質狀。有一種芳香。稍有苦味。



鬱金 (二)

製法 去鬚。切薄片。或原粒粹而用之。

性質 辛。苦。寒。無毒。

成分 爲黃色素(Curcumin. $C_{21}H_{20}O_6$)揮發油、澱粉等。

效能 解鬱行氣。涼血破瘀。用作血痰金瘡藥。

作用 在胃時僅分解。至腸始被吸收。然半數仍由大便排出。由腸壁吸入血中。卽能增進血液氣化之功。同時又能令子宮黏膜之充血。

主治 血積下氣。生肌止血。破惡血血淋。尿血。金瘡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論鬱金曰。單用治女人宿血氣心痛。冷氣結聚。溫醋磨服之。入心涼血。故潔古用以涼心。入足陽明。故治陽毒入胃下血熱痛。其性輕揚。能開鬱滯。故爲調逆氣行瘀血之要藥。【清】黃宮繡本草求眞論鬱金曰。鬱金辛苦而平。諸書論斷不一。有言此屬純陰。其論所治。皆屬破氣下血之說。有言性溫不寒。其論所治。則有療寒除冷之謂。究之體輕氣竄。其氣先上行而微下達。凡有宿血瘀積及有惡血不堪之物。先於上處而行其氣。若使其氣。其邪。其痰。其血。在於膈上而難消者。須審宜溫宜亦治馬脹。【金】張元素珍珠囊論鬱金曰。涼心。【元】李東垣用藥法象論鬱金曰。治陽毒入胃下血熱痛。【明】李時珍本草綱目論鬱金曰。治血氣心腹痛。產後敗血衝心欲死。失心顛狂。蠱毒。【明】繆希雍本草經疏論鬱金曰。鬱金味辛苦。其氣寒而無毒。辛能散。苦能洩。故善降逆氣。入心肝胃三經。故治血積。氣降而和。則血凝者散。故主生肌止血。其破惡血。治血淋尿血。主金瘡者。調氣行血之功也。單用亦治女人宿血氣心痛。冷氣結聚。溫醋磨服之。入心涼血。故潔古用以涼心。入足陽明。故治陽毒入胃下血熱痛。其性輕揚。能開鬱滯。故爲調逆氣行瘀血之要藥。【清】黃宮繡本草求眞論鬱金曰。鬱金辛苦而平。諸書論斷不一。有言此屬純陰。其論所治。皆屬破氣下血之說。有言性溫不寒。其論所治。則有療寒除冷之謂。究之體輕氣竄。其氣先上行而微下達。凡有宿血瘀積及有惡血不堪之物。先於上處而行其氣。若使其氣。其邪。其痰。其血。在於膈上而難消者。須審宜溫宜

1035／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

涼。同於他味。兼爲調治之。如敗血衝心。加以薑汁童便。去瘋心癇明礬爲丸。硃砂爲衣。與受蠱毒。加以升麻之類。若使惡血、惡痰、惡瘀、惡痟。在於下部而難消者。俟其辛氣既散。苦氣下行。卽爲疎泄。而無鬱滯難留之弊矣。此藥本屬入心散瘀。因瘀去而金得泄。故命其名曰鬱金。書云此藥純陰而寒者。因性主下而言也。有云是藥性溫而言者。因氣味辛香。主上而言也。各有論說不同。以致理難盡一耳。因爲辨論正之。出川廣圓如蟬肚。外黃內赤。色鮮微香。帶甘者眞。市人多以薑黃僞充【清】陳修園本草經讀論鬱金曰。時醫徇名有二說。一曰生脈散。因其有生脈二字。每用之以救脈脫。入咽少頃。脈未生而人已死矣。一曰鬱金。因其命名爲鬱。往往取治於氣鬱之症。數服之後。氣鬱未解。而血脫立至矣。醫道不明。到處皆然。而江浙閩粵。尤其甚者。又曰鬱金氣味苦寒者。謂氣寒而善降。味苦而善泄也。其云血積者。血不行則爲積。積不去則爲惡血。血逆於上。從口鼻而出。則爲衄血吐血。血走於下。從便溺而出。有痛爲血淋。無痛爲尿血。卽金瘡之瘀血不去。則血水不斷。不能生肌。此物所以統主之者。以其病原皆由於積血。特取其大有破惡血之功也。蓋血以氣爲主。又標之曰下氣者。以苦寒大泄其氣。卽所以大破其血。視他藥更進一步。解鬱二字。不見經傳。切不可惑此邪說。若經水不調。因實而閉者。不妨以此決之。若因虛而閉者。是其寇讐。且病起於鬱者。卽內經所謂二陽之病發心脾。大有深旨。若錯認此藥爲解鬱而類用之。十不救一。至於懷孕。最忌攻破。此藥更不可以沾唇。卽在產後。非熱結停瘀者。亦不可輕用。若外邪未淨者。以此擅攻其內。則邪氣乘虛而內陷。若氣血兩虛者。以此重虛其虛。則氣血無根而暴脫。此女科習用鬱金之害人也。聖經灼然可據。雜書雜說。居然魚目混珠。甚爲不解。昔人謂不讀人間非聖書。吾深有味乎斯言。

辨僞　㈠鄭肖巖曰。鬱金辛苦微甘。氣寒。其性輕揚。上行入心及包絡。兼入肺經。涼心熱。散肝鬱。破血下氣。出川廣體銳圓如蟬肚。皮黃肉赤。色鮮微香。折之光明脆徹。苦中帶甘者乃眞。今市中所售者。多是薑黃。并有以蓬莪朮僞之者。俱峻削性烈。挾虛者大忌。用者愼之。況鬱金苦寒。色赤入心。姜黃辛溫。色黃入脾。莪朮味苦。色青入肝。胡得混售而貽害耶。㈡曹炳章曰。按鬱金山草之根。野生也。兩廣江西咸有之。而以蜀產者爲勝。上古不甚重用。以治馬病。故又名馬蒐。因其形像莪蒁也。自唐以後。始入藥料。治血症有功。本非貴重之品。清初吳亂未靖。時蜀道不通。貨少居奇。致價數倍。甚則以薑黃冒僞之者。然其形銳圓。如蟬腹狀。根杪有細纓一纔。如蓌脖之苗。長一二寸。市人因呼金線弔蝦蟆。蟬肚爲金是也。其皮黃白有皺紋。而心內黃赤。剖開儼然兩層如井欄。產四川重慶。惟本年生者嫩小而黃。若遺地未採。逾年而收。則老而深黯色。如三七狀。爲老廣鬱金。然老鬱金治血症化瘀。創積之力。勝於嫩者。若開鬱散痛。卽嫩黃者亦效。乃近年傳黑者爲野鬱金。黃者爲假。并誤其爲薑黃。殊不知此物本是野生。若薑黃皮有節紋。肉色深黃。無暈蓬朮色黑。無心。最易辨也。然老鬱金雖產四川。近今名稱廣鬱金。所謂川鬱金。乃溫州產也。色黯黑。形扁亦有心。惟不香耳。

近人學說　㈠張山雷曰。鬱金始見於唐本草。稱其辛苦而寒。石頑逢原已改作辛平。謂安有辛香而寒之理。又謂蜀產體圓尾銳。如蟬腹狀。發苗處有小孔。皮黃而帶黑。通身粗皺。如梧桐子紋。每枚約重半錢。折開質堅色黃。中帶紫黑。嗅之微香。不烈者眞。如大小不等。折之中空質柔。內外皆黃。其氣烈者。卽片子薑黃也。案今市肆鬱金有二種。川產廣產。形頗相近。但川產者形扁。切片亦深黃褐色。中心則紫。廣產形圓。切片則作淡黃色。中心略深。亦黃而不紫。今俗尙多用廣產。實則質堅而光潔。其性沈重。其氣極微。嗅之亦無甚香味。二者皆然。若色深香烈。而形較大。則薑黃也。惟其質堅性重。色黃赤如血。故專入血分。能行血中之氣。下

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

氣行血。解開結止痛。是其專長。古稱解鬱義亦如是。唐本草謂治血積下氣破惡血血淋尿血。甄權謂治宿血氣心痛冷氣結。瀕湖謂治血氣心腹痛產後敗血衝心欲死。丹溪謂治吐血衄血唾血及經事逆行。並以鬱金末加韭汁薑汁童尿同服。其血自清。痰中帶血者加竹瀝。固無一非開泄沈降之功用也。又曰。丹溪謂鬱金之性。輕揚上行。古人以治鬱還不能升者。命名因此。案此藥是根。質堅沈重。潔古謂其氣味俱厚。故純以下行爲用。惟入血行氣。亦能破堅散結。所謂開鬱者。本以宣通解散爲義。鬱不能升一層。大是誤會。況丹溪亦自謂其治吐血衄血及逆經諸症。則專以下行爲長。當亦可於言外得之。反謂上行。寧不自矛自盾。范石湖且謂一味爲末。治蠱毒。服之即瀉出惡物。尤爲明白了解。丹溪此說。恐出依託。而石頑和之。亦謂先升後降。不思之甚矣。㊁王治華曰。市肆所售廣鬱金。即川鬱金。體圓尾銳。外皮糙粗皺。折開實堅。黃色光明脆澈。其味苦中帶甘者眞。川鬱金即溫州所產之鬱金。質堅色黑。香氣甚微。較遜。按鬱金入心與包絡肝胃四經。爲降氣解鬱涼血散瘀之品。日醫石原保秀氏用以治唾血吐血衄血尿血。婦人經脈逆行。心腹痛諸症。但考其功用。與蓬朮薑黃相似。惟蓬朮入肝。能治氣中之血。薑黃入脾。可治血中之氣。而鬱金則入心。專治心包之血。有破宿生新之功。爲稍異耳。

配合應用　㊀鬱金同韭菜。番降香。當歸。生地黃。童便。能治怒氣傷肝吐血。又治鼻衄唾血。喉中血腥氣。及經脈逆行有痰方加竹瀝。㊁鬱金七兩。同明礬三兩。爲細末。薄米糊爲丸。梧子大。每服五十丸。白湯下。昔人曾治婦人癲狂十年不愈。初服此藥。心胸間有物脫去。卽神氣洒然。再服而蘇。此鬱憂痰血。總衆心竅所致。此藥入心去惡血。明礬化頑痰故也。㊂痘疹始有白泡。忽搖入腹。漸作紫黑色。無膿。日夜叫亂者。鬱金一枚。甘草二錢半。水半碗。煮乾。去甘草。切片。微火烘燥爲末。入眞片腦半錢。每用一錢。以生豬尾血五七滴。新汲水調下。不過二服。甚者毒氣從手足心出。如癍狀。乃痊。此乃五死一生之候也。（龐安常傷寒論方）

㊃又范石湖文集云。嶺南有朱生之害。其術於飲食中行厭勝法。致魚肉能反生於人腹中。而人已死。則陰役其家。初得覺胸腹痛。次日刺人。十日則生在腹中也。凡胸膈痛。卽用升麻或膽礬吐之。若膈下痛。急以米湯調鬱金末二錢服。卽瀉出惡物。或合升麻鬱金服之。不吐則下。李巽巖侍郎爲雷州推官。鞫獄。得此方活人甚多。㊄治厥心氣痛不可忍。鬱金、附子、乾薑等分爲末。醋糊丸。梧子大。硃砂爲衣。每服三十丸。男酒女醋下。（奇效方）

㊅治產後心痛。血氣上衝欲死。鬱金燒存性爲末二錢。米醋一呷。調灌卽甦。（袖珍方）

㊆治自汗不止。鬱金末臥時調塗於乳上。（集簡方）

㊇治衄血吐血。川鬱金爲末。井水服二錢。甚者再服。（黎居士易簡方）

㊈治陽毒下血。熱氣入胃痛不可忍。鬱金五大箇。牛黃一皂莢子。爲散。每服用醋漿水一盞。同煎三沸。溫服。（孫用和秘寶方）

㊉治尿血不定。鬱金末一兩。葱白一握。水一盞。煎至三合。溫服。日三服。（經驗方）

㊊治風痰壅滯。用鬱金一分。藜蘆十分。爲末。每服一字。溫漿水調下。仍以漿水一盞漱口。以食壓之。（經驗方）

㊋治中砒霜毒。鬱金末二錢。入蜜少許。冷水調服。（事林廣記方）

㊌治痔瘡腫痛。鬱金末水調塗之。卽消。（醫方摘要方）

㊍治耳內作痛。鬱金末一錢。水調傾入耳內。急傾出之。（聖濟總錄方）

用量　錢半至二錢。

施用宜忌　凡陰虛而無瘀滯者禁用。

參攷資料　㊀鬱金其性輕揚上行。治吐血衄血。唾血血腥及經脈逆行。並宜鬱金末。加韭汁。薑汁。童尿同服。其血自清。痰中帶血者。加竹瀝。又鼻血上行者。鬱金、韭汁

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

加四物湯服之。(朱震亨)㊁鬱金　生蜀地及西戎。苗似薑。黃花白實。紅。末秋出莖心而無實。其根黃赤。取四畔子根去皮火乾。馬藥用之。破血而補。胡人謂之馬蓮。嶺南者有實。似小豆。不堪啗。(蘇恭)㊂今廣南江西州郡亦有之。然不及蜀中者佳。四月初生苗似薑。如蘇恭所說。(蘇頌)㊃鬱金不香。今人將染婦人衣。最鮮明。然不奈日炙。染成衣則微有鬱金之氣。(寇宗奭)

【鬱金香】古籍別名　鬱香。(御覽)草麝香。茶矩摩。(佛書)紅藍花。紫述香。(綱目)

外國名稱　Tulipa Gesneriana, L.(拉丁)ウツユンユウチウリツプ(日本)

基本　係百合科山慈姑屬。爲鬱金香之花。

產地　廣西羅城縣及諸山野間恒多有出。

形態　鬱金香爲芳草類之多年生草本。高尺餘。葉廣披針形。帶白色。四五月間花大而美麗。單生於花莖之頂端。花蓋六片。有黃紅白等色。或爲重瓣花。花瓣可供香

(德)ユウノトリ或ユフヅル(日本)

基本　係脊椎動物鳥類涉禽類鶴科。

產地　江湖池沼間有之。

形態　鶴爲水禽類之一種。其形似鵠。無丹頂。似鸛無冠毛。嘴長。色暗黑。眼裸出色赤。脚長亦赤色。肩甕及翼白色。略帶黑體之上部黑色。下部白色。脛以下無羽毛。被多角形鱗紋。爪短小而褐色。巢於高樹。以枝葉羽毛等構成。捕食魚蟲。性馴溫和。其骨可供藥用。



鶴

採取　以白色者佳。

性質　甘。大寒。無毒。

主治　鬼蟲諸疰毒。五尸心腹痛。

參攷資料　鶴骨有小毒。入沐湯浴頭。令髮盡脫。更不生也。(陳藏器)

時伽毗國獻鬱金香。葉似麥門冬。九月花開。狀似芙蓉。其色紫碧。香聞數十步。花而不實。欲種者取根。二說皆同。但花色不同。種或不一也。古樂府云。中有鬱金蘇合香者。是此鬱金也。晉左貴嬪有鬱金頌云。伊有奇草。名曰鬱金。越自殊域。厥珍來尋。芳香酷烈。悅目怡心。明德惟馨。淑人是欽。

【鬱香】即鬱金香之古籍別名。典見御覽。詳『鬱金香』條。

【鬱臭苗】即益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益母草』條。

【鬱臭草】即益母草之古籍別名。典見圖經本草。詳『益母草』條。

【鬱雚】即鬱金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鬱金』條。

【鬱雞】形態　鬱雞爲雞類之一種。棲在山野。多食鬱金苗葉。其肉鬆脆。可供藥用。

主治　解鬱散結氣。

【鸛】命名　鸛字象文象其形。

古籍別名　皂君。負釜。(詩疏)黑尻。(綱目)

外國名稱　Ciconia boyciana(拉丁)Storch(英)/Storch

1038／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【鸛卵】 主治 預解痘毒。水煮一枚。與小兒啖之。令不出痘。或出亦稀。（李時珍）

【鸛屎】 主治 小兒天釣驚風。發歇不定。炒研半錢。入牛黃、麝香各半錢炒。蠍五枚爲末。每服半錢。新汲水服。

【鸛腳骨及嘴】 主治 喉痺。飛尸。蛇鳥咬。及小兒閃癖。大腹痞滿。並麥汁服之。亦燒灰飲服。

【鸛鴿】 命名 本品性好浴水。其睛圓圜然故名。

古籍別名 鵴鴿（周禮）鵴鵴鳥（廣雅）八哥（綱目俗名）寒皐（萬畢術）

外國名稱 Acridotheres cristatellus Gm.（拉丁）ハハツチヤウ或ナシレン（日本）

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類白頭翁科之鸛鴿。

形態 鸛鴿爲林禽類之一種。全體羽色純黑。兩翼下各有白點。背面稍帶紫光。頭後及腰稍帶綠。頭羽稍長。爲冠。額羽稍向嘴基而卷曲。嘴色淡黃。嘴根紅色。脚橙黃。眼簾亦黃。捕雛者養之。修剔其舌尖。教以言語。能效人語。亦能巧擬禽獸之啼聲。其肉可供藥用。

採取 須於臘月採之。

性質 甘。平。無毒。

主治 五痔止血。炙食。或爲散飲服。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鸛鴿肉曰。治老嗽。臘月臘日取得。五味醃炙食。作羹食。或搗散蜜丸服之。【宋】日華諸家本草論鸛鴿肉曰。炙食一枚。治咽噫。下氣通靈。

【鸛鴿目睛】 主治 和乳汁。研滴目中。令人目明。能見霄外之物。

【鸛鶇】 即鵁鶄之古籍別名。典見綱目。詳『鵁鶄』條。

三十畫

【鱉豵】 即豪豬之古籍別名。典見綱目。詳『豪猪』條。

三十三畫

【蠶桂枝】 即桂枝之處方用名。詳『桂枝』條。

1039／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

編輯後記

中國藥學大辭典成於民國念二年六月。其間排印校對。歷時一年十月而始行出版。在此排校期間。續得珍貴之材料甚多。不忍割棄。因作編輯後記以容之。

一 日本化驗中藥之新報告

日本近年復興皇漢醫藥。已爲世人所共知。研求之精。成績之富。皆出國內人士之料想。近由日本醫學博士中尾万三集得中藥一百四十二種之成分報告。均係正式發表於醫藥雜誌者。誠皆中國藥學上之重大收獲。國人對此。能不憬然驚惕。吾願國醫同志。勿再泥於舊說學派之空論。作無謂之自訟。當知國醫之唯一寶物。卽在效驗卓特之中國藥物。今後當盡力於研求國藥文獻。辨別道地眞僞。改進泡製種植。化驗成分性質。判定藥效度量。此數端卽爲國醫造成萬世不滅之根基。亦爲國醫科學化之正確途徑。又願國內科學專家。西醫藥家。轉易研究標的。勿使國傳瓌寶。坐讓於人。是本書之所由作也。茲將中國藥品一百四十二種之成分化驗報告記錄如下。

★發表者均用縮名見後面縮名索引

【甘草】 學名 Glycyrrhiza Glabra, L. var Glandulifera, Reg. Et

成分 Glycyrrihizin $C_{44}H_{64}O_{19}$及蔗糖，葡萄糖，Mannit 林檎酸，Asparagin.

發表者 F.S.A.I.30(1927)

【人參】 學名 Panax Ginseng, C.A. Mey.

1040／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成分 Panaquilon $C_{32}H_{50}O_{14}$ (1) Panax Sapogenol $C_{27}H_{48}O_3$ Phytosterin $C_{29}H_{44}O$ (2) 等

發表者 (1)藤谷京醫2.(明38年) (2)近藤,天野:藥誌466(大9年)近藤,田中:藥誌401(大4年) (3)近藤,山口:藥誌440(大7年)

【沙參】 學名 Adenophora Varticillata, Fisch. Var Typica, Regel.

成分 Saponin

發表者 F.S.A.I.4(1927)

【桔梗】 學名 Platycodon Grandiflorum, DC.

成分 Kikyosaponin $C_{29}H_{48}O_{11}$

發表者 (1)松南,磯義:日藥總會(48)(昭3) (2)梅辻京藥誌26(大6) (3)大鹿京醫15(大7)等.

【尤】 學名 Atratylis Ovata, Thunb.

成分 精油(主成分爲 Atractylol $C_{15}H_{24}O$ 其他 Atractylon $C_{14}H_{18}O$ 等)

發表者 (1)上野:藥誌129(明25)高木:藥誌473(大10) (2)高木,本鄉:藥誌509(大13) 〔其他〕藤田:藥誌511(大13)金鮮醫83(昭2)

【貫衆】 學名 Polystichum Falcatum, Diels Var Fortunei, Baker.

成分 Oleoresin

發表者 F.S.A.I.60(1927)

【遠志】 學名 Polygala Tenuifolia Willd.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成分　Senegin, Resin. 脂肪油

發表者　F.S.A.I.26

【地楡】　學名　Sanguisorba Officinalis L.

成分　(1)單寧質, Sugar(2)

發表者　(1)邦藥213　(2)F.S.A.I.35　〔其他〕藤田醫誌(大12)附錄

【王孫】　學名　Paris Tetraphylla A. Gr.(?)

成分　Paridin, Paristyphnin

發表者　F.S.A.I.51

【紫草】　學名　Lithospermum Officinale, L. Var. Erythrorhizon, Maxim (?)

成分　Acetylshikonin $C_{18}H_{18}O_6$ (結晶性紫色素)

發表者　(1)黑田；化誌30(大7)　(2)上田；朝試(大6)　(3)澤田；東北醫29(明36)

【白頭翁】　學名　Auemone Chinen Sis, Runge.

成分　Auemonin

發表者　F.S.A.I. 41

【白及】　學名　Bletilla Striata, Reichb.

成分　黏液質

發表者　邦藥298

編輯後記

1042／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【黃連】學名 Coptis Chinensis, Franch.

成分 Berberin $C_{20}H_{17}NO_5$ Palmatin $C_{21}H_{21}NO_4$(1) Coptisin $C_{19}H_{15}NO_5$(2) Worenin $C_{20}H_{15}NO_4$(3)

發表者 (1)村山，篠崎：藥誌 530（大15） (2)北里：Proc. Imp. Acad. Japan 2(1926) (3)北里：藥誌 542（昭2）

【胡黃連】學名 Picrorhize Kurroa Royl.

發表者 朝比奈，前田：藥誌433(大7)

【黃芩】學名 Scutellaria Baicalensis, Georgi.

成分 Woogonin $C_{16}H_{12}O_4$ 及 Baicalin $C_{21}H_{18}O_{11}$

發表者 柴田 Acta. Phy. 1(1923) 〔其他〕高橋：藥誌109(明24)

【秦艽】學名 Gentiana Tiletica, King.

成分 Alkaloid.

發表者 F.S.A.I. 6

【柴胡】學名 Buplerum Falcatum, L.

成分 Saponin,(2)揮發油樹脂澱粉粒

發表者 (1)惠澤：臺研5(大5) 〔其他〕藤田，木村！藥誌553(昭3)近藤（東）：日本藥物7(昭3)等

【前胡】學名 Angelica Miqueliana, Maxi.(？)

成分 Nodakenin $C_{20}H_{24}O_9$(配糖體)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

發表者　有馬化誌48(昭2)49(昭3)

【升麻】學名　Cimicifuga Foetida, L.

成分　Cimicifugin. 蔗糖油樹脂鞣酸

發表者　F.S.A.1.40國本4

【苦參】學名　Sophora Angustifolia, L. Ets.

成分　(根)Martin $C_{15}H_{24}N_2O$(1)(子)脂肪油 Cytisin $C_{11}H_{14}N_{20}$(2)

發表者　(1)長井,近藤,藥誌260(明36)近藤,佐藤藥誌474(大10)近藤,貴志荒木藥誌478(大10)近藤,眞田藥誌498(大12)近藤,落合藥誌522(大15)532(大15)近藤,落合,相原554近藤,落合,中村藥誌561近藤,落合,西村藥誌561(昭3)　(2)猪子藥誌330(明42)〔其他〕藤田藥誌505(大12)石板東醫17(明36)杜臺醫237(大13)

【白鮮】學名　Dictamnus Albus, L.

成分　苦味質精油

發表者　F.S.A.I.37

【延胡索】學名Corydalis Bulbosa, DC.(?)

成分　Protopin $C_{20}H_{19}NO_5$(1) Bulbocapnin $C_{19}H_{19}NO_4$(2) Dtetrahydropalmatin $C_{21}H_{25}O_4N$ 及融點228－230°之一種 Alkaloid(3) Dehydrocorydalin Ber Berin(4)

發表者　(1)K.Makoshi: Arch Pharm.,274(1908)　(2)朝比奈,用瀨,藥誌463(大9)　(3)長田,藥誌547

編輯後記

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(昭2)　④F. S. A. I. 37

【貝母】　學名　Fritillaria Verticillata, Willd var Thunbergü, Baker.

成分　Fritillin $C_{28}H_{41}NO_3$ [1] Fritillarin $C_{19}H_{33}NO_2$ ve Rticin $C_{19}H_{33}NO_2$ Verticillin $C_{19}H_{33}NO_2$ [2]

發表者　(1)八木京醫 10 (大2)　(2)福昌化誌50(昭4)

【石蒜】　學名　Lycoris Radiata, Herb.

成分　Lycorin $C_{16}H_{17}NO_4$ [1] Sekisamin $C_{16}H_{19}NO_4$ [2]

發表者　(1)森島藥誌168(明29)東醫9(明28)朝比奈，杉井藥誌377(大2)　(2)近藤，富村藥誌545(昭2)〔其他〕外山，藥誌335(明43)江日新10年8號(大10)森島東醫專2402(大14)江千醫134(大10)

【水仙】　學名　Narcissus Tazetta, L. Var. Chinensis. M. Roem.

成分　Lycorin $C_{16}H_{17}O_4N$ [1] Narcitine $C_{16}H_{19}NO_4$ [2]

發表者　(1)山內藥誌243(明35)　(2)F.S.A.I. 50　〔其他〕朝比奈，杉井藥誌377(大2)

【龍膽】　學名　Gentiana Scabra, Bunge.

成分　Genticpicrin $C_{16}H_{26}O_9$ (苦味配糖體) Gentianose $C_{18}H_{32}O_{16}$ (二糖體)

發表者　朝比奈，照山藥誌382(大2)朝比奈，依田藥誌390(大3)

【細辛】　學名　Asarum Sieboldi, Miq.

成分　精油

發表者　近藤(東)鮮醫88(昭3)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【杜衡】學名 Asarum Maximum, Hemsl.

成分 精油(主成分爲 Safrol 及 Eugenol 少量)

發表者 朝比奈,藥誌 302(明40)朝比奈,化誌28(明40)

【拳參】學名 Polygonum Bistorta, L.

成分 (一般成分)灰分 4.35%單寧酸 18.25%還元糖 2.13%護膜黏液質2.23%澱粉,樹脂,纖維表 66.74%

發表者 藥誌471(大10)學彙

【當歸】學名 Angelica Sinensis, Diels

成分 精油

發表者 酒井;東醫 30(大5) 〔其他〕藤田;藥誌493(大12)

【芎藭】學名 Cnidium Officinale, Makino

成分 精油(成分爲Cnidium lacton $C_{12}H_{18}O_2$ Cnidiumsaure $C_{12}H_{20}O_3$ Cnidium Saure Ester $C_{12}H_{19}O_2$ O-$C_{10}H_{17}$ Sedanon Saure $C_{12}H_{10}O_{38}$等

發表者 酒井;東醫30(大5)藥誌 935(大8)村山;藥誌477(大10)493(大12) 〔其他〕藤田;藥誌 514(大13)

【蛇床】學名 Selinum Monnieri, L.

成分 精油

編輯後記

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

發表者　中尾；藥誌462(大9)

【葉本】學名　Ligusticum Sinensis, Oliv.

成分　精油

發表者　高橋化誌49(昭3)

【白芷】學名　Angelica Anomala, Lallen.

成分　精油Angelicasaure之類似酸(1)及 Angelicatozin(2)

發表者　(1)村山（長）藥誌 152（明27）　(2)酒井東醫31(大6)藥誌445(大8)

【芍藥】學名　Paeonia Albiflora, Pall

成分　安息香酸，精油(2)

發表者　(1)朝比奈，奥野藥誌309(明40)　(2)F.S.A.I.15

【牡丹】學名　Paeonia Moutan, Sims.

成分　Paeonol $C_9H_{10}O_3$ 安息香酸 Phytosterin

發表者　長井藥誌 77.81(明17) 田原藥誌 117（明24)同(明25)　〔其他〕藤田藥誌509(大13)

【木香】學名　Inulu Racemosa, Hook, Fil.

成分　精油（主成分爲 Aplotaxen $C_{17}H_{28}$ a-b- Coste $C_{15}H_{24}$ Costus Lacton $C_{15}H_{20}O_2$ Dihydrocostus Lacton $C_{15}H_{22}O_2$ Costussavre $C_{15}H_{22}O_2$ Costol $C_{14}H_{24}O$等

發表者　(Ber. 47 1914)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【甘松香】學名 Nardostachys Jatamansi, Royle.

成分 精油

發表者 朝比奈藥誌302(明40)化誌28(明40)

【山奈】學名 Kaempferia Rotunda, L.

成分 精油(主成分爲Methyl-p-cumar Saure Athyl Ester及Zimt-Saure Athyl Ester其他含 Pentadecan 及少量之 Zimtaldehyd)

發表者 中尾澁江藥誌513(大13)

【蔆醬】學名 Piper Metle, L.

成分 精油

發表者 F.S.A.I.47

【肉豆蔻】學名 Myristica Fragrans, Houtt.

成分 脂肪油,揮發油,澱粉,

發表者 下山生藥學399

【薑黃】學名 Curcuma Aromatica, Salisb

成分 Curcumin(黃色素) 油澱粉

發表者 藥誌542(昭2)藥彙

【蓬莪草】學名 Kaempferia Pandulata, Roxb.

1048／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成分　精油(主成分爲 Cineol)
發表者　邦藥304

【莎草】學名　Cyperus Rotundus, L.
成分　精油(主成分爲 Cyperen $C_{15}H_{24}$ 及 Cyperol $C_{15}H_{24}O$) 脂肪酸及 Phenol 性物質
發表者　木村(雄)大谷藥誌560(昭3)學彙藥誌527(大15)

【茉莉】學名　Jasminum Sambac, Ait.
成分　香脂(主成分爲精油及蠟)
發表者　士橋臺研I.I.(大11)

【茅香】學名　Cymbopogon Nardus, Rendl.
成分　精油
發表者　惠澤工化16(大2)篠崎(英)工化16(大2)賀田工化16(大2)加福工化19(大5)20(大6)加福臺研5(大5)

【迷迭香】學名　Rosmarinus Officinalis, L.
成分　揮發油
發表者　下山生藥學

【香薷】學名　Mosla Sp.
成分　精油(主成分爲 Elsholtziaketon $C_{10}H_{14}O_2$)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

發表者　朝比奈，村山：藥誌390(大2)398(大4)朝比奈，柴田(文)藥誌415(大5)朝比奈，刹米431(大7)朝比奈，桑田：藥誌485(大11)朝比奈：Acta, Phytochim, vol. 11之1

【荆芥假蘇】學名　Ocimum Bacilicum, L.

成分　精油（主成分 D-Methon 及非旋光性 Methon D-Limonen）

發表者　村山：板垣：藥誌476(大10) 村山：化誌32(明44)

【薄荷】學名　Metha Arvensis, L.

成分　精油（主成分爲 Meuthol $C_{10}H_{20}O$）

發表者　學彙：藥誌346（明44）學彙：藥誌441(大7)學彙：藥誌364(大1)篠崎(英)工化22(大8)18(大4)木村(惠)工化7(明37)

【積雪草】學名　Hydrocotyle Spp.

成分　精油

發表者　F.S.A.I.9

【蘇】學名　Perilla Ocimoides, L, Var Crispa, Benth.

成分　精油(主成分爲 Perilla Aldehyd $C_{10}H_{14}O$)

發表者　吉木：藥誌347（明44）〔其他〕吉川，富澤，工化23(大9)農業會報(大611月號)

【荏】學名　Perilla Ocimoides, L.

成分　精油

編輯後記

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

發表者　木村（惠）工化7(明37)

【青蓉】學名　Salvia Plebeia, R. Br.

成分　精油（主成分 Thymol）

發表者　村山藥誌459(大9)〔其他〕吉川，富澤，工化22(大8)

【菊】學名　Chrysanthemum Sineusis, Sab.

成分　精油

發表者　F.S.A.I.2

【野菊】學名　Chrysanthemum Indicum, L.

成分　精油

發表者　F.S.A.I.2

【艾】學名　Artemisia Vulgaris, L, Var. Indica, Maxim

成分　精油（主成分爲Cineol, a-Thujon $C_{10}H_{16}O$）

發表者　中尾，澁江藥誌510（大13）〔其他〕大橋東北醫10(1927)時日本藥物2(大15)；微生物誌20(大15)

【青蒿】學名　Artemisia Apiacea, Hance.

成分　苦味質精油Abrotanine.

發表者　F.S.A.I.1

1051／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【黃花蒿】 學名 Artemisia Annua, L.

成分 精油

發表者 F.S.A.I. I 今田藥誌420(大6) 朝比奈吉富藥誌424(大6)等

【益母草】 學名 Lenurus Silicicus L.

成分 Leonurin

發表者 久保田，中島：醫海1771(昭3)

【夏枯草】 學名 Brunella Vulgaris, L.

成分 全草含有水溶性無機鹽約3.5％其中約68％爲 Kcl 所成又成有水難溶性之植物膽鹼樣物質子中含脂肪油

發表者 久保田，中島：滿醫9(昭3)

【雞冠花】 學名 Celosia Cristata, L.

成分 子中含脂肪油

發表者 F.S.A.I.42

【紅藍花】 學名 Carthamus Tinctorius, L.

成分 花中含Saflargelb $C_{24}H_{0}O_{1}$及 Carthamin$C_{21}H_{22}O_{10}$(1)（紅色素）(2)種子中有脂肪油

發表者 (1)Ma.in: Aun. 136(1863) (2)鹽：高化誌29(明39)化誌31(明42)黑田日藥例會(昭41月)

〔其他〕羽根：植研4(昭2)

編輯後記

1052／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【番紅花】學名 Crocus Sativus, L.
成分 含有a-Crocin, b-Crocin, 及 a-Crocin 色素)其他 Picrocrosin $C_{32}H_{46}O_{19}$(苦味質)脂肪油，精油等
發表者 雜錄草誌57(昭3)

【續斷】學名 Dipradus Asper, Wall.
成分 Lamiine 及 Glycoside.
發表者 F.S.A.I.9

【惡實】學名 Arctium Lappa, L.
成分 Inulin. 脂肪油
發表者 F.S.A.I.1

【菜耳】學名 Xanthium Strumarium, L.
成分 Xanthostrumarin
發表者 學彙66(明20)

【天名精】學名 Carpesium Abrotanoides, L.
成分 Inulin(?)
發表者 F.S.A.I.2

【豨薟】學名 Siegesbeepia Pubescens, Makino

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成分　苦味質 Darutin

發表者　F.S.A.I.3

【甘蕉】　學名　Musa Paradisiaca, L.Var. Sapientum, Kuntze.

成分　糖質，有機酸，單寧，沒食子酸，脂肪，纖維素等

發表者　F.S.A.I.49

【麻黃】　學名　Ephedra Sivica, Stampf.

成分　Ephedrin $C_{10}H_{15}NO$[1] Psendoephdrin,[2] Non-Pseudoephedrin $C_9H_{13}NO$[3] Methylephedrin $C_{11}H_{17}NO$[4] Imethylpseudoephedrin $C_{11}H_{17}NO$[5]

發表者　(1)長井藥誌 120, 121, 127 (明25) 130139(26)　(2)E. Read & C. T. Feng: Chinese Jour. Phy. 1(1927)　(3) Smith: J. Chem.Soc. (1928) 學葉藥誌556(昭3)等

【木賊】　學名　Equistum Hyemale,L.

成分　無水珪酸

發表者　邦藥360

【燈心草】　學名　Juncus Effusus, L. Var.　Decipiens, Buch.

成分　水分7.15%脂肪6.55%粗纖維33.16%Protein1.73%無窒素抽出物42%灰分4.32%

發表者　大島 J. of Sapporo Agric. College 2(1906)

【地黃】　學名　Rehmannia Lutea, Maxim.

編輯後記

1054／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成分　Mannit及糖
發表者　大谷日藥總會(48)演講(昭3)

【牛膝】　學名　Achyranthes Bidentata, Blume
成分　灰分中富加里(1)鹽,黏液質
發表者　(1)河野:藥誌561(昭3)　〔其他〕藤田:藥誌504(大13)

【紫苑】　學名　Aster Tartaricus, L.(?)
成分　Quercetin及融點150°之結晶性物質
發表者　中沖日藥45回總對(昭3)

【鴨跖草】　學名　Commelina Communis, L.
成分　Starch, Mucilage,
發表者　F.S.A.I.52

【黃蜀葵】　學名　Abelmoschus Manihot, Medic.
成分　黏質物
發表者　小澤工化25(大11)石津:藥誌209(明32)

【龍葵】　學名　Solanum Nigrum, L.
成分　全草中含少量有散瞳作用之 Alkaloid(1)果實中含Solanin(2)及Saponin(3)
發表者　(1) Q. Schmidtu. Schutte: Arch. Pharm 229 (1891)　(2)Desfosses: J. De Phar.6(1820)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(3)Waage: Pharm.Central.(1892)

【酸漿】 學名 Physalis Alkekengi, L.

成分 (全草) Physlin (無晶形苦味質)(果實)枸櫞酸及微量 Alkaloid.(1)(根中)Hystonin(2)

發表者 (1)Dessaigne: et Chantard J. Pharm.21(1852) (2)溝口衛試彙24(大13)X.F.S.A.I.8

【迎春花】 學名 Jasminum Mediflorum, Lindl.

成分 葉中含Syringin(一種Glycoside)

發表者 F.S.A.I.13

【款冬花】 學名 Tussilago Farfara, L.

成分 (葉中)配糖體2.63%(花中)一種 Phytosterin.

發表者 W.P. 785; B.P.C. 1128 A.J.P. 1887(59)U.S.D. 1331

【決明】 學名 Cassia Tora, L.

成分 Emodin 及配糖體

發表者 Eelborue: Phar. Jocer. Traus. 3(1829)

【金盞草】 學名 Calendula Arvensis, L.

成分 全草中含水楊酸根中含 Inulin.

發表者 W.P. 786B.P.C.251

【車前】 學名 Plantago Major, L. Var Asiatica, Decne.

編輯後記

1056／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成分　全草中含配糖體 Aucubin $C_{15}H_{24}O_{10}$[1] 及 Plantagin[2] 種子中除多量黏液外尚有 Plantenolsaure $C_{15}H_8O_3$（？）琥珀酸[3]等

發表者　(1)宿谷富藥誌(大13)藥誌490(大11)　(2)高橋(統)岡醫385(大11)　(3)緒方(草)西大藥誌514(大13)

【馬鞭草】　學名　Verbena Officinalis, L.

成分　Verbenalin $C_{17}H_{28}O_{10}$(結晶性配糖體)

發表者　L.Bluradier: Chem. Ztg.1908, Apr 藥誌316(明41)學彙

【連翹】　學名　Hypericum Ascyron, L.

成分　葉中含Phyllirin.

發表者　Eijkman: Rec.5(1886)

【藍】　學名　Polygonum Tinctorium, Lour.

成分　Indican(配糖體)

發表者　W.P.176

【藍澱】　學名　Indigo(英名)

成分　Indigo

發表者　藥誌39(明18)雜錄

【蓼】　學名　Polygonum Hydropiper,L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成分 Polygonum Acid Tannin

發表者 F.S.A.I.43

【虎杖】學名 Polygonum Reynoutria, Makino

成分 Polygonin

發表者 藥誌314(明41)學彙

【萹蓄】學名 Polygonum Aviculare, L.

成分 糖，單寧，蠟

發表者 Lebbin:Med Woche.4(1908)

【蒺藜】學名 Tribulus Terrestris, L.

成分 單寧

發表者 U.S.D. 1291 I.M.P.229

【大黃】學名 Rheum Tanguticum (Maxim,)

成分 Chrysophan Saure, Emodin, Isoemodin. Rhein. Rheochrysin. 其他 Aporetin.Erythroretin 及 Phaeoretia 大黃鞣酸（Rheumgerbsaure）蔴酸酐，澱粉等

發表者 下山，生藥學114

【商陸】學名 Phytolacca Esculenta, Houtt.

成分 硝石(1)脂肪油

編輯後記

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

發表者 (1)猪子，本田東醫5(明24) (2)小倉：工化31(昭3) 〔其他〕長井：藥誌98(明23)岩川：東醫26(大1)

【狼毒】 學名 Aconitum Lycoctonum, L.

成分 Lycaconitin, Myoctonin Euphorbon, 樹脂，蓉

發表者 F.S.A.I. 40

【大戟】 學名 Euphorbia Spp.

成分 酸石灰及1種 Alkaloid

發表者 有馬：化誌252(昭3)

【續隨子】 學名 Euphorbia Lathyris, L.

成分 Aesucletine $C_9H_6O_4$

發表者 田原：化誌10(明22)藥誌93(明22)

【莨菪】 學名 Hyoscyamus Niger, L. Var. Chinensis, Makino.

成分 Hyoscyamin $C_{17}H_{23}NO_3$ Atropin, Nor-Hyoscyamin $C_{16}H_{21}O_3N$ Nor-Atropin. Scopolamin $C_{17}H_{21}N_4O$

發表者 邦藥58

【蓖麻】 學名 Ricinus Communis, L.

成分 子中含脂肪油，Ricin（毒性）Lipase（脂肪分解酵素）等蛋白質類，及 Roinin(Alkaloid)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

發表者　猪口工化29(大14)　〔其他〕喜多，大角工化26(大12)田中工化15(明15)

【藜蘆】　學名　Veratrum Nigrum, L.

成分　Jervin (Alkaloid) $C_{26}H_{37}NO_3$

發表者　邦藥327

【木藜蘆】　學名　Leucothae Grayana, Miqu.

成分　Grayanstoxin $C_9H_{14}O_2$

發表者　久保東醫21(明40)22(明41)土居日新醫9年11號(大9)　〔其他〕佐佐木(秀)日本公衆保健協會雜誌2(大15)

【烏頭】　學名　Aconitum Fischeri, Reichb.

成分　Japaconitin $C_{34}H_{47}NO_{11}$ (A.B.C.)

發表者　邦藥253

【虎掌天南星】　學名　Arisaemu Heterophyllum, Bl.

成分　Saponin (尙未精查)多量澱粉

發表者　邦藥332

【蒟蒻】　學名　Amorphophallus Konjac, K. Koch.

成分　Konjak-Manvan

發表者　辻暢 Bull. Coll. Agr. Imp. Univ. Tokyo 2 (1894)前田東醫31(大6)

編輯後記

1060／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【半夏】 學名 Pinellia Ternata, Breit.
成分 精油(1)揮發性 Alkaloid.(2)
發表者 (1)中山（匕）藥誌509（大13） (2)八木：第四回藥理學會（昭5） 〔其他〕江馬：中外醫新238號

【蚤休】 學名 Paris Polyphylla. Sm.
成分 Paridin
發表者 F.S.A.I.51

【鳶尾】 學名 Iris Tectorum, Maxim.
成分 脂肪油及配糖體 Tectoridin $C_{22}H_{22}O_{11}$
發表者 柴田（文）藥誌543（昭2） 朝比奈，柴田（文），小川：藥誌561（昭3）

【曼陀羅花】 學名 Datura Alba, Nees.
成分 （子）Scopolanin, Hyoscyamin Atropin 及脂肪油
發表者 長田：藥誌504（大13）

【羊躑躅】 學名 Rhododendron Molle G. Don.
成分 Andromedutxin
發表者 F.S.A.I.14

【莽草】 學名 Illicium Anisatum, L.（？）

1061／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成分　揮發油，樹脂，脂肪油，單寧，糖分。

發表者　藥考

【茵芋】學名　Skimmia Japonica. Th.（？）

成分　Skimmianine Skimmin

發表者　F.S.A.I.27

【石龍芮】學名　Ranunculus Sceleratus, L.

成分　Anemonin

發表者　朝比奈：Acta. Phytoch. 1922 (Not) 朝比奈，藤田：藥誌407(大10)

【蕁麻】學名　Urtica Thunbergiana, Sieb. et. Zucc.

成分　Urticin

發表者　藥邦285

【鉤吻】學名　Rhus Toxicodendron, L. Var. Radicans, M.

成分　樹皮滲出物中含Laccol $C_{23}H_{36}O_2$ 及酸化酵素 Laccase.

發表者　邦藥155

【菟絲子】學名　Cuscuta Chinesis, Lam.

成分　樹脂配糖體等

發表者　佐野：京藥誌28(大6)

編輯後記

1062／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【使君子】學名 Quisqualis Indica, L. Var Villosa, Clarke
成分 脂肪油(1)及少量性狀不明之結晶性物(2)
發表者 (1)於藥誌420(大6) (2)猪子藥誌331(明42) 「其他」鶴田長醫2(大13)

【木鼈子】學名 Momordica Cochinchinensis, Spreng.
成分 脂肪油二種 Saponince 及一種複糖體
發表者 攝陽主人藥誌13(明16)中尾藥誌453(大8)

【番木鼈子】學名 Strychnos Nux-Vomica, L.
成分 Strychuin, Brucin
發表者 下山生藥學363

【梹藤子】學名 Entada Scandens, Benth.
成分 Entadasaponin
發表者 F.S.A.I.31

【牽牛子】學名 Pharbitis Nil, Choisy.
成分 Pharbitin(樹脂配糖體)(3)脂肪油(3)
發表者 (1)朝比奈，寺田藥誌452(大8) (2)朝比奈，清水藥誌479(大11) (3)朝比奈中西藥誌520(大14)

【旋花】學名 Calystegia Sepium, R. Br.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成分　全草中含水溶性物質30.7%葡萄糖17.5%灰分4.3%及Sapmine

發表者　桑田播磨藥誌548(昭2)鶴田實驗消化器病學1(大15)

【營實】學名　Rosa Multiflora, Thumb.

成分　Auercetin, Multiflorin

發表者　安藤京醫9(大1)近藤岩本口羽藥誌565(昭4)

【月季】學名　Rosa Chinesis, Jacq.

成分　精油

發表者　F.S.A.I.34

【栝樓】學名　Trichosanthes Kirilowii, Maxim.

成分　(根)澱粉(子)脂肪油

發表者　津田九藥1(昭2)

【王瓜】學名　Thladiantha Dubia, Runge.

成分　根中含澱粉

發表者　邦藥30

【葛】學名　Pueraria Triloba, Makino

成分　(根)澱粉(葉) Adenin, Asparagin Glutamin Saure, Butter Saure及融點185°C之黃色結晶性物質

編輯後記

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

發表者　佐佐木（林）農化3(昭2)

【百部】　學名　Stemone Japonica, Miq.

成分　全草中含 Stemonin 及融點116°C 一種 Alkaloid.(1)根中有 Hodorin $C_{19}H_{31}O_3N$.(2)

發表者　(1)鈴木（衡）化誌82(明44)鈴木藥誌 352（明44)長井古屋藥誌 162（明29）　(2)古屋藥誌368(大1)　〔其他〕猪子東醫2(明22)

【何首烏】　學名　Polygoonum Multiflorum, Thunb.

成分　四川品之一般成分爲總窒素 1.1％澱粉45.2％脂肪 3.1％ 礦物 4.5％ Lecitein. 3.7％ Oxymethy Lanthrachinon 化合物1,78％水可溶性物總量26.4％

發表者　衣笠辰濃藥誌480(大11)　〔其他〕高木（重）藥誌472(大10)

【白藥子】　學名　Trichosanthes Kirilowii, Maxim(？)

成分　Trichosanthin Pigments

發表者　F.S.A.I.5

【茜草】　學名　Rubia Cardifolia, L.

成分　Purpurin

發表者　近藤藥誌208(明22)

【防己】　學名　Sinomeninum Acutum, Rehd. Et Wil.

成分　Sinomenin, $C_{19}H_{23}NO_4$ Disinomenin, $C_{38}H_{24}N_2O_8$ 及無晶形之 Diversin, $C_{20}H_{27}NO_5$

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

發表者　近藤，落合，中島，藥誌497（大42）　近藤，落合：藥誌503（大13）石割：中外醫事新報955等

【通草】

學名　Sauntonia Chineusis, DC（？）

成分　（子）脂肪油(1)（木部）結晶性配糖體 Akibin（$C_{35}H_{56}O_{20}$(2)）3

發表者　(1)內田：工化19（大5）　(2)有馬，高橋：化誌48(昭2)49(昭3)　〔其他〕石戶谷：鮮藥3（大14）河野：藥誌561(昭3)

【鉤藤】

學名　Uncaria Sinensis, Oliv.

成分　Rhinchophyllin $C_{22}H_{28}N_2O_4$ 或 $C_{21}H_{26}N_2O_4$

發表者　近藤，福田，富田：藥誌554(昭3)赤松，國香：長醫6(昭3)

【忍冬】

學名　Lonicera Japonica, Thunb.

成分　單寧質

發表者　邦藥34

【藤黃】

學名　Garcinia Morella, Desv.

成分　Gambogiasaure, Gummigutthigelb.

發表者　下山：生藥學397

【羊蹄】

學名　Rumex Japonicus, Melsn

成分　Chrysophansaure 及 Frangulaemodin

發表者　村山：藥誌375(大2)村山，板垣：藥誌470(大10)

1066／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【菖蒲】學名 Acorus Gramineus, Soland.

成分 精油(主成分 Asaron $C_{12}H_{16}O_3$)

發表者 木村(雄)藥誌513(大15)

【白菖】學名 Acorus Calamus, L. Var. Angustatus, Bess.

成分 精油

發表者 朝比奈：藥誌295(明30) 朝比奈，今井：藥誌393(大3)

【香蒲蒲黃】學名 Lypha Latifolia, L.

成分 脂肪油及 Iso-Rhammetin $C_{16}H_{12}O_7$ (配糖體)

發表者 Masao Fukuda: Bull Chem. Soc. Jap. 3 (1928)

【金星草】學名 Polypodium Normale, Don. (?)

成分 Cumarin

發表者 鈴木(衡)：藥誌557(昭3)

【石松】學名 Lycopodium Clavatum, D.

成分 脂肪油(鍾子中)(1) Lycopodin $C_{32}H_{52}N_2O_3$ (2)

發表者 (1) A. Langer: Arch. Phrm. 227, 208(1880) (2) K. Bodeker: Ann. 203(1881)

二 藥物產地之實地調查報告

1067／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中藥產地。以四川，廣東，浙江爲大宗。廣東方面之藥品產地。本書記載特詳。四川，浙江二處之產地。今據得之實地調查報告。錄記如下。

甲、四川方面　此項材料，係四川之中國銀行重慶分行所集。記述鑿確。頗不易致。

川藥產量以川芎，當歸，白芍，薑四種爲最多。年達百萬觔以上。

其次爲大黃，半夏，枳殼，天雄，陳皮，黨參，白薑，巴豆，羌活，白芷，杜仲，澤瀉，麥冬，黃芪，紅梅，使君子，谷芽，木香，鬱金，枳實，丹參等二十一種。年產十萬觔以上。

其次爲貝母，牛膝，甘松，鹿角，天麻，鮮石斛，天門冬，川楝子，秦艽，故紙，赤芍，黃柏，橘絡，吳茱，黃連，常山，薄荷，五加皮等十八種。年產萬觔以上。

再次爲冬蟲夏草，豬苓，雷丸，牙皂，通草，南星，佛手片，川烏，菊花，厚樸，龍骨，豹骨，九香蟲，紅花，參葉等十五種。年產在千觔以上。

再次爲茅慈姑，蟬花二種。年產百觔以上。

再次僅麝香一種。爲十觔以上。

每年出口總值。共達三四百萬之鉅。

重慶中國銀行之調查。精切邀恆。其有利於治藥學者殊鉅。各藥花名等級產地並錄於此。

【大黃】　產階州，文縣，南坪，岷州，泰州，葉塘等。有刁支混莊，伏頭，通底，頂底，刁王，統獨，枯枝，服子，歸尾等花名。以泰州所產皮微紅，紋細，苗小，味麻而甜者爲最佳。

【川芎】　產灌縣，石羊場。分貢芎，芎王，統芎，撫芎四種等級。

1068／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【羌活】產中壩，灌縣。分特羌，羌王，附羌三級。以羌心如菊花色黃有香味者爲佳。

【白芷】產遂寧，崇慶，渠河。以根條不壯皮紅內黃爲最劣。根條粗壯內外色白者爲最優。

【附子】產中壩河東與河西。分鹽附子，泥附子兩種。銅皮黃色者爲優。

【半夏】產渠縣，營山，令川，遂寧，敍府。分蛋夏，貢夏，棟夏，揀夏四等。以身乾色白子大圓熟者爲佳。

【澤瀉】產灌縣石羊場。以個頭大身乾色白無枯坑者爲佳。

【牛膝】產雅安，天全。以根粗如指者爲優。

【黃連】產雅安，石柱，雲南。分雅連，毛連，刁支連，味連四級。以根條粗短者爲佳。

【貝母】產松潘，雅安。分眞松貝，沖松貝，熟貝，黃貝，提貝，干貝，等數級。以羅漢肚狀平頂閉口者最佳。

【鬱金】產崇慶，灌縣，敍府。分出號，頭號，二號，魁貢，頂貢五級。以子粒圓熟內色黃形如麻雀卵者爲最佳。

【吳萸】產綏定，敍府，貴州。以子粒大開口無枝幹者爲最佳。

【巴豆】產納溪，合川，分巴豆，巴米兩種。以納溪產子粒大滿倉者最佳。

【枳實】產江津，綦江。分鵝眼枳實，片枳實，鎗枳實三級。以身乾色黃子粒與片子均細者爲最佳。

【川楝子】產合川，寧渡河。以身乾色黃個頭大者爲最佳。

【杜仲】產貴州，秦州，中壩，巴中。分厚仲，行仲二級。以身乾皮張寬大者爲最佳。

【黃柏】產嘉定。以身乾色黃塊大身厚者爲最佳。

【厚樸】產宣漢。分靴兜子，萬卷書，羊耳三級。以皮張厚有油氣，味帶辛辣者爲最佳。

【通草】各地皆產。以色白身乾者爲最佳。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【紅花】　產蓬溪。分片紅花大市紅花兩級。以色氣鮮紅花鬚長而淨者爲最佳。

【麝香】　產西康及四川邊境。以有原皮內色黃氣味香而長具有「黑豆瓣」者爲最佳。（未散之香形如黑豆瓣故名。）

乙、浙江方面　此項材料。係由國民政府實業部所編中國實業誌稿所錄出。據云。浙省所產藥材極多。最著者如貝母，麥冬，白朮。貝母種植面積達六千畝。產量達八千數百擔。值價達五十萬元。麥冬面積達萬畝。產量達二萬擔。價值達一百二十萬元。白朮面積凡三萬五千五百餘畝。產量達七萬一千餘擔。價值達一百三十三萬餘元。他如玄胡，茯苓，芍藥，冬桑葉，桑椹，桃仁，枇杷葉，萊菔子，冬瓜子，白芥子，荆芥，夏枯草，蘇根，苦參子，牛蒡子，百莽子，黃麻子，澤蘭，玄參，地黃，薄荷，決明，千金子，白芷等。多所在皆有。

浙江貝母。即統稱象貝。較川省之貝母爲大。產於象山縣。筧橋，鄞縣亦有。以漳村，大雷二處爲最多。

貝母爲草本植物。秋種夏收。幹高尺餘。分作二枝。葉對生。花白色。普通每株結實二枚。多則三枚。以元寶貝爲佳。

白朮產於新昌爲最多。他如溫嶺，仙居，東陽，永康，遂昌，於潛，各有出產。以於潛爲最佳。

麥冬產於杭州之筧橋及餘姚二處爲最多。

元參以筧橋爲最有名。喬司及艮山門外亦佳。

地黃，決明，白芷，荆芥均以筧橋爲名產。

三　本書內專門名詞之解釋

中國藥物學中。有常用之專門名辭甚多。每非通常學者所習知。茲分釋其意義如後。以備檢閱此書者之參考。

1070／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【咬咀】 嚼也。古人於藥物。無刀剉法。但以口嚼細。近世用咬咀二字。可作爲以藥切成飲片解。

【君】 方劑中之主要藥。如治寒病則熱藥爲君。治熱病則寒藥爲君。

【臣】 方劑中之輔助藥。因主要藥之力量尙有不足。故加他藥以輔助之。

【佐】 方劑中之監制藥。如寒病治以熱藥。而恐熱藥過甚之爲害也。則少用寒涼藥以監制之。

【使】 方劑中之引導藥。臟腑經絡各有引導專品。能使藥與病相遇而奏效易著。

【方寸匕】 古方中量名。其匕正方抄散藥末以不落一寸爲度。其容量猶今之一茶匙也。

【字】 古方中權名。古以銅錢抄藥末。依世相沿稱一銅錢所抄藥末之量。曰一錢。錢面共有四字。故又稱一錢之四分之一曰一字。二字則五分也。

【陰陽水】 生水與熱水相和也。又井水與河水相和亦稱陰陽水。

【文武火】 文火卽火力之緩而慢者。武火卽火力之猛而烈者。

【製】 裁製藥性之偏者猛者。使之就於範圍也。

【等分】 謂諸藥分量相同也。

【刀圭】 卽十分方寸匕之一。

【泡】 水製法之一。暫置藥品於水中。以解其烈性也。

【炒】 置藥物於火下使之黃而不焦。以祛其寒性也。

【炮】 置藥物於火上。以烟起爲度。

四 古方權量之考證

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

關於古方引用權量。均係古制。與今時全不相同。大抵古之一兩。約當今三錢。古之一七。約當今二錢四分。今爲檢閱者參考起見。特將章太炎先生所作古方權量考附錄於次。（以下均太炎先生稿。）

古權衡之難定者。在其自有盈朒。宋世如歐陽永叔沈存中諸公。各以古器與今之權量比勘。亦種種不同。夫謂一兩當今之三錢者。此惟王莽貨泉爲然。據志貨泉重五銖。今平得貨泉十枚重六錢三分五釐。則一銖當今一分二釐七毫二十四銖爲成兩。當今三錢另四釐八毫也。若漢五銖錢以今稱平之。一枚適重八分。十三枚則重一兩另四分。以唐開通元寶十枚互平略相當。（沈冠雲云開通元寶十枚重一兩另三分。比今之所平得者正同。然則今之一錢。不逮開通元寶一枚也。）是一銖當今一分六釐二十四銖當今三錢八分四釐也。五銖錢存者最多。除梁女錢隋鐵錢易辨外。以五字交服漢錢而其重悉如此。殆可以爲定法矣。昔人謂十六五銖錢當十開通元寶錢。實不然也。又上考武帝三銖。以三枚平之。重一錢八分八釐。是一銖當今二分另八八八不盡。又考王莽貨布。貨布重二十五銖。今以二枚平之。重九錢二分。是一銖當今一分八釐四毫。且三國晉宋權衡未改於漢也。今以宋四銖四枚平之。重二錢七分。是一銖當今一分六釐八毫七秒五忽。雖非能斠如畫一。然一銖之重。未有在一分六釐以下者。更以黃金驗之。漢志稱太公作九府圜法。黃金方寸重一斤。劉徽九章注亦有是說。而清康熙雍正兩朝所核黃金重量。積營造尺一立方寸重十六兩八錢。則欲求權衡之差。又當先知尺度之差矣。漢尺在者。有建初銅尺。孔尚謂當今量地官尺六寸六分。所謂量地官尺者。未知即營造尺否也。今以莽大泉比營造尺一枚。得七分九釐。積十枚得七寸九分。據漢志稱大泉徑一寸二分。是漢一寸。當今六分五釐八毫三秒三忽。不盡也。然劉歆尺即晉前尺所本。據宋王厚之所舉者。晉前尺實得營造尺六寸九分。現積十大泉者爲長。莽泉在者。貨布最爲完好。漢志稱貨布廣一寸。今以營造尺度之得七分一釐。然則王厚之所圖者。與貨布尺相近矣。與大泉尺相遠。以大泉寸法自乘再乘。得今二百八十五分所積黃金

1072／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

重。今平四兩七錢八分八釐。卽漢時十六兩。是漢一兩當今二錢九分九釐二毫半也。以貨布寸法自乘再乘。得今三百五十七分九百十一釐。所積黃金當重今平六兩另一分二釐九毫強。卽漢時十六兩是漢一兩當今三錢五釐八毫有奇。以大泉寸法計一銖之重略與貨泉相當。以貨布寸法計一銖之重略與漢五銖相當。則漢代權衡本有出入。然爲孔氏同度記謂漢一兩祇當今二錢五分有奇。則歷驗未有其徵也。（徐氏謂漢一兩當今二錢更謬。）

漢量在者。淸宮有王莽銅斛。然宋時范鎭已不見是器。蓋依著隋志仿造者爾。若依大泉寸法。漢時立方一寸。當今三百五十七分九百十一釐。一斗積一百六十二立方寸。當今五十七寸九百八十一分四百九十二釐。以淸康熙斗法三百二十立方寸除之。得一升四合四勺強。以淸雍正斗法三百十六立方寸以除。得一升四合六勺強。若依貨布寸法。漢時立方一寸。當今三百五十七分九百十一釐。一斗積一百六十二立方寸。當今五十七寸九百八十一分四百九十二釐。以淸康熙斗法三百二十立方寸除之。得一升八合一勺強。以淸雍正斗法三百十六方寸除之。得一升八合三勺強。二者相差。如徐氏所稱古一斗當今二升者。則於貨布寸法爲近。（周禮中年人食三釡。謂一月之食也。依古一寸。今一升八合。一日得粟一升一合五勺。粟率五十。粺米二十七。則爲米六合二勺也。若依一升四合六勺計。則太少矣。）藥物重輕。礦植旣異。植物之根莖葉實。復有不同。漢時散藥一錢匕者。謂以五銖錢鈔之不落爲度。然則積藥旣厚。無過三倍於錢爾。而植物與銅重量殊絕。木中重者。無爲烏木紫檀。視銅祇六分之一。其餘或十五分之一矣。以之作散重者亦輕。大抵草木散藥。積與五銖錢等。其重無過十分之一。積五銖銅三倍其重。無過十分之三。今據五銖銅重八分之三。則二錢四分以十除之得二分四釐。是草木散藥一錢匕之重也。石質重於草木。然以玉較銅。若一與二六比。麤碎作散。化堅爲壞。其重當減三方之一。以較銅若一與三九比。然則石藥作散體積三倍五銖錢者。得重六分一釐五毫也。金質又重於石。以黑鉛較銅。若三與三比。以水銀較銅若九與五比。丹砂輕於水銀。亦與鉛相等。麤碎作散。其重當減三分之一。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

是故鉛丹丹砂積與五銖錢等。其重亦等。若三倍錢積而成一七。則得二錢四分也。

五　近世權度之折合

向來國醫開方藥鋪配藥所用權度。悉依營造尺庫平制。近自民國十八年公布中華民國度量衡法。另定一種市用制以來。嚴厲推行。全國幾完成劃一。藥鋪已廢除營造尺庫平制。而改用市用制。惟市用制之斤兩較庫平爲輕。不及庫平八四折。而市用制之升亦較營造尺制之升爲小。不及舊升九七折。此後如國醫仍照舊制開方。而藥鋪乃依新制配藥。在輕病已覺見效稍緩。在重病必致貽誤不淺。與病家極有關係。茲將新舊制之分量比較如下。

（一）新舊制重量比較表

重量	庫平合市秤	市秤合庫平
一釐	一釐一毫九絲	八毫三絲八忽
五釐	五釐九毫七絲	四釐一毫九絲
一分	一分一釐九毫	八釐三毫八絲
二分	二分三釐九毫	一分六釐八毫
三分	三分五釐八毫	二分五釐一毫
四分	四分七釐七毫	三分三釐五毫
五分	五分九釐七毫	四分一毫九毫
一錢	一錢一分九釐	八分三釐八毫
一錢五分	一錢七分九釐	一錢二分六釐
二錢	二錢三分九釐	一錢六分八釐

編輯後記

1074／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

二錢五分	二錢九分八釐	二錢零九釐
三　錢	三錢五分八釐	二錢五分一釐
三錢五分	四錢一分八釐	二錢九分三釐
四　錢	四錢七分七釐	三錢三分五釐
五　錢	五錢九分七釐	四錢一分九釐
一　兩	一兩一錢九分	八錢三分八釐
二　兩	二兩三錢九分	一兩六錢八分
三　兩	三兩五錢八分	二兩五錢一分
四　兩	四兩七錢七分	三兩三錢五分
五　兩	五兩九錢七分	四兩一錢九分
一　斤	一九兩零九分	一三兩四錢

(二)新舊制容量比較表

容量	舊制合市用制	市用制合舊制
一勺	一勺〇・三六撮	九・六六撮
一合	一合零三・六撮	九勺六・六撮
一升	一升零三勺六撮	九合六勺六撮

例如方書某藥用一錢五分即知合市秤一錢七分九釐。又如依市秤某藥用二錢五分。即知僅合舊制庫平二錢另九釐。

★縮名索引

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

慶醫——慶應醫學　　臨床——臨床醫學
東醫——東京醫學會雜誌　　京醫——京都醫學雜誌
邦醫——邦產藥用植物　　化誌——日本化學會誌
臺醫——臺灣醫學會雜誌　　日新——日新醫學
千醫——千葉醫學會雜誌　　工化——工業化學會誌
醫海——醫海時報　　滿醫——滿洲醫學雜誌
植研——植物研究雜誌　　岡醫——岡山醫學會雜誌
國本——國譯本草綱目　　藥考——和漢藥考
長醫——長崎醫學會誌　　農化——農藝化學雜誌
朝鮮——朝鮮醫學會雜誌(鮮醫同)
藥誌——藥學雜誌(學藝雜錄皆本誌附錄)
朝試——朝鮮總督府中央試驗所報告
臺研——臺灣總督府中央研究所報告
富藥誌——富山藥專校友會雜誌
衛試彙——衛生試驗所彙報
京藥誌——京都藥學校藥窗誌
東北醫——東北醫學會報
中外醫新——中外醫事新報
微生物誌——日本微生學會雜誌
日本藥物——日本藥物學雜誌
Acta. Phy.　　Acta Phytochimica(Tokyo)

編輯後記

1076／1110　　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

A.T.P.	American Journal of Pharmacy.
Ann.	Anualen der Chemie(Liebig's)
Arch. Pharm.	Archiv der Pharmacie.
Ber.	Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft.
Berlin. Klin Woch.	Berliner Klinische Wochenschrift.
B.P.C.	British Pharmaceutical Codex, London.
Chem. Ztg.	Chemiker zeitung.
Chinese Gour. Phy.	Chinese Journal of Physiology (Peking)
F.S.A.I.	Flora Sinensis. Series A. volume I.
I.M.P.	Indian Medicinal Planto.
J. Dephar	Journal le Pharmacie et de Chimie(Paris)
J. Chem. Soc.	Journal of Chemical Society of London.
J. Exp. Pharm.	Journal of Experimental Pharmacology and Therapentis.
Med. Woche.	Medicinische Wochenschrift
Pharm. Cetral.	Pharmaceutische Centralhalle.
Rec.	Recueil des Travaux Chimique des Pays-bas.
U.S.D.	United States Dispensatory.

出版年號：(爲便於購買及查閱用日本原來年號不改西曆。)

明卽明治——四十年止

大卽大正——元年(民國元年)

昭卽昭和——二年(民國十六年)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

檢圖索引

本圖影有彩色版與照相版兩種。故所列頁碼。前後參差。惟均注明於每一藥名之下。俾檢查者得以前後對照。

二畫

丁香 一七七・一八三
人中白 二四七
人中黃 二四七
人參 一四・一五・一六・三七・三八・三九・四〇
刀豆 一四三・一四七
十姊妹 一四一

三畫

三七 一八・四一
三稜 五四
千年紅 一一四
千年健 一一四
千里光 一一四
土茯苓 一一四・一二六
土茜草 一二六
大青葉 七三
大胡麻 一四二
大麻 一四二
大麻仁 一四七
大麥 一四二・一四七
大戟 一〇一・一〇九
大黃 一〇一・一〇九
大腹皮 一六九
大蒜 一五〇
大薊 七三
女貞子 二〇九
小茴香 一五〇・一五六
小蒜 一五〇
小麥 一四二・一四七
小薊 七三
山豆根 一二六
山柰 五四
山查 一六三
山茶花 二〇一
山梔子 二〇一・二〇九
山慈菇 一八・四一
山藥 一五一・一五六
山蘭蹋 一〇七
川芎 五四・六六
川椒 一七二・一七三
川楝皮 二〇二

四畫

丹參 三一・四九
五加皮 二〇三
五味子 一一五・一二六
五倍子 二一九
五靈脂 二三三
六月霜 九〇
升麻 一九・四二
天仙藤 一二六
天竹黃 二一八
天門冬 一一四・一一五・一二七
天花粉 一二〇・一三〇
天南星 一〇二・一〇九
天麻 一八・四一
天雄 一〇二
天漿殼 一六二
太子參 一六
孔雀 二三五
巴豆 一八八
巴戟天 一九・四一
文蛤 二二八
木瓜 一六三・二〇九

1078／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

木香 五五・六六
木通 一一六
木犀 一七七
木賊草 七三・九〇
木綿子 二〇九
木蝴蝶 二一七・二一八
木蘭 一八三
木鼈子 一二七
水蛭 二一九・二二二
水銀 一〇
水獺肝 二四〇
牛蒡子 七四・九〇
牛膝 七四・九〇
王不留行子 九〇

五畫

仙人掌 一三九
仙茅 二四
仙鶴草 七五・九一

代代花 二〇三
代赭石 五・一〇
冬瓜子 一五一・一五七
冬瓜皮 一五一
冬青 二〇九
冬蟲夏草 二四
北沙參 二六
半夏 一〇二
半夏麴 一四四
功勞子 二〇二・二一〇
功勞葉 二〇二・二一〇
巨勝子 一四七
平地木 二一〇
玄參 二六・四五
玄精石 一三
玉竹 二五・四四
瓦松 一三九
瓦楞子 二二八

甘松香 六七
甘枸杞 二一〇
甘草 二五・四四
甘遂 一〇三
生地 七五
生苡仁 一四八
白丁香 二三三・二三五
白及 二二・四三
白木耳 一五六
白朮 二〇・二一・四二
白石英 一・三
白芍藥 五八
白芷 五六・六七
白芥子 一五七
白果 一六三
白花蛇 二二五
白前 二三
白茅根 二三・四三

白疾藜 八六
白槿花 二一〇
白頭翁 二四・四三
白薇 二二・四三
白鮮 二三・四四
白殭蠶 二二〇
白藥子 一二八
白蘇 六四・七二
白蘞 一一六・一二七
白蠟 二二二
石木耳 一五六
石灰 四
石決明 二二八・二三二
石柱參 四五
石南葉 二一一
石斛 一三七
石硫黃 八
石菖蒲 一三四・一三六

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石葦 一三九
石蒜 四四
石榴 一六二
石榴皮 一六四
石榴花 一六八
石燕 四
石蟹 四・一〇
石鹹 二四七
石鐘乳 八・一三

六畫

伏龍肝 二四六
全蝎 二一九・二二二
合歡皮 一八九・一九六
地栗 一七四
地骨皮 二〇五・二一一
地榆 二五・四五
地膚 七六
地錢 五七
地髓 一五三
安息香 一八三
戎鹽 九
百部 一一七
百藥煎 二一九
羊 二四〇
羊躑躅 一〇七・一〇九
老鸛草 一四一
肉豆蔻 五六
肉果 六七
肉桂 一七八・一八四
肉蓯蓉 二六・四六
自然銅 一・三
血竭 一八三
血餘 二四五
西瓜 一七四
西河柳 一八九・一九六
西洋參 一七・四〇

七畫

何首烏 一一七・一二八
佛手 一六四
佛耳草 九二
吳茱萸 一七二
呂宋果 一八八
延胡索 四六
忍冬藤 一一九・一二八
早蓮草 七七
杏仁 一六〇
杜仲 一九〇・一九六
沉香 一四四・一七九・一八三・一八四
沒石子 一八八
沒藥 一七七
沙參 二六・二七・四六
牡丹皮 五七・六八
牡蠣 二二九・二三二
豆蔻 五六
豆蔻花 五六・六七
貝母 二八
貝齒 二二九
赤小豆 一四三
赤芍藥 五七・五八・六八
車前草 七七・九二
辛夷 一七七・一八四
防己 一一八・一二八
防風 二七・四六

八畫

乳香 一七七
佩蘭 五八・六九
使君子 一一八
兔 二三九・二四〇

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

刺猬皮 二三七・二四〇
卷柏 一三八・一四〇
夜交藤 一一七・一二八
夜明砂 二三三
昆布 一三四
明黨參 一七・四一
松針 一七九・一八五
板藍根 七八
枇杷 一六八
枇杷葉 一六五
河白草 一三〇
狗牙半支蓮 一四一
狗脊 二八・四六
玫瑰花 二〇四
知母 二八
羌活 三五・五二
芙蓉 二一一
芙蓉花 二〇四

芥 一五二
芫花 一〇六
芭蕉 九二
花蕊石 四
虎 二四〇・二四一
金牛草 四七
金柑 一六五
金鈎子 一九七
金雀花 二〇六
金絲草 四七
金鈴子 一九二
金銀花 一一九・一二八
金精石 六・一一
金鎖匙 二九・四七
金錢白花蛇 二二六
金櫻子 二〇五・二一一
阿膠 二三七
阿魏 一八〇

附子 一〇三
青木香 五五・六六
青皮 一六四
青果 一七〇
青娘子 二二二
青葙子 一七八・九三
青蒿 七八
青礞石 五
九畫
前胡 三〇・四七
南天燭 二〇七
南燭子 二一一
南瓜蒂 一五二
南沙參 二七
厚樸 一九〇・一九一・一九七
威靈仙 一一九・一三〇
孩兒茶 二四六
紅花 七九

紅花子 九三
紅娘子 二二二
枳椇子 一六九
枳殼 二〇七
柿子 一六六
枸杞 二〇五
枸骨 二一二
枸橘 二一二
柴胡 二九・三〇・四七
炮薑 一五五・一五九
玳瑁 二三一・二三二
珊瑚 二一・三
珍珠母 二三二
砂仁 五九・六九
砒石 五・一一
禹餘糧 六
秋葵子 七九・九三
穿山甲 二二五

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

胖大海 一七〇
胡桐淚 一八六
胡荽子 一五七
胡椒 一六九・一七二
胡黃連 三四・五一
苡仁 一四三
苦參 三〇・四八
苧麻 八〇
茄子 一五二・一五七
茅朮 二一・四一
茅針花 二三・四三
茉莉花 六九
虻蟲 二二二
郁李仁 二〇五・二一二
降香 一八六
韭菜子 一五七
風茄葉 一〇六
風茄花 一〇六・一一三

香附 五九・六九・七〇
香樟木 一八〇・一八五
香薷 六〇
香橼 一六五
香橼皮 一六五・一六八

十畫

夏枯草 九三
射干 一〇三・一一一
栗 一六〇
栝蔞 一二〇・一三〇
桂枝 一八一・一八六
桃仁 一六〇
桃樹 一六二
桑枝 二〇六・二一二
桑寄生 二一四・二一六
桑葉 二〇六
桑螵蛸 二一四・二二二
桔梗 三一・四八

浮海石 六・一一
海金沙 八一・九四
海狗腎 二四一
海桐 一九七
海馬 二二六
海龍 二二六
海藻 一三五
烏桕 一九二
烏梢蛇 二二六
烏頭 一〇四・一一〇
烏藥 一八二
狼毒 一〇四・一〇九・一一〇
珠兒參 一六
益母草 八〇
益智仁 六一・七〇
神麴 一四四
秦皮 一九七
秦艽 三一・四九

秫米 一四三・一四七
粉萆薢 一三一
臭梧桐 一九二・一九八
臭蕪夷 一九八
荔枝草 一七〇
茜草 一二一・一三一
菱白子 一三六
茯苓 二一六・二一四
茯神 二一五
茴香 一五〇
茵蔯 八一・九四
莞蔚子 八〇
荊芥 六〇
草決明 九四
草河車 一〇五・一一〇
草果 五九
草烏 一一〇
馬勃 一三八・一四〇

1082／1110 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

寒水石 八・一三
斑蝥 二一九・二二二・二二三
款冬 八四
無名異 一二
無花果 一九八
猴棗 一二
琥珀 二一七
番木鼈 一二三・一三二
番瀉葉 一一二
絲瓜子 一五八
絲瓜絡 一五三
菊 八四・八五・九七
菝葜 一三二
菟絲子 一二三・一三二
萹蓄草 九七
蓽撥 一二三
萊菔子 一五三・一五八
蛤蚧 二二六

訶子 一九三・一九九
象皮 二四四
雁來紅 九八
雄黃 七・一二
雲母石 二・三
雲實子 一一二
黃芩 三三・五一
黃連 三四・五一
黃耆 三一・三三・五〇
黃魚膠 二二七
黃精 三四・五一
黃藥子 一三三
黃蘗 一九四
黑大豆 一四五
黑芝麻 一四二

十三畫

棬榴 一九四・一九九
椿樗皮 一九三・一九九

楓實 一八七
楮實子 二〇八・二一三
滑石 七・一二
煙草 一一〇
煙膠 二四五
當歸 六二・七一
萬年青 八五
萱草 九八
蒿蓄 八六
葛根 一二四・一三三
葡萄 一七三
葱白 一五〇
葶藶子 九八
蜀葵 九九
蜂房 二二四
補骨脂 六一
雌黃 七
雷丸 二一七・二一八

預知子 一三三
鼠屎 二四四
鼠婦 二二三

十四畫

墓頭回 一四一
榕樹根 一九九
樫子 一七一
槐 二〇〇
槐角炭 一九五
漏蘆 八七・九九
熊膽 二四五
瑪瑙 二
綠毛橘紅 一六九
綠豆 一四五
綠豆衣 一四五・一四八
蒲公英 一五四・一五九
蒲黃 一三四・一三六
蓴萍草 一三六

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蓖麻子 一〇八・一一二
蒼朮 二二・四二
蒼耳子 八六・九九
蜘蛛 二二三
蜣螂 二二三
豨薟草 八七
輕粉 一三
遠志 三六・五二
酸棗仁 二〇七
銀杏 一六八
銅綠 一・三
鳳仙花 一〇七・一一三
鳳尾金星草 一四一

十五畫

劉寄奴 八八
廣木香 五五・六六
廣膠 二四四
樟腦 一八〇・一八五

潼蒺藜 八六
熟地 七五
磁石 一二
稻根鬚 一四四
穀芽 一四四
穀精草 八八・九九
翦草 一三二
蓬砂 九・一三
蓬莪朮 六三・七一
蓮子 一七五
蓮芯 一七三・一七五
蓮房 一七五
蓮鬚 一七五
蓽撥 六一・七一
醉魚草 一一三

十六畫

壁錢幕 二二三
獨活 三五・五二

樸樕 二〇〇
樺木皮 二〇〇
橘子 一六六
橘白 一六六
橘紅 一六七
橘核 一六九
澤漆 二〇六
澤瀉 一三五
澤蘭 五八
燈芯草 九九・一〇〇
燕窩 二三四・二三六
蕎麥 一四二・一四八
蘘荷 一五四
薤仁 二〇七
豬苓 二一五・二一七
龍骨 二二七
龍涎香 二二七
龍齒 二二七

龍膽草 三六・五三
龍鬚草 一〇〇
龜板 二三〇・二三二

十七畫

薇 一五三
薄荷 六四・七一
薑皮 一五五
薔薇 二〇八・二一三
薤白頭 一五九
螺螄 二三二
螻蛄 二二三
蟋蟀 二二四
藁茸 二四五

十八畫

檳榔 一七一
瞿麥 一〇〇
翻白草 一五九

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蕎苋 五三

蕎菜花 一五五・一五九

蓁本 六三・七二

蟬蛻 二三一

覆盆子 一二五・一三三

雞內金 二三四

雞血藤 一二五

雞冠花 八九

銷陽 三六・五三

鵝 二三五

十九畫

藕節 一七六

藜蘆 一〇八・一一三

蟾蜍 二二一・二二四

二十畫

穭豆 一四五・一四八

罌粟 一四六・一四九

藿香 六五・七二

蘄蛇 二二七

蘆根 一〇〇

蘆荟 一八二

蘇 六四・六五

蘇方木 一九五・二〇〇

蟭蟧 二二四

二十一畫

櫻桃 一六七

續斷 八九

蠟梅花 二〇八・二一三

鶴 二三五

鶴虱 八九・一〇〇

麝香 二三九

二十二畫

蠹蟲 二二一・二二四

二十四畫

蠶豆 一四五

蠶豆花 一四九

鷺鷥 二三五

鼈甲 二三一・二三二

二十六畫

驢皮 二四五

二十九畫

鸞金 六五

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本書參攷書目

周秦兩漢

神農本草經三卷
蔡邕本草七卷

南北朝

神農本草五卷
神農本草屬物二卷
神農明堂圖一卷
名醫別錄七卷　陶弘景
陶隱居本草十卷
隋貲本草九卷　秦承祖
本草六卷
本草經三卷　王季瑛
本草病源合藥要鈔五卷　徐叔響
四家體療雜病本草要鈔十卷　仝上
小兒用藥本草　王末鈔
癰疽耳眼本草要鈔
本草集註七卷　陶弘景
本草經　趙賛
本草經細行本草經利用各一卷　趙賛
新集藥錄四卷　徐泊

藥草錄六卷
藥法四十二卷
藥性藥對各一卷　徐之才
神農採藥經二卷　雷敩
藥忌一卷
雷公藥對二卷
雷公泡炙論三卷

隋

本草二卷　徐大山
本草經類用三卷　姚昺
本草集錄二卷　甘濬之
本草雜要訣無攷　甘濬之
本草錄藥性三卷　原平仲
芝草圖一卷
入林採藥法二卷
太常採藥時月一卷
四時採及合月錄四卷
藥錄二卷　李寧
諸藥異名八卷　行矩
諸藥要性二卷
種植藥法一卷

1088／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

唐

唐本草（卽唐新修本草又名英公本草）五十三卷李勣大尉趙國公長孫無忌及蘇恭等二十三人
新修本草圖經四十卷　蘇恭
新本草四十卷　王方慶
蜀本草二十卷　韓保昇等
本草拾遺十卷　陳藏器
藥性本草（又名藥性論）四卷　甄權
本草性事類一卷　杜善方
南海藥譜（卽南海本草）六卷
溯本草七卷　鄭虔
藥錄纂要（載千金翼）　孫思邈
千金食治　孫思邈
食療本草三卷　孟詵
食性本草十卷　陳士良
本草音義廿卷（一作二卷）　李含光等
本草音義七卷　甄立言
四聲本草五卷　蕭炳
刪繁本草五卷　楊損之
海藥本草　李珣
本草經方　劉禹錫

宋

開寶新詳定本草廿卷　馬志
嘉祐補註本草廿卷　掌禹錫等
開寶重定新本草……（簡稱開寶本草廿一卷）　劉翰馬志等
經史證補備急本草（簡稱證類本草）三十二卷　唐愼微
嘉祐圖經本草廿卷　蘇頌
大觀本草二十卷　孫奎賢
政和新修經史證類本草（簡稱政和本草）　曹孝忠
重廣補註神農本草及圖經廿三卷　陳承
本草衍義二十卷　寇宗奭
日華諸家本草二十卷　日華子大明序
本草括要詩三卷　張文懿
證類本草單方三十五卷　王誤
本草外類五卷　鄭辨
本草辨誤一卷　崔源
本草會編　靳起蛟
本草補遺　龐安時

金元

珍珠囊一卷　張元素
潔古本草二卷　張元素
重修大觀本草三十二卷　張存惠
用藥法象一卷　李杲
珍珠囊指掌補遺藥性賦四卷　李杲
東垣藥性賦　李杲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本草衍義補遺　朱丹溪
湯液本草　王好古（海藏）
本草證類　沈好問
療癰疽耳眼本草要鈔　王好古
本草歌括　胡仕可
日用本草八卷　吳瑞

明

本草經疏三十卷　繆希雍
本草品彙精要　內府孤本朱啓鈐藏
本草綱目五十二卷　李時珍
本草乘雅半偈十卷　盧之頤
本草逆三十二卷　劉若金
本草發揮三卷　徐彥純
丹溪藥要一卷　趙良仁
本草集要八卷　王綸
庚辛玉册　龐仙著
本草彙箋二十卷　陳嘉謨
本草會編二十卷　汪機
救荒本草四卷　周憲王
食物本草二卷　王穎
食鑑本草　寧原
本草證治辨明一卷　徐彪
本草單方八卷　王履

本草單方八卷
本草單方八卷
本草古方講意
藥性準繩一卷
藥性對答一卷
藥性標本十卷
藥性賦補遺一卷
藥性辨疑一卷
藥品徵要
藥鏡四卷
本草發明纂要
本草彙言
本草輯要
本草類方
本草性能
方藥宜忌攷十卷
本草鈔一卷

清

校正神農本草三卷
本草崇原三卷
神農本草經讀三卷
本草三家註四册
本草經疏輯要十卷

繆希雍
李時珍
羅良
賀岳
翟良
吳文獻
熊宗立
姚能
姚澹
蔣儀
劉默
倪朱謨
邢增捷
黃良佑
王宏翰
繆希雍
方有執

孫星衍
張隱庵志聰等
陳念祖
葉天士等
吳世鎧

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本經疏證十二卷　鄒澍
本草綱目拾遺十八卷　趙學敏
藥性元解（利濟十二種之一）四卷　趙學敏
奇藥備攷（利濟十二種之一）六卷　趙學敏
本草話（利濟十二種之一）三十卷　年希堯
本草類方十卷　蔡烈先
本草萬方鍼線八卷　張璐（石頑）
本經逢原（在張氏醫通中）四卷　汪昂
本草備要四卷　吳儀洛
本草從新十八卷　徐大椿
神農本經百種錄一卷　李正宇
本草原始十二卷　黃鉦
本草便讀一卷　李中梓
本草通元二卷　黃宮繡
本草主治二卷　黃宮繡
本草求眞十卷　王子接
得宜本草一卷　葉志詵
本草經贊一卷　余霖高
藥性賦音釋一卷　尤乘
藥品辨義三卷　陳澈
藥證忌宜一卷　唐容川
本草問答二卷　沈芊綠
要藥分劑十卷
花藥小名錄

百草鏡　仲卽庭
本草崇原集說三卷　貴桂生
本草會通　顧金壽
本草必用　黃元御
長沙藥解四卷　郭章宜
玉楸藥解八卷　黃宮繡
本草匯十八卷　葉天士
本草綱目求眞十二卷　何克諫
本草經解　楊時泰
食物本草備考二卷
本草詩箋四冊
本草述鉤元十二冊　王士雄
本草分經審治一冊　李東垣
隨息居飲食譜二冊　李東垣註雷公藥性賦二冊
李東垣註雷公藥性賦二冊　唐秉鈞
重刻人參攷一冊
光論人參攷（靈鶼閣叢書中）一冊　李中梓
本草圖解三冊　編者失名
本草衍語（三三醫書中）一冊　吳其濬
植物名實圖攷一巨冊　龍方毅
本草纂要　陳士鐸
本草新編　陳葆善
本草時義一冊

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

民國

規定藥品之商榷二册　曹炳章
僞藥條辨四卷　鄭肖岩　曹炳章
中華藥學源流考（紹興醫藥學報）　曹炳章
中國藥物學史綱一册　何梅霜
藥物學講義二册　秦伯未
中國醫學史一册　陳賢邦
本草正義七册　張山雷
新中藥一册　黃勞逸
英譯本草綱目藥學植物第一卷　英人伊博思
藥物出產辨一册　華人劉汝强
中國醫學大辭典二册　陳任枚
中國藥物新辭典一册　謝利恒
中華藥典一册　江忍庵
中藥大辭典一册　衞生署
中國藥物學一册　趙公尙
中外藥名對照表一册　季愛人
方藥攷論類編一册　萬鈞
中國醫藥問題一册　張贊臣
藥飲啓秘一册　王一仁
中國實用藥物學一册　許半龍
製藥指南（又名國醫製藥學）一册　趙賢齊
藥物游記錄一册　張仲岩
衷中參西錄（第四期藥學）一册　李春芝
草藥圖考四卷　張錫純
中國藥物形態學一册　裘吉生
藥物名彙一册　沈嘉徵
中國植物圖譜二册　華鴻
藥性提要一册　中英對照
家庭新本草一册　秦伯未
化學實驗新本草一册　丁福保
本草思辨錄四册　丁福保
新本草教本一册　周伯度
辨藥指南一册　顧子靜
藥用作物學一册　賈九如
藥物辨異一册　方堯章
本草辨錄一册
要藥選一册　陸晉笙
新本草圖誌二册　趙燏黃
用藥禁忌書一册　陸晉笙
藥物學集說二卷　紹興醫報社
藥性輯要一册
參苗大觀一册　趙蘧臣
藥物大成一册
黨參新研究一册

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

各地中醫學校講義

藥物學講義	廣東中醫藥學校	李嘉鰲仲恒原編 盧朋著補編	四冊
藥物學綱要	蘭谿中醫學校	張山雷著	一冊
實驗藥物學講義	杭州中醫專門學校		
藥物學講義	山西中醫專門學校	時逸人編	一小冊
藥物學講義	上海國醫學院	章成之編	四冊
藥物學講義	上海中醫專門學校	丁甘仁編	二冊
藥物學講義	上海中醫專門學校	徐訪儒編註	八冊
藥物學講義	上海中國醫學院	盛心如編	二冊

日本之部

和漢藥考	小泉榮次郎	有中譯本	二冊
和漢藥物學	日野五七郎	一色直太郎	二冊
民間藥及其利用法	九山房雄		一冊
漢方醫藥全書	粟原廣山		一冊
藥草與特效藥研究	藥草研究所		一冊
藥草與毒草	篠田平三郎	張落霞譯	二冊
重修本草綱目			四十冊
藥徵	吉益東洞	有中文本二種	一冊
續藥徵	村井大年氏	有中文本二種	一冊
氣血水藥徵	吉益南涯氏		一冊
黑燒之研究	小泉榮次郎		一冊
日本草木圖說二十卷			

本草啓蒙四卷			一冊
本草名疏三卷			一冊
本草和名深根輔仁十卷			一冊
扶桑採藥輯要			一冊
安南藥品攷			一冊
本草圖補			一冊
古方藥品圖攷			一冊
高麗人參圖說			一冊
毒草圖說			一冊
獐麝圖說			一冊
藥經太素二卷		和氣廣世著	一冊
康賴本草二卷		丹波康賴	一冊
東華本草			一冊
藥治通義十二卷			一冊
一本堂藥選附錄續編三卷		香川修德太沖和	一冊
藥治通義	丹波元堅		一冊
和漢藥實典	岡本幸一郎		一冊
和漢藥之常識	古木仁		一冊
和漢藥良否鑑別	一色直太郎		一冊
和漢藥治療要解	鵜飼禮堂		一冊
皇漢醫學	湯本求眞		一冊
漢藥寫眞集 二輯	中尾万三　木村康一		二冊
食療本草之攷察	中尾万三		二冊
藥用植物寫眞集	剎米達夫		一冊

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藥用植物及其用途　和漢藥研究所　一册
有毒植物及其注意　仝　上　一册
本草圖譜　本岩崎常正氏　一册
藥用植物五彩圖（計單片二十四幅繪圖者無攷）　一册

近代各雜誌藥學稿件

癩子頭草之採訪與識別　俞鳳賓　中西醫學報九卷一號
肺形草之採訪與識別　俞鳳賓　中西醫學報九卷三號
麻黃之研究　丁名全　中西醫學報九卷三號
大蒜之研究　晉陵下工　中西醫學報十卷十號
藥龜小品　黃退庵　現代國醫雜誌一期至四期
瓜蒂攷　王錫光　現代國醫雜誌第二期
漢藥寫眞集成專號第一輯　中尾萬三木村康一　自然科學研究所彙報第一卷第二號
漢藥寫眞集成專號第二輯　中尾萬三木村康一　自然科學研究所彙報第一卷第五期
食療本草之攷察　中尾萬三　自然科學研究所彙報第一卷第三期
藥物研究　王治華　浙省中醫月刊第三期
羚羊與犀角　王治華　浙省中醫月刊第三期
逃狠把草　張若霞　浙省中醫月刊第三期
龍齒治效之徵驗　王治華　浙省中醫月刊第四期
和漢生藥之藥理研究　蘇錦全　浙省中醫月刊第四期
鹿茸治神經衰弱之特效　許勤勛　浙省中醫月刊第七期
垂絲柳　盧朋著　廣東光漢醫藥月刊第一期
食鹽　余照溥　廣東光漢醫藥月刊第一期
藥學論文十九篇　張梅庵　上海中國藥報第一期
發展中國藥的入手辦法　黃勝白　同德醫藥學五卷五期
麝香　鄭訓　同德醫藥學五卷五期
川芎之成分　張天放　同德醫藥學六卷五期
漢藥麻黃之醫治效用　袁淑範　同德醫藥學六卷五期
中國藥科分劑表　俞鳳賓　同德醫藥學五卷一期
本草綱目今釋　趙燏黃　同德醫藥學五卷五期起六卷一期止
科學的國產藥物研究之第一步　余雲岫　同德醫藥學六卷三四期（又學藝雜誌二卷四期）
漢藥目錄　趙燏黃　同德藥醫學七卷一期
茯苓　邵公佑　同德醫藥學七卷一期
漢藥治病之成績　孫祖烈　同德醫藥學七卷三期
大蒜治療之成績報告　丁濟華　同德醫藥學七卷三期
藥物學之研究法　秦伯未　中醫指導錄第二卷十三期
蛤蚧與 LIZARD　程登瀛　新嘉坡醫藥月刊第十一期
石膏功用卓著與煅煉　羅美東　新嘉坡醫藥月刊第十三期
石蓮子有長圓二種　羅美東　新嘉坡醫藥月刊第八期
黨參　章存之　新嘉坡醫藥月刊第六期
羚羊山羊鳥白角片之來源　程登瀛　新嘉坡醫藥月刊第十二期
蛙之種類及入藥部分　程登瀛　新嘉坡醫藥月刊第十期
燕窩之種類　程登瀛　新嘉坡醫藥月刊第六期

1094／1110
更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

全蝎及蛤蚧　程登瀛　新嘉坡醫藥月刊第十三期
談犀　程登瀛　新嘉坡醫藥月刊第五期
金鷄納霜截瘧應當注意的　程登瀛　新嘉坡醫藥月刊第四期
胃痛特效藥　程登瀛　新嘉坡醫藥月刊第四期
辨茸　何心餘　新嘉坡醫藥月刊第三期
藤鹽土鹽之製法　程登瀛　新嘉坡醫藥月刊第三期
龍草之藥效問題　程登瀛　新嘉坡醫藥月刊第三期
芭蕉葉水萍糖新用法　凌鎗清　新嘉坡醫藥月刊第二期
石膏效驗　黎百概　新嘉坡醫藥月刊第十一期
討論冬虫夏草之種類及效用　曹炳章　紹興醫藥學
藏紅花栽培法　張若霞　紹興醫藥學
藥物與產地之關係　裘吉生　紹興醫藥學
蔔麻油中西異性說　裘吉生　紹興醫藥學
地頭　裘吉生　紹興醫藥學
青黛宜用土靛說　張汝偉　紹興醫藥學
肉桂之栽培及製造法　曹炳章　紹興醫藥學
燕窩　長青　自然界雜誌六卷七期
人參眞僞和類別淺說　丁智伯　杭州三三醫報二卷二期
麥門冬之研究　謝安之　上海中醫世界雜誌第一年
論淡豆豉　陸成一　上海中醫世界雜誌第一年
論薏苡仁之滋養力　鐘廉　新刊紹興醫藥月報三卷四期
丁香　黃連　巴戟天　薺尼　朱守眞　舊刊紹興醫藥月報十卷十期
牛膝紫貝天葵草河東等　馬叔眉　紹興醫藥學刊十卷十一期
石膏論　張錫純　上海中醫雜誌第二期
貝母　崔眞吾　上海中醫雜誌第二期
辨中藥之眞僞　王葦生　上海中醫雜誌第四期
藥品道地錄　葉勁秋　上海中醫雜誌第七八期
藥性類編　徐子石　上海中醫雜誌第七期
論柴胡　高思澄　上海中醫雜誌第八期
石膏不可煆煉用　張錫純　上海中醫雜誌第九期
藥物之眞僞辨　祝天一　上海中醫雜誌第九期
柴胡治癰之我見　祝天一　上海中醫雜誌第九期
薤白解　朱不華　上海中醫雜誌第九期
本草選旨　閻立陞　上海中醫雜誌第十一期廿三期
藥物索隱　祝天一　上海中醫雜誌第十一期至十九期
鬱金之研究　王愼軒　上海中醫雜誌第十一期
赭石解　張錫純　上海中醫雜誌第十二期
羚羊角解　張錫純　上海中醫雜誌第十二期
芍藥之研究　王愼軒　上海中醫雜誌第十四期
本草分類詩　胡彷西　上海中醫雜誌第十四期
本草分類詩　胡彷西　上海中醫雜誌第十五期
甘草說　沈仲圭　上海中醫雜誌第十六期
石膏煆用卽同滴水論　張錫純　上海中醫雜誌第十八期
牡蠣記實　王陽春　上海中醫雜誌第十九期

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參考書目

草果之功用　孫秉公　上海中醫雜誌第十九期
荊芥之研究　陳亦毅　廣東醫林一諤雜誌第一期
番瀉葉之研究　程登瀛　廣東醫林一諤雜誌第二期
龍涎香之討論　程登瀛　廣東醫林一諤雜誌第六期
石膏之研究　張澤霖　廣東醫林一諤雜誌第六期
長圓形石蓮子不可用　程登瀛　廣東醫林一諤雜誌第六期
防己之研究　葉橘皋　廣東醫林一諤雜誌第六期
麻黃底討論　趙倚江　中醫雜誌廿九三十期
藥學研究方法　孫家驥　中醫雜誌廿九三十期
中國藥之研究　袁淑範　奉天民國醫學雜誌
犀角(一卷一期)　黃芪(二卷二期)　桔梗(二卷七期)
防風(五卷一期)　獨活(五卷二期)　土當歸(五卷三期)
都管草(五卷四期)　升麻(五卷五期)　苦參(五卷六期)
白蘞(五卷七期)　延胡索(五卷八期)　貝母(五卷九期)
山慈菇(五卷十期)　石蒜(五卷十一期)　水仙(五卷十二期)
白茅(六卷一期)　龍胆(二)　細辛(三)
杜衡(四)　及己(五)　鬼督郵(六)
徐長卿(七)　白薇(八)
草犀　釵子君　吉利草(十)　百兩金(十一)　硃砂(十二)
辟虺雷　錦地羅　紫金牛(第七卷第一期)
拳參　鐵線草　金絲草(第七卷第二期)
大黃之研究　郭紹庭　江都醫學月刊第一期
中國醫藥衛生常識　葉橘泉　醫界春秋五十四期五十六期五十七期
蝦蟆草考證　楊華亭　醫界春秋五十七期
仲景用附子之研究　謝安之　醫界春秋五十七期
麝香之研究　張澤林　醫界春秋五十七期
藥物學研究之方法　楊野鶴　醫界春秋五十七期
黃連之研究　時逸人　醫界春秋三十九期
草藥不可治淋　張錫純　醫界春秋三十九期
牡蠣攷　趙式訓　醫界春秋三十九期
白頭翁之研究　許小士　醫界春秋三十七期
阿膠之研究　李健頤　醫界春秋三十七期
麻黃攷證　楊亭華　醫界春秋五十六期
石膏治病無分南北論　張錫純　醫界春秋五十六期
烏頭攷證　楊華亭　醫界春秋五十六期
山茱萸攷證　楊華亭　醫界春秋五十六期
黃連攷證　葉橘泉　醫界春秋五十六期
附子柴胡　章次公　中國醫學月刊一卷五期
燕窩談　顧紹衣　上海東方雜誌十五卷八號
當歸確有調經種子之功　荊武蒙　中西醫學報十卷十期
犀牛全身多入藥　吳秉璋　現代名醫驗案第五期
冬虫夏草考　楊百城　山西醫學雜誌三十一期
元明粉之神效治驗談　呂子厚　山西醫學雜誌五十九期
峨眉山游記　克士　自然界雜誌五卷八期
藥用植物　洛文　自然界雜誌五卷九期

1096／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有毒植物撮要　張祿有　武昌博物學會雜誌一卷一期
類似植物博異　錢　城　武昌博物學會雜誌三卷一期
植物目錄　張　亨　武昌博物學會雜誌四卷一期
藥學概言　區若平　廣東醫藥雜誌一卷一期
生草藥之掘發　李仲守　廣東醫藥學報一卷七期
斷腸草之研究　李仲守　廣東醫藥學報一卷七期
雷豆壳的功用　沈壽鵬　廣東醫藥學報一卷六期
胡滿卽斷腸草辨　李仲守　廣東醫藥學報一卷六期
記金錢草治驗膀胱石三則　繆永祺　廣東醫藥學報一卷六期
金錢草與胡滿樹　李仲守　廣東醫藥學報一卷六期
三七有殊異之功能　張錫純　廣東杏林醫報一卷二期
三七有殊異之功能　張錫純　廣東杏林醫報一卷三期
龜是痔瘡的靈藥　沈玉書　廣東杏林醫報一卷九期
蛔虫辨　張錫純　廣東杏林醫報一卷九期
崇旋覆　張體元　廣東杏林醫報一卷十期
巴豆　沈仲圭　廣東杏林醫報一卷十期
續隨子治水腫之宜忌　沈仲圭　廣東杏林醫報一卷十五期
萊菔之功用　張體元　廣東杏林醫報一卷十五期
經驗生草藥性　劉琴仙　廣東杏林醫報一卷十八期
垂絲柳解　盧朋著　廣東杏林醫報一卷廿四期
論中國藥學　楊百城　山西醫學雜誌第一期
萎之研究　趙蓋臣　山西醫學雜誌第三期
地黃之研究　趙蓋臣　山西醫學雜誌第四期
朴硝　趙蓋臣　山西醫學雜誌第四期

答人參問　陳公澤　山西醫學雜誌第四期
辨東人參磉于氏論人參　張錫純　山西醫學雜誌第五期
石膏論　張錫純　山西醫學雜誌第六期
塘牛黃之研究　董鑑叔　山西醫學雜誌第十期
車前草　薄桂堂　山西醫學雜誌第十一期
紅升白降丹之煆煉法　相里柱　山西醫藥學雜誌第十二期
人參之成分與功效　高思潛　山西醫藥學雜誌第十三期
元寶草治血病　張龍芝　山西醫學雜誌第十四期
三春柳之研究　喬尙謙　山西醫學雜誌第十四期
藥物學之研究　高思潛　山西醫學雜誌第二十期
麻黃　章飛仙譯　山西醫學雜誌第十八期十九期二十期
高嶺土與礬石之研究　王　熾　山西醫學雜誌第二十一期
麻黃去沫之研究　徐世長　山西醫學雜誌第二十一期
防己之成分及效驗　黃國材　山西醫學雜誌第二十一期
藥炭與木炭之研究　王　熾　山西醫學雜誌第二十二期
國產藥物專號　社會醫報第一八四期
化州橘記　劉筱雲　山西醫藥雜誌第二十四期
馬錢子毒質不去之研究　王　熾　山西醫學雜誌第二十五期
化橘記書後　張錫純　山西醫藥雜誌第二十七期
論大黃功用　劉前英　山西醫藥雜誌第二十八期
點草考古　許小士　山西醫學雜誌第三十三期
記蘿蔔之功用　趙意空　山西醫學雜誌第三十三期
貝母半夏之研究　米煥章　山西醫學雜誌第三十五期

1097／1110　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丁跋

國醫釋藥之書。炎帝本經爲最古。繼之者爲陶隱居之別錄。宋金元明。代有作者。雖皆指實課虛。推闡盡致。而博大詳明。要以李時珍之本草綱目爲最備。海通以來。舟車便利。縮萬里於咫尺。萃萬國於一堂。奇卉異草。不期而咸集。藥類愈繁。用舍愈宏。居今日而視李氏之綱目。猶李氏當日之視隱居別錄矣。其爲隘狹。何能深諱。陳君存仁。好學深思士也。深慨藥典之未備。應用之未宏。乃集合醫藥研究社同人。廣羅舊籍。博采新說。成爲中國藥學大辭典一書。每一藥。先正名。分處方之名。古籍之名。外國之名。產地之名。及市中隱名。正名而外。則標其產地。詳其形態。分其種類。并種植栽培之要。採取之法。炮製之方。無不詳哉言之。至於性質。功用。主治。亦較他書爲備。而歷代名醫之藥論。外邦醫家之論述。尤采輯無遺。誠中國藥籍中空前之巨著也。兼附精圖千四百幅。內則攝影以顯其眞。彩繪以著其色。工筆以狀其形。全書凡三百二十萬言。迭易寒暑。數經易稿。成書豈易言哉。陳君年甚少。吾不意其力學之精。竟若是也。此書出而嘉惠醫林。功豈在時珍下。余對於藥籍。愧未有所發明。因中國藥學大辭典之成。樂而爲之跋。

中華民國二十二年一月二十三日武進丁仲英跋

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

王跋

醫道至變。病形而藥用。其爲用也。古簡而今繁。要歸於適當而已。余家世業醫。閱本草諸書。知藥類至夥。未易殫述。今觀陳氏中國藥學大辭典。旁徵博引。可謂詳且盡矣。雖然。藥無盡。學亦無盡也。出吾國門。西探美洲之大陸。東攬海邦之富士。轉歷五印度之叢山疊嶂。其間爛爛鬱鬱。含英蘊奇。莫可名狀者。無限也。是猶以國外者言之也。即吾國中而言。若能西上峨嵋。東登泰岱。北涉恒鎮。南入羅浮。其間所採之飛潛動植。或有出乎古今中外書目所錄之外者。亦無限也。綜而觀之。則彌六合者皆藥也。皆吾學之所存者也。今陳氏之用心。則主以中國之本草。輔以他邦之載籍。慇懃蒐羅。輯取資對鏡。蓋知所先也。若非然者。則將犇走舟車。皇皇然如徐霞客之徧游名山。某氏之經卅餘國。行六十萬里。恐不勝其煩。猶無當於藥學耳。爲藥學者。或創獲一物。遠符千金之古方。或專精一科。近摘十步之芳草。或遵呂氏之萬變通都僻壤。市之咸宜。或宗司命之二書。吹咀酌量。投之亦效。是亦吾學之所存。吾儕所當勉者也。余更有說焉。皇甫坦之禁諸欲。是藥之於未病之先。扁鵲之調陰陽。乃藥之於既病之後。皆非學而通乎道者。不爲功也。讀是編者。請勿街國外之藥。而試考國中之藥。能療他人之病。必自治一己之病。知所先

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

後。取精而用宏。則庶幾進道也夫。

民國二十二年二月皖歙王仲奇撰於海上之畸廬

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

呂跋

吾國醫藥發明最古藥學專著代不乏人逮近世以來俗尚歐西中藥已漸有式微之慨祇以國人不加整理僅圖墨守難與維新匪獨吾國藥物勢將退化即古代先哲發明之藥理歷千百禩而不朽者亦將隨世界之潮流以俱去有心人所爲悄悄然悲也今觀陳存仁先生主撰中國藥學大辭典一書其殆先得我心者矣不佞研究醫藥垂二十年每以不能振興中藥爲憾嘗有志於改良或整理而力未之逮今得先生搜集成書對於中藥之產地形狀種類與夫性質功用栽植炮製種種方法言之綦詳使吾國人無老無幼無賢愚不肖皆能明瞭吾國藥物功能之大即吾人類之生於天地間凡有一病自有一藥物以愈之不假外求自知其要其有裨於吾人生活之康健豈曰小補之哉況今國外人士研求吾國文化咸竭力注重於藥物之一途年中搜羅吾國藥材再加化驗而又轉售於吾國者數亦不貲禮失而求諸野則奚若保持其勿失而惟自己是求然則中國藥學大辭典一書亦保持中藥之干城也矣是爲跋

中華民國廿四年春三月新會呂哲公撰於僑港國醫聯合會

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

夏跋

嘗稽歷來本草圖籍。得百六十種。益以近賢所著。近二十種。發明增補。糾訛訓詁。衡之他國。可謂富矣。然各本所學。言成一家。鮮有邏輯蔚爲大觀。有之。吾於古得李東壁氏之本草綱目。於今得陳存仁君主纂之中國藥學大辭典二書而已。李氏以草木分部。從其類也。陳君以筆劃爲次。便於檢也。李氏以本經爲正。旁采宏景張李諸家。而古義完矣。陳君以綱目爲主。增續東西國內時人。而新說備矣。就人參言。李氏先釋名。次集解。次修治。次氣味。次主治。次發明。次正誤。次附方。陳君於釋名中。更分別名。西名。學名。處方用名等。主治中。分功用效能。仲景發明。歷代考證。國外研究學說等。復增基本成分。形態。栽培。採取等。或詳其略。或補其闕。兩相比觀。其精密宏博。實多突過前人之處。夫學問之道。隨時隨地。俱在進化。故不厭其詳。不賤其新。惟其詳。斯能深切瞭解。惟其新。斯能逐步推進。陳君蓋知其要矣。方今國外人士。竭力注意於吾國藥物。英人伊博思氏之繙譯本草綱目。駭爲珍寶。德人揚姆斯氏之蒐集中藥標本。陳列化驗。美人威爾遜氏之赴四川峨嵋。採取大黃黃連。日人宮島幹之助氏之組織漢藥特委會。其彰明較著者也。據此推測。國人而再不能加以整理。外人將越俎而代庖矣。國人而再不能從事改進。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

外人將借箸而代謀矣。然則陳君此舉。又無殊中流之砥柱也哉。至於陳君年少多才。早已名馳於海內。書成付梨。定看紙貴乎洛陽。可預卜云。是爲跋。

中華民國二十三年孟春之月夏紹庭應堂敍於九芝山館

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

諸醫官重修開寶本草新補八十二種新定一十七種統計一千〇八十二種謂之嘉佑補注本草共二十卷雖有增補無大發明後又詔天下郡縣所產藥物命太常博士蘇頌撰述圖經本草二十一卷考證詳切頗有發明但圖與說異是其缺點耳宋哲宗元祐中醫士陳子丞合本草及圖經爲一謂之重廣補注神農本草并圖經二十三卷閒綴數語無所發明徽宗大觀二年蜀醫唐愼微取嘉祐補注本草合爲一書復述諸家本草所遺者五百餘種增新藥八種附入各部又採古今單方並經史百家之書有關藥物者亦附之名經史證類本草計三十一卷上之朝廷改名大觀本草諸家說藥之書能垂千古不致湮沒皆其功也政和二年醫官寇宗奭編撰圖經集註衍義本草五卷又圖經衍義本草四十二卷以補註圖經之書參考事實覈其物理援引辨正發明良多其書刊入正統道藏中惜是書校刊不精訛誤脫落甚多政和六年復命醫官曹孝忠將大觀本草增附寇氏衍義校正刊行名曰政和新修本草三十一卷（一名政和新修經史證類備用本草）後高宗紹興二十九年復命醫官王繼先校正別刊紹興校定經史證類備用本草十二卷皆淺俚無高論其他如斬霖六之本草會編詹瑞芳之本草類要十卷龐安時之本草補遺一卷沈括之藥義一卷各有實驗發明金元朝諸家藥性本草得炳章所見者計一十四種無大改革發明故從略之明孝

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

宗弘治十六年。奉敕命施欽等撰本草品彙精要四十二卷。各藥別爲十類。每藥分「名」「地」「苗」「時」「收」「用」「質」「色」「味」「性」「氣」「臭」「主」「行」「助」「反」「製」「治」「合」「禁」「戒」「忌」「解」「膺」爲二十四項。附以彩圖。其書中生產方土。皆漢地名。今復加以考正。附載卷末。爲本草之別開生面者也。嘉靖時陳嘉謨撰本草蒙筌十二卷。首附熊宗立歷代名醫圖考一卷。及製藥總論。藥性歌二百四十首。搜採藥七百四十二種。依王綸集要部次。每種別氣味。產地。收採。治療方法。撰成對語。以便記誦。同時許希周撰藥性粗評四卷。取常用藥品。撰成俚句。附以發明。單方。其藥物形態。辨悉尤詳。最合初學之用。同時李時珍撰本草綱目五十二卷。列爲一十六部。類凡六十。蒐羅百家。訪採四方。始于嘉靖壬子。終于萬曆戊寅。稿凡三易。增新藥三百七十四種。新舊列藥一千八百九十二種。附方八千一百六十。廣收博採。集其大成。厥後盧子繇著本草乘雅半偈十一卷。以神農本經所錄。凡三百六十五種。古有今無者。刪去一百四十五種。採掇別錄以下適用之藥。如其數補足之。考辨詳明。繆氏希雍。亦著本草經疏三十卷。分本草爲十部。每藥皆有發明。故謂之疏。冠以序例二卷。論三十餘篇。亦多深義。清康熙十一年。何鎮撰本草綱目類纂。必讀十二卷。集李氏之要。有裨於檢考。康熙三十九年。命王道純奉敕重修本草品彙精要四十二卷。附續集十卷。四言舉要

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

二卷。較之弘治原本。更爲詳備。惜未刊行。乾隆三十年。錢塘趙恕軒。撰本草綱目拾遺十卷。本草話三十卷。花藥小名錄四卷。藥性元解四卷。奇藥備考六卷。足補諸家本草所未備。正李氏之訛誤及遺漏。乾隆時奉敕撰圖書集成。內有草木典三百二十卷。禽虫典一百九十二卷。關於藥用動植物。搜採豐富。且一物一圖。效用主治。收採時日。以及經史詩文之考正。能補正本草缺略者甚多。道光朝之吳其濬。撰植物名實圖考三十八卷。又長編二十二卷。其搜集經史百家。各地志書。有關藥用植物。有說無圖者。日長編。發明效用。辨識形態。有圖有說者。日圖考。共列藥一千七百十四種。彙集衆說。闡幽發微。有裨益於後學。趙吳二公爲有清以來之藥學發明家。其他明清本草。不下三百餘種。雖各有獨到處。亦各有訛誤處。非可以與趙吳二公相並列。現代上海陳君存仁爲余神交友也。學問淵博。經驗豐富。其著作已風行海內。有口皆碑。毋容余贅述也。近年著有中國藥學大辭典一書。以科學體例。博採經驗學說。考察藥物標本。繪以彩色精圖。爲便利檢查計。仿普通辭典體例。以藥名首字筆劃多少。以分部次。注重實際理論。不尚玄學空談。每列一藥。分別命名。基本產地。形態種植。性質效能。成分主治。歷代記述考證。辨僞。近人學說。（如歐美日本新學說）配合應用。用量等項。條分縷析。綱舉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

目張。蒐集四千餘年藥物學之大成。清代趙吳二公之後。陳君能繼趙吳未竟之志。成此巨帙。不愧爲現代藥學大家。際此國粹醫學。主用科學整理期間。國藥建設。尤爲整理藥學之發軔。陳君此編。不僅爲國醫藥界謀福利。更且爲國產挽利權。農村謀生計。一舉而數善備矣。今是書出版在即。囑跋於余。爰述國藥之沿革。及陳君編輯是書之意旨。是爲跋。

中華民國二十四年二月四明曹炳章謹跋

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

揮跋

民元以降。吾國醫學。日處於風雨飄搖之中。所以千鈞一髮維繫不斷者。賴治療有實驗。藥物有功效。然則謂吾國醫學。建築於藥物也可。故藥書於醫籍中。實占重要位置。

自神農嘗百草以迄於今。藥書汗牛充棟。其間搜羅最廣博者。唯李頻湖之本草綱目。積古人之經驗以成書。其所記述。自是實錄。然繁重而不切實用。蕪雜而不便檢查。狀述事物。畫影圖形。悉皆模糊影響。此爲時代所限。誠不足爲古人病。以今視之。自然不合時代化。殆已成過去之陳列品矣。

今者世界書局所印中國藥學大辭典。其繁重精詳。倍蓰綱目。而編述復分門別類。檢查良便。博采新知。發皇古義。影印圖本。爲往古所罕見。遂可免模糊影響之弊。解剖成分前人所未知。遂可爲科學化之張本。至於訂正別名。詳考產地。嚴定製法。發明功用。應有盡有。博大精純。可謂空前巨著矣。

嘗聞一國文化之進步。常與辭書相比例。辭書聚各種學說而理解之。用科學方法編輯之。誠爲學者重要之工具。吾國醫學。在此風雨飄搖之時。其有否極泰來之望乎。吾將於此書之出而占之。

中華民國二十三年十月揮鐵樵跋

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com