中医大辞典

中药分册

《中医大辞典》编辑委员会 编

人民卫生出版社

样本库

中医大辞典

中药分册

（试用本）

《中医大辞典》编辑委员会 编

中医研究院
广州中医学院 主编

南京中医学院
南京医学院 编

北京中医学院 图书馆

人民卫生出版社

1087448

中 医 大 辞 典
中 药 分 册
（试 用 本）
《中医大辞典》编辑委员会 编

人民卫生出版社出版
（北京市崇文区天坛西里10号）
兰州新华印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本 31$\frac{1}{4}$印张 4插页 681千字
1982年10月第1版第1次印刷
印数：1——23,700
统一书号：14048·4081 定价：4.55元

《中医大辞典》分册总目

基础理论分册	医史文献分册
内科分册	外科、骨伤科、五官科分册
妇科、儿科分册	中药分册
方剂分册	针灸、推拿、气功、养生分册

2/C4/27

《中医大辞典》编辑委员会委员、顾问

（姓氏笔画为序）

主任委员：李永春

副主任委员：王树歧　刘汝琛　许德良
张鼎臣

委　　员：丁绪亮　区永欣　邓铁涛
许占民　杨医亚　杨树藩
李经纬　李慕才　肖敏才
吴贻谷　何传毅　余瀛鳌
张自云　张启光　陈玉琦
林建德　欧　明　贾维诚
高忻洙　徐廷素　郭振球
裘沛然　蔡景峰　廖品正
谭日强

顾　　问：朱仁康　任应秋　米伯让
金寿山　黄星垣　鲁之俊

编辑委员会办公室主任：李经纬

中药分册编写、审阅人员

（按姓氏笔划为序）

主要编写人员：

丁绪亮　刘天培　宋立人　吴贻谷　杨树信

洪　恂　施仲安　倪和宪　彭怀仁

编 写 人 员：

王鲁芬　丘志昌　李　锡　李鸿逵　李德兴

陈立行　武仲颐　饶曼人　臧载阳

审 阅 人 员：

林启云　周序斌　赵守训　高成芝　颜正华

责 任 编 辑：

贾维诚

出版说明

为了适应我国医学发展的形势，满足医药卫生人员学习中医的迫切需要，经卫生部一九七四年二月批准编写这部《中医大辞典》。

《中医大辞典》是一部供医疗、教学、科研工作中应用的工具书。全书选收中医基础理论、临床、针灸、中药、方剂、人物、文献、推拿、气功等词目约四万五千条（其中包括单字及附条），于一九七五年十月开始编写的。在编写过程中，力求做到既要反映祖国医药学发展的历史继承性，又要反映解放后医药卫生战线的新成就。释文也力求简明扼要，引用文献尽量摘其要者。初稿完成后，各编写单位曾广泛征求了修改意见，最后邀请名老中医、有关方面的专家审阅定稿。

《中医大辞典》先按基础理论、临床各科以“试用本”分八册出版，广泛征求意见后，再作修改，重新编排，正式合订出版。

本书在编写、审定过程中，得到北京、上海、广东、四川、辽宁、江苏、河北、陕西、湖南等省市有关领导、有关单位和全国许多地方的医务工作者的大力支持和热情协助，谨在此表示诚挚的谢意。

编写出版辞典类工具书，有它一定的特性；再由于水平所限，缺乏经验，因而本书的编写等工作，恐达不到预期要求，存在一些问题。诚恳希望大家提出宝贵意见，帮助我们提高质量。

本书题笺，是特请郭沫若同志手写的，专此志念。

人民卫生出版社

一九八〇年一月

凡　例

一、本分册共收中药词目6995条。其中正词目2149条，副词目4846条。

正词目释文，根据综合性辞书的要求，以精炼概括、掌握要点为原则。少数药物附述于相关条目之内，以供参考，例如槲芽附述于杜仲条，红花子附述于红花条等。有关中药炮制的词目，均编在《中医基础分册》之内，本分册不再重复。

二、正、副词目所注出处，属于始载文献的，于书名前冠以“出”字，若非始载文献则冠以“见”字。

正词目的出处，不论其为始载或非始载文献，均以药学专书为准，副词目出处不受此限。

凡有同名之文献，于书名前冠以作者姓名（或单位名称），以资区别而利查考。

三、药物之有商品药材者，介绍其产地或主产地，无商品药材者，介绍其原植（动、矿）物的自然分布地区。一纲多目的药物，若其产地或分布地区相同，书中的词目排列又紧密相连者，只在前条介绍，后条省略。

四、药物用量，除另有说明者外，一般均系成人的常用一日量；外用量一律不写。

五、化学成分名词以通用者为准，向无通用名称者，则根据中国科学院所订命名原则或药物来源定名。一名数译者酌选其一。上述自定名和选用名均加注英文名。

六、本分册的目录，包括正、副词目在内。其编排以首字笔画多少，结合起笔笔形一丨丿丶乁顺序排列；首字相同的，按词目字数多少排列；词目字数相同的，再按第二字、第三字笔画多少和起笔笔形顺序排列。

七、鉴于某些原植（动）物名常与药名互用（如白毛藤与白英，闹羊花与羊踯躅等），故另编检索一份，附于书后；正词目内附属药的药名，也同时编入，并资查考。

八、本书字体均用简化字，以中国文字改革委员会《简化字总表》（1964年第二版）为主要依据。其中少数字在简化后容易发生歧义者，则仍用繁体，如癥（症）、橘（桔）、覆（复）等。

检　字

（每字后的页码，系检索目录的；根据目录，再查检词目）

一　画

一……1

二　画

〔一〕

二……1
十……1
丁……1
七……1

〔丨〕

卜……1

〔丿〕

八……1
人……1
入……1
儿……1
九……2

〔乙〕

刀……2
了……2

三　画

〔一〕

三……2
干……2
土……2
下……3
大……3
万……4
寸……4

〔丨〕

上……4
山……4

〔丿〕

千……4
川……5
及……5

〔丶〕

广……5

〔乙〕

女……5
小……5
飞……6
马……6
子……6

四　画

〔一〕

王……6
开……6
井……6
天……6
元……7
无……7
云……7
支……7
木……7
五……7
不……7
有……7
太……7
犬……7
扎……7
瓦……7
车……8
牙……8
巨……8

〔丨〕

止……8
少……8
日……8
内……8
见……8

〔丿〕

午……8
牛……8
气……8
手……8
毛……8
升……8
长……8
化……8
片……8
反……9
分……9
公……9
月……9
丹……9
风……9
凤……9
乌……9

〔丶〕

六……9
文……9
方……9
火……9
斗……9

〔乙〕

引……9
巴……9
双……9
孔……10
水……10

五　画

〔一〕

玉……10
末……10
功……10
艾……10
节……10
甘……10
古……11
左……11
石……11
右……11
布……11
龙……11
平……11
打……11

扑……11
东……11

〔丨〕

北……11
卡……12
卢……12
叶……12
叭……12
叫……12
号……12
申……12
由……12
田……12
四……12

〔丿〕

生……12
禾……12
代……12
仙……12
白……12
瓜……13
丛……13
冬……13
鸟……14
包……14

〔丶〕

立……14
玄……14
……14
兰……14
半……14
头……14

〔乙〕

奶……14
奴……14
皮……14
发……14
边……14
对……14
圣……14
台……14
矛……14
辽……14
丝……14
母……14

六 画

〔一〕

戎……14
地……14
朴……15
芋……15
芒……15
芝……15
芎……15
吉……15
老……15
耳……15
亚……15
西……15
列……15
百……15
有……15
灰……15
夹……15
扛……15
扞……16
托……16
扫……16
尧……16
过……16

〔丨〕

尖……16
光……16
当……16
吐……16
吸……16
刚……16
吊……16
曲……16
团……16
回……16
虫……16
网……16
肉……16

〔丿〕

竹……16
朱……16
丢……16
伏……16
伤……16
仰……16
伊……16
华……16
延……16
自……16
血……16
向……16
全……17
合……17
杀……17
多……17
争……17

〔丶〕

刘……17
齐……17
闭……17
问……17
灯……17
决……17
冰……17
汗……17
江……17
汤……17
壮……17
守……17
安……17
羊……17
并……17
关……17
米……17
祁……17
农……17

〔乙〕

寻……17
异……17
阳……17
阴……17
防……17
如……17
戏……17
观……17
羽……17
买……17
红……17
巡……18

七 画

〔一〕

寿……18
麦……18
远……18
坎……18
均……18
块……18
杠……18
杜……18
杉……18

枸……18
柜……18
杞……18
杨……18
豆……18
两……18
丽……19
克……19
汞……19
壳……19
芙……19
芫……19
芜……19
苇……19
芸……19
苣……19
苋……19
花……19
芹……19
芥……19
苍……19
芡……19
芳……19
苎……19
芦……19
芭……19
苏……19
苡……19
走……19
赤……19
杏……19
李……19
辰……19
还……19
豕……19
扶……19
抚……20
拒……20
扯……20
护……20
拟……20
连……20

〔丨〕

卤……20
时……20
别……20
吴……20
岗……20
旱……20
园……20
串……20

〔丿〕

牡……20
针……20
钉……20
何……20
伸……20
佛……20
伽……20
皂……20
余……20
含……20
谷……20
饭……20
肝……20
肚……20
龟……20
角……20
灸……20
迎……20

〔丶〕

辛……20
疗……20
怀……20
快……20
灶……20
冻……20
冷……20
沙……20
沟……20
没……20
沉……20
状……20
羌……20
诃……20
补……20
良……20

〔乙〕

张……21
灵……21
屁……21
尾……21
尿……21
陆……21
阿……21
陈……21
附……21
忍……21
鸡……21
驳……21
驴……21
纶……21
纽……21

八　画

〔一〕

玫……21
青……21
坤……21
林……22
枝……22
枇……22
杵……22
杞……22
板……22
松……22
枪……22
枫……22
构……22
杭……22
枕……22
耶……22
刺……22
画……22
莱……22
苦……22
苟……23
苹……23
苜……23
苘……23
苞……23
苕……23
茄……23
苔……23
茅……23
枣……23
雨……23
矾……23
矿……23
郁……23
顶……23
拔……23
拐……23
拖……23
抱……23
拉……23
拦……23
转……23
斩……23
轮……23
软……23
卧……23

㬎……23
鸢……23

〔丨〕

虎……23
肾……23
味……23
呷……23
岭……23
明……23
败……23
岩……23
昆……23
昌……23
罗……23
国……23
果……23

〔丿〕

牧……23
钓……23
知……23
刮……23
委……23
季……23
竹……23
垂……23
使……23
侧……23
佩……24
爬……24
乳……24
斧……24
念……24
金……24
狗……24
饴……25
肺……25
肿……25
肥……25
昏……25
鱼……25
兔……25
忽……25

〔丶〕

放……25
於……25
京……25
夜……25
兖……25
盲……25
底……25
疟……25
疙……25
怕……25
闹……25
炉……25
法……25
河……25
油……25
沿……25
泡……25
泻……25
泥……25
沸……25
波……25
泽……25
治……25
单……25
宝……25
定……25
宜……25
官……25
空……25
卷……25
郎……25
庠……25

〔7〕

屈……25
建……25
降……26
虱……26
参……26
细……26
绊……26
贯……26

九 画

〔一〕

玳……26
珍……26
珊……26
玻……26
毒……26
春……26
帮……26
枯……26
柑……26
柘……26
栌……26
相……26
柚……26
枳……26
柞……26
柏……26
枸……26
柳……26
栎……26
柿……26
柠……26
桎……26
树……26
胡……26
荆……27
南……27
茜……27
荛……27
革……27
茈……27
草……27
茵……27
茴……27
荞……27
茯……27
荏……27
荇……27
茶……27
荠……27
茺……27
茨……27
荨……27
荩……27
莅……27
茹……27
荔……27
莊……28
药……28
柰……28
砒……28
研……28
砂……28
斫……28
耐……28
面……28
牵……28
歪……28
厚……28
咸……28
威……28
挂……28
拱……28
挟……28
挡……28
指……28

挖……28
轻……28
鸦……28
皆……28

〔丨〕

点……28
背……28
韭……28
省……28
响……28
哈……28
映……28
昨……28
贴……28
虹……28
虾……28
蚁……28
虻……28
蚂……28
星……28
胃……28
思……28
骨……28

〔丿〕

钟……28
钢……28
钥……28
钩……28
钮……28
秋……28
香……28
看……29
竿……29
重……29
信……29
顺……29
追……29
鬼……29
禹……29
盾……29
剑……29
食……29
盆……29
狭……29
狮……29
独……29
饼……29
胆……29
胖……29
急……29

〔丶〕

亮……29
恒……29
洪……29
洗……29
活……29
洋……29
将……29
前……29
首……29
宣……29
穿……29
总……29
美……29
姜……29
类……29
养……29
迷……29
祖……29
神……29
扁……29

〔7〕

费……29
屏……29
退……29
眉……29
娃……29
蚤……29
骆……29
孩……29
绒……29
绕……29
绛……29
络……30
绞……30

十　画

〔一〕

艳……30
珠……30
秦……30
素……30
蚕……30
桂……30
桔……30
桐……30
栝……30
桦……30
桃……30
核……30
桉……30
根……30
都……30
真……30
索……30
壶……30
莽……30
荸……30
莱……30
莲……30
莳……30
莪……30
荷……30
荒……30
莎……30
莨……30
莙……30
莼……30
莺……30
盐……30
恶……31
栗……31
翅……31
赶……31
起……31
栽……31
破……31
夏……31
原……31
捕……31
较……31
热……31

〔丨〕

鸬……31
柴……31
党……31
逍……31
哮……31
峨……31
晒……31
鸭……31
蚌……31
蚊……31
圆……31

〔丿〕

钱……31
钻……31
铁……31
铃……31

铅……31
秋……31
积……31
称……31
缺……31
笔……31
透……31
倒……31
射……31
臭……31
徐……32
豹……32
釜……32
翁……32
狼……32
胭……32
脂……32
脐……32
胶……32
脘……32
皱……32
留……32
鸳……32

〔丶〕

旃……32
高……32
栾……32
唐……32
疳……32
烟……32
烙……32
凌……32
凉……32
酒……32
浙……32
消……32
海……32
浴……32
浮……32
流……32
涩……32
羟……32
瓶……32
粉……32
益……32
宽……32
家……33
拳……33
浆……33
娑……33
诸……33
调……33
扇……33

〔7〕

陵……33
预……33
桑……33
通……33
绣……33

十一画

〔一〕

球……33
琐……33
款……33
梗……33
梧……33
梓……33
梳……33
梭……33
勒……33
恭……33
菥……33
菱……33
菴……33
菝……33
菖……33
萝……33
菌……33
萎……33
萆……33
菜……33
菟……33
菊……33
堇……33
黄……33
营……34
梦……34
梵……34
硒……34
瓠……34
雪……34
排……34
推……34
掐……34
接……34
敕……34

〔丨〕

雀……34
常……34
啤……34
嗫……34
晚……34
眼……34
蚶……34
蛎……35
蛆……35
蚋……35
蚱……35
蚯……35
蛇……35
野……35
崩……35
曼……35
悬……35
匙……35

〔丿〕

铜……35
锌……36
银……36
移……36
甜……36
梨……36
犁……36
偏……36
假……36
徘……36
舶……36
盘……36
鸽……36
盒……36
猪……36
猫……36
猕……36
脚……36
脱……36
象……36

〔丶〕

旋……36
商……36
章……36
望……36
麻……36
庵……37
廊……37
鹿……37
痒……37
痕……37

惊……37
清……37
混……37
淮……37
淫……37
淡……37
羚……37
粘……37
断……37
剪……37
寄……37
密……37
婆……37

〔ㄱ〕

弹……37
蛋……37
堕……37
续……37
绵……37
绿……37

十二画

〔一〕

琥……37
斑……37
琴……37
博……37
棒……37
楮……37
棋……37
椒……37
棉……37
棕……38
椰……38
棘……38
鹁……38
酢……38
款……38
散……38
韩……38
朝……38
葫……38
葳……38
葛……38
葬……38
葡……38
葱……38
葶……38
落……38
萱……38
萎……38
蔺……38
葵……38
葉……38
喜……38
粟……38
雄……38
硬……38
硫……38
雁……38
提……38
搜……38
雅……38
翘……38
戟……38

〔丨〕

紫……38
棠……39
掌……39
喇……39
喝……39
喉……39
蛐……39
蛔……39
蛞……39
蜓……39
蛤……39
蛴……39
景……39
鼎……39
黑……39
遏……39

〔丿〕

铺……39
锁……39
锅……39
锈……39
锉……39
鹄……39
鹅……39
筋……39
粤……39
御……39
舒……39
番……39
猢……39
猬……39
猴……39
腊……39
腌……39

〔丶〕

蛮……39
痢……39
焰……39
湖……39
滑……39
滁……39
割……39
寒……39
窝……39
粪……39

〔ㄅ〕

犀……39
隔……39
骚……40
缅……40

十三画

〔一〕

瑧……40
瑞……40
塘……40
椿……40
楝……40
榄……40
榲……40
槟……40
榆……40
槠……40
楼……40
赖……40
赖……40
鼓……40
蓍……40
蓝……40
墓……40
蓖……40
蓬……40
蒟……40
蒡……40
蒺……40
蒲……40
蒴……40
蒻……40
蒙……40
硼……40
碎……40
鹤……40

感……40
雷……40
零……40
雾……40
雹……40
摄……40
摆……40
搬……40
摊……40

〔丨〕

频……40
暗……40
睡……40
蜈……40
蜗……40
蛾……40
蜂……40
蜣……41
路……41
蜀……41
照……41

〔丿〕

锡……41
锦……41
锄……41
锯……41
矮……41
雉……41
鼠……41
魁……41
腻……41
腰……41
腽……41
腹……41
解……41
鲍……41

〔丶〕

新……41
廉……41
痱……41
痴……41
痰……41
慎……41
满……41
滇……41
溪……41
滚……41
滂……41
滨……41
溺……41
萤……41
酱……41
福……41

〔乙〕

缠……41

十四画

〔一〕

碧……41
墙……41
樯……41
槟……41
榧……41
榜……41
槟……41
榕……41
榠……41
酸……41
毅……41
嘉……41
蔷……41
慕……41
蔓……41
蘖……41
蔫……42
蔻……42
蓼……42
磁……42
豨……42

〔丨〕

雌……42
蜚……42
嗽……42
蜻……42
蜞……42
蜡……42
蜥……42
蜘……42
蝉……42
罂……42

〔丿〕

稳……42
算……42
管……42
熏……42
鼻……42
獐……42
馒……42
鲜……42

〔丶〕

辣……42
韶……42
腐……42
瘩……42
漆……42
漂……42
滴……42
漏……42
蜜……42

〔乙〕

嫩……42
翠……42
熊……42
缩……42

十五画

〔一〕

樗……42
槲……42
樱……42
橡……42
槲……42
樟……42
橄……42
赭……42
豌……42
醋……42
醉……42
敷……42
蕨……42
蕤……42
蕉……42
蕲……42
層……42
震……42

〔丨〕

瞎……43
瞑……43
蝴……43
蝎……43
蝌……43
蝮……43
蝼……43
蝙……43
蹄……43
蹈……43

暴……43
墨……43

〔丿〕

稻……43
箭……43
靠……43
黎……43
僵……43
鯉……43
鯽……43

〔丶〕

熟……43
瘪……43
潮……43
潦……43
潘……43
潼……43
澄……43
寮……43
鹤……43

〔乁〕

缬……43

十六画

〔一〕

靛……43
橹……43
橙……43
橘……43
瓢……43
薤……43
薯……43
薇……43
蔺……43
薪……43
薏……43
薄……43
薜……43
薅……43
燕……43
橐……43
霍……43
擀……43
鍪……43

〔丨〕

螃……43
瞎……43

〔丿〕

镜……43
篦……43
篱……43
獭……43
膨……43
鲛……43

〔丶〕

鹧……43
磨……43
燎……43
潞……43
濂……43
糙……43
糖……43

〔乁〕

壁……43

十七画

〔一〕

檀……44
藏……44
藁……44
霜……44
霞……44
翳……44

〔丨〕

螳……44
螺……44
蟋……44

〔丿〕

穑……44
繁……44
爵……44
臌……44
鳅……44

〔丶〕

辫……44
蜜……44

〔乁〕

檗……44
翼……44

十八画

〔一〕

藕……44
藜……44
藤……44
覆……44
礫……44

〔丨〕

蟛……44
蟠……44
瞿……44
鹭……44

〔丿〕

翻……44

〔丶〕

鹰……44
癞……44

〔乁〕

戳……44

十九画

〔一〕

藿……44
攀……44

〔丨〕

蟾……44

〔丿〕

鳗……44
蟹……44

〔丶〕

麒……44
爆……44
鳖……44

二十画

〔一〕

蘘……44

〔丨〕

蠔……44

〔丿〕

獾……44
鳝……44

〔丶〕

糯……44

二十一画以上

〔一〕

霸……44
露……44
靡……45
〔丿〕
襲……45
鱷……45
〔丶〕
黼……45
罐……45
〔乙〕
廳……45
鬱……45

目　录

一　画

〔一〕

一口血……1
一支箭……1
一匹绸……1
一见消……1
一见喜……1
一文钱……1
一叶一枝花……1
一叶萩……1
一号黄药……1
一包针……1
一扫光……1
一帆青……1
一年蓬……1
一朵云……1
一朵芙蓉花……1
一块瓦……1
一把伞……1
一把针……1
一串红……1
一串钱……2
一条根……2
一枝香……2
一枝黄花……2
一枝蒿……2
一枝箭……2
一杯倒……2
一苗蒿……2
一味药……2
一点血……2
一点红……2
一炷香……2
一滴珠……2
一箭球……2

二　画

〔一〕

二十四症……3
二丑……3
二叶葎……3
二花……3
二花秧……3
二宝花……3
十大功劳……3
十大功劳叶……3
十字草……3
丁子香……3
丁子萝……3
丁公藤……3
丁茄……3
丁香……3
丁香枝……4
丁香油……4
丁香萝……4
丁癸草……4
丁桐皮……4
丁榔皮……4
七寸金……4
七匹散……4
七孔莲……4
七叶一枝花……4
七叶子……5
七叶莲……5
七叶麻……5
七叶藤……5
七仙桃……5
七加皮……5
七里香……5
七里麻……5
七层楼……5
七姐妹……5
七厘丹……5
七星草……5
七星剑……5
七星莲……5
七星箭……5

〔丨〕

卜芥……5

〔丿〕

八大锤……6
八木条……6
八爪龙……6
八爪金龙……6
八月札……6
八月白……6
八月瓜……6
八月兰……6
八月炸……6
八月炸藤……6
八月霜……6
八仙花……6
八仙草……6
八百棒……6
八字萝……6
八角……6
八角儿……6
八角乌……7
八角枫……7
八角刺……7
八角金盘……7
八角茴香……7
八角茶……7
八角莲……7
八角梧桐……7
八角铜盘……7
八股牛……7
八树……7
八厘麻……7
八厘麻子……8
八麻子……8
八棱麻……8
八楞木……8
八楞风……8
八颗叶下珠……8
人中白……8
人中黄……8
人字草……8
人苋……8
人言……8
人尿……8
人尿白……8
人乳汁……8
人参……8
人参叶……9
人参芦……9
人参须……9
人面子……9
人面果……9
人指甲……9
人胞……9
人退……9
人衔……9
入地老鼠……9
入地金牛……9
儿茶……10
儿茶膏……10

九牛二虎草……10
九牛七……10
九牛子……10
九牛造……10
九牛藤……10
九孔螺……10
九节木……10
九节风……10
九节草……10
九节茶……10
九节菖蒲……10
九节篱……11
九龙虫……11
九龙根……11
九龙盘……11
九龙藤……11
九头狮子草……11
九死还魂草……11
九步香……11
九里明……11
九里香……11
九层皮……11
九层塔……11
九层楼……11
九英菘……11
九转香……11
九股牛膝……11
九空子……11
九秋香……11
九香虫……11
九信菜……12
九姜连……12
九塔草……12

〔7〕

刀伤药……12
刀豆……12
刀豆子……12
刀豆壳……12
刀豆根……12
刀剪药……12
了哥王……12

三 画

〔一〕

三十六荡……12
三十六根……13
三七……13
三丫苦……13
三叉虎……13
三叉明棵……13
三叉剑……13
三叉蕨……13
三匹风……13
三片风……13
三爪龙……13
三爪金……13
三爪金龙……13
三分三……13
三月泡……14
三月黄花……14
三叶……14
三叶五加……14
三叶红……14
三叶佛甲草……14
三叶青……14
三叶扁藤……14
三叶珠……14
三叶蛇莓……14
三叶酸草……14
三叶藨……14
三甲皮……14
三白草……14
三加皮……14
三对节……14
三台红花……14
三台花……15
三百两银药……15
三百棒……15
三色堇……15
三步跳……15
三角风……15
三角枫……15
三角草……15
三角蒺藜……15
三角藤……15
三张叶……15
三层草……15
三枝九叶草……15
三枝枪……15
三转半……15
三变花……15
三春柳……15
三荚草……15
三柰……15
三桠苦……15
三钱三……15
三铃子……15
三苍……15
三敛子……15
三棱……15
三棱子……15
三棱草……15
三棱草根……15
三颗针……15
干归……16
干生地……16
干地黄……16
干苔……16
干岩矸……16
干油菜……16
干柿……16
干姜……16
干漆……16
干蟾……16
干蟾皮……16
土人参……16
土三七……17
土大黄……17
土大黄叶……17
土川芎……17
土马兜铃……17
土木瓜……17
土木香……17
土木贼……17
土木鳖……17
土贝……17
土贝母……17
土牛膝……17
土甘草……18
土甘草豆……18
土石莲子……18
土田七……18
土生地……18
土白芷……18
土白蔹……18
土瓜……18
土瓜仁……18
土瓜根……18
土瓜狼毒……18
土冬花……18
土玄参……18
土半夏……18
土地骨皮……18
土百部……18
土当归……18
土虫草……18
土肉桂……18
土血竭……18
土防己……18
土红花……18
土杜仲……18
土苋菜……18
土花椒……18
土连翘……18
土里开花……18

土鸡血……18
土败酱……18
土知母……18
土狗……19
土参……19
土细辛……19
土荆皮……19
土荆芥……19
土荜拨……19
土茵陈……19
土茴香……19
土茯苓……19
土砂仁……19
土虺蛇……19
土香草……19
土香榧……19
土香薷……19
土胆草……19
土洋参……19
土蚕……20
土桔梗……20
土夏枯草……20
土柴胡……20
土党参……20
土高丽参……20
土烟叶……20
土球子……20
土萸肉……20
土黄芩……20
土黄芪……20
土黄连……20
土黄柏……20
土黄耆……20
土常山……20
土蛋……20
土续断……20
土圈儿……20
土槿皮……20
土薄荷……20
土鳖虫……20
下马仙……20
下田菊……20
下白鼠曲草……21
下奶藤……21
大一枝蒿……21
大一枝箭……21
大丁草……21
大刀豆……21
大力子……21
大力王……21
大力草……21
大力黄……21
大力薯……21
大山桂……21
大千生……21
大飞扬……21
大飞扬草……21
大木花……21
大贝母……21
大风子……21
大风茅……21
大风消……21
大风藤……22
大凤尾……22
大方八……22
大节藤……22
大叶万年青……22
大叶毛鼠曲……22
大叶半枝莲……22
大叶灰菜……22
大叶青绳儿……22
大叶金花草……22
大叶草……22
大叶咸虾花……22
大叶蛇总管……22
大叶酢浆草……22
大叶藜……22
大田基黄……22
大四块瓦……22
大头花……22
大头陈……22
大头菜……22
大加皮……22
大发……23
大发药……23
大地丁草……23
大老鸦酸……23
大过路黄……23
大吊兰……23
大血草……23
大血通……23
大红袍……23
大麦牛……23
大麦芽……23
大麦秸……23
大芸……23
大豆卷……23
大豆荚……23
大豆黄卷……23
大伸筋草……23
大皂角……23
大良姜……23
大驳骨……23
大青叶……24
大青根……24
大青盐……24
大松身……24
大枫子……24
大刺儿菜……24
大枣……24
大果榆糊……24
大罗伞……24
大季花……24
大金不换……24
大金牛草……24
大金钱草……25
大金雀……25
大乳汁草……25
大肺筋草……25
大肥根……25
大贯众……25
大胡麻……25
大草鞋虫……25
大茴香……25
大茶药……25
大茶药根……25
大荠……25
大药……25
大骨风……25
大种半边莲……25
大鬼针草……25
大洞果……25
大活……25
大活血……25
大将军……25
大钻……25
大海子……25
大通草……26
大黄……26
大黄药……26
大黄藤……26
大接骨……26
大接骨丹……26
大救驾……26
大常山……26
大麻仁……26
大麻药……26
大巢菜……26
大搜山虎……27
大戟……27
大翘子……27
大黑头草……27
大黑药……27
大蒜……27
大蓝……27
大蓟……27

大腹子……27
大腹皮……27
大腹绒……27
大酸味草……27
大碧婆……27
大壁虎……28
万丈深……28
万年青……28
万年青叶……28
万年松……28
万年藤……28
万寿菊……28
万寿菊叶……28
万经槎……28
万重花……28
寸白蛇……28
寸芸……28
寸香……28

〔 丨 〕

上山虎……28
上巳菜……28
上甲……28
上树蜈蚣……28
上党人参……28
山大刀……28
山大黄……28
山大颜……28
山川柳……29
山小橘……29
山马兰……29
山马蝗……29
山马蹄……29
山木通……29
山木蟹……29
山凤尾……29
山乌龟……29
山甘草……29
山甘草根……29
山石榴……29
山东何首乌……29
山田薯……29
山白芷……29
山白菊……29
山地瓜……29
山芝麻……29
山芝麻根……30
山肉桂……30
山羊血……30
山羊角……30
山羊蹄……30
山红枣根……30
山杨柳……30
山豆根……30
山花菜……30
山花椒……30
山芥菜……30
山苏子……30
山皂角……30
山鸡头子……30
山鸡条子……30
山鸡茶……30
山枝仁……30
山枝根……30
山松须……31
山苦荬……31
山茄子……31
山茄花……31
山枣子……31
山枣参……31
山矾叶……31
山矾根……31
山夜兰……31
山油甘……31
山油麻……31
山帚条……31
山练草……31
山柑橘……31
山胡椒……31
山胡椒叶……31
山胡椒根……31
山茱萸……31
山茶花……31
山药……32
山药藤……32
山荔枝果……32
山柰……31
山虾子……32
山蚂蝗……32
山香草……32
山香菜……32
山姜……32
山姜子……32
山姜黄……32
山扁豆……32
山扁柏……33
山屎瓜……33
山桃花……33
山莲藕……33
山莓……33
山莨菪……33
山脂麻……33
山高粱……33
山海椒……33
山海螺……33
山梗菜……33
山梅根……33
山栀子……33
山栀茶……33
山萝卜……33
山萸肉……33
山黄豆……33
山黄连……33
山野烟……33
山崩子……33
山猪药……33
山猪薯……33
山蛋……33
山绿豆……34
山棉皮……34
山葡萄……34
山葡萄根……34
山葵……34
山雁皮……34
山紫草……34
山楂……34
山楂根……34
山榆仁……34
山蓟……34
山蒟……34
山蒲扇……34
山蜂子……34
山稔子……34
山稔叶……34
山稔根……35
山慈姑……35
山慈姑叶……35
山蓼……35
山辣……35
山蜡梅叶……35
山韶子……35
山膏药……35
山漆……35
山精……35
山熊胆……35
山橙……35
山蝴蝶……35
山蹴蹋……35
山薄荷……35
山薯……35
山橘……35
山蟾蜍……35
山藿香……35

〔 丿 〕

千日红……36

千斤拔……36
千斤草……36
千只眼……36
千年见……36
千年艾……36
千年老鼠屎……36
千年红……36
千年健……36
千年润……36
千年矮……36
千里及……36
千里光……36
千里香……36
千针万线草……37
千张纸……37
千张树……37
千层纸……37
千层塔……37
千层楼……37
千层矮……37
千金子……37
千金藤……37
千屈菜……37
千重塔……37
千脚虫……37
千捶打……38
川山七……38
川山甲……38
川木香……38
川木通……38
川五味子……38
川贝……38
川贝母……38
川牛膝……38
川乌……38
川乌头……38
川石斛……39
川朴……39
川朴花……39
川芎……39
川芎苗……39
川军……39
川连……39
川参……39
川独活……39
川黄柏……39
川断……39
川椒……39
川椒目……39
川楝子……39
川槿子……39
川槿皮……39
及己……39
及泻……40

〔丶〕

广木香……40
广术……40
广石莲子……40
广东土牛膝……40
广东金线草……40
广地丁……40
广地龙……40
广防己……40
广豆根……40
广陈皮……40
广枣……40
广金钱草……40
广狗肾……40
广柑……40
广扁线……40
广胶……40
广橘……41

〔7〕

女儿茶……41
女贞子……41
女贞叶……41
女贞实……41
女肠……41
女萎……41
女菀……41
小九股牛……41
小飞扬草……41
小飞蓬……41
小天冬……42
小元宝草……42
小无心菜……42
小木通……42
小五爪龙……42
小见肿消……42
小火草……42
小巴豆……42
小水杨梅……42
小龙胆草……42
小叶万年青……42
小叶山绿豆……42
小叶冬青……42
小叶团花……42
小叶青……42
小叶枇杷……42
小叶金花草……42
小叶金腰带……42
小叶莲……42
小叶蛇总管……42
小田基黄……42
小白花蛇……42
小白撑……43
小对叶草……43
小矛香艾……43
小扣子兰……43
小托盘……43
小百部……43
小回回蒜……43
小伤力草……43
小血藤……43
小米……43
小米草……43
小汗淋草……43
小红米果……43
小红米果根……43
小红参……43
小红药……43
小红藤……43
小麦……43
小麦苗……43
小麦麸……43
小远志……43
小芭蕉头……43
小克麻……43
小还魂……44
小连翘……44
小皂荚……44
小辛……44
小良姜……44
小鸡菜……44
小驳骨……44
小青……44
小青皮……44
小青鱼胆……44
小青草……44
小青胆……44
小茅香……44
小罗伞……44
小和尚滕……44
小金钱草……44
小金樱……44
小金樱子……44
小肺筋草……44
小泽兰……44
小贯众……44
小春花……44
小胡麻……45
小草……45
小草根……45

小茴香……45
小茴香根……45
小香草……45
小鬼叉子……45
小独根……45
小独脚莲……45
小独蒜……45
小扁藤……45
小晕药……45
小铁子……45
小透骨草……45
小粉……45
小被单草……45
小通花……45
小通草……45
小黄药……45
小救驾……45
小野鸡尾……45
小旋花……45
小粒蒿……45
小巢菜……45
小黑药……46
小蒜……46
小蓟……46
小锦枝……46
小慈姑……46
小颠茄……46
小颠茄子……46
小辫儿……46
小藤仲……46
飞刀剑……46
飞天蜈蚣……46
飞天蟾蜍……46
飞龙掌血……46
飞奴……46
飞机草……46
飞扬草……46
飞扬蕨……47
飞来鹤……47
飞蛾叶……47
飞廉……47
马三七……47
马木通……47
马牙半支……47
马矢蒿……47
马兰……47
马头鱼……47
马耳草……47
马先蒿……47
马豆……47
马辛……47
马屁勃……47
马尾连……47
马尾黄连……48
马尿花……48
马尿泡……48
马陆……48
马茄子……48
马齿苋……48
马齿苋子……48
马齿菜……48
马明退……48
马乳……48
马宝……48
马勃……48
马结石……49
马核果……49
马根子草……49
马莲子……49
马钱子……49
马瓟瓜……49
马料豆……49
马料梢……49
马桑叶……49
马桑根……49
马黄七……49
马蓼……49
马蛇子……49
马蔺儿……49
马脚迹……50
马脚莲……50
马兜铃……50
马兜铃根……50
马兜铃藤……50
马蔺……50
马粟草……50
马楝子……50
马蓟……50
马雹儿子……50
马蜂窝……50
马骝卵……50
马骝藤果……50
马槟榔……50
马蔺子……50
马蔺叶……50
马蔺花……50
马蔺根……51
马蜞……51
马鞍叶……51
马鞍藤……51
马蹄……51
马蹄决明……51
马蹄防风……51
马蹄肺筋草……51
马蹄金……51
马蹄草……51
马蹄香……51
马鞭草……51
子午莲……51
子芩……51

四 画

〔一〕

王不留……51
王不留行……51
王瓜……52
王瓜子……52
王瓜根……52
王母牛……52
王连……52
王浆……52
开心果……52
开金锁……52
开喉剑……52
开喉箭……52
井口边草……52
天丁……52
天门冬……52
天牛……52
天文草……52
天水牛……53
天水蚁草……53
天平一枝香……53
天龙……53
天生子……53
天仙子……53
天仙藤……53
天瓜……53
天冬……53
天芝麻……53
天吊瓜……53
天虫……53
天竹叶……53
天竹黄……53
天名精……53
天花粉……53
天芥菜……54
天秃……54
天青地白……54
天青地白草……54
天茄子……54
天罗瓜……54
天竺子……54
天竺参……54
天竺黄……54
天河芋……54

天泡草……54
天泽香……54
天胡荽……54
天南星……54
天荞麦……55
天荠……55
天星草……55
天星根……55
天香炉……55
天桥草……55
天烛子……55
天浆壳……55
天萝水……55
天麻……55
天麻子果……55
天葵……55
天葵子……55
天鹅抱蛋……56
天蒜……56
天蓬子根……56
天蓬草……56
天鼠屎……56
天膏药……56
天螺蛳……56
元寸……56
元芩……56
元宝贝……56
元宝草……56
元参……56
元胡……56
元胡索……56
元修菜……56
无心草……56
无白草……56
无头藤……56
无灰木……56
无爷藤……56
无名异……56
无花果……56
无柄紫堇……56
无骨苎麻……56
无食子……56
无根草……56
无根藤……57
无娘藤……57
无荆根……57
无患子……57
无患子皮……57
无患树皮……57
无患树蕴……57
云母……57
云母石……57
云连……57
云苓……57
云实……58
云实根……58
云南连翘……58
云钩莲……58
云雾草……58
支连……58
木五加……58
木瓜……58
木半夏……58
木芍药……58
木耳……58
木防己……58
木芙蓉叶……58
木芙蓉花……59
木芙蓉根……59
木别子……59
木灵芝……59
木附子……59
木香……59
木香子……59
木姜子……59
木姜子根……59
木莲果……59
木莲藤……59
木贼……59
木贼草……60
木笔花……60
木通……60
木黄连……60
木患子……60
木梨花……60
木绵……60
木椒根……60
木棉皮……60
木棉花……60
木棉根……60
木蓝……60
木蒴藋……60
木馒头……60
木槿子……60
木槿皮……61
木槿花……61
木樟子……61
木蝴蝶……61
木蝴蝶树皮……61
木檽……61
木鳖子……61
五匹风……61
五气朝阳草……61
五爪龙……61
五爪龙草……62
五爪金龙……62
五月红……62
五月花……62
五凤草……62
五龙草……62
五叶灵芝……62
五叶草……62
五叶藤……62
五加皮……62
五皮风……62
五行草……62
五朵云……62
五色花……62
五色梅……62
五色梅花……62
五色梅根……62
五花血藤……63
五谷虫……63
五灵脂……63
五味子……63
五毒草……63
五指毛桃根……63
五指柑……63
五香八角……63
五香草……63
五倍子……63
五倍子苗……64
五倍根……64
五眼子……64
五眼果……64
五眼果树皮……64
五敛子……64
五棱子……64
不灰木……64
不怕日草……64
有刺根……64
太子参……64
太白石……64
太白参……64
太白树……64
太白洋参……64
太白黄连……64
太极子……64
犬尾草……64
扎蓬棵……64
瓦韦……64
瓦鸟柴……65
瓦弄子……65
瓦花……65
瓦松……65
瓦垄子……65

瓦参……65
瓦草……65
瓦塔……65
瓦楞子……65
车轮菜……65
车前子……65
车前实……65
车前草……65
车桑仔叶……65
牙皂……66
牙齿草……66
牙肿消……66
牙刷草……66
牙痛子……66
牙痛草……66
巨胜……66
巨胜苗……66

〔丨〕

止血丹……66
止血树……66
止血草……66
少辛……66
日日新……66
内红消……66
见气消……66
见风青……66
见风消……66
见血飞……66
见血住……66
见血清……66
见肿消……66
见毒消……66

〔丿〕

午时合……66
牛人参……66
牛大力……66
牛大黄……66
牛子……66
牛马藤……66
牛心茶……67
牛奶子树……67
牛奶根……67
牛奶柴……67
牛奶浆草……67
牛奶浆根……67
牛皮冻……67
牛皮胶……67
牛皮菜……67
牛耳大黄……67
牛西西……67
牛至……67
牛肉……67
牛舌大黄……68
牛舌头……68
牛舌头草……68
牛舌头菜……68
牛舌草……68
牛舌黄……68
牛舌癀……68
牛李……68
牛李根……68
牛含水……68
牛肝……68
牛角七……68
牛角花……68
牛角胎……68
牛角鳃……68
牛角藤……68
牛尾七……68
牛尾巴花……68
牛尾花子……68
牛尾参……68
牛尾菜……68
牛尾蕨……68
牛刺笋菜……68
牛刺犁……69
牛乳……69
牛虱子……69
牛参……69
牛细辛……69
牛迭肚……69
牛虻……69
牛胆……69
牛屎虫……69
牛顿草……69
牛黄……69
牛筋条根……69
牛筋草……69
牛蒡子……69
牛蒡根……70
牛腿子……70
牛膝……70
牛髓……70
气包……70
气藤……70
手儿参……70
手爪甲……70
手掌参……70
毛七公……70
毛七哥……70
毛大丁草……70
毛大丁草根……70
毛山茶……71
毛天仙果根……71
毛爪参……71
毛风藤……71
毛叶仙桥……71
毛冬青……71
毛冬青叶……71
毛召……71
毛地梨……71
毛老虎……71
毛芋……71
毛血藤……71
毛青杠……71
毛刷子……71
毛建草……71
毛姑……71
毛姑朵花……71
毛茵陈……71
毛莨……71
毛荔枝……71
毛姜……71
毛姜黄……72
毛柴子……72
毛凉伞……72
毛黄连……72
毛梨……72
毛葫芦……72
毛慈姑……72
毛蓼……72
毛篓箕藤……72
毛漆……72
毛藤果……72
毛麝香……72
升麻……72
升登……72
长生花……72
长生果……72
长生草……72
长虫七……72
长春七……72
长春花……72
长瓠……73
长深根……73
化血莲……73
化州陈皮……73
化骨莲……73
化食丹……73
化痰青……73
化橘红……73
片子姜黄……73

片姜黄……73
片脑……73
反背红……73
反鼻蛇……73
分心木……73
分经草……73
公丁香……73
公道老……73
月下红……73
月月红……73
月石……74
月季红……74
月季花……74
月亮柴……74
月橘……74
丹皮……74
丹参……74
丹荔……74
丹砂……74
丹粉……74
凤车草……74
凤气草……74
凤化硝……74
凤茄花……74
凤轮菜……74
凤药……74
凤盏……74
凤栗壳……74
凤湿草……74
凤箱树叶……74
凤箱树根……75
凤藤……75
凤仙子……75
凤仙花……75
凤仙花子……75
凤仙根……75
凤仙透骨草……75
凤交尾……75
凤芽蒿……75
凤尾连……75
凤尾伸筋……75
凤尾草……75
凤尾蕨……75
凤尾蕉花……75
凤眼果……75
凤眼草……76
凤眼前仁……76
凤凰衣……76
凤凰肠……76
凤凰草……76
凤凰退……76
凤凰蛋……76
凤颈草……76
乌口仔……76
乌云盖雪……76
乌牛子……76
乌龙须……76
乌龙根……76
乌龙摆尾叶……76
乌龙摆尾根……76
乌芋……76
乌豆……76
乌豆衣……76
乌豆草……76
乌饭果……76
乌角……76
乌疔草……76
乌尾丁……76
乌鸡……76
乌鸢……76
乌金藤……76
乌鱼……76
乌泡叶……76
乌泡刺叶……76
乌泡刺根……77
乌泡根……77
乌茶子……77
乌药……77
乌药叶……77
乌韭……77
乌骨鸡……77
乌骨藤……77
乌柏子……77
乌柏木根皮……77
乌柏叶……77
乌贼鱼骨……78
乌贼鱼腹中墨……78
乌贼墨……78
乌扇……78
乌梅……78
乌梢蛇……78
乌菜……78
乌蛇……78
乌蛇胆……78
乌脚枪……78
乌麻子……78
乌麻花……78
乌巢子……78
乌棒子……78
乌蒜……79
乌蔹莓……79
乌鲗骨……79
乌檀……79
乌蔗子……79

〔丶〕

六月冻……79
六月凌……79
六月雪……79
六月寒……79
六月霜……79
六方疳积草……79
六耳棱……79
六达草……79
六曲……79
六谷米……79
六轴子……79
六神曲……79
六棱菊……79
文仙果……79
文先果……79
文冠木……80
文钱红……80
方通草……80
火把花……80
火把果……80
火草……80
火殃笋……80
火炭母草……80
火炭母草根……80
火绒草……80
火秧笋……80
火烧草……80
火消……80
火烟子……80
火麻仁……80
火焰草……81
斗篷草……81

〔ㄱ〕

引水蕉……81
引线包……81
巴山虎……81
巴豆杏仁……81
巴达杏仁……81
巴豆……81
巴豆叶……81
巴豆树根……81
巴岩草……82
巴岩香……82
巴果……82
巴戟……82
巴戟天……82
双头粘……82
双花……82
双参……82

双眼龙……82
双眼龙叶……82
双瑚草……82
孔雀毛……82
孔雀尾……82
水丁香……82
水八角……82
水三七……82
水飞蓟……82
水飞雉……82
水马……82
水马香果……82
水马桑……82
水木通……83
水车藤……83
水牛角……83
水牛膝……83
水毛茛……83
水玉簪……83
水石……83
水石榴……83
水龙骨……83
水龙胆……83
水田七……83
水仙子……83
水仙根……83
水仙桃草……83
水白菜……83
水瓜……83
水冬瓜……83
水兰……84
水半夏……84
水对叶莲……84
水百足……84
水吐丝……84
水团花……84
水红花……84
水红花子……84
水杨柳……84
水杨梅……84
水杨梅根……84
水豆瓣……84
水芙蓉……84
水苋菜……84
水芹……85
水芹菜……85
水苏……85
水皂角……85
水鸡仔……85
水板凳……85
水苦荬……85
水侧耳……85
水瓮菜……85
水金铃……85
水狗肝……85
水泻……85
水胡豆……85
水胡椒……85
水胡满……85
水胡满根……85
水荆芥……85
水荭子……85
水荭花……86
水香附……86
水剑草……86
水桐树……86
水桐树皮……86
水莴苣……86
水翁花……86
水胶……86
水浮钱……86
水案板……86
水通草……86
水黄连……86
水黄杨木……86
水菖蒲……86
水萝卜……86
水萍……86
水堇……86
水接骨丹……86
水银粉……86
水银霜……87
水旋复……87
水麻叶……87
水麻贴……87
水梁木……87
水雁……87
水蛭……87
水晶凉粉……87
水鹅掌……87
水筋骨……87
水蓬稞……87
水蒲桃……87
水蜈蚣……87
水锦花……87
水雍花……87
水蔓青……87
水碱……87
水蜡烛……87
水蜡烛实……87
水辣椒……87
水蕉……87
水蕹菜……87
水镜草……88

五 画

〔一〕

玉龙盘……88
玉龙鞭……88
玉竹……88
玉米芯……88
玉米轴……88
玉米须……88
玉如意……88
玉麦须……88
玉芙蓉……88
玉苏子……88
玉英……88
玉果……88
玉金……89
玉郎鞭……89
玉带风……89
玉带草……89
玉桂……89
玉桔梗……89
玉绣球……89
玉接骨……89
玉蕊花……89
玉蝴蝶……89
玉簪叶……89
玉簪花……89
玉簪花根……89
末药……89
功劳叶……89
功劳根……89
艾片……89
艾叶……89
艾纳香……89
艾纳香根……90
节节红……90
节节花……90
节节草……90
节节珠……90
节骨草……90
节菖蒲……90
甘中黄……90
甘石……90
甘瓜子……90
甘青青兰……90
甘松……90
甘泽……90
甘草……90
甘草黄……91
甘菊……91

甘瓠……91
甘葛……91
甘遂……91
甘蒲……91
甘蔗……91
甘蔗皮……91
甘露儿……91
甘露子……91
甘露秧……91
古山龙……91
古羊藤……91
古钩藤……92
左壳……92
左扭……92
左牡蛎……92
左转藤……92
左转藤灰……92
左秦艽……92
石三七……92
石上柏……92
石上香……92
石上莲……92
石门坎……92
石韦……92
石云茶……92
石见穿……92
石龙子……92
石龙芽草……93
石龙芮……93
石龙藤……93
石打穿……93
石仙桃……93
石白菜……93
石瓜子……93
石兰……93
石半夏……93
石皮……93
石灰……93
石灰草……93
石吊兰……93
石竹子……93
石竹根……94
石衣……94
石决明……94
石祁蛇……94
石防风……94
石豆……94
石花……94
石花菜……94
石松子……94
石苔花……94
石卷柏……94
石柏……94
石珊瑚……94
石胡椒……94
石南叶……94
石南藤……94
石荠苧……95
石指甲……95
石钟乳……95
石香薷……95
石胆……95
石穿盘……95
石豇豆……95
石蚕……95
石莲……95
石荷叶……95
石莼……95
石钻子……95
石秤砣……95
石菖蒲……95
石黄……95
石荚肉……96
石斛……96
石椒草……96
石硫黄……96
石棠花……96
石猴子……96
石窝蛋……96
石楠叶……96
石蒜……96
石蒟……96
石榴皮……96
石榴壳……96
石榴花……96
石榴根……97
石碱……97
石辣椒……97
石膏……97
石橄榄……97
石蕊……97
石燕……97
石濡……97
石蟹……97
右旋藤……97
布荆子……97
布渣叶……97
龙瓜草头……97
龙头草……97
龙舌三尖刀……97
龙舌叶……97
龙舌草……98
龙衣……98
龙芽草根……98
龙利叶……98
龙角藤……98
龙齿……98
龙虎草……98
龙骨……98
龙骨风……98
龙须草……98
龙须菜……98
龙胆……98
龙胆白薇……99
龙胆地丁……99
龙胆草……99
龙涎香……99
龙珠……99
龙脑冰片……99
龙眼叶……99
龙眼肉……99
龙眼树皮……99
龙眼核……99
龙眼根……100
龙船花……100
龙船花根……100
龙葵……100
龙葵子……100
龙葵根……100
龙腹香……100
龙蜜瓜……100
龙鳞草……100
平贝母……100
平地木……100
打不死……100
打枪子……100
打官司草……100
打毒金……100
打结花……100
打破碗花花……100
打鼓子……101
打碗棵……101
扑地金钟……101
东风菜……101
东风橘根……101
东丹……101
东方蓼……101
东北蛔蒿……101
东瓜……101

〔 丨 〕

北五加皮……101
北五味子……101
北刘寄奴……101
北豆根……101
北芫花……101

北沙参…… 101
北败酱…… 102
北细辛…… 102
北庭砂…… 102
北野菊…… 102
北寄生…… 102
北鲜皮…… 102
北鹤虱…… 102
卡密…… 102
卡斯纳…… 102
卢都子…… 102
卢橘…… 102
叶下双桃…… 102
叶下白…… 102
叶下红…… 102
叶上花…… 102
叶上花根…… 102
叶上果…… 102
叶上果根…… 102
叶上珠…… 102
叶上珠根…… 102
叶生根…… 102
叶后珠…… 103
叶抱枝…… 103
叭哒杏仁…… 103
叫铃子…… 103
叫梨子…… 103
号筒杆…… 103
号筒草…… 103
申枣…… 103
申姜…… 103
由甲草…… 103
田七…… 103
田边菊…… 103
田字草…… 103
田鸡爪…… 103
田鸡油…… 103
田鸡草…… 103
田萍…… 103
田菠菜…… 103
田基黄…… 103
田蓼草…… 103
田螺…… 103
田螺水…… 103
田螺壳…… 103
四儿风…… 103
四川大金钱草… 103
四匹瓦…… 103
四月子…… 103
四方草…… 103
四方拳草…… 103
四方麻…… 104
四方蒿…… 104
四方藤…… 104
四叶七…… 104
四叶对…… 104
四叶苹…… 104
四叶金…… 104
四叶参…… 104
四叶细辛…… 104
四叶草…… 104
四叶胆…… 104
四叶莲…… 104
四叶黄…… 104
四叶麻…… 104
四皮麻…… 104
四块瓦…… 104
四时茶…… 104
四季花…… 104
四季青…… 104
四季菜…… 105
四面戟…… 105
四眼叶…… 105
四脚蛇…… 105
四脚喜…… 105
四棱子…… 105
四棱杆蒿…… 105
四棱草…… 105
四棱麻…… 105
四棱锋…… 105
四棱蒿…… 105
四楞筋骨草…… 105
四蕊三角瓣花… 105

〔 J 〕

生地黄…… 105
生扯拢…… 105
生姜…… 105
生姜皮…… 105
生姜衣…… 105
生晒参…… 105
生等…… 105
生藤…… 106
禾雀舌…… 106
禾镰草…… 106
代代花…… 106
代赭石…… 106
仙人杖…… 106
仙人冻…… 106
仙人草…… 106
仙人掌…… 106
仙白草…… 106
仙灵脾…… 106
仙茅…… 106
仙茅参…… 106
仙草…… 106
仙桥草…… 106
仙桃草…… 106
仙遗粮…… 107
仙鹤草…… 107
仙鹤草根芽…… 107
仙蟾…… 107
白三七…… 107
白马尾…… 107
白马骨…… 107
白马胎…… 107
白云母…… 107
白云花根…… 107
白云草…… 107
白云香…… 107
白木耳…… 107
白木香…… 108
白木通…… 108
白牛胆…… 108
白牛膝…… 108
白毛夏枯草…… 108
白毛蛇…… 108
白毛藤…… 108
白毛藤根…… 108
白及…… 108
白火丹草…… 109
白丑…… 109
白水鸡…… 109
白玉兰…… 109
白术…… 109
白石…… 109
白石英…… 109
白石参…… 109
白石脂…… 109
白龙须…… 109
白龙粉…… 109
白龙船花…… 109
白占…… 109
白叶藤…… 109
白四轮风…… 109
白瓜…… 109
白瓜子…… 109
白瓜皮…… 109
白兰…… 109
白兰花…… 109
白头公…… 109
白头草…… 109
白头翁…… 110
白头翁花…… 110
白头翁茎叶…… 110
白头翁草…… 110

白对叶肾…… 110
白地黄瓜…… 110
白地榆…… 110
白朴根…… 110
白芍…… 110
白芍药…… 110
白耳子…… 110
白灯笼…… 110
白羊桃…… 110
白红菜…… 110
白杨皮…… 110
白杨树皮…… 110
白豆蔻…… 110
白豆蔻壳…… 111
白芜荑…… 111
白芷…… 111
白花丹…… 111
白花石竹…… 111
白花白头翁…… 111
白花岩陀…… 111
白花珍珠草…… 111
白花鬼灯笼…… 111
白花射干…… 111
白花夏枯草…… 111
白花益母草…… 112
白花菜…… 112
白花菜子…… 112
白花蛇…… 112
白花蛇舌草…… 112
白花矮陀陀…… 112
白花箭…… 112
白芥子…… 112
白芨…… 112
白苏子…… 112
白苏叶…… 112
白苏梗…… 113
白伸筋…… 113
白皂药…… 113
白余粮…… 113
白饭花…… 113
白冷风…… 113
白沙参…… 113
白附子…… 113
白鸡儿…… 113
白环藤…… 113
白苹…… 113
白茅花…… 113
白茅根…… 113
白矾…… 113
白果…… 113
白果叶…… 114
白芍花叶…… 114
白芍根…… 114
白芍蓬…… 114
白侧耳…… 114
白金条…… 114
白鱼尾…… 114
白河车…… 114
白屈菜…… 114
白屈菜根…… 114
白参…… 115
白胡椒…… 115
白茯苓…… 115
白茨叶…… 115
白药子…… 115
白药根…… 115
白药脂…… 115
白残花…… 115
白面风…… 115
白面水鸡…… 115
白面姑…… 115
白背三七…… 115
白背风…… 115
白背叶…… 115
白背叶根…… 115
白背丝绸…… 115
白背枫…… 115
白骨藤…… 115
白洋参…… 116
白姜…… 116
白前…… 116
白首乌…… 116
白扁豆…… 116
白桐叶…… 116
白桐皮…… 116
白桃树…… 116
白根…… 116
白射干…… 116
白狼毒…… 116
白胶…… 116
白胶香…… 116
白粉霜…… 116
白浆藤…… 116
白调羹…… 116
白通草…… 116
白斑鸠窝…… 116
白梗通…… 116
白梅花…… 116
白菝葜…… 116
白菖…… 116
白菀…… 117
白硇砂…… 117
白雪…… 117
白雪花…… 117
白接骨…… 117
白银杏…… 117
白甜蜜蜜…… 117
白麻…… 117
白蒂梅…… 117
白棘…… 117
白紫草…… 117
白榄…… 117
白榄根…… 117
白幕…… 117
白蒺藜…… 117
白蔹…… 117
白蔻…… 117
白蔻仁…… 117
白蔻衣…… 117
白蜡…… 117
白膜叶…… 117
白膜根…… 117
白鲜皮…… 117
白蜜…… 118
白蝴蝶…… 118
白僵蚕…… 118
白鹤仙…… 118
白鹤花…… 118
白鹤藤…… 118
白薇…… 118
白镜子…… 118
白檀…… 118
白螺壳…… 118
白螺蛳壳…… 118
白鳗…… 118
瓜丁…… 118
瓜子金…… 118
瓜子草…… 119
瓜子莲…… 119
瓜子藤…… 119
瓜蒂…… 119
瓜蒌…… 119
瓜蒌仁…… 119
瓜蒌皮…… 119
瓜槌草…… 119
瓜瓣…… 119
丛柏叶…… 119
冬术…… 119
冬瓜…… 119
冬瓜子…… 119
冬瓜叶…… 119
冬瓜皮…… 119
冬瓜丝…… 119
冬瓜藤…… 119
冬瓜瓤…… 119
冬地梅…… 120

冬虫草…… 120
冬虫夏草…… 120
冬均子…… 120
冬豆子…… 120
冬花…… 120
冬苋菜…… 120
冬青子…… 120
冬青叶…… 120
冬青实…… 120
冬凌草…… 120
冬桑叶…… 120
冬葵子…… 120
冬葵叶…… 121
冬葵根…… 121
鸟不宿…… 121
鸟不踏…… 121
包公藤…… 121
包谷心…… 121

〔丶〕

立制石…… 121
玄武版…… 121
玄英石…… 121
玄明粉…… 121
玄参…… 121
玄胡索…… 121
玄精石…… 121
汉防己…… 121
汉桃叶…… 121
兰花参…… 121
兰花根…… 121
兰香…… 121
兰香子…… 121
兰香草…… 121
半天吊…… 122
半边风药…… 122
半边伞…… 122
半边花…… 122
半边莲…… 122
半边梳…… 122
半边旗…… 122
半边蕨…… 122
半年红…… 122
半含春…… 122
半枝莲…… 122
半枫荷…… 122
半架牛…… 122
半夏…… 123
半夏曲…… 123
头顶一颗珠…… 123
头晕药…… 123
头痛花…… 123

〔7〕

奶汁草…… 123
奶母草…… 123
奶米…… 123
奶参…… 123
奶孩儿…… 123
奶浆果…… 123
奶浆草…… 123
奶浆柴胡…… 123
奶浆藤…… 123
奶蓟…… 123
奴柘刺…… 123
皮硝…… 123
发菜…… 123
发落海…… 123
边兰…… 123
对月草…… 123
对节树根…… 123
对叶四块瓦…… 124
对叶草…… 124
对叶莲…… 124
对对花…… 124
对对参…… 124
对座草…… 124
对着钱…… 124
圣生梅…… 124
台乌药…… 124
台党参…… 124
台湾柳…… 124
矛盾草…… 124
辽沙参…… 124
丝毛草根…… 124
丝叶…… 124
丝瓜…… 124
丝瓜子…… 124
丝瓜水…… 124
丝瓜叶…… 124
丝瓜皮…… 125
丝瓜网…… 125
丝瓜壳…… 125
丝瓜花…… 125
丝瓜络…… 125
丝瓜根…… 125
丝瓜筋…… 125
丝瓜藤…… 125
丝连皮…… 125
丝蕊…… 125
丝棉木…… 125
丝棉皮…… 125
母丁香…… 125
母草…… 125

六 画

〔一〕

戎盐…… 126
地丁草…… 126
地不荣…… 126
地不容…… 126
地毛球…… 126
地乌龟…… 126
地节…… 126
地节根…… 126
地石榴…… 126
地龙…… 126
地龙骨…… 126
地仙苗…… 126
地白草…… 126
地瓜…… 126
地瓜儿…… 126
地瓜根…… 127
地瓜藤…… 127
地耳草…… 127
地羊鹊…… 127
地米花…… 127
地麦草…… 127
地芙蓉…… 127
地花椒…… 127
地连钱…… 127
地冻风…… 127
地青杠…… 127
地枇杷…… 127
地板藤…… 127
地松…… 127
地松柏…… 127
地枫皮…… 127
地苦胆…… 127
地茄…… 127
地茄子…… 127
地茄子草…… 128
地茄根…… 128
地顶草…… 128
地罗汉…… 128
地侧柏…… 128
地肤子…… 128
地肤苗…… 128
地肤草…… 128
地狗…… 128
地油根…… 128
地虱…… 128
地贯草…… 128
地参…… 128
地枯萝…… 128

地柏叶……128
地柏枝……128
地柏草……128
地胡椒……128
地茨菇……128
地拱……128
地骨……128
地骨皮……128
地牯牛……129
地牯牛草……129
地钮子……129
地胆头……129
地扁蛇……129
地蚕……129
地蚕子……129
地莓……129
地桃花……129
地栗……129
地栗梗……129
地笋……129
地浮萍……129
地苍……129
地苍根……129
地菅……129
地黄木……129
地黄叶……130
地黄连……130
地黄姜……130
地椒……130
地棕根……130
地朝阳……130
地筋……130
地蒲壳……130
地榆……130
地雷……130
地蜈蚣……130
地蜂子……130
地锦……130
地锦草……130
地稔……131
地稔根……131
地槟榔……131
地骷髅……131
地精……131
地藕……131
地螺丝……131
地鳖虫……131
朴硝……131
芋儿七……131
芋头……131
芋头花……132
芋奶……132
芋苗花……132
芋茎……132
芋根……132
芋荷杆……132
芋梗……132
芒芋……132
芒果……132
芒种花……132
芒硝……132
芝麻荄……132
芝麻响铃铃……132
芎藭……132
芎藭苗……132
吉吉麻……132
吉祥草……132
老白毛……132
老头草……132
老母虫……133
老母猪藤……133
老君须……133
老虎爪……133
老虎芋……133
老虎花……133
老虎刺……133
老虎刺叶……133
老虎脚迹草……133
老虎獠子……133
老鸦枕头……133
老鸦胆……133
老鸦眼睛藤……133
老鸦蒜……133
老鸦糊……133
老鸹头……133
老鸹筋……133
老蒙花……133
老蜗生……133
老鼠耳……133
老鼠花……133
老鼠尾……133
老鼠刺……133
老鼠拉冬瓜……133
老鼠笋……133
老鼠乳……134
老腰弓……134
老鹳草……134
老鹳嘴……134
耳环草……134
耳挖草……134
耳响草……134
耳聋草……134
亚片……134
亚乎奴……134
亚麻……134
亚麻子……134
亚麻仁……134
西五味子……134
西瓜……134
西瓜子仁……134
西瓜皮……135
西瓜虫……135
西瓜硝……135
西瓜翠……135
西瓜翠衣……135
西瓜霜……135
西加皮……135
西伯利亚白刺……135
西青果……135
西国草……135
西河柳……135
西参……135
西洋参……135
西黄……135
西番莲……135
西藏橄榄……135
列当……135
百日红……135
百叶草……135
百合……135
百合花……136
百步蛇……136
百条根……136
百尾笋……136
百枝……136
百乳草……136
百草丹……136
百草霜……136
百药煎……136
百部……136
百眼藤……136
百脚……136
百解……137
百解头……137
百解药……137
百解藤……137
百蕊草……137
有毛老鸦嘴……137
灰包菌……137
灰涤菜……137
灰碱……137
灰藿……137
夹竹桃……137
夹板菜……137
夹蛇龟……137
扛板归……137

扦扦活…… 137
托盘…… 137
托盘根…… 138
扫把枝…… 138
扫帚子…… 138
扫帚菜子…… 138
扫盆…… 138
尧韭…… 138
过山风…… 138
过山龙…… 138
过山枫…… 138
过山香…… 138
过冬青…… 138
过江龙…… 138
过坛龙…… 138
过岗龙…… 138
过塘蛇…… 138
过塘莲…… 138

〔丨〕

尖尾风…… 138
尖惊药…… 138
光风草…… 138
光皮木瓜…… 138
光枝勾儿茶…… 138
光明子…… 139
光明草…… 139
光珀…… 139
光背勾儿茶…… 139
光菇…… 139
光慈姑…… 139
光藕节…… 139
当门子…… 139
当归…… 139
当药…… 139
吐丝子…… 139
吐血草…… 139
吸吸草…… 139
吸铁石…… 139
吸壁藤…… 139
刚子…… 139
吊马桩…… 139
吊风根…… 139
吊瓜…… 139
吊吊黄…… 139
吊线风…… 139
吊钟花…… 139
吊菜子…… 140
曲节草…… 140
曲莲…… 140
曲蟮…… 140
团鱼甲…… 140
回生草…… 140
回头青…… 140
回头草…… 140
回回蒜…… 140
回阳草…… 140
虫白蜡…… 140
虫花…… 140
虫草…… 140
虫胶…… 140
虫蜡…… 140
网虫…… 140
网络鸡血藤…… 140
肉苁蓉…… 140
肉豆蔻…… 140
肉皂角…… 141
肉皂荚…… 141
肉枣…… 141
肉果…… 141
肉桂…… 141
肉桂子…… 141
肉馄饨草…… 141
肉矮陀陀…… 141
肉螃蟹…… 141

〔丿〕

竹二青…… 141
竹三七…… 141
竹木…… 141
竹节七…… 141
竹节三七…… 141
竹节白附…… 142
竹节地丁…… 142
竹节参…… 142
竹节草…… 142
竹节香附…… 142
竹节藤…… 142
竹叶…… 142
竹叶青…… 142
竹叶菜…… 142
竹叶椒…… 142
竹叶椒根…… 142
竹汁…… 142
竹皮…… 142
竹丝鸡…… 142
竹沥…… 142
竹林标…… 142
竹林胃…… 143
竹苓…… 142
竹油…… 143
竹茹…… 143
竹根七…… 143
竹根参…… 143
竹铃芝…… 143
竹黄…… 143
竹筒菜…… 143
竹篙草…… 143
朱红…… 143
朱赤豆…… 143
朱果…… 143
朱姑…… 143
朱砂…… 143
朱砂七…… 143
朱砂草…… 143
朱砂根…… 143
朱砂莲…… 144
丢了棒…… 144
伏龙肝…… 144
伏地延胡索…… 144
伏地菜…… 144
伏花…… 144
伤寒草…… 144
仰天钟…… 144
伊贝母…… 144
华山矾…… 144
华山矾根…… 144
华山参…… 144
华灰木…… 145
华良姜…… 145
华荠苧…… 145
华南地丁…… 145
延胡…… 145
延胡索…… 145
自扣草…… 145
自灸草…… 145
自消溶…… 145
自然铜…… 146
血三七…… 146
血木通…… 146
血见愁…… 146
血风藤…… 146
血师…… 146
血当归…… 146
血余炭…… 146
血参根…… 146
血珀…… 146
血草…… 146
血盆草…… 146
血蒌…… 146
血竭…… 146
血满草…… 146
血箭草…… 147
血藤…… 147
向天草…… 147
向天盏…… 147

向天葫芦…… 147
向日葵子…… 147
向日葵花托…… 147
向日葵花盘…… 147
向日葵茎髓…… 147
向日葵饼…… 147
向日葵根…… 147
向日葵梗心…… 148
向阳花根…… 148
全叶青兰…… 148
全瓜蒌…… 148
全虫…… 148
全福花…… 148
全蝎…… 148
合子…… 148
合子草…… 148
合包花…… 148
合欢皮…… 148
合欢花…… 148
合明草…… 148
合昏皮…… 148
合萌…… 148
合掌草…… 149
合掌消…… 149
杀虫芥…… 149
多须公…… 149
争墙风…… 149

〔丶〕

刘芙蓉草…… 149
刘寄奴…… 149
齐头蒿…… 149
闭门草…… 149
问荆…… 149
灯心…… 149
灯心草…… 149
灯台树…… 149
灯草…… 150
灯盏花…… 150
灯盏细辛…… 150
灯笼果…… 150
灯笼草…… 150
决明子…… 150
冰片…… 150
冰片艾…… 150
冰郎花…… 150
冰粉…… 150
冰凌草…… 151
冰凉花…… 151
冰糖草…… 151
汗苏麻…… 151
江子…… 151
江苏金钱草…… 151
江剪刀草…… 151
汤罐头草…… 151
壮阳草…… 151
守宫…… 151
安乐菜…… 151
安息香…… 151
羊儿草…… 151
羊不挨…… 151
羊甘石…… 151
羊石子…… 151
羊外肾…… 151
羊奶奶…… 151
羊奶根…… 152
羊耳三稔…… 152
羊耳朵叶…… 152
羊耳朵朵尖…… 152
羊耳菊…… 152
羊肉…… 152
羊血…… 152
羊负来…… 152
羊肝…… 152
羊角豆…… 152
羊角扭…… 152
羊角纽…… 152
羊角草…… 152
羊角菜…… 152
羊角蒿…… 153
羊角藕…… 153
羊角藤…… 153
羊尿泡…… 153
羊刺蜜…… 153
羊齿天冬…… 153
羊肾…… 153
羊乳…… 153
羊肺…… 153
羊胡子根…… 153
羊骨…… 153
羊食子根…… 153
羊胆…… 153
羊须草…… 153
羊哀…… 153
羊屎条根…… 153
羊屎果…… 153
羊屎柴根…… 153
羊桃…… 153
羊起石…… 153
羊胲子…… 154
羊脂…… 154
羊眼豆…… 154
羊脬…… 154
羊婆奶…… 154
羊蹄蹋根…… 154
羊蹄…… 154
羊蹄叶…… 154
羊蹄草…… 154
羊膻七…… 154
羊膻草…… 154
羊髓…… 154
并头草…… 154
关木通…… 154
关白附…… 154
关防风…… 155
关黄柏…… 155
米仁…… 155
米仁根…… 155
米皮糠…… 155
米秕…… 155
米浆水…… 155
米筛花…… 155
米糠…… 155
祁木香…… 155
祁州一枝蒿…… 155
农吉利…… 155

〔7〕

寻风藤…… 155
寻骨风…… 155
异叶青兰…… 155
阳桃…… 155
阳桃叶…… 156
阳桃根…… 156
阳起石…… 156
阳雀花…… 156
阳雀花根…… 156
阳藿…… 156
阴地蕨…… 156
阴阳参…… 156
阴阳莲…… 156
阴香皮…… 156
阴桃子…… 156
阴精石…… 156
防己…… 156
防风…… 156
如意花…… 157
如意草…… 157
戏铁石…… 157
观音花…… 157
观音柳…… 157
羽叶三七…… 157
羽叶竹节参…… 157
买麻藤…… 157
红三七…… 157
红土…… 157

红大戟…… 157
红山花…… 157
红小豆…… 157
红子…… 157
红子根…… 157
红马蹄草…… 158
红木香…… 158
红内消…… 158
红毛七…… 158
红毛大戟…… 158
红毛走马胎…… 158
红毛毡…… 158
红火老鸦酸草… 158
红心灰藿…… 158
红石胡荽…… 158
红石根…… 158
红石薯…… 158
红龙船花…… 158
红四方藤…… 158
红白二丸…… 158
红头草…… 158
红皮…… 159
红母鸡草…… 159
红丝毛…… 159
红地胆…… 159
红芋荷…… 159
红芍药…… 159
红曲…… 159
红血儿…… 159
红米…… 159
红豆…… 159
红豆蔻…… 159
红花…… 159
红花艾…… 159
红花酢浆草…… 159
红芽大戟…… 159
红旱莲…… 159
红苓蕴…… 159
红枣…… 160
红岩七…… 160
红果子…… 160
红法落海…… 160
红油菜…… 160
红泽兰…… 160
红姑娘…… 160
红参…… 160
红南瓜…… 160
红茴香…… 160
红茶花…… 160
红茨藤…… 160
红药…… 160
红药子…… 160
红砖草…… 160
红背叶…… 160
红胆…… 160
红独活…… 160
红总管…… 160
红孩儿…… 160
红珠草…… 160
红桐…… 160
红根…… 160
红根仔…… 160
红根草…… 160
红柴…… 161
红党参…… 161
红狼毒…… 161
红浮萍…… 161
红浮漂…… 161
红琐梅…… 161
红梗草…… 161
红硇砂…… 161
红蛇根…… 161
红麻…… 161
红麻菠萝…… 161
红绵藤…… 161
红葡萄…… 161
红紫珠…… 161
红景天…… 161
红蓝花…… 161
红蔻…… 161
红蜻蜓叶…… 161
红管药…… 161
红樱花…… 161
红暴牙狼…… 161
红藤…… 162
红癫茄…… 162
巡骨风…… 162

七 画

〔一〕

寿星柑根…… 162
麦门冬…… 162
麦芽…… 162
麦芽糖…… 162
麦参…… 162
麦黄草…… 162
麦斛…… 162
麦粒团…… 162
麦蓝子…… 162
麦穗红…… 162
麦蘖…… 162
远志…… 163
远志筒…… 163
坎气…… 163
均姜…… 163
块根木蓝…… 163
杠板归…… 163
杠柳皮…… 163
杜牛膝…… 163
杜瓜…… 163
杜仲…… 163
杜茎山…… 163
杜鹃花…… 164
杜鹃花叶…… 164
杜鹃花根…… 164
杜衡…… 164
杉子…… 164
杉木…… 164
杉木节…… 164
杉木皮…… 164
杉木油…… 164
杉木根…… 164
杉节…… 164
杉叶…… 164
杉皮…… 165
杉材…… 165
杉果…… 165
杉树根…… 165
杉塔…… 165
杓儿菜…… 165
杓菜…… 165
杧果…… 165
杧果叶…… 165
杧果核…… 165
杞子…… 165
杨花…… 165
杨波叶…… 165
杨树花…… 165
杨桃…… 165
杨梅…… 165
杨梅根…… 166
杨梅树皮…… 166
豆卷…… 166
豆须子…… 166
豆豉…… 166
豆豉姜…… 166
豆豉菜根…… 166
豆菜…… 166
豆寄生…… 166
豆渣草…… 166
豆渣菜…… 166
豆稔干…… 166
豆蔻…… 166
豆蔻壳…… 166
豆瓣柴…… 166
两叶豆苗…… 166

两头尖…… 166
两头根…… 166
两面针…… 166
丽枝…… 166
克蛇龟…… 166
汞粉…… 166
壳莱…… 166
壳槟榔…… 166
芙蓉花…… 166
芙蓉花叶…… 167
芫花…… 167
芫花根…… 167
芫条花…… 167
芫青…… 167
芫荽…… 167
芫荽子…… 167
芜荑…… 167
芜菁…… 167
芜菁子…… 168
苇茎…… 168
苇根…… 168
芸皮…… 168
芸红…… 168
芸香草…… 168
芸薹…… 168
芸薹子…… 168
芸薹菜…… 168
苣荬菜…… 168
苋实…… 168
苋根…… 169
苋菜子…… 169
花木通…… 169
花龙骨…… 169
花叶细辛…… 169
花叶矮沱沱…… 169
花生…… 169
花生衣…… 169
花生草…… 169
花扫条…… 169
花壳虫…… 169
花乳石…… 169
花粉头…… 169
花脸莽…… 169
花斑毛…… 169
花椒…… 169
花椒叶…… 169
花碱…… 169
花旗参…… 169
花蕊石…… 169
花蝴蝶…… 170
花蝴蝶根…… 170
芹叶钩吻…… 170
芹菜…… 170
芥子…… 170
芥菜…… 170
芥菜子…… 170
苍子…… 170
苍子棵…… 170
苍术…… 170
苍耳…… 170
苍耳子…… 171
苍耳虫…… 171
苍耳根…… 171
苍耳蠹虫…… 171
苍条鱼鳖…… 171
苍棵子…… 171
苍蝇花…… 171
苍蝇翼…… 171
茯实…… 171
芳香草…… 171
芳樟…… 171
苎根…… 171
苎麻根…… 171
芦子…… 172
芦巴…… 172
芦叶…… 172
芦尖…… 172
芦竹根…… 172
芦竹笋…… 172
芦芽根…… 172
芦花…… 172
芦茎…… 172
芦荟…… 172
芦荻头…… 172
芦根…… 172
芦柴根…… 173
芦笋…… 173
芦通…… 173
芦蓬茸…… 173
芦箬…… 173
芭蕉汁…… 173
芭蕉头…… 173
芭蕉花…… 173
芭蕉油…… 173
芭蕉树水…… 173
芭蕉根…… 173
苏子…… 173
苏木…… 173
苏方木…… 173
苏叶…… 173
苏头…… 173
苏合油…… 173
苏合香…… 173
苏合香油…… 174
苏枋…… 174
苏罗子…… 174
苏梗…… 174
苏仁…… 174
走马风…… 174
走马芹…… 174
走马胎…… 174
走马箭…… 174
走胆药…… 174
走游草…… 174
赤小豆…… 174
赤木…… 174
赤车使者…… 174
赤术…… 174
赤石土…… 174
赤石脂…… 174
赤龙爪…… 175
赤龙皮…… 175
赤包…… 175
赤地榆…… 175
赤芍…… 175
赤芍药…… 175
赤阳子…… 175
赤松皮…… 175
赤柽柳…… 175
赤药…… 175
赤胫散…… 175
赤首乌…… 175
赤珠…… 175
赤瓟…… 175
赤菜…… 176
赤葛…… 176
赤雹子…… 176
赤箭…… 176
杏仁…… 176
杏叶防风…… 176
杏叶沙参…… 176
杏参…… 176
杏树皮…… 176
李子…… 176
李子仁…… 176
李仁…… 176
李核仁…… 176
李根白皮…… 176
李根皮…… 176
辰砂…… 177
辰砂草…… 177
还阳参…… 177
豕椒…… 177
扶芳藤…… 177
扶桑叶…… 177
扶桑花…… 177

扶桑根…… 177
抚芎…… 177
拒霜叶…… 177
拒霜花…… 177
扯丝皮…… 177
扯根菜…… 177
护生草…… 177
拟颠茄…… 177
连壳…… 177
连香草…… 177
连钱草…… 177
连翘…… 178

〔丨〕

卤地菊…… 178
卤咸…… 178
卤盐…… 178
卤碱…… 178
时计草…… 178
别直参…… 178
吴茱萸…… 178
吴茱萸叶…… 178
吴茱萸根…… 179
吴萸…… 179
岗灯笼…… 179
岗松…… 179
岗松根…… 179
岗油麻…… 179
岗梅根…… 179
岗稔根…… 179
旱地莲…… 179
旱芹…… 179
旱金莲…… 179
旱莲草…… 179
旱荷…… 179
旱葱…… 179
旱蒲花…… 179
园香草…… 179
串枝莲…… 180

〔丿〕

牡丹皮…… 180
牡狗阴茎…… 180
牡荆子…… 180
牡荆叶…… 180
牡荆汁…… 180
牡荆条…… 180
牡荆沥…… 180
牡荆茎…… 180
牡荆实…… 180
牡荆根…… 180
牡桂…… 181
牡蛎…… 181
牡蛎肉…… 181
牡蒿…… 181
针砂…… 181
钉皮…… 181
钉耙七…… 181
钉铜皮…… 181
何首乌…… 181
伸筋草…… 181
伸筋藤…… 182
佛手花…… 182
佛手香橼…… 182
佛手参…… 182
佛手柑…… 182
佛手草…… 182
佛甲草…… 182
佛耳草…… 182
佛柑花…… 182
佛指甲…… 182
伽蓝菜…… 182
皂李…… 182
皂针…… 183
皂角…… 183
皂角子…… 183
皂角针…… 183
皂角刺…… 183
皂刺…… 183
皂矾…… 183
皂荚…… 183
皂荚子…… 183
皂荚刺…… 183
皂荚根皮…… 183
皂药根…… 183
余甘子…… 183
余甘子叶…… 183
余甘子根…… 183
含羞草…… 183
含羞草根…… 183
谷白皮…… 184
谷芽…… 184
谷香…… 184
谷莠子…… 184
谷精草…… 184
谷精珠…… 184
谷臭…… 184
饭团根…… 184
饭汤叶…… 184
饭消扭…… 184
肝炎草…… 184
肚拉…… 184
龟甲…… 184
龟甲胶…… 184
龟肉…… 184
龟壳…… 184
龟版…… 184
龟版胶…… 184
龟版膏…… 185
龟胶…… 185
角心…… 185
角蒿…… 185
灸草…… 185
迎山红…… 185
迎春…… 185

〔丶〕

辛夷…… 185
疔毒草…… 185
疔疮草…… 185
怀山药…… 185
怀牛膝…… 185
快果…… 185
灶中黄土…… 185
灶心土…… 185
灶突墨…… 185
冻青树子…… 185
冷水丹…… 185
冷饭头…… 185
冷饭团…… 185
冷毒草…… 185
沙谷牛…… 185
沙苑子…… 186
沙苑蒺藜…… 186
沙枣…… 186
沙枣叶…… 186
沙枣树皮…… 186
沙参儿…… 186
沙姜…… 186
沙藤…… 186
沙罐草…… 186
沟子米…… 186
没石子…… 186
没药…… 186
没食子…… 186
沉水香…… 187
沉香…… 187
沉香曲…… 187
状元红…… 187
羌活…… 187
诃子…… 187
诃黎勒…… 187
补血草…… 187
补骨脂…… 187
补骨鸱…… 188
良姜…… 188

〔7〕

张天刚…… 188
灵仙…… 188
灵芝…… 188
灵芝草…… 188
灵砂…… 188
灵脂…… 188
灵猫香…… 188
灵磁石…… 188
屁巴虫…… 188
尾参…… 188
尿白碱…… 188
尿珠根…… 188
陆英…… 188
阿儿七…… 188
阿片…… 189
阿芙蓉…… 189
阿利藤…… 189
阿胶…… 189
阿魏…… 189
陈皮…… 189
陈芥菜卤汁…… 189
陈柑皮…… 189
附子…… 189
附地菜…… 190
忍冬花…… 190
忍冬藤…… 190
忍寒草…… 190
鸡儿肠…… 190
鸡儿松…… 190
鸡子白…… 190
鸡子白皮…… 190
鸡子壳…… 190
鸡子黄…… 190
鸡内金…… 190
鸡毛蕊…… 190
鸡爪三七…… 191
鸡爪果…… 191
鸡爪参…… 191
鸡爪草…… 191
鸡心白附…… 191
鸡仔树…… 191
鸡头…… 191
鸡头米…… 191
鸡肉…… 191
鸡舌香…… 191
鸡血…… 191
鸡血七…… 191
鸡血兰…… 191
鸡血藤…… 191
鸡苏…… 191
鸡肝…… 191
鸡肝散…… 191
鸡肠子草…… 192
鸡肠风…… 192
鸡肠草…… 192
鸡卵黄…… 192
鸡肶胫…… 192
鸡肫子…… 192
鸡肫皮…… 192
鸡肫草…… 192
鸡姆刺…… 192
鸡骨升麻…… 192
鸡骨草…… 192
鸡骨香…… 192
鸡骨常山…… 192
鸡骨癀…… 192
鸡胆…… 192
鸡冠子…… 192
鸡冠头…… 192
鸡冠苋…… 192
鸡冠花…… 192
鸡冠苗…… 193
鸡屎白…… 193
鸡屎藤…… 193
鸡娃草…… 193
鸡根…… 193
鸡脑壳…… 193
鸡黄皮…… 193
鸡菜…… 193
鸡眼草…… 193
鸡眼睛…… 193
鸡眼藤…… 193
鸡距子…… 193
鸡甜菜…… 193
鸡脚七…… 193
鸡脚叉…… 193
鸡脚爪…… 193
鸡脚草…… 194
鸡脚骨…… 194
鸡蛋花…… 194
鸡蛋膜衣…… 194
鸡髻花…… 194
驳骨丹…… 194
驳骨消…… 194
驴皮胶…… 194
驴耳朵菜…… 194
纶布…… 194
纽子三七…… 194

八　画

〔一〕

玫瑰花…… 194
青小豆…… 194
青凡木…… 194
青木香…… 194
青木香藤…… 195
青风藤…… 195
青水胆…… 195
青龙衣…… 195
青龙草…… 195
青龙骨…… 195
青叶胆…… 195
青白苏…… 195
青兰…… 195
青皮…… 195
青刚皮…… 195
青竹标…… 195
青羊血…… 195
青羊参…… 195
青阳参…… 195
青防风…… 195
青矾…… 196
青果…… 196
青鱼胆…… 196
青柑皮…… 196
青蒟叶…… 196
青树跌打…… 196
青胡桃皮…… 196
青骨藤…… 196
青缸花…… 196
青盐…… 196
青酒缸…… 196
青酒缸根…… 196
青娘子…… 196
青蛇仔…… 196
青麻…… 196
青葙…… 196
青葙子…… 196
青葙花…… 196
青蒌…… 197
青筋藤…… 197
青蒿…… 197
青蒿子…… 197
青蒿虫…… 197
青蒿根…… 197
青蒿蠹虫…… 197
青蒟…… 197
青橘皮…… 197
青黛…… 197
青藤香…… 197
青藤根…… 197
青礞石…… 197
青蘘…… 197
坤草…… 197

林兰…… 197
枝核…… 197
枇杷…… 198
枇杷叶…… 198
枇杷花…… 198
枇杷核…… 198
枇杷根…… 198
杵头糖…… 198
杩柑根…… 198
板参…… 198
板栗…… 198
板栗壳斗…… 198
板蓝根…… 198
松上寄生…… 198
松元…… 198
松木皮…… 198
松木笔…… 199
松毛…… 199
松节…… 199
松叶…… 199
松花…… 199
松花粉…… 199
松针…… 199
松果…… 199
松实…… 199
松郎头…… 199
松树梢…… 199
松树蕊…… 199
松香…… 199
松根…… 199
松笔头…… 199
松胶香…… 199
松脂…… 200
松球…… 200
松萝…… 200
松黄…… 200
松塔…… 200
松筋草…… 200
松藤…… 200
枪头菜…… 200
枫杨叶…… 200
枫杨皮…… 200
枫苓…… 200
枫果…… 200
枫柳皮…… 200
枫香树叶…… 200
枫香树皮…… 200
枫香树根…… 200
枫香脂…… 20
枫香寄生…… 201
枫荷梨…… 201
枫球子…… 201
枫寄生…… 201
枫藤…… 201
构叶…… 201
杭菊…… 201
枕瓜…… 201
枕头根…… 201
耶悉茗花…… 201
刺丁茄…… 201
刺儿草…… 201
刺儿菜…… 201
刺三甲…… 201
刺三加…… 201
刺天茄…… 201
刺木果…… 201
刺五加…… 201
刺毛菇…… 201
刺龙牙…… 201
刺打草…… 202
刺头…… 202
刺老鸦…… 202
刺红花…… 202
刺苋菜…… 202
刺矶松…… 202
刺针草…… 202
刺玫花…… 202
刺玫果…… 202
刺拐棒…… 202
刺虎…… 202
刺桐叶…… 202
刺桐皮…… 202
刺桐花…… 202
刺莲蓬实…… 202
刺莓果…… 202
刺莓果根…… 202
刺黄芩…… 203
刺黄连…… 203
刺黄柏…… 203
刺菠…… 203
刺梨…… 203
刺梨根…… 203
刺蜜…… 203
刺猬皮…… 203
刺楸皮…… 203
刺楸树皮…… 203
刺楸树根…… 203
刺榆子…… 203
刺蓟菜…… 203
刺蓬…… 203
刺蒺藜…… 203
刺糖…… 204
画石…… 204
画眉架…… 204
茉莉叶…… 204
茉莉花…… 204
茉莉根…… 204
苦丁茶…… 204
苦丁香…… 204
苦木…… 204
苦木通…… 204
苦甘草…… 204
苦艾…… 205
苦石莲…… 205
苦龙胆草…… 205
苦瓜莲…… 205
苦皮子…… 205
苦皮树…… 205
苦地丁…… 205
苦地胆…… 205
苦地胆根…… 205
苦竹叶…… 205
苦竹沥…… 205
苦竹茹…… 205
苦竹笋…… 205
苦灯笼…… 206
苦远志…… 206
苦豆…… 206
苦豆子…… 206
苦豆子草…… 206
苦豆草…… 206
苦豆根…… 206
苦杖…… 206
苦杏仁…… 206
苦芙…… 206
苦苦菜…… 206
苦板…… 206
苦金盆…… 206
苦实…… 206
苦参…… 206
苦参子…… 207
苦参实…… 207
苦草…… 207
苦荞头…… 207
苦荬菜…… 207
苦骨…… 207
苦胆木…… 207
苦胆草…… 207
苦桔梗…… 207
苦笋…… 207
苦爹菜…… 207
苦菜…… 207
苦猪菜…… 207
苦葵…… 207
苦蒿…… 207
苦蒴…… 207

苦楝皮…… 207
苦榴皮…… 208
苦蔸…… 208
苦蔸果…… 208
苦蔸根…… 208
苦碟子…… 208
苦薏…… 208
苛草…… 208
苹…… 208
苜蓿…… 208
苜蓿根…… 208
苘实…… 208
苘麻…… 208
苘麻子…… 209
苞蔷薇根…… 209
苔子…… 209
茄子…… 209
茄叶…… 209
茄母…… 209
茄根…… 209
茄蒂…… 209
苔条…… 209
苔菜…… 209
茅针花…… 209
茅草根…… 209
茅根…… 209
茅莓…… 209
茅莓根…… 209
茅盔花…… 210
茅膏菜…… 210
枣儿槟榔…… 210
枣仁…… 210
枣针…… 210
枣树皮…… 210
枣树根…… 210
枣根…… 210
枣槟榔…… 210
雨伞草…… 210
雨伞菜…… 210
矾石…… 210
矿灰…… 210
郁李仁…… 210
郁李根…… 210
郁金…… 211
郁焦…… 211
顶心风…… 211
拔地麻…… 211
拔毒散…… 211
拔脓消…… 211
拔脓膏…… 211
拐子药…… 211
拐角七…… 211
拐枣…… 211
拐棍参…… 211
拖地莲…… 211
抱石莲…… 211
拉牛入石…… 211
拉田草…… 211
拉汗果…… 211
拉拉狗…… 211
拉拉藤…… 211
拉蛄…… 211
拦路虎…… 211
转子莲…… 212
转心莲…… 212
转枝莲…… 212
斩龙剑…… 212
斩蛇剑…… 212
轮叶棘豆…… 212
轮蓟…… 212
软水黄连…… 212
软杆子水黄连… 212
软筋藤…… 212
卧龙草…… 212
矾石…… 212
鸢尾…… 212

〔 丨 〕

虎牙刺…… 212
虎牙草…… 212
虎兰…… 212
虎耳草…… 212
虎舌红…… 213
虎杖…… 213
虎杖叶…… 213
虎刺…… 213
虎骨…… 213
虎骨胶…… 213
虎胶…… 213
虎掌…… 213
虎掌草…… 213
虎蓟…… 214
肾茶…… 214
肾蕨…… 214
味连…… 214
呷蛇龟…… 214
岭南杜鹃…… 214
明子…… 214
明天麻…… 214
明沙参…… 214
明矾…… 214
明党参…… 214
败龟版…… 214
败毒草…… 214
败酱草…… 214
岩大蒜…… 214
岩丸子…… 214
岩马桑…… 215
岩五加…… 215
岩白菜…… 215
岩头菜…… 215
岩竹…… 215
岩如意…… 215
岩红…… 215
岩角…… 215
岩陀…… 215
岩鸡尾…… 215
岩青杠…… 215
岩泽兰…… 215
岩柏草…… 215
岩笋…… 215
岩椒…… 215
岩葱…… 215
岩壁菜…… 215
昆仑草…… 215
昆布…… 215
昆明沙参…… 215
昆明鸡血藤…… 215
昌阳…… 216
罗布麻…… 216
罗仙子…… 216
罗汉果…… 216
罗晃子…… 216
罗浮金锦香…… 216
罗勒…… 216
罗勒子…… 216
罗锅底…… 216
罗裙带…… 217
罗裙带根…… 217
国老…… 217
果上叶…… 217

〔 丿 〕

牧马豆…… 217
钓藤…… 217
知母…… 217
知羞草…… 217
刮筋板…… 217
委陵菜…… 217
季豆…… 217
竹苋菜…… 217
竹角蕨…… 217
垂花香薷…… 218
垂盆草…… 218
使君子…… 218
侧耳根…… 218

侧金盏花…… 218
侧柏子…… 218
侧柏叶…… 218
佩兰…… 218
爬山虎…… 218
爬地香…… 219
爬岩红…… 219
爬岩板…… 219
爬岩香…… 219
爬墙虎…… 219
乳汁草…… 219
乳头香…… 219
乳花…… 219
乳香…… 219
乳浆草…… 219
乳薯…… 219
斧头花…… 219
念珠藤…… 219
金山田七…… 219
金不换…… 219
金牛七…… 219
金牛草…… 219
金牛胆…… 219
金毛狗…… 219
金石斛…… 219
金龙胆草…… 219
金瓜…… 220
金边兔耳…… 220
金丝七…… 220
金丝茅…… 220
金丝鱼鳖…… 220
金丝草…… 220
金丝荷叶…… 220
金丝黄连…… 220
金丝矮陀…… 220
金丝矮坨坨…… 220
金丝蝴蝶…… 220
金耳环…… 220
金扣钮…… 220
金刚根…… 220
金刚散…… 220
金灯草…… 220
金灯笼…… 220
金汤匙…… 220
金花…… 220
金花果…… 220
金花草…… 221
金花菜…… 221
金豆…… 221
金针菜…… 221
金龟莲…… 221
金陀僧…… 221
金鸡尾…… 221
金鸡纳…… 221
金鸡勒…… 221
金鸡脚下红…… 221
金鸡落地…… 221
金环蛇…… 221
金顶龙菜…… 221
金果榄…… 221
金狗脊…… 222
金疙瘩…… 222
金炉底…… 222
金沸花…… 222
金沸草…… 222
金线风…… 222
金线吊乌龟…… 222
金线吊白米…… 222
金线吊芙蓉…… 222
金线吊葫芦…… 222
金线草…… 222
金柿根…… 222
金荞麦…… 222
金茶匙…… 222
金挖耳…… 222
金背枇杷…… 222
金背枇杷叶…… 223
金星草…… 223
金钟茵陈…… 223
金钩子…… 223
金钩藤…… 223
金钮头…… 223
金钮扣…… 223
金钮草…… 223
金香炉…… 223
金剑草…… 223
金盆…… 223
金盆草…… 223
金盆寒药…… 223
金疮小草…… 223
金扁柏…… 223
金盏银盘…… 223
金莲花…… 223
金钱白花蛇…… 223
金钱花…… 224
金钱草…… 224
金钱蛇…… 224
金钱蕲蛇…… 224
金钱薄荷…… 224
金铁锁…… 224
金铃子…… 224
金笋…… 224
金球…… 224
金菊…… 224
金梅草…… 224
金梳子草…… 224
金雀花…… 224
金雀根…… 224
金银花…… 224
金银藤…… 225
金弹子…… 225
金楷榄…… 225
金锁天…… 225
金锁匙…… 225
金锁银开…… 225
金腰带…… 225
金腰莲…… 225
金箔…… 225
金精石…… 225
金樱子…… 225
金樱叶…… 225
金樱花…… 225
金樱根…… 225
金樱蕴…… 225
金橘…… 225
金橘叶…… 226
金橘核…… 226
金橘根…… 226
金薄…… 226
金薄荷…… 226
金礞石…… 226
狗儿蔓…… 226
狗牙半支…… 226
狗仔花…… 226
狗仔菜…… 226
狗夺子…… 226
狗舌头草…… 226
狗舌花…… 226
狗舌草…… 226
狗舌草根…… 226
狗肝菜…… 226
狗尾巴子…… 226
狗尾巴草…… 226
狗尾半支…… 226
狗尾草…… 226
狗宝…… 227
狗骨…… 227
狗骨木…… 227
狗屎木…… 227
狗屎豆…… 227
狗屎花…… 227
狗屎花根…… 227
狗屎灵香…… 227
狗铃草…… 227
狗脊…… 227
狗脚刺…… 227

狗脚迹…… 227
狗葡萄根…… 227
狗筋蔓…… 227
狗嗽子…… 227
狗鞭…… 227
饴糖…… 227
肺形草…… 228
肺经草…… 228
肿手花根…… 228
肿节风…… 228
肥田草…… 228
肥皂子…… 228
肥皂荚…… 228
肥皂核…… 228
肥珠子…… 228
肥猪苗…… 228
肥猪草…… 228
昏鸡头…… 228
鱼肚…… 228
鱼尾草…… 228
鱼泡通…… 228
鱼胆…… 228
鱼胆木…… 228
鱼胆草…… 228
鱼首石…… 228
鱼脑石…… 228
鱼腥草…… 228
鱼鳅…… 229
鱼鳅串…… 229
鱼鳔…… 229
鱼鳔草…… 229
鱼鳖金星…… 229
鱼鳖草…… 229
鱼鳞草…… 229
兔儿伞…… 229
兔儿苗…… 229
兔子肠…… 229
兔子草…… 229
兔子腿…… 229
兔耳风…… 229
兔耳金边草…… 229
兔耳草…… 229
兔耳箭…… 229
兔屎…… 229
兔脑…… 229
忽布…… 229
忽地笑…… 229

〔丶〕

放杖草…… 230
於术…… 230
京菖蒲…… 230
夜兰茶…… 230
夜合叶…… 230
夜合叶根…… 230
夜合皮…… 230
夜合花…… 230
夜合珍珠…… 230
夜合草…… 230
夜交藤…… 230
夜关门…… 230
夜里串…… 230
夜明砂…… 230
夜牵牛…… 230
兖州卷柏…… 230
盲肠草…… 231
底野迦…… 231
疟疾草…… 231
疙瘩七…… 231
疙瘩药…… 231
怕羞草…… 231
怕痒花…… 231
闹羊花…… 231
闹羊花子…… 231
闹羊花根…… 231
闹狗药…… 231
闹鱼花…… 231
炉甘石…… 231
炉底…… 231
法罗海…… 231
法落海…… 231
法落梅…… 231
河白草…… 231
油子叶…… 231
油甘子…… 231
油甘子虫瘿…… 232
油松节…… 232
油柑木皮…… 232
油柑叶…… 232
油柑虫节…… 232
油柑根…… 232
油珠子…… 232
油桐子…… 232
油桐叶…… 232
油桐果…… 232
油桐根…… 232
油盐果…… 232
油菜子…… 232
油患子…… 232
油麻血藤…… 232
油麻稿…… 232
油蒿…… 232
沿壁藤…… 232
泡木根…… 232
泡叶乌头…… 233
泡竹叶…… 233
泡花草…… 233
泡沙参…… 233
泡桐花…… 233
泡桐果…… 233
泡通珠…… 233
泻叶…… 233
泥菖蒲…… 233
泥鳅…… 233
沸水菊…… 233
波丝草…… 233
波棱瓜子…… 233
泽兰…… 233
泽败…… 233
泽泻…… 233
泽泻叶…… 234
泽泻实…… 234
泽漆…… 234
泽漆麻…… 234
治疟草…… 234
单片锯…… 234
单打槌…… 234
单叶草…… 234
宝铎草…… 234
宝盖草…… 234
宝塔菜…… 234
宝鼎香…… 234
定风草…… 234
定心草…… 234
宜母果…… 234
宜男花…… 234
官桂…… 235
空心苋…… 235
空心蕹藤菜…… 235
空肠…… 235
空沙参…… 235
空莱菔…… 235
空麻子…… 235
卷子叶…… 235
卷子根…… 235
卷耳…… 235
卷柏…… 235
卷根白皮…… 235
郎耶草…… 235
犀斗藤…… 235

〔ㄱ〕

屈头鸡…… 235
建兰叶…… 235
建兰花…… 235
建兰根…… 235

降香…… 236
降真香…… 236
虱子草…… 236
参三七…… 236
参叶…… 236
参叶子…… 236
参须…… 236
细水麻叶…… 236
细叶飞扬草…… 236
细叶凤凰尾…… 236
细叶龙鳞草…… 236
细叶亚婆草…… 236
细叶沙参…… 236
细叶金鸡尾…… 236
细叶莠竹…… 236
细米草…… 236
细连翘…… 236
细辛…… 236
细辛幌子…… 236
细须草…… 236
细独脚马骝…… 236
细独脚金…… 236
细黑豆…… 236
绊根草…… 236
贯叶连翘…… 236
贯仲…… 237
贯众…… 237
贯榨根…… 237

九　画

〔一〕

玳玳花…… 237
玳瑁…… 237
珍珠…… 238
珍珠母…… 238
珍珠伞…… 238
珍珠杆…… 238
珍珠草…… 238
珍珠莲…… 238
珍珠梅…… 238
珍珠菜…… 238
珍珠菊…… 238
珊瑚…… 238
玻璃草…… 239
毒芋头…… 239
毒芹…… 239
毒药草…… 239
春尖叶…… 239
春尖花…… 239
春砂仁…… 239
春砂壳…… 239
春砂花…… 239
春莲秋柳…… 239
帮子毒乌…… 239
枯芩…… 239
枯萝卜…… 239
柑…… 239
柑子…… 239
柑叶…… 239
柑皮…… 239
柑核…… 239
柘根…… 239
栌木…… 239
相思子…… 239
相思子根…… 240
相思虫…… 240
相思豆…… 240
柚叶…… 240
柚皮橘红…… 240
柚花…… 240
柚根…… 240
枳壳…… 240
枳实…… 240
枳根皮…… 241
枳椇子…… 241
枳椇木皮…… 241
枳椇根…… 241
柞子…… 241
柞木仁…… 241
柞木皮…… 241
柞树叶…… 241
柞树皮…… 241
柏子…… 241
柏子仁…… 241
柏叶…… 241
柏叶草…… 241
柏白皮…… 241
柏枝节…… 241
柏实…… 241
柏根白皮…… 241
枸杞子…… 242
枸杞叶…… 242
枸杞头…… 242
枸杞苗…… 242
枸杞果…… 242
枸骨叶…… 242
枸骨根…… 242
枸橘…… 242
枸橘叶…… 242
枸橘李…… 242
柳子…… 242
柳叶…… 242
柳叶夹…… 243
柳叶桃…… 243
柳白皮…… 243
柳花…… 243
柳条…… 243
柳枝…… 243
柳实…… 243
柳洲七…… 243
柳根…… 243
柳絮…… 243
柳椹…… 243
柳蕊…… 243
栎子…… 243
栎树皮…… 243
柿丁…… 243
柿干…… 243
柿子…… 243
柿子杷…… 243
柿木皮…… 243
柿叶…… 244
柿饼…… 244
柿饼霜…… 244
柿根…… 244
柿钱…… 244
柿涩…… 244
柿萼…… 244
柿蒂…… 244
柿漆…… 244
柿霜…… 244
柿霜饼…… 244
柠果…… 244
柠檬…… 244
柠檬叶…… 245
柠檬皮…… 245
柠檬茅…… 245
柠檬香碱草…… 245
柽柳…… 245
树顶子…… 245
树挂…… 245
树莓…… 245
树脑…… 245
树梅…… 245
树蜡…… 245
树蕨…… 245
胡地莲…… 245
胡芦巴…… 245
胡芦草…… 245
胡豆…… 245
胡连…… 245
胡茄花…… 245
胡韭子…… 245
胡桐泪…… 245
胡桐律…… 246
胡桐碱…… 246

胡桃仁…… 246
胡桃叶…… 246
胡桃夹…… 246
胡桃肉…… 246
胡桃壳…… 246
胡桃青皮…… 246
胡桃枝…… 246
胡桃油…… 246
胡桃隔…… 246
胡索花…… 246
胡荽…… 246
胡荽子…… 246
胡脂麻…… 246
胡黄连…… 246
胡麻…… 247
胡麻子…… 247
胡麻叶…… 247
胡麻花…… 247
胡麻苗…… 247
胡椒…… 247
胡椒草…… 247
胡椒菜…… 247
胡藁…… 247
胡颓子…… 247
胡颓子叶…… 247
胡颓子根…… 247
胡颓叶…… 247
胡满蕴…… 247
荆芥…… 247
荆条果…… 248
南大戟…… 248
南天竹子…… 248
南天竹叶…… 248
南天竹根…… 248
南天竹梗…… 248
南天扇…… 248
南五加皮…… 248
南五味子…… 248
南瓜…… 249
南瓜子…… 249
南瓜叶…… 249
南瓜花…… 249
南瓜蒂…… 249
南瓜藤…… 249
南竹子…… 249
南竹叶…… 249
南刘寄奴…… 249
南豆花…… 249
南沙参…… 249
南苦参…… 249
南细辛…… 249
南星…… 249
南扁豆…… 249
南烛子…… 250
南烛叶…… 250
南蛇笋…… 250
南蛇藤…… 250
南蛇藤根…… 250
南鹤虱…… 250
南藤…… 250
茜草…… 250
荛花…… 250
荜茇…… 250
荜茇根…… 251
荜拨…… 251
荜拨没…… 251
荜澄茄…… 251
茈碧花…… 251
草寸香…… 251
草无根…… 251
草木灰…… 251
草贝…… 251
草贝母…… 251
草乌…… 251
草乌头…… 251
草乌喙…… 252
草玉铃…… 252
草玉梅…… 252
草本威灵仙…… 252
草石蚕…… 252
草龙胆…… 252
草龙珠…… 252
草血竭…… 252
草决明…… 252
草红花…… 252
草红藤…… 252
草杨梅…… 252
草豆…… 252
草豆蔻…… 252
草苁蓉…… 252
草芦荟…… 252
草灵仙…… 252
草果…… 252
草果仁…… 253
草河车…… 253
草珊瑚…… 253
草威灵…… 253
草钟乳…… 253
草黄连…… 253
草羚羊…… 253
草蒿…… 253
草蔻…… 253
草蔻仁…… 253
草蜜…… 253
草鞋板…… 253
草鞋底…… 253
草鳖甲…… 253
茵陈…… 253
茵陈蒿…… 253
茴香虫…… 253
茴香茎叶…… 253
茴香根…… 254
茴香菜…… 254
荞叶七…… 254
荞叶细辛…… 254
荞麦…… 254
荞麦三七…… 254
荞麦秸…… 254
茯苓…… 254
茯苓皮…… 254
茯神…… 254
茯神木…… 254
茯神心…… 254
茯神心木…… 254
茯菟…… 254
荏子…… 255
荏叶…… 255
荇丝菜…… 255
茶子…… 255
茶子饼…… 255
茶叶…… 255
茶叶花…… 255
茶油…… 255
茶油巴…… 255
茶实…… 255
茶枯…… 255
茶树根…… 255
茶麸…… 255
茶辣…… 255
荠苨…… 255
荠苨…… 255
荠草…… 256
荠菜…… 256
荠菜子…… 256
荠菜花…… 256
荛蔚…… 256
荛蔚子…… 256
茨梨…… 256
茨藜根…… 256
荨麻…… 256
荨麻根…… 256
荩草…… 257
莜麦…… 257
茹蕙…… 257
荔仁…… 257
荔枝…… 257

荔枝壳…… 257
荔枝草…… 257
荔枝核…… 257
荔枝根…… 257
荭草…… 257
荭草花…… 257
荭草实…… 257
药瓜…… 257
药百合…… 258
药芹…… 258
药枣…… 258
药鱼子…… 258
药鱼草…… 258
药虱药…… 258
药菖蒲…… 258
柰花…… 258
砒石…… 258
研螺…… 261
砂仁…… 258
砂仁壳…… 258
砂仁花…… 258
砂壳…… 258
斫合子…… 258
耐惊菜…… 258
面条树…… 258
面根藤…… 258
牵牛子…… 258
歪头菜…… 259
厚皮…… 259
厚朴…… 259
厚朴花…… 259
咸鱼草…… 259
咸虾花…… 259
咸秋石…… 259
威灵仙…… 259
威灵菊…… 259
挂金灯…… 259
拱地龙…… 259
拱腰老…… 259
挟剑豆…… 259
挡蛇剑…… 260
指甲花…… 260
指甲草…… 260
挖耳草…… 260
挖耳草根…… 260
轻粉…… 260
鸦片…… 260
鸦胆子…… 260
鸦燕草…… 261
皆治藤…… 261

〔丨〕

点秤根…… 261
点椒…… 261
背阴草…… 261
背蛇生…… 261
韭子…… 261
韭根…… 261
韭菜…… 261
韭菜子…… 261
韭黄…… 261
省头草…… 261
响铃草…… 261
哈士蟆…… 261
哈士蟆油…… 261
哈莫儿…… 261
哈蟆油…… 262
映山红…… 262
昨叶荷草…… 262
贴骨伞…… 262
贴壁蜈蚣…… 262
虹叶…… 262
虾参…… 262
虾钳草…… 262
虾钳菜…… 262
虾蟆…… 262
虾蟆子…… 262
虾蟆衣…… 262
虾蟆草…… 262
蚁狮…… 262
虻虫…… 262
蚂蚁草…… 262
蚂蚱…… 262
蚂蝗藤…… 262
星色草…… 262
星秀花…… 262
星星草…… 262
星宿菜…… 262
胃友…… 263
思仲…… 263
思茅腐婢…… 263
骨风木…… 263
骨碎补…… 263
骨牌草…… 263

〔丿〕

钟乳石…… 263
钢砂…… 263
钥匙藤…… 263
钩丁…… 263
钩虫草…… 263
钩吻…… 263
钩藤…… 263
钩藤钩子…… 264
钩藤根…… 264
钮子七…… 264
秋石…… 264
秋兰…… 264
秋枫木…… 264
秋鼠曲草…… 264
香五加皮…… 264
香风茶…… 264
香巴茅…… 264
香水花…… 264
香白芷…… 264
香瓜藤…… 264
香头草…… 264
香加皮…… 264
香丝菜…… 265
香芹…… 265
香苏…… 265
香豆子…… 265
香附…… 265
香附子…… 265
香附米…… 265
香青兰…… 265
香茅…… 265
香茅草…… 265
香茅筋骨草…… 265
香油…… 265
香泽兰…… 265
香茸…… 265
香草…… 265
香茶菜…… 265
香荠菜…… 265
香茹…… 265
香独活…… 265
香柴…… 265
香圆子…… 265
香脐子…… 265
香通…… 266
香豉…… 266
香菜…… 266
香菜子…… 266
香蛇麻…… 266
香蒿…… 266
香蒲…… 266
香椿子…… 266
香椿叶…… 266
香椿皮…… 266
香椿铃…… 266
香樟子…… 266
香樟木…… 266
香樟树皮…… 266
香樟根…… 266
香橼…… 266

香橼根…… 266
香薷…… 266
香瓜…… 267
竿蔗…… 267
重皮…… 267
重台…… 267
重楼…… 267
信石…… 267
信砒…… 267
顺经草…… 267
追风七…… 267
追风伞…… 267
追风草…… 267
追风棍…… 267
追风箭…… 267
追风藤…… 267
追骨风…… 267
鬼目…… 267
鬼臼…… 267
鬼灯笼…… 267
鬼针草…… 267
鬼疙草…… 267
鬼油麻…… 267
鬼督邮…… 268
鬼箭羽…… 268
禹白附…… 268
禹余粮…… 268
禹粮石…… 268
盾叶薯蓣…… 268
剑丹…… 268
食盐…… 268
盆消…… 268
狭叶蓟…… 268
狭叶醉鱼草…… 268
狮子七…… 268
狮子毛草…… 268
狮子草…… 268
狮鞭草…… 268
独一味…… 268
独丁子…… 268
独叶一支花…… 268
独叶一枝花…… 268
独叶一枝枪…… 268
独叶草…… 269
独行千里…… 269
独行根…… 269
独茅根…… 269
独活…… 269
独根草…… 269
独脚乌桕…… 269
独脚乌桕叶…… 269
独脚丝茅…… 269
独脚柑…… 269
独脚莲…… 269
独脚蒿…… 269
独滑…… 269
独蒜…… 269
独摇草…… 269
饼草…… 269
胆木…… 269
胆矾…… 269
胆草…… 270
胆星…… 270
胆南星…… 270
胖大海…… 270
胖血藤…… 270
急性子…… 270
急解索…… 270

〔丶〕

亮菌…… 270
恒山…… 270
洪连…… 270
洗手叶…… 271
洗手果…… 271
洗草…… 271
活血丹…… 271
活血龙…… 271
活血草…… 271
活血莲…… 271
活血藤…… 271
活磁石…… 271
洋虫…… 271
洋参…… 271
洋金花…… 271
洋薯草…… 271
将军…… 272
前胡…… 272
首乌…… 272
首乌藤…… 272
宣木瓜…… 272
穿山龙…… 272
穿山甲…… 272
穿心草…… 272
穿心莲…… 272
穿心箭…… 273
穿地龙…… 273
穿鱼柳…… 273
穿骨风…… 273
穿破石…… 273
穿钱草…… 273
穿墙草…… 273
总管皮…… 273
美人蕉根…… 273
美草…… 273
姜子叶…… 273
姜巴草…… 273
姜皮…… 273
姜朴花…… 273
姜黄…… 273
类梧桐…… 273
养心草…… 273
养心莲…… 274
迷马桩棵…… 274
迷迭香…… 274
祖师麻…… 274
神曲…… 274
神草…… 274
扁竹…… 274
扁竹根…… 274
扁豆…… 274
扁豆皮…… 274
扁豆衣…… 274
扁豆花…… 274
扁豆根…… 274
扁担叶…… 275
扁担杆…… 275
扁担藤…… 275
扁草…… 275
扁骨风…… 275
扁菜…… 275
扁蒲壳…… 275
扁蒲扇…… 275
扁藤…… 275

〔ㄱ〕

费菜…… 275
屏风…… 275
退秧竹…… 275
眉皂…… 275
娃儿藤…… 275
娃娃拳…… 275
蚤休…… 275
骆驼刺糖…… 275
骆驼蓬…… 275
骆驼蓬子…… 275
骆驼蒿…… 275
孩儿参…… 276
孩儿草…… 276
孩儿茶…… 276
绒毛鸡…… 276
绒毛鸭脚木…… 276
绒背蓟…… 276
绕绕藤…… 276
绛矾…… 276
绛梨木子…… 276

络石藤…… 276
绞蛆爬…… 276

十 画

〔一〕

艳山花…… 277
珠儿参…… 277
珠参…… 277
秦艽…… 277
秦归…… 277
秦皮…… 277
秦纠…… 277
秦胶…… 277
秦馨花…… 277
蚕衣…… 278
蚕豆…… 278
蚕豆叶…… 278
蚕豆皮…… 278
蚕豆衣…… 278
蚕豆壳…… 278
蚕豆花…… 278
蚕豆茎…… 278
蚕豆荚壳…… 278
蚕豆梗…… 278
蚕连…… 278
蚕连纸…… 278
蚕沙…… 278
蚕纸…… 278
蚕故纸…… 278
蚕茧…… 278
蚕退…… 279
蚕退纸…… 279
蚕蜕…… 279
蚕蜕纸…… 279
蚕蛹…… 279
桂丁…… 279
桂丁香…… 279
桂心…… 279
桂枝…… 279
桂圆肉…… 279
桔梗…… 279
桐子…… 279
桐子油…… 279
桐子树叶…… 280
桐子树根…… 280
桐木皮…… 280
桐叶…… 280
桐皮…… 280
桐油…… 280
桐油树子…… 280
桐油树根…… 280
桐根…… 280
栝楼…… 280
栝楼子…… 280
栝楼仁…… 281
栝楼皮…… 281
栝楼壳…… 281
栝楼茎叶…… 281
栝楼实…… 281
栝楼根…… 281
桦木皮…… 281
桦皮…… 281
桦树皮…… 281
桃儿七…… 281
桃子草…… 281
桃仁…… 281
桃叶…… 281
桃白皮…… 282
桃奴…… 282
桃皮…… 282
桃耳七…… 282
桃花…… 282
桃茎白皮…… 282
桃金娘花…… 282
桃枭…… 282
桃树皮…… 282
桃树胶…… 282
桃南瓜…… 282
桃核仁…… 282
桃根…… 282
桃胶…… 282
核桃仁…… 282
核桃虫…… 283
核桃揪皮…… 283
核桃揪果…… 283
桉叶…… 283
根下红…… 283
都拉参…… 283
都淋藤…… 283
真珠…… 283
真珠母…… 283
真珠花…… 283
真珠草…… 283
索人衣…… 283
索子果…… 283
索骨丹…… 283
索菜…… 283
壶卢…… 283
壶卢子…… 283
莕菜…… 283
荸荠…… 284
荸荠苗…… 284
莽草…… 284
莱阳参…… 284
莱菔…… 284
莱菔子…… 284
莱菔叶…… 284
莱菔甲…… 284
莲子…… 284
莲子心…… 285
莲心…… 285
莲生桂子花…… 285
莲生桂子草…… 285
莲台夏枯…… 285
莲肉…… 285
莲壳…… 285
莲花…… 285
莲花须…… 285
莲花姜…… 285
莲花蕊…… 285
莲实…… 285
莲房…… 285
莲须…… 285
莲蒂…… 285
莲蓬子…… 286
莲蓬壳…… 286
莲蓬草…… 286
莲蕊须…… 286
莲薏…… 286
莳萝子…… 286
莪术…… 286
荷叶…… 286
荷叶蒂…… 286
荷包草…… 286
荷花…… 286
荷花丁香…… 286
荷苞花…… 286
荷苞花根…… 286
荷梗…… 286
荷蒂…… 286
荷鼻…… 286
荻…… 286
莎草…… 287
莎草根…… 287
莨菪子…… 287
莨菪叶…… 287
莨菪根…… 287
葛苾菜…… 287
莼…… 287
鸢爪风…… 287
盐肤子…… 287
盐肤子…… 287
盐肤子根…… 287
盐肤叶…… 287
盐肤树白皮…… 288

恶实……288
恶实根……288
栗子……288
栗毛壳……288
栗毛球……288
栗当……288
栗花……288
栗刺壳……288
栗树皮……288
栗树根……288
翅茎香青……288
赶山鞭……288
赶风柴……288
赶狗木……288
起泡草……288
栽秧花……289
破天云……289
破天菜……289
破风藤……289
破布艾……289
破布叶……289
破布粘……289
破血丹……289
破阳伞……289
破故纸……289
破骨风……289
破铜钱……289
破膝风……289
夏天无……289
夏无踪……289
夏豆……289
夏枯草……289
夏枯球……290
夏草冬虫……290
原蚕沙……290
原蚕尿……290
原蚕蛾……290
捕虫草……290
较剪草……290
热参……290
热痱草……290

〔丨〕

鸬鹚涎……290
柴胡……290
党参……290
逍遥竹……290
哮灵草……290
峨参……290
晒不死……291
鸭儿芹……291
鸭儿芹根……291
鸭公青……291
鸭仔菜……291
鸭舌韦……291
鸭舌草……291
鸭脚木……291
鸭脚木叶……291
鸭脚木皮……291
鸭脚艾……291
鸭脚皮……291
鸭脚板……291
鸭脚草……291
鸭脚菜……292
鸭跖草……292
蚌粉……292
蚊子草……292
蚊枝叶……292
圆蛛……292

〔丿〕

钱串草……292
钻石风……292
钻地风……292
铁儿茶……292
铁马豆……292
铁牛七……292
铁牛入石……292
铁牛钻石……292
铁尺草……292
铁巴掌……292
铁石茶……292
铁甲将军……292
铁仔……292
铁包金……293
铁丝灵仙……293
铁丝草……293
铁扫把子……293
铁扫帚……293
铁色草……293
铁色箭……293
铁苋……293
铁板道……293
铁刺苓……293
铁线草……293
铁树叶……293
铁树花……293
铁树果……294
铁指甲……294
铁钢叉……294
铁扁担……294
铁烛台……294
铁粉……294
铁凉伞……294
铁扇子……294
铁菱角……294
铁脚威灵仙……294
铁脚犁……294
铁脚蜈蚣根……294
铁棒锤……294
铁散沙……294
铁落……294
铁锈……294
铁蜈蚣……294
铁筷子……294
铁箍散……294
铃兰……295
铃茵陈……295
铃铃草……295
铃铛菜……295
铅丹……295
秫米……295
积雪草……295
称钩风……295
称筋散……295
缺盆草……295
笔仔草……295
笔头花……296
笔头菜……296
笔筒草……296
透骨草……296
透骨香……296
透骨消……296
倒爪草……296
倒生莲……296
倒地拱……296
倒扣草……296
倒吊金钟……296
倒吊笔叶……297
倒吊蜡烛……297
倒刺草……297
倒毒伞……297
倒挂牛……297
倒挂金钟……297
倒挂金钩……297
倒钩草……297
倒捋草……297
倒提壶……297
倒罐草……297
射干……297
射香草……297
臭八宝……297
臭山橘……297
臭子……297
臭艾……297

臭叶子…… 297
臭杞…… 297
臭杞子…… 297
臭芙蓉…… 297
臭芜荑…… 297
臭苏…… 297
臭李子…… 297
臭牡丹…… 297
臭饭团…… 298
臭灵丹…… 298
臭阿魏…… 298
臭茉莉…… 298
臭苦葫…… 298
臭拉秧子…… 298
臭质草…… 298
臭金凤…… 298
臭法落海…… 298
臭草…… 298
臭根…… 298
臭根皮…… 298
臭铃铛…… 298
臭烟…… 298
臭菖…… 299
臭菜…… 299
臭梧桐…… 299
臭梧桐子…… 299
臭梧桐花…… 299
臭梧桐根…… 299
臭椿子…… 299
臭椿皮…… 299
臭蒿…… 299
臭橘…… 299
臭橘叶…… 299
臭藜藿…… 299
臭藤…… 299
徐长卿…… 299
豹子药…… 299
豹骨…… 299
釜脐墨…… 300
翁阿鲁…… 300
翁格尔…… 300
狼牙草…… 300
狼牙草根芽…… 300
狼把草…… 300
狼把草根…… 300
狼尾巴花…… 300
狼尾草…… 300
狼尾棵…… 300
狼毒…… 300
狼萁…… 300
胭脂菜…… 300
脂麻秸…… 300
脐带…… 300
胶菜…… 300
脓见消…… 300
皱叶芥…… 301
皱面草…… 301
留行子…… 301
留求子…… 301
鸳鸯豆…… 301
鸳鸯草…… 301

〔丶〕

旃那叶…… 301
高丽参…… 301
高良姜…… 301
高岭土…… 301
高脚鼠耳草…… 301
栾茶…… 301
唐古特青兰…… 301
唐传那保…… 301
疳积草…… 301
烟草…… 301
烙铁草…… 301
凌霄花…… 301
凌霄花根…… 302
凌霄藤…… 302
凉水果…… 302
凉伞草…… 302
凉伞遮珍珠…… 302
凉粉果…… 302
凉粉草…… 302
凉粉柴…… 302
凉粉藤…… 302
凉藤…… 302
酒杯花…… 302
酒饼木…… 302
酒醉花…… 302
浙贝母…… 302
浙桐皮…… 302
消山虎…… 302
消石…… 302
海马…… 303
海马蔺…… 303
海风藤…… 303
海石…… 303
海龙…… 303
海白菜…… 303
海芋…… 303
海州常山…… 303
海苔菜…… 303
海昆布…… 303
海金沙…… 303
海金沙草…… 303
海金沙根…… 303
海金沙藤…… 304
海狗肾…… 304
海参…… 304
海草…… 304
海带…… 304
海带根…… 304
海桐皮…… 304
海莴苣…… 304
海蚌含珠…… 304
海浮石…… 304
海菜…… 304
海蛎子壳…… 304
海蛇…… 304
海椒七…… 305
海椒梗…… 305
海蛤壳…… 305
海蛇…… 305
海蜇…… 305
海蕉…… 305
海薯藤…… 305
海螵蛸…… 305
海藻…… 305
浴香…… 305
浮小麦…… 305
浮水麦…… 305
浮石…… 305
浮麦…… 305
浮海石…… 305
浮萍…… 305
浮萍参…… 306
浮飘…… 306
流星草…… 306
涩叶藤…… 306
涩沙藤…… 306
涩疙瘩…… 306
羖羊角…… 306
瓶尔小草…… 306
粉丹皮…… 306
粉团花…… 306
粉条儿菜…… 306
粉沙参…… 306
粉草…… 306
粉葛…… 306
粉霜…… 306
益母…… 306
益母艾…… 306
益母草…… 306
益母草子…… 307
益母蒿…… 307
益智子…… 307
益智仁…… 307

宽紧草…… 307
宽筋藤…… 307
家佩兰…… 307
家蓼…… 307
拳参…… 307
浆水…… 307
娑罗子…… 307
诸葛草…… 307
诸葛菜…… 307
调羹花…… 307
调羹草…… 307
扇叶葵…… 307

〔7〕

陵草…… 307
预知子…… 308
桑上寄生…… 308
桑叶…… 308
桑白皮…… 308
桑皮…… 308
桑条…… 308
桑枝…… 308
桑枣…… 308
桑果…… 308
桑实…… 308
桑根…… 308
桑根白皮…… 308
桑根皮…… 308
桑寄生…… 308
桑椹…… 308
桑椹子…… 309
桑螵蛸…… 309
通天草…… 309
通气草…… 309
通气香…… 309
通心草…… 309
通光散…… 309
通关藤…… 309
通花根…… 309
通经草…… 309
通草…… 309
通城虎…… 309
绣花针…… 310
绣球叶…… 310
绣球防风…… 310
绣球防风根…… 310
绣球草…… 310

十一画

〔一〕

球子草…… 310
球兰…… 310
琐阳…… 310
麸皮…… 310
梗通草…… 310
梧桐子…… 310
梧桐叶…… 310
梧桐白皮…… 310
梧桐皮…… 311
梧桐花…… 311
梧桐根…… 311
梣皮…… 311
梣树子油…… 311
梅片…… 311
梅花冰片…… 311
梅花草…… 311
梅实…… 311
梅根…… 311
梅藓…… 311
栀子…… 311
栀子叶…… 311
栀子花…… 311
栀子花根…… 312
梓叶…… 312
梓白皮…… 312
梓实…… 312
椹木根…… 312
椹花…… 312
椹花根…… 312
梭罗子…… 312
梭罗花…… 312
梭罗草…… 312
勒马回…… 312
勒荔…… 312
蒜菜…… 312
菥蓂子…… 312
菱…… 313
菱叶…… 313
菱壳…… 313
菱角菜…… 313
菱蒂…… 313
菴茼…… 313
菴茼子…… 313
菝葜…… 313
菝葜叶…… 313
菖蒲…… 313
萝卜…… 313
萝卜子…… 313
萝卜甲…… 313
萝卜地丁…… 313
萝卜缨…… 313
萝丝子…… 313
萝芙木…… 313
萝芙木茎叶…… 314
萝藦…… 314
萝藦子…… 314
菌灵芝…… 314
蒌蕤…… 314
草蘚…… 314
菜蓟…… 314
菟丝…… 314
菟丝子…… 314
菟丝实…… 315
菟缕…… 315
菊三七…… 315
菊叶三七…… 315
菊苣…… 315
菊花…… 315
菊花叶…… 315
菊花苗…… 315
菊根…… 315
堇菜地丁…… 315
黄儿茶…… 315
黄三七…… 315
黄开口…… 316
黄木香…… 316
黄牛香…… 316
黄毛耳草…… 316
黄毛草…… 316
黄丹…… 316
黄水芋…… 316
黄水芋草…… 316
黄水茄…… 316
黄古头草…… 316
黄龙尾…… 316
黄占…… 316
黄瓜香…… 316
黄瓜菜…… 316
黄头草…… 316
黄皮子…… 316
黄皮叶…… 316
黄皮血藤…… 316
黄皮果…… 316
黄皮果核…… 317
黄皮核…… 317
黄皮根…… 317
黄米…… 317
黄米花…… 317
黄杜鹃…… 317
黄芫花…… 317
黄花三七…… 317
黄花大远志…… 317
黄花马豆…… 317
黄花甘…… 317
黄花白艾…… 317

黄花仔…… 317
黄花冬菊…… 317
黄花母…… 317
黄花地丁…… 317
黄花夹竹桃…… 317
黄花夹竹桃叶… 318
黄花曲草…… 318
黄花远志…… 318
黄花杜鹃…… 318
黄花鸡骨…… 318
黄花苦豆子…… 318
黄花参…… 318
黄花草…… 318
黄花茵陈…… 318
黄花柴胡…… 318
黄花倒水莲…… 318
黄花菜…… 318
黄花菜根…… 318
黄花稔…… 318
黄芥…… 318
黄芥子…… 318
黄芩…… 318
黄芩子…… 319
黄芪…… 319
黄芪茎叶…… 319
黄连…… 319
黄连三七…… 319
黄连芽…… 319
黄连参…… 319
黄连茶…… 319
黄连藤…… 319
黄饭花…… 319
黄闷头花…… 319
黄松木节…… 319
黄明胶…… 320
黄果…… 320
黄果皮…… 320
黄金石…… 320
黄金丝…… 320
黄金卵…… 320
黄金条…… 320
黄金线…… 320
黄狗肾…… 320
黄泡刺根…… 320
黄泡果…… 320
黄卷皮…… 320
黄练芽…… 320
黄栌…… 320
黄栌木…… 320
黄栌枝叶…… 320
黄柏…… 320
黄荆子…… 321
黄荆叶…… 321
黄荆枝…… 321
黄荆根…… 321
黄草…… 321
黄药子…… 321
黄药根…… 321
黄药脂…… 321
黄香…… 321
黄食草…… 322
黄独零余子…… 322
黄姜…… 322
黄根…… 322
黄耆…… 322
黄疸卷柏…… 322
黄疸草…… 322
黄梅花…… 322
黄栀子…… 322
黄雀花…… 322
黄蛇根…… 322
黄猛菜…… 322
黄脚鸡…… 322
黄鹂芽…… 322
黄喇叭花…… 322
黄喇嘛…… 322
黄锁梅叶…… 322
黄锁梅根…… 322
黄道栌…… 322
黄楝头…… 322
黄楝树…… 322
黄蓬花…… 322
黄蜂草…… 322
黄蜂窝…… 322
黄蜀葵子…… 323
黄蜀葵叶…… 323
黄蜀葵花…… 323
黄蜀葵茎…… 323
黄蜀葵根…… 323
黄蜡…… 323
黄蜡一枝蒿…… 323
黄精…… 323
黄熟花…… 323
黄橘皮…… 323
黄檗…… 323
黄藤…… 323
黄藤子…… 323
黄藤木…… 323
黄鳝藤…… 323
营实…… 324
梦花…… 324
梦花根…… 324
梵天花…… 324
硇砂…… 324
瓠子…… 324
雪上一枝蒿…… 324
雪乌…… 324
雪地开花…… 324
雪里开…… 324
雪里青…… 325
雪里梅…… 325
雪里蕻…… 325
雪冻花…… 325
雪药…… 325
雪哈…… 325
雪莲花…… 325
雪荷花…… 325
排风子…… 325
排风藤…… 325
排钱草…… 325
排钱草根…… 325
推车虫…… 325
推粪虫…… 325
掐不齐…… 325
接骨木…… 325
接骨木根…… 325
接骨丹…… 325
接骨仙桃…… 326
接骨金粟兰…… 326
接骨树…… 326
接骨草…… 326
接骨草根…… 326
接骨药…… 326
接骨莲…… 326
接骨藤…… 326
接续草…… 326
接筋草…… 326
救必应…… 326
救军粮…… 326
救兵粮…… 326

〔 丨 〕

雀儿麻…… 326
雀儿蛋…… 326
雀舌草…… 326
雀卵…… 326
常山…… 326
常春藤…… 326
常黄连…… 327
啤酒花…… 327
啜脓膏…… 327
晚蚕沙…… 327
眼子菜…… 327
眼明草…… 327
蚶子壳…… 327
蚶壳草…… 327

蛎蛤……327
蛆……327
蛆儿草……327
蚋蛇肉……327
蚋蛇胆……327
蚱蜢……327
蚯蚓……327
蛇不见……327
蛇不过……327
蛇不钻……328
蛇白蔹……328
蛇包谷……328
蛇头王……328
蛇头草……328
蛇头蓼……328
蛇皮……328
蛇虫草……328
蛇舌草……328
蛇舌癀……328
蛇壳……328
蛇足草……328
蛇利草……328
蛇含……328
蛇含石……328
蛇床子……328
蛇附子……328
蛇泡笋……328
蛇泡草……328
蛇咬草……328
蛇总管……328
蛇退……328
蛇退草……328
蛇根草……328
蛇莲……329
蛇莓……329
蛇莓根……329
蛇倒退……329
蛇罐管……329
蛇黄……329
蛇泡草……329
蛇葡萄……329
蛇葡萄根……329
蛇蜕……329
野三七……329
野丈人……329
野万年青……329
野山参……329
野山药……329
野山菊……329
野马林……330
野马追……330
野木瓜……330
野巴戟……330
野石榴……330
野田七……330
野白纸扇……330
野白菜……330
野冬青皮……330
野冬青果……330
野兰……330
野兰靛……330
野芋……330
野芋叶……330
野芋头……331
野芝麻……331
野芝麻根……331
野老姜……331
野朱桐……331
野决明……331
野红花……331
野麦……331
野杜仲……331
野杨梅……331
野苋菜……331
野花生……331
野花椒……331
野芹菜……331
野牡丹……332
野牡丹子……332
野含羞草……332
野沙柑……332
野鸡子豆……332
野鸡冠……332
野青仔……332
野玫瑰根……332
野苦荬……332
野苦菜……332
野苦麻……332
野茄……332
野枇杷叶……332
野佩兰……332
野狐丝……332
野油菜……332
野油麻……332
野毒芹……332
野胡椒……332
野南瓜……332
野茴香……332
野茶……332
野鸦椿子……332
野鸦椿根……332
野韭菜……332
野香茹……333
野香薷……333
野洋参……333
野洋姜……333
野扁豆……333
野蚊子草……333
野高粱……333
野席草……333
野烟……333
野烟叶……333
野凉薯……333
野料豆……333
野扇花果……333
野菜豆……333
野菊……333
野菊花……333
野菠菜……334
野猪粪……334
野麻……334
野麻豌……334
野婆婆头……334
野绿灯……334
野绿豆……334
野棉花……334
野葡萄……334
野葡萄根……334
野葡萄藤……334
野葵花……334
野蒜……334
野蒿……334
野蓼……334
野辣椒……334
野樱桃……334
野豌豆……334
野鹤嘴……334
野橙子……334
野薄荷……334
野藤茄……334
崩大碗……334
曼陀罗子……334
曼陀罗叶……335
曼陀罗花……335
曼陀罗根……335
悬钩子……335
匙叶草……335

〔丿〕

铜丝草……335
铜青……335
铜钱草……335
铜盘一枝香……335
铜绿……335
铜锤玉带草……335
铜锤草……335

铧头草…… 335
银不换…… 336
银毛委陵菜…… 336
银朱…… 336
银花…… 336
银花子…… 336
银花藤…… 336
银条参…… 336
银线草…… 336
银线盆…… 336
银背藤…… 336
银柴胡…… 336
银蛇…… 336
银稔…… 336
银锁匙…… 336
银腰带…… 336
银精石…… 336
移山参…… 336
移星草…… 336
甜瓜子…… 336
甜瓜茎…… 337
甜瓜蒂…… 337
甜瓜蔓…… 337
甜瓜瓣…… 337
甜地丁…… 337
甜杏仁…… 337
甜桔梗…… 337
甜梗子…… 337
甜橙…… 337
甜藤…… 337
梨…… 337
梨皮…… 337
犁头七…… 337
犁头尖…… 337
犁头草…… 337
犁尖草…… 338
犁嘴草…… 338
犁壁藤…… 338
偏头七…… 338
偏荷枫…… 338
假川连…… 338
假马鞭…… 338
假五味子…… 338
假牛柑…… 338
假芝麻…… 338
假决明…… 338
假苏…… 338
假苦瓜…… 338
假油柑…… 338
假油麻…… 338
假荔枝…… 338
假桃花…… 338
假烟叶…… 338
假海芋…… 338
假菠萝…… 338
假黄连…… 338
假绿豆…… 338
假葡萄藤…… 338
假蒌…… 338
假蒟…… 338
假蒟根…… 338
假辣蓼…… 338
假蕹菜…… 338
徘徊花…… 338
舶茴香…… 338
盘儿草…… 339
盘龙七…… 339
盘龙花…… 339
盘龙参…… 339
盘龙草…… 339
鸽…… 339
鸽卵…… 339
盒儿藤…… 339
猪牙皂…… 339
猪牙草…… 339
猪毛菜…… 339
猪毛漆…… 339
猪心…… 339
猪仔笼…… 339
猪母刺…… 339
猪辽参…… 339
猪耳朵穗子…… 339
猪耳草…… 339
猪耳菜…… 339
猪肝…… 339
猪肚…… 340
猪肠…… 340
猪苓…… 340
猪肾…… 340
猪肤…… 340
猪油花…… 340
猪蝤菜…… 340
猪姆耳…… 340
猪姆草…… 340
猪殃殃…… 340
猪胆…… 340
猪胞…… 340
猪胰…… 340
猪脂膏…… 340
猪笼草…… 340
猪脬…… 341
猪腰子…… 341
猪腰草…… 341
猪膏莓…… 341
猪屑…… 341
猪蹄…… 341
猪蹄叉…… 341
猪蹄花…… 341
猪糠藤…… 341
猪鬃草…… 341
猪髓…… 341
猫儿刺…… 341
猫儿核…… 341
猫儿眼…… 341
猫儿眼睛草…… 341
猫爪子花…… 341
猫爪草…… 341
猫耳朵…… 341
猫花…… 341
猫须公…… 341
猫须草…… 341
猫胞…… 342
猫胞衣…… 342
猫眼草…… 342
猫眼根…… 342
猫蓟…… 342
猫腿姑…… 342
猕猴桃…… 342
猕猴桃叶…… 342
猕猴桃根…… 342
猕猴桃藤中汁… 342
脚目草…… 342
脚板蒿…… 342
脚鱼壳…… 342
脱力草…… 342
脱骨丹…… 343
象牙…… 343
象贝母…… 343
象皮…… 343
象皮木…… 343
象豆…… 343

〔丶〕

旋花根…… 343
旋复花…… 343
旋复花根…… 343
旋复梗…… 343
商陆…… 343
章表根…… 343
章柳根…… 343
望月砂…… 343
望江青…… 344
望江南…… 344
望江南子…… 344
望果…… 344
麻口皮子药…… 344

麻子…… 344
麻子仁…… 344
麻布叶…… 344
麻叶青…… 344
麻芋果…… 344
麻虫…… 344
麻里果…… 344
麻沥果…… 344
麻油…… 344
麻参…… 344
麻柳叶…… 344
麻柳皮…… 345
麻骨风…… 345
麻黄…… 345
麻黄根…… 345
麻雀…… 345
麻秸…… 345
麻糖果…… 345
庵罗果…… 345
庵摩勒…… 345
廊茵…… 345
鹿皮…… 346
鹿耳苓…… 346
鹿肉…… 346
鹿血…… 346
鹿冲…… 346
鹿安茶…… 346
鹿角…… 346
鹿角刺果…… 346
鹿角草…… 346
鹿角胶…… 346
鹿角菜…… 346
鹿角霜…… 346
鹿尾…… 346
鹿肾…… 346
鹿茸…… 347
鹿茸草…… 347
鹿药…… 347
鹿骨…… 347
鹿胎…… 347
鹿铃草…… 347
鹿胶…… 347
鹿梨根皮…… 347
鹿衔草…… 347
鹿葱…… 348
鹿筋…… 348
鹿酱…… 348
鹿鞭…… 348
鹿髓…… 348
痒树棵…… 348
痒痒草…… 348
痕芋头…… 348
惊天雷…… 348
惊风伞…… 348
清风藤…… 348
清水跌打…… 348
清明花…… 348
清明草…… 348
清明菜…… 348
清油…… 348
清骨风…… 348
清香桂…… 348
混沌衣…… 348
淮木通…… 348
淮通…… 348
淫羊藿…… 348
淫羊藿根…… 349
淡竹叶…… 349
淡竹沥…… 349
淡竹茹…… 349
淡豆豉…… 349
淡秋石…… 349
淡菜…… 349
羚羊角…… 349
粘不扎…… 349
粘手风…… 349
粘身草…… 349
粘鱼须…… 349
粘粘葵…… 349
粘榔根…… 349
粘蝇草…… 349
粘糊菜…… 349
断血流…… 350
断肠草…… 350
断肠草根…… 350
断板龟…… 350
剪刀草…… 350
剪绒花…… 350
寄色草…… 350
密陀僧…… 350
密蒙花…… 350
婆婆丁…… 350
婆婆针…… 350
婆婆针线包…… 350
婆婆指甲菜…… 350

〔7〕

弹刀子菜…… 350
蛋黄花…… 351
堕胎花…… 351
续骨木…… 351
续断…… 351
续筋根…… 351
绵大戟…… 351
绵枣儿…… 351
绵茵陈…… 351
绵黄耆…… 351
绿升麻…… 351
绿竹…… 351
绿豆…… 351
绿豆叶…… 351
绿豆皮…… 351
绿豆衣…… 351
绿豆壳…… 351
绿矾…… 351
绿泽兰…… 352
绿梅花…… 352
绿菜…… 352
绿萼梅花…… 352
绿葡萄…… 352
绿蓐草…… 352

十二画

〔一〕

琥珀…… 352
斑叶兰…… 352
斑杖…… 352
斑鸠窝…… 352
斑根…… 352
斑猫…… 352
斑蝥…… 352
琴叶榕…… 353
博落回…… 353
棒子木…… 353
棒子毛…… 353
棒子头…… 353
棒棒木…… 353
棒槌草…… 353
棒棰…… 353
楮叶…… 353
楮李…… 353
楮实…… 353
楮茎…… 354
楮实子…… 354
楮树白皮…… 354
楮树根…… 354
楮桃…… 354
棋盘花…… 354
椒叶…… 354
椒目…… 354
棉子…… 354
棉花…… 354
棉花子…… 354
棉花团…… 354
棉花壳…… 354
棉花条…… 354

棉花核…… 354
棉花根…… 354
棉桃壳…… 355
棉筋条…… 355
棕毛…… 355
棕皮…… 355
棕鱼…… 355
棕树果…… 355
棕树根…… 355
棕笋…… 355
棕榈子…… 355
棕榈叶…… 355
棕榈皮…… 355
棕榈花…… 355
榔玉…… 355
榔头花…… 355
棘叶…… 355
棘针…… 356
棘刺…… 356
鹁鸽…… 356
酢浆草…… 356
款冬花…… 356
散血飞…… 356
散血丹…… 356
散血草…… 356
散星草…… 356
韩信草…… 356
朝开暮落花…… 356
朝天一柱香…… 356
朝天子…… 356
朝天罐…… 356
朝阳花根…… 356
朝鲜参…… 356
朝鲜黄连…… 356
葫芦…… 356
葫芦瓜…… 356
葫芦茶…… 356
葫芦茶根…… 357
葫芦罐…… 357
葳参…… 357
葛花…… 357
葛谷…… 357
葛条花…… 357
葛根…… 357
葛蔓…… 357
葛藤蔓…… 357
葎草…… 357
葎草花…… 357
葎草果穗…… 357
葎草根…… 357
葡萄…… 358
葡萄根…… 358
葡萄藤叶…… 358
葱子…… 358
葱叶…… 358
葱白…… 358
葱白头…… 358
葱茎白…… 358
葱实…… 358
葱须…… 358
葱根…… 358
葶苈子…… 358
落地生根…… 359
落地金钱…… 359
落花生…… 359
落花生枝叶…… 359
落苏…… 359
落得打…… 359
落翘…… 359
萱草花…… 359
萱草根…… 359
萱草嫩苗…… 359
蒌叶…… 359
蒌油…… 359
蒌根…… 359
蒿蓄…… 360
葭花…… 360
蒺耳…… 360
蒺耳实…… 360
葵子…… 360
葵花茎髓…… 360
葵花根…… 360
葵花盘…… 360
葵扇木…… 360
葵菜…… 360
葵菜子…… 360
喜树…… 360
喜树叶…… 360
喜树皮…… 360
粟壳…… 360
雄丁香…… 360
雄黄…… 360
雄黄草…… 361
雄精…… 361
硬水黄连…… 361
硬皮草…… 361
硬壳藤…… 361
硬杆水黄连…… 361
硬饭团…… 361
硬蒺藜…… 361
硫黄…… 361
雁来红…… 361
提云草…… 361
搜山虎…… 361
雅连…… 361
翘摇…… 361
戟叶半夏…… 361

〔 | 〕

紫大戟…… 361
紫贝…… 361
紫贝齿…… 361
紫丹参…… 362
紫石英…… 362
紫阳花…… 362
紫杉…… 363
紫花地丁…… 362
紫花杜鹃…… 362
紫花疔草…… 362
紫花草…… 362
紫花秧…… 362
紫苏子…… 362
紫苏叶…… 362
紫苏梗…… 362
紫茉莉叶…… 363
紫茉莉根…… 363
紫英…… 363
紫顶龙芽…… 363
紫金牛…… 363
紫金牛根…… 363
紫金龙…… 363
紫金皮…… 364
紫金标…… 364
紫金莲…… 364
紫河车…… 364
紫油厚朴…… 364
紫荆木…… 364
紫荆皮…… 364
紫草…… 364
紫草茸…… 365
紫背天葵…… 365
紫背天葵子…… 365
紫背金牛…… 365
紫背草…… 365
紫珠…… 365
紫胶…… 365
紫菘…… 365
紫菜…… 365
紫菀…… 365
紫堇…… 365
紫梗…… 365
紫梢花…… 365
紫硇砂…… 366
紫藏茎叶…… 366
紫藏根…… 366
紫萸…… 366

紫酢浆草…… 366
紫蓝花…… 366
紫槟榔…… 366
紫蕺…… 366
紫霄花…… 366
紫燕…… 366
紫薇叶…… 366
紫薇花…… 366
紫薇根…… 366
紫藤香…… 366
紫棕子…… 366
掌叶凤尾…… 366
掌参…… 366
喇叭花子…… 366
喝呼草…… 366
喝起草…… 366
喉咙草…… 366
喉毒药…… 367
喉科草…… 367
蛐蛐…… 367
蛔虫菜…… 367
蛞蝓…… 367
蜒蚰…… 367
蜒蚰蠃…… 367
蛤壳…… 367
蛤蚂油…… 367
蛤蚧…… 367
蛤蚆皮…… 367
蛤蒌…… 367
蛤蟆草…… 367
蛤蟆浆…… 367
蛤蟆酥…… 367
蛴螬…… 367
景天…… 367
景天三七…… 368
鼎足瓜…… 368
黑儿茶…… 368
黑大豆…… 368
黑大豆皮…… 368
黑及草…… 368
黑木耳…… 368
黑牛膝…… 368
黑风蛇…… 368
黑风藤…… 368
黑丑…… 368
黑龙骨…… 368
黑兰…… 368
黑头草…… 368
黑皮蛇…… 368
黑皮跌打…… 368
黑芝麻…… 368
黑老虎…… 368
黑耳草…… 369
黑阳参…… 369
黑豆衣…… 369
黑苏子…… 369
黑鱼…… 369
黑参…… 369
黑胡椒…… 369
黑面叶…… 369
黑面神…… 369
黑面神根…… 369
黑骨头…… 369
黑骨芒箕…… 369
黑种草子…… 369
黑洋参…… 369
黑根…… 369
黑脂麻…… 369
黑脚蕨…… 370
黑瞎子胆…… 370
遏蓝菜…… 370

〔丿〕

铺地虎…… 370
铺地草…… 370
铺地凉伞…… 370
铺地蜈蚣…… 370
铺地锦…… 370
锁阳…… 370
锁严子…… 370
锁眉草…… 370
锅底灰…… 370
锈钉子…… 370
锈铁棒…… 370
锉刀草…… 370
锉草…… 370
鹄壳…… 370
鹅儿肠菜…… 370
鹅不食草…… 370
鹅内金…… 371
鹅巴掌…… 371
鹅血…… 371
鹅馄饨…… 371
鹅脚板…… 371
鹅脚板根…… 371
鹅掌金星草…… 371
鹅管石…… 371
筋骨草…… 371
筋退…… 371
筋根…… 371
筋碎补…… 371
粤万年青…… 371
御米壳…… 371
舒筋草…… 371
舒筋藤…… 371
番木鳖…… 371
番石榴干…… 371
番石榴叶…… 372
番石榴皮…… 372
番仔桃…… 372
番瓜…… 372
番瓜藤…… 372
番杏…… 372
番泻叶…… 372
番海棠…… 372
番椒…… 372
番蕉叶…… 372
猢狲果…… 372
猬皮…… 372
猴子七…… 372
猴子埕…… 372
猴丹…… 372
猴仔草…… 372
猴耳草…… 372
猴血七…… 372
猴局根…… 373
猴枣…… 373
猴草…… 373
猴姜…… 373
腊瓜…… 373
腌芥卤…… 373

〔丶〕

蛮姜…… 373
痢疾草…… 373
痢疾罐…… 373
焰消…… 373
湖南连翘…… 373
滑石…… 373
滑叶跌打…… 373
滁菊…… 373
割人藤…… 373
寒水石…… 373
寒石…… 373
寒豆…… 373
寒草…… 373
寒雀粪…… 373
窝儿七…… 373
窝儿参…… 374
粪球虫…… 374
粪脚草…… 374
粪箕笃…… 374

〔7〕

犀角…… 374
隔山香…… 374

隔山消…… 378
隔子通…… 374
骚羊古…… 374
缅栀子…… 374

十三画

〔一〕

瑇瑁…… 374
瑞香叶…… 374
瑞香花…… 375
瑞香根…… 375
瑞莲…… 375
塘边藕…… 375
塘底菜…… 375
塘莺莲…… 375
塘葛菜…… 375
椿木叶…… 375
椿木皮…… 375
椿叶…… 375
椿白皮…… 375
椿花…… 375
椿树子…… 375
椿根白皮…… 375
楝叶…… 375
楝皮…… 375
楝花…… 375
楝实…… 375
楝根木皮…… 375
榄核莲…… 375
榅桲…… 375
楸马核果…… 376
楸叶常山…… 376
楸皮…… 376
楸树皮…… 376
槐叶…… 376
槐白皮…… 376
槐皮…… 376
槐豆…… 376
槐花…… 376
槐连灯…… 376
槐连豆…… 376
槐角…… 376
槐枝…… 376
槐实…… 376
槐根…… 376
槐蓝…… 377
槐嫩蘖…… 377
榆子…… 377
榆叶…… 377
榆白皮…… 377
榆皮…… 377
榆实…… 377
榆荚仁…… 377
榆钱…… 377
楤木白皮…… 377
楼台草…… 377
赖桐叶…… 377
赖桐花…… 377
赖尿郎…… 377
鼓槌草…… 377
蓍草…… 377
蓝子…… 377
蓝布正…… 378
蓝布裙…… 378
蓝地柏…… 378
蓝色草…… 378
蓝花参…… 378
蓝花柴胡…… 378
蓝花菜…… 378
蓝矾…… 378
蓝实…… 378
蓝雪草…… 378
蓝蝴蝶…… 378
蓝藤…… 378
墓头灰…… 378
墓头回…… 378
蓖麻子…… 378
蓖麻叶…… 379
蓖麻油…… 379
蓖麻根…… 379
蓬子菜…… 379
蓬术…… 379
蓬莪术…… 379
蓬藁…… 380
蒟叶…… 380
蒟蒻…… 380
蒟酱…… 380
蒟酱叶…… 380
蒡箕茶…… 380
蒺藜子…… 380
蒺藜苗…… 380
蒺藜草…… 380
蒺藜蔓…… 380
蒲公英…… 380
蒲包草…… 381
蒲包草根…… 381
蒲草黄…… 381
蒲厘…… 381
蒲种壳…… 381
蒲桃…… 381
蒲栗子…… 381
蒲笋…… 381
蒲扇…… 381
蒲黄…… 381
蒲黄草…… 381
蒲黄根…… 381
蒲棒…… 381
蒲棒花粉…… 381
蒲葵…… 381
蒲槌…… 381
蒲蒻…… 381
蒲颓子…… 381
蒲颓叶…… 382
蒴藋…… 382
蒻头…… 382
蒙花…… 382
蒙花珠…… 382
蒙顶茶…… 382
硼砂…… 382
碎叶青花…… 382
碎米柴…… 382
碎米棵…… 382
碎骨子…… 382
鹌子嘴…… 382
感应草…… 382
雷丸…… 382
雷丸草…… 382
雷公头…… 383
雷公根…… 383
雷公藤…… 383
雷实…… 383
零乌豆…… 383
零余子…… 383
零陵香…… 383
雾水葛…… 383
瓦瓜…… 383
摄龟…… 383
摆子草…… 383
搬倒甑…… 383
摊地莓…… 383

〔丨〕

频婆果…… 383
暗山公…… 383
睡莲…… 383
睡菜…… 383
蜈蚣…… 384
蜈蚣七…… 384
蜈蚣草…… 384
蜈蚣蒿…… 384
蜗牛…… 384
蛾药…… 384
蛾眉豆…… 384
蜂子…… 384
蜂斗菜…… 384

蜂乳……384
蜂房……385
蜂毒……385
蜂胶……385
蜂巢……385
蜂蜡……385
蜂窝草……385
蜂窝菊……385
蜂蜜……385
蜂糖罐……385
蜣螂……386
路头花……386
路边草……386
路边姜……386
路边菊……386
路路通……386
蜀羊泉……386
蜀椒……386
蜀葵子……386
蜀葵花……386
蜀葵苗……386
蜀葵根……386
蜀漆……386
照山白……386
照白杜鹃……387

〔丿〕

锡叶藤……387
锡生藤……387
锦地罗……387
锦灯笼……387
锦纹大黄……387
锦带……387
锯头草……387
锯草……387
矮瓜……387
矮地茶……387
矮陀陀……387
矮松……387
矮桐……387
矮脚苦蒿……387
雉子筵根……387
雉鸡尾……388
雉鸡蛋……388
鼠牙半枝莲……388
鼠耳草……388
鼠曲草……388
鼠妇……388
鼠李……388
鼠李皮……388
鼠李根……388
鼠尾……388
鼠粘子……388
鼠粘根……388
魁蛤壳……388
腻粉……388
腰带藤……388
腰黄……388
腽肭脐……388
腹水草……389
腹泻草……389
解毒蕨……389
解晕草……389
鲍鱼壳……389

〔丶〕

新会皮……389
新会橙……389
新蒙花……389
新疆雪莲……389
廉姜……389
痱子草……389
痴头婆……389
痰药……389
慎火草……389
满山红……389
满山香……390
满山黄……390
满天星……390
满江红……390
满堂红……390
滇白前……390
滇杠柳……390
滇香薷……390
滇独活……390
滇常山……390
滇紫参……390
滇橄榄……390
溪沟草……390
溪桃……390
溪黄草……390
滚山虫……390
滚山珠……391
滚地龙……391
滂藤……391
滨莴苣……391
溺白垩……391
萤藤……391
酱瓣半支……391
酱瓣豆草……391
酱瓣草……391
福寿草……391

〔7〕

缠龙子……391
缠豆藤……391

十四画

〔一〕

碧桃干……391
碧蝉花……391
墙头竹……391
榼子……391
榼子藤……391
榼藤……391
榼藤子……391
槟果……392
榧子……392
榜嘎……392
槟榔……392
槟榔皮……392
槟榔衣……392
榕树叶……392
榕树皮……392
榕树须……392
榕树胶汁……392
榕须……392
榠楂……392
酸五棱……393
酸汤杆……393
酸枣仁……393
酸枣根皮……393
酸胖……393
酸浆……393
酸浆水……393
酸浆草……393
酸浆根……393
酸桶笋……393
酸模……393
酸榴皮……393
酸榴根……393
酸赭……393
榖树子……393
嘉庆子……394
蔷薇子……394
蔷薇叶……394
蔷薇花……394
蔷薇果……394
蔷薇根……394
慕荷……394
蔓荆子……394
蔓荆子叶……394
蔓菁……394
蔓菁子……394
蔓椒……394
蔓荑……394

蓼蓼根…… 395
蔊菜…… 395
蔻米…… 395
蔻壳…… 395
蓼子七…… 395
蓼子朴…… 395
磁石…… 395
豨莶…… 395
豨莶根…… 395

〔丨〕

雌丁香…… 395
蜚虻…… 395
嗽药…… 395
蜻蜓红…… 395
蜞…… 395
蜡花…… 395
蜡树皮…… 395
蜡烛扦草…… 396
蜡梅花…… 396
蜥蜴…… 396
蜘蛛…… 396
蜘蛛抱蛋…… 396
蜘蛛香…… 396
蝉衣…… 396
蝉花…… 396
蝉退…… 396
蝉蜕…… 396
罂粟壳…… 397

〔丿〕

稳齿菜…… 397
算盘子…… 397
算盘子叶…… 397
算盘子根…… 397
算盘珠…… 397
管仲…… 397
熏牙子…… 397
熏衣草…… 397
熏陆香…… 397
熏草…… 397
熏梅…… 397
鼻涕虫…… 397
獐牙菜…… 397
獐耳细辛…… 398
馒头果…… 398
鲜白头…… 398
鲜生地…… 398
鲜地黄…… 398
鲜黄连…… 398

〔丶〕

辣茄…… 398
辣虎…… 398
辣菜子…… 398
辣椒…… 398
辣椒头…… 398
辣椒茎…… 398
辣椒根…… 398
辣蓼草…… 398
韶子…… 399
腐肠…… 399
腐婢…… 399
瘩背草…… 399
漆大姑…… 399
漆姑草…… 399
漆脚…… 399
漆渣…… 399
漂摇草…… 399
滴水珠…… 399
滴乳石…… 399
漏芦…… 399
蜜父…… 400
蜜果…… 400
蜜草…… 400
蜜香…… 400
蜜桶花…… 400
蜜望子…… 400
蜜脾…… 400
蜜蜂子…… 400
蜜蜂草…… 400
蜜蜂毒素…… 400
蜜蜡…… 400
蜜糖…… 400

〔7〕

嫩双钩…… 400
嫩芦梗…… 400
翠云草…… 400
翠羽草…… 400
翠蝴蝶…… 400
熊油…… 400
熊柳根…… 400
熊骨…… 400
熊胆…… 400
熊胆木…… 401
熊胆草…… 401
熊脂…… 401
缩砂仁…… 401
缩砂蜜…… 401

十五画

〔一〕

樗木叶…… 401
樗叶…… 401
樗白皮…… 401
樗皮…… 401
樗树子…… 401
榧子肉皮…… 401
樱桃叶…… 401
樱桃枝…… 401
樱桃核…… 401
樱桃梗…… 401
橡子…… 402
橡木皮…… 402
橡斗壳…… 402
橡皮草…… 402
橡实…… 402
橡实壳…… 402
槲寄生…… 402
樟木…… 402
樟木子…… 402
樟木皮…… 402
樟皮…… 402
樟扣…… 402
樟柳柽…… 402
樟树子…… 402
樟树叶…… 402
樟树皮…… 403
樟脑…… 403
樟脑树根…… 403
橄榄…… 403
橄榄核…… 403
橄榄根…… 403
赭石…… 403
豌豆跌打…… 403
醋柳果…… 403
醉鱼草…… 403
醉鱼草花…… 403
醉草…… 403
敷地两耳草…… 404
蕨…… 404
蕨儿菜…… 404
蕨鸡根…… 404
蕨根…… 404
蕨薯…… 404
蕤仁…… 404
蕤核…… 404
蕉油…… 404
蕲艾…… 404
蕲蛇…… 404
蕲蛇药…… 404
蕺子菜…… 404
震天雷…… 404

〔丨〕

蝴蝶……404
蝴菜……404
蝴蝶风……404
蝴蝶花……404
蝴蝶花根……404
蝴蝶草……404
蝎子……404
蝎子七……404
蝎子花……405
蝎子草……405
蝎虎……405
蝎虎草……405
蝌蚪……405
蝮蛇……405
蝼蛄……405
蝙蝠葛根……405
蝙蝠粪……405
踯躅花……405
踏天桥……405
暴马子……405
墨斗草……405
墨地……405
墨旱莲……405
墨鱼盖……406
墨柱根……406

〔丿〕

稻芽……406
稻蘖……406
箭头草……406
箭羽草……406
箭杆风……406
箭芪……406
靠山红……406
黎豆藤……406
僵虫……406
僵蚕……406
僵蛹……406
鲤鱼……406
鲤鱼胆……406
鲤鱼橄榄……406
鲤鱼鳞……406
鲫鱼胆草……406

〔丶〕

熟地……407
熟地黄……407
瘪竹……407
瘪谷茴香……407
瘪桃干……407
潮脑……407
潮湿虫……407
潦叶花……407
潘桑叶……407
潼沙苑……407
潼蒺藜……407
澄茄根……407
寮刁竹……407
鹤顶草……407
鹤虱……407
鹤草芽……407

〔乁〕

缬草……407

十六画

〔一〕

靛花……408
靛青根……408
靛沫花……408
橹罟子……408
橙子……408
橙子皮……408
橙子核……408
橙皮……408
橘……408
橘子叶……408
橘仁……408
橘叶……408
橘白……408
橘皮……408
橘丝……409
橘米……409
橘红……409
橘花……409
橘饼……409
橘络……409
橘核……409
橘根……409
橘筋……409
瓢儿果……409
瓢羹菜……409
薤白……409
薤白头……409
薯良……409
薯莨……409
薯蓣果……410
薇……410
蘼宝叶……410
薪草……410
薪柴灰……410
薏米……410
薏苡仁……410
薏苡根……410
薄荷……410
薄雪草……410
薜荔……410
薜荔果……410
薜荔根……410
薅田薰……411
薅田薰根……411
燕子石……411
燕子花……411
燕子尾……411
燕根……411
燕菜……411
燕菖子……411
燕窝……411
藁吾……411
霍石斛……411
擀杖花……411
鏊菜……411

〔丨〕

螃蟹……411
螃蟹七……411
螃蟹甲……411
螃蟹夹……411

〔丿〕

镜面草……411
篦子草……411
篦箕柴……411
篱障花……411
獭肝……411
膨胀草……411
鲮鲤甲……411

〔丶〕

鹧鸪菜……412
磨挡草……412
磨盘草……412
磨盘树子……412
磨盘根……412
燎眉蒿……412
潞党参……412
濂珠……412
糙苏……412
糖刺果……412
糖胶树……412
糖梗……412
糖罐……412

〔乁〕

壁虫……412
壁虎……412

壁虱胡麻…… 412
壁茧…… 412
壁蚕茧…… 413
壁钱…… 413
壁钱幕…… 413
壁蟢…… 413
壁蟢窠…… 413

十七画

〔一〕

檀香…… 413
藏木香…… 413
藏红花…… 413
藏青果…… 413
藏茄…… 413
藏黄连…… 414
藁本…… 414
霜坡虎…… 414
霜桑叶…… 414
霞天曲…… 414
霞天膏…… 414
翳子草…… 414
翳草…… 414

〔丨〕

螳螂子…… 414
螺丕草…… 414
螺丝三七…… 414
螺蛳…… 414
螺厣草…… 414
蟋蟀…… 414
蟋蟀草…… 415

〔丿〕

稽豆衣…… 415
繁缕…… 415
爵床…… 415
臟胀草…… 415
鍬鱼…… 415

〔丶〕

辫子草…… 415
辫子草根…… 415
蜜虫…… 415

〔乁〕

檗木…… 415
檗皮…… 415
翼首草…… 415

十八画

〔一〕

藕…… 415
藕节…… 415
藕节疤…… 416
藕杆…… 416
藕实…… 416
藕蔬菜…… 416
藜…… 416
藜芦…… 416
藤五甲…… 416
藤叶细辛…… 416
藤杜仲…… 416
藤黄…… 416
藤梨…… 416
藤篮果…… 416
覆盆…… 416
覆盆子…… 416
覆盆子叶…… 417
覆面…… 417
礞石…… 417

〔丨〕

蟛蜞菊…… 417
蟛蜞盖…… 417
蟠龙草…… 417
瞿麦…… 417
鹭鸶藤…… 417

〔丿〕

翻山虎…… 417
翻天印…… 417
翻白叶…… 417
翻白草…… 417
翻胃木…… 418

〔丶〕

鹰不泊…… 418
鹰不泊莲…… 418
癞头花…… 418
癞虾蟆…… 418
癞格宝…… 418
癞格宝草…… 418
癞蛤蟆…… 418
癞蛤蟆酥…… 418
癞蟆皮…… 418

〔乁〕

藏皮树…… 418

十九画

〔一〕

藿香…… 418
攀枝花…… 418

〔丨〕

蟾酥…… 418
蟾蜍…… 419
蟾蜍皮…… 419
蟾蜍草…… 419

〔丿〕

鳗鱼…… 419
鳗鲡鱼…… 419
鳗鲡鱼骨…… 419
蟹…… 419
蟹化石…… 419
蟹爪寄生…… 419
蟹壳…… 419

〔丶〕

麒麟血…… 419
爆格蚤…… 420
鳖甲…… 420
鳖甲胶…… 420
鳖肉…… 420
鳖血…… 420

二十画

〔一〕

蘘荷…… 420

〔丨〕

蟓壳…… 420

〔丿〕

獾子油…… 420
獾油…… 420
鳝鱼…… 420
鳝鱼血…… 420

〔丶〕

糯米草…… 420
糯米藤…… 421
糯秫…… 421
糯粟…… 421
糯稻根…… 421
糯稻根须…… 421

二十一画以上

〔一〕

霸王树…… 421
霸王鞭…… 421
露木尔…… 421
露珠草…… 421
露蜂房…… 421

露兜笋…… 421
露兜笋心…… 421
露兜笋花…… 421
露兜笋蕊…… 421
露兜根…… 421
蘼芜…… 422
蘘香…… 422
蘘香虫…… 422

〔丿〕

鱧鱼…… 422
鶸头婆…… 422
罐罐草…… 422

〔丶〕

麝香…… 422
麝香壳…… 422
麝香草…… 422

〔乙〕

蠡牛…… 422
蠡实…… 422
蠡草花…… 422

一 画

〔一〕

一口血 ❶见《四川中药志》。为水八角之别名。❷见《四川中药志》。为草血竭之别名。❸见《分类草药性》。为红白二丸之别名。各详该条。

一支箭 见《贵州民间方药集》。为瓶尔小草之别名，详该条。

一匹绸 见《广西中草药》。为白鹤藤之别名，详该条。

一见消 见《海南岛常用中草药手册》。为白花丹之别名，详该条。

一见喜 见《泉州本草》。为穿心莲之别名，详该条。

一文钱 见《云南中草药》。为地不容之别名，详该条。

一号黄药 见《红河中草药》。为大黄药之别名，详该条。

一叶一枝花 见《湖南药物志》。为盘龙参之别名，详该条。

一叶萩 见《浙江天目山药用植物志》。又名花扫条、山帚条、小粒蒿、八颗叶下珠。为大戟科植物叶底珠 Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. 的叶、嫩枝、花及根。分布东北、华北、华东地区及河南、陕西、四川。辛、苦，温，有毒。祛风活血，益肾强筋。治四肢麻木，偏瘫，面神经麻痹，小儿麻痹后遗症，风湿腰痛，眩晕，耳聋，阳痿，神经衰弱，嗜睡症。煎服：3～6克。叶、嫩茎、根含一叶萩碱；叶尚含二氢一叶萩碱、一叶萩碱醇(Securinol)及芸香甙、鞣质等。一叶萩碱与二氢一叶萩碱均有番木鳖碱样作用，能兴奋中枢神经系统，特别是脊髓；并有抑制胆碱酯酶的作用。一叶萩碱很快在体内被破坏，因此，适当加大剂量，一般不致引起积蓄反应，其治疗宽度较番木鳖碱大。中毒时则能引起脊髓性惊厥。二氢一叶萩碱的作用与毒性均较一叶萩碱强一倍。

一包针 ❶见《中药志》。为千年健之别名。❷见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为金盏银盘之别名。❸见《上海常用中草药》。为狼把草之别名。各详该条。

一扫光 见《分类草药性》。为千里光之别名，详该条。

一帆青 见《质问本草》。为蜘蛛抱蛋之别名，详该条。

一年蓬 见《浙江民间常用草药》。又名野蒿、治疟草、牙肿消。为菊科植物一年蓬 Erigeron annuus (L.) Pers. 的全草。分布吉林、河北、河南、江西、湖南、湖北、四川及华东地区。淡，平，清热解毒，抗疟。①治急性胃肠炎，急性传染性肝炎，淋巴结炎，血尿，疟疾。煎服：30～60克。②治齿龈炎，捣汁搽；毒虫螫伤，捣烂敷。本品含焦米壳酸、槲皮素、芹菜素-7-葡萄糖醛酸甙。茎、叶以石油醚、乙醚、氯仿洗涤后的水提取物，有降血糖作用。

一朵云 出《天宝本草》。为阴地蕨之别名，详该条。

一朵芙蓉花 见《生草药性备要》。为锦地罗之别名，详该条。

一块瓦 见《广西实用中草药新选》。为金耳环之别名，详该条。

一把伞 ❶见《广西中药志》。为八角莲之别名，❷见《贵州民间药物》。为兔儿伞之别名。各详该条。

一把针 见《浙江民间草药》。为鬼针草之别名，详该条。

一串红 见《草药手册》。为金线草之别名，详该条。

一串钱　❶见《民间常用草药汇编》。为大金钱草之别名。❷见《民间常用草药汇编》。为连钱草之别名。各详该条。

一条根　见《江西中医药》(10)：64，1957。为千斤拔之别名，详该条。

一枝香　❶出《植物名实图考》。为毛大丁草之别名。❷见《中国药用植物志》。为徐长卿之别名。各详该条。

一枝黄花　出《植物名实图考》。又名蛇头王、黄花柴胡、百条根、满山黄。为菊科植物一枝黄花Solidago virga-aureal L. var. laiocarpa（Benth.）A. Gray 的全草或根。分布华东、华中、西南及华南地区。辛、苦，凉，有小毒。疏风清热，消肿解毒。①治风热感冒，咽喉肿痛，支气管炎，肺炎，肺结核咳血，肾炎，小儿疳积。煎服：9～15克。②治毒蛇咬伤，内服并捣敷；痈疖肿毒，跌打损伤，捣敷；手、足癣，煎汤浸洗；霉菌性阴道炎，煎浓汁洗涤阴道。全草含槲皮素、槲皮甙、芸香甙、矢车菊素-3-龙胆双糖甙等黄酮类。又含绿原酸、咖啡酸、鞣质、挥发油、皂甙等。煎剂在试管内对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌等有不同程度的抑菌作用；对红色癣菌也能抑制。动物实验，内服有某些祛痰、利尿作用。

一枝蒿　见《本草纲目拾遗》。为蓍草之别名，详该条。

一枝箭　见《药学学报》12(10)：690，1965。为铁棒锤之别名，详该条。

一杯倒　见《广西中草药》。为羊蹄蹋根之别名，详该条。

一苗蒿　见《陕西中草药》。为洋蓍草之别名，详该条。

一味药　见《贵州民间方药集》。为马蓝之别名，详该条。

一点血　❶见《四川中药志》。又名红砖草。为秋海棠科植物网脉秋海棠Begonia wilsonii Gagn. 的根茎。分布四川。甘、苦，平。补气健脾，养血，止血。治病后虚弱，白带，咳嗽咯血，功能性子宫出血。煎服：15～30克（鲜品30～60克）；或加大剂量炖鸡服。本品预试含强心甙、黄酮类、鞣质、酚性成分、三萜成分、甾醇、皂甙。❷见《广西实用中草药新选》。为通城虎之别名，详该条。

一点红　见《南宁市药物志》。又名紫背草、羊蹄草、红背叶、叶下红。为菊科植物一点红 Emilia sonchifolia(L.)DC. 的全草。分布江西、福建、湖南、广西、广东、贵州、云南等地。苦，凉。清热解毒，利湿消肿。①治咽喉肿痛，口腔溃疡，目赤肿痛，湿热泻痢，热淋，上呼吸道感染，肺炎。煎服：15～30克。②治乳痈，疔疮，带状疱疹，湿疹，漆过敏，毛虫引起的过敏性皮炎，鲜品捣敷并煎服。本品含微量氢氰酸，预试还含生物碱、黄酮甙及酚类。体外试验，煎剂对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

一炷香　见《南宁市药物志》。为毛大丁草之别名，详该条。

一滴珠　见《江西草药》。为滴水珠之别名，详该条。

一箭球　见《广西民间常用草药》。又名三角草、三叶珠、单打槌、水百足、水香附。为莎草科植物单穗水蜈蚣 Kyllinga monocephala Rottb.的全草。分布广东、广西、云南。微甘、辛，平。疏风清热，散瘀消肿。①治感冒咳嗽，百日咳，咽喉肿痛，疟疾，痢疾。煎服：30～60克。②治跌打损伤，蛇咬伤，煎服并捣敷；皮肤瘙痒，煎水洗。

二 画

〔一〕

二十四症 见《广西实用中草药新选》。为山药之别名，详该条。

二丑 见《中药材手册》。即黑丑与白丑之合称，详牵牛子条。

二叶葎 见《中国药用植物志》。为白花蛇舌草之别名，详该条。

二花 见《中国经济植物志》。为金银花之处方名，详该条。

二花秧 见《河南中药手册》。为忍冬藤之别名，详该条。

二宝花 见《中国药学大辞典》。为金银花之处方名，详该条。

十大功劳 出《植物名实图考》。又名木黄连、刺黄芩、土黄柏。为小檗科植物阔叶十大功劳 Mahonia bealei (Fort.)Carr.或狭叶十大功劳 M. fortunei(Lindl.)Fedde 的根及茎。前者分布陕西、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、四川等地；后者分布浙江、湖北、四川等地。苦，寒。清热，燥湿，解毒。①治湿热泻痢，湿热淋浊，风湿痹痛，急性黄疸型传染性肝炎，肺炎，肺结核，支气管炎，咽喉肿痛。煎服：9～15克。②治目赤肿痛，制成眼药水点眼；痈肿疮毒，研末蜜调敷。阔叶十大功劳主含小檗碱。狭叶十大功劳含小檗碱、掌叶防己碱、小檗胺碱、木兰花碱、药根碱等。小檗碱药理见黄连条。

十大功劳叶 出清·叶小峰《本草再新》。又名功劳叶。为小檗科植物阔叶十大功劳 Mahonia bealei(Fort.)Carr. 或狭叶十大功劳 M.fortunei(Lindl.)Fedde 的叶。苦，凉。入肺经。滋阴清热，止咳化痰。治肺结核咯血，骨蒸潮热，头晕，耳鸣，心烦，腰酸腿软，失眠。煎服：9～15克。果实名功劳子，功能主治与叶同。阔叶十大功劳叶主含小檗碱。狭叶十大功劳叶含小檗碱、掌叶防己碱、药根碱和木兰花碱等，煎剂在试管内对金黄色葡萄球菌、大肠及绿脓杆菌有轻度抑制作用。小檗碱药理见黄连条。

十字草 见《上海常用中草药》。为苹之别名，详该条。

丁子香 见《齐民要术》。为丁香之别名，详该条。

丁子蓼 见《中国药用植物志》。为丁香蓼之别名，详该条。

丁公藤 ❶出《本草拾遗》。为石南藤之别名，详该条。❷见广州军区空军卫生部《常用中草药手册》。又名包公藤。为旋花科植物名叫丁公藤 Erycibe obtusifolia Banth. 的藤茎。分布广东、广西、云南。辛，温，有毒。发汗，祛风胜湿，消肿止痛。治风湿痹痛，半身不遂，跌打肿痛，坐骨神经痛。内服：水煎或水酒各半煎，3～6克。外用：浸酒局部涂擦。内服过量中毒，则产生出汗不止，四肢麻痹等症。孕妇忌服。含有效成分东莨菪素、东莨菪甙。

丁茄 见《广西实用中草药新选》。又名野颠茄、红癫茄、小颠茄、刺丁茄、天茄子。为茄科植物刺茄 Solanum surattense Burm.f. 的根、果或全株。四川、贵州、湖南、广西、广东、台湾、福建、江西、江苏等地有栽培。苦，辛，温，有毒。活血散瘀，麻醉镇痛。治跌打损伤，风湿性腰腿痛，淋巴结结核，寒性脓疡，慢性骨髓炎，冻疮，脚癣。捣敷、煎水洗或研末调敷。本品一般只作外用，不宜内服。全株含龙葵碱。浆果含澳洲茄碱、澳洲茄边碱、刺茄碱。

丁香 出《药性论》。又名雄丁香、公

丁香、丁子香。为桃金娘科植物丁香 Syzygium aromaticum(Baill.)Merr. et Perry 的花蕾。产印度尼西亚、马来西亚及东非沿海国家，我国广东有栽培。辛，温。入胃、脾、肾经。温中降逆，暖肾助阳，杀虫。①治脘腹冷痛，呃逆，反胃，呕吐，泻利。②治疝瘕，痃癖，阳萎，子宫虚冷，寒湿带下。煎服：1.5～4.5克。③治体癣、足癣。酒浸涂擦。畏郁金。忌见火。丁香树皮：亦治脘腹冷气诸病，可代丁香。花蕾含挥发油，主要成分为丁香油酚、β-石竹烯和乙酰丁香油酚。丁香为芳香健胃剂，可缓解腹部气胀，增强消化能力，减轻恶心呕吐。其乙醇浸液及丁香油、丁香油酚在体外对金黄色葡萄球菌、霍乱弧菌及肺炎杆菌、痢疾杆菌、大肠杆菌、伤寒杆菌、变形杆菌、白喉杆菌、鼠疫杆菌、结核杆菌等均有抑制作用，对表皮真菌也能抑制。丁香油口服有驱蛔作用，但转阴率低。

丁香枝 出《本草纲目》。为桃金娘科植物丁香 Syzygium aromaticum (Baill.) Merr. et Perry 的枝条。治一切冷气，心腹胀满疼痛，恶心，泄泻虚滑，水谷不消。煎服：3～6克。

丁香油 出清·龙柏《药性考》。为桃金娘科植物丁香Syzygium aromaticum(Baill.) Merr. et Perry 干燥花蕾经蒸馏分离得到的挥发油。甘、辛；大热。暖胃，温肾。①治胃寒痛胀，呃逆，吐泻，消化不良，疝痛。内服：1～2滴，入汤剂或和酒饮。②治风湿痹痛，涂擦患处；牙痛，以棉球蘸少许嵌入龋孔内。成份、药理参见丁香条。

丁香蓼 见《中国药用植物志》。又名水丁香、水冬瓜、丁子蓼、田蓼草。为柳叶菜科植物丁香蓼Ludwigia prostrata Roxb. 的全草。分布长江以南各地。苦、辛，凉。清热解毒，利尿消肿。①治石淋，白带，传染性肝炎，肠炎，痢疾，肾炎水肿，膀胱炎。煎服：15～30克。②治目翳，煎水洗；痈疽，疔疮，蛇、虫咬伤，鲜品捣烂敷。

丁癸草 出《生草药性备要》。又名人字草、铺地锦、苍蝇翼。为豆科植物丁癸草 Zornia diphylla Pers. 的全草。分布福建、浙江、江西、广东、四川、云南等地。甘，凉。清热解毒，散瘀消肿。①治风热感冒，目赤肿痛，小儿疳积，咽喉炎，黄疸，痢疾，急性胃肠炎，急性阑尾炎，急性乳腺炎。煎服：15～30克（鲜品60～90克）。②治跌打损伤，痈疖肿毒，捣敷；毒蛇咬伤，捣汁服，每次20～30毫升，每日3～4次，渣敷伤口周围；痔疮，煎水洗。本品预试显黄酮甙、酚类、氨基酸的反应。

丁桐皮 见《四川中药志》。为刺楸树皮之别名，详该条。

丁榔皮 见《陕西中草药》。为山茱萸科植物椋子木Cornus macrophylla Wall. 的树皮。分布山东、河南、江苏、浙江、台湾、湖北、湖南、陕西、甘肃、贵州、四川、云南。苦，平。祛风，活络。治筋骨疼痛，腰腿痛，肢体瘫痪。煎服：9～15克。本品含鞣质。

七寸金 见《福建民间草药》。为地耳草之别名，详该条。

七匹散 见《云南中草药》。为矮陀陀之别名，详该条。

七孔莲 见《江西草药》。为天香炉之别名，详该条。

七叶一枝花 出《本草蒙筌》。又名蚤休、重楼、三层草、草河车、白河车。为百合科植物华重楼 Paris polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara 或七叶一枝花P. polyphylla Smith 的根茎。前者分布华东、华南、西南及陕西、山西、甘肃、湖北等地；后者分布西南地区。苦，寒，有小毒。入心、肝经。清热解毒，消肿，定惊，止咳。①治毒蛇咬伤，内服并捣敷创口周围；疮疖痈肿，腮腺炎，乳腺炎，淋巴结结核，研末醋调涂患处，亦可煎服；神经

性皮炎，研末油调涂。②治小儿高热惊风，肺热咳嗽，哮喘，喉痹，疟疾寒热，流行性乙型脑炎，扁桃体炎。近试用于治疗癌症。煎服：4.5～9克。过量可引起恶心、呕吐、头痛，严重者可致痉挛。本品含皂甙，甙元为薯蓣皂甙元。水或醇提取物在体外对流感病毒、痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌等有抑制作用。醇提取物在体外能抗钩端螺旋体。动物试验有平喘、止咳及消炎作用。皂甙有镇静、镇痛作用。

七叶子 见《陕西中草药》。又名参叶子、定风草。为五加科植物珠子参 Panax japonicus C.A.Mey. var. major(Burk.) C.Y.Wu et K.M.Feng的叶。主要分布西南地区；陕西、甘肃、河南等地亦有分布。苦、甘，微寒。入心、肺、胃经。清热，生津，利咽。治暑热伤津，口干舌燥，心烦神倦，咽喉肿痛，风火牙痛。煎服：3～12克。本品含少量与人参皂甙类似的皂甙，水解得齐墩果酸、人参三醇，而人参二醇很少。

七叶莲 ❶见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名七加皮、七叶藤、汉桃叶。为五加科植物广西鹅掌藤 Schefflera arboricola Hayata 的茎或叶。分布广东、广西、云南、贵州、福建、江西等地。苦、甘，温。祛风活络，消肿止痛。①治三叉神经痛，神经性头痛，坐骨神经痛，风湿关节痛，消化道溃疡疼痛，跌打肿痛。煎服：15～30克。②治外伤出血。鲜叶捣敷。本品的注射剂对小鼠有明显的镇痛作用，并有一定的镇静和抗电惊厥作用；对离体蛙心有强心甙样作用；对离体豚鼠回肠有解痉作用，可用于胆绞痛及痉挛性胃痛。❷见《浙南本草新编》。为野木瓜之别名，详该条。

七叶麻 见《江西民间草药》。为蒴藋之别名，详该条。

七叶藤 见《广西实用中草药新选》。为七叶莲之别名，详该条。

七仙桃 见《湖南药物志》。为麦斛之别名，详该条。

七加皮 见《广西实用中草药新选》。为七叶莲之别名，详该条。

七里香 ❶见《修订增补天宝本草》。又名满山香、驳骨丹。为马钱科植物醉鱼草 Buddleia lindleyana Fort.的根。分布浙江、安徽、江苏、江西、福建、广东、广西、湖南、湖北、四川。辛、苦，温，有小毒。活血化瘀，消积，解毒。治经闭，瘕瘕，血崩，小儿疳积，腮腺炎。煎服：3～9克。孕妇忌服。❷见《福建中草药》。为阿利藤之别名，详该条。

七里麻 见《南京民间药草》。为兔儿伞之别名，详该条。

七层楼 见《全国中草药汇编》。为牛尾菜之别名，详该条。

七姐妹 见《浙江天目山药用植物志》。为小金樱之别名，详该条。

七厘丹 见《南方主要有毒植物》。为藜芦之别名，详该条。

七星草 见《江苏省植物药材志》。为瓦韦之别名，详该条。

七星剑 出《生草药性备要》。又名独行千里、野香薷、星色草。为唇形科植物细叶七星剑Mosla cavaleriei Lévl.的全草。分布云南、四川、贵州、广西、广东、湖北、江西、浙江等地。辛，微温。发汗解暑，利湿解毒。①治感冒，中暑，水肿，急性胃肠炎，消化不良。煎服：3～6克。②治湿疹，疮疖肿毒，带状疱疹，跌打肿痛。捣烂敷或煎水洗。③治毒蛇咬伤，捣汁服，渣敷伤口周围。本品含挥发油。

七星莲 见《植物名实图考》。为地白草之别名，详该条。

七星箭 ❶见《四川中药志》。为狗屎花之别名。❷见《全国中草药汇编》。为紫金莲之别名。各详该条。

〔卜〕

卜芥 见《广西实用中草药新选》。又名

老虎芋、假海芋、独脚莲。为天南星科植物尖尾芋Alocasia cucullata(Lour.)Schott的根茎。分布广东、广西、四川等地。辛、微苦，寒，有大毒。清热解毒，消肿散结，止痛。①治钩端螺旋体病，肠伤寒，流行性感冒，支气管炎，肺结核。煎服：3～9克。②治毒蛇咬伤，鲜品捣敷伤口周围并内服；蜂螫伤，蜂窝织炎，无名肿毒，瘰疬，鲜品捣敷。本品内服，须削去外皮，盐炒，久煎二小时以上，至药汁呈红色时方可内服，否则易引起中毒，出现舌、喉发痒肿胀，恶心呕吐，腹泻，惊厥等症状，严重者可致窒息、心脏麻痹而死亡。本品含皂毒甙（Sapotoxin）和草酸钙。

〔丿〕

八大锣 见《江西草药》。为梵天花之别名，详该条。

八木条 见《东北常用中草药手册》。为珍珠梅之别名，详该条。

八爪龙 见清·刘士季《草木便方》。即八爪金龙，详该条。

八爪金龙 出清·刘士季《草木便方》。又名八爪龙、开喉剑、大罗伞、珍珠伞。为紫金牛科植物百两金 Ardisia crispa（Thunb.）A.DC.的根及根茎。分布中南、西南及浙江、福建等地。苦、辛，凉。清热利咽，祛痰，利湿。①治咽喉肿痛，咳嗽，咯痰不爽，风湿痹痛，湿热黄疸，白浊，睾丸肿痛，肾炎水肿，痢疾。煎服：15～30克。②煎水含漱治牙痛。本品含生物碱、岩白菜素、紫金牛酸（Ardisic acid）等。

八月札 见《饮片新参》。又名燕菖子、八月炸、腊瓜、预知子。为木通科植物白木通 Akebia trifoliata（Thunb.）Koidz. var. australis（Diels）Rehd.或三叶木通 A. trifoliata(Thunb.)Koidz.、木通 A. quinata（Thunb.）Decns. 的果实。产江苏、浙江、安徽、陕西等地。苦，平。疏肝和胃，理气止痛。①治肝胃气痛，胁痛，消化不良，赤白痢疾。②治腰痛，疝气，睾丸肿痛，痛经，子宫脱垂，输尿管结石。③治瘰疬；近用于治疗乳癌及消化系统癌肿。煎服：6～12克。木通的果实含多种皂甙，甙元均为常春藤皂甙元。

八月白 见《浙江中药资源名录》。为鹅脚板之别名，详该条。

八月瓜 见《四川中药志》。为墨地之别名，详该条。

八月兰 见《分类草药性》。为建兰花之别名，详该条。

八月炸 见《南京民间药草》。即八月札，详该条。

八月炸藤 见《江苏药材志》。为木通之别名，详该条。

八月霜 见《浙江民间常用草药》。为红管药之别名，详该条。

八仙花 出《植物名实图考》。又名紫阳花、粉团花。为虎耳草科植物绣球Hydrangea macrophylla (Thunb.)Ser. 的叶。我国各地多有栽培。苦、微辛，寒，有小毒。抗疟，清心热。治疟疾，心热惊悸，烦躁。煎服：9～12克。本品含生物碱、茵芋甙。叶的醇提取液对鸡疟有显著疗效，总生物碱也有疗效，但易引起呕吐，毒性较大。对麻醉猫静脉注射可引起短暂血压下降，心收缩振幅加大；对兔在位子宫有兴奋作用。

八仙草 ❶出《滇南本草》。为猪殃殃之别名。❷见《南京民间药草》。为景天三七之别名。各详该条。

八百棒 见《全国中华药汇编》。为铁棒锤之别名，详该条。

八字蓼 见《闽东本草》。为荭草之别名，详该条。

八角 出清·赵其光《本草求原》。为八角茴香之别名，详该条。

八角儿 见《本草纲目》。为天牛之别名，详该条。

八角乌 见《全国中草药汇编》。又名活血莲、莲蓬草、独脚莲、藁吾。为菊科植物大吴风草 Farfugium japonicum(L.) Kitam. 的全草。分布我国东南部各地。辛、甘、微苦，凉。清热解毒，活血止血。①治感冒咳嗽，咽喉肿痛，咯血，吐血，尿血，便血，月经不调。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。②治痈肿疔毒，跌打损伤，乳腺炎。捣烂敷。叶含挥发油，主成分为β，γ-己烯醇。根和叶含克氏千里光碱等。克氏千里光碱对肝、肺有显著毒性，能致肝癌。

八角枫 出清·罗思举《简易草药》。又名白金条、白龙须、八角梧桐。为八角枫科植物华瓜木 Alangium chinense (Lour.) Harms或瓜木A. platanifolium Harms的侧根及须状根。前者分布长江及珠江流域；后者分布辽宁、河北、山西、河南、福建、台湾及长江流域。辛、苦，微温，有毒（须根毒性较侧根大）。祛风活络，散瘀镇痛。治风湿性及类风湿性关节炎，麻木瘫痪，劳伤腰痛，跌打损伤，精神分裂症。煎服：须根（白龙须）1.5～3克；侧根（白金条）3～6克。小儿和年老体弱慎用，孕妇忌服。须根含消旋毒藜碱（dl-Anabasine）、甙类。生物碱为去极化与非去极化的双相型横纹肌松弛剂，对平滑肌有轻度兴奋作用，临床应用不致引起肠麻痹；较大剂量能增加唾液分泌，对过量引起的呼吸停止，必须进行人工呼吸。长期应用可能对肝、肾功能产生一定影响。

八角刺 见《广西中药志》。为枸骨叶之别名，详该条。

八角金盘 见《江西草药》。为八角莲之别名，详该条。

八角茶 见《本草从新》。为枸骨叶之别名，详该条。

八角茴香 出《本草品汇精要》。又名大茴香、八角、五香八角、舶茴香。为木兰科植物八角茴香Illicium verum Hook. f.的果实。分布广东、广西、云南、福建、贵州。辛、甘，温。入脾、肾经。温中，理气止痛。治胃寒呕吐，食欲减退，脘腹胀痛，寒疝，睾丸偏坠，肾虚腰痛，干、湿脚气。煎服：3～6克。本品含挥发油，油中含茴香脑80%以上和少量茴香醛、茴香酮、黄樟醚等。挥发油及茴香脑具有刺激作用，能促进肠胃蠕动，缓解腹部疼痛，并能增进呼吸道分泌而用以祛痰。醇提取物在试管中能抑制金黄色葡萄球菌，肺炎球菌及白喉杆菌、大肠杆菌、伤寒与副伤寒杆菌、痢疾杆菌等，对真菌也有一定抑制作用。

八角莲 见《福建民间草药》。又名鬼臼、一把伞、八角金盘、独叶一枝花。为小檗科植物六角莲 Dysosma pleiantha (Hance) Woods. 或八角莲 D. versipellis (Hance) M. Cheng 等的根茎。前者分布台湾、福建、浙江、安徽、湖北、广西等地；后者分布长江流域各地。苦、辛，温，有毒。解毒，散瘀，消肿。①治毒蛇咬伤，肿毒疔疮，跌打损伤。捣汁酒冲服或煎服，渣敷患处（蛇伤敷伤口周围）。②治淋巴结炎，腮腺炎，带状疱疹。烧酒或醋磨涂患处。煎服：3～9克。孕妇忌服。六角莲和八角莲均含鬼臼毒素、去氧鬼臼毒素、山柰酚。六角莲还含黄芪甙、金丝桃甙、槲皮素等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有一定的抑菌作用。鬼臼毒素有抗癌作用，但因毒性太大，仅作外用。

八角梧桐 ❶见《全国中草药汇编》。为八角枫之别名。❷见清·汪连仕《采药书》。为臭梧桐之别名。各详该条。

八角铜盘 见《浙江民间常用草药》。为红马蹄草之别名，详该条。

八股牛 见《东北植物药图志》。为白鲜皮之别名，详该条。

八树 见《中国树木分类学》。为鬼箭羽之别名，详该条。

八厘麻 见《全国中草药汇编》。为闹羊花之别名，详该条。

八厘麻子 见南京药学院《中草药学》。为六轴子之别名，详该条。

八麻子 见《山东中草药手册》。为蓖麻子之别名，详该条。

八棱麻 见《药材学》。为八楞木之别名，详该条。

八楞木 见《饮片新参》。又名八棱麻、青竹标。为菊科植物风毛菊 Saussurea japonica（Thunb.）DC. 的全草。分布东北、华北、西北、华东及华南地区。辛、苦，平。祛风活血，止痛。治风湿痹痛，跌打损伤。内服：煎汤，9～15克；或浸酒饮。

八楞风 见《福建民间草药》。为六棱菊之别名，详该条。

八颗叶下珠 见《浙江天目山药用植物志》。为一叶萩之别名，详该条。

人中白 出《日华子诸家本草》。又名溺白垢、人尿白、尿白碱。为人尿自然沉结的固体物。咸，寒。入肺、肝、膀胱经。清热解毒，祛瘀止血。①治咽喉肿痛，研末吹；口舌生疮，牙疳，下疳恶疮，研末调敷。②治劳热，肺痿，咯血，衄血。煎服：3～9克。人尿沉淀物组成复杂，主成分为磷酸钙和尿酸钙。

人中黄 出《日华子诸家本草》。又名甘中黄、甘草黄。为甘草末置竹筒内，于人粪坑中浸渍后的制成品。甘，寒。入心、胃经。清热，凉血，解毒。治伤寒热病高热烦渴，热毒斑疹，咽喉肿痛，丹毒，疮疡。煎服：6～9克，包煎。

人字草 ❶见萧步丹《岭南采药录》。为丁癸草之别名。❷见清·赵其光《本草求原》。为鸡眼草之别名。❸见《广西中药志》。为金线草之别名。各详该条。

人苋 见《植物名实图考》。为铁苋之别名，详该条。

人言 见《本事方》。为砒石之别名，详该条。

人尿 出《名医别录》。为健康人的小便，一般以10岁以下男性儿童的小便为佳。咸，凉。入肺、肝、肾经。滋阴降火，止血消瘀。治阴虚发热，劳伤咳血，吐血，衄血，产后血瘀，血晕，跌打损伤。内服：取新鲜尿1～2杯温饮，或和入汤药内服。本品成分常因饮食及排尿时间之影响而变动较大，一般含尿素、尿酸、肌酐、氨、马尿酸、尿蓝母、氯化钠、钾、磷盐和微量维生素（B_1、B_2、B_6、C）及氨基酸等。

人尿白 见《四川中药志》。即人中白，详该条。

人乳汁 出《名医别录》。甘、咸，平。入心、肺、胃经。滋阴，养血，润燥。①治虚劳羸瘦，虚风瘫痪，消渴，噎膈，大便燥结，血虚经闭。取新鲜者乘热饮。②治目赤眼昏。点眼用。每100克人乳汁含蛋白质1.5克，脂肪3.7克，碳水化合物6.4克，灰分0.3克，钙34毫克，磷15毫克，铁0.1毫克，维生素A250国际单位，维生素$B_1$0.01毫克，维生素$B_2$0.04毫克，尼克酸0.1毫克，维生素C6毫克。

人参 出《神农本草经》。又名人衔、神草、棒棰。为五加科植物人参 Panax ginseng C. A. Mey.的根。主产吉林、辽宁。甘、微苦，温。入脾、肺经。补气固脱，补肺益脾，生津，安神，益智。①治重病、久病或大出血后虚脱。②治肺虚气短喘促，脾虚食少、倦怠，反胃，久泻，尿频，脱肛。③治病后津伤口渴，多汗。④治心悸怔忡，失眠健忘，崩漏，小儿慢惊。内服：煎汤，1.5～9克（急救可用至30克），宜文火另煎，单服或冲服；研末服，0.9～1.5克。反藜芦，畏五灵脂。人参商品药材，因产地、加工方法及野生与栽培的不同，而有野山参、移山参、生晒参、白参、红参、别直参（朝鲜参、高丽参）等不同名称。临床认为野山参、红参、别直参力量较胜。根含人参皂甙十三种以上，其含量因药用部位、加工方法、栽培年限和产地不同而异。大部分皂甙

水解后产生人参二醇或人参三醇，小部分皂甙水解后产生齐墩果酸，前一类皂甙是人参的有效成分，后一类皂甙的生理活性不强。还含挥发油，其中低沸点部分为β-榄香烯，系人参特有香气的来源，高沸点部分为人参炔醇。又含胡萝卜甾醇，多种糖类和人参三糖、氨基酸、有机酸以及胆碱，胆胺，维生素 B_1、B_2、C 等。人参能提高体力和脑力劳动的效率，有明显的抗疲劳作用。其中所含的某种皂甙对小鼠有镇静、安定及镇痛作用。人参有抗应激作用，能提高机体对各种有害刺激（如温度或气压的过高、过低，各种有毒的化学物质，微生物，放射线或移植癌等）的非特异性抵抗力，使病理改变趋向乃至恢复正常，人参皂甙有促性腺激素，促进动物生长的作用。能轻度降低血糖。根及叶有抗利尿作用，其中所含的各种皂甙，作用并不相同。皂甙混合物取名蛋白合成促进因子（Prostisol），能促进肝细胞的核糖核酸、蛋白质及脂质的生物合成，促进骨髓中血细胞脱氧核糖核酸的生物合成，能提高机体的免疫能力，试用于癌的辅助治疗，有某些效果。

人参叶 见《增订伪药条辨》。又名参叶。为五加科植物人参 Panax ginseng C. A. Mey.的叶。苦、甘，寒。入肺、胃经。生津，祛暑，降虚火。治热病津伤，暑热口渴，肺热声嘶，虚火牙痛。煎服：3～9克。本品含人参皂甙。参见人参条。

人参芦 出《本草蒙筌》。又名竹节参。为五加科植物人参Panax ginseng C. A. Mey.的根茎。甘、苦，温。涌吐，升阳。①吐虚人膈上痰饮，可代藜芦。②治泄泻日久，阳气下陷等证，煎服：3～9克；或研末服。本品含多种人参皂甙。

人参须 出《本经逢原》。又名参须。为五加科植物人参 Panax ginseng C.A. Mey.的侧根。甘、苦，平。入肺经。益气，生津。治胃虚吐逆，口渴，咳嗽失血，功近人参而力薄，用于轻病可代人参条。

人面子 ❶出《本草纲目》。又名银捻、人面果。为漆树科植物人面子 Dracontomelon dao（Blanco）Merr. et Rolfe 的果实。分布广东、广西、云南。甘、酸，平。健胃，生津，解毒。治消化不良，食欲不振，热病口渴，风毒遍身疮痒。煎服：3～5枚。捣敷治背痈。人面子根皮：以酒煎服能散乳痈。❷见南川药物试验种植场《常用中草药手册》。为广枣之别名，详该条。

人面果 见《广西本草选编》。为人面子之别名，详该条。

人指甲 出《本草衍文》。又名手爪甲，人退，筋退。为健康人的指甲。甘、咸，平。①治破伤风，尿血。内服：煅研末，1.5～2.4克；或入丸、散。②研极细末点目去翳障；搐鼻治鼻衄；煅研极细末吹耳内治中耳炎；吹喉治乳蛾。本品主含角蛋白。

人胞 出《本草拾遗》。为紫河车之别名，详该条。

人退 见《眼科龙木论》。为人指甲之别名，详该条。

人衔 出《神农本草经》。为人参之别名，详该条。

入地老鼠 见萧步丹《岭南采药录》。为紫茉莉根之别名，详该条。

入地金牛 出清·赵其光《本草求原》。又名蔓椒、豕椒、两面针、上山虎。为芸香科植物光叶花椒 Zanthoxylum nitidum（Roxb.）DC.的根及根皮。分布中南地区及云南、福建、台湾。辛、苦，平，有小毒。祛风，活血，麻醉止痛，解毒。①治风湿痹痛，腰肌劳损，跌打瘀痛，胃肠绞痛，胆道蛔虫病引起的疼痛。煎服：根，9～15克；根皮，4.5～9克。②治牙痛，煎水含漱；蛇咬伤，煎服并研末调敷。内服过量常引起头晕、腹痛、呕吐等中毒症状。本品禁与酸类食物同服。孕妇忌服。根及根皮含光叶花椒碱（Nitidine）、光叶花椒酮碱（Oxynitidi-

ne)。根皮又含香叶木甙。根的水提取物的注射剂，有浸润麻醉作用。

儿茶 出《本草述》。又名孩儿茶、儿茶膏、黑儿茶、铁儿茶。为豆科植物儿茶 Acacia catechu(L.) willd. 的枝干心材经煎汁浓缩而成的干燥浸膏。产云南。苦、涩，凉。入心、肺经。清热化痰，生津，止血，消食，敛疮。①治痰热咳嗽，消渴，咯血，吐血，衄血，尿血，便血，崩漏，腹泻，小儿消化不良。煎服：0.9～3克。②治疮疡久不收口，口疮，牙疳，皮肤湿疹，宫颈炎，外伤出血，研末撒；扁桃体炎，研末用甘油调涂。本品含儿茶鞣酸、左旋及消旋儿茶精、左旋及消旋表儿茶精，赭朴鞣质（Phlobatannin）及非瑟素、槲皮素、槲皮万寿菊素等黄酮醇。有收敛、止泻、抑菌、局部止血等作用。水浸剂在试管中能抑制常见的致病性皮肤真菌。表儿茶精能抑制癌细胞。儿茶鞣质能增进毛细血管抵抗力及抗组胺而有抗炎作用，还能抑制实验性膀胱结石的形成。

儿茶膏 见《中药材手册》。即儿茶，详该条。

九牛二虎草 见《云南中草药》。为石椒草之别名，详该条。

九牛七 见《陕西中草药》。为九牛造之别名，详该条。

九牛子 ❶见《草药手册》。为土圆儿之别名。❷见《江西草药》。为金果榄之别名。各详该条。

九牛造 ❶见《陕西中草药》。又名五朵云、翻天印、九牛七、震天雷。为大戟科植物九牛造 Euphorbia hylonoma Hand.-Mazz.的根。分布陕西、湖南、湖北、四川、贵州等地。甘、苦，温，有毒。泻下逐水，消积散痞。①治积聚腹胀，二便不通，肝硬化腹水。煎服：1.5～3克。过量则剧烈吐泻。②治跌打损伤，瘀血作痛，捣敷；外伤出血，研末掺。反乌头、甘草。孕妇及体虚者忌服。九牛造茎叶，晒干研末敷外伤，鲜品捣敷无名肿毒。❷见《四川中药志》。为红三七之别名，详红三七条。

九牛藤 见广州军区空军卫生部《常用中草药手册》。为杜仲藤之别名，详藤杜仲条。

九孔螺 出《日华子诸家本草》。为石决明之别名，详该条。

九节木 见《广西中药志》。为山大颜之别名，详山大颜条。

九节风 见《分类草药性》。为九节茶之别名，详该条。

九节草 见《辽宁经济植物志》。为斩龙剑之别名，详该条。

九节茶 出《生草药性备要》。又名接骨金粟兰、肿节风、接骨木、九节风、山鸡茶。为金粟兰科植物草珊瑚 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 的枝叶。分布长江以南地区。辛、苦，平，有小毒。清热，祛风，散瘀，接骨。①治流行性感冒，肺热喘咳，流行性乙型脑炎，急性肠胃炎，细菌性痢疾，风湿骨痛，腰腿痛，肠痈，盆腔炎。煎服：9～15克。②治骨折，跌打损伤，疮疡肿毒，内服并外敷；烧烫伤，用叶研末油调涂。全草含挥发油、延胡索酸、琥珀酸。预试还含酚类、黄酮甙、氰甙、香豆素、鞣质和内酯等。体外对金黄色葡萄球菌、痢疾、大肠、绿脓、伤寒等杆菌均有一定的抑制作用。体内试验对兔金黄色葡萄球菌菌血症也有治疗作用。延胡索酸、琥珀酸均有抑菌作用。

九节菖蒲 见《中药志》。又名京菖蒲、节菖蒲。为毛茛科植物阿尔泰银莲花 Anemone altaica Mey.的根茎。主产陕西、河南、山西等地。辛，微温。开窍，豁痰，化湿，健胃，解毒。①治热病神昏，痰浊蒙窍，癫痫，痰厥，脘痞腹胀，呕恶，下痢噤口，多梦健忘，气闭耳聋。煎服：1.5～6克。②捣敷痈、疽、疮、癣。

九节篱 见《湖南药物志》。为九头狮子草之别名，详该条。

九龙虫 见《本草纲目拾遗》。为洋虫之别名，详该条。

九龙根 见《上海常用中草药》。为虎杖之别名，详该条。

九龙盘 ❶见《贵阳民间药草》。为山姜之别名。❷见《贵州民间药物》。为蜘蛛抱蛋之别名。各详该条。

九龙藤 见《南宁市药物志》。又名过岗龙、猪蹄叉、黄开口、燕子尾、五花血藤。为豆科植物龙须藤 Bauhinia championi (Benth.)Benth.的茎。分布浙江、福建、台湾及中南、西南大部分地区。苦、辛，平。祛风除湿，活血止痛，治风湿性关节炎，跌打损伤，胃痛，小儿疳积。煎服：9～15克。茎皮含鞣质。本品在体外对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌均有抑制作用。

九头狮子草 出《植物名实图考》。又名九节篱、化痰青、尖惊药、蛇舌草。为爵床科植物九头狮子草 Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek. 的全草。分布长江以南地区。辛、微苦，凉。解表清热，化痰，解毒，镇痉。①治感冒发热，咽喉肿痛，咳嗽痰多，肺炎，小儿高热惊风。煎服：9～30克。②治痈肿疔毒，毒蛇咬伤。鲜品捣敷。

九死还魂草 见《现代实用中药》。为卷柏之别名，详该条。

九步香 见《浙南本草新编》。为隔山香之别名，详该条。

九里明 见《生草药性备要》。为千里光之别名，详该条。

九里香 ❶见萧步丹《岭南采药录》。又名千里香、过山香、石辣椒、九秋香、千只眼、月橘。为芸香科植物九里香 Murraya paniculata(L.)Jack 的根及茎叶。分布我国南部至西南部。辛、苦，微温，有小毒。入心、肝经。行气，活血，止痛，解毒。治风湿痹痛，跌打肿痛。煎服：6～12克。鲜叶煎汤洗湿疹；捣敷治牙痛及蛇、虫咬伤。九里香花：煎服治胃痛。叶含挥发油，油内含丁香油酚、苹澄茄烯、甜没药烯等，另含月橘素（Exoticin）、8-去甲氧基月橘素等黄酮类和九里香素（Paniculatin）、月橘香豆素（Coumurrayin）、脱水新九里香素（Phebalosin）等香豆素类。茎皮含迈月橘素（Mexoticin）、月橘香豆素、8-去甲氧基月橘素等。花瓣含东莨菪素、东莨菪甙。以石油醚提取的结晶成分，对大鼠离体小肠有解痉作用。茎叶煎剂有局部麻醉作用，唯局部刺激性较大。❷见《云南中草药》。为透骨香之别名，详该条。

九层皮 见《广西本草选编》。为救必应之别名，详该条。

九层塔 ❶见《福建中草药》。为兰香草之别名。❷见萧步丹《岭南采药录》。为罗勒之别名。各详该条。

九层楼 见《贵州民间药物》。为鹿药之别名，详该条。

九英菘 出《食疗本草》。为芜菁之别名，详该条。

九转香 见《贵州民间方药集》。为蜘蛛香之别名，详该条。

九股牛膝 见《云南中草药》。为白牛膝之别名，详该条。

九空子 见《中国药学大辞典》。为路路通之别名，详该条。

九秋香 见《全国中草药汇编》。为九里香之别名，详该条。

九香虫 出《本草纲目》。又名屁巴虫。为蝽科昆虫九香虫 Aspongopus chinensis Dallas 的干燥全体。主产四川、贵州等地。咸，温。入肝、肾经。理气止痛，温中壮阳。治胃脘气滞，胀痛痞闷，脾肾亏损，腰膝酸痛乏力，阳痿。煎服：3～6克。虫全体含九香虫油，油中含硬脂酸、棕榈酸、油酸；其臭气来源于醛或酮，还含蛋白质等。体外试验，对金黄色葡萄球菌、痢疾杆

菌等有抑制作用。

九信菜 见《生草药性备要》。为了哥王之别名，详该条。

九姜连 ❶见《峨眉山药用植物》。为山姜之别名。❷见《四川常用中草药》。为廉姜之别名。各详该条。

九塔草 见《浙江民间常用草药》。为风轮菜之别名，详该条。

〔7〕

刀伤药 见南川药物试验种植场《常用中草药手册》。为地桃花之别名，详该条。

刀豆 出《救荒本草》。又名挟剑豆、刀豆子、大刀豆。为豆科植物刀豆Canavalia gladiata（Jacq.）DC.的种子。主产江苏、安徽、湖北。甘，温。入胃、肾经。温中下气，益肾。治虚寒呃逆，呕吐，腹胀，肾虚腰痛。煎服：9～15克；或焙干研末服。刀豆含刀豆球朊(Canavaline)约20%，并含尿素酶，刀豆氨酸等。

刀豆子 见《本草纲目》。即刀豆，详该条。

刀豆壳 出清·汪双池《医林纂要·药性》。为豆科植物刀豆 Canavalia gladiata（Jacq.）DC.的果壳。甘，平。和中下气，散瘀活血。①治反胃，呃逆，久痢，腰痛，经闭，腹胁胀痛。内服：煎汤，9～15克；或焙干研末酒调服。②治喉痹，喉癣。烧存性研末吹之。

刀豆根 出清·汪双池《医林纂要·药性》。为豆科植物刀豆 Canavalia gladiata（Jacq.）DC.的根。苦，温。祛风，行血，通经。①治头风，风湿腰痛，疝气，久痢，经闭。煎服：9～15克，或浸酒服。②治跌打损伤。捣烂酒蒸外敷。

刀剪药 见《河北药材》。为拳参之别名，详该条。

了哥王 见萧步丹《岭南采药录》。又名九信菜、山棉皮、山雁皮、雀儿麻、小叶金腰带。为瑞香科植物南岭荛花 Wikstroemia indica（L.）C.A.Mey.的根、根的内皮或叶。分布长江以南各地。苦、微辛，寒，有毒。清热解毒，散瘀，利水。①治肺炎，支气管炎，扁桃体炎，腮腺炎，淋巴结炎，乳痈，疮疡肿毒。②治风湿痛，肾炎，晚期血吸虫病腹水，闭经，麻风。煎服：4.5～9克（宜久煎4小时以上）。外用：以鲜品捣敷。中毒症状为剧烈呕吐、腹泻。孕妇忌服。南岭荛花的果实名了哥王子，可捣敷瘰疬、痈疽。从本植物的乙醇提取物中发现有抗癌活性部位，已提出四种木脂素类物质：荛花酚（Wikstromol）、牛蒡酚、罗汉松树脂酚和冷杉树脂酚。还含西瑞香素（Daphnoretin）、芫花素、南荛甙、β-谷甾醇。西瑞香素对小鼠心肌营养性血流量有较明显的改善作用，β-谷甾醇在体外试验，对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、绿脓杆菌、伤寒杆菌等有抑制作用，南荛甙对狗有利尿作用。所含树脂有较强的泻下作用。

三 画

〔一〕

三十六荡 见《南宁市药物志》又名老君须、藤叶细辛、三十六根。为萝藦科植物卵叶娃儿藤 Tylophora ovata（Lindl.）Hook.ex Steud.的根及根茎。分布云南、广西、广东、台湾。辛，温，有小毒。祛痰定喘，散瘀止痛，解蛇毒。①治咳嗽哮喘，跌打肿痛，风湿骨痛，胃痛，腹痛。煎服：3～9克。②治毒蛇咬伤，鲜根捣烂，调酒敷伤

口周围。过量服用，易致中毒。孕妇慎服。本品含生物碱、黄酮甙、挥发油和单糖。可能有强心甙。水煎剂及非水溶性总生物碱对小白鼠腹腔注射均有镇咳作用。非水溶性总生物碱在体外对黄色葡萄球菌、奈氏球菌、流感嗜血性杆菌及甲型链球菌均有抑菌作用。

三十六根 见《海南岛常用中草药手册》。为三十六荡之别名，详该条。

三七 出《本草纲目》。又名山漆、参三七、田七。为五加科植物三七Panax notoginseng（Burk.）F.H.Chen.的块根。主产云南、广西。甘、微苦，温。入肝、胃经。止血，散瘀，定痛。①治咳血，吐血，衄血，便血，尿血，崩漏，产后血瘀腹痛，冠心病心绞痛。研末服，每次1.5～3克，每日二至三次。②治跌打瘀肿疼痛，外伤出血。研末内服并外敷。另有熟三七粉（三七打碎，用食油炸至棕黄色，研粉）能补血和血，用治失血、贫血。每次3～5克，每日二至三次。孕妇忌服生品。三七叶：功同三七而力弱。三七花：泡茶饮，有清热、平肝、降压作用。治头晕，目眩，耳鸣。根含与人参皂甙相似的多种皂甙，水解后得人参二醇和人参三醇。还含槲皮素和它与木糖、葡萄糖、葡萄糖醛酸所成的甙，β谷甾醇，胡萝卜甾醇。叶含皂甙，水解后主要得人参二醇，齐墩果酸次之，人参三醇极少。三七提取液能增加动物的冠状动脉血流量，并能对抗垂体后叶素引起的冠脉流量减少；同时心肌耗氧量亦有所减少，其有效成分为黄酮甙。三七皂甙对离体蛙心有强心作用，对狗有降压、利尿作用，并能止血与降低毛细血管通透性。

三丫苦 见萧步丹《岭南采药录》。又名三桠苦、三叉虎、三枝枪。为芸香科植物三叉苦Euodia lepta（Spreng.）Merr.的根及叶。分布广东、广西、福建等地。苦、寒。清热解毒，祛风止痛。①治感冒高热，咽喉肿痛，肺热咳嗽，流行性脑脊髓膜炎，乙型脑炎、疟疾，黄疸型肝炎。②治风湿痹痛，腰腿痛，胃痛。煎服：根9～30克；叶9～15克。③治痈肿，丹毒，跌打，扭伤，鲜叶捣敷；湿疹，皮炎，痔疮，叶煎水洗。叶含挥发油，其主成分为α-蒎烯、糠醛。根含生物碱。煎剂在体外对痢疾杆菌有抑制作用。

三叉虎 见《广西中兽医药用植物》。为三丫苦之别名，详该条。

三叉明棵 见《河南中草药手册》。为猪毛菜之别名，详该条。

三叉剑 见《江西民间草药》。为鹅掌金星草之别名，详该条。

三叉蕨 见《广西中兽医药用植物》。为蕨之别名，详该条。

三匹风 见清·刘士季《草木便方》。为蛇莓之别名，详该条。

三片风 见《浙江民间常用草药》。为地蜂子之别名，详该条。

三爪龙 见《分类草药性》。为蛇莓之别名，详该条。

三爪金 见《贵州草药》。为地蜂子之别名，详该条。

三爪金龙 见《全国中草药汇编》。又名爬山虎、小红藤，为葡萄科植物三叶爬山虎Parthenocissus himalayana（Royle）Planch.的根及茎。分布湖北、四川、云南、贵州、广东。辛、甘，平。祛风除湿，活络散瘀。治风湿骨痛。煎服：15～30克；或泡酒服。外用：捣烂敷骨折，跌打损伤。

三分三 见《中药形性经验鉴别法》。又名大搜山虎、山野烟、山茄子。为茄科植物三分三 Scopolia acutangula C.Y.Wu et C.Chen的根。产云南。辛、苦，温，有大毒。麻醉，止痛，解痉。①治骨折，跌打损伤，风湿骨痛。研末酒调敷。②治胃、十二指肠溃疡，胆、肾绞痛，肠痉挛。煎服：0.3～0.9克。过量可发生中毒，甚至死亡。心脏病及青光眼患者忌服。本品含樟柳碱、

山莨菪碱、天仙子胺（莨菪碱）、红古豆碱等多种生物碱。樟柳碱、山莨菪碱的作用均与阿托品相似，在作用强度上，樟柳碱与阿托品相近而稍弱；山莨菪碱则更弱，中枢作用不明显。毒性方面，阿托品最大，山莨菪次之，樟柳碱最小。用途参见藏茄条。

三月泡 见《全国中草药汇编》。又名饭消扭、刺菠、摊地莓。为蔷薇科植物蓬藥 Rubus hirsutus Thunb. 的根或叶。分布江苏、浙江、江西、福建、广东。甘、微苦，平。清热解毒，镇惊，通络。治扁桃体炎，小儿惊风，黄疸，风湿筋骨痛。煎服：15～30克。叶，捣汁外涂治小儿暑月热疖。

三月黄花 见《四川常用中草药》。为地羊鹊之别名，详该条。

三叶 出《名医别录》。为鸭儿芹之别名，详该条。

三叶五加 见《广西中兽医药用植物》。为刺三加之别名，详该条。

三叶红 见《广西药用植物名录》。为秋枫木之别名，详该条。

三叶佛甲草 见南京药学院《中草药学》。为垂盆草之别名，详该条。

三叶青 见《江西草药》。又名蛇附子、石猴子、金线吊葫芦、小扁藤、三叶扁藤。为葡萄科植物三叶崖爬藤 Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg 的块根。分布四川、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西。苦、辛，凉。清热解毒，活血祛风。①治高热惊厥，肺炎，支气管炎，白喉，扁桃体炎，病毒性脑膜炎，肝炎。煎服：9～15克。②治痈疖疔毒，淋巴结结核，跌打损伤，水或酒磨搽患处。③治毒蛇咬伤，捣烂敷并内服。

三叶扁藤 见《广西实用中草药新选》。为三叶青之别名，详该条。

三叶珠 见《广西民间常用草药》。为一箭球之别名，详该条。

三叶蛇莓 见《浙江民间常用草药》。为地蜂子之别名，详该条。

三叶酸草 见《备急千金要方》。为酢浆草之别名，详该条。

三叶藨 见《四川中药志》。为蛇莓之别名，详该条。

三甲皮 见《四川中药志》。为刺三加之别名，详该条。

三白草 出《新修本草》。又名白水鸡、过塘莲、白面姑、塘边藕、水木通。为三白草科植物三白草 Saururus chinensis (Lour.) Baill. 的根茎或全草。分布长江以南各地。甘、辛，寒。清热解毒，利水消肿。①治水肿，脚气，黄疸，白带，尿路感染，尿路结石，近用于肝癌腹水。煎服：15～30克。②治疔疮痈肿，捣烂敷；癣疥、绣球风，煎水洗。全草含挥发油，主成分为甲基正壬基甲酮。叶尚含槲皮素、金丝桃甙、异槲皮甙等黄酮类物质。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌有一定抑菌作用。

三加皮 见《广西药用植物名录》。为刺三甲之别名，详该条。

三对节 见《文山中草药》。又名三台花、三台红花、三百棒、大常山、大罗伞。为马鞭草科植物三对节 Clerodendrum serratum (L.) Spreng. 或抱茎三对节 C. serratum (L.) Spreng. var. amplexifolium Moldenke 的根或叶。分布广西、云南、贵州等地。苦、微辛，凉，有小毒。清热毒，祛风湿，截疟，接骨。①治风湿痛，咽喉炎，扁桃体炎，肝炎，痢疾。煎服：9～15克。②治恶性疟疾。本品配胡椒、草果少许，于疟发前一小时煎服。③治跌打损伤，骨折，无名肿毒，以鲜品捣敷；黄水疮，煎水外洗。孕妇慎服。皮含皂甙，主要甙元为齐墩果酸、栎焦油酸（Queretaroic acid）和三对节酸（Serratagenic acid）。根皮含甘露醇及其他多元醇物质。本品水提取物在动物试验中有抗组胺作用。

三台红花 见《云南中草药》。为三对节

之别名，详该条。

三台花 见《云南中草药》。为三对节之别名，详该条。

三百两银药 见《滇南本草》。为木蝴蝶之别名，详该条。

三百棒 ❶见《湖南药物志》。为飞龙掌血之别名。❷见《云南中草药》。为白背三七之别名。❸见《贵州草药》。为三对节之别名。各详该条。

三色堇 见《中国药用植物图鉴》。又名蝴蝶花。为堇菜科植物三色堇 Viola tricolor L.的全草。我国各地花圃常见栽培。止咳化痰。治咳嗽，瘰疬。煎服：3～9克。外用：捣汁涂。全草含芸香甙。茎、叶含三色堇黄甙。花含挥发油、皂甙等。全草制剂内服可增加支气管腺体之分泌而祛痰。叶有缓泻作用。全草能促进尿中氯离子的排泄。

三步跳 见《湖南野生植物》。为半夏之别名，详该条。

三角风 ❶见《本草纲目》。为常春藤之别名。❷见《四川中药志》。为鹅掌金星草之别名。各详该条。

三角枫 见《植物名实图考》。为梵天花之别名，详该条。

三角草 见《广西民间常用草药》。为一箭球之别名，详该条。

三角蒺藜 见《本草求真》。即刺蒺藜，详该条。

三角藤 ❶见《江西民间草药》。为杠板归之别名。❷见《海南植物志》。为粪箕笃之别名。各详该条。

三张叶 见《浙江民间常用草药》。为地蜂子之别名，详该条。

三层草 见《本草纲目》。为七叶一枝花之别名，详该条。

三枝九叶草 出《本草图经》。为淫羊藿之别名，详该条。

三枝枪 见《广东中草药》。为三丫苦之别名，详该条。

三转半 见《药学学报》12(10):690，1965。为铁棒锤之别名，详该条。

三柰 见《本草纲目》。即山柰，详该条。

三变花 见南京药学院《中草药学》。为木芙蓉花之别名，详该条。

三春柳 出《开宝重定本草》。为柽柳之别名，详该条。

三芙草 见萧步丹《岭南采药录》。为水蜈蚣之别名，详该条。

三桠苦 见萧步丹《岭南采药录》。即三丫苦，详该条。

三钱三 见《广西中草药》。为羊蹄蹋根之别名，详该条。

三铃子 见《贵州民间药物》。为歪头菜之别名，详该条。

三苾 见《生草药性备要》。为阳桃之别名，详该条。

三敛子 见《广东新语》。为阳桃之别名，详该条。

三棱 出《本草拾遗》。为黑三棱科植物黑三棱 Sparganium stoloniferum Buch.-Ham.的块茎。主产江苏、河南、山东、江西。苦、辛，平。入肝、脾经。破瘀，行气，消积，止痛。①治瘕瘕积聚，血滞经闭，痛经，产后瘀血腹痛，乳汁不下，子宫外孕。②治饮食积滞，脘腹胀痛。煎服：4.5～9克。醋炒用可缓和其烈性，增强疗效。孕妇忌服。本品含挥发油。

三棱子 见《广西中药志》。为阳桃之别名，详该条。

三棱草 见《江苏省植物药材志》。为莎草之别名，详该条。

三棱草根 见《中药志》。为香附之别名，详该条。

三颗针 出《分类草药性》。又名刺黄连、刺黄柏。为小檗科植物拟豪猪刺 Berberis soulieana Schneid.、小黄连刺 B. wilsonae Hemsl.或细叶小檗B. poiretii

Schneid. 等的根及茎。拟豪猪刺分布陕西、甘肃、湖北、四川；小黄连刺分布湖北及西南各地；细叶小檗分布东北及河北、内蒙古。苦、寒。清热燥湿，泻火解毒。①治痢疾，肠炎，副伤寒，黄疸，泌尿系感染，上呼吸道感染，扁桃体炎，口腔炎，中耳炎。煎服：9～15克。②治眼结膜炎，根磨汁点眼角；疮疡溃烂，湿疹，烫伤，研末调敷。小黄连刺的根含小檗碱。小檗碱的药理见黄连条。

干归 出《神农本草经》。为当归之别名，详该条。

干生地 见《中药志》。即干地黄，详该条。

干地黄 出《神农本草经》。又名干生地。为玄参科植物地黄 Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. 或怀庆地黄 R. glutinosa Libosch. f. hueichingensis (Chao et Schih) Hsiao 的干燥根茎。主产河南、浙江等地。甘、苦，凉。入心、肝、肾经。滋阴，凉血。治温病发热，舌绛，斑疹，阴虚内热，消渴，吐血，衄血，尿血，崩漏，月经不调，血虚肠燥，风湿痹痛。煎服：9～30克。地黄的花名地黄花，果实名地黄实；研末服，功用与地黄大体相同。地黄和怀庆地黄的根茎均含甘露醇、梓醇(Catalpol)，多种糖类（主为水苏糖）和多种氨基酸（主为精氨酸）。地黄还含地黄素（Rehmannin)、生物碱等。乙醇提取物对麻醉动物有降低血压及促进家兔血液凝固的作用。曾有报告，地黄有降血糖作用。

干苔 出《食疗本草》。又名海苔菜、苔菜、苔条。为石莼科植物浒苔 Enteromorpha prolifera (Müll.) J. Ag. 或条浒苔 E. clathrata (Roth) Grev. 等的藻体。分布我国沿海。咸，寒。清胆，化痰，软坚消结。①治瘿瘤，瘰疬，甲沟炎。煎服：9～15克。②烧存性研末吹鼻止衄血；汤浸捣敷治手背肿痛，疮疖。

干岩矸 见南川药物试验种植场《常用中草药手册》。为罂粟科植物毛黄堇 Corydalis tomentella Franch. 的全草。分布四川。苦，凉。祛瘀止痛，清热止血。治跌打损伤，咯血，吐血。内服：煎汤，6～9克；或浸酒饮。

干油菜 见《民间常用草药汇编》。为蔊菜之别名，详该条。

干柿 见《日华子诸家本草》。即柿饼，详该条。

干姜 出《神农本草经》。又名白姜、均姜。为姜科植物姜 Zingiber officinale Rosc. 的干燥根茎。全国大部分地区有产，主产四川、贵州等地。辛，热，入心、肺、脾、肾经。温中逐寒，回阳通脉，消痰下气。治胃腹冷痛胀满，虚寒吐泻，肢冷脉微，寒饮喘咳，风寒湿痹。煎服：3～9克。孕妇慎服。炮姜：温中止泻，止血。治寒性腹泻，虚寒吐血、便血，崩漏，产后瘀血腹痛。本品能反射性兴奋血管运动中枢和交感神经，使血压上升。

干漆 出《神农本草经》。又名漆渣、漆脚。为漆树科植物漆树 Rhus verniciflua Stokes 乳液的干燥品。辛、温，有毒。入肝、脾经。破瘀，消积，杀虫。治妇女经闭，癥瘕，瘀血疼痛，虫积腹痛。内服：炒至烟尽后入丸、散用，一次量0.09～0.15克。体虚胃弱、漆过敏患者及孕妇均忌服。未干燥的漆液称生漆，其毒更烈，一般不用。生漆含漆酚（Urushiol）约80%及少量氢化漆酚、虫胶酶和树胶等。漆酚在虫胶酶作用下吸收空气中的氧变成黑色树脂状物质，则为干漆。对生漆敏感者，0.001毫克的纯漆酚即可引起漆性皮炎。

干蟾 见《中药材手册》。为蟾蜍之干燥全体，详该条。

干蟾皮 见《药鑑启秘》。为蟾蜍皮之处方名。详该条。

土人参 ❶出《滇南本草》。又名土高丽参、土洋参、瓦参。为马齿苋科植物栌兰

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 的根。我国河南以南各地均有栽培。甘，平。补中益气，润肺生津。治气虚乏力，自汗，脾虚泄泻，肺燥咳嗽，虚喘，头晕目眩，乳汁稀少。煎服：15～30克。❷见《滇南本草》整理本。为金铁锁之别名，详该条。❸见《四川中药志》。为土党参之别名，详该条。❹见《证治准绳》。为明党参之别名，详该条。

土三七 ❶见《滇南本草》。为菊三七之别名。❷见《植物名实图考》。为景天三七之别名。❸见《植物名实图考》。为落地生根之别名。❹见《湖南药物志》。为景天之别名。各详该条。

土大黄 ❶出《植物名实图考》。又名金不换、吐血草、血三七、化血莲。为蓼科植物土大黄Rumex madaio Makino的根。分布山东、江苏、江西、河南、湖北、湖南、广东等地。苦、辛，凉。清热解毒，凉血止血，通便，杀虫。①治咽喉肿痛，肺痈，大头瘟，大便秘结，肝炎。②治吐血，咯血，衄血。煎服：9～15克。③治痈疖肿毒，腮腺炎，疥癣，湿疹，皮炎，跌打损伤，汤火伤。捣汁涂或研末调敷。根含蒽醌类。以小鼠作试验，煎剂有止血作用。蒽醌类有抗菌作用。❷见《陕西中草药》。为牛西西之别名，详该条。❸见《滇南本草》。为羊蹄之别名，详该条。

土大黄叶 见《植物名实图考》。为蓼科植物土大黄 Rumex madaio Makino 的叶。酸、微涩，平。清热解毒，散瘀消肿。①治肺痈，咽喉肿痛，痄腮，丹毒，流行性乙型脑炎，月经不调。煎服：鲜者30～60克。②治跌打损伤，捣汁，冲酒服，渣外敷；肿毒初起，捣碎，陈酒煎服。

土川芎 见《滇南本草》。为法罗海之别名，详该条。

土马兜铃 见《四川中药志》。为罗锅底之别名，详该条。

土木瓜 见《药材资料汇编》。为槟榔之别名，详该条。

土木香 ❶出《本草图经》。又名祁木香。为菊科植物土木香Inula helenium L. 的根。主产河北、浙江、四川等地。辛、苦，温。入肝、脾、胃经。行气止痛，健脾和胃，驱虫。治脘腹胁肋胀满疼痛，呕吐，泄泻，痢疾，蛔虫病。煎服：3～9克。土木香根含挥发油，其主成分为土木香内酯（Alantolactone, Helenine）、异土木香内酯、二氢异土木香内酯；又含达玛二烯醇及其乙酸酯，β-和γ-谷甾醇等。土木香内酯及其衍生物有驱蛔作用，类似山道年。土木香内酯在体外有相当强的抗结核杆菌作用。土木香对痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌及常见的致病性皮肤真菌有抑制作用。土木香内酯大量能降低兔血糖，引起呼吸麻痹而死。人应用过量（根）可发生四肢疼痛、吐泻、眩晕及皮疹。其中含毒性很强的蛋白质。❷见《西藏常用中草药》。为藏木香之别名，详该条。

土木贼 见《分类草药性》。为笔筒草之别名，详该条。

土木鳖 见《医宗金鉴》。即木鳖子，详该条。

土贝 见清·赵楷《百草镜》。为土贝母之简称，详该条。

土贝母 出《本草从新》。又名土贝、草贝、地苦胆。为葫芦科植物假贝母 Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquet的块茎。主产河南、陕西、山西、河北等地。苦，凉。清热解毒，散结消肿。①治乳痈，乳癌，瘰疬痰核，疮疡肿毒，煎服：3～9克。②捣敷蛇虫咬伤，外伤出血。

土牛膝 出《本草图经》。又名杜牛膝。为苋科植物土牛膝 Achyranthes aspera L. 或牛膝 A. bidentata Blume（野生种）的根。长江流域及南方各地均产。苦、酸，凉。功同牛膝，长于解毒泻火。亦治咽喉肿痛，白喉。煎服：9～15克。孕妇忌服。土

牛膝根含皂甙（甙元为齐墩果酸）、蜕皮甾酮。全草含甜菜碱、倒叩草碱（Achyranthine）。其酊剂在体外有某些抑菌作用，对小鼠有某些中和白喉毒素作用。从种子中分离出来的皂甙混合物，对动物的强心作用与肾上腺素相类似。甜菜碱能降低血压，扩张血管。牛膝的成分和药理参见牛膝条。

土甘草 ❶见《南宁市药物志》。为岗梅根之别名。❷见《广西中药志》。为冰糖草之别名。各详该条。

土甘草豆 见《药材学》。为相思子之别名，详该条。

土石莲子 见《南宁市药物志》。为苦石莲之别名，详该条。

土田七 ❶见《广西中药志》。为白背三七之别名。❷见《全国中草药汇编》。为峨参之别名。各详该条。

土生地 见《广西药用植物图志》。为白背三七之别名，详该条。

土白芷 见《闽东本草》。为山矾根之别名，详该条。

土白蔹 见《生草药性备要》。为马蹄儿之别名，详该条。

土瓜 出《神农本草经》。为王瓜之别名，详该条。

土瓜仁 见《本草汇言》。为王瓜子之别名，详该条。

土瓜根 见《金匮要略》。为王瓜根之别名，详该条。

土瓜狼毒 出《滇南本草》。为大戟科植物土瓜狼毒 Euphorbia prolifera Buch.-Ham. 的根。分布云南。辛、苦，温，有大毒。破积滞、痰毒，利水消肿，杀虫。治食积，虫积，血积，胃气疼痛，腹水。煎服：0.3～1克；火灰中煨熟，再以淘米水浸泡后蒸一小时，切片晒干备用。外用：研末调敷治跌打损伤，骨折，疥、癣、疮、癞。

土冬花 见《民间常用草药汇编》。为枇杷花之别名，详该条。

土玄参 见《云南经济植物》。为黑阳参之别名，详该条。

土半夏 见《闽南民间草药》。为犁头尖之别名，详该条。

土地骨皮 见《江西民间草药验方》。为大青根之别名，详该条。

土百部 见《中草药手册》。为羊齿天冬之别名，详该条。

土当归 见《修订增补天宝本草》。为杏叶防风之别名，详该条。

土虫草 见《陆川本草》。为甘露子之别名，详该条。

土肉桂 见《云南中草药选》。为山肉桂之别名，详该条。

土血竭 见《中药形性经验鉴别法》。即草血竭，详该条。

土防己 见《现代实用中药》。为木防己之别名，详该条。

土红花 见《陆川本草》。为扶桑花之别名，详该条。

土杜仲 见《广西中兽医药用植物》。即藤杜仲，详该条。

土苋菜 见《福建民间草药》。为刺苋菜之别名，详该条。

土花椒 ❶见《广西本草选编》。为竹叶椒之别名。❷见《岭南草药志》。为鹰不泊之别名。各详该条。

土连翘 ❶见《常用中草药配方》。为山枝仁之别名。❷见《昆明民间常用草药》。为芒种花之别名。❸见《本草从新》。为六轴子之别名。各详该条。

土墨开花 见《浙江民间常用草药》。为蓑荷之别名，详该条。

土鸡血 见《杭州药用植物志》。为昆明鸡血藤之别名，详该条。

土败酱 见《昆明民间常用草药》。为肚拉之别名，详该条。

土知母 ❶见《四川中药志》。为鸢尾之别名。❷见《贵州民间方药集》。为扁竹

根之别名。各详该条。

土狗 出《本事方》。为蝼蛄之别名，详该条。

土参 见《中药志》。为银柴胡之别名，详该条。

土细辛 ❶见《土宿本草》。为杜衡之别名。❷见《广西中草药》。为金耳环之别名。各详该条。

土荆皮 见《药材资料汇编》。即土槿皮，详该条。

土荆芥 出《生草药性备要》。又名臭草、钩虫草、杀虫芥、臭藜藿。为藜科植物土荆芥 Chenopodium ambrosioides L.的全草。主产广西、广东、福建、贵州等地。辛、苦，温，有毒。杀虫，祛风止痒。①治蛔虫病，钩虫病，蛲虫病及鞭虫病。内服：煎汤，3～6克；或入丸、散。亦可制成土荆芥油，成人每日1～1.5毫升，儿童酌减，晚上一次顿服，次晨服玄明粉导泻。②煎水洗皮肤湿疹，瘙痒，疥癣。内服过量，可引起恶心、呕吐、便秘、耳鸣和视觉障碍等中毒症状。孕妇忌服。全草含挥发油，主成分为驱蛔素（Ascaridole）、皂甙。叶中还含土荆芥甙和山柰酚-7-鼠李糖甙等黄酮甙。驱蛔素能驱除蛔虫。土荆芥油对钩虫、阿米巴痢疾也有效。本药有强烈刺激性，对有心、肝、肾疾患或消化道溃疡者禁用。虚弱或营养不良者应慎用或减量。因有蓄积性，故2～3周内不应重复应用，不宜空腹服药。对皮肤真菌也有良好的抑制作用。

土茯拔 见《食疗本草》。为蒟酱之别名，详该条。

土茴陈 见《广西药用植物名录》。为牛至之别名，详该条。

土茴香 见《中药志》。为荫萝子之别名，详该条。

土茯苓 出《滇南本草》。又名白余粮、冷饭团、仙遗粮、饭团根。为百合科植物光叶菝葜 Smilax glabra Roxb.的块状根茎。主产广东、湖南、湖北、浙江、安徽等地。甘、淡，平。入胃、肝经。利湿，解毒。①治梅毒，筋骨挛痛，肾炎水肿，脚气，腹泻，淋浊，带下，钩端螺旋体病。②治湿热疮毒，痈肿，瘰疬；解轻粉、银硃慢性中毒。煎服：15～30克。服药后忌饮茶。本品含皂甙、鞣质、树脂、淀粉等。

土砂仁 见《中药志》。为姜科植物山姜 Alpinia japonica Miq.的果实或种子。产福建、广东。辛、苦，温。行气调中，健胃。治腹痛痞胀，呕吐腹泻。内服：煎汤，1.5～4.5克；或研末服。种子含挥发油，主含桉叶素、樟脑等。尚含缩砂仁素、良姜素、鼠李柠檬素和3-0-甲基鼠李柠檬素（Kumatakenin）等。

土虺蛇 见《普济方》。为蝮蛇之别名，详该条。

土香草 见《滇州本草》。为莎草之别名，详该条。

土香榧 见《浙江天目山药用植物志》。为粗榧科植物中国粗榧 Cephalotaxus sinensis(Rehd. et Wils.)Li的种子。分布长江流域以南及河南、陕西、甘肃等地。治食积，驱蛔虫。内服：煎汤，15～20克；或炒熟食。

土香薷 ❶见《全国中草药汇编》。又名水荆芥、野香薷。为唇形科植物土香薷 Elsholtzia ciliata（Thunb.）Hyland.的全草。除新疆及青海外，分布几遍全国各地。辛，微温。发汗，解暑，利尿。治夏季感冒，发热无汗，中暑，急性胃肠炎，口臭，小便不利。煎服：3～9克。本品含挥发油，主为香薷酮（Elscholtziaketone），还含白苏酮（Naginataketone）、α-蒎烯、桉叶素等。❷见《贵州民间药物》。为牛至之别名，详该条。

土胆草 见《中医药实验研究》。为合掌消之别名，详该条。

土洋参 见《贵州民间方药集》。为土人

参之别名，详该条。

土夏枯草 见广州军区空军卫生部《常用中草药手册》。为孩儿草之别名，详该条。

土蚕 见《安徽药材》。为蛴螬之别名，详该条。

土桔梗 见《本草原始》。为荠苨之别名，详该条。

土柴胡 ❶见《陆川本草》。为牡蒿之别名。❷见《生草药性备要》。为苦地胆之别名。各详该条。

土党参 见《贵州民间方药集》。又名奶参、土人参、浮萍参、白洋参。为桔梗科植物大花金钱豹 Campanumoea javanica Bl. 或金钱豹C. javanica Bl. var. japonica Mak.的根。产广西、四川、云南等地。甘、微苦，温。健脾补肺，祛痰止咳。治虚劳内伤，肺虚咳嗽，脾虚泄泻，小儿疳积，乳汁不多，气虚白带。煎服：9～30克。

土高丽参 见《中国药用植物志》。为土人参之别名，详该条。

土烟叶 见《中国树木分类学》。即野烟叶，详该条。

土球子 见《东北动物药》。为蝮蛇之别名，详该条。

土莫肉 见《闽东本草》。为胡颓子之别名，详该条。

土黄芩 见《中国药用植物图鉴》。为虎掌草之别名，详该条。

土黄芪 ❶见《广西中草药》。为五指毛桃根之别名。❷见《浙江中药手册》。为金雀根之别名。各详该条。

土黄连 ❶见《东北药用植物志》。为白屈菜之别名。❷见《陕西中草药》。为黄三七之别名。各详该条。

土黄柏 见《江西草药》。为十大功劳之别名，详该条。

土黄耆 出《食疗本草》。为苜蓿根之别名，详该条。

土常山 见《南宁市药物志》。为华山矾根之别名，详该条。

土蛋 见《贵州民间药物》。为土圈儿之别名，详该条。

土续断 出《续古今考》。为建兰根之别名，详该条。

土圈儿 出《救荒本草》。又名九牛子、土蛋、野凉薯。为豆科植物土圈儿 Apios fortunei Maxim. 的块根。分布湖北、湖南、浙江、江西、福建、台湾、广东、四川、贵州等地。甘，平。祛痰止咳，解毒消肿。①治感冒咳嗽，百日咳，急性扁桃体炎，瘰疬。煎服：15～30克。②治乳痈，疔疮，蛇咬伤，鲜品捣敷；带状疱疹，醋磨涂。本品含多量淀粉，并含生物碱。

土槿皮 见《中药通报》3〔4〕：156，1957。又名土荆皮。为松科植物金钱松 Pseudolarix kaempferi Gord. 的根皮。主产浙江、安徽、江苏。苦、辛，温，有毒。杀虫。治体癣，脚癣，疥疮。浸酒涂擦或研末醋调敷。本品含鞣质、粘液质（多糖）和酸性成分。土槿皮酊，内含土槿皮酸（系混合物，约0.8%），对我国常见的10种皮肤致病真菌，均有一定的抑菌作用，对某些真菌，在0.1毫克/毫升时，即有杀菌作用。水煎剂作用不可靠。

土薄荷 见《泉州青草药》。为剪刀草之别名，详该条。

土鳖虫 见《药材学》。即地鳖虫，详该条。

下马仙 见《本草纲目》。为大戟之别名，详该条。

下田菊 见《全国中草药汇编》。又名风气草、汗苏麻。为菊科植物下田菊 Adenostem-ma lavenia（L.）O. Ktze. 的全草。分布长江流域以南及沿海和西南各地。苦，寒。清热利湿，解毒消肿。①治感冒发热，支气管炎，咽喉炎，扁桃体炎，黄疸型肝炎。煎服：9～15克。②治痈疖疮疡，蛇咬

伤。捣烂敷。

下奶藤 见《云南中草药选》。为通光散之别名，详该条。

下白鼠曲草 见《中国药用植物图鉴》。为秋鼠曲草之别名，详该条。

大一枝蒿 见《陕西中草药》。为角蒿之别名，详该条。

大一枝箭 见《滇南本草》。又名铁色箭、忽地笑、鹿葱、岩大蒜。为石蒜科植物黄花石蒜Lycoris aurea Herb.的鳞茎。分布湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、福建、台湾及华南、西南等地。辛、甘，温，有毒。解毒，消肿，杀虫。治痈肿，疔疮，结核。鲜品捣敷。一般不内服。内服中毒可出现流涎，呕吐，泻下，惊厥，休克，甚至呼吸中枢麻痹而死亡。本品含石蒜碱、雪花莲胺碱、石蒜胺碱、石蒜伦碱、多花水仙碱、伪石蒜碱、高石蒜碱等生物碱。药理详见石蒜条。给兔灌胃有祛痰作用，大量催吐。

大丁草 出《本草纲目》。又名鸡毛蒿、豹子药。为菊科植物大丁草 Leibnitzia anandria(L.)Nakai的全草。我国南北各地均有分布。苦，寒。清热利湿，祛风，解毒，止咳，止血。①治肺热咳嗽，风湿关节痛，肠炎，痢疾，尿路感染。煎服：6～15克。②治乳腺炎，痈疖肿毒，臁疮，烧烫伤，外伤出血。捣烂或研末敷。

大刀豆 见《分类草药性》。即刀豆，详该条。

大力子 出《卫生易简方》。为牛蒡子之别名，详该条。

大力王 见《南京地区常用中草药》。为飞廉之别名，详该条。

大力草 见《生草药性备要》。为向天盏之别名，详该条。

大力黄 见《广西野生资源植物》。为千斤拔之别名，详该条。

大力薯 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为山莲藕之别名，详该条。

大山桂 见《全国中草药汇编》。为山肉桂之别名，详该条。

大千生 见《云南中草药》。为冰粉之别名，详该条。

大飞扬 见《广西中药志》。又名夜合叶、马鞍叶、蝴蝶风。为豆科植物马鞍叶羊蹄甲 Bauhinia faberi Oliv.的枝叶。分布陕西、湖北、广西及西南地区。苦、涩，凉。解湿毒，止咳。①治天疱疮，顽癣，疮痈溃烂，烫伤，皮肤湿疹。用鲜品捣烂外敷或煎水洗患处。②治百日咳。本品配百部、猪苦胆（炕干）各等量，研末空腹时开水吞服，日服三次，每次1～3克。

大飞扬草 见萧步丹《岭南采药录》。即飞扬草，详该条。

大木花 见《四川中药志》。为雪莲花之别名，详该条。

大贝母 见《本草正义》。即浙贝母，详该条。

大风子 出《本草衍义补遗》。又名大枫子。为大风子科植物大风子 Hydnocarpus anthelmintica Pier.的成熟种子。主产越南、泰国。我国云南、台湾、广西等地有栽培。辛，热，有毒。入肝、脾、肾经。祛风燥湿，攻毒杀虫。①治麻风。内服：1.5～3克，入丸、散用。②治杨梅毒疮，疥癣，手背皲裂。捣敷；或研如泥，去油，以麻油调敷。本品内服易引起头痛、头晕、恶心、呕吐等中毒症状，不宜久服。大风子油：外用涂擦治疥、癣。种子含多量脂肪油，油中主要成分为大风子油酸、次大风子油酸（二者的甘油酯约占总油量的90%）。大风子油及其衍生物有抗麻风、抗结核作用，但对机体组织均有刺激性，毒性较大。大风子水浸液在试管内对奥杜盎氏小芽胞癣菌有抑制作用。

大风茅 见萧步丹《岭南采药录》。为香茅之别名，详该条。

大风消 见《草药手册》。为胃友之别名，详该条。

大风藤 ❶见《中药材手册》。即青风藤。❷见《江西中药》。为爬山虎之别名。各详该条。

大凤尾 见《陆川本草》。为铁树叶之别名，详该条。

大方八 见《中药材手册》。为马钱子之商品名，详该条。

大节藤 见《广西药用植物名录》。为买麻藤之别名，详该条。

大叶万年青 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为粤万年青之别名，详该条。

大叶毛鼠曲 见《江西草药》。为秋鼠曲草之别名，详该条。

大叶半枝莲 见《广西中草药》。为向天盏之别名，详该条。

大叶灰菜 见《黑龙江中药》。为大叶藜之别名，详该条。

大叶青绳儿 见南京药学院《中草药学》。为青风藤之别名，详该条。

大叶金花草 见《广西中药志》。又名金花草、雉鸡尾、孔雀尾、乌韭、细叶凤凰尾。为鳞始蕨科植物乌蕨 Stenoloma chusana (L.) Ching的全草或根茎。分布长江以南各地，西至四川、云南，北达陕西。苦，寒。清热解毒，利湿，止血。①治风热感冒，咳嗽，扁桃体炎，腮腺炎，肠炎，痢疾，肝炎，白带，吐血，便血，尿血。煎服：30～60克。②治痈肿汤火伤，鲜叶捣敷或干叶研末调敷。叶含牡荆素、丁香酸、原儿茶醛、原儿茶酸。本品煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌、人型结核杆菌有抑制作用，对钩端螺旋体也有抑制作用。

大叶草 见《中药材手册》。为豨莶之别名，详该条。

大叶咸虾花 见《广州植物志》。即咸虾花，详该条。

大叶蛇总管 ❶见《广西中草药》。又名蓝花柴胡。为唇形科植物显脉香茶菜Isodon nervosus (Hemsl.) Kudo的全草。分布四川、陕西、河南、湖北、浙江、江苏、安徽、江西、广东、广西。微辛、苦，寒。清热利湿，解毒。①治急性黄疸型肝炎，煎服：15～60克。②治毒蛇咬伤，煎服并捣敷伤口周围；烧烫伤，脓疱疮，湿疹，皮肤瘙痒，煎水洗。❷见《广东中草药》。为虎杖之别名，详该条。

大叶酢浆草 见《广西本草选编》。为铜锤草之别名，详该条。

大叶藜 见《东北药用植物志》。又名血见愁、大叶灰菜。为藜科植物大叶藜Chenopodium hybridum L.的地上部分。分布东北、华北、西北及山东、河南、四川、云南等地。甘，平。止血、活血。①治月经不调，崩漏，咯血，衄血，尿血。煎服：3～9克。②治疮痈肿毒，蛇、虫咬伤。捣烂敷。

大田基黄 见《广西民间常用草药》。为星宿菜之别名，详该条。

大四块瓦 见《四川中药志》。又名四块瓦、四儿风、四叶黄。为报春花科植物重楼排草Lysimachia paridiformis Franch.的全草。分布云南、四川、贵州、湖北、湖南、广东、广西。辛、苦，温。祛痰止咳，祛风止痛。治风寒咳嗽，胃痛腹痛，风湿腰痛，产后腹痛，月经不调。煎服：15～30克。鲜品捣敷治跌打损伤，毒蛇咬伤，疖肿。

大头花 见《浙江中药手册》。为夏枯草之别名，详该条。

大头陈 见萧步丹《岭南采药录》。为玄参科植物球花毛麝香Adenosma indianum (Lour.)Merr.的带花全草。分布广东、广西、云南等地。辛、微苦，凉。疏风解表，化湿消滞。①治感冒，发热头痛，消化不良，腹胀腹泻。煎服：9～30克。②煎水洗皮炎，湿疹。本品预试显黄酮甙、酚类等反应。

大头菜 见清·汪双池《医林纂要·药性》。为芜菁之别名，详该条。

大加皮 见《广西本草选编》。为绒毛鸭

脚木之别名，详该条。

大发 见《本草正义》。为胖大海之别名，详该条。

大发药 见《陆川本草》。为走马胎之别名，详该条。

大地丁草 见《广西中药志》。为黄花母之别名，详该条。

大老鸦酸 见《贵州民间药物》。为铜锤草之别名，详该条。

大过路黄 见《贵州民间方药集》。为芒种花之别名，详该条。

大吊兰 见《湖南药物志》。为石仙桃之别名，详该条。

大血草 见《云南中草药》。为血满草之别名，详该条。

大血通 见《陕西中草药》。为红藤之别名，详该条。

大红袍 ❶见《昆明民间常用草药》。又名锈钉子、地油根、山黄豆。为豆科植物毛杭子梢Campylotropis hirtella(Franch.) Schindl.的根。分布云南、四川。涩、微苦，温。活血调经，止痛。①治月经不调，闭经，痛经，白带，胃痛，扭伤。煎服：15～30克，或浸酒。②治外伤出血，烫伤，黄水疮，研末撒或鲜根烤取汁外搽。❷见《河北药材》。为丹参之别名，详该条。❸见《贵州民间药物》。为铁仔之别名，详该条。

大麦牛 见《江苏药材志》。为王不留行之别名，详该条。

大麦芽 见《本草汇言》。即麦芽，详该条。

大麦秸 出《本草纲目》。为禾本科植物大麦Hordeum vulgare L.成熟后枯黄的茎秆。甘、苦，温。入脾、肺经。消肿，利湿，理气。治小便不通。煎浓汁频服。大麦苗：捣汁服利小便，治黄疸；煮汁洗面目手足皲裂。

大芸 见《青海药材》。为肉苁蓉之药材名，详该条。

大豆卷 出《本草经集注》。即大豆黄卷，详该条。

大豆荚 见《文山中草药》。为大麻药之别名，详该条。

大豆黄卷 出《神农本草经》。又名大豆卷、黄卷皮、豆卷。为豆科植物大豆Glycine max(L.) Merr.的黑色种子发芽后晒干而成。甘，平。入脾、胃经。清暑解表，分利湿热。治暑湿感冒，湿温初起，汗少，胸脘痞闷，小便不利，水肿胀满，湿痹，骨节烦疼。煎服：9～15克。本品含天门冬酰胺、胆碱、黄嘌呤、次黄嘌呤、无机盐等。

大伸筋草 见《陕西中草药》。为牛尾菜之别名，详该条。

大皂角 见《本草纲目》。为皂荚之别名，详该条。

大良姜 见《广西中药志》。又名山姜。为姜科植物大高良姜Alpinia galanga(L.) Swartz 的根茎。主产广西。辛，温。温胃，散寒，止痛。治心胃气痛，胃寒及伤食吐泻。煎服：3～9克。本品含挥发油主成分为桂皮酸甲酯、蒎烯、桉叶素等。还含树脂、鞣质等。有较好的祛痰作用，大良姜挥发油对皮肤和粘膜有刺激作用，内服有驱风及抑制小肠过度蠕动的作用。

大驳骨 见《广西中药志》。又名大接骨、龙头草、大骨风。为爵床科植物黑叶爵床Adhatoda ventricosa (Wall.)Nees或鸭嘴花A.vasica Nees的枝叶。分布云南、广西、广东等地。辛、微酸，平。活血散瘀，理伤接骨，祛风除湿。①治跌打损伤，骨折，风湿痹痛，肋间神经痛。煎服：15～30克。外用：捣敷或煎水洗。②治乳痈，和黄糖、酒糟捣敷，鸭嘴花的叶中含鸭嘴花碱和鸭嘴花酮碱。鸭嘴花碱氧化后，大部分可以转变成鸭嘴花酮碱。鸭嘴花酮碱有支气管扩张作用，对离体豚鼠和兔心有加强心肌收缩力、增加冠脉流量的作用。鸭嘴花碱的作用则相反。所含油脂有抗结核作用。叶中不含氮的中性

成分可降低兔血糖。

大青叶 出《新修本草》。为十字花科植物菘蓝Isatis tinctoria L.或爵床科植物马蓝Baphicacanthus cusia (Nees)Bremek.、马鞭草科植物路边青Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.、蓼科植物蓼蓝Polygonum tinctorium Ait. 的叶。菘蓝叶主产江苏、安徽、河北、河南、浙江等地；马蓝叶主产福建、广西、广东、江西等地；路边青叶主产湖南、湖北、江西等地；蓼蓝叶主产河北、山西等地。苦，寒。入心、胃、肝经。清热解毒，凉血。①治流行性乙型脑炎，流行性感冒，腮腺炎，咽喉炎，扁桃体炎，肺炎，传染性单核细胞增多症，急性传染性肝炎，细菌性痢疾，急性胃肠炎。②治热病发斑，丹毒，吐血、衄血，疔疮肿毒，蛇咬伤。煎服：9～30克。菘蓝叶含靛红烷B(Isatan B)，马蓝和蓼蓝的叶均含靛甙。路边青叶含靛甙、山大青甙(Cyrtophyllin)。蓼蓝有解热、抗炎、降低毛细血管通透性及增加白细胞吞噬的作用。果实的醇浸液对炭疽、肺炎、痢疾杆菌及金黄色葡萄球菌有抑制作用。其所含类似靛甙样物质有一定抗病毒活性。路边青叶对金黄色葡萄球菌、链球菌、脑膜炎球菌，流感、痢疾杆菌，钩端螺旋体，均有抑制作用。

大青根 见《福建民间草药》。又名臭根、土地骨皮。为马鞭草科植物路边青Clerodendrum cyrtophyllum Turcz. 的根。分布华东、中南、西南各地。苦，寒。清热利湿，凉血解毒。①治流行性乙型脑炎，流行性脑脊髓膜炎，感冒头痛，麻疹并发肺炎，流行性腮腺炎，咽喉肿痛，斑疹，肠炎，痢疾，黄疸，鼻衄。煎服：9～30克。②治烂疮，蜈蚣咬伤。煎水洗或捣敷。

大青盐 见《中药志》。又名青盐、戎盐。为卤化物类矿物石盐Halite的结晶。主产青海。咸，寒。入心、肾经。凉血，明目。①治尿血，吐血，齿舌出血。入煎剂溶化服，0.9～1.5克。②治目赤肿痛，风眼烂弦，以溶液点眼；牙痛，炒研为末擦牙。肾脏病患者忌服。本品主含氯化钠，有时含钙、镁、硫酸盐、铁和微量砷等杂质。

大松身 见《全国中草药汇编》。为宽筋藤之别名，详该条。

大枫子 见《本草品汇精要》。即大风子，详该条。

大枣 出《神农本草经》。又名红枣。为鼠李科植物枣Ziziphus jujuba Mill. var. inermis(Bge.) Rehd.的果实。主产河北、河南、山东、四川等地。甘，温。入脾、胃经。补中益气，养血安神。治脾胃虚弱，食少便溏，倦怠乏力，气血不足，心悸怔忡，过敏性紫癜，妇人脏躁，并能缓和峻烈药物的毒性，减少副作用。煎服：5～12枚。本品含蛋白质，糖类，多种氨基酸，胡萝卜素，维生素B_2、C，微量钙、磷、铁等化合物。对小鼠有增强肌力，保护肝脏的作用。

大刺儿菜 见《全国中草药汇编》。为大蓟之别名，详该条。

大果榆糊 见《药材学》。为芜荑之别名，详该条。

大罗伞 ❶见《广西中草药》。为山大颜之别名。❷见《广西本草选编》。为八爪金龙之别名。❸见《广州植物志》。为朱砂根之别名。❹见《广西药用植物名录》。为三对节之别名。各详该条。

大季花 见《广西药用植物名录》。为鸡蛋花之别名，详该条。

大金不换 见《广东中草药》。为大金牛草之别名，详该条。

大金牛草 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名紫背金牛、大金不换、疳积草。为远志科植物金不换Polygala chinensis L. 的全草。分布广东、广西、福建、云南等地。甘、微辛，平。祛痰止咳，消积，活血散瘀。①治咳嗽胸痛，肺结核，百日咳，疳积，肝脾肿大，小儿麻痹后遗症，角膜溃

疡，急性结膜炎。煎服：9～30克。②治痈疽，疖肿，跌打损伤，蛇咬伤。煎服并捣烂外敷（蛇伤敷伤口周围）。本品含苏齐内酯（Suchilactone）、齐苏内酯（Chisulactone）、金不换素（Chinensin）、金不换萘酚、金不换萘酚甲醚、赛菊芋黄质（Helioxanthin）、皂甙等。

大金钱草 见《重庆草药》。又名金钱草、地蜈蚣、四川大金钱草、铜钱草、对座草、一串钱、黄疸草。为报春花科植物过路黄Lysimachia christinae Hance 的全草。分布河南、陕西及长江流域和西南地区。苦、酸，凉。入肝、胆、肾、膀胱经。清热解毒。利尿排石，散瘀消肿。①治黄疸型肝炎，胆囊炎，胆结石，尿路感染及结石，水肿。煎服：15～30克（鲜品60～120克）。②治乳腺炎，疮痈肿毒，跌打损伤，毒蛇咬伤。鲜品捣敷并捣汁饮。本品含酚性成分、甾醇、黄酮类、氨基酸、鞣质、挥发油、胆碱。预试还含皂甙及内酯类等。煎剂有利胆作用，可能是促进肝细胞分泌胆汁，并使奥狄氏括约肌松弛。体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

大金雀 见《江苏药材志》。为红旱莲之别名，详该条。

大乳汁草 见《广东中草药》。为飞扬草之别名，详该条。

大肺筋草 见《四川中药志》。又名肺经草、反背红、乌豆草。为伞形科植物薄片变豆菜Sanicula lamelligera Hance的全草、分布安徽、浙江、台湾、江西、湖北、广东、广西、四川、贵州。甘、辛，平。散风，化痰，行血，通经。治风寒感冒，咳嗽，哮喘，经闭，腰痛。煎服：9～15克。

大肥根 见《云南中草药》。为狗屎花根之别名，详该条。

大贯众 见《广西实用中草药新选》。为飞天蟑螂之别名，详该条。

大胡麻 见《江苏药材志》。为亚麻之别名，详该条。

大草鞋虫 见《四川中药志》。为马陆之别名，详该条。

大茴香 出《卫生杂兴》。为八角茴香之别名，详该条。

大茶药 见萧步丹《岭南采药录》。为钩吻之别名，详该条。

大茶药根 见萧步丹《岭南采药录》。又名胡满蕴、断肠草根。为马钱科植物胡蔓藤Gelsemium elegans Benth.的根或根皮。产贵州、云南、广东、广西、湖南、浙江、福建等地。苦，寒，有大毒。消肿，止痛，接骨。治疔疮，肿毒，湿疹，疥癣，跌打损伤，骨折（复位固定后再用药），气性坏疽。外用：捣敷，浸酒涂或煎水洗。忌内服，根含生物碱钩吻素子、寅、卯、甲及丙等。药理参见钩吻条。

大荠 出《尔雅》。为荠菜之别名，详该条。

大药 见《江苏省植物药材志》。为桔梗之别名，详该条。

大骨风 见《广西中草药》。为大驳骨之别名，详该条。

大种半边莲 见《中国药用植物图鉴》。为山梗菜之别名，详该条。

大鬼针草 见《安徽中草药》。为狼把草之别名，详该条。

大洞果 见《本草纲目拾遗》。为胖大海之别名，详该条。

大活 见《河北药材》。为独活之别名，详该条。

大活血 见《植物名实图考》。为红藤之别名，详该条。

大将军 见《云南中草药》。为野烟之别名，详该条。

大钻 见南京药学院《中草药学》。为黑老虎之别名，详该条。

大海子 见《中药志》。即胖大海，详该条。

大通草 见《四川中药志》。即通草，详该条。

大黄 出《神农本草经》。又名将军、川军、锦纹大黄。为蓼科植物掌叶大黄 Rheum palmatum L.或大黄R.officinale Baill.、鸡爪大黄R. tanguticum Maxim. ex Regel的根及根茎。主产甘肃、青海、四川等地。苦，寒。入胃、大肠、肝经。泻热毒，荡积滞，行瘀血。①治实热便秘，谵语发狂，食积停滞，腹痛泻痢，湿热黄疸，淋浊、溲赤，痈肿疮疡，暴眼赤痛。②治吐血，衄血，血瘀经闭，癥瘕。煎服：3～12克。③治烧汤伤及热毒疮疖，研末调敷；宫颈糜烂，以大黄浸膏棉球浸透，涂擦局部。大黄生用力猛，熟用力缓；通便宜后下，止血宜炒炭。胎前、产后慎用。以上三种大黄的根茎均含大黄酸，大黄素、大黄酚，芦荟大黄素、大黄素甲醚等以及其中某些物质的葡萄糖甙和双糖甙。又含鞣质和树脂。掌叶大黄的根茎还含番泻叶甙A、B、C。有缓泻作用，其有效成分以番泻叶甙A作用最强，蒽醌甙次之，本品含相当数量的鞣质，故在产生泻下作用后可出现便秘。对多数革兰氏阳性细菌和某些革兰氏阴性细菌在试管内均有抑菌作用，有效成分主要是蒽醌类衍生物，其中以芦荟大黄素、大黄素及大黄酸作用最好；在试管中对常见的致病性皮肤真菌也有抑制作用；尚有报告，在体外对流感病毒有抑制作用。大黄素和大黄酸对小鼠的黑色素瘤、乳腺瘤及艾氏癌腹水型均有抑制作用。大黄酚能缩短小鼠血液凝固时间而有止血作用。对胆汁及胰消化液的分泌有轻度促进作用，并有轻度利尿作用。对有高胆甾醇血症的家兔，大黄能降低血清胆甾醇水平。

大黄药 见《云南中草药》。又名一号黄药、大黑头草、垂花香薷。为唇形科植物垂花香薷 Elsholtzia penduliflora W.W. Smith的地上部分。分布云南。辛，凉。清热解毒，止咳。①治炭疽病，流行性感冒，流行性脑脊髓膜炎，肺炎，支气管炎，扁桃体炎，尿路感染。煎服：6～12克。②治乳腺炎，外伤感染。煎水洗或捣敷。

大黄藤 见《中草药新医疗法处方集》。为黄藤之别名，详该条。

大接骨 见《广西药用植物名录》。为大驳骨之别名，详该条。

大接骨丹 ❶见《云南中草药》。又名水冬瓜。为山茱萸科植物齿叶叨里木 Torricellia angulata Oliv.var. intermedia(Harms) Hu 的根、叶、花。分布四川、贵州、云南等地。苦、辛，温。祛风利湿，活血行瘀。治风湿关节痛，血瘀经闭，产后腰痛，慢性肠炎，腹泻。煎服：9～15克。捣敷治骨折，跌打损伤。❷见《昆明民间常用草药》。为金刚散之别名，详该条。

大救驾 见《陕西中草药》。为祖师麻之别名，详该条。

大常山 见《广西药用植物名录》。为三对节之别名，详该条。

大麻仁 出《药性论》。为火麻仁之别名，详该条。

大麻药 见《云南中草药》。又名大豆荚。为豆科植物镰果扁豆 Dolichos falcatus Klein 的根或叶。分布广东、云南。辛，温，有毒。祛风活血，止血止痛。①治风湿疼痛，跌打损伤，骨折疼痛，吐血，咯血，衄血，便血。煎服：3～6克；或泡酒服。止血，炒炭用。②治外伤出血。研末撒或调敷。根含三萜皂甙、生物碱。皂甙对小鼠有抗癌作用。

大巢菜 出《本草纲目》。又名薇、野麻豌、肥田草、野豌豆、野菜豆。为豆科植物大巢菜Vicia sativa L.的全草。我国各地均有分布。甘、辛，寒。补肾，利水，活血止血。①治肾虚腰痛，遗精，黄疸，浮肿，鼻衄，月经不调。煎服：15～30克。②治疔疮。鲜品捣烂敷或煎水洗。全草含蛋白质较高，另含微量氢氰酸。叶含维生素C。种子含蛋白质和精氨酸等氨基酸。所含毒性成分，

能麻痹动物的中枢神经系统。

大搜山虎 见《云南中草药》。为三分三之别名，详该条。

大翘子 出《新修本草》。为连翘之别名，详该条。

大戟 出《神农本草经》。又名下马仙、龙虎草、臌胀草、天平一枝香。为大戟科植物京大戟 Euphorbia pekinensis Rupr.的根。主产江苏。苦，寒，有毒。入肺、脾、肾经。逐水通便，消肿散结。①治水肿胀满，痰饮积聚，血吸虫病肝硬化及结核性腹膜炎引起的腹水，胸腔积液。内服：煎汤，1.5～3克；研末，0.3～1克。②治疮疡肿毒，以鲜根或鲜叶捣敷。肾功能不良及孕妇忌服。反甘草。本品含大戟甙(Euphorbon)，大戟色素A、B、C，生物碱等。乙醚和热水提取液对消化道有刺激作用，可致腹泻。对实验性腹水大鼠有利尿作用。如与甘草合用，则对小鼠致死作用加强。此外，尚有扩张末梢血管、兴奋妊娠离体子宫及对抗肾上腺素的升压作用。

大黑头草 见《云南思茅中草药选》。为大黄药之别名，详该条。

大黑药 见《云南中草药》。为臭灵丹之别名，详该条。

大蒜 出《本草经集注》。为百合科植物大蒜Allium sativum L.的鳞茎。辛，温。入脾、胃、肺经。解毒，健胃，杀虫。①预防流行性感冒，流行性脑脊髓膜炎。②治肺结核，百日咳，食欲不振，消化不良，肠炎，细菌性痢疾，阿米巴痢疾，蛲虫及钩虫病。内服：6～15克。生食或煨食。③捣烂敷足心，止鼻衄。本品含挥发油、蒜氨酸(Alliin)、大蒜素（即二烯丙基硫代磺酸酯）、环蒜氨酸(Cycloalliin)、微量的碘和多种低聚肽类等。蒜氨酸被蒜中存有的蒜酶分解后可产生不稳定的蒜辣素(Allicin)，放置后即产生大蒜素。蒜辣素是植物杀菌素的一种，对化脓性球菌、痢疾杆菌等有明显的抗菌或杀菌作用，大蒜的挥发性物质、大蒜汁或大蒜浸出液同样有效。在体外对常见致病真菌（如白色念珠菌）、阿米巴原虫、阴道滴虫也有抑制作用。抗菌的有效成分大蒜素现已人工合成，主用于痢疾、滴虫性阴道炎及深部霉菌感染。大蒜脂溶性挥发油对小鼠网织细胞肉瘤、肉瘤-180等有抗癌作用；大蒜还能增强吞噬细胞的功能，并有抗炎作用。蒜油能抑制动物动脉粥样硬化的发展，并有某些降血脂、抗血凝的作用，大蒜辣素能降血糖。

大蓝 见《生草药性备要》。为木蓝之别名，详该条。

大蓟 出《本草经集注》。又名马蓟、虎蓟、野红花、牛刺笋菜、鸡姆刺、大刺儿菜。为菊科植物大蓟Cirsium japonicum DC.的全草或根。我国大部分地区均产。甘，凉。入肝、肾经。凉血止血，散瘀消肿。①治衄血，吐血，咯血，尿血，便血，月经过多，崩漏，肠痈，高血压。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。止血炒炭用。②鲜品捣敷痈疖肿毒，外伤出血。全草含生物碱、挥发油。根含生物碱、乙酸蒲公英甾醇酯、α-和β-香树脂醇、β-谷甾醇等。鲜叶含柳穿鱼甙、柳穿鱼素等黄酮类。水或醇浸剂对猫、狗、兔有降低血压作用。

大腹子 出《岭表录异》。为槟榔之别名，详该条。

大腹皮 出唐·侯宁极《药谱》。又名大腹绒、槟榔皮、槟榔衣。为棕榈科植物槟榔Areca catechu L.的果皮。主产广东海南岛、云南、台湾。辛，微温。入脾、胃经。下气，宽中，利水。治腹胀，泻痢，水肿，脚气，小便不利。煎服：6～9克。本品含多量鞣质，儿茶精。

大腹绒 见《中国药学大辞典》。为大腹皮之处方名，详该条。

大酸味草 见《广州植物志》。为铜锤草之别名，详该条。

大酱瓣 见《广东中草药》。为臭茉莉之

别名，详该条。

大壁虎 见《中药志》。为蛤蚧之别名，详该条。

万丈深 见《滇南本草》。为还阳参之别名，详该条。

万年青 出清·陈士铎《本草新编》。又名竹根七、铁扁担、白河车。为百合科植物万年青Rohdea japonica Roth的根茎。分布华东、中南、西南地区。苦、微甘，寒，有小毒。强心利尿，清热解毒，止血。①治风湿性心脏病心力衰竭，白喉，白喉引起的心肌炎，咽喉肿痛，细菌性痢疾，疔疮走黄，呕血，咯血，崩漏。内服：煎汤，3～6克（鲜品9～15克）；或捣汁服。②治跌打损伤，蛇咬伤，痈疖肿毒，烧烫伤。鲜品捣敷。本品含强心甙万年青甙甲、乙、丙。有洋地黄样强心作用。其强度比为：万年青甙甲>乙>丙；口服效率较差，蓄积性较强。有刺激性，能引起恶心、呕吐、腹泻；大量则出现期前收缩及完全性传导阻滞。皮下注射可使局部皮肤发红、发炎。

万年青叶 出清·陈士铎《本草新编》。为百合科植物万年青Rohdea japonica Roth的叶。苦、涩，微寒。强心利尿，清热解毒，止血。①治心力衰竭，咽喉肿痛，慢性气管炎，咯血，吐血。煎服：3～6克。②治蛇咬伤，捣汁涂；痔疮、坐板疮，煎水洗。本品含强心甙万年青甙甲、乙、丙、丁。还含β-谷甾醇及其葡萄糖甙。药理作用参见万年青条。

万年松 见《本草原始》。为卷柏之别名，详该条。

万年藤 ❶见《全国中草药汇编》。为女萎之别名。❷见《药材学》。为关木通之别名。各详该条。

万寿菊 出《植物名实图考》。又名金菊、蜂窝菊、臭芙蓉。为菊科植物万寿菊Tagetes erecta L.的花序。我国各地花圃有栽培。苦、微辛，凉。平肝清热，祛风，化痰。①治头晕目眩，目痛，牙痛，小儿惊风，感冒咳嗽，百日咳。煎服：6～9克。②治腮腺炎，乳腺炎，研末醋调敷。本品含挥发油，内含右旋柠檬烯、右旋芳樟醇及其乙酸酯、桉叶素等。还含万寿菊属甙，堆心菊素(Helenien)等。

万寿菊叶 见《南宁市药物志》。为菊科植物万寿菊Tagetes erecta L.的叶。甘，寒。清热解毒。治感冒发热，疔疮，痈疮肿毒。煎服：5～9克。外用捣敷。本品含山柰甙。有消炎及维生素P样作用。并能轻度抑制离体兔肠运动。

万经棵 见《山东中草药手册》。为照山白之别名，详该条。

万重花 见《广西药用植物名录》。为咸虾花之别名，详该条。

寸白蛇 见《生物学通报》(3)：1958。为金钱白花蛇之别名，详该条。

寸芸 见《全国中草药汇编》。为肉苁蓉之药材名，详该条。

寸香 见《中药材手册》。为麝香之处方名，详该条。

【丨】

上山虎 见《广西中兽医药用植物》。为入地金牛之别名，详该条。

上巳菜 见《闽东本草》。为荠菜之别名，详该条。

上甲 出《证治要诀》。即鳖甲，详该条。

上树蜈蚣 ❶见《重庆草药》。为走游草之别名。❷见《分类草药性》。为常春藤之别名。各详该条。

上党人参 见《本经逢原》。即党参，详该条。

山大刀 见《生草药性备要》。为山大颜之别名，详该条。

山大黄 出《本草拾遗》。为酸模之别名，详该条。

山大颜 见萧步丹《岭南采药录》。又名

山大刀、大罗伞、九节木、暗山公、散血丹。为茜草科植物九节Psychotria rubra(Lour.) poir. 的嫩枝叶或根。产广东、广西。苦，凉。清热解毒，祛风除湿。①治扁桃体炎，白喉，咽喉炎，痢疾，肠伤寒，风湿疼痛，腰肌劳损。煎服：30～60克。②治跌打损伤，外伤出血，蛇咬伤，疮疡肿毒，下肢溃疡。鲜品捣烂敷。枝叶含β-谷甾醇、内酯、酚性成分、有机酸。根预试含酚类、鞣质、三萜。

山川柳 见《药材生产手册》。为柽柳之别名，详该条。

山小橘 见《常用中草药彩色图谱》。又名野沙柑、酒饼木、山柑橘、山油甘。为芸香科植物山小橘 Glycosmis citrifolia (Willd.) Lindl. 的根及叶。分布福建、广东、广西、云南。微辛、苦，平。祛风发表，化痰止咳，消积，散瘀。①治感冒咳嗽，消化不良，食积腹痛，疝痛。煎服：9～15克。②治跌打瘀肿。鲜叶捣烂，酒调敷。根预试含黄酮甙、氨基酸。

山马兰 见《浙江民间常用草药》。为红管药之别名，详该条。

山马蝗 出《植物名实图考》。为豆科植物山蚂蝗Desmodium racemosum(Thunb.) DC. 的根或全草。分布江苏、浙江、江西、福建、广东、广西、四川、贵州、云南。苦，寒。祛风利湿，散瘀止血。治风湿关节痛，哮喘，崩中带下。煎服：6～9克。捣敷治跌打损伤。叶含山柰甙(Kaempferitrin)。

山马蹄 见《中国药用植物志》。为萝芙木之别名，详该条。

山木通 ❶见《湖南药物志》。为女萎之别名。❷见《广西本草选编》。即川木通。各详该条。

山木蟹 见《浙江天目山药用植物志》。为莽草之别名，详该条。

山凤尾 见《南京民间药草》。为蕨之别名，详该条。

山乌龟 见《滇南本草》整理本。为地不容之别名，详该条。

山甘草 见《闽南民间草药》。又名野白纸扇、白蝴蝶、凉藤。为茜草科植物毛玉叶金花Mussaenda pubescens Ait. f.的茎叶。分布长江以南各地。甘、微苦，凉。解表清暑，凉血解毒。①治感冒、中暑，发热，咳嗽，咽喉肿痛，扁桃体炎，肾炎水肿，泄泻，痢疾。煎服：15～30克。②治疮疡脓肿，蛇咬伤，湿疹。捣敷。茎含豆甾醇、β-谷甾醇、阿江榄仁酸（Arjunolic acid）。叶含豆甾醇、β-谷甾醇及高级脂族醇。

山甘草根 见《闽南民间草药》。为茜草科植物毛玉叶金花Mussaenda pubescens Ait. f. 的根。甘，平。治小儿疳积，子宫出血，乳痈，腰脊酸痛。煎服：15～30克。

山石榴 ❶见《奇效良方》。为金樱子之别名。❷见《植物名汇》。为野牡丹之别名。各详该条。

山东何首乌 见《全国中草药汇编》。即白首乌，详该条。

山田薯 见《泉州本草》。为萆薢之别名，详该条。

山白芷 见《广东中草药》。为羊耳菊之别名，详该条。

山白菊 见《贵州民间药物》。为红管药之别名，详该条。

山地瓜 见《东北药用植物志》。为白蔹之别名，详该条。

山芝麻 ❶见《福建民间草药》。又名岗油麻、山油麻、假芝麻、假油麻、石秤砣。为梧桐科植物山芝麻 Helicteres angustifolia L.的根。分布江西、福建、广东、广西及西南地区。苦、微甘，寒，有小毒。解表清热，消肿解毒。①治感冒高热，扁桃体炎，咽喉炎，腮腺炎，肠炎，痢疾。煎服：9～15克。②捣敷治外伤出血，痈肿，疔疮，毒蛇咬伤。内服过量可出现头晕，恶心，腹泻等反应。孕妇忌服。本品预试含黄酮甙、酚

类、鞣质。体外试验，对金黄色葡萄球菌有抑制作用。❷见清·赵楷《百草镜》。为六轴子之别名，详该条。

山芝麻根 出《梁侯瀛集验良方》。为羊踯躅根之别名，详该条。

山肉桂 ❶见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名土肉桂、大山桂。为樟科植物钝叶樟 Cinnamomum obtusifolium (Roxb.) Nees的茎皮。分布广东、广西、云南。辛、甘，温。祛风散寒，行气止痛。治风湿痹痛，腰肌劳损，胃寒疼痛，泄泻，经闭。内服：研末吞，0.9～1.5克；煎服：9～15克。茎枝及皮含桂皮醛、鞣质等。❷见萧步丹《岭南采药录》。为阴香皮之别名，详该条。

山羊血 出《本草汇言》。又名青羊血。为牛科动物青羊 Naemorhedus goral Hardwicke 的血。产四川、广西、云南、黑龙江、河北、内蒙古等地。咸，温。入心、肝经。活血，散瘀，止血。治跌打损伤，筋骨疼痛，吐血，咯血，衄血，尿血，便血。研末酒化服：0.9～3克。

山羊角 出清·陈士铎《本草新编》。为牛科动物青羊Naemorhedus goral Hardwicke 的角。咸，寒。入肝经。平肝，镇痉，清热，明目。治小儿惊风抽搐，癫痫，肝阳头晕、头痛，目赤肿痛，夜盲。内服：研末，3～6克；镑片煎汤，9～15克。动物试验表明，山羊角的退热、镇静作用较羚羊角略差。

山羊蹄 见《本草纲目》。为酸模之别名，详该条。

山红枣根 见《河北药材》。为地榆之别名，详该条。

山杨柳 见《昆明民间常用草药》。为黑骨头之别名，详该条。

山豆根 出《开宝重定本草》。又名广豆根、苦豆根。为豆科植物柔枝槐 Sophora subprostrata Chun et T.Chen的根。主产广西。苦，寒。入心、肺、大肠经。清热解毒，消肿止痛，利咽喉。①治咽喉肿痛，急性扁桃体炎，牙龈肿痛，肺热咳嗽，湿热黄疸，热结便秘，痢疾，痔疾，肿瘤。煎服：4.5～9克。②治热毒疖肿，疥癣，毒虫螫伤，磨汁涂；口疮，宫颈糜烂，研粉撒。本品含苦参碱、氧化苦参碱、臭豆碱和甲基金雀花碱等生物碱，并含紫檀素和红车轴草根甙（Jrifolirhizin）等黄酮类。苦参碱在动物身上有抗癌活性，并有某些抗心律不齐作用。紫檀素类也有抗癌作用。

山花菜 见萧步丹《岭南采药录》。为鹿角菜之别名，详该条。

山花椒 见《浙江天目山药用植物志》。为竹叶椒之别名，详该条。

山芥菜 见《福建中草药》。为蔊菜之别名，详该条。

山苏子 见《内蒙古中草药》。为糙苏之别名，详该条。

山皂角 见《民间常用草药汇编》。为马棘之别名，详该条。

山鸡头子 见《本草纲目》。为金樱子之别名，详该条。

山鸡条子 见《东北药用植物志》。为鬼箭羽之别名，详该条。

山鸡茶 见《陆川本草》。为九节茶之别名，详该条。

山枝仁 见《四川中药志》。又名榨木仁、土连翘。为海桐科植物崖花海桐 Pittosporum illicioides Mak.或光叶海桐P.glabratum Lindl.的种子。前者分布四川、贵州、湖南、江西、福建、浙江、江苏、安徽、湖北、河南等地；后者分布广东、广西。苦、涩，平。清热，止泻，收敛。治虚热口渴，咽痛，肠炎，痢疾，白带，滑精。煎服：4.5～9克。

山枝根 见《四川中药志》。又名山栀茶。为海桐科植物崖花海桐Pittosporum illicioides Mak. 或光叶海桐 p. glabratum

Lindl.的根或根皮。苦、辛，温。镇静，祛风活络。①治前列腺炎，神经衰弱，失眠多梦，遗精，高血压病，风湿性关节炎，坐骨神经痛。煎服：15～30克；或泡酒饮。②治外伤出血，疮疖。捣烂敷。光叶海桐根预试含生物碱、皂甙。

山松须 见《生草药性备要》。为松叶之别名，详该条。

山苦荬 见《广西中草药》。为苣荬菜之别名，详该条。

山茄子 ❶见《云南中草药》。为三分三之别名。❷见《草药手册》。为杜茎山之别名。各详该条。

山茄花 出《扁鹊心书》。为洋金花之别名，详该条。

山枣子 见南川药物试验种植场《常用中草药手册》。为广枣之别名，详该条。

山枣参 见《云南中草药》。为地榆之别名，详该条。

山矾叶 出《本草纲目》。为山矾科植物山矾Symplocos caudata Wall. exA. DC.的叶。分布长江以南各地。酸、涩、微甘，平。清热，收敛，止血。①治肺结核咯血，便血，久痢。煎服：9～15克。②治急性扁桃体炎，捣烂、冲开水含漱；急性中耳炎，取汁滴耳；烂弦风眼，煎水洗。

山矾根 见《闽东本草》。又名土白芷。为山矾科植物山矾 Symplocos caudata wall. ex A. DC. 的根。苦、辛，平。清热利湿，祛风，凉血。治风火头痛，黄疸，痢疾，关节疼痛，血崩。煎服：15～30克。

山夜兰 见清·赵其光《本草求原》。为黑面神之别名，详该条。

山油甘 见《常用中草药彩色图谱》。为山小橘之别名，详该条。

山油麻 见《广州植物志》。为山芝麻之别名，详该条。

山帚条 见《东北药用植物志》。为一叶萩之别名，详该条。

山练草 见《广西中兽医药用植物》。为四方麻之别名，详该条。

山柰 见《本草纲目》。又名三柰、山辣、沙姜。为姜科植物山柰 Kaempferia galanga L.的根茎。主产广西、广东、云南、台湾等地。辛，温。入脾、胃经。温中，消食，祛风，化湿，止痛。①治胃脘寒痛，消化不良，急性胃肠炎，跌打损伤。煎服：3～6克。②治风虫牙痛，牙宣口臭。研末擦或煎水含漱。本品含挥发油，主要成分有龙脑、桂皮酸乙酯、对甲氧基桂皮酸乙酯、莰烯、对甲氧基苏合香烯等。又含山柰酚及山柰素。山柰酚对动物有消炎及维生素P样作用。根煎剂在试管中对常见皮肤致病性真菌有抑制作用。

山柑橘 见《全国中草药汇编》。为山小橘之别名，详该条。

山胡椒 ❶出《新修本草》。又名野胡椒。为樟科植物牛筋树Lindera glauca(Sieb.et Zucc.)Bl.的果实。分布长江流域及其以南大部分地区；陕西、山西、河南、山东等地也有分布。辛，温。温中散寒，行气破滞。治腹中冷痛，虚寒泄泻。煎服：1.5～4.5克。❷见《湖南药物志》。为木姜子之别名，详该条。❸见《辽宁经济植物志》。为地椒之别名，详该条。

山胡椒叶 见《福建民间草药》。又名见风消、铁箍散、洗手叶。为樟科植物牛筋树Lindera glauca(Sieb.et zucc.)Bl.的叶。苦、辛，温。祛风、解毒，散瘀，止血。①治感冒，筋骨疼痛，扁桃体炎，淋巴结炎。煎服：9～15克。②治痈疮肿毒，外伤出血。捣烂或研末敷。本品含挥发油，内有桉叶素、石竹烯、柠檬烯等。

山胡椒根 见《福建民间草药》。又名牛筋条根。为樟科植物牛筋树Lindera glauca (Sieb.et Zucc.) Bl.的根。辛，温。祛风湿，散瘀血。治风湿痹痛，脘腹冷痛，跌打损伤。煎服：15～30克；或浸酒服。

山茱萸 出《神农本草经》。又名山萸肉、肉枣、药枣。为山茱萸科植物山茱萸Cornus officinalis Sieb.et zucc.的果肉。主产浙江，河南、安徽、陕西、山西、山东、四川等地亦产。酸，微温。入肝、肾经。补益肝肾，涩精敛汗。治头晕，目眩，耳鸣，腰膝酸软，遗精滑泄，遗尿，老人尿频失禁，虚汗不止，月经过多，漏下不止。煎服：4.5～9克。救治虚脱时用量可稍加大。果实含莫罗忍冬甙（Morroniside）、7-甲基莫罗忍冬甙、当药甙、番木鳖甙、山茱萸甙。还含熊果酸、没食子酸、苹果酸、酒石酸、鞣质以及皂甙。果实煎剂在体外能抑制金黄色葡萄球菌、志贺氏痢疾杆菌。山萸肉体外能杀死小鼠腹水癌细胞。山茱萸甙毒性很低，有较弱的拟副交感神经的作用。流浸膏对麻醉狗有利尿、降血压作用。

山茶花 出《本草纲目》。又名红茶花。为山茶科植物山茶Camellia japonica L.的花。产江苏、浙江、云南、四川等地。甘、微辛，凉。入肝、肺经。凉血，止血，散瘀。①治吐血，衄血，血崩，肠风下血，赤痢。煎服：3～9克。②治烫伤，研末麻油调涂。本品含可可豆碱，β-香树脂醇、蛇麻脂醇，儿茶精、表儿茶精，豆甾烯醇，黄烷醇，花白甙、花色甙等。

山药 出唐·侯宁极《药谱》。又名山薯、怀山药。为薯蓣科植物薯蓣Dioscorea opposita Thunb.的根茎。主产河南、山西、河北、陕西。甘，平。入脾、肺、肾经。健脾胃，益肺肾，补虚羸。治脾虚泄泻，肺虚咳嗽，消渴，小便频数，遗精，虚劳羸瘦，食少倦怠，慢性肾炎，小儿遗尿，妇女带下。内服：煎汤，9～18克。补脾焙用，益阴生用。本品含多巴胺（Dopamine）、山药碱（Batatasine）、止权素（Abscisin Ⅱ）、胆碱、鞣质和多种氨基酸等。

山药藤 见《上海常用中草药》。为薯蓣科植物薯蓣Dioscorea opposita Thunb.的茎藤。全国大部分地区均有栽培或野生。甘，平。治皮肤湿疹，丹毒。煎水熏洗或捣敷。本品含薯蓣甙元、β-谷甾醇、豆甾醇、胆甾醇等。

山荔枝果 见《贵州草药》。为桑科植物小柘树 Cudrania cochinchinensis（Lour.）Kudo et Masam.或柘树C. tricuspidata（Carr.）Bur.的果实。分布华东、中南、西南等地。微甘，温。调气，消食，利水。治疝气，食积腹胀，小便不利。煎服：15～30克。

山虾子 见《江苏省植物药材志》。为拳参之别名，详该条。

山蚂蝗 见《植物学大辞典》。为青酒缸之别名，详该条。

山香草 见《全国中草药汇编》。为冬凌草之别名，详该条。

山香菜 见南京药学院《中草药学》。为藁本之别名，详该条。

山姜 ❶出《本草经集注》。又名箭杆风、九姜连、九龙盘。为姜科植物山姜Alpinia japonica Miq.的根茎。分布西南、华南及浙江、福建、台湾等地。辛、微苦，温。温中行气，祛风止痛。治脘腹冷痛，泄泻，食滞腹胀，风湿痹痛，四肢麻木，跌损瘀滞，月经不调。内服：煎汤，3～9克；或浸酒饮。❷见《广西中草药》。为大良姜之别名，详该条。

山姜子 见《湖南药物志》。为木姜子之别名，详该条。

山姜黄 见《广州植物志》。为莲莪朮之别名，详该条。

山扁豆 出《救荒本草》。又名黄瓜香、假牛柑、地柏草。为豆科植物含羞草决明Cassia mimosoides L.的全株。分布台湾、广东、广西、云南。甘，平。清热解毒，利湿通便。①治湿热黄疸，肾炎水肿，习惯性便秘。煎服：9～15克。②治疔疮痈肿，蛇咬伤。捣烂或研末调敷。孕妇慎用。种子名山

扁豆子，有利尿及健胃疏肠功能。果实含大黄素等蒽醌类衍生物。

山扁柏 见《广西药用植物名录》。为石上柏之别名，详该条。

山屎瓜 见《东北常用中草药手册》。为赤爬之别名，详该条。

山桃花 见《广西植物名录》。为莲生桂子花之别名，详该条。

山莲藕 见《陆川本草》。又名牛大力、地藕、大力薯、倒吊金钟。为豆科植物美丽崖豆藤Millettia speciosa Champ.的根。分布广东、广西。甘，平。润肺止咳，补肾，舒筋活络。治肺虚咳嗽，遗精，白带，腰肌劳损，风湿痹痛。煎服：9～15克。本品含生物碱。煎剂或乙醇提取物给小鼠灌服有止咳作用。

山莓 出《尔雅》。为悬钩子之别名，详该条。

山莨菪 见《全国中草药汇编》。为藏茄之别名，详该条。

山脂麻 见《中国药用植物志》。为亚麻之别名，详该条。

山高粱 见《东北常用中草药手册》。为珍珠梅之别名，详该条。

山海椒 见《贵州草药》。为龙葵之别名，详该条。

山海螺 出《本草纲目拾遗》。又名奶参、四叶参、乳薯。为桔梗科植物羊乳Codonopsis lanceolata Benth. et Hook. 的根。产黑龙江、广西、浙江、福建等地。甘，平。养阴润肺，补虚通乳，排脓解毒。①治阴虚咳嗽，病后体弱，乳汁不足，脾虚带下。②治肺痈，肠痈。煎服：15～30克（鲜品30～60克）。③治乳痈，痈疮肿毒。煎服并捣敷。本品含芹菜素、木犀草素及二者的糖甙等黄酮类物质。还含皂甙。小鼠游泳试验，有抗疲劳作用。煎剂能增加家兔的红细胞及血红蛋白，但能降低白细胞总数。煎剂灌服能升高家兔血糖水平。对小鼠有一定的止咳作用。

山梗菜 出《救荒本草》。又名大种半边莲、水白菜。为桔梗科植物山梗菜 Lobelia sessilifolia Lamb.的根或全草。分布东北及山东、福建、台湾、云南、江西等地。辛，平，有小毒。宣肺化痰，利尿消肿，清热解毒。①治伤风发热，支气管炎，肝硬化腹水，水肿。煎服：6～9克。②捣敷治痈疖疔疮，蛇咬伤，蜂螫。全草含山梗菜碱等多种生物碱。另含山梗菜聚糖（Sessilifolan）、熊果酸等。山梗菜碱为中枢兴奋药。应用于呼吸衰竭如新生儿窒息、麻醉药中毒等。其作用短暂，无蓄积性，可重复注射。口服可引起呕吐，小量有祛痰作用。

山梅根 见《南方主要有毒植物》。为岗梅根之别名，详该条。

山梔子 出《药性论》。即梔子，详梔子条。

山梔茶 见《中国药典·一部》1977年版。为山枝根之别名，详该条。

山萝卜 ❶见《浙江中药手册》。为明党参之别名。❷见《分类草药性》。为商陆之别名。❸见《广西本草选编》。为续断之别名。各详该条。

山萸肉 见《小儿药证直诀》。为山茱萸之处方名，详该条。

山黄豆 见《昆明民间常用草药》。为大红袍之别名，详该条。

山黄连 见《辽宁常用中草药手册》。为白屈菜之别名，详该条。

山野烟 见《云南中草药》。为三分三之别名，详该条。

山崩子 见《东北常用中草药手册》。为满山红之别名，详该条。

山猪药 见《中国经济植物志》。为走马胎之别名，详该条。

山猪薯 见《广西本草选编》。为薯莨之别名，详该条。

山蛋 见《山西中药志》。为光慈菇之别

名，详该条。

山绿豆 见《中国主要植物图说·豆科》。为望江南子之别名，详该条。

山棉皮 见《广西中药志》。为了哥王之别名，详该条。

山葡萄 ❶见《植物名汇》。即蛇葡萄。❷见《新修本草》。为蘡薁之别名。各详该条。

山葡萄根 见《江西草药》。即蛇葡萄根，详该条。

山蒌 见《广西本草》。为山蒟之别名，详该条。

山雁皮 见《广州常见经济植物》。为了哥王之别名，详该条。

山紫草 见《江苏省植物药材志》。即紫草，详该条。

山楂 出《本草衍义补遗》。又名棠棣子、红果子。为蔷薇科植物山里红 Crataegus pinnatifida Bge. var. ma. jor N. E. Brown、山楂 Crataegus pinnatifida Bge. 或野山楂C. cuneata Sieb. et Zucc. 的果实。主产山东、河北、河南、辽宁、江苏等地。酸、甘，微温。入脾、胃、肝经。消食化积，散瘀。①治肉积食滞，腹痛泄泻，细菌性痢疾，痰饮痞满吞酸，黄疸，疝气偏坠胀痛。②治痛经，产后恶露不尽，瘀滞痛，小儿疳积。③现代用于治疗高血脂症。煎服：6～12克。炒黄或炒焦用。山里红果实中含山楂酸、酒石酸、柠檬酸、黄酮类、内酯及甙类。山楂果实中含柠檬酸、苹果酸、维生素C、鞣质、生物槲皮素（Bioquercetin）等。野山楂果实中含山楂酸、柠檬酸、苹果酸、鞣质、皂甙及维生素C等。山楂果实有增加胃液消化酶，帮助消化的作用，及轻度降血脂作用；乙醇提取物给兔静脉注射，可使血压缓慢、持久地下降；煎剂在体外对痢疾杆菌、大肠杆菌及绿脓杆菌有抑制作用。

山楂根 出《本草纲目》。为蔷薇科植物山里红 Crataegus pinnatifida Bge. var. major N.E.Brown、山楂C. pinnatifida Bge.或野山楂C.cuneata Sieb. et Zucc. 的根。山里红多栽培于华北各地；山楂分布东北、华北、江苏等地；野山楂分布长江流域及河南、广东、广西、云南、福建等地。甘，平。消积，祛风，活血。治食积，痢疾，风湿关节痛。煎服：9～15克。山楂叶、山楂花：泡茶服，可治高血压病；山楂茎叶：煮汁，洗漆疮；木材名山楂木，又名赤爪木，煎服治水痢，头风，身痒。

山榆仁 出《本草拾遗》。为芜荑之别名，详该条。

山蓊 出《尔雅》。为白朮之别名，详该条。

山蒟 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名石蒟、爬岩香、山蒌、甘四症。为胡椒科植物山蒟piper hancei Maxim. 的茎叶。分布广东、广西、福建、湖南、江西、贵州、云南、浙江。辛，温。祛风湿，强腰膝，止痛，止咳。治风湿痹痛，四肢麻痹，腰膝无力，痛经，感冒风寒，咳嗽气喘。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。本品预试含生物碱、黄酮甙、酚类。

山蒲扇 见《东北药用植物志》。为射干之别名，详该条。

山蜂子 见《贵州草药》。为地蜂子之别名，详该条。

山稔子 出《生草药性备要》。又名豆稔干。为桃金娘科植物桃金娘 Rhodomyrtus tomentosa(Ait.)Hassk.的果实。产广东、广西、福建等地。甘、涩，平。养血止血，涩肠固精。治贫血，神经衰弱，耳鸣，吐血，衄血，便血，痢疾，脱肛，遗精，崩漏，带下。煎服：15～30克。本品预试含黄酮甙、酚类、氨基酸、有机酸、糖类。

山稔叶 出《生草药性备要》。为桃金娘科植物桃金娘 Rhodomyrtus tomentosa (Ait.)Hassk.的叶。分布福建、台湾、广东、

广西、云南、贵州、湖南。甘、涩，平。止泻，止血。①治急性胃肠炎，痢疾，消化不良，头痛。煎服：15～30克。②治外伤出血。捣烂敷。本品含蛇麻酯醇、β-香树脂醇、白桦脂酸和β-香树脂酮醇等。又含鞣质。

山稔根 出《生草药性备要》。又名岗稔根。为桃金娘科植物桃金娘 Rhodomyrtus tomentosa(Ait.)Hassk.的根。甘、涩，平。养血，通络，止泻，止血。①治风湿关节痛，腰肌劳损，胃痛，疝气，慢性肝炎，急性胃肠炎，功能性子宫出血。煎服：15～30克。②治烫伤。烧存性研末调敷。本品预试含酚类、鞣质。

山慈姑 出《本草拾遗》。又名朱姑、毛姑、毛慈姑。为兰科植物独蒜兰 Pleione bulbocodioides(Franch.)Rolfe 或杜鹃兰 Cremastra variabilis(Bl.)Nakai 等的假球茎。主产四川、贵州等地。甘、微辛，寒，有小毒。入肝、脾经。消肿散结，化痰解毒。治痈肿，疔疮，瘰疬结核、喉痹肿痛，毒蛇咬伤。近用治食道癌、淋巴肿瘤及白血病。煎服：3～6克。外用：捣敷或醋磨涂。杜鹃兰根茎含粘液质及葡萄糖配甘露聚糖。

山慈姑叶 出《经史证类备急本草》。为兰科植物独蒜兰pleione bulbocodioides(Franch.)Rolfe或杜鹃兰Cremastra variabilis(Bl.) Nakai 等的叶。前者分布长江流域及其以南各地；后者分布黄河流域至西南、华南等地。治乳痈，便毒，疮肿。捣敷。山慈姑花：研粗末煎服治血淋涩痛。

山辣 见《本草纲目》，即山柰，详该条。

山蓼 见《全国中草药汇编》。为金线草之别名，详该条。

山蜡梅叶 见《中国药典·一部》1977年版。又名香风茶、岩马桑、毛山茶。为蜡梅科植物山蜡梅 Chimonanthus nitens Oliv.的叶。分布江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、贵州等地。辛，凉。解表祛风，清热解毒。①防治感冒、流行性感冒。②治慢性气管炎。泡茶饮：9～18克。忌久煎。本品含挥发油、生物碱和黄酮类成分。水浸剂在体外有抗病毒作用。

山韶子 见《桂海虞衡志》。即韶子，详该条。

山膏药 见《浙江民间常用草药》。为腐婢之别名，详该条。

山漆 见《本草纲目》。即三七，详该条。

山精 出《神药经》。为白朮之别名，详该条。

山熊胆 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为胆木之别名，详该条。

山橙 出清·赵其光《本草求原》。又名屈头鸡、猢狲果、马骝藤果。为夹竹桃科植物山橙 Melodinus suaveolens Champ. ex Benth.的果实。分布广东、广西等地。苦，平，有小毒。行气止痛，消积化痰。治胃气痛，消化不良，胸膈饱胀，疝痛，腹痛，小儿疳积，淋巴结结核。煎服：1～2个。

山蝴蝶 见《浙江民间常用草药》。为肺形草之别名，详该条。

山鹿豆 见《本草纲目》。为杜鹃花之别名，详该条。

山薄荷 ❶见《广西中草药》。为兰香草之别名。❷见《吉林中草药》。为香青兰之别名。各详该条。

山薯 出《名医别录》。为山药之别名，详该条。

山橘 出《北户录》。为金橘之别名，详该条。

山蟾蜍 见《中医方药学》。为飞天蟾蜍之别名，详该条。

山藿香 见《峨眉山药用植物》。又名血见愁、野薄荷、皱面草。为唇形科植物山藿香 Teucrium viscidum Bl.的全草。分布江苏、浙江、福建、台湾、江西、湖南、四

川、广东、广西、云南。苦、辛，凉。凉血止血、散瘀消肿，解毒。①治吐血，衄血，肠风便血，产后瘀血腹痛。煎汤：15～30克；或研末。②治跌打瘀肿，外伤出血，痈肿疔疮，蛇咬伤，风湿关节痛。捣敷，或煎水洗。本品预试含酚类、氨基酸、有机酸、糖。

【丿】

千日红 出《植物名实图考》。又名百日红、千年红、沸水菊、长生花、蜻蜓红。为苋科植物千日红 Gomphrena globosa L. 的花序或全草。我国南北各地均有栽培。甘，平。止咳平喘，清肝明目。①治支气管炎，支气管哮喘，百日咳，肺结核咯血，头风目痛，视物昏糊，瘰疬初起，痢疾。煎服：9～15克。②捣敷治疮疡肿痛。全草含千日红素-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ，少量苋色素，异苋色素。又预试含皂甙、黄酮、氨基酸、挥发油。皂甙和黄酮部分，对动物有祛痰作用。

千斤拔 出《植物名实图考》。又名金鸡落地、老鼠尾、一条根、吊马桩、大力黄。为豆科植物蔓性千斤拔 Moghania philippinensis (Merr.et Rolfe) Li的根。分布贵州、湖南、湖北、广东、广西、福建、台湾等地。甘、淡，平。祛风湿，强腰膝，消肿解毒。①治风湿骨痛，腰腿痛，腰肌劳损，偏瘫，跌打损伤，阳萎，白带，慢性肾炎。煎服：15～30克。②治喉蛾肿痛，研末吹喉；肿毒，蛇咬，酒、水磨涂。本品含香豆素、酚类、氨基酸。

千斤草 见《上海常用中草药》。为牛筋草之别名，详该条。

千只眼 见《文山中草药》。为九里香之别名，详该条。

千年见 见《药材资料汇编》。即千年健，详该条。

千年艾 出《庐山志》。为鹿茸草之别名，详该条。

千年老鼠屎 见《本草纲目拾遗》。为天葵子之别名，详该条。

千年红 见《江苏省植物药材志》。为千日红之别名，详该条。

千年健 出《本草纲目拾遗》。又名千年见、一包针。为天南星科植物千年健 Homalomena occulta(Lour.)Schott 的根茎。主产广西。辛、微苦，温。入肝、肾经。祛风湿，强筋骨，活血止痛。①治风湿痹痛，四肢麻木，筋脉拘挛，跌打瘀肿，胃寒痛。煎服：4.5～9克。②治痈疽疮肿。捣敷或研末调敷。本品含挥发油等。

千年润 见《本草纲目》。为石斛之别名，详该条。

千年矮 见《广西中药志》。为矮陀陀之别名，详该条。

千里及 出《本草拾遗》。为千里光之别名，详该条。

千里光 出《本草图经》。又名千里及、眼明草、九里明、一扫光。为菊科植物千里光Senecio Scandens Buch.-Ham. 的全草。分布陕西及华东、中南、西南地区。苦，寒。清热解毒，杀虫，明目。①治上呼吸道感染，扁桃体炎，咽喉炎，肺炎，细菌性痢疾，肠炎，阑尾炎，黄疸型肝炎，胆囊炎，钩端螺旋体病。煎服：15～30克。②治眼结膜炎，角膜炎，煎服并制成眼药水滴眼；疮疖肿毒，急性淋巴管炎，丹毒，煎服并捣敷；湿疹，皮炎，痔疮，水火烫伤，煎水洗。本品含氢醌、对羟基苯甲酸、香荚兰酸、水杨酸、焦粘酸、胆碱、鞣质等。氢醌和对羟基苯甲酸对流感杆菌、肺炎球菌、甲链球菌、卡他球菌、变形杆菌、金黄色葡萄球菌等均有抑菌作用。煎剂即有广谱抗菌作用，调节酸碱度至中性或除去鞣质，对抗菌作用无影响。

千里光 见《本草纲目》。为石决明之别名，详该条。

千里香 出《生草药性备要》。为九里香

之别名，详该条。

千针万线草 出《滇南本草》。又名麦参、筋骨草。为石竹科植物云南繁缕Stellaria yunnanensis Franch. 的根。分布云南。甘，微温。健脾，养肝，益肾。治体虚贫血，头晕，耳鸣，潮热，虚汗，腰痛脚酸，肾虚遗精，月经不调，带下，小儿疳积。煎服：15～30克。

千张纸 见《滇南本草》。为木蝴蝶之别名，详该条。

千张树 见《天津医学通讯》（6）1，1971。为喜树之别名，详该条。

千层纸 见《广西中草药》。为木蝴蝶之别名，详该条。

千层塔 出《植物名实图考》。又名蛇足草、虱子草、矮松。为石松科植物蛇足石松Lycopodium serratum Thunb. 的全草。分布东北、长江流域及福建、广东、广西、云南、贵州。辛、甘，平，有小毒。散瘀止痛，解毒，生肌。①治跌打损伤，瘀肿疼痛，劳伤吐血，带下。煎服：3～9克。②治毒蛇咬伤，汤火伤，捣烂敷；疮疡溃烂久不生肌，全草煎膏涂。内服过量，可致中毒，出现头昏、恶心、呕吐等症。孕妇忌服。本品主含山芝烯二醇（Serratenediol）及其单乙酸酯。还含生物碱和黄酮类。生物碱部分，对动物有横纹肌松弛作用。

千层楼 见《四川中药志》。为贯叶连翘之别名，详该条。

千层矮 见《湖南药物志》。为鹿茸草之别名，详该条。

千金子 出《开宝重定本草》。又名打鼓子、小巴豆。为大戟科植物续随子Euphorbia lathyris L.的种子。主产河北、河南、浙江。辛，温，有毒。入胃、大肠、膀胱经。逐水消肿，破血散结。①治水肿胀满，二便不利，痰饮，宿滞，血瘀经闭，癥瘕积聚。内服入丸、散：0.9～1.5克，去壳，纸包榨去油，取霜用。②捣敷治毒蛇咬伤，疥癣，疣赘。本品峻烈有毒，不可多用、久服；体弱及孕妇忌服。本品含脂肪油，油中分离出续随子甾酯（Euphobiasteroid）、巨大戟萜醇20-棕榈酸酯（20-Hexadecanoylingenol）等含萜的酯类化合物；又含马栗树皮素、瑞香素等羟基香豆素类。

千金藤 出《本草拾遗》。又名金线钓乌龟、天膏药、金盆寒药。为防己科植物千金藤Stephania japonica（Thunb.）Miers的块根或茎藤。分布华东、华中、西南、华南地区。苦，寒。清热解毒，利湿消肿。①治咽喉肿痛，痧气腹痛，胃痛，湿热淋浊，小便不利，水肿脚气，外阴湿疹，风湿痹痛。煎服：9～15克。②治毒蛇咬伤，疮疖痈肿。捣敷。③治牙痛。磨汁含咽或切片放患处咬住。全株含轮环藤酚碱（Cyclanoline）、和千金藤碱（Steponine）、千金藤碱、表千金藤碱、氧化千金藤碱、迈它千金藤碱（Metaphanine）、毛叶含笑碱（Lanuginosine）等多种生物碱。轮环藤酚碱有横纹肌松弛作用，并能被新斯的明所拮抗。它与和千金藤碱均有神经节阻断作用，故可使血压降低。

千屈菜 出《救荒本草》。又名对叶莲、败毒草。为千屈菜科植物千屈菜Lythrum Salicaria L.的全草。我国大部分地区有分布。苦，凉。清热解毒，凉血止血。①治泄泻，痢疾，便血，血崩。煎服：6～12克。②治外伤出血，研末敷。本品含千屈菜甙、牡荆素、荭草素、异荭草素、并没食子酸、绿原酸、胆碱、鞣质等。煎剂在体外能抑制葡萄球菌、伤寒杆菌等，痢疾杆菌尤敏感。对离体肠管示解痉作用。根煎剂用于慢性痢疾作为收敛或缓和剂。千屈菜甙能阻止人因服用根皮甙而引起之糖尿，但它本身不产生低血糖。

千重塔 见《植物名实图考》。为鹿茸草之别名，详该条。

千脚虫 见《分类草药性》。为马陆之别

名，详该条。

千锤打 ❶见《广西药用植物名录》。为石吊兰之别名。❷见《四川中药志》。为羊齿天冬之别名。❸见《湖南药物志》。为翻白草之别名。各详该条。

川山七 见《云南中草药》。为紫金龙之别名，详该条。

川山甲 出《三因极一病证方论》。即穿山甲，详该条。

川木香 见《中药志》。为菊科植物川木香 Vladimiria Souliei (Franch.) Ling 或灰毛川木香 V. Souliei (Franch.) Ling Var. cinerea Ling的根。主产四川。辛、苦，温。入肝、脾、胃、大肠经。行气止痛，和胃止泻。治肝胃气痛，中寒气滞，脘腹胀痛，呕吐，泄泻，痢疾里急后重。内服：煎汤，3～9克，宜后下；研末，0.6～0.9克。本品含挥发油、川木香内酯(Mokko lactone)。

川木通 见《中国药物标本图影》。又名白木通、淮木通、山木通。为毛茛科植物小木通Clematis armandi Franch.或绣球藤C.montana Buch.-Ham.的茎藤。主产四川、贵州等地。淡、微苦，微寒。入心、小肠经。清热利水，活血，通乳。治水肿，小便不利，湿热癃闭，热淋，妇女经闭，乳汁不通。煎服：3～9克。孕妇忌服。

川五味子 见《四川中药志》。即南五味子，详该条。

川贝 见《本草纲目拾遗》。为川贝母之简称，详该条。

川贝母 出《滇南本草》。又名川贝。为百合科植物卷叶贝母 Fritillaria cirrhosa D.Don、甘肃贝母F. przewalskii Maxim.或棱砂贝母 F. delavayi Franch.等的鳞茎。主产四川、云南、甘肃、青海。苦、甘，凉。入肺经。润肺止咳，化痰散结。①治肺热咳嗽，肺虚久咳，咯血，肺痿，肺痈。②治痰火结核，瘰疬，瘰疬，疮痈肿毒，乳痈喉痹。内服：煎汤，3～9克；研末吞服，0.9～1.5克。反川乌头、草乌头、附子。从不同地区、不同品种的川贝母鳞茎中分离出多种生物碱：川贝母碱(Fritimine)、西贝母碱(Sipeimine)、炉贝碱(Fritiminine)、白炉贝碱(Beilupeimine)、青贝碱(Chinpeimine)或松贝碱(Sonpeimine)等。西贝母碱对麻醉狗有降压作用，主要由于外周血管扩张。对离体豚鼠回肠、兔十二指肠、大鼠子宫及整体狗小肠均有明显松弛作用，解痉作用类似罂粟碱。川贝母碱对麻醉猫有持久的降压作用，能增强离体豚鼠子宫收缩，抑制离体兔肠。

川牛膝 出《本草纲目》。为苋科植物川牛膝Cyathula officinalis Kuan的根。主产四川。甘、微苦，平。入肝、肾经。祛风利湿，破瘀通经。治风湿腰膝疼痛，脚痿筋挛，吐血，衄血，血淋，尿血，血瘀经闭，产后瘀滞腹痛。煎服：4.5～9克。孕妇忌服。本品含杯苋甾酮、蜕皮甾酮等多种甾类化合物，并显生物碱反应。流浸膏对未孕猫子宫有松弛作用，但对已孕猫子宫可发生强有力的收缩作用。

川乌 出《金匮要略》。即川乌头，详该条。

川乌头 出唐·侯宁极《药谱》。又名川乌。为毛茛科植物乌头 Aconitum carmichaeli Debx.(栽培品)的块根(主根)。主产四川、陕西。辛，热，有大毒。入心、脾经。祛风湿，散寒，止痛。①治风寒湿痹，半身不遂，历节风痛拘挛麻木，寒性头痛，寒疝腹痛。煎服：制川乌，1.5～9克，宜久煎(一小时以上)。②外治阴疽肿毒，生川乌研末调敷。反贝母、白蔹、半夏、栝楼、白及。本品的毒性反应同草乌，参见草乌条。生品内服宜慎。孕妇忌服。乌头子根的小者名侧子，又名即子，功同川乌，煎服并治脚气。乌头子根的琐细者名漏篮子，炒研末为丸服治恶痢；研末井水调涂治恶疮臭

溃。本品含生物碱，主为次乌头碱，其次为乌头碱、新乌头碱、川乌头碱甲及乙等。乌头碱具局麻（先刺激，后麻醉）镇痛及抗炎作用，但系剧毒药，安全范围小，可使心率减慢、心律紊乱，甚至室颤。据报告，人口服3～5毫克即可中毒致死，致死原因是呼吸中枢及心肌麻痹。乌头碱极易水解，水解后毒性大大减少。川乌头毒性极强，在炮制或加热煎煮后，总碱含量减少，毒性亦大大降低，但因炮制、煎煮时间的不同，其毒性差别很大。

川石斛 见《临证指南医案》。为石斛之处方名，详该条。

川朴 见《中国药学大辞典》。为厚朴之处方名，详该条。

川朴花 见《中药材手册》。为厚朴花之处方名，详该条。

川芎 出《汤液本草》。又名芎藭、抚芎。为伞形科植物川芎Ligusticum Chuanxiong Hort.的根茎。主产四川。辛，温。入肝、胆、心包经。活血行气，散风止痛。①治月经不调，产后瘀滞腹痛，痛经，闭经，胸胁胀痛，冠心病心绞痛。②治感冒风寒，偏正头痛，风寒痹痛，痈疽疮疡，跌打损伤。煎服：3～9克。本品含挥发油、生物碱(已分离出四甲吡嗪碱、黑麦草碱等)、丁基苯酞、瑟丹酮酸内酯（Sedaronic acid lactone）、阿魏酸、苯乙酸甲酯等。煎剂及挥发油对动物中枢神经有镇静作用，水及乙醇浸液对麻醉动物有降压作用。四甲吡嗪碱亦能降低血压增加冠脉血流量、降低冠脉阻力、抑制血栓形成及血小板的凝聚，对已形成的凝聚块有解聚作用。生物碱有抗急性心肌缺血、缺氧作用，并能提高对缺氧的耐受力。浸膏对兔子宫有收缩作用，对小肠则有抑制作用。阿魏酸与川芎内酯对平滑肌有解痉作用。

川芎苗 见《履巉岩本草》。为藨芜之别名，详该条。

川军 见《中国药学大辞典》。为大黄之处方名，详该条。

川连 见《本草蒙筌》。为黄连之处方名，详该条。

川参 见《贵州民间方药集》。为苦参之别名，详该条。

川独活 见《活幼心书》。为独活之处方名，详该条。

川黄柏 见《得配本草》。为黄柏药材之一种，详该条。

川断 见《临证指南医案》。为续断之处方名，详该条。

川椒 见《太平圣惠方》。为花椒之处方名，详该条。

川椒目 见《赤水玄珠》。为椒目之处方名，详该条。

川楝子 出《本草正》。又名楝实、金铃子。为楝科植物川楝Melia toosendan Sieb. et Zucc.的果实。主产四川、湖北、贵州、河南等地。苦，寒，有小毒。入肝、胃、小肠经。理气止痛，杀虫。①治肝胃气痛，胁痛，疝痛，痛经，虫积腹痛，乳腺炎。煎服：4.5～9克。①治头癣。焙黄研末，熟猪油或凡士林调成50%油膏涂之。本品含川楝素，有驱蛔作用。参阅苦楝皮条。

川槿子 见《药材学》。为木槿子之别名，详该条。

川槿皮 出《养生经验合集》。即木槿皮，详该条。

及己 出《本草经集注》。又名獐耳细辛、四叶细辛、牛细辛。为金粟兰科植物及己Chloranthus serratus(Thunb.)Roem. et Schult.的根茎及根。分布江苏、安徽、福建、湖南、广东、广西等地。辛、苦，平，有毒。活血散瘀，祛风止痛，杀虫止痒。①治跌打损伤，风湿痹痛，煎服：0.3～0.9克。②治头疮白秃，研末调敷；疥疮，皮肤瘙痒，煎水洗；毒蛇咬伤，捣敷。孕妇禁用。本品含二氢焦蓬莪朮烯酮（Dihydropyro-

curzerenone)、焦蓬莪术烯酮等。煎剂有一定抗菌作用。内服过量可中毒，甚至死亡。小鼠服后可致角弓反张，四肢抽搐，各脏器充血。妊娠小鼠灌服少量可致死，死前阴道流血，阴道和子宫腔充满凝血块。

及泻 出《名医别录》即泽泻，详该条。

【丶】

广木香 见《普济方》。为木香之处方名，详该条。

广朮 见《本草求真》。为蓬莪朮之别名，详该条。

广石莲子 见《四川中药志》。为苦石莲之别名，详该条。

广东土牛膝 见广州军区空军卫生部《常用中草药手册》。又名多须公、六月雪。为菊科植物华泽兰 Eupatorium chinense L.的根。分布江西、福建、广西、广东、云南等地。苦，凉。清热，利咽，解毒，行瘀。①治白喉，急性咽炎，喉炎，扁桃体炎，感冒高热，麻疹热毒炽盛，肺炎，血淋。煎服：10～15(鲜品30～60克)。②治痈疮热毒，外伤肿痛，捣敷；毒蛇咬伤，捣汁服，药渣敷伤口周围。孕妇忌服。本品预试含黄酮甙、酚类、氨基酸、有机酸。

广东金钱草 见《岭南草药志》。又名铜钱草、落地金钱、广金钱草。为豆科植物金钱草Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr.的全草。分布广东、广西、湖南、福建、云南、四川等地。甘、淡，凉。清热去湿，利尿，排石。①治泌尿系感染，尿路结石，胆石症，急性黄疸型肝炎，肝硬化腹水，肾炎水肿，口腔炎，喉头炎，小儿疳积。煎服：15～30克（鲜品30～60克）。②治乳腺炎。捣烂外敷。本品预试含生物碱、黄酮甙、酚类、鞣质。提取液对麻醉狗能增加冠脉流量，减少心肌耗氧量，并能增加脑、肾及下肢的血流量与尿量。对麻醉狗尚有利胆作用。

广地丁 见《广东中草药》。为龙胆地丁之别名，详该条。

广地龙 见《药材资料汇编》。为地龙之处方名，详该条。

广防己 见《药材学》。又名百解头。为马兜铃科植物广防己 Aristolochia fangchi Y.C.Wu ex Chow et Hwang 的根。主产广东、广西等地。苦、辛，寒。祛风止痛，清热利水。①治风湿热痹，关节红肿热痛，肾炎水肿，脚气，膀胱炎，小便不利。煎服：6～9克。②治毒蛇咬伤，鲜根捣敷并内服。本品含木兰花碱，马兜铃内酰胺（Aristololactam），马兜铃酸，β-谷甾醇等。

广豆根 见《中药材手册》。为山豆根之药材名，详该条。

广陈皮 见《药性切用》。为柑皮之药材名，详该条。

广金钱草 见《中药通报》5（1）:26，1959，即广东金钱草，详该条。

广狗肾 见《药材资料汇编》。为黄狗肾之产于广东者，详该条。

广扁线 见《四川中药志》。为黄水芋草之别名，详该条。

广枣 见《中国药典·一部》1977年版。又名人面子、山枣子、五眼果。为漆树科植物南酸枣 Choerospondias axillaris (Roxb.)Burtt et Hill的成熟果实。分布湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南、福建、浙江。甘、酸，平。行气活血，养心安神，消食滞。治气滞血瘀，心区作痛，心跳气短，心神不安，食滞腹满。煎服：1.5～2.5克。

广柑 见《广州植物志》。为甜橙之别名，详该条。

广胶 见《本经逢原》。为黄明胶之别名，详该条。

广橘 见《中国树木分类学》。为甜橙之别名，详该条。

【7】

女儿茶 见《陕西中草药》。为贯叶连翘之别名，详该条。

女贞子 出《本草正》。又名女贞实、冬青子、爆格蚤。为木犀科植物女贞Ligustrum lucidum Ait.的果实。主产浙江、江苏、湖南、福建、四川等地。甘、苦，平。入肝、肾经。补肾滋阴，养肝明目。治阴虚内热，腰膝酸软，眩晕，目昏，耳鸣，消渴，遗精，须发早白，尿血，老人大便虚秘，慢性肝炎。煎服：9～15克。脾胃虚寒及阳虚者忌服。本品含齐墩果酸、甘露醇、大量葡萄糖、女贞子甙（Nuzhenide）、齐墩果甙（Oleuropein）、毛柳甙(Salidroside)等。体外对葡萄球菌、痢疾杆菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等有抑菌作用。

女贞叶 出《本草纲目》。又名冬青叶。为木犀科植物女贞 Ligustrum lucidum Ait.的叶。分布长江流域及其以南各地和甘肃南部。微苦，平。清热，消炎，祛风，散血。①治支气管炎，小儿肺炎，痢疾。煎服：30～60克。②治口腔炎，咽喉肿痛，捣汁含漱；烫伤，熬膏涂；风热赤眼，取汁点；痈疖肿毒，捣敷或醋煮贴。女贞树皮：浸酒服补腰膝；研粉茶油调敷治烫伤。叶含齐墩果甙（Oleuropein）、毛柳甙（Salidroside）、木犀臭蚁醛甙（Ligustroside）丁香甙（Syringin）、甘露醇等。甘露醇为其止咳成分。

女贞实 出《神农本草经》。即女贞子，详该条。

女肠 出《广雅》。为女菀之别名，详该条。

女萎 出魏·李当之《药录》。又名山木通、小木通、白木通、钥匙藤、万年藤。为毛茛科植物女萎Clematis apiifolia DC.的茎。分布华东地区及江西、湖南、云南等地。辛，温，有小毒。祛风利湿，消肿散结。①治筋骨疼痛，泄泻，痢疾，肠鸣游气，尿路感染，妊妇浮肿，项下瘿瘤。煎服：9～15克。②久痢脱肛。烧烟熏之。全草含槲皮素、有机酸、甾醇及少量生物碱。

女菀 出《神农本草经》。又名白菀、女肠。为菊科植物女菀 Aster fastigiatus Fisch.的全草或根。分布东北、华北、陕西及长江流域各地。辛，温。温肺化痰，和中，利尿。治咳嗽气喘，肠鸣腹泻，小便不利。煎服：9～15克。全草含槲皮素。根含挥发油、香豆素。

小九股牛 见《云南中草药选》。为狗筋蔓之别名，详该条。

小飞扬草 出《生草药性备要》。又名乳汁草、痢疾草、细叶飞扬草。为大戟科植物千根草Euphorbia thymifolia L.的全草。分布广东、广西、福建、台湾、湖南、云南等地。酸、涩，凉。清热利湿，收敛止痒。①治细菌性痢疾，肠炎，痔血。煎服：15～30克。②治过敏性皮炎，湿疹，皮肤瘙痒。煎水洗。全草含生物碱。根含蒲公英赛醇、甘遂醇。茎叶含大波斯菊甙。

小飞蓬 见《湖南药物志》。又名祁州一枝蒿、破布艾、鱼胆草。为菊科植物小飞蓬Conyza canadensis(L.)Cronq.的全草或叶。我国大部分地区有分布。微苦、辛，凉。清热利湿，解毒消肿。①治肠炎，痢疾，传染性肝炎，胆囊炎。煎服：15～30克。②治风湿痹痛，鲜草捣烂调酒炒热外敷；皮炎，湿疹，煎水洗；牛皮癣，鲜叶揉擦；疮疖肿毒，跌打损伤，捣敷；中耳炎，眼结膜炎，绞汁滴。全草含挥发油，油中含柠檬烯、芳樟醇、母菊酯、去氢母菊酯、乙酸亚油醇酯等。茎叶还含邻苄基苯甲酸。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌有抑制作用。叶的挥发油能防治儿童对牛乳的过敏性泄泻。

小天冬 见《全国中草药汇编》。为羊齿天冬之别名，详该条。

小元宝草 见《浙江民间常用草药》。为小连翘之别名，详该条。

小无心菜 见《植物名实图考》。为铃铃草之别名，详该条。

小木通 见《全国中草药汇编》。为女萎之别名，详该条。

小五爪龙 见《云南中草药》。为五爪金龙之别名，详该条。

小见肿消 见《全国中草药汇编》。为黑及草之别名，详该条。

小火草 见《四川中药志》。为天青地白之别名，详该条。

小巴豆 见南京药学院《中草药学》。为千金子之别名，详该条。

小水杨梅 见《昆明民间常用草药》。为石龙芮之别名，详该条。

小龙胆草 见《云南中草药》。又名星秀花、雪里梅、小青鱼胆、草龙胆。为龙胆科植物红花龙胆Gentiana rhodantha Franch.的根或全草。分布河南、陕西、甘肃、湖北、广西、贵州、四川、云南。苦，寒。清热利湿，凉血解毒。①治虚热劳咳，痰中带血，支气管炎，实热哮喘，淋巴结结核，黄疸型肝炎，痢疾，小儿肺炎，小儿惊风。煎服：9～15克。②捣敷疮疡疔毒；水煎浓缩涂烫伤。

小叶万年青 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为吉祥草之别名，详该条。

小叶山绿豆 见《广西本草选编》。为碎米柴之别名，详该条。

小叶冬青 见《安徽中草药》。为四季青之别名，详该条。

小叶团花 见《广西中草药》。为水杨梅之别名，详该条。

小叶枇杷 见《防治老年慢性气管炎药用植物资料》。又名黄花杜鹃。为杜鹃花科植物烈香杜鹃Rhododendron anthopogonoides Maxim.的叶。分布甘肃、青海、四川北部。苦，寒。祛痰，止咳，平喘。治咳嗽，哮喘，支气管炎。煎服：15～30克。本品含挥发油，油中有效成分为4-苯基丁酮-2。还含槲皮甙、槲皮素、棉花皮素等黄酮类物质。小叶枇杷素（总黄酮甙）有祛痰及消除呼吸道粘膜炎症的作用，4-苯基丁酮-2有止咳、祛痰及平喘作用，并能降低大鼠毛细血管通透性，对豚鼠回肠有解痉作用。棉花皮素在体外对肺炎球菌、卡他球菌及金黄色葡萄球菌有抑菌作用。

小叶青 见《浙江民间常用草药》。为斑叶兰之别名，详该条。

小叶金花草 见《广西中药志》。又名孔雀尾、小野鸡尾、金花草、凤尾连、解毒蕨。为中国蕨科植物野鸡尾Onychium japonicum（Thunb.）Kunze的全草。广布长江以南各地，北到河北西部，河南南部和秦岭南坡。苦，寒。清热解毒，利湿，止血。①治风热感冒，急性胃肠炎，痢疾，黄疸，咳血，吐血，便血，尿血，小便不利。煎服：15～30克。②治疔疮，外伤出血，烧烫伤。研粉调敷。叶及根茎含山柰酚二鼠李糖甙。

小叶金腰带 见《草药手册》。为了哥王之别名，详该条。

小叶莲 见《西藏常用中草药》。为桃儿七之别名，详该条。

小叶蛇总管 见《广西中药志》。又名蛇总管、蛇通管、盘龙七、铁菱角。为唇形科植物香茶菜Isodon amethystoides（Benth.）C.Y.Wu et Hsuan的全草或根。分布广东、广西、湖北及华东各地。苦、辛，凉。清热，散血，消肿，解蛇、虫毒。①治毒蛇咬伤，跌打肿痛，疮疡。煎服或捣敷。②治肝硬化，肝炎，肺脓疡。煎服：10～15克。

小田基黄 见《广西实用中草药新选》。为地耳草之别名，详该条。

小白花蛇 见《中药志》。为金钱白花蛇

之别名，详该条。

小白撑 见《云南中草药》。又名黄蜡一枝蒿、泡叶乌头。为毛茛科植物皱叶乌头 Aconitum bullatifolium Lévl.的块根。产云南。辛、苦，温，有大毒。祛风止痛，活血祛瘀。治风湿关节痛，腰肌劳损，扭挫伤，肋间神经痛。研末，50～100毫克，分二次用酒或温开水送服。5岁以下儿童禁服。本品含乌头碱。

小对叶草 ❶见《四川中药志》。为小连翘之别名。❷见《贵州草药》。为贯叶连翘之别名。各详该条。

小矛香艾 见《青海常用中草药手册》。为火绒草之别名，详该条。

小扣子兰 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为麦斛之别名，详该条。

小托盘 见《中药材手册》。为覆盆子之别名，详该条。

小百部 见《中药大辞典》。为羊齿天冬之别名，详该条。

小回回蒜 见《植物学大辞典》。为自扣草之别名，详该条。

小伤力草 见《安徽中草药》。为仙桃草之别名，详该条。

小血藤 见《云南中草药选》。即血藤，详该条。

小米 见《本草蒙筌》。为秫米之别名，详该条。

小米草 见《湖南药物志》。为狗尾草之别名，详该条。

小汗淋草 见《南京民间药草》。为贯叶连翘之别名，详该条。

小红米果 见《云南中草药》。为红紫珠之别名，详该条。

小红米果根 见《云南中草药》。为对节树根之别名，详该条。

小红参 见《昆明民间常用草药》。又名滇紫参、小红药。为茜草科植物云南茜草 ubia yunnanensis(Franch.)Diels的根。产云南。甘，温。补血活血，祛风除湿。治头晕，失眠，吐血，月经不调，血虚经闭，肾虚腰痛，风湿痹痛，跌打损伤。煎服：9～30克。

小红药 见《红河中草药》。为小红参之别名，详该条。

小红藤 ❶见《贵州民间药物》。为三爪金龙之别名。❷见《昆明民间常用草药》。为走游草之别名。各详该条。

小麦 出《本草经集注》。为禾本科植物小麦Triticum aestivum L.的种子。甘，凉。入心、脾、肾经。养心益肾，除热止渴，治脏躁，烦热，消渴，泄痢。煎服：30～60克。种子含淀粉53～70%，蛋白质11%，糖类2～7%，糊精2～10%，脂肪约1.6%，粗纤维约2%。尚含少量谷甾醇、卵磷脂、尿囊素、淀粉酶和微量维生素B等。

小麦苗 出《本草拾遗》。为禾本科植物小麦Triticum aestivum L.的嫩茎叶。辛，寒。治黄疸。内服：捣烂绞取汁，每服30～40毫升，一日三至四次。麦杆中含多糖类，主要由戊糖、己糖组成。麦杆水浸剂有驱蛔作用；所含半纤维素及多糖类对小鼠有抗肉瘤－180的作用。

小麦麸 出《本草拾遗》。又名麸皮。为小麦磨取面粉后筛下的种皮。甘，寒。止汗，止泻，散瘀。①治虚汗。内服：煎汤，9～15克；或研末服。②治泄泻，和面做饼食。③治糖尿病，以6/10的麦麸，4/10的面粉，加适量食油、鸡蛋、蔬菜拌和蒸熟代餐，随病情好转，逐步减少麦麸用量。④治风湿痹痛，寒湿脚气，跌打损伤，醋炒包熨；口腔炎，烧存性，加冰片少许研末搽。

小远志 见《中国药用植物志》。为瓜子金之别名，详该条。

小芭蕉头 见《四川中药志》。为美人蕉根之别名，详该条。

小克麻 见《云南中草药》。为拔毒散之别名，详该条。

小还魂 见萧步丹《岭南采药录》。为驳骨丹之别名，详该条。

小连翘 出《本草纲目》。又名小对叶草、小元宝草。为藤黄科植物小连翘 Hypericum erectum Thunb. 的全草。分布四川、贵州、湖南、湖北、江西、安徽等地。苦，平。活血止血，消肿。①治吐血，咯血，衄血，便血，子宫出血，月经不调，跌打损伤。煎服：15～30克。②治风湿性关节炎，神经痛，疖疮肿毒。煎服或外敷。③治外伤出血。研末撒敷。全草含鞣质及小连翘碱（Hypecorine）、小连翘酮碱（Hypecorinine）。花含金丝桃属素（Hypericin）。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌有抑制作用。金丝桃属素有光致敏作用。

小皂荚 见《中药志》。为猪牙皂之别名，详该条。

小辛 出《神农本草经》。为细辛之别名，详该条。

小良姜 见《中药志》。即高良姜，详该条。

小鸡菜 见《全国中草药汇编》。为苦地丁之别名，详该条。

小驳骨 见《南宁市药物志》。为驳骨丹之别名，详该条。

小青 ❶见《全国中草药汇编》。为腐婢之别名。❷见《中国树木分类学》。为木蓝之别名。各详该条。

小青皮 见《中国药学大辞典》。为青皮之处方名，详该条。

小青鱼胆 见《云南中草药》。为小龙胆草之别名，详该条。

小青草 见清·赵楷《百草镜》。为爵床之别名，详该条。

小青胆 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为吉祥草之别名，详该条。

小茅香 见《分类草药性》。为羊耳菊之别名，详该条。

小罗伞 见《广西药用植物名录》。为矮陀陀之别名，详该条。

小和尚藤 见《重庆草药》。为小金樱之别名，详该条。

小金钱草 见《四川中药志》。为马蹄金之别名，详该条。

小金樱 出《生草药性备要》。又名红茨藤、七姐妹、小和尚藤。为蔷薇科植物小果蔷薇 Rosa cymosa Tratt. 的根及嫩叶。分布我国华东、中南、西南地区。苦，平。祛风除湿，散瘀止血。①治风湿关节痛，跌打损伤，月经不调，子宫脱垂，痔疮，脱肛，尿血。煎服：15～30克。②治外伤出血，痈疖疮毒。捣烂敷。根皮含鞣质。根皮的粉剂外用有止血效果，其水提取物和二甲基甲酰胺提取物在试管内对兔血有促进凝血作用。水、醇提取物在试管内对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等有抑制作用。

小金樱子 出《生草药性备要》。为蔷薇科植物小果蔷薇 Rosa cymosa Tratt. 的果实。酸、微甘，温。治风痰咳嗽，遗精。煎服：30～60克。捣敷治跌打损伤。

小肺筋草 见《四川中药志》。为粉条儿菜之别名，详该条。

小泽兰 出《雷公炮炙论》。即泽兰，详该条。

小贯众 见《贵州民间方药集》。又名昏鸡头、鸡脑壳。为鳞毛蕨科植物贯众 Cyrtomium fortunei J. Smith 的根茎和叶柄残基。分布华北、西北和长江以南各地。苦，微寒，有小毒。清热解毒，平肝熄风，止血，杀虫。预防感冒、麻疹、流行性脑脊髓膜炎；治热病斑疹，肝炎，痢疾，头晕目眩，高血压病，吐血，尿血，便血，崩漏带下，钩虫病。煎服：9～30克。孕妇慎用。根茎含鞣质、挥发油、树胶、黄酮类、氨基酸。本品煎剂能驱猪蛔，并有增强离体及在体家兔子宫收缩的作用。

小春花 见《闽东本草》。为阴地蕨之别

名，详该条。

小胡麻 见《苏州本产药材》。为茺蔚子之别名，详该条。

小草 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·内科》。为百蕊草之别名，详该条。

小草根 见《中药材手册》。为远志之别名，详该条。

小茴香 出《本草纲目》。又名茴香、谷香。为伞形科植物茴香Foeniculum rulgare Mill. 的成熟果实。主产山西、内蒙古等地。辛，温。入肝、肾、脾、胃经。温肾散寒，理气止痛，和胃。治寒疝，睾丸偏坠，胃腹冷痛，呕吐，肾虚腰痛，痛经。煎服：3～9克。本品含挥发油即茴香油，内含茴香醚（Anethole）、右旋小茴香酮（Fenchone）、甲基胡椒酚以及茴香醛、右旋蒎烯、莰烯、二戊烯等。

小茴香根 见《四川中药志》。即茴香根，详该条。

小香草 见《广西植物名录》。为臭草之别名，详该条。

小鬼叉子 见《江苏野生植物志》。为鹿角草之别名，详该条。

小独根 见《云南中草药》。为何首乌之别名，详该条。

小独脚莲 见《南方主要有毒植物》。为犁头尖之别名，详该条。

小独蒜 见《中药形性经验鉴别法》。为薤白之别名，详该条。

小扁藤 见《广西实用中草药新选》。为三叶青之别名，详该条。

小犟药 见《民间常用草药汇编》。为赤胫散之别名，详该条。

小透骨草 见《昆明民间常用草药》。为透骨香之别名，详该条。

小铁子 见《云南中草药选》。即铁仔，详该条。

小粉 出《本草纲目》。为小麦麸洗制面筋后沉淀的淀粉。甘，凉。补中益气，消肿毒。①治痢疾。内服：炒黄，30～60克，开水调服。②治痈肿发背，无名肿毒焮热未溃，烫伤。炒成黄黑色，研末醋调成糊，熬如黑漆，涂敷。

小被单草 见《云南中草药》。为狗筋蔓之别名，详该条。

小通花 见《四川中药志》。为小通草之别名，详该条。

小通草 见《四川中药志》。又名小通花、鱼泡通。为旌节花科植物喜马拉雅旌节花Stachyurus himalaicus Hook.f.et Thoms. 或中国旌节花 S. chinensis Franch. 等的茎髓。前者分布江西、台湾、湖北、湖南、广西、广东及西南地区，后者分布陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、广东、四川、贵州、云南等地。甘、淡，寒。入肺、胃经。清热利尿，通乳，安神。治急性肾炎，膀胱炎，小便不利，乳汁不通，肺热咳嗽，心烦失眠。煎服：2.5～4.5克。孕妇慎服。

小救驾 见《陕西中草药》。为缬草之别名，详该条。

小黄药 见《云南中草药》。为拔毒散之别名，详该条。

小野鸡尾 见《昆明民间常用草药》。为小叶金花草之别名，详该条。

小旋花 见《植物学大辞典》。为面根藤之别名，详该条。

小粒蒿 见《中国药用植物志》，为一叶萩之别名，详该条。

小巢菜 出《本草纲目》。又名翘摇、元修菜、漂摇草、苕子。为豆科植物硬毛果野豌豆Vicia hirsuta(L.)S.F.Gray的全草。分布江苏、浙江、江西、湖北、安徽、河南、陕西、四川、云南、台湾。辛，平。入肺、脾、胃经。清热利湿，活血止血。治黄疸，疟疾，白带，鼻衄。煎服：18～60克。叶含芹菜甙、槲皮素。

小黑药 见《滇南本草》。为草威灵之别名，详该条。

小蒜 见《河北药材》。为薤白之别名，详该条。

小蓟 出《本草经集注》。又名猫蓟、刺蓟菜、刺儿菜。为菊科植物小蓟Cephalanoplos segetum (Bge.) Kitam. 的全草。全国各地均产。甘、微苦，凉。入肝、脾经。凉血，祛瘀，止血。①治吐血，咯血，衄血，尿血，血淋，便血，血崩，肝炎。煎服：9～15克(鲜品30～60克)。②治创伤出血，痈疖肿毒。捣敷。本品含生物碱、皂甙。药理实验对小鼠有止血作用。在体外煎剂对溶血性链球菌、肺炎球菌及白喉、大肠、痢疾杆菌有抑制作用；醇浸剂能抑制结核杆菌。所含儿茶酚胺类物质，注射时能升高血压，口服则无。有某些消炎、镇静作用。

小锦枝 出《雷公炮炙论》。为赤车使者之别名，详该条。

小慈菇 见《全国中草药汇编》。即光慈菇，详该条。

小颠茄 ❶见《广西药用植物名录》。为丁茄之别名。❷出《生草药性备要》。为金扣钮之别名。各详该条。

小颠茄子 见萧步丹《岭南采药录》。为天仙子之别名，详该条。

小辫儿 见《中药材手册》。为紫菀之别名，详该条。

小藤仲 见《文山中草药》。为扶芳藤之别名，详该条。

飞刀剑 见《植物名实图考》。为石韦之别名，详该条。

飞天蜈蚣 见《全国中草药汇编》。为爬山虎之别名，详该条。

飞天蟑螂 见萧步丹《岭南采药录》。又名龙骨风、山蟑螂、大贯众、树蕨。为桫椤科植物桫椤Cyathea spinulosa Wall. 的茎干。分布贵州、四川、广东、广西、台湾等地。苦、涩，平。祛风利湿，活血祛瘀，清热止咳。治风湿关节痛，腰痛，跌打损伤，肺热咳喘；预防流行性感冒。煎服：9～15克。

飞龙掌血 出《植物名实图考》。又名见血飞、散血丹、三百棒。为芸香科植物飞龙掌血Toddalia asiatica (L.) Lam.的根或叶。分布陕西、湖北、湖南、浙江、福建、台湾、广东、广西、贵州、云南、四川等地。辛、微苦，温，有小毒。散瘀止血，祛风除湿。①治跌打损伤，劳伤吐血，衄血，子宫出血，痛经，闭经，风湿麻木，筋骨疼痛，肋间神经痛。煎服：6～12克，或浸酒饮。②叶捣敷外伤出血，疮疖肿毒。孕妇忌服。根含白屈菜红碱、二氢白屈菜红碱、茵芋碱、小檗碱等生物碱，还含飞龙掌血内酯(Toddaculine)、二羟基飞龙掌血内酯、茵芹香豆素、异茵芹香豆素等香豆素类和橙皮甙等黄酮类。叶含挥发油，内含香茅醛等，还含白屈菜红碱、鞣质等。白屈菜红碱为神经肌肉毒，对心脏也有抑制作用。对豚鼠小量可引起流产，大量引起麻痹、死亡。

飞奴 出《开元天宝遗事》。为鸽之别名，详该条。

飞机草 见《广东中草药》。又名香泽兰。为菊科植物飞机草Eupatorium odoratum L.的全草。分布云南、广东、广西等地。微辛，温，有小毒。散瘀消肿，止血。治跌打肿痛，疮疡肿毒，外伤出血，旱蚂蟥叮咬出血不止，稻田皮炎。鲜叶揉烂敷。全草含挥发油，其中主含香豆素、乙酸龙脑酯、芳樟醇、泽兰醇、泽兰烯。叶还含异樱花素、飞机草素(Odoratin)、茵香酸及β-谷甾醇。又从全株中分离得蛇麻脂醇、β-香树脂醇及三裂鼠尾草素(Salvigenin)。茎叶的煎剂对离体豚鼠回肠有兴奋作用，对离体兔十二指肠有抑制作用。

飞扬草 见《广东中药》。又名大飞扬草、大乳汁草、节节花、奶母草。为大戟科植物飞扬草Euphorbia hirta L.的全草。

分布广东、广西、云南、江西、福建、台湾等地。微苦、酸，凉。清热利湿，解毒止痒，通乳。①治急性肠炎，细菌性痢疾，支气管炎，血淋，产后缺乳。煎服：15～30克。②治疔疮痈肿，捣烂外敷；皮炎，湿疹，皮肤瘙痒，脓疱疮，脚癣，煎水洗。全草含槲皮素、鼠李素-3-鼠李糖甙、蒲公英赛醇、无羁萜及β-香树脂醇等。花含并没食子酸。本品对雌豚鼠可使乳腺加快发育及泌乳。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、大肠和绿脓杆菌有抑制作用，还有利尿和缓泻作用。

飞扬蕨 见《广西中兽医药用植物》。为兖州卷柏之别名，详该条。

飞来鹤 出《植物名实图考》。又名隔山消。为萝藦科植物耳叶牛皮消 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight的块根或全草。我国除东北和新疆外，其余各地均有分布。甘、苦，平，有小毒。健胃消积，解毒消肿。①治胃痛，食积饱胀，小儿疳积，痢疾，产后腹痛。煎服：6～9克。②治指头炎。用块根酒磨取汁涂敷。本品含皂甙、萝藦毒素（Cynanchotoxin）。过量服用可出现流涎、呕吐、癫痫性痉挛、强烈抽搐、心跳缓慢等中毒症状。

飞蛾叶 见《草药手册》。为白果叶之别名，详该条。

飞廉 出《神农本草经》。又名大力王、天荠、刺打草。为菊科植物飞廉 Carduus crispus L.的全草或根。分布全国各地。苦，平。凉血止血，祛风清热，利湿，消肿。①治吐血，衄血，尿血，子宫出血，头风眩晕，急性及迁延性肝炎，尿路感染，乳糜尿，白带，湿热痹痛。煎服：9～30克。②治跌打瘀肿，痈疖肿毒。鲜品捣敷。

马三七 见《湖南药物志》。为费菜之别名，详该条。

马木通 见《东北植物药图志》。为关木通之别名，详该条。

马牙半支 出《本草纲目拾遗》。又名酱瓣半支、酱瓣草、六月雪。为景天科植物凹叶景天Sedum emarginatum Migo 的全草。分布江苏、浙江、江西、湖北、云南、四川、陕西等地。酸，凉。清热解毒，止血。①治肝炎，痢疾，吐血，衄血，血崩，带下。内服：煎汤，30～60克；或捣汁服。②治痈肿，疔疮，带状疱疹，跌打损伤。捣敷。

马矢蒿 出《神农本草经》。即马先蒿，详该条。

马兰 出《本草拾遗》。又名路边菊、鱼鳅串、鸡儿肠。为菊科植物马兰Kalimeris indica（L.）Sch. Bip.的全草或根。分布我国各地。辛、凉。入肝、胃、肺经。凉血止血，清热利湿，解毒消肿。①治咯血，吐血，衄血，崩漏，肠炎，痢疾，黄疸，水肿，小便淋痛，急性咽炎，扁桃体炎，流行性腮腺炎。煎服：15～30克。②治外伤出血，疮疖肿毒，乳腺炎、蛇咬伤。捣敷。全草含挥发油，油中含乙酸龙脑酯、二聚戊烯、辛酸及萜类等。

马头鱼 见《动物学大辞典》。为海马之别名，详该条。

马耳草 见《吉林中草药》。为荩草之别名，详该条。

马先蒿 出《神农本草经》。又名马矢蒿、马尿泡。为玄参科植物返顾马先蒿Pedicularis resupinata L.的根。分布东北、华北及山东、安徽、陕西、甘肃、四川、贵州。苦，平。祛风，胜湿，利水。①治风湿关节疼痛，小便不利，带下，尿路结石。煎服：6～9克。②治疥疮，煎水洗。

马豆 出《本草图经》。为云实之别名，详该条。

马辛 ❶见《江苏药材志》。为杜衡之别名。❷出《神农本草经》。为菥蓂之别名。各详该条。

马屁勃 出《本草经集注》。为马勃之别名，详该条。

马尾连 出《本草纲目拾遗》。又名马尾

黄连、金丝黄连、草黄连。为毛茛科植物多叶唐松草 Thalictrum foliolosum DC. 或高原唐松草 T. cultratum Wall. 等的根茎及根。主产四川、云南等地。苦，寒。入心、大肠、肝、胆经。清热燥湿，泻火解毒。①治口舌生疮，痢疾，肠炎，传染性肝炎，扁桃体炎，结膜炎。煎服：3～9克。②治痈肿疮疖。研末调敷。本品含小檗碱、掌叶防己碱、药根碱、木兰花碱等。

马尾黄连 见《中药志》。即马尾连，详该条。

马尿花 出《植物名实图考》。又名水旋复、白苹。为水鳖科植物水鳖Hydrocharis asiatica Miq.的全草。分布河北、湖北、安徽、江苏、浙江、云南等地。苦、微咸，微寒。治赤白带下。研末，每服3克。

马尿泡 ❶见《青海常用中草药手册》。又名羊尿泡。为茄科植物马尿泡Przewalskia tangutica Maxim. 的根。分布甘肃、青海、四川等地。微苦、辛，寒，有毒。镇痛，解痉，杀虫，消炎。①治胃肠痉挛疼痛，白喉，炭疽。煎服：0.15～0.3克，本品多入丸、散用，内服宜慎。②治疮疡，无名肿毒，皮肤瘙痒。煎水洗、酒精浸涂或研末冷开水调敷。本品含山莨菪碱、天仙子胺（莨菪碱）、和天仙子碱（东莨菪碱）。❷见《山西中草药》。为马先蒿之别名，详该条。

马茄子 见《陕西中草药》。为蕤仁之别名，详该条。

马齿苋 出《本草经集注》。又名马齿菜、五行草、安乐菜、酱瓣豆草。为马齿苋科植物马齿苋 Portulaca oleracea L. 的全草。分布全国各地。酸，寒。入胃、大肠经。清热利湿，凉血解毒。①治细菌性痢疾，急性胃肠炎，急性阑尾炎，百日咳，肺痈，乳腺炎，尿路感染，肾炎水肿，湿脚气，钩虫病，白带，崩漏，便血，痔血。煎服：9～30克（鲜品60～120克）。②治疮疖肿毒，稻田皮炎，湿疹，天泡疮，带状疱疹，丹毒，瘰疬。捣敷或煎水洗。本品含大量去甲基肾上腺素和钾盐。还含多巴、多巴胺和多种维生素、糖类等。煎剂在体外对痢疾杆菌有抑菌作用，但多次接触培养后，能产生显著的抗药性。对伤寒杆菌、大肠杆菌及金黄色葡萄球菌也有抑制作用。提取液或鲜马齿苋汁有兴奋子宫的作用。

马齿苋子 出《开宝重定本草》。为马齿苋科植物马齿苋Portulaca oleracea L.的种子。明目，利大小肠。治青盲，白翳。研末服，每次一匙。

马齿菜 见《太平圣惠方》。为马齿苋之别名，详该条。

马明退 出《儒门事亲》。为蚕蜕之别名，详该条。

马乳 出《本草经集注》。为马科动物马Equus caballus（L.）的乳汁。甘，凉。补血润燥，清热止渴。治血虚烦热，虚劳骨蒸，消渴，牙疳。煮沸服。每100克含水分91克，蛋白质2.1克，脂肪1.1克，碳水化物6克，灰分0.4克。

马宝 见《饮片新参》。又名马结石。为马科动物马Equus caballus（L.）胃肠中的结石。主产河北、内蒙古、新疆、甘肃、云南、贵州、西藏和东北等地牧区。甘、咸，凉。入心、肝经。镇惊，化痰，止血，解毒。治高热动风，手足抽搐，惊痫癫狂，痰热咳喘，吐血，衄血，恶疮肿毒。内服：研末，0.6～1.5克。

马陆 出《神农本草经》。又名千脚虫、大草鞋虫。为圆马陆科动物约安巨马陆Prospirobolus joannsi（Brolemann）或其它马陆类动物的全虫。全国大部分地区有分布。辛，温，有毒。破积，解毒。①治瘕瘕，痞结。拌糠炒黄，去头足。煎服：3～9克②治痈肿，恶疮。捣敷或研末撒。本品有毒，内服宜慎。

马勃 出《名医别录》。又名马屁勃、灰包菌。为马勃科植物脱皮马勃 Lasiosphaera fenzlii Reich.、大颓马勃Calvatia gigant

ea (Batsch. ex pers.) Lloyd或紫颓马勃 C. lilacina (Mont.& Berk.) Lloyd 的子实体。主产内蒙古、甘肃、江苏、湖北等地。辛，平。入肺经。清肺，利咽，止血。①治咽喉肿痛，咳嗽失音，咯血，吐血，衄血。煎服：1.5～4.5克。包煎。②治冻疮，臁疮不敛，痔疮出血，外伤出血。研末撒或调敷。脱皮马勃子实体含马勃素、麦角甾醇及磷酸钠等。本品止血作用不亚于明胶海绵，但不被组织吸收。煎剂在体外对常见致病性皮肤真菌有抑菌作用。

马结石 见《四川中药志》。即马宝，详该条。

马核果 见《中国树木分类学》。为核桃楸果之别名，详该条。

马根子草 见《湖南药物志》。为铁线草之别名，详该条。

马莲子 见《河北中药手册》。即马蔺子，详该条。

马钱子 出《本草纲目》。又名番木鳖、大方八、苦实。为马钱科植物长籽马钱Strychnos wallichiana Steud. ex DC.或马钱 S. nux-vomica L.的干燥种子。前者产云南、广东海南岛等地。后者主产印度、越南、泰国。苦，寒，有大毒。入肝、脾经。通络，止痛，消肿散结。①治风湿痹痛，筋络拘挛，半身不遂，重症肌无力，小儿麻痹后遗症，跌打损伤，骨折；近亦用治食道癌，胃癌，直肠癌，皮肤癌。内服：一日量0.3～0.6克，炮制（油炸法或砂烫法）后入丸、散用。②治痈疽肿毒，醋磨涂或研末调敷；喉痹肿痛，痞块，磨水含咽；面神经麻痹，切成薄片，排列在胶布上，贴患侧面部。内服未经炮制或剂量过大者，均易中毒，甚至死亡。本品含生物碱，主要为番木鳖碱（士的宁）和马钱子碱。番木鳖碱对脊髓有强烈的兴奋作用，可引起强直性惊厥。其味苦，可反射性地增加胃分泌。马钱子碱的致惊厥作用为番木鳖碱的1/40，但有箭毒样的肌肉松弛作用和较弱的止咳作用。

马腰瓜 见《本草纲目》。为王瓜之别名，详该条。

马料豆 见《本草汇言》。为野料豆之别名，详该条。

马料梢 见《浙江天目山药用植物志》。为马棘之别名，详该条。

马桑叶 出清·刘士季《草木便方》。为马桑科植物马桑 Coriaria sinica Maxim. 的叶。分布华北、西北、西南及华中。辛、苦，寒，有大毒。治痈疽，肿毒，疥癞，黄水疮，烫伤。外用：捣敷、煎水洗或研末调敷。本品含鞣质、没食子酸、山柰酚、马桑糖（Coriose）等、并含毒性成份马桑内酯（Coriamyrtin）、吐丁内酯（Tutin）。

马桑根 出清·刘士季《草木便方》。又名乌龙须。为马桑科植物马桑 Coriaria sinica Maxim. 的根。苦，凉，有大毒。化瘀散结，消肿止痛。①治风湿痹痛，牙痛，瘰疬，跌打损伤，狂犬咬伤。煎服：3～6克。②治汤火伤。研粉调敷。内服、外用均须括去外层粗皮。服用本品过量，会出现间歇性强直性痉挛，流涎，出汗，心悸，呼吸困难，间歇性癫痫样发作等中毒症状，重者可致死亡，故一般只作外用，内服宜慎。孕妇、小儿、体虚者忌服。本品含毒性成分马桑内酯(Coriamyrtin)、吐丁内酯（Tutin），二者均有印防己毒素样的致惊厥作用。

马黄七 见《广西药用植物名录》。为苍条鱼鳖之别名，详该条。

马莲 出《新修本草》。为郁金之别名，详该条。

马蛇子 见《青岛中草药手册》。为石龙子之别名，详该条。

马陵儿 出《救荒本草》。又名老鼠拉冬瓜、土白蔹。为葫芦科植物马陵儿Melothria indica Lour. 的根或叶。分布江苏、福建、广东、广西、云南等地。甘、苦，微寒。

清热利湿，解毒散结。①治风湿痹痛，咽喉肿痛，急性肠炎，痢疾，尿路感染、结石，结膜炎。煎服：根9～15克。②治痈疽疔疮，湿疹，淋巴结结核，睾丸炎。捣敷或煎水洗。

马脚迹 见《江西民间草药》。为积雪草之别名，详该条。

马脚莲 见《湖南药物志》。为蓉菜之别名，详该条。

马兜铃 出《药性论》。又名葫芦罐、臭铃铛、水马香果。为马兜铃科植物北马兜铃Aristolochia contorta Bge.或马兜铃A. debilis sieb. et Zucc.的果实。主产辽宁、黑龙江、河北、山东、陕西等地。苦、微辛，寒。入肺、大肠经。清肺降气，止咳平喘。治肺热咳喘，失音，痔疮肿痛。煎服：4.5～9克。马兜铃果实含挥发油。种子含马兜铃酸及马兜铃子酸（Aristolochinic acid）等。煎剂口服对麻醉兔有弱的祛痰作用；对离体豚鼠支气管有一定的解痉作用。体外对金黄色葡萄球菌及某些皮肤真菌有抑菌作用。

马兜铃根 见《肘后方》。即青木香，详该条。

马兜铃藤 见《普济方》。即天仙藤，详该条。

马棘 出《救荒本草》。又名一味药、野绿豆、山皂角、马料梢。为豆科植物马棘Indigofera pseudotinctoria Matsum.的根或全株。分布华东、华南、西南及山西、陕西。苦、涩，平。清热解毒，消肿散结。①治感冒咳嗽，扁桃体炎，颈淋巴结结核，痔疮，食积饱胀。煎服：15～30克。②捣敷治疔疮。

马粟草 见《现代实用中药》。为莼之别名，详该条。

马蓟 出《范汪方》。为大蓟之别名，详该条。

马楝子 出《本草图经》。即马蔺子，详该条。

马霍儿子 出《濒湖集简方》。为王瓜子之别名，详该条。

马蜂窝 见《河南中药手册》。为露蜂房之别名，详该条。

马骝卵 见《陆川本草》。又名蕨薯、凉水果、石窝蛋、雉鸡蛋。为骨碎补科植物肾蕨Nephrolepis cordifolia（L.）Presl的块茎。分布西南、华南及福建、台湾等地。甘、淡，凉。清热利湿，止咳，止血。①治湿热腹泻，痢疾，疳积，疝气。②治肺热咳嗽，吐血，尿血。煎服：9～15克。③捣敷治淋巴结炎，创伤出血；鲜品切片外擦治体癣。

马骝藤果 见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。为山橙之别名，详该条。

马槟榔 见《本草品汇精要》。又名紫槟榔、屈头鸡、太极子。为白花菜科植物水槟榔Capparis pterocarpa Chun或马槟榔C.masaikai Lévl.的种仁。产广西、广东、云南、贵州。甘、微苦，凉。清热利咽，生津消积。治咽喉炎，暑热口渴，以种仁2～3粒，生嚼含咽药汁；食滞胀满，煎服，3～9克。马槟榔含甙类。

马蔺子 出《新修本草》。又名蠡实、马楝子、马莲子。为鸢尾科植物马蔺Iris pallasii Fisch. var. chinensis Fisch.的种子。主产江苏、辽宁、河北、北京等地。甘，平。清热利湿，凉血止血。治急性黄疸型传染性肝炎，泻痢，小便不利，疝痛，吐血，衄血，血崩，风湿痹痛，急性咽炎，痈肿。煎服：3～9克。本品含抗癌有效成分马蔺子甲素（Pallasone）。醇浸膏对小鼠有避孕作用，而对家兔则无。

马蔺叶 出《本草纲目》。为鸢尾科植物马蔺Iris pallasii Fisch.var. chinensis Fisch.的叶。酸、咸。治喉痹，大便不通，砂淋。内服：煎汤，3～9克；或捣汁。

马蔺花 出《珍珠囊补遗药性赋》。又名潦叶花、旱蒲花、蠡草花。为鸢尾科植物马

蔺 Iris pallasii Fisch. var. chinensis Fisch.的花。产江苏、河北等地。咸、酸、苦，微凉。清热凉血，利尿消肿。治咯血，吐血，衄血，小便不通，淋病，疝痛，咽喉肿痛，痈肿疮疖。煎服：3～6克。本品含挥发油。

马蔺根 出《本草纲目》。为鸢尾科植物马蔺 Iris pallasii Fisch.var. chinensis Fisch. 的根。分布东北、华北、西北、华东和西藏。甘，平。清热解毒。治痈疽，急性咽炎，支气管炎，急性黄疸型传染性肝炎。煎服：3～9克。本品含挥发油。

马蟆 出《本草经集注》。为水蛭之别名，详该条。

马鞍叶 见《全国中草药汇编》。为大飞扬之别名，详该条。

马鞍藤 见《福建民间草药》。为萤藤之别名，详该条。

马蹄 见清·赵其光《本草求原》。为荸荠之别名，详该条。

马蹄决明 见《本草经集注》。为决明子之别名，详该条。

马蹄防风 见《滇南本草》整理本。为杏叶防风之别名，详该条。

马蹄肺筋草 见《四川中药志》。为红马蹄草之别名，详该条。

马蹄金 见《四川中药志》。又名荷包草、黄疸草、肉馄饨草、小金钱草、螺丕草。为旋花科植物马蹄金 Dichondra repens Forst. 的全草。分布长江流域至南部各地。辛，凉。清热利湿，解毒消肿。①治黄疸型肝炎，胆囊炎，痢疾，胆结石，泌尿系结石，肾炎水肿，淋浊，尿血，扁桃体炎，风火眼痛。煎服：6～15克。②捣敷治乳腺炎，疔疮肿毒，跌打损伤。本品高浓度的煎剂在体外能抑制金黄色葡萄球菌。

马蹄草 ❶见《植物名实图考》。为连钱草之别名。❷见《滇南本草》。为积雪草之别名。❸出《经验良方》。为菟之别名。❹见《福建民间草药》。为萤藤之别名。❺见《广西本草选编》。为黄水芋草之别名。各详该条。

马蹄香 ❶出《新修本草》。为杜衡之别名。❷见《广西中药志》。为蜘蛛香之别名。各详该条。

马鞭草 出《名医别录》。又名凤颈草、紫顶龙芽。为马鞭草科植物马鞭草 Verbena officinalis L.的全草。我国大部分地区均产。苦，微寒。入肝、脾经。清热，利水，消肿，破血，杀虫。①治感冒，疟疾，黄疸型肝炎，肝硬化腹水，急性肾炎，脚气，痢疾，关节酸痛，闭经，癥瘕积聚。煎服：15～30克。②捣汁含咽治咽喉肿痛；捣敷或捣汁涂治痈肿、下部湿疮、跌打损伤。孕妇忌服。本品含马鞭草甙、鞣质、挥发油。水及醇提取物有消炎、镇痛作用。对子宫有兴奋作用。并能增强前列腺素E_2的效力。

子午莲 见《本草纲目拾遗》。为睡莲之别名，详该条。

子芩 出《本草经集注》。为黄芩之新根，详该条。

四 画

【一】

王不留 出《本草纲目》。为王不留行之简称，详该条。

王不留行 出《神农本草经》。又名留行子、王不留、麦蓝子、大麦牛、奶米、王母牛。为石竹科植物麦蓝菜Vaccaria segetalis(Neck.)Garcke 的种子。主产河北、山东、辽宁。苦，平。入肝、胃经。行血通经，下乳消肿。①治闭经，乳汁不通，乳腺炎，

睾丸炎，痈肿疔疮。煎服：3～9克。②治带状疱疹。研末油调搽。孕妇忌服。本品含王不留行皂甙(Vacsegoside)，王不留行黄酮甙(Vaccarin)等。煎剂及醇浸液对大鼠离体子宫均有收缩作用，以醇浸液作用较强。

王瓜 出《神农本草经》。又名雹瓜，马腿瓜、苦瓜莲、吊瓜、土瓜。为葫芦科植物王瓜Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim. 的果实。分布长江以南各地。苦，寒。入心、肾经。清热，生津，通乳。治消渴，黄疸，噎膈反胃，乳汁滞少。煎服：4.5～9克。

王瓜子 出《药性论》。又名赤雹子、马雹儿子、土瓜仁。为葫芦科植物王瓜Trichosanthes cucumeroides(Ser.)Maxim. 的种子。酸、苦，平。入肺、大肠经。清热，润肺，凉血。治肺痿吐血，黄疸，痢疾，肠风下血。煎服：3～9克。种子含α，β-二氨基丙酸、γ-胍基丁酸、精氨酸等多种氨基酸。还含脂肪油，油中有栝楼酸、亚油酸、油酸等。

王瓜根 出《名医别录》。又名土瓜根。为葫芦科植物王瓜 Trichosanthes cucumeroides(Ser.)Maxim. 的根。分布长江以南各地。苦，寒，有小毒。入心、肺、膀胱经。清热利尿，散瘀止痛。①治热病烦渴，黄疸，小便不利，闭经，瘾癖，跌打损伤。煎服：6～9克。②治胃肠道疼痛。用干根切片，成人每次0.3～0.6克，嚼烂吞服，根据病情决定每日用药次数。③治扁桃体炎，咽喉炎，研末吹患处，口含片刻，吐去痰涎；痈疮肿毒，捣烂敷。孕妇慎服。本品含胆碱、精氨酸、淀粉等。

王母牛 见《山东中草药手册》。为王不留行之别名，详该条。

王连 出《神农本草经》。为黄连之别名，详该条。

王浆 见中国医学科学院《医学科学参考资料》(1)：1～5，1960。为工蜂咽腺分泌的乳糜。详蜂乳条。

开心果 见《江苏省植物药材志》。为娑罗子之别名，详该条。

开金锁 见《上海常用中草药手册》。为金荞麦之别名，详该条。

开喉剑 见《天宝本草》。为八爪金龙之别名，详该条。

开喉箭 ❶见《湖南药物志》。为朱砂根之别名。❷见《分类草药性》。为射干之别名。各详该条。

井口边草 出《本草拾遗》。为凤尾草之别名，详该条。

天丁 见《本草纲目》。为皂角刺之别名，详该条。

天门冬 出《神农本草经》。又名天冬。为百合科植物天门冬Asparagus cochinchinensis(Lour.)Merr. 的块根。主产贵州、四川、广西。甘、微苦，寒。入肺、肾经。养阴润燥，清肺止咳。①治阴虚发热，干咳，咯血，肺痿，肺痈，消渴，便秘。②治热病伤阴，津少口渴。煎服：6～12克。③治疮疡肿毒，蛇咬伤。鲜品捣烂敷。本品含天门冬素、5-甲氧基甲基糠醛、β-谷甾醇、甾体皂甙及多种低聚糖。煎剂在试管内对各型葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌、白喉杆菌有抑制作用。水浸液并能杀灭蚊蝇幼虫。天门冬素有镇咳、祛痰作用。

天牛 出《本草拾遗》。又名天水牛、八角儿。为天牛科昆虫星天牛 Anoplophora chinensis(Forster)或桑天牛Apriona germari(Hope)等的全虫。我国大部分地区有分布。甘，温，有小毒。活血通经，镇惊，消肿。①治跌扑瘀血，经闭，崩漏，带下，乳汁不下，隐疹不发，痈疽不溃。内服：煎汤，3～6克；研末，0.9～1.5克，日服1～2次。②治小儿急惊风，研末吹鼻；疔肿恶毒，焙干研末，蜜调涂敷。

天文草 见《广东中草药》。又名雨伞草、金钮扣。为菊科植物金钮扣Spilanthes

acmella(L.)Murr. 的全草。分布广东、广西、四川、云南等地。辛、苦，微温，有小毒。止咳平喘，止痛消肿。治慢性支气管炎，哮喘，跌打损伤，风湿性关节炎，疮疡肿毒，蛇咬伤，牙痛。煎服：3～9克。外用：捣敷。近有制成注射剂作局部麻醉用。本品含麻醉性辛辣成分金钮扣酰胺(Spilanthol)。

天水牛 出《奇效良方》。即天牛，详该条。

天水蚊草 见《植物名实图考》。为秋鼠曲草之别名，详该条。

天平一枝香 见《药材学》。为大戟之别名，详该条。

天龙 ❶见《本草纲目》。为蜈蚣之别名。❷见《饮片新参》。为壁虎之处方名。各详该条。

天生子 见《滇南本草》。为无花果之别名，详该条。

天仙子 出《本草图经》。又名莨菪子、牙痛子、小颠茄子、熏牙子。为茄科植物莨菪 Hyoscyamus niger L. 的种子。主产河南、河北、辽宁。苦，温，有大毒。解痉，镇痛，定痫，平喘，止泻。①治癫狂，风痫，胃痛，腹痛，哮喘，久泻，久痢，脱肛。研末服：0.6～1.2克。②治痈肿疮疖。捣烂敷。中毒后出现瞳孔散大，视物模糊，神志狂乱，严重者可因呼吸中枢麻痹而死亡。心脏病、青光眼患者及孕妇忌服。本品含生物碱，主要为天仙子胺（即莨菪碱）、阿托品及天仙子碱（即东莨菪碱）。均为抗胆碱药，能减少腺体分泌、加速心率、解除平滑肌痉挛、扩瞳及升高眼内压。阿托品有中枢兴奋作用，天仙子碱则有镇静、催眠作用。又含脂肪油可达25%，其中亚油酸占71.1%。

天仙藤 出《本草图经》。又名都淋藤、马兜铃藤、青木香藤、臭拉秧子。为马兜铃科植物马兜铃 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.的带叶茎藤。主产浙江、江苏、湖北、江西、河南等地。苦，温。入肝、脾经。行气利水，活血通络。治妊娠水肿，风湿痛，胃痛，疝气痛，产后腹痛，煎服：6～12克。本品的丙酮提取物对小鼠腹水癌有抑制作用。

天瓜 见《滇南本草》。为瓠子之别名，详该条。

天冬 见《药品化义》。为天门冬之简称，详该条。

天芝麻 出《李氏草秘》。为水苏之别名，详该条。

天虫 见《药材资料汇编》。为僵蚕之别名，详该条。

天吊瓜 见《滇南本草》。为丝瓜之别名，详该条。

天竹叶 见《上海常用中草药》。为南天竹叶之简称，详该条。

天竹黄 见《本草衍义》。即天竺黄，详该条。

天名精 出《神农本草经》。又名野烟、癞格宝草、挖耳草、臭草。为菊科植物天名精 Carpesium abrotanoides L.的全草。我国大部分地区均有分布。辛、甘，寒，有小毒。入肺、胃、肝经。清热解毒，祛痰，散瘀止血。①治急性扁桃体炎，咽喉炎，气管炎，急性黄疸型传染性肝炎，疟疾，吐血，衄血，砂淋，血淋。煎服：9～15克。②治牙痛，鲜品揉烂塞痛牙处；疔疮肿毒，捣烂敷；皮肤痒疹，煎水洗。本品含抗菌成分大旋覆花内酯（Granillin）、天名精内酯酚(Carpesiolin)，还含鹤虱内酯(Carabrone)。果实中含挥发油，主成分为天名精内酯、天名精酮等。天名精内酯对动物的中枢神经先兴奋，后抑制，四肢肌肉松弛呈麻醉样；可对抗可拉明和士的宁的致惊厥作用，与巴比妥类有协同作用。此外并有解热作用。

天花粉 出《雷公炮炙论》。又名栝楼根、蒌根。为葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim.的根。我国大部分地区均产。甘、微苦、酸，微寒。入肺、胃经。清

热生津，降火润燥，排脓消肿。①治热病伤津、口渴，消渴，黄疸，肺热燥咳，咳血。煎服：9～12克。②治痈肿，乳痈，痔瘘。煎服并熬膏涂或研末调敷。反川乌、草乌。天花粉含有天花粉蛋白质、皂甙及多量淀粉。天花粉蛋白为中期引产及治疗恶性葡萄胎和绒癌的有效成分，对妊娠小鼠及狗均能杀死胎仔。天花粉的引产作用系天花粉蛋白直接作用于胎盘滋养层细胞使之变性坏死，使绒毛膜性腺激素下降到先兆流产的临界水平以下，前列腺素合成增加，发动宫缩而导致流产。有时可引起变态反应。高剂量可引起肝、肾细胞变性、坏死。天花粉亦能直接兴奋子宫，并使其对垂体后叶素的敏感性增加。

天芥菜 见《本草纲目》。为苦地胆之别名，详该条。

天秃 见《药材资料汇编》。为泽泻之别名，详该条。

天青地白 ❶出《质问本草》。又名清明草、小火草、叶下白。为菊科植物白背鼠曲草Gnaphalium japonicum Thunb.的全草。分布华东、华中、西南和台湾。甘，凉。入肺、肝经。解表，清热，明目，利湿。①治感冒，咳嗽，咽喉肿痛，小便不利，热淋，白带。煎服：鲜品30～90克。②治痈肿，疔疮，乳腺炎，蛇咬伤，捣敷。③治结膜炎，角膜白斑。制成眼药水滴眼。❷见《南京地区常用中草药》。为翻白草之别名，详该条。

天青地白草 见《江苏省植物药材志》。为茅莓之别名，详该条。

天茄子 ❶见《广西药用植物名录》。为丁茄之别名。❷出《本草图经》。为龙葵之别名❸见《滇南本草》。为金扣钮之别名。各详该条。

天罗瓜 见《普济方》。为丝瓜之别名，详该条。

天竺子 见《江苏省植物药材志》。为南天竹子之别名，详该条。

天竺参 见《滇南本草》。为还阳参之别名，详该条。

天竺黄 出《开宝重定本草》。又名竹黄、天竹黄。为禾本科植物青皮竹Bambusa textilis McClure 等茎杆内的伤流液自然干燥凝结而成的块状物。主产云南、广东、广西等地。甘，寒。入心、肝、胆经。清化热痰，凉心定惊。治热病神昏谵妄，中风痰壅，癫痫，小儿惊风抽搐。煎服：3～9克。本品含氢氧化钾、硅质等。

天河芋 见《湖南药物志》。为海芋之别名，详该条。

天泡草 ❶见《本草纲目》。为龙葵之别名。❷见《江西民间草药》。为苦蘵之别名。❸见《本草纲目》。为酸浆之别名。各详该条。

天泽香 见《本草纲目》。为乳香之别名，详该条。

天胡荽 出《备急千金要方·食治》。又名翳草、满天星、破铜钱。为伞形科植物天胡荽Hydrocotyle sibthorpioides Lam.的全草。分布华东、华中、华南、西南地区。辛，平。祛风清热，利湿，化痰止咳。①治风火赤眼，目翳，百日咳，咽喉炎，扁桃体炎，黄疸型传染性肝炎，胆囊炎，胆石症，急性肾炎，泌尿系感染、结石。煎服：9～15克。②治带状疱疹。鲜全草捣烂，酒精浸半天后，取汁涂，皮肤破损者忌用。本品含香豆素；预试尚含黄酮甙、酚类、氨基酸、挥发油。煎剂在试管内对金黄色葡萄球菌、变形杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌有一定抑制作用。

天南星 出《本草拾遗》。又名南星、虎掌、野芋头、蛇包谷。为天南星科植物天南星Arisaema consanguineum Schott、东北天南星A. amurense Maxim.或异叶天南星A. heterophyllum Bl.等的块茎。主产四川、河南、贵州、云南、广西等地。苦、辛，温，有毒。入肝、肺、脾经。燥湿化痰，祛风定惊，消肿散结。①治中风痰壅，口眼㖞

斜，半身不遂，风痰眩晕，癫痫，惊风，破伤风，痰湿咳嗽，积聚伏梁。近用治肿瘤。煎服：制南星3～9克。②治痈肿，痰核，跌打损伤，毒蛇咬伤。生品研末敷。天南星中毒，可致舌、喉发痒而灼热，肿大，严重的以致窒息，呼吸停止。天南星块茎含三萜皂甙、苯甲酸、氨基酸及右旋甘露醇等。煎剂有祛痰、镇静、镇痛、解痉作用，鲜天南星水提取液对小白鼠肿瘤有抑制作用。

天荞麦 出《李氏草秘》。为金荞麦之别名，详该条。

天荞 出《名医别录》。为飞廉之别名，详该条。

天星草 见《云南中草药》。为喉咙草之别名，详该条。

天星根 见《广西中草药》。为岗梅根之别名，详该条。

天香炉 出《生草药性备要》。又名金香炉、七孔莲、仰天钟。为野牡丹科植物金锦香Osbeckia chinensis L.的带根全草或根。分布长江以南各地。淡，平。入肺、大肠、肝经。清热利湿，止咳化痰，止血散瘀。治湿热痢，腹泻，咳嗽，哮喘，肺脓疡，吐血，咯血，便血，经闭，产后瘀血作痛，阑尾炎，阿米巴肝脓疡。煎服：15～30克。外敷疔疮疖肿；煎水含漱治齿槽脓肿。全草预试含黄酮甙、酚类、氨基酸。煎剂在试管内对绿脓杆菌、变形杆菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌及金黄色葡萄球菌有抑制作用。

天桥草 见《浙江民间常用草药》。为腹水草之别名，详该条。

天烛子 出《三奇方》。为南天竹子之别名，详该条。

天浆壳 出《现代实用中药》。为萝藦科植物萝藦Metaplexis japonica (Thunb.) Mak.的果壳。主产江苏、上海、浙江。咸，平。止咳，化痰，平喘，透疹。治咳嗽痰多，气喘，百日咳，麻疹透发不畅。煎服：6～9克。

天萝水 出《本草纲目拾遗》。又名丝瓜水。为葫芦科植物丝瓜Luffa cylindrica (L.) Roem.的茎中液汁。甘，寒。消痰火，止咳，解毒。①治咽喉肿痛，急、慢性支气管炎，肺炎，肺痈，肺痿。内服：60～120毫升，煮沸和糖分服。②外涂治烫伤。本品含硝酸钾。

天麻 出《雷公炮炙论》。又名赤箭、明天麻、定风草。为兰科植物天麻Gastrodia elata Bl.的块茎。主产云南、四川、贵州。甘，微温。入肝经。息风，定惊。治虚风眩晕，头风头痛，肢体麻木，半身不遂，癫痫，小儿惊风抽搐。煎服：3～9克。天麻的果实名天麻子，又名还简子，定风补虚，功同天麻。天麻茎叶：捣敷热毒痈肿。本品有效成分为天麻素(Gastrodin)，即对羟甲基苯酚β-D-葡萄糖甙，还含对羟基苯甲醛、对羟基苯甲醇、琥珀酸、β-谷甾醇等。实验证明，本品对小鼠有镇静、抗惊厥作用。醇提取物能治疗豚鼠实验性癫痫。

天麻子果 见《云南中草药》。为蓖麻子之别名，详该条。

天葵 出《滇南本草》。又名紫背天葵、雷丸草、夏无踪。为毛茛科植物天葵Semiaquilegia adoxoides(DC.)Mak.的全草。分布长江中、下游各地，南至广东北部，北达陕西南部。甘，寒，有小毒。清热解毒，利尿。①治瘰疬，肿毒，蛇咬伤。内服或捣敷。②治尿路结石。煎服：9～15克。

天葵子 出《分类草药性》。又名紫背天葵子、千年老鼠屎。为毛茛科植物天葵Semiaquilegia adoxoides (DC.) Mak.的块根。主产江苏、湖南、湖北等地。甘、苦，寒，有小毒。清热解毒，利尿消肿。①治疔疮疖肿，乳腺炎，淋巴结结核，跌打损伤，毒蛇咬伤。内服或外敷。②近用治肝癌，乳癌，淋巴肿瘤，尿路结石。煎服：3～9克。根含生物碱、内酯、香豆素类、酚性成分、氨基酸。煎剂在试管内对金黄色葡萄球菌有

抑制作用。

天鹅抱蛋 见《广西药用植物图志》。为肾蕨之别名，详该条。

天蒜 见《生草药性备要》。为绵枣儿之别名，详该条。

天蓬子根 见《全国中草药汇编》。为搜山虎之别名，详该条。

天蓬草 见《陕西中草药》。为松萝之别名，详该条。

天鼠屎 出《神农本草经》。为夜明砂之别名，详该条。

天膏药 见《浙江民间常用草药》。为千金藤之别名，详该条。

天螺蛳 见《四川中药志》。为蜗牛之别名，详该条。

元寸 见《中国药学大辞典》。为麝香之处方名，详该条。

元芩 见《东北药用植物志》。为黄芩之别名，详该条。

元宝贝 见《浙江中药手册》。为浙贝母之药材名，详该条。

元宝草 出《本草从新》。又名对月草、对叶草、穿心草、穿心箭、叶抱枝。为藤黄科植物元宝草Hypericum sampsonii Hance的全草。分布长江流域和台湾。辛、苦，寒。入肝、脾经。凉血止血，活血行瘀，清热解毒。①治咳血，吐血，衄血，尿血，痢疾，月经不调，白带。煎服：9～15克。②捣敷痈疮疔毒，毒蛇咬伤，烧烫伤。孕妇忌服。本品含金丝桃素(Hypericin)。

元参 见《本草通玄》。即玄参，详该条。

元胡 见《中药材手册》。为延胡索之处方名，详该条。

元胡索 见《药品化义》。即延胡索，详该条。

元修菜 见《本草纲目》。为小巢菜之别名，详该条。

无心草 见《山西中药志》。为木贼之别名，详该条。

无白草 见《上海常用中草药》。为合子草之别名，详该条。

无头藤 见《广东中草药》。为无根藤之别名，详该条。

无灰木 出《本草图经》。即不灰木，详该条。

无爷藤 见萧步丹《岭南采药录》。为无根藤之别名，详该条。

无名异 出《雷公炮炙论》。为软锰矿Pyrolusite的矿石。产广西、广东、四川、山西、湖北、山东、陕西、青海等地。甘，平。活血去瘀，消肿止痛。①治跌打损伤。研细末，水或酒调服，2～3克。②治痈疽肿毒，醋磨涂；臁疮久不愈合，研末撒或油调搽。本品含二氧化锰，尚有铁、钴、镍等杂质。

无花果 出《救荒本草》。又名天生子、蜜果、文仙果、奶浆果。为桑科植物无花果Ficus carica L. 的聚花果。我国各地有栽培。甘，平。入肺、脾、大肠经。润肺止咳，清热润肠。①治支气管炎，哮喘，肺热声嘶，咽喉肿痛，肠炎，痢疾，便秘，痔疮。煎服：15～30克。②捣敷治痈疮肿毒，瘰疬。果实含糖、柠檬酸、延胡索酸、奎尼酸等以及B族维生素、维生素C、生物碱、甙类、树脂、无花果蛋白酶(Ficin)等。无花果各种提取物对大鼠移植性肉瘤、小鼠自发性乳癌及艾氏肉瘤有抑制作用，对麻醉猫、兔有降压作用。内服可用作食物性轻泻剂。所含蛋白酶具有水解蛋白质及凝乳等消化作用。

无柄紫堇 见《浙江民间常用草药》。为夏天无之别名，详该条。

无骨兰麻 出清·赵楷《百草镜》。为白接骨之别名，详该条。

无食子 出《药性论》。即没食子，详该条。

无根草 ❶见清·赵其光《本草求原》。为无根藤之别名。❷见《本草纲目拾遗》。为菟丝之别名。各详该条。

无根藤 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名无爷藤、无头藤、无娘藤、无根草。为樟科植物无根藤 Cassytha filiformis L. 的全草。分布浙江、福建、江西、台湾、湖南、广西、广东、贵州、云南等地。甘、微苦，平，有小毒。入肝、肾经。清热解毒，化湿利水，凉血散瘀。①治感冒发热，急性黄疸型肝炎，肾炎水肿，泌尿系结石，痢疾，白带，咯血，衄血，尿血。煎服：9～15克。②治多发性疖肿，湿疹。捣敷或煎水洗。孕妇忌服。不能采用寄生在有毒植物如钩吻、鱼藤、马桑上的无根藤，误用可致中毒。本品含无根藤碱(Cassythine)、无根藤定碱(Cassythidine)、六驳碱等。尚含半乳糖醇。所含生物碱可致动物惊厥或死亡。

无娘藤 ❶见《广西中草药》。为无根藤之别名。❷见《贵州民间方药集》。为菟丝之别名。各详该条。

无蔺根 见《全国中草药新医疗法展览会资料选编·内科》。又名冇(mǎo卯)刺根。为葡萄科植物粤蛇葡萄 Ampelopsis cantoniensis (Hook.et Arn.) planch. 的根。分布安徽、湖南、江西、浙江、广东、广西、云南等地。清热解毒。①治嗜盐菌食物中毒，风湿性关节炎。煎服：30～45克。②治急性乳腺炎，急性淋巴结炎，骨髓炎，脓疱疮，湿疹，丹毒，疖肿。煎服或外敷。

无患子 出《本草拾遗》。又名洗手果、木患子、油患子、肥珠子、油珠子。为无患子科植物无患树 Sapindus mukorossi Gaertn. 的种子。分布长江以南各地及台湾、湖北西部。苦、微辛，寒，有小毒。清热祛痰，消积杀虫。①治白喉，咽喉炎，扁桃体炎，支气管炎，百日咳，食滞虫积，煎服：3～9克。②治滴虫性阴道炎。煎水冲洗阴道。服用过量，可出现恶心，呕吐等中毒症状。本品含脂肪油。

无患子皮 出《日华子诸家本草》。又名槤子肉皮。为无患子科植物无患树 Sapindus mukorossi Gaertn.的果肉。微苦，平，有小毒。清热化痰，行气消积。①治喉痹。用本品2两，蜜糖4两，浸半月，每次含咽半只，日二至三次。②治心胃气痛，虫积、食积腹痛。用7只煅炭，开水泡服。③捣敷治毒虫咬伤，无名肿毒。服本品中毒，可出现恶心、呕吐等症状。果皮含多种无患子皂甙(Sapindosides)，甙元均为常春藤皂甙元。果实尚含芸香甙、维生素C、鞣质。总皂甙能降低兔血压；对实验性动脉粥样硬化兔，可降低血胆固醇。常春藤皂甙元有抗菌作用。

无患树皮 见《南宁市药物志》。为无患子科植物无患树 Sapindus mukorossi Gaertn.的树皮。治白喉，水煎，含漱；治疥癞，疳疮，煎汤洗。

无患树蕊 见萧步丹《岭南采药录》。为无患子科植物无患树Sapindus mukorossi Gaertn.的根。苦，凉。清热解毒，行气止痛。①治风热感冒，咳嗽，哮喘，慢性胃炎，白浊，白带，蛇咬伤。煎服：15～30克。②煎水含漱治扁桃体炎。无患树嫩枝叶名无患子叶，煎服治百日咳；内服并捣敷治蛇咬伤。

云母 出《神农本草经》。又名白云母、云母石、银精石。为硅酸盐类矿物白云母的片状晶体。产内蒙古、西藏、辽宁、吉林、云南、山东、山西、江苏、浙江、湖南、湖北、安徽、江西等地。甘，平。入肺、脾、膀胱经。益肺，平喘，镇惊，止血，敛疮。①治虚喘，眩晕，惊悸，失眠，癫痫，咯血，吐血，寒疟，久痢，白带。内服：煎汤，9～12克；或入丸、散。②治痈疽疮毒，创伤出血。研末敷。

云母石 见《药材资料汇编》。即云母，详该条。

云连 见《本草从新》。为黄连药材之一种，详黄连条。

云苓 见《中国药学大辞典》。即茯苓，详茯苓条。

云实 出《神农本草经》。又名马豆。为豆科植物云实 Caesalpinia sepiaria Roxb. 的种子。分布长江以南各地。辛，温，有毒。止痢，驱虫。治痢疾，钩虫病，蛔虫病，疟疾。煎服：3～9克。云实的叶名四时青，煎服治产后恶露不尽；研末搽小儿白口疮。云实含脂肪油35%。水煎液给小鼠口服或腹腔注射有止咳、祛痰作用。

云实根 出《本草纲目》。又名倒挂牛。为豆科植物云实 Caesalpinia sepiaria Roxb. 的根或根皮。辛，温。散寒解表，祛风除湿。①治风寒感冒，支气管炎，咽喉肿痛，乳蛾，风湿疼痛，跌打损伤。内服：煎汤，9～15克；捣汁或泡酒服。②治蛇咬伤。煎服或捣烂敷。根皮含鞣质。

云南连翘 见《植物名实图考》。为芒种花之别名，详该条。

云钩藤 见《贵州民间方药集》。为胖血藤之别名，详该条。

云雾草 见《陕西中草药》。为松萝之别名，详该条。

支连 出《药性论》。为黄连之别名，详该条。

木五加 见《广西本草选编》。为枫荷梨之别名，详该条。

木瓜 出《雷公炮炙论》。又名宣木瓜、铁脚梨。为蔷薇科植物贴梗海棠 Chaenomeles lagenaria(Loisel.)koidz. 的果实。主产安徽、浙江、湖北。酸、涩，温。入肝、脾、胃经。和胃化湿，舒筋活络。治吐泻腹痛，腓肠肌痉挛，湿痹，脚气，腰膝无力。煎服：4.5～9克。木瓜根：治脚气；泡酒饮治风湿麻木。果实含皂甙、黄酮类、鞣质、维生素C、苹果酸、酒石酸、柠檬酸。煎剂对小鼠蛋清性关节炎有消肿作用。

木半夏 出《本草拾遗》。又名四月子、野樱桃、麦粒团、明子。为胡颓子科植物木半夏 Elaeagnus multiflora Thunb. 的果实。分布河北、河南、山东、江苏、安徽、浙江、江西等地。涩、微甘，温。活血止血，理气定喘。治跌打损伤吐血，痔疮下血，咳嗽哮喘。煎服：9～15克。木半夏根：煎服治跌打损伤，哮喘；根皮煎水洗恶疮。果实含番茄烃。

木耳 出《神农本草经》。又名木檽、黑木耳。为木耳科植物木耳 Auricularia auricula(L.ex Hook.)Underw. 的子实体。产四川、福建等地。甘，平。入胃、大肠经。益气，凉血，止血。治咯血，吐血，衄血，肠风，血痢，崩漏，痔血，高血压病。煎服：9～30克。止血炒用。本品含蛋白质、脂类、糖类及无机盐。

木芍药 出西晋·崔豹《古今注》。即赤芍药，详该条。

木防己 出《药性论》。又名土防己、青藤根、青藤香、金锁匙。为防己科植物木防己 Cocculus trilobus(Thunb.)DC. 的根。我国除西北地区外，各地均有分布。苦、辛，寒。入膀胱、脾、肾经。祛风止痛，利水消肿，降压，解毒。①治风湿痹痛，水肿，脚气，尿路感染，高血压病。煎服：6～9克。②捣烂外敷治毒蛇咬伤。木防己的茎叶名青檀香，煎服治诸风麻痹，痰湿流注，胃痛。本品含木兰花碱、木防己碱、异木防己碱、木防己胺、木防己宾碱、毛木防己碱(Menisarine)、去甲毛木防己碱等。木防己碱对发热兔有解热作用。对兔小肠、子宫，小量使之兴奋，大量麻痹。动物中毒时死于呼吸衰竭。木防己胺对中枢神经系统有抑制作用。木兰花碱作用见青木香条。

木芙蓉叶 出《本草纲目》。又名芙蓉花叶、拒霜叶、铁箍散。为锦葵科植物木芙蓉 Hibiscus mutabilis L. 的叶。除东北、西北外，广布全国各地。苦、微辛，平。清热解毒，消肿止痛。①治痈疽，疔疮，腮腺炎，带状疱疹，汤火灼伤。捣敷或研末调敷。②治肺痈。煎服：15～30克。③治阑尾炎。鲜品500克，水煎，一日3～5次分服；另用鲜

品适量，加食盐少许捣敷患部。本品预试含黄酮甙、酚类、氨基酸、鞣质、还原糖、粘液质。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

木芙蓉花 出《本草纲目》。又名芙蓉花、三变花、胡索花、拒霜花。为锦葵科植物木芙蓉 Hibiscus mutabilis L.的花。主产浙江、江苏等地。辛，平。入肺、肝经。清热解毒，散瘀消肿，凉血止血。①治痈肿，疔疮。初起可捣敷，已化脓者并宜煎服。②治肺痈、肺热咳嗽，吐血，崩漏，白带。煎服：9～15克。本品含异槲皮甙、金丝桃甙、芸香甙、槲皮黄甙等黄酮甙。红花含矢车菊甙、冬青花色甙(Ilicicyanin)等花色甙。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌及伤寒杆菌有抑制作用。

木芙蓉根 出明·范洪《滇南本草图说》。为锦葵科植物木芙蓉Hibiscus mutabilis L.的根。微辛，凉。清热解毒。治痈肿，肺痈，乳痈，臁疮，咳嗽气喘，白带。煎服：鲜品30～60克。外用：捣敷或研末调敷。根含粘液，主含阿聚糖、半乳聚糖、鼠李聚糖等。

木别子 见《中国药学大辞典》。即木鳖子，详该条。

木灵芝 见《杭州药用植物志》。为灵芝草之别名，详该条。

木附子 见《现代实用中药》。为盐麸子之别名，详该条。

木香 出《神农本草经》。又名广木香。为菊科植物云木香Saussurea lappa Clarke的根。主产云南、四川。辛、苦，温。入肝、脾、胃、大肠经。行气止痛，温中和胃。治中寒气滞，胸腹胀痛，呕吐，反胃，泄泻，痢疾里急后重。生用行气止痛；煨用止泻。内服：煎汤，1.5～4.5克，不宜久煎；研末服，每次0.6～0.9克。本品含挥发油，内有月桂烯、对聚伞花素、芳樟醇、β-榄香烯、丁香烯、葎草烯、雪松烯、β-紫罗兰酮、雪松醇、α-木香醇、单紫杉烯(Aplotaxene)以及木香内酯，木香烯内酯，二氢脱氢木香内酯等。还含白桦脂醇，豆甾醇，生物碱等。生物碱对豚鼠支气管及小肠平滑肌有明显解痉作用。根油中分离出来的某些内酯及去内酯油亦有解除平滑肌痉挛、扩张支气管和降低血压的作用。作用最强的是去内酯油及二氢脱氢木香内酯。可用于支气管哮喘。

木香子 见《全国中草药汇编》。为木姜子之别名，详该条。

木姜子 见《贵州民间药物》。又名山姜子、山胡椒、木樟子、木香子。为樟科植物木姜子Litsea pungens Hemsl.的果实。分布云南、四川、贵州、湖北、湖南、江西、浙江、江苏、河南、甘肃、陕西、山西。辛，温。健脾燥湿，行气散寒。①治胃寒腹痛，消化不良，胀满泄泻。煎服：9～15克。②治疮疡肿毒。捣烂或研末敷。干果含挥发油，主为柠檬醛、香叶醇等。

木姜子根 ❶见《重庆草药》。为木椒根之别名，❷见《四川中药志》。为豆豉姜之别名。各详该条。

木莲果 见《安徽中草药》。为木馒头之别名，详该条。

木莲藤 出《日华子诸家本草》。为薜荔之别名，详该条。

木贼 出《嘉祐补注神农本草》。又名木贼草、锉草、节骨草、无心草。为木贼科植物木贼 Equisetum hiemale L.的地上部分。主产东北地区及陕西。甘、苦，平。入肝、大肠经。散风，退翳，止血。①治目赤肿痛，迎风流泪，角膜云翳，肠风下血，血痢，血崩，月经淋漓，疝痛。煎服：3～9克。②治脱肛。烧存性，研末敷。本品含犬问荆碱(Palustrine)、二甲砜、阿魏酸、咖啡酸、鞣质、山柰酚葡萄糖甙、皂甙及较大量的硅质。牲畜食木贼后可致中毒，引起四肢无力、共济失调、震颤及肌强直，脉弱而频，血化学分析示维生素B缺乏，用大量维生素B有解

毒作用。

木贼草 见《本草经疏》。即木贼，详该条。

木笔花 出《蜀本草》。为辛夷之别名，详该条。

木通 出《药性论》。又名通草、八月炸藤。为木通科植物木通Akebia quinata(Thunb.)Decne.或三叶木通A.trifoliata(Thunb.)Koidz.白木通A.trifoliata(Thunb.)Koidz.var.australis (Diels) Rehd.的茎。主产四川、湖北、湖南、广西等地。苦，微寒。入心、小肠、膀胱经。清心降火，利尿，通乳。治口舌生疮，喉痹咽痛，心烦不眠，尿赤涩痛，淋病，水肿，乳汁不通。煎服：3～6克。孕妇慎服。木通和三叶木通茎均含豆甾醇、β-谷甾醇和β-谷甾醇葡萄糖甙。木通茎还含多种木通皂甙（甙元为常春藤皂甙元和齐墩果酸）及白桦脂醇、内消旋肌醇等。木通浸剂口服有利尿作用，在试管内对铁锈色小孢子菌等皮肤真菌有抑制作用，醇提液能抑制多种革兰氏阳性菌以及痢疾杆菌、伤寒杆菌。

木黄连 见《四川常用中草药》。为十大功劳之别名，详该条。

木患子 见《本草纲目》。为无患子之别名，详该条。

木梨花 见《中国树木分类学》。即茉莉花，详该条。

木绵 出《名医别录》。为杜仲之别名，详该条。

木椒根 见《贵州草药》。又名木姜子根。为樟科植物木姜子 Litsea pungens Hemsl.的根。辛，温。温中理气，祛风散寒。治胃脘冷痛，风湿痹痛，痛经。内服：煎汤，9～15克；研末服，0.9～1.5克。

木棉皮 出《生草药性备要》。为木棉科植物木棉Gossampinus malabarica(DC.)Merr.的树皮。分布云南、贵州、广西、广东。甘，凉。清热利湿，祛风活血。①治慢性胃炎，溃疡病，痢疾，产后浮肿，风湿痹痛，跌打肿痛。煎服：15～30克。②治疮肿。捣敷或煎水洗。

木棉花 出《生草药性备要》。又名攀枝花。为木棉科植物木棉Gossampinus malabarica(DC.)Merr.的花。主产广东、广西等地。甘，凉。清热利湿，止血。治肠炎腹泻，细菌性痢疾，肺结核咯血，血崩，痔疮出血。煎服：6～9克。本品含鞣质及木棉胶。

木棉根 出萧步丹《岭南采药录》。为木棉科植物木棉 Gossampinus malabarica (DC.) Merr.的根。甘，凉。清热利湿，散结止痛。①治慢性胃炎，溃疡病，产后浮肿，赤痢，瘰疬。煎服：15～30克。②治跌打扭伤。浸酒搽或捣敷。本品含蛋白质、鞣质、胶质等。

木蓝 出《本草图经》。又名槐蓝、大蓝、小青。为豆科植物木蓝 Indigofera tinctoria L.的枝叶。分布福建、广东等地，南方各地多有栽培。微苦，寒。清热解毒。①防治流行性乙型脑炎，治腮腺炎。煎服：15～30克。②治疮疡肿毒，丹毒。鲜叶捣敷。木蓝的根名大靛根，煎服治丹毒。全草含靛甙，氧化成靛蓝。

木蒴藋 出《新修本草》。为接骨木之别名，详该条。

木馒头 出《本草纲目》。又名薜荔果、凉粉果、木莲果。为桑科植物薜荔Ficus pumila L.的花序托及果实。产四川、江苏、浙江、广东、广西。甘、涩，平。补肾，固精，活血，通乳。①治肾虚腰酸，阳痿，遗精，乳糜尿，久痢脱肛，痔血，经闭，乳汁不下。煎服：6～15克。②治痈疮，疔肿。煎水洗。花托含芸香甙、β-谷甾醇、蒲公英赛醇乙酸酯、β-香树脂醇乙酸酯及内消旋肌醇。瘦果含多量粘液质。

木槿子 出《本草纲目》。又名朝天子、川槿子。为锦葵科植物木槿Hibiscus syriacus L. 的果实。主产江苏、广西等地。苦，

平。清肺化痰，止痛，解毒。①治肺热咳嗽，痰喘。煎服：9～15克。②内服或煎水熏洗头部治偏正头痛；烧存性，研末敷黄水疮。种子含油，油内非皂化物中含α-、β-及δ-生育酚、β-谷甾醇、菜油甾醇等；皂化物中含锦葵酸、苹婆酸等。

木槿皮 出《本草纲目》。又名川槿皮。为锦葵科植物木槿Hibiscus syriacus L.的茎皮或根皮。主产四川。甘，平。入肝、脾、大肠经。清热利湿，杀虫止痒。①治黄疸，痢疾，肠风泻血，肺痈，肠痈，赤白带下。煎服：3～9克。②治痔疮，脱肛，阴囊湿疹，煎水熏洗；疥疮，癣疾，酒浸搽擦或研末醋调敷。根皮含糅质、粘液质。根与茎的醇浸液在试管内能抑制革兰氏阳性菌、痢疾杆菌及伤寒杆菌。

木槿花 出《日华子诸家本草》。又名篱障花、猪油花、灯盏花、白饭花、朝开暮落花。为锦葵科植物木槿Hibiscus syriacus L.的花。主产江苏、湖北、四川等地。甘，苦，凉。入肺，脾，大肠经。清湿热，凉血，解毒。①治肺热咳嗽吐血，肠风泻血，痢疾，痔血，白带。煎服：3～9克。②治痈肿疮疖。捣敷或研末调敷。木槿叶：煎服治痢疾，肠风。木槿花含肥皂草甙、粘液质。动物试验证明，木槿花粉有致敏作用。

木樟子 见《全国中草药汇编》。为木姜子之别名，详该条。

木蝴蝶 出《本草纲目拾遗》。又名千层纸、千张纸、玉蝴蝶、三百两银药。为紫葳科植物木蝴蝶 Oroxylum indicum(L.) Vent.的种子。主产云南、广西、贵州。甘、苦，凉。入肺、肝、胃经。清肺利咽，疏肝和胃，外用生肌。①治肺热干咳，声音嘶哑，百日咳，咽喉肿痛，扁桃体炎，肝胃气痛。煎服：1.5～3克。②治痈疽疮口不敛。贴患处。本品含脂肪油，其中油酸占80.4%；还含黄芩甙元、特土甙(Tetuin)、木蝴蝶甙(Oroxin)A及B.、白杨素等。

木蝴蝶树皮 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为紫葳科植物木蝴蝶Oroxylum indicum(L.)Vent.的树皮。分布福建、广西、广东、四川、贵州、云南等地。微苦、甘，凉。清热利湿，消肿解毒。①治传染性肝炎，膀胱炎，咽喉肿痛。煎服：9～15克。②治痈疮，湿疹。捣敷或煎水洗。茎皮含木蝴蝶素(Oroxylin)、白杨素、黄芩甙元、黄芩素、黄芩甙元-7-葡萄糖醛酸甙、黄芩素-7-芸香糖甙。本品对动物能减轻多种实验性炎症，降低毛细血管通透性。此外尚有强壮、收敛作用。

木耳 出《经史证类备急本草》。为木耳之别名，详该条。

木鳖子 出《开宝重定本草》。又名土木鳖、木别子。为葫芦科植物木鳖子Momordica cochinchinensis(Lour.) Spr.的成熟种子。主产广西、四川、湖北。苦、微甘，有毒。入肝、脾、胃经。散结，消肿，止痛，追毒。①治痈肿，疔疮，乳痈，瘰疬，痔疮肿痛，干癣，牛皮癣，秃疮，跌打瘀血肿痛。用醋磨汁涂或研末调敷。②治疳积、痞块。煎服：0.3～0.9克，一般入丸、散用。内服宜慎。木鳖根：捣敷治痈疮疔毒，淋巴结炎。木鳖子含多种皂甙，其甙元有木鳖子酸(Momodic acid)、棉根皂甙元(Gypsogenin)。还含脂肪油44.38%，油中含α-桐酸等。此外，还含齐墩果酸、甾醇、海藻糖、蛋白质等。木鳖子的水或醇浸液对麻醉动物有降压作用。大鼠口服或皮下注射木鳖子皂甙，对角叉菜胶引起的足踝浮肿，有抗炎作用。

五匹风 见清·刘士季《草木便方》。为蛇含之别名，详该条。

五气朝阳草 见《昆明民间常用草药》。为蓝布正之别名，详该条。

五爪龙 ❶见《云南中草药》。为五爪金龙之别名。❷见《广西中草药》。为五指毛桃根之别名。❸见《广西本草选编》。为走游草之别名。❹见《分类草药性》。为蛇含之别

名。各详该条。

五爪龙草 见《医学正传》。为乌蔹莓之别名，详该条。

五爪金龙 见《云南中草药》。又名灯笼草、五爪龙、红葡萄、小五爪龙。为葡萄科植物狭叶崖爬藤Tetrastigma hypoglaucum planch.的全株或根。分布云南、四川等地。苦、涩，平。活血祛风，消肿止痛。①治风湿性关节炎，跌打损伤，闭经。内服：煎汤，15～30克；或浸酒服。②治无名肿毒。捣敷。孕妇忌服。

五月红 见《闽东本草》。为茅莓之别名，详该条。

五月花 见《生草药性备要》。为龙船花之别名，详该条。

五风草 见《本草纲目》。为泽漆之别名，详该条。

五龙草 见《本草述》。为乌蔹莓之别名，详该条。

五叶贯芝 见《全国中草药汇编》。为金鸡尾之别名，详该条。

五叶草 ❶见《中国主要植物图说·豆科》。为地羊鹊之别名。❷见《滇南本草》。为老鹳草之别名。各详该条。

五叶藤 见《履巉岩本草》。为乌蔹莓之别名，详该条。

五加皮 出《神农本草经》。又名南五加皮。为五加科植物五加Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith或短梗五加A. sessiflorus Seem.等的根皮。主产湖北、河南、安徽、浙江。辛，温。入肝、肾经。祛风湿，强筋骨。治风寒湿痹，筋骨挛急，腰腿酸疼，下肢痿弱，脚气，水肿，阴囊湿痒。煎服：4.5～9克。五加叶：敷跌打肿痛。五加根皮含挥发油、鞣质等。短梗五加根皮含多种短梗五加甙(Acanthoside)以及强心甙、挥发油等。五加煎剂在试管内对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌有抑制作用。短梗五加醇提取物具抗炎、镇痛、降压以及兴奋子宫和肠管的作用。

五皮风 见《分类草药性》。为蛇含之别名，详该条。

五行草 出《本草图经》。为马齿苋之别名，详该条。

五朵云 ❶见《陕西中草药》。为九牛造之别名。❷见《贵州民间方药集》。为泽漆之别名。❸见《中国高等植物图鉴》。为虎掌草之别名。各详该条。

五色花 见《广西中草药》。为五色梅之别名，详该条。

五色梅 见《广西中药志》。又名龙船花、奥金凤、五色花、如意花。为马鞭草科植物马缨丹Lantana camara L.的叶或带花叶的嫩枝。多栽培于庭园，在南方有野生。苦，寒，有小毒。消肿解毒，祛风止痒。治痈肿疮毒，皮炎，皮肤瘙痒，湿疹，疥癞，跌打损伤。捣敷或煎水洗。叶含马缨丹烯A(Lantadene A)、马缨丹酸(Lantanolic acid)、马缨丹酮(Lancamarone)、生物碱、鞣质、挥发油等。嫩枝含马缨丹烯A、挥发油等。挥发油中主含牻牛儿醇、α-蒎草烯、β-丁香烯、α-水芹烯、桉脑、对聚伞花素等。马缨丹烯A有解热作用。所含生物碱能使犬血压降低，对大鼠能兴奋肠管而抑制子宫。给羊、牛喂叶后可致慢性中毒，引起黄疸并对光敏感，有毒成分为马缨丹烯A。

五色梅花 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为马鞭草科植物马缨丹Lantana camara L.的花。甘、淡，凉。清热解毒，活血止血。治肺结核吐血，腹痛吐泻。煎服：6～9克。治湿疹。晒干研末服，外用鲜枝叶煎水洗。本品含挥发油，其主成分为蒎草烯、β-丁香烯等。另含花色甙类。

五色梅根 见《广西中药志》。为马鞭草科植物马缨丹Lantana camara L.的根。甘、苦，寒。清热解毒，活血祛风。治感冒发热，腮腺炎，瘰疬，胃痛，风湿痹痛，跌打损伤。煎服：15～30克。本品含齐墩果酸。

预试还含黄酮甙、酚类、氨基酸。水提取液给麻醉猫静脉注射有降压作用，并能延长小鼠的巴比妥睡眠时间。

五花血藤 见《湖南药物志》。为九龙藤之别名，详该条。

五谷虫 出《滇南本草》。又名蛆、水仙子、罗仙子。为丽蝇科昆虫大头金蝇Chrysomyia megacephala(Fab.)及其近缘昆虫的干燥幼虫。咸，寒。入脾、胃经。消疳，清热，解毒。①治小儿疳积腹胀。热病神昏，热痢吐食。内服：炙黄研末，1.5～3克，入丸剂用。②治唇疔。研末，香油调敷。含胰蛋白酶(Trypsin)、肠肽酶(Erepsin)、脂肪酶、淀粉酶等。

五灵脂 出《开宝重定本草》。又名灵脂、寒雀粪。为鼯鼠科动物橙足鼯鼠Trogopterus xanthipes Milne-Edwards 的干燥粪便。主产河北、山西。苦、甘，温。入肝、脾经。活血散瘀，止痛。①治经闭，痛经，产后瘀血作痛，脘腹胸胁血滞疼痛，冠心病心绞痛。煎服：4.5～9克，包煎。②治跌打损伤，虫、蛇咬伤。内服并研粉油调敷。孕妇慎用。恶人参。本品含尿素、尿酸、维生素A类物质及多量树脂等。对动物的实验性结核有一定的治疗效果。动物实验，还能缓解平滑肌痉挛。水浸剂在试管内对伤寒杆菌、葡萄球菌等有抑菌作用，高浓度对常见致病皮肤真菌也有某些抑制。

五味子 出《神农本草经》。又名北五味子。为木兰科植物五味子 Schisandra chinensis(Turcz.)Baill. 的果实。主产辽宁、吉林、黑龙江、河北。酸，温。入肺、肾经。敛肺滋肾，止津止汗，涩精止泻，安神。治久嗽虚喘，津少口干，自汗，盗汗，遗精，久泻，瞳孔散大，健忘，失眠。近用于降低谷丙转氨酶。煎服：3～9克。果实含挥发油、有机酸、维生素等。种子含脂肪油，内含木脂素类成分：五味子甲素（即去氧五味子素 Deoxyschizandrin），乙素（即γ-五味子素），和丙素，五味子醇甲（即五味子素）和乙（即Gomisin A），五味子酯甲（Wuweiziester A即Gomisin C.）和乙（即Gomisin B）等。浸膏或酊剂对中枢神经有强壮作用，能改善智力活动，消除疲乏。煎剂能兴奋呼吸中枢。仁的醇提取物则有镇静、抗惊厥作用。并能降低实验性肝损害所致的血清转氨酶增高。上述作用的有效成分为木脂素，特别是五味子乙素。五味子能增强机体对非特异性刺激的防御能力，增强肾上腺皮质功能，促进基础代谢，调节胃液和胆汁分泌，并有止咳、祛痰、兴奋子宫平滑肌等作用。此外，在试管内对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌和绿脓杆菌有一定的抑制作用。

五毒草 见《广西中药志》。为杠板归之别名，详该条。

五指毛桃根 见《广东中草药》。又名土黄芪、五爪龙。为桑科植物粗叶榕Ficus simplicissima Lour.或佛掌榕F. simplicissima Lour. var. hirla Migo. 的根。分布我国南部及西南部。甘，平。益气健脾，祛痰止咳，舒筋活络，通乳。①治病后体弱，自汗，肺结核咳嗽，慢性支气管炎。②治脾虚浮肿，风湿性关节炎，带下，产后无乳。煎服：15～30克。动物实验，煎剂对小鼠有止咳作用。在试管内对金黄色葡萄球菌、甲型链球菌有抑制作用。

五指柑 见《广西中药志》。为佛手柑之别名，详该条。

五香八角 见《全国中草药汇编》。为八角茴香之别名，详该条。

五香草 见《陕西植物药调查》。为牛至之别名，详该条。

五倍子 出《本草拾遗》。为倍蚜科昆虫五倍子蚜和倍蛋蚜寄生在漆树科植物盐肤木Rhus chinensis Mill.或青麸杨R. potaninii Maxim.等叶上形成的虫瘿。产四川、贵州、云南、陕西、湖北、广西等地。酸，平。

入肺、肾、大肠经。敛肺，涩肠，止血，解毒。①治肺虚久咳，久痢，久泻，咯血，衄血，便血，痔血，肾虚遗精，遗尿。煎服：1.5～4.5克。②研末敷脐治自汗，盗汗；煎水熏洗治脱肛，子宫脱垂；研末调敷治湿疮，鹅口疮，宫颈糜烂，疮疖肿毒，外伤出血。盐肤木虫瘿主含五倍子鞣酸。还含没食子酸、脂肪、树脂及腊质等。因含鞣质，有收敛、局部止血、解毒、抗菌等作用。大量鞣酸能干扰食物的吸收，更大量可引起刺激、腐蚀而导致腹痛、吐泻或便秘。

五倍子苗 出《履巉岩本草》。为漆树科植物盐肤木Rhus chinensis Mill.的幼嫩茎枝。除青海、新疆外，各地均有分布。治咽喉疼痛，发声不出。研末作丸服。

五倍根 见《分类草药性》。为盐肤子根之别名，详该条。

五眼子 见广州军区空军卫生部《常用中草药手册》。为百眼藤之别名，详该条。

五眼果 见《广西中草药》。为广枣之别名，详该条。

五眼果树皮 见《南宁市药物志》。为漆树科植物南酸枣Choerospondias axillaris (Roxb.)Burtt et Hill的树皮。分布湖南、湖北、广东、广西、贵州、云南、福建、浙江。酸、涩，凉。清热解毒，收敛止血。治烧烫伤，浓煎液涂创面；阴囊湿疹，牛皮癣，煎水洗；外伤出血，研末敷。本品含鞣质。抑菌试验，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌均有抑制作用。

五敛子 出《南方草木状》。为阳桃之别名，详该条。

五棱子 见《药材资料汇编》。为使君子之别名，详该条。

不灰木 出《开宝重定本草》。又名无灰木。为角闪石石棉的矿石。甘、淡，寒。清热，除烦，利尿。①治烦热阳厥，小便不利。内服：研末，0.3～1克；或入丸、散。②治热痱疮。配枣叶、石灰研粉撒布。本品主含水化硅酸镁。

不怕日草 见《泉州本草》。为鹿角草之别名，详该条。

冇(mǎo卯)刺根 见南京药学院《中草药学》。即无刺根，详该条。

太子参 出《本草从新》。又名孩儿参。为石竹科植物异叶假繁缕 Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm. 的块根。主产江苏、山东、安徽。甘，平。入肺、脾经。补充健脾，养胃生津。治体虚乏力，食少倦怠，脾虚泄泻，肺虚咳嗽，自汗少气，心悸，津伤口渴，急、慢性肝炎。煎服：6～12克。本品含皂甙及果糖。

太白石 出《名医别录》。为矾石之别名，详该条。

太白参 见《陕西中草药》。又名太白洋参、黑洋参。为玄参科植物大卫马先蒿Pedicularis davidii Franch. 或美观马先蒿 P. decora Franch. 等的根。主产陕西。甘、微苦，温。滋阴补肾，益气健脾。治体弱不思饮食，肾虚眩晕，骨蒸潮热，关节疼痛。煎服：9～15克。

太白树 见《陕西中草药》。为石蕊之别名，详该条。

太白洋参 见《陕西中草药》。即太白参，详该条。

太白黄连 见《陕西中草药》。为黄三七之别名，详该条。

太极子 见《中药形性经验鉴别法》。为马槟榔之别名，详该条。

犬尾草 见《福建民间草药》。即狗尾草，详该条。

扎蓬棵 见《河北中药手册》。为猪毛菜之别名，详该条。

瓦韦 出《新修本草》。又名剑丹、七星草、骨牌草。为水龙骨科植物瓦韦 Lepisorus thunbergianus(Kaulf.) Ching 的全草。分布华东、中南、西南各地。苦，凉。清热解毒，利尿止血。①治淋病，痢疾，咳

嗽吐血。煎服：15～30克。②治牙疳，煅灰存性，涂敷；蛇咬伤，痈肿，捣烂敷。

瓦鸟柴 见《贵州民间方药集》。为铁筷子之别名，详该条。

瓦弄子 见《东北动物药》。即瓦楞子，详该条。

瓦花 出《摘元方》。为瓦松之别名，详该条。

瓦松 出《新修本草》。又名瓦花、瓦塔、向天草、昨叶荷草。为景天科植物瓦松Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berg. 或瓦花O.japonicus(Maxim.)Berg.等的全草。我国各地均有分布。酸，平。入肝、肺经。凉血，止血，利湿，敛疮。①治鼻衄，吐血，便血，血痢，肝炎，淋浊。煎服：15～30克。②治疮口久不愈合。研末撒或调涂。瓦松全草含大量草酸。

瓦垄子 出《丹溪心法》。即瓦楞子，详该条。

瓦参 见《昆明民间常用草药》。为土人参之别名，详该条。

瓦草 出《滇南本草》。又名滇白前、青骨藤。为石竹科植物瓦草Melandryum viscidulum(Franch.)Hand.-Mazz. var. szechuanense (Wills.)Hand.-Mazz.的根。分布云南、四川、贵州等地。辛、苦，凉，有小毒。清热，化痰，止痛，利尿。①治肺热咳嗽，风湿疼痛，跌打损伤，淋病。煎服：9～15克。②治外伤出血。研末敷。

瓦塔 见《河北药材》。为瓦松之别名，详该条。

瓦楞子 出《本草备要》。又名瓦垄子、瓦弄子、蚶子壳、魁蛤壳。为蚶科动物魁蚶Arca inflata Reeve.泥蚶A. granosa L.或毛蚶A. subcrenala Lischke的贝壳。主产浙江、江苏、山东、广东、辽宁等地。甘、咸，平。入肝、脾、胃经。制酸止痛，消痰，软坚。治胃痛、嘈杂、吐酸，顽痰积结，瘰疬，瘀血癥瘕。内服：煎汤，9～15克，宜打碎先煎；或研末冲服，每次1.5～3克。制酸煅用，消痰软坚生用。本品主含碳酸钙、磷酸钙。还含少量镁、铁等。碳酸钙有抗胃酸作用。

车轮菜 见《救荒本草》。为车前草之别名，详该条。

车前子 出《神农本草经》。又名车前实、猪耳朵穗子、凤眼前仁。为车前科植物车前Plantago asiatica L.或平车前P. depressa Willd.的种子。主产江西、河南、湖北、东北等地。甘，寒。入肾、膀胱经。利水，清热，明目，祛痰。治小便不利，淋浊，带下，暑湿泻痢，咳嗽多痰，目赤翳障，眼目昏花，迎风流泪。煎服：4.5～9克，包煎。本品含桃叶珊瑚甙、6-氨基嘌呤、多量粘液质、胆碱等。动物试验，本品有利尿及祛痰止咳作用。

车前实 出《神仙服食经》。即车前子，详该条。

车前草 出《四声本草》。又名蟾蜍草、牛舌草、田菠草、打官司草、虾蟆衣、车轮菜、猪耳草。为车前科植物车前Plantago asiatica L. 或平车前 P. depressa Willd. 的全草。我国大部分地区有产。甘，寒。清热利尿，明目降压，祛痰止咳。①治小便不利，淋浊带下，尿血，黄疸，水肿，热痢，泄泻，目赤肿痛，高血压病，气管炎，百日咳。煎服：9～15克。②鲜叶捣汁含漱治喉痹，乳蛾；捣敷治金疮血出不止，疮疡溃烂。车前全草含桃叶珊瑚甙，可能是其利尿成分。还含有镇咳、祛痰作用的车前甙（Plantagin）以及熊果酸、β-谷甾醇等。

车桑仔叶 见《福建中草药》。为无患子科植物坡柳 Dodonaea viscosa(L.)Jacq. 的叶。分布西南和华南。淡，平，有毒。消肿解毒。外用：捣敷疔疮肿毒；研末调敷治湿疹，汤火伤。本品含β-谷甾醇、豆甾醇、异鼠李素、异鼠李素-3-芸香糖甙、槲皮素-3-半乳糖甙、槲皮素-3-芸香糖甙、鞣质、

生物碱。

牙皂 见《本事方》。为猪牙皂之简称，详该条。

牙齿草 见《滇南本草》。为眼子菜之别名，详该条。

牙肿消 见《南京民间药草》。为一年蓬之别名，详该条。

牙刷草 见《江苏省植物药材志》。为半枝莲之别名，详该条。

牙痛子 见《本草原始》。为天仙子之别名，详该条。

牙痛草 ❶见《云南中草药选》。为铁仔之别名。❷见《江西草药》。为鹿茸草之别名。各详该条。

巨胜 出《神农本草经》。为黑脂麻之别名，详该条。

巨胜苗 出《神农本草经》。为胡麻叶之别名，详该条。

【丨】

止血丹 见《安徽中草药》。为断血流之别名，详该条。

止血树 见《云南中草药选》。为滑叶跌打之别名，详该条。

止血草 ❶见《福建民间草药》。为紫珠之别名。❷见《安徽中草药》。为墨旱莲之别名。各详该条。

少辛 见《本草纲目》。为细辛之别名，详该条。

日日新 见《广州植物志》。为长春花之别名，详该条。

内红消 见《江西中药》。为红木香之别名，详该条。

见气消 见《全国中草药汇编》。为牛奶浆草之别名，详该条。

见风青 见《贵州民间方药集》。为虎掌草之别名，详该条。

见风消 见《分类草药性》。为山胡椒叶之别名，详该条。

见血飞 ❶见《分类草药性》。为飞龙掌血之别名。❷见《贵州民间药物》。为竹叶椒根之别名。各详该条。

见血住 见《湖北科技》(医药部分)(1)；40～2，1972.。为黄开口之别名，详该条。

见血清 见《民间常用草药汇编》。又名毛慈姑、黑兰、肉螃蟹。为兰科植物脉纹羊耳兰Liparis nervosa(Thunb.)Lindl.的全草。分布台湾、江西、福建、湖南、广西、广东、四川、贵州等地。苦，寒。凉血止血，清热解毒。①治咯血，吐血，肠风便血，血崩，小儿惊风。煎服：6～12克。②治热毒疮疡，创伤出血。捣烂敷或干粉撒。本品含脉纹羊耳兰碱(Nervosine)。水煎剂能缩短血凝时间。

见肿消 ❶见《南京民间药草》。为白蔹之别名。❷见《陕西中草药》。为金刚散之别名。❸见《江苏药材志》。为鬼箭羽之别名。❹见《分类草药》。为商陆之别名。❺见《陕西中草药》。为蓝布正之别名。各详该条。

见毒消 见《江西草药》。为蛇葡萄之别名，详该条。

【丿】

午时合 出《生草药性备要》。为排钱草之别名，详该条。

牛人参 见《浙江民间常用草药》。为豨莶之别名，详该条。

牛大力 见萧步丹《岭南采药录》。为山莲藕之别名，详该条。

牛大黄 见《湖南药物志》。为商陆之别名，详该条。

牛子 见《江苏省植物药材志》。为牛蒡子之简称，详该条。

牛马藤 出清·刘士季《草本便方》。又名过山龙、油麻血藤、黎豆藤。为豆科植物常绿油麻藤Mucuna sempervirens Hemsl.的根及茎叶。分布云南、四川、贵州、湖北、

江西、浙江、福建。甘，温。行血补血，祛风活络。治风湿痹痛，四肢麻木，跌打损伤，痛经，闭经，贫血。内服：煎汤，12～30克；或浸酒服。

牛心茶 见《辽宁经济植物志》。为红旱莲之别名，详该条。

牛奶子树 见《江西民间草药验方》。为琴叶榕之别名，详该条。

牛奶根 见《分类草药性》。为胡颓子根之别名，详该条。

牛奶柴 见《福建中草药》。为琴叶榕之别名，详该条。

牛奶浆草 见《中草药土方土法》。又名见气消、柳州七、铁凉伞。为大戟科植物牛奶浆草Euphorbia hippocrepica Hemsl.的根或茎。分布湖南、湖北等地。微苦、涩，寒，有毒。逐水消肿。治血吸虫病腹水，水肿，胸腔积液。内服：研末（装入胶囊），2.4～4.5克，每日一次，连服五至十天。如需续服，须间隔一个月再用。药后忌食盐三个月。服本品后有恶心、呕吐，或头昏、腹痛、腹泻等反应。用糖衣片剂可减少副作用，药后服适量胡椒水，亦可防止呕吐。孕妇、新产以及心力衰竭、食道静脉曲张、身体虚弱者，忌服。本品对动物有导泻作用，可有利于腹水的减轻。

牛奶浆根 见《浙江民间常用草药》。又名毛天仙果根。为桑科植物天仙果 Ficus beecheyana Hook. et Arn. 的根。分布广西、广东、湖南、江西、福建、台湾和浙江。甘、辛，温。入肺、脾、肾经。健脾益气，活血祛风。治气虚食少，劳倦乏力，乳汁不通，月经不调，白带，风湿痹痛。煎服：30～60克。

牛皮冻 见《植物名实图考》。为鸡屎藤之别名，详该条。

牛皮胶 出《本草图经》。即黄明胶，详该条。

牛皮菜 见《滇南本草》。为菩送菜之别名，详该条。

牛耳大黄 见《陕西中草药》。为牛西西之别名，详该条。

牛西西 见《天津中草药》。又名土大黄、牛耳大黄、金不换。为蓼科植物巴天酸模 Rumex patientia L. 等数种同属植物的根。分布黑龙江、辽宁、河北、山西、陕西、青海等地。苦、酸，寒，有小毒。凉血止血，清热解毒，通便杀虫。①治吐血，咯血，鼻衄，牙龈出血，溃疡病呕血、便血，功能性子宫出血，紫癜。②治慢性肝炎，痢疾，热结便秘，阑尾炎。煎服：9～15克。③治疥癣，疮疖，脂溢性皮炎。鲜根捣汁或干根研末加醋调敷。本品含大黄酚、大黄素、大黄素甲醚、芦荟大黄素等。还含蒽醌类的甙。大黄酚灌胃或皮下注射能缩短小鼠血凝时间。牛西西缩短兔血凝时间的作用比仙鹤草素、维生素K强。血小板减少症患者口服煎剂可使血小板数有所上升。此外，本品较大剂量有致泻作用，对动物尚有祛痰、镇咳及平喘作用。

牛至 见《中药志》。又名土香薷、土茵陈、五香草。为唇形科植物牛至 Origanum vulgare L.的全草。分布新疆、甘肃、陕西、河南至江南各地。辛，凉。解表，理气，化湿，利水。①治感冒发热，胸闷，吐泻，黄疸，水肿，小儿疳积。煎服：9～15克。②治跌打损伤，皮肤瘙痒。捣敷或煎水洗。茎、叶含挥发油，内有百里香酚、香荆芥酚、牻牛儿乙酸酯等。还含黄酮甙和咖啡酸等多种羧酸。酊剂有明显利尿作用，浸剂有祛痰作用。在体外对某些常见致病性真菌有抑制作用。

牛肉 出《名医别录》。为牛科动物黄牛 Bos taurus domesticus Gmelin或水牛Bubalus bubalis L.的肉。甘，平。入脾、胃经。补脾胃，益气血，强筋骨。治虚痨羸瘦，脾虚食欲不振，腰膝酸软。内服：煮熟食。每100克牛肉含蛋白质约20.1克，脂肪10.2

克，维生素$B_1$0.07毫克、$B_2$0.15毫克，钙7毫克，磷170毫克，铁0.90毫克。又含胆甾醇125毫克%。

牛舌大黄 见《植物名实图考》。为羊蹄之别名，详该条。

牛舌头 见《民间常用草药汇编》。为苣荬菜之别名，详该条。

牛舌头草 见《陕西中草药》。为拦路虎之别名，详该条。

牛舌头菜 见《云南中草药》。为黑阳参之别名，详该条。

牛舌草 见陆玑《诗疏》。为车前草之别名，详该条。

牛舌黄 见《福建民间草药》。为球兰之别名，详该条。

牛舌癀 见《福建中草药》。为兴尾风之别名，详该条。

牛李 出《吴普本草》。为鼠李之别名，详该条。

牛李根 出《传信适用方》。为鼠李根之别名，详该条。

牛舍水 见《甘肃卫生通讯》(3)：35，1972。又名倒爪草、紫花秧、刺儿草。为玄参科植物紫花秧 Dodartia orientalis L.的全草。分布新疆、内蒙古、甘肃、四川等地。清热解毒，止咳化痰，散风止痒。①治肺炎，支气管炎，扁桃体炎，乳腺炎，急性结膜炎，急性淋巴结炎，尿路感染。煎服：15～30克。②治荨麻疹，皮肤瘙痒，湿疹。煎水洗。

牛肝 出《名医别录》。为牛科动物黄牛Bos taurus domesticus Gmelin或水牛Bubalus bubalis L.的肝。甘，平。补肝，养血，明目。治虚劳羸瘦，血虚萎黄，青盲，雀目。内服：煮食或入丸、散服。本品每100克含水分69克，蛋白质18.9克，碳水化物9克，脂肪2.6克，灰分0.9克，钙13毫克，磷240毫克，铁9毫克，维生素$B_1$0.39毫克、维生素$B_2$2.3毫克，尼克酸16.2毫克，维生素C18毫克，维生素A18300单位。还含各种酶、磷脂、胆甾醇、肝糖元等。

牛角七 见《陕甘宁青中草药选》。为慕荷之别名，详该条。

牛角花 ❶见《植物名实图考》。为地羊鹊之别名。❷见《贵州民间方药集》。为淫羊藿之别名。各详该条。

牛角胎 见《本草纲目》。即牛角鰓，详该条。

牛角鰓 出《神农本草经》。又名牛角胎、角心。为牛科动物黄牛Bos taurus domesticus Gmelin或水牛Bubalus bubalis L.角中的骨质角髓。苦，温。入心、肝经。化瘀，止血。治经闭腹痛，血崩，赤白带下，便血，痢疾，水泻。内服：煎汤，6～12克；或入散剂。本品含碳酸钙、磷酸钙等。

牛角藤 见《广西药用植物名录》。为古钩藤之别名，详该条。

牛尾七 见《陕西中草药》。为竹根七之别名，详该条。

牛尾巴花 见《山东中药》。为青葙之别名，详该条。

牛尾花子 见《中药材手册》。为青葙子之别名，详该条。

牛尾参 见《昆明民间常用草药》。为青羊参之别名，详该条。

牛尾菜 见《江西草药》。又名大伸筋草、牛尾蕨、七层楼。为百合科植物牛尾菜Smilax riparia A.DC.的根及根茎。分布江苏、浙江、江西、湖南、湖北、广东、广西、贵州、四川、云南、陕西等地。甘、苦，平。补气活血，祛风通络，化痰止咳。治气虚浮肿，风湿痹痛，偏瘫，跌打损伤，咳嗽咯血。内服：煎汤，9～15克；或泡酒服。本品含有镇咳作用的皂甙、蒽醌甙。

牛尾蕨 见《广西本草选编》。为牛尾菜之别名，详该条。

牛刺竹菜 见《江西民间草药验方》。为大蓟之别名，详该条。

牛刺梨 见《湖南药物志》。为苦芙之别名，详该条。

牛乳 出《本草经集注》。为牛科动物黄牛 Bos taurus domesticus Gmelin 或水牛Bubalus bubalis L.的乳汁。甘，平。入肺、胃经。补虚，生津，润肠。治虚弱羸瘦，反胃噎膈，消渴，便秘。内服：煮沸饮。每100克含水分约87克，蛋白质3.1克，脂肪3.5克，碳水化物6克，灰分0.7克，维生素$B_1$0.04毫克，维生素$B_2$0.13毫克，尼克酸0.2毫克，维生素C 1毫克，维生素A140单位。

牛虱子 见《贵州民间方药集》。为苍耳子之别名，详该条。

牛参 见《湖南药物志》。为苦参之别名，详该条。

牛细辛 见《湖南药物志》。为及己之别名，详该条。

牛迭肚 见《中国高等植物图鉴》。为托盘之别名，详该条。

牛虻 见《本草崇原》。即虻虫，详该条。

牛胆 出《神农本草经》。为牛科动物黄牛Bos taurus domesticus Gmelin 或水牛Bubalus Bubalis L.的胆。苦，寒。入肝、胆、肺经。镇肝阳明目，利胆，止咳。治风热目赤，小儿惊风痰热，黄疸，慢性便秘，百日咳。内服：研末，0.3～0.9克；或入丸、散。外用：点眼。本品含胆酸、脱氧胆酸、鹅脱氧胆酸、甘胆酸、牛磺胆酸、石胆酸、胆甾醇、卵磷脂、胆碱等。

牛屎虫 见《苏州本产药材》。为蜣螂之别名，详该条。

牛顿草 见《闽南民间草药》。为牛筋草之别名，详该条。

牛黄 出《神农本草经》。又名西黄。为牛科动物黄牛Bos taurus domesticus Gmelin 或水牛 Bubalus bubalis L. 胆囊中的结石。全国各地均产，以西北、西南、东北等地较多。苦、甘，凉。入心、肝经。清心开窍，豁痰定惊，清热解毒。①治热病高热烦躁、神昏、谵语、惊痫、发狂，小儿惊风抽搐，热痰壅盛。②治咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔毒。研末服：0.15～0.45克。一般多入丸、散用。外用：研末敷患处。孕妇慎服。本品含胆酸、去氧胆酸、胆甾醇、胆红素、卵磷脂、维生素D等。又含两种酸性肽类成分，能收缩平滑肌，包括胆囊平滑肌及胆道口括约肌，并能防止毒物对肝脏的损害。去氧胆酸有镇静、抗惊厥及利胆作用。牛黄小剂量有抗贫血作用及某些强心作用。胆酸盐不能作静脉注射。

牛筋条根 见《四川中药志》。为山胡椒根之别名，详该条。

牛筋草 ❶出《本草纲目拾遗》。又名蟋蟀草、路边草、扁草、千斤草、牛顿草。为禾本科植物牛筋草Eleusine indica (L.) Gaertn.的全草。分布全国各地。甘、淡，平。清热解毒，祛风利湿，散瘀止血。①治伤暑发热，小儿急惊，风湿性关节炎，黄疸，肠炎，痢疾，淋浊。煎服：9～15克。②治跌打损伤，外伤出血。鲜草捣敷。本品含蛋白质、淀粉、脂肪、硝酸盐、亚硝酸盐。❷见《河南中草药手册》。为铁线草之别名，详该条。

牛蒡子 出《本草图经》。又名恶实、大力子、牛子、鼠粘子。为菊科植物牛蒡 Arctium lappa L.的果实。主产东北及河北、浙江。辛、苦，寒。入肺、胃经。疏风，透疹，利咽，消肿。治风热感冒，咳嗽，疹出不畅，咽喉肿痛，荨麻疹，流行性腮腺炎，痈肿疮毒。煎服：4.5～9克。牛蒡茎叶：煎汤当茶饮治乳痈。本品含牛蒡甙（Arctiin）、异牛蒡酚（Isoarctigenin）、牛蒡子酚（Lappaol）A、B、C、D、E等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。水浸剂对多种致病性真菌有抑制。提取物能降低大鼠血糖。牛蒡甙能引起蛙、小鼠、兔强

直性惊厥，最后麻痹。

牛蒡根 出《药性论》。又名恶实根、鼠粘根。为菊科植物牛蒡Arctium lappa L.的根。分布全国各地，野生或栽培。苦，寒。入肺经。祛风热，消肿毒。治风热头面赤肿，咽喉肿痛，咳嗽，龈肿牙痛，痈疽疮疥。内服：煎汤，30～60克；或捣汁服。外用捣敷。本品含咖啡酸、绿原酸、异绿原酸、牛蒡酸（Arctic acid）、巴豆酸、亚油酸、亚麻酸、多炔物质及可用二氯甲烷和乙醇提取的抗肿瘤物质等。多炔物质有抗菌和抗真菌作用。

牛腿子 见《全国中草药汇编》。为藤杜仲之别名，详该条。

牛膝 出《神农本草经》。又名怀牛膝。为苋科植物牛膝Achyranthes bidentata Blume的根。主产河南。苦、酸，平。入肝、肾经。生用活血，行瘀，消肿，治经闭，痛经，瘕瘕，产后瘀积腹痛，淋痛，尿血，高血压病，喉痹，痈肿。酒制补肝肾，强筋骨，治寒湿痿痹，腰脊酸痛，足膝软弱。煎服：9～15克。孕妇忌服。牛膝茎叶：煎服治寒湿痿痹，腰膝疼痛，久疟，淋病。本品含三萜皂甙（其中一个甙元是齐墩果酸）、多量钾盐、蜕皮甾酮、牛膝甾酮（Inokosterol），又含β-谷甾醇、豆甾醇、β-香树脂醇、氨基酸、琥珀酸等。醇浸液对大鼠实验性关节炎有抑制作用。对小鼠实验性疼痛（扭体反应）有一定缓解作用。流浸膏对多种动物子宫有兴奋作用，少数为抑制（因动物种类不同）。流浸膏对狗、兔有短暂降压和轻度利尿作用，并能抑制心脏和肠管的收缩。

牛髓 出《神农本草经》。为牛科动物黄牛Bos taurus domesticus Gmelin或水牛Bubalus bubalis L.的骨髓。甘，温。润肺，补肾，助胃。①治虚劳羸瘦，伤损骨折，泄利，消渴。煮汁或熬膏服。②煎油涂擦伤损骨痛。本品每100克含水3克，蛋白质0.5克，脂肪95.8克，灰分0.3克，维生素B_1微量，维生素$B_2$0.01毫克，尼克酸0.05毫克。

·气包 见《东北药用植物志》。为赤胞之别名，详该条。

气藤 见《贵州草药》。为血藤之别名，详该条。

手儿参 见《陕西中草药》。为手掌参之别名，详该条。

手爪甲 出《日华子诸家本草》。为人指甲之别名，详该条。

手掌参 见《东北药用植物志》。又名掌参、佛手参、手儿参、阴阳参。为兰科植物手参Gymnadenia conopsea R.Br.或粗脉手参G.crassinervis Finet的块茎。前者分布东北、华北、西北及四川；后者分布云南、西藏。甘，平。入肺、脾经。补脾润肺，益气养血。治肺虚咳喘，病后体弱，神经衰弱，慢性肝炎，久泻，白带，乳少。煎服：9～30克。本品含粘液质、淀粉、蛋白质、糖类，草酸钙及无机盐。其水提取物能利尿，但剂量过大反能降低尿量。

毛七公 见《南宁市药物志》。为漆大姑之别名，详该条。

毛七哥 见《陆川本草》。为漆大姑之别名，详该条。

毛大丁草 见《中国药用植物志》。又名一枝香、一炷香、兔耳风。为菊科植物毛大丁草Gerbera piloselloides Cass.的全草。分布江西、福建、广东、四川、云南等地。苦、辛，平。入肺、肾经。宣肺止咳，利水，散瘀，解毒。①治感冒发热，咳嗽痰多，水肿，淋浊，小便不通，泄泻，痢疾。煎服：9～15克。②治跌打损伤，痈疽疔疮，蛇咬伤。捣烂敷。

毛大丁草根 见《闽东本草》。又名白花白头翁。为菊科植物毛大丁草 Gerbera piloselloides Cass.的根及根茎。苦，平。清热解毒，理气和血。治痈肿，乳蛾，痄

腮，瘰疬，疝气，痢疾，便血。煎服：6～9克。外用：捣烂敷。根含毛大丁草醛(Piloselloidal)，毛大丁草酮(Piloselloidone)，羟基毛大丁草酮，羟基异毛大丁草酮，环毛大丁草酮和去氧去氢环毛大丁草酮（Desoxodehydrocyclopiloselloidone）。

毛山茶 见《全国中草药汇编》。为山腊梅叶之别名，详该条。

毛天仙果根 见《浙江民间常用草药》。为牛奶浆根之别名，详该条。

毛爪参 见《云南经济植物》。为白云花根之别名，详该条。

毛风藤 见《江西民间草药》。为白毛藤之别名，详该条。

毛叶仙桥 见《贵州民间方药集》。为茅莓之别名，详该条。

毛冬青 见《广西中草药》。又名喉毒药、乌尾丁。为冬青科植物毛冬青Ilex pubescens Hook.et Arn.的根。分布广东、广西、安徽、福建、江西、浙江、台湾等地。苦、涩，寒。活血通脉，清热解毒。①治冠心病心绞痛，心肌梗死，脑血管意外所致的偏瘫，血栓闭塞性脉管炎，风热感冒，肺热咳嗽，咽喉炎，扁桃体炎，中心性视网膜炎。煎服：30～90克②治烧烫伤，痈肿疮疖。研末调涂或煎液湿敷。本品含黄酮甙、酚性成分、甾醇、氨基酸、糖类、鞣质、三萜类。黄酮甙可降低动物血压，也能增加冠脉流量，但有快速耐受现象。煎剂对小鼠有祛痰、镇咳作用，在体外对某些革兰氏阳性、阴性细菌有抑制作用。

毛冬青叶 见《广西中草药》。为冬青科植物毛冬青Ilex pubescens Hook. et Arn.的叶。苦、涩，平。清热解毒。①治烧烫伤。煎服：3～9克。外用纱布蘸药液湿敷。②治外伤出血，痈肿疮疖。研末撒或捣敷。本品含熊果酸、齐墩果酸。

毛召 见《陆川本草》。为韶子之别名，详该条。

毛地梨 见《中国药用植物志》。为光慈菇之别名，详该条。

毛卷虎 见《生草药性备要》。为羊耳菊之别名，详该条。

毛芋 见《中国药用植物图鉴》。即芋头，详该条。

毛血藤 见《贵州民间方药集》。为胖血藤之别名，详该条。

毛青杠 见《民间常用草药汇编》。为红毛走马胎之别名，详该条。

毛刷子 见《江西民间草药验方》，为苦地胆之别名，详该条。

毛建草 出《本草拾遗》。为毛茛之别名，详该条。

毛姑 见《本草从新》。为山慈姑之别名，详该条。

毛姑朵花 见《东北植物药图志》。为白头翁之别名，详该条。

毛菌陈 见《湖南药物志》。为鹿茸草之别名，详该条。

毛茛 出《本草拾遗》。又名毛建草、老虎脚迹草、野芹菜、起泡草。为毛茛科植物毛茛Ranunculus japonicus Thunb.的全草。我国大部分地区有分布。辛，温，有毒。退黄，截疟，平喘，止痛，消肿。用鲜品捣烂外敷，可治以下各症：黄疸，敷列缺或内关穴；疟疾，敷大椎或内关穴（发作前3～6小时用）；哮喘，敷大椎或肺俞穴；风湿关节痛，敷疼痛关节附近穴位；鹤膝风，敷膝眼穴。敷治后局部皮肤有灼热感或起泡时即应除去，用消毒纱布覆盖。本品含原白头翁素，对革兰氏阳性及阴性细菌、白色念珠菌都有抑制作用。接触皮肤有强烈刺激性，内服则可引起剧烈胃肠炎。对组胺引起的支气管痉挛和回肠收缩有对抗作用。

毛蕊枝 见《植物名实图考》。为韶子之别名，详该条。

毛姜 见《本草正义》。为骨碎补之别名，详该条。

毛姜黄 见《全国中草药汇编》。即姜黄，详该条。

毛柴子 见《江西草药》。为华山矾之别名，详该条。

毛凉伞 见《广西中草药》。为红毛走马胎之别名，详该条。

毛黄连 见《辽宁经济植物志》。为鲜黄连之别名，详该条。

毛梨 见《四川常用中草药》。为猕猴桃之别名，详该条。

毛葫芦 见萧步丹《岭南采药录》。为鸡屎藤之别名，详该条。

毛慈姑 ❶见《药材资料汇编》。即山慈姑。❷见《浙江民间常用草药》。为见血清之别名。各详该条。

毛蓼 见《植物名实图考》。为金线草之别名，详该条。

毛箐箕藤 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为银不换之别名，详该条。

毛漆 见《陆川本草》。为漆大姑之别名，详该条。

毛藤果 见清·赵楷《百草镜》。为鬼目之别名，详该条。

毛麝香 出《生草药性备要》。又名饼草、香草、麝香草。为玄参科植物毛麝香Adenosma glutinosum(L.)Druce的全草。分布云南、广西、广东、江西、福建。辛、苦，温。疏风活络，行气散瘀，解毒。①治小儿麻痹症初期，风湿痹痛，腹痛。煎服：9～15克。②治跌打损伤，疮疡，捣敷；湿疹，荨麻疹，煎水洗。本品显黄酮甙、酚类、三萜、氨基酸、挥发油反应。

升麻 出《神农本草经》。又名绿升麻、龙眼根。为毛茛科植物升麻Cimicifuga foetida L.、兴安升麻 C. dahurica(Turcz.) Maxim. 或大三叶升麻 C. heracleifolia Kom.的根茎。主产陕西、四川、辽宁、吉林、黑龙江、河北。甘、辛、微苦，凉。入肺、脾、胃经。散风热，透疹，升提，解毒。治风湿头痛，麻疹透发不畅，热病身发斑疹，久泻，久痢，脱肛，胃下垂，子宫脱垂，胃火牙痛，齿龈腐臭，口舌生疮，咽喉肿痛。煎服：3～9克。升麻根茎含升麻碱、阿魏酸、异阿魏酸等。兴安升麻根茎含升麻环氧醇(Cimigenol)及其木糖甙（Cimigenoside）、兴安升麻醇(Dahurinol)、齿阿米素（Visnagin）、齿阿米醇(Visamminol)、异阿魏酸、阿魏酸等。大三叶升麻根茎含生物碱。升麻碱能使皮肤充血，内服则引起胃肠炎，未发现有特殊药理作用。水提取液有镇静作用，抑制离体肠管及妊娠子宫而兴奋膀胱及未孕子宫平滑肌。

升登 见《中国药典·一部》1977年版。又名生等。为鼠李科植物升登Rhamnella gilgitica Mansfeld et Melchior 的木材。微苦，凉。凉血，利湿消肿。治类风湿性关节炎，黄水病，高原性红细胞增多症。煎服：9～15克。外用：熬膏涂敷。

长生花 见《上海常用中草药》。为千日红之别名，详该条。

长生果 出《本经逢原》。为落花生之别名，详该条。

长生草 ❶见《花镜》。为卷柏之别名。❷见《本草纲目》。为独活之别名。各详该条。

长虫七 见《陕西中草药》。为长春七之别名，详该条。

长春七 见《陕西中草药》。又名长虫七。为伞形科植物长春七Seseli giraldii Diels的根。分布陕西、甘肃、四川等地。辛、甘，温。发散风寒，祛风活络，镇痛。治感冒，咳嗽，头痛，牙痛，风湿疼痛，跌打损伤。内服：煎汤，6～9克；或浸酒服。

长春花 见《中国药用植物图鉴》。又名雁来红、日日新。为夹竹桃科植物长春花Catharanthus roseus(L.)G.Don 的全草。长江以南各地都有栽培。微苦，凉，有毒。抗癌，降血压，清热解毒。①治淋巴网状细

胞肉瘤，绒毛膜上皮癌，急性淋巴细胞性白血病。用提取物长春碱、长春新碱注射剂注射。②治高血压病。煎服：9～15克。③外敷治痈疮肿毒，烧烫伤。本品已分离出约64种生物碱，其中有长春碱、长春新碱、异长春碱、环氧长春碱、长春西文碱（Leurosivine）、罗维定碱（Rovidine）、卡罗新碱（Carosine）以及派利文碱（Perivine）、派利维定碱（Perividine）、派利卡灵碱（Pericalline）、洛柯尼灵碱（Lochnerine）、洛柯绕维新碱（Lochrovicine）、文朵灵碱（Vindoline）、文朵尼宁碱（Vindolinine）、文考尼定碱（Vincolidine）、泻花碱（Catharanthine）、四氢鸭脚木碱（Tetrahydroalstonine）等。长春碱对何杰金氏病、绒毛膜上皮癌疗效较好，长春新碱则对恶性淋巴瘤及急性白血病的疗效较高。长春碱的主要毒性为抑制骨髓功能，长春新碱对神经系统及胃肠道的毒性较突出。长春新碱小量使血小板数升高，大量则使之减少。总碱降低动物血压，但长春新碱却可升高血压。其中所含的某些生物碱有利尿、降低血糖作用。

长瓠 见《本草纲目》。即瓠子，详该条。

长深根 见《云南中草药》。为白牛膝之别名，详该条。

化血莲 见《江西草药》。为土大黄之别名，详该条。

化州陈皮 见《本草从新》。为化橘红之别名，详该条。

化骨莲 见《草药手册》。为玉簪花之别名，详该条。

化食丹 见《上海中草药学》。为刘寄奴之别名，详该条。

化痰青 见《四川中药志》。为九头狮子草之别名，详该条。

化橘红 出《识药辨微》。又名柚皮橘红、化州陈皮。为芸香科植物化州柚Citrus grandis(L.)Osbeck var.tomentosa Hort.或柚C. grandis（L.）Osbeck的外果皮。主产广东、广西等地。苦、辛，温。入脾、肺经。燥湿化痰，下气健胃。治咳嗽气喘，痰多，呕吐噫气，食积。煎服：3～6克。柚的种子名柚核，煎服治小肠疝气。外果皮含挥发油、柚皮甙、新橙皮甙、枳属甙等。种子含黄柏酮（Obacunone）、黄柏内酯（Obaculactone）、去乙酰闹米林（Deacetylnomilin）。柚皮甙注射对小鼠、大鼠实验性炎症均有明显抗炎作用，并降低毛细血管通透性，增加毛细血管抵抗力。此外，对小鼠的病毒感染、X射线照射有一定的保护作用。

片子姜黄 见《本草纲目》。为姜黄之药材名，详该条。

片姜黄 见《临证指南医案》。为姜黄之处方名，详该条。

片脑 见《寿域神方》。即龙脑冰片，为冰片药材之一种，详该条。

反背红 ❶见《民间常用草药汇编》。为大肺筋草之别名。❷见《贵阳民间药草》。为血盆草之别名。各详该条。

反鼻蛇 见《本草纲目》。为蝮蛇之别名，详该条。

分心木 见《山西中药志》。又名胡桃夹、胡桃隔。为胡桃科植物胡桃Juglans regia L.果核内的木质隔膜。苦、涩，平。入脾、肾经。固肾涩精。治遗精、滑精，腰痛，耳聋，遗溺，尿频，尿血，崩中，带下，泻痢，噎膈。煎服：6～9克。

分经草 见《河南中草药手册》。为通经草之别名，详该条。

公丁香 见《本草原始》。即丁香，详该条。

公道老 见《全国中草药汇编》。为接骨木之别名，详该条。

月下红 见《苏州本产药材》。为石见穿之别名，详该条。

月月红 见《本草纲目》。为月季花之别

名，详该条。

月石 见《三因极一病证方论》。为硼砂之别名，详该条。

月季红 见《陕西中药志》。为月季花之别名，详该条。

月季花 出《本草纲目》。又名月月红、四季花、月季红。为蔷薇科植物月季Rosa chinensis Jacq.的花蕾或初开放的花。我国大部分地区均有栽培。甘，温。入肝经。活血调经，消肿解毒。①治月经不调，经闭，痛经。煎服：3～6克。②治痈疖肿毒，瘰疬，跌扑瘀肿。鲜品捣烂敷。孕妇忌服。本品含微量挥发油。

月亮柴 见《贵州植物药调查》。为黄栌之别名，详该条。

月橘 出《中山传信录》。为九里香之别名，详该条。

丹皮 见《本草正》。为牡丹皮之简称，详该条。

丹参 出《神农本草经》。又名红根、紫丹参、血参根、大红袍。为唇形科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bge.的根。主产河北、安徽、江苏、四川等地。苦，凉。入心、肝经。活血祛瘀，安神宁心。①治月经不调，闭经，痛经，产后瘀滞腹痛，冠心病心绞痛，癥瘕积聚，风湿痹痛，心悸，失眠。煎服：9～15克。②治乳腺炎，痈肿。内服并捣敷。反藜芦。本品含丹参酮Ⅰ、ⅠA、ⅠB，隐丹参酮，羟基丹参酮ⅡA，二氢丹参酮，丹参酸甲酯，次甲丹参醌，丹参新醌甲、乙、丙，β-谷甾醇，3,4-二羟基苯甲醛，儿茶精，芸香甙，维生素E等。注射液能降低血压，增加冠脉流量，减慢心率，缩短实验性心肌缺血的持续时间，还有抑制血小板聚集及抗凝作用，减轻急性实验性心肌梗塞所引起的病变。对中枢神经系统具镇静作用。隐丹参酮、二氢丹参酮、羟基丹参酮ⅠA、丹参酸甲酯及丹参酮ⅠB对金黄色葡萄球菌及其耐药菌株有抑菌作用。醇浸液在试管内对结核杆菌及某些真菌有抑制作用，对小鼠实验性结核病有治疗效果。也能降低兔血糖。

丹荔 见《本草纲目》。为荔枝之别名，详该条。

丹砂 出《神农本草经》。即朱砂，详该条。

丹粉 出《新修本草》。为铅丹之别名，详该条。

风车草 见《江西草药》。为四叶草之别名，详该条。

风气草 见《全国中草药汇编》。为下田菊之别名，详该条。

风化硝 见《本草蒙筌》。为玄明粉之别名，详该条。

风茄花 见清·赵其光《本草求原》。为洋金花之别名，详该条。

风轮菜 出《救荒本草》。又名蜂窝草、苦地胆、九塔草。为唇形科植物风轮菜Clinopodium chinense (Benth.) O. Ktze.的全草。分布中南、华东、西南各地。苦、辛，凉。疏风清热，解毒消肿，止血。①治感冒，中暑，胆囊炎，肝炎，痢疾，肠炎。煎服：9～15克。②治疔疮肿毒，皮肤瘙痒，外伤出血。捣敷或研末菜油调敷。本品含黄酮甙、皂甙、内酯、有机酸、无机盐等。

风药 见《本草纲目》。为石南叶之别名，详该条。

风壶 见《广西中兽医药用植物》。为宝盖草之别名，详该条。

风栗壳 见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。为栗毛球之别名，详该条。

风湿草 见《上海常用中草药》。为豨莶之别名，详该条。

风箱树叶 见《草药手册》。为茜草科植物风箱树Cephalanthus occidentalis L.的叶或嫩芽。分布长江以南各地及台湾。苦，凉。清热解毒，收湿止痒。①治急性胃肠炎，细菌性痢疾。煎服：9～15克。②治湿

疮，跌打损伤，捣敷；天疱疮，研末调敷；风火牙痛，煎水含漱。

风箱树根 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名水杨梅根。为茜草科植物风箱树Cephalanthus occidentalis L.的根或根皮。苦，凉。清热化湿，化痰止咳。治感冒发热，肺热咳嗽，咽喉肿痛，肠炎，细菌性痢疾，腮腺炎，乳腺炎。煎服：30～60克。

风藤 见《中药志》。为海风藤之别名，详该条。

风仙子 见《本草纲目》。为急性子之别名，详该条。

风仙花 出《救荒本草》。又名指甲花。为凤仙花科植物凤仙Impatiens balsamina L.的花。我国大部分地区有栽培。甘，温，有小毒。活血通经，祛风止痛，消肿解毒。①治闭经，产后瘀血未尽，腰胁引痛，跌打伤痛，关节疼痛。煎服：3～6克。②治痈疽疔疮，蛇咬伤，鹅掌风。鲜品捣烂涂敷。孕妇忌服。本品含多种花色甙，还含指甲花醌及其甲酯、山柰酚、槲皮素等。水浸液在体外对某些致病真菌有抑制作用。煎剂对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌及绿脓、伤寒、痢痢杆菌也有抑制作用。

凤仙花子 出《摘元方》。为急性子之别名，详该条。

凤仙根 出《本草纲目》。为凤仙花科植物凤仙Impatiens balsamina L.的根。苦、甘、辛，平。有小毒。活血，消肿。①治风湿筋骨疼痛。内服：研末冲，9～15克；或浸酒服。②治跌扑肿痛。研末服或捣敷。③治咽喉骨鲠。用本品嚼烂噙下，即用温水漱漱，免损齿。本品含矢车菊素甙。

凤仙透骨草 见《中药大辞典》。又名透骨草。为凤仙花科植物凤仙Impatiens balsamina L.的茎。主产江苏。苦、辛，平，有小毒。祛风，活血，消肿，止痛。①治关节风湿痛，屈伸不利。内服，煎汤，6～9克。外用：煎水熏洗患处。②治跌扑损伤，瘀肿疼痛，煎服，或捣汁酒冲服；瘰疬，痈肿，捣敷，或水煎浓缩成膏，以纸摊贴患处。凤仙花全草含指甲花醌及其甲醚，山柰酚和它的3-阿拉伯糖甙以及山柰酚的、槲皮素的、蹄纹天竺素的和矢车菊素的3-葡萄糖甙，1，2，4-三羟基萘-4-葡萄糖甙等。还含对羟基苯甲酸，龙胆酸，阿魏酸，对香豆酸，芥子酸，咖啡酸，东莨菪素等。

凤交尾 见《湖南药物志》。为夜关门之别名，详该条。

凤芽蒿 见《陕西中草药》。为百蕊草之别名，详该条。

凤尾连 见《福建中草药》。为小叶金花草之别名，详该条。

凤尾伸筋 见《湖南药物志》。为伸筋草之别名，详该条。

凤尾草 出《植物名实图考》。又名背阴草、金鸡尾、鸡脚草、井口边草、凤尾蕨。为凤尾蕨科植物凤尾草Pteris multifida Poir.的全草或根。分布华东、中南及河北、陕西、甘肃、四川、贵州等地。淡、微苦，凉。入肝、肾、大肠经。清热利湿，凉血解毒。①治湿热痢，泄泻，黄疸，淋浊，带下，鼻衄，吐血，尿血，便血，崩漏，感冒发热，咽喉肿痛，乳腺炎。煎服：9～18克。②治腮腺炎，疔疮，湿疹，鲜品捣烂敷；荨麻疹，凤尾草适量，食盐少许，水煎洗。全草含鞣质、黄酮类、甾醇、氨基酸、内酯或酯类、酚性成分。煎剂在体外试验中，对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌有抑制作用。

凤尾蕨 见《广西中兽医药用植物》。为凤尾草之别名，详该条。

凤尾蕉花 见《福建民间草药》。为铁树花之别名，详该条。

凤眼果 出《生草药性备要》。又名频婆果、罗晃子。为梧桐科植物苹婆Sterculia

nobilis smith 的种子。分布广东、广西、贵州等地。甘，温。温胃，杀虫。治虫积腹痛，反胃，疝痛。煎服：七枚。凤眼果壳：煎服治痢疾；煅灰冲酒饮治小肠疝气；煎水洗痔疮。

凤眼草 出《本草品汇精要》。又名樗树子、臭椿子。为苦木科植物臭椿Ailanthus altissima（Mill.）Swingle 的翅果。全国大部分地区均产。苦、涩，寒。清热燥湿，止血，止带，杀虫。①治痢疾，便血，尿血，崩漏，带下。煎服：3～9克。②治阴道滴虫，水煎冲洗。本品含臭椿苦酮（Ailanthone）、臭椿内酯（Ailantholide）、查把任酮（Chaparrinone）、苦木素（Quassin）等。

凤眼前仁 见《中药材手册》。为车前子之别名，详该条。

凤凰衣 出《医学入门·本草》。又名鸡蛋膜、鸡子白皮、凤凰退。为雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson 的卵壳内膜。甘，平。入肺经。养阴，润肺，开音，止咳；外用生肌敛疮。①治久咳咽痛，失音。煎服：3～9克。②治口疮，口疳，乳蛾，喉痈，焙黄，研末吹患处；小儿头身诸疮，烧灰猪脂调敷。本品主含角蛋白，其中杂有少量粘蛋白纤维（Mucin fibers）。

凤凰肠 见《生草药性备要》。为朱砂根之别名，详该条。

凤凰草 见《南宁市药物志》。为肾蕨之别名，详该条。

凤凰退 见《本草蒙筌》。即凤凰衣，详该条。

凤凰蛋 见《植物名实图考》。为铁树果之别名，详该条。

凤颈草 见《本草纲目》。为马鞭草之别名，详该条。

乌口仔 见《广东中药》。为铁包金之别名，详该条。

乌云盖雪 见《广西中草药》。为梵天花之别名，详该条。

乌牛子 见《本草纲目拾遗》。为丝瓜子之别名，详该条。

乌龙须 见清·刘士季《草木便方》。为马桑根之别名，详该条。

乌龙根 见《广东中药》。为铁包金之别名，详该条。

乌龙摆尾叶 见《湖南药物志》。为乌泡刺叶之别名，详该条。

乌龙摆尾根 见《湖南药物志》。为乌泡刺根之别名，详该条。

乌芋 出《广雅》。为荸荠之别名，详该条。

乌豆 出《肘后方》。即黑大豆，详该条。

乌豆衣 见《中药临床应用》。为黑大豆皮之别名，详该条。

乌豆草 见《贵州草药》。为大肺筋草之别名，详该条。

乌饭果 见《药材学》。为南烛子之别名，详该条。

乌角 见《湖南野生植物》。为蕨根之别名，详该条。

乌疔草 见《福建中草药》。为龙葵之别名，详该条。

乌尾丁 见《广西中草药》。为毛冬青之别名，详该条。

乌鸡 出《普济方》。即乌骨鸡，详该条。

乌鸢 见《本草纲目》。为鸢尾之别名，详该条。

乌鱼 见《滇南本草》。即鳢鱼，详该条。

乌金藤 见《福建民间草药》。为老鼠耳之别名，详该条。

乌泡叶 见《湖南药物志》。为乌泡刺叶之简称，详该条。

乌泡刺叶 见《全国中草药汇编》。又名乌龙摆尾叶。为蔷薇科植物灰白毛莓Rubus

tephrodes Hance的叶。分布安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广西。酸、甘，平。止血，解毒。治外伤出血，瘰疬，痈疖疮疡，捣敷；跌打损伤，捣烂取汁兑酒服。

乌泡刺根 见《全国中草药汇编》。又名乌龙摆尾根、乌泡根。为蔷薇科植物灰白毛莓Rubus tephrodes Hance的根。酸、甘，平。祛风除湿，活血。治产后感冒，风湿疼痛，慢性肝炎，腹泻，痢疾，闭经，月经不调，跌打损伤。煎服：15～30克。

乌泡根 见《湖南药物志》。为乌泡刺根之简称，详该条。

乌茶子 见《天宝本草》。为乌桕子之别名，详该条。

乌药 出《本草拾遗》。又名台乌药。为樟科植物乌药 Lindera strychnifolia (Sieb. et Zucc.) Villar的块根。主产浙江、湖南、安徽、广东、广西。辛，温。入脾、肺、肾、膀胱经。顺气止痛，散寒温肾。治脘腹胀痛，反胃吐食，宿食不消，气厥头痛，疝痛，痛经，小便频数，遗尿。煎服：3～9克。本品含挥发油，内有多种倍半萜成分：钓樟内酯(Linderalactone)、钓樟根内酯(Lindestrenolide)、钓樟烯醇(Linderene; Linderenol)、钓樟烯(Lindenene)、钓樟根烯(Lindestrene)等。还含新木姜子碱(Laurolitsine)、钓樟醇(即龙脑)、乌药酸(Linderaic acid)、谷甾醇。

乌药叶 出《本草拾遗》。又名蒡箕茶。为樟科植物乌药 Lindera strychnifolia (Sieb. et Zucc.) Villar的叶。分布广东、广西、台湾、福建、湖南、湖北、江西、浙江、安徽、江苏等地。温中燥脾，理气，止痛。①治腹中寒痛，食积，小便滑数。煎服：4.5～9克。②治风湿性关节炎、跌打肿痛。鲜叶捣烂酒炒敷。

乌韭 出《神农本草经》。为大叶金花草之别名，详该条。

乌骨鸡 出《本草纲目》。又名乌鸡、绒毛鸡、竹丝鸡。为雉科动物乌骨鸡(家鸡 Gallus gallus domesticus Brisson 之一种)除去内脏的全体。甘，平。入肝、肾经。养阴，退热，补中。治虚劳瘦弱，骨蒸潮热，脾虚泄泻，消渴，崩漏，赤白带，遗精，白浊。煨食或入丸、散。

乌骨藤 见《云南中草药选》。为通光散之别名，详该条。

乌桕子 出《本草拾遗》。又名乌茶子。为大戟科植物乌桕Sapium sebiferum(L.) Roxb. 的种子。甘，凉，有毒。消肿，杀虫。治肿毒，疥癣，榨油涂或研末调敷；手足皲裂，捣烂煎水浸泡。忌内服。种子蜡层含固体脂74.75%，壳含34.94%。种仁含油64.1%，内含毒素，不能食用。

乌桕木根皮 出《本草纲目》。又名卷子根、卷根白皮。为大戟科植物乌桕 Sapium sebiferum (L.) Roxb. 的根皮。分布华东、西南、华南及湖南、湖北、陕西、甘肃、河南等地。苦，微温，有毒。入脾、肾、大肠经。泻下逐水，消肿解毒。①治肝硬化腹水，大小便不利。煎服：6～12克。②治毒蛇咬伤，根皮30克和甜米酒、米泔水隔水炖沸，分二次服，将药渣敷伤口周围。③捣烂敷乳痈，疔疮；煎水洗疥癣，湿疹，皮炎。本品副作用为呕吐较剧，孕妇及溃疡病、胃炎患者忌服。本品含花椒油素，能杀肠虫。根煎剂有泻下作用。

乌桕叶 出《本草拾遗》。又名卷子叶、油子叶、虹叶。为大戟科植物乌桕 Sapium sebiferum (L.) Roxb. 的叶。苦，微温，有毒。杀虫，止痒。①治霉菌性阴道炎，湿疹，脚癣，煎水洗；乳痈疖肿，捣烂敷；毒蛇咬伤，捣汁服，渣敷伤口周围。②治血吸虫病。煎服：6～12克。剂量过大，可引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头痛、心慌、冷汗等中毒症状。孕妇忌服。本品含无羁萜、鞣云实精(Corilagin)、莽草酸、

并没食子酸、没食子酸、异槲皮甙、β-谷甾醇等。煎剂有泻下作用；在体外对金黄色葡萄球菌、痢疾、大肠、绿脓杆菌及钩端螺旋体均有抑制作用。

乌贼鱼骨 出《神农本草经》。为海螵蛸之别名，详该条。

乌贼鱼腹中墨 出《本草拾遗》。又名乌贼墨。为乌鲗科动物金乌鲗Sepia esculenta Hoyle. 或无针乌鲗 Sepiella maindroni de Rochebrune 等墨囊中的墨液。治血刺心痛，功能性子宫出血，支气管扩张出血，胃出血，肺结核、肺癌咯血，尿血以及宫颈癌出血。烘干研末装胶囊或醋调服，每次1～2克，一日二次。墨囊中的墨液主要成分为乌贼黑色素，是吲哚醌的聚合物，与蛋白结合或不结合。

乌贼墨 见《青岛中草药手册》。即乌贼鱼腹中墨，详该条。

乌扇 出《神农本草经》。为射干之别名，详该条。

乌梅 出《本草经集注》。又名梅实、熏梅。为蔷薇科植物梅Prunus mume(sieb.) Sieb, et Zucc.的未成熟果实经炕焙而成。主产四川、浙江、福建、湖南、贵州。酸、涩，温。入肝、脾、肺、大肠经。敛肺，涩肠，生津，安蛔，止血。①治肺虚久咳，久泻，久痢，虚热烦渴，蛔虫病腹痛，便血，尿血，血崩。煎服：3～9克。②治牛皮癣。熬膏服：每次9克，每日三次。③治疮疡腐肉，乌梅炭研末敷；鸡眼，用乌梅和盐水、米醋研烂涂敷。本品含柠檬酸、苹果酸、琥珀酸、苯甲酸、齐墩果酸、谷甾醇。种子含苦杏仁甙。乙醇或热水浸出液在体外对金黄色葡萄球菌，大肠、伤寒、副伤寒、痢疾、枯草、变形、结核杆菌均有抑制作用；亦能抑制某些常见致病性真菌。煎剂能减少豚鼠蛋白质过敏性休克的死亡，对离体兔肠有抑制作用。

乌菜 见《中国经济海藻志》。为鹧鸪菜之别名，详该条。

乌梢蛇 出《本草纲目》。又名乌蛇、黑风蛇。为游蛇科动物乌梢蛇Zaocys dhumnades (cantor)除去内脏的干燥全体。主产浙江、江苏、贵州、湖北等地。甘，平。入肝、肺经。祛风湿，通经络，攻毒。治风湿痹痛，肌肤麻木，骨、关节结核，小儿麻痹症，破伤风，麻风，皮疹瘙痒，疥癣。内服：煎汤，4.5～12克；研粉吞服，每次0.9～1.5克。亦可浸酒服。

乌蛇 出《药性论》。为乌梢蛇之简称。详该条。

乌蛇胆 出《本草纲目》。为游蛇科动物乌梢蛇Zaocys dhumn ades (cantor)的胆。苦、微甘，凉。祛风通窍，明目去翳。①治痰迷心窍，风热发狂，小儿惊搐，制成丸剂或水调服；眼雾不明，兑酒吞服。②治角膜溃疡。制成眼药水滴眼。

乌脚枪 见《陆川本草》。又名过坛龙、铁线草、黑脚蕨、黑骨芒箕。为铁扇蕨科植物扇叶铁线蕨Adiantum flabellulatum L. 的全草。分布西南、中南及浙江、福建、台湾等地。微辛、涩，凉。清热利湿，散瘀消肿。①治感冒，痢疾，腹泻，肝炎，尿路结石。内服：煎汤，15～30克；或捣汁服。②治跌打肿痛，疔疮，毒蛇咬伤，烫伤，外伤出血。捣敷或研末调敷。本品预试含黄酮甙、有机酸、氨基酸、酚类及糖类。

乌麻子 出《备急千金要方》。为黑脂麻之别名，详该条。

乌麻花 出《备急千金要方》。即胡麻花，详该条。

乌鼠子 出《本草图经》。为鼠李之别名，详该条。

乌樟子 见《贵州药用植物目录》。又名水黄杨木。为远志科植物尾叶远志 Polygala caudata Rehd. et wils. 的根。分布华南及西南地区。甘，平。止咳平喘，清热利湿。治咳嗽，支气管炎，黄疸型肝炎。煎服：

15～30克。根含具止咳作用的乌棒子黄酮和有祛痰作用的皂甙。现已确定乌棒子黄酮就是优叫酮（Euxanthone）。

乌蒜 见《本草纲目》。为石蒜之别名，详该条。

乌蔹莓 出《新修本草》。又名五爪龙草、五叶藤、五龙草、老鸦眼睛藤、老母猪藤。为葡萄科植物乌蔹莓Cayratia japonica（Thunb.）Gagn.的全草。分布华东、中南各地。苦、酸，寒。入心，小肠经。清热解毒，凉血，利尿。①治痈肿，疔疮，乳痈，痄腮，丹毒，蛇虫咬伤，跌打肿痛。捣汁或煎服，并捣烂外敷。②治咽喉肿痛，黄疸，痢疾，咳血，尿血，尿道涩痛，风湿性关节炎。煎服：15～30克。全草含阿聚糖、甾醇、氨基酸、酚性成分及黄酮类。根含生物碱、鞣质。果皮含乌蔹莓素（Cayratinin）。本品在体外对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、痢疾、大肠杆菌、钩端螺旋体均有抑制作用。

乌鲗骨 出《黄帝内经素问》。为海螵蛸之别名，详该条。

乌檀 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为胆木之别名，详该条。

乌蕨子 见《本草纲目》。为覆盆子之别名，详该条。

〔丶〕

六月冻 见《江西草药》。为腐婢之别名，详该条。

六月凌 见《植物名实图考》。为鬼箭羽之别名，详该条。

六月雪 ❶见《陆川本草》。为广东土牛膝之别名。❷见《四川中药志》。为马牙半支之别名。各详该条。

六月寒 见《陕甘宁青中草药选》。为鹅脚板之别名，详该条。

六月霜 ❶见《中药材手册》。为刘寄奴之别名。❷见《江西草药》。为鹿茸草之别名。各详该条。

六方疳积草 见《江西草药》。为爵床之别名，详该条。

六耳棱 见《广西本草选编》。为六棱菊之别名，详该条。

六达草 见《全国中草药汇编》。为六棱菊之别名，详该条。

六曲 见《中国药学大辞典》。为神曲之处方名，详该条。

六谷米 见《中药形性经验鉴别法》。为薏苡仁之别名，详该条。

六轴子 见《饮片新参》。又名土连翘、山芝麻、闹羊花子、八厘麻子。为杜鹃花科植物羊踯躅Rhododendron molle（Bl.）G. Don的果序。产江苏、安徽、浙江、湖南、湖北、河南。苦，温，有大毒。祛风止痛，散瘀消肿。①治风寒湿痹，骨节肿痛，跌打损伤。内服：研末，0.3～0.9克；或入丸、散。②治痈疽，疔毒。研末调敷。内服过量易致中毒，参见闹羊花条。孕妇忌服。本品含八厘麻毒素。药理作用及毒性参见闹羊花条。

六神曲 见《本草便读》。为神曲之处方名，详该条。

六棱菊 见《福建民间草药》。又名鹿耳苓、臭灵丹、八楞风、六耳棱、羊耳三稔、六达草。为菊科植物六棱菊Laggera alata（Roxb.）Sch.—Bip.的全草。分布我国东部、南部及西南各地。苦、辛，温。入肺、脾、膀胱经。祛风利湿，活血解毒。①治感冒咳嗽，风湿关节痛，经闭，肾炎水肿，跌打损伤。煎服：9～15克，鲜品30～60克。②治疔痈瘰疬，湿疹，烧烫伤，蛇咬伤，捣敷或煎水洗。本品含生物碱和皂甙。预试还含黄酮甙、酚类、有机酸、糖类等。叶、花均含挥发油。

文仙果 见清·刘士季《草木便方》。为无花果之别名，详该条。

文先果 见《四川中药志》。为刺梨之别名，详该条。

文冠木 见《东北常用中草药手册》。为无患子科植物文冠果 Xanthoceras sorbifolia Bge. 茎干或枝条的木部。分布东北、华北、甘肃、河南。甘，平，无毒。祛风湿，消肿止痛，收敛黄水。治风湿性关节炎，风湿内热，皮肤风湿。煎服：9～15克。外用：煎水洗或熬膏涂。

文钱红 见《陆川本草》。为锦地罗之别名，详该条。

方通草 见《中国药学大辞典》。为通草之处方名，详该条。

火把花 见《云南中草药》。为蛾药之别名，详该条。

火把果 出《滇南本草》。为赤阳子之别名，详该条。

火草 见《云南中草药》。为蛾药之别名，详该条。

火殃笋 见《广州植物志》。即火秧笋，详该条。

火炭母草 出《本草图经》。又名喉科草、黄鳝藤。为蓼科植物火炭母草Polygonum chinense L. 的全草。产广东、广西、四川、贵州、福建等地。微酸、涩，凉。清热解毒，化滞利湿，退翳消肿。①治感冒，咽喉肿痛，肺热咳嗽，百日咳，白喉。②治细菌性痢疾，肠炎，消化不良，黄疸型肝炎。煎服：15～30克。③治角膜云翳，制成眼药水滴眼；乳痈，疖肿，跌打损伤，鲜品捣敷；霉菌性阴道炎，煎水坐浴，浴后用其干粉喷撒。全草预试含黄酮甙。茎、叶醇提液在体外对金黄色葡萄球菌，大肠、伤寒、痢疾、绿脓杆菌有抑制作用。

火炭母草根 见《重庆草药》。为蓼科植物火炭母草Polygonum chinense L. 的根。酸、甘，平。益气，行血。治气虚头昏，耳鸣，耳聋，白带，跌打损伤。煎服：9～15克（鲜品30～60克）；炖鸡或炖肉服。根中含肌醇及谷氨酸、天门冬氨酸、胱氨酸、蛋氨酸、丝氨酸等多种氨基酸。

火绒草 见《黑龙江常用中草药手册》。又名老头草、小矛香艾、薄雪草。为菊科植物火绒草 Leontopodium leontopodioides (willd.) Beauv. 的地上部分。分布东北及河北、内蒙古、山东、甘肃、新疆、宁夏、青海等地。微苦，寒。清热凉血，利水。治急慢性肾炎，尿血。煎服：9～15克。

火秧笋 出《生草药性备要》。又名火殃笋、霸王鞭、羊不挨。为大戟科植物金刚纂 Euphorbia antiquorum L. 的茎叶或液汁。分布广东、广西、云南、贵州、四川、台湾、福建。苦，寒，有毒。消肿，杀虫，去湿，通便。①治痈肿疮毒，鲜茎叶捣烂同酒糟炒热敷；治疥癣，鲜茎醋磨涂患处。②治急性胃肠炎。煎服：3～6克，同米炒焦用。③治肝硬化腹水。取液汁拌入面粉制丸，如绿豆大，每服1～2丸。内服过量会引起下利，液汁与皮肤接触可引起皮炎、发泡，入眼可致失明。孕妇忌服。本品含蒲公英赛醇、蒲公英赛酮、3α-无羁萜醇、3β-无羁萜醇、甾醇及黄酮类等。

火烧草 见《履巉岩本草》。为佛甲草之别名，详该条。

火消 见《本草纲目》。为消石之别名，详该条。

火烟子 见《陕西草药》。为金牛七之别名，详该条。

火麻仁 出《日用本草》。又名麻子、麻子仁、大麻仁。为桑科植物大麻Cannabis sativa L. 的种仁。产黑龙江、辽宁、吉林、四川、甘肃、云南、江苏、浙江等地。甘，平，有小毒。入脾、胃、大肠经。润肠，止渴，通淋，活血。治肠燥便秘，产后血虚便秘，消渴，热淋，风痹，经闭。煎服：9～15克。食入过量可致中毒，产生恶心、呕吐、腹泻、四肢麻木、哭闹、失去定向力、瞳孔散大、抽风、甚至昏迷。本品含胡卢巴碱、异亮氨酸三甲铵内酯（Isoleu-

cine betaine）、玉蜀黍嘌呤（Zeatin）、植酸钙镁（Phytin）、少量黄酮类（芹菜素、木犀草素、牡荆素等）、脂肪油（内含大麻酚）、蛋白质等。药理试验，火麻仁对肠粘膜有刺激作用，可使分泌增多，蠕动加快，有泻下作用。醇提取物对麻醉猫及正常大鼠均有缓慢而显著的降压作用。

火焰草 见《植物名实图考》。为景天之别名，详该条。

斗篷草 见《广西本草选编》。为黄水芋草之别名，详该条。

〔ㄱ〕

引水蕉 见《泉州本草》。为罗裙带之别名，详该条。

引线包 见《浙江民间常用草药》。为金盏银盘之别名，详该条。

巴山虎 见清·赵楷《百草镜》。为羊蹄蹋根之别名，详该条。

巴旦杏仁 出《本草纲目》。又名巴达杏仁、叭哒杏仁。为蔷薇科植物甜巴旦杏 Prunus amygdalus Batsch var. dulcis Schneider 或苦巴旦杏 P. amygdalus Batsch var. amara Schneider 的种子。产新疆、陕西等地。甘，平，有小毒。润肺止咳，滑肠通便。治肺虚久咳，肠燥便秘。煎服：4.5～9克。本品含苦杏仁甙、苦杏仁酶、脂肪油等。两种杏仁的主要区别：甜巴旦杏仁不含或仅含少量苦杏仁甙，而脂肪油的含量则较苦巴旦杏仁为多。苦杏仁甙可在体内水解产生氢氰酸引起中毒，成人服巴旦杏仁约50～60个即可致死。但服小量杏仁产生的微量氢氰酸，则不致引起中毒，且可镇静呼吸中枢，奏镇咳、平喘的功效。苦杏仁油有驱虫、杀菌作用。对蛔、钩、蛲虫均有效。

巴达杏仁 见《本草通玄》。即巴旦杏仁，详该条。

巴豆 出《神农本草经》。又名刚子、江子、巴果、双眼龙。为大戟科植物巴豆Croton tiglium L. 的种子。产广东、广西、福建、台湾、四川、云南、湖北。辛，热，有大毒。入胃、大肠经。泻下寒积，逐痰，行水，杀虫。①治寒积停滞，胸腹胀满急痛，大便不通，痰饮，水肿，腹水，癫痫，痴狂。内服：巴豆榨去油取霜用，每次30～90毫克，入丸、散。②治泻痢，巴豆炒焦至内外黑透，研末，蜂蜡为丸，每丸含巴豆75毫克，成人每次服4丸，每日一至三次，空腹服用。③治白喉，巴豆仁与朱砂同研贴眉心；恶疮，疥癣，研末涂或以纱布包擦患处。孕妇忌服。不宜与牵牛子同用。巴豆油中含巴豆醇二酯十余种，去氧巴豆醇三酯多种，以及巴豆酸（Tiglic acid）、巴豆油酸（Crotonic acid）、亚油酸、花生酸等的甘油酯。还含蛋白质，内有巴豆毒素（Crotin）。又含巴豆甙、氨基酸等。巴豆油对皮肤及粘膜均有极强的刺激作用，服半滴至一滴，口腔及胃粘膜即有烧灼感，呕吐，多次大量水泻，伴有剧烈腹痛，产生严重的胃肠炎。服巴豆油1克，可中毒致死。外用可引起皮肤发红、发泡甚至坏死。巴豆油乳剂对感染乙型脑炎病毒的小鼠有保护作用。巴豆油对小鼠有致癌或促进致癌物质产生肿瘤的作用。煎剂或水浸剂对钉螺有杀灭作用。巴豆毒素系原浆毒，能引起局部细胞坏死，溶解红细胞。

巴豆叶 见《南宁市药物志》。又名双眼龙叶。为大戟科植物巴豆Croton tiglium L. 的叶。辛，温，有毒。①治疟疾。研末开水冲服：30～90毫克。②治带状疱疹，跌打损伤，蛇咬伤，鲜叶捣烂敷（蛇伤敷伤口周围）；治冻疮，煎水洗。本品的盐水浸出液在体外对大肠杆菌有抑制作用。

巴豆树根 出《本草纲目》。又名挡蛇剑、独行千里。为大戟科植物巴豆 Croton tiglium L. 的根。辛，温，有毒。温中散寒，祛风消肿。①治风湿痹痛，胃寒痛。

煎服：3～6克。②治跌打损伤，痈疽，疔疮，蛇咬伤。煎汤洗或捣烂敷。本品含生物碱、酚类、糖类与鞣质。

巴果 见《中药形性经验鉴别法》。为巴豆之别名，详该条。

巴岩草 见《湖南药物志》。为石吊兰之别名，详该条。

巴岩香 ❶见《中药志》。为海风藤之别名。❷见《广西中草药》。为假蒟之别名。各详该条。

巴戟 出《本草图经》。为巴戟天之简称，详该条。

巴戟天 出《神农本草经》。又名巴戟、鸡肠风、兔子肠。为茜草科植物巴戟天Morinda officinalis How 的根。产福建、广东、广西等地。辛、甘，微温。入肝、肾经。补肾阳，强筋骨，祛风湿。治肾虚阳痿，遗精，早泄，腰膝酸软，小便不禁，子宫虚冷，风寒湿痹。煎服：4.5～9克。本品含维生素C等。预试还含蒽醌、黄酮类化合物。

双头粘 见《闽东本草》。为腹水草之别名，详该条。

双花 见《中药材手册》。为金银花之处方名，详该条。

双参 见《昆明民间常用草药》。为肚拉之别名，详该条。

双眼龙 见萧步丹《岭南采药录》。为巴豆之别名，详该条。

双眼龙叶 见萧步丹《岭南采药录》。为巴豆叶之别名，详该条。

双瑚草 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为盘龙参之别名，详该条。

孔雀毛 见《江西草药》。为地柏枝之别名，详该条。

孔雀尾 ❶见《福建中草药》。为小叶金花草之别名。❷见《广东中草药》。为大叶金花草之别名。各详该条。

水丁香 见《福建民间草药》。为丁香蓼之别名，详该条。

水八角 出《分类草药性》。又名水蜈蚣、一口血、水黄连。为秋海棠科植物掌裂叶秋海棠 Begonia pedatifida Lévl. 的根茎。分布江西、湖南、湖北、四川、贵州、云南、广西、广东。酸，平。祛风利水，散瘀止血，消肿解毒。①治风湿性关节炎，水肿，吐血，尿血，子宫出血。煎服：9～15克。②治跌打损伤，毒蛇咬伤，内服并捣敷。

水三七 见《贵州卫生》(11)：1959。为水田七之别名，详该条。

水飞蓟 见《中草药通讯》(6)：28～35，1973。又名水飞雉、奶蓟、老鼠笋、菜蓟。为菊科植物水飞蓟Silybum marianum (L.)Gaertn. 的果实。原产南欧至北非，我国西北、华北等地区有引种栽培。苦，凉。保肝，利胆。治急、慢性肝炎。内服：用水飞蓟素，每次70～140毫克，每日三次，至少服五至六周；症状改善后，给予维持量，每次35～70毫克，每日三次。用糖衣丸（每粒35毫克）亦可。种子中含水飞蓟素（Silybin），水飞蓟宁（Silydianin），水飞蓟亭（Silychristin），脱氢水飞蓟素，聚水飞蓟素（Silybinomer）等成分。还含槲皮素、双氢槲皮素、脱氢二松柏醇等，又含脂肪油，内有亚油酸、油酸、棕榈酸、硬脂酸、花生四烯酸、肉豆蔻酸、山萮酸等。水飞蓟素具有较强的护肝作用，能对抗多种药物引起的肝损害。治疗肝炎、肝硬变以及各种类型的肝损伤，包括脂肪肝等有效。并有抗X光射线的作用。

水飞雉 见《全国中草药汇编》。即水飞蓟，详该条。

水马 出《抱朴子》。即海马，详该条。

水马香果 见《江苏省植物药材志》。为马兜铃之别名，详该条。

水马桑 见《贵阳民间药草》。为水苋菜之别名，详该条。

水木通 见《本草纲目拾遗》。为三白草之别名，详该条。

水车藤 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为锡叶藤之别名，详该条。

水牛角 出《名医别录》。为牛科动物水牛Bubalus bubalis L.的角。主产华南、华东地区。苦、咸，寒。清热，凉血，解毒。治热病头痛，高热昏迷，小儿惊风，斑疹，吐血，衄血，血淋，喉痹咽肿及原发性血小板减少性紫癜。内服：煎汤，9～15克，大剂量可用30～60克，剉碎先煎；或研末服，每次1.5～3克。本品经临床实践可作为犀角代用品。本品含胆甾醇，强心成分，肽类，多种氨基酸及无机盐。煎剂与醚提取物对动物有强心作用，缩短凝血时间，有镇静作用，与犀角煎剂作用相似；对大鼠有肾上腺皮质激素样作用。

水牛膝 见《民间常用草药汇编》。为节节花之别名，详该条。

水毛茛 见《云南中草药选》。为石龙芮之别名，详该条。

水玉簪 见《陕西中草药》。为鸭舌草之别名，详该条。

水石 见《石药尔雅》。为消石之别名，详该条。

水石榴 见《广西中草药》。为水杨梅之别名，详该条。

水龙骨 出《植物名实图考》。又名草石蚕、石蚕、岩鸡尾、青龙骨、贴壁蜈蚣。为水龙骨科植物水龙骨Polypodium niponicum Mett.的根茎。广布长江以南各地。甘、苦，凉。清热解毒，祛风利湿，润肠。①治小儿高热惊风，风湿痹痛，腰痛，尿路感染，肠炎，痢疾，黄疸，习惯性便秘，急性结膜炎。煎服：15～30克。②治背痈，指疔。内服并捣敷。

水龙胆 见《江苏省植物药材志》。即龙胆，详该条。

水田七 见《南宁市药物志》。又名水三七、屈头、鸡水鸡仔、水萝卜。为蒟蒻薯科植物裂果薯Tacca plantaginea (Hance) Prenth.的块茎。产广西、贵州、广东等地。苦，寒，有小毒。清热解毒，理气止痛，散瘀消肿。①治咽喉肿痛，牙痛，急性胃肠炎，胃、十二指肠溃疡，跌打损伤。内服：煎汤，3～9克；研末，0.9～1.5克。②捣敷治痈肿疮疖，外伤出血。服用过量，可出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等中毒症状及谷丙转氨酶明显升高。孕妇忌服。水田七叶：捣敷无名肿毒。

水仙子 见《药材资料汇编》。为五谷虫之别名，详该条。

水仙根 出《本草纲目》。为石蒜科植物水仙Narcissus tazetta L.var.chinensis Roem.的鳞茎。各地常见栽培。甘、苦，寒，有毒。排脓消肿，解毒。治痈肿疮毒，虫咬伤。捣烂敷或捣汁涂。不宜内服。水仙花：煎服治月经不调。根含石蒜碱(Lycorine)、伪石蒜碱(Pseudo lycorine)、高石蒜碱、雨石蒜碱(Pluviine)、漳州水仙碱、多花水仙碱(Tazettine)等。花含挥发油，其主成分为丁香油酚、苯甲醛等，尚含芸香甙、异鼠李素-3-鼠李糖葡萄糖甙及香草醇等。根的粗浸剂对动物子宫有明显的兴奋作用。总生物碱腹腔注射对大鼠Jensen肉瘤、小鼠Crocker肉瘤及艾氏腹水癌均有明显疗效。煎剂对小鼠淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒感染有一定疗效，体外试验亦有效。本品所含石蒜碱等成分的药理，见石蒜条。

水仙桃草 见《贵州民间方药集》。为水苦荬之别名，详该条。

水白菜 ㊶见《草药手册》。为山梗菜之别名。㊷见《贵州民间方药集》。为尤舌草之别名。各详该条。

水瓜 见萧步丹《岭南采药录》。为丝瓜之别名，详该条。

水冬瓜 ㊶见《福建民间草药》。为丁香蓼之别名。㊷见《云南中草药》。为大接骨丹

之别名。各详该条。

水兰 见《广西药用植物名录》。为蟛蜞菊之别名，详该条。

水半夏 见《广西本草选编》。又名戟叶半夏。为天南星科植物白苞犁头尖Typhonium flagelliforme(Lodd.)Bl.的块茎。分布云南、广东、广西。辛，温，有毒。燥湿，化痰，止咳，解毒消肿。①治咳嗽痰多，支气管炎。煎服：6～15克。内服需经炮制，炮制方法与半夏同。②治痈疮肿毒，毒虫咬伤，鲜品捣敷；外伤出血，研粉撒布伤处。本品含有机酸、酚类、鞣质、甾醇及生物碱。

水对叶莲 见《全国中草药汇编》。为水苦荬之别名，详该条。

水百足 见《广西民间常用草药》。为一箭球之别名，详该条。

水吐丝 见《江苏药材志》。为苹之别名，详该条。

水团花 出《本草纲目拾遗》。又名穿鱼柳、满山香。为茜草科植物水团花Adina pilulifera (Lam.) Franch.的枝叶或花。分布长江以南各地。苦、涩，凉。清热利湿，消瘀止痛，止血。①治细菌性痢疾，急性胃肠炎。煎服：花9～15克。②治跌打损伤，痈疮肿毒，枝叶捣敷；湿疹，叶煎水洗；创伤出血，花或叶捣敷。水团花根：煎服治感冒咳嗽，肝炎，腮腺炎，关节炎。茎、叶含β-谷甾醇、豆甾醇及混合皂甙。皂甙水解后产生奎诺酸(Quinovic acid)、模绕酸(Morolic acid)、辛可酸(Cincholic acid)、白桦脂酸等。

水红花 见《滇南本草》。为荩草之别名，详该条。

水红花子 出《滇南本草》。又名水荩子、荩草实。为蓼科植物红蓼Polygonum orientale L.的果实。主产江苏、辽宁等地。咸，微寒。活血散瘀，消积，利水。①治腹中痞块，肝硬化腹水。煎熬膏摊贴患部，并以酒调膏服。②治胃腹胀痛，消化不良，瘰疬。内服：煎汤，6～9克，或研末、浸酒服。现试用于甲状腺及消化道等肿瘤。煎剂在体外对痢疾杆菌有抑制作用。煎剂、酊剂对小鼠实验性癌有一定的抑制作用。

水杨柳 见《植物名实图考》。为水杨梅之别名，详该条。

水杨梅 ❶出《植物名实图考》。又名水石榴、水杨柳、小叶团花。为茜草科植物水杨梅Adina rubella (Sieb.et Zucc.) Hance的茎叶或花果序。分布长江以南各地及台湾。苦、涩，凉。清热利湿，杀虫解毒。①治肺热咳嗽，细菌性痢疾，肠炎，黄疸型肝炎，白带。煎服：茎叶，15～30克；花果序，9～15克。②治皮肤湿疹，滴虫性阴道炎，稻田皮炎。茎叶煎水洗；跌打损伤，外伤出血，热疖肿毒。叶或花捣敷。球状花果序含熊果酸、齐墩果酸、β-谷甾醇等。茎皮含鞣质。❷见《云南中草药》。为蓝布正之别名，详该条。

水杨梅根 ❶见《浙江民间常用草药》。为茜草科植物水杨梅Adina rubella (Sieb. et Zucc.) Hance的根。苦、涩，凉。清热解毒，散瘀。①治感冒发热，肺热咳嗽，咽喉肿痛，风火牙痛，腮腺炎。煎服：15～30克。②治疖肿，下肢溃疡，跌打损伤。煎服并捣敷。本品含鞣质。❷见《岭南草药志》。为风箱树根之别名，详该条。

水豆瓣 见《云南思茅中草药选》。为水苋菜之别名，详该条。

水芙蓉 见《湖南药物志》。为蜀葵花之别名，详该条。

水苋菜 出清·刘士季《草木便方》。又名水马桑、水豆瓣、肉矮陀陀。为千屈菜科植物圆叶节节菜Rotala rotundifolia (Buch.-Ham.)Koehne的全草。分布长江以南各地。甘、淡，凉。清热利湿，调经活血，消肿解毒。①治肺热咳嗽，痢疾，黄疸型肝炎，尿路感染，水臌。②治月经不调，痛经。煎服：15～30克。③捣敷治痈疖肿毒。本品含

酚类、氨基酸、黄酮甙。

水芹 出《千金翼·本草》。又名芹菜、水芹菜。为伞形科植物水芹Oenanthe javanica (Bl.) DC.的全草。全国大部分地区均有分布。甘，凉。清热，利尿，止血，降压，解毒。①治感冒发热，肺热咳嗽，百日咳，黄疸，水肿，淋病，白带，乳糜尿，尿血，便血，血崩，高血压病。内服：煎汤，51～30克；或捣汁服，每次20～50毫升。②捣敷治乳腺炎，腮腺炎。本品含挥发油，其中有α-和β-蒎烯、月桂烯等；另含酞酸二乙酯、水蓼素及其7-甲醚、多种氨基酸及β-谷甾醇等。挥发油内服能兴奋中枢神经，升高血压；促进胃液分泌，增进食欲，并有祛痰作用。外搽能扩张血管，促进循环。水蓼素及水蓼素-7-甲醚有降压作用。

水芹菜 出《滇南本草》。即水芹，详该条。

水苏 出《神农本草经》。又名鸡苏、香苏、望江青、天芝麻。为唇形科植物水苏Stachys japonica Miq.的全草。分布辽宁、内蒙古、河北、江西及华东地区。辛，微温。入胃、肺经。疏风下气，止血消炎。①治感冒，咳嗽，百日咳，肺痿，头风目眩，扁桃体炎，咽喉炎，痢疾，吐血，衄血，血崩，血淋。煎服：9～15克。②治带状疱疹。鲜根捣敷。

水皂角 见《分类草药性》。为合萌之别名，详该条。

水鸡仔 见《广西中药志》。为水田七之别名，详该条。

水板凳 见《四川中药志》。为眼子菜之别名，详该条。

水苦荬 出《本草图经》。又名水莴苣、水仙桃草、兔子草、水接骨丹、水对叶莲。为玄参科植物水苦荬Veronica anagallis-aquatica L.的全草。分布长江以北及西南、西北各地。苦，寒。活血止血，消肿止痛。①治咯血，吐血，血小板减少性紫癜，胃痛，风湿痹痛，闭经，痛经，跌打损伤，咽喉肿痛。煎服：3～15克。②捣敷治痈疖肿毒。本品含杂甙类(Heterosides)、蛋白质等含氮化合物和含磷化合物。

水侧耳 见《四川中药志》。为鸡肫草之别名，详该条。

水瓮菜 见清·赵其光《本草求原》。为过塘蛇之别名，详该条。

水金铃 见《四川中药志》。为节节花之别名，详该条。

水狗肝 见《本草纲目》。为獭肝之别名，详该条。

水泻 出《神农本草经》。为泽泻之别名，详该条。

水胡豆 见《全国中草药汇编》。为睡菜之别名，详该条。

水胡椒 见《救荒本草》。为回回蒜之别名，详该条。

水胡满 出《生草药性备要》。又名臭苦蔸、蟹蜞盖、苦蔸。为马鞭草科植物苦郎树Clerodendrum inerme(L.)Gaertn.的嫩枝叶。分布台湾、福建、广东、广西。苦，寒，有毒。散瘀消肿，祛湿杀虫。治跌打瘀肿，皮肤湿疹，疮疥。捣敷，研末撒或煎水洗；霉菌性阴道炎，煎水熏洗患处。本品不宜内服。叶含芹菜素-7-0-葡萄糖醛酸甙、黄芩素-7-0-葡萄糖醛酸甙、(24S)-乙基胆甾三烯-5，22，25-醇-3。又水溶性成分中呈生物碱反应。叶的乙醇和水提取物以及苦味成分对妊娠大鼠子宫呈兴奋作用，能升高麻醉狗的血压，并增加肠管运动。

水胡满根 见《广东中草药》。为马鞭草科植物苦郎树Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.的根。苦，寒，有小毒。祛风逐湿，散瘀活络。治风湿性关节炎，坐骨神经痛，肝脾肿大，跌打损伤。煎服：9～15克。

水荆芥 见《全国中草药汇编》。为土香薷之别名，详该条。

水荭子 出《本草衍义》。为水红花子之

别名，详该条。

水荭花 见《摘元方》。为荭草花之别名，详该条。

水香附 见《广西民间常用草药》。为一箭球之别名，详该条。

水剑草 见《本草纲目》。为石菖蒲之别名，详该条。

水桐树 见《天津医学通讯》(6)1，1971。为喜树之别名，详该条。

水桐树皮 出《濒湖集简方》。即桐皮，详该条。

水莴苣 见《救荒本草》。为水苦荬之别名，详该条。

水翁花 见萧步丹《岭南采药录》。又名水雍花。为桃金娘科植物水翁Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. et Perry 的花蕾。分布广东、广西南部。苦，寒。清暑解表，去湿消滞。治夏季感冒，细菌性痢疾，急性肠炎，消化不良。煎服：15～30克。水翁叶：捣敷治乳腺炎。水翁皮：煎水洗治癣癞，烂脚，囊痈。花预试呈黄酮甙、酚类、氨基酸反应。体外实验，对常见化脓性球菌和肠道致病菌均有较强的抑制作用。

水胶 出《外台秘要》。为黄明胶之别名，详该条。

水浮钱 见《福建中草药》。为萍之别名，详该条。

水案板 见《分类草药性》。为眼子菜之别名，详该条。

水通草 ❶见《云南中草药》。为龙须草之别名。❷见《江苏中药名实考》。为梗通草之别名。各详该条。

水菖蒲 出《名医别录》。又名白菖、菖蒲、臭菖、泥菖蒲、铁蜈蚣。为天南星科植物水菖蒲Acorus calamus L.的根茎。主产湖北、湖南、辽宁、四川等地。辛、苦，温。开窍祛痰，化湿解毒。①治癫痫，中风，慢性气管炎，胸腹胀闷，肠炎，痢疾，风湿痹痛。内服：煎汤，3～6克。研粉吞服，每日二、三次，每次0.6～0.9克。②治痈肿，研末调敷；疥癣，煎水洗；化脓性角膜炎，制成滴眼液滴眼。本品含挥发油，其中含有细辛醚、细辛醛、白菖酮、白菖烯等多种成分；另含菖蒲甙(Acorin)、鞣质、维生素C等。对中枢神经系统有镇静、镇痛、抗惊厥作用。对循环系统可降低血压、抑制心脏及奎尼丁样抗心律不齐作用；对平滑肌器官具解痉作用；并能促进食欲和胃液分泌以及祛痰、止咳、平喘等。在体外对葡萄球菌、链球菌等有抑制作用，并有一定的抗真菌作用。

水萝卜 见《广西植物名录》。为水田七之别名，详该条。

水黄连 ❶出清·赵楷《百草镜》。又名硬水黄连、硬杆水黄连、黄脚鸡。为毛茛科植物箭头唐松草Thalictrum simplex L. var.brevipes Hara的根茎及根。分布四川、湖北、甘肃、青海、陕西、山西、河北、内蒙古、辽宁、吉林。苦，寒。清热利湿，消肿解毒。①治黄疸，痢疾，腹水，小便不利，肺炎。煎服：3～9克。②煎水洗眼结膜炎；研末香油调搽鼻疳；捣烂敷热疮。根含小檗碱、箭头唐松草米定碱(Thalicsimidine)、黄唐松草碱(Thalictricine)。❷见《江西草药》。为水八角之别名。❸见《四川常用中草药》。为软水黄连之简称。❹见《广西本草选编》。为黄水芋草之别名。各详该条。

水黄杨木 见《贵州草药》。为乌桕子之别名，详该条。

水萍 出《神农本草经》。为浮萍之别名，详该条。

水堇 见《吴普本草》。为石龙芮之别名，详该条。

水接骨丹 见《全国中草药汇编》。为水苦荬之别名，详该条。

水银粉 出《嘉祐补注神农本草》。为轻粉之别名，详该条。

水银霜 见《本草纲目》。为粉霜之别名，详该条。

水旋复 见《滇南本草》。为马尿花之别名，详该条。

水麻叶 见《湖南药物志》。为杜茎山之别名，详该条。

水麻贴 见《中医方药学》。为水蛭之别名，详该条。

水梁木 见《广西药用植物名录》。为秋枫木之别名，详该条。

水雁 见《现代实用中药》。为海龙之别名，详该条。

水晶凉粉 见《贵州草药》。为冰粉之别名，详该条。

水蛭 出《神农本草经》。又名蜞、马蜞、水麻贴。为水蛭科动物日本医蛭 Hirudo nipponica Whitman或宽体金线蛭 Whitmania pigra(Whitman)等的干燥全体。主产山东及江苏等地。咸、苦，平，有毒。入肝、膀胱经。破血祛瘀，通经消癥。①治血滞经闭，瘀血内阻，癥瘕积聚，跌打瘀痛。内服：煎汤，1.5～3克；或炒黄研末，0.6～1克。②治急性结膜炎，角膜瘢翳。本品浸渍于蜂蜜内，取浸出液滴眼。孕妇忌服。新鲜水蛭唾液中含抗凝血物质水蛭素（Hirudin）。水蛭素能阻碍血液凝固。水蛭还可分泌一种组胺样物质，扩张毛细血管而增加出血。

水鹅掌 见《全国中草药汇编》。为兔儿伞之别名，详该条。

水筋骨 见《云南中草药》。为狗筋蔓之别名，详该条。

水蓬棵 见《东北药用植物志》。为荭草之别名，详该条。

水蒲桃 见《广西本草选编》。即蒲桃，详该条。

水蜈蚣 ❶出《植物名实图考》。又名三荚草、金钮草、球子草、黄古头草、疟疾草。为莎草科植物水蜈蚣Kyllinga brevifolia Rottb.的全草。分布长江流域以南各地及西藏。辛，平。解表，截疟，镇咳祛痰，清热利湿，消肿解毒。①治感冒发热，疟疾，支气管炎，百日咳，细菌性痢疾，黄疸型传染性肝炎，乳糜尿。煎服：12～18克。②治皮肤瘙痒，煎水洗；疖肿，蛇咬伤，捣烂敷。本品含挥发油、鞣质及苦味质等。煎剂用试管稀释法对绿脓杆菌、变形杆菌、伤寒杆菌、福氏痢疾杆菌及金黄色葡萄球菌有抑制作用。❷见《江西草药》。为水八角之别名，详该条。

水锦花 出《雷公炮炙论》。为密蒙花之别名，详该条。

水雍花 见《广东中药》。即水翁花，详该条。

水蔓青 见《全国中草药汇编》。又名勒马回、斩龙剑、追风草。为玄参科植物水蔓青 Veronice linariifolia Pall. ex Link subsp. dilatata (Nakai et Kitag.)Hong的地上部分。分布河北、山西、山东、浙江、江苏、广东等地。苦，寒。清热解毒，化痰，利尿，消肿止痒。①治支气管炎，肺脓疡，急性肾炎，尿路感染，疖肿疮疡。煎服：15～30克。②治皮肤湿疹，风疹身痒，痔疮。煎水洗。全草含甘露醇和黄酮甙，甙元为6-羟基木犀草素。甘露醇及总黄酮甙元对小鼠有止咳作用。本品在体外对肺炎球菌、金黄色葡萄球菌及痢疾杆菌等有抑制作用。

水碱 见《本经逢原》。为灰碱之别名，详该条。

水蜡烛 见《广东新语》。为香蒲之别名，详该条。

水蜡烛实 见《广东新语》。为蒲棒之别名，详该条。

水辣椒 见《广西本草选编》。为母草之别名，详该条。

水蕉 见《陆川本草》。为罗裙带之别名，详该条。

水雍菜 见《福建中草药》。为空心苋之

别名，详该条。

水镜草 出《土宿本草》。为荟菜之别名，详该条。

五 画

〔一〕

玉龙盘 出清·赵楷《百草镜》。为白接骨之别名，详该条。

玉龙鞭 见《广西民间常用草药》。又名玉郎鞭、假马鞭、狮鞭草。为马鞭草科植物假败酱Stachytarpheta jamaicensis(L.) Vahl的全草。分布广东、广西和云南南部。微苦，寒。清热解毒，利水通淋。①治尿路感染及结石，急性结膜炎，咽喉炎，风湿痹痛。煎服：15～30克。②捣敷跌打瘀肿，痈疖。假败酱根：治白浊，白带。根含绿原酸等。茎叶煎剂能兴奋离体豚鼠回肠、扩张大鼠下肢血管。

玉竹 出《吴普本草》。又名萎蕤、地节、葳参、铃铛菜、尾参。为百合科植物玉竹Polygonatum odoratum (Mill.)Druce的根茎。主产河南、江苏、辽宁、湖南、浙江等地。甘，平。入肺、胃经。滋阴润燥，除烦止渴。①治热病伤阴，肺胃燥热，咳嗽少痰，心烦口渴，消谷易饥，小便频数，筋脉失养而挛痛。②适用于素体阴虚，风湿自汗、灼热，及劳疟寒热。③近用于心脏病引起的心力衰竭，及冠状动脉粥样硬化性心脏病之心绞痛。煎服：9～15克。本品含铃兰苦甙、铃兰甙、山柰酚及槲皮素的糖甙、生物碱等。铃兰甙和铃兰苦甙具洋地黄样强心作用。玉竹对大鼠和兔实验性高血糖有抑制作用。对小鼠实验性结核有轻度治疗作用。

玉米芯 见《中医方药学》。即玉米轴，详该条。

玉米轴 见《民间常用草药汇编》。又名玉米芯、包谷心。为禾本科植物玉蜀黍Zea mays L.的果穗轴。甘，平。健脾利湿。治小便不利，水肿，腹泻，小儿夏季热。煎服：30～60克。本品含有抗小鼠艾氏癌和肉瘤-180的多糖。

玉米须 见《四川中药志》。又名棒子毛、玉麦须。为禾本科植物玉蜀黍Zea mays L.的花柱。甘，平。利水，通淋，止血，降血压。治急、慢性肾炎水肿，尿路结石，糖尿病，黄疸型肝炎，胆囊炎，胆石症，吐血，衄血，血崩，高血压病。煎服：15～30克。民间晒干作烟吸，治脑漏。玉蜀黍根、玉蜀黍叶，亦有利尿通淋作用。玉米须含苦味甙、皂甙、生物碱、树脂、挥发油（内含香荆芥酚）、维生素C、维生素K、肌醇、尿囊素等。有较弱的利尿、利胆及加速血液凝固的作用。

玉如意 见《苏州本产药材》。为剪刀草之别名。详该条。

玉麦须 见《滇南本草》。即玉米须，详该条。

玉芙蓉 ❶出《植物名实图考》。为仙人掌科植物仙人掌 Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw. 肉质茎中流出浆汁的凝结物。主产四川。甘、淡，寒。入心、肝、胆经。清热解毒。①治喉痛，疔肿，肠痔泻血，脱肛。煎服：3～9克；或入丸、散。②治小儿急惊风，捣绒敷脐；烫伤，研末撒布。❷出《花镜》。为素馨花之别名，详该条。

玉苏子 见《中药志》。为白苏子之别名，详该条。

玉英 出《金匮玉函方》。为菊花苗之别名，详该条。

玉果 见《药材学》。为肉豆蔻之别名，详该条。

玉金 见《中国医学大辞典》。即郁金，详该条。

玉郎鞭 见《广西民间常用草药》。即玉龙鞭，详该条。

玉带风 见《湖南药物志》。为罗裙带之别名，详该条。

玉带草 见《峨眉山药用植物》。为吉祥草之别名，详该条。

玉桔梗 见《中国药学大辞典》。即桔梗，详该条。

玉桂 见清·赵其光《本草求原》。即肉桂，详该条。

玉绣球 见《广州植物志》。为球兰之别名，详该条。

玉接骨 见《本草纲目拾遗》。为白接骨之别名，详该条。

玉蕊花 出《花镜》。为西番莲之别名，详该条。

玉蝴蝶 见《张聿青医案》。为木蝴蝶之别名，详该条。

玉簪叶 出《本草纲目》。为百合科植物玉簪Hosta plantaginea(Lam.)Aschers.的叶。我国各地均有栽培。甘、辛，寒，有毒。治痈肿，疔疮，蛇、虫蛟伤，捣烂外敷；顽固性溃疡，洗净以热米汤或开水泡软，敷贴患处，每日换二、三次。

玉簪花 出《本草品汇精要》。又名白鹤仙、白鹤花、化骨莲。为百合科植物玉簪Hosta plantaginea(Lam.)Aschers.的花。甘、辛，凉，微毒。活血，利尿，解毒。①治咽喉肿痛，咳血，崩漏，痛经，白带，小便不通。煎服：3～4.5克。②解斑蝥毒。捣烂，开水冲饮。③治烧伤。香油浸泡两月，取油涂。

玉簪花根 出《本草品汇精要》。为百合科植物玉簪Hosta plantaginea(Lam.)Aschers.的根茎。甘、辛，寒，有毒。清热解毒，消肿排脓，止痛。治痈肿，疮毒，瘰疬结核，捣烂外敷；中耳炎，烫伤，捣取自然汁滴耳或外涂。本品入口，可使齿牙脱落，用者宜慎。根含皂甙，甙元为芰脱皂甙元(Gitogenin)。还含香豆素类、三萜、多糖、氨基酸。

末药 见《本草纲目》。即没药，详该条。

功劳叶 ❶见《饮片新参》。为十大功劳叶之简称。❷见《江苏省植物药材志》。为枸骨叶之药材名。各详该条。

功劳根 见《浙江民间草药》。为枸骨根之别名，详该条。

艾片 见《增订伪药条辩》。为冰片药材之一种，详该条。

艾叶 出《本草经集注》。又名蕲艾、灸草。为菊科植物家艾Artemisia argyi Lévl. et vant. 的叶。我国大部分地区均产。苦、辛，温，有小毒。入脾、肝、肾经。温经散寒，止痛，止血，安胎。①治月经不调，痛经，崩漏，带下，宫冷不孕，胎动不安，腹中冷痛。②治吐血，衄血，便血，血痢。③近用治慢性气管炎。煎服：3～6克。④治疥、癣，湿疹。研末调敷或煎水熏洗。止血炒炭用。干叶捣绒，制成艾卷、艾炷，供灸疗用。本品含挥发油，内含桉叶素，β-石竹烯，松油烯醇，芳樟醇，蛔蒿醇，樟脑，龙脑等。艾叶油、β-石竹烯及松油烯醇对豚鼠有镇咳及明显的平喘作用，对小鼠有祛痰作用。艾叶油在体外对白色葡萄球菌、甲链球菌、奈瑟氏菌、肺炎球菌及多数革兰氏阴性杆菌有抑制作用。此外，艾叶油对豚鼠尚有抗过敏性休克的作用。

艾纳香 出《开宝重定本草》。又名冰片艾。为菊科植物大风艾Blumea balsamifera(L.)DC.的嫩枝叶。主产广西、广东、贵州、云南等地。辛、苦，温。祛风除湿，温中活血。①治风湿痹痛，腹痛，腹泻，痛经。煎服：9～18克。②治跌打损伤，疮疖痈肿，湿疹，癣疾，皮炎。捣敷或煎水洗。本品含挥发油，主成分为左旋龙脑，并含少量桉叶素，左旋樟脑、花椒油素等。还含糖甙。提

取物对动物有降压、血管扩张及交感神经抑制作用。浸剂能利尿。

艾纳香根 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为菊科植物大风艾Blumea balsamifera（L.）DC.的根。分布台湾、广东、广西、云南、贵州。辛，温。祛风止痛，活血调经。治风湿痹痛，跌打瘀痛，腹痛，腹泻，月经不调，痛经。煎服：9～15克。

节节红 见《南宁市药物志》。为赶风柴之别名，详该条。

节节花 ❶出《生草药性备要》。又名虾钳菜、耐惊菜、水牛膝、曲节草、水金铃。为苋科植物莲子草Alternanthera sessilis（L.）DC.的全草。分布华中、华东、华南和西南地区。甘、淡，凉。清热解毒，活血，利尿。①治痢疾，肠痈，鼻衄，咯血，便血，小便淋痛。煎服：15～30克。②治痈疖，蛇伤，捣敷；湿疹，皮炎，疥癣，煎水洗。❷见《福建民间草药》。为飞扬草之别名，详该条。❸见《广东中药》Ⅰ（生草药部分）。为鲫鱼胆草之别名，详该条。❹见《浙江民间常用草药》。为剪刀草之别名，详该条。

节节草 见《陕西中草药》。为问荆之别名，详该条。

节节珠 见《福建中草药》。为冰糖草之别名，详该条。

节骨草 ❶见《东北药用植物志》。为木贼之别名。❷见《湖南药物志》。为笔筒草之别名。各详该条。

节菖蒲 见《中药材手册》。为九节菖蒲之简称，详该条。

甘中黄 见《现代实用中药》。即人中黄，详该条。

甘石 见《本草品汇精要》。为炉甘石之简称，详该条。

甘瓜子 出《名医别录》。即甜瓜子，详该条。

甘青青兰 见《全国中草药汇编》。即唐古特青兰，详该条。

甘松 出《本草纲目》。为败酱科植物甘松香Nardostachys chinensis Batal.或匙叶甘松香N.jatamansi（Wall.）DC.的根及根茎。主产四川、甘肃。甘、辛，温。入脾、胃经。理气止痛，醒脾开胃，活络通经。①治精神忧郁，胃脘胀满疼痛，食欲不振，头痛，霍乱转筋。煎服3～6克。②煎水含漱治牙痛；煎水洗治脚气浮肿。本品含挥发油，主成分为甘松酮（Nordostachone）、缬草酮（Valeranone）。挥发油对动物具镇静和一定的安定作用，缬草酮有抗电惊厥及心律不整作用。匙叶甘松香醇提物对离体肠、子宫及支气管平滑肌有抑制作用。

甘泽 出《吴普本草》。为甘遂之别名，详该条。

甘草 出《神农本草经》。又名美草、蜜草、国老、粉草。为豆科植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.或胀果甘草G.inflata Bat.等的根和根茎。主产内蒙古、甘肃等地。甘，平。入脾、肺经。和中，缓急，止痛，祛痰止咳，解毒，调和诸药。治脘腹挛痛，咳嗽，心悸，癫病，咽喉肿痛，疮疡肿毒，药物及食物中毒。近用于治疗肾上腺皮质功能减退症。炙甘草性微温，补脾益气，多用于虚寒证。如煎服：1.5～9克。反大戟、甘遂、芫花、海藻。甘草根的末梢部分或细根名甘草梢，功能清火，解毒。煎服治茎中痛，淋浊等证。甘草根和根茎含甘草甜素（Glycyrrhizin），主要系甘草酸的钾、钙盐。还含24-羟基甘草次酸等三萜类及甘草素、异甘草素、甘草甙、异甘草甙、新甘草甙等黄酮类。并含苦味质、树脂等。胀果甘草根的主要成分为甘草查耳酮（Licochalcone）。甘草浸膏对大鼠实验性胃溃疡有保护作用，煎剂能抑制离体肠管。浸膏、甘草甜素（主要为甘草酸盐）及甘草次酸，具盐皮质激素样作用，促进钠、水潴留，可致水肿及血压升高。小量甘草甜素具抗过敏及糖皮质激素样作用，甘草次酸具抗炎作用。甘

草具镇咳作用，对四氯化碳引起的大鼠肝损害有保护作用。浸膏及甘草甜素对某些毒物有一定解毒作用。后者还能降低血胆固醇及增加胆汁分泌。甘草次酸对发热大鼠有退热作用。在体外并有一定抗菌、抗原虫作用。

甘草黄 见清·汪双池《医林纂要·药性》。为人中黄之别名，详该条。

甘菊 出《抱朴子》。即菊花，详该条。

甘瓠 出《诗经》。即瓠子，详该条。

甘葛 见《滇南本草》。为葛根之别名，详该条。

甘遂 出《神农本草经》。又名甘泽、肿手花根。为大戟科植物甘遂 Euphorbia kansui Liou 的块根。主产陕西、甘肃、河南等地。苦、寒，有毒。入脾、肺、肾经。泻水，逐痰，破积，通便。治水肿腹满，二便不通，胸胁积液，瘕瘕积聚，痰迷癫痫，噎膈痞塞。内服：多入丸散，一次量0.6～1.5克；煎汤，1.5～3克，醋制或面裹煨熟用。体虚及孕妇忌用。反甘草。本品含α-及γ-大戟甾醇(Euphorbol)，甘遂甾醇(Kanzuiol)，有毒的巨大戟萜醇(Ingenol)的衍生物，20-去氧巨大戟萜醇的衍生物，13-氧化巨大戟萜醇的衍生物，甘遂萜酯(Kansninine)A、B，糖质等。醇浸膏对小鼠有明显泻下作用，毒性大，经醋炙后泻下作用和毒性均减弱。甘遂萜酯A、B有镇痛作用。

甘蒲 出《新修本草》。即香蒲，详该条。

甘蔗 出《名医别录》。又名竿蔗、糖梗。为禾本科植物甘蔗Saccharum sinensis Roxb.的茎秆。我国南部地区广为栽培。甘，寒。入肺、胃经。清热，生津，润燥，解酒。治热病津伤，心烦口渴，反胃呕吐，燥咳，便秘。榨取浆汁服：60～120毫升。榨取浆汁的渣滓称甘蔗滓，烧存性研末，乌柏油调涂小儿头疮白秃。甘蔗节间苗生的嫩芽名蔗鸡，治消渴，每次100克，浓煎，不时温饮之。甘蔗含糖，氨基酸，柠檬酸，琥珀酸，延胡索酸，苹果酸及维生素B_1、B_2、B_6和C等，尚含多糖类。多糖类对小鼠艾氏癌和肉瘤-180有抑制作用。

甘蔗皮 出《本草纲目》。为禾本科植物甘蔗Saccharum sinensis Roxb.的茎皮。治小儿口疳，烧存性研末撒；秃疮，坐板疮。烧存性香油调敷。

甘露儿 见《救荒本草》。为甘露子之别名，详该条。

甘露子 见《饮膳正要》。又名地蚕、草石蚕、甘露儿、宝塔菜、土虫草、地牯牛草。为唇形科植物甘露子Stachys sieboldii Miq.的块茎或全草。全国各地常有栽培。甘，平。益肾润肺，滋阴除热。治肺结核咳嗽，咯血，盗汗，肺虚气喘，病后身体虚羸，小儿疳积。全草能清肺解表，治风热感冒。煎服：9～15克。全草含水苏碱、胆碱、水苏糖。

甘露秧 见《中药材手册》。为泽泻之别名，详该条。

古山龙 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名黄连藤、黄藤。为防己科植物古山龙 Arcangelisia loureiri (Pier.) Diels的根或茎藤。分布广东、广西、云南等地。苦，寒，有小毒。清热燥湿，解毒。①治急性胃肠炎，细菌性痢疾，扁桃体炎，支气管炎，疟疾。煎服：9～15克。②治眼结膜炎，皮肤湿疹，脓疱疮，阴道炎，脚癣感染。煎水洗患处。根含小檗碱、药根碱。茎含掌叶防己碱、小檗碱、药根碱。有降压、止痛作用；体外试验，对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌有抑制作用。

古羊藤 见《广西药用植物图志》。又名南苦参、有毛老鸦嘴。为萝藦科植物马连鞍 Streptocaulon griffithii Hook.f.的根。分布广西、云南等地。苦、微甘，凉，有小毒。清热解毒，散瘀。治肠炎泄泻，痢疾，胃溃疡病，跌打肿痛，毒蛇咬伤。煎服：3～9克，研末服，1～3克。本品的叶及种子有毒，误服可引起头晕、腹痛。

古钩藤 见《广西药用植物名录》。又名白叶藤、白浆藤、半架牛、牛角藤。为萝藦科植物古钩藤Cryptolepis buchananii Roem.et Schult.的根。分布云南、贵州、广东、广西。淡，平，有毒。活血，消肿，镇痛。①治跌打损伤，腰痛，腹痛，水肿。研末服：0.15～0.3克。②治骨折。内服或用鲜品捣烂敷。古钩藤叶：捣烂敷治痈疮肿毒；煎水洗治湿疹。根含白叶藤甙（Cryptolepisin），对在位兔心、离体豚鼠心脏及豚鼠心电图观察有强心甙作用。

左壳 见《中药志》。为牡蛎之别名，详该条。

左扭 见《河北药材》。为秦艽之别名，详该条。

左牡蛎 见《补缺肘后方》。为牡蛎之处方名，详该条。

左转藤 见《天宝本草》。为海金沙草之别名，详该条。

左转藤灰 见《四川中药志》。为海金沙之别名，详该条。

左秦艽 见《张聿青医案》。为秦艽之处方名，详该条。

石三七 见《草药手册》。为石吊兰之别名，详该条。

石上柏 见《广西本草选编》。又名地侧柏、梭罗草、山扁柏。为卷柏科植物深绿卷柏Selaginella doederleinii Hieron.的全草。分布浙江、福建、台湾、广东、广西及西南等地。苦，寒。祛风清热，利湿，抗癌。①治感冒咳嗽，咽喉肿痛，眼结膜炎，风湿痛，湿热黄疸，胆囊炎，急性泌尿系感染。煎服：15～30克。②近用治滋养叶肿瘤，鼻咽癌，肺癌，肝癌，肝硬化。用本品15～60克，加瘦肉1～2两或红枣数个，清水8～9碗，煎6小时，浓缩成一碗左右，分二次服，每日一剂，连服一至数月。③治烧伤。捣烂敷或研末调敷。本品含生物碱，对小鼠实验性肝癌有延长存活期的作用；还含植物甾醇、皂甙。

石上香 见《全国中草药汇编》。为兰香草之别名，详该条。

石上莲 见《广东中草药》。为石仙桃之别名，详该条。

石门坎 见《广西本草选编》。为鸡骨草之别名，详该条。

石韦 出《神农本草经》。又名石皮、石兰、飞刀剑、金汤匙、单叶草。为水龙骨科植物石韦Pyrrosia lingua（Thunb.）Farw.或庐山石韦P.sheareri(Bak.)Ching等的叶。前者产长江以南各地，后者主产江西、湖南、贵州、四川。苦、甘，微寒。入肺、膀胱经。利水通淋，清肺泄热，止血。治肾炎水肿，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，泌尿系结石，肺热咳嗽，支气管哮喘，吐血，咯血，衄血，尿血，崩漏。煎服：6～12克。石韦根：煎服亦有通淋、止血功用。石韦全草含皂甙、蒽醌类、鞣质、黄酮类、绵马鳞毛蕨三萜（Diploptene）、β-谷甾醇。庐山石韦全草含异杧果甙（Isomangiferin）、延胡索酸、咖啡酸、皂甙等。石韦煎剂在体外对金黄色葡萄球菌及变形杆菌有抑制作用。庐山石韦水煎浓缩液，异杧果甙、延胡索酸和咖啡酸对小鼠均有镇咳作用，异杧果甙和咖啡酸并有祛痰作用。

石云茶 见《本草汇言》。为石蕊之别名，详该条。

石见穿 出《本草纲目》。又名月下红、石打穿。为唇形科植物紫参Salvia chinensis Benth·的全草。分布华东及湖北、湖南、广东、广西、四川等地。苦、辛，平。清热解毒，活血镇痛。①治急、慢性肝炎，脘胁胀痛，骨痛，痛经，赤白带下，瘰疬。煎服：9～15克。②捣敷治面神经麻痹，痈肿。本品预试含甾醇、三萜类、氨基酸。

石龙子 出《神农本草经》。又名蜥蜴、四脚蛇、马蛇子。为石龙子科动物石龙子Eumeces chinensis（Gray）的全体。分

布长江流域以南各地。咸，寒，有毒。入肾经。解痉，破结，行水。①治癫痫，瘰疬，石淋，乳腺癌。内服：煅存性研末，1～1.5克，②治癞疮久不愈。熬膏或浸桐油外搽。孕妇忌服。

石龙芮 出《神农本草经》。又名水堇、水毛茛、胡椒菜、野芹菜、小水杨梅。为毛茛科植物石龙芮 Ranunculus sceleratus L.的全草。分布全国各地。苦、辛，寒，有毒。拔毒，散结，截疟。治痈疖肿毒，毒蛇咬伤，捣汁涂；瘰疬，下肢溃疡，熬膏涂敷；风湿性关节炎，捣烂敷痛点或穴位，待有烧灼或奇痒感时除去，局部见水疱，用无菌敷料覆盖；疟疾，于疟发前6小时捣敷大椎穴。本品误服，可致口腔肿胀，咀嚼困难，剧烈腹泻，脉搏缓慢，呼吸困难，瞳孔散大，严重者可致死亡。本品含毛茛甙、原白头翁素、黄酮类、及5-羟色胺等七种色胺衍生物与两种抗5-羟色胺的物质。原白头翁素，能引起皮炎、发泡。色胺衍生物对大鼠子宫有收缩作用。

石龙芽草 见《植物名实图考》。为茅膏菜之别名，详该条。

石龙藤 出《名医别录》。为络石藤之别名，详该条。

石打穿 见《江苏药材志》。为石见穿之别名，详该条。

石仙桃 ❶出《生草药性备要》。又名石上莲、石橄榄、石穿盘、石荚肉、大吊兰。为兰科植物石仙桃 Pholidota chinensis Lindl.的假鳞茎或全草。分布福建、广东、广西、云南、贵州等地。甘、淡，凉。养阴清肺，化痰止咳。①治热病津伤口渴，慢性胃炎，胃、十二指肠溃疡，眩晕，头痛，肺热咳嗽，肺结核咳血，淋巴结结核。如煎服：15～30克。②治慢性骨髓炎。鲜全草捣烂敷；或用干品，淡米酒浸软磨汁，温开水调搽患处。叶预试含生物碱。❷见《江西草药》。为麦斛之别名，详该条。

石白菜 见《全国中草药汇编》。为岩白菜之别名，详该条。

石瓜子 见《四川中药志》。为鱼鳖金星之别名，详该条。

石兰 见《本草纲目》。为石韦之别名，详该条。

石半夏 见《江西草药》。为滴水珠之别名，详该条。

石皮 出《名医别录》。为石韦之别名，详该条。

石灰 出《神农本草经》。又名矿灰。为石灰岩经加热煅烧而成，或再经吸收水分而得的粉状物。辛，温。有毒。熟石灰：解毒，止血，收敛；生石灰：蚀恶肉。①治烫伤，熟石灰500克，加水4碗，浸泡搅拌，沉淀后取清液加麻油调成糊状，涂敷患处。②治创伤出血，下肢溃疡，熟石灰研末敷；腮腺炎，熟石灰和醋调涂；头癣，熟石灰加水搅拌取上层乳状液和少量桐油，调成膏状，搽患处。②治赘疣、黑痣。生石灰醋浸，取液点涂局部。本品主成分为氧化钙，吸水后生成氢氧化钙。

石灰草 见《昆明民间常用草药》。为芸香草之别名，详该条。

石吊兰 出《植物名实图考》。又名石豇豆、岩泽兰、巴岩草、千锤打、石三七。为苦苣苔科植物石吊兰 Lysionotus pauciflorus Maxim.的地上部分。分布陕西、江西、湖北、湖南、广东、广西及西南各地。苦，凉。清热利湿，祛痰散结，活血调经。①治痢疾，钩端螺旋体病，风湿痹痛，慢性气管炎，肺结核，淋巴结结核，骨结核，脑结核，月经不调，闭经，产后腹痛。煎服：30～60克。②治跌打损伤。煎服并捣敷。全草含石吊兰素（5,7-二羟基-4′,6,8-三甲氧基黄酮）。预试含有机酸、酚类、黄酮类、树脂。体外试验，石吊兰素在每毫升100～200微克的浓度时有明显的抗结核杆菌作用。

石竹子 见《云南中草药》。为岩笋之别

名，详该条。

石竹根 见清·刘士季《草木便方》。为竹凌霄之别名，详该条。

石决明 出《名医别录》。又名鲍鱼壳、九孔螺、千里光。为鲍科动物杂色鲍Haliotis diversicolor Reeve或皱纹盘鲍H.discus hannai Ino等的贝壳。主产广东、福建、辽宁、山东等地。咸，平。入肝、肾经。平肝潜阳，清热明目。①治高血压引起的头痛，眩晕，惊搐。目赤肿痛，视物模糊，青光眼，白内障，肺结核发热，咳血，吐血。煎服：9～30克。打碎先煎。②治溃疡，创伤出血。煅存性，研细撒患处。

石祁蛇 见萧步丹《岭南采药录》。为草石蚕之别名，详该条。

石衣 见《青岛中草药手册》。为石花之别名，详该条。

石防风 出《本草图经》。又名珊瑚菜。为伞形科植物石防风Peucedanum terebinthaceum（Fisch.）Fisch. ex Turcz.的根。主产河北、陕西等地。苦、辛，凉。发散风热，降气化痰。治感冒头痛，咳嗽，支气管炎。煎服：3～9克。本品含前胡甙元（e-Marmesin，Nodakenetin）。

石花 ❶出清·刘士季《草木便方》。又名石苔花、乳花、石衣、梅藓。为梅花衣科植物藻纹梅花衣Parmelia saxatilis Ach.的叶状体。全国大部分地区有分布。甘，寒。明目，止血，清热利湿。①治视物模糊，吐血，血崩，小便热痛，白带。煎服：6～9克。②治小儿口疮，研末撒；带状疱疹，烫伤。研末，香油调敷。本品含藻纹苔酸（Salazinic acid）。❷见《贵州草药》。为石蕊之别名，详该条。❸见《云南中草药》。为佛指甲之别名，详该条。❹见《本草衍义》。为海浮石药材之一种，详该条。

石花菜 出《日用本草》。又名海菜、草珊瑚。为红翎菜科植物琼枝Eucheuma gelatinae（Esp.）J.Ag.的藻体。分布广东海南岛及台湾沿岸。甘、咸，寒。清肺化痰，软坚，利湿。治支气管炎，瘰疬，肠炎，痔血。本品对实验性高脂血症的大鼠有降低血清胆甾醇的作用。

石豆 见《福建中草药》。为麦斛之别名，详该条。

石松子 见《现代实用中药》。为石松科植物石松Lycopodium elavatum L.的孢子。分布东北、内蒙古、河南和长江以南各地。①治咳嗽，石松子3克，甘草6克同煎服。②治汗疹，皮肤湿烂，与滑石粉等分研匀扑身。本品含脂肪油，主为石松子油酸（Lycopodium-oleic acid）及多种不饱和脂肪酸的甘油酯；另含二氢咖啡酸、植物甾醇、木聚糖、精蛋白等。氯仿提取物对大鼠有雌激素样作用。

石苔花 见清·刘士季《草木便方》。为石花之别名，详该条。

石卷柏 见《陆川本草》。为兖州卷柏之别名，详该条。

石柏 见《浙江天目山药用植物志》。为地柏枝之别名，详该条。

石珊瑚 见《本草纲目拾遗》。为营实之别名，详该条。

石胡椒 见《昆明郊区药用植物的初步调查报告》。为石椒草之别名，详该条。

石南叶 出《名医别录》。又名风药、石楠叶、栾荼。为蔷薇科植物石南Photinia Serrulata Lindl.的叶。主产江苏、浙江等地。辛、苦，平，有小毒。入肝、肾经。祛风湿，强筋骨，止咳喘。①治风湿痹痛，腰膝酸软，阳痿，遗精，头风痛，风疹。内服：煎汤，4.5～9克；或浸酒饮。②治咳嗽痰喘。研末装烟斗内燃着吸烟。石南的果实名石南实，又名鬼目，煎服破积聚，逐风痹。本品含游离的氢氰酸和野樱皮甙。动物实验，煎剂能兴奋心脏。

石南藤 出《本草图经》。又名南藤、爬岩香、丁公藤。为胡椒科植物巴岩香Piper w-

allichii (Miq.) Hand.-Mazz. var. hupehense(DC.)Hand.-Mazz.的茎叶或全株。分布湖北、湖南、广东及四川等地。辛，温。祛风通络，强腰脚，止痛，壮阳。治风寒湿痹，肾虚腰痛，痛经，阳萎，咳喘。煎服：9～15克；或浸酒饮。

石荠苧 出《本草拾遗》。又名痱子草、热痱草、紫花草、野香茹。为唇形科植物粗糙荠苧Mosla scabra (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li的全草。分布辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、四川及华东、中南地区。辛，微温。疏风解表，清暑除湿，解毒止痒。①治感冒头痛，咳嗽，中暑，风疹，肠炎，痢疾，痔血，血崩。煎服：4.5～9克。止血炒炭用。②治热痱，湿疹，脚癣，煎水洗；蛇、虫咬伤，捣汁涂。本品含挥发油，其成分为左旋侧柏酮、右旋香桧烯、右旋柠檬烯等，另含生物碱、皂甙及鞣质。

石指甲 见《四川中药志》。为垂盆草之别名，详该条。

石钟乳 出《神农本草经》。即钟乳石，详该条。

石香薷 出《四声本草》。又名华荠苧、痱子草。为唇形科植物石香薷Mosla chinensis Maxim.的全草。分布华东、中南及贵州等地。辛，微温。祛暑，解表，行气化湿。①治夏月感冒，中暑呕吐、泄泻，胃痛，小儿夏季热初期。煎服：9～15克。②治跌打瘀痛，疖肿，蛇、虫咬伤，捣敷；湿疹，痱子，煎水洗。本品含挥发油，内含香荆芥酚、香荆芥酚乙酸酯、百里香酚、对聚伞花素、龙脑等。挥发油有利尿作用，在体外对金黄色葡萄球菌、乙型链球菌、脑膜炎球菌以及炭疽、白喉、变形、绿脓、大肠、伤寒、痢疾等杆菌均有抑制或杀灭作用，对流感病毒也能抑制。

石胆 出《神农本草经》。为胆矾之别名，详该条。

石穿盘 见《广西中草药》。为石仙桃之别名，详该条。

石豆豆 ❶见清·刘士季《草木便方》。为石吊兰之别名。❷见《陕西植物药调查》。为苍条鱼鳖之别名。各详该条。

石莲 见《广西药用植物名录》。为红孩儿之别名，详该条。

石荷叶 见《本草纲目》。为虎耳草之别名，详该条。

石莼 出《本草拾遗》。又名海白菜、海莴苣、绿菜。为石莼科植物石莼 Ulva lactuca L.或孔石莼U. pertusa Kjellm.的叶状体。前者分布浙江至广东、海南岛沿海；后者分布辽宁、河北、山东、江苏等地沿海。甘，平。清热，散结，利水，降压。治喉炎，淋巴结结核，瘿瘤，水肿，高血压病。煎服：15～60克。石莼含酸性多糖、糖醛酸、廿二碳五烯酸、28-异岩藻甾醇(28-Isofucosterol)、环木菠萝烯醇(Cycloartenol)、24-亚甲基环木菠萝烷醇、二甲基-β-丙酸噻亭等。孔石莼含亚麻酸、丙烯酸、α-蒎烯、柠檬烯、桉叶素、丁香油酚等。

石钻子 见《江西省防治慢性气管炎资料汇编》。为钻石风之别名，详该条。

石秤砣 见《全国中草药汇编》。为山芝麻之别名，详该条。

石蚕 ❶见《中国药用植物志》。为水龙骨之别名。❷出《本草图经》。即草石蚕。各详该条。

石黄 出《新修本草》。即雄黄，详该条。

石菖蒲 出《本草图经》。又名昌阳、尧韭、水剑草、菖蒲、药菖蒲。为天南星科植物石菖蒲Acorus gramineus Soland.的根茎。主产四川、浙江、江苏等地。辛，温。入心、肝、脾经。开窍豁痰，化湿和中，解毒。①治热病神昏，癫痫，痰厥，健忘，耳聋。②治胸腹闷胀，中暑腹痛，呕吐，腹泻，噤口痢，风寒湿痹。煎服：3～9克。③捣敷或研末调涂治痈肿发背，跌打损伤。菖蒲叶：煎水洗治疮疥。根茎含挥发油，其主成分为

α-及β-细辛醚、爱草脑等，对小鼠有镇静作用。石菖蒲内服能促进消化液分泌，缓解肠管平滑肌痉挛，动物实验有镇痛作用，在体外对某些常见的致病性真菌有抑制作用。

石荚肉 见《福建中草药》。为石仙桃之别名，详该条。

石斛 出《神农本草经》。又名林兰、千年润、黄草、金石斛、霍石斛、川石斛。为兰科植物金钗石斛Dendrobium nobile Lindl.或黄草石斛 D.chrysanthum Wall.、铁皮石斛 D.candidum Wall.ex Lindl.等的茎。主产四川、广东、广西、贵州、云南、安徽等地。甘、淡，微寒。入胃、肺、肾经。滋阴养胃，清热生津。治热病津伤，虚火上炎，口干燥渴，自汗，病后虚热，阴伤目暗，肾虚腰脚软弱。煎服：6～12克(鲜品30～60克)。须久煎。金钗石斛含石斛碱、石斛胺等生物碱。石斛煎剂口服促进胃液分泌，帮助消化。石斛碱有一定的止痛退热作用。

石椒草 出《滇南本草》。又名石胡椒、羊膻草、九牛二虎草。为芸香科植物石椒草Boenninghausenia sessilicarpa Lévl.的全草。分布云南及四川西南部。辛、苦，温，有小毒。祛风，化痰，消炎，活血。治感冒，支气管炎，扁桃体炎，腮腺炎，泌尿系感染，胃痛腹胀，血栓闭塞性脉管炎，跌打损伤。煎服：9～15克。本品含挥发油、芸香甙及石椒草碱(Seboehausine)。

石硫黄 出《神农本草经》。即硫黄，详该条。

石棠花 见《本草纲目拾遗》。为闹羊花之别名，详该条。

石猴子 见《植物名实图考》。为三叶青之别名，详该条。

石寓蛋 见《云南中草药》。为马鹿卵之别名，详该条。

石蒜 出《本草图经》。又名乌蒜、老鸦蒜、独蒜、野蒜、龙爪草头。为石蒜科植物石蒜Lycoris radiata(L.Herit.)Herb.的鳞茎。分布我国中部及西南各地。辛、甘，温，有毒。消肿解毒，催吐祛痰。外治痈疽疔疮，淋巴结结核，风湿关节痛，蛇咬伤。用鲜品捣敷患处。本品毒性较烈，一般不作内服。外敷时间过长，局部皮肤亦可发生水疱，停药后涂敷蜂蜜即消。本品含多种生物碱，主要有石蒜碱、雪莲花胺碱(加兰他敏)、石蒜伦碱、双氢石蒜碱等。加兰他敏具抑制胆碱酯酶作用，与新斯的明相似；但本品易透过血脑屏障，对脊髓灰质炎引起的瘫痪、重症肌无力等疗效比新斯的明好；对小鼠且有镇痛作用。石蒜碱与双氢石蒜碱有中枢镇静作用，也有较弱的抑制胆碱酯酶作用，对麻醉动物具降压作用；石蒜伦碱的降压作用更强。石蒜碱对动物子宫有明显兴奋作用。此外，石蒜碱有刺激肾上腺皮质功能的作用，它和加兰他敏对动物都有一定的抗癌作用。

石蒟 见《陆川本草》。为山蒟之别名，详该条。

石楠叶 见《本草从新》。即石南叶，详该条。

石榴皮 出《雷公炮炙论》。又名石榴壳、酸榴皮。为石榴科植物石榴Punica granatum L.的果皮。我国大部分地区均有栽培。酸、涩，温，有小毒。入胃、大肠经。涩肠止血，驱虫。①治细菌性痢疾、阿米巴痢疾，久泻，便血，脱肛，崩漏，带下、蛔虫病，绦虫病。煎服：2.5～4.5克。止血炒炭用。②研末麻油调涂治牛皮癣。本品含异槲皮甙、鞣质、石榴皮苦素(Granatin)、甘露醇、熊果酸、苹果酸等。煎剂在体外有抗菌与抗病毒作用，可能与其所含鞣质有关。

石榴壳 出《雷公炮炙论》。即石榴皮，详该条。

石榴花 出《本草拾遗》。为石榴科植物石榴Punica granatum L.的花。酸、涩，平。止血，消炎。①治吐血，鼻衄，月经不调，红崩白带。煎服：3～6克。②研末敷

刀伤出血；吹耳治中耳炎；香油调涂汤火伤。

石榴根 出《本草经集注》。又名酸榴根。为石榴科植物石榴Punica granatum L.的根皮。酸、涩，温，有毒。驱虫，涩肠，止带。①治蛔虫病，绦虫病，久泻，久痢，赤白带下。煎服：4.5～9克。用于驱虫，忌用油类泻下剂并忌食油脂类食物。本品含异石榴皮碱、伪石榴皮碱等生物碱，β-谷甾醇、甘露醇、鞣质等。异石榴皮碱和伪石榴皮碱均有杀灭绦虫作用，而以前者的作用为强。毒性较大，动物表现为脊髓兴奋，肌肉痉挛及呼吸麻痹；对人可引起头痛、眩晕、呕吐、腹泻、失明、惊厥等。

石碱 见《本草衍义补遗》。为灰碱之别名，详该条。

石膏 出《神农本草经》。为含水硫酸钙的矿石。产湖北、安徽、河南、山东、四川、湖南、广西、广东、云南、新疆等地。甘、辛，大寒。入肺、胃经。①生石膏清热泻火，除烦止渴。治急性热病高热、大汗、口渴、烦躁、神昏谵语，发斑发疹，中暑自汗，肺热咳喘，胃热头痛、牙痛、龈肿，口舌生疮，暴发赤眼。煎服：15～60克，打碎，先煎。②煅石膏收敛生肌。治湿疹，烫伤，创伤、溃疡久不收敛。研末掺敷。

石辣椒 见《全国中草药汇编》。为九里香之别名，详该条。

石蕊 出《本草拾遗》。又名太白树、石花、石濡、蒙顶茶、石云茶。为石蕊科植物石蕊Cladonia rangiferina Web.的枝状体。分布东北及陕西、四川、云南、贵州等地。甘、涩，凉。清热化痰，凉血止血，祛风除湿。①治烦热，口唇生疮，咽喉痰结，咳血，吐血，偏、正头痛，眼目昏障，黄疸，热淋。煎服或沸水泡服：6～9克。②研末敷刀伤出血。本品含黑茶渍素（Atranorin）、冰岛衣酸（Cetraric acid）、原冰岛衣酸（Protocetraric acid）、反丁烯二酸原冰岛衣酸酯（Fumarprotocetraric acid）及麦角甾醇。

石橄榄 见《广东中草药》。为石仙桃之别名，详该条。

石燕 出《新修本草》。又名燕子石。为古生代腕足类石燕子科动物中华弓石燕Cyrtiispirifer sinensis（Graban.）及其近缘动物的化石。产湖南、广西、四川、山西、江西等地。甘，凉。入肾、膀胱经。利水通淋，去目翳。①治热淋涩痛，石淋，尿血，赤白带下。煎服：1.5～3克；磨汁饮或入丸、散。②治拳毛倒睫，眼目障翳。磨水点眼，后以黄连水洗。本品主含碳酸钙，尚含少量磷酸及二氧化硅。

石濡 出《名医别录》。为石蕊之别名，详该条。

石蟹 出《日华子诸家本草》。又名蟹化石。为古生代节肢动物弓蟹科石蟹Telphusa sp.及其近缘动物的化石。产台湾、广东及南洋群岛等地。咸，寒。入肝、胆经。清热利湿，去翳明目，消肿，催生。①治尿路感染，白带。煎服：1.5～6克。②治目赤，角膜云翳，痈肿，漆疮，磨水点涂；喉痹，磨汁饮并涂喉部。孕妇忌服。本品主含碳酸钙。

右旋藤 见《贵州民间方药集》。为忍冬藤之别名，详该条。

布荆子 见清·赵其光《本草求原》。为黄荆子之别名，详该条。

布渣叶 见清·赵其光《本草求原》。为破布叶之别名，详该条。

龙爪草头 见《上海常用中草药》。为石蒜之别名，详该条。

龙头草 见《广西药用植物名录》。为大驳骨之别名，详该条。

龙舌三尖刀 见《中国药用植物图鉴》。为卤地菊之别名，详该条。

龙舌叶 见《广东中草药》。为龙脷叶之别名。详该条。

龙舌草 ❶出《本草纲目》。又名海菜、水白菜、瓢羹菜、塘底菜。为水鳖科植物水车前 Ottelia alismoides（L.）Pers.的全草。分布华东、中南、西南各地。甘、淡，凉。止咳化痰，清热利尿。①治咳嗽，哮喘，肺结核咳血，水肿。煎服：15～30克。②治痈疽肿毒，汤火伤。捣烂敷。❷见《中国药用植物图鉴》。为卤地菊之别名，详该条。

龙衣 见《分类草药性》。为蛇蜕之别名，详该条。

龙芽草根 出《本草图经》。又名地冻风。为蔷薇科植物龙芽草 Agrimonia pilosa Ledeb.的根茎、全国大部分地区均有分布。辛、涩，温。①治赤白痢疾，偏头痛，经闭，产后感冒、寒热头痛、腰腹痛，疖肿。煎服：9～15克（鲜者30～60克）；或研末服。②治小儿疳积，目中翳障。同猪肝煮，食肝及汤。本品含仙鹤草内酯（Agrimonolide）、双氢槲皮素、香荚兰酸、并没食子酸、仙鹤草酚（Agrimonol）、鞣质等。

龙利叶 见萧步丹《岭南采药录》。又名龙舌叶。为大戟科植物龙脷叶 Sauropus changianus S.Y. Hu的叶。分布广东、广西等地，多为栽培。甘，平。清肺润燥，止咳，化痰。治肺热咳嗽，失音，喉痛，支气管哮喘。煎服：9～30克。龙利叶花：治咯血，9～15克，开水冲服。叶的煎剂在试管中对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌有抑制作用。

龙角藤 见《福建中草药》。为铺地蜈蚣之别名，详该条。

龙齿 出《神农本草经》。为古代大形哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马等的牙齿化石。主产河南、河北、山西、内蒙古等地。涩，凉。入心、肝经。镇惊安神。治惊痫，癫狂，心悸，心烦失眠。煎服：9～15克，打碎，先煎。本品主含碳酸钙、磷酸钙。

龙虎草 见《中国药用植物志》。为大戟之别名，详该条。

龙骨 出《神农本草经》。又名花龙骨。为古代大形哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马等的骨骼化石。产河南、河北、山西、陕西、山东、内蒙古、湖北、四川、云南、广西、青海等地。甘、涩，平。入心、肝、肾经。平肝潜阳，镇惊安神，固涩。①治惊痫，癫狂，头昏目眩，心悸失眠，遗精，泄泻，自汗，盗汗，崩漏，带下。煎服：15～30克，先煎。镇静多生用，固涩多煅用。②治溃疡久不收口，煅存性研末撒或调敷；汤火伤，与生石膏、大黄、儿茶各等分，同研细末，冷茶水调成糊状，涂患处。本品主含碳酸钙、硫酸钙，尚含铁、钾、钠、氯化物、硫酸盐等。

龙骨风 见《广西实用中草药新选》。为飞天蟒蟒之别名，详该条。

龙须草 ❶出《本草纲目拾遗》。又名野席草、水通草。为灯心草科植物野灯心草 Juncus setchuensis Buch.的全草或根。分布我国长江中下游及陕西、四川、云南等地。甘、淡，平。清热，利尿，解毒，安神。治口咽诸毒火症，牙痛，目赤肿痛，鼻衄，小便淋涩，肾炎水肿，心烦失眠，心悸，梦遗。煎服：9～30克。❷见《江西草药》。为灯心草之别名，详该条。❸见《四川中药志》。为松萝之别名，详该条。❹见《四川中药志》。为狗尿花之别名，详该条。

龙须菜 ❶出《本草纲目》。又名竹筒菜、发菜。为江蓠科植物江蓠Gracilaria verrucosa（Huds.）Papenf. 的藻体。分布我国沿海各地。甘、咸，寒。除热，消炎，软坚，利尿。治瘿瘤结气，小便不利。煎服：9～15克；亦可用醋浸食。本品含藻红蛋白、胆甾醇。❷出《救荒本草》。为粘鱼须之别名，详该条。

龙胆 出《神农本草经》。又名龙胆草、胆草、水龙胆、四叶胆。为龙胆科植物龙胆 Gentiana scabra Bge. 东北龙胆 G.manshurica Kitag.或三花龙胆G.triflora Pall.的根及根茎。主产东北地区及江苏、浙

江。苦，寒。入肝、胆经。泻肝胆实火，除下焦湿热。治脑膜炎，头痛，目赤，中耳炎，咽喉肿痛，口苦，胁痛，黄疸，肝炎，胆囊炎，小儿惊痫，热痢，睾丸肿痛，痈肿疮疡，尿路感染，阴部湿疹。煎服：3～9克。本品主含龙胆苦甙。龙胆、东北龙胆还含龙胆碱、龙胆糖。三花龙胆还含当药苦甙、当药甙和三花龙胆甙（Trifloroside）。龙胆苦甙等可刺激味觉感受器，反射性促进胃液分泌。龙胆碱有镇静、降低体温等中枢抑制作用，对大鼠实验性关节炎有抗炎作用。煎剂在体外对绿脓、变形、痢疾杆菌，金黄色葡萄球菌，水浸剂对某些常见致病性皮肤真菌均有不同程度抑制作用。

龙胆白薇 见《药材资料汇编》。为白薇之别名，详该条。

龙胆地丁 见《中药志》。又名广地丁、华南地丁。为龙胆科植物华南龙胆 Gentiana loureirii（D.Don）Griseb.的全草。分布浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、云南。微苦，寒。清热利湿，解毒消肿。①治咽喉肿痛，痢疾，肝炎，阑尾炎。煎服：6～15克。②治疮疡肿毒，淋巴结结核，煎服或捣敷。

龙胆草 见《履巉岩本草》。为龙胆之处方名，详该条。

龙涎香 出《本草纲目拾遗》。又名龙腹香。为抹香鲸科动物抹香鲸Physeter catodon L. 肠内分泌物的干燥品。我国南海、东海和台湾省沿海有分布。甘、酸，气腥。行气活血，化痰开窍，利水通淋。治咳喘气逆，心腹疼痛，神昏气闷，淋病。内服：研末，0.3～0.6克；或入丸、散用。本品约含25%龙涎香醇（Ambrein）。本品药理与麝香相似，小量对动物中枢神经系统有兴奋作用，大量则表现抑制；对离体心脏有强心作用，对整体动物则引起血压下降。

龙珠 出《药性论》。又名赤珠、红珠草。为茄科植物龙珠Tubocapsicum anomalum（Franch.et Savat.）Mak.的全草。分布广东、广西、贵州、江西、浙江、福建、台湾。苦，寒。治小便淋痛。煎服：15～30克。外用捣敷疔疮。龙珠根：煎服治痢疾。

龙脑冰片 见《中药志》。为冰片药材之一种，详该条。

龙眼叶 出明·范洪《滇南本草图说》。为无患子科植物龙眼 Euphoria longan（Lour.）Steud.的叶或嫩芽。分布台湾、福建、广东、广西、四川。微苦、涩，平。清热利湿，解毒杀虫。①防治感冒；治肠炎，尿道炎。煎服：15～30克。②治痔疮，烂脚，阴囊湿疹，煎水洗；牙疳，烧存性研末搽；眼睑炎，晒干研末，茶油调涂。叶含槲皮素、槲皮甙；谷甾醇、豆甾醇及其葡萄糖甙，表无羁萜醇等。

龙眼肉 出《开宝重定本草》。又名桂圆肉、蜜脾。为无患子科植物龙眼 Euphoria longan（Lour.）Steud.的假种皮。主产广西、福建、广东、台湾、四川。甘，温。入心、脾经。补益心脾，养血安神。治失眠，健忘，心悸怔忡，慢性出血，月经过多，气血不足，虚劳羸弱等症。煎服：6～15克。本品含葡萄糖，蔗糖，酒石酸，腺嘌呤，胆碱，蛋白质，脂肪，维生素B_1、B_2、P及C。煎剂在体外对痢疾杆菌有抑制作用。

龙眼树皮 见萧步丹《岭南采药录》。为无患子科植物龙眼Euphoria longan（Lour.）Steud.树皮的韧皮部。杀虫，解毒，消肿，生肌。①治疳积，疔疮，睾丸炎。煎服：6～15克。②煅存性研末可治外伤出血；煎水洗治疳眼。龙眼的根或根皮的韧皮部称龙眼根，治乳糜尿、白带。煎服：15～30克。龙眼花：功用与根同，又治各种淋症。

龙眼核 出明·范洪《滇南本草图说》。为无患子科植物龙眼 Euphoria longan（Lour.）Steud.的种子。涩，平。止血定痛，理气散结。①煅研外敷，治创伤出血，足趾痒烂；煅研油调涂烫伤，疥癣。②治疝气，

瘿瘤。煎服：3～9克；研末服，每次1～2克。龙眼的果皮名龙眼壳，外用治痈疽久不愈合，汤火烫伤。洗去表面附着之姜黄粉末，煅存性研末油调涂。核含皂甙、脂肪油及鞣质。

龙眼根 见《辽宁主要药材》。为升麻之别名，详该条。

龙船花 ❶出《生草药性备要》。又名百日红、红樱花、五月花、番海棠。为茜草科植物龙船花 Ixora chinensis Lam.的花。分布广东、广西、台湾、福建等地。甘、辛，凉。清肝，活血，止痛。①治高血压病，月经不调，经闭。煎服：9～15克。②治筋骨折伤，疮疡。捣敷。❷见《植物名实图考》。为五色梅之别名，详该条。

龙船花根 见广州军区空军卫生部《常用中草药手册》。为茜草科植物龙船花Ixora chinensis Lam.的根。苦、微涩，凉。活血散瘀，行气止痛。①治肺结核咯血，胃痛，风湿肿痛，经闭。煎服：15～30克。②治跌打损伤，疮疡。研末水调敷。龙船花的茎叶名卖子木，捣烂外敷或研末调敷，治跌打损伤，瘀血疼痛，疮疖痈肿。

龙葵 出《药性论》。又名苦葵、天泡草、天茄子、山海椒、乌疔草、野辣椒。为茄科植物龙葵Solanum nigrum L.的全草。我国各地均有分布。苦、微甘，寒，有小毒。清热解毒，散结消肿，利尿，抗癌。①治痈肿疔疮，丹毒，天疱疮，跌打损伤，蛇咬伤，捣烂外敷；皮肤湿疹，瘙痒，煎服或煎水洗。②治高血压病，咽喉肿痛，慢性气管炎，泌尿系感染，痢疾，水肿，白带；近用于治疗各种癌症。煎服：15～30克。过量服用可引起头痛、腹痛吐泻、瞳孔散大、精神错乱等中毒反应；长期服用，并可导致白细胞下降。本品含澳洲茄碱和澳洲茄边碱等多种生物碱甙。又含皂甙；甙元是薯蓣皂甙元和替告皂甙元。还含较多量的维生素类物质。煎剂对金黄色葡萄球菌，痢疾、伤寒、变形、大肠、绿脓杆菌均有抑制作用。澳洲茄胺有考的松样作用及抗真菌作用，但能溶血，毒性较大。

龙葵子 出《药性论》。为茄科植物龙葵Solanum nigrum L.的果实。甘，温。解毒，祛痰。①治急性扁桃体炎，煎水含漱；疔疮，捣敷。②治咳嗽痰喘。煎服：4.5～9克。本品含脂肪油及少量甾醇。干果含绿原酸、咖啡酸等。醇提取物在动物试验中有镇咳、祛痰作用。

龙葵根 出《本草图经》。为茄科植物龙葵Solanum nigrum L.的根。苦、微甘，寒。清热利湿，消肿散血。①治痢疾，淋浊，白带。煎服：9～15克。②捣敷治痈疽肿毒，跌打损伤。本品含少量澳洲茄边碱。

龙腹香 见《中国药学大辞典》。即龙涎香，详该条。

龙蜜瓜 见《滇南本草》。为瓠子之别名，详该条。

龙鳞草 出《生草药性备要》。为排钱草之别名，详该条。

平贝母 见《吉林中草药》。为百合科植物平贝母Fritillaria ussuriensis Maxim.的鳞茎。分布东北的长白山区。微苦，微寒。清肺化痰止咳。治肺热咳嗽，痰多胸闷。煎服：3～9克。反乌头、附子。本品含生物碱可能是贝母碱（Peimine）。

平地木 出《李氏草秘》。为紫金牛之别名，详该条。

打不死 见《广西中药志》。为落地生根之别名，详该条。

打枪子 见《分类草药性》。为绛梨木子之别名，详该条。

打官司草 见《江苏省植物药材志》。为车前草之别名，详该条。

打毒金 见《全国中草药汇编》。为蜂窝草之别名，详该条。

打结花 见《中国树木分类学》。为新蒙花之别名，详该条。

打破碗花花 见《四川常用中草药》。又

名拐角七、青水胆。为毛茛科植物打破碗花花Anemone hupensis Lem.的根。分布西南地区。苦，凉，有毒。杀虫，清热利湿，化瘀消肿。治疟疾，痢疾，腹泻，蛔虫病，跌打损伤。煎服：1.5～6克。孕妇忌服。本品含白头翁素。鲜汁在体外对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌、大肠杆菌、伤寒杆菌、绿脓杆菌及某些致病性真菌有抑制作用。

打鼓子 见《云南中草药选》。为千金子之别名，详该条。

打碗棵 见《河北中药手册》。为猫眼草之别名，详该条。

扑地金钟 见《泉州本草》。为金边兔耳之别名，详该条。

东风菜 见《中国药用植物志》。又名白云草、仙白草、盘龙草、疙瘩药。为菊科植物东风菜 Doellingeria scaber (Thunb.) Nees的根或全草。分布我国北部、中部、东部至南部各地。辛、甘，寒。清热解毒，祛风，活血，消肿。①治毒蛇咬伤。煎服或捣敷伤口周围。②治感冒头痛，急性眼结膜炎，咽喉肿痛，肠炎腹痛，风湿性关节炎，跌打扭伤。煎服：15～30克；或捣汁冲服。③捣敷疮疖、刀伤。根含角鲨烯、无羁萜、3β-无羁萜醇、α-菠菜甾醇。

东风橘根 见《岭南采药录》。为芸香科植物酒饼笋Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.的根。分布广东、广西、台湾等地。辛、苦，温。祛风解表，顺气化痰，去瘀止痛。①治感冒，咳嗽，疟疾，胃痛，风湿痹痛，疝痛。煎服：9～15克。②治跌打肿痛。研末酒炒敷。

东丹 见《现代实用中药》。即铅丹，详该条。

东方蓼 见《中国药用植物志》。为荭草之别名，详该条。

东北蒿蒿 见《中国药用植物图鉴》。为菊科植物东北蒿蒿 Artemisia finita Kitag.的花蕾。分布黑龙江、内蒙古、新疆等地。辛、苦，寒，有毒。驱蛔虫。治蛔虫病腹痛。本品15～18克，研末，加白酒1两，浸一夜去渣，隔水蒸去酒精，清晨空腹一次服下，二小时后冲服芒硝12克，小儿减量。本品含左旋β-山道年及东北蒿蒿素(Finitin)。

东瓜 出《瀛崖胜览》。即冬瓜，详该条。

【丨】

北五加皮 见《科学的民间草药》。即香加皮，详该条。

北五味子 见《医学入门》。为五味子之处方名，详该条。

北刘寄奴 见《浙江民间常用草药》。为铃茵陈之别名，详该条。

北豆根 见《中国药典·一部》1977年版。又名蝙蝠葛根、狗葡萄根。为防己科植物蝙蝠葛Menispermum dauricum DC.的根茎。分布东北、华北、华东等地区。苦，寒。入心、肺经。清热解毒，通便。①治扁桃体炎，咽喉肿痛，肺热咳嗽，肠炎，痢疾，热结便秘，黄疸，水肿，风湿痹痛。煎服：6～12克。②治口腔炎，煎汤含漱；蛇虫咬伤，痔疮肿痛，研末外敷。本品含蝙蝠葛壬碱(Menisperine)、蝙蝠葛碱(Dauricine)、6-去甲蝙蝠葛碱(Daurinoline)、6'-去甲蝙蝠葛碱(Dauricinoline)、6,6'-去二甲蝙蝠葛碱(Dauricoline)、7-去甲蝙蝠葛碱(Daurisoline)和木兰花碱等生物碱。木兰花碱能降低血压，蝙蝠葛壬碱、蝙蝠葛碱有肌肉松弛作用。

北芫花 见《中药材手册》。为黄芫花之药材名，详该条。

北沙参 出《本草汇言》。又名银条参、莱阳参、辽沙参。为伞形科植物珊瑚菜 Glehnia littoralis Fr.Schm.ex Miq.的根。主产山东、河北、辽宁。甘，微寒。入肺、胃经。益气，润肺止咳，养胃生津。治肺热燥咳，虚痨久咳，肺痿，热病后阴伤，咽干口渴。煎服：6～15克。反藜芦。本品含生物

碱、挥发油及丰富的淀粉。醇提取物对家兔有解热、镇痛作用。本品尚能增加支气管粘膜分泌，有祛痰作用。

北败酱 见《中国药典·一部》1977年版。为苣荬菜之别名，详该条。

北细辛 见《理伤续断秘方》。为细辛之药材名，详细辛条。

北庭砂 出《四声本草》。为硇砂之别名，详该条。

北野菊 见《河北中药手册》。为菊科植物细裂野菊Chrysanthemum lavandulaefolium (Fisch.) Makino的地上部分。分布东北、华北、西北及华东地区。微苦、辛，凉。清热解毒，凉肝明目。①防治流行性感冒，感冒，头痛，目赤，肺炎，淋巴腺结核。煎服：9～30克。②治痈疖疔疮，湿疹，脓疱疮，宫颈糜烂。煎水洗，捣敷或熬膏涂敷。花、叶中含挥发油，油中主成分为白菊酮(Chrysantone)和蒈等。

北寄生 见《中药材手册》。为槲寄生之药材名，详该条。

北鲜皮 见《药材资料汇编》。即白鲜皮，详该条。

北鹤虱 见《中药志》。为鹤虱之处方名，详该条。

卡密 见《中国沙漠地区药用植物》。又名酸胖、哈莫儿、西伯利亚白刺。为蒺藜科植物小果白刺 Nitraria Sibirica Pall. 的果实。分布内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆等地。甘、酸、微咸，温。滋补强壮，健脾胃，调经活血，治身体瘦弱，气血两亏，脾胃不和，消化不良，月经不调，腰腿酸痛。煎服：9～15克。地上部分含生物碱，对麻醉狗和猫能降低血压，但无抗交感神经效应和罂粟碱样作用。

卡斯纳 见《中国药典·一部》1977年版。为菊苣之维吾尔族名，详该条。

卢都子 出《中藏经》。为胡颓子之别名，详该条。

卢橘 出《汉书》。为金橘之别名，详该条。

叶下双桃 见《浙江民间常用草药》。为铁苋之别名，详该条。

叶下白 ❶见《闽东本草》。为天青地白之别名。❷见《海南岛常用中草药手册》。为白背叶之别名。各详该条。

叶下红 ❶见《福建民间草药》。为一点红之别名。❷见《湖南药物志》。为白毛夏枯草之别名。❸见《贵州民间药物》。为血盆草之别名。各详该条。

叶上花 ❶见《峨眉山药用植物》。为叶上珠之别名。❷见《云南中草药》。为胃友之别名。❸见《昆明民间常用草药》。为猫花之别名。各详该条。

叶上花根 见《云南中草药》。即叶上珠根，详该条。

叶上果 见《中国药用植物图鉴》。为叶上珠之别名，详该条。

叶上果根 见《贵州草药》。即叶上珠根，详该条。

叶上珠 见《民间常用草药汇编》。又名叶上花、叶上果。为山茱萸科植物青荚叶Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.或西藏青荚叶H.himalaica Clarke等的叶和果实。前者分布中南、西南大部分地区及陕西、浙江、安徽、福建、台湾等地；后者分布广西、广东及西南地区。苦、辛，凉。清热除湿，止痛，消肿。①治痢疾，便血，胃痛。煎服：9～15克。②捣敷疮疖痈肿，蛇咬伤，汤火伤。

叶上珠根 见《云南中草药》。又名叶上花根、叶上果根。为山茱萸科植物青荚叶Helwingia japonica (Thunb.) Dietr.或西藏青荚叶H. himalaica Clarke等的根。苦、涩，凉。祛风除湿，止咳，化瘀，固脱。治风湿痹痛，慢性咳喘，劳伤疼痛，跌打损伤，子宫脱垂。煎服：9～15克。

叶生根 见《广西中药志》。为落地生根

之别名，详该条。

叶后珠 见《四川中药志》。为珍珠草之别名，详该条。

叶抱枝 见《福建中草药》。为元宝草之别名，详该条。

叭哒杏仁 见《要药分剂》。即巴旦杏仁，详该条。

叫铃子 见《四川中药志》。为绛梨木子之别名，详该条。

叫梨子 见《民间常用草药汇编》。为绛梨木子之别名，详该条。

号筒杆 见《湖南野生植物》。为博落回之别名，详该条。

号筒草 见《植物名实图考长编》。为博落回之别名，详该条。

申枣 见《药材资料汇编》。为猴枣之别名，详该条。

申蜜 见《本草正义》。为骨碎补之别名，详该条。

由甲草 见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。为孩儿草之别名，详该条。

田七 ❶见萧步丹《岭南采药录》。即三七。❷见《四川中药志》。为峨参之别名。各详该条。

田边菊 见《全国中草药汇编》。为红管药之别名，详该条。

田字草 见《本草纲目》。为苹之别名，详该条。

田鸡爪 见《福建民间草药》。为兖州卷柏之别名，详该条。

田鸡油 见《中药通报》（5）：205，1956。为蛤蟆油之别名，详该条。

田鸡草 见萧步丹《岭南采药录》。为粪箕笃之别名，详该条。

田萍 见《中药志》。为浮萍之别名，详该条。

田菠菜 见《湖南药物志》。为车前草之别名，详该条。

田基黄 见《生草药性备要》。为地耳草之别名，详该条。

田萝草 见《湖南药物志》。为丁香蓼之别名，详该条。

田螺 出《药性论》。为田螺科动物中国圆田螺 Cipangopaludina chinensis (Gray) 或其同属动物的全体。全国大部分地区均有分布。甘、咸，寒。入膀胱、肠、胃经。清热，利水。①治热结小便不通，水肿。煎服；并可取肉与盐同捣敷脐上。②治黄疸，脚气，消渴。煎服：肉60～120克。③治痈肿疮毒，取肉捣敷；瘰疬溃破，煅存性研末，香油调敷。

田螺水 出《本草纲目》。为田螺科动物中国圆田螺 Cipangopaludina chinensis (Gray) 分泌的水液。性大寒。①治目热赤痛，烂弦风眼，螺中入食盐少许，取汁滴眼；疔疮肿毒，痔疮肿痛，螺中入冰片少许，取汁涂搽患处。②治消渴饮水，小便频数。水浸取汁代茶饮，或水煎取汁服。

田螺壳 出《名医别录》。为田螺科动物中国圆田螺 Cipangopaludina chinensis (Gray) 的壳。甘，平。收敛，制酸，止血。①治反胃吐食，胃痛，泄泻，便血。内服：煅研末1.5～3克；或入丸服。②治疱疮脓水，头疮。煅研末撒或清油调涂。

四儿风 见《分类草药性》。为大四块瓦之别名，详该条。

四川大金钱草 见《中药通报》5（1）：26，1959。即大金钱草，详该条。

四匹瓦 见《民间常用草药汇编》。为四块瓦之别名，详该条。

四月子 见《本草纲目》。为木半夏之别名，详该条。

四方草 ❶见《江西草药》。为四叶草之别名。❷见《浙江民间常用草药》。为半枝莲之别名。❸见《海南岛常用中草药手册》。为母草之别名。各详该条。

四方拳草 见《广东中草药》。为母草之别名，详该条。

四方麻 出《植物名实图考》。又名四棱草、青鱼胆、山练草。为玄参科植物四方麻 Veronicastrum caulopterum (Hance) Yamazaki的全草。分布江西、湖北、湖南、广东、广西、云南、贵州。苦，寒。清热解毒，消肿，止痛，生肌。①治目赤，喉痛，痄腮，瘰疬，肠炎，痢疾，黄疸，淋病。煎服：9～15克。②治湿疹，脚癣，煎水洗；烧烫伤，研末油调涂；痈疖疔疮，跌打损伤，蛇咬伤，捣敷。

四方蒿 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·传染病》。为溪黄草之别名，详该条。

四方藤 见《广西中药志》。又名宽筋藤、红四方藤、蚂蝗藤、软筋藤。为葡萄科植物四方藤Cissus pteroclada Hayata 的茎藤。分布广西、广东等地。微苦、涩，平。入肝经。祛除风湿，舒筋活络。治风湿痹痛，四肢挛急，腰肌劳损，跌打内伤。煎服：15～30克；或浸酒内服。外用：捣烂酒炒敷。

四叶七 见《全国中草药汇编》。为四叶草之别名，详该条。

四叶对 见《安徽药材》。为银线草之别名，详该条。

四叶苹 见《天宝本草》。为苹之别名，详该条。

四叶金 见《福建中草药》。为对叶四块瓦之别名，详该条。

四叶参 见《江苏南部种子植物手册》。为山海螺之别名，详该条。

四叶细辛 见《植物名实图考》。为及己之别名，详该条。

四叶草 ❶见《江西草药》。又名风车草、四方草、四叶七、蛇舌癍。为茜草科植物四叶葎Galium bungei steudel的全草。广布我国各地，常见于长江中下游和华北地区。甘，平。清热解毒，利尿，消肿。①治尿路感染，赤白带下，痢疾，近用于脑脊髓膜炎，脓毒性败血症，癌症。煎服：15～30克。②治咳血。捣烂取汁，冷开水和服。③捣敷治痈疽，蛇头疔。❷见《除害灭病爱国卫生运动手册》。为银线草之别名，详该条。

四叶胆 见《广西中兽医药用植物》。为龙胆之别名，详该条。

四叶莲 见《本草纲目拾遗》。为对叶四块瓦之别名，详该条。

四叶黄 见《全国中草药汇编》。为大四块瓦之别名，详该条。

四叶麻 见《湖南药物志》。为对叶四块瓦之别名，详该条。

四皮麻 见《湖南药物志》。为麻口皮子药之别名，详该条。

四块瓦 ❶出《草木便方》。又名四匹瓦。为金粟兰科植物宽叶金粟兰 Chloranthus henryi Hemsl.的全草。分布湖北、湖南、四川、浙江等地。辛，温，有毒。祛风除湿，活血散瘀。①治风寒咳嗽，跌打损伤，风湿麻木，筋骨疼痛，闭经。煎服：1.5～2.4克。②治瘀血肿痛，毒蛇咬伤。捣敷。心脏病患者及孕妇忌服。❷见《贵州民间方药集》。为对叶四块瓦之简称，详该条。❸见清·刘士季《草木便方》。即大四块瓦，详该条。❹见《广西中药志》。为银线草之别名，详该条。

四时茶 见《闽南民间草药》。为冰糖草之别名，详该条。

四季花 ❶见《益部方物略记》。为月季花之别名。❷见《浙江民间草药》。为蛇根草之别名。各详该条。

四季青 见《中草药通讯》(3)：33，1971。又名小叶冬青、冬青叶。为冬青科植物冬青 Ilex chinensis Sims的叶。分布长江流域及其以南各地。苦、涩，寒。清热解毒，活血祛瘀，收敛止血。①治烧伤，下肢溃疡，麻风溃疡，制成药水或搽剂外涂；冻疮，皮肤皲裂，烧灰油调搽；热疖痈肿，创伤出血，捣烂敷；口腔炎，研末喷敷；接触性皮炎，漆疮，煎水洗。②治上呼吸道感染，急、慢

性支气管炎，肺炎，急性咽喉炎，扁桃体炎，肠炎，痢疾，胆道感染，尿路感染。煎服：15～60克。本品含原儿茶酸、原儿茶醛、熊果酸、挥发油、鞣质、黄酮类、三萜类等。水剂及原儿茶酸、原儿茶醛在体外对绿脓、大肠、痢疾、变形杆菌和金黄色葡萄球菌均有抑制作用；并有收敛和促进肉芽生长的作用，对实验性烫伤有良好的治疗效果。原儿茶酸能降低心肌氧耗量，对心肌供血不足的心电图有一定的改善作用。原儿茶醛扩张冠状动脉，抑制血小板凝聚。

四季菜 见《广州植物志》。为鸭脚艾之别名，详该条。

四面戟 见《药材学》。为鬼箭羽之别名，详该条。

四眼叶 见《南宁市药物志》。为黑面神之别名，详该条。

四脚蛇 见《四川中药志》。为石龙子之别名，详该条。

四脚喜 见《浙江民间常用草药》。为肺形草之别名，详该条。

四棱子 见《浙江天目山药用植物志》。为野杜仲之别名，详该条。

四棱杆蒿 见《中药志》。为荆芥之别名，详该条。

四棱草 ❶见《湖南药物志》。为四方麻之别名。❷见《广西植物名录》。为四楞筋骨草之别名。❸见《全国中草药汇编》。为黑及草之别名。各详该条。

四棱麻 见《湖南药物志》。为豨莶草之别名，详该条。

四棱锋 见《中国树木分类学》。为鬼箭羽之别名，详该条。

四棱蒿 见《云南中草药选》。为鸡肝散之别名，详该条。

四楞筋骨草 见《四川中药志》。又名箭羽草、四棱草。为唇形科植物四楞筋骨草 Schnabelia oligophylla Hand.-Mazz.的全草。分布长江以南各地。辛、苦，温。入肝、肾经。祛风通络，散瘀止痛。①治风湿痹痛，腰痛，四肢麻木，经闭。煎服：9～15克。②治烧烫伤，痈肿，捣烂取汁，调食盐少许外涂；跌打肿痛，煎服并捣烂酒炒敷。孕妇忌服。

四蕊三角瓣花 见《广西本草选编》。为黄根之别名，详该条。

〔丿〕

生地黄 出《本草经集注》。即鲜生地，详该条。

生扯拢 见《民间常用草药汇编》。为糯米藤之别名，详该条。

生姜 出《本草经集注》。为姜科植物姜 Zingiber officinale Rosc.的鲜根茎。除东北外我国大部分地区均有栽培。辛，微温。入肺、胃、脾经。发表散寒，消痰下气，温中止呕。①治感冒风寒，呕吐，痰饮咳喘，胀满泄泻。②解半夏、天南星及鱼、蟹、禽、兽肉毒。煎服：3～9克，或捣汁饮。姜叶：捣汁饮治肉食不消，成为癥积。根茎含挥发油，主成分为姜醇、姜烯、莰烯、龙脑等。还含辣味成分姜辣素，系一群具类似结构的物质的混合物。姜辣素刺激消化道粘膜，增进食欲，帮助消化。浸膏对硫酸铜引起的狗呕吐有止吐作用，姜汁亦有效。生姜能兴奋血管运动中枢和呼吸中枢，升高血压，促进发汗。能抑制某些常见的致病性皮肤真菌，杀灭阴道滴虫和抑制大鼠的蛋白性关节炎。

生姜皮 出《食疗本草》。又名姜皮、生姜衣。为姜科植物姜 Zingiber officinale Rosc.根茎的栓皮。辛，凉。入脾、肺经。行水消肿。治水肿胀满。煎服：1.5～6克。外擦皮肤癣疾。

生姜衣 见《江苏省植物药材志》。为生姜皮之别名，详该条。

生晒参 见《中药材手册》。为人参商品之一种，详人参条。

生等 见《全国中草药汇编》。即升登，

详该条。

生藤 见《云南中草药》。又名羊角藤。为萝藦科植物须药藤 Stelmatocrypton Khasianum (Benth.) H.Baill.的茎藤或全株。分布云南、广西。甘、辛，温。祛风解表，舒筋活络，行气止痛。治风寒感冒，支气管炎，风湿疼痛，胃痛，食积气胀。煎服：9～15克。根含挥发油，主为2-羟基-4-甲氧基苯甲醛。

禾雀舌 见萧步丹《岭南采药录》。为佛甲草之别名，详该条。

禾镰草 见《江西草药》。为合萌之别名，详该条。

代代花 见《饮片新参》。又名玳玳花。为芸香科植物代代花Citrus aurantium L. var.amara Engl.的花蕾。主产江苏、浙江。甘、微苦，平。理气，宽胸，开胃。治胸闷，恶心，胃脘胀痛，不思饮食。煎服：1.5～3克；或泡茶饮。本品含挥发油，内含柠檬烯、芳樟醇等。尚含新橙皮甙、柚皮甙。

代赭石 出《神农本草经》。又名血师、赭石、为氧化物类矿物赤铁矿的矿石。产山西、河北、广东、河南、山东、四川、湖南等地。苦、甘，寒。入肝、胃经。镇逆平肝，凉血止血。治呃逆，嗳气，呕吐，噎膈反胃，气逆喘息，眩晕，耳鸣，惊痫，吐血，衄血，便血，崩漏。煎服：9～30克，先煎。潜降多生用，止血多煅用。本品主含三氧化二铁，有时杂有钛、镁、铝、锰、钙、砷、硅等。内服有收敛作用，可保护胃肠粘膜面；吸收入血，能促进血细胞的新生。赭石中含十万分之一的砷盐，长期服用有慢性砷中毒的可能。

仙人杖 出《本草拾遗》。又名退秧竹、瘪竹。为禾本科植物苦竹 Pleioblastus amarus (Keng) Keng f.枯死的幼竹茎秆。分布我国南方各地。咸，平。治哕逆，反胃，小儿吐乳，水肿。煎服：15～30克。痔疮，烧存性研末服；脚气，与赤小豆煎水熏洗。

仙人冻 见《本草纲目拾遗》。为凉粉草之别名，详该条。

仙人草 出《职方典》。为凉粉草之别名，详该条。

仙人掌 出《本草纲目拾遗》。又名霸王树。为仙人掌科植物仙人掌Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.的全株。分布我国南方各地，野生或栽培。苦，寒。入胃、肺经。活血消肿，清热解毒，止痛，镇咳。①治腮腺炎，乳腺炎，痈疖肿毒，带状疱疹，烧烫伤，蛇、虫咬伤，冻伤。鲜品去刺捣敷或绞汁涂。②治心胃气痛，肠炎，痢疾，痔漏下血，支气管哮喘。煎服：鲜品30～60克。孕妇慎用。忌铁器。茎叶含苹果酸、琥珀酸及三萜化合物等。花含槲皮素，异槲皮素、异鼠李素。体外试验，对金黄色葡萄球菌和枯草杆菌有抑制作用。

仙白草 见《中国药用植物志》。为东风菜之别名，详该条。

仙灵脾 出《雷公炮炙论》。为淫羊藿之别名，详该条。

仙茅 出《海药本草》。又名独芽根、仙茅参、蟠龙草、地棕根、独脚丝茅。为仙茅科植物仙茅Curculigo orchioides Gaertn.的根茎。主产四川、云南、贵州、广东、广西。辛，温，有小毒。入肾经。温肾壮阳，散寒除湿。治阳痿精寒，小便失禁，遗尿，崩漏，寒湿痹痛，腰膝酸软，胃腹冷痛；近用于治更年期高血压症，更年期综合症，血清胆固醇过高症。煎服：4.5～9克。本品含粘液质、鞣质、树脂等。煎剂对史氏、福氏、宋氏痢疾杆菌有抑制作用、丙酮提取物对艾氏腹水癌实体型瘤有抑制作用。

仙茅参 见《中药志》。即仙茅，详该条。

仙草 见《中国药用植物图鉴》。为凉粉草之别名。详该条。

仙桥草 见《李氏草秘》。为腹水草之别名，详该条。

仙桃草 出清·赵楷《百草镜》。又名接

骨仙桃、小伤力草。为玄参科植物蚊母草Veronica peregrina L.带虫瘿的全草。分布东北、华东、华中、西南各地。甘、淡，温。活血止血，理气止痛。①治内伤吐血，咯血，衄血，便血，子宫出血，肝胃气痛，疝气，痛经。煎服：9～15克；亦可研末或捣汁服。②治跌打损伤，骨折，痈肿。煎服并捣敷。

仙遗粮 见《滇南本草》。为土茯苓之别名，详该条。

仙鹤草 出《伪药条辨》。又名脱力草、黄龙尾、狼牙草、金顶龙芽。为蔷薇科植物龙芽草Agrimonia pilosa Ledeb.的地上部分。全国大部分地区均产。苦、涩，平。入肺、肝、脾经。止血，强壮，消肿。①治咳血，吐血，衄血，齿龈出血，尿血，便血，月经不调，崩漏，带下，胃肠炎，赤白痢疾，贫血衰弱，脱力劳伤。煎服：9～30克。②治疟疾。研末，于发疟前用酒吞服。③治痈肿疮疖，炎性外痔，熬膏涂；滴虫性阴道炎，浓煎液涂抹；蛇咬伤，捣敷。全草含对疟原虫有抑制作用的仙鹤草酚（Agrimol）以及大波斯菊甙、仙鹤草内酯、鞣质、挥发油等。仙鹤草色素（混合物）用作止血药，但确切疗效迄未肯定。全草的脂溶性部分的酚性部位有抗疟作用，提取物及仙鹤草内酯能减少离体兔肠的张力及蠕动，水或乙醇提取物在体外对葡萄球菌等有抑制作用。

仙鹤草根芽 见《中华医学杂志》(6)：346，1974。又名鹤草芽、狼牙草根芽。为蔷薇科植物龙芽草Agrimonia pilosa Ledeb.带短小根茎的冬芽。治绦虫病。研末，30～45克，早晨空腹一次顿服，不需另服泻药。部分患者有恶心、呕吐。如服用其提取物，则具有疗效高、无副作用的优点，但需另服泻药导泻。本品含鹤草酚（Agrimophol），能使绦虫（猪肉绦虫、牛肉绦虫、短膜壳绦虫）吸盘丧失吸着能力，并呈痉挛性麻痹而被驱出肠外。毒性小，但忌服大量油、酒类食物；并宜先驱蛔虫而后驱绦虫。鹤草酚对阴道滴虫、滴虫性肠炎也有治疗作用。

仙蟾 见《本草纲目》。为蛤蚧之别名，见该条。

白三七 见《中药材品种论述》。为竹节三七之别名，详该条。

白马尾 见《安徽中草药》。为白薇之别名，详该条。

白马骨 出《本草拾遗》。又名满天星、曲节草、路边姜、凉粉草、鸡脚骨。为茜草科植物六月雪Serissa serissoides（DC.）Druce或白马骨S.foetida Comm.的全株。分布我国东南部和中部各地。苦、辛，凉。疏风解表，清热利湿，活血消肿。①治感冒，咳嗽，急性扁桃体炎，咽喉炎，目赤肿痛，急、慢性肝炎，高血压头痛，肠炎，痢疾，风湿腰腿痛，慢性肾炎水肿，小儿疳积，妇女白带过多。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。②治痈肿，蛇伤。捣敷。白马骨根：煎服治肠风，脏毒，咳嗽痰中带血，尿血。六月雪全株含甙类及鞣质；根含皂甙。白马骨全株含熊果酸及β-谷甾醇。

白马胎 见《广东中草药》。即走马胎，详该条。

白云母 见《备急千金要方》。即云母，详该条。

白云花根 见《全国中草药汇编》。又名滇独活、毛爪参。为伞形科植物白云花Heracleum rapula Franch.的根。分布云南、西藏等地。苦、辛，温。祛风除湿，活络止痛，止咳平喘。治风湿痹痛，跌打损伤，腰痛，胃痛，感冒，咳嗽，慢性气管炎，哮喘，闭经，白带。煎服：3～9克；研末，0.9～1.5克。

白云草 见《湖南药物志》。为东风菜之别名，详该条。

白云香 见《中药志》。为白胶香之别名，详该条。

白木耳 出清·叶小峰《本草再新》。又名

白耳子。为银耳科植物银耳Tremella fuciformis Berk.的子实体。主产四川、贵州、福建；江苏、浙江、湖北等地亦产。甘、淡，平。滋阴，润肺，益气。治劳咳，肺痿，咯血，痰中带血，崩漏，便秘，高血压病，血管硬化，及病后虚弱。煨食：3～9克。本品含抗癌多糖A、B及C。

白木香 见《浙江中药手册》。为防己之别名，详该条。

白木通 ❶见《湖南药物志》。为女萎之别名。❷见《四川中药志》。为川木通之别名。各详该条。

白牛胆 见《泉州本草》。为羊耳菊之别名。详该条。

白牛膝 出《滇南本草》。又名九股牛膝、长深根。为石竹科植物狗筋蔓Cucubalus boccifer L.的根。分布我国南北各地。甘、淡，温。祛风除湿，利尿消肿，散瘀止痛。①治风湿关节痛，肾炎水肿，尿路感染，小儿疳积，肺结核，闭经，赤白带，跌打损伤。煎服：9～15克。②治痈疖，瘰疬。捣敷或煎服。孕妇忌服。本品含多种低聚糖，内有剪秋罗糖（Lychnose）、异剪秋罗糖、棉子糖。

白毛夏枯草 出《本草纲目拾遗》。又名散血草、金疮小草、雪里青、叶下红。为唇形科植物筋骨草Ajuga decumbens Thunb.的全草。分布华东、中南及西南地区。苦，寒。清热解毒，止咳化痰，凉血止血。入肺经。①治上呼吸道感染，急性扁桃体炎，咽喉肿痛，急、慢性支气管炎，肺炎，肺脓疡。②治肝炎，赤痢，胃肠炎，阑尾炎，阑尾脓肿。③治咳血，衄血，吐血，便血，高血压。如煎服：9～15克（鲜品30～60克）。④治跌打损伤，外伤出血，痈肿疮疖，烧烫伤，蛇咬伤，鲜品捣烂敷，或焙干研末加蜂蜜调敷。本品含蜕皮甾酮，杯苋甾酮和少量的筋骨草甾酮B、C，筋骨草内酯。又谓含木犀草素（黄酮）等。所含黄酮对动物有止咳、祛痰、平喘作用。浸膏对大白鼠有预防肝损伤作用；黄酮及提取物在体外对流感病毒、甲型链球菌，金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、大肠、绿脓杆菌均有抑制作用。

白毛蛇 见《广西实用中草药新选》。为草石蚕之别名，详该条。

白毛藤 ❶出清·赵楷《百草镜》。又名蜀羊泉、排风藤、毛风藤、葫芦草。为茄科植物白英Solanum lyratum Thunb.或欧白英S.dulcamara L.的全草。前者分布甘肃、陕西、河南、山东及长江以南各地；后者分布云南、四川。苦，凉。清热解毒，祛风利湿，利尿，抗癌。①治风热感冒，发热，咳嗽，黄疸型肝炎，胆囊炎，风疹，肾炎水肿，血淋，白带，肺癌。煎服：9～15克（鲜品15～30克）。②治风湿性关节炎。泡酒服并捣敷。③治痈肿疔毒，煎服并捣敷；中耳炎，捣汁滴耳。白英全草含有β-羟基甾体生物碱甙，经动物试验具有抑制肿瘤作用。欧白英含多种苦茄碱（Solamarine）及蜀羊泉胺等生物碱。白英（和红枣）能增强机体非特异性的免疫生物学反应。β-苦茄碱对小鼠肉瘤-180有抑制作用。❷见《江苏省植物药材志》。为寻骨风之别名，详该条。

白毛藤根 见《福建民间草药》。为茄科植物白英Solanum lyratum Thunb.或欧白英S.dulcamara L.的根。苦，凉。治风火牙痛，头痛，崩带，瘰疬，痈肿，痔漏。煎服：15～30克。外用：捣敷。欧白英根含15α-羟基蜀羊泉碱、15α-羟基澳洲茄胺、15α-羟基番茄胺和15α-羟基番茄烯胺等生物碱甙，都有抗霉菌的活性。

白及 出《神农本草经》。又名白芨、白根、白鸡儿、地螺丝。为兰科植物白及Bletilla striata（Thunb.）Reichb.f.的块茎。主产贵州、四川、湖南、湖北、河南、安徽、浙江、陕西等地。苦、甘、涩，凉。入肺、胃经。敛肺止血，消肿生肌。①治肺结核咯血，支气管扩张出血，胃、十二指肠溃疡病

出血，衄血。煎服：6～15克；研末服，3～6克。②治痈肿疮毒，外伤出血，水火烫伤，手足皲裂。研末调敷或鲜品捣敷。反乌头。块茎含挥发油、粘液质等。根含白及甘露聚糖（Bletilla mannan）。白及细粉或煎煮所得胶状液，局部应用有良好的止血作用。

白火丹草 见《浙江民间常用草药》。为狗舌草之别名，详该条。

白丑 见《本草纲目》。为牵牛子之种皮呈淡黄白色者，详该条。

白水鸡 见《福建民间草药》。为三白草之别名，详该条。

白玉兰 见《广州植物志》。为白兰花之别名，详该条。

白术 出《本草经集注》。又名於术、冬术、山蓟、山精。为菊科植物白术Atractylodes macrocephala Koidz.的根茎。主产浙江、安徽。甘、苦，温。入脾、胃经。健脾，益气，燥湿，消痰，利水，止汗。治脾胃虚弱，食少倦怠，消化不良，虚胀，泄泻，痰饮眩晕，水肿，黄疸，湿痹，小便不利，自汗，胎动不安。煎服：4.5～9克。本品含挥发油，主要成分为苍术醇、苍术酮等。煎剂对动物有利尿及轻度降血糖作用，并有强壮、保肝、增加蛋白以及抗血凝的作用。白术对化疗或放射疗法引起的白血球下降有某些升高的作用。白术油有镇静及缓和胃肠蠕动作用。

白石 出《神农本草经》。为阳起石之别名，详该条。

白石英 出《神农本草经》。为氧化硅类矿物石英的纯白矿石。产江苏、广东、湖北、河北、福建、陕西等地。甘，温。入肺、肾、心经。温肺肾，安心神，利小便。治肺寒咳喘，阳痿，消渴，惊悸，小便不利。煎服：9～15克。本品主含二氧化硅，尚含铝、铁、钠、钾等杂质。

白石参 见《云南中医验方》。为青羊参之别名，详该条。

白石脂 出《神农本草经》。又名高岭土。为硅酸盐类矿物白陶土。甘、酸，平。涩肠，止血。治久泻，久痢，吐血，衄血，崩漏，带下，遗精。煎服：9～12克；或入丸、散。本品主成分为水化硅酸铝，常含铁、镁、钙等杂质。

白龙须 出清·罗思举《简易草药》。为八角枫之须根，详八角枫条。

白龙粉 出《御药院方》。为玄明粉之别名，详该条。

白龙船花 见《广西本草选编》。为臭茉莉之别名，详该条。

白占 见《外科正宗》。为白蜡之别名，详蜂蜡条。

白叶藤 见《药学学报》（9）：561，1963。为古钩藤之别名，详该条。

白四轮风 见《浙南本草新编》。为翅茎香青之别名，详该条。

白瓜 出《神农本草经》。为冬瓜之别名，详该条。

白瓜子 ❶出《神农本草经》。为冬瓜子之别名。❷见《东北药用植物志》。为南瓜子之别名。各详该条。

白瓜皮 见《全国中草药汇编》。即冬瓜皮，详该条。

白兰 见《广州植物志》。为白兰花之简称，详该条。

白兰花 见《四川中药志》。又名白兰、白玉兰。为木兰科植物白兰花Michelia alba DC.的花。我国长江流域各地均有栽培。辛、苦，温。止咳，行气，化浊。治慢性气管炎，前列腺炎，白浊，白带。煎服：9～15克。其蒸馏液（1：4）作动物实验，镇咳、祛痰、平喘作用都不强；加入了哥王及地龙等制成复方，则可提高疗效。

白头公 出《本草经集注》。即白头翁，详该条。

白头草 见《湖南药物志》。为鼠曲草之

别名，详该条。

白头翁 出《神农本草经》。又名野丈人、白头公、毛姑朵花、老白毛、猫爪子花。为毛茛科植物白头翁Pulsatilla chinensis（Bge.）Reg.的根。主产内蒙古、辽宁、河北。苦，寒。入胃、大肠经。清热凉血，解毒。①治阿米巴痢疾，细菌性痢疾，温疟，鼻衄，痔血，白带。煎服：9～15克。②治瘰疬。浸酒服。③治滴虫性阴道炎。煎水冲洗阴道。本品含原白头翁素、皂甙等。煎剂及所含皂甙在体外及小鼠体内均能抑制阿米巴原虫。流浸膏在试管内可杀死滴虫。鲜汁及醇提液在体外对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌有抑制作用，煎剂对某些痢疾杆菌有抑制作用。原白头翁素具强烈刺激作用，在豚鼠试验中有抗组胺作用。

白头翁花 出《本草纲目》。为毛茛科植物白头翁Pulsatilla chinensis（Bge.）Reg.的花。分布四川、湖北、陕西、安徽、江苏及华北、东北地区。治疟疾寒热。煎服：3～6克。研末调敷白秃头疮。

白头翁茎叶 出《日华子诸家本草》。又名白头翁草。为毛茛科植物白头翁Pulsatilla chinensis（Bge.）Reg.的茎叶。有毒。暖腰膝，强心。①治肢节风气疼痛，浮肿及心脏病。煎服：9～15克。②治小儿秃疮。煎水浓缩成膏外涂；神经性皮炎，鲜叶洗净，捣敷患处，20分钟后局部有烧灼感时揭去。

白头翁草 见《圣济总录》。即白头翁茎叶，详该条。

白对叶膏 见《浙江民间常用草药》。为扶芳藤之别名，详该条。

白地黄瓜 见《四川中药志》。为地白草之别名，详该条。

白地榆 见《云南中草药选》。为管仲之别名，详该条。

白朴根 见《岭南草药志》。为白背叶根之别名，详该条。

白芍 见《药品化义》。为白芍药之处方名，详该条。

白芍药 出《本草经集注》。又名白芍。为毛茛科植物芍药Paeonia lactiflora pall.的根。主产浙江、四川、安徽等地。苦、酸，微寒。入肝、脾经。养血敛阴，柔肝止痛。①治头晕，头痛，胸腹胁肋疼痛，泻痢腹痛，腓肠肌痉挛，手足拘挛疼痛，自汗盗汗。②治月经不调，经行腹痛，崩漏，带下。煎服：4.5～9克。反藜芦。本品含芍药甙（Paeoniflorin）、氧化芍药甙、苯甲酸、β-谷甾醇、鞣质及挥发油等。芍药甙对小鼠有镇静、镇痛和抗惊厥作用；对大鼠有抗炎作用，对应激性胃溃疡有预防作用，并抑制其胃液分泌及胃、肠运动，对子宫亦有抑制作用。对狗冠脉及后肢血管有扩张作用。本品与甘草有效成分Fm100有多方面的协同作用，从而证实“芍药甘草汤”组成的合理性。煎剂在体外对痢疾、伤寒、绿脓、变形杆菌及金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎球菌有抑制作用。

白耳子 见《贵州民间方药集》。即白木耳，详该条。

白灯笼 见《生草药性备要》。为鬼灯笼之别名，详该条。

白羊桃 见《云南中草药》。为夹竹桃之别名，详该条。

白红菜 见《福建民间草药》。为番杏之别名，详该条。

白杨皮 出《梅师集验方》。即白杨树皮，详该条。

白杨树皮 出《新修本草》。又名白杨皮。为杨柳科植物山杨Populus davidiana Dode的树皮。分布东北、华北、西北、华中地区。苦，寒。清热，祛风，行瘀，消痰，杀虫。①治肺热咳嗽，风痹，脚气，高血压病，妊娠下痢，扑损瘀血，痰癖，蛔虫腹痛。煎服：15～30克。②治皮肤瘙痒，煎汤洗；口疮，煎水，入盐含漱；牙痛，醋煎含。

白豆蔻 出《本草拾遗》。又名白蔻、白蔻

仁、豆蔻、蔻米 。为姜科植物白豆蔻Amomum kravanh Pierre ex Gagnep. 的果实（用时去果壳）。主产越南、泰国，我国南部有引种栽培。辛，温。入肺、脾、胃经。化湿，行气，暖胃，消滞，解酒。治湿阻气滞，胸闷腹胀，脘腹冷痛，宿食不消，噫气，呃逆，呕吐，反胃。煎服：1.5～6克。后下、本品含挥发油，其主成分为右旋龙脑、右旋樟脑、桉叶素、松油醇等。酊剂或醑剂有良好的芳香健胃作用。其挥发油对豚鼠实验性结核，能轻度增强小剂量链霉素的作用。

白豆蔻壳 出《药性切用》。又名白蔻衣，豆蔻壳、蔻壳。为姜科植物白豆蔻Amomum kravanh Pierre ex Gagnep. 的果壳。微辛，温。化湿，行气，温胃，消滞。治脘腹胀闷，胃呆，呕吐。煎服：1.5～6克。白豆蔻的花称豆蔻花，功用与壳同。

白芜荑 出《太平圣惠方》。为芜荑之处方名，详该条。

白芷 出《神农本草经》。又名香白芷。为伞形科植物白芷 Angelica dahurica（Fisch.）Benth. et Hook. f. 或杭白芷A. formosana Boiss. 的根。主产浙江、四川、河北、河南等地。辛，温。入肺、胃经。祛风，燥湿，止痛，排脓，生肌。①治感冒风寒，头痛鼻塞，牙痛，眉棱骨痛，鼻渊，肠风痔漏，赤白带下。煎服：3～9克。②治痈疽疮疡，煎服并研末调敷；皮肤瘙痒，蛇咬伤。研末调敷。白芷叶：煎水洗治丹毒，瘾疹，风疮。白芷根含白当归素（Byak-angelicin）、白当归脑、白芷毒素（Angelicotoxin）等。杭白芷根含佛手柑内酯等。白当归素对冠状血管有明显的扩张作用。小量白芷毒素对动物中枢神经系统有兴奋作用，大量可致惊厥，继以麻痹。

白花丹 出《生草药性备要》。又名白雪花、白皂药、一见消、白花岩陀。为蓝雪科植物白花丹 Plumbago zeylanica L. 的根或叶。分布云南、四川、贵州、广西、广东、福建、台湾。辛、苦，温。有毒。祛风止痛，散瘀消肿。①治风湿痹痛，胃痛，肝脾肿大，血瘀经闭。煎服：根，9～15克（须久煎3～4小时以上）。②治跌打扭伤，蛇咬伤，疥、癣。鲜叶捣敷，一般不宜超过30分钟，局部有灼热感即除去。孕妇忌服。根含矾松素、3-氯矾松素和3，3′-双矾松素。矾松素小量对蛙、小鼠、兔的中枢神经系统和妊娠子宫有兴奋作用。根的氯仿抽提物在体外对金黄色葡萄球菌有抗菌作用。

白花石竹 见《安徽中草药》。为脱力草之别名，详该条。

白花白头翁 见《中药形性经验鉴别法》。为毛大丁草根之别名，详该条。

白花岩陀 见《云南中草药》。为白花丹之别名，详该条。

白花珍珠草 见《上海常用中草药》。为喉咙草之别名，详该条。

白花鬼灯笼 见《海南岛常用中草药手册》。即鬼灯笼，详该条。

白花射干 出《植物名实图考》。又名冷水丹、扁蒲扇、白射干。为鸢尾科植物白花射干Iris dichotoma Pall. 的全草或根茎。分布东北、华北和陕西、甘肃、山东、安徽、江苏等地。苦，寒，有小毒。清热解毒，活血消肿。①治咽喉肿痛，扁桃体炎，肝炎，肝肿大，胃痛，乳腺炎。煎服：3～9克。②治牙龈肿痛。鲜根茎捣汁内服，或将根茎切片贴痛牙处。根茎含鸢尾黄酮甙、鸢尾甙等异黄酮类。

白花夏枯草 见《青海常用中草药》。又名白甜蜜蜜、异叶青兰。为唇形科植物白花枝子花 Dracocephalum heterophyllum Benth. 的全草。分布青海、甘肃、宁夏、新疆及西藏等地。苦、辛，寒。清肝火，散郁结，止咳祛痰。治高血压，目翳，淋巴结结核，淋巴结炎，肺热咳嗽。煎服：9～12克。小鼠口服本品的酸醇提取物，有止咳和

祛痰作用。

白花益母草 见《植物名实图考》。为蜜菜之别名，详该条。

白花菜 见《东北药用植物志》。为野芝麻之别名，详该条。

白花菜子 见《国药提要》。为白花菜科植物白花菜Cleo me gynandra L. 的种子。分布河北、河南、山东、江苏、安徽、台湾、广西、广东、四川、贵州等地。苦、辛，温，有小毒。祛风散寒，活血消肿，止痛。治风湿痹痛，筋骨酸痛、麻木，腰痛，跌打损伤，捣敷；痔疮，煎水熏洗。白花菜的全草名羊角菜，又名臭菜，功用与白花菜子同，又止下痢，白带。煎服：6～12克。一次服用大量，或少量多次服用，可致中毒。种子含辛味挥发油、脂肪油、醉蝶花素（Cleomin）。叶有轻度刺激作用，可引起局部皮肤发红。

白花蛇 出《开宝重定本草》。又名蕲蛇、百步蛇。为蝮科动物五步蛇 Agkistrodon acutus Guenther除去内脏的干燥全体。主产浙江、江西、福建。甘、咸，温，有毒。入肝、脾经。祛风湿，通络，定惊。治风湿痹痛，筋脉挛急，肌肉麻痹，口眼㖞斜，语言蹇涩，半身不遂，小儿惊风抽搐，破伤风，麻风，疥癣。煎服：3～9克；研粉吞服，0.6～0.9克。头部毒腺中含多量的血液毒，少量的神经毒，微量的溶血成分及促进血液凝固成分。干的蛇体主含蛋白质、脂肪及氨基酸。五步毒蛇具有凝血酶样作用，使纤维蛋白元耗竭、血液失凝而广泛出血。蛇毒并能发生急性溶血，心肌损害，水及电解质紊乱。五步蛇注射剂动物能直接扩张血管，降低血压。对小鼠具有镇静、催眠和镇痛作用。

白花蛇舌草 见《广西中药志》。又名蛇舌草、蛇舌癀、蛇脷草、蛇总管、二叶葎、羊须草。为茜草科植物白花蛇舌草 Hedyotis diffusa Willd. 的全草。分布长江以南各地。苦、甘，寒。入胃、大肠、小肠经。清热，解毒，利尿，消痈。①治肠痈，痢疾，黄疸，尿路感染，小便不利，扁桃体炎，肺热咳嗽，咽喉肿痛。近用于治疗多种肿瘤。煎服：15～30克。②捣敷痈肿疮疖，毒蛇咬伤。本品含熊果酸、齐墩果酸、对香豆酸及β-谷甾醇等。煎剂在动物试验中能刺激网状内皮系统增生和增强吞噬细胞的活力。

白花矮陀陀 见《云南中草药》。为矮陀陀之别名，详该条。

白花箭 见《修订增补天宝本草》。为杏叶防风之别名，详该条。

白芥子 出《新修本草》。又名芥菜子、辣菜子。为十字花科植物白芥 Brassica alba（L.）Boiss. 的种子。主产安徽、河南、山东、四川、河北、陕西、山西等地。辛，温。入肺，胃经。利气豁痰，温胃散寒，通络止痛，散结消肿。①治支气管哮喘，慢性气管炎，结核性胸膜炎，反胃吐食，胃寒疼痛，寒湿痹痛。煎服：3～9克。②治阴疽，痰核，煎服或研末调敷；扭伤、挫伤，各种神经痛，研末醋调敷。外敷皮肤有灼热感时即除去。本品含白芥子甙(Sinalbin)、芥子碱、芥子酶等。白芥子甙水解后的产物有较强的刺激作用，可致充血、发泡。白芥子内服可催吐、祛痰，过量可致胃肠炎。其水浸剂在试管中对某些致病真菌有一定的抑制作用。

白芨 见《证治准绳》。即白及，详该条。

白苏子 见《饮片新参》。又名玉苏子、荏子。为唇形科植物白苏Perilla frutescens（L.）Britt. 的果实。产江苏、河北、山东、湖北、四川、贵州、云南等地。辛，温。下气，消痰，润肺，宽肠。治咳逆，痰喘，气滞便秘。煎服：4.5～9克。本品含脂肪油，主要为亚麻油酸脂。

白苏叶 出《本草图经》。又名荏叶。为

唇形科植物白苏Perilla frutescens（L.）Britt. 的叶。我国南北各地多有栽培。辛，温。入肺、脾经。解表散寒，理气消食。治风寒感冒，咳喘，食积。煎服：4.5～9克。本品含挥发油，主成分为紫苏酮。还有β-去氢香薷酮，榄香脂素等。

白苏梗 见《中药形性经验鉴别法》。为唇形科植物白苏 Perilla frutescens（L.）Britt. 的茎。辛，温。入肺、脾经。顺气，消食，安胎。治胸膈痞闷，脘腹疼痛，胎动不安。煎服：4.5～9克。

白伸筋 见《江西民间草药》。为草石蚕之别名，详该条。

白皂药 见《四川中药志》。为白花丹之别名，详该条。

白余粮 出《本草经集注》。为土茯苓之别名，详该条。

白饭花 见《福建中草药》。为木槿花之别名，详该条。

白冷风 见《浙南本草新编》。为翅茎香青之别名，详该条。

白沙参 出《范子计然》。为南沙参之别名，详该条。

白附子 出《名医别录》。又名禹白附、鸡心白附。为天南星科植物独角莲Typhonium giganteum Engl. 的块茎。主产河南、陕西、四川、湖北。辛、甘，大温，有小毒。入肝、胃经。祛风痰，镇痉，止痛，散结。①治中风痰壅，口眼歪斜，面神经麻痹，偏正头痛，癫痫，小儿惊风，破伤风。②治痈肿，瘰疬痰核，喉痹肿痛，蛇、虫咬伤。煎服：3～4.5克；或入丸、散服。一般炮制后用。外用以鲜品捣敷；或熬膏涂。孕妇忌服。本品含肌醇、皂甙、β-谷甾醇及其葡萄糖甙等。动物试验证明有镇静作用，炮制后此作用增强。

白鸡儿 见《草药手册》。为白及之别名，详该条。

白环藤 出《本草拾遗》。为萝藦之别名，详该条。

白苹 见《滇南本草》整理本。为马尿花之别名，详该条。

白茅花 出《日华子诸家本草》。又名茅盔花、茅针花。为禾本科植物白茅Imperata cylindrica Beauv. var. major（Nees）C. E. Hubb. 的花序。甘，凉。止血。治衄血，吐血，咯血。煎服：4.5～9克。外敷创伤出血。动物实验证明，煎剂能促进血液凝固，并能降低血管通透性。

白茅根 出《本草经集注》。又名茅根、地菅、地节根、茅草根、丝毛草根。为禾本科植物白茅Imperata cylindrica Beauv. var. major（Nees）C. E. Hubb. 的根茎。全国各地均产。甘，寒。入肺、胃、膀胱经。清热，凉血，止血，利尿。治热病烦渴，胃热呕吐，肺热咳嗽，吐血，衄血，咳血，尿血，急性肾炎水肿，黄疸。煎服：15～30克（鲜品60～120克）。本品含多量蔗糖、葡萄糖、钾盐，少量草酸、柠檬酸等。煎剂对兔有利尿作用，可能与含多量的钾盐有关。在体外对弗氏、宋氏痢疾杆菌有抑制作用。

白矾 出《雷公炮炙论》。又名矾石、明矾。为天然矾石经加工提炼而成的结晶体。产浙江、安徽、山西、湖北等地。酸、涩，寒。入肺、脾、胃经。祛痰，燥湿，止血，止泻，杀虫止痒。①治癫痫，喉痹，痰涎壅盛，黄疸，消化性溃疡，吐血，咯血，衄血，便血，崩漏，久痢，久泻，白带。研末装胶囊服：0.6～1.5克。②治湿疹，疥癣，急、慢性中耳炎，水田皮炎，外伤出血，煅存性研末撒或油调敷；蝎子螫伤，醋调敷。③治各种内痔及混合痔合并粘膜脱垂，制成明矾注射液注入痔核。本品为含水硫酸铝钾。低浓度白矾液有消炎、收敛、防腐作用，高浓度可引起溃烂。

白果 出《日用本草》。为银杏科植物银杏Ginkgo biloba L. 的种子。我国各地均

有栽培。甘、苦、涩，平，有小毒。入肺、肾经。敛肺气，定喘嗽，止带浊，缩小便。①治支气管哮喘，慢性气管炎，白带，白浊，遗精，小便频数。煎服：3～9克。②治肺结核。秋季采嫩银杏，连同肉质外种皮浸菜油中百日，每次食种仁1枚，每日三次，连食三个月。本品含蛋白质、脂肪、糖、维生素B_2、胡萝卜素和钙、磷、铁等的化合物。肉质外种皮内含有引起皮肤炎的物质，口服可引起胃肠炎与肾炎，有溶血作用。

白果叶 出《本草品汇精要》。又名蒲扇、飞蛾叶。为银杏科植物银杏 Ginkgo biloba L. 的叶。苦、涩，平。敛肺平喘，止泻，活血止痛。①治慢性气管炎，泻痢，白浊，白带，煎服：4.5～9克。其提取物制成片剂、针剂用于冠状动脉硬化性心脏病心绞痛，血清胆固醇过高症。②治小儿肠炎，煎水洗手、足心及心口，严重者擦洗头顶，每日二次；灰指甲，漆疮肿痒，煎水洗。本品含芸香甙、槲皮素、山柰酚、异鼠李素、白果双黄酮等黄酮类和白果苦内酯（Ginkgolide）、白果新内酯（Bilobalide）等苦味质。还含白果酸、白果醇、白果酮等。所含槲皮素、山柰酚及异鼠李素的混合物对离体豚鼠心脏有扩张冠脉的作用，并能扩张豚鼠后肢血管；对离体肠管和气管有解痉作用。黄酮甙元及白果双黄酮类也有扩张后肢血管的作用。

白竹花叶 见《福建中草药》。为白竹蓬之别名，详该条。

白竹根 出《生草药性备要》。为刺三加之别名，详该条。

白竹蓬 出《生草药性备要》。又名白茨叶、白竹花叶。为五加科植物白竹Acanthopanax trifoliatus（L.）Merr. 的嫩枝叶。分布西南、华南、华中各地。苦、辛，寒。止痛，消肿，解毒。①治胃痛。煎服：9～15克。②治痈疖疔毒，创伤，捣敷患部；湿疹，疥癞，皮肤热毒，煎水洗。茎含正十五烷酸、棕榈酸、十七烷酸、硬脂酸及花生酸。又含以二十九烷为主的链烷混合物。尚含豆甾醇、β-谷甾醇、蒲公英甾醇及其乙酸酯等。

白侧耳 见《贵州民间药草》。为鸡肫草之别名，详该条。

白金条 见《分类草药性》。为八角枫之侧根，详八角枫条。

白鱼尾 见《闽东本草》。又名溪桃、杨波叶、白背风、狭叶醉鱼草。为马钱科植物驳骨丹Buddleja asiatica Lour. 的根或茎叶。分布湖北、四川、云南、贵州、广东、台湾、福建等地。苦、微辛，温，有小毒。祛风，化湿，通络，杀虫。①治风寒发热，头身疼痛，风湿痹痛，腹胀，痢疾，跌打损伤，虫积腹痛。煎服：9～15克。②叶捣敷无名肿毒；根煎洗皮肤瘙痒。

白河车 ❶见《浙江民间常用草药》。为七叶一枝花之别名。❷见《江苏省植物药材志》。为万年青之别名。各详该条。

白屈菜 出《救荒本草》。又名土黄连、山黄连、断肠草、雄黄草。为罂粟科植物白屈菜Chelidonium majus L. 的全草。分布东北、华北及河南、山东、江苏、江西、四川、新疆、陕西等地。苦，寒，有毒。镇痛，止咳，利尿，解毒。①治胃痛，腹痛，泻痢，慢性气管炎，百日咳，黄疸，肝硬化腹水。煎服：1.5～6克。②外治水田皮炎，疥癣，疖肿，毒虫咬伤，青年扁平疣。捣汁局部涂擦。本品含白屈菜碱、原阿片碱、小檗碱、黄连碱等生物碱。还含芸香甙、槲皮甙、强心甙和多量维生素C等。流浸膏对小鼠有轻度祛痰作用，煎剂有平喘作用。白屈菜碱能轻度镇痛，松弛平滑肌的作用与罂粟碱相似而稍弱，对小鼠实验性肿瘤有抑制作用。在体外对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及絮状表皮癣菌有抑制作用。

白屈菜根 见《陕西中草药》。为罂粟科植物白屈菜Chelidonium majus L.的根。

苦、涩，微温。祛瘀，通经，止痛。治劳伤瘀血，月经不调，痛经，消化性溃疡。煎服：1.5～3克。本品含白屈菜碱、原阿片碱、α-别隐品碱等。药理参见白屈菜条。

白参 见《增订伪药条辨》。为人参商品之一种，详人参条。

白胡椒 见《本草纲目拾遗》。为胡椒药材之一种，详胡椒条。

白茯苓 见《素问玄机原病式》。为茯苓之处方名，详该条。

白茨叶 见《分类草药性》。为白芳蓬之别名，详该条。

白药子 出《新修本草》。又名白药脂、白药根、金线吊乌龟。为防己科植物头花千金藤Stephania cepharantha Hayata的块根。产湖南、湖北、浙江、安徽、江西等地。苦、辛，凉，有小毒。入脾、肺、肾经。清热解毒，祛风止痛，凉血止血。①治肝炎，急性胃肠炎，细菌性痢疾，阑尾炎，风湿疼痛，腰肌劳损，衄血，肺结核咯血，消化道出血，功能性子宫出血。煎服：6～9克。②治急性咽喉炎痰涎壅塞者，研末吹喉，或煎水含漱；腮腺炎、无名肿毒、毒蛇咬伤，捣敷或磨汁涂。本品含金线吊乌龟碱（Cepharanthine）、异汉防己碱（Isotetrandrine）、轮环藤宁碱（Cycleanine）等。金线吊乌龟碱有升高白血球作用。异汉防己碱有抗炎、镇痛、退热作用，抗炎效果与保泰松相似，并降低血中尿酸含量。

白药根 出《本草图经》。即白药子，详该条。

白药脂 见《药材资料汇编》。即白药子，详该条。

白残花 见《药材资料汇编》。为蔷薇花之别名，详该条。

白面风 见《江西民间草药》。为寻骨风之别名，详该条。

白面水鸡 见《全国中草药汇编》。为独脚乌桕之别名，详该条。

白面姑 见《广西中兽医药用植物》。为三白草之别名，详该条。

白背三七 见《云南中草药》。又名三百棒、鸡菜、土生地、土田七。为菊科植物白子菜 Gynura divaricata（L.）DC.的根或全草。分布我国南部及西南部。甘，寒，有小毒。清热解毒，舒筋活血。①治痈肿，跌打损伤，骨折，创伤出血，水火烫伤。鲜品捣敷。②治支气管炎，肺结核，崩漏。煎服：6～9克。

白背风 ❶见《广西本草选编》。为白鱼尾之别名。❷见《广西药用植物名录》。为羊耳菊之别名。各详该条。

白背叶 ❶见《岭南草药志》。又名白膜叶、叶下白。为大戟科植物白背叶Mallotus apelta（Lour.）Muell.-Arg.的叶。分布河南、安徽、浙江、江西、湖南、广东、广西等地。消炎，止血。治化脓性中耳炎，煎液滴耳；新生儿鹅口疮，煎水抹患处；跌打扭伤，鲜叶捣敷；皮肤湿痒，煎水洗；外伤出血，研粉撒。0.5%煎剂或浸剂能抑制钉螺活动。❷见萧步丹《岭南采药录》。为蔓荆子叶之别名，详该条。❸见萧步丹《岭南采药录》。为黄荆叶之别名，详该条。

白背叶根 见《岭南草药志》。又名白膜根、白朴根。为大戟科植物白背叶Mallotus apelta（Lour.）Muell.-Arg.的根。微苦、涩，平。舒肝活血，清热去湿，收涩固脱。①治慢性肝炎，肝脾肿大，肠炎腹泻。②治淋浊，白带，疝气，脱肛，子宫脱垂。煎服：15～30克。本品预试含酚类、氨基酸、鞣质等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

白背丝绸 见《生草药手册》。为白鹤藤之别名，详该条。

白背枫 见《广东中草药》。为半枫荷之别名，详该条。

白骨藤 见《广西中草药》。为昆明鸡血藤之别名，详该条。

白洋参 见《昆明药用植物调查报告》。为土党参之别名，详该条。

白姜 见《本草纲目》。为干姜之别名，详该条。

白前 出《名医别录》。又名嗽药。为萝藦科植物柳叶白前Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Lévl. 或芫花叶白前C. glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz. 的根茎及根。主产浙江、安徽。辛、甘，微温。入肺经。降气，祛痰。治肺气壅实，咳嗽痰多，喘息。煎服：6～9克。芫花叶白前含三萜皂甙。

白首乌 见《山东中药》。又名山东何首乌。为萝藦科植物戟叶牛皮消Cynanchum bungei Decne. 的块根。主产山东。苦、甘、涩，微温。安神，补血，收敛精气。治久病虚弱，失眠，健忘多梦，痔疮，便血，阴虚久疟，性神经衰弱，皮肤瘙痒。煎服：9～30克。本品含白薇素(Cynanchol)、并有强心甙反应。

白扁豆 见《太平惠民和剂局方》。为扁豆之处方名，详该条。

白桐叶 出《本草经集注》。即桐叶，详该条。

白桐皮 出《药性论》。即桐皮，详该条。

白桃树 见《上海常用中草药》。为丝棉木之别名，详该条。

白根 出《吴普本草》。为白及之别名，详该条。

白射干 见《中国高等植物图鉴》。即白花射干，详该条。

白狼毒 见《中药志》。又名狼毒、猫眼根。为大戟科植物狼毒大戟Euphorbia fischeriana Steud.或月腺大戟E. ebracteolata Hayata 的根。主产东北、内蒙古、河北、河南、山东、江苏、安徽等地。辛，平，有大毒。入肝、脾经。破积，杀虫，除湿，止痒。①治淋巴结结核，皮肤结核。以本品250克放锅内加水煮，大枣500克放笼上蒸，至熟为度。每次服枣7枚，日服二至三次。②治咳逆上气，痰饮积聚，癥瘕虫积。醋制后用。煎服：0.9～2.4克。③治牛皮癣，神经性皮炎，熬膏涂；疥癣，酒齄鼻，顽固性皮肤溃疡，研末油调敷。本品极易中毒，内服宜慎。中毒症状为恶心，呕吐，出冷汗，面色苍白，抽风等，重者可致死亡。体弱及孕妇忌服。畏密陀僧。狼毒大戟根预试含皂甙、强心甙、甾醇、酚类及鞣质。

白胶 出《神农本草经》。为鹿角胶之别名，详该条。

白胶香 出《新修本草》。又名枫香脂、白云香。为金缕梅科植物枫香Liquidambar formosana Hance的树脂。产浙江、江西、福建、云南等地。辛、苦，平。活血，止血，止痛，生肌，解毒。①治跌打损伤，衄血，吐血，胃痛。研末服：1.5～3克，或入丸散用。②治牙痛，研末擦牙；骨折，痈疽，瘰疬，熬膏敷贴；创伤出血，癣疮，研末敷。本品含挥发油，内有萜类物质和桂皮酸类物质等。

白粉霜 见《药材资料汇编》。即粉霜，详该条。

白浆藤 见《云南中草药》。为古钩藤之别名，详该条。

白调蕊 见《闽东本草》。为秋鼠曲草之别名，详该条。

白通草 出《药性切用》。为通草之处方名，详该条。

白斑鸠窝 见《四川中药志》。为鸡眼草之别名，详该条。

白梗通 见《本草正义》。为梗通草之别名，详该条。

白梅花 见《本草纲目》。为绿萼梅花之别名，详该条。

白拔葵 见《日华子诸家本草》。为草蔴之别名，详该条。

白菖 出《名医别录》。为水菖蒲之别名，详该条。

白菀 出《吴普本草》。为女菀之别名，详该条。

白硇砂 见《药材资料汇编》。为硇砂药材之一种，详该条。

白雪 出《抱朴子》。为粉霜之别名，详该条。

白雪花 见《广州植物志》。为白花丹之别名，详该条。

白接骨 见《浙江民间草药》。又名玉龙盘、玉接骨、无骨苎麻。为爵床科植物白接骨Asystasiella chinensis (S. Moore) E. Hossain的根茎或全草。分布江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南等地。甘、淡，平。入肺经。止血，去瘀，清热解毒。①治吐血，便血，跌打损伤，咽喉肿痛。煎服：3～9克（鲜品15～30克）。②治创伤出血，根晒干研末撒；疖肿，下肢溃疡，全草捣敷。

白银杏 见《江苏南部种子植物手册》。为救必应之别名，详该条。

白甜蜜蜜 见《青海常用中草药手册》。为白花夏枯草之别名，详该条。

白麻 见《本草纲目》。为苘麻之别名，详该条。

白蒂梅 出《本草品汇精要》。为杨梅之别名，详该条。

白棘 出《神农本草经》。为棘针之别名，详该条。

白紫草 见《云南中草药》。为黑阳参之别名，详该条。

白榄 见《广东新语》。为橄榄之别名，详该条。

白榄根 见萧步丹《岭南采药录》。又名橄榄根。为橄榄科植物橄榄 Canarium album (Lour.) Raeusch. 的根。分布福建、台湾、广西、广东、四川、云南等地。淡，平。祛风除湿，舒筋活络，清咽解毒。治风湿痹痛，脚气，白浊，产后风瘫，手脚麻木。煎服：30～60克。治乳蛾。水煎加醋含漱。

白幕 出《名医别录》。为白薇之别名，详该条。

白蒺藜 出《药性论》。即刺蒺藜，详该条。

白蔻 见《本草经解》。为白豆蔻之简称，详该条。

白蔻仁 见《中国药学大辞典》。为白豆蔻之处方名，详该条。

白蔻衣 见《中药大辞典》。为白豆蔻壳之处方名，详该条。

白蔹 出《神农本草经》。又名山地瓜、见肿消。为葡萄科植物白蔹Ampelopsis japonica (Thunb.) Mak. 的块根。产华北、华东及中南地区。苦、辛，微寒。入心、脾经。清热解毒，泻火散结，生肌止痛。①治疮疡痈肿，煎服并捣敷；瘰疬，扭挫伤，烧烫伤，研末调敷。②治温疟，血痢，肠风，痔漏，赤白带下。煎服：3～9克。白蔹的果实名白蔹子，煎服亦治温疟，热结痈肿。5%煎剂在体外对金黄色葡萄球菌，水浸剂对某些致病性皮肤真菌均有抑制作用。

白蜡 ❶见《丹溪心法》。即虫白蜡。❷出《名医别录》。为蜂蜡之一种。各详该条。

白膜叶 见《岭南草药志》。即白背叶，详该条。

白膜根 见《岭南草药志》。为白背叶根之别名，详该条。

白鲜皮 出《药性论》。又名八股牛、北鲜皮、臭根皮。为芸香科植物白鲜Dictamnus dasycarpus Turcz. 的根皮。主产辽宁、河北、四川、江苏、安徽。苦，寒。入脾、胃经。祛风，燥湿，清热，解毒。①治皮肤瘙痒，荨麻疹，湿疹，疥癣，黄水疮。煎服或煎水洗。②治急、慢性黄疸型肝炎，湿痹死肌，产褥热，妇人阴中肿痛。煎服：3～9克。③治淋巴结炎，研末饭糊捣敷；外伤出血，研末敷。根含白鲜碱、茵芋碱、γ-崖椒碱、黄柏内酯、梣皮酮、谷甾醇、皂

甙等。水浸液对某些常见致病性皮肤真菌有抑制作用，对发热兔有解热作用。白鲜碱能兴奋蛙心、收缩血管。

白蜜 出《药性论》。为蜂蜜之白色至淡黄色者，详蜂蜜条。

白蝴蝶 见《闽南民间草药》。为山甘草之别名，详该条。

白僵蚕 出《神农本草经》。又名僵蚕、天虫、僵虫。为蚕蛾科昆虫家蚕Bombyx mori L. 4～5龄的幼虫因感染或人工接种白僵菌Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. 而致死的干燥全体。主产浙江。咸、辛，平。入肝、肺经。祛风解痉，化痰散结。①治中风、惊痫抽搐，面瘫，头痛，眩晕，目赤，咽喉肿痛，皮肤瘙痒，瘰疬结核。内服：煎汤，4.5～9克；或研末吞服，每次0.9～1.5克。②治糖尿病。研末为丸服：每次1～2克，每日3～4次。③治乳腺炎。生品研细末醋调敷。本品含脂肪及蛋白质，此种蛋白质有刺激肾上腺皮质作用。还可能含有甾类、类脂、还原糖等，又体表的白粉中含有草酸铵，是僵蚕中对抗小鼠士的宁惊厥的有效成分，对治疗癫痫大发作有一定疗效。

白鹤仙 见《本草纲目》。为玉簪花之别名，详该条。

白鹤花 见《本草品汇精要》。为玉簪花之别名。详该条。

白鹤藤 出清·赵其光《本草求原》。又名银背藤、一匹绸、白背丝绸。为旋花科植物白鹤藤Argyreia acuta Lour. 的茎叶。分布广西、广东海南及云南。微酸、微苦，凉。祛风利湿，化痰止咳，止血，消肿，解毒。①治风湿痹痛，肾炎水肿，肝硬化腹水，肺热咳嗽痰喘，吐血，崩漏，带下，跌打损伤。煎服：6～15克。②治疮疖痈肿，湿疹。鲜叶开水烫软贴患处，或煎水洗患处。

白薇 出《神农本草经》。又名白幕、白马尾、龙胆白薇。为萝藦科植物白薇Cynanchum atratum Bge.或蔓生白薇C.versicolor Bge.的根及根茎。主产山东、安徽、辽宁等地。苦、咸，寒。入肝、胃经。清虚火，除血热，利尿。①治阴虚内热，病后余热不清，产后虚烦呕逆，风温灼热，肺热咳血，痺疟，温疟。②治热淋，血淋。煎服：6～9克。③治乳痈。鲜品捣敷；创伤出血，研末敷。白薇根含挥发油、强心甙。

白镜子 见《全国中草药汇编》。为照山白之别名，详该条。

白檀 出《本草经集注》。为檀香之一种，详该条。

白螺壳 出《肘后方》。即白螺蛳壳，详该条。

白螺蛳壳 出《本草纲目》。又名白螺壳。为田螺科动物方形环棱螺Bellamya quadrata(Benson)或其同属动物的陈旧螺壳。产浙江、江苏等地。甘、淡，平。化痰，止痛，散结，敛疮。①治热痰咳嗽，胃痛吐酸，反胃。煅存性研末服，3～9克，或入丸剂。②治瘰疬、溃疡久不收口，烫火伤。研末撒或调敷。

白鳗 见《中国动物图谱·鱼类》。即鳗鲡鱼，详该条。

瓜丁 出《千金翼方》。为瓜蒂之别名，详该条。

瓜子金 出《植物名实图考》。又名金锁匙、辰砂草、瓜子草、小远志、散血丹、竹叶地丁。为远志科植物瓜子金Polygala japonica Houtt. 的根或全草。产东北、华北、西南及长江流域各地。辛、苦，平。化痰止咳，活血止血，安神，解毒。①治支气管炎，肺炎，百日咳，口腔炎，咽炎，扁桃体炎。②治吐血，便血，子宫出血，月经不调，惊悸，健忘，失眠。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。③治骨髓炎，浸酒服；疔疮疖肿，毒蛇咬伤，捣敷。本品含三萜皂甙、树脂、远志醇及其四乙酸酯等。浸液有溶血作用。煎液在体外有抑制金黄色葡萄球菌的作用。

瓜子草 ❶见《民间常用草药汇编》。为瓜子金之别名。❷见《分类草药性》。为垂盆草之别名。❸见《植物名实图考》。为婆婆指甲菜之别名。❹见《湖南药物志》。为螺厣草之别名。各详该条。

瓜子莲 见《湖南药物志》。为鱼鳖金星之别名，详该条。

瓜子藤 见《福建民间草药》。为阿利藤之别名，详该条。

瓜蒂 出《神农本草经》。又名甜瓜蒂、瓜丁、瓜丁香。为葫芦科植物甜瓜 Cucumis mele L. 的果柄。全国大部分地区均产。苦，寒，有毒。入胃经。催吐，退黄疸。①治宿食停积、食毒入胃、癫痫痰盛，用以催吐。研末服：0.6～0.9克。②治湿热黄疸。瓜蒂焙黄研末搐鼻，令黄水出。体弱及有心脏病者忌用。本品含苦味成分：葫芦素B、E、D，异葫芦素B，葫芦素B-2-葡萄糖甙等。还含α-菠菜甾醇。葫芦素B、E的混合物有抗肝炎作用；对四氯化碳性肝损伤的大鼠，能降低谷丙转氨酶、减少肝细胞的疏松变性、坏死、空泡等病理改变；能增加肝醣元及防止脂肪变性，临床观察证明，瓜蒂能增强细胞免疫功能，类似转移因子的作用。内服此种混合物（早期称为甜瓜毒或喷瓜苦味素）能刺激胃粘膜，引起反射性呕吐；犬中毒后可致呼吸中枢麻痹而死。

瓜蒌 出《针灸甲乙经》。即栝楼，详该条。

瓜蒌仁 出《丹溪心法》。为栝楼子之别名，详该条。

瓜蒌皮 见《御药院方》。即栝楼皮，详该条。

瓜槌草 见《植物名实图考》。为漆姑草之别名，详该条。

瓜瓣 见《金匮要略》。为冬瓜子之别名，详该条。

丛柏叶 见《闽东本草》。即侧柏叶，详该条。

冬朮 见《中国药学大辞典》。即白朮，详该条。

冬瓜 出《本草经集注》。又名白瓜、东瓜、枕瓜。为葫芦科植物冬瓜 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.的果实。甘、淡，凉。入肺、大小肠、膀胱经。利水，消痰，清热，解毒。①治水肿，胀满，脚气，痰吼，咳喘，暑热烦闷，消渴。煎服：60～120克。②解鱼、酒毒。捣汁饮。本品含蛇麻脂醇、甘露醇、β-谷甾醇、葡萄糖、鼠李糖及多种维生素。

冬瓜子 出《新修本草》。又名白瓜子、瓜瓣。为葫芦科植物冬瓜Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 的种子。甘，凉。入肺、大肠、小肠经。清肺，化痰，利湿，排脓。①治肺热咳嗽痰多，肺痈，肠痈。②治淋病，水肿，小便不利，湿热带下。煎服：9～15克。或去壳取仁用。本品含皂甙、脂肪、瓜氨酸、蛋白质等。

冬瓜叶 出《日华子诸家本草》。为葫芦科植物冬瓜 Benincasa hispida(Thunb.) Cogn. 的叶。清暑，解毒。治消渴，疟疾，泄泻，痢疾。煎服：15～30克。焙研末调敷蜂螫，肿毒。

冬瓜皮 出《开宝重定本草》。又名白瓜皮。为葫芦科植物冬瓜Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 的果皮。甘，微寒。入脾、肺经。利水消肿，清暑化湿。治水肿，小便不利，脚气，暑湿泄泻，荨麻疹。煎服：15～30克。本品含蜡类及树脂类物质。

冬瓜丝 出《药性论》。为冬瓜瓤之别名，详该条。

冬瓜藤 出《日华子诸家本草》。为葫芦科植物冬瓜Benincasa hispida(Thunb.) Cogn.的茎。苦，寒。①活络通经，利关节，去湿，追风，煎服。②治肺热痰火，内痈，取汁服。③治脱肛，疮疥，煎水洗。

冬瓜瓤 出《本草图经》。又名冬瓜练。为葫芦科植物冬瓜 Benincasa hispida (Th-

unb.) Cogn.的果瓤。甘,平。清热,止渴,利水,消肿。①治烦渴,水肿,淋病。煎服:30～60克;或绞汁饮。②煎水洗痈肿;捣敷火烫伤。本品含腺嘌呤,葫芦巴碱,组氨酸,维生素B、C及E。

冬地梅 见福建《中草药新医疗法资料选编》。为臭茉莉之别名,详该条。

冬虫草 见《全国中草药汇编》。为冬虫夏草之简称,详该条。

冬虫夏草 出《本草从新》。又名虫草、冬虫草、夏草冬虫。为麦角菌科真菌冬虫夏草菌Cordyceps sinensis (Berk.) sacc.寄生在蝙蝠蛾科昆虫虫草蝙蝠蛾Hepialus armoricanus oberthür幼虫上的子座与虫体。主产四川西北部,青海、甘肃、西藏及云南也产。甘,温。入肺、肾经。补肺,益肾。治肺结核咳嗽,咯血,慢性咳喘,盗汗,自汗,阳痿,遗精,腰膝酸痛,病后虚弱。煎服:3～9克。本品含粗蛋白、脂肪、虫草酸(即D-甘露醇)、维生素B_{12}等。浸剂能扩张豚鼠支气管而有平喘作用;对肠管、子宫及心脏均能抑制;对小鼠有镇静作用。

冬均子 见《中药材手册》。为使君子之别名,详该条。

冬豆子 见《四川中药志》。为黑大豆之别名,详该条。

冬花 出《万氏家抄方》。为款冬花之简称,详该条。

冬苋菜 见《重庆草药》。为冬葵叶之别名,详该条。

冬青子 ❶出《本草拾遗》。又名冬青实、冻青树子、树顶子。为冬青科植物冬青Ilex chinensis Sims的果实。分布长江流域及其以南各地。甘、苦,凉。入肝、肾经。祛风补虚,强筋健骨,止血。①治风湿痹痛。内服:煎汤,4.5～9克;或浸酒服。②治溃疡病出血,本品与白及等分研末,每次3～4.5克,日服二次。③治痔疮。本品以盐、酒浸一夜,多次蒸晒,早、晚空腹时各吞服70粒。❷见《济急仙方》。为女贞子之别名,详该条。

冬青叶 ❶出《海上方》。为女贞叶之别名,详该条。❷出《本草拾遗》。即四季青,详该条。

冬青实 出《本草图经》。即冬青子,详该条。

冬凌草 见《全国中草药汇编》。又名冰凌草、山香草。为唇形科植物碎米桠Rabdosia rubescens (Hemsl.) Hara的地上部分。分布甘肃、山西、河北、安徽、浙江、河南、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州等地。苦、甘,微寒。清热解毒,活血止痛。①粗制剂对食道癌、贲门癌、肝癌、乳腺癌、直肠癌有一定缓解作用,且可防治放射治疗的副作用。②治急、慢性咽炎,扁桃体炎,腮腺炎,气管炎,慢性迁延性肝炎。煎服:30～60克。本品含挥发油,内有α-和β-蒎烯、β-榄香烯、柠檬烯、桉叶素、对聚伞花素等;二萜内酯成分:冬凌草素甲(Oridonin)、冬凌草素乙(Poncidin)及冬凌草素丙、丁、戊;三萜类成分:α-香树脂醇等。冬凌草素对多种动物移植性肿瘤(小鼠艾氏腹水癌、肉瘤-180、肝癌及网织细胞肉瘤等)有抑制作用,对人体食管鳞癌细胞株C_aE_s-17有细胞毒作用;对外周白细胞、血小板总数及机体免疫功能无明显抑制。醇剂及煎剂对小鼠有镇痛,对家兔食管有解痉作用;试管中有某些抑菌作用。

冬桑叶 见《本草正义》。为桑叶之处方名,详该条。

冬葵子 出《神农本草经》。又名葵子、葵菜子。为锦葵科植物冬葵Malva verticillata L.的种子。我国大部分地区有分布。甘,寒。入小肠、膀胱经。利水,通乳,滑肠。治小便不利,热淋,血淋,砂淋,水肿,乳汁不行,乳房肿痛,大便燥结。煎服:3～9克。孕妇慎服。本品含脂肪油及蛋白质。

冬葵叶 出《名医别录》。又名葵菜、冬苋菜。为锦葵科植物冬葵Malva verticillata L. 的叶。甘，寒。清热利湿，通乳，滑窍。①治黄疸，肺热咳嗽，热毒下痢，小便不行，乳汁不下。煎服：15～30克。②研末敷治外伤出血，烫火伤。孕妇慎服。本品含锦葵酸(Malvic acid)、苹婆酸、粘液质。

冬葵根 出《本草经集注》。为锦葵科植物冬葵Malva verticillata L.的根。甘，寒。泄热通淋，滑利二便，解毒。①治消渴，热淋，茎中急痛，二便不利，白带，解蜀椒毒。煎服：15～60克。②烧存性研末敷褥疮、口吻疮。

鸟不宿 见《岭南草药志》。为鹰不泊之别名，详该条。

鸟不踏 见《江西草药》。为虎刺之别名，详该条。

包公藤 见广州军区空军卫生部《常用中草药手册》。为丁公藤之别名，详该条。

包谷心 见《重庆草药》。为玉米轴之别名，详该条。

【丶】

立制石 出《神农本草经》。为矾石之别名，详该条。

玄武版 见《四川中药志》。为龟板之处方名，详该条。

玄英石 见《本草纲目》。即玄精石，详该条。

玄明粉 出《药性论》。又名白龙粉、风化硝。为芒硝经风化失去结晶水而成的无水硫酸钠。本品功用同芒硝，参见芒硝条。

玄参 出《神农本草经》。又名重台、黑参、元参。为玄参科植物浙玄参 Scrophularia ningpoensis Hemsl. 或北玄参 S. buergeriana Miq. 的根。前者主产浙江、四川、湖北；后者产东北、华北地区。苦、咸，微寒。入肺、肾经。滋阴降火，凉血解毒。①治热病伤津，烦渴，发斑，肠燥便秘，阴虚骨蒸劳热，夜寐不宁，自汗盗汗，吐血，衄血。②咽喉肿痛，目赤，痈肿，瘰疬。煎服：9～15克。反藜芦。浙玄参根含生物碱，糖类，甾醇，氨基酸，脂肪油，微量挥发油，胡萝卜素等。北玄参根含玄参甙(Harpagoside)，甲氧基玄参甙，对甲氧基桂皮酸和芍药甙。北玄参水浸剂和煎剂对麻醉狗、肾型高血压狗、猫和兔有降压作用。流浸膏对家兔略有降血糖作用。

玄胡索 出《太平圣惠方》。即延胡索，详该条。

玄精石 出《本草纲目》。又名阴精石、玄英石。为年久所结的小形片状石膏矿石。产内蒙古、青海、四川、云南、陕西等地。咸，寒。入肺、胃、肾经。清热降火，祛痰。①治热病发热烦渴，肺胃蕴热生痰，头风，目赤。内服：煎汤，9～15克；或入丸、散。②治重舌，研细末掺敷；汤火伤，煅研细末调涂。本品主含含水硫酸钙，尚含少量硅酸盐等。

汉防己 出《药性论》。即防己，详该条。

汉桃叶 见《广西中草药》。为七叶莲之别名，详该条。

兰花参 见《滇南本草》。即蓝花参，详该条。

兰花根 出《刘羽仪经验方》。即建兰根，详该条。

兰香 见《齐民要术》。为罗勒之别名，详该条。

兰香子 出《海上名方》。为罗勒子之别名，详该条。

兰香草 出《植物名实图考》。又名山薄荷、石上香，九层塔、对对花。为马鞭草科植物兰香草Caryopteris incana(Thunb.) Miq.的全草。分布华东及湖北、湖南、广东、广西、甘肃等地。辛，温。祛风除湿，止咳，散瘀。①治感冒发热，百日咳，慢性气管炎，月经不调，崩漏，白带，产后瘀血

作痛。煎服：9～15克。②治湿疹、皮肤瘙痒，捣汁涂或煎水洗；跌打肿痛、疖肿、捣敷。本品含黄酮甙，体外对金黄色葡萄球菌、白喉杆菌等有抑菌作用。

半天吊 见《生草药性备要》。为榕须之别名，详该条。

半边风药 见《贵州民间药物》。为半边旗之别名，详该条。

半边伞 见《贵州民间药物》。为赤车使者之别名，详该条。

半边花 见《浙江民间草药》。为半边莲之别名，详该条。

半边莲 出《本草纲目》。又名急解索、腹水草、细米草、蛇利草、半边花。为桔梗科植物半边莲 Lobelia chinensis Lour. 的全草。分布长江中、下游及其以南各地；主产江苏、安徽、浙江。辛、淡，凉。清热解毒，利水消肿。①治疔疮，肿毒，毒蛇咬伤，捣汁服或煎服，并可捣烂外敷，蛇咬敷伤口周围。②治肝硬化腹水，晚期血吸虫病腹水，肾炎水肿。煎服：9～15克（鲜品30～90克）。③治跌打扭伤肿痛，湿疹，疥癣。捣敷。本品含山梗菜碱、山梗菜酮碱、山梗菜醇碱、异山梗菜酮碱等生物碱以及黄酮甙、皂甙、氨基酸等。还含治疗毒蛇咬伤的有效成分：延胡索酸钠、琥珀酸钠、对羟基苯甲酸钠。浸剂对麻醉犬有利尿作用，并可兴奋颈动脉体化学感受器而反射地兴奋呼吸中枢。上述作用可能与其中所含的山梗菜碱有关。本品大剂量可引起血压下降，可使小鼠出血时间缩短。体外对金黄色葡萄球菌，伤寒、副伤寒杆菌，大肠杆菌，绿脓杆菌及福氏痢疾杆菌有抑制作用。对某些致病真菌也能抑制。

半边梳 见《广东中草药》。即半边旗，详该条。

半边旗 见萧步丹《岭南采药录》。又名半边梳、半边蕨、半边风药、单片锯。为凤尾蕨科植物半边旗Pteris semipinnata L. 的全草。分布江西、福建、台湾、广东、广西和西南地区。苦、辛，凉。清热解毒，利湿，止血，消肿。①治痢疾，肠炎，黄疸型肝炎，急性眼结膜炎，吐血。煎服：15～30克。②治外伤出血，跌打肿痛 痈肿疮疖，湿疹，蛇咬伤。研末撒、捣敷或煎水洗。本品预试含生物碱、黄酮甙。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

半边蕨 见《广西药用植物图志》。即半边旗，详该条。

半年红 见《江苏药材志》。为夹竹桃之别名，详该条。

半含春 见《本草纲目》。为胡颓子之别名，详该条。

半枝莲 见《江苏省植物药材志》。又名金挖耳、并头草、四方草、牙刷草。为唇形科植物半枝莲 Scutellaria barbata Don 的全草。产江苏、江西、湖北、四川等地。微苦，凉。清热解毒，散瘀止血，利尿，抗癌。①治痈疽，疔肿，毒蛇咬伤。内服并捣敷。②治肺脓疡，阑尾炎，吐血，衄血，血痢，血淋，肾炎水肿，肝炎，肝硬化腹水。③近用治肺癌，胃肠道癌，子宫颈癌。煎服：15～30克（鲜品加倍）。孕妇慎用。本品预试含生物碱，黄酮甙、酚类及甾体。浸剂经乙醚提取的结晶对动物有利尿作用，煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌、大肠杆菌、绿脓杆菌有抑制作用。

半枫荷 ❶见萧步丹《岭南采药录》。又名白背枫、铁巴掌。为梧桐科植物翻白叶树 Pterospermum heterophyllum Hance 的根。分布江西、福建、台湾、广东、广西。甘，淡，微温。祛风除湿，活血通络。治风湿痹痛，坐骨神经痛，腰肌劳损，半身不遂，跌打扭伤。内服：煎汤，15～30克；或浸酒服。半枫荷叶：研末调敷，治外伤出血。❷见《江西草药》。为枫荷梨之别名，详该条。

半架牛 见《云南中草药》。为古钩藤之别名，详该条。

半夏 出《神农本草经》。又名老鸹头、地茨菇、麻芋果、三步跳。为天南星科植物半夏 pinellia ternata (Thunb.)Breit. 的块茎。主产四川、湖北、安徽、江苏、浙江、河南等地。辛，温，有毒，入脾、胃经。燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。①治痰饮，咳喘，痰厥头痛，眩晕不眠，恶心呕吐，反胃，胸脘痞闷，腹胀。煎服：4.5～9 克。②治痈肿未溃、鸡眼，研末调敷；子宫颈糜烂、外伤出血，研末撒患部；乳腺炎早期，和葱白同捣、塞鼻，每日二次，每次半小时；急、慢性化脓性中耳炎，研末，白酒浸24小时，取上清液滴耳；蛇咬伤，鲜品捣敷。内服用制半夏，外治用生半夏。反川乌、草乌、附子。仙半夏：功同制半夏而性较平和，适用于体质虚弱的患者，但近已很少生产和应用。本品含左旋麻黄碱及胆碱。还含挥发油、β-和 α-氨基丁酸、3,4二羟基苯甲醛、尿黑酸、β-谷甾醇及其葡萄糖甙等。煎剂对猫实验性咳嗽有止咳作用。醇提液对大鼠实验性矽肺有一定治疗作用。煎剂对狗有止吐作用，有效成分可能是生物碱部分，但生半夏有催吐作用，催吐成分可能是3,4二羟基苯甲醛及尿黑酸；如加温破坏后，止吐作用仍在。所含的γ-氨基丁酸有短暂的降压作用，临床用以降低血氨有效。

半夏曲 出《本草纲目》。为半夏加面粉、姜汁等制成的曲剂。苦、辛，平。止咳化痰，消食化滞。治咳嗽痰多，呕恶，食积，泄泻。煎服（布包）：6～9克。

头顶一颗珠 见《中国经济植物志》。为芋儿七之别名，详该条。

头晕药 见《云南中草药》。为蓝布正之别名，详该条。

头痛花 见《本草纲目》。为芫花之别名，详该条。

【7】

奶汁草 见《本经逢原》。为蒲公英之别名，详该条。

奶母草 见《卫生简报》(3)：11,1971。为飞扬草之别名，详该条。

奶米 见南京药学院《中草药学》。为王不留行之别名，详该条。

奶参 ❶见《广西中药志》。为山海螺之别名。❷见清·刘士季《草木便方》。为土党参之别名。各详该条。

奶孩儿 见《本草纲目拾遗》。为泽兰之别名，详该条。

奶浆果 见《湖南野生植物》。为无花果之别名，详该条。

奶浆草 见《草药手册》。为地锦草之别名，详该条。

奶浆柴胡 见《滇南本草》整理本，为还阳参之别名，详该条。

奶浆藤 ❶见《贵州药用植物目录》。为通光散之别名。❷见《民间常用草药汇编》。为萝藦之别名。各详该条。

奶蓟 见《全国中草药汇编》。为水飞蓟之别名，详该条。

奴柘刺 出《本草拾遗》。为桑科植物构棘Cudrania cochinchinensis(Lour.)kudo et Masam.或柘树 C.tricuspidata(Carr.) Bur. 的棘刺。分布华东、中南、西南等地。苦，温。治血瘕，痃癖，痞块。煎服：6～12克。

皮硝 见《本草纲目》。即朴硝，详该条。

发菜 见《中国药用海洋生物》。为龙须菜之别名，详该条。

发落海 见《滇南本草》。即法罗海，详该条。

边兰 见《浙江民间常用草药》。为荻之别名，详该条。

对月草 ❶见《分类草药性》。为元宝草之别名。❷见《中国药用植物志》。为蜜菜之别名。各详该条。

对节树根 见《贵州草药》。又名小红米

果根。为马鞭草科植物红紫珠Callicarpa rubella Lindl.的根。分布安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、四川、云南。辛、苦，凉。清热，止血。治吐血，尿血，痔疮出血，月经不调。煎服：15～30克。

对叶四块瓦 见《贵阳民间药草》。又名四叶莲、四块瓦、金薄荷、四叶麻、四叶金。为金粟兰科植物及己 Chloranthus serratus(Thunb.) Roem.et Schult. 的茎叶。分布江苏、福建、安徽、湖南、广东、广西等地。辛、苦，温，有毒。祛风止痛，活血散瘀，杀虫止痒。①治感冒头痛，风寒咳喘，风湿痹痛，闭经，跌打损伤。煎服：4.5～6克。②煎水洗头疮，黄癣，皮肤瘙痒；捣敷痈疖肿毒，毒蛇咬伤。服用过量可致中毒。孕妇忌服。地上部分含酰胺类：N-β-苯乙基-3-(3,4-甲二氧基苯基)丙烯酰胺和N-β-苯乙基-3-(3，4-二甲氧基苯基)丙烯酰胺。

对叶草 见清·刘士季《草木便方》。为元宝草之别名，详该条。

对叶莲 ❶见《贵州民间药物》。为千屈菜之别名。❷见《贵阳民间药草》。为徐长卿之别名。各详该条。

对对花 见《浙江民间常用草药》。为兰香草之别名，详该条。

对对参 见《昆明民间常用草药》。为肚拉之别名，详该条。

对座草 见《江苏省植物药材志》。为大金钱草之别名，详该条。

对眷钱 见《安徽中草药》。为荻之别名，详该条。

圣生梅 出《本草品汇精要》。为杨梅之别名，详该条。

台乌药 见《中国药学大辞典》。为乌药之处方名，详乌药条。

台党参 见《药材资料汇编》。为党参之药材名，详该条。

台湾柳 见《南方主要有毒植物》。为黄花夹竹桃之别名，详该条。

矛盾草 见《贵州草药》。为瓶尔小草之别名，详该条。

辽沙参 见《中药志》。为北沙参之别名，详该条。

丝毛草根 见《中药志》。为白茅根之别名，详该条。

丝叶 见萧步丹《岭南采药录》。为油柑叶之别名，详该条。

丝瓜 出《滇南本草》。又名天罗瓜、天吊瓜、水瓜。为葫芦科植物丝瓜 Luffa cylindrica(L.)Roem.的果实。甘，凉。入肝、胃经。清热，化痰，凉血，解毒。①治热病烦渴，痰喘咳嗽，肠风，痔漏，带下，血淋。内服：煎汤，9～15克，(鲜品60～120克)。②治风虫牙痛，干品烧存性研末撒。本品含皂甙、葫芦素B、大量粘液质和微量瓜氨酸，维生素B及C。

丝瓜子 出明·姚可成《食物本草》。又名乌牛子。为葫芦科植物丝瓜Luffa cylindrica(L.)Roem.的种子。苦，平。清热，化痰，通便，驱虫。①治肺热咳嗽，痰多，便秘，肠风，痔瘘。煎服：9～15克。②治蛔虫病。取种仁空腹时嚼食(或捣烂装胶囊服)，成人40～50粒，儿童30粒，每日一次，连服二日。孕妇忌服。本品含脂肪油、磷脂、α-菠菜甾醇、三萜皂甙(甙元为齐墩果酸)、葫芦素B等。

丝瓜水 见《中国药用植物图鉴》。为天萝水之别名，详该条。

丝瓜叶 出《滇南本草》。为葫芦科植物丝瓜Luffa cylindrica(L.) Roem. 的叶。苦、酸，微寒。清热解毒，化痰止咳，止血。①治暑热烦渴，咳嗽，百日咳。煎服：9～15克。②治痈肿，疔疮，天疱疮，带状疱疹，捣敷；疥癣，捣烂搽擦；汤火灼伤，研末调敷；创伤出血，研粉撒布。本品含齐墩果酸-3-葡萄糖甙，齐墩果酸-28-三葡萄糖甙，常

春藤皂甙元等三萜类。还含β-谷甾醇和多种氨基酸。又谓含葫芦素B。

丝瓜皮 出《滇南本草》。又名丝瓜壳。为葫芦科植物丝瓜 Luffa cylindrica(L.) Roem.的果皮。解毒，消肿。治金疮，研末撒；疔疮，油调涂；坐板疮，焙干研末，烧酒调涂。

丝瓜网 见清·汪双池《医林纂要·药性》。即丝瓜络，详该条。

丝瓜壳 见《分类草药性》。即丝瓜皮，详该条。

丝瓜花 出《滇南本草》。为葫芦科植物丝瓜 Luffa cylindrica(L.)Roem. 的花。甘、微苦，寒。清热止咳，消痰下气。①治肺热咳嗽，喘急气促，咽痛，鼻窦炎。煎服：6～9克。②治疔疮。肿毒，痔疮，捣烂敷；外伤出血，研粉撒。本品含谷氨酰胺、天冬氨酸、天门冬素、精氨酸、赖氨酸、丙氨酸等多种氨基酸。

丝瓜络 出清·叶小峰《本草再新》。又名丝瓜筋、丝瓜网。为葫芦科植物丝瓜Luffa cylindrica (L.) Roem. 老熟果实的维管束。甘，平。入肺、胃、肝经。通经活络，利尿消肿，凉血止血。①治风湿痹痛，关节不利，胸胁疼痛，肺热痰咳，妇女经闭，乳汁不通，乳痈肿痛，小便不利，水肿。煎服：4.5～9克。②炒炭研末服，治赤痢，便血，血崩。本品含多糖——木聚糖、纤维素等。

丝瓜根 出《滇南本草》。为葫芦科植物丝瓜Luffa cylindrica(L.)Roem. 的根。甘，平。活血，通络，清热，解毒。①治偏头痛，鼻炎，副鼻窦炎，喉风肿痛，肠风下血，痔漏，脱肛。煎服：15～30克。②治腰痛，烧存性研末，酒送服；乳腺炎，水煎兑酒服。③治疮疖，蛇咬伤。捣敷。

丝瓜筋 见《江苏省植物药材志》。即丝瓜络，详该条。

丝瓜藤 出《本草纲目》。为葫芦科植物丝瓜 Luffa cylindrica(L.)Roem.的茎。甘，微寒。舒筋活络，化痰止咳。①治腰痛，四肢麻木，肺热咳嗽，鼻炎。煎服：15～30克。②治脑漏，以近根处藤烧存性，研末搐鼻；牙宣，煅存性，研末敷；汤火伤，捣汁涂。本品含齐墩果酸-3-葡萄糖甙，齐墩果酸-28-三葡萄糖甙，常春藤皂甙元等三萜类，还含β-谷甾醇和多种氨基酸。煎剂对小鼠有止咳、祛痰作用。煎剂及醇浸剂在体外对肺炎双球菌及链球菌有抑制作用。

丝连皮 见《中药志》。为杜仲之别名，详该条。

丝莼 出《新修本草》。即莼，详该条。

丝棉木 见《贵州民间药物》。又名野杜仲、鸡血兰、白桃树。为卫矛科植物丝棉木 Euonymus bungeanus Maxim. 的根、树皮、果实或枝叶。全国大部分地区有分布。苦、涩，寒，有小毒。祛风除湿，活血止血。①治风湿痹痛，腰痛，血栓闭塞性脉管炎，鼻衄，痔疮。煎服：9～15克。②枝叶煎汤熏洗治漆疮。

丝棉皮 见苏州医学院等《中草药手册》。为杜仲之别名，详该条。

母丁香 出《雷公炮炙论》。又名鸡舌香、雌丁香。为桃金娘科植物丁香Syzygium aromaticum (Baill.) Merr. et Perry 近成熟的果实。产印度尼西亚、马来西亚、及东非沿海国家，我国广东有栽培。辛、温。温中散寒，降逆，杀虫。①治暴心气痛，胃寒呕逆，小儿疳积。煎服：1.5～4.5克；或研末服。②治龋齿痛，牙宣，口臭。煎水含嗽。畏郁金。忌见火。本品含挥发油，主成分为丁香油酚。

母草 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名四方草、四方拳草、水辣椒。为玄参科植物母草Lindernia crustacea(L.) F.Muell.的全草。分布江苏、安徽、浙江、江西、福建、广东、云南等地。苦、微辛，凉。清热利湿，解毒消肿。①治感冒，痢疾，肠炎，消化不良，急性肝炎，肾炎水肿，白

带。煎服：30～60克。②治痈疮疔毒，蛇咬伤。捣敷。全草含苦味质。

六 画

【一】

戎盐 出《神农本草经》。即大青盐。详该条。

地丁草 ❶见《辽宁经济植物志》。为苦地丁之别名，详该条。❷见清·叶小峰《本草再新》。为紫花地丁之别名，详该条。

地不荣 见明·范洪《滇南本草图说》。即地不容之别名，详该条。

地不容 出《新修本草》。又名地不荣、地芙蓉、一文钱、山乌龟、金线吊乌龟。为防己科植物地不容Stephania delavayi Diels的块根。产云南。苦、辛，微寒，有大毒。清热解毒，理气，止痛，消痰，化滞。①治急性胃肠炎，胃痛，疟疾，痰食停滞，内服：煎汤，1.5～3克，或研末吞，0.6～0.9克。本品内服须洗净切片，煮2小时后去皮晒干用。②治痈肿疮毒，研末，蜂蜜或醋调敷。孕妇忌服。用量过大，易引起呕吐。本品含地不容碱(Delavaine)、轮环藤宁碱Cycleanine)、金线吊乌龟碱、地不容新碱(Stephodeline)、异地不容新碱等生物碱。轮环藤宁碱有横纹肌松弛作用。金线吊乌龟碱能防治白细胞减少。

地毛球 见《中药志》。为锁阳之别名，详该条。

地乌龟 见《分类草药性》。为地鳖虫之别名，详该条。

地节 见《三国志》。为玉竹之别名，详该条。

地节根 见《青海药材》。为白茅根之别名，详该条。

地石榴 ❶出《滇南本草》。为地瓜藤之别名。❷见《湖南药物志》。为苍地之别名。各详该条。

地龙 出《本草图经》。又名蚯蚓、曲蟮、广地龙。为钜蚓科动物参环毛蚓Pheretima aspergillum (E.perrier)的干燥全体。主产广东、广西等地。咸，寒。入肝、脾、肺经。清热，镇痉，平喘，通络，利尿，降压。①治高热烦躁，惊风抽搐，喉痹，慢性气管炎，哮喘，风湿痹痛，半身不遂，水肿，黄疸，小便不利，高血压病。内服：煎汤，4.5～9克；研末服，每次1.5～3克，日服一至二次。②治流行性腮腺炎，下肢溃疡，丹毒，湿疹，烧烫伤，加白糖搅拌取液涂敷；骨折，酌加白糖及少许冰片同捣烂，涂敷患处。地龙含丁二酸，为止喘有效成分之一。并含6-羟基嘌呤、腺嘌呤、鸟嘌呤、胆碱、胍和多种氨基酸等。有平喘(舒张支气管)、降低血压、解热作用；并有轻度镇静、局部麻醉及拮抗某些实验性惊厥的作用。

地龙骨 见《河北中药手册》。为穿山龙之别名，详该条。

地仙苗 出《日华子诸家本草》。为枸杞叶之别名，详枸杞条。

地白草 出《天宝本草》。又名白地黄瓜、七星莲、黄瓜菜、野白菜、冷毒草。为堇菜科植物匍匐堇Viola diffusa Ging.的全草。分布华东、中南及西南等地。祛风清热，利尿解毒。①治感冒，百日咳，目赤肿痛，痢疾，肝炎，淋浊。煎服：9～15克。②治痈肿疔疮，跌打损伤，烫伤，蛇咬伤，疥疮。鲜品捣敷。

地瓜 见《救荒本草》。为地笋之别名，详该条。

地瓜儿 见《救荒本草》。为地笋之别名，详该条。

地瓜根 出清·刘士季《草木便方》。为桑科植物地瓜Ficus tikoua Bur.的根。苦、涩，凉。清热利湿，行气活血。治腹泻，痢疾，黄疸，白带，闭经，跌打损伤，瘰疬。内服：煎汤，30～60克；或浸酒服。

地瓜藤 见《贵州民间方药集》。又名地枇杷、地石榴、地板藤、霜坡虎。为桑科植物地瓜Ficus tikoua Bur.的茎叶。分布湖南、湖北、贵州、云南、四川和广西西部、陕西南部。苦，凉。清热利湿，止咳，消肿。①治小儿消化不良，急性胃肠炎，痢疾，黄疸，水肿，尿路感染，白带，风湿痹痛。煎服：15～30克。②捣敷治痈肿疮毒，跌打肿痛。

地耳草 出《植物名实图考》。又名田基黄、雀舌草、七寸金、小田基黄、黄花仔。为藤黄科植物地耳草 Hypericum japonicum Thunb. 的全草。分布长江流域及其以南各地。甘、微苦，凉。清热利湿，消肿解毒。①治传染性肝炎，早期肝硬化，泄泻，痢疾，阑尾炎，扁桃体炎。煎服：9～15克。②治急性眼结膜炎，煎水熏洗；痈疖肿毒，毒蛇咬伤，煎服并捣敷。本品预试含黄酮类、鞣质、内酯、蒽醌、酚类、氨基酸。流浸膏酸化后之沉淀物，在体外对牛型结核杆菌、痢疾杆菌、葡萄球菌、肺炎球菌等有不同程度的抑制作用。流浸膏可使离体兔肠节律性收缩增强。

地羊鹊 见《四川常用中草药》。又名牛角花、五叶草、三月黄花、斑鸠窝。为豆科植物百脉根 Lotus corniculatus L.的全草及根。分布湖北、湖南、四川、云南、贵州、甘肃、陕西、广西等地。全草：辛，平。清热解毒，止咳，消痞。①治风热咳嗽无痰，咽炎，扁桃体炎，胃部痞满疼痛。根：下气，止渴，去热，除虚劳，补不足。煎服：9～18克。②治疮疖，湿疹，痔疮，全草捣烂敷。全草含5，7，3′，4′-四羟基-8-甲氧基黄酮醇-3-O-β-半乳糖甙等黄酮甙，另含刀豆酸、齐墩果酸、皂甙等。

地米花 见《贵州民间方药集》。为荠菜花之别名，详该条。

地麦草 出《新修本草》。为地肤苗之别名，详该条。

地芙蓉 见《植物名实图考》。为地不容之别名，详该条。

地花椒 出《海上名方》。即地椒，详该条。

地连钱 见《本草纲目》。为螺厣草之别名，详该条。

地冻风 见《中药志》。为龙牙草根之别名，详该条。

地青杠 见《分类草药性》。为紫金牛之别名，详该条。

地枇杷 见《贵州民间药物》。为地瓜藤之别名，详该条。

地板藤 见《云南中草药》。为地瓜藤之别名，详该条。

地松 见《贵州民间方药集》。为漆姑草之别名，详该条。

地松柏 见《广西本草选编》。为铺地蜈蚣之别名，详该条。

地枫皮 见《全国中草药汇编》。为木兰科植物地枫皮 Illicium difengpi K.I.B. et K.I.M.的树皮。分布广西西南部。微辛、涩，温，有小毒。祛风除湿，行气止痛。治风湿关节痛，腰肌劳损。煎服：6～9克。

地苦胆 ❶见《陕西中草药》。为土贝母之别名。❷见《广西本草选编》。即苦地胆。❸见《四川中药志》。为金果榄之别名。各详该条。

地茄 见《植物名实图考》。为地苍之别名，详该条。

地茄子 出《分类草药性》。为桔梗科植物铜锤玉带草Pratia begoniifolia(Wall.) Lindl.的果实。分布西南、华南及湖南、湖北、江西、浙江、福建、台湾。涩，微温。固精，顺气，消积。治遗精，白带，疝气，

小儿疳积。煎服：15～30克。孕妇忌服。

地茄子草 见《分类草药性》。为铜锤玉带草之别名，详该条。

地茄根 见《浙江民间常用草药》。为地苍根之别名，详该条。

地顶草 见《云南中草药》。为灯盏细辛之别名，详该条。

地罗汉 见《云南中草药》。为滚山虫之别名，详该条。

地侧柏 见《全国中草药汇编》。为石上柏之别名，详该条。

地肤子 出《神农本草经》。又名扫帚子、扫帚菜子、铁扫把子。为藜科植物地肤Kochia scoparia(L.)Schrad.的果实。主产河北、山西、山东、河南等地。甘、苦，寒。入肾、膀胱经。清利湿热，止痒。①治湿热淋病，小便不利，白带。煎服：6～15克。②治荨麻疹，皮肤瘙痒，疥癣，湿疹。水煎服或煎水洗患处。本品含三萜皂甙、脂肪油。煎剂在体外对伤寒杆菌有抑制作用；水浸剂对某些致病性皮肤真菌有抑制作用。

地肤苗 出《名医别录》。又名地肤草、地麦草。为藜科植物地肤Kochia scoparia(L.)Schrad.的嫩茎叶。全国大部分地区有分布。苦，寒。清热解毒，利尿通淋。①治痢疾、泄泻，小便不利，淋病。煎服：30～60克。②煎水洗浴，治皮肤风热丹肿；洗目，治眼热昏暗、雀盲、涩痛。幼嫩茎叶含皂甙、微量胡萝卜素及维生素B_2、C。

地肤草 出《范汪方》。即地肤苗，详该条。

地狗 见《滇南本草》。为蝼蛄之别名，详该条。

地油根 见《云南中草药》。为大红袍之别名，详该条。

地虱 见《本草纲目》。为鼠妇之别名，详该条。

地贯草 见《广西中药志》。为莎草之别名，详该条。

地参 出《神农本草经》。为知母之别名，详该条。

地枯萝 见《现代实用中药》。即地骷髅，详该条。

地柏叶 见《湖南药物志》。为翠云草之别名，详该条。

地柏枝 ❶出清·刘士季《草木便方》。又名岩柏草、石柏、百叶草、黄疸卷柏、孔雀毛。为卷柏科植物江南卷柏Selaginella moellendorfii Hieron.的全草。分布长江以南各地，北至陕西南部。辛、微甘，平。清热利湿，凉血止血。①治湿热黄疸，全身浮肿，肺结核咯血，鼻衄，吐血，痔血，脏毒下血，血崩。煎服：15～30克。近用地柏枝注射液治血小板减少性紫癜，肌肉注射，每次2～4毫升。经一至二疗程（十至十五天为一疗程）或三个月以上才有效果。②治外伤出血，研末撒；烧伤，研末调敷。本品主含二种醛类成分，另有酚性、酸性、中性物质。注射液能缩短兔出血和凝血时间；在试管内能延迟纤维蛋白溶解，并能增加血小板总数和升高白细胞数。❷见《四川中药志》。为兖州卷柏之别名，详该条。

地柏草 见《广东中药》。为山扁豆之别名，详该条。

地胡椒 见清·罗思举《简易草药》。为鹅不食草之别名，详该条。

地茨菇 见《广西中兽医药用植物》。为半夏之别名，详该条。

地拱 见《四川中药志》。为地牯牛之别名，详该条。

地骨 见《新本草纲目》。为苦参之别名，详该条。

地骨皮 出《神农本草经》。为茄科植物枸杞Lycium chinense Mill.或宁夏枸杞L. barbarum L.的根皮。全国大部分地区均产。甘，寒。入肺、肾经。清热，凉血。治肺结核潮热盗汗，肺热咳喘，痰中带血，吐血，衄血，糖尿病，高血压病。煎服：

9～15克。本品含甜菜碱、桂皮酸、亚油酸、亚麻酸、β-谷甾醇和多量酚类物质。浸剂、酊剂及煎剂对麻醉犬、猫、兔均有明显降压作用；煎剂、浸膏可使兔血糖降低；水、醇提取物对发热家兔有退热作用。

地牯牛 ❶见《四川中药志》。又名蚁狮、沙谷牛、地拱。为蛟蜻蛉科昆虫蛟蜻蛉Myrmeleon micans Mac Lachlan的幼虫。辛、咸，温，有毒。通窍，散结，截疟。①治砂淋，炒研末，加白糖开水调服；治疟疾，炒研末，于疟发前半小时，温开水或兑酒服，每次7至10个。②治瘰疬破烂，配硼砂、冰片捣敷；疔毒，捣敷。③治竹木刺及铁砂入肉，配南瓜瓤捣敷。❷见《贵州民间方药集》。为蟛蜞之别名，详该条。

地牯牛草 见《贵州草药》。为甘露子之别名，详该条。

地钮子 见《四川中药志》。为铜锤玉带草之别名，详该条。

地胆头 见《广州植物志》。为苦地胆之别名，详该条。

地扁蛇 见《中国药学大辞典》。为蝮蛇之别名，详该条。

地蚕 见《日用本草》。为甘露子之别名，详该条。

地蚕子 见清·刘士季《草木便方》。为地笋之别名，详该条。

地莓 见《本草汇编》。为蛇莓之别名，详该条。

地桃花 见《广西药用植物图志》。又名刀伤药、野棉花、假桃花、桃子草。为锦葵科植物肖梵天花Urena lobata L.的根或全草。分布长江以南各地。甘、辛，平。祛风利湿，活血止血，清热解毒。①治感冒发热，风湿痹痛，肠炎，痢疾，水肿，淋病，带下。②治月经不调，咯血，吐血。煎服：15～30克。③治乳痈，跌打损伤，刀伤，蛇咬伤。鲜草捣敷。全草显酚性成分、氨基酸、甾醇反应。

地栗 出《通志》。为荸荠之别名，详该条。

地栗梗 见《苏州本产药材》。为通天草之别名，详该条。

地笋 出《嘉祐补注神农本草》。又名地瓜、地瓜儿、野三七、地蚕子、地藕。为唇形科植物地瓜儿苗Lycopus lucidus Turcz.或毛叶地瓜儿苗 L. lucidus Turcz.var. hirtus Regel 的根茎。前者分布东北、陕西、河北、四川及云南；后者分布我国南北各地。甘、辛，温。活血，益气。治吐血，衄血，产后腹痛，带下。煎服：4.5～9克。地瓜儿苗根茎含泽兰糖(Lycopose)、果糖、棉子糖、水苏糖等。

地浮萍 见《四川中药志》。为铜锤玉带草之别名，详该条。

地菍 见萧步丹《岭南采药录》。又名地茄、地稔、地石榴。为野牡丹科植物地菍Melastoma dodecandrum Lour. 的全草。分布江西、福建、广西、广东等地。甘、微涩，凉。清热解毒，活血止血。①煎剂喷喉、滴鼻预防流行性脑脊髓膜炎。②治肠炎，痢疾，消化道出血，肺脓疡，尿路感染。③治痛经，产后腹痛，血崩，带下，盆腔炎。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。④治外伤出血，痈肿疔疮，蛇咬伤。鲜品捣敷。本品煎剂在体外对伤寒、痢疾杆菌及金黄色葡萄球菌有抑制作用。

地菍根 见萧步丹《岭南采药录》。又名地茄根、地稔根。为野牡丹科植物地菍Melastoma dodecandrum Lour.的根。甘、微酸，平。活血止血。利湿通络。治痛经，产后腹痛，崩漏，白带，肠炎，痢疾，黄疸，尿路感染，风湿痹痛，瘰疬，虚火牙痛。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。本品预试含酚类、鞣质、糖类、氨基酸。

地菅 出《名医别录》。为白茅根之别名，详该条。

地黄木 见《广西中药志》。为华山矾之

别名，详该条。

地黄叶 出《食疗本草》。为玄参科植物地黄Rehmannia glutinosa(Gaertn.)Libosch.的叶。治手、足癣，恶疮似癞。捣汁日日涂之。

地黄连 见《云南中草药选》。为矮陀陀之别名，详该条。

地黄姜 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·外科》。为盾叶薯蓣之别名，详该条。

地椒 出《嘉祐补注神农本草》。又名地花椒、山胡椒。为唇形科植物百里香Thymus mongolicus Ronn.或兴凯百里香T.przewalskii(Kom.)Nakai的地上部分。前者分布东北及甘肃、陕西、青海、山西、河北等地，后者分布东北及河北、陕西等地。辛，温，有小毒。祛风止咳，温中止痛，利尿通淋。①治感冒咳嗽，百日咳，急性胃肠炎，消化不良，胃腹冷痛，高血压病，外伤周身疼痛，痛经，淋病小便涩痛。煎服：6～15克。②治疮痈肿痛，慢性湿疹，皮肤瘙痒，神经性皮炎，煎水洗。本品含挥发油，内有香荆芥酚、百里香酚、对聚伞花素、龙脑等。又含黄芩素葡萄糖甙、木犀草素-7-葡萄糖甙等黄酮类成分和熊果酸、鞣质等。百里香酚有防腐、消毒作用，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有抑制作用，它以原形自肺排出，故可治气管炎；还有抗真菌及驱虫作用。

地棕根 见《分类草药性》，为仙茅之别名，详该条。

地朝阳 见《云南中草药选》。为灯盏细辛之别名，详该条。

地筋 出《石药尔雅》。为苋根之别名，详该条。

地蒲壳 见《苏州本产药材》。即蒲种壳，详该条。

地榆 出《神农本草经》。又名酸赭、山枣参、山红枣根、黄瓜香、血箭草。为蔷薇科植物地榆 Sanguisorba officinalis L.的根。主产江苏、安徽、河南、河北、湖南等地。苦、酸，寒。入肝、大肠经。凉血止血，泻火敛疮。①治肠风下血，血痢，尿血，崩漏，痔疮出血，吐血，衄血，原发性血小板减少性紫癜，白带。煎服：9～15克，生用或炒炭。②治烧伤，研粉麻油调敷；湿疹，煎水纱布沾药液湿敷。本品含地榆甙Ⅰ、Ⅱ(Ziyu-glycoside Ⅰ、Ⅱ)，地榆皂甙A、B、E(Sanguisorbin A、B、E)，鞣质，游离没食子酸，并没食子酸。地榆粉外用对实验性烫伤有一定疗效。地榆炭煎剂使兔凝血时间明显缩短，小鼠出血时间缩短。煎剂对多种致病性球菌、杆菌和真菌均有一定的抑制作用，但药液经高压灭菌后则抑菌力明显减弱。

地雷 见《湖南药物志》。为雪里开之别名，详该条。

地蜈蚣 ❶出《王安卿采药志》。为大金钱草之别名。❷见《湖南药物志》。为蜘蛛抱蛋之别名。各详该条。

地蜂子 见《四川常用中草药》。又名三片风、三爪金、山蜂子、三张叶、三叶蛇莓。为蔷薇科植物三叶委陵菜 Potentilla freyniana Bornm.或地蜂子P.freyniana Bornm. var. Sinica Migo的根或全草。前者分布河北、江苏、浙江、福建、江西、四川等地，后者分布江苏、浙江、江西、湖北、贵州等地。苦、涩，凉。清热解毒，散瘀止血。①治肠炎，痢疾，牙痛，胃痛，胃肠出血，月经过多，产后或流产后出血不止，骨髓炎，跌打损伤，蛇咬伤。内服：煎汤，9～15克；研末，每服2～3克，一日三至四次。②治烧烫伤，捣烂敷或研粉撒。三叶委陵菜体外试验对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

地锦 出《本草拾遗》。为爬山虎之别名，详该条。

地锦草 出《嘉祐补注神农本草》。又名血见愁、奶浆草、粪脚草、铺地锦。为大戟科植物地锦Euphorbia humifusa Willd.

或斑地锦E.supina Rafin.的全草。我国大部分地区均有分布。苦、辛，平。清热，利湿，止血，解毒。①治急性细菌性痢疾，肠炎，黄疸，尿路感染，咳血，吐血，便血，尿血，子宫出血，痔疮出血，乳汁不通。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。②治蛇咬伤，痈肿疔疮，煎服并捣敷；外伤出血，研末敷；钩蚓皮炎，捣敷或捣汁涂。本品含槲皮素、没食子酸、内消旋肌醇。叶含鞣质。煎剂和酊剂在体外对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌，白喉、痢疾、大肠、变形、伤寒、百日咳杆菌等有较强的抗菌作用。动物试验证明酊剂对白喉毒素有中和作用。

地稔 见南京药学院《中草药学》。即地苍，详该条。

地稔根 见《南方主要有毒植物》。即地苍根，详该条。

地槟榔 见《云南中草药选》。为管仲之别名，详该条。

地骷髅 出《本草纲目拾遗》。又名地枯萝、枯萝卜、空莱菔。为十字花科植物莱菔Raphanus sativus L.结果后的干枯老根。甘、辛，平。宣肺化痰，消食，利水。治咳嗽痰多，食积气滞，脘腹胀痛，痞块，泻痢，水肿，臌胀，小便不利。煎服：9～30克。

地精 ❶出《石药尔雅》。为肉苁蓉之别名。❷出《何首乌录》。为何首乌之别名。各详该条。

地藕 ❶见《南宁市药物志》。为山莲藕之别名，详该条。❷见《分类草药性》。为地笋之别名，详该条。

地螺丝 见《湖南药物志》。为白及之别名，详该条。

地鳖虫 出《神农本草经》。又名蛴虫、土鳖虫、地乌龟。为鳖蠊科昆虫地鳖Eupolyphuga sinensis Walk.或冀地鳖Steleopyga plancyi(Bol.)雌虫的干燥全体。主产江苏、浙江、河南等地。咸，寒，有小毒。入肝经。活血散瘀，通经止痛。治癥瘕积聚，闭经，痛经，产后瘀血腹痛，跌打损伤。内服：煎汤，3～9克。或烘焙后研末吞服，每次0.9～1.5克。孕妇忌服。

朴硝 出《神农本草经》。又名皮硝。为矿物芒硝经加工而得的粗制结晶。苦、咸，寒。入胃、大肠经。泻热，通便，软坚。①治实热积滞，腹胀便秘。入汤剂或开水溶化服，4.5～9克。②治小儿食积，外敷脐部；乳痈初起及哺乳妇断奶，敷乳房；目赤肿痛，取溶液点眼；痔疮肿痛，煎水洗。孕妇忌服。畏三棱。本品多作外用，内服都用精制品芒硝及玄明粉。成分、药理见芒硝条。

芋儿七 ❶见《陕西中草药》。又名头顶一颗珠、黄花三七。为百合科植物延龄草Trillium tschonoskii Maxim.或白花延龄草T.camtschaticum Pall.的根茎。前者分布陕西、甘肃、安徽、湖北、四川、云南等地，后者分布东北地区。甘、辛，温，有小毒。镇静，止痛，活血，止血。①治高血压病，神经衰弱，眩晕，头痛，腰腿疼痛，月经不调，崩漏。内服：煎汤，6～9克；研末冲服，1.5～3克。②研末敷外伤出血；捣敷骨折，毒蛇咬伤，疔疮，无名肿毒。白花延龄草的根茎含薯蓣皂甙元、喷闹甙元(Pennogenin)、延龄草甙元（Cryptogenin）、延龄草螺甙元（Bethogenin）、26-氯-26-去羟延龄草甙元，白花延龄草甙A、B（Trilloside A、B）、白花延龄草烯醇甙（Trillenode）。延龄草地下部分含薯蓣皂甙、甲基原薯蓣皂甙（Methylprotodioscin）。延龄草煎剂和醇提取物对麻醉猫与家兔均有明显降压作用，可能与其溶血作用也有关，其降压作用有中枢神经系统的参与。醇提取物给小鼠灌胃有明显镇痛作用。❷见《全国中草药汇编》。为蓬莪朮之别名，详该条。

芋头 出《本草衍义》。又名毛芋、芋奶、芋根。为天南星科植物芋Colocasia esculenta(L.)Schott的块茎。我国南方广泛栽

培。辛、平，有小毒。化痰，软坚，消肿散结。①治瘰疬结核。入丸剂服，每次6～9克，每日二至三次。②治腹中癖气。浸酒服。③捣敷疮疡肿毒，乳腺炎，牛皮癣，水火烫伤。本品含淀粉69.6～73.7%，维生素B、B_2较多。

芋头花 见《民间常用草药汇编》。又名芋苗花。为天南星科植物芋Colocasia esculenta(L.)Schott的花。辛，平，有毒。治胃痛，吐血，子宫脱垂，痔疮，脱肛。煎服：15～30克。

芋奶 见明·黄省曾《种芋法》。即芋头，详该条。

芋茎 见《湖南药物志》。为芋梗之别名，详该条。

芋苗花 见《生草药性备要》。即芋头花，详该条。

芋荷杆 见《民间常用草药汇编》。为芋梗之别名，详该条。

芋根 见《汉书·颜师古注》。即芋头，详该条。

芋梗 出《本草衍义》。又名芋荷杆、芋茎。为天南星科植物芋Colocasia esculenta(L.)Schott的叶柄。辛，凉。利水，和脾，消肿。①治腹泻，痢疾。煎服：鲜品15～60克。②捣敷肿毒，蛇虫咬伤；烧存性研末撒黄水疮。

芒芋 出《神农本草经》。为泽泻之别名，详该条。

芒果 见《中国树木分类学》。即杧果，详该条。

芒种花 出《植物名实图考》。又名云南连翘、细连翘、土连翘、栽秧花、大过路黄。为藤黄科植物金丝梅Hypericum patulum Thunb.的全株。分布陕西、四川、云南、贵州、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、福建等地。苦，寒。清热解毒，利尿通淋，凉血止血。①治感冒、咳嗽，肝炎，痢疾，喉蛾，口腔炎，淋病，疝气，鼻衄，便血，血崩。煎服：9～15克。②治皮炎，皮肤瘙痒，叶煎水洗；黄水疮，茎叶研末撒敷。

芒硝 出《名医别录》。又名盆硝。为矿物芒硝经煮炼而得的精制结晶。咸、苦，寒。入胃、大肠经。泻热通便，润燥软坚。①治实热积滞，大便燥结，胸腹胀满。入汤剂或开水溶化服，4.5～9克。②治目赤肿痛，以溶液点眼；丹毒，痈肿，水化涂敷；咽痛，口疮，研细末吹搽患处；痔疮肿痛，水煎熏洗；乳痈初起及哺乳妇断奶，外敷乳房。孕妇忌服。畏三棱。本品主含含水硫酸钠，常有氯化钠、硫酸钙、硫酸镁等杂质。硫酸钠口服，在肠内形成高渗溶液，为盐类泻药。服用时饮大量水分，可于服后4～6小时排出液体粪便。对肠有刺激性，不适用于慢性便秘。

芝麻荄 见《中国医学大辞典》。为麻秸之别名，详该条。

芝麻响铃铃 见《浙江民间常用草药》。为农吉利之别名，详该条。

芎䓖 出《神农本草经》。即川芎，详该条。

芎䓖苗 出《名医别录》。为蘼芜之别名，详该条。

吉吉麻 见《江苏省植物药材志》。为罗布麻之别名，详该条。

吉祥草 出《本草纲目》。又名解晕草、小青胆、玉带草、竹叶青、小叶万年青。为百合科植物吉祥草 Reineckea carnea Kunth的带根全草。分布西南、华中、华南、华东和陕西等地。甘，凉。清肺止咳，凉血解毒。①治肺热咳嗽，哮喘，咯血，吐血，衄血，便血，黄疸，疳积，火眼。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。②外敷疮毒，跌打损伤。全草含甾体皂甙，甙元有薯蓣皂甙元、吉祥草皂甙元等。另含β-谷甾醇葡萄糖甙。

老白毛 见《安徽中草药》。为白头翁之别名，详该条。

老头草 见《东北常用中草药手册》。为火绒草之别名，详该条。

老母虫 见《四川中药志》。为蛴螬之别名，详该条。

老母猪藤 见《安徽中草药》。为乌蔹莓之别名，详该条。

老君须 ❶见《南宁市药物志》。为三十六荡之别名。❷见《安徽中草药》。为松萝之别名。各详该条。

老虎爪 见《河北药材》。为卷柏之别名，详该条。

老虎芋 ❶见《广西药用植物名录》。为卜芥之别名。❷见《贵州民间方药集》。为海芋之别名。各详该条。

老虎花 见《本草纲目》。为闹羊花之别名，详该条。

老虎刺 见《安徽中草药》。为葎草之别名，详该条。

老虎刺叶 见《江苏药材志》。为枸骨叶之别名，详该条。

老虎脚迹草 见《中国药用植物志》。为毛茛之别名，详该条。

老虎獠子 见《中国药用植物图鉴》。为刺五加之别名，详该条。

老鸹头 见《江苏省植物药材志》。为半夏之别名，详该条。

老鸹筋 见《东北资源植物手册》。为老鹳草之别名，详该条。

老鸦枕头 见《药材资料汇编》。为苦石莲之别名，详该条。

老鸦胆 见《生草药性备要》。为鸦胆子之别名，详该条。

老鸦眼睛藤 见《上海常用中草药》。为乌蔹莓之别名，详该条。

老鸦蒜 见《世医得效方》。为石蒜之别名，详该条。

老鸦糊 见《福建民间草药》。又名鱼胆、猴草、米筛花。为马鞭草科植物老鸦糊 Callicarpa bodinieri Lévl. var. giraldii (Rehd.) Rehd. 的根、茎、叶、果实。分布华东及湖北、湖南、广东、广西、贵州、四川、云南等地。苦、辛，凉。散瘀止血，祛风除湿。①治内出血，尿血。内服：煎汤，15～30克，或研粉，每次3克，每日三至四次。②治外伤出血，跌打损伤，取叶、果实研末外敷，或鲜叶捣敷；③治风湿关节痛，根，15～30克，水、酒煎服；颈淋巴结结核，根，250克，煮鸡蛋3个，吃蛋，一次吃完。本品水煎剂，在体外对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌有抑制作用。

老蒙花 见《药材资料汇编》。为密蒙花之商品名，详该条。

老蝎生 出《植物名实图考》。又名接筋草、野花生。为豆科植物天蓝苜蓿 Medicago lupulina L. 的全草。分布东北、华北、西北、华中及云南、四川等地。微苦，平。清热利湿，凉血止血，舒筋通络。①治黄疸型肝炎，便血，痔血，坐骨神经痛，风湿、劳伤疼痛。煎服：9～15克。②捣敷蛇头疔，蜈蚣、黄蜂、蛇咬伤。全草含雌激素样成分。种子含皂甙。

老鼠耳 见《福建民间草药》。又名狗脚刺、提云草、老鼠乳、乌金藤、鸭公青。为鼠李科植物细叶勾耳茶 Berchemia lineata (L.) DC. 的嫩茎叶。分布福建、台湾、广东、广西等地。微苦、涩，平。止咳，消滞，散瘀，解毒。①治慢性气管炎，小儿胃纳呆滞，睾丸肿痛，痔疮。煎服：15～30克。②治疔疮，煎服并加盐少许捣敷；汤火伤，研末茶油调涂。

老鼠花 见《东还纪程》。为芫花之别名，详该条。

老鼠尾 ❶见萧步丹《岭南采药录》。为千斤拔之别名。❷见《泉州本草》。为草石蚕之别名。各详该条。

老鼠刺 见《江西民间草药》。为虎刺之别名，详该条。

老鼠拉冬瓜 见《广西中草药》。为马陵儿之别名，详该条。

老鼠芋 见《全国中草药汇编》。为水飞

蓟之别名，详该条。

老鼠乳 见《福建中草药》。为老鼠耳之别名，详该条。

老腰弓 见《云南中草药选》。为草血竭之别名，详该条。

老鹳草 出《本草纲目拾遗》。又名五叶草、破铜钱、老鹳嘴、老鸦筋、鹤子嘴。为牻牛儿苗科植物牻牛儿苗 Erodium stephanianum Willd. 或老鹳草 Geranium wilfordii Maxim. 等的地上部分。主产河北、山东、山西、云南、四川、湖北等地。苦、辛，平。祛风湿，活血，通络；外用清热解毒，收敛生肌。①治风湿性关节炎，坐骨神经痛，急性胃肠炎，痢疾。煎服：9～15克。②制成软膏涂敷，治湿疹，痈、疔、疮疖，小面积水、火烫伤。牻牛儿苗全草含挥发油、其主要成分为牻牛儿醇，又含槲皮素及鞣质。煎剂或浸膏在一定剂量时，能抑制兔肠蠕动，有止泻作用，但用量过大反有泻下作用。煎剂在试管内对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、链球菌、痢疾杆菌等多种细菌以及流感病毒有抑制作用。

老鹳嘴 见《东北植物药图志》。为老鹳草之别名，详该条。

耳环草 见《世医得效方》。为鸭跖草之别名，详该条。

耳挖草 见《生草药性备要》。为向天盏之别名，详该条。

耳响草 见萧步丹《岭南采药录》。为磨盘草之别名，详该条。

耳聋草 ❶见《福建民间草药》。为虎耳草之别名。❷见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。为磨盘草之别名，各详该条。

亚片 见《随息居饮食谱》。即鸦片，详该条。

亚乎奴 见《云南思茅中草药选》。为锡生藤之傣族语名，详该条。

亚麻 出《本草图经》。又名山脂麻、胡脂麻、大胡麻。为亚麻科植物亚麻 Linum usitatissimum L. 的根。我国大部分地区有栽培。甘、辛，平。平肝，理气，活血。①治慢性肝炎，肝风头痛，睾丸炎，疝气。煎服：15～30克。②捣敷治跌打损伤。亚麻茎叶：煎服治头风疼痛，捣烂外敷或研末撒治刀伤出血。根含亚麻苦甙，对小肠的分泌、运动功能有调节作用。茎叶还含荭草素、异荭草素、牡荆素、异牡荆素等。

亚麻子 出《本草图经》。又名胡麻子、壁虱胡麻、亚麻仁。为亚麻科植物亚麻 Linum usitatissimum L. 的种子。主产内蒙古及东北地区。甘，微温。入胃、大肠经。解散温热湿毒，润燥，祛风，杀虫。①治麻风，眩晕，肠燥便秘，肺痈咳吐脓血，脂溢性脱发。煎服：4.5～9克；或入丸剂。②治疮癣湿疹，皮肤瘙痒。内服并煎水熏洗患处。种子脂肪油即亚麻油，主要成分为亚麻酸、亚油酸及油酸等的甘油酯，有轻泻作用，还含粘液质、蛋白质、糖、有机酸和少量的亚麻苦甙。

亚麻仁 见《国药的药理学》。即亚麻子，详该条。

西五味子 见《四川中药志》。即南五味子，详该条。

西瓜 出《日用本草》。为葫芦科植物西瓜 Citrullus vulgaris Schrad. 的果瓤。甘，寒。入心、胃、膀胱经。清热解暑，止渴利尿。治暑热伤津，心烦口渴，小便不利，口疮。内服：生啖或取汁饮。本品含瓜氨酸、精氨酸、能增加肝中尿素的形成，有利尿作用。还含甜菜碱、维生素C及多种挥发性成分。

西瓜子仁 出《本草纲目》。为葫芦科植物西瓜 Citrullus vulgaris Schrad. 的种仁。甘，平。清肺化痰。治吐血，久嗽。煎浓汁服：9～15克。本品含西瓜子皂甙（C-ucurbocitrin），有降压作用，并能缓解急性膀胱炎之症状。还含吡唑、α-氨基-β-（吡唑基）-N-丙酸和磷脂酰乙醇胺、溶血

磷脂酰乙醇胺等极性类脂物。

西瓜皮 出《本草纲目》。又名西瓜翠衣，西瓜翠。为葫芦科植物西瓜 Citrullus vulgaris Schrad.的果皮。甘，凉。入心、胃、膀胱经。清热解暑，利尿。①治暑热烦渴，高血压病，肾炎浮肿，膀胱炎，小便不利，糖尿病，咽燥肿痛。煎服：15～30克（鲜品60～120克）。②治口舌生疮，牙痛。烧存性研末，敷患处。果皮含蜡质及糖，有利尿、降压作用。

西瓜虫 见《苏州本产药材》。为鼠妇之别名，详该条。

西瓜硝 见清·叶小峰《本草再新》。即西瓜霜，详该条。

西瓜翠 见《药材资料汇编》。即西瓜皮，详该条。

西瓜翠衣 见《临证指南医案》。即西瓜皮，详该条。

西瓜霜 出《疡医大全》。又名西瓜硝。为西瓜皮和皮硝混合制成的白色结晶。咸，寒。清热消肿。治喉风，喉痹，白喉，口疮，牙疳，研末吹患处；目赤肿痛，以蒸馏水溶化点眼。

西加皮 见《陆川本草》。为鸭脚木皮之别名，详该条。

西伯利亚白刺 见《中国沙漠地区药用植物》。为卡密之别名，详该条。

西青果 见《药材资料汇编》。为藏青果之别名，详该条。

西国草 出《海上集验方》。为覆盆子叶之别名，详该条。

西河柳 见《本草汇言》。为柽柳之别名，详该条。

西参 见《增订伪药条辨》。即西洋参，详该条。

西洋参 出《本草纲目拾遗》又名洋参、西参、花旗参。为五加科植物西洋参Panax quinquefolium L.的根。主产美国、加拿大及法国。甘、苦，凉。补肺阴，降虚火，养胃生津。治肺虚久咳，咯血；热病伤阴，咽干口渴。煎服：2.4～6克。忌铁器及火炒。本品含多种人参皂甙（皂甙水解后产物主要是人参二醇、并有人参三醇及齐墩果酸）。还含挥发油，树脂等。动物试验对大脑有镇静作用，对延脑的呼吸中枢则有中度的兴奋作用。人参皂甙作用见人参条。

西黄 见《增订伪药条辨》。为牛黄之处方名，详该条。

西番莲 出《植物名实图考》。又名玉蕊花、转心莲、转枝莲、时计草。为西番莲科植物西番莲Passiflora caerulea L.的全草。我国南方地区庭园有栽培。苦，温。祛风，活血，镇静，止痛。①治风湿骨痛，神经痛，疝痛，痛经，失眠。如煎服：3～9克。②治骨折。捣烂和酒外敷。本品含哈尔满（Harman）。花和果穗含焦性儿茶酚、没食子酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、肉豆蔻酸、谷甾醇等。

西藏橄榄 见上海中医学院《中草药学》。为藏青果之别名，详该条。

列当 出《开宝重定本草》。又名栗当、草苁蓉、独根草、兔子腿。为列当科植物紫花列当 Orobanche caerulescens Steph.的全草。主产东北及陕西、河北、山西。甘，温。补肾，助阳，强筋。①治肾虚腰膝冷痛，阳痿，遗精。煎服：4.5～9克。②治小儿肠炎腹泻，煎水乘热浸洗足部，每日一次，每次10分钟。

百日红 ❶见《中国药用植物志》。为千日红之别名。❷见《广西本草选编》。为龙船花之别名。❸出《曲洧旧闻》。为紫薇花之别名。各详该条。

百叶草 见《广西本草选编》。为地柏枝之别名。详该条。

百合 出《神农本草经》。又名药百合。为百合科植物百合Lilium brownii F. E.Brown var.viridulum Baker或卷丹L.lancifolium Thunb.等的鳞茎。主产湖

南、浙江、江苏、安徽。甘、微苦，微寒。入肺、心经。润肺止咳，宁心安神。①治肺结核咳嗽，潮热，阴虚咳血，肺痈。②治热病后余热不清，神思恍惚，神经衰弱，心烦失眠。煎服：9～15克。③捣敷天疱湿疮，本品含生物碱及淀粉、蛋白质、脂肪等。煎剂对小鼠有止咳、平喘作用。

百合花 出《滇南本草》。为百合科植物百合Lilium brownii F.E.Brown var. Viridulum Baker的花。我国大部分地区有栽培。甘、微苦，平。清虚火，止嗽，安神，活血。①治咳嗽，夜寐不安，眩晕，小儿惊风，妇女闭经。煎服：4.5～9克。②晒干研末，油调，敷天疱湿疮。百合的种子名百合子，酒炒研末服，治肠风下血。

百步蛇 见《动物学大辞典》。为白花蛇之别名，详该条。

百条根 ❶见《泉州本草》。为一枝黄花之别名。❷见《杨氏经验方》。为百部之别名。各详该条。

百尾笋 见《贵州民间方药集》。为竹凌霄之别名，详该条。

百枝 出《吴普本草》。为草蘼之别名，详该条。

百乳草 见《本草图经》。为百蕊草之别名，详该条。

百草丹 见《本草纲目拾遗》。为羊胲子之别名，详该条。

百草霜 出《本草图经》。又名灶突墨。为杂草经燃烧后附于烟囱内的烟灰。辛，温。入肺、胃、大肠经。止血，止泻。①治吐血，衄血，便血，血崩，食积，泻痢。内服：煎汤，0.9～4.5克，包煎；或冲服。②治咽喉口舌诸疮。研末调敷。本品主含碳粒。

百药煎 出《本草蒙筌》。为五倍子同茶叶等经发酵制成的块状物。酸、甘，平。入肺、胃经。润肺化痰，涩肠止泻，清热解毒。①治久咳痰多，咽痛，便血，久痢，脱肛。煎服：3～9克。②治口疮，痈肿疮疡，研末调敷；牙疳，研末掺。

百部 出《本草经集注》。又名嗽药、百条根、药虱药。为百部科植物百部Stemona japonica (Blume) Miq.直立百部S.sessilifolia (Miq.) Miq.或对叶百部S. tuberosa Lour.的块根。百部、直立百部主产华东；对叶百部主产湖北、四川、广西、云南。甘、苦，微温，有小毒。入肺经。温润肺气，止咳，杀虫。①治肺结核，急、慢性支气管炎，百日咳，蛔虫病，阿米巴痢疾。如煎服：3～9克。②治蛲虫病，煎取浓液，睡前作保留灌肠；滴虫性阴道炎，煎液冲洗；癣症，酒精浸或研末涂擦；杀灭头虱、体虱，酒浸液或水煎液涂搽。百部根含百部碱(Stemoniue)，百部定碱(Stemonidine)，异百部定碱，原百部碱(Protostemonine)等；直立百部根含直立百部碱(Sessilistemonine)，对叶百部碱(Tulerostemonine)，原百部碱等；对叶百部根含对叶百部碱，异对叶百部碱，氧化对叶百部碱，次对叶百部碱等。煎剂和乙醇浸剂对多种球菌、杆菌及真菌均有抑制作用；对人型结核杆菌也能抑制，对实验性结核病具有一定疗效。百部对感染亚洲甲型流感病毒的小鼠还有一定的预防和治疗作用。醇浸剂对头虱、体虱、阴虱、臭虫、蝇蛆、孑孓、蛲虫、阴道滴虫均有杀灭作用。百部生物碱能降低呼吸中枢的兴奋性。

百眼藤 见广州军区空军卫生部《常用中草药手册》。又名爬山虎、五眼子、鸡眼藤、猪糠藤。为茜草科植物百眼藤Morinda parvifolia Bartl.的根及茎。分布华南和东南地区。甘，凉。解表清热，化痰止咳，散瘀止痛。治感冒咳嗽，百日咳，消化不良，大便秘结，跌打损伤，腰肌劳损。煎服：15～30克。

百脚 见《药材学》。为蜈蚣之别名，详

该条。

百解 见《广西中兽医药用植物》。为岗梅根之别名，详该条。

百解头 见《广西本草选编》。为广防己之别名，详该条。

百解药 见《贵州民间方药集》。为胖血藤之别名，详该条。

百解藤 见《广西野生资源植物》。为凉粉藤之别名，详该条。

百蕊草 出《本草图经》。又名小草、百乳草、凤芽蒿、细须草、青龙草。为檀香科植物百蕊草Thesium chinense Turcz.的全草。分布我国南北各地。辛、微苦，涩，寒。清热解毒，补肾涩精。治肺炎，肺脓疡，扁桃体炎，上呼吸道感染，急性乳腺炎，急性膀胱炎，淋巴结结核，肾虚腰痛，头晕、遗精、滑精。煎服：9～15克。本品含山柰酚及其3-鼠李葡萄糖甙，黄芪甙，D-甘露醇，琥珀酸。山柰酚及其3-鼠李葡萄糖甙、琥珀酸在体外具有广谱抗菌活性。本品对多种革兰氏阳性、阴性菌以及白色念珠菌感染均有效。D-甘露醇、山柰酸有止咳，祛痰作用。琥珀酸有平喘作用。

有毛老鸦嘴 见《广西中草药》。为古羊藤之别名，详该条。

灰包菌 见《中药形性经验鉴别法》。为马勃之别名，详该条。

灰涤菜 见《本草纲目》。为灰藿之别名，详该条。

灰碱 出《本草纲目》。又名石碱、花碱、水碱。为从蒿、蓼等草灰中提取之碱汁，和以面粉，经加工而成的固体。咸、苦，温。软坚，消积，杀虫。①治积块，噎膈反胃。内服：3～9克，入丸、散。②治疣赘，研末调敷；虫牙痛，研末填蛀孔内。石碱主要含碳酸钾、碳酸钠等无机物质，又含淀粉及蛋白质等。

灰藿 出《雷公炮炙论》。又名灰涤菜、金锁夭。为藜科植物小藜Chenopodium serotinum L.的全草。分布吉林、辽宁、河北、山东、湖北、台湾、广东、云南等地。甘，平。清热，去湿，解毒。治疔疮肿毒，疥癣风瘙，毒虫咬伤。煎水洗或捣敷。

夹竹桃 出《植物名实图考》。又名柳叶桃、白羊桃、半年红。为夹竹桃科植物夹竹桃Nerium indicum Mill.的叶。我国各地均有栽培。苦，寒，有大毒。强心利尿。治心脏病心力衰竭。研末服：每次0.05～0.1克，每日一至二次。应用时必须严格掌握剂量，不宜多服久服。如发现呕吐、心慌、脉搏缓慢、不整脉等中毒症状时，应立即停药。孕妇忌服。本品含强心甙为欧夹竹桃甙丙。另含欧夹竹桃甙乙，无强心作用。还含齐墩果酸，熊果酸、兰香甙等。欧夹竹桃甙丙对各种动物均现洋地黄样强心作用、属慢作用强心甙类。浸剂及醇提物对豚鼠、大鼠有利尿作用，对小鼠有镇静作用。中毒时的处理原则与解救洋地黄中毒相同。

夹板菜 见《吉林中草药》。为紫菀之别名，详该条。

夹蛇龟 出《蜀重广英公本草》。又名摄龟、呷蛇龟、断板龟、克蛇龟。为龟科动物夹蛇龟Cyclemys flavomarginata (Gray)的全体。分布浙江、福建、台湾、广东。活血消肿。①治肺结核，骨结核，喉蛾。煅存性研末入丸、散服，3～6克。②治瘰疬，内服或煅存性研末调敷；痔疾，恶疮，煎水洗。

扛板归 出《万病回春》。即杠板归，详该条。

扦扦活 ❶见《本经逢原》。为接骨木之别名。❷见《江苏省植物药材志》。为蒴藋之别名。各详该条。

托盘 见《黑龙江常用中草药手册》。又名树莓、牛迭肚、野马林、野婆婆头。为蔷薇科植物山楂叶悬钩子Rubus crataegifolius Bunge的果实。分布东北及内蒙古、河北、山东。酸、甘，温。补肝肾，缩小

便。治阳痿，遗精，尿频，遗尿。如煎服：6～9克。本品含有机酸，主为柠檬酸、苹果酸、水杨酸及其盐类。还含果胶质、维生素C等。

托盘根 见《黑龙江常用中草药手册》。为蔷薇科植物山楂叶悬钩子Rubus crataegifolius Bunge的根。苦、涩，平。祛风，利湿，解毒。①治风湿性关节炎，痛风，肝炎。煎服：15～30克。②捣敷治丹毒。

扫把筱 见《广西中药志》。为岗松之别名，详该条。

扫帚子 见《中药材手册》。为地肤子之别名，详该条。

扫帚菜子 见南京药学院《中草药学》。为地肤子之别名，详该条。

扫盆 见《本草便读》。为轻粉之别名，详该条。

兔韭 出《吴普本草》。为石菖蒲之别名，详该条。

过山风 见《中国药用植物志》。为南蛇藤之别名，详该条。

过山龙 ❶见清·刘士季《草木便方》。为牛马藤之别名。❷见《江西中药》。为南蛇藤之别名。各详该条。

过山枫 见《广西药用植物名录》。为榼藤之别名，详该条。

过山香 见《福建中草药》。为九里香之别名，详该条。

过冬青 出《经验广集》。为荔枝草之别名，详该条。

过江龙 ❶出《天宝本草》。为过塘蛇之别名。❷见《植物名实图考》。为茅莓之别名。❸见《广西药用植物名录》。为榼藤之别名。各详该条。

过坛龙 出《植物名实图考》。为乌脚枪之别名，详该条。

过岗龙 ❶出《生草药性备要》。为九龙藤之别名。❷见《广西本草选编》。为榼藤之别名。各详该条。

过塘蛇 ❶出《生草药性备要》。又名过江龙、鱼鳔草、水瓮菜。为柳叶菜科植物水龙Jussiaea repens L.的全草。分布长江以南各地。淡，寒。清热解毒，利尿消肿。①治感冒发热，燥热咳嗽，麻疹不透，肠炎，痢疾，小便不利，淋病。煎服：15～30克。②治痈肿疔疮，腮腺炎，带状疱疹，皮炎，湿疹，黄水疮，丹毒，蛇、犬咬伤。捣敷或研末调敷。本品预试含黄酮甙、酚类、氨基酸、糖类。❷见《广西本草选编》。为空心苋之别名，详该条。

过塘莲 见《南宁市药物志》。为三白草之别名，详该条。

〔丨〕

尖尾风 出清·赵其光《本草求原》。又名赶风柴、粘手风、穿骨风、牛舌癀。为马鞭草科植物尖尾枫Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.的叶或根。分布台湾、福建、江西、广东、广西、四川。辛、微苦，温。祛风，止痛，散瘀。①治风湿痹痛，风寒咳嗽，寒积腹痛，跌打损伤，吐血，衄血，便血。煎服：15～30克。②治瘫痪，小儿麻痹后遗症。煎服，或煎水外洗。③治外伤出血。研粉撒。

尖惊药 见《贵阳民间药草》。为九头狮子草之别名，详该条。

光风草 见《本草纲目》。为苜蓿之别名，详该条。

光皮木瓜 见《广西本草选编》。为楔楂之药材名，详该条。

光枝勾儿茶 见《全国中草药汇编》。又名光背勾儿茶。为鼠李科植物光枝勾儿茶Berchemia polyphylla Wall.var.leioclada Hand.-Mazz.的地上部分。分布湖南。微苦、涩，平。祛痰止咳，活络止痛。治急、慢性支气管炎，小儿疳积，风湿关节痛。煎服：15～30克。茎叶含芸香甙、槲皮素、β-谷甾醇。预试还含蒽甙、皂甙和鞣质等。

光明子 见《饮片新参》。为罗勒子之处方名，详该条。

光明草 见《本草纲目》。为狗尾草之别名，详该条。

光珀 见《中国药学大辞典》。为琥珀之处方名，详该条。

光背勾儿茶 见《全国中草药汇编》。为光枝勾儿茶之别名，详该条。

光菇 见《中药形性经验鉴别法》。为光慈菇之简称，详该条。

光慈菇 见《河南中药手册》。又名小慈姑、毛地梨、光菇、山蛋。为百合科植物老鸦瓣Tulipa edulis（Miq.）Bak.的鳞茎。分布东北至长江流域各地。甘、辛，凉，有小毒。清热解毒，散结化痰。①治咽喉肿痛，瘰疬结核。煎服：1.5～4.5克。②治痈疽，疮肿，蛇咬伤。捣敷或捣汁涂。孕妇忌用。本品含秋水仙碱等多种生物碱。秋水仙碱对急性痛风性关节炎有特效，但应注意剂量。它能抑制细胞的有丝分裂，繁殖较快的肿瘤组织尤其敏感，由于毒性大，临床难以应用。

光藕节 见《江苏省植物药材志》。即藕节，详该条。

当门子 见《雷公炮炙论》。为麝香之处方名，详该条。

当归 出《神农本草经》。又名干归、秦归。为伞形科植物当归Angelica sinensis（Oliv.）Diels的根。主产甘肃、云南、四川。甘、辛，温。入心、肝、脾经。补血活血，调经止痛，润燥滑肠。①治月经不调，闭经，痛经，慢性盆腔炎，产后瘀滞腹痛，崩漏。②治贫血，血虚头痛、眩晕，肠燥便秘。③治癥瘕积聚，风湿痹痛，腰肌劳损，痈疽疮疡，跌打损伤。煎服：6～15克。本品含亚丁基苯酞，东当归酞内酯（Ligustilide）、阿魏酸、丁二酸、蔗糖、维生素B_{12}、维生素A类物质和β-谷甾醇等。其挥发性成分能抑制子宫，而非挥发性成分则能兴奋子宫，煎剂或醇浸膏对在体子宫主要呈兴奋作用，使子宫呈慢而有节律的收缩，为治疗痛经的药理基础。当归流浸膏能降低心肌兴奋性，延长离体兔心房的不应期，对实验性房颤有防治效果，故可能有抗心律不齐作用。当归非挥发性成分有降压作用。当归能抗维生素E缺乏，并有抗恶性贫血作用。对实验性动脉粥样硬化大白鼠的主动脉病变有一定保护作用。煎剂在体外对痢疾、伤寒、变形等杆菌及肺炎球菌有抑制作用。

当药 ❶出《本草拾遗》。为酸模之别名。❷见《内蒙古中草药》。为獐牙菜之别名。各详该条。

吐丝子 见清·赵其光《本草求原》。即菟丝子，详该条。

吐血草 ❶见清·汪连仕《采药书》。为土大黄之别名。❷见苏州医学院等《中草药手册》。为景天三七之别名。各详该条。

吸吸草 见《浙江民间草药》。为野芝麻之别名，详该条。

吸铁石 出《乾坤生意秘韫》。为磁石之别名，详该条。

吸壁藤 见南京药学院《中草药学》。为络石藤之别名，详该条。

刚子 出《雷公炮炙论》。为巴豆之别名，详该条。

吊马桩 见《江西中医药》（10）：64，1957。为千斤拔之别名，详该条。

吊风根 见萧步丹《岭南采药录》。为榕须之别名，详该条。

吊瓜 ❶见《浙江中药手册》。为王瓜之别名。❷见《中医杂志》（12）：812，1958。为桃南瓜之别名。各详该条。

吊吊黄 见《江西草药》。为黄花远志之别名，详该条。

吊线风 见《湖南药物志》。为腹水草之别名，详该条。

吊钟花 见《南宁市药物志》。为扶桑花

之别名，详该条。

吊菜子 见《广州植物志》。为茄子之别名，详该条。

曲节草 ❶见《福建民间草药》。为节节花之别名。❷见萧步丹《岭南采药录》。为白马骨之别名。各详该条。

曲莲 见《昆明民间常用草药》。为罗锅底之别名，详该条。

曲蟮 见《小品方》。为蚯蚓之别名，详该条。

团鱼甲 见《河北药材》。即鳖甲，详该条。

回生草 见《福建民间草药》。为翠云草之别名，详该条。

回头膏 出《清异录》。为莎草之别名，详该条。

回头草 见《滇南本草》。为草血竭之别名，详该条。

回回蒜 出《救荒本草》。又名水胡椒、蝎虎草、鹅巴掌。为毛茛科植物回回蒜Ranunculus chinensis Bunse的全草。分布东北、华北、西南及陕西、甘肃、宁夏、江苏、湖北、广西等地。辛、苦，温。有毒。消炎，退肿，平喘，截疟，去翳，杀虫。①外敷穴位发泡，治急、慢性肝炎（敷肝区、中脘、足三里），肝硬化腹水（敷水分、关元、气海、中脘），哮喘（敷膻中），疟疾（发作前二小时敷寸口），风湿性关节痛（敷痛点及其附近穴位），胃痛（敷胃俞、肾俞）。敷后用纱布固定，待局部皮肤有灼热感时除去，起泡后以注射器抽去泡内黄水，外敷纱布，以防感染。②治角膜云翳，取鲜草少许塞鼻；牛皮癣，捣烂取汁外搽。本品有毒，一般不内服。全草含白头翁素及原白头翁素。原白头翁素用于局部有发疱引赤作用。0.2%水溶液局部应用于龋齿之蚀洞内即可镇痛。对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有较好的抑制作用。

回阳草 见《滇南本草》。为卷柏之别名，详该条。

虫白蜡 出明·汪机《本草会编》。又名虫蜡、树蜡、白蜡。为介壳虫科昆虫白蜡虫Ericerus pela(Chavannes)（雄虫）群栖于白蜡树、女贞等枝干上分泌的蜡质。主产四川、贵州、云南等地。甘，温。入肝经。止血，生肌，定痛。①治金疮出血，疮疡溃久不敛。配外科用药溶化调膏涂敷。②治尿血，配凉血滋肾药煎服；治肠红，配鲫鱼煮食。煎服：9～15克；或入丸、用。本品主含大分子量的酯类，其中醇类为廿六醇、廿七醇、廿八醇、卅醇，酸类为廿六酸、廿七酸、廿八酸、卅酸及少量棕榈酸、硬脂酸。

虫花 见《四川中药志》。即蝉花，详该条。

虫草 见《本草问答》。为冬虫夏草之简称，详该条。

虫胶 见《中药志》。为紫草茸之别名，详该条。

虫蜡 见《本草求真》。即虫白蜡，详该条。

网虫 见《现代实用中药》。为蜘蛛之别名，详该条。

网络鸡血藤 见《中国主要植物图说·豆科》。即昆明鸡血藤，详该条。

肉苁蓉 出《神农本草经》。又名地精、大芸、金笋、寸芸。为列当科植物肉苁蓉Cistanche deserticola Y.C.Ma的带鳞片的肉质茎。主产内蒙古。甘、咸，温。入肾、大肠经。补肾阳，益精血，润肠通便。治阳萎，早泄，遗精，不孕，遗尿，腰膝酸软，筋骨痿弱，血枯便秘。煎服：6～9克。本品含有微量生物碱及结晶性中性物质。水或醇浸剂对麻醉狗、猫、兔均有降低血压作用。

肉豆蔻 出《药性论》。又名肉果、玉果。为肉豆蔻科植物肉豆蔻Myristica fragrans Houtt.的种仁。主产马来西亚及印

度尼西亚、印度、巴西。辛，温，有小毒。入脾、胃、肾经。温中，行气，消宿食，固大肠。治脾胃虚寒，脘腹胀痛，食欲不振，霍乱中恶，呕吐，久泻，久痢。煎服：3～9克。肉豆蔻的假种皮名肉豆蔻衣，可作芳香健胃剂。种子含挥发油，主为右旋莰烯，α-蒎烯以及有毒物质肉豆蔻醚。还含多种双芳丙烷类化合物（Diarylpropanoid）。挥发油对肠胃道有局部刺激，而呈祛风效果。给猫服用过大剂量可引起半昏迷状态，并因肝损害在24小时内死亡。肉豆蔻醚对正常人有引起幻觉的作用。

肉皂角 见《药材学》。为肥皂荚之别名，详该条。

肉皂荚 见《中国主要植物图说·豆科》即肥皂荚，详该条。

肉枣 见《本草纲目》。为山茱萸之别名，详该条。

肉果 见《本草纲目》。为肉豆蔻之别名，详该条。

肉桂 出《新修本草》。又名牡桂、玉桂、官桂。为樟科植物肉桂 Cinnamomum cassia Presl的树皮，除去栓皮者名桂心。主产越南；我国广东、广西、福建、云南亦产。辛、甘，大热。入肾、脾、肝经。补肾阳，暖脾胃，除积冷，通脉，止痛。①治肾阳不足，阳萎，尿频，腰膝冷痛，低血压。②治脾阳不振，胃腹冷痛，食少溏泄。③治妇女冲任虚寒，痛经，闭经，癥瘕。④治阴疽色白，漫肿不溃或久溃不敛。内服：煎汤，1.5～4.5克，后下；研粉冲服，每次1～1.5克。有出血倾向者及孕妇忌服。肉桂树皮及枝叶蒸馏所得的芳香油称肉桂油，内服可健胃祛风，外用治风湿及皮肤瘙痒。皮含挥发油，主成分为桂皮醛，并含少量苯甲醛、乙酸桂皮酯、乙酸苯丙酯等。桂皮醛能阻止小鼠的应激性胃溃疡的形成，还有利疸、解痉、镇静，解热作用，桂皮油对胃肠有缓和的刺激作用，增强消化机能，排除消化道内积气，缓解胃肠痉挛性疼痛，并有抗菌及抑制某些致病性真菌作用。

肉桂子 见清·赵楷《百草镜》。为桂丁之别名，详桂丁条。

肉馄饨草 出《眼科要览》。为马蹄金之别名，详该条。

肉矮陀陀 见《贵州民间药物》。为水苋菜之别名，详该条。

肉螃蟹 见《四川常用中草药》。为见血清之别名，详该条。

〔丿〕

竹二膏 见《中国药学大辞典》。即竹茹，详该条。

竹三七 见《安徽中草药》。即竹节三七，详该条。

竹木 出《雷公炮炙论》。为草蔺之别名，详该条。

竹节七 ❶见《中药形性经验鉴别法》。即竹节三七。❷见《陕西中草药》。即竹根七。各详该条。

竹节三七 出清·赵楷《百草镜》。又名竹三七、野田七、竹节七、白三七。为五加科植物竹节参 Panax japonicus C.A.Mey.呈竹鞭状的根茎。主产云南。甘、苦，温。入肝、脾经。补益气血，化痰止咳，散瘀止血。①治病后脾胃虚弱，食欲不振，倦怠乏力；肺结核咯血，咳痰不爽；胃出血，鼻衄，功能性子宫出血，倒经，产后腹痛，跌打损伤。内服：煎汤，3～9克；研末服，1.5～3克。②治外伤出血。研粉撒。孕妇忌服。竹节参的肉质直根称峨三七，又名芋儿七。功用与竹节三七基本相同。根茎含与人参皂甙类似的多种竹节皂甙，（Chikusetsusaponin）。还含挥发油，其中主成分为大牻牛儿烯D以及痕迹量的β-檀香萜烯、β-金合欢烯。大鼠口服本品煎剂，对多种实验性“关节炎”均有明显的抑制作用，并抑制炎性肉芽肿的形成，切除肾上腺后，仍有

效。能抑制非特异性刺激（游泳）引起的肾上腺内维生素C含量的降低。对肝糖原的积累有明显促进作用。

竹节白附 见《中药材品种论述》。为关白附之别名，详该条。

竹叶地丁 见《浙江中药手册》。为瓜子金之别名，详该条。

竹节参 见《本经逢源》。为人参芦之别名，详该条。

竹节草 ❶见《江苏省植物药材志》。为萹蓄之别名。❷见《山东中药》。为瞿麦之别名。各详该条。

竹节香附 见《中药志》。又名两头尖、草乌喙。为毛茛科植物多被银莲花 Anemone raddeana Reg.的根茎。主产吉林、山东；辽宁、黑龙江等地亦产。辛，热，有毒。祛风湿，消痈肿。治风寒湿痹，腰腿疼痛，四肢拘挛，痈肿。煎服：1.5～3克。外用：研末撒膏药上敷贴。

竹节藤 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为买麻藤之别名，详该条。

竹叶 出《名医别录》。为禾本科植物淡竹Phyllostachys nigra（Lodd.）Munro var.henonis（Mitf.）Stapf ex Rendle等的叶。甘、淡，寒。入心、胃经。清热除烦，凉心止惊。治热病烦渴，口舌生疮，小儿惊痫，热淋、茎中涩痛。煎服：6～9克。竹之初生嫩叶卷而未放者，名竹卷心，又名竹心、竹针，具有清心除烦，消暑止渴功效，多用于暑热烦渴及温病神昏谵语等证。

竹叶青 见《中国药用植物志》。为吉祥草之别名，详该条。

竹叶菜 见《本草纲目》。为鸭跖草之别名，详该条。

竹叶椒 出《本草图经》。又名山花椒、野花椒、岩椒、土花椒。为芸香科植物竹叶椒Zanthoxylum planispinum Sieb.et Zucc.的果实。分布我国东南至西南部，北至秦岭。辛，温，有小毒。温中散寒，驱蛔，止痛。治胃寒疼痛，痧症及蛔虫腹痛，牙痛。内服：煎汤，6～9克；研末，0.9～1.5克。孕妇慎服。本品含挥发油。

竹叶椒根 见《贵州民间药物》。又名散血飞、见血飞。为芸香科植物竹叶椒 Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.的根。辛，温，有小毒。祛风除湿，温中散寒，活血止痛。①治感冒头痛、咳嗽，风湿痹痛，腰肌劳损，胃寒疼痛，痧症腹痛。煎服：15～30克。②治龋齿痛，根皮研末放入蛀牙孔内，或煎水频频含漱；顽癣，跌打损伤，根或根皮浸酒擦；创伤出血，根皮研粉撒。孕妇慎服。本品含木兰花碱、竹叶椒碱（Xanthoplanine），茵芋碱、白鲜碱及崖椒碱等生物碱。木兰花碱能降低血压。茵芋碱有麻黄碱样作用：升高血压，加强猫及兔的在位子宫的收缩，抑制小肠收缩及扩张冠脉等；还能提高横纹肌张力，加强脊髓反射的兴奋性。白鲜碱小量对离体蛙心有兴奋作用，对动物血管和子宫也有明显收缩作用。

竹汁 出《神农本草经》。即竹沥，详该条。

竹皮 出《金匮要略》。即竹茹，详该条。

竹丝鸡 见《陆川本草》。为乌骨鸡之别名，详该条。

竹沥 出《本草经集注》。又名竹汁、竹油、淡竹沥。为禾本科植物淡竹 Phyllostachys nigra（Lodd.）Munro var. henonis（Mitf.）Stapf ex Rendle等的茎用火烤灼而流出的液汁。甘，寒。入心、肝、肺经。清热，豁痰，镇惊。治中风昏迷，痰涎壅塞；肺热多痰，咳喘胸闷；热病神昏惊厥；妊娠子烦，小儿惊痫。冲服：20～60毫升。

竹苓 见《本草纲目》。为雷丸之别名，详该条。

竹林标 见《云南中草药》。为莲生桂子花之别名，详该条。

竹林胃 见《四川中药志》。又名百尾笋、石竹根、宝铎草。为百合科植物长蕊万寿竹、Disporum bodinieri (Lévl. et Vant.)Wang et Tang或万寿竹D. sessile (Thunb.)D.Don var.flavens(Kitag.) Y.C.Tang的根。前者分布陕西、湖北、四川、贵州、云南等地。后者分布辽宁、河北、陕西、江西、河南、湖南、四川及华东地区。甘、淡，平。润肺，化痰止咳，健脾消食，舒筋活血。①治劳伤气血虚损，咳血，耳鸣，食欲不振，胸腹胀及小儿食积，筋骨疼痛，腰腿痛。煎服：15～30克。②治烧烫伤，熬膏涂；骨折，加酒捣烂敷。本品提取物，经动物试验证明有强心作用。

竹油 见《中国药学大辞典》。即竹沥，详该条。

竹茹 出《本草经集注》。又名竹皮、竹二青、淡竹茹。为禾本科植物淡竹 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendle 或青秆竹 Bambusa breviflora Munro 等的茎秆除去外皮后刮下的中间层。我国大部分地区均产。甘，凉。入肺、胃、胆经。清热，化痰，除烦，止呕。治胃热呕吐、呃逆，虚烦不寐，妊娠恶阻，肺热咳嗽，咯痰黄稠，小儿热痫；亦治吐血，衄血，崩漏。煎服：4.5～9克。

竹根七 ❶见《陕西中草药》。又名竹节七、竹根参、牛尾七。为百合科植物开口箭 Tupistra chinensis Bak. 的根茎。分布我国中南、西南地区及陕西等地。甘、微苦，寒，有毒。滋阴降火，活血调经。①治劳热咳嗽，白喉，月经不调。内服：煎汤，1.5～3克；研末冲服，0.6～1克。②治风湿痹痛，痈疖肿毒，跌打损伤。煎服并捣敷。孕妇忌服。内服过量，可致中毒，出现头痛、眩晕、恶心、呕吐等症。服药时忌食醋及酸味食物。本品含强心甙为万年青甙。❷见《陕西药用植物调查》。为万年青之别名，详该条。

竹根参 见《陕西中草药》。即竹根七，详该条。

竹铃芝 见《中药志》。为雷丸之别名，详该条。

竹黄 见《本草纲目》。即天竺黄，详该条。

竹筒菜 见《中国药用海洋生物》。为龙须菜之别名，详该条。

竹篙草 见《岭南科学杂志》。为笔仔草之别名，详该条。

朱红 见《中国树木分类学》。为杨梅之别名，详该条。

朱赤豆 见《中药材手册》。为赤小豆之别名，详该条。

朱果 出《事类合璧》。为柿子之别名，详该条。

朱姑 见《本草纲目》。为山慈姑之别名，详该条。

朱砂 出《本草经集注》。又名丹砂、辰砂。为天然的辰砂矿石。主产贵州、湖南、四川、广西、云南等地。甘，微寒，有小毒。入心经。安神定惊，解毒。①治癫痫，惊风，心悸，失眠多梦，眩晕。内服：研末水飞，0.3～0.9克；或拌他药同煎。②治疮疡肿毒，疥疮，咽喉肿痛。水飞与他药配伍外用。③研极细粉末点两目内眥，治急性腰肌扭伤。内服不宜过量和久服，以防汞中毒。不可火煅，见火则析出水银，有剧毒。本品主成分为硫化汞。

朱砂七 见《陕西中草药》。为红药子之别名，详该条。

朱砂草 见《贵阳民间草药》。为血盆草之别名，详该条。

朱砂根 出《本草纲目》。又名大罗伞、开喉箭、凤凰肠、珍珠伞、凉伞遮珍珠。为紫金牛科植物朱砂根Ardisia crenata Sims或红凉伞A. bicolor walker的根。前者分布长江流域及福建、台湾、广东、广西、

云南等地；后者分布福建、江西、湖北、湖南、广西、贵州、四川、云南等地。苦、辛，凉。清热解毒，祛风除湿，散瘀止痛。①治上呼吸道感染，咽喉肿痛，扁桃体炎，白喉，支气管炎，丹毒，淋巴结炎。风湿骨痛，腰腿痛，跌打损伤，胃痛，痛经。煎服：3～9克。②治毒蛇咬伤，内服并捣敷伤口周围。朱砂根含微量酸金牛醌（Rapanone）。

朱砂莲 ❶见《全国中草药汇编》。又名背蛇生。为马兜铃科植物朱砂莲 Aristolochia cinnabaria C.Y. Cheng 的根茎。分布四川、云南等地。苦、辛，寒。有小毒。清热解毒，消肿止痛。①治肠炎，痢疾，胃、十二指肠溃疡，咽喉肿痛。内服：0.6～1.5克，研粉或磨汁服。②治蛇咬伤，痈疖肿毒，外伤出血。研粉或磨汁搽敷。❷见《贵州民间方药集》。为薯莨之别名，详该条。

丢了棒 ❶出《生草药性备要》。又名追风棍、赶风柴。为大戟科植物白桐树claoxylon polot（Burm.f.）Merr. 的带叶嫩枝或根。分布广东、广西、云南等地。苦、辛，平，有小毒。消炎止痛，祛风除湿，活血散瘀。治咽喉肿痛，风湿性关节炎，腰腿痛，外伤瘀痛，脚气水肿。煎服：3～9克。叶捣敷或研末敷，治烧烫伤，外伤出血。孕妇忌服。❷见《广西药用植物名录》。为秋枫木之别名，详该条。

伏龙肝 出《雷公炮炙论》。又名灶中黄土、灶心土。为土灶内久经柴草熏烧的焦土块。辛，微温。入脾、胃经。温中燥湿，止呕止血。①治妊娠恶阻，反胃呕吐，腹痛腹泻。②治呕血，便血，崩漏，带下。煎服：30～60克，布包煎。或煎汤代水煎药。③研末油调敷痈肿溃疡。本品主由硅酸、氧化铝、氧化铁所组成，尚含钠、钾、镁、钙等。

伏地菜 见《全国中草药汇编》。即附地菜，详该条。

伏地延胡索 见《草药手册》。为夏天无之别名，详该条。

伏花 见《上海常用中草药》。为旋复花之别名，详该条。

伤寒草 见萧步丹《岭南采药录》。又名夜牵牛、寄色草、消山虎。为菊科植物夜香牛 Vernonia cinerea (L.)Less. 的全草。分布福建、台湾、广西、广东、江西、湖南、云南、四川。苦，凉。清热，除湿，解毒、安神。①治感冒发热，咳嗽，急性黄疸型肝炎，腹泻，痢疾，神经衰弱，小儿夜尿。煎服：15～30克。②捣敷疔疮肿毒，乳腺炎，毒蛇咬伤。本品预试含黄酮甙、酚类、氨基酸。种子可作驱虫剂；叶有弱的抗菌作用。

仰天钟 见《广西中草药》。为天香炉之别名，详该条。

伊贝母 见《新疆中草药手册》。为百合科植物新疆贝母 Fritillaria walujewii Regel或伊犁贝母F. pallidiflora Schrenk 的鳞茎。产新疆。苦、甘，微寒。止咳化痰，清肺散结。治肺热咳嗽，胸闷痰粘，淋巴结结核，痈肿。煎服：3～9克。反乌头、附子。伊犁贝母的鳞茎含西贝母碱，对动物有降低血压作用，对离体动物肠管有解痉作用。

华山矾 见《广西中药志》。又名华灰木、狗屎木、毛柴子、地黄木。为山矾科植物华山矾 Symplocos chinensis（Lour.）Druce 的枝叶。分布长江流域以南各地。苦，凉。清热利湿，止血生肌。①治痢疾，泄泻。鲜品捣汁服：15～30克。②捣敷创伤出血，疮疡；研末调敷治烫伤。

华山矾根 见《南宁市药物志》。又名土常山。为山矾科植物华山矾 Symplocos chinensis（Lour.）Druce 的根。苦，凉，有小毒。清热利湿，截疟，解毒。①治感冒发热，痢疾，肠炎，急性肾炎，疟疾，筋骨疼痛，热毒疮肿。煎服：6～12克。②治疥疮。煎服或煎水洗。服本品过量，会出现恶心、呕吐、头晕、胸闷等症状。

华山参 见《陕西中草药》。又名热参。

为茄科植物华山参 Physochlaina infundibularis Kuang 的根。分布陕西、山西、河南等地。甘、微苦，热。有毒。平喘，温中，安神。治慢性支气管炎，虚寒腹泻，心悸失眠。煎服：0.1～0.2克。不宜多服、久服，过量易致中毒，可出现口渴、咽喉灼热、瞳孔散大、烦躁等中毒症状。不宜与黑豆、卤水、同用。忌铁器。青光眼患者忌服。孕妇慎用。本品含天仙子碱（东莨菪碱）、天仙子胺（莨菪碱）、山莨菪碱、阿托品等生物碱和东莨菪素等。煎剂对狗及小鼠有明显的镇静作用；豚鼠口服有明显的平喘作用。天仙子碱药理作用见天仙子条。

华灰木 见《广西中兽医药用植物》。为华山矾之别名，详该条。

华良姜 见《中国经济植物志》。为廉姜之别名，详该条。

华荠苧 见《江苏南部种子植物手册》。为石香薷之别名，详该条。

华南地丁 见《中药志》，为龙胆地丁之别名，详该条。

延胡 出《雷公炮炙论》。为延胡索之简称，详该条。

延胡索 出《本草拾遗》。又名元胡、延胡、元胡索、玄胡索。为罂粟科植物延胡索 Corydalis turtschaninovii Bess. f. yanhusuo Y.H. Chou et C. C. Hsü 等的块茎。主产浙江、江苏。苦、微辛，温。入肝、胃经。活血，利气，止痛。治胃痛，胁痛，胸腹痛，暴腰痛，疝痛，痛经，产后血瘀腹痛，瘾瘕，跌打损伤。内服：煎汤，3～9克；研末服，0.9～1.5克。醋制后用，可增强止痛效果。孕妇忌服。本品含延胡索甲素、乙素、丑素、黄连碱和去氢延胡索甲素等多种生物碱。延胡索甲素、乙素、丑素对小鼠、大鼠、兔均有镇痛作用，以乙素作用较好，镇痛作用虽不及吗啡，但无明显成瘾性，可产生耐受性并与吗啡有交叉耐受性。不同剂量的乙素对各种动物有催眠、镇静，安定作用。并有明显的中枢性止吐及降温作用。去氢延胡索甲素对大鼠实验性溃疡病有保护作用和抑制内脏平滑肌的作用。延胡索对小鼠能增强耐缺氧的能力，对兔、猫有一定的扩张冠状血管的作用。

自扣草 出《生草药性备要》。又名自灸草、野芹菜、小回回蒜。为毛茛科植物禺毛茛Ranunculus cantoniensis DC.的全草。分布长江中、下游及其以南各地。苦、辛，温，有毒。退黄，截疟，消翳。治黄疸，疟疾，结合膜炎，目翳。鲜品捣烂，隔姜置手腕脉门处，纱布包扎，至皮肤灼热起泡时除去，用消毒针挑破水泡，防止感染。治疟疾需在未发作前二小时使用。不可内服及点目。本品含原白头翁素。预试尚含黄酮类、酚类、氨基酸、有机酸。煎剂及原白头翁素对金黄色葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌和白色念珠菌等均有抑制作用。本品有刺激性，高浓度接触过久，使皮肤发泡，粘膜充血。

自灸草 见《广东中草药》。为自扣草之别名，详该条。

自消容 出《生草药性备要》。又名通心草。为豆科植物大猪屎豆Crotalaria assamica Benth.的叶。分布台湾、广东、广西、贵州、云南。淡，微凉。清热解毒，凉血，利尿。①治热咳，吐血，水肿，牙痛。煎服或与瘦猪肉炖服：15～30克。②煎水洗或研末调敷，治小儿头疮；捣烂蜂蜜调敷，治马口疮。孕妇忌服。大猪屎豆的根名马铃根，用鲜品30～60克炖瘦猪肉服治高血压病。全草含野百合碱。野百合碱对小鼠肉瘤S-180、S-37及淋巴肉瘤Ⅰ号腹水型的生长有显著抑制作用；对小鼠移植性肿瘤细胞具有较明显的破坏作用；对瘤细胞的有丝核分裂或增殖发育有较明显的抑制，主要在于破坏细胞的蛋白合成和代谢，从而促进其退行性变。有明显的迟发肝脏损害，干扰肝细胞分裂，全身应用对肝的毒性很大。

自然铜 出《雷公炮炙论》。为天然黄铁矿的矿石。主产辽宁、河北、湖南、广东、四川等地。辛，平。入肝经。散瘀止痛，续筋接骨。①治跌打损伤，筋伤骨折，血瘀疼痛。煎服：3～9克。②治疮疡，烫伤。研末调涂或干敷。本品含二硫化铁，还含铜、镍、砷、锑等杂质。

血三七 见《全国中草药汇编》。为土大黄之别名，详该条。

血木通 见《中药志》。为红藤之别名，详该条。

血见愁 ❶见《生草药性备要》。为山藿香之别名。❷见《东北药用植物志》。为大叶藜之别名。❸出《本草纲目》。为地锦草之别名。❹出《土宿本草》。为茜草之别名。❺见《安徽药材》。为铁苋之别名。各详该条。

血风藤 ❶见《广西中草药》。又名青筋藤、铁牛入石、红蛇根。为鼠李科植物翼核果 Ventilago leiocarpa Benth. 的根及茎。分布广西、广东、福建、台湾。甘、淡，微温。养血祛风，舒筋活络。治贫血头晕，月经不调，风湿筋骨疼痛，四肢麻木，腰肌劳损，跌打损伤。煎服：15～30克。根含生物碱、黄酮甙、酚类、氨基酸、蒽醌。❷见《中药志》。为鸡血藤之别名，详该条。

血师 出《名医别录》。为代赭石之别名，详该条。

血当归 ❶见《云南中草药》。为花蝴蝶根之别名。❷见《贵州民间方药集》。为菊三七之别名。各详该条。

血余炭 出《本草蒙筌》。为人的头发煅成的炭。苦，温。入肝、肾经。止血，散瘀，利尿。治咯血，吐血，鼻衄，齿龈出血，尿血，便血，崩漏，小便不通。内服：煎汤，4.5～9克；研末服，每次0.9～1.5克。本品主含碳素及灰分，内含钙、钠、钾、锌、铜、铁、锰等。

血参根 见《山东中药》。为丹参之别名。详该条。

血珀 见《大明一统志》。为琥珀之处方名，详该条。

血草 见福建省晋江专区民卫组《中草药手册》。为费菜之别名，详该条。

血盆草 见《贵阳民间药草》。又名朱砂草、反背红、叶下红、铺地虎。为唇形科植物血盆草 Salvia cavaleriei Lévl. 或单叶血盆草S. cavaleriei Lévl. var. simplicifolia Stib. 的全草。前者分布四川、贵州及湖北、广东、广西等地。后者分布云南、四川、贵州、广西、广东、福建、湖北、湖南、江西。微苦，凉。凉血，止血，散瘀，解毒。①治吐血，咯血，衄血，血痢，血崩。煎服：9～15克。②治跌打损伤，外伤出血，疖肿。捣烂外敷。

血蒌 见《全国中草药汇编》。为通城虎之别名，详该条。

血竭 出《雷公炮炙论》。又名麒麟血。为棕榈科植物麒麟竭 Daemonorops draco Blume 果实中渗出的树脂；或为龙舌兰科植物柬埔寨龙血树 Dracaena cambodiana Pierre 木质中提取的树脂。前者主产马来西亚、印度尼西亚、伊朗等地；后者主要分布越南、柬埔寨，我国云南南部也有分布。甘、咸，平。入心、肝经。行瘀，止痛，止血，敛疮生肌。①治跌打损伤，瘀滞作痛，刀伤出血。研末服：0.9～1.5克；或外敷。②治疮疡溃久不合，研末撒敷；瘰疬已破浓水不止，痔漏痛不可忍，研末调敷。本品含血竭红素（Dracorubin）、血竭素（Dracorhodin）、去甲血竭红素及去甲血竭素等。水浸剂对多种致病皮肤真菌有抑制作用。

血满草 见《云南中草药》。又名大血草、接骨药、红山花、苛草。为忍冬科植物血满草Sambucus adnata Wall. 的全株或根。分布甘肃、四川、云南、西藏等地。辛、甘，微温。活血，散瘀，祛风，利尿。①治风湿痹痛，扭伤瘀肿，风疹瘙痒，急、慢性

肾炎，水肿。煎服：9～15克。②治跌打损伤、骨折。全草或鲜根皮捣敷。

血箭草 见《湖南药物志》。为地榆之别名，详该条。

血藤 ❶见《四川中药志》。又名小血藤、活血藤、黄皮血藤、气藤。为木兰科植物翼梗五味子 Schisandra henryi clarke 或华中五味子 S. sphenanthera Rehd. et wils. 等的藤茎。前者分布长江以南各地；后者分布山西、陕西、甘肃及华中、西南地区。辛、酸、苦，温。活血行瘀，理气化湿。治跌打损伤，痨伤吐血，心胃气痛，筋骨肢节酸痛，脚气，痿躄，月经不调。煎服：15～30克。孕妇忌服。翼梗五味子含五味子酚（Schisanhenol）。华中五味子茎的醇提物对实验性肝损害的小鼠有一定的降低血清转氨酶的作用。❷出《本草图经》。为红藤之别名，详该条。❸见《浙江民间常用草药》。为昆明鸡血藤之别名，详该条。

向天草 出《庚辛玉册》。为瓦松之别名，详该条。

向天盏 见《福建中草药》。又名韩信草、耳挖草、金茶匙、大力草、大叶半枝莲、顺经草、调羹草。为唇形科植物向天盏 Scutellaria indica L. 的全草。分布我国中部、东南部至西南各地。辛、微苦，平。清热解毒、活血散瘀。①治咽喉肿痛，肺脓疡，痢疾，肠炎，白浊，白带，吐血，咯血。煎服：15～30克。②捣敷治跌扑损伤，胸胁闷痛，疔疮痈肿，蛇咬伤，外伤出血。孕妇慎服。本品含黄芩素等黄酮类、酚性成分、氨基酸、有机酸。

向天葫芦 见《广西中兽医药用植物》。为朝天罐之别名，详该条。

向日葵子 出清·汪连仕《采药书》。为菊科植物向日葵 Helianthus annuus L. 的种子。我国各地均有栽培。甘、淡，平。滋阴，止痢，透疹。治食欲不振，虚弱头风，血痢，麻疹不透。煎服：15～30克。本品含油达50%，其中亚油酸含量可达70%，尚有肌醇、磷脂及多种甾醇。此外还含绿原酸、新绿原酸、异绿原酸、奎宁酸、咖啡酸等有机酸及3,4-苯骈芘等。饲料中加入向日葵油，可增强兔的免疫反应，干燥全草煎剂蒸干后的粉末作成油膏，局部应用可加速损伤的痊愈。

向日葵花托 见《浙江中药资源名录》。又名葵花盘、向日葵花盘、向日葵饼。为菊科植物向日葵 Helianthus annuus L. 的花托。微苦、辛，平。平肝降压，祛风止痛，止咳平喘。①治头痛眩晕，目昏视物不清，胃痛，腹痛，痛经，哮喘，乳腺炎。内服：煎汤，30～60克；炒焦研末：每次9～15克，糖开水冲服，每日三次。②治关节炎，无名肿毒。煎膏外敷。本品含向日葵酸（Solanthic acid），多量木质素，蛋白质，果胶和少量甙类，类脂（内有甾醇）等。

向日葵花盘 见《福建民间草药》。即向日葵花托，详该条。

向日葵茎髓 见《江苏药材志》。又名向日葵梗心、葵花茎髓。为菊科植物向日葵 Helianthus annuus L. 的茎髓。甘、淡，平。利尿通淋，止咳平喘。①治小便不利，血淋，尿路结石，乳糜尿，浮肿，白带，咳嗽痰喘，百日咳。煎服：15～30克。②治荨麻疹，风疹。煎水洗浴。茎含多糖约53%，还含绿原酸，新绿原酸，4-咖啡酰基奎宁酸，栲利烯酸（Kaurenoic acid），环栲利酸（Cyclokauranoic acid，Trachylabanoic acid），东莨菪甙，苹果酸及其钾盐和钙盐，氯化钾，硝酸钾等。

向日葵饼 见《湖北科技》(8)：60，1972。为向日葵花托之别名，详该条。

向日葵根 见萧步丹《岭南采药录》。又名葵花根、向阳花根、朝阳花根。为菊科植物向日葵 Helianthus annuus L. 的根。甘、淡，平。行气，利尿，润肠，祛瘀。治胸胁胃脘疼痛，疝气，淋病，便秘，跌打损

伤。煎服：15～30克。本品含绿原酸及微量的东莨菪甙（Scopolin）。

向日葵梗心 见苏州医学院等《中草药手册》。即向日葵茎髓，详该条。

向阳花根 见《四川常用中草药》。为向日葵根之别名，详该条。

全叶青兰 见《陕甘宁青中草药选》。为唇形科植物全叶青兰 Dracocephalum integrifolium Bge. 的全草。分布新疆、甘肃等地。辛，平。祛痰，止咳，平喘。治咳嗽，支气管炎，支气管哮喘。煎服：9～15克。地上部分含挥发油，木犀草素-7-葡萄糖甙、木犀草素-7-葡萄糖醛酸甙，内酯，皂甙，酸性树脂等。醇提取物对豚鼠有平喘作用。对小鼠有止咳、祛痰作用。

全瓜蒌 见《中国药学大辞典》。为栝楼之处方名，详该条。

全虫 见《中药形性经验鉴别法》。即全蝎，详该条。

全福花 见《中国药学大辞典》。为旋复花之处方名，详该条。

全蝎 出《蜀重广英公本草》。又名全虫、蝎子。为钳蝎科动物问荆蝎 Buthus martensii Karsch 的干燥全体。主产河南、山东、河北、辽宁等地。咸、辛，平，有毒。入肝经。熄风，镇痉，通络，解毒。①治惊风，癫痫，抽搐痉挛，中风半身不遂、口眼㖞斜、语言蹇涩，破伤风，偏正头痛，风湿痹痛，淋巴结结核。内服：煎汤，2.4～4.5克；研末，0.6～0.9克。②治疮疡肿毒，研末调敷。孕妇忌服。本品含蝎毒、三甲胺、甜菜碱、牛黄酸、卵磷脂及胆甾醇等。动物实验证明全蝎有抗惊厥作用，也可使清醒动物产生镇静。全蝎浸剂及煎剂可显著而持久地降低犬、兔的血压。蝎毒可使呼吸麻痹。

合子 出《本草拾遗》。为榼藤子之别名，详该条。

合子草 出《本草拾遗》。又名盒儿藤、无白草、汤罐头草。为葫芦科植物盒子草 Actinostemma lobatum（Maxim.）Maxim. 的全草。我国大部分地区均有分布。淡，凉，有小毒。利尿消肿，清热解毒。①治肾炎水肿，腹水肿胀，小儿疳积。煎服：15～30克。②捣敷治蛇咬伤，疮疡肿毒；煎水洗治湿疹。

合包花 见清·刘士季《草木便方》。即荷包花，详该条。

合欢皮 出《本草拾遗》。又名合昏皮、夜合皮。为豆科植物合欢 Albizzia julibrissin Durazz. 的树皮。主产湖北、四川、江苏、浙江、安徽。甘，平。入心、肝经。宁心，解郁，和血，消痈，止痛。①治心神不安，失眠，肺痈咳吐脓血，瘰疬，折伤疼痛。煎服：4.5～9克。②治痈疖疮肿，煎服或研末外敷。本品含5-羟色胺、去甲肾上腺素以及鞣质、皂甙等。

合欢花 出《本草衍义》。又名夜合花。为豆科植物合欢 Albizzia julibrissin Durazz. 的花或花蕾。主产四川、湖北、浙江、江苏、安徽。甘、苦，平。理气解郁，养心安神，和络止痛。治肝气郁结，胸闷，胁痛，心胃气痛，健忘，失眠，跌打损伤疼痛。煎服：4.5～9克。

合明草 出《本草拾遗》。为合萌之别名，详该条。

合昏皮 出《备急千金要方》。为合欢皮之别名，详该条。

合萌 见《中国药用植物志》。又名合明草、水皂角、野含羞草、禾镰草、拉田草。为豆科植物田皂角 Aeschynomene indica L. 的全草。分布东北、华中、华东、华南、西南各地。苦、涩，凉。清热利湿，祛风明目，消肿解毒。①治黄疸，淋病，小便不利，肠炎，痢疾，结膜炎，夜盲症。煎服：15～30克。②治痈疖肿毒，煎服并外敷；荨麻疹，煎服并外洗；外伤出血，鲜品捣烂敷。全草含少量皂甙。预试果实含生物碱、皂甙、鞣质。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有

抑制作用。

合掌草 见《湖南药物志》。为合掌消之别名，详该条。

合掌消 出《植物名实图考》。又名土胆草、合掌草、硬皮草、拱地龙。为萝藦科植物合掌消 Cynanchum amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl. 的根或全草。分布东北及河北、新疆、山东、江苏、江西、湖南等地。苦、辛，平。祛风，活血，消肿，解毒。①治风湿痹痛，腰痛，偏头痛，跌打损伤，乳痈，睾丸肿痛，月经不调，肝炎，急性肠胃炎。煎服：15～30克。②治痈疖肿毒，湿疹，研末调敷。

杀虫芥 见《广东中药》。为土荆芥之别名，详该条。

多须公 见《生草药性备要》。为广东土牛膝之别名，详该条。

争墙风 见《常用中草药配方》。为紫葳茎叶之别名，详该条。

〔丶〕

刘芙蓉草 见《全国中草药汇编》。为蓬子菜之别名，详该条。

刘寄奴 ❶出《新修本草》。又名六月霜、化食丹、南刘寄奴。为菊科植物奇蒿 Artemisia anomalas S.Moore的全草。主产浙江、江苏、江西等地。苦、辛，温。入心、肝、脾经。活血通经，消食除胀，止痛。①治经闭腹痛，产后瘀阻，跌打损伤，食积腹胀，肠炎，痢疾。煎服：9～15克。②治乳腺炎，鲜品捣敷；创伤出血，研末撒；烧烫伤，研末油调敷。本品含挥发油，并显黄酮甙反应。❷见《广西药用植物名录》。为鸭脚艾之别名，详该条。

齐头蒿 出《新修本草》。为牡蒿之别名，详该条。

闭门草 见《福建民间草药》。为夜关门之别名，详该条。

问荆 出《本草拾遗》。又名节节草、笔头菜、接续草。为木贼科植物问荆 Equisetum arvense L. 的全草。我国大部分地区有分布。苦，凉。利尿，止血，止咳。治尿路感染，小便涩痛，水肿，吐血，衄血，肠出血，痔血，月经过多，慢性气管炎。煎服：6～9克。本品含问荆皂甙(Equisetonin)和其他溶血物质，木贼甙、异槲皮甙等黄酮甙，菸碱、犬问荆碱(Palustrine)等生物碱以及β-谷甾醇、多种氨基酸等。新鲜全草的醇溶性成分有轻度利尿作用。

灯心 见《圣济总录》。即灯心草，详该条。

灯心草 出《开宝重定本草》。又名灯心、灯草、龙须草。为灯心草科植物灯心草 Juncuseffusus L. 的茎髓。我国各地均有分布；主产江苏及西南地区。甘、淡，微寒。入心、小肠经。清心，利尿。①治心烦不寐，小儿惊热，夜啼，口舌生疮，黄疸，水肿，尿路感染，小便不利。煎服：1.5～2.5克。②治急喉痹，烧存性，研末吹喉。灯心草根：煎服治湿热黄疸，乳痈初起。茎髓含一种三肽(谷-缬-谷肽)，阿拉伯聚糖，木聚糖，甲基戊聚糖，芹菜素，木犀草素-7-葡萄糖甙等。

灯台树 见《云南中草药选》。又名象皮木、糖胶树、面条树、鸭脚木。为夹竹桃科植物灯台树 Alstonia scholaris(L.)R. Br. 的叶或树皮。分布广东、广西、云南等地。苦，寒，有毒。清热解毒，化痰止咳，止痛，止血。①治感冒发热，肺炎，百日咳，慢性支气管炎，扁桃体炎，疟疾，急性传染性肝炎，胃痛，腹泻，风湿痹痛。煎服：6～9克。②治跌打肿痛，痈疮红肿，鲜叶捣敷；外伤出血，溃疡久不收口，研末撒。本品含狄他树皮碱、狄他树皮定碱(Echitamidine)、鸭脚树叶碱、鸭脚树叶醛碱(Picralinal)、阿枯米定碱(Akuammidine)、伪阿枯米精碱(Pseudoakuammigine)、纳锐灵碱(Nareline)等生物碱，以及白桦脂

醇、熊果酸、α-香树脂醇、蛇麻脂醇、β-谷甾醇等。浸膏水溶液对兔有祛痰作用，对猫有止咳作用，对豚鼠有轻度平喘作用。对肠平滑肌有解痉作用。对人工发热兔有解热作用。狄他树皮碱有箭毒样横纹肌松弛作用。茎皮粗提物有降压和抗癌作用。

灯草 见《珍珠囊》。即灯心草，详该条。

灯盏花 ❶见《湖南药物志》。为木槿花之别名。❷见《云南中草药》。为灯盏细辛之别名。各详该条。

灯盏细辛 见《云南中草药》。又名地顶草、地朝阳、灯盏花。为菊科植物短葶飞蓬 Erigeron breviscapus (Vant.)Hand.-Mazz.的全草。分布西南地区及湖南、广西。辛、微苦，温。散寒解表，活络止痛，消积。①治感冒头痛、鼻塞，风湿痹痛，瘫痪，胃痛，小儿疳积，蛔虫病，跌打损伤。煎服：9～15克。②捣敷治疔疮、骨髓炎、牙痛。本品含焦迈康酸(Pyromeconic acid)、灯盏细辛甙(Erigeroside)。灯盏细辛甙对狗具有扩张周围血管的作用。

灯笼果 见《铁岭县志》。为挂金灯之别名，详该条。

灯笼草 ❶见《云南中草药》。为五爪金龙之别名。❷见《江西民间草药》。为苦蘋之别名。❸出《新修本草》。为酸浆之别名。各详该条。

决明子 出《神农本草经》。又名草决明、马蹄决明、假绿豆。为豆科植物决明 Cassia obtusifolia L. 或小决明 C. tora L. 的种子。主产安徽、江苏、浙江、广西、广东、四川。苦，凉。入肝、肾经。清肝明目，润肠通便。治目赤肿痛，羞明多泪，青盲内障，角膜溃疡，高血压病头痛眩晕，肝炎，习惯性便秘。煎服：9～15克。新鲜种子含蒽醌化合物：大黄酚、大黄素-6-甲醚、美决明子素(Obtusifolin)、决明素(Obtusin)、金黄决明素(Aurantio-obtusin)、橙黄决明素(Chrysoobtusin)及大黄酚-9-蒽酮等，还含胡萝卜素。水浸剂和乙醇浸剂对麻醉狗、猫、兔、大鼠均有降压作用，大剂量可致泻。醇提取物在体外对葡萄球菌、白喉及伤寒杆菌等有抑制作用。水浸剂对某些皮肤真菌如红色毛癣菌、须癣毛菌等亦有一定的抑制作用。

冰片 出《本草纲目》。又名梅片、梅花冰片。有机制冰片和艾片两种，机制冰片用松节油等人工合成，主产北京、上海、广州等地，艾片系用大风艾鲜叶蒸馏制成，主产广东、广西等地。过去进口之冰片为龙脑香树脂的加工品，称龙脑冰片，又名片脑。苦、辛，凉。入心，肺经。开窍散郁，清热止痛，防腐。①治热病神昏，中风，中暑，痰厥，气厥，惊痫。②治痈肿疮疖，喉痹，咽痛，口疮，牙龈肿痛，中耳炎，目赤翳障，烧烫伤，霉菌性阴道炎，痔疮。内服：研末，0.1～0.3克，多入丸、散，不入汤剂。外用：研末撒。孕妇忌服。天然品成分是右旋龙脑，常夹杂有葎草烯、β-榄香烯、石竹烯等倍半萜类和齐墩果酸、麦珠子酸(Alphitolic acid)、积雪草酸(Asiatic acid)、龙脑香醇酮(Dipterocarpol)、龙脑香二醇酮(Dryobalanone)、古柯二醇(Erythrodiol)等三萜类的杂质。人工制品成分是消旋龙脑。

冰片艾 见《广东中草药》。为艾纳香之别名，详该条。

冰郎花 见《吉林中草药》。即冰凉花，详该条。

冰粉 见《云南中草药选》。又名水晶凉粉、大千生。为茄科植物假酸浆 Nicandra physaloides(L.) Gaertn. 的全草。原产南美洲。我国南方及北方均有栽培；河北、甘肃、四川、贵州、云南等地有栽培或逸为野生。甘、淡、微苦，平，有小毒。镇静，祛痰，清热解毒。治狂犬病，精神病，癫痫，热淋，感冒。如煎服：15～30克。假酸浆的果实名假酸浆子，煎服治风湿性关节炎，疮

痈肿痛。假酸浆花煎服治鼻渊。叶含多种假酸浆烯酮（Nicandrenone）和魏察假酸浆酮（Withanicandrin）、根含托品酮、古豆碱、全草含假酸浆甙苦素（Nicandrin）、果实含柠檬酸、维生素C，果胶和糖等。

冰凌草 见《全国中草药汇编》。为冬凌草之别名，详该条。

冰凉花 见《药材学》。又名福寿草、冰郎花、侧金盏花。为毛茛科植物冰凉花 Adonis amurensis Regel et Radde 的带根全草。分布东北。苦，平，有毒。强心，利尿，镇静。治充血性心力衰竭，心脏性水肿，心房纤维性颤动。内服：粉剂，每次25毫克，每日一至三次。本品毒性较大，服用过量可出现恶心、呕吐、多汗、腹痛、头目眩晕、视物不清、心慌等中毒症状，严重者可致死亡。根含强心甙：加拿大麻甙、加拿大麻醇甙、黄麻属甙A、铃兰毒甙、K-毒毛旋花子次甙-β、索马林（Somalin）等。地上部分含强心甙，甙元有：毒毛旋花子甙元、洋地黄毒甙元等。根和地上部分都含伞形花内酯、东莨菪素等。浸剂及所含强心甙有洋地黄样强心作用，蓄积作用较小，浸剂和总甙对小鼠有镇静、催眠作用。

冰糖草 见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。又名土甘草、四时茶、节节珠。为玄参科植物野甘草Scoparia dulcis L.的全株。分布江西、福建、广东、广西、云南等地。甘，凉。祛风，清热解毒，利水消肿。①治肺热咳嗽，喉炎，暑热泄泻，痢疾，脚气浮肿，小便不利，丹毒，小儿肝火烦热，防治麻疹，解木薯中毒。煎服：30～60克。②捣汁外涂治湿疹，热痱。地上部分含生物碱，野甘草醇（Dulciol），野甘草酮（Dulcimone），β-谷甾醇，脂肪油，甘露醇，氯化钾及磷酸盐等。根皮含β-谷甾醇，甘露醇等。

汗苏麻 见《全国中草药汇编》。为下田菊之别名，详该条。

江子 见《瑞竹堂经验方》。为巴豆之别名，详该条。

江苏金钱草 见《中药通报》5（1）：27，1959。为连钱草之别名，详该条。

江剪刀草 见《上海常用中草药》。为蕹菜之别名，详该条。

汤罐头草 见《上海常用中草药》。为合子草之别名，详该条。

壮阳草 见《本草述》。为韭菜之别名，详该条。

守宫 出《尔雅》。为壁虎之别名，详该条。

安乐菜 见清·汪双池《医林纂要·药性》。为马齿苋之别名，详该条。

安息香 出《新修本草》。为安息香科植物青山安息香 Styrax tonkinensis Pierre 或粉背安息香 S. hypoglaucus Perk. 等的树干受伤后分泌出的香树脂。产广东、广西、云南等地。辛、苦，平。入心、肝、脾经。开窍，安神，辟秽，行气血。治卒中暴厥，心腹诸痛，产后血晕，小儿惊痫。研末服：0.3～1.5克，或入丸剂。忌见火。本品含树脂、主要成分为苯甲酸及其松柏醇酯。在醇浸出物的总香脂酸中，苯甲酸占98%以上。

羊儿草 见南川药物试验种植场《常用中草药手册》。为漆姑草之别名，详该条。

羊不挨 《广西中草药》。为火秧笋之别名，详该条。

羊甘石 见《现代实用中药》。即炉甘石，详该条。

羊石子 出《本事方》。为羊外肾之别名，详该条。

羊外肾 出《本草纲目》。又名羊肾、羊石子。为牛科动物山羊Capra hircus L.或绵羊Ovis aries L.的睾丸。甘、咸，温。入肾经。补肾，益精，助阳。治肾虚腰痛，遗精，带下，阳痿，消渴，小便频数，疝气，睾丸肿痛。煮食或入丸剂。

羊奶奶 见《贵州民间方药集》。为胡颓子之别名，详该条。

羊奶根 见《分类草药性》。为羊尿条根之别名，详该条。

羊耳三稔 见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。为六棱菊之别名，详该条。

羊耳朵朵尖 见《昆明民间常用草药》。为密蒙花之别名，详该条。

羊耳朵叶 出《滇南本草》。为马钱科植物密蒙花 Buddleja officinalis Maxim. 的叶。分布陕西、甘肃及西南、中南等地区。酸、苦，微温。治臁疮、顽疮、久不收口，研末调搽；跌打创伤，捣敷。

羊耳菊 见《湖南药物志》。又名白牛胆、毛老虎、白背风、山白芷、小茅香。为菊科植物羊耳菊Inula cappa(Buch.-Ham.)DC. 的根或全草。分布云南、四川、贵州、广西、广东、江西、福建、浙江。辛、微苦，温。祛风散寒，利湿，行气止痛。①治风寒感冒，咳嗽，哮喘，风湿痹痛，神经性头痛，胃痛，胸膈满闷，痢疾，泄泻，早期血吸虫病。②月经不调，痛经，白带。煎服：9～30克。③煎水洗痔疮，疥癣。本品预试含挥发油、黄酮、甾醇、酚类等。小鼠腹腔注射煎剂有止咳作用。

羊肉 出《本草经集注》。为牛科动物山羊Capra hircus L.或绵羊Ovis aries L.的肉。甘，温。入脾、肾经。补虚益气，温中暖下。治虚劳羸瘦，腰膝酸软，产后虚冷，中虚反胃，腹痛，寒疝。内服：煮食。每100克瘦羊肉约含蛋白质17.3克，脂肪13.6克，碳水化物0.5克，钙15毫克，磷168毫克，铁3毫克，维生素$B_1$0.07毫克，维生素$B_2$0.13毫克，尼克酸4.9毫克，胆甾醇70毫克。

羊血 出《新修本草》。为牛科动物山羊Capra hircus L.或绵羊Ovis aries L.的血。咸，平。止血，祛瘀，解毒。治吐血，衄血，便血，痔血，崩漏，产后血晕；解野葛毒。煮食或以鲜血饮之。主要成分为血红蛋白、血清蛋白、血清球蛋白、纤维蛋白，尚含少量脂类。

羊负来 出《本草经集注》。为苍耳之别名，详该条。

羊肝 出《药性论》。为牛科动物山羊Capra hircus L.或绵羊Ovis aries L.的肝。甘、苦，凉。入肝经。滋补强壮，明目。治血虚萎黄羸瘦，肝虚目暗昏花，雀目，青盲，障翳。煮食或入丸、散。每100克的含蛋白质18.5克，脂肪7.2克，碳水化物4克，钙9毫克，磷414毫克，铁6.6毫克，维生素$B_1$0.42毫克，尼克酸3.57毫克，维生素C 18.9毫克，维生素A29900国际单位。

羊角豆 见《中国树木分类学》。为望江南之别名，详该条。

羊角扭 见《中国药用植物志》。又名羊角纽、羊角藕、羊角藤、断肠草，鲤鱼橄榄。为夹竹桃科植物羊角拗 Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn. 的种子或叶。分布华南及西南地区。苦，寒，有大毒。祛风湿，通经络，消肿解毒，止痒杀虫，强心。①治风湿关节肿痛，小儿麻痹后遗症，疥癣瘙痒。煎汤温洗。②治多发性疖肿，腱鞘炎，蛇咬伤，跌打骨折（应先复位、固定），研末，酒、水调和，温敷患处。③羊角拗甙注射液治充血性心力衰竭。不可内服。羊角扭花：外用敷跌打损伤，止血。种子或叶含多种强心甙的混合物，内有：羊角拗甙、羊角拗异甙、D-毒毛旋花甙-I等。羊角拗混合甙（Divasidum）及羊角拗甙具有和毒毛旋花子甙K相似的强心作用，已证明混合甙的作用比毒毛旋花子甙K稍弱而持久，在胃肠道吸收缓慢而不规则。他们还有中枢抑制、利尿和兴奋子宫的作用。D-毒毛旋花甙-I也有强心作用。

羊角纽 见清·赵其光《本草求原》。即羊角扭，详该条。

羊角草 见《东北植物药图志》。为角蒿之别名，详该条。

羊角菜 见《救荒本草》。为萝藦之别名，详该条。

羊角蒿 见《东北常用中草药手册》。为角蒿之别名，详该条。

羊角藕 见《中国药用植物志》。为羊角扭之别名，详该条。

羊角藤 ❶见《云南中草药》。为生藤之别名。❷见萧步丹《岭南采药录》。为羊角扭之别名。各详该条。

羊屎果 ❶见《广西本草选编》。为萝芙木之别名。❷见《云南思茅中草药选》。为野冬青果之别名。各详该条。

羊尿泡 见《青海常用中草药手册》。为马尿泡之别名，详该条。

羊刺蜜 出《北史》。即刺蜜，详该条。

羊齿天冬 见《全国中草药汇编》。又名小天冬、小百部、土百部、千锤打。为百合科植物羊齿天门冬 Asparagus filicinus Buch.-Ham.的块根。分布山西、河南、陕西、甘肃、浙江、湖北、湖南及西南地区。甘、苦，寒。入肺经。养阴清热，润肺止咳。治肺痨久咳，咯血，百日咳，肺脓疡，支气管哮喘，糖尿病。煎服：6～15克。本品含粘液质、生物碱、挥发油。

羊肾 见《四川中药志》。即羊外肾，详该条。

羊乳 出《本草经集注》。为牛科动物山羊Capra hircus L.或绵羊Ovis aries L.的乳汁。甘，温。温润补虚。①治虚劳羸瘦，消渴，反胃，哕逆。煮沸内服。②涂敷口疮，漆疮。每100克约含蛋白质3.8克、脂肪4.1克、碳水化物5克，钙140毫克，磷106毫克，铁0.1毫克，维生素$B_1$0.05毫克，维生素$B_2$0.13毫克，尼克酸0.3毫克，维生素C 1毫克，维生素A80国际单位。

羊肺 出《名医别录》。为牛科动物山羊Capra hircus L·或绵羊Ovis aries L.的肺。甘，平。补肺，利尿。治肺痿咳嗽，消渴，水肿，小便不利。煮食。每100克约含蛋白质20.2克，脂肪2.8克，钙17毫克，磷66毫克，铁9.3毫克，维生素$B_1$0.01毫克，维生素$B_2$0.15毫克，尼克酸0.4毫克。

羊胡子根 见《中药志》。为知母之别名，详该条。

羊骨 出《名医别录》。为牛科动物山羊Capra hircus L.或绵羊Ovis aries L.的骨。甘，温。补肾，强筋骨。治虚劳羸瘦，腰膝无力，筋骨挛痛，白浊，久泻，久痢。煎汤或煅存性研末入丸、散服。含大量磷酸钙，少量碳酸钙、磷酸镁和微量的氟、氯、钠、钾、铁、铝等，还含骨胶原、骨类粘蛋白、弹性硬蛋白样物质以及脂肪、磷脂、糖原等。

羊食子根 见《四川中药志》。为羊屎条根之别名，见该条。

羊胆 出《本草经集注》。为牛科动物山羊Capra hircus L.或绵羊Ovis aries L.的胆。苦，寒。入肝、胆、胃经。清火，明目，解毒。①治肺痨吐血，咽喉肿痛，黄疸。内服：入煎剂，干品1.5～3克；或研末装入胶囊。②取汁点眼治风热目赤，雀盲，青盲，翳障；涂敷热毒疮疡。本品含胆汁酸盐、胆色素、粘蛋白、胆甾醇、卵磷脂、碳酸氢钠等。

羊须草 见《广东中药》。为白花蛇舌草之别名，详该条。

羊哀 出《辍耕录》。为羊胲子之别名，详该条。

羊屎条根 出《分类草药性》。又名羊奶根、羊食子根、羊屎柴根。为忍冬科植物烟管荚蒾Viburnum utile Hemsl.的根。分布湖北、湖南、贵州及四川东部。酸、涩，平。清热利湿，凉血止血，祛风通络。①治痢，痔血脱肛，白带，风湿筋骨疼痛，跌打肿痛。煎服：15～30克。②捣敷痈疽发背。

羊屎柴根 见《本草纲目》。为羊屎条根之别名，详该条。

羊桃 出《医心方》。为猕猴桃之别名，详该条。

羊起石 出《名医别录》。即阳起石，详

该条。

羊胰子 出《本草纲目》。又名羊哀、百草丹。为牛科动物山羊Capra hircus L.胃中的草结。温。入胃经。降逆止呕。治反胃吐食，噎膈嗳气，晕车、晕船呕吐。内服：煎汤，0.9～1.5克；或煅存性研末入丸、散。

羊脂 出《备急千金要方·食治》。为牛科动物山羊Capra hircus L.或绵羊Ovis aries L.的脂肪。甘，温。补虚，润燥，去风毒。治虚劳羸瘦，肌肤枯憔，久痢。烊化冲服。主含棕榈酸、硬脂酸、油酸，还含少量亚油酸、肉豆蔻酸。

羊眼豆 见《药品化义》。为扁豆之别名，详该条。

羊脬 出《本草纲目》。为牛科动物山羊Capra hircus L.或绵羊Ovis aries L.的膀胱。甘，温。治下虚遗尿。焙干研末服。

羊蹄奶 见《本草纲目》。为南沙参之别名，详该条。

羊踯躅根 出《本草纲目》。又名山芝麻根、巴山虎、闹羊花根、三钱三、一杯倒。为杜鹃花科植物羊踯躅Rhododendron molle (Bl.)G·Don的根。分布长江流域各地，南达广东、福建。辛，温，有大毒。祛风除湿，散瘀止痛，止咳。①治风湿痹痛，坐骨神经痛，腰椎间盘突出症，跌打损伤，慢性气管炎。煎服：1.5～3克。②治痔漏，煎汤熏洗；癣疮，煎水和醋涂搽。根皮含裂叶蓬醇(Sparassol)。

羊蹄 出《神农本草经》。又名鬼目、土大黄、牛舌大黄、野菠菜。为蓼科植物羊蹄Rumex japonicus Houtt.等的根。分布华东、中南及四川等地。苦、酸，寒，有小毒。凉血止血，通便，解毒，杀虫。①治鼻衄，吐血，便血，功能性子宫出血，血小板减少性紫癜。②治淋浊，黄疸，肛门周围炎，大便秘结。煎服：9～15克。③治急性乳腺炎，疖肿，外痔，捣烂敷或煎水洗头风白屑，研末羊胆汁调涂；白秃、顽癣、疥疮，醋磨汁涂敷；烧烫伤，研细末油调涂。本品含大黄酚、大黄素、呢坡定(Nepodin)等。

羊蹄叶 出《日华子诸家本草》。为蓼科植物羊蹄Rumex japonicus Houtt.的叶。甘，寒。①治肠风下血，大便秘结，小儿疳积。煎服：9～15克。②治热毒红肿，疥癣，捣敷；暴赤火眼疼痛，捣贴太阳穴。羊蹄的果实名羊蹄实，煎服治赤白痢疾。叶含槲皮甙和多量维生素C。

羊蹄草 见萧步丹《岭南采药录》。为一点红之别名，详该条。

羊蹄七 见《陕西中草药》。为鹅脚板之别名，详该条。

羊蹄草 见《云南中草药》。为石椒草之别名，详该条。

羊髓 出《名医别录》。为牛科动物山羊Capra hircus L.或绵羊Ovis aries L.的脊髓或骨髓。甘，温。益阴补髓，润肺泽肌。①治虚劳羸弱，肺痿，骨蒸，咳嗽，消渴，皮毛憔悴。熬膏或煮食。②揉痈疽疮疡；敷目赤，翳障。

并头草 见《南京民间药草》。为半枝莲之别名，详该条。

关木通 见《中药志》。又名苦木通、马木通、万年藤。为马兜铃科植物木通马兜铃Aristolochia manshuriensis Kom.的木质茎。主产吉林、黑龙江、辽宁。苦，寒。泻热降火，利尿。治口舌生疮，小便赤涩疼痛，水肿。煎服：1.5～4.5克。本品含马兜铃酸、齐墩果酸、常春藤皂甙元、鞣质等。煎剂对离体小鼠子宫有抑制作用，对离体肠管有兴奋作用。

关白附 见《中药志》。又名竹节白附。为毛茛科植物黄花乌头Aconitum coreanum (Levl.) Raipaics的块根。主产东北。辛、甘，温，有毒。入肝、胃经。祛风痰，逐寒湿，止痛。治风寒湿痹，偏正头痛，风痰眩晕，口眼歪斜，跌打肿痛。煎服：1.5～4.5克。炮制后用。孕妇忌服。本品含次乌头碱

和关附甲、乙、丙、丁、戊素等生物碱。

关防风 见《药材学》。为防风之药材名，详该条。

关黄柏 见《东北植物药图志》。为黄柏药材之一种，详该条。

米仁 见《本草崇原》。为薏苡仁之别名，详该条。

米仁根 见《上海常用中草药》。为薏苡根之别名，详该条。

米皮糠 出《本草纲目》。又名谷白皮、米秕、米糠、杵头糠。为稻的种皮。甘、辛，平。治噎膈，脚气。内服：煎汤，适量；或入丸、散。本品含油，油中含三萜烯醇阿魏酸酯(Triterpene alcohol furulate)，通称谷维醇(Oryzanol)。还含多种甘油酯及游离脂肪酸，角鲨烯(Squalene)、阿魏酸、甾醇、磷脂、脂蛋白、维生素B_1和E族、一种抗肿瘤物质(小鼠艾氏腹水癌及肉瘤-180)和糠甙(Nakain)等。谷维醇可改善植物神经的功能障碍，能促进大鼠生长，增加肝脏中糖元的含量。对切除卵巢的大鼠，皮下注射可引起动情期改变，口服则无效。

米秕 见明·汪颖《食物本草》。为米皮糠之别名，详该条。

米浆水 见《中国医学大辞典》。即浆水，详该条。

米筛花 见《浙江民间常用草药》。为老鸦糊之别名，详该条。

米糠 见《验方新编》。即米皮糠，详该条。

祁木香 见《河北药材》。为土木香之别名，详该条。

祁州一枝蒿 出《祁州药志》。为小飞蓬之别名，详该条。

农吉利 见《中医方药学》。又名野芝麻，芝麻响铃铃、狗铃草、紫花疔草。为豆科植物野百合Crotalaria sessiliflora L.的地上部分。分布华东、中南及西南各地。苦、淡，平，有毒。解毒抗癌，止咳平喘，利湿消积。①用于皮肤鳞状上皮癌，子宫颈癌等癌症。盐酸农吉利碱注射液肿瘤基底部注射，一次2毫升，一日一次。治疗十五日后休息七日。治疗期间定期检查肝功能。皮肤癌亦可用鲜草捣成糊状或干品研粉水调成糊，涂敷患处。②治耳鸣耳聋，头目眩晕，慢性气管炎，咳嗽喘息，痢疾，小儿黄疸，疳积。煎服：15～30克。③治疔疮，疖肿，煎服并捣敷；毒蛇咬伤，捣敷。本品含野百合碱(Monocrotaline)、6，8-二-C-葡萄糖基芹菜素、6，8-二-C-葡萄糖基木犀草素等。野百合碱对小鼠肉瘤-180、白血病L615、大鼠瓦克癌-256均有一定的抑制作用。但毒性大，有积蓄性，对肺、肝、肾均有损害，故不作全身注射用。半胱氨酸和蛋氨酸对其有解毒作用。

〔7〕

寻风藤 见《本草纲目》。为青风藤之别名，详该条。

寻骨风 出《植物名实图考》。又名巡骨风、清骨风、白面风、白毛藤、黄木香、猴耳草。为马兜铃科植物绵毛马兜铃Aristolochia mollissima Hance的根茎或全草。主产江苏、河南、江西等地。苦，平。祛风通络，活血，止痛。治风湿痹痛，跌打损伤，胃腹疼痛，疝痛，近用治癌症。煎服：9～15克。本品含生物碱、挥发油、内酯等。挥发油及总生物碱对大鼠实验性关节炎有明显预防作用。粉及煎剂对小鼠艾氏腹水瘤有抑制作用。煎剂在体外对葡萄球菌有抑制作用。

异叶青兰 见《青海常用中草药手册》。为白花夏枯草之别名。详该条。

阳桃 ❶出《本草纲目》。又名五敛子、三敛子、三棱、杨桃、三棱子、酸五棱。为酢浆草科植物阳桃 Averrhoa carambola L.的果实。云南、广西、广东、福建、台湾有栽培。甘、酸，寒。清热，生津，利水。①治热病烦渴，风热咳嗽，咽喉痛，口疮，小便不利，石淋，内服：煎汤，15～60克；生

食或捣汁服，2～3枚。②鲜汁滴入耳内，治中耳炎。鲜果肉含草酸、柠檬酸、苹果酸、蔗糖、果糖、葡萄糖和痕迹量脂肪。种子含油37%。❷见《日用本草》。为猕猴桃之别名，详该条。

阳桃叶 出《生草药性备要》。为酢浆草科植物阳桃Averrhoa carambola L.的叶。酸、涩，凉。清热解毒，利水祛湿。①治风热感冒，急性胃肠炎，小便不利，产后浮肿。煎服：9～15克。②捣敷痈疽肿毒；煎水洗顽癣，疥疮，漆过敏，皮肤瘙痒，阴道滴虫。

阳桃根 见萧步丹《岭南采药录》。为酢浆草科植物阳桃 Averrhoa carambola L.的根。涩，平。祛风，止痛，消滞，涩精。治头风，风湿痹痛，消化不良，遗精。内服：煎汤，12～15克(鲜品30～45克)；或浸酒服。

阳起石 出《神农本草经》。又名白石、羊起石。为石棉类矿石。主产湖北、河南、山西等地。咸，温。入肾经。温肾壮阳。治肾气虚寒，阳痿，遗精，早泄，子宫虚寒，腰膝冷痹。煎服：4～9克。本品含氧化铁、氧化钙、氧化镁、氧化硅等。

阳雀花 见清·刘士季《草木便方》。为金雀花之别名，详该条。

阳雀花根 见清·刘士季《草木便方》。为金雀根之别名，详该条。

阳蕷 出《广西志》。为蘘荷之别名，详该条。

阴地蕨 出《本草图经》。又名一朵云、小春花、蛇不见、独脚蒿、破天云。为阴地蕨科植物阴地蕨Botrychium ternatum (Thunb.)Sweet的带根全草。分布长江流域及广西、福建、台湾。甘、苦，凉。平肝，清热，止咳，解毒。①治头晕头痛，惊痫，瘰疬，火眼，目翳，百日咳，支气管肺炎，哮喘。煎服：6～15克。②治痈疮肿毒，蛇咬伤。煎服并捣敷。叶含木犀草素等。鲜草煎剂在体外对大肠杆菌有抑制作用。

阴阳参 见《全国中草药汇编》。为手掌参之别名，详该条。

阴阳莲 见《南宁市药物志》。为虎杖之别名，详该条。

阴香皮 见萧步丹《岭南采药录》。又名山肉桂。为樟科植物阴香Cinnamomum burmannii (Nees) Bl.的树皮及叶。分布广东、广西、江西、福建、浙江、湖北、贵州等地。辛，温。温中散寒，祛风止痛，止血。①治寒性胃痛，腹胀，腹泻，痢疾，风湿痹痛。煎服：3～9克。②治外伤出血，研末撒；疖肿疮毒，研末调敷。阴香根：煎服治胃痛，水泻。树皮、叶均含挥发油，树皮油中的主成分为桂皮醛、丁香油酚和黄樟醚。叶油中的主成分为丁香油酚及芳樟醇。

阴桃子 见《分类草药性》。为碧桃干之别名，详该条。

阴精石 见《本草纲目》。即玄精石，详该条。

防己 出《神农本草经》。又名汉防己、白木香、倒地拱。为防己科植物粉防己Stephania tetrandra S. Moore的根。主产浙江、安徽、江西、湖北等地。苦、辛，寒。入膀胱、肺经。利水消肿，祛风除湿，降血压，散痈肿。①治水肿，脚气，水饮喘嗽，小便不利，风湿性关节炎，高血压病。煎服：4.5～9克。②治湿疹，下肢溃疡，痈疖肿毒。煎服或鲜品捣敷。本品含多种生物碱，主要有汉防己碱、粉防己碱、汉防己甲素、防己诺林碱(汉防己乙素)、小檗胺碱和轮环藤酚碱(Cyclanoline)。尚含黄酮甙、酚类、有机酸、挥发油等。汉防己碱有镇痛、解热、抗炎、增加冠脉流量、利尿与抗过敏性休克的作用，在体内外均有抗阿米巴原虫的作用，对大鼠及小鼠实验性肿瘤有一定抑制作用。汉防己碱(季胺化)和轮环藤酚碱有横纹肌松弛作用及降压作用。防己诺林碱亦有较弱的镇痛、消炎及降压作用。

防风 出《神农本草经》。又名屏风，关防风、青防风。为伞形科植物防风Saposhni-

kovia divaricata (Turcz.) Schischk。的根。主产吉林、黑龙江、内蒙古、河北等地。辛、甘，微温。入膀胱、肝、脾经。解表，祛风，胜湿，止痛，解痉。治风寒感冒，寒热，头痛身疼，偏正头风，风寒湿痹，四肢挛急，风疮疥癣，皮肤瘙痒，破伤风。炒至焦黄，治腹泻；炒炭治便血，崩漏。煎服：4.5～9克。防风叶：煎服治风热汗出。防风花：煎服治心腹痛，四肢拘急，骨节间痛。根含挥发油、甘露醇、苦味甙等。煎剂和醇浸剂对兔有解热作用。

如意花 见萧步丹《岭南采药录》。为五色梅之别名，详该条。

如意草 ❶见《全国中草药汇编》。为犁头草之别名。❷见《南京民间药草》。为蕨之别名。各详该条。

戏铁石 见《中药志》。为磁石之别名，详该条。

观音花 见《浙江中药资源名录》。为蘘荷之别名，详该条。

观音柳 出《卫生易简方》为柽柳之别名，详该条。

羽叶三七 见《中国药用植物志》。又名纽子三七、黄连三七、羽叶竹节参、疙瘩七。为五加科植物羽叶三七 Panax pseudo-ginseng Wall.var.bipinnatifida(Seem.)Li的根茎。分布云南、湖北、四川、陕西、甘肃和西藏。甘、微苦，温。止血，散瘀，兼有滋补强壮作用。治肺结核咯血，衄血，经闭，产后血瘀腹痛，劳伤腰痛，跌打损伤。煎服：3～9克。

羽叶竹节参 见《中药志》。为羽叶三七之别名，详该条。

买麻藤 出《本草纲目拾遗》。又名大节藤、麻骨风、接骨藤、竹节藤。为买麻藤科植物小叶买麻藤 Gnetum parvifolium (Warb.) C.Y.Cheng的茎藤。主产广东、广西、福建、江西、湖南。苦，平。祛风活血，消肿止痛，止咳化痰。①治风湿痹痛，腰肌劳损，跌打损伤，蛇咬伤，慢性支气管炎。煎服：6～9克(鲜品15～30克)。②治骨折。鲜品捣烂，酒炒，复位后热敷包扎，固定，每天换药一次。本品含生物碱，对豚鼠支气管平滑肌有解痉作用。煎剂和脂溶性生物碱在体外对肺炎球菌、链球菌、流感杆菌等有抑制作用。

红三七 见《陕西中草药》。又名九牛造、螺丝三七、赶山鞭、蓼子七。为蓼科植物支柱蓼polygonum suffultum Maxim.的根茎。主产四川、陕西等地。苦、涩，凉。活血止血，行气止痛，生肌敛疮。①治跌打损伤，劳伤吐血，便血，崩漏，白带，月经不调，痢疾，脱肛。内服：煎汤，9～15克；研末服，3～6克。②治外伤出血，溃疡久不收口。研细末撒。根和根茎中含大黄素、大黄酸、大黄酚及鞣质。

红土 见《药材学》。为赤石脂之别名。详该条。

红大戟 见《中国药用植物志》。又名红芽大戟、紫大戟、南大戟、红毛大戟。为茜草科植物红大戟Knoxia valerianoides Thorel ex Pitard的块根。分布福建、广西、广东及云南等地。苦、寒，有小毒。泻水逐饮，解毒散结。治胸水，腹水，痰饮喘急。煎服：1.5～3克。外治痈肿，用鲜品捣敷。根皮含大戟素甲、乙、丙，根含游离的和结合性的蒽醌类化合物。

红山花 见《云南中草药》。为血满草之别名，详该条。

红小豆 见《本草原始》。即赤小豆，详该条。

红子 见《分类草药性》。为赤阳子之别名，详该条。

红子根 出《分类草药性》。为蔷薇科植物火棘pyracantha fortuneana (Maxim.) Li的根。分布西南地区及广西、湖南、湖北、福建、浙江、江苏、陕西等地。酸、涩，平。清热凉血，活血。治虚劳骨蒸，月经不调，

跌打损伤，筋骨疼痛。煎服：12～24克。孕妇忌服。本品含鞣质。

红马蹄草 见《四川中药志》。又名马蹄肺筋草、八角铜盘、金钱薄荷、红石胡荽。为伞形科植物红马蹄草Hydrocotyle nepalensis Hook.的全草。分布陕西、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、云南、贵州、广西、广东。辛、微苦，凉。清肺止咳，活血止血，消肿解毒。①治感冒，咳嗽，咯血，跌打损伤。煎服：9～30克。②治外伤出血，痔疮，骨髓炎，无名肿毒。鲜草捣敷。

红木香 出《本草纲目拾遗》。又名内红消、紫金皮。为木兰科植物长梗南五味子Kadsura longipedunculata Finet et Gagn.的根或根皮。产江西、浙江、江苏、福建等地。辛，温。行气，活血，止痛。①治脘腹胀痛，筋骨疼痛，痛经。煎服：9～15克。②治跌打瘀痛，外伤出血，无名肿毒。研末调敷。孕妇忌服。

红内消 ❶见《外科精要》。为何首乌之别名。❷见《四川常用中草药》。为金刚散之别名。各详该条。

红毛七 见《民间常用草药汇编》。又名金丝七、海椒七、鸡骨升麻。为小檗科植物类叶牡丹Leontice robustum (Maxim.) Diels的根茎及根。分布东北、陕西、甘肃、安徽、浙江、湖北、四川等地。苦、辛，温，有小毒。祛风除湿，活血通络。治风湿痹痛，胃气痛，月经不调，痛经，产后瘀血腹痛，跌打损伤。内服：煎汤，3～9克；或浸酒。本品含木兰花碱、塔斯品碱(Taspine, Thaspine)、甲基金雀花碱(Methy lcystisine)、右旋羽扇豆碱、威岩仙皂甙(Cauloside)A、B、C、D、E和类叶牡丹甙元(Caulophyllogenin)。根之浸剂或酊剂有收缩子宫和血管的作用，所含塔斯品碱对结核杆菌(H_{37}及Academia株)呈显著抑菌作用。

红毛大戟 见《药材资料汇编》。即红大戟，详该条。

红毛走马胎 见《民间常用草药汇编》。又名毛青杠、虎舌红、红毛毡、红胆、毛凉伞。为紫金牛科植物乳毛紫金牛Ardisia mamillata Hance的全株。分布福建、广东、广西、贵州、四川、云南。苦、辛，凉。清热利湿，活血止血。①治痢疾，黄疸，风湿痹痛，肺结核咯血，外伤吐血，血崩，痛经。煎服：9～15克。②捣敷疮疖痈肿。孕妇慎服。

红毛毡 见《云南中草药选》。为红毛走马胎之别名，详该条。

红火老鸦酸草 见《草药手册》。为酸蔹之别名，详该条。

红心灰藜 出《庚辛玉册》。为藜之别名，见该条。

红石胡荽 见《全国中草药汇编》。为红马蹄草之别名，详该条。

红石根 见《辽宁经济植物志》。为紫草之别名，详该条。

红石藤 见《福建中草药》。为糯米藤之别名，详该条。

红龙船花 见《广西民间常用草药》。为荷苞花之别名，详该条。

红四方藤 见《广西中草药》。即四方藤，详该条。

红白二丸 见《陕西中草药》。又名一口血、岩丸子。为秋海棠科植物秋海棠Begonia evansiana Andr.的根及块茎或全草。我国大部分地区有栽培。苦、涩、酸，凉。活血散瘀，凉血止血，止痛。治吐血，咯血，衄血，痢疾，淋浊，血尿，崩漏，带下，月经不调，跌打损伤。内服：煎汤，9～15克；研末服，3～6克。全草捣汁含漱治咽喉痛；捣敷痈肿及跌打损伤。

红头草 见《云南省药品标准》(1974)。为菊科植物柔毛艾纳香Blumea mollis (D. Don) Merr.的带花全草。分布广西、广东、云南、四川、贵州、湖南、江西、浙江、台

湾等地。苦，寒。清热解毒。治肺炎，扁桃体炎，腮腺炎，口腔炎，牙龈脓肿，乳腺炎，无名肿毒，外伤肿痛，皮肤瘙痒。煎服：9～15克。本品不宜久煎。

红皮 出《汤液本草》。为橘皮之别名，详该条。

红母鸡草 见《南宁市药物志》。为鸡骨草之别名，详该条。

红丝毛 见《陕西中草药》。为珍珠菜之别名，详该条。

红地胆 见《全国中草药汇编》。为红根草之别名，详该条。

红芋荷 见《江西民间草药验方》。为野芋之别名，详该条。

红芍药 见《圣济总录》。即赤芍药，详该条。

红曲 出《饮膳正要》。又名红米。为曲霉科真菌紫色红曲霉Monascus purpureus Went寄生在粳米上而成的红曲米。主产福建、广东。甘，温。入肝、脾、大肠经。活血化瘀，健脾消食。治产后恶露不净，瘀滞腹痛，食积饱胀，赤白痢。煎服：6～12克。

红血儿 见《陕西中草药》。为鸡血七之别名，详该条。

红米 见《药材资料汇编》。即红曲，详该条。

红豆 ❶出《本草纲目》。为赤小豆之别名。❷出《王右丞集》。为相思子之别名。各详该条。

红豆蔻 出《药性论》。又名红蔻。为姜科植物大高良姜Alpinia galanga (L.) Willd的果实。主产广东、广西、云南。辛，温。温中散寒，行气止痛。治胃寒疼痛，呕吐，吞酸，噎膈反胃，消化不良，腹痛泄泻。煎服：3～9克。果实含挥发油，种子含乙酰氧基胡椒酚乙酸酯和乙酰氧基丁香油酚乙酸酯。挥发油对皮肤和粘膜有刺激性，内服有驱风作用；本品石油醚提取物给家兔灌服有祛痰作用。

红花 出《本草图经》。又名红蓝花、刺红花、草红花。为菊科植物红花Carthamus tinctorius L.的花。主产河南、浙江、四川。辛，温。入心、肝经。活血通经，去瘀止痛。①治闭经，痛经，产后瘀阻腹痛，癥瘕积聚，冠心病心绞痛，跌打损伤。煎服：3～6克。②用50%红花提取液10～15毫升，加入10%葡萄糖液250毫升中静脉滴注，每日一次，治脑血栓；用红花注射液2～6毫升，局部封闭，治疗神经性皮炎。孕妇忌服。红花的果实称红花子，又名红蓝子、白平子，酒拌晒干、研末蜜丸服，治妇女瘀滞腹痛。花含红花甙、新红花甙、红花醌甙和两种杀线虫的多炔(Polyacetylene)等。瘦果含脂肪油、2-羟基牛蒡子甙(2-Hydroxyarctiin)、罗汉松树脂醇单葡萄糖甙、半乳糖、肌醇等。煎剂对各种动物的子宫及肠管呈兴奋作用，并有降压作用；水提取物能增加狗的冠脉流量，改善冠脉循环；醇提取物能提高小鼠耐缺氧能力。

红花艾 见萧步丹《岭南采药录》。为益母草之别名，详该条。

红花酢浆草 见《福建中草药》。为铜锤草之别名，详该条。

红芽大戟 见《小儿药证直诀》。即红大戟，详该条。

红旱莲 见《江苏省植物药材志》。又名湖南连翘、金丝蝴蝶、牛心茶、大金雀。为藤黄科植物黄海棠Hypericum ascyron L.的全草。主产江苏。苦，寒。平肝，止血，消肿，解毒。①治肝火头痛，吐血，咯血，衄血，子宫出血，黄疸，肝炎。煎服：4.5～9克。②治跌打损伤，烧烫伤，捣敷或取汁涂；湿疹，黄水疮，研末油调涂。全草含挥发油，主为α-丁香烯。还含平喘、止咳的有效成分槲皮素、金丝桃甙以及山奈酚、芸香甙、异槲皮甙、胡罗卜素、维生素B_2等。

红苓蕴 见萧步丹《岭南采药录》。为荷苞花根之别名，详该条。

红枣 见《医学入门·本草》。即大枣，详该条。

红岩七 见《全国中草药汇编》。为岩白菜之别名，详该条。

红果子 见《中国药用植物志》。为山楂之别名，详该条。

红法落海 见《中草药通讯》(12)：6，1976。即法罗海，详该条。

红油菜 见《四川中药志》。为芸苔之别名，详该条。

红泽兰 见《贵州民间药物》。为赤胫散之别名，详该条。

红姑娘 出《巵言》。为酸浆之别名，详该条。

红参 见《增订伪药条辨》。为人参商品之一种。详人参条。

红南瓜 见《中药大辞典》。为桃南瓜之别名，详该条。

红茴香 见《浙江天目山药用植物志》。为莽草之别名，详该条。

红茶花 见《分类草药性》。为山茶花之别名，详该条。

红茨藤 见《分类草药性》。为小金樱之别名，详该条。

红药 见《草药手册》。为雷公藤之别名，详该条。

红药子 ❶出《本草图经》。又名赤药、朱砂七、猴血七。为蓼科植物毛脉蓼 Polygonum cillinerve (Nakai) Ohwi的块根。主产陕西、甘肃、河南。苦、微涩，凉，有小毒。清热解毒，止痛，止血，调经。①治扁桃体炎，胃炎，胃溃疡病，肠炎，痢疾，尿路感染，风湿痹痛，胆道蛔虫症。②治吐血，衄血，便血，崩漏，月经不调。煎服：3～9克。③治外伤感染、出血，跌打损伤，痈疖。研粉敷。内服有时可出现恶心、呕吐、腹胀，肢麻及头晕等反应。孕妇慎服。本品含大黄素、大黄素甲醚、大黄酚、大黄酸及食用大黄甙(Rhapontin)等。大黄素、大黄素甲醚对金黄色葡萄球菌，大肠、绿脓、痢疾杆菌均有抑制作用；水浸液对多种呼吸道及肠道病毒有抑制作用。❷见《陕西中草药》。为慕荷之别名。❸见《湖南药物志》。为薯莨之别名，各详该条。

红砖草 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·妇产科》。为一点血之别名，详该条。

红背叶 见《广州植物志》。为一点红之别名，详该条。

红胆 见《贵州植药调查》。为红毛走马胎之别名，详该条。

红独活 见《中药材科技》(1)：34，1979。为法罗海之别名，详该条。

红总管 见《草药手册》。为瑞香花之别名，详该条。

红孩儿 ❶出《植物名实图考》。又名岩红、石莲。为秋海棠科植物裂叶秋海棠Begonia laciniata Roxb.的全草。分布福建、台湾、广东、广西、云南、四川、贵州、湖南、浙江等地。酸，寒。清热解毒，散瘀消肿。①治感冒，急性支气管炎，肺炎，风湿骨痛，闭经，肝脾肿大。煎服：9～15克。②治跌打肿痛，毒蛇咬伤，痈肿，疔疮。捣敷。❷见《草药手册》。为薯莨之别名，详该条。

红珠草 见《福建民间草药》。为龙珠之别名，详该条。

红桐 见《中国树木分类学》。为秋枫木之别名，详该条。

红根 ❶见《中国药用植物志》。为丹参之别名。❷见南京药学院《中草药学》。为刺玫果根之别名。各详该条。

红根仔 见《福建中草药》。为星宿菜之别名，详该条。

红根草 ❶见《全国中草药汇编》。又名红地胆、根下红。为唇形科植物黄埔鼠尾Salvia prionitis Hance的全草。分布浙江、安徽、江西、湖南及广东。微苦，凉。清热解毒。治急性扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎，

肠炎，细菌性痢疾。煎服：15～30克。❷见《福建民间草药》。为星宿菜之别名，详该条。

红柴 见《四川中药志》。为苏木之别名，详该条。

红党参 见《本草从新》。为明党参之别名，详该条。

红狼毒 见《中药材手册》。即狼毒，详该条。

红浮萍 见《分类草药性》。为满江红之别名，详该条。

红浮漂 见《贵州民间方药集》。为满江红之别名，详该条。

红琐梅 见《植物名实图考》。为茅莓之别名，详该条。

红梗草 见《滇南本草》。为泽兰之别名，详该条。

红硇砂 见《药材资料汇编》。亦称紫硇砂，为硇砂药材之一种，详该条。

红蛇根 见《全国中草药汇编》。为血风藤之别名，详该条。

红麻 见《东北资源植物手册》。为罗布麻之别名，详该条。

红麻菠萝 见《云南中草药》。为野烟之别名，详该条。

红棉藤 见《中草药通讯》(4)：41，1972。为蔷薇科植物红棉藤 Rubus rufolanatus H.T.Chang的叶。分布我国南部。止血。治外科手术及外伤性出血，消化道出血，呼吸道出血，泌尿道出血，妇科病出血及血液病引起的出血。制成注射液，每支2毫升，一般每日肌肉注射一支，或直接滴于伤口，或作湿敷。

红葡萄 见《云南中草药选》。为五爪金龙之别名，详该条。

红蔻 见《本草述钩元》。为红豆蔻之简称，详该条。

红紫珠 见《广西药用植物名录》。又名小红米果、野兰靛。为马鞭草科植物红紫珠 Callicarpa rubella Lindl.的叶。分布安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、四川、云南。辛、苦，平。止血。①治吐血，尿血。煎服：30～60克。②治外伤出血。研末撒。

红景天 见《中国药典·一部》1977年版。又名狮子七、涩疙瘩。为景天科植物大株红景天Rhodiola kirilowii (Regel) Regel ex Maxim.或唐古特红景天R. algida (Ledeb.)Fu var.tangutica(Maxim.)Fu等的根及根茎。前者分布河北、山西、甘肃、陕西、青海、西藏、云南等地；后者分布青海、甘肃、西藏。微苦、涩，寒。清热解毒，止血化瘀。治肺热，温病，四肢肿胀，吐血，崩漏，带下，痢疾。煎服：0.6～1.2克。孕妇忌服。

红蓝花 出《金匮要略》。为红花之别名，详该条。

红蜻蜓叶 见《中国药用植物图鉴》。为赖桐叶之别名，详该条。

红管药 见《全国中草药汇编》。又名山白菊、田边菊、山马兰、八月霜。为菊科植物三褶脉马兰Aster ageratiodes Turcz.的全草。分布几遍全国。苦、辛，凉。疏风，清热，解毒。①治风热感冒，支气管炎，扁桃体炎，腮腺炎，乳腺炎，肝炎，泌尿系感染，鼻衄。煎服：15～60克。②捣敷治疔疮肿毒，蛇虫咬伤，外伤出血。地上部分含黄酮类，从中分离出槲皮素、槲皮甙、异槲皮甙、芸香甙、山柰酚及其3-鼠李糖葡萄糖甙等。根含皂甙。煎剂及所含黄酮在动物试验中有镇咳、祛痰、平喘作用及增强肾上腺皮质功能的作用，并能促进小鼠甲状腺对碘^{131}的积聚和增加甲状腺的活力，提高肌体组织细胞的能量代谢。对金黄色葡萄球菌、卡他球菌、变形和痢疾杆菌有一定的抑制作用。

红樱花 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为龙船花之别名，详该条。

红暴牙狼 见《全国中草药汇编》。为野

牡丹之别名，详该条。

红藤 见《浙江中药手册》。又名血藤、大活血、大血通、血木通。为大血藤科植物大血藤Sargentodoxa cuneata (Oliv.)Rehd. et Wils.的茎藤。主产湖北、四川、江西、河南、江苏。苦，平。入肝、大肠经。祛风，活血，通络，败毒，杀虫。①治肠痈，乳痈，风湿痹痛，四肢酸楚，痢疾，经闭腹痛，钩虫病，蛔虫病。煎服：9～15克。②治跌打损伤。捣敷。孕妇慎服。本品含鞣质。煎剂对金黄色葡萄球菌，乙型链球菌，卡他球菌，大肠及绿脓杆菌均有抑制作用。

红颠茄 见《广东中草药》。为丁茄之别名，详该条。

巡骨风 见上海中医学院《中草药学》。即寻骨风，详该条。

七 画

〔一〕

寿星柑根 见《四川中药志》。为金橘根之别名，详该条。

麦门冬 出《神农本草经》。为百合科植物麦冬草 Ophiopogon japonicus Ker-Gawl.的块根。主产浙江、四川。甘、微苦，寒。入心、肺、胃经。清心润肺，养胃生津。①治热病心烦，津伤口渴，肺燥干咳。咽痛，咽白喉，咯血，衄血，肺痈，消渴，肠燥便秘，萎缩性胃炎；试用于冠心病有改善症状作用。煎服6～12克。本品含多种沿阶草甙(Ophiopogonin)，其甙元为罗斯考皂甙元(Ruscogenin)，还含β-谷甾醇及其葡萄糖甙、豆甾醇等。麦冬粉在体外对白色葡萄球菌、大肠杆菌有抑制作用；对小白鼠有明显提高耐缺氧能力，故对心绞痛可能有缓解作用。

麦芽 出《本草纲目》。又名麦蘖、大麦芽。为大麦的颖果经发芽制成。甘，微温。入脾、胃经。开胃消食，下气，回乳。①治食积不化，脘腹胀满，食欲不振，嗳气吞酸。②治断乳时乳汁郁积、乳房胀痛。煎服：9～15克（回乳炒用60克）。③治急、慢性肝炎肝痛、厌食。生品研粉制成糖浆服。麦芽含淀粉酶，转化糖酶，脂酶，朊酶等多种酶类物质。另含大麦芽碱(Hordenine)、甜菜碱，胆碱，腺嘌呤，氨基酸，细胞色素C，维生素B、D、E，磷脂，麦芽糖，葡萄糖等。还含抗霉菌有效成分大麦芽胍碱(Hordatine) A、B及其葡萄糖甙。

麦芽糖 见《药材学》。为饴糖之别名，详该条。

麦参 见《云南中草药》。为千针万线草之别名，详该条。

麦黄草 见《陕西中草药》。为紫堇之别名，详该条。

麦斛 出《新修本草》。又名果上叶、七仙桃、石豆、青兰、小扣子兰、石仙桃。为兰科植物麦斛 Bulbophyllum incouspicuum Maxim. 的全草。分布安徽、浙江、江苏、湖南、江西、福建、广东、广西、贵州等地。甘，凉。入肺、胃经。润肺化痰，滋阴养胃。治肺燥干咳，肺结核咯血，热病烦渴，慢性咽痛，慢性胃炎，胃酸缺乏，食欲不振，小儿惊痫，风火牙痛。煎服：15～30克。

麦粒团 见《安徽中草药》。为木半夏之别名，详该条。

麦蓝子 见《甘泉县志》。为王不留行之别名，详该条。

麦穗红 见《南宁市药物志》。为狗肝菜之别名，详该条。

麦蘖 出《日华子诸家本草》。为麦芽之

别名，详该条。

远志 出《神农本草经》。又名小草根、苦远志、远志筒。为远志科植物细叶远志Polygala tenuifolia Willd.或卵叶远志P.sibirica L.的根。主产山西、陕西、河北、河南。苦、辛，温。入心、肺、肾经。安神益志，祛痰止咳，消痈肿。①治神经衰弱，惊悸，失眠，健忘，梦遗，中风，癫痫，咳嗽痰多。煎服：3～9克。②治痈疽疮肿。研末浸酒饮，药渣敷肿处。远志的嫩苗名小草，又名细草，煎服治虚损，梦遗，有益精、补阴功能。本品含皂甙，水解得远志皂甙元A、B(Tenuigenin A、B)。另含远志醇、细叶远志定碱(Tenuidine)、脂肪油、树脂等。全远志、皮有祛痰作用。全远志、皮、木对动物均有加强催眠药的作用，全远志有抗惊厥作用，远志有溶血作用。远志皂甙能刺激胃粘膜而反射地引起轻度恶心，故胃炎及胃溃疡病人应避免使用。煎剂和流浸膏对动物子宫有兴奋作用。乙醇提取液体外对革兰氏阳性菌，痢疾、伤寒及人型结核杆菌有抑制作用。

远志筒 见《中药材手册》。为远志之药材名，详该条。

坎气 见《本草从新》。为脐带之处方名，详该条。

均姜 见《本草纲目》。为干姜之别名，详该条。

块根木蓝 见《中国药典·一部》1977年版。为豆科植物块根木蓝Indigofera neopolygaloides Hu的块根。分布贵州。苦，寒。止痛消炎。治胃痛，胃肠炎，咽喉痛，扁桃体炎。煎服：15～30克；研末服，一次2～3克，一日三次。

杠板归 见《中国药用植物志》。又名扛板归、河白草、犁尖草、五毒草、三角藤、蛇倒退。为蓼科植物杠板归Polygonum perfoliatum L.的全草。我国大部分地区有分布。酸，凉。利水消肿，清热解毒。①治肾炎水肿，小便不利，淋浊，腹泻，痢疾，黄疸，上呼吸道感染，气管炎，百日咳，急性扁桃体炎，瘰疬。煎服：15～30克。②治湿疹，带状疱疹，天泡疮，捣敷或煎水洗；痈疖肿毒。内服或捣敷；毒蛇咬伤。捣汁调酒服，并捣敷创口周围。本品含靛甙等，预试有蒽甙、强心甙、鞣质反应。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌，痢疾、大肠、伤寒及绿脓杆菌等有抑制作用。

杠柳皮 见《科学的民间药草》。为香加皮之别名，详该条。

杜牛膝 见《本草备要》。即土牛膝，详该条。

杜瓜 见《浙江中药手册》。为栝楼之别名，详该条。

杜仲 出《神农本草经》。又名木绵、思仲、丝棉皮、扯丝皮、丝连皮。为杜仲科植物杜仲Eucommia ulmoides Oliv.的树皮。主产四川、陕西、湖北、河南、贵州、云南。甘、微辛，温。入肝、肾经。补肝肾，壮筋骨，安胎，降血压。治腰膝酸痛，筋骨痿弱，阳痿，尿频，先兆流产，高血压病。煎服：9～15克。杜仲初生的嫩叶名樗芽，治风毒脚气，风冷痔血。树皮含杜仲胶，是一种难溶于水、易溶于酒精的硬橡胶类物质，还有抗高血压的主要成分松脂醇二葡萄糖甙(Pinoresinol diglucoside)以及杜仲醇(Eucommiol)筋骨草甙(Ajugoside)、哈帕甙乙酸酯(Harpagide acetate)等。对正常及高血压狗有持久、较弱的降低血压作用。重复给药在急性试验中，能产生急速耐受性。炒杜仲降压作用比生杜仲大，煎剂比酊剂作用强。对动物还有镇静、利尿作用。

杜茎山 出《本草图经》。又名水麻叶、山茄子、踏天桥。为紫金牛科植物杜茎山Maesa japonica (Thunb.) Moritzi的根或茎叶。分布长江流域各地及台湾、福建、云南、广西、广东。苦，寒。祛风利尿，止痛，消肿止血。①治感冒头痛，水肿，腹水，腰痛。

煎服：15～30克。②治外伤出血，跌打损伤，骨折，疔疮肿毒。鲜叶捣敷。本品含杜茎山醌。

杜鹃花 出《本草纲目》。又名艳山花、清明花、映山红、水踯躅。为杜鹃花科植物杜鹃Rhododendron simsii Planch.的花。分布长江流域，东至台湾，西达四川、云南。酸，平，有小毒。化痰止咳，活血止血，祛风湿。治支气管炎，月经不调，闭经，崩漏，吐血，衄血，风湿痛。煎服：9～15克。孕妇忌服。本品含矢车菊素和杜鹃黄素的糖甙。煎剂和浸膏对小鼠有镇咳、祛痰作用。

杜鹃花叶 见《浙江民间常用草药》。为杜鹃花科植物杜鹃Rhododendron simsii Planch. 的叶。酸，平，有毒。镇咳祛痰，清热解毒。①治慢性气管炎。煎服：9～15克。②捣敷治痈肿疔疮，外伤出血；煎水洗治荨麻疹。本品含杜鹃花醇、杜鹃花醇甙、槲皮素槲皮甙、金丝桃甙、均为祛痰和镇咳的有效成分。

杜鹃花根 见《浙江民间常用草药》。又名翻山虎、搜山虎。为杜鹃花科植物杜鹃Rhododendron simsii Planch. 的根或根皮。酸、甘，温。活血，止血，祛风，止痛。①治吐血，衄血，肠风下血，月经不调，闭经，崩漏，白带，痢疾，风湿疼痛，乳痈初期。煎服：15～30克。②捣敷治跌打损伤。孕妇忌服。根皮含鞣质。

杜衡 出《土宿本草》。又名土细辛、马蹄香、马辛、南细辛。为马兜铃科植物杜衡Asarum forbesii Maxim.的根或全草。产江苏、浙江、安徽、湖南等地。辛，温，有小毒。祛风散寒，止痛，平喘。①治风寒头痛，牙痛，痰饮喘咳，胃痛，肋间神经痛，疝气腹痛，风寒湿痹，跌打损伤。煎服：1.5～3克。②捣敷治毒蛇咬伤；加黄连等量研末搽口舌疮。孕妇忌服。本品含挥发油，主成分为黄樟醚及少量丁香油酚。煎剂灌胃对小鼠有镇痛作用。黄樟醚有中枢抑制作用；家畜长期服用，能使肝、肾发生脂肪变性。

杉子 见《本草纲目》。即杉果，详该条。

杉木 出《新修本草》。又名杉材。为杉科植物杉木Cunninghamia lanceolata (Lamb.)Hook. 的心材及树枝。分布我国淮河、秦岭以南地区。辛，微温。入脾、胃经。祛风燥湿，解毒消肿，下气止痛。①治漆疮，臁疮，脚气，风疹痒疮。煎水洗；烧伤。烧灰存性研末油调敷。②治奔豚，心腹胀痛。煎服：30～60克。木材含挥发油，其中主要为雪松醇，柠檬烯，桉叶素等。

杉木节 出《本草图经》。又名杉节。为杉科植物杉木Cunninghamia lanceolata (Lamb.)Hook.枝干上的结节。祛风，活血，止痛。①治心气痛，骨节疼痛，痞块，带下。内服：煎汤，30～60克；或浸酒服。②治跌打血瘀。煅存性研末，每服1～1.5克，日服三次，童便送下。③治慢性下肢溃疡。煅存性研末油调涂；脚气，煎水洗。

杉木皮 出《分类草药性》。即杉皮，详该条。

杉木油 出《本草纲目拾遗》。为杉木木部的油脂。用纸糊碗面，以杉木屑堆纸上，取炭火放屑顶烧着，待烧至近纸时除去，再堆木屑重烧如此数次，即有油汁积碗内。治顽癣。以洁净毛笔蘸涂之，涂油前先将患处皮肤刮破。

杉木根 出《分类草药性》。又名杉树根。为杉科植物杉木Cunninghamia lanceolata (Lamb.)HooK.的根皮。辛，温。①治淋病，疝气，痧秽腹痛转筋。煎服：15～30克。②治风湿性关节炎，跌打损伤。煎服或捣烂调酒敷。③烧存性研末敷金疮；煎水洗疥癣。

杉节 见《生草药性备要》。为杉木节之简称，详该条。

杉叶 出《本草纲目》。为杉科植物杉木Cunninghamia lanceolata (Lamb.)

Hook.的叶。①治慢性气管炎。煎服：15～30克。②治牙痛，煎水含漱；天疱疮，捣汁外涂；鹅掌风，先用做豆腐的黄浆水洗净患处，再用叶烧烟熏；跌打扭伤，捣烂调酒外敷；烧伤。煅存性研末调敷。本品含榧双黄酮(Kayaflavone)、扁柏双黄酮、苏铁双黄酮。

杉皮 出《本草纲目》。又名杉木皮。为杉科植物杉木 Cunninghamia lancelaota (Lamb.) Hook.的树皮。①治水肿。煎服：15～30克。②治脚气，漆疮，流火，煎水洗；金疮出血，烫火伤，煅存性研末调鸡蛋清搽。

杉材 出《本草经集注》。即杉木。详该条。

杉果 见《民间常用草药汇编》。又名杉子、杉塔。为杉科植物杉木Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.的球果。辛，微温。①治慢性气管炎，疝气，乳痈。煎服：30～90克。②研末调搽治白癜风。

杉树根 见《四川中药志》。即杉木根，详该条。

杉塔 见《全国中草药汇编》。即杉果，详该条。

杓儿菜 见《全国中草药汇编》。为挖耳草之别名，详该条。

杓菜 见《广州植物志》。为菩菇菜之别名，详该条。

杠果 见萧步丹《岭南采药录》。又名庵罗果、蜜望子、榹果、芒果、望果。为漆树科植物杠果Mangifera indica L.的果实。分布云南、广西、广东、福建、台湾。甘、酸，凉。止咳，益胃，活血通经。治咳嗽，晕船呕吐，坏血病，妇女经闭。内服：生食。果实含三萜酸：杠果酮酸 (Mangiferonic acid)、异杠果醇酸(Isomangiferolic acid)、阿波酮酸(Ambonic acid)、阿波醇酸(Ambolic acid)；多酚类化合物：没食子酸、并没食子酸、间双没食子酸、没食子鞣质；槲皮素、异槲皮甙、杠果甙、多种类胡萝卜素（β-胡萝卜素及胡蝶梅黄素等十多种）及一些B族维生素（B_1、B_2及叶酸）。

杠果叶 见萧步丹《岭南采药录》。为漆树科植物杠果Mangifera indica L.的叶。酸、甘，凉。清热止咳，健胃消滞。治急、慢性支气管炎，消化不良。煎服：15～30克。煎水洗治湿疹瘙痒。叶含维生素C、鞣质、杠果甙、树脂、氢氰酸和黄酮类等。煎剂及其提取物有某些镇咳、祛痰作用。体外对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有抑制作用。

杠果核 见萧步丹《岭南采药录》。为漆树科植物杠果Mangifera indica L.的果核。酸、涩，平。行气，消滞。治疝气，睾丸炎，食滞。煎服：15～30克。果仁含脂肪，其脂肪酸组成主要为油酸、硬脂酸，尚含谷甾醇和多量淀粉。种子含氢氰酸。

杞子 见《藏府药式补正》。为枸杞子之简称，详该条。

杨花 出《摘元方》。为柳花之别名，详该条。

杨波叶 见《福建中草药》。为白鱼尾之别名，详该条。

杨树花 见《中国药典·一部》1977年版。为杨柳科植物毛白杨Populus tomentosa Carr.、加拿大杨P. canadensis Moench或同属几种植物的雄花序。前者分布辽宁、华北、西北、华东；后者分布东北、华北及甘肃，南至长江流域及福建、贵州、广西。苦，寒。化湿止痢。治细菌性痢疾，急性肠炎。煎服：50～100克。

杨桃 见《生草药性备要》。即阳桃，详该条。

杨梅 出《食疗本草》又名圣生梅、白蒂梅、朱红、树梅。为杨梅科植物杨梅Myrica rubra (Lour.) Sieb. et zucc.的果实。分布长江以南各地。甘、酸，温。入肺、胃经。生津解渴，和胃消食。①治烦渴，口腔咽喉炎症，胃痛，食欲不振，吐泻，痢疾。内服：生食，浸酒或腌食，15～30克。②治头痛。

干果研末搐鼻；烫火伤。烧存性油调敷。本品含糖，有机酸，花色素的单葡萄糖甙和双葡萄糖甙及微量的杨梅树皮素。

杨梅根 出《本草纲目》。为杨梅科植物杨梅Myrica rubra(Lour.)Sieb.et zucc.的根或根皮。辛、苦，温。理气，止血，化瘀。①治胃痛，膈食呕吐，疝气，痢疾，吐血，血崩，痔血。煎服：鲜品，30～60克。②治跌打损伤，煎服并熏洗；牙痛，煎水漱；外伤出血，研末敷；恶疮，疥癣，煎水洗；火烫伤，煅存性研末油调敷。本品含鞣质。根皮干粉有止血作用，水煎剂对痢疾杆菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等有抑制作用。

杨梅树皮 出《本草纲目》。为杨梅科植物杨梅Myrica rubra(Lour)Sieb. et zucc.的树皮。苦，温。理气，散瘀，止痛，利湿。①治肠胃气滞疼痛，痢疾。煎服：15～30克。②治跌打损伤，煎服并用米酒少许捣烂外敷；牙痛，煎水漱；目翳，煎水熏眼；恶疮，疥癣，煎水洗；火烫伤，研末油调涂。孕妇忌服。本品含杨梅树皮甙、杨梅树皮素、大麻甙(Cannabiscitrin)、鞣质。体外试验，煎剂对痢疾杆菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等均有抑制作用。杨梅树皮素有利尿及略丁样作用。

豆卷 见《本草便读》。为大豆黄卷之简称，详该条。

豆须子 见《山东中草药手册》。为菟丝子之别名，详该条。

豆豉 见《本经疏证》。即淡豆豉，详该条。

豆豉姜 见《南宁市药物志》。又名澄茄根、木姜子根。为樟科植物山鸡椒Litsea cubeba(Lour.)Pers.的根。分布长江以南各地。辛，温。祛风散寒，行气止痛。治风寒感冒头痛，风湿痹痛，胃痛，跌打损伤。煎服：6～9克（鲜品15～30克）。根皮含挥发油，油中含柠檬醛、香茅醇及芳樟醇等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌、绿脓杆菌均有抑制作用。水浸剂在体外还能杀灭丝虫幼虫。

豆豉菜根 见《贵州民间方药集》。即蜘蛛香，详该条。

豆菜 见《贵州民间药物》。为歪头菜之别名，详该条。

豆寄生 见《植物学大辞典》。为菟丝之别名，详该条。

豆渣草 见《四川中药志》。为狼把草之别名，详该条。

豆渣菜 见《陕西中草药》。为金盏银盘之别名，详该条。

豆稔干 见《广西中药志》。为山稔子之别名，详该条。

豆蔻 见《中药材手册》。即白豆蔻，详该条。

豆蔻壳 见《饮片新参》。为白豆蔻壳之处方名，详该条。

豆瓣柴 见《贵州民间药物》。为铁仔之别名，详该条。

两叶豆苗 见《中国主要植物图说·豆科》。为歪头菜之别名，详该条。

两头尖 出《本草品汇精要》。为竹节香附之别名，详该条。

两头根 见《浙江中药手册》。为腹水草之别名，详该条。

两面针 ❶见萧步丹《岭南采药录》。为入地金牛之别名。❷见《广西药用植物名录》。为虎刺之别名。各详该条。

丽枝 见《本草纲目拾遗》。为荔枝之别名，详该条。

克蛇龟 见《浙江中药手册》。为夹蛇龟之别名，详该条。

汞粉 出《本草拾遗》。即轻粉，详该条。

壳菜 出《嘉祐补注神农本草》。为淡菜之别名，详该条。

壳槟榔 见《药材学》。为枣槟榔之别名，详该条。

芙蓉花 见《岭外代答》。即水芙蓉花，

详该条。

芙蓉花叶 见《普济方》。即木芙蓉叶，详该条。

芫花 出《神农本草经》。又名药鱼草、头痛花、老鼠花、癞头花、棉花条、芫条花、锁腰带。为瑞香科植物芫花 Daphne genkwa Sied. et Zucc.的花蕾。产安徽、江苏、浙江、四川、山东、湖南等地。辛、苦，温，有毒。入肺、脾、肾经。泻水逐饮，杀虫。①治水肿胀满，痰饮积癖，咳逆上气，痛引胸胁，瘴疟，精神病。内服：煎汤，1.5～3克；研末0.6～0.9克，日服一次。②治白秃头疮，研末调敷。醋制可使其毒性减弱，并加强逐水作用。孕妇忌服。反甘草。本品含芫花素、羟基芫花素、芹菜素、苯甲酸及谷甾醇等。芫花素能刺激肠粘膜，引起剧烈的水泻和腹痛。煎剂给大鼠口服和麻醉狗静脉注射，均可引起利尿作用。水浸剂在体外对某些皮肤真菌有抑制作用，醋制或苯制芫花的醇提取液及羟基芫花素对实验动物有止咳、祛痰作用。

芫花根 出《吴普本草》。又名金腰带。为瑞香科植物芫花Daphne genkwa Sieb. et Zucc.的根。分布长江流域及山东、河南、陕西等地。辛、苦，温，有毒。逐水，消肿，解毒。①治水肿，风湿痛，跌打损伤，瘰疬，便毒。煎服：2.4～4.5克。②治急性乳腺炎初起，取根二层皮捣搓小团，塞鼻孔内，约20分钟即有热辣感，再过5分钟取出；治瘤或鼠奶痔，鲜根置石器内(忌铁)捣取汁，以之浸渍丝线半日或一宿制成药线系之；治多种牙痛，芫花根二层皮，用75%酒精浸泡三至五天，以棉球蘸液置痛处3～5分钟，即可止痛。孕妇忌服。反甘草。根皮含芫根甙、芫根乙素、β-谷甾醇等。近来又得到芫花酯甲(Yuanhuacine)，对动物有引产作用，并具有刺激皮肤的副毒作用。根的碳酸溶解部分对动物子宫有明显的兴奋作用。麻醉猫静脉注射，除引起短暂的血压下降外，亦出现子宫收缩。中毒剂量可延长凝血时间，并出现血尿。芫根乙素对鱼有很强毒性，给离体豚鼠心脏灌流时，有扩张冠状血管作用。

芫条花 见《山东中药》。为芫花之别名，详该条。

芫青 出《名医别录》。为青娘子之别名，详该条。

芫荽 出《日用本草》。又名胡荽、香菜。为伞形科植物芫荽 Coriandrum sativum L.的带根全草。我国各地均有栽培。辛，温。入肺、胃经。发汗透疹，健胃消食。治麻疹透发不畅，感冒发热无汗，食滞胃痛，痞闷。煎服：9～15克。透疹亦可用鲜品煎汤熏洗。全草含具恶臭的癸醛。

芫荽子 见《现代实用中药》。又名胡荽子、香菜子。为伞形科植物芫荽Coriandrum sativum L.的果实。主产江苏、安徽、湖北。辛，微温。透疹，健胃。①治痘疹透发不畅，食欲不振，消化不良，痢疾。煎服：6～12克。②治牙痛，煎水含漱；脱肛，醋煮熏洗。果实含挥发油，油中主含芳樟醇，尚有α-和β-蒎烯、柠檬烯，对聚伞花素、龙脑、莰烯等。另含脂肪油，其脂肪酸中以岩芹酸的含量最高。本品能增进胃肠腺体分泌和促进胆汁分泌。挥发油具有抗皮肤真菌作用。

芫荑 出《神农本草经》。又名山榆仁、臭芫荑、白芫荑、大果榆糊。为榆科植物大果榆 Ulmus macrocarpa Hance 果实的加工品。主产山西、河北；东北各地亦产。辛、苦，平。入脾、胃经。杀虫，消积。①治蛔虫、绦虫病腹痛，小儿疳积泻痢，肠风，痔漏，皮肤骨节中如虫行。煎服：4.5～9克。②治疮疥、湿癣，研末蜜调涂；虫牙作痛，以一小块安蛀孔中。本品含鞣酸等。醇提取物在体外对猪蛔虫有杀灭作用。水浸剂在试管内对某些常见的致病性皮肤真菌有不同程度的抑制作用。

芫菁 出《名医别录》。又名九英菘、诸

葛菜、蔓菁、大头菜。为十字花科植物芜菁Brassica rapa L.的块根及叶。我国各地均有栽培。辛、甘、苦，平。下气，宽中，清利湿热，①治食积不化，消渴，黄疸。煎服：30～60克。②治热毒风肿，疔疮，乳痈，阴囊肿大，捣烂外敷；小儿秃疮，烧灰油调涂。叶、根的水提取物在体外可抑制大肠杆菌的生长。块根皮中含黄色油状物有抑制细菌、真菌的作用。以提取物饲喂大鼠，可增加甲状腺中碘酪氨酸而降低碘甲腺氨酸的量。

芜菁子 出《名医别录》。又名蔓菁子。为十字花科植物芜菁Brassica rapa L.的种子。苦、辛，平。入肝、脾经。清热利湿，明目，解毒。①治黄疸，痢疾，小便不利，青盲，目暗。煎服：3～9克。②研末敷痈疽疮毒。本品含挥发性异硫代氰酸盐。

苇茎 出《千金要方》。为芦茎之别名，详该条。

苇根 见《温病条辨》。为芦根之别名，详该条。

芸皮 见《药材资料汇编》。为橘红之别名，详该条。

芸红 见《药材资料汇编》。为橘红之别名，详该条。

芸香草 ❶见《四川中药志》。又名诸葛草、香茅筋骨草、香茅草、射香草、石灰草。为禾本科植物芸香草Cymbopogon distans (Nees) A. Camus的地上部分。分布甘肃、陕西、四川、贵州、云南等地。辛、苦，温。散寒利湿，止咳平喘，行气宽中，治感冒，喘咳，风湿筋骨酸痛、麻木，胸腹胀痛，消化不良，肠炎。煎服：15～30克。本品含挥发油，油中含胡椒酮、蒈烯-4、牻牛儿醇、牻牛儿醛、柠檬烯等。芸香油和胡椒酮在动物试验中有显著平喘、止咳作用、并能抑制离体兔肠平滑肌；体外试验，对革兰氏阳性球菌及杆菌、革兰氏阴性球菌及杆菌均有不同程度的抑制作用。❷见《滇南本草》。为挖耳草之别名，详该条。

芸薹 出《新修本草》。又名芸薹菜、红油菜。为十字花科植物芸薹Brassica campestris L.或油菜B.campestris L. var. oleifera DC.的嫩茎叶。全国大部分地区有栽培。辛，寒。散血，消肿。①治劳伤吐血，血痢，瘾瘕。内服：煎汤，60～150克；或捣汁燉温服。②捣敷治丹毒，乳痈。油菜含少量槲皮甙和维生素K，并分离出淀粉样蛋白及一种12S球蛋白。

芸薹子 出《备急千金要方·食治》。又名油菜子。为十字花科植物芸薹Brassica campestris L.或油菜B. campestris L. var. oleifera DC.的种子。主产安徽、浙江、山西。辛，温。行瘀，消肿，散结。①治痛经，产后血滞腹痛，肠风下血，血痢，腹胀，大便秘结。煎服：4.5～9克。②治丹毒，痈肿。研末调敷。芸薹子的脂肪油名油菜子油，又名香油、菜子油，治肠梗阻，汤火灼伤，湿疹。油菜种子含脂肪40～50%，蛋白质23%，芸香甙和一种能生成异硫代氰酸巴豆醇酯的甙。种子油中含大量芥酸，以及甾醇、生育酚等。

芸薹菜 见《日用本草》。即芸薹，详该条。

苣荬菜 出《植物名实图考》。又名牛舌头、野苦荬、山苦荬、北败酱。为菊科植物苣荬菜Sonchus arvensis L.的全草。分布广东、广西、湖南、四川、江苏及其他温暖地区。苦，寒。清湿热，消肿排脓，凉血，化瘀解毒。①治阑尾炎，肠炎，痢疾，吐血，衄血，便血，倒经，产后瘀血腹痛。煎服：9～15克。②捣敷疮疖痈肿；煎水熏洗痔疮。全草含胆碱、酒石酸。乳汁中含蒲公英甾醇、莴苣苦素(Lactucopicrin)、甘露醇、肌醇等。

苋实 出《神农本草经》。又名苋菜子。为苋科植物苋Amaranthus mangostanus L.的种子。我国各地均有栽培。甘，寒。入肝、大肠、膀胱经。清肝明目，通利二便。治目

赤肿痛，角膜云翳，青盲，乳糜血尿，二便不利。内服：煎汤，6～9克；或研末服。

苋根 出《石药尔雅》。又名地筋。为苋科植物苋Amaranthus mangostanus L.的根。甘，寒。活血，凉血，解毒。治细菌性痢疾，肠炎，吐血，血崩，白带，癥瘕，痔疮，跌打损伤。煎服：鲜品15～30克。苋的茎叶名苋菜，煎服治痢疾，二便不通；煎水洗治漆疮瘙痒。

苋菜子 见《得配本草》。即苋实，详该条。

花木通 见《贵州民间药物》。为破骨风之别名，详该条。

花龙骨 见《中国药学大辞典》。为龙骨之处方名，详该条。

花叶细辛 见《四川中药志》。为花叶矮沱沱之别名，详该条。

花叶矮沱沱 见《四川中药志》。又名花叶细辛。为楝科植物地黄连Munronia sinica Diels的全草。分布四川。辛，温。祛风，活血，解毒。治咳嗽，风湿疼痛，跌打损伤。内服：煎汤，9～15克；或浸酒。捣敷治无名肿毒。

花生 出《酉阳杂俎》。即落花生，详该条。

花生衣 见《安徽中草药》。为豆科植物落花生Arachis hypogaea L.的种皮。甘、微苦、涩，平。止血。治血友病，类血友病，原发性及继发性血小板减少性紫癜，肝病出血症，术后出血，癌肿出血，胃、肠、肺、子宫等出血。内服：煎汤，3～6克；或制成糖浆、片剂服。大量口服能缓解类血友病患者的出血症状，花生米皮的效力较花生米本身强50倍，炒熟后效力大减。其止血与抗纤维蛋白溶解有关；还能增加第Ⅸ及第Ⅶ因子的血中含量。

花生草 见《浙江民间常用草药》。为鸡眼草之别名，详该条。

花扫条 见《中国药用植物志》，为一叶荻之别名，详该条。

花壳虫 见《中药志》。为斑蝥之别名，详该条。

花乳石 出《嘉祐补注神农本草》。即花蕊石，详该条。

花粉头 见萧步丹《岭南采药录》。为紫茉莉根之别名，详该条。

花脸荞 见《贵州民间方药集》。为赤胫散之别名，详该条。

花斑毛 见《中药志》。即斑蝥，详该条。

花椒 出《日用本草》。又名川椒、蜀椒、点椒。为芸香科植物青椒Zanthoxylum schinifolium Sieb.et Zucc.或花椒Z.bungeanum Maxim.的果皮。主产辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、河南；四川亦产。辛，温，有小毒。入脾、胃、肾经。温中散寒，止痛，燥湿，杀虫。①治胃腹冷痛，呕吐，泻痢，风寒湿痹，疝痛，蛔虫病。煎服：1.5～4.5克。②治蛲虫病，煎液灌肠；阴痒，煎水洗；齿痛，醋煎含漱。青椒果实含挥发油，其中含爱草脑；果皮还含佛手柑内酯、苯甲酸和香叶木甙。花椒果实含挥发油，其中含牻牛儿醇、柠檬烯等。尚含甾醇，不饱和有机酸等。小量牻牛儿醇对兔离体肠管呈兴奋作用，大量则抑制。稀醇液还有局部麻醉作用。煎剂在体外对甲、乙型链球菌，葡萄球菌，肺炎球菌，白喉、变形、伤寒、副伤寒、大肠、宋氏痢疾、绿脓等杆菌和霍乱弧菌均有抑制作用。

花椒叶 出《本草纲目》。又名椒叶。为芸香科植物花椒Zanthoxylum bungeanum Maxim.的叶。除东北、新疆外，各地均有分布。辛，热。治脚气，漆疮，疥疮，煎水洗；蛇咬伤，捣敷。

花碱 见《圣济总录》。为灰碱之别名，详该条。

花旗参 见《中国药用植物志》。为西洋参之别名，详该条。

花蕊石 出《嘉祐补注神农本草》。又名

花乳石。为变质岩类岩石含蛇纹石大理岩的石块。产陕西、河南、河北等地。酸、涩，平。入肝经。化瘀止血。治吐血，衄血，便血，崩漏。内服：煎汤，4.5～9克；煅研末冲服，一次量0.3～0.9克。研末敷创伤出血。本品主含钙、镁的碳酸盐。

花蝴蝶 见《贵州民间方药集》。为赤胫散之别名，详该条。

花蝴蝶根 见《贵州民间方药集》。又名皂药根、血当归、鸡脚七。为蓼科植物缺腰叶蓼Polygonum runcinatum Buch.-Ham的根。分布台湾、湖北、湖南、四川、云南、贵州等地。苦、涩，寒。清热，解毒，活血。①治高热神昏，肺痨咳嗽，瘰疬，急性胃肠炎，吐血，痔血，风湿痹痛，月经不调。煎服：15～30克。②治跌打损伤，泡酒服并取渣捣敷；痈疖肿毒，醋磨搽；汤火伤，研末调搽；蛇咬伤，捣敷。孕妇忌服。

芹叶钩吻 见《植物学大辞典》。为毒芹之别名，详该条。

芹菜 ❶出《尔雅·郭璞注》。即水芹。❷出《名医别录》。即旱芹。各详该条。

芥子 出《名医别录》。又名芥菜子、黄芥子。为十字花科植物芥菜Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. 的种子。全国各地均产。辛，温。入肺经。利气豁痰，温中散寒，消肿止痛。①治咳喘痰多，胸胁胀痛，胃寒吐食，心腹疼痛，阴疽痰核。煎服：3～9克。②治跌打损伤，关节疼痛。研末醋调敷。本品含黑芥子甙(Sinigrin)、芥子酶(Myrocin)、芥子酸、芥子碱、脂肪油等。芥子泥对皮肤有刺激作用。可引起皮肤潮红、疼痛、充血等，时间稍久则产生水泡。此乃由于黑芥子甙为芥子酶水解生成一种有刺激性的挥发油所引起。内服可作刺激性祛痰药，过量可引起肠胃道炎症。

芥菜 出《备急千金要方·食治》。又名雪里蕻、皱叶芥、黄芥。为十字花科植物芥菜Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. 的嫩茎叶。辛，温。通肺豁痰，利膈开胃。①治寒饮内盛，咳嗽痰滞，胸膈满闷。煎服：30～60克。②治牙龈肿烂，烧存性研末敷；漆疮瘙痒，煎水洗。

芥菜子 ❶见《中药志》。为白芥子之别名。❷出《孙天仁集效方》。即芥子。各详该条。

苍子 见《东北药用植物志》。为苍耳子之简称，详该条。

苍子棵 见《山东中草药手册》。为苍耳之别名，详该条。

苍术 出《经史证类备急本草》。又名赤术、枪头菜。为菊科植物茅苍术Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 或北苍术 A. chinensis (DC.) Koidz.的根茎。主产江苏及东北，华北地区。辛、苦，温。入脾、胃经。燥湿，健脾，祛风，明目，辟秽。①治湿困倦怠，脘腹胀满，食欲不振，恶心呕吐，泄泻，痢疾，痰饮癖积，皮肤水肿。②治脾湿下注，足膝痿软，肠风，带下，小便浑浊。③治时邪感冒，寒热头痛，疟疾，风湿痹痛。④治夜盲症，小儿软骨病。煎服：4.5～9克。本品含挥发油，油中主成分为茅术醇(Hinesol)，β-桉叶醇，还含苍术酮(Atractylone)、糠醛等。煎剂对家兔实验性糖尿病有降低血糖作用；对大鼠有明显排钠、钾、氯的作用。但无利尿作用。

苍耳 出《备急千金要方·食治》。又名胡菜、菜耳、野茄、羊负来、喝起草、痴头婆、粘粘葵、疔疮草、苍子棵。为菊科植物苍耳Xanthium sibiricum Patrin的茎叶。苦、辛，寒，有小毒。散风湿，通鼻窍，消肿毒。①治感冒头痛，鼻渊，湿痹拘挛，麻风，痢疾。煎服：15～30克，②煎水洗风疹瘙痒；痈疽肿毒。内服过量，产生恶心，呕吐，腹痛，呼吸困难，烦躁不安，肢冷，昏迷等中毒症状，严重者可致呼吸、循环衰竭而死亡。苍耳花：煎服治白痢；捣敷治白癜风痒。叶含苍耳内酯(Xanthinin)、隐苍耳内酯

(Xanthumin)、苍耳醇(Xanthanol)、异苍耳醇、胆碱、植物甾醇及萜醇。叶的浸剂可增强兔离体肠管运动、离体兔耳血管扩张，并抑制蛙心的冲动传导。叶的酊剂给猫静脉注射，可引起血压下降和抑制脊髓反射的兴奋性。

苍耳子 出《备急千金要方·食治》。又名葈耳实、苍子、苍棵子、牛虱子。为菊科植物苍耳Xanthium sibiricum Patrin带总苞的果实。全国各地均产。甘、苦，温，有小毒。入肺、肝经。散风湿，通鼻窍，止痛，杀虫。治风寒头痛，鼻渊，鼻塞，风湿痹痛，肢体拘挛，麻风，疥癞，皮肤瘙痒。煎服：4.5～9克。用量不宜过大，中毒症状参阅苍耳条。本品含苍耳子甙(Xanthostrumarin)、氢醌、生物碱、β-谷甾醇、豆甾醇、脂肪油。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌等有抑制作用。醇提取物对红色毛癣菌有抑制作用。苍耳子的主要毒性成分，可能是一种甙类性质的物质，它能引起动物的血糖急剧下降而致惊厥和死亡。动物的病理解剖还发现，中毒后肾脏、肝脏都受到损害，脑组织有继发性水肿。水浸或高热处理可解除其毒性。

苍耳虫 见《本草纲目》。即苍耳蠹虫，详该条。

苍耳根 出《食疗本草》。为菊科植物苍耳Xanthium sibiricum Patrin的根。辛，温。①治疔疮，痈疽，丹毒。内服：煎汤或捣汁。外用：捣敷或熬膏敷贴。②治咳嗽，风湿痹痛，痢疾，高血压病，肾炎水肿，乳糜尿，宫颈炎。煎服：15～30克。本品含糖甙。水或甲醇提取物能延长接种艾氏腹水癌小鼠的寿命，可减轻患肉瘤180的小鼠肉瘤的重量。

苍耳蠹虫 出《本草纲目》。又名麻虫、苍耳虫。为寄居于菊科植物苍耳茎中的一种昆虫的幼虫。解毒。治疔肿，无名毒肿，恶疮，痔疮。以香油浸渍，用时取适量捣烂外敷患处。

苍条鱼鳖 见《浙江中药资源名录》。又名石豇豆、卧龙草、马黄七、鸭舌韦。为水龙骨科植物石蕨 Saxiglossum angustissimum(Gies.) Ching的全草。分布浙江、福建、台湾、广东、广西、贵州、四川、江西、安徽、湖北、河南、山西、陕西和甘肃。苦，平。活血，止痛，利尿。①治疝气肿痛，小便不利，吐血，衄血，崩漏，带下，月经不调。煎服：15～30克。②治跌打损伤，筋骨疼痛。捣汁滴鼻内。

苍棵子 见《陕西中草药》。即苍耳子，详该条。

苍蝇花 见《宁夏中草药手册》。为补血草之别名，详该条。

苍蝇翼 ❶见《福建中草药》。为夜关门之别名。❷见《广东中草药》。为丁癸草之别名。各详该条。

芡实 出《本草纲目》。又名鸡头、鸡头米、刺莲蓬实。为睡莲科植物芡 Euryale ferox Salisb.的种仁。主产山东、湖北、湖南、江苏等地。甘、涩，平。入脾、肾经。益肾固精，补脾止泻。治遗精，滑精，尿频，遗尿，白浊，带下，久泻。煎服：9～15克。芡根：治疝气，白浊，白带。芡茎：止烦渴，除虚热。种子含淀粉、蛋白质、脂肪、糖类、维生素B_1、B_2、C及无机盐等。

芳香草 见《云南中草药》。为透骨香之别名，详该条。

芳樟 见《中国高等植物图鉴》。即樟木，详该条。

苎根 出《名医别录》。即苎麻根，详该条。

苎麻根 出《药性论》。又名苎根。为荨麻科植物苎麻Boehmeria nivea (L.) Gaud.的根及根茎。主产浙江、山东、陕西。甘，寒。入肝、脾经。清热利尿，止血安胎，解毒消肿。①治尿路感染，水肿，小便不利，尿血，便血，崩漏，赤白带下，妊娠胎动，

胎漏下血，吐血，咯血，衄血，煎服：9～30克。②治热毒痈肿，丹毒，痔疮肿痛，跌打损伤。鲜根捣烂敷。本品含绿原酸。预试尚含酚类、三萜(或甾醇)。浸膏酸化后的乙醇提取物的水溶性注射液及绿原酸衍生物，对小鼠可缩短血凝时间，并有局部止血作用。

芦子 见《云南中草药选》。为蒟酱之别名，详该条。

芦巴 见《本草原始》。为胡芦巴之简称，详该条。

芦叶 出《新修本草》。又名芦箬。为禾木科植物芦苇Phragmites communis (L.) Trin.的叶。分布几遍全国。甘，寒。①治呕逆吐泻，吐血，衄血，肺痈。内服：煎汤，30～60克；或煅存性研末。②治发背溃烂。研末敷。本品含纤维素、戊聚糖、木质素、维生素C。

芦尖 见《要药分剂》。为芦笋之别名，详该条。

芦竹根 见《四川中药志》。又名芦荻头。为禾本科植物芦竹Arundo donax L.的根茎。分布西南、华南地区及江苏、浙江、安徽、福建、湖南等地。苦，寒。入肺、胃经。清热，利水。治热病发狂，虚劳骨蒸，淋病，小便不利，风火牙痛。煎服：15～30克。根茎含N，N-二甲基色胺、5-甲氧基-N-甲基色胺、蟾毒色胺(Bufotenine)等。根茎脱脂乙醇提取物，有降压及解痉作用；所含蟾蜍特尼定有抗乙酰胆碱作用。

芦竹笋 见《重庆草药》。为禾本科植物芦竹Arundo donax L.的嫩苗。苦，寒。清热泻火。治肺热吐血，骨蒸潮热，头晕，热淋，牙痛。煎服：15～60克。捣汁加冰片，滴耳，治中耳炎。芦竹沥：治小儿高热惊风。开水冲饮。

芦芽根 见《山东中药》。即芦根，详该条。

芦花 出《新修本草》。又名葭花、芦蓬茸。为禾本科植物芦苇Phragmites communis (L.) Trin.的花。甘，寒。止血，解毒。①治血崩，吐泻，食鱼、蟹中毒。煎服：15～30克。②煅存性研末吹鼻治鼻衄；捣敷刀伤出血。本品含戊聚糖、纤维素、木质素。

芦茎 出《新修本草》。又名苇茎、嫩芦梗。为禾本科植物芦苇Phragmites communis (L.) Trin.的茎。甘，寒。入心、肺经。治肺痈烦热。煎服：15～30克(鲜品60～120克)。本品含纤维素、戊聚糖、木质素。

芦荟 出《开宝重定本草》。又名草芦荟。为百合科植物芦荟Aloe vera L.var. chinensis(Haw.)Berger或同属植物叶汁浓缩后的制成品。产广东、广西、福建等地。苦，寒。入肝、胃、大肠经。泻热通便，消积杀虫。①治热结便秘及习惯性便秘，肝火头痛，目赤，惊痫，闭经，小儿疳热虫积。入丸、散服：每日量1.5～4.5克。②治疥癣，痔瘘，瘰疬，研末调涂。孕妇忌服。芦荟叶：鲜叶功用与制成品同；捣汁涂烧烫伤；用鲜芦荟叶浸出液制成20%芦荟注射液，注射于下鼻甲粘膜下，治萎缩性鼻炎。芦荟根：煎服治小儿疳积，尿路感染。芦荟花：煎服治咳血，吐血，尿血。制成品含芦荟大黄素甙、少量异芦荟大黄素甙等。芦荟大黄素甙为刺激性泻下药。水浸剂可轻度促进创伤的愈合；在体外对皮肤某些常见的致病性真菌有不同程度的抑制。醇提取物可抑制小鼠肉瘤-180和艾氏腹水癌生长。

芦荻头 见萧步丹《岭南采药录》。为芦竹根之别名，详该条。

芦根 出《本草经集注》。又名苇根、芦柴根、芦通、芦芽根、甜梗子。为禾本科植物芦苇Phragmites communis (L.) Trin.的根茎。主产安徽、江苏、浙江、湖北等地。甘，寒。入肺，胃经。清热，生津，止呕。①治热病烦渴，鼻衄，齿衄，胃热呕哕，噎膈，反胃，肺热咳嗽，肺痈，肺痿。煎服：30～60克。②解河豚鱼中毒。鲜品0.5公斤，捣汁或煎

服。本品含薏苡素、天门冬酰胺。

芦柴根 见《南京民间药草》。即芦根，详该条。

芦笋 出《本草图经》。又名笋尖。为禾本科植物芦苇Phragmites communis (L.) Trin.的嫩苗。甘，寒。清肺止渴，利水通淋。治热病口渴，淋病，小便不利，解鱼毒。煎服：30～60克。

芦通 见《江苏省植物药材志》。为芦根之别名，详该条。

芦蓬茸 出《小品方》。为芦花之别名，详该条。

芦箬 见《本经逢原》。即芦叶，详该条。

芭蕉汁 出《卫生杂兴》。即芭蕉油，详该条。

芭蕉头 见《分类草药性》。即芭蕉根，详该条。

芭蕉花 出《日华子诸家本草》。为芭蕉科植物芭蕉Musa basjoo Sieb. et Zucc.的花。山东至长江流域以南各地常见栽培。甘、微辛，凉。平肝，化痰，活血。治胃痛，吐酸，胸膈饱胀，痢疾，怔忡不安，心绞痛，经行不畅。煎服：6～9克。心痹痛。烧存性研末，盐汤点服。

芭蕉油 出《日华子诸家本草》。又名蕉油、芭蕉汁、芭蕉树水。为芭蕉科植物芭蕉Musa basjoo Sieb.et Zucc.近根部茎中的液汁。甘，寒。①治风热头痛，烦渴，红丝疔。内服：50～100毫升。②治暗风痫病，晕闷欲倒。服后取吐。③治痈疽肿毒，烫伤，外涂患处；中耳炎，滴入耳内。

芭蕉树水 见《中级医刊》(5)：57，1959. 即芭蕉油，详该条。

芭蕉根 出《日华子诸家本草》。又名芭蕉头。为芭蕉科植物芭蕉Musa basjoo Sieb.et Zucc.的根茎。甘，寒。入肝、脾经。清热解毒，利尿，消肿。①治热病头痛狂躁，消渴，黄疸，水肿，脚气，血尿，血崩，白带，高血压病。内服：煎汤，15～30克（鲜品加倍）；或捣汁饮。②捣敷痈肿，发背，疔疮，丹毒。

苏子 出《本草经集注》。为紫苏子之简称，详该条。

苏木 见《医学启源》。又名红柴、赤木、苏枋、苏方木。为豆科植物苏木Caesalpinia sappan L. 的干燥心材。产广西、广东、台湾、贵州、云南、四川等地。甘、咸，平。入心、肝、脾经。行血祛瘀，消肿止痛。治妇女血气心腹痛，血滞经闭，产后瘀阻腹部胀痛、血晕，痈肿，跌打瘀痛，破伤风。煎服：3～9克。孕妇忌服。本品含巴西苏木素、苏木酚（Sappanin）、β-香树脂醇葡萄糖甙、鞣质、挥发油（主成份为右旋水芹烯、罗勒烯）和多种氨基酸。煎剂对动物有镇静、催眠作用，并能对抗士的宁对小鼠的惊厥作用；能增强离体蛙心的收缩力，对抗水合氯醛等药引起的心脏抑制；皮下注射能引起正常狗的呕吐和腹泻。浸煎液在体外有抑菌作用。

苏方木 出《新修本草》。即苏木，详该条。

苏叶 出《本草经集注》。为紫苏叶之简称，详该条。

苏头 见《四川中药志》。为唇形科植物皱紫苏Perilla frutescens(L.) Britt.var. Crispa (Thunb.) Decne或尖紫苏P.frutescens (L.) Britt.var.acuta (Thunb.) Kudo等的根及近根老茎。全国各地均有栽培。辛，温。入肺、脾经。祛风散寒，化痰降气。治风寒感冒，咳逆上气，胸膈痰饮。煎服：6～12克。

苏合油 出《太平寰宇记》。即苏合香，详该条。

苏合香 出《名医别录》。又名苏合油、苏合香油。为金缕梅科植物苏合香树Liquidambar orientalis Mill. 所分泌的香树脂。主产土耳其。我国广西有栽培。甘、辛，温。入心、脾经。开窍，解郁，豁痰。治中

风痰厥，卒然昏倒，惊风，癫痫，卒心痛，霍乱吐利。内服：入丸、散用，一次量0.3～0.9克。本品含桂皮酸，α-及β-苏合香树脂醇（Storesinol）及其桂皮酸酯，齐墩果酮酸，3-表-齐墩果酸，香荚醛等。苏合香脂能扩张冠状血管，有缓解心绞痛功效。又为刺激性祛痰药，并有较弱的抗菌作用，可用于各种呼吸道感染。用于局部可缓解炎症，如湿疹和瘙痒，并能促进溃疡与创伤的愈合。

苏合香油 见《太平惠民和剂局方》。即苏合香，详该条。

苏枋 出《南方草木状》。为苏木之别名，详该条。

苏罗子 见《药材资料汇编》。即娑罗子，详该条。

苏梗 见《药品化义》。为紫苏梗之简称，详该条。

苡仁 见《临证指南医案》。即薏苡仁，详该条。

走马风 见《广西中药志》。即走马胎，详该条。

走马芹 见《辽宁省中草药新医疗法资料选编》。为毒芹之别名，详该条。

走马胎 ❶出《生草药性备要》。又名走马风、山猪药、白马胎、大发药。为紫金牛科植物走马胎Ardisia gigantifolia stapf的根茎及根。分布广西、广东、云南、江西、福建等地。辛、涩，温。祛风除湿，活血散瘀，止痛。治风湿骨痛，产后风瘫，半身不遂，小儿麻痹症后遗症，跌打损伤。内服：煎汤，9～30克；或浸酒。走马胎叶：捣汁外涂治疮疖肿痛，下肢溃疡，有消炎，去腐，生肌之效。❷见《天宝本草》。为刮筋板之别名。❸见《贵州民间方药集》。为香樟根之别名。各详该条。

走马箭 见萧步丹《岭南采药录》。为蒴藋之别名，详该条。

走胆药 见《云南中草药选》。为青叶胆之别名，详该条。

走游草 见《四川中药志》。又名五爪龙、岩五加、藤五甲、上树蜈蚣、小红藤。为葡萄科植物崖爬藤Tetrastigma obtectum（Wall.）Planch.的全草或根。分布中南及西南地区。辛、涩，平，有小毒。祛风活络，散瘀消肿，解毒。①治风湿麻木，筋骨疼痛，跌打损伤。内服：煎汤，9～15克；或浸酒饮。②治蛇咬伤，煎服并用鲜全草捣敷伤口周围；疮疖，无名肿毒，捣敷或煎水洗。孕妇忌服。

赤小豆 出《神农本草经》。又名红豆、红小豆、朱赤豆。为豆科植物赤小豆Phaseolus calcaratus Roxb.或赤豆P.angularis Wight的种子。主产广东、广西、江西等地。甘、酸，平。入心、小肠经。利水除湿，通乳，解毒排脓。①治水肿，脚气，黄疸，泻痢。煎服：9～30克。②治乳汁不下。适量煎煮，饮浓汤。③治痈肿，腮腺炎，风疹瘙痒，研末调敷。赤小豆花：治疟疾，痢疾，消渴，痔瘘下血。赤小豆叶：治小便数。赤豆含蛋白质20.7%，脂肪0.5%，糖类58%，微量的维生素B_1、B_2以及烟酸、钙、铁、磷等。还含三萜皂甙类。

赤木 见《兽医国药及处方》。为苏木之别名，详该条。

赤车使者 出《雷公炮炙论》。又名小锦枝、细水麻叶、半边伞。为荨麻科植物赤车使者Elatostema umbellatum Bl. var. majus Maxim.的全草。分布我国长江以南各地。微苦，平。清热，利湿，活血，消肿。①治小儿高热惊风，咳嗽，痢疾，黄疸，淋病，水肿，闭经。煎服：9～15克。②治风湿关节疼痛，捣烂兑烧酒揉擦；跌打损伤，骨折，无名肿毒，捣敷。孕妇忌服。

赤术 出《本草经集注》。为苍术之别名，详该条。

赤石土 见《中药形性经验鉴别法》。即赤石脂，详该条。

赤石脂 出《神农本草经》。又名红土、

赤石土。为红色的多水高岭土块状体。产福建、河南、江苏、陕西、湖北、山东、安徽、山西等地。甘、涩，温。入胃、大肠经。涩肠，止血。治虚寒久泻，久痢，脱肛，便血，崩漏，带下。煎服：9～15克。研末撒溃疡久不敛口。本品主含水化硅酸铝，尚含相当多的氧化铁等物质，内服能吸附消化道内的毒物，如磷、汞、细菌毒素及食物异常发酵的产物等。对发炎的胃肠粘膜有保护作用。对胃肠出血有止血作用。

赤龙爪 见《普济方》。为棘针之别名，详该条。

赤龙皮 见《本草纲目》。为松木皮之别名，详该条。

赤包 见《东北常用中草药手册》。即赤瓟，详该条。

赤地榆 出《滇南本草》。又名隔山消。为牻牛儿苗科植物紫地榆Geranium strictipes R. Kunth 的根。分布云南、四川。苦、涩，微寒。清热利湿，活血止血。①治痢疾、肠炎，慢性胃炎，鼻衄，便血，月经过多，产后出血。煎服：9～15克。②治跌打损伤。捣敷。

赤芍 见《药品化义》。为赤芍药之简称，详该条。

赤芍药 出《本草经集注》。又名木芍药、赤芍、红芍药。为毛茛科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall.或草芍药P. obovata Maxim.、川赤芍P. veitchii Lynch 的根。主产内蒙古、河北、辽宁、黑龙江、吉林。苦，微寒。入肝、脾经。清热凉血，活血祛瘀。①治热病发斑，吐血，衄血，血痢，肠风下血。②治闭经，痛经，瘀血腹痛，胸胁疼痛，目赤，痈肿，跌打损伤。煎服：4.5～9克。反藜芦。芍药根含芍药甙（Paeoniflorin）、牡丹酚、芍药花甙（Paeonin），苯甲酸、鞣质、树脂、挥发油、β-谷甾醇、三萜类等。草芍药根含苯甲酸，挥发油，脂肪油，树脂、鞣质。川赤芍含花青素、醛酮、酚、生物碱。芍药甙对实验动物胃、肠及子宫平滑肌有解痉作用，并有镇痛、镇静、解热、抗炎、抗溃疡等作用，尚可使狗冠脉流量增加。商品赤芍煎剂，在体外对葡萄球菌、痢疾、伤寒和绿脓杆菌等有抑制作用。

赤阳子 出《滇南本草》。又名救兵粮、救军粮、火把果、红子。为蔷薇科植物火棘 Pyracantha fortuneana(Maxim.) Li的果实。分布陕西、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广西及西南地区。甘、酸，平。消食化积，散瘀止血。治食积，虫积，泄泻，痢疾，痞块，产后血瘀，崩漏。煎服：9～15克。救军粮叶：捣烂敷眼皮上，治暴发火眼。

赤松皮 见《备急千金要方》。即松木皮，详该条。

赤药 出《本草图经》。为红药子之别名，详该条。

赤桎柳 见《本草备要》。即桎柳，详该条。

赤胫散 出《植物名实图考》。又名花蝴蝶、花脸荞、小晕药、红泽兰、蛇头蓼。为蓼科植物缺腰叶蓼 Polygonum runcinatum Buch.-Ham.的全草。分布台湾、湖北、湖南、四川、云南、贵州等地。酸、苦，微寒。清热解毒，活血消肿。①治痢疾，急性胃炎，赤白带，经闭。煎服：9～15克。②捣敷治痈疖肿毒，乳腺炎，毒蛇咬伤。

赤首乌 见《中药志》。即何首乌，详该条。

赤珠 出《药性论》。为龙珠之别名，详该条。

赤瓟 见《黑龙江中药》。又名气包、赤包、山屎瓜。为葫芦科植物赤瓟Thladiantha dubia Bunge的果实。分布东北、华北及山东、陕西等地。酸、苦，平。降逆，理湿，调气，活血。治反胃吐酸，黄疸，肠炎，痢疾，便血，气滞胁痛，扭腰岔气，肺结核咳

嗽咯血。煎服：3～9克，或研末服。赤颣的块根名气包根，苦，寒。捣汁服治黄疸；研末服治乳汁不下，乳房胀痛。

赤菜 出《闽书》。为鹿角菜之别名，详该条。

赤葛 见《四川常用中草药》。为金刚散之别名，详该条。

赤雹子 出《本草衍义》。为王瓜子之别名，详该条。

赤箭 出《神农本草经》。为天麻之别名，详该条。

杏仁 出《本草经集注》。又名苦杏仁。为蔷薇科植物杏Prunus armeniaca L.或山杏P.armeniaca L.var.ansu Maxim.等味苦的种子。主产东北、华北各地。苦，温，有小毒。入肺、大肠经。祛痰止咳，下气平喘，润肠。治感冒咳嗽，气息喘促，胸满烦闷，便秘。煎服：4.5～9克。服用勿过量，婴儿慎用。苦杏仁生食过多，可引起眩晕、心悸、恶心呕吐等中毒反应，严重者会使呼吸麻痹而死亡。本品含苦杏仁甙约30%，杏仁油（主含三油酸甘油酯）约50%，又含蛋白质和多种游离氨基酸。苦杏仁甙在体内分解产物氢氰酸，有剧毒。但微量氢氰酸能镇静呼吸中枢而有镇咳、平喘作用，过量则可使组织窒息，导致死亡。须立即静脉注射亚硝酸钠，然后缓慢静脉注射硫代硫酸钠急救解毒。煎剂给猫静脉注射，可出现明显而持久的血压下降。

杏叶防风 出《滇南本草》。又名骚羊古、蜘蛛香、土当归、白花箭、蛇倒退、马蹄防风。为伞形科植物杏叶防风 Pimpinella candolleana Wight et Arn. 的根或全草。产云南、四川等地。辛，温。祛风除湿，行气温中，活血消肿。①治感冒，咳嗽，风湿麻木，关节疼痛，疟疾，胃痛，腹痛，疝痛。煎服：9～15克。②治颈淋巴结结核，内服或捣敷；肿毒，跌打损伤，蛇咬伤，鲜品捣敷。

杏叶沙参 见《救荒本草》。为荠苨之别名，详该条。

杏参 出《本草图经》。为荠苨之别名，详该条。

杏树皮 见《中医方药学》。为蔷薇科植物杏Prunus armeniaca L.或山杏P.armeniaca L.var.ansu Maxim.等的树皮。治苦杏仁中毒。取杏树皮60克削去外面粗皮，留中间纤维部分。加水500毫升，煮沸20分钟，过滤后温服。杏树根：煎服，亦治杏仁中毒。

李子 出《滇南本草》。又名嘉庆子。为蔷薇科植物李Prunus salicina Lindl.的果实。除新疆、西藏、内蒙古等地区外，我国大部分地区均有分布。甘、酸，平。入肝、肾经。清热，生津，利水，健胃。①治虚劳骨蒸，消渴，腹水，小便不利。内服：生食或捣汁饮。②治消化不良，嘈杂嗳气。煎服：腌李子3～5粒。李树干上分泌的胶汁名李树胶，治目翳，透发麻疹。果肉中含天门冬素、谷氨酰胺及γ-氨基丁酸等多种氨基酸。

李子仁 见《四川中药志》。即李核仁，详该条。

李仁 见《四川中药志》。即李核仁，详该条。

李核仁 出《吴普本草》。又名李仁、李子仁。为蔷薇科植物李Prunus salicina Lindl.的种子。甘、苦，平。散瘀，止咳，利水，润肠。①治跌打损伤，瘀血作痛，痰饮咳嗽，脚气，水肿，便秘。煎服：6～12克。②研末调敷治蝎子螫伤。孕妇慎用。本品含苦杏仁甙。

李根白皮 见《本草纲目》。即李根皮，详该条。

李根皮 出《名医别录》。又名李根白皮。为蔷薇科植物李Prunus salicina Lindl.根皮韧皮部。苦、咸，寒。入肝经。清热，止渴，下气。①治消渴烦热，奔豚气

逆，痢疾，赤白带下，热淋。煎服：6～9克。②煎水含漱治齿痛；烧存性，研末调敷小儿丹毒。

辰砂 出《本草图经》。为朱砂之处方名，详该条。

辰砂草 见《贵州民间方药集》。为瓜子金之别名，详该条。

还阳参 出《滇南本草》。又名万丈深、天竺参、奶浆柴胡。为菊科植物长茎还阳参 Crepis elongata Babc.的根。分布云南、广东、广西。甘，温。补肾，健脾，益气。①治虚损，头晕耳鸣，心慌怔忡，性神经衰弱，遗尿，薛劳，宫冷不孕，腰痛带下，小儿消化不良。煎服：9～15克。

豕椒 出《神农本草经》。为入地金牛之别名，详该条。

扶芳藤 出《本草拾遗》。又名滂藤、岩青杠、白对叶肾、小藤仲、爬墙虎。为卫矛科植物扶芳藤 Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.的茎叶。分布华东、中南及陕西、山西、云南等地。苦、辛，温。舒筋活络，散瘀止血。①治腰肌劳损，关节酸痛，咳血，吐血，鼻衄，崩漏，月经不调。煎服：9～15克。②治骨折，复位固定后用鲜叶捣敷；外伤出血，用干茎皮研末敷。孕妇忌服。本品含卫矛醇。

扶桑叶 出《本草纲目》。为锦葵科植物朱槿Hibiscusrosa-sinensis L.的叶。分布福建、台湾、广西、广东、四川、云南等地。甘，平。清热解毒。捣敷治痈疮肿毒；搓烂外擦治汗斑。本品含乙酸蒲公英赛醇酯及β-谷甾醇。煎剂对离体豚鼠回肠有轻度兴奋作用。温浸液1:200浓度对孑孓有毒杀作用。对人和动物毒性不大。

扶桑花 出《本草纲目》。又名土红花、吊钟花。为锦葵科植物朱槿Hibiscus rosa-sinensis L.的花。甘，寒。清肺化痰，凉血解毒。①治肺热咳嗽，咳血，衄血，痢疾，赤白浊，月经不调。煎服：3～9克（鲜品15～30克）。②治疔疮痈肿，乳腺炎，淋巴结炎。鲜花捣敷。本品含矢车菊素二葡萄糖甙、矢车菊素槐糖葡萄糖甙和槲皮素二葡萄糖甙。

扶桑根 见《民间常用草药汇编》。为锦葵科植物朱槿Hibiscus rosa-sinensis L.的根。涩，平。清热解毒，止咳，利尿，调经。治腮腺炎，急性结膜炎，支气管炎，尿路感染，子宫颈炎，白浊，白带，月经不调，闭经，血崩。煎服：15～30克。

抚芎 见《丹溪心法》。为川芎之别名，详该条。

拒霜叶 见《世医得效方》。为木芙蓉叶之别名，详该条。

拒霜花 出《益部方物略记》。为木芙蓉花之别名，详该条。

扯丝皮 见《湖南药物志》。为杜仲之别名，详该条。

扯根菜 见《植物名实图考》。为珍珠菜之别名，详该条。

护生草 见《本草纲目》。为荠菜之别名，详该条。

拟颠茄 见《全国中草药汇编》。为搜山虎之别名，详该条。

连壳 见《药材资料汇编》。为连翘之别名，详该条。

连香草 见《陕西中草药》。为蜘蛛香之别名，详该条。

连钱草 出《质问本草》。又名金钱草、马蹄草、穿墙草、金钱薄荷、江苏金钱草、一串钱。为唇形科植物活血丹Glechoma longituba(Nakai)Kupr.的全草。主产江苏、浙江等地。苦、辛，微寒。清热利尿，祛风解毒，①治尿路感染，尿路结石，肾炎水肿，黄疸，感冒咳嗽，脑漏，风湿关节痛，疟疾。煎服9～30克。②治毒蛇咬伤，腮腺炎，疮疡肿毒，跌打损伤，鲜品捣敷；疮疥，湿疹，煎水洗。本品含挥发油，其中主成分为左旋蒎莰酮（Pinocamphone），还

有蒎烯、柠檬烯等。又含熊果酸、胆碱、鞣质、苦味质、水苏糖、硝酸钾等。煎剂对大鼠、兔有明显的利尿、利胆作用。在体外对金黄色葡萄球菌，伤寒、痢疾及绿脓等杆菌有抑制作用。

连翘 出《神农本草经》。又名大翘子、连壳、落翘。为木犀科植物连翘 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl的果实。主产山西、河南、陕西、山东。苦，微寒。入心、胆经。清热解毒，消肿排脓。治风热感冒，咽喉肿痛，热病心烦、口渴，斑疹，热淋，疮疡肿毒，瘰疬，丹毒，过敏性紫癜，视网膜出血。煎服：9～15克。连翘茎叶：煎服治心肺积热。果实含白桦脂酸、齐墩果酸、松脂醇、连翘酚、连翘甙、芸香甙。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌以及痢疾、伤寒、副伤寒、白喉、大肠、变形、鼠疫，人型结核等杆菌均有抑制作用、连翘酚对金黄色葡萄球菌，志贺氏痢疾杆菌有较强的抑制作用。煎剂并有一定的镇吐作用。注射剂对动物有降压、利尿及抗炎作用。

〔卜〕

卤地菊 见《福建民间草药》。又名龙舌草、龙舌三尖刀、黄花冬菊。为菊科植物卤地菊 Wedelia prostrata (Hook.et Arn.) Hemsl.的全草。分布广东、福建、台湾、浙江等地。甘，平。清热解毒。①治白喉，急性扁桃体炎，支气管炎，肺炎，百日咳，鼻衄，高血压病。煎服：9～15克(鲜品30～60克)。②治乳腺炎，疔疮痈肿。鲜品捣敷。

卤咸 出《神农本草经》。即卤碱，详该条。

卤盐 出《吴普本草》。即卤碱，详该条。

卤碱 见《吉林中草药》。又名卤咸、卤盐、寒石。为盐卤凝结而成的氯化镁等物质的结晶。苦、咸，寒。强心，利尿，镇静，消炎，降血压。治克山病，大骨节病，地方性甲状腺肿，风湿性关节炎，高血压病。内服：每次1～2克，每日二至三次。以开水溶化后冷服。部分病人服后胃部有烧灼感，肠鸣增加，或出现轻度腹泻，皮肤瘙痒，在一般情况下可继续给药，如症状不减甚至加重时，可酌情减量或停药。本品主含氯化镁，还含钠、锌、钙、硫酸盐和微量元素。

时计草 见《中国药用植物图鉴》。为西番莲之别名，详该条。

别直参 见《增订伪药条辨》。为人参之产于朝鲜者，详人参条。

吴茱萸 出《神农本草经》。又名吴萸、茶辣。为芸香科植物吴茱萸Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.将近成熟的果实。主产贵州、广西、湖南、云南、陕西、浙江、四川。辛、苦，热，有小毒。入肝、胃经。温中止痛，降逆止呕，开郁，杀虫。①治肝胃不和，脘腹冷痛，呕逆吞酸，食积泻利，胁痛，疝痛，风湿痹痛，脚气肿痛，痛经，蛔虫病。煎服：1.5～4.5克。②研末醋调敷两足心（涌泉穴）治高血压及口腔溃疡；调成软膏涂湿疹，黄水疮，神经性皮炎。本品含吴茱萸碱、吴茱萸次碱、吴茱萸卡品碱(Evocarpine)、羟基吴茱萸碱等生物碱。还含挥发油（内有吴茱萸烯Evodene）、吴茱萸内酯醇（Evodol）、柠檬苦素等。种子含脂肪酸(内有吴茱萸酸Goshuynic acid)。吴茱萸有驱除肠胃气体及抑制肠内异常发酵的作用。乙醚提取物对猪蛔虫及水蛭有一定的抑制与杀灭作用。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌及结核杆菌有抑制作用。水浸剂对常见致病性真菌有抑制作用。某些成分有镇痛作用。吴茱萸注射剂对麻醉兔、犬及肾型高血压犬均有降压作用。

吴茱萸叶 出《日华子诸家本草》。为芸香科植物吴茱萸Evodia rutaecarpa (Juss.)Benth.的叶。辛、苦，热。温中散寒，理气止痛。治大寒犯脑头痛。酒拌袋盛蒸熟，

交互枕熨；心腹冷痛，内外肾钓痛，加盐研罨敷；手术后肠麻痹，鲜叶45克，捣烂炒热用纱布包敷脐部。本品含挥发油、羟基吴茱萸碱、去氢吴茱萸碱（Dehydroevo diamine、胆碱及黄酮化合物。

吴茱萸根 出《神农本草经》。为芸香科植物吴茱萸Evodia rutaecarpa(Juss.) Benth.的根或根的韧皮部。辛、苦，热。行气温中，燥湿杀虫。治脘腹冷痛，泄泻，下痢，头风痛，疝气，经闭腹痛，蛔虫病，绦虫病。煎服：15～30克。

吴萸 见清·刘士季《草木便方》。为吴茱萸之简称，详该条。

岗灯笼 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为鬼灯笼之别名，详该条。

岗松 见《药学通报》(5)：228，1958。又名扫把枝、蛇虫草、鸡儿松、香柴。为桃金娘科植物岗松Baeckea frutescens L.的全草。分布广西、广东、福建、台湾、江西等地。苦，寒。清热利尿，解毒止痒。①治急性胃肠炎，膀胱炎，小便不利。煎服：3～9克。②治滴虫性阴道炎，皮炎，湿疹，天疱疮，脚癣，蛇咬伤。煎水洗或捣敷。叶含挥发油及岗松醇。挥发油中含α-和-β-蒎烯、对聚伞花素、桉叶素、柠檬烯、芳樟醇、龙脑等十九个成分。

岗松根 见《草药手册》。为桃金娘科植物岗松Baeckea frutescens L.的根。苦、涩，寒。祛风，清热利湿，解毒。治感冒高热，风湿痹痛，胃痛，腹痛，肠炎，黄疸型肝炎，膀胱炎，小便不利。煎服：15～30克。

岗油麻 出《生草药性备要》。为山芝麻之别名，详该条。

岗梅根 出《生草药性备要》。又名点秤根、土甘草、百解、山梅根、天星根。为冬青科植物梅叶冬青Ilex asprella(Hook.et Arn.)Champ.ex Benth.的根。分布广西、广东、湖南、江西等地。苦、甘，凉。清热解毒，生津，活血。①治感冒，发热口渴，扁桃体炎，咽喉炎，气管炎，百日咳，肺痈，咳血，痔血，跌打损伤。煎服：15～30克。②治胆道感染，子宫内膜及附件炎症等多种感染性疾病。制成100%注射液肌内注射。岗梅叶：煎服治感冒，捣敷跌打损伤、痈毒、疔疮。岗梅根注射剂有增加冠脉流量，加强心收缩力的作用。

岗稔根 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·传染病》。为山稔根之别名，详该条。

旱地莲 出《本草纲目拾遗》。为金莲花之别名，详该条。

旱芹 见《履巉岩本草》。又名芹菜、香芹、药芹。为伞形科植物旱芹Apium graveolens L.Var. dulce DC.的全草。全国各地均有栽培。甘、苦，凉。入肝、胃经。平肝清热，祛风利湿。治早期高血压眩晕头痛，风湿痹痛，神经痛，尿血，乳糜尿。内服：煎汤，鲜品60～120克；或捣汁服。茎叶含挥发油，内含α-芹子烯、丁基苯酞、新蛇床酞内酯和瑟丹内酯等。还含东莨菪素、芸香甙、芹菜甙、佛手柑内酯、芹菜素等。芹菜素给麻醉犬、兔静脉注射有明显的降压作用，反复给药未出现快速耐受性，其降压作用主要是通过颈动脉体化学感受器的反射而产生。芹菜的挥发油及种子中的生物碱对动物有镇静、抗惊作用，而且毒性较低。

旱金莲 出《五台山志》。即金莲花，详该条。

旱莲草 出《本草图经》。为墨旱莲之别名，详该条。

旱荷 见《全国中草药汇编》。为窝儿七之别名，详该条。

旱葱 见《山东中药》。为藜芦之别名，详该条。

旱蒲花 见《江苏药材志》。为马蔺花之别名，详该条。

困香草 见《安徽中草药》。为铃茵陈之

别名，详该条。

串枝莲 见《云南中草药》。为紫金龙之别名，详该条。

〔丿〕

牡丹皮 出《珍珠囊》。又名丹皮、粉丹皮。为毛茛科植物牡丹Paeonia suffruticosa Andr.的根皮。主产安徽、四川、甘肃、陕西、湖北、湖南、山东、贵州等地。辛、苦，寒。入心、肝、肾经。清热凉血，活血散瘀。治热病发斑，吐血，衄血，无汗骨蒸，惊痫，经闭，痛经，癥瘕，跌损瘀血，肠痈，痈疡肿毒，亦治高血压病。煎服：4.5～9克。孕妇慎用。牡丹花：煎服治月经不调，经行腹痛。根皮含牡丹酚、牡丹酚甙、牡丹酚原甙、芍药甙(Paeoniflorin)、挥发油及植物甾醇等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌、白喉、痢痢、伤寒、副伤寒等杆菌有抑制作用。浸剂对某些皮肤真菌也有抑制作用。煎剂、牡丹酚和除去牡丹酚的煎剂对实验动物均有降压作用。牡丹酚对小鼠有镇静、催眠、镇痛、解热、抗炎和抗惊厥作用。此外，还能抑制大鼠胃液分泌，防止小鼠的应激性胃溃疡；对肠管、子宫有解痉作用。

牡狗阴茎 出《神农本草经》。即黄狗肾，详该条。

牡荆子 出《本草经集注》。又名牡荆实、荆条果。为马鞭草科植物牡荆 Vitex negundo L. var.cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.的果实。分布华东及江西、湖南、四川、贵州、广东、广西等地。苦、辛，温。入肝、胃经。祛痰止咳，化湿消滞，理气止痛。治咳嗽哮喘，消化不良，痢疾，肠炎，胃痛，疝气，白带。煎服：6～9克。本品含苦味健胃的有效成分淡紫花牡荆甙（Agnuside）。还含黄酮甙、强心甙、生物碱、氨基酸、中性树脂和少量挥发油。油中含右旋蒎烯、柠檬烯、桉叶素，对聚伞花素、β-石竹烯等。挥发油对小鼠有祛痰作用。挥发油、醇及石油醚提取物对猫和小鼠有镇咳作用。非挥发性成分有平喘作用。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌等有抑制作用。

牡荆叶 出《名医别录》。为马鞭草科植物牡荆Vitex negundo L. var.cannabifolia(Sieb.et Zucc.)Hand.-Mazz.的叶。苦、辛，平。解表，祛痰，化湿。①治感冒发热，风湿痛，久痢，急性胃肠炎，慢性支气管炎，血淋，乳痈初起。煎服：9～15克。②煎水熏洗湿疹，皮炎，脚气；捣汁涂头癣，脚癣。本品含挥发油，其组成与牡荆子挥发油基本一致。还含健胃苦味有效成分淡紫花牡荆甙(Agnuside)以及牡荆内酯(Vitexilactone)、洋艾黄酮素（Artemetine）、对羟基苯甲酸等。对小鼠有祛痰镇咳作用。

牡荆汁 出《陶隐居登真隐诀》。即牡荆沥，详该条。

牡荆条 见《安徽药材》。即牡荆茎，详该条。

牡荆沥 出《本草拾遗》。又名牡荆汁。为马鞭草科植物牡荆 Vitex negundo L. var.cannabifolia(Sieb.et Zucc.)Hand.-Mazz.的茎，用火烤灼而流出的液汁。甘，凉。入肺、肝、胃经。除风热，导痰涎，通络，止痉。①治中风口噤，痰热惊痫，高热惊风，痰鸣气急，头风，喉痹，热痢。冲服：20～40毫升。②治火眼，点入目中。

牡荆茎 出《名医别录》。又名牡荆条。为马鞭草科植物牡荆 Vitex negundo L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.)Hand.-Mazz. 的枝条。苦、辛，平。祛风，清热，解毒。①治感冒，喉痹肿痛。煎服：6～9克。②煎水洗皮肤疮肿湿毒；煎水含漱治牙痛。

牡荆实 见《本草经集注》。即牡荆子，详该条。

牡荆根 出《名医别录》。为马鞭草科植物牡荆Vitex negundo L. var. cannabifo-

lia (Sieb. et Zucc.)Hand.-Mazz.的根。苦、辛，平。祛风解表，化痰，通络。治感冒，头痛，支气管炎，风湿关节痛，疟疾。煎服：9～15克。本品含黄酮甙、强心甙、生物碱、氨基酸、中性树脂。粗制剂及牡荆根黄酮甙对豚鼠有平喘作用。

牡桂 出《神农本草经》。即肉桂，详该条。

牡蛎 出《神农本草经》。又名蠔壳、海蛎子壳、左壳、左牡蛎、蛎蛤。为牡蛎科动物长牡蛎Ostrea gigas Thunb.或大连湾牡蛎O. talienwhanensis Crosse等的贝壳。产山东、江苏、福建、广东、浙江、河北、辽宁等地。咸、涩，凉。入肝、肾经。生用：平肝潜阳，安神。治眩晕，惊痫，抽搐，心悸，失眠。煅用：收涩，软坚，制酸。治自汗、盗汗，遗精，崩漏，泄泻，带下，瘰疬，瘿瘤，胃酸过多。煎服：15～30克。生用宜先煎。本品主含碳酸钙、磷酸钙及硫酸钙（80～95%）并含镁、铅、硅、氧化铁及有机质等。钙盐有抗酸及轻度镇静、消炎作用。

牡蛎肉 出《本草拾遗》。为牡蛎科动物长牡蛎Ostrea gigas Thunb.等的肉。甘、咸，平。滋阴，安神，解毒。治烦热失眠，心神不安，丹毒。煮食。长牡蛎肉主含糖元，尚含氨基酸，无机盐，维生素A、B_1、B_2、D等。

牡蒿 出《名医别录》。又名齐头蒿、土柴胡、臭艾、油蒿、脚板蒿。为菊科植物牡蒿Artemisia japonica Thunb.的全草。主产江苏、四川等地。微苦，平。解表，清热，凉血。①治感冒发热，小儿疳热，肺结核潮热，疟疾。煎服：4.5～9克。②捣敷外伤出血；煎水洗湿疹，风疹。牡蒿根：煎服治风湿痹痛。全草含挥发油，油中含珐玥烯、乙酸金合欢醇酯、α-及β-蒎烯、柠檬烯、石竹烯、桉叶素、蛔蒿酮、蛔蒿醇等。乙醇或丙酮提取物在体外有抗红色毛癣菌的作用。

针砂 出《本草拾遗》。又名钢砂。为制钢针时磨下的细屑。酸、辛，平。入脾、大肠经。补血，除湿，利水，散瘿。治血虚黄胖，湿热黄疸，水肿，瘿瘤。内服：6～9克，火煅醋淬后入丸、散用。本品主要成分为铁，杂质为氧化铁（水化物）等，但也常含碳、磷、硅、硫等元素。

钉皮 见《四川中药志》。为刺楸树皮之别名，详该条。

钉耙七 见《贵阳民间药草》。为眼子菜科植物眼子菜Potamogeton franchetii A. Benn. et Baag.的嫩根。全国各地都有分布。治气痞腹痛，腰痛，痔血。煎服：9～15克。

钉铜皮 见《药材资料汇编》。为海桐皮之别名，详该条。

何首乌 出《日华子诸家本草》。又名首乌、地精、红内消、赤首乌、小独根。为蓼科植物何首乌Polygonum multiflorum Thunb.的块根。主产河南、湖北、贵州、四川、江苏、广西等地。苦、甘、涩，微温。入肝、肾经。制首乌：补肝益肾，养血涩精。治血虚，头晕，耳鸣，失眠，须发早白，腰膝软弱，肢体麻木，关节酸痛，梦遗滑精，崩漏带下，久痢，高血脂症，慢性肝炎，皮肤瘙痒。生首乌：润肠通便，解毒，截疟。治肠燥便秘，瘰疬，久疟。煎服：9～5克。本品含大黄酚、大黄素、大黄酸、大黄素甲醚、大黄酚蒽酮及卵磷脂等。实验性动脉粥样硬化兔口服何首乌可使血胆固醇降低，动脉病变亦较轻。制何首乌水浸液能使切除肾上腺的饥饿小鼠的肝糖元积累有所升高。所含蒽醌类化合物能促进肠蠕动，有泻下作用。煎剂在体外对结核杆菌有抑制作用。

伸筋草 出《分类草药性》。又名宽筋藤、舒筋草、狮子毛草、筋骨草、凤尾伸筋。为石松科植物石松Lycopodium Clava-

tum L. 的带根全草。主产浙江、湖北等地。苦、辛，温。入肝、脾、肾经。祛风散寒，舒筋活络①治风湿痹痛，关节酸痛，皮肤不仁，扭伤肿痛，小儿麻痹症后遗症。煎服：9～12克。②研末麻油调涂，治带状疱疹。全草含石松碱、伸筋草碱（Clavatine）、伸筋草毒（Clavatoxin）、伸筋草宁碱（Clavolonine）、烟碱等生物碱；伸筋草醇（Lycoclavanol）、伸筋草素（Lycoclavanin）等三萜类及香荚兰酸、阿魏酸等。石松碱及伸筋草碱、伸筋草毒对动物有退热作用；对平滑肌（小肠及子宫）有兴奋作用。石松能利尿及增进尿酸的排泄。

伸筋藤 见《南宁市药物志》。即宽筋藤，详该条。

佛手花 出《随息居饮食谱》。又名佛柑花。为芸香科植物佛手Citrus medica L. var. sarcodactylis (Noot.)Swingle的花朵和花蕾。主产四川、浙江，云南、广东等地亦产。微苦，温。入肝、胃经。理气，宽中，健胃。治胸脘胀闷，胃气痛，食欲不振，嗳气，呕恶。煎服：3～6克。

佛手香橼 见《闽书》。为佛手柑之别名，详该条。

佛手参 见《宁夏中草药手册》。为手掌参之别名，详该条。

佛手柑 出《滇南本草》。又名五指柑、佛手香橼。为芸香科植物佛手Citrus medica L.var.sarcodactylis(Noot.) Swingle 的果实。主产四川、广东等地。辛、苦、酸，温。入肝、胃经。理气化痰，舒肝和胃。治痰饮咳嗽，脘闷胁胀，肝胃气痛，食欲不振，恶心呕吐。煎服：4.5～9克。佛手柑经蒸馏得到的饱和水溶液名佛手露，宽胸，解郁，治气膈。果实含柠檬油素、香叶木甙、橙皮甙。果皮含挥发油。佛手柑醇提物对乙酰胆碱引起的兔肠痉挛有显著的解痉作用。

佛手草 见《东北药用植物志》。为卷柏之别名，详该条。

佛甲草 出《本草图经》。又名火烧草、铁指甲、佛指甲、鼠牙半支、禾雀舌。为景天科植物佛甲草Sedum lineare Thunb.的全草。分布山东、江西、福建、河南、湖南、广西、广东、四川、云南等地。甘，寒。清热，解毒。①治咽喉红肿疼痛，风火牙痛。捣汁含漱。②治痈肿，疔疮，丹毒，汤火烫伤，毒蛇咬伤，带状疱疹，漆疮，外伤出血等，鲜品捣敷；目赤肿痛，生翳，鲜品取汁和人乳滴眼。③治黄疸，痢疾。煎服：15～30克（鲜品加倍）。本品含景天庚糖等。

佛耳草 出《脾胃论》。为鼠曲草之别名，详该条。

佛柑花 见《四川中药志》。即佛手花，详该条。

佛指甲 ❶出《滇南本草》。又名岩如意、石花、指甲草。为景天科植物滇瓦花Sedum multicaule Wall.的茎叶。分布云南、西藏等地。甘、辛，凉。清热解毒，祛风湿，止血。①治咽喉肿痛，扁桃体炎，口腔炎，角膜云翳，高血压病，头昏，眼雾。内服：煎汤，9～15克；或鲜品捣汁服。②鲜品捣敷囟门，治鼻衄不止；煎水洗湿疹，疮毒。长期服用，可致白血球降低。滇瓦花根：煎服治关节疼痛。❷见《本草纲目》。为佛甲草之别名，详该条。

伽蓝菜 见《广西中草药》。又名鸡爪三七、假川连、五爪三七。为景天科植物伽蓝菜Kalanchoe laciniata（L.）DC.的全草。分布云南、广西、广东、福建及台湾。甘、苦，寒。清热解毒，散瘀止血。①治跌打损伤，蛇咬伤。内服：煎汤，15～30克；或鲜品捣汁冲酒服，渣捣敷患处；蛇伤敷创口周围。②治疮疡脓肿，外伤出血，汤火伤，湿疹。鲜叶捣烂外敷。

皂李 出《新修本草》。为鼠李之别名，详该条。

皂针 见《中药材手册》。为皂角刺之别名，详该条。

皂角 出《肘后方》。为皂莢之别名，详该条。

皂角子 见《备急千金要方》。即皂莢子，详该条。

皂角针 见《江苏省植物药材志》。即皂角刺，详该条。

皂角刺 出《本草衍义补遗》。又名天丁、皂莢刺、皂刺、皂角针、皂针。为豆科植物皂莢 Gleditsia sinensis Lam. 的棘刺，主产四川、河北、山西、河南、江苏、湖北等地。辛，温。入肝、胃经。搜风，活血，消肿，杀虫。①治痈疽肿毒初起或脓成不溃，急性扁桃体炎，麻风。煎服：6～9克。②醋熬嫩刺，取汁，涂癣疮。孕妇忌服。本品含黄酮类、酚类、皂甙。

皂刺 见《医学入门》。为皂角刺之简称，详该条。

皂矾 见《普济方》。即绿矾，详该条。

皂莢 出《神农本草经》。又名皂角、大皂莢。为豆科植物皂莢Gleditsia sinensis Lam. 的果实。主产四川、河北、河南、山西、山东等地。辛，温，有小毒。入肺、大肠经。开窍，涤痰，通便，消肿，杀虫。①治痰厥昏迷，口噤不开，头风头痛。研末吹鼻取嚏。②治癫痫痰盛，咳嗽痰喘。内服：煎汤，3～6克；炒研末服，每次0.6～1.5克。③治大便燥结，肠麻痹，不完全性肠梗阻。研末蜜调服；或制成栓剂，纳入肛中导下。久痢脱肛，烧烟熏之。④治痈疽，便毒，醋煮捣烂敷；风癣疥癞，熬膏涂。内服过量，可引起呕吐及腹泻。孕服慎用。本品含数种皂甙〔已分离出一种皂甙元为阔叶合欢萜酸（Albigenic acid）〕，还含鞣质、谷甾醇等。皂甙有溶血作用，高等动物一般很少吸收，口服可刺激胃肠粘膜，大量可引起呕吐，腹泻。过量也能腐蚀胃粘膜，发生吸收中毒。煎剂给猫灌胃能增加呼吸道粘液分泌，有祛痰作用；对离体大鼠子宫有兴奋作用。水浸剂对堇色毛癣菌、星形奴卡氏菌有抑制作用。

皂莢子 出《雷公炮炙论》。又名皂角子。为豆科植物皂莢 Gleditsia sinensis Lam. 的种子。辛，温，有小毒。润燥通便，散结消肿。①治便秘，肠风下血，下痢里急后重，疝气及睾丸肿痛。②治瘰疬坚肿疼痛。内服：煎汤，4.5～9克；或入丸、散。③研末调敷肿毒，疥癣。孕妇慎用。

皂莢刺 见《太平圣惠方》。即皂角刺，详该条。

皂莢根皮 出《本草纲目》。为豆科植物皂莢Gleditsia sinensis Lam. 的根皮。分布东北、华北、华东、华南地区及四川、贵州等地。辛，温。治风湿骨痛，疮疡肿毒。煎服：3～9克。

皂药根 出《分类草药性》。为花蝴蝶根之别名，详该条。

余甘子 出《临海异物志》。为庵摩勒之别名，详该条。

余甘子叶 见《广东中草药》。为油柑叶之别名，详该条。

余甘子根 见《广东中草药》。为油柑根之别名，详该条。

含羞草 见萧步丹《岭南采药录》。又名知羞草、喝呼草、怕羞草、感应草。为豆科植物含羞草Mimosa pudica L.的全草。分布华东、华南、西南地区。甘，微寒，有小毒。安神，清热，消积，解毒。①治神经衰弱，失眠，慢性支气管炎，肠炎，胃炎，小儿疳积，目赤肿痛，尿路结石。煎服：6～9克。②捣敷跌打肿痛，痈肿，带状疱疹。本品有麻醉作用，内服不宜过量。孕妇忌服。本品含含羞草碱(Mimosine)及其葡萄糖甙，松醇，去甲肾上腺素等。含羞草碱是一种毒性氨基酸，食之可使大鼠或小鼠生长停滞，脱毛，白内障。

含羞草根 见《云南中草药》。为豆科植

物含羞草Mimosa pudica L.的根。微苦，温。止咳化痰，祛湿通络，健胃消食。治慢性支气管炎，风湿疼痛，慢性胃炎，小儿消化不良。煎服：9～15克。从干燥的根中可提得生物碱、内酯类物质和黄酮甙。小鼠灌服煎剂有明显止咳作用。能对抗乙酰胆碱引致离体兔肠的痉挛作用。体外试验，对金黄色与白色葡萄球菌、卡他双球菌有较强的抑制作用，对亚洲甲型流感病毒和鼻病毒17型亦均有抑制作用。

谷白皮 见《千金翼·本草》。为米皮糠之别名，详该条。

谷芽 出《本草纲目》。又名谷蘖、稻蘖、稻芽。为稻的颖果经发芽干燥而得。甘，温。入脾、胃经。健脾开胃，消食和中。治脾失健运、脘闷腹胀，慢性泄泻，食欲不振。煎服：9～15克。本品含麦芽糖、胆碱、腺嘌呤、淀粉酶、维生素B等。

谷香 见《现代实用中药》。为小茴香之别名，详该条。

谷莠子 见《植物名汇》。为狗尾草之别名，详该条。

谷精草 出《开宝重定本草》。又名珍珠草、流星草、谷精珠、移星草、鼓槌草。为谷精草科植物谷精草Eriocaulon buergerianum Koern.带花茎的花序。主产浙江、江苏、湖北。辛、甘，平。入肝、胃经。疏散风热，明目退翳。治风热头痛，赤眼，目翳，夜盲，中心性视网膜脉络膜炎，鼻衄，牙痛，疳疾。煎服：4.5～9克。体外试验水浸剂对某些皮肤真菌有抑制作用，煎剂对绿脓杆菌、大肠杆菌、肺炎球菌有抑制作用。

谷精珠 见《中国药学大辞典》。为谷精草之处方名，详该条。

谷蘖 出《澹寮方》。为谷芽之别名，详该条。

饭团根 见《广西中药志》。为土茯苓之别名，详该条。

饭汤叶 见《广西药用植物名录》。为赶风柴之别名，详该条。

饭消扭 见《浙江天目山药用植物志》。为三月泡之别名，详该条。

肝炎草 见《云南中草药》。为青叶胆之别名，详该条。

肚拉 见《四川中药志》。又名双参、都拉参、对对参、土败酱。为川续断科植物西南囊苞花 Triplostegia glandulifera Wall.的根。分布甘肃、陕西、湖北、四川、云南。苦、微甘，平。补肾健脾，活血调经，止血。①治肾虚腰痛，阳痿，遗精，崩漏，带下，月经不调，风湿性心脏病。煎服：9～15克。②研末敷创伤出血。

龟甲 出《神农本草经》。即龟版，详该条。

龟甲胶 见《四川中药志》。即龟版胶，详该条。

龟肉 出《名医别录》。为龟科动物乌龟Chinemys reevesii (Gray)的肉。甘、咸，平。益阴，止血。治劳瘵骨蒸，久咳咯血，吐血，衄血，久疟，血痢，肠风痔血。内服：煮食；或炙灰研末服。

龟壳 出《淮南子》。即龟版，详该条。

龟版 出《日华子诸家本草》。又名龟甲、龟壳、玄武版、败龟版。为龟科动物乌龟Chinemys reevesii (Gray)的腹甲。主产湖北、安徽、湖南、江苏、浙江等地。咸、甘，平。入肝、肾经。滋阴潜阳，补血止血，益肾健骨。①治肾阴不足，骨蒸劳热，盗汗，热病伤阴，阴虚风动。②治吐血，衄血，痔血，崩漏。③治遗精，带下，腰痛，骨痿，小儿囟门不合。煎服：9～24克。先煎。本品含骨胶原、角质、脂肪、钙、磷等。

龟版胶 出《本经逢原》。又名龟胶、龟版膏、龟甲胶。为龟版熬制而成的胶。甘、咸，平。滋阴，养血。治阴虚血亏，骨蒸劳热，吐血，崩漏，肾虚腰痛，腰膝痿弱。烊化后冲服，3～9克。

龟版膏 见《本草正》。即龟版胶，详该条。

龟胶 见《本草汇言》。为龟版胶之简称，详该条。

角心 见《青岛中草药手册》。为牛角鰓之别名，详该条。

角蒿 出《新修本草》。又名羊角草、羊角蒿、大一枝蒿。为紫葳科植物角蒿Incarvillea sinensis Lam. 的全草。分布东北、华北及山东、河南、陕西、甘肃、四川、青海等地。辛、苦，平。有小毒。清热解毒，散风祛湿。①治口疮，齿龈腐烂，耳疮，烧灰研末撒；疥疮，烧灰研末油调涂；蛇咬伤，捣烂敷。②治肝硬化。煎服：9～12克。③治风湿痹痛。内服或煎汤熏洗。

灸草 见《埤雅》。即艾叶，详该条。

迎山红 ❶见《吉林中草药》。又名满山红、映山红。为杜鹃花科植物迎红杜鹃Rhododendron mucronulatum Turcz.的叶。分布东北、华北及山东、江苏。苦，平。解表，化痰，止咳，平喘。治感冒头痛，咳嗽，支气管炎，哮喘。煎服：3～9克。叶含挥发油、大牻牛儿酮、槲皮素、杜鹃素及梫木毒素-1等。煎剂或挥发油对小鼠有祛痰作用。后者尚有镇咳作用。煎剂在试管内对金黄色葡萄球菌有抑制作用。❷见《东北常用中草药手册》。即满山红，详该条。

迎春 出《本草拾遗》。为辛夷之别名，详该条。

〔丶〕

辛夷 出《神农本草经》。又名迎春、木笔花、姜朴花。为木兰科植物辛夷Magnolia liliflora Desr. 或玉兰M. denudata Desr. 等的花蕾。主产河南、四川、安徽、浙江等地。辛，温。入肺、胃经。散风寒，通鼻窍。治头痛，鼻塞，鼻炎，鼻渊。煎服：3～9克。玉兰花蕾含挥发油，中含柠檬醛、丁香油酚，1.8-桉叶素、茴香醚等。辛夷花中含挥发油，主为丁香油酚、黄樟醚（Safrole）、柠檬醛、茴香醚（Anethole）、黄酮甙，花色甙。挥发油有收缩鼻粘膜血管作用，煎剂给麻醉兔、猫、狗静脉注射，有降压作用，但挥发油无降压作用；对动物在体、离体子宫呈兴奋作用；体外对白色念珠菌有抑制作用。

疔毒草 ❶见《中药大辞典》。为甜地丁之别名。❷见《东北常用中草药手册》。为蓬子菜之别名。各详该条。

疔疮草 见《浙江民间草药》。为苍耳之别名，详该条。

怀山药 见《药物出产辨》。为山药之处方名，详该条。

怀牛膝 见《增订伪药条辨》。为牛膝之处方名，详该条。

快果 出《名医别录》。为梨之别名，详该条。

灶中黄土 出《金匮要略》。即伏龙肝，详该条。

灶心土 见《本草纲目》。为伏龙肝之别名，详该条。

灶突墨 出《备急千金要方》。为百草霜之别名，详该条。

冻青树子 出《濒湖集简方》。为冬青子之别名，详该条。

冷水丹 ❶见《植物名实图考》。为白花射干之别名。❷见江西药科学校《中草药学》。为鸢尾之别名。各详该条。

冷饭头 见《广州植物志》。为菝葜之别名，详该条。

冷饭团 出《卫生杂兴》。为土茯苓之别名，详该条。

冷毒草 见《云南中草药选》。为地白草之别名，详该条。

沙谷牛 见《生草药性备要》。为地牯牛之别名，详该条。

沙苑子 见《增订伪药条辨》。又名潼蒺

藜、沙苑蒺藜、潼沙苑。为豆科植物扁茎黄芪 Astvagalus complanatus R. Br. 的种子。主产陕西、山西、河北。甘、温。入肝、肾经。补肝益肾，固精明目。治虚损劳乏，腰膝酸软，头晕，目花，遗精，早泄，尿频，遗尿。煎服：6～9克。本品含维生素A类物质、鞣质等。

沙苑蒺藜 出《本草图经》。为沙苑子之别名，详该条。

沙枣 见《新疆中草药手册》。为胡颓子科植物沙枣Elaeagnus angustifolia L.的果实。常生于沙漠地区。分布东北、华北及西北。甘、酸、涩，平。健脾，止泻。治消化不良，胃痛，腹泻。煎服：15～30克。本品含黄酮类。果肉含糖、蛋白质和少量鞣质及粘液质。从果实制得的胶质、鞣质的浓缩物有抗炎作用；对人工引起腹泻的动物，有抑制小肠运动的功能，故可用于肠炎。

沙枣叶 见《中国药典·一部》1977年版。为胡颓子科植物沙枣Elaeagnus angustifolia L. 的叶。分布东北、华北及西北地区。甘、微涩，凉。清热解毒。治痢疾，肠炎。煎服：15～30克。沙枣花：蜜炙煎服可止咳，平喘，治慢性支气管炎。本品含胡颓子碱、咖啡酸，绿原酸、新绿原酸等。

沙枣树皮 见《陕甘宁青中草药选》。为胡颓子科植物沙枣 Elaeagnus angustifolia L. 的树皮。酸、微苦，凉。收敛止痛，清热凉血。①治慢性气管炎，胃痛，肠炎，白带。煎服：3～9克。②治烧烫伤，煎水喷洒或湿敷创面；外伤出血，研末外敷。茎皮和枝含胡颓子碱（Eleagnine，即四氢哈尔满）、四氢哈尔醇(Tetrahydroharmol)、2-甲基四氢哈尔醇、哈尔满、二氢哈尔满、2-甲基-1，2，3，4-四氢-β-咔啉、鞣质、右旋儿茶精、左旋表儿茶精等。

沙参儿 见《中药志》。为银柴胡之别名，详该条。

沙姜 见萧步丹《岭南采药录》。为山柰之别名，详该条。

沙藤 见《浙江天目山药用植物志》。为野木瓜之别名，详该条。

沙罐草 见《陕西中草药》。为铁苋之别名，详该条。

沟子米 见《东北药用植物志》。为薏苡仁之别名，详该条。

没石子 出《子母秘录》。即没食子，详该条。

没药 出《药性论》。又名末药。为橄榄科植物没药树Commiphora myrrha Engl. 及其同属数种植物茎干皮部渗出的油胶树脂。主产索马里、埃塞俄比亚。苦，平。入肝经。散血消肿，定痛，生肌。①治跌扑伤痛，脘腹疼痛，风湿痹痛，痈疽肿痛，经闭，痛经。内服：煎汤，3～9克；或入丸、散。②研末敷溃疡久不收口。孕妇忌服。本品含α-和β-罕没药酸(Heerabomyrrholic acid)、α-、β-和γ-没药酸（Commiphoric acid）、没药次酸(Commiphorinic acid)、α-和β-罕没药酚（α-、β-Heerabomyrrhol）、罕没药树脂（Heeraboresene）。另含挥发油，其成分为丁香油酚、间苯甲酚、枯醛、桂皮醛、罕没药烯（Heerabolene）等。水浸剂对堇色毛癣菌等皮肤真菌有抑制作用。其挥发油也能轻度抑制皮肤真菌。本品还能降低兔的血胆甾醇含量。

没食子 出《海药本草》。又名无食子、没石子。为没食子蜂幼虫寄生于壳斗科植物没食子树Quercus infectoria Olivier幼枝上所生的虫瘿。产希腊、土耳其、伊朗等国。苦，温。入肺、脾、肾经。固气，涩精，敛肺，止血，生肌。①治泻痢不止，便血，遗精，咳嗽，咯血，盗汗。煎服：6～12克。②治创伤出血及疮疡久不收口，研末撒或调

敷；齿痛，以少量用药棉包裹，置患处咬紧，可止痛。本品含没食子鞣质、没食子酸、并没食子酸、丁香酸及树脂等。

沉水香 见《桂海虞衡志》。即沉香，详该条。

沉香 出《名医别录》。又名蜜香、沉水香。为瑞香科植物白木香Aguilaria Sinensis（Lour.）Gilg或沉香A. agallocha Roxb. 含树脂的心材。前者主产海南岛、广西；后者主产印度、马来西亚等地。辛、苦，温。入肺、脾、肾经。降气，调中，暖肾。治肾虚气喘，呕吐，呃逆，胸腹胀痛，腰膝虚冷，大肠虚闭，小便气淋，男子精冷。内服：煎汤，0.9～3克，后下；研末冲服，0.6～0.9克，一日二次。白木香含挥发油和树脂。沉香含树脂、挥发油，油中主含苄基丙酮、对甲氧基苄基丙酮、高级萜醇、氢化桂皮酸、对甲氧基氢化桂皮酸等。

沉香曲 见《饮片新参》。为沉香、广木香、檀香、羌活、葛根等多种药末和以神曲糊剂制成的曲剂。苦，温。疏表，理气，化滞。治感冒风寒，食积气滞，胸腹胀痛，呕吐吞酸。煎服：3～9克。

状元红 见《广州植物志》。为荷苞花之别名，详该条。

羌活 出《神农本草经》。为伞形科植物羌活Notopterygium incisum Ting或宽叶羌活N. forbesii Boiss. 的根茎和根。主产四川、甘肃、青海。辛、苦，温。入膀胱、肾经。祛风解表，除湿止痛。①治感冒风寒，恶寒发热，头痛，身疼，风湿关节痛，破伤风。②治痈疖疮毒，荨麻疹，皮肤瘙痒。煎服：3～9克。本品含挥发油。在体外对布氏杆菌有抑制作用。

诃子 出《本草图经》。又名诃黎勒。为使君子科植物诃子Terminalia Chebula Retz. 的果实。主产云南。苦、酸、涩，温。入肺、大肠经。涩肠，敛肺。①治久泻，久痢，脱肛，便血，痔疮出血，崩漏，带下，遗精，盗汗，尿频。②治久咳虚喘，久嗽失音，咳痰带血，慢性喉炎。煎服：3～9克。止泻宜煨用。诃子叶：止渴及泄痢，煎服。果实含鞣质，其中主成分为诃子酸（Chebulinic acid），诃黎勒酸（Chebulagic acid），1，3，6-三没食子酰葡萄糖和1，2，3，4，6-五没食子酰葡萄糖。还含莽草酸、奎宁酸、氨基酸和番泻甙A、诃子素（Chebulin）等。煎剂在体外对痢疾杆菌、伤寒杆菌、大肠杆菌、变形杆菌、白喉杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌均有抑制作用。本品富含鞣质，对菌痢或肠炎时形成的粘膜溃疡有收敛作用。诃子素有罂粟碱样的平滑肌解痉作用。诃子有一定的抗实验性肿瘤作用。

诃黎勒 见《金匮要略》。即诃子，详该条。

补血草 见《北方常用中草药手册》又名燎眉蒿、匙叶草、苍蝇花。为蓝雪科植物二色补血草Limonium bicolor（Bge.）Kuntze的全草。分布河北、河南、山西、内蒙古、陕西、甘肃等地。甘，平。补血益气，止血散瘀。治功能性子宫出血，月经不调，肾盂肾炎，尿血，痔疮出血，胃溃疡，脾虚浮肿。煎服：15～30克。

补骨脂 出《雷公炮炙论》。又名破故纸、胡韭子、补骨鸱。为豆科植物补骨脂Psoralea Corylifolia L. 的果实。主产四川、河南、陕西、安徽。辛、苦，温。入肾经。补肾助阳。①治黎明泄泻，阳痿，早泄，遗精，滑精，尿频，遗尿，腰膝冷痛，虚寒喘嗽。煎服：4.5～9克。②治白癜风，牛皮癣，秃发，配成酊剂外搽，同时配合晒日光20～30分钟或紫外线照射2～3分钟；鸡眼，熬膏涂。果实含花椒毒素、补骨脂素（Psoralen）、异补骨脂素、补骨脂定（Psoralidin）、异补骨脂定、补骨脂甲素（Bavachin）、补骨脂乙素（Isobavachalcone）、

补骨脂甲素甲醚（Bavachinin）、异补骨脂甲素、新补骨脂异黄酮、补骨脂醛、补骨脂酚（Bakuchiol）等。补骨脂乙素对动物有明显的扩张冠状血管、兴奋心脏、提高心肌作功率作用，并能对抗乳酸引起的蛙心心力衰竭。补骨脂对因化疗及放射线疗法引起的白血球下降有某些升高作用。并有抗实验性肿瘤作用。异补骨脂素对麻醉犬有降低血压，并有镇静、解痉作用。补骨脂素和花椒毒素为光敏感成分，能促进皮肤黑色素新生；对妇科出血有止血作用。补骨脂酚对金黄色葡萄球菌等在体外有强抑制作用。

补骨鹅 出《本草图经》。即补骨脂，详该条。

良姜 出《太平惠民和剂局方》。为高良姜之简称，详该条。

〔ㄱ〕

张天刚 见《植物名实图考》。为朝天罐之别名，详该条。

灵仙 见《药品化义》。为威灵仙之简称，详该条。

灵芝 见《嵇中散集》。即灵芝草，详该条。

灵芝草 出《滇南本草》。又名灵芝、木灵芝、菌灵芝。为多孔菌科植物紫芝Ganoderma japonicum（Fr.）Lloyd或赤芝G.lucidum（Leyss. ex Fr.）Karst.的子实体。前者分布华南及浙江、福建等地。后者分布华东、西南、华南及河北、山西。现多用人工培育。淡、微苦，温。入肾、脾经。滋补强壮，安神，健胃。治虚劳，头晕，失眠，消化不良，老年慢性气管炎，小儿支气管哮喘，血胆固醇过高症，白细胞减少症。内服：煎汤，1.5～3克；研末服，每次0.9～1.5克，日服二次；或制成糖浆、片剂及浸酒服。紫芝含甘露醇，α，α-海藻糖，麦角甾醇，顺蓖麻酸，延胡索酸，氨基葡萄糖，树脂，多糖类。近来从野生紫芝中得到生物碱：甜菜碱及其盐酸盐，γ-三甲胺基丁酸。赤芝中已确证含有十五个氨基酸，并分离得到四个肽，四个生物碱以及麦角甾醇，苯甲酸、硬脂酸等。赤芝酊对小鼠有镇静作用，水提液、乙醇提取液对小鼠有止咳、祛痰作用。赤芝发酵液和菌丝液均有明显的强心作用，提高小鼠耐缺氧的能力，改善心肌供血。灵芝注射液有较弱的降胆甾醇作用。对某些平滑肌有解痉作用。多糖有增强免疫活性作用。

灵砂 出《经史证类备急本草》。为银朱之别名，详该条。

灵脂 见《山西中草药》。为五灵脂之简称，详该条。

灵猫香 见《国药的药理学》。为灵猫科动物大灵猫Viverra zibetha L.的香腺囊中的分泌物。产陕西秦岭以南各地。辛，温。辟秽，行气，止痛。治中恶，心腹卒痛，疝痛。内服：入丸、散，0.15～0.3克。外科药中可作麝香之代用品。本品含香猫酮、香猫醇、乙胺、丙胺等。

灵磁石 见《中国药学大辞典》。为磁石之处方名，详该条。

屁巴虫 见《中药志》。为九香虫之别名，详该条。

尾参 见《湖南药物志》。为玉竹之别名，详该条。

尿白碱 见《四川中药志》。为人中白之别名，详该条。

尿珠根 见成都中医学院等《常用草药治疗手册》。为薏苡根之别名，详该条。

陆英 出《神农本草经》。为忍冬科植物蒴藋Sambucus chinensis Lindl.的花。分布华东、中南、西南及陕西、甘肃、宁夏等地。苦、辛，寒。祛风除湿，散瘀消肿。①治风湿痹痛，水肿，脚气，跌打损伤。煎服：9～15克。②煎水洗，治风疹瘙痒。

阿儿七 见《陕西中草药》。即窝儿七，详该条。

阿片 见《本草纲目》。即鸦片，详该条。

阿芙蓉 见《本草纲目》。为鸦片之别名，详该条。

阿利藤 见《福建民间草药》。又名念珠藤、瓜子藤、满山香、七里香。为夹竹桃科植物链珠藤Alyxia sinensis Champ. ex Benth.的全株或根。分布贵州、广西、广东、湖南、福建、江西、浙江。苦、辛，温，有小毒。祛风利湿，活血通络。治风湿痹痛，腰痛，脾虚泄泻，周身浮肿，湿性脚气，经闭，跌打损伤。煎服：9～12克。孕妇忌服。

阿胶 出《神农本草经》又名驴皮胶。为驴皮煎制而成的胶质块。主产山东、河北、浙江。甘，平。入肺、肝、肾经。补血，止血，养阴，安胎。①治贫血，眩晕，心悸，虚劳咯血、吐血，尿血，便血，月经不调，崩漏，胎漏。②治热病伤阴，虚烦不眠，阴虚咳嗽，也可治痉厥抽搐。内服：3～9克，入汤剂溶化，或另用黄酒加热溶化冲服。本品主含骨胶原及其部分水解产物。阿胶能改善动物体内钙的平衡，促进钙的吸收，使血钙略升高。对狗能促进血液中红细胞和血红蛋白的生长。阿胶能预防和治疗豚鼠进行性肌营养障碍，其原理可能是防止食物中维生素E的氧化。阿胶还能对抗猫的创伤性休克。

阿魏 出《新修本草》。又名臭阿魏。为伞形科植物新疆阿魏Ferula Sinkiangensis K.M.Shen或圆茎阿魏F.conocaula Korovin及其具有蒜样特臭的同属植物的油胶树脂，主产新疆。过去进口之阿魏为同属植物胶阿魏草F.assafoetida L.的油胶树脂，产伊朗、阿富汗等国。苦、辛，温。入肝、脾、胃经。消积，杀虫，解毒。①治癥瘕痞块，疟疾。内服或制成药膏外敷（治疟疾敷于合谷穴）。②治虫积，肉积，脘腹胀痛，痢疾。内服：入丸、散，0.9～1.5克。不入汤剂。孕妇忌服。胶阿魏草的油胶树脂含挥发油、树脂和树胶。挥发油内含多种有机含硫化合物和少量香英兰醛等；树脂中主含阿魏树脂鞣酸及其阿魏酸酯和游离的阿魏酸；树胶内含法呢费醇（Farnesiferol）A、B、C。新疆阿魏油胶树脂的成分和胶阿魏草油胶树脂的成分大体相同。水浸剂对狗、大鼠能延长血凝时间。煎剂在体外对人型结核杆菌有抑制作用；能引起离体豚鼠子宫的强烈收缩。

陈皮 出《食疗本草》。为橘皮之处方名，详橘皮条。

陈芥菜卤汁 出《本草纲目拾遗》。又名腌芥卤。为腌芥菜的陈年卤汁。咸，凉。清热化痰。治肺痈吐脓血。内服：每日100～200毫升，炖温，分二至三次服。

陈柑皮 见清·赵其光《本草求原》。即柑皮，详该条。

附子 出《神农本草经》。为毛茛科植物乌头Aconitum Carmichaeli Debx.（栽培品）的侧根（肥大者）。主产四川、陕西。辛，大热，有毒。入心、脾、肾经。回阳补火，温中止痛，散寒除湿。①治亡阳汗出，四肢厥冷，脉微欲绝。②治脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐，泄泻，冷痢，小儿慢惊。③治肾阳不足，畏寒肢冷，阳萎，尿频，肾虚水肿。④治风寒湿痹，阴疽，疮漏。煎服：制附子，3～9克，宜久煎。反贝母、白蔹、半夏、括蒌、白及。本品中毒反应与草乌同，参见草乌条。孕妇忌服。附子或草乌头之形长而细者名天雄。功专壮阳强肾，余同附子。附子含新乌头碱、乌头碱、次乌头碱、消旋去甲基乌药碱、棍掌碱（Coryneine）等生物碱以及附子脂酸、附子磷脂酸钙、β-谷甾醇及其脂肪酸酯等。炮制后生物碱含量大为减少。熟附片煎剂有兴奋心脏作用，有效成分可能为消旋去甲基乌药碱，静脉注射有短暂的收缩力增强、心跳变快及降压作用，并扩张冠状血管。对实验性关节炎有抗炎作用。

生附子冷浸液可致心律不齐和心跳停止，煮沸后毒性作用大为降低。附子磷脂酸钙及β-谷甾醇等脂类成分具有促进饱和脂肪和胆固醇的新陈代谢作用，减少它们在动脉壁的沉着和血液中的含量，曾用于实验性动脉粥样化兔的治疗，获初步效果。所含生物碱的药理，见川乌头条。

附地菜 ❶出《植物名实图考》。又名伏地菜、鸡肠草。为紫草科植物附地菜Trigonotis peduncularis(Trev.)Benth.的全草。全国大部分地区均有分布。微辛、苦，平。①治遗尿，赤白痢。煎服：6～15克。②捣敷发背，肿毒，漆疮，跌打损伤。❷出《植物名实图考》。为狗屎花之别名，详该条。

忍冬花 出《新修本草》。为金银花之别名，详该条。

忍冬藤 出《本草经集注》。又名银花藤、金银藤、鸳鸯藤、忍寒草、右旋藤、二花秧。为忍冬科植物忍冬Lonicera japonica Thunb.的茎叶。我国大部分地区均产。甘，寒。入心、肺经。清热，解毒，通络。治温病发热，咽炎，肺炎，肺脓疡，腮腺炎，痢疾，肠炎，肝炎，风湿性关节炎，痈疮肿毒。煎服：15～60克。叶含忍冬素(Loniceraflavone)、忍冬甙(Lon icerin)，木犀草素，番木鳖甙等。茎含鞣质、生物碱。所含木犀草素对离体兔肠平滑肌有解痉作用，并有抗炎作用，在体外能抑制葡萄球菌和枯草杆菌。

忍寒草 出《洪氏集验方》。为忍冬藤之别名，详该条。

鸡儿肠 见《救荒本草》。为马兰之别名，详该条。

鸡儿松 见《广西中药志》。为岗松之别名，详该条。

鸡子白 出《本草经集注》。为雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson的卵白。甘，凉。治热毒肿痛，丹毒，和赤小豆末调敷患处。涂敷子宫颈糜烂，用生理盐水棉签揩拭后涂布。固形物中约90%是蛋白质，其中主要为卵白蛋白、卵类粘蛋白等。蛋白质中含所有的必需氨基酸，故在营养上是优良的。所含脂类甚少。

鸡子白皮 出唐·孟詵《必效方》。为凤凰衣之别名，详该条。

鸡子壳 出《日华子诸家本草》。为雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson的卵壳。制酸，止血；外用敛疮。治胃痛，吐酸，反胃，吐血，咳血，衄血，便血，佝偻病，手足搐搦症。焙燥研粉服，每次1.5～3克，每日二至三次，小儿酌减。本品含碳酸钙90%以上，还含碳酸镁、磷酸钙、胶质、有机物等。

鸡子黄 出《名医别录》。又名鸡卵黄。为雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson的卵黄。甘，平。入心、肾经。滋阴养血，润燥熄风。①治阴虚心烦不寐，猝然干呕不止，胎漏下血。生鸡子黄1～2枚，冲服。②治肺结核潮热、盗汗、咳嗽、吐血，婴幼儿慢性消化不良。鸡子黄煮熟熬油内服。③治烧、烫伤，热疮，湿疹，皮肤溃疡。鸡子黄油外涂。本品含脂类30%（主含卵磷脂），又含蛋白质、糖类、无机盐及多种维生素。

鸡内金 出《本草蒙筌》。又名鸡肫皮、鸡黄皮、鸡胵胫。为雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson的砂囊内壁。甘，平。入脾、胃、小肠，膀胱经。健脾胃，消食滞，止遗溺，化结石。①治食积不化，脘腹胀满，呕吐反胃，泻痢，小儿疳积，遗尿，遗精，胆结石，尿路结石。内服：煎汤，3～9克；研末吞服，每次1.5～3克。②烧存性研末敷口疮、乳蛾、牙疳。本品含胃激素Ventriculin、角蛋白等。口服能提高消化力，使胃分泌量及酸度增加，运动机能增强，作用迟缓而持久。

鸡毛蕊 见《贵州民间药物》。为大丁草

之别名，详该条。

鸡爪三七 见《广西中草药》。为伽蓝菜之别名，详该条。

鸡爪果 见《南宁市药物志》。为枳椇子之别名，详该条。

鸡爪参 ❶见《贵州民间方药集》。为狗屎花根之别名。❷见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为隔山香之别名。各详该条。

鸡爪草 见《中国经济植物志》。为委陵菜之别名，详该条。

鸡心白附 见《中药材品种论述》。为白附子之药材名，详该条。

鸡仔树 见《广西中草药》。为黄花倒水莲之别名，详该条。

鸡头 出《方言》。为芡实之别名，详该条。

鸡头米 见《中药材手册》。为芡实之别名，详该条。

鸡肉 出《神农本草经》。为雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson的肉。甘，温。入脾、胃经。补中益气。治虚劳羸瘦，重病后胃呆食少，崩漏，产后乳少。内服：煨食或隔水蒸汁。本品每100克含蛋白质23.3克，脂肪1.2克，钙11毫克，磷160毫克，铁1.5毫克，维生素$B_1$0.03毫克，维生素$B_2$0.09毫克，尼克酸8毫克。还含维生素A、C及E，胆甾醇，3-甲基组氨酸。

鸡舌香 出《抱朴子》。为母丁香之别名，详该条。

鸡血 出《名医别录》。为雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson的血。咸，平。入心，肝经。祛风，安神，活血，解毒。①治小儿惊风，热饮之；筋骨折伤，和酒饮。②治口面㖞斜，痈疽疮癣，蜈蚣、蜘蛛咬伤，局部涂敷。

鸡血七 见《陕西中草药》。又名红血儿、倒生莲、蜈蚣七。为蓼科植物中华抱茎蓼Polygonum amplexicaule D. Don var. sinense Forb. et Hemsl. 的根茎。分布陕西、湖北、四川、云南等地。微苦、涩，平，有小毒。活血，止血，消炎，止痛。治跌打损伤，外伤出血，急性细菌性痢疾，胃肠炎。内服：煎汤，3～9克；研末吞1～3克；或适量浸酒饮。外用：研末撒。不宜与鸡冠花、钩藤同用。本品的10%浸出液有广谱体外抗病毒作用，对腺病毒3型、肠病毒、单纯疱疹病毒、乙型脑炎病毒均有抑制作用。

鸡血兰 见《贵州民间药物》。为丝棉木之别名，详该条。

鸡血藤 出《本草纲目拾遗》。又名血风藤。为豆科植物密花豆Spatholobus Suberectus Dunn或香花崖豆藤Millettia dielsiana Harms ex Diels等的藤茎，前者主产广西；后者主产江西。苦、甘，温。入肝、肾经。补血行血，舒筋活络。治贫血，月经不调，经闭，痛经，腰膝酸痛，肢体麻木、瘫痪。亦治放射性白细胞减少症。内服：煎汤，9～15克；或浸酒服。香花崖豆藤的茎含无羁萜，3β-无羁萜醇，蒲公英赛醇，菜油甾醇，豆甾醇，谷甾醇。密花豆藤煎剂对实验性贫血家兔有补血作用。香花崖豆藤煎剂对大鼠实验性关节炎有显著抗炎作用，在试管中能抑制金黄色葡萄球菌。

鸡苏 出《吴普本草》。为水苏之别名，详该条。

鸡肝 出《名医别录》。为雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson的肝。甘，微温。入肝、肾经。补肝肾。治目暗，夜盲，小儿疳积，痿黄病，产后贫血，胎漏。内服：煮食。

鸡肝散 见《云南中草药》。又名黑头草、滇香薷、四棱蒿。为唇形科植物四方蒿Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. 的全草。分布广西、云南、贵州。辛、微苦，平。发汗解表，利湿止痒。①治感冒，扁桃体炎，肠炎，痢疾，疳积，肾盂肾炎，肝炎。煎服：3～9克。②治湿疹，皮炎，脚癣，

鲜品捣敷；创伤出血，捣敷或研末撒。鸡肝散花：治夜盲，结合膜炎，煎服并洗眼。全草含挥发油，主要成分为香薷酮。

鸡肠子草　见《陕西中草药》。为铃铃草之别名，详该条。

鸡肠风　见《中药志》。为巴戟天之别名，详该条。

鸡肠草　出《名医别录》。为附地菜之别名，详该条。

鸡卵黄　见《本草纲目》。即鸡子黄，详该条。

鸡胜胚　出《本草经集注》。为鸡内金之别名，详该条。

鸡肫子　见《福建中草药》。为野鸦椿子之别名，详该条。

鸡肫皮　见《滇南本草》。为鸡内金之别名，详该条。

鸡肫草　见《重庆草药》。又名白侧耳、水侧耳。为虎耳草科植物鸡眼梅花草Parnassia wightiana wall. 的带根全草。分布陕西、甘肃、云南、四川、贵州、湖北、广东、福建等地。甘、淡，温。益肺气，利水湿。①治久咳咯血，肾结石，胆石症，白带。煎服：15～30克。②鲜品捣敷湿热疮毒。

鸡姆刺　出《质问本草》。为大蓟之别名，详该条。

鸡骨升麻　见《全国中草药汇编》。为红毛七之别名，详该条。

鸡骨草　见萧步丹《岭南采药录》。又名红母鸡草、黄头草、猪腰草、黄食草、石门坎、细叶龙鳞草。为豆科植物广东相思子Abrus cantoniensis Hance除去荚果的全株。分布广东、广西等地。甘、淡，凉。清热利湿，舒肝活血，止痛。①治黄疸型肝炎，肝硬化腹水，胃痛，风湿骨痛，跌打瘀血内伤。煎服：15～30克。②鲜叶捣敷乳痈，蛇咬伤。本品种子有毒，不可内服。全草含相思子碱，胆碱，甾醇化合物、黄酮类、氨基酸、糖类。根、叶含甘草甜素。相思子碱腹腔注射，能降低小鼠肩部由葡萄球菌毒素引起的炎症反应，高浓度可抑制羊血球的溶解。

鸡骨香　出《生草药性备要》。又名滚地龙、驳骨消、黄牛香。为大戟科植物鸡骨香Croton Crassifolius Geisel. 的根。分布我国南部和西南部。辛、苦，温。理气止痛，祛风活络。治胃肠胀气，脘腹疼痛，疝痛，咽喉肿痛，风湿关节痛，腰腿痛，跌打扭伤。内服：煎汤，9～15克；研末，每服0.9～1.5克。

鸡骨常山　出《本草经集注》。即常山，详该条。

鸡骨癀　见《泉州本草》。为倒扣草之别名，详该条。

鸡胆　出《名医别录》。为雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson的胆囊。苦，寒。消炎，止咳、祛痰，明目。①治百日咳，慢性支气管炎，小儿细菌性痢疾。内服：鲜鸡胆1～3个取汁，加白糖调服；或干燥品研粉服：每次0.3～0.7克，一日三次。②治目赤流泪，取汁点眼；痔疮，取汁和水调涂。鸡胆汁含胆汁酸、胆色素等。鹅去氧胆酸为胆汁中有效成分。药理作用与猪胆基本相似，参见猪胆条。

鸡冠子　出《本草拾遗》。为苋科植物鸡冠花Celosia cristata L. 的种子。甘，凉。入肝经。凉血止血。治吐血，肠风便血，赤白痢疾，崩漏带下，淋浊。煎服：4.5～9克。本品含脂肪油。煎剂在试管内能杀灭人阴道毛滴虫。

鸡冠头　见《药材学》。即鸡冠花，详该条。

鸡冠苋　见《本草纲目》。为青葙之别名，详该条。

鸡冠花　出《滇南本草》。又名鸡髻花、鸡冠头。为苋科植物鸡冠花Celosia Cristata L. 的花序。全国各地均有栽培。甘，

凉。入肝、大肠经。清热利湿，收敛止血。治吐血，咳血，痔血，痢疾，崩漏，带下，产后瘀血腹痛，尿路感染。煎服：9～15克。本品含山柰甙、苋色素（Amaranthin）、松醇及多量硝酸钾。煎剂在试管内对人阴道滴虫有杀灭作用。

鸡冠苗 出《本草纲目》。为苋科植物鸡冠花 Celosia Cristata L. 的茎叶。甘，凉。①治痔疮，痢疾，吐血，衄血，血崩。煎服：9～15克。②治荨麻疹，煎服并煎水洗；蜈蚣咬伤，鲜品捣敷。

鸡屎白 出《神农本草经》。为雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson粪便上的白色部分。苦、咸，凉。入膀胱经。利水，泄热、祛风，解毒。治臌胀积聚，黄疸，淋病，风痹，破伤风，转筋。内服：炒研末入丸、散，3～6克，或浸酒服。

鸡屎藤 出《生草药性备要》。又名臭藤、皆治藤、毛葫芦、甜藤、牛皮冻。为茜草科植物鸡矢藤Paederia scandens（Lour.）Merr. 的全草或根。分布长江流域及其以南各地。甘、酸，平。祛风活血，利湿消积，止痛，解毒。①治风湿筋骨酸痛，跌打瘀痛，黄疸型肝炎，肠炎，痢疾，食滞，白带，阑尾炎，久咳。煎服：9～15克。②治疮疡肿毒，皮肤溃疡久不愈合，毒虫咬伤，鲜叶捣敷。③治胆、肾绞痛，胃肠痉挛性疼痛，骨折及手术后疼痛，以针剂肌肉注射。④治有机磷农药中毒。本品加绿豆煎服，二至三小时一次。药后可出现呕吐腹泻。果实名鸡屎藤果，取汁涂毒虫螫伤。全草含鸡屎藤甙（Paederoside）、鸡屎藤次甙（Scandoside）、车叶草甙、熊果酚甙、齐墩果酸、r-谷甾醇、挥发油等。动物试验，本品有轻度中枢抑制，并能抑制平滑肌的收缩。醇制剂对猫、兔、犬有降压作用，煎剂在体外对金黄色葡萄球菌和福氏痢疾杆菌有抑菌作用。

鸡娃草 见《陕甘宁青中草药选》。又名蓝雪草、刺矾松。为蓝雪科植物小蓝雪花 Plumbagella micrantha (Ledeb.) Spach 的全草。分布新疆、甘肃、青海、四川、西藏等地。苦，寒。解毒，杀虫。捣敷治神经性皮炎，牛皮癣；浸酒涂头癣，体癣，手足癣；研末制油膏涂敷疣痣。新鲜的根、茎及叶中均含矾松素。

鸡根 见《云南中草药》。为黄花远志之别名，详该条。

鸡脑壳 见清·刘士季《草木便方》。为小贯众之别名，详该条。

鸡黄皮 见《现代实用中药》。为鸡内金之别名，详该条。

鸡菜 见《广州植物志》。为白背三七之别名，详该条。

鸡眼草 出《救荒本草》。又名人字草、掐不齐、蚂蚁草、白斑鸠窝、鸳鸯草、花生草。为豆科植物鸡眼草Kummerowia Striata（Thunb.）Schindl. 的全草。分布东北及河北、山东、江苏、湖北、湖南、福建、广东至西南等地。辛、甘，微寒。清热利湿，活血，解毒。①治感冒发热，肠炎，痢疾，黄疸型肝炎，小儿疳积，泌尿系感染。煎服：9～30克。②捣敷跌打损伤，疔疮疖肿。地上部分含木犀草素-7-葡萄糖甙。5%煎剂对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

鸡眼睛 见《四川中药志》。为野鸦椿子之别名，详该条。

鸡眼藤 见广州军区空军卫生部《常用中草药手册》。为百眼藤之别名，详该条。

鸡距子 见《苏沈良方》。为枳实子之别名，详该条。

鸡甜菜 见《陆川本草》。为鸭脚艾之别名，详该条。

鸡脚七 见《贵州民间药物》。为花蝴蝶根之别名，详该条。

鸡脚叉 见《贵州民间方药集》。为鹅掌金星草之别名，详该条。

鸡脚爪 见《四川中药志》。为翻白草之别名，详该条。

鸡脚草　见《南宁市药物志》。为凤尾草之别名，详该条。

鸡脚骨　见《浙江民间草药》。为白马骨之别名，详该条。

鸡蛋花　见萧步丹《岭南采药录》。又名缅栀子、蛋黄花、大季花。为夹竹桃科植物鸡蛋花Plumeria rubra L.var. acutifolia (Poir.)Bail.的花。我国广东、广西、福建、云南等地有栽培。甘，凉。清热，利湿，止咳。治痢疾，肠炎，肝炎，支气管炎。煎服：3～9克。又可作预防中暑的清凉饮料。鸡蛋花叶：煎服治感冒发热。

鸡蛋膜衣　见《现代实用中药》。为凤凰衣之别名，详该条。

鸡鬠花　见《闽东本草》。即鸡冠花，详该条。

驳骨丹　❶出《生草药性备要》。又名接骨草、小还魂、小驳骨。为爵床科植物裸篱樵Gendarussa vulgaris Nees的茎叶。分布台湾、广东、广西、云南等地。辛、苦，微温。祛瘀生新，消肿止痛。治骨折，跌打扭伤，无名肿毒，鲜嫩枝叶捣烂，酒、醋炒外敷。风湿骨痛，煎服：15～30克；并煎水熏洗。本品含裸篱樵碱(Justicine)和挥发油。预试叶含黄酮甙、有机酸、糖类及氨基酸。❷见《四川中药志》。为七里香之别名，详该条。

驳骨消　见萧步丹《岭南采药录》。为鸡骨香之别名，详该条。

驴皮胶　出《备急千金要方·食治》。即阿胶，详该条。

驴耳朵菜　见《全国中草药汇编》。为紫菀之别名，详该条。

纶布　出《吴普本草》。为昆布之别名，详该条。

纽子三七　见《中国药用植物志》。为羽叶三七之别名，详该条。

八　画

〔一〕

玫瑰花　出明·姚可成《食物本草》。又名徘徊花、笔头花、刺玫花。为蔷薇科植物玫瑰Rosa rugosa Thunb.初放的花。主产江苏、浙江、福建、四川。甘、微苦，温。入肝、脾经。舒肝理气，和血调经。治胸闷、胃脘胁肋胀痛，吐血，咯血，月经不调，赤白带下，噤口痢，跌打瘀痛。煎服：3～6克。鲜花含挥发油(玫瑰油)，其中主成分为香茅醇、牻牛儿醇等，还含槲皮甙、苦味质，鞣质等。煎剂能解除小鼠口服吐酒石的毒性。玫瑰油对大鼠有促进胆汁分泌作用。

青小豆　出《太平圣惠方》。为绿豆之别名，详该条。

青凡木　见《广西中草药》。为黑面神之别名，详该条。

青木香　出《本草蒙筌》。又名马兜铃根、独行根、青藤香。为马兜铃科植物马兜铃Aristolochia debilis sieb. et Zucc.的根。主产浙江、江苏、安徽、河南等地。苦、辛，寒。入肺、胃经。行气止痛，祛风湿，降血压，解毒消肿。①治胃痛，腹痛，胸胁胀痛，疝气，风湿性关节炎，高血压。煎服：3～9克。②治痈肿疔疮，湿疹。研末调敷或磨汁涂。③治毒蛇咬伤。研末内服并调敷。本品含挥发油，其中已分离出马兜铃酸A、马兜铃酸C、7-羟基马兜铃酸A、7-甲氧基马兜铃酸A等。还含马兜铃内酰胺(Aristolochialactam)、木兰花碱、轮环藤酚碱等。木兰花碱对麻醉猫、正常大鼠、

肾性高血压狗均有明显降压作用，对舒张压的降低更显著，降压作用与神经节阻断有密切关系。粗制剂对小鼠有镇静作用，高浓度在体外对金黄色葡萄球菌等有某些抑菌作用。马兜铃酸对小鼠腹水癌有抑制作用。

青木香藤 见《本草备要》。为天仙藤之别名，详该条。

青风藤 见《中药志》。又名清风藤、寻风藤、大叶青绳儿、追骨风、大风藤。为防己科植物青藤Sinomenium acutum(Thnub.) Rehd. et Wils. 或毛青藤 S.acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd.et Wils.的茎藤。主产湖北、江苏、浙江等地。苦、辛，温。祛风湿，通经络，利水，止痛。治风湿痹痛，鹤膝风、肢节肿痛，肢体麻痹、瘙痒，水肿，脚气，坐骨神经痛，三叉神经痛。煎服：9～15克。茎及根含青藤碱、异青藤碱、土藤碱、清风藤碱（Sinoacutine）、双青藤碱等生物碱以及丁香树脂酚（Syringaresinol），β-谷甾醇、豆甾醇。青藤碱对各种动物有镇痛、镇静、镇咳、降压、抗炎等作用，但也有明显的释放组织胺的副作用。给犬、猴口服常有轻度的胃肠不良反应。

青水胆 见《全国中草药汇编》。为野棉花根之别名，详该条。

青龙衣 见《山东中草药手册》。为胡桃青皮之别名，详该条。

青龙草 见《草药手册》。为百蕊草之别名，详该条。

青龙骨 见《江西草药》。为水龙骨之别名，详该条。

青叶胆 见《云南中草药》。又名肝炎草、青鱼胆、走胆药。为龙胆科植物云南当药Swertia yunnanensis Burkill或青叶胆 S. mileensis T. N. Ho et W. L. Shi的全草。分布云南。苦，寒。清肝胆湿热。治急性黄疸型肝炎，胆囊炎，尿路感染。煎服：15～30克。云南当药含油橄榄酸、氧蒽酮的羟基和甲氧基衍生物及其甙类，还含有具生理作用的内酯碳甙类和黄酮酸甙类。青叶胆含日本当药素（Smertia japonin）及当药素（Swertisin）。能显著降低大白鼠四氯化碳中毒性肝炎引起的血清谷丙转氨酶升高。对肝细胞有保护作用。

青白苏 出《日华子诸家本草》。为荠苧之别名，详该条。

青兰 见《中国药用植物图鉴》。为麦斛之别名，详该条。

青皮 出《珍珠囊》。又名小青皮、青桔皮、青柑皮。为芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其变种未成熟的果皮或幼果。主产福建、浙江、四川。苦、辛，温。入肝、胆经。疏肝破气，散结化滞。①治肝气郁结、胸胁疼痛，疝气痛，乳胀，乳房结块。②治胃脘胀痛，消化不良，食积痞满，久疟结癖。煎服：3～9克。成分参见橘皮条。所含挥发油及柠檬烯用蒸气给兔吸入，能刺激呼吸道分泌细胞，有祛痰作用，其余参见橘皮条。

青刚皮 见南京药学院《中草药学》。为橡木皮之别名，详该条。

青竹标 见《贵州草药》，为八楞木之别名，详该条。

青羊血 见《全国中草药汇编》。即山羊血，详该条。

青羊参 出《植物名实图考》。又名青阳参、白石参、牛尾参、闹狗药。为萝藦科植物青羊参Cynanchum otophyllum Schneid. 的根。分布湖南、广西、贵州、云南、西藏。甘、辛，温，有小毒。补肾，镇痉，祛风湿，解毒。治头晕，耳鸣，腰痛，癫痫，风湿骨痛，荨麻疹，狂犬咬伤，蛇咬伤。内服：煎汤，3～9克；或入丸、散。

青阳参 见《云南中草药选》。即青羊参，详该条。

青防风 见《中国药学大辞典》。为防风之处方名，详该条。

青矾 出《新修本草》。即绿矾，详该条。

青果 出《宛陵集》。为橄榄之别名，详该条。

青鱼胆 ❶出《食疗本草》。为鲤科动物青鱼 Mylopharyngodon piceus (Richardson) 的胆囊。分布长江以南平原地区。苦，寒。入肝、胆经。泻热，明目。治乳蛾，喉痹，含咽；目赤肿痛，翳障，滴眼；热疮，涂敷。❷见《湖南药物志》。为四方麻之别名，详该条。

❸见《云南中草药选》。为青叶胆之别名，详该条。

❹见《全国中草药汇编》。为黑及草之别名，详该条。

青柑皮 见清·赵其光《本草求原》。即青皮，详该条。

青蒟叶 见萧步丹《岭南采药录》。为蒟酱叶之别名，详该条。

青胡桃皮 出《救急方》。即胡桃青皮，详该条。

青树跌打 见《云南中草药选》。为滑叶跌打之别名，详该条。

青骨藤 见《云南中草药选》。为瓦草之别名，详该条。

青缸花 见《外科正宗》。为青黛之别名，详该条。

青盐 出《本草图经》。即大青盐，详该条。

青酒缸 出清·刘士季《草木便方》。又名山蚂蝗、粘身草、草鞋板。为豆科植物小槐花Desmodium caudatum(Thunb.)DC.的茎叶。分布安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、贵州。微苦、辛，平。清热利湿，消积、散瘀。①治感冒发热，肠胃炎，痢疾，风湿痹痛，小儿疳积，劳伤咳嗽吐血，白带过多。煎服：9～15克。②治痈疖疔疮，漆疮，汤火伤。捣敷或煎水洗。③治蛇咬伤。煎服并捣敷。茎叶含生物碱。叶中又含当药素(Swertisin)、刀豆氨酸等。

青酒缸根 见清·刘士季《草木便方》。为豆科植物小槐花 Desmodium caudatum (Thunb.) DC.的根。微苦，平。祛风除湿，活血，解毒。①治风湿腰痛，痢疾，黄疸型肝炎，瘰疬。内服：煎汤，15～30克；或浸酒。②治痈疽，跌打损伤，蛇咬伤。鲜品捣敷。本品含生物碱。

青娘子 出《本草纲目》。又名芫青、相思虫。为芫青科昆虫绿芫青 Lytta caraganae pallas 的全虫。产江苏、浙江等地。辛，温，有大毒。攻毒，逐瘀。治瘰疬，狂犬咬伤。去两翅及头足，炒炙后煎服：1～2枚；或入丸、散。孕妇忌服。含斑蝥素及脂肪等。

青蛇仔 见《岭南草药志》。为狗肝菜之别名，详该条。

青麻 见《中国药用植物志》。即苘麻，详该条。

青葙 出《神农本草经》。又名野鸡冠、鸡冠苋、草蒿、昆仑草、牛尾巴花。为苋科植物青葙 Celosia argentea L. 的茎叶。全国大部分地区均有分布。苦，微寒。清热燥湿，杀虫，止血。治疥疮，皮肤风热瘙痒，荨麻疹，妇女阴痒，煎水洗；创伤出血，捣烂敷。全草含糖类和多量草酸。

青葙子 出《神农本草经》。又名草决明、牛尾花子、狗尾巴子。为苋科植物青葙 Celosia argentea L. 的种子。全国大部分地区均产。苦，微寒。入肝经。去风热，清肝火，明目，去翳。治目赤肿痛，角膜云翳，高血压病，头痛，眩晕，唇口青，风瘙身痒。煎服：9～15克。青光眼患者忌服。本品含青葙子油脂，烟酸和丰富的硝酸钾。动物试验，本品有降低血压的作用。青葙子油脂有扩瞳作用。

青葙花 见《江西草药》。为苋科植物青葙Celsia argentea L. 的花序。苦，微寒。清肝凉血。①治头风痛，吐血，鼻衄，血

淋，血崩，赤痢。煎服：15～30克（鲜品30～60克）。②治视网膜出血。适量煎水洗。花含β-花青甙。

青蒌 见《广东中草药》。为蒟酱之别名，详该条。

青筋藤 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为血风藤之别名，详该条。

青蒿 出《神农本草经》。又名香蒿、苦蒿、草蒿。为菊科植物黄花蒿 Artemisia annua L. 或青蒿A. apiacea Hance的全草。全国大部分地区均产。苦，寒。入肝、胆经。清热解暑，化湿，截疟，杀虫。①治夏令感冒，中暑，温病寒热往来，骨蒸劳热或原因不明的低热。煎服：4.5～9克（鲜品30～60克）。②治疟疾。煎服或晒干研末，于疟发前四小时服3克，连服五日。③治皮肤瘙痒，荨麻疹。煎水熏洗。青蒿经蒸馏得到饱和水溶液名青蒿露，治骨蒸，虚热，虚烦，久疟，蓐劳。全草含挥发油，内含蛔蒿酮，樟脑、丁香烯、桉叶素、石竹烯、蒎烯、莰烯等，并含东莨菪素，东莨菪甙。青蒿还含芸香甙、绿原酸、胆碱、鞣质等。黄花蒿还含青蒿素。青蒿素有良好的抗疟作用，可代替氯喹以抑制各型疟原虫裂殖体的繁殖而中止发作，具有高效、速效、低毒、用法简便等优点，唯复发率较高。

青蒿子 出《食疗本草》。为菊科植物黄花蒿Artemisia annua L.或青蒿A. apiacea Hance的果实。甘，寒。清热，杀虫。①治劳热骨蒸，痢疾。煎服：3～6克。②煎水洗疥癣，风疹。

青蒿虫 见《本草推陈》。即青蒿蠹虫，详该条。

青蒿根 出《滇南本草》。为菊科植物黄花蒿Artemisia annua L. 或青蒿A. apiacea Hance 的根。治劳热骨蒸，风湿性关节炎，便血。煎服：3～15克本品含烯炔类成分。

青蒿蠹虫 出《本草纲目》。又名青蒿虫。为寄居于菊科植物青蒿茎中的一种昆虫的幼虫。镇静，镇痉。治急、慢惊风，对流行性乙型脑炎及脑膜炎的痉挛抽搐有效。内服：入丸剂。

青蒟 见《岭南草药志》。为蒟酱之别名，详该条。

青橘皮 见《本草品汇精要》。即青皮，详该条。

青黛 出《药性论》。又名靛花、青缸花、靛沫花。为爵床科植物马蓝 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.或豆科植物木蓝 Indigofera tinctoria L.、十字花科植物菘蓝 Isatis tinctoria L.、蓼科植物蓼蓝 Polygonum tinctorium Ait. 的茎叶经加工制成的粉末状物。产河北、江苏、安徽、江西、福建、河南、四川、云南等地。咸，寒。入肝、肺经。清热解毒，凉血。①治热病发斑，吐血，衄血，咯血，肺热咳嗽，小儿发热惊痫。内服：1.5～3克，多入散剂。②治痄腮，中耳炎，口腔炎，小儿鹅口疮，咽喉肿腐，丹毒，黄水疮，湿疹。干撒或调涂患处。本品含靛蓝和靛玉红，是治疗慢性粒细胞白血病的有效成分。青黛（木蓝）醇浸液在体外对某些细菌具抑制作用。

青藤香 ❶见清·刘士季《草木便方》。为青木香之别名。❷出《阳春县志》。为木防己之别名。各详该条。

青藤根 见《药材学》。为木防己之别名，详该条。

青礞石 见《太平圣惠方》。为礞石药材之一种，详该条。

青蘘 出《神农本草经》。为胡麻叶之别名，详该条。

坤草 见《青海药材》。为益母草之别名，详该条。

林兰 出《神农本草经》。为石斛之别名，详该条。

枝核 见《四川中药志》。为荔枝核之别名，详该条。

枇杷 出《名医别录》。为蔷薇科植物枇杷Eriobotrya japonica(Thunb.)Lindl.的果实。分布长江流域以南及甘肃、陕西、河南等地。甘、酸，凉。入肺、肝经。润肺，止渴，下气。治肺热咳嗽，咯血，燥渴，呕逆。生食：适量。果肉含脂肪、糖、蛋白质、纤维素、果胶、鞣质、维生素B_1、C、隐黄素、β-胡萝卜素及钠、钾、铁、钙、磷等。

枇杷叶 出《名医别录》。为蔷薇科植物枇杷 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 的叶。主产广东、江苏、浙江、福建、湖北等地。苦，平。入肺、胃经。清肺化痰，降气和胃。治肺热咳嗽气喘，咳血，衄血；胃热呕吐，呃逆。煎服：4.5～9克，刷去毛。治肺病蜜炙用，治胃病姜汁炒用。本品含皂甙、熊果酸、齐墩果酸苦杏仁甙、鞣质、糖类及山梨醇。鲜叶含挥发油，油中主含反式橙花叔醇及金合欢醇等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。苦杏仁甙有止咳作用，其水解产物苯甲醛在消化道有抑制酵母、防止发酵的作用。

枇杷花 出《本草纲目》。又名土冬花。为蔷薇科植物枇杷 Eriobotrya japonica (Thunb.)Lindl. 的花。淡，微温。治感冒，头风，咳嗽，痰血。内服：煎汤，6～9克；或研末服。本品含挥发油及寡糖。

枇杷核 出《本经逢原》。为蔷薇科植物枇杷 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 的种子。苦，微寒。疏肝理气，化痰止咳。①治疝气，水肿，咳嗽。煎服：3～6克。②治瘰疬，研末热酒调敷。本品只能水煎服，不能炒熟吃。本品含苦杏仁甙及游离氢氰酸，另含绿原酸、新绿原酸、异绿原酸、咖啡酸、右旋儿茶酸及右旋梓儿茶酸。还含磷脂酰丝氨酸、脑甙等磷脂类物质及谷甾醇等。

枇杷根 见《四川中药志》。为蔷薇科植物枇杷 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 的根。苦，平。止咳，镇痛，下乳。治虚劳咳、吐血，风湿骨痛，乳汁不通。内服：煎汤，6～30克；或用60～120克同肉类煨汤服。枇杷树茎干的韧皮名枇杷木白皮，生嚼咽汁或煎汤冷服，下气，止呕不止。

杵头糠 出《圣济总录》。为米皮糠之别名，详该条。

枸柑根 见成都中医学院《常用草药治疗手册》。为柚根之别名，详该条。

板参 见清·刘士季《草木便方》。为金雀根之别名，详该条。

板栗 出《新修本草》。即栗子，详该条。

板栗壳斗 见《草药手册》。为栗毛球之别名，详该条。

板蓝根 出《本草纲目》。又名靛青根。为十字花科植物菘蓝Isatis tinctoria L.或爵床科植物马蓝 Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek. 等的根。前者主产河北、江苏、安徽、陕西，后者主产浙江、广东、广西等地。苦，寒。入肝、胃、肺经。清热解毒，凉血。①治流行性感冒，流行性腮腺炎，流行性脑脊髓膜炎，流行性乙型脑炎，急性传染性肝炎，细菌性痢疾，急性胃肠炎。②治热毒斑疹，丹毒，吐血，衄血，咽喉肿痛，暴发性火眼。煎服：9～30克。菘蓝根含黑芥子甙(Sinigrin)、靛玉红(Indirubin)、β-谷甾醇和一种吲哚醇的甙。还含r-氨基丁酸等。煎剂及丙酮提取物在体外对多种革兰氏阳性和阴性细菌都有抑制作用；本品对流感病毒也有抑制。靛玉红可治疗慢性粒细胞白血病。

松上寄生 见《本草纲目》。为松萝之别名，详该条。

松元 见《重庆草药》。为松塔之别名，详该条。

松木皮 出《本草纲目》。又名赤龙皮、赤松皮。为松科植物马尾松 Pinus massoniana Lamb. 或其同属数种植物的树皮。苦、涩，温。祛风胜湿，止血敛疮。①治风湿

关节疼痛，跌打损伤，肠风下血，久痢。内服：煎汤，9～15克；或研末服。②治烧烫伤，烧炭研细末，香油调敷；有渗出液或化脓者，直接撒布创面。③治湿疹，漆疮，皮肤瘙痒。煎汤熏洗。本品含鞣质。

松木笔 见《中药大辞典》。为松笔头之别名，详该条。

松毛 出《杨起简便单方》。即松叶，详该条。

松节 出《本草经集注》。又名黄松木节、油松节、松郎头。为松科植物油松Pinus tabulaeformis Carr.或马尾松 P.massoniana Lamb. 等枝干上的结节。我国大部分地区均产。苦，温。入肝、心经。祛风燥湿，活络止痛。①治风湿关节痛，转筋挛急，脚膝痿软，鹤膝风，大骨节病，跌损瘀痛。煎服：9～15克。②本品与艾叶等量，制成松艾酒精，涂抹治水田皮炎。本品主含纤维素、木质素、树脂和少量挥发油（松节油）。

松叶 出《本草经集注》。又名松毛、松针、山松须。为松科植物油松 Pinus tabulaeformis Carr. 或马尾松 P. massoniana Lamb. 等的叶。苦、涩，温。祛风通络，养肝明目，燥湿止痒。①治流行性感冒，慢性气管炎，风湿关节痛，腰痛脚弱，头风头痛，口眼㖞斜，跌打肿痛，夜盲症，失眠，高血压病，营养性水肿。内服：煎汤，9～15克（鲜品30～60克）；或浸酒饮。②治湿疹，漆疮，冻疮，阴囊湿痒。煎水洗。马尾松叶含挥发油，主成分为蒎烯及乙酸龙脑酯。还含贝壳杉酸-19-甲醚、南洋杉酸、槲皮素、山柰酚、鞣质等。煎液在体外对脑膜炎双球菌有抑制作用。

松花 出《新修本草》。即松花粉，详该条。

松花粉 出《新修本草》。又名松花、松黄。为松科植物马尾松 Pinus massoniana Lamb. 或其同属数种植物的花粉。主产江苏、浙江、辽宁、吉林、湖北等地。甘，温。祛风，收湿，止血。①治眩晕，胃及十二指肠溃疡，咳血，久痢。内服：煎汤，3～6克，包煎；或作散剂。②外撒治黄水疮，湿疹，婴儿尿布性皮炎，创伤出血。

松针 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。即松叶，详该条。

松果 见《重庆草药》。为松塔之别名，详该条。

松实 出《名医别录》。即松塔，详该条。

松郎头 见《药材学》。为松节之别名，详该条。

松树梢 见《浙江民间常用草药》。为松笔头之别名，详该条。

松树蕊 见《滇南本草》。为松笔头之别名，详该条。

松香 出《滇南本草》。又名松脂、松胶香、黄香。为松科植物马尾松 Pinus massoniana Lamb. 或其同属数种植物的松油脂，经蒸馏除去挥发油后的固体树脂。产广东、广西、福建、湖南等地。苦、甘，温。燥湿杀虫，生肌止痛。治痈疽，疖肿，疔毒，疥癣，湿疮瘙痒，外伤出血，烧伤。外用：入膏药或研末敷。

松根 出《本草经集注》。为松科植物马尾松Pinus massoniana Lamb. 或其同属数种植物的幼根或根白皮。苦，温。祛风活络，化瘀止血。①治风湿痹痛，跌打瘀痛，风虫牙痛。煎服：30～60克。②治呕血，损伤吐血。炒黑研末服：每次3克，一日二次。

松笔头 出《滇南本草》。又名松树蕊、松木笔、松树梢。为松科植物马尾松 Pinus massoniana Lamb. 或其同属数种植物的幼枝尖端。苦、涩，温。活血止痛，涩精，解毒。①治跌打损伤，关节疼痛。煎服：30～60克；或和面粉捣烂成饼，外敷。②治遗精，尿浊，膏淋，小便疼痛。煎服或磨汁服。

松胶香 见《刘涓子鬼遗方》。即松香，

详该条。

松脂 出《神农本草经》。即松香，详该条。

松球 见《周益生家宝方》。为松塔之别名，详该条。

松萝 出《神农本草经》。又名云雾草、老君须、金线草、树挂、天蓬草、龙须草、松上寄生。为松萝科植物长松萝Usnea longissima Ach. 或破茎松萝U. diffracta Vain. 的丝状体。分布全国各地林区。苦、甘，平，有小毒。止咳化痰，活血通络，清热解毒。①治慢性支气管炎，肺结核咳嗽痰多，风湿痹痛，头痛，目赤翳膜。②治白带，崩漏，月经不调。煎服：6～9克。③治瘰疬，痈肿，溃疡，创伤出血，烧伤。研末外敷。长松萝和破茎萝均含巴尔地衣酸、松萝酸、地弗地衣酸及地衣聚糖等。长松萝尚含拉马酸（Ramalic acid）。松萝酸对肺炎球菌、溶血性链球菌、白喉杆菌、结核杆菌都有很强的抑菌作用。对阴道滴虫也能抑制，还有对抗白喉及破伤风毒素的作用；能显著增加小鼠支气管的分泌，故有祛痰作用。

松黄 出《新修本草》。为松花粉之别名，详该条。

松塔 见《山西中草药》。又名松实、松元、松球、松果。为松科植物白皮松 Pinus bungeana Zucc. 或油松P. tabulaeformis Carr. 等的球果。前者分布山西、河南、陕西、甘肃、四川、湖北等地；后者分布辽宁、内蒙古、河北、山东、河南、山西、陕西、甘肃、青海、四川。苦，温。祛痰，止咳平喘，祛风，润肠。①治慢性气管炎，哮喘。②治风痹，大便燥结。煎服：30～60克。③治痔疮，煎水洗；烫伤，磨汁涂。本品含挥发油，内有柠檬烯、松醇、醛（或酮）酯类化合物。此外，尚含酚性物及皂甙等。总挥发油能提高大鼠的肾上腺皮质功能。

松筋草 见《广西中兽医药用植物》。为铺地蜈蚣之别名，详该条。

松藤 见《浙江民间常用草药》。为昆明鸡血藤之别名，详该条。

枪头菜 见《东北植物药图志》。为苍术之别名，详该条。

枫杨叶 见《湖南药物志》。为麻柳叶之别名，详该条。

枫杨皮 见《湖南药物志》。即枫柳皮，详该条。

枫苓 见《安徽中草药》。为猪苓之别名，详该条。

枫果 见《本草纲目拾遗》。为路路通之别名，详该条。

枫柳皮 出《新修本草》。又名枫杨皮、麻柳皮。为胡桃科植物枫杨 Pterocarya stenoptera DC. 的树皮或根皮。分布陕西、河南及长江流域以南地区。辛，大热，有毒。外用治疥、癣，用酒精浸搽或煎水洗；龋齿痛，捣烂塞患处；烫伤，煎液外涂。本品含鞣质等。

枫香树叶 出《本草纲目》。为金缕梅科植物枫香Liquidambar formosana Hance 的叶。分布甘肃、陕西和长江流域及其以南各地。辛、苦，平。祛风除湿，行气止痛，解毒。治感冒，产后风，小儿脐风，肠炎，痢疾，胃痛。煎服9～30克。研末调敷痈疖疮肿；捣烂搽蜈蚣螫伤。本品含挥发油，其中主含α-和β-蒎烯、莰烯以及柠檬烯等。

枫香树皮 出《新修本草》。为金缕梅科植物枫香Liquidambar formosana Hance 的树皮。辛，平。利湿，解毒。①治泄泻，痢疾，水肿。煎服：15～30克。②治大风癞疮。煎水洗或研末调敷。

枫香树根 出《本草纲目》。为金缕梅科植物枫香Liquidambar formosana Hance 的根。辛、苦，平。祛风除湿，止痛，解毒。①治风湿性关节炎，牙痛。煎服：15～30克。②治痈疖疮肿。研末调敷。

枫香脂 出《新修本草》。为白胶香之别

名，详该条。

枫香寄生 出《生草药性备要》。又名虾钳草、螃蟹夹、蟹爪寄生。为桑寄生科植物扁枝槲寄生Viscum articulatum Burm.f.的枝叶。分布台湾、福建、广东、湖南、贵州、四川、云南等地。苦，平。祛风除湿，止咳祛痰，活血。①治风湿痹痛，腰肌劳损，肺结核咳嗽，衄血，崩漏，带下，产后瘀痛，小儿惊风。煎服：9～15克。②治疥疮，煎水洗；牛皮癣，研末，用鸡蛋油调搽；小儿牙疳，研末吹敷。本品含齐墩果酸、齐墩果酸酯、古柯二醇（Erythrodiol）等三萜成分及肌醇。

枫荷梨 见《江西草药》。又名偏荷枫、木五加、鸭脚木、半荷枫。为五加科植物树参Dendropanax chevalieri (Vig.) Merr.的根。分布长江以南各地。甘，温。祛风除湿，活血止痛。治风湿痹痛，腰肌劳损，腰腿痛，半身不遂，偏头痛，臂丛神经炎，月经不调，跌打损伤。煎服：15～30克。孕妇慎用。

枫球子 见《中药志》。为路路通之别名，详该条。

枫寄生 见《广西本草选编》。为枫香寄生之简称，详该条。

枫藤 见《浙江民间常用草药》。为爬山虎之别名，详该条。

构叶 出《子母秘录》。为楮叶之别名，详该条。

杭菊 见《药物生产辨》。为菊花药材之一种，详菊花条。

枕瓜 见《中国药用植物志》。为冬瓜之别名，详该条。

枕头根 见《中国药用植物志》。为盾叶薯蓣之别名，详该条。

耶悉茗花 出《南方草木状》。为素馨花之别名，详该条。

刺丁茄 见《全国中草药汇编》。为丁茄之别名，详该条。

刺儿草 见《中国沙漠地区药用植物》。为牛舌水之别名，详该条。

刺儿菜 见《本草纲目拾遗》。为小蓟之别名，详该条。

刺三甲 出《天宝本草》。又名三加皮、三叶五加、三甲皮、刺三加、白笋根。为五加科植物白笋 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr. 的根或根皮。分布西南、华南、华中各地。苦、辛，凉。解热毒，除风湿，散瘀，止痛。①治黄疸，肠炎，风湿关节肿痛，腰膝酸疼，偏正头风，白带。煎服：15～30克。②治跌打损伤，痈肿疔毒。煎服并捣敷。孕妇忌服。

刺三加 见《贵州民间药物》。即刺三甲，详该条。

刺天茄 见《滇南本草》。为金扣钮之别名，详该条。

刺木果 见南京药学院《中草药学》。即刺莓果，详该条。

刺五加 见《中药材手册》。又名刺拐棒、老虎獠子。为五加科植物刺五加Acanthopanax senticosus(Rupr. et Maxim.) Harms的根及根茎。分布河北、山西及东北地区。辛、微苦，温。益气健脾，补肾安神、祛风除湿。治脾肾阳虚，腰膝酸痛，筋骨拘挛，步履乏力，失眠多梦，老年慢性气管炎。煎服：9～27克。本品含刺五加甙A、B、C、D、E、F、G，左旋芝麻素，多糖等。本品作用与人参相似，能增加机体对有害刺激的非特异性抵抗力，如抗疲劳作用，减轻寒冷、灼热、X线照射等对机体的伤害，延迟肿瘤发生，阻止肿瘤转移、减轻抗癌药物毒性。对实验性糖尿病能降低尿糖或血糖等。有人认为本品可作为人参的代用品。

刺毛菇 见《黑龙江省主要野生药用植物的鉴别及中草药新制剂》。为绒背蓟之别名，详该条。

刺龙牙 见《东北木本植物图志》。为刺老鸦之别名，详该条。

刺打草 见《湖南药物志》。为飞廉之别名，详该条。

刺头 见《浙江天目山药用植物志》。为金樱子之别名，详该条。

刺老鸦 见《黑龙江中药》。又名刺龙牙。为五加科植物辽东楤木 Aralia elata (Miq.)Seem. 的根皮或树皮。分布我国东北地区。甘、苦，平。补肾益精，健脾和胃，祛风活血。①治肾虚、性神经衰弱，糖尿病，水肿，胃痉挛，胃、十二指肠溃疡，慢性胃炎，肝炎，风湿性关节炎。煎服：9～15克。②治外伤出血，鲜根皮捣敷。根含楤木皂甙A、B、C（甙元为齐墩果酸）。另含生物碱、鞣质、挥发油、香豆素等。本品与人参相似，具有"适应原"样作用，并有抗辐射作用；楤木总甙给兔静脉注射，能增强神经细胞的兴奋性，提高小鼠的活动能力。醇浸液小剂量对离体蛙心及在体兔心都有强心作用，大剂量有抑制作用。家兔灌服水浸剂有轻泻作用。

刺红花 见《四川中药志》。即红花，详该条。

刺苋菜 见《南宁市药物志》。又名篱苋菜、野苋菜、猪母刺、土苋菜。为苋科植物刺苋 Amaranthus spinosus L. 的根或全草。分布我国华东、华南、西南及陕西、河南等地。甘、淡，寒。清热利湿，凉血止血，解毒消肿。①治痢疾，肠炎，咽喉肿痛，白带，胆结石，胃、十二指肠溃疡出血，便血，瘰疬，甲状腺肿。煎服：30～60克。②治痈疽疔毒，捣烂外敷；蛇咬伤，煎服并捣敷伤口；痔疮肿痛，皮肤湿疹，煎水洗；牙龈糜烂出血，烧灰研末搽敷；臁疮，与桐油同捣烂，敷贴患处。本品含芸香甙、β-谷甾醇、豆甾醇、菠菜甾醇、胆甾醇、正廿三烷至正卅三烷等。根还含皂甙，甙元为齐墩果酸。叶含微量氢氰酸。

刺矶松 见《青海常用中草药手册》。为鸡娃草之别名，详该条。

刺针草 见《内蒙古中草药》。为鹿角草之别名，详该条。

刺玫花 见《河北药材》。为玫瑰花之别名，详该条。

刺玫果 见《黑龙江中药》。即刺莓果，详该条。

刺拐棒 见《中国药用植物图鉴》。为刺五加之别名，详该条。

刺虎 出《本草图经》。即虎刺，详该条。

刺桐叶 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为豆科植物刺桐 Erythrina variegata L.var. orientalis(L.) Merr. 的叶。分布广东、广西、云南、贵州等地。治小儿疳积，蛔虫病。研末开水冲服：2～3克。

刺桐皮 见《中药材手册》。为海桐皮之别名，详该条。

刺桐花 出《本草图经》。为豆科植物刺桐Erythrina variegata L.var. orientalis(L.) Merr. 的花。止血。治创伤出血。研末敷。

刺莲蓬实 见《药材学》。为芡实之别名，详该条。

刺莓果 见《黑龙江中药》。又名刺玫果、刺木果、蔷薇果、为蔷薇科植物山刺玫 Rosa davurica Pall. 的果实。分布东北、华北地区。甘、酸，温。健脾理气，养血调经。①治消化不良，胃痛，腹胀，泄泻，淋病，月经不调。煎服：9～15克。②治维生素C缺乏症。生食。刺玫花：煎服治月经过多。果实含较多的维生素C，以及维生素B_2、E、K，A元和橙皮甙、鞣质等。

刺莓果根 见《黑龙江常用中草药手册》。又名野玫瑰根、红根。为蔷薇科植物山刺玫Rosa davurica Pall. 的根。苦、涩，平。治慢性支气管炎，肠炎，细菌性痢疾，功能性子宫出血。煎服：9～15克。本品含大量的儿茶精，以及左旋表儿茶精、左旋没食子儿茶

精、左旋表没食子儿茶精等。

刺黄芩 见《陕西中草药》。为十大功劳之别名，详该条。

刺黄连 见《贵州药用植物目录》。为三颗针之别名，详该条。

刺黄柏 见《全国中草药汇编》。为三颗针之别名，详该条。

刺菠 见《闽东本草》。为三月泡之别名，详该条。

刺梨 出《本草纲目拾遗》。又名茨梨、文先果。为蔷薇科植物刺梨 Rosa roxburghii Tratt.f.normalis Rehd.et Wils.的果实。分布江苏、湖北、广东、四川、贵州、云南。甘、酸、涩，平。健胃，消食。治食积饱胀，维生素C缺乏症。煎服：3～5枚。新鲜黄色果实中含多量维生素C，维生素P。

刺梨根 出清·刘士季《草木便方》。又名茨藜根。为蔷薇科植物刺梨 Rosa roxburghii Tratt.f.normalis Rehd.et Wils.的根。甘、酸、涩，平。健胃消食，涩精，止血。治胃痛；食积腹胀，泄泻、痢疾，遗精，自汗，盗汗，崩漏，带下，痔疮出血。煎服：15～60克。刺梨叶：外用治疥疮，痈肿。刺梨花：煎服止泻痢。根含鞣质、维生素B及P。

刺蜜 出《本草拾遗》。又名羊刺蜜、草蜜、刺糖、骆驼刺糖。为豆科植物骆驼刺Alhagi pseudoalhagi Desv.叶中分泌液凝结而成的糖粒。产新疆、甘肃、内蒙古等地。甘、酸，平。除烦止渴，涩肠，止痛。治烦热口渴，痢疾，腹泻，腹痛，头痛。研末服：9～15克。骆驼刺的种子名骆驼刺子，煎服治胃痛；鲜品压汁外涂治牙痛。

刺猬皮 出《本草原始》。又名猬皮。为刺猬科动物刺猬 Erinacus europaeus L.的皮。全国大部分地区均产。苦，平。入胃、大肠经。行气止痛、固精缩尿，化瘀止血。①治胃脘疼痛，反胃，遗精，遗尿。内服：煎汤，6～9克；研末吞，每次3克，每天二至三次。②治痔疮出血，肠风下血，脱肛。内服并研末撒或调敷。孕妇慎用。本品含角蛋白、骨胶原、弹性硬蛋白和脂肪等。

刺楸皮 见《陕西中草药》。为刺楸树皮之简称，详该条。

刺楸树皮 见《四川中药志》。又名丁桐皮、钉皮、刺楸皮。为五加科植物刺楸Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.的树皮。分布几遍全国。辛、苦，平。祛风除湿，解毒杀虫。①治风湿关节痛及腰膝疼痛，急性胃肠炎，痢疾。煎服：9～15克。②治痈肿，捣敷；疥癣，研末调搽；虫牙痛，煎水含漱。本品含鞣质、多炔化合物、黄酮甙、香豆素甙、少量生物碱、挥发油、三萜皂甙（甙元为常春藤皂甙元）、树脂等。

刺楸树根 见《四川中药志》。为五加科植物刺楸Kalopanax septemlobus (Thunb.)Koidz.的根或根皮。苦、凉。有小毒。凉血，散瘀，祛风，利湿。治肠风，痔血，跌打损伤，风湿骨痛，肾炎水肿。煎服：9～15克。根含刺楸皂甙A及B（甙元为常春藤皂甙元）。

刺榆子 出《蜀重广英公本草》。为金樱子之别名，详该条。

刺蓟菜 见《救荒本草》。为小蓟之别名，详该条。

刺蓬 见《甘肃中草药手册》。为猪毛菜之别名，详该条。

刺蒺藜 出《本草衍义》。又名蒺藜子、白蒺藜、硬蒺藜、三角蒺藜。为蒺藜科植物蒺藜Tribulus terrestris L.的果实。主产河南、河北、山东、安徽等地。苦、辛，微温。入肝、肺经。平肝，疏肝，祛风，明目。①治头痛眩晕。胸胁不舒，乳房胀痛、乳闭不通，咳逆，肺痿，肺痈，瘾瘾。②治风疹瘙痒，目赤肿痛多泪，角膜云翳，痈肿疮毒。煎服：6～9克。本品含刺蒺藜甙（Tribuloside)、黄芪甙、山柰酚-3-芸香糖甙、山柰酚、哈尔满碱、哈尔明碱，少量挥发油

和油酯。水及醇浸液，对麻醉动物有降压作用，生物碱部分有轻度利尿作用。在大鼠离体肠管及蛙腹直肌标本上，有抗乙酰胆碱作用。

刺糖 见《新疆药材》。为刺蜜之别名，详该条。

画石 见《本草衍义》。即滑石，详该条。

画眉架 见《岭南草药志》。为鹰不泊之别名，详该条。

茉莉叶 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为木犀科植物茉莉 Jasminum Sambac (L.) Ait.的叶。我国南方各地均有栽培。辛，凉。清热解表，理气。治外感发热，腹胀腹泻。煎服：3～6克。

茉莉花 出《本草纲目》。又名奈花、木梨花。为木犀科植物茉莉 Jasminum Sambac (L.) Ait. 的花。产江苏、四川、广东等地。辛、甘，凉。理气和中。①治下痢腹痛。煎服：1.5～4.5克。②治眼结膜炎。煎水洗。本品含挥发油，其中含芳樟醇、苯甲醇和它们的乙酸酯等，尚含茉莉花素。

茉莉根 出《本草纲目》。为木犀科植物茉莉Jasminum Sambac (L.) Ait. 的根。苦，温，有毒。麻醉，镇静，止痛。①治跌打损伤，筋骨疼痛。捣烂，酒炒包敷患处。②治龋齿，研末，熟鸡蛋黄调匀塞龋孔内。③治失眠。磨水服：0.9～1.5克。本品预试含生物碱，甾醇。水提取物对动物有镇静和催眠作用，青蛙则表现全身瘫痪。

苦丁茶 出《本经逢原》。为冬青科植物枸骨Ilex cornuta Lindl.或大叶冬青I. latifolia Thunb. 等的嫩叶。产江苏、浙江、福建、广西等地。苦，寒。入肝、肺、胃经。散风热，清头目，解毒消炎。①治风热头痛，齿痛，目赤，耳鸣，热病烦渴，肠炎，痢疾。煎服：4.5～9克。②治口腔炎，水煎含并内服；水、火烫伤，乳腺炎初起，研末油调外涂；外伤出血，研细末敷。枸骨叶含咖啡碱，预试尚含皂甙、鞣质、苦味质。大叶冬青叶含大叶冬青苦糖甙（Latifoloside）A及B、熊果酸、β-香树脂醇、蛇麻脂醇、蒲公英赛醇、熊果醇、β-谷甾醇。枸骨对豚鼠离体心脏有增加冠脉流量及心肌收缩力的作用。

苦丁香 见《本草衍义补遗》。为瓜蒂之别名，详该条。

苦木 见《四川中药志》。又名苦皮子、苦皮树、苦胆木、赶狗木、黄楝树。为苦木科植物苦木 Picrasma quassioides (D. Don) Benn. 的根皮、树皮或枝叶。分布我国黄河流域以南各地。苦，寒，有毒。清热燥湿，解毒杀虫。①治细菌性痢疾，胃肠炎，胆道感染，蛔虫病，咽喉炎，急性扁桃体炎。煎服：根皮、树皮4.5～9克；枝3～4.5克；叶1～3克。②治痈疖肿毒，疥癣，湿疹，烫伤。煎水洗或研末调敷。孕妇忌服。木材含苦木素（Quassin）、异苦木素、苦树素（Picrasin）、苦木半缩醛（Niqakihcmiacetal）、苦木内酯（Niqakilactone）等。并含苦木萜醇（Niqakinol）、苦木酮碱（Niqakinone）、甲基苦木酮碱、铁屎米酮（canthin-6-one）、1-甲氧甲酰-β-咔啉（1-carbomethoxy-β-carboline）、1-乙氧甲酰-β-咔啉、1-甲酰-β-咔啉、1-乙烯基-4·8-二甲氧基-β-咔啉等。总生物碱在体外对溶血性乙型链球菌、金黄色葡萄球菌、宋内氏痢疾杆菌、枯草杆菌等有抑制作用。苦木素可作健胃剂。1:10000的浓度在体外能抑制溶组织阿米巴的运动；浸剂灌肠可治蛲虫。其毒性可侵犯神经系统，在兔先引起全身的肌肉震颤，而后转入麻痹。

苦木通 见《中药材品种论述》。为关木通之别名，详该条。

苦甘草 见《内蒙古中草药》。又名苦豆根。为豆科植物苦豆子 Sophora alopecuroides L. 的根。主产内蒙古。苦、寒，有毒。清热解毒。①治细菌性痢疾，黄疸，热病狂

躁，牙痛。煎服：3～9克。②治湿疹，皮肤瘙痒，煎服或熏洗；烫伤，研末油调敷。本品含槐果碱，为抗癌有效成分，还有平喘作用。

苦艾 见《云南中草药选》。为金龙胆草之别名，详该条。

苦石莲 见《增订伪药条辨》。又名老鸦枕头、土石莲子、猫儿核、广石莲子。为豆科植物南蛇竹 Caesalpinia minax Hance 的种子。主产云南、广西。苦，寒。清热利湿。治急性胃肠炎，痢疾，膀胱炎，淋病，白浊，尿血，梦遗。煎服：6～9克。

苦龙胆草 见《全国中草药汇编》。即金龙胆草，详该条。

苦瓜莲 见《江西民间草药验方》。为王瓜之别名，详该条。

苦皮子 见《四川中药志》。为苦木之别名，详该条。

苦皮树 见《中国树木分类学》。为苦木之别名，详该条。

苦地丁 见《中药志》。又名地丁草、小鸡菜。为罂粟科植物地丁紫堇 Corydalis bungeana Turcz. 的全草。分布甘肃、陕西、山西、山东、河北、辽宁等地。苦，寒。清热解毒。①治疔疮、痈肿及其他化脓性感染。煎服或捣敷患处；烫伤，研末油调敷。②治流行性感冒，支气管炎，温病发热烦躁，急性传染性肝炎，肠炎，痢疾，肾盂肾炎，瘰疬，水痘，眼结膜炎。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。本品含苦地丁甲素、乙素、丙素、丁素等多种生物碱；另含香豆素或内酯、甾体皂甙、酚性物质、中性树脂及挥发油。全草制成的注射剂（含生物碱）在体外，对链球菌、肺炎球菌、痢疾杆菌、大肠杆菌、葡萄球菌等有抑菌作用。组织培养法证明，它对病毒（单纯疱疹病毒、副流感仙台株）也有抑制作用。注射剂对离体蛙心有抑制作用。

苦地胆 ❶出《生草药性备要》。又名天芥菜、地胆头、土柴胡、草鞋底、毛刷子、地苦胆、铁烛台。为菊科植物地胆草Elephantopus scaber L. 的全草。分布云南、贵州、广西、广东、江西、福建等地。苦、辛，寒。清热解毒，利水消肿。①治流行性感冒，咽喉疼痛，口腔溃疡，百日咳，眼结膜炎，黄疸，痢疾，腹泻，肠风下血，淋病，肝硬化腹水，肾炎水肿。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。②鲜品捣敷治乳腺炎，疔疮，痈疖，湿疹，蛇虫咬伤；取汁滴耳治中耳炎。孕妇慎服。本品含表无羁萜醇、蛇麻脂醇及其乙酸酯、去氧地胆草素及异去氧地胆草素等。注射液在体外对金黄色葡萄球菌，大肠、绿脓、伤寒及痢疾等杆菌有一定抑菌作用。去氧地胆草素有抑制肿瘤生长作用。❷见《广东中草药》。为风轮菜之别名。详该条。

苦地胆根 出《生草药性备要》。为菊科植物地胆草 Elephantopus scaber L. 的根。苦，寒。清热解毒，利湿。①治感冒发热，温毒发斑，头风，咳嗽痰血，痢疾，睾丸炎，白带。煎服：9～30克。②治痈肿，鲜品捣敷；风火牙痛，酒煎含漱。孕妇慎服。

苦竹叶 出《本草经集注》。为禾本科植物苦竹Pleioblastus amarus (keng)keng f. 的嫩叶。我国南方各地均产。苦，寒。清热除烦，利尿，解毒，明目。①治热病口渴，心烦不眠，卒然失音，小儿潮热，小便不利，口舌生疮，目痛目热。煎服：6～15克。②烧存性研末敷汤火伤。

苦竹沥 出《名医别录》。为禾本科植物苦竹Pleioblastus amarus (keng) keng f. 的茎秆用火烤灼时流出的液汁。功用与淡竹沥相同。参阅竹沥条。

苦竹茹 出《食疗本草》。为禾本科植物苦竹Pleioblastus amarus (keng) keng f. 的基秆除去外皮后刮下的中间层。主下热壅，止尿血。煎服：4.5～9克。

苦竹笋 出《本草拾遗》。又名苦笋。为禾本科植物苦竹 Pleioblastus amarus (keng) keng f. 的嫩苗。苦、甘，寒。清热，

利水，止渴。治烦热，消渴，脚气，面目黄，解酒毒。煎汤：60～90克。

苦灯笼 见萧步丹《岭南采药录》。为鬼灯笼之别名，详该条。

苦远志 见《滇南本草》。即远志，详该条。

苦豆 ❶见蒙古《中草药新医疗法资料选编》。为苦参实之别名。❷见《饮膳正要》。为胡芦巴之别名。各详该条。

苦豆子 见《新疆中草药手册》。为豆科植物苦豆子Sophora alopecuroides L. 的种子。分布河北、河南、山西、陕西、甘肃、内蒙古、新疆、西藏等地。苦，寒，有毒。清热燥湿，止痛杀虫。①治胃痛吐酸，腹痛，腹胀，小儿消化不良，痢疾，白带过多，滴虫性肠炎。炒至冒烟呈黑色后研末内服，每次5粒。②治疮疖，溃疡，煎水外洗；湿疹，顽癣，用干馏油配10%软膏外擦。内服过量或炒制不合要求可发生头晕、恶心、呕吐、腹胀、烦躁等副作用。本品含苦参碱、槐果碱、槐定碱及苦豆碱等多种生物碱。苦参碱的作用见"苦参"条。

苦豆子草 见《新疆中草药手册》。即苦豆草，详该条。

苦豆草 见《中国药典·一部》1977年版。又名苦豆子草。为豆科植物苦豆子 Sophora alopecuroides L. 的茎叶。苦，寒，有毒。清热燥湿。治肠炎，细菌性痢疾。煎服：1.5～3克。内服过量可引起中毒，副作用参见苦豆子条。本草含槐定碱、苦豆碱、槐果碱以及有机酸、黄酮、多糖等。

苦豆根 ❶见《中药材手册》。为山豆根之别名。❷见《内蒙古中草药》。为苦甘草之别名。各详该条。

苦杖 出《本草拾遗》。为虎杖之别名，详该条。

苦杏仁 见《临证指南医案》。即杏仁，详该条。

苦芙 出《本草经集注》。又名狭叶蓟、苦板、轮蓟、牛刺犁。为菊科植物条叶蓟Cirsium lineare (Thunb.) Sch.-Bip.的全草。分布辽宁、河南、云南、四川等地。甘、苦，凉。清热，凉血，解毒。①治吐血，衄血，尿血，尿路感染，黄疸，崩漏，带下。煎服：15～30克。②治疔疮疖肿，丹毒，捣敷；痔疮，烧灰敷；漆疮，煎水洗。全草含条叶蓟醇-4′-葡萄糖甙（Cirsilineol、-4-monoglucoside），3′-去甲条叶蓟醇-4′-葡萄糖甙（Cirsiliol-4′-monoglucoside）。

苦苦菜 见《陕西中草药》。为骆驼蓬之别名，详该条。

苦板 见《本草纲目》。为苦芙之别名，详该条。

苦金盆 见《云南中草药选》。为罗锅底之别名，详该条。

苦实 见《本草原始》。为马钱子之别名，详该条。

苦参 出《神农本草经》。又名苦骨、地骨、牛参、川参。为豆科植物苦参Sophora flavescens Ait. 的根。全国各地均产。苦，寒，有小毒。入肝、大肠、小肠经。清热燥湿，祛风杀虫。①湿热痢疾，肠胃炎，黄疸，瘙痕，疳积，肠风痔血，小便黄赤，溺有余沥，赤白带下，瘰疬。煎服：3～9克。②治湿毒疮疡，皮肤瘙痒，疥、癣，麻风，荨麻疹。煎洗或内服。③治滴虫性阴道炎，煎水洗；烫伤，研末香油调敷。内服用量不宜过大。反藜芦。本品含右旋苦参碱、右旋氧化苦参碱，右旋槐花醇、左旋槐果碱、左旋臭豆碱、左旋甲基金雀花碱等生物碱，以及苦参黄酮（Kurarinone）、苦参黄酮醇（Kurarinol）、苦参查耳酮（Kuraridin）、苦参查耳酮醇（Kuraridinol）、蛇麻素、异蛇麻素、红车轴草根甙、去甲脱水淫羊藿素、异脱水淫羊藿素等。苦参在实验室及临床上均有一定的抗心律不齐作用，作用性质类似奎宁丁。氧化苦参碱有升高白细胞作用。体外高浓度对葡萄球菌、痢疾杆菌有抑

菌作用；对某些常见的皮肤真菌也有抑制作用。苦参碱对小鼠艾氏腹水癌及肉瘤-180均有抑制作用。醇浸膏在体外尚有抗滴虫作用。在动物身上有平喘作用，并有报告其利尿作用者。毒性剂量的苦参碱能引起兔的脊髓兴奋而导致惊厥，最终呼吸麻痹而死。

苦参子 ❶见《本草纲目》。即苦参实。❷见《本草纲目拾遗》。为鸦胆子之别名。各详该条。

苦参实 出《新修本草》。又名苦参子、苦豆。为豆科植物苦参Sophora flavesens Ait.的种子。我国南北各地均有分布。苦，寒。治细菌性痢疾，研末装入胶囊服，每次0.5克，一日四次；大便秘结，每次吞服10粒。本品含油14.76%；另含少量金雀花碱。

苦草 ❶见《福建中草药》。为穿心莲之别名。❷见《苏州本产药材》。为益母草之别名。各详该条。

苦荞头 见《贵阳民间药草》。又名荞叶七。为蓼科植物苦荞麦Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.的块根及根茎。分布东北、西北、西南地区，栽培或野生。甘、苦，平。健胃顺气，除湿止痛。治胃痛，消化不良，痢疾，小儿疳积；跌打损伤，腰腿疼痛。煎服：9～30克。本品含芸香甙等黄酮类。

苦荬菜 出《嘉祐补注神农本草》。又名盘儿草。为菊科植物苦荬菜Ixeris denticulata (Houtt.) Stebb.的全草。我国大部分地区有分布。苦，凉。清热，解毒，散瘀止血。①治肺痈，尿血，血淋，崩漏，带下。煎服：6～12克。②治痈疖肿毒，煎服并捣敷；阴道滴虫病，煎水熏洗；烧烫伤，研末油调搽。

苦胄 见《本草纲目》。为苦参之别名，详该条。

苦胆木 见《全国中草药汇编》。即苦木，详该条。

苦胆草 见《广东中药》Ⅱ。（生草药部分）。为鲫鱼胆草之别名。详该条。

苦桔梗 见《本草纲目》。即桔梗，详该条。

苦笋 出《食疗本草》。为苦竹笋之简称，详该条。

苦蓼菜 见《植物学大辞典》。为鹅脚板之别名，详该条。

苦菜 见《本草纲目》。为败酱草之别名，详该条。

苦猪菜 见《江西中药》。为败酱草之别名，详该条。

苦葵 出《本草图经》。为龙葵之别名，详该条。

苦蒿 见《江苏省植物药材志》。为青蒿之别名，详该条。

苦蒻 见《广西本草选编》。为水胡满之别名，详该条。

苦楝皮 出《经史证类备急本草》。又名楝皮、楝根木皮。为楝科植物楝树Melia azedarach L.的根皮或树皮。分布华北、华东、中南及西南各地。苦，寒，有小毒。入肝、脾、胃经。驱虫。①治蛔虫、钩虫，绦虫病。煎服：4.5～9克（鲜品15～30克）。②治蛲虫病，研末以蜜制成栓剂，塞入肛门内；阴道滴虫病，煎汤外洗或制成栓剂外用；风疹，疥癣，煎水浸洗；头癣，研末油调敷；虫牙痛，煎汤漱口。内服过量，易引起头昏、思睡、恶心、呕吐、腹痛、面红等中毒症状。本品含苦楝素。还含苦楝萜酮内酯（Kulactone）、苦楝萜醇内酯（Kulolactone）、苦楝皮萜酮（Kulinone）、苦楝萜酸甲酯（Methylkulonate）等多种苦味成分及β-谷甾醇等。苦楝素有驱蛔作用，高浓度时能麻痹猪蛔，特别是头部的神经节，低浓度则有明显的兴奋作用，使虫体不能附着肠壁而被驱除体外。对胃有刺激，胃溃疡患者慎用。大剂量能伤害肝脏。本品有一定蓄积性，不要连续使用。急性中毒的致死原因似为急性循环衰竭。苦楝皮水浸剂能

抑制某些皮肤真菌。

苦榴皮 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·皮肤病》。为秦皮之别名，详该条。

苦蔵 出《本草拾遗》。又名灯笼草、野绿灯、天泡草、响铃草。为茄科植物苦蔵Physalis pubescens L.的全草。分布长江以南各地。苦，寒。清热，利尿，解毒。①治咽喉肿痛，肺热咳嗽，肺痈，百日咳，腮腺炎，黄疸，细菌性痢疾，淋病，尿血，睾丸炎。煎服：15～30克。②治天疱疮，捣汁涂或焙干研末油调敷；疔疮肿毒，煎服或捣敷。孕妇忌服。本品含酸浆果红素。

苦蔵果 见《湖南药物志》。为茄科植物苦蔵Physalis pubescens L.的果实。甘，酸，微寒。清热解毒。治咽炎，大便秘结。煎服：9～15克。捣敷或研末调敷治天疱疮，疔疮。种子含油约21%，油中含亚油酸（约75%）及油酸（约12%）。

苦蔵根 见《江西民间草药》。为茄科植物苦蔵Physalis pubescens L.的根。苦，寒。清热解毒，利水通淋。治水肿腹胀，黄疸，热淋，疔疮。煎服：15～30克。

苦碟子 见《全国中草药汇编》。又名满天星。为菊科植物抱茎苦荬菜Ixeris sonchifolia（Bge.）Hance的当年生幼苗。分布东北及内蒙古等地。苦、辛，平。清热解毒，排脓止痛。①治肠炎，痢疾，头痛，牙痛，腹痛，外伤及中、小手术后疼痛，各种化脓性炎症。煎服：15～30克。②治黄水疮，研末香油调敷；痔疮，煎水熏洗。本品含黄酮类。对小鼠有镇静、镇痛作用，对动物的平滑肌有解痉作用，并有一定的抗炎作用。

苦薏 ❶出《本草图经》。为莲子心之别名。❷出《名医别录》。为野菊之别名。各详该条。

苛草 见《西藏常用中草药》。为血满草之别名，详该条。

苹 出《吴普本草》。又名田字草、四叶草、十字草、夜合草、水吐丝、夜里串、水浮钱。为苹科植物苹Marsilea quadrifolia L.的全草。分布长江流域以南各地，北达华北、辽宁，西北至陕西。甘，寒。清热解毒，利尿消肿，止血，安神。①治黄疸型肝炎，疟疾，小儿夏季热，尿路感染，急性肾炎，脚气，水肿，吐血，衄血，崩漏，心烦不眠，急性结膜炎。煎服：9～30克。②捣敷痈疖肿毒，痔疮肿痛，蛇咬伤。本品含环鸦片甾烯醇（Cyclolaudenol）。

苜蓿 出《名医别录》。又名金花菜、光风草。为豆科植物紫苜蓿Medicago sativa L.或南苜蓿M. hispida Gaertn.的全草。我国大部分地区有栽培。苦，平。清热，利尿。治黄疸，痢疾，肠炎，痔疮出血，膀胱结石，小便不利，浮肿。内服：煎汤，15～30克；捣汁，90～150克。紫苜蓿含皂甙、苜蓿酚（Medicagol）、苜蓿二酚（Sativol）、拟雌内酯（Coumestrol）、大豆黄酮、苜蓿素等。南苜蓿含鹰嘴豆芽素A、染料木素、胡萝卜素等。全草提取物在体外能抑制结核杆菌生长，并对小鼠脊髓灰白质炎有效。苜蓿素对离体兔肠有抑制作用。

苜蓿根 出《新修本草》。又名土黄耆。为豆科植物紫苜蓿Medicago sativa L.或南苜蓿M. hispida Gaertn. 的根。苦、微涩，寒。清热，利尿，明目。治黄疸，尿路结石，夜盲症。煎服：15～30克。紫苜蓿根含糖类、α-氨基己二酸、苜蓿甙（Medi Carpin-β-D-glucoside）。

苘实 出《新修本草》。又名苘麻子、空麻子。为锦葵科植物苘麻Abutilon theophrastii Medic.的种子。主产四川、河北、江苏、湖北。苦，平。治赤白痢疾，痈肿，瘰疬，眼翳。内服：煎汤，6～9克；或研末服。本品含油15～17%，其中58%为亚油酸，并含球蛋白C。

苘麻 出《新修本草》。又名青麻、白麻。

为锦葵科植物苘麻Abutilon theophrastii Medic.的全草或叶。分布几遍全国。苦，平。祛风，解毒。①治关节酸痛，痢疾，中耳炎。煎服：9～30克。②治痈疽肿毒。鲜叶捣敷。苘麻根：煎服治痢疾，小便淋沥。叶含芸香甙。根含粘液质。

苘麻子 见《圣济总录》。即苘实，详该条。

苞蔷薇根 见《福建民间草药》。又名金柿根、猴局根。为蔷薇科植物硕苞蔷薇Rosa bracteata Wendl.的根。分布浙江、福建、湖南等地。苦，温。健脾，益肾，理气，固涩。治久泻，脱肛，水肿，脚气，疝气，风湿痛，腰脊无力，盗汗，遗精，白带，子宫脱垂。煎汤：9～18克(鲜品30～90克)。抑菌试验，对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、八联球菌均有明显的抑制作用。

苕子 见《民间常用草药汇编》。为小巢菜之别名，详该条。

茄子 出《本草拾遗》。又名落苏、矮瓜、吊菜子、草鳖甲。为茄科植物茄Solanum melongena L.的果实。我国大部分地区有栽培。甘，凉。清热，止血，消肿。①治肠风下血，血痔。烧存性研末服，每次9克，米汤冲服。②治热毒疮痈，研末调敷；皮肤溃疡，煅研细末，撒创面；乳头皲裂，经过霜冻的茄子名霜茄子焙干研末，香油调敷；蜈蚣螫伤，捣敷。果实含葫芦巴碱、水苏碱、胆碱、龙葵碱。果皮含茄色甙(Nasunin)、紫苏甙(Shisonin)、飞燕草素-3-葡萄糖甙、飞燕草素-3，5-二葡萄糖甙等。口服或注射其提取物，能降低兔与人的血胆固醇水平，并有利尿作用。

茄叶 出《开宝重定本草》。为茄科植物茄Solanum melongena L.的叶。散瘀，止血，消肿。①治血淋，血痢，肠风便血。研末服：6～9克。②治冻伤，煮水熏洗；痈肿，捣烂和醋煮后外敷。叶含龙葵碱。药理参见茄子条。

茄母 出《摘元方》。为茄根之别名，详该条。

茄根 出《开宝重定本草》。又名茄母。为茄科植物茄Solanum melongena L.的根和茎。甘、微苦，平。祛风通络，止血，止痛。①治风湿疼痛，手足麻木，尿血，便血，龋齿痛，痔疮肿痛。煎服：15～30克。②治冻疮未溃。煎水洗。

茄蒂 出《履嶙岩本草》。为茄科植物茄Solanum melongena L.的宿萼。止血，消肿，止痛。①治肠风下血。烧存性为末服，每次6～9克。②治痈毒初起。煎服：6～9克，或研末调敷。③治蛀牙痛，口疮。研末撒患处。茄花：治牙痛，烧研敷痛处。

苔条 见《中国药用海洋生物》。为干苔之别名，详干苔条。

苔菜 ❶见明·姚可成《食物本草》。为干苔之别名。❷见《本草图经》。为紫堇之别名。各详该条。

茅针花 见《江苏省植物药材志》。为白茅花之别名，详该条。

茅草根 见《江苏省植物药材志》。即白茅根，详该条。

茅根 出《神农本草经》。即白茅根，详该条。

茅莓 出《本草拾遗》。又名天青地白草、薅田薰、蛇泡笋、红锁梅、过江龙、五月红、草杨梅、毛叶仙桥。为蔷薇科植物茅莓Rubus parvifolius L.的茎叶。分布几遍全国。甘、苦，凉。活血止痛，清热解毒。治跌打损伤、出血，内服并外敷；湿疹，皮炎，痈疮肿毒，鲜叶煎水洗或捣敷。煎服：9～18克。本品预试含鞣质、酚类、氨基酸及糖类。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

茅莓根 见《福建中草药》。又名薅田薰根。为蔷薇科植物茅莓Rubus parvifolius L.的根。苦、涩，平。清热凉血，祛风利湿，散瘀消肿。①治感冒发热，咽喉肿痛，

咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，风湿痹痛，肝炎，肠炎，痢疾，肾炎水肿，尿路感染，结石，白带。煎服：15～30克。②治疮疖肿毒，跌打损伤，捣敷；龋齿痛，以酒精浸出液滴入龋洞。本品含鞣质、糖、黄酮甙。煎剂在体外对钩端螺旋体有抑制作用。

茅盔花 见《江苏省植物药材志》。为白茅花之别名，详该条。

茅膏菜 出《本草拾遗》。又名石龙芽草、捕虫草、露珠草、胡椒草、夏无踪、黄金丝。为茅膏菜科植物茅膏菜Drosera peltata Smith var. lunata(Buch.-Ham.) C. B. Clarke的全草。分布长江与珠江流域及西藏。甘、辛，温，有毒。祛风除湿，活血止痛。①治风湿性及类风湿性关节痛，跌打损伤，腰肌劳损，瘰疬，研末水调，取绿豆或黄豆大，放在胶布中心贴患部，24小时后取下（敷药后局部有轻微灼痛感，并可出现水泡）；疟疾，如上法敷贴大椎穴；偏头痛，角膜云翳，贴患侧太阳穴；湿疹、神经性皮炎，研末，酒精浸泡（每药末100克浸泡酒精100毫升）外搽。②治胃痛，痢疾，小儿疳积。煎服：3～9克（小儿酌减）。不可多服、久服，以免中毒。孕妇忌服。茅膏菜的块根名落地珍珠，又名一粒金丹，功能主治及用法与全草同。全草含矾松素、茅膏醌、羟萘醌氢化萘醌等。叶还含氢氰酸。矾松素为植物抗菌素，但有刺激性。

枣儿槟榔 出《随息居饮食谱》。即枣槟榔，详该条。

枣仁 见《药品化义》。为酸枣仁之简称，详该条。

枣针 出《名医别录》。即棘针，详该条。

枣树皮 出《本草纲目》。为鼠李科植物枣Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bge.)Rehd.的树皮。全国各地都有栽培。苦、涩、温。收敛止泻，祛痰止咳，消炎止血。①治痢疾，肠炎，崩漏，慢性气管炎。内服：煎汤，30～60克；烧存性研末服，1.5～3克。②治刀伤出血，研末撒。本品含无色矢车菊素、鞣质等。醇提取物给小鼠灌胃有祛痰作用，腹腔注射有镇咳作用。

枣树根 出《本草纲目》。又名枣根。为鼠李科植物枣Ziziphus jujuba Mill.var. inermis (Bge.) Rehd.的根。甘，平。祛风，活血，调经。①治关节酸痛，胃痛，吐血，血崩，月经不调。煎服：15～30克。②治荨麻疹。煎水洗。根皮含乌药碱（Coclaurine)、异欧鼠李碱（Frangulanine）、蛇婆子碱X（Adouetine X）等。

枣根 见《本草经集注》。即枣树根，详该条。

枣槟榔 见《饮片新参》。又名枣儿槟榔、壳槟榔。为棕榈科植物槟榔Areca catechu L.的未成熟的果实。我国福建、台湾、广西、广东及云南有栽培。甘、微苦，涩。利气，消食。治胸腹胀闷，呕吐，消化不良；又能消痰、止咳。煎服：4.5～9克。

雨伞草 见《广东中草药》。为天文草之别名，详该条。

雨伞菜 见《北方常用中草药手册》。为兔儿伞之别名，详该条。

矾石 出《本草经集注》。即白矾，详该条。

矿灰 见《本草纲目》。即石灰，详该条。

郁李仁 出《神农本草经》。为蔷薇科植物欧李Prunus humilis Bge.或郁李P. japonica Thunb.的种子。主产辽宁、河北、内蒙古等地。辛、苦、甘，平。入脾、大肠、小肠经。润燥破血，利水消肿。治大肠气滞、燥涩不通，小便不利，腹水，四肢浮肿，脚气。煎服：6～9克。孕妇慎用。郁李仁种子含苦杏仁甙、郁李仁甙（Prunuside）、脂肪油、挥发油及有机酸。郁李仁甙有缓泻作用。酊剂对狗有降压作用。

郁李根 出《神农本草经》。为蔷薇科植物欧李Prunus humilis Bge.或郁李P. japonica Thunb.的根或根皮。前者分布东北

及河北、山东、陕西、河南、江苏等地；后者分布华北、华中及华南，东北常有栽培。苦、酸，凉。①治气滞积聚。煎服：6～9克。②治龋齿痛，煎浓汁含漱。

郁金 出《药性论》。又名马蓣、玉金。为姜科植物温郁金Curcuma wenchowensis Y.H. Chen et C. Ling、广西莪术C. kwangsiensis S. lee et C. F.Liang或姜黄C. longa L.、郁金C. aromatica Salisb.、莪术C. zedoaria (Berg.)Rosc.的块根。主产浙江、广西、四川。辛、苦，微寒。入心、肝、胆、肺经。行气破瘀，疏肝利胆，清心凉血。①治胸腹胁肋胀痛，痛经，倒经。②治黄疸，胆囊炎，肝硬化。③治热病神昏，惊痫癫狂，吐血，衄血，尿血。煎服：4.5～9克。畏丁香。孕妇慎服。郁金块根含挥发油6.1%，内有姜黄烯(Curcumene)、水芹烯、樟脑、莰烯等；还有姜黄素、去甲氧基姜黄素、姜黄酮(Turmerone)、芳基姜黄酮(ar.—Turmerone)、对甲苯基-甲基羟甲基姜黄素等。莪术根茎含挥发油1～1.5%，内有樟脑、莰烯、龙脑、蒎烯等；还含蓬莪术烯酮(Curzerenone)、姜黄二酮(Curdione)等以及微量的姜黄素、去甲氧基姜黄素、去二甲氧基姜黄素。姜黄根茎含挥发油，内有姜烯、龙脑、水芹烯等；还含姜黄酮、芳基姜黄酮、姜黄素、去甲氧基姜黄素、去二甲氧基姜黄素等。在试管内对多种致病性皮肤真菌有抑制作用。郁金挥发油有促进胆汁分泌的作用。莪术根茎挥发油可治宫颈癌、外阴癌、皮肤癌及唇癌，一般供瘤内注射，有刺激性痛。

郁焦 见《福建民间草药》。为罗裙带之别名，详该条。

顶心风 见《广西中草药》。为穿心草之别名，详该条。

钹地麻 见《陕西中草药》。为缬草之别名，详该条。

拔毒散 出《滇南本草》。又名小黄药、小克麻、迷马桩棵。为锦葵科植物拔毒散Sida szechuensis Matsuda的全株。分布西南及广西。苦，平。活血调经，清热解毒。①治闭经，乳汁不通，乳腺炎，扁桃体炎，肠炎，痢疾，尿血，血淋，皮肤瘙痒。煎服：9～15克。②捣敷痈疽疔疮，跌打损伤。孕妇忌服。

拔脓消 见《广西中药志》。为黄花母之别名，详该条。

拔脓膏 见《广西药用植物名录》。为雾水葛之别名，详该条。

拐子药 见《湖南药物志》。为雪里开之别名，详该条。

拐角七 见《全国中草药汇编》。为野棉花根之别名，详该条。

拐枣 见《救荒本草》。为枳椇子之别名，详该条。

拐棍参 见《滇南本草》整理本。为蓝花参之别名，详该条。

拖地莲 见《全国中草药汇编》。为黄毛耳草之别名，详该条。

抱石莲 见《中国主要植物图说·蕨类》。为螺厣草之别名，详该条。

拉牛入石 见萧步丹《岭南采药录》。为穿破石之别名，详该条。

拉田草 见《福建中草药》。为合萌之别名，详该条。

拉汗果 见《广西药用植物名录》。即罗汉果，详该条。

拉拉狗 见《河北药材》。为蝼蛄之别名，详该条。

拉拉藤 ❶见《植物名实图考》。为猪殃殃之别名。❷见《江苏野生植物志》。为葎草之别名。各详该条。

拉蛄 见《山东中药》。为蝼蛄之别名，详该条。

拦路虎 见《陕西中草药》。又名铁箍散、铁板道、牛舌头草、鸦燕草、玻璃草、

狗屎花。为紫草科植物大硫璃草 Cynoglossum Zeylanicum(Vahl)Thunb.的根皮及叶。分布我国西南及广西、陕西等地。苦，寒。清热利湿，散瘀止血，消肿解毒。①治黄疸，痢疾，月经过多，产后恶露不净。煎服：9～12克。②治痈疖肿毒，跌打肿痛，毒蛇咬伤。煎服并捣敷。孕妇慎服。

转子莲 见《贵州草药》。为紫金莲之别名，详该条。

转心莲 见《植物名实图考》。为西番莲之别名，详该条。

转枝莲 见《四川中药志》。为西番莲别名，详该条。

斩龙剑 ❶见《沈阳药学院学报》(3):85，1961.。又名草本威灵仙、狼尾巴花、九节草、草玉梅、草灵仙。为玄参科植物轮叶婆婆纳 Veronicastrum sibiricum (L.)Pennell的全草。分布东北、华北及甘肃、陕西、山东等地。微苦，寒。祛风除湿，解毒止痛。①治风湿性腰腿痛，肌肉痛，感冒，膀胱炎，肺结核。煎服：9～15克(鲜品30～60克)。②治蛇咬伤，蝎螫伤，创伤出血。捣烂外敷，并煎服。❷见《全国中草药汇编》。为水蔓青之别名，详该条。

斩蛇剑 见《广东中草药》。为穿心莲之别名，详该条。

轮叶棘豆 见《西藏常用中草药》。为豆科植物轮叶棘豆Oxytropis Chiliophylla Royle的全草。分布西藏、四川。苦，凉。消炎，止泻，止血，镇痛。①治肠炎腹泻。煎服：3～9克。②捣敷治创伤出血，疮疖肿毒。

轮蓟 见《江苏南部种子植物手册》。为苦芙之别名，详该条。

软水黄连 见《四川中药志》。又名水黄连、软杆子水黄连。为毛茛科植物多枝唐松草Thalictrum ramosum Boivin的全草。分布四川、湖南、广西等地。苦，寒。清热，利湿，解毒。①治痢疾，黄疸，蛔虫病，目赤。煎服：9～15克。②捣敷痈疖肿毒。

软杆子水黄连 见《民间常用草药汇编》。即软水黄连，详该条。

软筋藤 见《广西药用植物名录》。为四方藤之别名，详该条。

卧龙草 见《湖南药物志》。为苍条鱼鳖之别名，详该条。

矾石 出《神农本草经》。又名太白石、立制石。为毒砂的矿石。辛、甘，热，有大毒。祛寒湿，破积聚，蚀恶肉，杀虫。①治远年风寒湿痹，痼冷腹痛，积聚坚癖，内服：入丸、散用；或浸酒饮。②治疖瘘息肉，赘瘤，瘰疬，疥、癣。研末涂敷。本品有大毒，内服宜慎。含砷、铁、硫及少量钴、锑、铜。

鸢尾 出《神农本草经》。又名乌鸢、扁竹、蓝蝴蝶、冷水丹、土知母。为鸢尾科植物鸢尾Iris tectorum Maxim.的根茎。主产广东、广西、四川、贵州。辛、苦，寒，有小毒。活血行瘀，祛风利湿，消积，解毒。①治跌打损伤，瘀瘕积聚，风湿痹痛，水肿，臌胀，食积腹胀，二便不通。煎服：3～9克。②治咽喉肿痛，煎服，或捣烂加冷开水少许绞汁，频频含漱；痈疖肿毒，研末调敷。服用过量可引起头晕，呕吐，腹泻等。孕妇忌服。本品含鸢尾黄酮甙(Tectorrdin)、鸢尾黄酮新甙A.B(Iristectorin)A、B及鸢尾酮甙(Tectoruside)等。

〔丨〕

虎牙刺 见《湖南药物志》。即虎刺，详该条。

虎牙草 见《全国中草药汇编》。为墓头回之别名，详该条。

虎兰 见《神农本草经》。为泽兰之别名，详该条。

虎耳草 出《履巉岩本草》。又名石荷叶、金线吊芙蓉、金丝荷叶、耳聋草、猫耳朵、铜钱草。为虎耳草科植物虎耳草Sa-

xifraga stolonifera (L.) Meerb. 的全草。分布华东、华南、西南及湖南、湖北、河南等地。微苦、辛，寒，有小毒。清热、解毒，凉血。①治化脓性中耳炎，鲜草捣汁滴耳；疮疖肿毒，煎服并捣敷；口腔溃疡，取汁含漱或涂患处。②治风疹，湿疹，丹毒，煎服并煎水洗。③治肺热咳嗽，肺痈，吐血，血崩，煎服：9～15克。止血炒炭用。本品含生物碱、熊果酚甙、挥发油，油内含柠檬烯、莰烯、龙脑、芳樟醇等。鲜叶含虎耳草素(Saxifragin)、槲皮甙。熊果酚甙对大鼠和人均有利尿作用；其水解后的甙元对苯二酚具有抑菌作用。

虎舌红 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为红毛走马胎之别名，详该条。

虎杖 出《名医别录》。又名苦杖、斑杖、酸桶笋、斑根、酸汤杆、紫金龙、活血龙、阴阳莲、大叶蛇总管、九龙根。为蓼科植物虎杖Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.的根茎。产华东、华中、西南及陕西等地。苦、酸，凉。入肝经。清热利湿，活血通经，止痛，解毒。①治风湿筋骨痛，黄疸型肝炎，急性阑尾炎，肠炎，痢疾，肺炎，慢性支气管炎，淋浊，带下，瘀阻经闭，癥瘕积聚，产后瘀血腹痛，高血脂症。内服：煎汤，9～30克；浸酒或研末酒调服。②治跌打损伤，毒蛇咬伤，捣敷；烧伤，捣汁或研末油调涂；念珠菌阴道炎，内服并以煎液冲洗或外涂；痈肿疼痛，研末浓茶调敷。孕妇忌服。本品含大黄素、大黄素甲醚及两者的8-β-D-葡萄糖甙，还有大黄酚、白藜芦酚、虎杖甙(Polydatin)等。大黄素等蒽醌有抗菌作用。虎杖甙能镇咳，降低血压，扩张冠状血管，增加冠脉流量，并能轻度增强心脏的收缩。并有某些降血脂作用。外用可止血收敛。

虎杖叶 出《本草拾遗》。为蓼科植物虎杖Polygonum cuspidatum Sieb.et Zucc.的叶。酸，凉。祛风，凉血，解毒。①治风湿痛，肺结核咳血。煎服：15～30克。②捣敷蛇咬伤，外伤出血；捣汁搽漆疮。本品含槲皮甙、异槲皮甙、瑞诺甙、蒿蓄甙、金丝桃甙、芸香甙及白藜芦酚(Resveratrol)。另含鞣质、叶绿醌B和C、维生素C。

虎刺 出《本草图经》。又名刺虎、绣花针、老鼠刺、鸟不踏、虎牙刺、两面针、蛇不过。为茜草科植物虎刺Damnacanthus indicus Gaertn. f. 的全株或根。分布浙江、江西、安徽、广东、湖北、湖南等地。甘、苦，平。祛风利湿，活血消肿。治痛风，风湿痹痛，肺痈，痰饮咳嗽，水肿，黄疸，痞块，小儿疳积，痛经，闭经，荨麻疹，跌打损伤。煎服：15～30克。

虎骨 出《本草经集注》。为猫科动物虎Panthera tigris L.的骨骼。主产东北及西南地区。辛、甘，温。入肝、肾经。祛风湿，健筋骨，止痛，镇惊。治关节筋骨疼痛，四肢拘挛，屈伸不利，腰膝软弱无力，惊悸，痫。内服：煎汤，9～15克；或浸酒服。本品含磷酸钙、蛋白质等。虎骨粉混悬剂对大鼠甲醛性和蛋清性“关节炎”有抑制作用，此作用与肾上腺有关。虎骨胶对大鼠有镇痛作用。

虎骨胶 见《四川中药志》。又名虎胶。为猫科动物虎Panthera tigris L.的骨骼煎熬而成的胶。咸，温。入肝、肾经。补益气血，强健筋骨。治中风瘫痪，筋骨拘挛，四肢麻木，不能屈伸，痿躄。内服：3～6克，烊化冲入药液中。虎骨胶经水解得多种氨基酸，但不含酪氨酸。药理见虎骨条。

虎胶 见清·汪双池《医林纂要·药性》。为虎骨胶之简称，详该条。

虎掌 出《神农本草经》。为天南星之别名，详该条。

虎掌草 出《滇南本草》。又名见风青、狗脚迹、土黄芩、五朵云。为毛茛科植物草玉梅Anemone rivularis Buch.-Ham.的根或全草。分布西南及广西、甘肃等地。苦、

辛，寒，有小毒。清解热毒，止咳，祛痰。散结消肿。①治急慢性肝炎，肝硬化，咳嗽痰多，风湿痹痛，胃痛，痢疾。内服：煎汤，3～9克；或浸酒。②治疟疾，鲜根一两捣汁，加米泔水适量于疟发前二小时服；或单独捣敷寸口。③治咽喉肿痛，扁桃体炎，口腔炎，煎水含漱；腮腺炎，痈疖肿毒，瘰疬结核，流痰，横痃，捣敷患部。根含皂甙，其中分离得虎掌草皂甙甲及虎掌草皂甙乙；两者的皂甙元均为齐墩果酸。小鼠灌服粗提物（具有内酯反应）有明显止咳作用，灌服虎掌草皂甙，有祛痰作用。

虎蓟 出《本草经集注》。为大蓟之别名，详该条。

肾茶 见《广西药用植物名录》。为猫须草之别名，详该条。

肾蕨 见《广西药用植物图志》。又名天鹅抱蛋、蜈蚣草、凤凰草、篦子草、金鸡尾。为骨碎补科植物肾蕨 Nephrolepis cordifolia（L.）Presl的全草。分布西南、华南及福建、台湾等地。苦，平。入肝、肾经。清热利湿，消肿解毒。①治肺热咳嗽，湿热黄疸，痢疾，淋病，白浊。煎服：6～15克。②捣敷治乳痈，烫伤，创伤。

味连 见《增订伪药条辨》。为黄连药材之一种，详黄连条。

呷蛇龟 出《新修本草》。为夹蛇龟之别名，详该条。

岭南杜鹃 见《广西药用植物名录》。为紫花杜鹃之别名，详该条。

明子 见《安徽中草药》。为木半夏之别名，详该条。

明天麻 见《临证指南医案》。为天麻之处方名，详该条。

明沙参 见《中药志》。为明党参之别名，详该条。

明矾 见《本草纲目》。即白矾，详该条。

明党参 见《饮片新参》。又名土人参、粉沙参、红党参、明沙参、山萝卜。为伞形科植物明党参 Changium Smyrnioides Wolff的根。主产四川、安徽、江苏、浙江。甘、微苦，凉。润肺化痰，和中养胃。治肺燥咳嗽，咯痰不爽，胃虚呕吐，病后体弱，食少口干，消化不良。煎服：9～15克。本品含微量挥发油，并含有机物、糖类及多量淀粉。

败龟版 出《日华子诸家本草》。即龟版，详该条。

败毒草 见《山东中草药手册》。为千屈菜之别名，详该条。

败酱草 出《神农本草经》。又名泽败、鹿酱、苦菜、苦猪菜、野苦菜。为败酱科植物黄花龙芽Patrinia scabiosaefolia Fisch. 或白花败酱P. villosa Juss. 等的根或全草。产四川、江西、福建等地。苦，平。入胃、大肠、肝经。清热解毒，散瘀排脓。①治阑尾炎，肺脓疡，肝炎，肠炎，痢疾，子宫颈炎，产后瘀滞腹痛，疮痈肿毒，眼结膜炎。煎服：9～15克（鲜品，60～120克）。②取鲜叶和生石膏捣敷流行性腮腺炎；鲜叶捣烂取汁外涂蛇咬伤。内服过量可引起头昏、恶心和白细胞数暂时性减少等反应。黄花龙芽根、根茎含齐墩果酸，常青藤皂甙元，败酱皂甙（Patrinoside）C、D、C_1、D_1，黄花败酱皂甙（Scabioside）A、B、C、D、E、F、G；根尚含生物碱、挥发油，油中含败酱烯（Patrinene）、异败酱烯、异戊烯等。白花败酱全草含挥发油、黑芥子甙（Sinigrin）等；根、根茎含莫罗忍冬甙（Morroniside）、番木鳖甙、白花败酱甙（Villoside）等。黄花龙芽有促进肝细胞再生、改善肝功能作用。挥发油有镇静、催眠作用。体外试验，黄花龙芽对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌等有抑制作用。

岩大蒜 见《四川中药志》。为大一枝箭之别名，详该条。

岩丸子 见《陕西中草药》。为红白二丸之别名，详该条。

岩马桑 见《全国中草药汇编》。为山腊梅叶之别名，详该条。

岩五加 见《贵州草药》。为走游草之别名，详该条。

岩白菜 出《分类草药性》。又名岩壁菜、石白菜、红岩七。为虎耳草科植物岩白菜Bergenia purpurascens (Hook.f.et Thoms.) Engl.的根茎或全草。分布云南、四川、西藏等地。甘、苦、涩，平。滋补强壮，止咳，止血，止痢，止带。①治肺虚咳喘，劳伤咯血、吐血、衄血、便血，功能性子宫出血，腹泻，痢疾，白带，淋浊。煎服：6～12克。②外敷治肿毒，黄水疮。本品含岩白菜素，有镇咳作用；在动物实验中能抑制胃酸分泌，阻止实验性胃溃疡的形成。

岩头菜 见《浙南本草新编》。为鹧鸪菜之别名，详该条。

岩竹 见《云南思茅中草药选》。为岩笋之别名，详该条。

岩如意 见《云南中草药》。为佛指甲之别名，详该条。

岩红 见《云南中草药选》。为红孩儿之别名，详该条。

岩角 见《云南中草药》。为岩笋之别名，详该条。

岩陀 见《云南中草药选》。为虎耳草科植物羽叶岩陀Rodgersia pinnata Franch.或岩陀R.sambucifolia Hemsl.的根茎。分布云南、贵州及四川。苦、涩，平。解热，祛风，消炎，收敛。治感冒头痛，风湿骨痛，肠炎，细菌性痢疾。煎服：9～15克。研末敷外伤出血。

岩鸡尾 见《贵州民间药物》。为水龙骨之别名，详该条。

岩青杠 见《贵州民间药物》。为扶芳藤之别名，详该条。

岩泽兰 见《贵阳民间药草》。为石吊兰之别名，详该条。

岩柏草 见《浙江天目山药用植物志》。为地柏枝之别名，详该条。

岩笋 见《云南中草药选》。又名岩角、石竹子、岩竹、接骨丹、为兰科植物笋兰Thunia alba (Lindl.) Reichb.f.的全草。分布云南、四川、西藏等地。甘，平。滋阴润肺，止咳平喘，活血祛瘀。①治肺结核，肺炎，气管、支气管炎，胃及十二指肠溃疡。煎服：9～15克。②治跌打损伤，创伤，煎服或浸酒服，另以鲜品捣敷患处；骨折，鲜品捣烂加酒或鸡蛋清调敷。

岩椒 见《四川常用中草药》。为竹叶椒之别名，详该条。

岩葱 见《云南中草药选》。为兰科植物棒叶鸢尾兰Oberonia myosurus (Forst.) Lindl.的全草。分布云南、贵州、江西。辛、微苦，温。散瘀止血，消炎利尿。①治骨折，外伤出血。捣敷或研粉撒伤口。②治白浊。煎服：9～15克。

岩壁菜 见《中国药用植物志》。为岩白菜之别名，详该条。

昆仑草 出《新修本草》。为青葙之别名，详该条。

昆布 出《吴普本草》。又名纶布、海昆布。为海带科植物海带Laminaria japonica Aresch.或翅藻科植物鹅掌菜Ecklonia kurome okam.等的叶状体。产山东、辽宁、浙江等地。咸，寒。入肝、胃、肾经。消痰，软坚，行水。治瘿瘤，瘰疬，慢性气管炎，噎膈，水肿，脚气，睾丸肿痛。煎服：4.5～9克。海带富含多糖类成分藻胶酸和昆布素，还含甘露醇，无机盐(碘、钙、钴、氟、钾等)，海带氨酸，多种维生素等。碘可以纠正因缺碘所致的甲状腺机能不足，亦能抑制甲状腺机能亢进。海带氨酸具有降压作用。昆布素有清除血脂作用。

昆明沙参 见《植物名实图考》。为金铁锁之别名，详该条。

昆明鸡血藤 出《植物名实图考》。又名网络鸡血藤、血藤、蓝藤、土鸡血、松藤、

白骨藤、硬壳藤。为豆科植物昆明鸡血藤Millettia reticulata Benth.的茎。分布长江以南及台湾等地。苦、甘，温。养血补虚，通经活络。治贫血，月经不调，经闭，遗精，盗汗，白带，腰膝酸软，骨节疼痛，肢体麻木，小儿麻痹后遗症，放射治疗引起的白血球减少症。煎服：15～30克。昆明鸡血藤根：煎服，治狂躁型精神分裂症。孕妇忌服。昆明鸡血藤煎剂或酊剂对子宫有直接的兴奋作用。小剂量能增强子宫节律性收缩，剂量增大或对受孕子宫则较易引起痉挛性收缩。

昌阳 出《神农本草经》。为石菖蒲之别名，详该条。

罗布麻 见《陕西中草药》。又名吉吉麻、泽漆麻、野茶、野麻、红麻、茶叶花。为夹竹桃科植物罗布麻Apocynum venetum L.的全草或叶。分布东北、华北、西北及河南等地。甘、苦，凉，有小毒。平肝降压，强心，利尿。①治高血压眩晕头痛，失眠梦多。②治急、慢性心功能不全，能改善充血性心力衰竭之症状、体征。③治心、肝、肾性的水肿腹胀。内服：煎汤，6～9克；或泡茶饮，3～6克。本品对粘膜的刺激性较强，过量易致恶心、呕吐、肠鸣、腹泻。全草含新异芸香甙(Neo-isorutin)。叶含芸香甙、槲皮素、异槲皮甙、儿茶精、蒽醌、甾体化合物、氨基酸等。根含加拿大麻甙、毒毛旋花子甙元及K-毒毛旋花子次甙-β、异槲皮甙、槲皮素。叶煎剂对肾型高血压犬有持久的降压作用。加拿大麻甙有强心作用，性质和毒毛旋花子甙相似。

罗仙子 见《中医方药学》。为五谷虫之别名，详该条。

罗汉果 见萧步丹《岭南采药录》。又名拉汗果、假苦瓜。为葫芦科植物罗汉果Momordica grosvenori Swingle的果实。主产广西。甘，凉。清肺止咳，润肠通便。治痰火咳嗽，百日咳，扁桃体炎，咽喉炎，急性胃炎，肠燥便秘。内服：煎汤，9～30克；或开水泡服。罗汉果叶：捣敷顽癣，痈肿。果实含多量葡萄糖。

罗晃子 见《本草纲目》。为凤眼果之别名，详该条。

罗浮金锦香 见《中国药用植物图鉴》。为朝天罐之别名，详该条。

罗勒 出《重修政和经史证类备用本草》。又名兰香、香菜、翳子草、九层塔、家佩兰、省头草。为唇形科植物毛罗勒Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.的全草。各地多有栽培，南方亦有野生。辛，温。入脾、肺经。化湿和中，疏风解表，活血止痛。①治脘腹胀闷，泄泻，外感头痛，月经不调，煎服：6～9克。②治跌打扭伤。煎服或捣敷。③治湿疹，皮炎，煎服并煎水洗；齿龈烂疮，烧灰涂敷。罗勒含挥发油，油中含罗勒烯、甲基胡椒酚、芳樟醇、1，8-桉叶素、牻牛儿醇等。

罗勒子 出《嘉祐补注神农本草》。又名兰香子、光明子。为唇形科植物毛罗勒Ocimum basilicum L. var. pilosum (Willd.) Benth.的果实。甘、辛，凉。明目。治目赤肿痛，多眵。煎服：3～4.5克。研末，以黍米大，点眼眦头治角膜云翳。

罗锅底 见《云南中草药选》。又名金盆、金龟莲、金腰莲、苦金盆、曲莲、蛇莲、土马兜铃。为葫芦科植物大籽雪胆Hemsleya macrosperma C. Y. Wu或雪胆H. amabilis Diels等的块根。产云南、四川。苦，寒，有小毒。清热解毒，消肿止痛。①治上呼吸道感染，急性咽喉炎，扁桃体炎，肺炎，慢性气管炎，百日咳，细菌性痢疾，肠炎，泌尿系感染，胃、十二指肠溃疡，目赤肿痛，牙痛，外伤疼痛。内服：煎汤，6～9克；研末服，0.3～0.9克。②治痈疖，烫伤。研末调敷。内服过量，有呕吐、腹泻等反应。雪胆块根含雪胆皂甙甲、乙（甙元为齐墩果酸），苦味成分雪胆素甲、乙。雪胆素(甲、乙混合物)，在体外对金黄

色葡萄球菌、溶血性链球菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌、猪霍乱沙门氏菌以及结核杆菌等有强的抑制作用，但能明显抑制心脏，对心脏病患者慎用。雪胆皂甙及苦味成分亦有抗菌作用。雪胆总皂甙能增加小鼠心肌供血量，对抗垂体后叶素引起的冠脉收缩，并降低心肌耗氧量。

罗裙带 出《本草纲目拾遗》。又名水蕉、海蕉、郁蕉、引水蕉、扁担叶、玉带风。为石蒜科植物文殊兰 Crinum asiaticum L.var. sinicum Bak.的叶。分布福建、台湾、广东等地。辛，凉，有小毒。解毒散瘀，消肿止痛。①治咽喉炎。煎服：3～9克。②治跌伤，骨折，痈疖肿毒，蛇咬伤。捣敷。本品预试含生物碱、氨基酸。

罗裙带根 见《广西药用植物图志》。为石蒜科植物文殊兰 Crinum asiaticum L. var. sinicum Bak.的鳞茎及根。辛，凉，有毒。清肺化痰解毒，散瘀消肿。①治咳嗽，喉痛。煎服：3～9克。②治跌打损伤，痈疖肿毒，捣敷；牙痛，取根1小片，置牙痛处，咬含15分钟左右吐去。罗裙带根毒性较叶大，内服宜慎。中毒后可导致腹痛，先便秘，后剧烈泻下，脉搏增速，呼吸不整，体温上升。鳞茎含石蒜碱，多花水仙碱。多花水仙碱对蛙心、猫血压，豚鼠小肠及神经肌肉等标本上有拟胆碱样作用。

国老 出《本草经集注》。为甘草之别名，详该条。

果上叶 见《贵州民间方药集》。为麦斛之别名，详该条。

〔丿〕

牧马豆 见《东北植物检索表》。为野决明之别名，详该条。

钓藤 出《本草经集注》。即钩藤，详该条。

知母 出《神农本草经》。又名地参、羊胡子根、穿地龙。为百合科植物知母Anemarrhena asphodeloides Bge.的根茎。主产河北、山西。苦，寒。入肺、胃、肾经。清热降火，滋阴润燥。治热病高烧，烦燥口渴，肺热咳嗽，咳吐黄痰，骨蒸潮热，泌尿系感染，糖尿病，大便燥结。煎服：6～12克。本品含多种知母皂甙(Timosaponin)，还含芒果甙、异芒果甙、鞣酸等。浸膏对兔有解热作用，煎剂在体外对葡萄球菌，痢疾、伤寒、大肠等杆菌和常见皮肤真菌均有抑制作用。提取物对人型结核杆菌有抑制作用。水提取物对兔和小鼠实验性糖尿病有降血糖作用。

知羞草 出《南越笔记》。即含羞草，详该条。

刮筋板 见《四川中药志》。又名走马胎。为大戟科植物草沉香Excoecaria acerifolia F. Didr.的幼嫩全株。分布四川、云南、贵州、湖南、湖北。苦、辛，微温。祛风散寒，健脾利湿，破血。治风寒咳嗽，疟疾，风湿痹痛，黄疸型肝炎，食积，疳积，瘀瘕积聚，闭经，狂犬病。煎服：9～15克。孕妇慎用。

委陵菜 出《救荒本草》。又名痢疾草、蛤蟆草、鸡爪草、翻白草。为蔷薇科植物委陵菜Potentilla chinensis Ser.的根或全草。主产于山东、辽宁、安徽。苦，平，有小毒。清热解毒，利湿，止血。①治阿米巴痢疾，细菌性痢疾，肠炎，风湿性关节炎，咽喉炎，百日咳，吐血，咯血，便血，尿血，功能性子宫出血。煎服：9～15克。②治外伤出血，痈疖肿毒，鲜品捣敷；疥疮，煎水洗。根含鞣质。根煎剂大鼠灌胃对体内的溶组织阿米巴原虫有抑制作用。全草煎剂在体外能抑制痢疾杆菌。

季豆 见《东北药用植物志》。为胡芦巴之别名，详该条。

芳苋菜 见萧步丹《岭南采药录》。即刺苋菜，详该条。

芳角强 见萧步丹《岭南采药录》。为露兜芳蕴之别名，详该条。

垂花香薷 见《中国经济植物志》。为大黄药之别名，详该条。

垂盆草 见《四川中药志》。又名石指甲、狗牙半支、瓜子草、三叶佛甲草。为景天科植物垂盆草Sedum sarmentosum Bge.的全草。分布东北及河北、河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、四川等地。甘、淡，凉。清热，解毒，利湿。治传染性肝炎，咽喉肿痛，痈肿疮疡，毒蛇咬伤，烧烫伤，近亦用治肺癌、胰腺癌，煎服：15～30克（鲜品30～90克）；或捣汁服。外用：捣烂敷。本品含对肝炎的有效成分垂盆草甙，能降低患者的谷丙转氨酶。还含甲基异石榴皮碱等生物碱，景天庚糖等。

使君子 出《开宝重定本草》。又名留求子、五棱子、索子果、冬均子。为使君子科植物使君子Quispualis indica L.的果实。主产四川、广东、广西。甘，温，有小毒。入脾、胃经。杀虫，消积。治蛔虫病，蛲虫病，小儿疳积。捣碎煎服：9～12克；去壳取仁，4.5～9克。亦可炒熟嚼食，小儿每岁1粒，总量不超过20粒。忌饮热茶。多食或饮热茶可引起呃逆，眩晕等反应。种子含使君子酸钾（Potassium quisqualate）、胡芦巴碱、吡啶、有机酸及脂肪油。水或醇浸剂在体外可麻痹猪蛔，使君子酸钾对猪蛔也能抑制。水浸剂在体外对常见致病性皮肤真菌有抑制作用。

侧耳根 出《遵义府志》。为鱼腥草之别名，详该条。

侧金盏花 见《桂海虞衡志》。为冰凉花之别名，详该条。

侧柏子 见《日华子诸家本草》。即柏子仁，详该条。

侧柏叶 出《药性论》。又名柏叶、丛柏叶。为柏科植物侧柏Biota orientalis (L.) Endl.的嫩枝和叶。全国大部分地区有产。苦、涩，微寒。入肺、肝、大肠经。凉血止血，祛痰止咳，除风湿，降压，消肿解毒。①治肺结核咯血，衄血，胃肠道出血，血痢，便血，尿血，功能性子宫出血，肺热咳嗽，慢性气管炎，百日咳，风湿热痹，关节疼痛，高血压病。煎服：6～12克。止血炒炭用。②治深部脓肿，用叶30克捣碎，同白矾粉15克，加酒和匀，调敷患处；丹毒，痄腮，汤火伤，鲜叶捣烂敷。叶含挥发油，油中主含小茴香酮、侧柏烯、侧柏酮等，另含山柰酚、槲皮素等黄酮类和鞣质等。本品的水、醇提取液及所含黄酮对小鼠有镇咳、祛痰作用。体外试验，侧柏叶对金黄色葡萄球菌，伤寒、痢疾和大肠等杆菌有抑制作用；醇浸剂还能抑制结核杆菌。

佩兰 出清·叶小峰《本草再新》。又名省头草、香草。为菊科植物兰草Eupatorium fortunei Turcz.的茎叶。主产江苏、浙江、河北、山东等地。辛，平。入脾、胃经。醒脾，化湿，解暑。①治湿阻中焦，胃脘痞闷，恶心呕吐，泄泻、口中甜腻。②治感受暑湿或湿温初起，寒热头痛，身困、胸闷、纳呆。煎服：4.5～9克。③煎汤含漱疗牙痛。鲜叶或干叶的醇浸出物对动物有毒性作用。佩兰能使小鼠动情周情暂时停止、排卵受抑制。

爬山虎 ❶见《浙江民间常用草药》。又名大风藤、假葡萄藤、爬墙虎、飞天蜈蚣、枫藤、地锦。为葡萄科植物爬山虎Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.的根及茎。分布辽宁、河北、陕西、湖北、湖南及华东、华南、西南等地。甘、涩，温。祛风，活血，解毒。①治风湿关节疼痛，偏头痛，半身不遂，便血，赤白带下。内服：煎汤，15～30克，或浸酒服。②治跌打损伤，痈疖肿毒，捣烂敷；带状疱疹，磨汁外搽。❷见《全国中草药汇编》。为三爪金龙之别名，详该条。❸见广州军区空军卫生部《常用中草药手册》。为百眼藤之别名，详该条。❹见《南京民间药草》。为络石藤之别名，详该条。

爬地香 见《全国中草药汇编》。为碎米柴之别名，详该条。

爬岩红 见《陕甘宁青中草药选》。为腹水草之别名。详该条。

爬岩板 见《贵州民间药物》。为球兰之别名，详该条。

爬岩香 ❶见《广西实用中草药新选》。为山药之别名。❷见《全国中草药汇编》。为石南藤之别名。各详该条。

爬墙虎 ❶见《文山中草药》。为扶芳藤之别名。❷见《中国树木分类学》。为壁石虎之别名。❸见《中国药用植物志》。为薜荔之别名。各详该条。

乳汁草 见《岭南草药志》。为小飞扬草之别名，详该条。

乳头香 出《海药本草》。即乳香，详该条。

乳花 见《北方常用中草药手册》。为石花之别名，详该条。

乳香 出《名医别录》。又名熏陆香、乳头香、天泽香、浴香。为橄榄科植物卡氏乳香树Boswellia carterii Birdw. 及其同属数种植物的油胶树脂。主产索马里、埃塞俄比亚及阿拉伯半岛南部。辛、苦，温。入心、肝、脾经。活血行气，止痛，消肿生肌。①治瘀阻气滞脘腹疼痛，急心痛，风湿痹痛，跌打损伤，痛经，产后腹痛，煎服：3～9克。②治痈疽肿毒，煎服或研末外敷；溃疡，研末撒敷伤口。孕妇忌服。本品含树脂、树胶、挥发油。树脂主含α-及β-乳香脂酸及其衍生物和α-及β-树脂醇的衍生物。树胶主含多聚糖。挥发油中含蒎烯、二戊烯、α-水芹烯等。

乳浆草 见《江苏省植物药材志》。为泽漆之别名，详该条。

乳薯 见《江西民间草药》。为山海螺之别名，详该条。

斧头花 见《浙江中药手册》。为金雀花之别名，详该条。

念珠藤 见《广州植物志》。为阿利藤之别名，详该条。

金山田七 见《四川常用中草药》。为峨参之别名，详该条。

金不换 ❶见《本草纲目拾遗》。为土大黄之别名。❷见《陕西中草药》。为牛西西之别名。各详该条。

金牛七 见《陕西中草药》。又名火烟子、千捶打。为毛茛科植物太白乌头Aconitum taipeicum Hand.-Mazz.或松潘乌头A. sungpanense Hand.-Mazz.的块根。前者分布陕西，后者分布山西、陕西、甘肃、青海、四川等地。辛、微苦，温，有大毒。祛风止痛，散瘀消肿。①治跌打损伤，风湿性关节炎。内服：煎汤，90～150毫克；研粉，30～90毫克，凉开水送服。②治痈肿疔毒。水、酒或醋磨涂，或研粉调敷。

金牛草 见《陕甘宁青中草药选》。为通经草之别名，详该条。

金牛胆 见《中国药用植物图鉴》。为金果榄之别名，详该条。

金毛狗 出《分类草药性》。为狗脊之别名，详狗脊条。

金石斛 见《临证指南医案》。为石斛之处方名，详该条。

金龙胆草 见《四川中草药通讯》(3)：27，1972。又名苦艾、苦龙胆草、鱼胆草、矮脚苦蒿。为菊科植物苦蒿Conyza blinii Lévl.的全草。分布云南、四川。苦，寒。消炎祛痰，平喘止咳，清热解毒。①治慢性气管炎，研末为丸，每次1克，一日三次，饭后服。②治急性黄疸型肝炎，牙痛，口腔炎，咽喉炎，扁桃体炎，肾炎，疟疾。煎服：6～9克。③治中耳炎，捣汁滴耳；眼结膜炎，捣汁滴眼；疮疡，捣敷；外伤出血，研末撒。本品含生物碱、皂甙、鞣质、酚性物质、酸性物质及微量的挥发油等。小鼠口服煎剂，水浸膏，醇浸膏及分离出的皂甙粗品，均有明显的祛痰作用，对豚鼠有平

喘作用。

金瓜 见《中国蔬菜栽培学》。为桃南瓜之别名，详该条。

金边兔耳 出《本草纲目拾遗》。又名兔耳草、兔耳箭、橡皮草、兔耳金边草、朝天一柱香、扑地金钟。为菊科植物杏香兔耳风Ainsliaea fragrans Champ.的全草。分布华东、中南等地区。苦、辛，平。入肺经。清热解毒，止血，利湿。①治上呼吸道感染，吐血，肺结核咯血，肺痈，肠痈，水肿，黄疸，小儿疳积，消化不良。煎服：9～15克。②捣敷治瘰疬，肿毒，创伤，蛇咬伤。水煎液在体外对金黄色葡萄球菌有明显抑制作用。

金丝七 见《陕西中草药》。为红毛七之别名，详该条。

金丝茅 见《中国主要植物图说·禾本科》。为笔仔草之别名，详该条。

金丝鱼鳖 见《浙江中药手册》。为鱼鳖金星之别名，详该条。

金丝草 见《山西中药志》。为通经草之别名，详该条。

金丝荷叶 ❶见《现代实用中药》。为虎耳草之别名。❷见南京药学院《中草药学》。为锡生藤之别名。各详该条。

金丝黄连 见《四川中药志》。为马尾连之别名，详该条。

金丝矮陀 见《云南思茅中草药选》。为矮陀陀之别名，详该条。

金丝矮坨坨 见《滇南本草》整理本。为金铁锁之别名，详该条。

金丝蝴蝶 见《中国树木分类学》。为红旱莲之别名，详该条。

金耳环 见《广西中草药》。又名一块瓦、土细辛、小洋紫苏。为马兜铃科植物金耳环Asarum longepedunculatum O. C. Schmidt的全草。分布广东、广西等地。辛，温，有毒。祛风散寒，止咳平喘，止痛消肿。①治风寒咳嗽，支气管哮喘，腹中寒痛，风寒痹痛。煎服：0.9～3克。②治跌打肿痛，毒蛇咬伤。煎服并捣敷。本品预试含黄酮甙、氨基酸、糖类和挥发油。

金扣钮 见《陆川本草》。又名刺天茄、天茄子、黄水茄、金钮头、小颠茄。为茄科植物紫花茄Solanum indicum L.的根或全草。分布华南、西南地区。苦，寒，有小毒。祛风止痛，消肿散瘀。治头痛，风湿痹痛，胃痛，牙痛，扁桃体炎，咽喉炎，淋巴结炎，阑尾炎，跌打损伤。煎服：6～9克。服用过量，可致口渴、吞咽困难、体温升高、皮肤干燥发红、瞳孔散大、视力模糊等中毒症状，重者可因呼吸衰竭而死亡。孕妇忌服。全草含龙葵碱、澳洲茄胺、β-谷甾醇、薯蓣皂甙元等。果还含黄酮甙。澳洲茄胺有可的松样抗炎作用，参见龙葵条。

金刚根 出《日华子诸家本草》。为菝葜之别名，详该条。

金刚散 见《云南中草药》。又名红内消、赤葛、绿葡萄、见肿消、大接骨丹。为葡萄科植物三裂叶蛇葡萄Ampelopsis delavayana (Franch.) Planch.的根或根皮。分布中南、西南及陕西、甘肃等地。甘、苦，凉。消炎镇痛，止血，消肿。①治外伤肿痛，风湿痹痛，胃痛，肠炎，痢疾，便血，崩漏，白带。煎服：9～15克。②治骨折，痈肿，捣敷；外伤出血，研末撒；水火烫伤，研粉，鸡蛋清调敷。

金灯草 见《履巉岩本草》。为酸浆之别名，详该条。

金灯笼 见清·汪连仕《采药书》。为挂金灯之别名，详该条。

金汤匙 见《中药材手册》。为石韦之别名，详该条。

金花 见《江苏省植物药材志》。即金银花，详该条。

金花果 见《云南中草药》。为薯莨之别名，详该条。

金花草 ❶见《云南中草药选》。即小叶

金粟草。❷见《广东中药》。为大叶金花草之简称。各详该条。

金花菜 见《中国植物图鉴》。为苜蓿之别名，详该条。

金豆 见《上海常用中草药》。为蓖麻子之别名，详该条。

金针菜 出《滇南本草》。又名黄花菜、萱草花、宜男花。为百合科植物萱草Hemerocallis fulva L.、黄花萱草 H. flava L. 或小萱草H. minor Mill. 等的花蕾。我国大部分地区有产。甘，凉。清热利湿，解毒，通乳。治小便赤涩，黄疸，胸膈烦热，夜不安寐，风火牙痛，腮腺炎，痔疮便血，产后乳汁不下。煎服：15～30克。小萱草花含生物碱、鞣质、挥发油、槲皮素、绿原酸、芸香甙。

金龟莲 见《修订增补天宝本草》。为罗锅底之别名，详该条。

金陀僧 见《中药志》。即密陀僧，详该条。

金鸡尾 ❶见《贵州民间药物》。又名五叶灵芝、掌叶凤尾。为凤尾蕨科植物掌羽凤尾蕨Pteris dactylina Hook. 的根茎或全草。分布我国西南地区及甘肃等地。苦，凉。清热利湿，解毒。治肠炎，痢疾，流行性腮腺炎，淋巴结炎，白带，小儿急惊风。煎服：9～15克。❷见《四川中药志》。为凤尾草之别名，详该条。❸见《福建中草药》。为肾蕨之别名，详该条。

金鸡纳 见李承祜《药用植物学》。即金鸡勒，详该条。

金鸡勒 出《本草纲目拾遗》。又名金鸡纳。为茜草科植物金鸡纳树Cinchona ledgeriana Moens.或红色金鸡纳树C. succirubra Pav. 及数种同属植物的树皮、枝皮及根皮。云南、台湾、广东、广西等地有栽培。辛、苦，寒，有小毒。抗疟，解热。治疟疾，高热。内服：煎汤，3～9克；或研末服。孕妇忌服。本品含生物碱廿余种，其中主要有奎宁、奎尼丁、辛可尼丁、辛可宁。还含鸡勒甙（Quinovin）、金鸡纳鞣酸、奎宁酸、金鸡纳红等。金鸡纳树还含莱氏金鸡纳碱（Cinchophyllamine）和异莱氏金鸡纳碱。奎宁能消灭各种疟原虫的裂殖体，而终止疟疾的发作，但不能防止良性疟的复发及杜绝各种疟疾的传染源。奎尼丁有抗心律不齐作用。奎宁与其他金鸡纳碱所引起的副作用，统称金鸡纳反应，如耳鸣、头痛、恶心、呕吐和视听力减退，甚至产生暂时性耳聋、目盲。

金鸡脚下红 见《湖南药物志》。为烟草之别名，详该条。

金鸡落地 见《植物名实图考》。为千金拔之别名，详该条。

金环蛇 见《广西中药志》。为眼镜蛇科动物金环蛇Bungarus fasciatus（Schneider）除去内脏的全体。分布福建、广东、广西、云南、江西等地。咸，温。入肝经。治风湿麻痹，手足瘫痪、肿痛。内服浸酒。头部毒腺中含有强烈的神经性毒和心脏毒，但无溶血作用。

金顶龙芽 出清·赵楷《百草镜》。为仙鹤草之别名，详该条。

金果榄 出《本草纲目拾遗》。又名金楛榄、地苦胆、金牛胆、金线吊葫芦、九牛子。为防己科植物金果榄 Tinospora capillipes Gagn或青牛胆T. sagittata(Oliv.) Gagn 的块根。主产广西、湖南。苦，寒。入肺、胃经。清热解毒，利咽消肿。①治急性咽喉炎，扁桃体炎，口腔炎，热咳失音。②治急性胃肠炎，胃痛，细菌性痢疾，煎服：3～9克。③治痈肿疔毒，瘰疬，蛇咬伤，捣敷或磨汁涂。本品含掌叶防己碱、咖伦宾。预试尚含黄酮甙、氨基酸、糖类。煎剂在体外对钩端螺旋体有抑制作用。动物实验，掌叶防己碱有明显的增进促肾上腺皮质激素分泌的作用，及抗肾上腺素的作用。

金狗脊 出《职方典》。为狗脊之药材名，详狗脊条。

金疙瘩 见《山西中药志》。为金莲花之别名，详该条。

金炉底 见《现代实用中药》。为密陀僧之别名，详该条。

金沸花 见《上海常用中草药》。为旋复花之别名，详该条。

金沸草 出《神农本草经》。又名旋复梗。为菊科植物旋复花Inula japonica Thunb. 的全草。我国大部分地区有分布。苦、辛、咸，微温。入肺、大肠经。化痰止咳，利水除湿，消肿，止血。①治咳喘痰多，胁下胀痛，水肿，风湿痹痛。煎服：4.5～9克。治疔疮肿毒，鲜品捣敷或煎水洗；创伤出血，研末撒。旋复花的地上部分含旋复花素（Inulicin）。

金线风 ❶见《广西中草药》。为银不换之别名。❷见《陆川本草》。为凉粉藤之别名。各详该条。

金线吊乌龟 ❶见《杭州药用植物志》。为千金藤之别名。❷见《植物名实图考》。为白药子之别名。❸见《滇南本草》整理本。为地不容之别名。各详该条。

金线吊白米 见《湖南药物志》。为粉条儿菜之别名，详该条。

金线吊芙蓉 ❶见《生草药性备要》。为虎耳草之别名。❷见《南宁市药物志》。为锦地罗之别名。各详该条。

金线吊葫芦 ❶见《浙江民间常用草药》。为三叶青之别名。❷见《全国中草药汇编》。为金果榄之别名。各详该条。

金线草 ❶见《贵州民间草药》。又名毛蓼、山蓼、野蓼、一串红、人字草。为蓼科植物金线草Antenoron filiforme(Thunb.) Roberty et Vautier 或短毛金线草A. heofiliforme (Nakai) Hara的全草。分布山西、陕西、山东、河南、江苏、浙江、湖北、四川、云南、贵州等地。辛，凉。止血散瘀，理气解毒。①治肺结核咳血，吐血，便血，血崩，经期腹痛，产后血瘀腹痛，跌打损伤。②治胃痛，痢疾，腹痛吐泻。煎服：15～30克。块根名海根，又名铁箍散、蓼子七、铁拳头。治痈疽肿毒，蛇、犬咬伤，煎服并外敷。❷见《新本草纲目》。为松萝之别名，详该条。

金柿根 见《闽东本草》。为苞蔷薇根之别名，详该条。

金荞麦 出《植物名实图考》。又名开金锁、金锁银开、天荞麦、荞麦三七。为蓼科植物野荞麦Fagopyrum cymosum(Trev.) Meisn. 的根茎及块根。分布陕西、江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南等地。微辛、涩，凉。入肺、肝经。清热解毒，活血散瘀，祛风除湿。①治肺脓疡，肺炎，咽喉肿痛，肝炎，细菌性痢疾，消化不良，痛经，闭经，产后瘀滞腹痛，风湿痹痛。煎服：15～30克。②治疖肿，跌打，鲜品捣烂敷；蛇、蜈蚣咬伤，研粉醋调搽。本品含双聚原矢车菊素（Procyanidin）1～2%，以及海柯皂甙元、β-谷甾醇等。临床证明，双聚原矢车菊素对治疗肺脓疡有显著疗效。根的煎剂，在体外对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌、绿脓杆菌等有抑制作用，酊剂作用强于水剂。

金茶匙 ❶见《闽东本草》。为螺厣草之别名。❷见清·赵其光《本草求原》。为向天盏之别名。各详该条。

金挖耳 见《江苏民间草药验方》。为半枝莲之别名，详该条。

金背枇杷 见《陕西中草药》。为杜鹃花科植物陇蜀杜鹃Rhododendron przewalskii Maxim.的果实。分布陕西、甘肃、四川、青海。苦，平。清肺止咳，降气和胃。治肺热咳嗽，呕吐。煎服：3～6克。金背枇杷花：治咳嗽，咯血，肺痈，煎服。

金背枇杷叶 见《陕西中草药》。为杜鹃花科植物陇蜀杜鹃 Rhododendron przewalskii Maxim. 的叶。辛、苦，平，有毒。清肺泻火，止咳化痰，降压。治咳嗽，痰喘，老年慢性支气管炎，高血压。煎服（刷去叶背面绒毛）：0.5～1克。过量能致中毒性休克，应注意。本品含微量挥发油，内有大牻牛儿酮。还含槲皮素及梫木毒素-1（Andromedotoxin-1）。

金星草 见《四川中药志》。为鱼鳖金星之别名，详该条。

金钟茵陈 见《滇南本草》。为铃茵陈之别名，详该条。

金钩子 见《现代实用中药》。为枳椇子之别名，详该条。

金钩藤 见《贵州民间方药集》。即钩藤，详该条。

金钮头 出萧步丹《岭南采药录》。为金扣钮之别名，详该条。

金钮扣 见《广东中草药》。为天文草之别名，详该条。

金钮草 见《福建民间草药》。为水蜈蚣之别名，详该条。

金香炉 见《广东中草药》。为天香炉之别名，详该条。

金剑草 见《泉州本草》。为葫芦茶之别名，详该条。

金盆 见清·刘士季《草木便方》。为罗锅底之别名，详该条。

金盆草 见《中药材手册》。为细辛之别名，详该条。

金盆寒药 见《四川常用中草药》。为千金藤之别名，详该条。

金疮小草 出《本草拾遗》。为白毛夏枯草之别名，详该条。

金扁柏 见《福建民间草药》。为兖州卷柏之别名，详该条。

金盏银盘 见《广东中药》Ⅱ（中草药部分）。又名一包针、盲肠草、粘身草、虾钳草、豆渣菜、引线包。为菊科植物三叶鬼针草Bidens pilosa L.或金盏银盘 B. biternata（Lour.）Merr. et Sherff的全草。主产广东、广西等地。甘、淡，平。清热解毒，散瘀消肿。①治外感发热，咽喉肿痛，肠痈，肠炎，小儿腹泻，尿路感染。煎服：9～30克（鲜品60～90克）。②治跌打肿痛，痈疮肿毒，捣敷；疮疡，疥癞，痔疮，煎水洗。三叶鬼针草全草含葸醌甙。预试还显生物碱、鞣质、皂甙反应。乙醇浸液在体外对革兰氏阳性细菌有抑制作用。

金莲花 见《本草纲目拾遗》。又名旱金莲、金梅草、旱地莲、金疙瘩。为毛茛科植物金莲花 Trollius chinensis Bge. 或短瓣金莲花T. ledebouri Reichb.等的花。前者分布山西、河北和内蒙古南部，后者分布内蒙古北部和黑龙江。苦，寒。清热解毒。治急、慢性扁桃体炎，急性中耳炎，急性鼓膜炎，急性结膜炎，急性淋巴管炎，口疮，疔疮。煎服：3～6克。本品含有抑菌作用的3'、4'、5-三羟基黄酮-7-鼠李葡萄糖甙。预试还含生物碱、香豆素及其甙、树脂、挥发油、鞣质以及多种甾萜类化合物。短瓣金莲花含叶黄素环氧化物和金莲花黄质（Trollixanthin）。水提取物在体外对革兰氏阳性球菌及阴性杆菌都有抑制作用。对猫或豚鼠有平喘作用。

金钱白花蛇 见《饮片新参》。又名金钱蛇、金钱蕲蛇、小白花蛇、寸白蛇、银蛇。为眼镜蛇科动物银环蛇 Bungarus multicinctus Blyth幼蛇去除内脏的干燥体。主产广东、广西。甘、咸，温，有毒。入肝、脾经。搜风，活络，镇痉，攻毒。治半身不遂，口眼歪斜，四肢麻木，抽搐痉挛，关节酸痛，类风湿性关节炎，破伤风，麻风，疥癞，梅毒。内服：煎汤，3～4.5克；研末服，0.6～0.9克，亦可入丸剂或浸酒。本品主含蛋白质、脂肪及乌嘌呤核甙

(Guanoside)。头部毒腺中含有强烈的神经性毒，并含溶血成分及血球凝集成分(不含出血性毒)，毒液中还含胆碱酯酶、蛋白酶、ATP酶等。银环蛇的乙种环蛇毒素作用于突触前部位，抑制神经末梢释放乙酰胆碱，对呼吸肌、神经系统，特别是呼吸中枢有抑制作用；危重病例也能出现严重的心肌损害。

金钱花 出《本草图经》。为旋复花之别名，详该条。

金钱草 ❶见《四川中药志》。即大金钱草。❷出《本草纲目拾遗》。为连钱草之别名。各详该条。

金钱蛇 见《中药材手册》。为金钱白花蛇之简称，详该条。

金钱蕲蛇 见《中药志》。为金钱白花蛇之别名，详该条。

金钱薄荷 ❶见《全国中草药汇编》。为红马蹄草之别名。❷见《福建民间草药》。为连钱草之别名。各详该条。

金铁锁 出《滇南本草》。又名土人参、独丁子、昆明沙参、麻参、金丝矮坨坨。为石竹科植物金铁锁Psammosilene tunicocides W. C. Wu et C.Y. Wu 的根。产云南。苦、辛，温，有毒。祛风除湿，散瘀止痛。①治风湿痹痛，跌打损伤。煎服：0.9～1.5克。刮去外皮用。②治创伤出血。研粉撒。孕妇忌服。本品预试含氨基酸、有机酸、皂甙、三萜。

金铃子 见唐·侯宁极《药谱》。为川楝子之别名，详该条。

金笋 见《中国药学大辞典》。为肉苁蓉之别名，详该条。

金球 见《本草纲目》。为橙子之别名，详该条。

金菊 见《民间常用草药汇编》。为万寿菊之别名，详该条。

金梅草 出《山西通志》。为金莲花之别名，详该条。

金梳子草 见《民间常用草药汇编》。为眼子菜之别名，详该条。

金雀花 出清·赵楷《百草镜》。又名黄雀花、阳雀花、斧头花、猪蹄花。为豆科植物锦鸡儿Caragana sinica(Buchoz)Rehd.的花。分布河北、河南、陕西、湖北、湖南及华东、西南地区。甘，平。入肺、脾、肝经。滋阴，健脾，和血祛风。治肺虚咳嗽，头晕头痛，耳鸣眼花，腰膝酸痛，白带，疳积，风湿痹痛，跌打损伤。煎服：3～15克。

金雀根 出《本草纲目拾遗》。又名土黄芪、板参、阳雀花根。为豆科植物锦鸡儿Caragana sinica(Buchoz)Rehd.的根。产浙江、江苏、四川等地。甘，微温。入肺、脾经。健脾补气，活血，调经，降压。①治体虚乏力，浮肿，盗汗。②治跌打损伤，风湿性关节痛，月经不调，白带，产后乳汁不下。③治高血压病，头晕，目花。煎服：15～30克。预试根含生物碱、皂甙和淀粉。醇提取物对猫有中枢性降低血压作用。

金银花 出《履巉岩本草》。又名忍冬花、银花、双花、金花、二花、二宝花。为忍冬科植物忍冬Lonicera japonica Thunb.或红腺忍冬L.hypoglauca Mig.、山银花L.confusa DC.等的花蕾。我国大部分地区均产。甘，寒。入肺、胃经，清热解毒。①治风热感冒，温病初期，咽喉肿痛，急性结膜炎，大叶性肺炎，肺脓疡，热毒血痢，流行性乙型脑炎，钩端螺旋体病。②治痈疖脓肿，丹毒，急性乳腺炎，胆道感染，阑尾炎，外伤感染，子宫颈糜烂。煎服：9～30克。③治乳头皲裂。煎浓汁蘸洗患处。本品含挥发油，内含双花醇、芳樟醇、松油醇、橙花醇、香叶醇、苯甲醇、蒎烯等。还含木犀草素及其葡萄糖甙、肌醇、皂甙、鞣质等。煎剂及醇浸液在试管内对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎球菌、脑膜炎球菌、伤

寒、痢疾及人型结核等杆菌，以及钩端螺旋体均有一定的抑制作用，对小鼠实验性结核病也有疗效。体外和体内试验均有抗流感病毒作用。水浸剂对某些皮肤真菌也有抑制作用。高压消毒或久煮均能影响其抗菌效力。此外，金银花能减少大鼠对胆固醇的吸收，从而降低血胆固醇水平。

金银藤 出《乾坤生意秘韫》。为忍冬藤之别名，详该条。

金弹子 见清·赵其光《本草求原》。为黄皮果之别名，详该条。

金榼榄 见清·龙柏《药性考》。即金果榄，详该条。

金锁天 出《雷公炮炙论》。为灰藿之别名，详该条。

金锁匙 ❶见《海南岛常用中草药手册》。为木防己之别名。❷见《植物名实图考》。为瓜子金之别名。❸见《广西药用植物名录》。为凉粉藤之别名。各详该条。

金锁银开 出《李氏草秘》。为金荞麦之别名，详该条。

金腰带 见《分类草药性》。为芫花根之别名，详该条。

金腰莲 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·外科》。为罗锅底之别名，详该条。

金箔 出《本草蒙筌》。又名金薄。为用黄金锤成的纸状薄片。辛，平。入心、肝经。镇心，安神。治惊痫，癫狂，心悸。内服：入丸、散。亦用作丸药挂衣。

金精石 出《本草纲目》。为水金云母的片状体。产河南、山东、山西、四川等地。咸，寒，有小毒。入心、肝、肾经。镇惊安神，去翳明目。①治心悸怔忡，夜寐不安。内服：3～6克，入丸、散用。②治角膜云翳。内服或研末点眼。本品含氧化镁、氧化铁、氧化亚铁、氧化硅、氧化铅等。

金樱子 出《雷公炮炙论》。又名刺榆子、山石榴、野石榴、糖罐、山鸡头子、糖刺果、刺头。为蔷薇科植物金樱子 Rosa laevigata Michx. 的果实。主产广东、湖南、浙江、江西等地。酸、涩，平。入肾、膀胱、大肠经。益肾，固涩。治滑精，遗精，遗尿，尿频，咳喘，自汗，盗汗，慢性腹泻，崩漏，带下，慢性肾炎，高血压病，子宫脱垂，脱肛。煎服：6～12克。本品含柠檬酸、苹果酸、鞣质、树脂、维生素C、皂甙、糖类等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌，大肠、绿脓及痢疾杆菌等以及流感病毒均有抑制作用。果实口服有促进胃液分泌帮助消化和收敛止泻作用。

金樱叶 出《本草纲目》。又名塘莺蓬。为蔷薇科植物金樱子Rosa laevigata Michx. 的嫩叶。分布华东、中南、西南及陕西等地。苦，凉。清热解毒。治痈肿，溃疡，创伤出血，捣敷；烫伤，研末加麻油调敷。

金樱花 出《日华子诸家本草》。为蔷薇科植物金樱子 Rosa laevigata Michx. 的花。酸、涩，平。固涩，杀虫。治遗精，遗尿，尿频，泄泻，痢疾，虚汗，白带，绦虫病，蛔虫病。煎服：3～6克。

金樱根 出《日华子诸家本草》。又名金樱蕊、脱骨丹。为蔷薇科植物金樱子 Rosa laevigata Michx. 的根。酸、涩，平。固精涩肠，祛风除湿，杀虫。①治遗精，遗尿，泄泻，痢疾，子宫脱垂，崩漏，白带，风湿痹痛，绦虫病。煎服：15～60克。②煎浓汁涂治烫伤；煎水含漱止牙痛。本品含鞣质。

金樱蕊 见《生草药性备要》。即金樱根，详该条。

金橘 出《本草纲目》。又名卢橘、山橘。为芸香科植物金橘 Fortunella margarita (Lour.) Swingle 或金弹 F. crassifolia swingle 等的果实。分布我国南部各地。辛、

甘，温。理气，解郁，化痰，消食，治胸闷郁结，食滞胃呆。煎汤或泡茶服，适量。本品含金柑甙（Fortunellin），维生素C。

金橘叶 出清·叶小峰《本草再新》。为芸香科植物金橘 Fortunella margarita（Lour.）Swingle 或金弹 F. crassifolia Swingle的叶。辛、苦，微寒。舒肝，开胃，散结。治噎膈，瘰疬，乳房结块。煎服：3～9克。本品含维生素C。

金橘核 出清·叶小峰《本草再新》。为芸香科植物金橘Fortunella margarita(Lour.) Swingle 或金弹 F.crassifolia Swingle 的种子。酸、辛，平。入肺、肝经。治喉痹，瘰疬。煎服：6～9克。

金橘根 见《闽东本草》。又名寿星柑根。为芸香科植物金橘Fortunella margarita（Lour.）Swingle或金弹 F.crassifolia Swingle的根。酸、甘，温。行气散结。治胃痛，疝气，产后腹痛，子宫下垂，瘰疬。煎服：3～9克。本品含挥发油。

金薄 出《药性论》。即金箔，详该条。

金薄荷 见《湖南药物志》。为对叶四块瓦之别名，详该条。

金礞石 见《药物出产辨》。为礞石药材之一种，详该条。

狗儿蔓 见《陕西中草药》。为面根藤之别名，详该条。

狗牙半支 见《本草纲目拾遗》。为垂盆草之别名，详该条。

狗仔花 见《广西中草药》。为咸虾花之别名，详该条。

狗仔菜 见《广州植物志》。为咸虾花之别名，详该条。

狗夺子 出《滇南本草》。为狗筋蔓之别名，详该条。

狗舌头草 见《浙江民间常用草药》。即狗舌草，详该条。

狗舌花 见《滇南本草图谱》。为狗尿花之别名，详该条。

狗舌草 出《新修本草》。又名狗舌头草、铜盘一枝香。为菊科植物狗舌草 Senecio kirilowii Turcz. 的全草。分布东北至华东、西南各地。苦、寒。清热，利水，解毒，杀虫。①治肺脓疡、尿路感染，小便不利，疖肿。煎服：9～15克。②治疥疮。研末调敷。

狗舌草根 见《浙江民间常用草药》。为菊科植物狗舌草Senecio kirilowii Turcz. 的根。苦、寒。解毒，利尿，活血消肿。①治尿路感染，口腔炎。煎服：30～60克。②治跌打损伤，捣敷或煎服；肾炎水肿，捣敷脐部。

狗肝菜 见萧步丹《岭南采药录》。又名草羚羊、麦穗红、青蛇仔、野青仔。为爵床科植物狗肝菜 Dicliptera chinensis（L.）Nees 的全草。分布广东、广西、福建、台湾等地。甘、淡，凉。清热，凉血，利尿，解毒。①治感冒高热，斑疹发热，肺热咳嗽，吐血，衄血，便血，尿血，小便淋沥，痢疾，目赤肿痛，湿火骨痛，近用于流行性乙型脑炎。煎服：15～30克。②治疔疮、带状疱疹，捣烂敷。

狗尾巴子 见《四川中药志》。为青葙子之别名，详该条。

狗尾巴草 见《南京民间药草》。为珍珠菜之别名，详该条。

狗尾半支 见《本草纲目拾遗》。即狗尾草，详该条。

狗尾草 出《本草纲目》。又名光明草、狗尾半支、谷莠子、洗草、小米草、犬尾草。为禾本科植物狗尾草 Setaria viridis（L.）Beaur. 的全草。我国大部分地区有分布。甘、淡，凉。清热解毒，明目，利水。①治急性肝炎，小儿疳积，目赤肿痛，淋病。煎服：15～30克。②捣敷治痈肿疔毒，疟腮；煎水洗，治痔疮；熬膏敷贴瘰疬。鲜叶含草酸镁。开花时全草含戊聚糖约20%。未成熟种子含止权素Ⅱ。

狗宝 出《本草纲目》。为犬科动物狗 Canis familiaris L. 的胃中结石。主产内蒙古、西藏、新疆、河北等地。甘、咸，平。降逆，止痛，解毒。治噎膈反胃，胃痛，痈疽疮疡。研末服：0.9～1.5克。本品含碳酸钙、碳酸镁、磷酸镁等。

狗骨 出《名医别录》。为犬科动物狗 Canis familiaris L. 的骨骼。甘，温。祛风除湿，活血生肌。①治风湿痛，腰腿无力，四肢麻木，久痢。内服：浸酒或烧存性研末，9～15克。②焙灰研末调敷治疮痿、冻疮。狗骨含有机物、脂肪、磷酸钙、碳酸钙、磷酸镁、化心钙。

狗骨木 见《广西本草选编》。为黄根之别名，详该条。

狗屎木 见《广西中药志》。为华山矾之别名，详该条。

狗屎豆 见《中国主要植物图说·豆科》。为望江南子之别名，详该条。

狗屎花 ❶出《滇南本草》。又名蓝布裙、龙须草、附地菜、狗舌花、七星箭。为紫草科植物倒提壶 Cynoglossum amabile Stapf et Drumm. 的全草。分布西南地区及甘肃。苦，凉。清热利湿，止咳化痰，止血。①治肝炎，痢疾，疟疾，尿痛，白带，肺结核咳嗽，喉痛失音，咯血。煎服：9～30克；②治疮肿，鲜叶捣敷；创伤出血，干草研末敷。本品含倒提壶碱，刺凌德草碱（Echinatine），刺凌德草碱有神经节阻滞作用，可完全阻断电刺激交感节前纤维引起的瞬膜收缩，它能增强肾上腺素的升压作用。❷见《昆明民间常用草药》。为拦路虎之别名，详该条。

狗屎花根 出《滇南本草》。又名鸡爪参、接骨草根、蓝花参、大肥根。为紫草科植物倒提壶 Cynoglossum amabile Stapf et Drumm.的根。苦、甘，平。清热利湿，理气，止血。①治肝炎，痢疾，疟疾，风湿性关节炎，肾炎，水肿，淋病，肺结核咳喘，盗汗，疝气，月经不调，崩漏，带下。煎服：15～30克。②治骨折，复位固定后用鲜根捣敷；外伤出血，干根研末撒。成分同狗屎花。

狗屎灵香 见《广东中草药》。为臭草之别名，详该条。

狗铃草 见《中国主要植物图说·豆科》。为农吉利之别名，详该条。

狗脊 出《神农本草经》。又名金毛狗、金狗脊。为蚌壳蕨科植物金毛狗脊 Cibotium barometz（L.）J. Sm. 的根茎。主产四川、福建、浙江。苦、甘，温。入肝、肾经。补肝肾，强筋骨，除风湿。治肝肾不足，腰背酸痛，脚软无力，尿频，遗尿，妇女白带，风湿痹痛。煎服：4.5～9克。根茎上的细柔毛名金狗脊黄毛，外敷，止创伤出血。

狗脚刺 见萧步丹《岭南采药录》。为老鼠耳之别名，详该条。

狗脚迹 ❶见《贵阳民间药草》。为虎掌草之别名。❷见《浙江民间常用草药》。为梵天花之别名。各详该条。

狗葡萄根 见《吉林中药手册》。为北豆根之别名，详该条。

狗筋蔓 出《救荒本草》。又名狗夺子、水筋骨、称筋散、小被单草、小九股牛。为石竹科植物狗筋蔓 Cucubalus baccifer L. 的全草。分布我国南北各地。甘、淡，温。接骨生肌，祛瘀止痛。治骨折，跌打损伤，风湿关节痛。浸酒服，或用鲜草捣后敷患部。

狗啾子 见《福建民间草药》。为黄独零余子之别名，详该条。

狗鞭 见《中药志》。为黄狗肾之别名，详该条。

饴糖 出《本草经集注》。又名麦芽糖。为米、大麦、小麦、粟或玉蜀黍等经发酵糖化制成的糖类。甘，微温。入脾、胃、肺经。补中缓痛，润肺止咳。治中气虚乏，腹痛喜按，肺虚燥咳，咽干口渴。冲服：30～60克。本品主含麦芽糖。

肺形草 ❶见《药用植物图说》。又名山蝴蝶、蝴蝶草、四脚喜、胡地莲、黄金线、鸦燕草。为龙胆科植物双蝴蝶Tripterospermum affine (Wall.) H. Sm. 的幼嫩全草。分布陕西、浙江、安徽、江西、福建、湖南及西南等地。甘、辛，寒。清热，止血，利尿，解毒。①治支气管炎，肺炎，肺结核，咳血，肺脓疡，肾炎，泌尿系感染。煎服：6～12克（鲜品15～30克）。②治疔疮、疖肿，乳痈，创伤出血。捣敷或研末敷。水煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有一定抑菌作用。❷见《贵州民间方药集》。为鱼腥草之别名，详该条。

肺经草 见《天宝本草》。为大肺筋草之别名，详该条。

肿手花根 见《药材资料汇编》。为甘遂之别名，详该条。

肿节风 见《江西草药》。为九节茶之别名，详该条。

肥田草 见《贵州草药》。为大巢菜之别名，详该条。

肥皂子 见《药材学》。即肥皂核，详该条。

肥皂荚 出《本草纲目》。又名肉皂荚、肉皂角。为豆科植物肥皂荚 Gymnocladus chinensis Baill. 的果实。分布江苏、浙江、福建、江西、安徽、湖北、湖南、广东、四川等地。辛，温。除顽痰，祛风湿。①治咳嗽痰塞，风湿疼痛，痢疾，肠风。煎服：1.5～3克。②治头疮，疥癣。烧存性，研末调敷。本品含皂甙。

肥皂核 出《本草纲目》。又名肥皂子。为豆科植物肥皂荚 Gymnocladus chinensis Baill. 的种子。甘，温。祛痰，通便，利尿。治顽痰阻塞，大肠风秘，下痢，淋病。煎服：3～6克。

肥珠子 见《本草纲目》。为无患子之别名，详该条。

肥猪苗 见《分类草药性》。为豨莶之别名，详该条。

肥猪草 见《草药手册》。为鸭舌草之别名，详该条。

昏鸡头 见《四川中药志》。为小贯众之别名，详该条。

鱼肚 见清·汪双池《医材纂要·药性》。即鱼鳔，详该条。

鱼尾草 见《履巉岩本草》。为醉鱼草之别名，详该条。

鱼泡通 见《四川中药志》。为小通草之别名，详该条。

鱼胆 见《中国树木分类学》。为老鸦糊之别名，详该条。

鱼胆木 见《广西药用植物图志》。为萝芙木之别名，详该条。

鱼胆草 ❶见《云南中草药》。为小飞蓬之别名。❷见《云南中草药选》。为金龙胆草之别名，各详该条。

鱼首石 见《浙江中药手册》。即鱼脑石，详该条。

鱼脑石 见《药材资料汇编》。又名鱼首石。为石首鱼科动物大黄鱼 Pseudosciaena crocea (Rich.) 或小黄鱼 P. polyactis Bleeker 头骨中的耳石。主产浙江。咸，寒。清热解毒，化石，通淋。①治鼻渊。研末掺鼻腔。②治胆结石，泌尿系结石，小便淋沥不利。内服：煎汤，6～18克；或研末服，3～6克。本品主含碳酸钙，另含有机质、纤维蛋白。

鱼腥草 出《履巉岩本草》。又名臭菜、侧耳根、紫蕺、肺形草、猪姆耳、臭质草。为三白草科植物蕺菜 Houttuynia cordata Thunb. 的全草。主产浙江、江苏、湖北。辛，微寒。入肺经，清热解毒，利尿。①治肺脓疡，肺炎，百日咳，尿路感染，痢疾，白带。煎服：15～25克，不宜久煎；鲜品用量加倍，或捣汁服。②治热毒痈肿，捣烂敷；痔疮、外阴瘙痒，煎水熏洗；萎缩性鼻炎，取蒸馏液滴鼻。本品含挥发油，其中含

鱼腥草素。尚含蕺菜碱（Cordarine）、槲皮甙、异槲皮甙、金丝桃甙、氯化钾等。鱼腥草素，在体外对金黄色葡萄球菌、卡他球菌、肺炎球菌，大肠、痢疾、伤寒、流感等杆菌，均有较强的抑制作用。煎剂对京科68-1株病毒有抑制作用，对小鼠有止咳作用。鱼腥草，素能增强人体白细胞吞噬功能，槲皮甙有利尿作用。此外，还有镇痛，止血，抑制浆液分泌，促进组织再生等作用。

鱼鳅 见《草药手册》。即泥鳅，详该条。

鱼鳅串 见清·刘士季《草木便方》。为马兰之别名，详该条。

鱼鳔 出《本草纲目》。又名鱼肚。为石首鱼科动物大黄鱼Pseudosciaena crocea (Rich.)或小黄鱼P. polyactis Bleeker 等的鱼鳔。甘，平。入肾经。补肾益精，熄风，止血。①治肾虚滑精，产后风痉，吐血，血崩。内服：煎汤，9～15克；熬膏或研末入丸、散。②治创伤出血，痔疮。烧灰研末撒。

鱼鳔草 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为过塘蛇之别名，详该条。

鱼鳖金星 出《本草纲目拾遗》。又名鱼鳖草、石爪子、瓜子莲、金星草、金丝鱼鳖、镜面草。为水龙骨科植物抱石莲 Lepidogrammitis drymoglossoides (Bak.) Ching 的全草。分布长江流域及福建、广东、广西、贵州、陕西等地。甘、微苦，凉。清热凉血，利水，解毒，化痰。治咳嗽吐血，便血，尿血，淋浊，胆囊炎，臌胀，痄腮，咽喉肿痛，瘰疬，疔疮痈肿，风湿关节疼痛。煎服：15～30克。外用：捣敷。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、变形杆菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌有抑制作用。

鱼鳖草 见《浙江中药手册》。为鱼鳖金星之别名，详该条。

鱼鳞草 见《泉州本草》。为猪鬃草之别名，详该条。

兔儿伞 出《救荒本草》。又名一把伞、七里麻、雨伞菜、水鹅掌、南天扇、贴骨伞、破阳伞。为菊科植物兔儿伞 Syneilesis aconitifolia Maxim. 的根或全草。分布东北、华北、华中及华东地区。苦、微辛，微温，有小毒。祛风除湿，活血止痛，解毒消肿。①治风湿性关节炎，腰腿痛，月经不调，痛经，跌打损伤。煎服：6～15克。②治痈疽疮疖，毒蛇咬伤。鲜品捣敷。根含毛叶醇乙酸酯、α-松油醇葡萄糖甙的3，4-二当归酸酯。地上部分含α-松油醇葡萄糖甙的3，4-二当归酸酯、芳樟醇葡萄糖甙的3,4-二当归酸酯和大牻牛儿烯D等。

兔儿苗 见《救荒本草》。为面根藤之别名，详该条。

兔子肠 见《中药材手册》。为巴戟天之别名，详该条。

兔子草 见《上海常用中草药》。为水苦荬之别名，详该条。

兔子腿 见《辽宁经济植物志》。为列当之别名，详该条。

兔耳风 见清·刘士季《草木便方》。为毛大丁草之别名，详该条。

兔耳金边草 见《浙江民间常用草药》。即金边兔耳，详该条。

兔耳草 ❶出《慈航活人书》。为金边兔耳之别名。❷见《中国高等植物图鉴》。为面根藤之别名，各详该条。

兔耳箭 出清·汪连仕《采药书》。为金边兔耳之别名，详该条。

兔屎 见《补缺肘后方》。为望月砂之别名，详该条。

兔脑 出《名医别录》。为兔科动物蒙古兔Lepus tolai Pallas 或家兔Oryctolagus cuniculus domesticus (Gmelin) 等的脑。性温。催生。治难产。内服：入丸剂。捣敷冻疮，火伤，皮肤皲裂。

忽布 见《新疆中草药手册》。为啤酒花之别名，详该条。

忽地笑 见《汝南圃史》。为大一枝箭之

别名，详该条。

〔丶〕

放杖草 出《日华子诸家本草》。为淫羊藿之别名，详该条。

於术 见《增订伪药条辨》。即白术，详该条。

京菖蒲 见《药材学》。为九节菖蒲之别名，详该条。

夜兰茶 见《岭南草药志》。为黑面神之别名，详该条。

夜合叶 见《贵州药用植物目录》。为大飞扬之别名，详该条。

夜合叶根 见《贵州草药》。又名夜关门。为豆科植物马鞍叶羊蹄甲Bauhinia faberi Oliv.的根。分布陕西、湖北、广西及西南地区。苦、涩，平。止泻，安神，止痛，散结。①治腹泻，心悸失眠，筋骨疼痛。内服：煎汤，9～15克；或泡酒服。②治颈淋巴结结核。鲜品捣绒敷。

夜合皮 出《独行方》。为合欢皮之别名。详该条。

夜合花 出《本草衍义》。为合欢花之别名，详该条。

夜合草 ❶见《广州植物志》。为苹之别名，❷见《闽东本草》。为夜关门之别名。❸见《江西民间草药》。为珍珠草之别名。各详该条。

夜合珍珠 见《民间常用草药汇编》。为珍珠草之别名，详该条。

夜交藤 出《本经逢原》。又名首乌藤。为蓼科植物何首乌 Polygonum multiflorum Thunb. 的茎藤。主产浙江、湖北、河南、江苏、湖南等地。甘、微苦，平。入心、肝经。养心安神，祛风活络。①治神经衰弱，失眠多汗，血虚周身酸痛。煎服：15～30克。②茎或叶煎水洗疥癣，皮肤瘙痒。

夜关门 ❶出《分类草药性》。又名蛇退草、闭门草、凤交尾、夜合草、铁扫帚、苍蝇翼。为豆科植物截叶铁扫帚 Lespedeza cuneata (Dum. Cours.)G. Don 的全草。分布华东、华南、西南及湖北、湖南、江西等地。苦、辛，凉。入肺、肝、肾经。止咳化痰，补肝益肾，散瘀消肿。①治咳嗽痰喘，遗精，遗尿，视力减退，胃痛，小儿疳积，泻痢，跌打损伤。煎服：15～30克。②捣敷乳痈。本品含松醇、β-谷甾醇等，有较好的止咳、祛痰作用。还含槲皮素、山柰酚、牡荆素、荭草素等黄酮类化合物，对动物有平喘作用。醇提取物对多种动物子宫有兴奋作用。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、甲型链球菌、卡他球菌均有抑制作用。❷见《云南中草药》。为夜合叶根之别名，详该条。

夜里串 见《上海常用中草药》。为苹之别名，详该条。

夜明砂 出《日华子诸家本草》。又名蝙蝠尿、天鼠尿。为蝙蝠科动物蝙蝠 Vespertilio superans Thomas或大耳蝠 Plecotus auritus L.等的干燥粪便。主产浙江、江西、广西、河南、甘肃、辽宁等地。辛，寒。入肝经。清肝明目，散血消积。治肝热目赤，白睛溢血，青盲，雀目，白内障，角膜云翳，疳积，跌打损伤。内服：煎汤，3～9克，包煎；或炒研末入散剂，1.2～1.5克。孕妇慎用。本品含尿素、尿酸、胆甾醇及微量维生素A等。

夜牵牛 ❶见萧步丹《岭南采药录》。为伤寒草之别名。❷见《全国中草药汇编》。为独脚乌桕之别名。各详该条。

兖州卷柏 出《本草图经》。又名金扁柏、石卷柏、田鸡爪、飞扬蕨、地柏枝、细叶金鸡尾、柏叶草。为卷柏科植物兖州卷柏 Selaginella involvens (Sw.) Spring 的全草。分布福建、广东、广西、云南、西藏、四川、江西、湖北、陕西。微甘，平。凉血，止血，止咳化痰，清热利湿。①治吐血，鼻衄，咳血，痔血，崩漏，咳嗽，哮喘，黄疸，水

肿，淋病，带下，瘰疬，乳痈。煎服：9～15克（鲜草，30～60克）。②治烫伤，研末油调敷；创伤出血，研末敷。本品含海藻糖。

盲肠草 ❶见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。为金盏银盘之别名。❷见《福建中医杂志》(3)：9，1959。为鬼针草之别名。各详该条。

底野迦 出《新修本草》。为鸦片之别名，详该条。

疟疾草 见《中国药用植物志》。为水蜈蚣之别名，详该条。

疙瘩七 见《云南植物志》。为羽叶三七之别名，详该条。

疙瘩药 见《贵州草药》。为东风菜之别名，详该条。

怕羞草 见《生草药性备要》。即含羞草，详该条。

怕痒花 出《群芳谱》。为紫薇花之别名，详该条。

闹羊花 出《本草纲目》。又名黄杜鹃、老虎花、黄喇叭花、石棠花、八厘麻、踯躅花。为杜鹃花科植物羊踯躅 Rhododendron molle (Bl.) G. Don 的花。主产江苏、浙江、安徽、湖南等地。辛，温，有大毒。入肝经。祛风，除湿，镇痛。①治风湿痹痛，折伤疼痛。煎服：0.3～0.6克。②捣烂擦皮肤顽癣，癞痢头；煎水含漱治龋齿痛。③用于手术麻醉。本品内服宜慎，中毒时可出现恶心、呕吐、腹泻、心跳缓慢、血压下降、动作失调、呼吸困难等症，严重者因呼吸停止而死亡。孕妇忌服。本品含毒性成分八厘麻毒素。混悬液、浸剂、酊剂均有镇痛作用，其镇痛指数与阿片相似。但剂量加大，作用不见增加而毒性显著增加。八厘麻毒素有降压、减慢心率作用，对昆虫与人均有毒性。对人可致心律不整、呼吸困难及惊厥等。

闹羊花子 见清·汪连仕《采药书》。为六轴子之别名，详该条。

闹羊花根 见《本草纲目拾遗》。为羊踯躅根之别名，详该条。

闹狗药 见《昆明民间常用草药》。为青羊参之别名，详该条。

闹鱼花 见《本草纲目》。为醉鱼草之别名，详该条。

炉甘石 出《外丹本草》。又名甘石、羊甘石。为菱锌矿的矿石。主产广西、四川、云南、湖南等地。甘，平。明目去翳，收湿敛疮。①治目赤翳障，烂弦风眼。水飞点眼用。②治湿疹，疮疡脓水淋沥或久不收口，研末撒患处。本品主含碳酸锌，尚含有少量钙、镁、铁、锰。外用能部分吸收创面分泌液，有中度的防腐、收敛、保护皮肤的作用。

炉底 见《本草纲目》。为密陀僧之别名，详该条。

法罗海 出《滇南本草》。又名发落海、法落梅、土川芎、法落海、红法落海、臭法落海、红独活。为伞形科植物阿坝当归 Angelica apaensis Shan et Yuan 的根。产云南。辛、苦，温。入肺、脾经。疏风，止咳，理气，定痛。治感冒风寒，头痛，咳喘，胃痛，胁肋胀痛。内服：煎汤，3～9克；研末服，1.5～3克。根茎含氧化前胡素（Oxypeucedanin）及其水合物、白当归素（Byakangelicin）、白当归脑（Byakangelicol）、异欧芹属素乙、β-和γ-谷甾醇等。本品有平喘、镇咳及抑菌作用，氧化前胡素有明显的镇咳作用。

法落海 见《中草药通讯》(12)：6，1976。即法罗海之别名，详该条。

法落梅 见《滇南本草》。为法罗海之别名，详该条。

河白草 见《本草纲目拾遗》。为杠板归之别名，详该条。

油子叶 见《生草药手册》。为乌桕叶之别名，详该条。

油甘子 见《广州植物志》。为庵摩勒之

别名，详该条。

油甘子虫瘿 见《广东中草药》。即油柑虫节，详该条。

油松节 见《药材资料汇编》。为松节之处方名，详该条。

油柑木皮 见《陆川本草》。为大戟科植物油柑Phyllanthus emblica L.的树皮。甘、酸，寒。杀菌去腐，止血。治口疮，疔疮，痔疮，阴囊湿疹，煎水洗；外伤出血，研末撒；蜈蚣螫伤，捣烂取汁涂。本品含蛇麻脂醇、无色飞燕草素、鞣质。浓煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、绿脓杆菌、弗氏痢疾杆菌、变形杆菌、大肠杆菌均有抗菌作用；用作皮肤消毒剂，无不良反应。

油柑叶 见萧步丹《岭南采药录》。又名丝叶、余甘子叶。为大戟科植物油柑Phyllanthus emblica L.的叶。分布四川、贵州、云南、广西、广东、福建。涩，平。清热利湿，解毒消肿。①治水肿，毒蛇咬伤。煎服：9～18克。②治口疮，疔疮，湿疹，皮炎。煎水洗或捣汁涂。本品含鞣质、余甘子酸（Amlaic acid）、蛇麻脂醇、β-谷甾醇、山柰酚、山柰酚-3-葡萄糖甙等。

油柑虫节 见萧步丹《岭南采药录》。又名油甘子虫瘿。为大戟科植物油柑Phyllanthus emblica L. 树枝上的虫瘿。产广西、广东等地。治胃痛，疝气，遗精，小儿咳嗽、疳积。煎服：3～9克。

油柑根 见萧步丹《岭南采药录》。又名余甘子根。为大戟科植物油柑Phyllanthus emblica L. 的根或根皮。苦、涩，凉。清湿热，降压。治胃痛，肠炎，高血压病。煎服：9～15克。根茎含蛇麻脂醇、并没食子酸、β-谷甾醇。

油珠子 见《本草纲目》。为无患子之别名，详该条。

油桐子 出《本草纲目》。又名桐子、桐油树子、油桐果。为大戟科植物油桐Aleurites fordii Hemsl.的种子。甘，有大毒。吐风痰，消肿毒。治风痰喉痹，研末吹喉取吐；瘰疬，磨水涂；疥癣，脓疱疮，烫伤，捣烂绞汁搽敷。一般不内服，误服后轻度中毒症状为胸闷，头晕，呕吐，腹痛，腹泻，严重者血性大便，呼吸困难，抽搐，可因心脏麻痹而死亡。种子含油约35%，种仁含油约50～61%，其中主成分为桐油酸（占80%）和油酸。本品有剧烈泻下作用。

油桐叶 见《福建民间草药》。又名桐子树叶。为大戟科植物油桐 Aleurites fordii Hemsl.的嫩叶。消肿，解毒，杀虫。捣敷痈肿，丹毒，疔疮；捣烂绞汁涂疥癣，烫伤；煎水洗漆疮；煅灰撒布冻疮破溃。油桐的花名桐子花，泡油涂秃疮，热毒疮，天泡疮。

油桐果 见《福建民间草药》。即油桐子，详该条。

油桐根 见《四川中药志》。又名桐油树根、桐子树根。为大戟科植物油桐 Aleurites fordii Hemsl.的根。辛，寒，有毒。消积驱虫，祛风利水，降气化痰。治食积痞满，蛔虫病，风湿痹痛，水肿，哮喘，瘰疬。煎服：6～12克。孕妇慎服。

油盐果 见《南宁市药物志》。为盐麸子之别名，详该条。

油菜子 见《本草纲目》。即芸薹子，详该条。

油患子 见《中国树木分类学》。为无患子之别名，详该条。

油麻血藤 见《中草药资料》。为牛马藤之别名，详该条。

油麻稿 见福建《民间实用草药》。为麻秸之别名，详该条。

油蒿 见《浙江民间常用草药》。为牡蒿之别名，详该条。

沿壁藤 见《湖南药物志》。为络石藤之别名，详该条。

泡木根 见《分类草药性》。为盐麸子根之别名，详该条。

泡叶乌头 见《云南中草药》。为小白撑之别名，详该条。

泡竹叶 见《上海市中药饮片炮制规范》。为番泻叶之别名，详该条。

泡花草 见《贵州民间药物》。为野芝麻之别名，详该条。

泡沙参 见《四川中药志》。为南沙参之别名，详该条。

泡桐花 见《河南中草药手册》。为玄参科植物泡桐 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.或毛泡桐P. tomentosa (Thunb.) Steud.的花。前者分布长江流域及其以南各地；后者分布辽东半岛、河北、河南、山东、江苏、安徽、江西等地。苦，寒。清热解毒。①治上呼吸道感染，支气管肺炎，哮喘，急性扁桃体炎，腮腺炎，细菌性痢疾，急性肠炎，急性膀胱炎。煎服：9～15克。②治结膜炎，鼻炎，外耳道炎，制成水剂，滴患部；治疖肿，手足癣，烧伤，研末调膏涂敷或捣敷。

泡桐果 见河南医学院《医药科研资料》(3)：20，1972。为玄参科植物泡桐Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl. 或毛泡桐P. tomentosa (Thunb.) Steud.的果实。苦，寒。祛痰，止咳，平喘。治慢性气管炎。煎服：15～30克。泡桐果实含桐酸、脂肪油、黄酮类、生物碱。毛泡桐果实含泡桐素 (Paulownin)、右旋芝麻素等。提取物对小鼠口服有止咳、祛痰作用，对大鼠的实验性炎症有某些抑制作用。

泡通珠 见《湖南药物志》。为博落回之别名，详该条。

泻叶 见《药物学大成》。为番泻叶之简称，详该条。

泥菖蒲 见《本草纲目》。为水菖蒲之别名，详该条。

泥鳅 出《滇南本草》。又名鳅鱼、鱼鳅。为鳅科动物泥鳅Misgurnus anguillicaudatus (Cantor) 的全体。我国南北各地均有分布。甘，平。入脾经。补中益气，利水祛湿。①治消渴，传染性肝炎，水肿，泄泻，小便不利，淋病，痔疾，疥、癣。内服：烘干研粉，每次6～9克，每日三次；或用30～60克煨汤服。②醋炙为末敷治久疮。本品可食部分每100克含蛋白质9.6克，脂肪3.7克，碳水化物2.5克，钙28毫克，磷72毫克，铁0.9毫克。又，全体100克中含维生素A70国际单位，维生素A原90国际单位，维生素$B_1$30微克，$B_2$440微克，尼克酸4毫克。

沸水菊 见《广西中药志》。为千日红之别名，详该条。

波丝草 见《贵州草药》。为雪药之别名，详该条。

波棱瓜子 见《云南省药品标准》(1974)。为葫芦科植物波棱瓜Herpetospermum caudigerum Wall.的种子。分布我国西南及西藏。苦，寒。泻肝火，解毒。治黄疸型传染性肝炎，胆囊炎，消化不良。入丸、散服：0.5～1克。

泽兰 出《神农本草经》。又名红梗草、甘露秧、虎兰、小泽兰、奶孩儿。为唇形科植物地瓜儿苗Lycopus lucidus Turcz.或毛叶地瓜儿苗L. lucidus Turcz. var. hirtus Regel的茎叶。全国大部分地区均产。苦、辛，微温。入肝、脾经。活血祛瘀，行水。①治经闭，痛经，腹中包块，产后瘀血腹痛，身面浮肿，跌打损伤。煎服：4.5～9克。②治痈毒肿痛，蛇咬伤。煎服并捣敷。孕妇忌服。地瓜儿苗的全草含泽兰糖(Lycopose)、水苏糖、葡萄糖、半乳糖、蔗糖等。毛叶地瓜儿苗的全草含挥发油和鞣质。

泽败 出《名医别录》。为败酱草之别名，详该条。

泽泻 出《神农本草经》。又名水泻、及泻、芒芋、天秃。为泽泻科植物泽泻 Alisma plantago-aquatica L. var. orientale Samuels的块茎。主产福建、四川、江西。甘，寒。入肾、膀胱经。利水，渗湿，泄热。

治小便不利，水肿胀满，脚气，泄泻，痰饮眩晕，淋病，尿血，带下。煎服：6～12克。本品含泽泻醇（Alisol）及其乙酸酯等三萜类，挥发油、生物碱、树脂、天门冬素等。泽泻有利尿、抗脂肪肝作用。醇提物可以明显抑制高血脂家兔及大白鼠的血清胆固醇含量。并有抗脂肪肝及增加离体兔心冠脉流量的作用。浸膏对犬有降压作用，对兔有轻度降血糖作用。在试管内对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、结核杆菌均有抑制作用。

泽泻叶 出《名医别录》。为泽泻科植物泽泻 Alisma plantago-aquatica L.var. orientale Samuels的叶。我国各地均有分布。咸，平。止咳，平喘，化痰，通乳。治慢性气管炎，乳汁不通。煎服：9～15克。叶含泽泻醇（Alisol）A、B及其乙酸酯和少量维生素C(<10mg%)。

泽泻实 出《名医别录》。为泽泻科植物泽泻Alisma plantago-aquatica L.var. orientale Samuels的果实。甘，平。益肾，除湿。治风痹，消渴。煎服：6～9克。

泽漆 出《神农本草经》。又名五朵云、五凤草、倒毒伞、凉伞草、乳浆草、猫儿眼睛草。为大戟科植物泽漆Euphorbia helioscopia L.的全草。除新疆、西藏外，分布几遍全国。辛、苦，凉，有毒。入脾、肺、小肠、大肠经。利水消肿，化痰散结，杀虫。①治腹水胀满，面目浮肿，痰饮喘咳，细菌性痢疾。煎服：3～9克。②治瘰疬，结核性瘘管，煎服或熬膏外涂；癣疮，捣烂外擦、煎水洗或研末油调搽。③近用治食道癌、胃癌及淋巴肉瘤。孕妇忌服。鲜叶含泽漆皂甙（Phasin），为无溶血性的酸性皂甙。干草含有强溶血性的酸性和中性皂甙。另含槲皮素-3，5-二半乳糖甙、泽漆醇（Heliscopiol）等。茎叶煎剂对人工发热家兔有轻度降温作用；根制剂对离体兔耳血管有扩张作用，对离体兔、豚鼠及小鼠肠管有兴奋作用。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌有抑制作用；高浓度能抑制结核杆菌生长。

泽漆麻 见《陕西中草药》。为罗布麻之别名，详该条。

治疟草 见《中国药用植物志》。为一年蓬之别名，详该条。

单片锯 见《草药手册》。为半边旗之别名，详该条。

单打槌 见《广西民间常用草药》。为一箭球之别名，详该条。

单叶草 见《青岛中草药手册》。为石韦之别名，详该条。

宝锋草 见《植物学大辞典》。为竹林胥之别名，详该条。

宝盖草 出《植物名实图考》。又名接骨草、莲台夏枯、珍珠莲、风盏、蜡烛扦草。为唇形科植物宝盖草 Lamium amplexicaule L.的全草。分布华东、华中、西南、西北地区。辛、苦，平。清热利湿，祛风通络，消肿解毒。①治黄疸型肝炎，高血压，筋骨疼痛，四肢麻木，鼻渊，瘰疬。煎服：9～15克。②治跌打损伤肿痛，配芒麻根、大蓟捣烂，和鸡蛋清、蜂蜜调敷；皮肤肿毒，黄水疮，煎服并用渣外敷。叶含野芝麻甙（Lamioside）、去乙酰野芝麻甙（Lamiol）、野芝麻新甙（Lamiide）、去羟野芝麻新甙（Ipolamiide）。

宝塔菜 见《中国植物图鉴》。为甘露子之别名，详该条。

宝鼎香 见《本草纲目》。为姜黄之别名，详该条。

定风草 ❶出《药性论》。为天麻之别名。❷见《陕西中药志》。为七叶子之别名，各详该条。

定心草 见《广西中草药》。为通城虎之别名，详该条。

宣母果 见《岭南杂记》。为柠檬之别名，详该条。

宣男花 出《滇南本草》。为金针菜之别

名，详该条。

官桂 出《本草图经》。为肉桂之药材名，详该条。

空心苋 见《福建中草药》。又名空心蕹藤菜、水蕹菜、过塘蛇、假蕹菜。为苋科植物空心莲子草 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.的全草。分布江苏、浙江、江西、福建、广西等地。苦、甘，寒。清热凉血，利尿，解毒。①治感冒，麻疹，乙型脑炎及流行性出血热初期，肺结核咳血，淋浊。内服：煎汤，鲜草60～120克；或制成流浸膏。②治带状疱疹，湿疹。鲜品加洗米水捣汁外涂；疔疖，鲜品捣烂用蜂蜜调敷；蛇咬伤，鲜品捣汁内服并用渣外敷伤口周围；出血性结膜炎，制成眼药水点眼。本品含6-甲氧基木犀草素-7α-L-鼠李糖甙。初步预试还含三萜皂甙、有机酸、酚性成分、糖、脂肪、蛋白质、无机盐等。体外试验对脑膜炎球菌、白喉杆菌及金黄色葡萄球菌有抑制作用，并有抗亚洲甲型流感病毒70-5株、乙脑病毒、狂犬病毒的作用。

空心蕹藤菜 见《福建中草药》。为空心苋之别名，详该条。

空肠 出《名医别录》。为黄芩之别名，详该条。

空沙参 ❶见《药材资料汇编》。为南沙参之处方名。❷见《本草从新》。为荠苨之别名。各详该条。

空莱菔 见《苏州本产药材》。为地骷髅之别名，详该条。

空麻子 见《江苏省植物药材志》。为苘实之别名，详该条。

卷子叶 见《分类草药性》。为乌桕叶之别名，详该条。

卷子根 见《分类草药性》。为乌桕木根皮之别名，详该条。

卷耳 见《草药手册》。为婆婆指甲菜之别名，详该条。

卷柏 出《神农本草经》。又名长生草、九死还魂草、万年松、回阳草、佛手草、老虎爪。为卷柏科植物卷柏 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring的全草。主产山东、辽宁。辛，平。入肝经。①生用活血祛瘀。治经闭，癥瘕，跌打损伤。②炒炭用止血。治吐血，衄血，便血，尿血，子宫出血。煎服：6～12克。孕妇忌服。叶含芹菜素、穗花杉双黄酮、扁柏双黄酮、苏铁双黄酮和异柳杉素。煎剂在试管中对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

卷根白皮 见清·刘士季《草木便方》。为乌桕木根皮之别名，详该条。

郎耶草 出《本草拾遗》。为狼把草之别名，详该条。

犀斗藤 见《广西本草选编》。为粪箕笃之别名，详该条。

〔ㄱ〕

屈头鸡 ❶见清·赵其光《本草求原》。为山橙之别名。❷见《广西中药志》。为马槟榔之别名。❸见《南宁市药物志》。为水田七之别名。各详该条。

建兰叶 出《本草纲目拾遗》。为兰科植物建兰Cymbidium ensifolium(L.)Sw.的叶。全国各地均有栽培。辛，平。清热，凉血，利湿，解毒。①治肺热咳嗽，肺痈，咯血，吐血，白浊，白带。煎服：15～30克。②治疮毒疔肿。捣汁涂。

建兰花 出《本草纲目拾遗》。又名秋兰、八月兰。为兰科植物建兰Cymbidium ensifolium (L.) Sw.的花。辛，平。止咳，理气，明目。治久咳，胸闷，腹泻，青盲。内服：水炖，14朵；泡水饮，适量。

建兰根 出《本草纲目拾遗》。又名土续断、兰花根。为兰科植物建兰Cymbidium ensifolium (L.) Sw.的根。辛，平。理气，和血，利湿，消肿。①治咳嗽咯血，肠风便血，血崩，淋病，白浊，白带，月经不调，跌打损伤。煎服：9～15克（鲜品15～45

克）；或捣汁服。②治痈肿。捣汁涂。

降香 出《本草纲目》。又名降真香、紫藤香。为豆科植物降香檀 Dalbergia odorifera T.Chen的根部心材。产广东海南岛。进口降香为印度黄檀D.sissoo Roxb.的心材。辛，温。入心、肝、脾经。降气散瘀，止血定痛。①治呕吐，心胃气痛，胸胁气滞血瘀疼痛，冠心病心绞痛。②治吐血，咯血，跌打损伤。煎服：3～9克。③研末敷创伤出血。印度黄檀的心材含黄檀素（Dalbergin）、异黄檀素、甲基黄檀素、去甲基黄檀素、黄檀色烯（Dalbergichromene）、黄檀酚（Dalbergiphenol）等。黄檀素对兔有微弱的抗血凝作用，在离体兔心能显著增加冠脉流量，减慢心律，轻度增加心跳振幅、不引起心律不整。

降真香 见《经史证类备急本草》。即降香，详该条。

虱子草 见《贵州民间药物》。为千层塔之别名，详该条。

参三七 见《本草便读》。即三七，详该条

参叶 见《本草从新》。为人参叶之简称，详该条。

参叶子 见《陕西中草药》。为七叶子之别名，详该条。

参须 见《本经逢原》。为人参须之简称，详该条。

细水麻叶 见《湖南药物志》。为赤车使者之别名，详该条。

细叶飞扬草 见《广东中草药》。即小飞扬草，详该条。

细叶凤凰尾 见《浙江民间常用草药》。为大叶金花草之别名，详该条。

细叶龙鳞草 见《广东中草药》。为鸡骨草之别名，详该条。

细叶亚婆草 见《广东中草药》。为鲫鱼胆草之别名，详该条。

细叶沙参 见《质问本草》。为蓝花参之别名，详该条。

细叶金鸡尾 见《湖南药物志》。为兖州卷柏之别名，详该条。

细叶莠竹 见《广州植物志》。为荩草之别名，详该条。

细米草 见《中国药用植物志》。为半边莲之别名，详该条。

细连翘 见《湖南药物志》。为芒种花之别名，详该条。

细辛 出《神农本草经》。又名小辛、少辛、独叶草、金盆草、北细辛。为马兜铃科植物辽细辛 Asarum heterotropoides F. Schm. var. mandshuricum（Maxim.）Kitag.或华细辛A. sieboldii Miq.的全草。主产东北及陕西等地。辛，温。入肺、肾经。祛风散寒，止痛，温肺化饮宣窍。治感冒风寒，头痛，鼻塞，风寒湿痹，寒饮喘咳，鼻渊。煎服：1.5～3克。煎水含漱治齿痛；研末醋调敷脐部，治口疮糜烂。反藜芦。全草含挥发油，主要成分有：甲基丁香酚、黄樟醚等。还含左旋细辛素。华细辛还另含左旋芝麻素。挥发油对兔有解热、镇痛作用，并可使人舌的粘膜麻醉，对豚鼠有局麻作用。醇浸液在体外对金黄色葡萄球菌，枯草、痢疾及伤寒杆菌有抑制作用。

细辛幌子 见《东北药用植物志》。为鲜黄连之别名，详该条。

细须草 见《安徽中草药》。为百蕊草之别名，详该条。

细独脚马嘣 见《南宁市药物志》。为独脚柑之别名，详该条。

细独脚金 见《广西本草选编》。为独脚柑之别名，详该条。

细黑豆 见《本经逢原》。为野料豆之别名，详该条。

绊根草 见《植物名实图考》。为铁线草之别名，详该条。

贯叶连翘 见《南京民间药草》。又名小汗淋草、千层楼、小对叶草、女儿茶、赶山

鞭。为藤黄科植物贯叶连翘 Hypericum perforatum L.的全草。分布河北、陕西、山东、江苏、江西、四川、贵州等地。微苦、涩，平。收敛止血，清热解毒。①治咳血，吐血，肠风下血，头晕，目赤，尿路感染，月经不调。煎服：6～9克。②治痈疖肿毒，痔腮，烧伤，外伤出血。鲜品捣敷或干品研末调敷。本品含挥发油、贯叶连翘素（Hyperforin）、金丝桃素（Hypericin）、金丝桃甙、芸香甙、槲皮甙、异槲皮甙、槲皮素、大黄素蒽酚、鞣质、绿原酸、咖啡酸、β-谷甾醇等。贯叶连翘素在体外对金黄色葡萄球菌、粪链球菌、大肠杆菌和变形杆菌等均有很强的抑制作用。浸剂有驱肠虫的作用，对蛲虫、膜壳绦虫均有效，对狗蛔虫病也有效。金丝桃素有降低血糖，血钙和升高血钾的作用，对精神抑郁者可增加食欲、体重及活动性。金丝桃甙可增强兔毛细管抵抗力，对离体心脏有兴奋作用。

贯仲 见《本草纲目》。即贯众，详该条。

贯众 出《神农本草经》。又名贯仲、管仲。为鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨 Dryopteris crassirhizoma Nakai或蹄盖蕨科植物峨眉蕨 Lunathyrium acrostichoides (Sweet)Ching、乌毛蕨科植物乌毛蕨Blechnum orientale L.、狗脊蕨 Woodwardia japonica (L.f.)Sweet、紫萁科植物紫萁Osmunda japonica Thunb.、球子蕨科植物荚果蕨 Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro等的根茎及叶柄基部。粗茎鳞毛蕨主产东北，峨眉蕨产北京、河南、甘肃，乌毛蕨产湖南、广东、广西，狗脊蕨产浙江、湖南、四川，紫萁产华中、华东，荚果蕨产吉林、河北、河南、陕西。苦，微寒，有小毒。入肝、脾经。杀虫，清热解毒，止血。①治蛔虫、绦虫及钩虫病。②预防麻疹，流行性乙型脑炎；治流行性感冒。③治吐血，衄血，崩漏，便血，血痢，尿血。煎服：4.5～9克。④治热毒疮疡，痔腮。煎服或研末调敷；蛲虫病煎服并煎水熏洗肛门。孕妇慎服。粗茎鳞毛蕨根茎含槲马酸类、黄槲马酸类、白槲马素以及羊齿烯（Fernene）、雁齿烯（Filicene）等三萜类成分，还含鞣质、挥发油等。乌毛蕨根茎含绿原酸。狗脊蕨根茎含鞣质。紫萁根茎含玻那甾酮A（Ponasterone A）、蜕皮松（Ecdysone）、蜕皮甾酮（Ecdysterone）。荚果蕨根茎含玻那甾酮A、蜕皮甾酮、蕨甾酮（Pterosterone）等。粗茎鳞毛蕨可使绦虫麻痹，因而不能牢附肠壁，服后给予泻盐，可将绦虫驱出；槲马酸的作用比黄槲马酸强；大量槲马酸镁盐可使狗视神经损害而失明，大脑白质亦受损；粗茎鳞毛蕨的乙醚提取物可使子宫兴奋，作用与麦角相似；煎剂在体外对各型流感病毒有不同的抑制作用。据初步实验，上述各种贯众的煎剂在体外对猪蛔虫均有不同程度的抑制作用。

贯榕根 见《浙江民间草药》。为胡颓子根之别名，详该条。

九 画

〔一〕

玳玳花 见《药材资料汇编》。即代代花，详该条。

玳瑁 出《开宝重定本草》。又名瑇瑁。为海龟科动物玳瑁 Eretmochelys imbricata L.背部的甲片。主产台湾、福建及广东海南岛沿海地区。甘，寒。入心、肝经。清热解毒，平肝镇惊。治热病烦躁，神昏谵语痉厥，小儿惊痫。多入丸、散，亦可镑片煎

服或磨汁服，3～6克。本品含角蛋白及胶质等。

珍珠 出《开宝重定本草》。又名真珠、濂珠。为真珠贝科动物合浦珠母贝Pteria martensii（Dunker）、真珠贝P.margaritifera（L.）或蚌科动物褶纹冠蚌Cristaria plicata（Leach）等贝壳中受刺激而产生的颗粒状珍珠。主产广东、广西、台湾；淡水养殖的主产黑龙江、安徽、江苏及上海等地。甘、咸，寒。入心、肝经。镇惊安神，清肝除翳，解毒，生肌。①治心悸失眠，癫痫，惊风。研末吞服：0.3～0.9克。②治目赤翳障，研极细末内服并点眼；皮肤溃疡久不愈合，研粉撒；咽喉、口舌肿痛糜烂，研末吹。本品含碳酸钙（90%以上），并含多种氨基酸。提取物对离体兔肠有抑制作用。

珍珠母 见《饮片新参》。又名真珠母。为蚌科动物褶纹冠蚌Cristaria plicata Leach或三角帆蚌Hyriopsis cumingii Lea、射线裂脊蚌Schistodesmus lampreyanus Baird et Adams等贝壳的珍珠层。主产江苏、浙江、湖北、安徽等地。甘、咸，寒。入心、肝经。平肝潜阳，定惊安神。治肝阳上亢，眩晕耳鸣，惊痫，心悸失眠，衄血，崩漏。煎服：9～30克，打碎先煎。未经煅、煮或水飞的珍珠层粉含有十二种氨基酸，含量约占珍珠粉的1/3。还含大量的碳酸钙和氧化钙以及微量的锰、镍、硅、镁、镓、铝、钠、锶、铜、铁、磷等元素。珍珠层的浓盐酸提取液对动物有抗组胺性过敏的作用。

珍珠伞 ❶见《草药手册》。为八爪金龙之别名。❷见《浙江民间常用草药》。为朱砂根之别名。各详该条。

珍珠杆 见《宁夏中草药手册》。为珍珠梅之别名，详该条。

珍珠草 ❶出《生草药性备要》。又名夜合草、夜合珍珠、假油柑、叶后珠、真珠草。为大戟科植物叶下珠Phyllanthus urinaria L.的全草。分布江苏、浙江、福建、湖南、江西、广东等地。甘、微苦，凉。清热，利水，明目，消积。①治痢疾，肠炎，传染性肝炎，尿路感染、结石，肾炎水肿，夜盲症，眼结膜炎，小儿疳积。煎服：15～30克。②治蛇、犬咬伤，鲜草捣敷。本品含槲皮素、黄芪甙、槲皮甙、异槲皮甙、芸香甙、没食子酸和并没食子酸。煎剂体外试验对葡萄球菌、大肠和绿脓杆菌有抑制作用。❷见《江苏省植物药材志》。为谷精草之别名，详该条。❸见《滇南本草》。为漆姑草之别名，详该条。

珍珠莲 见《植物名实图考》。为宝盖草之别名，详该条。

珍珠梅 见《东北常用中草药手册》。又名山高粱、八木条、珍珠杆。为蔷薇科植物高丛珍珠梅Sorbaria arborea Schneid.或东北珍珠梅S.sorbifolia（L.）A.Br.的茎皮或果穗。前者分布西南、甘肃、宁夏等地；后者分布东北及河北、内蒙古等地。苦，寒，有毒。活血祛瘀，消肿止痛。治骨折，跌打损伤。内服：研末，0.6～1.2克，如恶心呕吐可减量。外用：研末调敷。珍珠梅枝条：治风湿性关节炎。煎服：9～15克。

珍珠菜 见《南京民间药草》。又名狗尾巴草、狼尾草、扯根菜、红丝毛。为报春花科植物虎尾珍珠菜Lysimachia clethroides Duby的根或全草。分布华北至长江以南各地。辛、涩，平。活血调经，利水消肿。①治月经不调，白带，水肿，小儿疳积，痢疾，风湿痹痛，跌打损伤，乳痈。煎服：15～30克。②治痈疖，蛇咬伤。鲜品捣敷。孕妇忌服。根含多种皂甙。

珍珠菊 见《福建中草药》。为鸭脚艾之别名，详该条。

珊瑚 出《新修本草》。为矶花科动物桃色珊瑚Corallium japonicum Kischinouye等珊瑚虫分泌的石灰质骨骼。产台湾及南部沿海。甘，平。安神镇惊，去翳明目。①治惊风，癫痫，吐血，衄血。内服：研末，

0.3～0.6克。②研细粉点眼治目生翳障。本品含碳酸钙等。

玻璃草 见《广西本草选编》。为拦路虎之别名，详该条。

毒芋头 见《广西中兽医药用植物》。为海芋之别名，详该条。

毒芹 见《药材学》。又名走马芹、野毒芹、芹叶钩吻。为伞形科植物毒芹 Cicuta virosa L.的根茎。分布我国东北、华北、西北地区。辛、微甘，温，有大毒。拔毒，祛瘀。治化脓性骨髓炎。研细末，以鸡蛋清调敷患处，面积不宜过大，以免刺激正常皮肤，或以鲜品捣烂，鸡蛋清调敷亦可，制剂时忌用金属器械。本品只供外用，不可内服。根茎含有毒成分毒芹素（Cicutoxin）和无毒成分毒芹醇及其他多种聚炔化合物。毒芹素有剧毒，对中枢神经系统有兴奋作用，猫静脉注射可引起惊厥，最后因呼吸麻痹而死，如注射巴比妥类药物则有对抗作用，可使动物免于死亡。

毒药草 见《四川中药志》。为藜芦之别名，详该条。

春尖叶 见《重庆草药》。为椿叶之别名，详该条。

春尖花 见《重庆草药》。为香椿子之别名，详该条。

春砂仁 出《古今药物别名考》。为砂仁之处方名，详该条。

春砂壳 见《上海市饮片炮制规范》。为砂仁壳之处方名，详该条。

春砂花 见《饮片新参》。又名砂仁花。为姜科植物阳春砂 Amomum villosum Lour.的花朵及花序梗。分布广东、广西、云南、福建。辛，平。功用与砂仁壳略同，又能利肺化痰，治咳嗽痰喘。煎服：1.5～3克。

春莲秋柳 见萧步丹《岭南采药录》。为穿心莲之别名，详该条。

哲子毒乌 见《西藏常用中草药》。为翼首草之藏族语名，详该条。

枯芩 见《药品化义》。为黄芩之老根，详该条。

枯萝卜 见《山东中药》。为地骷髅之别名，详该条。

柑 出《本草拾遗》。又名柑子。为芸香科植物茶枝柑Citrus chachiensis Hort.或瓯柑C.suavissima Tanaka等的果实。前者分布珠江三角洲；后者分布浙江。甘、酸，凉。生食有生津止渴，醒酒，利尿之效。

柑子 出《开宝重定本草》。即柑，详该条。

柑叶 出《本草纲目》。为芸香科植物茶枝柑Citrus chachiensis Hort.或瓯柑C. suavissima Tanaka等的叶。苦，平。行气滞，散肿毒。①治胸膈逆气，胁痛，乳痈，乳癌。煎服：3～9克。②治肺痈。鲜品捣汁服。③治聤耳流水或脓血。嫩叶捣汁滴耳。

柑皮 出《本草拾遗》。又名新会皮、陈柑皮、广陈皮。为芸香科植物茶枝柑Citrus chachiensis Hort.或瓯柑C.suavissima Tanaka等的果皮。苦、辛，温。理气，燥湿，导滞，化痰。治脘腹胀满，呕吐，泄泻，咳嗽痰多。煎服：3～9克。

柑核 出《本草图经》。为芸香科植物茶枝柑Citrus chachiensis Hort.或瓯柑C. suavissima Tanaka等的种子。苦，温。治腰痛，疝气偏坠。煎服：6～9克。

柘根 出《备急千金要方》。即穿破石，详该条。

栌木 见《经济植物手册》。即黄栌，详该条。

相思子 出《新修本草》。又名土甘草豆、相思豆、鸳鸯豆、红豆。为豆科植物相思子Abrus precatorius L.的种子。主产广东、广西、福建。辛、苦，平，有大毒。杀虫。治疥癣，痈疮，湿疹。研粉油调涂。一般不宜内服。中毒可引起呕吐、腹痛、腹泻、呼吸困难、皮肤青紫、尿闭、幻视、溶血、虚

脱等症状，严重者可致死亡。本品含相思子毒蛋白，并含相思子碱，红豆碱、胆碱、下箴刺桐碱等生物碱，又含β-谷甾醇等多种甾醇类、相思子甙、相思子酸、5β-胆烷酸、没食子酸和多种氨基酸等。相思子毒蛋白对小鼠实验性癌有很强的抑制作用，毒性极大，0.5毫克即可使人致死，但加热至65°以上则毒性消失，小鼠腹腔注射半数致死量为0.20毫克/公斤。固醇类部份对大鼠、小鼠有避孕作用。种子的醇提取物在体外对金黄色葡萄球菌，大肠、痢疾及伤寒杆菌以及某些皮肤真菌有抑制作用，并可导致心、肺、肾及小肠出血。

相思子根 见《南宁市药物志》。为豆科植物相思子Abrus precatorius L.的根。分布台湾、福建、广东、广西、云南等地。甘，平，有小毒。清热利尿。治黄疸性肝炎，咽喉肿痛，支气管炎。煎服：6～9克。相思子的茎叶，名相思藤。又名土甘草、山甘草，功用与相思子根同。根含相思豆醇(Precol)、相思子醇（Abrol）、相思子新碱(Abrasine)、相思豆碱（Precasine）。又含多糖。叶含皂甙（为甘草酸等）。醇提取物对小鼠有抗雌性激素的作用。

相思虫 见《苏州本产药材》。为青娘子之别名，详该条。

相思豆 见《中国主要植物图说·豆科》。即相思子，详该条。

柚叶 出《本草纲目》。为芸香科植物柚Citrus grandis（L.）Osbeck的叶。长江以南各地均有栽培。辛，温。①治寒湿痹痛，食滞腹痛，乳痈。煎服：15～30克。②治头风痛。同葱白捣贴太阳穴。本品含挥发油。

柚皮橘红 见《中药志》。为化橘红之别名，详该条。

柚花 出《本草纲目》。又名橘花。为芸香科植物柚Citrus grandis（L.）Osbeck的花。顺气，化痰，止痛。治胸膈胃脘疼痛。煎服：1.5～3克。本品含挥发油。

柚根 见《民间常用草药汇编》。又名杷柑根。为芸香科植物柚Citrus grandis(L.)Osbeck的根。辛，温。理气止痛，散风寒。治胃痛，疝气疼痛，风寒咳嗽。煎服：9～15克。

枳壳 出《雷公炮炙论》。为芸香科植物枸橘Poncirus trifoliata（L.）Raf.、酸橙Citrus aurantium L.、香圆C. Wilsonii Tanaka或代代花C. aurantium L.var. amara Engl.等将成熟的果实。产福建、江西、四川、浙江、江苏、广东、贵州等地。苦，微寒。入肺、肝、脾经。行气宽中，化痰，消食。治气滞，食积，痰饮，胸胁胀满，脘腹胀痛，噫气，下痢后重，胃下垂，子宫脱垂，脱肛。煎服：3～9克。本品含挥发油和黄酮甙等。酸橙和代代花的未熟果实的果皮中含有新橙皮甙。香圆和枸橘中分离得同一种生物碱样物质。枸橘未熟果实中还含枸橘香豆素（Poncimarin）、异枸橘香豆素、佛手柑内酯、欧芹属素乙等。枳壳和枳实的水煎剂能兴奋家兔子宫，能使动物胃肠蠕动加强而有节律。能升高血压，减小肾容积。低浓度使离体蟾蜍心肌收缩加强，高浓度时抑制，对血管呈轻度的收缩。所含的N-甲基酪胺和辛弗林具有和枳实同样的抗休克作用。

枳实 出《神农本草经》。为芸香科植物枸橘Poncirus trifoliata（L.）Raf.、酸橙Citrus aurantium L.或香圆C. Wilsonii Tanaka等的幼果。产福建、陕西、广西、广东、贵州、四川、江西。苦，微寒。入脾、胃经。破气，行痰，消积，散痞。治气滞，食积痰癖，便秘，胸腹痞满胀痛，下痢后重，胃下垂，子宫脱垂，脱肛。煎服：3～9克。酸橙干燥幼果含辛弗林（Synephrine）、N-甲基酪胺；幼果皮含新橙皮甙、柚皮甙、野漆树甙及忍冬甙等黄酮甙，还含维生素C 23.2～60.3毫克%。药理作用见枳壳条。

枳根皮 出《本草拾遗》。为芸香科植物枸橘Poncirus trifoliata (L.) Raf.的根皮。分布华东、中南及四川等地。治痔疾，便血。煎服：4.5～9克。治齿痛，浸酒含漱。根含柠檬苦素、印度楝榨素(Marmesin)、邪蒿素(Seselin)、β-谷甾醇、枸橘素(Poncitrin)。

枳椇子 出《新修本草》。又名臭杞子、金钩子、鸡距子、拐枣、鸡爪果。为鼠李科植物枳椇Hovenia dulcis Thunb。带有肉质果柄的果实或种子。主产陕西、广东、湖北、浙江、江苏、安徽、福建。甘、酸，平。入心、脾经。解酒毒，利二便，平肝熄风，舒筋活络。①治醉酒、烦渴，呕吐，二便不利。②治头风，小儿惊风，风湿麻木。煎服：4.5～9克。果实含多量葡萄糖、苹果酸钙、硝酸钾等。对家兔有利尿作用。

枳椇木皮 出《新修本草》。为鼠李科植物枳椇Hovenia dulcis Thunb.的树皮。甘，温。活血舒筋。治风湿麻木。内服：煎汤，9～15克；或浸酒服。

枳椇根 出明·姚可成《食物本草》。为鼠李科植物枳椇Hovenia dulcis Thunb.的根。分布华北、华东、中南、西北、西南各地。涩，温。治虚劳吐血，风湿筋骨痛。内服：煎汤，鲜品120～240克；或炖肉服。本品含药用鼠李碱(Frangulanine)、枳椇碱(Hovenine)A、B。还含枳椇甙(Hovenoside)。

柞子 见《本草纲目》。为橡实之别名，详该条。

柞木仁 见《四川中药志》。为山枝仁之别名，详该条。

柞木皮 出《本草拾遗》。为大风子科植物柞木Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray的树皮或根皮。分布陕西秦岭以南和长江以南各地。苦，平。利湿，解毒。治黄疸，水肿，痢疾，肺结核咯血，瘰疬。煎服：12～18克。

柞树叶 见《黑龙江常用中草药手册》。为壳斗科植物蒙栎Quercus mongolica Fisch.的叶。分布山东、河北、山西、内蒙古和东北。①治细菌性痢疾，痈疽肿毒。内服：煎汤，3～9克。②治小儿消化不良，研末炒焦，每次服0.5～1克，日服3～4次。

柞树皮 见《吉林中草药》。为壳斗科植物蒙栎Quercus mongolica Fisch.的树皮。微苦、涩，平。清热，利湿，解毒。治肠炎，痢疾，小儿消化不良，黄疸，急、慢性支气管炎，痔疮。煎服：6～9克。本品含鞣质，有收敛止泻作用。

柏子 出《本草经集注》。即柏子仁，详该条。

柏子仁 出《新修本草》。又名柏实、柏子、侧柏子。为柏科植物侧柏Biota orientalis (L.) Endl.的种仁。主产山东、河南、河北、陕西等地。甘，平。入心、肝、脾经。养心，润燥，益智，安神。治心悸怔忡，虚烦失眠，大便虚秘。煎服：6～12克。本品含皂甙、挥发油及大量脂肪油。

柏叶 出《金匮要略》。即侧柏叶，详该条。

柏叶草 见《湖南药物志》。为兖州卷柏之别名，详该条。

柏白皮 出《名医别录》。即柏根白皮，详该条。

柏枝节 出《新修本草》。为柏科植物侧柏Biota orientalis (L.) Endl.的茎节或树枝。①治风痹，历节风。内服：煮汁酿酒饮；或煎汤，9～15克。②治霍乱转筋。劈碎，煎水淋洗患处。木材含挥发油，内有雪松醇、韦得醇(Widdrol)、罗汉柏烯(Thujopsene)、罗汉柏二烯(Thujopsadiene)等。

柏实 出《神农本草经》。即柏子仁，详该条。

柏根白皮 出《本草纲目》。又名柏白皮。为柏科植物侧柏Biota orientalis (L.)E-

ndl.的根白皮。苦，平。治火烫伤。入猪油内煎枯去渣，取油外涂。

枸杞子 出《名医别录》。又名杞子、枸杞果。为茄科植物宁夏枸杞Lycium barbarum L.或枸杞L. chinense Mill.的果实。主产宁夏、甘肃、河北等地。甘，平。入肝、肾经。补肾益精，养肝明目。治肝肾阴虚，腰膝酸软，头目眩晕，视力减退，消渴，遗精。煎服：6～12克。宁夏枸杞果实含甜菜碱、酸浆果红素。水浸液对小鼠、大鼠四氯化碳性肝损害有一定保护作用。水提取物可引起兔心抑制、血压下降、肠平滑肌收缩等拟胆碱样作用。还有降血糖作用。

枸杞叶 出《名医别录》。又名地仙苗、枸杞苗、枸杞头。为茄科植物枸杞Lycium chinense Mill.或宁夏枸杞 L.barbarum L.的叶。前者分布全国各地；后者分布西北、华北地区。苦、甘，凉。补虚益精，清热，明目。①治虚劳烦热，目赤，障翳夜盲，崩漏，带下。内服：煎汤，鲜品60～240克；或与动物肝煮汤食。②治热毒疮肿。煎水洗。叶含甜菜碱、芸香甙、β-谷甾醇-β-D-葡萄糖甙、维生素C、硫胺素抑制物；干叶含肌甙、6-氧嘌呤（Hypoxanthin）、胞啶酸、尿甙酸和多量的氨基酸、枸杞甾酮（Lycium substance）A和B等。

枸杞头 见《江苏省植物药材志》。即枸杞叶，详该条。

枸杞苗 见《本草纲目》。即枸杞叶，详该条。

枸杞果 见《河北药材》。即枸杞子，详该条。

枸骨叶 出《本草拾遗》。又名功劳叶、八角茶、老虎刺叶、猫儿刺、八角刺。为冬青科植物枸骨Ilex cornuta Lindl.的叶。产河南、湖北、安徽、江苏等地。微苦，凉。入肝、肾经。养阴清热，补益肝肾。①治肺痨咳血，骨蒸潮热，骨结核，头晕耳鸣，腰膝酸软，煎服：9～30克。②治白癜风。枝叶烧灰淋取汁或煎膏涂。本品含咖啡碱，预试还含皂甙、鞣质、苦味质。枸骨注射液对离体豚鼠心脏有增加冠脉流量，加强心收缩力的作用。

枸骨根 见《福建民间草药》。又名功劳根。为冬青科植物枸骨Ilex cornuta Lindl.的根。分布浙江、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、河南、广西等地。苦，微寒。祛风清热，益肾强筋骨。①治赤眼，牙痛，痒腮，腰膝痿弱，风湿痹痛。煎服：6～15克。②治臁疮溃烂。煎水洗。

枸橘 出《本草纲目》。又名臭橘、臭杞、枸橘李、野橙子。为芸香科植物枸橘Poncirus trifoliata（L.）Raf.的果实。产江苏、浙江、四川、江西、福建、广东、广西等地。苦、辛，温。入肝、胃经。疏肝和胃，利气止痛。治胸腹胀满，胃痛，消化不良，便秘，疝痛，睾丸肿痛，乳房结块，子宫脱垂，胃下垂，脱肛。煎服：9～15克，大剂量可用至30克。果实含大量柠檬酸。另含枳属甙、橙皮甙、新橙皮甙等黄酮类。还含茵芋碱。外层果皮含挥发油，油中含α-和β-蒎烯、柠檬烯等。

枸橘叶 出《本草纲目》。又名臭橘叶。为芸香科植物枸橘Poncirus trifoliata(L.) Raf.的叶。辛，温。利气，止呕，散结。治噎膈，反胃，呕吐，乳房结块，下痢脓血后重。煎服：6～12克。枸橘树上的棘刺名枸橘刺，煎水含漱治风虫牙痛。叶含枳属甙、新枳属甙、柚皮甙和少量野漆树甙。还含茵芋碱及挥发油等。

枸橘李 见《江苏省植物药材志》。即枸橘，详该条。

柳子 出《名医别录》。即柳絮，详该条。

柳叶 出《神农本草经》。为杨柳科植物垂柳Salix babylonica L.的叶。我国大部分地区均有分布。苦，寒。清热解毒，透疹，利尿，降压。①治慢性气管炎，急性肝炎，痧疹透发不畅，尿道炎，膀胱炎，膀胱结石，

高血压病。煎服：9～15克(鲜品30～60克)。②治地方性甲状腺肿，乳腺炎，疔疮疖肿。煎服并熬膏外涂。③治关节肿痛。鲜品捣敷。漆疮，皮肤瘙痒，脚癣，煎水洗；痈疽肿毒。熬膏涂。鲜柳叶含碘10毫克/公斤。又含鞣质。

柳叶夹 见《昆明民间常用草药》。为黑骨头之别名，详该条。

柳叶桃 出《花历百咏》。为夹竹桃之别名，详该条。

柳白皮 出《经史证类备急本草》。为杨柳科植物垂柳Salix babylonica L.的树干或根的韧皮部。苦，寒。祛风利湿，消肿解毒。①治风湿痹痛，黄疸，肾盂肾炎，膀胱炎，带下。煎服：30～60克。②治风肿瘙痒。煎汤洗浴；烫伤。猪油熬膏涂；中耳炎。烧存性研末吹耳。本品含水杨甙，有退热作用。又含鞣质。

柳花 出《神农本草经》。又名杨花、柳椹、柳蕊。为杨柳科植物垂柳Salix babylonica L.的花。苦，寒。祛风利湿，止血散瘀。①治风水，黄疸，咳血，吐血，便血，血淋，经闭。内服：煎汤，15～30克；或捣取汁服。②治走马牙疳。烧存性，入麝香少许，研末搽。

柳条 出《芷园臆草》。即柳枝，详该条。

柳枝 出《本草拾遗》。又名柳条。为杨柳科植物垂柳Salix babylonica L.的枝条。苦，寒。入肝、胃经。祛风止痛，利小便，消肿毒。①治风湿性关节炎，尿闭，淋病，白浊，带下，传染性肝炎。煎服：30～60克。②治痈肿，疔疮。熬膏涂；烫伤。烧存性研末油调敷。木质部含水杨甙。局部作用于胃，可作苦味剂，吸收后部分变为水杨酸，有解热止痛作用，随即很快水解。水杨甙元4～10%浓度可作局部麻醉用。

柳实 出《神农本草经》。即柳絮，详该条。

柳州七 见《全国中草药汇编》。为牛奶浆草之别名，详该条。

柳根 出《经史证类备急本草》。为杨柳科植物垂柳Salix babylonica L.的根。苦，寒。利水通淋，祛风除湿。治淋病，白浊，带下，水肿，风湿痹痛，四肢拘挛，牙龈肿痛。煎服：15～30克。柳须根：又名水柳须、青龙须。烧存性研末，油调敷黄水湿疮。

柳絮 出《神农本草经》。又名柳实、柳子。为杨柳科植物垂柳Salix babylonica L.的具毛种子。凉。清湿热，止血，溃痈。①治湿热黄疸，湿痹四肢挛急，膝痛，吐血。内服：煎汤，9～15克；或焙干研细末服。②治创伤出血。研末敷；痈疽脓成胀痛不溃。研末调敷。

柳蕊 出《岣嵝神书》。为柳花之别名，详该条。

柳蕊 见《本草纲目拾遗》。为柳花之别名，详该条。

栎子 见清·汪双池《医林纂要·药性》。为橡实之别名，详该条。

栎树皮 出《日华子诸家本草》。为橡木皮之别名，详该条。

柿丁 见《中药志》。为柿蒂之别名，详该条。

柿干 见《本草备要》。即柿饼，详该条。

柿子 出明·范洪《滇南本草图说》。又名朱果。为柿科植物柿Diospyros kaki L. f.的果实。全国各地普遍栽培。甘、涩，寒。入心、肺、大肠经。清热，润肺，生津，止渴。治肺痿，咳血，咽喉干燥，热渴，口舌生疮。内服：生啖，1～2枚。成熟果实含柿酚（Diospyrol）、蔗糖、葡萄糖、果糖、瓜氨酸等。新鲜柿子含碘49.7毫克%。可用于甲状腺肿。未熟果实含鞣质。口服柿子可促进血中乙醇之氧化。柿酚有驱肠虫(钩虫、绦虫、线虫）作用。

柿子把 见《中药材手册》。为柿蒂之别名，详该条。

柿木皮 出《本草图经》。为柿科植物柿

Diospyros kaki L.f.的树皮。①治下血不止。内服：焙干研末，每服1.5～3克，米汤调下。②烧存性研末油调敷，治烫伤。

柿叶 出《滇南本草》。为柿科植物柿Diospyros kaki L.f.的叶。苦、酸、涩，凉。凉血止血，止咳平喘。①治胃溃疡出血，肺结核出血，支气管扩张咯血，鼻衄，功能性子宫出血，痔疮便血，血尿，血小板减少症，高血压病。研末服：每次5～10克，每日三次。②治咳嗽气喘。煎服：3～9克。本品含黄酮甙（黄芪甙及杨梅树皮甙）、鞣质、香豆素类化合物、多糖、挥发油、白桦脂酸、齐墩果酸、熊果酸及多量维生素C等。黄酮甙给狗静脉注射，能降低血压并增加冠脉流量，在离体兔心标本上，也能增加冠脉流量。给兔腹腔注射，有降温作用。体外试验，对金黄色葡萄球菌、卡他球菌有抑制作用。

柿饼 出《日用本草》。又名干柿、柿干。为柿科植物柿Diospyros kaki L.f.的果实经加工而成的饼状食品。甘、涩，凉。润肺，止血。治肺热咳嗽，咯血，吐血，血淋，肠风下血，痔疮出血。内服：生食，1～2枚；煎汤，15～30克。

柿饼霜 见《药材学》。即柿霜，详该条。

柿根 出《本草纲目》。为柿科植物柿Diospyros kaki L.f.的根。苦、涩，凉。凉血止血。治吐血，便血，血痢，血崩，痔疮出血。煎服：30～60克。本品含矾松素、柿酚、柿醌（Diospyrin）、7-甲基胡桃叶醌、3-甲氧基-7-甲基胡桃叶醌、鞣质等。

柿钱 出《洁古家珍》。为柿蒂之别名，详该条。

柿涩 见《药材资料汇编》。为柿漆之别名，详该条。

柿萼 见《药材学》。为柿蒂之别名，详该条。

柿蒂 出《本草拾遗》。又名柿钱、柿丁、柿子把、柿萼。为柿科植物柿Diospyros kaki L.f.的宿存花萼。主产河南、山东。苦、涩，平。入胃经。降气止呃。①治呃逆，气膈反胃。煎服：6～12克。②治血淋。烧存性研末服，每次3～6克。本品含齐墩果酸、白桦脂酸、无羁萜、熊果酸、丁香酸、香荚兰酸、没食子酸、山柰酚、槲皮素、三叶豆甙、金丝桃甙、β-谷甾醇及其葡萄糖甙等。

柿漆 出《本草纲目》。又名柿涩。为柿科植物柿Diospyros kaki L.f.的未成熟果实加工制成的胶状液。涩、苦。治高血压病。内服：每次1～2匙，米汤和服，每日二至三次。本品含柿漆酚、胆碱及乙酰胆碱等。胆碱及乙酰胆碱抑制心血管，兴奋平滑肌。在体外柿漆有溶血作用，注射入兔体，可引起红细胞形态变化及淋巴球减少。

柿霜 出《本草纲目》。又名柿饼霜、柿霜饼。为柿科植物柿Diospyros kaki L.f.的果实制成柿饼后所生的白色粉霜。甘，凉。入心、肺经。清热，润燥，化痰，宁嗽。治肺热燥咳无痰，咽干喉痛，口舌生疮，吐血，咯血，肠风痔血，上消。冲服：3～9克；或作丸含化。本品含甘露醇、葡萄糖、果糖、蔗糖。

柿霜饼 见《药材资料汇编》。为柿霜加工后的药材名，详柿霜条。

柠果 见《南宁市药物志》。为柠檬之别名，详该条。

柠檬 见萧步丹《岭南采药录》。又名宜母果、柠果。为芸香科植物黎檬Citrus limonia Osbeck或柠檬C.limon Burm.的果实。我国南部有栽培。酸、甘，平。化痰，生津，祛暑，和胃。治支气管炎，百日咳，维生素C缺乏症，中暑烦渴，食欲不振，对孕妇胃气不和，纳减、噫气等更为适宜。内服：绞汁饮或生食。柠檬果实含橙皮甙、柚皮甙、柠檬酸、苹果酸等。黎檬果实中一般还含维生素B_1、B_2、C、菸酸、糖类、钙、磷、铁等。橙皮甙、柚皮甙有抗炎作用。

柠檬叶 出《生草药性备要》。为芸香科植物黎檬Citrus limonia Osbeck或柠檬C. limon Burm.的叶。辛、甘,温。理气化痰,健胃。治咳嗽,气喘,腹胀,泄泻。煎服:9～15克。本品含槲皮素、伞形花内酯、东莨菪素、马栗树皮素、芥子酸、对羟基苯甲酸、香荚兰醛等。

柠檬皮 见《陆川本草》。为芸香科植物黎檬Citrus limonia Osbeck或柠檬C.limon Burm.的果皮。酸、辛,微温。理气,化痰,健胃,止痛。治郁滞腹痛,不思饮食。煎服:9～15克。柠檬果皮含橙皮甙、圣草次甙、香叶木甙、伞形花内酯、东莨菪素、奎宁酸、咖啡酸、β-谷甾醇等。黎檬果皮含橙皮甙、β-和γ-谷甾醇。

柠檬茅 见《种子植物名称》。为香茅之别名,详该条。

柠檬香碱草 见《草药手册》。为隔山香之别名,详该条。

柽柳 出《本草图经》。又名西河柳、赤柽柳、山川柳、三春柳、观音柳。为柽柳科植物柽柳Tamarix chinensis Lour.的细嫩枝叶。主产河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北、云南、福建、广东、甘肃等地。甘、咸,平。入肺、胃、心经。疏风,解表,透疹,利尿,解毒。①治麻疹热透发不畅,喘嗽烦躁,风疹身痒。煎服并煎水外洗。②治感冒头痛,慢性气管炎,风湿关节疼痛,小便不利。煎服:4.5～9克。本品含树脂、槲皮素。煎剂对小鼠有止咳作用,在体外对肺炎球菌、甲型链球菌、白色葡萄球菌及流感杆菌均有抑制作用。

树顶子 见《全国中草药汇编》。为冬青子之别名,详该条。

树挂 见《黑龙江中药》。为松萝之别名,详该条。

树莓 见《全国中草药汇编》。为托盘之别名,详该条。

树脑 见《药材资料汇编》。为樟脑之别名,详该条。

树梅 见《中国树木分类学》。为杨梅之别名,详该条。

树蜡 见《中国药学大辞典》。即虫白蜡,详该条。

树蕨 见《广西本草选编》。为飞天蠊螃之别名,详该条。

胡地莲 见《江西草药》。为肺形草之别名,详该条。

胡芦巴 出《嘉祐补注神农本草》。又名芦巴、苦豆、季豆、香豆子。为豆科植物胡芦巴Trigonella foenumgraecum L.的种子。主产河南、安徽、四川。苦,温。入肾、肝经。温肾阳,祛寒湿。治寒疝、小腹痛引睾丸,腰酸,腰痛,阳萎,肾虚泄泻,痛经,寒湿脚气,腹胁胀满。煎服:4.5～9克。本品含胡芦巴碱、胆碱、牡荆素及其7-葡萄糖甙、胡芦巴甙Ⅰ及Ⅱ、槲皮素、胡芦巴肽甙(Fenugreekine)、β-谷甾醇等。种子油中有催乳成分,但无性激素样作用;去油后的种子有致泻作用。种子还有轻度的驱肠线虫作用。

胡芦草 见《福建民间草药》。为白毛藤之别名,详该条。

胡豆 见《本草纲目》。为蚕豆之别名,详该条。

胡连 见《本草正义》。为胡黄连之简称,详该条。

胡茄花 见《本草原始》。为洋金花之别名,详该条。

胡韭子 出《徐表南州记》。为补骨脂之别名,详该条。

胡桐泪 出《新修本草》。又名胡桐碱、胡桐律。为杨柳科植物胡杨Populus diversifolia Schrenk的树脂,在土中留存多年而成。分布内蒙古、甘肃、青海、新疆等地。咸、苦,寒。入胃经。清热,化痰,软坚。①治瘰疬,咽喉肿痛,胃、十二指肠溃疡,胃痛,胃酸过多。内服:煎汤,粗制品6～9

克；研末调服，精制品1克。②治齿痛，牙宣，牙疳，骨槽风。煎水含漱或研末撒；中耳炎。研末吹入；痔疮。研末敷。

胡桐律 出《石药尔雅》。即胡桐泪，详该条。

胡桐碱 见《本草纲目》。为胡桐泪之别名，详该条。

胡桃仁 出《本草纲目》。又名胡桃肉、核桃仁。为胡桃科植物胡桃Juglans regia L.的种仁。主产河北、山西、山东。甘，温。入肺、肾经。温补肺肾，润肠通便。治肾虚喘咳，腰痛脚弱，阳痿，遗精，耳鸣，小便频数，石淋，带下，大便燥结。内服：9～15克，研碎，开水冲服；或入煎剂。本品含脂肪油（58～74%）、蛋白质、糖类及钙、磷、铁、胡萝卜素、维生素B_2等。动物实验证明，本品有平喘、镇咳作用。用含胡桃油的混合脂肪饲犬，可使体重增长较对照组快，血清白蛋白增加，而血胆甾醇水平升高则较慢。

胡桃叶 见《贵州草药》。为胡桃科植物胡桃Juglans regia L.的叶。我国各地广泛栽培。苦、涩，平，有毒。①近用于白带，食道癌，象皮腿。胡桃树叶60克，与鸡蛋3个同煮，吃蛋，14天为一疗程。②煎水洗疥疮。本品含α-和β-蒎烯、柠檬烯、桉叶素、α-氢化胡桃醌-4-葡萄糖甙、胡桃甙、金丝桃甙、萹蓄甙。此外尚含没食子酸、并没食子酸、鞣质、挥发油、5-羟色胺及有高度抗炎作用的多聚酚复合物。抑菌试验，水提取物对炭疽杆菌、白喉杆菌有杀菌作用。浸剂能杀灭钩端螺旋体。

胡桃夹 见《现代实用中药》。为分心木之别名，详该条。

胡桃肉 出《海上集验方》。即胡桃仁，详该条。

胡桃壳 出《本草纲目》。为胡桃科植物胡桃Juglans regia L.成熟果实的内果皮。①治血崩，乳痈。烧存性研末服：3～6克。②煎水洗疥癣。

胡桃青皮 出《开宝重定本草》。又名青龙衣、青胡桃皮。为胡桃科植物胡桃Juglans regia L.未成熟果实的外果皮。苦、涩，平，有毒。①治胃、十二指肠溃疡及胃炎疼痛。用未成熟青皮核桃6斤，打碎，装瓶内，加入60度烧酒10斤，密封曝晒20～30日，过滤去渣，加单糖浆1350毫升，每次服10毫升，每日1～2次。②治水痢不止。青胡桃皮30克，炒研细末，每早晨服9克。③治痈肿疮毒，癣疾。捣涂或煎水洗。本品含胡桃叶醌、α-和β-氢化胡桃叶醌（Hydroju glone）和儿茶精等。胡桃叶醌有抗出血作用，其还原衍生物包括氢化胡桃叶醌有抗菌作用。

胡桃枝 见《贵州草药》。为胡桃科植物胡桃Juglans regia L.的嫩枝。甘，温。①治淋巴结核，鲜核桃树嫩枝、鲜大蓟各等分，煎水代茶饮。近用于肿瘤，鲜核桃树嫩枝一尺，与鸡蛋4个同煮，吃蛋。②煎水洗疥疮。胡桃花：泡酒涂疣。

胡桃油 见《现代实用中药》。为胡桃科植物胡桃Juglans regia L.种仁榨取的脂肪油。①治绦虫病。炖温服：10～20毫升。②局部涂搽治疥癣，冻疮；滴耳治中耳炎。本品主成分是亚油酸、亚麻酸及油酸的甘油酯。

胡桃隔 见《山东中草药手册》。为分心木之别名，详该条。

胡絮花 见《草药手册》。为木芙蓉花之别名，详该条。

胡荽 出《食疗本草》。为芫荽之别名，详该条。

胡荽子 见《备急千金要方·食治》。即芫荽子，详该条。

胡脂麻 见《中国药用植物志》。为亚麻之别名，详该条。

胡黄连 出《新修本草》。又名胡连、假黄连。为玄参科植物胡黄连Picrorhiza scrophulariiflora Pennell的根茎。产四川、云南、西藏。苦，寒。入肝、胃、大肠经。

清热燥湿。治骨蒸劳热，小儿疳积发热，目赤，黄疸，泻痢，痔疮。煎服：3～9克。本品含胡黄连甙（Kutkoside）、胡黄连苦甙（Picroside）Ⅰ及Ⅱ、胡黄连醇（Kutkinol）、胡黄连甾醇（Kutkisterol）、香荚兰酸、香荚兰乙酮及D-甘露醇。根提取物有利胆、抗菌作用。水浸剂对堇色毛癣菌等皮肤真菌有不同程度抑制作用。

胡麻 出《神农本草经》。为黑脂麻之别名，详该条。

胡麻子 出《博济方》。为亚麻子之别名，详该条。

胡麻叶 出《本草经集注》。又名青蘘、巨胜苗、胡麻苗。为胡麻科植物脂麻 Sesamum indicum DC.的叶。我国各地有栽培。甘，寒。治风湿痹痛，血崩，吐血。煎服：6～9克。干燥的叶含脂麻甙（Pedaliin）0.3%。还含胶质。腹泻和痢疾病人用作饮料有缓和刺激作用。

胡麻花 出《备急千金要方·食治》。又名乌麻花。为胡麻科植物脂麻 Sesamum indicum DC.的花。治秃发，阴干研末，麻油浸涂；冻疮初起，浸酒擦。

胡麻茹 出《寿亲养老新书》。即胡麻叶，详该条。

胡椒 出《新修本草》。为胡椒科植物胡椒 Piper nigrum L.的果实。药材商品有白胡椒和黑胡椒之分。产广东、广西、云南。辛，热。入胃、大肠经。温中，祛寒。①治脘腹冷痛，寒痰食积，呕吐，泄泻，冷痢，内服：煎汤，1.5～3克；粉剂，0.3～0.9克。②治受寒腹痛泄泻，研粉布脐上，膏药封贴；小儿哮喘，研粉布肺俞穴，膏药封贴。本品含胡椒碱、胡椒林碱（Piperyline）、胡椒油碱（Piperoleine）A、B、C等，尚含胡椒新碱（Piperanine）、胡椒阿明碱（Piperamine）、挥发油，油中主成分为向日葵素（Piperonal）、二氢葛缕醇、氧化石竹烯、隐品酮、左旋水芹烯等。咀嚼本品，可使血压暂时升高，约持续10～15分钟。小量内服可增进食欲，大量可刺激胃粘膜，引起充血性炎症。体内有杀绦虫作用。胡椒碱有镇静、抗实验性惊厥作用，其衍生物用于抗癫痫。

胡椒草 见《四川中药志》。为茅膏菜之别名，详该条。

胡椒菜 见《救荒本草》。为石龙芮之别名，详该条。

胡蕊 出《神农本草经》。为苍耳之别名，详该条。

胡颓子 出《本草经集注》。又名卢都子、蒲颓子、半含春、羊奶奶、土黄肉、蒲栗子。为胡颓子科植物胡颓子 Elaeagnus pungens Thunb.的果实。分布长江以南各地。酸、涩，平。止泻，开胃，止血。治肠炎，痢疾，食欲不振，咯血，血崩。煎服：9～15克。本品含鞣质、有机酸及草酸盐等。

胡颓子叶 出《本草拾遗》。又名胡颓叶、蒲颓叶、潘桑叶。为胡颓子科植物胡颓子 Elaeagnus pungens Thunb.的叶。酸，平。入肺经。止咳平喘，止血。治肺虚短气，咳嗽，哮喘，肺结核咳血。煎服：9～15克。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、卡他球菌、肺炎球菌、痢疾和大肠等杆菌均有抑制作用。

胡颓子根 出《本草拾遗》。又名牛奶根、贯榨根。为胡颓子科植物胡颓子 Elaeagnus pungens Thunb.的根。酸，平。止血，祛风，利湿，消积滞，利咽喉。①治咯血，吐血，便血，泻痢，崩漏，白带，风湿关节痛，跌打损伤，小儿疳积，咽喉肿痛。煎服：9～15克。②煎汤洗皮肤湿疹。

胡颓叶 见《泉州本草》。为胡颓子叶之简称，详该条。

胡满蕴 见萧步丹《岭南采药录》。为大茶药根之别名，详该条。

荆芥 出《吴普本草》。又名假苏、稳齿菜、四棱杆蒿。为唇形植物荆芥 Schizone-

peta tenuifolia (Benth.)Briq.的全草。主产江苏、浙江、江西、湖北、河北等地。辛，温。入肺、肝经。解表，祛风，止血，消疮毒。①治感冒发热，头痛，咳嗽，咽喉肿痛，麻疹初起透发不畅，荨麻疹。②治吐血，衄血，便血，崩漏，产后血晕。③治痈肿，疥疮，瘰疬。煎服：4.5～9克。解表、透疹生用，止血炒炭用。花穗名荆芥穗，功用与荆芥相同，而发散力量较强。全草含挥发油，其中主成分是右旋薄荷酮，还有右旋柠檬烯，左旋胡薄荷酮等。煎剂在试管内能抑制结核杆菌。荆芥炒黑后，能使出血时间和凝血时间缩短。

荆条果 见《药材学》。为牡荆子之别名，详该条。

南大戟 见《本草纲目》。即红大戟，详该条。

南天竹子 出《本草纲目拾遗》。又名天竺子、天烛子、南竹子。为小檗科植物南天竹Nandina domestica Thunb.的果实。产江苏、浙江、广西等地。苦、涩、微甘，平，有小毒。入肺经。止咳平喘。治咳嗽，哮喘，百日咳。煎服：3～9克。内服过量，易引起痉挛和神经麻痹。本品含生物碱，主为南天竹碱甲醚，其它尚有南天竹碱、南丁宁碱等。还含蹄纹天竺素-3-木糖葡萄糖甙、翠菊甙。又含氢氰酸，系以氰甙形式存在。南天竹碱甲醚兴奋中枢神经系统，使反射活动亢进及肌肉痉挛，对离体及在体蛙心有抑制作用。

南天竹叶 出《本草纲目拾遗》。又名南竹叶、天竹叶。为小檗科植物南天竹Nandina domestica Thunb.的叶。分布江苏、浙江、安徽、江西、湖北、四川、广西等地。苦，寒，有毒。解热，利湿，止咳，止血，健胃，强筋。①治感冒，风湿痹痛，百日咳，血尿，小儿疳积，跌打损伤。煎服：3～9克。②治目赤肿痛，煎水洗；疮毒，捣敷；烫伤，研末油调敷。内服过量，可引起中毒，表现为头晕、呕吐、麻痹（全身不能自主活动、不能说话）。本品含木兰花碱、穗花杉双黄酮、南天竹甙（Nantenoside）A、B及氢氰酸。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌、绿脓杆菌、大肠杆菌均有抑制作用。

南天竹根 见《福建民间草药》。为小檗科植物南天竹Nandina domestica Thunb.的根。苦，寒。祛风，清热，化痰，利湿。①治感冒发热，目赤肿痛，肺热咳嗽，瘰疬，急性胃肠炎，痢疾，黄疸，风湿痹痛，尿路感染，跌打损伤。煎服：15～30克。②治疮癣，疥癞。煎水洗。本品含生物碱：南天竹碱、南天竹碱甲醚、南天青碱（Nandazurine）、小檗碱和药根碱。

南天竹梗 出《本草纲目拾遗》。为小檗科植物南天竹Nandina domestica Thunb.的茎枝。苦，平，有毒。止咳平喘，健胃，强筋。治咳嗽气喘，腹泻，坐骨神经痛，跌打肿痛。煎服：3～9克。内服过量可引起中毒，中毒症状参阅南天竹叶条。本品含木兰花碱、小檗碱、药根碱、蝙蝠葛壬碱、南天竹碱、南天竹碱甲醚、南天青碱（Nandazurine）、异波尔定碱（Isoboldine）、原阿片碱及异南天竹碱。

南天扇 见《湖南药物志》。为兔儿伞之别名，详该条。

南五加皮 见《科学的民间药草》。为五加皮之正品，详该条。

南五味子 出《本草纲目》。又名川五味子、西五味子。为木兰科植物华中五味子Schisandra sphenanthera Rehd.et Wils.的果实。分布陕西、甘肃、江西、四川、云南等地。性味功用与北五味子相同而力弱。参阅五味子条。本品含五味子酯甲、乙、丙、丁、戊。五味子酯甲经临床验证，对迁延性、慢性病毒性肝炎的血清谷丙转氨酶升高有较好的降低作用；五味子酯乙、丙和丁，经实验性小鼠四氯化碳中毒性肝炎模型试验

及临床初步观察，表明均有降低转氨酶的作用。

南瓜 出《滇南本草》。又名番瓜。为葫芦科植物南瓜Cucurbita moschata（Duch.）Poiret的果实。我国各地广泛栽培。甘，平。入脾、胃经。消炎止痛，解毒，杀虫。①治肺痈。南瓜500克，牛肉250克，煮熟食（勿加盐、油）；蛔虫病。南瓜生食，成人每次500克，儿童250克，两小时后再服泻剂。连服二天；解鸦片毒，生品捣汁饮。②治干性肋膜炎，肋间神经痛，煮熟敷；汤火伤，生品捣敷。南瓜瓤：捣敷烫伤，创伤。果肉含瓜氨酸，精氨酸，天门冬酰胺，胡芦巴碱，腺嘌呤，维生素B、C，戊聚糖，甘露醇等。

南瓜子 见《现代实用中药》。又名白瓜子。为葫芦科植物南瓜Cucurbita moschata（Duch.）Poiret的种子。甘，温。驱虫。治绦虫、蛔虫、血吸虫病。去皮生食或微炒研末空腹服，每次60～120克，两小时后再服泻剂；或连皮捣碎入煎剂服。种子在果实内萌发的幼苗，名盘肠草，又名南瓜阴芽，捣烂炒热熨，治小儿盘肠气痛；煎服治惊风，感冒，风湿热。种子含南瓜子氨酸（Cucurbitine）、维生素及脂肪油。煎剂在体外对牛肉或猪肉绦虫的中段或后段有麻痹作用，而对其头节及未成熟节片则无此作用，故与槟榔有协同作用。水溶液在体外能杀死蛲虫或蛔虫。南瓜子能抑制血吸虫幼虫的生长发育。

南瓜叶 见《岭南草药志》。为葫芦科植物南瓜Cucurbita moschata（Duch.）Poiret的叶。治痢疾，疳积，夏季热。煎服：60～90克。研末敷刀伤出血。

南瓜花 出《分类草药性》。为葫芦科植物南瓜Cucurbita moschata（Duch.）Poiret的花。清湿热，消肿毒。治黄疸，痢疾，咳嗽。煎服：9～15克。捣敷痈疽肿毒。

南瓜蒂 出《本草纲目拾遗》。为葫芦科植物南瓜Cucurbita moschata（Duch.）Poiret的果柄。甘，平。安胎，解毒，消肿。①治先兆流产。煎服：3～5个。②治疔疮痈肿，乳头破裂或糜烂，汤火伤。煅存性研末油调敷。

南瓜藤 出清·叶小峰《本草再新》。又名番瓜藤。为葫芦科植物南瓜Cucurbita moschata（Duch.）Poiret的茎。甘、苦，微寒。清肺，和胃，通络。治肺结核低热，胃痛，月经不调。煎服：15～30克。捣汁涂烫伤。茎上的卷须名南瓜须，又名南瓜蔓，开水泡服治妇人乳头内缩，剧烈疼痛。

南竹子 见《广西中药志》。为南天竹子之简称，详该条。

南竹叶 出清·赵楷《百草镜》。为南天竹叶之简称，详该条。

南刘寄奴 见《中药志》。即刘寄奴，详该条。

南豆花 见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。为扁豆花之别名，详该条。

南沙参 出《本经逢原》。又名白沙参、泡沙参、空沙参、羊婆奶。为桔梗科植物轮叶沙参Adenophora tetraphylla(Thunb.)Fisch.或杏叶沙参A.axilliflora Borb.等的根。主产安徽、江苏、浙江、贵州、四川、云南等地。甘，凉。入肺经。清肺，祛痰，止咳。治肺热咳嗽，咯痰不爽，百日咳，口燥咽干，虚火牙痛。煎服：9～15克。反藜芦。轮叶沙参的根含三萜皂甙。杏叶沙参的根含皂甙及花椒毒素。煎剂对兔有祛痰作用。其浸剂对离体蟾蜍心脏有强心作用；对奥杜盎氏小芽胞癣菌，羊毛状小芽胞癣菌等皮肤真菌有一定抑制作用。

南苦参 见《广西中草药》。为古羊藤之别名，详该条。

南细辛 见清·汪双池《医林纂要·药性》。为杜衡之药材名，详该条。

南星 见《本草纲目》。为天南星之简称，详该条。

南扁豆 见《滇南本草》。即扁豆，详该

条。

南烛子 出《本草纲目》。又名乌饭果。为杜鹃花科植物乌饭树Vaccinium bracteatum Thunb.的果实。产江苏、浙江等地。酸、甘，平。益肾固精，补气，止血。治体气虚弱，筋骨痿软，遗精，赤白带，久泻，久痢，鼻衄，牙龈出血，血小板减少性紫癜。煎服：6～12克。本品含糖及苹果酸等。

南烛叶 出清·陈士铎《本草新编》。为杜鹃花科植物乌饭树Vaccinium bracteatum Thunb.的叶。分布长江以南各地。酸、涩，平。益精气，强筋骨，明目，止泄。煎服：6～9克。南烛根：内服治牙痛；煎水洗治跌打损伤。叶含无羁萜，表无羁萜醇、槲皮素、异荭草素、对羟基桂皮酸及内消旋肌醇等。

南蛇竹 见《南宁市药物志》。为豆科植物南蛇竹Caesalpinia minax Hance的根或嫩茎叶。分布广东、广西、四川、贵州、云南。苦，寒。清热解毒，散瘀止痛。①治感冒发热，胃肠炎，风湿性关节炎。煎服：9～15克。②治跌打损伤，疮疡肿毒，瘰疬，皮肤瘙痒。捣敷或煎水洗。

南蛇藤 出《植物名实图考》。又名过山风、穿山龙、过山龙。为卫矛科植物南蛇藤Celastrus orbiculatus Thunb.的藤茎。我国大部分地区有分布。辛，温。祛风，活血，解毒。治风湿痹痛，腰腿痛，瘫痪，四肢麻木，闭经，跌打损伤，痢疾，肠风，痔漏，毒蛇咬伤。煎服：15～24克。南蛇藤叶：治毒蛇咬伤，捣烂加白酒、雄黄少许，调敷伤口周围；疮疡，疱疹，煎服并捣敷。叶含卫矛醇及山柰甙、山柰酚-7-鼠李糖甙、槲皮素-3，7-二鼠李糖甙等多种黄酮甙。

南蛇藤根 出《植物名实图考》。为卫矛科植物南蛇藤Celastrus orbiculatus Thunb.的根。产江西、福建、湖南等地。微辛，温。祛风胜湿，行气活血，解毒消肿。①治风湿痹痛，腰痛，经闭，跌打损伤，痧气呕吐腹痛。内服：煎汤，15～30克；或浸酒服。②治多发性脓肿，煎服并研末调敷；毒蛇咬伤，煎服并捣敷。从根皮中提出一种红色结晶，体外能抑制枯草杆菌、金黄色葡萄球菌、普通变形杆菌、大肠杆菌；对吉田肉瘤亦有抑制效力。

南鹤虱 见《中药志》。为伞形科植物野胡萝卜Daucus carota L.的成熟果实。分布安徽、江苏、浙江、江西、湖北、四川、贵州等地。辛，平，有小毒。入肝经。驱虫。治蛔虫病虫积腹痛，久痢。煎服：3～9克。本品含挥发油，油中主含细辛醚、细辛醛、蒎烯、甜没药烯、胡萝卜醇（Daucol）、胡萝卜次醇（Carotol）等。

南藤 出《开宝重定本草》。即石南藤，详该条。

茜草 出《神农本草经》。又名茹蔼、活血丹、血见愁、活血草。为茜草科植物茜草Rubia cordifolia L.的根及根茎。主产陕西、河北、河南、山东。苦，寒。入肝经。凉血止血，行血祛瘀，止咳化痰。①治咯血，吐血，衄血，尿血，便血，崩漏，经闭，风湿痹痛，血栓性脉管炎，黄疸，慢性支气管炎。煎服：6～9克。②治疖肿，跌打损伤。内服或捣敷。活血宜生用；止血多炒用。根含紫茜素、伪紫茜素、茜草色素。根煎剂对小鼠有镇咳、祛痰作用，对离体兔小肠有解痉作用；水提取物并能收缩子宫。根温浸液能轻度缩短兔血凝时间，在体外对葡萄球菌、卡他球菌、肺炎球菌及流感杆菌有抑制作用。

茺花 出《神农本草经》。为瑞香科植物茺花Wikstroemia canescens Meissn.的花。分布湖南、湖北、陕西、江西、云南等地。辛、苦，寒，有毒。泻水饮，破积聚。治痰饮咳逆上气，咽喉肿闭，水肿，瘾瘕痃癖。内服：煎汤，1.5～3克；或入丸剂。孕妇忌服。

荜茇 出《开宝重定本草》。又名荜拨、鼠尾。为胡椒科植物荜茇Piper longum L.

的未成熟果穗。产云南河口；广东海南岛亦有栽培。辛，热、入脾、胃经。温中散寒，下气止痛。①治脘腹冷痛，呕吐吞酸，痰饮恶心，肠鸣腹泻，气痢，疝痛，月经不调。煎服：1.5～3克。②治头痛，鼻渊，鼻塞流清涕，研细末搐鼻；龋齿痛，研末放蛀牙孔中。果实含胡椒碱、N-异丁基癸二烯〔反-2，反-4〕酰胺、芝麻素、挥发油、脂肪油等。种子还含长柄胡椒碱（Sylvatine）等。胡椒碱有镇静、抗惊厥及抗癫痫作用，并能降低大鼠直肠温度及破坏家蝇的神经及肌肉组织，荜茇提出之挥发油在体外对葡萄球菌、大肠及痢疾杆菌有抑制作用。

荜茇根 出《本草拾遗》。又名荜拨没。为胡椒科植物荜茇Piper longum L.的根。辛，温。温中，降逆，破滞气。治冷气呕逆，心腹胀满，食不消，寒疝核肿，阴汗，妇人宫冷无子。煎服：1.5～3克。本品含胡椒碱、荜茇亭碱（Piplartine）、荜茇明宁碱、芝麻素，3，4，5-三甲氧基桂皮酸甲酯及β-谷甾醇等。荜茇亭碱有明显降低狗血压的作用，阿托品及抗组织胺药对其降压作用无影响，于第二颈椎处横切脊髓后，降压作用仍然保持。

荜拨 出《新修本草》。即荜茇，详该条。

荜拨没 出《本草拾遗》。即荜拨根，详该条。

荜澄茄 出《开宝重定本草》。为胡椒科植物荜澄茄Piper cubeba L.或樟科植物山鸡椒Litsea cubeba(Lour.)Pers.的果实。前者产印度尼西亚、马来西亚等国；后者主产我国广西、浙江、江苏、安徽。辛，温。入脾、胃、肾经。温中暖肾，行气止痛。治脘腹冷痛，积滞气胀，呕吐，呃逆，泄泻痢疾，寒疝腹痛。煎服：1.5～3克。荜澄茄果实含挥发油，其中主含右旋香桧烯、右旋萜烯、1.4-桉叶素、右旋松油醇等；尚含荜澄茄素、荜澄茄酸、荜澄茄内酯（Cubebinolide）。山鸡椒果实含挥发油，其中主含柠檬醛、6-甲基庚烯-5-酮-2等；另含脂肪油约40%，其不皂化物中含豆甾醇。荜澄茄果实对粘膜有局部刺激作用，口服其挥发油，对尿路有防腐作用。山鸡椒流浸膏能增加兔尿量及氯化物排出，还能杀灭蚊幼虫，体外有抗血吸虫作用。

荜碧花 见《植物名实图考》。为睡莲之别名，详该条。

草寸香 见《陕西中草药》。为铃兰之别名，详该条。

草无根 见《天宝本草》。为满江红之别名，详该条。

草木灰 见中国人民解放军总医院医疗队第八队《草木灰治疗大骨节病》。又名薪柴灰。为柴草烧成的灰。辛，温。治大骨节病。用本品1.5公斤，加水5公斤，搅拌后浸泡24小时，过滤，取澄清液，加热浓缩成1公斤。每服30～40毫升，日服三次。本品主含碳酸钾。

草贝 见《陕西中草药》。为土贝母之别名，详该条。

草贝母 见《云南中草药选》。为百合科植物丽江山慈姑Iphigenia indica Kunth et Benth.的鳞茎。分布云南、四川等地。苦，温，有毒。止咳，平喘，镇痛，抗癌。治支气管炎，哮喘，痛风，近用于鼻咽癌，乳癌，唾腺肿瘤。研粉服：每次0.3～0.6克，加适量蜂蜜蒸服。鳞茎含秋水仙碱、β-光秋水仙碱、角秋水仙碱(Cornigerine)、N-甲酰-N-去乙酰秋水仙碱等多种生物碱。秋水仙碱能缓解急性痛风，并有抗癌活性，唯毒性较大。

草乌 见《圣济总录》。为草乌头之处方名，详该条。

草乌头 出唐·侯宁极《药谱》。又名草乌。为毛茛科植物北乌头Aconitum kusnezoffii Reichb.或华乌头 A. chinense Paxt.等的块根。主产辽宁、江苏、浙江等地。辛，热，有大毒。入肝、脾经。祛风除湿，

散寒止痛，消肿。①治风寒湿痹，中风瘫痪，破伤风，偏正头痛，脘腹冷痛，痃癖气块。煎服：用制草乌1.5～6克，煎煮须一小时以上。②治阴疽肿毒，瘰疬初起。生品研末调敷，皮肤破损处不宜用。内服过量或煎煮不当，易致中毒，出现唇舌、手足发麻，运动失灵，心律不整，甚至心脏及呼吸麻痹而死亡。孕妇忌服。反白芨、贝母、白蔹、半夏、栝楼、天花粉；畏犀角。北乌头和华乌头块根均含乌头碱、新乌头碱等生物碱。乌头碱对小鼠有镇痛作用。乌头总生物碱对兔、小鼠具抗炎作用，可使狗心率减慢，心律紊乱，甚至室颤。草乌尚有局部麻醉作用。乌头碱毒性颇大，参见附子条。

草乌喙 见《药材资料汇编》。为竹节香附之别名，详该条。

草玉铃 见《中国植物图鉴》。为铃兰之别名，详该条。

草玉梅 见《辽宁经济植物志》。为斩龙剑之别名，详该条。

草本威灵仙 见李承祜《药用植物学》。为斩龙剑之别名，详该条。

草石蚕 ❶出《本草拾遗》。又名石蚕、石祁蛇、白伸筋、老鼠尾、白毛蛇、筋碎补。为骨碎补科植物圆盖阴石蕨 Humata tyermanni Moore的根茎或全草。分布华东、华南和西南地区。甘、淡，凉。祛风利湿，散血凉血，解毒，止痛。①治风湿性关节炎，慢性腰腿痛，腰肌劳损，黄疸型肝炎，尿路感染，吐血，便血，尿血，肺痈。煎服：15～30克。②捣敷治乳痈，扭伤；捣汁涂治带状疱疹。全草预试含黄酮甙、有机酸、氨基酸、酚类、糖类。❷见《本草纲目拾遗》。为水龙骨之别名，详该条。❸见《本草汇编》。为甘露子之别名，详该条。

草龙胆 见南川药物试验种植场《常用中草药手册》。为小龙胆草之别名，详该条。

草龙珠 见《本草纲目》。为葡萄之别名，详该条。

草血竭 出《植物名实图考》。又名回头草、土血竭、拱腰老、老腰弓、一口血。为蓼科植物草血竭 Polygonum paleaceum Wall.的根茎。分布我国西南地区。苦、辛、微涩，微温。活血散瘀，止痛，止血。①治慢性胃炎，胃及十二指肠溃疡，痢疾，肠炎，瘕瘕积聚，月经不调，风湿痹痛，跌打损伤。内服：煎汤，9～15克。研粉吞服，1.5～3克。②治创伤出血。研末撒。本品含混合型鞣质。

草决明 ❶见《吴普本草》。为决明子之别名。❷见《神农本草经》。为青葙子之别名，各详该条。

草红花 见《陕西中药志》。即红花，详该条。

草红藤 见《全国中草药汇编》。为铁马豆之别名，详该条。

草杨梅 见《中国药用植物志》。为茅莓之别名，详该条。

草豆 见《中国主要植物图说·豆科》。为歪头菜之别名，详该条。

草豆蔻 出《雷公炮炙论》。又名草蔻、草蔻仁。为姜科植物草豆蔻Alpinia katsumadai Hayata的种子团。主产广西、广东。辛，温。入脾、胃经。温中燥湿，开郁破滞。治脘腹胀满、冷痛，食欲不振，噎膈反胃，呕吐泄泻，痰饮积聚，寒疟，瘴疟，口臭。煎服：3～6克。含山姜素、小豆蔻查耳酮（Cardamomin）。水煎剂小剂量对离体豚鼠肠管呈兴奋作用；大剂量或挥发油则呈抑制作用。

草苁蓉 出《新修本草》。为列当之别名，详该条。

草芦荟 见《北京地区植物志》。即芦荟，详该条。

草灵仙 ❶见《全国中草药汇编》。为斩龙剑之别名。❷见《昆明民间常用草药》。为草威灵之别名。各详该条。

草果 出《本草品汇精要》。又名草果仁。

为姜科植物草果 Amomum tsao-ko Crevost et Lem.的果实。主产云南、广西、贵州。辛，温。入脾、胃经。燥湿除寒，祛痰截疟。治脘腹胀痛，痰饮痞满，反胃呕吐，泻痢，食积，疟疾。煎服：3～6克。种子含挥发油等，油中主含桉叶素，还有柠檬醛、α-和β-蒎烯等。

草果仁 见《传信适用方》。为草果之处方名，详该条。

草河车 见《植物名实图考》。为七叶一枝花之别名，详该条。

草珊瑚 见《南越笔记》。为石花菜之别名，详该条。

草威灵 出《滇南本草》。又名小黑药、黑根、草灵仙、威灵菊。为菊科植物显脉旋复花Inula nervosa Wall.的根。分布云南、贵州等地。辛、苦，温。祛风除湿，健胃消食。治风湿性关节炎，腰腿痛，胃痛，消化不良，噎膈，骨鲠喉。煎服：9～15克。

草钟乳 出《本草拾遗》。为韭菜之别名，详该条。

草黄莲 见《云南中草药》。为马尾连之别名，详该条。

草羚羊 见《广西本草选编》。为狗肝菜之别名，详该条。

草蒿 ❶出《神农本草经》。为青蒿之别名。❷出《神农本草经》。为青蒿之别名。各详该条。

草蔻 见《本草从新》。为草豆蔻之简称，详该条。

草蔻仁 见《药材资料汇编》。即草豆蔻，详该条。

草蜜 出《本草拾遗》。为刺蜜之别名，详该条。

草鞋板 ❶见《天宝本草》。为青酒缸之别名。❷见《贵州民间药物》。为球兰之别名。各详该条。

草鞋底 见萧步丹《岭南采药录》。为苦地胆之别名，详该条。

草鳖甲 出《养生主论》。为茄子之别名，详该条。

茵陈 出《本草经集注》。为茵陈蒿之简称，详该条。

茵陈蒿 出《神农本草经》。又名茵陈、绵茵陈。为菊科植物茵陈蒿 Artemisia capillaris Thunb. 或猪毛蒿 A. scoparia Waldst. et Kit.的嫩苗。主产陕西、山西、安徽。苦、辛，微寒。入肝、胆、脾经。清热利湿，利胆退黄。①治湿热黄疸，胆囊炎，伤暑发热，小便不利。煎服：9～15克。②煎水洗风瘙瘾疹，湿疮。茵陈蒿含蒿属香豆素（Scoparone），α-对羟苯氧基-6-甲氧基-5，7-二羟基色酮，绿原酸，脂肪油，挥发油等；挥发油中含茵陈炔酮(Capillin)、茵陈烯酮（Capillone）、茵陈炔(Capillene)、茵陈素（Capillarin）、β-蒎烯等。猪毛蒿含蒿属香豆素，对羟基苯乙酮，脂肪油，挥发油等；挥发油中含α-和β-蒎烯、桉叶素、丁香油酚、侧柏醇、侧柏酮等。煎剂或茵陈蒿汤注射液对四氯化碳中毒性肝炎，无论在肝脏的功能或病理形态方面，均有治疗作用。α-对羟苯氧基-6-甲氧基-5，7-二羟基色酮和对羟基苯乙酮均有明显的利胆作用。挥发油在体外有抑菌作用。茵陈炔酮有抗皮肤真菌作用。蒿属香豆素还有某些利尿、降压及平喘作用。水煎剂可降低血清胆甾醇。对小鼠艾氏腹水癌有轻度抑制作用。

茴香虫 出《本草衍义》。又名茴香虫。为凤蝶科昆虫金凤蝶Papilio machaon L.的幼虫。分布全国各地。甘、辛，温。治胃痛，噎膈，疝气。煎服：1～3条，或入散剂。虫体含挥发油，内含对甲氧基桂皮醛、对甲氧基桂皮酸、对甲氧基苯甲醛、对甲氧基苯甲酸。

茴香茎叶 出《药性论》。又名茴香菜、香丝菜。为伞形科植物茴香 Foeniculum vulgare Mill.的茎叶。甘、辛，温。透疹，顺气，消肿。①治麻疹不透，疝气。煎服：

9～15克。②治痈肿，煎服或外敷。本品含挥发油，茴香甙（Foeniculin），山柰酚-3-阿拉伯糖甙等黄酮类，维生素C以及桂皮酸，茴香酸等。

茴香根 出《本草图经》。又名小茴香根。为伞形科植物茴香Foeniculum vulgare Mill.的根。我国大部分地区有栽培。辛、甘，温。温肾和中，行气止痛。治疝气痛，胃寒呕吐，腹痛。煎服：9～15克。本品含挥发油，内含莳萝油脑（Dill-apole）、α-和γ-松油烯、α-和β-蒎烯等。又含豆甾醇、伞形花内酯等。

茴香菜 出《备急千金要方·食治》。为茴香茎叶之别名，详该条。

荞叶七 见《陕西草药》。为苦荞头之别名，详该条。

荞叶细辛 见《贵州草药》。为胖血藤之别名，详该条。

荞麦 出《备急千金要方·食治》。又名荍麦。为蓼科植物荞麦Fagopyrum esculentum Moench的种子。我国各地都有栽培。甘，凉。入脾、胃、大肠经。降气宽肠，导滞，消肿毒。①治肠胃积滞，腹痛泄泻，痢疾，白浊，赤白带。磨粉炒黄，水调服：每次10～15克，一日数次。②荞麦粉和醋调涂，治小儿丹毒，疮疖初起；水调敷烫伤。

荞麦三七 见《浙江民间常用草药》。为金荞麦之别名，详该条。

荞麦秸 出《本草纲目》。为蓼科植物荞麦Fagopyrum esculentum Moench的茎叶。酸，寒。降压，止血，解毒。①治高血压病，毛细血管脆弱性出血，眼底出血，肺出血。煎服：鲜品30～60克。②治深部脓肿。鲜品打汁，用陈酒冲服；药渣外敷。全草含芸香甙、槲皮素、咖啡酸。芸香甙有维生素P样活性。提取物在体外有杀肠道圆虫的作用。整个植物特别是花，含红色荧光色素，动物食后，可产生光敏感症，对某些人亦可产生过敏的各种症状，如皮炎。

茯苓 出《神农本草经》。又名茯菟、白茯苓、云苓。为多孔菌科植物茯苓Poria cocos(Schw.)Wolf的干燥菌核。主产安徽、湖北、河南、云南。甘、淡，平。入心、脾、肾经。利水渗湿，健脾和胃，宁心安神。治小便不利，水肿胀满，痰饮咳嗽，食少脘闷，大便泄泻，眩晕，心悸，失眠。煎服：9～15克。近菌核外皮部的淡红色部分称赤茯苓，行水利窍，治小便不利，淋浊，泻利。本品含茯苓酸（Tumulosic acid）、乙酰茯苓酸（Pachymic acid）、齿孔酸、去氢齿孔酸、松苓酸（Pinicolic acid）等三萜成分和β-茯苓聚糖(β-Pachyman)、麦角甾醇、卵磷脂等。对大鼠幽门结扎性溃疡有预防作用，并能降低胃酸。煎剂对小鼠有镇静作用。茯苓聚糖如切断支链变为茯苓次聚糖时，对小鼠肉瘤-180有抑制作用。

茯苓皮 出《本草纲目》。为多孔菌科植物茯苓Poria cocos（Schw.）Wolf菌核的外皮。甘、淡，平。利水消肿。治水肿，小便不利。煎服：15～30克。

茯神 出《名医别录》。为多孔菌科植物茯苓Poria cocos（Schw.）Wolf抱有松根的菌核。甘、淡，平。入心、脾经。宁心安神，利水。治心悸，失眠，健忘，小便不利。煎服：9～15克。茯苓、茯神用朱砂拌红，可加强安神作用。小鼠口服煎剂有镇静作用。

茯神木 出《本草纲目》。又名茯神心、茯神心木。为多孔菌科植物茯苓Poria cocos（Schw.）Wolf菌核中间的松根。甘，平。平肝安神。治中风不语，口面㖞斜，惊悸健忘，脚气转筋挛痛。煎服：6～9克。

茯神心 见《卫生宝鉴》。即茯神木，详该条。

茯神心木 见《本草备要》。即茯神木，详该条。

茯菟 出《神农本草经》。为茯苓之别名，详该条。

荏子 出《名医别录》。为白苏子之别名，详该条。

荏叶 出《名医别录》。为白苏叶之别名，详该条。

荇丝菜 出《救荒本草》。为莕菜之别名，详该条。

茶子 出《本草纲目》。又名茶实。为山茶科植物茶 Camellia sinensis O.Ktze. 的果实。苦，寒，有毒。祛痰，治喘嗽齁龄。内服：入丸剂，每次量0.6～0.9克；亦可磨汁滴鼻，令患者吸入喉中，少顷吐出痰涎。本品含皂甙；还有茶氨酸（Theanine），有弱的镇静作用。

茶子饼 见《广东中医》4（1）：40，1959。又名茶枯、茶麸、茶油巴。为山茶科植物油茶 Camellia oleifera Abel 的种子经榨去脂肪油后的渣滓。辛、苦、涩，有小毒。治皮肤瘙痒，阴囊湿疹，煎水洗；跌打损伤，火煨，研末，酒调敷。本品含皂甙、鞣质、生物碱。茶子饼粉在体外有杀灭血吸虫卵的效果。

茶叶 出《本草图经》。为山茶科植物茶 Camellia sinensis O.Ktze. 的芽叶。我国长江流域及其以南各地均有栽培。苦、甘，凉。入心、肺、胃经。清头目，除烦渴，助消化，利尿，止泻。①治头痛，目昏，嗜睡，心烦口渴，食积，泄泻，痢疾，小便不利，水肿。煎服：3～9克。②治烧、烫伤，脚趾缝烂疮。研末调敷。本品含咖啡碱（咖啡因）、茶碱、鞣质（大量）、维生素C及挥发油；并含茶皂醇E（Theasapogenol E）、茶叶皂甙（Theafolisaponin）、槲皮素、山柰酚、茵芋甙等。咖啡碱能兴奋大脑皮层，使精神兴奋，故饮浓茶可致失眠。茶碱及咖啡碱，能加强心肌收缩力，加快心率，扩张皮肤、冠状及肾血管，收缩脑及内脏血管。茶碱有利尿和解除支气管及胆管平滑肌痉挛作用。煎剂在体外对各型痢疾杆菌等有抑制作用。茶叶尚能激活纤溶酶原引起抗凝。

茶叶花 见《东北资源植物手册》。为罗布麻之别名，详该条。

茶油 出《本草纲目拾遗》。又名梣树子油。为山茶科植物油茶 Camellia oleifera Abel 种子的脂肪油。分布长江流域及其以南各地。甘，凉。清热化湿，杀虫解毒。①治痧气腹痛，急性蛔虫性肠梗阻。内服：150～200毫升，一次服下。②治小儿面癣，烫伤。涂搽患处。

茶油巴 见《广东中医》4（1）：40，1959。为茶子饼之别名，详该条。

茶实 出《续名家方选》。即茶子，详该条。

茶枯 见《中国药用植物志》。为茶子饼之别名，详该条。

茶树根 出《本草纲目拾遗》。为山茶科植物茶 Camellia sinensis O.Ktze. 的根。苦，平。强心，利尿。①治心力衰竭，心脏病水肿。②治肝炎。煎服：30～60克。③治口烂。煎汤代茶不时饮。新鲜根含水苏糖、棉子糖等糖类，并含少量多酚化合物，对动物有降血脂作用。

茶麸 见《广东中医》4（1）：40，1959。为茶子饼之别名，详该条。

茶辣 见《中国药用植物提要》。为吴茱萸之别名，详该条。

荇苧 出《新修本草》。又名臭苏、青白苏。为唇形科植物荇苧 Mosla grosseserrata Maxim. 的根。分布江苏、浙江、福建、山东及东北等地。辛，温。宣肺平喘。治哮喘。煎服：9～15克。荇苧茎叶：内服治冷气泄痢，胃酸过多。全草及根含挥发油，油中主含甲基丁香油酚，又含左旋甜没药烯，α-石竹烯。

荇苞 出《名医别录》。又名杏参、杏叶沙参、土桔梗、甜桔梗、空沙参。为桔梗科植物荇苞 Adenophora trachelioides Maxim. 或薄叶荇苞 A. remotiflora（Sieb. et Zucc.）Miq. 的根。前者分布安徽、江苏、

山东、河北、内蒙古、辽宁；后者分布辽宁、吉林。甘，寒。入肺、脾经。清肺化痰，生津解毒。①治肺热咳嗽，消渴，咽喉炎。煎服：3～9克。②捣敷治疮毒疔肿。荠苨苗：煎服治咳嗽上气。薄叶荠苨根含β-谷甾醇、胡萝卜甾醇（Daucosterol）。

荠草 见《江苏药材志》。即荠菜，详该条。

荠菜 出《备急千金要方·食治》。又名香荠菜、菱角菜、荠草、护生草、上巳菜。为十字花科植物荠菜 Capsella bursa-pastoris(L.)Medic.的全草。全国大部分地区均有分布。甘，凉。入肝、胃经。凉血止血，清热利水，降压。治吐血，咯血，便血，尿血，崩漏，月经过多，感冒发热，麻疹，肠炎，痢疾，肾炎水肿，淋病，乳糜尿，高血压病。煎服：9～30克。本品含胆碱、乙酰胆碱、马钱子碱、芸香甙、木犀草素-7-芸香糖甙、香叶木甙（Diosmin）、橙皮甙、黑芥子甙（Sinigrin）、刺槐乙素、山梨醇、甘露醇、侧金盏花醇、β-谷甾醇等。煎剂及流浸膏能使小鼠和兔的出血、凝血时间缩短，使大鼠、兔、猫子宫兴奋。醇提取物使狗、猫、兔及大鼠血压下降。浸膏对狗、豚鼠的冠状血管有舒张作用，对人工形成的大鼠胃溃疡有抑制作用。

荠菜子 出《备急千金要方·食治》。为十字花科植物荠菜 Capsella bursa-pastoris(L.)Medic.的种子。甘，平。健脾，利湿，止血，明目。治腹胀，黄疸，胃肠出血，痔疮出血，目痛，青盲，翳障。煎服：9～15克。果实的绿色果皮中含香叶木甙。种子含槲皮素衍生物。香叶木甙有维生素P样作用，其降低兔毛细血管渗透性的作用比芦丁强，且毒性较低。

荠菜花 出《履巉岩本草》。又名地米花。为十字花科植物荠菜 Capsella bursa-pastoris(L.)Medic.的花序。甘、淡，凉。健胃，止痢，止血。治食积腹胀，痢疾，尿血，崩漏。煎服：9～30克。本品含橙皮素（Hesperidin）、芸香甙等黄酮类物质。

芜蔚 出《神农本草经》。为益母草之别名，详该条。

芜蔚子 出《神农本草经》。又名益母草子、小胡麻。为唇形科植物益母草 Leonurus heterophyllus Sweet 的果实。全国大部分地区均产。辛、甘，微寒，有小毒。入肝、脾经。活血调经，清肝明目。治月经不调，崩中，带下，产后瘀血腹痛，高血压病，目赤肿痛。煎服：3～9克。本品含益母草宁碱及维生素A类物质等。水浸出液静脉注射可使动物血压下降，无子宫收缩作用。如一次服用30克以上，可使人发生中毒，全身乏力，周身酸痛，下肢不能活动，甚至出汗、虚脱。

茨梨 见《分类草药性》。即刺梨，详该条。

茨藜根 见《贵阳民间药草》。即刺梨根，详该条。

荨麻 出《本草图经》。又名蝎子草。为荨麻科植物麻叶荨麻 Urtica cannabina L.或狭叶荨麻 U.angustifolia Fisch.ex Hornem.的全草。前者分布西北、华北、东北；后者分布华北、东北。苦、辛，温，有毒。祛风湿，活血，镇痉，解毒。①治产后抽风，小儿惊风。煎服：2～3克。②治风湿关节疼痛，煎水洗；荨麻疹，捣汁涂擦；蛇咬伤，捣敷。麻叶荨麻全草含多种维生素及鞣质。茎皮主要含蚁酸、丁酸及有刺激作用的酸性物质等。

荨麻根 见《新疆中草药手册》。为荨麻科植物麻叶荨麻 Urtica cannabina L.或狭叶荨麻U. angustifolia Fisch. ex Hornem.的根。苦、辛，温，有毒。祛风，活血，止痛。①治风湿痹痛，高血压肢麻，麻风。煎服：6～9克。②煎水洗，治湿疹。内服过量，可致剧烈呕吐、腹痛、头晕、心悸，甚至虚脱。

荩草 出《神农本草经》。又名菉竹、黄草、菉蓐草、细叶莠竹、马耳草。为禾本科植物荩草 Arthraxon hispidus (Thunb.) Mak.的全草。我国各地都有分布。苦，平。止咳定喘，杀虫。①治久咳气喘。煎服：6～12克。②治恶疮，疥癣，白秃。捣敷，或煎水洗。茎叶含乌头酸、木犀草素、木犀草素-7-葡萄糖甙、荩草素(Anthraxin)。

荍麦 见《日用本草》。即荞麦，详该条。

茹蓐 见《诗经》。为茜草之别名，详该条。

荔仁 见《广西中药志》。为荔枝核之别名，详该条。

荔枝 出《本草拾遗》。又名丹荔、勒荔、丽枝。为无患子科植物荔枝 Litchi chinensis Sonn.的果实。分布福建、广东、广西、云南等地。甘、酸，温。入脾、肝经。生津止渴，补脾养血，理气止痛。①治烦渴，便血，血崩，脾虚泄泻，病后体弱，胃痛，呃逆。煎服：15～30克。②捣敷治瘰疬溃烂，疔疮肿毒；烧存性研末撒治外伤出血。果肉含葡萄糖66%，还含蛋白质、脂肪、多种维生素、有机酸等。

荔枝壳 出《本草蒙筌》。为无患子科植物荔枝 Litchi chinensis Sonn.的外果皮。治痢疾，血崩。内服：4.5～9克，或煅存性研末服。煎水洗湿疹。本品含多酚氧化酶。

荔枝草 出《本草纲目》。又名虾蟆草、过冬青、膨胀草。为唇形科植物雪见草Salvia plebeia R.Br.的全草。除新疆、甘肃、青海、西藏外各地都有分布。辛，凉。利水，凉血，清热解毒。①治腹水，肾炎水肿，小便不利，咯血，吐血，尿血，便血，崩漏，慢性气管炎，近用于血小板减少性紫癜，高血压病。煎服：9～30克（鲜品15～60克）；或捣汁饮。②治咽喉肿痛，煎服或鲜草绞汁服；痈肿。捣敷并绞汁服；宫颈糜烂，煎水冲洗后，用棉球浸吸浓药液纳入阴道内宫颈处（棉球须系一线，以便牵出）；痔疮，痒疮。煎水洗。全草的水提取物中含高车前甙元、高车前甙、原儿茶酸和4-羟基苯乳酸。高车前甙元和高车前甙对小鼠有镇咳和明显的祛痰作用，原儿茶酸和4-羟基苯乳酸有平喘作用和抑菌作用。

荔枝核 出《本草衍义》。又名荔仁、枝核。为无患子科植物荔枝 Litchi chinensis Sonn.的种子。主产广东、广西。甘、涩，温。入肝、肾经。散寒，理气，止痛。治胃气冷痛，疝气痛，睾丸肿痛，妇女腹中血气刺痛。煎服：4.5～9克。本品含α-次甲基环丙基甘氨酸，给小鼠皮下注射，可降低血糖及肝糖元。还含皂甙、鞣质等。

荔枝根 出《本草图经》。为无患子科植物荔枝 Litchi chinensis Sonn.的根。微苦、涩，温。治胃寒胀痛，疝气，遗精。煎服：30～60克。

荭草 出《名医别录》。又名东方蓼、水红花、八字蓼、水蓬稞、家蓼。为蓼科植物红蓼 Polygonum orientale L.的全草。分布几遍全国。辛，凉，有小毒。祛风利湿，活血止痛。①治风湿痹痛，痢疾。煎服：15～30克。②治溃疡久不收口。以根煎水外洗，并以叶研末掺；疮肿，脚气。煎水浸洗。叶含牡荆素、异牡荆素、荭草素、异荭草素、荭草甙(Orientoside)槲皮甙、异槲皮甙等，此外尚含叶绿醌-9 (Plastoquinone)及β-谷甾醇等。

荭草花 出《本草纲目》。又名水荭花。为蓼科植物红蓼 Polygonum orientale L.的花。散血，消积，止痛。①治胃脘血气痛，痢疾初起。煎服：3～6克。②熬膏贴治痞块；捣敷治横痃。

荭草实 见《本草纲目》。为水红花子之别名，详该条。

药瓜 见《四川中药志》。为栝楼之别名，详该条。

药百合 见《东北植物药图志》。即百合，详该条。

药芹 见《中国药用植物图鉴》。即旱芹，详该条。

药枣 见《四川中药志》。为山茱萸之别名，详该条。

药鱼子 见《除害灭病爱国卫生运动手册》。为醉鱼草之别名，详该条。

药鱼草 见《河北药材》。为芫花之别名，详该条。

药虱药 见《河南中药手册》。为百部之别名，详该条。

药菖蒲 见《全国中草药汇编》。为石菖蒲之别名，详该条。

柰花 出《丹铅杂录》。为茉莉花之别名，详该条。

砒石 出《开宝重定本草》。又名人言、信石、信砒。为天然的砷华矿石，或为毒砂、雄黄等含砷矿石的加工制成品。产江西、湖南、广东、贵州等地。辛、酸，大热，有大毒。杀虫，蚀疮去腐，平喘化痰，截疟。①外用治痔疮，瘘管，瘰疬，牙疳，癣疮，溃疡恶肉不脱。②治寒喘，疟疾，休息痢。内服：一日量3～6毫克，入丸剂用。本品有剧毒，内服时需用绿豆或豆腐同煮后应用，不能过量或持续服用，以防中毒。孕妇忌服用。主成分为三氧化二砷，具砷剂的基本药理和毒理。外用亦可自粘膜面吸收，如应用不当，可致急性中毒，引起呕吐，淘米水样腹泻，蛋白尿，血尿，眩晕，惊厥，麻痹，以至死亡。

砂仁 出《本草原始》。又名春砂仁、缩砂仁、缩沙蜜。为姜科植物阳春砂Amomum villosum Lour.或海南砂A.longiligulare T.L.Wu的果实或种子、主产广东、广西等地。辛，温。入脾、胃经。行气宽中，健脾化湿。治胃腹胀痛，食欲不振，恶心，呕吐，泄泻，痢疾，妊娠恶阻，胎动不安。煎服：1.5～6克。不宜久煎。阳春砂种子含龙脑、乙酸龙脑酯、樟脑、柠檬烯及皂甙等。

砂仁壳 见《中药志》。又名砂壳、春砂壳。为姜科植物阳春砂Amomum villosum Lour.的果壳。辛，温。入脾、胃经。行气宽中。治脾胃气滞，脘腹胀满，恶心，呕吐。煎服：1.5～4.5克。

砂仁花 见《中国医学大辞典》。即春砂花，详该条。

砂壳 见《饮片新参》。为砂仁壳之简称，详该条。

斫合子 出《本草拾遗》。为萝藦子之别名，详该条。

耐惊菜 见《救荒本草》。为节节花之别名，详该条。

面条树 见《广西本草选编》。为灯台树之别名，详该条。

面根藤 见《分类草药性》。又名兔耳苗、兔耳草、狗儿蔓、小旋花。为旋花科植物打碗花Calystegia hederacea Wall.的全草或根茎。分布全国各地。甘、淡，平。补虚益气，活血调经。治脾虚消化不良，小儿疳积，月经不调，白带，淋病，咯血，衄血，尿血。煎服：15～30克。

牵牛子 出《雷公炮炙论》。又名喇叭花子。为旋花科植物裂叶牵牛Pharbitis nil (L.)Choisy或圆叶牵牛P.purpurea (L). Voigt的种子。药材商品以种皮呈灰黑色者名黑丑，淡黄白色者名白丑，合称二丑。全国大部分地区均产。苦、辛，寒，有毒。入肺、肾、大肠经。泻下，逐水，祛痰，杀虫。治水肿，腹水，二便不利，脚气，痰饮咳喘，虫积腹痛。研末(取头末)吞1～2克；煎服：3～6克。孕妇忌服。不宜与巴豆同用。种子含牵牛子甙、没食子酸、裸麦角碱等。未成熟种子含多种赤霉素及其葡萄糖甙。水、醇浸剂对小鼠皆有泻下作用，但煎剂则失去致泻能力。致泻有效成分主要为牵牛子甙，它在肠内分解后，刺激肠道，引起腹泻。

歪头菜 见《救荒本草》。又名三铃子、野豌豆、豆菜、草豆、两叶豆苗。为豆科植物歪头菜 Vicia unijuga A.Br.的根或嫩叶。我国大部分地区有分布。甘，平。补虚，调肝。治劳伤。根，15克，水、酒各半煎服。头晕，嫩叶9克，蒸鸡蛋吃；胃痛，体虚浮肿。煎服：9～15克。叶含大波斯菊甙和木犀草素-7-葡萄糖甙。

厚皮 出《吴普本草》。为厚朴之别名，详该条。

厚朴 出《神农本草经》。又名厚皮、重皮、川朴、紫油厚朴。为木兰科植物厚朴 Magnolia officinalis Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴M.biloba(Rehd.et Wils.)Cheng的树皮或根皮。主产四川、湖北、浙江、贵州、湖南。苦、辛，温。入脾、胃、大肠经。温中下气，燥湿消痰。治脘腹痞满胀痛，呕吐，泻痢，食积，痰饮咳喘。煎服：3～9克。厚朴及凹叶厚朴树皮均含厚朴酚和朴酚（Honokiol）、四氢厚朴酚及异厚朴酚，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等以及某些皮肤真菌有抑制作用，并有驱猪蛔虫作用。另含挥发油、其主成分为β-桉叶醇，有镇静作用。还含生物碱，有箭毒样肌肉松弛及降低血压作用。

厚朴花 见《饮片新参》。又名川朴花、调羹花。为木兰科植物厚朴 Magnolia officinalis Rehd.et Wils.或凹叶厚朴M. biloba(Rehd.et Wils.)Cheng 的花蕾。主产四川、湖北、浙江等地。微苦，温。理气宽中，芳香化浊。治胸脘痞闷，胃痛，食欲不振。煎服：1.5～4.5克。

威鱼草 见《岭南草药志》。为葫芦茶之别名，详该条。

威虾花 见《广西药用植物名录》。又名狗仔菜、狗仔花、万重花、大叶威虾花。为菊科植物威虾花 Vernonia patula (Ait.) Merr.的全草。分布福建、广东、广西、云南、贵州等地。苦、辛，平。疏风，清热，解毒。①治感冒发热，头痛，高血压，疟疾，肠炎，痢疾。煎服：15～30克。②治荨麻疹。捣汁外擦；乳腺炎。捣烂取汁兑酒服，渣外敷。根预试含黄酮甙、三萜、植物甾醇、挥发油、氨基酸、有机酸。

威秋石 见《药物出产辨》。为秋石药材之一种，详该条。

威灵仙 出唐·侯宁极《药谱》。又名灵仙、铁脚威灵仙。为毛茛科植物威灵仙 Clematis chinensis Osbeck 或棉团铁线莲 C.hexapetala Pall. 等的根。主产江苏、安徽、浙江等地。辛，温。入膀胱经。祛风除湿，通络止痛，消痰散积。①治风寒湿痹，腰膝冷痛，四肢麻木，脚气，黄疸，积聚，噎膈，急性扁桃体炎，丝虫病。煎服：6～9克。②治鱼骨鲠喉。水醋煎服：15～30克。③治腮腺炎，鲜品捣烂，醋浸三日，取浸液涂患处，每日三、四次。本品含原白头翁素、甾醇、皂甙、酚类等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、志贺氏痢疾杆菌有抑制作用。浸剂对常见致病性皮肤真菌有抑制作用。原白头翁素药理参见毛茛条。

威灵菊 见《全国中草药汇编》。为草威灵之别名，详该条。

挂金灯 出《救荒本草》。又名金灯笼、锦灯笼、灯笼果。为茄科植物酸浆Physalis alkekengi L.var. franchetii (Mast.) Mak. 带宿萼的果实。主产吉林、河北、新疆、山东。酸，寒。入肺、脾经。清热解毒，化痰，利咽，利尿。①治肺热咳嗽，咽喉肿痛，音哑，骨蒸劳热，黄疸，水肿，淋病。煎服：4.5～9克。②治天疱疮，湿疹。捣敷或研末油调涂。孕妇慎服。果实含酸浆果红素（physalien），微量生物碱等。

拱地龙 见《安徽中草药》。为合掌消之别名，详该条。

拱腰老 见《中药形性经验鉴别法》。为草血竭之别名，详该条。

挟剑豆 见《酉阳杂俎》。为刀豆之别

名，详该条。

挡蛇剑 见《岭南草药志》。为巴豆树根之别名，详该条。

指甲花 见清·刘士季《草木便方》。为凤仙花之别名，详该条。

指甲草 见《西藏常用中草药》。为佛指甲之别名，详该条。

挖耳草 ❶出《滇南本草》。又名杓儿菜、芸香草、倒提壶、野葵花。为菊科植物烟管头草 Carpesium cernuum L. 的全草。我国大部分地区有分布。苦、辛，寒，有小毒。清热解毒，消肿，止痒。①治感冒发热，咽喉肿痛，痄腮，淋巴结结核，风火牙痛，急性肠炎，痢疾，尿路感染。煎服：6～15克。②治疮疖肿毒，乳痈，蛇咬伤，鲜草捣敷；黄水疮，疥疮，脓疱疮，煎水洗。❷见《上海常用中草药》。为天名精之别名，详该条。

挖耳草根 出《分类草药性》。为菊科植物烟管头草Carpesium cernuum L.的根。苦，凉。治痢疾，牙痛，喉蛾，子宫脱垂，脱肛。煎服：6～12克。

轻粉 出《本草拾遗》。又名水银粉、汞粉、腻粉、扫盆。为粗制的氯化亚汞结晶。产湖北、河北、湖南、云南等地。辛，寒，有大毒。入肝、肾经。杀虫，攻毒，逐水，通便。①治疥、癣，瘰疬，梅毒下疳，皮肤溃疡，酒糟鼻，慢性湿疹，神经性皮炎。配他药研末外掺。②治水肿臌胀，大小便不利的实证。内服：60～150毫克，多入丸剂。因有强烈的毒性反应，故内服宜慎。孕妇忌服。外用有杀菌作用，对常见致病性皮肤真菌也能抑制。内服能制止肠内异常发酵，阻碍肠中电解质与水分的吸收而导致泻下。少量吸收后有利尿作用，但过量可致中毒，导致心、肝、肾病变。

鸦片 出《本草纲目》。又名底野迦、阿片、阿芙蓉、亚片。为罂粟科植物罂粟 Papaver somniferum L.的未成熟果实经割破果皮后流出的乳汁干燥而得。酸、涩，温，有毒。入肺、肾、大肠经。敛肺，止咳，涩肠，止痛。治久咳，久泻，久痢，脱肛，心腹及筋骨诸痛。内服：入丸、散，一次0.03～0.1克，一日量0.1～0.4克。有成瘾性，不可长期持续应用。肝功能有严重不全、肺原性心脏病、支气管哮喘、婴儿、哺乳期妇女均忌服。本品含多种生物碱，内有吗啡、可待因、罂粟碱、那可汀（Narcotine）等。又含豆甾醇、环鸦片甾烯醇、树脂等。吗啡有显著的镇痛作用，并有催眠作用；对呼吸中枢有高度的选择性抑制作用，小剂量即使呼吸变慢。吗啡的止咳作用也很强，主要是对咳嗽中枢的抑制，但因易于成瘾而少用。可待因镇咳作用不及吗啡强而成瘾性低，主要用于镇咳。那可汀具有与可待因相等的镇咳作用，但无其他中枢抑制作用。罂粟碱对各种平滑肌、大的动脉血管有直接松弛作用，可用于外周动脉或肺动脉栓塞。吗啡还能抑制消化腺的分泌和肠管的蠕动，有止泻和导致便秘作用。吗啡急性中毒具有昏睡、瞳孔缩小和呼吸抑制三大特征；慢性中毒即吗啡瘾。

鸦胆子 出《本草纲目》。又名苦参子。老鸦胆。为苦木科植物鸦胆子 Brucea javanica(L.)Merr.的果实。主产广东、广西。苦，寒，有毒。清热燥湿，杀虫。①治阿米巴痢疾，早期血吸虫病，疟疾。内服：每次10～15粒，一日二次（去壳，用龙眼肉包裹或装胶囊吞服）。②治赘疣，鸡眼，捣烂敷；灰指甲，鸦胆子油涂。服用过量可引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻、呼吸减慢，甚至四肢麻痹。孕妇忌服。本植物的根名老鸦胆根，煎服治疟疾。果实含生物碱：鸦胆子碱（Brucamarine）、鸦胆宁；甙类：鸦胆灵、鸦胆子甙（Yatanoside）。还含鸦胆子酚（Brucenol）、鸦胆子酸（Bruceolic acid）等。种子含鸦胆子苦醇（Brusatol）和多种鸦胆子素（Bruceine）。鸦胆子仁及

其有效成分（甙类）体外和体内（动物）试验对阿米巴原虫有杀灭或抑制作用，唯毒性较大。种仁及其水浸液对鸡疟有效。临床上对阿米巴滋养体的疗效较包囊为佳。对鞭虫、蛔虫及绦虫也有一定的驱除作用。鸦胆子仁或油对正常皮肤或粘膜面有刺激作用，对赘疣细胞可使细胞核固缩，细胞坏死、脱落。

鸦燕草 ❶见《广西本草选编》。为肺形草之别名。❷见《广西本草选编》。为拦路虎之别名。各详该条。

研螺 出《本草图经》。为紫贝之别名，详该条。

皆治藤 见《本草纲目拾遗》。为鸡屎藤之别名，详该条。

〔丨〕

点秤根 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为岗梅根之别名，详该条。

点椒 见《本草纲目》。为花椒之别名，详该条。

背阴草 见《江苏药材志》。为凤尾草之别名，详该条。

背蛇生 见《四川常用中草药》。为朱砂莲之别名，详该条。

韭子 出《本草经集注》。又名韭菜子。为百合科植物韭 Allium tuberosum Rottler 的种子。辛、甘，温。入肝、肾经。温肾壮阳，固精，止呃。①治阳痿，遗精，遗尿，小便频数，腰膝酸软冷痛，泻痢，白带，淋浊，疝痛。煎服：3～9克。②治顽固性呃逆，炒或生研服，每次9克，日服二次。本品预试含生物碱及皂甙。

韭根 出《名医别录》。又名韭黄。为百合科植物韭 Allium tuberosum Rottler 的根及鳞茎。辛，温。行气，散瘀，止汗。治胸痹，吐血，带下，取汁服，30～60毫升；衄血，捣烂塞鼻；盗汗，虚汗，食积腹胀。煎服：30～60克。捣汁涂漆疮，癣疮。根含硫化物、甙类，苦味质。鳞茎主含蒜氨酸及甲基蒜氨酸。

韭菜 出《滇南本草》。又名草钟乳、壮阳草、扁菜。为百合科植物韭 Allium tuberosum Rottler 的叶。辛，温。入肝、胃、肾经。温中，下气，散血。①治胸痹，噎膈，反胃，吐血，衄血，尿血，倒经。捣汁饮，30～60毫升，②治消渴，盗汗。煮汁饮。③治痔漏，脱肛，子宫下垂煎水熏洗；跌打损伤，瘀血肿痛，外伤出血，漆疮。捣敷。④治产后血晕，不省人事。韭菜切碎，入小口磁瓶中，以醋一大碗煎沸注入，瓶口对产妇鼻孔熏之。本品含芳樟醇、甙类、苦味质及多种含甲基和烯丙基的硫化物。用韭菜茎压榨过滤所得之原液给小鼠静脉注射，可产生休克样症状乃至狂躁、痉挛而死亡。叶研磨后的滤液，1：4在试管内对阴道滴虫有杀灭作用。

韭菜子 见《滇南本草》。即韭子，详该条。

韭黄 见《本草纲目》。为韭根之别名，详该条。

省头草 ❶见《江苏药材志》。为罗勒之别名。❷出《唐瑶经验方》。为佩兰之别名。各详该条。

响铃草 见《湖南药物志》。为苦蕻之别名，详该条。

哈士蟆 见《饮片新参》。又名雪哈。为蛙科动物中国林蛙Rana temporaria chensinensis David或黑龙江林蛙 R. amurensis Boulenger 除去内脏的全体。产东北、四川等地。咸，凉。入肺、肾经。养肺滋肾，治虚劳咳嗽。炖汤服：1～3个。中国林蛙含蛙醇（Ranol）；其腓肠肌中含三磷酸腺甙、二磷酸腺甙。

哈士蟆油 见《中药志》。即蛤蟆油，详该条。

哈莫儿 见《内蒙古中草药》。为卡蜜之别名，详该条。

哈蟆油 见《药材资料汇编》。又名田鸡油、蛤蚂油、哈士蟆油。为蛙科动物中国林蛙Rana temporaria chensinensis David或黑龙江林蛙R. amurensis Boulenger雌性的干燥输卵管。甘、咸，平。入肺、肾经。补肾益精，润肺养阴。治病后虚弱，产后无乳，肺痨咳嗽吐血，盗汗，神经衰弱。煨汤服：3～9克。主含蛋白质，脂肪仅占4%左右，糖占10%；尚含硫，磷，维生素A、B、C和雌酮、17β-雌二醇、17β-羟甾醇脱氢酶等。

映山红 ❶见《本草纲目》。为杜鹃花之别名。❷见《吉林中草药》。为迎山红之别名。❸见《东北常用中草药手册》。即满山红。各详该条。

昨叶荷草 出《新修本草》。为瓦松之别名，详该条。

贴骨伞 见《陕西中草药》。为兔儿伞之别名，详该条。

贴壁蜈蚣 见《安徽中草药》。为水龙骨之别名，详该条。

虹叶 见《岭南草药志》。为乌桕叶之别名，详该条。

虾参 见《山东中药》。为拳参之别名，详该条。

虾钳草 ❶见清·赵其光《本草求原》。为枫香寄生之别名。❷见萧步丹《岭南采药录》。为金盏银盘之别名。❸见《广西中药志》。为豨莶之别名。各详该条。

虾蛄菜 见《广州常见经济植物》。为节节花之别名，详该条。

虾蟆 出《神农本草经》。为蛙科动物泽蛙Rana limnocharis Boie的全体。分布华东、中南、西南各地。甘，寒。清热解毒，健脾消积。①治痈肿热疖，瘰疬。捣敷，或焙脆研末油调敷。②治泻痢，疳积。内服：烧存性研末，每次1～2克，一日三次；或入丸剂。

虾蟆子 见西晋·崔豹《古今注》。即蝌蚪，详该条。

虾蟆衣 出《尔雅·郭璞注》。为车前草之别名，详该条。

虾蟆草 见《药物图考》。为荔枝草之别名，详该条。

蚊蝇 见《动物学大辞典》。为地牯牛之别名，详该条。

虻虫 出《本草经集注》。又名蜚虻、牛虻、瞎蠓。为虻科昆虫中华虻Tabanus mandarinus Schi.或复带虻T. bivittatus Matsum.及其同属近缘昆虫的雌虻干燥全体。产广西、四川、浙江、江苏、湖南、湖北、山西、河南、辽宁等地。苦，微寒，有毒。入肝经。逐瘀血，消癥结。治血滞经闭，癥瘕寒热，跌打瘀痛。内服：微炒用，煎汤，1.5～3克；或研末吞。孕妇忌服。

蚂蚁草 见《上海常用中草药》。为鸡眼草之别名，详该条。

蚂蚱 见《内蒙古中草药》。即蚱蜢，详该条。

蚂蝗藤 见《广西药用植物名录》。为四方藤之别名，详该条。

星色草 出《生草药性备要》。为七星剑之别名，详该条。

星秀花 见《云南中草药》。为小龙胆草之别名，详该条。

星星草 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·皮肤科》。又名蚊子草。为禾本科植物大画眉草Eragrostis cilianensis(All.) Link或小画眉草E. poaeoides Beauv.等的全草。全国大部分地区均有分布。甘、淡，凉。清热疏风，利尿排石。治目生云翳，角膜炎，结膜炎，肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，肾结石，膀胱结石。煎服：9～15克。星星草花：治黄水疮。炒黑存性，研细，油调敷。

星宿菜 见《福建民间草药》。又名大田基黄、假辣蓼、红根仔、红根草。为报春花科植物星宿菜Lysimachia fortunei Ma-

xim.的全草。分布华东、华中、华南地区。苦、涩，平。活血，调经，清热，利湿。①治痛经，经闭，白带，肠炎，痢疾，肝炎，风湿关节痛。煎服：9～15克。②治瘰疬，乳痈，跌打损伤。内服并捣敷。

胃友 见《云南中草药》。又名叶上花、清香桂、大风消、野樱桃。为黄杨科植物野扇花 Sarcococca ruscifolia Stapf 的根。分布四川、湖北、江西、贵州、云南。辛、苦，平。行气止痛，祛风活血。治胃痛，风湿关节痛，跌打损伤。煎服：9～15克。

思仲 出《名医别录》。为杜仲之别名，详该条。

思茅腐婢 见《云南中草药》。为类梧桐之别名，详该条。

骨风木 见《江西民间草药验方》。为琴叶榕之别名，详该条。

骨碎补 出《本草拾遗》。又名毛姜、申姜、猴姜。为水龙骨科植物槲蕨 Drynaria fortunei (Kunze J.Smith.或中华槲蕨 D.baronii (Christ) Diels 的根茎。主产湖北、浙江、广东、四川等地。苦，温。入肝、肾经。补肾壮骨，祛风除湿，活血止痛。①治肾虚久泻，耳鸣，耳聋，腰痛，牙痛，风湿痹痛，足跟痛。煎服：3～9克。②治跌打损伤，骨折。内服或外敷；秃发，酒浸汁外搽。③近有用煎剂防治链霉素毒副反应。槲蕨根茎含柚皮甙。

骨牌草 见《江苏省植物药材志》。为瓦韦之别名，详该条。

〔J〕

钟乳石 出《本草崇原》。又名石钟乳、滴乳石、鹅管石。为碳酸盐类矿物钟乳状的岩石。产广西、广东、湖北、四川、贵州、云南、陕西等地。甘，温。入肺、肾经。温肺，壮阳，下乳。治虚劳喘咳，寒嗽，阳痿，腰脚冷痹，乳汁不下。煎服：4.5～9克。主成分为碳酸钙，尚含少量的镁。

钢砂 出《本草拾遗》。即针砂，详该条。

钥匙藤 见《浙江天目山药用植物志》。为女萎之别名，详该条。

钩丁 见《陕西中药志》。为钩藤之别名，详该条。

钩虫草 见《广西药用植物图志》。为土荆芥之别名，详该条。

钩吻 出《神农本草经》。又名断肠草、大茶药、黄猛菜。为马钱科植物胡蔓藤 Gelsemium elegans Benth.的全草。分布浙江、福建、湖南、广东、广西、贵州、云南。苦、辛，温，有大毒。散瘀，攻毒，杀虫，止痛。外治痈肿，疔疮，麻风，瘰疬，臁疮，跌打肿痛，疥癣，湿疹。鲜草捣敷、研末调敷或煎水洗。禁止内服，误服极易中毒死亡。根、茎、叶含钩吻素子(Koumine)、钩吻素寅(Kouminicine)、钩吻素卯(Kouminidine)、钩吻素甲(Gelsemine)、钩吻素丙(Sempervine)、钩吻素辰(Kounidine)。根、茎、叶三部分均有剧毒，主要毒性成分为钩吻素子、钩吻素寅、钩吻素卯等。钩吻素寅对兔的中毒症状主要为呼吸麻痹，推测其作用在脊髓运动神经原之麻痹。钩吻素甲对中枢神经系统则有兴奋作用，并有散大瞳孔的作用。

钩藤 出《本草原始》。又名钓藤、钩藤钩子、嫩双钩、鸢爪风、金钩藤、钩丁、倒挂金钩。为茜草科植物钩藤 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks. 或大叶钩藤 U.macrophylla Wall.等的带钩茎枝。主产广西、江西、湖南、广东、四川、云南等地。甘，微寒。入肝、心经。清热平肝，熄风定惊。治高血压病，头痛，眩晕，高热痉厥，惊痫痴疯，手足走注疼痛，筋脉挛急，口眼歪斜，孕妇子痫。煎服：9～15克。后下。本品含钩藤碱、异钩藤碱、异钩藤碱等多种生物碱。煎剂对动物有镇静作用，但无催眠作用。乙醇浸膏能治疗实验性癫痫，但

毒性较大。煎剂或钩藤碱均有降血压作用，但持续时间较短。

钩藤钩子 出《小儿药证直诀》。即钩藤，详该条。

钩藤根 见《闽东本草》。为茜草科植物钩藤 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks.的根。分布福建、江西、湖南、广东、广西、贵州等地。甘、苦，平。清热镇痉，祛风湿，舒筋络。治小儿高热，癫痫，风湿关节痛，坐骨神经痛，半身不遂，跌打损伤。煎服：15～30克。本品含钩藤碱、异钩藤碱等多种生物碱。

钮子七 见《民间常用草药汇编》。为珠儿参之别名，详该条。

秋石 出《本草品汇精要》。为人中白或食盐的加工品。古代亦有用人尿、秋露水和石膏等加工制成。人中白加工而成的名淡秋石，主产华东；食盐加工而成的名咸秋石，主产安徽。咸，寒。入肺、肾经。滋阴降火。①治骨蒸劳热，咳嗽，咳血，遗精，白浊，膏淋，带下。煎服：4.5～9克。②治口疮，咽喉肿痛。淡秋石煎服；或咸秋石研末外用。亦可作为水肿患者食盐的代用品，但不宜多用。淡秋石主含尿酸钙与磷酸钙。咸秋石主含氯化钠与尿素等。

秋兰 出《本草衍义》。为建兰花之别名，详该条。

秋枫木 见《陆川本草》。又名水梁木、三叶红、红桐、丢了棒。为大戟科植物秋枫 Bischofia javanica Bl.的根、树皮、枝叶。分布长江流域以南各地。辛、涩，微温。祛风化湿，消肿解毒。①治风湿骨痛，痢疾，疳积，膈食反胃。煎服：9～15克。②捣敷治痈疽，无名肿毒。根含β-香树脂醇、熊果酸、β-谷甾醇。树皮含乙酸表无羁萜酯、无羁萜、β-谷甾醇、白桦脂酸甲酯。枝叶含黄酮类、香豆素类等。叶尚含酸性酒石酸甲、酒石酸钙、乙酸无羁萜-3α-酯、无羁萜、无羁萜-3β-醇、无羁萜-3α醇、β-谷甾醇、并没食子酸。

秋鼠曲草 见《中国药用植物图鉴》。又名天水蚁草、下白鼠曲草、黄花草、大叶毛鼠曲草、白调羹、碎叶青花。为菊科植物秋鼠曲草 Gnaphalium hypoleucum DC.的全草。全国大部分地区均有分布。微辛、微苦，平。祛风清热，止咳化痰，降血压，解湿毒。①治风热感冒，急、慢性支气管炎，哮喘，高血压，风疹，湿疹。煎服：9～15克。②捣敷治下肢溃疡。

香五加皮 见《四川中药志》。即香加皮，详该条。

香风茶 见《安徽中草药》。为山腊梅叶之别名，详该条。

香巴茅 见《四川中药志》。即香茅，详该条。

香水花 见《东北药用植物志》。为铃兰之别名，详该条。

香白芷 见《夷坚志》。为白芷之处方名，详该条。

香瓜藤 见《江苏中医》(5)：31,1960。为甜瓜茎之别名，详该条。

香头草 见《广州植物志》。为莎草之别名，详该条。

香加皮 见《中药志》。又名北五加皮、杠柳皮、香五加皮。为萝藦科植物杠柳 Periploca sepium Bge.的根皮。主产山西、河南、河北、山东。辛、苦，微温，有毒。祛风湿，壮筋骨，强心。治风寒湿痹，关节疼痛，小儿筋骨软弱，脚痿行迟，轻度心力衰竭，心慌，气短，水肿，小便不利。煎服：3～6克。本品不可过量和久服，以免中毒。本品含强心甙——杠柳毒甙等，还含4-甲氧基水杨醛，α-和β-香树脂醇及其乙酸酯，β-谷甾醇及其葡萄糖甙等。醇提取物有强心作用，可使在体蛙心停止于收缩期，对人工衰竭猫心也有强心作用。α-香树脂醇及β-香树脂醇乙酸酯对大鼠实验性关节炎有抗炎作用。

香丝菜 见《植物名实图考》。为茴香茎叶之别名，详该条。

香芹 见《本草推陈》。即旱芹，详该条。

香苏 见《补缺时后方》。为水苏之别名，详该条。

香豆子 见《新疆中草药手册》。为胡芦巴之别名，详该条。

香附 出《本草纲目》。又名香附子、莎草根、雷公头、三棱草根、香附米。为莎草科植物莎草 Cyperus rotundus L.的块茎。主产山东、浙江、湖南、河南。辛、微苦、甘，平。入肝经。疏肝理气，调经止痛。治肝郁气滞，饮食积聚，胸胁胀闷作痛，胃痛，腹痛，月经不调，痛经。煎服：4.5～9克。本品含挥发油1%，其中主成分为香附子烯、香附醇（Cyperol）、异香附醇。还含α-及β-香附酮、α-及β-莎草醇（α-β-Rotunol）、柠檬烯等。还含生物碱、强心甙、黄酮化合物、树脂、葡萄糖、果糖等。流浸膏对豚鼠、兔、猫、狗等动物的离体子宫均有抑制收缩作用。乙醇提取物对小鼠有镇痛作用。还有健胃、驱除消化道积气的作用。

香附子 出《新修本草》。即香附，详该条。

香附米 见《本草求真》。即香附，详该条。

香青兰 见《内蒙古中草药》。又名山薄荷。为唇形科植物香青兰 Dracocephalum moldavica L.的地上部分。分布东北、华北及西北。辛、苦，凉。解表，泻肝火，清胃热。治外感头痛发热，咽痛，黄疸；炒炭用止吐血，衄血。煎服：3～9克。全草含挥发油，内有柠檬醛、橙花醇、香茅醇、百里香酚等。

香茅 见萧步丹《岭南采药录》。又名大风茅、香巴茅、柠檬茅、姜巴草。为禾本科植物香茅 Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 的全草。分布广东、广西、云南、四川、福建、台湾、浙江等地。辛，温。祛风解表，散寒止痛，化瘀消肿。治感冒，头痛，风湿痹痛，胃痛，腹痛，腹泻，脚气，产后水肿，月经不调，跌打瘀血肿痛。煎服：9～15克。茎叶含挥发油，油中主含柠檬醛，又含香茅醛、牻牛儿醇、甲基庚烯酮等。挥发油有抗委内瑞拉链丝菌等放线菌的作用。叶、根中含有某种未知成分，口服后能降低血糖。

香茅草 见《云南中草药》。为芸香草之别名，详该条。

香茅筋骨草 见《四川中药志》。为芸香草之别名，详该条。

香油 出《物类相感志》。为麻油之别名，详该条。

香泽兰 见《广东中草药》。为飞机草之别名，详该条。

香茸 出《本草图经》。为香薷之别名，详该条。

香草 ❶见《广西中草药》。为毛麝香之别名。❷见《本草纲目》。为佩兰之别名。各详该条。

香茶菜 见《草药手册》。为溪黄草之别名，详该条。

香荠菜 见《浙江天目山药用植物志》。即荠菜，详该条。

香茹 见《中国药学大辞典》。即香薷，详该条。

香独活 见《中药志》。为独活之药材名，详该条。

香柴 见《草药手册》。为岗松之别名，详该条。

香圆子 见《江苏药材志》。为芸香科植物香圆 Citrus Wilsonii Tanaka 的种子。我国长江中下游地区多有栽培。疏肝，止痛。治疝气，小腹胀痛。煎服：3～6克。

香脐子 见《中药材手册》。为麝香之别名，详该条。

香通 见《四川中药志》。为香樟根之别名，详该条。

香豉 出《伤寒论》。为淡豆豉之别名，详该条。

香菜 ❶见《嘉祐补注神农本草》。为罗勒之别名。❷出《韵略》。为芫荽之别名。各详该条。

香菜子 见《江苏省植物药材志》。为芫荽子之别名，详该条。

香蛇麻 见《新疆中草药手册》。为啤酒花之别名，详该条。

香蒿 出《说文》。为青蒿之别名，详该条。

香蒲 出《神农本草经》。又名甘蒲、蒲黄草、水蜡烛、蒲包草。为香蒲科植物水烛Typha angustifolia L.或宽叶香蒲T.latifolia L.等的全草。我国各地均有分布。甘，平。利尿，泻火。①治小便不利。煎服：3～9克。②治乳痈。捣敷或煎服。宽叶香蒲全草含多量维生素B_1、B_2和C。

香椿子 见《东北药用植物志》。又名椿树子、香椿铃、椿花、春尖花。为楝科植物香椿Toona sinensis(A.Juss.)Roem.的果实。分布华北至东南和西南地区。辛、苦，温。祛风，散寒，止痛。治风寒外感，胃痛，风湿关节痛，疝气痛。煎服：3～9克。

香椿叶 见萧步丹《岭南采药录》。即椿叶，详该条。

香椿皮 见《经验方》。即椿白皮，详该条。

香椿铃 见《陕西中药志》。为香椿子之别名，详该条。

香樟子 见《贵州民间方药集》。即樟树子，详该条。

香樟木 见《药材资料汇编》。即樟木，详该条。

香樟树皮 见《玉局方》。即樟树皮，详该条。

香樟根 出《分类草药性》。又名香通、走马胎、樟脑树根。为樟科植物樟Cinnamomum camphora(L.)Presl的根。分布西南、华南及湖南、湖北、江西、台湾、福建、浙江、江苏等地。辛，温。祛风除湿，理气活血。①治感冒头痛，吐泻，胃腹胀痛，风湿痹痛，跌打损伤。煎服：12～30克。②煎水洗疥癣瘙痒。根含挥发油可达8%，主成分为右旋樟脑，1,8-桉叶素和黄樟醚。还含生物碱：牛心果碱及新木姜子碱。

香薷 出《名医别录》。又名香茹、香茸、蜜蜂草。为唇形科植物海州香薷Elsholtzia splendens Nakai ex F.Maekawa的带花全草。主产江西、河北、河南等地。辛，微温。入肺、胃经。发汗解表，和中，化湿，利尿。治暑湿感冒，恶寒发热，无汗，头痛，胸痞腹痛，呕吐泄泻，水肿，小便不利，脚气。煎服：3～9克。本品含挥发油，有利尿作用；对小鼠有镇咳、祛痰作用。

香橼 出《本草图经》。为芸香科植物枸橼Citrus medica L.或香圆C.wilsonii Tanaka的成熟果实。前者主产云南、四川；后者主产浙江、江苏。苦、辛、酸，温。入肝、脾、肺经。理气，宽中，化痰，治肝郁气滞，脘腹痞满，胁肋胀痛，气逆呕吐，痰饮咳嗽，胸膈不利。煎服：3～6克。枸橼果实含挥发油，其中主成分为右旋柠檬烯、柠檬醛、水芹烯和柠檬油素。还含橙皮甙、鞣质、维生素C等。香圆外层果皮含挥发油等。挥发油对胃肠道有温和刺激作用，能促进肠胃蠕动和消化液分泌，排除肠内积气，并有祛痰作用。

香橼根 见《民间常用草药汇编》。为芸香科植物枸橼Citrus medica L.的根。我国长江以南地区均有栽培。理气宽中，化痰。治胃腹胀痛，小儿疝气，风痰咳嗽。煎服：3～9克。本品含柠檬酸、苹果酸、琥

珀酸。

看瓜 见《中医杂志》。(12)：812，1958。为桃南瓜之别名，详该条。

竿蔗 见《随息居饮食谱》。即甘蔗，详该条。

重皮 见《广雅》。为厚朴之别名，详该条 。

重台 出《神农本草经》。为玄参之别名，详该条。

重楼 出《新修本草》。为七叶一枝花之别名，详该条。

信石 见《朱氏集验医方》。为砒石之别名，详该条。

信砒 出宋·孙用和《传家秘宝脉证口诀并方》。即砒石，详该条。

顺经草 见《贵阳民间药草》。为向天盏之别名，详该条。

追风七 见《陕西中草药》。为蓝布正之别名，详该条。

追风伞 见《贵州民间方药集》。又名惊风伞。为报春花科植物狭叶排草Lysimachia trientaloides Hemsl.的根或全草。分布湖南、湖北、四川、贵州、广东、广西等地。苦、辛，温。祛风除湿，活血散瘀，定惊。治风湿痹痛，半身不遂，跌打损伤，小儿惊风。煎服：9～30克。

追风草 见《全国中草药汇编》。为水蔓菁之别名，详该条。

追风棍 见《生草药性备要》。为丢了棒之别名，详该条。

追风箭 见《全国中草药汇编》。为墓头回之别名，详该条。

追风藤 见《陕甘宁青中草药选》。为常春藤之别名，详该条。

追骨风 ❶见《陕西中草药》。为青风藤之别名。❷见《南京民间药草》。为鼠曲草之别名。❸见《湖南药物志》。为薜荔之别名。各详该条。

鬼目 ❶出《名医别录》。又名排风子、毛藤果。为茄科植物白英Solanum lyratum Thunb.的果实。分布甘肃、陕西、河南、山东及长江以南各地。酸，平。清热明目。①治风热上攻，头旋，目赤，迎风流泪。研末服：每次1～2克。②治虫牙痛。烧烟熏患处。❷出《神农本草经》。为羊蹄之别名，详该条。

鬼臼 出《神农本草经》。为八角莲之别名，详该条。

鬼灯笼 出《生草药性备要》。又名白灯笼、岗灯笼、苦灯笼、白花鬼灯笼。为马鞭草科植物灯笼草Clerodendrum fortunatum L.的全株。分布广东、广西、福建等地。苦、微甘，寒。祛风止咳，清热解毒。①治感冒，咳嗽，咽痛，骨蒸劳热，小儿惊风，胃痛、疝痛。煎服：9～15克。②治疖肿，跌打损伤。鲜品捣敷。

鬼针草 出《本草拾遗》。又名一把针、索人衣、盲肠草、婆婆针、粘身草、脱力草。为菊科植物鬼针草Bidens bipinnata L.或三叶鬼针草B.pilosa L.的全草。全国大部分地区有分布。苦，平。清热解毒，散瘀消肿。①治上呼吸道感染，咽喉肿痛，腹泻，痢疾，阑尾炎，黄疸型肝炎，急性肾炎，疟疾，风湿关节痛，脱力劳倦。煎服：15～30克。②治跌打损伤，蛇、虫咬伤。煎服并捣敷；小儿单纯性消化不良，煎汤乘热熏洗患儿双脚，每日一次，年龄大及腹泻程度重者，熏洗的部位须扩大至腿膝部。鬼针草全草含多种微量聚乙炔类化合物和多种强极性炔类化合物。预试全草还含生物碱、皂甙、黄酮甙、苦味质及鞣质等。三叶鬼针草全草预试含蒽醌甙。与海州常山混合制成的水煎剂或醇浸剂，对动物有消炎作用，单味则作用不明显。体外试验，对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

鬼疙草 见《河南中草药手册》。为鹿角草之别名，详该条。

鬼油麻 见《日华子诸家本草》。为漏

芦之别名，详该条。

鬼督邮 ❶出《神农本草经》。为徐长卿之别名。❷出《本草经集注》。为银线草之别名。各详该条。

鬼箭羽 出《日华子诸家本草》。又名六月凌、四棱锋、八树、四面戟、见肿消、山鸡条子、篦箕柴。为卫矛科植物卫矛Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.具翅状物的枝条或翅状附属物。全国大部分地区均产。苦，寒。入肝经，破血散瘀，祛风，杀虫。①治经闭，癥瘕，产后瘀血腹痛，风湿关节痛，虫积腹痛，跌打损伤，瘀血肿痛。内服：煎汤，4.5～9克；或研末服，每次1～3克。②治过敏性皮炎，荨麻疹，漆疮。煎水熏洗。孕妇忌服。本品水提取液含草酰乙酸钠，能刺激胰岛β-细胞，给糖尿病人口服，每日0.1～1.0克，能降低血糖。

禹白附 见《中药志》。为白附子之药材名，详该条。

禹余粮 出《神农本草经》。又名禹粮石。为氧化物类矿物褐铁矿的矿石。产河南、江苏、浙江、四川等地。甘、涩，平。入脾、胃、大肠经。涩肠，止血，止带。治虚寒久泻、久痢，便血，崩漏，带下。煎服：9～15克。主成分为三氧化二铁，并含多量的磷酸盐。

禹粮石 见《中药志》。为禹余粮之别名，详该条。

盾叶薯蓣 见《中国药用植物志》。又名枕头根、野洋姜、黄连参、地黄姜。为薯蓣科植物盾叶薯蓣Dioscorea zingiberensis C. H. Wright的根茎。分布陕西、湖北、湖南、江西及西南地区。甘、苦，凉。解毒消肿。治皮肤各种急性化脓性感染，软组织损伤，蜂螫伤，阑尾炎。研末调敷。皮肤破溃或脓已形成者忌用。本品含薯蓣皂甙元。

剑丹 见《植物名实图考》。为瓦韦之别名，详该条。

食盐 出《名医别录》。为海水或盐井、盐池、盐泉中的盐水经煎晒而成的结晶体。咸，寒。入胃、肾、大小肠经。涌吐，清火，凉血，解毒。①治食停上脘，心腹胀痛，胸中痰癖，以食盐9～18克，炒黄，开水冲服，探吐；卒小便不通，炒盐纳脐中；齿龈出血，牙痛，淡盐水含漱，或以盐末刷牙；亦可化水点眼，洗疮。②治虚火上炎喉痛。内服：0.9～3克，开水冲淡盐汤服。水肿忌服。主成分为氯化钠，常杂有氯化镁、硫酸镁、硫酸钠、硫酸钙等。

盆消 出《本草图经》。即芒硝，详该条。

狭叶蓟 见《湖南药物志》。为苦芙之别名，详该条。

狭叶醉鱼草 见《广西本草选编》。为白鱼尾之别名，详该条。

狮子七 ❶见《陕西中草药》。为鹿药之别名。❷见《陕西中草药》。为红景天之别名。各详该条。

狮子毛草 见《中药材手册》。为伸筋草之别名，详该条。

狮子草 见《全国中草药汇编》。为翼首草之别名，详该条。

狮鞭草 见《全国中草药汇编》。为玉龙鞭之别名，详该条。

独一味 见《四川中药志》。为唇形科植物独一味 Lamiophlomis rotata(Benth.) Kudo的根及根茎。分布四川、云南及西藏。苦，微寒，有小毒。活血祛瘀，消肿止痛。治跌打筋骨损伤，闪腰挫气。煎服：3～6克。外用捣敷。孕妇忌服。

独丁子 见《昆明郊区药用植物的初步调查报告》。为金铁锁之别名，详该条。

独叶一支花 见《浙江民间常用草药》。为滴水珠之别名，详该条。

独叶一枝花 见《广西中药志》。为八角莲之别名，详该条。

独叶一枝枪 出清·赵楷《百草镜》。

为瓶尔小草之别名，详该条。

独叶草 见《中药材手册》。为细辛之别名，详该条。

独行千里 ❶出清·赵其光《本草求原》。为七星剑之别名。❷见《岭南草药志》。为巴豆树根之别名。各详该条。

独行根 出《新修本草》。为青木香之别名，详该条。

独茅根 出《开宝重定本草》。为仙茅之别名，详该条。

独活 出《神农本草经》。又名独摇草、独滑、长生草、川独活、香独活、大活。为伞形科植物重齿毛当归 Angelica pubescens Maxim. f. biserrata Shan et Yuan或毛当归A. pubescens Maxim. 等的根。前者主产湖北、四川；后者主产浙江、安徽。辛、苦，温。入肾、膀胱经。祛风胜湿，散寒止痛。①治风寒湿痹，腰脚酸痛，手足挛痛，屈伸不利。②治外感风寒头痛，慢性气管炎。煎服：3～9克。毛当归的根含当归醇（Angelol）、当归素、佛手柑内酯、伞形花内酯、东莨菪素、当归酸等。煎剂或流浸膏对动物有镇静、催眠、镇痛及抗炎作用。对人有时能引起日光性皮炎。

独根草 见《河北药材》。为列当之别名，详该条。

独脚乌桕 见《全国中草药汇编》。又名白面水鸡、夜牵牛。为葡萄科植物白粉藤 Cissus modecoides Planch. var. subintegra Gagn.的根。分布我国南部。微辛，平。化痰散结，消肿解毒，祛风活络。治痰核瘰疬，痈肿疮毒，扭伤骨折，风湿骨痛，腰肌劳损，坐骨神经痛。煎服：6～9克。孕妇慎服。

独脚乌桕叶 见《广东中草药》。为葡萄科植物白粉藤Cissus modecoides planch. var.subintegra Gagn 的茎叶。苦，寒，有小毒。消肿拔毒。捣敷痈疮肿毒，瘰疬，湿疹。茎藤预试含酚类、皂甙、氨基酸及有机酸。

独脚丝茅 见《江西中药》。为仙茅之别名，详该条。

独脚柑 出《生草药性备要》。又名细独脚马骝、疳积草、黄花甘、细独脚金。为玄参科植物独脚金Striga asiatica (L.) O.Ktze.的全草。分布福建、广东、广西、贵州等地。甘、微苦，平。消积杀虫，清热解毒。治小儿疳积，腹泻，夏季热，黄疸型肝炎，结膜炎，夜盲症。煎服：小儿3～9克，成人9～15克。本品预试含氨基酸、有机酸、酚类。

独脚莲 ❶出《质问本草》。为八角乌之别名。❷见《四川常用中草药》。为卜芥之别名。各详该条。

独脚蕨 见《民间常用草药汇编》。为阴地蕨之别名，详该条。

独滑 见《本草蒙筌》。即独活，详该条。

独蒜 见《贵州民间方药集》。为石蒜之别名，详该条。

独摇草 ❶出《名医别录》。为独活之别名。❷出《新修本草》。为银线草之别名。各详该条。

饼草 见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。为毛麝香之别名，详该条。

胆木 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名乌檀、山熊胆。为茜草科植物胆木Nauclea officinalis Pier.ex Pitard 的枝干及树皮。分布我国南部。苦，寒。清热解毒，消肿止痛。①治感冒发热，急性扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎，肺炎，尿路感染，肠炎，痢疾，胆囊炎，乳腺炎，急性结膜炎。煎服：15～30克。②煎水洗下肢溃疡，脚癣，湿疹，皮炎。现制成注射液试用于钩端螺旋体病。茎预试含黄酮甙及酚类。

胆矾 出《本草品汇精要》。又名石胆、蓝矾。为硫酸盐类矿物胆矾的天然晶

体，或用化学方法制得。主产云南、山西。酸、辛，寒，有毒。涌吐风痰，收湿解毒。①治风痰壅塞，喉痹，癫痫。研末，0.3～0.6克，温醋汤调下，探吐，限服一次；治咽喉肿痛，与僵蚕为末，吹喉取吐。②治口疮，牙疳，痔疮，风眼赤烂。煎水洗或点眼，须稀释至千分之一。本品为含水硫酸铜。溶液内服可刺激消化道粘膜引起反射性呕吐。

胆草 见《药品化义》。为龙胆之处方名，详该条。

胆星 出《本草纲目》。又名胆南星。为天南星用牛胆汁拌制而成的加工品。苦，凉。入心、肝、肺经。清火，化痰，镇惊。治中风，惊风抽搐，癫痫，痰火喘咳，头风眩晕。煎服：3～9克。

胆南星 见《本草选旨》。即胆星，详该条。

胖大海 出《本草纲目拾遗》。又名大洞果、大海子、大发。为梧桐科植物胖大海 Sterculia lychnophora Hance的种子。主产越南、泰国、马来西亚。甘、淡，微寒。入肺、大肠经。清肺，利咽，润肠通便，解毒。治肺热干咳，咽喉燥痛，声音嘶哑，骨蒸内热及吐、衄、便血，时行赤眼，风火牙痛，热结便秘。内服：煎汤，3～5枚；或沸水泡汁饮。本品含胖大海素(Sterculin)、西黄芪胶粘素、戊聚糖、粘液质及收敛性物质。水浸出液能增加兔肠内容积，促进肠蠕动，有缓泻作用，种仁的作用最强。种仁溶液（去脂干粉制成）对猫有降压作用。胖大海素能改善粘膜炎症，可减轻痉挛性疼痛，可用于治疗前列腺炎、尿道炎、子宫及附件炎和月经不调等。

胖血藤 见《贵州民间方药集》。又名毛血藤、百解药、云钩莲、荞叶细辛。为蓼科植物牛皮消蓼 Polygonum cynanchoides Hemsl.的根。分布西南地区及湖北、陕西等地。辛、涩，凉。敛肺，止咳，镇痉，止痛。治肺结核咳血，百日咳，惊痫，胃脘胀痛，风湿关节痛。煎服：9～15克。

急性子 出《救荒本草》。又名凤仙子、凤仙花子。为凤仙花科植物凤仙Impatiens balsamina L.的种子。我国大部分地区均产。微苦，温，有小毒。活血通经，软坚消积。①治闭经，难产，积块，噎膈，骨刺鲠喉。煎服：3～4.5克。②治外疡坚块，酸肿麻木。研末熬膏贴患处。孕妇忌服。本品含凤仙甾醇、帕灵锐酸（Parinaric acid）、β-谷甾醇、槲皮素的多糖甙、皂甙等。煎剂及酊剂对动物子宫有兴奋作用。

急解索 ❶见《本草纲目》。为半边莲之别名。❷见《全国中草药汇编》。为廊茵之别名。各详该条。

〔丶〕

亮菌 见江苏省"亮菌"科研协作组《亮菌及亮菌甲素的研究资料汇编》(1978)。为白蘑科真菌假蜜环菌 Armillariella tabescens（Scop.ex Fr.）Sing.的菌丝体。分布河北、四川、安徽、江苏、浙江。功能利胆、解痉，止痛，消炎，退热。治急性胆囊炎，慢性胆囊炎急性发作及其它胆道疾病并发急性感染，急性传染性肝炎和迁延性、慢性肝炎。亮菌片内服，每次5～10片（每片含干燥菌丝体0.25克），每日三次；亮菌甲素注射液肌内注射，每次2毫升（含甲素1毫克），每日二至四次。菌丝体含假蜜环菌甲素（ArmillarisinA）、乙素、丙素及甘露醇、氨基酸、多糖等。动物实验证明，甲素具有较强的胆道末端括约肌松弛效应，促进肝脏胆汁分泌和轻度免疫功能；未见由药物引起的毒副作用。

恒山 出《吴普本草》。即常山，详该条。

洪连 见《西藏常用中草药》。又名藏黄连。为玄参科植物兔耳草Lagotis glauca Gaertn.或短管兔耳草L.brevituba Maxim.

的根或带根全草。前者分布山西至西北高山地区；后者分布青海、甘肃。苦，寒。清热解毒，降血压。治五脏有热，血分热毒，急、慢性肝炎，高血压。煎服：1.5～3克。

洗手叶 见《陕西中草药》。为山胡椒叶之别名，详该条。

洗手果 见《广西中兽医药用植物》。为无患子之别名，详该条。

洗草 见《贵州民间方药集》。为狗尾草之别名，详该条。

活血丹 ❶见《本草纲目拾遗》。为茜草之别名。❷见《浙江民间常用草药》。为景天三七之别名。各详该条。

活血龙 见《浙江民间草药》。为虎杖之别名，详该条。

活血草 见《江苏省药用植物志》。为茜草之别名，详该条。

活血莲 见《湖南药物志》。为八角乌之别名，详该条。

活血藤 出《天宝本草》。为血藤之别名，详该条。

活磁石 见《中国药学大辞典》。为磁石之处方名，详该条。

洋虫 出清·龙柏《药性考》。又名九龙虫。为拟步虫科昆虫洋虫 Martianus dermestoides Chevr.的全虫。分布海南岛，江苏、浙江、福建、广东等地有饲养。温。活血祛瘀，温中理气。①治劳伤咳嗽，哮喘，吐血，心胃气痛，噎膈反胃，中风瘫痪，月经不调，无名肿毒，跌打损伤。内服：研烂酒冲服，或研末入丸、散，7～9只。②捣敷治刀斧伤。

洋参 见清·龙柏《药性考》。即西洋参，详该条。

洋金花 见《药物图考》。又名曼陀罗花、风茄花、山茄花、胡茄花、酒醉花。为茄科植物白曼陀罗Datura metel L.或毛曼陀罗D.innoxia Mill.等的花。前者主产江苏、福建、广东等地；后者主产河北、山东、河南。辛，温，有大毒。入肺经。平喘，止咳，镇痛，麻醉。①治支气管哮喘。用本品切丝，和入烟丝中燃吸，作临时平喘用。用量60～240毫克。儿童忌用。②治慢性气管炎，胃痛，跌打损伤疼痛。内服：煎汤，0.3～0.6克；研末服，一日量90～150毫克。③风湿痹痛，寒湿脚气。内服并煎水洗。④用于外科手术麻醉。用本品过量易致中毒，主要表现为颜面干燥潮红，躁动不安，脉快，瞳孔散大，呕吐眩晕，甚则血压下降而死亡。青光眼患者忌用；心脏病、高血压病、肝肾功能不正常、体弱及孕妇慎用。白曼陀罗和毛曼陀罗的花均含天仙子胺（莨菪碱）、天仙子碱（东莨菪碱）和去甲天仙子胺。天仙子碱有中枢镇静作用，与其他药配伍，可用作全身麻醉剂；并有抗晕、抗震颤性麻痹的作用。末梢作用与阿托品性质相似，有散瞳、解除平滑肌痉挛、抑制腺体分泌的作用。大量能解除血管痉挛，有抗休克功效。

洋蓍草 见《中国药用植物图鉴》。又名锯草、蜈蚣蒿、一苗蒿。为菊科植物千叶蓍Achillea millefolium L.的全草。分布东北、华北及新疆等地。甘、苦、辛，寒，有小毒。祛风，止痛，活血，止血，解毒。①治胃痛，风湿痛，痛经，肠炎，痢疾。②治痈疖肿毒，痔血，跌打肿痛，外伤出血，蛇虫咬伤。内服：煎汤，3～9克；研末服，每次1克；或浸酒饮。外用，捣敷；或煎水熏洗。本品主含挥发油，油中含桉叶素、兰香油奠、乙酰巴艾内酯（Acetylbalchanolide）、千叶蓍内酯。另含胆碱、北通水苏碱（Betonicine）、蓍素（Achillin）、芹菜素、木犀草素和它们的7-葡萄糖甙、咖啡酸、皂甙和多种多炔化合物等。浸剂内服可治肠、痔出血，亦可外用治鼻、牙或外伤出血，其作用可能是由于血小板数目的增加及出血时间的缩短。还能增强子宫肌的收缩，故可用于子宫出血。干燥花头的水提取

物有抗炎作用。

将军 ❶出魏·李当之《药录》。为大黄之别名。❷见《本草纲目拾遗》。为蟋蟀之别名。各详该条。

前胡 出《雷公炮炙论》。为伞形科植物白花前胡 Peucedanum praeruptorum Dunn或紫花前胡P. decursivum (Miq.) Maxim.的根。主产浙江、江西、安徽、湖南等地。苦、辛，微寒。入肺经。疏风清热，降气化痰。治风热感冒，肺热咳喘痰多，胸膈痞闷，呕逆。煎服：4.5～9克。白花前胡根含白花前胡甲素、乙素、丙素、丁素和极微量的前胡甙(Nodakenin)，还含挥发油、甘露醇。紫花前胡根含挥发油、前胡甙、前胡甙元、紫花前胡素(Andelin)、前胡素(Decursin)、异紫花前胡素(Decursidin)、伞形花内酯等。还含甘露醇、海绵甾醇。白花前胡丙素对离体心脏能增加冠脉流量。紫花前胡煎剂口服对麻醉猫有祛痰作用，前胡甙元并有某些抗菌作用。

首乌 出《经验方》。为何首乌之简称，详该条。

首乌藤 见《江苏省植物药材志》。为夜交藤之别名，详该条。

宣木瓜 见《增订伪药条辨》。为木瓜之处方用名，详木瓜条。

穿山龙 ❶见《东北药用植物志》。又名穿地龙、地龙骨、野山药。为薯蓣科植物穿龙薯蓣Dioscorea nipponica Mak.的根茎。分布东北、华北、华中、华东及四川、甘肃、陕西等地。苦，平。祛风，活血，止痛，消肿。①治风寒湿痹，劳损扭伤，急性化脓性骨关节炎，慢性气管炎，疟疾，近用于甲状腺瘤，甲状腺机能亢进。煎服：9～15克。②捣敷痈肿恶疮。本品含薯蓣皂甙等多种甾体皂甙，少量25-异-螺甾-3，5-二烯等。根状茎的水提取物，对小白鼠有镇咳、祛痰作用，对豚鼠有平喘作用。体外试验，水煎剂有抗流感病毒作用，对金黄色葡萄球菌、八迭球菌、大肠杆菌、卡他球菌、脑膜炎双球菌、甲型链球菌等也有抑制作用。总皂甙能显著降低兔血胆甾醇及血压，增加尿量、改善冠脉循环。❷见《泉州本草》。为南蛇藤之别名，详该条。

穿山甲 出《本草图经》。又名鲮鲤甲、川山甲。为鲮鲤科动物鲮鲤Manis pentadactyla L.的鳞甲。主产广东、广西、云南、福建、台湾等地。咸，微寒，入肝、胃经。活血，通经，下乳，消肿，排脓。治经闭，乳汁不下，瘛瘲，风痹强直疼痛，筋骨拘挛，痈肿初起，或脓成不溃。煎服：4.5～9克。外用：止血。植物油炸黄研细末撒。痈疽已溃者忌服。据报道，穿山甲有升高白细胞的作用。

穿心草 ❶见《广西中草药》。又名穿钱草、顶心风。为龙胆科植物穿心草Canscora lucidissima(Levl. et Vant.)Hand.-Mazz.的全草。分布广西、广东等地。微甘、微苦，凉。清热解毒，活血止痛。治肺热咳嗽，黄疸型肝炎，钩端螺旋体病，胸痛，胃痛，跌打内伤，毒蛇咬伤。煎服：9～15克(治毒蛇咬伤用量加倍)。❷见《江苏省植物药材志》。为元宝草之别名，详该条。

穿心莲 见《广东中草药》。又名春莲秋柳、一见喜、榄核莲、斩蛇剑、苦草。为爵床科植物穿心莲Andrographis paniculata(Burm.f.)Nees的全草或叶。长江以南温暖地区多有栽植。苦，寒。入心、肺经。清热，消炎，解毒。①治细菌性痢疾，肠炎，肺炎，咳嗽咽痛，肺脓疡，传染性肝炎，胆囊炎，尿路感染，盆腔炎，眼结膜炎。内服：煎汤，6～12克；研末，0.9～1.5克，日服2～3次。②治疮疖痈肿，丹毒，蛇、虫咬伤，汤火伤。捣汁涂并煎服。本品味极苦，用量过大易引起恶心，呕吐，食欲不振，针剂肌肉注射亦可能出现过敏反应。叶含穿心莲内酯，去氧穿心莲内酯，新

穿心莲内酯等。根还含芹菜素-7,4′-二甲醚等多种黄酮类成分。穿心莲内酯对细菌内毒素引起的发热，有明显的解热作用，它还具有明显的抗炎作用及镇静作用，可能有促肾上腺皮质激素样作用。在体外需较高浓度才能抑制金黄色葡萄球菌，新穿心莲内酯对菌痢有明显疗效。

穿心箭 见《杭州药用植物志》。为元宝草之别名，详该条。

穿地龙 ❶见《山东中药》。为知母之别名。❷见《东北药用植物志》。即穿山龙。各详该条。

穿鱼柳 见《草药手册》。为水团花之别名，详该条。

穿骨风 见《广西本草选编》。为尖尾风之别名，详该条。

穿破石 见萧步丹《岭南采药录》。又名柘根、黄蛇根、拉牛入石。为桑科植物构棘Cudrania cochinchinensis(Lour.)Kudo et Masam.或柘树C. tricuspidata(Carr.)Bur.的根。分布华东、中南、西南等地。淡、微苦，微凉。祛风利湿，止咳化痰，活血通络。①治风湿痹痛，黄疸型肝炎，淋浊，肺结核咳嗽、咯血，消化性溃疡疼痛，闭经，跌打损伤。煎服：15～30克。②治疮疖肿痛。鲜品捣敷。孕妇慎用。本品预试含黄酮甙、酚类、氨基酸、有机酸、糖类。

穿钱草 见《广西中草药》。为穿心草之别名，详该条。

穿墙草 出《经效实验单方》。为连钱草之别名，详该条。

总管皮 见《湖南药物志》。为麻口皮子药之别名，详该条。

美人蕉根 见《南宁市药物志》。又名小巴蕉头。为美人蕉科植物美人蕉 Canna indica L.的根茎。全国大部分地区有栽培。苦、涩，寒。清热利湿，收敛止血。①治急性黄疸型传染性肝炎，痢疾，高血压病，白浊，白带，血崩，咯血。煎服：15～30克。②捣敷治疮疡肿毒。美人蕉花：治吐血、衄血。美人蕉根茎含淀粉，脂肪，生物碱，树胶。

美草 出《神农本草经》。为甘草之别名，详该条。

姜子叶 见《农村常用草药手册》。为黄荆叶之别名，详该条。

姜巴草 见《贵州草药》。为香茅之别名，详该条。

姜皮 出《本草图经》。即生姜皮，详该条。

姜朴花 见《四川中药志》。为辛夷之别名，详该条。

姜黄 出《新修本草》。又名黄姜、毛姜黄、宝鼎香、片姜黄、片子姜黄。为姜科植物姜黄Curcuma longa L.的根茎。产四川、福建。辛、苦，温。入心、肝经。行气破瘀，通经止痛。治血瘀气滞，胸腹胀痛，胁肋刺痛，风痹臂痛，痛经，闭经，癥瘕，跌打损伤，痈肿。煎服：3～9克。本品含挥发油，油中主成分为姜黄酮，去氢姜黄酮、姜烯、还含水芹烯、桉叶素、龙脑及姜黄素等。还含β-谷甾醇、胆甾醇、豆甾醇、菜油甾醇等。煎剂及姜黄素对犬有利胆作用，并可促进食欲。煎剂或浸汁对动物子宫有收缩作用。挥发油及姜黄素对金黄色葡萄球菌有抗菌作用。煎剂尚有镇痛作用，水浸剂能抑制皮肤真菌。

类梧桐 见《云南中草药》。又名接骨树、绿泽兰、戳皮树、思茅腐婢。为马鞭草科植物类梧桐Premna szemaoensis Pei的根皮或茎皮。分布云南。甘、微苦，平。舒筋活血，接骨止痛。①治风湿痹痛，跌打损伤。煎服：15～30克。②治骨折，外伤出血。捣烂或研末撒。根含皂甙和多羟基酚类。

养心草 见《福建民间草药》。为费菜之别名，详该条。

养心莲 见成都《常用草药治疗手册》。为蜘蛛香之别名，详该条。

迷马桩棵 见《云南中草药》。为拔毒散之别名，详该条。

迷迭香 出《本草拾遗》。为唇形科植物迷迭香Rosmarinus officinalis L.的全草。原产南欧各国，我国有栽培。辛，温。强壮，发汗，健胃，安神。治头痛。煎服：4.5～9克。全草含芹菜素-7-葡萄糖甙、木犀草素-7-葡萄糖甙、香叶木甙、鼠尾草酸、迷迭香碱、异迷迭香碱、挥发油（内含α-蒎烯、莰烯，桉叶素，龙脑，樟脑等）等。可用作催经药，对更年期的神经功能紊乱所引起的月经过少或停经、可用此加速月经来潮。迷迭香碱静脉注射，能利胆，还有催眠、抗惊厥作用。叶的挥发油对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、霍乱弧菌等在体外有抗菌作用。

祖师麻 见《陕西中药志》。又名大救驾。为瑞香科植物黄瑞香Daphne giraldii Nitsche的根皮或茎皮。分布山西、陕西、甘肃、青海、四川等地。辛、苦，温，有毒。祛风除湿，行瘀止痛。①治风湿痹痛，四肢麻木，跌打损伤，感冒头痛，胃痛及各种神经痛。煎服，3～6克。孕妇忌服。本品含瑞香素和瑞香甙，还含芫花素、β-谷甾醇等。瑞香素对小鼠有镇痛和镇静作用；皂甙部分有抗炎、消肿作用。在体外对金黄色葡萄球菌，大肠、绿脓及福氏痢疾杆菌有抑制作用。祖师麻毒素虽也有中枢抑制作用，但应认为是一种毒性成分。

神曲 出《药性论》。又名六曲、六神曲。为辣蓼、青蒿、杏仁等药加工后与面粉或麸皮混和，经发酵而成的曲剂。辛、甘，温。入脾、胃经。消食调中，健脾和胃。治饮食停滞，胸痞腹胀，呕吐泄泻。煎服：6～12克。本品含淀粉酶、酵母菌、挥发油、甙类及B族维生素。

神草 出《吴普本草》。为人参之别名，详该条。

扁竹 ❶见《植物名实图考》。为鸢尾之别名。❷出《本草崇原》。为萹蓄之别名。各详该条。

扁竹根 ❶出《分类草药性》。又名土知母、铁扁担。为鸢尾科植物蝴蝶花Iris Japonica Thunb.的根茎。我国大部分地区均有分布。苦，寒。利水，通便，消食，杀虫，活血，止痛。①治肾炎水肿，便秘，食积饱胀，蛔虫腹痛，牙痛。煎服：3～9克。②治跌打损伤。煎服并捣敷。本品含多量维生素C。❷出《永类钤方》。为射干之别名，详该条。

扁豆 出《名医别录》。又名白扁豆、南扁豆、羊眼豆、蛾眉豆。为豆科植物扁豆Dolichos lablab L.开白花植株的种子。甘，微温。入脾、胃经。健脾和中，化湿，消暑。治脾虚泄泻，水肿，白带，暑湿吐泻，小儿疳积。煎服：9～15克，或入丸散。本品含蛋白质，维生素B_1及C，胡萝卜素。另含L-脲可酸、植物凝集素、胰蛋白酶抑制物和淀粉酶抑制物。煎剂在体外对痢疾杆菌有抑制作用；也有报告其中含抗病毒作用的物质。

扁豆皮 见《本草便读》。即扁豆衣，详该条。

扁豆衣 见《安徽药材》。又名扁豆皮。为豆科植物扁豆Dolichos lablab L.的干燥种皮。甘，微寒。健脾，化湿。治脾虚泄泻，痢疾，浮肿。煎服：4.5～9克。

扁豆花 出《本草图经》。又名南豆花。为豆科植物扁豆Dolichos lablab L.未完全开放的花。甘，平。清暑，化湿，健脾和胃。治暑湿泻痢，赤白带下。煎服：4.5～9克。

扁豆根 出《生草药性备要》。为豆科植物扁豆Dolichos lablab L.的根。治便血，痔漏，淋浊。煎汤：6～9克。根含天门冬酰胺酶。根瘤中含多种游离的氨基酸。

扁担叶 见《分类草药性》。为罗裙带之别名，详该条。

扁担杆 见《青岛中草药手册》。又名娃娃拳、麻糖果、棉筋条。为椴树科植物扁担杆Grewia biloba G.Don.的根、茎、叶。分布陕西、河南、山东至长江以南各地。辛、甘，温。健脾益气，祛风除湿，解毒。治小儿疳积，脾虚久泻，遗精，崩漏，带下，子宫脱垂，脱肛，风湿痹痛。煎服：9～15克。鲜根皮捣烂敷疮疖。

扁担藤 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名扁藤、扁骨风、腰带藤。为葡萄科植物扁担藤Tetrastigma planicaule (Hook.f.) Gagn.的藤茎及根。分布福建、广东、广西、贵州、云南。辛、涩，温。祛风除湿，舒筋活络。治风湿骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，半身不遂。内服：煎汤，30～60克；或浸酒。煎水洗治荨麻疹。

扁草 见《江西民间草药验方》。为牛筋草之别名，详该条。

扁骨风 见《广西中草药》。为扁担藤之别名，详该条。

扁菜 见《广西药用植物图志》。为韭菜之别名，详该条。

扁蒲壳 见《苏州本产药材》。即蒲种壳，详该条。

扁蒲扇 见《全国中草药汇编》。为白花射干之别名，详该条。

扁藤 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。即扁担藤，详该条。

〔7〕

费菜 出《救荒本草》。又名养心草、马三七、血草。为景天科植物费菜Sedum kamtschaticum Fisch.的全草或根。分布陕西、山西、河北、内蒙古。甘、酸，平。入心、肝、脾经。活血凉血，宁心安神。①治咳血、吐血，鼻衄，齿衄，便血，子宫出血，白带，心悸，烦躁失眠，癔病，高血压病。煎服：4.5～9克。②治跌打损伤。煎服并捣敷；外伤出血，研末撒；烫伤，鲜品捣汁涂敷。

屏风 出《名医别录》。为防风之别名，详该条。

退秧竹 见萧步丹《岭南采药录》。为仙人杖之别名，详该条。

眉皂 见《中药志》。为猪牙皂之别名，详该条。

娃儿藤 见《江西草药》。为萝藦科植物七层楼Tylophora floribunda Miq.的根。分布贵州、广西、广东、湖南、江西、福建、浙江、江苏、安徽。辛，温，有小毒。祛风化痰，散瘀解毒。①治小儿惊风，哮喘痰咳，咽喉肿痛，口腔炎，牙周炎，风湿痹痛，胃痛，腹痛，跌打损伤。煎服：3～9克。②治白喉。鲜根30克，捣汁服，每日数次。③治关节肿痛，蛇咬伤。捣烂外敷。

娃娃拳 见《民间常用草药汇编》。为扁担杆之别名，详该条。

蚤休 出《神农本草经》。为七叶一枝花之别名，详该条。

骆驼刺糖 见《新疆药材》。为刺蜜之别名，详该条。

骆驼蒿 见《陕甘宁青中草药选》。即骆驼蓬，详该条。

骆驼蓬 见《新疆中草药手册》。又名苦苦菜、骆驼蒿。为蒺藜科植物骆驼蓬Peganum harmala L.的全草。分布华北、西北地区。辛、苦，凉，有毒。祛风湿，消肿毒。①治风湿性关节炎，皮肤瘙痒，无名肿毒。煎水洗或捣敷。含左旋鸭嘴花碱、哈尔明碱等多种生物碱。另含骆驼蓬酸(Pegaline)。

骆驼蓬子 见《新疆中草药手册》。为蒺藜科植物骆驼蓬Peganum harmala L.的种子。苦，温，有毒。宣肺止咳，祛风湿，解毒。①治咳嗽气喘，小便不利。研末，加蜂蜜开水冲服：0.6～1.2克。②治关

节痠痛。榨油外涂。③制丸服可试用于食道癌。本品含哈尔明碱、骆驼蓬碱、去甲骆驼蓬碱、鸭嘴花碱等。在动物试验中，骆驼蓬碱对皮层及其运动中枢、脊髓有兴奋作用，可引起幻觉、震颤以及阵发性惊厥。曾用以治帕金森氏症，有短暂疗效。骆驼蓬碱还能松弛小肠平滑肌，但也有抗胆碱酯酶作用。对孕妇子宫有兴奋作用。此外有抗阿米巴、抗疟、抗菌及驱蛔作用。

孩儿参 见《饮片新参》。为太子参之别名，详该条。

孩儿草 ❶见萧步丹《岭南采药录》。又名由甲草、黄蜂草、土夏枯草、疳积草、蓝色草。为爵床科植物孩儿草Rungia Pectinata（L.）Nees的全草。分布台湾、广东、广西、云南等地。淡、微苦，凉。消积滞，清肝火。①治小儿消化不良，食欲不振，喉痛，肝炎，痢疾，急性眼结膜炎，颈淋巴结结核。煎服，9～15克。②治疖肿，蛇咬伤。煎服并捣敷。❷见《全国中草药汇编》。为爵床之别名，详该条。

孩儿茶 出《饮膳正要》。即儿茶，详该条。

绒毛鸡 见《中药志》。为乌骨鸡之别名，详该条。

绒毛鸭脚木 见《广西本草选编》。又名大加皮、野巴戟、隔子通。为五加科植物穗序鹅掌柴Schefflera delavayi(Franch.)Harms.的根、根皮或茎。分布广西、四川、云南等地。苦、涩，平。祛风活络，强筋骨。治风湿关节痛，腰肌劳损。煎服：15～30克。捣敷骨折，扭挫伤，无名肿毒。

绒背蓟 见《全国中草药汇编》。又名猫腿姑、刺毛菇。为菊科植物绒背蓟Cirsium vlassovianum Fisch.的块根。分布东北、华北地区。微辛，温。祛风，除湿，止痛。治风湿性关节炎，四肢麻木。煎服：3～6克。

绕绕藤 见《浙江中药资源名录》。为野木瓜之别名，详该条。

绛矾 出《新修本草》。即绿矾，详该条。

绛梨木子 见《重庆草药》。又名打枪子、叫梨子、叫铃子、鹿角刺果。为鼠李科植物薄叶鼠李Rhamnus leptophyllus Schneid.的果实。分布陕西、甘肃、河南、湖北、湖南及华南、西南地区。苦、辛，平。消食去积，活血，利水。治食积饱胀，痢疾，水肿，臌胀，经闭。煎服：3～9克。孕妇忌服。根名绛梨木根，又名黑龙须，铁包金。功用与绛梨木子同。根含1-O-甲基肌醇。

络石藤 出《本草拾遗》。又名爬山虎、吸壁藤、沿壁藤、石龙藤。为夹竹桃科植物络石Trachelospermum jasminoides（Lindl.）Lem.的带叶茎藤。主产江苏、安徽、湖北、山东。苦，微寒。入肝、肾经。祛风通络，活血止痛。①治风湿痹痛，筋脉拘挛，痈肿，喉痹咽塞，产后恶露不行，跌打损伤。煎服：6～12克。②治外伤出血。鲜叶捣敷。本品含牛蒡甙（Arctiin）、络石糖甙（Tracheloside）、降络石糖甙、罗汉松树脂酚甙、橡胶肌醇（Dambonitol）等。煎剂在体外能抑制金黄色葡萄球菌，痢疾及伤寒杆菌。牛蒡甙可引起血管扩张，血压下降，大量可使动物腹泻、惊厥乃至呼吸衰竭。

绞蛆爬 见《内蒙古中草药》。为黄蓬花之别名，详该条。

十 画

〔一〕

艳山花 见《贵州民间方药集》。为杜鹃花之别名，详该条。

珠儿参 出《本草从新》。又名珠参、钮子七。为五加科植物珠子参Panax japonicus C.A.Mey.var.major(Burk.)C.Y.Wu et K.M.Feng呈串珠状的根茎。主产云南。苦、甘，寒。补肺清热，养阴生津，止血，散瘀。①治热病烦渴，阴虚咳嗽，咳血，鼻衄，咽痛，胃痛，风湿性关节炎，跌打损伤。煎服：6～9克。②治外伤出血。研末调敷。根茎含皂甙，从中分离出竹节人参皂甙Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ三种纯品。还含挥发油，内有β-檀香烯、β-金合欢烯。本品和竹节参的混合煎剂有糖皮质激素样作用，对大鼠有明显的抗炎作用。

珠参 见《本草纲目拾遗》。即珠儿参，详该条。

秦艽 出《神农本草经》。又名秦胶、秦纠、左扭、左秦艽。为龙胆科植物秦艽Gentiana macrophylla Pall.或粗茎秦艽G.crassicaulis Duthie ex Burkill等的根。主产甘肃、陕西、山西、四川、云南等地。苦、辛，平。入胃、肝、胆经。祛风除湿，和血舒筋，退黄疸，清虚热。治风湿痹痛，筋骨拘挛，肢体酸疼烦热，湿热黄疸，肠风便血，骨蒸潮热，小儿疳热。煎服：4.5～9克。秦艽根含秦艽碱甲（龙胆宁碱），秦艽碱乙（龙胆次碱）和秦艽碱丙（Gentianol）；还含挥发油等。秦艽碱甲能抑制中枢神经，对大鼠有镇痛和镇静作用；大剂量时反而出现兴奋。对大鼠实验性关节炎有抗炎作用；还有抗过敏性休克及抗组织胺作用，降低毛细血管通透性。短暂降压和升高血糖的作用。中毒时出现严重恶心、呕吐等症状。秦艽醇浸液在体外对金黄色葡萄球菌，肺炎球菌，痢疾、伤寒等杆菌有抑制作用。水浸液能抑制常见致病性皮肤真菌。

秦归 见《本草纲目》。为当归之药材名，详该条。

秦皮 出《神农本草经》。又名蜡树皮、苦榴皮、梣皮。为木犀科植物苦枥白蜡树Fraxinus rhynchophylla Hance或白蜡树F.chinensis Roxb.等的树皮。主产陕西、河北、河南等地。苦、涩，寒。入大肠、肝、胆经。清热燥湿，止咳祛痰，凉肝明目。①治热毒泻痢，白带，慢性气管炎。煎服：4.5～9克。②治目赤肿痛，目生翳障。水浸汁点眼或煎汤洗眼；牛皮癣。煎水洗。苦枥白腊树皮含马栗树皮素、马栗树皮甙、鞣质。白腊树皮含马栗树皮素、秦皮素。马栗树皮素和马栗树皮甙在体外有抑制痢疾杆菌的作用。对大鼠实验性关节炎有消炎作用；对大鼠及兔还有促进尿酸排泄的作用，并有止咳、祛痰的功效，前者尚能平喘。

秦纠 出《新修本草》。即秦艽，详该条。

秦胶 出《本草经集注》。即秦艽，详该条。

素馨花 出《本草纲目》。又名耶悉茗花、玉芙蓉。为木犀科植物素馨花Jasminum officinale L.var. grandiflorum (L.) Kobuski或素方花J.officinale L.的花蕾。各地均有栽培。微苦，平。疏肝，理气，止痛。治肝炎、肝硬化肝区疼痛，胁肋不舒，胃痛，下痢腹痛。煎服：6～9克。鲜花含挥发油、内含乙酸苄脂、芳樟醇、茉莉花素（Jasmone）、吲哚及邻氨基苯甲酸甲脂。

蚕衣 见《山东中草药手册》。即蚕蜕，详该条。

蚕豆 出《救荒本草》。又名胡豆、寒豆、夏豆。为豆科植物蚕豆Vicia faba L.的种子。全国大部分地区有栽培。甘，平。入脾、胃经。健脾利湿。①治膈食。炒熟磨粉，红糖拌食，每日60克。②治水肿。同黄牛肉炖服。本品含L-多巴（3，4-二羟基苯丙氨酸）、巢菜碱甙（葡萄糖-6-磷酸的拮抗物）、哌啶酸-2及植物凝集素。极少数有先天性生化缺陷的人，在食入蚕虫或吸入其花粉后，可发生急性溶血性贫血（名蚕豆黄病），其原因是其血细胞中缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD），因而其还原型的谷胱甘肽含量也很低，故巢菜碱甙（或蚕豆中的其他有关成分）侵入后，发生血细胞溶解。

蚕豆叶 见《现代实用中药》。为豆科植物蚕豆Vicia faba L.的叶。苦、微甘，温。止血。①治肺结核咯血，消化道出血。鲜叶捣汁服，每次20毫升，每日二次。②治臁疮多年不愈。捣烂外敷。本品含山柰酚-3-葡萄糖甙-7-鼠李糖甙，D-甘油酸，5-甲酰四氢叶酸，叶绿醌，游离氨基酸，并含丰富的多巴（2，4-二羟基苯丙氨酸）。甘油酸有利尿作用。

蚕豆皮 见清·赵其光《本草求原》。即蚕豆壳，详该条。

蚕豆衣 见上海中医学院《中草药学》。即蚕豆壳，详该条。

蚕豆壳 出《本草纲目拾遗》。又名蚕豆皮、蚕豆衣。为豆科植物蚕豆Vicia faba L.的种皮。甘、淡，平。健脾利湿。①治水肿，脚气，小便不利。煎服：9～15克。②治天疱疮，黄水疮。煅存性研末油调敷。本品含β-〔3-（β-D-吡喃葡糖氧基）-4-羟苯基〕-L-丙氨酸，L-酪氨酸及多巴。

蚕豆花 见《现代实用中药》。为豆科植物蚕豆Vicia faba L.的花。甘、涩，平。凉血止血，止带，降血压。治吐血，咯血，衄血，便血，血痢，漏下，带下，高血压病。煎服：9～30克。

蚕豆茎 见《民间常用草药汇编》。又名蚕豆梗。为豆科植物蚕豆Vicia faba L.的茎。甘、微辛，平。止血，止泻。①治各种内出血，水泻。内服：煎汤，15～30克（鲜品60～90克）；或焙干研末服，每次3克，每日三次。②治烫伤。烧灰油调敷。本品含山柰酚、对羟基苯甲酸、延胡索酸、白桦脂醇及D-甘油酸。药理作用参见蚕豆叶条。

蚕豆荚壳 出明·姚可成《食物本草》。为豆科植物蚕豆Vicia faba L.的果壳。苦、涩，平。止血。①治咯血，鼻衄，尿血，消化道出血。煎服：15～30克。②治天疱疮，黄水疮，烫伤。煅存性研末油调敷。本品含β-〔3-（β-D-吡喃葡糖氧基）-4-羟苯基〕-L-丙氨酸，甘油酸。

蚕豆梗 见《上海常用中草药》。即蚕豆茎，详该条。

蚕连 见《本草纲目》。为蚕退纸之别名，详该条。

蚕连纸 见《本草纲目》。即蚕退纸，详该条。

蚕沙 出《本草经集注》。为原蚕沙之简称，详该条。

蚕纸 出《肘后方》。即蚕退纸，详该条。

蚕茧 出《本草纲目》。为蚕蛾科昆虫家蚕Bombyx mori L.的茧壳。甘，温。止渴，止血，破痈。①治消渴，反胃吐食，蛔虫病，便血，尿血，血崩。内服：煎汤，3～9克；研末，1.5～3克。②治痈肿无头。煅研温酒冲服；口舌破烂。研末蜂蜜调搽。蚕茧由丝纤蛋白、丝胶蛋白粘结而成，尚含少量油脂类、色素、无机物等。蚕茧乙醇提取物有M-胆碱脂作用。

蚕故纸 出《卫生易简方》。为蚕退纸之

别名，详该条。

蚕退 见《嘉祐补注神农本草》。即蚕蜕，详该条。

蚕退纸 出《嘉祐补注神农本草》。又名蚕纸、蚕蜕纸、蚕连、蚕连纸、蚕故纸。为蚕蛾科昆虫家蚕Bombyx mori L.的卵壳。甘，平。止血，止痢，祛风。①治吐血，衄血，痔血，崩漏，带下，痢疾，缠喉风，喉痹。内服：煅研为末，1.5～6克；或为丸含咽。②治牙痛，牙宣，牙疳，牙痈。煅研搽患处。蚕卵壳外层含多酚类，中层、内层含类脂，最内层含类脂及蛋白质。

蚕蜕 见《本草纲目》。又名蚕衣、蚕退、马明退。为蚕蛾科昆虫家蚕 Bombyx mori L.幼虫的蜕皮。甘，平。祛风止血。①治崩漏，带下，赤白痢疾，肠风下血，吐血，衄血，热淋，尿血。焙干研末服，1.5～3克，每日二次。②治牙疳，牙宣，口疮，缠喉风，目翳，疔疮肿痛。研末撒患部。本品含甲壳质的分解产物，主含N-乙酰胺基葡萄糖、D-葡萄糖胺及少量葡萄糖胺酸。另含蜡质，烃，甾醇类及磷脂。

蚕蜕纸 出《太平圣惠方》。即蚕退纸，详该条。

蚕蛹 出《日华子诸家本草》。为蚕蛾科昆虫家蚕Bombyx mori L.的蛹。甘，平。祛风，健脾，止渴。①治消渴多尿，小儿疳积羸瘦，蛔虫病。内服：煎汤，9～15克；研末，3～6克，日服二次；炒食或捣烂绞汁服。②治高胆甾醇血症。取蚕蛹油提纯品制成丸剂，（每丸含亚油酸、亚麻酸150毫克，维生素E0.5毫克）内服，每日三次，每次6丸。本品含蜕皮松、羟基蜕皮松、蛹油甾醇（Bombicesterin）、蛹醇（Bombykol）、多种不饱和脂肪酸、叶酸、酚类化合物、维生素B_2和氨基酸。蛹皮含甲壳质。

桂丁 出《本草纲目拾遗》。又名桂丁香、肉桂子。为樟科植物肉桂 Cinnamomum cassia Presl的幼嫩果实。主产广东、广西等地。辛、甘，温。温中，散寒。治脘腹疼痛，呕哕，肺寒咳喘。煎服：3～6克。本品含生物碱、皂甙、鞣质、挥发油，油中主含桂皮醛。药理参见肉桂条。

桂丁香 见《上海饮片炮制规范》。即桂丁，详该条。

桂心 见《千金翼方》。为肉桂药材之一种，系加工除去栓皮者，详肉桂条。

桂枝 出《新修本草》。为樟科植物肉桂 Cinnamomum cassia Presl的嫩枝。主产广东、广西等地。辛、甘，温。入肺、心、膀胱经。发汗解肌，温经通阳。治风寒感冒，风湿痹痛，痛经，闭经，痰饮咳喘，小便不利。煎服：3～9克。各种出血患者及孕妇忌服。本品含挥发油，主为桂皮醛。药理参见肉桂条。

桂圆肉 见《药品化义》。为龙眼肉之别名，详该条。

桔梗 出《神农本草经》。又名苦桔梗、玉桔梗、大药。为桔梗科植物桔梗 Platycodon grandiflorum(Jacq.)A.DC.的根。主产安徽、河北、河南、湖北、辽宁、吉林、内蒙古。苦、辛，平。入肺经。宣肺，祛痰，利咽排脓。①治感冒咳嗽，痰多不爽，咽喉肿痛，音哑，胸满痞闷，肺痈咳吐脓血。煎服：3～6克。根含多种皂甙，其中最主要的是桔梗皂甙D（Platycodin-D）。还含桔梗聚糖、桔梗酸（Platycogenic acid）和植物甾醇等。桔梗口服能刺激胃粘膜，反射性引起支气管腺体分泌增多而起祛痰作用，它还有降血脂作用。用量过大可致恶心、呕吐。桔梗有溶血作用，不能注射给药。桔梗三萜甙混合物（Platycodin）对大鼠有镇静及抗炎作用，并能阻止实验性胃溃疡的形成。

桐子 见《本草纲目》。为油桐子之简称，详该条。

桐子油 见《本草纲目》。即桐油，详该条。

桐子树叶 见清·刘士季《草木便方》。为油桐叶之别名，详该条。

桐子树根 见清·刘士季《草木便方》。为油桐根之别名，详该条。

桐木皮 见《本草纲目》。即桐皮，详该条。

桐叶 出《神农本草经》。又名白桐叶。为玄参科植物泡桐Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.或毛泡桐P.tomentosa (Thunb.) Steud.的叶。前者分布长江流域及其以南各地；后者分布辽东半岛及河北、河南、山东、江苏、安徽、江西等地。苦，寒。清热解毒，利水消肿。①治手足浮肿。煎服：15～30克。②治痈疽肿毒。煎服、捣敷或以醋蒸贴。毛泡桐叶含三萜类皂甙元熊果酸、泡桐素、右旋芝麻素、杜鹃花醇、糖甙及多酚类。叶泡沫提出物对小鼠有祛痰作用。

桐皮 出《神农本草经》。又名白桐皮、桐木皮、水桐树皮。为玄参科植物泡桐Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.或毛泡桐P. tomentosa(Thunb.)Steud.的树皮。苦，寒。清热利湿，解毒。①治热病烦躁，淋病，痔血。煎服：15～30克。②治痈肿。煎服并捣敷；丹毒。煎汁涂；跌打损伤。研末，醋炒，热敷患部。泡桐或毛泡桐的木材名桐木。煎服并浸足，治肿从脚起。毛泡桐树皮含丁香甙。

桐油 出《日华子诸家本草》。又名桐子油。为大戟科植物油桐Aleurites fordii Hemsl.种子所榨出的油。多栽培于中南、西南、华南、华东及陕西、甘肃等地。甘、辛，寒，有毒。杀虫解毒，探吐风痰。①治疥癣，齿槽脓肿。局部涂擦；汤火伤。先取石灰一块投入适量水中搅拌之，取其上面澄清水，入桐油数滴，急搅之，片时成乳白色胶状物，频频涂敷患部；慢性溃疡。和鲜桑白皮适量捣敷。②治风痰喉痹。以水和油，扫入喉中探吐。不可内服。本品主为桐酸、异桐酸及油酸的甘油酯。有剧烈泻下作用。

桐油树子 见萧步丹《岭南采药录》。即油桐子，详该条。

桐油树根 见《贵州草药》。即油桐根，详该条。

桐根 见《重庆草药》。为玄参科植物泡桐Paulownia fortunei (Seem.)Hemsl.或毛泡桐P.tomentosa (Thunb.)Steud.的根或根皮。苦，寒。祛风利湿，清热解毒。①治风湿痹痛，慢性肝炎，早期肝硬化，肠风痔血，血崩白带。煎服：15～30克。②治痈疮肿毒。煎服并捣敷；跌打损伤。捣烂，加酒炒热外敷。

栝楼 出《神农本草经》。又名栝楼实、瓜蒌、杜瓜、药瓜、全瓜蒌。为葫芦科植物栝楼Trichosanthes kirilowii Maxim.或双边栝楼T.uniflora Hao的果实。主产山东、安徽、河南等地。甘、苦，寒。入肺、胃、大肠经。清肺，化痰，宽胸散结，润肠。治痰热咳喘，肺痈，胸痹，结胸，冠心病，乳痈肿痛，消渴，黄疸，便秘。煎服：9～15克。反川乌、草乌。栝楼含三萜皂甙、蛋白质、有机酸、糖类、树脂等。注射液对豚鼠离体心脏有增加冠脉流量的作用，并能增加小鼠耐缺氧的能力。栝楼对小鼠有镇静作用，并对小鼠肉瘤及腹水癌细胞有抑制作用。在体外对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、链球菌、绿脓杆菌、流感杆菌等有抑制作用。

栝楼子 出《本草经集注》。又名瓜蒌仁、栝楼仁。为葫芦科植物栝楼Trichosantnes kirilowii Maxim. 或双边栝楼T. uniflora Hao、大子栝楼T.truncata C.B. Clarke等的种子。主产安徽、山东、河南、广东、广西、云南等地。甘，寒。入肺、胃、大肠经。润肺化痰，滑肠。治肺热咳嗽，痰粘不易咯出，燥结便秘。煎服：9～12克。反川乌、草乌。栝楼仁含皂甙、树脂及脂肪油（内含栝楼酸）等。药理作用与栝

楼皮同，但较弱。

栝楼仁 出《药性类明》。即栝楼子，详该条。

栝楼皮 出《雷公炮炙论》。又名栝楼壳、瓜蒌皮。为葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 或双边栝楼 T.uniflora Hao等的果皮。我国大部分地区均产。甘，寒。入肺、胃经。清肺化痰，宽胸散结。治肺热咳嗽，咽痛，胸痹，消渴，便秘。煎服：9～12克。反川乌、草乌。栝楼果皮含皂甙、有机酸、树脂等。对离体豚鼠心脏能增加冠脉流量，皮的作用比种子显著。提取物尚能增加小鼠耐缺氧的能力。在体外对腹水癌细胞有杀死作用。

栝楼壳 见《中药形性经验鉴别法》。即栝楼皮，详该条。

栝楼茎叶 出《名医别录》。为葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 或双边栝楼T.uniflora Hao等的茎叶。酸，寒。解暑。治中热伤暑。煎服：9～15克。栝楼叶含山柰甙。

栝楼实 出《金匮要略》。即栝楼，详该条。

栝楼根 出《神农本草经》。为天花粉之别名，详该条。

桦木皮 出《开宝重定本草》。又名桦皮、桦树皮。为桦木科植物华北白桦Betula platyphylla Suk. var. japonica (Sieb.) Hara或白桦B. platyphylla Suk.的树皮。前者分布山西、河北等地；后者分布东北、西北、西南地区和内蒙古等地。苦，平。清热利湿，解毒，祛痰止咳。①治急性扁桃体炎，肠炎，痢疾，黄疸，尿路感染，乳腺炎，肺炎，支气管炎。煎服：9～30克。②研末调敷烧烫伤，痈疖肿毒。华北白桦树皮含白桦脂醇、脂肪酸、鞣质、白桦甙（Betuloside）和华北白桦甙（Platyphyllin）。白桦树皮含白桦脂醇。桦树皮的水、甲醇、酸性乙醇的提取物给小白鼠腹腔注射有镇咳作用。桦树皮的水或甲醇提取物均有明显的祛痰效果。乙醇处理的桦树皮水提取物对豚鼠有一定的平喘作用。煎剂在体外对肺炎双球菌、卡他球菌、甲型链球菌有抑制作用。

桦皮 出《灵苑方》。即桦木皮，详该条。

桦树皮 见《吉林中草药》。即桦木皮，详该条。

桃儿七 见《陕西中草药》。又名桃耳七、小叶莲。为小蘖科植物桃儿七Podophyllum emodi Wall. var.chinense Sprague的根及根茎。分布陕西、甘肃、青海、四川、云南和西藏等地。苦，温。有小毒。祛风除湿，止咳止痛，活血解毒。治风湿疼痛，麻木，跌打损伤，胃痛，风寒喘咳，月经不调，解铁棒锤中毒。内服：煎汤，1.5～6克；酒浸服，每次0.6～0.9克。根含鬼臼毒素（Podophyllotoxin）、槲皮素、山柰酚及较多量树脂成分。鬼臼毒素能抑制细胞有丝分裂于中期，对动物肿瘤有明显的抑制作用，但治疗指数低，对人的毒性大，无药用价值。现临床上用其衍生物如鬼臼酸乙肼或其苄叉衍生物等。

桃子草 见《湖南药物志》。为地桃花之别名，详该条。

桃仁 出《本草经集注》。又名桃核仁。为蔷薇科植物桃Prunus persica（L.）Batsch或山桃P. davidiana(Carr.)Franch.的种仁。主产四川、云南、陕西、山东、河北等地。苦、甘，平。入心、肝、大肠经。活血行瘀，润燥滑肠。治痛经，闭经，产后瘀阻腹痛，癥瘕积聚，跌打损伤，肺痈，肠痈，肠燥便秘，皮肤血热燥痒，血滞风痹。煎服：4.5～9克。孕妇忌服。本品含苦杏仁甙、苦杏仁酶、挥发油及脂肪油。醇提取物有抑制血液凝固作用。苦杏仁甙药理见巴旦杏仁条。

桃叶 出《名医别录》。为蔷薇科植物桃 Prunus persica（L.）Batsch 或山桃

P.davidiana(Carr.)Franch.的叶。苦,平。清热解毒，祛风杀虫。①治痈疖初起，鲜品捣敷；湿疹，脚癣，痔疮。煎水熏洗；阴道滴虫。煎汁冲洗。②治疟疾。煎服：60克。每日一剂，连服5天为一疗程。本品含苦杏仁甙、柚皮素、奎宁酸、番茄烃、熊果酸、鞣质、腈甙、β-谷甾醇、卅一烷及卅一烷醇。煎剂对福氏痢疾杆菌有抑制作用。在体外有杀灭钩端螺旋体和日本血吸虫尾蚴的作用。浸液有杀灭孑孓的效果。

桃白皮 出《本草图经》。即桃茎白皮，详该条。

桃奴 出《名医别录》。为碧桃干之别名，详该条。

桃皮 出《本草经集注》。即桃茎白皮，详该条。

桃耳七 见《陕西草药》。即桃儿七，详该条。

桃花 出《神农本草经》。为蔷薇科植物桃Prunus persica (L.) Batsch或山桃P.davidiana (Carr.) Franch.的花。苦，平。利水，通便，活血。治水肿，腹水，脚气，痰饮，二便不利，经闭。内服：煎汤，3～6克；或研末服，每次1.5克，每日二至三次。孕妇忌服。桃花含山柰酚、香豆素。白桃花含三叶豆甙。花蕾含柚皮素。

桃茎白皮 出《名医别录》。又名桃皮、桃树皮、桃白皮。为蔷薇科植物桃Prunus persica (L.) Batsch或山桃P.davidiana (Carr.) Franch.树干的韧皮部。苦，平。①治水肿，卒心痛，痧气腹痛，喉痹。煎服：9～15克。②研末醋调敷湿癣；煎水含漱治牙痛。桃树皮含柚皮素(Naringenin)、香橙素、桃甙元、桃甙(Persicoside, Persiconin)卅烷酸甲酯、β-谷甾醇、焦性儿茶酚。

桃金娘花 出《本草纲目拾遗》。为桃金娘科植物桃金娘Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.的花。分布福建、台湾、广东、广西、云南、贵州、湖南。甘、涩，平。行血止血。治肺结核咳血，鼻衄。煎服：6～12克。

桃枭 出《神农本草经》。为碧桃干之别名，详该条。

桃树皮 出《备急千金要方》。即桃茎白皮，详该条。

桃树胶 见《上海常用中草药》。即桃胶，详该条。

桃南瓜 见《中医杂志》(12)：812，1958。又名金瓜、鼎足瓜、看瓜、吊瓜、红南瓜。为葫芦科植物桃南瓜Cucurbita pepo L. var.akoda Mak.的果实。河北、江苏、广西、四川等地均有栽培。甘、微苦，平。平喘，止咳。治支气管哮喘，咳嗽。内服：挖开瓜蒂作盖，放入冰糖及蜂蜜，盖紧蒂盖，蒸熟后，食瓜瓤及子，一个瓜吃二至三天，连服4～5个瓜为一个疗程。

桃核仁 出《神农本草经》。即桃仁，详该条。

桃根 出《经史证类备急本草》。为蔷薇科植物桃Prunus persica (L.) Batsch或山桃P.davidiana(Carr.) Franch.的根。苦，平。清热利湿，活血止痛，截疟，杀虫。①治黄疸，风湿关节痛，腰痛，跌打损伤，吐血，衄血，经闭，间日疟，丝虫病。煎服：15～30克。②煎水洗痈肿，痔疮。孕妇忌服。桃根皮含右旋儿茶精、没食子酰表儿茶精、橙皮素-5-葡萄糖甙、苯甲酸等。

桃胶 出《名医别录》。又名桃树胶。为蔷薇科植物桃Prunus persica(L.) Batsch或山桃P. davidiana (Carr.) Franch.等的树脂。甘、苦，平。和血益气。治石淋，血淋，痢疾，糖尿病，乳糜尿，虚热作渴，小儿疳积。煎服：9～15克。本品为一种多糖类物质，水解后得阿拉伯糖、半乳糖、甘露糖、鼠李糖及葡萄糖醛酸等。

核桃仁 见《本草纲目》。即胡桃仁，详该条。

核桃虫 见《药材学》。为蛴螬之别名，详该条。

核桃楸皮 见《中药志》。又名楸皮、楸树皮。为胡桃科植物核桃楸Juglans mandshurica Maxim.的枝皮或干皮。产河南、河北、陕西、黑龙江、吉林、甘肃等地。苦，寒。清热燥湿，明目。治湿热泄泻，痢疾，白带，急性结膜炎，麦粒肿，骨结核。煎服：4.5～9克。树皮含甙类及大量鞣质等。

核桃楸果 见《东北药用植物志》。又名马核果、楸马核果。为胡桃科植物核桃楸 Juglans mandshurica Maxim. 的未成熟绿色果实或果皮。辛，平，有毒。止痛。①治胃炎、胃及十二指肠溃疡等痉挛性腹痛。本品6斤，轧碎，用烧酒10斤浸泡二至三周，去渣。成人每服10～15毫升，日服二至三次。②治神经性皮炎。鲜品捣烂搽患处。果实富含维生素C。果仁含油脂（40～50%）、蛋白质及糖。

桉叶 见《药材资料汇编》。为桃金娘科植物蓝桉Eucalyptus globulus Labiil.或大叶桉E.robusta Smith等的叶。我国西南部和南部都有栽培。苦、辛，凉。疏风清热，解毒，杀虫。①治感冒，流行性感冒，支气管炎，肺炎，肠炎，痢疾，间日疟，泌尿系感染，丝虫病，钩虫病。煎服：9～15克（鲜品15～30克）。②治小儿头疮、烧烫伤、神经性皮炎、疥癣。煎水洗；丹毒、蜂窝组织炎、深部脓肿、带状疱疹，创伤感染，水煎服，并用20%溶液湿敷。本品有刺激性，临产妇忌服；消化道溃疡病人慎用。蓝桉叶含挥发油，油中主含桉叶素、蒎烯、莰烯、蓝桉醇（Globulol）、表蓝桉醇、喇叭醇、番橙烯等。并含桉树素（Eucalyptin）、芸香甙、金丝桃甙、槲皮甙、槲皮素等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、卡他球菌、绿脓杆菌、福氏及宋氏痢疾杆菌等有抑制作用。桉叶油在试管内有抗结核菌作用。浸剂和桉叶油内服有祛痰作用。

根下红 见《全国中草药汇编》。为红根草之别名，详该条。

都拉参 见《四川中药志》。为肚拉之别名，详该条。

都淋藤 出《补缺肘后方》。为天仙藤之别名，详该条。

真珠 出《本草经集注》。即珍珠，详该条。

真珠母 见《中国药学大辞典》。即珍珠母，详该条。

真珠花 见《闽东本草》。为荷苞花之别名，详该条。

真珠草 见《本草纲目拾遗》。即珍珠草，详该条。

索人衣 见《江西草药》。为鬼针草之别名，详该条。

索子果 见《南宁市药物志》。为使君子之别名，详该条。

索骨丹 见《陕西中药志》。为慕荷之别名，详该条。

索菜 出《漳浦县志》。为紫菜之别名，详该条。

壶卢 出《日华子诸家本草》。又名葫芦、葫芦瓜。为葫芦科植物瓢瓜Lagenaria siceraria（Molina）Standl. var. depressa（Ser.）Hara的果实。甘、淡，平。入肺、脾、肾经。利水通淋。治水肿，腹胀，淋病，黄疸。煎服：15～30克。本品含瓜氨酸。

壶卢子 出《本草纲目》。为葫芦科植物瓢瓜Lagenaria siceraria(Molina）Standl.var. depressa（Ser.）Hara的种子。治龈肿、齿痛。用本品50克，牛膝25克煎水含漱，每日三至四次。

荇菜 出《新修本草》。又名荇丝菜、莕蔬菜、屑子菜、水镜草、马脚莲。为龙胆科植物荇菜Nymphoides peltatum(Gmel.）O.Ktze.的全草。我国南北各地均有分布。甘、辛，寒。发汗，透疹，清热，利尿，消

肿解毒。①治感冒发热无汗，麻疹透发不畅，荨麻疹，烦热，消渴，热淋，小便不利，小儿便秘。煎服，9～15克。②治丹毒，痈肿。鲜草捣敷。叶含芸香甙、槲皮素-3-巢菜糖甙（β-Vicianosyl-3-quercetin）。

荸荠 出《日用本草》。又名乌芋、地栗、马蹄。为莎草科植物荸荠 Eleocharis tuberosa（Roxb.）Roem.et Schult.的球茎。我国大部分地区均产。甘，寒。入肺、胃经。清热凉血，化痰，消积。①治热病烦渴，痰热咳嗽，矽肺，咽喉肿痛，口腔炎，痰核，瘰疬。②治黄疸，热淋，膈气，痞积，血痢，便血，血崩，高血压病。内服：煎汤，60～120克；或捣汁饮。③取汁滴目或澄粉配眼药点目，治目赤热痛及障翳。本品含荸荠英（Puchiin），对金黄色葡萄球菌及大肠杆菌等有抑制作用。

荸荠苗 见《苏州本产药材》。即通天草，详该条。

荠草 出《神农本草经》。又名红茴香、山木蟹。为木兰科植物狭叶茴香 Illicium lanceolatum A.C.Smith的叶。分布长江中、下游以南各地。辛，温，有毒。祛风，消肿。外用治头风，痈肿，瘰疬，皮肤麻痹，疥癣，秃疮。煎水洗或研末调敷。狭叶茴香的根及根皮名红茴香根，捣敷治跌打损伤。内服可治风湿痹痛，但本品有大毒，一般不宜使用。叶含挥发油。

莱阳参 见《江苏省植物药材志》。为北沙参之别名，详该条。

莱菔 出《新修本草》。又名紫菘、萝卜、为十字花科植物莱菔 Raphanus sativus L.的根。辛、甘，凉。入肺、胃经。化痰热，散瘀血，消积滞。①治痰嗽失音，吐血，衄血，消渴。捣汁饮：30～100毫升。②治食积胀满，反胃吞酸，痢疾。煮食或生嚼数片。③治偏正头痛。取汁随左右滴鼻中。本品含糖类，香豆酸、阿魏酸等有机酸和多种氨基酸。又含胡卢巴碱，胆碱，腺嘌呤等。鲜根含甲硫醇、维生素C。醇提取物有抗菌作用，特别是对革兰氏阳性细菌较敏感；有血清时，活力降低一半。榨取之汁液，可防止胆石形成而应用于胆石症。

莱菔子 出《本草衍义补遗》。又名萝卜子。为十字花科植物莱菔 Raphanus sativus L.的种子。辛、甘，平。入肺、胃经。下气，化痰，消食。①治咳嗽痰喘，食积气滞，胸闷腹胀，便秘，下痢后重。煎服：9～15克。②生研服，吐风痰；醋研敷，消肿毒。③研烂，热酒调敷跌打损伤，瘀血肿痛。本品含莱菔素（Raphanin）、脂肪油、挥发油、植物甾醇等。脂肪油中含多量芥酸、芥子酸甘油酯等。挥发油中含甲硫醇等。莱菔素在体外对葡萄球菌和大肠杆菌有抑制作用。水浸剂能抑制常见致病性皮肤真菌生长。

莱菔叶 出《新修本草》。又名萝卜缨、莱菔甲、萝卜甲。为十字花科植物莱菔Raphanus sativus L.的叶。辛、苦，平。清利咽喉，消食和中。治咽痛音哑，胸膈痞闷，食滞不消，呕吐酸水，痢疾，乳汁不通。煎服：15～60克。本品含叶黄素和挥发油，油中有α-，β-己烯醛及β-，γ-己烯醇。

莱菔甲 见《现代实用中药》。为莱菔叶之别名，详该条。

莲子 出《本草经集注》。又名藕实、莲蓬子、莲肉。为睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn.的种子。主产湖南、湖北、福建、江苏、浙江、江西。甘、涩，平。入心、脾、肾经。养心益肾，健脾止泻。治心悸，失眠，遗精，淋浊，久泻，虚痢，崩漏，白带。煎服：6～12克。莲实成熟后，堕入池塘淤泥中，经久坚黑如石者名石莲子，又名甜莲子。功能涤除热毒，止呕开胃，可治噤口痢。莲子含多量淀粉，棉子糖，还含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁等。子莫含荷叶碱、N-去甲基荷叶碱、氧化黄心树宁碱及N-去甲亚美罂粟碱。

莲子心 出《食性本草》。又名莲心、莲薏、苦薏。为睡莲科植物莲Nelumbo nucifera Gaertn.的胚芽。苦，寒。入心、肾经。清心，涩精，止血，降血压。治热病神昏谵语，心烦失眠，遗精，吐血，高血压病。煎服：1.5～3克。本品含莲心碱、甲基莲心碱、去甲基乌药碱、非晶性生物碱Nn-9等多种生物碱，又含金丝桃甙及芸香甙等。莲心碱对猫有短暂降压效果，改变为季铵盐，则降压作用强而持久。从分离莲心碱母液中得到的非晶性生物碱Nn-9亦具较强的降压作用。其降压原理主要是释放组织胺，其次与神经因素也有关。去甲基乌药碱则具有异丙肾上腺素样的强心作用及平滑肌松弛作用。

莲心 见清·叶小峰《本草再新》。即莲子心，详该条。

莲生桂子花 出《植物名实图考》。又名莲生桂子草、野鹤嘴、山桃花、竹林标。为萝藦科植物马利筋Asclepias curassavica L.的全草。我国各地常有栽培，南方有变为野生者。苦，凉，有小毒。清热解毒，散瘀止血。①治肺炎，支气管炎，扁桃体炎，尿路炎症，月经不调，痛经。煎服：6～9克。②治乳腺炎，痈疖。煎服并捣敷；外伤出血。研末撒；湿疹，顽癣。取乳汁搽；骨折。捣敷。全草含强心甙（粗品称马利筋甙Curassavicin）。叶含细胞毒——卡罗托甙及多种卡烯内酯（如卡罗托甙元、乌他甙元及马利筋甙元等）。马利筋甙，对冷血、温血动物心脏，表现强心甙性质，其作用特点与毒毛旋花子甙相似。卡罗托甙的强心效力与毒毛旋花子甙G接近。

莲生桂子草 见《福建民间草药》。即莲生桂子花，详该条。

莲台夏枯 见《滇南本草》。为宝盖草之别名，详该条。

莲肉 见《本草纲目》。为莲子的处方名，详该条。

莲壳 见《儒门事亲》。为莲房之别名，详该条。

莲花 出《日华子诸家本草》。又名荷花。为睡莲科植物莲Nelumbo nucifera Gaertn.的花蕾。苦、甘，凉。入心、肝经。清热，散瘀止血。①治暑热烦渴，惊痫，咯血，跌损呕血。煎服：3～4.5克。②捣敷天疱疮。花含槲皮素、木犀草素、异槲皮甙、木犀草素葡萄糖甙、山柰酚、山柰酚-3-半乳糖葡萄糖甙、山柰酚-3-二葡萄糖甙等多种黄酮类。

莲花须 见《医学正传》。即莲须，详该条。

莲花姜 见《浙江民间常用草药》。为蘘荷之别名，详该条。

莲花蕊 见《孙天仁集效方》。为莲须之别名，详该条。

莲实 出《尔雅·郭璞注》。即莲子，详该条。

莲房 出《食疗本草》。又名莲蓬壳、莲壳。为睡莲科植物莲Nelumbo nucifera Gaertn.的成熟花托。苦、涩，温。入肝经。消瘀，止血，收敛。①治瘀血腹痛，血崩，月经过多，胎漏下血，血淋，尿血，痔疮脱肛。煎服：4.5～9克。消瘀生用，止血烧存性用。②治黄水疮，天疱疮，乳头裂。烧存性研末调涂。本品含微量莲子碱（Nelumbine）等。

莲须 出《本草通玄》。又名莲花蕊、莲花须、莲蕊须。为睡莲科植物莲Nelumbo nucifera Gaertn.的雄蕊。甘、涩，平。入心、肾经。清心，固肾，涩精，止血。治遗精，滑精，尿频，遗尿，吐血，衄血，血崩，白带。煎服：2.4～4.5克。本品含槲皮素、木犀草素、异槲皮甙、木犀草素葡萄糖甙及生物碱。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、变形杆菌有抑制作用。

莲蒂 见萧步丹《岭南采药录》。为荷叶蒂之别名，详该条。

莲蓬子 见《山西中药志》。即莲子，详该条。

莲蓬壳 出《海上方》。为莲房之别名，详该条。

莲蓬草 见《福建民间草药》。为八角乌之别名，详该条。

莲蕊须 见《本草纲目》。为莲须之别名，详该条。

莲薰 见《本草纲目》。为莲子心之别名，详该条。

莳萝子 出《海药本草》。又名土茴香、蒔谷茴香。为伞形科植物莳萝 Anethum graveolens L.的果实。我国从东北到广东、广西均有栽培。辛，温。入脾、肾经。温胃健脾，散寒止痛。治霍乱呕逆，腹中冷痛，疝气偏坠。煎服：2.4～4.5克。本品含挥发油，油中含葛缕酮、柠檬烯、莳萝油脑、佛手柑内酯等。

莪术 见《医学入门》。为蓬莪术之简称，详该条。

荷叶 出《食疗本草》。为睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn.的叶。全国大部分地区均产。苦、涩，平。入心、肝、脾经。解暑清热，升发清阳，散瘀止血。①治中暑，暑湿泄泻，头痛，眩晕，吐血，咯血，衄血，便血，尿血，崩漏。煎服：3～9克。止血，焙炭用。②治高脂血症。煎水代茶：90～150克，20天为一疗程。③治黄水疮。焙炭研末调敷；漆疮。煎水洗。本品含莲碱、荷叶碱、N-甲基乌药碱等多种生物碱。又含莲甙（Nelumboside），异槲皮甙，维生素C，β-谷甾醇等。荷叶碱类对平滑肌有解痉及降压作用。

荷叶蒂 出《本草拾遗》。又名荷蒂、荷鼻、莲蒂。为睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn.叶的基部。苦，平。清暑去湿，止血安胎。治泻痢，尿血，血崩，胎动不安。煎服：4.5～9克。本品含莲碱、原荷叶碱及荷叶碱。莲碱中毒量能引起蛙、小鼠、兔及犬的惊厥（类似士的宁），小量可降低狗血压、兴奋呼吸，苯巴比妥和水合氯醛有对抗其死亡或惊厥的作用。

荷包草 见清·赵楷《百草镜》。为马蹄金之别名，详该条。

荷花 出《毛诗传》。为莲花之别名，详该条。

荷花丁香 见《宁夏中草药手册》。为暴马子之别名，详该条。

荷苞花 见《民间常用草药汇编》。又名赪桐花、合包花、真珠花、红龙船花、状元红。为马鞭草科植物赪桐Clerodendrum japonicum（Thunb.）Sweet 的花朵。分布浙江及中南、西南地区。甘，平。清肺热。治疝气，咳嗽，带下，痔疮。煎服：30～60克。

荷苞花根 见《民间常用草药汇编》。又名红苓蒻。为马鞭草科植物赪桐 Clerodendrum japonicum（Thunb.）Sweet的根。苦，寒。清湿热，散瘀肿。治肺热咳嗽，黄疸，痢疾，风湿骨痛，跌打损伤，痔疮出血。煎服：30～60克。

荷梗 出清·叶小峰《本草再新》。又名藕杆。为睡莲科植物莲Nelumbo nucifera Gaertn.的叶柄或花柄。微苦，平。清热解暑，通气行水。治暑湿胸闷，泄泻，痢疾，淋病，白带。煎服：9～15克。本品含莲碱、原荷叶碱等多种生物碱，树脂，鞣质等。

荷蒂 见《唐瑶经验方》。为荷叶蒂之简称，详该条。

荷鼻 出《本草拾遗》。为荷叶蒂之别名，详该条。

莸(yóu) 见《浙江民间常用草药》。又名边兰、倒挂金钟、疳积草、对着钱。为马鞭草科植物莸 Caryopteris nepetaefolia（Benth.）Maxim.的全草。分布江苏、安徽、浙江等地。辛、微苦，温。解表，止咳，利湿，止血。①治感冒，百日咳，尿路感染，

白带，小儿疳积。煎服：9～15克。②治外伤出血。鲜叶捣敷。

莎草 出《名医别录》。又名三棱草、回头青、地贯草、土香草、野韭菜、香头草。为莎草科植物莎草Cyperus rotundus L.的茎叶。分布全国各地。①治胸闷不舒，皮肤风痒。煎服：15～30克。②捣敷治痈疽肿毒；捣烂贴涌泉穴、关元穴治水肿，小便短少。本品含无色花青素（Leucocyanidin）。

莎草根 出《名医别录》。即香附，详该条。

莨菪子 出《神农本草经》。为天仙子之别名，详该条。

莨菪叶 见《科学的民间药草》。为茄科植物莨菪Hyoscyamus niger L.的叶。分布我国北部和西南部。苦，寒，有大毒。解痉，镇痛，止泻。治胃痛，神经痛，气管炎，咳喘，腹泻。研末服：每次0.1～0.3克。以本品少许，混烟叶中，吸烟含口内治牙痛。本品含生物碱，主要为天仙子胺（即莨菪碱），天仙子碱（即东莨菪碱）和阿托品，另含天仙子苦甙（Hyospicrin）。药理见“天仙子”条。

莨菪根 出《本草纲目》。为茄科植物莨菪Hyoscyamus niger L.的根。苦，寒，有大毒。治疟疾。烧存性研末服：0.3～0.6克。外用治癣。捣烂，和蜜敷。本品含天仙子胺（即莨菪碱）、天仙子碱（即东莨菪碱）、去水阿托品、托品碱和四甲基二氨基丁烷等生物碱。药理见“莨菪子”条。

菪苾菜 出《嘉祐补注神农本草》。又名莽菜、牛皮菜、杓菜、猪齧菜。为藜科植物菪苾菜Beta vulgaris L.var. cicla L.的茎叶。我国南方及西南地区常见栽培。甘，凉。清热解毒，行瘀止血。①治麻疹透发不快，痢疾，经闭，淋病，吐血。煎服：15～30克（鲜品60～120克）。②治痈肿，创伤。鲜茎叶捣敷。

莼 出《名医别录》。又名丝莼、马蹄草、缺盆草、锦带、马粟草。为睡莲科植物莼菜Brasenia schreberi J. F. Gmel.的茎叶。分布江苏、浙江、江西、湖南、四川、云南等地。甘，凉。清热，解毒，止呕。①治黄疸，热痢，呕吐。煎服或作羹服：适量。②治痈疽疔毒。嫩叶捣敷。本品含少量维生素B_{12}，又含亮氨酸等氨基酸。叶背分泌粘液，其组成中含L-阿拉伯糖、L-岩藻糖、D-半乳糖、D-葡萄糖醛酸、D-甘露糖、L-鼠李糖、D-木糖等。其粘液部分在动物筛选试验中，被认为有抗癌作用。

莺爪风 见清·刘士季《草木便方》。为钩藤之别名，详该条。

盐肤子 见《本草纲目》。即盐麸子，详该条。

盐麸子 出《开宝重定本草》。又名盐肤子、木附子、假五味子、油盐果。为漆树科植物盐肤木Rhus chinensis Mill.的果实。除青海、新疆外，各地均有分布。酸、咸，微寒。生津降火，润肺化痰，敛汗。①治喉痹，痰火咳嗽，酒毒黄疸，瘴疟，毒痢，体虚多汗，头风白屑。煎服：9～15克。②治顽癣，痈毒溃烂。研末调敷或捣敷。本品含大量糅质，还含树脂、黄酮甙等。

盐麸子根 出《日华子诸家本草》。又名五倍根、泡木根。为漆树科植物盐肤木Rhus chinensis Mill.的根或根皮。酸、咸，微寒。清热解毒，祛风湿，散瘀血。①治感冒发热，咳嗽咯血，腹泻，急性黄疸型肝炎，水肿，子宫出血，便血，痔疮出血，风湿痹痛。煎服：9～30克。②鲜根皮捣敷治跌打损伤，创伤出血，蛇咬伤，乳痈；煎水洗癣疮，湿疹。根含抗菌性物质。

盐麸叶 出《开宝重定本草》。为漆树科植物盐肤木Rhus chinensis Mill.的叶。酸、咸，微寒。化痰止咳，解毒。①治痰嗽，便血，血痢。煎服：鲜品30～60克。②捣敷跌打损伤，蛇、犬咬伤，创伤出血，黄蜂螫伤，牛皮癣；煎水洗湿疹，漆疮。本品含槲

皮甙、没食子酸甲酯、并没食子酸。

盐麸树白皮 出《开宝重定本草》。为漆树科植物盐肤木Rhus chinensis Mill.树干的韧皮部。①治血痢，杀蛔虫。煎服：15～60克。②煎水洗无名肿毒，恶疮疥癞，蛇、犬咬伤。

恶实 出《名医别录》。为牛蒡子之别名，详该条。

恶实根 出《名医别录》。为牛蒡根之别名，详该条。

栗子 出《备急千金要方·食治》。又名板栗。为壳斗科植物栗Castanea mollissima Bl.的种仁。我国大部分地区有栽培。甘，温。入脾、胃、肺、肾经。健脾益气，补肾强筋，活血止血。①治泄泻，痢疾，咳嗽，腰脚酸软，筋骨疼痛，瘰疬，吐血，衄血，便血。内服：煎汤，30～60克；生食或煮食。②治创伤肿痛。捣烂敷。种仁含蛋白质5.7%、脂肪2.0%、碳水化合物62%、灰分1.3%、淀粉25%及维生素B等。

栗毛壳 出《新修本草》。为栗毛球之别名，详该条。

栗毛球 出《本草纲目》。又名栗毛壳、栗刺壳、风栗壳、板栗壳斗。为壳斗科植物栗Castanea mollissima Bl.的总苞。化痰，散结，解毒。①治百日咳，瘰疬，痰核。煎服：9～30克。②治丹毒、肿毒。煎水洗。

栗当 出《食医心鉴》。即列当，详该条。

栗花 出《日用本草》。为壳斗科植物栗Castanea mollissima Bl.的花。苦、涩，平。①治痢疾，便血，小儿消化不良，腹泻。煎服：3～9克。②治瘰疬，煎汤或研末服；并同八月瓜、金樱子适量捣敷。本品含精氨酸。

栗刺壳 出《日用本草》。为栗毛球之别名，详该条。

栗树皮 出《食疗本草》。为壳斗科植物栗Castanea mollissima Bl.的树皮。甘、淡，平。解毒，敛疮。治丹毒，口疮。煎水洗；漆疮。煎水洗或同蟹壳各煅存性，研末麻油调敷；癞疮，创伤。烧灰调敷。皮含槲皮素、尿素、色素和鞣质。

栗树根 出明·汪颖《食物本草》。为壳斗科植物栗Castanea mollissima Bl.的根或根皮。甘、淡，平。①治风湿腰腿痛，疝气，牙痛。煎服：9～15克。②治漆疮。根皮同蟹壳煅研为末，麻油调涂。

翅茎香青 见《浙南本草新编》。又名白四轮风、白冷风。为菊科植物翅茎香青Anaphalis sinica Hance f. pterocaulon (Franch. et Sav.)Ling的全草。分布浙江。微苦、辛，微温。疏风宣肺，化痰止咳。治感冒，急、慢性气管炎，痢疾，肠炎。煎服：9～15克。本品含挥发油、甙类、香豆素衍生物、还原性糖、鞣质和酚类等。醇提取物对小鼠有镇咳作用，挥发油有祛痰作用。煎剂对豚鼠离体气管有解痉平喘作用，在体外对葡萄球菌，痢疾、伤寒、大肠等杆菌有抑制作用。

赶山鞭 ❶见《陕西中草药》。为红三七之别名。❷见《四川中药志》。为贯叶连翘之别名。各详该条。

赶风柴 ❶见萧步丹《岭南采药录》。又名节节红、饭汤叶。为马鞭草科植物裸花紫珠Callicarpa nudiflora Hook.et Arn.带有嫩枝的叶。分布我国南部。苦、微辛，平。消炎，解毒，止血，收敛。①治细菌性感染引起的炎症，急性传染性肝炎，咯血，吐血，衄血，便血。煎服：9～30克。②治外伤出血。研末撒；烧伤。煎液浸纱布敷贴；扭伤肿痛。捣敷。预试叶含黄酮甙、酚类、鞣质和多糖。❷见萧步丹《岭南采药录》。为尖尾风之别名，详该条。❸见清·赵其光《本草求原》。为丢了棒之别名，详该条。

赶狗木 见《广西本草选编》。为苦木之别名，详该条。

起泡草 见南京药学院《中草药学》。为

毛茛之别名，详该条。

栽秧花 ❶见《昆明民间常用草药》。为芒种花之别名。❷见《贵州草药》。为蜀葵花之别名。各详该条。

破天云 见《湖南药物志》。为阴地蕨之别名，详该条。

破天菜 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·内科》。为野烟之别名，详该条。

破风藤 见《草药手册》。为破骨风之别名，详该条。

破布艾 见《中医方药学》。为小飞蓬之别名，详该条。

破布叶 出《生草药性备要》。又名布渣叶、麻布叶、蘼宝叶。为椴树科植物破布树 Microcos paniculata L.的叶。分布云南、广西、广东等地。酸，平。清热利湿，健胃消滞。治感冒，食欲不振，消化不良，腹泻，黄疸。煎服：9～30克。

破布粘 见《福建民间草药》。为倒扣草之别名，详该条。

破血丹 见《植物名实图考》。为鹿衔草之别名，详该条。

破阳伞 见《浙江民间常用草药》。为兔儿伞之别名，详该条。

破故纸 出《药性论》。即补骨脂，详该条。

破骨风 出《分类草药性》。又名破膝风、破风藤、花木通。为木犀科植物光清香藤 Jasminum lanceolarium Roxb.或清香藤J.lanceolarium Roxb.var.puberulum Hemsl.的根或茎。分布安徽、台湾、福建及中南、西南大部分地区。苦、辛，微温。祛风除湿，活血散瘀。治风湿痹痛，腰痛，头风，跌打损伤。煎服：9～30克。孕妇忌服。

破铜钱 ❶见《植物名实图考》。为天胡荽之别名。❷见《贵州民间方药集》。为老鹳草之别名。❸见《湖南药物志》。为积雪草之别名。各详该条。

破膝风 见《分类草药性》。为破骨风之别名，详该条。

夏天无 见《浙江民间常用草药》。又名夏无踪、伏地延胡索、无柄紫堇。为罂粟科植物伏生紫堇 Corydalis decumbens (Thunb.)Pers.的块茎。分布江苏、安徽、浙江、江西、湖南、福建、台湾。苦，凉。降压，止痛，行气活血。治高血压，偏瘫，风湿性关节炎，坐骨神经痛，小儿麻痹症后遗症。研末冲服：每次2～4克，每日三次。块茎含四氢掌叶防己碱、比枯枯林、原阿片碱、空褐鳞碱、藤荷包牡丹定碱(Adlumidine)等生物碱。对麻醉猫有较明显而持久的降压作用。扩张末梢血管，对脊髓有兴奋作用，空褐鳞碱能对动物产生所谓“强直性昏厥”样现象，比枯枯林有强烈的致惊厥作用。

夏无踪 ❶见《植物名实图考》。为天葵之别名。❷见《湖南药物志》。为茅膏菜之别名。❸见南京药学院《中草药学》。为夏天无之别名。各详该条。

夏豆 见《上海常用中草药》。为蚕豆之别名，详该条。

夏枯草 出《神农本草经》。又名大头花、铁色草、棒槌草、铃头草、夏枯球。为唇形科植物夏枯草Prunella vulgaris L.的花穗或果穗。主产江苏、安徽、浙江、河南。苦、辛，寒。入肝、胆经。清肝火，散郁结。治目赤肿痛，目珠痛，高血压病，头痛，眩晕，急性黄疸型肝炎，肺结核，瘰疬，瘿瘤，乳痈，乳癌，腮腺炎，痈疖肿毒。煎服：6～15克。花穗含挥发油，内含右旋樟脑、右旋小茴香酮等，还含熊果酸、花色甙等。煎剂对麻醉狗及实验性高血压狗有降压、利尿作用；在体外对葡萄球菌，链球菌，痢疾、大肠、伤寒、变形、绿脓等杆菌有抑制作用；水浸剂对常见致病性皮肤真菌有抑制作用。煎剂还有增强离体兔子宫收

缩和肠蠕动等作用。

夏枯球 见《上海常用中草药》。即夏枯草，详该条。

夏草冬虫 出《黔囊》。即冬虫夏草，详该条。

原蚕沙 出《本草纲目》。又名晚蚕沙、蚕沙、原蚕屎。为蚕蛾科昆虫家蚕Bombyx mori L.幼虫的干燥粪便。主产浙江、四川、河南、江苏、湖南等地。甘、辛，温。入肝、脾、胃经。祛风除湿，和胃化浊，活血定痛。①治风湿痹痛，头风头痛，霍乱吐泻、转筋，腹痛。煎服：9～15克，包煎。②治皮肤瘙痒，瘾疹、烂弦风眼。煎服并煎水洗。本品含抗菌物质原儿茶酸，对羟基苯甲酸。还含蚕沙酮（Bombiprenone），多量维生素A、B以及游离氨基酸，植物甾醇，蛇麻脂醇，β-谷甾醇及其葡萄糖甙，尿酸，铜等。

原蚕屎 出《名医别录》。即原蚕沙，详该条。

原蚕蛾 出《名医别录》。为蚕蛾科昆虫家蚕Bombyx mori L.的雄性全虫。咸，温，有小毒。入肝、肾经。壮阳，涩精，止血。①治阳痿，遗精，白浊，尿血。内服：焙干研末入丸、散。②治刀伤出血，烫伤，冻疮及溃疮不敛。研末撒患处。蚕蛾含蛋白质及游离氨基酸、细胞色素C，α-和β-脱皮松（Ecdysone）。

捕虫草 见《福建中草药》。为茅膏菜之别名，详该条。

较剪草 见《生草药性备要》。为鲫鱼胆草之别名，详该条。

热参 见《全国中草药汇编》。为华山参之别名，详该条。

热痢草 见《浙江中医杂志》9（6）：47，1966。为石荠苧之别名，详该条。

〔丨〕

鸬鹚涎 出《本草纲目拾遗》。为鸬鹚科动物鸬鹚Phalacrocorax carbo sinensis（Blumenbach）的口涎。广布南方地区湖泽中，常被驯养。治百日咳。内服：开水冲或入丸剂。

柴胡 出《神农本草经》。为伞形科植物北柴胡Bupleurum chinense DC.或狭叶柴胡B.scorzonerifolium Willd.等的根。主产辽宁、甘肃、河北、河南、湖北、江苏、四川。苦，微寒。入肝、胆经。解表退热，疏肝，升阳。治上呼吸道感染，疟疾，寒热往来，胸满胁痛，肝炎，胆道感染，胆囊炎，月经不调，子宫脱垂，脱肛。煎服：3～9克。北柴胡根含柴胡皂甙a、c、d（Saikosaponin a、c、d），芸香甙，侧金盏花醇（Adonitol），α-菠菜甾醇及挥发油等。狭叶柴胡根含皂甙、侧金盏花醇、α-菠菜甾醇及挥发油等。煎剂对人工发热兔有解热作用。柴胡甙对实验动物具解热、镇静、镇痛、止咳及抗炎作用，对大鼠应激性胃溃疡有保护作用。北柴胡对动物某些实验性肝功能障碍有保护作用。北柴胡注射液对流感病毒有较强的抑制作用。此外，柴胡甙对狗有短暂的降压及减慢心率作用。

党参 出《本草从新》。又名上党人参、潞党参、台党参。为桔梗科植物党参Codonopsis pilosula（Franch.）Nannf.的根。主产山西、陕西、甘肃及东北等地。甘，平。入脾、肺经。补中益气，生津。治食少便溏，四肢无力，面目浮肿，心悸，气短，口渴，自汗，脱肛，子宫脱垂。煎服：9～15克。反藜芦。本品含皂甙、微量生物碱及树脂等。浸膏可使兔红细胞及血色素略有增加。对于因化疗及放射线疗法引起的白细胞下降，可使其升高。此外，对兔有轻微升高血糖和促进凝血作用。

逍遥竹 出《简易草药》。为徐长卿之别名，详该条。

哮灵草 见《四川中草药通讯》（1）：30，1972。为碎米柴之别名，详该条。

峨参 见《峨眉山药用植物》。又名田

七、土田七、金山田七。为伞形科植物峨参 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 的根。主产四川。甘、辛、微苦，微温。入脾、胃、肺经。补中益气，祛瘀生新，治脾虚腹胀，四肢无力，肺虚咳喘，咳嗽咯血，老人尿频，水肿，腰痛，跌打损伤。煎服：9～15克。本品含峨参内酯(Anthricin)、异峨参内酯及糖类等。

晒不死 见《广西中药志》。为落地生根之别名，详该条。

鸭儿芹 见《国药提要》。又名三叶、鸭脚板、鹅脚板。为伞形科植物鸭儿芹Cryptotaenia japonica Hassk.的茎叶。全国大部分地区均有分布。辛、苦，平。清热解毒，活血消肿。①治肺炎，肺脓肿，百日咳，淋病，小便不利，疝气。煎服：9～15克。②治痈疽疔肿，跌打损伤，带状疱疹，皮肤瘙痒。捣敷或煎水洗。果实名鸭儿芹果，治食积。茎叶含挥发油，其中有α-及β-蒎烯、莰烯、对聚伞花素以及γ-松油烯等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

鸭儿芹根 见《贵州民间方药集》。为伞形科植物鸭儿芹 Cryptotaenia japonica Hassk.的根。辛，温。发表散寒，止咳化痰。治风寒感冒，咳嗽，跌打损伤。煎服：6～15克。

鸭公青 见《全国中草药汇编》。为老鼠耳之别名，详该条。

鸭仔菜 见《南宁市药物志》。为鸭舌草之别名，详该条。

鸭舌韦 见《浙江天目山药用植物志》。为苍条鱼鳖之别名，详该条。

鸭舌草 出《植物名实图考》。又名鸭仔菜、猪耳菜、肥猪草、水玉簪。为雨久花科植物鸭舌草Monochoria vaginalis(Burm. f.)Presl的全草。分布华东、华中、华南、西南及河北、河南、陕西、甘肃等地。苦，寒。清热解毒，止咳平喘。①治痢疾，肠炎，感冒，咽喉肿痛，齿龈脓肿，慢性支气管炎，百日咳。煎服：9～30克。②捣敷疔疮，丹毒，蛇伤。

鸭脚木 ❶见《江西草药》。为枫荷梨之别名。❷见《广西本草选编》。为灯台树之别名。各详该条。

鸭脚木叶 见萧步丹《岭南采药录》。为五加科植物鹅掌柴 Schefflera octophylla (Lour.)Harms的茎叶。苦、涩，凉。清热解毒，祛风除湿，散瘀止痛。①治感冒发热，咽喉肿痛，腮腺炎，风湿痹痛，腹泻，跌打损伤。煎服：9～15克。②治漆疮，风疹，湿疹。煎水洗；外伤出血。叶捣敷。孕妇慎服。

鸭脚木皮 见萧步丹《岭南采药录》。又名西加皮、鸭脚皮。为五加科植物鹅掌柴 Schefflera octophylla (Lour.) Harms的根皮或树皮。产广东、广西等地。苦、涩，凉。发汗解表，祛风除湿，舒筋活络。治感冒发热，咽喉肿痛，风湿关节痛，跌打损伤。煎服：9～15克。树皮含挥发油，预试尚含酚类、氨基酸及有机酸。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有抑制作用。

鸭脚艾 出《生草药性备要》。又名鸭脚菜、四季菜、珍珠菊、鸡甜菜、刘寄奴。为菊科植物白苞蒿 Artemisia lactiflora wall. 的全草。分布华东及中南、西南地区。辛、甘，平。清肺，利湿，活血，解毒。①治肺热咳喘，泄泻，慢性肝炎，肝硬化，肾炎水肿，白带，痛经，闭经，产后瘀滞酸痛。煎服：9～15克。②治跌打损伤。煎服或捣敷；烫火伤。取汁涂或研末油调敷；外伤出血。研末撒。孕妇忌服。全草预试含黄酮甙、酚类、挥发油和氨基酸。叶和茎含脱肠草素(Herniarin)及香豆素。

鸭脚皮 见《岭南草药志》。为鸭脚木皮之简称，详该条。

鸭脚板 见《陕西中草药》。为鸭儿芹之别名，详该条。

鸭脚草 见《江苏省植物药材志》。为鹅掌金星草之别名，详该条。

鸭脚菜 见《南宁市药物志》。为鸭脚艾之别名，详该条。

鸭跖草 出《本草拾遗》。又名竹叶菜、耳环草、蓝花菜、翠蝴蝶、碧蝉花。为鸭跖草科植物鸭跖草Commelina communis L.的全草。全国大部分地区有分布。甘，微寒。清热解毒，利水消肿，止血。①治感冒，流行性感冒，急性扁桃体炎，咽喉肿痛，腮腺炎，黄疸型肝炎，急性肠炎，痢疾，小便不利，水肿，脚气，泌尿系感染，尿血，衄血，崩漏，白带。煎服：9～15克。②治疮疖肿毒，外伤出血。鲜草捣敷；丹毒。煎服，并用鲜叶醋浸后敷贴；麦粒肿。用鲜茎一枝，一端放酒精灯上燃烧，待另一端茎液沸出时，取液滴于患处。花含鸭跖黄酮甙(Flavocommelin)。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌等有抑制作用。

蚌粉 出《日华子诸家本草》。为蚌科动物背角无齿蚌Anadonta woodiana Lea或褶纹冠蚌Cristaria plicata Leach等贝壳制成的粉。分布我国各地江河、湖沼中。咸，寒。入肺、肝、胃经。化痰消积，清热燥湿。①治痰饮咳嗽，胃及十二指肠溃疡，呕逆，疳积，痢疾，白带。研末服：1～2克。②治湿疮。研末撒；痈肿。研末醋调敷。本品含碳酸钙（90%以上）和少量有机质、微量的锶等。

蚊子草 见《全国中草药汇编》。为星星草之别名，详该条。

蚊枝叶 见《生草药性备要》。为黄荆叶之别名，详该条。

圆蛛 见《吉林中草药》。即蜘蛛，详该条。

〔丿〕

钱串草 见《草药手册》。为排钱草之别名，详该条。

钻石风 ❶见《江西草药》。又名铁牛钻石、石钻子。为清风藤科植物四川清风藤Sabia schumanniana Diels的根或茎。分布四川、湖北、甘肃、江西、浙江等地。辛，温。止咳祛痰，祛风活血。治慢性气管炎，关节炎，腰痛，跌打损伤。煎服：9～30克。本品有效成分为L-水苏碱，有祛痰、镇咳及松弛支气管平滑肌的作用。❷见《贵州民间药草》。为铁筷子之别名，详该条。

钻地风 见《滇南本草》。为黄锁梅根之别名，详该条。

铁儿茶 见《中药炮制学》。为儿茶之处方名，详该条。

铁马豆 出《滇南本草》。又名草红藤、黄花马豆、蝴蝶草。为豆科植物毛宿苞豆Shuteria pampaniniana Hand.-Mazz.的全草。分布云南、贵州、广西等地。苦，凉。清热，解毒。治肺结核咳嗽，潮热骨蒸，阑尾炎，乳腺炎，腮腺炎。煎服：9～15克。

铁牛七 见《陕西中草药》。为铁棒锤之别名，详该条。

铁牛入石 ❶见《广西中草药》。为血风藤之别名。❷见《福建中草药》。为琴叶榕之别名。各详该条。

铁牛钻石 见《江西草药》。为钻石风之别名，详该条。

铁尺草 见《四川常用中草药》。为蓬子菜之别名，详该条。

铁巴掌 见《广西中草药》。为半枫荷之别名，详该条。

铁石茶 见《全国中草药汇编》。为照山白之别名，详该条。

铁甲将军 见《本草纲目》。为蜣螂之别名，详该条。

铁仔 见《中草药通讯》(3)：26，1972。又名碎米棵、小铁子、牙痛草、大红袍、豆瓣柴。为紫金牛科植物铁仔Myrsine africana L.的根或全株。分布西南及陕西、甘肃、湖北、湖南、广东、广西、台湾等地。苦、涩，平。清热除湿，祛风止痛，收敛止血。①治肠炎，痢疾，血淋，风湿痹痛，牙痛，咯

血，血崩，便血，脱肛，子宫脱垂。煎服：30～60克。②治咽喉肿痛。煎水含漱；刀伤出血。鲜叶捣敷；烧烫伤。鲜叶煎水洗创面。茎皮和叶均含鞣质。叶、果实和嫩枝均含铁仔皂甙（Myrsinesaponin）。果实还含樗贝素（Embelin）、槲皮醇。叶及小枝的乙醇提取物或铁仔皂甙对大鼠瓦克肉瘤-256有抑制作用，但有效剂量与中毒剂量相距太近，毒性颇大。樗贝素对绦虫有驱虫作用。

铁包金 见萧步丹《岭南采药录》。又名乌龙根、乌口仔。为鼠李科植物细叶勾儿茶Berchemia lineata (L.)DC.的根。主产广东、福建等地。苦、涩，平。散瘀止血，祛风，止痛，解毒。①治肺结核咯血，消化道溃疡出血，风湿骨痛，睾丸肿痛，荨麻疹，疔疮疖肿。煎服：15～30克。②治蛇咬伤。捣敷伤口。本品含槲皮素、芸香甙及β-谷甾醇。

铁丝灵仙 见《全国中草药汇编》。为粘鱼须之别名，详该条。

铁丝草 见《广州植物志》。为猪鬃草之别名，详该条。

铁扫把子 见《四川中草药》。为地肤子之别名，详该条。

铁扫帚 见《上海常用中草药》。为夜关门之别名，详该条。

铁色草 见《本草纲目》。为夏枯草之别名，详该条。

铁色箭 见《本草纲目》。为大一枝箭之别名，详该条。

铁苋 出《植物名实图考》。又名大苋、血见愁、海蚌含珠、猫眼草、痢疾草、野苎麻、叶下双桃、沙罐草。为大戟科植物铁苋菜Acalypha australis L.的全草。分布长江和黄河流域中下游及西南、华南地区。苦、涩，平。清热利湿，消积，止血。①治腹泻、痢疾，疳积腹胀，吐血，衄血，尿血，便血，子宫出血。煎服：15～30克。②捣敷创伤出血，湿疹，皮炎。本品预试含生物碱、黄酮甙、酚类、鞣质等。煎剂在体外对痢疾杆菌有良好的抑制作用；对金黄色葡萄球菌、霍乱弧菌及变形、伤寒、绿脓、炭疽等杆菌也有抑制作用。

铁板道 见《陕西中草药》。为拦路虎之别名，详该条。

铁刺苓 见《浙江民间草药》。为菝葜之别名，详该条。

铁线草 ❶出《滇南本草》。又名绊根草、马根子草、牛筋草、铺地草。为禾本科植物狗牙根Cynodon dactylon(L.) Pers.的全草。广布黄河流域及其以南各地。苦、微甘，平。祛风活络，清热利尿，止血散瘀。①治风湿痹痛，半身不遂，黄疸，痢疾，脚气，水肿，泌尿道感染，鼻衄，咯血，吐血，便血。煎服：15～30克。②治跌打损伤，臁疮，捣敷；外伤出血，研末撒。本品含β-谷甾醇及其D-葡萄糖甙、棕榈酸。提取液在体外试验，能增强人的白细胞的吞噬能力。此植物可产生氰酸，牲畜食之，有时可发生中毒。❷见萧步丹《岭南采药录》。为乌脚枪之别名，详该条。

铁树叶 出《本草纲目拾遗》。又名大凤尾、番蕉叶。为苏铁科植物苏铁Cycas revoluta Thunb.的叶。分布我国南方，长江流域及华北都有栽培。甘、淡，平，有小毒。入肝、胃经。理气，活血，止血，消肿解毒。①治肝胃气痛，经闭，吐血，痢疾。近用治癌症。煎服：9～15克。②治外伤出血，煅存性研末撒；治肿毒初起，煅存性研末调敷。本品含苏铁双黄酮、扁柏双黄酮、二氢扁柏双黄酮、穗花杉双黄酮、二氢穗花杉双黄酮等。

铁树花 见《四川中药志》。又名梭罗花、风尾蕉花。为苏铁科植物苏铁Cycas revoluta Thunb.的花（大孢子叶）。甘，平。理气止痛，活血去瘀，益肾固精。治胃痛，吐血，咳血，跌打损伤，腰腿痛，痛经，带下，遗精。煎服：15～30克。

铁树果 出《植物名实图考》。又名凤凰蛋。为苏铁科植物苏铁Cycas revoluta Thunb.的种子。苦、涩，平，有毒。平肝降压，镇咳化痰，收敛固涩。治高血压病，咳嗽痰多，痢疾，遗精，白带。煎服：9～15克。苏铁种子和茎顶部树心有毒。中毒症状为头晕，呕吐。本品含苏铁甙(Cycasin)，新苏铁甙和大泽米甙(Macrozamin)以及胆碱、胡芦巴碱、玉蜀黍黄质、隐黄素等。苏铁甙类虽有抑制肿瘤作用，但连续应用有致癌作用。口服毒性大，致死原因为呼吸麻痹。

铁指甲 见《本草纲目拾遗》。为佛甲草之别名，详该条。

铁钢叉 见《贵州民间方药集》。为铁筷子之别名，详该条。

铁扁担 ❶见《江西草药》。为万年青之别名。❷见《江苏省植物药材志》。为射干之别名。❸见《上海常用中草药》。为扁竹根之别名。各详该条。

铁烛台 见《福建民间草药》。为苦地胆之别名，详该条。

铁粉 出《本草拾遗》。为钢铁飞炼而成的粉末；或系生铁打碎成粉，用水漂出的细粉。辛，平。入肝经。平肝，镇惊。治惊痫，发狂。内服：锻赤醋淬研末；或配制为丸。主含四氧化三铁。

铁凉伞 见《全国中草药汇编》。为牛奶浆草之别名，详该条。

铁扇子 见清·赵楷《百草镜》。为桑叶之别名，详该条。

铁蒺角 ❶见《浙南本草新编》。为小叶蛇总管之别名。❷见《本草纲目》。为蒺藜之别名。各详该条。

铁脚威灵仙 见《本草纲目》。即威灵仙，详该条。

铁脚梨 见《清异录》。为木瓜之别名，详该条。

铁脚蜈蚣根 见《江西草药》。为海金沙根之别名，详该条。

铁棒锤 见《陕西中草药》。又名铁牛七、一枝箭、三转半、八百棒、雪上一枝蒿。为毛茛科植物铁棒锤 Aconitum szechenyianum Gay.的块根。分布陕西、青海、甘肃、四川、云南、河南等地。苦、辛，热，有大毒。祛风止痛，散瘀消肿。①治风湿关节痛，腰腿痛，痛经，跌打损伤。内服：研末，凉开水送下，0.06～0.15克。须经炮制后用。②治痈肿，瘰疬，冻疮未破者，磨汁外涂；牙痛。研末用棉签蘸涂痛处，勿咽下。内服宜慎，以免中毒。服药后应忌热饮食及烟、酒；孕妇忌服。铁棒锤茎叶：煎水洗痈肿疮毒。

铁散沙 见《广西药用植物名录》。为黑骨头之别名，详该条。

铁落 出《神农本草经》。为生铁煅至红赤，外层氧化时被锤落的铁屑。辛，凉。平肝镇惊。治癫狂，心悸，睡眠不宁，惊痫，善怒。煎服：9～30克。先煎。本品主含四氧化三铁。

铁锈 出《本草拾遗》。为铁露置空气中氧化后生成的红褐色氧化铁锈衣。辛、苦，寒。清热解毒，镇心平肝。①治疔疮肿毒，口疮，疥、癣，风瘙瘾疹，烫伤，毒虫螫伤。研末调涂。②治痫病。研末水调服；重舌。研末水调噙咽。

铁蜈蚣 见《安徽中草药》。为水菖蒲之别名，详该条。

铁筷子 见《贵州民间方药集》。又名铁钢叉、瓦鸟柴、钻石风。为腊梅科植物腊梅 Chimonanthus praecox(L.)Link 的根。我国各地常见栽培。辛，温。止咳，平喘，祛风，活血。治风寒感冒，咳嗽，哮喘，风湿痹痛，腰肌劳损、跌打损伤。内服：煎汤，9～15克；或浸酒服。孕妇忌服。

铁箍散 ❶见《本草纲目》。为木芙蓉之别名。❷见《陕西中草药》。为山胡椒叶之别名。❸见《陕西中草药》。为拦路虎之别名。各详该条。

铃兰 见《东北药用植物志》。又名草玉铃、香水花、草寸香、鹿铃草。为百合科植物铃兰Convallaria keiskei Miq.的全草。分布东北及河北、山西、山东、河南、陕西等地。苦,温,有毒。强心，利尿。①治充血性心力衰竭，克山病。内服：煎汤，1～3克；研末吞，每次0.3克，一日量为1克。②煎水外洗治丹毒。内服过量，可出现房室及室内传导阻滞，使用时，应注意心律变化。急性心肌炎、心内膜炎忌用。本品含铃兰毒甙、铃兰毒醇甙、铃兰苦甙(Convallamarin)、去葡萄糖墙花毒甙等多种强心甙以及铃兰黄酮甙(Keioside)、多种铃兰皂甙和葡萄糖铃兰皂甙等。全草(根部及叶柄作用最强)浸剂或醇提取物有强心作用，与毒毛旋花子甙相似，口服吸收不恒定，故需注射给药。铃兰毒甙是强心甙中作用最强者之一。铃兰有镇静乃至催眠作用，也有利尿作用，还能延长凝血时间。

铃茵陈 见《中药志》。又名金钟茵陈、黄花茵陈、北刘寄奴、园香草。为玄参科植物阴行草Siphonostegia chinensis Benth.的全草。主产江苏、安徽、浙江、云南、广西等地。苦，寒。清热利湿，活血祛瘀。①治黄疸型肝炎，胆囊炎，蚕豆病，泌尿系结石，小便不利，水肿腹胀，血痢，血淋，产后瘀滞腹痛，跌损瘀痛。煎服：9～15克。②治创伤出血，烧烫伤。研末撒或调敷。孕妇忌服。本品含强心甙及挥发油。

铃铃草 见《湖南药物志》。又名小无心菜、雀儿蛋、鸡肠子草。为石竹科植物蚤缀Arenaria serpyllifolia L.的全草。分布我国南北各地。辛、苦，凉。止咳，明目，清热解毒。①治肺结核咳嗽，急性结膜炎，麦粒肿，咽喉痛，齿龈炎。煎服：15～30克。②治目翳。配韭菜根捣烂塞鼻。本品含皂甙。

铃铛菜 见《东北药用植物志》。为玉竹之别名，详该条。

铅丹 出《神农本草经》。又名黄丹、广丹、东丹、丹粉。为纯铅加工制成的四氧化三铅粉末。产河南、广东、福建、湖南、云南等地。辛、咸，寒，有毒。拔毒，生肌，杀虫。治痈疽疮疡。研末撒，或制油膏涂搽。

秫米 出《名医别录》。又名小米、糯秫、糯粟、黄米。为禾本科植物粟Setaria italica (L.) Beauv. 的种子。山东、河北及东北各地都有种植。甘，微寒。入胃、大肠经。治胃气不和、夜不得眠，胃弱久泻。煎服：15～30克。

积雪草 出《神农本草经》。又名落得打、崩大碗、马蹄草、雷公根、铜钱草、蚶壳草、马脚迹、破铜钱。为伞形科植物积雪草Centella asiatica(L.)Urban的全草。产广东、广西、四川、江苏、浙江、江西、福建、湖南等地。苦、辛，凉。清热，利湿，散瘀，解毒。①治感冒发热，中暑，风火赤眼，扁桃体炎，咽喉炎，尿路感染和结石，传染性肝炎，肠炎，痢疾，咳血，衄血。内服：煎汤，9～30克；或捣汁饮。②治痈肿，疔疮，丹毒，湿疹，外伤出血。捣敷或取汁涂。本品含积雪草甙、羟基积雪草甙等皂甙和积雪草酸、白桦脂酸等三萜酸。还含山柰酚、槲皮素和二者的甙，内消旋肌醇，β-谷甾醇，积雪草糖等。所含的甙对动物有镇静、安定作用。积雪草甙能治疗皮肤溃疡，如顽固性创伤、皮肤结核、麻风等。醇提取物及甙能松弛动物肠平滑肌。

称钩风 见《中国药典·一部》。为防己科植物中华称钩风 Diploclisia chinensis Merr. 的根、根茎及老茎。分布湖南。微苦，平。祛风湿，活血，利尿。治风湿关节痛，跌打损伤，小便不利。煎服：9～15克。

称筋敝 见《云南中草药》。为狗筋蔓之别名，详该条。

缺盆草 出《经验良方》。为蕺之别名，详该条。

笔仔草 见《福建民间草药》。又名竹篙草、黄毛草、金丝茅、墙头竹。为禾本科植物

金丝草Pogonatherum crinitum(Thunb.) Kunth 的全草。分布浙江、福建、台湾、广东、云南、四川、湖南、江西等地。甘、淡，凉。清热解毒，利尿通淋，凉血止血。治感冒高热，中暑，小儿久热不退，黄疸型肝炎，痢疾，肾炎水肿，尿路感染，糖尿病，咳血，衄血。煎服：9～15克。预试含黄酮甙、酚类、氨基酸、有机酸、糖类。

笔头花 见《浙江中药手册》。为玫瑰花之别名，详该条。

笔头菜 见《东北植物药图志》。为问荆之别名，详该条。

笔筒草 出清·刘士季《草木便方》。又名通气草、土木贼、锁眉草、节骨草、锉刀草。为木贼科植物节节草Equisetum ramosissimum Desf. 的全草。广布全国各地。甘、苦，平。清肝明目，祛痰，利尿，止血。①治目赤肿痛，角膜云翳，肝炎，慢性气管炎，肾炎，尿路感染，鼻衄，便血，血尿，崩漏，带下。煎服：9～15克。②治跌打骨折。整复后用鲜草调红糖捣烂外敷。全草的甲醇提取物水解后得芹菜素、木犀草素。并显生物碱、三萜、皂甙等反应。25%水煎剂和粗提物分别给小白鼠灌胃均有止咳和祛痰作用。

透骨草 ❶出明·高濂《灵秘丹药笺》。为大戟科植物地构叶 Speranskia tuberculata (Bge.) Baill. 的全草。主产山东、河南等地。辛、苦，温。祛风除湿，活血止痛。①治风湿痹痛，屈伸不利，腰扭伤，闭经，寒湿脚气。煎服：6～9克。②煎水洗疮痛肿毒，阴囊湿疹。孕妇忌服。❷见明·高濂《灵秘丹药笺》。为凤仙透骨草之简称，详该条。

透骨香 见《贵阳民间药草》。又名透骨消、九里香、满山香、芳香草、小透骨草。为杜鹃花科植物云南白珠树 Gaultheria yunnanensis Rehd. 的全株。分布云南、四川、贵州、湖北、湖南、广西、广东等地。辛，温。祛风除湿，活血通络。①治风寒感冒，风湿痹痛，脚气，胃寒疼痛，跌打损伤。煎服：6～12克。②煎水洗治湿疹。枝叶含挥发油，其主要成分是水杨酸甲酯。内服水杨酸甲酯有解热、镇痛及抗风湿作用，与水杨酸类药物相似，所需剂量亦相同，但因吸收慢而不规则，故服药后产生作用较迟。本品刺激性很强，亦可产生特异性水杨酸中毒症状。

透骨消 ❶见《昆明民间常用草药》。为透骨香之别名。❷见《广西药用植物名录》。为雪药之别名。各详该条。

倒爪草 见《全国中草药汇编》。为牛舌水之别名，详该条。

倒生莲 见《陕甘宁青中草药选》。为鸡血七之别名，详该条。

倒地拱 见《浙江中药手册》。为防己之别名，详该条。

倒扣草 出萧步丹《岭南采药录》。又名倒钩草、倒刺草、鸡骨癀、破布粘、倒捋草、为苋科植物土牛膝 Achyranthes aspera L. 的全草。分布西南及福建、广东、广西等地。微苦，凉。清热解毒，活血通络，利水消肿。①治感冒发热，流行性腮腺炎，喉痛，疟疾，痢疾，风湿性关节炎，腰腿痛，肾炎水肿，脚气，尿路结石。煎服：9～15克（鲜品15～30克）。②治疮疡肿痛。鲜叶捣敷。孕妇忌服。本品含倒扣草碱（Achyranthine）、脱皮甾酮（Ecdysterone）、甜菜碱。根及种子均含皂甙。种子主含倒扣草皂甙（Asperasaponin）A、B。本品酊剂在体外对白喉杆菌、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌均有抑制作用。10%酊剂有抗白喉毒素的作用。倒扣草素在体外能使蛙腹直肌收缩，且不为箭毒碱所阻断；对狗有降低血压和减慢心率、扩张血管的作用；给大鼠灌胃有利尿和导泻作用。皂甙能使离体蛙心收缩增强，作用比用洋地黄快，但时间较短。

倒吊金钟 见《广东中草药》。为山莲藕之别名，详该条。

倒吊笔叶 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为夹竹桃科植物倒吊笔Wrightia pubescens R. Br.的叶。甘，凉。清热解毒。治感冒发热，急性支气管炎，咽炎，肾盂肾炎等。煎服：6～9克。

倒吊蜡烛 出《生草药性备要》。又名章表根、墨柱根。为夹竹桃科植物倒吊笔Wrightia pubescens R.Br.的根或茎。分布广东、广西、云南。甘，平。祛风通络，祛痰止咳，解毒散结。治风湿性关节炎，腰腿痛，跌打损伤，慢性气管炎，黄疸型肝炎，肝硬化腹水；淋巴结结核。煎服：9～15克。

倒刺草 见《广东中草药》，为倒扣草之别名，详该条。

倒毒伞 见《四川中药志》。为泽漆之别名，详该条。

倒挂牛 见《中国药典·一部》1977年版。为云实根皮之别名，详云实根条。

倒挂金钟 见《浙江民间常用草药》。为莸之别名，详该条。

倒挂金钩 见《湖南药物志》。为钩藤之别名，详该条。

倒钩草 见《广州植物志》。为倒扣草之别名，详该条。

倒拐草 见《南宁市药物志》。为倒扣草之别名，详该条。

倒提壶 见《中药形性经验鉴别法》。为挖耳草之别名，详该条。

倒罐草 ❶见成都中医学院等《常用草药治疗手册》。为野牡丹之别名。❷见《成都中草药》。为朝天罐之别名。各详该条。

射干 出《神农本草经》。又名乌扇、扁竹根、开喉箭、剪刀草、蝴蝶花根、铁扁担、山蒲扇。为鸢尾科植物射干Belamcanda chinensis (L.)DC.的根茎。主产湖北、河南、江苏、安徽等地。苦，寒，有小毒。入肺、肝经。泻火解毒，利咽消痰，祛瘀散结。①治咽喉肿痛，痰咳气喘，肝脾肿大，瘰疬结核，闭经，痈肿疮毒。煎服：3～6克。②治水田皮炎，煎水洗；跌打损伤，捣敷。孕妇忌服。本品含射干定(Belaincandin)、鸢尾甙(Iridin)、鸢尾黄酮甙(Tectoridin)、鸢尾黄酮等。煎剂或浸剂在体外高浓度能抑制常见的致病性皮肤真菌及腺$_3$病毒及Ec HO$_{11}$病毒；鸢尾黄酮和鸢尾黄酮甙有抗炎作用。还能促进家兔唾液分泌，并且有雌激素样作用。

射香草 见《云南中草药》。为芸香草之别名，详该条。

臭八宝 见《植物名实图考》。为臭牡丹之别名，详该条。

臭山橘 见《泉州本草》。为算盘子之别名，详该条。

臭子 见《中药志》。为麝香之别名，详该条。

臭艾 ❶见《闽东本草》。为牡蒿之别名。❷见《广西中药志》。为臭草之别名。各详该条。

臭叶子 见《滇南本草》整理本。为臭灵丹之别名，详该条。

臭杞 见《江苏省植物药材志》。为枸橘之别名，详该条。

臭杞子 见《江苏药材志》。为枳椇子之别名，详该条。

臭芙蓉 见《植物名实图考》。为万寿菊之大者，详该条。

臭芜荑 见《中国药学大辞典》。为芜荑之处方名，详该条。

臭苏 出《日华子诸家本草》。为荠苨之别名，详该条。

臭李子 见《中国树本分类学》。为鼠李之别名，详该条。

臭牡丹 ❶出《本草纲目拾遗》。又名臭八宝、野朱桐、矮桐。为马鞭草科植物臭牡丹Clerodendrum bungei Steud.的根或茎、叶。分布华北、西北、西南、华南各地。苦、辛，平。平肝，祛风，消肿解毒。治高血压病，头晕，头痛，风湿性关节炎，乳腺

炎，牙痛。煎服：9～15克。治痈肿疔疮，毒蛇咬伤，鲜品捣敷；痔疮，脱肛，湿疹，皮肤瘙痒，煎水洗；子宫脱垂，煎水熏洗。含乳酸镁，还含琥珀酸、硝酸钾、生物碱。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。对子宫脱垂、脱肛等有一定疗效。❷见《滇南本草》。为滇常山之别名，详该条。

臭饭团 见《海南植物志》。为黑老虎之别名，详该条。

臭灵丹 ❶出《滇南本草》。又名大黑药、臭叶子。为菊科植物齿翼臭灵丹Laggera pterodonta(DC.)Benth.的茎叶。分布云南、贵州等地。苦、辛，寒。清热解毒。①治上呼吸道感染，扁桃体炎，咽喉炎，口腔炎，支气管炎，疟疾。煎服：9～15克。②捣敷疮疖肿毒，烧烫伤，毒蛇咬伤。全草含黄酮甙，香豆素。鲜叶含挥发油，对呼吸道粘膜有温和刺激，促进炎症痊愈，减少过多痰量。❷见《江苏南部种子植物手册》。为六棱菊之别名，详该条。

臭阿魏 见《中药材手册》。即阿魏，详该条。

臭茉莉 ❶出《生草药性备要》。又名白龙船花、大鬼婆、冬地梅。为马鞭草科植物臭茉莉Clerodendrum fragrans Vent.的根或叶。分布浙江、福建、湖南、广东、广西、台湾及西南各地。微苦，平。祛风除湿，化痰止咳，活血消肿。①治风湿性关节炎，脚气，水肿，白带，支气管炎，肺痈。煎服：15～30克。②治痔疮，脱肛，煎水坐浴；皮肤瘙痒，疥疮，疱疹，煎水洗；痈疖肿毒，鲜叶捣敷。叶含黄芩素，粗毛豚草素及其7-葡萄糖醛酸甙，6-羟基木犀草素，(24S)-乙基胆甾黄芩甙、三烯-5，22,25-醇-3β。❷见《云南中草药选》。为滇常山之别名，详该条。

臭苦蔺 见萧步丹《岭南采药录》。为水胡满之别名，详该条。

臭拉秧子 见《江苏省植物药材志》。为天仙藤之别名，详该条。

臭质草 见《浙江民间草药》。为鱼腥草之别名，详该条。

臭金风 见萧步丹《岭南采药录》。为五色梅之别名，详该条。

臭法落海 见《中草药通讯》(12)：6，1976。即法罗海，详该条。

臭草 ❶出《生草药性备要》。又名臭艾、小香草、猴仔草、狗屎灵香。为芸香科植物芸香Ruta graveolens L.的全草。我国南部常见栽培，长江以北栽种于温室内。辛、微苦，凉。祛风清热，利湿，活血，解毒。①治感冒发热，小儿惊风，风湿骨痛，泄泻，小便不利，疝痛，月经不调。煎服：6～9克。②治跌打损伤，疮疖痈肿，蛇咬伤，煎汤或捣汁服，并用鲜品捣敷。孕妇忌服。本品含挥发油，内含桉叶素、α-和β-蒎烯、芳樟醇、柠檬烯、对聚伞花素等。还含茵芋碱、芸香碱、香草木宁碱、芸香宁碱、山小橘碱等多种生物碱。又含芸香甙以及佛手柑内酯、补骨脂素、伞形花内酯、东莨菪素等。全草中所含的总碱对离体兔回肠有解痉作用，以山小橘碱为最强，效力与罂粟碱相当。对大鼠奥狄氏括约肌，总碱也有解痉作用，白鲜碱、崖椒碱、茵芋碱、香草木宁碱的混合物对大鼠、豚鼠的解痉作用较单个成分强。种子的水提取物对豚鼠的离体子宫有兴奋作用，引起流产的成分为挥发油。佛手柑内酯等香豆素均可引起光过敏。❷见《福建民间草药》。为土荆芥之别名，详该条。❸见《上海常用中草药》。为天名精之别名，详该条。

臭根 见《福建民间草药》。为大青根之别名，详该条。

臭根皮 见《江苏药材志》。为白鲜皮之别名，详该条。

臭铃铛 见《河北药材》。为马兜铃之别名，详该条。

臭烟 见《闽南民间草药》。为野烟叶之

别名，详该条。

臭菖 见《全国中草药汇编》。为水菖蒲之别名，详该条。

臭菜 见《中药志》。为鱼腥草之别名，详该条。

臭梧桐 出清·汪连仕《采药书》。又名海州常山、八角梧桐、楸叶常山。为马鞭草科植物臭梧桐 Clerodendrum trichotomum Thunb.的嫩枝叶。主产江苏、安徽等地。苦、甘，平。入肝经。祛风湿，止痛，降血压。①治风湿痹痛，半身不遂，高血压病，疟疾，痢疾。煎服：9～15克。②治手癣，水田皮炎，湿疹，痔疮。煎水洗。茎叶含黄酮类物质海常黄酮素及其4′-甲醚，刺槐素二葡萄糖醛酸甙和苦味成分海常苦素（Clerodendrin）A及B。还含生物碱、内消旋肌醇等。根含赪桐二醇烯酮(Clerodolone)，赪桐酮(Clerodone)，赪桐甾醇(Clerosterol)。水提取物或热浸剂（加热不可太高）对多种动物有降低血压作用；开花前的新鲜叶的效果好。煎剂有轻度镇静、镇痛作用。与鬼针草或与豨莶草作成的合剂，有抗炎作用。

臭梧桐子 见萧步丹《岭南采药录》。为马鞭草科植物臭梧桐 Clerodendrum trichotomum Thunb. 的果实或带宿萼的果实。分布华北、华东、中南、西南等地区。祛风湿，平喘。治风湿痛，气喘。煎服：9～15克。果实含臭梧桐碱(Trichotomine)及其N-葡萄糖衍生物。种子含油3.9%，中有油酸53.4%，亚油酸9.3%。

臭梧桐花 出《本草纲目拾遗》。为马鞭草科植物臭梧桐 Clerodendrum trichotomum Thunb.的花。治头风，痢疾，疝气偏坠。煎服：6～9克。

臭梧桐根 出《本草纲目拾遗》。为马鞭草科植物臭梧桐 Clerodendrum trichotomum Thunb.的根。苦，平。祛风湿，降血压。治风湿痛，高血压，疟疾。煎服：9～15克。根含赪桐二醇烯酮(Clerodolone)、赪桐酮(Clerodone)、赪桐甾醇(Clerosterol)。

臭蒿 见《药材资料汇编》。为菴蕳之别名，详该条。

臭椿子 见《江苏药材志》。为凤眼草之别名，详该条。

臭椿皮 见《滇南本草》。为樗白皮之别名，详该条。

臭橘 出《本草图经》。为枸橘之别名，详该条。

臭橘叶 出《夏子益治奇疾方》。即枸橘叶，详该条。

臭藜蒿 见《广东中药》。为土荆芥之别名，详该条。

臭藤 见《天宝本草》。为鸡屎藤之别名，详该条。

徐长卿 出《神农本草经》。又名鬼督邮、寮刁竹、逍遥竹、对叶莲、一枝香。为萝藦科植物徐长卿 Cynanchum paniculatum(Bge.)Kitag.的根及根茎或带根全草。全国大部分地区有分布。辛，温。祛风止痛，活血，利尿，解毒消肿。①治风湿关节痛，腰痛，胃痛，痛经，肠炎，痢疾，水肿，腹水，牙痛，跌打肿痛。煎服：3～9克，不宜久煎。②治蛇虫咬伤，煎服或捣敷；湿疹荨麻疹，神经性皮炎。内服或煎水外洗。全草含牡丹酚，根尚含黄酮甙等。注射液及牡丹酚对小鼠均有止痛作用，注射液尚有镇静作用，并能降低狗、兔、大鼠血压。注射液中不含牡丹酚，因此，除牡丹酚外，尚含其它降压成分。徐长卿能增加小鼠心肌营养血流量。牡丹酚对离体豚鼠回肠有显著解痉作用。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、痢疾、伤寒、大肠及绿脓等杆菌有抑制作用，牡丹酚则对金黄色葡萄球菌、大肠和枯草杆菌有抑制作用。

豹子药 见《贵州民间药物》。为大丁草之别名，详该条。

豹骨 出清·汪双池《医林纂要·药

性》。为猫科动物豹Panthera Pardus L.的骨骼。主产四川、云南、贵州、湖北、安徽。辛，温。入肝、肾经。追风定痛，强壮筋骨。治风寒湿痹，筋骨疼痛，四肢拘挛、麻木，腰膝酸楚。内服：煎汤，3～6克；浸酒或入丸、散。对大鼠蛋清性关节炎有明显消炎作用。

釜脐墨 出《四声本草》。又名锅底灰。为杂草经燃烧后，附于锅底部之烟灰。辛、苦，温。入肝、脾经。止血，解毒。①治吐血，咯血。内服：0.9～1.2克。②治聤耳，研末吹耳内；口疮，调搽。

翁阿鲁 见《高原中草药治疗手册》。为雪乌之藏族语名，详该条。

翁格尔 见《高原中草药治疗手册》。为雪乌之藏族语名，详该条。

狼牙草 见《中草药通讯》(1)：34，1972。为仙鹤草之别名，详该条。

狼牙草根芽 见《中草药通讯》(1)：34，1972。为仙鹤草根芽之别名，详该条。

狼把草 出《本草拾遗》。又名郎耶草、狼尾棵、豆渣草、一包针、大鬼针草。为菊科植物狼把草Bidens tripartita L.的全草。全国大部分地区有分布。苦、甘，平。养阴宣肺，清热解毒，利湿。①治气管炎，肺结核，感冒，扁桃体炎，咽喉炎，肠炎，痢疾，肝炎，泌尿系感染。煎服：6～15克。②治疖肿，鲜草捣敷；湿疹，皮癣。捣烂，绞汁搽。本品含木犀草素及其7-葡萄糖甙、异金鸡菊属甙(Isocoreopsin)、蛇目菊黄酮甙(Flavanomarein)，秦皮乙素，3′,4′,6-三羟基噢哢，2,3′,4,4′-四羟基查耳酮，伞形花内酯，东莨菪素，维生素C及挥发油等。浸剂对动物有镇静、降压以及利尿、发汗作用。

狼把草根 出《本草图经》。为菊科植物狼把草Bidens tripartita L.的根。治赤白久痢，小儿大腹痞满，丹毒，盗汗。煎服：6～15克。本品含十三碳二烯-2,12-四炔-4,6,8,10-醛等多种微量聚乙炔类化合物。

狼尾巴花 见《辽宁经济植物志》。为斩龙剑之别名，详该条。

狼尾草 见《江苏药材志》。为珍珠菜之别名，详该条。

狼尾棵 见《安徽中草药》。为狼尾巴草之别名，详该条。

狼毒 ❶出《神农本草经》。又名红狼毒、绵大戟。为瑞香科植物瑞香狼毒Stellera chamaejasme L.的根。产内蒙古、山西、河南、青海、甘肃、陕西等地。辛、苦，平，有毒。入肝、脾经。逐水，祛痰，散结，止痛，杀虫。①治水肿腹胀，虫积，痰饮积癖，咳逆上气。内服：多入丸、散用；煎汤，1～2.5克。醋制后可降低毒性。②治淋巴结结核、疥、癣。磨汁涂，研末调敷，或熬膏外敷。内服过量，可出现腹痛、腹泻、里急后重等中毒症状。孕妇忌服。畏密陀僧。本品含狼毒甙(Stellerin)、甾醇、三萜类，有毒的高分子有机酸、黄酮甙等。狼毒甙对金黄色葡萄球菌、链球菌在试管中有抑制作用。毒性较低。煎剂对小白鼠有镇痛作用。❷出《神农本草经》。即白狼毒，详该条。

狼蕨 见《全国中草药汇编》。为蕨之别名，详该条。

胭脂菜 见《本草纲目》。为藜之别名，详该条。

脂麻秸 出《摘元方》。即麻秸，详该条。

脐带 出《本草拾遗》。又名坎气，为初生婴儿的脐带。甘、咸，温。益肾，纳气，敛汗。治虚劳羸弱，气血不足，肾虚喘咳，盗汗。内服：煎汤，1～2条；焙干研末服0.6～1.8克。本品含有硫酸软骨素(一种酸性粘多糖)，还含糖元和脂质。提取物有脐带激素(即性激素)样作用，此外，能兴奋兔肠管及子宫。

胶菜 见《中国药用海洋生物》。为鹿角菜之别名，详该条。

脓见消 见《生草药性备要》。为雾水葛

之别名，详该条。

皱叶芥 见《本草纲目》。为芥菜之别名，详该条。

皱面草 见《广东中草药》。为山藿香之别名，详该条。

留行子 见《中国药学大辞典》。为王不留行之处方名，详该条。

留求子 见《南方草木状》。为使君子之别名，详该条。

鸳鸯豆 见《中药材手册》。为相思子之别名，详该条。

鸳鸯草 见《湖南药物志》。为鸡眼草之别名，详该条。

〔丶〕

旗那叶 见《药物学大成》。为番泻叶之别名，详该条。

高丽参 见《增订伪药条辨》。即别直参，详人参条。

高良姜 出《名医别录》。又名良姜、蛮姜、小良姜。为姜科植物高良姜 Alpinia officinarum Hance的根茎。产广东、广西、台湾等地。辛，温。入脾、胃经。温中，散寒，祛风，止痛。治胃脘冷痛，霍乱吐泻，噎嗝反胃，宿食不消，痢疾，瘴疟，寒疝，产后瘀血腹痛，风寒湿痹。内服：煎汤，3～6克；或入丸、散。本品含挥发油，油中主含桉叶素，桂皮酸甲酯等。还含高良姜素、山柰素、山柰酚、槲皮素、异鼠李素等黄酮类及高良姜酚等。煎剂在体外对各型葡萄球菌、溶血性链球菌、白喉杆菌、结核杆菌等有不同程度的抑制作用。

高岭土 见《矿物学与丹药》。为白石脂之别名，详该条。

高脚鼠耳草 见《浙江天目山药用植物志》。为婆婆指甲菜之别名，详该条。

栾茶 见《本草纲目拾遗》。为石南叶之别名，详该条。

唐古特青兰 见《西藏常用中草药》。又名甘青青兰。为唇形科植物唐古特青兰 Dracocephalum tanguticum Maxim. 的全草。分布青海、甘肃、四川、西藏等地。甘、苦，寒。疏肝和胃，消炎解毒。治肝炎，肝肿大，胃炎，消化性溃疡病，关节炎，疮疖。煎服：3～9克。预试含黄酮甙、挥发油、氨基酸、甾类。

唐传那保 见《陕甘宁青中草药选》。为藏茄之藏族语名，详该条。

疳积草 ❶见《广西药用植物名录》。为大金牛草之别名。❷见《广东中草药》。为独脚柑之别名。❸见《广西本草选编》。为孩儿草之别名。❹见《安徽中草药》。为荻之别名。各详该条。

烟草 出《滇南本草》。又名野烟、金鸡脚下红。为茄科植物烟草Nicotiana tabacum L.的叶。主产山东、安徽、福建、湖南、湖北、山西、四川、贵州、云南。辛，温，有毒。解毒，消肿，杀虫。治痈肿，疔疮，疥疮，鲜叶捣敷；头癣，白癣，秃疮。煎水涂拭，每日数次。烟叶中含多种生物碱，其中以烟碱（烟叶中所含烟碱约占全株含量的64%，根占13%，茎18%，花5%）、毒藜碱、去氢毒藜碱等较为主要。还含芸香甙、环木菠萝烯醇、γ-谷甾醇、苹果酸、柠檬酸、树脂、脂肪等。烟碱在毒理学上有很大意义：急性中毒时死亡之快，与氰化物相似。吸烟对于脑力或体力活动，均有不利影响。吸烟过多，可产生各种毒性反应，如增高支气管炎、胃病、便秘、闭塞性脉管炎、头痛、失眠等；增加肺癌、冠心病的发病率。

烙铁草 见《重庆草药》。为铧头草之别名，详该条。

凌霄花 出《新修本草》。又名堕胎花。为紫葳科植物紫葳 Campsis grandiflora (Thonb.)Loisel.的花。主产江苏、浙江等地。辛、酸，寒。入肝、心胞经。破血散瘀，祛风，凉血。①治瘀滞经闭，痛经，癥瘕，血热皮肤瘙痒。煎服：3～9克。②研末调

搽皮肤湿癣，酒齄鼻。孕妇忌服。

凌霄花根 出《圣济总录》。为紫葳根之别名，详该条。

凌霄藤 见《常用中草药配方》。为紫葳茎叶之别名，详该条。

凉水果 见《四川中药志》。为马骝卵之别名，详该条。

凉伞草 见《质问本草》。为泽漆之别名，详该条。

凉伞遮珍珠 见《植物名实图考》。为朱砂根之别名，详该条。

凉粉果 见《中国树木分类学》。为木馒头之别名，详该条。

凉粉草 ❶出《本草纲目拾遗》。又名仙人草、仙人冻、仙草、薪草。为唇形科植物凉粉草 Mesona chinensis Benth. 的全草。分布我国南部。甘、淡，凉。祛暑，清热，利湿，解毒，凉血，降压。治中暑，感冒，糖尿病，痢疾，黄疸，肾炎，肌肉、关节痛，跌打肿痛，高血压病。煎服：9～15克。❷见《广西中药志》。为白马骨之别名，详该条。

凉粉柴 见《全国中草药汇编》。为腐婢之别名，详该条。

凉粉藤 见《广西药用植物名录》。又名百解藤、金线风、金锁匙、银锁匙、黑皮蛇。为防己科植物粉叶轮环藤 Cyclea hypoglauca (Schau.)Diels的根或茎、叶。分布华南地区。苦，寒。清热解毒，祛风止痛。①治感冒发热，咽喉肿痛，气管炎，肠炎，痢疾，尿路感染，尿路结石，风湿性关节炎，牙痛。煎服：6～15克。②治疮疡肿毒，蛇咬伤。煎服并捣敷。本品含左旋筒箭毒次碱、轮环藤宁碱。

凉藤 见《陆川本草》。为山甘草之别名，详该条。

酒杯花 见《南方主要有毒植物》。为黄花夹竹桃之别名，详该条。

酒饼木 见《广西药用植物名录》。为山小橘之别名，详该条。

酒醉花 见《陕西中药志》。为洋金花之别名，详该条。

浙贝母 见《中国药学大辞典》。又名象贝母、大贝母、元宝贝。为百合科植物浙贝母 Fritillaria thunbergii Miq. 的鳞茎。主产浙江。苦，寒。入肺、胃经。清热化痰，散结解毒。治风热感冒，咽喉肿痛，肺热咳嗽痰多，肺脓疡，消化道溃疡，瘰疬，瘿瘤，痈疖肿毒。煎服：4.5～9克。反川乌头、草乌头。本品含浙贝母碱、去氢浙贝母碱和微量的贝母丁碱、贝母芬碱、贝母辛碱、贝母替定碱，以及浙贝母碱甙等。浙贝母碱及去氢浙贝母碱对小鼠有镇咳作用。浙贝母碱低浓度时对猫、兔支气管平滑肌有扩张作用，高浓度则收缩，并能兴奋家兔、大鼠子宫；可使蛙心率减慢，并使房室传导完全阻断，对麻醉猫有降压作用。对犬、猫、兔均有扩瞳作用，又能抑制犬的唾液分泌。浙贝母碱甙比浙贝母碱有较强的降压作用。

浙桐皮 见《中国药典·一部》1977年版。为芸香科植物樗叶花椒 Zanthoxylum ailanthoides sieb.et Zucc.或朵椒Z.molle Rehd. 的树皮。前者分布我国东南部；后者分布江西、浙江、安徽。辛、微苦，温。祛风湿，通络，止痛。①治腰膝疼痛。煎服：6～9克。②治湿疹。煎水洗。樗叶花椒的树皮含木兰花碱、茵芋碱和挥发油等。

消山虎 见《广东中草药》。为伤寒草之别名，详该条。

消石 出《神农本草经》。又名火消、焰消、水石。为矿物硝石经加工炼制而成的结晶。产山东、江苏、湖南、湖北、四川、贵州等地。苦、咸，温，有毒。入心、脾经。破坚散积，利尿泻下，解毒消肿。①治痧胀，心腹疼痛，吐泻，黄疸，石淋，便秘。内服：入丸、散，1.5～3克。②治喉痹，研末吹喉；痈肿疔毒，研末调敷。孕妇忌服。本品主成分为硝酸钾。

海马 出《本草拾遗》。又名水马、马头鱼。为海龙科动物克氏海马 Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder或刺海马H.-histrix Kaup、大海马H.kuda Bleeker等除去皮膜及内脏的全体。主产广东、福建及台湾等地。甘,温。入肾经。温肾壮阳,调气和血,催生。治阳痿,遗尿,虚喘,妇女难产腹痛。煎服:3～9克。孕妇忌服。克氏海马醇提物对雌小鼠有雌激素样作用,商品海马提取液对雄小鼠则表现雄激素样作用。

海马菌 见《东北药用植物志》。为海带之别名,详该条。

海风藤 出清·叶小峰《本草再新》。又名风藤、巴岩香。为胡椒科植物细叶青蒌藤 Piper kadsura(Choisy)Ohwi 的藤茎。主产福建、台湾。辛、苦,微温。入肝经。祛风湿,通经络。治风寒湿痹,关节不利,腰膝疼痛,筋脉拘挛,跌打损伤。内服:煎汤,9～15克;或浸酒饮。茎含细叶青蒌藤素(Futoxide)、细叶青蒌藤烯酮(Futoenone)、细叶青蒌藤醌醇(Futoquinol)、细叶青蒌藤酰胺(Futoamide)、β-谷甾醇、豆甾醇及挥发油,油中主成分为蒎烯、柠檬烯、莰烯等。细叶青蒌藤素有抑制肿瘤作用。

海石 见《丹溪心法》。为海浮石之别名,详该条。

海龙 出《本草纲目拾遗》。又名水雁、海蛇。为海龙科动物刁海龙Solenognathus hardwickii(Gray)或拟海龙Syngnathoides biaculeatus (Bloch)等除去皮膜及内脏的全体。主产广东、福建。甘,温。温肾壮阳,催生。治阳痿,不育,老年体虚精神衰惫。煎服:3～9克。孕妇忌服。

海芋 出《本草纲目》。又名野芋、老虎芋、痕芋头、毒芋头、天河芋。为天南星科植物海芋Alocasia odora(Roxb.)C.Koch的根茎。分布广东、广西、台湾、福建、湖南、四川、贵州等地。辛,寒,有毒。清热解毒,消肿散结。①治流行性感冒,肺结核,肠伤寒,瘴疟。煎服:4.5～9克。与米同炒至黄色,去米,煎煮3小时以上。②捣敷疔疮,痈疖肿毒,蛇、虫咬伤。本品生食或煎煮时间过短,服后可引起舌肿麻木,甚至出现中枢神经中毒症状。孕妇忌服。果实名野芋实,又名痕芋头花仁,有小毒,治疝气,每用15克,煨猪肚服。根茎含生物碱、甾醇类、皂草毒(Supotoxin)及海芋素(Alocasin)。

海州常山 出《本草图经》。为臭梧桐之别名,详该条。

海白菜 见《中药志》。为石莼之别名,详该条。

海苔菜 见《本草汇言》。为干苔之别名,详该条。

海昆布 见《山东中药》。即昆布,详该条。

海金沙 出《嘉祐补注神农本草》。又名左转藤灰。为海金沙植物海金沙Lygodium japonicum(Thunb.)sweet 的孢子。主产广东、浙江。甘、淡,寒。入小肠、膀胱经。清热,利水,通淋。治尿路感染,尿路结石,小便淋沥涩痛,尿血,肾炎水肿。煎服:9～15克。本品含脂肪油及海金沙素(Lygodin)。

海金沙草 出《本草纲目》。又名海金沙藤、左转藤。为海金沙科植物海金沙Lygodium japonicum(Thunb.)sweet 的全草。分布华东、中南、西南及陕西等地。甘,寒。清热,解毒,利水。①治感冒发热,咽喉肿痛,肺炎,支气管炎,腮腺炎,湿热黄疸,肠炎,痢疾,尿路感染,尿路结石,肾炎水肿,白浊,带下。煎服:15～30克。②捣敷烧伤,缠腰火丹,外伤出血。本品预试含黄酮类、酚类、氨基酸及糖类。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌,伤寒,大肠、绿脓及痢疾等杆菌有抑制作用。

海金沙根 见《四川中药志》。又名铁脚蜈蚣根。为海金沙科植物海金沙 Lygodium

japonicum (Thunb.) Sweet的根及根茎。甘、淡，寒。清热解毒，利湿消肿。治肺炎，流行性乙型脑炎，痢疾，急性胃肠炎，黄疸型肝炎，湿热肿满，淋病，急性乳腺炎，腮腺炎。煎服：9～30克。

海金沙藤 见《上海常用中草药》。即海金沙草，详该条。

海狗肾 出《本草图经》。又名腽肭脐。为海狗科动物海狗Callorhinus ursinus(L.)或海豹科动物海豹 Phoca vitulina(L.)的雄性外生殖器。前者产加拿大、夏威夷群岛等地；后者我国辽宁有产。咸，热。入肾经。暖肾壮阳，益精补髓。治肾虚阳痿，畏寒肢冷，腰膝痿弱，瘾瘕痃癖，心腹冷痛。内服：煎汤，3～9克；研末吞服，1～1.5克。本品含雄性激素、蛋白质、脂肪等。

海参 见《本草从新》。为刺参科动物刺参Stichopus japonicus Selenka的全体。分布渤海、黄海。甘、咸，温。入心、肾经。补肾益精，养血润燥。治遗精，阳痿，尿频，遗尿，肺结核咯血，神经衰弱，再生障碍性贫血，肠燥便秘。内服：研末，9～15克；或煮食，适量。本品含多量蛋白，少量脂肪并含甾醇、三萜醇、海参皂甙及抗霉剂海参毒素等。

海草 见《东北药用植物志》。为海带之别名，详该条。

海带 出《嘉祐补注神农本草》。又名海马藻、海草。为大叶藻科植物大叶藻Zostera marina L.的全草。主产辽宁、山东。咸，寒。清热消痰，软坚散结，利尿。治甲状腺肿大，淋巴结结核，水肿，疝气。煎服：4.5～9克。本品含碘、大叶藻素（Zosternin）、维生素B_2及鞣质等。醚提取物在体外对结核杆菌有抑制作用。

海带根 见福建《医药卫生》(1)：66，1972。为海带科植物海带Laminaria japonica Aresch.的根状固着器。产山东、辽宁等地。化痰，镇咳，平喘，降压。治慢性气管炎，高血压病。煎服：15～30克。粗提液对豚鼠有平喘作用，对大鼠和猫有止咳作用。

海桐皮 出《开宝重定本草》。又名刺桐皮、钉桐皮、接骨药。为豆科植物刺桐Erythrina variegata L.var. orientalis(L.) Merr.的干皮。主产广西、云南。苦，平。入肝、脾经。祛风除湿，通络止痛，杀虫。①治风湿顽痹，麻木，腰膝疼痛，跌打损伤，骨折，痢疾。煎服：6～15克。②治龋齿痛。煎水含漱；顽癣。和蛇床子研末，猪脂调敷；时行赤毒眼疾，用盐水微炒后，开水泡，温洗。刺桐含刺桐灵碱（Erythraline）、下箴刺桐碱（Hypaphorine）、氨基酸及有机酸。生物碱有箭毒样横纹肌松弛作用（此作用可能被新斯的明所拮抗），又有中枢镇静作用。毒性表现主要为对心脏的抑制，用量过大可引起心律紊乱。体外试验，水浸剂对多种皮肤真菌和金黄色葡萄球菌有抑制作用。

海莫苣 见《中国植物图鉴》。为石莼之别名，详该条。

海蚌含珠 见《植物名实图考》。为铁苋之别名，详该条。

海浮石 出《本草从新》。又名海石、浮海石。为火山喷出的岩浆凝固形成的多孔状石块或胞孔科动物脊突苔虫、瘤苔虫等的骨胳。前者产广东、福建、山东、辽宁等地，药材称为浮石；后者产浙江、福建、广东，药材称为花石。咸，寒。入肺、肾经。清肺化痰，软坚，通淋。治肺热喘咳，咯血，瘰疬，瘿瘤，石淋。煎服：9～15克。浮石含铝、钾、钠的硅酸盐。脊突苔虫骨胳主含碳酸钙，杂有少量的镁、铁及酸不溶性物质。

海菜 ❶见《南越笔记》。为石花菜之别名。❷见《植物名实图考》。为龙舌草之别名。各详该条。

海蛎子壳 见《山东中药》。为牡蛎之别名，详该条。

海蛇 见《药材资料汇编》。即海龙，详

该条。

海椒七 见《全国中草药汇编》。为红毛七之别名，详该条。

海椒梗 见《重庆草药》。为辣椒茎之别名，详该条。

海蛤壳 见《饮片新参》。即蛤壳，详该条。

海蛇 见《本草纲目》。即海蜇，详该条。

海蜇 出《食物本草会纂》。又名海蛇。为海蜇科动物海蜇 Rhopilema esculenta kishinouye的口腕部或伞部。分布我国沿海各地。咸，平。清热，化痰，消积，润肠。治痰嗽，哮喘，痞积胀满，大便燥结，脚气，痰核。煎服：30～60克。本品每100克含蛋白质12.3克，脂肪0.1克，碳水化物4克，钙182毫克，磷微量，铁9.5毫克，维生素$B_1$0.01毫克，维生素$B_2$0.04毫克，尼克酸0.2毫克。还含胆碱和碘。以微热溶解的海蜇原液，有胆碱样作用。

海蕉 见《南方主要有毒植物》。为罗裙带之别名，详该条。

海薯藤 见《广西本草选编》。为鲎藤之别名，详该条。

海螵蛸 出《本草纲目》。又名乌鲗骨、乌贼鱼骨、墨鱼盖。为乌贼科动物金乌贼 Sepia esculenta Hoyle. 或针乌贼 S. andreana steen-strup 等的骨状内壳。主产浙江、福建、广东、山东、江苏、辽宁沿海地区。咸，微温。入肝、肾经。收敛，止血，止带，制酸。①治崩漏，吐血，衄血，便血，遗精，带下，久虚泻痢，胃痛泛酸，胃、十二指肠溃疡出血，瘿瘤。煎服：4.5～9克。②治创伤出血，聍耳，湿疹，疮疡久不收口，研末撒；目中浮翳。研极细末，和蜜点之。本品含碳酸钙（80～85%）、壳角质、粘液质和少量氯化钠、磷酸钙、镁盐等。

海藻 出《神农本草经》。为马尾藻科植物羊栖菜Sargassum fusiforme（Harv.）Setch.或海蒿子S.pallidum(Turn.)C.Ag.的全草。产福建、浙江、山东、辽宁。苦、咸，寒。入肝、胃、肾经。清热消痰，软坚散结，利尿。治地方性甲状腺肿大，淋巴结结核，瘿瘕，水肿，脚气，睾丸肿痛。煎服：9～15克。反甘草。羊栖菜和海蒿子均含藻胶酸、甘露醇、钾、碘等。海蒿子还含马尾藻多糖，岩藻甾醇。藻胶酸硫酸酯有抗高脂血症作用，对兔可降低血清胆固醇及减轻动脉粥样硬化。商品海藻水浸剂对麻醉犬、兔有降压作用。所含碘化物可预防和纠正由于缺碘所引起的甲状腺功能不足。

浴香 ❶见《本草纲目》。为乳香之别名。❷见《本草纲目》。为檀香之别名。各详该条。

浮小麦 出《本草汇言》。又名浮麦、浮水麦。为干瘪轻浮的小麦。甘、咸，凉。入心经。养心敛汗，益气除热，利尿。治自汗，盗汗，骨蒸劳热。煎服：15～30克。血淋不止。童便炒，研末，砂糖水调服。本品含淀粉、蛋白质、脂肪、钙、磷、铁和B族维生素。

浮水麦 见《本草蒙筌》。即浮小麦，详该条。

浮石 见《备急千金要方》。为海浮石药材之一种，详该条。

浮麦 见《本草纲目》。即浮小麦，详该条。

浮海石 见《玉楸药解》。即海浮石，详该条。

浮萍 出《新修本草》。又名水萍、田萍。为浮萍科植物紫背浮萍Spirodela polyrrhiza Schleid.或青萍Lemna minoa L.的全草。全国各地均有分布。辛，寒。入肺、小肠经。发汗，祛风，行水，凉血。①治感冒发热无汗，麻疹透发不畅，荨麻疹，皮肤瘙痒，风水浮肿，小便不利，口舌生疮。煎服：3～6克；亦可煎汤熏洗。②治鼻衄，研末吹鼻；丹毒，捣汁涂；肿毒初起，捣烂

敷。紫背浮萍主含荭草素，牡荆素，大波斯菊甙，木犀草素-7-葡萄糖甙等。另含鞣质，类脂化合物以及醋酸钾、氯化钾、碘、溴等。青萍含多量维生素B_1、B_2、C，木犀草素-7-葡萄糖甙，8-羟基木犀草素-8-β-葡萄糖甙；另含多糖、碘、溴及鞣质等。紫萍有利尿作用，可能与其中所含的钾盐有关。青萍水浸膏对奎宁引起衰竭的蛙心有强心作用，剂量过大则抑制心脏。

浮萍参 见《民间常用草药汇编》。为土党参之别名，详该条。

浮飘 见《四川中药志》。为满江红之别名，详该条。

流星草 见《本草纲目》。为谷精草之别名，详该条。

涩叶藤 见《海南植物志》。为锡叶藤之别名，详该条。

涩沙藤 见《陆川本草》。为锡叶藤之别名，详该条。

涩疙瘩 见《陕西中草药》。为红景天之别名，详该条。

羖羊角 出《神农本草经》。为牛科动物山羊Capra hircus L.或绵羊Ovis aries L.的角。咸，凉。入肝、心经。清热，镇惊，明目，解毒。①治小儿惊痫，风热头痛，烦闷，吐血，青盲。内服：煎汤，3～6克；或烧存性研末服。②治肿毒。研末调敷。

瓶尔小草 出《植物名实图考》。又名独叶一枝枪、一支箭、蛇舌草、矛盾草。为瓶尔小草科植物瓶尔小草Ophioglossum vulgatum L.或有梗瓶尔小草O. pedunculosum Desv.等的全草。分布长江下游、西南地区及湖南、陕西、台湾等地。甘、微酸，凉。入肺经。清热凉血，解毒，止痛。①治肺热咳嗽，肺痈，肺痿，咯血，黄疸，胃痛，痧症腹痛。煎服：9～15克。②治痈疮肿毒，蛇咬伤。煎服并捣敷。叶含一支箭三糖甙，即3-O-甲基槲皮素-7-O-二葡萄糖甙-4′-O-葡萄糖甙。

粉丹皮 见《滇南本草》。为牡丹皮之处方名，详该条。

粉团花 见《现代实用中药》。为八仙花之别名，详该条。

粉条儿菜 出《救荒本草》。又名小肺筋草、蛆儿草、金线吊白米。为百合科植物肺筋草Aletris spicata (Thunb.) Franch.的全草或根。分布河北、山西、甘肃、陕西及华东、中南至西南地区。甘、微辛，平。润肺止咳，养心安神，消积驱蛔。治咳嗽，哮喘，百日咳，肺痈，肺结核咯血，神经官能症，小儿疳积，蛔虫病，腮腺炎，乳少，经闭。煎服：9～30克。根含皂甙。水解后产生异娜草皂甙元(Lsonarthogenin)和薯蓣皂甙元。

粉沙参 见《本草从新》。为明党参之别名，详该条。

粉草 见《群芳谱》。为甘草之别名，详该条。

粉葛 见清·刘士季《草本便方》。为葛根之别名，详该条。

粉霜 见《本草品汇精要》。又名白雪、水银霜、白粉霜。为轻粉的精制品。产湖北、浙江、河北等地。辛，温，有毒。攻毒，利水，通便。①治牙疳，梅毒恶疮。研末撒患部。②治水肿，臌胀，大小便闭。入丸、散。本品有大毒，内服宜慎。孕妇忌服。本品主含甘汞(即氯化亚汞)。药理作用与轻粉基本相同。

益母 出《神农本草经》。即益母草，详该条。

益母艾 见《生草药性备要》。即益母草，详该条。

益母草 出《本草图经》。又名益母、茺蔚、益母艾、坤草、红花艾、益母蒿、苦草。为唇形科植物益母草Leonurus heterophyllus Sweet的全草。全国大部地区均产。辛、微苦，微寒。入心、肝、肾经。活血调经，利尿消肿。①治月经不调，痛经，闭经，崩

漏，产后瘀血腹痛，血晕，肾炎水肿，小便不利，尿血，皮肤瘙痒。煎服：9～30克。②治疮疡肿毒，跌打瘀滞，捣敷或研末调敷。益母草全草含益母草碱、水苏碱、益母草定碱、益母草宁碱、芸香甙和多量氯化钾等。益母草碱或叶的水煎剂能使子宫收缩，与麦角新碱相似，水浸剂静脉注射能引起动物血压下降，尿量增加，在试管内能抑制常见致病性皮肤真菌。

益母草子 见《江苏药材志》。为茺蔚子之别名，详该条。

益母蒿 见《东北药用植物志》。即益母草，详该条。

益智子 见《开宝重定本草》。即益智仁，详该条。

益智仁 出《得配本草》。又名益智子。为姜科植物益智Alpinia oxyphylla Miq.的果实。主产海南岛。辛，温。入脾、肾经。温脾，暖肾，收摄精气。治腹部冷痛，泄泻，多唾，遗精，白浊，遗尿，尿频，吐血，血崩。煎服：3～9克。本品含挥发油，其中主含桉叶素，还有姜烯（Zingiberene）、姜醇（Zingiberol）等。

宽紧草 见《浙江中药手册》。为鼠曲草之别名，详该条。

宽筋藤 ❶见《南宁市药物志》。又名伸筋藤、舒筋藤、大松身。为防己科植物中华青牛胆 Tinospora sinensis（Lour.）Merr.的茎藤。分布广东、广西等地。微苦，凉。舒筋活络，祛风除湿。①治风湿痹痛，坐骨神经痛，腰肌劳损，跌打损伤。煎服：9～30克。②捣敷乳腺炎，无名肿毒。孕妇及产后慎服。本品预试含氨基酸、糖类。❷见《陆川本草》。为四方藤之别名。❸出《生草药性备要》。为伸筋草之别名，各详该条。

家佩兰 见《中国药用植物志》。为罗勒之别名，详该条。

家蓼 见《新疆中草药手册》。为荭草之别名，详该条。

拳参 出《本草图经》。又名山虾子、虾参、刀剪药。为蓼科植物拳参Polygonum bistorta L.的根茎。主产河北、河南、山西、山东、陕西、湖北。苦，微寒，有小毒。入肺、大肠经，清热解毒，凉血止血，消肿散结。①治热病惊痫，肝炎，细菌性痢疾，肠炎，慢性气管炎，淋浊带下，痔疮出血，子宫出血。煎服：4.5～9克。②煎水含漱，治口腔炎，咽喉炎；醋磨汁涂搽痈疖肿毒、瘰疬。本品含鞣质，儿茶精，没食子酸，羟基甲基蒽醌等。外用有一定的止血效果。试管内对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有抑制作用。

浆水 出《嘉祐补注神农本草》。又名米浆水、酸浆水。为用粟米加工，经发酵而成的白色浆液。甘、酸，凉。调中和胃，化滞，止渴。治呕哕，伤食，泻痢，烦渴。内服：冲水煎汤或代水煮粥。

娄罗子 出《本草纲目》。又名苏罗子、梭罗子、开心果。为七叶树科植物七叶树Aesculus chinensis Bge.或天师栗A.wilsonii Rehd.的果实或种子。主产浙江、江苏、河南、陕西。甘，温。入肝、胃经。疏肝理气，和胃止痛，杀虫。治肝胃气痛，脘腹胀满，经前腹痛、乳胀，疳积虫痛，痢疾。煎服：3～9克。

诸葛草 见《种子植物名称》。为芸香草之别名，详该条。

诸葛菜 出《嘉话录》。为芜菁之别名，详该条。

调羹花 见《中药材手册》。为厚朴花之别名，详该条。

调羹草 见《湖南药物志》。为向天盏之别名，详该条。

扇叶葵 见《广州植物志》。为蒲葵之别名，详该条。

〔7〕

陵草 见《中药材手册》。为零陵香之别

名，详该条。

预知子 出《日华子诸家本草》。原指木通之种子，但现在商品以此为木通之果实名，详八月扎条。

桑上寄生 出《神农本草经》。即桑寄生，详该条。

桑叶 出《神农本草经》。又名冬桑叶、霜桑叶、铁扇子。为桑科植物桑Morus alba L.的叶。全国大部分地区均产。苦、甘，寒。入肺、肝经。疏风清热、清肝明目。①治风热感冒，咳嗽，头痛，眩晕，咽喉红肿。煎服：4.5～9克。②治目赤肿痛。煎服或煎水洗眼。鲜桑叶摘破叶脉后渗出的白色液汁名桑叶汁，又名桑叶滋、桑脂，涂敷痈疖，外伤出血，蜈蚣咬伤。叶含芸香甙，槲皮素，槲皮甙，桑甙（Moracetin），伞形花内酯，东莨菪素，东莨菪甙，胡芦巴碱，胆碱，矢本菊素3-葡萄糖甙，绿原酸，内消旋肌醇，维生素C、B_1、B_2，叶酸，多种氨基酸等。还含挥发油，内含丁香油酚、愈创木酚等。对大鼠实验性糖尿病有降低血糖的作用。

桑白皮 出《药性论》。又名桑根白皮、桑根皮、桑皮。为桑科植物桑Morus alba L.的根皮。主产安徽、河南、浙江、江苏、湖南。甘、寒。入肝、脾经。泻肺平喘，利水，降压。①治肺热咳喘，水肿，脚气，小便不利，高血压病，糖尿病。煎服：6～15克。②治小儿鹅口疮。鲜根皮捣汁涂敷。桑树皮中的白色液汁名桑皮汁，又名桑汁、桑木汁、桑白汁，涂敷小儿口疮，外伤出血。根皮含桑素（Mulberrin），环桑素，桑色烯（Mulberrochromene），环桑色烯，桑黄酮（Kuwanon）A、B、C，白桦脂酸等。煎剂对兔有利尿作用，提取物对麻醉兔有明显的降压作用，对小鼠有镇静作用。

桑皮 出《食疗本草》。即桑白皮，详该条。

桑条 出《本草图经》。即桑枝，详该条。

桑枝 出《本草图经》。又名桑条。为桑科植物桑Morus alba L.的嫩枝。全国大部分地区均产。苦，平。入肝经。祛风湿，通经络，利小便。治风湿性关节炎，风热臂痛，四肢拘挛，脚气浮肿。煎服：15～30克。老桑树上的结节名桑瘿，内服治风湿痹痛，胃痛。茎皮含桑素、环桑素、桑色烯、环桑色烯及白桦脂酸、鞣质等。

桑枣 见《生草药性备要》。即桑椹，详该条。

桑果 见《江苏省植物药材志》。即桑椹，详该条。

桑实 出《说文》。即桑椹，详该条。

桑根 见《南京民间药草》。为桑科植物桑Morus alba L.的根。祛风，通络，降压，明目。治风湿痛，跌打损伤，高血压，目赤。煎服：15～30克。桑木材烧成的灰名桑柴灰。桑柴灰加水过滤、蒸发后所得的结晶状物名桑霜，又名木硇，内服治噎食积块；外用敷痈疽，疔疮。根的乙醇及丙酮浸出液在体外有抑制皮肤真菌的作用。

桑根白皮 出《神农本草经》。即桑白皮，详该条。

桑根皮 出《食疗本草》。即桑白皮，详该条。

桑寄生 出《雷公炮炙论》。又名桑上寄生。为桑寄生科植物桑寄生 Loranthus parasiticus (L.)Merr. 的枝叶。主产广东、广西。苦、甘，平。入肝、肾经。补肝肾，祛风湿，降血压，养血安胎。治腰膝酸痛，筋骨痿弱，风寒湿痹，冠心病心绞痛，高血压病，妊娠胎动不安，胎漏下血。煎服：9～15克。枝叶含萹蓄甙及槲皮素。对麻醉狗、猫有降压、利尿作用；对离体豚鼠心脏有扩张冠脉作用，对实验性动脉硬化的离体兔耳血管有扩张作用，对小鼠有镇静作用。煎剂或浸剂对脊髓灰质炎病毒在体外有抑制作用。

桑椹 出《新修本草》。又名桑实、桑果、桑枣、桑椹子。为桑科植物桑Morus

alba L.的果穗。全国大部分地区均产。甘，酸，寒。入肝、肾经。滋补肝肾，养血祛风。治眩晕，失眠，耳聋，目昏，消渴，便秘，瘰疬，风湿关节炎。煎服：9～15克。本品含芸香甙，花青素甙，胡萝卜素，维生素B_1、B_2、C，菸酸，糖类，脂肪油。油中主成分为亚油酸。

桑椹子 见《临证指南医案》。即桑椹，详该条。

桑螵蛸 出《神农本草经》。又名螳螂子、赖尿郎。为螳螂科昆虫大刀螂Paratenodera sinensis de Saussure或小刀螂Statilia maculata Thunb.薄翅螳螂Mantis religiosa L.等的干燥卵鞘。产广西、云南、湖北、湖南、山东、浙江、江苏等地。甘、咸，平。入肝、肾经。益肾，固精，缩小便。治遗尿，尿频失禁，腰痛，带下，遗精滑精。煎服：3～9克。薄翅螳螂的卵鞘含蛋白质、脂肪、粗纤维、胡萝卜素样色素及铁盐。

通天草 见《饮片新参》。又名荸荠苗、地栗梗。为莎草科植物荸荠 Eleocharis tuberosa (Roxb.) Roem.et Schult. 的地上茎。我国大部分地区均产。甘，寒。清热，利尿。治小便不利，水肿，淋病。煎服：9～15克。

通气草 出清·刘士季《草木便方》。为笔筒草之别名，详该条。

通气香 见《云南思茅中草药选》。为黑风藤之别名，详该条。

通心草 见萧步丹《岭南采药录》。为自消容之别名，详该条。

通光散 见《云南中草药选》。又名奶浆藤、乌骨藤、黄木香、下奶藤、通关藤。为萝藦科植物通光散Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.的藤茎。分布云南、贵州等地。苦，寒。清热解毒，止咳平喘，通乳利尿。①治上呼吸道感染，慢性支气管炎，支气管哮喘，咽喉炎。②乳汁不通，小便不利。③近试用于食管癌，贲门癌，宫颈癌，及淋巴网状细胞瘤等。煎服：9～15克。通光散叶：鲜叶捣敷治疔疮肿毒。藤茎含苦味甾体脂甙，其主要甙元可能为肉珊瑚甙元。苦味甾体酯甙能对抗组织胺所致的豚鼠离体气管痉挛，对离体兔耳血管有扩张作用。总甙对小鼠有止咳作用，在体外能抑制肺炎双球菌和流感杆菌的生长。

通关藤 见《中国药典·一部》1977版。为通光散之别名，详该条。

通花根 见清·刘士季《草木便方》。为五加科植物通脱木Tetrapanax papyriferus (Hook.) K.Koch的根。分布长江以南各地和陕西。淡，平。行气，利水，消食，下乳。治水肿，小便不利，淋病，气胀，食积，乳汁不下。煎服：15～30克。

通经草 见《山西中草药》。又名金牛草、铜丝草、金丝草、分经草。为中国蕨科植物银粉背蕨Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fée的全草。广布全国各地。淡、微涩，平。活血通经，止咳，祛湿。治月经不调，经闭腹痛，百日咳，肺结核咯血，赤白带下，泻痢，风湿性关节炎。煎服：9～15克。叶含粉背蕨酸 (Alepterolic acid)、蔗糖、黄酮类化合物。

通草 ❶出《本草拾遗》。又名白通草、大通草、方通草。为五加科植物通脱木 Tetrapanax papyriferus (Hook.) K.Koch的茎髓。产云南、贵州、台湾、广西、四川等地。甘、淡，寒。入肺、胃、膀胱经。清热利水，通乳。治小便不利，水肿，尿路感染，乳汁不通。煎服：2.5～4.5克。孕妇慎服。本品含肌醇以及多聚戊糖，多聚甲基戊糖、半乳糖醋酸等。水解物中含通脱木甙 (Papyrioside)。❷出《神农本草经》。为木通之别名，详该条。

通城虎 见《广西中草药》。又名定心草、一点血、血蒌。为马兜铃科植物通城虎 Aristolochia fordiana Hemsl.的根。分布广西。辛、微苦，温，有小毒。祛风止痛，

解毒消肿。①治胃痛，风湿痹痛，跌打损伤。煎服：3～6克。②治蛇咬伤。煎服并捣敷伤口周围。

绣花针 见《植物名实图考》。为虎刺之别名，详该条。

绣球叶 见《福建民间草药》。为球兰之别名，详该条。

绣球防风 ❶出《滇南本草》。又名绣球草、蜜蜂草。为唇形科植物绣球防风Leucas ciliata Benth.的全草。分布西南及广西。苦、辛，凉。行气散瘀，明目退翳，解毒消肿。①治肝气郁结，血瘀经闭，小儿雀眼，青盲翳障。煎服：9～30克。②治痈疽肿毒，皮疹，癣疮，疥癞。捣敷或煎水洗。❷见《文山中草药》。为蜂窝草之别名，详该条。

绣球防风根 见《云南中草药》。为唇形科植物绣球防风Leucas ciliata Beuth.的根。苦、辛，温。祛风散寒，理气，健胃。治风寒感冒，风湿麻木疼痛，肝气郁结，痢疾，食欲不振，小儿疳积，皮疹，脱肛。煎服：9～15克。

绣球草 见《云南中草药》。为绣球防风之别名，详该条。

十一画

〔一〕

球子草 ❶见《全国中草药汇编》。为水蜈蚣之别名。❷见《广州植物志》。为鹅不食草的别名。各详该条。

球兰 见《福建民间草药》。又名玉绣球、牛舌黄、绣球叶、爬岩板、草鞋板。为萝藦科植物球兰 Hoya carnosa(L.f.)R.Br.的藤茎或叶。分布云南、广西、广东、台湾等地。苦，平。清热解毒，祛风利湿，催乳。治支气管炎，肺炎，流行性乙型脑炎，瘰疬，睾丸炎，风湿性关节炎，小便不利，乳妇奶少。煎服：9～15克。捣敷治痈肿疔疮。茎、叶含球兰甙(Hoyin)、春日菊醇(Leucanthemitol)，谷甾醇，脂肪油等。

琐阳 出《丹溪心法》。即锁阳，详该条。

麸皮 见《本草蒙筌》。即小麦麸，详该条。

梗通草 见《饮片新参》。又名白梗通、水通草。为豆科植物田皂角Aeschynomene indica L.茎的木质部。主产浙江、江苏。微苦，凉。入肺、胃经。清热，利尿，通乳。治水肿，淋病，小便不利，乳汁不通。煎服：3～6克。本品含皂甙。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

梧桐子 出《履巉岩本草》。又名瓢儿果。为梧桐科植物梧桐Firmiana simplex(L.)W.F.Wight的种子。产江苏、浙江、河南、陕西、甘肃等地。甘，平。顺气，和胃，消食。①治胃痛，疝气。煎服：6～9克。②治伤食腹泻。炒焦研末，每服3克。③治小儿口疮。烧存性研末撒。本品含不干性油，其中脂肪酸有苹婆酸，另含咖啡碱。

梧桐叶 出《本草纲目》。为梧桐科植物梧桐Firmiana simplex(L.)W.F.Wight的叶。我国华南至河北各地栽培甚广。苦，寒。祛风除湿，镇咳去痰，降压，清热解毒。①治风湿疼痛，哮喘。煎服：15～30克。②治高血压病。制成糖浆内服或注射剂肌肉注射。③治痔疮，煎汤熏洗；痈疖肿毒，臁疮，创伤出血，烫伤，捣敷或研末外敷。本品含甜菜碱、胆碱、芸香甙、β-香树脂醇及其乙酸酯和β-谷甾醇等。浸膏对狗、猫有降压作用，对小鼠有显著的镇静作用。

梧桐白皮 出《本草图经》。又名梧桐

皮。为梧桐科植物梧桐Firmiana simplex (L.)W.F.Wiqht去掉栓皮的茎皮。苦,寒。祛风除湿，和血调经，清热解毒。①治腰膝痹痛，跌打损伤，月经不调，丹毒，痔疮，脱肛。煎服：9～15克。②捣敷治腮腺炎。树皮含戊聚糖、羽扇烯酮（Lupenone）、槲皮甙等。树皮浸出的粘液质中含半乳聚糖、戊聚糖、糖醛酸、蛋白质等。树皮所含无色化合物，浓度在1:1000时对蛙离体横纹肌有增强收缩作用。

梧桐皮 见《履巉岩本草》。即梧桐白皮，详该条。

梧桐花 出《本草纲目拾遗》。为梧桐科植物梧桐Firmiana simplex (L.)W.F.Wight的花。甘，平。健脾利水,清热解毒。①治水肿。煎服：9～15克。②治烧伤，秃疮。研末调敷。

梧桐根 见《福建民间草药》。为梧桐科植物梧桐Firmiana simplex (L.) W.F.Wight的根或根皮。苦，寒。祛风利湿,清热解毒，和血，驱虫。①治风湿性关节炎，尿路感染，白带。②治外感发热，腮腺炎，疮痈肿毒，肺结核咳血，肠风下血,月经不调。③治蛔虫性肠梗阻,血丝虫病。煎服：9～15克。

梣皮 出《名医别录》。为秦皮之别名，详该条。

梣树子油 见《本草纲目拾遗》。为茶油之别名，详该条。

梅片 见《中国药学大辞典》。为冰片之处方名，详该条。

梅花冰片 见《中国药学大辞典》。为冰片之处方名，详该条。

梅花草 见《内蒙古中草药》。为虎耳草科植物梅花草Parnassia palustris L.的全草。分布东北、华北及陕西、甘肃等地。微苦，平。清热解毒，止咳化痰。治黄疸型肝炎，细菌性痢疾，咽喉肿痛，脉管炎，疮痈肿毒，咳嗽多痰,百日咳。煎服：9～15克。全草含山柰酚、芸香甙、金丝桃甙。茎尚含槲皮素的葡萄糖甙。根含生物碱。

梅实 出《神农本草经》。即梅之果实，详乌梅条。

梅根 出《名医别录》。为蔷薇科植物梅Prunus mume (Sieb.) Sieb. et Zucc.的根。全国各地均有栽培。治胆囊炎，风痹，休息痢，瘰疬。煎服：30～60克。

梅蕻 见《山东中草药手册》。为石花之别名，详该条。

栀子 出《神农本草经》。又名山栀子、黄栀子。为茜草科植物栀子Gardenia jasminoides Ellis的果实。主产浙江、江西、湖南、福建。苦，寒。入心、肝、肺、胃经。泻火除烦,清热利湿,凉血散瘀。①治热病心烦不眠，黄疸，淋病,尿血,吐血,衄血,目赤，口疮,疮疡肿毒。煎服(一般炒黑用于止血)：6～9克。②生用治跌打损伤,扭伤，研末调敷。本品含栀子素、栀子甙（Gardenoside）、去羟栀子甙（Geniposide）、栀子新甙（Gardoside）、山栀甙（Shanzhiside）和藏红花素、藏红花酸、熊果酸等。去羟栀子甙及栀子水提取物在动物试验中，有镇痛、对肠管有解痉作用，熊果酸有解热、镇静作用。藏红花素和藏红花酸能抑制兔在总输胆管被结扎后的血胆红素的升高，并有降血脂作用。水和醇浸膏对兔有利胆、降压作用。水浸剂在体外能抑制某些常见致病性皮肤真菌。

栀子叶 出清·赵其光《本草求原》。为茜草科植物栀子Gardenia jasminoides Ellis的叶。苦、涩,寒。解毒,消肿。治痔疮，疔疮。煎水洗。叶、叶柄含栀子甙、去羟栀子甙。

栀子花 出《滇南本草》。为茜草科植物栀子Gardenia jasminoides Ellis的花。分布我国南部和中部。苦，寒。清肺，凉血。治肺热咳嗽。煎服：3～5朵。焙干为末，吹鼻治鼻衄。本品含挥发油。

栀子花根 出《分类草药性》。为茜草科植物栀子Gardenia jasminoides Ellis的根。苦，寒。清热利湿，凉血解毒。治感冒发热，黄疸型肝炎，痢疾，淋病，吐血，衄血，风火牙痛，流火，痈肿疮毒。煎服：9～15克。孕妇忌服。

梓叶 出《神农本草经》。为紫葳科植物梓树Catalpa ovata G. Don的叶。治小儿壮热，疮疥，皮肤瘙痒。煎水温洗。本品含对香豆酸、对羟基苯甲酸。体外试验，冷、温浸液对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、产气杆菌均有抑制作用。

梓白皮 出《神农本草经》。为紫葳科植物梓树 Catalpa ovata G.Don的根皮或树皮的韧皮部。分布东北、华北、西北及长江流域各地。苦，寒。入胆、胃经。清热，解毒，利湿。①治温病发热，黄疸，反胃吐逆。煎服：4.5～9克。②煎水洗小儿热疮，皮肤瘙痒，疥疮。梓树的木材名梓木，治手足痛风，煎汤熏洗。根皮含异阿魏酸、谷甾醇、对羟基苯甲酸。树皮含对香豆酸、阿魏酸。

梓实 见《现代实用中药》。为紫葳科植物梓树Catalpa ovata G.Don的果实。甘，平。利尿。治慢性肾炎，浮肿，膀胱炎，肝硬化腹水。煎服：9～15克。本品含梓甙(Catalposide)、梓醇(Catalpol)、对羟基苯甲酸、柠檬酸、蜡等。水提取物对小白鼠、家兔均有利尿作用。梓醇利尿排钠，梓甙利尿排氯，其利尿作用乃由于对肾小管的影响所致。梓醇还有降低血糖及迟效性缓和泻下作用。

椎木根 见《湖南药物志》。即椎花根，详该条。

椎花 出《植物名实图考》。为金缕梅科植物椎木 Loropetalu Lum chinense (R.Br.)Oliv.的茎叶或花，分布华东、中南、西南等地区。甘、涩，平。止血，清热，解毒。治吐血，衄血，咯血，崩漏，痢疾，泄泻。煎服：茎叶9～15克；花6～12克。捣烂或研末敷外伤出血，痈疖溃疡；研末油调，涂烧伤。叶含槲皮素、没食子酸、鞣质等。花含异槲皮甙。干叶粉末有止血作用。煎液在体外对金黄色葡萄球菌，福氏痢疾杆菌，伤寒杆菌有抑制作用。

椎花根 见《福建民间草药》。又名椎木根。为金缕梅科植物椎木Loropetalum chinense(R.Br.)Oliv.的根。苦、涩，微温。止血，活血，止泻。治吐血，咯血，衄血，崩漏；血瘀经闭，产后恶露不畅，跌打损伤，关节疼痛；泄泻，脱肛。煎服：9～15克。孕妇忌服。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用；对动物离体子宫有较强而持久的兴奋作用。

梭罗子 见《陕西中草药》。即娑罗子，详该条。

梭罗花 见《四川中药志》。为铁树花之别名，详该条。

梭罗草 见《贵州民间药物》。为石上柏之别名，详该条。

勒马回 见《全国中草药汇编》。为水蔓菁之别名，详该条。

勒荔 见《广西中药志》。为荔枝之别名，详该条。

蓼菜 出《名医别录》。为荠苨菜之别名，详该条。

菥蓂 出《神农本草经》。又名遏蓝菜、大荠、马辛。为十字花科植物菥蓂 Thlaspi arvense L.的全草。我国大部分地区均有分布。苦、甘，平。和中益气，清热解毒。治消化不良，肾炎，子宫内膜炎，疮疖痈肿。煎服：9～15克。本品含黑芥子甙(Sinigrin)。

菥蓂子 出《神农本草经》。为十字花科植物菥蓂Thlaspi arvense L.的种子。辛，微温。祛风明目，止血，强筋骨。①治目赤肿痛，迎风流泪。煎服或研细粉点眼。②治鼻衄，风湿痹痛，腰痛。煎服：6～12克。本

品含黑芥子甙（Sinigrin）、芥子油。油中脂肪酸主要有芥酸、油酸、亚油酸、亚麻酸。另含卵磷脂等。

菱 出《名医别录》。为菱科植物菱Trapa bispinosa Roxb.的种子。全国各地有栽培。甘，凉。生食：清热，除烦，止渴。熟食：益气，健脾。本品除含丰富的淀粉、葡萄糖、蛋白质外，还分离出麦角甾四烯-4，6，8（14），22-酮-3，22-二氢豆甾烯-4-二酮-3，6和β-谷甾醇。曾有报告，醇浸出液对小鼠艾氏腹水癌体内试验有抗癌作用。

菱叶 出《滇南本草》。为菱科植物菱Trapa bispinosa Roxb.或其同属植物的叶。治小儿走马牙疳，小儿头疮，研末搽。

菱壳 出《本草纲目拾遗》。为菱科植物菱Trapa bispinosa Roxb.的果壳。甘、涩，平。收敛，止泻，解毒，消肿。①治泄泻，痢疾，便血，胃溃疡。煎服：30～60克。②烧存性研末油调，敷痔疮，天泡疮、黄水疮及无名肿毒；煎水洗脱肛。本品含鞣质等。

菱角菜 见《广州植物志》。为荠菜之别名，详该条。

菱蒂 出《本草纲目拾遗》。为菱科植物菱Trapa bispinosa Roxb.或其同属植物的果柄。①治胃溃疡，近亦用治胃癌、食管癌、子宫颈癌。煎服：鲜品30～60克。②治皮肤疣。鲜品在患部不断擦拭，每次约2分钟，每天六至八次。

庵蔺 出《神农本草经》。又名覆闇、臭蒿。为菊科植物菴闾Artemisia keiskeana Miq.的全草。分布东北地区及河北、山东、江苏、浙江、安徽等地。辛、苦，温。散瘀血，祛风湿。治血瘀经闭，跌打损伤，风湿痹痛。煎服6～15克。

庵蔺子 出《神农本草经》。为菊科植物闾菴Artemisia keiskeana Miq.的果实。苦、辛，温。入肝、肾经。益气壮阳，祛风湿，消瘀血。治阳痿，风湿痹痛，妇女经闭，产后停瘀腹痛，跌打损伤。煎服：6～15克。

菝葜 出《名医别录》。又名金刚根、铁菱角、冷饭头、铁刺苓。为百合科植物菝葜Smilax china L.的根茎。主产浙江、江苏等地。苦、涩，平。祛风利湿，解毒消肿。治筋骨酸痛，历节痛风，泄泻，痢疾，淋病，消渴，赤白带下，乳糜尿，扁桃体炎，瘰疬，痔疮，牛皮癣，疔疮，肿毒。近用治消化道癌症，对改善症状有一定作用。煎服：9～30克。外用：捣烂敷。本品含薯蓣皂甙元和菝葜皂甙（Smilaxsaponin）A、B、C。还含生物碱等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、大肠和绿脓杆菌有抑制作用。

菝葜叶 出《日华子诸家本草》。为百合科植物菝葜Smilax china L.的叶。分布华东、中南、西南地区。①治疮疖肿毒，臁疮，蜈蚣螫伤，用鲜叶捣敷；烫伤，鲜叶烤干研末，麻油调涂；钩蚴性皮炎，嫩叶同米泔水捣汁外搽。②治糖尿病，鲜叶30～60克。煎汤代茶。本品含芸香甙。还含高级醛类、高级伯醇类、棕榈酮等。

菖蒲 ❶出《本草衍义》。为水菖蒲之别名。❷出《神农本草经》。即石菖蒲。各详该条。

萝卜 出《食疗本草》。为莱菔之别名，详该条。

萝卜子 出《日华子诸家本草》。为莱菔子之别名，详该条。

萝卜甲 见《江苏省植物药材志》。为莱菔叶之别名，详该条。

萝卜地丁 见《中药材手册》。为甜地丁之别名，详该条。

萝卜缨 见清·叶小峰《本草再新》。为莱菔叶之别名，详该条。

萝丝子 见《江苏省植物药材志》。为菟丝子之别名，详该条。

萝芙木 见《中国药用植物志》。又名鱼胆木、羊屎果、山马蹄。为夹竹桃科植物萝芙木Rauvolfia verticillata(Lour.)Baill.

的根。主产广西、广东、云南。苦，寒，有小毒。降压，镇静，清热，活血，解毒。①治高血压引起的头痛、眩晕，失眠，耳鸣，心悸，癫痫，胆囊炎，感冒发热，咽喉肿痛。煎服：6～9克。②捣烂敷，治跌打损伤及蛇咬伤。本品含利血平，萝芙木碱、四氢蛇根碱、萝莱碱（Raunescine）、萝芙木甲素（Rauvolfia A）等多种生物碱以及熊果酸、β-谷甾醇等。萝芙木总碱有温和而持久的降压作用，并有镇静和安定作用，可使心率减慢；国产的萝芙木根总碱的降压作用比印度产萝芙木总碱强，副作用相似，有嗜睡、口干、乏力、鼻塞等。萝芙木碱对动物和人都有明显的抗心律不齐作用。

萝芙木茎叶 见《南宁市药物志》。为夹竹桃科植物萝芙木 Rauvolfia verticillata（Lour.）Baill.的茎叶。分布台湾及华南、西南地区。苦、甘，凉。降压，清热，行瘀，解毒。①治高血压，痧症吐泻，咽痛。煎服：9～15克。②治疮疖，跌打损伤，蛇咬伤，捣敷；汤火伤，煎浓汁洗。本品含阿立新碱（Aricine）、维洛斯明碱、霹雳萝芙辛碱（Peraksine）、蛇根碱、萝芙木碱、利血平等多种生物碱以及羊槐甙（Robinin）、β-谷甾醇、β-香树脂醇乙酸酯等。叶的水浸剂或酸性乙醇浸剂对麻醉狗有立即降压作用，维持约1小时。叶及茎皮的煎剂亦有降压作用，但较弱。

萝藦 出《本草经集注》。又名白环藤、羊角菜、婆婆针线包、奶浆藤。为萝藦科植物萝藦Metaplexis japonica（Thunb.）Mak.的全草或根。我国大部分地区均有分布。甘、辛，平。补气益精，消肿解毒。①治虚损劳伤，阳痿，遗精，白带，乳汁不足，小儿疳积。煎服：6～15克。②治丹毒，疮肿，蛇、虫咬伤。捣烂敷。本品含酯型甙，从中分得萝藦甙元、肉珊瑚甙元、去酰牛皮消甙元、夜来香素（pergularin）等。

萝藦子 出《新修本草》。又名斫合子。为萝藦科植物萝藦Metaplexis japonica（Thunb.）Mak.的果实。甘、微辛，温。补肾壮阳，生肌止血。治虚劳，阳痿，遗精。煎服：9～15克。捣敷治创伤出血。本品含酯型甙。从中分得热马酮（Ramanone）、萝藦甙元、肉珊瑚甙元、去酰牛皮消甙元等多种甙元和多种脱氧糖。

菌灵芝 见《安徽中草药》。为灵芝草之别名，详该条。

菱蕤 出《名医别录》。为王竹之别名，详该条。

萆薢 出《神农本草经》。又名百枝、竹木、白菝葜、硬饭团、山田薯。为薯蓣科植物粉萆薢Dioscorea hypoglauca Palib.或棉萆薢D.officinalis Tsi的根茎。主产浙江、湖南、广东等地。苦，平。入肝、胃、膀胱经。祛风，利湿。治风湿痹痛，腰膝酸痛，小便不利，淋浊，白带，乳糜尿。煎服：9～15克。粉萆薢含薯蓣皂甙（Dioscin）、鞣质等。

菜蓟 见《常用中成药》。为水飞蓟之别名，详该条。

菟丝 出《神农本草经》。又名菟缕、野狐丝、无娘藤、缠豆藤、无根草、豆寄生。为旋花科植物菟丝子 Cuscuta chinensis Lam.的全草。甘、苦，平。清热，凉血，利水，解毒。①治痢疾，黄疸，淋浊，带下，吐血，衄血，便血，崩漏。煎服：9～15克。②治痈疽，疔疮，捣敷；痱子。煎水洗。

菟丝子 出《神农本草经》。又名菟丝实、黄藤子、萝丝子、缠龙子、吐丝子、豆须子。为旋花科植物菟丝 Cuscuta chinensis Lam.的种子。主产江苏、辽宁、吉林、河北、河南、山东、山西等地。辛、甘，平。入肝，肾经。补肾益精，养肝明目，安胎。①治腰膝痿痛，阳痿，早泄，遗精，遗尿，尿频余沥，耳鸣，头眩眼花，视力减退，先兆流产，胎动不安。煎服：9～15克。②治带状疱疹。文火焙黄，研细加香油调敷。含树脂甙等。

浸剂和醇提取液能加强离体蟾蜍心肌收缩力，浸剂能降低麻醉狗血压，抑制肠运动。对离体子宫有兴奋作用。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌和伤寒杆菌有抑制作用。

菟丝实 出《吴普本草》。即菟丝子，详该条。

菟缕 出《名医别录》。为菟丝之别名，详该条。

菊三七 见《上海常用中草药》。又名土三七、菊叶三七、血当归。为菊科植物三七草Gynura segetum (Lour.) Merr.的根。产四川、云南、贵州、广西、广东、江苏、江西、湖南等地。甘、苦，温。散瘀，止血，消肿。①治跌打损伤，吐血，咯血，衄血，尿血，便血，崩漏，产后瘀血腹痛。现亦用于大骨节病之关节疼痛。内服：煎汤，6～9克；研末服，1.5～3克。②治创伤出血。研末外敷。本品含生物碱、有机酸、鞣质。

菊叶三七 见《上海常用中草药》。即菊三七，详该条。

菊苣 见《新疆中草药手册》。又名卡斯纳（维名）。为菊科植物菊苣 Cichorium intybus L.的全草。分布西北、东北、华北及山东、江西等地。微苦、咸，凉。清热解毒，利尿消肿，健胃。治黄疸型肝炎，肾炎水肿，胃脘疼痛。煎服：4.5～9克。全草含马栗树皮素、马栗树皮甙、野莴苣甙（Cichoriin）、山莴苣素（Lactucin）、山莴苣苦素（Lactucopicrin）。根含山莴苣素、α-山莴苣醇（α-Lactucerol）、野莴苣甙。还含单咖啡酰酒石酸、菊苣酸（Chicoric acid）、咖啡酸、绿原酸、新绿原酸等。花的浸剂对动物注射，可兴奋中枢神经系统并增强心脏活动；花的煎剂及根的乙醇或乙醚提取物在体外有抗菌作用。根中提取的苦味成分能提高消化器官的活动机能。

菊花 出《神农本草经》。又名滁菊、杭菊、甘菊。为菊科植物菊Chrysanthemum morifolium Ramat.的头状花序。主产安徽、浙江、河南。甘、苦，凉。入肺、肝经。疏风，清热，平肝，明目，解毒。治外感风热，头痛，头昏，眩晕，目赤，高血压病，疔疮，肿毒。煎服：6～9克。本品含挥发油，其中主含龙脑，还有樟脑、菊油环酮（Chrysanthenone）等。另含菊甙、大波斯菊甙、木犀草素-7-葡萄糖甙、刺槐甙、胆碱、水苏碱等。菊花制剂对离体兔心，能增加冠脉流量，改善心肌供血，对冠心病患者有一定疗效。浸膏可使小鼠毛细血管抵抗力增强。菊花尚有中枢镇静和解热作用。煎剂或浸剂在体外对金黄色葡萄球菌、乙型溶血链球菌，痢疾、变形、伤寒及大肠等杆菌有抑制作用。

菊花叶 出《名医别录》。为菊科植物菊Chrysanthemum morifolium Ramat.的叶。清肝，明目，解毒。治头风，目眩，疔疮，肿毒。内服：煎汤，15～30克；或捣汁服。外用：捣敷。叶含挥发油、腺嘌呤、水苏碱及微量胆碱。参见“菊花”条。

菊花苗 见《得配本草》。又名玉英。为菊科植物菊Chrysanthemum morifolium Ramat.的幼嫩茎叶。甘、微苦，凉。清肝，明目。治头风眩晕，目翳。煎服：15～30克。菊的幼株中分离得氯代菊花内酯(Chlorochrymorin)。

菊根 出《本草纲目拾遗》。为菊科植物菊Chrysanthemum morifolium Ramat。或野菊 C.indicum L.的根。解毒，利水。①治疔疮，喉癣，癃闭。内服：煎汤，30～60克，或捣汁和酒服。②治瘰疬未破。野菊根捣烂煎酒服，渣外敷。根含小白菊素（Chrysartemin）A及B_1菊花萜二醇(Chrysandiol)等。

堇菜地丁 见《中药志》。为紫花地丁之别名，详该条。

黄儿茶 见《中国树木分类学》。为黄练芽之别名，详该条。

黄三七 见《陕西中草药》。又名土黄

连、太白黄连。为毛茛科植物长果升麻 Souliea vaginata (Maxim.) Franch. 的根茎或全草。分布西藏、云南、四川、青海、甘肃、陕西。苦,凉。泻火解毒,清心除烦。①治眼结膜炎,咽炎,口腔炎,热病心烦,痢疾,肠炎。煎服:6～9克。②治痈疮肿毒。研末调敷。

黄开口 ❶见《江苏药材志》。又名血见住。为报春花科植物轮叶排草Lysimachia klattiana Hance 的全草。分布江苏、浙江、福建、江西、湖北、四川、贵州、云南等地。酸、涩,凉。降压,止血,解蛇毒。①治高血压病,咯血及其它出血。煎服:15～30克。②治毒蛇咬伤,捣敷并取汁服;外伤出血。研末撒。❷见《浙江民间常用草药》。为九龙藤之别名,详该条。

黄木香 ❶见《江苏省植物药材志》。为寻骨风之别名。❷见《云南中草药选》。为通光散之别名,各详该条。

黄牛香 见《广东中草药》。为鸡骨香之别名,详该条。

黄毛耳草 见《浙江民间常用草药》。又名拖地莲、铺地蜈蚣、敷地两耳草、腹泻草。为茜草科植物黄毛耳草Hedyotis chrysotricha (Palib.) Merr.的全草。分布长江以南各地。苦,凉。清热利湿,消肿解毒。①治肠炎,痢疾,急性黄疸型肝炎,乳糜尿,小儿急性肾炎。煎服:9～30克。②治毒蛇、蜈蚣螫伤,跌打损伤,创伤出血,疔疮肿毒。鲜品捣敷。本品含伞花耳草素(Corymbosin)、三萜酸类化合物、β-和γ-谷甾醇、齐墩果酸、油酸、亚油酸等。

黄毛草 见《广州植物志》。为笔仔草之别名,详该条。

黄丹 见《抱朴子》。即铅丹,详该条。

黄水芋 见《贵州民间药物》。为罂粟科植物血水草 Eomecon chionantha Hance 的根及根茎。分布湖北、四川、贵州、广西、湖南、江西、福建。苦,寒,有小毒。行气活血,清热解毒。①治劳伤咳,跌打损伤,腰痛。煎服:6～15克。②捣敷治疮疖,无名肿毒;研末油调搽,治小儿癣疮。

黄水芋草 见《贵州民间药物》。又名广扁线、斗篷草、马蹄草、水黄连。为罂粟科植物血水草Eomecon chionantha Hance 的全草。苦,寒,有小毒。清热解毒,活血散瘀。①治流行性眼结膜炎。煎服:鲜品9～30克。②研末油调搽,治小儿癣疮;捣敷治皮肤瘙痒,湿疹,疮疖,无名肿毒,跌打瘀肿。

黄水茄 见《海南岛常用中草药手册》。为金扣钮之别名,详该条。

黄古头草 见《上海常用中草药》。为水蜈蚣之别名,详该条。

黄龙尾 见《滇南本草》。为仙鹤草之别名,详该条。

黄占 见《种福堂公选良方》。为黄蜡之别名,详蜂蜡条。

黄瓜香 ❶见《中国主要植物图说·豆科》。为山扁豆之别名。❷见《东北药用植物志》。为地榆之别名。各详该条。

黄瓜菜 见《湖南药物志》。为地白草之别名,详该条。

黄头草 见萧步丹《岭南采药录》。为鸡骨草之别名,详该条。

黄皮子 出《桂海虞衡志》。即黄皮果,详该条。

黄皮叶 见萧步丹《岭南采药录》。为芸香科植物黄皮Clausena lansium(Lour.) Skeels 的叶。我国华南和西南地区多有栽培。辛,凉。解表散热,化痰行气,祛风利尿。防治流行性感冒,流行性脑脊髓膜炎,疟疾,痰咳哮喘,气胀腹痛,风湿痹痛,小便不利。煎服:9～15克。本品显生物碱、黄酮甙、酚类、氨基酸的反应。

黄皮血藤 见《四川中药志》。即血藤,详该条。

黄皮果 出《本草纲目》。又名黄皮子、金

弹子。为芸香科植物黄皮 Clausena lansium (Lour.) Skeels 的果实。甘、酸，微温。消食，化痰。治食积胀满，痰饮咳喘。煎服：15～30克。

黄皮果核 出清·赵其光《本草求原》。又名黄皮核。为芸香科植物黄皮Clausena lansium (Lour.) Skeels 的种子。苦、辛，微温。行气止痛，消肿解毒。①治胃痛，疝痛，风湿痹痛，痛经。煎服：9～15克。②捣敷治蛇伤；水磨涂治疮疖。种子含油52.21%。

黄皮核 见萧步丹《岭南采药录》。为黄皮果核之简称，详该条。

黄皮根 见《福建中草药》。为芸香科植物黄皮Clausena lansium (Lour.) Skeels 的根。苦、辛，微温。行气止痛，祛风利尿。治胃痛，腹痛，疝痛，痛经，风湿痹痛，黄疸，小便不利。煎服：9～15克。

黄米 出《本草图经》。为秫米之别名，详该条。

黄米花 见《东北常用中草药手册》。为蓬子菜之别名，详该条。

黄杜鹃 见《本草蒙筌》。为闹羊花之别名，详该条。

黄芫花 见《中药志》。又名北芫花、黄闷头花。为瑞香科植物河朔荛花Wikstroemia Chamaedaphne Meissn. 的花蕾及叶。分布河北、山西、内蒙古、陕西、甘肃等地。辛、苦，寒，有小毒。泻下逐水。治水肿胀满，痰饮咳喘，急、慢性肝炎，精神分裂症，癫痫。煎服：1.5～3克。反甘草。花含皂甙，叶含酮类物质。

黄花三七 ❶见《浙江中药资源名录》。为芋儿七之别名。❷见《杭州药用植物志》。为蒲公英之别名。各详该条。

黄花大远志 见《草药手册》。为黄花倒水莲之别名，详该条。

黄花马豆 见《滇南本草》。为铁马豆之别名，详该条。

黄花甘 见《广东中药》，为独脚柑之别名，详该条。

黄花白艾 见《履巉岩本草》。为鼠曲草之别名，详该条。

黄花仔 见《广东中草药》。为地耳草之别名，详该条。

黄花冬菊 见《中国药用植物图鉴》。为卤地菊之别名，详该条。

黄花母 见《文山中草药》。又名黄花稔、大地丁草、拔脓消。为锦葵科植物白背黄花稔Sida rhombifolia L.的根或叶。分布云南、贵州、四川、湖南、广东、广西、台湾、福建等地。甘、辛，凉。清热利湿，止痛排脓。①治感冒发热，咽喉炎，扁桃体炎，肠炎，痢疾，疟疾，泌尿系结石。②治胆道疾患，消化性溃疡，急性肠胃炎，及外伤和腹腔手术后的疼痛。煎服：15～30克。③治痈疽疔毒。煎服或鲜叶捣烂外敷。根含生物碱及甾醇化合物等。水提物有祛痰作用。本品对大鼠甲醛性关节炎有抗炎作用。体外对大肠杆菌有抑制作用。

黄花地丁 见《本草纲目》。为蒲公英之别名，详该条。

黄花夹竹桃 见《广西药用植物图志》。又名台湾柳、番仔桃、酒杯花。为夹竹桃科植物黄花夹竹桃Thevetia peruviana (Pers.)K.Schum.的种子。我国南部各地均有栽培。辛、苦，温，有大毒。强心，利尿，消肿。治多种心脏病引起的心力衰竭，阵发性室上性心动过速，阵发性心房纤维性颤动。种子提取物已制成片剂、注射剂。应在医师指导下使用。中毒症状为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、烦躁，继之四肢冰冷有汗、瞳孔放大、昏迷、心跳停止而死亡。本品含黄花夹竹桃甙甲、乙，黄花夹竹桃次甙甲、乙等多种强心甙。黄花夹竹桃甙甲、乙及黄花夹竹桃次甙甲、乙均有洋地黄样强心作用，特点是作用迅速，维持时间短而蓄积性小。属速效强心甙。黄夹甙（黄花夹竹桃甙甲及乙的混合

物）对动物离体肠管及子宫均有明显的兴奋作用，此现象为阿托品所减弱。黄花夹竹桃次甙乙经乙酰化后有明显的镇静和催眠作用，而对心脏作用减弱。黄夹甙口服吸收较差，而黄花夹竹桃次甙甲、乙经口给药吸收良好。

黄花夹竹桃叶 见《广西药用植物图志》。为夹竹桃科植物黄花夹竹桃Thevetia peruviana（Pers.）K.Schum.的叶。辛，温，有毒。解毒消肿。治蛇头疔，鲜叶捣烂蜜调服。本品含强心甙为黄花夹竹桃甙B。还含白坚皮醇（L-(+)-Bornesitol）。

黄花曲草 见《福建中草药》。为蟛蜞菊之别名，详该条。

黄花远志 见《江西草药》。又名黄金卵、吊吊黄、黄花鸡骨、鸡根。为远志科植物黄花远志Polygala arillata Buch.-Ham.的根。分布西南、华东和陕西、湖北等地。甘、辛，温。补气活血，利湿祛风。治肺结核，产后虚弱，子宫脱垂，月经不调，肝炎，水肿，泌尿道感染，风湿痹痛，跌打损伤。煎服：15～30克。本品含咕吨酮类化合物，美远志酸和大量的由原儿茶酸或没食子酸与葡萄糖所成的酯。并显皂甙、香豆素、黄酮及生物碱反应。根的香豆素部分对小鼠有止咳作用。

黄花杜鹃 见《陕甘宁青中草药选》。为小叶枇杷之别名，详该条。

黄花鸡骨 见《江西草药》。为黄花远志之别名，详该条。

黄花苦豆子 见《宁夏中草药手册》。为野决明之别名，详该条。

黄花参 见《广西中草药》。为黄花倒水莲之别名，详该条。

黄花草 见《江西草药》。为秋鼠曲草之别名，详该条。

黄花茵陈 见《植物名实图考》。为铃茵陈之别名，详该条。

黄花柴胡 见《广西药用植物名录》。为一枝黄花之别名，详该条。

黄花倒水莲 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名黄花大远志、黄花参、鸡仔树。为远志科植物黄花倒水莲Polygala aureocauda Dunn 的根或全株。分布广西、广东、湖南、江西、福建等地。甘，平。益气补血，祛风利湿，活血散瘀。治病后、产后虚弱，风湿痹痛，黄疸型肝炎，肾炎水肿，白带，月经不调，子宫脱垂，跌打损伤，煎服：9～15克。

黄花菜 出《本草纲目》。为金针菜之别名，详该条。

黄花菜根 见《山东中药》。为萱草根之别名，详该条。

黄花稔 见《福建中草药》。为黄花母之别名，详该条。

黄芥 见《中药志》。为芥菜之别名，详该条。

黄芥子 见《中药志》。即芥子，详该条。

黄芩 出《神农本草经》。又名腐肠、空肠、元芩、枯芩、子芩。为唇形科植物黄芩Scutellaria baicalensis Georgi的根。主产辽宁、河北、内蒙古、山西等地。苦，寒。入心、肺、胆、大肠经。清热燥湿，泻火解毒，安胎。①治温病发热、烦渴，肺热咳嗽，湿热泻痢，黄疸，热淋，高血压病。②治血热妄行，吐血，咯血，衄血，便血，崩漏，胎动不安。③治目赤肿痛，痈疖疮疡。煎服：4.5～9克。本品含黄芩甙元、黄芩甙、汉黄芩素、汉黄芩甙和黄芩新素（Neobaicalein）。还含苯甲酸、β-谷甾醇等。煎剂在体外对葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌、脑膜炎球菌，痢疾、白喉、绿脓及结核等杆菌均有抑制作用。对感染流感病毒的小鼠有一定保护作用。黄芩甙对动物有抗炎、抗变态反应，阻止肥大细胞释放组胺，并有提高免疫能力的作用，降低小鼠毛细血管通透性。汉黄芩素对小鼠四氯化碳性肝中毒有解毒作用。煎剂、酊剂及黄芩甙对麻醉犬、猫、兔均

有降压作用。煎剂、酊剂、黄芩甙元及汉黄芩素有利尿作用。此外，黄芩还有利胆、解除平滑肌痉挛、解热、镇静及降低实验性动脉粥样化总胆固醇/总磷脂比值的作用。

黄芩子 出《名医别录》。为唇形科植物黄芩Scutellaria baicalensis Georgi 的果实。治下痢脓血。煎服：4.5～9克。

黄芪 出《神农本草经》。又名黄耆、绵黄耆、箭芪。为豆科植物黄芪 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.或内蒙古黄芪A.mongholicus Bge. 等的根。主产甘肃、内蒙古及东北各地。甘，微温。入脾、肺经。补中益气，固表，利水，托脓毒、生肌。①治脾胃虚弱，食少倦怠，气虚血脱，崩漏，带下，久泻，脱肛，子宫脱垂，胃下垂，肾下垂。②治表虚自汗，盗汗。③治气虚浮肿，慢性肾炎。④治痈疽久不溃破或溃久不敛。亦用治消化性溃疡。补中益气宜炙用，固表、利水、托脓毒宜生用。煎服：9～15克，大剂可用30～60克。黄芪根含胆碱、甜菜碱、香豆素、黄酮化合物、皂甙、氨基酸及微量的叶酸等。内蒙古黄芪根含β-谷甾醇、亚油醇、亚麻酸等。本品在人及动物身上均能利尿，效力与剂量有关；对肾病综合症，能增快尿蛋白的消退。能增强机体抵抗力，可能为增强非特异性免疫反应，减少病毒的致病性，增加末梢白细胞总数。对动物能降低血压，扩张血管。降压有效成分可能为γ-氨基丁酸。毒性很低。

黄芪茎叶 出《名医别录》。为豆科植物黄芪 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. 或内蒙古黄芪A. mongholicus Bge.等的茎叶。升清滋液，通络消肿。治口渴，筋挛，痈肿，疽疮。煎服：9～15克。

黄连 出《神农本草经》。又名王连、支连、川连。为毛茛科植物黄连Coptis chinensis Franch.、三角叶黄连C.deltoidea C.Y.Cheng et Hsiao 或云连 C.teetoides C.Y.Cheng 的根茎。黄连、三角叶黄连主产四川，前者习称味连，后者习称雅连；云连主产云南。苦，寒。入心、肝、胃、大肠经。清热燥湿，泻火解毒。①治热病烦躁，神昏谵语。②治湿热内蕴的痞满，呕逆，泻痢。③治心火亢盛的心烦失眠，吐血，衄血，胃热消渴；痈疖疮毒。内服：煎汤，1.5～6克；研末服，每次0.9～1.5克，日服二至三次。④浸乳汁点眼治目赤；煎汤含漱治咽喉肿痛；研末涂治口疮，湿疹，烫伤，黄水疮；和硼酸溶液滴耳治中耳炎。本品含小蘖碱、甲基黄连碱等多种生物碱。粗提取物与小蘖碱对多种革兰氏阳性及阴性细菌有良好的抗菌作用；对结核菌疗效差。体外能抑制某些病毒、真菌、钩端螺旋体、滴虫、草履虫等。黄连复方较单方用时产生抗药性的机会少；静脉注射能降低血压。对肠胃道、支气管平滑肌有兴奋作用。小蘖碱有轻度利胆、降血清胆甾醇、消炎等作用；还有报告解热、抗利尿、局部麻醉、镇静、镇痛及轻度抗癌、抗放射等作用。口服后血浓度不易维持。毒性很轻。黄连生药受热愈高，则小蘖碱含量降低愈多。

黄连三七 见《四川中药志》。为羽叶三七之别名，详该条。

黄连芽 见《本草纲目拾遗》。即黄练芽，详该条。

黄连参 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·外科》。为盾叶薯蓣之别名，详该条。

黄连茶 见《中国树木分类学》。为黄练芽之别名，详该条。

黄连藤 ❶见《广东中草药》。为古山龙之别名。❷见《中国药用植物图鉴》。为黄藤之别名。各详该条。

黄饭花 见《南宁市药物志》。为密蒙花之别名，详该条。

黄闷头花 见《中药志》。为黄芫花之别名，详该条。

黄松木节 见《太平圣惠方》。即松节，

详该条。

黄明胶 出《食疗本草》。又名牛皮胶、水胶、广胶。为牛皮煎制而成的胶。甘，平。止血，消肿。①治吐血，咯血，衄血，崩漏，血淋，跌打损伤。内服：3～9克，酒化冲服；或入丸、散用。②治痈肿，烫伤。烊化后涂患处。

黄果 出《滇海虞衡志》。为甜橙之别名，详该条。

黄果皮 见《滇南本草》。为橙皮之别名，详该条。

黄金石 见《本草纲目》。为雄黄之别名，详该条。

黄金丝 见《江苏药材志》。为茅膏菜之别名，详该条。

黄金卵 见《江西草药》。为黄花远志之别名，详该条。

黄金条 见徐州《单方验方新医疗法选编》。为黄荆枝之别名，详该条。

黄金线 见《陕西中草药》。为肺形草之别名，详该条。

黄狗肾 见《饮片新参》。又名牡狗阴茎、狗鞭、广狗肾。为犬科动物 Canis familiaris L.（雄性黄狗）的外生殖器。咸，温。补命门，暖冲任。治阳痿，带下。煎汤：4.5～9克。

黄泡刺根 见《昆明民间常用草药》。为黄锁梅根之别名，详该条。

黄泡果 见《文山中草药》。为蔷薇科植物栽秧泡Rubus ellipticus Smith var.obcordatus Focke 的果实。分布四川、云南、贵州。酸，平。补肾涩精。治神经衰弱，多尿，遗精，早泄。煎服：鲜品30～60克。

黄卷皮 出《本草图经》。即大豆黄卷，详该条。

黄练芽 出《本草纲目拾遗》。又名黄楝头、黄连芽、黄鹂芽、黄儿茶、黄连茶。为漆树科植物黄连木 Pistacia chinensis Bge. 的叶芽。分布长江中下游及河北、河南、陕西、山东。苦、涩，寒，有小毒。清热解毒，止渴。①治暑热口渴，霍乱，痢疾，咽喉肿痛，口舌糜烂。煎服：1.5～3克。②治风湿疮，漆疮初起。煎水洗。

黄栌 出《本草拾遗》。又名黄道栌、栌木、月亮柴、黄栌木。为漆树科植物黄栌 Cotinus coggygria scop. 的木材或根。分布西南、华北和浙江等地。苦，微寒。清利湿热。治烦热，黄疸，慢性肝炎、麻疹不出。煎服：6～9克。木材含硫黄菊素及其葡萄糖甙，又含杨梅树皮素及没食子酸等鞣质成分。还含非瑟素（Fisetin）及二氢非瑟素。

黄栌木 见《中国药学大辞典》。即黄栌，详该条。

黄栌枝叶 见《河北中药手册》。为漆树科植物黄栌Cotinus coggygria Scop.的枝叶。苦，寒。清热利湿。①治黄疸型肝炎。煎服：6～9克。②治烫伤皮肤未破，漆疮，丹毒。煎水洗或捣烂外敷。叶含鞣质，其中主含三没食子酰葡萄糖。还含杨梅树皮素、杨梅树皮甙、异槲皮甙、山柰酚、飞燕草素-3-半乳糖甙、越桔花青甙、矮牵牛素-3-葡萄糖甙等。另含挥发油，油中主含月桂烯、α-蒎烯和莰烯。叶中提得的总黄酮甙给小鼠灌胃，对甲醛引起的实验性关节炎有抗炎作用，并增加毛细血管抵抗力。

黄柏 出《本草纲目》。又名黄檗、檗皮、檗木。为芸香科植物黄皮树Phellodendron chinense Schneid. 或黄柏P. amurense Rupr.的树皮。前者习称川黄柏，主产四川；后者习称关黄柏，主产东北。苦，寒。入肾、膀胱、大肠经。泻火解毒，清湿热。①治湿热泻痢，黄疸，淋浊，带下，痔疮，足膝肿痛，湿热痿痹，阴虚火旺，骨蒸劳热，梦遗滑精。煎服：4.5～9克。②浸液滴眼治目赤肿痛；研末调敷治湿疹，黄水疮，口疮，痈疖，烫伤。黄柏果实名黄波罗果，有止咳祛痰作用。黄皮树树皮含小蘖碱、黄柏碱等生物碱及甾醇、内脂、粘液质等。黄柏树皮含小

蘖碱、黄柏碱、药根碱等生物碱，并含黄柏内酯（Obaculactone）、β-谷甾醇等。黄柏果实含小蘖碱、掌叶防己碱；另含挥发油，油中主要成分为月桂烯。小蘖碱的作用见黄连条。黄柏对麻醉动物静脉或腹腔注射，可产生显著而持久的降压作用。黄柏碱对中枢神经系统有抑制作用。黄柏内酯可降低兔血糖。

黄荆子 出《本草纲目拾遗》。又名布荆子。为马鞭草科植物黄荆Vitex negundo L.的果实。我国大部分地区均有分布。辛、苦，温。祛风除痰、理气止痛。治感冒，咳嗽，支气管炎，哮喘，胃肠绞痛，手术后疼痛，消化不良，肠炎，痢疾，疝气，痔漏。内服：煎汤，6～15克。粉剂，每次3～6克。本品含挥发油，其中主要含桉叶素、左旋香桧烯等。还含对羟基苯甲酸、5-氧异酞酸、β-谷甾醇、葡萄糖和多种正烷烃的混合物。煎剂对豚鼠、小鼠能扩张支气管。在试管内对金黄色葡萄球菌、卡他球菌有抑制作用。

黄荆叶 出《本草纲目拾遗》。又名蚊枝叶、白背叶、姜子叶。为马鞭草科植物黄荆Vitex negundo L.的叶。苦，平。清热解表，利湿解毒。①治感冒，中暑，呕吐，泄泻，痢疾，黄疸，疟疾，淋病。煎服：9～30克。②煎水洗湿疹，皮炎脚癣；鲜叶捣敷治蛇、虫咬伤。本品含挥发油，油中有α-蒎烯、β-石竹烯、桉叶素、柠檬烯、对聚伞花素等。还含桃叶珊瑚甙，淡紫花牡荆甙（Agnuside），荭草素，异荭草素，牡荆定碱，对羟基苯甲酸，5-氧异酞酸，诺尼醇-葡萄糖（Gluco-nonitol），维生素C，紫花牡荆素，木犀草素-7-葡萄糖甙，艾黄素，3,4二羟基苯甲酸，β-谷甾醇等。对大鼠甲醛性关节炎有抗炎作用。

黄荆枝 见《民间常用草药汇编》。又名黄金条。为马鞭草科植物黄荆Vitex negundo L.的枝条。辛，温。祛风解表，消肿，止痛。①治感冒，咳嗽，风湿痹痛，浮肿，喉痹肿痛，牙痛。煎服：6～15克。②煅存性调涂，治烫伤。本品含香荚兰酸、对羟基苯甲酸、木犀草素、β-谷甾醇。

黄荆根 出清·刘士季《草木便方》。为马鞭草科植物黄荆Vitex negundo L.的根。辛，温。解表，截疟，镇咳，顺气，祛风湿。治感冒，疟疾，慢性气管炎，胃溃疡，慢性胃炎，头风，风湿痹痛，肝炎。煎服：6～15克。本品含黄酮类和香豆素类物质，并显强心甙、生物碱、氨基酸、中性树脂的反应。煎剂对小鼠有镇咳和祛痰作用，尚有扩张支气管及体外对金黄色葡萄球菌、卡他球菌的抑制作用。

黄草 ❶见《药物出产辨》。为石斛之别名。❷出《吴普本草》。为荩草之别名。各详该条。

黄药子 出《本草图经》。又名黄药根、黄药脂。为薯蓣科植物黄独Dioscorea bulbifera L.的块茎。主产湖北、湖南、江苏等地。苦，平，有小毒。入心、肝经。消肿解毒，止咳平喘，凉血止血。①治瘿瘤，瘰疬，喉痹肿痛，疝气，睾丸炎，咳嗽气喘，百日咳，吐血，咯血，衄血；近亦用治食道癌，胃癌，乳腺癌。煎服：4.5～9克。②捣敷或磨汁涂痈肿疮疖，蛇、犬咬伤；研末涂治天泡疮。内服量过大可出现恶心、呕吐、流涎、腹痛、泄泻、出汗、心悸、瞳孔缩小、惊厥、昏迷等中毒症状。肝功能不正常者慎用。本品含皂甙、鞣质、黄独素（Dios-bulbin）和薯蓣皂甙元。对缺碘食物所致的甲状腺肿具有一定疗效。酊剂和煎剂对蛙心有抑制作用，对离体兔肠亦表现抑制，对未孕家兔与豚鼠的子宫有兴奋作用。煎剂对常见致病性皮肤真菌有不同程度的抑制作用。

黄药根 出《开宝重定本草》。即黄药子，详该条。

黄药脂 见《药材资料汇编》。即黄药子，详该条。

黄香 见《本草原始》。为松香之别名，详该条。

黄食草 见《广东中草药》。为鸡骨草之别名，详该条。

黄独零余子 见《中国药用植物图鉴》。又名狗啾子。为薯蓣科植物黄独Dioscorea bulbifera L. 叶腋中的珠芽。分布华东、中南、西南等地。苦，凉，有小毒。清热，祛痰，止咳。①治百日咳，肺热咳嗽。煎服：6～12克。②切薄片贴太阳穴治头痛。内服过量，可引起中毒，症状见黄药子条。

黄姜 见《生草药性备要》。即姜黄，详该条。

黄根 见《广西本草选编》。又名四蕊三角瓣花、狗骨木。为茜草科植物南山花 Prismatomeris tetrandra (Roxb.)K.Schum. 的根。分布云南、广西、广东。微苦、辛，凉。凉血止血，利湿，壮筋骨。①治白血病，再生障碍性贫血。内服：30克，与猪骨共煮（不加油盐），每日服二至三次。②治牙龈出血，肝炎，尿路感染，风湿性关节炎。煎服：15～30克。本品60%乙醇提取物和除去总蒽醌后的水溶液对大白鼠实验性矽肺有防治作用。

黄蓍 出《神农本草经》。即黄芪，详该条。

黄疸卷柏 见南京药学院《中草药学》。为地柏枝之别名，详该条。

黄疸草 ①见《中国药用植物图鉴》。为马蹄金之别名。②见《本草推陈》。为大金钱草之别名。各详该条。

黄梅花 见《本草纲目》。为蜡梅花之别名，详该条。

黄栀子 见《中国药学大辞典》。即栀子。详该条。

黄雀花 见《本草纲目拾遗》。为金雀花之别名，详该条。

黄蛇根 见《广东中草药》。为穿破石之别名，详该条。

黄猛菜 见《广西中药志》。为钩吻之别名，详该条。

黄鹂鸡 见《四川中药志》。为水黄连之别名，详该条。

黄鹂芽 见《植物名实图考》。即黄练芽，详该条。

黄喇叭花 见《浙江中药手册》。为闹羊花之别名，详该条。

黄喇嘛 见《中国沙漠地区药用植物》。为黄蓬花之别名，详该条。

黄锁梅叶 见《红河中草药》。为蔷薇科植物栽秧泡 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Focke 的叶。治创伤出血，慢性湿疹及黄水疮。研末外敷。

黄锁梅根 出《滇南本草》。又名钻地风、黄泡刺根。为蔷薇科植物栽秧泡 Rubus ellipticus Smith var. obcordatus Focke 的根。主产云南、四川等地。酸、涩，平。舒筋活络，消肿止痛，收涩止泻。①治筋骨疼痛，痿软麻木，扁桃体炎，肿毒，痢疾，黄疸型肝炎。煎服：9～15克。②研末敷治烫、烧伤。根皮含鞣质。

黄道栌 见《中国树木分类学》。即黄栌，详该条。

黄楝头 出《物理小识》。为黄练芽之别名，详该条。

黄楝树 见《救荒本草》。为苦木之别名，详该条。

黄蓬花 见《中国沙漠地区药用植物》。又名绞蛆爬、黄喇嘛、蓼子朴。为菊科植物沙地旋覆花 Inula salsoloides (Turcz.) Ostenf. 的全草。分布东北、华北及西北地区。苦，寒。清热，利尿，解毒。①防治流行性感冒，并治急性细菌性痢疾，急、慢性肠炎，浮肿，小便不利。煎服：6～15克。②治疮痈肿毒，黄水疮，湿疹。研末撒或调敷。

黄蜂草 见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。为孩儿草之别名，详该条。

黄蜂窝 见《全国中草药汇编》。为露蜂房之别名，详该条。

黄蜀葵子 出《本草衍义》。为锦葵科植物黄蜀葵Abelmoschus manihot(L.) Medic.的种子。甘，寒。健胃润肠，利水通乳，消肿解毒。治消化不良，不思饮食，大便秘结，小便不利，水肿，淋病，尿路结石，乳汁不通，痈肿，跌打损伤。煎服：9～15克。孕妇慎服。

黄蜀葵叶 见《福建民间草药》。为锦葵科植物黄蜀葵Abelmoschus manihot(L.) Medic.的叶。甘，寒。消肿，解毒。鲜叶捣烂敷痈疽，疔疮，腮腺炎，烫伤。研末敷刀伤出血。本品含维生素C、B_1，菸酸，葫萝卜素等。

黄蜀葵花 出《嘉祐补注神农本草》。为锦葵科植物黄蜀葵Abelmoschus manihot (L.) Medic. 的花。除东北、西北外，各地均有分布。甘，寒。通淋，消肿，解毒。①治砂淋。研末服，3～6克。②捣敷痈疽肿毒；浸油涂烫伤，小儿秃疮；烧存性研末调敷小儿口疮。孕妇慎服。

黄蜀葵茎 见《草药手册》。为锦葵科植物黄蜀葵 Abelmoschus manihot (L.) Medic.的茎或茎皮。甘，寒。治产褥热。煎服：15～30克。茎皮浸油搽，治烫伤。

黄蜀葵根 出《本草纲目》。为锦葵科植物黄蜀葵Abelmoschus manihot (L.)medic.的根。甘、苦，寒。利水通淋，消肿解毒。治水肿，淋病，乳汁不通。煎服：15～30克。捣敷治痈肿，腮腺炎，骨折。本品含粘液质，蔗糖，淀粉。

黄蜡 出《金匮要略》。为蜂蜡之一种，详该条。

黄蜡一枝蒿 见《云南中草药》。为小白撑之别名，详该条。

黄精 出《雷公炮炙论》。为百合科植物黄精 Polygonatum sibiricum Redoute或囊丝黄精 P.cyrtonema Hua 等的根茎。全国各地均产。甘，平。入脾、肺经。补脾润肺，养阴生津。①治脾胃气虚，倦怠乏力，口干、消渴，燥咳，咯血及病后、产后体弱。②近代用治高血压病，冠心病心绞痛，白细胞减少症，再生障碍性贫血。煎服：9～15克。③用黄精流浸膏外涂，治股癣、足癣。黄精根茎含粘液质、菸酸、醌类成分。囊丝黄精根茎含吖丁啶羧酸、二氨基丁酸、毛地黄糖甙及多种蒽醌类化合物等。黄精在试管内对抗酸菌有抑制作用，醇提水溶液对常见致病性皮肤真菌有抑制作用。黄精的乙醇-水浸出液有降低麻醉动物血压的作用。醇提取液能增加狗冠脉流量。

黄熟花 见《南京民间药草》。为旋复花之别名，详该条。

黄橘皮 出《鸡峰普济方》。即橘皮，详该条。

黄檗 出《本草经集注》。即黄柏，详该条。

黄藤 ❶出《本草图经》。又名黄连藤、大黄藤。为防己科植物藤黄连 Fibraurea recisa Pierre 的茎叶。产广西、广东。苦，寒，有小毒。清热解毒，利尿。①治急性扁桃体炎，咽喉炎，眼结膜炎，黄疸，细菌性痢疾，急性胃肠炎，泌尿道感染，妇科炎症。煎服：15～30克。②治热毒疮疖，鲜品捣敷。叶含微量生物碱。❷见《海南岛常用中草药手册》。为古山龙之别名，详该条。

黄藤子 见《东北药用植物志》。为菟丝子之别名，详该条。

黄藤木 见《广西药用植物名录》。为雷公藤之别名，详该条。

黄鳝藤 ❶出《植物名实图考》。又名熊柳根。为鼠李科植物多花勾儿茶 Berchemia floribunda(Wall.)Brongn. 的根。分布华东、中南、西南和陕西。微涩，温。入肝、脾、肾经。健脾利湿，祛风活血止痛。①治脾虚食少，小儿疳积，风湿痹痛，黄疸，水肿，淋浊，白带，痛经，产后腹痛。煎服：15～30克。②根皮捣敷治跌打损伤，骨折肿痛。❷见《四川中药志》。为火炭母草之别名，

详该条。

营实 出《神农本草经》。又名蔷薇子、石珊瑚。为蔷薇科植物多花蔷薇Rosa multiflora Thunb. 的果实。分布华北、华东、华中、华南及西南地区。酸，平。利湿，活血，解毒。治水肿，脚气，小便不利，风湿关节痛，痛经，疮毒痛肿。内服：煎汤，3～9克；或浸酒服。本品含蔷薇甙(Multiflorin)、芸香甙、槲皮甙、脂肪油。

梦花 见《分类草药性》。为新蒙花之别名，详该条。

梦花根 出《分类草药性》。为瑞香科植物结香Edgeworthia chrysantha Lindl. 的根。分布河南、陕西和长江流域及其以南各地区。辛、甘，温。舒筋活络，滋养肝肾。治风湿关节僵硬，劳伤疼痛，遗精，早泄，虚淋，白浊、白带，血崩，肾虚眼雾，迎风流泪。煎服：6～15克。

梵天花 见《福建民间草药》又名三角枫、狗脚迹、藕头婆、野棉花，八大乌云盖雪。为锦葵科植物梵天花 Urena Procumbens L.的全草。分布广西、广东、湖南、江西、福建、台湾、浙江。淡、微甘，凉。祛风利湿，消肿解毒。①治感冒，流行性感冒，风湿性关节炎，痢疾，腹泻，心脏性水肿，痛经，白带。煎服：9～15克。②捣敷治疮疡肿毒，毒蛇咬伤。叶预试含黄酮甙，酚类，氨基酸，有机酸。

硇砂 出《新修本草》。又名北庭沙。为紫色石盐晶体或氯化铵矿石。前者药材称紫硇砂或红硇砂；后者药材称白硇砂。产青海、甘肃，新疆等地。咸、苦、辛，温，有毒。入肝、脾、胃经。消积、破瘀，祛痰，去翳。①治噎膈反胃，癥瘕积块，痰饮咳嗽，妇女经闭。研末服：0.3～0.9克，一般多入丸、散用。②治痈肿，疔疮、息肉、疣赘，研末或制成药膏敷贴；目翳。细粉点眼。孕妇忌服。紫硇砂主要含氯化钠，尚含铁、镁、硫化物，硫酸盐等。白硇砂主要含氯化铵，尚含钙、镁、硫酸盐等。

瓠子 出《新修本草》。又名甘瓠，龙蜜瓜，天瓜、长瓠。为葫芦科植物瓠子Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. hispda (Thunb.) Hara 的果实。我国各地有栽培。甘，寒。利水退肿，消热止渴。治水肿腹胀，消渴，口、鼻生疮。煎服：鲜品60～120克。

雪上一枝蒿 ❶见《科学的民间药草》。为毛茛科植物短柄乌头Aconitum brachypodum Diels 的块根。主产云南、四川。苦、辛，温，有剧毒。消炎止痛，祛风除湿。①治跌打损伤，风湿骨痛，牙痛，研末吞服：一次25～50毫克。极量，一次70毫克。②治骨折，扭伤，疮疡肿毒。浸酒搽患处。内服中毒时，可出现流涎，呕吐，血压降低，呼吸困难等症状。孕妇，心脏病、溃疡病患者及小儿忌服。本品含乌头碱、次乌头碱等多种生物碱。乌头碱的药理见乌头条。❷见《陕甘宁青中草药选》。为铁棒锤之别名。详见该条。

雪乌 见《高原中草药治疗手册》。又名榜嘎、翁阿鲁、翁格尔(藏名)。为毛茛科植物甘青乌头Aconitum tanguticum (Maxim.)Stapt 的全草。分布青海、甘肃、陕西及云南西北部、西藏东部、四川西部。苦麻，凉，有小毒。清热解毒。治传染病发热，肝胆热病，肺热，肠热，流行性感冒，食物中毒。煎服：1～3克。多入丸、散服。

雪地开花 见《草药手册》。为瑞香花之别名，详该条。

雪里开 见《浙江天目山药用植物志》。又名地雷、拐子药。为毛茛科植物单叶铁线莲 Clematis henryi Oliv. 的根或叶。分布长江中、下游及其以南各地。辛，平。止痛，清热，止咳，止呕，消肿。①治头痛，胃痛，腹痛，痢疾，急性肠胃炎，高热惊风，气管炎，晕车呕吐。煎服：3～9克。②治咽喉炎，煎水含漱；跌打损伤。酒磨汁服并

外涂；疔疮肿毒，捣烂敷。

雪里青 见《本草纲目拾遗》。为白毛夏枯草之别名，详该条。

雪里梅 ❶见《文山中草药》。为小龙胆草之别名。❷见《浙江民间常用草药》。为蛇根草之别名。各详该条。

雪里蕻 出《野菜笺》。为芥菜之别名，详该条。

雪冻花 见《草药手册》。为瑞香花之别名，详该条。

雪药 见《四川常用中草药》。又名透骨消、波丝草。为荨麻科植物毛花点草Mahocnide Pilosa Migo. 的全草。分布广西、四川、贵州、陕西、浙江、江苏、安徽。苦、辛，凉。清热，解毒。治肺病咳嗽，疮毒，痱疹。煎服：15～30克。油菜浸涂烧烫伤。

雪哈 见《药材资料汇编》。为哈士蟆之别名，详该条。

雪莲花 出《本草纲目拾遗》。又名雪荷花、大木花。为菊科植物绵头雪莲花Saussurea laniceps Hand.-Mazz. 的带花全株。主产云南、四川、西藏。甘、苦，温。补肾壮阳，调经止血。①治阳痿，腰膝软弱，月经不调，崩漏，带下，风湿性关节炎，雪盲，牙痛。煎服：3～9克。②治创伤出血，捣烂外敷。孕妇忌服。过量可致大汗淋漓。

雪荷花 ❶见《本草纲目拾遗》。为雪莲花之别名。❷见《本草纲目拾遗》。为新疆雪莲之别名。各详该条。

排风子 见《本草纲目》。为鬼目之别名，详该条。

排风藤 见《分类草药性》。为白毛藤之别名，详该条。

排钱草 见《福建民间草药》。又名龙鳞草、钱串草、午时合。为豆科植物排钱树Desmodium pulchellum (L.) Benth. 的叶。分布福建、台湾、广东、广西、云南等地。微苦，平。祛风利湿，活血消瘀。治感冒发热，风湿性关节炎，腹水，锁喉风，跌打瘀肿。煎服：6～15克。孕妇忌服。全草含蟾毒色胺及其甲醚，N,N-二甲基色胺，5-甲氧基-N-甲基色胺，禾草碱等生物碱。禾草碱对哺乳类动物中枢神经系统有兴奋作用，大量可导致麻痹。体外试验能收缩动物子宫。

排钱草根 见《泉州本草》。为豆科植物排钱树Desmodium pulchellum(L.) Benth. 的根。淡、涩，凉。行瘀散结，除湿消肿。治肝脾肿大，急性传染性肝炎，风湿骨痛，月经不调，闭经，子宫脱垂，痈疽疔疮，跌打瘀肿。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。孕妇忌服。根显生物碱、酚类、有机酸和氨基酸反应。

推车虫 见《药材资料汇编》。为蜣螂之别名，详该条。

推粪虫 见《全国中草药汇编》。为蜣螂之别名，详该条。

掐不齐 见《救荒本草》。为鸡眼草之别名，详该条。

接骨木 ❶出《新修本草》。又名木蒴藋、公道老、续骨木、扦扦活。为忍冬科植物接骨木 Sambucus Williamsii Hance 的茎枝。产江苏、福建、四川、广西、浙江等地。甘、苦，平。祛风，活血，止痛，利水。①治风湿痹痛，肾炎水肿。煎服：9～15克。②治跌打骨折，腰扭伤，煎服或捣敷；创伤出血。研末撒；风疹瘙痒，漆疮，煎水洗。孕妇忌服。煎剂对小鼠有镇痛及镇静作用。❷见《植物名实图考》。为九节茶之别名，详该条。

接骨木根 出《本草拾遗》。为忍冬科植物接骨木 Sambucus williamsii Hance的根皮。甘，平。治风湿痹痛，痰饮，水肿，热痢，黄疸。煎服：9～15克。捣敷治跌打损伤；研末油调敷烫伤。

接骨丹 见《云南中草药》。为岩笋之别名，详该条。

接骨仙桃 见《本草纲目拾遗》。为仙桃草之别名，详该条。

接骨金粟兰 见《中国药用植物志》。为九节茶之别名，详该条。

接骨树 见《云南中草药选》。为类梧桐之别名，详该条。

接骨草 ❶见《群芳谱》。为驳骨丹之别名。❷见《滇南本草》。为宝盖草之别名。❸出《履巉岩本草》。为蒴藋之别名。各详该条。

接骨草根 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·外科》。为狗屎花根之别名，详该条。

接骨药 ❶见《云南中草药》。为血满草之别名。❷见《贵州草药》。为海桐皮之别名，各详该条。

接骨莲 见《昆明民间常用草药》。为野棉花之别名，详该条。

接骨藤 ❶见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·外科》，为买麻藤之别名。❷见《贵州民间方药集》。为蔓奠之别名。各详该条。

接续草 出《本草拾遗》。为问荆之别名，详该条。

接筋草 见《昆明民间常用草药》。为老蜗生之别名，详该条。

救必应 见萧步丹《岭南采药录》。又名熊胆木、白银香、九层皮。为冬青科植物铁冬青Ilexrotunda Thunb.的树皮或根皮。分布长江流域以南及台湾。苦、寒。清热解毒，利湿，止痛。治感冒发热，扁桃体炎，咽喉肿痛，肝炎，急性胃肠炎，胃及十二指肠溃疡，肾炎水肿，风湿痹痛。煎服：9～15克。救必应叶：捣敷跌打损伤；研末调涂疮疡，烧伤，创伤出血。树皮含救必应甙甲(Ilexin A)，即丁香甙(Syringin)。还含黄酮甙、鞣质、β-香树脂醇、β-谷甾醇等。丁香甙有局部止血作用，还能收缩离体兔耳血管。黄酮甙部分对动物小肠有解痉作用。煎剂在体外能抑制金黄色葡萄球菌，链球菌，痢疾、伤寒及绿脓等杆菌。

救军粮 出《滇南本草》。为赤阳子之别名，详该条。

救兵粮 见《中国种子植物分类学》。为赤阳子之别名，详该条。

〔丿〕

雀儿麻 见《广西中兽医药用植物》。为了哥王之别名，详见该条。

雀儿蛋 见《陕西中草药》。为铃铃草之别名，详该条。

雀舌草 见《植物名实图考》。为地耳草之别名，详该条。

雀卵 出《名医别录》。为文鸟科动物麻雀Passer montanus saturatus Stejneger.的蛋。分布几遍全国。甘、咸，温。入肾经。补肾阳，益精血。治阳萎，血枯经闭，崩漏，带下。内服：煮食；或入丸剂。

常山 出《神农本草经》。又名鸡骨常山、恒山、翻胃木。为虎耳草科植物黄常山Dichroa tebrituga Lour.的根。主产四川、贵州、湖南。苦、辛，寒，有毒。入肝、脾经。截疟。治间疟，三日疟，恶性疟疾。煎服：4.5～9克，（酒炒后用），候药冷，未发前用。本品服后有恶心、呕吐等副作用，应配合镇吐药同用，孕妇忌服。本品含常山碱甲、乙、丙，黄常山定，4-喹-唑酮等生物碱和伞形花内酯（又名常山素A）及常山素B（Dichrin B）。常山碱甲，乙，丙均有抗疟作用，疗效与奎宁相似。乙有抗阿米巴原虫作用，但毒性高，易复发。三者对麻醉狗有降压，抑制心脏，扩张血管作用。总碱对小鼠实验性肿瘤有抑制作用；煎剂对人工发热兔有解热作用。常山碱易引起呕吐。

常春藤 出《本草拾遗》。又名三角风、上树蜈蚣、追风藤。为五加科植物常春藤Hedera nepalensis K.Koch var.sinensis (Tobl.) Rehd.的茎叶。分布陕西、甘肃、

黄河流域以南至华南、西南各地。苦、辛，温。祛风散寒，活血消肿。①治风湿痹痛，口眼㖞斜，产后感风头痛，闭经，跌打损伤，急性结膜炎。内服：煎汤，6～12克；或泡酒服。②治痈疖肿毒，外伤出血，鲜茎叶捣敷；荨麻疹，湿疹，煎水洗。本品含鞣质、树脂。叶尚含常春藤甙、肌醇等。

常黄连　见《东北药用植物志》。为鲜黄连之别名，详该条。

啤酒花　见《中国药用植物图鉴》。又名忽布，香蛇麻。为桑科植物啤酒花Humulus lupulus L.的雌花序。新疆北部有野生，东北、华北及山东等地有栽培。苦，微凉。健胃，安神，抗痨，消炎，利尿，化痰止咳。①治消化不良，食欲减退，癔病，失眠，肺结核，结核性胸膜炎，麻风，膀胱炎。煎服，1.5～4.5克。②治慢性气管炎。研粉服，每次1克，每日三次，连服二个月。③治淋巴结核，用本品提取物酒花素制成软膏外敷；伤口感染，用酒花素制成油剂外涂。本品含苦味成分（葎草酮、异葎草酮、蛇麻酮及其各种衍生物），挥发油（主成分为葎草烯、月桂烯等），黄酮类（芸香甙、异槲皮甙、黄芪甙等），鞣质等。蛇麻酮、葎草酮及含异葎草酮的酒花素，在体外对结核杆菌、枯草杆菌、金黄色葡萄球菌等有抑制作用。啤酒花对兔的实验性动脉粥样硬化有治疗作用，并使血压轻度下降。蛇麻草或蛇麻酮具镇静作用。鲜花粉能引起接触性皮炎。

啜脓膏　见萧步丹《岭南采药录》。为雾水葛之别名，详该条。

晚蚕沙　出《斗门方》。即原蚕沙，详该条。

眼子菜　出《救荒本草》。又名牙齿草、水案板、木板凳、金梳子草。为眼子菜科植物眼子菜Potamogeton franchetii A. Benn.et Baag.的全草。全国各地都有分布。苦、涩，寒。清热解毒，渗湿利水，消积，止血。①治急性结膜炎，痢疾，黄疸，水肿，臌胀，淋病，白带，小儿疳积，蛔虫病。②治鼻衄，便血，痔血，血崩。煎服：9～12克。③捣敷治痈疖肿毒。本品是一种有效驱蛔剂，毒性很低。

眼明草　见《履巉岩本草》。为千里光之别名，详该条。

蚶子壳　见《本草蒙筌》。为瓦楞子之别名，详该条。

蚶壳草　见《福建民间草药》。为积雪草之别名，详该条。

蛎蛤　出《神农本草经》。为牡蛎之别名，详该条。

蛆　出《集韵》。即五谷虫，详该条。

蛆儿草　见《四川中药志》。为粉条儿菜之别名，详该条。

蚺蛇肉　出《食疗本草》。为蟒蛇科动物蟒蛇Python molurus bivittatus schlegel的肉。分布广东、广西、云南、福建等地。甘，温，有小毒。祛风，杀虫。治风痹，瘫痪，疠风，疥、癣。煮食、酒浸或焙干研末。

蚺蛇胆　出《本草经集注》。为蟒蛇科动物蟒蛇Python molurus bivittatus schlegel的胆。苦，寒，有毒。入肝经。燥湿，杀虫，明目。①治腹部虫痛，疳痢，痫疾，目翳肿痛。内服：研末，0.9～1.5克，酒化或水化服。②治痔疮。研末调敷。

蚱蜢　出《本草纲目》。又名蚂蚱。为蝗科昆虫稻蝗Oxya chinensis Thunb.等的全虫。我国大部分地区有分布。辛，平。止咳平喘，镇痉，消积。①治百日咳，支气管喘息，小儿惊风，破伤风，疳积。内服：煎汤，3～8只；焙存性研末服，1～5只。②治冻疮。焙研油调搽。

蚯蚓　出《神农本草经》。为地龙之别名，详该条。

蛇不见　见《闽东本草》。为阴地蕨之别名，详该条。

蛇不过　见《浙江民间常用草药》。为虎刺之别名，详该条。

蛇不钻 见《草药手册》。为廊茵之别名，详该条。

蛇白蔹 见《种子植物名称》。为蛇葡萄之别名，详该条。

蛇包谷 见《昆明郊区药用植物的初步调查报告》。为天南星之别名，详该条。

蛇头王 见《上海常用中草药》。为一枝黄花之别名，详该条。

蛇头草 见《江西草药》。为蜂斗菜之别名，详该条。

蛇头蓼 见《广西本草选编》。为赤胫散之别名，详该条。

蛇皮 出《雷公炮炙论》。即蛇蜕，详该条。

蛇虫草 见《广西中药志》。为岗松之别名，详该条。

蛇舌草 ❶见《浙江民间草药》。为九头狮子草之别名。❷见《广西中药志》。为白花蛇舌草之简称。❸见《贵州民间方药集》。为瓶尔小草之别名。各详该条。

蛇舌癀 ❶见《福建中草药》。为四叶草之别名。❷见《闽南民间草药》。为白花蛇舌草之别名。各详该条。

蛇壳 见《本草纲目》。即蛇蜕，详该条。

蛇足草 见《贵州民间药物》。为千层塔之别名，详该条。

蛇利草 见萧步丹《岭南采药录》。为半边莲之别名，详该条。

蛇含 出《神农本草经》。又名五匹风、五皮风、五爪龙。为蔷薇科植物蛇含Potentilla kleiniana Wight et Arn.的全草。全国大部分地区有分布。苦、辛，凉。清热解毒。①治小儿高热惊风，外感发热咳嗽，咽喉肿痛，痢疾，疟疾。煎服：9～30克。②治丹毒，痈肿，外伤出血，蛇、虫咬伤，捣烂敷；角膜溃疡，捣烂敷患眼眉弓。

蛇含石 出《本草纲目》。又名蛇黄。为褐铁矿的结核。产浙江、广东等地。甘，寒。安神镇惊，止血定痛。治心悸，惊风，癫痫，肠风下血，骨节酸痛。煎服：6～9克。本品主成分为含水氧化铁，常杂有锰、磷、钙、钒等。

蛇床子 出《神农本草经》。又名野茴香。为伞形科植物蛇床Cnidium monnieri (L.)Cusson 的果实。主产河北、山东、江苏、浙江等地。辛，苦，温。入肾、脾经。温肾助阳，燥湿，杀虫。①治阳痿，宫冷不孕。煎服：3～9克。②治滴虫性阴道炎，每晚用10%蛇床子煎剂冲洗后，放入蛇床子栓剂，7天为一疗程；湿疹，疥癣，煎水熏洗或研末调敷，并煎服。本品含挥发油，其主成分为左旋蒎烯、左旋莰烯、异戊酸龙脑酯等；又含甲氧基欧芹酚、食用当归素(Edultin)、异茴芹香豆素(Isopimpinelline)、欧芹属素乙、佛手柑内酯、二氢山芹醇(Dihydrooroselol)及其当归酸酯等。乙醇提取物对小鼠有类似性激素的作用。体外有抗病毒作用。流浸膏高浓度时在体外能杀死阴道滴虫。

蛇附子 见《植物名实图考》。为三叶青之别名，详该条。

蛇泡竹 见《生草药性备要》。为茅莓之别名，详该条。

蛇泡草 见《分类草药性》。为蛇莓之别名，详该条。

蛇咬草 见《陕甘宁青中草药选》。为鹅脚板之别名，详该条。

蛇总管 ❶见《南宁市药物志》。即小叶蛇总管。❷见《福建中草药》。为白花蛇舌草之别名。各详该条。

蛇退 见《本草纲目》。即蛇蜕，详该条。

蛇退草 见《贵州民间方药集》。为夜关门之别名，详该条。

蛇根草 见《浙江民间草药》。又名四季花、雪里梅。为茜草科植物蛇根草 Ophiorrhiza japonica Bl.的全草。分布长江以南大部分地区。淡，平。清肺止咳，活血散瘀。治咳嗽，劳伤吐血，月经不调。煎服：

9～15克。捣敷治跌打扭伤。本品含哈尔满碱(Harman)，无羁萜(Friedclin)，β-谷甾醇。

蛇莲 见《昆明民间常用草药》。为罗锅底之别名，详该条。

蛇莓 出《名医别录》。又名野杨梅、地莓、三叶蕉、爪龙、蛇泡草。为蔷薇科植物蛇莓Ducheshea indica(Andr.)Focke的全草。分布辽宁以南各地。甘、苦，寒，有小毒。清热解毒，散结。①治感冒发热，咳嗽，小儿高热惊风，咽喉肿痛，白喉，痢疾，亦治癌肿。煎服：9～15克，鲜品倍量。②治疮肿疔毒，瘰疬，烧伤，蛇咬伤。煎服或捣敷。鲜汁或煎剂在体外对金黄色葡萄球菌，绿脓，伤寒、变形、痢疾等杆菌有抑制作用。

蛇莓根 出《本草纲目》。为蔷薇科植物蛇莓 Duchesnea indica(Andr.)Focke 的根。治眼结膜炎，角膜炎。取鲜根3～5株，洗净捣烂，置净杯内，加入菜油适量，每日蒸一次，点眼，每次2～3滴，一日三次。

蛇倒退 ❶见《贵阳民间药草》。为杠板归之别名。❷见《贵阳民间药草》。为杏叶防风之别名，各详该条。

蛇通管 见《广西中药志》。为小叶蛇总管之别名，详该条。

蛇黄 出《新修本草》。为蛇含石之别名，详该条。

蛇泡草 见《广西中草药》。为白花蛇舌草之别名，详该条。

蛇葡萄 出《救荒本草》。又名野葡萄、山葡萄、蛇白蔹、见毒消。为葡萄科植物蛇葡萄 Ampelopsis brevipedunculata (Maxim) Trautv. 的叶或茎藤。东北至华南各地均有分布。甘，平。利尿，清热，止血。①治慢性肾炎，小便不利，消化道出血。煎服：9～30克。治外伤出血，研末掺；疮毒，煎水洗。预试藤含黄酮类、酚类、糖类、氨基酸等。

蛇葡萄根 见《浙江天目山药用植物志》。又名山葡萄根、野葡萄根。为葡萄科植物蛇葡萄Ampelopsis brev ipedunculata (Maxim.) Trautv.的根或根皮。甘、酸，平。清热解毒，散瘀破结，祛风除湿。①治肺痈，肠痈，呕吐，腹泻，肺结核，瘰疬，风湿痹痛。煎服：15～30克。②治痈疮肿毒，水、火烫伤，研末调敷；跌打损伤。捣敷。体外试验，根对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

蛇蜕 出《神农本草经》。又名蛇皮、蛇退、龙衣、蛇壳。为游蛇科动物黑眉锦蛇 Elaphe taeniurus cope或锦蛇E.carinata. Guenther 等多种蛇类蜕下的干燥皮膜。主产浙江、广西、四川、江苏、福建、安徽、陕西、云南等地。甘、咸，平，有毒。入肝经。祛风，定惊，解毒，退翳。①治惊风、抽搐，癫痫，喉痹肿痛，小便不通，疮疥，乳糜尿，风疹，角膜云翳。内服：煎汤，1.5～3克；或研末服，0.3～0.6克。②治脑囊虫病。研末服：每次3克，日服二次。③治疔肿，煎服并烧存性以鸡子清调敷患部；带状疱疹，炒微黄，研细末，麻油调敷患部，每日二至三次；蛲虫病，焙黄研末，加冰片少许，每晚睡前抹肛门部。孕妇忌服。本品含骨胶原。

野三七 见《民间常用草药汇编》。为地笋之别名，详该条。

野丈人 出《神农本草经》。为白头翁之别名，详该条。

野万年青 见《四川中药志》。为爵床之别名，详该条。

野山参 见《增订伪药条辨》。为人参之野生者，详人参条。

野山药 见《安徽中草药》。为穿山龙之别名，详该条。

野山菊 见《植物名实图考》。为野菊之别名，详该条。

野马林 见《黑龙江常用中草药手册》。为托盘之别名，详该条。

野马追 见《药学资料》(1)：13,1972。又名：野佩兰。为菊科植物轮叶泽兰Eupatorium llindleyanum DC.var.tripartitum Mak 的全草。主产江苏。苦，平。清热解毒，止咳化痰，平喘，降压。①治慢性气管炎、痰多咳喘，感冒发热，急性扁桃体炎，钩端螺旋体病，高血压病。煎服：30～60克。②治痈疽疖肿。内服并捣敷。本品含挥发油、黄酮类（内有金丝桃甙）、生物碱，香豆素等。黄酮类成分对小鼠有某些镇咳作用。野马追还能增加末梢血中白细胞、降低血压和抑制唾液分泌；体外有一定的抑菌作用。

野木瓜 见《浙南本草新编》。又名七叶莲、绕绕藤、沙藤、假荔枝。为木通科植物野木瓜Stauntonia chinensis DC的全株。分布浙江、福建、湖南、广东等地。微苦、平。祛风行气止痛，利尿消肿。治风湿痹痛，脘腹疼痛，三叉神经痛，神经性头痛，坐骨神经痛，痛经，外伤、手术后及癌症晚期的疼痛，水肿，小便不利。煎服：9～15克。孕妇忌服。对小鼠有镇痛和镇静作用。能抑制兔小肠，并能解除子宫痉挛。

野巴戟 见《昆明民间常用草药》。为绒毛鸭脚木之别名，详该条。

野石榴 见《江苏省植物药材志》。为金樱子之别名，详该条。

野田七 见《广西本草选编》。为竹节三七之别名，详该条。

野白纸扇 见《广州植物志》。为山甘草之别名，详该条。

野白菜 见《贵州草药》。为地白草之别名，详该条。

野冬青皮 见《云南思茅中草药选》。为桃金娘科植物海南蒲桃 Syzygium cumini (L.)skeels或短序蒲桃S. brachythyrsum Merr. et Perry的树皮及叶。苦、涩，凉。治痢疾，肠炎。煎服：9～15克。海南蒲桃树皮含没食子酸，并没食子酸，3,3'～二甲基没食子酸，3,3',4-三甲基没食子酸，杨梅树皮素和树脂等。

野冬青果 见《云南中草药》。又名麻里果、羊屎果。为桃金娘科植物海南蒲桃Syzyqium cumini(L.) Skeels或短序蒲桃S. brachythyrsum.Merr.et Perry的果实。前者分布福建、广东、广西和云南；后者分布广东海南及云南。甘、酸，平。止咳，平喘。治肺结核，气管炎，哮喘。内服：炖肉服，15～30克，分6次服，日服三次；或研末每次0.6克，1日三次，温开水送服。海南蒲桃果含葡萄、果糖、麦芽糖、矢车菊素鼠李葡萄糖甙、矮牵牛素葡萄糖甙、锦葵花素葡萄糖甙、叶酸。给雄性家兔和四氧嘧啶性糖尿病大鼠口服种子醇提取物，有降血糖作用。家兔灌服果的温浸剂有祛痰作用。

野兰 出《神农本草经》。为漏芦之别名，详该条。

野兰靛 见《广西中兽医药用植物》。为红紫珠之别名，详该条。

野芋 ❶出《本草经集注》。又名野芋头、红芋荷。为天南星科植物芋 Colocasia antiguorum Schott et Endl.的块茎。分布长江以南各地。辛，寒，有毒。解毒，消肿，止痛。治痈疖肿毒，乳痈，跌打损伤，疥癣，虫、蛇咬伤。外用：鲜品捣敷或醋磨汁涂。本品含有刺激性的二糖甙苯甲醛。也有认为它对胃的刺激性是由于含草酸钙的原故，煮熟后食用，刺激性即消减。有云以所作食品者，肾炎发病率高。动物食其茎叶可使甲状腺肿大。❷见萧步丹《岭南采药录》。为海芋之别名，详该条。

野芋叶 出《本草纲目》。为天南星科植物野芋Colocasia antiquorum Schott.et Endl.的叶。辛、涩，寒，有毒。治疔疮，无名肿毒，蛇咬伤，蜂虿螫伤。捣敷。

野芋头 ❶见《中药材手册》。为天南星之别名。❷见《本草纲目拾遗》。即野芋。各详该条。

野芝麻 ❶出《植物名实图考》。又名白花菜、吸吸草、泡花草、野油麻。为唇形科植物野芝麻Lamium barbatum Sieb. et Zucc.的花或全草。分布东北，华北、华东、华中及四川、贵州等地。微甘，平。清肺凉血，散瘀消肿。①治肺热咳血，胃痛，血淋，白带，月经不调，小儿疳积。煎服：9～15克。②治跌打损伤，肿毒。捣敷或研末调敷。花含挥发油、异槲皮甙、山奈酚-3-葡萄糖甙、槲皮黄甙、野芝麻甙（Lamioside)、芸香甙、胆碱、鞣质、绿原酸、咖啡酸等。全株含水苏碱。提取物可使动脉及子宫收缩，可用于子宫出血。植物含强溶血作用的皂甙，小鼠口服所含黄酮，能抑制可卡因产生的兴奋作用。❷见《浙江民间常用草药》。为农吉利之别名，详该条。

野芝麻根 见《浙江民间草药》。为唇形科植物野芝麻 Lamium barbatum Sieb. et Zucc.的根。微甘，平。清肝利湿，消肿。①治头目眩晕，慢性肝炎，肺结核，肾炎浮肿，白带，小儿疳积，痔疮。煎服：9～15克。②捣敷肿毒。本品含水苏糖、葡萄糖甙。

野老姜 见《浙江民间常用草药》。为蘘荷之别名，详该条。

野朱桐 见《福建民间草药》。为臭牡丹之别名，详该条。

野决明 见《东北植物药图志》。又名牧马豆、黄花苦豆子。为豆科植物披针叶黄华 Thermopsis lanceolata R. Brown 的全草。分布东北、华北、西北及四川等地。甘，微温，有毒。祛痰，止咳。治咳嗽痰喘。煎服：6～9克。全草含金雀花碱、黄华碱（Thermopsine）、合模黄华碱、臭豆碱（Anagyrine）、甲基金雀花碱、鹰爪豆碱、阿良亭（Argentine）、羽扇豆碱、菱叶黄华碱（Rhombifoline)、黄华胺(Thermopsamine）及染料木甙等。全草浸剂有祛痰作用。于麻醉猫的股静脉注入金雀花碱，具有强烈的兴奋呼吸作用，并有升高血压的作用。

野红花 见《本草纲目》。为大蓟之别名，详该条。

野麦 见《草药手册》。为瞿麦之别名，详该条。

野杜仲 ❶见《草药手册》。又名痰药、四棱子。为卫矛科植物大花卫矛Euonymus grandiflorus Wall.或肉花卫矛E.carnosus Hemsl. 的根、根皮或树皮。前者分布甘肃、陕西、湖北、四川、云南、贵州、湖南等地；后者分布湖北、江西、安徽、江苏、浙江、福建、台湾。微苦、涩平。软坚散结，祛风湿，通经络。治淋巴结结核，与鸡蛋、红糖共煮服；治风湿疼痛，跌打损伤，肾虚腰痛，闭经，痛经，煎服：15～30克。根皮、树皮含硬橡胶，树皮中含量为3.38%～17.25%。❷见《浙江民间常用草药》。为丝棉木之别名，详该条。

野杨梅 见《救荒本草》。为蛇莓之别名，详该条。

野苋菜 见《福建民间草药》。为刺苋菜之别名，详该条。

野花生 ❶见《云南思茅中草药选》。为豆科植物决明Cassia obtusifolia L.或小决明C.tora L. 的全草或叶。苦、甘，凉。祛风散热，清肝明目。治流行性感冒，感冒。煎服：15～30克。全草含D-甘露醇、蜂花醇、β-谷甾醇。叶含山奈酚-3-二葡萄糖甙。❷见《贵州草药》。为老蜗生之别名，详该条。❸见《贵州草药》。为紫堇之别名，详该条。

野花椒 见《杭州药用植物志》。为竹叶椒之别名，详该条。

野芹菜 ❶见《福建民间草药》。为毛茛之别名，详该条。❷见《上海常用中草

药》。为石龙芮之别名，详该条。❸见《广东中草药》。为自扣草之别名，详该条。❶见《安徽中草药》。为藁本之别名，详该条。

野牡丹 见《陆川本草》。又名猪姆草、山石榴、倒罐草、红暴牙狼。为野牡丹科植物野牡丹Melastoma candidum D. Don的根或叶。分布广西、广东、福建、台湾等地。甘、酸、涩，平。清热止痢，散瘀止血。①治细菌性痢疾，肠炎，消化不良，胃痛，血栓闭塞性脉管炎，便血，衄血，月经过多。煎服：根，15～30克；叶9～21克。②捣敷治跌打损伤，外伤出血；煎水洗疮疡溃烂。

野牡丹子 见《陆川本草》。为野牡丹科植物野牡丹Melastoma candidum D. Don的果实。淡，平。治子宫出血，乳汁稀少。煎服：9～15克。

野含羞草 见《湖南药物志》。为合萌之别名，详该条。

野沙柑 见《广西药用植物名录》。为山小橘之别名，详该条。

野鸡子豆 见《福建民间草药》。为望江南子之别名，详该条。

野鸡冠 见《本草纲目》。为青葙之别名，详该条。

野青仔 见《福建中草药》。为狗肝菜之别名，详该条。

野玫瑰根 见《吉林医药参考资料》(1)：32,1971。为刺玫果根之别名，详该条。

野苦荬 见《广州植物志》。为苣荬菜之别名，详该条。

野苦菜 见《植物名实图考》。为败酱草之别名，详该条。

野苦麻 见《闽东本草》。为铁苋之别名，详该条。

野茄 见《本草纲目》。为苍耳之别名，详该条。

野枇杷叶 见《上海常用中草药》。为紫金牛之别名，详该条。

野佩兰 见《安徽中草药》。为野马追之别名，详该条。

野狐丝 见《本草纲目》。为菟丝之别名，详该条。

野油菜 见《分类草药性》。为蔊菜之别名，详该条。

野油麻 见《湖南药物志》。为野芝麻之别名，详该条。

野毒芹 见《江苏药材志》。即毒芹，详该条。

野胡椒 见《中国经济植物志》。为山胡椒之别名，详该条。

野南瓜 ❶见《浙江民间常用草药》。为蜂斗菜之别名。❷见《植物名实图考》。为算盘子之别名。各详该条。

野茴香 见《草药手册》。为蛇床子之别名，详该条。

野茶 见《陕西中草药》。为罗布麻之别名，详该条。

野鸦椿子 见《四川中药志》。又名鸡眼睛、鸡肫子。为省沽油科植物野鸦椿Euscaphis japonica (Thunb.)Dippel的果实或种子。分布黄河流域以南各地；北至河南，东南至台湾。辛、微苦，温。祛风散寒，理气止痛。治头痛，胃痛，寒疝腹痛，泻痢，脱肛，月经不调，子宫脱垂，睾丸肿痛。煎服：6～15克。种子含脂肪油。荚含异槲皮甙、矢车菊素-3-木糖葡萄甙、黄芪甙。黄芪甙略能降低毛细血管通透性。对大鼠离体小肠、膀胱有解痉作用。

野鸦椿根 见《中国药用植物志》。为省沽油科植物野鸦椿Euscaphis japonica (Thunb.)Dippel的根。微苦、辛，平。解表，除湿，消肿。①治感冒头痛，偏头痛，痢疾，泄泻，风湿腰痛。煎服：9～15克。②治跌打损伤。煎服并捣敷。

野韭菜 见《浙江中药手册》。为莎草之别名，详该条。

野香茹 见《福建民间草药》。为石荠苧之别名，详该条。

野香薷 ❶见《岭南草药志》。为七星剑之别名。❷见《全国中草药汇编》。即土香薷。各详该条。

野洋参 见《贵州民间药物》。为斑叶兰之别名，详该条。

野洋姜 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·外科》。为盾叶薯蓣之别名，详该条。

野扁豆 见《中国树木分类学》。为望江南之别名，详该条。

野蚊子草 见《江苏南部种子植物手册》。为脱力草之别名，详该条。

野高粱 见《高原中草药治疗手册》。为蝎子七之别名，详该条。

野席草 见《本草纲目拾遗》。为龙须草之别名，详该条。

野烟 ❶见《云南中草药》。又名：破天菜、大将军、红麻菠萝。为桔梗科植物西南山梗菜Lobelia seguinii Levl. et vant.的根或叶。分布云南、贵州、四川、湖北。辛，寒，有剧毒。祛风散瘀，消肿解毒。治风湿关节疼痛，跌打损伤，痈肿疔疮，腮腺炎。外用：捣敷或浸酒涂擦。本品有剧毒、忌内服。误服后的中毒症状：头晕、心慌、呕吐、血压下降。❷见《贵州民间方药集》。为天名精之别名，详该条。❸见《滇南本草》。即烟草，详该条。

野烟叶 见《南宁市药物志》。又名：土烟叶、假烟叶、臭烟。为茄科植物茄树Solanum verbascitolium L.的叶。分布我国南部、西南部。苦、辛，平，有毒。祛风，消肿。治风湿脚痛，煎水洗；跌打肿痛，捣烂酒炒敷；瘰疬，痈疖肿毒，湿疹，皮炎，捣敷或煎浓汁洗。叶含澳洲茄碱(Solasonine)。澳洲茄边碱、澳洲茄二烯(Solasodiene)、密花茄碱(Solafloridine)、番茄烯胺(Tomatidenol)、薯蓣皂甙元等。水提取物能兴奋离体动物肠管，对小鼠有镇静作用。

野凉薯 见《湖南药物志》。为土圈儿之别名，详该条。

野料豆 见《饮片新参》。又名零乌豆、马料豆、细黑豆。为豆科植物蒺豆 Glycine soja Sieb.et Zucc.的种子。主产江苏、浙江等地。甘，凉。补肾益肝，祛风，明目。治头晕眼花，肾虚腰痛，盗汗，筋骨疼痛，小儿疳积。煎服：9～15克。正常大鼠喂给野料豆种子粉有明显降低血糖和血胆甾醇的作用。含一种酸性成分，可能为植酸，动物食之可中毒。

野扇花果 见《云南中草药》。为黄杨科植物野扇花Sarcococca ruscifolia Stapt的果实。分布四川、湖北、江西、贵州、云南。养肝安神。治头晕，心悸，视力减退。煎服：9～15克。

野菜豆 见《中国主要植物图说·豆科》。为大巢菜之别名，详该条。

野菊 出《日华子诸家本草》。又名野山菊，苦薏、路边菊。为菊科植物野菊Chrysanthemum indicum L. 的全草。除新疆外，全国各地均有分布。苦、辛，寒。清热解毒。①防治感冒，流行性感冒，流行性脑脊髓膜炎。②治风热头痛，鼻炎，支气管炎，咽喉肿痛，风火赤眼。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。③治痈疖疔疮，瘰疬，蛇咬伤，内服并捣敷；天疱疮，湿疹，皮肤痒。煎水洗。本品含挥发油，内含樟脑等；还含蒙花甙、矢车菊甙、菊黄质、野菊花内酯(Yejuhualactone)、多糖、香豆素类等。

野菊花 出《本草正》。为菊科植物野菊Chrysanthemum indicum L.的花序。主产江苏、四川、广西、山东。苦、辛，凉。入肺、肝经。清热解毒，凉血降压。①防治感冒，流行性感冒，流行性脑脊髓膜炎。②治头痛眩晕，目赤，咽喉肿痛，肺炎，支气管

炎，肝炎，痢疾，高血压病。煎服：9～15克。③治痈肿疔毒，丹毒、蛇咬伤，内服并捣敷；口疮，煎水含漱；湿疹，天疱疮，煎水洗。花含挥发油、苏格兰蒿素A(Artegl-asinA)野菊花内酯等。口服对正常或高血压动物均有降低血压作用，这是由于总外周阻力的下降。体外试验煎剂对金黄色葡萄球菌、白喉杆菌有抗菌作用。苏格兰蒿素A能致敏。

野菠菜 见《上海常用中草药》。为羊蹄之别名，详该条。

野猪粪 见《东北药用植物志》。为猪苓之别名，详该条。

野麻 见《中国经济植物志》。为罗布麻之别名，详该条。

野麻豌 见清·刘士季《草木便方》。为大巢菜之别名，详该条。

野婆婆头 见《辽宁经济植物志》。为托盘之别名，详该条。

野绿灯 见《上海常用中草药》。为苦蘵之别名，详该条。

野绿豆 见《贵州民间方药集》。为马棘之别名，详该条。

野棉花 ❶出《滇南本草》。又名接骨莲、满天星。为毛茛科植物野棉花Anemone Vitifolia Buch.-Ham.的根及茎叶。分布西南地区。苦，微寒，有毒。祛风，散瘀，利湿，杀虫。①治风湿关节痛，跌打损伤，痢疾，肠炎，蛔虫病，钩虫病。煎服：3～6克。②治疟疾，捣敷大椎穴；痈疽不溃，蜈蚣咬伤，捣敷患处；鼻疳，茎叶捣烂布包塞鼻。本品有毒，内服宜慎，过量可现头晕、呕吐、四肢麻木等中毒症状。根含白头翁素(Anemonin)。❷见《福建中草药》。为地桃花之别名，详该条。❸见《江西民间草药验方》。为梵天花之别名，详该条。

野葡萄 见《泉州本草》。即蛇葡萄，详该条。

野葡萄根 见《泉州本草》。即蛇葡萄根，详该条。

野葡萄藤 见《百一选方》。为蘡薁之别名，详该条。

野葵花 见《云南中草药》。为挖耳草之别名，详该条。

野蒜 ❶见《江西草药》。为石蒜之别名。❷见《中药形性经验鉴别法》。为薤白之别名。各详该条。

野蒿 见《中国药用植物志》。为一年蓬之别名，详该条。

野辣椒 见《江西民间草药》。为龙葵之别名，详该条。

野蓼 见《草药手册》。为金线草之别名，详该条。

野樱桃 ❶见《本草纲目》。为木半夏之别名。❷见《昆明民间常用草药》。为胃友之别名。各详该条。

野豌豆 ❶出《本草品汇精要》。为大巢菜之别名，详该条。❷见《贵州民间药物》。为歪头菜之别名。各详该条。

野鹤嘴 见《广西中药志》。为莲生桂子花之别名，详该条。

野橙子 见《本草纲目》。为枸橘之别名，详该条。

野薄荷 见《广西中兽医药用植物》。为山藿香之别名，详该条。

野黄茄 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为丁茄之别名，详该条。

崩大碗 见《广州植物志》。为积雪草之别名，详该条。

曼陀罗子 出《本草纲目》。为茄科植物白曼陀罗Datura metel L.或毛曼陀罗D. innoxia Mill.等的种子。产江苏、福建、广东等地。辛、苦，温，有毒。止痛，平喘，治风湿痹痛，跌打损伤，胃痛，喘咳，惊痫。内服：煎汤，0.15～0.3克；或浸酒服。过量或生食易致中毒。儿童忌用。白曼陀罗和毛曼陀罗的种子均含天仙子碱(东莨菪碱)、天仙子胺(莨菪碱)。白曼陀罗的

种子还含去甲天仙子胺。

曼陀罗叶 见《现代实用中药》。为茄科植物白曼陀罗 Datura metel L.或毛曼陀罗D.innoxia Mill.等的叶。我国各地有栽培或野生。苦、辛，温，有大毒。止咳平喘，镇痛。①治哮喘。本品切成丝和入烟丝中燃吸，作临时平喘用。用量60～240毫克，不可多用。儿童忌用。②治痉挛性咳嗽，胃肠挛痛，疝痛。煎服：0.3～0.6克。③治风湿痹痛，跌打损伤。煎服或捣敷。④治慢性瘘管。取叶洗净，刺多数小孔，放煮沸之米汤中烫软后贴疮口，每日换药一次。内服过量易致中毒，禁忌证同洋金花。白曼陀罗叶及毛曼陀罗叶均含天仙子碱(东莨菪碱)、天仙子胺（莨菪碱），白曼陀罗还含去甲天仙子胺。

曼陀罗花 出《御药院方》。为洋金花之别名，详该条。

曼陀罗根 见《陆川本草》。为茄科植物曼陀罗Datura metel L.或毛曼陀罗O.innoxia Mill.的根。治牛皮癣。根皮晒干研末，加醋及枯矾外擦患处。白曼陀罗根和毛曼陀罗根均含生物碱，主要为天仙子碱（东莨菪碱）、天仙子胺（莨菪碱）、托品碱、伪托品碱等。

悬钩子 出《本草拾遗》。又名山莓。为蔷薇科植物悬钩子Rubus corchorifolius L.f.的果实。除东北地区及甘肃、青海、新疆外，各地均有分布。酸，平。①治呃逆，遗精。煎服：9～15克。②捣汁涂治丹毒。

匙叶草 见《北方常用中草药手册》。为补血草之别名，详该条。

〔丿〕

铜丝草 见《西藏常用中草药》。为通经草之别名，详该条。

铜青 见《抱朴子》。即铜绿，详该条。

铜钱草 ❶见《广西中草药》。为广东金钱草之别名，详该条。❷见清·刘士季《草木便方》。为大金钱草之别名，详该条。❸见《浙江民间常用草药》。为虎耳草之别名，详该条。❹见《浙江中药手册》。为积雪草之别名，详该条。

铜盘一枝香 见《浙江民间常用草药》。为狗舌草之别名，详该条。

铜绿 出《本草纲目》。又名铜青。为铜器表面经二氧化碳或醋酸作用后生成的绿色锈衣。涩，平，有毒。退翳，去腐，杀虫。治目翳，烂弦风眼，痈疽肿毒，喉痹，牙疳，臁疮，顽癣。研末撒或调敷。本品主含碱式碳酸铜。

铜锤玉带草 出《植物名实图考》。又名地茄子草、地浮萍、地钮子、翳子草。为桔梗科植物铜锤玉带草Pratia begoniifolia (wall.) Lindl.的全草。分布西南、华南及湖南、湖北、江西、浙江、福建、台湾。辛、甘、苦，平，有小毒。补虚清肺，祛风利湿，活血解毒。①治虚弱，遗精，肺热咳嗽，风湿痹痛，月经不调，子宫脱垂，白带。煎服：9～15克。②治痈疮肿毒，跌打骨折，淋巴结炎，煎服并捣敷；结膜炎，角膜云翳，捣烂敷患眼周围。孕妇忌服。

铜锤草 见《四川中药志》。又名大叶酢浆草、大酸味草、大老鸦酸、紫酢浆草、红花酢浆草。为酢浆草科植物铜锤草Oxalis corymbosa DC.的全草或根。我国南北各地均有栽培。酸，寒。清热利尿，散瘀消肿。①治肾盂肾炎，水泻，痢疾，白浊，白带。煎服：15～30克。②治咽喉肿痛，牙痛，煎水慢慢含咽。③治跌打损伤，毒蛇咬伤，烫伤，痈疮肿毒，煎服或捣敷。孕妇忌服。全草含草酸盐。

铧头草 ❶出清·刘士季《草木便方》。又名烙铁草、犁头草。为堇菜科植物白花地丁Viola patrinii DC.或长萼堇菜V. inconspicua Bl.等的全草。前者分布东北，后者分布长江流域以南各地。微苦，寒。清热解毒，凉血消肿。治急性黄疸型肝炎，咽喉炎，扁桃体炎，结膜炎，急性阑尾炎，乳腺

炎，痈疮疖肿，化脓性骨髓炎，毒蛇咬伤。内服：煎汤，15～30克；或捣汁饮。外用：鲜品捣敷。长萼堇菜花含一种腊质，其中34%为饱和酸。❷见《全国中草药汇编》。即犁头草，详该条。

银不换 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名毛篝箕藤、银锁匙、金线风。为防己科植物毛叶轮环藤Cyclea barbata (Wall.) Miers的根。分布广东、广西等地。苦，寒，有小毒。清热解毒，散瘀止痛，利湿通淋。①治风热感冒，急性扁桃体炎，咽喉炎，牙痛。煎服并煎水含嗽。②治胃痛，腹痛，胃肠炎，痢疾，砂淋，跌打损伤。内服：煎汤，3～9克；或研末，1.5～3克，温开水冲服。全株含汉防己碱（根2.81%、茎0.11%、叶0.09%）、α-和β-轮环藤酚碱（Cyclanoline）、消旋防己醇灵碱、右旋防己醇灵碱和少量粒枝碱。根茎含异汉防己碱、高阿莫灵碱。

银毛委陵菜 见《云南中草药》。为管仲之别名，详该条。

银朱 出《本草纲目》。又名灵砂。为人工制成的赤色硫化汞。辛，温，有毒。攻毒，杀虫，燥湿，劫痰。①研末调敷治丹毒，疥、癣，黄水疮，汤火伤；和黄蜡调膏敷贴臁疮。②治痰涎壅盛，心腹冷痛。研末，用微量配入丸、散服。

银花 见《温病条辨》。即金银花，详该条。

银花子 见《饮片新参》。为忍冬科植物忍冬Lonicera japonica Thunb.的果实。我国大部分地区有分布。苦、涩，凉。凉血解毒。治肠风，赤痢。煎服，3～9克。

银花藤 见《医学真传》。为忍冬藤之别名，详该条。

银条参 见《江苏省植物药材志》。为北沙参之别名，详该条。

银线草 见《福建民间草药》。又名鬼督邮、独摇草、四叶对、四叶草、四块瓦。为金粟兰科植物银线草Chloranthus japonicus Sieb.的全草。分布辽宁、吉林、河北、山西、陕西、甘肃、湖北、江西、福建等地。辛、苦，温，有毒。祛风散寒，行瘀解毒。①治风寒咳嗽，闭经，痈疮疖肿。煎服：1.5～3克。②捣敷治跌打损伤，蛇咬伤；煎水洗治皮肤瘙痒。多服会引起呕吐，大量服用会导致肝脏出血。孕妇忌服。本品含8—0—甲基秦皮素（Isofraxidin），并显黄酮甙、酚类、氨基酸、糖类反应。

银线盆 见《峨眉山药用植物》。为斑叶兰之别名，详该条。

银背藤 见《广西药用植物名录》。为白鹤藤之别名，详该条。

银柴胡 出《本草纲目》。又名沙参儿、土参。为石竹科植物银柴胡Stellaria gypsophiloides Fenzl.的根。主产陕西、甘肃、宁夏、内蒙古。甘、苦，凉。入肝、胃经。清热凉血。治虚劳骨蒸，阴虚久疟，小儿疳热羸瘦。煎服：3～9克。本品含皂甙。

银蛇 见《广西药用动物》。为金钱白花蛇之别名，详该条。

银稔 见《广州植物志》。为人面子之别名，详该条。

银锁匙 ❶见《广西本草选编》。为凉粉藤之别名。❷见《广西中草药》。为银不换之别名。各详该条。

银腰带 见《江西草药》。为芫花之别名，详该条。

银精石 见《石雅》。为云母之别名，详该条。

移山参 见《增订伪药条辨》。为人参之移植者，详人参条。

移星草 见《现代实用中药》。为谷精草之别名，详该条。

甜瓜子 出《开宝重定本草》。又名甜瓜瓣、甘瓜子。为葫芦科植物甜瓜Cucumis melo L.的种子。甘，寒。散结排脓，清肺化痰。①治肠痈，肺痈。②治慢性支气管

炎，咳嗽口渴。煎服：9～15克。本品含脂肪油，内含亚油酸、油酸、肉豆蔻酸等的甘油脂，卵磷脂及胆甾醇，尚含蛋白质等。水、乙醇或乙醚提取液和种子脂肪油有驱蛔虫和绦虫作用。

甜瓜茎 出《本草图经》。又名甜瓜蔓、香瓜藤。为葫芦科植物甜瓜 Cucumis melo L.的茎。治鼻瘜肉，闭经，细菌性痢疾，高血压病。煎服：9～15克。服药后可出现恶心、呕吐、腹泻及腹部不适等副作用，一般三至四天后自行消失。

甜瓜蒂 出《本草经集注》。即瓜蒂，详该条。

甜瓜蔓 见《本草纲目》。即甜瓜茎，详该条。

甜瓜瓣 见《本经逢原》。即甜瓜子，详该条。

甜地丁 出《本草逢原》。又名疔毒草、痒痒草、萝卜地丁。为豆科植物米口袋Guldenstaedtia multiflora Bge. 的带根全草。主产江苏、山东、辽宁、河南等地。甘、苦，寒。入心、肝经。清热解毒。①治疔疮痈肿，阑尾炎，瘰疬，丹毒，毒蛇咬伤。煎服并捣敷。②治黄疸，痢疾，肠炎，目赤。煎服：9～30克。根含多量淀粉，并有生物碱反应。

甜杏仁 见《本草从新》。为蔷薇科植物杏Prunus armeniaca L.或山杏P.armeniaca L.var. ansu Maxim.的部分栽培种味甜的种子。主产河北、北京、山东等地；陕西、四川、内蒙古、甘肃、新疆、山西及东北等地亦产。甘，平。入肺、大肠经。润肺，祛痰，止咳，平喘。治虚劳咳嗽、气喘，肠燥便秘。内服：煎汤，6～10克；或入丸剂。本品含苦杏仁甙约0.1%，脂肪油40～60%。

甜桔梗 见《本草纲目》。为荠苨之别名，详该条。

甜梗子 见《四川中药志》。为芦根之别名，详该条。

甜橙 见《滇南本草》整理本。又名黄果、新会橙、广橘、广柑。为芸香科植物甜橙Citrus sinensis(L.) Osbeck的果实。长江流域以南各地均有栽培。甘、辛、微苦，微温。入肝经。行气，止痛，通乳。治胁痛脘胀，乳汁不通。生食或捣汁点水酒服。本品含橙皮甙、柚皮芸香甙（Narirutin）、柚皮甙、黄柏内酯（Obaculactone）、那可汀、柠檬酸、苹果酸等。

甜藤 见《广西中兽医药用植物》。为鸡屎藤之别名，详该条。

梨 出《名医别录》。又名快果、蜜父。为蔷薇科植物白梨Pyrus bretschneideri Rehd. 或沙梨P. Pyrifolia(Burm.f.)Nakai等栽培种的果实。白梨多栽培于我国北部，沙梨多栽培于长江和珠江流域。甘、微酸，微寒。入肺、胃经。生津润燥，清热化痰。治热病津伤烦渴，消渴，肺热咳嗽，咯血，吐血，噎膈，反胃，便秘。内服：生啖、捣汁或熬膏服。白梨含蔗糖、果糖等。沙梨含苹果酸、柠檬酸、果酸、葡萄糖、蔗糖等。

梨皮 出《滇南本草》。为蔷薇科植物白梨Pyrus bretschneideri Rehd.或沙梨P. Pyrifolia(Burm.f.)Nakai等的果皮。甘、涩，凉。清热生津，润肺。治暑热烦渴，咳嗽，久痢不止。煎服：鲜品15～30克。

犁头七 见《陆川本草》。即犁头尖，详该条。

犁头尖 出清·赵其光《本草求原》。又名犁头七、土半夏、小独脚莲。为天南星科植物犁头尖 Typhonium divaricatum (L.) Decne.的全草或块茎。分布台湾、福建、广东、广西。辛、苦、温，有毒。解毒消肿，散瘀，止血。治痈疖肿毒，乳痈，瘰疬，癣疮，蛇咬伤，跌打损伤，外伤出血。外用：磨汁涂或捣敷。本品有毒，不可内服。块茎含生物碱、甾醇。

犁头草 ❶见《江西民间草药》。又名瘩背草、铧头草、如意草、犁嘴草。为堇菜科

植物犁头草Viola Japonica Langsd. 的全草。分布浙江、江西、福建、湖北、湖南、四川等地。苦、微辛，寒。清热解毒，凉血消肿。①治痈疽，疔疮，目赤肿痛，咽喉炎，急性黄疸型肝炎。煎服：9～15克（鲜品30～60克）。②治毒蛇咬伤，瘰疬，鲜品捣敷并取汁内服。❷见《重庆草药》。即铧头草，详该条。

犁尖草 见《本草纲目拾遗》。为杠板归之别名，详该条。

犁嘴草 见《全国中草药汇编》。即犁头草，详该条。

犁壁藤 见《广东中草药》。为粪箕笃之别名，详该条。

偏头七 见《陕西中草药》。为鹿药之别名，详该条。

偏荷枫 见《江西草药》。为枫荷梨之别名，详该条。

假川连 见《广州植物志》。为伽蓝菜之别名，详该条。

假马鞭 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为玉龙鞭之别名，详该条。

假五味子 见《南宁市药物志》。为盐肤子之别名，详该条。

假牛柑 见《广西中草药》。为山扁豆之别名，详该条。

假芝麻 见《广西药用植物图志》。为山芝麻之别名，详该条。

假决明 见《南方主要有毒植物》。为望江南之别名，详该条。

假苏 出《神农本草经》。为荆芥之别名，详该条。

假苦瓜 见《广西药用植物目录》。为罗汉果之别名，详该条。

假油柑 见《临证指南医案》。为珍珠草之别名，详该条。

假油麻 见《岭南草药志》。为山芝麻之别名，详该条。

假荔枝 见《浙江天目山药用植物志》。为野木瓜之别名，详该条。

假桃花 见《南宁市药物志》。为地桃花之别名，详该条。

假烟叶 见《广州植物志》。即野烟叶，详该条。

假海芋 见《广州植物志》。为卜芥之别名，详该条。

假菠萝 见《生草药手册》。为橹罟子之别名，详该条。

假黄连 见《全国中草药汇编》。为胡黄连之别名，详该条。

假绿豆 见《中国药用植物志》。为决明子之别名，详该条。

假葡萄藤 见《广西中草药》。为爬山虎之别名，详该条。

假蒌 见《南宁市药物志》。为假蒟之别名，详该条。

假蒟 出《生草药性备要》。又名巴岩香、蛤蒌、假蒌。为胡椒科植物假蒟 Piper Sarmentosum Roxb.的全草。分布广西、广东及云南等地。苦、辛，温。温中散寒，祛风利湿，消肿止痛。①治胃腹寒痛，风寒咳嗽，泄泻，痢疾，肾炎水肿。煎服：9～15克。②治风湿痹痛，跌打损伤。煎服，或倍量浸酒内服外搽。茎、叶水浸液在体外对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌有抑制作用。

假蒟根 出《生草药性备要》。为胡椒科植物假蒟 Piper sarmentosum Roxb.的根。辛，微温。①治疟疾。内服30～60克，水酒各半，分两次煎服，于疟发前4小时、2小时各服一次。②治溃疡，煎水洗；龋齿痛，煎浓汁含漱。

假睐蓼 见《广州植物志》。为星宿菜之别名，详该条。

假蕹菜 见《广西本草选编》。为空心苋之别名，详该条。

徘徊花 见《群芳谱》。为玫瑰花之别名，详该条。

舶茴香 见《本草纲目》。为八角茴香之

处方名，详该条。

盘儿草 见《陕西中草药》。为苦荬菜之别名。详该条。

盘龙七 ❶见《云南中草药》。为小叶蛇总管之别名，详该条。❷见《贵州民间药物》。为鹿药之别名，详该条。

盘龙花 见《江西草药》。为盘龙参之别名，详该条。

盘龙参 出《植物名实图考》。又名一叶一枝花、猪辽参、盘龙花、双瑚草。为兰科植物绶草Spiranthes sinensis(Pers.)Ames的根或全草。全国大部份地区有分布。甘、苦，平。益阴清热，润肝止咳。①治病后虚弱，阴虚内热，神经衰弱，肺结核咯血，咽喉肿痛，糖尿病，小儿夏季热，遗精，淋浊，带下。煎服：6～15克。②治带状疱疹，研末撒；烫伤，蛇咬伤，捣烂敷。

盘龙草 见《湖南药物志》。为东风菜之别名，详该条。

鸽 出《嘉祐补注神农本草》。又名鹁鸽、飞奴。为鸠鸽科动物原鸽Columba livia Gmelin或家鸽C.livia domestica Gmelin等的肉或全体。前者分布我国北部；后者我国大部分地区均有饲养。咸，平。滋肾益气，祛风解毒。治虚羸，消渴，久疟，肠风下血，血虚经闭，恶疮，疥、癣。一般煮食或蒸服。鸽肉每100克含粗蛋白质22.14克，粗脂肪1克，灰分1克。

鸽卵 出《本草纲目》。为鸠鸽科动物原鸽Columba livia Gmelin或家鸽C.livia domestica Gmelin等的蛋。甘、咸，平。解毒，益气。治恶疮，疥、癣，痘疹难出。煮食。本品可食部100克含蛋白质9.5克，脂肪6.4克，碳水化物2克，灰分0.7克，钙108毫克，磷117毫克，铁3.9毫克。

盒儿藤 见清·赵楷《百草镜》。为合子草之别名，详该条。

猪牙皂 出《名医别录》。又名牙皂、眉皂、小皂荚。为豆科植物皂荚Gleditsia sinensis Lam.因衰老或受害后所结的小型果实。主产四川、贵州、云南、山东等地。功用与皂荚同。参阅皂荚条。本品含皂甙。有溶血作用。在体外有杀死丝虫幼虫的作用。

猪牙草 见《安徽中草药》。为萹蓄之别名，详该条。

猪毛菜 见《河北中药手册》。又名扎蓬棵、三叉明棵、刺蓬。为藜科植物猪毛菜Salsola collina Pall.的全草。分布东北、华北及陕西、甘肃，青海、四川、云南、西藏等地。甘、淡，凉。降血压。治高血压病头晕，失眠。内服：煎汤，15～30克，或经开水烫后当菜食。本品水浸液与醇浸液对麻醉动物静脉注射有明显、持久的降压作用，无快速耐受现象。本品对小鼠还有明显的镇静作用。

猪毛漆 见《中国药用植物志》。为猪鬃草之别名，详该条。

猪心 出《名医别录》。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson的心。甘、咸，平。入心经。治惊悸，怔忡，自汗，不眠，咳血，吐血。煮食。

猪仔笼 见《广东中草药》。为猪笼草之别名，详该条。

猪母刺 见《福建中草药》。为刺苋菜之别名，详该条。

猪辽参 见《天宝本草》。为盘龙参之别名，详该条。

猪耳朵穗子 见《青海药材》。为车前子之别名，详该条。

猪耳草 见《青海药材》。为车前草之别名，详该条。

猪耳菜 见《江苏药材志》。为鸭舌草之别名，详该条。

猪肝 出《备急千金要方·食治》。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson的肝。甘、苦，温。入肝经。养血，补肝，明目。治血虚萎黄，夜盲。内服：煮食，或入丸、散。

猪肚 出《本草经集注》。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson的胃。甘，温。补虚损，健脾胃。治虚劳羸弱，泄泻，下痢，消渴，小便频数，小儿疳积。内服：煮食，或入丸剂。

猪肠 出《食疗本草》。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson 的肠。甘，微寒。入大肠经。治便血，血痢，痔疮，脱肛。内服：煮食，或入丸剂。

猪苓 出《神农本草经》。又名枫苓、野猪粪。为多孔菌科植物猪苓Polyporus umbellatus (pers.)Fr. 的菌核。主产陕西、云南、河南、山西、河北等地。甘、淡，平。入脾、肾、膀胱经。利尿渗湿。治小便不利，水肿胀满，泄泻，淋浊，带下。煎服：6～15克。本品含麦角甾醇、生物素、水溶性多聚糖（猪苓聚糖）。健康人口服煎剂，可使尿量、氯化物轻度增加；动物身上也证明有利尿作用，但剂量较小时则无效。作用原理可能是抑制肾小管对电解质的重吸收。多聚糖对动物具抗癌作用。

猪肾 出《名医别录》。又名猪腰子。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson的肾。咸，平。补肾。治肾虚腰痛，水肿，久泻，遗精，盗汗，老人耳聋。煮食。

猪肤 出《汤液本草》。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson的皮肤。甘，凉。入肾经。清虚热。治少阴下利、咽痛、胸满、心烦。内服：煮食或熬膏。

猪油花 见《民间常用草药汇编》。为木槿花之别名，详该条。

猪蹄菜 见《广州植物志》。为荠苨菜之别名，详该条。

猪姆耳 见《福建民间草药》。为鱼腥草之别名，详该条。

猪姆草 见《植物名汇》。为野牡丹之别名，详该条。

猪殃殃 出《滇南本草》。又名拉拉藤、八仙草。为茜草科植物猪殃殃Galium aparine L. var. tenerum(Gren. et Godr.) Reichb. 的全草。分布华南、西南至东北各地。辛、苦，凉。清热解毒，利尿消肿。①治感冒，牙龈出血，急慢性阑尾炎，泌尿系感染，水肿，痢疾，痛经，崩漏，白带；亦治乳腺癌，子宫颈癌，慢性白血病。煎服：15～30克。②治跌打损伤，痈疖肿毒，鲜品捣敷。本品含车叶草甙(Asperuloside)。能降低兔血压。

猪胆 出《名医别录》。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson的胆汁。苦，寒。入肝、胆、肺、大肠经。清热，解毒。①治喉痹，肺热咳嗽，百日咳，哮喘，湿热黄疸，肠炎，痢疾，便秘。内服：入丸剂或冲服6～9克。②治目赤肿瘤，内服并点眼；痈肿疔疮、烧烫伤，涂敷。猪胆汁含猪胆酸、猪去氧胆酸、去氧胆酸和多种氨基酸。胆汁或胆盐口服可刺激胆汁分泌，增加肠蠕动；在体外对百日咳杆菌、痢疾杆菌等有抑制作用；在动物实验中能"抗炎"、抗过敏性休克，对小鼠能抗惊厥，还有某些止咳，祛痰作用。胆酸或鹅去氧胆酸对豚鼠有平喘作用。

猪胞 见《圣济总录》。即猪脬，详该条。

猪胰 出北齐·徐之才《雷公药对》。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson的胰脏。甘，平。益肺，健脾，润燥。①治慢性气管炎，咳嗽上气，咯血，脾虚久痢，乳汁不通。内服：煮食或煎汤。②酒泡捣烂涂治手足皲裂。

猪脂膏 出《本草经集注》。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson的脂肪。甘，凉。补虚，润燥，解毒。①治脏腑枯涩，大便不利，燥咳。内服：熬膏或入丸剂。②治恶疮，皮肤皲裂，熬膏涂。

猪笼草 见《陆川本草》。又名猪仔笼、猴子埕。为猪笼草科植物猪笼草Nepenthes mirabilis (Lour.)Druce的茎叶。分布广东、广西。甘，凉。清肺止咳，利尿，降压。

治风热咳嗽，肺燥咯血，百日咳，黄疸，痢疾，尿路结石，高血压病。煎服：15～30克。孕妇慎服。全草含黄酮甙、酚类、氨基酸、糖类、蒽醌甙。

猪脬 出《本草纲目》。又名猪胞。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson的膀胱。甘、咸，平。治遗尿。煮食。

猪腰子 见《医学入门》。即猪肾，详该条。

猪腰草 见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。为鸡骨草之别名，详该条。

猪膏莓 出《新修本草》。为豨莶之别名，详该条。

猪膈 出《本草纲目》。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson的甲状腺体。治气瘿。焙干研末，每晚温酒调服1～3克。

猪蹄 出《备急千金要方·食治》。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson的蹄。甘、咸，平。入胃经。填肾精，滋胃液，通乳，生肌。①治乳少。煨汤食。②治痈疽溃烂，煮清汁外洗。

猪蹄叉 见《广西中草药》。为九龙藤之别名，详该条。

猪蹄花 见《福建民间草药》。为金雀花之别名，详该条。

猪糠藤 见《广西本草选编》。为百眼藤之别名，详该条。

猪鬃草 见《贵州民间方药集》。又名猪毛漆、铁丝草、鱼鳞草。为铁线蕨科植物铁线蕨Adiantum capillus-veneris L.的全草。分布长江以南各地，北至陕西、山西、甘肃、河北。苦，凉。祛风清热，利尿消肿。①治感冒发热，咳嗽咯血，风湿痹痛，肝炎，肠炎，痢疾，尿路感染，肾炎浮肿，淋浊，带下。煎服：9～30克。②治乳腺炎，疔疮，烧烫伤。鲜品捣敷。本品含挥发油、鞣质及黄芪甙、异槲皮甙、芸香甙等多种黄酮甙。

猪髓 出《本草纲目》。为猪科动物猪Sus scrofa domestica Brisson的脊髓或骨髓。甘，寒。补阴益髓。①治骨蒸劳热，消渴，遗精。内服：煎汤或入丸剂。②捣敷疮疡。

猫儿刺 ❶见《本草纲目》。为枸骨叶之别名。❷见《草药手册》。为廊茵之别名。各详该条。

猫儿核 见《广西中药志》。为苦石莲之别名，详该条。

猫儿眼 见《中国药用植物图鉴》。即猫眼草，详该条。

猫儿眼睛草 见《履巉岩本草》。为泽漆之别名，详该条。

猫爪子花 见《东北药用植物志》。为白头翁之别名，详该条。

猫爪草 见《中药材手册》。为毛茛科植物小毛茛Ranunculus ternatus Thunb.的块根。产河南、江苏、浙江、广西等地。辛、苦，平，有小毒。散结消肿。①治瘰疬。煎服并熬膏外敷。②治肺结核，淋巴结炎，咽喉炎。煎服：12～24克。③治疟疾，鲜根捣烂，于疟发前2小时敷内关穴。

猫耳朵 见《湖南药物志》。为虎耳草之别名，详该条。

猫花 见《四川中药志》。又名蜂糖罐、密桶花、叶上花。为玄参科植物来江藤Brandisia hancei Hock. f.的全株。分布西南、华中、华南等地区。微苦，凉。祛风利湿，清热解毒。①治风湿筋骨痛，骨髓炎，骨膜炎，黄疸型肝炎，泻痢，痨伤咳嗽咯血。煎服：9～15克。②治疮疖，捣敷。

猫须公 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。即猫须草，详该条。

猫须草 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名猫须公、肾茶。为唇形科植物猫须草Clerodendranthus spicatus(Thunb.) C. Y. Wu. 的全草。分布广东、广西、云南等地。甘、微苦，凉。清热去湿，排石利水。治急慢性肾炎，膀胱炎，尿路结石，胆结石，风湿性关节炎。煎服：30～60克。

全草含挥发油、皂甙、醛酸、硫酸钙等。叶含内消旋肌醇。

猫胞 见《本经逢原》。为猫胞衣之简称，详该条。

猫胞衣 出《本草纲目》。又名猫胞。为猫科动物家猫 Felis ocreate domestica Brisson的胎盘。甘、酸，温。治噎膈反胃，胃脘痛。煮食或焙干研末吞。

猫眼草 ❶见《河北中药手册》又名打碗棵、猫儿眼。为大戟科植物猫眼草Euphorbia lunulata Bge. 的全草。分布东北及内蒙古、河北、山东等地。苦，凉，有毒。利尿消肿，祛痰镇咳，拔毒止痒。①治四肢浮肿，小便不利，慢性气管炎。煎服：3～6克。②治颈淋巴结结核，未溃破的与鸡蛋同煮吃蛋，已溃破的熬膏外敷；疥癣瘙痒，研粉香油调敷；痈肿，捣敷。本品含猫眼草素、山柰酚、槲皮素、槲皮甙、山柰酚-3-鼠李糖甙、秦皮乙素、挥发油、生物碱等。所含黄酮甙对小鼠有镇咳、祛痰作用。酒精浸剂和水浸剂在体外对结核杆菌、肺炎双球菌、甲链球菌、卡他球菌、流感杆菌均有抑制作用。❷见《南宁市药物志》。为铁苋之别名，详该条。

猫眼根 见《东北植物药图志》。为白狼毒之别名，详该条。

猫蓟 出《本草经集注》。为小蓟之别名，详该条。

猫腿姑 见《中药大辞典》。为绒背蓟之别名，详该条。

猕猴桃 出《开宝重定本草》。又名藤梨、阳桃、羊桃、毛梨。为猕猴桃科植物猕猴桃Actinidia chinensis Planch.的果实。分布长江以南各地。甘、酸，寒。入胃、肾经。解热，止渴，通淋。治烦热，消渴，食欲不振，消化不良，呕吐，黄疸，痢疾，尿路结石，痔疮。煎服：30～60克。本品含糖11%，维生素（其中维生素C300毫克%），猕猴桃碱（Actinidine）等。猕猴桃碱能引起猫的行为异常。

猕猴桃叶 出《开宝重定本草》。为猕猴桃科植物猕猴桃Actinidia chinensis Planch. 的叶。治乳痈，鲜叶一握和酒糟、红糖捣烂，加热外敷，早晚各换一次；治烫伤，鲜叶加石灰少许捣敷。本品含咖啡酸、对香豆酸、槲皮素、山柰素、无色飞燕草素（Leucodelphinidin）及无色矢车菊素（leucocyanidin）。

猕猴桃根 见《福建民间草药》。为猕猴桃科植物猕猴桃Actinidia chinensis planch.的根或根皮。苦、涩，寒。清热利湿，祛风活血消肿。①治肝炎，水肿，风湿关节痛，淋浊，带下，产后缺乳；亦用治胃癌，乳腺癌。煎服：30～60克。②治疮疖，瘰疬，跌打损伤。鲜根皮捣敷。

猕猴桃藤中汁 出《本草拾遗》。为猕猴桃科植物猕猴桃 Actinidia chinensis Planch. 茎中的液汁。甘，寒。治石淋，反胃，茎汁和姜汁服。茎含多量的精氨酸和相当量的赖氨酸、亮氨酸、丙氨酸及天门冬酰胺。

脚目草 见《全国中草药汇编》。为落地生根之别名，详该条。

脚板蒿 见《湖南民间药物资料》。为牡蒿之别名，详该条。

脚鱼壳 见《全国中草药汇编》。为鳖甲之别名，详该条。

脱力草 ❶见《江苏药材志》。又名野蚊子草、粘蝇草、白花石竹。为石竹科植物蝇子草Silene fortunei Vis.的带根全草。分布山东、山西、陕西、甘肃、河南和长江流域及其以南各地。辛、涩，凉。清热解毒，利湿消肿。①治痢疾，肠炎，尿路感染，白带，颈淋巴结结核。煎服：30～60克。②治急性咽喉炎、扁桃体炎。煎服并捣汁和蜜拭咽喉部。③治蝮蛇咬伤，鲜品捣烂绞汁服，渣敷伤口周围；扭、挫伤，关节肌肉酸痛，浸酒外搽。根、叶显生物碱，皂甙，鞣质等反应。❷见《滇南本草图谱》。为仙鹤草之别名，详

该条。❸见《江苏药材志》。为鬼针草之别名，详该条。

脱骨丹 见《生草药性备要》。为金樱根之别名，详该条。

象牙 出《药性论》。为象科动物亚洲象 Elephas maximus L. 或非洲象E. africanus Blumenbach 的牙齿。甘，寒。清热镇惊，解毒生肌。①治痫病，惊悸，骨蒸劳热。内服：研末，1.5～3克；磨汁或入丸、散。②治痈肿疮毒，痔漏。磨汁涂或研末调散。本品含磷酸钙57～60%，牙基质40～43%，还含较多的有机质和少量脂肪等。

象贝母 见清·赵楷《百草镜》。即浙贝母，详该条。

象皮 出《医学入门》。为象科动物亚洲象Elephas maximus L.或非洲象E. africanus Blumenbach的皮。前者分布印度、印度尼西亚、斯里兰卡、泰国、缅甸、马来西亚及我国云南南部；后者产非洲各地。甘、咸，温。止血，敛疮。治创伤出血，溃疡久不收口。熬膏或研末调敷。

象皮木 见《陆川本草》。为灯台树之别名，详该条。

象豆 出《南方草木状》。为榼藤子之别名，详该条。

〔丶〕

旋花根 出《神农本草经》。又名筋根、续筋根。为旋花科植物篱天剑 Calystegia sepium(L.) R. Br.的根。分布华东至西南各地。甘、微苦，温。补劳损，益精气，续筋骨，利小便。煎服：9～12克。

旋复花 出《神农本草经》。又名伏花、全福花、金沸花、黄熟花、金钱花。为菊科植物旋复花Inula japonica Thunb.的头状花序。主产河南、江苏、河北、浙江、安徽及东北。苦、辛、咸，微温。入肺、肝、胃经。消痰，降气，软坚，行水，通血脉。治咳喘痰多，心下痞硬，胁下胀满疼痛，噫气，呃逆，呕吐，水肿腹胀，闪腰岔气。煎服（包煎）：4.5～9克。旋复花含黄酮甙，蒲公英甾醇，旋复花甾醇(Inusterol)B.C，菊糖。所含黄酮在动物身上有较弱的平喘、利尿作用。

旋复花根 出《名医别录》。为菊科植物旋复花Inula japonica Thunb.的根。治咳喘。煎服：9～15克。捣敷刀伤，疔疮。

旋复梗 见《苏州本产药材》。为金沸草之别名，详该条。

商陆 出《神农本草经》。又名见肿消、章柳根、牛大黄、山萝卜。为商陆科植物商陆Phytolacca acinosa Roxb.或垂序商陆P. americana L.的根。主产河南、湖北、安徽、陕西。苦，寒，有毒。入脾、膀胱经，泻水，解毒。①治水肿胀满，小便不利，便秘，血小板减少性紫癜。煎服：6～15克。②治疮疡肿毒。鲜品捣敷。商陆中毒症状表现为恶心呕吐，腹泻，肌肉抽搐，言语不清，甚至心脏和呼吸中枢麻痹而死亡。内服时久煎能减低毒性。孕妇忌服。本品含三萜皂甙（甙元为商陆酸和商陆酸甲酯）、加利果酸（Jaligonic acid）、甾族化合物、生物碱和大量硝酸钾。商陆皂甙元有祛痰作用；生物碱部分有镇咳作用。商陆根提取物有利尿作用。醇提取物对大鼠有“抗炎”作用。煎剂及酊剂在体外对流感杆菌和肺炎双球菌有抑制作用。水浸剂对部分皮肤真菌亦有抑制作用。

章表根 见《广东中草药》。为倒吊蜡烛之别名，详该条。

章柳根 出《本草图经》。为商陆之别名，详该条。

望月砂 出《本经逢原》。又名兔屎。为兔科动物蒙古兔Lepus tolai Pallas或华南兔L.Sinensis Gray等野兔的粪便。全国大部分地区均产。辛，平。入肝、肺经。明目，杀虫。治目暗翳障，劳瘵，疳疾，痔瘘。煎服：3～9克。

望江青 出《李氏草秘》。为水苏之别名，详该条。

望江南 出《救荒本草》。又名野扁豆、羊角豆、假决明。为豆科植物望江南Cassia occidentalis L.的茎叶。分布福建、台湾、广东、广西、云南等地。苦，寒，有小毒。入肝、胃、大肠经。肃肺，清肝，和胃，消肿解毒。①治咳嗽，哮喘，脘腹痞痛，高血压头痛，目赤，习惯性便秘。煎服：6～9克。②治疔疮肿毒，虫蛇咬伤。鲜叶捣敷。叶含杜鹃花醇-7-鼠李糖甙和5，7，4′-三羟基-3′，6-二甲基黄酮-7-鼠李糖甙(Jaceidin-7-rhamnoside)。水提取物在体外对某些皮肤真菌有抑制作用。水煎剂对豚鼠回肠、大鼠子宫有兴奋作用。

望江南子 见《现代实用中药》。又名槐豆、山绿豆、狗屎豆、野鸡子豆。为豆科植物望江南Cassia occidentalis L.的种子。苦，微寒，有小毒。入肝、胃、大肠经。清肝明目，健胃润肠。治高血压头痛，目赤肿痛，消化不良，胃痛，下痢腹痛，习惯性便秘。内服：煎汤，6～9克；炒焦研末服，每次1.5～3克，日服二次。内服过量可引起腹泻，呕吐。本品含大黄素甲醚及其1-葡萄糖甙，1，8-二羟基-2-甲基蒽醌，1，4，5-三羟基-3-甲基-7-甲氧基蒽醌，N-甲基吗啉，半乳糖配甘露聚糖等。尚含挥发油和对人、畜有一定毒性的毒蛋白。

望果 出《广东新语》。即杧果，详该条。

麻口皮子药 见《湖南药物志》。又名总管皮、满山香、四皮麻。为芸香科植物柄果花椒Zanthoxylum simulans Hance var. podocarpum(Hemsl.) Huang的根皮或树皮。分布湖南、广西等地。辛，温。有小毒。祛风散寒，止痛，解毒。①治风湿筋骨疼痛，跌打损伤，牙痛，喉痛。内服：煎汤，3～9克；研末，每服1.5克。②治蛇咬伤。研末调敷。孕妇忌服。

麻子 出《神农本草经》。为火麻仁之别名，详该条。

麻子仁 出《伤寒论》。为火麻仁之别名，详该条。

麻布叶 见《广东中草药》。为破布叶之别名，详该条。

麻叶青 见《浙江民间常用草药》。为斑叶兰之别名，详该条。

麻芋果 见《贵州民间方药集》。为半夏之别名，详该条。

麻虫 见《圣济总录》。为苍耳蠹虫之别名，详该条。

麻里果 见《云南中草药》。为野冬青果之别名，详该条。

麻沥果 见《本草纲目拾遗》。为橡实之别名，详该条。

麻油 出《本草经集注》。又名香油、清油。为胡麻科植物脂麻Sesamum indicum DC.种子的脂肪油。甘，凉。润燥，通便，解毒，生肌。①治肠燥便秘，蛔虫痛，食积腹痛。内服：生用或熬熟，30～60毫升。②涂搽疮肿，溃疡，疥癣，皮肤皲裂。本品含棕榈酸、油酸、亚油酸、花生酸、廿二酸、廿四酸等的甘油酯、植物甾醇、芝麻素、芝麻林素(Sesamolin)、芝麻酚、维生素E等。大量黑芝麻油能抑制大鼠的肾上腺皮质功能。

麻参 见《云南中草药》。为金铁锁之别名，详该条。

麻柳叶 见清·刘士季《草木便方》。又名枫杨叶。为胡桃科植物枫杨 Pterocarya Stenoptera DC. 的叶。分布陕西、河南及长江流域以南地区。苦，温，有小毒。止咳化痰，消炎解毒，杀虫止痒。①治慢性气管炎。鲜叶250克，加水500毫升，煮15分钟，去渣，浓缩至200毫升，三次分服。②治关节痛，鲜叶捣敷；痈疽疖肿，煎浓汁，湿敷。③治稻田皮炎，天疱疮，皮肤痒疹，煎水洗；麻风溃疡，以提取物制成软膏外用；疥疮，黄癣，捣敷或煎水洗。枫杨的果实名麻柳果，又名一群鸭、雁鹅群。

炒黄煎服，散寒止咳；煎水洗治天疱疮。叶及果实，内服宜慎。叶有泻下作用。叶含水杨酸、内酯及酚类。100%煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌及伤寒杆菌有抑制作用。动物体内试验有抑制钩端螺旋体生长的作用。

麻柳皮 见《四川中药志》。即枫柳皮，详该条。

麻骨风 见《广西药用植物名录》。为买麻藤之别名，详该条。

麻黄 出《神农本草经》。为麻黄科植物草麻黄Ephedra sinica stapf、木贼麻黄E. equisetina Bge.或中麻黄E. intermedia Schrenk et Mey.的草质茎。主产山西、河北、甘肃、辽宁等地。辛、苦，温。入肺、膀胱经。发汗，平喘，利水。①治风寒感冒，发热恶寒无汗，百日咳，支气管炎，支气管哮喘，大叶性肺炎，麻疹初期透发不畅，风疹身痒。②治风水浮肿，小便不利。煎服：1.5～9克。高血压及心功能不全患者慎用。草麻黄茎含生物碱，主为左旋麻黄碱，其次为右旋伪麻黄碱及微量的左旋N-甲基麻黄碱。又含儿茶鞣质和挥发油等。木贼麻黄含生物碱，主为左旋麻黄碱和右旋伪麻黄碱。还含无色飞燕草素（Leucodelphinidin），鞣质，黄酮化合物等。中麻黄含生物碱，主为右旋麻黄碱。还含鞣质、黄酮甙等。麻黄碱有平喘、升高血压、收缩血管等作用，伪麻黄碱的作用与麻黄碱相似，二者对横纹肌均有兴奋作用。对大脑、脑干及脊髓均有兴奋作用，大量可致失眠，不安和震颤。其乳剂对发热兔有解热作用。麻黄碱反复应用，可产生快速耐受性。

麻黄根 出《本草经集注》。为麻黄科植物草麻黄Ephedra sinica Stapf、木贼麻黄E.equisetina Bge.或中麻黄E.intermedia Schrenk et Mey.的根。主产内蒙古、辽宁、山西、河北、陕西、甘肃等。甘、涩，平。入肺经。止汗。治自汗，盗汗。煎服：3～9克。本品含伪麻黄碱。麻黄根浸膏静脉注射，能使动物血压下降。伪麻黄碱用于止喘，副作用小于麻黄碱。

麻雀 出《滇南本草》。为文鸟科动物麻雀Passer montanus Saturatus Stejneger的肉。分布几遍全国。甘，温。入肾、膀胱经。壮阳益精，暖腰膝，缩小便。治老人阳衰，虚损羸瘦，阳痿，疝气，小便频数，崩漏，带下。内服：煨食；或煅存性研末为丸服。

麻秸 出《本草纲目》。又名脂麻秸、芝麻茇、油麻稿。为胡麻科植物脂麻Sesamum indicum DC.的茎。我国各地有栽培。①治小儿盐哮。内服：烧存性研末，以淡豆腐蘸食。②治周身浮肿，胀满气喘。内服：60克，加红糖30克，炖服。全草的水提取物对离体豚鼠子宫有兴奋作用。

麻糖果 见《四川中药志》。为扁担杆之别名，详该条。

庵罗果 出《开宝重定本草》。为杧果之别名，详该条。

庵摩勒 出《新修本草》。又名余甘子、油甘子、滇橄榄。为大戟科植物油柑phyllanthus emblica L.的果实。产四川、广东、广西、贵州、云南等地。苦、甘，寒。祛风，化痰，止咳，生津，利咽，解毒。①治感冒发热，咳嗽，哮喘，烦渴，咽喉肿痛，风火牙痛。煎服：6～12克。②治维生素C缺乏症。煎服，或用甘草、盐水浸渍后常吃。果实含大量鞣质和丰富的维生素C。果皮含没食子酸和油柑酸(phyllemblic acid)。种子含脂肪油26%。醇提取物在体外对葡萄球菌，伤寒、副伤寒、大肠及痢疾杆菌均有抑制作用；对兔有增加体重及血中总蛋白含量的作用。

廓茵 见《草药手册》。又名急解索、蛇不钻、猫儿刺、红火老鸦酸草。为蓼科植物刺蓼Polygonum Senticosum (Meissn.) Franch. et sav.的全草。分布辽宁、河北、山东、浙江、福建、台湾、江西等地。酸、

微辛，平。清热解毒，利湿止痒。治湿疹，漆过敏，煎水洗或捣汁涂；疔疮，痈疖，蛇咬伤，研末调敷或捣敷；耳道炎症，捣汁滴耳。本品含异槲皮甙。

鹿皮 出《本草纲目》。为鹿科动物梅花鹿 Cervus nippon Temminck 或马鹿 C. elaphus L.的皮。咸，温。补气，收涩。①治肾虚滑精，白带，血崩。煎服：9～12克。②治瘘疮。烧灰猪脂调涂。

鹿耳苓 见《生草药性备要》。为六棱菊之别名，详该条。

鹿肉 出《名医别录》。为鹿科动物梅花鹿 Cervus nippon Temminck 或马鹿 C. elaphus L.的肉。甘，温。补五脏，调血脉。治虚劳羸瘦，产后无乳。煮食。本品每100克含粗蛋白质19.77克，脂肪1.92克。

鹿血 出《备急千金要方·食治》。为鹿科动物梅花鹿 Cervus nippon Temminck 或马鹿C.elaphus L.血的干燥品。咸，温。补虚，和血。治虚损腰痛，贫血，心悸，失眠，肺痿吐血，鼻衄，崩中，带下。炒枯研末和酒服，3～6克。

鹿冲 见《四川中药材生产技术》。为鹿肾之别名，详该条。

鹿安茶 见《山西中草药》。为鹿衔草之别名，详该条。

鹿角 出《神农本草经》。为鹿科动物梅花鹿Cervus nippon Temminck等雄体已骨化的角。主产东北及河北、北京等地。咸，温。入肝、肾经。温补肝肾，活血消肿。①治肾阳不足，阳痿，滑精，腰膝酸痛，崩漏，乳汁不下。内服：煎汤，6～15克；研末服，3～5克。②治阴症疮疡，乳痈初起，瘀血肿痛。内服并醋磨涂。本品含骨胶原（内含氨基己糖）、磷酸钙、磷酸镁及氯化物等。

鹿角刺果 见《贵阳民间药草》。为绛梨木子之别名，详该条。

鹿角草 ❶见《泉州本草》。又名小鬼叉子、不怕日草、鬼疙草、刺针草。为菊科植物小花鬼针草Bidens parviflora Willd.的全草。分布东北、华北及河南、山东、江苏、四川等地。苦，凉。清热解毒，活血祛瘀。①治感冒发热，咽喉肿痛，肠炎，阑尾炎，痔疮，跌打损伤，痈疖。煎服：15～30克。②治蛇虫咬伤，捣敷。❷见《闽南民间草药》。为铺地蜈蚣之别名，详该条。

鹿角胶 出《神农本草经》。又名白胶、鹿胶。为鹿角煎制而成的胶质块。主产东北和山东、北京、上海等地。甘、咸，温。入肝、肾经。补肾阳，生精血，止血。①治肾气不足，虚劳羸瘦，腰膝无力，阳痿，滑精。②治虚寒性吐血，尿血，便血，崩漏，带下，亦治再生障碍性贫血。烊化冲服：3～6克。本品含骨胶原及其部分水解产物和钙等。

鹿角菜 出《食性本草》。又名赤菜、山花菜、胶菜。为海萝科植物海萝Gloiopeltis furcata (post.et Rupr.) J.Ag.的藻体。分布我国沿海。甘、咸，寒。清热，化痰，散结。治小儿骨蒸劳热，痰结痞积，瘿瘤，痔疮。煎服：4.5～9克。粘液内含甲基半乳糖甙、甲基木糖、D-半乳糖以及由半乳糖等组成的硫酸多糖。还含牛磺酸。

鹿角霜 出《本草品汇精要》。为鹿角经煎制鹿角胶后的残角。主产东北及山东、北京等地。咸，温。入肝、肾经。补虚，助阳，活血。治肾阳不足，腰膝酸痛，遗精，小便频数；脾胃虚寒，呕吐，食少，便溏；子宫虚冷，崩漏，带下，乳腺炎，关节肿胀。煎服：9～15克。本品含可溶胶约25%、磷酸钙约50%、碳酸钙约15%。

鹿尾 见《青海药材》。为鹿科动物梅花鹿 Cervus nippon Temminck 或马鹿 C. elaphus L.的尾。甘、咸，温。益肾精，暖腰膝。治肾虚头昏，耳鸣，腰脊疼痛，遗精，阳痿。煎服：6～9克，或入丸剂。

鹿肾 出《名医别录》。又名鹿鞭、鹿冲。为鹿科动物梅花鹿 Cervus nippon Temminck 或马鹿C. elaphus L. 的雄性外

生殖器。甘、咸，温。补肾，壮阳，益精。治劳损，腰膝酸痛，肾虚耳聋，耳鸣，阳痿，遗精，滑精，宫冷不孕，乳汁不足。内服：煎汤，6～9克；或入丸剂。

鹿茸 出《神农本草经》。为鹿科动物梅花鹿Cervus nippon Temminck雄体未骨化而带茸毛的幼角。主产东北及河北、北京等地。甘、咸，温。入肝、肾经。壮肾阳，补精血，强筋骨。①治精亏血虚，眩晕，耳鸣，耳聋，阳痿，滑精，腰膝酸冷，虚寒崩漏带下，不育。②治小儿发育不良，筋骨痿软，行迟，齿迟，囟门不合。研末吞服：1～2.5克。含鹿茸精(Pantocrine)、硫酸软骨素A、雌酮，还含多量骨胶原、蛋白质，灰分中含钙、磷、镁。鹿茸精系鹿茸的醇提取物，含有25种氨基酸，其中以脯氨酸、赖氨酸及丙氨酸为最多，为良好强壮剂，能提高机体工作能力，改善睡眠和食欲，减少疲劳。鹿茸能促进生长发育和溃疡与创口的愈合。家兔服用鹿茸粉末或注射鹿茸浸膏后，红细胞、血色素及网织红细胞数增加。中等剂量鹿茸使心跳加强，心率加快，输出量增加，大剂量时心脏抑制，血压下降。

鹿茸草 出《植物名实图考》。又名千年艾、千重塔、千层矮、毛茵陈、牙痛草、六月霜。为玄参科植物绵毛鹿茸草Monochasma savatieri Franch. ex Maxim。的全草。分布江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南等地。微苦、涩，平。清热解毒，凉血止血。①治感冒，肺炎，小儿高热惊风，风湿性关节炎，牙痛，牙龈炎，牙髓炎，肠炎，赤痢，咯血，便血，月经不调，崩漏。煎服：9～15克。②治乳痈，捣敷或捣汁服；外伤出血，捣敷。全草含甘露醇，并有较明显的酚类及还原糖反应。

鹿药 出《备急千金要方·食治》。又名九层楼、盘龙七、偏头七、狮子七、螃蟹七。为百合科植物鹿药Smilacina japonica A. Gray的根茎及根。分布东北、华北及陕西、甘肃、四川、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、台湾。甘、苦，温。补气，益肾，祛风，活血，解毒。①治劳伤，阳痿，偏、正头痛，风湿疼痛，月经不调。煎服：9～15克。②治跌打损伤，乳痈，痈疖肿毒。捣烂外敷。

鹿骨 出《名医别录》。为鹿科动物梅花鹿Cervus nippon Temminck或马鹿C. elaphus L.的骨骼。甘，微热。补虚羸，强筋骨。治虚劳，风湿痹痛。煎服：15～30克；或浸酒服。

鹿胎 出清·陈士铎《本草新编》。为鹿科动物梅花鹿Cervus nippon Temminck或马鹿C. elaphus L.的胎兽及胎盘。甘、咸，温。益肾壮阳，补虚生精。治虚损劳瘵，精血不足，崩漏，带下，不育。内服：入丸、散，6～15克；或煮汁熬膏用。

鹿铃草 见《东北药用植物志》。为铃兰之别名，详该条。

鹿胶 见《本经逢原》。即鹿角胶，详该条。

鹿梨根皮 出《本草图经》。为蔷薇科植物豆梨Pyrus Calleryana Decne.的根皮。分布华东及中南地区。酸、涩，寒。治疮疡，研末麻油调敷；癣疮，和醋捣烂，布包擦患处。果实名鹿梨，煨食治痢。

鹿衔草 出《滇南本草》。又名鹿安茶、破血丹。为鹿蹄草科植物鹿蹄草Pyrola rotundifolia L. subsp. chinensis H. Andres或卵叶鹿蹄草P. decorata H. Andres等的全草。主产浙江、安徽；云南、四川、陕西等地亦产。苦，平。入肝、肾经。祛风除湿，补肾，止血。①治风湿痹痛，肾虚腰痛，淋浊，肺结核咯血，衄血，月经过多，神经衰弱，肠炎，痢疾。煎服：9～15克。②治过敏性皮炎，煎水洗；痈疮肿毒，虫蛇咬伤，外伤出血，捣敷或研末撒。孕妇忌服。鹿衔草叶含有效抗菌成分鹿蹄草素，即甲基氢醌。还含熊果酚甙、高熊果酚甙、异高熊

果酚甙、梅笠草灵(chimaphillin)、鞣质等。浸剂对衰弱蛙心可增强搏动，心率不整时可促使恢复正常；对狗、兔等可使血管扩张，血压下降，叶的作用较根、茎强。煎剂在体外对葡萄球菌，痢疾、伤寒、绿脓杆菌等均有抑制作用。

鹿葱 见《群芳谱》。为大一枝箭之别名，详该条。

鹿筋 出《新修本草》。为鹿科动物梅花鹿 Cervus nippon Temminck 或马鹿C. elaphus L.四肢骨上的韧带。淡、微咸，温。入肝、肾经。益肾阳，壮筋骨。治劳损，风湿关节痛，转筋。内服：煎汤或煮食，15～30克。

鹿酱 出《药性论》。为败酱草之别名，详该条。

鹿鞭 见清·汪双池《医林纂要·药性》。为鹿肾之别名，详该条。

鹿髓 出《名医别录》。为鹿科动物梅花鹿 Cervus nippon Temminck 或马鹿C. elaphus L.的脊髓或骨髓。甘，温。补阳益阴，生精润燥。治虚劳羸弱，肺痿咳嗽，阳痿，血枯。熬膏或入丸剂服。

痒树棵 见《云南中草药选》。为漆大姑之别名，详该条。

痒痒草 见《中国经济植物志》。为甜地丁之别名，详该条。

痕芋头 见《南宁市药物志》。为海芋之别名，详该条。

惊天雷 见《江西民间草药验方》。为馥水草之别名，详该条。

惊风伞 见《贵州民间方药集》。为追风伞之别名，详该条。

清风藤 出《本草图经》。即青风藤，详该条。

清水跌打 见《云南中草药》。为滑叶跌打之别名，详该条。

清明花 见《江西民间草药验方》。为杜鹃花之别名，详该条。

清明草 见《分类草药性》。为天青地白之别名，详该条。

清明菜 见《南京民间药草》。为鼠曲草之别名，详该条。

清油 出《岭南卫生方》。为麻油之别名，详该条。

清骨风 见《南京民间药草》。即寻骨风，详该条。

清香桂 见《云南中草药》。为胃友之别名，详该条。

混沌衣 出《本草纲目》。为紫河车之别名，详该条。

淮木通 ❶见《中药志》。即川木通。❷见《中药鉴别手册》。即淮通。各详该条。

淮通 见《四川常用中草药》。又名淮木通。为马兜铃科植物木香马兜铃 Aristolochia moupinensis Franch.的茎藤或根。分布四川、云南、贵州、湖北。苦，寒。入心、肾、膀胱经。清热利湿，排脓止痛。治湿热壅滞身肿，淋病，尿血，小便不利，风湿痹痛，湿疹，荨麻疹，痈肿恶疮。煎服：6～9克。孕妇忌服。茎藤含β-谷甾醇、马兜铃酸、木兰花碱和酸性成分等。

淫羊藿 出《神农本草经》。又名仙灵脾、放杖草、三枝九叶草、牛角花。为小檗科植物箭叶淫羊藿Epimedium Sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim. 或淫羊藿E. Brevicornum Maxim.等的全草。主产陕西、山西、湖北、四川、广西等地。辛、甘，温。入肝、肾经。温肾助阳。祛风除湿。治阳痿，早泄，腰膝痠软，肢冷畏寒，神疲健忘，慢性支气管炎，风寒湿痹，四肢拘挛麻木。亦治更年期高血压病，小儿麻痹症。煎服：3～9克。箭叶淫羊藿全草含淫羊藿素、淫羊藿甙、甾醇、黄酮甙、生物碱等。淫羊藿提取物给雄性小鼠注射，能增加前列腺、贮精囊及提肛肌的重量，证明具有雄性激素样作用；煎剂在体外对脊髓灰质炎病毒和某些肠道病毒有抑制作用。对动物有降压、

降血糖作用。

淫羊藿根 出《本草纲目》。为小檗科植物箭叶淫羊藿 Epimedium sagittatum (sieb.et Zucc.)Maxim.或淫羊藿E.brevicornum Maxim. 等的根。治虚淋，白浊，白带，月经不调，哮喘，雀盲，痈疽成脓不溃。煎服：9～15克。箭叶淫羊藿根含木兰花碱。

淡竹叶 出《本草纲目》。为禾本科植物淡竹叶 Lophatherum gracile Brongn.的茎叶。主产浙江、江苏、湖南、湖北、广东等地。甘、淡，寒。入心、肾经。清热，除烦，利尿。治热病心烦口渴，小便赤涩，淋浊，尿血，口腔炎，咽喉炎，牙龈肿痛，齿衄，鼻衄。煎服：9～15克。本品含三萜化合物：芦竹素、印白茅素、蒲公英赛醇和无羁萜。还含酚性成分、氨基酸、有机酸、糖类。对人工发热的动物有退热作用，并能增加尿中氯化物的排出；尚有增高血糖的作用。

淡竹沥 出《名医别录》。即竹沥，详该条。

淡竹茹 见《食疗本草》。即竹茹，详该条。

淡豆豉 出《本草汇言》。又名豆豉、香豉。为豆科植物大豆 Glycine max(L.) Merr. 的种子经蒸罨加工而成。苦，寒。入肺、胃经。解表，除烦，宣郁，调中。治时疾热病，寒热头痛，虚烦不眠，胃脘胀闷，食欲不振，断奶乳胀。煎服：6～12克。本品含蛋白质，脂肪，糖类，维生素 B_1、B_2，菸酸，以及钙、铁、磷盐等。

淡秋石 见《本经逢原》。为秋石药材之一种，详该条。

淡菜 出《嘉祐补注神农本草》。又名壳菜。为贻贝科动物厚壳贻贝Mytilus crassitesta Lischke及其它贻贝类的肉。分布我国沿海地区。咸，温。入肝、肾经。补肝肾，益精血，消瘿瘤。治虚劳羸瘦，眩晕，盗汗，阳痿，腰疼，吐血，崩漏，带下，瘿瘤，疝瘕。煮食，15～30克。干品每100克含蛋白质59.1克，脂肪7.6克，碳水化物13克，钙277毫克，磷864毫克，铁24.5毫克，维生素 B_2 0.46毫克，尼克酸3.1毫克。

羚羊角 出《神农本草经》。为牛科动物赛加羚羊 Saiga tatarica L. 的角。主产新疆。咸，寒。入肝、心经。平肝息风，清热镇惊，解毒。治热病神昏，痉厥，谵语，狂躁，头痛，眩晕，惊痫，手足搐搦，目赤翳膜。内服：研末服，0.3～0.9克；磨汁服，0.9～1.5克；或镑片另煎冲服，0.9～3克。含磷酸钙及多量含硫量极少的角蛋白。羚羊角外皮浸出液能抑制中枢神经系统，有镇静、镇痛、解热和增强动物耐缺氧的能力，对小鼠并有轻度抗惊厥作用。

粘不扎 见《东北药用植物志》。为豨莶之别名，详该条。

粘手风 见《全国中草药汇编》。为尖尾风之别名，详该条。

粘身草 ❶见《江西草药》。为青酒缸之别名。❷见《福建中草药》。为金盏银盘之别名。❸见《闽东本草》。为鬼针草之别名。各详该条。

粘鱼须 出《救荒本草》。又名铁丝灵仙、龙须菜。为百合科植物华东菝葜Smilax sieboldii Miq. 的根茎及根。分布辽宁、山东、江苏、安徽、浙江、福建、台湾。甘，温。祛风，活血，消肿。①治风湿筋骨疼痛，关节不利。煎服：4.5～9克。②捣敷或研末调敷治疔疮肿毒。根茎含皂甙、鞣质、树脂及淀粉。

粘粘葵 见《福建民间草药》。为苍耳之别名，详该条。

粘椰根 见《文山中草药》。为雾水葛之别名，详该条。

粘蝇草 见《全国中草药汇编》。为脱力草之别名，详该条。

粘糊菜 见《救荒本草》。为豨莶之别名，详该条。

断血流 见《安徽中草药》。又名止血丹。为唇形科植物荫风轮Clinopodium polycephalum (Vant.) C.y.wu et Hsuan的全草。分布华东、中南、西南地区及陕西、甘肃、山西、河北等地。苦、涩、微辛，凉。止血，祛风，清热，解毒。①治咳血，衄血，吐血，尿血、便血、崩漏、子宫肌瘤出血，原发性血小板减少性紫癜。②治风热感冒，急性眼结膜炎，胆囊炎，黄疸型肝炎，痢疾。煎服：9～15克。③治疮疖肿毒，捣敷；外伤出血，捣敷或研末撒敷，加压包扎。干草含挥发油，内有左旋柠檬烯等。地上部分预试含黄酮甙、皂甙、鞣质、酚性物质、香豆素等。醇提取物可缩短兔和小鼠的血凝时间。外用有止血作用。温浸液在体外对金黄色葡萄球菌，绿脓及痢疾杆菌均有抑制作用。

断肠草 ❶见《辽宁经济植物志》。为白屈菜之别名。❷见《广西药用植物名录》。为羊角扭之别名。❸见《梦溪笔谈》。为钩吻之别名。❹见《贵州草药》。为紫堇之别名。❺见《湖南药物志》。为雷公藤之别名，各详该条。

断肠草根 见《广西中药志》。为大茶药根之别名，详该条。

断板龟 见《中药大辞典》。为夹蛇龟之别名，详该条。

剪刀草 ❶见《饮片新参》。又名土薄荷、玉如意、节节花。为唇形科植物光风轮Clinopodium confine(Hance) O. ktze.或瘦风轮C. gracile (Benth.)Matsum.等的全草。主产江苏、浙江、福建、江西等地。苦、辛，凉。祛风清热，散瘀消肿。①治感冒头痛，咽喉肿痛，肠炎，细菌性痢疾，鼻衄，血崩。煎服：15～30克。②治痈疮肿毒，跌打损伤，煎服并捣敷；荨麻疹，过敏性皮炎，煎水洗。❷见《中药志》。为射干之别名，详该条。

剪绒花 见清·汪双池《医林纂要·药性》。为瞿麦之别名，详该条。

寄色草 见《广州植物志》。为伤寒草之别名，详该条。

密陀僧 出《本草纲目》。又名金陀僧、炉底、金炉底。为粗制的氧化铅块状物。产广东、湖南、湖北、福建等地。咸、辛，平，有毒。入肝、脾经。燥湿，杀虫，敛疮，坠痰，镇惊。①治疥疮，湿疹，汗斑，溃疡久不收口，腋臭，研细末撒或油调涂。②治惊痫，研末吞服：1.5～3克。一般多入丸、散用。本品外用为主，内服宜慎。不宜与狼毒同用。密陀僧膏和水浸剂在体外对多种皮肤真菌有抑制作用。外用可减轻炎症。

密蒙花 出《开宝重定本草》。又名蒙花、水锦花、老蒙花、黄饭花、羊耳朵朵尖。为马钱科植物密蒙花 Buddleia officinalis Maxim.的花蕾及花序。主产湖北、四川、陕西、河南等地。甘，凉。入肝经。清肝明目，退翳。治目赤肿痛，多眵，多泪，目翳，羞明，风弦烂眼。煎服：3～9克。花穗含刺槐素、刺槐甙等。刺槐素有维生素P样作用，能减轻小鼠甲醛性炎症及松弛大鼠离体肠平滑肌。

婆婆丁 见《滇南本草》。为蒲公英之别名，详该条。

婆婆针 见《江苏南部种子植物手册》。为鬼针草之别名，详该条。

婆婆针线包 见《本草纲目》。为萝藦之别名，详该条。

婆婆指甲菜 出《救荒本草》。又名瓜子草、高脚鼠耳草、卷耳。为石竹科植物粘毛卷耳Cerastium Viscosum L.的全草。分布江苏、浙江、安徽、江西、湖南、河南等地。甘，凉。①治感冒发热，高血压。煎服：9～15克。②治乳痈初起，捣烂加酒糟作饼，烘热敷于腕部脉门上，左乳敷右腕，右乳敷左腕；疔疽，加桐油捣敷。水煎剂在急性及慢性动物试验中有降低血压作用。

〔7〕

弹刀子菜 见《中草药土方土法·战备

专辑》。为玄参科植物弹刀子菜 Mazus stachydifolius (Turcz.)Maxim.的全草。我国大部分地区有分布。微辛，凉。解蛇毒。治毒蛇咬伤。捣烂敷伤口周围。

蛋黄花 见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。为鸡蛋花之别名，详该条。

堕胎花 见《植物名实图考》。为凌霄花之别名，详该条。

续骨木 见《本草纲目》。为接骨木之别名，详该条。

续断 出《神农本草经》。又名川断、山萝卜。为川续断科植物川续断Dipsacus asper wall.的根。主产湖北、四川、湖南、贵州等地。苦、辛、甘，微温。入肝、肾经。补肝肾，续筋骨，调血脉。①治肝肾不足，腰膝酸痛，足软乏力，遗精，带下。②治风湿骨节疼痛，跌打损伤，骨折。③治崩漏，妊娠胎动漏血，痔漏，创伤出血。煎服：6～12克。本品含生物碱、挥发油。对小鼠和鸡有抗维生素E缺乏症的作用。体外试验，对肺炎球菌有抑制作用。

续筋根 出《本草图经》。为旋花根之别名，详该条。

绵大戟 出《滇南本草》。为狼毒之别名，详该条。

绵枣儿 出《救荒本草》。又名天蒜、鲜白头。为百合科植物绵枣儿Scilla Sinensis (Lour.) Merr.的鳞茎或全草。全国大部分地区有分布。甘，寒。活血解毒，消肿止痛。①治肠痈，腰腿痛，跌打损伤。煎服：3～9克。②治乳痈，捣敷并煎服。鳞茎含海葱原甙甲(Proscillaridin A)及一种有毒糖甙。还含果糖、蔗糖、淀粉以及类似淀粉精的多糖和类似菊糖的多糖。根茎醇提取物的水溶液及提取物有洋地黄样强心作用。根提取液对犬有明显利尿作用，对离体小鼠子宫有显著的兴奋作用。

绵茵陈 见《本经逢原》。为茵陈蒿之处方名，详该条。

绵黄耆 出《本草图经》。为黄芪之处方名，详该条。

绿升麻 见《医学广笔记》。即升麻，详该条。

绿竹 出《诗经》。为菉草之别名，详该条。

绿豆 出《开宝重定本草》。又名青小豆。为豆科植物绿豆Phaseolus radiatus L.的种子。我国南北各地均有栽培。甘，凉。入心、胃经。清热，消暑，利尿，解毒。①治暑热烦渴，消渴，水肿，热痢。煎服：30～60克；大剂量作清凉饮料，可预防中暑。②解乌头、附子、砒石等药毒、酒毒及铅中毒、1059农药中毒。用大剂量配甘草煎服，或研粉末调服。③治烧烫伤，研细粉，白酒调如糊状，加冰片少许，涂敷患处；痈疽，肿毒，丹毒，研粉，蜜调敷。本品含蛋白质，脂肪，糖类，胡萝卜素，维生素B_1、B_2，尼克酸和磷脂等。

绿豆叶 出《本草纲目》。为豆科植物绿豆Phaseolus radiatus L.的叶。苦，寒。①治疔毒，斑疹，捣汁服，30～60克；霍乱吐泻，捣汁和醋服。②治风癣，干疥。捣烂和醋少许，纱布包擦患处。

绿豆皮 出《本草纲目》。又名绿豆衣、绿豆壳。为豆科植物绿豆Phaseolus radiatus L. 的种皮。甘，寒。清热解毒，利尿，退翳。治斑疹，麻疹合并肠炎，水肿腹胀，目翳。煎服：4.5～12克。本品含牡荆素、β-谷甾醇。体外试验，对葡萄球菌有抑制作用。

绿豆衣 见《山西中药志》。即绿豆皮，详该条。

绿豆壳 见《本经逢原》。即绿豆皮，详该条。

绿矾 出《日华子诸家本草》。又名青矾、绛矾、皂矾。为水绿矾的矿石或化学合成品。产山东、湖南、甘肃、新疆、陕西、安徽、浙江、河南等地。酸，寒。入肝、脾经。

燥湿，杀虫，补血。①治黄肿胀满，疟疾，痢疾，疳积，贫血。煅研细末，饭后吞服：0.3～0.9克；或入丸剂。②治湿疹，疥癣，研末调搽或煎汤熏洗；烂弦风眼，煅、研细，沸水溶化澄清点洗。本品主含含水硫酸亚铁，杂有铜、钴、镁、锌等。硫酸亚铁有治疗缺铁性贫血的作用。

绿泽兰　见《云南中草药》。为类梧桐之别名，详该条。

绿菜　见《中国药用海洋生物》。为石莼之别名，详该条。

绿梅花　见《中国药学大辞典》。为绿萼梅花之处方名，详该条。

绿萼梅花　出《本草纲目拾遗》。又名白梅花、绿梅花。为蔷薇科植物绿萼梅 Prunus mume Sieb. et zucc var. viridicalyx Makino的花蕾。主产江苏、浙江。酸、涩，平。入肝、胃经。疏肝解郁，和胃化痰。①治肝气郁结，脘痛，胸闷，食欲不振，梅核气。煎服：3～6克。②治瘰疬。鸡蛋开一孔，入本品7朵，封口，蒸熟，去花食蛋，每日1枚，连服七日。本品含挥发油，主要成分为苯甲醛、异丁香油酚、苯甲酸。

绿葡萄　见《昆明民间常用草药》。为金刚散之别名，详该条。

绿蓐草　出《新修本草》。为荩草之别名，详该条。

十二画

〔一〕

琥珀　出《雷公炮炙论》。又名血珀、光珀。为古代松树等树脂的化石。产云南、河南、广西、福建、贵州、辽宁等地。甘，平。入心、肝、小肠经。镇惊安神，利水通淋，活血化瘀。①治惊风，癫痫，惊悸，失眠，小便不利，血淋茎痛，尿血，闭经，癥瘕，产后瘀滞腹痛。研粉冲服：1～2克。②治创伤出血，研末撒。本品主含二松香醇酸（Diabietinolic acid）的聚酯化合物。还含镁、钙、铁等无机盐。

斑叶兰　见《贵州民间药物》。又名小叶青、银线盆、麻叶青、蕲蛇药、野洋参。为兰科植物大斑叶兰Goodyera schlechtendaliana Reichb. f. 或小斑叶兰G. repens (L.)R.Br.的全草。前者分布江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、四川、贵州、广东、福建等地；后者分布东北、华北、西北地区及四川、云南、西藏等地。苦，寒。清肺止咳，解毒消肿。①治肺结核咳嗽，支气管炎，瘰疬，跌打损伤。煎服：3～9克。②捣敷治毒蛇咬伤，痈肿疮疡。斑叶兰根：煎服，补虚，治神经衰弱，阳痿。

斑杖　出《日华子诸家本草》。为虎杖之别名，详该条。

斑鸠窝　见《四川常用中草药》。为地羊鹊之别名，详该条。

斑根　见《植物名实图考》。为虎杖之别名，详该条。

斑猫　出《神农本草经》。即斑蝥，详该条。

斑蝥　出《神农本草经》。又名斑猫、花斑毛、花壳虫。为芫青科昆虫南方大斑蝥 Mylabris phalerata Pallas或黄黑小斑蝥 M.cichorii L.的干燥全体。主产河南、广西、安徽、四川、贵州、湖南、云南、江苏等地。辛，寒，有大毒。入大肠、小肠、肝、肾经。攻毒，散瘀，发泡。①治牛皮癣，神经性皮炎，酒浸液涂患处；恶疮，研末调敷；口眼歪斜，研末调敷病侧太阳穴上；喉蛾，取末少许，放膏药中心，贴患侧颈外压痛处；

急性风湿痛，按针灸取穴原则选定穴位，然后取少许斑蝥粉末，置胶布中心，贴于选定穴位上，一般24小时揭去。穴位的皮肤上可出现微黄色透明小水泡，4～7日内结痂脱落。本品不宜大面积敷贴。②治瘰疬，狂犬咬伤，肝癌。内服：米炒后煎汤，0.05～0.1克；或入丸、散用。心脏、肾脏功能不全者及孕妇忌服。本品含斑蝥素，脂肪，树脂，蚁酸等。斑蝥素有抗癌作用，用于治疗原发性肝癌及其他恶性肿瘤。对皮肤、粘膜有发赤、发泡等刺激作用。水浸剂在体外对常见致病性皮肤真菌有抑制作用。

琴叶榕 见《江西民间草药验方》。又名牛奶柴、牛奶子树、骨风木、铁牛入石。为桑科植物琴叶榕Ficus pandurata Hance的根或叶。分布广东、广西、云南、江西、福建、浙江。辛、微涩，平。祛风利湿，活血调经。①治风湿痹痛，黄疸，闭经，月经不调。煎服：9～15克。②治乳腺炎。煎服并捣敷。

博落回 出《本草拾遗》。又名号筒草、号筒杆、泡通珠。为罂粟科植物博落回Macleaya cordata(Willd.)R. Br.的根或全草。分布长江流域中、下游各地。辛、苦，温，有毒。消肿解毒，杀虫止痒。治疔疮痈肿，跌打损伤，风湿性关节痛，和酒糟少许捣烂敷；下肢溃疡，烫伤，研末干撒或调敷；顽癣，蜈蚣、黄蜂螫伤，取汁涂；滴虫性阴道炎，煎水冲洗，或熬膏（每毫升相当于原药25克）涂擦阴道壁，每日一、二次。不可内服。本品含原阿片碱、α-别隐品碱、白屈菜红碱、血根碱、黄连碱、小檗碱及微量刻叶紫堇明碱（Corysamine）等。根还含白屈菜黄碱、白屈菜玉红碱（Chelirubin）、氧化血根碱及博落回根碱（Bocconine）。果实含原阿片碱、α-别隐品碱、博落回碱Ⅰ、Ⅱ。生物碱在体外对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、大肠及福氏痢疾等杆菌有抑制作用，并能抗线虫。全草煎剂有抗钩端螺旋体作用。全碱有局部麻醉作用。大剂量口服或注射能引起急性心源性脑缺血综合症、中毒乃至死亡。

棒子木 见《全国中草药汇编》。即棒棒木，详该条。

棒子毛 见《河北药材》。为玉米须之别名，详该条。

棒子头 见《全国中草药汇编》。为翼首草之别名，详该条。

棒樟木 ❶见《新医药研究》(4～5)：42，1971。又名棒子木。为榆科植物小叶朴Celtis bungeana Blume的茎枝。分布辽宁、河北、河南、山东、陕西、甘肃、云南及长江流域各地。辛、微苦，凉。祛痰，止咳，平喘。治支气管哮喘，慢性气管炎。煎服：30～60克。本品含生物碱、甾醇、香豆素、挥发油、脂肪油、中性树脂等。水提取物及挥发油部分对小鼠有镇咳、祛痰作用。❷见《北方常用中草药手册》。为暴马子之别名，详该条。

棒槌草 见《中药志》。为夏枯草之别名，详该条。

棒棰 见《辽宁主要药材》。为人参之别名，详该条。

楮叶 出《名医别录》。又名构叶。为桑科植物构树Broussonetia papyrifera(L.) Vent.的叶。甘，凉。凉血，解毒，利水。①治吐血，衄血，血崩，肠炎，痢疾，水肿，疝气。内服：煎汤，3～6克；或鲜叶捣汁服。②捣敷外伤出血，痔瘘，癣疮。本品预试含黄酮甙、酚类、有机酸、鞣质。

楮李 见《本草纲目》。为鼠李之别名，详该条。

楮实 出《名医别录》。又名楮实子、楮桃、穀树子。为桑科植物构树Broussonetia papyrifera(L.)Vent.的果实。分布黄河、长江和珠江流域。甘，寒。入肝、脾、肾经。补肾，强筋骨，明目，利尿。治肾虚腰膝酸痛，遗精，阳痿，头晕目花，水肿。煎服：

9～15克。本品含皂甙、维生素B及油脂。

楮实子 出《素问病机保命集》。即楮实，详该条。

楮茎 出《名医别录》。为桑科植物构树Broussonetia papyrifera(L.)Vent.的茎枝。捣汁服，治小便不利；煎水洗瘾疹瘙痒；烧存性泡汤洗目赤肿痛。

楮树白皮 出《本草纲目》。为桑科植物构树Broussonetia papyrifera(L.)Vent.树皮的韧皮部。甘，平。行水，止血。治水肿，肠风血痢，血崩。煎服：6～9克。煎水洗瘾疹，痔疮。构树茎皮部的乳汁名楮树汁，又名构胶。内服治水肿。取汁涂搽体癣，疥疮，湿疹，神经性皮炎，蛇、虫咬伤。

楮树根 出《分类草药性》。为桑科植物构树Broussonetia papyrifera(L.)Vent.的嫩根或根皮。微涩，平。清热，凉血，利湿，祛瘀。治慢性气管炎，肺脓疡，吐血，血崩，痢疾，水肿，筋骨酸痛，跌打损伤。煎服：15～30克。

楮桃 见《本草纲目》。为楮实之别名，详该条。

棋盘花 见《分类草药性》。为蜀葵花之别名，详该条。

椒叶 见《日华子诸家本草》。即花椒叶，详该条。

椒目 出《本草经集注》。又名川椒目。为芸香科植物青椒Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc.或花椒Z. bungeanum Maxim.的种子。主产辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、河南、四川等地。苦、辛，寒，有毒。入脾、膀胱经。去水，平喘。治水肿胀满，痰饮喘息。内服：煎汤，1.5～4.5克；或入丸、散。本品含挥发油。

棉子 见《安徽中草药》。即棉花子，详该条。

棉花 出《本草纲目》。为锦葵科植物草棉Gossypium herbaceum L.或陆地棉G. hirsutum L.等种子上的棉毛。甘，温。止血。①治吐血，便血，血崩。内服：煅存性入散剂。②治创伤，冻疮。烧存性敷。本品含纤维素91%，蜡和脂肪0.4%，细胞内容物0.6%。

棉花子 出清·赵楷《百草镜》。又名棉花核、棉子。为锦葵科植物草棉Gossypium herbaceum L.或陆地棉G. hirsutum L.等的种子。辛，热，有毒。补虚，温胃，止血，催乳。①治腰膝无力，遗尿，胃寒作痛，便血，崩漏，白带，痔漏，脱肛，乳汁缺少。煎服：6～12克。②治睾丸偏坠，手足皲裂。煎水熏洗。棉子油：局部涂擦治恶疮、疥、癣。陆地棉种子含棉酚、6,6′-二甲氧基棉酚、6-甲氧基棉酚、棉紫色素(Gossypurpurine)、类脂物质、脂肪油、棉子糖，并含极微量的黄曲霉毒素B_1(Aflatoxin B_1)。棉酚有男性避孕作用，参见“棉花根”条。

棉花团 见《安徽中草药》。为鼠曲草之别名，详该条。

棉花壳 出清·赵楷《百草镜》。又名棉桃壳。为锦葵科植物草棉Gossypium herbaceum L.或陆地棉G.hirsutum L.等的果皮。温。理气，止吐，泄痰瘀。治膈食，膈气，反胃呕吐。内服：9～15克，煎汤代茶饮。陆地棉棉花壳含卅烷、卅醇、β-谷甾醇、亚油酸及棕榈油酸的脂类等。小鼠口服棉桃壳提取物有某些镇咳及祛痰作用。

棉花条 见《江苏省植物药材志》。为芫花之别名，详该条。

棉花核 出《兰台轨范》。即棉花子，详该条。

棉花根 见《上海常用中草药》。为锦葵科植物陆地棉Gossypium hirsutum L.或草棉G. herbaceum L.等的根或根皮。甘，温。入脾、肺经。补虚，止咳，平喘。治体虚咳喘，肢体浮肿，乳糜尿，月经不调，子宫脱垂，胃下垂。煎服：根，30～60克；根皮，9～30克。蜜炙用，不宜长期大量服用，孕妇慎服。陆地棉和草棉的根均含棉酚、甜

菜碱、香荚兰乙酮、水杨酸等。陆地棉根还含半棉酚、甲氧基半棉酚、6-甲氧基棉酚和6、6-二甲氧基棉酚，以及维生素C及K等。草棉根还含皂甙、黄酮类、甾醇等。棉酚有男性避孕作用，成年男子服棉酚后，精液中精子逐渐消失，但对性生活无影响。棉酚或天冬酰胺有止咳作用；树脂及天冬酰胺有某些平喘作用。煎剂对离体豚鼠子宫有兴奋作用。棉酚有抗病毒（A型流感病毒PR_8）、抗肿瘤（小鼠吉田肉瘤、艾氏腹水癌、肉瘤-180、大鼠瓦克氏癌等）作用。棉酚或棉花根煎剂长期喂动物，能引起中毒，心肌有浊肿、变性，内脏出血，导致死亡。人长期服用，少数人可引起低血钾。

棉桃壳 见《安徽中草药》。即棉花壳，详该条。

棉筋条 见《草药手册》。为扁担杆之别名，详该条。

棕毛 见《普济方》。为棕榈皮之别名，详该条。

棕皮 见清·赵其光《本草求原》。为棕榈皮之简称，详该条。

棕鱼 见《本草纲目》。为棕榈花之别名，详该条。

棕树果 见《云南中草药》。为棕榈子之别名，详该条。

棕树根 出《滇南本草》。为棕榈科植物棕榈Trachycarpus fortunei(Hook.f.)H. Wendl.或棕树T. wagnerianus Becc.的根。苦、涩，平。止血，收敛。治咳血，吐血，便血，血淋，血崩，痢疾，遗精，子宫脱垂。煎服：9～15克。心材名棕树心，煎服治头晕目眩，崩漏。

棕笋 出《濒湖集简方》。为棕榈花之别名，详该条。

棕榈子 出《本草拾遗》。又名棕树果。为棕榈科植物棕榈Trachycarpus fortunei (Hook.f.)H.Wendl.和棕树T.wagnerianus Becc.的果实。苦、涩，平。收敛，止血。治泻痢 遗精，白带，血崩，便血。煎服：9～15克。研碎用。果实含脂肪油；果壳含花白甙（Leucoanthocyanin）。

棕榈叶 见《现代实用中药》。为棕榈科植物棕榈 Trachycarpus fortunei (Hook.f.) H. Wendl. 或棕树T. wagnerianus Becc.的叶。降血压，止血。预防中风，治高血压病，劳伤吐血。煎服：6～12克。本品富含鞣质。

棕榈皮 出《日华子诸家本草》。又名棕皮、棕毛。为棕榈科植物棕榈Trachycarpus fortunei (Hook.f.)H. Wendl.或棕树T. Wagnerianus Becc.的叶鞘纤维。主产我国南部及西南部。苦、涩，平。入肝、脾经。收涩止血。①治吐血，衄血，便血，尿血，血淋，子宫出血，泻痢。煎服：9～15克。煅炭用。②治外伤出血，疥癣。烧存性研末撒或调敷。叶柄名棕板，又名棕骨，功用与棕榈皮同。棕榈皮富含鞣质。

棕榈花 见《现代实用中药》。又名棕笋、棕鱼。为棕榈科植物棕榈 Trachycarpus fortunei (Hook.f.)H. Wendl.或棕树T. wagnerianus Becc.未开放的花序。涩，凉，有小毒。治血崩，便血，血痢，高血压病。煎服：3～9克。瘰疬，酒煎服。本品富含鞣质。

榔玉 见《中药志》。为槟榔之别名，详该条。

榔头花 见《陕甘宁青中草药选》。为漏芦之别名，详该条。

棘叶 出《本草纲目》。为鼠李科植物酸枣Ziziphus jujuba Mill.的叶。①治瘰疬。捣敷或研末麻油调敷。②片剂试用于治疗冠心病心绞痛有效。每次服5～6片（每片含生药2克），每日三次，连服八周。少数病人有轻度口干、便溏、困倦等反应。本品含酸枣叶碱（Yuziphine）、酸枣叶次碱(Yuzirine)、乌药碱、异波尔定碱、去甲异波尔定碱、巴婆碱、小檗碱、原阿片碱等生物碱，

还含芸香甙、维生素C等。叶具有局部麻醉作用，如咀嚼1～2片，可使口腔对甜味及苦味的感觉消失达5～10分钟。10%叶浸剂给狗静脉注射，可使其大脑皮质抑制，心率加快，心收缩力变弱，血压下降，呼吸减少。

棘针 出《神农本草经》。又名白棘、棘刺、枣针、赤龙瓜。为鼠李科植物酸枣Ziziphus jujuba Mill.的棘刺。分布辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、河南、山东、江苏、安徽、湖北、四川等地。辛，寒。消肿，溃脓，止痛。①治痈肿有脓，腹痛，腰痛，喉痹，尿血。煎服：3～6克。②治疔肿。煎汁内服并外涂。

棘刺 出《名医别录》。即棘针，详该条。

鹁鸽 出《食疗本草》。即鸽，详该条。

酢浆草 出《新修本草》。又名酸浆草、三叶酸草。为酢浆草科植物酸浆草 Oxalis corniculata L.的全草。分布全国各地。酸，凉。清热利湿，凉血散瘀，解毒消肿。①治感冒发热，咽喉肿痛，尿路感染、结石，黄疸，泄泻，痢疾，赤白带下，吐血，衄血。煎服：9～30克。②捣敷或煎水洗，治跌打损伤，毒蛇咬伤，疔疮，痈肿，疥癣，湿疹，烧烫伤。本品含大量酒石酸，还含柠檬酸、苹果酸、草酸盐、维生素C等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌，福氏痢疾、伤寒、绿脓及大肠杆菌等有抑制作用。

款冬花 出《神农本草经》。又名冬花。为菊科植物款冬花Tussilago farfara L.的花蕾。主产河南、甘肃、山西、陕西。辛，温。入肺经。润肺下气，止咳化痰。治新久咳嗽、喘息，肺痈，喉痹。煎服：3～9克。本品含款冬二醇（Faradiol）、芸香甙、金丝桃甙、三萜皂甙、挥发油及鞣质等。煎剂在动物试验中有镇咳及轻度的祛痰、平喘作用；醚提取物对胃肠平滑肌有抑制作用。在动物身上有类似去甲肾上腺素的升高血压作用。

散血飞 见《贵州民间药物》。为竹叶椒根之别名，详该条。

散血丹 ❶见《广西中草药》。为山大颜之别名。❷见《广西药用植物名录》。为飞龙掌血之别名。❸见《江西民间草药验方》。为瓜子金之别名。各详该条。

散血草 见《分类草药性》。为白毛夏枯草之别名，详该条。

散星草 见《浙江民间常用草药》。为鹅不食草之别名，详该条。

韩信草 见《生草药性备要》。为向天盏之别名，详该条。

朝开暮落花 见《本草纲目》。为木槿花之别名，详该条。

朝天一柱香 见《贵州草药》。为金边兔耳之别名，详该条。

朝天子 见《饮片新参》。为木槿子之别名，详该条。

朝天罐 见《贵阳民间药草》。又名张天刚、痢疾罐、向天葫芦、倒罐草、罗浮金锦香。为野牡丹科植物朝天罐Osbeckia crinita Benth.ex C.B.Clarke 的根或果实。分布我国长江以南各地。酸、涩，微寒。清肠解毒，收敛，止血。治细菌性痢疾，肠炎，咳嗽咯血，白带。煎服：15～30克。②近用治鼻咽癌，乳腺癌。

朝阳花根 见《四川常用中草药》。为向日葵根之别名，详该条。

朝鲜参 见《中国药学大辞典》。即别直参，详人参条。

朝鲜黄连 见《东北常用中草药手册》。即鲜黄连，详该条。

葫芦 出《千金月令》。即壶卢，详该条。

葫芦瓜 见清·赵其光《本草求原》。即壶卢，详该条。

葫芦茶 出《生草药性备要》。又名金剑草、咸鱼草。为豆科植物葫芦茶Desmodium triquetrum(L.)DC.的全草。分布福建、广东、广西、云南等地。苦、涩，凉。清热，解毒，利湿，杀虫。①治感冒发热，咽喉肿

痛，肺痛，肠炎，痢疾，黄疸，水肿，风湿关节痛，小儿疳积，钩虫病。煎服：15～30克。②治口腔炎，水煎含漱；风疹，下肢溃疡，疮疥，鲜品捣汁涂或煎水洗。全草预试含香豆素，酚类、有机酸、鞣质。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

葫芦茶根 见《贵州草药》。为豆科植物葫芦茶Desmodium triquetrum(L.)DC.的根。微苦、辛，平。清热解毒，利湿。治风热咳嗽、咯血，肺痈，黄疸，痈肿，瘰疬。煎服：15～30克。

葫芦罐 见《东北药用植物志》。为马兜铃之别名，详该条。

蔵参 见《滇南本草》。为玉竹之别名，详该条。

葛花 出《名医别录》。又名葛条花。为豆科植物葛 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi的花。主产湖南、河南、广东、广西、浙江、四川、安徽等地。甘，凉。入胃经。解酒醉，止烦渴。煎服：3～9克。本品预试含胺类或水溶性生物碱及微量黄酮类。

葛谷 出《神农本草经》。为豆科植物葛 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi的种子。甘，平。解酒毒，治痢疾。煎服：9～15克。种子含油15%。

葛条花 见《中药志》。即葛花，详该条。

葛根 出《神农本草经》。又名甘葛、粉葛。为豆科植物葛 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 的根。主产河南、湖南、浙江、四川等地。甘、辛，平。入脾、胃经。解肌退热，透疹，生津，止泻。①治感冒发热，头痛项强，麻疹透发不畅，热病烦渴，泄泻，痢疾。②治高血压病引起的颈项强痛，心绞痛。煎服：6～15克。脾虚泄泻宜煨用。葛根经水磨而澄取的淀粉名葛粉，内服治烦热，口渴。根含葛根素、葛根素木糖甙、大豆黄酮、大豆黄酮甙等黄酮类，尚含β-谷甾醇、花生酸等。总黄酮及葛根素对狗能增加冠状动脉血流量，并能明显增加脑血流量，血管阻力下降。醇浸剂对大鼠有拮抗脑垂体后叶素引起的心肌缺血反应；对人工发热兔有解热作用。大豆黄酮对肠管平滑肌有解痉作用，还能降低血糖。煎剂在体外能抑制痢疾杆菌。

葛蔓 出《新修本草》。又名葛藤蔓。为豆科植物葛 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi的藤茎。①治喉痹。内服：煎汤，6～9克；或烧存性研末。②治痈肿。烧存性，研末服或调敷。葛叶捣敷，治创伤出血。地上部分含山柰酚二鼠李糖甙及洋槐甙。

葛藤蔓 见《卫生易简方》。即葛蔓，详该条。

葎草 出《新修本草》。又名拉拉藤、割人藤、老虎刺。为桑科植物葎草 Humulus scandens (Lour.) Merr. 的全草。除新疆和青海外，全国大部分地区均有分布。甘、苦，寒。清热利尿，解毒消肿。①治热淋，石淋，尿血，小便不利，水肿，腹泻，痢疾，肺结核潮热，盗汗，肺热咳嗽，肺脓疡。煎服：9～30克。②治风湿性关节炎，瘰疬，痈疖肿毒，毒虫咬伤，鲜草捣敷；皮肤瘙痒，湿疹，痔疮，脱肛，煎水洗。叶含木犀草素-7-葡萄糖甙、大波斯菊甙、牡荆素、胆碱、天门冬酰胺、挥发油、鞣质等。挥发油中主含β-葎草烯。球果含葎草酮、蛇麻酮。二者都有抑菌作用，参见啤酒花条。

葎草花 见《现代实用中药》。为桑科植物葎草Humulus scandens(Lour.)Merr.的花。治肺结核，大叶性肺炎。煎服：9～18克。

葎草果穗 见《本草推陈》。为桑科植物葎草Humulus scandens (Lour.)Merr.的果穗。甘、苦，寒。清热，健胃，利尿。治热病发热烦渴，肺结核潮热、盗汗，消化不良，急性胃肠炎，痢疾，膀胱炎，尿道炎。煎服：15～30克。本品含葎草酮及蛇麻酮。对结核杆菌和金黄色葡萄球菌有抑制作用。

葎草根 出《本草纲目》。为桑科植物葎

草Humulus scandens (Lour.) Merr.的根。治石淋，疝气，瘰疬。煎服：15～24克。

葡萄 出《神农本草经》。又名草龙珠。为葡萄科植物葡萄Vitis vinifera L.的果实。主产新疆、甘肃、陕西、山西、河北、山东等地。甘、酸，平。入肺、脾、肾经。补气血，强筋骨，利小便。治气血虚弱，肺虚咳嗽，心悸，盗汗，风湿痹痛，淋病，浮肿，小便不利。内服：煎汤，15～30克；或捣汁服。葡萄含葡萄糖、果糖、酒石酸、草酸、柠檬酸、苹果酸、维生素C等。葡萄皮含矢车菊素、芍药素(Peonidin)、飞燕草素等。种子含油9.58%。又含焦性儿茶酚、儿茶精、没食子酸盐等。有某种维生素P的活性。种子油15克口服可降低胃酸度；12克可利胆；40～50克有致泻作用。

葡萄根 出《食疗本草》。为葡萄科植物葡萄Vitis vinifera L.的根。各地普遍栽培。甘、涩，平。除风湿，利尿。①治风湿痹痛，肿胀，小便不利。煎服：15～30克。②捣敷筋伤骨折。本品含胶质、聚糖及酶。

葡萄藤叶 出《本草纲目》。为葡萄科植物葡萄Vitis vinifera L.的茎藤和叶。甘、涩，平。祛风利湿，止呕，止咳。①治风湿痹痛，水肿，小便不利，呕吐，恶阻，咳嗽，目赤。内服：煎汤，9～15克，或捣汁。②治无名肿毒。鲜叶捣敷。茎含还原糖、鞣质、黄酮类化合物等。叶含酒石酸、苹果酸、异槲皮甙、槲芸香甙等。

葱子 见《日华子诸家本草》。即葱实，详该条。

葱叶 出《食疗本草》。为百合科植物葱Allium fistulosum L.的叶。辛，温。祛风发汗，解毒消肿。①治风寒感冒，头痛鼻塞，身热无汗。煎服：9～15克。②治疮痈肿痛，跌打创伤。捣敷或煎水洗。本品含低果聚糖、粘液质等。煎剂在体外能抑制志贺氏痢疾杆菌，滤液在试管内能杀灭阴道滴虫，但显效慢。

葱白 出《名医别录》。又名葱茎白、葱白头。为百合科植物葱Allium fistulosum L.的鳞茎。辛，温。入肺、胃经。发表，通阳，解毒，止血。①治风寒感冒，阴寒腹痛、腹泻，痢疾，煎服：9～15克。②治蛔虫性急腹痛。捣汁和麻油空腹服。③治小便不通，炒热布包熨脐下；鼻衄，捣汁滴鼻；痔疮出血，煎汤熏洗；乳痈、痈肿，炒热捣烂敷。本品含挥发油，其主要成分为蒜素、二烯丙基硫醚。又含S-甲基巯基半胱氨酸，S-烯丙基巯基半胱氨酸，维生素C、B_1等多种维生素及粘液质等。挥发性成分在体外对痢疾杆菌、白喉杆菌、葡萄球菌、链球菌等有抑菌作用。水浸剂能抑制某些常见致病性皮肤真菌。

葱白头 见《药品化义》。即葱白，详该条。

葱茎白 见《本草纲目》。即葱白，详该条。

葱实 出《神农本草经》。又名葱子。为百合科植物葱Allium fistulosum L.的种子。辛，温。温肾，明目。治阳痿，目眩。煎服：3～4.5克。

葱须 出《食疗本草》。又名葱根。为百合科植物葱Allium fistulosum L.的须根。性平。解肌发汗。①治风寒头痛。煎服：6～9克。②治喉疮，与胆矾共研末吹喉；治冻伤，与茄根共煎水浸洗患处。

葱根 出《名医别录》。即葱须，详该条。

葶苈子 出《神农本草经》。为十字花科植物独行菜Lepidium apetalum Willd.、北美独行菜L. virginicum L.或播娘蒿Descurainia sophia (L.) Webb的种子。主产河北、辽宁、内蒙古及江苏、山东、安徽等地。辛、苦，寒。入肺、膀胱经。泻肺行水，祛痰定喘。治痰涎壅肺，咳嗽气喘，面目浮肿，胸腹积水，小便不利。煎服：4.5～9克。独行菜种子含脂肪油、黑芥子甙(Sinigrin)，并含有强心成分。播娘蒿种

子含挥发油，内有异硫氰酸苄酯、二烯丙基二硫化物等；又含脂肪油15～20%，油中主要为亚油酸32.5%，油酸25.1%及芥酸等；还含强心甙，其中有七里香甙甲（Helveticoside）。葶苈子醇提取物对动物的在体心脏及心肺制备标本均呈强心作用，能增强心肌收缩，减慢心率，降低传导速度，大量则可引起心动过速、心室颤动等。本品还有平喘及利尿作用。

落花生 出明·范洪《滇南本草图说》。又名长生果、花生。为豆科植物落花生Arachis hypogaea L.的种子。我国各地均有栽培。甘，平。入肺、脾经。润肺，和胃，补脾。治燥咳，反胃，浮肿，脚气，乳妇奶少。内服：煎汤，60～90克；煮食或生研冲汤服。落花生油：治蛔虫性肠梗阻，内服，60～80毫升。种子含脂肪油40～50%。含氮物质(20～30%)除蛋白质外，还有氨基酸、卵磷脂、嘌呤、甜菜碱和胆碱等。又含维生素B_1、泛酸、生物素、α-及γ-生育酚。种子中还含三萜皂甙、焦性儿茶酚型鞣质、无色矢车菊素、无色飞燕草素及花生甙（Arachidoside）等。

落花生枝叶 出《滇南本草》。为豆科植物落花生Arachis hypogaea L.的枝叶。治失眠，神经衰弱，高血压病。煎服：30～45克。捣敷跌打损伤。花生的地上部分含有戊烯醇、己醇、芳樟醇、α-松油醇和牻牛儿醇等。

落苏 出《食疗本草》。为茄子之别名，详该条。

落地生根 见萧步丹《岭南采药录》。又名叶生根、晒不死、打不死、脚目草、土三七。为景天科植物落地生根Bryophyllum Pinnatum(L.f.)Oken的全草。分布广东、广西、福建、台湾、云南等地。淡、微酸、涩，凉。消肿解毒，清热凉血。①治咽喉肿痛，捣烂绞汁含漱；中耳炎，取汁滴耳；乳痈，疔疮肿毒，捣敷；创伤出血，烫伤，研末撒。②治吐血，热性胃痛，关节肿痛。内服：煎汤，鲜品15～30克；或捣烂绞汁服。叶含苹果酸、柠檬酸、异柠檬酸、延胡索酸、咖啡酸、阿魏酸、槲皮素-3-二阿拉伯糖甙、黄芪甙等。

落地金钱 ❶见《岭南草药志》。为广东金钱草之别名。❷见《广州植物志》。为锦地罗之别名。各详该条。

落得打 见《江苏省植物药材志》。为积雪草之别名，详该条。

落翅 见《中药志》。为连翘之别名，详该条。

萱草花 出《救荒本草》。为金针菜之别名，详该条。

萱草根 出《本草拾遗》。又名黄花菜根。为百合科植物萱草Hemerocallis fulva L.、黄花萱草H. flava L.或小萱草H. minor Mill.等的根。我国大部分地区有产。甘，凉，有小毒。清利湿热，凉血解毒。①治水肿，小便不利，淋浊，带下，黄疸，衄血，吐血，便血，尿血，崩漏。煎服：3～6克。②捣敷治乳痈，蛇咬伤。多服损目、小便失禁。萱草根和茎含生物碱。本品有强烈毒性，动物试验表明主要病理变化在中枢神经和肝、肾实质细胞。加温后，毒性可显著降低。

萱草嫩苗 出《日华子诸家本草》。为百合科植物萱草Hemerocallis fulva L.、黄花萱草 H. flava L.或小萱草 H. minor Mill.的嫩苗。甘，凉。清热利湿。①治胸膈烦热，黄疸，小便赤涩。煎服：鲜品15～30克。②捣敷跌打瘀痛。

蒌叶 见《本草纲目》。为蒟酱叶之别名，详该条。

蒌油 出《本草纲目拾遗》。为胡椒科植物蒟酱Piper betle L.的叶经蒸馏而得的芳香油。滴耳治耳痛；涂敷刀伤，痈疔，杨梅毒疮，痔漏。成分见蒟酱叶条。

蒌根 出《雷公炮炙论》。为天花粉之别

名，详该条。

萹蓄 出《神农本草经》。又名扁竹、竹节草、猪牙草。为蓼科植物萹蓄Polygonum aviculare L.的全草。全国大部分地区均产。苦，寒。入膀胱经。清热，利尿，杀虫。①治尿路感染，尿路结石，黄疸，痢疾。②治蛔虫病，及胆道蛔虫症，蛲虫病，钩虫病。煎服：9～18克。③治皮肤湿疹，阴道滴虫病，阴部瘙痒。鲜草煎水洗。本品含萹蓄甙、槲皮甙、儿茶精、没食子酸、咖啡酸、草酸、绿原酸、对香豆酸等。鲜草还含维生素E。煎剂对大鼠有明显利尿作用，在体外对葡萄球菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌及常见致病性皮肤真菌均有抑制作用。

葭花 出《尔雅》。为芦花之别名，详该条。

菜耳 出《楚辞·王逸注》。为苍耳之别名，详该条。

菜耳实 出《神农本草经》。为苍耳子之别名，详该条。

葵子 出《金匮要略》。为冬葵子之简称，详该条。

葵花茎髓 见《安徽中草药》。即向日葵茎髓，详该条。

葵花根 见《四川常见中草药》。即向日葵根，详该条。

葵花盘 见《草药手册》。即向日葵花托，详该条。

葵扇木 见《陆川本草》。为蒲葵之别名，详该条。

葵菜 见《说文》。即冬葵叶，详该条。

葵菜子 见《妇人良方》。为冬葵子之别名，详该条。

喜树 出《浙江民间常用草药》。又名千张树、水桐树。为珙桐科植物旱莲木Camptotheca acuminata Decne.的果实或根皮。分布长江流域及南方各地。苦、寒，有毒。抗癌，清热，破血，杀虫。①治胃癌、结肠癌、直肠癌、肝癌、膀胱癌，慢性粒细胞性白血病，急性淋巴细胞性白血病。煎服：根皮9～15克；果实3～9克。临床上多提取喜树碱制成注射液用，用量每日10～20毫克。②治银屑病。以20%喜树果软膏涂敷，每日一次。亦可与喜树果注射剂肌肉注射结合使用。本品毒性较大，可出现恶心、呕吐、消化道出血、腹泻、膀胱炎、白细胞减少、血尿、脱发等毒性反应。根含喜树碱、喜树次碱（Venoterpine）、β-谷甾醇、3,3′,4-三甲基并没食子酸。果实含喜树碱、羟基喜树碱、喜树次碱、去氧喜树碱、白桦脂酸、喜果甙（Vincoside-lactam）、丁香酸和八个并食子酸衍生物。喜树碱有抗癌作用，对动物的L-615白血病、肉瘤-180、艾氏腹水癌以及大鼠瓦克氏癌、吉田肉瘤等有效，羟基喜树碱有相似效果而效力高，临床上用于胃癌、肠癌、直肠癌、食道癌、气管癌、骨髓性白血病等。作用原理可能是抑制有丝分裂及核酸代谢。对狗能引起消化道反应及出血、白细胞下降；对肝、肾及心肌均有毒性；静脉注射可出现静脉炎；对大鼠有抗早孕作用。

喜树叶 见江西药科学校《中草药学》。为珙桐科植物旱莲木Camptotheca acuminata Decne.的叶。微苦、甘、辛，寒，有小毒。捣敷治疮疖痈肿。本品含喜树碱等生物碱。

喜树皮 见《浙江民间常用草药》。为珙桐科植物旱莲木Camptotheca acuminata Decne.的树皮。苦、寒，有毒。治牛皮癣。煎服：15～30克。外用：制成油膏外搽；或加水浓煎后外洗。忌用铁器煎煮、调制。本品含喜树碱等。

粟壳 见《易简方》。为罂粟壳之简称，详该条。

雄丁香 见《本草蒙筌》。即丁香，详该条。

雄黄 出《神农本草经》。又名石黄、腰黄、黄金石、雄精。为含硫化砷的矿石。产

湖南、湖北、贵州、云南、四川等地。辛，温，有毒。入心、肝经。燥湿，解毒，杀虫。①治痈疽肿毒，蛇虫咬伤，外敷或配入丸、散服；疥癣，神经性皮炎，带状疱疹，黄水疮，研末调涂。②治惊痫，疟疾。入丸、散服，一次量150～300毫克。内服宜水飞，不可火制。不能持续内服，以防蓄积中毒。中毒症状主要为吐泻。孕妇忌服。雄黄水浸剂在体外对常见致病性皮肤真菌，肠道致病菌，常见化脓性球菌及人型、牛型结核杆菌，均有抑制作用。

雄黄草 见《陕西中药志》。为白屈菜之别名，详该条。

雄精 见《中国药学大辞典》。为雄黄之别名，详该条。

硬水黄连 见《四川中药志》。即水黄连，详该条。

硬皮草 见《江西草药》。为合掌消之别名，详该条。

硬壳藤 见《广西中兽医药用植物》。为昆明鸡血藤之别名，详该条。

硬杆水黄连 见《四川常用中草药》。即水黄连，详该条。

硬饭团 见《植物名实图考长编》。为萆薢之别名，详该条。

硬蒺藜 见《山东中药》。即刺蒺藜，详该条。

硫黄 见《吴普本草》。又名石硫黄。为硫黄矿或含硫矿物冶炼而成的块状物。产山西、陕西、河南、山东、湖北、湖南、江苏、四川、广东、台湾等地。酸，温，有毒。入肾、大肠经。杀虫，补火助阳。①治疥、癣，湿疹。研末油调涂敷。②治命门火衰，阳痿，腰酸膝冷，肾虚喘促，虚寒腹痛、泻痢，便秘。研末服：1.5～3克；或入丸剂。应与豆腐同煮后用。内服中毒时，呼气有硫化氢味，可出现呕吐、吞咽困难、头痛、眩晕、腹痛、腹泻甚至虚脱等症。孕妇忌服。畏朴硝、芒硝、元明粉。本品内服后变为硫化物或硫化氢，刺激胃肠粘膜，蠕动增加，导致下泻。硫化物局部应用，有软化表皮、溶解角质及杀死皮肤寄生虫（疥）的作用。

雁来红 见《广东新语》。为长春花之别名，详该条。

提云草 见萧步丹《岭南采药录》。为老鼠耳之别名，详该条。

搜山虎 ❶见《云南中草药》。又名天蓬子根、拟颠茄。为茄科植物新莨菪Scopolia Sinensis Hemsl.的根。分布湖北、四川、云南。辛、苦，温，剧毒。祛风散寒，舒筋活络，止痛。治风寒感冒，风湿性关节炎，瘫痪，破伤血，跌打损伤。取本品900毫克，泡酒1斤，每次5～10毫升，日服二次。本品含樟柳碱、天仙子胺（莨菪碱）、红古豆碱。樟柳碱有阿托品样作用。❷出清·汪连仕《采药书》。为杜鹃花之别名，详该条。

雅连 见《本草从新》。为黄连药材之一种，详黄连条。

翘摇 出《本草拾遗》。为小巢菜之别名，详该条。

戟叶半夏 见《广西本草选编》。为水半夏之别名，详该条。

〔丨〕

紫大戟 见《三因极一病证方论》。即红大戟，详该条。

紫贝 出《新修本草》。又名紫贝齿、研螺。为宝贝科动物蛇首眼球贝Erosaria caputserpentis（L.）或阿文绶贝 Mauritia arabica(L.)等的贝壳。产海南岛、台湾、福建等地。咸，平。入肝经。清肝明目，镇惊安神。治热毒目翳，目赤肿痛，头晕头痛，惊惕不眠，热盛风动，四肢抽搐。煎服：9～15克，打碎，先煎。绶贝的贝壳含碳酸钙90%以上，有机质0.47%，少量镁、铁、硅酸盐、硫酸盐、磷酸盐和氯化物。

紫贝齿 见《中国医学大辞典》。为紫贝之处方名，详该条。

紫丹参 见《集验拔萃良方》。为丹参之处方名，详该条。

紫石英 出《神农本草经》。为萤石的矿石。产浙江、江苏、辽宁、黑龙江、河北、湖南、湖北、甘肃等地。甘，温。入心、肝经。镇心，温肺，暖子宫。治心悸怔忡，肺寒咳逆上气，妇女子宫虚寒不孕。煎服：6～12克。本品主含氟化钙，常杂有氧化铁及稀土金属。

紫阳花 见《现代实用中药》。为八仙花之别名，详该条。

紫花地丁 出《本经逢原》。又名地丁草、箭头草、堇菜地丁。为堇菜科植物紫花地丁Viola yedoensis Mak.的全草。主产江苏、浙江、安徽等地。苦，寒。入心、肝经。清热，解毒，消肿。①治疔疮，痈肿，丹毒，瘰疬，毒蛇咬伤。内服并捣敷。②治目赤肿痛，咽炎，黄疸型肝炎，肠炎，痢疾。煎服：15～30克（鲜品，30～60克）。本品含甙类、黄酮类、蜡（为虫蜡酸及不饱和酸等的酯）。预试还含大量粘液质和有弱的溶血作用的物质。体外试验对结核杆菌、葡萄球菌与卡他球菌有某些抑菌作用。

紫花杜鹃 见《广西本草选编》。又名岭南杜鹃。为杜鹃花科植物广东紫花杜鹃Rhododendron mariae Hance的花、叶、嫩枝或根皮。分布广东、广西、江西、湖南等地。苦，平。镇咳，祛痰，平喘，消肿。①治慢性气管炎，支气管哮喘，跌打肿痛。煎服：15～30克（鲜品60克）。②治口疮，用鲜叶捣敷。叶含杜鹃花醇及其7-木糖葡萄糖甙，槲皮甙，金丝桃甙，槲皮素，东莨菪素，齐墩果酸和挥发油。煎剂和所含的黄酮对小鼠有镇咳、祛痰作用。煎剂及其黄酮成分对抗乙酰胆碱引起的兔及豚鼠离体回肠平滑肌的痉挛。煎剂在体外对肺炎球菌、金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、卡他球菌均有抑制作用。

紫花疔草 见《浙南本草新编》。为农吉利之别名，详该条。

紫花草 见《江苏药物志》。为石荠苧之别名，详该条。

紫花秧 见《全国中草药汇编》。为牛舍水之别名，详该条。

紫苏子 出《药性论》。又名苏子、黑苏子。为唇形科植物皱紫苏Perilla frutescens (L.)Britt. var. crispa (Thund.) Decne或尖紫苏 P. frutescens (L.) Britt. var. acuta(Thunb.)Kudo等的果实。主产湖北、江苏、河南等地。辛，温。入肺、大肠经。下气消痰，止咳平喘，润肺宽肠。治气滞胸闷，咳逆，痰喘，便秘。煎服：4.5～9克。本品含脂肪油、维生素B_1。

紫苏叶 出《药性论》。又名苏叶。为唇形科植物皱紫苏 Perilla frutescens (L.) Britt. var. crispa(Thunb.)Decne或尖紫苏 P. frutescens (L.) Britt. var. acuta (Thunb.) Kudo的叶。主产江苏、浙江、湖南、湖北、广东等地。辛，温。入肺、脾经。发表散寒，理气宽中，安胎，解鱼蟹毒。①治风寒感冒，恶寒发热，咳嗽气喘，胸腹胀满，吐泻腹痛。②妊娠恶阻，胎动不安。煎服：6～9克。紫苏的宿萼名紫苏苞，宜用于血虚感冒患者。皱紫苏叶含挥发油，油中主含紫苏醛、左旋柠檬烯及少量α-蒎烯等。还含矢车菊素-3-(6-对香豆酰葡萄糖甙)-5-葡萄糖甙、枯酸(Cumic acid)、精氨酸等。尖紫苏叶含挥发油，油中含紫苏醛、异戊基-3-呋喃甲酮、α-及β-蒎烯、右旋柠檬烯、紫苏醇、二氢紫苏醇、薄荷醇、薄荷酮等。煎剂或浸剂对实验性发热家兔有较弱的解热作用；在体外对葡萄球菌有抑制作用。紫苏醛给家兔口服有升高血糖作用。

紫苏梗 出《本草蒙筌》。又名苏梗。为唇形科植物皱紫苏 Perilla frutescens(L.) Britt. var. crispa (Thunb.)Decne或尖紫苏 P. frutescens (L.) Britt. var. acuta (Thunb.)Kudo等的茎枝。主产江苏、湖

北等地。辛，温。入肺、脾、胃经。理气舒郁，和胃安胎。治胸脘痞闷，气滞腹胀，嗳气呕吐，噎膈反胃，胎动不安。煎服：4.5～9克。成分与紫苏叶相同。

紫杉 见《东北药用植物志》。为红豆杉科植物东北红豆杉 Taxus cuspidata Sieb. et Zucc.的枝和叶。分布东北地区。治肾炎浮肿，小便不利，糖尿病。煎服：叶，3～6克；小枝（去皮），9～15克。叶含紫杉宁（Taxihine）及紫杉宁A.H.K.L等，另含坡那甾酮A（ponasterone A）、蜕皮甾酮（Ecdysterone）、金松双黄酮（Sciadopitysin）。嫩枝含紫杉碱（Taxine）。茎皮含紫杉酚（Taxol）。紫杉碱皮下或静脉注射，对人的肾上腺素性或食物性的高血糖，有降血糖作用。紫杉酚有抗肿瘤的作用。

紫茉莉叶 见《峨眉山药用植物》。为紫茉莉科植物紫茉莉 Mirabilis jalapa L.的叶。甘，平。清热，解毒，活血。治乳腺炎，痈疮，跌打损伤。捣敷。水提取物对离体兔心有短暂的兴奋作用，给猫注射可引起血压升高；对兔十二指肠有抑制作用。叶浸剂有利尿作用。

紫茉莉根 出《本草纲目拾遗》。又名入地老鼠、花粉头。为紫茉莉科植物紫茉莉 Mirabilis jalapa L.的根。全国大部分地区均有栽培。甘、苦，凉，有小毒。祛风，清热解毒，利尿，泻下，活血消肿。①治风湿性关节炎，扁桃体炎，痛经，月经不调，崩漏，带下，子宫颈糜烂，水肿，大便秘结，泌尿系感染，前列腺炎。煎服：9～15克（鲜品15～30克）。②捣敷小儿胎毒，乳腺炎，痈疖疔疮，跌打损伤；煎水洗湿疹，疥癣。孕妇忌服。忌铁器。本品含葫芦巴碱、氨基酸、有机酸及大量淀粉。体外试验，煎剂对金黄色葡萄球菌，5%浓度对痢疾杆菌和大肠杆菌均有抑制作用。酸性水浸液静脉注射，可使麻醉兔血压升高。

紫英 见《本草从新》。为紫菜之别名，详该条。

紫顶龙芽 见《本草纲目拾遗》。为马鞭草之别名，详该条。

紫金牛 出《本草图经》。又名平地木、矮地茶、野枇杷叶、地青杠、铺地凉伞。为紫金牛科植物紫金牛 Ardisia japonica（Hornst.）Bl.的茎叶。分布陕西及华东、中南、西南地区。苦，平。止咳化痰，活血止血，利尿，解毒。①治慢性气管炎，大叶性肺炎。②治跌打损伤，筋骨痠痛，月经不调，肺结核咯血，黄疸型肝炎，痢疾，肾炎，尿路感染，高血压病。煎服：9～15克。③治无名肿毒，捣敷；皮肤瘙痒，漆疮，煎水洗。全草含挥发油，在去油后的残渣中分离得岩白菜素。还含冬青萜醇（Ilexol），槲皮甙，杨梅树皮甙等。从全草中的乙醇可溶部分中可提出紫金牛素（Ardisin）。煎剂有止咳、祛痰作用；岩白菜素有止咳作用；所含黄酮甙有平喘作用。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌，甲型链球菌，大肠杆菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌及流感病毒均有抑制作用。紫金牛素能抑制结核杆菌。

紫金牛根 出《本草图经》。为紫金牛科植物紫金牛Ardisia japonica（Hornst.）BL.的根及根茎。辛，平。治膈气，冷气腹痛，风湿腰痛，睾丸肿痛，经闭，跌打损伤。煎服：9～12克。根茎含槲贝素（Embelin）、微量酸金牛醌（Rapanone）和羟基苯醌衍生物的混合物。

紫金龙 ❶见《云南中草药》。又名串枝莲、豌豆跌打、黑牛膝、川山七。为罂粟科植物藤铃儿草 Dactylicapnos scandens (D.Don)Hutch.的根。分布云南、广西。微苦，凉，有毒。镇痛，止血，降压。①治神经性头痛，牙痛，胃痛，关节痛，跌打损伤，骨折疼痛，血崩，内伤出血，高血压病。研末服：1～3克。②治外伤出血。研粉撒敷。孕妇忌服。本品含原阿片碱、右旋异紫堇定碱等生物碱。❷见《南京民间药草》。为虎杖

之别名，详该条。

紫金皮 出清·汪连仕《采药书》。为红木香之别名，详该条。

紫金标 见《贵州药植目录》。为紫金莲之别名，详该条。

紫金莲 见《贵州草药》。又名搬倒甑、转子莲、七星箭、紫金标。为蓝雪科植物紫金莲Ceratostigma willmottianum Stapf的根。分布贵州、四川、云南及西藏东南部。甘，温。解痉，镇痛，化瘀。①治胃炎，胃溃疡，胆囊炎，胆道蛔虫症，胰腺炎等病所引起的疼痛。内服：煎汤，3～4.5克；研末，每服0.45～0.9克，每日3次。②治骨折。捣敷。本品含酚基的醌类物质，能松弛平滑肌痉挛，在试管内有抑制金黄色葡萄球菌、枯草杆菌生长的作用。

紫河车 出《本草纲目》。又名混沌衣、人胞。为健康产妇的胎盘。甘、咸，温。入肺、肝、肾经。补气，养血，温肾，益精。治虚损瘦弱，劳热骨蒸，咳喘，咯血，自汗，盗汗，遗精，阳痿，不孕，月经不调，乳少，神经衰弱，白细胞减少症，再生障碍性贫血。内服：焙干研末，2.4～4.5克。胎盘成分较复杂，主要含：①蛋白质和肽类——胎盘球蛋白（制品含多种抗体）；β-抑制因子（一种巨球蛋白）；与血液凝固的有关成分（如纤维蛋白稳定因子、尿激酶抑制物、纤维蛋白溶酶元活化物）；激素（如胎盘催乳素、红细胞成熟因子）；各种酶（溶菌酶、激肽酶、组胺酶、催产素酶）。②类甾醇激素——雌激素及肾上腺皮质激素。③其它——磷脂、多糖、类似前列腺素E_1的一种酸性抽提物。胎盘能增强机体抵抗力。注射给药有抗感染作用，对动物的实验性胃溃疡也有一定的预防及治疗效果。因含与血液凝固有关的成分，可用于某种出血患者。因含很多激素，注射给药，又可促进幼年动物全身或某些器官的发育。

紫油厚朴 见《中药材手册》。为厚朴之药材名，详该条。

紫荆木 出《开宝重定本草》。为豆科植物紫荆Cercis chinensis Bge.的木部。分布华北、华东、西南、中南地区及甘肃、陕西、辽宁。苦，平。活血，通淋。治痛经，瘀血腹痛，淋病。煎服：15～30克。孕妇忌服。

紫荆皮 出《日华子诸家本草》。为豆科植物紫荆Cercis chinensis Bge.的树皮。产河南、陕西。苦，平。入肝、脾经。活血通经，消肿解毒。①治月经不调，经闭，痛经，喉痹，淋疾，风湿痹痛，跌打损伤。内服：煎汤，6～12克；或浸酒服。②治痈肿，癣疥，蛇、虫咬伤。研末调敷。孕妇忌服。本品含鞣质。在体外对某些病毒有抑制作用，并能抑制葡萄球菌的生长。

紫草 出《神农本草经》。又名山紫草、红石根。为紫草科植物紫草Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.、新藏假紫草Arnebia euchoroma (Royle) Johnst.或滇紫草Onosma paniculatum Bur. et Franch.的根。主产东北、华北、新疆、云南。苦，寒。入心、肝经。凉血，解毒，滑肠。①治温热斑疹，湿热黄疸，紫癜，吐血、衄血、尿血、血痢、淋浊，便秘。煎服：3～9克。②近用于治疗玫瑰糠疹，绒毛膜上皮癌。煎服：30～60克。③治阴道炎，湿疹，烧烫伤，疮痈肿毒。煎汁或研末调油涂敷。新藏假紫草和紫草根含紫草醌（Shikonin）、乙酰紫草醌、β,β-二甲基丙烯酰紫草醌、β-羟基异戊酰紫草醌、二甲基戊烯酰基紫草醌（Teracrylshikonin）等。新疆假紫草还含β,β-二甲基丙烯酰基紫草红(β,β-Dimethylacrylalkanin)。新疆假紫草煎剂对小鼠有降低生育力效果，并有对抗垂体促性腺激素及对抗绒毛膜促性腺激素的作用；对蟾蜍、兔离体或在体心脏有兴奋作用；对人工发热的兔有缓和的解热作用。新藏假紫草煎剂、紫草醌、二甲基戊烯酰基紫草醌等在体外对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、流感病毒

有抑制作用。紫草根还有某些抗癌作用。

紫草茸 出《本经逢原》。又名紫梗、紫胶、虫胶。为胶蚧科昆虫紫胶虫 Laccifer lacca Kerr 雌虫在树枝上所分泌的胶质。主产云南、四川、台湾等地。甘、咸，平。清热，凉血，解毒。①治麻疹、斑疹不透，月经过多，带下。煎服：1.5～6克，或研末吞。②治外伤出血，研末撒；湿疹，溃疡不敛，制成油膏涂。本品含虫胶树脂、蜡、色素等。

紫背天葵 出《雷公炮炙论》。即天葵，详该条。

紫背天葵子 出《医宗汇编》。即天葵子，详该条。

紫背金牛 见《生草药性备要》。为大金牛草之别名，详该条。

紫背草 见《植物名实图考》。为一点红之别名，详该条。

紫珠 出《本草拾遗》。又名止血草。为马鞭草科植物杜虹花 Callicarpa pedunculata R.Br.的叶。分布江苏、浙江、江西、福建、台湾、广西、广东等地。苦、涩，平。止血散瘀，解毒消肿。①治吐血，咳血，衄血，尿血，便血，崩漏，血小板减少性紫癜。内服：煎汤，9～15克；粉剂，每次0.9～1.5克，日服三至四次。②治外伤出血，烧伤，研末涂布；疮痈肿毒，蛇咬伤，鲜叶捣敷；结膜炎，角膜炎，角膜溃疡，沙眼，制成溶液滴眼。本品含黄酮类、缩合鞣质、中性树脂等。注射液对人可增加血小板，缩短出血时间、血块收缩时间及凝血酶元时间，并能收缩小血管，故有止血作用。在体外对金黄色葡萄球菌、链球菌、大肠及痢疾杆菌等有抑制作用。

紫胶 见蔡邦华《昆虫分类学》。为紫草茸之别名，详该条。

紫菘 出《新修本草》。为菜菔之别名，详该条。

紫菜 出《本草经集注》。又名索菜、紫葵、紫英。为红毛菜科植物甘紫菜Porphyra tenera Kjellm.或圆紫菜P.suborbiculata Kjellm.等的叶状体。前者分布江苏连云港以北的黄海和渤海沿岸；后者分布青岛以南的广大黄海南部及东海和南海沿岸。甘、咸，寒。入肺经。化痰软坚，清热利尿。治瘿瘤，脚气，水肿，淋病。煎服：9～30克。甘紫菜含尼克酸、生物素、硫辛酸、维生素B_2及B_{12}，胆碱；多量自由氨基酸等；又含磷脂、甘油三酯、甘碳四烯酸。尚含挥发油等。

紫菀 出《神农本草经》。又名小辫儿、夹板菜、驴耳朵菜。为菊科植物紫菀 Aster tataricus L.f. 的根及根茎。主产河北、安徽等地。苦，温。入肺经。温肺下气，化痰止咳。治咳嗽气喘，咯痰不爽，虚劳咳吐脓血，喉痹，小便不利。煎服：4.5～9克。本品含表无羁萜醇、无羁萜、紫菀酮、紫菀皂甙、槲皮素及挥发油。还含皂甙，甙元为常春藤皂甙元。煎剂对小鼠、兔有祛痰作用，在体外对金黄色葡萄球菌，痢疾、变形、伤寒、副伤寒、大肠及绿脓杆菌均有抑制作用，在鸡胚尿囊中对流感病毒有抑制作用。表无羁萜醇对艾氏腹水癌有抗癌作用。

紫堇 出《本草图经》。又名苔菜、野花生、麦黄草、断肠草、蝎子花。为罂粟科植物紫堇 Corydalis edulis Maxim. 的全草或根。分布山西、河南、陕西、甘肃、江苏、安徽、湖北、四川、浙江、江西、贵州等地。苦、涩，凉，有毒。止痛，止血，固精，解毒。治中暑头痛，腹痛，尿痛，肺结核咳血，遗精。煎服：3～9克。捣烂取汁滴耳治化脓性中耳炎；煎水洗毒疮，顽癣；捣敷秃疮，蛇咬伤。煎液试管内对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

紫梗 见《本草纲目》。为紫草茸之别名，详该条。

紫梢花 出《本草图经》。又名紫霄花。为淡水海绵科动物脆针海绵Spongilla fragilla fragilis Leidy的干燥群体。主产江苏、河南等地。甘，温。益阳，涩精。治阳

痿，遗精，白浊，带下，小便不禁。研末服，1.5～4.5克。本品含海绵硬蛋白（spongin）、海绵异硬蛋白（sponginin）、磷酸盐、碳酸盐等。

紫硇砂 见《中药志》。亦称红硇砂，为硇砂药物之一种，详该条。

紫葳茎叶 出《名医别录》。又名凌霄藤、争墙风。为紫葳科植物紫葳Campsis grandiflora（Thunb.）Loisel.的茎叶。苦，平。祛风利湿，凉血散瘀。①治风湿痹痛湿热腹泻，咽喉肿痛，风疹身痒，跌打损伤。煎服：9～15克。②治耳暴聋。叶捣取自然汁滴耳内。孕妇忌服。

紫葳根 出《日华子诸家本草》。又名凌霄花根。为紫葳科植物紫葳Campsis grandiflora（Thunb.）Loisel.的根。分布华北至长江流域以南各地。甘、酸，寒。清热利湿，祛风行血。①治急性胃肠炎，小便不利，白带，风湿痹痛，风疹身痒。煎服：6～9克。②捣敷治跌打损伤，骨折。孕妇忌服。

紫荑 见《本草纲目》。为紫菜之别名，详该条。

紫酢浆草 见《四川中药志》。为铜锤草之别名，详该条。

紫蓝花 出《广西本草选编》。为紫薇花之别名，详该条。

紫槟榔 见《本草纲目》。为马槟榔之别名，详该条。

紫蕺 出《救急易方》。为鱼腥草之别名，详该条。

紫霄花 见《苏州本产药材》。即紫梢花，详该条。

紫燕 见《浙江民间常用草药》。为蝴蝶花之别名，详该条。

紫薇叶 见《湖南药物志》。为千屈菜科植物紫薇Lagerstroemia indica L.的叶。苦、微涩，寒。清热解毒，止血。①治痢疾，急性传染性黄疸型肝炎。煎服：3～9克。②煎水洗湿疹；捣敷痈疮肿毒；研末敷创伤出血。本品含微量印车前明碱（Lagerstroemine）、紫薇碱（Lagerine）等生物碱。又含紫薇醛（Lageracetal）、戊醇、并没食子酸。

紫薇花 出《滇南本草》。又名百日红、紫蓝花、满堂红、怕痒花。为千屈菜科植物紫薇Lagerstroemia indica L.的花。分布华东、华中、华南、西南地区，各地庭园有栽培。微酸，寒。活血，止血，解毒。①治月经不调，癥瘕，血崩，带下。煎服：9～15克。②捣敷痈疽疮疖。孕妇忌服。本品含飞燕草素-3-阿拉伯糖甙、矮牵牛素-3-阿拉伯糖甙、锦葵花素-3-阿拉伯糖甙、没食子酸、没食子酸甲酯、并没食子酸等。还含甲基紫薇碱（Methyl lagerine）。

紫薇根 见《民间常用草药汇编》。为千屈菜科植物紫薇Lagerstroemia indica L.的根。苦、微涩，寒。清热利湿，活血止血，解毒。①治偏头痛，牙痛，痢疾，急性传染性黄疸型肝炎，肝硬化腹水，内出血，痛经，崩漏，产后腹痛。煎服：9～15克。②研末调敷痈疽疮疖；煎水涂烧烫伤，湿疹。孕妇忌服。本品含谷甾醇，3,3′,4-三甲基并没食子酸。

紫藤香 见《卫济宝书》。为降香之别名，详该条。

紫梂子 出《本草图经》。为山楂之别名，详该条。

掌叶凤尾 见《全国中草药汇编》。为金鸡尾之别名，详该条。

掌参 见《宁夏中草药手册》。为手掌参之简称，详该条。

喇叭花子 见《江苏省植物药材志》。为牵牛子之别名，详该条。

喝呼草 出《广西通志》。为含羞草之别名，详该条。

喝起草 出《斗门方》。为苍耳之别名，详该条。

喉咙草 见《中国药用植物志》。又名满

天星、天星草、白花珍珠草。为报春花科植物点地梅Androsace umbellata (Lour.) Merr.的全草。我国大部分地区有分布。苦、辛,寒。清热解毒,消肿止痛。①治咽喉炎,口腔炎,鹅口疮,扁桃体炎,赤眼,目翳,偏头痛,牙痛。煎服:15～30克。②治痈疮肿毒,跌打损伤。煎服并捣敷。本品含皂甙、鞣质、酚类物质、糖类,并有生物碱沉淀反应。醇浸液能加强豚鼠和兔离体心脏收缩力,兴奋兔及大鼠子宫平滑肌。

喉毒药 见《广西植物名录》。为毛冬青之别名,详该条。

喉科草 见《中医方药学》。为火炭母草之别名,详该条。

蛐蛐 见《河北药材》。为蟋蟀之别名,详该条。

蛔虫菜 见《中国经济海藻志》。为鹧鸪菜之别名,详该条。

蛞蝓 出《神农本草经》。又名蜒蚰、鼻涕虫。为蛞蝓科动物蛞蝓 Limax flavus L.的全体。产广西、湖南、江苏等地。咸,寒。清热祛风,破瘀通经,解毒消肿。①治中风喎僻,筋脉拘挛,惊痫,喘息,喉痹,咽肿,经闭,癥瘕。焙干研末吞服,3～5条,或捣烂作丸。②治痔疮,脱肛,痈肿,丹毒,蜈蚣咬伤。焙干研末撒或捣敷患处。

蜒蚰 出《救急方》。为蛞蝓之别名,详该条。

蜒蚰蠃 见《本草纲目》。为蜗牛之别名,详该条。

蛤壳 出《本草原始》。又名海蛤壳。为帘蛤科动物文蛤 Meretrix meretrix L.或青蛤Cyclina sinensis Gmelin的贝壳。分布我国沿海。咸,寒。入肺、肾经。清肺化痰,软坚散结,利尿,制酸。①治肺热痰稠咳喘,胸胁疼痛,瘿瘤,瘰疬,水肿,淋浊,遗精,崩漏,带下,胃痛泛酸。煎服:6～12克,蛤粉,须包煎。②煅研调涂皮肤湿疹,外阴炎,外阴溃疡。本品含碳酸钙、甲壳质等。

蛤蚂油 见《中药通报》(5):205,1956。即蛤蟆油,详该条。

蛤蚧 出《雷公炮炙论》。又名仙蟾、大壁虎。为壁虎科动物蛤蚧 Gekko gecko(L.)除去内脏的干燥全体。主产广西、云南等地。咸,微温,有小毒。入肺、肾经。补肺益肾,定喘止咳,助阳。治虚劳,喘咳,肺痿,咯血,阳痿,淋沥,消渴,经闭。内服:煎汤,3～6克;研末服,0.9～1.5克。含肌肽(Carnosine)、胆碱、肉毒碱(Carnitine)、乌嘌呤及蛋白质、脂肪等。

蛤蚆皮 见《医方约说》。为蟾蜍皮之别名,详该条。

蛤蒌 见《广西中草药》。为假蒟之别名,详该条。

蛤蟆草 见《东北药用植物志》。为委陵菜之别名,详该条。

蛤蟆浆 见《中药材手册》。为蟾酥之别名,详该条。

蛤蟆酥 见《山东中药》。即蟾酥,详该条。

蛴螬 出《神农本草经》。又名老母虫、土蚕、核桃虫。为金龟子科昆虫朝鲜黑金龟子Holotrichia diomphalia Bates或铜绿金龟子 Anomala carpulenta Motsch.等的幼虫。产江苏、四川、安徽、河北、山东、河南和东北等地。咸,温,有毒。入肝经。活血,行瘀,解毒。①治癥瘕积聚,折损瘀痛,经闭,破伤风,喉痹,历节风。研末入丸、散服,1.5～6克。②研末调敷或捣敷治丹毒、痈疽;取汁点眼治目翳。水浸剂对离体兔耳血管、蟾蜍肺血管皆有收缩作用,大剂量有利尿作用。

景天 出《神农本草经》。又名慎火草、火焰草、土三七。为景天科植物景天Sedum erythrostictum Miq.的全草。分布云南、贵州、四川、湖北、陕西、山西、河北、辽宁、吉林、浙江等地。苦,寒。入肝经。清热,

解毒，止血。①治烦热惊狂，吐血，咯血，目赤涩痛。煎服：15～30克。②治风疹，漆疮，煎水洗；痈疮肿毒，外伤出血，捣汁涂。叶含景天庚糖。

景天三七 见《江苏药材志》。又名土三七、八仙草、吐血草、活血丹。为景天科植物景天三七Sedum aizoon L.的根或全草。分布西北、华北、东北至长江流域。甘、微酸，平。止血化瘀，镇静安神。①治血小板减少性紫癜，牙龈出血，衄血，吐血，咯血，消化道出血，尿血，子宫出血。②治心悸，烦躁失眠。煎服：9～30克。③治跌打损伤，外伤出血，烧烫伤，鲜品捣敷。全草含甲基异石榴皮碱（Methylisopelletierine）、景天碱（Sedinine）、景天胺（Sedamine）等生物碱，齐墩果酸，谷甾醇，没食子酸，景天庚糖及黄酮类等。根含熊果酸、齐墩果酸、谷甾醇等。水溶性提取物能缩短兔凝血及出血时间。煎剂在体外能抑制金黄色葡萄球菌。

鼎足瓜 见《中国蔬菜栽培学》。为桃南瓜之别名，详该条。

黑儿茶 见《药材学》。为儿茶之别名，详该条。

黑大豆 出《本草图经》。又名乌豆、冬豆子。为豆科植物大豆Glycine max(L.) Merr.的黑色种子。甘，平。入脾、肾经。利水，祛风，活血，解毒。①治水肿胀满，风痹，脚气，黄疸浮肿，痢疾腹痛，产后风痉。煎服：9～30克。②解乌头、附子毒。煎服。③治痈肿疮毒。研末调敷或煮汁涂。本品含较丰富的蛋白质、脂肪和糖类，以及胡萝卜素、B族维生素等；还含大豆黄酮甙、染料木甙和多种大豆皂甙。

黑大豆皮 出《本草纲目》。又名黑豆衣、乌豆衣、穞豆衣。为豆科植物大豆 Glycine max（L.）Merr. 黑色种子的种皮。甘，凉。养血疏风。治阴虚烦热，盗汗，头痛，眩晕，风痹。煎服：9～15克。本品含矢车菊甙、飞燕草素-3-葡萄糖甙、乙酰丙酸、果胶和多种糖类。

黑及草 见《贵州民间药物》。又名青鱼胆、四棱草、小见肿消、黑耳草。为龙胆科植物椭圆叶花锚Halenia elliptica D.Don的根。分布陕西、山西、甘肃、青海、新疆、湖北、湖南、四川、贵州、云南。苦，寒。清热利湿，平肝利胆。治急性黄疸型肝炎，胆囊炎，胃炎，头晕头痛，牙痛。煎服：9～15克。

黑木耳 见《太平圣惠方》。即木耳，详该条。

黑牛膝 见《云南中草药》。为紫金龙之别名，详该条。

黑风蛇 见《新本草纲目》。为乌梢蛇之别名，详该条。

黑风藤 见《全国中草药汇编》。又名黑皮跌打、通气香。为番荔枝科植物多花瓜馥木Fissistigma polyanthum(Hook. f. et Thoms.) Merr.的茎藤。分布云南、贵州、广西、广东。涩、微辛，温。祛风湿，强筋骨，活血止痛。治小儿麻痹后遗症，风湿性关节痛，跌打损伤。煎服：9～15克；亦可浸酒。孕妇忌服。

黑丑 见《本草纲目》。为牵牛子之种皮呈灰黑色者，详该条。

黑龙骨 见《云南中草药选》。为黑骨头之别名，详该条。

黑兰 见南川药物试验种植场《常用中草药手册》。为见血清之别名，详该条。

黑头草 见《云南思茅中草药选》。为鸡肝散之别名，详该条。

黑皮蛇 见《全国中草药汇编》。为凉粉藤之别名，详该条。

黑皮跌打 见《云南思茅中草药选》。为黑风藤之别名，详该条。

黑芝麻 出《三元延寿书》。即黑脂麻，详该条。

黑老虎 见萧步丹《岭南采药录》。又名

臭饭团、大钻。为木兰科植物冷饭团Kadsura coccinea (Lem.) A.C.Smith的根或藤叶。分布中南及西南等地区。辛、微苦，温。行气止痛，活血散瘀。①治慢性胃炎，急性胃肠炎，胃及十二指肠溃疡等的疼痛，风湿痛，产后瘀痛，痛经。煎服：9～15克。②治跌打损伤。鲜藤叶捣烂外敷。孕妇慎服。预试藤含生物碱、酚类、三萜类（或甾醇）、挥发油。

黑耳草 见《全国中草药汇编》。为黑及草之别名，详该条。

黑阳参 出《滇南本草》。又名白紫草、土玄参、牛舌头菜。为紫草科植物长蕊斑种草 Antiotrema dunnianum (Diels) Hand.—Mazz.的根。分布云南、四川、贵州、广西。苦、微甘，微寒。滋阴清热，利尿，解毒。①治虚劳发热，头昏，热淋，膏淋。煎服：9～15克。②捣敷治痈肿；研末撒治口腔炎，走马牙疳。

黑豆衣 见《江苏省植物药材志》。即黑大豆皮，详该条。

黑苏子 见《饮片新参》。即紫苏子，详该条。

黑鱼 见《日用本草》。即鳢鱼，详该条。

黑参 出《孙天仁集效方》。为玄参之别名，详该条。

黑胡椒 见《中国药学大辞典》。为胡椒药材之一种，详胡椒条。

黑面叶 见《中医方药学》。即黑面神，详该条。

黑面神 出《生草药性备要》。又名黑面叶、山夜兰、夜兰茶、青凡木、四眼叶。为大戟科植物黑面树 Breynia fruticosa(L.) Hook.f.的嫩枝叶。分布广东、广西、云南、贵州、浙江、福建等地。苦，寒，有小毒。清热解毒，止痛，止痒。治疔疮肿毒，湿疹，过敏性皮炎，皮肤瘙痒，阴道炎，烧烫伤。捣敷、捣汁涂或煎水洗。枝叶均含鞣质，预试显酚类、三萜类反应。流浸膏在体外对金黄色葡萄球菌、甲型链球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌、痢疾杆菌等有抑制作用，可能与其中所含鞣质有关。

黑面神根 见《中医方药学》。为大戟科植物黑面树Breynia fruticosa(L.)Hook.f.的根。微苦、涩，凉，有小毒。清热解毒，散瘀止痛。①治急性胃肠炎，扁桃体炎，咽喉炎，风湿痹痛，尿路结石，白浊，产后子宫收缩痛，功能性子宫出血。煎服：6～12克。刮去外皮用。②治漆疮，煎水洗。内服过量或长期服用，会引起呕吐，头晕，甚至中毒性肝炎。孕妇忌服。

黑骨头 见《昆明民间常用草药》。又名滇杠柳、铁散沙、山杨柳、柳叶夹、黑龙骨。为萝藦科植物西南杠柳 Periploca forrestii Schltr. 的根或全株。分布西藏、云南、贵州、广西。苦，凉，有小毒。祛风除湿，活血调经，消炎解毒。①治风湿痹痛，跌打损伤，闭经，月经不调，疮毒，乳腺炎，咽喉炎，口腔炎。煎服：3～6克。②捣敷治骨折。内服一日量不宜超过9克，过量可出现抽搐，甚至死亡。孕妇及肝炎、消化道溃疡患者均忌服。树皮含滇杠柳素（Forrestin）。滇杠柳粗甙具有强心作用，其特点类似毒毛旋花子甙G而毒性较低。

黑骨芒箕 见《广州植物志》。为乌脚枪之别名，详该条。

黑种草子 见《全国中草药汇编》。为毛茛科植物瘤果黑种草Nigella glandulifera Freyn的种子。分布新疆。甘、辛，温。补脑、肾，通乳，通经，利尿。治耳鸣，乳汁缺少，尿路结石，闭经。煎服：1.5～6克。孕妇忌服。

黑洋参 见《陕西中草药》。为太白参之别名，详该条。

黑根 见《贵州民间药物》。为草威灵之别名，详该条。

黑脂麻 出《本草纲目》。又名胡麻、巨胜、黑芝麻、乌麻子。为胡麻科植物脂麻

Sesamum indicum Dc.的黑色种子。甘，平。入肝、肾经。补肝肾，润五脏。治肝肾不足，虚风眩晕，耳鸣，头痛，血虚风痹麻木，肠燥便秘，病后虚弱，妇人乳少。煎服：9～15克。本品含脂肪油可达60%，油中主要为油酸、亚油酸、棕榈酸、软脂酸等的甘油酯及甾醇、芝麻素等。还含叶酸、烟酸、卵磷脂、蛋白质和多量的钙。种子提取物口服能降低大鼠血糖。

黑脚蕨 见《广西药用植物图志》。为乌脚枪之别名，详该条。

黑瞎子胆 见《全国中草药汇编》。为熊胆之别名，详该条。

遏蓝菜 出《救荒本草》。为菥蓂之别名，详该条。

〔丿〕

铺地虎 见《全国中草药汇编》。为血盆草之别名，详该条。

铺地草 见《云南中草药》。为铁线草之别名，详该条。

铺地凉伞 见《广西药用植物名录》。为紫金牛之别名，详该条。

铺地蜈蚣 ❶见《福建民间草药》。又名龙角藤、鹿角草、地松柏、松筋草。为石松科植物垂穗石松Lycopodium cernuum L.的全草。分布浙江、福建、台湾、广东、广西、贵州、云南、四川、江西。甘，平。入肝、脾、肾经。祛风除湿，活血止血，清热解毒。①治风湿拘疼麻木，吐血，衄血，便血，黄疸，痢疾，目赤，跌打损伤。煎服：6～15克。②煎水洗疮疖肿毒；炒存性研末油调搽带状疱疹，汤火伤；末敷刀伤出血。孕妇忌服。本品含垂穗石松碱、羟基垂石松碱、烟碱等多种生物碱，垂石松黄酮甙(Cernoside.)，β-谷甾醇，豆甾醇，菜油甾醇，三萜类，山芝烯二醇(Serratenediol)；山芝烯三醇，21-表山芝烯三醇，芒柄花醇(Onocerine)等。❷见《广西野生资源植物》。为黄毛耳草之别名，详该条。

铺地锦 ❶见萧步丹《岭南采药录》。为丁癸草之别名。❷见《福建民间草药》。为地锦草之别名。各详该条。

锁阳 出《本草衍义补遗》。又名琐阳、地毛球、锈铁棒、锁严子。为锁阳科植物锁阳Cynomorium songaricum Rupr.的肉质茎。主产新疆、甘肃、内蒙古。甘，温。入肝、肾经。补肾润肠。治肾虚阳痿，腰膝无力，遗精滑泄，尿血，肠燥便秘。煎服：4.5～9克。本品含花色甙、三萜皂甙、鞣质。

锁严子 见《陕甘宁青中草药选》。为锁阳之别名，详该条。

锁眉草 见《四川中药志》。为笔筒草之别名，详该条。

锅底灰 见清·叶小峰《本草再新》。为釜脐墨之别名，详该条。

锈钉子 见《昆明民间常用草药》。为大红袍之别名，详该条。

锈铁棒 见《新疆药材》。为锁阳之别名，详该条。

锉刀草 见《浙江民间常用草药》。为笔筒草之别名，详该条。

锉草 出《盛京通志》。为木贼之别名，详该条。

鹄壳 见《本草纲目》。为橙子之别名，详该条。

鹅儿肠菜 见《本草纲目》。为繁缕之别名，详该条。

鹅不食草 出《食性本草》。又名地胡椒、球子草、散星草。为菊科植物石胡荽Centipeda minima (L.)A.Br.et Aschers.的带花全草。分布东北、华北、华南、中南、西南及陕西。辛，温。祛风利湿，通窍散寒，散瘀消肿。①治感冒，头痛，寒哮，百日咳，疟疾，风湿痹痛，煎服：6～9克。②治过敏性鼻炎，萎缩性鼻炎，鼻瘜肉，目赤翳膜，鲜叶捣烂塞鼻或研末搐鼻；跌打损伤，臁疮癣疾，毒蛇咬伤，鲜品捣敷。全草含蒲公英

赛醇、蒲公英甾醇、山金车烯二醇（Arnidiol）、蛇麻脂醇等三萜成分以及豆甾醇、β-谷甾醇、黄酮类、挥发油、氨基酸、有机酸等。动物试验挥发油和醇提取液有止咳、祛痰、平喘作用。煎剂在体外能抑制流感病毒和肺炎球菌的生长。

鹅内金 见《四川中药志》。为鸭科动物鹅Anser domestica Geese的砂囊内壁。健脾。治消化不良，痢疾。内服：煎汤，4.5～9克；或研末服。

鹅巴掌 见《中国药用植物图鉴》。为回回蒜之别名，详该条。

鹅血 出《本草经集注》。为鸭科动物鹅Anser domestica Geese的新鲜血液。咸，平，微毒。治噎膈反胃，白细胞减少症。开水冲服，或制成片剂服。

鹅馄饨 见苏州医学院《中草药手册》。为繁缕之别名，详该条。

鹅脚板 ❶见《峨眉山药用植物》。又名苦爹菜、八月白、蛇咬草、六月寒、羊膻七。为伞形科植物异叶茴芹Pimpinella diversifolia DC.的全草。分布华东、华中、西南、华南地区。辛、微苦，温。散寒，利湿，化积，解毒。①治风寒感冒，咽喉肿痛，疟疾，百日咳，肺结核，胃痛，痢疾，黄疸型肝炎，小儿疳积。煎服：9～15克。②治毒蛇咬伤，蜂、蝎螫伤，无名肿毒，煎服并捣敷；皮肤瘙痒，煎水洗；近用鲜草捣汁滴鼻治鼻咽癌。本品含挥发油。❷见《全国中草药汇编》。为鸭儿芹之别名，详该条。

鹅脚板根 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为伞形科植物异叶茴芹Pimpinella diversifolia DC.的根。辛、甘，微温。健胃，止泻，解毒，消肿。①治消化不良，腹泻。煎服：9～15克。②治无名肿毒，毒蛇咬伤，蜂螫伤。煎服或捣敷。

鹅掌金星草 出《植物名实图考》。又名鸭脚草、三角风、三叉剑、鸡脚叉。为水龙骨科植物金鸡脚Phymatopsis hastata (Thunb.)Kitag.的全草。分布西南、中南、华东地区及陕西等地。苦，平。祛风，清热，利湿，解毒。①治小儿惊风，感冒咳嗽，支气管肺炎，吐血，咽喉肿痛，扁桃体炎，中暑腹痛，腹泻，痢疾，肝炎，淋病，白浊，便血，筋骨疼痛。煎服：9～15克。②治痈肿疔疮，毒蛇咬伤。煎服并捣敷。叶含香豆素。

鹅管石 见《本草纲目》。为钟乳石之处方名，详该条。

筋骨草 ❶见《云南中草药》。为千针万线草之别名。❷见《陕西中药志》。为伸筋草之别名。各详该条。

筋退 见《本草纲目》。为人指甲之别名，详该条。

筋根 出《神农本草经》。为旋花根之别名，详该条。

筋碎补 见《广西药用植物名录》。为草石蚕之别名，详该条。

粤万年青 见《福建中草药》。又名大叶万年青。为天南星科植物粤万年青Aglaonema modestum Schott的根茎及叶。分布广东、广西、云南等地。微苦，寒，有毒。清热凉血，消肿解毒。①治咽喉肿痛，哮喘，咳嗽，吐血。煎服：6～15克（鲜品15～30克）。②治蛇咬伤，犬咬伤。鲜品捣烂绞汁服并取渣敷。③捣敷疔疮肿毒；煎水熏洗小儿脱肛。

御米壳 出《医学启源》。为罂粟壳之处方名，详该条。

舒筋草 见《四川中药志》。为伸筋草之别名，详该条。

舒筋藤 见《海南岛常用中草药手册》。即宽筋藤，详该条。

番木鳖 出《飞鸿集》。为马钱子之别名，详该条。

番石榴干 见《广西中药志》。为桃金娘科植物番石榴Psidium guajava L.未成熟的干燥幼果。分布广东、广西、四川、云南、

福建等地。酸、涩，温。止泻。治腹泻，痢疾。煎服：6～9克。幼果含β-谷甾醇、槲皮素、番石榴甙、没食子酸、并没食子酸、维生素C、蒴蓄甙、阿拉伯聚糖等。又含番石榴鞣素（Arabinoseester hexahydroxydiphenic acid）。

番石榴叶 见《南宁市药物志》。为桃金娘科植物番石榴Psidium guajava L.的叶。甘、涩，平。消食，止泻，收敛，出血。①治消化不良，肠炎，痢疾。煎服：2.4～4.5克（鲜品15～30克）。②治牙痛，牙龈脓肿，煎水含漱；小儿盗汗，皮肤瘙痒，热痱，煎水洗浴；湿疹，创伤出血，研末撒敷；跌打损伤，捣敷。本品含β-谷甾醇、三萜类及挥发油。又含槲皮素、番石榴甙、番石榴鞣花甙（Amriloside）、番石榴酸（Psidiolic acid）等。醇浸出物和水煎剂对金黄色葡萄球菌在体外有抗菌作用。饮用叶浸剂可降低血糖。

番石榴皮 见萧步丹《岭南采药录》。为桃金娘科植物番石榴Psidium guajava L.的根皮及树皮。治牙痛，根皮用醋煎含漱；疮疖，根皮煎水洗；湿毒疥疮，树皮煅灰调涂；中耳炎，煅灰吹耳内。根含阿江榄仁酸（Arjunolic acid）。树皮含鞣质和有机酸。茎皮含诃子鞣质酸、并没食子酸、番石榴鞣花甙（Amritoside）。

番仔桃 见《福建中草药》。为黄花夹竹桃之别名，详该条。

番瓜 见清·赵其光《本草求原》。为南瓜之别名，详该条。

番瓜藤 见清·叶小峰《本草再新》。为南瓜藤之别名，详该条。

番杏 出《质问本草》。又名白红菜、滨莴苣。为番杏科植物番杏Tetragonia tetragonioides（Pall.）O.Ktze.的全草。分布江苏、浙江、福建、台湾、广东、云南等地。甘、微辛，平。清热解毒，消肿。①治肠炎，败血病；近用治食道癌，胃癌，子宫颈癌。煎服：45～90克。②治疔疮红肿，刀伤出血后红肿。叶捣敷。本品含丰富的铁、钙、维生素A和各种维生素B，并含磷脂酰胆碱、磷脂酰胆胺、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇、番杏素（Tetragonin）。

番泻叶 见《饮片新参》。又名旃那叶、泻叶、泡竹叶。为豆科植物狭叶番泻Cassia angustifolia Vahl 或尖叶番泻 C. acutifolia Del. 的叶。主产印度、埃及。甘、苦，寒。入大肠经。泻热导滞。治热结便秘，产褥期便秘，积滞腹胀；亦可用於腹部手术前清洁肠道。煎服：1.5～6克，后下。孕妇忌服。本品含番泻甙A、B、C，大黄酸、芦荟大黄素、植物甾醇和三者的甙，大黄酚、松醇、水杨酸等。本品有泻下作用，因作用较强，故泻下时可伴有腹痛，有效成份主要为番泻甙A、B。水浸剂在体外对某些常见致病性皮肤真菌有抑制作用。

番海棠 见萧步丹《岭南采药录》。为龙船花之别名，详该条。

番椒 见《群芳谱》。即辣椒，详该条。

番蕉叶 见《本草纲目拾遗》。为铁树叶之别名，详该条。

猢狲果 见《全国中草药汇编》。为山橙之别名，详该条。

猸皮 出《神农本草经》。即刺猬皮，详该条。

猴子七 见《陕西中草药》。为蝎子七之别名，详该条。

猴子埕 见《海南植物志》。为猪笼草之别名，详该条。

猴丹 见《中国医学大辞典》。为猴枣之别名，详该条。

猴仔草 见《实用中草药》。为臭草之别名，详该条。

猴耳草 见《全国中草药汇编》。为寻骨风之别名，详该条。

猴血七 见《陕西中草药》。为红药子之别名，详该条。

猴局根　见《闽东本草》。为苞蔷薇根之别名，详该条。

猴枣　见《饮片新参》。又名猴丹、申枣。为猴科动物猕猴Macaca mulatta Zimmermann等胆囊的结石。产印度、马来半岛、南洋群岛及我国广西等地。苦、咸，寒。入心、肺、肝、胆经。消痰镇惊，清热解毒。治痰热喘咳，小儿惊痫痰厥，瘰疬，痰核，痈疽，横痃。研末冲服：0.3～1克。

猴草　见《福建民间草药》。为老鸦糊之别名，详该条。

猴姜　出《本草拾遗》。为骨碎补之别名，详该条。

腊瓜　见《湖南科技情报（医药卫生）》（3）：44，1973。为八月札之别名，详该条。

腌芥卤　见《随息居饮食谱》。即陈芥菜卤汁，详该条。

〔丶〕

蛮姜　出《履巉岩本草》。为高良姜之别名，详该条。

痢疾草　❶见《广东中药》。为小飞扬草之别名。❷见南京药学院《中草药学》。为委陵菜之别名。❸见《江西民间草药》。为铁苋之别名。各详该条。

痢疾罐　见《贵阳民间药草》。为朝天罐之别名，详该条。

焰消　见《土宿本草》。为消石之别名，详该条。

湖南连翘　出《植物名实图考》。为红旱莲之别名，详该条。

滑石　出《神农本草经》。又名画石。为矿物滑石的块状体。产江西、山东、江苏、陕西、山西、河北、福建、浙江、广东、广西、辽宁等地。甘、淡，寒。入胃、膀胱经。清热解暑，利水渗湿。①治暑热烦渴，小便不利，淋病，水肿，湿热泻利，黄疸。布包煎服：9～24克。②治湿疹，痱子。研粉撒。本品主含含水硅酸镁。尚含氧化铝等杂质。滑石粉撒于皮肤、粘膜创面有保护作用，内服对发炎的胃肠粘膜有保护作用；可镇吐、止泻、消炎及阻止毒物吸收。

滑叶跌打　见《云南中草药》。又名清水跌打、青树跌打、止血树。为桑科植物假鹊肾树Pseudostreblus indica Bur.的树皮。分布广西、广东和云南南部。苦、辛，温。止血，止痛。①治消化道出血，胃痛，风湿痛，跌打损伤。煎服：9～15克。②治外伤出血。研末撒。本品含佛手柑内酯及东莨菪素。生药能促进家兔正常血液凝固，缩短血液凝血活素、凝血酶元时间；佛手柑内酯并有对抗肝素的作用。

滁菊　见《增订伪药条辨》。为菊花药材之一种，详菊花条。

割人藤　见《本经逢原》。为葎草之别名，详该条。

寒水石　出《吴普本草》。为天然产的红石膏与方解石。前者产辽宁、吉林、内蒙古、甘肃、河北、山西、山东等地；后者产河南、安徽、江苏、浙江、江西、广东、湖北等地。辛、咸，大寒。清热泻火。①治热病壮热烦渴。煎服：9～15克，先煎。②治丹毒，烫伤。煅研细末调敷。红石膏含硫酸钙或碳酸钙。方解石主含碳酸钙。

寒石　出《吴普本草》。为卤碱之别名，详该条。

寒豆　见《中国药用植物志》。为蚕豆之别名，详该条。

寒草　见《福建中草药》。为蓝花参之别名，详该条。

寒雀粪　见《中药志》。为五灵脂之别名，详该条。

窝儿七　见《陕西中草药》。又名窝儿参、旱荷、阿儿七。为小檗科植物中华山荷叶Diphylleia sinensis Li的根茎。分布陕西、甘肃、四川、湖北、云南等地。苦、辛，温，有毒。祛风除湿，活血解毒。①治风湿疼痛，月经不调，少腹疼痛，跌打损伤。内服：煎汤，

3～6克；或浸酒。②研末调敷痈肿疮疖。孕妇忌服。本品含鬼臼素、去氢鬼臼素和山柰酚。鬼臼素为"细胞毒"。能伤害实验性肉瘤及癌细胞，对人体正常细胞的毒性也大，口服刺激小肠，产生大量水泻，腹痛，便血。用其油溶剂或醇溶剂可除去尖头湿疣或乳状疣，此时应注意勿使药液接触健康皮肤。

窝儿参 见《陕西中草药》。为窝儿七之别名，详该条。

粪球虫 见《中药志》。为蜣螂之别名，详该条。

粪脚草 见《上海常用中草药》。为地锦草之别名，详该条。

粪箕笃 见萧步丹《岭南采药录》。又名三角藤、戽斗藤、田鸡草、犁壁藤。为防己科植物粪箕笃Stephania longa Lour.的全株。分布我国南部。苦、涩，平。清热解毒，利尿消肿，祛风活络。①治肠炎，痢疾，黄疸，疳积，膀胱炎，肾盂肾炎，肾炎，风湿性关节炎，坐骨神经痛，腰肌劳损。煎服：9～15克。②治痈疖疮疡。鲜叶捣敷。孕妇忌服。

〔7〕

犀角 出《神农本草经》。为犀科动物印度犀Rhinoceros unicornis L.或爪哇犀R. sondaicus Desmarest等的角。主产印度、尼泊尔、缅甸、泰国、马来西亚、印度尼西亚等国。苦、酸、咸，寒。入心、肝经。清热，凉血，定惊，解毒。治伤寒温疫热入血分，壮热神昏，谵语，烦躁，惊厥，斑疹，吐血，衄血，下血，急黄，热毒疮肿。磨汁或研末服；0.9～1.8克。恶川乌、草乌。本品主要成分为角蛋白，有效成分为犀氨酸（S-Sulfocysteine）。还含其他蛋白质、肽类及游离氨基酸、胍衍生物、甾醇类等。煎剂对正常及衰竭的离体蟾蜍、兔心及在体蟾蜍心脏均有强心作用；对兔、犬血压先上升而后下降，然后再持续上升。

隔山香 出《植物名实图考》。又名柠檬香碱草、鸡爪参、九步香。为伞形科植物隔山香Angelica citriodora Hance的根。分布浙江、江西、湖南、广东、福建等地。苦、辛，平。疏风清热，活血散瘀，行气止痛。治风热感冒，支气管炎，腮腺炎，胃痛，腹痛，心绞痛，风湿骨痛，痢疾，疟疾，肝硬化腹水，经闭，跌打损伤。煎服：9～15克。本品含挥发油，预试还含黄酮甙、氨基酸、有机酸等。

隔山消 ❶见《陕西中草药》。为飞来鹤之别名。❷见《昆明郊区药用植物初步调查报告》。为赤地榆之别名。各详该条。

隔子通 见《四川常用中草药》。为绒毛鸭脚木之别名，详该条。

鹭羊古 见清·刘士季《草本便方》。为杏叶防风之别名，详该条。

缅梔子 见《植物名实图考》。为鸡蛋花之别名，详该条。

十 三 画

〔一〕

瑇瑁 出《开宝重定本草》。即玳瑁，详该条。

瑞香叶 见萧步丹《岭南采药录》。为瑞香科植物瑞香Daphne odora Thunb.的叶。①治痛风，胎漏。煎服：3～6克。②治疮疡，面疔。捣敷、研末调敷或煎水洗。全草含瑞香甙、瑞香素-8-葡萄糖甙及多量伞形花内酯。瑞香甙可降低兔血液凝固性，此作用可被维生素K所拮抗；还能促进体内尿酸之排泄。

瑞香花 出清·龙柏《药性考》。又名雪冻花、雪地开花、红总管。为瑞香科植物瑞香Daphne odora Thunb.的花。长江流域以南都有栽培。甘、咸，平。祛风除湿，活血止痛。治风湿痛，坐骨神经痛，咽喉肿痛，齿痛，跌打损伤。煎服：3～6克。

瑞香根 出《本草纲目》。为瑞香科植物瑞香Daphne odora Thunb.的根。甘，咸。解毒消肿，活血散瘀。①治急喉风，胃脘痛，跌打损伤。内服：煎汤，3～6克，或研末、捣汁。②治蛇咬伤。烧酒磨浓汁涂敷。本品含瑞香醇酮（Daphneolone）。

瑞莲 出《岭南杂记》。为睡莲之别名，详该条。

塘边藕 见《广西本草选编》。为三白草之别名，详该条。

塘底菜 见《全国中草药汇编》。为龙舌草之别名，详该条。

塘鹅莲 见《生草药性备要》。为金樱叶之别名，详该条。

塘葛菜 见萧步丹《岭南采药录》。为蔊菜之别名，详该条。

椿木叶 出《新修本草》。即椿叶，详该条。

椿木皮 出《新修本草》。即椿白皮，详该条。

椿叶 出《本草纲目》。又名椿木叶、春尖叶、香椿叶。为楝科植物香椿Toona sinensis（A.Juss.）Roem.的叶。分布华北至东南和西南地区。苦、辛，平。祛风，除湿，解毒，杀虫。①治风寒感冒，肠炎，痢疾，尿道炎。煎服：60～120克。②治疥疮，漆疮。煎水洗。本品含胡萝卜素，维生素B、C。

椿白皮 出《食疗本草》。又名香椿皮、椿根白皮、椿木皮。为楝科植物香椿Toona sinensis（A.Juss.）Roem.树皮或根皮的韧皮部。产贵州、四川、湖北、陕西等地。苦、涩，凉。入大肠、胃经。清热，燥湿，涩肠，止血，杀虫。①治湿热泻痢，便血，崩漏，带下，遗精，泌尿道感染，疳积，蛔虫。煎服：6～12克。②治疮癣。煎水洗。树皮含川楝素、甾醇、鞣质。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等有抑制作用。

椿花 见《四川中药志》。为香椿子之别名，详该条。

椿树子 见《生生篇》。为香椿子之别名，详该条。

椿根白皮 见《经验方》。即椿白皮，详该条。

楝叶 出《本草纲目》。为楝科植物楝树Melia azedarach L.或川楝M.toosendan Sieb. et Zucc.的叶。前者分布华北、华东、中南及西南各地；后者分布甘肃、河南、湖北、湖南、贵州、四川、云南等地。苦，寒，有小毒。止痛，杀虫，解毒。①治疝气痛，蛔虫病。煎服：6～9克。②煎水洗滴虫性阴道炎，脓疱疮，皮肤瘙痒，湿疹，疥癣；研末敷跌打肿痛，外伤出血。苦楝叶含槲皮甙、芸香甙。一说含类胡萝卜烃(Meliatin)。

楝皮 出《斗门方》。为苦楝皮之简称，详该条。

楝花 出《本草纲目》。为楝科植物楝树Melia azedarach L.或川楝M. toosendan Sieb. et Zucc.的花。治热疟。焙干研末掺之。本品含黄酮甙：杨梅树皮素-3′-L-阿拉伯糖甙，槲皮素-3-半乳糖甙，山柰酚-3-葡萄糖甙。

楝实 出《神农本草经》。即川楝子，详该条。

楝根木皮 见《本草纲目》。即苦楝皮，详该条。

榄核莲 见《广东中草药》。为穿心莲之别名，详该条。

榅桲 出《本草拾遗》。为蔷薇科植物榅桲Cydonia oblonga Mill.的果实。我国西北各地常有栽培。酸、甘，微温。下气，消食。治呕吐酸水，食积胸闷。成熟的果实含

糖、鞣质、原果胶、有机酸和挥发油。果皮含庚基乙基醚和壬基乙基醚。种子含粘质（达20%），苦杏仁甙，脂肪油；油中含肉豆蔻酸和异油酸的甘油酯。

楸马核果 见《中国药用植物图鉴》。为核桃楸果之别名，详该条。

楸叶常山 见《现代实用中药》。为臭梧桐之别名，详该条。

楸皮 见《中药志》。为核桃楸皮之简称，详该条。

楸树皮 见《甘肃中药手册》。即核桃楸皮，详该条。

槐叶 出《食疗本草》。为豆科植物槐 Sophora japonica L.的叶。苦，平。入肝、胃经。①治小儿惊痫壮热，肠风便血，尿血。煎服：15～30克。②治痔疮，疥癣，湿疹，风疹搔痒，疔肿。煎水洗或捣敷。本品含芸香甙及刺槐素。

槐白皮 出《药性论》。又名槐皮。为豆科植物槐Sophora japonica L.的树皮或根皮的韧皮部。苦，平。祛风除湿，消肿止痛。①治肠风下血，喉痹，中风身体强直，皮肤不仁。煎服：6～15克。②治热病口疮，牙痛，煎水含漱；痈疽烂疮，捣敷；火烫伤，熬膏涂；痔疮，阴下湿痒，煎水熏洗。

槐皮 出《肘后方》。为槐白皮之简称，详该条。

槐豆 ❶见《救荒本草》。为望江南子之别名。❷见《本草原始》。即槐角。各详该条。

槐花 出《日华子诸家本草》。为豆科植物槐Sophora japonica L.的花。我国大部分地区有产。苦，凉。入肝、大肠经。清热，凉血，止血，降压。①治肠风便血，痔血，尿血，崩漏，咯血，衄血，风热目赤，痈疽疮毒，颈淋巴结结核，高血压病。煎服：6～15克。止血炒用。孕妇忌服。花蕾名槐米，又名槐蕊，功用与花同。花含芸香甙、白桦脂醇、槐花二醇，以及槐花米素甲（Sophorin A）、乙和丙。芸香甙对兔能减少毛细血管通透性，对实验性关节炎等有抗炎作用，对大鼠有解痉、抗胃溃疡作用。在动物身上有预防冻伤及抗辐射作用。

槐连灯 见《河南中药手册》。为槐角之别名，详该条。

槐连豆 见《中药材手册》。为槐角之别名，详该条。

槐角 见《本草备要》。又名槐实、槐豆、槐连灯、槐连豆。为豆科植物槐 Sophora japonica L.的果实。主产河北、山东、江苏、辽宁等地。苦，寒。入肝、大肠经。清热，凉血，止血。治肠风下血，痔血，血痢，崩漏，血淋，吐血，咯血，唾血，鼻衄，齿衄，心胸烦闷，风眩欲倒。内服：煎汤，9～15克；或研末。孕妇忌服。果实含大量芸香甙，还含染料木素、槐属甙、槐属双甙、槐属黄酮甙等。种子含脂肪油，还含金雀花碱、N-甲基金雀花碱、苦参碱等生物碱，以及血球凝集素等。浸膏能使兔产生一时性血糖升高。槐角在体外对葡萄球菌及大肠杆菌有抑制作用。

槐枝 出《名医别录》。又名槐嫩蘖。为豆科植物槐Sophora japonica L.的嫩枝。苦，平。①治崩漏，带下，胃痛，目赤，风痹。内服：煎汤，15～30克，或研末。②煎水洗痔疮，阴囊湿痒，疥癞；烧取沥，涂癣。本品含芸香甙，其药理作用见槐花条。

槐实 出《神农本草经》。即槐角，详该条。

槐根 出《名医别录》。为豆科植物槐Sophora japonica L.的根。①治喉痹，蛔虫病。煎服：30～60克。②煎水洗痔疮。本品含具抗癌作用的右旋山槐素葡萄糖甙（d-Maackiainmono-β-D-glucoside）以及消旋及右旋山槐素、去水豌豆素（Anhydropisatin）、4′-O-甲基鸢尾黄酮（Irisolidone）、5，7-二羟基-3′，4′-甲二氧基异黄酮（5，7-dihydroxy-3′4′-methylenedioxyisoflavone）、鹰嘴豆芽素A（Biocha-

nin A)、β-谷甾醇等。

槐蓝 出《本草拾遗》。为木蓝之别名，详该条。

槐嫩蘖 出《新修本草》。为槐枝之别名，详该条。

榆子 见《食疗本草》。即榆实，详该条。

榆叶 出《本草经集注》。为榆科植物榆树Ulmus pumila L.的叶。甘，平。利小便。①治石淋，水肿。煎服：4.5～9克。②煎汁洗酒皶鼻。

榆白皮 出《药性论》。又名榆皮。为榆科植物榆树Ulmus pumila L.的树皮或根皮的韧皮部。我国大部分地区有分布。甘、平。利水，通淋，消肿。①治小便不通，淋浊，水肿。内服：煎汤，4.5～9克；或入散剂。②治痈疽发背，丹毒，疥癣。鲜品捣敷、研末调敷或煎水洗。本品含β-谷甾醇、植物甾醇、豆甾醇等多种甾醇类及鞣质、树胶、脂肪油。

榆皮 出《神农本草经》。即榆白皮，详该条。

榆实 出《神农本草经》。又名榆子、榆荚仁、榆钱。为榆科植物榆Ulmus pumila L.的果实。我国大部分地区有分布。微辛，平。健脾利湿，安神，杀虫。治带下，食欲不振，神经衰弱失眠，小儿疳热羸瘦。煎服：4.5～9克。果实每100克含蛋白质3.8克，脂肪1克，碳水化物8.5克，钙280毫克，磷100毫克，铁22毫克，维生素$B_1$0.05毫克，维生素$B_2$0.1毫克，尼克酸1.4毫克。

榆荚仁 见《经史证类备急本草》。为榆实之别名，详该条。

榆钱 见《救荒本草》。为榆实之别名，详该条。

楤木白皮 见《本草纲目》。为五加科植物楤木Aralia chinensis L.根皮或树皮的韧皮部。分布华北、华中、华东、华南、西南地区。辛，平，有小毒。祛风除湿，利尿消肿，活血止痛。①治风湿性关节炎，肾炎水肿，淋浊，带下，糖尿病，急、慢性肝炎，肝硬化腹水，胃痛。煎服：9～30克。②治跌打损伤，瘰疬，痈肿。鲜品捣敷。孕妇忌服。本品含三萜皂甙（甙元为齐墩果酸）、鞣质、胆碱及挥发油。齐墩果酸腹腔注射对大鼠实验性关节炎有明显的抗炎作用。

楼台草 见《滇南本草》。为蜜菜之别名，详该条。

赖桐叶 见《福建民间草药》。又名红蜻蜓叶。为马鞭草科植物赖桐 Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet的叶。分布浙江及中南、西南地区。甘、酸，凉。清热解毒，散瘀消肿。捣敷痈疖肿毒，疔疮，跌打损伤。

赖桐花 见《南方草木状》。为荷苞花之别名，详该条。

赖尿郎 见《本草便读》。为桑螵蛸之别名，详该条。

鼓槌草 见《药材资料汇编》。为谷精草之别名，详该条。

蓍草 出《本草纲目拾遗》。又名一枝蒿、锯草、蜈蚣草。为菊科植物蓍Achillea alpina L.的全草。分布东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、江苏等地。苦、酸，平。入心、肝经。抗菌消炎，活血，祛风，定痛，解毒。①治扁桃体炎，肠炎，痢疾，阑尾炎，肾盂肾炎，盆腔炎，风湿疼痛，胃痛，痛经。内服：煎汤，15～45克，必要时日服二剂。②治跌打损伤，痈疖肿毒，蛇咬伤，腹中痞块。鲜品捣敷或研末醋调敷。孕妇忌服。本品含蓍素（Achillin）、兰香油萜、右旋樟脑、乌头酸、去乙酰母菊酮素（Deacetyl matricarin）和桉叶素。预试还含生物碱、香豆素、黄酮类、氨基酸、甾醇、酚类及还原性物质等。在体外对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等均有较强的抑制作用。

蓝子 出《本草经集注》。即蓝实，详该条。

蓝布正 见《全国中草药汇编》。又名五气朝阳草、水杨梅、见肿消、头晕药、追风七。为蔷薇科植物南水杨梅 Geum japonicum Thunb. var. chinense Bolle的全草或根。分布陕西、江西、四川和云南等地。辛、苦，平。补脾肾，祛风湿，降血压，活血消痈。①治虚劳咳嗽，腰腿痛，崩漏，带下，月经不调，小儿慢惊，腹泻，痢疾，高血压头晕头痛。煎服：9～30克。②外敷痈、疖、肿毒，跌打损伤。根含水杨梅甙(Gein)。

蓝布裙 出《四川通志》。为狗屎花之别名，详该条。

蓝地柏 见《植物学大辞典》。为翠云草之别名，详该条。

蓝色草 见《广州植物志》。为孩儿草之别名，详该条。

蓝花参 ❶出《滇南本草图谱》。又名兰花参、细叶沙参、拐棍参、罐罐草、寒草。为桔梗科植物蓝花参 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A.DC.的根或全草。分布长江以南各地。甘、微苦，平。入脾、心经。补虚健脾，化痰止咳。治虚损劳伤，自汗，盗汗，咳血，衄血，感冒，咳嗽，妇女白带，小儿疳疾。煎服：9～15克(鲜品30～60克)。❷见《云南中草药》。为狗屎花根之别名，详该条。

蓝花柴胡 见《广西中草药》。为大叶蛇总管之别名，详该条。

蓝花菜 见《全国中草药汇编》。为鸭跖草之别名，详该条。

蓝矾 见《中药材手册》。为胆矾之别名，详该条。

蓝实 出《神农本草经》。又名蓝子。为蓼科植物蓼蓝Polygonum tinctorium Ait.的果实。分布辽宁、河北、山东、山西、陕西、湖北、广东、广西、四川。甘，寒。清热，解毒。①治温热发斑，咽痛。煎服：3～9克。②治肿毒，疮疖，湿疹。煎服并研末调敷。

蓝雪草 见《高原中草药治疗手册》。为鸡娃草之别名，详该条。

蓝蝴蝶 见《广州植物志》。为鸢尾之别名，详该条。

蓝藤 见《湖南野生植物》。为昆明鸡血藤之别名，详该条。

墓头灰 见《山西中草药》。即墓头回，详该条。

墓头回 出《本草纲目》。又名墓头灰、追风箭、虎牙草、摆子草。为败酱科植物异叶败酱Patrinia Neterophylla Bge.或糙叶败酱P. scabra Bge.等的根。主产山西、河北、河南。苦、微酸、涩，凉。清热燥湿，祛瘀，截疟。①治崩漏，子宫颈糜烂，赤白带下，赤痢。现用治早期宫颈癌。煎服：9～15克。②治温疟，15～30克，水煎于疟发前一小时服。本品含挥发油。对小鼠艾氏腹水癌有抑制作用。

蓖麻子 出《新修本草》。又名八麻子、金豆、天麻子果。为大戟科植物蓖麻 Ricinus communis L.的种子。我国大部分地区有栽培。甘、辛，平。有毒。入大肠、肺经。消肿，排脓，拔毒，通便。①治痈疽肿毒未溃，瘰疬，疥癞，竹、木刺及金属入肉，捣敷；面神经麻痹，捣敷患侧；子宫脱垂，脱肛，胃下垂，捣敷百会穴；难产，胎盘不下，捣敷涌泉穴。②治肠内积滞，水肿腹满便秘。炒食：二、三粒至十几粒。本品不可生食。中毒时先出现咽喉灼热，头痛，恶心呕吐，腹痛腹泻，无尿或血尿，痉挛，最后血压下降，休克，呼吸停止而死亡。孕妇及大便泄泻者忌服。本品含三种蓖麻毒蛋白：蓖麻毒蛋白-D、酸性蓖麻毒蛋白和碱性蓖麻毒蛋白。还含蓖麻碱、蓖麻油。蓖麻油在肠内水解释出蓖麻油酸，刺激小肠蠕动而通便。蓖麻毒蛋白7毫克或蓖麻碱0.16克可使成人中毒死亡，儿童口服生蓖麻子5～6粒，成人20粒即可致死。加热后毒性物质即被破

坏。蓖麻毒蛋白对接种艾氏腹水癌小鼠有一定的抗肿瘤作用。

蓖麻叶 出《新修本草》。为大戟科植物蓖麻Ricinus communis L.的叶。甘、辛，平，有小毒。消肿拔毒，止痒。①治痈疮肿毒，鹅掌风，捣烂外敷；湿疹，煎水洗；脚气肿痛，取叶蒸熟热熨；下肢溃疡，叶醋浸一周，裹敷患处；阴道滴虫，鲜叶煎水坐浴。②治咳嗽痰喘。内服：6～9克，入丸、散用。本品含芸香甙、黄芪甙、异槲皮甙、山柰酚、槲皮素、蓖麻碱及维生素C；还含脂肪油，其中不饱和脂肪酸有亚油酸、β-桐油酸、亚麻酸、油酸等。煎剂可使狗血压下降，大鼠后肢血管扩张。浸剂对离体心脏能使心收缩力增加。叶及其浸膏能杀灭蝇蛆及蚊类幼虫。

蓖麻油 出《新修本草》。为大戟科植物蓖麻Ricinus communis L.种子的脂肪油。润肠通便。①治大便燥结。内服：提纯蓖麻油，10～20毫升。②治烧伤，蓖麻油和等量的3～5%漂白粉上清液，调和成乳状，涂患处；治疥癞，涂敷。孕妇忌服。油中脂肪酸的组成主要为顺蓖麻酸（Ricinoleic acid）。甘油脂的组成为三蓖麻酸酯（Triricinolein）、二蓖麻酸脂、一蓖麻酸脂等。药理作用参见蓖麻子条。

蓖麻根 见《民间常用草药汇编》。为大戟科植物蓖麻Ricinus communis L.的根。淡，微温。祛风活血，镇静解痉。治风湿疼痛，跌打瘀痛，破伤风，癫痫，精神分裂症。内服：煎汤，15～30克；或炖肉食。本品含反癸烯-2-三炔-4，6，8-酸甲酯、十三烯-1-五炔-3，5，7，9，11、吲哚-3-乙酸及β-谷甾醇。

蓬子菜 出《救荒本草》。又名铁尺草、刘芙蓉草、疔毒草、黄米花。为茜草科植物蓬子菜Galium verum L.的全草。分布东北、西北至长江流域。苦、甘，微寒。清热，解毒，活血。①治肝炎，咽喉肿痛，静脉炎，妇女血气痛。煎服：9～15克。②治急性荨麻疹，稻田皮炎，痈疖疔疮，蛇咬伤，跌打损伤。煎服或捣汁搽。全草含挥发油，油中有甲基香荚兰醛、向日葵素。还含槲皮黄甙、异槲皮甙、槲皮素-3、7-二葡萄糖甙、木犀草素-7-葡萄糖甙，芸香甙、喇叭茶甙（Palustroside）、绿原酸等。根含茜黄樱草糖甙（Rubiadin primeveroside）、伪紫茜素葡萄糖甙。全草有利胆作用。

蓬朮 见《普济方》。为蓬莪朮之简称，详该条。

蓬莪朮 出唐·侯宁极《药谱》。又名蓬朮、莪朮、山姜黄、芋儿七、广朮。为姜科植物莪朮Curcuma zedoaria（Berg.）Rosc.、郁金C. aromatica Salisb.或广西莪朮C.kwangsiensis S.Lee et C. F. Liang的根茎。主产广西、四川、浙江。苦、辛，温。入肝、脾经。行气，破血，消积，止痛。治癥瘕积聚，血瘀经闭，跌打损伤，饮食积滞，脘腹胀痛。煎服：4.5～9克。孕妇忌服。郁金的根茎经蒸馏而得的挥发油，名莪朮油，再取莪朮油制成莪朮油注射液，用于早期子宫颈癌，作局部瘤体注射，一次5～10毫升，一日一次。或稀释后静脉滴注。莪朮根茎含挥发油，其中含桉叶素、蓬莪朮酮（Zedoarone）、姜黄环氧莫醇（Curcumol）、蓬莪朮环氧酮（Zederone）等多种倍半萜类。还含姜黄素、去氢姜黄二酮。郁金根茎含挥发油，已分离出姜黄环氧莫醇，姜黄二酮（Curdione）、四甲基吡嗪、樟脑、龙脑、异龙脑等。还含蓬莪朮烯（Curzerene）。挥发油对小鼠肉瘤-180有较强的抑制作用。姜黄环氧莫醇对人的宫颈癌有较好疗效。姜黄二酮对宫颈癌、小鼠肉瘤—37、艾氏腹水癌等均有显著抑制、破坏作用；对人的宫颈癌疗效也较好。在试管中，挥发油对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠杆菌有抑制作用。莪朮对肠胃道有兴奋作用，可用于气胀性腹痛。

蓬藂 出《神农本草经》。为蔷薇科植物灰白毛莓 Rubus tephrodes Hance 的果实。分布安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广西。甘、酸，温。补肝肾，益气。治头晕，目眩，病后体虚，神经衰弱，多尿。煎服：9～15克。

蒟(jǔ矩)叶 见《本经逢原》。为蒟酱叶之简称，详该条。

蒟蒻（ruò 弱） 出《开宝重定本草》。又名蒻头。为天南星科植物魔芋Amorphophallus rivieri Durieu的块茎。分布广西、云南、四川、贵州、湖北、甘肃、陕西等地，多为栽培。辛，温，有毒。化痰散结，行瘀消肿。①治痰嗽，积滞，疟疾，瘰疬，经闭，近用于治癌肿，脑瘤。煎服：9～15克，须久煎3小时后服。②治跌打损伤，痈肿，疔疮，丹毒，毒蛇咬伤，烧、烫伤。醋磨涂或煮熟捣敷。内服过量或煎煮时间不足，均易引起中毒，表现为舌、咽喉灼热、痒痛、肿大。本品含魔芋甘露聚糖（Konjacmannan）约50%，蛋白质30%，淀粉以及葡萄糖、甘露糖、果糖、蔗糖等。温浸液对动物有乙酰胆碱样作用(扩张末梢血管、兴奋肠管)。

蒟酱 出《新修本草》。又名土革拨、青蒟、青蒌、芦子。为胡椒科植物蒟酱 Piper betle L.的果穗。产云南、广东、广西等地。辛，温。温中，下气，散结，消痰。①治脘腹冷痛，吐泻，虫积腹痛，咳逆上气。煎服：3～6克。②研末掺治牙痛。

蒟酱叶 出《新修本草》。又名蒟叶、蒌叶、青老叶。为胡椒科植物蒟酱Piper betle L.的叶。主产广东。辛、微甘，温。祛风，温中，燥湿，消肿，止痒。①治风寒咳嗽，哮喘，胃痛，风湿痹痛，子肿。煎服：9～15克。②治疥癞，湿疹，脚癣，捣敷或煎水洗；烫伤，研末撒或调敷。本品含挥发油，其成分为丁香油酚、胡椒酚、蒌叶酚等，还含多种氨基酸、维生素C、铁等。水提取物及挥发油在试管中对金黄色葡萄球菌，变形、伤寒、大肠杆菌等及某些常见致病性真菌均有抑菌作用。蒌叶酚为抗菌有效成分；挥发油在试管内对某些原虫，蚯蚓有杀灭作用；对动物肠管有抑制及解痉作用。

蒡箕茶 见清·汪双池《医林纂要·药性》。为乌药叶之别名，详该条。

蒺藜子 出《神农本草经》。即刺蒺藜，详该条。

蒺藜苗 出《本草纲目》。又名蒺藜蔓、蒺藜草。为蒺藜科植物蒺藜 Tribulus terrestris L.的茎叶。全国大部分地区有分布。苦、辛，微温。入肝、肺经。①治慢性气管炎。内服：制成糖浆或蜜丸服。②治痈肿，水煎浓汁外涂；急慢性鼻炎，滴鼻；疥癣，皮肤瘙痒，煎汤洗。蒺藜花：阴干为末，酒调服治白癜风。叶含刺蒺藜甙、黄芪甙、山柰酚和多种山柰酚甙；并含哈尔满碱和哈尔明碱，皂甙，少量挥发油及油脂。结果期的地上部分还含芸香甙。

蒺藜草 见《陕甘宁青中草药选》。即蒺藜苗，详该条。

蒺藜蔓 见《千金翼方》。即蒺藜苗，详该条。

蒲公英 出《新修本草》。又名黄花地丁、婆婆丁、奶汁草、黄花三七。为菊科植物蒲公英 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. 的带根全草。全国大部分地区均有分布。苦、甘，寒。入肝、胃经。清热解毒，消毒散结。治上呼吸道感染，扁桃体炎，咽喉炎，流行性腮腺炎，眼结膜炎，淋巴结炎，肺炎，急性胆囊炎，胰腺炎，肝炎，胃炎，肠炎，痢疾，急性乳腺炎，阑尾炎，尿路感染，盆腔炎，疔疮疖肿。煎服：9～30克。外用：鲜品捣敷。本品含蒲公英甾醇、胆碱、菊糖和果胶等。注射液对金黄色葡萄球菌有显著抑制作用，对溶血性链球菌、肺炎球菌、脑膜炎球菌、白喉杆菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌、变形杆菌等亦有抑制作用。水浸剂对常见致病性皮肤真菌有抑制作用；醇提

物对钩端螺旋体有抑制作用，动物试验尚有健胃、轻泻、利胆及保肝作用。

蒲包草 见《本草纲目拾遗》。为香蒲之别名，详该条。

蒲包草根 见《上海常用中草药》。为蒲蒻之别名，详该条。

蒲草黄 见《药材学》。即蒲黄，详该条。

蒲厘 出《本草图经》。为蒲棒之别名，详该条。

蒲种壳 见《药材资料汇编》。又名地蒲壳、扁蒲壳。为葫芦科植物瓠子 Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. hispida (Thunb.) Hara老熟的干燥果皮。我国各地有栽培。苦，寒。利水消肿。治水肿胀满，小便不通。煎服：9～15克。

蒲桃 见《广西本草选编》。又名水蒲桃。为桃金娘科植物蒲桃 Syzygium jambos (L.)Alston的果实。我国云南、广东、广西、福建、台湾有栽培或野生。甘、涩，平。收敛。治腹泻，痢疾。煎服：15～30克。果皮名蒲桃壳，煎服治肺虚寒嗽，止呃逆。蒲桃根皮：治刀伤出血，研末撒。根皮含蒲桃碱及油树脂、生物碱等。

蒲栗子 见苏州医学院等《中草药手册》。为胡颓子之别名，详该条。

蒲笋 见《日用本草》。为蒲蒻之别名，详该条。

蒲扇 见《江苏药材志》。为白果叶之别名，详该条。

蒲黄 出《神农本草经》。又名蒲棒花粉、蒲草黄。为香蒲科植物水烛Typha angustifolia L.或宽叶香蒲T. latifolia L.等的花粉。全国大部分地区均产。甘，平。入肝、心经。活血祛瘀，止血，收敛。①治瘀血阻滞，心腹刺痛，经闭腹痛，痛经，产后瘀滞作痛，跌打瘀痛，疮疖肿毒，小便不利。②炒黑治吐血，衄血，尿血，便血，崩漏，带下。煎服：4.5～9克。③治重舌，口疮，聤耳流脓，创伤出血，阴囊湿痒。撒患部。孕妇慎服。香蒲和宽叶香蒲的花粉均含黄酮甙（甙元为异鼠李素）、β-谷甾醇、脂肪油等。香蒲还含α-香蒲甾醇（α-Typhasterol）。煎剂对动物子宫有兴奋作用。水或醇浸液可使兔凝血时间缩短，煎剂在体外对结核杆菌有抑制作用，对豚鼠实验性结核病也有一定疗效。

蒲黄草 出《经效产宝》。为香蒲之别名，详该条。

蒲黄根 出《产乳集验方》。为蒲蒻之别名，详该条。

蒲棒 出《本草衍义》。又名水蜡烛实、蒲厘、蒲槌。为香蒲科植物水烛Typha angustifolia L. 或宽叶香蒲T. latifolia L. 等的果穗。我国各地均有分布。甘、微辛，平。消炎止血。外用治创伤出血。

蒲棒花粉 见《新疆药材》。为蒲黄之别名，详该条。

蒲葵 见萧步丹《岭南采药录》。又名扇叶葵、葵扇木。为棕榈科植物蒲葵Livistona chinensis R. Br.的叶柄、种子或根。分布我国南部。甘、涩，平。①叶柄：止血。治血崩。煎服：6～9克；或煅存性研末。治外伤出血。煅存性研末撒。②种子：抗癌。治食道癌，绒毛膜上皮癌，恶性葡萄胎，白血病。煎服：30～60克。须久煎。③根：止痛。治各种痛症。制成浸膏片服；或制成注射剂供肌肉注射。种子预试含酚类、还原糖、鞣质；并含甘油三酯。

蒲槌 出《本草衍义》。为蒲棒之别名，详该条。

蒲蒻 出《本草纲目》。又名蒲黄根、蒲笋、蒲包草根。为香蒲科植物水烛Typha angustifolia L.或宽叶香蒲T.latifolia L.等的带有部分嫩茎的根茎。甘，凉。清热凉血，利水消肿。治胎动下血，消渴，口疮，咳喘，热痢，小便淋沥，带下，水肿，瘰疬。内服：煎汤，3～9克；或捣汁服。

蒲颓子 见《本草纲目》。即胡颓子，详该条。

蒲颓叶 出《中藏经》。为胡颓子叶之别名，详该条。

蒴藋 出《名医别录》。又名扦扦活、接骨草、走马箭、七叶麻。为忍冬科植物蒴藋 Sambucus chinensis Lindl.的全草或根。分布华东、中南、西南及陕西、甘肃、宁夏等地。甘、酸，温。活血消肿，祛风除湿。①治跌打损伤，骨折疼痛，风湿关节炎。内服：煎汤，9～15克。外用：捣敷。②治肾炎水肿，脚气，茎叶煎服。③治瘰疬，根研末调敷；风疹瘙痒，全草煎水洗；疮痈肿毒，鲜草捣敷。孕妇忌服。蒴藋的果实名蒴藋赤子，捣烂涂治疣目。全草含黄酮类、酚类、鞣质、熊果酸、β-谷甾醇、绿原酸等。种子含氰甙类。外敷酒调剂，内服煎剂可加速骨折愈合；油膏剂能轻度减少毛细血管通透性，有轻度消肿作用。

蒟头 出《开宝重定本草》。为蒟蒻之别名，详该条。

蒙花 见《本草求真》。为密蒙花之简称，详该条。

蒙花珠 见《中药材手册》。为新蒙花之别名，详该条。

蒙顶茶 见《本草纲目》。为石蕊之别名，详该条。

硼砂 出《日华子诸家本草》。又名月石。为矿物硼砂经精制而成的结晶。主产青海、西藏。甘、咸，凉。入肺、胃经。解毒防腐，清热化痰。①治咽喉肿烂，口舌生疮，与冰片等研粉吹患处；目赤肿痛，制成眼药点眼。②治热痰咳嗽，喧膈。研末服：0.9～1.5克。本品为含水四硼酸钠。与硼酸一样有较弱的抑菌作用。可用以冲洗溃疡、脓肿，特别是粘膜发炎，因本品为碱性，可使粘膜去垢。口服用于尿道杀菌，特别尿为酸性时，可使之成碱性。

碎叶青花 见《湖南药物志》。为秋鼠曲草之别名，详该条。

碎米柴 出《本草纲目》。又名辫子草、爬地香、哮灵草、小叶山绿豆。为豆科植物小叶三点金草 Desmodium microphyllum (Thunb.)DC.的全草。分布四川、云南、贵州、广西、广东、湖南、湖北、安徽、江苏、江西、福建、台湾。甘，平。健脾利湿，止咳平喘，清热解毒。①治小儿疳积，慢性胃炎，黄疸，痢疾，泌尿系结石，慢性气管炎，哮喘，小儿肺炎，眼结合膜炎。煎服：15～30克。②治痈疮，漆疮，痔疮，煎水洗；烫伤，研末油调涂；蛇咬伤，捣敷。本品含生物碱、三萜皂甙、香豆素、糖类、蛋白质、油脂、挥发油、酸性树脂、鞣质和酚类等成分。水浸出物对小鼠有镇咳作用，对大鼠有祛痰作用，对豚鼠组织胺性哮喘有预防作用。煎剂对离体肠管有解痉作用。

碎米棵 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·五官疾病》。为铁仔之别名，详该条。

碎骨子 出《本草纲目》。为禾本科植物淡竹叶Lophatherum gracile Brongn.的块根。产浙江、江苏、湖南、湖北、广东等地。甘，寒。清热，利尿，滑胎。治热病心烦口渴，肾炎。煎服：9～15克。孕妇忌服。

鹌子嘴 见《山东中药》。为老鹳草之别名，详该条。

感应草 见南京药学院《中草药学》。为含羞草之别名，详该条。

雷丸 出《神农本草经》。又名竹苓、雷实、竹铃芝。为多孔菌科植物雷丸 Omphalia lapidescens Schroet.的菌核。主产四川、贵州、云南。苦，寒，有小毒。入胃、大肠经。杀虫。治绦虫病、钩虫病、蛔虫病，脑囊虫病。研粉服：每次3～6克，每天二至三次，连服二至三天。不宜入煎剂。本品主要成分是一种蛋白酶称雷丸素。浸出液（不可煎服）有驱绦虫作用，雷丸中的蛋白酶能分解蛋白质，从而破坏绦虫节片。煎剂在试管中有抗阴道滴虫作用。

雷丸草 出《外丹本草》。为天葵之别名，

详该条。

雷公头 见《本草纲目》。为香附之别名，详该条。

雷公根 见《江苏省植物药材志》。为积雪草之别名，详该条。

雷公藤 见《中国药用植物志》。又名黄藤木、断肠草、红药。为卫矛科植物雷公藤 Tripterygium wilfordii Hook.f.的全株。分布长江流域以南至西南地区。苦，寒，有大毒。消炎，解毒。治风湿性关节炎，捣敷患处半小时除去，否则起泡；治烧伤，煎液涂搽伤面；治皮肤瘙痒，捣烂涂擦。本品皮部毒性更大，不可内服。误服本品的中毒症状为恶心、呕吐、腹痛、腹泻，血压下降，呼吸微弱，最后因心脏及呼吸抑制而死亡。根含雷公藤定碱(Wilfordine)、南蛇藤肉桂酰胺碱(Celacinnine)、南蛇藤苯酰胺碱(Celabenzine)、南蛇藤糠酰胺碱(Celafurine)等多种生物碱。还含具抗癌活性的雷公藤内酯醇(Triptolide)、雷公藤内酸酮(Triptonide)以及雷公藤内酯二醇(Tripdiolide)、南蛇藤醇(Celastrol)、鞣质等，根皮中含山海棠素(Hypolide)。

雷实 出《吴普本草》。为雷丸之别名，详该条。

零乌豆 见《本草汇言》。为野料豆之别名，详该条。

零余子 出《本草拾遗》。又名薯蓣果。为薯蓣科植物薯蓣Dioscorea opposita Thunb.的珠芽。全国大部分地区均有栽培或野生。甘，温。入肾经。补肾虚，强腰脚。治遗精，小便频数。煎服：15～30克。本品含山药素(Batatasin)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。

零陵香 出《本草拾遗》。又名熏草、陵草、熏衣草、满山香。为报春花科植物灵香草 Lysimachia foenum-graecum Hance的全草。分布广东、广西、四川、云南、贵州等地。辛、甘，平。祛风寒，行气，止痛，驱蛔。①治感冒头痛，鼻塞，咽喉肿痛，胸腹胀满，下利，遗精。煎服：4.5～15克。②治蛔虫病。4.5～15克，水煎，于睡前一次服。③治牙痛，研末撒或煎水含漱。本品含挥发油。

雾水葛 出《生草药性备要》。又名啜脓膏、拔脓膏、脓见消、粘榔根。为荨麻科植物雾水葛 Pouzolzia zeylanica(L.)Benn.的全草。分布福建、湖北、湖南、广西、广东、四川、云南等地。甘、淡，凉。清热利湿，排脓解毒。①治尿路感染，肠炎，痢疾。煎服：15～30克。②治痈疽疮疖，鲜品捣敷；风火牙痛，捣汁含漱。

雹瓜 出《太平圣惠方》。为王瓜之别名，详该条。

摄龟 出《尔雅》。为夹蛇龟之别名，详该条。

摆子草 见《全国中草药汇编》。为墓头回之别名，详该条。

搬倒甑 见《中草药通讯》(2)：43，1971。为紫金莲之别名，详该条。

摊地莓 见《浙江民间常用草药》。为三月泡之别名，详该条。

〔丨〕

频婆果 出《岭外代答》。为凤眼果之别名，详该条。

暗山公 见《生草药性备要》。为山大颜之别名，详该条。

睡莲 出《本草纲目拾遗》。又名瑞莲、子午莲、茈碧花。为睡莲科植物睡莲Nymphaea tetragona Georgi 的花。我国大部分地区有分布。治小儿急、慢惊风，并可消暑解酲。煎服：7～14朵。

睡菜 出《本草纲目》。又名瞑菜、醉草、水胡豆。为龙胆科植物睡菜 Menyanthes trifoliata L.的根或全草。分布东北、西南地区及河北、陕西等地。甘、微苦，凉。清利湿热，健胃安神。治急性胃炎，黄疸，胆囊炎，消化不良，小便赤涩，心中邪热不得眠。煎服：6～12克。根茎含白桦脂酸、睡

菜根甙甲和乙、双氢睡菜根甙乙。全草含龙胆宁碱、龙胆次碱、欧龙胆碱、西藏龙胆碱等生物碱，睡菜苦甙(即番木鳖甙)，芸香甙，金丝桃甙，车轴草甙，睡菜根甙甲和乙，双氢睡菜根甙乙，开联番木鳖甙 (Secologanin)，鞣质，脂肪油等。花、果含挥发油，主成分为 α-蒎烯、桉叶素等。叶、根煎剂可作苦味健胃剂，并有泻下作用，大量可致吐。味苦与其中所含之睡菜苦甙有关。

蜈蚣 出《神农本草经》。又名百脚、天龙。为蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣Scolopendra subspinipes mutilans L. koch的干燥全体。主产江苏、浙江、湖北、湖南、安徽、河南、陕西等地。辛，温，有毒。入肝经。祛风，定惊，攻毒。①治中风，惊痫，痉挛抽搐，破伤风，面神经麻痹，风湿疼痛，百日咳，骨结核，淋巴结结核，骨髓炎，风癣。现用治癌症。煎服：1.5～3克；研末吞服：0.9～1.5克。②治疔疮肿毒，溃疡，瘘管久不收口，毒蛇咬伤。研撒或油调敷。孕妇忌用。蜈蚣含二种类似蜂毒的有毒成分：组胺样物质及溶血蛋白质。还含胆甾醇、氨基酸等。蜈蚣粉对小鼠有抗惊厥作用。水浸剂对常见致病性皮肤真菌有抑制作用。

蜈蚣七 见《陕甘宁青中草药选》。为鸡血七之别名，详该条。

蜈蚣草 ❶见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为肾蕨之别名。❷见《分类草药性》。为蓍草之别名。❸见《湖南药物志》。为蜘蛛抱蛋之别名。❹见《福建民间草药》。为鲫鱼胆草之别名。各详该条。

蜈蚣蒿 见《陕西中草药》。为洋蓍草之别名，详该条。

蜗牛 出《名医别录》。又名蠡牛、蜒蚰蠃、天螺蛳。为蜗牛科动物蜗牛Eulota simiaris Ferussac的全体。产广西、广东、湖南、江西等地。咸，寒。清热，解毒，利水，消肿。①治风热惊痫，喉痹，小便不利。煎服：30～60克；或捣汁、焙干研末服。②治疟腮，瘰疬，痈肿，痔疮，脱肛，蜈蚣咬伤。捣敷或焙干研末调敷。

蛾药 见《云南中草药》。又名火把花、火草。为菊科植物华火绒草 Leontopodium sinense Hemsl.的根。分布云南、贵州、四川。辛，凉。清热解毒，消炎止痛。治扁桃体炎，咽喉炎。研末吹喉。内服：研末，每次0.9～1.5克，每日三次。

蛾眉豆 见《本草纲目》。为扁豆之别名，详该条。

蜂子 出《神农本草经》。即蜜蜂子，详该条。

蜂斗菜 见《江西草药》。又名蛇头草、野南瓜。为菊科植物蜂斗菜Petasites japonicus(Sieb.et Zucc.)F.Schmidt的根茎。分布江西、安徽、福建、湖北、四川、陕西等地。苦、辛，凉。解毒，散瘀。①治蛇咬伤，痈肿疔毒，跌打损伤。内服：煎汤，9～15克；或捣汁服。外用：捣敷。②治扁桃体炎。煎水频频含漱。本品含蜂斗菜素(Petasin)、百里香酚甲醚、橐吾烯酮(Ligularone)、白蜂斗菜素(Petasalbin)、白蜂斗菜素甲醚、白蜂斗菜素当归酸酯、呋喃蜂斗菜醇(Furano-fukinol)、呋喃蜂斗菜单酯(Furanojaponin)等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

蜂乳 见《中国药学会1962年学术会议论文文摘集》。为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 Apis cerana Fabricius 或意大利蜜蜂 A. mellifera L. 工蜂咽腺分泌的乳糜(王浆)和蜂蜜配制而成的液体。甘、酸，平。滋补强壮。用于老年体衰，病后虚弱，小儿营养不良，慢性肝炎，溃疡病，高血压病，心血管机能不全，糖尿病，风湿性关节炎等的辅助治疗。温开水冲服，3～5毫升。本品含果糖、葡萄糖、蔗糖、核糖、蛋白质、氨基酸、脂肪、乙酰胆碱及丰富的维生素；还含多种酶，芸香甙，促性腺样物质和抗菌素类物质等。本品能加强机体抵抗力及促进生长。对大白

鼠的实验性肝炎有一定保护作用。对动物有促性腺功能及促肾上腺皮质激素样作用。对大白鼠由四氧嘧啶引起的糖尿病有降血糖作用。

蜂房 见《中国药学大辞典》。为露蜂房之简称，详该条。

蜂毒 见《吉林中草药》。又名蜜蜂毒素。为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂Apis Cerana Fabicius或意大利蜜蜂A.mellifera L.工蜂尾部螫刺腺内的有毒液体。苦、辛，平。祛风湿，镇痛。治风湿性关节炎，类风湿性关节炎，坐骨神经痛，腰肌酸痛，支气管哮喘。用蜂毒制备的水剂或油剂作皮内注射，以200蜂毒为一疗程，开始以1蜂毒(约0.1毫升量)皮内注射，如无不良反应，可隔日递增1蜂毒，直至一次注射10蜂毒。然后视病人情况应用维持剂量，每次3～6蜂毒，隔日一次，至总量达200蜂毒为止，全程约三个月。注射后局部红肿直径超过10厘米者，即不宜再行蜂毒治疗。民间也有捕捉蜜蜂直接螫刺皮肤治病的。蜂毒毒性成分有磷酯酶A、脱痉酶抑制因子及多肽类。并含蚁酸、组胺等。对大鼠有促肾上腺皮质激素样作用；对甲醛性关节炎有抗炎作用；对动物有降压和降胆固醇的作用，有增强中枢抑制药的作用。对小鼠有抗惊厥作用。此外，还有镇痛作用。

蜂胶 见江西药科学校《中草药学》。为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂Apis cerana Fabricius或意大利蜜蜂A.mellifera L.所分泌的黄褐色或黑褐色的粘性物质。辛，温。软化角化组织，止痛。治鸡眼，胼胝，瞧疣和寻常疣，皲裂。适量外涂。本品含树脂50～60%，蜂蜡30%及挥发油10%。临床上供口腔科手术局部麻醉用。使角化组织软化脱落，脱落后并有保护润滑穴窝内肉芽生长的作用。体外试验对链球菌、葡萄球菌、伤寒杆菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等均有抑制作用。

蜂巢 见《中国药学大辞典》。即露蜂房，详该条。

蜂蜡 见《现代实用中药》。又名蜜蜡、黄蜡、白蜡、黄占、白占。为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂Apis cerana Fabricius或意大利蜜蜂A. mellifera L.分泌的蜡质，经精制而成。甘、淡，平。收涩，解毒，生肌，定痛。①治疮痈久溃不敛，臁疮，烧烫伤。熔化敷患处。②预防痈疽毒气内攻。配白矾等制成丸剂服。③治赤白下痢，胎动腹痛下血。溶化后入煎剂和服，4.5～9克。本品含酯类、游离蜡酸、游离蜂醇、虫蜡素(Cerolein)。此外还含微量的挥发油及色素。

蜂窝草 ❶见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名打毒金、绣球防风。为唇形科植物绉面草Leucas zeylanica (L.)R. Br.的全草。分布广东、广西、云南等地。苦、辛，温。疏风解表，止咳，通经。治感冒，咳嗽，哮喘，百日咳，闭经。煎服：9～15克。❷见《贵州民间药物》。为风轮菜之别名，详该条。

蜂窝菊 见《昆明民间常用草药》。为万寿菊之别名，详该条。

蜂蜜 出《本草纲目》。又名白蜜、蜜糖。为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂Apis cerana Fabricius或意大利蜜蜂A.mellifera L.所酿的蜜糖。全国大部分地区均产。甘，平。入肺、脾、大肠经。滋养，润燥，解毒。①治肺燥干咳，肠燥便秘，胃、十二指肠溃疡；解乌头毒。温开水冲服，15～30克。②涂治汤火烫伤，口疮，鼻炎，皮肤疮疡。本品主含果糖和葡萄糖(约70%)。还含蔗糖，麦芽糖，蛋白质以及水解产物；淀粉酶，氧化酶，还原酚，过氧化氢酶，转化酶；有机酸，乙酰胆碱以及微量的维生素A、B_1、B_2、B_6、C、D、K，尼克酸，泛酸，叶酸，生物素和镍、铜、铁、锰等微量元素。蜂蜜有促进大鼠生长，升高兔血糖作用。对创面有收敛、营养和促进愈合作用，并有润滑性祛痰和缓泻作用。

蜂糖罐 见《贵州民间药物》。为猫花之别名，详该条。

蜣螂 出《神农本草经》。又名推车虫、推粪虫、牛屎虫、粪球虫、铁甲将军。为金龟子科昆虫屎蜣螂 Catharsius molossus L. 的干燥虫体。产江苏、浙江、河北、湖北等地。咸，寒，有毒。入肝、胃、大肠经。定惊，破瘀，通便，攻毒。①治惊痫，癫狂，癥瘕，噎膈反胃，腹胀便秘，疳积，血痢，淋病。煎服：1.5～3克。②治疮疡，痔漏。焙焦研粉，油调搽敷。孕妇忌服用。蜣螂含蜣螂毒素。对蟾蜍神经-肌肉标本有麻痹作用。

路头花 见《南宁市药物志》。为露兜笋花之别名，详该条。

路边草 见《全国中草药汇编》。为牛筋草之别名，详该条。

路边姜 见《四川中药志》。为白马骨之别名，详该条。

路边菊 ❶见《上海常用中草药》。为马兰之别名。❷见萧步丹《岭南采药录》。为野菊之别名。❸见《生草药性备要》。为蟛蜞菊之别名。各详该条。

路路通 出《本草纲目拾遗》。又名枫果、枫球子、九空子。为金缕梅科植物枫香Liquidambar formosana Hance的果实。主产江苏、浙江、江西、福建等地。苦，平。入肝、胃经。行气，活血，通络，利水。①治胃痛腹胀，风湿痹痛，手足拘挛，月经不调，乳汁不通，水肿胀满，小便不利。煎服：4.5～9克。②治荨麻疹，湿疹，皮炎，煎服并煎水洗；痈疽，痔漏，疥癣，烧存性研末调敷。孕妇忌服。本品含挥发油。预试还含黄酮甙、酚类、有机酸及糖类。酒精溶剂(60%)外用，能防止钩蚴侵入小鼠皮肤。

蜀羊泉 出《神农本草经》。为白毛藤之别名，详该条。

蜀葵子 出《本草拾遗》。为锦葵科植物蜀葵Althaea rosea(L.)Cav.的种子。甘，寒。利水通淋，滑肠，催生。治水肿，尿路结石，大、小便不利。煎服：3～9克。孕妇忌服。本品含脂肪油。油中含不饱和游离酸很多，以油酸计，达34.88%。

蜀葵花 出《备急千金要方·食治》。又名棋盘花、水芙蓉、栽秧花、擀杖花。为锦葵科植物蜀葵Althaea rosea(L.)Cav.的花。我国各地有栽培。甘，微寒。和血润燥，通利二便。①治痢疾，吐血，血崩，赤白带下，大小便不利，疟疾，小儿风疹。煎服：3～6克，或研末。②捣敷或研末调敷痈肿疮疡，蜂、蝎螫伤；麻油浸泡涂烫伤。本品含黄酮甙。

蜀葵苗 出《本草纲目》。为锦葵科植物蜀葵Althaea rosea(L.)Cav.的茎叶。甘，微寒。清热，散血。①治热毒下痢，淋病，小便出血。煎服：6～18克，或捣汁。②捣敷或烧存性研末调敷金疮、火疮。

蜀葵根 出《本草拾遗》。为锦葵科植物蜀葵Althaea rosea(L.)Cav.的根。甘，寒。清热凉血，利尿，排脓。①治小便淋痛，白带，尿血，吐血，血崩，子宫炎，阴道炎，肠痈。煎服：30～60克。②捣敷疮肿、丹毒。本品含大量粘质(其中有戊糖、戊聚糖、甲基戊聚糖及糖醛酸)，能缓和刺激，可用于粘膜炎症。

蜀椒 出《神农本草经》。即花椒，详该条。

蜀漆 出《神农本草经》。为虎耳草科植物黄常山Dichroa febrifuga Lour.的嫩枝叶。主产四川、贵州、湖南。苦、辛，微温，有毒。主治、用法均同常山。参见常山条。本品含常山碱甲、乙、丙等生物碱。

照山白 见《山东中草药手册》。又名万经棵、照白杜鹃、铁石茶、白镜子。为杜鹃花科植物小花杜鹃 Rhododendron micranthum Turcz.的枝叶或花。分布辽宁、河北、河南、陕西、湖北、四川、山东等地。酸、辛，温，有大毒。祛痰，止咳，通络，调经。①治慢性支气管炎，风湿痹痛，月经不调，闭经，痛经。煎服：3～4.5克。切勿过量，以免中毒。②捣敷骨折，疮肿。孕妇忌服。叶含

挥发油，内含牻牛儿酮、对羟基苯甲酸、香荚兰酸等。又含金丝桃甙、黄芪甙、山柰酚、槲皮素，东莨菪素、梭木毒素和三萜类、甾类等。煎剂对小鼠有祛痰作用，挥发油有镇咳、祛痰作用。对麻醉狗有明显的降压作用。

照白杜鹃 见《高原中草药治疗手册》。为照山白之别名，详该条。

〔丿〕

锡叶藤 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名涩沙藤、涩叶藤、水车藤。为五桠果科植物锡叶藤Tetracera asiatica (Lour.)Hoogl.的根和叶。分布广东、广西等地。苦、涩，凉。收敛止泻，消肿，止痛。①治肠炎腹泻，久痢，脱肛，子宫下垂，遗精，白带。煎服：15～30克。③治风湿性关节炎，跌打肿痛。以叶煎水洗或捣烂敷。锡叶藤属的多种植物均含异鼠李素、鼠李素杜鹃黄素、鼠李柠檬素等甲基黄酮醇类。

锡生藤 见《云南思茅中草药选》。又名亚乎奴、金丝荷叶。为防己科植物锡生藤Cissampelos pareira L.的全草。分布云南。苦、微甘，温。活血，止血，生肌，止痛。①治跌打损伤肿痛，创伤出血。鲜品捣敷或研粉撒。②用本品提取锡生藤碱制成注射剂，手术时用作肌肉松弛剂。重症肌无力患者忌用。全草含锡生藤碱(Cissampareine)；茎含海牙亭碱(Hayatine)；根含海牙亭碱、海牙亭宁碱(Hayatinine)、海牙剔定碱(Hayatidine)、筒箭毒次碱(Curine)、4″-0-甲基筒箭毒次碱、粒枝碱(Isochondrodendrine)等。海牙亭碱有横纹肌松弛作用，新斯的明能拮抗此作用。锡生藤碱在组织培养中对人鼻咽癌细胞有抑制作用。此外，锡生藤碱及海牙亭碱对离体蛙心有强心作用，对麻醉兔有降压作用，对离体豚鼠肠管有兴奋作用。释放组织胺的作用较等剂量的右旋筒箭毒弱。

锦地罗 出《生草药性备要》。又名一朵芙蓉花、落地金钱、文钱红、金线吊芙蓉。为茅膏菜科植物锦地罗 Drosera burmannii Vahl去花茎的全草。分布云南、广东、广西、福建、台湾等地。甘、微苦，凉。清热除湿，凉血解毒。①治痢疾，肠炎腹泻，疟疾，肺热咳嗽，咯血，衄血，咽喉溃烂，小儿疳积。煎服：15～30克。②治疮疥，溃疡，荨麻疹。煎水洗。

锦灯笼 见《山西中药志》。为挂金灯之别名，详该条。

锦纹大黄 见《备急千金要方》。为大黄之处方名，详该条。

锦带 见《本草纲目》。为莞之别名，详该条。

铘头草 见《江苏省植物药材志》。为夏枯草之别名，详该条。

锯草 ❶见《中国药用植物图鉴》。为洋蓍草之别名。❷见《内蒙古中草药》。为蓍草之别名。各详该条。

矮瓜 见《广州植物志》。为茄子之别名，详该条。

矮地茶 见《湖南药物志》。为紫金牛之别名，详该条。

矮陀陀 见《贵州草药》。又名千年矮、小罗伞、七匹散、白花矮陀陀、金丝矮陀陀、地黄连。为楝科植物滇黔地黄连 Munronia henryi Harms 的全株。分布贵州、云南等地。辛、微苦，凉，有小毒。清热解毒，行气活血。①治感冒高热，咳喘，咽喉炎，疟疾，胃腹胀痛，风湿痹痛，跌打损伤。煎服：6～9克。②治痈肿疔毒。煎服并用叶捣敷或研末调敷。

矮松 见《安徽中草药》。为千层塔之别名，详该条。

矮桐 见《江西民间草药》。为臭牡丹之别名，详该条。

矮脚苦蒿 见《昆明民间常用草药》。为金龙胆草之别名，详该条。

雉子筵根 见《中草药通讯》(6)：8，1973。为蔷薇科植物莓叶委陵菜Potentilla

fragarioides L.的根及根茎。分布黑龙江、内蒙古、河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃、江苏、浙江、湖南、湖北及西南等地。甘、微苦，平。止血。治月经过多、功能性子宫出血、子宫肌瘤出血等一般妇科出血，肺结核咯血。煎服：9～18克。全草名雉子筵，又名满山红、瓢子、毛猴子，煎服益气补阴，治疝气，干血痨。根含右旋儿茶精。

雉鸡尾 见《浙江民间常用草药》。为大叶金花草之别名，详该条。

雉鸡蛋 见《福建中草药》。为马骝卵之别名，详该条。

鼠牙半枝莲 见《江西草药》。为佛甲草之别名，详该条。

鼠耳草 出《本草拾遗》。为鼠曲草之别名，详该条。

鼠曲草 出《本草拾遗》。又名鼠耳草、佛耳草、清明菜、追骨风、宽紧草、白头草、黄花白艾、棉花团。为菊科植物鼠曲草Gnaphalium affine D.Don的全草。主产江苏、浙江等地。甘，平。祛痰，止咳，平喘，祛风湿，降血压。①治感冒咳嗽，痰喘，风湿痹痛，胃脘痛，痢疾，腹泻，高血压病，蚕豆病。煎服：9～30克。②治阴囊湿痒，煎水洗；疔疮肿毒，跌打损伤，捣敷。全草含挥发油、木犀草素-4′-葡萄糖甙、豆甾醇和微量生物碱等。此外，花含鼠曲草素(Gnaphalin)、木犀草素等。煎剂对小鼠有一定的止咳作用。

鼠妇 出《神农本草经》。又名地虱、西瓜虫、潮湿虫。为鼠妇科动物平甲虫Armadillidium vulgare(Latreille)或鼠妇Porcellioscaber Latreille的干燥全体。产江苏、吉林、山东、浙江、广西等地。酸，温。入肝经。破血通经，利水，解毒，止痛。①治经闭癥瘕，小便不利，水肿，久疟寒热，外科手术后疼痛。煎服：1～6克；或研末服，每次0.45～0.9克。②治口腔炎，扁桃体炎。研末调敷或吹患处。孕妇忌服。平甲虫含硫酸软骨素A或C，或含玻璃糖醛酸(Hyaluronic acid)。又含脂类，胆甾醇。以氯仿浸提，再进一步精制作成溶液或片剂口服，或作成油膏局部应用，可治疗麻风。

鼠李 出《神农本草经》。又名牛李、皂李、乌巢子、楮李、臭李子。为鼠李科植物鼠李Rhamnus davurica Pall.的果实。分布东北、华北及河南等地。甘、微苦，平，有小毒。清热利湿，止咳祛痰，解毒杀虫。①治水肿胀满，支气管炎，肺气肿。煎服：6～12克。②治龋齿痛，煎服并含漱；瘰疬，痈、疖、疥、癣，捣敷。本品含大黄素、大黄酚、蒽酚、山柰酚。

鼠李皮 出《名医别录》。为鼠李科植物鼠李Rhamnus davurica Pall.的树皮。苦，微寒，有小毒。清热，通便。治风痹，皮肤热毒，大便秘结。煎服：3～9克。本品含大黄素、芦荟大黄素、大黄酚等多种蒽类。树皮的水浸膏或所含蒽醌对小鼠或人均有泻下作用。

鼠李根 出《食疗本草》。又名牛李根。为鼠李科植物鼠李Rhamnus davurica Pall.的根。有毒。煎水含漱治龋齿，口疳；熬膏涂发背肿毒。

鼠尾 见《中药志》。为荜茇之别名，详该条。

鼠粘子 出《本草图经》。为牛蒡子之别名，详该条。

鼠粘根 出《延年方》。为牛蒡根之别名，详该条。

魁蛤壳 见《本草品汇精要》。为瓦楞子之别名，详该条。

膩粉 出《传家秘宝方》。即轻粉，详该条。

腰带藤 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为扁担藤之别名，详该条。

腰黄 见《药材资料汇编》。为雄黄之处方名，详该条。

腽肭脐 见《药性论》。为海狗肾之处方

名，详该条。

腹水草 ❶见《浙江中药手册》。又名两头根、惊天雷、天桥草、双头粘、爬岩红、仙桥草、吊线风。为玄参科植物腹水草veronicastrum axillare(Sieb.et Zucc.)yamazaki的全草。分布浙江、江苏、安徽、江西、福建等地。辛、苦，凉，有小毒。利尿消肿，散瘀解毒。①治肝病腹水，肾病水肿，小便不利，急性黄疸型肝炎，闭经。煎服：9～15克。②治痄腮，疔疮，跌打损伤，汤、火烫伤。鲜品捣敷或煎水洗。孕妇忌服。含甾醇、甘露醇、鞣质、树脂、无机盐等。正常人口服腹水草5～10克，一小时后可引起恶心、呕吐，四小时后腹痛、腹泻，使体液减少。❷见《湖南药物志》。为半边莲之别名，详该条。

腹泻草 见《中草医药经验交流》。为黄毛耳草之别名，详该条。

解毒蕨 见《广西实用中草药新选》。为小叶金花草之别名，详该条。

解暑草 见《本草纲目拾遗》。为吉祥草之别名，详该条。

鲍鱼兜 见《中药材手册》。为石决明之别名，详该条。

〔丶〕

新会皮 见《药性切用》。为柑皮之药材名，详该条。

新会橙 见《植物名实图考》。为甜橙之别名，详该条。

新蒙花 见《中药志》。又名梦花、打结花、蒙花珠。为瑞香科植物结香Edgeworthia chrysantha Lindl. 的花蕾。主产四川、贵州、湖北、广西等地。淡，平。养阴，明目，去翳。治青盲，夜盲，障翳，多泪，羞明，梦遗，失音。煎服：3～6克。

新疆雪莲 见《新疆中草药手册》。又名雪荷花。为菊科植物大苞雪莲花 Saussurea involucrata Kar. et kir. ex Maxim.的带花全草。主产新疆；青海、甘肃亦产。微苦，热，有毒。通经活血，散寒除湿，强筋助阳。治风湿痹痛，肺寒咳嗽，妇女经闭，小腹冷痛，产后胎衣不下，阳痿。煎服：0.6～1.5克；或泡酒服。剂量过大，可致大汗淋漓。孕妇忌服。本品含内酯、黄酮、甾醇、生物碱、挥发油、还原糖等。总碱和总黄酮均可降低麻醉狗的血压。

廉姜 出《本草拾遗》。又名箭杆风、华良姜、九姜连。为姜科植物华山姜Alpinia chinensis Rosc.的根茎。分布四川、贵州、云南、湖北、湖南、广东、广西、福建等地。辛，温。温中下气，祛风，活血，止痛。①治胃脘痛胀，噎膈呕吐，腹痛泄泻，风湿关节冷疼，月经不调。内服：煎汤，15～30克；或浸酒服。②治跌损瘀血停滞，无名肿毒。捣敷。

痱子草 ❶见《安徽中草药》。为石香薷之别名。❷见《分类草药性》。为石荠苧之别名。各详该条。

痴头婆 见《生草药性备要》。为苍耳之别名，详该条。

痰药 见《全国中草药汇编》。为野杜仲之别名，详该条。

慎火草 出《备急千金要方》。为景天之别名，详该条。

满山红 ❶见《东北常用中草药手册》。又名映山红、靠山红、迎山红、山崩子。为杜鹃花科植物兴安杜鹃Rhododendron dauricum L.的叶。分布东北及内蒙古等地。辛、苦，温。止咳祛痰。治急、慢性支气管炎，支气管喘息。煎服：25～50克。满山红根：煎服治急性细菌性痢疾。叶含挥发油，内含大牻牛儿酮、杜松樟脑(Juniper-camphor等)。还含杜鹃素、去甲杜鹃素、东莨菪素、伞形花内酯、槲皮素、山柰酚、杨梅树皮素、金丝桃甙、异金丝桃甙等。又含微量梭木毒素(0.003%)、氢醌等。大牻牛儿酮对小鼠有止咳作用，杜鹃素有祛痰作用。叶提取物的水

溶部分及挥发油部分，对豚鼠有平喘作用。煎剂或醇提取液在体外对金黄色葡萄球菌、甲型链球菌、绿脓杆菌等有抑制作用。浸剂及酊剂给动物注射，能减慢心率，降低血压。梫木毒素毒性大，可引起犬呕吐、呼吸抑制、心跳微弱、血压剧降等。人服用大量，也可出现头晕、出汗、心悸或肝功能异常。❷见《吉林中草药》。为迎山红之别名，详该条。

满山香 ❶见《草药手册》。为水团花之别名。❷见《全国中草药汇编》。为阿利藤之别名。❸见《分类草药性》。为透骨香之别名。❹见《湖南药物志》。为麻口皮子药之别名。❺见《全国中草药汇编》。为零陵香之别名。❻见《陕西中草药》。为缬草之别名。❼见《民间常用草药汇编》。为七里香之别名。各详该条。

满山黄 见《浙江民间常用草药》。为一枝黄花之别名，详该条。

满天星 ❶见清·刘士季《草木便方》。为天胡荽之别名。❷见《阳春县志》。为白马骨之别名。❸见《黑龙江省主要野生药用植物的鉴别及中草药新制剂》。为苦碟子之别名。❹见明·范洪《滇南本草图说》。为野棉花之别名。❺见《安徽中草药》。为喉咙草之别名。各详该条。

满江红 出《本草纲目》。又名红浮萍、红浮漂、草无根、浮飘。为满江红科植物满江红Azolla imbricata(Roxb.)Nakai的全草，分布长江以南各地。辛，寒。入肺、膀胱经。祛风湿，透疹，利尿。①治风湿疼痛，风瘙瘾疹，麻疹不透，小便不利，带下。煎服：3～9克。②治烧烫伤，研末油调敷。满江红根：煎服治肺痨病，有润肺止咳功能。

满堂红 出《涌幢小品》。为紫薇花之别名，详该条。

滇白前 见《植物名实图考》。为瓦草之别名，详该条。

滇杠柳 见《广西本草选编》。为黑骨头之别名，详该条。

滇香薷 见《云南中草药选》。为鸡肝散之别名，详该条。

滇独活 见《云南经济植物》。为白云花根之别名，详该条。

滇常山 出《植物名实图考》。又名臭牡丹、臭茉莉。为马鞭草科植物滇常山Clerodendrum yunnanense Hu的根及茎叶。分布云南、四川等地。辛、苦，温。祛风湿，截疟，行气，利水，降压。①治风湿性关节炎，腰腿痛，疟疾，胸腹胀满，水肿，小便不利，高血压病。煎服：15～30克。②治痔疮，脱肛。茎叶煎水洗。

滇紫参 见《云南中草药选》。为小红参之别名，详该条。

滇橄榄 见《云南中草药选》。为庵摩勒之别名，详该条。

溪沟草 见《常用中草药彩色图谱》。即溪黄草，详该条。

溪桄 见《闽东本草》。为白鱼尾之别名，详该条。

溪黄草 中药名。见广州部队卫生部《常用中草药手册》。又名熊胆草、溪沟草、四方蒿、香茶菜。为唇形科植物线纹香茶菜Rabdosia lophanthoides(Hamilt. ex D. Don) Hara 的全草。分布我国西南、中南地区及浙江、福建等地。甘、苦，凉。清热，利湿，散瘀。治急性黄疸型肝炎，急性胆囊炎，痢疾，肠炎，小便癃闭，跌打瘀肿。煎服：15～30克(鲜品60～90克)。本品预试含黄酮甙、酚类、氨基酸、有机酸。

滚山虫 见《云南中草药》。又名地罗汉、滚山珠。为球马陆科动物滚山球马陆Glomeris nipponica Kishida的全虫。主产云南。咸，温。舒筋活血，接骨止痛。①治跌打损伤，骨折，关节脱臼。研粉服：1.5～3克，黄酒送下(治骨折、关节脱臼均须复位固定后服药)。②治子宫脱垂，脱肛。研粉，香油调涂患处。

滚山珠　见《云南中草药》。即滚山虫，详该条。

滚地龙　见《广东中草药》。为鸡骨香之别名，详该条。

滂藤　出《本草拾遗》。为扶芳藤之别名，详该条。

滨莴苣　见《本草推陈》。为番杏之别名，详该条。

湖白垚　出《名医别录》。为人中白之别名，详该条。

鲎藤　见《福建民间草药》。又名马鞍藤、马蹄草、海薯藤。为旋花科植物二叶红薯Ipomoea pescaprae (L.) Sweet的全草。分布广东、广西、福建等地。辛、微苦，微寒。祛风除湿，消肿散结。①治风湿痹痛，腰肌劳损，痔疮漏血。煎服：15～30克。②治痈疽，肿毒，疔疮。煎服并捣敷。孕妇慎用。鲎藤根治流火，风火牙痛，风湿关节痛。煎服：15～45克。叶含粘液质、挥发油、树脂、甾醇、苦味物质、脂肪、山蓟酸、蜂花酸、肉豆蔻酸等。挥发性酯类对海蜇刺伤所引起的风疹、搔痒有良好的解毒作用；在离体豚鼠回肠标本上，有抗组织胺作用。

酱瓣半支　见清·赵楷《百草镜》。为马牙半支之别名，详该条。

酱瓣豆草　见《中国药用植物志》。为马齿苋之别名，详该条。

酱瓣草　见清·汪连仕《采药书》。为马牙半支之别名，详该条。

福寿草　见《植物学大辞典》。为冰凉花之别名，详该条。

〔7〕

缠龙子　见《中药材手册》。为菟丝子之别名，详该条。

缠豆藤　出《李氏草秘》。为菟丝之别名，详该条。

十四画

〔一〕

碧桃干　见《饮片新参》。又名瘪桃干、桃枭、桃奴、阴桃子。为蔷薇科植物桃 Prunus persica(L.) Batsch或山桃 P. davidiana (Carr.)Franch.的未成熟果实。主产江苏、浙江、安徽。苦，微温。敛汗，止血，止痛。治自汗，盗汗，内伤吐血，妊娠下血，胃痛，疝痛。煎服：9～15克。桃幼果含顺式和反式的右旋止权素。

碧蝉花　见《本草纲目》。为鸭跖草之别名，详该条。

墙头竹　见《福建民间草药》。为笔仔草之别名，详该条。

榼（kě渴）子　出《日华子诸家本草》。为榼藤子之简称。详该条。

榼子藤　见《广西本草选编》。即榼藤，详该条。

榼藤　出《南方草木状》。又名榼子藤、过岗龙、过江龙、过山枫。为豆科植物榼藤Entada phaseoloides (L.) Merr.的茎藤。分布福建、台湾、广东、广西、云南。微苦、涩，平，有毒。祛风除湿，活血通络。治风湿性关节炎，腰痛，跌打损伤。煎服：9～15克。过量可致中毒，参阅榼藤子条。茎预试含黄酮类、氨基酸、酚类。茎皮含氢氰酸。

榼藤子　出《南方草木状》。又名象豆、合子、榼子。为豆科植物榼藤Entada phaseoloides (L.) Merr.的种子。涩、微甘，平，有毒。行气止痛，利湿消肿。治胃痛，疝气痛，黄疸，脚气水肿，痔疮，脱肛，血痢，便血。内服：炒熟或煅存性，研粉，

开水冲服，1.5～3克。服用本品，必须煮熟或炒熟后使用，过量会出现头晕，呕吐，血压下降，呼吸缓减，甚至死亡。种仁含皂甙，水解得榼藤子酸（Entagenic acid）、阿拉伯糖、木糖。所含皂甙对大鼠肉瘤瓦克-256有明显的抗癌活性；对哺乳类动物主要会引起溶血。

榧果 见《植物名实图考》。即杠果，详该条。

榧子 出《新修本草》。为红豆杉科植物香榧Torreya grandis Fort.的种子。主产浙江、湖北、江苏；安徽、湖南、江西、福建亦产。甘，平。入肺、胃、大肠经。杀虫，消积，润燥。治钩虫病，绦虫病，炒榧子30～50克，每晚临睡前去壳嚼食，连食数日；小儿疳积；蛔虫病，燥咳，便秘，痔疮，煎服：15～30克。种子脂肪油含棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸等；还含挥发油、鞣质等。榧子对钩虫有驱除作用，并能驱除猫的绦虫。

榜嘎 见《中国药典·一部》1977年版。为雪乌之藏族语名，详该条。

槟榔 出魏·李当之《药录》。又名大腹子、榔玉。为棕榈科植物槟榔Areca catechu L.的种子。主产广东海南岛；福建、台湾、广西及云南有栽培。苦、辛，温。入脾、胃、大肠经。杀虫，破积，下气，行水。治绦虫病，姜片虫病，蛔虫病，蛲虫病，食积气滞，痢疾，疟疾，水肿，脚气。煎服：4.5～9克。单用杀虫，用量可增至30～50克。本品含槟榔碱、槟榔次碱、槟榔副碱、缩合鞣质等。槟榔碱驱除猪肉绦虫效果好，使全虫各部都瘫痪。对牛肉绦虫则仅能使头部和未成熟节片完全瘫痪而对中段和后段影响不大，可与南瓜子合用。对姜片虫亦有效。煎剂在体外对某些常见致病性皮肤真菌有一定的抑制作用。槟榔碱尚有拟胆碱作用，可增强肠蠕动，缩小瞳孔。

槟榔皮 见《本草经疏》。为大腹皮之别名，详该条。

槟榔衣 见《药材资料汇编》。为大腹皮之别名，详该条。

榕树叶 见萧步丹《岭南采药录》。为桑科植物榕树Ficus microcarpa L.的叶。微苦、涩，凉。清热解毒，活血散瘀。①治流行性感冒，急、慢性气管炎，百日咳，扁桃体炎，肠炎，痢疾，疟疾，结合膜炎。煎服：9～15克。②治臁疮，捣烂敷患处；跌打损伤，骨折，捣烂酒炒敷。本品主要含黄酮甙、香豆素。还含三萜皂甙、酸性树脂、鞣质。叶的水浸剂在试管内对金黄色葡萄球菌、史密氏痢疾杆菌有抑制作用。

榕树皮 见《南宁市药物志》。为桑科植物榕树Ficus microcarpa L.的树皮。苦、涩，凉。清热解毒，止泻，止痒。①治感冒，气管炎，百日咳，扁桃体炎，泄泻。煎服：9～30克。②治疥、癣，疮疡，痔疮。煎水洗。水浸剂在试管内对金黄色葡萄球菌、史密氏痢疾杆菌有抑制作用。

榕树须 见萧步丹《岭南采药录》。即榕须，详该条。

榕树胶汁 见萧步丹《岭南采药录》。为桑科植物榕树Ficus microcarpa L.嫩枝中的树脂。治瘰疬，牛皮癣，涂患处；唇疔，醋调涂。榕属植物的胶汁中含有蛇麻脂醇。

榕须 出《本草纲目拾遗》。又名半天吊、吊风根、榕树须。为桑科植物榕树Ficus microcarpa L.的气根。分布广东、广西、福建、台湾、浙江、云南、贵州等地。苦、涩，凉。解表清热，祛风活络，利尿。①治感冒发热，麻疹不透，疟疾，百日咳，眼结膜炎，风湿痹痛，跌打损伤，小便不利，血淋，疝气，白带，子宫脱垂。煎服：9～15克。②治扁桃体炎，牙痛，煎水含漱；湿疹，痔疮，阴痒，煎水洗；神经性皮炎，捣敷。本品预试含酚类、氨基酸、有机酸及糖类。

榠楂（zhā渣） 出《本草经集注》。又名土木瓜、光皮木瓜。为蔷薇科植物榠楂

Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne 的果实。分布华东及江西、湖北、广东、广西、四川、陕西等地。酸，平。祛湿，舒筋活络，和胃化痰。治风湿痹痛，吐泻转筋，痢疾，恶心，泛酸。煎服：6～9克。

酸五棱 见《南宁市药物志》。为阳桃之别名，详该条。

酸汤杆 见《中国药用植物图鉴》。为虎杖之别名，详该条。

酸枣仁 出《雷公炮炙论》。又名枣仁。为鼠李科植物酸枣Ziziphus jujuba Mill. 的种子。主产山东、河北、河南、陕西、辽宁。甘、酸，平。入心、肝、胆经。养心，安神，敛汗。治虚烦不眠，惊悸怔忡，健忘，虚汗，神经衰弱。煎服：6～15克。本品含白桦脂醇、白桦脂酸、酸枣皂甙（Jujuboside）、维生素C等。煎剂有镇静作用，有效成分可能含于油中，也有认为是水溶性成分。煎剂对动物还有降温、镇痛及降低血压作用；对小鼠的烫伤有治疗作用。毒性极低。

酸枣根皮 见《陕西中草药》。为鼠李科植物酸枣Ziziphus jujuba Mill. 根皮的韧皮部。涩，温。①治便血，高血压头晕头痛，遗精，白带。煎服：15～30克。②治烧、烫伤。熬膏涂。

酸胖 见《内蒙古中草药》。为卡密之别名，详该条。

酸浆 出《神农本草经》。又名灯笼草、天泡草、金灯草、红姑娘。为茄科植物酸浆 Physalis alkekengi L. var. franchetii (Mast.) Mak. 的全草。我国大部分地区均有分布。酸、苦，寒。入肺、脾经。清热解毒，化痰，利尿。①治肺热咳嗽，咽喉肿痛，音哑，黄疸，痢疾，水肿，小便不利。煎服：9～15克。②治疔疮，丹毒。捣敷或研末调敷。本品含酸浆苦素（Physalin）A、B、C，木犀草素及其7-葡萄糖甙等。煎剂在试管中对痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌等有抑菌作用。据报告，根及果实有催产作用。

酸浆水 见《本经逢原》。即浆水，详该条。

酸浆草 出《履巉岩本草》。即酢浆草，详该条。

酸浆根 出《蜀重广英公本草》。为茄科植物酸浆 Physalis alkekengi L. var. franchetii (Mast.) Mak. 的根。苦，寒。清热，镇咳，利尿。治疟疾，急性气管炎，扁桃体炎，咽喉痛，黄疸，疝气。煎服：6～9克。孕妇忌服。根含三种生物碱，主要为3α-巴豆酰氧托烷（3α-Tigloyloxytropane）。另含玉蜀黍黄素（Zeaxanthin）、酸浆根素（Hystonin）、粘液质。酸浆根素对大白鼠离体子宫有收缩作用，其作用比脑垂体后叶素快而短，可用于催产。

酸桶箅 见《救荒本草》。为虎杖之别名，详该条。

酸模 出《本草经集注》。又名山大黄、当药、山羊蹄。为蓼科植物酸模 Rumex acetosa L. 的根或全草。我国大部分地区均有分布。酸、苦，寒。凉血，解毒，通便，利尿，杀虫。①治吐血，便血，内痔出血，热痢，便秘，淋病，小便不通，目赤。煎服：9～15克。②治疥疮，疔疮，神经性皮炎，湿疹，捣汁涂；癣疮，醋磨涂。根含大黄酚、大黄素、大黄酚甙、金丝桃甙、鞣质等。果实含槲皮素、金丝桃甙。茎叶含牡荆素、桃甙、酸性草酸钾、酒石酸、维生素C等。水提取物在体外对某些常见致病真菌有抑制作用。

酸榴皮 见《本草纲目》。为石榴皮之别名，详该条。

酸榴根 见《本草纲目》。为石榴根之别名，详该条。

酸蜻 出《名医别录》。为地榆之别名，详该条。

毅树子 见《上海常用中草药》。为楮实之别名，详该条。

嘉庆子 出《两京记》。为李子之别名，详该条。

蔷薇子 出《本草经集注》。即营实，详该条。

蔷薇叶 出《本草纲目》。为蔷薇科植物多花蔷薇Rosa multiflora Thunb. 的叶。苦，寒。清热解毒。治痈疖疮疡。捣敷或研末调敷。

蔷薇花 出清·汪双池《医林纂要·药性》。又名白残花。为蔷薇科植物多花蔷薇Rosa multiflora Thunb. 的花朵。主产浙江、江苏等地。甘，凉。入胃、肝经。清暑，和胃，止血。①治暑热胸闷，口渴，呕吐，不思饮食，泻痢，吐血，口疮。煎服：3～6克。②捣敷治创伤出血。本品含黄芪甙及少量挥发油。

蔷薇果 见《东北植物药图志》。为刺莓果之别名，详该条。

蔷薇根 出《本草纲目》。为蔷薇科植物多花蔷薇Rosa multiflora Thunb.的根。分布华北、华东、华中、华南及西南地区。苦、涩，凉。入脾、胃经。清热解毒，活血通络。①治肺痈，痢疾，风湿关节痛，面神经瘫痪，半身不遂，吐血，衄血，便血，月经不调，带下，遗尿，尿频，跌打损伤，疮疖，疥癣。煎服：4.5～12克。②治外伤出血，烫伤。研末油调涂。本品含委陵菜酸；还含鞣质，其中主为儿茶精。

慕荷 见《四川中药志》。又名索骨丹、红药子、牛角七。为虎耳草科植物鬼灯擎Rodgersis aesculifolia Batal.的根茎。分布陕西、甘肃、宁夏、河南、湖北、四川、云南、西藏等地。苦、涩，平，有小毒。清热化湿，解毒，止血。①治痢疾，腹泻，白浊，带下，淋巴结结核，甲状腺肿，咽喉肿痛，衄血，吐血，咯血，便血，崩漏。煎服：4.5～9克。②研末撒治外伤出血；捣敷疮毒。根茎含岩白菜素，又含蒽醌甙、强心甙、鞣质等。本品对标准株腺病毒、肠病毒、流行株腺病毒及单纯疱疹等有广谱性的体外抗病毒作用。用酸水解后的提取物，对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌、福氏痢疾杆菌均有体外抑菌作用。

蔓荆子 出《本草经集注》。为马鞭草科植物单叶蔓荆Vitex rotundifolia L. 或蔓荆V. trifolia L. 的果实。主产山东、浙江、江西、福建等地。辛、苦，凉。入肝、胃、膀胱经。疏散风热，清利头目。治风热感冒，偏、正头痛，目赤肿痛，夜盲，肌肉神经痛。煎服：6～9克。单叶蔓荆子含挥发油，其中主成分为莰烯和蒎烯；还含单叶蔓荆呋喃（Rotundifuran）、前单叶蔓荆呋喃（Prerotundifuran）、蔓荆子黄酮（Vitexicarpin）和微量生物碱等。蔓荆子含少量蔓荆子碱（Vitricin）。

蔓荆子叶 见萧步丹《岭南采药录》。又名白背叶。为马鞭草科植物单叶蔓荆Vitex rotundifolia L. 或蔓荆V. trifolia L. 的叶或枝叶。分布我国沿海各地和云南、江西。辛、苦，凉。消肿，止痛，止血。①治跌打损伤，头风，风湿痹痛。煎服：3～9克。②捣敷治创伤出血，痈疮肿毒。蔓荆枝叶含挥发油，其中主成分为莰烯和左旋蒎烯；还含桃叶珊瑚甙，淡紫花牡荆甙（Agnuside）、牡荆子黄酮（Vitexicarpin）、木犀草素-7-葡萄糖甙、锦葵花素-3，5-二葡萄糖甙、无羁萜等。单叶蔓荆叶含挥发油，油中主含蒎烯；还含单叶蔓荆呋喃（Rotundifuran）、牡荆子黄酮等。

蔓菁 出《礼记·郑玄注》。为芜菁之别名，详该条。

蔓菁子 出《备急千金要方》。为芜菁子之别名，详该条。

蔓椒 出《神农本草经》。为入地金牛之别名，详该条。

蔓䕷（yīng 婴 yù 玉） 出《新修本草》。又名山葡萄、野葡萄藤、接骨藤。为葡萄科植物蔓䕷Vitis adstricta Hance的

茎叶。分布华东及江西、湖北等地。甘，平。祛湿利尿，清热解毒。①治风湿痹痛，淋病，痢疾，哕逆，乳腺炎。煎服：15～30克。②治目翳，捣汁滴眼；外伤出血，研粉撒。

蓼莫根　出《本草纲目》。为葡萄科植物蓼莫Vitis adstricta Hance的根。甘，平。清热利湿，消肿解毒。①治黄疸型传染性肝炎，淋病，痢疾，风湿痹痛，肺痈，乳痈，瘰疬。煎服：15～30克。②治烫伤。煎浓汁涂敷。

蔊菜　出《本草纲目》。又名干油菜、野油菜、山芥菜、塘葛菜、江剪刀草。为十字花科植物蔊菜 Rorippa montana (Wall.) Small 或印度蔊菜 R. indica (L.) Hiern 的全草。我国华东、中南、西南地区及陕西、甘肃等地均有分布。辛，温。止咳化痰，利尿，活血。①治风寒感冒，慢性支气管炎，风湿性关节炎，胃脘痛，黄疸，水肿，干血痨，跌打损伤。煎服：15～30克。②捣敷疔疮痈肿；捣汁搽漆疮。忌与黄荆叶同用，否则可使人肢体麻木。本品含蔊菜素（Rorifone）及蔊菜酰胺。蔊菜素对兔和小鼠有祛痰作用，对豚鼠有平喘作用，在体外对肺炎球菌和流感杆菌有抑制作用。

蔻米　见《中药材手册》。为白豆蔻之药材名，详该条。

蔻壳　见《药材学》。为白豆蔻壳之处方名，详该条。

蓼子七　见《全国中草药汇编》。为红三七之别名，详该条。

蓼子朴　见《中国沙漠地区药用植物》。为黄蓬花之别名，详该条。

磁石　出《神农本草经》。又名吸铁石、戎铁石、灵磁石、活磁石。为磁铁矿的矿石。产江苏、山东、辽宁、广东、安徽、河北等地。辛，寒。入肾、肝、肺经。潜阳纳气，镇惊安神。治眩晕，目昏，耳鸣，耳聋，虚喘，惊痫，怔忡，失眠。煎服：9～30克，先煎。本品主成分为四氧化三铁，杂有锰、钙、氧化硅。

豨莶　出《新修本草》。又名猪膏莓、粘糊菜、肥猪苗、粘不扎、虾钳草、风湿草、牛人参、四棱麻、大叶草。为菊科植物豨莶Siegesbeckia orientalis L.或腺梗豨莶S. pubescens Mak. 等的全草。主产湖北、湖南、江苏、河北。苦，寒。入肝、肾经。祛风湿，利关节，降血压。①治风湿痹痛，腰膝无力、四肢麻木，半身不遂，高血压病，疟疾，急性黄疸型传染性肝炎。内服：煎汤，9～15克；或入丸、散。②治疔疮肿毒，捣烂敷，风疹湿痒，煎水洗。腺梗豨莶全草含豨莶苦味质（Darutin-bitter）、生物碱及海松烯-8(14)-四醇。豨莶全草含豨莶甙(Darutoside)及豨莶甙元(Darutigenol)。水浸剂和稀醇浸剂均有降低麻醉动物血压的作用。

豨莶根　出《滇南本草》。为菊科植物豨莶Siegesbeckia orientalis L.或腺梗豨莶S. pubescens Mak. 等的根。①治风湿顽痹，头风，白带。煎服：鲜品60～90克。②研末，麻油调敷治烧、烫伤。豨莶果：煎服驱蛔虫。

〔丨〕

雌丁香　见《本草蒙筌》。即母丁香，详该条。

蜚虻　出《神农本草经》。为虻虫之别名，详该条。

嗽药　❶出《新修本草》。为白前之别名。❷出《本草经集注》。为百部之别名。各详该条。

蜻蜓红　见《福建中草药》。为千日红之别名，详该条。

蜞　出《本草图经》。为水蛭之别名，详该条。

蜡花　见南京药学院《中草药学》。为蜡梅花之简称，详该条。

蜡树皮　见《中药志》。为秦皮之别

名，详该条。

蜡烛扦草 见苏州医学院《中草药手册》。为宝盖草之别名，详该条。

蜡梅花 出《本草纲目》。又名黄梅花、蜡花。为蜡梅科植物蜡梅Chimonanthus Praecox（L.）Link 的花蕾。产江苏、浙江、四川、贵州等地。酸、涩，平。解暑生津，顺气，止咳。①治暑热头晕，热病烦渴，胸闷，肝胃气痛，百日咳。煎服：3～6克。②花蕾浸油涂治烫伤；滴耳内治中耳炎。本品含挥发油，其主要成分为1，8－桉叶素、龙脑等。又含洋蜡梅碱、异洋蜡梅碱、蜡梅甙。洋蜡梅碱可引起哺乳动物强烈抽搐，作用类似士的宁。对离体兔肠、子宫有兴奋作用，对麻醉猫、犬可抑制心脏、降低血压。

蜥蜴 出《神农本草经》。为石龙子之别名，详该条。

蜘蛛 出《本草经集注》。又名网虫、圆蛛。为圆网蛛科动物大腹圆网蛛 Aranea ventrjcosa（L.Koch）等的全虫。分布全国各地。苦、寒，有毒。入肝经。祛风，消肿，解毒。①治小儿慢惊，初生儿口噤，疳积，狐疝偏坠。焙黄研末服：每次0.25～0.5克，每日二至三次。②治疔肿，疮疡，瘰疬，鼻息肉，蜈蚣、蜂、蝎螫伤。外用：捣敷或焙干研末撒。

蜘蛛抱蛋 出《植物名实图考》。又名一帆青、九龙盘、蜈蚣草、地蜈蚣。为百合科植物蜘蛛抱蛋Aspidistra elatior Bl.的根茎。分布我国南部，各地庭园有栽培。甘、微苦，平。清热利尿，活血通络。①治感冒高热，肺热咳嗽，疟疾，风火头痛，牙痛，风湿痹痛，腰痛，泄泻，砂淋，经闭腹痛。煎服：9～15克。②治跌打损伤，骨折。煎服并捣敷。地下部分含蜘蛛抱蛋甙(Aspidistrin)。

蜘蛛香 ❶出《本草纲目》。又名豆豉菜根、九转香、马蹄香、连香草、养血莲。为败酱科植物心叶缬草 Valeriana jatamansii Jones或阔叶缬草V. officinalis L. var. latifolia Mig. 的根茎。前者分布河南、陕西、湖北、湖南及西南地区；后者分布东北、华北、华东至西南地区。辛，温。入肺、脾、胃经。顺气，消食，散寒，止痛，祛风湿。①治胃痛腹胀，消化不良，呕吐腹泻，小儿疳积。②治感冒，流行性感冒，疟疾，风湿麻木，脚气，水肿。煎服：3～4.5克。孕妇忌服。心叶缬草根和根茎含1，2－双酮物质（$C_{17}H_{24}O_6$），碱解或酸解后得异戊酸和己酸，又含蒙花甙异戊酸酯（Linarinisovalerate）、缬草环臭蚁醛酯甙（Valerosidatum）。阔叶缬草根含挥发油，成分为阔叶缬草醇(Kessylalcohol）、阔叶缬草甘油（Kessoglycerin）和它们的乙酸酯类，左旋蒎烯，松油醇，二戊烯，龙脑，阔叶缬草甘醇（kessoglycol）等。药理作用与缬草相似。❷见《分类草药性》。为杏叶防风之别名，详该条。

蝉衣 见《临证指南医案》。即蝉蜕，详该条。

蝉花 出《本草图经》。又名虫花。为麦角菌科真菌大蝉草Corayceps cicadae shing的分生孢子阶段即蝉棒束孢菌及其寄主山蝉Cicada flammata Dist. 的幼虫干燥体。主产浙江、四川、云南等地。甘，寒。定惊，散翳。治小儿惊痫，癫疯，夜啼，心悸，久翳不退。煎服：9～15克。

蝉退 出《眼科龙木论》。即蝉蜕，详该条。

蝉蜕 出《药性论》。又名蝉退、蝉衣。为蝉科昆虫黑蚱Cryptotympana atrata Fabr. 或蚱蝉C. pustulata Fabr. 等的若虫羽化时脱落的皮壳。主产山东、河南、河北、湖北、江苏、四川等地。咸、甘，寒。入肺、肝经。散风热，宣肺，透疹，解痉。治外感风热，咳嗽，音哑，咽喉肿痛，麻疹透发不畅，风疹，小儿惊痫，夜啼，破伤

风，目赤，翳障。煎服：2.5～4.5克。蝉蜕为甲壳质，含异黄质蝶呤(Isoxanthopterin)、赤蝶呤(Erythropterin)等。对破伤风毒素引起的兔破伤风，可使其存活时间延长。也能对抗小鼠因士的宁、可卡因及烟碱引起的惊厥死亡。并有中枢镇静作用。蝉蜕有解热作用，其中以蝉衣头足解热作用较强。

罂粟壳 出《本草发挥》。又名御米壳、粟壳。为罂粟科植物罂粟Papaver somniferum L. 的果壳。酸、涩，平。入肺、大肠、肾经。敛肺，止咳，涩肠，止痛。治久咳，久泻，久痢，脱肛，便血，心腹及筋骨诸痛。功用与鸦片相同而力弱。煎服：2.4～6克。本品含少量吗啡、可待因、那碎因、那可汀、罂粟碱及罂粟壳碱等生物碱，以及多糖、内消旋肌醇、赤藓醇等。吗啡、可待因、罂粟碱及那可汀药理见鸦片条。那碎因止咳作用约与可待因相等，但能兴奋呼吸中枢，能特异性地对抗吗啡的呼吸抑制作用，而对巴比妥类的抑制呼吸作用则无效。还有明显的降压及兴奋肠管蠕动的作用。

〔丿〕

稳齿菜 见《滇南本草》。为荆芥之别名，详该条。

算盘子 出《植物名实图考》。又名野南瓜、算盘珠、臭山橘、馒头果、磨盘树子。为大戟科植物算盘子Glochidion puberum (L.) Hutch. 的果实。分布广东、广西、贵州、四川、湖北、江西、浙江、福建、江苏、安徽、陕西等地。苦，凉，有小毒。清热利湿。治疟疾，疝气，睾丸炎，淋浊，带下，腰痛。煎服：6～12克。

算盘子叶 见《江西民间草药》。为大戟科植物算盘子Glochidion puberum (L.) Hutch. 的枝叶。苦、涩，凉。清热解毒，消滞化湿，活血散瘀。①治感冒，流行性感冒，咽喉炎，淋巴结炎，疟疾，痢疾，胃肠炎，食滞腹痛，黄疸，白浊白带，闭经。煎服：9～15克。②捣敷治毒蛇咬伤、疮疖肿痛、乳腺炎、跌打损伤；煎水洗治皮疹搔痒。孕妇忌服。叶含鞣质。煎剂在试管中对志贺氏痢疾杆菌、甲型副伤寒杆菌、伤寒杆菌及沙门氏菌等9种肠道细菌有抑制作用，其中对志贺氏痢疾杆菌最敏感。

算盘子根 出《植物名实图考》。为大戟科植物算盘子Glochidion puberum (L.) Hutch. 的根。苦、涩，凉。清热利湿，活血散瘀。治感冒发热，咽喉痛，疟疾，黄疸，痢疾，肠炎，风湿性关节炎，尿道炎，白带，闭经，跌打损伤，瘰疬。煎服：15～30克。孕妇忌服。本品含鞣质。

算盘珠 见《福建民间草药》。即算盘子，详该条。

管仲 ❶出《滇南本草》。又名翻白叶、白地榆、地槟榔、银毛委陵菜。为蔷薇科植物亮叶委陵菜Potentilla fulgens Wall. 的根或全草。分布我国西南地区。苦、涩，寒。凉血止血，收敛止泻。①治肺结核咯血，吐血，鼻衄，血崩，肠炎，痢疾，消化不良。煎服：9～15克。②捣敷治疔疮；研末撒治外伤出血。❷见《本草纲目》。即贯众，详该条。

熏牙子 见《陕西中药志》。为天仙子之别名，详该条。

熏衣草 见《广西本草选编》。为零陵香之别名，详该条。

熏陆香 出《名医别录》。为乳香之别名，详该条。

熏草 出《山海经》。为零陵香之别名，详该条。

熏梅 见《现代实用中药》。为乌梅之别名，详该条。

鼻涕虫 见《本草纲目》。为蛞蝓之别名，详该条。

獐牙菜 见《内蒙古中草药》。又名当药。为龙胆科植物瘤毛獐牙菜Swertia pseudo-

chinensis Hara的全草。分布东北、华北地区及河南、山东。苦，寒。健胃，清热利湿。治消化不良，胃炎，急、慢性细菌性痢疾，黄疸，火眼，牙痛，口疮。内服：前汤，3～9克；研末，每次1.5克，每日二次。本品含生物碱：龙胆碱；黄酮类：当药素、异荭草素、异牡荆素；呫吨酮类：雏菊叶龙胆酮（Bellidifolin）、当药呫吨酮（Swertianin）、对叶当药呫吨酮（Decussatin）等。当药呫吨酮有抗结核活性。

獐耳细辛 见《本草纲目》。为及己之别名，详该条。

馒头果 见《福建民间草药》。为算盘子之别名，详该条。

鲜白头 见《江苏药材志》。为绵枣儿之别名，详该条。

鲜生地 出《本草便读》。又名生地黄、鲜地黄。为玄参科植物地黄 Rehmannia glutinosa（Gaertn.）Libosch. 的新鲜根茎。产河南、浙江、江苏、河北、陕西、湖南等地。甘、苦，寒。入心、肝、肾经。清热，凉血，生津。①治温病热入营血，阴伤烦渴，舌绛，神昏，斑疹，咳血，吐血，衄血，尿血，便血，虚劳骨蒸，咽喉肿痛，消渴，便秘。煎服：15～60克。②捣烂绞汁，少加冰片滴耳，治中耳炎。成分参见干地黄条。

鲜地黄 见《植物名实图考》。即鲜生地，详该条。

鲜黄连 见《东北药用植物志》。又名细辛幌子、常黄连、毛黄连、朝鲜黄连。为小檗科植物鲜黄连Jeffersonia dubia（Maxim.）Benth. et. Hook. f. 的根茎，分布东北地区。苦，寒。清热解毒，健胃止泻。①治发热烦躁，口舌生疮，扁桃体炎，吐血，衄血，消化不良，恶心呕吐，肠炎，痢疾。煎服：3～6克。②治眼结膜炎。煎水洗眼。本品含小檗碱等生物碱。

〔丶〕

辣茄 见《花镜》。即辣椒，详该条。

辣虎 见清·龙柏《药性考》。为辣椒之别名，详该条。

辣菜子 见《中药志》。为白芥子之别名，详该条。

辣椒 出《植物名实图考》。又名番椒、辣茄、辣虎。为茄科植物辣椒 Capsicum frutescens t. 的果实。辛，热。入心、脾经。温中，散寒，健胃。①治寒滞腹痛，食欲不振，呕吐，泻痢，风湿疼痛。研末服，0.9～2.4克。②治冻疮，疥癣，煎水洗；腮腺炎，蜂窝织炎，多发性疔肿，外伤瘀肿，研末油调敷。本品含辣椒碱、二氢辣椒碱、辣椒红素、辣椒玉红素、维生素C等。种子含龙葵碱、龙葵胺、辣椒新甙（Capsicosine）、辣椒甙（Capsicoside）等。干果含N-（13-甲基十四烷基）乙酰胺。辣椒可刺激人舌的味觉感受器，反射性地增加胃的运动，辣椒煎剂有杀灭臭虫的功效。

辣椒头 见萧步丹《岭南采药录》。又名辣椒根。为茄科植物辣椒Capsicum frutescens L. 的根。治功能性子宫出血，阴囊肿胀。煎服：9～15克。

辣椒茎 见《重庆草药》。又名海椒梗。为茄科植物辣椒Capsicum frutescens L. 的茎。辛，热。祛寒湿，散瘀血。治风寒湿痹，冻疮。煎水洗浴。

辣椒根 见《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编·计划生育、妇产科疾病》。即辣椒头，详该条。

辣蓼草 见《江苏省植物药材志》。为蓼科植物辣蓼 Polygonum flaccidum Meissn.或水蓼P.hydropiper L. 的全草。全国各地均产。辛，温，有小毒。祛风利湿，消滞，散瘀，止痛，杀虫。①治痢疾，泄泻，腹痛，食滞，疳积，风湿疼痛，功能性子宫出血。煎服：15～30克。②治湿疹，顽

癣，煎水洗；跌打损伤，蛇、犬咬伤，捣敷。孕妇忌服。上述两种植物的全草均含挥发油、鞣质及黄酮类：水蓼素及其7-甲醚、甲基鼠李素（Rhamnazin）、金丝桃甙等。水蓼挥发油中主要成分为水蓼二醛、异水蓼酮等；黄酮类中还有槲皮素、槲皮甙、芸香甙等。水蓼煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌等有抑制作用。所含的甙能加速血液凝固。水蓼叶有麦角样作用，可用于子宫出血及其它内出血。挥发油有刺激性，可使皮肤发赤。

韶子 出《本草拾遗》。又名山韶子、毛荔枝、毛召。为无患子科植物海南韶子Nephelium lappaceum L. var. topengil (Merr.)How et Ho的果实。分布广东、广西、云南等地。甘、酸，温。①治痢疾。煎服：9～15克。②治口腔炎，溃疡。煎水洗。种仁含油36.28%。果皮含鞣质23.65%。

腐肠 出《神农本草经》。为黄芩之别名，详该条。

腐婢 出《本草经集注》。又名小青、凉粉柴、山膏药、六月冻。为马鞭草科植物豆腐木Premna microphylla Turcz.的根或茎、叶。分布华东、中南、西南等地区。苦、微辛，凉。清热解毒，消肿。①治疟疾，腹泻，痢疾，阑尾炎，肝火头痛。煎服：15～30克。②治痈肿疮疖，外伤出血，蛇咬伤，烫伤。捣敷或研末调敷。本品含萜类化合物。体外试验，水煎剂对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

瘩背草 见《南京民间药草》。为犁头草之别名，详该条。

漆大姑 见萧步丹《岭南采药录》。又名毛漆、毛七哥、毛七公、藤篮果、痒树棵。为大戟科植物毛果算盘子Glochidion eriocarpum Champ.的根或枝叶。分布广东、广西、贵州、云南等地。苦、涩，平。清热利湿，解毒止痒。①治急性胃肠炎，痢疾，风湿性关节炎，牙痛，咽喉痛，脱肛，白带，月经过多。煎服：15～30克。②治漆过敏，水田皮炎，湿疹，荨麻疹，剥脱性皮炎。枝叶煎水洗或研末撒。预试全草含鞣质、酚类。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌有抑菌作用。

漆姑草 出《本草拾遗》。又名珍珠草、羊儿草、地松、瓜槌草。为石竹科植物漆姑草Sagina japonica（Sw.）Ohwi的全草。分布江苏、安徽、江西、湖南、湖北及西安等地。苦，凉。清热解毒，行血止血。①治跌打内伤，呕血，咯血。煎服：9～15克。②治漆疮，捣汁外搽；慢性鼻炎，副鼻窦炎，捣烂塞患侧鼻孔，每天二至三次，连用一星期；痈肿，瘰疬，毒蛇咬伤，鲜品捣敷；龋齿痛，捣烂取汁含漱，或捣烂塞入牙缝内。

漆脚 见《中药材手册》。为干漆之别名，详该条。

漆渣 见《中药材手册》。为干漆之别名，详该条。

漂摇草 见《本草纲目》。为小巢菜之别名，详该条。

滴水珠 见《江西草药》。又名一滴珠、石半夏、独叶一支花。为天南星科植物心叶半夏Pinellia cordata N. E. Br.的块茎。分布长江以南各地。辛，温，有小毒。行瘀止痛，解毒消肿。①治头痛，胃痛，腹痛，腰痛，过敏性皮炎。研末服：0.3～0.6克，或1～3粒块茎吞服。②治毒蛇咬伤，跌打损伤。内服并取鲜品捣敷。③治瘰疬，乳痈，研末油调敷；痈疮肿毒，鲜品捣敷。内服切勿过量，应整粒用温开水吞服，不可嚼碎，研粉服可装入胶囊，否则引起喉舌麻痹。孕妇忌服。

滴乳石 见《中国药学大辞典》。为钟乳石之处方名，详该条。

漏芦 出《神农本草经》。又名野兰、鬼油麻、榔头花。为菊科植物祁州漏芦Rhaponticum uniflorum(L.)DC.或禹州漏芦

Echinops latifolius Tausch.的根。主产河北、辽宁、山西。苦、咸，寒。入胃、大肠经。清热解毒，消肿排脓，下乳。①治乳痈，乳汁不通，流行性腮腺炎，疖肿，淋巴结结核。②治风湿性关节炎，热毒血痢，尿血，血痔。煎服：4.5～9克。外用捣敷。孕妇慎用。祁州漏芦根含挥发油。

蜜父 见《本草纲目》。为梨之别名，详该条。

蜜果 见《群芳谱》。为无花果之别名，详该条。

蜜草 出《名医别录》。为甘草之别名，详该条。

蜜香 见《南方草木状》。为沉香之别名，详该条。

蜜桶花 见《云南中草药》。为猫花之别名，详该条。

蜜望子 出《肇庆志》。为杧果之别名，详该条。

蜜脾 见《本草纲目》。为龙眼肉之别名，详该条。

蜜蜂子 出《本草经集注》。又名蜂子。为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 Apis cerana Fabricius或意大利蜜蜂A. mellifera L. 的幼虫。甘，平。祛风，解毒，杀虫。治头风，麻风，丹毒，风疹，虫积腹痛，带下。炒炙研末服。

蜜蜂草 ❶见《本草纲目》。为香薷之别名。❷见《云南中草药》。为绣球防风之别名，各详该条。

蜜蜂毒素 见《药材学》。即蜂毒，详该条。

蜜蜡 出《神农本草经》。为蜂蜡之别名，详该条。

蜜糖 见《本草蒙筌》。即蜂蜜，详该条。

〔7〕

嫩双钩 见上海中医学院《中草药学》。为钩藤之处方名，详该条。

嫩芦梗 见《现代实用中药》。即芦茎，详该条。

翠云草 出《本草纲目拾遗》。又名翠羽草、地柏叶、回生草、蓝地柏。为卷柏科植物翠云草Selaginella uncinata (Desv.)Spring的全草。分布广西、广东、湖南、福建、浙江、安徽及西南地区。微苦，寒。清热利湿，止血，解毒。①治肠炎，痢疾，黄疸型肝炎，胆囊炎，风湿痹痛，水肿，泌尿系感染，肺结核咯血，鼻衄，喉痛。煎服：6～12克。②治烫伤，炒炭研末，麻油调敷；外伤出血，研末撒。本品含海藻糖。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

翠羽草 见《本草纲目拾遗》。为翠云草之别名，详该条。

翠蝴蝶 见《广西中草药》。为鸭跖草之别名，详该条。

熊油 出《洞天奥旨》。即熊脂，详该条。

熊柳根 见《福建民间草药》。为黄鳝藤之别名，详该条。

熊胥 出《食疗本草》。为熊科动物黑熊Selenarctos thibetanus G.Cuvier或棕熊Ursus arctos L.的骨骼。主产黑龙江、吉林、云南、四川等地。咸、微辛，温。祛除风湿。治风湿关节肿痛。煎服：30～60克；或浸酒。

熊胆 出《药性论》。又名黑瞎子胆。为熊科动物黑熊 Selenarctos thibetanus G. Cuvier或棕熊Ursus arctos L.的胆囊。苦，寒。入肝、胆、脾、胃经。清热解毒，镇痉，明目，杀虫。①治小儿惊痫，疳疾羸瘦，黄疸，蛔虫病。研末服：0.3～1克。②点眼治目赤障翳；吹喉治咽喉肿痛；调敷治痔疮。主含胆汁酸类的碱金属盐，又含胆甾醇及胆色素。胆汁酸主为牛磺熊去氧胆酸，还有少量鹅去氧胆酸、胆酸。熊胆对小鼠离体肠管有罂粟碱样解痉作用，解痉的主要成

分是牛磺熊去氧胆酸，其水解产物去氧胆酸钠对士的宁引起的小鼠惊厥有解毒作用，与鹅去氧胆酸钠及胆酸钠合用能增强其解毒作用。

熊胆水 见《南宁市药物志》。为救必应之别名，详该条。

熊胆草 见广州部队卫生部《常用中草药手册》，为溪黄草之别名，详该条。

熊脂 出《神农本草经》。又名熊油。为熊科动物黑熊 Selenarctos thibetanus G. Cuvier或棕熊Ursus arctos L.的脂肪油。甘，温。补虚损，强筋骨，润肌肤。治虚损羸瘦，风痹不仁，筋脉挛急。内服：9～15克，熬炼后开水冲。外涂头癣，白秃疮，臁疮。

缩砂仁 出《药性论》。为砂仁之处方名，详该条。

缩沙蜜 出《药性论》。为砂仁之别名，详该条。

十五画

〔一〕

樗木叶 出《新修本草》。即樗叶，详该条。

樗叶 出《本草纲目》。又名樗木叶。为苦木科植物臭椿 Ailanthus altissima (Mill.)Swingle 的叶。苦，温，有小毒。煎水洗疮疥，风疽。本品含异槲皮素。

樗白皮 出《药性论》。又名樗皮、臭椿皮。为苦木科植物臭椿Ailanthus altissima (Mill.) Swingle的根或树干的内皮。全国大部分地区均产。苦、涩，寒。入胃、大肠经。清热燥湿，收涩，杀虫。①治痢疾，久泻，便血，痔血，崩漏，滞下，遗精，小便频数，蛔虫病。煎服：6～9克。②煎汤洗治皮肤疮癣；熬膏敷治脾肿大。根皮含苦楝素（Mersosin）、鞣质等。树皮含臭椿苦酮（Ailanthone）、臭椿苦内酯（Amarolide）、乙酰臭椿苦内酯、苦木素（Quassin）、新苦木素等。本品在体外对痢疾、伤寒杆菌有一定的抑制作用。臭椿苦酮有较强的抗阿米巴原虫作用。苦木素可作苦胃健胃剂。

樗皮 出《日华子诸家本草》。为樗白皮之简称，详该条。

樗树子 见《山西中药志》。即凤眼草，详该条。

槐子肉皮 出《濒湖集简方》。为无患子皮之别名，详该条。

樱桃叶 出《新修本草》。为蔷薇科植物樱桃Prunus pseudocerasus Lindl.的叶。分布河北、陕西、甘肃、山西、山东、安徽、江苏、浙江、福建、江西、广西、四川、云南、贵州等地。甘、苦，温。透疹，温胃，健脾，止血，解毒。①治麻疹透发不畅，胃寒食积，腹泻，吐血。内服：煎汤，9～15克；或捣汁饮。②治毒蛇咬伤，疮毒，捣敷；阴道滴虫，煎水坐浴，并用棉球（用线扎好）浸透樱桃叶水，塞入阴道内，每日换一次。本品含黄酮甙。

樱桃枝 出《本草纲目》。又名樱桃梗。为蔷薇科植物樱桃Prunus pseudocerasus Lindl.的枝条。治寒疼，胃气疼，九种气疼。烧灰研末，烧酒送服。

樱桃核 出明·范洪《滇南本草图说》。为蔷薇科植物樱桃Prunus pseudocerasus Lindl.的果核。辛，平。清热透疹。治麻疹透发不畅。煎服：3～9克。亦可加大剂量煎汤熏洗。

樱桃梗 见《滇南本草》。即樱桃枝，详

该条。

橡子 出《庄子、司马彪注》。即橡实，详该条。

橡木皮 出《本草纲目》。又名栎树皮。青刚皮。为壳斗科植物麻栎Quercus acutissima carr.的树皮或根皮。苦，平。收敛，止痢。①治久泻。煎服：3～9克。②治阿米巴痢疾。本品1斤，加水3000毫升，煎成1500毫升，每次30～50毫升，日服三次，连服七天。③煎水洗恶疮。树皮含鞣质，广西产的含16%，贵州产的含7.17%。

橡斗壳 出《日华子诸家本草》。即橡实壳，详该条。

橡皮草 见《湖南药物志》。为金边兔耳之别名，详该条。

橡实 出《雷公炮炙论》。又名橡子、栎子、柞子、麻沥果。为壳斗科植物麻栎Quercus acutissima Carr.的果实。分布辽宁、河北至华南、西南地区。苦、涩，微温。涩肠固脱，解毒消肿。①治肠炎，痢疾，痔血，乳腺炎，睾丸炎。煎服：9～15克。②治脱肛，烧存性研末调敷；石痈，醋磨涂。种子含淀粉50.4%，脂肪油约15%。

橡实壳 出《新修本草》。又名橡斗壳。为壳斗科植物麻栎Quercus acutissima Carr.的壳斗。涩，温。收敛，止血。①治泻痢，肠风下血，崩中，带下。内服：煎汤，9～15克；或入散剂。②治脱肛。煎水洗或研末调敷。本品含鞣质19～29%。

槲寄生 见《新修本草》。又名北寄生。为桑寄生科植物槲寄生Viscum coloratum (Komar.) Nakai的带叶茎枝。主产河北、辽宁、吉林。苦，平。祛风湿，补肝肾，强筋骨。治风湿痹痛，腰膝酸软，胎动不安，功用与桑寄生基本相同。煎服：9～15克。茎叶含齐墩果酸、β-香树脂醇、内消旋肌醇、蛇麻脂醇、β-谷甾醇及黄酮甙等。叶含黄槲寄生甙(Flavoyadorinin)A、B，高黄槲寄生甙B(Homoflavoyadorinin B)及蛇麻脂醇、肉豆蔻酸。叶的浸剂及该植物的其他部分的酊剂有温和的降低血压、利尿作用。

樟木 出《本草拾遗》。又名香樟木、芳樟。为樟科植物樟Cinnamomum camphora (L.) Presl的木材。分布西南、华南及湖南、湖北、江西、台湾、福建、浙江、江苏等地。辛，温。祛风除湿，和中消食，活血通络。①治感冒头痛，风湿痹痛，胃腹胀痛，宿食不消，跌打损伤，克山病。煎服：9～15克。②治疥、癣，风痒，煎水熏洗。孕妇忌服。本品含挥发油，油中主成分为右旋樟脑、1，8-桉叶素、黄樟醚。又含有机酸类、单萜类、倍半萜类、倍半萜醇类等数十种化合物。药理见樟脑条。

樟木子 见《中药志》。即樟树子，详该条。

樟木皮 见《生草药手册》。即樟树皮，详该条。

樟皮 见《本草纲目拾遗》。为樟树皮之简称，详该条。

樟扣 见《广西中药志》。为樟树子之别名，详该条。

樟柳柽 见《陕甘宁青中草药选》。为藏茄之别名，详该条。

樟树子 出《本草纲目拾遗》。又名香樟子、樟木子、樟扣。为樟科植物樟Cinnamoum camphora (L.) Presl的果实。辛，温。散寒祛湿，行气止痛。①治吐泻，胃腹冷痛，食滞腹胀。煎服：9～15克。③煎水洗脚气；磨涂肿毒。本品含挥发油，主成分为樟脑。

樟树叶 出《本草纲目拾遗》。为樟科植物樟Cinnamomum camphora (L.) Presl的叶。苦、辛，温。祛风，除湿，止痛，杀虫。①治慢性下肢溃疡，疥癣，跌打损伤。煎水洗或捣敷。②治风湿骨痛。煎服：3～9克。孕妇忌服。本品含挥发油0.8～1.8%，主成分为右旋樟脑，还含桉叶

素、黄樟醚等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌及绿脓杆菌有较弱的抑制作用。

樟树皮 出《本草纲目拾遗》。又名香樟树皮、樟皮、樟木皮。为樟科植物樟Cinnamomum camphora (L.) Presl的树皮。行气，止痛，祛风湿。①治脚气，慢性下肢溃疡，疥癣，跌打损伤。煎水洗。②治吐泻，胃痛，风湿痹痛。煎服：6～9克。孕妇忌服。树皮含挥发油3～5%，主成分为右旋樟脑、1，8-桉叶素和黄樟醚。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌均有抑制作用。

樟脑 出《本草品汇精要》。又名潮脑、树脑。为樟科植物樟Cinnamomum camphora (L.) Presl的根、干、枝、叶经加工提炼制成的颗粒状结晶。主产台湾、贵州、广西、福建、江西、四川。辛，热，有毒。入心、脾经。通窍，辟秽，杀虫，止痛。①治中恶猝然昏倒，热病神昏，寒湿霍乱，心腹胀痛。入丸、散服，一次量60～150毫克，不入汤剂。②治疮疡，疥癣，跌打扭伤，冻疮。研末用酒精配成酊剂涂擦；牙痛，喉痹，研末敷。孕妇忌服。樟脑对中枢神经系统有兴奋作用，增进呼吸及循环。中毒量可引起惊厥。少量口服在胃内产生温暖舒适感，大量口服可引起恶心，呕吐；皮肤上揉擦可发红，增进局部血液循环，并有轻微局麻作用。对离体兔肠有解痉作用。

樟脑树根 见《四川中药志》。为香樟根之别名，详该条。

橄榄 出《日华子诸家本草》。又名青果、白榄。为橄榄科植物橄榄Canarium album(Lour.)Raeusch.的果实。产广东、广西、福建等地。甘、涩、酸，平。入肺、胃经。清肺利咽，生津化痰，解毒。治咽喉肿痛，烦渴，咳嗽，癫痫，肠炎腹泻，鱼骨鲠喉，酒及鱼鳖中毒。内服：煎汤，9～15克；亦可生嚼咽汁或捣汁服。本品含挥发油及维生素C 167.2～200.6毫克%。

橄榄核 出《本草纲目》。为橄榄科植物橄榄Canarium album (Lour.) Raeusch.的果核。甘、涩，温。①治鱼骨鲠喉，磨汁服；肝胃气痛，疝气，便血，烧存性研末服，3～6克。②治冻疮。烧存性研末油调涂。

橄榄根 见《福建中草药》。即白榄根，详该条。

赭石 见《普济方》。为代赭石之简称，详该条。

豌豆跌打 见《云南思茅中草药选》。为紫金龙之别名，详该条。

醋柳果 见《西藏常用中草药》。为胡颓子科植物沙棘Hippophae rhamnoides L.的成熟果实。分布华北、西北及四川、云南、西藏。酸、涩，微温。止咳祛痰，健胃消食，活血散瘀。治慢性支气管炎，咳嗽痰多，胸满，消化不良，胃痛，肠炎，痢疾，跌扑瘀肿，经闭。煎服：3～9克。果实含异鼠李素及其3-葡萄糖甙和3-芸香糖甙、槲皮素等。

醉鱼草 出《本草纲目》。又名闹鱼花、药鱼子、鱼尾草。为马钱科植物醉鱼草Buddleja lindleyana Fort.的全草。分布浙江、安徽、江苏、江西、福建、广东、广西、湖南、湖北、四川。辛、苦，温，有小毒。祛风，止咳，杀虫，活血。①治感冒，咳喘，风湿性关节炎，蛔虫病，钩虫病，跌打损伤。煎服：9～15克。②治创伤出血。研末敷。服用过量可引起头晕，呕吐，呼吸困难，四肢麻木和震颤等中毒现象。孕妇忌服。本品含醉鱼草黄酮醇甙(Buddleoflavonoloside)、醉鱼草甙等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

醉鱼草花 出《本草纲目》。为马钱科植物醉鱼草Buddleja lindleyana Fort.的花。辛、苦，温，有小毒。①治痰饮寒喘，小儿疳积。煎服：9～15克。②治烫伤，痈疽疔毒。捣敷或研末调敷。本品含醉鱼草甙、刺槐素等多种黄酮类。

醉草 见《本草纲目》。为睡菜之别名，详该条。

敷地两耳草 见《广西野生资源植物》。为黄毛耳草之别名，详该条。

蕨 出唐·崔禹锡《食经》。又名山凤尾、蕨儿菜、三叉蕨、如意草、狼萁。为凤尾蕨科植物蕨Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var.latiusculum(Desv.)Underw.的嫩叶。分布全国各地。甘，寒。清热，滑肠，降气，化痰。治食隔，气隔。煎服：9～15克。叶含多种蕨素（Pterosin）、蕨甙(Pteroside）等印满酮类化合物。还含致癌物：蕨内酰胺（Pterolactam）。又含蕨甾酮（Pterosterone）等。

蕨儿菜 见《东北药用植物志》。为蕨之别名，详该条。

蕨鸡根 见《分类草药性》。为蕨根之别名，详该条。

蕨根 出《本草纲目》。又名蕨鸡根、乌角。为凤尾蕨科植物蕨Pteridium aquilinum（L.）Kuhn var. latiusculum（Desv.）Underw.的根茎。甘，寒。清热利湿。安神，消肿。治黄疸，泻痢腹痛，风湿性关节炎，白带，高血压病，头昏失眠，痔疮，脱肛，痈肿。煎服：9～15克。

蕨薯 见《广西药用植物图志》。为马鞍卵之别名，详该条。

蕤仁 出《雷公炮炙论》。又名蕤核、马茄子。为蔷薇科植物单花扁核木Prinsepia uniflora Batal. 的果核。主产陕西、山西、甘肃。甘，微寒。入肝、心经。养肝明目，补心安神。治目赤肿痛，眦烂，羞明，流泪，角膜云翳，失眠。煎服：4.5～9克。失眠宜炒用。种仁含脂肪油约32%。

蕤核 出《神农本草经》。为蕤仁之别名，详该条。

蕉油 见《本草纲目》。即芭蕉油，详该条。

蘄艾 出《蘄艾传》。为艾叶之处方名，详该条。

蘄蛇 见《本草纲目》。为白花蛇之别名，详该条。

蘄蛇药 见《浙江民间常用草药》。为斑叶兰之别名，详该条。

蘄子菜 出《野菜谱》。为荟菜之别名，详该条。

震天雷 见南川药物试验种植场《常用中草药手册》。为九牛造之别名，详该条。

〔 | 〕

瞎蟓 见《中药志》。为虻虫之别名，详该条。

瞑菜 见《南方草木状》。为睡菜之别名，详该条。

蝴蝶风 见《广西中药志》。为大飞扬之别名，详该条。

蝴蝶花 ❶见《四川中药志》。又名燕子花、紫燕。为鸢尾科植物蝴蝶花Iris japonica Thunb.的全草。我国大部分地区均有分布。苦，寒。清热解毒，消肿止痛。治肝炎，肝肿大，肝痛，胃痛，食积胀满，咽喉肿痛，跌打损伤。煎服：6～15克。花瓣含恩比宁(Embinin)、当药素（Swertisin）。❷见《中国药用植物图鉴》。为三色堇之别名，详该条。

蝴蝶花根 见《药材学》。为射干之别名，详该条。

蝴蝶草 ❶见《浙江民间常用草药》。为肺形草之别名。❷见《昆明民间常用草药》。为铁马豆之别名。各详该条。

蝎子 见《药材资料汇编》。即全蝎，详该条。

蝎子七 见《陕西中草药》。又名猴子七、野高粱。为蓼科植物珠芽蓼Polygonum viviparum L. 或圆穗蓼P. sphaerostachyum Meissn.的根茎。前者分布吉林、内蒙古、四川、西藏及西北地区；后者分布西南地区及陕西、甘肃、青海等地。苦、涩，凉。清热解毒，散瘀止血。①治扁桃体炎，咽喉炎，肠炎，痢疾，白带，崩漏，便血，

吐血，衄血。煎服：6～15克。②治跌打损伤、外伤出血，痈疖肿毒。捣敷或研末撒。

蝎子花　见《陕西中草药》。为紫堇之别名，详该条。

蝎子草　出《人海记》。为荨麻之别名，详该条。

蝎虎　出《新修本草》。即壁虎，详该条。

蝎虎草　见《救荒本草》。为回回蒜之别名，详该条。

蝌蚪　出《本草拾遗》。又名虾蟆子。为蛙科动物泽蛙Rana limnocharis Boie或金线蛙R. plancyi Lataste等蛙类的幼体。分布全国各地。清热解毒。治热毒疮肿，流行性腮腺炎，火疮。捣敷；或加适量冰片化水后频涂患处。

蝮蛇　出《名医别录》。又名土球子、土虺蛇、反鼻蛇、地扁蛇。为蝮蛇科动物蝮蛇Agkistrodon halys（Pallas）除去内脏的全体。我国北部和中部均有分布。甘，温，有毒。祛风，攻毒。①治麻疯，癞疾，风痹，破伤风，胃痉挛。内服：浸酒饮；或烧存性研末吞，每次3～6克。②治瘰疬，搭背。入磁器内，香油浸，埋地下，百日后取出晒半干，捣成膏状物敷患处。蝮蛇所含蝮蛇毒是以血循毒为主的血循、神经混合毒。呼吸麻痹是早期死亡的主要原因。由于血循毒能大量释放血管活性物质，如组胺、5-羟色胺及缓动素等，破坏红细胞，增加毛细血管通透性，使血浆及体液大量丧失，血容量不足，对心脏也有严重的直接损害，可因循环衰竭而引起死亡。

蝼蛄　出《神农本草经》。又名土狗、地狗、地牯牛、拉拉狗、拉蛄。为蝼蛄科昆虫蝼蛄Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois或大蝼蛄G.unispina Saussure的干燥全体。主产江苏、浙江、山东、河北、安徽、辽宁等地。咸，寒。入胃、膀胱经。利水退肿。①治水肿，小便不利。内服：煎汤，3～4.5克；或焙干研末，每次2克，日服三次。②治小儿脐风汁出，与甘草研末撒；竹、木刺入肉，与红糖捣敷伤口处，孕妇忌服。蝼蛄睾丸、血淋巴及尿中含多种游离氨基酸。

蝙蝠葛根　见《中国药用植物志》。即北豆根，详该条。

蝙蝠粪　见《中药材手册》。为夜明砂之别名，详该条。

蹄蹋花　出《本草图经》。为闹羊花之别名，详该条。

踏天桥　见《湖南药物志》。为杜茎山之别名，详该条。

暴马子　见《吉林中草药》。又名棒棒木、荷花丁香。为木犀科植物暴马丁香Syringa reticulata(Blume) Hara var. mandshurica（Maxim.）Hara的树皮或树干、茎枝。分布东北、华北及陕西、甘肃、宁夏等地。苦，微寒。清肺，祛痰，止咳，平喘。治慢性支气管炎，支气管哮喘。煎服：15～30克。本品含挥发油、甾醇、鞣质等。从中分离出一种具祛痰作用的有效成分：β-羟乙基-3，4二羟基苯。树皮煎剂对小鼠有祛痰作用，与等量的桔梗作用相似；对豚鼠有平喘作用。在体外对肺炎球菌及流感杆菌有中度抑制作用。

墨斗草　见《医学正传》。为墨旱莲之别名，详该条。

墨地　见《四川中药志》。又名八月瓜。为小檗科植物桃儿七Podophyllum emodi Wall. var. chinense Sprague的果实。分布陕西、甘肃、青海、四川、云南和西藏等地。酸、涩，平，有毒。健脾，理气，安胎。治痢疾腹痛，劳伤咳喘，胎气不安，月经不调，白带。煎服：3～9克。

墨旱莲　见《饮片新参》。又名旱莲草、墨斗草、止血草。为菊科植物鳢肠Eclipta prostrata L.的全草。主产江苏、浙江、江西、广东等地。甘、酸，凉。入肝，肾经。凉血，止血，补肾，益阴。①治吐血，咳血，衄血，尿血，便血，崩漏，阴虚头晕、耳鸣，

腰痛。煎服：9～30克。②治痈肿疮毒，捣敷；皮肤湿痒，煎水熏洗；外伤出血，捣敷或研末撒。全草含鳢肠素（Ecliptine）、皂甙、鞣质及多种噻吩化合物。叶含蜇蜞菊内酯等。

墨鱼盖 见《中药志》。为海螵蛸之别名，详该条。

墨柱根 见广州部队卫生部《常用中草药手册》。为倒吊蜡烛之别名，详该条。

〔 J 〕

稻芽 见《中药材手册》。即谷芽，详该条。

稻糵 出《本草纲目》。为谷芽之别名，详该条。

箭头草 见《普济方》。为紫花地丁之别名，详该条。

箭羽草 见《四川中药志》。为四楞筋骨草之别名，详该条。

箭芪 见《医学集成》。为黄芪之处方名，详该条。

箭杆风 ❶见清·刘士季《草木便方》。为山姜之别名。❷见《四川常用中草药》。为廉姜之别名。各详该条。

靠山红 见《东北常用中草药手册》。即满山红，详该条。

黎豆藤 见《四川常用中草药》。为牛马藤之别名，详该条。

僵虫 见《河北药材》。即白僵蚕，详该条。

僵蚕 出《备急千金要方》。即白僵蚕，详该条。

僵蛹 见《中草药通讯》(6)：5，1972。为蚕蛹经白僵菌Beauveria bassiana（Bals.）Vuill.发酵的制成品。镇惊，清热，止咳，化痰。治高热惊厥，癫痫，流行性腮腺炎，上呼吸道感染，慢性支气管炎，遗尿，荨麻疹，高血清胆固醇，制成片剂服：每片0.3克，成人每日20～30片，分三次服。本品含蚕蛹油，油中含多种不饱和酯肪酸。脱脂后的僵蛹预试含有酚性成分，有机酸、植物甾醇和氨基酸等；其中确定有草酸铵，为对抗小鼠士的宁惊厥的成分。在体外能抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌生长，对小白鼠肉瘤-180有抑制作用。

鲤鱼 出《神农本草经》。为鲤科动物鲤鱼Cyprinus carpio L.的肉或全体。甘，平。入脾、肾经。利水消肿，下气，通乳。治水肿胀满，黄疸，水泻，痢疾，咳嗽气逆，乳汁不通。内服：煮食。鲤鱼肉每100克含蛋白质17.3克，脂肪5.1克，钙25毫克，磷175毫克，铁1.6毫克，维生素B_2 0.1毫克，尼克酸3.1毫克，并含组织蛋白酶、肌酸等。

鲤鱼胆 出《神农本草经》。为鲤鱼科动物鲤鱼Cyprinus carpio L.的胆囊。苦，寒。入肝经。清热，消肿，明目，散翳。①治咽痛，喉痹。内服：和药作丸。②治目赤肿痛，青盲，雀目，翳障，取汁点涂；滴耳治慢性中耳炎。本品含胆汁酸、胆汁色素、脂类、鲤胆醇（Cypinol）、别鹅去氧胆酸等。

鲤鱼橄榄 见《福建中草药》。为羊角扭之别名，详该条。

鲤鱼鳞 出《食疗本草》。为鲤科动物鲤鱼Cyprinus carpio L.的鳞。止血，散瘀。治吐血，衄血，崩漏，带下，瘀滞腹痛。炒存性研末服，3～6克。本品含鱼鳞硬蛋白。

鲫鱼胆草 见萧步丹《岭南采药录》。又名较剪草、蜈蚣草、节节花、苦胆草、细叶亚婆草。为茜草科植物耳草 Hedyotis auricularia L.的全草。分布华南和西南地区。苦，凉。清热解毒，凉血消肿。①治感冒发热，肺热咳嗽，咽痛，急性结膜炎，肠炎，痢疾，便血。煎服：9～15克。②治痈疮肿毒，带状疱疹，瘰疬，毒蛇咬伤，鲜品捣敷；湿疹、皮肤风热毒痒，煎水洗；走马牙疳，煎汤和醋漱口。根、茎含耳草碱(Auricularine)、茜素、草酸、植物甾醇、鞣质等。根含耳草根碱（Hedyotine）。另预试含三萜类化合

物。

〔丶〕

熟地 见《景岳全书》。为熟地黄之简称，详该条。

熟地黄 出《本草图经》。又名熟地。为玄参科植物地黄 Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.或怀庆地黄R.glutinosa Libosch. f. hueichingensis (Chao et Schih) Hsiao的根茎经加工蒸晒而成。主产河南、浙江等地。甘，微温。入肝、肾经。滋阴，补血。①治肝肾阴虚，头晕耳鸣，消渴，骨蒸潮热，盗汗，腰膝酸软，溲数，遗精。②治血虚萎黄，心悸，失眠，月经不调，崩漏。煎服：9～30克。成分参见干地黄条。

瘪竹 见《药材资料汇编》。为仙人杖之别名，详该条。

瘪谷茴香 见《本草正义》。为莳萝子之别名，详该条。

瘪桃干 见《中药志》。即碧桃干，详该条。

潮脑 见《本草品汇精要》。为樟脑之别名，详该条。

潮湿虫 见《中药志》。为鼠妇之别名，详该条。

潦叶花 见《民间常用草药汇编》。为马蔺花之别名，详该条。

潘桑叶 见上海中医学院《中草药学》。为胡颓子叶之别名，详该条。

潼沙苑 见《中国药学大辞典》。为沙苑子之处方名，详该条。

潼蒺藜 见《本草便读》。为沙苑子之别名，详该条。

澄茄根 见《四川中药志》。为豆蔻姜之别名，详该条。

寮刁竹 见《广东中药》Ⅱ（生草药部分）。为徐长卿之别名，详该条。

鹤顶草 出《土宿本草》。为藜之别名，详该条。

鹤虱 出《新修本草》。又名北鹤虱。为菊科植物天名精 Carpesium abrotanoides L.的果实。主产河南、山西。苦、辛，平，有小毒。入脾、胃经。杀虫。治蛔虫、钩虫、绦虫、蛲虫病及痢。煎服：6～9克。本品含挥发油，其主成分为天名精内酯（Carpesialactone）、天名精酮(Carabrone)等。尚含缬草酸、豆甾醇等。在体外，煎剂对鼠蛲虫、酊剂对犬绦虫有抑制作用。天名精内酯对小白鼠先呈短暂兴奋，随即安静，四肢弛缓麻痹；对大鼠有抑制脑组织呼吸作用；对兔有降温、降压作用。天名精100%煎剂对皮肤有一定的消毒和抑菌作用。

鹤草芽 见《全国中草药汇编》。即仙鹤草根芽，详该条。

〔7〕

缬草 见《科学的民间药草》。又名拔地麻、小救驾、满山香。为败酱科植物缬草 Valeriana officinalis L.的根及根茎。分布东北、华北、西北及河南、山东、湖北、四川等地。辛、甘，温。入心、肝经。安神，理气，止痛。治心悸，失眠，癔病，癫痫，脘腹胀痛，月经不调，腰腿痛，跌打损伤。煎服：3～6克。根含挥发油，其主成分为异戊酸龙脑酯。又含缬草碱（valerine）、缬草胺碱（Valeramine）、缬草三酯（Valepotriate）、缬草酸、异缬草酸、β-谷甾醇等。本品对兔、小鼠及大鼠均有镇静作用，异缬草酸衍化物对小鼠有镇痛作用，提取物还有一定的抗惊厥作用。对麻醉动物能降低血压，对兔的四氯化碳性肝坏死有一定的保护作用。总生物碱对革兰氏阳性细菌在体外有较好的抗菌作用。

十 六 画

〔一〕

靛花 出《简便良方》。为青黛之别名，详该条。

靛青根 见《本草便读》。为板蓝根之别名，详该条。

靛沫花 见《中药形性经验鉴别法》。为青黛之别名，详该条。

橹罟子 出《本草纲目》。又名露兜笋、假菠萝。为露兜树科植物露兜树 Pandanus tectorius Soland.的果实。产广东、广西等地。甘，凉。止咳，利湿，解毒。治咳嗽，小便不利，痢疾。煎服：30～60克。本品含挥发油，主成分为苯乙基甲基甲酮和芳樟醇，另含二戊烯、乙酸苯乙酯、柠檬醛及酸类等。

橙子 出《食性本草》。又名鹄壳、金球。为芸香科植物香橙Citrus junos Tanaka的果实。我国长江以南各地均有栽培。酸，凉。理气宽胸，止呕，解毒。①治胸闷腹胀，呕吐。②醒酒，解鱼、蟹毒。生食或煎服。本品含橙皮甙、柠檬酸、苹果酸、维生素等。又含挥发油，油中主含牻牛儿醛、柠檬烯等。

橙子皮 出《开宝重定本草》。为芸香科植物香橙Citrus junos Tanaka的果皮。苦、辛，温。理气化痰，利膈消食，止呕，解毒。治咳嗽痰多，胸闷腹胀，食欲不振，呕吐，解鱼、蟹毒。内服：煎汤，3～9克；或研末服。果皮含橙皮甙、挥发油，油中主含牻牛儿醛、柠檬烯等。

橙子核 出《本草图经》。为芸香科植物香橙Citrus junos Tanaka的种子。治疝气，淋病，腰痛。内服：煎汤，3～9克；或研末服。种子含脂肪油、蛋白质、黄柏内酯、闹米林（Nomilin）。

橙皮 见萧步丹《岭南采药录》。又名黄果皮。为芸香科植物甜橙Citrus sinensis（L.）Osbeck的果皮。长江以南各地均有栽培。辛、微苦，温。入脾、肺、肝经。化痰，利膈，理气，消食。①治感冒咳嗽痰多，胸腹胀满，食欲不振，肠鸣腹泻。煎服：4.5～9克。②治乳痈初起。煎水乘热洗数次。果皮含挥发油，油中主含柠檬烯、柠檬醛、癸酸等；另含枳属甙、橙皮甙、柚皮甙。煎剂能抑制胃、肠及子宫的运动；橙皮油给麻醉兔吸入，能增加呼吸道分泌而有祛痰作用。本属植物果内皮的果胶可降低实验性动脉粥样硬化的发病率，减轻病灶，降低血清胆固醇。

橘 出《神农本草经》。为芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其变种的果实。栽培于长江以南各地。甘、酸，凉。开胃，润燥，生津。治食欲不振，呕逆，烦渴。醒酒。生食。本品含挥发油，其中主含芳樟醇、柠檬烯、蒎烯等。

橘子叶 见《滇南本草》。即橘叶，详该条。

橘仁 见《药材学》。即橘核，详该条。

橘叶 出《本草纲目》。又名橘子叶。为芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其变种的叶。苦，平。入肝经。疏肝，行气，消肿散结。治肝郁气滞，胸胁胀痛，疝气，乳痈，乳房结块。煎服：6～15克（鲜品30～60克）。本品含挥发油、维生素C等。

橘白 出《本草便读》。为芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其变种果皮的白色内层部分。微苦、甘，平。和胃，化湿。治脘腹胀闷，消化不良。煎服：3～4.5克。

橘皮 出《神农本草经》。又名陈皮、红皮、黄橘皮。为芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其变种的成熟果皮。主产

四川、浙江、福建等地。辛、苦，温。入脾、肺经。理气，健脾，燥湿，化痰。①治脾胃气滞，脘腹胀满，消化不良，呕吐，呃逆。②治湿痰壅滞，胸膈满闷，咳嗽痰多。煎服：3～9克。③治烧伤，鲜橘皮捣烂装瓶液化后，蘸涂创面，一日数次。橘的外层果皮含挥发油，其主成分为柠檬烯，还含橙皮甙、新橙皮甙、红橘素（Tangeretin）、米橘素（Citromitin）、5-去甲米橘素。挥发油对胃肠有温和的刺激作用，促进消化液分泌，排除肠内积气，并有轻度祛痰作用。橙皮甙类似维生素P，有抗炎、抗胃溃疡形成及利胆作用。维生素B_1含量较多，在动物身上有某些抗动脉粥样硬化作用。煎剂能抑制胃肠平滑肌，并有某些解痉作用。

橘丝 见《本草纲目拾遗》。即橘络，详该条。

橘米 见《四川中药志》。即橘核，详该条。

橘红 出《本草纲目》。又名芸红、芸皮。为芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其变种果皮的外层红色部分。辛、苦，温。温肺化痰，燥湿，理气。治肺寒咳嗽多痰，胸膈胀闷，呕吐嗳气，胃痛，疝气痛。煎服：3～4.5克。本品含挥发油、红橘素等。参见橘皮条。

橘花 见《广西中药志》。为柚花之别名，详该条。

橘饼 出《本草纲目拾遗》。为芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其变种果实的制成品。甘、辛，温。宽中，下气，化痰，止嗽。治食滞，气膈，咳嗽，泻痢。煎服或沸水泡饮。

橘络 出清·赵其光《本草求原》。又名橘丝、橘筋。为芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其变种果皮内层的筋络（维管束）。主产四川、福建、浙江。甘、苦，平。入肝、肺经。理气，通络，化痰。治气滞经络，咳嗽胸胁痛，痰中带血。煎服：2.4～4.5克。

橘核 出《日华子诸家本草》。又名橘米、橘仁。为芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其变种的种子。主产福建、浙江、江西、四川等地。苦，平。入肝、肾经。理气，止痛，散结。治小肠疝气，睾丸肿痛，腰痛，乳痈初起。煎服：3～9克。本品含苦味成分黄柏内脂、闹米林（Nomilin）等。

橘根 见《民间常用草药汇编》。为芸香科植物橘Citrus reticulata Blanco及其变种的根。苦、辛，平。理气止痛。治气痛，气胀，疝气痛。煎服：9～15克。

橘筋 见《中药材手册》。即橘络，详该条。

瓢儿果 见《四川中药志》。为梧桐子之别名，详该条。

瓢瓢菜 见《贵州草药》。为龙舌草之别名，详该条。

薤白 出《本草图经》。又名薤白头、野蒜、小蒜、小独蒜。为百合科植物小根蒜Allium macrostemon Bge.的鳞茎。主产东北及河北、江苏、湖北等地。辛、苦，温。入肺、胃、大肠经。理气，宽胸，通阳，散结。①治胸痹，心绞痛，脘痞不舒，干呕，久痢，冷泻，胃炎，痰饮咳喘，胁痛。煎服：4.5～9克。②治疮疖，蛇咬伤。鲜品捣敷。小根蒜的叶名薤叶，治疥疮。煎水洗或捣敷。鳞茎含蒜氨酸、甲基蒜氨酸及大蒜糖。煎剂在体外对痢疾杆菌及金黄色葡萄球菌有抑制作用。

薤白头 见《中国药学大辞典》。即薤白，详该条。

薯良 见清·龙柏《药性考》。即薯莨，详该条。

薯莨 出《植物名实图考》。又名薯良、朱砂莲、山猪薯、红药子、红孩儿、金花果。为薯蓣科植物薯莨Dioscorea cirrhosa Lour.的块茎。产贵州、江西、湖南、云南等

地。苦、微酸、涩，平，有小毒。活血止血，清热解毒。①治产后腹痛，月经不调，崩漏，咯血，吐血，便血，尿血，腹泻，痢疾。内服：煎汤，6～9克；研末，每次0.9～1.5克。②治外伤出血，研粉撒；烧烫伤，研粉油调涂；毒蛇咬伤，捣敷或醋磨涂伤口周围。本品含鞣质及皂甙等。煎剂能缩短家兔出血、凝血时间，有类似血小板的促凝作用。煎剂及酊剂对离体小鼠子宫有兴奋作用；在体外对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌均有抑制作用。

薯蓣果 见《江西草药》。为零余子之别名，详该条。

薇 出《诗经》。为大巢菜之古名，详该条。

蕨宝叶 出《汉英韵府》。为破布叶之别名，详该条。

薪草 见《全国中草药汇编》。为凉粉草之别名，详该条。

薪柴灰 见《本草纲目》。为草木灰之别名，详该条。

薏米 见《药品化义》。即薏苡仁，详该条。

薏苡仁 出《神农本草经》。又名薏米、米仁、苡仁、沟子米、六谷米。为禾本科植物薏苡 Coix lacryma-jobi L.var. ma-yuen(Roman) Stapf的种仁。主产福建、河北、辽宁。甘、淡，凉。入脾、肺、肾经。健脾，利湿，清热，排脓。治泄泻，湿痹，筋脉拘挛，屈伸不利，水肿，脚气，肺痿，肺痈，肠痈，淋浊，白带。煎服：9～30克。本品含脂肪油、蛋白质、甾体衍生物、氨基酸及淀粉等，并含薏苡酯(Coixenolide)。薏苡仁油对离体兔肠，低浓度呈兴奋，高浓度呈抑制作用；对家兔及豚鼠子宫一般呈兴奋作用，还可降低蛙的横纹肌之收缩。薏苡酯对小鼠艾氏腹水癌细胞的生长有抑制作用。

薏苡根 出《神农本草经》。又名米仁根、尿珠根。为禾本科植物薏苡Coix lacryma-jobi L. var. ma-yuen (Roman) Stapf的根。我国各地有栽培。苦、甘，寒。入脾、膀胱经。清热，利湿，杀虫。治黄疸，水肿，热淋，血淋，尿路结石，带下，蛔虫病，肺痈。煎服：15～30克。本品含薏苡素、谷甾醇、豆甾醇等。薏苡素对小鼠及大鼠有镇静及镇痛作用；对人工发热的动物有解热作用；对蛙的横纹肌，有抑制作用。毒性很低。

薄荷 出《雷公炮炙论》。为唇形科植物薄荷Mentha haplocalyx Briq.的全草或叶。主产江苏、浙江、江西。辛，凉。入肺、肝经。疏风，散热，解毒，透疹。①治外感风热，头痛，目赤，咽喉肿痛，牙痛，麻疹透发不畅，风疹瘙痒。煎服：2.4～6克。宜后下。②治漆疮，疥癞。捣汁涂或煎水洗。茎叶经蒸馏得到的饱和水溶液名薄荷露，内服治头痛，热嗽，耳目咽喉口齿诸病。茎叶含挥发油，其主成分为薄荷醇、薄荷酮，另含乙酸薄荷酯、莰烯、柠檬烯、异薄荷酮等。薄荷醇局部应用可使皮肤、粘膜的冷觉感受器产生冷觉反射，引起皮肤、粘膜血管收缩，久之则有刺激作用而致充血；对离体小鼠肠管有解痉作用。

薄雪草 见《陕甘宁青中草药选》。为火绒草之别名，详该条。

薜荔 出《本草拾遗》。又名爬墙虎、木莲藤、追骨风。为桑科植物薜荔Ficus pumila L.的茎叶。主产江苏、浙江、山东。酸，平。祛风，利湿，活血，解毒。①治风湿痹痛，泻痢，淋病。煎服：9～15克。②治痈肿疮毒。捣敷或煎水熏洗。本品含脱肠草素(Herniarin)、佛手柑内酯。

薜荔果 见《湖南药物志》。为木馒头之别名，详该条。

薜荔根 见《福建中草药》。为桑科植物薜荔Ficus pumila L.的根。分布华东、华南和西南地区。苦，平。祛风除湿，舒筋通络。治头痛眩晕，关节风湿痛，产后风。煎

服：3～6克。

薅（hāo 蒿）田藨 见《本草纲目》。为茅莓之别名，详该条。

薅田藨根 见《福建民间草药》。为茅莓根之别名，详该条。

燕子石 见《全国中草药汇编》。即石燕，详该条。

燕子花 见《浙江民间常用草药》。为蝴蝶花之别名，详该条。

燕子尾 见《南宁市药物志》。为九龙藤之别名，详该条。

燕根 见《药材学》。即燕窝，详该条。

燕菜 见《现代实用中药》。即燕窝，详该条。

燕蕾子 出《食疗本草》。为八月扎之别名，详该条。

燕窝 出《本经逢原》。又名燕菜、燕根。为雨燕科动物金丝燕Collocalia esculenta L.及几种同属燕类用唾液或唾液与绒羽等混合凝结所筑成的巢。产印度尼西亚、泰国、缅甸、日本等国。甘，平。入肺、胃、肾经。养阴润燥，益气补中。治虚损，痨瘵，咳嗽痰喘，咯血，吐血，噎膈反胃。内服：布包隔汤炖4.5～9克；或入膏剂。天然燕窝含水分10.4%，含氮物质57.4%，微量脂肪，无氮提出物22%，纤维1.4%，灰分8.7%。

藁吾 出《质问本草》。为八角乌之别名，详该条。

霍石斛 见《中国药学大辞典》。为石斛之处方名，详该条。

擀杖花 见《陕西中草药》。为蜀葵花之别名，详该条。

錾（zàn暂）菜 出《本草拾遗》。又名楼台草、白花益母草、对月草。为唇形科植物錾菜 Leonurus pseudo-macranthus Kitag.的全草。分布东北、华北及陕西、甘肃、安徽、江苏等地。甘、辛，平。活血，利尿。①治产后瘀血腹痛，痛经，月经不调，跌打损伤，肾炎水肿。内服：煎汤，6～15克；或研末服。②捣敷疔疮。孕妇慎服。

〔丨〕

螃蟹 见《蟹谱》。即蟹，详该条。

螃蟹七 见《陕西中草药》。为鹿药之别名，详该条。

螃蟹甲 见《西藏常用中草药》。又名露木尔（藏名）。为唇形科植物螃蟹甲Phlomis younghuslandii Mukerjee的块根。分布西藏。甘，平。清热，镇咳，化痰。治感冒咳嗽，支气管炎。煎服：3～6克。本品含生物碱、甙类和甾体等。对小鼠有明显止咳作用。

螃蟹夹 见《四川中药志》。为枫香寄生之别名，详该条。

〔丿〕

镜面草 ❶见《福建中草药》。为鱼鳖金星之别名。❷出《杨氏家藏方》。为螺厣草之别名。各详该条。

篦子草 见《四川中药志》。为肾蕨之别名，详该条。

篦箕柴 见《浙江中药手册》。为鬼箭羽之别名，详该条。

篙障花 见《中国树木分类学》。为木槿花之别名，详该条。

獭肝 出《本草经集注》。又名水狗肝。为鼬科动物水獭Lutra luera L.的肝脏。主产吉林、黑龙江、云南。甘、咸，平，有小毒。入肝、肾经。养阴，宁嗽，止血，杀虫。治虚劳骨蒸潮热，盗汗，咳嗽，气喘，咯血，肝气痛，夜盲，痔疮下血。焙干研末服，3～6克，或入丸剂。

膨胀草 见《中国药用植物图鉴》。为荔枝草之别名，详该条。

鲛鲤甲 出《名医别录》。为穿山甲之别名，详该条。

〔丶〕

鹧鸪菜 出《本草纲目拾遗》。又名蛔虫菜、岩头菜、乌菜。为红叶藻科植物美舌藻Caloglossa leprieurii(Mont.)J.Ag.的藻体。我国广东、福建、浙江沿海均有分布。咸，平。驱蛔虫。治小儿虫积，蛔虫性肠梗阻。煎服：鲜品30～60克。本品含α-海人草酸、海人草素及胆甾醇等。煎剂在体外对蛔虫先兴奋后抑制；应用于蛔虫病患者，驱蛔率高者可达80%，但虫卵转阴率很低（约20%）。海人草酸驱蛔阴转率约为50%。水浸液能兴奋离体兔肠，引起节律性甚至强直性收缩。本药毒性低。

磨挡草 见《生草药性备要》。为磨盘草之别名，详该条。

磨盘草 见萧步丹《岭南采药录》。又名磨挡草、耳响草、耳聋草。为锦葵科植物磨盘草Abutilon indicum（L.）Sweet的全草。分布福建、台湾、广东、广西、贵州、云南等地。甘、淡，平。疏风，清热，化痰，止咳。①治感冒，荨麻疹，气管炎，百日咳，肺结核，流行性腮腺炎，耳鸣，耳聋，小便小利。煎服：15～30克。②鲜草捣烂绞汁滴耳，可治中耳炎；捣敷痈肿，煎水熏洗痔疮。本品含棉花皮甙（Gossylin）、棉花皮次甙（Gossypitrin）、矢车菊素-3-芦丁糖甙。又含酚类、氨基酸、有机酸、糖类。

磨盘树子 见《江西民间草药》。为算盘子之别名，详该条。

磨盘根 见《广西中药志》。为锦葵科植物磨盘草Abutilon indicum(L.)Sweet的根。甘、淡，凉。清热，利湿，开窍，活血。治咳嗽，淋病，白浊，泄泻，中耳炎，喉蛾。煎服：9～15克。孕妇慎用。磨盘草子：炒研末服治赤白痢疾，痈疽肿毒。

燎眉蒿 见《甘肃中草药手册》。为补血草之别名，详该条。

潞党参 见《医学衷中参西录》。为党参之处方名，详该条。

濂珠 出《增订伪药条辨》。为珍珠之别名，详该条。

糙苏 见《内蒙古中草药》。又名山苏子。为唇形科植物糙苏Phlomis umbrosa Turcz.的根或全草。分布辽宁、内蒙古、河北、山东、山西、陕西、甘肃、四川、贵州、湖北、广东。辛，温。祛风活络。治感冒，风湿性关节炎。腰痛，跌打损伤，疮痈肿毒。煎服：6～12克。本品预试含黄酮甙类、氨基酸、甾体类、挥发油、糖类、鞣质等。体外试验对流感病毒、流感杆菌、肺炎球菌、奈氏球菌等具有一定的灭活和抑制作用。所含黄酮类具有祛痰和镇咳作用。

糖刺果 见《广西中药志》。为金樱子之别名，详该条。

糖胶树 见《广西本草选编》。为灯台树之别名，详该条。

糖梗 见《国药的药理学》。为甘蔗之别名，详该条。

糖罐 见《植物名实图考》。为金樱子之别名，详该条。

〔7〕

壁虫 见《本草纲目》。即壁钱，详该条。

壁虎 出《本草纲目》。又名守宫、蝎虎、天龙。为壁虎科动物无蹼壁虎Gekko swinhoana Gunther或无疣壁虎G.subpalmatus Gunther等的干燥全体。全国大部分地区有产。咸，寒，有小毒。祛风，定惊，散结，解毒。治中风瘫痪，小儿惊风，癫痫，破伤风，风湿性关节疼痛，瘰疬。现用治癌肿。内服：焙干研末，每次0.9～1.5克，日服二至三次；煎汤，1.5～4.5克。

壁虱胡麻 出《本草纲目》。为亚麻子之别名，详该条。

壁茧 见《本草拾遗》。为壁钱幕之别名，详该条。

壁蚕茧 见《药材学》。为壁钱幕之别名，详该条。

壁钱 出《本草拾遗》。又名壁蟢、壁虫。为壁钱科动物壁钱 Uroctea compactilis koch的全虫。我国大部分地区均有分布。咸，平。解毒，止血。治喉痹，乳蛾，研末吹喉；牙疳腐臭，同人中白等分煅研敷；鼻衄，金疮出血，痔疮，捣汁点鼻中及疮上或研末塞鼻、敷疮。

壁钱幕 出《本草拾遗》。又名壁蟢窠、壁蚕茧、壁茧。为壁钱科动物壁钱Uroctea compactilis Koch的卵囊。止咳，消肿，生肌，定痛。①治呕逆，咳嗽，哮喘。煎服：5～7个。②治烂喉痧，喉痹，乳蛾，重舌，牙痛，研末吹患处；创伤出血，疮口不敛，取茧频贴；疔疮未溃，沾麻油贴，已溃干贴。

壁蟢 见《外科全生集》。即壁钱，详该条。

壁蟢窠 见《外科全生集》。即壁钱幕，详该条。

十七画

〔一〕

檀香 出《名医别录》。又名白檀、浴香。为檀香科植物檀香Santalum album L.的心材。主产印度、澳大利亚、印度尼西亚及马来西亚等国，我国台湾亦有出产。辛，温。入脾、胃、肺经。理气，和胃。治心腹疼痛，噎膈，呕吐，胸膈痞闷不舒。煎服：1.5～4.5克，后下。本品含挥发油，根部心材含油最多可达10%。油中含α-及β-檀香萜醇达90%以上，还含檀香红（Santalin）、芥子醛（Sinapyl aldehyde）、香夹兰醛等。

藏木香 见《全国中草药汇编》。又名土木香。为菊科植物总状土木香 Inula racemosa Hook.f.的根。产新疆北部；在四川、湖北、陕西、甘肃、西藏均有栽培。辛、苦，温。健脾和胃，理气解郁，止痛，安胎。治慢性胃炎，胃肠功能紊乱，肋间神经痛，胸壁挫伤和岔气作痛，胎动不安。煎服：3～9克；或入丸、散。本品含挥发油。

藏红花 出《本草纲目拾遗》。为鸢尾科植物番红花Crocus sativus L.花柱的上部及柱头。产西班牙、希腊、苏联等国，我国北京、山东、浙江、四川等地有引种栽培。甘，平。入心、肝经。活血消瘀，散郁开结。治痛经，闭经，产后瘀血腹痛，吐血，忧郁、胸膈痞闷，热病发狂，惊悸，恍惚。煎服：1.5～4.5克。孕妇忌服。本品含藏红花素、藏红花酸二甲酯、藏红花苦素、挥发油（内含主成分藏红花醛）及多量维生素B_2。煎剂对多种动物离体及在位子宫均有加强收缩作用；藏红花并能延长小鼠的动情周期。

藏青果 见《中药材手册》。又名西青果、西藏橄榄。为使君子科植物诃子Terminalia chebula Retz.的幼果。广东、广西、云南有栽培。苦、微甘、涩，凉。生津，利咽，开音，涩肠。治慢性咽喉炎，声音嘶哑，扁桃体炎，急性肠炎，细菌性痢疾。内服：煎汤，3～9克；或每次一枚，含咽其汁。本品含鞣质。其中成分参阅诃子条。

藏茄 见《陕甘宁青中草药选》。又名山莨菪、樟柳柽、唐传那保（藏名）。为茄科植物甘青赛莨菪 Anisodus tanguticus(Maxim.)Pascher的根。分布甘肃、青海、西藏等地。苦、辛，温，有大毒。镇痛，解痉，止血，消肿。①治消化性溃疡、胃肠炎、胃肠神经官能症、胆道蛔虫症、胆石症等引起的疼痛。煎服：0.3～0.6克。②治跌打骨折，外伤出血，痈肿疮疖。研末撒或调敷。中毒时可见口舌干燥，皮肤潮红，心跳加快，瞳

散大，烦躁，昏迷，甚至发生痉挛，呼吸中枢麻痹而死亡。本品含红古豆碱、天仙子胺（莨菪碱）、天仙子碱（东莨菪碱）、山莨菪碱、樟柳碱等生物碱。山莨菪碱有阿托品样作用，并能扩大瞳孔，抑制唾液分泌，松弛平滑肌，解除有机磷中毒。毒性比阿托品低，无蓄积作用。对中毒性休克，山莨菪碱有改善各脏器微循环障碍的作用。天仙子碱、樟柳碱等亦有类似作用。东莨菪碱与樟柳碱对中枢神经有抑制作用，适当剂量可产生麻醉。上述生物碱能增加脑血流量，改善脑血管阻力，樟柳碱可用于偏头痛或脑血管缺血性疾患、视网膜及视神经血管痉挛。

藏黄连 见《西藏常用中草药》。为洪连之别名，详该条。

藁本 出《神农本草经》。又名野芹菜、山香菜。为伞形科植物藁本Ligusticum sinense Oliv.或辽藁本L. jeholense Nakai et Kitag.的根茎及根。前者主产湖北、湖南、四川；后者主产河北、辽宁。辛，温。入膀胱经。祛风，胜湿，止痛。①治风寒头痛，巅顶痛，偏头痛，风湿骨痛，寒湿腹痛。煎服：3～9克。②治疥癣。煎水洗。藁本含挥发油，其中主含3-丁基苯酞、蛇床酞内酯（Cnidilide）、丁香油酚甲醚等。辽藁本根含挥发油。煎剂在体外对某些致病性皮肤真菌有抑制作用。

霜坡虎 见《广西中草药》。为地瓜藤之别名，详该条。

霜桑叶 见《本草正义》。为桑叶之处方名，详该条。

霞天曲 见《本草备要》。为霞天膏和半夏等药物制成的曲剂。甘、微苦，温。健脾胃，消饮癖。治中气虚馁，体倦腹胀，宿饮，癖积。内服：9～15克，开水或黄酒溶化冲服；或入丸、散、膏剂。

霞天膏 出明·韩悉《药性裁成》。为黄牛肉熬炼而成的膏剂。甘，温。补气益血，健脾安中。治虚劳羸瘦，中风偏废，脾虚痞积。内服：9～15克；溶化后冲服，或入丸剂。本品主含蛋白质及其水解产物，并含肌酸、黄嘌呤、脂类、糖元、维生素、无机盐等。

翳子草 ❶见《本草纲目》。为罗勒之别名。❷见《贵阳民间药草》。为铜锤玉带草之别名。各详该条。

翳草 见清·汪双池《医林纂要·药性》。为天胡荽之别名，详该条。

〔丨〕

螳螂子 出《名医别录》。为桑螵蛸之别名，详该条。

螺丕草 见《福建民间草药》。为马蹄金之别名，详该条。

螺丝三七 见《浙江天目山药用植物志》。为红三七之别名，详该条。

螺厣草 出《本草拾遗》。又名地连钱、抱石莲、瓜子草、金茶匙、镜面草。为水龙骨科植物伏石蕨Lemmaphyllum microphyllum Presl的全草。分布福建、台湾、广东、广西、云南、湖北、湖南、江西等地。辛，凉。清肺泻热，凉血解毒。①治肺痈咳吐脓血，肺结核咯血，衄血，尿血，腮腺炎，痢疾，风火牙痛。煎服：9～18克。②捣敷治手指肿毒，痈肿，创伤出血。全草含蕨甾醇、蜕皮松、蜕皮甾酮及伏石蕨甾酮。

螺螄 出《本草纲目》。为田螺科动物方形环棱螺Bellamya quadrata(Benson)等的全体。全国大部分地区均有分布。甘，寒。入膀胱经。利水，明目，解毒。治黄疸，痢疾，水肿，淋浊，目赤，翳障。煮食。捣敷治疔疮肿毒。

蟋蟀 出《本草纲目》。又名将军、蛐蛐。为蟋蟀科昆虫蟋蟀 Gryllulus chinensis Weber的全虫。主产江苏、上海、浙江、河北等地。辛、咸，温，有小毒。入膀胱、大肠、小肠经。利尿消肿。治尿闭，水肿，臌胀。内服：煎汤，2～6只；或焙焦研粉吞服，

每次1～2只。孕妇忌服。

蟋蟀草　见《嘉兴府志》。为牛筋草之别名，详该条。

〔丿〕

穑豆衣　见《药材资料汇编》。为黑大豆皮之处方名，详该条。

繁缕　出《本草图经》。又名鹅儿肠菜、鹅馄饨。为石竹科植物繁缕Stellaria media(L.)Cyr.的全草。我国大部分地区有分布。甘、微咸，平。活血，催乳，清热解毒。①治产后瘀滞腹痛，乳汁不多，痢疾，肠痈。煎服：30～60克。②治痈肿，跌打损伤。煎服并捣敷。全株含皂甙。叶含γ-亚麻酸及十八碳四烯酸。

爵床　出《神农本草经》。又名小青草、孩儿草、野万年青、六方疳积草。为爵床科植物爵床Rostellularia procumbens(L.)Nees的全草。分布秦岭以南地区。咸、辛，寒。清热解毒，利湿消肿，活血止痛。①治感冒发热，咳嗽喉痛，疟疾，泻痢，黄疸，肾炎水肿，泌尿系感染，小儿疳积。煎服：9～15克。②治痈疽疔疮，跌打损伤。煎服或捣敷。本品含生物碱，并含爵床定（Justicidin）C、D等木脂体。体外试验对痢疾杆菌有抑制作用。

臌胀草　见《江苏药材志》。为大戟之别名，详该条。

鳅鱼　出《本草拾遗》。即泥鳅，详该条。

〔丶〕

辫子草　见《云南中草药》。为碎米柴之别名，详该条。

辫子草根　见《云南中草药》。为豆科植物小叶三点金草Desmodium microphyllum(Thunb.)DC.的根。分布四川、云南、贵州、广西、广东、湖南、湖北、安徽、江苏、江西、福建、台湾。甘，平。清热利湿，止血，通络。治黄疸，痢疾，淋病，风湿痛，咯血，崩漏，白带，痔疮，跌打损伤。煎服：15～30克。

廪虫　出《神农本草经》。即地鳖虫，详该条。

〔7〕

檗木　出《神农本草经》。即黄柏，详该条。

檗皮　出《伤寒论》。即黄柏，详该条。

翼首草　见《西藏常用中草药》。又名棒子头、狮子草、帮子毒乌（藏名）。为川续断科植物翼首草Pterocephalus hookeri（Clarke）Höeck的根或全草。分布云南、四川、西藏等地。苦，寒，有小毒。清热解毒，凉血止血。治感冒发热，麻疹，心中烦热，咳血，吐血，尿血，便血，痈疮，疔毒。煎服：3～9克。本品含生物碱、黄酮甙。

十八画

〔一〕

藕　出《神农本草经》。为睡莲科植物莲Nelumbo nucifera Gaertn.根茎的肥厚部分。甘，寒。入心、脾、胃经。清热生津，凉血散瘀。治热病烦渴，咯血，衄血，吐血，便血，尿血。内服：250～500克，分数次生吃，亦可捣汁或煎浓汁服。本品含淀粉、天门冬素、焦性儿茶酚、右旋没食子儿茶精、新绿原酸、无色飞燕草素、无色矢车菊素及维生素C等。

藕节　出《药性论》。又名光藕节、藕节

疤。为睡莲科植物莲Nelumbo nucifera Gaertn.根茎的节部。主产浙江、江苏、安徽、湖南、湖北。甘、涩，平。入肝、肺、胃经。止血，化瘀。治吐血，衄血，咳血，尿血，便血，血痢，崩漏。煎服：炒炭9～15克（鲜品30～60克）。本品含鞣质、天门冬素及淀粉等。

藕节疤 见《中药志》。即藕节，详该条。

藕杆 见《随息居饮食谱》。为荷梗之别名，详该条。

藕实 出《神农本草经》。为莲子之别名，详该条。

藕蔬菜 见《救荒本草》。为莕菜之别名，详该条。

藜 出《本草拾遗》。又名红心灰藋、胭脂菜、鹤顶草。为藜科植物藜Chenopodium album L.的全草。全国各地有分布。甘，平，微毒。清热，利湿，杀虫。①治痢疾，腹泻。煎服：15～30克。②治疥癣，湿疮，皮肤瘙痒，毒虫咬伤。煎水熏洗或捣敷。全草含挥发油。叶的脂质中含油酸、亚油酸及谷甾醇、油醇、蜡等。根含甜菜碱、氨基酸、甾醇、油脂等。本品70%醇浸剂能引起动物的呼吸先兴奋后抑制，终因呼吸麻痹致死；亦有降压和抑制心脏的作用；对骨骼肌和运动神经呈麻痹作用。

藜芦 出《神农本草经》。又名旱葱、毒药草、七厘丹。为百合科植物藜芦 Veratrum nigrum L.或毛穗藜芦 V. maackii Regel等的根及根茎。全国大部分地区有产。苦、辛，寒，有大毒。入肺、胃经。吐风痰，杀虫。①治中风痰壅，癫痫，喉痹。内服：研末，0.3～0.6克，温水送服以催吐。②治疥癣，恶疮，研末加生油调成软膏外涂。内服过量易中毒，轻者眩晕、剧吐，重者便血、血压下降、心律不齐、震颤、痉挛、失明、昏迷，甚至呼吸抑制而死亡。孕妇忌服。反人参、沙参、丹参、苦参、玄参、细辛、芍药。本品含介芬胺、玉红介芬胺（Rubijervine）及藜芦酰棋盘花碱）Veratroyl Zygadenine）等多种生物碱。总碱有明显而持久的降低血压作用，但必需静脉注射，口服可引起恶心、呕吐，粉剂对口、鼻、眼粘膜有刺激作用。

藤五甲 见《四川中药志》。为走游草之别名，详该条。

藤叶细辛 见《广西中药志》。为三十六荡之别名，详该条。

藤杜仲 见《陆川本草》。又名土杜仲、牛腿子、九牛藤。为夹竹桃科植物杜仲藤Parabarium micranthum（A.DC.）Pierre或毛杜仲藤P.huaitingii Chun et Tsiang的茎或根。分布广东、广西、云南、贵州等地。苦、微辛，平，有小毒。祛风活络，强筋壮骨。①治风湿痹痛，腰痛，跌打损伤。煎服：6～15克。②治外伤出血，研粉撒。服用过量可出现头晕、呕吐等症。毛杜仲藤皮含生物碱、酚类、有机酸、糖类。

藤黄 出《海药本草》。为藤黄科植物藤黄Garcinia morella Desv.的胶质树脂。主产印度及泰国。酸、涩，有毒。消肿，攻毒，止血，杀虫。治痈疽肿毒，顽癣，恶疮，损伤出血，牙疳，蛀齿，汤火伤。外用：研末调敷，磨汁涂或熬膏涂。内服：入丸剂，一次量30～60毫克。过量可引起头昏、呕吐、腹痛、泄泻，甚至死亡。树汁含α-及β-藤黄素、藤黄酸（Morellic acid）、异藤黄酸、藤黄双黄酮（Morelloflavone）等。藤黄素能引起动物腹泻。

藤梨 出《开宝重定本草》。为猕猴桃之别名，详该条。

藤篮果 见《云南中草药》。为漆大姑之别名，详该条。

覆盆 出《名医别录》。即覆盆子，详该条。

覆盆子 出《本草经集注》。又名：覆盆、乌藨子、小托盘。为蔷薇科植物掌叶覆盆子Rubus chingii Hu或插田泡 R. coreanus

Miq.等的果实。主产浙江、福建、湖北等地。甘、酸,平。入肾、肝经。补肾,固精,缩尿。治遗精,滑精,早泄,阳痿,尿频,遗尿,虚劳,目暗。煎服:6～12克。本品含有机酸、糖类及少量维生素C。煎剂在试管中对葡萄球菌、霍乱弧菌有抑制作用;对动物还有雌激素样作用。

覆盆子叶 出《本草拾遗》。又名西国草。为蔷薇科植物掌叶覆盆子Rubus chingii Hu或插田泡R.coreanus Miq.等的叶。酸、咸,平。明目止泪,收湿气。①治眼睑赤烂,泪多,视物昏花。鲜品捣汁或干品捣烂,薄绵裹,以乳汁浸,点眼。②治臁疮。煅研末撒。

覆菌 出《本草纲目》。为庵闾之别名,详该条。

礞石 出《嘉祐补注神农本草》。为变质岩类岩石绿泥石片岩或云母岩的石块或碎粒。前者产湖南、湖北、四川、江苏、浙江等地,药材称为青礞石,后者产河南、河北等地,药材称为金礞石。咸,平。入肝、肺、胃经。坠痰下气,镇肝止痉。治咳嗽喘急,痰涎上壅,顽痰癖积,胸膈胀满,大便秘结,癫痫,狂躁,惊风。煎服:3～6克。孕妇忌用。青礞石主要成分为镁、铝、铁及硅酸。金礞石主要成分为云母及石英,主含钾、镁、铝、硅酸及钒。

〔丨〕

蟛蜞菊 出清·赵其光《本草求原》。又名路边菊、水兰、黄花曲草。为菊科植物蟛蜞菊Wedelia Chinensis(Osb.)Merr.的全草。分布广东、广西、福建、台湾。甘、淡,凉。清热解毒,祛瘀,消肿。①治感冒发热,白喉,咽喉炎,扁桃体炎,肺炎,百日咳,痢疾,痔疮,跌打损伤。煎服:15～30克。②捣敷治疔疮肿毒。叶含蟛蜞菊内酯(Wedelolactone),并含异黄酮类化合物。水提取物腹腔注射对小鼠艾氏腹水癌有一定的抑制作用。

蟛蜞盏 见《生草药性备要》。为水胡满之别名,详该条。

蟠龙草 见《生草药性备要》。为仙茅之别名,详该条。

瞿麦 出《神农本草经》。又名野麦、剪绒花、竹节草。为石竹科植物石竹Dianthus chinensis L.或瞿麦D.Superbus L.的带花全草。主产河北、河南、辽宁、湖北、江苏。苦,寒。入心、肾、小肠、膀胱经。清热利水,破血通经。①治小便赤涩,或癃闭不通,尿路结石,血淋,水肿,经闭,目赤障翳,痈肿。煎服:4.5～9克。②煎水洗浸淫疮毒。孕妇忌服。瞿麦鲜草含皂甙、少量生物碱及维生素A类物质。石竹花含挥发油,其主成分为丁香油酚、苯乙醇、苯甲酸苄酯、水杨酸苄酯、水杨酸甲酯等。全草含皂甙。瞿麦穗煎剂口服对兔有利尿作用,氯化物的排泄也增加,对肠管有兴奋作用。

鹭鸶藤 出《履巉岩本草》。为忍冬藤之别名,详该条。

〔丿〕

翻山虎 出清·汪连仕《采药书》。为杜鹃花根之别名,详该条。

翻天印 见《陕西中草药》。为九牛造之别名,详该条。

翻白叶 见《滇南本草》。为管仲之别名,详该条。

翻白草 ❶出《救荒本草》。又名鸡脚爪、千锤打、天青地白。为蔷薇科植物翻白草Potentilla discolor Bge.的全草。全国各地均产,主产河北、安徽等地。苦、甘,平。入胃、大肠经。清热解毒,凉血止血。①治肠炎,痢疾,疟疾,肺痈,咳血,吐血,鼻衄,便血,崩漏,瘰疬。煎服:9～15克。②捣敷治疔疮肿毒;煎汤熏洗治臁疮溃烂及疥癣。全草含鞣质。根尚含黄酮类。体外对痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌有抑制作用。❷见

《中国药用植物志》。为委陵菜之别名，详该条。

翻胃木 出唐·侯宁极《药谱》。为常山之别名，详该条。

〔丶〕

鹰不泊 出清·赵其光《本草求原》。又名土花椒、画眉架、鸟不宿。为芸香科植物竹桡 Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.的根。分布福建、广东、广西等地。苦、辛，温。祛风，利湿，活血，止痛。①治咽喉肿痛，风湿性关节炎，腰肌劳损，黄疸型肝炎，肾炎水肿。煎服：15～30克。②治跌打损伤。浸酒饮。根皮含竹桡碱(Avicine)、白屈菜红碱、光叶花椒碱、木兰花碱等多种生物碱，并含橙皮甙、香叶木甙、竹桡素(Avicennin)等。

鹰不泊藕 出清·赵其光《本草求原》。为芸香科植物竹桡Zanthoxylum avcennae (Lam.)DC.的嫩叶。治跌打损伤，乳腺炎，疖肿。鲜品捣敷。本品含橙皮甙、柠檬烯及糠醛。

癞头花 见《浙江民间常用草药》。为芫花之别名，详该条。

癞虾蟆 见《本草蒙筌》。为蟾蜍之别名，详该条。

癞格宝 见《贵州民间方药集》。为蟾蜍之别名，详该条。

癞格宝草 见《贵州民间方药集》。为天名精之别名，详该条。

癞蛤蟆 见《吉林中药手册》。为蟾蜍之别名，详该条。

癞蛤蟆酥 见《全国中草药汇编》。即蟾酥，详该条。

癞蟆皮 见《中药材手册》。为蟾蜍皮之别名，详该条。

〔7〕

藏皮树 见《云南中草药》。为类梧桐之别名，详该条。

十九画

〔一〕

藿香 出《名医别录》。为唇形科植物广藿香Pogostemon cablin(Blanco)Benth.或藿香Agastache rugosa(Fisch.et)Mey. O.Ktze.的全草。前者主产广东、四川；后者主产江苏、浙江等地。辛，微温。入脾、胃、肺经。祛暑解表，化湿和中。治感冒暑湿，寒热头痛，胸脘痞闷，食欲不振，恶心，呕吐，泄泻，痢疾，口臭。煎服：4.5～9克。广藿香含挥发油，油中主含广藿香醇、广藿香萜醇(Pogostol)、丁香油酚。还含环赛车烯(Cycloseychellene)等。藿香含挥发油，油中主含甲基胡椒酚。还含柠檬烯、α-和β-蒎烯、葎草烯等。挥发油能促进胃液分泌增强消化力，浸出物(比煎剂好)在试管内对常见致病性皮肤真菌有较强的抑制作用。

攀枝花 见《本草纲目》。为木棉花之别名，详该条。

〔丨〕

蟾酥 出《本草衍义》。又名蛤蟆酥、蛤蟆浆、癞蛤蟆酥。为蟾蜍科动物中华大蟾蜍Bufo bufo gargarizans Cantor或黑眶蟾蜍B.melanostictus Schneider的耳后腺及皮肤腺所分泌的白色浆液，经加工而成。产河北、山东、四川、湖南、江苏、浙江等地。甘、辛，温，有毒。入心、胃经。解毒，消肿，强心，止痛。治痈肿疔疮，咽喉肿痛，瘰疬，骨关节结核，慢性骨髓炎，心力衰竭，

吐泻腹痛，牙痛。内服：15～30毫克，多入丸、散用。痈肿疔疮等外用时，研末调敷患处。孕妇忌服。本品含华蟾蜍毒素、华蟾蜍它灵、去乙酰华蟾蜍它灵、肾上腺素、胆甾醇、华蟾蜍色胺等。蟾蜍毒素有强心利尿作用，与洋地黄相似；还能兴奋呼吸，升高血压，并有很好的抗炎作用及某些抗癌、抗放射作用。其表面麻醉作用也相当强，有镇痛作用，但毒性较大。蟾蜍色胺有某些平喘、抗过敏作用，量大可引起幻觉，对动物有致惊作用。人中毒后，可按洋地黄中毒时的急救原则处理。

蟾蜍 出《名医别录》。又名癞蛤蟆、癞虾蟆、癞格宝、干蟾。为蟾蜍科动物中华大蟾蜍Bufo bufo gargarizans Cantor或黑眶蟾蜍B.melanostictus Schneider的全体。主产山东、河北、江苏、浙江、四川、湖南、湖北、辽宁、吉林等地。辛，凉，有毒。解毒消肿，止痛，利尿。治慢性支气管炎，痈疖，疔疮，瘰疬，咽喉肿痛，水肿，小便不利，小儿疳积。内服：煎汤，6～9克；研末，0.9～3克。孕妇忌服。

蟾蜍皮 出《本经逢原》。又名癞蟆皮、干蟾皮、蛤蟆皮。为蟾蜍科动物中华大蟾蜍Bufo bufo gargarizans Cantor或黑眶蟾蜍B.melanostictus Schneider的皮。辛，凉，有小毒。清热解毒，利水消胀。①治慢性气管炎，瘰疬，疳积腹胀。现用治肿瘤。煎服：3～6克。②治痈疽肿毒。用活蟾皮敷贴，或焙干研末调敷。蟾蜍皮的特殊成分，一般与蟾酥相似。

蟾蜍草 见《广西中兽医药用植物》。为车前草之别名，详该条。

〔丿〕

鳗鱼 见《本经逢原》。为鳗鲡鱼之简称，详该条。

鳗鲡鱼 出《名医别录》。又名鳗鱼、白鳗。为鳗鲡科动物鳗鲡Anguilla japonica Temminck et Schlegel的全体或肉。分布长江、闽江、珠江流域及海南岛。甘，平。入肝、肾经。补虚羸，祛风湿。治虚劳骨蒸，风湿痹痛，脚气，风疹，小儿疳积，崩漏，肠风下血，痔漏，疮疡。内服：煮食或烧炙研末。本品每100克含蛋白质14.5克，脂肪8克，灰分1.4克，钙166毫克，磷211毫克，铁1.8毫克，维生素A3000国际单位，维生素B_1 10微克，维生素$B_2$100微克，尼克酸3毫克，维生素C15毫克。还含肌肽和鹅肌肽。鱼身粘滑液含有多糖。

鳗鲡鱼骨 出《本草纲目》。为鳗鲡科动物鳗鲡Anguilla japonica Temminck et Schlegel的骨骼。治疳痢，肠风，血崩，带下。内服：炙研末入丸、散。烧灰敷恶疮。

蟹 出《神农本草经》。又名螃蟹。为方蟹科动物中华绒螯蟹 Eriocheir Sinensis H. Milne-Edwards 的肉或全体。我国沿海地区均有分布。咸，寒。入肝，胃经。清热，散血，续绝伤。治跌打骨折筋断。内服：焙干研末，9～12克。捣涂疥癣，漆疮，烫伤；捣汁滴耳治聋；盐蟹汁含咽治喉风肿痛。本品可食部每100克含蛋白质14克，脂肪2.6克，碳水化物0.7克，灰分2.7克，钙141毫克，磷191毫克，铁0.8毫克，维生素A230国际单位，维生素$B_1$0.01毫克，维生素$B_2$0.51毫克，尼克酸2.1毫克，微量的胆甾醇。

蟹化石 见《药材学》。即石蟹，详该条。

蟹爪寄生 见《广西本草选编》。为枫香寄生之别名，详该条。

蟹壳 出《备急千金要方·食治》。为方蟹科动物中华绒螯蟹Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards的甲壳。破瘀消积。①治瘀血积滞，胁痛，腹痛，乳痈。内服：煅存性研末，3～9克。②治冻疮，蜂螫伤，烧灰调敷。含碳酸钙、甲壳质、蛋白质。

〔丶〕

麒麟血 出《太平圣惠方》。为血竭之别名，详该条。

爆格蛋 见《分类草药性》。为女贞子之别名，详该条。

鳖甲 出《神农本草经》。又名上甲、脚鱼壳、团鱼甲。为鳖科动物中华鳖Amyda Sinensis（Wiegmann）的干燥背甲。主产湖北、安徽、江苏、河南、湖南、浙江、江西等地。咸，平。入肝、脾、肾经。滋阴潜阳，软坚散结。①生用治阴虚潮热，骨蒸盗汗，热病伤阴，阴虚风动，高血压病。②炙用治疟母，经闭，瘕瘕积聚。煎服：9～24克。孕妇慎服。本品含动物胶、角蛋白、碘质、维生素D等。

鳖甲胶 出《本草纲目》。为鳖科动物中华鳖Amyda Sinensis（Wiegmann）的背甲煎熬而成的胶块。补肾滋阴，软坚散结。治阴虚潮热，久疟，疟母，瘕瘕，痔核肿痛。内服：3～9克，烊化冲服。孕妇忌服。

鳖肉 出《名医别录》。为鳖科动物中华鳖Amyda sinensis（Wiegmann）的肉。甘，平。入肝经。滋阴，凉血。治骨蒸劳热，久疟，久痢，崩漏，带下，瘰疬。煮食。本品每100克含蛋白质16.5克，脂肪1克，碳水化物1.6克，灰分0.9克；钙107毫克，磷135毫克，铁1.4毫克，维生素$B_1$0.62毫克，维生素$B_2$0.37毫克，尼克酸3.7毫克，维生素A13国际单位。

鳖血 出《本草纲目》。为鳖科动物中华鳖Amyda sinensis（Wiegmann）的血。治虚劳潮热。内服：生饮；或拌炒他药，入煎剂、丸剂。涂敷口眼歪斜。

二十画

〔一〕

蕹荷 出《名医别录》。又名观音花、野老姜、莲花姜、阳藿、土里开花。为姜科植物蕹荷Zingiber mioga Rosc.的根茎。分布长江流域及陕西、甘肃、贵州、四川等地。辛，温。温中调经，止咳平喘，消肿解毒。①治脘腹冷痛，月经错后，痛经，咳嗽，气喘，跌打损伤，腰腿痛。煎服：9～15克。②治喉痹，捣汁含漱；颈淋巴结结核，捣敷并煎服。根茎含α-和β-蒎烯，β-水芹烯。

〔丨〕

蠔壳 见《浙江中药手册》。为牡蛎之别名，详该条。

〔丿〕

獾子油 见《黑龙江中药》。即獾油，详该条。

獾油 出《本草纲目拾遗》。又名獾子油。为鼬科动物狗獾Meles meles L.的脂肪油。我国大部分地区有分布。治中气不足，子宫脱垂，咳血。内服：溶化入汤剂。外涂治痔疮，疳疮，疥、癣，白秃，烫伤，冻疮。

鳝鱼 出《雷公炮炙论》。为合鳃科动物黄鳝Monopterus albus（Zuiew）的肉或全体。全国除西北和西南部分地区外均有分布。甘，温。入肝、脾、肾经。补虚损，除风湿。治痨伤，风寒湿痹，产后淋沥，下痢脓血。内服：煮食。剖片贴敷痔瘘，臁疮。鳝鱼肉每100克含蛋白质18.8克，脂肪0.9克，灰分1克，钙38毫克，磷150毫克，铁1.6毫克。

鳝鱼血 出《本草拾遗》。为合鳃科动物黄鳝Monopterus albus（Zuiew）的血。咸、甘，平。祛风，活血。外敷治口眼㖞斜，顽癣；滴耳治慢性中耳炎；滴鼻治鼻衄。

〔丶〕

糯米草 见《贵州民间方药集》。即糯米

藤，详该条。

糯米藤 见《贵州民间方药集》。又名糯米草、生扯拢、红石薯。为荨麻科植物糯米团Memorialis hirta(Bl.)Wedd.的全草。分布我国东部、南部至西南部。淡、微苦，凉。清热利湿，健脾消积，消肿，止血。①治急性黄疸型肝炎，痢疾，小儿疳积，吐血，白带。煎服：15～30克。②治疔疮痈肿，瘰疬，跌打肿痛，外伤出血。捣敷。

糯秫 出《新修本草》。即秫米，详该条。

糯粟 出《新修本草》。为秫米之别名，详该条。

糯稻根 见《江苏省植物药材志》。即糯稻根须，详该条。

糯稻根须 出清·叶小峰《本草再新》。又名糯稻根。为禾本科植物糯稻Oryza sativa L.var. glutinosa Matsum.的根茎及根。甘，平。入肺、肝、肾经。止汗，养胃阴，退虚热。治自汗，盗汗，肺痨虚热，慢性肝炎，肾炎蛋白尿，丝虫病。煎服：30～60克。

二十一画以上

〔一〕

霸王树 见《植物学大辞典》。为仙人掌之别名，详该条。

霸王鞭 见《植物名实图考》。为火秧竹之别名，详该条。

露木尔 见《西藏常用中草药》。为螃蟹甲之藏族语名，详该条。

露珠草 见《广西本草选编》。为茅膏菜之别名，详该条。

露蜂房 出《神农本草经》。又名蜂房、马蜂窝、蜂巢、黄蜂窝。为胡蜂科昆虫大黄蜂Polistes mandarinus Saussure或同属近缘昆虫的巢。全国大部分地区均有分布。甘，平，有毒。入肝、胃经。祛风，攻毒，杀虫。①治风痹，头风，百日咳，惊痫，瘾疹瘙痒。煎服：2.4～6克。②治乳痈，疔肿，瘰疬，研末调敷或煎服；湿疹，头癣，蜂螫肿痛，烧存性研末油调敷或煎水熏洗；龋齿疼痛，配乳香、细辛煎水含漱，或与全蝎同研末擦牙。肾功能不全患者忌服。本品主含蜂蜡、树脂。又曾提出有毒的露蜂房油。醇、醚及丙酮浸出物能促进血液凝固，利尿；低浓度增强心脏，高浓度则抑制心脏，扩张血管，引起血压下降。

露兜竹(lè勒) 见清·赵其光《本草求原》。为橹罟子之别名，详该条。

露兜竹心 出清·赵其光《本草求原》。为露兜树科植物露兜树Pandanus tectorius Soland.的叶芽。分布广东、广西、云南等地。甘，微寒。清热，凉血，解毒。①治麻疹，发斑，丹毒，暑热症。煎服：9～18克。②治恶疮，烂脚。煎水洗或捣敷。

露兜竹花 见《南宁市药物志》。又名路头花。为露兜树科植物露兜树Pandanus tectorius Soland.的花。甘，寒。清热，利水，解毒。①治感冒咳嗽，热泻，淋浊。煎服：3～9克。②研末调敷治对口疮。花含挥发油，内含甲基苯乙基醚、二戊烯、右旋方樟醇、乙酸苯乙酯、柠檬醛、苯乙醇等。

露兜竹蕴(jiàng强) 出清·赵其光《本草求原》。又名勒角蕴、露兜根。为露兜树科植物露兜树Pandanus tectorius Soland.的根及根头。甘、淡，凉。解表，清热，利水，解毒。治感冒发热，肾炎水肿，尿路感染，肝炎，肝硬化腹水，小儿夏季热，眼结膜炎。煎服：15～30克。根预试含酚类、氨基酸、糖类。

露兜根 见《云南思茅中草药选》。为露

兜笃蕴之别名，详该条。

蘼芜 出《神农本草经》。又名芎劳苗、川芎苗。为伞形科植物川芎 Ligusticum chuanxiong Hort.的苗叶。分布四川、云南、贵州，多为栽培。辛，温。入心、肝、胆经。祛风散寒。治头风头眩，流泪，咳嗽。煎服：3～9克。

蘼香 出《药性论》。即小茴香，详该该条。

蘼香虫 见《本草纲目》。即茴香虫，详该条。

〔丿〕

鳢鱼 出《神农本草经》。又名黑鱼、乌鱼。为鳢科动物乌鳢 Ophicephalus argus cantor的肉或全体。我国大部分地区的河流、湖沼中均有分布。甘，寒。健脾，利水。治水肿，湿痹，脚气，痔疮。内服：煮食。鳢鱼肉每100克含蛋白质19.8克，脂肪1.4克，灰分1.2克，钙57毫克，磷163毫克，铁0.5毫克，维生素$B_1$0.03毫克，维生素B_2 0.25毫克，尼克酸2.8毫克。

鶸（亓离）头婆 见《广州植物志》。为梵天花之别名，详该条。

罐罐草 见《四川中药志》。为蓝花参之别名，详该条。

〔丶〕

麝香 出《神农本草经》。又名寸香、元寸、当门子、臭子、香脐子。为鹿科动物麝 Moschus moschiferus L.雄体香囊中的干燥分泌物。主产四川、西藏、云南、陕西、甘肃、内蒙古等地。辛，温。入心、脾、肝经。开窍，辟秽，活血，散结。①治热病神昏，中风痰厥，惊痫，中恶烦闷，心腹暴痛。内服：30～100毫克，入丸、散用。②治痞块积聚，跌打损伤，痈疽肿毒。内服或研末调敷。孕妇忌服。本品主含麝香酮和少量降麝香酮，并含无机盐、胆甾醇等。人工或天然麝香酮有抗炎作用，并能增强β-肾上腺素能药物的作用，对动物能升高血压，兴奋呼吸，引起子宫收缩。在试管内能抑制金黄色葡萄球菌及大肠杆菌。对中枢神经系统，小量兴奋而大量抑制。

麝香壳 见《四川中药志》。为鹿科动物麝Moschus moschiferus L.雄体香囊的外皮。辛，温。入脾经。消肿，解毒。治疔疮肿痛，痈疽久烂及疮疖硬痛。内服：入散剂，1.5～2.4克。外用：研末调敷。

麝香草 见《广东中草药》。为毛麝香之别名，详该条。

〔乙〕

蠡（亓礼）牛 出《药性论》。为蜗牛之别名，详该条。

蠡实 出《神农本草经》。为马蔺子之别名，详该条。

蠡草花 出《本草图经》。为马蔺花之别名，详该条。

汉语拼音索引

A

ā 阿…… 188
ǎi 矮…… 387
ài 艾……89
ān 安…… 151
庵…… 345
桉…… 283
鹌…… 382
菴…… 313
àn 暗…… 383

B

bā 八……6
叭…… 103
巴……81
芭…… 173
bá 拔…… 211
菝…… 117
bà 霸…… 421
bái 白…… 107
bǎi 百…… 135
摆…… 383
柏…… 241
bài 败…… 214
bān 斑…… 352
搬…… 383
bǎn 板…… 198
bàn 半…… 122
绊…… 236
bāng 帮…… 239
bǎng 榜…… 392
bàng 蒡…… 380
棒…… 353
蚌…… 292
bāo 包…… 121
苞…… 209
báo 雹…… 383
bǎo 宝…… 234
bào 暴…… 405
bào 爆…… 420
豹…… 299
抱…… 211
鲍…… 389
běi 北…… 101
bèi 背…… 261
bēng 崩…… 334
bí 鼻…… 397
荸…… 284
bǐ 笔…… 295
bì 革…… 250
蓖…… 378
壁…… 412
萆…… 314
薜…… 410
闭…… 149
碧…… 391
篦…… 411
biān 蝙…… 405
biǎn 扁…… 360
边…… 123
扁…… 274
biàn 辩…… 415
biāo 鳖…… 420
bié 别…… 178
biě 瘪…… 407
bīn 滨…… 391
槟…… 392
bīng 冰…… 150
bǐng 饼…… 269
bìng 并…… 154
bō 波…… 233
玻…… 238
bó 舶…… 338
博…… 353
鹁…… 356
驳…… 194
bò 檗…… 415
薄…… 410
bǔ 捕…… 290
卜……5
补…… 187
bù 布……97
不……64

C

cài 菜…… 314
cán 蚕…… 277
cāng 苍…… 170
cāo 糙…… 412
cǎo 草…… 251
cè 侧…… 218
chá 茶…… 255
chái 柴…… 290
chán 蝉…… 396
缠…… 391
蟾…… 418
chāng 昌…… 216
菖…… 313
cháng 常…… 326
长……72
cháo 朝…… 356
潮…… 407
chē 车……65
chě 扯…… 177
chén 辰…… 177
沉…… 187
陈…… 189
榇…… 311
chēng 赪…… 377
称…… 295
柽…… 248
chéng 橙…… 405
澄…… 407
chī 鹚…… 422
痴…… 389
chí 匙…… 334
chì 翅…… 288
赤…… 174
chōng 茺…… 256
chóng 虫…… 140
重…… 267
chòu 臭…… 297
chū 樗…… 401
chú 滁…… 373
chǔ 楮…… 354
杵…… 198
chuān 川……38
穿…… 272
chuàn 串…… 180
chuí 垂…… 218
chūn 春…… 239
椿…… 375
chún 莼…… 287
chuō 戳…… 418
chuò 啜…… 327

cí 磁…… 395
茨…… 256
雌…… 395
cì 刺…… 201
cōng 葱…… 358
cóng 丛…… 119
cù 醋…… 403
酢…… 356
cuì 翠…… 400
cùn 寸……28
cuò 锉…… 370

D

dá 瘩…… 399
dǎ 打…… 100
dà 大……21
dài 代…… 106
玳…… 237
瑇…… 374
dān 单…… 284
丹……74
dǎn 胆…… 269
dàn 蛋…… 351
弹…… 350
淡…… 349
dāng 当…… 139
dǎng 党…… 290
挡…… 260
dāo 刀……12
dǎo 倒…… 296
dào 稻…… 406
dēng 灯…… 149
dèng 蹬…… 408
dī 滴…… 399
dǐ 底…… 231
dì 地…… 126
diān 滇…… 390
diǎn 点…… 261
diàn 靛…… 408
diào 吊…… 139
钓…… 217
dīng 丁……3
钉…… 181
疔…… 185
dǐng 顶…… 211
鼎…… 368
dìng 定…… 234
diū 丢…… 144
dōng 东…… 101
冬…… 119
dòng 冻…… 185
dōu 都…… 283
dǒu 斗……81
dòu 豆…… 166
dū 都…… 283
dú 独…… 268
毒…… 239
dù 杜…… 163
dù 肚…… 184
duàn 断…… 350
duì 对…… 123
dùn 盾…… 268
duō 多…… 149
duò 堕…… 351

E

é 峨…… 290
蛾…… 384
鹅…… 370
莪…… 286
è 恶…… 288
遏…… 370
ér 儿……10
ěr 耳…… 134
èr 二……3

F

fā 发…… 123
fǎ 法…… 231
fān 番…… 371
翻…… 417
fán 矾…… 210
繁…… 415
fǎn 反……73
fàn 饭…… 184
梵…… 324
fāng 方……80
芳…… 171
fáng 防…… 156
fàng 放…… 230
fēi 飞……46
féi 肥…… 228
fěi 蜚…… 395
榧…… 392
fèi 沸…… 233
费…… 275
痱…… 389
肺…… 228
fēn 分……73
fěn 粉…… 306
fèn 粪…… 374
fēng 蜂…… 384
风……74
枫…… 200
fèng 凤……75
fó 佛…… 182
fū 麸…… 310
敷…… 403
fú 浮…… 305
伏…… 144
茯…… 254
福…… 391
扶…… 177
芙…… 166
fǔ 腐…… 399
斧…… 219
釜…… 300
抚…… 177
fù 附…… 189
覆…… 416
腹…… 389
蝮…… 405

G

gài 芥…… 170
汽…… 198
gān 干……16
肝…… 184
竿…… 267
甘……90
柑…… 239
疳…… 301
gǎn 赶…… 288
橄…… 403
擀…… 411
感…… 382
gāng 刚…… 139
钢…… 263
gǎng 岗…… 179
gàng 杠…… 163
gāo 高…… 301
gǎo 藁…… 414
gē 疙…… 231
鸽…… 339
割…… 373
gé 隔…… 374
蛤…… 367
葛…… 357
gēn 根…… 283
gěng 梗…… 310
gōng 功……89
公……73
gǒng 拱…… 259
汞…… 166
gōu 枸…… 242
沟…… 186

钩…… 263
gǒu 狗…… 226
构…… 242
gòu 构…… 201
gǔ 古……91
骨…… 263
羖…… 306
毂…… 393
鼓…… 377
谷…… 184
鹄…… 370
臌…… 415
guā 瓜…… 118
栝…… 280
刮…… 217
guà 挂…… 259
guǎi 拐…… 211
guān 官…… 235
观…… 157
关…… 154
guǎn 管…… 397
guàn 罐…… 422
贯…… 236
guāng 光…… 138
guǎng 广……40
guī 龟…… 184
guǐ 鬼…… 267
guì 桂…… 279
gǔn 滚…… 390
兖…… 230
guō 锅…… 370
guó 国…… 217
guǒ 果…… 217
guò 过…… 138

H

há 蛤…… 367
虾…… 262
hà 哈…… 261
hái 孩…… 276
hǎi 海…… 303
hān 蚶…… 327
hán 含…… 183
韩…… 356
寒…… 373
hàn 汗…… 151
旱…… 179
汉…… 121
蓐…… 395
háng 杭…… 201
hāo 薅…… 411
háo 嚎…… 420
hào 号…… 103
hē 诃…… 187
喝…… 366
hé 合…… 148
盒…… 339
何…… 181
河…… 231
荷…… 286
禾…… 106
核…… 282
hè 鹤…… 407
hēi 黑…… 368
hén 痕…… 348
héng 恒…… 270
hóng 虹…… 262
洪…… 270
红…… 157
荭…… 257
hóu 喉…… 366
猴…… 372
hòu 厚…… 259
鲎…… 391
hū 忽…… 229
hú 胡…… 245
湖…… 373
猢…… 372
蝴…… 404
葫…… 356
槲…… 402
壶…… 283
hǔ 虎…… 212
琥…… 352
hù 护…… 177
戽…… 235
瓠…… 324
huā 花…… 169
huá 华…… 144
铧…… 335
滑…… 373
huà 化……73
桦…… 281
画…… 204
huái 怀…… 185
蘹…… 422
淮…… 348
槐…… 376
huān 獾…… 420
huán 还…… 177
huàn 槛…… 401
huáng 黄…… 316
huī 灰…… 137
huí 回…… 140
蛔…… 367
茴…… 253
hūn 昏…… 228
hún 混…… 348
hùn 混…… 348
huó 活…… 271
huǒ 火……80
huò 霍…… 411
藿…… 418

J

jī 积…… 295
鸡…… 190
jí 吉…… 132
蒺…… 380
棘…… 355
急…… 270
及……39
jǐ 戟…… 361
jì 季…… 217
寄…… 350
椹…… 312
鲫…… 406
jiā 嘉…… 394
夹…… 137
挟…… 259
葭…… 360
家…… 307
jiǎ 假…… 338
jiān 尖…… 138
jiǎn 剪…… 350
jiàn 建…… 235
见……66
箭…… 406
剑…… 268
jiāng 僵…… 406
姜…… 273
浆…… 307
江…… 151
jiàng 降…… 236
绛…… 276
将…… 272
jiàng 酱…… 391
浆…… 307
jiāo 胶…… 300
蕉…… 404
椒…… 354
jiǎo 绞…… 276
角…… 185
脚…… 342
jiào 较…… 290
叫…… 103

jiē 皆…… 261
接…… 325
jié 桔…… 279
节……90
jiě 解…… 389
jiè 芥…… 170
jīn 金…… 219
筋…… 371
jǐn 堇…… 316
锦…… 387
jìn 荩…… 257
jīng 京…… 230
惊…… 348
荆…… 247
jǐng 景…… 367
井……52
jìng 镜…… 411
jiǔ 九……10
韭…… 261
酒…… 302
灸…… 185
jiù 救…… 325
jú 橘…… 408
菊…… 315
jǔ 蒟…… 380
jù 巨……66
拒…… 177
锯…… 387
juǎn 卷…… 235
jué 蕨…… 404
决…… 150
爵…… 415
jūn 莙…… 287
菌…… 314
均…… 163

K

kǎ 卡…… 102
kāi 开……52
kǎn 坎…… 163
kàn 看…… 267
káng 扛…… 137
kào 靠…… 406
kē 苛…… 208
榼…… 391
蝌…… 405
ké 壳…… 166
kè 克…… 166
kòu 蔻…… 395
kōng 空…… 235
kǒng 孔……82
kū 枯…… 239
kǔ 苦…… 204
kuài 块…… 163
快…… 185
凿…… 103
kuān 宽…… 307
kuǎn 款…… 356
kuàng 矿…… 210
kuī 魁…… 388
kuí 葵…… 360
kūn 昆…… 197
坤…… 197
kuò 蛞…… 367

L

lā 拉…… 211
lǎ 喇…… 366
là 辣…… 398
腊…… 373
là 蜡…… 395
lái 莱…… 284
lài 赖…… 377
癞…… 418
lán 兰…… 121
拦…… 211
蓝…… 377
lǎn 揽…… 375
láng 狼…… 300
郎…… 235
榔…… 355
锒…… 387
廊…… 345
làng 莨…… 287
lǎo 老…… 132
lào 烙…… 301
lè 笏…… 217
lēi 勒…… 312
léi 雷…… 382
lèi 类…… 273
lěng 冷…… 185
lí 犁…… 337
篱…… 411
梨…… 337
黎…… 406
藜…… 416
lǐ 鳢…… 422
鲤…… 406
李…… 176
蠡…… 422
蚂…… 327
痢…… 373
立…… 121
栗…… 288
栎…… 243
丽…… 166
荔…… 257
lián 廉…… 389
濂…… 412
连…… 177
莲…… 284
liàn 楝…… 375
liáng 良…… 188
凉…… 302
liǎng 两…… 166
liàng 亮…… 270
liáo 潦…… 407
燎…… 412
寮…… 407
辽…… 124
疗…… 185
liǎo 蓼…… 395
了……12
liè 列…… 135
lín 林……6
líng 铃…… 295
羚…… 349
零…… 383
凌…… 301
陵…… 307
鲮…… 411
菱…… 313
灵…… 188
lǐng 岭…… 214
liú 留…… 301
流…… 306
硫…… 361
刘…… 149
liǔ 柳…… 242
liù 六……79
lóng 龙……97
lóu 楼…… 377
蝼…… 405
蒌…… 359
lòu 漏…… 399
lú 卢…… 102
栌…… 239
鸬…… 290
炉…… 231
芦…… 172
lǔ 橹…… 408
卤…… 178
lù 鹿…… 346
lù 路…… 386
潞…… 412
鹭…… 417

露…… 421
陆…… 188
lǘ 驴…… 194
lǚ 稆…… 415
lǜ 绿…… 351
葎…… 357
luán 栾…… 301
lún 纶…… 194
轮…… 212
luó 罗…… 216
萝…… 313
螺…… 414
luò 络…… 276
骆…… 275
落…… 359

M

má 麻…… 344
mǎ 马……47
mà 蚂…… 262
mǎi 买…… 157
mài 麦…… 162
mán 蔓…… 394
鳗…… 419
蛮…… 373
馒…… 398
mǎn 满…… 389
màn 蔓…… 394
曼…… 334
máng 忙…… 165
芒…… 132
盲…… 231
mǎng 莽…… 284
māo 猫…… 341
máo 毛……70
矛…… 124
茅…… 209
mǎo 冇……64
méi 眉…… 275
梅…… 311
玫…… 194
měi 美…… 273
méng 蒙…… 382
礞…… 417
虻…… 262
mèng 梦…… 324
mí 猕…… 342
蘼…… 422
迷…… 274
mǐ 米…… 155
mì 密…… 350
蜜…… 400
mián 绵…… 351
棉…… 354
miǎn 缅…… 374
miàn 面…… 258
míng 瞑…… 404
榠…… 392
明…… 214
mó 磨…… 412
mò 末……89
茉…… 204
墨…… 405
没…… 186
mǔ 母…… 125
牡…… 180
mù 墓…… 378
慕…… 394
苜…… 208
木……58
牧…… 217

N

nǎi 奶…… 123
nài 柰…… 258
耐…… 258
nán 南…… 248
náo 硇…… 324
nào 闹…… 231
nèi 内……66
nèn 嫩…… 400
ní 泥…… 233
nǐ 拟…… 177
nì 溺…… 391
腻…… 388
nián 粘…… 349
niàn 念…… 219
niǎo 鸟…… 121
niào 尿…… 188
níng 柠…… 244
niú 牛……66
niǔ 纽…… 194
钮…… 264
nóng 农…… 155
脓…… 300
nú 奴…… 123
nǚ 女……41
nüè 疟…… 231
nuò 糯…… 420

O

ǒu 藕…… 415

P

pá 爬…… 218
pà 怕…… 231
pái 排…… 325
徘…… 338
pān 潘…… 407
攀…… 418
pán 盘…… 339
蟠…… 417
pāng 滂…… 391
páng 螃…… 411
pàng 胖…… 270
pào 泡…… 232
pèi 佩…… 218
pén 盆…… 268
péng 硼…… 382
膨…… 411
蟛…… 417
蓬…… 379
pī 砒…… 258
pí 枇…… 198
啤…… 327
皮…… 123
pì 屁…… 188
piān 偏…… 338
piàn 片……73
piāo 漂…… 399
piáo 瓢…… 409
pín 频…… 383
píng 瓶…… 306
屏…… 275
平…… 100
苹…… 208
pō 朴…… 131
pó 婆…… 350
pò 朴…… 131
破…… 289
pū 扑…… 101
pú 蒲…… 380
葡…… 358
pǔ 朴…… 131
pù 铺…… 370

Q

qī 七……4
漆…… 399
qí 棋…… 354
蜞…… 395
麒…… 419
蕲…… 404
齐…… 149
脐…… 300
蛴…… 367

祁…… 155
qǐ 杞…… 165
起…… 288
槿…… 312
qì 气……70
荠…… 255
qiā 掐…… 325
qiān 千……36
扦…… 137
铅…… 295
牵…… 258
qián 荨…… 256
钱…… 292
前…… 272
qiàn 茨…… 171
茜…… 250
qiāng 枪…… 200
羌…… 187
蜣…… 386
qiáng 墙…… 391
蔷…… 394
qiáo 荞…… 254
荛…… 257
qiào 翘…… 361
qié 伽…… 182
茄…… 209
qín 琴…… 353
梣…… 311
秦…… 277
芹…… 170
qīng 青…… 194
清…… 348
蜻…… 395
轻…… 260
qǐng 苘…… 208
qiōng 芎…… 132
qiū 秋…… 264
楸…… 375
鳅…… 415
蚯…… 327
qiú 球…… 310
qū 蛆…… 327
蛐…… 367
屈…… 235
qú 瞿…… 417
qǔ 曲…… 140
苣…… 168
quán 全…… 148
拳…… 307
quǎn 犬……64
quē 缺…… 295
què 雀…… 326

R

rán 蚺…… 327
ráng 蘘…… 420
ráo 荛…… 250
rǎo 绕…… 276
rào 绕…… 276
ré 热…… 290
rén 人……8
rěn 忍…… 190
荏…… 255
rì 日……66
róng 榕…… 392
戎…… 126
绒…… 276
ròu 肉…… 140
rú 如…… 157
茹…… 257
rǔ 乳…… 219
rù 入……9
ruǎn 软…… 212
ruí 蕤…… 404
ruì 瑞…… 374
ruò 蒻…… 382

S

sān 三……12
sǎn 散…… 356
sāng 桑…… 308
sāo 骚…… 374
sǎo 扫…… 138
sào 扫…… 138
sé 涩…… 306
shā 砂…… 258
沙…… 185
莎…… 287
杀…… 149
shā 杉…… 164
shài 晒…… 291
shàn 珊…… 238
山……28
shàn 鳝…… 420
扇…… 307
shāng 伤…… 144
商…… 343
shàng 上……28
sháo 杓…… 165
韶…… 399
shào 少……66
shé 蛇…… 327
shè 摄…… 383
射…… 297
麝…… 422
shēn 申…… 103
伸…… 181
参…… 236
shén 神…… 274
shén 肾…… 214
慎…… 389
shēng 生…… 105
升……72
shèng 圣…… 124
shī 狮…… 268
虱…… 236
蓍…… 377
shí 时…… 178
石……92
十……3
食…… 268
shǐ 使…… 218
豕…… 177
shì 莳…… 286
柿…… 243
shì 匙…… 334
shóu 熟…… 407
shǒu 手……70
首…… 272
守…… 151
shòu 寿…… 162
shū 舒…… 371
shú 秫…… 295
shǔ 薯…… 409
蜀…… 386
鼠…… 388
shù 树…… 245
shuāng 双……82
霜…… 414
shuǐ 水……82
shuì 睡…… 383
shùn 顺…… 267
shuò 蒴…… 282
sī 思…… 263
丝…… 124
sì 四…… 103
sōng 松…… 198
sǒng 棕…… 377
sōu 搜…… 361
sòu 嗽…… 395
sū 苏…… 173
sù 缩…… 401
粟…… 360
suān 酸…… 393

suàn 算…… 397
suì 碎…… 382
suō 娑…… 307
梭…… 312
suǒ 锁…… 370
琐…… 310
索…… 283

T

tǎ 獭…… 411
tà 踏…… 405
tāi 苔…… 209
tái 台…… 124
tài 太……64
tān 摊…… 383
tán 痰…… 389
弹…… 350
檀…… 413
tāng 汤…… 151
táng 唐…… 301
塘…… 375
糖…… 412
棠…… 366
螳…… 414
táo 桃…… 281
téng 藤…… 416
tí 提…… 361
tiān 天……52
tián 田…… 103
甜…… 336
恭…… 312
tiáo 苕…… 209
调…… 307
tiē 贴…… 262
tiě 铁…… 292
tíng 葶…… 358
tōng 通…… 309
tóng 桐…… 279
铜…… 335
潼…… 407
tóu 头…… 123
tòu 透…… 296
tǔ 土……16
tù 兔…… 229
菟…… 314
吐…… 139
tuán 团…… 140
tuī 推…… 325
tuì 退…… 275
tuō 托…… 137
脱…… 342
拖…… 211
tuó 橐…… 411

W

wā 挖…… 260
wá 娃…… 275
wǎ 瓦……64
wà 腽…… 388
wāi 歪…… 259
wǎi 葳…… 357
wān 豌…… 403
wǎn 晚…… 327
wàn 万……28
wáng 王……51
wǎng 网…… 140
wàng 望…… 343
wēi 萎…… 314
威…… 259
葳…… 357
薇…… 410
wěi 苇…… 168
委…… 217
萎…… 314
尾…… 188
wèi 胃…… 262
猬…… 372
味…… 214
wēn 榅…… 375
wén 文……79
蚊…… 292
wěn 稳…… 397
wèn 问…… 149
wēng 翁…… 300
wō 窝…… 373
wò 卧…… 212
wū 乌……76
wú 梧…… 310
wú 无……56
芜…… 167
吴…… 178
蜈…… 384
wǔ 午……66
五……61
wù 雾…… 383

X

xī 豨…… 395
溪…… 390
西…… 134
蜥…… 396
蓠…… 312
吸…… 139
蟋…… 415
锡…… 387
犀…… 374
xǐ 喜…… 360
洗…… 271
菜…… 360
xì 细…… 236
戏…… 157
xiā 瞎…… 404
虾…… 262
呷…… 214
xiá 狭…… 268
霞…… 414
xià 下……20
夏…… 289
xiān 仙…… 106
鲜…… 398
xián 咸…… 259
xiàn 苋…… 168
xiāng 相…… 239
香…… 264
xiǎng 响…… 261
xiàng 象…… 343
橡…… 402
向…… 147
xiāo 消…… 302
逍…… 290
哮…… 290
xiǎo 小……41
xiē 蝎…… 404
xié 缬…… 407
xiě 血…… 146
xiè 蟹…… 410
蟹…… 419
薤…… 409
泻…… 233
xīn 辛…… 185
新…… 389
薪…… 410
xìn 信…… 267
xīng 星…… 262
xǐng 省…… 261
xìng 荇…… 283
杏…… 176
荇…… 255
xiōng 芎…… 132
xióng 雄…… 360
熊…… 400
xiù 绣…… 310
锈…… 370
xú 徐…… 299
xù 续…… 351
xuān 宣…… 272

萱…… 359
xuán 旋…… 343
玄…… 121
悬…… 334
xuě 雪…… 324
xūn 熏…… 397
xún 寻…… 155
巡…… 162

Y

yā 鸭…… 291
鸦…… 260
yá 牙……66
yǎ 雅…… 361
yà 砑…… 258
亚…… 134
yān 腌…… 373
烟…… 301
yān 胭…… 300
yán 延…… 145
蜒…… 367
沿…… 232
岩…… 214
盐…… 281
yǎn 眼…… 327
yàn 燕…… 411
艳…… 277
焰…… 373
雁…… 361
yáng 羊…… 151
杨…… 165
阳…… 155
洋…… 271
yǎng 痒…… 348
养…… 273
仰…… 144
yāo 腰…… 388
yáo 尧…… 138
yào 药…… 257
钥…… 236
yè 耶…… 201
yě 野…… 329
yè 夜…… 230
腭…… 404
叶…… 102
yī 伊…… 144
一…… 1
yí 饴…… 227
移…… 336
宜…… 234
yǐ 蚁…… 262
苡…… 174
yì 薏…… 410
益…… 306
翼…… 415
异…… 155
yì 翳…… 414
yīn 茵…… 253
阴…… 156
yín 银…… 336
淫…… 348
yǐn 引……81
yīng 樱…… 401
蓼…… 394
罂…… 397
莺…… 287
鹰…… 418
yíng 营…… 324
迎…… 185
yìng 映…… 262
硬…… 361
yóu 莸…… 286
油…… 231
柚…… 240
yǒu 有…… 137
yòu 右……97
柚…… 240
yú 榆…… 377
余…… 183
鱼…… 228
於…… 230
矾…… 212
yǔ 禹…… 268
雨…… 210
羽…… 157
yù 浴…… 305
预…… 308
芋…… 131
玉……88
御…… 371
郁…… 210
yuān 鸳…… 301
鸢…… 212
yuán 原…… 289
yuán 元……56
芫…… 167
园…… 179
圆…… 292
yuǎn 远…… 163
yuè 月……73
钥…… 263
粤…… 371
yún 云……57
芸…… 168

Z

zāi 栽…… 289
zàn 錾…… 411
zàng 藏…… 413
zǎo 蚤…… 275
枣…… 210
zào 皂…… 182
灶…… 185
zé 泽…… 233
zhā 扎……64
zha 蚱…… 327
zhān 粘…… 349
旃…… 301
zhǎn 斩…… 212
zhāng 章…… 343
獐…… 397
樟…… 402
张…… 188
zhǎng 掌…… 366
zhāo 朝…… 356
zhào 照…… 386
zhě 赭…… 403
zhè 鹧…… 412
蔗…… 415
柘…… 239
浙…… 302
zhēn 针…… 181
珍…… 238
真…… 283
zhěn 枕…… 201
zhèn 震…… 404
zheng 争…… 149
zhī 支……58
枝…… 197
知…… 217
蜘…… 396
芝…… 132
梔…… 311
脂…… 300
zhí 蹠…… 405
zhǐ 止……66
枳…… 241
指…… 360
zhì 雉…… 388
治…… 234
zhōng 钟…… 263
zhǒng 肿…… 228
zhòu 皱…… 301
zhū 朱…… 143
珠…… 277
诸…… 307

	猪	339
zhú	竹	141
zhù	苎	171
zhuǎn	转	212
zhuàng	壮	151
	状	187
zhuī	追	267
zhuó	斫	258
zǐ	子	51
	紫	361
	茈	251
	梓	312
zì	自	145
zōng	棕	355
zǒng	总	273
zǒu	走	174
zǔ	祖	274
zuān	钻	292
zuì	醉	403
zuó	昨	262
zuǒ	左	92
zuò	柞	241
	酢	356

部分原植(动)物名、附属药药名检索

（一）原植（动）物名

二 画

二叶红薯…… 391
二色补血草…… 187
七叶树…… 307
七层楼…… 275
九节……29

三 画

三叉苦……13
三叶木通…… 6
三叶委陵菜…… 130
三叶爬山虎……13
三叶鬼针草…… 223
三叶崖爬藤……14
三花龙胆……98
三角叶黄连…… 319
三裂叶蛇葡萄… 220
三褶脉马兰…… 161
土牛膝…… 296
大麻……80
大风艾……89
大叶冬青…… 204
大叶桉…… 283
大叶藻…… 304
大血藤…… 162
大花卫矛…… 331
大花金钱豹……20
大吴风草…… 7
大苞雪莲花…… 389
大画眉草…… 262
大籽雪胆…… 216
大高良姜……23
大琉璃草…… 212
大猪屎豆…… 145
大颓马勃……48
大蝉草…… 296
万寿竹…… 143
山里红……34
山鸡椒…… 166
山刺玫…… 202
山银花…… 224
山楂叶悬钩子… 137
山蝉…… 396
千叶蓍…… 271
千根草……41
川赤芍…… 175
川续断…… 351
广东相思子…… 192
广东紫花杜鹃… 362
广西莪术…… 211
广西鹅掌柴…… 5
广藿香…… 418
卫矛…… 268
小木通……38
小毛茛…… 341
小叶朴…… 353
小叶买麻藤…… 157
小决明…… 150
小花杜鹃…… 386
小花鬼针草…… 346
小画眉草…… 262
小果白刺…… 102
小果蔷薇……44
小根蒜…… 409
小黄连刺……15
小斑叶兰…… 352
小萱草…… 221
小蓝雪花…… 193
小槐花…… 196
小藜…… 137
马连鞍……91
马利筋…… 285
马蓝……24
马缨丹……62
马鞍叶羊蹄甲……21

四 画

开口箭…… 143
天仙果……67
天师栗…… 307
天名精…… 407
天蓝苜蓿…… 130
云木香……59
云连…… 319
云南白珠树…… 296
云南当药…… 195
云南茜草……43
云南繁缕……37
支柱蓼…… 157
木香马兜铃…… 348
木贼麻黄…… 345
木通马兜铃…… 154
木蓝……60
五步蛇…… 112
太白乌头…… 219
瓦花……65
中国粗榧……19
中麻黄…… 345
内蒙古黄芪…… 319
牛筋树……31
手参……70
毛叶地瓜儿苗… 129
毛叶轮环藤…… 336
毛杭子梢……23
毛曼陀罗…… 271
长籽马钱……49
长梗南五味子… 158
长蕊万寿竹…… 143
月腺大戟…… 116
风毛菊…… 8
乌毛蕨…… 237
乌饭树…… 250
乌蕨……22
六月雪…… 107
六角莲…… 7
文冠果……80
文殊兰…… 217
文蛤…… 367
火棘…… 157
心叶半夏…… 399
心叶缬草…… 396
巴天酸模……67
巴岩香……94
双蝴蝶…… 228
孔石莼……95
水车前……98
水烛…… 266
水蓼…… 398
水槟榔……50
水鳖……48

五 画

玉兰…… 185
节节草…… 396
甘青乌头…… 324

甘青赛莨菪…… 413
甘松香……90
甘肃贝母……38
石竹…… 417
石松…… 181
石胡荽…… 370
石蕨…… 171
龙芽草……98
龙须藤……11
平车前……65
打碗花…… 258
东北天南星……54
东北龙胆……98
北马兜铃……50
北乌头…… 251
北美独行菜…… 358
北柴胡…… 290
叶下珠…… 238
叶底珠…… 1
田皂角…… 148
四方蒿…… 191
四叶葎…… 104
白木香…… 187
白木通…… 6
白花地丁…… 337
白花延龄草…… 131
白花败酱…… 214
白花前胡…… 272
白英…… 108
白芍…… 201
白背黄花稔…… 317
白背鼠曲草……54
白粉藤…… 269
白曼陀罗…… 271
白蜡树…… 277
瓜木…… 7
冬青…… 104
兰草…… 218
凹叶厚朴…… 259
凹叶景天……47
对叶百部…… 136
辽东楤木…… 202
辽细辛…… 236
辽藁本…… 414

六　画

地丁紫堇…… 205
地瓜儿苗…… 129
地构叶…… 296
地胆草…… 205
地黄连…… 169
老鸦瓣…… 139
耳叶牛皮消……47
耳草…… 406
西南山梗菜…… 333
西南杠柳…… 369
西南囊苞花…… 184
西藏青荚叶…… 102
百两金…… 6
百里香…… 130
百脉根…… 127
灰白毛莓……77
过路黄……25
尖尾芋…… 6
尖尾枫…… 138
光风轮…… 350
光叶花椒…… 9
光叶海桐……30
光叶菝葜……19
网脉秋海棠…… 2
竹节参…… 141
伏生紫堇…… 289
伊犁贝母…… 144
华山姜…… 389
华中五味子…… 147
华乌头…… 251
华东菝葜…… 349
华瓜木…… 7
华泽兰……40
华细辛…… 236
华南龙胆……99
华重楼…… 4
延龄草…… 131
血水草…… 316
多叶唐松草……48
多花勾儿茶…… 323
多花瓜馥木…… 368
多花蔷薇…… 324
多枝唐松草…… 212
多被银莲花…… 142
灯笼草…… 267
江南卷柏…… 128
江蓠……98
羊角拗…… 152
羊乳……33
羊蹄蹋……79
米口袋…… 337
兴安升麻……72
兴安杜鹃…… 389
祁州漏芦…… 399
阳春砂…… 239
阴行草…… 295
羽叶岩陀…… 215
红花龙胆……42
红蓼……84
异叶天南星……54
异叶败酱…… 378

七　画

麦蓝菜……51
杠柳…… 264
杜仲藤…… 416
杜虹花…… 365
杜鹃…… 164
芫花叶白前…… 116
芸香…… 298
苏铁…… 293
赤芝…… 188
杏叶沙参…… 249
拟豪猪刺……15
肖梵天花…… 129
旱莲木…… 360
佛手…… 182
佛掌榕……63
含羞草决明……32
卵叶远志…… 163
卵叶娃儿藤……12
条浒苔……16
迎红杜鹃…… 185
庐山石韦……92
怀庆地黄……16
冷饭团…… 368
沙棘…… 403
灵香草…… 383
陆地棉…… 354
阿尔泰银莲花……10
阿坝当归…… 231
陇蜀杜鹃…… 223
忍冬…… 190
鸡爪大黄……26
驳骨丹…… 114

八　画

青牛胆…… 221
青萍…… 305
青蛤…… 367
青藤…… 195
松潘乌头…… 219
枫杨…… 200
枫香…… 116
构树…… 353
构棘…… 123
杭白芷…… 111
刺茄…… 3
刺参…… 304
刺桐…… 202

直立百部…… 130
苦巴旦杏……81
苦枥白蜡树…… 277
苦郎树……85
苦荞麦…… 207
苦蒿…… 219
苹婆……75
茅苍术…… 170
抱石莲…… 229
抱茎三对叶……14
抱茎苦荬菜…… 208
轮叶沙参…… 249
轮叶泽兰…… 330
轮叶排草…… 316
轮叶婆婆纳…… 212
欧李…… 210
笋梢…… 418
金不换……24
金毛狗脊…… 227
金刚纂……80
金鸡纳树…… 221
金鸡脚…… 371
金钗石斛……96
金钱松……20
金钱草……40
金弹…… 225
金锦香……55
狗脊蕨…… 237
肺筋草…… 306
胀果甘草……90
兔耳草…… 270
京大戟……27
河朔尧花…… 317
油柑…… 230
空心莲子草…… 235
卷丹…… 135
线纹香茶菜…… 390
细叶小檗……15
绉面草…… 385

九 画

珊瑚菜…… 101
柘树……32
枸骨…… 204
枸橼…… 266
柳叶白前…… 116
树参…… 201
胡蔓藤…… 263
南岭尧花……12
南酸枣……40
草芍药…… 175
草麻黄…… 345
草棉…… 354
茶枝柑…… 239
荫风轮…… 350
点地梅…… 367
贴梗海棠……58
显脉香茶菜……22
禹毛茛…… 145
秋海棠…… 158
香花崖豆藤…… 191
香茶菜……42
香圆…… 240
香椿…… 266
香榧…… 392
鬼灯擎…… 394
禹州漏芦…… 399
狭叶十大功劳…… 3
独行菜…… 358
独角莲…… 113
独蒜兰……35
匍匐堇…… 126
活血丹…… 177
总状土木香…… 413
美舌藻…… 412
美丽马先蒿……64
美丽崖豆藤……33
浒苔……16
屎蛤螂…… 386
蚤缀…… 295
柔枝槐……30
骆驼刺…… 203
结香…… 324

十 画

珠子参…… 5
桃金娘……34
莲子草……90
莓叶委陵菜…… 387
莨菪……53
盐肤木……63
栽秧泡…… 322
烈香杜鹃……42
峨眉蕨…… 237
鸭嘴花……23
蚊母草…… 107
铁皮石斛……96
铁线蕨…… 341
缺腰叶蓼…… 170
臭椿…… 401
倒吊笔…… 297
倒提壶…… 227
狼毒大戟…… 116
高原唐松草……48
烟管头草…… 260
酒饼笋…… 101
浙玄参…… 121
海州香薷…… 266
粉叶轮环藤…… 302
粉防已…… 156
粉草蘚…… 314
通脱水…… 309
绣球…… 6
绣球藤……38

十 一 画

桫椤……46
榧木…… 312
菘蓝……24
黄皮树…… 320
黄花乌头…… 154
黄花蒿…… 197
黄连木…… 320
黄独…… 321
黄常山…… 326
黄瑞香…… 274
雪见草…… 257
雪胆…… 216
野甘草…… 151
野百合…… 155
野荞麦…… 222
崖爬藤…… 174
匙叶甘松香……90
牻牛儿苗…… 134
银耳…… 108
银杏…… 114
银环蛇…… 223
甜巴旦杏……81
麻栎…… 402
鹿蹄草…… 347
续随子…… 307
绵毛马兜铃…… 155
绵草蘚…… 314
绶草…… 339

十 二 画

琼枝……94
斑地锦…… 131
椋子木…… 4
喜马拉雅旌节花…45
硬毛果野豌豆……45
裂叶秋海棠…… 160
戟叶牛皮消…… 116
紫芝…… 188
紫花前胡…… 272
紫参……92

紫背浮萍……305
紫胶虫……365
紫萁……237
紫葳……301
掌叶大黄……26
黑山棱……15
短柄乌头……324
短梗五加……62
鹅掌柴……291
筋骨草……108
粤蛇葡萄……57
番红花……413
阔叶十大功劳……3

十三画

瑞香狼毒……300
赫桐……286
蓝桉……383
蓬蘽……14
蒙栎……241
碎米桠……120
路边青……24
锦鸡儿……224
腺梗豨莶……395
新疆假紫草……365
新疆贝母……144
新疆阿魏……189
滇瓦花……182
滇紫草……364
裸花紫珠……288

十四画

踯躅……333
蔓生白薇……118
蔓性千金拔……36
蓼蓝……24
截叶铁扫帚……230
蝇子草……342
裹篱樵……194
瘦风轮……350

十五画

樗叶花椒……302
槲蕨……263
醉鱼草……5
蕺菜……228
播娘蒿……358
蝙蝠葛……101
暴马丁香……405
箭叶唐松草……86
藜蒺……244

十六至二十一画

薯蓣……32
蟒蛇……327
篱天剑……343
鲮鲤……272
藤黄连……323
麒麟竭……146
魔芋……380
糯米团……421
露兜树……408
鳢肠……405

（二）附属药药名

一至二画

一粒金丹……210
一群鸭……344
丁香树皮……4
人面子根皮……9
九牛造茎叶……10
九里香花……11
了哥王子……12

三　画

三七叶……13
三七花……13
土甘草……240
土荆芥油……19
大风子油……21
大麦苗……23
大靛根……60
山甘草……240
山扁豆子……32
山楂木……34
山楂叶……34
山楂花……34
山楂茎叶……34
山慈姑花……35
女贞树皮……41
小草……103
马铃根……145

四　画

天麻子……55
天麻茎叶……55
天雄……189
无患子叶……57
木瓜根……58
木半夏根……58
木硇……308
木槿叶……61
木鳖根……61
五加叶……62
牛蒡茎叶……69
牛膝茎叶……70
毛猴子……388
气包根……176
凤眼果壳……76
水田七叶……83
水仙花……83
水团花根……64
水柳须……243
水翁叶……86
水翁皮……86

五　画

玉蜀黍叶……88
玉蜀黍根……88
功劳子……3
甘草梢……90
甘蔗滓……91
古钩藤叶……92
石韦根……92
石南实……94
石莲子……284
龙利叶花……98
龙珠根……99
龙眼壳……100
龙眼花……99
龙眼根……99
四时青……58
生漆……16
仙半夏……123
白马骨根……107
白平子……159
白芷叶……111
白蔹子……117
半枫荷叶……122

六 画

地黄花……16
地黄实……16
芋儿七……141
老鸦胆根……260
亚麻茎叶……134
百合子……136
肉豆蔻衣……141
肉桂油……141
竹心……142
竹针……142
竹卷心……142
灯心草根……149
羊角扭花……152
羊角菜……112
羊蹄实……154
阴香根……156
防风叶……157
防风花……157
红花子……159
红茴香根……284
红蓝子……159

七 画

豆蔻花……111
苋菜……169
苍耳花……170
茯苓……172
茯根……172
芦竹沥……172
芦荟叶……172
芦荟花……172
芦荟根……172
赤小豆叶……174
赤小豆花……174
赤爪木……34
赤茯苓……254
走马胎叶……174
杏树根……176
李树胶……126
还筒子……55
连翘茎叶……178
岗梅叶……179
牡丹花……180
牡蒿根……180
佛手露……182
沙枣花……186
诃子叶……187
即子……38
鸡肝散花……192
鸡屎藤果……193
鸡蛋花叶……194

八 画

青龙须……243
青蒿露……197
青檀香……58
枇杷木白皮……198
刺梨叶……203
刺梨花……203
卖子木……100
苘麻根……209
茄花……209
昆明鸡血藤根……216
罗汉果叶……216
侧子……38
金狗脊黄毛……227
金背枇杷花……223
油菜子油……168
细草……103

九 画

珍珠梅枝条……238
相思藤……240
柚核……73
枸橘刺……242
柳须根……243
胡桃花……246
荆芥穗……248
南瓜阴芽……249
南瓜须……249
南瓜蔓……249
南瓜瓤……249
南烛根……250
南蛇藤叶……250
荠苨茎叶……255
荠苨苗……256
星星草花……262
香油……168
鬼目……94
炮姜……16
美人蕉花……273
姜叶……105
骆驼刺子……203
绛梨木根……276

十 画

桐子花……232
桐木……280
莪术油……379
峨三七……141
鸭儿芹果……291
铁包金……276
铁拳头……222
铁棒锤茎叶……112
铁箍散……308
臭菜……308
海根……222
桑木汁……308
桑叶汁……308
桑叶滋……308
桑白汁……308
桑汁……308
桑皮汁……308
桑脂……308
桑麌……308
桑霜……308
通光散叶……309

十 一 画

梓木……312
菖蒲叶……95
菜子油……168
黄波罗果……320
救必应叶……326
救军粮叶……175
野芋实……303
甜莲子……284
假败酱根……88
假酸浆子……150
假酸浆花……151
盘肠草……249
麻柳果……344
鹿梨……347
痕芋头花仁……303

十 二 画

斑叶兰根……352
棉子油……354
棕板……355
棕树心……355
棕骨……355
葛叶……357
葛粉……357
落地珍珠……210
落花生油……359
雁鹅群……344
紫苏苞……362
黑龙须……276

十 三 画

槐米……376
槐蕊……376
蒺藜花……380
蒴藋赤子……382

蒲桃壳…… 381
蒲桃根皮…… 381
雉子筵…… 388
满山红…… 388
满山红根…… 389
满江红根…… 390
滇瓦花根…… 182
鲎藤根…… 391

十 四 画

蔗鸡……91
蓼子七…… 222
豨莶果…… 395
漏篮子……39

十五至十七画

榈芽…… 163
瓢子…… 388
蕹叶…… 409
薄荷露…… 410
磨盘草子…… 412
霜茄子…… 209

[General Information]
书名=中医大辞典 中药分册（试用本）
作者=
页数=437
SS号=0
出版日期=