中医大辞典

内科分册

《中医大辞典》编辑委员会 编

人民卫生出版社

样本库

中医大辞典

内科分册

（试用本）

《中医大辞典》编辑委员会　编

中医研究院
广州中医学院　主编

上海中医学院　编

人民卫生出版社

中 医 大 辞 典
内 科 分 册
（试 用 本）
《中医大辞典》编辑委员会 编

人民卫生出版社出版
（北京市崇文区天坛西里10号）
兰州新华印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本 29¼印张 4插页 741千字
1987年11月第1版 1987年11月第1版第1次印刷
印数：00,001——15,830
ISBN 7-117-00428-2/R·429 定价：8.10元
统一书号：14048·5026
〔科技新书目148—80〕

《中医大辞典》分册总目

基础理论分册	医史文献分册
内科分册	外科、骨伤、五官科分册
妇科、儿科分册	中药分册
方剂分册	针灸、推拿、气功、养生分册

1166044

《中医大辞典》编辑委员会委员、顾问

（按姓氏笔划为序）

主任委员：李永春

副主任委员：王树歧　刘汝琛　许德良　张鼎臣

委　　员：丁绪亮　区永欣　邓铁涛　许占民
杨医亚　杨树藩　李经纬　李慕才
肖敏材　吴贻谷　何传毅　余瀛鳌
张自云　张启光　陈玉琦　林建德
欧　明　贾维诚　高忻洙　徐廷素
郭振球　裘沛然　蔡景峰　廖品正
谭日强

顾　　问：朱仁康　任应秋　米伯让　金寿山
黄星垣　鲁之俊

编辑委员会办公室主任：李经纬

2/C41/29

凡　例

一、本分册共收载内科词目3839条。其中包括附词在内。

二、选词力求正确反映祖国医学伟大宝库的实际内容，反映祖国医学理论与临床实践的密切联系，反映其悠久历史及源流；以收集古典医籍的词汇为主，兼收现代中医学发展过程中及中西医结合的新词目。

三、本分册有关治法的释文而引用例方者，一般不列其药物组成，可查阅方剂分册。

四、释文一般先定义，后解释，注意言简意明，通俗易懂，结合实际。引录文献，力求简要。一词多义者和单字多音者，以❶❷❸……分别叙述。对学术见解不同的词目，选择介绍各家观点。单字词目，通常只解与中医学有关的字义。

五、各类词目，一般注明出处，以便查核。出处属原始文献记载者，冠以“出”字，出处不确者，冠以“见”字。

六、本分册的简化字采用1964年中国文字改革委员会《简化字总表》，并参考《新华字典》、《辞海》等，按笔画、字数多少编排。

（1）同数笔画，据第一笔笔形一（横）丨（直）丿（撇）丶（点）乛（折。包括㇛㇜㇜等）为序。

（2）第一字相同，依第二字笔画多少为序；第一字相同，第二字笔画数相等，依第三字笔画多少为序。余类推。

（3）对某些容易混淆的或简化以后即失去原意的字，仍采用繁体字，如癥、橘等。另外，还保留了个别古体字、异体字。

出 版 说 明

为了适应我国医学发展的形势，满足医药卫生人员学习中医的迫切需要，经卫生部一九七四年二月批准编写这部《中医大辞典》。

《中医大辞典》是一部供医疗、教学、科研工作中应用的工具书。全书选收中医基础理论、临床、针灸、中药、方剂、人物、文献、推拿、气功等词目约四万五千条（其中包括单字及附条），于一九七五年十月开始编写的。在编写过程中，力求做到既要反映祖国医药学发展的历史继承性，又要反映解放后医药卫生战线的新成就。释文也力求简明扼要，引用文献尽量摘其要者。初稿完成后，各编写单位曾广泛征求了修改意见，最后邀请名老中医、有关方面的专家审阅定稿。

《中医大辞典》先按基础理论、临床各科以“试用本”分八册出版，广泛征求意见后，再作修改，重新编排，正式合订出版。

本书在编写、审定过程中，得到北京、上海、广东、四川、辽宁、江苏、河北、陕西、湖南等省市有关领导、有关单位和全国许多地方的医务工作者的大力支持和热情协助，谨在此表示诚挚的谢意。

编写出版辞典类工具书，有它一定的特性；再由于水平所限，缺乏经验，因而本书的编写等工作，达不到预期要求，存在不少问题。诚恳希望大家提出宝贵意见，帮助我们提高质量。

本书题笺，是特请郭沫若同志手写的，专此志念。

人民卫生出版社

一九八〇年六月

内科分册编写、审阅人员

（按姓氏笔划为序）

主要编写人员：

王啸山　严以平　肖敏材　何传毅　茹十眉　郭镜我　裘沛然

参加编写人员：

王灵台　包明惠　朱宝贵　华蓓苓　阮圣川　李孝刚　陈　照
林廉洁　陶御风

审阅人员：

邓铁涛　印会河　余瀛鳌

责任编辑：

贾维诚

检　字

（每字后的页码，系检索目录；根据目录，再查检词目）

一　画

〔一〕

一……1

二　画

〔一〕

二……1
十……1
七……1

〔丿〕

八……1
人……1
九……1

三　画

〔一〕

三……1
干……1
土……1
下……1
大……1
寸……1

〔丨〕

上……1
口……2
山……2

〔丿〕

久……2

〔丶〕

亡……2

〔冂〕

尸……2
女……2
叉……2
小……2
飞……2
子……2
马……2

四　画

〔一〕

天……2
无……2
木……2
五……2
支……2
太……3
犬……3
不……3
历……3
牙……3

〔丨〕

少……3
日……3
中……3
内……3
见……3

〔丿〕

丹……3
午……3
牛……3
毛……5
手……5
气……5
长……5
仆……5
爪……5
反……5
乏……5
欠……5
风……5
乌……5

〔丶〕

六……5
火……5
心……5

〔冂〕

尺……6
巴……6
水……6

五　画

〔一〕

击……6
玉……6
正……6
去……6
左……6
右……6
石……6
平……6
打……6
扑……6

〔丨〕

目……6
叫……6
四……6
出……6

〔丿〕

生……6
矢……7
失……7
白……7
瓜……7
外……7
冬……7
饥……7

〔丶〕

玄……7
闪……7
半……7
头……7

〔冂〕

皮……7

发……7
母……7

六 画

〔一〕

动……7
老……7
耳……7
再……7
厌……7
百……7
死……7
夹……8
过……8
邪……8
协……8

〔丨〕

当……8
早……8
吐……8
虫……8
吊……8
吃……8
刚……8
肉……8

〔丿〕

先……8
舌……8
牝……8
传……8
伏……8
休……8
任……8
仲……8
伤……8
自……8
血……8
似……8
后……8
行……8
杀……8
合……8
众……8
肌……8
杂……8
犯……8
多……8
色……8

〔丶〕

妄……9
交……9
闭……9
羊……9
关……9
米……9
壮……9
冲……9
灯……9
汗……9
污……9
江……9

〔乛〕

寻……9
阳……9
阴……10
收……10
奸……10
如……10
红……10

七 画

〔一〕

远……10
运……10
走……10
坏……10
赤……10
志……10
声……10
芫……10
花……10
劳……10
杏……10
杨……10
两……10
否……10
折……10

〔丨〕

呕……11
呃……11
时……11
呆……11
足……11
里……11

〔丿〕

利……11
吞……11
牡……11
体……11
但……11
身……11
近……11
余……11
肝……11
肛……12
肚……12
肘……12
肠……12
角……12
狂……12
卵……12
饭……12
饮……12
饨……12

〔丶〕

忧……12
忪……12
间……12
闷……12
冷……12
冻……12
注……12
沥……12
沙……12
沉……12
谷……12

〔乛〕

尾……12
尿……12
张……12
鸡……12
纵……12
纽……12

八 画

〔一〕

表……12
青……13
直……13
茎……13
卧……13
刺……13
郁……13
奔……13
奇……13
顶……13
转……13
软……13

抽……13
拘……13
拂……13

〔丨〕

非……13
齿……13
肾……13
味……13
呵……13
呷……13
呴……13
果……13
固……13
岭……13

〔丿〕

刮……13
季……13
併……13
金……13
往……13
肤……13
肢……13
肿……14
胀……14
股……14
肺……14
肥……14
胁……14
周……14
昏……14
卑……14
鱼……14
狐……14
狗……14
忽……14
饶……14

〔丶〕

夜……14
卒……14
疟……14
疝……14
疙……14
盲……14
郑……14
单……14
沫……14
泄……14
河……15
油……15
注……15
泻……15
宗……15
实……15
肩……15
房……15
怔……15
怵……15
怫……15
闷……15

〔乛〕

孟……15

九　画

〔一〕

春……15
毒……15
项……15
贲……15
茧……15
带……15
茶……15
药……15
枯……15
砒……15
砂……15
面……15
轻……15
指……15
挥……15
鸦……15

〔丨〕

背……15
战……15
哑……15
咽……15
哟……15
咯……15
咬……15
咳……15
冒……15
胃……15
思……16
骨……16
幽……16

〔丿〕

秋……16
咸……16
重……16
便……16
徇……16
鬼……16
钩……16
食……16
胨……16
胪……16
胆……16
胕……17
胞……17
脉……17
胫……17
急……17

〔丶〕

疫……17
疮……17
恍……17
类……17
前……17
首……17
逆……17
洪……17
浊……17
洞……17
浑……17
客……17
诧……17
语……17
神……17
鸩……17

〔乛〕

昼……17
眉……17
除……17
怒……17
蚤……17
怠……17
柔……17
结……17
绝……17
绞……17

十　画

〔一〕

顽……17
恚……17
盐……17
恐……17

恶……17
真……17
莨……17
桐……17
桃……17
格……17
核……17
索……17
鬲……17
唇……17
夏……17
破……18
振……18
损……18
热……18
顿……18

〔丨〕

鸪……18
紧……18
哮……18
眩……18
晕……18
鸭……18
蚬……18
贼……18

〔丿〕

积……18
健……18
臭……18
息……18
射……18
铁……18
脊……18
胸……18
脏……18
脐……18
脑……18
脓……18
脂……18
蛆……18
狼……18
留……19

〔丶〕

挛……19
高……19
离……19
疳……19
病……19
疮……19
疹……19
痈……19
症……19
痉……19
疲……19
痉……19
凉……19
涕……19
酒……19
消……19
浮……19
流……19
浪……19
涌……19
涎……19
烦……19
穷……19
诸……19

〔乛〕

弱……19
通……19

十 一 画

〔一〕

黄……19
萎……19
梦……19
梅……19
雪……19
掉……19
捻……19

〔丨〕

虚……19
虚……20
晨……20
悬……20
圊……20
野……20
曼……20
眼……20
晚……20
蛊……20
蚰……20
蛇……20
趺……20
啮……20
唾……20
惋……20

〔丿〕

铜……20
银……20
停……20
偏……20
偻……20
盘……20
脚……20
脬……20
脱……20
猪……20
猝……20

〔丶〕

麻……20
痣……20
痉……20
痰……20
商……20
情……20
悸……20
惊……20
凑……20
断……20
盗……20
清……20
淋……20
淡……20
深……20
宿……20
着……20
密……20

〔乛〕

蛋……20
颈……20

十 二 画

〔一〕

越……21
斑……21
喜……21
落……21
朝……21
酣……21
酢……21
惑……21
硫……21
厥……21
雄……21
淹……21

搅……21

〔丨〕

悲……21
紫……21
龄……21
掌……21
胴……21
暑……21
喘……21
喉……21
喑……21
喂……21
跌……21
跗……21
遗……21
蛲……21
蛔……21
蛟……21
黑……21
骭……21

〔丿〕

掣……21
短……21
犊……21
皿……21
遁……21
循……21
翕……21
筋……21
番……22
腘……22
脾……22
腋……22
猥……22
飧……22
饷……22

〔丶〕

痨……22
痞……22
痈……22
痛……22
痢……22
瘸……22
痧……22
痛……22
游……22
善……22
滞……22
湿……22
温……23
渴……23
滑……23
溲……23
寒……23
遍……23
禄……23

〔乛〕

强……23
隔……23
缠……23
缓……23

十三画

〔一〕

鼓……23
蓄……23
蒸……23
禁……23
殽……23
雷……23
感……23
碍……23
摇……23
搐……23
摊……23

〔丨〕

督……23
蒙……23
睛……23
暗……23
嗜……23
嗌……23
嗳……23
蜈……23
蜣……23

〔丿〕

稠……23
愁……23
鼠……24
微……24
腠……24
腈……24
腰……24
腮……24
腽……24
腹……24
腿……24
触……24
解……24

〔丶〕

痲……24
痱……24
痼……24
痫……24
痴……24
痿……24
痹……24
瘀……24
瘫……24
痰……24
新……24
数……24
煎……24
煤……24
溪……24
溏……25
溢……25
溺……25
满……25
寝……25

〔乛〕

肾……25

十四画

〔一〕

韬……25
聚……25

〔丨〕

嘈……25
嗽……25
蜘……25
蜴……25

〔丿〕

鼻……25
魄……25
膜……25
膑……25
膈……25
膀……25
僧……25

〔丶〕

膏……25
瘐……25
瘩……25
瘟……25
瘦……25
瘪……25

瘙……25
瘖……25
瘕……25
精……25
慢……25
漆……25
漉……25
漩……25
漏……25

〔ㄱ〕

瞀……25
鹜……25
缩……25

十 五 画

〔一〕

漐……25
醋……25
醉……25
撮……25
髮……25

〔丨〕

暴……25
噎……26
瞑……26
蝦……26
踝……26

〔丿〕

箭……26
膝……26

〔丶〕

瘛……26
瘨……26
瘮……26
瘧……26
瘤……26
瘫……26
瘮……26
瘯……26
懊……26
憕……26
潮……26
额……26
谵……26

十 六 画

〔一〕

槊……26
薄……26
霍……26

〔丨〕

噤……26
噫……26
餐……26

〔丿〕

鼽……26
膨……26

〔丶〕

弹……26
瘴……26
癃……26
瘵……26
壅……26
糖……26

十 七 画

〔一〕

戴……26
藏……26

〔丨〕

嚏……26

〔丿〕

黏……26
鼾……26
朦……26

〔丶〕

燥……26
濡……26

〔ㄱ〕

臂……26

十 八 画

〔一〕

藜……26

〔丨〕

蹠……26

〔丿〕

翻……26

〔丶〕

瀋……26
癞……26
癫……26
癖……26

十 九 画

〔丨〕

巅……26
嚥……26

〔丿〕

齁……26

〔丶〕

颤……26
癡……26
瘪……26
鳖……26

二 十 画

〔一〕

麵……27

〔丨〕

躁……27

〔丶〕

癥……27
灌……27
瀼……27

二十一画

〔丿〕

鐰……27

〔丶〕

癲……27

二十二画

〔一〕

囊……27
鬚……27

〔丨〕

髓……27

二十三画

〔一〕

魇……27
颧……27

目　录

一　画

〔一〕

一身悉肿……1

二　画

〔一〕

二十三蒸……1
二阳并病……1
二浊……1
十二经脉病候……2
十二癥……2
十水……2
十指麻木……2
十咳……2
十疰……2
七气……2
七伤……2
七疝……2
七情饥饱嗽……3
七情伤感嗽……3
七情郁证……3
七情泻……3
七情痢……3
七癥……3

〔丿〕

八纲……3
八淋……3
八瘕……3
人黄……4
人痫……4
九气……4
九虫病……4
九注……4
九种心痛……4
九积……4
九疸……4
九窍出血……5

三　画

〔一〕

三十六黄……5
三日疟……5
三虫病……5
三阳头痛……5
三阳合病……6
三阳经疟……6
三阳病……6
三阳痉……6
三阴头痛……6
三阴疟……6
三阴病……6
三阴痉……6
三消……7
三焦手少阳经
　病证……7
三焦郁……7
三焦胀……7
三焦咳……7
三焦秘……7
三焦病……7
三焦蒸……8
三痞……8
三痹……8
干呕……8
干胁痛……8
干咳……8
干咳嗽……8
干黄……8
干脚气……8
干喘……9
干嗽……9
干霍……9
干霍乱……9
土郁……9
土黄……9
下气……9
下血……10
下利……10
下利脓血……10
下利清谷……10
下体肿痛……10
下体痛……10
下沃赤白……10
下迫……10
下格……10
下消……10
下脱……10
下厥上竭证……10
下焦吐……10
下痞……11
大风恶疾……11
大孔痛……11
大头天行……11
大头风……11
大头伤寒……11
大头毒……11
大头痛……11
大头瘟……11
大肉陷下……11
大伤寒……11
大关节不利……11
大汗出……11
大肠手阳明经
　病证……12
大肠胀……12
大肠泄……12
大肠咳……12
大肠病……12
大肠蒸……12
大泻泄……12
大实心痛……12
大骨枯槁……12
大便不通……12
大便秘结……13
大便秘涩……13
大便难……13
大便燥结……14
大结胸……14
大衄……14
大病后虚汗……14
大偻……14
大脱血……14
大厥……14
大戟中毒……14
大雷头风……14
大腹水肿……14
大腹痛……14
大痹……15
大聚……15
大瘕泄……15
寸白虫病……15

〔丨〕

上气……15
上气鸣息……15

上半日咳……15
上格……16
上热下寒证……16
上热衄血……16
上消……16
上脱……16
上溃……16
上焦吐……16
上痞……16
口干……16
口不能言……17
口甘……17
口角流涎……17
口辛……17
口苦……17
口咸……17
口喎……17
口臭……17
口眼歪斜……18
口眼喎斜……18
口淡……18
口渴……18
口酸……18
口鼻出血……18
口噤……18
口糜……18
山瘴疟……18

〔丿〕

久心痛……18
久头痛……18
久疟……19
久泄……19
久泻……19
久咳……19
久咳嗽……19
久衄……19
久聋……19
久喘……20
久痢……20
久腰痛……20
久痰……20
久嗽……20
久癖……20

〔丶〕

亡血……20
亡阳……21
亡阳汗……21
亡阳症……21
亡阴……21

〔乛〕

尸注……21
尸疰……21
尸厥……21
尸蹶……21
女劳复……22
女劳疸……22
叉手自冒心……22
小中……22
小中风……22
小伤风……22
小伤寒……22
小肠气……22
小肠手太阳经病证……22
小肠胀……22
小肠泄……22
小肠咳……23
小肠病……23
小肠蒸……23
小便不利……23
小便不禁……23
小便不通……24
小便失禁……24
小便多……24
小便闭……24
小便赤涩……24
小便利多……24
小便余沥……24
小便涩痛……24
小便难……24
小便黄赤……24
小便浑浊……25
小便频数……25
小便数……25
小结胸……25
小雷头风……25
小腹结痛……25
小腹痛……25
小腹痛痞……25
小腹痛满……25
小腹满……26
小痹……26
飞尸……26
子母疟……26
马痫……26
马癫……26

四　画

〔一〕

天白蚁……26
天行……26
天行头痛……26
天行嗽……26
天柱骨倒……27
无汗……27
无阳证……27
木郁……27
木肾……27
木疝……27
五不女……27
五不男……27
五心烦热……27
五色黄……28
五色痢……28
五劳……28
五更头晕……28
五更泄……28
五更泄泻……29
五更泻……29
五更溏泄……29
五更嗽……29
五郁……29
五味过伤……29
五疝……29
五泄……29
五实……29
五逆……29
五绝……29
五鬲气……30
五积……30
五秘……30
五脏郁证……30
五脏胀……30
五脏疟……30
五脏衄……30
五脏遗精……30
五脏痫……30
五脏痹……30
五疸……30
五窍出血……30
五虚……31
五淋……31
五痫……31
五蒸……31
五痹……31
五痰……31
五嗽……31
五膈……31
五噎……32
五癫……32
支节烦疼……32
支饮……32

支咳……32
支嗽……32
支膈……32
太阳中风……32
太阳少阳并病……32
太阳头痛……33
太阳伤寒……33
太阳阳明合病……33
太阳少阳合病……33
太阳经证……33
太阳经病……34
太阳经脚气……34
太阳病……34
太阳痉……34
太阳厥……34
太阳腑证……34
太阳腑病……34
太阴头痛……35
太阴伏暑……35
太阴经病……35
太阴经脚气……35
太阴脏病……35
太阴病……35
太阴痉……35
太阴厥……35
犬癎……36
不伏水土肿……36
不伏水土痢……36
不更衣……36
不识人……36
不食……36
不能正偃……36
不能食……36
不得卧……36
不得前后……37
不得眠……37
不得偃卧……37
不痹……37
不嗜食……37
历节……37
历节风……37
牙关紧急……37
牙宣……38

〔丨〕

少气……38
少血……38
少阳头痛……38
少阳经脚气……38
少阳病……38
少阳痉……38
少阳厥……38
少阴四逆证……38
少阴头痛……39
少阴经脚气……39
少阴病……39
少阴痉……39
少阴厥……39
少腹拘急……39
少腹胀……39
少腹急结……39
少腹痛……39
少腹满……40
少精……40
少瞑……40
日轻夜重咳……40
日晡发热……40
中气……40
中风……40
中风闭证……40
中风绝证……41
中风恶证……41
中风脱证……41
中火……41
中水……41
中血脉……41
中经……41
中经络……41
中毒……41
中食……41
中络……41
中恶……41
中恶心痛……42
中恶霍乱……42
中热……42
中洒……42
中酒头痛……42
中消……42
中脏……42
中脘痛……42
中暑……42
中暑眩晕……43
中焦吐……43
中腑……43
中痞……43
中湿……43
中寒……43
中寒便血……43
中喝……43
中满……43
中溪……44
中酸……44
内风……44
内火喘逆……44
内伤三消……44
内伤小便不利……44
内伤不得卧……44
内伤牙衄……44
内伤中风证……44
内伤半身不遂……44
内伤头痛……45
内伤夹暑……45
内伤吐血……45
内伤吐酸水……45
内伤休息痢……45
内伤发斑……45
内伤呃逆……45
内伤呕吐……45
内伤胁痛……45
内伤泄泻……46
内伤肩背痛……46
内伤胃脘痛……46
内伤咳嗽……46
内伤结胸……46
内伤恶寒……46
内伤衄血……46
内伤黄疸……47
内伤喘逆……47
内伤遗尿……47
内伤短气……47
内伤腋痛……47
内伤痢疾……47
内伤湿痰……47
内伤蓄血……47
内伤腰痛……47
内伤腹胀……47
内伤嗽血……47
内伤噎隔……48
内伤燥痰……48
内证头痛……48
内郁……48
内实证……48
内热……48
内衄……48
内烦……49
内消……49
内黄……49
内蒸……49
见闻精出……49

〔丿〕

丹石中毒……49
午后嗽……49
牛肉积……49
牛黄……49
牛癎……49

牛癫……49
毛发焦……49
毛折……49
毛耸……49
毛窍血出……49
毛悴色夭……49
手太阳经筋病候……50
手太阴心痛……50
手太阴经筋病候……50
手心主心痛……50
手心主经筋病候……50
手心热……50
手少阳经筋病候……50
手少阴经筋病候……50
手气……50
手阳明经筋病候……50
手足不仁……50
手足心热……50
手足汗……50
手足逆冷……51
手足烦热……51
手足麻木……51
手足厥冷……51
手足厥逆……51
手足寒……51
手足缓弱……51
手足蠕曳……51
手肿痛……51
手指麻木……51
手背热……51
手热……52
手臂痛痹……52
气下……52
气上……52
气中……52
气心痛……52
气水……52
气水肿……52
气收……52
气血俱虚头痛……52
气闭……52
气劳……53
气极……53
气呃……53
气乱……53
气郁……53
气郁吐血……53
气郁胁痛……53
气郁怔忡……54
气郁眩晕……54
气郁脘痛……54
气奔……54
气呕……54
气肿……54
气胀……54
气疝……54
气注……54
气泻……54
气促……55
气食泄……55
气急喘……55
气逆……55
气逆失血……55
气结……55
气结腹胀……55
气结腹痛……55
气绝……55
气耗……56
气鬲病……56
气热不得卧……56
气晕……56
气积……56
气秘……56
气衰呕吐……56
气高……56
气病……56
气消……57
气涩嗽……57
气陷泄泻……57
气黄……57
气虚……57
气虚小便不利……57
气虚中满……57
气虚头痛……57
气虚耳鸣……58
气虚耳聋……58
气虚自汗……58
气虚劳复……58
气虚身热……58
气虚咳嗽……58
气虚热……58
气虚眩运……58
气虚眩晕……58
气虚淋……58
气虚厥……59
气虚喘……59
气虚喘逆……59
气虚短气……59
气虚痿……59
气虚痹……59
气虚痰……59
气虚腹痛……59
气脚……59
气淋……59
气散腹胀……60
气厥……60
气厥头痛……60
气喘……60
气痞……60
气痢……60
气痛……61
气滞腰痛……61
气滞腹痛……61
气缓……61
气鼓……61
气蒸……61
气腰痛……61
气痹……61
气痰……61
气嗽……61
气膈……62
气噎……62
气癃……62
气癫……62
气鳖……62
长虫病……62
仆击……62
爪枯……62
爪黄……62
反发热……62
反折……62
反胃……62
乏气……63
欠……63
风尸……63
风中血脉……63
风中府……63
风中藏……63
风气呕吐……63
风气腹痛……63
风不仁……63
风气霍乱……64
风心痛……64
风水……64
风水肿……64
风头眩……64
风头旋……64
风头痛……65
风血痹……65
风伤卫证……65

风伤卫疟……65
风劳……65
风冷痹……65
风郁……65
风肿……65
风疟……66
风疝……66
风泄……66
风注……66
风泻……66
风毒脚气……66
风咳……66
风痰……66
风家……66
风顽麻……66
风热头痛……67
风热耳聋……67
风热吐血……67
风热疟……67
风热眩运……67
风热感冒……67
风热腰痛……67
风热嗽……67
风眩……67
风晕……67
风秘……67
风疸……68
风痉……68
风痉……68
风消……68
风黄……68
风黄疸……68
风聋……68
风虚腰痛……68
风偏枯……68
风痒……69
风惊……69
风惊邪……69
风惊恐……69
风惊悸……69
风厥……69
风喘……69
风膨腿……69
风痫……69
风痼……69
风湿……70
风湿头痛……70
风湿热头痛……70
风湿腰痛……70
风湿腹胀……70
风湿痹……70
风湿痿软……70
风温……70
风温嗽……71
风寒外束喘……71
风寒头痛……71
风寒两伤荣卫证……71
风寒身肿……71
风寒胁痛……71
风寒咳嗽……71
风寒眩晕……72
风寒痉……72
风寒喘……72
风寒喘逆……72
风寒湿痹……72
风寒感冒……72
风寒腰痛……72
风寒嗽……72
风搐……72
风腰痛……72
风痱……73
风痹……73
风痞癥……73
风痰……73
风痰头痛……73
风痰哮……73
风痰眩晕……73
风痰痉……73
风痰嗽……73
风嗽……74
风瘙痒……74
风掣曳……74
风壅头痛……74
风癌……74
风癫……74
风懿……74
乌头类中毒……74
乌痧……74
乌痧胀……74
乌癫……75

〔丶〕

六极……75
六郁……75
六府胀……75
六泻……75
六经病……75
六经厥……75
六经渴……75
六畜痫……75
六腑腹胀……75
六聚……76
火中……76
火头痛……76
火邪头痛……76
火伤风……76
火冲眩晕……76
火呃……76
火郁……76
火郁胃脘痛……76
火郁喘……77
火郁嗽……77
火泄……77
火泻……77
火炎上喘……77
火炎肺胃喘……77
火胀……77
火热头痛……77
火病结核……77
火黄……77
火喘……78
火痰……78
火嗽……78
火馈……78
心下支结……78
心下否痛……78
心下坚筑……78
心下急……78
心下悸……78
心下痞……78
心下痞痛……79
心下痞硬……79
心下痞满……79
心下痛……79
心下满……79
心中风……79
心中寒证……79
心中懊恼……80
心中懊恢……80
心中憹憹大动……80
心手少阴经病证……80
心气虚不得卧……80
心风……80
心水……80
心主手厥阴经病证……80
心包络咳……80
心动悸……80
心虫病……81
心伤……81
心血虚不得卧……81
心汗……81
心劳……81
心忪……81

心郁……81
心胀……81
心疟……81
心疝……81
心风疝……81
心实证……81
心实热证……81
心经失血……82
心经咳嗽……82
心经热痰……82
心咳……82
心浊……82
心绝……82
心损……82
心热证……82
心热病……82
心热痿软……83
心积……83
心脏中风……83
心病……83
心疽……84
心烦……84
心烦嗜睡痫……84
心黄……84
心虚自汗……84
心虚证……84
心虚热证……84
心虚寒证……84
心悬痛……85
心悸……85
心悗……85
心惊……85
心遗……85
心跳心慌……85
心掣……85
心脾中暑证……85
心脾郁……85
心痨……85
心痫……85
心痛……86
心痛彻背……86
心痛痫……86
心愦愦……86
心痿……86
心痹……86
心蒸……86
心嘈……86
心瘥……86
心蹙……86

〔ㄱ〕

尺肤热……87
尺热……87
巴豆中毒……87
水……87
水中病……87
水气……87
水气喘促……87
水分……87
水谷利……87
水谷痢……87
水郁……87
水肿……88
水胀……88
水疝……88
水泄……88
水注……88
水泻……88
水毒病……89
水咻咳……89
水咳……89
水逆……89
水结胸……89
水哮……89
水积……89
水病……89
水恣……90
水恣泄……90
水黄……90
水蛊……90
水液浑浊……90
水喘……90
水鼓……90
水瘕……90
水癖……90
水痰……90

五　画

〔一〕

击仆……91
玉房蒸……91
正水……91
正头痛……91
正伤寒……91
正疟……91
正黄疸……91
去来心痛……91
左胁痛……91
左偏枯……92
左瘫右痪……92
右胁下痛……92
右胁痛……92
右枯……92
右痪……92
石水……92
石药中毒……93
石淋……93
石瘕……93
平旦热……93
打咯忒……93
扑蛾痫……93

〔丨〕

目下肿……93
目上视……93
目不瞑……93
目中不了了……93
目妄见……93
目直视……94
目转耳鸣……94
目眩……94
目龈……94
目黄……94
目晾晾……94
目窠上微肿……94
目瞑……94
叫伤咳嗽……94
四支别离……95
四支疼痛……95
四支解堕……95
四时伤寒……95
四时感冒……95
四饮……95
四肢不仁……95
四肢不用……95
四肢不收……95
四肢不举……95
四肢坚硬……95
四肢别离……95
四肢拘急……95
四肢肿……96
四肢实……96
四肢逆冷……96
四肢疼痛……96
四肢热……96
四肢倦怠……96
四肢麻木……96
四肢痠疼……97
四肢缓弱……97
四肢懈惰……97
四逆……97
出白……97
出黄如糜……97

〔丿〕

生金中毒……97

生注……97
生银中毒……97
矢气……97
失气……97
失心风……97
失血……97
失血心痛……98
失血发热……98
失血眩晕……98
失志……98
失音……98
失音嗽……98
失说物望……98
失溲……98
失溺……98
失精……98
失精家……99
白气翳……99
白水……99
白虫病……99
白血……99
白汗……99
白虎风……99
白虎历节风……99
白果中毒……99
白浊……99
白黄……99
白淫……99
白痢…… 100
白滞痢…… 100
白癌…… 100
瓜瓤瘟…… 100
外证头痛…… 100
外郁…… 100
外热…… 100
外寒失血…… 100
外感三消…… 101
外感小便不利… 101
外感不得卧…… 101
外感牙衄…… 101
外感中风症…… 101
外感中暑泻…… 101
外感中热泻…… 101
外感风泻…… 101
外感半身不遂… 101
外感头痛…… 101
外感吐血…… 101
外感吐酸水…… 102
外感休息痢…… 102
外感呃逆…… 102
外感呕吐…… 102
外感胁痛…… 102
外感肩背痛…… 102
外感泄泻…… 102
外感胃脘痛…… 102
外感咳嗽…… 102
外感结胸…… 103
外感恶寒…… 103
外感衄血…… 103
外感黄疸…… 103
外感遗尿 ……103
外感喘逆…… 103
外感短气…… 103
外感腋痛…… 103
外感痢疾…… 103
外感温病…… 104
外感湿泻…… 104
外感湿痰…… 104
外感寒邪泻…… 104
外感腰痛…… 104
外感腹胀…… 104
外感嗽血…… 104
外感噎隔…… 104
外感燥痰…… 104
冬月咳嗽…… 104
冬温…… 104
饥不能食…… 105
饥不欲食…… 105
饥伤…… 105
饥饱咳嗽…… 105
饥疝…… 105

〔丶〕

玄水…… 105
闪挫腰痛…… 105
半边头风…… 105
半身不随…… 105
半身不遂…… 105
半身不遂痧…… 106
半身汗…… 106
半身麻木…… 106
半表半里证…… 106
半表半里热不得卧…… 106
半肢风…… 107
半夏中毒…… 107
头风…… 107
头风眩运…… 107
头风眩晕…… 107
头风屑…… 107
头风旋…… 107
头目不清利…… 107
头皮痛…… 107
头汗…… 107
头运眼花…… 108
头冷…… 108
头胀…… 108
头项强痛…… 108
头响…… 108
头重…… 108
头眩…… 108
头眩偏痛痧…… 109
头晕…… 109
头脑鸣响…… 109
头疼…… 109
头偏痛…… 109
头旋…… 109
头旋眼花…… 109
头痛…… 109
头痛痧…… 109
头摇…… 109

〔一〕

皮毛焦…… 109
皮水…… 110
皮肤不仁…… 110
皮肤否肿…… 110
皮肤痛…… 110
皮热…… 110
皮蒸…… 110
皮痿…… 110
皮毛痿…… 110
皮痹…… 110
皮槁毛拔…… 110
发作无时疟…… 110
发热…… 110
发热恶寒…… 111
发斑伤寒…… 111
母疟…… 111

六　画

〔一〕

动暑…… 111
老人便结…… 111
老人腰痛…… 112
老疟…… 112
老淋…… 112
老痰…… 112
耳妄闻…… 112
耳鸣…… 112
耳衄…… 112
耳聋…… 113
再经…… 113
厌黄…… 113
百合病…… 113
死血胁痛…… 113

夹竹桃中毒…… 113
夹血伤寒…… 114
夹阴中寒…… 114
夹阴伤寒…… 114
夹食伤寒…… 114
夹脑风…… 114
夹痰伤寒…… 114
过经…… 114
邪嗽…… 115
邪喘…… 115
协热下利…… 115
协热自利…… 115
协热利…… 115
协寒利…… 115

〔丨〕

当脐痛…… 115
早泄…… 115
早起眩晕…… 115
早晨嗽…… 115
吐…… 115
吐血…… 115
吐利…… 116
吐泻发斑…… 116
吐屎…… 116
吐蚘…… 116
吐臭水…… 116
吐脓血…… 116
吐涎沫…… 116
吐绿水…… 117
吐黑水…… 117
吐清水…… 117
吐蛔…… 117
吐痞…… 117
吐酸…… 117
吐嗽…… 117
虫心痛…… 117
虫吐…… 117
虫胀…… 117
虫积…… 118
虫积胀…… 118
虫积腹胀…… 118
虫积腹痛…… 118
虫病…… 118
虫症痢…… 118
虫痛…… 118
虫渴…… 118
虫瘕…… 118
虫鼓…… 119
吊脚痧…… 119
吃忒…… 119
吃逆…… 119
刚痉…… 119
刚痓…… 119
肉虫病…… 119
肉行…… 119
肉极…… 119
肉苛…… 119
肉枯…… 119
肉烁…… 119
肉绝…… 120
肉积…… 120
肉疸…… 120
肉脱…… 120
肉淋…… 120
肉瞤筋惕…… 120
肉蒸…… 120
肉痿…… 120
肉痹…… 120
肉瘕…… 120

〔丿〕

先血后便…… 120
先便后血…… 120
舌肿…… 121
舌卷…… 121
舌卷囊缩…… 121
舌衄…… 121
舌疸…… 121
舌萎…… 121
舌麻…… 121
舌强…… 121
舌痹…… 122
舌缩…… 122
牝疟…… 122
传尸…… 122
传尸劳…… 122
传中…… 122
传经…… 122
传症痨咳…… 123
伏气…… 123
伏气温病…… 123
伏虫病…… 123
伏连…… 123
伏饮…… 123
伏热…… 123
伏梁…… 123
伏暑…… 124
伏暑伤寒…… 124
伏暑晚发…… 124
伏痰…… 124
伏瘕…… 124
休息痢…… 124
任脉病…… 125
仲冬痹…… 125
仲春痹…… 125
仲秋痹…… 125
仲夏痹…… 125
伤力嗽…… 125
伤风…… 125
伤风头痛…… 125
伤风咳…… 125
伤风咳嗽…… 125
伤风眩晕…… 126
伤风腰痛…… 126
伤生冷果菜…… 126
伤肉…… 126
伤饮…… 126
伤谷…… 126
伤茶…… 126
伤面…… 126
伤胃…… 126
伤胃吐血…… 126
伤食…… 126
伤食头痛…… 127
伤食发热…… 127
伤食泻…… 127
伤食恶寒…… 127
伤食腹痛…… 127
伤损喘逆…… 127
伤热咳嗽…… 127
伤酒…… 127
伤酒头痛…… 128
伤酒吐血…… 128
伤酒泄泻…… 128
伤酒恶寒…… 128
伤鱼鳖…… 128
伤蛋…… 128
伤暑…… 128
伤暑头痛…… 128
伤暑咳嗽…… 128
伤暑腹痛…… 129
伤暑霍乱…… 129
伤湿头运…… 129
伤湿自汗…… 129
伤湿咳…… 129
伤湿咳嗽…… 129
伤湿腹痛…… 129
伤寒…… 129
伤寒亡阳…… 130
伤寒亡阴…… 130
伤寒头痛…… 130
伤寒耳聋…… 130
伤寒阴证…… 130
伤寒发黄…… 130

伤寒夹食…… 130
伤寒里证…… 130
伤寒表证…… 131
伤寒咳…… 131
伤寒咳嗽…… 131
伤寒喘…… 131
伤寒蓄水证…… 131
伤寒蓄血证…… 131
伤寒腹胀…… 132
伤寒嗽…… 132
伤寒潮热…… 132
伤寒霍乱…… 132
伤燥咳嗽…… 132
伤蠹…… 132
自汗…… 132
自缢死…… 132
血心痛…… 133
血汗…… 133
血极…… 133
血郁…… 133
血呕…… 133
血肿…… 133
血胀…… 134
血疟…… 134
血疝…… 134
血沫痧…… 134
血泄…… 134
血枯…… 134
血便…… 134
血逆…… 134
血结胸…… 134
血热不得卧…… 134
血热盗汗…… 135
血积…… 135
血秘…… 135
血虾…… 135
血黄…… 135
血虚心汗…… 135
血虚心悸…… 135
血虚头痛…… 135
血虚发热…… 135
血虚发痉…… 136
血虚发躁…… 136
血虚耳鸣…… 136
血虚自汗…… 136
血虚咳嗽…… 136
血虚热…… 136
血虚眩运…… 136
血虚眩晕…… 136
血虚秘…… 136
血虚盗汗…… 136
血虚厥…… 136
血虚腰痛…… 136
血虚腹痛…… 137
血虚痿…… 137
血虚痹…… 137
血虚痰…… 137
血蛊…… 137
血脱…… 137
血淋…… 137
血厥…… 137
血痢…… 138
血滞腹痛…… 138
血渴…… 138
血溃…… 138
血鼓…… 139
血蒸…… 139
血痹…… 139
血瘀腰痛…… 139
血瘀痿…… 139
血溢…… 139
血嗽…… 139
血膈…… 139
血瘕…… 139
血噎膈…… 139
血箭…… 139
血壅…… 140
血鼓腹胀…… 140
血鳖…… 140
血癥…… 140
似中风…… 140
似疟…… 140
似喘…… 140
后不利…… 141
后血…… 141
后沃沫…… 141
后泄…… 141
后重…… 141
行黄…… 141
行痹…… 141
杀血心痛…… 141
合病…… 141
众痹…… 141
肌肉不仁…… 141
肌肉如铁…… 142
肌肉消瘦…… 142
肌肉蠕动…… 142
肌极…… 142
肌肤不仁…… 142
肌肤甲错…… 142
肌热…… 142
肌衄…… 142
肌痹…… 142
杂积…… 143
杂痢…… 143
犯黄…… 143
多汗…… 143
多忘…… 143
多卧…… 143
多眠…… 143
多喜…… 143
多寐…… 143
色复…… 144
色厥…… 144
色厥动血…… 144

〔丶〕

妄言…… 144
妄语…… 144
交阳…… 144
交肠…… 144
交感脱精…… 144
闭…… 144
闭暑…… 144
闭癃…… 144
羊毛痧…… 144
羊筋痧…… 145
羊癇…… 145
羊踯躅中毒…… 145
羊癫…… 145
羊癫风…… 145
关格…… 145
米瘕…… 146
米癥…… 146
壮热…… 146
冲气…… 146
冲气犯心…… 146
冲气犯肝…… 146
冲气犯肾…… 146
冲气犯肺…… 146
冲头痛…… 146
冲疝…… 146
冲脉病…… 146
灯笼病…… 147
汗血…… 147
汗出如油…… 147
汗证…… 147
污血胁痛…… 147
江东脚气…… 147

〔一〕

寻常渴…… 147
阳水…… 147
阳旦证…… 147

阳汗…… 147
阳证…… 147
阳证发斑…… 148
阳证似阴…… 148
阳证咳逆…… 148
阳明三急下证… 148
阳明头痛…… 148
阳明经证…… 148
阳明经病…… 148
阳明经脚气…… 148
阳明病…… 149
阳明病外证…… 149
阳明痉…… 149
阳明厥…… 149
阳明腑证…… 149
阳明腑病…… 149
阳明蓄血…… 149
阳明瘅疟…… 149
阳易…… 150
阳物细小…… 150
阳疟…… 150
阳结…… 150
阳痉…… 150
阳消…… 150
阳浮发热…… 151
阳黄…… 151
阳盛阴虚失血… 151
阳虚小便不利… 151
阳虚失血…… 151
阳虚头痛…… 151
阳虚发热…… 151
阳虚自汗…… 151
阳虚证…… 151
阳虚恶寒…… 152
阳虚眩晕…… 152
阳虚喘…… 152
阳痿…… 152
阳维脉病…… 152
阳斑…… 152
阳厥…… 152
阳暑…… 153
阳痫…… 153
阳痧…… 153
阳强…… 153
阳跷脉病…… 153
阳痿…… 153
阳缩不伸…… 154
阳躁…… 154
阳癫…… 154
阴火怔忡…… 154
阴火痛风…… 154
阴火痰…… 154
阴水…… 154
阴汗…… 154
阴阳交…… 154
阴阳易…… 155
阴冷…… 155
阴证…… 155
阴证头痛…… 155
阴证发斑…… 155
阴证似阳…… 155
阴证伤寒…… 155
阴证咳逆…… 155
阴纵…… 155
阴茎易举…… 156
阴易…… 156
阴狐疝气…… 156
阴疟…… 156
阴疝…… 156
阴挺…… 156
阴结…… 156
阴俳…… 157
阴疽…… 157
阴痉…… 157
阴消…… 157
阴黄…… 157
阴盛格阳汗…… 157
阴虚小便不利… 157
阴虚头痛…… 157
阴虚发疟…… 157
阴虚发热…… 157
阴虚呕吐…… 158
阴虚挟痰喘…… 158
阴虚吐血…… 158
阴虚劳复…… 158
阴虚证…… 158
阴虚胃脘痛…… 158
阴虚眩晕…… 158
阴虚盗汗…… 159
阴虚喘…… 159
阴虚喘逆…… 159
阴虚痢疾…… 159
阴虚痿…… 159
阴痉…… 159
阴维脉病…… 159
阴斑…… 159
阴厥…… 159
阴暑…… 160
阴痫…… 160
阴痧…… 160
阴湿鼓胀…… 160
阴寒…… 160
阴寒小便不利… 161
阴跷脉病…… 161
阴痿…… 161
阴痹…… 161
阴瘅…… 161
阴缩…… 161
阴癫…… 161
阴躁…… 161
阴癫…… 162
阴囊汗…… 162
收引…… 162
奸黄…… 162
如疟…… 162
红汗…… 162
红痧…… 192

七 画

〔一〕

远血…… 162
远痹…… 163
运气小便不利… 163
运气胁痛…… 163
运气喘…… 163
走马黄…… 163
走阳…… 163
走注…… 163
走哺…… 163
走精黄…… 163
坏伤寒…… 163
坏病…… 164
赤水…… 164
赤白浊…… 164
赤白痢…… 164
赤虫病…… 164
赤沃…… 164
赤脉攒…… 164
赤浊…… 164
赤斑…… 165
赤痢…… 165
志伤…… 165
声哑嗽…… 165
声嘶嗽…… 165
芫花中毒…… 165
花癫…… 165
劳…… 165
劳风…… 165
劳风咳…… 165
劳心吐血…… 165
劳发…… 165
劳伤吐血…… 165
劳伤鼻衄…… 166
劳汗…… 166
劳极…… 166
劳役痢…… 166

劳疟…… 166
劳怯…… 166
劳注…… 166
劳咳…… 166
劳复…… 166
劳神咳嗽…… 167
劳损…… 167
劳热…… 167
劳倦恶寒…… 167
劳黄…… 167
劳聋…… 167
劳淋…… 167
劳痢…… 167
劳蒸…… 168
劳碌气虚喘…… 168
劳嗽…… 168
劳噎…… 168
劳瘵…… 168
杏仁中毒…… 168
杨梅瘟…… 168
两丸冷…… 168
两手撮空…… 169
两外肾冷…… 169
两胁下痛…… 169
两胁里急…… 169
两胁刺痛…… 169
两胁肿痛…… 169
两胁痛…… 169
两肫疼痛…… 169
两脚麻木…… 169
两感伤寒…… 169
否…… 169
否格…… 170
折伤吐血…… 170
折脊…… 170
折腰…… 170
折髀…… 170

〔丨〕

呕…… 170
呕汁…… 170
呕吐…… 170
呕吐苦水…… 170
呕血…… 170
呕青蓝水…… 171
呕苦…… 171
呕苦水…… 171
呕胆…… 171
呕逆…… 171
呕家…… 171
呕脓…… 171
呕清水…… 171
呕酸…… 171
呃逆…… 171
呃逆痧…… 171
时气…… 171
时气发斑…… 171
时气咳嗽…… 171
时行…… 172
时行伤寒…… 172
时行疫病…… 172
时行寒疫…… 172
时行感冒…… 172
时行嗽…… 172
时毒…… 172
时疫…… 172
时疫发斑…… 172
呆病…… 173
足下热…… 173
足不收…… 173
足太阳疟…… 173
足太阳经筋病候…… 173
足太阴心痛…… 173
足太阴疟…… 173
足太阴经筋病候…… 173
足少阳疟…… 173
足少阳经筋病候…… 173
足少阴心痛…… 174
足少阴疟…… 174
足少阴经筋病候…… 174
足心痛…… 174
足阳明疟…… 174
足阳明经筋病候…… 174
足软…… 174
足胫肿…… 174
足胫肿痛…… 174
足胫跗肿…… 174
足胫痛…… 174
足跗肿…… 174
足厥阴疟…… 174
足厥阴心痛…… 175
足厥阴经筋病候…… 175
足寒…… 175
足跟痛…… 175
足痹…… 175
里水…… 175
里证…… 175
里实证…… 175
里急后重…… 175
里热不得卧…… 176
里热证…… 176
里虚证…… 176
里寒证…… 176

〔丿〕

利…… 176
吞酸…… 176
牡疟…… 176
体厥…… 176
佝欲痫…… 176
身体不仁…… 177
身灼热…… 177
身肿…… 177
身面卒浮肿…… 177
身重…… 177
身重痹…… 177
身热…… 177
身热不扬…… 177
身痒…… 177
近血…… 177
余热不得卧…… 178
肝中风…… 178
肝中热证…… 178
肝中寒证…… 178
肝气…… 178
肝气胁痛…… 178
肝气实…… 178
肝气逆证…… 178
肝气盛…… 178
肝风…… 179
肝风疝…… 179
肝火五更泄泻…… 179
肝火不得卧…… 179
肝火耳聋…… 179
肝火胁痛…… 179
肝火眩晕…… 179
肝火腹胀…… 179
肝心痛…… 179
肝水…… 179
肝虫病…… 180
肝伤…… 180
肝阳头痛…… 180
肝阳眩晕…… 180
肝劳…… 180
肝足厥阴经病证…… 180
肝郁…… 180
肝郁胁痛…… 180

肝郁黄疸…… 180
肝肾虚肿…… 181
肝肾虚胀…… 181
肝胀…… 181
肝疟…… 181
肝泄…… 181
肝实证…… 181
肝实热证…… 181
肝经风痰…… 181
肝经失血…… 182
肝经咳嗽…… 182
肝咳…… 182
肝胃气痛…… 182
肝胆郁…… 182
肝逆头痛…… 182
肝绝…… 182
肝损…… 182
肝热自汗…… 182
肝热证…… 182
肝热病…… 182
肝热淋症…… 183
肝热痿软…… 183
肝积…… 183
肝脏中风…… 183
肝病…… 183
肝疸…… 183
肝著…… 184
肝黄…… 184
肝虚汗…… 184
肝虚证…… 184
肝虚胁痛…… 184
肝虚热证…… 184
肝虚寒证…… 184
肝厥…… 185
肝遗…… 185
肝痨…… 185
肝癌…… 185
肝蒸…… 185
肝痿…… 185
肝痹…… 185
肛门痒痛…… 185
肛头痒痛…… 185
肚胀…… 185
肚瘧…… 185
肘热…… 185
肘挛…… 185
肠风…… 186
肠风下血…… 186
肠红…… 186
肠鸣…… 186
肠泻…… 186
肠垢…… 186
肠痈腹痛…… 186
肠蛊痢…… 187
肠覃…… 187
肠癌…… 187
肠痨…… 187
肠澼…… 187
肠澼下血…… 187
肠癫…… 187
角弓反张…… 187
角弓痧…… 187
狂…… 187
狂汗…… 188
狂越…… 188
卵胀…… 188
卵缩…… 188
饭醉…… 188
饮…… 188
饮气嗽…… 188
饮心痛…… 188
饮后即便…… 189
饮泻…… 189
饮食中毒…… 189
饮食内伤痢…… 189
饮食汗…… 189
饮家…… 189
饮酒中毒…… 189
饮酒发热…… 189
饮癌…… 189
饮痰…… 189
饮瘧…… 189
饮癖…… 189
悒逆…… 190

〔丶〕

忧气…… 190
忧伤…… 190
忧郁…… 190
忧膈…… 190
忧噎…… 190
忪悸…… 190
间日子母…… 190
间日疟…… 190
闷痧…… 190
闷瞀…… 190
冷气…… 190
冷气心痛…… 191
冷风嗽…… 191
冷心痛…… 191
冷水嗽…… 191
冷汗…… 191
冷劳…… 191
冷呃…… 191
冷泄…… 191
冷泻…… 191
冷热痢…… 191
冷热嗽…… 192
冷哮…… 192
冷疝…… 192
冷涎呕吐…… 192
冷涎泛…… 192
冷淋…… 192
冷厥…… 192
冷喘…… 192
冷痢…… 193
冷癗…… 193
冷痧…… 193
冷温…… 193
冷痹…… 193
冷痰…… 193
冷嗽…… 193
冷瘴…… 193
冻死…… 193
沥血腰痛…… 194
沙石淋…… 194
沙证…… 194
沙虱毒…… 194
沙虱…… 194
沉厥…… 194
谷劳病…… 194
谷胀…… 194
谷疸…… 194
谷道痒…… 194
谷瘕…… 194

〔一〕

尾骶骨痛…… 194
尿血…… 195
尿床…… 195
尿精…… 195
张口抬肩…… 195
鸡黄…… 195
鸡癗…… 195
鸡癫…… 195
纵…… 195
纵酒泄泻…… 195
纽痛…… 196

八　画

〔一〕

表里同病…… 196
表里传…… 196
表里俱实证…… 196
表里俱热证…… 196
表里俱虚证…… 196
表里俱寒证…… 196

表证…… 196
表实里虚证…… 196
表实证…… 196
表热不得卧…… 197
表热里寒证…… 197
表热证…… 197
表虚里实证…… 197
表虚证…… 197
表寒里热证…… 197
表寒证…… 197
青水…… 197
青筋…… 197
青筋牵…… 197
青瘕…… 197
直中三阴…… 198
直肠…… 198
直肠泄…… 198
直肠泻…… 198
直肠结…… 198
直肠痢…… 198
直腹泄…… 198
茎纵…… 198
茎缩…… 198
卧不安…… 198
刺风…… 198
郁火恶寒…… 198
郁火积滞呕吐… 199
郁证…… 199
郁冒…… 199
郁咳…… 199
郁热失血…… 199
郁热头痛…… 199
郁热衄血…… 200
郁厥…… 200
郁痰…… 200
郁嗽…… 200
奔气…… 200
奔豚…… 200
奔豚气…… 200
奇恒痢…… 200
顶巅痛…… 200
转矢气…… 200
转注…… 201
转胞…… 201
转症…… 201
转胖…… 201
转筋…… 201
转筋霍乱…… 201
软脚瘟…… 201
软痹…… 201
软懒症…… 201
抽筋痧…… 201
抽搐…… 202
拘…… 202
拘苛…… 202
拘急…… 202
拘挛…… 202
拂郁痰…… 202
拂拂发热…… 202

〔丨〕

非风…… 202
齿间血出…… 202
齿衄…… 202
肾中寒证…… 203
肾气实…… 203
肾气盛…… 203
肾气腰痛…… 203
肾风…… 203
肾风疝…… 203
肾心痛…… 203
肾水…… 203
肾伤…… 203
肾劳…… 204
肾足少阴经病证…… 204
肾郁…… 204
肾中风…… 204
肾胀…… 204
肾疟…… 204
肾疝…… 204
肾泄…… 204
肾泻…… 204
肾实证…… 205
肾实热证…… 205
肾经失血…… 205
肾经疟…… 205
肾经咳嗽…… 205
肾经寒痰…… 205
肾经腰痛…… 205
肾咳…… 205
肾浊…… 205
肾绝…… 206
肾损…… 206
肾热证…… 206
肾热病…… 206
肾热痿软…… 206
肾哮…… 206
肾积…… 206
肾脏中风…… 206
肾脏风…… 206
肾病…… 206
肾疽…… 207
肾鹜…… 207
肾黄…… 207
肾虚五更泄泻… 207
肾虚头痛…… 207
肾虚耳鸣…… 207
肾虚耳聋…… 207
肾虚自汗…… 208
肾虚证…… 208
肾虚泄…… 208
肾虚热证…… 208
肾虚眩晕…… 208
肾虚胸胁痛…… 208
肾虚寒证…… 208
肾虚腰痛…… 208
肾着…… 209
肾厥头痛…… 209
肾遗…… 209
肾喘…… 209
肾痨…… 209
肾痫…… 209
肾蒸…… 209
肾痿…… 209
肾痹…… 209
肾满漏疾…… 210
味痰…… 210
呵欠…… 210
呷咳…… 210
呷嗽…… 210
呴嗽…… 210
果木渴…… 210
果中毒…… 210
果菜积…… 210
固泄…… 210
固瘕…… 210
岭南脚气…… 210

〔丿〕

刮肠…… 210
季冬痹…… 210
季胁痛…… 211
季春痹…… 211
季秋痹…… 211
季夏痹…… 211
併病…… 211
金石中毒…… 211
金劳黄…… 211
金郁…… 211
往来寒热…… 211
往来寒热疟…… 212
肤胀…… 212
肤瞤…… 212
肤蒸…… 212
肢节肿痛…… 212

肢节烦疼…… 212
肢节痛…… 212
肢肿…… 213
肢痹…… 213
肿腮…… 213
胀…… 213
胀病…… 213
股不收…… 213
肺中风…… 213
肺中寒证…… 213
肺气实…… 213
肺气盛…… 213
肺手太阴经病证…… 213
肺风…… 214
肺风疝…… 214
肺风疮…… 214
肺火恶寒…… 214
肺心痛…… 214
肺水…… 214
肺邪胁痛…… 214
肺虫病…… 214
肺伤…… 214
肺劳…… 214
肺极…… 215
肺饮…… 215
肺郁…… 215
肺鸣…… 215
肺胀…… 215
肺胀嗽…… 215
肺疟…… 215
肺疝…… 215
肺实证…… 215
肺实咳嗽…… 215
肺实热证…… 216
肺实嗽…… 216
肺经咳嗽…… 216
肺经燥痰…… 216
肺经失血…… 216
肺咳…… 216
肺绝…… 216
肺损…… 216
肺损咯血…… 216
肺热久嗽…… 216
肺热身肿…… 217
肺热证…… 217
肺热病…… 217
肺热腹胀…… 217
肺热痿…… 217
肺热痿软…… 217
肺热瘴疟…… 217
肺热鼻衄…… 217
肺积…… 217
肺脏中风…… 217
肺病…… 218
肺疸…… 218
肺疽…… 218
肺痈…… 218
肺痈喘…… 219
肺痈嗽…… 219
肺消…… 219
肺黄…… 219
肺萎…… 219
肺虚自汗…… 219
肺虚身肿…… 219
肺虚证…… 219
肺虚热证…… 219
肺虚寒证…… 220
肺虚腹胀…… 220
肺虚嗽…… 220
肺遗…… 220
肺喘咳…… 220
肺脾郁…… 220
肺痨…… 220
肺瘤…… 220
肺痛…… 220
肺雍…… 220
肺蒸…… 220
肺痿…… 220
肺痿喘…… 221
肺痿嗽…… 221
肺痹…… 221
肺燥作泻…… 221
肺燥咳嗽…… 221
肥气…… 221
胁下支满…… 221
胁下偏痛…… 221
胁下痞鞕…… 222
胁下痛…… 222
胁下满…… 222
胁支痛…… 222
胁支满…… 222
胁肋胀痛…… 222
胁痛…… 222
胁痛里急…… 222
胁痛应嗽…… 223
胁满…… 223
周痹…… 223
昏运…… 223
昏迷…… 223
昏晕…… 223
卑慄…… 223
鱼脑痈…… 223
鱼腥哮…… 223
鱼瘕…… 223
鱼鳖蟹积…… 224
狐疝风…… 224
狐疝…… 224
狐惑…… 224
狐蜮…… 224
狐瘕…… 224
狗肉积…… 224
狗癫…… 225
忽作喘…… 225
悗逆…… 225
夜不安…… 225
夜症…… 225
夜热…… 225
卒上气…… 225
卒口僻…… 225
卒中…… 225
卒中风…… 225
卒中急风…… 225
卒心痛…… 225
卒耳聋…… 225
卒忤…… 226
卒疝…… 226
卒病…… 226
卒聋…… 226
卒淋…… 226
卒喘…… 226
卒腰痛…… 226
卒魇死…… 226
疟…… 226
疟母…… 226
疟后黄…… 226
疟劳…… 227
疟积…… 227
疟疾…… 227
疟黄…… 227
疟脱…… 227
疟瘕…… 227
疟寒疾…… 227
疝…… 227
疝瘕…… 228
疙瘩瘟…… 228
盲肠气…… 228
郑声…… 228
单鼓…… 228
单腹胀…… 228
沫痰…… 228
泄…… 228
泄风…… 228
泄如蟹渤…… 228

〔 、 〕

泄利……229
泄注……229
泄注赤白……229
泄泻……229
泄脓血……229
泄痢……229
泄满……229
河豚中毒……229
油汗……229
注……229
注下……229
注下赤白……229
注心痛……229
注车注船……229
注泄……230
注夏……230
泻……230
泻痢……230
泻疮……230
宗筋弛纵……230
宗筋纵……230
实火眩晕……230
实邪短气……230
实证……230
实呕……230
实肿……231
实胀……231
实热……231
实热证……231
实热结胸……231
实热衄血……231
实哮……231
实秘……231
实挛……232
实喘……232
实痞……232
实痰……232
实痰眩晕……232
肩上热……232
肩不举……232
肩后痛……232
肩垂背曲……232
肩项痛……232
肩背痛……233
肩前痛……233
肩息……233
肩息咳……233
肩痛……233
房黄……233
房劳胁痛……233
房劳咳嗽……233
房劳复……233
房劳蓄血……234
怔忡……234
怵惕……234
怫热……234
阔……234

〔一〕

孟冬痹……234
孟春痹……234
孟秋痹……234
孟夏痹……234

九 画

〔一〕

春月咳嗽……234
春温……234
毒注……235
毒痢……235
项软……235
项背强……235
项背强几几……235
项脊强……235
项痛……235
项强……235
贲肫……236
贲豚……236
贲豚气……236
茧唇……236
带脉病……236
茶积……236
茶癖……236
药物中毒……236
药后喘……237
药烦……237
枯……237
砒霜中毒……237
砂淋……237
面无血色……237
面目浮肿……237
面目虚浮……238
面尘……238
面色苍黑……238
面色萎黄……238
面色黧黑……238
面如漆柴……238
面肿……238
面热……238
面浮……239
面垢……239
面附庞然壅……239
面脱……239
面焦……239
面痛……239
面寒……239
面瘦……239
轻粉中毒……239
指甲脱落……239
挥霍撩乱……240
鸦黄……240

〔丨〕

背曲肩随……240
背伛偻……240
背恶寒……240
背脊骨痛……240
背胭筋痛……240
背偻……240
背痛……240
背腧诸经心痛…241
战汗……241
战慄……241
哑风……241
哑嗽……241
咽干口燥……241
咽痛……241
哕……242
咯血……242
咬牙……242
咳……242
咳血……242
咳逆……243
咳逆上气……243
咳逆嗽……243
咳脓血……243
咳家……243
咳喘……243
咳唾脓血……243
咳嗽……243
冒风……243
冒心……243
冒眩……244
冒暑……244
冒暑眩晕……244
冒寒……244
胃不和卧不安…244
胃气不足……244
胃气虚喘……244
胃气痛……244
胃反……244
胃风……244
胃火……245
胃火呕吐……245
胃心痛……245
胃虫病……245

胃阴虚…… 245
胃足阳明经病
证…… 245
胃胀…… 245
胃疟…… 245
胃泄…… 246
胃泻…… 246
胃实…… 246
胃实秘…… 246
胃实腹胀…… 246
胃经失血…… 246
胃咳…… 246
胃络不和喘…… 246
胃热呕吐…… 246
胃热渴…… 246
胃病…… 246
胃疸…… 247
胃消…… 247
胃家实…… 247
胃黄…… 247
胃虚…… 247
胃虚汗…… 247
胃虚秘…… 247
胃虚喘…… 247
胃脘痛…… 247
胃喘…… 248
胃寒呕吐…… 248
胃蒸…… 248
胃痹…… 248
思伤…… 248
思郁…… 248
思膈…… 248
思噎…… 248
思风…… 248
骨节烦疼…… 248
骨节疼烦…… 248
骨极…… 248
骨枯髓减…… 248
骨绝…… 249
骨厥…… 249
骨痛…… 249
骨痿…… 249
骨蒸…… 249
骨蒸劳…… 249
骨痿…… 249
骨痹…… 249
骨癫疾…… 249
幽门不通…… 249

〔丿〕

秋月咳嗽…… 250
秋后晚发…… 250
秋时晚发…… 250
秋暑…… 250
秋温…… 250
秋燥…… 250
咸哮咳…… 250
重暍…… 250
便血…… 251
便肠垢…… 251
便浊…… 251
便秘…… 251
便脓血…… 251
便痈…… 251
徇蒙招尤…… 251
鬼击…… 252
鬼疟…… 252
鬼痓…… 252
鬼黄…… 252
鬼排…… 252
鬼魇…… 252
鬼箭…… 252
鬼箭风…… 252
鬼箭打…… 252
钩吻中毒…… 252
食马肉中毒…… 252
食中…… 252
食牛肉中毒…… 253
食气霍乱…… 253
食六畜肉中毒… 253
食心痛…… 253
食已即吐…… 253
食夹痰嗽…… 253
食伤…… 253
食后昏困…… 253
食亦…… 253
食劳复…… 254
食劳疸黄…… 254
食劳黄…… 254
食郁…… 254
食郁头痛…… 254
食郁肉中毒…… 254
食呕…… 254
食胀…… 254
食饱咳…… 254
食疟…… 254
食泄…… 255
食注…… 255
食饰…… 255
食泻…… 255
食咸哮嗽…… 255
食咳…… 255
食复…… 255
食哮…… 255
食积…… 255
食积五更泄泻… 255
食积呕吐…… 255
食积泄…… 256
食积泄泻…… 256
食积胁痛…… 256
食积泻…… 256
食积咳嗽…… 256
食积喘逆…… 256
食积痿…… 256
食积腰痛…… 256
食积腹胀…… 256
食积腹痛…… 256
食积痰嗽…… 256
食积嗽…… 257
食瘕…… 257
食臭…… 257
食诸肉中毒…… 257
食诸鱼中毒…… 257
食猪肉中毒…… 257
食厥…… 257
食喘…… 257
食瘤…… 258
食滞中满…… 258
食滞脘痛…… 258
食减…… 258
食痰…… 258
食膈…… 258
食痹…… 258
食瘕…… 258
食噎…… 258
食噎膈…… 258
食蕈菌中毒…… 258
食鲩鲊鱼中毒… 258
食蟹中毒…… 259
食癥…… 259
胠胁肋痛…… 259
胠胁痛…… 259
胪胀…… 259
胆气不足…… 259
胆风毒气…… 259
胆火…… 259
胆火不得卧…… 259
胆足少阳经病
证…… 259
胆郁…… 259
胆胀…… 260
胆怯…… 260
胆实多卧…… 260
胆咳…… 260
胆热多睡…… 260
胆热呕吐症…… 260

胆病…… 260
胆黄…… 260
胆虚…… 261
胆虚不得眠…… 261
胆蒸…… 261
胆瘅…… 261
胆衡…… 261
胕肿…… 261
胕疝…… 261
胞转…… 261
胞疸…… 261
胞蒸…… 261
胞痹…… 261
脉极…… 261
脉绝…… 262
脉厥…… 262
脉蒸…… 262
脉痿…… 262
脉痹…… 262
脉溢…… 262
脉癫疾…… 262
胫肿…… 262
急中风…… 262
急风…… 262
急劳…… 262
急病…… 262
急黄…… 262

〔丶〕

疫…… 263
疫疠…… 263
疫疟…… 263
疫毒痢…… 263
疫疹…… 263
疫痢…… 264
疫疠…… 264
疮闭咳嗽…… 264
恍惚…… 264
类中…… 264
类中风…… 264
类中暑…… 264
类伤寒…… 264
类消…… 264
前后血…… 264
前闭…… 264
首风…… 265
首如裹…… 265
逆气…… 265
洪肿…… 265
浊…… 265
洞…… 265
洞肠泄…… 265
洞泄…… 265
洞泻…… 266
浑身麻木…… 266
客忤…… 266
谵妄…… 266
谵语…… 266
语言蹇吃…… 266
语言蹇涩…… 266
神不守舍…… 266
神志不定…… 266
神昏…… 267
鸠酒毒…… 267

〔一〕

昼热…… 267
眉眶痛…… 267
眉棱骨痛…… 267
除中…… 267
怒…… 267
怒气…… 267
怒气肋痛…… 267
怒气咳…… 267
怒伤…… 267
怒郁…… 267
怒喘…… 268
怒膈…… 268
蚤啾…… 268
怠堕…… 268
柔风…… 268
柔汗…… 268
柔痉…… 268
柔痓…… 268
柔痰…… 268
结阳…… 268
结阴…… 268
结阴便血…… 268
结胸…… 269
结筋…… 269
结痰…… 269
结瘕…… 269
绝汗…… 269
绞肠瘟…… 269
绞肠痧…… 269

十　画

〔一〕

顽淋不痛症…… 270
顽痰…… 270
顽痹…… 270
恚气…… 270
恚膈…… 270
盐哮…… 270
盐卤中毒…… 270
恐…… 270
恐伤…… 270
恐郁…… 270
恐膈…… 271
恶中…… 271
恶风…… 271
恶心…… 271
恶血…… 271
恶食…… 272
恶热…… 272
恶疰…… 272
恶疰心痛…… 272
恶寒…… 272
真元耗损喘…… 273
真中…… 273
真中风…… 273
真心跳…… 273
真心痛…… 273
真头痛…… 273
真阴内损失血… 273
真实假虚证…… 274
真热假寒证…… 274
真眩运…… 274
真虚假实证…… 274
真寒假热证…… 274
真喘…… 275
莨菪中毒…… 275
桐油中毒…… 275
桃花斑…… 275
格气…… 275
格阳衄血…… 275
格阳虚火失血… 275
格食…… 275
核瘟…… 276
索泽…… 276
索粉积…… 276
鬲…… 276
鬲中热…… 276
鬲气…… 276
鬲消…… 276
鬲偏枯…… 276
鬲痈…… 276
唇口瞤动…… 276
唇口燥裂…… 276
唇反…… 276
唇甲青…… 276
唇青…… 276
唇萎…… 276
唇焦…… 277
唇缩…… 277
夏月咳嗽…… 277

夏月霍乱…… 277
夏秋霍乱…… 277
夏痿…… 277
破胭脱肉…… 277
振寒…… 277
振慄…… 277
损…… 278
损伤咳…… 278
损嗽…… 278
热中…… 278
热气…… 278
热气霍乱…… 278
热心痛…… 278
热水肿…… 278
热在皮肤…… 278
热在骨髓…… 278
热伤风…… 279
热伤风咳嗽…… 279
热汗…… 279
热劳…… 279
热呃…… 279
热证…… 279
热郁…… 279
热呕…… 279
热胀…… 279
热疟…… 280
热疝…… 280
热泄…… 280
热泻…… 280
热实结胸…… 280
热毒…… 280
热毒下血…… 280
热毒风…… 280
热毒痢…… 280
热甚发痉…… 280
热结小便不利… 281
热结胸…… 281
热结旁流…… 281
热结腹痛…… 281
热结膀胱腹胀… 281
热哮…… 281
热晕…… 281
热积…… 281
热秘…… 281
热拿…… 282
热病…… 282
热病劳复…… 282
热淋…… 282
热厥…… 282
热厥头痛…… 282
热厥心痛…… 282
热喘…… 283
热痢…… 283
热痧…… 283
热痿…… 283
热痹…… 283
热痰…… 283
热痰嗽…… 283
热嗽…… 284
热膈…… 284
热霍乱…… 284
热瘴…… 284
顿呛…… 284
顿泻…… 284
顿嗽…… 284

〔丨〕

鸬鹚瘟…… 285
紧唇…… 285
紧病…… 285
紧痧…… 285
哮…… 285
哮吼…… 285
哮证…… 285
哮喘…… 285
眩…… 286
眩仆…… 286
眩运…… 286
眩冒…… 286
眩晕…… 286
眩掉…… 286
晕厥…… 286
晕痧…… 286
鸣溏…… 286
蚘心痛…… 287
蚘动脘痛…… 287
蚘虫病…… 287
蚘咬心痛…… 287
蚘厥…… 287
贼风…… 287

〔丿〕

积…… 287
积心痛…… 288
积年肺气…… 288
积年腰痛…… 288
积块…… 288
积饮…… 288
积冷胃脘痛…… 288
积泻…… 288
积结泻…… 288
积热三消…… 288
积热咳嗽…… 288
积热泄泻…… 288
积热胃脘痛…… 289
积热便血…… 289
积痢…… 289
积滞泄泻…… 289
积寒泄泻…… 289
积瘀泄…… 289
积聚…… 289
健忘…… 289
臭毒头痛…… 290
息贲…… 290
息积…… 290
息高…… 290
息粗…… 290
射工病…… 290
铁痧…… 291
脊背强…… 291
脊痛…… 291
脊强…… 291
胸中热…… 291
胸中烦热…… 291
胸中痞硬…… 291
胸汗…… 292
胸胁苦满…… 292
胸胁痛…… 292
胸胁满…… 292
胸痞…… 292
胸痛…… 292
胸痹…… 293
胸满…… 293
脏毒…… 293
脏毒下血…… 294
脏结…… 294
脏寒腹胀…… 294
脐下悸…… 294
脐下痛…… 294
脐中出血…… 294
脐中痛…… 294
脑风…… 294
脑鸣…… 294
脑逆头痛…… 295
脑衄…… 295
脑黄…… 295
脑痛…… 295
脑蒸…… 295
脑漏…… 295
脓血痢…… 295
脂瘕…… 295
衄…… 295
衄血…… 295
衄鳅…… 296
狼疝…… 296
狼毒中毒…… 296

留饮…… 296
留饮咳…… 296
留痹…… 296

〔丶〕

挛…… 296
挛节…… 296
挛急…… 296
高消…… 296
离魂症…… 297
疳利…… 297
疳蟹…… 297
疳蠹…… 297
病后多汗…… 297
病后多眠…… 297
疟疾…… 297
疹…… 297
疹筋…… 298
痫挛…… 298
症…… 298
症夏…… 298
痃…… 298
痃气…… 298
痃癖…… 298
痰劳咳嗽…… 299
痉…… 299
凉注…… 299
凉燥…… 299
疬疹…… 299
酒风…… 299
酒胀…… 299
酒泄…… 299
酒注…… 299
酒食齄…… 300
酒哮…… 300
酒积…… 300
酒积五更泄泻… 300
酒积泄…… 300
酒积泻…… 300
酒积便血…… 300
酒积腹痛…… 300
酒疸…… 300
酒黄…… 300
酒黄疸…… 300
酒厥…… 300
酒渴…… 301
酒湿泄…… 301
酒痢…… 301
酒禁…… 301
酒痰…… 301
酒嗽…… 301
酒痕…… 301
酒臌…… 301
酒癖…… 301
酒齄…… 302
酒鼾鼻…… 302
消…… 302
消中…… 302
消心…… 302
消谷…… 302
消谷善饥…… 302
消肾…… 302
消脾…… 302
消渴…… 302
消瘅…… 302
浮肿…… 302
浮痹…… 303
流火流痰疹…… 303
流饮…… 303
浪子瘟…… 303
涌水…… 303
涎积…… 303
烦…… 303
烦心…… 303
烦乱…… 303
烦冤…… 303
烦热…… 304
烦悗…… 304
烦恹…… 304
烦冤嗽…… 304
烦满…… 304
烦躁…… 304
窍泄…… 305
诸菌中毒…… 305
诸腑心痛…… 305

〔ㄱ〕

弱虫病…… 305
通身肿…… 305

十 一 画

〔一〕

黄水…… 305
黄肉随…… 305
黄汗…… 305
黄汗身肿…… 305
黄昏嗽…… 306
黄胖…… 306
黄病…… 306
黄疸…… 306
黄疸二十八候… 306
黄家…… 306
黄瘕…… 307
萎黄…… 307
梦失精…… 307
梦泄…… 307
梦泄精…… 307
梦洩…… 307
梦遗…… 307
梦魇…… 307
梅核气…… 307
梅核膈…… 307
雪上一枝蒿中毒…… 307
掉眩…… 307
捻头瘟…… 307
捻衣摸床…… 307

〔丨〕

虚中…… 307
虚中风…… 308
虚火咳嗽…… 308
虚火眩晕…… 308
虚阳上浮眩晕… 308
虚劳…… 308
虚劳失血…… 308
虚劳失精…… 308
虚劳发热…… 308
虚劳吐血…… 308
虚劳自汗…… 309
虚劳盗汗…… 309
虚劳腰痛…… 309
虚呃…… 309
虚坐努责…… 309
虚冷上气喘…… 309
虚冷腹痛…… 310
虚证…… 310
虚呕…… 310
虚肿…… 310
虚胀…… 310
虚疟…… 310
虚疝…… 311
虚泄…… 311
虚泻…… 311
虚实错杂证… 311
虚损…… 311
虚损怔忡…… 311
虚热…… 311
虚热证…… 312
虚热渴…… 312
虚哮…… 312
虚晕…… 312
虚秘…… 312
虚挛…… 312
虚烦…… 312
虚烦不得卧… 313

虚烦不得眠…… 313
虚黄…… 313
虚聋…… 313
虚脱呃…… 313
虚痉…… 313
虚淋…… 313
虚斑…… 313
虚喘…… 314
虚痨…… 314
虚痞…… 314
虚痫…… 314
虚癃…… 314
虚滑痢…… 314
虚寒证…… 314
虚痰…… 314
虚痰眩晕…… 315
虚嗽…… 315
虚瘕…… 315
晨运…… 315
晨泄…… 315
晨晕…… 315
悬心…… 315
悬水…… 315
悬饮…… 315
悬癖…… 315
圊血…… 315
圊脓血…… 315
野葛中毒…… 315
曼陀罗中毒…… 315
眼眶骨痛…… 316
晚发…… 316
蛊…… 316
蛊下血…… 316
蛊风…… 316
蛊胀…… 316
蛊注…… 316
蛊注毒痢…… 316
蛊注痢…… 316
蛊毒病…… 317
蛊痉痢…… 317
蛊痢…… 317
蚰蜒黄…… 317
蛇蛊…… 317
蛇瘕…… 317
趺蹶…… 317
啮舌…… 317
唾血…… 317
唾脓血…… 318
腕…… 318

〔丿〕

铜中毒…… 318
铜痧…… 318
银杏中毒…… 318
停饮心痛…… 318
停饮胁痛…… 318
停饮眩晕…… 318
偏风…… 318
偏头风…… 318
偏头痛…… 318
偏沮…… 319
偏枯…… 319
偏身青筋痧…… 319
偏身肿胀痧…… 319
偏渗小便不利… 319
偻附…… 319
盘疝…… 319
盘肠痧…… 319
盘脐痧…… 319
脚下痛…… 320
脚气…… 320
脚气入腹…… 320
脚气伤寒…… 320
脚气冲心…… 320
脚气迫肺…… 320
脚气肿满…… 320
脚心痛…… 320
脚汗…… 320
脚板红…… 320
脚软…… 320
脚肿…… 321
脚弱…… 321
脚跟痛…… 321
脚膝痿弱…… 321
脬转…… 321
脬痹…… 321
脱…… 321
脱力黄…… 321
脱气…… 321
脱血…… 321
脱汗…… 321
脱阳痧…… 321
脱肛…… 322
脱泻…… 322
脱营…… 322
脱营失精…… 322
猪黄…… 322
猪癃…… 322
猪癫…… 322
猝中…… 322
猝痧…… 322

〔丶〕

麻木…… 322
麻痹…… 323
痦瘴…… 323
痃…… 323
痰疟…… 323
商陆中毒…… 323
情志三郁…… 323
悸…… 323
悸心痛…… 324
惊…… 324
惊伤…… 324
惊伤胁痛…… 324
惊狂…… 324
惊郁…… 324
惊怖…… 324
惊骇…… 324
惊衄…… 324
惊黄…… 324
惊悸…… 325
惊癇…… 325
惊痰…… 325
惊躁…… 325
凑肺…… 325
断泄…… 325
断肠草中毒…… 325
断绝…… 325
盗汗…… 325
清血…… 326
清便自调…… 326
清脓血…… 326
清晨嗽…… 326
清厥…… 326
淋…… 326
淋闭…… 326
淋沥…… 326
淋闭…… 326
淋浊…… 326
淋秘…… 326
淋家…… 327
淋溲…… 327
淡饮…… 327
深痹…… 327
宿食…… 327
宿食不消…… 327
宿哮…… 327
宿滞…… 327
着痹…… 327
密嘿…… 327

〔一〕

蛋积…… 327
颈肿…… 327
颈项强急…… 327

颈项强痛…… 327
颈脉动…… 328
颈痛…… 328

十 二 画

〔一〕

越经传…… 328
斑…… 328
斑疹…… 329
斑痧…… 329
喜…… 329
喜气…… 329
喜伤…… 329
喜忘…… 329
喜怒…… 329
喜笑不休…… 329
喜梦…… 329
喜惊…… 329
喜悲…… 329
喜膈…… 329
落弓痧…… 329
朝食暮吐…… 330
酣饮…… 330
酢心…… 330
惑…… 330
硫黄中毒…… 330
厥心痛…… 330
厥头痛…… 330
厥阴头痛…… 331
厥阴经脚气…… 331
厥阴咳…… 331
厥阴病…… 331
厥阴痉…… 331
厥阴厥…… 331
厥证…… 331
厥疟…… 332
厥疝…… 332
厥逆…… 332
厥逆头痛…… 332
厥热胜复证…… 332
厥晕…… 332
厥深热深…… 332
雄黄中毒…… 332
殗殜…… 332
搅肠痧…… 332

〔丨〕

悲…… 333
悲伤…… 333
悲郁…… 333
紫云斑…… 333
紫斑…… 333
紫疱痧…… 333
龂齿…… 333
掌中热…… 333
掌中寒…… 333
睭瘛…… 333
暑中…… 333
暑中阳邪…… 333
暑中阴邪…… 333
暑气呕吐…… 333
暑风…… 334
暑劳…… 334
暑疟…… 334
暑泄…… 334
暑泻…… 334
暑毒失血…… 335
暑迷…… 335
暑病…… 335
暑秽…… 335
暑淋…… 335
暑厥…… 335
暑喘…… 335
暑痫…… 335
暑痫…… 336
暑痧…… 336
暑湿眩晕…… 336
暑湿喘逆…… 336
暑湿腹痛…… 336
暑湿痹…… 336
暑温…… 336
暑渴…… 336
暑痿…… 336
暑痰…… 336
暑嗽…… 337
暑瘵…… 337
暑霍乱…… 337
喘…… 337
喘证…… 337
喘呼…… 338
喘鸣…… 338
喘促…… 338
喘息…… 338
喘胀…… 338
喘逆…… 338
喘家…… 338
喘粗…… 338
喘喝…… 338
喘痰…… 338
喘满…… 338
喉吟…… 339
喑俳…… 339
喝呷咳嗽…… 339
跌扑胁痛…… 339
跌蹶…… 339
跗肿…… 339
遗失…… 339
遗泄…… 339
遗沥…… 339
遗尿…… 339
遗毒…… 339
遗洩…… 339
遗热…… 339
遗溺…… 339
遗精…… 340
蛲虫病…… 340
蛲虫痫…… 340
蛲瘕…… 340
蛔虫病…… 340
蛔结痧…… 341
蛔厥…… 341
蛟蛸…… 341
黑水…… 341
黑骨温…… 341
黑疸…… 341
黑黄…… 341
黑斑…… 341
黑痧…… 341
骭厥…… 341

〔丿〕

擘节…… 341
短气…… 342
短气不足以息… 342
短气嗽…… 342
犊黄…… 342
蚵…… 342
遁尸…… 342
循衣摸床…… 342
循经传…… 342
翕翕发热…… 342
筋极…… 343
筋疝…… 343
筋枯…… 343
筋骨疼痛痧…… 343
筋脉拘急…… 343
筋急…… 343
筋结…… 343
筋绝…… 343
筋挛…… 343
筋惕肉瞤…… 344
筋痛…… 344
筋缓…… 344
筋蒸…… 344
筋瘘…… 344
筋痹…… 344

筋缩…… 344
筋瘛…… 345
筋燥…… 345
筋癫疾…… 345
番沙…… 345
腼血…… 345
脾中风…… 345
脾中寒证…… 345
脾气实…… 345
脾气盛…… 345
脾风…… 345
脾风疝…… 345
脾心痛…… 345
脾水…… 346
脾虫病…… 346
脾伤…… 346
脾约…… 346
脾劳…… 346
脾足太阴经病证…… 346
脾郁…… 346
脾肾泄…… 346
脾肾泻…… 347
脾胀…… 347
脾疟…… 347
脾泄…… 347
脾泻…… 347
脾实证…… 347
脾实热证…… 347
脾实腹胀…… 347
脾经失血…… 347
脾经咳嗽…… 348
脾经湿痰…… 348
脾咳…… 348
脾胃郁…… 348
脾浊…… 348
脾结气陷泄泻… 348
脾绝…… 348
脾损…… 348
脾热身肿…… 348
脾热证…… 348
脾热病…… 349
脾热痿软…… 349
脾积…… 349
脾脏中风…… 349
脾病…… 349
脾疸…… 350
脾消…… 350
脾黄…… 350
脾虚生风…… 350
脾虚自汗…… 350
脾虚身肿…… 350
脾虚证…… 350
脾虚呕吐证…… 350
脾虚泄泻…… 350
脾虚热证…… 350
脾虚秘…… 351
脾虚寒证…… 351
脾虚腹胀…… 351
脾遗…… 351
脾痨…… 351
脾痛…… 351
脾痫…… 351
脾蒸…… 351
脾痿…… 351
脾痹…… 351
脾瘅…… 351
腋汗…… 352
腋痛…… 352
腋漏…… 352
猴退风…… 352
飧泄…… 352
飧泻…… 352
馋…… 352
〔丶〕
痨虫病…… 352
痨瘵…… 353
痨瘵咳嗽…… 353
痞…… 353
痞气…… 353
痞块…… 353
痞饮…… 354
痞胀…… 354
痞积…… 354
痞满…… 354
痈…… 354
痈中…… 354
痈肾…… 354
痈渴…… 354
痈心…… 354
痢…… 354
痢风…… 354
痢后风…… 354
痢后痿…… 355
痢疾…… 355
瘸…… 355
瘸黄…… 355
瘀…… 355
瘀气…… 356
瘀块…… 356
瘀胀…… 356
瘀胀腹痛…… 356
瘀烦瘀睡…… 356
瘀秽…… 356
瘀筋…… 356
瘀痢…… 356
痛风…… 357
痛风身肿…… 357
痛风肿…… 357
痛痹…… 357
游气…… 357
游疟…… 357
善饥…… 357
善忘…… 357
善怒…… 357
善恐…… 358
善眠…… 358
善惊…… 358
善悲…… 358
善酸…… 358
滞下…… 358
湿中…… 358
湿气呕吐…… 358
湿气霍乱…… 358
湿火三消…… 358
湿冷腰痛…… 358
湿郁…… 358
湿肿…… 359
湿疟…… 359
湿疝…… 359
湿泻…… 359
湿毒下血…… 359
湿毒脚气…… 359
湿咳…… 359
湿热头痛…… 360
湿热发黄…… 360
湿热身肿…… 360
湿热呕吐…… 360
湿热便血…… 360
湿热眩晕…… 360
湿热痉…… 360
湿热脚气…… 360
湿热痢…… 361
湿热腰痛…… 361
湿热腹胀…… 361
湿热腹痛…… 361
湿热痿…… 361
湿晕…… 361
湿秘…… 361
湿疸…… 361
湿家…… 361
湿黄…… 362
湿脚气…… 362

湿厥头痛…… 362
湿喘…… 362
湿痫…… 362
湿温…… 362
湿腰痛…… 362
湿痹…… 363
湿痰…… 363
湿痰发热…… 363
湿痰眩晕…… 363
湿痰脚气…… 363
湿痰腰痛…… 363
湿痰痿…… 363
湿痰嗽…… 363
湿嗽…… 363
湿蜃…… 363
湿霍乱…… 364
湿癣血箭…… 364
湿癫…… 364
温…… 364
温疟…… 364
温疠…… 364
温毒…… 364
温毒发斑…… 364
温疫…… 365
温疫发斑…… 365
温热病…… 365
温病…… 365
温病劳复…… 365
温淫…… 365
温燥…… 365
渴…… 366
渴利…… 366
滑泄…… 366
滑泻…… 366
滑痫…… 366
滑痰…… 366
滑精…… 366
溲血…… 367
寒中…… 367
寒气…… 367
寒气呕吐…… 367
寒气腹痛…… 367
寒气霍乱…… 367
寒包热咳嗽…… 367
寒包热哮…… 367
寒包热喘…… 367
寒伤荣证…… 367
寒呃…… 368
寒冷腹痛…… 368
寒证…… 368
寒证发狂…… 368
寒郁…… 368
寒呕…… 368
寒胀…… 368
寒疟…… 368
寒疝…… 368
寒泄…… 369
寒注…… 369
寒泻…… 369
寒实证…… 369
寒实结胸…… 369
寒毒下利…… 369
寒战…… 369
寒咳…… 369
寒疫…… 369
寒结…… 370
寒结胸…… 370
寒热往来…… 370
寒热错杂证…… 370
寒积…… 370
寒积五更泄泻… 370
寒积痫…… 370
寒积腹痛…… 370
寒秘…… 370
寒挛…… 370
寒淋…… 370
寒厥…… 370
寒厥心痛…… 371
寒喘…… 371
寒痫…… 371
寒痧…… 371
寒湿水肿…… 371
寒湿头痛…… 371
寒湿发黄…… 371
寒湿眩晕…… 371
寒湿脚气…… 372
寒湿痫…… 372
寒湿腰痛…… 372
寒湿腹胀…… 372
寒湿霍乱…… 372
寒温…… 372
寒暄…… 372
寒腰痛…… 373
寒痹…… 373
寒痰…… 373
寒慄…… 373
寒嗽…… 373
寒膈…… 373
寒霍乱…… 373
寒瘴…… 373
寒癖…… 373
遍体麻木…… 374
遍身肿…… 374
禄食泻…… 374

〔一〕

强上…… 374
强中…… 374
强阳不倒…… 374
强直…… 374
隔…… 374
隔食…… 374
缠丝痧…… 374
缓风…… 374

十 三 画

〔一〕

鼓胀…… 374
蓄血发黄…… 375
蓄血证…… 375
蓄血腹胀…… 375
蓄热吐血…… 375
蒸病…… 375
蒸蒸发热…… 376
禁口痢…… 376
飧泄…… 376
雷头风…… 376
感冒…… 376
感冒胁痛…… 376
感冒头痛…… 376
感暑眩晕…… 376
感湿嗽…… 376
感寒腹痛…… 376
碍气嗽…… 376
摇头…… 377
搐搦…… 377
摊缓…… 377
摊缓风…… 377

〔丨〕

督脉病…… 377
蒙昧…… 377
睛不和…… 377
暗风…… 377
暗痧…… 377
嗜卧…… 377
嗌干…… 378
嗌痛…… 378
嗳气…… 378
嗳腐…… 378
蜈蚣中毒…… 378
蜣螂蛊…… 378

〔丿〕

稠痰…… 378
愁气…… 378

鼠疫…… 378
鼠疸…… 379
微风…… 379
微热…… 379
腠理热…… 379
腧郁…… 379
腧菀…… 379
腰以下肿…… 379
腰以上肿…… 379
腰尻痛…… 379
腰足痛…… 379
腰软…… 379
腰股痛…… 380
腰背痛…… 380
腰重…… 380
腰热…… 380
腰胯疼痛…… 380
腰脊痛…… 380
腰脊强…… 380
腰疼…… 380
腰脚冷痹…… 380
腰脚痛…… 380
腰胫痛…… 380
腰腿痛…… 380
腰痛…… 380
腰痛痞…… 381
腰痠…… 381
腰膝注痛…… 381
膨腿…… 381
膨腿风…… 381
脑痛…… 381
腹上麻痹…… 381
腹中干痛…… 381
腹中如铁石…… 381
腹中疠痛…… 381
腹中窄狭…… 381
腹中绞痛…… 382
腹中痛…… 382
腹中雷鸣…… 382
腹中满痛…… 382
腹皮急…… 382
腹皮绷急…… 382
腹皮痛…… 382
腹冷痛…… 382
腹胀…… 382
腹痛…… 383
腹满…… 383
腿痛…… 383
触恶…… 383
解㑊…… 383

〔丶〕

痲…… 384
痱…… 384
瘤冷证…… 384
瘤病…… 384
瘤疾…… 384
瘤疫…… 384
痴呆…… 384
痿…… 384
痿阳不振…… 384
痿易…… 384
痿咳…… 384
痿黄…… 385
痿厥…… 385
痿躄…… 385
痹…… 385
痹气…… 385
瘀血头痛…… 385
瘀血发热…… 385
瘀血发黄…… 386
瘀血闭结…… 386
瘀血胃脘痛…… 386
瘀血咳…… 386
瘀血咳嗽…… 386
瘀血短气…… 386
瘀血腰痛…… 386
瘀血腹痛…… 386
瘀血嗽…… 387
瘀呃…… 387
瘴…… 387
瘴疟…… 387
瘴热…… 387
痰中…… 387
痰火头痛…… 387
痰火耳鸣…… 387
痰火耳聋…… 387
痰火证…… 388
痰火怔忡…… 388
痰火眩晕…… 388
痰火痉…… 388
痰血…… 388
痰呃…… 388
痰饮…… 388
痰饮呕吐…… 388
痰饮胁痛…… 388
痰饮胃脘痛…… 388
痰饮咳嗽…… 389
痰饮恶寒…… 389
痰饮眩晕…… 389
痰饮喘逆…… 389
痰饮腹胀…… 389
痰饮霍乱…… 389
痰证…… 389
痰证发热…… 389
痰证自汗…… 390
痰郁…… 390
痰郁心悸…… 390
痰呕…… 390
痰胀…… 390
痰疟…… 390
痰注腰痛…… 390
痰泄…… 390
痰泻…… 390
痰实疟…… 390
痰话…… 390
痰甚喘…… 390
痰咳…… 391
痰涎血…… 391
痰涎症…… 391
痰结…… 391
痰结实…… 391
痰哮…… 391
痰哮嗽…… 391
痰晕…… 391
痰积…… 391
痰积发热…… 392
痰积泄泻…… 392
痰积脘痛…… 392
痰积腹痛…… 392
痰积嗽…… 392
痰秘…… 392
痰疾癫狂…… 392
痰淋…… 392
痰厥…… 392
痰厥头痛…… 392
痰喘…… 393
痰痞…… 393
痰痈…… 393
痰滞蓄血…… 393
痰湿头痛…… 393
痰瘀嗽…… 393
痰嗽…… 393
痰膈…… 393
痰馈…… 393
痰噎膈…… 393
痰燥…… 394
痰癖…… 394
痰躁…… 394
痰咳…… 394
新痰…… 394
新感温病…… 394
数欠…… 394
煎厥…… 394
煤气中毒…… 394
溪毒…… 395

溪病…… 395
溪温…… 395
溏泄…… 395
溢饮…… 395
溢饮滑泄…… 395
溺白…… 395
溺死…… 395
溺血…… 395
溺后漏精…… 395
溺赤…… 395
溺浊…… 395
满痧…… 395
寝汗…… 395

〔ㄱ〕

臀腰…… 395

十 四 画

〔一〕

齧舌…… 396
聚…… 396
聚咳…… 396

〔丨〕

嘈…… 396
嘈杂…… 396
嘈杂嗳气…… 396
嗽…… 396
嗽血…… 396
蜘蛛胀…… 397
蜘蛛蛊…… 397
蜴蜥蛊…… 397

〔丿〕

鼻大衄…… 397
鼻孔煽张…… 397
鼻汗…… 397
鼻如烟煤…… 397
鼻衄…… 397
鼻流浊涕…… 397
鼻流清涕…… 397
鼻掀胸挺…… 397
鼻渊…… 398
鼻痛…… 398
鼻塞…… 398
鼻鼽…… 398
鼻齆…… 398
魄汗…… 398
膜外气…… 398
膜胀…… 398
膈…… 398
膈中…… 398
膈内拒痛…… 399
膈气…… 399
膈虫病…… 399
膈洞…… 399
膈消…… 399
膈痛…… 399
膈痰…… 399
膈噎…… 399
膀胱中暍证…… 399
膀胱气…… 399
膀胱足太阳经
病证…… 399
膀胱胀…… 399
膀胱呕吐症…… 400
膀胱咳…… 400
膀胱病…… 400
膀胱蒸…… 400
膀胱痹…… 400
慒杂…… 400
慒症…… 400

〔丶〕

膏疸…… 400
膏淋…… 400
膏肓病…… 400
瘈…… 401
瘈疭…… 401
瘤疟…… 401
瘟疫…… 401
瘟黄…… 401
瘟痧…… 401
癀疝…… 401
瘋疰…… 401
瘙…… 401
瘖俳…… 401
瘖痱…… 401
瘕…… 401
瘕泻…… 402
精少…… 402
精伤…… 402
精极…… 402
精时自下…… 402
精冷…… 402
精浊…… 402
精热…… 402
精虚三消…… 402
精虚痰…… 402
精清…… 402
精滑…… 403
精寒…… 403
精薄…… 403
精髓枯淋症…… 403
慢痧…… 403
漆中毒…… 403
漉汗…… 403
漩多…… 403
漩浊…… 403
漏气…… 403
漏风…… 403
漏汗…… 403
漏底伤寒…… 403
漏泄…… 404
漏食泄…… 404
漏腋…… 404
漏精…… 404

〔ㄱ〕

瞀闷…… 404
瞀昧…… 404
瞀热…… 404
鹜泄…… 404
鹜溏…… 404
缩筋…… 404
缩脚痧…… 404

十 五 画

〔一〕

漐漐汗出…… 404
醋心…… 404
醋抢喉嗽…… 404
醋哮…… 405
醋呛哮…… 405
醋咽…… 405
醉头风…… 405
撮空…… 405
撮空理线…… 405
髮瘕…… 405
髮癥…… 405

〔丨〕

暴疟…… 405
暴泄…… 405
暴注…… 405
暴注下迫…… 405
暴泻…… 406
暴热…… 406
暴病…… 406
暴聋…… 406
暴淋…… 406
暴厥…… 406
暴感咳嗽…… 406
暴痹…… 406
暴嗽…… 406
暴瘖…… 406

暴蹙…… 406
暴癥…… 407
噎…… 407
噎塞…… 407
噎膈…… 407
瞑眩…… 407
蝦蟆蛊…… 407
蝦蟆黄…… 407
蝦蟆瘟…… 407
踝厥…… 408

〔丿〕

箭风…… 408
箭风痛…… 408
膝痛…… 408

〔丶〕

瘛…… 408
瘛病…… 408
瘛疭…… 408
瘨…… 408
瘾黄…… 408
瘰痹…… 409
瘤病…… 409
瘫痪…… 409
瘫痪风…… 409
瘫缓风…… 409
瘚…… 409
糍糕积…… 409
懊侬…… 409
憕忡…… 409
潮热…… 409
额上黑…… 409
额汗…… 410
谵言…… 410
谵妄…… 410
谵语…… 410

十 六 画

〔一〕

槃气…… 410
薄厥…… 410
霍乱…… 410
霍乱转筋…… 411
霍乱痧…… 411
霍乱烦渴…… 411

〔丨〕

噤口痢…… 411
噤口痧…… 411
噤黄…… 412
噫…… 412
噫气…… 412
噫醋…… 412
餐泄…… 412

〔丿〕

鼽衄…… 412
膨脝…… 412

〔丶〕

䘌…… 412
瘴气…… 412
瘴疟…… 412
瘴毒脚气…… 413
癃…… 413
癃闭…… 413
癃閟…… 413
瘵…… 413
壅疾…… 413
壅嗽…… 413
糖哮…… 413

十 七 画

〔一〕

戴阳…… 413
戴眼…… 414
藏结…… 414
藏厥…… 414

〔丨〕

嚏…… 414

〔丿〕

黏汗…… 414
鼾嗽…… 414
朦昧…… 414

〔丶〕

燥火三消…… 414
燥火身肿…… 414
燥火呕吐…… 415
燥火眩晕…… 415
燥火喘逆…… 415
燥火痢…… 415
燥火腹痛…… 415
燥矢…… 415
燥屎…… 415
燥热咳嗽…… 415
燥热痢…… 415
燥热痿…… 415
燥凉…… 415
燥痰…… 415
燥嗽…… 416
燥瘕…… 416
濡泄…… 416
濡泻…… 416

〔乛〕

臂热…… 416
臂厥…… 416
臂痛…… 416
臂痹…… 417

十 八 画

〔一〕

藜芦中毒…… 417

〔丨〕

蹠跛…… 417

〔丿〕

翻胃…… 417

〔丶〕

瀋唇…… 417
癞…… 417
癞疝…… 417
癖…… 417
癖气…… 418
癖饮…… 418
癖结…… 418
癖积…… 418
癖黄…… 418

十 九 画

〔丨〕

巅顶痛…… 418
巅疾…… 418
嚥酸…… 418

〔丿〕

齁喘…… 418
齁嗽…… 419
齁鮯…… 419

〔丶〕

颤振…… 419
癡呆…… 419
瘪螺痧…… 419
鳖瘕…… 419
鳖癥…… 419

二 十 画

〔一〕

麵积…… 420

〔丨〕

躁…… 420
躁烦…… 420

〔丶〕

癥…… 420
癥疝…… 420
癥瘕…… 420
灌汗…… 421
瀼泄…… 421
瀼泻…… 421

二十一画

〔丿〕

螬嗽…… 421

〔丶〕

癫…… 421
癫狂…… 421
癫眩…… 422
癫蛊…… 422
癫痫…… 422

二十二画

〔一〕

囊缩…… 422
鬓髮早白…… 422

〔丨〕

髓疽…… 422
髓黄…… 422
髓蒸…… 422

二十三画

〔一〕

魇…… 423
颧赤…… 423

一　画

〔一〕

一身悉肿　即全身水肿。因水湿潴留于皮肤经络所致。多见于风水，有虚实之分。《金匮要略·水气病脉证并治》："风水恶风，一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热，越婢汤主之。"此法宣散水湿，兼清胃郁热，湿重加白术；恶风加附子。若见脉浮身重，汗出恶风，用防己黄芪汤固表利水，腹痛加芍药。参见风水条。

二　画

〔一〕

二十三蒸　古病名。古代二十三种蒸病的总称。《诸病源候论·虚劳骨蒸候》"二十三蒸：一、胞蒸，小便黄赤；二、玉房蒸，男则遗沥漏精，女则月候不调；三、脑蒸，头眩闷热；四、髓蒸，髓沸热；五、骨蒸，齿黑；六、筋蒸，甲焦；七、血蒸，发焦；八、脉蒸，脉不调；九、肝蒸，眼黑；十、心蒸，唇焦；十一、脾蒸，舌干；十二、肺蒸，鼻干；十三、肾蒸，两耳焦；十四、膀胱蒸，右耳偏焦；十五、胆蒸，眼白失色；十六、胃蒸，舌下痛；十七、小肠蒸，下唇焦；十八、大肠蒸，鼻右孔干痛；十九、三焦蒸，亦杂病，乍寒乍热；二十、肉蒸；二十一、肤蒸；二十二、皮蒸；二十三、气蒸，遍身热。凡诸蒸患，多因热病患愈后，食牛羊肉及肥腻或酒或房触犯而成此疾。"参见蒸病条。

二阳并病　病名。指太阳证未解而阳明证已见。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："二阳并病，太阳初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明，续自微汗出，不恶寒。若太阳病证不罢者，不可下，下之为逆，如此可小发汗。"又《辨阳明病脉证并治篇》："二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足漐漐汗出，大便难而谵语者，下之则愈，宜大承气汤。"《伤寒全生集·伤寒合并病论》："太阳阳明并病一证，若并未尽，仲景所谓太阳证不罢，面色赤，阳气怫郁在表，不得发越，烦躁短气是也。是传未尽，尚有表证，法当汗之，麻黄桂枝各半汤。若并之已尽，是为传过，仲景所谓太阳证罢，潮热，手足汗出，大便硬而谵语，法当下之，以承气汤。"《景岳全书·伤寒典》："如太阳先病，发热头痛而后见目痛鼻干不眠等证者，此太阳并于阳明也。"《医宗金鉴·伤寒心法要诀》："二阳谓太阳阳明并病也。汗不彻谓邪在太阳，发汗未彻，又传阳明也。面赤谓邪犹怫郁于太阳阳明之表，未并阳明之府。宜大青龙汤解两经之热也。"《伤寒溯源集·并病证治第十六》："二阳，太阳阳明也。并病者，谓太阳虽受邪，虽已传入阳明，而太阳仍未罢，两经俱病也。……两经之邪，有偏盛于太阳者，治法亦当以太阳为主，未可轻治阳明也。""太阳证已罢，但有潮热手足汗出，大便难而谵语等阳明胃实诸证，应以阳明为治而当下。"参见并病条。

二浊　即浊病。见《杂病源流犀烛·五淋二浊源流》。因浊病有白浊、赤浊之不同，故名。亦称赤白浊。参见赤白浊、浊、

便浊、精浊各条。

十二经脉病候 指手太阴、手少阴、手厥阴、足太阴、足少阴、足厥阴和手阳明、手太阳、手少阳、足阳明、足太阳、足少阳十二条经脉及其所属脏腑的生理功能发生异常时出现的一类证候。十二经“外络于支节，内属于府脏”，故经络病变，可以影响所属络的内脏，内脏有病也可影响其有关经络，有时表现为局部的外经病候，有时则表现为内脏病候，二者往往同时兼见。各经具体病候，详见手太阴经筋病候、手少阴经筋病候等各条。

十二癥 ❶指十二种原因不同的癥病。《中藏经》：“癥有劳、气、冷、热、虚、实、风、湿、食、药、思、忧之十二名也。”❷指妇科的十二种经带病症。《备急千金要方·赤白带下崩中漏下第三》：“何谓十二癥？是所下之物，一曰状如膏，二曰如黑血，三曰如紫汁，四曰如赤肉，五曰如脓痂，六曰如豆汁，七曰如葵羹，八曰如凝血，九曰如清血，血似水，十曰如米泔，十一曰如月浣，乍前乍却，十二曰经度不应期也。”参见癥条。

十水 古代对水肿病的分类。历代说法不一：①《中藏经·论水肿脉证生死》：“水有十名，一曰青水，二曰赤水，三曰黄水，四曰白水，五曰黑水，六曰玄水，七曰风水，八曰石水，九曰里水，十曰气水。”②《诸病源候论·水肿病诸候》：“十水者、青水、赤水、黄水、白水、黑水、悬水、风水、石水、暴水、气水也。”③《三因极一病证方论》卷十四：“以心水、肝水、肺水、脾水、肾水、胆水、大肠水、膀胱水、胃水、小肠水为十水。”

十指麻木 证名。手指麻木的别称。见《丹溪心法》卷四。详手指麻木条。

十咳 见《备急千金要方·咳嗽》。指风咳、寒咳、支咳、肝咳、心咳、脾咳、肺咳、肾咳、胆咳、厥阴咳十种咳嗽。详各条。

十痓 十种痓病的总称。❶指气痓、劳痓、鬼痓、冷痓、生人痓、死人痓、尸痓、食痓、水痓、土痓等（《千金要方》卷十七）。❷指风痓、寒痓、气痓、生人痓、凉痓、酒痓、食痓、水痓、尸痓、土痓等十种痓（《奇效良方》卷二十二）。参见痓条。

七气 指七情之气所伤的病证。❶《诸病源候论·七气候》：“七气者，寒气、热气、怒气、恚气、忧气、喜气、愁气。凡七气积聚，牢大如杯，若拌在心下腹中疾痛欲死，饮食不能，时来时去，每发欲死，如有祸状，此皆七气所生。”❷《证治要诀·诸气门》：“喜怒忧思悲恐惊，谓之七气所伤。有小疾，在咽喉间，如棉絮相似，咯不出，咽不下，并宜四七汤，未效，进丁沉透膈汤。”参见气病、九气条。

七伤 病名。❶指食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络营卫气伤（见《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》）。❷指虚劳的七种病证。①指阴寒、阴萎、里急、精连连、精少阴下湿、精清、小便苦数临事不卒（见《诸病源候论·虚劳病诸候》）。②指阴汗、精寒、精清、精少、囊下湿痒、小便涩数、夜梦阴人等（见《古今医鉴》）。③指脾伤、肝伤、肾伤、肺伤、心伤、形伤、志伤（见《诸病源候论·虚劳病诸候》）。参虚劳条。

七疝 指七种疝病。历代有各种说法：①《素问·骨空论》：“任脉为病，男子内结七疝，女子带下瘕聚。”马莳注：“七疝乃五脏疝及狐疝、癫疝也。”②《诸病源候论》卷二十：“七疝者，厥疝、癥疝、寒疝、气疝、盘疝、附疝、狼疝，此名七疝也。”③《儒门事亲》卷二：“七疝者何，寒疝、水疝、筋疝、血疝、气疝、狐疝、癫疝，是谓七疝。”④《医宗必读》卷八：“所谓冲疝、狐疝、癫疝、厥疝、瘕疝、瘭疝、瘭癃疝，分言七疝之状也。”⑤《素问识》卷

七："简按，七疝，考经文，其目未明显，姑从马、张之意。王永辅惠济方以石、血、阴、气、妒、肌疝、癖为七疝，亦未知何据。李中梓《必读》别立七疝之名，分癀与癫，误甚。"

七情饥饱嗽 病名。又称七情伤感嗽。指因情绪不安，饥饱失常，伤及脏腑所致的咳嗽。《证治要诀·诸嗽门》："七情饥饱嗽，无非伤动脏腑正气，致邪上逆，结成痰涎，肺道不理，宜顺为先。"用四七汤加桑白皮、杏仁、枇杷叶等。参见七情伤感嗽条。

七情伤感嗽 病名。指七情伤动脏腑之气所致的咳嗽。《不居集》卷十五："七情伤感嗽。七情伤感，无非伤动脏腑正气，致邪上逆，结成痰涎，肺道不理，宜顺气为先。四七汤加杏仁、五味子、桑白皮、人参、阿胶、麦冬、枇杷叶。"参见咳嗽、七情饥饱嗽条。

七情郁证 病证名。指因情志郁结所致的病证。《证治汇补·七情郁症》："七情不快，郁久成病，或为虚怯，或为噎膈，或为痞满，或为腹胀，或为胁痛，女子则经闭堕胎、带下崩中，可见百病兼郁如此。"参怒郁、思郁、忧郁、悲郁、惊郁、恐郁各条。

七情泻 病证名。指因情志刺激过度所致的泄泻。《医学入门·杂病》："七情泻腹常虚痞，欲去不去，去不通泰。"《景岳全书·泄泻》："凡遇怒气便作泄泻者，必先以怒时挟食致伤脾胃，故但有所犯即随触而发，此肝脾二脏之病也，盖以肝木克土，脾气受伤而然。"治宜和中顺气，用藿香正气散、七气汤、古萸连丸等方。参气泻条。

七情痢 病名。指因情绪失常，影响脾胃运化功能所致的下利。《症因脉治·痢疾论》："七情内伤痢之症，初起先见饮食难化，后复大便不实，时常清泄，久久不愈，渐下脓血。"治宜消补兼施，健脾化积，用枳术丸、参苓白术散等方。若久泻气虚下陷，用补中益气汤、升阳益胃汤。久泻虚寒，用理中汤、归脾汤，滑泄不禁加固涩药。肾阳不足用肾气丸，肾阴不足用六味丸与白术散，朝暮对服。本病可见于神经官能性腹泻等。参见痢疾条。

七癥 指七种癥病。《三因极一病证方论·癥瘕证治》："夫癥者，坚也，坚则难破。……然七癥八瘕之名，经论亦不详出。虽有蛟龙、鱼、鳖、肉、发、虱、米等七证，初非定名，偶因食物相感而致患耳。"《东医宝鉴·杂病篇》："癥名有七，蛟、龙、鱼、鳖、獭、狐、蛇是也，亦曰蛇、蛟、鳖、肉、发、虱、米也……（千金）。"

〔丿〕

八纲 阴、阳、表、里、寒、热、虚、实八类证候的总称，为中医辨证的纲要。《伤寒论》创六经辨证。后有《本草纲目》引寇宗奭："有八要，一曰虚、二曰实、三曰冷、四曰热、五曰邪、六曰正、七曰内、八曰外也。"《医学六要》："治病大法有八，曰阴、曰阳、曰表、曰里、曰寒、曰热、曰虚、曰实。"《景岳全书·传忠录》："凡诊病施治，必须先审阴阳，乃为医道之纲领。"又："六变者，表里寒热虚实也。"表里辨病位的浅深，寒热辨病证的性质，虚实辨邪正的盛衰，阴阳则是统摄其他六纲的纲领。表、热、实多属阳；里、寒、虚多属阴。临床上运用八纲，为对病证进行分析、归纳，为施治的重要依据。详见阴证、阳证、表证、里证、寒证、热证、虚证、实证各条。

八淋 指八种淋症。❶指冷、热、气、劳、膏、砂、虚、实等八淋。见《华氏中藏经·论淋沥小便不利》。❷指劳、血、热、气、石、膏、砂、冷等八淋。见《东医宝鉴·内景篇》。

八瘕 病名。见《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》。指青瘕、黄瘕、燥瘕、血瘕、

脂瘕、狐瘕、蛇瘕、鳖瘕八种瘕病。详各条。

人黄 三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一："病人面青掩口，恶闻人声，或似颠狂，此是人黄。"治宜灸烙法，内服赤箭散。参黄疸有关条。

人痫 五不男之一，亦称"变"。见清·卢若腾《岛居随笔》。类于两性畸型，俗称阴阳人。详五不男条。

九气 指九种气病。出《素问·举痛论》。原指怒、喜、悲、恐、寒、炅、惊、劳、思九气所致的疾患。《诸病源候论·气病诸候》："九气者，谓怒喜悲恐寒热忧劳思。因此九事而伤动于气。一曰怒则气逆，甚则呕血，及食而气逆也；二曰喜则其气缓，荣卫通利，故气缓；三曰悲则气消，悲则使心系急，肺布叶举，使上焦不通，热气在内，故气消也；四曰恐则气下，恐则精却，精却则上焦闭，闭则气还，气还则下焦胀，故气不行；五曰寒则气收，聚寒使经络涩涩，使气不宣散故也；六曰热则腠理开，腠理开则荣卫通，汗大泄；七曰忧则气乱，气乱则心无所寄，神无所归，虑无所定，故气乱；八曰劳则气耗，气耗则喘且汗，外内皆越，故气耗也；九曰思则气结，气结则心有所止，故气留而不行。"《医学入门·气》："七气喜怒忧思悲恐惊，又曰九气者，挟外感寒热而言也。"

九虫病 病名。出《诸病源候论·九虫病诸候》。伏虫、蚘虫、白虫、肉虫、肺虫、胃虫、弱虫、赤虫、蛲虫等九种虫病的总称。《证治准绳·杂病》："九虫皆由脏腑不实，脾胃皆虚，杂食生冷甘肥油腻盐藏等物，节宣不时，腐败停滞，所以发动。又有神志不舒，精魄失守，及五藏劳热，又病余毒气血积郁而生，或食瓜果，与畜兽内藏遗留诸虫子类而生。"治宜健脾、驱虫。详各虫病条。

九注 古病名。出《诸病源候论·诸注候》。风注、寒注、气注、生注、凉注、酒注、食注、水注、尸注等九种注病的总称。

九种心痛 病名。出《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证治》。❶《千金要方·心脏》："九种心痛：一、虫心痛，二、注心痛，三、风心痛，四、悸心痛，五、食心痛，六、饮心痛，七、冷心痛，八、热心痛，九、去来心痛。"❷《张氏医通·诸痛门》："心痛分为九种：曰饮、曰食、曰气、曰血、曰冷、曰热、曰悸、曰虫、曰疰。"❸《医学心悟》卷三："心痛有九种：一曰气、二曰血、三曰热、四曰寒、五曰饮、六曰食、七曰虚、八曰虫、九曰疰，宜分而治之。"❹《类证治裁·心痛》指饮、食、寒、火、气、血、悸、虫、疰九种心痛。详虫心痛、注心痛、风心痛、悸心痛、食心痛、饮心痛、冷心痛、热心痛、去来心痛各该条。

九积 病名。食积、酒积、气积、涎积、痰积、癖积、水积、血积、肉积的统称。《儒门事亲》卷三："食积酸心腹满，大黄、牵牛之类，甚者礜石、巴豆。酒积目黄口干，葛根、麦蘗之类，甚者甘遂、牵牛。气积、噫气、痞塞，木香、槟榔之类，甚者枳壳、牵牛。涎积咽如拽锯，朱砂、腻粉之类，甚者瓜蒂、甘遂。痰积涕唾稠粘，半夏、南星之类，甚者瓜蒂、藜芦。癖积两胁刺痛，三棱广茂之类，甚者甘遂、蝎梢。水积足胫胀满，郁李、商陆之类，甚者甘遂、芫花。血积打扑胁愈，产后不月，桃仁、地榆之类，甚者蝎虫、水蛭。肉积瘿瘤核疬、腻粉、白丁香，砭刺出血，甚者硇砂、信石。九积皆以气为主，各据所属之状而对治之。"

九疸 九种黄疸之合称。❶《诸病源候论·黄病诸候》："九疸候，夫九疸者，一曰胃疸，二曰心疸，三曰肾疸，四曰肠疸，五曰膏疸，六曰舌疸，七曰髓疸，八曰肉疸，九曰肝疸。凡诸疸病，皆由饮食过度，醉酒劳伤，脾胃有瘀热所致。其病身面皆发黄，但立名不同耳。"❷《外台秘要》卷四

列九疸为胃疸、心疸、肾疸、脾疸、肺疸、舌疸、肉疸、髓疸、肝疸。

九窍出血　病证名。又名大衄。指耳、目、口、鼻、前阴、后阴九窍同时出血。《诸病源候论·血病诸候》："凡荣卫大虚，府藏伤损，血脉空竭，因而恚怒失节，惊忿过度，暴气逆溢，致令腠理开张，血脉流散也，故九窍出血。"亦可因感受疫疠或中毒所致。一般宜内服侧柏散，外用百草霜、油发灰、龙骨末，或吹入或掺之。如因猝然惊恐见此，可用朱砂安神丸加发灰治之。如感受疫疠者宜清疫解毒；中毒出血者，宜审因施治。参见大衄、衄血、中毒等有关条。

三　画

〔一〕

三十六黄　指三十六种黄病证候。出《外台秘要》卷四。❶《太平圣惠方》卷五十五："夫诸黄者，其黄皆因伤寒为本，五脏互有所伤，热气相侵，致使病人精神恍惚，六腑不和，七神无主，情意改变。"其所指与一些急性发热病引起的发黄及意识障碍相似。三十六种黄为肝黄、心黄、脾黄、肺黄、肾黄、胆黄、脑黄、行黄、癖黄、胃黄、鬼黄、奸黄、走马黄、立黄、黑黄、体黄、劳黄、脊禁黄、食黄、火黄、阴黄、气黄、盗黄、髓黄、房黄、血黄、忧黄、惊黄、花黄、疟黄、水黄、蛇黄、牛黄、鸦黄、鸡黄、蚰蜒黄等。详见各条。❷《圣济总录》卷六十一云黄病三十六种"皆非黄疸之比"。谓本病多发生在东南地带，地气湿热，易成瘴毒，人感而成黄，其所指似包括我国南方一带地区性传染病。所载三十六黄为心黄、肝黄、脾黄、肺黄、肾黄、鬼黄、奸黄、血黄、人黄、髓黄、荫黄、急黄、气黄、痫黄、白黄、明黄、胆黄、惊黄、风黄、走精黄、酒黄、鸡黄、蚰蜒黄、火黄、走马黄、房黄、黑黄、厌黄、水黄、爪黄、肠黄、犊黄、猪黄、土黄、虾蟆黄。

三日疟　病名。疟疾之一。指疟之三日一发者，亦称三阴疟。《素问·疟论》："时有间二日或至数日发，或渴或不渴，其故何也？岐伯曰，其间日者，邪气与卫气客于六府，而有时相失，不能相得，故休数日乃作也。"《杂病源流犀烛·疟疾源流》："三日疟，即经所云休数日作者。"《张氏医通·寒热门》："三日疟，初起发于夏秋者，宜用二陈去橘皮，加生术、槟榔、常山，逐去痰癖为先，稍加穿山甲以透经络；至于暑结营分，又当以香薷、鳖甲、茯苓、半夏、甘草、当归、生姜、大枣，祛暑为要，而前药为无益也；若元气大虚，只用补正，宜六君加草果、乌梅，名四兽饮，兼本经引使药；若元气下陷，日发渐晏者，补中益气汤，大剂参术姜枣为治，如常山、槟榔、山甲、草果皆为戈戟矣。"参见三阴疟、疟疾条。

三虫病　病名。长虫病、赤虫病、蛲虫病的合称。《诸病源候论·三虫候》："三虫者，长虫、赤虫、蛲虫也。……此既是九虫内之三者，而今别立名，当以其三种偏发动成病，故谓之三虫也。"治宜白薇丸等方。（见《太平圣惠方》）。参九虫病条。

三阳头痛　病证名。见《医垒元戎·三阳头痛》。太阳头痛、阳明头痛、少阳头痛的合称。《冷庐医话》卷三："头痛属太阳者，自脑后上至巅顶，其痛连项；属阳明者，上连目珠，痛在额前；属少阳者，上至两角，痛在头角。"治疗当于疏邪治痛方中酌加引经药。如太阳用羌活，阳明用白芷，

少阳用川芎等。参头痛条。

三阳合病 病名。指太阳、阳明、少阳三经同时受邪而出现的证候。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》："三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁，面垢，谵语遗尿。发汗则谵语，下之则额上生汗，手足逆冷。若自汗出者，白虎汤主之。"《医宗金鉴·订正伤寒论注》："三阳合病者，太阳、阳明、少阳合而为病也。必太阳之头痛发热，阳明之恶热不眠，少阳之耳聋寒热等证皆具也。……证虽属于三阳，而热皆聚胃中，故当从阳明热证主治也。"《伤寒贯珠集》卷一："三阳合病，视诸合病邪气为较大矣。而太阳之府膀胱，阳明之府胃，少阳之府胆，热邪盛满，自经入府，故腹满身重，口不仁而面垢，谵语遗尿及但欲眠睡，目合则汗，皆为里为热之征也。……虽三阳合病，而邪聚于阳明者较太阳为多，故宜白虎汤请而解之。"三阳合病轻证，可用柴葛解肌汤清解。参见合病、太阳阳明合病、太阳少阳合病条。

三阳经疟 病名。指疟疾之发于三阳经者。《症因脉治》卷四："疟疾者，先寒后热，发作有定期，大约巳午未三时者多。若一日一作，太阳、少阳也；间日而作，阳明、少阳也；伸欠、恶寒头痛，太阳也；发热口渴，阳明也；有寒有热，呕而口苦，少阳也。日中三阳得令，其病即发；日夕三阳时令退而病解。"《类证治裁·疟》："疟邪伏于募原，浅者客三阳经。"参见足太阳疟、足少阳疟、足阳明疟条。

三阳病 病名。太阳病、阳明病、少阳病的总称。《医述·阳经分经腑》："三阳病在经者，可汗而已。""三阳病入腑者，可下而已。"参见六经病条。

三阳痉 见《类证治裁·痉症》。指太阳痉、阳明痉、少阳痉。详各条。

三阴头痛 病名。太阴头痛、厥阴头痛、少阴头痛的合称。《罗氏会约医镜·论头痛》："太阴头痛，脉沉缓，身体沉重，或腹痛，必有痰也，以苍术、半夏、南星为主；少阴头痛，脉沉细，必寒厥，以麻黄、附子、细辛为主；厥阴头痛，脉浮缓，项痛，吐痰，以吴茱萸、川芎为主。"详各条。

三阴疟 病名。指疟疾发于三阴经者。❶即三日疟，详见该条。❷指疟发在处暑后，冬至前之三日疟。《类证治裁·阴疟》："三阴疟多发在处暑后，冬至前，发愈晚者去亦迟，以气令收肃故也。其发时也不定，有前间一日，忽间二日发者，有前间二日，忽一日夜两发者，有连发二日，中间一日者，有间三日发不爽者，或不忌口，不节劳，伏邪旁溢界络，皆能致之。否则发期错乱，乃将愈之兆矣。"❸指疟夜发者。《医宗金鉴·疟疾》："疟在夜发，名曰三阴疟疾。初热宜用桂枝汤、麻黄汤、小柴胡汤、四物汤方合剂，以杏仁易桃仁增损汗之，汗解之后，余同前法。"❹指疟作有定时者。《丹溪心法·疟》："作于子午卯酉日者，少阴疟也；寅申巳亥日者，厥阴疟也；辰戌丑未日者，太阴疟也。"《医贯》卷六："三阴疟者，惟太阴疟当用理中汤，必加肉桂，若少阴、厥阴，非八味地黄不效。"《类证治裁》谓治三阴疟宜和营调卫兼疏邪，勿期速效用劫剂。参见疟疾条。

三阴病 病名。太阴病、少阴病、厥阴病等三阴病的总称。《医学心悟·六经见证法》："三阴有传、有中。……三阴有传经者，由三阳而传入三阴，此热邪也。有直中者，初起不由阳经传入，而直中三阴，此寒邪也。"三阴病多见里证、虚证、寒证。《景岳全书·伤寒典》："其证或厥冷，或呕吐，或腹痛泻利，或畏寒不渴，或脉来沉弱无力，此皆元阳元气之不足，乃为真正阴证。"参见六经病、少阴病、太阴病、厥阴病条。

三阴痉 指太阴痉、少阴痉、厥阴痉。

《张氏医通·诸风门》："足三阴痉，俱手足厥冷，筋脉拘急，汗出不止，项强脉沉。"治法用附子散，多汗去川芎、独活加黄芪、当归。详太阴痉、少阴痉、厥阴痉条。

三消 病名。亦称三病。三种消证之总称。《太平圣惠方》卷五十三："夫三病者，一名病渴，二名病中，三名病肾。……一则饮水多而小便少者，病渴也。二则吃食多而饮水少，小便少而黄赤者，病中也。三则饮水随饮便下，小便味甘而白浊，腰腿消瘦者，病肾也。"《景岳全书·杂证谟》："三消之病，三焦受病也。上消者，渴证也。大渴引饮，随饮随渴以上焦之津液枯涸，古云其病在肺，而不知心脾阳明之火皆能熏灸而然。故又谓膈消也。中消者，中焦病也，多食善饥不为肌肉而日加削瘦，其病在脾胃，又谓之消中也。下消者，下焦病也，小便黄赤为淋为浊，如膏如脂，面黑耳焦，日渐消瘦，其病在肾，故又名肾病也。"详上消、中消、下消条。

三焦手少阳经病证 指手少阳三焦经经气异常所致的病症。《灵枢·经脉》："三焦手少阳之脉，……是动则病耳聋浑浑焞焞，嗌肿，喉痹。是主气所生病者，汗出，目锐眦痛，颊痛，耳后、肩、臑、肘、臂外皆痛，小指次指不用。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。"《脉经·三膲手少阳经病证》除上述"是动、所生"病外，还列举了腹胀气满、小腹坚、不得小便、咳成肺痿、溺血等症。参三焦经病有关条。

三焦郁 郁证之一。《类证治裁》卷三："三焦郁，口干不食，栀子仁姜汁浸，炒黑研细，以人参、麦冬、乌梅煎汤服。"参郁证条。

三焦胀 胀病之一。《灵枢·胀论》："三焦胀者，气满于皮肤中，轻轻然而不坚。"《奇效良方·胀满》："若其不升降，痞结胸中，三焦相混，大小便不通，卒然胀满，脉来沉伏，为三焦胀也。又有虚实之分，虚者皮肤壳壳然而坚，不痛而气满，治以升降气道，温补脾元即复矣。实者内挟宿食，邪实于内，按之坚痛，当以疏气涤实可也。"《医醇剩义·胀》："上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎，此状其气与水之流行，而究无实在形质。受寒气逆，故气满于皮肤之中，因无形质，故虽胀而轻轻然不坚也。当调和气血，疏导行水，通皮饮主之。"参胀病条。

三焦咳 病症名。指咳而腹满，纳食减少者。《素问·咳论》："久咳不已，则三焦受之；三焦咳状，咳而腹满，不欲食饮。"治宜异功散、通理汤、木香顺气散、七气汤加黄连、枳实等。参见咳嗽条。

三焦秘 病症名。见《中国医学大辞典》。指大便秘结之由于三焦不和者。《丹溪心法附馀·燥门》："三焦不和，胸膈痞闷，气不升降，饮食迟化，肠胃燥涩，大便秘结。"用搜风润肠丸。参大便秘结条。

三焦病 六腑病候之一。三焦即上焦、中焦、下焦。其病有寒热虚实之分。《灵枢·邪气藏府病形》："三焦病者，腹气满，小腹尤坚，不得小便，窘急，溢则水留，即为胀。"《诸病源候论·三焦病候》："三焦气盛为有余，则胀气满于皮肤内，轻轻然而不牢，或小便涩，或大便难，是为三焦之实也，则宜泻之。三焦气不足，则寒气客之，病遗尿，或泄利，或胸满，或食不消，是三焦之气虚也，则宜补之。"《杂病广要·脏腑类》："三焦者，谓上中下也。若上焦有热，则胸膈痞满，口苦咽干，有寒则吞酢而吐沫；中焦有热，则身重目黄，有寒则善胀而食不消；下焦有热，则大便难，有寒则少腹痛而小便数。三焦之气主腐熟水谷，分别清浊，若不调平，则生诸病(《简要济众方》)。"《杂病源流犀烛·三焦病源流》："海藏曰：上焦如雾，雾不散，则为喘满，

此出而不纳也。中焦如沤，沤不利，则为留饮不散，久为中满，此上不能纳，下不能出也。下焦如渎，渎不利，则为肿满，此上纳而下不出也。”治宜宣通三焦、升降气机等法。

三焦蒸 二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

三消 病名。消同消。即三消。见《太平圣惠方》卷五十三。详三消条。

三痹 指行痹、痛痹、著痹三种痹证。《素问·痹论》：“风寒湿三气杂至，合而为痹也。其风气胜者为行痹，寒气胜者为痛痹，湿气胜者为著痹也。”《类证治裁·痹症》：“风寒湿三气杂至，合而为痹。痹非偏受一气。其风胜者为行痹。风行而不定，如走注之类。寒胜者为痛痹。寒凝则阳气不行，痛有定处，即痛风。湿胜者为着痹。重著不移，或肿痛，或不仁，湿从土化，痛发肌肉，即麻木也。……风胜脉必浮，寒胜脉必濇，湿胜脉必缓。三痹各有所胜，用药以胜者为主，而兼者佐之。治行痹散风为主，兼去寒利湿，参以补血，血行风自灭也，防风汤。治痛痹温寒为主，兼疏风渗湿，参以益火，辛温解凝寒也，加减五积散。治著痹利湿为主，兼去风逐寒，参以补脾补气，土强可胜湿也。川芎茯苓汤加耆、术。”参风痹、寒痹、着痹条。

干呕 证名。出《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》。指呕而有声无物吐出者。《诸病源候论·呕哕病诸候》：“干呕者，胃气逆故也。但呕而欲吐，吐而无所出。”有胃虚气逆者，宜橘皮竹茹汤、吴茱萸汤。有胃中寒者，宜半夏干姜散、理中汤。有胃热者，宜黄芩加半夏生姜汤、黄连解毒汤。少阴病干呕下利脉微者，宜白通汤、通脉四逆汤。

干胁痛 证名。见《医学入门》卷五。《医钞类编·胁痛门》：“虚盛成损，胁下常有一点痛不止，名干胁痛。”《杂病源流犀烛》卷十：“酒色过度，当胁一点痛不止，名干胁痛，甚危，惟大补气血而已。”方用八物汤、补肝散、六味地黄丸等方。参肝虚胁痛条。

干咳 病证名。见《理虚元鉴》。即干咳嗽。详该条。

干咳嗽 病症名。又名干嗽、干咳。指咳嗽无痰或少痰者。《赤水玄珠·干咳嗽》：“干咳嗽者，无痰出而欬咳连声者是也。此本于气涩。涩之微者，咳十数声方有痰出，涩之甚者，虽咳十数声，亦无痰出。”多因火郁伤燥或脏腑亏损所致。《景岳全书·杂证谟》：“干咳嗽者，以肺中津液不足，枯涸而然。此明系内伤亏损，肺肾不交，气不生精，精不化气，所以干涩如此。但其有火无火，亦当辨治。若脏平无火者，止因肺虚故，必先补气，自能生精，宜五福饮之类主之；若脏气微寒者，非辛不润，故必先补阳自可生阴，宜理阴煎，或六君子汤之类主之；若兼内热有火者，须保真阴，故必先壮水，自能制火，宜一阴煎，或加减一阴煎，兼贝母丸之类主之。若以此证而但知消痰开郁，将见气愈耗，水愈亏，未免为涸辙之鲋矣。”《类证治裁》卷二：“其脾肺亏损，致咳嗽喘促，畏寒呕泻，及脉见细弱，症见虚寒，咳久不已者，切勿清嗽，但补元气，嗽自止。六味回阳饮，或理中汤，劫劳散，八味地黄丸。”参见干咳，干嗽，咳嗽条。

干黄 病名。指小便自利，渴而引饮的黄疸。《此事难知》：“干黄，燥也，小便自利，四肢不沉重，渴而引饮者，栀子柏皮汤。”干黄有因瘀热搏结所致者，《医钞类编》卷九：“干黄，……瘀热在里，宜下。”参黄疸等条。

干脚气 脚气病之一。见《太平圣惠方》卷四十五。指脚气之足膝不肿者。因素体阴虚内热，湿热、风毒之邪从热化，伤及营血，筋脉失养所致。症见足胫无力，麻木痠痛，挛急，脚不肿而日见枯瘦，饮食减

少，小便热赤，舌红，脉弦数等。本病症与现代医学所称的脚气病干型相类似。治宜宣壅化湿，和营清热。可用加味苍柏散或生干地黄丸等方。

干喘　病证名。见《证治要诀·哮喘》。指气喘而无咳嗽痰涎的病症。因喘逆未见痰涎，故称为干喘。多由情志郁结，气机壅逆所致。《医学入门·喘》："七情气急无声响，惊忧气郁，惕惕闷闷，引息鼻张，气喘，呼吸急促而无痰声。"治宜降气疏郁为主，如四七汤、分气紫苏饮、四磨汤、苏子降气汤或神秘汤吞养正丹等。参气喘条。

干嗽　病名。又名干咳嗽、干咳。指无痰而嗽者。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："干嗽，肺中无津液也。其脉细涩，必兼气弱或促，乃痰郁火邪于肺中。轻则连咳数十声，方有痰出，重则虽多咳亦无痰，故为干咳嗽，极难治。始宜用苦桔梗以开之，再用补阴降火之剂。不已，则成劳瘵，在不得志者多患此。宜干嗽补肺膏、加味二母丸、琼玉膏。"参见干咳嗽、干咳条。

干霍　病名。指虫蚀下部所致的疾患。《千金要方·大肠腑》："干霍，不甚泄痢而下部疮痒，不问干湿，久则杀人。"

干霍乱　病名。俗称搅肠痧、斑痧、乌痧胀。指突然腹中绞痛，吐泻不得的疾患。多因冷气搏于肠胃，或邪恶污秽之气郁于胸腹，闭塞经隧，气滞血凝，中气拂乱所致。《诸病源候论·干霍乱候》："干霍乱者，是冷气搏于肠胃，致饮食不消，但腹满烦乱、绞痛、短气，其肠胃先挟实，故不吐利。"《圣济总录·干霍乱门》："干霍乱之状，中气喘争而不吐不利是也，肠胃挟实，与冷气相搏，正气暴衰，神志昏冒，上下隔塞，白汗自出，治之稍缓，则不可救。"《杂病源流犀烛·霍乱源流》："干霍乱，即俗云搅肠痧，亦由胃气虚，猝中天地邪恶污秽之气，郁于胸腹间，上不得吐，下不得泻，以致肠胃绞痛异常，胸腹骤胀，遍体紫黑。"《医学心悟》卷三："干霍乱证，欲吐不得吐，欲泻不得泻，搅肠大痛，变在须臾。古方以烧盐合阴阳水引而吐之，或以陈皮同煎吐之，或用多年陈香橼煎汤更佳。俗名搅肠痧、乌痧胀，皆此之类。此系秽气闭塞经隧，气滞血凝，脾土壅满，不能转输，失天地运行之常，则胀闭而危矣。"《医宗己任篇·霍乱》："有干霍乱者，俗名斑痧，又名搅肠痧。吐泻不见，面色青冷，腹中绞痛，乃阴阳错乱最恶之候而最易治。急刺委中部分出血，明矾末调饮探吐，或用菜油探吐，兼用碗刮背上，用苧麻根蘸清菜油，刮夺命穴，督脉后顶，天庭等处，后服砂仁细末数口，连嗳数十声即愈。"本病除内服药物探吐、急刺委中出血外并可刺十指出血。参见霍乱等条。

土郁　病证名。五郁之一。指脾胃之气郁滞之症。出《素问·六元正纪大论》。《证治汇补·郁症》："食滞中焦，痰凝脾脏，热蕴肠胃，皆土郁也。"症见心腹饱胀，肠鸣泻利，呕恶痰涎或清水等。治宜夺之。《杂病源流犀烛》卷十八："夺者，直取之谓也。湿滞则土郁，脏应脾，腑应胃，……滞在上宜吐，滞在中宜伐，滞在下宜泻，皆夺也。"可用夺郁汤、善夺汤、疏土汤等方。参五郁、郁证条。

土黄　三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一："治土黄身体冷，面色青，宜灸太冲及百会后心发际百壮。若面目及十指俱青，不治也。"参黄疸有关条。

下气　❶指人体下部之气。《灵枢·口问》："下气不足，则乃为痿厥、心悗。"❷症名。指肠胃郁结而排泄气体。即矢气。《杂病源流犀烛·诸气源流》："下气，肠胃郁结病也。盖惟郁结，则肠胃之气不能健运，所纳谷食之气，从内而发，不得宣通，往往上行则多噫气，上行不快，还而下行，因复下气也。"❸运气学说术语。指六气定位下之气。如水位下之土气，土位下之木

气，木位下之金气，金位下之火气，火位下之水气等。《素问·六元正纪大论》："藏其下气而见可知也。"❶指平降气逆的一种治法。参气病、气下条。

下血 证名。即便血。《金匮要略·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治》："下血，先便后血，此远血也。"详见便血条。

下利 证名。简称利。古代医书对痢疾与泄泻的统称。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》："下利脉数而渴者，……必圊脓血，以有热故也。"似指痢疾。又："下利清谷，里寒外热，汗出而厥者，通脉四逆汤主之。"似指泄泻。亦有以利为泄泻者。《伤寒捷诀·肠垢鹜溏》："利与痢不同。利者，泻也。"详见痢疾、泄泻等条。

下利脓血 证名。指痢下赤白粘冻。出《伤寒论·辨少阴病脉证并治》。《儒门事亲》卷四："夫下利脓血，腹痛不止，可用调胃承气汤，加生姜、枣煎，更下藏用七八十丸，量虚实加减，泻讫，次用长流水调五苓散五七钱，或加灯心煎调下亦得，调益元散五七钱亦可，大忌油腻一切热物。"参见脓血痢条。

下利清谷 证名。出《伤寒论·辨少阴病脉证并治》。指泻出物清稀夹杂不消化食物者。多因脾肾虚寒所致。治宜温中散寒，用四逆汤、通脉四逆汤。参寒泄条。

下体肿痛 证名。指下部肢体肿胀疼痛。《类证治裁·身痛》："下体肿痛，脉浮，自汗，恶风者，多由卫气不固，风湿侵袭所致。治宜祛风湿，兼固表，方用防己黄芪汤、五皮饮等；痛而大便不通者，宜厚朴七物汤微利之。"

下体痛 证名。指痛在下身者。见《张氏医通·身体痛》。多由湿热相搏下注所致。治宜清热利湿，可用黄柏、苍术等煎服。若小便不利者，宜用五苓散、二妙丸等方。

下沃赤白 证名。指便下赤白粘冻。《素问·至真要大论》："热客于胃……少腹痛，下沃赤白。"参见赤白痢条。

下迫 证名。指急欲大便而又排便不畅的窘迫感。《素问·至真要大论》："暴注下迫，皆属于热。"《类经·疾病类》："下迫，后重里急迫痛也。"参里急后重条。

下格 病名。指大便数旬不通，时呕而食不进者。《医钞类编》卷十五："大便二三旬不行，时时作呕，饮食不进，虽少与汤水，呕吐愈加，此为下格。盖下既不通必反于上。……宜调胃承气，热饮，顿下宿结及溏粪胶粘恶物，则呕吐立止。"参关格条。

下消 病症名。见《丹溪心法·消渴》。又称肾消、消肾。《医学纲目》卷二十一："下消者，经谓之肾消。肾消者，饮一溲二，其溲如膏油。"本症多因肾衰不摄所致。主要症候为小便特多，或如膏油，或甜，口渴多饮，面黑耳焦，日渐消瘦。治宜滋肾固摄。用六味地黄丸、左归饮、大补阴丸、滋膵汤等方。气虚火衰者，用八味地黄丸、右归丸、秘元煎、固阴煎等方。参见消渴条。

下脱 脱证之一。《张氏医通·脱》："下脱者，多缘房劳伤精。其人肾惫少气，不能饮食，大便滑泄无度，小便清利倍常，或梦寐走泄，昼夜遗精，或精血并脱，不能自主。"

下厥上竭证 病证名。指少阴病误用汗法所致的危候。《伤寒论。辨少阴病脉证并治》："少阴病，但厥无汗，而强发之，必动其血，未知从何道出，或从口鼻、或从目出者，是名下厥上竭，为难治。"阳亡于下，厥从下起，故称下厥；血从上出，阴竭于上，故称上竭。治疗如四逆加人参汤、六味回阳饮等方，滋阴回阳并顾，均可取法。

下焦吐 证名。《活法机要·吐证》："下焦吐者，皆从于寒，地道也。其脉沉而迟。其证朝食暮吐，暮食朝吐，小便清利，大便秘而不通。治法当以"毒药"通其秘

塞，温其寒气。大便渐通，复以中焦药和之，不令大便秘结而自愈也。”可选用古丁半汤、半硫丸、木香匀气散、附子理中汤等方。

下痞 证名。指下焦闭塞不通所致的痞症。《华氏中藏经·辨三痞证并方第四十六》：“下痞者，小便不利，脐下满硬，语言蹇滞，腰背疼痛，脚重不能行立者是也。”宜用瞿麦头子、官桂、甘遂、车前子等药。参痞有关条。

大风恶疾 古病名。即疠风。又称癞。《世医得效方》卷十三：“疠风……即大风恶疾，癞是也。”详疠风条。

大孔痛 证名。见《丹溪心法·痢》。指肛门疼痛。如因下痢所致者，按痢疾诊治。因肛病所致者，详肛头痒痛条。

大头天行 瘟疫的一种。见《丹溪心法·瘟疫》。即大头瘟、时毒、鸬鹚瘟。《医学正传·瘟疫》：“大头天行病，从颐颔肿热者，又名鸬鹚瘟。东垣有方用羌活、酒炒黄芩、酒蒸大黄加减。”亦可用芩连消毒汤等方。参大头瘟、鸬鹚瘟条。

大头风 病名。见《医学纲目》十五卷。即大头瘟。《杂病源流犀烛·头痛源流》：“大头风者，头大如斗，俗名大头瘟，天行时疫病也。感天地不正之气，甚而溃裂出脓，由邪客上焦之故。”参见瘟疫条。

大头伤寒 病名。见《医方考》卷一。即大头瘟。详该条。

大头毒 病证名。即大头伤寒。《嵩崖尊生书》卷六：“大头毒俗所云大头伤寒也，感天行疫毒之气而发。”详见大头伤寒条。

大头痛 病名。见《此事难知》卷四。即大头瘟。《医碥》卷三：“大头痛，头肿如斗，俗云大头瘟。天行疫气所发。”详见大头瘟条。

大头瘟 瘟疫的一种。见《医方考·大头瘟》。又名大头风、大头痛、时毒、大头伤寒、虾蟆瘟、捻头瘟、大头天行、疫毒等。指以头面部红肿为特征的疫病。多因天行邪毒侵及三阳经络所致。《杂病源流犀烛·瘟疫源流》：“大头瘟，……其症状发于鼻面耳项咽喉间，皆赤肿无头，或结核有根，令人多汗气蒸，初则憎寒壮热，肢体重，头面俱痛，目不能开，上喘，咽喉不利，甚则堵塞不能食饮，舌干口燥，或恍惚不宁。不速治，十死八九。”治宜分清病变所在经络用药。《伤寒括要》卷下：“大头瘟，天行疫毒邪犯高巅，分别三阳经而施治。”可用普济消毒饮、通圣消毒散、升降散等。外用三黄二香散，马齿苋，麦面并醋调敷。因病患部位及病情重危的不同，又有瓜瓤瘟、鸬鹚瘟等名。参有关各条。

大肉陷下 证名。出《素问·玉机真藏论》。指脾气衰败而见肩、臂、股、胫等处骨节显露，肌肉瘦削如脱之症。本证可见于慢性消耗性疾病后期及恶液质等疾患。

大伤寒 病名。指外受寒邪感而即发的病。《通俗伤寒论·伤寒本证》：“大伤寒，一名正伤寒。立冬后，严寒为重，春夏秋暴寒为轻。”《伤寒全生集》则以正伤寒发病于冬季。与大伤寒之以季节分辨病情轻重者不同。参正伤寒、伤寒条。

大关节不利 证名。指四肢的肩、肘、腕、股、膝、踝等关节伸屈不利。出《素问·至真要大论》。多由风、寒、湿邪侵袭经络，气血痹阻所致。本证可见于风湿性关节炎、类风湿性关节炎、痛风等证。

大汗出 证名。出《灵枢·五禁》。大量出汗之意。有见于外感病发汗之后，汗出表解而渐愈者。有热迫津液外泄，大汗出而里热转甚者。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。”又：“服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，白虎加人参汤主之。”又有发汗太过而致大汗亡阳者。《景

岳全书·杂证谟》："有不当汗而妄汗，或虽当汗而汗之太过者，皆汗多亡阳之证。"治当察其虚之微甚，选用独参汤、六味回阳饮等方。《古今医鉴·自汗盗汗》以久病气血两虚，大汗如雨不止，有虚脱危险。治宜十全大补汤倍用人参、黄芪加制附子等。参汗证条。

大肠手阳明经病证 证名。指手阳明大肠经经气异常而致的病症。《灵枢·经脉》："大肠手阳明之脉，……是动则病齿痛，颈肿。是主津液所生病者，目黄，口干，鼽衄，喉痹，肩前臑痛，大指次指痛不用。气有余则当脉所过者热肿，虚则寒栗不复。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。"《脉经·大肠手阳明经病证》："大肠病者，肠中切痛而鸣濯濯，冬日重感于寒，则泄，当脐而痛，不能久立。"又："大肠有寒，鹜溏。有热，便肠垢。大肠有宿食，寒栗、发热有时，如疟状。大肠胀者，肠鸣而痛，寒则泄食不化。"参大肠病有关各条。

大肠胀 胀病之一。《灵枢·胀论》："大肠胀者，肠鸣而痛濯濯，冬日重感于寒，则飧泄不化。"《医醇剩义·胀》："大肠为传道之官，居小肠之下，司变化而出糟粕，寒气上逆，变化失度，故肠鸣腹痛而有水声，重感于寒，故完谷不化也。当温通肠胃，上下兼顾，未可徒治大肠也，顾理脏汤主之。"参胀病条。

大肠泄 病证名。《难经·五十七难》："大肠泄者，食已窘迫，大便色白，肠鸣切痛。"后世多认为属寒。治宜温中散寒，可用干姜附子汤等方。参寒泄条。

大肠咳 病证名。指咳而大便失禁者。《素问·咳论》："肺咳不已，则大肠受之；大肠咳状，咳而遗矢。"治用赤石脂禹余粮汤、桃花散，或用补中益气汤去升麻，加桔梗；或用回风养脏汤等。参见咳嗽条。

大肠病 六腑病候之一。大肠为传导之官，与脾胃同候。大肠与肺相为表里。其病有寒热虚实之分。多由大肠客寒积热、宿滞瘀积，或气虚津枯所致。临床表现多见大便异常，并可兼见肺脾症状。《灵枢·邪气藏府病形篇》："大肠病者，肠中切痛而鸣濯濯，冬日重感于寒即泄，当脐而痛，不能久立，与胃同候。"《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》："大肠有寒者，多鹜溏，有热者，便肠垢。"《太平圣惠方》卷六："寒则肠鸣泄利，食不消化，皮肤干燥。""热则肠结胀满，善气喘咳，身面热，喉中喘。……大肠有宿滞，则发热寒栗如疟之状，秘涩不通。"《本草经疏》："大肠实四证，便硬闭，肠风下血，属大肠湿热；脏毒，属血热；肠痈，属大肠实火。""大肠虚四证，虚热便闭不通，属血虚津液不足；虚寒滑泄不禁，属气虚；肠鸣，属气虚，脱肛，属气虚兼有湿热。"治宜通导腑气、化滞消积、补气固涩等法。

大肠蒸 二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详该条。

大泻泄 病证名。即肾泄。《药症宜忌》："肾泄，即五更及黎明泄泻者是也。亦名大泻泄。属命门真火不足。"详该条。

大实心痛 病证名。《活法机要·心痛证》："大实心中痛者，因气而食，卒然发痛，大便或秘，久而注闷，心胸高起，按之愈痛，不能饮食。急以煮黄丸利之，利后以藁本汤去其邪也。"参心痛条。

大骨枯槁 证名。出《素问·玉机真脏论》。指全身骨骼关节显露，肌肉瘦削及肩垂项倾，腰重膝败的病症。多因肾气衰败，气血大亏所致。《类经·脉色类》："肩垂项倾，腰重膝败者，大骨之枯槁也。"可见于慢性消耗性疾病后期及恶液质病患等。

大便不通 证名。指大便秘结，壅塞不通。《诸病源候论·大便病诸候》："大便不通者，由三焦、五脏不和，冷热之气不调，热气偏入肠胃，津液竭燥，故令糟粕否

结，壅塞不通也。”《太平圣惠方》用大黄、牛蒡、枳壳治伤寒热结，大便不通。若时气热毒在脏，大便不通，宜羚羊角散；若时气胃中壅热，大便不通，宜大麻仁丸。《丹溪心法附余》用润麻丸治血燥大便不通。《杂病源流犀烛·大便秘结源流》：“若不通，则往往十日半月不便，闭塞阻隔，甚至胸腹胀满，气闷欲绝，而其原则各有由。大约热邪入里，则胃有燥屎，三焦伏阳，则津液中干，此固由大肠挟热者也，宜润肠丸。虚人阴冷而血干枯，老人阳衰而气道寒，此则由大肠之挟冷者也，宜润肠汤。腹胀痛闷，胸痞咳呕，此又由宿食留滞者也，宜脾积圆。肠胃受风，干燥涸涩，此又由风气燔灼者也，宜大麻仁丸。肺气壅蔽，不能下降大肠，而诸气之道路，因以闭塞，噫逆泛满，此又由气失升降之常者也，宜桔梗枳壳汤。”参见大便秘结条。

大便秘结　证名。见《丹溪心法附余·燥门》。简称便秘。也称大便难、大便不通、大便秘涩。一般指大便排出困难或三四天以上不大便者。有正虚与邪实之不同。《医学正传·秘结论》：“肾主五液，故肾实则津液足而大便滋润，肾虚则津液竭而大便结燥。原其所由，皆房劳过度，饮食失节，或恣饮酒浆，过食辛热，饮食之火起于脾胃，淫欲之火起于命门，以致火盛水亏，津液不生，故传道失常，渐成结燥之证。是故有风燥，有热燥，有阳结，有阴结，有气滞结，又有年高血少，津液枯涸，或因有所脱血，津液暴竭，种种不同。”《症因脉治·大便秘结论》：“大便秘结之症，外感门有表未解，太阳阳明之脾约，有半表半里，少阳阳明之大便难，又有正阳阳明之胃实。大便硬，又有表邪传里，系在太阴，七八日不大便。又有少阴病，六七日不大便，厥阴下利，谵语有燥屎者。以分应下、急下、大下、可下。又互发未可下、不可下。俟之，蜜导、胆汁导等法。内伤门则有积热、气秘、血枯各条之不同。”《医宗必读·大便不通》：“经曰，北方黑色，入通于肾，开窍于二阴。愚按内经之言，则知大便秘结，专责之少阴一经。证状虽殊，总之津液枯干，一言以蔽之也。分而言之，则有胃实、胃虚、热秘、冷秘、风秘、气秘之分。”“更有老年津液干枯，妇人产后亡血，及发汗利小便，病后血气未复，皆能秘结。法当补养气血，使津液生则自通。误用硝黄利药，多致不救，而巴豆、牵牛，其害更速。若病证虽属阴寒，而脉实微燥，宜温暖药中略加苦寒，以去热燥，燥止勿加。如阴燥欲坐井中者，两尺按之必虚，或沉细而迟，但煎理中汤，待极冷方服。或服药不应。不敢用峻猛之药者，宜蜜煎导之。”“久虚者，如常饮食法，煮猪血脏汤加酥食之。血仍润血，脏仍润脏，此妙法也。”《寿世保元·大便闭》：“大便闭结至极，昏不知人事，用大田螺二三枚，以盐一小撮，和壳捣碎，置病人脐下一寸三分，以宽帛紧系之即通。”便秘有阳结、阴结、实秘、虚秘、气秘、风秘、痰秘、冷秘、热秘、三焦秘、幽门秘（幽门不通）、直肠结、脾约之区分，详各条。

大便秘涩　证名。见《圣济总录·大小便门》。即大便秘结。详该条。

大便难　证名。出《素问·至真要大论》。指大便秘结，排便困难。《诸病源候论·大便病诸候》：“大便难者，由五脏不调，阴阳偏有虚实，谓三焦不和，则冷热并结故也。胃为水谷之海，水谷之精化为营卫，其糟粕行之于大肠以出也。五脏三焦既不调和，冷热壅涩，结在肠胃之间，其肠胃本实，而又为冷热之气所结聚不宣，故令大便难也。”“邪在肾，亦令大便难。所以尔者，肾脏受邪，虚而不能制小便，则小便利，津液枯燥，肠胃干涩，故大便难，又渴利之家，大便亦难，所以尔者，为津液枯竭，致令肠胃干燥，……脉沉为阴，阴实者，病苦闭，大便不利，腹满四支重，身热，若

胃胀，右手关上脉阴实者，脾实也。若肠中伏，伏如牢状，大便难，脉紧而滑直，大便亦难；跗阳脉微弦，法当腹满，不满者，必大便难而脚痛，此虚寒从上向下也。”见大便秘结条。

大便燥结 证名。指粪便干燥秘结。见《名医类案·秘结》。详大便秘结条。

大结胸 结胸证之一。即指《伤寒论》中之大陷胸汤（丸）证。《类证活人书》卷十：“大结胸，不按而痛，胸连脐腹坚硬为大结胸，大陷胸丸主之。”参结胸条。

大衄 病证名。❶指口、耳、鼻皆出血。见《圣济总录》卷七十。又名鼻大衄。详见该条。❷指九窍同时出血。《血证论》卷二：“大衄者，九窍出血之名也。此非疫疠，即中大毒。人身止此九窍，而九窍皆乱，危亡之证，法在不治。惟有猝然惊恐而九窍出血者，可用朱砂安经丸加发灰治之。”详见九窍出血条。

大病后虚汗 证名。出《诸病源候论·虚劳病诸候》。指大病后因体虚而多汗。参病后多汗条。

大偻 证名。一名背偻、背伛偻，俗称“驼背”。指曲背俯身的征象。《素问·生气通天论》：“阳气者，精则养神，柔则养筋。开阖不得，寒气从之，乃生大偻。”参见背伛偻、背偻条。

大脱血 证名。出《素问·腹中论》。指大量失血之症。常伴见面白肢冷，汗出气喘，脉沉微欲绝等。《类证治裁》：“气虚血脱，宜温补以摄之。”治疗急宜益气回阳，用独参汤、参附汤加龙骨、牡蛎等。如大失血后，面色不华，神疲少食，则宜气血两补。选用归脾汤、八珍汤、十全大补汤、人参养营丸等。如阴血偏虚者可用加减四物汤、补营汤等方。

大厥 厥证之一。指卒然昏厥重症，状如暴死者。《素问·调经论》：“络之与孙脉，俱输于经，血与气并，则为实焉。血之与气，并走于上，则为大厥，厥则暴死；气复反则生，不反则死。”《类经·疾病类》：“血气并走于上则上实下虚，下虚则阴脱，阴脱则根本离绝而下厥上竭，是为大厥，所以暴死。若气极而反，则阴必渐回，故可复甦。其有一去不反者，不能生矣。”参厥证、中风条。

大戟中毒 病名。因药服或误服大戟过量中毒。见《千金要方》卷二十四。症见恶心，呕吐，腹痛，腹泻水样便。严重者可引起脱水及酸中毒。甚者可致肾功能衰竭。治宜按情况应用中西医结合疗法。文献有用菖蒲汁、芦根解毒的记载，可参考。

大雷头风 病名。指雷头风病势较剧者。《证治准绳·杂病》：“但头痛倏疾而来，疼至极而不可忍，身热目痛便秘结者，曰大雷头风。”详雷头风条。

大腹水肿 证名。指腹大而四肢小的水肿病。《太平圣惠方》卷五十四：“水病者，皆由荣卫否涩、肾脾虚弱所为。而大腹水肿者，或因大病之后，或积虚劳损，或新热食毕，入于水中自渍，及浴冷水气不散，流溢肠外，三焦闭塞，小便不通，水气结聚于内，乃腹大而四肢小，手足逆冷，腰痛，上气咳嗽烦疼，故云大腹水肿也。……”可选用赤茯苓散、葶苈圆等方治疗。参见正水、石水等条。

大腹痛 病证名。指脐以上腹部疼痛。《医学从众录·心痛续论》：“大腹痛者，乃太阴脾土之部。”《证治汇补》：“腹痛乃脾家受病，或受有形而痛，或受无形而痛。盖暴伤饮食，则胃脘先痛而后入腹；暴触怒气，则两胁先痛而后入腹；血积上焦，脾火熏蒸，则痛从腹而攻上；血积下部，胃气下陷，则痛从腹而下坠。伤于寒者，痛无间断，得热则缓；伤于热者，痛作有时，得寒则减；因饥而痛者，过饥即痛，得食则止；因食而痛者，多食则痛，得便乃安。吞酸腹痛，为痰郁中焦；痞闷腹痛，为气搏中州。火痛，肠内雷鸣，冲斥无定，痛处觉热，心烦口渴；虫痛，肚大青筋，饥即咬啮，痛

必吐水，痛定能食；气虚痛者，痛必喜按，呼吸短浅；血虚痛者，痛如芒刺，牵引不宁。”又：“凡痛多属血涩气滞，宜甘以缓之，寒宜辛温消散，热宜苦寒清解，虚宜甘温调理，实宜辛寒推荡。”参见腹痛条。

大痹　病名。泛指邪在筋骨或五脏较重的痹症。《灵枢·厥病》：“头痛不可刺者，大痹为恶。”《素问·四时刺逆从论》：“冬刺络脉，内气外泄，留为大痹。”张志聪注：“大痹者，风寒客于筋骨而为恶也。”又：“大痹者，脏气虚而邪痹于五脏也。”

大聚　指聚病之较重者。《灵枢·五变》：“人之善病肠中积聚者，……皮肤薄而不泽，肉不坚而淖泽，如此，则肠胃恶，恶则邪气留止，积聚乃伤脾胃之间，寒温不次，邪气稍至，蓄积留止，大聚乃起。”指明大聚多由正虚邪实，久延不愈所致。参聚、六聚、积聚条。

大瘕泄　古病名。《难经·五十七难》：“大瘕泄者，里急后重，数至圊而不能便，茎中痛。”本病后人有数解：❶即痢疾。《研经言》：“今之痢，即《难经》五泄中之大瘕泄。”❷一种阴虚似痢症，由肾虚所致。《医贯·痢疾论》：“又有一等阴虚似痢者，即五泄中大瘕泄者是也。……阴已耗而复竭之，则大小便牵痛，愈痛则愈便，愈便则愈痛，其证红白相杂，里急后重，悉似痢疾，必小便短涩而痛，或不通而痛，或欲小便而大便先脱，或欲大便而小便自遗。”治宜补肾，用附桂八味丸加补骨脂、肉豆蔻、阿胶等。❸即肾泄。《罗氏会约医镜·杂证》：“又言大瘕泄者，即肾泄也。每在五更天明之时。”❹指热泄之一。《杂病源流犀烛·泄泻源流》：“曰大瘕泄者，里急后重，数至圊而不能便，茎中痛，即寒湿而变为热泄也。”宜用八正散加木香、槟榔，再用天水散。❺指泄而腹有瘕聚。清·怀抱奇《古今医彻·杂症》：“大瘕泻，则腹中有瘕，时作时止也。”

寸白虫病　九虫病之一。又名白虫病、脾虫病。多因食未熟猪、牛、鱼肉所致。《诸病源候论·寸白虫候》：“寸白者，九虫内之一虫也。长一寸，而色白，形小褊。因府藏虚弱而能发动。或云：饮白酒，以桑枝贯牛肉炙食，并生粟所成；又云：食生鱼后，即饮乳酪，亦令生之。”《景岳全书·杂证谟》：“寸白虫，此虫长寸许，色白，其状如蛆，母子相生，有独行者，有个个相接不断者，故能长至一、二丈。”证见腹痛、腹胀，泄泻或泻出白色节片等。本病即现代所称绦虫病。寸白虫长寸许，实为绦虫的一个节片。治疗以驱虫至头排出为止。药如槟榔、南瓜子、榧子、仙鹤草根、石榴皮等均可选用。参九虫病、白虫病条。

〔丨〕

上气　出《素问·调经论》。❶指气逆壅上的症候。多由外感六淫，痰气凝结，肺道壅塞所致。《诸病源候论·咳嗽上气候》：“肺主气，气有余则喘咳上气，此为邪搏于气，气壅不得宣发，是为有余，故咳嗽而上气也。其状喘咳上气，多涕唾而面目肿肿，气逆也。”《济生方·喘》：“亦有痰停胃脘，痰与气搏，肺道壅塞，亦令人上气。”《证治准绳·杂病》：“上气者，盖气上而不下，升而不降，痞满膈中，气道奔迫，喘息有音者是也。”以宣肺祛邪，降气化痰为主。参喘证各条。❷指人体上部之气。《灵枢·口问》“故上气不足，脑为之不满，耳为之苦鸣，头为之苦倾，目为之眩。”

上气鸣息　见《肘后备急方》。指气喘而见痰鸣声音。《诸病源候论·上气鸣息候》：“肺主于气，邪乘于肺则肺胀，胀则肺管不利，不利则气道涩，故气上喘逆，鸣息不通。”参痰喘、痰甚喘、齁喘、哮证条。

上半日咳　指咳嗽在午前发作者。多由胃火犯肺所致。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘

源流》："上半日咳，痰稠黄，胃火也。宜二陈汤加竹茹、贝母、石膏。"《张氏医通·咳嗽》："上半日嗽，多属胃火，竹叶石膏汤降泄之。胃气虚者，补中益气，或五味异功，并加山栀。"《医学入门·咳嗽》："上半午咳多者，胃有实火，单石膏丸加知母、贝母；便闭喘渴痰稠者，凉膈散，败毒散，古芩半丸。"参见咳嗽、午后嗽，早晨嗽、清晨嗽、五更嗽条。

上格 病名。《医门补要》卷中："忧闷伤肝，致帝丁两旁凸起紫筋数条，束紧咽喉，似物撑塞，吐不出，咽不下，名为上格……内投平肝散。"参关格条。

上热下寒证 证名。指上部表现为热，下部表现为寒的病症。语出《灵枢·刺节真邪》。多因阳盛于上、阴盛于下所致。症见胸中烦热，频欲呕吐，腹痛喜暖，大便稀薄等。亦指下元虚寒，阳气上越之证。《中医临证备要·上热下寒》："足胫寒冷，而反微红似酣，兼见形寒，脉沉细，或伴大便泄泻，系下元虚寒，阳气上越，称做'戴阳'，为虚脱证候之一。急用白通汤回阳。"参见寒热错杂、戴阳条。

上热衄血 证名。见《丹溪心法附余》卷十一。指膈以上蕴热所致的衄血。《证治要诀·诸血门》："上膈极热而衄者，金沸草散去麻黄、半夏，加茅花如荆芥数。"《张氏医通·衄血》："六脉俱大，按之空虚，心动面赤，善惊上热，乃手少阴心火旺，而上熏于肺脉也，三黄补血汤。"亦可由肾经虚火，浮游上行所致，兼见腰痛、项背痛、头昏、足厥冷等症，宜用止衄散（生地、白芍、黄芪、赤苓、当归、阿胶）去黄芪，加骨碎补、淮牛膝、续断、玄参、葛根，续用地黄汤加天冬、阿胶、五味子之类以滋补肾阴（见《血证论·鼻衄》）。参衄血条。

上消 病名。又称膈消、消心。《素问病机气宜保命集·消渴论》："上消者上焦受病，又谓之鬲消病也。多饮水而少食，大便如常，或小便清利，知其燥在上焦也。"本病以大渴引饮为主症，或见小便甜。多因心肺火炽所致。治法宜以清心肺为主，可兼清其胃。方用消渴方、麦门冬饮子、二冬汤、人参白虎汤、止消润燥汤等。亦可因命火上浮所致。《医碥·消渴论》："下焦命门火不归元，游于肺则为上消。……以八味肾气丸，引火归元，使火在釜底。水火既济，气上熏蒸，俾肺受湿润之气而渴疾愈矣。"参见下消、肾消条。

上脱 脱证之一。《张氏医通·脱》："上脱者，皆是思虑伤神，其人多汗，面如渥丹，妄见妄闻，如有神灵，闭目转盼，觉身非己有，恍若离魂者然。"详脱条。

上渍 证名。出《素问·风论》。王冰注："上渍，谓皮上湿如水渍也，以多汗出故尔。"《类经》卷十五："上渍者，身半以上，汗多如渍也。"

上焦吐 证名。《活法机要·吐证》："上焦吐者，皆从于气。……其脉浮而洪。其证食已暴吐，渴欲饮水，大便结燥，气上冲而胸发痛。其治当降气和中。"宜用桔梗汤、木香散、七气汤，或用六君子汤加木香、藿香、桔梗、枇杷叶等。

上痞 证名。指上焦闭塞不通所致的痞症。《华氏中藏经·辨三痞论并方第四十六》："上痞者，头眩目昏，面赤心悸，肢节痛，前后不仁，多痰，短气，惧火，喜寒，又状若中风之类者是也。"宜用桑白皮、槟榔、木通、大黄、黄芩、泽泻等药。参痞有关条。

口干 证名。出《灵枢·热病》。❶即口渴症。《证治准绳·杂病》："口燥咽干，此寻常渴，非三消证。"❷指自觉口中干燥少津但不欲饮水之症。《景岳全书·传忠录》："凡病人问其渴否，则曰口渴。问其欲汤水否，则曰不欲。盖其内无邪火，所以不欲汤水，真阴内亏，所以口无津液，此口干也，非口渴也。"口干多因阴虚津少，或

气虚阳弱，津液不承所致。阴虚津少者，治宜养阴生津，用六味地黄丸、增液汤、五汁饮等方。气虚阳弱者，治宜益气温阳，用七味白术散、小建中汤、金匮肾气丸等方。

口不能言 指语言发生困难。可由中风及多种疾病导致。《万病回春·中风》："中经脉者，外无六经之形证，内无便溺之阻隔，肢不能举，口不能言，为在中也。"《杂病源流犀烛·中风源流》："语言蹇涩……皆由肾脉之气不能上循喉咙，挟舌本，故不能言，脾土不足，痰涎涌盛而蹇涩，故亦不能言。"治宜养营汤、解语丹、涤痰汤、地黄饮子等方。《医学入门·风》："口不能言，肢不能持，……乃血弱不能营筋与舌也。"

口甘 指口中有甜味的感觉。《素问·奇病论》："津液在脾，故令人口甘也，此肥美之所发也。"《张氏医通》卷八："口甘，经云有病口甘者，此五脏之溢也，名曰脾瘅。治之以兰，除陈气也，兰香饮子。若脉弦滑兼嘈杂属痰火，滚痰丸，此指实火而言。平人口甘欲渴或小便亦甜而浊，俱属土中湿热。脾津上乘，久之必发痈疽，须断厚味、气恼。服三黄汤加兰叶、白芍、生地。燥渴甚者，为肾虚，日服加减八味丸，可保无虞。中消，脾液上乘口甘者，兰香饮子。老人虚人，脾胃虚热，不能收敛津液而口甘者，当滋补脾气，补中益气汤去升柴，加兰香、煨葛根。"参见脾瘅、消渴条。

口角流涎 证名。指口角自流清涎的症象。多因脾气虚衰，不能收摄津液所致。《景岳全书·杂证谟》："口角流涎者，太阴脏气之脱也。"《医钞类编》卷十二："舌纵涎下多唾或口角流涎不止，口眼㖞斜，手足痿软，神龟滋阴丸。"《张氏医通》卷一："卒然晕倒，口眼㖞斜，口角流涎者，气虚挟痰也。六君子加秦艽、天麻、姜汁、竹沥。"

口辛 指口内有辛辣味的感觉。《医学入门·口舌唇》："肺热口辛。甘桔汤、泻白散。"《张氏医通》卷八："口辛，肺气上溢也。生脉散加桑皮、地骨皮、黄芩。"

口苦 指口内有苦味的感觉。多由热蒸胆汁上溢所致。《灵枢·邪气藏府病形》："胆病者，善太息，口苦。"《素问·痿论》："肝气热，则胆泄，口苦。"为伤寒少阳病主证之一。《伤寒论·辨少阳病脉证并治》："少阳之为病，口苦咽干目眩也。"治宜和解，方用小柴胡汤加减。杂病亦可见此症。《景岳全书·口舌》："凡以思虑劳倦色欲过度者，多有口苦舌燥，饮食无味之证。此其咎不在心脾，则在肝肾，心脾虚则肝胆邪溢为苦。"

口咸 指口内有咸味的感觉。《医学正传·口病》："肾热则口咸。"《张氏医通》卷七："口咸，肾液上乘也。六味地黄丸，加五味乌鲗骨。"《奇效良方·口舌门》："五脏之气偏，由是诸疾生焉。且咸则为寒。"属虚寒者，用附桂八味丸加五味子，属肾热者，用滋肾丸。

口㖞 证名，亦称口僻。指口唇歪斜于一侧的症象。出《灵枢·经脉》。多由风寒阻滞经脉所致。《诸病源候论·风口㖞候》："风邪入于足阳明手太阳之经，遇寒则筋急引颊，故使口㖞僻，言语不正，而目不能平视，诊脉浮而迟者可治。"《金匮翼》卷一："风入耳中，亦令口㖞。缘坐卧处对耳有窍，为风所中，筋牵过一边。"治宜祛风散寒，通络活血为主。亦可用外敷法。参见口眼㖞斜条。

口臭 指口内呼出秽浊的臭气。《诸病源候论·口臭候》："口臭，由五藏六府不调，气上胸鬲。"《杂病源流犀烛·口齿唇舌病源流》："虚火郁热，蕴于胸胃之间，则口臭，宜加减甘露饮，或心劳味厚之人，亦口臭，宜加减泻白散，或肺为火烁亦口臭，宜消风散、加减泻白散，或吐脓血如肺痈状而口臭，他方不应，宜升麻黄连丸。"

并可用香薷、藿香煎汤含漱。

口眼歪斜 证名。亦作口眼㖞斜。《景岳全书·非风》："口眼歪斜者，足阳明及肝胆经病。"详见口眼㖞斜条。

口眼㖞斜 证名。出《灵枢·经筋篇》。亦称口眼歪斜。指口眼向一侧歪斜的症象。多由经脉空虚，风痰乘袭所致。《医学发明·中风》："中血脉则口眼㖞斜。"《证治要诀》卷一："中风之证，卒然晕倒不知人，或痰涎壅盛，咽喉作响，或口眼㖞斜，手足瘫缓，或半身不遂，或舌强不语。"治用小续命汤、疏风汤等方。又"有无故口眼㖞斜，投以中风药剂不效，盖缘骨虚受风所致，……川乌一味，决不可少，宜炮熟用。"参见中风、口㖞条。本证可见于脑血管意外、面瘫等。

口淡 指口内有淡而无味的感觉。《世医得效方》卷十七："虚则口淡。"《景岳全书·口舌》："凡大劳大泻大汗大病之后，皆能令人口淡无味，亦岂皆胃火使然耶。"《医学正传·口病》："有口淡者，知胃热也。"有虚、实之别，虚者可见于病后胃虚，宜健脾和胃，用六君子汤加味；实者多由胃热所致，当清热为主，宜甘露饮加减。

口渴 渴之俗称。详渴条。

口酸 指口内常有酸味的感觉。《医学入门·口舌唇》："肝热口酸而苦。"多由肝热上犯，或肝热乘脾，宿食停积所致。治宜疏肝泄热，用小柴胡汤、当归龙荟丸等方；肝热乘脾，宜左金丸加神曲、龙胆草等；宿食停积而见口酸嗳腐者，当消积导滞为主。

口鼻出血 证名。指血从口鼻涌溢而出。多因热盛迫血妄行，或血脉脏器受损所致。《杂病广要·诸血病》："口鼻出血，是肺胃上脘有损破。"《世医得效方·失血》："口鼻出血不止，名脑衄。"本症可见于肺结核大咯血，支气管扩张大咯血，肝硬变之食管与胃底静脉曲张破裂，以及鼻腔较大动脉破裂。参见脑衄、吐血、鼻衄等条。

口噤 证名。指牙关紧急，口不能张开的症状。见《金匮要略·痉湿暍病脉证治》。可因内有积热，外中风邪，痰凝气滞，瘀阻经络所致。《医碥》卷一："口噤即牙关不开也。由气血凝结于牙关筋脉，不能活动，以苏合丸或生南星为末擦牙或以郁金、藜芦末搐鼻或针人中颊车。"《张氏医通》卷一："口噤不能开，肝风乘胃故也。……风邪乘虚入其筋则挛，故令口眼㖞斜，牙关急而口噤也。秦艽升麻汤。""痰迷心窍，昏愦，口噤不能言，涤痰汤。"本症可见于中风、痉病、惊厥等疾患。参见中风等条。

口糜 证名。指口腔内泛现白色糜点，形如苔藓。《素问·至真要大论》："火气内发，上为口糜。"《杂病源流犀烛·口齿唇舌源流》："脏腑积热则口糜，口糜者，口疮糜烂也，宜局方凉膈散；心热亦口糜口疮多赤，宜花粉末掺之；肺热亦口糜，口疮多白，宜黄柏、苇拨末掺之良久，以水漱口。膀胱移热于小肠亦口糜，宜移热汤、柴胡地骨皮汤；心脾有热亦口糜，宜升麻散；三焦火盛亦口糜，宜回春凉膈散；中焦不足，虚火上泛亦口糜，或服凉药不效，宜理中汤；阴亏火泛亦口糜，宜四物汤加知柏；内热亦口糜并咽喉肿痛，宜冰柏丸。"

山瘴疟 病名。见《诸病源候论·山瘴疟候》，即瘴疟，详见该条。

〔丿〕

久心痛 病名。指心痛久延不愈者。《诸病源候论·心痛病诸候》："久心痛者，是心之支别络，为风邪冷热所乘痛也。……发作有时，经久不瘥也。"参心痛条。

久头痛 病名。指经久不愈的头痛症。《丹溪心法附余·风热门》："久头痛病，略感风寒便发，寒月须重绵厚帕包裹者，此属郁热，本热而标寒。"《明医杂著》薛立

斋注："久头痛……多主于痰，痛甚者乃风毒上攻，有血虚者，有诸经气滞者，有气虚者，有四气外伤，有劳役所伤，有可吐者，有可下者，当分虚实寒热兼变而治之。"多属气血阴阳内伤，或内挟痰涎风火，郁遏头部经络，气血壅滞所致。如头风、偏头风、气虚头痛、血虚头痛、郁热头痛、痰厥头痛等，多属久头痛。详各条。

久疟　指疟疾久延不愈者。《诸病源候论·久疟候》："夫疟皆由伤暑及伤风所为，热盛之时，发汗吐下过度，府藏空虚，营卫伤损，邪气伏藏，所以引日不瘥，仍故休作也。"疟见气虚则寒，血虚则热；胃虚则恶寒，脾虚则发热；若阴火下流则寒热交发而疟作；或微寒微热，面白神萎，口淡无味，胃呆纳差，大便溏薄等。治宜益气养血，温阳化阴。方用补中益气汤、人参养荣丸等。倘阳虚明显，则用桂附八味丸等，以益火之源，而消阴翳。参见疟疾条。

久泄　病症名。见《素问病机气宜保命集·泄泻论》。又称久泻。指泄泻日久不愈，或兼见脱肛者。多因正虚气陷所致。治宜补虚、固涩。若因邪恋正虚，则宜扶正祛邪兼顾。详久泻、气陷泄泻、滑泄条。

久泻　病证名。指泄泻之久延时日而不愈者。《寿世保元·泄泻》："大抵久泻，多由泛用消食利水之剂，损其真阴，元气不能自持，遂成久泻。"《张氏医通·大小府门》："久泻，谷道不合，或脱肛，乃元气下陷，大肠不行收令而然。补中益气加诃子、肉果、五味、乌梅肉为丸，或四君子加防风、升麻。"参泄泻条。

久咳　指经久不愈的咳嗽。出《素问·咳论》。又称久咳嗽、久嗽。多因外邪留恋，脏腑内伤，气虚血亏，七情郁结等所致。《太平圣惠方》卷四十六："久咳嗽者，由肺虚极故也。肺气既虚，为风寒所搏，连滞岁月而嗽也。此皆阴阳不调，气血虚弱，风冷之气搏于经络，留积于内，邪正相并，气道壅涩，则咳嗽而经久不差也。"《万病回春》卷四："大抵久嗽者，多属肾气亏损，火炎水涸，或津液涌而为痰者，乃真脏为患也。"《医方集解》："久嗽有痰者，燥脾化痰，无痰者，清金降火。盖外感久则郁热，内伤久则火炎，俱要开郁润燥，其七情气逆者，顺气为先，停水宿食者，分导为要，气血虚者，补之敛之。"《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："久咳者，属虚属郁。有由气虚者，宜补中益气汤；有由血虚者，宜阿胶四物汤；有由血虚火盛，喘咳声嘶者，宜芩连四物汤；有气血两虚者，宜宁肺汤；有虚劳嗽，痰热渴汗者，宜滋阴清化丸；有虚劳咳血痰喘者，宜五汁膏；有虚劳嗽一二声，无痰，夜则发热，过则冷，睡多梦者，宜劫劳散；有火郁于肺，咳则有声无痰者，宜桔梗汤；有湿痰内郁，痰出则咳少止，少顷又咳者，宜加味二陈汤；而又有咳久伤脾，满面生疮者，宜人参蛤蚧散；有久咳失音者，宜杏仁膏、清肺汤；有久咳失气者，宜劫嗽丸；有久咳面目浮肿者，宜葶苈散；有久咳不止，诸药不效者，宜噙化丸、立效方；有久咳成痨者，宜保和汤；有久咳经年，百药不效，余无他症，与劳嗽异者，宜百部膏、乌梅膏；有痰郁火邪在中，成干咳嗽者，此症极难治，先用开剂，宜逍遥散，重加桔梗，后用补阴之品，宜本事鳖甲丸加熟地、当归、白芍、麦冬、阿胶、茯苓之属。"

久咳嗽　见《太平圣惠方》卷四十六。即久咳。详该条。

久衄　见《圣济总录》卷七十。指鼻出血经久不愈。《诸病源候论·鼻病诸候》："鼻衄，由热乘血气也。肝藏血，肺主气，开窍于鼻。劳损藏府，血气生热，血得热则流散妄行，随气发于鼻者名为鼻衄。藏虚不复，劳热停积，故衄经久不瘥。"常伴见面色无华，头目昏眩。可选用桑根白皮丸、榴花散、血余散、阿胶汤、铅丹散等方。

久聋　病名。指耳聋久不愈者。《诸病

源候论·久聋候》："足少阴肾之经，宗脉之所聚，其气通于耳，劳伤于肾，宗脉虚损，血气不足，为风邪所乘，故成耳聋。劳伤甚者，血虚气极，风邪停滞，故为久聋。"《医林绳墨》卷七："体虚不足而久聋者，宜以养血滋阴降火为要。……久聋难治，先用小柴胡汤清痰理气以治其标，后用补中益气汤扶阳益阴以治其本。"《医学心悟·耳》："若久患耳聋，则属肾虚，精气不足，不能上通于耳，宜用六味地黄加枸杞、人参、石菖蒲、远志之类。"参见耳聋条。

久喘 病证名。见《东医宝鉴·喘证》。❶指喘证久延不愈者。多表现为正气虚衰，痰饮壅阻的证候。《丹溪心法·喘》："凡久喘之证，未发，宜扶正气为主；已发，用攻邪为主。"❷指久病气短不能接续，似喘非喘者。《医学入门·喘》："久病气短，不能接续，似喘非喘者，单人参汤。"亦可用人参润肺丸等培固元气、补肺平喘。参积年肺气条。

久痢 指痢疾久延不愈者。见《诸病源候论·痢病诸候》。多因痢症久延，脾胃亏损，中气下陷所致。症见大便常带粘冻血液，腹部隐痛，虚坐努责，甚至脱肛，肌肉消瘦，神疲乏力，食欲减退等。《丹溪心法·痢》："下痢久不止，发热者，属阴虚，用寒凉药，必兼升散药并热药。"又："其或久痢后，体虚气弱，滑下不止，又当以药涩之。可用诃子、肉豆蔻、白矾、半夏。甚者添牡蛎，可择用之，然须用陈皮为佐，恐大涩亦能作痛。"《景岳全书·杂证谟》："久痢阳虚，或因攻击寒凉太过，致竭脾肾元神而滑脱不止者，本原已败，虽峻用温补诸药，亦必不能奏效矣，宜速灸百会、气海、天枢、神关等穴以回其阳。"《张氏医通·大小府门》："久痢不瘥，虽所下渐减，而津血枯槁，肛门涩滞者，千金羊脂煎，润以导之。""久痢，虚冷，滑脱，脉细，皮寒，少气，畏食，不能言，或时发虚热者，附子理中汤，加肉桂、肉果、诃子。"《慎斋遗书·痢》："久痢必用制过乳香、没药，行气行血。盖气行则后重自除，血行则便脓自止，再用白芷以醒脾，人参以补气，甘草、白芍以和中。痢久，小腹痛，破故、小茴、杜仲以固肾，痢不止加续断；久痢，腹痛，如湿热为害里急后重者，用姜汁炒川连。"一般治久痢脱肛，脾虚下陷，宜用三奇散、补中益气汤；肾气不固，用桑螵蛸散；阴血已亏，湿热未尽，用驻车丸；脾肾阳虚，渐见滑脱者，用桃花汤、真人养脏汤等方。参见痢疾、虚痢等条。本病可见于慢性结肠炎、局限性肠炎、溃疡性肠结核、慢性细菌性痢疾及阿米巴痢疾等疾患。

久腰痛 又称积年腰痛。指腰痛反复发作，经久不愈者。《诸病源候论·腰背病诸候》："夫腰痛皆由伤肾气所为。肾虚受于风邪，风邪停积于肾经，与气血相击，久而不散，故久腰痛。"多因肾气不足或肾虚邪恋所致。治疗以补肾为主，或兼祛邪。参腰痛、内伤腰痛等条。

久痰 痰证之一。指痰液在体内停积日久的病证。《明医杂著·痰饮》："久而重者，黄浊稠结，咳之难出，渐成恶味，酸辣腥臊咸苦，甚至带血而出，"亦可见潮热咳嗽，有似内伤阴火。宜用熟地、茯苓、山药、苡仁、芡实、萸肉、五味、车前、益智仁等。参见痰证条。

久嗽 见《圣济总录》卷六十五。详久咳条。

久癖 病名。指癖病积年不愈者。《诸病源候论·癖病诸候》："久癖，谓因饮水过多，水气壅滞，遇寒热气相搏，便成癖，在于两肋下，经久不瘥，乃结聚成形段而起，按之乃水鸣，积有岁年，故云久癖。"参癖有关条。

〔丶〕

亡血 统指血液的失亡。可见于伤寒误

治。《注解伤寒论·辨脉法》："病人脉微而濇者，此为医所病也。大发其汗，又数大下之，其人亡血。"如吐血、衄血、便血、尿血等失血量较多，血气亏损，亦可称为亡血。亡血可由多种病因导致，治法亦异。参血证有关条。

亡阳　❶阳气失亡，以汗出不止为主症。《伤寒论·辨少阴病脉证并治》："病人脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也。"《张氏医通·杂门》："汗出不止，名曰亡阳。以附子理中加黄芪，外用温粉扑之。"参见亡阳症条。❷作无阳解。《伤寒论·辨少阴病脉证并治》："少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也。"《脉经》卷七："少阴病脉微，不可发其汗，无阳故也。"

亡阳汗　证名。即阳气欲绝之汗多证。《医略六书·杂病证治》："亡阳汗者，……每每病笃虚极之人，多有头面汗淋，口鼻俱冷，而手足青色，气促不止者，急宜温补以追欲绝之阳。"参亡阳条。

亡阳症　证名。❶指汗多阳气亡逸之症。《杂病源流犀烛·诸汗源流》："汗多不止，真阳亡脱，名曰亡阳症。其身体必冷，多成痹寒或四肢拘急，宜桂枝附子汤。"伤寒病发汗过度，易致亡阳。《伤寒论》用大青龙汤有"汗多亡阳，遂虚"之说。❷指惊狂症状。因伤寒误用火法所致。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："伤寒脉浮，医以火迫劫之，亡阳，必惊狂，卧起不安者，桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤主之。"❸亡作无解，又名无阳症。《杂病源流犀烛·诸汗源流》："又阳虚亡阳，汗不得出，亦曰亡阳症。"参亡阳、亡阳汗、无阳症条。

亡阴　阴血耗损的危重证候。多由高热、汗吐泻、出血或其它慢性消耗发展所致。临床表现为身体干瘪、皮肤皱折或眼眶深陷，精神烦躁或昏迷谵妄。本证与亡阳之别在于：虽有汗出但身热、手足温，口渴而喜冷饮，呼吸气粗，唇舌干红，脉虚数或细数。治宜滋阴增液或养津固气。《医学源流论·亡阴亡阳论》："经云：夺血者无汗，夺汗者无血。血属阴，是汗多亡阴也。……亡阴之汗，身畏热，手足温，肌热汗亦热而味咸，口渴喜凉饮，气粗，脉洪实，此其验也。"

〔尸〕

尸注　九注之一。见《诸病源候论·尸注候》。主要表现为寒热淋沥，沉沉默默，腹痛胀满，喘息不得，气息上冲心胸，挛引腰脊，举身沉重，精神杂错，恒觉惛谬，每逢节气改变，辄致大恶，积月累年，渐就顿滞，以至于死。死后复易傍人，乃至灭门。以其尸病、注易傍人，故名尸注。可用五尸丸治之。

尸疰　病名。见《太平圣惠方》卷五十六。即尸注。详该条。

尸厥　厥证之一。指厥而其状如尸的病证。❶即尸蹷。《素问·缪刺论》："邪客于手足少阴、太阴及足阳明之络，此五络皆会于耳中，上络左角，五络俱竭，令人身脉皆动，而形无知也，其状若尸，或曰尸厥。"《医林绳墨·厥》："或有尸厥者，因而元本空虚，及入庙堂冢墓，心觉惊闪，偶尔中恶之气冒感卒然，手足冰冷，肌肤粟起，头面青黑，精神不守，错言妄语，牙关紧急，不知人事，卒然而中，此尸厥也，宜以苏合香丸灌之，俟用二陈汤加苍术、香附、当归、厚朴之类。"❷即飞尸、卒厥。《证治要诀·厥》："尸厥，即飞尸、卒厥。"参见该条。❸指神游失守暴亡。《素问·本病论》："神游失守其位，即有五尸鬼干人，令人暴亡也，谓之曰尸厥。"

尸蹷　厥证之一。即尸厥。指厥而其状如尸者。《素问·缪刺论》："邪客于手足少阴太阴足阳明之络，……五络俱竭，令人身脉皆动，而形无知也，其状若尸，或曰尸厥。"《葛洪肘后备急方·救卒死尸蹷方》：

“尸厥之病，卒死而脉犹动，听其耳中，循循如啸声，而腹间暖是也，耳中虽然啸声而脉动者，故当以尸厥。”参尸厥等条。

女劳复 古病名。见《三因极一病证方论·劳复证治》。男子病后，因房劳而复发。亦泛指男、女病后，因房事而病复发者。详房劳复条。

女劳疸 五疸之一。多因房劳伤肾，瘀血内阻所致。《金匮要略·黄疸病脉证并治》：“额上黑，微汗出，手足中热，薄暮即发，膀胱急，小便自利，名曰女劳疸。”《症因脉治·黄疸论》：“女劳疸之症，发热恶寒，膀胱急，小腹满，身黄额黑，足心热，大便或黑或溏，腹胀如水。”治宜补肾消瘀为主。方用减黄丹、小菟丝子丸、硝石矾石散等。参黄疸条。

叉手自冒心 证名。指两手交叉覆按心胸。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。”《伤寒溯源集》注：“发汗过多，则阳气散亡，气海空虚，所以叉手自冒覆其心胸，而心下觉惕惕然悸动也。……此以误汗亡阳，心胸真气空虚而悸动，故欲得按也。”

小中 病名。指中风轻症。《世医得效方·风科》：“中风要说：若风归手足，名曰小中。”《杂病源流犀烛·中风源流》：“小中者何？其风之中人，不至如脏腑血脉之甚，止及手足者是也。若遇小中症，切不可用正风药深切治之，或至病反引而向里，只须平和之剂调理。”

小中风 病名。指头晕眼花、跌仆不知人事而随即恢复者，不似中风之跌仆昏迷不醒、肢体瘫痪。《景岳全书·杂证谟》：“但忽运而忽止者，人皆谓之头运眼花；卒倒而不醒者，人必谓之中风中痰。不知忽止者，以气血未败，故旋见而旋止，即小中风也。”本病相似于一过性脑缺血。参眩晕、中风条。

小伤风 病名。《中国医学大辞典》：“即伤风，称为小者，别于伤寒之中风也。”参伤风条。

小伤寒 病名。一名冒寒。亦称四时感冒。外受风寒之轻者。《通俗伤寒论·伤寒本证》：“小伤寒，一名冒寒，通称四时感冒。如冒风感寒之类，皆属此病。【因】四时偶感寒气，或因贪凉冒风。【证】肌肤紧缩，皮毛粟起，头痛怕风，鼻塞声重，频打喷嚏，清涕时流，身不发热，故无传变。舌如平人，苔或白薄而润。”治宜辛散轻扬，疏解宣肺，如葱白香豉汤等方。参大伤寒、伤寒、感冒、风寒感冒条。

小肠气 病名。即疝气。见明·何瑭《医学管见》。《三因极一病证方论·疝叙论》：“疝之为病，……世人称为横弦、竖弦、膀胱小肠气、贼风入腹等，名义不同，证状则一。”证见脐下疠痛连腰脊，控睾丸而痛等。治宜小茴香圆等方。参见疝条。

小肠手太阳经病证 指手太阳小肠经经气异常而致的病证。《灵枢·经脉篇》：“小肠手太阳之脉，……是动则病嗌痛，颌肿，不可以顾，肩似拔，臑似折。是主液所生病者，耳聋，目黄，颊肿，颈、颔、肩、臑、肘、臂外后廉痛。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。”《脉经·小肠手太阳经病证》除上列“是动、所生”病外，尚列举了小腹痛、腰脊控睾而痛、下重便脓血、暮发热等症。

小肠胀 胀病之一。《灵枢·胀论篇》：“小肠胀者，少腹膜胀、引腰而痛。”《医醇剩义·胀》：“小肠为受盛之官，居胃之下，受盛水谷而分清浊，水液渗于前，糟粕归于后，寒气上逆，则化物不出，故小腹膜胀，引腰而痛也。当分理水谷，俾二便通行，则胀满自解，通幽化浊汤主之。”参胀病条。

小肠泄 病名。《难经·五十七难》：

“小肠泄者，溲而便脓血，少腹痛。”《素问病机气宜保命集》用承气汤、加减平胃散、七宣丸、香连丸、芍药藥皮丸等方。

小肠咳　病名。指咳而肠中排出气体者。《素问·咳论》：“心咳不已，则小肠受之；小肠咳状，咳而失气，气与咳俱失。”治用芍药甘草汤，清宫丸或桔梗汤加人参、茯苓、橘红、五味等。参见咳嗽条。

小肠病　六腑病候之一。小肠受盛胃中水谷，主转输清浊。与心相为表里。其病有寒热虚实之分。多由客寒蕴热、气滞郁结或气虚不禁所致。临床表现多见二便失常，并可兼见心经症状。《灵枢·邪气藏府病形篇》：“小肠病者，小腹痛，腰脊控睾而痛。”《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》：“小肠有寒者，其人下重便血，有热者，必痔。”《太平圣惠方》卷四：“若虚则生寒，寒则肠中痛，惊跳，乍来乍去，小便数，此则小肠虚冷之候也。”又“小肠实则生热，热则心下急痹，口张，舌上生疮，身热来去，汗出，心烦身重，小腹胀急，小便赤涩不利，则为小肠实热之候也。”《杂病源流犀烛·小肠病源流》：“小肠气，小肠经病也，小腹引睾丸，连腰脊而痛。”“小肠痈，小肠火热病也。……其症发热恶寒，脉芤而数，肤皮错纵，腹急渐肿，按之内痛，大便重坠，小便濇滞若淋。”治宜通利小肠、清心泻火等法。参见小肠病各条。

小肠蒸　二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详该条。

小便不利　证名。出《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。泛指小便量减少、排尿困难及小便完全闭塞不通。《卫生宝鉴》卷十七：“小便不利者有三，不可一概而论也。若津液偏渗于肠胃，大便泄泻而小便涩少，一也，治宜分利而已。若热搏下焦津液，则热湿而不行，二也，必渗泄则愈。若脾胃气涩，不能通利水道，下输膀胱而化者，三也，可顺其气，令施化而出也。”《症因脉治·小便不利论》：“小便不通，非一例也。在外感五运中，则有运气加临；伤寒门，则有热结膀胱，湿热发黄，汗下亡津；阴症中，则有寒湿内结；内伤门，则有肺热、心热、肾热、水液偏渗、气化不及、真阴不足诸症。……小便不利，真阳不足者，用肾气丸；真阴不足者，用滋肾丸、知柏地黄丸；热结膀胱者，用五苓散、车前木通汤；心移热于小肠者，用导赤散。此分经用方之大法也。”如因阴虚、发热、大汗、吐泻、失血等导致化源不足而小便不利者，治宜滋阴养血为主，不宜渗利。方用增液汤、养荣汤、十全大补汤等。因肺气失宣、脾虚不运、肾关不利、三焦决渎失常等导致水湿失运而小便不利者，治宜宣通肺气、健运脾胃、温补肾元、疏通三焦等法，方用生脉散加桔梗、实脾饮、八味丸、疏凿饮子等。因肺热气壅、热结膀胱、气机郁滞、瘀腐阻塞水道、肾元虚衰、胞转等导致尿蓄膀胱而小便不利者，治宜审察病情，分别采用清肺、泄热、理气、化瘀、温肾、渗利等法。参癃闭、气闭、转胞、外感小便不利、内伤小便不利等条。

小便不禁　证名。又称小便失禁。指清醒时小便自出不觉，或小便频数、难以自制者。《诸病源候论·小便病诸候》：“小便不禁者，肾气虚，下焦受冷也。肾主水，其气下通于阴。肾虚下焦冷，不能温制水液，故小便不禁也。”《丹溪心法》卷三：“小便不禁者，属热属虚。”本症属虚寒者居多，小便自遗而色清；因热者，小便频数不能自制，尿色黄赤。肺虚者，宜补中益气汤。肾与膀胱虚冷者，宜菟丝子散、固脬丸、家韭子丸等方。心气不足者，恐惧则遗，宜用归脾丸。膀胱火邪妄动者，则宜清利，用鸡肠散、白薇散、神芎导水丸及四苓散合三黄汤等方。又有肝郁热结者，胁腹作胀，尿意急迫，甚则不禁，宜用逍遥丸加减。热病昏迷、中风、癫痫症等均可见小便失禁。

参外感遗尿、内伤遗尿条。

小便不通 证名。见《诸病源候论·小便病诸候》。即癃闭。详该条。

小便失禁 证名。见《备急千金要方·淋闭》。又称小便不禁，详该条。

小便多 证名。又称小便利多、漩多。《证治要诀·大小府门》："小便多者，乃下元虚冷，肾不摄水，以致渗泄。"症见小便次数增多而清长，或夜间尿多，并可见腰膝痠软，畏寒肢冷，精神困倦等症。治宜温肾固摄，用附桂八味丸、玄兔丹、鹿茸丸、缩泉丸等方，并宜灸命门、关元等穴。小便多又为消渴病主症之一，常伴见多饮、多食，详消渴条。

小便闭 证名。指小便闭塞不通。《素问·标本病传论》："膀胱病，小便闭。"详癃闭条。

小便赤涩 证名。出《素问·本病论》。《圣济总录·大小便门》："膀胱者，津液之府，与肾合而主水，共为表里，行于小肠，入于胞为溲便。今胞内有客热，入于膀胱，致水液不利，故小便赤涩也。"《证治准绳·杂病》："汗多而小便赤涩，暑月多有此证，盛暑所饮既多，小便反涩少而赤，缘上停为饮，外发为汗，津液不通，小肠涩闭，则水不运下，五苓散。……然有虚劳汗多而赤涩者，却是五内枯燥，滋腴既去，不能生津，故溺涩而赤，不宜过用通小便之剂，竭其肾水，唯当温养润肺，十全大补汤、养荣汤之类自足选用。汗者心液，心主血，血荣则心得所养，汗止津生，不待通而溺自清矣。诸失精血及患痈毒人或有小便赤涩之证，此亦是枯竭不润之故，并宜前法。"小便赤涩而频数疼痛者，为淋证，详热淋条。

小便利多 证名。出《诸病源候论·小便病诸候》。又称漩多。即指尿多。《圣济总录》卷九十六："肾者主水，膀胱为府，今肾气不足，膀胱有寒，不能约制水液，令津滑气虚，故小便利多。"详小便多条。

小便余沥 证名。出《诸病源候论·虚劳病诸候》。指小便之后，滴沥不尽的病症。多因肾虚膀胱冷所致。《圣济总录》卷九十二："虚劳小便余沥者，肾气虚弱，而膀胱不利故也，膀胱不利，则气不能化，气不化，则水道不宣，故小便后有余沥。"治宜温补，用肉苁蓉散、二参丸等方。

小便涩痛 证名。指小便排出不畅、疼痛，是淋症的主要症状。《素问玄机原病式》卷一："淋，小便涩痛也，热客膀胱，郁结不能渗泄故也。"详淋条。

小便难 证名。出《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》。指尿少及小便艰涩之证。《诸病源候论·小便病诸候》："小便难者，此是肾与膀胱热故也。"治疗宜瞿麦、滑石之类泻之。太阳病误发汗，阳明中风亦可致小便难。治疗用桂枝加附子汤，小柴胡加茯苓汤等方。详小便不利、癃闭条。

小便黄赤 证名。出《素问·六元正纪大论》。指小便颜色较正常时黄，甚至带红色。有寒热虚实之辨。《杂病源流犀烛》卷七："小便黄赤，实热病也。凡脏腑皆能为之，而下焦更甚。经曰，肝热病者，小便先黄，宜火府丹；又曰，胃气盛，则身以前皆热，消谷善饥，溺色黄，宜凉胃汤。此二条言肝胃有实热，故黄赤也。又曰肺气虚则肩背痛寒，少气不足以息，溺色变，宜加味补中益气汤。又曰冬脉不及，令人胁清脊痛，小便变，宜温肾汤，此二条言肺肾虚寒，故黄赤也。……又曰，中气不足，溲便为之变，宜加味补中益气汤，此一条言脾家虚，故黄赤也。又曰，小便黄者，小腹中有热也，此则言下焦之热，不可不清之利之者，宜四苓散。然下焦之热，岂但是哉。或由肾虚有火，宜补阴丸。或由膀胱畜热，宜葵子汤。亦或由小肠燥结，宜赤茯苓汤。固当分别治之。"如肝热而溺赤，尿频涩痛，时觉凛凛，或发寒热，宜龙荟丸；阴虚火旺而溺赤

者，咽干口燥，口舌碎痛，心烦失眠，舌红，脉细数，宜黄连阿胶汤；肾气虚寒，小便赤，足胫逆冷，脉涩，宜附子四逆汤。黄疸、泄泻、鼓胀、水肿、多汗、热淋等，小便皆可见黄赤，详各条。

小便浑浊　见《素问玄机原病式·热类》。见便浊条。

小便频数　证名。《张氏医通》卷七："脬气不足，小便频数，昼甚于夜者，缩泉丸；或时清利过多，或时频数赤涩者，旧用萆薢分清饮，多不应，改用加减八味丸，效；若夜起小便多者，八味丸加五味子；数而少为实热，宜渗之，五苓减桂加滑石、甘草；数而色黄，虚热也，宜滋阴六味丸；数而多，色白体羸，为真阳虚，升气少而降气多，须补右肾相火，八味丸加补骨脂鹿茸。"《明医杂著》卷三："盖膀胱火邪妄动，水不得宁，故不能而频数来也。故年老人多频数者，是膀胱血少，阳火偏旺也，治法当补膀胱阴血，泻火邪为主，而佐以收涩之剂，如牡蛎、山茱萸、五味子之类。……若小便频数或劳而益甚，属脾气虚弱，用补中益气汤加山药、五味子。"若妇人小便频数，量少急迫，腹部觉胀，为肝郁气结，治宜舒肝理气，用逍遥散。如小便频数涩痛者，为淋症；小便频数量多，或尿如脂膏，或多饮、多食，为消渴病。详见该条。

小便数　证名。出《灵枢·经脉篇》。又称小便频数，详该条。

小结胸　病名。结胸之一。指痰热互结心下，按之则痛者。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。"参结胸条。

小雷头风　病名。指雷头风病势较轻者。《证治准绳·杂病》："若痛从小至大，大便先润后燥，小便先清后涩，曰小雷头风。"详雷头风条。

小腹结痛　证名。见《华氏中藏经·论肾脏虚实寒热生死逆顺脉治》。结，指邪气结聚。亦有作急结解。小腹结痛，可见于下焦多种疾患，如瘀结膀胱，寒凝下焦，滞积肠腑及邪气入肾与血室等。

小腹痛　证名。出《素问·藏气法时论》。又称少腹痛。指下腹部疼痛。《医林绳墨·腹痛》："若自脐以下而腹作痛者，名曰小腹痛。"《景岳全书·杂证谟》："下焦小腹痛者，或寒或热，或食或虫，或血或气，逆皆有之。凡闭结者，利之下之，当各求其类而治之。"《证治汇补·腹痛章》："小腹为至阴之位，厥阴所属，有沉寒下虚，有积热内郁，或忿怒所至，或房劳损伤，俾中上二焦清纯之气，下陷于至极之地，郁久不舒，痛连阴器，久则元气愈虚，不能归复本位，所以痛无止耳。然肝主疏泄，不利峻补，总宜调补气血为主。"治疗如气滞用四磨汤；血瘀用手拈散；寒郁以二陈汤加干姜、吴萸、苍术、厚朴；热郁以四逆散加黄连、山栀、香附、黄芩；沉寒以理中汤加附子、肉桂、吴萸、茴香；气陷以二陈汤加升麻、柴胡、干姜、当归；若醉饱行房，小腹胀痛，用当归、芍药、川芎、柴胡、青皮、吴萸、甘草之类。参见腹痛、少腹痛条。

小腹痛痧　痧证之一。《痧胀玉衡·小腹痛痧》："痧毒入大小肠，则小腹大痛不止，形如板锥，绞绞不已，治之须分左右二股，屈伸为验。"若左卧，左足不能伸者，为大肠、小肠经痧；若右卧，右足不能屈伸者，为阳明大肠经痧。治宜刺腿弯痧筋，药用红花汤、枳实大黄汤等。参痧条。

小腹痛满　证名。指脐腹部胀满疼痛。《张氏医通·腹痛》："小腹痛满有三，皆为内有留着，非虚气也。"常由燥结大肠，热结膀胱或下焦蓄血所致。如症见便秘，小腹按之坚满，绕脐攻痛，小便黄赤，脉数实有力者，为肠腑邪实，宜大承气汤。若因津血枯澹而结者，麻仁丸、通幽汤、蜜煎导、猪胆汁导等可选用。如溺闭不通，腹满按之

不坚，弹之有声激指，烦渴引饮，脉数盛有力者，为热结膀胱，宜五苓散、猪苓汤等方。如症兼善忘如狂，或渴而漱水不饮，腹满，小便清利者，为血结膀胱，宜代抵当丸。若邪据下焦，真阳虚衰，可减硝黄倍桂加附子。若因房劳强力忍精，致少阴与任督受伤，血结阴分者，症见小便滴数，胀满如淋，宜生料济生肾气丸，红酒煎服。参见小腹痛、小腹结痛等条。

小腹满 指脐下部胀满。一名少腹满。《医宗必读》卷五："小腹满，脐下满也。胸腹满为邪气，小腹满为有物。小腹满，小便利，蓄血也，重者桃红承气汤，轻者犀角地黄汤。小腹鞕满，小便自利，发狂者，抵当汤。腹满手足厥冷，真武汤。不结胸，小腹满，按之痛，冷结也，灸关元穴。"参见癃闭、伤寒蓄血、腹满条。

小痹 病名。指邪在孙络，随脉往来的一种痹病。因邪入未深，故称小痹。《素问·气穴论》："其小痹淫溢，循脉往来，微针所及，与法相同。"《黄帝内经素问合纂》张志聪注："小痹者，谓邪始入于皮肤，未伤筋骨。脉，谓孙络脉也。"

飞尸 古病名。指一种突然发作危重疾患。《太平圣惠方》卷五十六："飞尸者，发无由渐，忽然而至，若飞走之急疾，故谓之飞尸。其状心腹刺痛，气息喘急，胀满上冲心胸也。……治飞尸，在人皮中，又名恶脉，又名贼风。发时头痛，不在一处，针灸则移，发时一日半日方微差，须臾复发，细辛散方。"亦可用瓜蒂散、蜥蜴圆等方。

子母疟 病名。疟疾之一。《医略十三篇》卷九："有日一作，夜一作，俗名子母疟。……或间疟，当期日二作，俗名间日子母。"参见疟疾条。

马痫 病名。六畜痫之一。即马癫。《备急千金要方》卷五："马痫之为病，张口摇头，马鸣欲反折。灸项风府、脐中二壮。"参见六畜痫、马癫条。

马癫 病名。❶五癫之一。《诸病源候论》卷二："五曰马癫，发作时时反目，口噤，手足相引，身体皆然。"❷即马痫。痫症发时如马鸣状。《景岳全书》卷三十四："马痫、牛痫、猪痫、羊痫、鸡痫者，即今人之谓羊癫、猪癫也。此不过因其声之相似，遂立此名。"参见痫条。

四 画

〔一〕

天白蚁 病名。❶即脑鸣。见《医学纲目·头风痛》。详该条。❷指喉癣经久失治，霉烂起腐，旁生小孔如蚁蛀蚀。预后多不良（《中医临证备要》）。

天行 病名。疫的别称。见《肘后备急方》卷二。《三因极一病证方论·叙疫论》："疫病者，……一方之内，长幼患状，率皆相类者，谓之天行是也。"参疫、时疫、瘟疫等条。

天行头痛 病证名。指传染性疾病而见头痛者。《症因脉治·外感头痛》："头痛之症，初起不因内伤，忽尔头额作痛，沿门多病，大小传染，此外感岁运之气，所谓天行症也。"多因湿毒侵袭，搏于经络所致。症见头痛，身发寒热，头面腑肿，赤色烦红等。治宜清热解毒为主，选用羌活败毒散、普济消毒饮等方。参头痛条。

天行嗽 病证名。指感时行之气，或四时感受风寒所致的咳嗽。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："天行嗽，感时行之气作咳也。盖因时令不正，人多感冒，以致痰盛，寒热，或鼻塞声重，宜人参饮子、一服散。

而亦有四时感受风寒作嗽，不尽由一时天行之气者，宜参苏饮。”参见时行嗽、咳嗽条。

天柱骨倒　证名。项软的别称。《东医宝鉴·外形篇》：“项软者，天柱骨倒也。”《医医偶录》卷二：“天柱骨倒者，督脉空也，右归饮主之。”详项软条。

无汗　证名。出《素问·脉要精微论》。泛指当出汗时而不出汗的症候。常因邪闭、表实、津血不足等因所致。伤寒无汗，有邪在表者，有邪行里者，有水饮内蓄者。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病，头痛发热，……恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。”“伤寒脉浮，发热无汗，……渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。”“服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛，小便不利者，桂枝汤去桂加茯苓白术汤主之。”有盛夏当出汗而无汗者。《赤水玄珠·汗门》引丹溪曰：“盛夏浴、食无汗为表实。”又有阴血耗伤或阳虚而无汗者。《灵枢·营卫生会篇》：“故夺血者无汗。”《伤寒明理论·无汗》：“诸阳为津液之主，阳虚则津液虚少，故无汗。”病情不同，宜审因施治。

无阳证　证名。指阳虚不能作汗之证。《伤寒论大全》卷四：“头痛发热，项脊强，恶寒无汗，用发汗药二、三剂，汗不出者，……殊不知阳虚不能作汗，故有此证，名曰无阳证。”治宜再造散。参亡阳证等条。

木郁　五郁之一。指肝胆郁结之症。出《素问·六元正纪大论》。症见畏寒畏热，头痛颊痛，头晕耳鸣，目赤暴痛，脘腹胀满，吞酸吐食等。治宜疏达。《杂病源流犀烛·诸郁源流》：“木郁风之属，脏应肝，腑应胆，主在筋爪，伤在脾胃，症多呕酸。木喜条鬯，宜用轻扬之药，在表疏其经，在里疏其脏，但使气得通行，均谓之达。”可用达郁汤、开郁至神汤或舒木汤等方。参五郁、郁证条。

木肾　病名。《嵩崖尊生书》卷十三：“木肾，顽痹硬大，或痛或不痛，此肾经虚惫，水火不交，寒冷凝滞之故，惟当温散，使荣卫流转则愈。”外用艾炒热裹丸，冷则频换。

木疝　病名。指睾丸结硬，阴囊皮厚，不知痛痒的一种疝症。《医林绳墨》卷四：“有木疝者，睾丸结硬，不知痛痒，阴囊皮厚，不知长大，重坠难当，是谓木疝。……木疝当宜温和，则补养脾胃，充和元气，其肾不木者矣。温则健脾温中，通调水道，其疝自可者矣。”

五不女　指五种女性生殖系畸形病症。清·卢若腾《岛居随笔》：“五不女，螺、纹、鼓、角、脉也。螺者，牝窍内旋，有物如螺也；纹者，窍小即实女（石女）也；鼓者，无窍如鼓也；角者，有物如角，古名阴挺是也；脉者，一生经水不调及崩带之类是也。”

五不男　指五种男性生殖系病症。清·卢若腾《岛居随笔》：“人有五不男：天、犍、漏、怯、变也。天者，阳痿不用，古云天阉是也；犍者，阳势割去，寺人是也；漏者，精寒不固，常自遗泄也；怯者，举而不强，见敌不兴也；变者，体兼男女，俗名二形。”

五心烦热　证名。指心中烦热伴两手足心有发热感觉。见《太平圣惠方·治骨蒸烦热诸方》。多由心血不足、阴虚火旺或病后虚热不清，以及火热内郁所致。是虚损劳瘵等病的常见症之一。《证治准绳·杂病》：“五心烦热，是火郁于地中。四肢，土也，心火下陷在脾土之中，故宜升发火郁。”又“病暂去而五心常有余热，此属虚证。”《症因脉治·心血虚不得卧》：“心烦躁乱，夜卧惊起，口燥舌干，五心烦热，此心血不足，心火太旺之症也。”《金匮翼·火郁发热》：“火郁者，阳气为外寒所遏，不得宣行，郁而成火，或因胃中过食冷物，郁遏阳气于脾

土之中，令人心烦，手足心热，骨髓中热如火燎，此为郁热。”《杂病源流犀烛·火病源流》：“阳愈盛则阴虚，阴愈虚则为五心烦热。”治宜滋阴降火，清热养阴，清肝理脾等法，选用清骨散、升麻散、千金竹叶汤、逍遥散、茯苓补心汤等方。火郁而宜升发者，用火郁汤加减。参发热、阴虚发热、火郁等条。

五色黄 黄病二十八候之一。见《诸病源候论·黄病诸候》。由脾热引起身黄。若脾更移热于它脏，则于身面、眼目、或舌下并可出现该脏之色。如脾移热于肝则可见眼青黄，面色黄，脉亦青；如脾移热于心，则其人身热而发赤黄，眼赤高视，心腹胀满，脉亦赤；如脾移热于肺，其人身热发黄白，舌下白垢生；如脾移热于肾，则其人身热发黑黄，唇黑眼黄，舌下脉黑等。参黄疸有关条。

五色痢 病名。指痢下脓血呈现多种颜色者。有虚证和实证之分。实证多因止涩太早，或下之未净，热毒留滞肠中所致，虚证多因痢症久延，脏气受损，脾肾两伤所致。亦有正虚邪恋，虚实夹杂者。《张氏医通》卷七：“五色痢，古人皆谓肾病，以肾为藏精之室，所居之位，最下最深，深者既病，其浅而上者，安有不病之理？精室既伤，安能任蛰藏之令乎？仲景所谓五液注下，脐筑揪痛，命将难全者是也。……不知益火消阴，实脾堤水，兼分理其气，使失于气化之积，随之而下，未失气化之津，统之而安。”痢下五色，病机各别。《痢证汇参》卷二：“痢有五色之辨，如下痢肠垢之属，无非气之所化也。但白者其来浅，浮近之脂膏也。赤者其来深，由脂膏而切肤结也。纯下赤者，多以血为热迫，故随溢随下，此则最深者也。若紫红紫白者，则离位稍久，其下不速，而色因一变。……大都纯血鲜红者，多热证，以火性速，逼迫而下也；紫红紫白者，少热证，以阴凝血败损而然也；纯白者，多寒证，脏寒薄滑而然也。又有黄黑二色，则色深而秽臭者为热证，亦有寒者；若浅黄色淡，不甚臭者，此即不化之类，皆寒证也；黑而脓厚大臭者，多火证；若青黑而腥薄者，此肝肾腐败之色也。”沈汉卿《温热经解》中以痢有五色，各有病源。痢色赤，或先白后赤，或赤多白少者，银查芩连汤；痢色黄者，葛根芩连汤；痢色绿者，陈苓术芍甘连汤；痢色纯白，姜苓术草汤、理中汤；脉沉迟者加附子，痢色纯黑如漆，银查姜桂大黄汤。《时病论》卷三以初起者为实，日久者为虚，脉实有力者为实，脉虚无力者为虚。补虚以补火生土法，泻实以清痢荡积法。参痢疾等条。

五劳 ❶指五脏劳伤。见《诸病源候论·虚劳候》。即肺劳、肝劳、心劳、脾劳、肾劳。《证治要诀·虚损门》：“五劳者，五脏之劳也，皆因不量才力，勉强运为，忧思过度，嗜饮无节，或病失调理，将积久成劳。”治法当调心补肾为先，不当用峻烈之剂，惟用温养滋补，以久取效。详肺劳、肝劳、心劳、脾劳、肾劳条。❷指五种劳伤病因。《素问·宣明五气篇》：“五劳所伤，久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋。”❸指情志劳伤。《诸病源候论·虚劳候》：“五劳者，一曰志劳，二曰思劳，三曰心劳，四曰忧劳，五曰瘦劳。”（《千金要方》瘦劳作疲劳。）参虚劳有关条。

五更头晕 病证名。指头部昏晕常在五更时发作。《慎斋遗书》卷九：“五更头晕，阳气不足也。盖阳主动，动则阳气上升，故不晕。五更静极，阳气虚则潜于下，不足于上，所以晕也。”参头晕、阳虚眩晕、晨晕条。

五更泄 病证名。即肾泄。《寿世保元·泄泻》：“五更泄者，肾泄也。”又名五更泻、五更溏泄、晨泄、濛泄。清晨五更之时即泄，多因肾虚所致。五更泄可由多种原因引起。《症因脉治·泄泻论》论五更泄泻

有肾虚五更泄泻、酒积五更泄泻、寒积五更泄泻、食积五更泄泻、肝火五更泄泻之不同，详各该条。

五更泄泻　病证名。见《症因脉治·泄泻论》。即五更泄。详该条。

五更泻　病证名。见《张氏医通·大小府门》。即五更泄，详该条。

五更溏泄　病证名。即五更泄。《不居集·泄泻》："五更溏泄。有肾虚失闭藏之职，五味子丸；亦有食积，香砂枳术丸；寒积理中汤；酒积葛花解醒汤。"详五更泄条。

五更嗽　病证名。指五更时咳嗽，或五更时咳嗽加重的病症。见《松厓医经·咳嗽》。《丹溪心法》："五更嗽多者，此胃中有食积，至此时火气流入肺，以知母，地骨皮降肺火。"《杂病源流犀烛》："五更嗽，或五更痰多，或清晨痰多，总皆脾虚所致宜六君子汤加炮姜。"《张氏医通》卷四："五更嗽甚者，胃中有食积也。二陈汤加枳实，川连以消导之。虚者，六君子加姜汁，炒川连。"参早晨嗽、清晨嗽、咳嗽条。

五郁　五种郁证的总称。《素问·六元正纪大论》："木郁达之，火郁发之，土郁夺之，金郁泄之，水郁折之。"后世将木郁、火郁、土郁、金郁、水郁称为五郁。《景岳全书·杂证谟》："经言五郁者，言五行之化也。气运有乖和，则五郁之病生矣。"详木郁、火郁、土郁、金郁、水郁等条。

五味过伤　伤食之一。见《东医宝鉴》卷四。因过食五味致伤。《医便·饮食论》："五味入口，不欲偏多，多则随其脏腑各有所损，故咸多伤心，甘多伤肾，辛多伤肝，苦多伤肺，酸多伤脾。《内经》曰，多食咸则脉凝涩而变色；多食苦则皮槁毛拔；多食辛则筋急而爪枯；多食酸则肉胝皱而唇揭；多食甘则骨肉痛而发落，偏之为害如此。"参伤食条。

五疝　指五种疝病。《诸病源候论》卷二十："一曰石疝，二曰血疝，三曰阴疝，四曰妒疝，五曰气疝，是为五疝也。"又："五疝之状，寻此皆由腑脏虚弱，饮食不节，血气不和，寒温不调之所生也。"详血疝、气疝、阴疝等条。

五泄　五种泄泻的总称。❶《难经·五十七难》："泄凡有五，其名不同。有胃泄，有脾泄，有大肠泄，有小肠泄，有大瘕泄。"❷《宣明论方》卷十："五泄有溏泄、鹜泄、飧泄、濡泄、滑泄。"详各该条。

五实　指五种实证。《素问·玉机真脏论》："脉盛，皮热，腹胀，前后不通，闷瞀，此谓五实。……身汗得后利，则实者活。"治宜祛邪为主。参实证、五虚条。

五逆　疾病过程中所出现的五种逆证。❶内证之五逆。《灵枢·玉版》："腹胀，身热，脉大，是一逆也；腹鸣而满，四肢清，泄，其脉大，是二逆也；衄而不止，脉大，是三逆也；咳且溲血，脱形，其脉小劲，是四逆也；咳，脱形，身热，脉小以疾，是谓五逆也。"又："其腹大胀，四末清，脱形，泄甚，是一逆也；腹胀便血，其脉大，时绝，是二逆也；咳，溲血，形肉脱，脉搏，是三逆也；呕血，胸满引背，脉小而疾，是四逆也；咳呕，腹胀且飧泄，其脉绝，是五逆也。"《灵枢·五禁》："热病脉静，汗已出，脉盛躁，是一逆也；病泄，脉洪大，是二逆也；著痹不移，胭肉破，身热，脉偏绝，是三逆也；淫而夺形，身热，色夭然白，及后下血衄，血衄笃重，是谓四逆也；寒热夺形，脉坚搏，是谓五逆也。"❷指痈疡病之五逆。《灵枢·玉版》："以为伤者，其白眼青，黑眼小，是一逆也；内药而呕者，是二逆也；腹痛渴甚，是三逆也；肩项中不便，是四逆也；音嘶色脱，是五逆也。除此五者，为顺矣。"

五绝　❶指五脏绝。见《华氏中藏经》卷上。即指心绝、肝绝、脾绝、肺绝、肾绝。详各条。❷指五种卒死候。《备急千金要方》卷二十五："夫五绝者，一曰自缢，二曰墙

壁压迮，三曰溺水，四曰魇寐，五曰产乳绝。”《三因极一病证方论·五绝治法》：“凡魇寐、产乳、自缢、压、溺五者，令人卒死，谓之五绝。”《寿世保元》将自缢、墙壁压、溺水、魇魅、冻死称为五绝。《医学心悟》则指自缢、擿压、溺水、魇魅、服毒五者。

五鬲气 忧膈、恚膈、气膈、寒膈、热膈的总称。见《诸病源候论·五鬲气候》。即五膈。参见该条。

五积 病名。五脏积症之总称。《难经·五十六难》载五脏之积：肝之积名曰肥气，心之积名曰伏梁，脾之积名曰痞气，肺之积名曰息贲，肾之积名曰贲豚。后世称为五积（见《太平圣惠方》卷四十八）。详各该条。

五秘 五种大便秘结病症的总称。《济生方·大便》：“澹寮方云，五脏伤和，三焦气涩，运掉不得，于是乎壅结于肠胃之间，遂成五秘之患。夫五秘者，风秘、气秘、湿秘、寒秘、热秘是也。”多因肠胃不足，风寒湿热乘之，使脏气壅滞，津液不能流通所致。详风秘、气秘、湿秘、寒秘、热秘各条。

五脏郁证 指脏腑本气郁结所致的病症。《证治汇补·五脏郁症》：“有本气自郁而生病者，心郁昏昧健忘，肝郁胁胀嗳气，脾郁中满不食，肺郁干咳无痰，肾郁腰胀淋浊，不能久立，胆郁口苦哺热，怔忡不宁。”详心郁、肝郁、脾郁、肺郁、肾郁各条。

五脏胀 病证名。见《医钞类编》卷九。指心胀、肝胀、脾胀、肺胀、肾胀。详各该条。

五脏疟 病证名。指肺、心、肝、脾、肾等五脏疟疾。因疟邪深伏所致。《杂病源流犀烛·疟疾源流》：“邪气深伏，并能为五脏疟。”详见各条。

五脏衄 病证名。指由情志激动过度而导致的鼻衄。《三因极一病证方论》卷九：“病者积怒伤肝，积忧伤肺，烦思伤脾，失志伤肾，暴喜伤心，皆能动血。蓄聚不已，停留胸间，随气上溢，入清道中，发为鼻衄，名五脏衄。”可用止衄散。参见鼻衄条。

五脏遗精 病证名。五脏病变而致遗精的统称。《医宗必读·遗精》：“若乎五脏各得其职，则精藏而治。苟一脏不得其正，甚者必害心肾之主精者焉。治之之法，独因肾病而遗者，治其肾，由他脏而致者，则他脏与肾两治之。”《证治汇补·遗精》：“五脏各有精，肾则受而藏之，故遗精之病，五脏皆有，不独肾也。”参遗精、肝遗、心遗、肺遗、肾遗、脾遗条。

五脏癌 病名。出《备急千金要方》卷五。指肝癌、心癌、脾癌、肺癌、肾癌等。《医林绳墨》卷六：“大抵五脏之癌，各随五脏所治。皆以清痰降火为要也，或加以五脏补养之药。有风者驱其风，有痰者豁其痰，因气者清其气，因惊者镇其惊，各随所得之由，而加减用治可也。”详各该条。

五脏痹 病名。见《证治准绳·杂病》。肝痹、心痹、脾痹、肺痹、肾痹的总称。详各该条。

五疸 五种黄疸的合称。❶指黄疸、谷疸、酒疸、女劳疸、黑疸五种（见《金匮要略·黄疸病脉证并治》）。❷指黄疸、谷疸、酒疸、女劳疸、黄汗五种（见《备急千金要方》卷十）。❸指黄疸、谷疸、女疸、酒疸、劳疸。《肘后备急方》卷四：“疸病有五种，谓黄疸、谷疸、酒疸、女疸、劳疸也。”❶指五种黄疸的病因。《本草纲目》卷三：“黄疸有五，皆属热湿。有瘀热、脾虚、食积、瘀血、癥黄。”参黄疸有关条。

五窍出血 证名。《嵩崖尊生书》卷八：“五窍出血，耳目口鼻一齐出血，药不及煎，死在顷刻，先将水当面喷几口，急分开头发，用粗纸数层蘸醋令透，搭在囟门，血即止，次用当归一两煎好，磨沉降香五钱，加童便服，血自归经，然后以四物加人参五味丸服，可收万全之功。”

五虚 指五脏真气不足所致的五种虚证。《素问·玉机真藏论》："脉细，皮寒，气少，泄利前后，饮食不入，此谓五虚。"王冰注："虚谓真气不足也。然脉细心也，皮寒肺也，气少肝也，泄利前后肾也，饮食不入脾也。"参虚劳有关条。

五淋 指五种淋症。❶指石淋、气淋、膏淋、劳淋、热淋。见《外台秘要》卷二十七。❷指冷淋、热淋、膏淋、血淋、石淋。见《三因极一病证方论》卷十二。❸指血淋、石淋、气淋、膏淋、劳淋。见《医部全录·淋》。❹《医学纲目·肝胆部》："治五种淋疾，气淋、热淋、劳淋、石淋，及小便不通。"参淋症各条。

五痫 痫病的统称。见《景岳全书·癫痫》❶指以牲畜叫声和发病形态命名的痫病。①指马、羊、鸡、猪、牛等五痫（《名医别录》）。②指犬、羊、牛、鸡、猪等五痫（《小儿药证直诀》）。❷指五脏痫。（《婴童百问·惊痫》）。❸指风痫、食痫、惊痫、痰痫、饮痫等五痫。

五蒸 骨蒸、脉蒸、皮蒸、肉蒸、内蒸的总称。《诸病源候论·虚劳骨蒸候》："蒸病有五，一曰骨蒸，其根在肾，旦起体凉，日晚即热，烦躁，寝不能安，食无味，小便赤黄，忽忽烦乱，细喘无力，腰疼，两足逆冷，手心常热。蒸盛过伤，内则变为疳，食人五藏。二曰脉蒸，其根在心，日增烦闷，掷手出足，翕翕思水，口唾白沫，睡即浪言，或惊恐不定，脉数。若蒸盛之时，或变为疳，脐下闷，或暴利不止。三曰皮蒸，其根在肺，必大喘鼻干，口中无水，舌上白，小便赤如血。蒸盛之时，胸满，或自称得注热，两胁下胀，大嗽彻背连脾疼，眠寐不安，或蒸毒伤脏，口内唾血。四曰肉蒸，其根在脾，体热如火，烦躁无汗，心腹鼓胀，食则欲呕，小便如血，大便秘涩。蒸盛之时，身肿目赤，寝卧不安。五曰内蒸，亦名血蒸。所以名内蒸者，必外寒而内热，把手附骨，而内热甚。其根在五脏六腑，其人必因患后得之。骨肉自消，饮食无味，或皮燥而无光。蒸盛之时，四肢渐细，足跌肿起。"治用五蒸汤、五蒸丸等。参蒸病条。

五痹 五种痹证的总称。出《素问·移精变气论》。❶指骨痹、筋痹、脉痹、肌痹（一作肉痹）、皮痹。王冰注："五痹谓皮、肉、筋、骨、脉之痹也。"《医碥·痹》："经又分以冬得之为骨痹，春得之为筋痹，夏得之为脉痹，长夏得之为肌痹，秋得之为皮痹，是名五痹。"❷指筋痹、骨痹、血痹、肉痹、气痹。见《中藏经·论痹》。❸指风痹、寒痹、湿痹、热痹、气痹。见《中藏经·论痹》。

五痰 五种痰证的总称。❶指风痰、热痰、湿痰、酒痰、沫痰。又指风痰、热痰、湿痰、酒痰、食痰。上述两种五痰，均见《儒门事亲·治法杂论》。❷指风痰、热痰、寒痰、气痰、味痰。元·王珪《泰定养生主论》："方书皆曰五痰，何谓也？答曰：所谓风痰、寒痰、热痰、气痰、味痰。"味痰又名酒痰。❸指风痰、湿痰、燥痰、热痰、寒痰。《医宗必读·痰饮》：痰有五，"在脾经者，名曰湿痰。""在肺经者，名曰燥痰。""在肝经者，名曰风痰。""在心经者，名曰热痰。""在肾经者，名曰寒痰。"

五嗽 五种咳嗽的总称。❶《外台秘要》卷九："《深师》疗五嗽。一曰上气嗽，二曰饮嗽，三曰燥嗽，四曰冷嗽，五曰邪嗽。"方用四满丸等。❷《外台秘要》卷九："《古今录验》四满丸疗五嗽。一为气嗽，二为痹嗽，三为燥嗽，四为邪嗽，五为冷嗽。"❸《太平惠民和剂局方》卷四："备急五嗽圆。治五种咳嗽。一曰上气嗽，二曰饮嗽，三曰燥嗽，四曰冷嗽，五曰邪嗽。"❶指五脏咳嗽。《三因极一病证方论》卷十二："世谓五嗽，且以五脏而言之。"详心咳、肝咳、脾咳、肺咳、肾咳、咳嗽等条。

五膈 病证名。❶忧膈、恚膈、气膈、寒

膈、热膈的总称。见《肘后备急方》卷四。又称五鬲气。详各条。❷忧膈、气膈、食膈、寒膈、饮膈的总称。见《外台秘要》卷八。详各条。❸忧膈、思膈、怒膈、恐膈、喜膈的总称。见《三因极一病证方论》卷八。参见噎膈条。

五噎 病证名。❶指气噎、忧噎、食噎、劳噎、思噎五种噎证。《诸病源候论·否噎病诸候》："夫五噎，谓一曰气噎，二曰忧噎，三曰食噎，四曰劳噎，五曰思噎。虽有五名，皆由阴阳不和，三焦隔绝，津液不行，忧恚嗔怒所生。"❷从病因上分，又有因气滞、血瘀、火炎、痰凝、食积五者所致噎者。《证治汇补》卷五："有气滞者，有血瘀者，有火炎者，有痰凝者，有食积者，虽分五种，总归七情之变。"参噎、噎膈条。

五癫 ❶指阳癫、阴癫、风癫、湿癫、马癫。见《诸病源候论》卷二。❷指马痫、牛痫、猪痫、羊痫、鸡痫。《景岳全书》卷三十四："马痫、牛痫、猪痫、羊痫、鸡痫者，即今人之谓羊癫、猪癫也。此不过因其声之相似，遂立此名。"《外台秘要》卷十五："五癫病者，腑脏相引，盈气起寒厥，不识人，气争，瘈疭吐沫，久而得苏。"治宜雄黄丸、铁精散等。参癫痫条。

支节烦疼 证名。亦作肢节烦痛。指四肢关节烦热疼痛。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："伤寒六七日，发热，微恶寒，支节烦疼。"《伤寒论辑义》卷三："支节者，四肢百节也。若言百节，则似周身百节烦疼，此恐不然，当是四肢之关节烦疼。"《伤寒明理论·烦热》："烦疼，即是热疼。"《伤寒溯源集》卷七："发热恶寒，支节烦疼，又为在表之邪，是邪气半在表半在里也。"可与柴胡桂枝汤和解。

支饮 四饮之一。出《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证治》。因饮邪停留于胸膈之间，上迫于肺，肺失肃降所致。主要症状为胸闷短气，咳逆倚息不能平卧，外形如肿，或兼见头晕目眩，面色黧黑，心下痞坚等。治宜温肺化饮平喘为主。方用小青龙汤、葶苈大枣泻肺汤等。参痰饮、四饮条。

支咳 病名。十咳之一。又名支嗽。指咳嗽兼见心下硬满引痛者。《诸病源候论·咳嗽病诸候》："三曰支咳。心下硬满，咳则引痛，其脉反迟是也。"参咳嗽、痰饮咳嗽、十咳条。

支嗽 病名。见《不居集》卷十五。①即支饮。详该条。②即支咳。详该条。

支膈 证名。指胸膈有阻塞不适感。出《灵枢·经脉》。《类经·十五别络病刺》："手少阴之络名通里，在腕后一寸陷中，别走手太阳者也。此经入心下膈，故邪实则支膈，谓膈间若有所支而不畅也。"

太阳中风 病名。太阳经病之一。中风是外感风邪之意，与猝然倒地、口眼㖞斜的中风不同。太阳中风的特征是发热恶风，汗出脉缓。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名为中风。"《注解伤寒论》卷二："风则伤卫，发热，汗出，恶风者，卫中风也。……以卫为阳，卫外者也，病则不能卫固其外，而皮腠疏，故汗出而恶风也。"《伤寒溯源集·中风正治》："中风，风伤卫也。……感之则为中风矣。然非独春令为然也，四时皆有之，唯春时为当令耳。发热者，风邪客于卫而郁蒸也，汗出恶风者，风邪袭于毛孔，卫气不能司其开阖之常，玄府不闭，故汗自出，腠理疏而不克任受风寒，故恶风也。"参太阳病条。

太阳少阳并病 病名。指太阳病证未解，而少阳病证已见。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳与少阳并病，头项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞硬。"《景岳全书·伤寒典》："如太阳先病发热头痛……后见耳聋胁痛，呕而口苦等证者，此太阳并于少阳也。"《医宗金鉴·订正伤寒论注》："太阳与少阳并病，故见头项强痛，或眩冒，时

如结胸，心下痞硬之证。……苟不知此，而以头项强痛为太阳之邪，目眩胸满为少阳之邪，发其汗，两阳之邪乘燥入胃，则发谵语。”《伤寒溯源集·并病证治第十六》：“头项强痛，太阳证也，眩冒，少阳肝胆病也。……邪在太阳则当汗，邪在少阳则禁汗，太阳与少阳并病，亦不可汗。既不可汗，则两经郁经之邪无可解之法，故当刺大椎第一间及肺俞、肝俞。”亦可用柴胡桂枝汤和解少阳，兼散表邪。慎不可峻汗或攻下。参并病条。

太阳头痛 ❶病证名。指伤寒太阳病而见头痛者。《兰室秘藏·头痛》：“故太阳头痛，恶风，脉浮紧。川芎、羌活、独活、麻黄之类为主。”❷证名。头痛而在太阳经脉循行部位者。《冷庐医话·头痛》：“头痛属太阳者，自脑后上至巅顶，其痛连项。”参头痛、三阳头痛条。

太阳伤寒 病名。太阳经病之一。由外感寒邪所致。太阳伤寒的特征是发热，恶寒，无汗，脉紧等。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名为伤寒。”“太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。”《注解伤寒论》卷三：“此太阳伤寒也，寒则伤荣，头痛，身疼，腰痛，以至牵连骨节疼痛者，太阳经荣血不利也。”《伤寒辨证》卷四：“寒邪外束，人身之阳不得宣越，故令发热，寒邪在表，不复任寒，故令恶寒，寒主闭藏，故令无汗。人身之阳，既不得宣越于外，则必壅寒于内，故令作喘。”《伤寒论辨证广注·太阳病》：“寒邪在表，皮肤闭而为热，则其人当无汗而恶风寒，……仲景用麻黄汤者，专以发太阳经无汗之伤寒也。”参太阳病条。

太阳阳明合病 病名。指太阳与阳明两经同时受邪，起病即见两经的证候。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。”又“太阳与阳明合病，不下利，但呕者，葛根加半夏汤主之。”《景岳全书·伤寒典》：“如初起发热恶寒头痛者，此太阳之证，而更兼不眠，即太阳阳明合病也。”《伤寒溯源集·合病证治第十五》：“太阳阳明合病者，谓太阳阳明两经皆有见证也，以两经见证之中，有喘而胸满之证，是太阳之表邪偏重于阳明也。”《伤寒论条辨·辨太阳病脉证并治》：“盖太阳，膀胱也，膀胱主水；阳明，胃也，胃主饮。风邪属阳，阳主气，阳邪协气，泛滥水饮而上涌，得逆则与俱出。此呕之所以为呕，太阳阳明相合而为一家之证也。”《医宗金鉴·订正伤寒论注》：“太阳与阳明合病者，谓太阳之发热恶寒无汗，与阳明之烦热不得眠等证同时均病，表里之气升降失常，故不下利则上呕也。治法只须先解太阳之表，表解而阳明之里自和矣。若利则宜葛根汤表而升之，利自可止；呕则加半夏，表而降之，呕自可除也。”参太阳病、阳明病、合病条。

太阳少阳合病 病名。指太阳与少阳两经同时受邪，起病即见两经的证候。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤。若呕者，黄芩加半夏生姜汤主之。”《伤寒溯源集·合病证治第十五》：“太少两阳经之证，并见而为合病。太阳虽在表，而少阳逼处于里，已为半表半里，以两经之热邪内攻，令胃中之水谷下奔，故自下利。”《医宗金鉴·订正伤寒论注》：“太阳与少阳合病，谓太阳发热恶寒与少阳寒热往来等证并见也。若表邪盛，肢节烦疼，则宜与柴胡桂枝汤两解其表矣，今里热盛而自下利，则当与黄芩汤清之，以和其里也，若呕者，更加半夏、生姜，是清和之中兼降法也。”参见太阳病、少阳病、合病条。

太阳经证 即太阳经病。见《伤寒医诀串解》卷一。详见该条。

太阳经病 病证名。亦称太阳经证。一般指桂枝汤证与麻黄汤证。《伤寒溯源集·太阳经纲领》："足太阳之脉，起于目内眥，上额交巅，从巅络脑，还出别下项，连风府、循肩膊，内挟脊，抵腰中，夹督脉而行。风寒客之，故头项强痛也，风寒在表则恶寒。"《医学心悟·太阳经证》："太阳经病，头痛，发热，项脊强，身体痛，鼻鸣，干呕，恶风，自汗，脉浮缓者，名曰中风。宜解肌，桂枝汤主之。若前证悉具，恶寒，无汗，脉浮紧，或喘嗽者，名曰伤寒。宜发表，麻黄汤主之。"太阳经病，由于邪未入里，大多二便如常，口亦不渴，故均用辛温解表法。

太阳经脚气 脚气病之一。见《三因极一病证方论》卷三。指风寒暑湿流注足太阳膀胱经而成的脚气。症见头痛，目脱，项强，腰脊连体枢、循髀外出外踝后、循京骨至小趾外侧皆痛。若风胜者，自汗；寒胜者，无汗、痛甚；暑胜者，热烦；湿胜者，重着、肿满。治宜发散，用麻黄左经汤等方。

太阳病 病名。六经病之一。太阳病包括经证和腑证。多由外感风寒所致。经病包括太阳中风与太阳伤寒，腑病包括太阳蓄水证和太阳蓄血证。《尚论篇》卷一："太阳病之总脉总证，统中风伤寒为言也。太阳，膀胱经，乃六经之首，主皮肤而统营卫，所以为受病之始。"《伤寒指掌》卷一："凡风寒初感，先入皮毛肌表，外症便有头痛，项强，身痛，腰痛，骨节烦疼，发热，恶寒，此皆太阳经之见症。如无汗而脉浮紧，此营卫俱强而表实也，用麻黄汤以发表，使营卫之邪，从皮毛而出，则诸症自除矣；如脉浮而弱，汗自出者，此营强卫弱而表虚也，用桂枝汤以解肌，使营卫和，而邪自解矣。"《伤寒医诀串解·太阳篇》："太阳为寒水之经，主一身之表。何谓太阳经证？曰头痛、项强、发热、恶寒是也。……何谓太阳腑证？曰表邪不去，必入于里，膀胱为表中之里也，有蓄水、蓄血之辨。"详太阳中风、太阳伤寒、伤寒蓄水证、伤寒蓄血证等条。

太阳痉 病证名。指太阳病出现痉症者。《证治准绳·杂病》："海藏云：发汗太多因致痉。身热足寒，项强恶寒，头热，面肿目赤，头摇口噤，背反张者，太阳痉也。"《医宗金鉴·订正伤寒论注》："盖身以后属太阳，凡头项强急，项背几几，脊强反张，腰似折，髀不可以曲，腘如结，皆太阳痉也。"参刚痉、柔痉条。

太阳厥 六经厥之一。《三因极一病证方论·叙厥论》："头重，足弱，发为瞑仆，名太阳厥。……考其厥因，多以不胜乘其所胜，气不得行，遂致于逆。"参六经厥、厥证条。

太阳腑证 即太阳腑病。见《伤寒医诀串解》卷一。详该条。

太阳腑病 病证名。亦称太阳腑证。为太阳经邪热不解，内犯膀胱所致。有蓄水与蓄血之分。《伤寒溯源集·中风失治》："太阳者，膀胱之经也。……太阳之经邪不解而内犯膀胱，则下焦不蒸而气液不得上腾。"《伤寒论辨证广注·太阳病》："太阳之邪传里，膀胱府病，水气上逆而作渴也，故宜五苓散。"《注解伤寒论》卷三："太阳经邪热不解，随经入府，为热结膀胱，……太阳多热，热在膀胱，必与血相搏。"《伤寒辨证》卷四："小腹急者，邪在下焦也。大便黑者，瘀血渍之也。小便利者，血病而气不病也。"《伤寒医诀串解》卷一："何谓太阳腑证？曰表邪不去，必入于里，膀胱为表中之里也，有蓄水、蓄血之辨。太阳证，其人口渴，烦躁，不得眠，脉浮，小便不利，水入即吐，为膀胱蓄水证，宜五苓散。太阳证，其人如狂，小腹硬满，小便自利，脉沉，为膀胱蓄血证，宜桃仁承气汤。"亦有以蓄血为瘀血蓄于下焦，不在膀胱，为伤寒兼证。《医学心悟》卷二："伤寒兼症者，非传经六经之正病，……蓄血者，瘀血蓄于下焦也。"详伤寒蓄水证、伤寒蓄血证条。

太阴头痛　病证名。三阴头痛之一。《兰室秘藏·头痛门》："太阴头痛，必有痰，体重，或腹痛为痰癖，其脉沉缓，苍术、半夏、南星为主。"《冷庐医话》卷三："太阴、少阴二经虽不上头，然痰与气逆壅于膈，头上气不得畅而亦痛。"参头痛、三阴头痛条。

太阴伏暑　病名。《温病条辨》卷一："太阴伏暑，舌白口渴，无汗者，银翘散去牛蒡、元参加杏仁、滑石主之。"详伏暑条。

太阴经病　病证名。指太阴经受邪引起的疾患。亦称太阴经证。宜辨虚实。《医学心悟·太阴经证》："太阴经病，自古混同立言，故方药多错乱，今细按之，有三法焉。夫太阴有传经之邪，有直中之邪，有误下内陷之邪，不可不辨也。如经所谓腹满嗌干者，此传经之阳邪也，法当用小柴胡去人参加芍药以和之。不已，则下之。经又谓腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛者，此直中之寒邪也，法当理中汤以温之。又谓太阳证，医反下之，因尔腹满时痛者，此误下内陷之邪也，法当用桂枝加芍药，大实痛者，桂枝加大黄汤。"上述理中汤证，实即太阴脏病。《伤寒论翼》称腹满、嗌干为热伤太阴之标，非太阴本病。参太阴病、太阴脏病条。

太阴经脚气　脚气病之一。见《三因极一病证方论》卷三。指风寒暑湿流注足太阴脾经而成的脚气。症见腹满，夹咽连舌系急，胸膈痞满，循胫骨下股膝内前廉内踝，过核骨后连足大趾端内侧皆痛。若自汗者为风胜，无汗痛甚者为寒胜，热烦者为暑胜，重着肿满者为湿胜。治以温散为主，用六物附子汤等方。

太阴脏病　病证名。指寒邪直中太阴或邪传太阴寒证。亦称太阴脏证。《通俗伤寒论·伤寒本证》："邪传太阴脏证，口淡胃钝，呕吐清水，大腹痞满，满而时痛，自利不渴，渴不喜饮，小便短少色白。……此太阳寒邪，直入足太阴脏证也。法当温健脾阳，香砂理中汤主之；重则热壮脾肾，附子理中汤主之。"参太阴病、太阴经病条。

太阴病　病名。六经病之一。多因三阳病传经入里，或寒邪直中，或内伤生冷所致。其特征是腹满而吐，食不下，自利，时有腹痛等。《伤寒论·辨太阴病脉证并治》："太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。"《伤寒分经》卷三："太阴为寒藏，其宜温之证为最多，非一方可尽，故曰，宜服四逆辈，则理中、真武、附子等汤，俱可随证用之矣。"《伤寒附翼·太阴方总论》："其来由有三，有因表虚而风寒自外入者；有因下虚而寒湿自下上者；有因饮食生冷而寒邪由中发者。总不出于虚寒，法当温补以扶胃脘之阳，一理中而满痛吐利诸症悉平矣。"一说，太阴病有阴阳虚实之分。《伤寒贯珠集》卷六："然太阴为病，不特传经如是，即直中亦如是，且不特伤寒如是，即杂病亦如是，但有属阴属阳，为盛为虚之分耳。"《伤寒医诀串解》卷四："太阴为湿土，纯阴之脏也，从阴化者多，从阳化者少。病入太阴，何谓太阴之邪从阴化？《伤寒论》云：腹满，吐食，自利，不渴，手足自温，时腹自痛是也，宜理中丸、汤主之，不愈宜四逆辈。病入太阴之邪从阳化，《伤寒论》云：发汗后不解，腹痛，急下之，宜大承气汤是也。"从阳化，即指太阴病转为阳明病。参六经病、伤寒、太阴经病、太阴脏病条。

太阴痉　病证名。指太阴病出现痉症者。《医宗金鉴·订正伤寒论注》："夫六气皆足以致痉，不专在湿也，六经皆有痉证，亦不专在太阳一经也。……至若腹内拘急，因吐利后而四肢挛急者，未尝非太阴痉也。"《张氏医通·诸风门》："足三阴痉，俱手足厥冷，筋脉拘急，汗出不止，项强脉沉。……太阴，则四肢不收，术附汤加甘草、生姜。"参见痉条。

太阴厥　六经厥之一。《三因极一病证

方论·叙厥论》："腹胀，后闭，食为寒呕，名太阴厥。……考其厥因，多以不胜乘其所胜，气不得行，遂致于逆。"参六经厥、厥证条。

犬痫 六畜痫之一。即狗癫。《备急千金要方》卷五："犬痫之为病，手屈拳挛。灸两手心一壮，灸足太阳一壮，灸助户一壮。"参见六畜痫、狗癫条。

不伏水土肿 病证名。指因水土不习惯而发生的水肿。《诸病源候论·水肿病诸候》："不伏水土者，言人越在他境，乍离封邑，气候既殊，水土亦别，因而生病，故云不伏水土。病之状，身体虚肿，或下利而不能食，烦满气上是也。"《医学入门·水肿》："不伏水土者，胃苓汤。"参水肿条。

不伏水土痢 病证名。指易地生活，肠胃一时不能适应当地水土而致的下痢。《诸病源候论·痢病诸候》："四方之气，温凉不同，随方嗜欲，因以成性，若移其旧土，多不习伏，必因饮食以入肠胃，肠胃不习，便为下痢，故名不伏水土痢也。即水谷痢是也。"参水谷痢条。

不更衣 指不大便。见《伤寒论·辨阳明病脉证并治》。《注解伤寒论》卷五："古人登厕必更衣。不更衣者，通为不大便。不更衣，则胃中物不得泄，故为内实。"参便秘条。

不识人 证名。指神志失常的严重证候。《辨证录·中风门》："人有身忽猝倒，两目紧闭，昏晕，不识人，即子孙亦不相识。"《张氏医通·狂》："热入血室，发狂不识人，小柴胡加犀角、生地黄。"《素问玄机原病式》卷一："伤寒阳明病，热极则日晡潮热，甚则不识人，循衣摸床，独语如见鬼状，法当大承气汤下之。"《世医得效方》卷八："狂痫不识人，癫病眩乱，灸百会九壮。"可见于癫、狂、痫、伤寒及温病热极、中风等疾病。

不食 证名。指食欲减退，甚则不欲饮食。《素问·五常政大论》："太阳司天，……湿气变物，水饮内稸，中满不食。"参不能食条。

不能正偃 证名。指不能仰卧。《素问·评热病论》："不能正偃者，胃中不和也。正偃则咳甚，上迫于肺也。"参不得偃卧条。

不能食 证名。出《素问·评热病论》。指食欲减退，甚则不进饮食。《杂病源流犀烛·伤食不能食源流》："不能食，脾胃俱虚病也。东垣云，脾胃旺，能食而肥；脾胃虚，不能食而瘦，此之谓也。故治之者必当知不食之故。由于脾胃之虚，急当补益，宜补中益气汤，而不可用诛伐，使元气愈虚，斯为要着；或补之不效，更当兼补其母，使火以生土，土自健运，宜八味丸、二神丸；补母不效，更当兼顾其子，使金不窃母之气以自救，致脾胃益虚，则土自能保，宜茯苓、人参、桔梗、甘草。惟审知脾胃中或有积滞，或有实火，或有寒痰，或有湿饮，而元气未衰，邪气方甚者，方可稍用消导，而仍以补益为主，宜异功散、香砂枳术丸。其有挟郁者，开之，宜育气丸；动气者，平之，宜异功散加木香、沉香；上焦湿热阻气者，开提之，宜枇杷叶、苏子、杏仁、黄芩、降香、土瓜蒌皮；胃伤恶食，络虚风动浮肿者，和解之，宜人参、檀香泥、新会皮、炒荷叶蒂、炒粳米；心营热入，胃汁全亏，不饥不食，假寐惊跳者，调摄之，宜鲜生地、竹叶心、金银花、火麻仁、麦门冬、生知母；脾胃虚不能消化水谷，胸膈痞闷，腹胁膨胀，连年累月，食减嗜卧，口无味者，通快之，宜消谷丸；腹中虚冷，不能食，食辄不消，羸弱生病者，温暖之，宜苍术丸；时病后，胃气未和，知饥不纳者，调养之，宜茯神、枣仁、川石斛、知母、鲜莲子、鲜省头草，夫然后脾胃益快，自然进食矣。"参食减、不食条。

不得卧 证名。❶指不寐症。出《灵枢·

大惑论》。详不寐、不得眠条。❷指不能平卧之症。《素问·逆调论》："夫不得卧，卧则喘者，是水气之客也。"详喘条。

不得前后　证名。前，指小便；后，指大便。❶指二便不通。《灵枢·邪气藏府病形》："肾脉急甚为骨癫疾；微急为沉厥奔豚，足不收，不得前后。"清·张志聪《灵枢集注》："肾开窍于二阴，气虚不化，故不得前后也。"❷指大小便失常。《类经·厥逆》："不得前后者，或闭结不通，或遗失不禁，不得其常之谓也。"

不得眠　证名。指不寐症。《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》："虚劳虚烦不得眠，酸枣仁汤主之。"《金匮要略·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治》："衄家不可汗，汗出必额上陷，脉紧急，直视不能眴，不得眠。"详见不寐条。

不得偃卧　证名。指不能仰天平卧。又称不能正偃。多因肺气壅盛或胃中不和，逆气迫肺所致。《素问·病能论》："肺者藏之盖也，肺气盛则脉大，脉大则不得偃卧。"《素问·评热病论》："有病肾风者，面膀胱然壅，害于言，……口干苦渴，小便黄，目下肿，腹中鸣，身重难以行，月事不来，烦而不能食，不能正偃，正偃则咳甚，病名曰风水。"常见于风水、水肿、哮喘等疾患。参有关各条。

不寐　病证名。出《难经·第四十六难》。又名不得卧、不得眠、不能眠、失眠等。指睡眠时经常不易入眠，或睡眠短浅易醒，甚至整夜不能入眠之症。《景岳全书·杂证谟》："神不安则不寐。其所以不安者，一由邪气之扰，一由营气之不足耳。有邪者多实证，无邪者皆虚证。"不寐虚症，多因阴血亏损，中气不足，或心脾两虚所致。因阴血不足，心失所养者，常兼虚火偏亢，症见心烦失眠，头晕耳鸣，甚则五心烦热，多汗、口干、舌红、脉细数。治宜滋阴养血为主。火亢则兼降心火，方用酸枣仁汤、补心丹、朱砂安神丸等。因中气虚弱者，症见失眠，神疲乏力，食欲减退。治以补气为主，方用六君子汤、补中益气汤加减。因心脾两虚所致者，症见多梦易醒，心悸健忘，饮食减少，面色少华，舌淡，脉细。治宜补益心脾。方用归脾汤、寿脾煎等。也有因胆虚所致者，详见胆虚不眠条。实证不寐，有外感时邪和内邪滞逆之不同。外感时邪者，有表热不得卧、里热不得卧、半表半里热不得卧、血热不得卧、气热不得卧、余热不得卧、虚烦不得卧等。详各该条。内邪滞逆者，又有痰浊内阻、水气凌心、肝火、胆火、胃中不和数种。痰浊内阻者，症见不寐，呕恶胸闷，苔腻脉滑，治以化痰为主，用温胆汤加减。水气凌心者，症见不寐而心下动悸，胸中漉漉有声，治宜逐饮祛湿，用平胃散、控涎丹等方。肝火、胆火、胃中不和者，详见肝火不得卧、胆火不得卧、胃不和卧不安等条。

不嗜食　证名。指自觉饥饿，但不欲食。多由寒湿阻胃或脾胃运化失常所致。《灵枢·大惑论》："胃气逆上，则胃脘寒，故不嗜食也。"治用平胃丸、泻脾丸、茱萸丸、升阳益胃汤等。

历节　病名。出《金匮要略·中风历节病脉证并治》。又名白虎风、痛风。详历节风、痛风条。

历节风　病名。《诸病源候论·风病诸候》："历节风之状，短气自汗出，历节疼痛不可忍，屈伸不得是也。"《圣济总录》卷十："历节风者，由血气衰弱，为风寒所侵，血气凝涩，不得流通关节，诸筋无以滋养，真邪相薄，所历之节，悉皆疼痛，故为历节风也。痛甚则使人短气汗出，肢节不可屈伸。"参痛风、白虎风条。

牙关紧急　证名。指牙关紧收，口不能开的症象。多由痰气风火壅阻经络所致。见《卫生宝鉴·咽喉口齿门》。《万病回春·中风》："凡卒中昏倒，不省人事，牙关紧急者，此中风痰也。"《张氏医通》卷一：

"阳中者，面色赤，唇焦，牙关紧急，上视强直，掉眩烦渴。……痰气闭塞，牛黄清心丸；痰热闭遏，清心牛黄丸。"《证治要诀》卷一："破伤风者，因皮肉曾破伤处，风从疮口入，其证项强，牙关紧，状如发痉。"又"中气，因七情内伤，气逆为病，痰潮昏塞，牙关紧急。"治疗用苏合香丸灌之。本症可见于中风、痉病、惊厥等疾。参见口噤条。

牙宣 证名。见《证治要诀·诸血门》。又名齿间血出、齿衄、齿血。详齿衄条。

〔丨〕

少气 证名。出《素问·玉机真藏论》。指呼吸微弱短促，言语无力。可由脏气虚弱或水饮内聚所致。《诸病源候论·少气候》："所由藏气不足故也。肺主于气而通呼吸，藏气不足，则呼吸微弱而少气。胸痛少气者，水在藏府，水者阴气，阴气在内，故少气。"亦有因痰气、食积内阻所致者。《鲒溪医述·病症辨异》："少气者，气少不足于言，……由里气因痰或食或饮碍其升降之路使然。"参短气、气促条。

少血 指津血虚少。《素问·脉要精微论》："肾脉搏坚而长，其色黄而赤者，当病折腰；其软而散者，当病少血，至令不复也。"王冰注："肾主水，以生化津液，今肾气不化，故当病少血，至令不复也。"

少阳头痛 ❶病证名。指伤寒少阳病而见头痛者。见《兰室秘藏·头痛门》："少阳经头痛，脉弦细，往来寒热，柴胡为主。"❷证名。指头痛而在少阳经脉循行部位者。《冷庐医话·头痛》："属少阳者，上至两角，痛在头角。"参头痛、三阳头痛条。

少阳经脚气 脚气病之一。见《三因极一病证方论》卷三。指风寒暑湿流注足少阳胆经而成的脚气。症见口苦，善太息，胁痛，面垢，肌肤不泽，头额、目锐皆痛，缺盆并腋下马刀肿，自汗，振寒，发热，胸中、胁、肋、髀、膝外至胫绝骨外踝及诸节趾皆痛。若风胜者，自汗；寒胜者，无汗痛甚；暑胜者，热烦；湿胜者，重着肿满。治宜和解，用半夏左经汤等方。

少阳病 病名。六经病之一。由邪热在半表半里所致。本病特征是口苦，咽干，目眩，往来寒热，胸胁苦满，心烦喜呕，嘿嘿不欲饮食，脉弦等。《伤寒论·辨少阳病脉证并治》："少阳之为病，口苦，咽干，目眩也。"又"本太阳病不解，转入少阳者，胁下鞕满，干呕不能食，往来寒热，尚未吐下，脉沉紧者，与小柴胡汤。"《注解伤寒论》卷三："邪因正虚，自表之里，而结于胁下，与正分争，作往来寒热。"《伤寒微旨论·伤寒源篇》："少阳受之，少阳主胆，故胸胁痛而耳聋。"《伤寒辨证》卷四："邪在半表半里，则恶寒且热，故令寒热往来。少阳之脉行于两胁，故令胁痛。其经属于胆，胆汁上溢，故口苦。"《张氏医通·诸伤门》："若交少阳之经，则往来寒热，口苦胁痛，以其经居表里之半，邪欲入则寒，正与争则热，所以只宜和解，而有汗、下、利小便三禁。"本病多兼证。若有太阳表证时可兼用汗法，如柴胡桂枝汤证；若有阳明里证时可兼用下法，如大柴胡汤证、柴胡加芒硝汤证等。参太阳病、阳明病、寒热往来等条。

少阳痉 病证名。指少阳病出现痉症者。《证治准绳·杂病》："若一目或左右斜视，并一手一足搐搦者，少阳痉也。"《医宗金鉴·订正伤寒论注》："身之侧属少阳，口眼㖞斜，手足牵引，两胁拘急，半身不遂，皆少阳痉也。"参痉条。

少阳厥 六经厥之一。《三因极一病证方论·叙厥论》："暴聋，颊肿，胁胫拘痛，名少阳厥。……考其厥因，多以不胜乘其所胜，气不得行，遂致于逆。"参六经厥、厥证条。

少阴四逆证 证名。指邪传少阴，心肾

阳衰，阴寒内阻而致四肢逆冷之证。参见少阴病、厥逆条。

少阴头痛 三阴头痛之一。《兰室秘藏·头痛门》："少阴经头痛，三阴三阳经不流行而足寒，气逆为寒厥，其脉沉细，麻黄、附子、细辛为主。"《症因脉治·头痛论》："心疼烦闷，头痛，痛连胲骨，少阴症也。"参头痛，三阴头痛条。

少阴经脚气 脚气病之一。见《三因极一病证方论》卷三。指风寒暑湿流注足少阴肾经而成的脚气病。症见腰脊痛，小趾之下连足心，循内踝入跟中，上腨内出腘中内廉及股内皆痛，气上冲胸咽，饥不能食，面黑，小便淋闭，咳唾不已，善恐，心惕，小腹不仁。若自汗者为风胜，无汗痛甚者为寒胜，热烦者为暑胜，重着肿满者为湿胜。治用温法，如八味丸等方。

少阴病 病名。六经病之一。多因邪传少阴，心肾阳气衰微，阴寒内盛所致。本病特征是脉微细，但欲寐，四肢逆冷，下利清谷，甚至汗出亡阳等。《伤寒论·辨少阴病脉证并治》："少阴之为病，脉微细，但欲寐也。"《注解伤寒论》卷六："少阴为病，脉微细，为邪气传里深也。卫气行于阳则寤，行于阴则寐。邪传少阴，则气行于阴而不行于阳，故但欲寐。"《伤寒指掌》卷二："少阴证，仲景以脉微细，但欲寐为主病。此指正气之虚，非示邪气之实也。……引衣蜷卧，下利清谷，腹痛吐泻，是少阴虚寒见证。"治宜温经回阳，如四逆汤等方。其病可从三阳病传变而致，亦有因寒邪直中少阴引起。少阴病如见阴虚火旺，为热伤肾阴证。《伤寒溯源集·少阴热证》："热邪内郁而心烦不得卧，致手足两少阴俱受病也，以黄连阿胶汤主之者，所以泻心家之烦热，益肾脏之真阴也。"参伤寒、六经病条。

少阴痉 病名。指少阴病出现痉症者。《医宗金鉴·订正伤寒论注》："夫六气皆足以致痉，不专在湿也；六经皆有痉证，亦不专在太阳一经也。……恶寒蜷卧，尻以代踵，脊以代头，俯而不能仰者，未尝非少阴痉也。"《张氏医通·诸风门》："足三阴痉，俱手足厥冷，筋脉拘急，汗出不止，项强脉沉。……少阴则闭目合面，参附汤加甘草、干姜。"参见痉条。

少阴厥 六经厥之一。《三因极一病证方论·叙厥论》："口干，溺赤，腹满，心痛，名少阴厥。……考其厥因，多以不胜乘其所胜，气不得行，遂致于逆。"参六经厥、厥证条。

少腹拘急 证名。即自觉下腹部牵引不适，可兼见小便异常等。《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》："虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利者，八味肾气丸主之。"除肾气虚寒者外，湿浊瘀热蕴结下焦亦可导致。本症可见于尿路感染、慢性前列腺炎及慢性盆腔炎等疾患。

少腹胀 证名。指少腹胀满。出《素问·标本病传论》。详腹胀、小腹满条。

少腹急结 证名。指下腹部板滞、坚硬。为下焦蓄血的主要症候之一。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤"。参伤寒蓄血条。

少腹痛 证名。出《素问·五常政大论》。少，通小。即小腹痛。详该条。亦指小腹两旁疼痛。《医学从众录·心痛续论》："小腹两旁谓之少腹，少腹痛者，乃厥阴肝脏之部，又为胞中之血海。盖胞中之水，主于少阴，而胞中之血，主于厥阴也。痛者，厥阴肝气，不合胞中之血而上行也。肝脏不虚者，当疏通以使之上；肝脏虚者，当补益以助其下。"《杂病源流犀烛·腹少腹病源流》："若少腹痛，疝病为多，然有不尽由于疝者，其为症可辨。如痛而喜按，虚也，宜温补汤。痛不可按，实也，宜温气汤。痛

而小便不利，湿热也，宜五苓散加大黄、滑石。痛而胀急，小便反利，死血也，宜和血汤。痛连阴茎，按之则止，肝血虚也，宜补血清热，用当归、生地、白芍、艾草、牛膝、麦冬、丹皮、童便、甘菊。有汗加人参、黄芪、枣仁、五味子。痛如绞急，不可忍耐，小便如淋，诸药不效，酒欲过度也，宜黄芩、木通、甘草三味，煎服立止。痛而按之有块，时胀闷，其痛不移处，瘀血已久也，宜元胡索、肉桂、香附、归尾、桃仁、砂仁。”参腹痛条。

少腹满 证名。指小腹胀满。出《素问·玉机真藏论》。亦称小腹满。详小腹满条。

少精 病证名。又称精少。指性交时泄精量少，甚者只有一、二滴。《诸病源候论·虚劳少精候》：“肾主骨髓，而藏于精。虚劳肾气虚弱，故精液少也。”多由先天不足，房室不节，或劳心过度，饮食不调而耗精所致。治宜补肾益精。用生髓育麟丹、添精嗣续丸、鹿茸丸、补益地黄丸等方。

少瞑 证名。闭目曰瞑。少瞑是睡而少寐之意。《灵枢·大惑论》：“卫气之留于阳也久，故少瞑焉。”详见不寐条。

日轻夜重咳 病证名。指咳嗽在白天轻而入夜加剧。多因久咳后阴虚血少所致。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》：“日轻夜重咳，血少也。宜二陈汤多加当归。”或用六味丸加二冬以滋化源等。参夜嗽、咳嗽条。

日晡发热 证名。指下午三至五时左右发热。《类证活人书·问伤寒疟状》：“问伤寒疟状，有阳明证，病人烦热汗出，如疟状，日晡发热而脉浮虚者与桂枝汤，脉实者宜承气汤。”本症在《伤寒论·辨阳明病脉证并治》称日晡所发热。参见潮热、发热条。

中气 ❶类中风之一。见《太平惠民和济局方》附《指南总论》。又名气中。详该条。❷生理名词。指中焦后天脾胃之气。《医方考·脾胃门》：“中气者，脾胃之气也。”如中气虚弱，可使脾胃功能失常而发生病变。《灵枢·口问》：“中气不足，溲便为之变，肠为之苦鸣。”❸运气学说术语。指中见之气。《素问·至真要大论》：“是故百病之起，有生于本者，有生于标者，有生于中气者。”《类经·标本类》：“中气，中见之气也。如少阳厥阴互为中气，阳明太阴互为中气，太阳少阴互为中气，以其相为表里，故其气互通也。”

中（zhòng 众）风 ❶病名。出《灵枢·邪气藏府病形》。又名卒中。指卒暴昏仆，不省人事，或突然口眼㖞斜，半身不遂、言语蹇涩的病症。中风的病因，历代医书论述不同。《医略十三篇》卷一以北宋前皆宗《灵》、《素》作外风论治；刘河间谓中风非外中于风，是由将息失宜，心火暴甚，肾水虚衰，不能制之；东垣以中风非外来风邪，乃本气自病；丹溪谓中风大率主血虚有痰；王安道则谓刘、李、朱三说是以类中风之病视为中风而立论，殊不知因于风者，真中风也。因于火、因于气、因于湿者，类中风而非中风，辨证可分中络、中经、中腑与中脏。《金匮要略·中风历节病脉证并治》：“邪在于络，肌肤不仁；邪在于经，即重不胜；邪入于腑，即不识人；邪入于脏，舌即难言，口吐涎。”对猝然昏仆，不省人事者，又有闭证和脱证之分。本病可见于脑血管意外及中毒性脑病等。参真中风、类中风等条。❷指外感风邪的病症。是太阳表证之一。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名曰中风。”参见伤寒、太阳中风条。

中风闭证 中风重危证型之一。见何廉臣选编《重印全国名医验案类编》。《金匮翼·中风统论》：“卒然口噤目张，两手握固，痰壅气塞，此为闭证。闭者宜开。”《类证治裁》：“如牙关紧闭，两手握固，是为闭证，苏合香丸、三生饮开之。”《医宗必读》：“惟中脏之证，是闭而非脱者，宜苏

合香丸、牛黄丸、至宝丹、活命丹之类。”参闭条。

中风绝证 即中风恶证。《杂病源流犀烛·中风源流》：“《得效》曰：口开，心绝也；遗尿，肾绝也；手撒，脾绝也；眼合，肝绝也；鼻鼾，肺绝也。皆不治。五症中见一症犹可治。”参中风恶证条。

中风恶证 证名。指中风病出现口开、遗尿、手撒、眼合、鼻鼾等五脏气绝证者。属于脱证。《世医得效方·风科》：“中风恶证，口开者，心气闭绝也；遗尿者，肾气闭绝也；手散者，脾气闭绝；眼合者，肝气闭绝；鼻鼾者，肺气闭绝。备此五证，尤不可治。五证中才见一证，犹当审余证以救疗，盖以初中则眼合者多，痰上则鼻鼾者亦多。惟遗尿口开俱见为恶，心为五脏主君，肾为一身根本，诚不可闭绝也。”参见中风脱证条。

中风脱证 中风重危证型之一。见何廉臣选编《重印全国名医验案类编》。《医宗必读》：“凡中风昏倒，……若口开心绝，手撒脾绝，眼合肝绝，遗尿肾绝，声如鼾肺绝，即是脱证。更有吐沫，直视，肉脱，筋骨痛，发直，摇头上窜，面赤如妆，汗出如珠，皆脱绝之证。”《金匮翼·中风统论》：“猝中之候，但见目合，口开，遗尿，自汗者，无论有邪无邪，总属脱证。脱则宜固，急在元气也。元气固，然后可以图邪气。参附汤。”参真中风、类中风、脱条。

中火 类中风之一。见《万病回春·类中风》。又名火中。详该条。

中水 古病名。见《诸病源候论·水毒候》。又称水毒病。详该条。

中血脉 中风类型之一。又名风中血脉。主症为口眼㖞斜，或见半身不遂，皮肤不仁等。《医学发明·中风有三》：“中血脉则口眼㖞斜，亦有贼风袭虚，伤之者也。”《医学从众录》：“真中风症……中血脉者，外无六经之形症，内无便溺之阻隔，非表非里，邪无定居，或偏于左，或偏于右，口眼㖞斜，半身不遂。”《症因脉治》卷一：“中风之症，……惟见皮肤不仁，或麻或木，口眼㖞斜，东垣所谓中血脉之最轻者。”参见中经、中络条。

中经 中风类型之一。《金匮要略·中风历节病脉证并治》：“正气引邪，㖞僻不遂。邪在于络，肌肤不仁。邪在于经，即重不胜。”病情较中络略重。《医学正传·中风》：“或外无六经之形证，内无便溺之阻隔，但手足不遂，语言蹇涩者，此邪中于经也。”中经亦指风邪袭于经络而见瘾疹者。《金匮要略·中风历节病脉证并治》：“邪气中经，则身痒而瘾疹。”参见中风、真中风、类中风条。

中经络 中风、中经、中络的总称。见《寿世保元·中风》。病在经络，一般无神志改变，表现为口眼歪斜，肌肤麻木，半身不遂，言语不利等症。与中脏腑相对而言，病情较轻。参中经、中络条。

中毒 病名。指毒物进入人体，因毒性作用而发生的病证。药物毒如巴豆、狼毒、闹羊花、砒等；食物中毒如酒、郁肉、河豚等；其他毒如煤炭毒等。参饮食中毒、药物中毒条。

中食 类中风之一。见《证治准绳·杂病》。又名食中。详见该条。

中络 中风类型之一。见《金匮要略·中风历节病脉证并治》。为中风之证情最轻者。《医宗金鉴·杂病心法要诀》：“中风总括：盖口眼㖞斜，肌肤不仁，邪在络也。”参见中风、真中风、类中风条。

中恶 古病名。又称客忤、卒忤。泛指感受秽毒或不正之气，突然厥逆不省人事的病证。出《肘后备急方》卷一。《证治要诀·中恶》：“中恶之证，因冒犯不正之气，忽然手足逆冷，肌肤粟起，头面青黑，精神不守，或错言妄语，牙紧口噤，或头旋晕倒，昏不知人。即此是卒厥、客忤、飞尸、鬼击。

吊死、问丧、入庙、登冢，多有此病。苏合香丸灌之，候稍苏，以调气散和平胃散服，名调脉平胃散。”《诸病源候论·中恶病诸候》包括中恶候、中恶死候、尸厥候、卒死候、卒忤候、卒忤死候、鬼击候、卒魇死候、魇不寤候、自缢死候、溺死候、中热暍候、冒热困乏候、冻死候等。

中恶心痛 病证名。指中邪毒秽恶之气所致的心痛。见《外台秘要》卷七。《太平圣惠方》卷四十三：“夫中恶心痛者，由人脏腑气虚，精神衰弱，为毒邪鬼气之所中也。……邪毒之气，入于脏腑，攻击于心络，故令心腹刺痛也。”《圣济总录》卷第五十六：“若心气不足，精神衰弱，邪恶之气，因得干止，连滞心络，令人气不升降，卒然心痛如刺，闷乱欲绝者，中恶心痛也。”《张氏医通·诸痛门》：“卒中恶心痛，用苦参一两，酢煮顿服；老弱者，分二三服；若脉微欲绝，手足逆冷，肉桂一两，水煮分三服，效。”亦可用赤芍药散、大黄散、沉香散、犀角汤等方。参注心痛条。

中恶霍乱 病名。指霍乱由感受污秽毒气所致者。《圣济总录·霍乱门》：“中恶霍乱者，客邪内干，正气暴乱，使胃中食物不化，气道否结，不得宣通，令人心腹卒痛，吐利烦闷，甚则精神冒昧，靡所知识。”治用十香丸、丹砂丸、桃枝汤等。参见霍乱条。

中热 ❶病证名。《金匮要略·痉湿暍病脉证并治》：“太阳中热者，暍是也。”即中暍、中暑。详该条。❷病理名词。指心胸中热。《素问·气交变大论》：“民病疟，……中热，肩背热。”

中酒 古病名。见《肘后备急方》卷七。又称水毒病。详该条。

中酒头痛 病证名。伤酒头痛的别称。见《证治要诀·诸痛门》。详伤酒头痛条。

中消 病名。又称消中、消中、消脾。《素问病机气宜保命集·消渴论》：“中消者胃也，渴而饮食多，小便黄。”本病以善饥多食，形体消瘦为主要症候，或见小便甜，或因脾胃燥热所致。治宜清胃泻火，滋阴润燥。用白虎汤、抽薪饮、黄连猪肚丸、生地八物汤、调胃承气汤等方。或因命门火衰，火不归元，游于胃而成中消者，宜八味丸。本证可见于甲亢、糖尿病等。参消渴条。

中脏 中风之一。见《素问病机气宜保命集·中风论》。《金匮要略·中风历节病脉证并治》称“邪入于脏”。亦称风中脏。中风之病情最重者。症见猝然昏迷，不能言语，唇缓不收，口角流涎等。《医宗金鉴·杂病心法要诀》：“中风总括：神昏不语，唇缓涎出，邪在脏也。”参中风、真中风、类中风条。

中脘痛 证名。《此事难知》：“中脘痛，太阴也，理中、建中、黄芪汤类主之。”《医学刍言》：“膺胸之下，即为中脘。中脘痛，手不可近，寒痰积气为多，实者宜五积散，虚者宜加味香苏饮。”参胃脘痛条。

中暑 病名。❶指感受暑邪而发生的一种急性病证。见《三因极一病证方论》卷二。症见突然闷倒，昏不知人，或身热烦躁，气喘不语，牙关微紧，或口开齿燥，大汗或无汗，脉虚数，甚者昏迷不醒，四肢抽搐。治当移患者至凉爽通风处，法当清暑、解热、开窍，方用辟瘟丹、消暑丸灌服，后用益元散、白虎汤、清营汤等。并可配用针刺、刮痧、冰水擦浴等法。元气不足者，当调补元气为主，少佐解暑。一名中暍、中热。详暑病、暑厥、暑痫等条。❷指暑风。《医碥》卷一：“中暑，或名暑风，以与中风相似也。”参暑风条。❸指阴暑。《时病论·中暑》：“洁古曰：静而得之为中暑。东垣曰：避暑乘凉得之者，名曰中暑。其实二说皆是阴暑之证……”详阴暑条。❹指暑日受寒，腹痛吐泻者。《六因条辨》上卷：“暑热相逼，好食生冷，不禁房欲，遂至肾阳内歉，腠理不密，寒凉暑湿，乘虚直入，

顷刻胸腹闷痛，肢逆汗冷，吐泻交作。此无论动静，而即为中暑也。”

中暑眩晕 病证名。见《世医得效方》卷二。又名冒暑眩晕、感暑眩晕。症见眩晕欲仆，口渴，烦躁，或见身热，甚则昏不知人，脉虚。治宜解暑化湿。宜用人参白虎汤、香薷饮、黄连香薷饮、消暑丸等方。参暑湿眩晕条。

中焦吐 病证名。《活法机要·吐证》：“中焦吐者，皆从于积。有阴有阳。食与气相假为积而痛，其脉浮而匿。其证或先痛而后吐，或先吐而后痛。”治宜消积导滞，可用紫沉丸，或用木香槟榔等分为末调服。

中腑 中风类型之一。见《素问病机气宜保命集·中风论》。《金匮要略·中风历节病脉证并治》称“邪入于腑”。亦称风中腑。病情较中脏略轻。症见猝然昏倒，苏醒后半身不遂，或伴有大小便不通等症。《症因脉治》卷一：“中风之症，……若仓卒仆倒，少顷即醒，身热痰涎，或见左瘫右痪，半身不遂，《内经》名曰偏枯，东垣所谓中腑之稍轻者。”《医宗金鉴·杂病心法要诀》：“中风总括：昏不识人，便溺阻隔，邪在腑也。”参见中风、真中风、类中风条。

中痞 证名。指中焦闭塞不通所致的痞症。《华氏中藏经·辨三痞证并方第四十六》：“中痞者，肠满，四肢倦，行立艰难，食已呕吐，冒昧，减食或渴者是也。”宜用大黄、槟榔、木香等药。参痞有关条。

中（zhòng 众）湿 ❶指湿痹。《金匮要略·痉湿暍病脉证并治》：“太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细者，此名湿痹（《玉函》云中湿）。”参见湿痹条。❷总指外感或内伤湿邪引起的疾患，可出现皮肤顽麻，喘满，倦怠，肿胀，腰胯疼痛，肢体强硬，肢节不利等多种症候。见《古今医鉴·中湿》。❸类中风类型之一。即湿中。又名痰中。《万病回春·中风》：“类中风者则常有之，有中寒、中暑、中湿……等症。”参湿中、痰中条。❶五邪之一。《难经·四十九难》：“有中风，有伤暑，有饮食劳倦，有伤寒，有中湿，此之谓五邪。”

中寒 ❶类中风之一。又名寒中。《证治要诀·诸中门》：“中寒之证，人身体强直，口噤不语，或四肢战抖，或洒洒恶寒，或翕翕发热，或卒然眩晕，身无汗者，此为寒毒所中。”详见寒中①。❷指寒邪直中三阴。《症因脉治》卷一：“其人真阳素虚，阴寒内盛，……一得外寒，则直中三阴，而为中寒之症矣。”症见恶寒身蜷，手足厥冷，遍身疼痛，面如刀刮，口吐冷涎，下利，无热，不渴，小便清白等。治宜散寒、温阳为主。选用麻黄附子甘草汤、附子汤、白通汤、四逆汤等方。《古今医鉴·中寒》：“如寒中太阴，则中脘疼痛，宜理中汤，或加藿香正气散同服；寒甚脉沉细，手足冷者，附子理中汤。”“寒中少阴，则脐腹疼痛，宜五积散加吴茱萸；寒甚脉沉细，手足冷者，四逆汤加吴茱萸。”“寒中厥阴，则少腹疼痛，宜当归四逆汤加吴茱萸；甚者倍附子。”

中寒便血 病证名。指脾虚中寒，统摄失权所致的大便下血。《张氏医通·诸血门》：“因冷饮中寒，或杂食生冷，血为寒凝而下，必腹痛色晦淡。宜附子理中倍炮姜加酒连。”此外尚可见怯寒神疲，舌质淡红，脉象沉细等。《金匮》黄土汤、黑神散、胶艾汤、熟附子丸等方亦可选用。参便血条。

中暍 古病名。出《金匮要略·痉湿暍病脉证并治》。❶即中暑、中热。《六气感证要义》：“伤寒论，太阳中热者暍是也，故中热即中暍，中暍即中暑，暑热暍三字，并无二义。”参见中热、中暑条。❷指阴寒之暑证。《证治准绳·诸中门》：“中暍者，乃阴寒之证，法当补阳气为主，少佐以解暑，故先哲多用姜桂附子之类，此推《内经》舍时从证之良法也。”❸即阳暑，详该条。

中满 证名。出《素问·阴阳应象大论》。❶指脘腹胀满，甚则可见有块坚痛。

《医林绳墨·臌胀》："中满之症，中气满闷，当胸之下，胃口之上，一掌之横，按之坚石，有形作痛，此名中满者也。由其忿怒太甚，不能发越，郁结中州，痰涎停住，乃成满也。"❷肿胀证状之一。《景岳全书·肿胀》："肿胀之病，原有内外之分，盖中满者，谓之胀，而肌肤之胀者，亦谓之胀。"参见食滞中满、气虚中满、肿胀等条。

中溪 古病名。见《肘后备急方》卷七又称水毒病。详该条。

中酸 证名。俗称醋心。指吞酸之轻症。《医学正传·吞酸》："或微而上为中酸，俗谓之醋心。"详吞酸、吐酸条。

内风 ❶古病名。指因房劳汗出，风邪乘袭的病症。《素问·风论》："入房汗出中风，则为内风。"《增补内经拾遗方论·内风》："新房室竟，取风，为内风。其状恶风，汗流粘衣被，此其候也，大补黄芪汤。"❷病理名词。指肝风。与外风相对而言。《临证指南医案·中风》华岫云按："今叶氏发明内风，乃身中阳气之变动。肝为风脏，因精血衰耗，水不涵木，木少滋荣，故肝阳偏亢，内风时起，治以滋液熄风，濡养荣络，补阴潜阳。如虎潜、固本、复脉之类是也。"参肝风内动条。

内火喘逆 病证名。指阴虚火旺犯肺所致的气喘。《症因脉治·喘症论》："内火喘逆之因：内而欲心妄动，外而起居如惊，五志厥阳之火，时动于中，煎熬真阴，精竭血燥，内火刑金，肺气焦满而喘逆作矣。"症见喘逆自汗，五心烦热，口燥唇焦，得食稍减，少顷复发，时作时止，面赤便秘等。治宜审察火动之原，随症施治。如肾虚肝旺，宜养阴制火，用门冬饮子、家秘肝肾丸；肝火上冲，宜柴胡清肝散；心火上炎，宜导赤各半汤；脾胃之火上冲，宜清胃汤；肺火煎熬，宜石膏泻白散等方。参阴虚喘、火喘条。

内伤三消 病证名。见《症因脉治》卷三。指七情、房室、饮食内伤引起的消渴病。有精虚、积热之分。详见精虚三消、积热三消、消渴条。

内伤小便不利 小便不利症之一。见《症因脉治》卷四。内伤小便不利包括热结小便不利、偏渗小便不利、气虚小便不利、阴虚小便不利、阳虚小便不利。详各该条。

内伤不得卧 病证名。指脏腑不调引起的不寐症。《症因脉治·不得卧论》："在杂症门，则里热多而无表热者也。今注外感者七条，内伤者六条。"内伤不得卧，包括肝火不得卧、胆火不得卧、肺壅不得卧、胃不和卧不安、心血虚不得卧、心气虚不得卧等。详见各条。

内伤牙衄 病证名。指胃中实热或阴虚火炎所致的齿牙出血。《症因脉治》卷二："内伤牙衄之症，身无表邪，牙龈出血，一涌而上，来血甚多，此阳明经牙衄之症；若身无表邪，牙龈时或出血，来血不多，久而不愈，肌肉消瘦，此少阴经牙衄之症也。"因多进膏粱厚味，或饮酒过量，嗜食辛辣炙爆，使肠胃积热，血中伏火或肾阴不足，水中之火上炎所致。肠胃积热者，治宜清胃，用升麻清胃散加酒制大黄；若阳明血热者，用犀角地黄汤加酒浸黄芩；龙火上冲者，宜用知柏肝肾丸加减。参见衄血有关条。

内伤中风证 病名。指类中风。《症因脉治》卷一："内伤中风论……以其不因外感，故曰内伤，以其症类中风症，故亦曰中风，古人名类中风，即此症也。"参见类中风条。

内伤半身不遂 病证名。指半身不遂不由外邪所致者。多因气血凝滞，脉络不通，或痰火内作，饮酒酿湿，流踞经络而成。症有缓急。《症因脉治》卷一："或一手、一指，先见麻木，一年半载，渐渐不能举动，此病起于缓者；或痰火内作，忽尔僵仆，少顷即苏，半身不能举动，此病因于火而急者，二者皆无表邪形象，故曰内伤半身不遂也。……血痹者，活血汤；结痰者，二陈汤加竹沥、

生姜；酒湿成瘫者，戒酒，服散湿热之药。葛花平胃散，或加栀连，或栀连二陈汤；若气虚补气，血少补血。”参半身不遂条。

内伤头痛　病证名。指人体脏腑、气血损伤，或内邪上扰所致的一类头痛。《景岳全书·杂证谟》：“至若内伤头痛，则不得以三阳为拘矣。”内伤头痛，一般起病较缓，时作时止，遇劳累受风，或情志刺激则常易发作，并有脏腑气血不足或内邪的症候。《症因脉治·头痛论》：“头痛之因，或元气虚寒，遇劳即发，或血分不足，阴火攻冲，或积热不得外泄，或积痰留饮，或食滞中焦，或七情恼怒，肝胆火郁，皆能上冲头角，而成内伤头痛之症也。”内伤头痛以虚证居多。有气虚头痛，血虚头痛，阴虚头痛，阳虚头痛，肾虚头痛，瘀血头痛，痰湿头痛，肝阳头痛等。详各条。

内伤夹暑　病证名。指炎暑因伤房劳及杂进膏粱水果致全身阳气不得伸越的重危病证。《杂病源流犀烛·暑病源流》：“内伤夹暑者，暑月房劳，兼膏粱水果杂进，至周身阳气不伸，脉沉细，或弦紧，面垢，无汗恶寒，四肢厥逆拘急，霍乱呕吐，宜冷香饮子；或吐利兼作，脉微欲绝，或虚浮而散，此为紧病，急当救之毋缓，宜浆水散；或冒暑伏热，引饮过多，及恣啖生冷，致脾胃受寒，及腹痛呕泄，水谷不分，脉沉而紧，宜大顺散。”参暑病条。

内伤吐血　病证名。见《症因脉治》卷二。多因胃热络伤，或心、脾、肝、肾劳损而致。《临证指南·吐血》：“内因起见，不出乎嗔怒郁勃之激伤肝脏，劳形苦志而耗损心脾，及恣情纵欲以贼肾脏之真阴真阳也。”其症身无表邪，脉不浮大，时而呕吐纯血。因胃热络伤者，吐血量多，鲜瘀相杂，兼见胸闷作痛，嘈杂便秘，苔黄腻，脉滑数，宜清胃泻火，用三黄泻心汤加侧柏叶、白茅之类。因郁怒伤肝者，吐血鲜红，头痛目赤，口苦心烦，胸胁引痛。治宜清肝凉血，用化肝煎合茜根散加减。因心脾损伤者，吐血气短，憔悴声怯，心悸少寐。治宜补养心脾，用归脾汤。因阴虚火旺者，吐血盗汗，耳鸣遗精。治宜壮水制火，用六味地黄丸加蒲黄、藕节、阿胶、五味子之属。因阳虚血不归经者，血色晦淡，怕冷肢凉。治宜温中补阳，用理中汤加木香，或八味丸以引火归元。参吐血、劳伤吐血等条。

内伤吐酸水　病证名。见《症因脉治》卷二。指因恼怒忧郁，肝郁生火，克伐脾胃所致的吐酸症。症见食入吐水酸馊，两胁刺痛，面红升火，脉多弦数。宜用柴葛平胃散、栀连平胃散等方。因脾胃虚寒、宿食、水饮、痰热所致者，亦属内伤吐酸，详吐酸条。

内伤休息痢　病证名。休息痢类型之一。见《症因脉治》卷四。由劳心过度，饮食伤损，脾肾相传所致。详休息痢条。

内伤发斑　病证名。斑的类型之一。《医学入门》卷五：“内伤发斑，轻如蚊迹疹子者，多在手足，初起无头疼身热。”又名内伤斑。《丹溪心法·斑疹》：“内伤斑者，胃气极虚，一身火游于外所致。”治以补虚为主。用调中益气汤、黄芪建中汤、大建中汤等方。参斑条。

内伤呃逆　病证名。见《症因脉治·呃逆论》。指脏腑不调及情志失常、伤食等引起的呃逆症。因中气不足所致者，宜六君子汤。因胃气损伤，食滞中焦者，宜枳术汤、苍朴二陈汤。因膏粱积热，胃火上冲者，宜栀连平胃散。因胃寒饮冷、水寒上逆者，宜丁香柿蒂汤、理中汤、苓桂术甘汤。因怒动肝火者，宜加味柴胡汤。因肝肾阴亏者，宜知柏地黄丸、家秘知柏天地煎、家秘肝肾丸等方。参见呃逆条。

内伤呕吐　病证名。见《症因脉治·呕吐论》。指脾胃虚弱，或邪滞脾胃所致的呕吐。如胃寒呕吐、胃热呕吐、痰饮呕吐、食积呕吐等。详各该条。

内伤胁痛　病证名。指胁痛由内伤引起

者。见《景岳全书·胁痛》。《症因脉治·胁痛论》："内伤胁痛之因，或痰饮悬饮，凝结两胁；或死血停滞胁肋；或恼怒郁结，肝火攻冲；或肾水不足，龙雷之火上冲；或肾阳不足，虚阳上浮，皆成胁肋之痛矣。"宜随证施治。详停饮胁痛、死血胁痛、肝郁胁痛、肝火胁痛、肾虚胸胁痛条。

内伤泄泻 病证名。见《症因脉治》卷四。包括积热泄泻、积寒泄泻、痰积泄泻、食积泄泻、脾虚泄泻。又如气泻、积瘀泄、酒泄、肾泄、肝泄等，亦属内伤泄泻。参各条。

内伤肩背痛 病证名。指因肺气不足或肺气壅阻，劳力损伤，积热上熏所致的肩背痛。《症因脉治》卷一："内伤肩背痛之症，气怯神离，精神不足，痛势不急，仍能睡卧，此肺气不足之症也；若喘急气逆，不得睡卧，此肺壅作痛之症也；若劳伤脱力，遇劳即痛，此损伤之症也；口渴唇焦，二便赤涩，烦躁不宁，此积热作痛之症也。"多由元气素亏，伤损肺气，或肺热叶焦，肺气怫郁，或劳碌举重，损伤筋膜，或肠胃积热，上熏肺金所致。如症见气怯神清，脉大而虚，宜四君子汤、补中益气汤；喘急气逆，不得安卧，六脉躁盛，宜葶苈泻肺汤、家秘泻白散；久痛不愈，气血有伤者，宜四物汤、八珍汤加秦艽、续断、钩藤、羌活等药；膏粱积热，口燥唇焦，六脉沉数者，宜家秘泻白散；木火刑金，左关脉数者，泻白各半汤等方。参见肩背痛条。

内伤胃脘痛 病证名。见《症因脉治·胃脘痛论》。指胃痛之由食积、痰饮、积热、积冷、气滞、死血、虫积等所致者。详食滞脘痛、痰饮胃脘痛、积冷胃脘痛、积热胃脘痛、瘀血胃脘痛、蚘动脘痛、胃脘痛条。

内伤咳嗽 病证名。见《景岳全书·杂证谟》。指肺脏虚弱或它脏累肺所致的咳嗽。《医宗必读·咳嗽》："劳役情志伤其内，则脏气受伤，先由阴分而病及上焦，此自诸脏而后传于肺也。"其表现为起病缓慢，咳声轻微，并有脏腑虚损及气虚血亏等症，多属虚证或虚实夹杂。治宜调理脏腑为主。《医门法律·咳嗽门》："内伤之咳，治各不同，火盛壮水，金虚崇土，郁甚舒肝，气逆理肺，食积和中，房劳补下，用热远热，用寒远寒，内已先伤，药不宜峻。"由于内伤性质和脏腑病变的不同，有肺经咳嗽、脾经咳嗽、心经咳嗽、肝经咳嗽、肾经咳嗽、气虚咳嗽、血虚咳嗽等。详各该条。

内伤结胸 病证名。指寒饮结胸者。《医学衷中参西录·论结胸治法》："结胸之证，有内伤外感之殊。内伤结胸，大抵系寒饮凝于贲门之间，遏抑胃气不能上达，阻隔饮食不能下降。当用干姜八钱，赭石两半，川朴、甘草各三钱开之。其在幼童，脾胃阳虚，寒饮填胸，呕吐饮食成慢惊，此亦皆寒饮结胸证。治用庄在田《福幼编》逐寒荡惊汤"等。

内伤恶寒 病证名。指恶寒由饮食、劳倦等所致者。《证治汇补·恶寒章》："内伤恶寒稍就温暖即止。"《张氏医通》卷三："脉缓弱，或气口虚大，按之无力，兼见倦怠，手心热，是内伤元气证。补中益气汤，加桂附二、三分，以行参芪之力，且益阳气。"参阳虚恶寒、劳倦恶寒、伤食恶寒等条。

内伤衄血 病证名。统指无外伤、外感所致的鼻衄。《症因脉治》卷二："内伤衄血之症，身无表邪，目睛或黄，五心烦热，鼻孔出血。"常由肺热上壅、胃热熏蒸、肝火上炎、阴虚火浮等因所致。因肺热者，伴见口干鼻燥，或见咳呛。治宜辛凉清解，可选用泻白一物汤，或桑菊饮加丹皮、茅根。因胃热者，伴见口渴口臭，大便秘结。治宜清胃降火，可选用玉女煎，或清胃汤加酒大黄。因肝火者，伴见烦躁易怒，头胀目赤。治宜清肝泻火，可选用龙胆泻肝汤、清肝饮。肝肾阴虚，火浮于上者，伴见头晕耳鸣，脉

沉细而数。治宜滋阴降火，可选用知柏地黄丸，或六味地黄丸加龟版、牡蛎等。本证可见于血液病、高血压、动脉硬化症、肝硬变、鼻腔炎症等疾病。参见鼻衄条。

内伤黄疸 病证名。指因脾胃内伤所致的黄疸。见《症因脉治》卷三。包括谷疸、酒疸、女劳疸、阴黄在内。《医学纲目》卷二十一："劳役形体，饮食失节，中州变寒，病生黄，非外感而得，只用建中、理中、大建中足矣。"《石室秘录·黄疸》："黄疸，盖外感之湿易治，内伤之湿难医，外感单治湿而疸随愈，内伤单治湿而疸难痊，泻水则气愈消，发汗则精愈泄。"治宜健脾、化湿、温肾、利胆为主。忌用攻法。参见黄疸等条。

内伤喘逆 病证名。见《症因脉治·喘症论》。指气喘由内伤脏腑气血引起者。包括内火喘逆、痰饮喘逆、食积喘逆、气虚喘逆、阴虚喘逆、伤损喘逆等。详各该条。

内伤遗尿 病证名。见《症因脉治》卷一。指脏腑内伤所致的小便失禁。脾肾不足者居多。主要症候为小便时时自遗，神志清醒，语言轻微，饮食减少，大便溏泄，脉濡软或浮大。治宜补益脾肾，可选用补中益气汤、八味肾气丸。又有肝阴不足，肝火内扰，脉见沉数者，宜用三才汤加麦冬、五味子、黄柏、知母等。参遗尿、小便不禁条。

内伤短气 病证名。见《症因脉治·短气论》。指因内伤而致气短不足以息者。有实邪短气与气虚短气之分。详各该条。

内伤腋痛 病证名。指郁怒伤肝，积热熏肺，肾火上冲等因而致的腋痛。见《症因脉治·腋痛论》。详腋痛条。

内伤痢疾 病证名。见《慎斋遗书》卷八。《痢证汇参》卷二："内伤之痢有三。有七情内伤，劳力内伤，饮食内伤。虽属一证，而治各不同。"详见七情痢、劳役痢、饮食内伤痢等条。

内伤湿痰 病证名。湿痰证之一。《症因脉治·内伤痰症》："湿痰之症，身或热或不热，体重足痠，呕而不渴，胸膈满，时吐痰，身体软倦，此内伤湿痰之症也。"多因脾胃阳虚，水液停留，生湿酿痰所致。治宜理脾燥湿为主。如二陈平胃散、二陈羌防汤、栀连二陈汤、六君子汤等方。参见湿痰条。

内伤蓄血 病证名。指蓄血是由于内伤所致者。其症胸胁或小腹急痛，宜桃仁承气汤或抵当汤，随痛之高下选用之。体虚者，可略加桂、附；若下血瘀滞，色晦不鲜者，酌加温补气血之品。参见基础理论分册瘀血条。

内伤腰痛 病证名。《症因脉治·腰痛总论》："内伤腰痛之症，日轻夜重，痛定一处，不能转侧，此沥血停畜之症；胁肋气胀，遇怒愈甚，此怒气郁结之症；腰间重滞一片如冰，得热则减，得寒愈甚，此痰注作痛之症；时常怕冷，手足不暖，凡遇寒气，腰背即痛，此真火不足，阳虚之症也；五心烦热，足心如火，痛如锥刺，此阴虚火旺之症也。内伤腰痛之因，挫闪跌扑，劳动损伤，则腰腹作痛；七情恼怒，忧思郁结，则腰胁疼痛；脾湿不运，水饮凝结，则为痰注腰痛；先天不足，真阳亏损，则为阳虚腰痛；真水不足，复损阴精，则肾虚火旺而腰痛。"详肾虚腰痛、血虚腰痛、气腰痛、沥血腰痛、食积腰痛、痰注腰痛等条。

内伤腹胀 病证名。见《症因脉治·肿胀总论》。指因气郁、痰饮，或食滞、虫积，或脏腑虚衰等所致的腹胀。如气结腹胀、痰饮腹胀、食积腹胀、虫积腹胀、肝火腹胀、脾虚腹胀、六腑腹胀等。详各该条。

内伤嗽血 病证名。见《症因脉治》卷二。指内伤肺络的咳嗽吐血。多因肺胃积热，痰火上冲，或房劳精竭，肾火刑金，或思虑伤脾，脾火消阴，或郁怒伤肝，肝火怫郁，或用心太过，心火妄动所致。其症身无表邪，咳嗽吐血。肺胃积热，胃火上冲者，治

宜清金降火，选用泻白散、清胃汤、化痰丸等方。房劳精竭，肾火刑金者，先用犀角地黄汤，血止后选用归芍天地煎、三才丹等。脾阳不足，土不生金者，加味归脾汤；脾阴不足，土中之火刑金，加味戊己汤。怒动肝火，木火刑金者，柴胡饮子；肝血不足者，加味补肝散。心火妄动者，导赤各半汤；心血不足者，天王补心丹。肾火不足，阳虚不能摄血者，八味肾气丸等方。本证可见于慢性支气管炎、支气管扩张症、肺部结核、肺部肿瘤、肺郁血等疾病。参见嗽血条。

内伤噎隔 病证名。多因忧愁郁结，五志之火皆动，日夜煎熬，津液干涸，或膏粱厚味，辛辣炙煿，恣意不谨，积热消阴等所致。《症因脉治》卷二："饮食之间，渐觉难下，或下咽稍急，即噎胸前，如此旬月，日甚一日，渐至每食必噎，只食稀粥，不食干粮，此内伤噎隔之症也。"治宜生津养胃为主，可用二母二冬汤。虚者，生脉散加养血之药，若凝窒已久，痰涎聚结于胃脘，不可用凝滞之药，先用清痰清火，开豁化痰，宜《金匮》麦门冬汤冲竹沥、姜汁、芦根汁，以开通中脘结痰，随以养阴生津治本。若膏粱积热，本元旺者，可酌用承气汤。参见噎膈条。

内伤燥痰 病证名。燥痰证之一。《症因脉治·内伤痰症》："燥痰之症，咳嗽喘逆，痰火上升，时咳时止，痰不能出，连嗽不已，面赤气升，此内伤燥痰之症也。"多因肺肾阴亏，或膏粱厚味，肠胃积热，火灼津液而致。治宜养阴润肺为主。如二冬二母汤、二母固本丸等。因膏粱积热者，宜节斋化痰丸。参燥痰条。

内证头痛 病证名。指内伤头痛。《内外伤辨·辨头痛》："内证头痛有时而作，有时而止。"详内伤头痛条。

内郁 指七情所致之郁证。《不居集·诸郁》："内郁者，七情之郁也。"参怒郁、思郁、忧郁、悲郁、惊郁、恐郁各条。

内实证 证名。里实证的别称。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："伤寒十三日，过经谵语者，以有热也，当以汤下之。若小便利者，大便当鞕，而反下利，脉调和者，知医以丸药下之，非其治也。若自下利者，脉当微厥，今反和者，此为内实也，调胃承气汤主之。"详见里实证条。

内热 ❶证名。指体内脏腑阴阳偏胜之热。宜辨虚实。《素问·调经论》："阴虚生内热，……有所劳倦，形气衰少，谷气不盛，上焦不行，下脘不通，胃气热，热气熏胸中，故内热。"《素问·厥论》："酒气与谷气相搏，热盛于中，故热遍于身，内热而溺赤也。"内热常见胸中烦热，午后潮热，五心发热，口苦，溲赤等症。《明医杂著》卷一："内伤发热，是阳气自伤不能升达，降下阴分而为内热，乃阳虚也，故其脉大而无力，属肺脾；阴虚发热，是阴血自伤不能制火，阳气升腾而为内热，乃阳旺也，故其脉数而无力，属心肾。"《理虚元鉴·虚热内热骨蒸论》："故夜热、内热、虚热，为虚劳之初病，骨蒸内热、潮热，则虚劳之本病也。……治法以清金养营，疏邪润燥为主，则热自退矣。"参见发热条。❷内通纳。《灵枢·寿夭刚柔》："刺寒痹者内热。"即在针刺痹症时用火针或熨法、灸法等。

内衄 病证名。❶呕血的一种表现。《千金要方》卷十二："内衄者，出血如鼻衄，但不从鼻孔出，是近从心肺间津液出，还流入胃中，或如豆羹汁，或如切藏，血凝停胃中，因即满闷便吐，或去数斗至于一石者是也。得之于劳倦、饮食过常所为也。"此症有虚实之分，实者用三黄泻心汤加生地黄，虚者用茯苓补心汤、人参救肺散等（见《东医宝鉴·内景篇》）。❷血从口出之总称。《医宗金鉴·杂病心法要诀》："若从口出则为内衄。内衄出血，涎嗽出于脾，唾出于肾，咯出于心，咳出于肺，呕出于

肝，吐出于胃。”参吐血、呕血、咳血、咯血、唾血等条。

内烦　证名。指伏热或吐后引起的心胸烦热或烦闷。《素问·本病论》：“伏热内烦。”《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病吐之，但太阳病当恶寒，今反不恶寒，不欲近衣，此为吐之内烦也。”《注解伤寒论》卷五：“吐后心烦，谓之内烦。”参虚烦条。

内消　病证名。❶消渴病之一。《诸病源候论·消渴病诸候》：“内消病者，不渴而小便多是也。由少服五石，石热结于肾内也。”《千金要方》卷二十一：“内消之为病，当由热中所作也。小便多于所饮。令人虚极短气。夫内消者，食物消作小便也，而又不渴。”参下消条。❷指强中症。《张氏医通·杂门》：“肾消之病，古曰强中，又谓内消。”详强中条。

内黄　黄病二十八候之一。《诸病源候论·黄病诸候》：“热毒气在脾胃，与谷气相搏，热蒸在内，不得宣散，先心腹胀满气急，然后身面悉黄，名为内黄。”治宜选用栀子散、茵陈散、三黄散等方。参黄疸条。

内蒸　五蒸之一。亦名血蒸。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详五蒸条。

见闻精出　证名。指耳闻目睹色情之事而精自泄者。《诸病源候论·虚劳病诸候》：“见闻感触，则动肾气。肾藏精，今虚弱不能制于精，故因见闻而精溢出也。”义同漏精，属滑精病。详滑精条。

〔丿〕

丹石中毒　病名。古代封建贵族为追求长生不老而恣意服食金石类丹药中毒。详金石中毒、石药中毒条。

午后嗽　病证名。指咳嗽午后发作者。亦称劳嗽。为阴虚所致。《明医杂著》卷二：“午后嗽者，属阴虚，即劳嗽也，宜补阴降火。……愚按前症，属肾气亏损，火炎水涸，或津液涌而为痰者，乃真脏为患也。须用六味地黄丸壮肾水，滋化源为主，以补中益气汤养脾土、生肺肾为佐。”《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源论》：“午后咳，痰黑粘滞，阴虚火动也，宜六味作汤，加止嗽药。”或知柏四物汤等方。参劳嗽、夜嗽、咳嗽条。

牛肉积　病证名。指因多食牛肉停滞不化者。《医钞类编》卷九：“牛肉积，捣马鞭草汁或生姜汁饮之。”参肉积条。

牛黄　❶三十六黄之一。《太平圣惠方》卷五十五：“牛黄者，舌如蜡色，口作噤，不多言语，或如牛吼。若眼目头面未变，作深黄色者可治；如舌上及身体黄黑色者难疗。”治用点烙法，内服犀角散等方。参黄疸有关条。❷中药名。详中药分册该条。

牛痫　六畜痫之一。见《小儿药证直诀·五痫》。即牛癫。详六畜痫、牛癫条。

牛癫　病名。即牛痫。因发作时吼声如牛鸣故而得名。《圣济总录》卷十五：“牛癫若牛鸣。”《辨证录·癫痫门》：“痰气太盛，一时跌仆，口作牛马之鸣者，世人所谓牛马之癫也，其实乃虚寒之症，痰入心包也。”参痫、癫、六畜痫条。

毛发焦　证名。指毛发干焦的症象。出《灵枢·寒热病》。多由血气耗伤，津液不能滋养所致。

毛折　证名。指毛发枯槁，稀疏易折。出《素问·玉机真藏论》。多因精气耗伤，不能濡润皮毛所致。为元气衰绝之候。

毛耸　证名。指毫毛耸然直竖。见《金匮要略·痉湿暍病脉证治》。

毛窍血出　证名。亦称脉溢。《医学入门》卷八：“毛窍血出，节次若血不出，皮膨胀如鼓，须臾眼鼻口被气胀合，此名脉溢。饮生姜汁、水各一二盏即安。”

毛悴色夭　证名。指皮毛憔悴，色泽枯暗。出《灵枢·本神》。多由心脾不足，肺气亏虚，皮毛失养所致。

手太阳经筋病候 病证名。又名仲夏痹。十二经筋病候之一。《灵枢·经筋》："手太阳之筋……其病，小指支肘肉锐骨后廉痛，循臂阴入腋下，腋下痛，腋后廉痛，绕肩胛引颈而痛，应耳中鸣，痛引颔，目瞑，良久乃得视。颈筋急则为筋瘘颈肿。寒热在颈者，治在燔针劫刺之，以知为数，以痛为输。其为肿者，复而锐之。本支者，上曲牙，循耳前，属目外眦，上颔，结于角，其痛当所过者支转筋。治在燔针劫刺，以知为数，以痛为输。名曰仲夏痹也。"

手太阴心痛 病证名。外邪侵犯手太阴经所致。《三因极一病证方论》卷九："若十二经络外感六淫，则其气闭塞，郁于中焦，气与邪争，发为疼痛，属外所因。"又："手太阴心痛，短气，不足以息，季胁空痛，遗失无度，胸满，烦心。"参心痛条。

手太阴经筋病候 病证名。又名仲冬痹。十二经筋病候之一。《灵枢·经筋》："手太阴之筋……其病，当所过者支转筋，痛甚成息贲，胁急吐血。治在燔针劫刺，以知为数，以痛为输。名曰仲冬痹也。"

手心主心痛 病证名。外邪侵犯手厥阴经所致。《三因极一病证方论》卷九："若十二经络外感六淫，则其气闭塞，郁于中焦，气与邪争，发为疼痛，属外所因。"又："手心主心痛，彻背，心烦，掌中热，咽干，目黄赤，胁满。"参心痛条。

手心主经筋病候 病证名。又名孟冬痹。十二经筋病候之一。《灵枢·经筋》："手心主筋，……其病，当所过者支转筋，前及胸痛息贲。治在燔针劫刺，以知为数，以痛为输，名曰孟冬痹也。"

手心热 证名。指两手掌心中有发热感觉。一名掌中热。手三阴经是动、所生病症之一。详见掌中热条。又为劳倦内伤及五心烦热的症状之一。《内外伤辨惑论》卷上："内伤及劳役饮食不节，病手心热，手背不热；外伤风寒则手背热，手心不热，此辨至甚皎然。"参发热、掌中热、五心烦热条。

手少阳经筋病候 病证名。又名季夏痹。十二经筋病候之一。《灵枢·经筋》："手少阳之筋，……其病当所过者即支转筋，舌卷。治在燔针劫刺，以知为数，以痛为输。名曰季夏痹也。"热者无用燔针。

手少阴经筋病候 病证名。又名季冬痹。十二经筋病候之一。《灵枢·经筋》："手少阴之筋，……其病内急，心承伏梁，下为肘网，其病当所过者支转筋，筋痛。治在燔针劫刺，以知为数，以痛为输。其成伏梁唾血脓者，死不治。名曰季冬痹也。"

手气 证名。亦称手肿痛。见《证治要诀》卷三。指手指肿痛或连臂膊作痛。多因脾虚风湿或风热挟痰，内阻经络所致。宜用五痹汤、蠲痹汤等方。因肿疡所致者，宜按痈肿论治。

手阳明经筋病候 病证名。又名孟夏痹。十二经筋病候之一。《灵枢·经筋》："手阳明之筋，……其病当所过者支痛及转筋，肩不举，颈不可左右视。治在燔针劫刺，以知为数，以痛为输，名曰孟夏痹也。"热者无用燔针。

手足不仁 证名。指手足不知痛痒，不觉寒热的症象。出《素问·本病论》。《伤寒明理论·不仁》："不仁，谓不柔和也。痒不知也，痛不知也，寒不知也，热不知也，任其屈伸灸刺，不知所以然者，是谓不仁也。由邪气壅盛，正气为邪气闭伏，郁而不发，荣卫血气虚少，不能通行，致斯然也。"《金匮要略心典·腹满寒疝宿食病脉证治》："手足不仁，或身疼痛，阳痹于外也，此为寒邪兼伤表里，故当表里并治。"本证可见于中风后遗症、痹证等疾患。

手足心热 证名。指手心、足心有发热感觉。见《丹溪心法·发热》。多由阴虚而生内热，或火热内郁等所致。参手心热、掌中热、足下热、五心烦热条。

手足汗 证名。见《伤寒明理论》。指

手足局部多汗。有因脾胃湿热内蒸而傍达四肢，致令手足心常有汗者，治宜化湿清热，可用清脾散或二陈汤加黄连、白芍等。有因脾胃虚寒不能运行水湿而横溢于四肢，手足出冷汗者，治宜温中为主，可用理中汤加减。有因阴阳不和，经络不调，而手足汗出者，宜八珍汤加半夏、茯苓、川乌、白附子等。手足汗见于热性病，多因阳明腑热，伴见潮热，大便难者，治当泻热通腑，可用大承气汤。

手足逆冷 证名。又称四肢逆冷、手足厥冷。《伤寒论·厥阴病脉证并治》："厥者，手足逆冷者是也。"详手足厥冷条。

手足烦热 证名。指患者手足热而心情烦躁。见《诸病源候论》卷十八。可见于骨蒸、虚劳等。详手心热、足下热、五心烦热条。

手足麻木 证名。四肢麻木的别称。《丹溪心法》卷四："手足麻者，属气虚；手足木者有湿痰、死血。"详四肢麻木条。

手足厥冷 证名。指手足冷至肘膝的症象。《金匮要略·腹满寒疝宿食病脉证治》："寒疝绕脐痛，若发则自汗出，手足厥冷。"又称手足逆冷、手足厥逆、四逆等。《伤寒溯源集》卷九："论中或云厥，或云厥逆，或云四逆，或云厥冷，或曰手足寒，或曰手足厥寒，皆指手足厥冷而言也。"有寒热之分：寒证由于阳气衰微，阴寒内盛所致，常伴有怕冷，下利清谷，脉沉微等，治宜回阳救逆，祛寒，方用四逆汤、大乌头煎等方；热证多因热邪郁遏，阳气不能通达四肢，伴有胸腹烦热，口渴等证，治宜宣透郁热，方用四逆散、白虎汤、承气汤等。

手足厥逆 证名。手足厥冷的别称。见《难经·十七难》。详手足厥冷条。

手足寒 证名。指手足有寒冷感觉。出《素问·通评虚实论》。多因脾胃虚寒所致。《伤寒论大全·厥分寒热辨》："人之手足乃胃土之末，凡脾胃有热，手足必热，脾胃有寒，手足必冷，理之常也。"本症可见于伤寒、厥逆等疾患。

手足缓弱 证名。指手足弛缓软弱无力。多由风、寒、湿邪阻遏经脉所致。《千金要方·诸风》："中风，身体疼痛，四肢缓弱不遂。"可用羌活汤、五痹汤等。本证可见于中风、痹证等。

手足躽（duō）曳 证名。指手足筋脉弛缓无力，类似四肢不收。多由风邪乘袭经脉所致。《备急千金要方·诸风》："治风懿不能言，四肢不收，手足躽曳。"宜用独活汤。《丹溪心法附余》卷一："中风虽能言，口不㖞斜而手足躽曳。"可用星附散。《奇效良方》卷二："风邪所攻，肌肤虚弱，手足躽曳，筋脉不利。"治宜赤箭丸。本证可见于中风、偏瘫等疾患。

手肿痛 证名。手气的别称。《杂病源流犀烛·肩臑肘臂腕手病源流》："手肿痛，或指掌连臂膊肘腕俱痛，为手气也。"详手气条。

手指麻木 证名。亦称十指麻木。指手指不觉痛痒，麻木不适。多因风湿入络，或气虚兼有湿痰，瘀血阻滞所致。常为中风先兆。《素问病机气宜保命集·中风论》："中风者俱有先兆之证。凡人如觉大拇指及次指麻木不仁，或手足不用，或肌肉蠕动者。"《张氏医通·痹》："手指麻木是气不行，有顽痰死血也。"治宜益气活血、祛风、化湿、涤痰为主。如补中益气汤加红花、姜黄；导痰汤加乌药、苍术；二陈汤加二术、桃仁、附子等。《鲖溪医述·手指尖》："平人手指麻木，不时眩晕何？曰中风先兆，须预防之，宜慎起居，节饮食，远房帏，调情志。"参麻木条。

手背热 证名。指两手背有发热感觉。《内外伤辨惑论·辨手心手背》："内伤及劳役饮食不节，病手心热，手背不热；外伤风寒则手背热，手心不热，此辨至甚皎然。"亦为伤寒邪在表之证。《万病回春·伤寒》：

“手心热者，邪在里也；手背热者，邪在表也。”参发热条。

手热 证名。指两手有发热感觉。见《素问·至真要大论》。明·吴崑注：“火佛于中，故手热。”手热并可见于虚损痨瘵等病。参手心热、五心烦热等条。

手臂痛痁 痁证之一。《痁胀玉衡·手臂痛痁》：“手臂有痁，攻及脏腑者为紧痁，不攻脏腑者为慢痁。慢痁之症，惟刺手臂，紧痁之症，兼服痁药。”参痁条。

气下 九气之一。《素问·举痛论》：“恐则气下。”详九气条。

气上 九气之一。《素问·举痛论》：“怒则气上。”详九气条。

气中 类中风之一。又名中气。多由七情气结，或怒动肝气，气逆上行所致。《太平惠民和剂局方》附《指南总论》论诸风气中：“因事激挫忿怒而不得宣泄，逆气上行，忽然仆倒昏迷，不省人事，牙关紧急，手足拘挛，其状与中风无异，但口内无涎声。此证只是中气，不可妄投取涎发汗等药，反生他病。但可与七气汤，分解其气，散其壅结。”《医宗必读·类中风》：“但风中身温，气中身冷，……急以苏合香丸灌之，候醒，以八味顺气散加香附，或木香调气散。”

气心痛 证名。见《外台秘要》卷七。多因诸气郁滞及七情过用所致。《医学从众录·心痛》：“气痛，脉沉而涩，诸气郁滞及七情过用所致。宜二陈汤加沉香、乌药、百合主之。”《证治汇补·腹胁门》：“气痛，因恼怒而发，痛时隐隐闷结，胸臆相引，得嗳觉宽，为忧郁所致(《指掌》)。甚则痛连胁肋，呕逆恶心，吐不得出，坐卧不安，奔走狂叫。均宜枳壳、木香，以开其气。”《张氏医通·心痛胃脘痛》：“气郁脉沉伏，或结或弦，胸中气壅，攻刺胀痛，沉香降气散。中气虚，按之则痛定，二陈加炮姜。不应，理中汤。病久服耗气药太过，脉大或数无力，亦为中气虚，六君子加炮姜。”参心痛条。

气水 古病名。十水之一。《中藏经·论水肿脉证生死候》：“气水者，其根在大肠，其状乍来乍去，乍盛乍衰者是也。此良由上下不通，关窍不利，气血痞格，阴阳不调而致之也。”参十水条。

气水肿 病证名。水肿之一。指肺肾不足，水气留滞皮肤的病症。《太平圣惠方》卷五十四：“夫肾主水，肾虚则水妄行；肺主气，肺虚则卫气不能循环。水之与气，留滞皮肤，令身体四肢肿满，故名气水肿也。”症见肿满喘急，大小便涩，胸胁烦闷等。治用大腹皮散、猪苓散、木香圆等方。参水肿条。

气收 九气之一。《素问·举痛论》：“寒则气收。”《杂病源流犀烛·诸气源流》：“有气收，胸寒上喘，腹胀不和者，宜分气紫苏饮。”参九气条。

气血俱虚头痛 病证名。指气虚与血虚证候并见的头痛。见《兰室秘藏·头痛》。《脉因证治·诸头痛有六证》：“气虚，因下部气虚，上攻，温温而痛者，异乎邪毒所攻。”《张氏医通·头痛》：“因血虚而痛者，痛连鱼尾，善惊惕，其脉芤或沉数。”气血俱虚，可血虚、气虚二证同见。《证治准绳·头痛》：“气血俱虚头痛者，于调中益气汤加川芎、蔓荆子、细辛。”参气虚头痛、血虚头痛条。

气闭 ❶病证名。癃闭之一。指气虚或气滞而使小便不通。《景岳全书·癃闭》：“气闭证当分虚实寒热而治之。凡气实者，气结于小肠膀胱之间而壅闭不通，多属肝强气逆之证，惟暴怒郁结者多有之，宜以破气行气为主，如香附、枳壳、乌药、沉香、茴香之属，兼四苓散而用之。若气陷于下，药力不能骤及者，当即以此药多服探吐以提其气，使气升则水自降也。有痰气逆滞不通者，即以二陈汤、六安煎之类探吐之。有热闭气逆者，即以大分清饮探吐之。有气实血虚而闭者，用四物汤探吐之。”又：“凡气虚而小

便闭者，必以素多斫丧或年衰气竭者，方有此证，正以气有不化，最为危候，不易治也。然凡病此者，必其有渐，但觉小便短少或便时费力，便当留心速治，若待其剧，恐无及也。但治此者，亦当辨其脏气之寒热，若素无内热之气者，是必阳虚无疑也，或病未至甚，须常用左归、右归、六味、八味等汤丸。……若气虚下陷，升降不利者，宜补中益气汤主之，或即用此汤探吐之最妙。”内热不堪温补者，宜补阴化阳，用化阴煎等方。参癃闭、小便不利等条。❷指便秘由气滞所致者。《金匮翼》卷八：“气閟者，气内滞而物不行也。”閟通闭。《诗·鲁颂》毛传：“閟，闭也。”参便秘条。❸病理名词。指气机阻滞的一类病症。《兰台轨范·厥门》：“尸厥，脉动而无气，气闭不通。”

气劳 病名。指虚劳病中虚气滞者。《太平圣惠方·治气劳诸方》：“夫气劳者，由脏腑虚弱，阴阳不和，喜怒无恒，劳逸过度之所致也。”症见胸膈噎塞，呕逆，脘腹胀气，饮食不下，大便时泄，面色萎黄，四肢无力，日渐消瘦等。治宜补中行气，可选用丁香散、荜菝丸、前胡丸等方。参虚劳条。

气极 六极之一。指气虚重症。多因脏气不足，正虚邪袭所致。《诸病源候论·虚劳病诸候》：“气极，令人内虚，五脏不足，邪气多，正气少，不欲言。”偏虚者，症见短气不能言，入晚甚，乏力，皮毛焦。治宜益气。可用诃黎勒丸、钟乳石散、益气丸等方。偏实者，症见喘急胸满，易怒，心腹胀满，口燥咽干，发热，唾血等。宜用麻黄散、前胡汤等方。参六极条。

气呃 病证名。见《杂病源流犀烛·呃逆源流》。指因气滞及气虚所致的呃逆。中气虚者，宜补中益气汤、六君子汤。阳气欲尽，呕吐，呃逆，下利，两脉微涩者，急宜温阳驱阴，用干姜、吴萸、人参、茯苓、丁香、柿蒂、炮附子等。气滞而呃者，宜木香调气散、调气平胃散、气郁汤。肺气郁痹，面冷、频呃、咽喉不爽者，宜舒展清阳，用枇杷叶、川贝、郁金、射干、通草等药。参呃逆条。

气乱 九气之一。《素问·举痛论》：“惊则气乱。”《诸病源候论》作“忧则气乱。”参九气条。

气郁 病证名。出《素问·六元正纪大论》。多因情志不舒，气机郁结所致。《丹溪心法·六郁》：“气郁者，胸胁痛，脉沉涩。”《证治汇补·郁证章》：“气郁，胸满胁痛，噫气腹胀。”治宜行气解郁。《杂病源流犀烛·诸气源流》“一切气郁，总宜以化滞为主。”用气郁汤、木香调气散、七气汤、越鞠丸等方。若气郁生痰者，用温胆汤、半夏厚朴汤、上下分消导痰汤。若气郁化火者，用加味逍遥散等方。参六郁、郁证条。

气郁吐血 病证名。指胸怀菀结，气郁不舒所致的吐血。也有泛指气机郁滞而吐血者。《医贯·血症论》：“但郁之一字，不但怒为郁，忧为郁，怒与忧固其一也。若其人素有阴虚火证，外为风寒暑湿所感，皮毛闭塞即为郁。郁则火不得泄，血随火而妄行。郁于经络，则从鼻而出；郁于胃脘，则从吐而出。”其症多见恶风寒，面色晦滞，口苦口酸，恶心喜呕，脉涩。木郁达之，治以舒郁为主，宜逍遥散加丹皮、茱萸、黄连、栀子之属。血止后，继用六味丸滋阴。因忧思气郁，损伤心脾者，兼见神疲肢倦，气短气怯，形气憔悴，饮食无味，或饥不欲食，卧不得安，宜用五福饮、五阴煎等治本。气陷者用归脾汤。大便时溏，四肢不温者，宜六味回阳饮加白术等（见《景岳全书·杂证谟》）。

气郁胁痛 病证名。见《东医宝鉴·外形篇》。指七情过度，肝气郁结所致的胁痛。《杂病源流犀烛·肝病源流》：“一曰气郁，由大怒气逆，或谋虑不决，皆令肝火动甚，以致胠胁胁痛，宜沉香降气散、枳壳煮散、枳壳散、桂枝汤、小龙荟丸。”详肝

气胁痛条。

气郁怔忡 病证名。《不居集》卷二十二论气郁怔忡："失意之人，怀抱抑郁，气生痰涎，涎与气搏，心神不宁，脉必沉结，或弦者是也。"治宜疏肝和营，解郁化痰。用逍遥饮、益营汤、温胆汤等方。参怔忡条。

气郁眩晕 病证名。又称气晕。《证治汇补·气郁眩晕》："七情所感，脏气不平，郁而生涎，结而为饮，随气上逆，令人眩晕。"症见头目昏眩，精神抑郁，心悸怔忡，时时面部发热，眉棱骨痛，嘈杂恶心，脉沉等。治宜解郁化痰，安神定志。可用十四友丸、茯神汤、化痰玉壶丸等方。本证可见于神经官能症、高血压病等。参眩晕、气晕条。

气郁脘痛 病证名。指气机郁滞所致的胃脘痛。《类证治裁》卷六："气郁脘痛，必攻刺胀满。"多由情志不舒，肝气郁结，横逆犯胃所致。故又称肝胃气痛。症见胃脘胀痛，痛常游走，连及两胁，嗳气频繁，嘈杂吐酸等。《医林绳墨》卷四："痛者手不可按，按之而痛甚者，此则气之实也，实当破气先之；手按之而少可者，此则气之虚也，虚当补气兼之。"方用柴胡疏肝汤、沉香降气散、金铃子散等。参肝胃气痛、胃气痛条。

气奔 古病名。《世医得效方》卷十："遍身忽皮底混混如波浪声，痒不可忍，抓之血出不能解，谓之气奔。以人参、苦杖、青盐、细辛各一两，作一服。"

气呕 病证名。指呕吐因七情伤感、盛怒气逆所致者。《三因极一病证方论》卷十一："病者心膈胀满，气逆于胸间，食入即呕，呕尽却快，名曰气呕。"《证治要诀》卷六："气呕，胸满膈胀，关格不通，不食常饱，食则常气逆而吐，此因盛怒中饮食而然。"治宜降气和中。选用茱萸人参汤、藿香汤、丁香透膈散、五膈宽中汤等方。

气肿 病证名。❶指水肿以气滞为主者。《丹溪心法·水肿》："气肿者，皮厚，四肢瘦削，腹胁胀膨。"多因气滞湿郁水凝所致。治宜理气化湿，消肿除满，用橘皮煎丸、加味枳术汤、控涎丹、推车丸、增损流气饮等方。❷指皮肤局部肿痛。《诸病源候论·气肿候》："气肿者，其状如痈，无头，虚肿，色不变，皮上急痛，手才着，便即痛，此风邪搏于气所生也。"参水肿条。

气胀 病证名。①胀病之一。一名膜胀。出《素问·脉要精微论》。《仁斋直指方·胀证》："七情郁结，气道壅塞，上不得降，下不得升，身体肿大，四肢瘦削，是为气胀。"气虚、气热、气寒亦可致气胀。《医碥·肿胀》："因于气：气热壅滞作胀，或气寒不运作胀，或气实作胀。其色苍老，皮厚肉坚，其胀或连胸胁，或倏然而胀，或通身尽胀，以手按之随手即起者，如按气囊也。……凡胸腹胀初得是气胀，宜行气疏导之剂，木香、槟榔、枳壳、青皮、陈皮、厚朴之类。"参鼓胀、膜胀条。②即鼓胀。《医碥》卷三："气胀，又名鼓胀，以其外虽坚满，中空无物（止气作胀耳），有似乎鼓也。"参鼓胀条。

气疝 病名。指气郁而致的一种疝症。《儒门事亲》卷二："气疝，其状上连肾区，下及阴囊，或因号哭忿怒，则气郁之而胀，怒哭号罢，则气散者是也。"《医林绳墨》卷四："宜开郁行气为主，如二陈汤加查、朴、青皮、乌药等剂。"或用气疝饮、聚香饮子（见《重订通俗伤寒论》第九章）。参疝条。

气注 九注之一。《诸病源候论·气注候》："风邪搏于肺气所为也，肺主气，气通行表里，邪乘虚弱，故相搏之，随气游走冲击，痛无定所，故名为气注。"参九注条。

气泻 病证名。又称气泄。指气机郁滞所致的泄泻，包括七情过极所致者。《证治要诀·大小腑门》："气泻肠鸣，气走胸膈，痞闷腹急而痛，泻则腹下须臾又急，亦有腹急气塞而不通者。此由中脘停滞，气不流转，

水谷不分所致。”治宜行气和中，用大七香丸、解肝煎、痛泻要方、排气饮、五膈宽中散、震灵丹等方。参七情泻、泄泻条。

气促 证名。呼吸短促。多属虚证。《罗氏会约医镜》卷九：“促者，即经之所谓短气者也。呼吸虽急而不能接续，似喘而无声，亦不抬肩，劳动则甚，此肾经元气虚也。盖肾为气之根，主精髓而在下焦，若真阴亏损，则精不化气，下不上交而为促，治宜补之，温之。”亦有因外邪、水饮等所致者。《类证治裁·喘症》谓呼吸促而不能续，似喘而无痰声，其证有二：一属支饮，症见短气有微饮，治宜苓桂术甘汤、肾气汤等方。一属气虚，症见气短小便利者，四君子汤去茯苓加黄芪；腹中气不转者，倍甘草；肺气短促，倍人参，加白芍。若失血后阴火上乘，短气不足以息，或肾虚发热唾废者，生脉散加当归、黄芪、生地。参短气、外感短气、内伤短气、真元耗损喘条。

气食泄 病证名。《不居集》卷二十一：“气食泄，腹痛下无休时，去如蟹渤者，气食交并而作泄也。”《世医得效方》治气痢泄如蟹渤，可用牛乳汤、异香散、木香匀气散等方。参气泻、食泻条。

气急喘 证名。指喘急无痰。《丹溪心法·喘》：“气急喘者，呼吸急促而无痰声。”参气喘条。

气逆 ❶九气之一。《素问·举痛论》：“怒则气逆。”详见九气条。❷指火病。《杂病源流犀烛·诸气源流》：“气逆，火病也。……皆由火热上冲，气不得顺之所致也。然则治逆，惟有散火，而散火必先降气，气降则火自清，火清而逆自平也。”《局方发挥》：“上升之气，自肝而出，中挟相火，自下而出，其热为甚，自觉其冷，非真冷也，火极似水，积热之甚，阳亢阴微，故见此证。”气逆亦可由痰壅、食积、形寒饮冷、上实下虚等原因所致。参气病等条。

气逆失血 病证名。指呕血由气逆而致者。多因情志过分激动，肝火随气上逆而然。常伴见胸胁满痛、烦躁而渴等症。《金匮翼·诸血统论》：“气逆失血者，血从气逆，得之暴怒而厥也。经云，阳气者，大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥，又怒则气逆，甚则呕血及飧泄是也。”可用小乌沉汤加芍药、生地、丹皮、黄芩、黄连之属。参呕血条。

气结 九气之一。《素问·举痛论》：“思则气结。”《杂病源流犀烛·诸气源流》：“有气结，痰在喉间吞吐不得，膈痞呕恶者，宜四七汤。”参九气条。

气结腹胀 病证名。指气机郁结所致的腹胀。《症因脉治》卷三：“气结腹胀之症，胸腹凝结作胀，胀而不休，或胸前饱闷，或小腹胀急。”多因恼怒伤肝，肝气怫郁，或因思虑伤脾，脾气郁结，气血凝滞所致。治宜理气解郁为主。若攻冲刺痛，宜四七汤。寒凝结胀，厚朴汤。胸前饱闷，枳桔平胃散。小腹胀急，青皮散。小便涩滞，木通饮。参腹胀、内伤腹胀条。

气结腹痛 病证名。指气滞郁结所致的腹痛。亦称气滞腹痛。《症因脉治·腹痛论》：“气结腹痛之症，胸腹胀满，痛应心背，失气则痛减，气闭则痛甚，服破气之药稍减，服补气之药则愈痛，此气结腹痛之症也。”多因七情郁结，气食相凝，用力迸气及起居不慎所致。治宜调气散结为主。心腹胀者，枳朴香砂汤、木香调气散。痛应背心，气结痰凝者，二陈四七汤。气食相凝，中气郁结者，调气散。气结便实，脉数应下者，厚朴大黄汤。脉迟应下者，煮黄丸。郁伤肝脾之络，致败血瘀留，遇劳役动怒，腹痛即发者，宜辛通润血，用桃仁、桂枝、薤白、穿山甲等药。参腹痛、内伤腹痛、气滞腹痛条。

气绝 古病名。指十二经脏气衰竭败绝的疾患。《难经·二十四难》：“手足三阴三阳气已绝，何以为候，可知其吉凶不？……

三阴气俱绝者，则目眩转目瞑，目瞑者，为失志，失志者则志先死，死即目瞑也。六阳气俱绝者，则阴与阳相离，阴阳相离，则腠理泄，绝汗乃出，大如贯珠，转出不流，即气先死，旦占夕死，夕占旦死。”《备急千金要方·肺脏》：“扁鹊曰，气绝不治，喘而汗出，二日死。气应于手太阴，太阴气绝，则皮毛焦，气先死矣。”参气极、脉绝条。

气耗 九气之一。《素问·举痛论》：“劳则气耗。”详九气条。

气鬲病 膈病之一。《史记·扁鹊仓公列传》：“气鬲病，病使人烦懑，食不下，时呕沫，病得之少忧，数忤食饮。”参噎膈条。

气热不得卧 病证名。外感不得卧之一。指气分受邪热所致的不寐症。《症因脉治》卷三：“气热不得卧之症，昼则发热，夜则身凉，是阳气伤于阳分而不得卧也；昼则发热烦躁，夜亦发热烦躁，是气受邪热，重阳无阴而不得卧也。”如左脉浮数，宜羌活败毒散加黄柏、知母；左关数大，柴胡饮子；右关洪数，白虎汤；骨节烦热，地骨皮散。”参不寐条。

气晕 病证名。指眩晕由气郁痰逆所致者。《东医宝鉴·外形篇》：“气晕，七情过伤，气郁生涎，痰涎迷塞心窍而眩晕，眉棱骨痛，眼不可开。宜玉液汤、补虚饮。”参气郁眩晕条。

气积 病证名。九积之一。指气机郁滞成积者。《儒门事亲》卷三：“气积，噫气痞塞，木香、槟榔之类，甚则枳壳、牵牛。”《金匮翼·积聚统论》：“气积，气滞成积也，凡忧思郁怒，久不得解者，多成此疾。故王宇泰云，治积之法理气为先，气既升降，津液流畅，积聚何由而生。”主要症状有胸闷痞塞，嗳气则舒，胁腹膨胀，或痞块时隐时现，或游走不定等。治宜疏肝理气为主。方如大七气汤，或四逆散加香附、郁金、青皮、陈皮等药。参积条。本证可见于慢性胃炎、胃肠功能紊乱、慢性胆囊炎等疾病。

气秘 病证名。见《济生方·大便》。指气滞或气虚所致的便秘。《证治要诀·大便秘》：“气秘则气不升降，谷气不行，其人多噫。宜苏子降气汤加枳壳，吞养正丹，或半硫丸、来复丹；未效，佐以木香槟榔丸；欲其速通则枳壳生用。”《症因脉治·大便秘结论》：“气秘便结之症，心腹胀满，胁肋刺痛，欲便而不得便，此气实壅滞之症也。若质弱形弱，言语力怯，神思倦怠，大便不出，此气虚不振之症也。”多因七情郁结，气壅大肠，或中气不足，传送无力所致。可选用枳桔汤、四君子汤等方。《医碥·大便不通》：“有气秘，气壅塞不通，不升不降，其人多噫。实者破结导滞，木香、槟榔、枳壳、陈皮、杏仁等类。虚者，补而行之，不宜破者，人参多用。”“若气少气弱，无力推送，则惟有助气而已。丹溪云，肺气不降，则难传送，用枳壳、沉香、诃子、杏仁等；老人虚人津液少，宜滑之，用胡麻、麻仁、阿胶等。”《杂病源流犀烛·大便秘结源流》：“有由气秘者，气不升降，谷气不行，善嘻，宜苏子降气汤加枳壳。”参大便秘结条。

气衰呕吐 病证名。清·罗应章《经验医库》：“气衰呕吐，是脾胃气虚不化。”症见呕吐，面白唇淡，形寒胃冷，口渴不欲饮水。治宜健脾益气。用加减六君子汤。参脾虚呕吐症条。

气高 证名。指胸满气喘不平。《素问·脉要精微论》：“上盛则气高。”上盛可由病邪壅阻，致肺气胀满，亦可由真阳不固而上浮，见下虚上盛之证。《素问·脉解篇》：“所谓呕咳上气喘者，阴气在下，阳气在上，诸阳气浮，无所依从，故呕咳上气喘也。”参喘证、虚喘、实喘等条。

气病 指脏腑经络气机失调的病症。见《诸病源候论·气病诸候》。有虚实之分。虚由精气内夺，实由邪气偏盛。虚症可见气

耗、气消、气脱等；实症可见气结、气乱、气逆等。气病与情志过极关系密切，如怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下。并与寒热偏胜有关，如聚热则腠理开而气泄，聚寒则经络凝涩而气收。劳损可致元气虚衰，积聚可使气机壅阻。古有七气、九气等名。气病与肺肾疾患影响尤深，以肺主一身之气，肾为元气之根。血病与气亦有密切的联系，以气为血帅，气病常易导致血疾。参见气病各条。

气消 九气之一。《素问·举痛论》："悲则气消。"详九气条。

气涩嗽 病证名。指痰湿阻滞，气机不利，喘而咳微者。《不居集》卷十五："气涩嗽：气涩咳嗽，气塞喘而咳不起也。用二陈汤加瓜蒌、莱菔子、桔梗、枳壳。"参咳嗽条。

气陷泄泻 病证名。指中气亏损，气虚下陷而致者。症见食后即泻，完谷不化，食减，消瘦，困倦，脱肛，自汗等。《医略六书·杂病证治》："气陷泄泻，补中益气汤加羌、防。""久泻脱肛，补中益气汤加粟壳、乌梅、五味、肉果。"《寿世保元·泄泻》："饮食入胃不住，完谷不化者，气虚也。"用益气健脾汤。《罗氏会约医镜·杂证》："泄泻急而趋下，不能少停，此脾气虚而下坠也。"用甘缓汤。若大泻气脱不知人，口眼俱闭，呼吸欲绝，急灸气海穴，可进大剂参附辈温补。参虚泻、脾虚泄泻条。

气黄 三十六黄之一。《太平圣惠方》卷五十五："气黄者，上气心闷，腹胁胀痛，两脚冷疼，睡卧不安，小便淋涩，状似脾黄。"《圣济总录》卷六十一："气黄，病人初得，先从两脚黄肿，大小便难，心中战悸，面目虚黄，不能食。"治用灸烙法，内服葫芦饮方。参黄疸有关条。

气虚 证名。①指脏腑正气虚弱。《景岳全书·传忠录》："如心气虚则神有不明，肺气虚则治节有不行，脾气虚则食饮不能健，肝气虚则魂怯而不平，肾气虚则阳道衰而精少志屈，胃气虚则仓廪匮而并及诸经，三焦虚则上中下俱失其职，命门虚则精气神总属无根。凡此者，何非气虚之类？"②指肺气虚。《素问·通评虚实论》："气虚者，肺虚也。"③指脾肺气衰。《杂病源流犀烛·虚损痨瘵源流》："气虚者，脾肺二经虚也。或饮食，或劳倦，气衰火旺，四肢困热，无气以动，懒于言语，动作喘乏，自汗心烦，必温补中气。"④指下焦元气虚。《东医宝鉴·杂病篇》："夫肾虚为病，不能纳诸气以归元。……肺出气也，肾纳气也，肺为气之主，肾为气之藏。凡咳嗽暴重，动引百骸，自觉气从脐下逆奔而上，此肾虚不能收气也，当以补骨脂安肾丸主之。"或用都气丸、八味丸等方。参气病等条。

气虚小便不利 病证名。见《症因脉治》卷四。由于久病、劳倦过度、汗下太过等伤气所致。主要症状为气怯神疲，面色萎黄，言语低微，唇不焦，口不渴，欲小便而解不出，脉细弱。治宜补气为主。肺气不足者，用生脉散。中气不足者，用补中益气汤。膀胱气弱者，用人参车前汤。参小便不利条。

气虚中满 病证名。指气虚所致的脘腹胀满。《医林绳墨·臌胀》："由其忿怒太甚，不能发越，郁结中州，痰涎停住，乃成满也。久而不食，以致气虚，则曰气虚中满。宜当塞因塞用，治以二陈汤去甘草加参、术、厚朴、山楂之类。"《类证治裁·肿胀》："气虚中满者，兼消补，消导宽中汤。"《医贯·气虚中满论》："气虚者，肾中以火气虚，中满者，中空似鼓，虚满而非实满也。"宜八味丸。若脾虚，以参芪四君合八味丸。参中满条。

气虚头痛 病证名。指气虚清阳不升所致的头痛。见《脉诀·头痛》。《兰室秘藏·头痛门》："头痛耳鸣，九窍不利者，肠胃之所生，乃气虚头痛也。"常兼有神疲乏力，饮食无味，脉弱，或大而无力，遇劳则头

痛更甚等。治宜健脾益气，可用补中益气汤，四君子汤加黄芪、蔓荆子等。本证可见于贫血、紧张性头痛等病。参头痛条。

气虚耳鸣 耳鸣的一种。《诸病源候论·耳鸣候》："此为血气虚损，宗脉不足，病苦耳鸣嘈嘈。"《医钞类编·耳病门》："耳聋、耳鸣：有痰，有火，有气虚，有阴虚，有肝火。"《医学入门·耳》治气虚耳鸣，四君子汤。若气虚有火，四君子加山栀、柴胡。《杂病源流犀烛·耳病源流》："耳鸣，……右寸关大于左，无力倦怠，色黄白，属中气虚，补中益气汤加减。"参耳鸣条。

气虚耳聋 耳聋的一种。指气虚清阳不升而致的耳聋。《古今医统》："气虚耳聋，当见于大病之后。"常兼见倦怠无力，口中无味，脉大无力或濡细等。宜补气升清阳，方用益气聪明汤、补中益气汤等。参耳聋条。

气虚自汗 病证名。见《红炉点雪》。由气虚卫不固表所致。症见自汗恶风，汗出常冷，疲乏无力，脉微而缓或虚大。治宜益气固表。可用玉屏风散、补中益气汤等方。参自汗条。

气虚劳复 病证名。《重订广温热论·温热复症疗法》："气虚劳复者，温热瘥后，余邪未尽，止因正气大虚，因劳复热，微兼恶寒，四肢倦怠，无气以动，脉虚右大，舌润无胎，胸膈宽畅者，此真气虚劳复也。宜补中益气汤甘温补之，惟升、柴须蜜炙；如兼汗多恶寒，归芪建中汤最妙；若正气虽虚，尚有余热未清，其人虚羸少气，气逆欲呕者，竹叶石膏汤加姜汁主之，或陈氏六神汤加银柴胡、地骨皮亦佳。"参劳复条。

气虚身热 病证名。《素问·刺志论》："气虚身热，得之伤暑。"因元气本虚，伤于暑湿所致发热。治用李东垣及王孟英清暑益气汤。亦有因饮食劳倦，内伤脾胃而致气虚发热。宜用甘温除热。详气虚热条。

气虚咳嗽 病证名。指气虚引起的咳嗽。多因劳役过度，肺气有伤；或饮食劳倦，中气有损，土不生金所致。《症因脉治》卷二："气虚咳嗽之症，面黄肌瘦，气怯神离，咳嗽吐痰，痰色清稀，饮食减少。"治宜健脾益气补肺。方用四君子汤、参术膏、补中益气汤、琼玉膏、生脉散等。参咳嗽条。

气虚热 病证名。①指脾胃气虚或脾肺气虚而致的虚热。多因饮食劳倦，内伤脾胃，以致气虚火旺，虚热内生。《杂病源流犀烛·虚损痨瘵源流》："有气虚热，必兼少气自汗，体倦心烦。"《证治汇补·气血热辨》："气分虚热者，用甘温以除热。"治宜用补中益气汤等方。②指暑湿伤气而致的发热。伴见四肢困倦，精神疲乏，心烦气促，口渴，自汗，小便黄，脉虚等证。《素问·刺志论》："气虚身热，得之伤暑。"治用东垣清暑益气汤。若暑热之邪耗气伤津，症见身热脉虚，汗多，烦渴较甚者，治以清暑热，益气生津，宜用王氏清暑益气汤等方。

气虚眩运 病证名。见《丹溪心法·头眩》。又作气虚眩晕。详该条。

气虚眩晕 病证名。《症因脉治·内伤眩晕》："气虚眩晕之症，气虚即阳虚也。其人面色白，身无热，神识清爽，言语轻微，二便清利，时或虚阳上浮，头面得火，眩晕不止。"《医略六书·眩晕》："劳倦伤脾，清阳下陷，眩晕倦怠，此劳役人多气虚眩晕。"治宜益气为主。肺气不足者，人参生脉散合四君子汤；中气不足者，补中益气汤；心气不足者，酸枣仁汤；肾气不足者，都气丸；若真阳不足，虚阳上浮者，肾气丸加鹿角胶。亦有因肾不纳气引起。《医林绳墨·眩运》："有醉饱房劳，损伤精血，肾家不能纳气归元，使诸气逆奔而上，此气虚而眩运也。"参眩晕、肾虚眩晕条。

气虚淋 气淋之一。指淋症因气虚所致者。《证治准绳·淋》："气虚淋，八珍汤加杜牛膝、黄芩汁煎服。老人气虚亦能淋，参、术中加木通、山栀。"参气淋条。

气虚厥 厥证之一。因劳伤气弱，不能运行所致。《赤水玄珠·厥证门》："厥因气虚而得者，其脉细小，宜四君子汤加黄芪、附子。"或用补中益气汤等。参厥证条。

气虚喘 病证名。见《证治汇补》卷五。又名气虚喘逆。指肺气或元气不足所致的气喘。《症因脉治》卷二："气虚喘逆之因，或本元素虚，或大病后、大劳后，失于调养，或过服克削，元气大伤，则气虚喘逆之症作矣。"症见身倦懒怯，言语轻微，久久渐见气不接续，喝喝喘急等。《景岳全书》卷十九："气虚之喘十居七八，但察其外无风邪，内无实热而喘者，即皆虚喘之证。若脾肺气虚者，不过在中上二焦，化源未亏，其病犹浅，若肝肾气虚，则病出下焦而本末俱病，其病则深。"《医学纲目·喘》："若久病气虚而发喘者，宜阿胶、人参、五味补之。"如脾肺气虚，上焦微热微渴而作喘者，宜生脉散，如气虚而无热者，用独参汤；若火燥肺金，上焦热甚，烦渴多汗，宜人参白虎汤。又如人参平肺散、参橘煎、四君子汤、参冬饮、理中汤等均可随证选用。参虚喘、真元耗损喘条。

气虚喘逆 病证名。见《症因脉治·喘症论》。即气虚喘。详该条。

气虚短气 病证名。内伤短气之一。多由本元素弱，劳伤中气或大病后元气耗伤所致。《症因脉治》卷二："气虚短气之症，气怯神离，言语轻微，气不接续。"脉象微弱或见浮大者，为阳微或真阳外越；脉细数、芤涩，为阴血不足。治宜补气为主。如有气脱者，急用独参汤；中气不足者，用补中益气汤等；有痰用六君子汤、参橘煎等方。

气虚痿 痿证之一。见《证治汇补·痿躄章》。多由劳倦内伤、饮食失调或久病脾胃气虚，不能充养肢体而成。主症为手足痿弱，举动无力。治以补脾益气为主。宜四君子汤。有虚热者，用补气和中汤。《医宗必读·痿》："气虚，四君子汤合二妙散。"《张氏医通·痿痹门》："肥白人脉沉缓或滑，恶心，胸膈不利，属气虚有痰，六君子加苍术、黄柏、竹沥、姜汁。"参痿条。

气虚痹 病证名。指气虚阴盛所致的痹症。《医学入门·痹风》："气虚痹者，关节不充，一身如从水中出，阳虚阴盛也。四君子汤加肉桂、生附，或川附丸。"麻木重着者，可用神效黄芪汤加减。

气虚痰 病证名。因气虚所致的痰证。《症因脉治》卷二："气虚痰，面黄肌瘦，六脉濡缓。"治宜健脾、益气、化痰。方用六君子汤等。参痰证条。

气虚腹痛 病证名。指中气虚弱的腹痛。《症因脉治》卷四："气虚腹痛之症，面色痿黄，言语轻微，饮食减少，时时腹痛，劳动则甚，按之稍减。此气虚腹痛之症也。"《证治汇补·腹痛章》："气虚痛者，痛必喜按，呼吸短浅。"可因久病汗下，久泻伤元，劳形气散，或饥饿损伤，或勉强行房，气道虚损所致。脉多见微弱，或见空大，或见细涩。如气怯神倦，脉微细，宜四君子汤；遇劳痛甚，脉大无力，宜补中益气汤；饮食减少者，宜香砂六君子汤。参腹痛条。

气脚 古病名。泛指脚气以外的其他脚膝软弱之症。《中藏经·论脚弱状候不同》："谓人之喜怒忧思，寒热邪毒之气，自内而注入于脚……其状类诸风、历节、偏枯、痈肿之证，但入于脚膝，则谓之气脚也。"因与脚气之病邪从外而入于脚，从足而入于脏者不同，故名为气脚以资区别。

气淋 病证名。见《脉经》卷八。《诸病源候论·淋病诸候》："气淋者，肾虚膀胱热，气胀所为也。……其状膀胱小便皆满，尿涩，常有余沥是也，亦曰气癃。"气淋有气滞不通和气虚无力之分。气滞者，小便涩痛而脐下胀满特甚，宜用沉香散、瞿麦汤、石苇散等方。气虚者，小腹坠胀，尿出无力而常有余沥不尽，宜用补中益气汤，或八珍汤加杜仲、牛膝等。

气散腹胀 病证名。指真气耗散所致的腹胀。《症因脉治》卷三："气散腹胀之症，时胀时退，气怯，言微，目慢神清，静则稍减，动作胀急。"多因劳累太过，中气受伤，或久病缠绵，元气受损，真气散乱所致。治宜补气敛气为主。气怯言微，宜生脉散；动作胀急，静则稍减，宜戊己汤加敛气药；气不归元，宜都气丸、纳气丸；气虚极，宜四君子汤、参橘煎等方。参腹胀条。

气厥 ❶厥证之一。指中气衰竭，或气机怫郁上逆而厥者。《景岳全书·厥逆》："气厥之证有二，以气虚气实，皆能厥也。气虚卒倒者，必其形气索然，色清白，身微冷，脉微弱，此气脱证也。宜参、芪、归、术、地黄、枸杞、大补元煎之属，甚者以回阳饮、独参汤之类主之。气实而厥者，其形气愤然勃然，脉沉弦而滑，胸膈喘满，此气逆证也。经曰大怒则形气绝而血菀于上，即此类也。治宜以排气饮，或四磨饮，或八味顺气散、苏合香丸之类，先顺其气，然后随其虚实而调理之。又若因怒伤气，逆气旋去而真气受损者，气本不实也。再若素多忧郁恐思而气怯气陷者，其虚尤可知也。若以此类而用行气开滞等剂，则误矣。"气厥亦称中气。《证治要诀·厥》："气厥，即中气。"《丹溪心法·厥》："气厥者，与中风相似，何以别之？风中身温，气中身冷。以八味顺气散或调气散。如有痰，以四七汤、导痰汤服之。"❷病理名词。指气逆。《素问·气厥论》："胆移热于脑，则辛頞鼻渊，鼻渊者，浊涕下不止也，传为衄衊瞑目，故得之气厥也。"参厥证等条。

气厥头痛 病证名。指因情志触发，气逆于上所致的头痛。见《丹溪心法附余·风热门》。症见头痛，头目昏眩，胸腹胀满，呕吐酸水等。治宜理气解郁，可用芎乌散加味。参头痛条。

气喘 病证名。❶各种呼吸困难证候的统称。包括实喘与虚喘两类。见《景岳全书·喘促》。详喘证、实喘、虚喘等条。❷指七情所伤而导致的气喘。见《医学入门·喘》。《证治准绳·喘》："七情郁结，上气喘急，宜四磨汤、四七汤。"《张氏医通·喘》："有因气而喘者，遇恼便发，脉必沉弦。此气滞其痰也，苏子降气汤。"参怒喘条。

气痞 病证名。❶指表邪因误下入里，无形之邪结于心下，按之柔和不痛的痞症。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："脉浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞，按之自濡，但气痞耳。"❷指气膈。多因忧思郁结所致。《医方考·痞门》："忧气郁结，腹皮里微痛，心下痞满，不思饮食，……即六朝之医所谓气膈也，今人谓之气痞耳。经曰：脾主行气于三阴，三阴之脉皆行腹里，今忧气郁结，营卫之行涩，故令腹皮里微痛。心下痞满者，升降之道乖也；不思饮食者，忧气伤脾也。"初起可理气和营，解郁消痞，用木香化滞汤等；倘日久虚中挟实，兼见肢体懒倦，则宜健脾行滞，用枳实消痞丸等。参痞条。

气痢 病证名。①指中气下陷致痢者。症见气短言微，面色㿠白，下痢滑脱，所下之物不粘不臭，大便随矢气而出。治宜温涩固脱。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》："气痢，诃黎勒散主之。"《医宗金鉴·订正金匮要略注》："气利，……若所利之气不臭，所下之物不粘，则谓气陷肠滑，故用诃黎勒散以固肠，或用补中益气以举陷亦可。"②指气滞致痢者。症见下痢如蟹渤，秽臭稠粘，常伴腹部胀痛。治宜行气导滞消积为主。《医学入门》卷五："气痢如蟹渤，拘急独甚，流气饮子、古萸连丸、六磨汤。"《世医得效方》卷六治气痢用牛乳、荜拨煎服。③指冷气停于肠胃致痢者。《圣济总录》卷七十七："冷气停于肠胃间，致冷热不调，脾胃不和，腹胁虚满，肠鸣腹痛，便痢赤白，名为气痢。治宜厚肠胃，调冷热，

补脾气，则痢当自愈。”参痢疾条。

气痛 病证名。指气滞三焦所致的疼痛。出《灵枢·五色》。《杂病源流犀烛·诸气源流》：“气痛，三焦内外俱有病也。人身之气，周流不息，本无停止，多因七情六气，饮食劳役所郁，以致凝滞上焦，则为心胸痞痛，宜枳橘汤、清膈苍莎丸；凝滞中焦，则为腹胁刺痛，宜木香破气散、撞气阿魏丸；凝滞下焦，则为疝瘕、腰痛，宜四磨汤、木香槟榔丸；凝滞于内，则为癖积疼痛，宜化积丸、三棱散；凝滞于外，则为遍身刺痛，或浮肿，或膜胀，宜流气饮子、木香流气饮。”参气病条。

气滞腰痛 病证名。腰痛之一。见《医学入门》卷三。因忧思或闪挫跌扑而气滞不行所致。症见腰痛连腹胁胀满，其痛如刺，或痛处走注不定。治宜行气调气。可用沉香降气汤、七香丸、乌药顺气散等方。

气滞腹痛 病证名。见《赤水玄珠·腹痛门》。指气机结滞所致的腹痛。详气结腹痛条。

气缓 九气之一。《素问·举痛论》：“喜则气缓。”详九气、喜气条。

气鼓 病证名。鼓胀之一。❶指气机郁滞所致的鼓胀。《万病回春·鼓胀》：“中空无物，有似于鼓，小便短涩不利，其病胶固，难以治疗，用分消汤加减。……胁痛面黑是气鼓，加青皮去白术。”❷指气虚所致的全身肿胀。《石室秘录·内伤门》：“气臌乃气虚作肿，似水臌而非水臌也。其症一如水鼓之状，但按之皮肉不如泥耳。必先从脚面肿起，后渐渐肿至上身，于是头面皆肿者有之。此等气臌，必须健脾行气加利水之药则可救也，倘亦以水臌法治之，是速之死也。”方用消气散，并禁食盐。参鼓胀条。

气蒸 二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

气腰痛 病证名。见《东医宝鉴·外形篇》。指情志不舒使气机郁滞所致的腰痛。详气滞腰痛条。

气痹 病证名。指由情志刺激等因素引发的痹证。《中藏经·论气痹》：“气痹者，愁忧（一本无“忧”字）思喜怒过多，则气结于上，久而不消则伤肺，肺伤则生气渐衰，则邪气愈胜，留于上则胸腹痹而不能食，注于下则腰脚重而不能行，攻于左则左不遂，冲于右则右不仁，贯于舌则不能言，遗于肠中则不能溺，壅而不散则痛，流而不聚则麻。”宜节忧思，慎喜怒。不能食者，用异功散加郁金、香附；腰脚重痛者，用羌活胜湿汤加减；半身不遂、口不能言者，治法参中风、类中风等条。

气痰 痰证之一。❶即燥痰。《医宗必读·痰饮》：“在肺经者，名曰燥痰。又名气痰。”参见燥痰条。❷指梅核气类病证。《医学入门》卷五：“七情痰滞咽膈，多胸胁痞满，名曰气痰。”又“七情郁成，咯之不出，咽之不下，形如破絮，或如梅核，四七汤；久者换苏子加黄芩、山栀、海石、三仙丸》、千金》指迷丸。”❸指素有痰疾，因气恼而喘咯咳唾的病证。《泰定养生主论》：“气痰者，因事逆意而然也。……此皆素抱痰疾者，因风寒气热味，而喘咯咳唾，非别有此五种之痰。”参痰证条。

气嗽 病证名。见《肘后备急方》。可因肺虚邪气壅塞所致。如肺虚而阴冷之邪上攻于肺者。《太平圣惠方》卷四十六：“肺主于气，若肺虚，则风寒入于经络，而成咳嗽也。此皆由脏腑不调，阴阳否塞，阳气外虚，阴气内积，邪冷之气，上攻于肺，肺气不足，为邪所搏，则嗽而多气，故曰气嗽。”治用干姜散、五味子散等。亦可由宿热及饮食伤热，久嗽肺虚引起。《外台秘要》卷九：“肺气嗽者，不限老少，宿多上热，后因饮食将息伤热，则常嗽不断，积年累岁，肺气衰，便成气嗽。”七情郁结，或劳伤脾肺亦可引起本病。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘病源流》：“气嗽，七气积伤成咳也。其脉浮

洪滑数，必兼上气喘急，痰涎凝结，或如败絮，或如梅核，滞塞咽喉，吐不出，咽不下。多因七情郁结，或劳伤脾肺，甚而多吐脓血，渐成肺萎，将作劳瘵也。然气嗽一症，妇人多有之，宜团参饮子、苏子降气汤、星香丸。”参郁嗽、咳嗽条。

气膈 五膈之一。见《肘后备急方》卷四。多因恼怒太过，肝木乘脾所致。《诸病源候论·五鬲气候》：“气鬲之为病，胸胁逆满，咽塞，胸鬲不通，恶闻食臭。”或见大小便闭涩，不时吐逆等。治用七气汤、四七汤等方。若见脾胃久冷，心腹痞满，饮食无味，面色萎黄等，可用《圣惠》沉香圆。本证可见于贲门痉挛。参噎膈、五膈条。

气噎 五噎之一。出《诸病源候论·否噎病诸候》。其症心悸，上下不通，噫哕不彻，胸背痛等。治用五噎丸、《深师》七气汤。参噎、五噎条。

气癃 气淋的别称。《诸病源候论·淋病诸候》：“气淋者……亦曰气癃。”详气淋条。

气癫 病证名。见《备急千金方》卷二十四。阴癫之一。即疝气，俗称小肠气。《三因极一病证方论》卷十四：“病者久蓄忧思，恐怒兼并，随脏气下坠阴癫，肿胀急痛，名曰气癫，属内所因。”治宜大戟丸。详见阴癫条。

气鳖 病证名。指因多气恼怒而成的一种瘕病。以其瘕块形状如鳖，故名。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“平时多气，血凝于气，而成气鳖。……摇头掉尾，如虫之行，上侵入咽，下餂入肛，或附胁背，或隐胸腹，大则如鳖，小则如钱。宜芜荑汤。”参瘕、鳖瘕条。

长虫病 病名。长虫即蛔虫。《诸病源候论·三虫候》：“长虫，蚘虫也，长一尺。动则吐清水，出则心痛，贯心则死。”详蛔虫病条。

仆击 病名。出《素问·通评虚实论》。又名击仆。详见击仆①。

爪枯 证名。指手足爪甲干枯无光泽。多因气虚血少，津液亏耗，或感受寒湿，或肝脏受损等所致。《灵枢·经脉》：“故气不荣则皮毛焦，皮毛焦则津液去皮节，津液去皮节者，则爪枯毛折。”《灵枢·阴阳二十五人》：“感于寒湿则善痹，骨痛，爪枯也。”《素问·五藏生成篇》：“多食辛，则筋急而爪枯。”《杂病源流犀烛·燥病源流》：“筋燥爪枯，必滋养其荣血也，宜养荣汤。”本证可见于虚劳、痿、痹等疾患。

爪黄 三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一：“爪黄之病，口苦舌干，身体急强，面目俱黄，行履不得，言语狂乱，四肢疼痛，发即便走。”治用灸烙法，内服瓜蒂散等方。参黄疸有关条。

反发热 证名。指少阴病不应发热而见发热的症状。多见于少阴、太阳合病患者。《伤寒论·辨少阴病脉证并治》：“少阴病，始得之，反发热，脉沉者，麻黄附子细辛汤主之。”“少阴病，吐利，手足不逆冷，反发热者，不死，脉不至者，灸少阴七壮。”参发热条。

反折 证名。背反张之意。《素问·骨空论》：“督脉为病，脊强反折。”《素问·诊要经终论》：“太阳之脉，其终也，戴眼，反折，瘈疭。”张志聪注：“反折，背反张也。”参见角弓反张条。

反胃 病名。又称翻胃、胃反。㊀指食下良久复出，或隔宿吐出者。《医贯》：“饮食倍常，尽入于胃矣，但朝食暮吐，暮食朝吐，或一两时而吐，或积至一日一夜，腹中胀闷不可忍而复吐，原物酸臭不化，此已入胃而反出，故曰翻胃。”《景岳全书·杂证谟》：“反胃一证，本属火虚。……然无火之由，则犹有上中下三焦之辨，又当察也。若寒在上焦，则多为恶心，或泛泛欲吐者，此胃院之阳虚也；若寒在中焦，则食入不化，每食至中脘，或少顷或半日复出者，此胃中

之阳虚也；若寒在下焦，则朝食暮吐，或暮食朝吐，乃以食入幽门，丙火不能传化，故久而复出，此命门之阳虚也。”“治反胃之法，当辨其新久及所致之因。或以酷饮无度，伤于酒湿；或以纵食生冷，败其真阳；或因七情忧郁，竭其中气，总之无非内伤之甚，致损胃气而然。故凡治此者，必宜以扶助正气，健脾养胃为主。”如新病者，胃气犹未尽坏而饮食未消，当兼去其滞；若有逆气未调，则当兼解其郁；若病稍久，或气体禀弱，则当专用温补，不可妄行峻利开导、消食化痰等剂，以致重伤胃气。虚在上焦，微寒呕恶者，用姜汤或橘皮汤；若气虚寒侵而恶心呕食者，宜黄芽丸或橘皮干姜汤之类；若寒痰甚者，宜小半夏汤或大半夏汤之类。虚在中焦，而食入反出者，宜五君子煎、理中汤、温胃饮、圣术煎之类；若胃虚甚者，宜四味回阳饮，或黄芽丸；若兼寒痰者，宜六君子汤，或理中化痰丸之类；若水泛为痰者，宜金水六君煎；若胃不甚寒，而微虚兼滞者，宜五味异功散。虚在下焦，而朝食暮吐，或食入久而反出者，宜六味回阳饮，或人参附子理阴煎，或右归饮之类。反胃初起，而气体强壮者，可先化痰湿，和胃气，如二陈汤、橘皮半夏汤、平胃散、不换金正气散、五苓散之类。或用半夏干姜散、吴萸汤、橘皮汤等以祛寒。若病稍久而胃气虚者，则非所宜。反胃证多有大便闭结者，因下不通而致上逆。便秘因阴虚兼寒者，宜以补阳为主，可加当归、肉苁蓉、韭汁、姜汁之属；阴虚兼热者，宜以补阴为主，而加乳汁、童便、酥油、蜂蜜、豕膏诸血之属。此症奏效较缓，以粪如羊矢、或年高病此者为尤甚。亦有因瘀阻所致者。《张氏医通》卷四：“瘀血在膈，阻滞气道而成者，代抵当丸作芥子大，服二钱。”参见翻胃、胃反条。❷即噎膈。《丹溪心法》卷三：“翻胃即膈噎，膈噎乃翻胃之渐。”参噎膈条。

乏气　证名。指气虚之甚者。《诸病源候论·乏气候》：“夫虚极之人，荣卫减耗，府藏虚弱，气行不足，所以呼吸气短也。”参气病条。

欠　❶证名。多表现呵欠频频不已，亦称数欠、善欠。《灵枢·九针》：“肾主欠。”多因肾气不足，或寒邪阻遏阳气，或气郁于胃所致。《金匮要略心典》卷中：“中寒者，阳气被抑，故喜欠。”《张氏医通》卷九：“气郁于胃，故欠生焉。……肾虚经郁于下则为欠。”参数欠条。❷生理名词。俗称呵欠。指一种深吸气动作。正常人或疲劳时均可出现。

风尸　病名。《太平圣惠方》卷五十六：“风尸者，在人四肢，循环经络。其状淫跃去来，沉沉默默，不知痛处。若冲风则发，故名风尸也。”治疗风尸宜服甘草散、川大黄散、金牙散等方。

风中血脉　即中血脉。《张氏医通·中风门》：“口颊㖞僻，乃风中血脉也。”详中血脉条。

风中府　见《普济本事方》卷一。又名中腑。详该条。

风中藏　见《普济本事方》卷一。又名中脏。详该条。

风气呕吐　病证名。指呕吐因风冷入胃所致者。《症因脉治》卷二：“风气呕吐之症，偶遇风冷，即发呕吐，头额疼痛，面赤面热。”脉多见浮。治以散风为主。宜用防葛平胃散、防葛二陈汤等方。

风气腹痛　病证名。指感受风冷而致腹痛。《症因脉治·腹痛论》：“风气腹痛之症，风冷着腹，即患腹痛，或发寒热，腹中攻注，或腹中作响，大便作泻，此风气腹痛之症也。”多因风寒侵袭肠胃，传于太阴所致、治宜疏散温中为主。寒热，脉浮者，宜防风汤；腹中作响，大便作泻，宜平胃五苓散加防风，亦可用建中汤加防风、柴胡汤、干葛汤等方。参腹痛条。

风不仁　病证名。指皮肤搔之无所觉

知。《圣济总录》卷十一："风不仁之状，皮肤搔之如隔衣是也。由荣气虚卫气实，风寒入于肌肉，血气不相与，凝痹结滞，皮肤瘃厚，无所觉知。《内经》曰，皮肤不营，故为不仁。"治宜调气行血，祛风活络等法。

风气霍乱 病证名。见《症因脉治》卷四。指霍乱由风淫或风木克脾所致者。症见头痛发热，上吐下泻，心腹绞痛，甚则转筋。若风寒则脉浮紧，方宜败毒散；若风热，则脉浮数，宜用家秘神术汤；若风湿，则脉浮濡，宜以海藏神术汤；若风木犯脾，则宜柴胡防风汤。参霍乱条。

风心痛 病证名。见《备急千金要方》卷十三。指风邪入肝乘心，或风冷入乘心络而致使心痛。《医学入门》卷五："风因肝邪乘心，痛则两胁引小腹阴股。桂枝汤加附子。"《杂病源流犀烛·心病源流》："其痛分九种。……曰风，因伤风冷，或肝邪乘心，两胁引痛也。宜羌活、荆芥等。"《张氏医通·诸痛门》："风冷邪气，入乘心络，或府藏暴感寒气，上乘于心，卒然心痛，或引背膂，经久不差。"方用乌头丸等。参冷气心痛、心痛条。

风水 病名。水肿病之一。亦称风疿。出《素问·水热穴论》。《金匮要略·水气病脉证并治》："风水，脉浮身重，汗出恶风者，防己黄芪汤主之。"又"风水，恶风，一身悉肿，脉浮而渴，续自汗出，无大热，越婢汤主之。"《诸病源候论·水肿病诸候》："风水病者，由脾肾气虚弱所为也，肾劳则虚，虚则汗出，汗出逢风，风气内入，还客于肾，脾虚又不能制于水，故水散溢皮肤，又与风湿相搏，故云风水也。令人身浮肿，如裹水之状，颈脉动，时咳，按肿上，凹而不起也，骨节疼痛而恶风是也，脉浮大者，名曰风水也。"《医宗金鉴·肿胀总括》注："上肿曰风，下肿曰水。故风水之证，面与胫足同肿也。""从上肿者，多外感风邪，故宜乎汗；从下肿者，多内生湿邪，故宜乎利水。"本证可见于急性肾小球肾炎等疾患。参水肿条。

风水肿 水肿之一。亦称风水。多由脾肾气虚，汗出当风所致。《太平圣惠方》卷五十四："夫风水肿者，由脾肾气虚弱所为也。肾劳则虚，虚则汗出，汗出当风，风气内入，还客于肾，脾虚又不能制于水，故水散溢皮肤，又与风湿相搏，故云风水也。"症见身体浮肿，皮肤欲裂，上气喘急，不能眠卧，骨节痠痛，恶风脚弱，脉浮而紧等。治宜散风祛湿，健脾补肾，通利小便。可用防风散、麻黄散、大腹皮散等方。参风水条。

风头眩 病名。见《诸病源候论·风病诸候》。指头晕目眩。多由血气亏损，风邪上乘所致。《圣济总录》卷十六："风头眩之状，头与目俱运是也。五脏六府之精华，皆见于目，上注于头。风邪鼓于上，脑转而目系急，使真气不能上达，故虚则眩而心闷，甚则眩而倒仆也。"参眩晕、风头旋等条。

风头旋 病证名。❶指眩晕由风邪入脑，或挟痰水逆上所致者。《太平圣惠方》卷二十二："夫风头旋者，良由体虚，风邪乘于阳脉，诸阳之经，皆上注于头面，风邪随入于脑，遂成头旋。亦因痰水在于胸膈之上，犯大寒，使阳气不行，令痰水结聚，而阴气逆上，风与痰相结，上冲于头，则令头旋也。"《圣济总录》卷十七："风头眩，肩背拘急，肢节疼痛，鼻塞耳鸣，面赤咽干，心忪痰逆，眼目黑花，当风泪出。"宜用松香散，以荆芥、薄荷茶调下。若见头旋，忽忽如醉，痰逆，不下饮食者，宜服甘菊花散等。若头旋，手足厥逆，身体疼痛，心乱，反倒如癫，发歇无时者，宜服独活散等方。参风热眩运、风寒眩晕、风痰眩晕等条。❷指肝风病。《杂病源流犀烛·头痛源流》："风头旋，肝风病也。肝风盛则头自摇动。别无疾痛，不自觉知。"参风头

眩、眩晕条。

风头痛 病证名。指风邪侵犯头部所致的各种偏、正头痛。出《脉经·辨三部九候脉证》。《圣济总录》卷十六："风头痛之病。由风邪客于阳经，循风府而上至于头脑，令人头重疼痛，心隔烦热，上焦壅滞，头面虚汗，诊其脉左手寸口浮紧者是也。"治宜天南星散、石膏汤等方。参伤风头痛、头痛等条。

风血痹 病名。即血痹。《太平圣惠方》卷十九："夫风血痹者，由体虚之人，阴邪入于血经故也。若阴邪入于血经而为痹，故为风血痹也。其状形体如被微风所吹，皆由优乐之人，骨弱肌肤充盛，因疲劳汗出，肤腠易开，为风邪所侵故也。诊其脉自微而涩，在寸口关上小紧者，为风血痹也。"详血痹条。

风伤卫证 病证名。指桂枝汤证。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名为中风。"《伤寒明理论·恶风》："风邪中于卫也，则必恶风。何者？以风则伤卫，寒则伤荣，为风邪所中于分肉不温而热矣，皮毛不充而缓矣。腠理失其肥，则疏而不密；开阖失其司，则泄而不固，是以恶风也。"《张氏医通·诸伤门》："如交霜降节后，有病发热，头痛，自汗，脉浮缓者，风伤卫证也。以风为阳邪，故只伤于卫分。卫伤，所以腠理疏，汗自出，身不疼，气不喘，脉亦不紧。"《伤寒论大全》卷一："风则伤卫，头痛恶风，脉浮缓而自汗，则用桂枝汤充塞腠理以散邪，汗止即愈。"参太阳中风条。

风伤卫疟 疟疾之一。一名温疟、风疟。《症因脉治》卷四："风伤卫疟，《内经》亦名温疟。风疟之症，《内经》云，风伤卫气，先热后寒，此言先后者，言多少也，言热多寒少之疟，是以不曰恶寒，而曰恶风、自汗、烦躁、伸欠也。不恶寒则寒少也；发热直至烦躁，热多也。若头痛背痛，发于午前者，太阳也；目痛鼻干，发于午后者，阳明也；发于寅卯者，少阳也。风疟之因，《内经》云，暑邪既伏，秋气收之，汗出遇风，与卫气并居，阴阳分争，内外相搏，而风邪伤卫之疟作矣。"脉弦或浮缓、洪长。治法如疟在太阳有汗，桂枝石膏汤；在阳明，白芷石膏汤；在少阳，小柴胡汤；三阳俱见症者，《准绳》和解汤等方。参疟疾条。

风劳 病名。指虚劳病而复受风邪者。《太平圣惠方·治风劳诸方》："夫劳伤之人，表里多虚，血气衰弱，肤腠疏泄，风邪易侵，或游易皮肤，或沉滞脏腑，随其所感，而众病生焉。"若体虚食少，羸瘦，筋脉不利，手足多疼者，可用防风散等方。若气血不足，脏腑虚伤，肢节烦疼，腰膝无力，形体羸瘦，面色萎黄，小便数多，卧即盗汗者，可用巴戟散等方。风劳又称肝劳。《金匮翼·风劳》："风劳之证，肌骨蒸热，寒热往来，痰嗽，盗汗，黄瘦，毛焦，口臭，或成疳利。由风邪淹滞经络，瘀郁而然，其病多著于肝，亦名肝劳。"治宜秦艽鳖甲散等方。参虚劳、肝劳条。

风冷痹 病名。《圣济总录》卷二十："风冷痹。论曰痹虽异状，此皆本于三气。寒气多者，谓之冷痹。其证令人脚膝疼疼，行履艰难，四肢瘴麻，身体俱痛，甚则有一身不随者。"本病如见身体不随，四肢瘴麻，不觉痛痒，不能言语者，宜防风汤等方。参痹、寒痹条。

风郁 郁证之一。见《景岳全书·杂证谟》。因风邪侵袭，郁而不散所致。症见头痛目胀，项背拘急，鼻塞身重，皮膜顽麻，瘾疹瘙痒，或恶寒壮热。《杂病源流犀烛》卷十八："风邪袭人而郁，头痛目胀，鼻塞声重者是。"治宜疏散风邪，用消风散、神术散等方，或麻黄、桂枝、柴胡、升麻、紫苏、细辛、防风、荆芥、薄荷、生姜之类。参郁证、外郁条。

风肿 病症名。❶肿病之一。出《灵枢·

五变》。又称痛风肿、痛风身肿。《丹溪心法·水肿》："风肿者，皮粗，麻木不仁，走注疼痛。"《医学入门·水肿》："风肿，即痛风肿者，肿面多风热，肿脚多风湿，关脉浮洪弦者，风热湿三气郁而为肿，因脾土不足，木火太盛，胃中纯是风气，所以清气不升，腹作膜胀，浊气不降，大便闭涩，经曰，中满泻之于内者是也。外症走注疼痛，面皮粗，麻木不仁，先服三和散，次服小续命汤，大便闭去附子，加槟榔、牵牛，日久者，金丹，风从汗散故也。虚弱不敢汗者，四君子汤加升麻、柴胡、苍术、防风。汗多者，防己黄芪汤。"《证治汇补·水肿章》："风肿走注疼痛，皮粗麻木，即痛风身肿是也。"❷外科病证之一。《诸病源候论·风肿候》："凡人忽发肿，或着四肢，或在胸背，或着头项，……久不瘥，气结盛生热，乃化为脓血，并皆烂败，则杀人。"

风疟 疟疾之一。❶夏季贪凉受风，复感疟邪，至秋而发者。《素问·金匮真言论》："秋善病风疟。""夏暑汗不出者，秋成风疟。"《素问·刺疟篇》："风疟，疟发则汗出恶风。"《素问·生气通天论》："魄汗未尽，形弱而气灼，穴俞以闭，发为风疟。"症见烦躁、头痛、恶风、自汗、先热后寒等。治宜发汗。方用桂枝羌活汤、芎苏饮、桂枝黄芩汤等。❷即温疟。《杂病源流犀烛·疟疾源流》："伤寒余热未尽，重感于寒而变疟，名曰温疟，亦名风疟。此为伤寒坏症，其症先热后寒，不得作正疟疾治。"详风伤卫疟、疟疾条。

风疝 古病名。出《素问·四时刺逆从论》。指足厥阴肝经逆气所致的疝症。《医学入门·疝气》："风疝者，非外风也，乃肝木阳脏气动之风。"《儒门事亲》卷二："素问云：厥阴滑为狐疝，少阳滑为肺气疝，太阴滑为脾气疝，阳明滑为心风疝，太阳滑为肾风疝，少阴滑为肝风疝。凡此六疝，虽见于他脉中，皆言风疝者，足厥阴肝经之气也。"治宜荆芥穗新瓦上焙为末，每服二钱，热酒调下。参肺风疝、脾风疝、肾风疝、肝风疝、心风疝、狐风疝等条。

风泄 病证名。又称风泻。《杂病源流犀烛·泄泻源流》："风泄，恶风自汗，或带清血。由春伤风，夏感湿，故其泻暴。宜胃风汤。或泻而风邪内缩，必汗之，宜桂枝麻黄汤。"《医学入门》卷四："风泻，……要知四季脾受风温，亦名飧泻。春古苍防汤、苍芍汤，夏二香散，秋神术散，冬不换金正气散，微汗之；稍久者三白汤、曲芎丸；带血虚者胃风汤。"本症可见肠胃型流行性感冒、病毒性肠炎、细菌性食物中毒等疾病。参风泻、外感风泻条。

风注 九注之一。《诸病源候论·风注候》："注之言住也，言其连滞、停住也。风注之状，皮肤游易往来，痛无常处是也。由体虚受风邪，邪气客于荣卫，随气行游，故谓风注。"治用烫熨、针石、导引等法，或服白术散等方。参九注条。

风泻 病证名。又称风泄。见《医学入门》卷四。详风泄条。

风毒脚气 病名。即脚气。见《备急千金要方》卷七。指脚气因感受风毒所致者。《赤水玄珠·脚气门》载风毒脚气，述其症为脚重虚肿，常兼肢节烦疼，心神壅闷等症。治宜祛风发散为主，用紫苏散、大腹子散等方。

风咳 十咳之一。指因风邪乘肺所致的咳嗽。《诸病源候论·咳嗽病诸候》："有十种咳，一曰风咳，语因咳言不得竟是也。"又肺风、劳风咳亦属风咳。参咳嗽条。

风痓 古病名。痓，同水，风痓即风水。《灵枢·四时气》："风痓肤胀。"参风水、水肿条。

风家 指患太阳中风症之人，或平素易患伤风者。《医宗金鉴》卷一："风家，谓太阳中风也。"参太阳中风、伤风条。

风顽麻 病名。《太平圣惠方》卷二十

一："夫风顽麻者，由荣气虚，卫气实，风寒入于肌肉之间，使血气不能流通。其状，搔之皮肤下似膈衣是也。诊其寸口脉缓，则皮肤不仁。脉数者生，牢急者死。"治宜乌蛇散、乌头丸等方。

风热头痛　病证名。指外感风热引起的头痛。见《外台秘要》卷十五。《医林绳墨·头痛》："上攻头目，或连齿鼻不定而作痛者，此为风热之头痛也。"《杂病源流犀烛·头痛源流》："因风热痛者，必兼目昏鼻塞。"症常见头部胀痛，恶风发热，或鼻塞流浊涕，或目赤面红，口渴喜饮，便秘溺赤，苔薄黄，脉浮数等。治宜石膏散、荆芥散、神芎散、桑菊饮等方。参头痛条。

风热耳聋　耳聋的一种。指风热入侵经络而致的耳聋。见《证治准绳·耳》。《医学六要·耳》："风热耳聋，耳根连牙床肿痛，属上焦风热，阳明、少阳二经受病，清胃兼辛凉散之。"方用防风通圣散、清神散等。参耳聋条。

风热吐血　病症名。指风热损肺所致的吐血。《金匮翼·诸血统论》："风热吐血：风，阳邪也；热，火气也。并入络中，则血溢络外。其证乍寒乍热，咳嗽口干，烦躁者是也。宜以辛凉入血之药治之。"方如《圣惠》荆芥地黄汤、《圣济》荆芥散等。参外感吐血、吐血条。

风热疟　疟疾之一。《普济方·诸疟门》："邪在少阳经谓之风热疟，治多和之。"参足少阳疟条。

风热眩运　病证名。见《医学正传·眩运》。因风热上壅所致。《杂病源流犀烛·头痛源流》："风热上冲眩晕，必胸中不利，旋运欲倒。"治宜疏风清热，用羌活汤、荆黄汤等方。参眩晕条。

风热感冒　病名。指感受风热之邪所致的表证。《诸病源候论·风热候》："风热病者，风热之气，先从皮毛入于肺也。肺为五脏上盖，候身之皮毛，若肤腠虚，则风热之气，先伤皮毛，乃入肺也。其状使人恶风寒战，目欲脱，涕唾出。"《杂病源流犀烛·感冒源流》："至有风热兼伤者，或先感风，又受热，或先受热，又感风，一时交发，贵审其轻重而治之。宜桔梗汤、上清散、菊花散，或加味二陈汤。若久而不愈，其人必虚，固不得专用疏散也。阳虚宜加参、术，阴虚宜加地黄、五味，倍门冬、白芍。"《时病论》卷二："春应温而过热，是为非时之气，所感之风，风中必夹热气，故名风热病耳。"参感冒、热伤风、火伤风等条。

风热腰痛　病证名。腰痛之一。见《世医得效方·大方脉杂医科》。因风热之邪侵袭肾经所致。症见腰痛强急，牵连脚膝，口渴便秘，脉洪数。治宜祛风清热。可用败毒散，或大、小柴胡汤等方。

风热嗽　病证名。见《类证治裁·咳嗽》。指风热犯肺，肺失清肃所致的咳嗽。症见咳嗽痰稠，身热，汗出恶风，口干咽痛，鼻流黄涕，苔薄，脉浮数等。治宜疏风清热，宣通肺气。用桑菊饮、银翘散等方。参咳嗽条。本症类似急性上呼吸道感染、急性支气管炎等疾患。

风眩　❶古病名。见《诸病源候论·妇人杂病诸候》。又称风头眩。指因风邪或风痰所致的眩晕。详见风寒眩晕、风热眩运、风痰眩晕等条。❷癫痫的别称。《备急千金要方》卷十四："痰热相感而动风，风心相乱则闷瞀，故谓之风眩。大人曰癫，小儿则为痫。"详癫痫条。

风晕　病证名。《东医宝鉴·外形篇》："风晕，伤风眩晕，恶风自汗，或素有头风而发作。宜川芎散、芎藭散。"参眩晕、伤风眩晕条。

风秘　病证名。由风搏肺脏，传于大肠，津液干燥所致。其症大便燥结，排便艰难。多见于老年体弱及素患风病者。《圣济总录·大小便门》："风气壅滞，肠胃干涩，是谓风秘。"《证治要诀·大便秘》："风秘

之病，由风搏肺脏，传于大肠，故传化难；或其人素有风病者，亦多有秘。宜小续命汤去附子倍芍药，入竹沥两蚬壳许。实者，吞脾约麻仁丸。虚者，吞养正丹。”《奇效良方·秘结门》：“风秘为病，风痰秘于大肠，结而不通也。”“皂角丸治老人、虚人风秘。乃大肠经有风，大便秘结宜服之。”《张氏医通·大小府门》：“风秘者，风入大肠，传化失职。羌、防、苏子、枳壳、麻仁、杏仁、皂角灰，煎服润肠丸。”《杂病源流犀烛·大便秘结源流》：“专由风秘，宜小皂角丸；如由虚而兼风秘，宜二仁丸。”《医灯续焰·大便燥结证》：“风燥宜五仁丸、《得效》皂荚丸，搜风顺气丸之类。”“《得效》五仁丸治津液枯竭，大肠秘涩，传导艰难。《得效》皂角丸，专治有风人藏府闭塞。”本证多见于张力减退性结肠性便秘。参见大便秘结、五秘条。

风疸 古病名。黄病之一。《备急千金要方》卷十：“风疸，小便或黄或白，洒洒寒热，好卧不欲动。”《太平圣惠方》卷五十五：“夫风疸者，由风气在于腑脏，与热气相搏，便发于黄，小便或赤或黄，好卧而心振，面虚黑。”如兼见身体皆黄，小便赤涩，宜服牛黄散方。如脏腑风热相搏，心神不安，多卧少起，小便赤涩，犀角散方。参风黄条。

风疰 病名。见《太平圣惠方》卷五十六。即风注。详该条。

风痉 病名。出《灵枢·热病》。指风伤太阳经脉，复遇寒湿所致的痉症。《圣济总录》卷八：“风痉者，以风伤太阳之经，复遇寒湿故也。其状口噤不开，腰背强直如发痫。盖风邪内薄于经，则荣卫凝泣，筋脉紧急，故令口噤不开，卒然倒仆，不知所以。凡发极则复苏，苏则复作。其或耳中策策而痛，身背直而不屈者，不可治也。”治宜祛邪为主，参以熄风。用续命汤、天麻汤等方。参痉条。

风消 病名。出《素问·阴阳别论》。❶指燥火所致的消渴。《症因脉治》卷三：“燥火三消之症，即风消也。”详燥火三消条。❷指心脾受病，精血虚少，形体日益消削的病症。多因思虑不遂，心神耗散引起。见《圣济总录》卷十三。主要症状为肢体痠痛，四肢无力，日渐发热，肌肉消瘦，胸膈烦闷，经闭不行等。治宜调养心脾，益气，养血为主。可用黄芪羌活饮、人参荆芥汤、逍遥散、归脾汤、乌骨鸡丸等方。

风黄 ❶黄病二十八候之一。《诸病源候论·黄病诸候》：“风黄候，凡人先患风湿，复遇冷气相搏，则举身疼痛，发热而体黄也。”❷三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一：“病人爱笑，腰背急，手足强，口干，舌上生疮，三部脉乱，此是风黄。”治用烙法及服祛风药。❸《杂病源流犀烛·诸疸源流》：“风黄，身不黄，独目黄，其人肥，风不外泄故也。宜青龙散。”参黄疸有关条。

风黄疸 古病名。《诸病源候论·黄病诸候》：“夫风湿在于府藏，与热气相搏，便发于黄，即小便或赤或白，好卧而心振，面虚黑，名为风黄疸。”参黄疸有关条。

风聋 病证名。《圣济总录》卷一百一十四：“风聋者，本于足少阴经虚，风邪乘之，令气脉不通，风邪内鼓，则耳中引痛，牵及头脑，甚者聋闭不通，故谓之风聋。治风聋，飕飕如风雨钟磬声，或时出清水，或有脓汁，黄耆汤方。”

风虚腰痛 病证名。因肾虚而风冷侵袭所致。《金匮翼·腰痛》：“风虚腰痛者，肾虚而风冷乘之也。其尺脉虚浮，而痛多抽掣，或拘急且瘦，而上连脊背。”治宜益肾祛风。可用独活寄生汤、甘豆汤等方。参风寒腰痛、肾虚腰痛条。

风偏枯 病证名。见《诸病源候论·风病诸候》。指因于风湿而致的偏枯证。《圣济总录》卷九：“风偏枯。论曰：气血不足，

腠理开疏，风湿客于分肉之间，久而不差，真气去，邪气独留，乃为偏枯之疾。”症见半身不遂，肌肉枯瘦而痛，言语不变，神智不乱。治疗可用天南星丸等方。

风痒 证名。《诸病源候论·风痒候》：“虚则邪气往来，故肉痒也。”多由卫虚风邪易入，皮肤郁热生风作痒所致。治宜清热疏风、凉血为主。用消风散、胡麻散等方加减。

风惊 古病名。《诸病源候论·风病诸候》：“风惊者，由体虚，心气不足，为风邪所乘也。心藏神，而主血脉。心气不足则虚，虚则血乱，血乱则气并于血，气血相并，又被风邪所乘，故惊不安定，名为风惊。”症见精神恍惚，惊悸不安，健忘，多梦魇等。治宜养心安神，祛风定惊。方用小定心汤、大定心汤等。参惊条。

风惊邪 病证名。《诸病源候论·风病诸候》：“风惊邪者，由体虚，风邪伤于心之经也。心为手少阴之经，心气虚，则风邪乘虚伤其经，入舍于心，故为风惊邪也。其状乍惊乍喜，恍惚失常是也。”治宜养心、安神、祛风。可用茯神丸、地黄煎丸等。参惊条。

风惊恐 病证名。指由风邪所致的神志不宁，时发惊恐的病症。《诸病源候论·风病诸候》：“风惊恐者，由体虚受风，入乘脏腑，其状如人将捕之。心虚则惊，肝虚则恐，足厥阴为肝之经，与胆合，足少阳为胆之经，主决断众事。心肝虚而受风邪，胆气又弱，而为风所乘，恐如人捕之。”治用牡蛎汤、龙齿汤、龙骨汤等方。

风惊悸 病证名。指心悸因心气不足而风邪乘袭所致者。《诸病源候论·风病诸候》：“风惊悸者，由体虚，心气不足，心之府为风邪所乘，或恐惧忧迫，令心气虚，亦受于风邪。风邪搏于心，则惊不自安。惊不已，则悸动不定。其状，目睛不转而不能呼。诊其脉，动而弱者，惊悸也。”宜用镇心丸、定心防风散等方（见《圣济总录》卷十四）。参见惊悸条。

风厥 厥证之一。指肝气化风之厥。《素问·阴阳别论》：“二阳一阴发病，主惊骇背痛，善噫善欠，名曰风厥。”王冰注：“夫肝气为风，肾气陵逆，既风又厥，故名风厥。”《素问·评热病论》：“汗出而身热者风也，汗出而烦满不解者厥也，病名曰风厥。”《张氏医通·厥》：“风厥者，手足搐搦，汗出而烦热不解也。”治宜加减续命汤、人参汤、地黄饮子等。参厥证等条。

风喘 病证名。见《医学入门·喘》。指感受风邪，肺气胀逆所致的气喘。治宜祛风宣肺为主，如金沸草散、麻黄杏仁饮等方。参风寒喘、风寒喘逆等条。

风膨腿 病名。《圣济总录》卷十一：“风膨腿之状，四肢不收，身体疼痛，肌肉虚满，骨节懈怠，腰脚缓弱，不自觉知也。盖风邪侵于分肉，流于血脉，荣卫稽留，涩而不行，致身体骨节，肌肉腰脚，痹滞无力不能用也。”宜用五加皮汤等方。

风痫 病证名。指因风邪伤及脾胃而致痫者。《三因极一病证方论》卷九治风痫便清血，或下瘀血，注下无度，用胃风汤。《医学入门》卷五治风痫恶风鼻塞，身痛色青，或纯下清水，用古苍术汤、神术散。《时病论》卷三治风痫先泻后痫，腹痛后重，或下纯血，脉沉小弦，用痛泻要方加茯苓、炮姜、吴萸、荷叶等药。参痫疾条。

风癎 病名。❶指痫症发作由本虚蓄热，风邪乘袭，或肝经有热引起者。《圣济总录》卷十五：“风痫病者，由心气不足，胸中蓄热，而又风邪乘之。病间作也，其候多惊，目瞳子大，手足颤抖，梦中叫呼，身热瘛疭，摇头口噤，多吐涎沫，无所觉知是也。”治宜用麻黄饮、茯神汤、钩藤丸、丹砂丸等。❷指发痫瘥后出现身体头面肿满或不能言语之证。多因痫发后气血尚虚，热未尽除，或因风冷之气留滞心之络脉所致。《诸病源候

论》卷四十五："痫瘥后而肿满者，是风痫。风痫因小儿厚衣汗出，因风取凉而得之。初发之状，屈指如数，然后掣缩是也。其痫虽瘥，气血尚虚，而热未尽，在皮肤与气相搏，致令气不宣泄，故停并成肿也。""而痫发瘥后不能语者是风痫。……其初发之状，屈指如数，然后发瘈疭是也。是心之声为言，开窍于口，其痫发虽止，风冷之气犹滞心之络脉，使心气不和，其声不发，故不能言也。"本症可见于乙脑等病的后遗症。❸指手足偏废如瘫痪之证。《奇效良方》卷六十四："风痫为病，废手足，或一手一足，或两手两足，如瘫不随，或睫眼，或睫口，或口㖞牵引颊车。"本症可见于脑血管意外后遗症等。参痫条。

风湿 病名。❶指人体感受风、寒、湿邪而致身痛或身重、关节疼痛，屈伸不利为主症的一种疾病。《金匮要略·痉湿暍病脉证治》："病者一身尽疼，发热，日晡所剧者，名风湿。此病伤于汗出当风，或久伤取冷所致也。可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。"又："风湿，脉浮身重，汗出恶风者，防己黄耆汤主之。"又："风湿相搏，骨节疼烦掣痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。"❷泛指感受风湿而致的多种病症。《诸病源候论·风病诸候》："风湿者，是风气与湿气共伤于人也。……其状令人懈惰，精神昏愦，若经久，亦令人四肢缓纵不随，入藏则痞痼，口舌不收；或脚痹弱，变成脚气。"参痹、脚气条。

风湿头痛 病证名。指风邪、湿痰所致的头痛。《赤水玄珠·头痛门》："风湿头痛亦作痰患。"症见头痛如裹，肢体困重，胸闷腹胀，恶心纳呆，口干少饮，苔腻，脉濡或浮缓。治宜祛风化湿，可用玉壶丸、加减神术散、羌活胜湿汤等方。参头痛条。

风湿热头痛 病证名。指风湿热合而上壅的头痛。《兰室秘藏·头痛门》："清空膏乃风湿热头痛药也。"《证治准绳·杂病》："风湿热头痛，上壅损目及脑痛，偏正头痛年深不愈，并以清空膏主之。如苦头痛，每料中加细辛二钱。"参头痛条。

风湿腰痛 病证名。见《诸病源候论·腰背病诸候》。多因风湿乘袭，留滞经络所致。症见腰背重痛，转侧不利；或见发热恶寒，自汗身重；或见浮肿，脉多浮涩。治宜祛风化湿。可用羌活败毒散、独活秦艽汤、五加皮汤等方。本证可见于肌纤维组织炎、腰肌劳损、类风湿性脊椎炎等病。

风湿腹胀 证名。指感受风湿，脾胃失调所致的腹胀。《症因脉治》卷三："风湿腹胀之症，发热身重，不能转侧，一身尽痛，心腹胀满，外连头面，此风湿腹胀之症也。"治宜祛风化湿为主。胸前饱满重者，防风平胃散主之；身热恶风重者，羌独败毒散、荆芥汤主之；下身重滞肿者，五苓散主之；内外皆热重者，防风木通汤主之。参腹胀条。

风湿痹 病名。《诸病源候论·风病诸候》："风寒湿三气杂至合而成痹。其风湿气多而寒气少者，为风湿痹也。"症见皮肤顽厚，或肌肉酸痛，日久不瘥。亦可致身体手足不遂。治宜祛风湿为主。用海桐皮汤、羌活胜湿汤等方。

风湿痿软 病证名。见《症因脉治》卷三。多因居处潮湿，触冒风雨，邪留经络所致。症见手足瘫痪，痿弱不能举动，皮肤不仁，关节重痛等。治宜祛风湿，通经络为主，可用羌活胜湿汤等方。寒气胜，宜桂枝汤加苍术、防风、羌活、独活；热气胜，宜荆防平胃散；若皮肤不仁，可用苍防五皮饮。参痿条。

风温 病名。❶指感受风热引起的温病。见《温热经纬·叶香岩三时伏气外感篇》。《温病条辨·上焦篇》："风温者，初春阳气始开，厥阴行合，风挟温也。"多发于冬春二季。主要症状有发热、头痛、咳嗽、口渴、脉浮数等。初起病在卫分及气分，

治宜辛凉透表，方用银翘散、麻杏石甘汤、千金苇茎汤等加减。如见高热神志昏迷，手足瘛疭，脉数疾者，为热盛劫津，逆传心包，营血受灼，肝风内动。宜清营泄热，平肝熄风，用羚角勾藤汤、犀角地黄汤、清营汤、至宝丹、紫雪丹、安宫牛黄丸等。如正气火伤，而见虚脱者，急宜回阳固脱，用参附龙牡合生脉散。一说本症即春温之重者（见《医碥》卷二）。❷指温病误汗的变症。《伤寒论·辨太阳病脉症并治上》："太阳病，发热而渴，不恶寒者为温病。若发汗已，身灼热者，名曰风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。"治宜萎蕤汤等方。❸《六气感证要义·风温》："风温一证，众说分歧，莫衷一是。《伤寒论》：若发汗已，身灼热者，名曰风温为一说。《伤寒序例》谓阳脉浮滑，阴脉濡弱者，更遇于风，变为风温为二说。陶节庵乃以素伤于风，复伤于热，风热相搏，即为风温为三说。近人以冬温春，吸受风温，先犯手太阴者为风温为四说。第四说以吸受温风为风温，风与温不分先后，虽似稍戾于古，然治法实无二致。"本病包括上呼吸道感染、急性支气管炎、感染性肺炎、流行性感冒等疾患。

风温嗽 病证名。指风温之邪袭肺所致的咳嗽。《类证治裁·咳嗽》："风温嗽，风温上侵，头胀咽痛，呛咳失音，宜清轻凉解。"治用桑叶、象贝、连翘、薄荷、杏仁、沙参、桔梗、甘草等药。参咳嗽、外感咳嗽、风温条。

风寒外束喘 病证名。指风寒外束，肺气壅阻不宣所致的气喘。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："风寒外束喘，喘必有力，其气粗，有余之喘也。"《景岳全书·杂证谟》："凡风寒外感，邪实于肺而咳喘并行者，宜六安煎加细辛或苏叶主之。若冬月风寒感甚者，于本方加麻黄亦可，或用小青龙汤、华盖散、三拗汤之类主之。"本病症除气喘外常兼见咳嗽痰多，鼻塞流清涕，恶寒发热等症。参风寒喘、风寒喘逆、风寒咳嗽条。

风寒头痛 病证名。指外有风寒表症而头痛剧烈者。《罗氏会约医镜·杂证》："外感风寒，头痛暴甚。"症见头痛或连及项背，恶风寒，骨节疼痛，鼻塞流清涕，舌苔薄白，脉浮紧等。治宜疏风散寒，用桂枝羌活汤、川芎茶调散、祛风立效散等方。本证可见于感冒、上呼吸道感染等疾病。参头痛条。

风寒两伤荣卫证 病证名。指大青龙汤证。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳中风，脉浮紧，发热，恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。"《注解伤寒论》卷三："此中风见寒脉也。浮则为风，风则伤卫，紧则为寒，寒则伤荣，荣卫俱病，故发热，恶寒，身疼痛也。"《伤寒论条辨》卷三："中风者，单只卫中于风而病也；伤寒者，单只荣伤于寒而病也；若风寒俱有而中伤，则荣卫皆受而俱病。"风寒两伤营卫等说，后世医家持有异议。参太阳病条。

风寒身肿 病证名。身肿类型之一。《症因脉治》卷三："风寒身肿之症，恶寒身热，身首皆肿，风胜多汗，寒胜无汗。此外感风寒，即金匮风水、皮水，从太阳经主治之症也。风寒身肿之因，表气素虚，肺气素热。表气虚则外邪易入，肺气热则皮毛易开。寒袭于肌表，郁而不散，则发热身肿之症作矣。"脉多浮大或浮数。治宜选用防己黄芪汤、越婢汤、大腹皮散等方。参身肿、水肿条。

风寒胁痛 病证名。见《东医宝鉴》卷三。《类证治裁·胁痛》："风寒者，外感之邪，留著胁下，小柴胡汤加桔梗、枳壳。"参外感胁痛、感冒胁痛条。

风寒咳嗽 病证名。指感受风寒所致的咳嗽。《普济本事方》卷三："肺感风寒作嗽，紫苏散。"《仁术便览》卷二："风寒

咳嗽，肺气喘急。”方用五拗汤。《证治准绳·杂病》：“春月风寒所伤，咳嗽声重，头疼，用金沸草散；咳嗽声重，身热头痛，用局方消风散。……冬月风寒外感，形气病气俱实者，宜华盖散加减，麻黄汤。”《类证治裁·咳嗽》：“兼感风寒暴嗽，鼻塞声重，芎苏饮；咳逆倚息不得卧，小青龙汤。”参咳嗽条。本症可见于上呼吸道感染、气管炎、支气管炎等。

风寒眩晕 病证名。见《症因脉治·外感眩晕》。因感受风寒外邪所致的头晕目眩。有风邪眩晕与寒邪眩晕之分。风邪眩晕，症见头痛额痛，骨节烦痛，身热多汗，上气喘逆，躁扰时晕。治以祛风为主。用羌活防风汤等方。寒邪眩晕，症见身热无汗，恶寒拘紧，头痛身痛，时时眩冒。治以散寒为主。用羌活败毒汤等方。参眩晕条。

风寒痉 病证名。不论刚痉、柔痉，凡因风寒而致者，属于风痉的范围。《三因极一病证方论》卷七：“病者身热足寒，头项强急，恶寒，时头热，面赤，目脉赤，独头动摇，卒口噤，背反张，以发热恶寒、不恶寒、有汗、无汗、分刚柔者，风寒痉也。”参刚痉、柔痉条。

风寒喘 病证名。风寒外束喘的简称。《东医宝鉴》卷五：“风寒喘，寻常感冒，风寒内郁，肺胀逆而为喘。”可选用金沸草散、麻黄散、加味三拗汤等方。详风寒外束喘条。

风寒喘逆 病证名。指风寒郁于肌表，壅于肺脏所致的气喘。《症因脉治·喘症论》：“风寒喘逆之症：头痛身痛，身发寒热，无汗恶寒，喘咳痰鸣，气盛息粗。”脉浮缓为风，浮紧为寒，六脉俱浮，表有风寒，六脉沉数，寒郁为热。治疗以祛风散寒为主。风气胜者，散风解表，宜防风泻白散、防风桔梗汤等方；寒气胜者，用小青龙汤、三拗汤、麻黄定喘汤等方；如寒郁化热，兼有呕吐者，可用干葛竹茹汤、平胃散加减。参喘证、风寒外束喘条。

风寒湿痹 病证名。见《圣济总录》卷二十。因风寒湿三气杂至，使气血郁滞所致的身重而痛，四肢拘挛，甚则走注疼痛，或手足麻木等。治宜祛风、散寒、利湿。用石顽改定三痹汤、蠲痹汤等方。参三痹条。

风寒感冒 病名。指感受风寒所致的恶寒、发热、鼻塞、流涕、咳嗽、喘急、头痛、身痛等表证。《万病回春·伤寒》：“四时感冒风寒者，宜表解也。”方用荆防败毒散、十神汤等。头痛身痛甚者，可用神术散、川芎茶调散。咳嗽重者，可用金沸草散。参感冒、冒寒等条。

风寒腰痛 病证名。见《东医宝鉴·外形篇》。《诸病源候论·腰背病诸候》：“凡腰痛病有五……二曰风痹，风寒着腰是以痛。”因风寒着腰所致的腰痛拘急，或连脊背，或引脚膝，或见寒热，腰间觉冷，得温痛减，脉浮而紧。治宜疏散风寒。可用二柴胡饮、五积散、加味龙虎散等方。参风腰痛、腰痛条。本证可见于纤维组织炎、增殖性脊椎炎、类风湿性脊椎炎、腰肌劳损等病。

风寒嗽 病证名。即风寒咳嗽。《古今医鉴》卷四：“风寒嗽者，鼻塞，声重，恶风恶寒，或自汗，或无汗者是也。治当以发散行痰，用二陈汤加麻黄、桔梗、杏仁。”参风寒咳嗽条。

风搐 病名。见《儒门事亲·风形》。指以手足抽动为主症的疾患。多因火盛肝旺，风动痰壅所致。症见双目上视，角弓反张，或手足颤振抽动不已，不能持物和步履，夜卧发热，遍身燥痒等。治宜平肝熄风或涌吐风痰。《罗氏会约医镜·杂证》：“风搐证者，……由火盛制金，金衰不能平木，木旺而自病。或平肝，或吐下，因证治理。”

风腰痛 病证名。见《三因极一病证方论》卷三十三。又称伤风腰痛。因风邪伤于肾经所致的腰痛如掣，或左或右，痛无定处，或连肩背，或牵引两足，或见寒热，脉浮。

治宜祛风通络活血。可用独活寄生汤、五积散、小续命汤等方。风腰痛有风寒腰痛、风热腰痛、风湿腰痛。详各该条。

风痱 病证名。见《诸病源候论·风病诸候》。简称痱。症见为四肢废而不用。甚则可见口不能言，神志昏乱等。《金匮要略·中风历节病脉证并治》附录《古今录验》"续命汤：治中风痱，身体不能自收持，口不能言，冒昧不知痛处，或拘急不得转侧。"《备急千金要方·诸风》治疗风痱用三味竹沥饮、竹沥汤。《杂病源流犀烛·中风源流》治风痱用换骨丹、疏风顺气圆（丸）、八宝回春汤等方。参痱条。

风痹 病名。见《灵枢·寿夭刚柔》。又名行痹、筋痹。《素问·痹论》："风寒湿三气杂至，合而为痹也。其风气胜者为行痹。"《证治准绳·杂病》："风痹者，游行上下，随其虚邪与血气相搏，聚于关节，筋脉弛纵而不收。"《症因脉治》卷三："风痹之症，走注疼痛，上下左右，行而不定，故名行痹。……风痹之治、风寒攻痛，防风汤；表里有邪者，防风通圣散、和血散痛汤、大秦艽汤；风热痛者，四物二妙丸；风湿之邪，苍防二妙汤。"亦可用虎骨散加减。一说风痹即痛风。《景岳全书·杂证谟》："风痹一证，即今人所谓痛风也。"参筋痹、走注、痛风条。

风痞瘟 病证名。指感风邪所致的一种隐疹。《诸病源候论·风痞瘟候》："夫人阳气外虚则多汗，汗出当风，风气搏于肌肉，与热气并，则生痞瘟，状如麻豆，甚者渐大搔之成疮。"治宜枳壳散、荆芥散等方。

风痰 痰证之一。①指痰扰肝经的病证。《医学入门》卷五："动于肝，多眩晕头风，眼目瞤动昏涩，耳轮搔痒，胁肋胀痛，左瘫右痪，麻木蜷跛奇证，名曰风痰。"治宜用青州白圆子等方。《医宗必读》卷九："在肝经者，名曰风痰，脉弦面青，四肢满闷，便溺秘涩，时有躁怒，其痰青而多泡。"治用水煮金花丸、防风丸、川芎丸等。又名肝经风痰。参该条。②指素有痰疾，因感受风邪或风热怫郁而发者。《泰定养生主论》："风痰者，因感风而发，或因风热怫郁而然也。此皆素抱痰疾者，因风、寒、气、热、味而喘咯咳唾，非别有此五种之痰。"参痰证条。

风痰头痛 病证名。指风邪挟痰上扰清窍的头痛。见《圣济总录·诸风门》。《兰室秘藏·头痛门》："发时两颊青黄，晕眩，目不欲开，懒言身体沉重，兀兀欲吐。洁古曰，此厥阴太阴合病，名曰风痰，以局方玉壶丸治之。"并可选用甘菊荆芥汤，半夏白术汤等方。参头痛条。

风痰哮 病证名。见《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》。指风邪与痰气相搏所致的哮吼。风邪袭肺，痰阻气道，肺气壅阻而发哮。治宜祛风宣肺，豁痰利气为主，用千缗导痰汤、黄芩利膈丸、定喘汤等方。

风痰眩晕 病证名。见《医学正传·眩运》。因风痰上壅，闭塞清阳所致。《杂病源流犀烛·头痛源流》："风痰闭壅眩晕，必胸膈痞塞，项急，肩背拘倦，神昏多睡，或心忪烦闷而发。"治宜祛风化痰。用半夏白术天麻汤、天麻丸、白附子丸等方。如见眩晕闷乱，瘫痪，搐搦，瞤动，宜青州白圆子。参眩晕、痰晕等条。

风痰痉 病证名。见《万病回春·痉病》。指因风痰壅滞经络所致的痉病。症见眼牵嘴扯，手足振摇或搐搦，甚则神昏不醒。治宜祛风化痰，用祛风导痰汤，加姜汁、竹沥；风痰盛者，败毒散加防风、天麻、黄芩、全蝎、生姜、薄荷，气血不足而兼风痰者，用参归养荣汤。参痉条。

风痰嗽 病证名。指风痰壅盛于肺所致的咳嗽。《世医得效方·大方脉杂医科》："风痰嗽……直至嗽顿吐饮食痰物伏出尽，方少定。乃肝木克脾土，风痰壅盛。"治宜祛风豁痰。方用青州白圆子加天麻、全蝎、

僵蚕等。参咳嗽、痰嗽条。

风嗽 病证名。指感受风邪所致的咳嗽。《证治要诀》卷六："感风而嗽者，恶风有汗，或身体发热，或鼻流清涕。"方用桂枝汤加味。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："风嗽，风乘肺也。其脉浮，必兼鼻塞，流涕、声重、口干、喉痒，憎寒发热，自汗恶风，烦躁，语未竟而咳。宜款冬花散、金沸草散。"参伤风咳嗽、咳嗽条。

风瘙痒 病证名。《圣济总录》卷十一："风瘙痒者，表虚卫气不足，风邪乘之，血脉留滞，中外鼓作，变而生热，热则瘙痒，久不差，淫邪散溢，搔之则成疮。……治风瘙痒如虫行，或瘭痹不仁，防风汤淋洗方。"

风弸曳 病证名。指肢体不能收摄者。见《圣济总录》卷七。弸则偏而不举，曳则泄不随。与半身不遂，偏枯等症类似。详见各该条。

风壅头痛 病证名。见《丹溪心法附余·风热门》。指风热壅盛所致的头疼。症见头痛而头目昏眩。治宜祛风清热，如羌活汤、芎芷汤等方。参头痛条。

风癫 病证名。出《诸病源候论·风病诸候》。即风懿。详该条。

风癫 五癫之一。即痫证。见《诸病源候论》卷二。多因血气亏虚，邪入阴经；或在胎时母卒受惊，精气并居所致。证见发时仆地吐涎沫无所觉，眼目相引，牵纵反强，羊鸣，食顷方解。方宜莨菪子散等。参见五癫、癫痫条。

风懿 病名。一作风癔。症见猝然昏倒，不知人事，伴见舌强不能言，喉中有窒塞感，甚则噫噫有声等。属于风中脏腑的范围。《备急千金要方》卷八："风懿者，奄忽不知人，咽中塞，窒窒然，舌疆不能言，病在脏腑。"《医门法律·中风门》："按风懿曰，奄忽不知人，即该中风卒倒内，金匮不重举其证，意可知矣。"《杂病源流犀烛，中风源流》："风懿，亦名风癔，其病亦在脏腑间，由痰水制火，闭塞心窍，故猝然昏倒，舌强不言，喉中窒塞，噫噫有声是也。但此症有汗身软者可治，无汗身直者不易治。""风懿病有由于热者，则以痰火郁积而然，非清火不可，宜牛黄清心丸；有由于虚者，则以元弱痰横之故，非化痰不可，宜导痰汤。"参类中风条。

乌头类中毒 病名。是指服用过量乌头、附子、天雄而见中毒症状者。见《千金要方》卷二十四。中毒轻者症见口唇、四肢麻木，头晕，言语不清，视力模糊。重者心率加速，心律不齐，血压下降，突然抽搐，紫绀，昏迷，甚至死亡。治疗宜中西医结合救治。民间有用生姜、甘草、银花煎、犀角、川连、芫荽汁等解毒。《本草纲目》卷四载有解乌头、附子、天雄毒药如防风汁、远志汁、甘草汁、人参汁、黄耆、乌韭、绿豆、寒食饧、大枣肉、井华水、陈壁土等。可参考。

乌痧 痧证之一。《杂病源流犀烛·痧胀源流》："乌痧，满身胀痛，面目黧黑。身有黑斑，毒在脏腑，气滞血凝，以致疼痛难忍。"宜阿魏丸等方。《七十二种痧症救治法、乌痧》："此症有二，俱系预先感冒风邪，未经发泄，又因受寒而发者，先发寒战，牙齿眼白俱发青黑色，周身四肢俱胀痛入腹者，延过周时不治则死。有因受热而发者，先身热如火，牙齿眼白皆黑，若周身四肢胀痛入腹中者，半日内不治则死。治法先以三指拍曲池穴，一路拍上至臂臑穴，拍出紫黑块，不拘多少，刺出黑血。热症用麻油四两，滑石末三钱和服，服后呕出臭水而愈；寒症用鹅毛向喉中搅呕，呕粘痰而愈。如腹仍痛，大便闭者，用小红药下之，或瓜蒂箭插入粪门，出大便而止。无论寒热症，针刺刮呕俱用，后再槟榔、藿香、砂仁、粟梗、木香、灯草三十寸。阴阳水煎服。"参痧条。

乌痧胀 病名。干霍乱之俗称。《医学

心悟·伤暑》："谓干霍乱证，世俗名搅肠痧、乌痧胀。"详干霍乱条。

乌癞　疠风之一。见《诸病源候论》卷二。《太平圣惠方》卷二十四："夫癞疾皆是恶风，及犯触忌害所得。初觉皮毛变黑，或淫淫苦痒如虫行，或眼前见物如垂丝，言语无定，心常惊恐，皮肉之中，或如桃李，瘾疹赤黑，手足顽痹，针刺不觉痛，脚下痛顽，不得蹈地，凡食之时，开口取气而鸣，语亦如是，身体生疮，痛痒而时如虫行，或两肘如绳搏，此名乌癞。"治宜猬皮丸、硫黄散、大黑神膏等方。

〔ㄒ〕

六极　出《金匮要略·脏腑经络先后病证》。指六种虚损重症。❶指气极、血极、筋极、肌极、骨极、精极六种病症。（见《诸病源候论·虚劳病诸候》）❷指气极、脉极、筋极、肉极、骨极、精极六种病症。（见《备急千金要方》）❸指气极、肺极、脏极、筋极、骨极、肉极六种病症。（见《奇效良方·痨瘵门》）

六郁　六种郁证的总称。见《丹溪心法·六郁》。指气郁、湿郁、痰郁、热郁、血郁、食郁。《医学正传·郁证》："夫所谓六郁者，气、湿、热、痰、血、食六者是也。"详各条。

六府胀　见《医钞类编》卷九。指胃胀、大肠胀、小肠胀、胆胀、膀胱胀、三焦胀。详各该条。

六泻　六种泄泻的总称。指脾泻、胃泻、肠泻、洞泻、痕泻、食积泻。《医林绳墨·泄泻》："泻有六焉，脾、胃、肠、痕、洞、食积是也。"详各该条。

六经病　病名。指太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病、厥阴病六经病症。《伤寒论》中把外感疾病在发展、变化过程中所产生的各种证候，依据所侵犯的经络、脏腑病变部位，受邪轻重，邪正盛衰，分辨阴阳、表里、寒热、虚实，指出各经的主要脉证、治法及其传变规律，进行辨证论治。并对诊治杂病也有指导意义。《伤寒论翼》卷上："六经之为病，不是六经之伤寒，乃是六经分司诸病之提纲，非专为伤寒一症主法也。……夫仲景之六经，是分六区地面，所该者广，虽以脉为经络，而不专在经络上立说，凡风寒温热内伤外感，自表及里，有寒有热，或虚或实，无乎不包。"六经分手足，为十二经。古代有些医家，有伤寒传足不传手之说。《类经·伤寒》："周身上下脉络，惟足六经则尽之矣。手经无能遍也，且手经所至，足经无不至者，故但言足经，则其左右前后阴阳诸证，无不可按而得，而手经亦在其中。"详太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病、厥阴病条。

六经厥　太阳厥，阳明厥，少阳厥，太阴厥，少阴厥，厥阴厥之总称。《三因极一病证方论·叙厥论》："经云，厥者逆也。有寒厥，有热厥，有六经厥，有尸厥。……六经厥者，头重，足弱，发为瞑仆，名太阳厥。妄言，走呼，腹满，面赤，名阳明厥。暴聋，颊肿，胁髀拘痛，名少阳厥。腹胀，后闭，食为寒呕，名太阴厥。口干，溺赤，腹满，心痛，名少阴厥。淫溲不利，脐热，阴缩，名厥阴厥。"参六经厥各条。

六经渴　指伤寒六经病所见之渴症。《卫生宝鉴》卷十二："辨六经渴并治法。太阳渴，脉浮无汗者，五苓、滑石之类。阳明渴，脉长有汗者，白虎、凉膈之类。少阳渴，脉弦而呕者，小柴胡加瓜蒌根也。太阴渴，脉细不欲饮水，纵饮唯思汤不思水，四君子、理中汤之类。少阴渴，脉沉自利者，猪苓汤、三黄汤之类。厥阴渴，脉微引饮者，当少少与之滑石。"

六畜瘟　病名。见《备急千金要方》卷五。以瘟发时叫声及病状命名。分马瘟、牛瘟、羊瘟、猪瘟、犬瘟、鸡瘟。详各条。

六腑腹胀　病证名。指腹胀属于腑气失

调引起者。《症因脉治》卷三："六腑腹胀之症，胸前胀满，妨于饮食，胃胀也。肠鸣而痛，濯濯有声，大肠胀也。小便时赤，小腹胀满，小肠胀也。气癃溺涩，少腹胀急，膀胱胀也，气满肤中，空空然响，三焦胀也。胁肋作痛，口苦太息，胆胀也。此六腑腹胀之症也。"多因饮食不节，酿痰成积，湿热壅阻，气滞不通所致。治宜通调腑气为主。胃胀者，宜平胃散；大肠胀者，枳壳化滞汤、导痰汤；小肠胀者，木通饮；膀胱胀者，五苓散；三焦胀者，枳壳青皮饮；胆胀者，柴胡清肝饮等方。参见腹胀条。

六聚 六腑聚症之总称。《中藏经·积聚癥瘕杂虫论》："聚有大肠、小肠、胆、胃、膀胱、三焦之六名也。"故后世有将聚总称为六聚者（如《三因极一病证方论》卷八）。详见聚条。

火中 类中风之一。见《医宗必读·类中风》。又名中火。《医学心悟·类中风》："一曰火中……良由将息失宜，心火暴盛，肾水虚衰，不能制之。"症见猝然昏倒，不省人事，言语不出，口眼歪斜，瘫痪，面赤，烦渴，便秘等。心火盛实者，治宜清心泻火，宣窍宁神，方用牛黄清心丸、凉膈散等。若肾阴不足，虚火上炎者，宜滋水以敛火，选用六味地黄丸或灭火汤。痰多者，用贝母瓜蒌散加减。

火头痛 病证名。即火邪头痛，火热头痛。《医学六要·头痛》："火头痛，寸口脉洪而大，证兼口干目赤等火证者，上焦实火也。"多由阳明胃火上冲所致。症见头部跳痛或胀痛，或痛颊齿，或自耳前后痛连耳内，烦热、口渴，便秘，脉洪大。治宜清热泻火，用白虎汤、清降玉女煎、一味大黄散等方。参头痛条。

火邪头痛 病证名。又名火头痛、火热头痛。指胃火上冲所致的头痛。《景岳全书·头痛》："火邪头痛者，虽各经皆有火证，而独惟阳明为最。正以阳明胃火盛于头面，而直达头维。故其痛必甚，其脉必洪，其证必多内热，其或头脑振振痛而兼胀，而绝无表邪者，必火邪也。"详火头痛、火热头痛条。

火伤风 病名。感冒之一种。伤风而见燥火证候者。《类证治裁·伤风》："火伤风，火郁燥嗽咽痛，甘桔汤加薄荷、玄参、黄芩、前胡、花粉。"详风热感冒、热伤风条。

火冲眩晕 病证名。《症因脉治·内伤眩晕》："火冲眩晕之症，暴发倒仆，昏不知人，甚则遗尿不觉，少顷汗出而醒，仍如平人。"有实火、虚火、虚阳上浮之分。实火上冲，脉多洪数，宜用导赤各半汤、栀子清肝散、龙胆泻肝汤、火府丹、栀连导赤散、家秘泻白散、干葛清胃散等方。阴虚火旺、虚火上冲者，脉多细数，宜用天王补心丹、家秘肝肾丸、知柏天地煎、二冬二母丸等方。真阳不足、虚阳上浮者，脉浮大，重按无力，宜用八味肾气丸。参热晕、肝火眩晕、阴虚眩晕、阳虚眩晕等条。

火呃 病证名。见《证治汇补·呃逆》。又称热呃，详该条。

火郁 五郁之一。指心火怫郁之症。出《素问·六元正纪大论》。《杂病源流犀烛》卷十八："火郁之病，为阳为热，脏应心，腑应小肠、三焦，主在脉络，伤在阴分。"症见全身不适，少气，咽喉肿痛，口干舌苦，脘腹疼痛，目赤头晕，烦闷懊侬，潮热颧红，咳嗽痰喘，身生痱疮等。《证治汇补》卷二："咳嗽痰喘，风疹潮热，此火郁也。治宜发之。发者，汗之也，升举之也。"可用发郁汤、发火汤或通火汤等方。参五郁、郁证条。

火郁胃脘痛 病证名。指肝火郁热所致的胃脘痛。见《类证治裁、胃脘痛》。《医醇賸义》卷四："肝为将军之官，其体阴，其用阳，故为刚脏。一有郁结，气火俱升，上犯胃经，痛连胁肋，加味左金丸主之。"

《症因脉治》卷一："时作时止，痛而汗出者，火也。热而无滞者，清火为急，清胃汤；热而有滞者，消滞为先，栀连保和散。"《类证治裁·胃脘痛》："火郁致痛，发则连日，脉必弦数，当苦辛泄热，姜汁炒黄连，山栀泻火为君。香附、川芎、陈皮、枳壳开郁为臣，反佐炮姜从治为使。"化肝煎，一贯煎亦可随症选用。参胃脘痛条。

火郁喘 病证名。见《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》。指火邪内郁所致的气喘。多由邪热内郁，肺气壅遏不宣而成。症见喘促、厥逆、神情闷乱等。《医贯·喘》："又有一等火郁之证，六脉微濇，甚至沉伏，四肢悉寒，甚至厥逆，拂拂气促而喘，却似有余，而脉不紧数，欲作阴虚，而按尺鼓指，此为蓄郁已久，阳气拂遏，不能营运于表，以致身冷脉微而闷乱喘急。"治宜宣散蓄热，如逍遥散加茱连等。《医宗金鉴·喘急死证》："面赤浮肿，谓之火郁之喘，宜泻白散。"参火喘条。

火郁嗽 病证名。指咳嗽由痰郁火邪引起者。《明医杂著》卷二："火郁嗽，为痰郁火邪在中，宜开郁消痰。用诃子及香附、瓜蒌仁、半夏曲、海石、青黛、黄芩为末，蜜调为丸。噙化。"又"若因肺胃蕴热、痰气不利，宜用前药。若因脾肺不清，气郁痰滞，用二陈加山栀、枳壳、桔梗。若因郁结伤脾，气血虚损，用济生归脾加山栀、桔梗。若因怒动肝火，脾土受克，用四君子加山栀、柴胡。若劳役失宜，伤损元气，用补中益气加山栀、桔梗。"《赤水玄珠》卷七："火郁嗽用诃子、海石、瓜蒌仁、青黛、半夏曲、香附以开之。"参火嗽，郁嗽、热嗽、咳嗽等条。

火泄 病证名。又称火泻、热泄。《证治汇补·泄泻》："火泄者，暴注下迫，焦黄秽臭。"《杂病源流犀烛·泄泻源流》："又有火泄，即热泄。脉数实，腹痛肠鸣，口干喜冷烦渴，小便赤涩，后重如滞，泻水，痛一阵，泻一阵，泻后尚觉涩滞，仲景谓之协热自利是也。宜黄芩芍药汤。"参热泻、火泻条。

火泻 病证名。又称热泻、火泄、协热自利。《万病回春·泄泻》："火泻者，腹中痛一阵泻一阵，后去如汤，后重如滞，泻下赤色，小水短赤，烦渴脉数是也。"《医学入门》卷五："火泻，实火口渴喜冷，痛一阵，泻一阵，肛门焦痛，其来暴速稠粘，五苓散去桂加黄连、芍药，或黄芩汤加木通六一散。"参热泻、火泄条。

火炎上喘 病证名。见《丹溪心法·喘》。即火喘。又名火炎肺胃喘。详该条。

火炎肺胃喘 病证名。见《医学入门·痰类》。又名火喘、火炎上喘。详各该条。

火胀 鼓胀之一。《张氏医通·鼓胀》："如面色枯槁，肢体消瘦，单腹胀急而块垒不平者，皆属火胀，此非水肿，无虑助肾水之邪也。若脉弦细涩，虽能饮食，终亦必亡。火肿误服金匮肾气等药，急投连、柏、金铃、白芍之类，仍用桂、附少许，为热因热用之响导，庶可挽回。若喘泻肢枯，脉无胃气者，不救。"参鼓胀条。

火热头痛 火头痛的别称。《医林绳墨·头痛》："有心烦头痛，病出于耳，其络在于手足少阳二经。其症自耳前后痛连耳内，痛甚则心烦。治宜黄连、山栀之属，泻之则愈，此为火热之头痛也。"详火头痛条。

火病结核 病证名。《红炉点雪》卷二："火病结核。夫结核者，相火之所为，痰火之征兆也。凡人病此不知预治，鲜有不致危者，何也？盖以肾水先亏，相火随炽，熏迫津液，凝聚于皮肤之下，肌肉之上，似疬非疬，不红不肿，不甚痛苦，久而乃溃，人多怠忽。其为证也，初或寒热似疟，形容憔悴，久则肌肉渐消，咳嗽失血，潮汗遗滑等证，……倘因循失治，致于肌肉脱尽，形体尪羸，块腐核烂。"参痨瘵各条。

火黄 三十六黄之一。《太平圣惠方》

卷五十五："火黄者，遍身如火色，两腋下有赤点子，状如粟米或如麦麸。其点子紫色多，黑色少者可治。黑色多，紫色少者难治。"《圣济总录》卷六十一："病人先体热身赤，午后却凉，遍身有赤点起，宜烙脚心、背心、手心、百会、下廉即差。如生黑点，不可疗也，如无黑点，宜服紫草汤。"参黄疸有关条。

火喘 病证名。见《医林绳墨·喘》。又名火炎上喘，或火炎肺胃喘。指火炎上行，气粗而盛的气喘。《丹溪心法·喘》："戴云，火炎上喘者，乍进乍退，得食则减，食已则喘。"本证多因胃有实火，膈有稠痰，痰火上冲，肺气不降所致。治宜清火涤痰，清肃肺气为主。方如导痰汤、白虎汤加枳壳、黄芩、瓜蒌仁等药。火喘亦有因冲脉之火上逆而作者。《东医宝鉴·喘》："平居则气平和，行动则气促而喘者，是冲脉之火上攻也。"参热喘、阴虚喘、真元耗损喘条。

火痰 痰证之一。❶《医学入门》卷五："痰病尤多生于脾，……留于胃脘，多呕吐吞酸，嘈杂上冲，头面烘热，名曰火痰。"❷即热痰。见《杂病源流犀烛·痰饮源流》。详该条。❸即外感燥痰。见《症因脉治·痰症论》。详该条。

火嗽 病证名。指火盛犯肺引起的咳嗽。又称火热嗽、火咳。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："火嗽，火热嗽也。其脉洪数，必兼面赤，烦渴引饮，有声痰少。或由肺家积热，宜清肺饮；或由伤寒潮热，痰盛，胸胁痛，宜柴胡枳桔汤；或由火郁肺胀，气急息重，宜海青丸。盖以肺肾二经乃人身之化源。二经有亏，则化源绝。故痰火益盛，而嗽发不止也。宜滋阴清化丸。"参火咳、火热嗽、咳嗽条。

火嘈 嘈杂之一种。《景岳全书·杂证谟》："大抵食已即饥，或虽食不饱者，火嘈也。"治宜清火。可用和中汤、三圣丸、左金丸等方。参嘈杂条。

心下支结 证名。指胃脘部有物支撑之感。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："伤寒六七日，发热，微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。"《伤寒论今释》卷四："其鞕满甚微，按之不痛者，此为支结。支结乃烦闷之意耳。……心下支结，即胸胁苦满，心下痞鞕之轻者。"

心下否痛 证名。心下，即胃脘部。否通痞。指胃脘部痞塞胀闷疼痛。出《素问·五常政大论》。又称心下痞痛。伤寒误下，痰凝气滞，湿阻食积及气虚不运等皆可导致。参心下痞、胃脘痛等条。

心下坚筑 证名。指脘部痞闷而悸动有力。多因水气凌心所致。《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》："水在心，心下坚筑，短气，恶水不欲饮。"参心痛条。

心下急 证名。指心窝部有迫急不舒感。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤；呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤下之则愈。"

心下悸 证名。❶自觉近膻中处悸动不适。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。《伤寒溯源集》卷一："所谓心下悸也，盖心之下，胃脘之上，鸠尾之间，气海之中，《灵枢》谓膻中为气之海也。"多因阳气虚，水饮内停上凌于心所致。治宜温阳利水，用真武汤、桂枝甘草汤、茯苓甘草汤等方。❷亦指心悸。《张氏医通》卷六："悸即怔忡之谓。心下惕惕然跳，筑筑然动，怔怔忡忡，本无所惊，自心动而不宁，即所谓悸也。……心下悸有气虚血虚、属饮属火之殊。"参心悸、怔忡条。

心下痞 证名。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。指胃脘满闷，按之柔软不痛者。多因伤寒表邪未解，误用下法，或内伤元气不足，痰湿、郁热蕴结所致。《注解伤寒论》卷四："无热恶寒者，发于阴也，而反下之，表中之阴入里，结于心下为痞。"若

误下后，心下痞，气逆呕吐者，宜用半夏泻心汤；又见胃中虚弱者，宜用甘草泻心汤；若误下后，心下痞，阳气不足者，宜用附子泻心汤。《丹溪心法·痞》："如禀受充实，面苍骨露，气实之人而心下痞者，宜枳实、黄连、青皮、陈皮、枳壳；如禀受素弱，转运不调，饮食不化而心下痞者，宜白术、山查、曲蘖、陈皮；如肥人心下痞者，乃是湿痰，宜苍术、半夏、砂仁、茯苓、滑石；如瘦人心下痞者，乃是郁热在中焦，宜枳实、黄连、葛根、升麻；如食后感寒，饮食不化，心下痞，宜藿香、草豆蔻、吴茱萸、砂仁。"《寿世保元·痞满》："内伤元气脾胃而作心下痞者，宜大补元气也，服加减补中益气汤。如脉缓有痰而痞，加半夏、黄连；脉弦，四肢满闭，便难而心下痞，加黄连、柴胡、甘草；大便闭燥，黄连、桃仁，少加大黄、归身；心下痞，腌闷，加白芍、黄连；心下痞，腹胀，加白芍、砂仁、五味子。……一切心下痞，及年久不愈者，宜用大消痞丸。"参痞、心下痞满等条。

心下痞痛 证名。见《内经吴注》卷二十。即心下否痛。详该条。

心下痞硬 证名。一名心下痞鞕。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。指胃脘部有堵塞满闷不适感而按之硬满者。多因胃气虚弱，邪气逆结所致。治当扶胃攻邪。因协热利不止，心下痞鞕，表里不解者，桂枝人参汤；汗出胃虚，客气上逆，心下痞鞕，干呕食臭，胁下有水气，腹中雷鸣下利者，生姜泻心汤；下后胃虚，客气上逆，下利日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞鞕，干呕心烦者，甘草泻心汤；心下痞鞕，噫气不除者，旋复代赭汤；痞不解，燥渴，小便不利者，五苓散；心中痞鞕，吐呕下利者，大柴胡汤（见《伤寒补天石·结胸痞气第五》）。参痞、心下痞等条。

心下痞满 证名。见《脾胃论》卷下。指胸脘部痞塞胀满。多因气滞郁结所致。《古今医鉴·痞满》："因忧郁气结于中脘，腹中微痛，心下痞满，不思饮食。"治用木香化滞汤、散滞气汤等。若心下痞满，壅滞不散，喘促不安，可用黄连消痞丸等方。参痞、心下痞等条。

心下痛 证名。心下即胃脘部，因胃脘位于心窝下，故名。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之后鞕者，大陷胸汤主之。"参结胸、心痛、胃脘痛条。

心下满 证名。见《伤寒论·太阳病脉证并治》。指胃脘部痞闷胀满的症候。《伤寒全生集》："凡心下满，以手按之则散而软者此虚气也。如不发热者，以木香和中汤主之；若发热者，以小柴胡加枳实姜炒黄连去黄芩治之；若按之汩汩有声而软者，此停水也，用小半夏汤合减桂五苓散主之；若按之硬痛者，有宿食也，轻则消导，重则用承气下之。"

心中风 古病名。又名心脏中风。指风邪入中于心经而致的症候。主症为发热，不能起，或但偃卧不可倾侧等。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》："心中风者，翕翕发热，不能起，心中饥，食即呕吐。"《诸病源候论·风病诸候》："心中风，但得偃卧，不得倾侧，汗出，……。"参心脏中风条。

心中寒证 指心受寒邪所致的病症。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》："心中寒者，其人苦病心如噉蒜状，剧者心痛彻背，背痛彻心，譬如蛊注。"《三因极一病证方论·五脏中寒证》："心中寒之状，……恶寒，四肢厥，自吐，少间，顷时复发，休作不已，昏塞不知人。"治宜散寒通阳为主。《圣济总录》治心中寒，心背彻痛，用茱萸丸、吴茱萸汤。《证治准绳·杂病》："心中寒者，……治当审微甚。甚则以姜附汤为主，微则不换金正气散加附子，附子五积散。"

心中懊恼（ào náo奥挠） 证名。即心中懊侬。《医经小学》："心中懊恼，反覆颠倒不安，心乱如有所失也。"详心中懊侬条。

心中懊侬 证名。简称懊侬。又名心中懊恼。指心胸烦热，闷乱不宁之状。多由外感热病误治，邪热留于胸膈，扰及胃腑；或因湿热内蕴所致。《伤寒论·辨太阳病脉证并治法》："发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反覆颠倒，心中懊侬，栀子豉汤主之。"若太阳表证未解，下后成结胸者，用大陷胸汤。或阳明病下之，心中懊侬而烦，胃中有燥屎者，可攻，宜大承气汤。又《金匮要略·黄疸病脉证并治》："酒黄疸，心中懊侬，或热痛，栀子大黄汤主之。"《伤寒绪论·懊侬》："温热病懊侬，为热毒蕴于膈上，凉膈、解毒选用。"

心中憺（dàn淡）憺大动 证名。出《灵枢·经脉》。憺，通惮，震动之意。指心剧跳不安之状，属心悸之重症。详**怔忡**条。

心手少阴经病证 病证名。指手少阴心经经气异常而致的病症。《灵枢·经脉》："心手少阴之脉，……是动则病嗌干，心痛，渴而欲饮，是为臂厥。是主心所生病者，目黄，胁痛，臑臂内后廉痛厥，掌中热痛。为此诸病，盛则泻之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。"《脉经·心手少阴经病证》除上列"是动，所生"病外，还列举了善悲、喜笑不休、烦心短气、手掌烦热、不得卧等症。参心病有关各条。

心气虚不得卧 内伤不得卧之一。指心气虚怯，心神失守所致的不寐症。《症因脉治》卷三："二便时滑、目漫神清、气怯倦怠、心战胆寒、时时欲睡、睡中自醒、喜热恶冷，此心气虚不得卧之症也。"宜用人参养荣汤、归脾汤。肝肾脉迟者，八味丸。左关脉弱者，补肝散等方。参不寐条。

心风 病名。❶指心受风邪所致的病患。《素问·风论》："心风之状，多汗恶风，焦绝，善怒嚘，赤色，病甚则言不可快，诊在口，其色赤。"《奇效良方》治风中于心，用远志汤。❷癫疾之一。见《太平圣惠方》卷四。多由情志抑郁，所欲不遂，心脾两虚，气血不足，或痰浊阻滞，神不守舍所致。症情较一般癫疾稍轻。《证治要决·癫狂》："心风者，精神恍惚，喜怒不常，无语，时或错乱，有癫之意，不如癫之甚。"治宜补益心脾，化痰宣窍，清心安神。选用归脾汤、养心汤、定志丸，痰盛热甚者，用星香散、寿星丸或清心汤等方。

心水 五脏水肿病之一。《金匮要略·水气病脉证并治》："心水者，其身重而少气，不得卧，烦而躁，其人阴肿。"多因心阳虚而水气凌心所致。《千金要方》用茯苓甘草汤、苓桂术甘汤等治疗。参见水肿、十水条。

心主手厥阴经病证 病证名。指手厥阴心包经经气异常而致的病症。《灵枢·经脉》："心主手厥阴心包络之脉，……是动则病手心热，臂肘挛急，腋肿，甚则胸胁支满，心中憺憺大动，面赤，目黄，喜笑不休。是主脉所生病者，烦心，心痛，掌中热。为此诸病，盛则泻之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。"参手少阴心经条。

心包络咳 病名。指咳嗽时心胸部隐痛者。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："心包络咳，心胸间隐隐作痛，宜以心经药治之。如丹皮、山栀、肉桂等。"参心经咳嗽、咳嗽条。

心动悸 证名。指患者不仅自觉心悸，或可察见心前搏动，"其动应衣"。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："伤寒，脉结代，心动悸，炙甘草汤主之。"《伤寒溯源集》卷二："因气血虚衰，心神摇动，气馁而惕惕然悸动也。此为阴阳并虚，法当气血兼补，故以炙甘草汤主之。"参见心悸、怔忡条。

心虫病 病名。心虫即蛔虫。《普济本事方·诸虫飞尸鬼疰》："心虫曰蛔。"即蛔虫病。详该条。

心伤 出《灵枢·邪客》。指心脏伤损的疾患。《脉经》卷六："愁忧思虑则伤心，心伤则苦惊，喜忘，善怒。"《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》："心伤者，其人劳倦，即头面赤而下重，心中痛而自烦发热，当脐跳，其脉弦，此为心脏伤所致也。"参脉极、七伤条。

心血虚不得卧 内伤不得卧之一。指用心过度，心血耗损所致的不寐症。《症因脉治》卷三："心血虚不得卧之症，心烦躁乱，夜卧惊起，口燥舌干，五心烦热。此心血不足，心火太旺之证也。"治宜壮水之主，以制阳光。用归芍天地煎，黄连安神丸。虚人，天王补心丹。"参不寐条。本证可见于神经衰弱、心脏神经官能症等疾患。

心汗 病名。《丹溪心法·盗汗》。指心窝部多汗。《医林绳墨·汗》："又有心汗者，当心膻中，聚而有汗。"因忧思惊恐，伤及心脾所致。治宜补养心脾，敛神益气，选用生脉散、归脾汤、补心丹、茯苓补心汤等方。

心劳 病名。因劳损伤心所致。《诸病源候论·虚劳病诸候》："心劳者，忽忽喜忘，大便苦难，或时鸭溏，口内生疮。"《三因极一病证方论·五劳证治》："心劳实热，口舌生疮，大便闭涩不通，心满闷，小肠热。"可用泄热汤等。又"心劳虚寒，惊悸，恍惚多忘，梦寐惊魇，神志不定。"可用定心汤等。《医醇賸义·劳伤》："心劳者，营血日亏，心烦神倦，口燥咽干，宜调补营卫，安养心神，宅中汤主之。"参虚劳、五劳条。

心忪 即怔忡。《伤寒明理论》卷二："悸者，心忪是也。筑筑惕惕然动，怔怔忪忪，不能自安者是矣。"详怔忡条。

心郁 五脏郁证之一。《赤水玄珠》卷十一："心郁者，神气昏昧，心胸微闷，主事健忘。治宜肉桂、黄连、石菖蒲。"参五脏郁证条。

心胀 胀病之一。《灵枢·胀论》："心胀者，烦心，短气，卧不安。"《医醇賸义·胀》："心本纯阳，寒邪来犯，阴阳相战，故烦满短气而卧不安也，治之之法，但须发其神明，推荡邪气，使浮云不能蔽日，自然离照当空，太阳之火不烦补助也，离照汤主之。"参胀病条。

心疟 五脏症之一。《素问·刺疟篇》："心疟者，令人烦心甚，欲得清水，反寒多，不甚热，刺手少阴。"治宜桂枝黄芩汤、甘草汤等。参五脏疟条。

心疝 古病名。指心痛、唇口变青、四肢逆冷之症。出《素问·脉要精微论》。多因阴寒之气上冲于心所致。《诸病源候论》卷二十："疝者痛也，由阴气积于内，寒气不散，上冲于心，故使心痛，谓之心疝也。其痛也，或如锥刀所刺，或阴阴而痛，或四支逆冷，或唇口变青，皆其候也。"治宜温散寒邪，方用牡丹丸、橘皮益智汤等方。

心风疝 古病名。《素问·四时刺逆从论》："阳明有余，病脉痹，身时热；不足病心痹；滑则病心风疝。"《类经》卷十七："滑则燥热生风，热则主于心也，故为心风疝。"参风疝条。

心实证 指心病因邪气盛实所出现的证候。多由实热、痰火犯心等所致。《脉经》卷二："心实也，苦心下有水气，忧恚发之。"又"心实，……病苦闭大便不利，腹满，四肢重，身热，苦胃胀。"《本草经疏》："心实，即实火、实热之证。谵语，属心家邪热，舌破，属心火，烦躁，属心家邪热及心火内炎，自笑，属心家有热邪，发狂，属心家有邪热甚。"方用茯神汤、石膏汤、泻心汤等方。参心病、心实热证等条。

心实热证 证名。指心经邪热炽盛的病证。《备急千金要方》："病苦闭，大便不

利，腹满，四肢重，身热，名曰心实热也。”《太平圣惠方》卷四：“夫心实则生热，热则阳气盛，阳气盛则卫气不行，荣气不通，遂令热毒稽留，心神烦乱，面赤身热，口舌生疮，咽燥，头疼，喜笑，恐悸，手心热，满汗出，衄血，其脉洪实相搏者，是其候也。”《三因极一病证方论·心小肠经虚实寒热证治》：“心实热，心下痞满，身重，发热，干呕不安，腹中雷鸣，泾溲不利，水谷不消，欲吐不吐，烦闷，喘急。”或伴有夜眠不安，体背生疮，甚则发狂等。治宜泻心清热为主。选用竹沥汤、黄连泻心汤等方。

心经失血 病证名。见《不居集》卷十三。多由惊恐或劳心过度所致。症见咯出血丝或小量鲜血，胸膈隐隐牵痛，懊侬嘈杂。治宜补心养营，方如茯苓补心汤、五神汤、天门冬汤等方，以及丹参、麦冬、山药、当归、生地等药。参失血条。

心经咳嗽 病名。指心火妄动，金被火灼或心血心气不足所致的咳喘。《症因脉治·内伤咳嗽》：“心经咳嗽之症，咳则心痛，喉中解解如梗状，甚则舌肿咽痛。”多因心火妄动，金被火囚，肺叶焦满，或心血不足，心气亏损所致。治宜选用导赤各半汤、朱砂安神丸、家秘泻白散、人参平肺散等方。《校注医醇賸义·咳嗽》：“心经之咳，痰少心烦，夜不成寐，玄妙散主之。”参见咳嗽、心咳条。

心经热痰 痰证之一。即热痰。见《不居集》卷十七。详见该条。

心咳 病名。❶指咳则心痛、咽梗或肿者。《素问·咳论》：“心咳之状，咳则心痛，喉中介介如梗状，甚则咽肿喉痹。”治用桔梗汤；心经火郁者，用导赤各半汤、凉膈散去硝黄加黄连、竹叶；风温袭肺，引动心包火逆者，用心咳汤等。参见心经咳嗽条。❷十咳之一。《诸病源候论·咳嗽病诸候》：“五曰心咳。咳而唾血，引手少阴是也。”治宜刺手神门。参见十咳、咳嗽条。❸五嗽之一。见《三因极一病证方论》卷十二。参见五嗽条。

心浊 溺浊之一。见《世医得效方·大方脉科》。多由思虑太过，伤及心神所致。症见小便浑浊，或赤或白，精神恍惚，恐怖，健忘，心悸怔忡，心烦少寐，梦遗等。治宜养心安神。用瑞莲丸、加味清心饮、宁志膏、妙香散等方。心虚有热者，宜清心莲子饮。参见便浊条。

心绝 五脏绝候之一。❶指心气绝而出现的危重脉证。《华氏中藏经》卷上：“面黑，无左寸脉者，心绝也。”《注解伤寒论·辨脉法》：“阳反独留，形体如烟薰，直视摇头，此心绝也。”《脉经》卷四：“病人心绝一日死，何以知之？肩息回视立死（一曰目亭亭一日死）。”参见五绝条。❷指中风脱证之一。《医林绳墨·中风》：“设若口不能言者，心绝也。”《医宗必读·真中风》：“中风昏倒……若口开心绝。”参中风脱证条。

心损 五脏虚损之一。又称损心。《难经·十四难》：“二损损于血脉，血脉虚少，不能荣于五藏六府也。”又“损其心者，调其荣卫。”虞庶注：“心主血，血为忧愁思虑伤于心，因兹致损。”《杂病源流犀烛·虚损劳瘵源流》：“损心伤神，血脉不荣，急调荣卫，宜八珍汤。”参虚损条。

心热证 证名。《素问·痿论》：“心热者，色赤而络脉溢。”《圣济总录》卷四十三：“大抵心属火而恶热，其受病则易以生热，热则血气壅滞，故为烦躁，寝卧不得安宁，口舌生疮，头痛颊赤之类。”《证治准绳·杂病》：“心热者，……微按至皮毛之下则热，少加力按之则全不热，是热在血脉也。日中大甚，乃心之热也。”心热有虚实之分。参心虚热证、心实热证条。

心热病 证名。❶指心受邪热所致的病症。《素问·刺热篇》：“心热病者，先不乐，数日乃热，热争则卒心痛，烦闷善呕，头痛，面

赤，无汗，……。”❷指心痛。《杂病源流犀烛·心病源流》：“心痛，心热病也。经曰：诸痛痒疮疡，皆属心火。其发于他经者，且莫不由于心火，况本经积热，而即发于本经部位者乎。其所以致热之故，则必其平日好饮酒，或嗜食辛辣热物，以致日久凝聚而生此证也。宜先用凉血饮，次服加味十奇散。”

心热痿软 病证名。指心火上炎，耗伤阴血所致的痿症。《症因脉治》卷三：“心热痿软之症，四肢关节不能活动，足胫纵缓，不能收持，如枢纽之折，而不能提挈，面颊常赤，心烦意乱，此《内经》心热痿软之症也。”治宜清心、滋阴、降火。可用导赤各半汤、泻青丸、六味丸合丹溪大补丸等方。参痿、脉痿条。

心积 五积之一。《难经·五十六难》：“心之积，名曰伏梁。起脐上，大如臂，上至心下，久不愈，令人病烦心。”《脉经·平五脏积聚脉证》：“诊得心积，脉沉而芤，上下无常处，病胸满悸，腹中热，面赤，嗌干，心烦，掌中热，甚即唾血。”《三因极一病证方论》卷八：“心积，名曰伏梁。”“伏梁圆治心之积，起于脐下，上至心，大如臂。久久不已，病烦心，身体髀股皆肿，环脐而痛，其脉沉而芤。”也可用大七气汤加石菖蒲、半夏，兼吞伏梁丸（见《证治准绳·杂病》）。参伏梁条。

心脏中风 病名。亦称心中风。泛指风邪中于心而发生的症候。《太平圣惠方·治心脏中风诸方》：“夫体虚之人，腠理疏泄，风邪外伤，搏于血脉。入于手少阴之经，则心神颠倒，言语謇涩，舌强口干，面赤头痛，翕翕发热，胸背拘急，手心热盛，但多偃卧，不得倾侧，忪悸汗出，恍惚不安，此皆风邪伤于心经，致有斯候，故曰心中风也。”参见心中风条。

心病 病名。指心脏的各种病证。有寒热虚实之分。心为火脏，主血脉，又主神明，开窍于舌。心病多由病邪内侵，或痰迷心窍、水饮凌心，或气滞血瘀，或心气心血不足所致。《素问·藏气法时论》：“心病者，胸中痛，胁支满，胁下痛，膺背肩胛间痛，两臂内痛。”《难经·十六难》：“假令得心脉，其外证面赤，口干，喜笑；其内证脐上有动气，按之牢若痛，其病烦心，心痛，掌中热而唿，有是者心也。”《脉经》卷六：“心病，其色赤，心痛短气，手掌烦热，或啼笑骂詈，悲思愁虑，面赤身热，其脉实大而数，此为可治。”《诸病源候论·心病候》：“心气不足，则胸腹大，胁下与腰背相引痛，惊悸恍惚，少颜色，舌本强，善忧悲，是为心气之虚也。”《太平圣惠方·心脏论》：“夫心虚则生寒，寒则阴气盛，阴盛则血脉虚少，而多恐畏，情绪不乐，心腹暴痛，时唾清涎，心膈胀满，好忘多惊，梦寐飞颺，精神离散，其脉浮而虚者，是其候也。”又“夫心实则生热，热则阳气盛，阳盛则卫气不行，荣气不通，遂令热毒稽留，心神烦乱，面赤身热，口舌生疮，咽燥头疼，喜笑，恐悸，手心热，满汗出，衄血，其脉洪实相搏者，是其候也。”《本草纲目·脏腑虚实标本用药式》：“心藏神为君火，包络为相火，代君行令，主血，主言，主汗，主笑。本病，诸热瞀瘛惊惑，谵妄烦乱，啼笑，骂詈，怔忡，健忘，自汗，诸痛痒疮疡。标病，肌热，畏寒，战栗，舌不能言，面赤目黄，手心烦热，胸胁满痛，引腰背肩胛肘臂。”《杂病源流犀烛·心病源流》：“心主血，血即精也。心气原自有余，特精伤而失血，心便不足，故血甚则神明湛湛，血衰则志气昏蒙。凡火之有余，皆由血之不足，而血之不足又能使火益就衰也，然则心病之有余不足，讵得与运气司天之火淫、火郁，徒属乎火者同视哉，亦惟握精以固其气，养阴以凝其神，以调剂其有余不足，使归于和而已。……以心为血脉之主，故其实其虚皆不见本脏而在血脉，其在血脉，必先于在经

络者病之也。若胸腹腰胁时皆心与心包之所在，故先病于本经也，其虚而腹胸大，则缘脾胃不上纳气于心而然，虚而胁下与腰相引痛，又缘肝肾不上贡精于心而然，此其病非止于本经络，可由本经络而推者也。”治宜清心泻火，清心开窍，滋阴降火，或养心安神，益气补血，以及活血化瘀等法。参心病各条。

心疸 病名。❶九疸之一。《外台秘要》卷四：“心瘴，烦心，心中热，葛根主之。”❷《辨证奇闻》：“心疸之症，烦渴引饮，一饮水即停于心之下。时作水声，胸前时多汗出，皮肤尽黄惟两目独白、人以为黄疸也，谁知是心中虚热以成之乎。”治宜“补肝气以生心，泻其火湿以逐热。”方用泻肝利湿汤。参黄疸有关条。

心烦 证名。出《素问·五藏生成篇》。又名烦心。指心中烦热郁闷之状。烦多属热，亦有因于寒者。可见于外感、内伤多种病症。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“伤寒无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。”伤寒六经病多能见此。“阳明病，不吐不下，心烦者，可与调胃承气汤。”“少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。”《类证治裁·烦躁》：“伤寒热在表而烦，宜散，桂枝汤。在里而烦，宜下，承气汤。在半表半里而烦，宜和，小柴胡汤。在胸膈以上而烦，宜吐，栀豉汤。其阴寒而烦，则有恶寒蹉卧及下利厥逆、吐蚘之症，宜温，温用四逆汤，蚘用乌梅丸。”又：“如内伤阴虚火动而烦，宜生脉散加生地黄、熟地黄、茯神、枣仁。或不得卧而烦，朱砂安神丸。”

心烦嗜睡痞 痞证之一。见《痞胀然犀照》。详痞烦、痞睡条。

心黄 三十六黄之一。❶《太平圣惠方》卷五十五：“心黄者，目赤，舌上生疮，心闷喘急，多言无度，或笑或嗔，微微汗出，口干舌短，起卧不安，神思恍惚，小便赤难，心下胀满，状如风火，悲哭，手乱捻物者难治。”治法用生地黄饮子、马牙消散等方。❷《圣济总录》卷六十一：“病人面赤，口张，气喘，多惊，饶睡，手脚烦疼，舌上疮生，心下急闷，不欲饮食，舌缩口干，七八日内必发狂走，即是心黄。”治用柴胡汤并加灸法。参黄疸有关条。

心虚自汗 病证名。见《证治汇补·汗病章》。多由心之气血不足，心液外泄所致。症见自汗，怔忡恍惚等。治宜补心养血为主。选用天王补心丹、当归补血汤、归脾汤等方。参自汗条。

心虚证 证名。指心气、心血不足所出现的证候。《脉经》卷二：“心虚，……病苦悸恐不乐，心腹痛难以言，心如寒状，恍惚。”《圣济总录》卷四十三：“心虚之状，气血衰少，面黄烦热，多恐悸不乐，心腹痛难以言，时出清涎，心膈胀满，善忘多惊，梦寐不宁，精神恍惚，皆手少阴经虚寒所致。”《本草经疏》：“心虚八证：惊邪，属心气虚；癫痫，属心气虚有热；不得眠，属心血虚有热；心烦，属心家有热；怔忡，属心血不足；心澹澹动，盗汗，属心血虚；汗者，心之液也；伏梁，属心经气血虚，以致邪留不去。”方用人参汤、丹砂茯神丸、山萸丸等。参心病、心虚寒证等条。

心虚热证 证名。❶指心经虚热的病症。《圣济总录》卷四十三：“治心虚热，多汗，熟干地黄汤方。”又“心藏虚热，惊悸心忪，虚乏气短，睡卧不安，茯神丸方。”❷劳热之一。《杂病源流犀烛·虚损劳瘵源流》：“心热，微按之皮毛之下，肌肉之上乃得，心主血脉也，日中尤甚。必兼烦心掌热而呕，善笑，善忘，善惊，不寐，筑筑然动，舌破，消渴，口苦，心胸间汗。”治宜养心清热为主。选用大五补丸、清心莲子饮等方。参劳热条。

心虚寒证 证名。指心气不足、心阳虚衰所出现的证候。《备急千金要方》卷十三：

“病苦悸恐不乐，心腹痛，难以言，心如寒，恍惚，名曰心虚寒也。”可伴见喜悲易愁，冷汗出等症。治宜补益气血，养心安神。选用茯苓补心汤、远志饮子等方。

心悬痛 证名。指心痛而兼悬荡感觉者。多因水饮或寒邪内留，气机上逆所致。《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证治》：“心中痞，诸逆，心悬痛，桂枝生姜枳实汤主之。”《金匮要略心典》：“诸逆，该痰饮、客气而言。心悬痛，谓如悬物动摇而痛，逆气使然也。桂枝、枳实、生姜，辛以散逆，苦以泄痞，温以祛寒也。”亦可由邪迫阳气，不得宣畅，壅瘀生热引起。《诸病源候论·心悬急懊痛候》：“其痛悬急懊者，是邪迫于阳气，不得宣畅，壅瘀生热，故心如悬而急烦懊痛也。”参心痛条。

心悸 证名。出《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。俗称心跳。简称悸。或谓怔忡，或谓重症称怔忡。指不因惊吓而自心跳不宁的疾患。由气血虚弱、痰饮内停、气郁血瘀等原因所致。因阳虚气弱而心悸者，症见心下空虚，状若惊悸，或先烦而后悸，脉大无力。治宜温阳益气。用小建中汤、真武汤等方。因阴血不足，血不养心而心悸者，兼见面色无华，舌淡脉细，若兼虚火，则五心烦热。治宜养血补心。用四物汤、朱砂安神丸等方。因水饮内停，水气凌心而心悸者，兼见胸脘痞满，头晕恶心，小便短少，苔白，脉弦。治宜通阳化饮。用苓桂术甘汤合小半夏汤加减。因痰郁而心悸者，兼见惊惕不宁，突然而作，时作时止，甚则心跳欲厥，脉滑大。治宜涤痰定悸。用温胆汤、茯苓饮子、简要济众方等。因气滞血瘀而心悸者，兼见短气喘息，胸闷，胸膺疼痛，舌色紫暗，脉结代。治宜活血理气。用血府逐瘀汤、失笑散等方。参怔忡、虚损怔忡、气郁怔忡、痰火怔忡、阴火怔忡、风惊悸等条。

心悗（mèn闷） 证名。指心中烦乱而闷者。多由下元精气不足或血虚阴火炽盛引起。《灵枢·口问》：“下气不足，则乃为痿厥心悗。”《证治准绳·杂病》：“荣气不营，阴火炽盛，是血中伏火，日渐煎熬，血气日减，心包与心主血，血减则心无所养，致使心乱而烦，病名曰悗。”

心惊 证名。指肝血虚不能养心所致的惊症。《石室秘录·本治法》：“心惊非心病也，乃肝血虚而不能养心也。方用白芍五钱、当归五钱、熟地五钱、生枣仁一两、远志一钱、茯神三钱、麦冬五钱、北五味一钱、人参二钱、水煎服。”参惊条。

心遗 病名。指心病而致遗精的病症。《医宗必读》卷九：“心病而遗者，必血脉空虚，本纵不收。”因心病而遗精，多阴虚火旺，阳事易举。治宜养阴清心。可用天王补心丹等方。参遗精、五脏遗精条。

心跳心慌 证名。指心悸、怔忡。详心悸、怔忡条。

心掣 古病名。属怔忡之类。掣，牵引。以心悸掣动为主症，故名。多因心气虚寒，或胆与三焦之火传心所致。症见心动不宁，有牵引、紧缩感，甚则作痛，伴少气，咳呛或便泄。《素问·阴阳别论》：“一阳发病，少气，善咳，善泄，其传为心掣。”属于虚寒者，治宜益心气，温心阳，用调中汤（见《圣济总录》卷五十六）。火炽者，宜清火宁神，可用安神丸。

心脾中暑证 病证名。指感受暑邪而及心脾者。《证治汇补·暑症章》：“兼恶寒发热而渐厥者，为心脾中暑症。”参暑病条。

心脾郁 郁证之一。《类证治裁》卷三：“心脾郁，怔忡崩漏，归脾汤。”参五脏郁证条。

心痨 病名。❶即心劳。详见该条。❷《慎柔五书》卷四以虫在于心则成心痨。治以雷公丸等。

心痫 病名。出《备急千金要方》卷五。可表现为多种症状。《医学入门·痫》：“心痫，面赤，口张，摇头，马嘶。”《景岳全

书》卷四十一："面赤目瞪，吐舌啮唇，心烦气短，其声如羊者曰心痫。"《医林绳墨》卷六以痫症因惊而发，心烦闷乱，躁扰不宁，舌多吐出，涎沫满口，来时速而去亦速者为心痫。参痫、五脏痫条。

心痛 病证名。胸脘部疼痛的统称。出《灵枢·经脉》。❶指心前区或心窝部疼痛。《诸病源候论·心痛病诸候》："心痛者，风冷邪气乘于心也，其痛发，有死者，有不死者，有久成疹（通"疢"，病也）者。心为诸藏主而藏神，其正经不可伤，伤之而痛为真心痛，朝发夕死，夕发朝死。心有支别之络脉，其为风冷所乘，不伤于正经者，亦令心痛，则乍间乍甚，故成疹不死。"《赤水玄珠·心痛门》："今之治例，皆非真心痛也，以其在心之部位而名，或心之脉络，或手心主之脉络，……或食伤，或寒伤，或气逆，或痰饮，或死血，或虫，或郁火，皆致痛也。"❷指胃脘痛。《丹溪心法·心脾痛》："心痛即胃脘痛。"详胃脘痛有关条。古代文献对心痛有多种记载。如真心痛、厥心痛、九种心痛、冷心痛、热心痛、气心痛、血心痛、食心痛、饮心痛、失血心痛、蚘心痛、虫心痛、大实心痛、悸心痛等。详各该条。

心痛彻背 证名。指心痛（心前、心窝、胃脘等部位疼痛）引及背部者。除见于心痛、胃脘痛外，尚可见于胸痹等。《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证并治》："胸痹不得卧，心痛彻背者，栝蒌薤白半夏汤主之。""心痛彻背，背痛彻心，乌头赤石脂丸主之。"又该书在五藏风寒积聚病脉证并治篇中："心中寒者，其人苦病心如噉蒜状，剧者心痛彻背，背痛彻心，譬如蛊注。其脉浮者，自吐乃愈。"参胸痹及心痛、胃脘痛等条。

心痛疰 疰证之一。《疰胀玉衡·心痛疰》："疰毒冲心，属之于气，则时痛时止，痰涎壅盛，昏迷烦闷，此其候也。治宜刺手臂，服顺气之剂为主。疰毒攻心，属之于血，则大痛不已，昏沉不醒，此其候也。治宜刺腿湾，服活血之剂为主，迟则难救。"宜乌药顺气汤冷饮。参疰条。

心愦愦（kuì愧） 症名。出《伤寒论·辨阳明病脉证并治》。愦，昏乱之意。心愦愦是形容心中烦乱不能自主之状。

心痿 证名。即脉痿。《医宗必读·痿》："心痿者，脉痿也。"详脉痿条。

心痹 病名。由脉痹发展而成。亦有称为脉痹者。《素问·痹论》："心痹者，脉不通，烦则心下鼓，暴上气而喘，嗌干善噫，厥气上则恐。"《诸病源候论·心痹候》："思虑烦多，则损心，心虚故邪乘之，邪积而不去，则时害饮食，心里愊愊，如满，蕴蕴而痛，是谓之心痹。"《圣济总录·心痹》："脉痹不已，复感于邪，内舍于心，是为心痹。"《症因脉治·心痹》："心痹之症，即脉痹也。脉闭不通，心下鼓暴，嗌乾善噫，厥气上则恐，心下痛，夜卧不安。"治宜茯神汤、赤茯苓汤、秦艽汤、紫石英散、犀角散、导赤各半汤、朱砂安神丸、天王补心丹等方。

心蒸 二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

心嘈 证名。嘈杂的俗称。《杂病源流犀烛·嗳气嘈杂吞酸恶心源流》："嘈杂者，即心嘈。"详嘈杂条。

心瘧 古病名。指食入易消的疾患。《证治准绳·杂病》："心瘧，亦痰饮所致，俗名饮瘧。有胃口热，食易消，故瘧。《素问》谓之食瘧，亦类消中之状，俗名肚瘧。痰气，宜小半夏茯苓汤加枳实一钱；胃中热，宜二陈汤加黄连一钱，或五苓散去桂加辰砂。亦有病瘧呷姜汤数口，或进干姜剂而愈，此膈上停寒中有伏饮，见辛热则消。"参消中、中消条。

心匿（nì匿） 病证名。因脏气虚弱，肠虫攻蚀心所致。《诸病源候论·湿匿病诸候》："心匿者，由藏虚诸虫在肠胃间，因

虚而动，攻食心，谓之心蹙。初不觉他病，忽忽嗜睡，四支沉重。此蹙或食心，则心烦闷懊痛，后乃侵食余处。诊其脉沉而细，手足冷内湿，蹙在心也。”参湿蹙、疳蹙条。

〔尸〕

尺肤热　证名。指两手肘关节下至寸口部分的皮肤有发热感觉，即尺热。《灵枢·论疾诊尺》：“尺肤热甚，脉盛躁者，病温也。”《类经·脉色类》：“尺肤热者，其身必热，脉盛躁者，阳邪有余，故当为温病。”参发热、尺热条。

尺热　证名。指尺肤热。参发热、尺肤热条。

巴豆中毒　病名。因药服或误服巴豆过量而出现中毒症状者。症见口咽热痛，面赤，五心烦热，剧烈腹痛腹泻。严重者可致昏迷，黄疸，肾脏损害，甚至休克死亡。治疗宜中西医结合救治。《本草纲目》卷四载有解巴豆毒的药物，如黄连汁、菖蒲汁、甘草汁、葛根汁、白药子、黑豆汁、生藿汁、芦荟、冷水、寒水石等。文献又有食稀粥，并忌一切热性药物的记载，可参考。

水　❶古病名，即水肿。《素问·平人气象论》：“颈脉动，喘疾咳，曰水。目裹微肿如卧蚕起之状，曰水。”“足胫肿曰水。”❷指水肿的病因病理。《素问·阴阳别论》：“三阴结，谓之水。”王冰注：“三阴结，谓脾肺三脉俱寒结也，脾肺寒结，则气化为水。”❸五行之一。《素问·藏气法时论》：“五行者，金木水火土也。”五行以肾属水，故常肾水并称。详水肿、水病、浮肿等条。

水中病　古病名。见《诸病源候论·水毒候》。又称水毒病。详该条。

水气　❶古病名。指水肿。《素问·评热病论》：“诸有水气者，微肿先见于目下也。”《金匮要略》载有水气病，其中包括风水、皮水、正水、石水等。❷指水饮、痰饮。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“伤寒心下有水气，咳而微喘，发热不渴。服汤已，汤者，此寒去欲解也。小青龙汤主之。”参水肿各条。

水气喘促　病证名。即水喘。《杂病源流犀烛》卷一：“水气喘促，乃水气逆行乘肺，肺得水而浮，喘不能卧，气不宣通，当从小便去之。宜桂苓甘术汤，肾气丸。”参水喘条。

水分　病证名。❶指肾虚不能制水，水分流散于四肢而致的肢肿。《诸病源候论·水肿病诸候》：“水分者，言肾气虚弱不能制水，令水气分散，流布四支，故云水分，但四支皮肤虚肿聂聂而动者，名水分也。”❷指妇人先患水肿后月经闭止的病症。《金匮要略·水气病脉证并治》：“先病水后经水断，名曰水分。”参水肿、肢肿条。❸经穴名。属任脉。

水谷利　病名。指泄泻完谷不化者。《卫生宝鉴·泄痢门》：“饮食太过，肠胃所伤，亦致米谷不化，此俗呼水谷利也。法当下者举之而消克之也。加减木香散主之。”参飧泄条。

水谷痢　古病名。见《诸病源候论·痢病诸候》。❶指脾胃虚弱，不能消化所致的痢疾。《时病论》卷三：“水谷痢者，糟粕脓血杂下，腹中微痛，登圊频频，饮食少餐，四肢困倦，脉来细缓无力，或关部兼弦，此因脾胃虚寒，虚则不能健运，寒则不能消化也。”治宜健脾温中为主。❷指水土不伏所致的痢疾。又称不伏水土痢。详该条。❸指飧泄。《杂病源流犀烛·痢疾源流》：“飧泄亦曰水谷痢。”用保和丸、和胃丸等方。参飧泄条。

水郁　五郁之一。指水气郁阻之症。出《素问·六元正纪大论》。《证治汇补》卷二：“水肿胀满，二便阻隔，皆水郁也。治宜折之。折者制御之也，伐而挫之也，渐杀其势也。”《杂病源流犀烛》卷十八：“水

之本在肾，标在肺。实土可以制水，治在脾；壮火可以制水，治在命门；自强可以帅水，治在肾；分利可以泄水，治在膀胱。凡此皆谓之折。”可用折郁汤、补火解郁汤等方。不效者，或发汗，或通利二便。参五郁、郁证条。

水肿 病名。古代称水、水气，水病、水胀。出《素问·水热六论》。指体内水湿停留，面目、四肢、胸腹甚至全身浮肿的疾患。《灵枢·水胀》：“水始起也，目窠上微肿，如新卧起之状，其颈脉动，时咳，阴股间寒，足胫肿，腹乃大，其水已成矣。”本病的分类，《金匮要略·水气病脉证》：“病有风水，有皮水，有正水，有石水，有黄汗。”亦有以五脏而分，如心水、肺水、肝水、脾水、肾水等。后世又分为阳水、阴水两类。《丹溪心法·水肿》：“阳病水兼阳证者，脉必沉数；阴病水兼阴证者，脉必沉迟。……若遍身肿，烦渴，小便赤涩，大便闭，此属阳水，先以五皮散或四磨饮，添磨生枳壳，重则疏凿饮。若遍身肿，不烦渴，大便溏，小便少不涩赤，此属阴水，宜实脾饮或木香流气饮。”《景岳全书·水肿论治》：“凡水肿等证，乃脾、肺、肾三脏相干之病……。今肺虚则气不化精而化水，脾虚则土不制水而反克，肾虚则水无所主而妄行，水不归经，则逆而上泛，故传入脾而肤肉浮肿，传入肺，则气息喘急。”水肿治则：“诸有水者，腰以下肿，当利小便；腰以上肿，当发其汗。”实证，多由外邪侵袭，气化失常，治宜祛邪为主。用疏风，宣肺、利湿、逐水等法。如麻黄连翘赤小豆汤，越婢加术汤，五苓散等方。虚证，多由脾肾阳虚，不能运化水湿，治宜扶正为主，用温肾、健脾、益气、通阳等法。如真武汤合理苓汤等方。虚证常由阳证转变而来，病情常虚实夹杂，治应兼顾。亦须注意饮食起居的调护，如忌食、慎风寒等。参风水、石水、正水、皮水、里水、气水等各条。本病证可见于心源性水肿、肾病性水肿、肝病性水肿以及营养不良性水肿等疾患。

水胀 胀病之一。见《灵枢·五癃津液别篇》。《备急千金要方》：“水胀，胀而四肢面目俱肿。”《金匮翼·胀满统论》：“脾土受湿，不能制水。水渍于肠胃，而溢于皮肤，漉漉有声，怔忡喘息，即为水胀是也。”治疗初起时宜去其水，葶苈木香散，久则宜补其脾土以制其水，用中满分消丸。参水鼓条。

水疝 病名。指阴囊汗湿并出黄水或肿如水晶的一种疝症。多由寒湿下注所致。《儒门事亲》卷二：“水疝，其状肾囊肿痛，阴汗时出，或囊肿而状如水晶，或囊痒而燥出黄水，或少腹中按之作水声。得于饮水醉酒，使内过劳，汗出而遇风寒湿之气，聚于囊中，故水多令人为卒疝。宜以逐水之剂下之。”治宜禹功散加肉桂末，或用胃苓汤（见《重订通俗伤寒论》）。

水泄 病证名。见《素问玄机气宜保命集·泻论》。即水泻。《杂病源流犀烛·泄泻源流》：“水泄、肠鸣如雷，一泄如注，皆是水。”详水泻条。

水注 九注之一。《诸病源候论·水注候》：“人肾虚受邪，不能通传水液故也。肾与膀胱合，俱主水，膀胱为津液之府，肾气下通于阴，若肾气平和，则能通传水液，若虚则不能通传，脾与胃合，俱主土，胃为水谷之海，脾候身之肌肉，土性本克水，今肾不能通传则水气盛溢，致令脾胃翻弱不能克水，故水气流散四肢，内溃五藏，令人身体虚肿，腹内鼓胀，淹滞积久，乍瘥乍甚，故谓之水注。”参九注条。

水泻 病证名。又称水泄、注泄、泄注、注下。《圣济总录》卷七十四：“脾胃怯弱，水谷不分，湿饮留滞，水走肠间，禁固不能，故令人腹胀下利，有如注水之状，谓之注泄，世名水泻。”《太平圣惠方》卷五十九：“若肠胃虚弱受于气，或饮食生冷伤于脾胃，大

肠虚寒，故成水泻也。”可用厚朴丸，香连散等方。湿泻，寒泻、热泻等皆可表现为水泻。详各该条。

水毒病 古病名。泛指山溪河流中水毒侵入人体所致的疾患。多流行于江南地带。《诸病源候论·水毒候》：“自三吴已东及南诸山郡、山县，有山谷溪源处，有水毒病，春秋辄得。一名中水，一名中溪，一名中灑，一名水中病，亦名溪温。”症见恶寒、头微痛，目眶痛，心中烦懊，骨节皆强，筋急，两膝疼痛，或嗢嗢热但欲睡，旦醒暮剧，手足指逆冷至肘膝，或见身体发赤斑，或有下部生疮，不痛不痒，脓溃，或热盛下注，不食狂语，下血物如烂肝等。本病可见于急性血吸虫病等。

水啾（xǔ诩）咳 病症名。指肺有水饮而呻吟喘咳。《不居集》卷十五：“水啾咳者，水停肺而啾喘咳嗽也。”用芫花末和米粉糊成颗粒煮食。详水咳、咳嗽条。

水咳 病证名。指咳嗽由水饮凌肺引起者。《医学入门》卷四：“水咳，因饮茶水停蓄，为涎上涌，身热，胸满、怔悸者，小青龙汤；身寒胁硬者，玄武汤；结胸者，小半夏汤。……小便闭者，十枣汤；小便涩者，五苓散。”《伤寒六书·咳嗽》：“其水咳三证，不可不辨。小青龙，太阳之表水也；十枣汤，太阳之里水也；真武汤，阴证之水气也。盖水与表寒相合而咳，则小青龙当汗之，水与里寒相合而咳，则真武汤温之，里癖合水动肺而嗽，十枣汤所以下之也。”参咳嗽条。

水逆 病名。出《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。太阳中风，发热，心烦，渴欲饮水，如水入即吐，称为水逆。因内有伏饮所致。宜通阳利水，用五苓散。《伤寒论条辨》卷一：“伏饮内作，故外者不得入也。盖饮亦水也，以水得水，涌溢而为格拒，所以谓之曰水逆也。”《张氏医通·诸呕逆门》：“渴欲饮水，水入即吐者，名曰水逆，五苓散；气虚，四君子去甘草，加枳、橘、生姜；不应，六君子换赤茯苓，用伏龙肝煮汤，澄清代水，煎药。”

水结胸 ❶指结胸之一。指水邪结于胸胁者。《注解伤寒论》卷四：“但结胸无大热者，非热结也，是水饮结于胸胁，谓之水结胸。周身汗出者，是水饮外散，则愈；若但头微汗出，余处无汗，是水饮不得外泄，停畜而不行也，与大陷胸汤以逐其水。”《伤寒全生集·辨伤寒结胸》：“若心下怔忡，头汗出，无大热、先渴后闷痛，揉之有声汩汩者，名水结胸，用半夏茯苓汤。”❷即结胸。《伤寒来苏集·陷胸汤证》：“水邪热邪结而不散，故名曰结胸。粗工不解此义，竟另列水结胸一症，由是多岐滋惑矣。不思大陷胸汤丸，仲景用甘遂、葶苈何为耶？”参结胸条。

水哮 病证名。指痰水蓄肺所致之哮症。《医学入门·哮》：“水哮者，因幼时被水停蓄于肺为痰。”《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》：“有水哮，宜水哮方。”症见咳喘哮吼，唾清稀痰沫，胸胁疼痛或见形肿呕吐等。治宜祛水饮、肃肺气为主，如小青龙汤、金沸草散、导水丸等均可选用。

水积 九积之一。指多饮汤水成积者。《儒门事亲》卷三：“水积，足胫胀满，郁李、商陆之类，甚者甘遂、芫花。”《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“水积，多饮汤水成积，胸胁引痛，沥洛有声也。宜牵牛子、甘遂、茯苓、猪苓，方用五苓散、十枣丸、破积导饮丸。”参积条。

水病 病名。❶指水肿病。《素问·水热穴论》：“故水病下为胻（hēng衡。脚胫）肿大腹，上为喘呼。”《备急千金要方》卷二十一：“凡水病之初，先两目上肿起如老蚕色，侠颈脉动，股里冷，胫中满，按之没指，腹内转侧有声，此其候也。”《诸病源候论·水肿病诸候》：“水病者，由肾脾俱虚故也。肾虚不能宣通水气，脾虚又不

能制水，故水气盈溢，渗液皮肤，流遍四支。”详水肿条。❷指单腹胀。《外台秘要》卷二十：“深师疗三焦决漏，水在胁外，名曰水病，腹独肿大。”用麝香丸。参鼓胀条。❸水肿病的总称。《诸病源候论》有水病诸候，分风水、石水、皮水、大腹水肿、十水等二十二症。详各条。

水恣 病名。又称水恣泄。因膈热口渴，饮水过多所致。《素问病机气宜保命集·泻论》：“渴引饮者，是热在膈上。水多入则下鬲入胃中，胃经本无热，不胜其水，名曰水恣，故使米谷一时下。”可灸大椎三五壮，或用平胃五苓散，热加黄连、木通。本症与溢饮滑泄相似，参该条。

水恣泄 病名。即水恣。《脉因证治·泄》：“水恣泄，乃大引饮，是热在膈上，水多入下，胃经无热。”详水恣条。

水黄 三十六黄之一。《太平圣惠方》卷五十五：“水黄者，身面青黄，脚膝浮肿，心腹胀满，上气烦闷，语声不出。”治用大黄甘草汤等方。参黄疸有关条。

水蛊 病名。《诸病源候论·水蛊候》：“水毒气结聚于内，令腹渐大，动摇有声，常欲饮水，皮肤粗黑，如似肿状，名水蛊也。”即水鼓。详该条。参蛊条。

水液浑浊 多指小便浑浊。《素问·至真要大论》：“诸转反戾，水液浑浊，皆属于热。”《类经》十三卷：“水液，小便也。”参便浊条。

水喘 病证名。指水饮犯肺所致的气喘。《医说》卷四：“水喘，有人先因咳嗽发喘，胸膈痃闷，难于倒头，气上凑者，宜早利水道，化痰下气。”《医学入门·喘》：“水喘，怔忡或肿胀。水喘，水气辘辘有声，怔忡者，小青龙汤、古葶枣散、白前汤。水肿、水气胀肺而喘，然喘必生胀，胀必生喘，二症相因，皆小便不利。肺主气，先喘而后胀者，宜清金降火，而行水次之；脾主湿，先胀而后喘者，宜燥脾行水，而清金次之。”《景岳全书·喘促》：“水病为喘者，以肾邪干肺也。……故凡治水喘者，不宜妄用攻击之药，当求肿胀门诸法治之，肿退而喘自定矣。”《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》：“水气喘促，乃水气逆行乘肺，肺得水而浮，喘不能卧，气不宣通，当从小便去之。宜桂苓甘术汤、肾气丸。”参喘条。

水鼓 鼓胀之一。多因饮酒过量，损伤脾胃，水湿停聚而致。《景岳全书·杂证谟》：“少年嗜酒无节，多成水鼓。……盖酒性本湿，壮者气行则已，酒即血也；怯者着而成病，酒即水也。不惟酒为水，而血气既衰，亦皆随酒而悉为水矣。所以凡治水鼓者，必当以血气为主，而养阴利湿，是诚善矣。”《辨证录·臌胀门》：“人有水肿既久，遍身手足俱胀，面目亦浮，口不渴而皮毛出水，手按其肤如泥，此真水鼓也。”宜用决水汤或用决流汤逐水，续用五苓散、六君子汤等方调理。忌食盐。本病可见于肝硬变腹水，肾性水肿，营养不良性水肿等出现腹水者。参鼓胀条。

水瘕 病症名。《诸病源候论·水病诸候》：“水瘕者，由经络否涩，水气停聚在于心下，肾经又虚，不能宣利溲便，致令水气结聚而成形段，在于心腹之间，抑按作水声，但欲饮而不用食，遍身虚肿是也。”参瘕条。

水癖 病名。指因水气结聚而成的癖病。《诸病源候论·水病诸候》：“水癖由水浆不消，水气结聚而成癖，在于两胁之侧，转动便痛，不耐风寒，不欲食而短气是也。”又称支饮。《儒门事亲·内积形》：“积水转甚，流于两胁，世谓水癖，或谓支饮。”参癖、支饮条。

水癥 病症名。《诸病源候论·水病诸候》：“水癥者，由经络否涩，水气停聚在腹内，大小便不利所为也。其病腹内有结块䐜强，在两胁间膨膨胀满，遍身肿，所以谓之水癥。”治宜理气逐水。用木香丸等方。参癥条。

五　画

〔一〕

击仆　❶古病名。出《灵枢·九宫八风》。一作仆击。指突然仆倒的病症。亦名卒中。多由正气先虚，邪风入中所致。《医学纲目》卷十："其卒然仆倒者，经称为击仆，世又称为卒中。"参卒中条。❷指击倒损伤而言。是外伤性的致病因素之一。见《灵枢·邪气藏府病形》。

玉房蒸　二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

正水　病名。❶水肿病之一。《金匮要略·水气病脉证并治》："正水，其脉沉迟，外证自喘。"多因脾肾阳虚，水停于里，上迫于肺所致。参见水肿、肺虚身肿条。❷指十种水病。《三因极一病证方论》卷十四，称心水、肝水、肺水、脾水、肾水、胆水、大肠水、膀胱水、胃水、小肠水等十水为正水。参见十水条。

正头痛　病证名。❶即冲头痛。《东医宝鉴·外形篇》："其病冲头痛，目似脱，项似拔，即正头痛也。"参见冲头痛条。❷指满头皆痛之症，与偏头痛相对而言。《鲒溪医述·病症辨异》："正头痛者，满头皆痛，……偏头风者，但在半边。"参头痛条。

正伤寒　病名。❶指冬令感受寒邪而即发的疾患。《伤寒全生集》卷一："夫伤寒者，自霜降后至春分前，天令严寒，水冰地冻而成杀厉之气，人触犯之，即时病者，为正伤寒。"《医学心悟》卷二："霜降以后，天令严寒，感之而即病者，正伤寒也。其症发热恶寒，头项痛，腰脊强，身体痛。但脉浮紧、无汗为伤寒；脉浮缓、有汗为伤风。寒用麻黄汤，风用桂枝汤。予以加味香苏散代之，随手而愈。"《伤寒大白》称南方无正伤寒，麻黄桂枝仅可用于北方冬月。❷正伤寒又指四季感寒的病。亦称大伤寒。《通俗伤寒论·伤寒本证》："大伤寒，一名正伤寒。立冬后，严寒为重，春夏秋暴寒为轻。"参大伤寒、伤寒条。

正疟　病名。指长期寒热发作之疟。《景岳全书·疟疾》："古法云，以清脾饮治秋时正疟，随证加减大效。"参疟疾条。

正黄疸　病名。《症因脉治》卷三："正黄疸之症：食已即饥，遍身俱黄，小便或赤或不利，憎寒壮热，身体如肿。"多由脏腑积热，并于脾胃之间，外因风湿相搏，闭郁腠理，湿热熏蒸盦而成黄。如见表证脉浮，可用汗解，桂枝黄芪汤。若寒热，胸满，烦呕，小柴胡汤。恶寒身痛，表不解者，麻黄醇酒汤。若腹满小便不利而赤，自汗出，此表解里实热、宜下，大黄硝石汤、茵陈汤。小便不利，加减五苓散。胸满呕吐，小半夏汤。黄结上焦者，权用瓜蒂散吐之。外治亦可用吹鼻法，出其黄水。参黄疸有关条。

去来心痛　证名。出《备急千金要方》卷十三。指心痛或作或止，久而不愈者。《辨证录·心痛门》："人有一时心痛，倏痛倏已，一日而十数遍者，饮食无碍，昼夜不安，……乃气虚而微感寒湿之邪，邪冲心包而作痛。"治宜补气温阳，祛湿消痰。方用去来汤、苍乌参苓散等。参心痛条。

左胁痛　证名。指左侧胁痛。多由气滞血瘀、痰饮、食积、肝郁等所致。《医学入门》卷五："左为怒火与死血，大怒气逆及谋虑不决，或外感风邪，皆令肝火动甚，胁痛难忍，古茧连丸、当归龙荟丸，轻者小柴胡汤加黄连、牡蛎、枳壳。瘀血必归肝经，夜痛或午后发者小柴胡汤合四物汤加桃仁、

红花、乳末。”《古今医彻·胁痛》：“左者肝也，肝藏血，性浮，喜条达而上升，有以抑之，则不特木郁而火亦郁，故为痛。治之宜疏肝清火理血，左金兼桃仁、红花、钩藤、青皮之属。”亦可由肝虚所致。《证治准绳·胁痛》：“左胁偏痛久，宿食不消，并目瞤瞤，昏风泪出，见物不审，……宜补肝散。”《景岳全书·杂证谟》：“有谓肝位于左而藏血，肺位于右而藏气，故病在左者为血积，病在右者为气郁。脾气亦系于右，故湿痰流注者亦在右。若执此说则左岂无气，右岂无血，食积痰饮岂必无涉于左乎？古无是说，此实后世之谬谈不足凭也。然则在气在血，何以辨之？但察其有形无形，可知之矣。盖血积有形而不移，或坚硬而拒按；气痛流行而无迹，忽倏聚而倏散。若食积痰饮皆属有形之证。第详察所因，自可辨识。”参胁痛、右胁痛条。

左偏枯 证名。指左半身不遂。见《中藏经·论痹》。简称左枯，又名左瘫。《类证治裁·中风》：“自丹溪以左枯属血虚，用四物汤。”参半身不遂、左瘫右痪条。

左瘫右痪 病证名。见《太平惠民和剂局方》卷一。半身不遂之证，在左侧者称左瘫，发于右侧肢体者称右痪。属于中风的范围。《素问·大奇论》论偏枯，有发于左者，有发于右者，亦即左瘫右痪。后世有以左瘫属血虚而中，治以四物汤加祛风、活血、化痰药。右痪属气虚而中，治以四君子汤加祛风、化痰之品。《寿世保元·中风》用上池饮统治左瘫右痪，可因血虚为主或气虚为主而随证加减。参半身不遂条。

右胁下痛 证名。指胁痛偏于右侧胁肋处。出《素问·咳论》。外感、内伤均可引起。参胁痛、两胁下痛、脾咳各条。

右胁痛 证名。指右侧胁痛。多由肝邪犯肺或气滞、痰饮、食积引起。《医学入门》卷四：“食积胁（右）下，如扛揿起一条作痛，神保丸、枳实煎汤下，轻者保和丸；痰饮流注肝经，喘咳引痛者，二陈汤加南星、苍术、川芎、柴胡、白芥子或入青黛少许，姜汁二匙；……七情凝滞，如有物刺痛，气促呕吐者，分气紫苏饮、流气饮子、调中顺气丸。”《万病回春·胁痛》：“推气散治肝邪入肺，右胁痛甚，胀满不食。”《慎斋遗书·胁痛》：“右胁痛为肺气不降，血中之气病也，宜芎归芍药汤加乌药、青皮、肉桂、陈皮调之。”《古今医彻·胁痛》：“右者肺也。肺主气，性沉，喜清肃而下降，有以逆之，则肺苦气上逆而为痛。治之宜降气消痰，前、桔、枳壳、陈皮之属；虚人归脾汤去芪、术加延胡主之，以补其母；苦香燥破血之药，非其治也。”《景岳全书·杂证谟》论胁痛不拘右肺左肝之说。详胁痛、左胁痛条。

右枯 证名。指右偏枯，即右半身不遂。一名右痪。《类证治裁·中风》：“自丹溪……右枯属气虚，用四君子汤。”参半身不遂，左瘫右痪条。

右痪 即右半身不遂。见《太平惠民和剂局方》卷一。参左瘫右痪条。

石水 病名。出《素问·阴阳别论》等篇。❶水肿病之一。多因下焦阳虚，不能司其开阖，聚水不化所致。《症因脉治》卷三：“肝肾虚肿之症，腹冷足冷，小水不利，或小腹肿，腰间痛，渐至肿及遍身，面色黑黄，此肝肾经真阳虚，即内经石水症也。”参肝肾虚肿、水肿条。❷指单腹胀。《医门法律·胀病论》：“凡有癥瘕积块痞块，即是胀病之根，日积月累，腹大如箕，腹大如瓮，是名单腹胀，不似水气散于皮肤面目四肢也。仲景所谓石水者，正指此也。”参鼓胀条。❸指疝瘕类病证。《诸病源候论·水肿病诸候》：“小腹肿大，鞕如石，故云石水，其候引胁下胀痛而不喘是也。”“石水者，先从四支小腹肿独大，其根在膀胱。”又《医门法律·水肿论》：“石水，其脉自沉，外证腹满不喘……以其水积胞中，坚满

如石，不上大腹，适在厥阴所部，即少腹疝瘕之类也。”参疝瘕有关各条。

石药中毒　病名。见《千金要方》卷二十四。指汉、魏至唐初时期士大夫们为求长生不老，恣服钟乳石、硫黄、紫石英等矿物药组成的钟乳石散、五石散等所出现的种种药毒证候。表现不一。治疗方药各异。参金石中毒条。

石淋　病名。指淋症见有小便涩痛，尿出砂石者。又称砂淋、沙石淋。《诸病源候论·石淋候》：“石淋者，淋而出石也。肾主水，水结则化为石，故肾客砂石。肾虚为热所乘，热则成淋，其病之状，小便则茎里痛，尿不能卒出，痛引少腹，膀胱里急，沙石从小便道出，甚者塞痛合闷绝。”多因下焦积热、煎熬水液所致。《张氏医通·淋》：“石淋者，脐腹隐痛，小便难，痛不可忍，溲如砂石，或黄赤或浑浊，色泽不定，正如汤瓶久受煎熬，底结白碱，宜清其积热，涤其砂石。”可选用神效琥珀散、二神散、石苇散、独圣散及金钱草、鸡内金、海金砂、石首鱼脑骨等。参淋条。本症即为尿路结石病。

石瘕　病名。指女子寒瘀留积胞宫所致瘕块。一名血瘕。《灵枢·水胀》：“石瘕生于胞中，寒气客于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，衄以留止，日以益大，状如怀子，月事不以时下。皆生于女子，可导而下之。”亦指血瘕。《金匮翼·积聚统论》：“石瘕者，衄血留止，结硬如石，即血瘕也。”《证治准绳·杂病》：“此病先气病而后血病，故月事不来，则可宣导而下出者也。……非大辛之剂不能已也。可服见睍丸、和血通经汤。”亦可用坐导药治疗。参瘕、血瘕条。

平旦热　证名。指在清晨四至五时左右发热。多因肺气热盛所致。《证治准绳·发热》：“平旦发热，热在行阳之分，肺气主之，故用白虎汤，以泻气中之火。”参见发热条。

打咯忒　证名。即呃逆。《医林改错》卷上：“呃逆俗名打咯忒。”详呃逆条。

扑蛾痧　痧证之一。《痧症全书》卷中：“痰涎壅盛，喘急如锯，痛若喉蛾，但喉蛾内肿胀，痧只痛而无肿胀，形若急喉风，但喉风痛而不移，痧痛则无一定，且痧有痧筋可辨也。”参痧、痧气条。

〔丨〕

目下肿　证名。指眼胞浮肿。为水肿病初起常见症状之一。《素问·评热病论》：“诸有水气者，微肿先见于目下也。”又：“水者阴也，目下亦阴也。腹者至阴之所居、故水在腹者，必使目下肿也。”参水病、目窠上微肿、风水条。

目上视　证名。指眼睛上翻、白多黑少的症象。亦称瞳子高，戴眼。多因精气竭绝，肝风或痰闭所致。《瘴疟指南》卷上：“如其证目上视，口噤牙关紧闭，昏不知人。”可见于痉厥、瘴疟、癫痫、惊风等。属危候。

目不瞑　闭目曰瞑。目不能闭，是失眠之意。《灵枢·邪客》：“营气……行于阳则阳气盛，阳气盛则阳跻陷，不得入于阴，阴虚，故目不瞑。”详不寐条。

目中不了了　证名。指目视昏矇不清。多由阳明腑热炽盛，邪热上蒸所致。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》：“伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者，此为实也，急下之，宜大承气汤。”《伤寒论本义》：“其目昏暗矇昧，若隔云雾而不了了明白者，此证明为睛不和也。阳明热盛，循经络而发其昏矇之象，以致睛失其光，此内热盛而为实。”参阳明腑证条。

目妄见　证名。指目视出现幻觉，多见于癫狂病。《灵枢·癫狂》：“狂，目妄见，耳妄闻，善呼者，少气之所生也。治之取手太

阳、太阴、阳明、足太阴、头两颞。”《素问·厥论》：“阳明之厥，则癫疾欲走呼，腹满不得卧，面赤而热，妄见而妄言。”多由痰火郁闭，热扰神明，或精气内夺所致。参癫狂、温病、瘟疫条。

目直视 证名。指目睛不能转动。《华氏中藏经·察声色形证诀死法》：“面(两)目直视者死。”《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“直视失溲。”《伤寒明理论·直视》：“伤寒目直视者，邪气壅盛，冒其正气，使神智不慧，脏精之气不上荣于目，则目为之直视，……为邪气已极，证候已逆，多难治。”可由邪热壅盛、精气不能上荣于目或阴虚肝血不足，不能上注于目所致。多见于外感热病，内伤杂病中危重病症。

目转耳鸣 证名。指眼目昏旋耳有鸣响的症候。《素问·五常政大论》：“风行太虚，云物摇动，目转耳鸣。”多由肝热，肝肾阴血不足，风阳上扰所致。参眩晕条。

目眩 证名。出《灵枢·大惑论》。指眼前发黑，视物昏花的症象。多由肝肾精血不足，或肝阳风火、痰浊上扰所致。《巢氏病源·目眩候》：“目者五藏六府之精华，宗脉之所聚也。筋骨血气之精，与脉并为目系，系上属于脑，若府藏虚，风邪乘虚随目系入于脑，则令脑转而目系急，则目眴而眩也。”本症可见于耳源性眩晕，前庭神经炎，晕动病等疾患。

目衄 证名。《医宗金鉴·杂病心法要诀》：“目出血，曰目衄。”多因阳明燥热，或肝火亢盛，迫血上溢而致。病势严重者，甚至直射而出。因阳明燥热者，多伴见口渴引饮，大便燥结，目干鼻干等证。治宜清胃、凉营、止血，选用犀角地黄汤、白虎汤、甘露饮、玉女煎等方。因肝郁火盛者，多伴见胸胁刺痛，耳鸣口苦。治宜清肝舒郁，用丹栀逍遥散或地骨皮饮加柴胡、炒山栀、益母草。如因怒火上逆，则宜清肝泻火，用龙胆泻肝汤、当归龙荟丸等方。

目黄 证名。指两眼巩膜泛现黄色。有虚实之辨。《罗氏会约医镜·杂证》：“然目黄亦有虚实之异。实热之黄，以湿热内蓄、郁蒸而成，清其热而黄自退；若虚寒之黄，以元阳日剥，津液消索而然，即无烦热脉症，惟有干涸枯黄，此则其衰已甚，须大加温补，始可救治。”《医学纲目·目黄》：“经云：目黄者曰黄疸，然亦有目黄而身不黄者，风气自阳明入胃，循脉而上至目眥，其人肥，风气不得外泄则为热中而目黄。”治宜选用青龙散等方。本症多见于黄疸病，详该条。

目晾晾 证名。指肝虚目视不明，如见蝇黑花者。《圣济总录》卷一百八：“目晾晾，论曰目者肝之外侯，血之府也。腑脏气虚，不能上注于目，则精华衰弱，又为风邪痰饮所致，故使瞻视不明而晾晾也。或见飞蝇黑花者，久成障翳。”治宜补肝明目，如青羊肝散等方。

目窠上微肿 证名。指眼胞浮肿。目窠，下眼胞。即目下肿。《灵枢·水胀》：“水始起也，目窠上微肿，如新卧起之状。”《金匮要略·水气病脉证并治》称为“目窠上微拥。”《诸病源候论·水肿候》：“脾病则不能制水，故水气独归于肾，三焦不泻，经脉闭塞，故水气溢于皮肤而令肿也。其状目裹上微肿，如水裹物之状。”参水病、目下肿等条。

目瞑 证名。指眼睛闭着不想睁开的症象。《素问·六元正纪大论》：“其病眩掉目瞑。”多由精气不足，或邪热内盛所致，可见于热病心烦、眩晕等病证。亦可见于病危之时，《难经·二十四难》：“三阴气俱绝者，则目眩转目瞑，目瞑者为失志，失志者则志先死，死即目瞑也。”

叫伤咳嗽 病证名。指叫呼太过伤肺所致的咳嗽。见《不居集·叫伤咳嗽》。《医学入门·咳嗽》：“叫呼伤肺，咳而呕吐白沫，口燥声嘶者，润肺丸、人参清肺饮。”

参咳嗽、劳咳条。

四支别离 证名。见《素问识》卷八。又称四肢别离。详该条。

四支疼痛 证名。见《医权初编》卷上。即四肢疼痛。详该条。

四支解堕 证名。指手足四肢怠惰松懈如脱的症象。由于脾失运化精微所致。《素问·示从容论》："四支解堕，此脾精之不行也。"可见于虚劳等证。

四时伤寒 病名。即感冒风寒。《东医宝鉴·杂病篇》："凡感冒风寒，通谓之四时伤寒。"可选用冲和散、正气散、参苏饮和沃雪汤等方。参风寒感冒条。

四时感冒 病名。见《赤水玄珠》。亦称冒寒、小伤寒。指春夏秋冬四时外受风寒之邪而症状较轻者。详感冒条。

四饮 病证名。出《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证治》。为痰饮、悬饮、溢饮、支饮四种饮证的总称。详各该条。

四肢不仁 证名。指四肢麻木不知痛痒。见《外台秘要》卷十四。多由气血虚弱，或痰湿阻滞经络所致。详手足不仁条。

四肢不用 证名。指四肢痿软无力、失去活动能力的症象。《灵枢·本神》："脾气虚则四肢不用。"《医权初编》卷上："脾病而四肢不用，有虚有实。《内经》专主于虚，谓脾主四支，今脾气虚弱，不能为胃行其津液，以灌溉乎四支，故四支不为用也。然体肥善饮，素多痰火者，一旦发动，经络壅塞，四肢疼痛亦不为用，此亦脾家之病，较前症更多，一宜补正，一宜涤荡，相悬天壤，细参内症色脉，自不能掩矣。"本证可见于痿证、瘫痪等。

四肢不收 证名。见《难经·十六难》。指手足瘫废或软弱无力，活动艰难者。多因中风，或气虚血枯，或痰湿流滞所致。《外台秘要·中风及诸风》："凡初得风，四肢不收，心神昏愦。"《脾胃论·肺之脾胃虚论》："脾胃之虚，怠惰嗜卧，四肢不收。"《类证治裁·中风论治》："四肢不收。诸阳经皆起于手足，循行身体，如邪气客于肌肤，随其虚处停滞，与气血相搏，故肢不举，脉缓大有力，土太过也，当泻其湿，胃苓汤；脉细小无力，土不足也，当补其气，补中汤。瘦人血枯筋急，木旺风淫者，四物汤加钩藤、秦艽、防风、木瓜。肥人色白多痰者，六君子汤加秦艽、天麻、竹沥、姜汁。"本证可见于痿、中风等症。

四肢不举 证名。指四肢活动受限，不能抬举。多因风袭经络，或脾胃虚衰及积热所致。《素问·阴阳别论》："三阳三阴发病，为偏枯痿易，四肢不举。"《千金要方·诸风》："脾虚寒，厉风所伤，举体消瘦，……四肢不举，身重，大小便利无度。"《医门法律·中风门》："四肢不举，有虚有实。阳明虚则宗筋失润，不能束骨而利机关；阳明实则肉理致密，加以风邪内淫，正气自不周流也。虚用六君子汤，实用三化汤合承气汤。"又"四肢不举，皆属脾土，膏粱太过，积热内壅者，为脾土瘀实，宜泻以开其壅，食少体羸，怠惰嗜卧者，为脾土虚衰，宜补以健其运。"本证可见于中风、偏枯、痿证等。

四肢坚硬 证名。指四肢肌肉发硬及关节活动障碍。《医学入门·怪疾》："四肢坚硬：寒热不止，经日后四肢坚如石，以物击之似钟磬声，日渐瘦恶。"多由气血不荣四末，痰瘀停滞日久所致。

四肢别离 证名。又称四支别离。指四肢好象与躯体分离的感觉。《素问·阴阳类论》："二阴一阳，病出于肾，阴气客游于心，脘下空窍，提闭塞不通，四肢别离。"《素问识》卷八："四支别离。吴（昆）云：胸中病，则四支无以受气，故若别离于身，不为己有也。张（隐庵）云：清阳实四支，阳虚则四支不为用。"

四肢拘急 证名。指手足筋脉拘挛收紧难以屈伸。出《伤寒论·辨霍乱病脉证并

治》。《伤寒论大全》卷三："四肢拘急，拘急者，手足不能自如，屈伸不便，如跣卧恶风之貌，四肢者，诸阳之本，盖因发汗亡阳，阳虚是有其证也。"《伤寒绪论》卷下："四肢为诸阳之本，寒邪客于经络之中，故使拘急不和也。有因发汗亡阳，津血内竭，不能营养筋脉而屈伸不便者，有阳气内衰，不能行于四末而拘急疼痛者，大抵有发热头痛，骨节疼而四肢拘急为表证；无身热头疼而倦卧不伸，四肢拘急者，为阴证。若汗下后，筋惕肉瞤而见拘急不仁者，则为气血虚弱也。"多因寒邪侵袭经脉，或热灼阴液，血燥筋枯所致。因寒者，宜温经扶阳，用桂枝加附子汤；吐利后直中阴经者，宜四逆汤；津血耗伤者，宜芍药甘草汤加味；亡阳者，宜用参附龙牡汤。

四肢肿 证名。水肿病证状之一。《金匮要略·水气病脉证并治》："皮水为病，四肢肿，水气在皮肤中，四肢聂聂动者，防己茯苓汤主之。"也称肢肿。又可因脾郁、气血不调而致。详结阳、皮水、肢肿等条。

四肢实 证名。指由阳邪盛实致四肢动作、步履失常。《素问·阳明脉解篇》："四肢者，诸阳之本也，阳盛则四肢实。"《类经·阳明病解》："阳受气于四末，故四支为诸阳之本，阳邪刚盛，故步履变常也。"

四肢逆冷 证名。手足逆冷的别称。又称四逆、手足厥冷。《诸病源候论·虚劳四肢逆冷候》："虚劳则血气衰损，不能温其四支，故四肢逆冷也。"伤寒少阴病常见本症。治宜温阳散寒益气等法。

四肢疼痛 证名。见《备急千金要方·诸风》。多因风寒湿邪外袭，或痰火壅塞经络所致。疼痛部位有固定与游走的不同。《诸病源候论·四肢痛无常处候》："四肢痛无常处者，手足支节皆卒然而痛，不在一处，其痛处不肿，色亦不异，但肉里掣痛，如锥刀所制。由体虚受于风邪，风邪随气而行，气虚之时，邪气则胜，与正气交争相击，痛随虚而生，故无常处也。"《医权初编》卷上："体肥善饮，素多痰火者，一旦发动，经络壅塞，四支疼痛，亦不为用，此亦脾家之病。"可用防己汤、附子八物汤、松节酒等。本证可见于痹证、痛风等疾患。

四肢热 症名。出《素问·逆调论》。多因阴气虚，阳气盛，或复有风寒外束所致。《脾胃论·脾胃胜衰论》："若脉弦气弱自汗，四肢发热，或大便泄泻，或皮毛枯槁发脱落，从黄芪建中汤。"《证治汇补·发热章》："四肢蒸灼如火者，必阴气虚，阳气盛。……外候口干体瘦，食少懒倦，遇夜尤甚，平旦不觉，宜秦艽鳖甲散主之。"《寿世保元·发热》："论男妇四肢肌表发热如火烙，此病多因血虚而得之，或胃虚遇食冷物，抑遏阳气于脾土之中，火即上越，宜用升阳散火汤。"《医脉摘要·发热辨》："四肢发热，口唇干燥，烦闷不宁而身不热者，脾热也。"参见发热等条。

四肢倦怠 证名。指手足无力，懒于动作。《世医得效方·身疼》："男子妇人气血劳伤，四肢倦怠，肌体羸瘦，骨节烦疼。"多由脾胃虚弱，不能温润四肢所致。可见于内伤劳倦、脾虚久泻等证。治宜人参黄芪散等方。

四肢麻木 证名。指手足自觉麻木不适感。见《寿世保元》卷五。又名手足麻木。多因四末气血不充，荣卫不通，或兼寒湿、痰血凝滞经络所致。《古今医案按·麻木》："麻木多在于手足者，以四末道远气馁，则卫行迟而难到也，故麻不兼木，必属气虚，否则风痰。凡脉浮而软或大而弱者，气虚也；脉浮而滑，按之不衰者，风痰也。若麻木兼作，则有寒湿、积痰、死血之殊，其脉有沉迟滑实与沉涩而芤之分矣。"治以补益气血为主，挟风寒者，先用桂附；兼痰湿者，用二术、二陈汤酌加羌活、独活、桂枝等；因瘀血者，四物汤加桃仁、甘草、红花等；有湿痰、瘀血相并者，宜双合汤；因气

滞经络者，宜开结舒筋汤；冷风麻痹足屈不伸者，独活寄生汤；腿足麻木如火热者，三妙丸；手臂麻属气虚者，补中益气汤加桑枝、姜黄等。文献有谓在手多兼风湿，在足多兼寒湿之说。参麻木条。

四肢痠疼　证名。指四肢肌肉、筋脉有痠楚、疼痛的感觉。多由湿热侵袭经络，或气血亏损所致。《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》："虚劳里急，……四肢痠疼，手足烦热，咽干口燥，小建中汤主之。"《备急千金要方·风毒脚气》："若暑月久坐久立湿地者，则热湿之气，蒸入经络，病发必热，四肢痠疼，烦闷。"本证常见于痹证。

四肢缓弱　证名。指四肢弛软无力。见《千金要方》卷八。多见于中风、痿、痹等症。参见各有关条。

四肢懈惰　证名。见《医钞类编·肢体门》。即四支解堕。详该条。

四逆　证名。指四肢逆冷不温的症象。出《素问·阴阳别论》。多见于虚寒之证。如伤寒少阴病见四肢逆冷，脉微欲绝，下利清谷而用四逆汤等。亦有因热邪郁遏所致。《伤寒明理论·四逆》："四逆者，四肢逆而不温者是也。……若手足自热而至温，从四逆而至厥者，传经之邪也，四逆散主之；若始得之手足便厥而不温者，是阴经受邪，阳气不足，可用四逆汤温之。"详手足厥冷条。

出白　证名。《素问·玉机真藏论》："脾传之肾，病名曰疝瘕，少腹冤热而痛，出白，一名曰蛊。"后人将出白解作"溲出白液"，有谓与"白淫"义同。参便浊、白淫条。

出黄如糜　证名。指泻下粪便色黄如糜糊状。《灵枢·师传》："肠中热则出黄如糜。"参热泻条。

〔丿〕

生金中毒　病名。指服生金而出现中毒症状者。急宜中西医结合救治。《本草纲目》卷四载有解生金毒药物，如白药子、翡翠石、鹧鸪肉、鸭血、白鸭通汁、生鸡屎淋汁等。可参考。参金石中毒条。

生注　九注之一。《诸病源候论·生注候》："人有阴阳不调和，血气虚弱，与患注人同共居处，或看侍扶接，而注气流移染易得注，与病者相似，故名生注。"症见心胁痛，转移无常，或体中痛，移易牵制，冲绞心胁。日久颜目赤，精泽青黑，或咳逆下痢等。参见九注条。

生银中毒　病名。指吞服生银而出现中毒症状者。急宜中西医结合救治。《本草纲目》卷四载有解银毒药物，如葱汁、鸡子汁、鸭血、鸭通汁等。可参考。参金石中毒条。

矢气　证名。见《伤寒论·辨阳明病脉证并治》。亦作失气。或谓失为"矢"之误。参转矢气、失气条。

失气　❶证名。出《素问·咳论》。指气体从肛门排出，亦称矢气，俗称放屁。多因脾虚饮食不化，或肝胃气滞所致。治宜健脾消食，行气和中。伤寒阳明腑实也见矢气，腹满。参转矢气条。❷指表失真气之意。《灵枢·终始》："形体淫佚，乃消脑髓，津液不化，脱其五味，是谓失气也。"

失心风　病名。癫病的别称。《证治准绳》卷五："癫病俗谓之失心风。"详癫条。

失血　证名。各种大量出血的总称。《三因极一病证方论·失血叙论》："血不得循经流注，荣养百脉，或泣，或散，或下而亡反，或逆而上溢，乃有吐、衄、便、利、汗、痰诸证生焉。十种走失，无重于斯，随证别之，乃可施治。"其发病原因，或肺虚阴亏，热损肺络；或脾虚气弱，不能统血摄血；或邪热迫血妄行；或跌仆外伤，损及脏腑经脉等。详衄血、肌衄、汗血、吐血、呕血、咳血、咯血、唾血、便血、尿血各条。

失血心痛 病证名。一名杀血心痛。因失血后心脾失养或瘀血未化所致。《张氏医通·妇人门》："妇人血崩而心痛甚，名曰失血心痛。……痛如刀刺，崩甚则痛甚，崩缓则痛缓。"治疗宜分虚实。小腹喜按，而下淡色血水为阴血耗散，先用乌鲗骨炒末醋汤调下收敛之，次与补中益气汤升举之。若小腹中有块，而按之作痛，血色红紫，中有结块，为瘀血不散，先用失笑散，后与十全大补峻补之。若心脾血弱，或郁结伤血，用归脾汤调补之。参心痛、杀血心痛条。

失血发热 病证名。指失血后的发热。多因阴血亏耗，虚阳偏亢或阳气郁于血分不得发越所致。《证治汇补·发热》："一切吐衄便血，产后崩漏，血虚不能配阳，阳亢发热者，治宜养血。然亦有阳虚而阴走者，不可徒事滋阴，所以有生血益气、阳生阴长之法。"可选用当归补血汤、四物汤、圣愈汤等方。《血证论·发热》："失血家阳气郁于血分之中，则身热郁冒，但头汗出，身热者，火闭于内，而不得达于外故也。但头汗出者，火性炎上，外有所束，则火不能四达，故愈炎上而头汗也。治法宜解其郁，使遍身微汗，则气达于外，而阳不乘阴，热止血亦治矣。此如盛暑遏热，得汗而解，小柴胡汤主之。"参发热、血虚发热条。

失血眩晕 病证名。指因出血过多所致的眩晕。《杂病源流犀烛·头痛源流》："失血眩晕，或吐衄太甚，或便血过多，或由伤胎，或由产后，或由崩漏，或由金疮跌扑、拔牙。往往闷绝，不省人事。"治宜补血益气。用芎归汤、归脾汤、人参养荣汤等方。危急者应先益气回阳固脱，用独参汤、参附汤等方。参大脱血、血虚眩运等条。

失志 病名。指抑郁嗟伤而致的神志失常。《证治要诀》卷九："失志者，由所求不遂，或过误自咎，懊恨嗟叹不已，独语书空，若有所失。"治宜温胆汤、定志丸、辰砂妙香散等方。本病可见于精神病等患者。参癫条。

失音 证名。古称瘖。指声音嘶哑或不能发声。《诸病源候论·风病诸候》："皆由风邪所伤，故谓风失音不语。"《张氏医通》卷四："瘖：失音大都不越于肺，然须以暴病得之，为邪郁气逆；久病得之，为津枯血槁。盖暴瘖总是寒包热邪。或本内热而后受寒或先外感而食寒物。"有外感、内伤和属虚属实之分，一般外感多属实证。因外邪乘肺，闭塞气道所致。治宜宣肺散邪为主，用三拗汤，桑杏汤等方。如久病失音，由于肺肾气阴两伤，宜润肺滋肾，用清音汤、百合固金汤、地黄饮子等方。又因高声叫呼，强力骂詈，损其会厌，伤于肺气，亦可引起本证。

失音嗽 病证名。指咳嗽声音嘶嗄。多因热嗽、冷热嗽久延所致。《不居集》卷十五："失音嗽。有热嗽失音咽疼，多进冷剂而声愈不出者，宜以生姜汁调消风散，少少进之，或只一味姜汁亦可。冷热嗽后失音者尤宜。嗽而失音者，非独热嗽有之，宜审其症用药，佐以橄榄丸含化，仍浓煎独味枇杷叶散热服，或润肺丸、清音丸。"参咳嗽条。

失说物望 古病名。精神神志病之一。《世医得效方·怪疾门》："卧于床，四肢不能动，只进得食，好大言，说吃物，谓之失说物望病，治如说食猪肉时，便云你吃猪肉一顿，病者闻之即喜，遂置肉令病人见，临要，却不与吃，此乃失说物望也。"

失溲 证名。出《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。指小便自遗之症。失溲病因甚多，伤寒热病在病危时亦可见此。《伤寒后条辨》："直视、失溲者，水亏营竭而肾气不藏也。"详遗溺、小便不禁、外感遗尿条。

失溺 证名。出《素问·本病论》。小便失禁之症。详小便不禁条。

失精 ❶即遗精。《金匮要略·血痹虚

劳病脉证并治》："男子失精，女子梦交，桂枝龙牡汤主之。"详见遗精条。❷情志病。《素问·疏五过论》："尝富后贫，名曰失精。"详脱营失精条。

失精家 出《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》。指素患遗精病者。详遗精条。

白气貍 古病名。指发于秋季的一种疫病。见《伤寒总病论》卷五。《三因极一病证方论·叙疫论》："夫疫病者……秋时应凉，而热气抑之，则责邪在肺，病曰白气貍。"其症"乍寒乍热，损肺伤气，暴嗽，呕逆，或体热，发斑，喘咳，引气。"治宜清解疫毒为主。选用石膏杏仁汤，石膏葱白汤，或治白气貍方。

白水 古病名。十水之一。《中藏经·论水肿脉证生死候》："白水者，其根起于肺，其状先从脚肿，而上气喘嗽也。"参见十水条。

白虫病 病名。即寸白虫病。《金匮要略·禽兽鱼虫禁忌并治》："食生肉，……变成白虫。"《备急千金要方·九虫》："三曰白虫，长一寸。……白虫相生，子孙转多，其母转大，长至四、五丈，亦能杀人。"详寸白虫病条。

白血 证名。指咳出浅红色血。《素问·至真要大论》："阳明司天，清复内余，则咳衄嗌塞，心鬲中热，咳不止而白血出者死。"王冰注："白血，谓咳出浅红色血，似肉似肺者。"《张氏医通·咳嗽》："咳嗽吐粉红痰，谓之吐白血，仅可绵延岁月。"一说，若服小剂异功、保元、大剂六味、都炁，亦能得生，不可尽委之于无救也(见《中国医学大辞典》)。本证可见于二尖瓣瓣膜病变所致肺郁血、心力衰竭等疾患。

白汗 证名。出《素问·经脉别论》。《内经吴注》卷七："白汗者，邪实于里则表虚汗出，故曰白汗。白汗者，气为阳，其色白也。"白汗即魄汗，详该条。

白虎风 病名。见《肘后备急方》卷三。《太平圣惠方》卷二十二："夫白虎风病者，是风寒暑湿之毒，因虚所起，将摄失理，受此风邪，经脉结滞，血气不行，畜于骨节之间，或在四肢，肉色不变，其疾昼静而夜发，即彻骨髓痠疼，其痛如虎之啮，故名曰白虎风病也。"详痛风、历节风条。

白虎历节风 病名。简称白虎历节。又名痛风。《丹溪心法》："痛风，四肢百节走痛是也。他方谓之白虎历节风证。"《张氏医通·痿痹门》："按痛风一证，……《金匮》名曰历节，后世更名白虎历节。"详痛风、历节风条。

白果中毒 病名。因服食生白果肉过量或皮肤接触白果而出现中毒症状者。内服者可见发热，呕吐，腹泻，惊厥，抽搐，皮肤青紫，脉弱而乱，甚至昏迷，死亡。外因接触种仁及其外皮者，可患皮炎。严重者宜中西医结合救治。《随息居饮食谱》等载有白果壳、白鲞头、麝香解毒。可参考。

白浊 病证名。❶指以小便浑浊色白为主要症状的疾患。《诸病源候论·虚劳小便白浊候》："胞冷肾损，故小便白而浊也。"亦称便浊、溺浊、尿浊。详便浊条。❷指溺孔常流白色浊物而小便自清的疾患。《证治准绳·赤白浊》："今患浊者，虽便时茎中如刀割火灼而溺自清，唯窍端时有秽物如疮脓目眵，淋沥不断，初与便溺不相混滥。"后世称精浊。详该条。

白黄 三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一："病人颜色干枯，目下赤、口干舌缩，心中恍惚，四肢烦重，此是白黄。"治用灸烙法，内服地黄当归汤。参黄疸有关条。

白淫 古病名。❶指男子尿出白物如精及女子带下病。《素问·痿论》："思想无穷，所愿不得，意淫于外，入房太甚，宗筋弛纵，发为筋痿，及为白淫。"王冰注："白淫，谓白物淫衍，如精之状，男子因溲而下，女子阴器中绵绵而下也。"参见尿精、

带下条。❷指滑精。《证治要诀·遗精》："甚者耳闻目见，其精即出，名曰白淫。"参见滑精条。❸指精浊症之严重阶段。《理虚元鉴·白浊白淫论》："初出茎中痛而浓浊如膏，谓之白浊。久之不已，精微弱而薄，痛亦渐减，至后闻淫声，见女色而精下流，清稀而不痛，则谓之白淫也。"参见精浊条。❹指蛊病。《杂病源流犀烛·五淋二浊源流》："白淫，热郁病也，一名蛊。"《素问·玉机真藏论》所载蛊病，症见少腹觉热而痛，白浊如精，随溲而下，由邪热内结，真精不守所致。宜用半苓丸、清心莲子饮等方。

白痢 病名。痢疾类型之一。古称白滞痢。因便下白色粘冻或脓液，故名。有属寒属热之分。《太平圣惠方》卷五十九："白痢者，由肠虚而冷气客之，搏于肠间，津液凝滞成白，故为白痢也。"其症便下如冻胶或鼻涕，可兼见腹痛，后重，不能食，小便清利，或手足厥冷等。由寒湿凝滞，脾阳受伤所致者，治宜温中化湿。可选用当归散、除湿汤、十补汤等方。本证可见于过敏性结肠炎、慢性细菌性痢疾等病。参见冷痢、寒痢条。若症见痢下白色，粘冻多脓，腹痛，里急后重，小便赤涩者，属湿热为患。《素问玄机原病式·热类》："下迫窘痛，后重里急，小便赤涩，皆属燥热，而下痢白者，必多有之。"《张氏医通》卷七："白痢初起，里急后重，频欲登圊，及去而所下无多，才起而腹中复急，皆湿热凝滞所致。胃苓汤加木香、砂仁。"也可用香连丸、黄芩丸等。详湿热痢条。

白滞痢 古病名。即白痢。《诸病源候论·痢病诸候》："白滞痢者，肠虚而冷气客之，搏于肠间，津液凝滞成白。"方用豆蔻丸等。参见白痢、寒痢条。

白疮 证名。指颈、项、胸、腹等处出现的一种小如粟粒的白色水疱，破之有淡黄色浆液流出。常见于湿温病。多因湿热之邪，郁遏气分所致。《温热经纬·外感温热篇》："再有一种白疮小粒如水晶色者，此湿热伤肺，邪虽出而气液枯也。必得甘药补之；或未至久延，伤及气液，乃湿郁卫分，汗出不彻之故，当理气分之邪；或白如枯骨者多凶，为气液竭也。"宜当化湿透热，清其气分之余邪。方用三仁汤或薏仁竹叶散等。若见疮色无晶莹，白如枯骨者，是为气液耗伤，枯竭之危症，宜急用生脉散之类补益气阴。参湿温条。

瓜瓤瘟 病名。瘟疫的一种。《杂病源流犀烛·瘟疫源流》："瓜瓤瘟，胸高胁起，呕血如汁是也。"证情多危重。治宜生犀散、加味凉膈散等。参瘟疫条。

外证头痛 病证名。指外感头痛。《内外伤辨·辨头痛》："外证头痛常常有之，直须传入里实方罢。"详外感头痛条。

外郁 指六气所致之郁证。《不居集·诸郁》："外郁者，六气之郁也。六气伤人，皆有传变，由轻及重。惟外郁之症，只在本经，聚而不散，有失升降变化之权，胶结不开，厌厌有似虚损痨瘵之症。"又："此外郁之类损者，盖气血充和，脉络贯通，百病不生，今为六淫所伤，气血抑窒，则有寒热吐衄之患，虽年深月久，郁有不开，不兼舒郁，治必不效。"参风郁、寒郁、湿郁、热郁各条。

外热 证名。指皮肤肌表发热。《素问·调经论》："上焦不通利，则皮肤致密，腠理闭塞，玄府不通，卫气不得泄越，故外热。"《寿世保元·发热》："伤寒发热，是寒邪入卫，与阳气交争，而为外热。阳气主外，为寒所薄，而失其职，故为热。其脉紧而有力，是外之寒邪伤卫也。治主外。宜服九味羌活汤。"《景岳全书·杂证谟》："凡热病之作，亦自有内外之辨。如感风寒而传化为热，或因时气而火盛为热，此皆外来之热。"参发热、肌热、热在皮肤等条。

外寒失血 病证名。指寒邪郁于经络而

致的吐血。《不居集》卷十三："外寒失血者，为邪气不能发散，壅盛于经络，逼迫于血因而吐者，须当发散经中寒邪。"宜麻黄桂枝汤。

外感三消　病证名。见《症因脉治》卷三。指感受外邪引起的消渴病，有燥火、湿火之分。详燥火三消、湿火三消、消渴条。

外感小便不利　小便不利证之一。见《症因脉治》卷四。外感小便不利包括运气小便不利、伤寒小便不利、阴寒小便不利。详各该条。

外感不得卧　病证名。指感受外邪之不寐症。《症因脉治》卷三："不得卧之症，诸经皆有，主热者多。在外感门，有表热、里热、半表半里热，有气分热、血分热，有余热未尽，汗下太过等多种。详见表热不得卧、里热不得卧、半表半里热不得卧、血热不得卧、气热不得卧，余热不得卧、虚烦不得卧等条。

外感牙衄　病证名。指外感风热侵袭阳经的齿牙出血。《症因脉治》卷二十："外感牙衄之症，身发寒热，烦闷不安，目痛头额痛，鼻干不眠，牙血暴出。"多因太阳表邪，侵入阳明，或阳明本经热甚所致。治宜清热解表，选用葛根羌活汤、干葛防风汤、干葛清胃汤等方。参衄血有关条。

外感中风症　指真中风。《症因脉治》卷一："中风之症，……有外感，有内伤。外感者，真中风也，内伤者，类中风也。"参真中风条。

外感中暑泻　病证名。指感受暑湿所致的泄泻。《症因脉治》卷四："中暑泻之症，时值夏秋之令，忽然腹痛。烦闷口渴，板齿干焦，暴泻粪水，肠鸣飧泄，痛泻交作。"治宜清暑利湿。脉虚细，体弱者，用藿香参桔煎；脉洪滑，热重者，用黄连香薷饮；热轻者，用木通汤。均调服六一散。参暑泻条。

外感中热泻　病证名。指内有积热，外中热邪所致的泄泻。《症因脉治》卷四："中热泻之症，发热口渴，唇干齿燥，面赤烦躁，小便赤涩，小腹中一汛即泻，一泻即止，少顷复痛复泻，肛门如火，粪色多黄。"脉浮数者热在表，宜柴葛芩连汤。脉沉数或数实者，里热重，宜家秘枳壳黄连汤，调六一散。二便涩滞者，宜八正散。参热泻条。

外感风泻　病证名。指风邪入于肠胃而致的泄泻。见《症因脉治》卷四。主症为恶风发热，自汗头汗，头痛额疼，泻下水谷或清水。治宜解表利水，有表证者当散表，兼利小便。可用柴胡防风汤调五苓散，干葛防风汤调下六一散，防葛汤调胃苓散等方。参风泄条。

外感半身不遂　病证名。指半身不遂由风邪入络所致者。多因起居不慎，卫气不固，风邪袭踞经络，气血留滞而成。《症因脉治》卷一："身发寒热，暴仆卒倒，醒后或左或右，偏废不用，或痛或木，或热或冷，二便赤濇，此外感半身不遂之症也。……脉洪大者，宜祛邪涤热，大秦艽汤；外邪抑遏，脉伏不出者，加减续命汤，散其表邪。"如兼痰火壅闭，可用三化汤、导痰汤。参半身不遂条。

外感头痛　病证名。指感受外邪所致的头痛。《景岳全书·杂证谟》："外感头痛，自有表证可察，盖其身必寒热，脉必紧数，或多清涕，或兼咳嗽，或兼脊背痠痛，或兼项强不可以左右顾，是皆寒邪在经而然。"本症起病较急，头痛持续不解，并伴有恶寒，发热，鼻塞流涕，骨节疼痛，咳嗽等，多属实证。由于外邪性质，受邪部位和疾病发展阶段的不同。外感头痛有伤风头痛、伤寒头痛、风寒头痛、风热头痛、风湿头痛、伤暑头痛、太阳头痛、阳明头痛、少阳头痛等不同名称，详各条。

外感吐血　病证名。指内有积热，而又外感风寒（或风热）所致的吐血。《症因脉治》卷二："外感吐血之因，内有积热，诸

经火盛，外有风寒，束其肌表，血络热甚，不得外越，妄行上冲。”因风热者，兼见发热头痛，鼻干口燥，或有咳嗽，脉象浮数。用桑杏汤加藕节、茅根之类。因风寒者，兼见发热恶寒，头痛无汗。宜清疏营卫，表散风寒。用羌活冲和汤加减。若表邪已解，仍吐血发热，目痛不眠，为阳明邪热，宜用干葛石膏汤、犀角地黄丸等方。亦有寒邪郁于经络者，详外寒失血条。

外感吐酸水 病证名。见《症因脉治》卷二。指素有湿热郁结、复冒外寒所致的吐酸症。症见发热，呕吐酸水，甚则酸水浸渍胃脘，不胜苦楚，吐出酸水令牙关酸涩不能合，脉多带弦。属本热标寒之症，不宜骤进苦寒，而当辛散。脉弦数者，宜防葛平胃散、家秘神术汤，甚者加栀连。脉弦迟者，宜草豆蔻丸、姜桂大顺饮、连理汤。参吐酸条。

外感休息痢 休息痢类型之一。见《症因脉治》卷四。由外感失表，过早止涩，邪伏肠胃所致。详休息痢条。

外感呃逆 病证名。见《症因脉治·呃逆论》。指感受外邪所致的呃逆症。邪传半表半里，抑遏少阳者，症见身发寒热，呕逆作呃，脉弦大。治宜和解，用小柴胡汤。热邪结里者，症见内热口渴，唇焦便赤，脉沉数。治宜下热，用承气汤。若胃热而便利者，用泻心汤；胃中兼痰火攻冲者，呃逆乍发乍止，连续不已，脉滑大而数，宜栀连二陈汤。参见呃逆条。

外感呕吐 病证名。见《症因脉治·呕吐论》。指感受外邪所致的呕吐。常并见恶寒发热，头痛，脘腹痛、泄泻等症。外感呕吐有风气呕吐、寒气呕吐、暑气呕吐、湿气呕吐、湿热呕吐、燥热呕吐等。详各该条。

外感胁痛 病证名。指感受外邪而见胁痛者。《景岳全书·胁痛》：“凡寒邪在少阳经，乃病为胁痛耳聋而呕，然必有寒热表证者，方是外感。”《医学入门》卷五：“外感胁痛寒热者，小柴胡加枳、梗。”参感冒胁痛、运气胁痛条。

外感肩背痛 病证名。指因感受外邪所致的肩背痛。多因岁运失常，热淫所胜，火热伤肺；或肺素有热，风寒外束皮毛所致。《症因脉治》卷一：“外感肩背痛之症，背痛肩痛，发热不恶寒，反恶热，烦躁不宁，便闭便赤，口渴唇焦，此火邪伤肺之症也；若背痛肩痛，头痛发热，内虽烦躁，外反恶寒，此风寒伤肺之症也。”脉多右寸洪数或浮紧。因火邪伤肺者，用家秘泻白汤、清燥清肺饮；肺素有热，风寒束于肌表者，用羌防泻白散。参肩背痛条。

外感泄泻 病证名。见《症因脉治》卷四。包括外感风泻、外感寒邪泻、外感中暑泻、外感中热泻、外感湿泻，尚有肺燥作泻亦属外感。详各该条。

外感胃脘痛 病证名。指感受寒邪、湿热所致的胃脘痛。寒症多见于中气素寒，热症多见于内有积热患者。《症因脉治》卷一：“外感胃脘痛之症，向无此症，偶值时令暴寒，心下闷痛，恶寒厥冷，二便清利，口吐冷沫，此寒邪入胃，凝结痰饮食积，卒然暴痛之症也。若时令暴热，心下忽绞痛，手足虽冷，头额多汗，身虽恶寒，口燥舌干，大便虽泻，溺色黄赤，此湿热所伤之症也。”脉多浮紧或浮数。前者宜先用五积散，继用温胃汤。后者先用神术平胃散，后用清中汤。参胃脘痛条。

外感咳嗽 病证名。见《景岳全书·杂证谟》。指感受外邪而致的咳嗽。《医宗必读·咳嗽》：“总其纲领，不过内伤外感而已。风寒暑湿伤其外，则先中于皮毛，皮毛为肺之合，肺邪不解，他经亦病，此自肺而后传于诸脏也。”《医门法律》卷五：“风火热湿燥寒，皆能乘肺，皆足致咳。”其表现为起病较急，声盛而浊，并有外感其它症候，如寒热、头痛、身痛、鼻塞、流涕、咽干、喉痒等。多属实证。治宜祛邪宣肺为

主。由于外邪性质和兼感的不同，有伤风咳嗽、伤寒咳嗽、伤热咳嗽、伤暑咳嗽、伤燥咳嗽、伤湿咳嗽及风寒咳嗽、冷热嗽、时气咳嗽等。详各该条。

外感结胸 病证名。指结胸之因外感病邪所致者。《医学衷中参西录·论结胸治法》："结胸之证，有内伤外感之殊。……外感结胸，伤寒与温病皆有。伤寒降早可成结胸，温病即非降早亦可成结胸，皆外感之邪内陷与胸中痰饮互相胶漆也。无论伤寒、温病，其治法皆可从同。若《伤寒论》大陷胸汤及大陷胸丸，俱为治外感结胸良方，宜斟酌病之轻重浅深，分别用之。"参结胸条。

外感恶寒 恶寒证之一。指恶寒由感受外邪所致者。《张氏医通》卷三："外感、内伤……皆有恶寒，非阳独虚也。若脉浮紧，头痛拘急，身疼微恶寒，热起，是外感，审时令轻重发散之。"《证治汇补·恶寒》："外感恶寒，虽近烈火不除。"参恶寒条。

外感衄血 病证名。指感受外邪所致的鼻衄。《症因脉治》："外感衄血之症，恶寒身热，头疼身痛，鼻孔出血。"多因外感风热，或内有积热，外冒风寒，或太阳失表，热郁于经，阳明失下，热郁于里，或温病误用辛温，扰动经血所致。有表证而见发热口干，头痛目瞑者，均宜清解，方用羌活冲和汤、桑菊饮加丹皮、茅根、黄芩等。如阳明失下，多兼漱水不欲咽，治宜清下，用养营承气汤去归、朴，加丹皮、牛膝、茅根。温病误用辛温致衄者，治宜清血。用黄芩芍药汤、犀角地黄汤加连翘、玄参、葛根、茅根之类。本证可见于风湿热、流行性感冒及多种传染病过程中。参鼻衄等条。

外感黄疸 病证名。见《症因脉治》卷三。指因外邪失治传里，化热熏蒸所致的黄疸。《素问·玉机真藏论》："今风寒客于人，使人毫毛毕直，皮肤闭而为热，当是之时，可汗而发也。……弗治，肝传之脾，病名曰脾风，发瘅，腹中热，烦心出黄。"伤寒阳明病可见本证。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》："伤寒七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。伤寒身黄发热者，栀子柏皮汤主之。伤寒瘀热在里，身必发黄，麻黄连翘赤小豆汤主之。"《诸病源候论》有风黄候、伤寒变成黄候、时气变成黄候、温病变成黄候等。按其病因，均属外感黄疸的范畴。亦指脏腑素有积热，复受外邪诱发所致的黄疸。治疗当以祛邪、清热、利湿为主。参黄疸有关条。

外感遗尿 病证名。见《症因脉治》卷一。指外感热病中出现的小便失禁。因邪传心包，神识昏迷，故小便自遗，尿色黄赤，脉数。治宜清心泻火为主，用导赤各半汤；里实而腹满便秘者，可用三化汤；外有表邪者，可用羌活防风汤；挟痰、挟滞者，可用导痰汤、枳实消滞汤。参遗尿、小便不禁条。

外感喘逆 病证名。见《症因脉治·喘症论》。指气喘由于外感六淫引起者。包括风寒喘逆、暑湿喘逆、燥火喘逆等。详各该条。

外感短气 病证名。指外邪袭肺所致的气短不能相续。多因六淫之邪侵袭肌表，继则郁结于里，致气道受阻，呼吸不能接续。《症因脉治》卷二："外感短气之症，身发寒热，呼吸不利，短息出入，似喘而不急促，此外邪壅滞之症也。"如脉紧为寒邪，洪数为风热，躁疾为燥邪，弦急为肝胆邪逆。治宜祛邪为主。冒寒用三拗汤，冒风用防风泻白散，伤燥热用石膏泻白散，清肺饮。如脉见促结，应予宣通法；脉见沉伏，当用升散法。参短气条。

外感腋痛 病证名。指感受风寒、燥热等外邪而致的腋痛。见《症因脉治·腋痛论》。详腋痛条。

外感痫疾 病证名。见《症因脉治·痫疾论》。为寒湿痫、湿热痫、燥热痫、疫

痢的总称。详各条。

外感温病 指感邪即发的温病。见《温热经纬·叶香岩外感温热篇》王士雄注。与伏气温病相对而言。详见温病有关条。

外感湿泻 病证名。见《症因脉治》卷四。指湿邪外侵，脾气不运所致的泄泻。症见水泻肠鸣，腹反不痛，或呕而不渴，身重身痛。脉多濡软，或细涩，或浮缓。治宜燥湿利小便，用胃苓散、平胃散。身热身痛脉浮者，用败毒散、羌活胜湿汤。参湿泻条。

外感湿痰 湿痰证之一。《症因脉治·外感痰症》："湿痰之症，身发寒热，面目浮肿，恶寒头痛，身痛不能转侧，呕吐恶心，烦满不渴，此外感湿痰之症也。"多因坐卧卑湿之地，或感受雨湿，与体内水液交凝而致。治宜散风除湿为主。如羌活胜湿汤、化痰二陈汤、平胃散等方。参湿痰条。

外感寒邪泻 病名。见《症因脉治》卷四。指感受寒邪所致的泄泻。如寒邪直中三阴经者，症见恶寒身痛，不发热，口不渴，小便清白，腹中疼痛，泄下水谷，脉多沉迟，宜用理中汤、真武汤等方。若肠胃有热而寒邪外束，则泻而恶寒、发热、身痛、口渴、脉多浮，宜用羌活汤、葛根黄芩黄连汤等方。

外感腰痛 病证名。见《症因脉治·腰痛总论》。指感受外邪所致的腰痛。主要有风湿腰痛、寒湿腰痛、湿热腰痛三种。另有风腰痛、风寒腰痛、风热腰痛、湿腰痛等也属外感腰痛。一般以实症居多。治疗以祛邪通络为主。详各该条。

外感腹胀 病证名。见《症因脉治·肿胀总论》。指感受六淫之邪所致的腹胀。详伤寒腹胀、风湿腹胀、湿热腹胀、寒湿腹胀条。

外感嗽血 病证名。见《症因脉治》卷二。指因外感时邪，损伤肺络的咳嗽吐血。因肺热内郁，风寒外束者，症见发热形寒、咳嗽、脉象浮大。宜清热解表，用泻白散加荆芥、防风、葛根之属。因风热犯肺者，症见发热口干，脉象浮数。宜清宣肺热，用桑杏汤。因燥火伤肺者，症见鼻干咽燥，舌红脉数，宜清燥润肺，用清燥救肺汤。如血出较多，均可配加茅根、藕节等药。本证可见于肺炎、慢性支气管炎与支气管扩张症继发感染等疾病。

外感噎隔 病证名。多因偶逢赫曦之令，或远行劳倦，时当大热，燥火烁人，津液内涸所致。《症因脉治》卷二："外感噎隔之症，向无饮食阻隔，忽尔内热唇焦，饮食不得下咽，下咽噎住不通，或下咽而复吐出，烦热引饮。……右脉洪数，热在气；左脉洪数，热在血；两手洪数，气血皆热；两手细数，血燥津竭。"治宜清热生津。方用三因麦门冬汤、人参白虎汤，或冲竹沥、芦根汁；大便闭结者，三一承气汤选用；血不足者，四顺饮；便结有寒热者，大柴胡汤。参噎膈条。

外感燥痰 燥痰证之一。亦称火痰。《症因脉治·外感痰症》："燥痰之症，发热唇焦，烦渴引饮，喘欬短息，时作时止，吐咯难出，此外感燥痰之症也。"多因时令燥热之气干犯肺胃所致。治宜清热润燥、降火化痰为主。如竹叶石膏汤、二母石膏汤、二母二陈汤等方。参燥痰条。

冬月咳嗽 指冬月感受风寒所致的咳嗽。《不居集》卷十五："冬月咳嗽，冬月风寒外感，形气俱病俱实者，宜华盖散、加减麻黄汤，所谓从表而入，自表而出。若形气病气虚者，宜补其元气，而佐以解表之药。若专于解表，则肺气益虚，腠理益疏，外邪乘虚易入，其病愈难治矣。"《温热经解》："冬咳嗽者，人气内藏，寒邪入肺，法当温散。麻黄汤主之。"《类证治裁·咳嗽》："冬季咳，风寒侵肺也。治宜温散。苏叶、川芎、桂枝、麻黄之属。"参咳嗽、风寒咳嗽各条。

冬温 病名。见《伤寒论·伤寒例》。指冬季发生的热病。《医效秘传·冬温温

毒》："冬温者，冬感温气而成，即时行之气也。何者？冬令严寒而反温热，人触冒之，名曰冬温。"本病如邪在肺卫，见头痛、无汗、发热、微恶风寒、咳嗽、咽痛等症。治宜辛凉解表，选用桑菊饮、银翘散，配合桔梗汤等。如其邪不解，则可见气分、营分或血分证候，宜参照卫气营血辨证法治疗。《医学入门·正伤寒》："冬温，总是时行，……与伤寒相似，但脉不浮耳。治法大同春温，表症萎蕤汤、九味羌活汤，入里加大黄，重者双解散，轻者加减调中汤。"一说本病虽属新感，但与正气虚弱，肾经不足有关（见《伤寒绪论·冬温》）。亦有因冬令不能闭藏，其气反泄于外者，宜用补药中兼解表药（见《丹溪心法附余·瘟疫》）。参温病、风温条。

饥不能食　指知饥而不能食。多因邪结胸膈而致。《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》："病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜用瓜蒂散。"亦有因脾胃津竭而致者，《医碥》卷二："其有饥而不能食者，脾热则消谷而饥，本欲食，因胃脘枯槁不能纳，或火热上冲，或痰涎上壅食不得下也。"参饥不欲食条，

饥不欲食　出《素问·至真要大论》。指感觉饥饿而又不想进食。病在胃、肾。有因胃虚有热所致者，宜六君子汤加黄连；有因肾阴虚，虚火乘胃者，宜六味丸加肉桂、五味子；亦有热病后余热未尽者，亦知饥不食，脉多虚大，可用人参白虎汤（《张氏医通》卷九）。"针灸饥不欲食有二法，其一清胃，经云胃者水谷之海，其腧上在气冲，下至三里，水谷之海不足，则饥不受谷，审守其腧，调其虚实是也；其二取肾，经云肾足少阴之脉，是动则病饥不欲食，心若悬，若饥状，视盛虚热寒，陷下取之也"（《证治准绳·杂病》）。

饥伤　病证名。出《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》。指因饥饿致伤者。《景岳全书·饮食门》："凡失饥伤饱，损及脾胃，多令人胸膈痞闷，不能消化……神体困倦，此皆脾气受伤，中虚而然。"饥饿损伤肠胃者，初宜少之予清稀粥，逐次增量，待胃气恢复，饮食渐趋正常。绝不可骤然饱食，以免后果不良。治宜调养脾胃为主，如木香人参丸或大健脾丸去黄连等。

饥饱咳嗽　病证名。指饥饱伤脾，痰食积滞不化引起的咳嗽。见《不居集》卷十五。《三因极一病证方论·不内外因咳嗽》："病者中满腹胀，抢心痛，不欲食，此因饥饱伤脾。"治宜保和丸等方。参见咳嗽、脾咳条。

饥疝　古病名。指一种食后即饥，胃脘疼痛的疝气。《诸病源候论》卷二十："阴气在内，寒气客于足阳明、手少阴之络，令食竟必饥，心为之痛。故谓之饥疝。"

〔丶〕

玄水　古病名。亦称悬水。指先从头面渐及下肢的水肿。《华氏中藏经·论水肿脉证生死候》："玄水者，其根起于胆，其状先从头面起，肿而至足者，是也。"可兼见头眩痛，身虚热，大小便涩少等。治用中军候黑丸，葶苈散等方。

闪挫腰痛　病证名。腰痛之一。见《丹溪心法·腰痛》。古称腎腰。因跌仆闪挫，伤气伤筋所致。症见腰痛不能俯仰转侧，动则痛剧。治宜行气和血，疏通经络。选用独活汤、舒筋散、乳香趁痛散、复元通气散等方。日久瘀血阻滞者，详沥血腰痛条。

半边头风　病证名。见《辨症录·头痛》。即偏头痛。边，指边侧。即半侧头痛。详偏头痛、偏头风条。

半身不随　证名。见《诸病源候论·风病诸候》。即半身不遂。详该条。

半身不遂　证名。中风病常见症之一。一作半身不随，又名偏枯、偏风。《金匮要

略·中风历节病脉证并治》："夫风之为病，当半身不遂。"《类证治裁·中风》："半身不遂，因气血不至，故痛痒不知。经曰：营虚则不仁，卫虚则不用，营卫俱虚，则不仁且不用。"亦有先觉手足麻木，逐渐形成者，多由营卫先衰，络脉空虚，邪气乘虚而入，或因气虚血虚，或肾虚精气不足等所致。主症为一侧肢体不能随意运动，可伴见口眼㖞斜，语言蹇涩等症。治宜养血祛风、温经通络、益气活血、补肾益精等法。选用大秦艽汤、大活络丹、小活络丹、补阳还五汤、八珍汤、地黄饮子等方。并可配合针灸治疗。本症常见于脑血管意外后遗症。

半身不遂痧 痧证之一。《痧胀玉衡·半身不遂痧》："心主血，痧毒入于血分，故易攻心，此痧症所以发昏也。若痧之慢者，冲激迟缓，未逆于心，留滞经络，或在于右，或在于左，为半身疼痛，或麻痹不仁。如此半身不遂，总因痧毒之遗害也。治之者，见有痧筋，急宜刺破，然后用药以散其毒，活血以消其瘀，则痧根既拔，其症渐痊。若不知治，绵延日久，痧毒益深，势不可遏，当又有变症，难愈矣。"参痧条。

半身汗 证名。《医略六书》卷二十："半身汗者，汗不遍身，或上或下或左或右，乃气血偏衰，阴阳不相接洽之候。"《张氏医通》卷九："夏月止半身出汗，皆气血不充，内挟寒饮所致，偏枯及夭之兆也。大剂十全大补、人参养营、大建中辈加行经豁痰药治之。若元气稍充，即间用小续命汤一剂以开发其表，或防己黄芪汤加川乌以散其湿。"《中医临证备要》以下肢瘫痪证，汗出多在胸部以上，患处无汗，为上半身汗出。参偏沮条。

半身麻木 证名。指身体半部肌肤麻木不适感。《慎斋遗书·麻木》："麻木须分左右上下。左因气中之血虚，归脾汤；右因血中之气虚，黄芪建中汤。左右俱麻木，十全大补汤；上身麻木，清阳不升也，补中益气汤；下身脚软麻木至膝者，胃有湿痰死血，妨碍阳气不得下降，故阴气渐逆而上也，四物汤加人参、牛膝、薏苡仁，引阳气下降；下身麻木，脉豁大无力，宜八味汤加人参。"《证治汇补》卷三："左右者，阴阳之道路。左半手足麻木者，责风邪与血少；右半手足麻木者，责气虚与湿痰。"本证可见于脊髓炎症、结核、外伤及多发性神经炎等。参麻木条。

半表半里证 证名。指邪既不在表，也不在里，而是在表里之间的病证。❶指少阳病小柴胡汤证。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，……小柴胡汤主之。"《伤寒论条辨》："往来寒热者，邪入躯壳之里，藏府之外，两夹界之隙地，所谓半表半里，少阳所主之部位。故入而并于阴则寒，出而并于阳则热，出入无常，所以寒热间作也。胸胁苦满者，少阳之脉循胸络胁，邪凑其经，伏饮搏聚也。默，静也。胸胁既满，谷不化消，所以静默不言，不需饮食也。心烦喜呕者，邪热伏饮搏胸胁者涌而上溢也。"参见少阳病条。❷指温疫病邪在募原的病证。《温疫论·原病》："邪从口鼻而入，……舍于伏脊之内，其邪去表不远，附近于胃，乃表里之分界，……即针经所谓横连膜原是也。邪在膜原，正当经胃交关之所，故为半表半里。"其证先憎寒，后壮热，昼夜发热，日晡益甚，头疼身痛，口渴，脉数，舌红苔白，或苔如积粉等。治宜疏利湿热，用达原饮。参见瘟疫条。

半表半里热不得卧 病证名。外感不得卧之一。指邪搏心胸半表半里之间所致的不寐症。《症因脉治》卷三："半表半里不得卧之症。太阳病二三日不得卧，心下闭结，汗吐下后，反复颠倒，心中懊侬者，太阳经半表半里热也；咽燥口干，发热汗出，烦躁不眠，阳明经半表半里热也；往来寒热，胸胁苦满，心烦喜呕，不得眠，少阳经半表半

里热也。……半表半里不得卧之治：太阳者，羌活冲和汤；少阳者，小柴胡汤合栀子豆豉汤；阳明者，竹叶石膏汤合知母葛根汤。”参不寐条。

半肢风　病证名。指一侧上下肢或两下肢不能运动的疾患。❶指左侧或右侧肢体不能随意运动（见《医贯·中风论》）。参见半身不遂条。❷指两下肢软弱，难于行动。多由肝肾精血亏损，或肾阴肾阳俱虚，筋骨失于濡养所致。《医贯·中风论》：“半肢风者，……又有一等人，身半以上俱无恙，如平人。身半以下，软弱麻痹，小便或涩或自遗。”多属足三阴经虚证，治宜滋阴益精，补肾温阳。用地黄饮子等方。本病症可见于因外伤、炎症、肿瘤等所致的截瘫。

半夏中毒　病名。因误食过量生半夏而出现中毒症状者。见《千金要方》卷二十四。症见口舌作麻，咽痒热灼疼痛，甚则呼吸急促、饮食困难，严重者可致死亡。治疗初宜洗胃，继服醋加姜汁、浓茶、蛋清等，严重者宜中西医结合抢救。《本草纲目》卷四载解半夏毒药有生姜、干姜、防风等。可参考。

头风　病证名。指头痛经久难愈者。《医林绳墨·头痛》：“浅而近者，名曰头痛；深而远者，名曰头风。头痛卒然而至，易于解散也，头风作止不常，愈后触感复发也。”多因患者素有痰火，风寒客之则热郁而闷痛。《杂病源流犀烛·头痛源流》：“头风之症。素有痰饮，或栉沐取凉，或久卧当风，以致贼风入脑入项。自颈以上，耳目口鼻眉棱之间，有麻痹不仁之处。或头重，或头晕，或头皮顽厚，不自觉知，或口舌不仁，不知食味。或耳聋，或目痛，或眉棱上下掣痛，或鼻闻香极香，闻臭极臭，或只呵欠而作眩冒之状。热者消风散，冷者追风散。头风发时闷痛，必欲棉裹者，热郁也，二陈汤加酒芩，荆芥，川芎，薄荷，石膏，细辛。”头风痛在一侧者，名偏头风；两太阳连脑痛者，名夹脑风；头风而见头面多汗，恶寒者，名首风。详各有关条。

头风眩运　病证名。指眩运因风痰结聚胸中，壅遏清阳所致者。《医碥·眩晕》：“痰涎随风火上壅，浊阴干于清阳也，故头风眩晕者多痰涎。”《儒门事亲·风门》：“凡头风眩运，手足麻痹，胃脘发痛，心腹满闷，按如水声，可用独圣散吐之。吐讫，可用清上辛凉之药。”如防风通圣散加半夏等。参风痰眩晕条。

头风眩晕　病证名。见《医碥·眩晕》。又称头风眩运。详该条。

头风屑　证名。指头皮燥痒，搔落白屑的病证。见《医碥·头痛》。《证治准绳·头痛》：“梳头有雪皮见，肺之证也。肺主皮毛，大便实，泻青丸主之，虚者，人参消风散主之。万病紫苑丸治头多白屑，每服三丸至五、七丸，姜汤下。按上治法，必有风热上攻，头目眩痛诸症而后用之。若止是白屑，但宜白芷、零陵香之属外治而已。”

头风旋　古病名。见《外台秘要·头风旋方》。又称风头旋。详该条。

头目不清利　证名。见《兰室秘藏·头痛门》。指头脑不爽利及视物模糊的感觉。《东医宝鉴·外形篇》：“此由风湿热痰涎郁于精明之府，故头目不为清爽。宜川芎丸、防风散、川芎散、沃雪汤、清神养荣汤。”肝阳上亢、气郁等均可引起本症。参眩晕条。

头皮痛　证名。《医林绳墨·头痛》：“头皮痛者，枕不能安，手不能按，亦由浮游之火上行，当以轻扬散火可也。如芩、连、山栀、天花粉、玄参、连翘之属。”其证多由风火上犯所致。如局部肿痛者，可配用外治法。《外治寿世方》卷二：“头皮肿痛，好鸡蛋黄白调匀，涂肿处即愈。”

头汗　证名。指头面局部多汗。以邪热内郁、热蒸于上为多见。《伤寒明理论·头汗》：“但头汗出，身无汗，剂颈而还，小

便不利，渴饮水浆，此为瘀热在里，身必发黄，如热不得越而上达者也。又热入血室，与其虚烦，或阳明被火，及水结胸，皆但头汗出也，俱是热郁于内，而不得越者也。”治宜栀子豉汤、茵陈蒿汤、大陷胸汤等方。有见于伤寒者。《伤寒寻源》中集：“伤寒五、六日，已发汗而复下之，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤主之。”有因水亏火旺而致者。《石室秘录·敛治法》：“凡人头顶出汗，乃肾火有余而肾水不足。”治当滋肾清肺，可用桑叶、熟地、北五味、麦冬等；或滋阴降火，宜当归六黄汤。有因胃火上腾者。《辨证录·汗症门》以每当饮食时，即头汗淋漓，治以泻胃火为主，方用收汗丹。有因湿胜所致者。《杂病源流犀烛·诸汗源流》：“湿邪搏阳，亦汗出头额，宜参用胜湿汤。”有瘀血内蓄而致者。《证治汇补》卷三：“头汗者……有瘀血内蓄者。”《类证治裁·汗症》：“畜血头汗，剂颈而还，犀角地黄汤；头汗，小便不利，渴而不饮，此血瘀膀胱也，桃仁承气汤。”若关格不通或重病阳脱之时而见头汗者，属危证。《医略六书·杂病证治》卷二十：“若关格不通而头汗者，为难治。及阳虚唇舌口鼻清冷而头汗者亦不治。”

头运眼花 证名。或作头晕眼花。指身体有飘忽不定、眼花缭乱的感觉。《景岳全书·杂证谟》：“但忽运而忽止者，人皆谓之头运眼花。”详眩晕条。

头冷 证名。指头部感觉寒冷，或伴痛的病症。多因阴阳气血不足或风气偏胜所致。《罗氏会约医镜》卷六：“头上冷而畏风，或痛或不痛，属后天气血之不足也。经曰：‘头上诸病，求之于真阴、真阳而不得者，其病在脾、肺、肝三经。’”治用加味十全大补汤等方。风气侵袭者，用祛风药。

头胀 证名。指头部胀重不适的感觉。可因外感或内伤引起。外感多因湿热蒸郁所致。《伤寒绪论·头胀》：“头胀者，气虚火炎也。冬温、风温、温病、热病、时行、中暍、中暑，多有头重胀痛，皆是湿热火气内燔，慎不可用发散药。如冬温，阳旦汤；风温，萎蕤汤；温病，黄芩汤；热病、时行、中暍，白虎汤；中暑，清暑益气汤。”内伤多因肝火上逆所致。治宜泻肝降逆为主。方用龙胆泻肝汤等。湿痰、食积、痉夏等，亦可伴有头胀病证。参见各该条。

头项强痛 证名。指头项部牵强不舒作痛。多因邪在肌肤或遏阻经络所致。《伤寒论·太阳病脉证并治》：“太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。”外感表证，宜发散解表。如久病项强，多属痹证，宜祛风化湿、舒经活络。痉病初起，亦常有头痛项强，症情较重，治宜清解通络、镇痉熄风为主。本症可见于某些神经系统感染性疾患及颈椎病等。

头响 脑鸣的别称。《四科简效方·内科通治》：“头响即脑鸣也。”详见脑鸣条。

头重 证名。指头部自觉重坠，或如布带困裹的感觉。出《素问·刺热论》。多因外感湿邪、疫气或湿痰壅阻所致。《证治准绳·头重》：“头重，何因得之？曰：因天之湿淫外着也，因人之湿痰上蒸也，……外着内蒸必壅蔽清道，致气血不利，沉滞于经隧脉络，故重。”《张氏医通》卷五：“湿热上攻，所以头重，秋、冬、春，俱宜羌活胜湿汤；夏暑，苍术白虎汤，并瓜蒂搐鼻；若时行疫疠之时患头重者，败毒散加苍术、藁本；内伤元气，头重气乏，补中益气加苍术、蔓荆子。”肾气虚衰亦可出现头重。《古今医统·头重》：“精滑脱，肾气竭而阴微，不能与胃气上升，以接清阳之气，故病多头重。”外感热病亦常兼见头重，宜用清泄通下等法。参首如裹条。

头眩 病证名。出《金匮要略·中风历节病脉证并治》。即眩晕。详该条。

头眩偏痛痧　痧证之一。《痧胀玉衡·头眩偏痛痧》："痧气慢者，上升于二阳头面。常觉头眩内热，或半边头痛、心烦不安。宜刮痧，不愈，用清凉之剂治之。"参痧条。

头晕　病证名。指头脑昏晕而感觉自身或周围景物旋转，甚者有恶心呕吐之症。《医碥·眩晕》："晕与运同，旋转也，所见之物皆旋转如飞，世谓之头旋是也。"《慎斋遗书》卷九："头晕，有肾虚而阳无所附者；有血虚火升者；有脾虚生痰者；有寒凉伤其中气，不能升发，故上焦元气虚而晕者；有肺虚肝木无制而晕者。……肾虚阳无所附而晕，六味汤加人参；血虚火升而晕，芎归芍药汤；脾虚生痰，四君子加半夏、天麻；寒凉伤气，气虚而晕，补中益气加附子；肝木无制而晕，黄芪建中汤。"参眩晕条。

头脑鸣响　证名。见《杂病源流犀烛·头痛》。亦称脑鸣、头响。详该条。

头疼　病证名。疼，义同痛。见头痛。

头偏痛　病证名。偏头痛的别称。《太平圣惠方》卷四十："夫头偏痛者，由人气血俱虚，客风入于诸阳之经，偏伤于脑中故也。"详偏头痛条。

头旋　证名。见《外台秘要》卷十五。指感觉自身与周围景物旋转。又称头晕。《医碥·眩晕》："晕与运同，旋转也，所见之物皆旋转如飞，世谓之头旋是也。"详头晕条。

头旋眼花　病证名。即眩晕。《医学心悟·眩晕》："眩，谓眼黑；晕者，头旋也。古称头旋眼花是也。"详眩晕条。

头痛　病证名。出《素问·平人气象论》。亦称头疼。凡整个头部以及头的前、后、偏侧部的疼痛，总称头痛。头为"诸阳之会"、"精明之府"，五脏六腑之气血皆上会于此。凡六淫外感，脏腑内伤，导致阳气阻塞，浊邪上踞，肝阳上亢，精髓气血亏损，经络运行失常者，均能发生头痛。从病因分，有外感头痛，可由感冒风寒、风热、风湿，伤暑，火邪致痛及伤寒头痛等；有内伤头痛，可由气虚、血虚、阳虚、阴虚、肝阳、伤食、瘀血致痛等。从经络分，有三阳头痛（太阳头痛、阳明头痛、少阳头痛）、三阴头痛（太阴头痛、厥阴头痛、少阴头痛）等。从病情轻重，病程长短，发作规律及疼痛部位分，有真头痛、头风、偏头痛、雷头痛、脑风、巅顶痛、久头痛等。详各条。

头痛痧　痧证之一。《痧胀玉衡·头痛痧》："痧毒中于脏腑之气，闭塞不通，上攻三阳巅顶，故痛入脑髓，发晕沉重，不省人事，名真头痛，朝发夕死，夕发旦死，急刺破巅顶，出毒血以泄其气，药惟破其毒气，清其脏腑为主；痧毒中于脏腑之血，壅瘀不流，上冲三阳头面肌肉，故肌肉肿胀，目闭耳塞，心胸烦闷，急刺破巅顶及诸青筋，出毒血，药宜清其血分，破其壅阻为要。"痧毒中于气分，宜四十二号旅象方；中于血分，宜先冷服红花膏子半盏，再用四十三号鼎象方。参痧条。

头摇　证名。指头部摇摆、颤动而不能自制的症象。又名摇头。《证治准绳·头摇》："头摇，风也，火也。二者皆主动，会之于巅，乃为摇也。"《张氏医通·诸痛门》："头摇有二证，风火相煽，卒然头摇，项背强痛，少阳经证也，小柴胡去参加防风；里实腹痛，不大便而头摇者，阳明府证也，凉膈散、大柴胡选用；若老人及病后辛苦人，因气血虚，火犯上而鼓动者，十全大补汤、大建中汤，并加羌活。"亦可结合针刺治疗。

〔一〕

皮毛焦　证名。指皮毛枯憔。出《灵枢·经脉》。多由经气不荣皮毛所致。《难经·二十四难》："手太阴气绝，即皮毛焦。太

阴者，肺也，行气温于皮毛者也。气弗营则皮毛焦，皮毛焦则津液去，津液去则皮节伤，皮节伤则皮枯毛折，毛折者则毛先死。”

皮水 病名。出《金匮要略·水气病脉证并治》。《诸病源候论·水肿病诸候》：“肾虚则水妄行，流溢于皮肤，故令身体面目悉肿，按之没指而无汗也。腹如故而不满，亦不渴，四支重而不恶风是也。脉浮者，名曰皮水也。”治宜通阳、健脾、利水，用防己茯苓汤、蒲灰散等方。参水肿、风水等条。

皮肤不仁 证名。又称肌肤不仁。指肌肤麻木，不知痛痒的症象。多由邪入于肌肤，气血运行不畅所致。《诸病源候论·风不仁候》：“其状，搔之皮肤如隔衣是也，诊其寸口脉缓，则皮肤不仁。”可见于中风后遗症、痹证等疾患。

皮肤否肿 证名。否，通痞。指皮肤因寒邪凝聚、气血痞塞而引起的肿胀。《素问·至真要大论》：“太阳之胜，凝溧且至，……皮肤否肿，腹满食减。”参水肿、肤胀、鼓胀等条。

皮肤痛 证名。《灵枢·五邪》：“邪在肺，则病皮肤痛。”多由火邪侵袭肺表所致。《杂病源流犀烛·筋骨皮肉毛发病源流》：“皮也者，所以包涵肌肉，防卫筋骨者也。……心实之痛，深至肉间，宜导赤散加减；火灼之痛，如欲炙手，宜加减凉膈散；风热之痛，痒痛相间，宜上清散；肺经火郁之痛，不可抚按，宜泻肺汤。”

皮热 指皮肤有发热感觉。多由阴虚或阳盛所致。《中藏经·寒热论》：“皮热而燥者，阴不足，……皮热而热者，阳盛也。”若仅局部热痛，须防疮痈。《灵枢·上膈》：“其痈在外者，则痈外而痛浮，痈上皮热。”

皮蒸 五蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。又为二十三蒸之一。参五蒸、二十三蒸条。

皮瘘 瘘证之一。见《三因极一病证方论》卷九。又名皮毛瘘。详该条。

皮毛瘘 瘘证之一。见《医宗必读·瘘》。又名皮瘘、肺热瘘，亦称肺瘘。由于肺热叶焦，病及皮毛所致。症见皮毛枯萎，或咳呛气急等；若病邪留着不去，可使筋、脉、骨、肉失养，发生瘘蹙。《素问·瘘论》：“肺主身之皮毛，……故肺热叶焦，则皮毛虚弱急薄，着则生瘘蹙也。”治宜清热生津，养阴润肺。选用二母二冬汤、知柏天地煎、清燥救肺汤、犀角桔梗汤、玉华煎等方。参瘘条。

皮痹 病名。出《素问·痹论》。❶指风寒湿邪外袭皮毛所致的痹证。也有称寒痹者。《医宗必读·痹》：“皮痹者，邪在皮毛。”证见瘾疹风疮，搔之不痛。初起皮中如虫行状。治宜疏风养血，用秦艽地黄汤、羌活汤、蔓荆实丸等方。参寒痹条。❷指肺痹。《症因脉治》卷三：“肺痹之症，即皮痹也，烦满喘呕，逆气上冲，右胁刺痛，牵引缺盆，右臂不举，痛引腋下。”参肺痹条。

皮槁毛拔 指皮肤枯槁不泽，毫毛脱落如拔掉的症象。《素问·五藏生成篇》：“多食苦，则皮槁而毛拔。”多由肺气耗伤，皮毛失荣所致。

发作无时疟 病名。疟疾的一种。因发作无一定时间，故名。《诸病源候论·发作无时疟候》：“夫卫气，一日一夜，大会于风府则腠理开，开则邪入，邪入则病作。当其时，阴阳相并，随其所胜，故生寒热，故动作皆有早晏者。若府藏受邪，内外失守，邪气妄行，所以休作无时也。”《类证治裁·阴疟》：“或不忌口，不节劳，伏邪旁溢界络，皆能致之。否则发期错乱乃将愈之兆矣。阴疟主治之法，惟和营调卫兼疏邪，勿期速效而用劫剂。”参见疟疾条。

发热 证名。出《素问·气交变大论》。指体温高出正常标准，或自有身热不适的感觉。发热原因，一般可分为外感与内伤两

类。外感发热，常因感受六淫之邪及疫疠之气所致；内伤发热，多由饮食劳倦，或七情变化，导致阴阳失调，气血虚衰所致。外感发热多属于实，可见于感冒、伤寒、温病、瘟疫等病症；内伤多虚，可见阴虚发热、阳虚发热、血虚发热、气虚发热、虚劳发热，阳浮发热、失血发热等。由于发热的类型不同，又有壮热、微热、恶热、发热恶寒、往来寒热、潮热、五心烦热、暴热等；因发热时间不同，有平旦热、昼热、日晡发热、夜热等；因发热部位不同，有肌热、腠理热、肩上热、背热、肘热、尺肤热、手心热、手背热、足热、四肢热等；又有痰积发热、食积发热、饮酒发热、瘀血发热、病后遗热等。详有关各条。

发热恶寒　即发热怕冷。出《素问·至真要大论》。系感冒、伤寒、温病等多种外感热病的常见症状。一般先见恶寒，继而发热，发热后恶寒即减轻。亦有已发热而仍恶寒者。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名曰伤寒。""病有发热恶寒者、发于阳也。"为太阳表证的主要征象，治以解表为主。亦为劳倦内伤的常见症状之一。《张氏医通·诸伤门》："劳倦所伤，寒温不适，身热头痛，自汗恶寒，脉微而弱，黄芪建中汤。"参发热条。

发斑伤寒　病证名。指伤寒见发斑的疾患。《伤寒括要·伤寒总论》："伤寒发斑，因当汗不汗，当下不下，或未当下而早下，则热蕴于胃而发斑也。"《重订通俗伤寒论·发斑伤寒》："凡斑既出，脉洪滑有力，手足温而神识清爽者，病势顺而多吉；脉沉弱无神，四肢厥而神识昏沉者，病势逆而多凶。"《伤寒辨证·发斑》："凡斑欲出未出之际，且与葛根升麻汤，以透其毒，甚则升麻汤加犀角、黑参。若斑已出，不宜再行升发，始发又不宜便下。恐毒内陷也。如热盛脉洪数，烦渴者，人参化斑汤主之；如热毒内甚，心烦不得眠，错语呻吟者，以黄连解毒汤加黑参、升麻、大青主之。若斑发已尽，外热稍退，内实不大便，谵语，小剂凉膈散或大柴胡汤微下之。"详见阳证发斑、阴证发斑条。

母疟　病名。《三因极一病证方论·疟病不内外因证》："亦有数年不差，百药不断，结成癥癖在腹胁，名曰老疟，亦曰母疟。"即疟母、老疟。参见各条。

六　画

〔一〕

动暑　病证名。《温热类编》卷三："阳暑，即动暑。"详阳暑条。

老人便结　病证名。指老人大便坚涩或不通。《景岳全书·杂证谟》："老人便结，大都皆属血燥。盖人年四十而阴气自半，则阴虚之渐也，此外则愈老愈衰，精血日耗，故多有干结之证，治此之法无他，惟虚者补之，燥者润之而尽之矣。然亦当辨其虚实微甚，及有火无火，因其人而调理之可也。凡润燥等剂如导滞通幽汤、苁蓉润肠丸、搜风顺气丸、东垣润肠丸、卫生润肠丸、元戎四物汤、三仁丸、百顺丸之类皆可选用。又豕膏为润燥之神剂，最当随宜用之。其有大虚大热者，宜用前阴、阳结治法。许学士治年老虚人便秘，只用火麻仁、苏子仁各半研取汁服之，更煮粥食之，不必服药而秘愈。"《济生方·大便》："年高之人，以致秘结者，非少壮比，多服大黄恐伤真气，后方所载有威灵仙丸最佳。"《世医得效方·秘涩》："老人脏腑秘，不可用大黄，老人津

液少，所以脏腑秘涩，更服大黄以泻之，津液皆去，定须再秘甚于前。只可服宽润大肠之药，更用槐花煎汤淋洗亦效。更有老人发热而大腑秘涩，或因多服丹药，脾胃虚弱，蒸化不行，遂为脏腑积热，须用神保圆，得通泻一行，热亦即退。”《辨证录·大便闭结门》：“人有大便秘结者，其症口干舌燥，咽喉肿痛，头目昏晕，面红烦躁，人以为火盛闭结也，谁知是肾水之涸乎？……此等之症，老人最多，正以老人阴衰于燥，火有余而水不足耳，治法但补其肾中之水，则水足以济火，大肠自润矣。方用濡肠饮。”《张氏医通·大便不通》：“老人血枯便闭，用生地黄、当归身、鲜首乌各四两，广皮一两，熬膏顿热服半小杯，不通，三五次效。”参见虚秘条。

老人腰痛 病证名。见《医宗必读·腰痛》。多因肝肾不足所致。《临证指南医案·腰腿足痛》龚商年按：“有老年腰痛者，他人但撮几味通用补肾药以治，先生独想及奇经之脉隶于肝肾，用血肉有情之品。鹿角、当归、苁蓉、薄桂、小茴以温养下焦。”也可选用二至丸、右归丸等方，或外用摩腰膏热摩腰部。

老疟 疟疾之一。指疟疾延久不愈，深入三阴经者。见《三因极一病证方论·疟病不内外因》。《丹溪心法·疟》：“老疟病，此系风暑于阴分，用血药引出阳分则散。”一名母疟。参母疟、疟疾条。

老淋 病名。指老人淋证。见《医医偶录·膀胱部》。老人精气已衰，患淋多见虚证。若精竭复耗，大小便牵痛如淋，用八味丸加车前、牛膝，或萆薢分清饮加减。若气虚下陷成淋，用补中益气汤加木通、泽泻。若老人绝欲太早成淋，用生绿豆衣水浸，擂汁服，或淡秋石擂水饮服。参淋条。

老痰 痰证之一。指气火郁结，凝结胶固之痰症。又名郁痰、结痰、顽痰。《症因脉治》卷二：“老痰即结痰。”“顽痰坚结胶固，……即老痰。”《丹溪心法附余·痰》：“因火邪炎上，薰于上焦，肺气被郁，故其津液之随气而升者为火薰蒸，凝浊郁结而成。岁月积久，根深蒂固，故名老名郁。”《丹溪心法·痰》：“喉中有物，咯不出，咽不下，此是老痰。重者吐之，轻者用瓜蒌辈，气实必用荆沥。”《张氏医通·痰饮》：“老痰积于胸膈作痞，或流滞于经络四肢者，青礞石丸。”老痰症治宜开郁降火，清润肺金，以消化其凝结之痰。《医碥》卷二：“老痰即郁痰结成粘块，吐咯不出，非南星、半夏、茯苓、苍术可治。青黛为主，五倍、海石、苦梗、旋复花、瓜蒌仁、芒硝。”老痰可由燥痰失治所致。《医学入门》卷五：“燥痰，久为老痰。”参痰症有关条。

耳妄闻 证名。出《灵枢·颠狂》。即幻听。多见于颠狂等病。多因痰火郁闭，热扰神明，或精气内夺所致。参目妄见条。

耳鸣 病证名。指耳中自觉有各种声响。《素问·脉解篇》：“所谓耳鸣者，阳气万物盛上而跃，故耳鸣也。”《灵枢·海论》：“髓海不足，则脑转耳鸣。”《诸病源候论·耳病》：“肾气通于耳，足少阴肾之经，宗脉之所聚，劳动经血，而血气不足，宗脉则虚，风邪乘虚，随脉入耳，与气相击，故为耳鸣。”《景岳全书》卷二十七：“凡暴鸣而声大者多实，渐鸣而声细者多虚，少壮热盛者多实；中衰无火者多虚。饮酒味厚，素多痰火者多实，质清脉细，素多劳倦者多虚。”虚证，由于肾精不足，阴虚火动，或气血虚损等所致，可兼见头晕目眩，腰痛等，宜补肾滋阴，益气养血为主；实证，由痰热，肝火上阻耳窍所致，宜化痰清火泻肝为主。详肾虚耳鸣，气虚耳鸣，血虚耳鸣，痰火耳鸣等条。

耳衄 病证名。指血从耳中流出。《医宗金鉴·杂病心法要诀》：“耳出血，曰耳衄。”肾开窍于耳，手足少阳经脉循行耳

部，故耳衄常见于肝胆火旺、肾虚火旺以及饮酒多怒之人。因肝胆火旺者，常有头痛烦躁，夜寐不安，口苦咽干，关脉弦数等症。治宜清泄木火，选用柴胡疏肝汤、龙胆泻肝汤。因肾虚火动者，多见性欲亢进、烦躁遗精，舌干红，脉弦细数等症。治宜滋阴降火，方如六味丸合导赤散、柴胡梅连散之类。也可外治，用十灰散或龙骨末吹耳中。

耳聋　病证名。指听力减退，或完全丧失者。《灵枢·决气》："精脱者，耳聋。"《素问·脏气法时论》："肝病者，……气逆，则头痛、耳聋不聪、颊肿。"《医学心悟·耳》："凡伤寒邪热耳聋者，属少阳证，小柴胡汤主之。"耳聋有虚实之辨。虚证多由肾虚精气不足所致，可分肾虚耳聋、气虚耳聋，久聋、虚聋等。实证多因风热、痰火、肝火所致，可分风热耳聋、痰火耳聋、肝火耳聋等。详各该条。

再经　❶指太阳病不愈，传至另一经。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽故也。若欲作再经者，针足阳明，使经不传则愈。"《医宗金鉴》卷一："再者，再传阳明经也。谓其邪已传经尽，热盛不衰，欲再转属阳明故也。"❷指伤寒一日传一经，六日传至厥阴，七日再传太阳，八日再传阳明。《注解伤寒论》卷二："伤寒自一日至六日，传三阳三阴经尽，至七日当愈。经曰：七日太阳病衰，头痛少愈，若七日不愈，则太阳之邪，再传阳明。"另说，如《伤寒论浅注·太阳篇》："何以谓发于阳者七日愈？请言其所以愈之故。如太阳病头痛等证，至七日以上，应奇数而自愈者，以太阳之病自行其本经，已尽七日之数故也。若未愈，欲作再经者，阳明受之。宜针足阳明足三里穴以泄其邪。"参六经病、传经、过经等条。

厌黄　三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一："病人四肢烦疼，手足无力，吐逆，不下饮食，渐渐瘦弱。"治用灸烙法，内服大黄汤等方。参黄疸有关条。

百合病　病名。情志病之一。《金匮要略·百合狐惑阴阳毒病脉证并治》："百合病者，百脉一宗，悉致其病也。意欲食，复不能食；常默然，欲卧不能卧，欲行不能行；饮食或有美时，或有不用闻食臭时；如寒无寒，如热无热；口苦，小便赤；诸药不能治，得药则剧吐利。如有神灵者，而身形如和，其脉微数。""百合病，不经吐、下、发汗，病形如初者，百合地黄汤主之。"《金匮要略心典》卷上："全是恍惚去来，不可为凭之象，惟口苦，小便赤，脉微数，则其常也。所以者何？热邪散漫，未统于经，其气游走无定，故其病亦去来无定。"《伤寒温疫条辨·百合病》："百脉一宗，举身皆痛，无复经络传次，故曰百合。大抵病后虚劳，藏府不调所致。……通宜小柴胡汤加百合、知母、粳米，血热用百合地黄汤。"亦可用百合滑石散、百合鸡子汤、百合知母汤等方。

死血胁痛　病证名。指瘀血内停所致的胁痛。见《医钞类编·胁痛门》。《证治准绳·胁痛》："死血者，日轻夜重，或午后热，脉短濇或芤，桃仁承气汤加鳖甲、青皮、柴胡、芎、归之属。若跌扑胁痛者，亦是死血，宜复元活血汤、破血散瘀汤。"《证治汇补》卷六："左胁下有块作痛，夜甚者，死血也。"《辨证录·胁痛》："血死难于推移，行气而沉积不化，必用败血之药以下死血，而痛可除也，方用抵当丸。"《杂病源流犀烛》卷十："死血，由恶血停留于肝，居于胁下，以致胠胁肋痛，按之则痛益甚，宜小柴胡汤合四物汤加桃仁、红花、乳香、没药。"参肝郁胁痛、污血胁痛、跌扑胁痛条。

夹竹桃中毒　病名。因药用或误服过量夹竹桃而出现中毒症状者。症见头痛，头晕，恶心，呕吐，腹痛，腹泻，谵语，甚则汗出肢厥，心律失常，直至休克死亡。治宜中西医结合救治。

夹血伤寒 病名。一名伤寒夹瘀。《重订通俗伤寒论·夹血伤寒》："一名伤寒夹瘀。""内伤血郁，外感风寒，或脱衣斗殴，触冒冷风，又或跌仆打伤，一时不觉，过数日作寒热，状如伤寒。……头痛身热，恶寒烦渴，胸胁串疼，腹有痛处不移，或少腹痛处，手不可按，乍寒乍热，夜有谵语，甚至昏厥不省，少顷复苏，苏后或复如狂，剧则疼极发狂，舌色紫暗，扪之滑润，或深紫而赤，甚或青紫。"治宜活血解表为主。轻则香苏葱豉，重则桂枝桃仁。

夹阴中寒 病名。指因房劳伤肾，复感寒邪而致的阴症。《伤寒全生集·辨治伤寒传经证治脉要指法》："又有脉沉，足冷，面青，小腹绞痛无热者，此皆夹阴中寒也。"本证即后世所称夹阴伤寒。详该条。

夹阴伤寒 病名。指因房劳伤肾，复感风寒而致病。《伤寒全生集》卷一："若脉沉足冷，面赤微热，此皆夹阴伤寒也。"《重订通俗伤寒论·夹阴伤寒》："房劳伤精而后骤感风寒，或夏月行房后，恣意乘凉，触犯风露。证身热面赤，或不热而面青，小腹绞痛，足冷蹉卧，或吐或利，心下胀满，甚则舌卷囊缩，阴极发躁，或昏沉不省，手足指甲皆青，冷过肘膝，舌苔淡白滑嫩，或苔黑滑，舌本胖嫩。脉六部沉细，甚或伏绝，或反浮大无伦，沉按豁豁然空。"治宜"外则先灸关元、气海以回元阳；内则先用参附再造汤，助阳发表，或用麻附细辛汤加人参、干姜，温经散寒。如脉伏绝，阴极发躁，继即神气昏沉，不省人事者，速用回阳急救汤，提神益气，回阳生脉。"也有用来复丹二钱研末，放入脐中，或用麝香少许置脐中，上罨活杀白鹑鸽对剖半只，内去肠杂，外不去毛，用布扎紧，约三小时即去之。参阴证伤寒条。

夹食伤寒 病名。一名伤寒夹食。《全生集·审证问因察形正名》："若头疼身热，恶寒拘急，恶心，中脘痞满，或吐或呕，或痛或泻，则知挟食伤寒也。"《通俗伤寒论·夹食伤寒》："夹食伤寒，一名伤寒夹食。""伤寒夹食，十常八九，或先伤食而后感寒，或先受寒而后伤食，或病势少间，强与饮食，重复发热，变证百出，……头痛身热，恶寒无汗，胸痞恶心，嗳腐吞酸，甚或呕吐泄泻，或脘闷腹痛。"治宜先解表，后消食，或解表消积并用，如枳实栀子豉汤、香苏葱豉汤、藿香正气丸、大承气汤等方。

夹脑风 病名。见《太平圣惠方》卷四十。《证治要诀·头痛》："有偏正夹脑风，服川乌附不愈，用莲子草乌而愈者，此乃毒攻毒之意。"《杂病源流犀烛·头痛源流》："有夹脑风者，两太阳连脑痛是也。宜透顶散。"参脑痛条。

夹痰伤寒 病名。一名风寒夹痰。《全生集·审证问因察形正名》："若身热恶寒，隐隐头痛，喘咳烦闷，胸胁体痛，左脉紧盛，右脉洪滑，或示脉沉伏者，则知是夹痰伤寒也。""其证喘咳身热，恶寒头痛，骨节痛，即是夹痰伤寒，必以痰药兼发散药中求之。"《通俗伤寒论·夹痰伤寒》："一名风寒夹痰。""外感风寒，每涉于痰，多由素有痰积，或夹痰饮，或夹痰火，复感风寒及形寒饮冷所致。"可选用越婢加半夏汤、小青龙汤、瓜蒂散等方。参风寒夹痰。

过经 ❶病邪由一经传入另一经谓之过经。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："伤寒十三日，过经谵语者，以有热也，当以汤下之。"又："太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤。"❷指太阳病过期不解。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽故也。若欲作再经者，针足阳明，使经不传则愈。"《伤寒论注》："发于阳者七日愈，是七日乃太阳一经行尽之期，……而曰欲作再经，是太阳过经不解，复病阳明而为并病也。"伤寒通常为七日传一经，若太阳病经过七日以上不

解，称为过经不解。亦有以至十三日不解者为过经。《医学入门》卷四："伤寒六日传经一遍，七日当解，再传至于十三日以上不愈，谓之过经，汗下失宜，以致邪气留连不已，神昏谵语，胸满潮渴，随其表里证见而调之。"参伤寒、六经病、传经等条。

邪嗽　五嗽之一。见《外台秘要》卷九。又称劳嗽、痉嗽。指劳极损伤肺络或感邪恶之气所致的咳嗽。《医说》卷四："惟今之所谓劳嗽者，无所经见，意其华佗所谓邪嗽，真人所谓痉嗽者是也。此病盖酒色过度，劳极伤肺，损动经络，其重咯唾脓血，轻者时发时差。又有因虚感邪恶之气，且传痉得之，或先呕血而后嗽，或先咳嗽渐就沉羸，此则非特内损肺经，又挟邪恶传痉之气，所以特甚，病之毒害，无过此也。"治宜通气丸（方用蜈蚣四节）、四满丸、蛤蚧、桃柳枝、麝香、安息香等。参五嗽、咳嗽条。

邪喘　病证名。见《证治准绳·喘》。指寒邪伏肺的气喘。多由邪伏肺中，关窍不通，肺气壅塞所致。症见上气喘逆，呼吸不利，咽喉如塞，如欲呕吐，有时可见身热，脉六部俱伏等。治宜发散为主。如麻黄散、射干麻黄汤、五虎汤等方。参寒喘等条。

协热下利　病证名。见《卫生宝鉴·补遗》："协热下利，脐下热，大便赤黄，或有肠垢者，治用仲景黄芩汤。"参热泻、火泄条。

协热自利　病证名。又称火泻、火泄。《医宗必读·泄泻》："火泄，腹痛泻水，肠鸣，痛一阵泻一阵，火也，黄芩芍药汤，张长沙谓之协热自利。"详热泻、火泄条。

协热利　病证名。指泄利挟有表热者。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病，外证未除，而数下之，遂协热而利，利下不止，心下痞鞕，表里不解者，桂枝人参汤主之。"亦有指热泻者。参协热下利、夹热自利条。

协寒利　病证名。指脾胃寒盛所致的泄泻。《伤寒捷诀·肠垢鹜溏》："协寒利者，曰鹜溏，脐下必寒，宜理中、四逆汤主之。"参寒泻、寒泄、鹜溏条。

〔丨〕

当脐痛　病证名。《张氏医通·腹痛》："当脐痛为肾虚、任脉为病，六味丸加龟板灰；伤寒阳脉濇，阴脉弦，法当腹中急痛，此为本虚受寒，小建中汤和之。"本证亦可由虫积引起。参脐中痛、虫积腹痛条。

早泄　病证名。指性交时泄精极早，甚至未交精液即出。多因肾阴不足，相火亢盛所致。常伴见阴茎易举，或举而不坚，心烦口干，脉细数。治宜滋阴降火。用知柏八味丸、大补阴丸、三才封髓丹等方。阴阳两虚，兼见畏寒肢冷、舌淡脉沉，宜兼温肾阳，加狗脊、菟丝子、巴戟天之类。又有心肾两虚者，宜补益心肾。用济火延嗣丹、补天育麟丹等方。

早起眩晕　病证名。见《丹溪心法·头眩》。又称晨晕、晨运。指眩晕常发生在清晨者。多因阳虚及痰浊固结所致。详阳虚眩晕、湿痰眩晕等条。

早晨嗽　一名清晨嗽。指晨起作咳，或晨间咳嗽加剧者。多因气动宿痰、食积所致。《增补万病回春·咳嗽》："早晨嗽者，胃中有食积也。"《类证治裁》："清晨嗽、为气动宿痰，二陈汤加贝母、枳壳、桑白皮、枇杷叶、橘红。"《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："日夜不咳，但朝晨咳几声，火空则发也。宜二陈加黄芩、桔梗、桑皮。日夜亦嗽，惟早晨嗽更甚，胃中有食积，至此时火气流入肺中也。宜泻白散加知母，或二母散。"参咳嗽条。

吐　证名。呕吐之一种。呕吐一般有声有物，若有物而无明显呕声，则称为吐。《卫生宝鉴·补遗》："有物无声，名曰吐。"详呕吐条。

吐血　病证名。见《金匮要略·惊悸吐

蛔下血胸满瘀血病脉证并治》。指血从口吐出，无明显呕恶及咳嗽。亦有泛指血从口吐出者。甚者可倾盆盈碗。多因酒热辛肥，郁怒忧思，劳欲体虚等因导致胃热壅盛，肝郁化火，或心脾气虚，血失统御而成。亦有因外感引动者。吐血有外感吐血、内伤吐血、阴虚吐血、劳心吐血、劳伤吐血、气郁吐血、畜热吐血、伤胃吐血、伤酒吐血等命名，详各该条。本证包括上消化道出血之呕血及呼吸系出血。

吐利 出《素问·五常政大论》。指呕吐、下利并见。后世将卒暴呕吐下利、躁扰不安者，称为霍乱。仅见呕吐下利，病程缓慢者，称为吐利。《证治准绳·杂病》："成无己云：若止呕吐而利，经谓之吐利是也。上吐下利，躁扰烦乱乃谓之霍乱，其与但称吐利者有异也。盖暴于旦夕者为霍乱可数，日久者为吐利。"有因于寒者，吐利腥秽，澄彻清冷，完谷不化，小便清冷不涩，口不渴，脉微细而弱。宜理中汤。有因于热者，吐利酸臭，宜黄芩加半夏生姜汤。有因风痰者，吐利而有痰，不饮食，宜水煮金花丸。参霍乱条。

吐泻发斑 病证名。《嵩崖尊生书》卷十二："吐泻发斑由胃虚无根之火游行于外，此症不妨，但可补，不可泻；可温，不可凉。"

吐屎 证名。指呕吐之物，挟有粪便。《杂症会心录·吐屎》："……其标在胃，其本在肾，幽门失开阖之职也。……兹则阴阳错乱，清浊混淆，为医家所不及逆料者，洵为幽门无权，胃液空虚，肾水迫之，又迫而不足以敌直奔之势，从小肠入胃，糟粕随之，已可知矣，治法非救胃则救肾，非正治则逆治。"若病急起，属实火，便秘腹痛者，可攻下，用承气汤类。轻者可用清胃平逆散，若久病体虚脉虚者，宜补养胃肾，可用救肾安逆汤加减。本证可见于各种因素引起的低位肠梗阻。

吐蚘 证名。蚘古作蛔。即吐蛔。出《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》。指呕吐蛔虫。《仁术便览》卷四："吐蛔虫，以苦楝根为君，佐以二陈汤。"亦可用安蚘法。《景岳全书》卷二十："凡吐蚘者；必因病而吐蚘，非因蚘而致吐也。故不必治其蚘，而但治其所以吐，则蚘自止矣。有因胃火而吐蚘者，以内热之甚，蚘无所容而出也，但清其火，火清而蚘自静，轻者抽薪饮，甚者万应丸之属是也。有因胃寒而吐蚘者，以内寒之甚，蚘不能存而出也，但温其胃，胃暖而蚘自安，仲景乌梅丸之属是也。有因胃虚无食而吐蚘者，以仓廪空虚，蚘因求食而上出也，此胃气大虚之候，速宜补胃温中以防根本之败，如温胃饮、理中汤、圣术煎之属是也。"《张氏医通》卷四："吐蚘有寒、有热、有寒热交错。寒则手足厥逆，吐出之蚘色淡白者，理中汤加乌梅、黄连、蜀椒；甚则蚘死而形扁者危矣；热则蚘色赤而多，且跳动不已，安蚘丸主之；寒热交错，则病者静而复时烦，得食而呕，蚘闻食臭出，其人当自吐蚘，乌梅丸主之。"并可用使君子、鹤虱、芜荑、槟榔等。

吐臭水 证名。见《寓意草·面议倪庆云危症再生治验》。《证治汇补》卷五："臭水是肠中逆来。"多因胃气大伤所致。

吐脓血 证名。指吐血杂有脓液者。多由热毒壅盛，血络损伤所致。亦可由药误引起。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》有内热盛误服桂枝汤吐者，其后吐脓血的记载。

吐涎沫 证名。指呕吐涎水清沫。多由水饮内阻所致。《金匮要略》："脐下有悸，吐涎沫而癫眩，此水也，五苓散主之。"又："干呕吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。""干呕吐逆，吐涎沫，半夏干姜散主之。""妇人吐涎沫，医反下之，心下即痞，当先治其吐涎沫，小青龙汤主之。"如因脾胃虚弱而致者。《张氏医通》卷四："盖脾为涎，脾虚不能约束津液，故涎沫自出。"宜

用六君子汤加减，挟寒者加肉桂、附子；挟热者加枳实、黄连。

吐绿水　证名。见《寓意草·面议倪庆云危症再生治验》。患者不食，先吐清水，后吐绿水，进而吐黑水、吐臭水，系胃气欲绝所致。《张氏医通》卷四："呕吐大痛，吐出色如青菜色者危。"先用理中汤，后用旋复花煎汤调服代赭石。

吐黑水　证名。见《寓意草·面议倪庆云危症再生治验》。《张氏医通》卷四："黑水为胃底之水，此水且出，则胃中之津久已不存。"

吐清水　证名。指呕吐清水而无食物者。《古今医统·吞酸叙论》："吐清水证有五因，有因湿、因痰饮、因寒、因宿食、因虫。明知恣食生冷瓜果而作者为寒湿也；胸膈间漉漉有声者，痰饮也；饮食后而吐清水者，宿食也；但犯寒而作者，胃寒也；心腹时痛而作，亦吐清黄水者，虫也。"因湿者，可用一味苍术丸、家秘神术汤；若伤于雨湿而见恶寒发热者，宜用荆防平胃散；因痰饮者，可用茯苓饮、橘皮半夏汤；因脾胃虚寒者，可用六君子汤（用伏龙肝煎汤澄清代水煎药），理阴煎；饮冷过度所致者，可用赤石脂散；因宿食者，可用保和丸；因虫者，可用化虫丸。"诸种吐清水，可通用二术二陈汤等方。

吐蛔　证名。见《卫生宝鉴》卷十四。即吐蚘（蚘通蛔）。详吐蚘条。

吐痧　痧证之一。指患痧兼有入水即吐者。《痧症全书》卷中："吐痧，汤水入口即吐，研伏龙肝泡水澄饮即定，药亦以此水煎，用金四方。"

吐酸　证名。出《素问·至真要大论》。指吐出酸水之症。多因宿食、湿痰、热郁、停饮等所致。常兼见气闷饱胀，嗳气腐臭等。治宜和中消食化痰，用曲术丸、八味平胃散、干姜丸等方；若从热化，则宜栀连二陈汤、咽醋丸。有因肝郁犯胃，湿郁化热所致者，症见两胁刺痛，口苦咽干，心烦吐酸，脉弦数。治宜泄肝清火。用逍遥散合左金丸，或柴葛平胃散。有因脾胃虚寒所致者，症见面色萎黄，饮食减少，苔白，脉弦细。治宜温养脾胃。用香砂六君子汤、理中汤、温胃饮等方。参外感吐酸水、内伤吐酸水、吞酸等条。本证可见于慢性肥厚性胃炎、溃疡病、消化不良、胃酸分泌过多症等疾患。

吐噦　病证名。指咳噦吐痰与食俱出者。多因饮食失节，肝气不利，而肺有客邪所致。《不居集》卷十五："吐噦，有噦吐痰与食俱出者，此饮食失节，致肝气不利，而肺又有客邪，肝浊道，肺清道，清浊相干，故噦饮食俱吐出。二陈汤加木香、杏仁、细辛、枳壳"。参咳噦、食积咳噦条。

虫心痛　病证名。见《备急千金要方》卷十三。指虫扰所致的心痛。《圣济总录》卷第五十六："论曰，诸虫在人身中，若府藏平调，则自安其所，若藏气虚弱，或因食肥甘过度，致动肠胃间诸虫，其虫往来上攻于心络，则令人心痛。痛有休止，腹中热，喜吐涎出，是蚘心痛也。"《杂病源流犀烛·心病源流》："曰虫，必面色青黄有白斑，唇红，能食或食后即痛，或痛后即能食，或呕哕涎沫，或吐青水。凡吐水者虫痛，不吐水，冷心痛也。虫心痛，小儿多有之。"可用乌梅丸、芜荑散、万应丸、妙应丸等方。中气伤者，宜调中气。参心痛、蚘心痛条。

虫吐　病证名。指蛔虫所致的呕吐。《医学入门》卷五："虫吐时常恶心，胃口作痛，口吐清水，得食暂止，饥则甚者，胃中有蛔也。"治宜和胃驱虫。可用二陈汤加苦楝根、使君子、白术、乌梅、槟榔等。参吐蛔条。

虫胀　胀病之一。亦称虫积胀。指由肠寄生虫所致的腹胀。《证治汇补·胀满章》："虫胀者，腹痛能食，善吃茶叶盐土等物。"《医学入门·鼓胀》："虫积胀，腹痛，善

吃茶盐之物。千金散、雷公丸、小儿使君子丸。大人虚者，木香槟榔丸、灵槟散、化虫丸。”参胀病条。

虫积 病证名。亦称九虫积。指腹内虫多而积聚成块的病症。《古今医统》卷六：“九虫积，腹中不时作块痛，面青，口吐清水。”《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“虫积，饮食积聚，变化生虫，时呕清水苦水，常生腹中咬痛也。宜雄黄、白矾、槟榔、雷丸、芜荑、榧子、使君子肉，方用妙应丸、温白元。”虫积，腹痛多在脐周，时作时止，或腹中有块，不坚硬，推时能动，面黄肌瘦，时吐苦水、清水，或睡时流涎，脘腹膨大等。治宜驱虫消积为主。亦可用化虫丸、平安万应丸、乌梅丸等方。本证可见于肠寄生虫病。

虫积胀 即虫胀。见《医学入门·鼓胀》。详虫胀条。

虫积腹胀 证名。指虫积肠内所致的腹胀。《症因脉治》卷三：“虫积腹胀之症，肚大青筋，腹皮胀急，反能饮食，或面见白斑黑点，或喜食一物，或腹起块扛，大便偶见长虫。”治宜驱虫为主。可用万应丸、使君子丸等。参腹胀、虫积条。

虫积腹痛 病证名。指肠寄生虫积聚所致的腹痛。《症因脉治》卷四：“虫积腹痛之症，腹中有块，块或耕起，痛而能食，时吐清水，或下长虫，面见白点，唇无血色，或爱食一物，肚大青筋，此虫积腹痛之症也。”治宜驱虫为主。用使君子散、乌梅丸、雄黄槟榔丸等方。腹中有块，秘方万应丸；时下长虫，化虫丸；平居调理，宜用健脾消积之药。参腹痛、虫痛条。

虫病 病名。泛指因虫所致的各种疾患。《景岳全书·杂证谟》：“虫之为病，人多有之。由于化生，诚为莫测，在古方书虽曰由湿由热，由口腹不节，由食饮停积而生，是因皆有之矣。然以常见验之，则凡藏强气盛者未闻其有虫。正以随食随化，虫自难存。而虫能为患者，终是脏气之弱，行化之迟，所以停聚而渐致生虫耳。然则或由湿热，或由生冷，或由肥甘，或由滞腻，皆可生虫，非独湿热已也。至若治虫之法，虽当去虫，而欲治生虫之本，以杜其源，犹当以温养脾肾元气为主，但使脏气阳强，非惟虫不能留，亦自不能生也。余制有温脏丸方最所宜也。”《证治汇补·虫病章》：“凡虫症，眼眶鼻下必带青色，面上痿黄，或生白斑，或见赤丝，唇疮如粟，或红而肿，或缓而痛，饮食减少，肌肉不生，睡卧不安，肠鸣腹痛，口吐清水，目无睛光，甚则沉沉寒热，肚大青筋，或为鬼胎血鳖。”又：“好食茶叶、生米、草纸怪异之物，当因倦少食，今反饮食如常，形健不渴，悉属虫症。”治用化虫丸、追虫丸、遇仙丹等。参九虫病、狐惑等条。

虫疰痢 病名。见《痢证汇参》卷四。即蛊注痢。详该条。

虫痛 病名。指因肠内虫扰动所致的脘腹疼痛。《医碥·虫》：“虫证心嘈腹痛，或上攻心如咬，……饥则痛，得食痛更甚，饱即安，时痛时止，以手附击即息。”《丹溪心法附余》卷十五：“虫痛者，面上白斑，唇红，能食属虫，治以苦楝根、锡灰之类。”当先以肉汁及糖蜜食下，则引虫痛向上，然后服用驱虫药。《医学入门·腹痛》：“虫痛，吐水定能食，虫痛，肚大青筋，往来绞痛，痛定能食，发作有时，不比诸痛停聚不散，乌梅丸、化虫丸。”参九虫病、蛔虫病条。

虫渴 消渴病之一。《类证治裁·三消》：“有虫渴，脏腑生虫，耗津液而成消渴，苦楝子汤。”

虫瘕 病证名。指寄生虫结聚肠中所致的瘕病。《灵枢·厥病》：“肠中有虫瘕及蛟蛕，皆不可取以小针，心腹痛，懊侬发作，肿聚，往来上下行，痛有休止，腹热喜渴，涎出者，是蛟蛕也。”《类经·针刺类》

注："此言虫瘕在肠胃中，亦为心腹痛也。瘕，结聚也。……虫瘕之证，其痛则懊侬难忍，或肚腹肿起而结聚于内，或往来上下而行无定处，或虫动则痛，静则不痛而有时休止，或腹热喜渴而口涎出者，是皆蛟蛔之为患也。"本证与虫积类似，详瘕病条。

虫鼓　鼓胀之一。《石室秘录》卷六："虫鼓，微小腹作痛，而四肢浮胀不十分之甚，面色红而带点如虫蚀之象，眼下无卧蚕微肿之形，此是虫鼓也。"参虫胀、虫积腹胀条。

吊脚痧　病证名。即霍乱转筋。《霍乱燃犀说》卷上："霍乱有称为吊脚痧者，即霍乱之剧而转筋者，原非另有一证也。"详霍乱条。

吃忒（tè特）　即呃逆，又称咳逆。古称哕。《儒门事亲·治病百法·咳逆》："咳逆，俗呼曰吃忒。"详呃逆条。

吃逆　证名。见《丹溪心法·咳逆》。即呃逆，详该条。

刚痉　病名。一作刚痓。症见发热无汗，恶寒，颈项强急，头摇口噤，手足挛急或抽搐，甚则角弓反张，脉弦紧等。《金匮要略·痉湿暍病脉证治》："太阳病，发热无汗，反恶寒者，名曰刚痉（一作痓，余同）。"又："太阳病，无汗，而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，欲作刚痓，葛根汤主之。"又："痓为病（一本痓字上有刚字），胸满口噤，卧不着席，脚挛急，必齘齿，可与大承气汤。"《圣济总录》治伤寒刚痉，选用石膏汤、羚羊角汤、犀角大黄散等方。风热盛亦可致刚痉。《医醇賸义·湿热暑》："刚痉者，头痛项强，手足搐逆，甚则角弓反张，发热无汗，此风热盛也，热伤营血，筋脉暴缩，风入经络，肢节拘挛，风热合而为病，赤芍连翘散主之。"参见痉条。

刚痓　病名。出《金匮要略·痉湿暍病脉证治》。即刚痉。详该条。

肉虫病　病名。九虫病之一。一名肝虫病。《诸病源候论·九虫病诸候》："肉虫，状如烂杏。……令人烦满。"参九虫病条。

肉行　天行时疫的一种。见《续名医类案·奇疾门》。多为血枯而感天时不正之气所致。以其肉推之则一堆，平之则如故为特征，并见头痛发热，恶心口渴，神昏欲寐，四肢无力等症。治法不宜单从发散，须在补血药如熟地、当归、首乌、杞子中加羌活等风药。

肉极　病证名。指肌肉痿弱困怠的疾患。《备急千金要方·脾脏》："凡肉极者，主脾也，脾应肉，肉与脾合，若脾病则肉变色。又曰，至阴遇病为肌痹，肌痹不已，复感于邪，内舍于脾。"症见身上如鼠走，多汗，四肢急痛，或软弱，唇口坏，皮色变。宜用薏苡仁散、石楠散、参苓元等方。其偏虚寒者，症见体重怠惰，四肢不欲举，不嗜饮食，动则关节痛，右胁下痛引肩背不可转动。宜用大黄芪汤、茯苓散等方。参六极、肌极条。

肉苛　病名。指肌肉顽木沉重，不知痛痒寒热之症。《素问·五常政大论》："寒客至，沉阴化，湿气变物，水饮内搐，中满不食，皮痹肉苛，筋脉不利，甚则肿身后痛。"《素问·逆调论》："人之肉苛者，虽近衣絮，犹尚苛也，是谓何疾？岐伯曰：荣气虚，卫气实也。荣气虚则不仁，卫气虚则不用，荣卫俱虚，则不仁且不用，肉如故也。"可见于痿、痹、中风、麻木等症。

肉枯　证名。出《灵枢·刺节真邪》。指肌肉干枯萎缩。多由外邪乘虚内侵，气血衰少，肌肉失于濡养所致。本证可见于虚劳、偏枯、痿、痹等。参各条。

肉烁　证名。指阳热亢盛，煎熬津液，久而肌肉消削者。《素问·皮部论》："热多则筋弛骨消，肉烁腘破，毛直而败。"《素问·逆调论》："人有四支热，逢风寒如炙如火者何也？岐伯曰：是人者，阴气虚，阳

气盛，……逢风而如灸如火者，是人当肉烁也。”本证可见于虚劳、消渴等。

肉绝 病名。指肌肉羸弱败绝的疾患。《千金要方·脾脏》：“扁鹊云：“肉绝不治，五日死。何以知之？皮肤不通，外不得泄。凡肉应足太阴，太阴气绝则脉不营其肌肉，唇反者气尽，则肉先死。”参肉极条。

肉积 九积之一。指食肉过多而成积滞者。《儒门事亲》卷三：“肉积，癥瘤核疬，腻粉，白丁香，砭刺出血，甚则硇砂、信石。”《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“食肉过多成积，腹多膨胀，泄泻疼痛也。宜楂肉、阿魏、硇砂、硝石；方用阿魏丸、小阿魏丸、三棱煎元。”按：轻粉、硇砂、信石（砒石）等药有毒，一般作外用，不入煎剂。参积条。

肉疸 病名。见《诸病源候论·黄病诸候》。为九疸之一。症见身面发黄，饮少，小便多而色白如泔。《三因极一病症方论》卷十：“发于脾，则为肉疸。”多因饮食过度，醉酒劳伤，脾胃有瘀热所致。治宜寒水石散等方。参黄疸有关条。

肉脱 证名。出《灵枢·经水》。指肌肉瘦削如脱尽的症象。多因精血内竭，中气虚衰所致。本证可见于虚劳、痿证及久病垂危患者等。

肉淋 即膏淋。《诸病源候论·淋病诸候》：“淋而有肥状似膏，故谓之膏淋，亦曰肉淋。”详膏淋条。

肉瞤筋惕 证名。筋惕肉瞤的别称。见《伤寒论大全》卷二。详筋惕肉瞤条。

肉蒸 五蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。又为二十三蒸之一。详五蒸、二十三蒸条。

肉痿 痿症之一。亦称脾痿。由于脾气热而致肌肉失养，或湿邪困脾，伤及肌肉所致。症见肌肉麻痹不仁，口渴，甚则四肢不能举动等。《素问·痿》：“脾主身之肌肉……脾气热，则胃干而渴，肌肉不仁，发为肉痿。”又：“有渐于湿，以水为事，若有所留，居处相湿，肌肉濡渍，痹而不仁，发为肉痿。”治宜清热化湿，健脾和胃。选用川连枳壳汤、泻黄散、栀连平胃散、栀连二陈汤，或用二术二陈汤、霞天膏等方。参痿条。

肉痹 病名。指虽能饮食而四肢活动迟钝、不能收持之症。《素问·四时刺逆从论》：“太阴有余，病肉痹寒中。”《华氏中藏经·论肉痹》：“肉痹者，饮食不节，膏粱肥美之所为也。脾者肉之本，脾气已失，则肉不荣，肉不荣则肌肤不滑泽，肌肉不滑泽，则腠理疏，则风寒暑湿之邪易为入，故久不治则为肉痹也。肉痹之状，其先能食而不能充悦，四肢缓而不收持者，是也。……宜节饮食以调其脏，常起居以安其脾，然后依经补泻以求其愈尔。”参肌痹条。

肉瘦 病名。指因食肉无度而成的瘦病。《诸病源候论·癥瘦病诸候》：“人有病常思肉，得肉食讫，又思之，名曰肉瘦。”本病与肉癥类似，参该条。

肉癥 病证名。❶指因食思肉类无度，日久脘腹结块坚定不移的一种病症。多由滞积挟痰瘀凝滞所致。见《备急千金要方·肝脏》。❷指妇人脐下结块，大如杯升，按之坚硬，月经不通，身体羸瘦的一种病症。见《肘后备急方·治卒心腹癥坚方》。参见癥病各条。

〔丿〕

先血后便 亦称近血。出《金匮要略·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治》。指大便下血，血在粪前。《景岳全书·血证》：“血在便前者，其来近，近者或在广肠，或在肛门。”参便血、肠风、脏毒条。本证可见于溃疡性结肠炎，直肠癌肿，息肉，痔疮，肛裂等疾病。

先便后血 亦称远血。出《金匮要略·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治》。指大便

下血，血在粪后。《景岳全书·血证》："血在便后者，其来远，远者或在小肠，或在于胃。"参便血条。本证可见于上消化道溃疡、慢性胃炎、胃肠癌肿等疾病。

舌肿　证名。指舌体肿胀的症象。《诸病源候论·舌肿强候》："心脾虚为风热所乘，邪随脉至舌，热气留心，血气壅滞，故舌肿。"《医林绳墨》卷七："七情之所郁，则舌肿而难食。"《杂病源流犀烛·口齿唇舌病源流》："有舌肿满口不能出声者，宜蒲黄散。"亦可用黄连汤泻火清热，或用针刺法治疗。

舌卷　证名。指舌体卷缩，不能伸出。多因邪火热灼，寒邪直中或风痰扰动所致。出《素问·脉要精微论》。《灵枢·经脉》："筋急则引舌与卵，故唇青，舌卷，卵缩。"《医林绳墨》卷七："因风痰之所中，则舌卷而难言。……津液结鞕，则舌卷而难伸。"《嵩崖尊生书》卷六："舌卷，亦是伤寒见证，系足厥阴肝经，烦满、消渴、谵妄，邪热传脏，宜下。无身热、口渴、四肢厥冷过肘膝，为直中真寒病，急温，直中少阴亦有舌卷囊缩者，急温补。"证属危候。

舌卷囊缩　证名。指舌体卷曲不能伸直及阴囊向上收缩。《素问·热论》："六日厥阴受之，……故烦满而囊缩。"《难经·二十四难》："足厥阴气绝，即筋缩引卵与舌卷。"《医学心悟》卷二："肝主周身之筋，热邪内灼，则津液枯，不能荣养于筋，故舌卷而囊缩，宜急下之。"本证多因热邪内灼，津液枯涸，筋脉失养所致，系热病深入厥阴经之危候。若见烦满消渴，唇焦口燥，舌卷不伸，舌面无津者，可急下存阴，用承气汤之类；若下利清谷，四肢厥逆，口鼻气冷，舌卷囊缩而润泽，脉沉迟者，是寒邪直中厥阴经证，宜用当归四逆汤，或代灸涂脐膏贴关元穴。

舌衄　病证名。见《证治要诀·诸血门》。又称舌上出血。指血液从舌体流出。《诸病源候论·血病诸候》："心主血脉，而候于舌。若心藏有热，则舌上出血如涌泉。"舌乃心苗，舌本又为肝脉所络，故多因心肝火盛，热迫血外出。因心火上炎者，可伴见舌红舌胀，心烦不寐等。治宜清泄心火，方用泻心汤，或导赤饮加黄连、连翘、蒲黄。因肝火上扰者，多伴见头痛目赤，胁痛舌干。治宜清肝泻火，如文蛤散、龙胆泻肝汤、当归龙荟丸等方。外治可用炒蒲黄末、炒槐花末等末敷。《景岳全书·杂证谟》："舌上无故出血如缕者，以心、脾、肾之脉皆及于舌，若此诸经有火，则皆能令舌出血。"又《杂病源流犀烛·诸血源流》："有舌硬而出血者，宜木贼煎；有舌肿出血如泉者，宜涂舌丹；有舌上出血，窍如针孔者，宜紫金沙丸。"《血证论》以"胃火熏之，亦能出血。"故须详审。参衄血有关条。

舌疸　病名。见《诸病源候论·黄病诸候》。为九疸之一。因饮食过度，醉酒劳伤，脾胃有瘀热所致。症见身面发黄，渴而数便。参黄疸有关条。

舌萎　证名。指舌体萎废，不能自由转动。《灵枢·经脉》："足太阴气绝者。则脉不荣肌肉。唇舌者，肌肉之本也。脉不荣则肌肉软，肌肉软则舌萎。"《张氏医通·伤寒绪论》："舌痿不能动者。肝绝。"可见于脏气衰竭等危重病候。

舌麻　证名。指舌有麻木的感觉。《嵩崖尊生书》卷六："血虚亦舌麻，火痰居多，审因施治。"《证治汇补·麻木章》："脾肾亏，湿痰风化乘间而入，均使舌本麻木。"参舌痹条。

舌强　证名。指舌体伸缩不利的症象。外感热病常见于热入心包，内伤杂病多见于中风症。亦可由热盛伤津或痰浊壅阻所致。《诸病源候论·风舌强不得语候》："今心脾二脏受风邪，故舌强不得语也。"《医林绳墨》卷七："涎痰壅盛，则舌强而难吞。"《杂病源流犀烛·口齿唇舌源流》："痰迷

而舌强者，宜防己、僵蚕、木通、菖蒲、竹沥、山栀、南星、半夏、荆芥、陈皮。亦有中风病而舌强、舌卷、不能言者，宜大秦艽汤，若天热加知母五分。”参中风条。

舌痹 病名。指舌体有麻木不仁的感觉。多因痰气阻滞脉络，或血虚失荣所致。《赤水玄珠·舌门》：“舌痹或麻，此因痰气滞于心胞络。”又：”血虚舌麻者，四物汤加黄连。”《医钞类编》卷十二：“舌无故常自痹者，名舌痹。由心血不足，不可作风治，理中汤加当归，或归脾汤加炮姜服之。”本证可见于中风等疾患。

舌缩 证名。指舌体短缩。出《千金要方》卷十四。《医学心悟》：“凡舌硬，舌强，舌短缩，舌卷，神气昏乱，语言不清者，皆危证也。”参舌卷条。

牝疟 疟痰之一。《金匮要略·疟病脉证并治》：“疟多寒者，名曰牝疟。”《三因极一病症方论·疟叙论》：“病者寒多，不热，但惨戚振慄，病以时作，此以阳虚阴盛，多感阴湿，阳不能制阴，名曰牝疟。”方用蜀漆散、柴胡桂枝干姜汤等。参疟疾条。

传尸 古病名。指能互相传染的消耗性疾患。《外台秘要·传尸方四首》：“大都男女传尸之候，心胸满闷，背髆烦疼，两目精明，四肢无力，虽知欲卧，睡常不着，脊膂急痛，膝胫酸疼，多卧少起，状如佯病，每至旦起，即精神尚好，欲似无病，从日午以后，即四体微热，而好颜色，喜见人过，常怀忿怒，才不称意，即欲嗔恚，行立脚弱，夜卧盗汗，梦与鬼交通，或见先亡，或多惊悸，有时气急，有时咳嗽，虽思想饮食而不能多飡，死在须臾，而精神尚好，或两胁虚胀，或时微利，鼻干口燥，常多粘唾，有时唇赤，有时欲睡，渐就沉羸，犹如水涸，不觉其死矣。”一名转注。固其病变早晚不同，又有疰疟、遁注、骨蒸、伏连、殗殜之称，参有关各条。本症相似于结核病。

传尸劳 古病名。见《圣济总录·骨蒸传尸门》。又名传尸、劳瘵、尸注、殗殜、复连、骨蒸等。系一种相互传染而广泛流行的病症，包括现代医学的结核病。《证治要诀·虚损门》：“传尸劳，骨肉相传，甚至灭门。此其五脏中皆有劳虫，古名瘵疾。”症见寒热，盗汗，咳嗽，咯痰，咯血，疲乏，消瘦，饮食减少，泄利，腹部有块，遗精，白浊，或经闭等。治宜益气养阴，清热杀虫。可选用獭爪丸、百部清金汤、润神散、黄连饮等方。参劳瘵、虚劳条。

传中 见《医述·阴证分传中》。传，指传经；中，指直中。《医学入门·伤寒》：“有风寒自背入者，直中太阳少阳；自面入者，直中阳明；有首尾只在太阳经而不传诸经者；有间传一二经者；有不传而罢者；有不罢再传者；有不自阳经，直中阴经者。”《医学心悟·阴证有三说》：有传经之阴证，阴中之热证也；有直中之阴证，阴中之寒证也。”传经的阴证既有热证，例如少阴病有心中烦，不得卧的黄连阿胶汤证等，但也有寒证。故不论传经或直中，都应根据证候表现，以辨寒证或热证。参传经、直中三阴等条。

传经 指伤寒六经病的传变，病邪从一经传入另一经的证候。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“伤寒一日，太阳受之，脉若静者为不传。颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也。”《伤寒论大全·辨张仲景伤寒论》：“盖风寒之初中人也，无常，或入于阴，或入于阳，皆无定体，非但始太阳终厥阴也。或自太阳始，日传一经，六日至厥阴，邪气衰不传而愈者，亦有不罢再传者，或有间经而传者，或有传至二三经而止者，或有终始只在一经者，或有越经而传者，或有初入太阳，不作郁热，便入少阴而成真阴证者，或有直中阴经而成寒证者。”《景岳全书·伤寒典·传经辨》：“伤寒传变不可以日数为拘，亦不可以次序为拘，如内经言一日太阳二日阳明三日少阳之类，盖言传经

之大概，非谓凡患伤寒者必皆如此也。”病邪轻重，正气强弱，以及治疗得当与否，是传经与不传经的重要因素。观察疾病的传经与否，决定于脉证有无变化。六经传变，有循经传、越经传、表里传、合病、并病、直中三阴等。详各该条。

传症痨咳　病名。指痨瘵病的咳嗽。传作传染解。《医学入门》卷五：“传症痨咳，即干咳、劳咳久者。”参干咳、劳咳、痨瘵咳嗽条。

伏气　病名。见《伤寒论·伤寒例》。亦称晚发、伏气温病。详各该条。

伏气温病　病名。“伏气”原见《伤寒论》，伏气温病见《温热经纬》卷二。指感受外邪，蕴伏于里，经过一定时期而发的温病。以《素问·阴阳应象大论》“冬伤于寒，春必温病”为理论根据。临床特征为病发即见内热较重，出现发热、口渴、心烦、溲赤等症状。治疗以清泄里热为主。一说本病亦有“春日阳生，内蕴之热，原有萌动之机，而复薄受外感，与之相触，则陡然而发，表里俱热”者（见《衷中参西录·治温病方》）。参温病、春温、伏暑、温疟等条。

伏虫病　病名。九虫病之一。《诸病源候论·九虫病诸候》：“九虫者，一曰伏虫。”多因脾胃虚弱，湿热虫蚀所致。证见困倦少食，腹痛腹泻，甚则面黄浮肿，体力锐减，或不食羸瘦，或异嗜茶叶、生米、草纸等。治宜健脾杀虫。方用伐木丸、黄病绛矾丸、化虫丸等。本病类似钩虫病。参九虫病条。

伏连　古病名。指传尸内传至脏者。《外台秘要·传尸方四首》论传尸，以病邪内传五脏，名之伏连。可用朱砂丸治疗。参传尸条。

伏饮　痰饮之一。因饮邪伏匿于体内，或留饮去而不尽，潜伏为患。《金匮要略·痰饮病脉证并治》：“膈上病痰，满喘，咳唾，发则寒热，背痛腰疼，目泣自出，其人振振身瞤剧，必有伏饮。”治宜化饮逐邪，扶正固本。方用小青龙汤、木防己汤、桂枝半夏汤、倍术丸等。本证可见于慢性支气管炎、肺气肿、肺源性心脏病等。参痰饮、留饮条。

伏热　泛指热邪深伏于体内的发热病症。出《素问·本病论》。《温热经纬·叶香岩三时伏气外感篇》：“若因外邪先受，引动在里伏热，必先辛凉以解新邪，继进苦寒以清里热。”伏热，章虚谷引申为伏邪。《重订广温热论·清凉法》：“温热郁于气分为伏热，郁于血分为伏火，通称伏邪。……凡用清凉方法，必先辨其为伏热，为伏火。热属气分，为虚而无形。如盛夏酷暑炎蒸，虽挥汗淋漓，一遇凉风而即解，故人身之热，气清即退。至其清热之法，首用辛凉继用轻清者，所以清肃气分之浮热也。终用甘寒者，所以清滋气分之燥热也。”参发热、风温、暑温等条。

伏梁　古病名。❶指心积症。《灵枢·邪气藏腑病形》：“心脉，……微缓为伏梁，在心下，上下行，时唾血。”《难经·五十四难》：“心之积名曰伏梁，起脐上，大如臂，上至心下。久不愈，令人病烦心。”治宜伏梁丸等方。参心积条。❷指髀股骶皆肿，环脐而痛的疾患。《素问·腹中论》：“人有身体髀股骶皆肿，环脐而痛，是为何病？岐伯曰：病曰伏梁，此风根也，其气溢于大肠，而著于肓，肓之原在脐下，故环脐而痛也。”《三因极一病证方论》卷八以本证为心积伏梁之日久不愈者可见之，亦宜用伏梁圆治之。❸指少腹内之痈肿。《素问·腹中论》：“病有少腹盛，上下左右皆有根，……病名伏梁，……裹大脓血，居肠胃之外。”《儒门事亲》卷三：“其一伏梁，上下左右皆有根，有大脓血，此伏梁义同肚痛。”1972年甘肃武威汉滩坡出土《武威汉代医简》有“治伏梁裹脓在肠胃之外方”，

用大黄、黄芩、芍药、消石、桑皁肖、虻虫，祛瘀破坚，清热解毒。

伏暑 ❶病名。指发于深秋以至冬月的伏气温病。见《济生方》卷三。《杂病源流犀烛》卷十五："伏暑症，暑久伏病也，……若热毒之气既已受之，或为些小风寒所固，此毒遂渐渐入内，伏于三焦肠胃之间，或秋或冬，久久而发，此暑毒伏于人身之内。"因病发季节不同，有秋时晚发、秋后晚发、伏暑晚发、伏暑伤寒等。病证轻重与邪伏时间的长短有关。《温病条辨》卷一："长夏受暑，过夏而发者，名曰伏暑，霜未降而发者少轻，霜既降而发者则重，冬日发者尤重。"初起多由新感引动，头痛身热，恶寒无汗，体痛肢楚，脘闷恶心，口渴或不渴，便秘或溏，色如红酱，溺黄浊而热，继则状如疟，但寒热模糊不甚分明，或皮肤隐隐见疹，或红或白，甚或但热不寒，热盛于夜，谵语烦躁，渴喜冷饮，或呕或呃，天明得汗，身热虽减而胸腹灼热不除，病程久延，速则三四候可解，缓则五七候始除。舌苔白腻而厚或满布如积粉，继则由白转黄，甚则转灰转黑，或糙或干，或焦而起刺，或燥而开裂。亦有初起即寒少热多，日轻夜重，头痛而晕，目赤唇红，面垢齿燥，烦躁恶热，口干不喜饮，饮则干呕，咽燥如故，肢虽厥冷而胸腹灼热如焚，大便多秘，或解而不多，或溏而不爽，肛门如灼，溺短赤涩，剧则手足瘛疭，昏厥不语，或烦则狂言乱语，静则郑声独语，舌色鲜红起刺，剔无苔垢，甚则深红起裂，或嫩红而干光，俟其邪由营转气，苔始渐布薄黄，及上罩粘腻薄苔，如舌红中夹黑苔，或舌红起刺中夹黄黑苔者，症情凶危，本病脉多弦数不扬，治宜视热偏重者，按暑温治疗，湿偏重者，按湿温治疗。❷指病因。《六因条辨》中卷："四时伏气，皆能为病，即伏寒、伏风、伏燥，皆可与伏暑立名主病。故春温为冬令之伏寒，肠风为春令之伏风，疟痢为夏间之伏暑，咳嗽为秋天之伏燥，以类而推。"

伏暑伤寒 病名。一名伏暑兼寒、伏暑晚发。《通俗伤寒论·伏暑伤寒》："夏伤于暑，被湿所遏而蕴伏，至深秋霜降及立冬前后，为外寒搏动而触发。邪伏膜原而在气分者，病浅而轻；邪舍于营而在血分者，病深而重。"详伏暑条。

伏暑晚发 病名。指伏暑之发于霜降后立冬前者。《重订广温热论·湿火之症治》："至于秋暑，由夏令吸收之暑气，与湿气蕴伏膜原，至秋后而发者是也。……发于处暑以后者，名曰伏暑，病尚易治；发于霜降后立冬前者，名曰伏暑晚发，病最重而难治。"参伏暑、晚发条。

伏痰 痰证之一。指痰浊留伏于胸膈所致的病证。《不居集》卷十七："伏痰：略有感冒，便发哮嗽，呀呷有声。"方用乌巴丸等。参痰证条。本症类似慢性哮喘性支气管炎或支气管哮喘。

伏瘕 病名。即虚瘕。《儒门事亲》卷八："小肠遗热于大肠，为伏瘕。"日·丹波元简《素问识》卷四："简按：《颜氏家训》曰，宓、伏、虙，古来通字。"详虚瘕条。

休息痢 病名。指痢疾时止时发，久久不愈者。见《诸病源候论·痢病诸候》。《症因脉治》卷四有外感休息痢，内伤休息痢之别。多因治疗失宜，或气血虚弱，脾肾不足，以致正虚邪恋，湿热积滞伏于肠胃而成。发作时，治宜清热化湿为主。或兼补气血，或兼补脾肾，可选用香连丸、驻车丸、倪氏补理煎方等。缓解期，可见神疲乏力，食欲不振，形体消瘦四肢不温等症，治宜健运脾胃，补益气血为主，可选用补中益气汤、八珍汤等方；属肾亏者，四神丸。《类证治裁》以屡发屡止，经久不愈，用诃黎勒散，因固涩太早，积滞未清，用香连丸加茯苓，枳实；因饮食失节，用香连丸加楂肉、神曲；中气下陷，用补中益气汤；因脏寒虚

滑，用大断下丸。《医贯》载有一种休息痢，系寒积大肠，独用一味巴豆炒研腊丸吞服。本病可见于慢性细菌性痢疾。溃疡性结肠炎，慢性阿米巴痢疾及局限性肠炎等疾患。参痢疾条。

任脉病　病名。指任脉经经气异常而致的病症。《素问·骨空论》："任脉为病，男子内结七疝，女子带下瘕聚。"《脉经》卷二："脉来紧实细长至关者，任脉也。动苦少腹绕脐下引横骨、阴中切痛"又："横寸口边丸丸，此为任脉，苦腹中有气如指，上抢心，不得俛仰，拘急。"《杂病源流犀烛·任脉病源流》用夺命丹、一捏金散治少腹引阴中切痛，用木香顺气散、和气汤治腹中有气上抢心等症。

仲冬痹　病名。出《灵枢·经筋》。十二经筋病中的手太阴筋病。《灵枢注证发微》："此证当发于十一月之时，故名之曰仲冬痹也。"详手太阴经筋病候条。

仲春痹　病名。出《灵枢·经筋》。十二经筋病中的足太阳筋病。《灵枢注证发微》："此证当发于二月之时，故名之曰仲春痹也。"详足太阳经筋病候条。

仲秋痹　病名。出《灵枢·经筋》。十二经筋病中的足少阴筋病。《灵枢注证发微》："此证当发于八月之时，故名之曰仲秋痹也。"详足少阴经筋病候条。

仲夏痹　病名。出《灵枢·经筋》。十二经筋病中的手太阳筋病。《灵枢注证发微》："此证当发于五月之时，故名之曰仲夏痹也。"详手太阳经筋病候条。

伤力嗽　病证名。指因持重过度，内伤脏腑气血所致的咳嗽。《不居集》卷十五："伤力嗽，兼有痰涎。用白术、知母、茯苓、甘草、当归、白芍、川芎、麦冬、贝母、款冬花、花粉。"参损嗽、咳嗽条。

伤风　病名。❶指风邪犯表所致的一种外感轻症。见《伤寒直格》卷中。又称冒风、感冒。《景岳全书·杂证谟》："邪轻而浅者，上犯皮毛，即为伤风。"详见感冒条。❷指伤寒病太阳中风。《时病论·伤风》："伤风之病，即仲景书中风伤卫之证也。"详见中风。❸指感受风邪所致的一种外感热病。见《三因极一病证方论》卷四。载六经皆有伤风症：太阳伤风，症见发热，恶风，自汗，头项强，腰脊痛，脉浮等。宜桂枝汤。阳明伤风，症见发热，腹满，烦渴，自汗，嗜卧，身重，小便难，脉浮弦长而数等。宜杏子汤。少阳伤风，症见身热，恶风，自汗，颈项强，胁满，口苦而渴，脉浮弦等。宜柴胡加桂汤。太阴伤风，症见自汗，胸满，腹痛，自利，咽干，脉弦大而缓等。宜桂枝芍药汤。少阴伤风，症见口燥，舌干，咽痛，心烦，自汗，腰痛连脐骨痠痛，脉沉弦等。宜桂枝汤。厥阴伤风，症见恶风而倦，自汗，小腹急痛，寒热如疟，骨节烦疼，脉微而迟等。宜八物汤。

伤风头痛　病证名。指伤于风邪的头痛。《脉因证治·头目痛》："伤风头痛，或半边偏痛，皆因冷风所吹。"《医林绳墨·头痛》："有风寒克于头，令人鼻塞声重，自汗恶风，此伤风之头痛也。"《医学六要·头痛》："伤风头痛，脉缓而浮，或左脉微急，证兼鼻塞，眼胀目赤，伤风头痛也。宜解肌，冬月桂枝汤，余月十味芎苏饮。"参感冒头痛条。

伤风咳　病证名。《三因极一病证方论》卷十二："伤风咳者，憎寒、壮热、自汗、恶风、口干、烦躁。"即伤风咳嗽。详该条。

伤风咳嗽　病证名。指咳嗽由外感风邪引起者。《症因脉治》卷二："伤风咳嗽之症，憎寒，壮热，头痛，眼眶痛，自汗，恶风，鼻塞，涕流，痰结肺管，咳嗽不已。"《明医杂著》卷二："春若伤风咳嗽，鼻流清涕，宜辛凉解散。"方如苏子杏仁汤、羌活汤、干葛汤等。参咳嗽、风嗽、伤风咳条。

伤风眩晕 病证名。又称风晕。指感冒风邪及头风证所致的眩晕。《杂病源流犀烛·头痛源流》："伤风眩晕，必恶风自汗，或素有头风而发。宜芎劳散。"参眩晕、风寒眩晕、风热眩运、头风眩晕等条。

伤风腰痛 病证名。见《类证治裁·腰痛》。又称风腰痛。详该条。

伤生冷果菜 伤食之一。见《张氏医通》卷二："伤生冷果菜，宜木香、砂仁、炮姜、肉桂。"《杂病源流犀烛·伤食不能食源流》："至于所伤之物既种种不同，宜各用主治之药。……伤菜，丁香，麝香、肉桂。伤瓜，鲞鱼炙食，瓜皮煎汤。"《世医得效方》卷四："果菜积，平胃散加丁香麝香为末，热盐汤调服，麝香汤下阿魏圆三十粒立效。"参伤食条。

伤肉 伤食之一。《杂病源流犀烛·伤食不能食源流》："至于所伤之物，既种种不同，宜各用主治之药。……伤肉，轻者山查，阿魏；甚者硝石、硼砂。伤狗肉，杏仁、山查。"《张氏医通》卷二："伤诸肉食，用草果、山查。"亦可选用三黄枳术丸、三棱煎。狗肉伤亦可服芦根汁；食鸭肉不消，糯米泔水顿饮一盏即消；食生肉在胸膈不化必成癥瘕，捣马鞭草汁及生姜汁饮之。参伤食条。

伤饮 伤食之一。《证治百问》："饮即茶、汤、酒、水之类，或脾虚不运而结滞，或暴渴多饮而停留，或豪兴狂饮而沉醉，或……以茶茗自供，往往至后面黄肌瘦，脾泄中满，烦渴肿胀。若遇利疾，危者不少，六脉濡微细滑，举按无力。"治宜发汗利小便，使上下分消其湿，葛花解醒汤，五苓散之类主之。参伤食、伤酒、伤茶等条。

伤谷 伤食之一。《古今医鉴》卷四："食者有形之物，伤之则宜损其谷，其次莫如消导，重者宜吐宜下，枳术丸、保和丸、备急丹之类，量轻重择用。"《杂病源流犀烛·伤食不能食源流》："至于所伤之物既种种不同，宜各用主治之药。"伤谷轻者麦芽、谷芽、神麴、砂仁，甚者鸡内金。参伤食条。

伤茶 伤食之一。指饮茶过多所致。《杂病源流犀烛·伤食不能食源流》："至于所伤之物既种种不同，宜各用主治之药。……伤茶，轻者姜黄、芝麻，甚者吴萸、椒、姜。"《世医得效方》卷四："茶积，磨积丸治茶积饮食减少，面黄腹痛。"参伤食、伤饮条。

伤面 伤食之一。《杂病源流犀烛·伤食不能食源流》："至于所伤之物既种种不同，宜各用主治之药。……伤面：莱菔子，姜，酒煎。"《不知医必要·不思食》治用平胃散加谷芽、麦芽、神麴。《证治准绳·伤饮食》选用三黄枳术丸、除湿益气丸等。参伤食条。

伤胃 病证名。又称伤胃吐血。《诸病源候论·血病诸候》："伤胃者，是饮食大饱之后，胃内冷不能消化，则便烦闷强呕吐之，所食之物，与气共上冲蹙，因伤损胃口，便吐血色鲜正赤是也。"详伤胃吐血条。

伤胃吐血 病证名。又称伤胃。指因酒食太过，胃络受伤所致的吐血。《三因极一病证方论》卷九："病者因饮食过度，伤胃，或胃虚不能消化，致翻呕吐逆，物与气上冲蹙胃口决裂，所伤吐出，其色鲜红，心腹绞痛，白汗自流，名曰伤胃吐血。"用理中汤加味等方。参胃经失血条。

伤食 病证名。指因饮食损伤脾胃所致的病证。见《丹溪心法·伤食》。一名食伤。《景岳全书·饮食》："凡治饮食暂伤者，亦当辨虚实。若停滞中焦或胀或痛者，此实证也。当先去其食，宜大和中饮主之。然去食莫先于理气，又惟排气饮为佳；若所停犹在上焦，莫若用吐为捷法，或用吐剂亦可；若食停下焦，痛极兼胀者，须下而去

之，宜神祐丸或备急丸，或赤金豆。”老人虚人易于伤食，治宜权衡虚实，消补兼施。伤食有伤谷、伤面、伤肉、伤鱼鳖、伤蟹、伤蛋、伤生冷果菜、伤酒以及伤茶、宿食、宿滞、五味过伤等，详有关各条。

伤食头痛　病证名。指脾胃积滞、清阳不升所致的头痛。见《证治要诀·头痛》。《医宗必读·头痛》：“伤食头痛，胸满咽酸，噫败卵臭，恶食，虽发热而身不痛，香砂枳术丸。”治宜消食导滞为主，并可选用保和丸、治中汤等方。参头痛条。

伤食发热　病证名。指食积内停所致的发热。《证治汇补·发热章》：“伤食发热，必气口紧盛或沉伏，头疼，呕恶，噫气吞酸，胸口饱闷，或胀或痛，手不可按，蒸蒸然热，明知其热在内也，消导则已。”《金匮翼·发热统论》：“食积者，当暮发热，恶闻食臭，时时嗳腐，其脉滑或实。活人所谓伤食令人头痛，脉数，发热，但左手人迎脉平和，身不疼是也。”治宜枳术丸、保和丸、枳实导滞丸、大柴胡汤等方。参发热条。

伤食泻　病证名。又称食泻、食泄、积泻、食积泻、胃泻。《丹溪心法·泄泻》：“伤食泻，因饮食过多，有伤脾气，遂成泄泻。”症见饱闷恶食，嗳腐吞酸，腹痛则泻，泻后痛减，泻下不畅，粘而秽臭，苔腻，脉滑或弦紧。治宜消食和中，如保和丸、枳术丸、治中汤等方。挟寒者宜温，可用红丸子、小七香丸等，若形症俱实而宜下者，可用感应丸、煮黄丸。挟热者宜清，可用栀连平胃散，若宜下者，可用大承气汤。参泄泻条。

伤食恶寒　病证名。《证治汇补·恶寒章》：“伤食恶寒，由饮食过度，宿食内停，或食冷物所致。脉必沉滑，恶心头痛，饱闷咽酸。宜从消导，食化而寒自已。”参恶寒、伤食条。

伤食腹痛　病证名。指多食不消，气机阻滞所致的腹痛。其症痛甚欲大便，利后痛减，脉多弦或沉滑。《医学正传·腹痛》：“如饮食过伤而腹痛者，宜木香槟榔丸下之；如气虚之人，伤饮食而腹痛，宜调补胃气并消导药，用人参、白术、山楂、神麴、枳实、麦芽、木香，砂仁之类。”或用六君子加木香、砂仁。参腹痛、食积腹痛条。

伤损喘逆　病证名。《症因脉治·喘症论》：“伤损喘逆之因，或饱后举重，或饥时用力，或号呼叫喊，伤损脏腑。”症见喝喝喘急，张口抬胸，不能接续，或胸胁作痛，或吐紫血。脉或促或结，大小不均，如至数不清，按之散乱者，多属危候。治宜理气调逆，和血祛瘀，如四磨汤合四物汤。伤损肺窍久不愈者，用白芨散等方。

伤热咳嗽　病证名。指因湿热行令，热伤肺气所致的咳嗽。《症因脉治》卷二：“伤热咳嗽之症，咽喉干痛，面赤潮热，夜卧不宁。吐痰黄浊，或带血腥臭，烦躁喘咳，每咳自汗。”脉洪数而滑。治宜家秘泻白散、柴胡饮子、栀连清肺饮、凉膈散加川贝母、犀角地黄汤加山栀黄芩等。又名热痰嗽。参该条。本症可见于支气管扩张、肺脓疡或慢性支气管炎急性发作时。

伤酒　伤食之一。一名酒伤。指饮酒过度致伤者。见《证治要诀·伤酒》。《诸病源候论》卷二：“酒性有毒，而复大热，饮之过多，故毒热气渗溢经络，浸溢腑脏，而生诸病也。”症见头晕头痛，胸膈痞塞，恶心呕吐，躁动或昏睡等。治宜发汗、利湿、解酒毒。轻者用葛根、葛花、枳椇子、神麴、黄连、白蔻仁；甚者用甘遂、黑牵牛子等药。《景岳全书·饮食》：“凡饮酒致伤者，多宜除湿利水，若或伤气，亦宜间用人参。然其证有三，不可不辨。一以酒湿伤脾，致生痰逆呕吐，胸膈痞塞，饮食减少者，宜葛花解醒汤、胃苓汤、五苓散之类主之；一以酒热伤阴，或致发热动血者，宜黄

苓芍药汤，清化饮，徙薪饮之类主之；一以酒质伤脏，致生泄泻不已，若气强力壮者，惟五苓散、胃苓汤之类皆可除湿止泻。若因湿生寒以泻伤阴致损命门阳气者，非胃关煎及五德丸、九炁丹之类不可。”伤酒严重者，可成癥积，黄疸、鼓胀。参酒癖、酒疸、水鼓、伤食、伤饮各条。

伤酒头痛 病证名。指饮酒过量，气血逆乱所致的头痛。见《证治准绳·头痛》。《证治要诀·诸伤门》：“伤酒，恶心呕逆，吐出宿酒，昏冒眩晕，头痛如破。”治宜和胃解醒，常用葛花解醒汤加减。参头痛条。

伤酒吐血 病证名。见《医钞类编》卷七。《金匮要略·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证并治》：“夫酒客咳者，必致吐血，此因极饮过度所致也。”酒性大热，最易伤胃，胃气不守，乱于胸中，中焦之血，不布于经络，因热射肺而为咳逆，血随气溢而致吐血。治宜清胃解醒，用徙薪饮、清化饮、葛黄丸、葛花解醒汤加黄连、丹皮等。此症即肺疸之属，亦称伤胃吐血。参肺疸、伤胃吐血、内伤吐血等条。

伤酒泄泻 病证名。见《医略六书·泄泻》。又称酒泄。参该条。

伤酒恶寒 病证名。《证治汇补·恶寒章》：“伤酒恶寒，因饮酒太过，热郁在内，不得宣越而恶寒者，症兼口渴昏眩。”参恶寒、内伤恶寒条。

伤鱼鳖 食伤之一。《杂病源流犀烛·伤食不能食源流》：“至于所伤之物既种种不同，宜各用主治之药。……伤鱼鳖，紫苏、陈皮、木香、姜汁。”参伤食条。

伤蛋 伤食之一。《杂病源流犀烛·伤食不能食源流》：“至于所伤之物既种种不同，宜各用主治之药。……伤蛋，蔻仁、橘红、豆豉、姜汁。”《张氏医通》卷二：“伤蛋满闷，姜汁蒜泥。”参伤食条。

伤暑 病名。❶指中暑热而致的病证。出《素问·刺志论》。《医林绳墨》卷一：“伤暑者，由其暑热劳伤元气之所致也。其症日间发热，头疼眩运，躁乱不宁，无气以动，亦无气以言，或身如针刺，小便短赤，此为热伤元气也，宜以黄连香茹饮，或清暑益气汤、黄连解毒汤，量其虚实而与之。”《医方简义》卷二：“伤暑者，因受暑而伤，暑热伤气，一受暑邪，不急调治，渐入营分，阳已外泄，阴气更被耗散，阴阳两虚，形若虚劳，内热外寒，脉必虚数，东垣清暑益气汤最妙，如胃中宿满者，去黄芪甘草可也。”《杂病源流犀烛》卷十五：“伤暑者……其所及之症，有吐利腹痛气逆，发热，头疼烦渴，肢冷疼，前板齿寒，无汗，脉虚或迟或伏，昏闷者，宜香茹饮；有身热，小便不利者，宜益元散；有吐泻寒热，喘咳痞满，体肿倦卧，便赤者，宜六和汤；有发热呕血者，宜黄连二钱，酒煎服；有暑天身热头疼燥渴者，宜麦冬汤；有暑天发渴者，宜生津丸。以上皆伤暑之属，所当分别而治之者也。”❷指暑病之轻者。《医学心悟》卷三：伤暑者，感之轻者也，其症烦热口渴，益元散主之。中暑者，感之重者也，其症汗大泄，昏闷不醒，或烦心、喘喝、妄言也。”❸指病因。《难经·四十九难》：“何谓五邪？然：有中风，有伤暑，有饮食劳倦，有伤寒，有中湿，此之谓五邪。”参中暑条。

伤暑头痛 病证名。指感受暑气所致的头痛。《世医得效方》卷二：“伤暑头痛，浓煎葱白汤。”症见头胀痛，身热汗多，心烦口渴，面垢，舌苔腻或黄腻，脉微带数。治宜清暑渗湿，方用香薷散加茵陈、黄连、车前子等。参头痛条。

伤暑咳嗽 病证名。指感受暑邪所致的咳嗽。多因触冒暑湿，或热甚于中，或气虚身弱，偶感时行，内外相挟，蒸酿胸胃之间，上熏于肺所致。《古今医鉴·咳嗽》：“伤暑咳者，脉数，烦热引饮，口燥，或吐涎沫，声嘶咯血。”《症因脉治》卷二：“伤

暑咳嗽之症，身热引饮，内热烦躁，外反恶寒，或身痛口渴，咳嗽身倦。”脉濡软或虚或数。若身热引饮，内热烦躁者，用石膏知母汤；身痛口渴，外反恶寒者，十味香薷饮、泻白益元散；外冒暑邪，内伤积热者，凉膈散；脉虚身热，气虚身乏之人，清暑益气汤。参暑嗽条。

伤暑腹痛 病证名。指暑伤气分，脾经郁滞所致的腹痛。《杂病源流犀烛·腹少腹病源流》：“暑伤气分，长夏腹胀，食减、微痛，宜调脾疏肝。宜人参、广皮、白芍、茯苓、谷芽、益智仁。”《医钞类编·腹痛门》：“盛暑而痛，或泄利并作，脉必虚豁，宜十味香薷饮及六和饮。”参腹痛条。

伤暑霍乱 病名。见《张氏医通·霍乱》。因感受暑热所致。症见身热烦渴，气粗喘闷，上吐下泻，神情躁扰等；甚则昏闷，抽掣，厥逆少气，唇面爪甲皆青，六脉俱伏，吐出酸秽，泻下臭恶，便溺黄赤者，此火伏于厥阴，如热极似阴之候。治宜急救回生丹、解毒活血汤等；轻者可选用香薷饮冷服，或竹叶石膏汤、六一散等方。参热霍乱、霍乱条。

伤湿头运 病证名。见《丹溪心法·头眩》。又称湿晕。因感受湿邪所致。症见头重眩晕，鼻塞声重，呕吐痰涎，身体沉重等。治宜散湿化湿为主。可用除湿汤、渗湿汤、芎术除眩汤等方。伤湿头运又有寒湿与湿热之分。详寒湿眩晕、湿热眩晕条。

伤湿自汗 自汗证之一。见《三因极一病证方论》卷十。多由湿邪阻遏所致。《证治汇补》卷三：“伤湿自汗，困倦身痛，天阴转甚，声如瓮出。”治宜健脾化湿，可用防己黄芪汤、术附汤。亦有湿火熏蒸而致者。《丹溪心法·自汗》：“火气上蒸胃中之湿，亦能汗，凉膈散主之。”参自汗条。

伤湿咳 病证名。即伤湿咳嗽。见《三因极一病证方论》卷十二。《古今医鉴》卷四：“伤湿咳者，脉细，骨节烦疼，四肢重着，或自汗，小便涩。”《医门法律·咳嗽门》：“伤湿之咳，身重，脉细，痰多，五苓散、白术汤。如喘满浮肿，款气丸。”详伤湿咳嗽、感湿嗽、咳嗽条。

伤湿咳嗽 病证名。指因感受湿邪引起的咳嗽。多由时行雨湿，或坐卧湿地，或湿衣沾身所致。《症因脉治》卷二：“伤湿咳嗽之症，身重身痛，或发热有汗，或面目浮肿，或小便不利，骨节烦疼，气促咳嗽。”脉多濡软、浮缓等。治宜燥湿、化湿、利湿为主。兼表症者，用防风胜湿汤；湿热壅肺者，用神术泻肺汤；汗后兼利小便，用通苓散等。参湿咳、感湿嗽、湿嗽等条。

伤湿腹痛 证名。指因受湿邪所致腹痛。《杂病源流犀烛·腹少腹病源流》：“伤湿腹痛，小便秘，大便泄，宜燥湿利水，宜胃苓汤。”参腹痛条。

伤寒 ❶病名。指外感热性病。《素问·热论》：“今夫热病者，皆伤寒之类也。”❷张仲景《伤寒论》以伤寒命名，即为多种外感病的总称。《难经·五十八难》：“伤寒有五，有中风，有伤寒，有湿温，有热病，有温病，其所苦各不同。”❸指感受寒邪的太阳表证。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名曰伤寒。”《备急千金要方·伤寒》：“王叔和曰：……夫伤寒病者，起自风寒，入于腠理，与精气分争，荣卫否隔，周行不通。病一日至二日，气在孔窍、皮肤之间，故病者头痛，恶寒，腰背强重。此邪气在表，发汗则愈。”❹指冬季感寒所致的病症。亦名正伤寒。《伤寒例》：“冬时严寒，触冒之者，乃名伤寒耳。”又：“从霜降以后，至春分以前，凡有触冒露雾，中寒即病者，谓之伤寒。”详见正伤寒条。❺指感受寒邪的浅深程度。《伤寒全生集》卷一：“四时天令，惟冬寒为重，暴寒为轻；伤寒为重，感寒为轻，中寒尤甚重也。”参大伤寒、太阳病等

条。

伤寒亡阳 病证名。❶指伤寒杂病中所出现的亡阳证。《伤寒论·辨少阴病脉证并治》："病人脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也。此属少阴，法当咽痛而复吐利。"亡阳证主要为汗出不止，恶寒蜷卧，四肢厥冷，脉微欲绝等。治宜温阳回阳，如四逆汤之类。❷亡与无通。亡阳，即无阳。《伤寒论·辨少阴病脉证并治》："少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也。"又《辨太阳病脉证并治》："脉微弱者，此无阳也，不可发汗。"两者可以互证。

伤寒亡阴 病证名。指伤寒病误汗、动血或误下而致阴竭液脱的危候。阴，指津液与血。《伤寒论·辨少阴病脉证并治》："少阴病，但厥无汗，而强发之，必动其血，未知从何道出，或从口鼻，或从目出者，是名下厥上竭，为难治。"《伤寒寻源》："少阴便脓血，是感君火热化，奔迫太过，闭藏失职，关闸尽撤，不急治则亡阴。"《此事难知·下多亡阴》："下者，本所以助阴也。若阴受阳邪，热结有形，须当除去已败坏者，以致新阴。此所谓益阴而除火热邪气也。阳邪已去而复下之，反亡阴也。"亡阴常导致亡阳，治当急救真阴，或益气回阳救阴，或急下存阴。参下厥上竭证，伤寒亡阳等条。

伤寒头痛 病证名。指外感风寒表证而见头痛者。《兰室秘藏·头痛门》："风寒伤上，邪从外入，客于经络，令人振寒头痛，身重恶寒，治在风池、风府，调其阴阳，不足则补，有余则泻，汗之则愈，此伤寒头痛也。"《医学六要·头痛》："伤寒头痛，脉浮而紧，身形拘急，恶寒脊强，身大热。"治宜疏寒解表，选用麻黄汤、羌活冲和汤等方。参风寒头痛条。

伤寒耳聋 耳聋的一种。指因外感热病而丧失听力者。《医学心悟·耳》："凡伤寒邪热耳聋者，属少阳证。"《伤寒类证》："伤寒耳聋有二证：其一未持脉时，令其咳而不咳者，此必耳聋无闻也，此为重发汗虚故也，治以黄芪建中汤；其一少阳中风而耳无闻，邪在半表半里也，治以小柴胡汤。"参耳聋条。

伤寒阴证 病证名。指伤寒病的太阴、少阴、厥阴证而言。参太阴、少阴、厥阴条。

伤寒发黄 病证名。指外感病邪而出现黄疸症者。《景岳全书·杂证谟》："表邪发黄，即伤寒证也。凡伤寒汗不能透而风湿在表者有黄证，或表邪不解，自表传里而湿热郁于阳明者，亦有黄证。表邪未解者，必发热，身痛，脉浮，少汗，宜从汗散；湿热内郁者，必烦热，脉缓滑，多汗，宜从分消清利；若阳明实邪内郁而痞结胀满者，宜先下之，然后清其余热。"又："伤寒发黄，凡表邪未清而湿热又盛者，其证必表里兼见，治宜双解，以柴苓汤，或茵陈五苓散主之；若内热甚而表邪仍在者，宜柴苓煎主之；若但有湿热内实胀闭等证而外无表邪者，宜茵陈蒿汤主之；若因内伤劳倦致染伤寒者，亦多有发黄之证，但察其本无湿热实邪等证，即当以阴黄之法调补治之。"亦有指黄汗、黄疸、谷疸、酒疸、女劳疸等五种黄疸为伤寒发黄。见《备急千金要方》卷十。参黄疸有关条。

伤寒夹食 病名。即夹食伤寒。见该条。

伤寒里证 证名。指伤寒病邪在里的病证。❶邪在三阳，以阳明实热为里证。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》："阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也。手足濈然汗出者，此大便已鞕也，大承气汤主之。"又："阳明病，发热汗出者，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，齐颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。"❷病邪由

三阳传入三阴，或直中三阴，属里虚寒证。《伤寒论·辨少阴病脉证并治》："少阴病，脉细沉数，病为在里，不可发汗。"阳明实热之里，宜清宜下；三阴虚寒之里，当温当补。两者虽同属里证，但寒热虚实病机不同，应加区别。

伤寒表证　证名。指病邪侵入太阳而所出现的证候。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病，脉浮紧，无汗发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗，……麻黄汤主之。"又："太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。"外证即表证。太阳表证的治疗原则是发汗解肌。参太阳病条。

伤寒咳　病证名。❶泛指外感病中所出现的咳嗽。《伤寒明理论》卷二："伤寒咳者，何以明之？咳者謦咳之咳，俗谓之嗽者是也。……皮毛者肺之合也，皮毛先受寒气，寒气以从其合也。其寒饮食入胃，从肺脉上至于肺，肺寒则外内合邪，因而客之，则为咳嗽者，是肺寒而咳也。伤寒表不解，心下有水气，干呕发热而咳，小青龙汤主之；少阴病腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳者，真武汤加五味子、细辛、干姜主之。"详伤寒有关条。❷指感受寒邪所致的咳嗽。《古今医鉴》卷四："伤寒咳者，脉紧，憎寒发热，无汗恶寒，烦躁不渴，遇寒而咳。"详伤寒咳嗽条。

伤寒咳嗽　病证名。指寒邪外袭皮毛，内入于肺所致的咳嗽。《症因脉治》卷二："伤寒咳嗽之症，头痛身痛，恶寒发热，无汗喘咳。"脉浮紧或浮数。治宜分时令，寒伤肺，未郁热者，冬月麻黄杏仁汤；若三时恶寒身热咳嗽，前方加石膏、半夏；寒伤肺，郁而变热者，羌防泻白散等方。参伤寒嗽、咳嗽条。

伤寒喘　病证名。外感热病过程中出现的气喘。《圣济总录》卷二十四："论曰，伤寒喘其证不一。有邪气在表，表未解，无汗而喘者；有邪气在里，汗出，不恶寒，腹满而喘者；有潮热者；有心下有水而喘者。古人治之，亦各求其本。故在表者当汗，在里者宜下。至于心下有水而喘，则又当利其小便也。若乃阴证发喘，是为无阳，非灸之不可。"又指外感寒邪伤肺所致的喘急。治用华盖散等方。参寒喘、喘证等条。

伤寒蓄水证　病名。太阳腑证之一。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："若脉浮，小便不利，微热消渴者，五苓散主之。"《伤寒论类方》："小便不利而欲饮，此蓄水也，利水则愈。"其主要证候有小便不利，少腹满微热，消渴，或水入则吐等。膀胱为太阳经之府，太阳病不解，邪热随经入府，膀胱气化不行，与水相结，而成蓄水证。故用五苓散通阳化气，利水解表。参太阳病、太阳腑病条。

伤寒蓄血证　病名。❶指太阳蓄血症。多由太阳病不解，瘀热随经，内结膀胱所致。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解其外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。"❷指阳明蓄血症。多由素有瘀血，热传阳明所致。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》："阳明证，其人喜忘者，必有蓄血，所以然者，本有久瘀血，故令喜忘，屎虽鞕，大便反易，其色必黑者，宜抵当汤下之。"《伤寒明理论·蓄血》："伤寒蓄血，何以明之？蓄血者，在下焦结聚，结聚而不行，蓄积而不散者是也。……留于下而瘀者，谓之蓄血。此由太阳随经，瘀热在里，血为热所搏，结而不行，蓄于下焦之所致。……阳明证，其人喜忘，屎虽鞕，大便反易，其色必黑，亦是蓄血之证。蓄血于下所以如狂者，经所谓热结膀胱，其人如狂者是也。血瘀于下所以喜忘者，内经曰，血并于下，乱而喜忘者是也。二者若有其一，则为

蓄血证明矣。蓄血之证，又有轻重焉：如狂也，喜忘也，皆蓄血之甚者，须抵当汤园以下之；如外已解，但少腹急结者，则为蓄血之轻也，须桃仁承气汤以利之。”蓄血证与蓄水证不同，蓄血又有太阳蓄血与阳明蓄血之别。参太阳府病、伤寒蓄水证等条。

伤寒腹胀 病证名。指伤寒病邪传里所致的腹胀。又分热结膀胱腹胀，及阳明胃实腹胀，血蓄腹胀。《症因脉治·肿胀总论》：“伤寒腹胀之症，恶寒发热，自汗口渴，小便不利，小腹胀满，此热结膀胱之症。若里热不恶寒，自汗不大便，烦满燥实，此阳明胃实腹胀之症，若腹胀硬痛，小便自利，大便或黑，此蓄血腹胀之症也。”多因表邪不解，内传膀胱，或热结或血蓄下焦所致。治宜逐瘀、利水、攻下为主。如热邪入里，腹胀满，脉沉数，大便结者，宜承气汤；若寒热者，大柴胡汤。若热结膀胱腹胀，小便不利者，五苓散或羌活木通汤调六一散。若腹胀小便利，大便黑，宜桃仁承气汤。参腹胀、胃实腹胀、蓄血腹胀、热结膀胱腹胀条。

伤寒嗽 病证名。指寒邪乘肺所致的咳嗽。《类证治裁》卷二：“伤寒嗽，恶寒无汗，脉紧，加味麻黄汤。”《古今医鉴》：“伤寒咳者，脉紧，憎寒发热，无汗恶寒，烦躁不渴，遇寒而咳。”一名伤寒咳嗽。详该条。

伤寒潮热 病证名。阳明病主要证候之一。《伤寒明理论·潮热》：“伤寒潮热，何以明之？若潮水之潮，其来不失其时也。一日一发，指时而发者，谓之潮热。”《伤寒全生集·潮热》：“潮热属阳明，旺申未，一日一发，日晡时作，如潮候之有信，故曰潮热，专主胃腑实热，燥粪使然。渴甚不大便，谵语，脉洪数有力者，用调胃承气汤攻之。……参潮热条。

伤寒霍乱 病名。指内伤饮食兼感寒邪引起的霍乱。《张氏医通》卷四：“伤寒吐利，由邪气所伤，霍乱吐利，由饮食所伤，其有兼伤寒之邪，内外不和，加之头痛发热而吐利者，是伤寒霍乱也。”治宜理中、四逆之类，或藿香正气散，胃苓汤加半夏、藿香，平胃散加木瓜等方。参寒湿霍乱条。

伤燥咳嗽 病证名。指天行燥烈，燥火伤肺所致的咳嗽。《症因脉治》卷二：“伤燥咳嗽之症，口渴唇焦，烦热引饮，吐痰不出，或带血缕，二便带赤，喘急咳嗽。”治用石膏泻白散、清燥救肺汤、人参白虎汤等方。《医门法律·咳嗽门》：“伤燥之咳，痰粘气逆，血腥，杏仁萝卜子丸；清金润燥，天门冬丸、牛髓汤；如面目浮肿，蜜酥煎。”参咳嗽条。

伤蟹 病证名。伤食之一。见《张氏医通》卷二：“伤蟹腹痛者，丁香、紫苏、生姜。”《证治要诀·伤食泻》：“食蟹，太过致伤，一味丁香足以治之。”《世医得效方》卷四：“鱼蟹积，香苏散多加生姜陈皮煎。”参伤食条。

自汗 证名。❶指发热汗出。亦称自汗出。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治法》。❷指清醒时不因劳动而常自出汗。《三因极一病证方论·自汗证治》：“夫自汗，多因伤风伤暑，及喜怒惊恐、房室虚劳，皆能致之。无问昏醒，浸浸自出者，名曰自汗。”《丹溪心法·自汗》：“自汗属气虚、血虚、湿、阳虚、痰。”《证治汇补》卷三：“阳虚自汗，必恶寒；火热自汗，必躁热；伤湿自汗，困倦身重，天阴转甚，声如瓮出；伤风自汗，头疼身热，咳嗽烦闷，鼻塞流涕；伤暑自汗，身热口渴、烦躁面垢；痰证自汗，头眩呕逆，胸满吐痰；心虚自汗，怔忡恍惚；肝热自汗，口苦多眠；肾虚自汗，潮热咳嗽；脾虚自汗，倦怠少食。”又肺虚，伤寒、温病、柔痉、霍乱等多种病症均有自汗。详阳虚自汗、气虚自汗、血虚自汗、虚劳自汗、心虚自汗、肺虚自汗、脾虚自汗、肝热自汗、痰症自汗、伤湿自汗等条。

自缢死 五绝之一。见《金匮要略·杂

疗方》。《诸病源候论·中恶病诸候》："以绳物系颈自悬挂致死，呼为自缢。若觉早虽已死，徐徐捧下，其阴阳经络虽暴壅闭，而脏腑真气，故有未尽，所以犹可救疗，故有得活者。若见其悬挂，便忽遽截断其绳，旧云则不可救。此言气已壅闭，绳忽暴断，其气虽通而奔迸运闷故，则气不能还，即不能复生。"《外台秘要·自缢死》："一人以手按据胸上微动之，一人摩捋臂胫，屈伸之。若已僵，但渐渐强屈之，并按其腹。如此一炊顷，气从口出，呼吸眼开，而犹引按莫置，亦勿苦劳之，须令可少桂心汤及粥清含与之，令濡喉，渐渐能咽，乃稍止。"参五绝条。

血心痛 病证名。指瘀血所致的心痛。《证治汇补·心痛章》："血痛，若跌扑损伤或平日喜食热物，以致死血留于胃口，时痛时止，或饮汤水下咽即呃。痛时从上而下自闻唧唧有声，搔抓无措，眠卧不稳，心下如刮，上连胸臆。乃积血不消，为火所载，非虫症也。又有妇人经行未尽，偶触恚怒，气郁不行，血亦留积，上攻心痛而成薄厥者，轻则开导，重则攻下。"《医学心悟·心痛》："血痛者，痛有定处而不移，转侧若刀锥之刺。"《医学从众录·心痛》："血痛，脉浮沉俱濇，其痛如刺，不可按扪，或寒热往来，大便黑，宜失笑散主之。"《医宗己任篇》卷三："血痛者，胸膈刺痛，脉必濡涩，食可进，四物汤加大黄、桃仁、红花主之。亦有宜用理中汤加肉桂、桃仁、红花者，须因症施之。"《杂病源流犀烛·心病源流》："曰血，脉必涩，壮盛人宜下，宜代抵当汤；虚弱人须补而带行，宜四物汤加桃仁、穿山甲、肉桂心、蓬术、降香。"参心痛、瘀血胃脘痛条。

血汗 证名。见《奇效良方·诸血门》。又名红汗、汗血、肌衄。指汗出色淡红如血。多由火热炽盛，迫血外溢所致。《血证论·汗血》："则知阳乘阴而外泄者，发为皮肤血汗矣。"《杂病源流犀烛·诸汗源流》："有血汗者，汗出污衣，甚如苏木水溻染，即《内经》之衄症，则由胆经受热，血遂妄行，又与手少阴气并，故成此症。"《惠直堂经验方》卷四："血汗，出汗红色也，血自毛孔中出，即肌衄，又名脉溢，乃虚弱极有火之症也。"治以清热泻火为主，辨别心火、肝火、胃火、肺热、胆热的不同，选用凉血地黄汤、当归芦荟丸、竹叶石膏汤、人参清肺汤、定命散等方。如因气虚血少者，用当归补血汤加味。产后血汗，宜猬皮散。亦有因大喜伤心，血随气行者，用黄芪建中汤兼用小麦、麦门冬，金银器煎汤调下妙香散。参红汗、汗血、肌衄条。

血极 又称脉极。见《诸病源候论·虚劳病诸候》。详脉极条。

血郁 六郁之一。《丹溪心法》卷三："血郁者，四肢无力，能食便红，脉沉。"因暴怒、挫闪、劳役过度，饥饱不调等所致。《杂病源流犀烛·诸郁源流》："盛怒叫呼，挫闪，饥饱劳役，致胸胁间常如针刺痛，或能食，小便淋，大便红，脉沉芤而涩，是血郁。"治宜和血解郁。用血郁汤、四物化郁汤等方。参六郁、郁证条。

血呕 病证名。指呕吐食物和血液之症。《三因极一病证方论》卷十一："病者心下满，食入即呕，血随食出，名曰血呕。此由瘀蓄冷血，聚积胃口之所为也。"详蓄血吐血条。

血肿 病证名。指水肿以血瘀为主者。《丹溪心法·水肿》："其皮间有红缕赤痕者，此血肿也。"多因瘀血留滞，血化为水所致。主要表现为四肢浮肿，皮肉间有红丝血痕，或妇女经水先断，后见水肿，少腹胀痛拒按，小便清长等。治宜活血祛瘀，用续断饮、桃红四物汤、代抵当汤、小调经散等方。四肢肿甚，则兼治水，五皮饮加当归、白芍、蒲黄、丹皮、桃仁，或用干漆、雄

黄，醋丸，麦芽汤下。参水肿条。

血胀 鼓胀之一。《世医得效方·胀满》："烦躁嗽水，迷忽惊狂，痛闷喘息，虚汗厥逆，小便多、大便黑，名血胀。"《医钞类编·胀病门》："血胀，瘀蓄死血作胀。"《张氏医通·鼓胀》："蓄血成胀，腹上青紫筋见，或手足有红缕赤痕，小水利、大便黑。金匮下瘀血汤，不应，抵当丸去水蛭，加樗鸡做丸，空腹日进梧子大三丸，血下止后服，轻则散血消胀汤。"《杂病源流犀烛·肿胀源流》："有因血热而胀者。必喘躁，虚汗，肢厥，溲赤，屎黑而胀。宜人参芎归汤。"参鼓胀条。

血疟 疟疾之一。指疟发时有各种出血症状者。《杂病源流犀烛·疟疾源流》："血疟者，或衄血，或便血，或女人月事适来，皆是血疟。宜于治疟药中，加桃仁、莪术、延胡索等。"参疟疾条。

血疝 病名。指在少腹两旁与脬囊的肿块，脓血夹杂的一种疝证。《儒门事亲》卷二："血疝，其状如黄瓜，在少腹两傍，横骨两端约中，俗云便痈。得于重感春夏大燠，劳动使内，气血流溢，渗入脬囊，留而不去，结成痈肿，脓少血多，宜以和血之剂下之。"《疮疡全书》："左右便毒，又名血疝。夫便毒者，生于小腹两腿合缝之间。或行路远步辛苦，或上或下，低闪肭气，或房事所伤，或男女大欲，不得直遂其志，故败精滞血，留聚中途，或梦寐之间而不泄，或妄想不能忘情息念，故结成毒。然肾者作强之官，伎巧所出，一有所感，精血凝滞，此证遂生。初起之时，寒热交作，两腿牵绊，肿起不能屈伸，乃证之渐也。急服龙胆汤。"参见疝条。

血沫痧 痧证之一。指患痧面有口吐血沫者。《痧症全书》卷中："血沫痧，胀闷废食，两胁疼甚，口出淡血沫，如西瓜瓤，用熏陆香为君，佐以寄奴、茜草之类，治之即愈。"

血泄 证名。出《素问·至真要大论》。指大小便下血。《素问玄机原病式·热类》："血泄，热客下焦，而大小便血也。"详便血、尿血条。

血枯 病名。❶《素问·腹中论》："有病胸胁支满者，妨于食，病至则先闻腥臊臭，……先唾血，四肢清，目眩，时时前后血，……病名血枯。此得之年少时，有所大脱血，若醉入房，中气绝，肝伤，故月事衰少不来也。"❷指妇女血海枯竭所致经闭者。见《兰室秘藏》卷中。

血便 证名。❶指大便下血。见《素问·六元正纪大论》。详见便血条。❷指小便出血。《素问·至真要大论》："少腹痛，溺赤，甚则血便。"张志聪注："溺赤便血者，甚则血出于小便也。"详溺血条。

血逆 病证名。《医学入门》卷五："坠堕闪挫，误行补涩，则瘀蓄于胃，心下胀满，食下即吐，名曰血逆。古法以二陈汤去茯苓、甘草，加赤芍等分。"参血呕条。

血结胸 结胸证之一。❶指邪热瘀血互结胸膈者。《伤寒全生集·辨伤寒结胸》："伤寒阳证，吐衄血不尽，蓄在上焦，胸腹胀满硬痛，身热，漱水不咽，喜忘如狂，大便黑，小便利，名血结胸，用犀角地黄汤。"亦可用抵当汤、桃核承气汤等方。❷指结胸之因妇人经行，复感外邪所致者。《杂病源流犀烛·胸膈脊背乳病源流》："有血结胸，胸腹痛连腰胁背膂，上下攻刺痛，痛不可忍，手不可按，甚而搐搦者是也。此惟妇人有之。因患伤寒，经血适来凝滞，或经血适去，尚有余血未散之故。宜海蛤散、元胡索散。"参结胸条。

血热不得卧 外感不得卧之一。指阳邪陷于血分所致的不寐症。《症因脉治》卷三："血热不得卧之症，昼则了了，夜则发热，睡中盗汗，心烦惊起。"治疗如清阴中伏火，丹溪有知柏四物汤。左尺沉数，加羌活、独活；左关沉数，加柴胡、山栀；右关

沉数，加升麻、葛根。睡中盗汗，时时惊醒，当归六黄汤等方。参不寐条。

血热盗汗 证名。见《张氏医通·杂门》。指阴虚盗汗之偏于火旺血热者。《景岳全书·杂证谟》："阴虚者，阳必凑之，故阳蒸阴分则血热，血热则液泄而为盗汗也。"治宜清火补阴，用当归六黄汤。参阴虚盗汗条。

血积 九积之一。指瘀血凝结成积者。见《儒门事亲》卷三。《金匮翼·积聚统论》："血积，痛有定处，遇夜则甚，其脉芤濡。……跌扑努力者，多有此症。或忧怒伤其内，风寒袭于外，气逆血寒，凝结成积。内经云卒然外中于寒，若内伤于忧怒，则气逆，六输不通，营气不行，凝血蕴里而不散，此之谓也。"《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："血积，瘀血成积。或因打扑，或因堕跌，瘀血蓄于脾腹，面黄粪黑也。"《医碥·积聚》："血积，证见面色萎黄，有蟹爪纹路，（血不能上荣也）多怒善忘，口燥便秘，骨热肢冷。"治宜活血化瘀为主，如桃红四物汤、加减四物汤（东垣）、桃仁承气汤、三棱煎、抵当丸、大黄䗪虫丸等方。参积条。

血秘 病证名。指血虚津枯或跌打瘀滞等所致的大便秘结。《医碥·大便不通》："血秘，老人产妇血液干枯或病后血虚或发汗利小便以致津涸（津亦属血），均宜润剂，苁蓉润肠丸、更衣丸、四物汤、麻仁、杏仁辛润之品。又肾司二便，肾水虚燥，宜以六味滋水，少佐辛味以润之。若跌打损伤，瘀血凝滞，致气不行而大小便不通者，破瘀导滞为主。"参瘀血闭结条。

血虾 证名。指大便所下呈紫黑色的血块。《灵枢·五禁》："淫而夺形，身热，色夭然白，乃后下血虾，血虾笃重，是谓四逆也。"王冰注："虾血，谓败恶凝聚之血，色赤黑也。"《灵枢·杂病》："衄而不止，虾血流，取足太阳。"

血黄 三十六黄之一。❶《太平圣惠方》卷五十五："血黄者，头痛心闷，眼运欲倒，胸膈热壅，鼻衄不止，咽喉干燥，舌上生疮。若身热如火，头面肿者，难治。"❷《圣济总录》卷六十一："病人三日鼻中出血，大小便亦下血，心间烦闷，腹中有块，痛如虫咬，吐逆喘粗，此是血黄。"治疗用点烙法或服续随汤。参黄疸有关各条。

血虚心汗 证名。指心胸部独见汗出。多因思虑太过，耗伤心血所致。《医钞类编》卷八："血虚心汗：别处无汗，独心孔一片有汗，思虑多则汗亦多，此病在心，宜养心血。猪心一个，破开带血，入人参、当归二两缝之，煮熟去药，只吃猪心，仍以艾汤调茯神末服之。"亦可用生脉散、六味地黄丸等方。

血虚心悸 心悸之一。《不居集》卷二十二："血虚心悸，阴气内虚，虚火妄动，体瘦心悸，五心烦热，面赤唇燥，左脉微弱，或大而无力者是也。"治宜养血益阴，安神定悸。用宁志丸、十四友丸、朱砂安神丸等方。参心悸条。

血虚头痛 病证名。指阴血亏损不能上荣所致的头痛。《兰室秘藏·头痛门》："血虚头痛，当归、川芎为主。"症见眉尖至头角抽痛，善惊惕，脉芤，或见头隐隐作痛，头晕目花，面色㿠白，心悸等。治宜补血为主，可用四物汤加味。本证可见于贫血、血管性头痛等。参头痛条。

血虚发热 病证名。指血虚所致的一种发热。又名血虚热。多由吐衄便血、产后崩漏或饮食劳倦内伤脾胃所致。《内外伤辨惑论》卷中："血虚发热，证象白虎，惟脉不长实有辨耳，……此病得之于饥困劳役。"《证治汇补·发热》："血虚发热，一切吐衄便血，产后崩漏，血虚不能配阳，阳亢发热者，治宜养血；然亦有阳虚而阴走者，不可徒事滋阴，所以有脱血益气，阳生阴长之法，使无形生出有形来，此千古传心之法。"

《明医杂著·医论》："凡妇人产后阴血虚，阳无所依，而浮散于外，故多发热。治法用四物汤补阴血，而以炙干姜之苦温从治，收其浮散，使归依于阴。"或用当归补血汤等方。参肌热、血虚热等条。

血虚发痉 病证名。见《类证治裁·痉症》。指失血过多，血虚无以养筋所致的痉病。症见手足搐搦，或角弓反张等。《张氏医通·诸风门》："血虚之人发痉，或反张，或只手足搐搦，或但左手足动摇。十全大补汤加钩藤、蝎尾，或用大营煎等方加减。"参痉、虚痉条。

血虚发躁 病证名。指因血虚而致的烦躁。《脾胃论》："如发热恶热，烦躁，大渴不止，肌热不欲近衣，其脉洪大，按之无力者，……此血虚发躁。"治宜当归补血汤。

血虚耳鸣 耳鸣的一种。《诸病源候论·耳鸣候》："此为血气虚损，宗脉不足，病苦耳鸣嘈嘈。"《杂病源流犀烛·耳病源流》："耳鸣脉数，黑瘦人属血虚。"治宜养血调肝，如四物汤加减。参耳鸣条。

血虚自汗 自汗证之一。见《世医得效方·大方脉杂医科》。因血虚而致自汗者，伴见心悸惊惕，形瘦烦倦等症。治宜补血敛营为主，用当归建中汤、四物汤加减。血虚有热者，用当归六黄汤。若大失血之后，汗多不止，气随血脱者，急宜补气，用独参汤，后用补益气血之剂。参自汗条。

血虚咳嗽 病证名。指血虚引起的咳嗽。多因形役阳扰，阴血亏损，火旺克金所致。《症因脉治》卷二："血虚咳嗽之症，盗汗自汗，潮热骨蒸，下午嗽多，形体黑瘦，五心烦热。"治宜养阴补血，敛阴降火。方用四物汤、归芍地黄汤、天地煎、家秘肝肾丸合黄芩泻白散等。参咳嗽条。

血虚热 病证名。《杂病源流犀烛·虚损痨瘵源流》："有血虚热，必兼燥渴，睡卧不安，宜圣愈汤、人中白丸两方参酌用。"参发热、血虚发热条。

血虚眩运 病证名。又作血虚眩晕。《症因脉治·内伤眩晕》："血虚即阴虚也，形体黑瘦，五心常热，夜多盗汗，睡卧不宁，头面火升，则眼花旋转。火气下降，则旋晕亦止，不比外感之常晕不休，不比痰火之暴发暴作，此血虚眩晕之症也。"多因损伤心脾，肝火炽盛，阴血亏耗而致。治宜滋阴补血为主。血虚无火者，可用归脾汤、补中益气汤、酸枣仁汤等方；血虚有火者，可用天王补心丹、知柏四物汤、知柏天地煎、知柏肝肾丸等方。眩晕可由失血过多所致。《丹溪心法·头眩》："吐衄漏崩，肝象不能收摄荣气，使诸血失道妄行，此血虚眩运也。"治宜补肝养血，益气滋阴等法。参阴虚眩晕、失血眩晕条。

血虚眩晕 病证名。见《症因脉治·血虚眩晕》。又称血虚眩运。详该条。

血虚秘 病证名。指阴血不足，肠道欠润而致的大便秘结。多见于老弱、产妇、病后或发汗、利小便过度而津涸者。《万病回春·大便闭》："虚弱并产妇及失血大便不通者，血虚而闭也。"其症头眩心悸，面色无华，唇舌淡，脉细涩，大便虽软，努责不出，治宜养血润肠，可选用润肠丸，大剂四物汤加陈皮、甘草、酒红花，导滞通幽汤，益血丹等。参虚秘条。

血虚盗汗 证名。指阴血不足引起的盗汗，属于阴虚盗汗范围。《薛立斋医案全集·保婴撮要》："当归六黄汤治血虚盗汗，内热哺热者。"参阴虚盗汗条。

血虚厥 厥证之一。因血虚所致。多见于失血、崩漏、产后。《赤水玄珠·厥证门》："因血虚而得者，脉洪大，宜四物汤加酒炒黄柏、知母。"或用芎归养荣汤等。参厥证条。

血虚腰痛 病证名。因血虚筋脉失养所致。《证治要诀·诸痛门》："妇人血过多，及素患血虚致腰痛者。当益其血。"宜

用四物汤加减。

血虚腹痛　病证名。指因阴血亏虚、经脉凝涩所致的腹痛。《症因脉治》卷四："血虚腹痛之症，偎偎作痛，如细筋牵引，下引小腹，上行肋梢，肢体瘦弱，面色痿黄，腹虽痛而不饱闷，痛无定处，此血虚腹痛之症也。"《证治汇补·腹痛章》："血虚痛者，痛如芒刺，牵引不宁。"脉多细涩，或见虚微。治宜养血活血和络为主。痛引小腹，牵引肋梢者，戊己汤、补肝散、逍遥散；阴虚阳旺者，知柏四物汤、归芍地黄丸等方。参腹痛条。

血虚痿　痿证之一。见《证治汇补·痿躄章》。多由产后或失血后，血虚不能养筋而致痿症。症见手足痿弱无力，不能行动，面色萎黄等。治宜养血为主。《丹溪心法·痿》："血虚，四物汤加黄柏、苍术煎送补阴丸。"《张氏医通·痿痹门》："阴血衰弱，不能养筋，筋缓不能自收持，故痿弱无力，补血荣筋丸。"参痿条。

血虚痹　病证名。指血虚不能濡养肢体而致的痹症。《医学入门》卷五："血虚痹者，皮肤不仁，济生防风汤，或黄芪建中汤去饴加桂枝。挟瘀血者，四物汤加桃仁、红花、竹沥、姜汁。挟痰者，手足麻痹，多睡眩晕，济生茯苓汤或二陈汤加竹沥、姜汁。肾脂枯涸不行，髓少筋弱，冻慄挛急者，十全大补汤，地仙丹。通用五痹汤擦痹法。"参血痹条。

血虚痰　因血虚所致的痰证。《症因脉治》卷二："血虚痰，五心烦热，形体消瘦，六脉细数。"治宜养血化痰。方用加减四物汤加贝母、杏仁、青黛等。参痰证条。

血蛊　病名。因跌扑坠堕误行补涩所致。《证治汇补》卷五："坠堕闭塞、气逆、气郁，误行补涩则瘀蓄于胃，心下胀满，食入即吐，名曰血逆；瘀蓄于脾，大腹膨胀，渐成鼓满，名曰血蛊。"参血鼓、蛊条。

血脱　病证名。出《灵枢·决气》。又名脱血。《杂病源流犀烛·诸血源流》："脱血，冲脉病也。"《灵枢经》曰：冲脉为血之海，血海不足，则身少血色，面无精光。是名血脱。"因先天禀赋不足，或思虑、劳倦、房室、酒食所伤，或慢性出血后，以至真阴亏损，血海空虚而成。症见面白，夭然不泽，头晕目花，四肢清冷，脉空虚。或兼见失血。治宜益阴补血，可用四物汤，补荣汤，加减四物汤等方。如见大量出血，可用独参汤，参附汤。参脱血条。

血淋　病名。指淋症而见小便夹血者。《诸病源候论·淋病诸候》："血淋者，是热淋之甚者，则尿血，谓之血淋。"《圣济总录·血淋》："下焦受热，则气不宣通，故溲便癃闭而成淋也。热甚则搏于血脉，血得热则流行入于胞中，与溲便俱下，故为血淋也。"《医宗必读·淋证》论血淋有血热、血冷、血虚、血瘀之不同。主症为小便涩痛有血。血热者，尿出灼热刺痛，血色鲜红，脉有力。治宜凉血清热。选用小蓟饮子、导赤散、琥珀散等方。血冷者，尿出血色晦暗，面色枯白，脉沉迟。宜温下元。用金匮肾气丸、生料鹿茸丸、汉椒根煎服，或地髓汤送服附子八味丸。血虚者，尿出时涩痛不甚，尿色淡红，脉虚数。治宜滋阴补血为主。用八珍汤合益元散，或六味地黄丸加减。血虚有热，则宜知柏八味丸。血瘀者，尿出阴中痛如刀割，血色紫暗有块，小腹硬满，脉沉弦或数。治宜活血通淋。选用一味牛膝膏、桃红四物汤、代抵当丸等方。参淋条。本症可见于尿路感染、前列腺炎、精囊炎、尿路结石、结核、肿瘤等疾病。

血厥　厥证之一。❶指郁冒。多由热升风动引起。《普济本事方》卷七："郁冒，亦名血厥。"《类证治裁·厥症》："郁厥亦血厥症，平居无疾，忽默默无知，目闭口噤，恶闻人声，移时方寤，由热升风动，郁冒而厥，妇人多有之。羚羊角散。"❷指因失血过多致厥者。《医林绳墨·厥》："有

血厥者，因而吐衄过多，上竭下厥，先致足冷，有如水洗，冷过腰膝，入腹即死，此血竭而作厥也。皆由阳气妄行于上、阴血无所依附，气血相离，不居本位，宁有不死之理乎。必须急用大蒜捣烂，敷于涌泉，或以热手频擦脚心，次用二陈汤，加参、术、当归、炒黑干姜之类。此药劫剂，不可多服，但欲其阳复血止耳。”《赤水玄珠·厥证门》：“有吐衄不知人而厥者，此血厥也。治之无论其脉，急用芎归养荣汤，十全大补汤，或独参汤以投之。”亦可由血逆引起。《景岳全书·厥逆》：“血厥之证有二，以血脱血逆皆能厥也。血脱者，如大崩大吐，或产血尽脱，则气血随之而脱，故致卒仆暴死。宜先掐人中，或烧醋炭以收其气，急用人参一二两，煎汤灌之，但使气不尽脱，必渐苏矣。”又：“血逆者，即经所云血之与气并走于上之谓，又曰大怒则形气绝而血菀于上之类也。夫血因气逆，必须先理其气，气行则血无不行也，宜通瘀煎或化肝煎之类。”

血痢 亦称赤痢。指痢下多血或下纯血者。多由热毒乘血所致。《诸病源候论·痢病诸候》：“血痢者，热毒折于血，入大肠故也。”临床上有血鲜、血黯，属热属寒之分。《秘传证治要诀·痢》以血鲜者，此属热痢，宜藿香正气散加黑豆，五苓散加木香、粟米，下黄连丸，或黄连阿胶丸、茶梅园、白头翁汤；若血色黯如瘀，服冷药所下愈多，次数愈频者，当作冷痢，宜理中汤，或四君子汤加肉豆蔻、木香。《张氏医通·大小府门》：“血色如猪肝，如紫草，如苋菜汁者，非炮姜不治，理中汤去参，加肉桂、木香、肉果、乌梅。”《时方妙用·痢》：“下奔鲜血，口渴便短，里急后重，脉盛者，为火证，宜白头翁汤。一日二服。虚人及产后加阿胶、甘草。亦有下鲜血而非火证者。若血带黯而成块者，属热者少，属寒者多，俱宜从脉证细辨之。若口中和，脉细，小便长，手足冷者属虚寒无疑，宜以理中汤加灶心土八钱主之，下血多者，宜间服黄土汤。”《医门法律·痢疾门》：“下血者，宜凉血活血，当归、黄芩、桃仁之类。风邪下陷者，宜升提之。湿热伤血者，宜行湿清热。下坠异常，积中有紫黑血，而且痛甚者，此为死血，用桃仁、滑石行之。血痢久不愈者，属阳虚阴脱，用八珍汤加升举之药。甚有阵阵自下，手足厥冷，脉渐微缩，此为元气欲绝，急灸气海穴，用附子理中汤。……久痢血，脉沉弱，诸药不效，以十全大补汤。”《医学传灯》卷下：“血痢者，纯红散血，不与粪杂，故为血痢。……此因饮食伤脾，中州郁结，不能摄血，所以血从大孔而下，亦用芩芍调中汤。若脉来细数，胸中如故者，宜用柴胡四物汤加地榆、乌梅之类。”参痢疾、赤痢、赤白痢条。本病可见于阿米巴痢疾、溃疡性结肠炎、慢性血吸虫病、细菌性痢疾等疾患。

血滞腹痛 病证名。指血行凝滞所致的腹痛。《症因脉治》卷四：“血滞腹痛之症，不作胀，不饱满，饮水作呃，遇夜更痛，痛于一处，定而不移，服行气消化之药不应，以热物熨之稍减，此血滞停瘀之症也。”多因七情郁结或饮食不节、跌扑损伤，瘀血凝滞所致。治宜活血祛瘀为主，方用桃仁承气汤、桃仁当归汤、戊己汤、少腹逐瘀汤等。参瘀血腹痛条。

血渴 渴证之一。❶因失血所致的口渴症。《证治要诀·拾遗门》：“诸失血及产妇蓐中渴者，名曰血渴，宜求益血之剂。”可用四物汤、十全大补汤等方。❷泛指劳伤元气及失血所致的口渴症。《不居集》卷二十五：“内伤劳役，精神耗散，胃气不升，或血后亡津，名曰血渴。”治宜健脾养血，用理脾益荣汤、补中益气汤、味补饮、当归养血汤等方。

血溃 病名。《世医得效方》卷十：“眼白人浑黑，见物依旧，毛发直如铁条，虽能饮食，不语如醉，名曰血溃。用五灵脂为

末，二钱，酒调下。”

血鼓　一名单腹胀。鼓胀之一。《石室秘录·内伤门》：“血臌之症，其由来渐矣。或跌闪而瘀血不散，或忧郁而血结不行，或风邪而血蓄不发，遂至因循时日，留在腹中，致成血臌。”《血证论·血臌》：“血臌之证，胁满，小腹胀满，身上有血丝缕，烦躁漱水，小便赤，大便黑，腹上青筋是也。……单腹胀者为血臌。”治宜活血行瘀，健脾利湿，可用消瘀荡秽汤，抵当丸，分消汤加当归、芍药、红花、丹皮，去白术、茯苓等。如内热目黄，皮肤黄，宜用茵陈汤合化瘀汤。本证可见于门脉性肝硬变，血吸虫性肝硬化及某些腹腔内肿瘤并发腹水等病症。参鼓胀条。

血蒸　见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。即内蒸。又为二十三蒸之一。详五蒸、二十三蒸条。

血痹　病名。出《灵枢·九针论》。❶指邪入血分而成的痹症。见《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》。《诸病源候论》卷一：“血痹者，由体虚邪入于阴经故也。血为阴，邪入于血而痹，故为血痹也。”多由气血虚弱，当风睡卧，或因劳汗出，风邪乘虚侵入，使血气闭阻不通所致。症见身体不仁，肢节疼痛，脉微濇，尺脉小紧等。治宜益气和营，通阳行痹。用黄芪桂枝五物汤、当归汤、防风散等方。❷指风痹。《备急千金要方》卷八：“治风痹游走无定处，名曰血痹。”详风痹条。

血瘀腰痛　病证名。腰痛之一。见《医学入门》卷四。又名沥血腰痛。详该条。

血瘀瘘　瘘证之一。见《证治汇补·瘘瘿章》。多由产后恶露未尽，或跌仆损伤，瘀血不消所致。症见四肢痿软，不能运动，兼见疼痛、脉涩等症。治宜活血行瘀为主。用桃红四物汤加味，或用归梢汤。参瘘条。

血溢　出《素问·六元正纪大论》。指血失常道从上窍溢出。《原病式·热类》：“血溢者，上出也。心养于血，故热甚则血有余而妄行。”《证治准绳·杂病》：“一应血上溢之证，苟非脾虚泄泻，羸瘦不禁者，皆当以大黄醋制，和生地黄汁及桃仁泥、牡丹皮之属，引入血分，使血下行，以转逆而为顺。”参见吐血、呕血、鼻衄各条。

血嗽　病证名。指咳嗽因血瘀而致者。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》：“血嗽，嗽而多唾瘀血也。其脉浮芤而数，必兼喉中有腥气，或因上焦有热，血瘀沉闷，嗽声连并，气不得透。宜桑皮散。或因打扑损伤肺气作咳，多吐黑血。宜当归散。”参瘀血咳、损嗽条。

血膈　膈证之一。指膈证因瘀血阻滞所致者。《慎斋遗书》卷八：“血膈，时吐时止，胸前作痛，且连背心，血积胸中。气行则血行，宜用气药，枳壳、沉香、芎、归行气导血。”又名血噎膈。参膈、噎膈、血噎膈条。

血瘕　八瘕之一。出《素问·阴阳别论篇》。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“血瘕，留着肠胃之外及少腹间，其苦横骨下有积气，牢如石，因而少腹急痛，阴中若有冷风，亦或背脊疼，腰疼不可俯仰。”《类证治裁·痃癖癥瘕诸积》：“血瘕，经行劳动感寒，留络不去，腰腹急痛，宜血瘕方或调经散。”参瘕、八瘕条。

血噎膈　膈证之一。《医方考》卷三：“血噎膈者，或因跌扑，或因大怒，血积胸膈，久久凝结，令人妨碍饮食，得热则宽，得寒则痛是也。”又名血膈。参该条。

血箭　病证名。❶指毛孔出血，射出如箭。《血证论》卷三：“从毛孔中流出一条血来，有似箭之射出，故名血箭。由心肺火盛，逼血从毛孔中出。治宜清心火，以除血出之源，凉血地黄汤加蒲黄。又宜泻肺火以敛皮毛之气，使毛孔不渗泻，则血自止。泻白散加生地、蝉蜕、百合、五倍子、黄芩、蒲黄、杏仁、白茯。心肺兼治，宜用生地黄

散。”并可用水调桃花散外敷血孔，或京墨磨醋搽，或用十灰散、花蕊石散干掺患处。参见毛发出血、肌衄等条。❷肠癖的俗名。《医学入门》卷四：“肠癖，俗呼血箭，因其便血即出，有力如箭射之远也。”参肠澼条。

血壅 病名。《医学入门·怪疾》：“遍身忽然肉出如锥，既痒且痛，不能饮食，此名血壅。若不速治，溃而脓出。以赤皮葱烧灰，淋洗。吃豆豉汤数盏，自安。”此证由风热内扰血分所致。如火盛则肉起疙瘩如锥，甚或疼痛。风盛则作痒更甚。

血鼓腹胀 病证名。指鼓胀之由于瘀阻血络引起者。《症因脉治》卷三：“血臌腹胀之症，腹胀不减，肚大紫筋，腿足或见血缕，小便反利，大便或黑，血在上则漱水多忘，血在下则小腹闷痛。”多因七情失调，或过食辛辣，血热妄行，不归故道，停积于中，或跌扑损伤所致。治宜红花桃仁汤、桃仁承气汤等方。参腹胀、血鼓条。

血鳖 病证名。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“虚劳痼冷，败血杂痰而成血鳖。摇头掉尾，如虫之行，上侵入咽，下餂人肛，或附胁背，或隐胸腹，大则如鳖，小则如钱，宜羌黄汤。”参瘕、鳖瘕条。

血癥 癥病之一。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“其有脏腑虚弱，寒热失节，或风冷内停，饮食不化，周身运行之血气，适与相值，结而生块，或因跌扑，或因闪挫，气凝而血亦随结，经络壅瘀，血自不散成块，心腹胠胁间苦痛，渐至羸瘦，妨于饮食，此之谓血癥。”《餐溪医述·外候问答》：“血癥者何，曰，脏腑气虚，风冷相侵或饮食失节，与血气相搏，适值经水往来，经络痞塞，恶血不除，结聚成块也。”治法初起宜活血散瘀，日久脏气虚弱，则用扶正祛邪。可选用沈氏血癥丸，化癥回生丹、膈下逐瘀汤、少腹逐瘀汤、必甲煎丸等方。参癥病条。

似中风 病证名。指浊火闭阻五脏脉络的五官歪斜症。《慎斋遗书》卷七：“似中风之证，其类不一，要皆阳气闭塞，浊火冒明所致。盖气行则脉行，脉行则五官正，气滞则脉滞，脉滞则五官歪。滞于肝则目邪，滞于心则舌邪，滞于肾则耳邪，滞于肺则鼻邪，滞于脾则口邪。故初滞以七气汤之类以理其气，后则随其所滞而平之，必兼肝经之药，因风气通于肝，治风先治肝也。”

似疟 病证名。指如疟非疟的一类病证。《医贯·疟论》：“世间似疟非疟者多。世人一见寒热往来，便以截疟丹施治，一截不止则再截，再截而止，止而复发复截，以致委顿，甚或因而致毙者有之，是不可不辩也。经曰，阳虚则恶寒，阴虚则恶热。阴气上入于阳中，则恶寒；阳气下陷于阴中，则恶热。凡伤寒后、大病后、产后、劳瘵等证，俱有往来寒热，似疟非疟，或一日二三度发，并作虚治。但有阳虚、阴虚之别。阳虚者补阳，如理中汤、六君子汤、补中益气汤加姜桂，甚则加附子，诸方中必用升麻柴胡，以提出阴中之阳，水升火降而愈。医书中有论及之者矣。至于阴虚者，其寒热亦与正疟无异，而阴疟中又有真阴真阳之分，人所不知。经曰，昼见夜伏，夜见昼止，按时而发，是无水也；昼见夜伏，夜见昼止，倏忽往来，时作时止，是无火也。无水者，壮水之主，以镇阳光，六味汤主之；无火者，益火之原，以消阴翳，八味汤主之。世人患久疟而不愈者，非疟不可愈，乃治之不如法也。……又有恶寒恶热，如疟无异，面赤如脂，口渴不甚，吐痰如涌，身以上热如烙，膝以下自觉冷，此真阳泛上，肾虚之极，急以附子八味地黄汤，大剂冷饮而热退，继以人参建中汤调理。”参如疟条。

似喘 证名。即虚喘。指呼吸气短，如不能续的症候。多由真元受伤，脏气虚衰，肾不纳气所致。《景岳全书·杂证谟》：“似

喘者，其责在肾。”，“肾主精髓而在下焦，若真阳亏损，精不化气，则下不上交而为促促者，断之基也。”《医学入门》卷五：“气短不能续呼吸。久病气短不能接续，似喘非喘者，单人参汤；扶脾，生脉散、调中益气汤。”《医钞类编》卷六：“贞元饮，景岳治气短似喘，呼吸促急气道噎塞，不能升降垂危者。人但知为气急，其病在上，不知元海无根，肝肾亏损，子午不交，气脱证也。”参虚喘条。

后不利　指大便秘结。《素问·厥论》：“太阴之厥，则腹满膜胀，后不利。”参大便秘结条。

后血　即便血。《灵枢·百病始生篇》：“阴络伤则血内溢，血内溢则后血。”详便血条。

后沃沫　证名。见《灵枢·邪气藏府病形》。指大便多粘沫。参泄泻、痢疾条。

后泄　即泄泻。《素问·举痛论》：“寒气客于小肠，小肠不得成聚，故后泄，腹痛矣。”《类经》卷五：“脾肾虚寒，故为后泄。”详泄泻条。

后重　❶古病名。即大瘕泄。《难经·五十七难》：“有大瘕泄，名曰后重。”详大瘕泄条。❷证名。指腹痛急迫，肛门重坠不适。《医宗必读·痢疾》：“邪迫而后重者，至圊稍减，未几复甚，芍药汤；虚滑而后重者，圊后不减，以得解愈虚故也，真人养脏汤；下后乃后重者，当甘草缓之，升麻举之。”参里急后重、虚坐努责条。

行黄　黄病二十八候之一。《诸病源候论·黄病诸候》：“瘀热在脾藏，但肉微黄，而身不甚热，其人头痛心烦，不废行立，名为行黄。”《太平圣惠方》卷五十五有治行黄方，用黄芩、麦门冬、犀角屑、栝蒌根、栀子仁、甘草等药。参黄疸有关条。

行痹　病名。出《素问·痹论》。又名风痹、走注。详风痹条。

杀血心痛　病证名。《妇人大全良方》卷一：“妇人血崩，而心痛甚，名曰杀血心痛，由心肝血虚也。若小产去血过多，而心痛甚者，亦然。”详失血心痛条。

合病　指伤寒病二经或三经同时受邪，起病即同时出现各经主症。见《伤寒论》。《景岳全书·伤寒典》：“合病者，乃两经三经同病也。如初起发热、恶寒、头痛者，此太阳之证，而更兼不眠，即太阳阳明合病也，若兼呕恶，即太阳少阳合病也，若发热不眠呕恶者，即阳明少阳合病也，若三者俱全，便是三阳合病。”《伤寒溯源集·合病并病总论》：“合病者，两经三经一时并受，见证齐发，不似传经之以此传彼也。”“以其并感齐发，无先后之不齐，故谓之合。”合病多见于三阳经，阴经与阳经亦可见合病。《医宗金鉴·辨合病并病脉证并治》：“论中所著合病并病，虽单举阳经，未及阴经，然阳经既有合病并病，则阴经亦必有之可知矣。如太阳病脉反沉，少阴病反发热，是少阴太阳合病也。”《伤寒论翼·合并启微第三》：“夫阴阳互根，气虽分而神自合。三阳之里，便是三阴，三阴之表，即是三阳。如太阳病而脉反沉，便合少阴；少阴病而反发热，便合太阳；阳明脉迟，即合太阴；太阴脉缓，即合阳明；少阳细小，是合厥阴；厥阴微浮，是合少阳。虽无合并之名，而有合并之实。”参并病、太阳阳明合病、太阳少阳合病、三阳合病等条。

众痹　病名。因风寒湿邪侵入皮肤、经络所致。症见痹痛左右相移，随发随止，歇而复起。《灵枢·周痹》：“愿闻众痹。……此各在其处，更发更止，更居更起，以右应左，以左应右，非能周也，更发更休也。”众痹以痛处左右相移为其特征，与周痹之随脉上下，周身疼痛者不同。参周痹条。

肌肉不仁　证名。指肌肉麻木不知痛痒、冷热。《素问·痿论》：“脾气热，则胃干而渴，肌肉不仁，发为肉痿。”《伤寒

明理论·不仁》："不仁，谓不柔和也。痒不知也，痛不知也，寒不知也，热不知也，任其屈伸灸刺，不知所以然者，是谓不仁也。由邪气壅盛，正气为邪气闭伏，郁而不发，荣卫血气虚少，不能通行。"本症可见于痿、痹、中风等病。详各条。

肌肉如铁 证名。《医门补要》卷中："肌肉如铁，胸腹串痛，按之有跳跃之处。……针刺不得入，此真气已竭，血不流行，则肌肉呆板。"

肌肉消瘦 证名。《难经·十四难》："三损损于肌肉，肌肉消瘦，饮食不为肌肤。"多因脾气虚损，运化失常，饮食不长肌肉所致。本症可见于虚劳、久泻以及慢性消耗性疾病等。

肌肉蠕动 证名。出《素问·调经论》。指肌肉动如虫蠕的感觉。多因风、湿、热伤脾，卫气不荣肌肉所致。《医学入门》卷一："脾受风湿则卫气不荣而肌肉蠕动。……脾热者，色黄而蠕动也。"《奇效良方》卷二："风热壅实，上攻头面，口眼㖞斜，语言不正，肌肉瞤动，面若虫行。"若病轻而无其他见证者，称为微风，参该条。

肌极 又称肉极。《诸病源候论·虚劳病诸候》："肌极，令人羸瘦无润泽，饮食不生肌肤。"详肉极条。

肌肤不仁 指皮肤不仁。《金匮要略·中风历节病脉证并治》："邪在于络，肌肤不仁。"详皮肤不仁条。

肌肤甲错 证名。皮肤枯燥如鳞甲交错之状。多因干血内结、痈脓积滞，津血不能外荣，或因温邪久留，阴液耗伤所致。《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》："五劳虚极羸瘦，腹满不能饮食，食伤，忧伤，饮伤，房室伤，肌伤，劳伤，经络营卫气伤，内有干血，肌肤甲错，两目黯黑，缓中补虚，大黄䗪虫圆主之。"《诸病源候论·肠痈候》："肠痈者，由寒温不适，……血气蕴积，结聚成痈，热积不散，血肉腐坏，化而为脓。其病之状，小腹重而微强，抑之即痛，小便数似淋，时时汗出，复恶寒，其身皮皆甲错，腹皮急，如肿状。"《温病条辨·下焦篇》："邪气久羁，肌肤甲错。"治疗有干血者，用大黄䗪虫丸；肠痈脓滞者，用薏苡附子败酱散；温邪久羁所致者，用复脉汤等。

肌热 证名。指肌表有发热感觉。见《内外伤辨惑论》卷中。有虚实之分。实证多为外邪侵袭，阳明经脉受病。《景岳全书·伤寒典》："阳明经病，为身热，目疼，鼻干，不眠，脉洪而长，以阳明主肌肉，其脉挟鼻络于目，故为此证。"治宜去阳明在经之邪，宜柴葛解肌汤等方。虚证多为气虚或血虚所致。《证治准绳·杂病》："肌热，燥热，目赤面红，烦渴引饮，日夜不息，脉浮大而虚，重按全无，为血虚发热，症似白虎，唯脉不长实为辨也，误服白虎必危，宜当归二钱，黄芪一两。"《丹溪心法·发热》："肌热及去痰者，须用黄芩，肌热亦用黄芪，……补中益气汤，治虚中有热或肌表之热。"参发热、气虚发热、血虚发热等条。

肌衄 证名。指不因外伤的肤表出血。又名血汗，亦称红汗。《证治要诀·诸血门》："血从毛孔而出，名曰肌衄。"多因气血亏虚，血随气散所致。治宜补血固表，可选用当归补血汤、黄芪建中汤、保元汤等方。有阴虚火旺者，宜养阴清火，用凉血地黄汤或当归六黄汤。亦有由胆热而致者，用河间定命散（见《赤水玄珠》）。本证可见于凝血酶原缺乏、毛细血管病变、血友病等疾病。

肌痹 病名。出《素问·痹论》。㊥指寒湿侵袭肌肤所致的痹症。又名着痹、湿痹。《素问·长刺节论》："病在肌肤，肌肤尽痛，名曰肌痹，伤于寒湿。"《圣济总录》卷十九："肌痹，其状皮肤弗营，肌肉痛（同顽）厚而不仁是也。"《张氏医通》

卷六："肌痹者，即著痹、湿痹也。留而不移，汗出，四肢痿弱，皮肤麻木不仁，精神昏塞。"治宜天麻丸、细辛汤、神效黄芪汤、五痹汤等方。参见湿痹条。❷指脾痹。《症因脉治》卷三："脾痹之症，即肌痹也。四肢怠惰，中州痞塞，隐隐而痛，大便时泻，面黄足肿，不能饮食，肌肉痹而不仁。"参脾痹条。

杂积　指寒热气血痰瘀食积等夹杂所致的积证。《证治准绳·杂病》："杂积通治，万病紫菀丸、局方温白丸、厚朴丸。"参积有关条。

杂痢　病名。指痢疾排出物的颜色杂乱不定者。《诸病源候论·痢病诸候》："杂痢谓痢色无定，或水谷，或脓血，或青或黄或赤或白，变杂无常，或杂色相兼而痢也。挟热则黄赤，热甚则变脓血也，冷则白，冷甚则青黑。皆由饮食不节，冷热不调，胃气虚，故变易。"本病类似后世所称的五色痢。详该条。

犯黄　黄疸二十八候之一。《诸病源候论·黄病诸候》："有得黄病已瘥，而将息失宜，饮食过度，犯触禁忌，致病发胃，名为犯黄候。"犯黄即指黄疸已退而又发者，多属慢性肝脏疾患。参黄疸有关条。

多汗　证名。出《素问·脉要精微论》。指不因气候炎热或劳力过度而常多汗者。参汗证条。

多忘　证名。又名善忘、健忘。《诸病源候论·多忘候》："多忘者，心虚也。心主血脉而藏于神。若风邪乘于血气，使阴阳不和，时相并隔，乍虚乍实，血气相乱，致心神虚损而多忘。"详健忘条。

多卧　证名。指经常困倦欲睡之症。《灵枢·大惑论》："肠胃大则卫气留之，皮肤湿则分肉不解，其行迟。夫卫气者，昼日常行于阳，夜行于阴，故阳气尽则卧，阴气尽则寤。故肠胃大则卫气行留久，皮肤湿，分肉不解则行迟。留于阴也久，其气不清则欲瞑，故多卧矣。"又："邪气留于上焦，上焦闭而不通，已食若饮汤。卫气久留于阴而不行，故卒然多卧焉。"参嗜卧、多寐、多眠、善眠等条。

多眠　证名。同多卧。《类证活人书·问多眠》："多眠有四证，有风温证，有小柴胡证，有少阴证，有狐惑证。病人尺寸脉俱浮，头痛身热，常自汗出，体重，其息必喘，四支不收，默默但欲眠者，风温证也。风温不可发汗，宜萎蕤汤。病人脉浮，头项强痛而恶寒者，太阳证也。十日已去，脉浮细而嗜卧者，外已解也。设胸满胁痛者，与小柴胡汤。脉但浮者，麻黄汤主之。病人尺寸脉俱沉细，但欲寐者，少阴证也。急作四逆汤，复其阳不可缓也。若状如伤寒，四支沉重，忽忽喜眠，须看上下唇，上唇有疮，虫蚀五脏，下唇有疮，虫蚀下部，当作狐惑治之。"《医学心悟》卷二："表证多眠者，何也？答曰：表证多眠，是寒邪外束，阳气不舒，必见头痛发热诸证。若直中多眠，则见下利清谷，手足厥冷诸证，与表邪自是不同。"参嗜卧、多寐、多卧、善眠等条。

多喜　证名。出《灵枢·行针》。指喜乐不禁之症。参见喜笑不休条。

多寐　病证名。同多卧、多眠症。《杂病源流犀烛·不寐多寐源流》："多寐，心肺病也。一由心神昏浊，不能自主，一由心火虚衰，不能生土而健运。其原有如此者，试言其症状。体重或浮而多寐，湿胜也。宜平胃散加防风、白术。食方已，即困倦欲卧，脾气弱，不胜食气也。俗称饭醉。宜六君子汤加山楂，神曲、麦芽。四肢怠惰而多寐，气弱也。宜人参益气汤。长夏懒怠，四肢无力，坐定即寐，肺脾两经之气本弱，复为炎暑所逼也。宜清暑益气汤。病后多眠，身犹灼热，余邪未清，正气未复也。宜沈氏葳蕤汤。狐惑症舌白齿晦，面目乍白乍赤乍黑变异无常，四肢沉重，默默多眠，大病后肠胃空虚，三虫求食，食人五脏，食其喉则

为惑，其声哑，上唇必有疮，宜三黄泻心汤。食其肛则为狐，其咽干，下唇必有疮。宜雄黄锐散。此症杀人甚急，当急治也。通用宜黄连犀角汤、治惑桃仁汤。风温阳脉浮滑，阴脉濡弱，发热，咽干口苦，微恶寒，闭目欲眠，少阴伏邪发出，更感太阳客邪也。宜黄芩汤加桂枝、石膏，甚则葳蕤汤加减。亦有阴阳俱浮。具如前症。太阳受邪误发汗也，宜麻黄升麻汤去二麻、姜、桂。取汗即愈。热病得汗后，脉沉细身冷喜卧，脉沉细昏沉不省，阳气遏也，急与药令四肢温暖，不尔，有熟睡死者，宜四逆汤。伤寒诸般多寐症，各详本条，兹不赘，惟汗下后酣眠者，为正气已复，可勿药也。”参见嗜卧、多卧、多眠、善眠等条。

色复 劳复证之一。即房劳复。《重订广温热论·温热复症疗法》：“房劳复者，即女劳复，一名色复。”详房劳复条。

色厥 厥证之一。指因纵欲过度致厥者。《类证治裁·厥症》：“色厥乃纵欲竭情，精脱于下，气脱于上。独参汤。”参厥证条。

色厥动血 病证名。见《景岳全书·杂证谟》。指因欲火上炎引起的吐血、鼻衄。其症吐衄来势急暴，倾吐不止，或兼见厥逆，或汗出，或咳嗽、气喘等。治宜制火以抑其势。选用清化饮、四阴煎、加减一阴煎等方。亦有阴竭于下，火不归源，外无烦热脉证而血厥不止者，属危证，宜用镇阴煎，待其势定，然后随证调治。参血厥条。

〔丶〕

妄言 证名。指语言错妄。又名妄语。多由阳热亢盛，心神昏乱所致。可见于外感热病热盛期，亦为癫狂病常见症状之一。《素问·阳明脉解篇》：“阳盛则使人妄言骂詈，不避亲疏。”《素问·厥论》：“阳明之厥，则癫疾欲走呼，腹满不得卧，面赤而热，妄见而妄言。”

妄语 见《难经·十七难》。即妄言。详该条。

交阳 证名。指郁热外达而致出汗。《伤寒直格》卷下：“世所谓交阳者，非阴寒交热以为阳热也，乃怫热蓄之于里而郁热乃发，则交传出之于表之阳分，是谓交阳，而后作汗也。”可用凉膈散调之，甚者宜黄连解毒汤。

交肠 病名。指大便时有尿液从肛门流出，小便时有粪质自尿道排出。《证治要诀·大小腑门》：“交肠之病，大小便易位而出。盖因气不循故道，清浊混淆。宜五苓散、调气散各一钱，加阿胶末半钱，汤调服，或研黄连阿胶丸为末，加木香末少许，再以煎汤送下。”本病相似直肠膀胱瘘。

交感脱精 病证名。见《石室秘录》卷二。指性交时突然虚脱者。男女皆可发生。因下元不足，感乐太过，虚阳外脱所致。急宜进行口对口人工呼吸，煎大剂独参汤或救脱汤灌服。

闭 ❶指中风闭证。《医宗必读》：“凡中风昏倒，……最要分别闭与脱二证明白。”《医学三字经》：“中风：闭与脱，大不同。”又注：“热风多见闭证，宜疏通为先。”参中风闭证条。❷指大便或小便闭而不通。见《素问》举痛论篇及标本病传论篇。

闭暑 病名。《医学心悟》卷三：“闭暑者，内伏暑气，而外为风寒闭之也。其头痛，身痛，发热恶寒者，风寒也；口渴，烦心者，暑也。四味香薷饮加荆芥、秦艽主之。”参暑病条。

闭癃 病名。《灵枢·本输》：“实则闭癃。闭癃则泻之。”详癃闭条。

羊毛痧 痧证之一。病处见细白色毛，状如羊毛。《痧症全书》卷中：“羊毛痧，腹胀连背心或腰胯如芒刺痛，用烧酒瓶头泥筛细，和烧酒作团，辊擦痛处，即有细白毛粘团上。”古人用铜钱置病所。以艾火烧钱

上，外将瓦罐或竹罐合之，即时收出汗水而愈；又有用手推背上二筋撮起掐紧以治痧痛。

羊筋痧　痧证之一。指病处白毛积聚如筋。《痧症全书》卷中："羊筋痧，腹胀混身板痛，此二症胸前或腰背，用小针穿皮挑出筋毛自愈，只拣疼处看有毫毛聚起者便是，药用涤痧丸，普济消毒饮。"

羊癎　六畜痫之一。见《备急千金要方》卷五。《小儿药证直诀·五痫》："羊痫，目瞪吐舌，羊叫。心也。"《杂病源流犀烛·诸痫源流》："羊痫之扬目、吐舌，作羊声者，则应乎肺。"参羊癫、痫、六畜痫等条。

羊踯躅中毒　病名。羊踯躅一名闹羊花。见《千金要方》卷二十四。因药用或误服羊踯躅过量而出现中毒症状者。症初见恶心呕吐，腹泻，继则心跳缓慢，血压下降，动作失调，严重者因呼吸停止而死亡。治宜中西医结合救治。文献有用栀子汁、茅根、菉豆解毒的记载。可参考。

羊癫　病名。即羊痫。癫与痫通。《景岳全书·杂证谟》："癫，即痫也。……马痫、牛痫、猪痫、羊痫、鸡痫者，即今人之谓羊癫、猪癫也。"《石室秘录》卷一："羊癫之症，忽然卧倒，作羊马之声，口中吐痰如涌，多痰迷心窍，因寒而成，感寒则发也。"参痫、癫、六畜痫条。

羊癫风　痫疾的俗称。《增广验方新编》卷下："忽然跌倒，口吐白沫，不省人事，时发时愈，此名羊癫风。"治用回癫汤、祛痰定癫汤等。详痫条。本病即为原发性或继发性癫痫。

关格　❶病名。①小便不通名关，呕吐不已名格，小便不通与呕吐不止并见名为关格。见《伤寒保命集类要·关格病》。《医学心悟》卷三："更有小便不通，因而吐食者，名曰关格。经云：关则不得小便，格则吐逆。关格者，不得尽其命矣。"本证多系癃闭的严重阶段，可见于尿毒症等疾患。②大便不通名内关，小便不通名外格，大小便都不通名关格。《诸病源候论·关格大小便不通候》："关格者，大小便不通也。大便不通谓之内关，小便不通谓之外格，二便俱不通为关格也。由阴阳气不和，荣卫不通故也。阴气大盛，阳气不得荣之曰内关；阳气大盛，阴气不得荣之曰外格；阴阳俱盛不得相荣曰关格。关格则阴阳气否，结于腹内，胀满，气不行于大小肠，故关格而大小便不通也。"③指上不得入而呕吐，下则大小便秘结者。《医贯》卷之五："关格者，粒米不欲食，渴喜茶水饮之，少顷即吐出，复求饮复吐。饮之以药，热药入口即出，冷药过时而出，大小便秘，名曰关格。关者下不得出也，格者上不得入也。"④指呕吐而渐见大小便不通者为关格。《医醇賸义·关格》："患此证者，多起于忧愁怒郁，即富贵之家，亦多有隐痛难言之处，可见病实由于中上焦，而非起于下焦也。始则气机不利，喉下作梗；继则胃气反逆，食入作吐；后乃食少吐多，痰涎上涌，日渐便溺艰难。此缘心肝两经之火煎熬太过，营血消耗，郁蒸为痰；饮食入胃，以类相从，谷海变为痰薮，而又孤阳独发，气火升痰，宜其格而不入也。"因肝气犯胃，食入作吐，宜解郁和中，归桂化逆汤；痰气上逆，食入呕吐，人参半夏汤；孤阳独发，阻格饮食，甚则作呃，和中大顺汤。二气双调饮通治关格。❷脉象之一。指人迎与寸口脉俱盛极，系阴阳离决之危象。《灵枢·终始》："人迎四盛，且大且数，名曰溢阳，溢阳为外格。""脉口四盛，且大且数者，名曰溢阴，溢阴为内关，内关不通，死不治。人迎与太阴脉口俱盛四倍以上，命曰关格，关格者，与之短期。"❸病理名词。指阴阳均偏盛，不能相互营运的严重病理状态。《灵枢·脉度》："阴气太盛，则阳气不能荣也，故曰关；阳气太盛，则阴气弗能荣也，故曰格。阴阳俱盛，不

得相荣，故曰关格。关格者，不得尽期而死也。”

米瘕 病证名。见《医说》卷五。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“好吃生米成瘕，不得米则吐清水，得米即止，米不消化，久亦毙人，宜鸡屎米煎。”本病与《诸病源候论》记载的米癥略同，参该条。

米癥 七癥之一。见《诸病源候论·癥瘕病诸候》。由好吃生米，食多不消，兼挟痰瘀积聚而成。主要症状为脘腹结块固定不移，常思食生米，其他饮食难进，呕吐清水等。参癥、食癥、七癥等条。

壮热 证名。指发热热势壮盛。《诸病源候论·伤寒挟实壮热候》：“伤寒，是寒气客于皮肤，搏于血气，腠理闭密，气不宣泄，蕴积生热，故头痛、体疼而壮热。其人本脏气实者，则寒气与实气相搏而壮热者，谓之挟实。实者有二种，有冷有热，其热实，粪黄而臭，其冷实，食不消，粪白而酸气，此候知之，其内虽有冷热之殊，外皮肤皆壮热也。”本症多见于外感病的邪热盛实患者。参风温、湿温、中暑、瘟疫等条。

冲气 指冲脉之气上逆的疾患。出《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》。多因饮邪内伏，肾阳虚衰，冲脉之气挟饮上逆所致。证见气从少腹上冲胸咽，并伴见手足厥逆，小便难，脉沉微，或面热如醉，头晕目花等。治以敛气平冲为主。方用茯苓桂枝五味甘草汤等方。参气病条。

冲气犯心 冲脉病误治变证之一。《杂病源流犀烛·冲脉病源流》：“汗之气逆上冲，正在心端。下之掌握热烦，身上浮冷，热汗自泄，欲得水自灌，皆冲气犯心，心受其害，且汗下则心液泄，故见如是等症也。宜甘李根汤。”参冲脉病条。

冲气犯肝 冲脉病误治变证之一。《杂病源流犀烛·冲脉病源流》：“汗之伤血而引肝上逆，故头眩，汗不出，筋惕肉瞤。下之伤气，故腹内拘急，食下动气反剧，身虽有热，卧则欲踡，皆冲气犯肝，肝受其害所见之症也。宜防风白术牡蛎汤。”参冲脉病条。

冲气犯肾 冲脉病误治变证之一。《杂病源流犀烛·冲脉病源流》：“汗之必寒起，无汗，心中大烦，骨节苦疼，目晕恶寒，食则反吐，谷不能进。下之腹胀满，卒起头晕，食则清谷不化，心下痞，皆冲气犯肾，肾受其害，且肾主五液，汗下则五液耗，故见如是等症也。宜大橘皮汤。”参冲脉病条。

冲气犯肺 冲脉病误治变证之一。《杂病源流犀烛·冲脉病源流》：“汗之气躁而逆，故衄渴，苦烦，气隔，饮水即吐。下之津液内竭而不下，故咽燥鼻干，头眩心悸，皆冲气犯肺，肺受其害所见之症也。宜五苓散。”参冲脉病条。

冲头痛 病证名。后世亦称正头痛。《灵枢·经脉》：“膀胱，足太阳之脉，起于目内眦，上额交巅，……是动则病冲头痛，目似脱，项如拔。”《东医宝鉴·外形篇》：“足太阳之脉，上额交巅，直入络脑，别下项。其病冲头痛，目似脱，项似拔，即正头痛也。”参该条。

冲疝 指疝气由督脉受病所致者。《素问·骨空论》：“督脉者，……此生病，从少腹上冲心而痛，不得前后，为冲疝。”《类证治裁·疝气》：“疝发自下，冲上猝痛，下引睾丸，此七疝中冲疝也。”治宜木香散等方。参气病、疝气等条。

冲脉病 病名。指冲脉脉气逆乱的疾患。《杂病源流犀烛·冲脉病源流》：“冲脉为病，气逆而里急。……一曰寒逆，阳不足也。脉来中央实坚，经至关、尺寸俱牢，直上直下。症见胸中寒，少腹痛，中满暴胀，疝瘕，遗溺，胁支满烦，女子绝孕。宜理中汤去白术，或加肉桂。一曰火逆，阴不足也。脉来阴阳俱盛，两手脉浮之俱有阳，沉

之俱有阴，症见咳唾，躁热上抢心，眩仆，四肢如火，心烦，恍惚痴狂，宜加味补阴丸。”冲脉病忌汗，忌下。误治可致冲气犯心，冲气犯肺　冲气犯肝，冲气犯肾，详各该条。

灯笼病　病名。指瘀血所致里热外凉者。《医林改错》卷上：“身外凉，心里热，故名灯笼病，内有瘀血。认为虚热，愈补愈瘀，认为实火，愈凉愈凝。”治当活血祛瘀，宜用血府逐瘀汤。

汗血　证名。出《诸病源候论·血病诸候》。又名血汗、肌衄。详血汗条。

汗出如油　证名。见《伤寒发微论》。指汗出如油之状，黏腻不易流动。多见于病危虚脱之证。参绝汗、油汗、黏汗条。

汗证　证名。见《医学正传》。指汗出异常症候。一般分自汗、盗汗两类。《景岳全书·杂证谟》：“汗出一证，有自汗者，有盗汗者。”由于病情不同，汗证有阴汗、阳汗之分。并有战汗、狂汗、红汗、漏汗、阴盛格阳汗、亡阳汗、绝汗、头汗、额汗、心汗、腋汗、手足汗、无汗、偏沮等多种。详各条。

污血胁痛　病证名。指污血凝滞胁下所致的胁痛。《金匮翼》卷六：“污血胁痛者，凡跌扑损伤，污血必归胁下故也。其症昼轻夜重，或午后发热，脉短涩或搏，其人喘逆。”《赤水玄珠》卷五：“跌蹼损伤，瘀血停积胁内，日久作痛。”治宜祛瘀通络为主。如鸡鸣散等方。参死血胁痛、跌扑胁痛条。

江东脚气　见《圣济总录》卷八十四。又名瘴毒脚气。详该条。

〔冂〕

寻常渴　即渴。为与消渴区别，故称寻常渴。《证治准绳·杂病》：“口燥咽干，此寻常渴，非三消证。”详渴条。

阳水　病证名。水肿病两大类型之一。多属实证。因外感风、寒、湿、热、暑邪等所致。《丹溪心法·水肿》：“若遍身肿，烦渴、小便赤涩、大便闭，此属阳水。”《医学入门·水肿》：“阳水多外因，涉水冒雨，或兼风寒，暑气而见阳证。”治宜发汗、利水及攻下等法。凡肺气失宣，三焦壅滞，不能通调水道，下输膀胱，起病即见恶寒发热，咳嗽咽痛，面部浮肿，小便短少，苔薄脉浮等证，宜疏风宣肺，清热利水，如越婢汤、五皮饮等方。若见浮肿不退，烦热口渴，小便赤涩，大便秘结，腹胀满，苔黄脉数等实证，宜清热逐水，用八正散、疏凿饮子等。参水肿、遍身肿条。

阳旦证　病证名。❶指桂枝汤证。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“证象阳旦。”成无己注：“阳旦，桂枝汤别名也。”《金匮要略·妇人产后病脉证治》：“阳旦证续在耳，可与阳旦汤。”旁注：“即桂枝汤。”❷指桂枝汤证兼见心烦口苦等里热证者。《外台秘要·伤寒中风方》：“古今录验疗中风伤寒脉浮，发热往来，汗出恶风，项颈强，鼻鸣干呕，阳旦汤主之。”其方为桂枝汤加黄芩。

阳汗　证名。指热汗。《景岳全书·杂证谟》：“阳汗者，热汗也。……阳证自汗或盗汗者，但察其脉证有火，或夜热烦渴，或便热喜冷之类，皆阳盛阴虚也。宜当归六黄汤为第一，保阴煎亦妙。其或阴分虽有微火而不甚者，宜一阴煎或加减一阴煎之类主之。其有心火不宁，烦躁出汗者，宜朱砂安神丸、天王补心丹、生脉散之类主之。又有本非阴虚，止因内火熏蒸，血热而多汗者，宜正气汤或黄芩芍药汤、清化饮之类主之。”参热汗条。

阳证　八纲之一。指疾病所出现的阳盛证候。见《此事难知·辨阴阳二证》。凡表证、热证、实证多属阳证。常见发热恶寒，头痛身疼，烦躁口渴，面赤潮红，口唇燥裂，声高息粗，腹痛拒按，大便秘结或下利

臭秽，小便短赤，舌红坚敛，苔黄垢糙，脉浮、数、洪、滑等。治宜解表、清热、攻下、和解等法。详表证热证、实证条。

阳证发斑 病证名。指发斑属于实热性者。见《此事难知》。又名阳斑。《阴证略例》："阳证发斑有四，有伤寒发斑，有时气发斑，有热病发斑，有温毒发斑，斑斑如锦纹，或发之面部，或发之胸背，或发之四末，色红赤者，胃热也，紫黑为胃烂也。一则下早，一则下之晚，乃外感热病而发斑也，当服元参、升麻、白虎等药。"亦可用泻心汤、调胃承气汤等方。参斑、阳斑条。

阳证似阴 真热假寒证的别称。《景岳全书·传忠录》："寒热有真假者，阴症似阳，阳症似阴也。"多因阳盛之极，阳气闭郁不能外达所致。《医宗必读·疑似之症须辨论》："阳盛之际，往往发厥，厥则口鼻无气，手足逆冷，有似乎阴也。"《万病回春》："阳症似阴者，初起身不热，头不痛，四肢厥冷，身寒怕寒，腹痛呕吐，泄泻蹉卧，好静沉默，不渴，脉沉迟细微。或兼见不欲衣被，大小便闭涩，或赤或黑，烦闷昏迷，不眠口渴，指甲时温，不问脉之浮沉迟数，但重按微有力者是也。此阴失守而避在肌表，亢阳侵于内，法当下之，不可作阴症治也。"参真热假寒条。

阳证咳逆 病证名。指呃逆之属热者。见《类证活人书·问咳逆》。《杂病源流犀烛·呃逆源流》："呃逆阳症，发热口苦，胸满脉数，宜橘皮竹茹汤，或小柴胡汤加橘皮、竹茹。"参咳逆、呃逆条。

阳明三急下证 指阳明病急用下法的三种症型。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》："伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者，此为实也，急下之，宜大承气汤。"又："阳明病，发热汗多者，急下之，宜大承气汤。"又："发汗不解，腹满痛者，急下之，宜大承气汤。"以上三急下证，亦称阳明病三急下法。《尚论篇》："阳明经亦有急下三法，以救津液。一汗多津越于外；一腹满津结于内；一目睛不慧，津枯于中。"参阳明病条。

阳明头痛 病证名。❶指伤寒阳明病而见头痛者。《兰室秘藏·头痛门》："阳明头痛，自汗发热，恶寒，脉浮缓长实者。升麻，葛根，石膏，白芷为主。"❷头痛而在阳明经脉循行部位者。《冷庐医话·头痛》："属阳明者，上连目珠，痛在额前。"参头痛，三阳头痛条。

阳明经证 证名。即阳明经病。见《医学心悟》。详阳明经病条。

阳明经病 亦称阳明经证。《伤寒辨证·六经证治》："传至阳明，则目痛、鼻干、不眠，宜升麻葛根汤。此证有在经在府之别。如目痛，鼻干，微恶寒，身热，脉浮洪，病在经也。"阳明经病又有在标在本说。在标宜辛凉解肌，在本宜清热保津。《伤寒全生集·足阳明经见证治例》："其证目痛、鼻干、不眠、头额痛、身微热、恶寒，此是阳明经之标病，不拘日数多少，便宜解肌；如身热，烦渴欲饮水，汗出恶热者，此阳明经本病也，当清解邪热。"《医宗金鉴·订正伤寒论注》："阳明主里，内候胃中，外候肌肉，故有病经病府之分。如论中身热，烦渴，目痛，鼻干，不得眠，不恶寒反恶热者，此阳明经病也。……治阳明经病，则以葛根汤或桂枝加葛根汤发之，或以白虎汤清之，或以柴胡白虎汤和之，随其证而施之可也。"《医学心悟·阳明经证》："阳明经病，目痛、鼻干、唇焦、漱水不欲咽，脉长，此阳明本经证，其经去太阳不远，亦有头痛发热，宜用葛根汤解肌。"（葛根、升麻、秦艽、荆芥、赤芍、苏叶、白芷、甘草、生姜）。本方即治阳明经标病，若见身热、烦渴、汗出恶热者，宜白虎汤、白虎加人参汤等方。参阳明病、阳明腑病条。

阳明经脚气 脚气病之一。见《三因极一病证方论》卷三。指风寒暑湿流注足阳明

胃经而成的脚气。症见寒热，呻欠，口鼻干，腹胀，髀膝膑中循胫外廉、下足附入中趾内间皆痛。若风胜者，自汗；寒胜者，无汗、痛甚；暑胜者，热烦；湿胜者，重着、肿满。治宜微利之，用大黄左经汤等方。

阳明病　病名。六经病之一。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》："阳明之为病，胃家实是也。"胃家，泛指肠胃而言；实，是邪气实。阳明病一般主里、热、实证。辨证有经证、府证之分。《伤寒贯珠集·阳明篇上》："阳明则府病多于经病。以经邪不能久留，而府邪常聚而不行也。……经病有传经、自受之不同，府病有宜下、宜清、宜温之各异。"阳明经证因无形的邪热盛于经，证见身大热，汗大出，大烦渴，脉洪大等。治宜清热保津为主，常用白虎汤等方。详见阳明经病条。阳明府证是有形的燥实热结于腑，证见潮热、谵语、腹满痛、不大便、脉沉实等。治当攻下燥实，清除热结，常用三承气汤等方。详见阳明腑病条。阳明病由于里热外蒸，故不恶寒而反恶热，是阳明病的发热特征。在治疗上，因阳热亢盛，津液容易耗伤，故清、下二法，为阳明病的重要治法。

阳明病外证　指阳明病的发热、汗出、不恶寒反恶热的外在表现。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》："问曰：阳明病外证云何？答曰：身热汗自出，不恶寒反恶热也。"阳明病多属里、热、实证。由于里热外蒸，可见内外俱热证候。身热汗自出，不恶寒反恶热，是阳明病经病、腑病所共有。《伤寒来苏集》："四证是阳明外证之提纲。"参阳明病、阳明经病、阳明府病条。

阳明痉　病证名。指阳明病出现痉症者。《证治准绳·杂病》："若头低视下，手足牵引，肘膝相搏，阳明痉也。"《类证治裁·痉症》："属里者，痉病，胸满口噤，卧不著席，脚挛急，必龂齿，属阳明，若便鞕，可与大承气汤。"参痉条。

阳明厥　六经厥之一。《三因极一病证方论·叙厥论》："妄言，走呼，腹满，面赤，名阳明厥。……考其厥因，多以不胜乘其所胜，气不得行，遂致于逆。"参六经厥、厥证条。

阳明腑证　即阳明府病。见《医学心悟》。详阳明府病条。

阳明腑病　病名。亦称阳明腑证。《伤寒辨证·六经证治》："潮热、自汗、谵语、发渴、大便闭，揭去衣被，扬手掷足，发斑发黄，狂乱恶热，脉沉数，病在府也。"治宜攻下燥实为主。《医学心悟·阳明经病》："假如邪已入腑，发热转为潮热，致有谵语、燥渴、便闭、腹胀等症，是为邪气结聚，则用承气汤下之。"《伤寒全生集·足阳明经见证治例》："若潮热、自汗、谵语、发渴、不恶寒、反恶热、揭去衣被、扬手掷足，或发斑、发黄，狂乱，大便燥实不通，或手足乍冷乍温，腹满硬痛，喘急，此是正阳明胃腑本实病也。急宜调胃承气汤下之。"《医宗金鉴·订正伤寒论注》："其治阳明府病，虽均为可下，然不无轻重之分。故或以三承气汤下之，或麻仁丸通之，或蜜煎、胆汁导之，量其病而治之可也。"参阳明病、阳明经病条。

阳明蓄血　病名。❶指伤寒阳明热邪与宿瘀相搏结而成的蓄血症。见《伤寒溯源集》。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》："阳明证，其人喜忘者，必有蓄血。所以然者，本有久瘀血，故令喜忘。屎虽鞕，大便反易，其色必黑者，宜抵当汤下之。"❷指久患牙齿蛀蚀作痛者。牙齿蛀蚀，数年不愈者，此阳明经蓄血也。嗜酒者多患之。治宜桃仁承气汤为末，炼蜜为丸，如桐子大服之（见《张氏医通·齿》）。

阳明瘅疟　疟疾之一。即温疟、瘅疟。《症因脉治》卷四："阳明瘅疟《内经》名瘅疟，仲景名温疟。瘅疟之症，但热不寒，少气烦冤，手足热而欲吐呕，面赤口渴，虽热

已而六脉仍数大者。《内经》名热伤阳明瘅疟之症，仲景发明《内经》阳明瘅疟，则曰身无寒，骨节疼痛，烦冤时呕，更其名曰温疟是也。瘅疟之因，夏秋暑热之令，热气伤人。《内经》云，阴气先绝，阳气独发，此暑热伤于阳经，阳独用事，毫无阴寒，故名曰瘅热疟也。"宜用白虎加桂枝汤；治太阳阳明，家秘用桂枝黄芩汤，兼治少阳阳明；并可用三阳和解汤。参瘅疟、温疟、疟疾条。

阳易 病名。阴阳易之男传于女者。《三因极一病证方论》卷四："其男子病新差，未平复，而妇人与之交接，得病名曰阳易。里急，腰踝连腹内痛。"可用猴鼠粪汤治之。参阴阳易条。

阳物细小 证名。指阴茎短而细小之症。多因肝气不足所致。《辨证录·种嗣门》："男子有天生阳物细小，而不得子者，人以为天定之也，谁知人工亦可以造作乎。……盖人之阳物修伟者，因其肝气之有余；阳物细小者，由于肝气之不足。"又"欲使小者增大，要非补肝不可。然而肾为肝之母，心为肝之子，补肝而不补其肾，则肝之气无所生，补肝而不补其心，则肝之气有所耗，皆不能助肝以伸其筋，助筋以壮其势，故必三经同补。"宜补肝壮筋，兼益心肾。用夺天丹、展阳神丹等方。

阳疟 病名。❶指三阳疟。见《类证治裁·阴疟》。详见三阳疟条。❷泛指在表、在阳、在气、在腑之疟。《医学入门·疟》："疟疾先要阴阳定。阳为外感邪气，其间阳为风暑，有汗，阴为寒湿，无汗。阴为内伤正气虚，其间阳为气虚，阴为血虚。阳为升，发在春夏；阴为降，发在秋冬。阳为腑，邪浅与荣卫并行，一日一发；阴为脏，邪深横连募原，不能与正气并行，故间日蓄积乃发，或三四日一发，久则必有疟母。阳为日发，邪浅，荣卫昼行背与脊故也；阴为夜发，邪深，荣卫夜行胸与腹故也。又有二日连发住一日者，及日夜各一发者，乃气血俱受病也。阳为子时至巳，阴为午时至亥，如发寅卯而退于申未，或发未申而退于子丑，皆谓之阴阳不分，须随症用药，趱卑或移时分定阴阳，然后阳疟截住，阴疟升散。"参疟疾条。

阳结 病证名。❶指胃肠实热燥火所致的便秘。见《兰室秘藏·大便燥结门》。《医学入门·燥结》："结有能食脉实数者为阳结。"《景岳全书·杂证谟》："阳结证必因邪火有余以致津液干燥，此或以饮食之火起于脾，或以酒色之火炽于肾，或以时令之火蓄于脏，凡因暴病或以年壮气实之人方有此证。然必有火证火脉内外相符者，方是阳结。治此者又当察其微甚，邪结甚者，非攻不可，宜诸承气汤、神祐丸、百顺丸之类主之。邪结微者，宜清凉饮子、元戎四物汤，或黄龙汤、玉烛散之类主之。火盛不解者，宜清凉散、大黄硝石汤、八正散、大分清饮、大金花丸之类主之。火盛水亏，阴虚而燥者，宜丹溪补阴丸，人参固本丸，或六味地黄加黄柏、知母、麻仁之类主之。"亦有以风秘、气实秘、热秘等为阳结。《金匮翼·便闭统论》："实闭热闭即阳结。"《医学心悟·大便不通》："热闭者，口燥、唇焦、舌胎黄、小便赤、喜冷、恶热，此名阳结。"参见大便秘结、风秘、气秘、热秘各条。❷脉象名。《注解伤寒论·辨脉法第一》："脉蔼蔼如车盖者，名曰阳结也。"

阳痉 病名。一作阳痓。❶指刚痉，即刚痉。《丹溪心法·痉》："阳痉曰刚，无汗。"参见刚痉条。❷指痉病无四肢厥冷者。《证治准绳·杂病》："痉既以有汗无汗辨刚柔，又以厥逆不厥逆辨阴阳。仲景虽曰痉皆身热足寒，然阳痉不厥逆。"治宜清热、凉血、祛风。选用羚羊角散、麦门冬散、防风散等方。参痉条。

阳消 病名。见《景岳全书·杂证谟》。指因火盛所致的消渴病。消渴病以阳消居多。详消渴条。

阳浮发热 病证名。指脾肾阳浮不敛的发热。《金匮翼·阳浮发热》："阳气虚浮，其端有二：或脾胃气虚，阳浮于外。其症上见呕恶，下为溏泄，其脉大而不实，身虽大热，切忌寒凉，宜甘辛温药温其中，使土厚则火自敛也；或肾虚火不归经，游行于外，其症烦渴引饮，面赤，舌刺，唇黑，足心如烙，或冷如冰，其脉洪大无伦，按之微弱，宜八味肾气丸之属，导火下行也。"参发热、阳虚发热条。

阳黄 病证名。为黄疸两大类型之一。见《伤寒微旨论》。《景岳全书·杂证谟》："阳黄证因湿多成热，热则生黄，此即所谓湿热证也。"由湿热蕴蒸肝胆，胆热液泄，外渗肌肤，下流膀胱而致一身面目及小便尽黄。主要症状为发热，烦渴，身目黄色鲜明如橘子色，小便色深如浓茶，伴食欲减退或恶心呕吐，大便不畅，腹胀胁痛，舌质红，苔黄腻，脉弦数等。治法以清化湿热为主。热重于湿者，常用茵陈蒿汤、栀子柏皮汤、大柴胡汤等；湿重于热者，可用茵陈五苓散等。针灸疗法，瓜蒂散搐鼻、毛茛发泡疗法等，对退黄及症状都有一定疗效。参黄疸、湿热发黄条。

阳盛阴虚失血 病证名。《不居集》卷十三："阳盛阴虚失血。口鼻出血，皆系阳盛阴虚，有升无降，血随气上，越出上窍。法当补阴益阳，则血自归经也。"阳盛阴虚失血除见口鼻出血外，还可见吐血、呕血、大便下血及不规则的阴道出血。

阳虚小便不利 小便不利症之一。见《症因脉治》卷四。因肝肾阳虚，施泄无权，关门不利所致。主要症状为小便滴沥不畅，或全然不通，憎寒喜暖，手足逆冷，小腹冷，脉沉迟。治宜温阳为主。方如金匮肾气丸、八味丸、理中汤之类。参小便不利条。

阳虚失血 病证名。《金匮翼·诸血统论》："阳虚失血者，脾胃气虚，不能固护阴气也。仁斋直指云：血遇热则宣流，故止血多用凉剂。然亦有气虚挟寒，阴阳不相为守，荣气虚散，血亦错行，所谓阳虚阴必走是耳。外证必有虚冷之状，其血色必黯黑而不鲜。法当温中，使血自归经络。可用理中汤加南木香，或甘草干姜汤。"《医略六书》谓"肾中阳虚，下寒上热，八味丸以引火归元。"如阳虚大吐血成升斗者，初用花蕊石散以化之，随用独参汤以补之，继用四君、八珍等调之（见《医学心悟》）。参吐血、内伤吐血条。

阳虚头痛 病证名。指阳气不足，无力升举所致的头痛。《景岳全书·杂病谟》："阳虚头痛，即气虚之属也。亦久病者有之，其证必戚戚悠悠，或羞明，或畏寒，或倦怠，或食饮不甘，脉必微细，头必沉沉，遇阴则痛，逢寒亦痛。"参气虚头痛条。

阳虚发热 病证名。指阳气虚衰而致的发热。见《丹溪心法·发热》。《景岳全书·杂证谟》："阳虚者，亦能发热，此以元阳败竭，火不归源也。"《医碥》卷一："阳虚谓肾火虚也。阳虚应寒，何以反发热？则以虚而有寒，寒在内而格阳于外，故外热，寒在下而戴阳于上，故上热也。此为无根之火，乃虚焰耳。证见烦躁，欲坐卧泥水中，面赤如微酣，或两颧浅红，游移不定，渴欲饮水，或咽喉痛而索水置前却不能饮，肌表虽大热而重按之则不热，或反觉冷，且两足必冷，小便清白，下利清谷，脉沉细或浮数无力，按之欲散。治宜温热之剂，温其中而阳内返，温其下而火归元。误投寒凉立死。"参发热、阳浮发热条。

阳虚自汗 自汗证之一。见《赤水玄珠·汗门》。由于阳气虚弱，腠理不密，故汗液易泄。症见畏寒，倦怠，汗出觉冷。治宜温阳固表。可用芪附汤、黄芪建中汤等方。参自汗条。

阳虚证 证名。指阳气虚衰所出现的病证。出《素问·调经论》。多见于慢性疾患，因素体阳气虚弱，或病邪损伤阳气所

致。《景岳全书·传忠录》："阳虚者，火虚也，为神气不足，为眼黑头眩，或多寒而畏寒。"症见面色㿠白，短气懒言，精神倦怠，四肢不温，尿清便溏，舌淡苔薄，脉细弱或大而无力等症。治宜益气温阳为主。选用补中益气汤、理中丸、保元汤等方。亦指阴寒内盛，阳气衰微的病证。多见于重危病证。症见四肢逆冷，下利清谷，恶寒蜷卧，喘息头汗，脉微欲绝等。治宜回阳救逆为主。用四逆汤、参附龙牡汤等方。

阳虚恶寒 恶寒证之一种。《证治汇补·恶寒章》："阳虚恶寒，以阳气能温分肉而充皮毛，肥腠理而司阖闢，内伤房欲，火衰恶寒，即热之不热，是无火也。其症必兼蜷卧，足冷，溲溲自汗，两尺沉细。"《景岳全书·杂证谟》："其证则未冷先寒，或手足清厥，或身为寒栗，或脾胃不健，或肚腹不实，或小水频数，或阳道不壮，或每多恐畏，或眼耳少神，是皆阳虚生寒也。治宜温补元气，其微者宜五君子煎、理阴煎、六气煎、温胃饮、寿脾煎之类择而用之。其甚者宜大补元煎、右归饮、右归丸、四味回阳饮、六味回阳饮、海藏八味地黄丸之类主之。"《医碥·恶寒》："阳虚则恶寒也，治宜姜、附、参、芪之类助阳固表。"参恶寒、内伤恶寒条。

阳虚眩晕 病证名。见《世医得效方》卷三。因阳气不足，清阳不能升达头部所致。《医略六书·眩晕》："元阳寒冷，真火不归，眩晕，躁扰，此虚羸人多阳虚眩晕。"症见头晕头痛，恶寒，耳鸣耳聋；或眩晕欲倒，气短自汗，手足冷，脉沉细；或晨起头晕，片时自定。治宜温阳补气。用三五七散、参附汤、正元散、黑锡丹等方。参虚阳上浮眩晕条。

阳虚喘 病证名。见《中国医学大辞典》。《类证治裁·喘症》："肾阳虚而气脱，孤阳浮越，面赤烦躁，火不归元，七味地黄丸加人参、麦冬，肾不纳气，身动即喘，阴阳枢纽失交，急须镇摄，肾气汤加沉香，从阴引阳；都气丸入青铅，从阳引阴。"《杂症会心录·喘症》："第内伤之喘，有阴虚阳虚之异。……如面㿠白，口不渴，大便泄，手足冷，属阳虚。"方以八味地黄汤。亦可加入人参、紫河车、枸杞子、菟丝子、杜仲、鹿角胶之属。参真元耗损喘、虚冷上气喘、虚喘等条。

阳痉 病名。见《丹溪心法·痉》。即阳痉。详该条。

阳维脉病 指阳维脉经气异常出现的病症。《难经·二十九难》："阳维维于阳，阴维维于阴，阴阳不能相维，则怅然失志，溶溶不能自相持。阳维为病，苦寒热。"《脉经》卷二："诊得阴维脉浮者，蹙起目眩，阳盛实，苦肩息，洒洒如寒。"《杂病源流犀烛·阳维阴维脉病源流》以桂枝汤、麻黄汤、黄芪建中汤等方治阳维脉病。

阳斑 证名。斑的类型之一。见《明医指掌·斑疹》。又名阳证发斑。指外感热病发斑，属于实热性者。多由邪热熏灼营血所致。证见斑出红赤如锦纹，发热烦渴，舌红苔黄等。治宜清热凉血、轻透斑毒，用化斑汤或用水牛角、玄参、丹皮、银花、薄荷、连翘、牛蒡子、人中黄等。参斑、阳证发斑条。

阳厥 ❶厥证之一。指热厥。《景岳全书·杂证谟》："阳厥者，热厥也。"《药症忌宜》："阳厥即热厥，其证四肢厥逆，身热面赤，唇燥大渴，口干舌苦，目闭或不闭，小便赤涩短少，大便燥结，不省人事。"《丹溪心法·厥》："阳厥者，是热深则厥。盖阳极则发厥也。不可作阴证而用热药治之。精魂绝而死矣。急宜大小承气汤，随其轻重治之。"参厥证条。❷足少阳经经气厥逆所致的病证。《灵枢·经脉》："胆，足少阳之脉，……是动则病，口苦，善太息，心胁痛，不能转侧，甚则面微有尘，体无膏泽，足外反热，是为阳厥。"❸指突受

刺激过度而出现善怒发狂的病证。《素问·病能论》："有病怒狂者，此病安生？……阳气者，因暴折而难决，故善怒也，病名曰阳厥。"

阳暑 病名。❶一名动暑、中暍。《景岳全书》卷十五："阳暑者，乃因暑而受热者也。在仲景即谓之中暍。凡以盛暑烈日之时，或于长途，或于田野，不辞劳苦，以致热毒伤阴，而病为头痛，烦躁，肌体大热，大渴，大汗，脉浮，气喘，或无气以动等证，此以暑月受热，故名阳暑。治宜察气之虚实，火之微甚，或补或清，以固其气。"方用益元散、白虎加人参汤、竹叶石膏汤、桂苓甘露饮等。参暑病、动暑、中暍条。❷暑温的一种类型。《医门棒喝》初集："暑温者，夏至后所感热邪也。古人分阴暑、阳暑。盖夏至以后，相火湿土，二气交会，合而为暑，或值时令热盛，或人禀体阳旺，而成阳暑之证，是暑而偏于火者。"参见暑病、中暍条。❸即中暑，见《六气感证要义》，详该条。

阳痫 病名。❶指兼见阳症为主的痫症。《诸病源候论》卷四十五："病先身热，瘛疭，惊啼唤而后发痫，脉浮者为阳痫。"《杂病源流犀烛·诸痫源流》："阳痫必由痰热客心胃，闻惊而作，甚则不闻惊亦作。宜用寒凉药。"方宜妙香散等。❷即急惊风。《证治准绳·幼科》："阳痫乃急惊也。"❸指惊风一月或一季必三度发者。《证治准绳·幼科》："阳痫者，因感惊风三次发搐，不与去风下痰则再发。然三次者，非一日三次也，或一月或一季，一发惊搐，必经三度，故曰三次。所谓惊风三发便为痫，即此义也。其病主身热自汗，两目上视，嚼沫咬牙，手足掣搦，面色红紫，六脉浮数，以百能散加五和汤水煎疏解，次下痰，用水晶丹或半夏丸。"参痫条。

阳痧 痧证之一。①指痧证腹痛而手足暖者。《杂病源流犀烛·痧胀源流》："阳痧，腹痛而手足暖者是也，出血即安。或因郁气不通之故。"宜荆芥汤。②指热毒郁结之痧。《痧症度针》卷上："阳痧，即热毒郁结之痧，多因冒暑耕耘，趋炎奔走，或怒劳郁勃，或醉饱迎凉，皆能成痧。发则头痛、眩运、恶心、腹痛、面赤、目红，甚则护心噤口，汗出如油。治之不速，不半日而死。凡见此等热痧，其四肢必温暖，脉必暴数，或沉伏。与阴痧不同，切不可饮热粥、热汤，尤最忌姜汤、烧酒之类，反致不救。法当先刮后放，并鼻嗤卧龙丹，调服痧药，以开闭塞，而通结滞，或令饮冷水，亦可解毒回生。"参痧条。

阳强 证名。❶指阴茎长举不痿，精液自泄者。见《张氏医通·杂门》。又名强中。详该条。❷指男女房劳后，吐舌不收者。治宜大补真阴，如鳖甲、阿胶、元参、芝麻、牛角腮、猪脊髓、巴戟天、补骨脂、菟丝子、女贞子等。或用梅花冰片研细掺舌上。

阳跷脉病 指阳跷脉经气异常出现的病症。《素问·缪刺论》："邪客于足阳跷之脉，令人目痛从内眦始。"《难经·二十九难》："阳跷为病，阴缓而阳急。"《杂病源流犀烛·阳跷阴跷脉病源流》："至其为病，阳跷则阴缓而阳急。阳急则狂走，目不眛。洁古云，里和表病，为阴不病而阳病。阳病则寒，其治风池、风府。若在阳表，当汗，桂枝汤、麻黄汤。若在阴里，当下，承气汤。"

阳痿 病名。见《景岳全书·杂证谟》。又称阴痿。痿亦作萎。指未到肾衰年龄而出现阴茎不举或举而不坚者。多因房室过度，命门火衰所致。也有因抑郁伤肝，思虑惊恐损伤心脾，肝经湿热，阴湿伤阳等所致。命门火衰者，常伴见滑精，腰疼，畏寒肢冷，脉沉细。治宜温肾补元。用右归丸、赞育丹等方。心脾亏损者，常伴见神疲乏力，心悸失眠等症。治宜培养心脾。用归脾汤、妙香散、七福饮等方。精神抑郁，阳痿不起者，

治宜舒肝解郁。用达郁汤、逍遥散等方。肝经湿热者，常伴见小便热赤、下肢痠困、脉沉滑，或伴见睾丸冷、阴汗如水、小便后有余沥臊气、尻臀及前阴冷、恶寒喜热、膝冷等。治宜清利湿热为主，或兼清养。用龙胆泻肝汤、柴胡胜湿汤、知柏八味丸等方。又有肝肾阴伤，虚火妄动者，症见阴茎易举，举而不坚，早泄滑精，心烦口干，脉多细数。治宜滋阴降火。用知柏八味丸、大补阴丸等方。参阴萎条。

阳缩不伸 指男子阴茎内缩之证。见《得心集医案·痿证门》。即茎缩，属阴缩范畴。详阴缩条。

阳躁 躁证之一。指因热盛而躁急、躁动者。《赤水玄珠·烦躁门》："阳躁者，烦渴欲饮，愤激躁怒，二便不利。经云：诸躁狂越，皆属于火者是也。"参躁条。

阳癫 五癫之一。指突然失去意识，不久即苏之症。《诸病源候论》卷二："阳癫，发如死人，遗尿，食顷乃解。"参癫、五癫、癎条。

阴火怔忡 怔忡之一。见《不居集》上集卷二十二。《证治汇补》卷五："有阴火上冲，头晕目花，耳鸣齿落，或腹中作声，怔忡不已者，宜滋阴抑火，加养心之剂。久服不愈，为无根失守之火，脉必空豁，宜温补方愈。"参怔忡、虚损怔忡等条。

阴火痛风 病证名。见《丹溪心法·痛风》。指气血不足，阴火旺而有痰浊的痛风症。治宜补气血，调阴阳，参以清痰火。药用人参、白术、熟地黄、黄柏、山药、海石、南星、琐阳、败龟板、干姜等。参痛风条。

阴火痰 痰证之一。因阴虚火旺所致。《不居集》卷十七："阴火痰：面有红光者，乃阴火上炎，又当用滋阴药。"方用地黄汤加麦冬、五味子等。参痰证条。

阴水 病证名。水肿病两大类型之一，多属虚证。因脾肺虚弱或肾经亏损等所致。《丹溪心法·水肿》："若遍身肿，不烦渴，大便溏，小便少，不涩赤，此属阴水。"《医学入门·水肿》："阴水多内因，……或肌饱劳役、房欲而见阴证。"《类证治裁·肿胀》："因肺脾肾虚，致水溢者，为阴水。"脾阳虚弱，证见下肢浮肿，按之凹陷不起，脘闷腹胀，纳减便溏，面色萎黄，四肢不温，小便短少，舌淡苔白滑，脉濡缓等，治宜健脾利水，用实脾饮，木香流气饮等方。肾阳虚衰，证见腰以下肿甚，畏寒肢冷，神疲气怯，面色㿠白，腰脊痠重，舌胖色淡苔白，脉沉细弱等，治宜温肾化水，用真武汤、金匮肾气丸等方。参水肿、遍身肿条。

阴汗 证名。❶指前阴、阴囊及其附近处局部多汗。《医林绳墨·汗》："阴汗者，谓至阴之处，或两腿挟中，行走动劳，汗出腥秽。"有因肝经湿热所致者。《张氏医通·汗》："阴汗，阴间有汗，属下焦湿热。龙胆泻肝汤加风药一、二味，风能胜湿也。或当归龙荟丸及二妙散俱效。阴囊湿者，以炉甘石煅过扑之，密陀僧亦佳。"《兰室秘藏》用清震汤、固真汤治阴汗，两丸如冰，前阴痿弱，小便黄，余沥臊臭，亦属湿热之症。有因肝肾亏损，湿热下乘者。《医略六书》卷二十："酒色过度，湿热下乘则精血不藏，每多阴汗，宜滋肾凉肝。"用六味地黄汤加黄柏、白芍。《奇效良方》卷四十五："前阴如冰冷，并阴汗，两脚痿软无力。"宜补肝汤。有因肾虚阳衰而阴囊多汗者。《杂病源流犀烛》卷七："有阴囊汗者，则为肾虚阳衰，宜安肾丸、小安肾丸。"❷多汗之属阴证者，常汗出而冷。《景岳全书·杂证谟》："阴汗者，冷汗也。"多由阳衰阴盛所致。治以益气温阳为主，选用人参建中汤、参附汤、六味回阳饮等方。参冷汗条。

阴阳交 病名。指热病汗出后复发热、汗出、脉躁、狂言的危症。因阳邪入于阴分，交结不解所致。《素问·评热论》："有病温者，汗出辄复热，而脉躁疾，不为汗

衰，狂言不能食，……病名阴阳交。”

阴阳易 病名。❶指伤寒或温疫等病后余热未净，由房事而传之对方者。《伤寒论·辨阴阳易差后劳复病脉证并治》：“伤寒，阴阳易之为病，其人身体重，少气，少腹里急，或引阴中拘挛，热上冲胸，头重不欲举，眼中生花，膝胫拘急者。”《医学心悟·伤寒兼症》：“男子病新瘥，与女子接，其病遂遗于女，女子病新瘥，与男子接，其病遂遗于男，名曰阴阳易。”有阴易、阳易之分。参各该条。❷指阴位见阳脉，阳位见阴脉。《素问·至真要大论》：“阴阳易者危。”《内经吴注》卷二十二：“阴位见阳脉，阳位见阴脉，变易失常，故谓之危。”

阴冷 证名。《诸病源候论·虚劳病诸候》：“肾主精髓，开窍于阴，今阴虚阳弱，血气不能相荣，故使阴冷也，久不已则阴萎弱。”又称阴寒。详该条。

阴证 八纲之一。指疾病所出现的阴盛证候。见《此事难知·辨阴阳二证》。凡里证、虚证、寒证多属阴证。常见面色㿠白，形寒肢冷，声微息短，喜静少言，纳少无味，不烦不渴或喜热饮，脘腹冷痛，大便溏泄，小便清长，舌质淡胖，苔白而润，脉沉、迟、微细等。治宜温中、散寒、扶阳、培补等法。详见里证、虚证、寒证条。

阴证头痛 病证名。指头痛而见阴寒症状者。《医垒元戎·三阳头痛》：“若阴证头痛，只用温中药足矣，乃理中、姜附之类也。”参三阴头痛条。

阴证发斑 病证名。指发斑属于虚寒者。《阴证略例·阴证发斑》：“阴证发斑，亦出胸背，又出手足，亦稀少而微红，若作热疾投之凉药大误矣，此无根失守之火聚于胸中，上独熏肺，传于皮肤而为斑点。但如蚊、虻、蚤、虱、咬形状，而非锦文也。调中温胃加以茴香、芍药，以大建中之类，其火自下，斑自退。可谓治本而不治标也。”亦可用八味汤等方。

阴证似阳 真寒假热证的别称。《景岳全书·传忠录》：“寒热有真假者，阴证似阳。”多因阴盛之极，虚阳外露所致。《医宗必读·疑似之症须辨论》：“阴盛之极，往往格阳，面红目赤，口舌裂破，手扬足掷，语言错妄，有似乎阳也。”《万病回春·阴证似阳》：“阴症似阳者，发热烦躁，或欲坐井中，揭去衣被，面赤目赤，……饮冷，脉洪而大，或兼见欲得衣被，不渴，手足逆冷，大小便自利，昏沉多眠，指甲黑色，脉虽洪大，但指下无力，重按至骨全无者是也。此阳失守而避在肌表，淫阴攻于内，法当温之，不可作阳症治。”参真寒假热条。

阴证伤寒 病名。指病邪直中阴经的虚寒证。见《通俗伤寒论·阴证伤寒》。分寒中太阴、寒中少阴、寒中厥阴三类。寒中太阴用胃苓汤、附子理中汤等方；寒中少阴用真武汤、附姜白通汤等方；寒中厥阴用当归四逆汤、通脉四逆汤等方。《伤寒广要·少阴病证候》：“自然阴证，人皆可晓，及至反常，则不能矣。……至于发热面赤，烦躁不安，揭去衣被，饮冷脉大，人皆不识，认为阳证。误投寒药，死者多矣。必须凭脉下药，至为切当。不问浮沉大小，但指下无力，按至筋骨，全无力者，必有伏阴，不可与凉剂。脉虽洪大，按之无力者，重按全无，便是阴证。”参直中三阴条。

阴证咳逆 病证名。指呃逆之属寒者。见《类证活人书·问咳逆》。《杂病源流犀烛·呃逆源流》：“呃逆阴症，胃寒欬细虚极，宜丁香柿蒂散、羌活附子汤。”也可用乳香、硫黄、陈艾研末，用好酒一锺，煎数沸，乘热嗅病人鼻，外用生姜擦胸前；或用荔枝七个，连核烧枯，研为细末，开水调服。食远服。参咳逆、呃逆条。

阴纵 证名。指阴茎挺长不收，或肿胀而痿之证。见《医学纲目·肝胆部》。又称茎纵。多由肝经湿热所致。《杂病源流犀烛·前阴后阴病源流》：“阴纵，亦名阴挺。

由前阴受热，则玉茎挺长不收，或肿胀而痿，或与股相磨难行，甚至两胁气逆上，手足倦弱。”治宜清肝化湿。用柴胡胜湿汤，小柴胡汤加黄连或黄柏，龙胆泻肝汤等方。甚者用三一承气汤。外用朴硝、荆芥煎汤浸洗，或用丝瓜汁调五倍子粉外敷。若肿挺减轻而坚块不消者，可用青皮配以散风药。参茎纵、阴挺条。

阴茎易举 证名。指阴茎容易勃举，常与早泄症并见。多因阴虚火旺，相火妄动所致。治宜滋阴降火。用知柏地黄丸、大补阴丸、三才封髓丹等方。一般不宜苦寒直折。若平时阳事易举，体质、脉象俱实者，可用龙胆泻肝汤直泻相火。又有外治法，用皮硝置于手心，硝化茎举即衰。

阴易 病名。阴阳易之女传于男者。《三因极一病证方论》卷四：“妇人病新差，未平复，而男子与之交接，得病名曰阴易。身重，少气，阴肿入里，腹内绞痛，热上冲胸，头痛不欲举，眼中生花。”参阴阳易条。

阴狐疝气 即狐疝。《金匮要略·趺蹶手指臂肿转筋狐疝蚘虫病脉证治》：“阴狐疝气者，偏有小大，时时上下，蜘蛛散主之。”详狐疝条。

阴疰 病名。❶指三阴疰。《类证治裁·阴疰》：“疰邪伏于募原，浅者客三阳经，深者入三阴经，……以伏邪深入三阴，故名阴疰也。”❷泛指在里、在阴、在脏之疰。见《医学入门·疰》参阳疰条。

阴疝 病名。❶指厥疝。《宣明论》卷一：“阴疝牵引小腹痛，诸厥疝，即阴疝也。嘻欲劳痛，不可忍之。”多由七情内郁或房事过度，厥阴受病所致。《医林绳墨》卷四：“或遇忧怒所感，郁而不发，反将房劳触动，结为阴疝者有之。”治宜理气解郁、泻邪补经，用蒺藜汤、茴香楝实汤等方。参见厥疝条。❷指癫疝。《证治准绳》卷六：“阴疝，一名癫疝。”参见癫疝条。❸肠癫、卵胀、气癫、水癫之合称。见《圣济总录》卷九十四。详各该条。

阴挺 病证名。❶即强中。《证治汇补·疝气附阴挺》：“阴茎挺纵不收，为强中之症。”治宜助阴抑阳，地黄汤加牛膝、知柏之类。详强中条。❷即阴纵。《杂病源流犀烛·前阴后阴病源流》：“阴纵，亦名阴挺。”详阴纵条。❸即子宫脱垂。《济阴纲目·前阴诸疾门》：“妇人阴挺下脱，或因胞络伤损，或因子脏虚冷，或因分娩用力所致。”又：“阴挺下脱，当升补元气为主，若肝脾郁结，气虚下陷，用补中益气汤。若肝火湿热，小便涩滞，用龙胆泻肝汤。”

阴结 病证名。❶指胃肠阴寒固结，或精血亏耗，大肠干燥所致的便秘。见《兰室秘藏·大便燥结门》。《医学入门·燥结》：“不能食，脉弦微者，为阴结。”《景岳全书·杂证谟》：“阴结证，但察其既无火证，又无火脉，……盖此证有二则，一以阳虚，一以阴虚也。凡下焦阳虚，则阳气不行，阳气不行，则不能传送而阴凝于下，此阳虚而阴结也；下焦阴虚则精血枯燥，精血枯燥则津液不到而肠脏干槁，此阴虚而阴结也。故治阳虚而阴结者，但益其火则阴凝自化，宜右归饮，大补元煎、大营煎之类主之。或以人参当归数钱煎汤送右归、八味等丸俱妙。治阴虚而阴结者，但壮其水，则泾渭自通，宜左归饮、左归丸、当归地黄饮、五福饮、六味地黄丸之类主之。二者欲其速行，宜于前法中各加肉苁蓉二三钱。”亦有以寒秘、气虚秘、湿秘等归为阴结。《证治汇补·秘结》：“阴结者，阴寒固结肠胃，血气凝滞而秘结也，外症不渴不食，肢冷身凉，大便硬闭，脉沉而迟，宜四物合附子汤，如久不大便而脉反微濡者，黄芪建中汤。”《金匮翼·便秘统论》：“冷闭虚闭即阴结也。”《医学心悟·大便不通》：“冷闭名阴结。”参见大便秘结、寒秘、气秘、湿秘、虚秘各条。❷脉象名。《注解伤寒论·辨脉法第一》：“脉累累，如循

长竿者，名曰阴结也。”

阴俳　喑俳的别称。见《医略十三篇·类中风》。详喑痱条。

阴疸　又名阴瘴。指无热恶寒，小便自利，一身面目色黄而不鲜的黄疸。《医钞类编》卷九：“阴疸，无热恶寒，小便自利，脉迟而微。误开鬼门则肌肤冷鞕，自汗不止；误洁净府则膀胱不约，小便如奔。”《医门法律·黄瘴门》：“阴瘴病，误从阳治，袭用苦寒，倒行逆施，以致极重不返者，医杀之也。……其始必先退阴复阳，阴退乃从阳治。”治宜温阳散寒退黄，选用茵陈附子干姜汤等方。参阴黄条。

阴痉　病名。一作阴痓。❶指柔痓，即柔痉。《丹溪心法·痓》：“阴痓曰柔，有汗。”参见柔痉条。❷指痉病见四肢厥冷者。《证治准绳·杂病》：“痉既以有汗无汗辨刚柔，又以厥逆不厥逆辨阴阳。……其厥逆者皆阴也。”治宜温阳祛邪。《太平圣惠方》选用附子散、白术散、柴胡散等方。参见痉条。

阴消　病名。见《景岳全书·杂证谟》。指真阳不足，气不化液所致的消渴病。治宜温阳补火。参消渴条。

阴黄　病名。❶黄疸病两大类型之一。因阳黄日久转化，或因脾阳不振、寒湿内蕴、胆液不循常道外溢肌肤所致。《景岳全书·黄疸》：“凡病黄疸而绝无阳证阳脉者，便是阴黄。”症见身目黄色晦暗，胃呆腹胀，神疲乏力，胁肋隐痛，小便短少，大便不实，舌淡苔腻，脉沉细迟等。治宜调理脾胃，温化寒湿。方如茵陈五苓散、茵陈术附汤、茵陈四逆汤等。阴黄可见于慢性肝炎、肝硬化、慢性胆囊炎等病。参见黄疸条。❷黄疸二十八候之一。《诸病源候论·黄病诸候》：“阳气伏，阴气盛，热毒加之，故但身面色黄，头痛而不发热，名为阴黄。”❸三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一：“病人寒热，并十指疼痛，鼻中煤生，此是阴黄。”治疗宜“先烙上脘穴，更灸二十壮，次烙气海、下廉、内乳等穴。不差，灸气海、天窗、百壮。更宜服麻黄栀子汤。”若见人中反者，病情较为严重。参黄疸条。

阴盛格阳汗　证名。指阴寒内盛，格拒阳气于外，而致自汗之证。《张氏医通·杂门》：“身冷自汗，阴躁，欲坐泥水中，脉浮而数，按之如无，……此阴盛格阳，真武汤冷服。”参绝汗条。

阴虚小便不利　小便不利症之一。见《症因脉治》卷四。肺阴不足则水无化源，肝阴不足则不能施泄，肾阴不足则水竭于下，都可导致小便不利。主要症状为小便不通，内热神衰，肌肉黑瘦，下午咳嗽，脉多细数。治宜养阴为主。肺阴不足用生脉散或人参固本丸。肝阴不足用海藏四物汤。肾阴不足用知柏天地煎加玄武胶。肝肾俱虚用肝肾丸。参小便不利条。

阴虚头痛　病证名。指阴血及阴精亏损所致的头痛。《景岳全书·杂证谟》：“阴虚头痛，即血虚之属也，凡久病者多有之。”因阴虚水亏，虚火易动所致。症见头痛而兼心烦内热，面红升火，失眠，舌红，脉弦细数等。治宜滋阴降火，可用滋阴八味煎、玉女煎等方。如阴虚而火不旺者，治当滋阴补血，可用六味地黄丸、四物汤、左归饮等方。本证可见于高血压病、脑动脉硬化症、紧张性头痛等病。参头痛条。

阴虚发疟　病证名。《医钞类编》卷八：“阴虚发疟……发时其寒如冰，其热如烙，面赤如脂，渴欲饮水，热退则不渴，以六味地黄汤加柴胡、白芍、肉桂。”参虚疟条。

阴虚发热　病证名。见《丹溪心法·发热》。指精血津液等耗损所致的虚热。《证治汇补·阴虚发热》：“有劳心好色，内伤真阴，阴血既伤，阳气独盛，发热不止，向晚更甚，或饮食如常，头胀时作，脉洪数无力，视其舌大而色赤者，阴虚也，当滋真阴，宜地黄汤；若久而盗汗遗精，咳嗽毛枯，

宜三才丸补水以匹火，是亦壮水之主，以镇阳光之义耳。”《医碥》卷一：“阴亏水虚则柴干火烈而焚灼为灾矣。此之火炎，乃由水虚所致，与上条阳亢而阴未亏者不同，证见口干体瘦，食少懒倦，头痛时作时止，遗精盗汗，骨蒸肉烁，唇红颧赤，咳嗽痰血，久成痨瘵。治宜甘润之剂，滋水以制火。”可选用四物汤加炒黄柏、黄芩、龟版，鳖甲散，青蒿鳖甲汤，大补阴丸，一阴煎等方。参发热条。

阴虚呕吐 病证名。因阴虚阳气上逆所致。《证治汇补·胸膈门》：“诸阳气浮，无所依从，呕咳上气，此阴虚成呕。”治宜滋阴降气。可用六味地黄汤加石斛、沉香等。大便不通者，宜兼通秘结。

阴虚夹痰喘 病证名。见《丹溪心法·喘》。指阴血虚耗，痰气阻碍气道所致的气喘。多因血虚阳无依附而上奔，痰阻肺失清肃而气不下降所致。症见气从脐下直冲清道，痰喘不平等。治疗宜分别缓急。急则治其标，宜玄霜雪梨膏，缓则治其本，宜滋阴清化膏，亦可用四物汤加枳壳、半夏。一说，“归地泥膈生痰，枳半燥泄伤阴，不如用天门冬、桑皮、贝母、马兜铃、地骨皮、麦门冬、枇杷叶之属”（见《证治准绳·喘》）。

阴虚吐血 病证名。见《医学心悟》。指肾阴亏虚，肝火炽盛所引起的吐血。治宜壮水制火而滋其化源。《血证论》卷二：“色欲过度，阴虚火旺，其证夜则发热，盗汗梦交，耳鸣不寐，六脉细数芤革。宜地黄汤加蒲黄、藕节、阿胶、五味治之。”此外，如凉血地黄汤、清火滋阴汤（《寿世保元·吐血》）、四生丸、十灰散等方亦可选用。本证可见于肺结核、支气管扩张症等疾病。参吐血、内伤吐血条。

阴虚劳复 劳复证之一。《重订广温热论·温热复症疗法》：“阴虚劳复者，由温热伤阴，肾液已亏，稍加劳动，微挟风寒，其病复作，症仍头痛发热恶风，舌燥口渴，六脉浮数无力者，此真阴虚劳复也，宜七味葱白汤，清润而微汗之，或金水六君去半夏，用生地，加川斛、丹皮、豆豉、葱白之类，滋养阴液以汗之；如兼呕恶，当留半夏，加竹茹以和胃；如兼咳嗽，加旋复花、甜杏仁以降气；如兼虚火上冒，目赤颧红，大渴烦躁，呕恶不纳者，亦宜金水六君煎加麦冬、代赭之类，养阴镇逆。”参劳复条。

阴虚证 指津液精血不足所出现的病证。出《素问·调经论》。多由真阴虚衰或热病伤阴，或久病耗伤阴液所致。《景岳全书·传忠录》：“阴虚者，水亏也，为亡血、失血，为戴阳，为骨蒸劳热。”症见形体消瘦，骨蒸潮热，盗汗遗泄，五心烦热，头眩耳鸣，口燥咽干，面红颧赤，舌红少津或红绛光剥，脉虚细而数等。治宜补益阴液为主。肺胃阴虚者，宜养阴生津为主；心脾阴亏者，宜滋阴补血益气为主；肝肾阴耗者，宜填补精髓为主。可选用沙参麦冬汤，大补阴丸、黑归脾丸、归芍地黄汤、左归饮等方。参基础理论分册心阴虚、肺阴虚、肝阴虚、肾阴虚等条。

阴虚胃脘痛 证名。多由病延日久，或郁火伤阴所致。《医宗己任篇·四明心法》：“又有一种胃脘痛，是阴虚症将成，须认明白。”症见脘痛时作，缠绵难愈，舌红口干，时或嘈杂，大便干结等。治宜养阴和胃，佐以泄肝，切忌香燥疏气，愈疏愈甚。方用一贯煎合芍药甘草汤。参胃脘痛条。

阴虚眩晕 病证名。指阴虚精亏血少所致的眩晕。《杂症会心录·眩运》：“如纵欲无节而伤阴，脱血过多而伤阴，痈疽大溃而伤阴，崩淋产后而伤阴，金石破伤，失血痛极而伤阴，老年精衰，劳倦日积而伤阴，大醉之后，湿热相乘而伤阴，……盖蒂固则真水闭藏，根摇则上虚眩仆，此阴虚之运也。”症见头目眩晕，五心烦热，面红升火，潮热盗汗，脉细数等。可用知柏地黄汤，

滋阴降火汤等方。参虚晕、肾虚眩晕条。

阴虚盗汗 病证名。盗汗之一。见《赤水玄珠·汗门》。由于阴虚热扰，津液外泄所致。《医略六书·内因门》："盗汗属阴虚。阴虚则阳必凑之，阳蒸阴分，津液越出，而为盗汗也。"症见盗汗，伴有烦热、口干等。治宜养阴清热，可用六味地黄丸、益阴汤。偏于火旺者，宜当归六黄汤。参盗汗条。

阴虚喘 病证名。见《医学入门·痰类》。又名阴虚喘逆。指阴虚阳浮所致的气喘。《丹溪心法·喘》："阴虚自小腹下火起冲于上喘者，宜降心火、补阴。"《症因脉治·喘症论》："阴虚喘逆之因：阴血不足，五志厥阳之火，触动冲任之火，自下冲上；阴精不足，龙雷之火，直冲上焦。"症见气从小腹直冲于上，喘声重浊，撷肚抬身，乍进乍退，时止时作，或兼潮热、盗汗等。治宜滋阴养血或补益肾精为主。阴血不足者，用四物汤加味，阴精不足者，用家秘天地煎、家秘肝肾丸等方。参喘证条。

阴虚喘逆 病证名。见《症因脉治·喘症论》。指阴血或阴精不足而阳失依附上奔的气喘。详阴虚喘条。

阴虚痢疾 病证名。指痢疾而见阴液耗伤者。见《张氏医通》卷七。症见发热烦渴，至夜转剧，恶食，痢下五色，脓血稠粘，滑泄无度，或下鲜血，脐下急痛等。治宜救阴泄热为主。可用驻车丸、阿胶丸、阿胶连梅丸、千金黄连汤、黄连阿胶汤等方。参痢疾、虚痢条。

阴虚痿 痿证之一。多由久病或房欲不节，肝肾不足，阴虚火旺，伤及筋骨所致。《证治汇补·痿躄章》："阴虚痿者，……自觉两足极热，上冲腿膝，痠弱痿软，行步艰难，不能久立。"可伴见头昏目眩，舌质红，脉细数等症。治宜滋阴清火，补益肝肾。《景岳全书·杂证谟》："痿证，若阴虚兼热者，宜《正传》加味四物汤、虎胫骨丸、或丹溪补阴丸、滋阴八味丸之类主之。"《类证治裁》治肝肾阴虚，足热枯痿者，用滋阴大补丸。参见痿条。

阴痒 病名。见《丹溪心法·痒》。即阴痒。详该条。

阴维脉病 病证名。由阴维脉经气异常所致。《难经·二十九难》："阴维为病，苦心痛。"《脉经》卷二："诊得阴维脉沉大而实者，苦胸中痛，肋下支满心痛。诊得阴维如贯珠者，男子两胁实，腰中痛，女子阴中痛，如疮状。"《杂病源流犀烛·阳维阴维脉病源流》："按仲景法，太阴症则用理中汤，少阴症则用四逆汤，厥阴症则用当归四逆汤、吴茱萸汤。参其法，酌其剂，以治阴维之病，乃洁古所以治足少阳三阴交之意也。"

阴斑 病证名。斑的类型之一。见《丹溪心法·斑疹》。又名阴证发斑。指斑之属于虚寒者。多由体虚内有伏寒。或误进寒凉药等，阴寒内盛，格阳于外所致。《温热类编·伏阴》："阴斑者因内有伏寒或误进寒凉逼其虚阳浮散于外。"阴斑亦出胸背手足，但斑稀色淡红，隐而不显，或仅胸部微见数点。伴手足逆冷，口不甚渴，下利清谷，舌苔白滑或舌胖苔黑滑，脉虚大或沉微等症。治宜温阳散寒。选用附子理中汤、大建中汤、八味汤等方。若内伤生冷，外感寒邪而发阴斑，用调中汤等方。参见斑条。

阴厥 厥证之一。指阳亏精损致四肢厥逆之证。《医林绳墨·厥》："阴厥者，因其纵欲太过，阳亏于内，精损于外，邪气偶入，阳衰精竭，不能荣养，反被克伐，脏腑生寒而发厥也。其症始得之，身冷脉沉，四肢厥逆，屈足倦卧，唇口青黑，或自利不渴，小便清白，是其候也。治宜理中汤、四逆汤之类。"《医宗己任篇·厥逆》："如得病便四肢厥冷，脉沉而细，手足拳而恶寒，引衣盖复不欲水。或下利清谷而厥逆者，阴也，四逆汤、白通汤；厥逆脉不至

者，通脉四逆汤；手足指头微寒者，谓之清，理中汤；无热症而厥，当归四逆汤加茱萸、生姜；喘促脉伏而厥，五味子汤；吐利，手足厥冷，烦躁欲死，吴茱萸汤；寒热而厥，面色不泽，冒昧，两手忽无脉或一手无脉，必是有正汗也。多用绵衣包手足，服五味子汤，或兼与桂枝麻黄各半汤，须臾大汗而解。”参厥证条。

阴暑　病名。❶《景岳全书》卷十五：“阴暑者，因暑而受寒者也。凡人之畏暑贪凉，不避寒气，则或于深堂大厦，或于风地树阴，或以乍热乍寒之时，不谨衣被，以致寒邪袭于肌表，而病为发热头痛，无汗恶寒，身形拘急，肢体痠痛等证。此以暑月受寒，故名阴暑，即伤寒也。惟宜温散为主，当以伤寒法治之也。又有不慎口腹，过食生冷，以致寒凉伤脏，而为呕吐泻利腹痛等证，此亦因暑受寒，但以寒邪在内，治宜温中为主，是亦阴暑之属也。”参暑病条。❷暑温类型之一。《医门棒喝》初集：“暑温者，夏至后所感热邪也。古人分阴暑、阳暑。……或值时令湿盛，或人禀体阳虚而成阴暑之证，是暑而偏于湿者。”参暑病条。

阴痫　病名。❶指兼见阴症的痫证。《诸病源候论》卷四十五：“病先身冷，不惊瘈，不啼唤，而病发时脉沉者为阴痫。”《杂病源流犀烛·诸痫源流》：“阴痫亦本痰热，缘医用寒药太过，损伤脾胃，变而成阴。宜用温补燥湿药。”方用五生丸、引神归星丹等。❷即慢惊风。《证治准绳·幼科》：“阴痫乃慢惊也。”“小儿急慢惊风古谓阴阳痫也。急者属阳，阳盛而阴亏；慢者属阴，阴盛而阳亏。阳动而躁疾，阴静而迟缓，皆因脏腑虚而得之。”详见急惊、慢惊条。❸指慢惊之后，痰迷心窍之症。《证治准绳·幼科》：“阴痫者，因慢惊后去痰不尽，痰入心包而得，四肢逆冷，吐舌摇头，口噤白沫，牙关紧闭，但不甚，惊搐作啼，面色或白或青，脉息沉微。”治疗宜固真汤加回生汤同煎，调宽气饮和解。参见痫条。

阴痧　痧证之一。❶指痧证腹痛而手足冷者。《杂病源流犀烛·痧胀源流》：“阴痧，腹痛而手足冷者是也，宜用火烧；或因秽气所触而致。”宜藿香汤。❷指猝然而发的四种重危痧证。《痧证指微·阴症》：“有四症，俱猝然而发。”其一症头面周身四肢俱冷，手足摇动，牙关咬紧，不言眼定，头摇脚掉，手足面容变黑色，如六脉全无，元气已脱，多不治。宜急刺人中穴、并舌尖、十手指尖、十脚趾尖及两曲池穴，刺出微血。一症猝然身热暴躁，叫号不出，头摇脚掉，牙关紧闭，不言，眼定，身强，六脉全无，初则面红渐渐紫暗而变黑色者不治。宜先用麻油以牙刷柄撬开牙关，灌入，再以绿豆煮清汁一碗冷服，苏后能言，再刮臂腻、曲池、肩井及风府、膏肓、命门穴。一症先患伤寒未愈，又感痧邪，身手如冰，寒颤不语，脉息全无，面黑色者，亦属逆症，刮刺同前。药用砂仁、木香、槟榔、青皮、广皮、灯心，阴阳水煎服。一症先患伤寒未愈，复感邪，腹痛泄泻，初不发热，渐渐发热，热极不语。刮针俱同前。仍服前药加芦粟梗五钱、石榴皮三钱、伏龙肝三钱、江鱼背脊刺三钱炙，俱炙干研末蜜丸，每日空心服二钱，泻止而伤寒亦愈。❸即冷痧。《痧症度针》卷上：“阴痧，俗称冷痧。”详见冷痧条。参见痧条。

阴湿鼓胀　病名。《医门补要》卷中：“阴湿鼓胀，寒湿留着中焦，清阳不布，满腹坚胀，面黄，不渴，不食，脉沉迟，宜通阳汤。”参鼓胀条。

阴寒　证名。指前阴有寒冷的感觉。出《金匮要略·妇人杂病脉证并治》。又名阴冷。因下元虚冷，寒气凝结而致者，男子阴冷而痿，女子阴冷而腹内亦觉冷，常影响生育。治宜温肾散寒。用金匮肾气丸加鹿茸，十补丸，加减内固丸等方。因肝经湿热所致

者，前阴、睾丸、尻臀皆冷，恶寒喜热，阴汗如水，前阴痿弱，小便有余滴。治宜清化湿热。用固真汤、柴胡胜湿汤等方。又有厥疝症，厥气上冲心腹，囊冷囊缩，宜用吴茱萸汤。妇人阴寒，身体肥胖者，多湿痰下流。治宜燥湿导痰，用二陈汤加苍术、白术、羌活、防风等。妇人阴寒而阴中搔痒，带下绵绵者，属寒湿，用蛇床子散塞阴道中。

阴寒小便不利　小便不利证之一。见《症因脉治》卷四。因寒湿搏于经络者，小便不利而兼见骨节烦痛不得屈伸，汗出短气，恶风，身微肿，脉濡缓。宜用甘草附子汤、术附汤等方。因寒湿内结者，属少阴病，症见小便不利，腹痛，四肢沉重，下利，或咳，脉濡迟。宜用真武汤、四逆汤等方。参小便不利、癃闭条。

阴跷脉病　病证名。由阴跷脉经气异常所致的病症。《灵枢·热病》："目中赤痛，从内眦始，取之阴跷。"《难经·二十九经》："阴跷为病，阳缓而阴急。"《奇经八脉考》："寸口脉后部左右弹者，阴跷也，动苦癫痫，寒热，皮肤淫痹，又为少腹痛，里急，腰及髀窌下相连，阴中痛，男子阴疝，女子漏下不止。"《杂病源流犀烛·阳跷阴跷脉病源流》："阴跷病，阳缓而阴急。阴急则阴厥，足胫直，五络不通。洁古云：表和里病，为阳不病而阴病。阴病则热，甘草干姜汤。"

阴痿　病证名。出《灵枢·经脉》。又称阳痿。详该条。

阴痹　病名。❶指发于阴分的痹症，如骨痹之类。《灵枢·五邪》："邪在肾，则病骨痛、阴痹。阴痹者，按之而不得，腹胀，腰痛，大便难，肩背颈项痛，时眩。"❷指阴邪所致的痹症，如寒痹之类。《素问·四时刺逆从论》："厥阴有余病阴痹。"王冰注："阴，谓寒也。有余，谓厥阴气盛满，故阴发于外而为寒痹。"《灵枢经合纂》马莳注："阴痹者，痛无定所，按之而不可得，即痹论之所谓以寒胜者为痛痹也。"

阴痒　病证名。见《医门法律·黄瘅门》。即阴疸。详该条。

阴缩　证名。出《灵枢·邪气脏腑病形》。指前阴内缩，包括男子阴茎、阴囊、睾丸上缩，及妇人阴户急，痛引入腹。多由足厥阴经受病而致。寒症居多。《张氏医通·前阴诸疾》："阴缩，谓前阴受寒入腹内也。"也有属热症者。因寒入厥阴所致者，宜温散厥阴寒邪，用吴萸内消散、当归四逆汤等方。《杂病源流犀烛》卷二十八：谓足厥阴之筋伤于寒则阴缩也，宜吴茱萸内消散。因少阴直中，或大吐大泻而阳气外脱，宜回阳固脱，用大固阳汤，四逆汤加人参、肉桂。因阳明热邪陷入厥阴所致，症见腹满便秘、烦热口渴、脉实有力。宜急下存阴，用承气汤类。因肝胆有热者，囊胀茎缩、腹痛、目赤唇燥，脉弦紧。治宜清泄肝胆。用左金丸、温胆汤等方。妇人阴户急，痛引入腹者，治宜疏泄，用加味逍遥散等方。参囊缩、茎缩条。

阴癫　病名。见《备急千金要方》卷二十四。肠癫、气癫、水癫、卵胀之总称。《圣济总录》称阴疝。《三因极一病证方论》卷十四："夫阴癫，属肝系宗筋，胃阳明养之……古方虽出四证，但曰肠癫、气癫、水癫、卵胀。……凡癫病，唯肠癫无问贵贱多有之。有睡卧脊系延入胁下者，有坠入囊中者，或遇疲劳，天色变动，逼上囊根，肿急作痛过于寒疝，得暖则下，其如卵胀，有作热生脓为痈溃烂者，比比有之。"详肠癫、气癫、水癫、卵胀各条。

阴躁　躁证之一。指阴盛格阳所致扰动不宁者。《类证活人书》卷四："阴发躁，热发厥，物极则反也。……外台秘要云：阴盛发躁，名曰阴躁。"常伴见身体微热，面赤，躁扰欲坐井中，或渴不欲饮，脉沉而微等。宜用吴茱萸汤、理中汤或姜附汤，甚者

四逆汤加葱白等药。阴躁亦可由肾火炎上所致。参见躁条。

阴癫 五癫之一。《诸病源候论》卷二："阴癫，初生小时，脐疮未愈，数洗浴，因此得之。"参见癫、五癫条。

阴囊汗 见《丹溪心法附馀·盗汗》。阴汗之一种。详阴汗条。

收引 ❶证名。收，收缩；引，拘急。收引即筋脉、形体拘挛之状。《素问·至真要大论》："诸寒收引，皆属于肾。"《类经》十三卷："形体拘挛，皆收引之谓。"参拘挛条。❷运气学说术语。《素问·五常政大论》："坚成之纪，是谓收引。"马莳注："岁金太过，为坚成之纪。……收引者，阳气收敛而阴气引用也。"张志聪注："岁金太过，名曰坚成。秋令主收，是谓收引。"

奸黄 三十六黄之一。《太平圣惠方》卷五十五："奸黄者，是鬼黄变入奸黄也。面目遍身俱黄，言语失错，心神狂乱，诈奸黠如不患人，若不与漱，即口舌干燥，气喘者难治。"治用点烙法或内服犀角散方。《圣济总录》卷六十一："病人向明卧多，爱索鞋拟起，身体全冷，肉色苍黑，睡中啼泣，或狂言妄语，此是奸黄。"治用点烙法或内服茯神汤。参黄疸有关条。

如疟 病证名。指症情似疟而非疟的一类病症。《证治要诀·疟寒热》："外有伤寒，往来寒热如疟；劳病，往来寒热，亦如疟。谓之如疟，非真疟也。然伤寒寒热如疟，初必恶风寒，发热，头痛体疼，自太阳经而来；劳病寒热如疟，初必五心发烦热，劳倦咳嗽，久乃成寒热，与正疟自不同。诸病皆有寒热，如失血、痰饮、癥瘕积聚、小肠癫气、风寒暑湿、食伤发劳、劳瘵、疮毒脚气，已各见本门，其余不能尽举，应有不如发疟之传为寒热者，须问其元有何病而生寒热，则随病施治。寒热发作有期者，疟也，无期者，诸病也。"参似疟、疟疾条。

红汗 证名。❶指鼻衄。见《伤寒论条辨·辨太阳病脉证并治》。伤寒太阳病，脉浮紧，发热身无汗，有得鼻衄而自愈者，犹血汗出而热解，故此种鼻衄，称为红汗。❷血汗之别称。《杂病源流犀烛·诸血源流》："血汗者，或有病，或无病，汗出而色红染衣，亦谓之红汗。"详血汗条。

红痧 痧证之一。《杂病源流犀烛·痧胀源流》："红痧，皮肤隐隐红点，如痦疹相似，痧在肌表，感受虽浅，热酒热汤，亦不可犯。外用焠刮。"用荆芥汤等。参痧条。

七 画

〔一〕

远血 病名。指便血之先排便、后下血者。《金匮要略·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证并治》："下血，先便后血，此远血也，黄土汤主之。"《景岳全书》谓："血在便后者，其来远，远者或在小肠，或在于胃。"因脾气虚寒，不能统血所致者，症见血色暗黑，唇淡口和，四肢不温，舌淡苔白，脉细无力等。宜用黄土汤温阳健脾，坚阴止血。因阴虚火旺，壮火食气，脾阴虚而肺气燥，失其敛摄之制者，宜用人参清肺汤。因肝经怒火，肺经忧郁，以致血不藏摄者，用归脾汤加山栀、麦冬、五味，或用丹栀逍遥散加阿胶、桑寄生、地榆。若虚损不足，下血过多，脾气不固，肾气不强，面色萎黄，手足厥冷，六脉微弱虚浮者，宜大补肝脾肾三经，用人参养营汤补脾，胶艾四物汤加巴戟、甘

草补肝，断红丸补肾（见《血证论·便血》）。参便血有关条。

远痹　病名。指日久不愈的痹症。《灵枢·九针十二原》："长针者，锋利身薄，可以取远痹。"《类经》卷十九："凡虚风之深入者，必内舍于骨解腰脊节凑之间，故欲取深邪远痹者，必为大针以治之也。"

运气小便不利　小便不利症之一。见《症因脉治》卷四。指与岁运气候有关的小便不利症。阳明司政，燥热加临而见发热烦渴，小便不利，右脉数大者，宜用知母石膏汤、清燥汤。少阴司政，火胜而见发热舌赤，小便不利，左脉数大者，宜用导赤各半汤。太阴在泉，湿淫胜而见小便不利，右脉濡缓者，宜用苍术防风汤。厥阴司天，风湿胜而见大便溏泄，小便闭，左脉浮弦者，宜用防风四苓散。参小便不利条。

运气胁痛　病证名。见《医学纲目》卷十四。又名刺肋伤寒、痧胀。为一种流行性的烈性传染病。《症因脉治·胁痛论》："运气胁痛之症，病起于仓卒，暴发寒热，胁肋刺痛，沿门相似，或在一边，或在两边，痛之不已，胀及遍身，甚则指甲紫黑而死，此天行岁运，胜复之气加临，所谓天灾流行之疫症。……运气胁痛之治，宜疏散为先，若少阳司政，柴胡汤加减主之，少阴司政，独活败毒散对泻心汤，阳明司政，干葛石膏汤主之。凡胁痛，外用针刺委中、三里二穴出血。若痛甚，指甲黑者，即刺十指尖出血为妙，越地所谓放痧是也。若咳嗽痰声，无论左右，即为肺邪胁痛，宜泻青各半汤，并刺少商穴。"参胁痛、外感胁痛条。

运气喘　病证名。见《医学纲目·喘》。指岁运失常，气候变化所致的气喘。❶由岁金太过而致者，症见咳嗽气逆，肩背痛，喘喝有声，胸凭仰息等。当治以温剂。❷由岁火太过，火攻肺虚而致者，症见喘咳肺胀，呼吸响鸣，寒热，少气，大腹膨胀等。治以咸寒之剂。❸由木火太过，风火为逆者，症见气逆不平。当以清泄风火为主。

走马黄　三十六黄之一。《太平圣惠方》卷五十五："走马黄者，眼目黄赤，烦乱狂言，走卧不安，气力强壮，唯爱嗔怒，怒目高声，打骂他人，犹如癫醉。若厥逆者难治。"治用点烙法，内服竹叶汤等方。参黄疸有关条。

走阳　病名。❶性交时精泄不止之症。《医宗必读·遗精》："更有久旷之人，或纵欲之人，与女交合，泄而不止，谓之走阳。"治宜益气回阳。用独参汤、参附汤等方。❷遗精之俗称。详遗精条。

走注　行痹的别称。俗称鬼箭风。《太平圣惠方》卷二十一："夫风走注者，是风毒之气，游于皮肤骨髓，往来疼痛无常处是也，此由体虚，受风邪之气，风邪乘虚所致，故无定止。是谓走注也。"《杂病源流犀烛》卷十三："风胜为行痹，游行上下，随其虚处，风邪与正气相搏，聚于关节，筋弛脉缓，痛无定处，古名走注。……俗有鬼箭风之说。"参风痹、鬼箭风条。

走哺　❶古病名。指下焦实热而致二便不通，呕吐不停者。出《千金要方》卷二十。《张氏医通》卷四："下焦实热，其气内结，不下泌糟粕，而淤浊反蒸于胃，故二便不通，清逆不续，呕逆不禁，名曰走哺。人参汤主之。"❷生理名词。指下焦。《中藏经》卷中："三焦者，人之三元之气也。……又名玉海、水道。上则曰三管，中则名霍乱，下则曰走哺，名虽三而归一，有其名而无形者也，亦号曰孤独之腑。"

走精黄　三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一："走精黄，病人昏昏饶睡，四肢疼痛，面目俱黄，舌上紫色，甚则舌面坼裂，及加黑色，此是走精黄，宜用药烙之。"参黄疸有关条。

坏伤寒　即伤寒坏病。见《诸病源候论·伤寒诸候》。《三因极一病证方论·坏伤寒》："坏伤寒者，以医者不辨阴阳，错谬

下汗，置病不解，坏证乱经。又伤寒过经，热留脏腑，病候数变，久而不差，阴阳无复纪律，皆名坏病。”参坏病条。

坏病 病名。指伤寒病重证。可因治疗失当引起。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病三日，已发汗，若吐，若下，若温针，仍不解者，此为坏病。桂枝不中与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之。”《辨少阳病脉证并治篇》：“若已吐、下、发汗、温针、谵语，柴胡汤证罢，此为坏病。知犯何逆，以法治之。”《伤寒论条辨》卷一：“坏，言历遍诸治而犹不愈，则反复杂误之余，血气已惫坏，难以正名名也。”《医宗金鉴·订正伤寒论注·辨坏病脉证并治篇》：“坏病者，谓不当汗而汗，不当吐而吐，不当下而下，即当汗吐下而过甚，或当汗吐下而失时，皆为施治失宜，所以成坏病也。凡三阴三阳，若汗若吐若下若温针，火熏火熨火灸火劫等法致诸坏病者，有汗后亡阳眩冒振惕，魄汗不收，有下后虚中，结胸痞鞕，下利不止，有吐后烦乱腹满，有温针失血惊狂，甚至阳毒斑狂，阴躁欲死，神昏谵语，循衣摸床之类是也。”《伤寒辨证·伤寒坏病》：“大抵伤寒至于坏病，当作危证断之，不可卤莽造次，或温补，或和解，或攻下，宜详虚实轻重。若脉虚数，人羸弱，或见烦热、口干、舌燥者，此为虚证，不可下，以人参三白汤，或小柴胡汤增损治之。若虚烦少气者，宜人参竹叶汤。虚烦不得眠者，宜参胡温胆汤。若脉实邪盛，大柴胡汤亦可酌用。要在审察虚实而治之。”参伤寒、坏伤寒条。

赤水 十水之一。《中藏经·论水肿脉证生死候》“赤水者，其根起于心，其状先从胸肿起也。”参十水、水肿条。

赤白浊 病证名。即浊病。因浊病有赤浊、白浊之不同，故又称赤白浊或二浊。赤白浊在古代文献中有指小便浑浊者（如《丹溪心法·赤白浊》），后人名为便浊、溺浊、尿浊；有指阴茎口流浊物而小便不浑浊者（如《证治准绳·赤白浊》），后人名为精浊。参浊、便浊、精浊各条。

赤白痢 病名。指下痢粘冻脓血，赤白相杂。《素问》中称“注下赤白”、“泄注赤白”。《诸病源候论·痢病诸候》：“赤白痢候，然其痢而赤白者，是热乘于血，血渗肠内则赤也，冷气入肠，搏肠间，津液凝滞则白也。冷热相交，故赤白相杂。重者，状如脓涕而血杂之，轻者白脓上有赤脉薄血，状如脂膏。”亦有以伤气伤血分赤白者。《医林绳墨·痢》：“痢虽有赤白二色，终无寒热之别。白者湿热伤气，自大肠来；赤者湿热伤血，自小肠来；赤白相杂，气血俱伤，亦兼气血两治可也。”治宜清热化湿，消导积滞，调气行血。常用白头翁汤、洁古芍药汤、香连丸、枳实导滞丸等方。地锦草、马齿苋、一见喜等药均可选用。参痢疾条。

赤虫病 九虫病之一。《诸病源候论·九虫病诸候》：“赤虫状如生肉，动则肠鸣”，或更见腹泻，便脓血等。治宜攻积杀虫为主。方用追虫丸、芜荑散等。参九虫病条。

赤沃 证名。指利下赤色粘沫。《素问·至真要大论》：“少阴之胜，……腹满痛，溏泄，传为赤沃。”王冰注：“沃，沫也。”张景岳注：“赤沃者，利血，尿赤也。”详赤痢、血痢条。

赤脉攒 病名。指发于夏季的一种疫病。见《伤寒总病论》卷五。《三因极一病证方论·叙疫论》：“夫疫病者……夏时应暑，而寒气折之，则责邪在心，病曰赤脉攒。”其症“病者脉促，身颤掉不能禁，或肉热，口干，舌破，咽塞，声嘶。”治宜清解疫毒为主，选用石膏地黄汤等。

赤浊 病证名。❶指以小便浑浊色赤为主要症状的疾患。见《世医得效方·大方脉科》。属便浊、溺浊。实即血尿。详便浊、血尿条。❷指溺孔常流浊物挟血的疾患，属

精浊。《证治要诀·白浊》："精者血之所化，有浊去太多，精化不及，赤未变白，故成赤浊，此虚之甚也。"详精浊条。

赤斑　证名。指发斑见红赤色。见《诸病源候论·时气病诸候》。其中又以赤而红者为轻，紫赤者为重。《寿世保元·斑疹》："若斑发赤红为胃热。"《温疫论补注》："温疫发斑……稠密紫赤者凶。"《医学入门·赋杂症》以黑膏黄连葛根桔皮汤治之。参斑、紫斑条。

赤痢　即血痢。《诸病源候论·痢病诸候》："热乘于血，则流渗入肠，与痢相杂下，故为赤痢。"详血痢条。

志伤　病证名。指精神情志伤损的疾患。《灵枢·本神》："盛怒而不止则伤志，志伤则喜忘其前言，腰脊不可以俯仰屈伸，毛悴色夭。"《诸病源候论·虚劳病诸候》："大恐惧不节伤志，志伤，恍惚不乐。"参七伤条。

声哑嗽　病证名。指咳嗽而声嘶哑者。见《不居集》卷十五。多因痰热壅肺，肺气不清，或因寒包热而致肺气不宣。若治宜清肺中邪滞，或散寒透热，如清咽宁嗽汤及细辛、半夏、生姜等药。痨瘵病人因肺阴耗伤，亦可见咳嗽声哑。参咳嗽、哑嗽、劳咳、久咳条。

声嘶嗽　病证名。指咳嗽而声音嘶哑者。多因血热所致。《不居集》卷十五："声嘶嗽，咳嗽而声嘶者，乃血分受热故也。"治用"蛤粉、青黛，蜜调服之"。参咳嗽、哑嗽、劳咳、久咳条。

芫花中毒　病名。因药服或误服芫花过量，或因用芫花根外用引产而出现中毒症状者。症见恶心、呕吐、腹痛、腹泻、皮疹。外用引产者更见阴道出血量多。严重者可见痉挛，抽搐，昏迷及呼吸衰竭。治疗宜中西医结合救治。《本草纲目》有以醋煮去毒，以防己、防风、甘草、桂汁解毒的记载。可参考。

花癫　病名。俗称"花痴"。见《石室秘录》。多因思慕异性不遂，情怀抑郁，肝火炽盛所致。病发时可见精神异常，严重者往往赤身露体，不识羞耻。治宜平肝散郁为主。本病可见于精神分裂症。又有因思虑过度，耗伤心血而成癫疾，虽有裸体而走等证，为失志之癫，不属本病。参癫、癫狂条。

劳　❶病名。虚劳的简称。《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》："夫男子平人，脉大为劳，极虚亦为劳。"劳亦作痨。《医林绳墨》卷三："痨者劳也，劳损气血而为病也。"详虚劳条。❷病因之一。指过度劳累。《素问·举痛论》："劳则气耗。"

劳风　病证名。指劳力伤风所致的咳嗽。《素问·评热病论》："劳风法在肺下。其为病也，使人强上冥视，唾出若涕，恶风而振寒，此为劳风之病。……咳出青黄涕，其状如脓，大如弹丸，从口中若鼻中出，不出则伤肺，伤肺则死也。"参劳风咳条。

劳风咳　病证名。一名风咳。指咳嗽由劳力伤风所致者。《儒门事亲》卷三："劳风咳，出青黄涕，其状如脓，大如弹丸，亦风咳也。"治宜桂苓五味甘草汤加姜汁、竹沥；若痰逆势甚，用桂枝二越婢一汤、小青龙加石膏汤；禀气虚者，炙甘草汤等。参风咳、劳风条。

劳心吐血　病证名。见《中国医学大辞典》。《张氏医通·诸血门》："劳心太过，吐血不止，归脾汤去木香加门冬、阿胶。"如心火旺盛，可用米莲散（见《杂病源流犀烛·诸血源流》）。参吐血、内伤吐血条。

劳发　证名。指元气不足，因劳累而发的寒热。《张氏医通·寒热》："元气虚人，遇劳即发寒热，此元气下陷之故。或劳力而发寒热，腿缝中结核作痛，谓之劳发，俱宜补中益气汤。"参气虚发热，阳虚发热，阴虚发热，劳热等条。

劳伤吐血　病证名。指因劳力过度，肺胃络脉损伤所致的吐血。《金匮翼·诸血统论》："劳伤吐血者，经所谓用力太过，则络脉伤是也。盖络脉之血随经上下，往来不

休，若络脉有伤损之处，其血因得渗漏而出矣。”《血证论》卷二：“用力努挣而得失血之证者，法宜补气以续其绝，消瘀以治其伤。四物汤加黄芪、人参、续断、桃仁、红花、陈酒、童便治之。”或用发灰散。血止后如遇劳即发，则用补中益气汤加麦冬、五味、山药、熟地、茯神、远志之属（见《医钞类编》卷七）。愈后尤须调护，以免复发。参吐血、内伤吐血条。

劳伤鼻衄 病证名。指因劳力过度所致的鼻腔出血。《张氏医通·诸血门》：“内伤劳役之人，喘嗽面赤，发热头痛而衄。此肺经气虚，失护卫之职，致心包火炎，经脉热甚，故行清道。当归补血汤加薄荷、荆芥，不应，补中益气倍黄芪，慎不可用辛热之药。兼有风寒，小建中加葱豉。”参鼻衄条。

劳汗 证名。出《素问·生气通天论》。指稍劳即出汗。多因脾虚气弱，以致稍劳即汗出淋漓。治宜补中益气汤加减。

劳极 病名。❶指肾虚劳损者。《济生方》卷一：“肾虚劳损，卧多盗汗，小便余沥，阴湿痿弱，名劳极。”可用磁石丸等方。❷指劳瘵。《医学正传·劳极》：“大抵不过咳嗽发热，咯血吐痰，白浊白淫，遗精盗汗，或心神恍惚，梦与鬼交，妇人则月闭不痛，日渐羸瘦，渐成劳极之候。……虽然未有不由气体虚弱，劳伤心肾而得之者，初起于一人不谨，而后传注数十百人，甚而至于灭族灭门者。”参劳瘵、虚劳条。

劳役痫 病名。指痫疾之因劳累过度所致者。见《症因脉治·痫疾论》。多因生活无节，劳力过度，或饥饱不匀，负重远行，营伤卫损，血渗大肠所致。其症痫下纯血，或腰疼背楚，胁肋作痛，四肢倦怠，嗜睡减食。节劳稍缓，劳重即发。治宜先用当归活血汤去瘀生新，后用当归补血汤、补中益气汤、归脾汤等调养气血，扶元固本。参痫疾条。

劳疟 病名。疟疾的一种。❶指疟久不瘥，表里俱虚，小劳即复者。见《金匮要略·疟病脉证并治》。《诸病源候论·劳疟候》：“凡疟积久不瘥者，则表里俱虚，客邪未散，真气不复，故疾虽暂间，小劳便发。”症见寒热不止，或发于昼，或发于夜，食欲减少，肌肤羸瘦，颜色萎黄，四肢无力，或疟停稍劳即发，治宜补虚截疟。用小柴胡汤去半夏加栝蒌根、补中益气汤加鳖甲、牛膝首乌、小建中汤、八味丸、人参乌梅散等；或可加灸膏肓、四花等穴。❷即疟母。《证治要诀·疟寒热》：“久疟，经年累月，名曰疟母，又名劳疟，不宜十分攻之，所谓久疟不治者是也。”参久疟、疟疾条。

劳怯 病证名。指一种阴虚生内热的病症。《松崖医径》卷下：“劳怯者，多由气体虚弱，劳伤心肾，则阴虚而生内热所致。主在痰血水火不能既济故也。亦有外感六淫之气，失于祛散，以致乘虚入里，久不与治，遂成劳瘵。又有传疰而得者。其脉多弦虚细数。治疗之法，当究其源所受，补阴降火为妥，秘传加减八珍汤。”参虚损条。

劳注 注病之一。《诸病源候论·劳注候》：“人大劳虚，而血气空竭，为风邪所乘，致不平复，小运动，便四肢体节沉重，虚喘啜乏汗出，连滞不差，小劳则极，故谓之劳注。”参疰条。

劳咳 病证名。❶指外感、内伤咳嗽经久不愈者。《济生方·咳嗽》：“外则六淫所伤，内则七情所感，连滞岁月，致伤五脏，遂成劳咳者多矣。”即劳嗽。参见该条。❷指劳伤五脏而致者。《医学入门》卷五：“劳咳，五劳虚咳也。”谓疲极伤肝、劳神伤心、劳倦伤脾、叫呼伤肺、房劳伤肾致咳。详疲劳咳嗽、劳神咳嗽、叫伤咳嗽、房劳咳嗽、劳嗽等条。

劳复 病名。指伤寒、温热病瘥后，余邪未清，过度劳累而病复发者。《伤寒论·辨阴阳易差后劳复病脉证并治》：“大病差后劳复者，枳实栀子豉汤主之。”《三因极

一病证方论·劳复证治》："伤寒新差后，不能将摄，因忧愁思虑，劳神而复，或梳沐洗浴，作劳而复，并谓之劳复。"《重订广温热论·温热复症疗法》："复则诸症复起，惟脉不沉实为辨。轻者静养自愈，重者必先察其虚实。虚则调其营卫，和其脏腑，待其表里融和方愈。误用攻下清凉，必致不救。安神养血汤主之。实则主以仲景枳实栀豉汤，撤表邪而清里热。如兼头痛恶寒，加薄荷、葱白；如兼寒热，寒多加羌活、紫苏；热多加知母、黄芩。一二剂后，必复汗而解，此屡试屡验者。不可妄投补益，以致闭邪增病。"劳复中又有房劳复、食劳复、温病劳复、气虚劳复、阴虚劳复之分，详各该条。

劳神咳嗽 病证名。指劳神伤心所致的虚咳。《不居集》卷十五："劳神咳嗽，咳而因劳神伤心，烦热自汗，咽干咯血。"治宜劫劳散、梦授天王补心丹等。参咳嗽、劳咳、心咳条。

劳损 病证名。指虚劳、虚损之属阴虚者。《景岳全书·杂病谟》："劳损之病，本属阴虚。"多因恣饮纵酒、色欲无度、劳倦过极，精血受损所致。《不居集》卷十九："精极则阴虚，阴虚则无气，以致为劳为损。"详虚劳、虚损条。

劳热 病证名。见《丹溪心法·发热》。指虚劳骨蒸发热。《医学说约·热》："劳热则蒸。"多由气血亏损，阳衰阴虚所致。常见骨蒸、潮热、五心烦热等症。五脏邪热不清亦可导致劳热。《医学入门》卷五："心劳邪热，则口舌生疮、语涩、肌瘦；肝劳邪热，则胁痛、关格不通；脾劳邪热，则气急、肌痹、多汗；肺劳邪热，则气喘、面肿、口燥、咽干；肾劳邪热，则尿赤、阴疮、耳鸣、溺闭。三白汤主之。"心热加黄连、木通、麦冬、生地；肝热加黄芩、防风、当归、龙胆草、赤芍；脾热加山栀、石斛、升麻；肺热加知母、桑白皮、秦艽、葶苈；肾热加元参、赤苓、车前子、生地。

劳倦恶寒 恶寒证之一种。《证治汇补·恶寒章》："劳倦恶寒，脉必缓弱，或气口虚大无力，兼见倦怠，手心独热。此劳倦过度，脾胃不足，卫阳下陷，宜补中益气汤，甚加桂、附以行参、芪之力。"参恶寒、内伤恶寒条。

劳黄 黄病二十八候之一。《诸病源候论》卷十二："脾脏中风，风与瘀热相搏，故令身体发黄，额上黑，微汗出，手足中热，薄暮发，膀胱急，四支烦，小便自利，名为劳黄。"《太平圣惠方》卷五十五："劳黄者，四肢无力，骨节烦疼，或时吐逆，不能下食，鼻中干燥，身热疼闷，渐觉羸瘦，寒热不定。若喘息气粗者难治。"若心热劳黄，可见口干舌涩，面目俱黄，上气喘急等症。治宜选用柴胡散、龙胆散、秦艽散、鳖甲散等方。参黄疸有关条。

劳聋 病证名。指肾气虚劳而致耳听失聪者。《圣济总录》卷一百一十四："劳聋者，肾气虚劳所致也。足少阴肾经宗脉所聚，其之通于耳，肾气虚弱，宗脉耗损，则气之所通，安得聪彻而聩哉。旧说谓因劳则甚，要当节嗜欲，慎起居，而无损肾脏。"治宜补肾为主。

劳淋 病名。指淋症之遇劳即发者。有肾劳、脾劳、心劳之分。《诸病源候论·淋病诸候》："劳淋者，谓劳伤肾气，而生热成淋也。肾气通于阴，其状尿留茎内，数起不出，引小腹痛，小便不利，劳倦即发也。"其症可表现为小便淋沥不断，涩痛不甚，遇劳即发。《医碥·淋》："劳淋，劳则动火，热流膀胱所致。脾劳（劳倦所伤），补中益气合五苓。肾劳（色伤），阳虚肾气汤，阴虚知柏地黄汤。心劳（思虑所伤），清心莲子饮。"参淋条。本症可见于前列腺炎、前列腺肥大、慢性泌尿系感染等疾病。

劳痫 病名。指痫疾日久不愈，状如虚劳者。《证治要诀·大小腑门》："劳痫，

因痢久不愈，耗损积血，致肠胃虚空，变生他证，或五心发热，如劳之状，宜赭莲饮。赤多倍莲肉，白多倍山药。痢后调补，宜四君子汤加陈皮一钱半，即用异功散，恶甜者，生料平胃散加人参、茯苓各半钱。”本病可见于慢性菌痢、慢性肠道阿米巴痢疾、溃疡性肠结核、局限性肠炎等。参痢疾、虚痢条。

劳蒸 病名。指蒸病。因蒸病多属虚劳，故名。见《三因极一病证方论·劳瘵诸证》。参蒸病各有关条。

劳碌气虚喘 病证名。见《杂病源流犀烛、咳嗽哮喘源流》。指劳累过度引起的气喘。详气虚喘条。

劳嗽 病证名。见《肘后备急方》卷三。❶指久嗽成劳或劳极伤肺所致者。《证治要诀·诸嗽门》：“劳嗽。有久嗽成劳者，有因病劳久嗽者，其证寒热往来，或独热无寒，咽干嗌痛，精神疲极，所嗽之痰或浓或时有血腥臭异常，语声不出者，补肺汤半贴，加杏仁、贝母、款冬花、阿胶、百合各半钱。”《万病回春》卷四：“劳嗽者，干咳，声哑，痰中有血丝、血屑者是也。”“劳嗽者，盗汗，痰多，作寒热，脉数大无力是也。已上四者，皆是劳力、酒色、内伤或忧思郁结，阴虚火动而嗽者。”《类证治裁》卷二：“虚劳干咳，琼玉膏或金水六君煎；脾肺伤损劳嗽，憎寒壮热，团参饮子；心肾虚，发热盗汗，劳嗽无痰，劫劳散；咳而无痰者，人参同蜜煎胡桃肉细嚼，或二味煎服；名观音应梦散。脾肺虚寒，怯冷痰嗽，加味理中汤；肾阴虚，脉细数，下午寒热，干咳颊红，晨服异功散，夜服六味丸；肾阳虚，脉微弱，水泛为痰，七味地黄丸；肺劳久嗽，饥则胸中大痛，视上唇有白点如米西者，此虫啮其肺，百部膏加乌梅、槟榔，下其虫自愈。”参见劳咳条。❷即火郁嗽。《丹溪心法·咳嗽》：“劳嗽即火郁嗽。”详该条。❸即邪嗽、疰嗽。《鸡峰普济方》谓：“今之所谓劳嗽者，无所经见，意其华佗所谓邪嗽，真人所谓疰嗽者是也。”参邪嗽、疰嗽条。

劳噎 五噎之一。出《诸病源候论·否噎病诸候》。其症气上鬲，胁下支满，胸中填塞，攻背疼痛等。治用五噎散等。参五噎、噎条。

劳瘵 病名。一作痨瘵。又名传尸劳、劳极、尸注、殗殜、鬼注。指痨病有传染性者。《济生方·劳瘵》：“夫劳瘵一证，为人之大患，凡受此病者，传变不一，积年染疰，甚至灭门。”《三因极一病证方论·劳瘵叙论》：“大略令人寒热，盗汗，梦与鬼交，遗泄，白浊，发干而耸。或腹中有块，或脑后两边有小结核，连复数个，或聚或散，沉沉默默，咳嗽痰涎，或咯脓血，如肺瘘、肺痈状；或复下利，羸瘦困乏，不自胜持，积月累年，以至于死，死后乃疰易傍人，乃至灭门者。”《杂病源流犀烛·虚损痨瘵源流》：“五脏之气，一有损伤，积久成痨，甚而为瘵。痨者，劳也，劳困疲惫也；瘵者，败也，羸败凋敝也。虚损痨瘵，其病相因。”本病症可见于结核病等。详虚劳、传尸劳条。

杏仁中毒 病名。因误食苦杏仁过量而出现中毒症状者。见《千金要方》卷二十四。症见无发热或体温不足，昏迷，惊厥，呕吐，瞳孔散大，可迅速死亡。宜中西医结合救治。文献有用蓝子汁、杏树皮解毒法可参考。

杨梅瘟 病名。瘟疫的一种。以遍身紫块，发疮如杨梅状为特征。《杂病源流犀烛·瘟疫源流》：“杨梅瘟，遍身紫块，忽然发出霉疮是也。”治宜清热解毒汤下人中黄丸。并宜刺块令出血。参瘟疫条。

两丸冷 证名。丸，即睾丸。见《兰室秘藏·阴痿阴汗门》。又称两外肾冷。多因肝经湿热所致。症见睾丸冷，或前阴、尻臀皆冷，阳痿，阴汗如水，小便淋沥或黄或赤臊臭。《证治准绳·杂病》：“溺黄臊臭淋沥，两丸如冰，阴汗浸，两股阴头亦冷。”

治宜清化湿热为主。用柴胡胜湿汤、固真汤，冬月用清震汤等方。参两外肾冷条。

两手撮空　证名。简称撮空。指患者神昏时，两手向空作抓物状。常与循衣摸床等症同时出现。不论见于实证或虚证，多属病情危重。《普济本事方》卷九："又有人病伤寒，大便不利，日晡发潮热，手循衣缝，两手撮空，直视喘急。……若大便得通而脉弦者，庶可治也。与小承气汤一服，而大便利，诸疾渐退，脉且微弦，半月愈。"《张氏医通·神志门》："循衣撮空摸床，多是大虚之候，不问杂病伤寒，以大补之剂投之，多有得生者。"参循衣摸床、撮空理线条。

两外肾冷　证名。外肾，即睾丸。见《兰室秘藏·阴痿阴汗门》。又称两丸冷。《证治准绳》："两外肾冷，两髀枢阴汗，前阴痿弱，阴囊湿痒臊气，宜柴胡胜湿汤。"参两丸冷条。

两胁下痛　证名。指两侧胁肋下疼痛。多由气滞痰凝瘀阻所致。亦可见于肝咳。《素问·咳论》："肝咳之状，咳则两胁下痛，甚则不可以转。"详胁痛、胁下痛、各条。

两胁里急　证名。出《素问·至真要大论》。指两侧胁部里急牵紧。参胁痛里急条。

两胁刺痛　证名。见《儒门事亲·治病百法》。指两侧胁肋部疼痛如刺，多由气结、血瘀、癖积及疫疠之气等滞而不散，络脉受损所致。详肺邪胁痛，死血胁痛、胁痛、食积、运气胁痛各条。

两胁肿痛　证名。指两胁部肿胀疼痛。多由湿热而致。《张氏医通·诸痛门》："两胁肿痛，或腹痛，或小便濇滞者，属湿热。"用龙胆泻肝汤。《辨证录·胁痛门》载有右胁肿痛是脾火内伏，瘀血存注不散而致，用败瘀止痛汤。

两胁痛　证名。见《慎斋遗书》卷九。多由邪袭少阳，肝胆湿热蕴结，或痰瘀阻滞所致。有外感、内伤之分。《杂症会心录》卷下："两胁之痛皆属肝胆为病。内伤者，不外气血两端，外感者，责在少阳一经而已。"治宜和解少阳，行气行血、化痰祛瘀等法。参胁痛、外感胁痛、内伤胁痛等条。

两胠（qū区）疼痛　证名。指腋下胁上部疼痛。《金匮要略·腹满寒疝宿食病脉证治》："趺阳脉微弦，法当腹满，不满者必便难，两胠疼痛，此虚寒从下上也，当与温药服之。"参胠胁肋痛条。

两脚麻木　证名。指两脚部肌肉麻木不适感。见《医学入门·痹风》。《张氏医通·麻木》："湿热下流，两脚麻木，或如火燎者，二妙加牛膝作丸。不应，少加肉桂。"参手足麻木、半身麻木条。

两感伤寒　病名。指阴阳两经同时感受寒邪而致病。《素问·热论》："人之伤于寒也，则为病热，热虽甚不死；其两感于寒而病者，必不免于死。"又："两感于寒者，病一日则巨阳与少阴俱病，则头痛，口干而烦满；二日则阳明与太阴俱病，则腹满，身热，不欲食，谵言；三日则少阳与厥阴俱病，则耳聋囊缩而厥，水浆不入，不知人，六日死。"《注解伤寒论》卷二："表里俱病者，谓之两感。"《伤寒标本心法类萃》卷上："两感谓一日太阳少阴两证俱见，二日阳明与太阴俱病，三日少阳与厥阴俱病，前六经之证是也。小柴胡汤、凉膈散、五苓散、天水散、通圣散、双解散、大柴胡汤可选用之，热势甚，欲可下者，三一承气汤或解毒合承气汤。"《重订通俗伤寒论·两感伤寒》："两感伤寒一症，俞氏求原固确，惟救里救表，其间先后缓急，当消息之。如下利不止，肢冷筋吊者，则先救里。若下利尚微，足筋不吊，而头身剧痛，发热恶寒者，宜先解表，随证权变可也。"又："仲景谓两感病俱作，治有先后。朱南阳谓宜先救里，以四逆汤，后救表，以桂枝汤。"参伤寒条。

否　❶证名。见《素问·五常政大论》。否，通痞。《素问玄机原病式·六气为病》："痞，与否同，不通泰也。"详见痞条。

❷病理名词。指阴阳隔绝，上下否塞不通。《华氏中藏经》卷上："阳气上而不下曰否，阴气下而不上亦曰否。"

否格 病名。指阴阳之气阻塞不通所致的疾患。《华氏中藏经·阴阳否格论》："否格者，谓阴阳不相从也。阳奔于上则燔，脾肺生其疸也，其色黄赤，皆起于阳极也；阴走于下则冰，肾肝生其厥也，其色青黑，皆发于阴极也。疸为黄疸也，厥为寒厥也，由阴阳否格不通而生焉。阳燔则治以水，阴厥则助以火。"参黄疸、厥逆、痞等条。

折伤吐血 病证名。《三因极一病证方论》卷九："折伤吐血证治。病者因坠闪肭，致伤五脏，损裂出血，停留中脘，脏热则吐鲜血，脏寒则吐瘀血，如豆羹汁，此名内伤。"可用加味芎劳汤。

折脊 证名。出《灵枢·邪气藏府病形》。指腰脊疼痛似折的症象。因督脉属肾贯脊，肾虚则督脉懈弛，腰脊疼痛如折。治宜温补肾督、理气活血等法。参脊痛条。

折腰 证名。腰痛如折之意。《素问·脉要精微论》："肾脉搏坚而长，其色黄而赤者，当病折腰。"详腰痛条。

折髀 证名。指股部疼痛如折的症象。《素问·脉要精微论》："胃脉搏坚而长，其色赤，当病折髀。"《类经·脉色类》："胃脉搏坚，木乘土也，加之色赤，则阳明火盛，木火交炽，胃经必伤，阴阳不行者，从气冲下髀抵伏兔，故病髀如折也。"可见于痛风、痹证、伤损等。

〔丨〕

呕 证名。出《素问·诊要经终论》。❶即呕吐。指胃内之物上涌而出，有声有物。《卫生宝鉴·补遗》："有物有声，名曰呕。"详呕吐条。❷食入即吐出，称为呕。《医宗必读·呕吐哕》："后世更为分别，食入则吐谓之呕。入者，顷刻也。食才入口，即便吐出。"详噎膈条。

呕汁 证名。指呕吐清水或涎沫。《素问·痹论》："脾痹者，四支解堕，发咳呕汁，上为大塞。"《内经吴注》卷十二："寒气乘之故发呕，湿气乘之故涌出涎汁。"详吐清水、吐涎沫条。

呕吐 病证名。出《素问·六元正纪大论》。古代文献有将呕吐区分者，谓声物俱出为呕，有物无声为吐。现一般将胃内容物经食道口腔吐出者，总称呕吐。可分虚实两类。《景岳全书·杂证谟》："呕吐一证，最当详辨虚实。实者有邪，去其邪则愈。虚者无邪，则全由胃气之虚也。"实证因外感六淫、痰饮停积、宿食不消，以及情志失调气机逆乱所致。虚证多因脾胃气阴不足所致。和胃降逆，为呕吐通治法，然仍当审因治本。呕吐有实呕、虚呕、外感呕吐、内伤呕吐、寒呕、热呕、痰呕、气呕、食呕、血呕、脾虚呕吐、阴虚呕吐等。但呕而有声无物者，称干呕。详各该条。

呕吐苦水 见《症因脉治·吐水类》。又称呕苦。详该条。

呕血 病证名。出《素问·厥论》。指血因呕吐而出，有多至盈盆倾碗者。常因恼怒、过劳及伤于酒色所致。也可因暴怒伤肝，气火上逆者，兼见胸胁疼痛，心烦不宁，少寐多梦。甚者可见惊狂骂詈，不辨亲疏。舌质红，脉多弦数。治宜泻肝清胃，用丹栀逍遥散、伐肝煎等方。偏火旺者，可先用犀角地黄汤凉血止血。若肝木侮土，脾胃受伤，致营血失守，其症无胀无火而神疲脉虚者，则宜五阴煎、五福饮、理阴煎等方。过劳所伤者，兼见遍身疼痛，时或发热，宜用犀角地黄汤加当归、肉桂、桃仁泥。饮酒过度，积热动血者，宜葛黄丸。房劳过度损伤肝肾者，兼见面赤足冷，烦躁口渴。偏真阴亏损者，宜生脉散合加减八味丸，或用左归饮、小营煎之类。偏气虚阳衰者，宜异功散合八味丸，或五福饮、大补元煎之类。呕血量多者，皆可合用花蕊石散。本证可见于食管及

胃底静脉曲张破裂、消化性溃疡、胃炎、胃动脉硬化、某些血液病等多种疾病。参吐血条。

呕青蓝水　证名。呕吐青蓝色水液。多因肝郁化火所致。《医贯·噎膈论》："又有一种肝火之证，亦呕而不入，但所呕者酸水，或苦水，或青蓝水，惟大小便不秘，亦能作心痛，此是火郁木郁之证。"宜用吴茱萸、黄连浓煎，继服逍遥散。愈后用六味丸调理。

呕苦　证名。指呕吐苦水。又称呕胆、呕苦水、吐苦水。《灵枢·四时气》："邪在胆，逆在胃，胆液泄，则口苦，胃气逆，则呕苦。"肝胆受病，胆液外泄，随胃气上逆而出，故呕出苦水。《症因脉治》卷二以呕吐苦水有因外感时邪，邪犯少阳阳明所致者，症见潮热，胸闷太息，脉弦数，或洪大。宜用柴胡清胆汤、葛根清胃汤。有因恼怒伤于肝胆所致者，症见胁肋胀痛，胸闷太息，或见目黄，脉弦数。偏虚者，宜用人参小柴胡汤。偏实者，宜用家秘清胆汤。挟食者，宜用干葛平胃散。挟痰者，合用二陈汤。

呕苦水　见《赤水玄珠·呕吐哕门》。又称呕苦。详该条。

呕胆　病名。指呕吐苦水。《灵枢·四时气》："邪在胆，逆在胃，胆液泄则口苦，胃气逆则呕苦，故曰呕胆。"详呕苦条。

呕逆　病证名。出《灵枢·经脉》等。即呕吐。详该条。

呕家　指常发呕吐疾患的病者。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》："呕家本渴，今反不渴者，以心下有支饮故也。"详呕吐条。

呕脓　证名。指呕吐脓液，为胃痈主症之一。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证并治》："夫呕家有痈脓，不可治呕，脓尽自愈。"详胃痈条。

呕清水　见《证治准绳·杂病》。又称吐清水。详该条。

呕酸　出《素问·至真要大论》。又称吐酸。详该条。

呃逆　病证名。见《万病回春》卷三。一作惊逆、惩逆。《内经》称哕。金、元多称咳逆。又称吃逆、吃忒。俗称打咯忒。指胃气冲逆而上。呃呃有声的症状。《医碥》卷二："呃逆，即内经所谓哕，气自下冲上而呃呃作声也。"其声短促，与嗳声沉长不同。呃逆有寒呃、热呃、气呃、痰呃、瘀呃、虚呃等。也有分为外感呃逆、内伤呃逆，或阳证咳逆、阴证咳逆者。详各条。本证可见于胃、膈肌痉挛和神经性呃逆，亦可见于危重病证。

呃逆痧　痧证之一。指痧胀而有呃逆者。《痧胀玉衡·呃逆痧》："痧胀为呃，有痰火血郁之分，有食阻气阻之异，有病重喘呃之凶。苟非细辨受病之原，用药稍或不妥，非惟不效，势必呃死，是明痧呃之害焉。"治宜放痧，方用细辛大黄丸、苏木散、桃仁红花汤、清凉至宝饮等。参痧条。

时气　❶指疫病。见《肘后备急方》卷二。亦名疫疠、天行、时行、时疫。《医学入门·疫疠》："疫疠如有鬼厉相似，故曰疫疠，又曰时气。"详疫疠、时疫、天行等条。❷病邪名。指具有强烈传染性、流行性的病邪。《全生集·时气》："时气者，乃天时暴厉之气流行人间。"

时气发斑　病证名。见《诸病源候论》卷九。又名时疫发斑、温疫发斑、温毒发斑。各详该条。

时气咳嗽　病证名。指咳嗽由感受时行杂气所致者。《杂症会心录·时气咳嗽》："今夫天之杂气有各种，人之感受有轻重，其来也无时，其著也无方。有触之者，各随其气而为诸病焉。如秋冬之交，咳嗽一症，遍于四方，延门合户，众人相同者，此皆时行之气，即杂气为病也。其初起恶寒发热，咳嗽咽干，鼻塞声重，头痛身痛，脉浮而数，或细而数。"又称时行嗽，详咳嗽、时行嗽

等条。

时行 病名。❶指冬季感受不正之气而至春发病者。与伤寒、温疫源本小异。《肘后备急方》卷二："伤寒，时行，温疫，三名同一种耳，而源本小异。其冬月伤于寒，或疾行力作，汗出得风冷，至夏发，名为伤寒。其冬月不甚寒，多暖气，及西风使人骨节缓惰受病，至春发，名为时行。其年岁中有疠气兼挟鬼毒相注，名为温病。如此诊候相似。"❷伤寒，温疫之俗称。《肘后备急方》卷二："又贵胜雅言，总名伤寒。世俗因号为时行。"❸又名时气。是感冒四时不正之气所致的流行性疾病。《诸病源候论·时气候》："时行病者，是春时应暖而反寒，夏时应热而反冷，秋时应凉而反热，冬时应寒而反温，非其时而有其气，是以一岁之中，病无长少，率相似者，此则时行之气也。"参时气、疫、疫疠等条。

时行伤寒 病名。见《外台秘要》卷三。即时行寒疫。详该条。

时行疫痢 病名。见《先醒斋医学广笔记》卷一。即疫痢。详该条。

时行寒疫 病名。指感受暴寒的疫病。《外台秘要》卷三："从春分以后至秋分节前，天有暴寒者，皆为时行寒疫也。一名时行伤寒。"症见头痛、身疼、寒热无汗，或作呕逆，脉浮紧。治宜辛温解表，可用苏羌饮加神曲、豆卷等。本病可见于流行性感冒等疾患。

时行感冒 病名。感冒之一种。指感冒之呈流行性者。病情常较一般感冒为重。《类证治裁·伤风》："时行感冒，寒热往来，伤风无汗，参苏饮、人参败毒散、神术散。"《诸病源候论·时气候》："时行病者，是春时应暖而反寒，夏时应热而反冷，秋时应凉而反热，冬时应寒而反温，非其时而有其气，是以一岁之中，病无长少，率相似者，此则时行之气也。"本病类似流行性感冒。参感冒条。

时行嗽 病名。亦名虾蟆瘟。指感受四时不正之气所致的咳嗽。以相互感染，流行一地为特点。《证治要诀·咳嗽》："时行嗽，发热恶寒，头痛，鼻塞，气急，状如伤冷热，连咳不已。初得病，即伏枕，一二日即轻。记壬午秋，满城有此病。继时甲午年夏秋之交，此病又自南而北，得免者少，并呼为虾蟆瘟。"治用参苏饮、败毒散、人参饮子、一服散等方。参天行嗽、咳嗽、虾蟆瘟条。本病类似流行性感冒。

时毒 病名。泛指时邪疫毒客于三阳之经的疾患。见《景岳全书·杂证谟》。❶瘟疫的一种。即大头瘟。《杂病源流犀烛·瘟疫源流》："大头瘟，……亦谓之时毒。"详见大头瘟条。❷指温热病之兼毒者，包括温毒痄腮及发颐，温毒发斑，温毒喉痹等。《重订广温热论·论温热兼症疗法》："其六兼毒，病名温毒，一名热毒，通称时毒。"参各该条。❸指时行与暴温发斑。《医学入门》卷三："伤寒阳症发斑谓之阳毒，春温发斑谓之温毒，夏热发斑谓之热毒，时行与暴温发斑谓之时毒。"参斑条。

时疫 病名。❶即疫、瘟疫。见《瘟疫论》。因疠气疫毒从口鼻传入所致。有强烈的传染性。《不知医必要·时疫》："此症有由感不正之气而得者，或头痛，发热，或颈肿，发颐，此在天之疫也。若一人之病，染及一室，一室之病，染及一乡、一邑，其症憎寒，壮热，口吐黄涎，乃在人之疫也。"甚者痉厥谵狂等。治宜疏利、解秽、清中，攻下等法。参瘟疫、疫条。❷指夏季所患之瘟疫。《辨疫琐言》："世之宗瘟疫论者，……春则曰春瘟，夏则曰时疫、秋则曰秋疫，冬则曰冬瘟。"

时疫发斑 病名。见《瘟疫论补注·发斑》。又名时气发斑、温疫发斑、温毒发斑。《温热类编》卷一："时疫发斑，憎寒壮热，头痛骨节痛，拘急，满闷，初出尚有表证者白虎汤。"参温疫发斑、温毒发斑等条。

呆病 病名。癫病的别称。《石室秘录》卷六："呆病如痴而默默不言也，如饥而悠悠如失也。意欲癫而不能，心欲狂而不敢。有时睡数日不醒，有时坐数日不眠。有时将己身衣服密密缝补，有时将他人物件深深藏掩。与人言则煎语而神游，背人言则低声而泣诉。与之食则厌薄而不吞，不与食则吞炭而若快。此等证，虽有祟想之实，亦胸腹之中，无非痰气，故治呆无奇法，治痰即治呆也。……方用逐呆仙丹。"《辨证录·呆病门》："人有终日不言不语，不饮不食，忽笑忽歌，忽愁忽哭；与之美馔则不受，与之粪秽则无辞；与之衣不服，与之草木之叶反善，人以为此呆病，不必治也。然而呆病之成必有其因。大约其始也，起于肝气之郁；其终也，由于胃之气衰。"治宜开郁逐痰，健胃通气，方用洗心汤、还神至圣汤及转呆丹等。因起居失节，胃气伤而痰迷所致者，宜生其胃气，而佐以消痰之品，方用启心救胃汤、指迷汤等。参癫条。

足下热 证名。指两足及足心有发热感觉。见《素问·刺热篇》。多因肾虚所致。《不居集·热症》："足心如烙者，虚火烁阴，涌泉涸竭也。澄按：足少阴其脉斜从小指趋至足心，出于然骨，循内踝入跟，为涌泉穴。此经原多气而少血，今虚劳之人，真阴不足，则涌泉渐干涸，故如火之烙，或足跟作痛，此水不制火之故也。"参五心烦热条。

足不收 证名。指两足软弱，行走时收引无力，举步艰难。《灵枢·经脉》："虚则足不收，胫枯，取之所别也。"《素问·藏气法时论》："脾病者，身重，善肌肉痿，足不收，行善瘛，脚下痛。"多因脾肾气虚，精血不足所致。本证可见于痿证、半身不遂等病。

足太阳疟 病名。指疟发于足太阳者。《素问·刺疟篇》："足太阳之疟，令人腰痛头重，寒从背起，先寒后热，熇熇暍暍然，热止汗出，难已，刺郄中出血。"治用羌活黄芩汤、柴胡汤、麻黄黄芩汤等。参三阳疟条。

足太阳经筋病候 病证名。又名仲春痹。十二经筋病候之一。《灵枢·经筋》："足太阳之筋，……其病小指（趾）支跟肿痛，腘挛，脊反折，项筋急，肩不举，腋支缺盆中纽痛，不可左右摇。治在燔针劫刺，以知为数，以痛为输，名曰仲春痹也。"热者无用燔针。

足太阴心痛 病证名。外邪侵犯足太阴经所致。《三因极一病证方论》卷九："若十二经络外感六淫，则其气闭塞，郁于中焦，气与邪争，发为疼痛，属外所因。"又："足太阴心痛，腹胀满，濡濡然大便不利，膈闭，咽塞。"参心痛条。

足太阴疟 病名。指疟发于足太阴者。《素问·刺疟篇》："足太阴之疟，令人不乐，好太息，不嗜食，多寒热，汗出，病至则善呕，呕已乃衰，即取之。"《杂病源流犀烛·疟疾源流》："盖以脾喜乐，病则否，上焦痞塞，故好太息而不嗜食；太阴主里，邪不易解，故多寒热；脾病及胃，故善呕也。宜桂枝汤加减，参用建中汤；脾寒诸疟，宜橘皮散。"参三阴经疟条。

足太阴经筋病候 病证名。又名季春痹。十二经筋病候之一。《灵枢·经筋》："足太阴之筋，……其病足大指（趾）支内踝痛，转筋痛，膝内辅骨痛，阴股引髀而痛，阴器纽痛，下引脐两胁痛，引膺中脊内痛。治在燔针劫刺，以知为数，以痛为输，名曰季春痹也。"热者勿用燔针。

足少阳疟 病名。指疟发于足少阳者。《素问·刺疟篇》："足少阳之疟，令人身体解㑊，寒不甚，热不甚，恶见人，见人心惕惕然，热多汗出甚，刺足少阳。"治用小柴胡汤。参三阳疟条。

足少阳经筋病候 病证名。又名孟春痹。十二经筋病候之一。《灵枢·经筋》："足

少阳之筋，……其病小指（趾）次指（趾）支转筋，引膝外转筋，膝不可屈伸，腘筋急，前引髀，后引尻，即上乘肷季胁痛，上引缺盆、膺、乳、颈维筋急，从左之右，右目不开，上过右角，并跷脉而行，左络于右，故伤左角，右足不用，命曰维筋相交。治在燔针劫刺，以知为数，以痛为输，名曰孟春痹也。”热者勿用燔针。

足少阴心痛 病证名。外邪侵犯足少阴经所致。《三因极一病证方论》卷九：“若十二经络外感六淫，则其气闭塞，郁于中焦，气与邪争，发为疼痛，属外所因。”又：“足少阴心痛，烦剧，面黑，心悬若饥，胸满，腰脊痛。”参心痛条。

足少阴疟 病名。指疟发于足少阴者。《素问·刺疟篇》：“足少阴之疟，令人呕吐甚，多寒热，热多寒少，欲闭户塞牖而处，其病难已。”治宜先用人参白虎汤，次用鳖甲牛膝汤等方。参三阴经疟条。

足少阴经筋病候 病证名。又名仲秋痹。十二经筋病候之一。《灵枢·经筋》：“足少阴之筋，……其病足下转筋，及所过而结者皆痛及转筋。病在此者，主痫瘛及痉，在外者不能俛，在内者不能仰，故阳病者腰反折不能俛，阴病者不能仰。治在燔针劫刺，以知为数，以痛为输。在内者熨引饮药，此筋折纽，纽发数甚者死不治。名曰仲秋痹也。”热者勿用燔针。

足心痛 证名。《张氏医通》卷五：“足心痛。足心及踝骨热疼者，为肾虚湿著，命门火不归经，肾著汤，下八味丸。肥人多湿痰流注，足心作痛，但久坐卧，起则痛甚，行动则缓，宜肾著汤合二妙散。”参脚心痛条。

足阳明疟 病名。指疟发于足阳明者。《素问·刺疟篇》：“足阳明之疟，令人先寒，洒淅洒淅，寒甚久乃热，热去汗出，喜见日月光火气乃快然，刺足阳明跗上。”方用大剂竹叶石膏汤等，参三阳疟条。

足阳明经筋病候 病证名。又名季春痹。十二经筋病候之一。《灵枢·经筋》：“足阳明之筋，……其病足中指（趾）支胫转筋，脚跳坚，伏兔转筋，髀前肿，癀疝，腹筋急，引缺盆及颊，卒口僻，急者目不合，热则筋纵，目不开；颊筋有寒则急，引颊移口，有热则筋弛纵，缓不胜收，故僻。”治宜马脂膏涂其急，以白酒和桂涂其弛缓。并可用按摩、针刺等法。

足软 证名。见《理虚元鉴·阳虚三夺统于脾》。又称脚软。详该条。

足胫肿 证名。指足及小腿浮肿。即胫肿。《素问·平人气象论》：“足胫肿曰水。”《灵枢·水胀》：“足胫肿，腹乃大，其水已成矣。”多因脾虚湿胜所致。参胫肿条。

足胫肿痛 证名。指两脚小腿部肿胀作痛。多因风湿，或湿热下注所致。《寿世保元·脚气》：“湿热脚气为病，肢节烦痛，肩背沉重，胸胁不利，兼遍身疼痛，下注足胫肿痛。”又：“风湿气，足胫肿痛。”参脚气、足胫痛条。

足胫跗肿 证名。指两脚小腿部浮肿的症象。《素问·至真要大论》：“太阴之胜，火气内郁，……头重、足胫跗肿。”《类经·六气相胜病治》：“脾胃不能胜湿，则足胫跗肿。”本证可见于水肿、脚气等证。

足胫痛 证名。指两脚及小腿部作痛。出《素问·平人气象论》。多由阴寒湿邪下注所致。本证可见于脚气、痹证等。

足胕肿 证名。指足及小腿浮肿。《素问·脉要精微论》：“脾脉搏坚而长，其色黄，当病少气；其耎而散，色不泽者，当病足胕肿，若水状也。胕，与胫同。参胫肿、脚肿、水肿各条。

足厥阴疟 病名。指疟发于足厥阴者。《素问·刺疟篇》：“足厥阴之疟，令人腰痛，少腹满，小便不利，如癃状，非癃也，数便，意恐惧气不足，腹中悒悒，刺足厥

阴。”治宜先用三黄石膏汤以祛暑邪，次用鳖甲牛膝汤等方。参三阴经疟条。

足厥阴心痛　病证名。外邪侵犯足厥阴经所致。《三因极一病证方论》卷九：“若十二经络外感六淫，则其气闭塞，郁于中焦，气与邪争，发为疼痛，属外所因。”又：“足厥阴心痛，两胁急，引小腹连阴股，相引痛。”参心痛条。

足厥阴经筋病候　病证名。又名季秋痹。十二经筋病候之一。《灵枢·经筋》：“足厥阴之筋，……其病足大指（趾）支内踝之前痛，内辅痛，阴股痛，转筋，阴器不用，伤于内则不起，伤于寒则阴缩入，伤于热则纵挺不收，治在行水清阴气。其病转筋者，治在燔针劫刺，以知为数，以痛为输，名曰季秋痹也。”热者勿用燔针。

足寒　证名。指两足有寒冷的感觉。多由阳气虚弱，阴寒下盛所致。《素问·解精微论》：“阴并于下，则足寒，足寒则胀也。”《素问识》卷八：“阳气不降，阴气不升，故上为目无所见，而下为足寒。”

足跟痛　证名。又称脚跟痛。多由肾虚、血热、痰湿所致。《丹溪心法·足跟痛》：“足跟痛。有痰，有血热。”常见足跟一侧或二侧疼痛，不红不肿，行走不便。《张氏医通》卷五：“肾脏阴虚者，则足胫时热而足跟痛，六味丸加龟板、肉桂；阳虚者，则不能久立而足跟痛，八味丸；挟湿者，必重著而肿，换骨丹、史国公药酒；肥人湿痰流注，导痰汤加木瓜、萆薢、防己；虚人用补中益气、十全大补汤。”《医学入门·脚气》：“脚跟痛，有血热者，四物汤加知母、黄柏、牛膝；有痰者，五积散加木瓜。”参脚跟痛条。

足痹　病名。指足部麻木疼痛不能行走的一种痹症。多由气血不足所致。《灵枢·阴阳二十五人》：“足阳明之下，……血气皆少则无毛，有则稀枯悴，善痿厥足痹。”

里水　病名。①水肿病之一。《金匮要略·水气病脉证并治》：“里水者，一身面目黄肿，其脉沉，小便不利，故令病水。……越婢加术汤主之，甘草麻黄汤亦主之。”《脉经》注：“一云皮水。”黄肿，《脉经》作“洪肿”。②十水之一。华佗《中藏经·论水肿脉证》：“里水者，其根在小肠，其状先从小腹胀而不肿，渐渐而肿也。”参十水条。

里证　八纲之一。指邪入脏腑，血脉，骨髓等所出现的症候。《景岳全书·传忠录》：“里证者，病之在内，在脏也。凡病自内生，则或因七情，或因劳倦，或因饮食所伤，或为酒色所困，皆为里证。”《万病回春·伤寒总论》：“病在里，有里虚，里实，又有表里俱虚，表里俱实，毫厘之分，贵乎早辨。”详见里寒证、里热证、里虚证、里实证条。

里实证　证名。亦称内实证。❶指外邪化热入里，结于胃肠所出现的症候。症见壮热、烦渴、腹痛、便秘等。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“伤寒十三日，过经谵语者，以有热也，当以汤下之。……若自下利者，脉当微厥，今反和者，此为内实也，调胃承气汤主之。”❷指停痰、瘀血、食滞、虫积等所致的症候。《景岳全书·传忠录》：“里实者，或为胀为痛，或为痞为坚，或为闭为结，或为喘为满，或懊侬不宁，或躁烦不眠，或气血积聚，结滞腹中不散，或寒邪、热毒深留脏腑之间。”治宜祛痰、理气活血、消食导滞、杀虫等法。参实证、内实条。

里急后重　证名。出《难经·第五十七难》。其状腹痛窘迫，时时欲泻，肛门重坠，便出不爽。为痢疾主症之一。《景岳全书·杂证谟》：“凡里急后重者，病在广肠最下之处，而其病本，则不在广肠，而在脾肾。凡热痢、寒痢、虚痢，皆有之，不得尽以为热也。盖中焦有热，则热邪下迫中焦；有寒，则寒邪下迫脾肾；气虚则气陷下迫。欲治此

者，但当察其所因，以治脾肾之本。”参痢疾条。

里热不得卧 外感不得卧之一。指三阳失于解表，邪热传里所致的不寐症。《症因脉治》卷三：“里热不得卧之症：身热汗出，渴而引饮，小便不利，太阳经里热也；烦渴消水，口燥唇焦，大便坚结，阳明经里热也；寒热口苦，胁痛干呕，少阳经里热也。……里热不得卧之治：太阳里热，冬月五苓散、家秘用木通羌活汤；阳明里热，白虎汤，有下症者，承气汤下之；少阳里热，家秘黄芩汤。”参不寐条。

里热证 证名。指邪热炽盛的里证。多因病邪内传或脏腑积热所致。症见身热汗多，渴欲引饮，心烦口苦，小溲短赤刺痛，舌红苔黄，脉洪数或弦数等。《景岳全书》卷一：“热在里者，为瞀闷胀满，为烦渴喘结，或急叫吼，或躁扰狂越。”治宜清热泻火为主。《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》：“伤寒脉滑而厥者，里有热，白虎汤主之。”《医学心悟·伤寒主治四字论》：“热邪入里，皆为里热，其在太阴则津液少，少阴则咽干口燥，厥阴则消渴，仲景所谓急下之，而用大柴胡、三承气者是也。”参阳明经证条。

里虚证 证名。指脏腑阴阳气血虚衰所出现的证候。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“尺中脉微，此里虚。”《金匮要略·血痹虚劳脉证并治》：“男子面色薄，主渴及亡血，卒喘悸，脉浮者，里虚也。”症见少气懒言，心悸神疲，头晕耳鸣，食少肢倦，舌淡嫩，脉虚弱等，治宜补阴、补阳、益气、养血等法。参里证、虚证条。

里寒证 证名。指伤寒阴证，即中寒。《医学心悟·伤寒主治四字论》：“何谓里寒？凡伤寒不由阳经传入而直入阴经，手足厥冷，脉微细，下利清谷者，名曰中寒。”如太阴病的理中汤证，少阴病的四逆汤证，厥阴病的当归四逆汤证等。亦指慢性病的脏腑内寒证。症见脘腹冷痛，呕吐清水，大便溏泄，小便清长，畏寒肢冷，面色苍白，舌淡苔白滑，脉沉迟或微细等。治宜温中祛寒为主，方如吴茱萸汤、附子理中汤等。参寒证条。

〔丿〕

利 ❶通利之意。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病，小便利者，以饮水多，必心下悸。小便少者，必苦里急也。”❷病证名。指泄泻。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止。”参泄泻条。❸病证名。指痢疾。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》：“热利下重者，白头翁汤主之。”参下利、痢疾条。

吞酸 证名。见《诸病源候论·脾胃病诸候》。又称咽酸。《医林绳墨·吞酸吐酸》：“吞酸者，胃口酸水攻激于上，以致咽嗌之间，不及吐出而咽下，酸味刺心，有若吞酸之状也。”《寿世保元·吞酸》：“饮食入胃，被湿热郁遏，食不得化，故作吞酸。”《证治汇补·吞酸章》：“吞酸为中气不舒，痰涎郁滞，须先用开发疏畅之品。”治同吐酸，参该条。

牡疟 病名。疟疾之一。出《金匮要略·疟病脉证并治》。牡系牝字之讹，详牝疟条。

体厥 厥证之一。指热极反见身冷如冰者。《温疫论》：“阳证阴脉，身冷如冰为体厥。……今元阳已极，以至通身冰冷，此体厥也。六脉如无者，群龙无首之象。证亦危矣。投大承气汤，嘱其缓缓下之，脉至厥回，便得生也。”参厥证条。

但欲寐 证名。指朦胧欲睡貌。为少阴病主症之一。因阳气虚衰所致。《伤寒论·辨少阴病脉证并治》：“少阴之为病，脉微细，但欲寐也。”《医学心悟》首卷：“问曰：但欲寐，何以是直中寒证？答曰：寒邪属阴，阴主静，静则多眠。……表证多眠

者，何也？答曰：表证多眠，是寒邪外束，阳气不舒，必见头痛发热诸证；若直中多眠，则见下利清谷，手足厥冷诸证，与表邪自是不同。……热证亦有昏昏而睡者，何也？答曰：此热邪传入心胞，令人神昏不语，或睡中独语一、二句，与之以水则咽，不与则不思，此乃热甚神昏，非欲寐也。”参少阴病条。

身体不仁　证名。指身体肌肤顽痹，不知痛痒冷热的症象。《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》：“外证身体不仁，如风痹状。”《医林绳墨》卷六：“有所谓不仁者，谓肌肤麻痹，或周身不知痛痒，如绳扎拇初解之状，皆因正气空虚，而邪气乘之，血气不能和平，邪正有相互克，致使肌肉不和，而为麻痹不仁者也，或有痰涎不利，或有风湿相搏，营卫行涩，经络疏散，皮肤少荣，以致遍体不仁，而有似麻痹者也。轻则不见痛痒，甚则不知人事，治宜驱风理气，而兼养血清湿可也。用二陈汤加归、术、天麻、防风、防己、芩、连之属，如不效者，去芩、连加薄桂。”

身灼热　证名。指发热壮盛，身如烧灼或手抚病人皮肤有烫手感。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病，发热而渴不恶寒者为温病，若发汗已，身灼热者，名曰风温。”多见于温邪热盛的患者。

身肿　即水肿。《金匮要略·水气病脉证并治》：“寸口脉沉而迟，沉则为水，迟则为寒，寒水相搏，趺阳脉伏，水谷不化，脾气衰则鹜溏，胃气衰则身肿。”“肺水者，其身肿，小便难。”本病有风寒身肿、寒湿身肿、湿热身肿、燥火身肿，黄汗身肿、肺虚身肿、肺热身肿、脾虚身肿、脾热身肿、肝肾虚肿之分。详水肿有关各条。

身面卒浮肿　证名。指身体头面突然浮肿者。《太平圣惠方》卷五十四：“身面卒浮肿者，亦水病之候也。此由肾脾虚弱之所为也。肾主于水，今肾虚，故水妄行，脾主于土，脾虚不能制水，故水流溢散入皮肤，全身面卒然浮肿也。”症还常伴见上气喘息，大小便不利等。治用鳢鱼汤、甜葶苈圆、甘遂圆等方。

身重　证名。指身体重着，活动不便的症象。《素问·气交变大论》：“民病腹满，身重濡泄。”多因风湿、寒湿、湿热困脾所致。《鲒溪医述·身体》：“身重如山，不利转侧，麻木浮肿者何？曰，湿在肉分也。”又“身重，跗肿，肉如泥，按之不起者何？曰，湿土之气也。”《医钞类编·身痛门》：风湿、热湿、寒湿身重治法：夏月中风湿，身重如山，不能转侧，宜除风胜湿去热之药治之；湿热身重而痛，羌活胜湿汤；寒湿身重者，五积散；肾著身重，甘姜苓术汤。”平胃散、实脾饮、济生肾气丸等亦可选用。

身重痧　痧证之一。《杂病源流犀烛·痧胀源流》：“身重痧，痧症初发，势虽凶暴，未必身重，若饮热汤热酒，痧毒即阻塞经络血肉之间，遍身重痛，不能转侧，或呕吐腹胀，脉伏。放痧之后，治先消瘀解毒。宜三十五号家人方。如痧气渐减，再放痧，用三十六号益象方。”参痧条。

身热　指全身发热的症象。《素问·阴阳应象大论》：“阳胜则身热”。亦有阳气虚衰而见身热者。《素问·刺志论》：“气虚身热，此谓反也。”详发热条。

身热不扬　证名。见《王旭高医案》卷一。指病人自觉发热，但按其肌肤而不甚热的一种症象。多见于湿温病，热为湿遏，以致发热在里，热势不扬，宜用渗湿透热或清泄芳开法治疗。

身痒　证名。指身上皮肤不适，非搔不快的感觉。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。多由邪郁肌表不能透达、血虚风燥等所致。可见于热病汗不得出、疮疥、癮疹等疾患。

近血　病名。指便血之先下血、后排便者。《金匮要略·惊悸吐衄下血胸满病脉证

并治》："下血，先血后便，此近血也。赤小豆当归散主之。"《景岳全书》谓："血在便前者其来近，近者或在广肠，或在肛门。"肠风、脏毒多见之，详各该条。本症可见于溃疡性结肠炎，结肠及直肠癌肿或息肉、痔疮、肛裂等。

余热不得卧 病证名。外感不得卧之一。指热病余邪未尽所致的不寐症。《症因脉治》卷二："余热不得卧之症，表汗已出，表邪已退，身不发热，但睡中盗汗，小便色黄，夜多烦躁，口苦舌干，不得安睡。"治疗如太阳余热，五苓散，木通羌活汤下；少阳有热，栀子柴胡汤；阳明有热，竹叶石膏汤。参不寐条。

肝中风 病名。又名肝脏中风。指风邪入中于肝经而致的症候。主症为头目瞤动，胁痛，常伛偻而行，或踞坐不得低头等。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》："肝中风者，头目瞤，两胁痛，行常伛，令人嗜甘。"《诸病源候论·风病诸候》："肝中风，但踞坐不得低头……。"参肝脏中风条。

肝中热证 证名。指肝脏实热的病证。《华氏中藏经》："肝中热，则喘满而多怒，目疼，腹胀满，不嗜食，所作不定，睡中惊悸，眼赤视不明，其脉左关阴实者是也。"参肝实热条。

肝中寒证 证名。指肝受寒邪所致的病证。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》："肝中寒者，两臂不举，舌本燥。喜太息，胸中痛，不得转侧，食则吐而汗出也。"《三因极一病证方论·五脏中寒证》："肝中寒之状，其人洒洒恶寒，翕翕发热，薰然面赤，漐漐如有汗，胸中烦热，胁下挛急，足不得伸。"治宜疏肝散寒为主。选用二柴胡饮、正柴胡饮、不换金正气散等方。

肝气 ❶病证名。指肝气疏泄失常者。《类证治裁·肝气肝火肝风》："肝木性升散，不受遏郁，郁则经气逆，为嗳，为胀，为呕吐，为暴怒胁痛，为胸满不食，为飧泄；为癥疝，皆肝气横决也。"又："治肝气，先疏其郁，宜逍遥散。"❷生理名词。指肝脏之精气。其功能主要是荣目养筋。《灵枢·脉度》："肝气通于目，肝和则目能辨五色矣。"《素问·上古天真论》："丈夫……七八，肝气衰，筋不能动。"

肝气胁痛 病证名。见《医方考》卷五。指因情志不舒，肝气失于疏泄所致的胁痛。临床表现为胁肋胀痛，胸闷，饮食减少，疼痛部位走窜不定，时痛时歇，得嗳气则痛胀见宽，如情绪波动其痛加剧，多见弦脉。治宜疏肝理气为主，如严氏推气散、柴胡疏肝散、逍遥散等加减。参气郁胁痛条。

肝气实 证名。见《外台秘要》卷十六。即肝气盛。《灵枢·本神》："肝气虚则恐，实则怒。"详肝气盛条。

肝气逆证 证名。指肝脏气机不和，出现上逆或横逆等证候。《圣济总录》卷四十一："肝气逆则面青多怒。"《类证治裁》卷二："胁痛吐血者，肝气逆也，化肝煎。"又卷三："怒郁伤肝气逆，解肝煎。"《西溪书屋夜话录》谓肝气逆上冲心，热厥心痛者，宜泄肝，药如金铃、延胡、吴萸、川连；兼寒，去川连加椒、桂；寒热俱有者，仍入川连，或再加白芍；肝气上逆冲肺，猝得胁痛，暴上气而喘者，宜抑肝，药如吴萸汁炒桑皮、苏梗、杏仁、橘红之属；如肝气横逆乘脾，脘腹胀痛者，治宜培土泄木，用六君子汤加吴萸、白芍、木香；肝气乘胃，症见脘痛呕酸者，二陈加左金丸，或白蔻、金铃子等。

肝气盛 证名。又名肝气实。指肝经邪气盛实的证候。《灵枢·淫邪发梦》："肝气盛，则梦怒。"《圣济总录》卷四十一："气盛则为血有余，故目赤，两胁下痛引少腹，善怒，甚则气逆头眩，耳愦颊肿，皆肝实之证也。"肝气盛实，可导致肝火旺盛。参肝病、肝火条。

肝风　病证名。❶指肝受风邪所致的疾患。《素问·风论》："肝风之状，多汗恶风，善悲，色微苍，嗌干，善怒，时憎女子，诊在目下，其色青。"《奇效良方》治风中于肝，用射干汤。《圣济总录》卷四十一："若肝藏气虚，不能荣养，则为风邪所侵，搏于筋脉，荣卫凝泣，关节不通，令人筋脉抽掣疼痛，以至眩闷口眼偏斜，皆其证也。"《太平圣惠方》治肝风筋脉拘挛，用羚羊角散。❷指肝风内动的病症。《素问·至真要大论》："诸风掉眩，皆属于肝。"《临证指南医案·肝风》华岫云按："故肝为风木之脏，因有相火内寄，体阴用阳，其性刚，主动主升，全赖肾水以涵之，血液以濡之，……倘精液有亏，肝阴不足，血燥生热，热则风阳上升，窍络阻塞，头目不清，眩晕跌仆，甚则瘈疭痉厥矣。"肝主筋，其经脉上巅络脑，故症见眩晕、痉厥、四肢抽搐等。

肝风疝　病名。《素问·四时刺逆从论》："少阳有余，病筋痹胁满；不足病肝痹；滑则病肝风疝。"马莳注："其脉若滑，则病肝风疝，外感之邪也。"《类经》卷十七："滑实则风热合邪而为肝风疝，病在筋也。"详风疝条。

肝火五更泄泻　五更泄的一种。因恼怒伤肝，肝气怫逆化火所致。《症因脉治·肝火五更泄泻》："胁肋常痛，痛连小腹，夜多不寐，每至五更，小腹左角一汛，急欲登厕，火性急速，一泻即止。"脉多弦数或洪大。治宜清肝泻火，用龙胆泻肝汤、柴胡栀连汤、左金丸、栀连戊己汤等方。

肝火不得卧　内伤不得卧之一。指肝火扰动心神所致的不寐症。《症因脉治》卷三："肝火不得卧之症，胁肋时胀，夜卧常惊，口渴多饮，腹大如怀，小腹季胁牵引作痛，痛连阴器。"治宜平肝清火，如用疏肝散，四物汤加山栀、川连，龙胆泻肝汤，家秘肝肾丸等方。参不寐条。本证可见于动脉硬化、高血压病及肝胆疾患等出现的失眠症。

肝火耳聋　耳聋的一种。指肝火上扰所致的耳聋。《医学六要·耳》："肝火，左脉弦急而数，属肝火。其人必多怒，耳鸣或聋。"治宜平肝降火。选用龙胆泻肝汤、聪耳芦荟丸等方。参耳聋条。

肝火胁痛　证名。指肝气实或气郁化火而致的胁痛。《金匮翼·胁痛统论》："肝火胁痛，肝火盛而胁痛者，肝气实也。其人气收善怒。经云，肝病者，两胁下痛引少腹，善怒。又云，肝气实则怒是也。其脉当弦急数实。其口当苦酸，其痛必甚，或烦热或渴，或二便热涩不通。"治宜当归龙荟丸或左金丸等方。参肝郁胁痛条。

肝火眩晕　病证名。《证治汇补·眩晕章》："肝火眩晕，黑瘦人肾水亏少，肝枯木动，复挟相火，上踞高巅而眩晕。"症见头晕头痛，面红升火，口苦目赤，舌质红，脉弦数。偏火旺者，宜清肝泻火为主，用龙胆泻肝汤；偏阴虚者，宜滋阴降火，用知柏八味丸等方。本症可见于高血压等病症。参眩晕条。

肝火腹胀　病证名。指肝火克脾、气机不畅所致的腹胀。《症因脉治》卷三："肝火腹胀之症，目睛黄，两胁痛，小腹胀急，或攻刺作痛，或左边胀甚，小便赤，夜不得寐。"多因恼怒、酒热伤肝，肝气怫郁，气机不利所致。治宜泻火疏肝为主。宜清肝饮、泻肝汤、左金丸等方。参腹胀、内伤腹胀条。

肝心痛　厥心痛之一。因肝病而邪上乘心所致。《灵枢·厥病》："厥心痛，色苍苍如死状，终日不得太息，肝心痛也。"《医宗金鉴·杂病心法要诀》："歧骨陷处痛，名心痛。……连胁，名肝心痛。"《张氏医通·诸痛门》："肝心痛者，多由木火之郁，病在血分，……在血则行之，郁则开之。"可用金铃子散等方。参厥心痛、心痛条。

肝水　五脏水肿病之一。《金匮要略·水气病脉证并治》："肝水者，其腹大，不

能自转侧，胁下腹痛，时时津液微生，小便续通。”多因水气凌肝，肝失疏泄所致。参水肿、十水条。

肝虫病 病名。肝虫指肉虫。《普济本事方》卷七：“肝虫如烂杏。”即肉虫病。详该条。

肝伤 指肝脏伤损的疾患。《脉经》卷六：“凡有所坠堕恶血留内，若有所大怒气上而不能下，积于左胁下则伤肝。肝伤者，其人脱肉，又卧口欲得张，时时手足青，目瞑，瞳人痛，此为肝藏伤所致也。”《诸病源候论·虚劳病诸候》：“大怒气逆伤肝，肝伤，少血目闇。”参筋极、七伤条。

肝阳头痛 病证名。指肝阳上扰所致的头痛。《类证治裁·头痛》：“内风扰巅者，筋惕，肝阳上冒，震动髓海。”症见头角及巅顶掣痛，眩晕烦躁易怒，睡眠不宁，脉弦等。治宜平肝潜阳为主，用天麻钩藤饮、珍珠母丸等。《医醇賸义·诸痛》：“有因于火者，肝阳上升，头痛如劈，筋脉掣起，痛连目珠，当壮水柔肝，以熄风火。”用羚羊角汤、龙胆泻肝汤等方。本证常见于高血压病、血管性头痛、眼原性头痛等疾患。参头痛条。

肝阳眩晕 病证名。指因情志不舒，烦劳过度，肝阴暗耗，而致肝阳上僭引起者。症见时时头晕头痛，睡眠不宁，容易激动，脉弦。治宜平肝潜阳为主，用天麻钩藤饮等方。肝阴偏虚者，心烦少寐，舌红少苔，宜滋养肝肾之阴，用二至丸、杞菊地黄丸。肝阳眩晕之火旺者，则为肝火眩晕。详该条。本证可见于高血压等疾病。

肝劳 ❶病名。因劳损伤肝所引起的虚损之症。《诸病源候论·虚劳病诸候》：“肝劳者，面目干黑，口苦，精神不守，恐畏不能独卧，目视不明。”《太平圣惠方·治肝劳诸方》：“治肝劳虚热，两目赤涩，烦闷宛转，热气壅滞，胸里炎炎，宜服泻肝除热，柴胡散方。”又：“治肝劳，虚寒胁痛，胀满气急，昏不思饮食，宜服鳖甲散方。”《医醇賸义·劳伤》：“肝劳者，阳气拂运，阴气亏损，身热胁痛，头眩耳鸣，筋节弛纵，加味扶桑饮主之。”参见虚劳、五劳条。❷证名。指风劳。《圣济总录·风劳》：“论曰风劳者，肝劳之类也。”《金匮翼·风劳》：“风劳之证，……亦名肝劳。”详风劳条。

肝足厥阴经病证 病证名。指足厥阴肝经经气异常所致的病症。《灵枢·经脉》：“肝足厥阴之脉，……是动则病腰痛不可以俛仰，丈夫癀疝，妇人少腹肿，甚则嗌干，面尘，脱色。是主肝所生病者，胸满，呕逆，飧泄，狐疝，遗溺，闭癃。为此诸病，盛则泻之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不衰，以经取之。”《脉经·肝足厥阴经病证》：“肝气虚则恐，实则怒。”又：“病先发于肝者，头目眩，胁痛肢满。”又：“肝病者，必两胁下痛引小腹，令人善怒，虚则目晾晾，无所见，耳无所闻，善恐，如人将捕之。”此外，尚列举了肝中风、肝胀、肝著、肝痹、肥气等多种病证。参肝病有关各条。

肝郁 五脏郁证之一。《赤水玄珠》卷十一：“肝郁者，两胁微膨，嗳气连连有声。治宜青皮、川芎、吴茱萸。”亦可用逍遥散等方。参五脏郁证条。

肝郁胁痛 证名。指气机郁结所致的胁痛。多由情志失调，肝气郁结，气阻络痹所致。《金匮翼·胁痛统论》：“肝郁胁痛者，悲哀恼怒，郁伤肝气，两胁骨疼痛，筋脉拘急，腰脚重滞者是也。”甚则可见胁痛难忍，或胁腋牵痛，烦躁易怒等。肝郁日久并能化火。治宜解郁理气为主，兼以清泄郁火，如枳壳煮散、金铃子散、调肝散、小龙荟丸等方。参肝气胁痛、肝火胁痛条。

肝郁黄疸 病证名。见《诊余集·黄疸》。其症“忽然呕吐，发热，遍体疼痛，热退则面目俱黄，此宜从疏肝理气，利湿健脾自

愈，又不可用温热也。”参黄疸有关条。

肝肾虚肿　身肿类型之一。《症因脉治》卷三：“肝肾虚肿之症，腹冷足冷，小水不利，或小腹肿，腰间痛，渐至肿及遍身，面色黑黄，此肝肾经真阳虚肿，即内经肾水症也。肝肾虚肿之因，肝主施泄，肾主闭藏，肝肾之真阳不足，不能司其开阖，则小水不利。若阴精素虚，色欲太过，肝肾之真阴不足，虚火烁金，小水亦不利。内经所云，关门不利，聚水而生病也。”脉迟弦为肝肾真阳不足，脉细数为肝肾阴虚，治宜选用金匮肾气丸、河车丸、人参固本丸、家秘肝肾丸等方。参身肿、水肿条。

肝肾虚胀　病证名。指肝肾亏损，小便不利所致的小腹胀。《症因脉治》卷三：“肝肾虚胀之症，腰软作痛，痛连季胁，小便常涩，气怯消瘦，小腹胀冷。”多因肝肾不足，气化无权所致。治宜补益肝肾为主。腰软常痛，宜大造丸溶化龟鹿二仙胶为丸；小便常滴，小腹胀冷，宜金匮肾气丸；真阴虚，脉数内热者，宜家秘肝肾丸。参腹胀、内伤腹胀条。

肝胀　病证名。❶胀病之一。《灵枢·胀论》：“肝胀者，胁下满而痛引小腹。”《医醇賸义·胀》：“寒气上逆，则两气相积，而肝木怒张，胁下乃肝木之本位，痛引小腹，则壅极而决矣。当疏肝化浊，青阳汤主之。”《金匮翼·胀满诸论》：“肝胀，怒动肝火，逆于中焦，其症口苦、脉弦、胁及小腹胀满或痛，发则身热、气逆是也。左金丸。”参胀病条。❷指目睛无故脱出的怪疾。《增广验方新编·目部》：“眼珠无故涌出垂下，大便下血，亦有不便血者，名曰肝胀。羌活煎浓汤，乘热先熏后服，即入，或用羌活烧烟熏之，更妙。”

肝疟　五脏疟之一。《素问·刺疟篇》：“肝疟者，令人色苍苍然，太息，其状若死者，刺足厥阴见血。”治宜四逆汤等。参五脏疟条。

肝泄　病证名。指怒伤肝经，木克脾土所致的泄泻。《证治汇补·下窍门》：“肝泄者，忿怒所伤，厥而面青，必兼胁满。”《医学入门·泄泻》：“肝虚忿怒所伤，木克脾土，门户不束，厥而面青，当归厚朴汤，或熟料五积散去麻黄，汗多者，黄芪建中汤。”参七情泻、气泻条。

肝实证　指肝病因邪气盛实所出现的证候。多由气郁，火旺等所致。《脉经》卷二：“左手关上阴实者肝实也，苦肉中痛动，善转筋。”《圣济总录·肝脏门》：“肝实之状，苦心下坚满，常两胁痛，或引小腹，忿忿如怒，头目眩痛，目眥赤生瘕肉是也。”《本草经疏》：“肝实之证，善怒，怒则气上逆，甚则呕血及飧泄，善太息，忽忽不乐，胁痛，呕血，属肝气逆，肝火盛，肝血虚；发搐，属肝家邪热，热则生风，风主掉眩故也。口赤肿痛，属血热。”方用犀角地黄汤、羚羊角散、甘菊花散等方。参肝病、肝实热、肝火等条。

肝实热证　证名。指肝经邪热炽盛的病症。《备急千金要方》卷十一：“病苦心下坚满，常两胁痛，息忿忿如怒状，名曰肝实热也。”《太平圣惠方》卷三：“夫肝实则生热，热则阳气盛，致心下坚满，两胁痛引小腹，忿忿如怒。气逆目眩，为血有余，即目痛，眼眥赤，生瘕肉，阳毒所致，悒悒先寒而后热，颈直背强，筋急不得屈伸。”《三因极一病证方论·肝胆经虚实寒热证治》：“肝实热，阳气伏邪。胁痛，忿忿悲怒，发热，喘逆，满闷，目痛，视物不明，狂悸，非意而言，乍宽乍急，所作反常。”《杂病源流犀烛·目病源流》：“肝脏积热，先患赤肿，疼痛，怕日羞明，泪溢难开，忽生翳膜，初患一目，渐及两眼。”治宜泻肝清热为主。选用竹沥泄热汤、泻肝汤、泻青丸等方。

肝经风痰　痰证之一。见《不居集》卷十七。即风痰。详见该条。

肝经失血 病证名。《不居集》卷十三："肝经失血：肝藏血，因怒而动血者，属于肝。"症见失血鲜红或瘀黯，躁扰喘急，面青脉弦。挟肝火则伴见烦热不宁；挟肝气则伴见胸胁痛满。治宜疏利、降火、行气等法。选用柴胡栀子清肝散、畅郁汤、赤茯苓汤等方。参失血条。

肝经咳嗽 病证名。指肝病犯肺所致的咳嗽。《症因脉治·咳嗽》："肝经咳嗽之症，咳则两胁下痛，痛引小腹，或寒热往来，面青色，筋急，此肝经咳嗽。"多因木气怫郁，肝火刑金，或肝经少血，肝气亏损，木燥火生所致。《校注医醇剩义·咳嗽》："肝经之咳，痰少胁痛，易怒头眩，丹青饮主之。"《丹溪心法·咳嗽》："嗽而胁下痛，宜疏肝气，以青皮挟痰药，实者白芥子之类，在后以二陈汤加南星、香附、青黛、青皮、姜汁。"亦可用泻青各半汤、柴胡饮子、加味逍遥散等方。参咳嗽条。

肝咳 病证名。①指咳则两胁痛，甚则不可以转动者。《素问·咳论》："肝咳之状，咳则两胁下痛，甚则不可以转，转则两胠下满。"治用小柴胡汤、泻青各半汤、枳壳煮散加减。参肝经咳嗽条。②十咳之一。《诸病源候论·咳嗽诸病候》："四曰肝咳。咳而引胁下痛是也。"治宜刺足太冲。参十咳、咳嗽条。③五嗽之一。见《三因极一病证方论》卷十二。参五嗽条。

肝胃气痛 病证名。见《柳选四家医案·环溪草堂医案》。指情志郁结，肝气犯胃所致的胃痛。《类证治裁·胃脘痛》："因肝乘胃而脘痛者，气冲胁胀，当辛酸制木，吴萸、白芍、青皮、木瓜、厚朴、延胡、金橘。"参胃气痛、气郁脘痛条。

肝胆郁 郁证之一。《类证治裁》卷三："肝胆郁，血燥结核。加味逍遥散。若馋杂吞酸，逍遥合左金汤。"参五脏郁证条。

肝逆头痛 病证名。指肝气上逆所致的头痛。《素问·脏气法时论》："肝病者，……气逆则头痛，耳聋不聪，颊肿。"《证治准绳·头痛》："怒气伤肝及肝气不顺上冲于脑，令人头痛。"症见头痛目眩、耳聋，颊赤，胁肋胀痛，脉弦等。治宜疏肝降逆为主，用沉香降气散、苏子降气汤、小柴胡汤、养正丹等方。参肝阳头痛、气逆头痛条。

肝绝 五脏绝候之一。❶指肝气绝出现的危重脉证。《华氏中藏经》卷上："面白，无左关脉者，肝绝也。"《注解伤寒论·辨脉法》："唇吻反青，四肢紫习者，此为肝绝也。"《脉经》卷四："病人肝绝八日死，何以知之？面青，但欲伏眠，目视而不见人，汗（一作泣）出如水不止（一日二日死）。"❷指中风脱证之一。《医林绳墨·中风》："眼合直视者，肝绝也。"（《医宗必读·真中风》作眼合肝绝）。参中风脱证条。

肝损 五脏虚损之一。又称损肝。《难经正义》："肝藏血而主怒，怒则伤肝，肝损者宜缓其中，即经所谓肝苦急，急食甘以缓之之义。"《难经·十四难》："四损损于筋，筋缓不能自收持。"《杂病源流犀烛·虚损劳瘵源流》："损肝伤筋，筋缓不收，急当缓中，宜牛膝丸、八味丸。"参虚损条。

肝热自汗 自汗证之一。《证治汇补·汗病章》："肝热自汗，口苦，多眠。"治宜清肝为主，用逍遥散加减。参自汗条。

肝热证 证名。《素问·痿论》："肝热者，色苍而爪枯。"又"肝气热，则胆泄口苦。"《医碥·发热》："恚怒不发，止自摧抑，则肝气不宣，郁而成热，妇人最多此证。证见胸胁胀痛，或飧泄，面青，手足冷，太息不乐，脉沉弦。木郁则达之，宜逍遥散。"《证治准绳·杂病》："肝热者，按之肌肉之下至骨之上，乃肝之热，寅卯间尤甚。"肝热有虚实之分，参肝火、肝实热、肝虚热条。

肝热病 指肝受邪热所致的病症。《素

问·刺热篇》："肝热病者，小便先黄，腹痛，多卧，身热，热争则狂言及惊，胁满痛，手足躁，不得安卧。"

肝热淋症　病名。指淋症因肝火阻滞下焦所致者。见罗应章《经验医库·溲淋》。症见小便淋漓，溺出痛如刀割，或见阴肿，心烦，脉细数。宜用止痛四物汤。参淋条。

肝热痿软　病证名。指恼怒伤肝，肝气怫郁，木燥火生，筋膜干急所致的痿症。《症因脉治》卷三："肝热痿软之症，汁溢口苦，两胁攻刺作痛，筋膜干急，筋缩而挛，此《内经》肝热痿弱之症也。"治宜疏肝理气，滋水涵木，舒筋活络等法，可用清肝顺气饮、家秘肝肾丸、补肝丸、舒筋活络丹等方。参痿、筋痿条。

肝积　五积之一。《难经·五十四难》："肝之积名曰肥气。"《脉经·平五脏积聚脉证》："诊得肝积脉弦而细，两胁下痛，邪可起心下，足肿寒，胁痛引少腹，男子积疝，女子瘕淋，身无膏泽，喜转筋，爪甲枯黑。"治宜大七气汤煎熟待冷却，以铁器烧通红，以药淋之，乘热服，兼吞肥气丸（见《证治准绳·杂病》）。参肥气条。

肝脏中风　亦称肝中风。泛指风邪入中于肝发生的症候。《太平圣惠方·治肝脏中风诸方》："夫肝中风者，是体虚之人，腠理开疏，肝气不足，风邪所伤也。其候筋脉拘挛，手足不收，厉风入肝，坐踞不得，胸背强直，两胁胀满，目眩心烦，言语謇涩者，是肝中风候也。"参肝中风条。

肝病　病名。指肝脏的各种病证。有寒热虚实之分。肝为刚脏，性喜条达，藏血，开窍于目，肝病多由七情所伤，肝气郁结，气郁化火，肝络瘀阻，或肝阳偏亢，肝风内动，以及肝经湿热，寒滞肝脉等所致。《素问·藏气法时论》："肝病者，两胁下痛引少腹，令人善怒，虚则目晾晾无所见，耳无所闻，善恐，如人将捕之。"《难经·十六难》："假令得肝脉，其外证善洁，面青，善怒，其内证齐左动气，按之牢若痛，其病四肢满闭，癃溲便难，转筋，有是者肝也。"《脉经》卷六："肝病，其色青，手足拘急，胁下苦满，或时眩冒。"《仁斋直指附遗方论》卷二："肝病，面青筋急，多怒，目痛，目闭不欲见人，脐左动气。"《太平圣惠方·肝脏论》："夫肝虚则生寒，寒则苦胁下坚胀，寒热，腹满，不欲饮食，悒悒情不乐，如人将捕之，视物不明，眼生黑花，口苦，头疼，关节不利，筋脉挛缩，爪甲干枯，喜悲恐，不得太息，诊其脉沉细滑者，此是肝虚之候也。"又："肝实则生热，热则阳气盛，致心下坚满，两胁痛引小腹，忿忿如怒，气逆头眩，为血有余，即目痛，眼眥赤，生瘪肉，阳毒所致，悒悒先寒而后热，颈直背强，筋急，不得屈伸，诊其脉浮大而数者，此是肝气实也。"《杂病源流犀烛·肝病源流》："其性条达而不可郁，其气偏于急而激暴易怒，故其为病也多逆，逆则头痛，耳聋，颊肿，目瞑，两胁下痛引少腹，善怒，善痿，四肢满闷。……经病则腰痛不可俯仰，丈夫疝癀，妇人少腹肿，甚则嗌干，面尘，色脱，遗溺，癃闭，其郁与胜，必侵及乎脾，脾受木邪，则胸满，呕逆，飧泄。总而计之，其为寒热虚实邪气侵克，本经自病与经气相加种种诸症。"《本草纲目·脏腑虚实标本用药式》："肝藏血属木，胆火寄于中，主血，主目，主筋，主呼，主怒。本病，诸风眩运，僵仆强直，惊痫，两胁肿痛，胸胁满痛，呕血，小腹疝痛，痃瘕，女人经病。标病，寒热疟，头痛，吐涎，目赤，面青，多怒，耳闭，颊肿，筋挛，卵缩，丈夫癫疝，女人少腹肿痛阴病。"治宜疏肝理气，平肝泻火，活血通络，养血柔肝，潜阳熄风等法。参肝病各条。

肝疸　病名。九疸之一，见《诸病源候论·黄病诸候》。由饮食过度，醉酒劳伤，脾胃有瘀热所致。症见身面发黄，胃热饮水多，治宜秦王散等方。《辨证奇闻》载述肝

疸由肝气郁结，湿热不散引起。症见面目四肢尽黄，而以两目为甚，气逆，手足发冷，腰以上汗出不止。治法以疏肝解郁、分利湿热为主，方用利肝分水散。参黄疸有关条。

肝著 病名。指胸痛时每欲蹈压，初起常喜饮热之症。多因邪气留着，肝脏气血滞而不畅，上逆于肺所致。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证治》："肝著，其人常欲蹈其胸上，先未苦时，但欲饮热，旋复花汤主之。"有因肝虚所致者。《证治准绳·杂病》："肝着则常欲蹈压其胸。经云春脉如弦，其气不实而微，此谓不及，令人胸痛引背，下则两胁胀满，此肝虚而其脉证见于春如此也，宜补肝汤。"亦有因劳怒所致。《临证指南医案·胁痛》："肝著，胁中痛，劳怒致伤气血。川楝子皮、炒延胡、归须、桃仁、生牡蛎、桂枝木。"

肝黄 三十六黄之一。《太平圣惠方》卷五十五："肝黄者，面色青，四肢拘急，口舌干燥，言语蹇涩，面目不利，爪甲青色，若背上浮肿，腹胁胀满者难治。"治用烙法及柴胡散、犀角散等方。《圣济总录》卷六十一："病人齿黄，目如丹赤，口燥热渴，气力虚劣，身体青黄，即是肝黄。"治用灸烙法或土浆方及知母汤等。参黄疸有关条。

肝虚汗 证名。见《中国医学大辞典》。指肝虚而致自汗之证。《杂病源流犀烛·诸汗源流》："由肝虚而汗，则必禁其疏泄，宜白芍汤。"参自汗条。

肝虚证 证名。指肝虚所出现的证候。《脉经》卷二："肝虚，……病苦胁下坚，寒热，腹满，不欲饮食，腹胀，悒悒不乐，妇人月经不利，腰腹痛。"《圣济总录》卷四十一："肝虚之状，其病面青，善洁善怒，脐左有动气，按之牢若痛，不欲饮食，悒悒不乐，恐惕如人将捕之。"《本草经疏》："肝虚十证。胸胁痛，属肝血虚，肝气实，因而上逆；转筋属血虚；目光短，属肝血虚，有热兼肾水真阴不足；目翳，属肝热，兼肾水不足；亡血过多，角弓反张，属肝血虚有热；少腹连阴作痛，按之则止，属足厥阴经血虚；偏头痛，属血虚，肝象有热，不急治之，久必损目；目黑暗眩晕，属血虚，兼肾水真阴不足；肥气属气血两虚，肝气不和，逆气与瘀血相并而成。"方用沉香煎丸、茇拨丸等。参肝病，肝虚寒等条。

肝虚胁痛 证名。指肝气虚或阴血不足，筋脉失养所致的胁痛。《医学入门·胁痛》："虚者，肝血虚也，痛则悠悠不止，耳目眩瞤，善恐如人将捕，五物汤加柴胡梢，或五积散去麻黄加青木香、青皮。"《金匮翼·肝虚胁痛》："肝虚者，肝阴虚也，阴虚则脉绌急，肝之脉贯膈布胁肋，阴虚血燥，则经脉失养而痛，其症胁下筋急，不得太息，目昏不明，爪枯色青，遇劳即甚，或忍饥即发者是也，滑氏补肝散。"《医钞类编·胁痛门》："肝气不足，两胁下痛，筋急不得太息，四肢厥冷，心腹痛，目不明了，爪甲枯，口面青，宜补肝汤。"《嵩崖尊生书》卷七："肝虚胸痛引胁背，宜补肾六味丸加牛膝、首乌。"参胁痛条。

肝虚热证 证名。《杂病源流犀烛·虚损痨瘵源流》："肝热，按至肌肉之下，骨之上乃得，肝主筋也，寅卯时尤甚。必兼多怒多惊，便难，转筋挛急，四肢困热，满闷，筋痿不能起，头痛，耳聋，……冒眩，多癫。"治宜养肝清热为主。可用柴胡饮子等方。参劳热条。

肝虚寒证 证名。指素体阳虚，肝脏亏损所出现的证候。《备急千金要方》卷十一："病苦胁下坚，寒热，腹满不欲饮食，腹胀，悒悒不乐，妇人月经不利，腰腹痛，名曰肝虚寒也。"《三因极一病证方论·肝胆经虚实寒热证治》："肝虚寒，两胁满，筋急，不得太息，寒热，腹满，不欲饮食，悒悒不乐，四肢冷，发抢心腹痛，目视眩眩，或左胁偏痛，筋痿，脚弱。"治宜补肝为主，参以温通。选用补肝汤、补肝细辛散、防风补

煎、加减六君子汤等方。

肝厥　厥证之一。因肝气厥逆上冲所致的厥证。《证治汇补·眩晕》："肝厥之证，状如痫疾，僵仆不惺，惺则呕吐，头眩发热。宜二陈汤加柴胡、枳壳、甘菊、勾藤、干葛、山栀、生姜。"勾藤散、石膏汤等方均可选用。参厥证条。

肝遗　指肝病而致遗精的病症。《医宗必读》卷九："肝病而遗者，色青而筋痿。"《张氏医通》载"肝热胆寒"遗精，用温胆汤加人参、茯神、枣仁、莲肉治疗。参遗精、五脏遗精条。

肝痨　病名。❶即肝劳。详该条。❷《慎柔五书》以虫在于肝则成肝痨。治以五凤丸等方。

肝痫　病名。出《备急千金要方》卷五。可表现为多种症状。《医学入门·痫》："肝痫，面青，摇头，喜惊，作鸡鸣状。"《景岳全书》卷四十一："面青唇青，两眼上窜，手足挛掣反折，其声如犬者曰肝痫。"《医林绳墨》卷六以痫症因怒而起，怒不得越，痰涎壅盛，口多喊叫，面青目瞪，右胁作疼而中气作闷者为肝痫。参痫、五脏痫条。

肝蒸　二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

肝痿　证名。指筋痿。《医宗必读·痿》："肝痿者，筋痿也。"详筋痿条。

肝痹　病名。由筋痹发展而成。亦有称为筋痹者。《素问·痹论》："肝痹者，夜卧则惊，多饮数小便，上为引如怀。"《圣济总录·诸痹》："肝痹。……肝之合，筋也。故筋痹不已，复感于邪，则舍于肝也。"《症因脉治·肝痹》："肝痹之症，即筋痹也。夜卧则惊，多饮数小便，腹大如怀物，左胁凝结作痛。"可用薏仁汤，人参散，蕈蘑丸，补肝汤，泻青丸，柴胡疏肝散，逍遥散等方。肝痹亦可由肺痹传变而来。《素问·玉机真藏论》："今风寒客于人，使人毫毛毕直，皮肤闭而为热，当是之时，可汗而发也；或痹不仁肿痛，当是之时，可汤熨及火灸刺而去之；弗治，病入舍于肺，名曰肺痹，发咳上气；弗治，肺即传而行之肝，病名曰肝痹，一名曰厥，胁痛出食，当是之时，可按若刺耳。"参筋痹条。

肛门痒痛　证名。又称肛头痒痛。《杂病源流犀烛·脱肛源流》："肛门痒痛，湿与火病也。大肠有湿，流注于肛门，则作痒。宜秦艽羌活汤。甚或生虫，其痒难当，治法与虫痔相同。宜神应黑玉丹、扁蓄汤；外以苦楝根煎汤熏洗。大肠有火，郁闭不宣，则肛门作痛。宜七圣丸、芜白丸。"参肛头痒痛条。

肛头痒痛　证名。又称肛门痒痛。指肛门作痒或痛。多因大肠湿热风邪流注或因虫扰所致。《类证治裁·脱肛》："肛头痒，朴硝煎汤熏洗。"又："肛头痒痛，风湿火兼病也。大肠受湿，流注肛头，则作痒，秦艽羌活汤；得风与湿热，则生虫而痒，神应黑玉丹、萹蓄汤，外以苦楝根煎汤洗；若虫蚀其肛，则上唇有疮，化虫丸；大肠有火，则肛门作痛，七圣丸、秦艽白术丸；甚或便燥，肠头努出，下血，当归郁李仁汤。"本证可见于肛管疾病、蛲虫病等。参谷道痒、肛门痒痛等条。

肚胀　即腹满。《伤寒明理论》卷一："腹满者，俗谓之肚胀是也。"详腹满条。

肚癌　病名。即食癌的俗称，见《证治准绳·杂病》。详心癌、食癌条。

肘热　证名。指肘部或肘前、后有发热感觉。《灵枢·论疾诊尺》："肘所独热者，腰以上热；……肘前独热者，膺前热；肘后独热者，肩背热。"《类经》五卷："肘前，内廉也，手三阴之所行，故应于膺前；肘后，外廉也，手太阳之所行，故应于肩背。"参发热条。

肘挛　证名。指肘关节拘挛，难以屈伸。《灵枢·经脉》："手少阳之别，……病实则肘挛。"马莳注："邪气有余而实则为肘

挛。”参挛、拘挛条。

肠风 病名。《素问·风论》：“久风入中，则为肠风、飧泄。”系指一种以便血为主症的疾病。后世用其名而含义不一。❶指大肠久积风冷所致的便血。《太平圣惠方》卷六十：“大肠中久积风冷，中焦有虚热，……风冷热毒，搏于大肠，大肠既虚，时时下血，故名肠风也。”可用卷柏散、内补散等方。❷泛指内痔、外痔、举痔、脱肛、肛瘘出血。《世医得效方·大方脉杂医科》：“槐角圆治五种肠风泻血：粪前有血名外痔；粪后有血名内痔；大肠不收名脱肛；谷道四面弩肉如奶名举痔，头上有孔名瘘。”❸指因风邪而便纯血鲜红的病症。《三因极一病证方论》亦称为风利。《证治汇补·下窍门》：“或外风从肠胃经络而入害，或内风因肝木过旺而下乘，故曰肠风。”其症便前出血如注，颜色鲜红，肛门不肿痛，或见腹痛、肠鸣。外风可选用槐角丸或柏叶汤；内风宜选用胃风汤或人参胃风汤。❹指以湿热为主因的下血。《杂病源流犀烛·诸血源流》：“肠风者，肠胃间湿热郁积，甚至胀满而下血也。宜槐花散，或四物汤加阿胶、山栀、地榆。而其条分缕判，则有风入大肠，留滞不散，挟湿而成者，宜加减四物汤；有阴分虚，血不循经而成者，宜四物汤、地榆散合用。”参便血有关条。

肠风下血 病名。见《太平圣惠方》卷六十。即肠风，详该条。

肠红 证名。见《鸡鸣录·后阴病》。指大便出血。可因湿毒瘀热留注大肠或脾阳不振，统摄失司所致。湿蒸热毒，多见下血鲜红；瘀热留注，多见血块紫殷。治宜清热化湿，和营消瘀，选用地榆散、芍药汤等方。脾失统摄，多见血出稀淡，脘痞腹胀，难于饮食，舌淡苔白，脉形沉细等，治宜健脾温中，选用黄土汤、归脾汤等方。亦有因痔疾所致者。可选用罗汉散，用参三七或红枣，或稻根须煎汤调服。参便血有关条。

肠鸣 证名。出《素问·藏气法时论》。又称腹鸣。《张氏医通·大小府门》：“《内经》肠鸣有五。一曰脾虚。经云，脾虚则腹满肠鸣，飧泄，食不化。枳实理中汤加木香。二曰中气不足，肠为之苦鸣。六君子汤加木香。三曰邪在大肠。经云，肠中雷鸣，气上冲胸，邪在大肠。半夏泻心汤。四曰土郁。经云，土郁之发，肠鸣而为数后是也。平胃散加半夏、木香、茯苓。五曰热胜。经云，少阳在泉，热淫所胜，病腹中肠鸣，气上冲胸。葶苈木香散。《金匮》云，腹中寒气，雷鸣切痛，胸腹逆满呕吐，附子粳米汤。东垣云，如胃寒泄泻，肠鸣，于升阳除湿汤中加益智、半夏各五分，生姜、大枣和煎。丹溪云，腹中鸣者，病本于胃，乃火激动其水也。二陈加芩、连、山栀；不应，用胃苓汤加减。肺移寒于肾，为涌水。涌水者，按腹不坚，水气客于大肠，疾行则鸣，濯濯如囊裹浆水之病也。葶苈丸加木香。”

肠泻 病证名。《医林绳墨·泄泻》：“肠泻则疼，或腹痛肠鸣，痛一阵而泻一阵也。此由脾气不利，阴寒留滞。宜以升提其气，又兼温而养之。”参泄泻、脾泻条。

肠垢 证名。指大便时排出的腐浊垢腻物质。多因湿热邪毒郁滞肠道所致。《诸病源候论·痢病诸候》：“肠垢者，肠间津汁垢腻也。”便肠垢，可见于热痢、协热利等。《杂病源流犀烛·痢疾源流》：“其冷热蕴结肠胃间，滑泄垢腻者，名肠垢，即为热痢，宜芩连芍药汤。”《伤寒捷诀·肠垢鹜溏》：“凡伤寒自利，有因三阳传阴经而下利者，为协热利，协热利者，曰肠垢，脐下必热，宜黄芩汤、葛根汤主之。”参便肠垢、热痢、协热利等条。

肠痈腹痛 病名。指肠生痈肿所致腹痛者。《症因脉治·腹痛论》：“肠痈腹痛之症，缩脚皱眉、小便为淋，痛有肿处，手不可按，夜来每发寒热，或绕脐生疮，或腹皮紧急，肌肤甲错，或时时出汗，此肠痈腹痛

之症也。”多因膏粱厚味，蕴积肠胃，或劳动跌仆，损伤气血，或六淫之邪内伏，或恼怒郁结，气血凝聚所致。治宜清热解毒，活血排脓。将成脓者，四圣散；已有脓者，薏苡仁汤；内蓄血者，大黄牡丹皮汤、桃仁承气汤。本证可见于急性阑尾炎、阑尾周围脓肿等。参腹痛条。

肠蛊痢　病名。指痢下赤白或纯下瘀血而连年不愈者。《诸病源候论·痢病诸候》：“肠蛊痢者，冷热之气入在肠间，先下赤，后下白，连年不愈，侵伤于藏府，下血杂白，如病蛊之状。”《千金要方》卷十五：“蛊则纯痢瘀血。”参蛊注痢条。本病可见于慢性细菌性及阿米巴痢疾，及慢性血吸虫病、慢性非特异性溃疡性结肠炎等。

肠覃　古病名。指女子腹腔内有块，始如鸡卵，渐至如怀子之状，其块按之则坚，推之则移，月事仍以时下的病症。《灵枢·水胀》：“寒气客于肠外，与卫气相搏，气不得荣，因有所系，癖而内着，恶气乃起，瘜肉乃生。其始也，大如鸡卵，稍以益大，至其成，如怀子之状，久者离岁，按之则坚，推之则移，月事以时下，此其候也。”《证治准绳·杂病》：“此气病而血未病，故月事不断，应时而下。本非胎娠，可以此为辨矣。”治用晞露丸。木香通气散、香粉丸等。参癥瘕、积聚等条。

肠痈　病名。《备急千金要方》卷五：“肠痈之为病，不动摇。”参痈条。

肠痹　病名。指大、小肠的气机痹阻，导致多饮而小便不利或飧泄的病症。《素问·痹论》：“肠痹者，数饮而出不得，中气喘争，时发飧泄。”治宜利尿健脾为主。选用五苓散、吴茱萸散、木香丸等方。

肠澼　古病名。出《素问·通评虚实论》。❶指痢疾。“澼”指垢腻粘滑似涕似脓的液体，因自肠排出，故称肠澼。《景岳全书》卷二十四：“痢疾一证，即内经之肠澼也。”❷指便血。《古今医鉴》卷八：“夫肠澼者，大便下血也。”参痢疾、便血等条。

肠澼下血　病证名。指肠澼（痢疾古称）所致的便血。《脾胃论·肠澼下血论》：“肠澼者，为水谷与血另作一派，如涌桶涌出也。”详痢疾、血痢条。

肠癫　病名。见《备急千金要方》卷二十四。阴癫之一。即疝气，俗称小肠气。《三因极一病证方论》卷十四：“因房室过度，元脏虚冷，肠边脂系不收，坠入癫中，上下无定，谓之肠癫，属不内外因。”治宜茱萸内消丸等方。参疝气条。

角弓反张　证名。《诸病源候论·风病诸候》：“风邪伤人令腰背反折，不能俯仰角弓者，由邪入诸阳经故也。”因项背强直，使身体向后反折如角弓状，故名。多见于痉，破伤风等病症。参痉、破伤风条。

角弓痧　痧证之一。《杂病源流犀烛·痧胀源流》：“角弓痧，心胸胀极，痧毒内攻，故头项向上，形如角弓反张，是脏腑已坏死症也。然反复试验，又得一治法，胸腹胀闷，自不必言，身难转侧，或手足拘挛，不能屈伸，有时踡缩，有时反张，急将毛青布一块蘸油烧，抹其手足拘急处，再口含火酒，喷其通体，少顷，定觉舒展松动，然后用药，或可回生。”宜宝花散、三香散等方。参痧条。

狂　病名。指精神躁狂失常的病证。出《灵枢·癫狂》。多因七情过度，五志化火，痰蒙心窍或因热盛邪入心包所致。症见发作刚暴，骂詈不避亲疏，甚者持刀持杖，登高而歌，弃衣而走，踰垣上屋，力大倍常；或多食，或卧不知饥，妄见妄闻，妄自尊大，妄走不止，日夜无休等。脉弦滑数或沉紧而实等。《景岳全书》卷三十四：“当以治火为先，而或痰或气，察其甚而兼治之。若止因火邪而无胀闭热结者，但当清火，宜抽薪饮、黄连解毒汤、三补丸之类主之。若水不制火而兼心肾微虚者，宜硃砂安神丸，或服蛮煎、二阴煎主之。若阳明火盛者，宜白虎

汤、玉泉散之类主之。若心脾受热，叫骂失常，而微兼闭结者，宜清心汤、凉膈散、三黄丸、当归龙荟丸之类主之。若因火致痰者，宜清膈煎、抱龙丸、生铁落饮主之，甚者宜滚痰丸。若三焦邪实热甚者，宜大承气汤下之。若痰饮热壅闭，气道不通者，必须先用吐法，并当清其饮食。此治狂之要也。”《医林改错》卷下：“癫狂一症，哭笑不休，詈骂歌唱，不避亲疏，许多恶态，乃气血凝滞脑气，与脏腑气不接，如同作梦一样。”宜癫狂梦醒汤等方。本病症可见于狂躁性精神病、中毒性精神病、反应性精神病及癔病等。参癫狂条。

狂汗 证名。见《温疫论》。是瘟疫、温热病欲作汗解时的症候。多见于体质充盛之人，阳气冲击，不能顿开，故忽然狂躁，坐卧不安，少时大汗淋漓，邪从汗解，脉静身凉而愈。

狂越 证名。指神志失常而狂乱无定。《素问·至真要大论》：“诸躁狂越，皆属于火。”参狂条。

卵胀 病名。见《备急千金要方》卷二十四。阴癫之一。即疝气，俗称小肠气。《三因极一病证方论》卷十四：“病者劳役无节，及跨马坐车，致卵核肿胀，或偏有大小，上下无常，名曰卵胀。亦属不内外因。”治宜蒺藜汤等方。参疝气条。

卵缩 证名。指睾丸上缩之证。多因足厥阴肝经病变所致。《灵枢·经脉》：“足厥阴气绝则筋绝。厥阴者，肝脉也。肝者筋之合也。筋者，聚于阴器而络于舌本也。故脉弗荣则筋急，筋急则引舌与卵，故唇青舌卷卵缩，则筋先死。”又称囊缩。属阴缩范畴。详阴缩、囊缩条。

饭醉 证名。又称食后昏困。指饭后昏倦欲睡之症。《杂病源流犀烛·不寐多寐源流》：“食方已，即困倦欲卧，脾气弱，不胜食气也，俗名饭醉。宜六君子汤加山楂、神曲、麦芽。”参食后昏困、嗜卧等条。

饮 ❶病名。饮证的总称。出《素问·至真要大论》。《金匮要略·痰饮咳嗽脉证并治》：“夫饮有四，何谓也？师曰：有痰饮，有悬饮，有溢饮，有支饮。”《诸病源候论·痰饮病诸候》：“诸饮者，皆由荣卫气否涩，三焦不调，而因饮水多停积而成痰饮。”《证治汇补》卷二：“饮分各经，在心则怔忡眩晕，在肺则喘急咳嗽，在脾则短气痞满，在肝则胁满嘘痛，在肾则脐下悸动，在上则面浮，在下则跗肿，在胃中则胸满口渴而水入即吐，在经络则一臂不遂而复移一臂，在肠间则雷鸣泄泻或为溺结与癃闭相似，在阳分不去，久则化气与黄肿相似，在阴分不去，久则成形与积块相似，在左胁者形同肥气，在右胁者形同息贲。”治疗初宜分消为主，次宜调养，虚宜温中，久宜暖肾。参见悬饮、溢饮、痰饮等条。❷方剂剂型之一。如甘露饮、香薷饮等。❸饮食水谷之总称。如《素问·经脉别论》：“饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行。”

饮气嗽 病证名。指咳嗽由水气凌肺引起者。《外台秘要》卷九：“饮气嗽者，由所饮之物，停澄在胸，水气上冲，冲入于肺，肺得此气，便成嗽。久而不除，渐成水气。”又：“饮气嗽经久不已，渐成水病。其状亦不限四时，昼夜嗽不断，遇诸动嗽物，便致困剧，甚者乃至双眼突出，气即欲断，汗出，大小便不利，吐痰饮涎沫，无复穷限，气上喘急肩息，每旦眼肿不得平眠，有如此者宜合细辛等八味汤、葶苈子十五味丸。”参痰饮咳嗽、咳嗽条。

饮心痛 病证名。指水饮，痰涎上乘于心所致的心痛。见《备急千金要方》卷十三。亦称停饮心痛。《诸病源候论·心病诸候》：“心痛而多唾者，停饮乘心之络故也。”《杂病源流犀烛·心病源流》：“曰饮，必恶心烦闷，时吐黄水，甚则摇身作水声，由伤水饮，痰涎积聚也。宜小胃丹、胃苓汤。热饮

加黄连、甘遂，寒饮加肉桂、茯苓、苍术、半夏。水饮流注胸膈痛，宜三花神佑丸。”《医学从众录·心痛》：“痰痛即饮痛，脉滑，咳嗽，其痛游走无定，宜二陈汤加干薤白五钱、瓜蒌皮二钱主之。”《医学心悟·心痛》：“饮痛者，水饮停积也，干呕吐涎，或咳，或噎，甚则摇之作水声，脉弦滑，小半夏加茯苓汤主之。”亦可用桂朴汤、枳壳汤、旋复花汤等方。参心痛、停饮心痛条。

饮后即便 证名。见《杂病源流犀烛·小便闭癃源流》。由于精气衰耗，不能输于脾、归于肺所致。其症饮入立觉至脐，即欲小便。宜用补中益气汤等方。

饮泻 病名。又称溢饮滑泄。《医宗金鉴·杂病心法要诀》：“渴而饮，饮而泻，泻而复渴，渴而复饮，饮而复泻，饮泻也。”详溢饮滑泻条。

饮食中毒 病名。泛指误食含有毒性金属盐类的食物、毒蕈、有毒鱼类及其他毒物污染的食物而发生中毒症状者。《诸病源候论·诸饮食中毒候》：“凡人往往因饮食忽然困闷，少时致甚，乃至死者，名为饮食中毒。”参食河豚鱼中毒、食蟹中毒、食诸肉中毒、食六畜肉中毒、食诸鱼中毒、饮酒中毒、食蕈菌中毒等条。

饮食内伤痢 病名。见《症因脉治》卷四。即积痢。详该条。

饮食汗 证名。指饮食后随即汗出，甚至汗下如雨。多因正虚胃热所致。《证治汇补·汗病章》：“饮食汗者，因正气空虚，反为饮食慄悍之气所胜，故食入汗出。”治宜安胃汤、二甘汤等方。

饮家 指素患水饮的病人。《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证治》：“先渴后呕，为水停心下，此属饮家。”

饮酒中毒 病名。俗称醉酒。即酒精中毒。见《诸病源候论·饮酒中毒候》。因饮酒过量，酒毒溃于脾胃，流溢经络所致。症初起则脸面潮红，兴奋多语，头痛眩晕，时悲时喜；继则烦乱呕吐，步态不稳，或壮热烦渴，或恶寒呻吟；甚者吐利不安，神智不清，昏睡不醒，二便失禁，抽搐，直至死亡。《证治汇补·伤酒》：“轻者，头痛眩晕，呕吐痰逆，神昏烦乱，胸满恶心，饮食减少，小便不利；甚者，大醉之后，忽然战栗，手足厥冷，不省人事，名曰酒厥。”症轻者可不必治疗，症剧者宜中西医结合救治。中药解酒可用竹茹、葛根、枳椇子、砂仁、柑皮、黑豆、黄连、石膏、豆蔻等，方选葛花解醒汤、枳椇子丸等。

饮酒发热 证名。指因饮酒而致的发热。亦可因误服药酒导致。《诸病源候论·解散饮酒发热候》：“服散而积饮酒，石因酒势而盛，敷散经络，故烦而发热也。”《丹溪心法》：“因酒发热用青黛、瓜蒌仁，入姜汁。”《儒门事亲·酒食不消散》：“宿酒不散，亦同伤寒，身热恶寒、战栗、头项痛、腰脊强及两手脉沉。不可用双解。止可用导饮丸五六十丸，量虚实加减。”参发热条。

饮痫 病名。《奇效良方》卷六十四：“饮痫为病，此患吃食不知饱，忽然连三五日不甚思食，手足搐动，多自梦寐中作，食之太饱，亦便发作。”参痫、食痫、五痫条。

饮痰 痰证之一。因痰饮留于四肢、膈上或胁下所致。见《赤水玄珠》卷六。《不居集》卷十七：“饮痰，停于膈上，一臂不遂，时复转移一臂，蓄于胁下，胁痛干呕，往来寒热。”《张氏医通》卷四：“饮痰成呕吐，胁痛，四肢不举。”治宜攻逐痰饮为主。方用小胃丹、指迷茯苓丸、导痰汤等。参痰证条。

饮瘧 病名。心瘧的俗称。《证治准绳·杂病》：“心瘧，亦痰饮所致，俗名饮瘧。”详心瘧条。

饮癖 病名。指水饮停聚胁下日久所致的癖病。《诸病源候论·癖病诸候》：“饮癖者，由饮水过多，在于胁下不散，又遇冷气相触而痛，即呼为饮癖也。其状胁下弦急，

时有水声。”《类证治裁·痰饮》：“饮癖，呕酸，馋杂，心悬如饥。”《张氏医通·积聚》：“有饮癖，积成块，在胁腹之间，病类积聚，用破块药多不效，此当行其饮，六君子合五苓散最妙，更加旋复、前胡、枳实、白芍，即海藏五饮汤。”控涎丹、三圣丸、苍术丸等亦可选用。参癖、痰饮有关条。

娩逆 病证名。即呃逆。又称咳逆。《赤水玄珠·咳逆》：“咳逆古谓之娩逆。”详见呃逆条。

〔丶〕

忧气 七气之一。《诸病源候论·七气候》：“忧气，则不可极作，喜卧不安席。”参七气、九气条。

忧伤 指忧愁过度所致的疾患。《医醇賸义·忧伤》：“忧愁太过，忽忽不乐，洒淅寒热，痰气不清，萱草忘忧汤主之。”参忧郁条。

忧郁 情志三郁之一。多因悲忧过度所致。《景岳全书·杂证谟》：“若忧郁病者，则全属大虚，本无邪实。……盖悲则气消，忧则气沉，必伤脾肺；惊则气乱，恐则气下，必伤肝肾。此其戚戚悠悠，精气但有消索，神志不振，心脾日以耗伤。凡此之辈，皆阳消证也。”“忧郁内伤之治，若初郁不开，未至内伤而胸膈痞闷者，宜二陈汤、平胃散，或和胃煎，或调气平胃散，或神香散，或六君子汤以调之。若忧郁伤脾而吞酸呕恶者，宜温胃饮或沉香散。若忧郁伤脾肺而困倦怔忡，倦怠食少者，宜归脾汤或寿脾煎。若忧思伤心脾，以致气血日消，饮食日减。凡食日削者，宜五福饮、七福饮，甚者大补元煎。”参情志三郁、七情郁证、内郁条。

忧膈 五膈之一。见《肘后备急方》卷四。《诸病源候论·五膈气候》：“忧膈之病，胸中气结烦闷，津液不通，饮食不下，羸瘦不为气力。”参五膈条。

忧噎 五噎之一。出《诸病源候论·否噎病诸候》。其症天气阴寒时心下悸动，手足不能自温等。治用五噎丸、五噎散、沉香散。参五噎、噎条。

忪（zhong 中）悸 即心悸怔忡。《证治要诀》卷九：“忪悸者，本无所惊，常心忪而自悸。”详心悸、怔忡条。

间日子母 间日疟的俗称。见《医略十三篇》卷九。详子母疟条。

间日疟 疟疾之一。见《诸病源候论·疟病诸候》。《素问·疟论》：“其间日而作者何也？岐伯曰：其气之舍深，内薄于阴，阳气独发，阴邪内著，阴与阳争不得出，是以间日而作也。”“其间日发者，由邪气内薄于五脏，横连募原也。其道远，其气深，其行迟，不能与卫气俱行，不得皆出，故间日乃作也。”治用小柴胡汤、清脾饮加常山、常山酒等。参疟疾条。

闷痧 痧证之一。《痧胀玉衡·闷痧》：“痧毒冲心，发晕闷倒地，一似中暑、中风，人不知觉，即时而毙。此痧之急者，如略有苏醒，扶起放痧，不愈，审脉服药施治。如发晕不醒，扶之不能起，必须审脉辨证的确，果系何因，先用药数剂灌醒，然后扶起放痧，渐为调治。”刮紫宫、膻中、中脘、中庭及刺间使、大陵穴。方用金花散、薄荷汤、藿香汤等。参痧条。

闷瞀 指心胸闷乱，眼目昏花之状。多属热证、实证。《素问·玉机真藏论》：“脉盛，皮热，腹胀，前后不通，闷瞀，此谓五实。”高士宗注：“闷，郁也；瞀，目不明也。”

冷气 病证名。指脏腑之气与寒冷相搏所致的疾患。《诸病源候论·冷气候》：“夫藏气虚，则内生寒也。气常行府藏，府藏受寒冷，即气为寒冷所并，故为冷气。其状或腹胀，或腹痛，甚则气逆上而面青手足冷。”《圣济总录·诸气门》：“冷气者，因寒冷搏于气所为也。……若人呼吸少气，胁肋刺痛，皮肤拘急，恶寒战栗，百节酸疼，咳嗽

声嘶，膈脘否塞者，冷气之为病也。”方用沉香丸等。参见气病条。

冷气心痛　病证名。出《外台秘要》卷七。因风邪宿冷伤及心之支脉所致。《圣济总录》卷五十六：“冷气心痛，……风邪冷气，伤于心之络脉，皆能致痛。若阳气偏虚，宿挟冷滞，又因饮食伤动，而致心痛，则其病喜温而恶寒，其气惨而不舒，甚者四肢厥冷，气攻心而发痛也。”治用高良姜汤等方。参心痛、冷心痛、寒厥心痛条。

冷风嗽　病证名。指受风冷即发喘嗽。《万病回春》卷四：“冷风嗽者，遇风冷即发痰多喘嗽是也。”治宜三拗汤、五拗汤等。参咳嗽条。

冷心痛　病证名。出《备急千金要方》卷十三。指因寒所致的心痛。症见心痛绵绵不休，喜暖喜按，肢冷，溺清不渴，脉迟微细。治宜温化为主。《杂病源流犀烛·心病源流》：“外受寒，当温散；内受寒，当温利；久则寒必郁，当疏解。总治宜术附汤。虚寒当温补，宜归脾汤加干姜、肉桂、菖蒲。肾寒乘心，痛则心悬如饥，泄利下重，宜五积散。寒气客背俞之脉，则血脉涩。血脉涩，则血虚，血虚则痛。其俞注于心，故相引而痛，宜桂枝四七汤、神效散。”参心痛、寒厥心痛、冷气心痛条。

冷水嗽　病证名。指饮冷伤肺所致的咳嗽。《不居集》卷十五：“冷水嗽，有饮冷水太过，伤肺致嗽，俗谓之凑肺，宜紫苑饮。”详凑肺咳嗽条。

冷汗　证名。又名柔汗。①见《类证活人书》卷四。又名阴汗。指多汗之属阴证者。多由阳气虚衰，阴寒相乘，以致汗冷肢冷，甚则身冷。《景岳全书·汗证》：“阴汗者，冷汗也。……所谓寒者，非曰外寒，正以阳气内虚，则寒生于中而阴中无阳，阴中无阳则阴无所主而汗随气泄，故凡大惊大恐大惧，皆能令人汗出，是皆阳气顿消，真元失守之兆，至其甚者则如病后产后，或大吐大泻失血之后，必多有汗出者，是岂非气去而然乎？”治宜益气、温阳等法。黄芪建中汤，甚者加附子。或参附汤、六味回阳饮等方。参见阴汗条。②指汗出而冷者，除阴证外，热极、痰证亦可见之。《医碥·汗》：“盖热聚于内，肌肤反冷，肤冷，故汗亦冷也。”因火邪亢极者，治宜如神白虎汤；相火旺盛者，宜知柏地黄汤。《证治准绳·杂病》：“有痰证冷汗自出者，宜七气汤或理气降痰汤，痰去则汗自止。”

冷劳　病名。指虚劳病之属虚寒者。《太平圣惠方·治冷劳诸方》：“夫冷劳之人，气血枯竭，表里俱虚，阴阳不和，精气散失，则内生寒冷也。”症见宿食不消，脘腹痞满积聚，脐腹疼痛，面色萎黄，口舌生疮，大便泄痢，手足逆冷，骨节疼痛，四肢无力，肌肉消瘦等。治宜温补。可用补骨脂散、茱萸茄散、獭肝散等方。参虚劳条。

冷呃　病证名。见《张氏医通·呃逆》。指因吸入冷气而立即发生的呃逆。《杂病源流犀烛·呃逆源流》：“故人有寻常并无疾病，或一张口而寒气相袭，立时发呃者，俗名之曰冷呃。”集中思想、迸气，连饮热茶，呃可自止。参呃逆条。

冷泄　病证名。指受寒伤冷所致的泄泻。又称冷泻、寒泄、寒泻。《素问·至真要大论》：“厥阴司天，风淫所胜，民病……冷泄，腹胀。”参寒泄、冷泻条。

冷泻　病证名。指外受风寒或内伤生冷所致的暴泻。陈德求《医学传灯》：“冷泻者，鼻吸风寒之气，口食生冷之物，皆能作泻，此暴病也。宜用香砂理中汤。”参寒泄、寒泻条。

冷热痢　病名。指痢疾因寒热挟杂而致者。《诸病源候论·痢病诸候》：“夫冷热痢者，由肠胃虚弱，宿有寒，而为寒热所伤，冷热相乘，其痢乍黄乍白是也。若热搏于血，血渗肠间，则变为血痢也；而冷伏肠内，搏津液则变凝白，则成白滞，亦变赤白痢也。”

参痢疾、赤白痢等条。

冷热嗽 病证名。指感寒受热所致的咳嗽。《证治要诀》卷六："冷热嗽，因增减衣裳，寒热俱感。遇乍寒亦嗽，乍热亦嗽，饮热亦嗽，饮冷亦嗽。宜金沸草散、消风散各一帖和煎，或应梦人参散，或款冬花散、二母散，仍以辰砂化痰丸、八风丹，或四和丸含化。"热重者，用葳蕤汤去川芎加香豉；失音者用《古今录验》续命汤，轻则消风散。参咳嗽条。

冷哮 病名。指因寒邪水饮所致的哮吼。《类证治裁》卷二："遇风寒而发者为冷哮。"多由感受风寒，邪入肺腧，寒饮内停，痰阻气道而成。症见呼吸气急，喉中有哮鸣声，咳吐清稀粘痰，苔白滑，脉弦紧等。治宜温肺以劫寒痰，如温肺汤、钟乳丸、冷哮丸等。亦可采用灸法，并以三建膏护肺俞穴。或选用定喘汤、夺命丹、三白丸等方。亦可由表寒内热，肺气失宣所致。《证治准绳·喘》："哮喘遇冷则发者，有二证。其一属中外皆寒，治法乃东垣参苏温肺汤、调中益气加茱萸汤及紫金丹劫寒痰者是也。其二，属寒包热，治法乃仲景、丹溪用越婢加半夏汤等。"参寒包热哮条。

冷秘 病证名。又名阴结。指阴寒凝结，腑气不通。《圣济总录·大小便门》："下焦虚冷，窘迫后重，是谓冷秘。"《证治要诀·大便秘》："冷秘由冷气横于肠胃，凝阴固结，津液不通，胃道秘塞，其人肠内气攻，喜热恶寒，宜藿香正气散加官桂、枳壳各半钱，吞半硫丸。"《医述》："世人但知热秘，不知冷秘，冷秘者，冷气凝结，津液不通，如天寒地冻，水结成冰之义，治宜八味丸、半硫丸温而通之。"《医学心悟·大便不通》："冷闭者，唇淡、口和，舌胎白，小便清，喜热、恶寒，此名阴结，宜用温药而兼润燥之法，理中汤加归芍主之。"参大便秘结条。

冷涎呕吐 病证名。见《金匮翼·呕吐统论》。又名冷涎泛、冷癖。因痰饮伏于中脘所致。症见胸闷恶心，泛吐痰涎，遇冷即发。治宜温化痰饮。用吴茱萸汤、旋覆花汤、新法半夏汤、撝脾汤等方。参痰饮呕吐条。

冷涎泛 病证名。又名冷涎呕吐、冷癖。多因胃有寒痰所致。《医宗必读·呕吐哕》："痰饮者，遇冷即发，俗名冷涎泛。"详冷涎呕吐条。

冷淋 病名。①即寒淋。见《太平圣惠方》卷五十八。《圣济总录·诸淋门》："其状先寒颤，然后便溺成淋，谓之冷淋也。"《医学心悟》："冷淋，寒气坚闭，水道不行，其症四肢厥冷，口鼻气冷，喜饮热汤是也。"本症多因肾虚而冷气客于下焦所致。治以温肾散寒为主，兼予通利。可用肉苁蓉丸、沉香散、生附散、金匮肾气丸等方。②指淋症而小便如米泔者。《华氏中藏经·论淋沥小便不利》："冷淋者，小便数，色白如泔也。"参见膏淋条。③指血淋之属于下元虚冷者。见《证治要诀·淋》。其症小便淋沥有血，服冷剂病愈甚。宜用地髓汤下附子八味丸，或用生料鹿茸丸。参淋、血淋条。

冷厥 厥证之一。《类证活人书·论阴阳寒热》："冷厥者，初得病日便四肢逆冷，脉沉微而不数，足多挛，卧而恶寒，或自引衣盖覆，不饮水，或下利清谷，或清便自调，或小便数，外证多惺惺而静，脉虽沉实，按之迟而弱者，知其冷厥也。四逆汤、理中汤、通脉四逆汤、当归四逆汤、当归四逆加茱萸生姜汤、白通加猪胆汤，皆可选用也。"《卫生宝鉴·厥逆》："四肢冷，身不热，恶心，踡足卧，或引衣被自覆，不渴，或下利，或大便如常，脉沉微不数，或虽沉实，按之则迟弱，此名冷厥。"参寒厥、清厥、厥证条。

冷喘 病证名。指阳气虚衰、内寒偏盛所致的气喘。《古今医鉴》卷四："冷喘则遇寒而发。"可用止喘丸等方。参寒喘等条。

冷痢 病名。指痢疾之由肠虚寒客所致者。《诸病源候论·痢病诸候》："冷痢者，由肠胃虚弱，受于寒气，肠虚则泄，故为冷痢也。凡痢，色青色白色黑，并皆为冷痢。"《证治要诀》治冷痢下如冻胶，或如鼻涕，先服除湿汤加木香，吞感应丸，继进理中汤。《张氏医通》卷七治积久冷痢，少腹痠痛，结滞不爽，用千金温脾汤去甘草加桂心倍香附、人参。参寒痢条。

冷癊 病证名。又名冷涎呕吐。指泛吐痰涎，遇冷即发的病症。《证治要诀·诸嗽门》："又有中脘伏痰，遇冷即发，俗谓之冷癊。"见冷涎呕吐条。

冷痧 痧证之一。《痧症度针》卷上："阴痧·俗称冷痧。人当夏月乘凉于深堂广厦之中，消暑于冰雪瓜桃之类，遂致遏郁清阳，阴寒内迫，伤脾败胃，凝结成痧者有之；又或寒凉败脾，食痰内滞，或夜凉失被，触犯外邪；又如暑天行路，骤饮冰浆，酷日操劳，多啖生冷。发则呕泻、腹痛，面白唇青，汗出肢冷，甚则畜血唾血，寒偏热溢，阴极似阳；或为盘肠、吊脚等痧症，死者，不知凡几也。若以时令温热，辄用寒凉，无不立毙。是当以脾胃为主，疏散温通，以开结滞，加以刮放，自安。"参阴痧条。

冷温 病名。❶又名春温伤寒、客寒包火。即指《伤寒论》中"太阳病，发热而渴，不恶寒者为温病"的疾患（见《重订通俗伤寒论》第八章）。❷温热病伏邪兼寒，名为冷温。其证初起一二日必有头痛、发热、身痛、恶寒诸表症，又有烦躁、口苦、口臭。此症若治寒遗热，必有斑、黄、狂、衄之变；治热遗寒，复有呕、利、厥之忧（见何廉臣《重订广温热论·论温热兼症疗法》）。参温病有关条。

冷痹 病名。《圣济总录》卷二十："痹虽异状，然皆本于三气，寒气多者，谓之冷痹。其证令人脚膝痠疼，行履艰难，四肢痛麻，身体俱痛，甚则有一身不随者。"治冷痹，脚膝疼痛，行履艰难，可用巴戟天汤，脚膝疼痛无力，可用牛膝散。参寒痹条。

冷痰 痰证之一。❶指因气虚阳虚，脾胃无力宣行水谷，致痰水结聚于胸膈，浸渍于肠胃者。《诸病源候论·痰饮诸病候》："冷痰者，言胃气虚弱，不能宣行水谷，故使痰水结聚，停于胸膈之间，时令人吞酸气逆，四肢变青，不能食饮也。"治用半夏汤、二生汤等。❷指风寒袭肺，脾寒内盛之痰证。《不居集》卷十七："肺者皮毛之合也，风寒外入，肺先受邪，肺气不清，必兼咳嗽，吊动脾涎，……挟寒则为冷痰。"治以散寒利肺。方用华盖散、温肺汤等。❸即寒痰。详该条。

冷嗽 五嗽之一。指感寒饮冷所致的咳嗽。《外台秘要》卷九："冷嗽者，年衰力弱，体气虚微，如复寝食伤冷，故成冷嗽。"《圣济总录》卷六十五："形寒饮冷，内外合邪，因而客之，则为肺咳。盖肺主气，外合皮毛，其经环循胃口，故内外得寒，皆能伤之，而为冷嗽。其候呼吸气寒，口如饮冰雪，呕唾冷沫，胸中急痛，昼静夜甚，得温则止，遇寒即发是也。"方用干姜汤、橘皮汤、紫苑饮、胡椒理中汤等。《赤水玄珠》卷七："呷热汤而暂停者，冷嗽也。……冷嗽，理中汤并加五味子。"参五嗽、咳嗽条。

冷瘴 病名。一名寒瘴。《瘴疟指南·冷瘴》："其证恶寒，发震，发热，头或痛或不痛，或呕吐，或不呕吐，胸膈痞闷，身重腰痛，脚软，或先寒后热，或先热后寒，寒时虽厚衣被不能温，热时虽卧冷地不能凉，或大渴饮水，或一日一发，发时多，退时少，或间日三日一发，所兼之证极多，不能尽述。惟以其有寒，谓之冷瘴。"治宜温通或温下为主，如来复丹、夺命散、真武汤、截疟丸、姜附汤、黑锡丹、感应丸等方均可选用。亦可用正气散、和解散等。参瘴气、瘴疟条。

冻死 指受冷极深冻僵而死。《诸病源候论·冻死候》："人有在于途路，逢凄风

苦雨，繁霜大雪，衣服沾濡，冷气入藏，致令阴气闭于内，阳气绝于外，荣卫枯涩，不复流通，故致噤绝而死。若早得救疗，血温气通则生。”

沥血腰痛　病证名。腰痛之一。又名瘀血腰痛、血瘀腰痛。《证治要诀·诸痛门》：“腰痛如锯刀所刺，大便黑，小便赤黄或黑，由血滞腰间，名沥血腰痛。”症见痛有定处，日轻夜重。脉涩。治宜化瘀行气。可用调营活络饮、桃红四物汤、复元通气散等方，或用桃仁酒调黑神散。

沙石淋　病名。见《世医得效方》卷第八。又称沙淋、石淋。以小便排出沙石为主症。《杂病源流犀烛·五淋二浊源流》：“轻则为沙，重则为石。”详石淋条。

沙证　病名。见《世医得效方》卷二。沙通痧。详痧条。

沙虱毒　古病名。指沙虱虫毒侵入所致的疾患。《肘后方·治卒中沙虱毒方》：“山水间多有沙虱甚细，略不可见。人入水浴及以水澡浴，此虫在水中着人身，及阴天雨行草中亦着人，便钻入皮里。其诊法：初得之皮上正赤，如小豆黍米粟粒，以手摩赤上痛如刺，三日之后，令百节疼痛，寒热，赤上发疮，此虫渐入至骨则杀人。”本病与恙虫病相类似。

沙蜮　病名。俗名麻脚瘟。指感受沙蝛溪毒所致的病症。《医略十三·沙蜮第十二》：“其病与伤寒、温疫、霍乱、瘴气相类，但手足逆冷者是。甚至手足麻木不仁，冷过肘膝。……沙毒流行，两足先麻木，当时流俗名麻脚瘟。继之腹痛吐泻，肢冷脉伏，剧则大汗身冷，脉脱目陷，四肢瘫疡，须臾不救。”可用含沙散主治。参霍乱、温疫条。

沉厥　厥证之一。肾元不足，正气虚寒所致的昏厥。《灵枢·邪气脏腑病形》：“肾脉……；微急为沉厥，奔豚。”参厥证条。

谷劳病　病名。指食后手足重着，默然欲卧之症。因脾胃虚寒而致。《肘后备急方》卷四：“治饱食便卧，得谷劳病，令人四肢烦重，嘿嘿欲卧，食毕辄甚方。大麦蘖一升，椒一两，并熬。干姜三两，捣末服方寸匕，日三四服。”

谷胀　证名。即食胀。指谷食不化所致的胸腹胀满。《仁斋直指方·胀论》：“失饥伤饱，痞闷停酸，朝则阴消阳长，谷气易行，故能食，暮则阴长阳消，谷气难化，故不能食，是为谷胀。”《世医得效方·胀满》：“失饥伤饱，痞闷停酸，早食暮不能食，名谷胀。”《杂病源流犀烛·肿胀源流》：“谷胀，即食胀。”详食胀条。

谷疸　五疸之一。《金匮要略·黄疸病脉证并治》：“谷疸之为病，寒热不食，食即头眩，心胸不安，久久发黄……。”可伴见食难用饱，小便不利，脉沉等。《圣济总录》卷六十：“失饥饱甚，则胃中满塞，谷气未化，虚热熏蒸，遂为谷疸。其证心下懊闷，头眩心忪，怫郁发烦，小便不利，身黄如橘是也。”治宜清热、化湿、消导等法，如谷疸丸、加味枳术汤等方。参见胃黄条。即胃疸。见《杂病源流犀烛·诸疸源流》。详该条。

谷道痒　证名。指肛门搔痒。《诸病源候论·痢病诸候》：“谷道痒者，由胃弱肠虚，则蛲虫下侵谷道，重者食于肛门，轻者但痒也。”参蛲虫病、肛头痒痛等条。

谷瘕　病名。《诸病源候论·癥瘕病诸候》：“人有能食而不大便，初亦不觉为患，久乃腹内成块结，推之可动，故名为谷瘕也。”参瘕条。

〔一〕

尾骶骨痛　证名。指脊椎下段尾骶骨部位作痛。见《中国医学大辞典》。多因肾脏精气亏耗，督脉受损，或寒湿侵袭，或血瘀气滞所致。疼痛常连及腰部，难以挺直。喜暖怕冷者，治宜温肾补督脉，可用温肾散，附桂八味丸；肾水不足者，治用六味丸、左

归丸等；寒湿侵袭者，治宜祛寒化湿；瘀血停滞者，宜活血化瘀为主。本证可见于坐骨神经痛、腰椎肥大等疾患。

尿血　病证名。出《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》。又名溺血，溲血。指血从尿道排出而无疼痛者。《医学心悟》卷三："心主血，心气热，则遗热于膀胱，阴血妄行而溺出焉。又肝主疏泄，肝火盛，亦令尿血。"《杂病源流犀烛·五淋二浊源流》："尿血，溺窍病也。其原由于肾虚。"尿血与心、肝、肾三经关系较为密切。其症属心肝火盛者，可伴见虚烦不眠，舌咽作痛，少腹胀满，胁肋刺痛，口苦耳聋等。治以清热为主，用导赤散、清肠汤、龙胆泻肝汤等。倘火盛伤阴，小便短赤带血，目眩耳鸣，腰腿酸软，舌质红，脉弦细数者，宜滋阴清火，凉血止血，方用保阴煎、知柏地黄丸合小蓟饮子。亦有日久导致脾肾气虚，尿血淡红，面色萎黄，饮食减少，腰酸肢冷，舌质淡，脉虚软者，宜健脾补肾，益气摄血，用补中益气汤、无比山药丸等方。本证可见于肾结核、尿路感染、尿路结石、某些血液病等病。

尿床　病名。《诸病源候论·尿床候》："夫人有于眠睡不觉尿出者，是其禀质阴气偏盛，阳气偏虚者，则膀胱肾气俱冷，不能温制于水，则小便多或不禁而遗尿。"《类证治裁》卷七："睡中自遗，多属下元虚冷，宜螵蛸丸，然遗失不知，必交通心肾，寇氏桑螵蛸散。"《杂病源流犀烛·小便闭癃源流》："小儿睡中遗尿，多由于实热，而间或因寒，宜沈氏鹍泉丸，挟寒去山栀，加茴肉、巴戟、干姜。"参遗溺条。

尿精　病名。指精液随小便而出者。《诸病源候论·虚劳病诸候》："肾藏精，其气通于阴，劳伤肾虚，不能藏于精，故因小便而精液出也。"治宜益肾固精。用枸杞子散、金锁子丸、菟丝子丸、聚精丸等方。若小便多而溺后精出，宜用补中益气汤送服缩泉丸。

张口抬肩　指气喘发作时口张肩耸以助呼吸。见《伤寒明理论》。本症多见于严重的喘证患者。宜辨虚实。《罗氏会约医镜》："喘者，气急声高，张口抬肩，摇身撷肚，唯呼出一息为快，此肺经邪气实也。盖肺主皮毛而居上焦，故风寒犯之，则气道壅滞而为喘，治宜散之破之。"《类证治裁·喘症论治》："张口抬肩，气道奔迫，病机谓诸病喘满皆属于热，海藏以为火铄真气，气衰而喘，有由然矣。"因火烁真气致张口抬肩而喘者，宜用补益、镇摄、收敛等法，忌用破散药。参肩息、息高等条。

鸡黄　三十六黄之一。《太平圣惠方》卷五十五："鸡黄者，遍身爪甲并青黄，多语，梦寐或见鬼神，时自言笑。"《圣济总录》卷六十一："病人面目俱青，好向暗处眠卧，不欲见明，手舁衣服，状如鬼神，望见黄花生者，此是鸡黄。"治疗用灸烙法或内服地黄饮。参黄疸有关条。

鸡痫　六畜痫之一。即鸡癫。《备急千金要方》卷五："鸡痫之为病，摇头反折，喜惊自摇。灸足诸阳各三壮。"参六畜间、鸡癫条。

鸡癫　病名。即鸡痫。见《圣济总录》卷十五。因痫发声如鸡鸣故名。参痫、癫、六畜痫条。

纵　❶纵，弛纵、纵缓之意。多属筋脉、关节病变，如筋纵、百节皆纵之类。《素问·生气通天论》："有伤于筋，纵，其若不容。"《灵枢·经脉》："脾之大络，名曰大包……实则身尽痛，虚则百节尽皆纵。"❷指脉象。《伤寒论·平脉法》："脉有相乘、有纵、有横、有逆、有顺，……水行乘火，金行乘木，名曰纵。"《注解伤寒论》卷一："金胜木，水胜火。纵者，言纵任其气，乘其所胜。"《伤寒论·辨太阳病脉证并治法》："伤寒腹满谵语，寸口脉浮而紧，此肝乘脾也，名曰纵，刺期门。"

纵酒泄泻　病证名。见《不居集》卷二

十一。又称酒泄。详该条。

纽痛 证名。出《灵枢·经筋》。指痛如纽结之状。是经筋病的症状之一。

八 画

〔一〕

表里同病 证名。指表证里证同时存在。多因表证未解而病邪入里，或病者素有宿疾又新感表邪所致。有表寒里热证、表热里寒证、表虚里实证、表实里虚证之分。亦指表里出现同一性质的病证。如表里俱寒证、表里俱热证、表里俱虚证、表里俱实证等。详各条。

表里传 指太阳表证直接向少阴里证传变。见《此事难知·太阳六传》。《证治准绳·伤寒》："太阳传少阴肾水，名曰表传里，为病急当下而反不攻不发，所以传里也。"《伤寒论辨证广注·中寒辨证》："太阳与少阴为表里，少阴者，肾也，邪在太阳，膀胱为寒水之经，肾家无火，不能御寒，为真阴证。"阳明经与太阴经为表里，少阳经与厥阴经为表里（见《素问·热论》王冰注）。故凡相为表里之阳经与阴经的传变，亦称为表里传。但表里传与两感于寒的阳经与阴经同病不同。参见传经、两感条。

表里俱实证 证名。表里同病之一。见《万病回春·伤寒总论》。指肌表营卫和脏腑气血俱见邪实症象者。详实证、表实证、里实证条。

表里俱热证 证名。指表热、里热症状同时存在。《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》："伤寒若吐若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。"多由表证未解，邪热入里，或原有里热，又感温邪所致。《医学心悟·伤寒主治四字论》："何谓表里皆热？如伤寒阳明证传于本腑，外而肌肉，内而胃腑，热气熏蒸，口渴谵语，此散漫之热邪未结聚，治用白虎汤，外透肌肤，内清腑脏。俾表里两解，不比邪热结实，专在肠胃可下而愈也。……正伤寒有此，而温热之病，更多有此，不可不察。"详表热证、里热证条。

表里俱虚证 证名。表里同病之一。见《万病回春·伤寒总论》。指营卫肌表和脏腑气血等俱见虚弱症象者。详虚证、表虚证、里虚证条。

表里俱寒证 证名。指表寒、里寒症状同时存在。《医学心悟·伤寒主治四字论》："何谓表里皆寒？凡伤寒表受寒邪，更兼直中于里，此为两感寒证，仲景用麻黄附子细辛汤是也。"多由外感寒邪，内伤生冷，或里有虚寒，又感风寒所致。症见恶寒无汗，头痛身痛，腹痛泄泻，四肢厥冷，小便清长等。治宜温解表里，方用麻黄附子细辛汤，小青龙汤等。详见表寒证、里寒证条。

表证 八纲之一。指外邪侵袭肌肤体表所出现的证候。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗。"本证有表寒证、表热证、表虚证、表实证之分。详见各条。

表实里虚证 证名。指表实里虚症状同时存在。多由正气素虚，又感外邪，或外感表证，误用攻下正气受损所致。详见表实证、里虚证条。

表实证 证名。指外邪束表，腠理闭塞所致的病症。《景岳全书·传忠录》："表实者，或为发热，或为身痛，或为恶热掀衣，或为恶寒鼓慄，寒束于表者无汗。"如

太阳病，头痛发热，恶寒无汗，脉浮紧等。治宜解表发汗，用麻黄汤等方。参见表证条。

表热不得卧　证名。外感不得卧之一。因风寒伤于太阳或阳明、或少阳郁而发热所致的不寐症。《症因脉治》卷三："表热不得卧之症，发热身痛，无汗烦热，不得卧，太阳经表热症也；目痛鼻干，身大热，不得卧，阳明经表热症也；时寒时热，寒热往来，不得卧，少阳经表热症也。治宜分经辨证，如太阳表热，不得卧而无汗者，冬月，北方人麻桂汤；阳明表热不得卧，干葛升麻汤；少阳表热不得卧，小柴胡汤。"参见不寐条。

表热里寒证　证名。指表热、里寒症状同时存在。见《伤寒论·辨阳明病脉证并治》。多因本体虚寒，外感温邪所致。详见表热证、里寒证条。

表热证　证名。指感受风热阳邪所致的表证。《赤水玄珠·论表里热》："有表而热者，谓之表热。"症见发热，恶风，头痛，口渴咽痛，咳嗽痰黄，舌苔薄白或微黄，脉浮数等。治宜辛凉解表。用桑菊饮、银翘散等方。参见热证条。

表虚里实证　证名。指表虚症状和里实症状同时存在。见《伤寒论·辨阳明病脉证并治》。多由卫气不足，外邪传里，胃肠积滞，痰瘀停留所致。详见表虚证、里实证条。

表虚证　证名。指外邪袭表，腠理不固，营卫之气不和所致的表证。《景岳全书·传忠录》："表虚者，或为多汗，或为肉战，或为怯寒。"如太阳病，头痛发热，汗出恶风，脉浮缓等。治宜解肌发表，用桂枝汤等方。亦指慢性疾患的汗多证。常见汗出不止，怕风畏寒，精神倦怠，脉濡软无力。治宜益气固表，止汗。方用玉屏风散，牡蛎散之属。历代医家亦称自汗为表虚（见《医述·表里虚实》）。参见表证条。

表寒里热证　证名。指表寒、里热症状同时存在。见《医学心悟·伤寒主治四字论》。多由外邪传里化热而表寒未解，或本有内热，又感寒邪所致。详见表寒证、里热证条。

表寒证　证名。指由风寒侵袭肌表所致的表证。《医学心悟·伤寒主治四字论》："何谓表寒？伤寒初客太阳，头痛发热而恶寒者，名曰外感。"症见恶寒发热，头痛，舌苔薄白而润等。治宜辛温解表，可选用麻黄汤、桂枝汤、荆防败毒散、葱豉汤、杏苏散等方。参见寒证条。

青水　古病名。十水之一。《中藏经·论水肿脉证生死候》："青水者，其根起于肝，其状先从面肿，而渐行一身也。"参见十水、水肿条。

青筋　证名。指人体体表部异常显露的青色筋脉。多由瘀血、虫积或痧证等引起。《张氏医通·鼓胀》："畜血成胀，腹上青紫筋见，或手足有红缕赤痕，小水不利，大便黑，金匮下瘀血汤。不应，抵当丸去水蛭加槟鸡作丸，空服。"《症因脉治》卷四："肚大青筋，此虫积腹痛之症也。"治宜秘方万应丸等。《古今医鉴》卷六所述青筋症似痧证、乌痧，详各该条。本证可见于肝硬化、静脉曲张等疾病。

青筋牵　古病名。指发于春季的一种疫病。见《伤寒总病论》卷五。《三因极一病证方论·叙疫论》："夫疫病者……若春时应暖，而清气折之，则责邪在肝，病曰青筋牵。"其症"发热，腰痛，强急，脚缩不伸，胁中欲折，目中生花，或滴滴憎寒复热，颈中双筋牵，不能屈伸，项直，背强，眼赤黄，欲转动，合目回侧"。治宜清解疫毒为主。用柴胡地黄汤、石膏竹叶汤等方。

青瘕　病名。八瘕之一。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："青瘕聚在左右胁下，藏于背膂，上至肩胛，其苦腰下急痛，腹下气冲，面色黄，四肢肿，二便难，

喜唾涎，不可多食。”《类证治裁·痃癖癥瘕诸积论治》：“青瘕，新产浴早风袭，瘕聚左右胁，崩中不禁，下青汁，用坐导戎盐散。”参见瘕、癥瘕、八瘕等条。

直中三阴 指寒邪直接侵犯三阴经。《医学入门·伤寒》：“若不自阳经传来，直中三阴之经，初起厥逆，腹痛自利不渴，太阴自受寒也，上症加之呕吐，少阴自受寒也，又加之小便不利，厥阴自受寒也。”《景岳全书·伤寒典》：“若初起本无发热头痛等证，原不由阳经所传而迳入阴分者，其证或厥冷、或呕吐、或腹痛泻利、或畏寒不渴、或脉来沉弱无力，此皆元阳元气之不足，乃为真正阴证。”《医述·五法大旨》引陈养晦：“盖邪不由阳经而入，迳中三阴，名曰直中。内寒盛极，阳气衰危，故曰救。救者，救阳危也。”《医学心悟·直中三阴诸证》：“直中者，初起不由阳经传入，而迳中三阴者也。中太阴，宜用理中汤；中少阴，宜用四逆汤；中厥阴，宜用白通加猪胆汁汤。”参见六经病、少阴病、太阴病、厥阴病条。

直肠 古病名。又称直肠泻。《证治要诀·大小腑门》：“药食方入口而即下者，名曰直肠。”详直肠泻条。

直肠泄 病名。即直肠泻。《医宗必读·泄泻》：“直肠泄，食方入口而即下。”详直肠泻条。

直肠泻 病名。指饮食不化随即泻出。又称直肠泄、直肠、直腹泄。《张氏医通·大小府门》：“药与食入口即泻下者，名直肠泻。”《医略六书·杂病证治》：“直肠泻，食入辄下完谷，参附理中汤加诃子、肉果、煨木香。”亦可用木香散加人参、白术，以伏龙肝汤煎服，或大断丸。也有把食入即下之急暴者称直肠症，日久者称录食泻。《症因脉治》卷四：“直肠之症，急症暴症，录食之泻，久病缓病。”参刮肠、直肠泄、直肠条。

直肠结 病证名。见《医宗金鉴·大便燥结总括》。指粪便结于直肠难出者。《医碥·大便不通》：“燥屎巨硬，结在肛门难出，名直肠结。从导法治之。导法，以蜂蜜炼成条，大如指，纳皂角末、油抹入便门。寒结者加草乌头末，以化寒消结；热结者以猪胆汁导之。”参见大便秘结条。

直肠痢 病名。指痢疾之随食随痢者。清·陆子贤《六因条辨》：“伏暑痢色如冻，杂如水谷，肛垂里急，随食随痢，完谷不化，此直肠痢也。”治宜温脾涩肠为主，如桃花汤、赤石脂禹余粮丸、补中益气汤等方。参见痢疾条。

直腹泄 病名。《不居集》卷二十一：“直腹泄，饮食入口，少顷即出。”即直肠泻。详该条。

茎纵 证名。见《类证治裁·阳痿附茎纵》。又称阴纵。详该条。

茎缩 证名。指阴茎内缩之症。属阴缩范围。《类证治裁·阳痿附茎缩》：“有阴茎内缩，乃肝之筋受寒，四逆汤加参、桂。”详阴缩条。

卧不安 证名。❶睡眠不安之症。《医学心悟》卷二：“经云：胃不和则卧不安。”❷指不能平卧之症。《素问·逆调论》：“不得卧而息有音者，是阳明之逆也。”详见不寐条。本证可见胃肠神经官能症、胃炎、溃疡病等疾患伴发的失眠症。

刺风 证名。指风寒蕴滞生热，遍身如针刺者。《圣济总录》卷十二：“刺风者，以气血为风寒所侵，不得宣利，则蕴滞而生热，寒热相搏于皮肤之间，淫跃不能发泄，故遍身如针刺也。其痛甚若刀划者，谓之蛊风，与刺风相似，不可不辨也。”治用芎枳丸等方。

郁火恶寒 恶寒证之一种。《证治汇补·恶寒章》：“郁火恶寒，有素病虚热，忽觉恶寒，须臾战栗，如丧神守，此火郁清道，抑遏阳气于脾土，不得外越，故手足厥

冷，乃火极似水，热极反兼水化，自觉其寒非真寒也。外症口苦、溺赤、脉数，宜升阳散火汤。”或用火郁汤等。参恶寒条。

郁火积滞呕吐　证名。指呕吐因火郁气滞所致者。清·罗应章《经验医库·郁火积滞呕吐症》：“郁火积滞，呕吐，五心烦热，咽干口渴，有汗，神强气壮，面赤红活，脉沉滑数疾。”治宜泄火散郁，宜栀连二陈汤。

郁证　证名。凡滞而不得发越之证，总称郁证。简称郁。见《赤水玄珠·郁证门》。《素问·六元正纪大论》载有木郁、火郁、土郁、金郁、水郁，属五气之郁，后世合称五郁。《丹溪心法》将郁证分为气郁、血郁，湿郁、热郁、痰郁、食郁六种，总称“六郁”。《张氏医通》卷三：“郁证多缘于志虑不伸，而气先受病。”又有七情郁证称内郁，如怒郁、思郁、忧郁、悲郁、惊郁、恐郁。脏腑郁证如心郁、肝郁、脾郁、肺郁、肾郁、胆郁、三焦郁等。六气郁证又称外郁，如风郁、寒郁、湿郁、热郁等。辨证有虚实之分。实证常见有肝气郁结，气郁化火，痰气郁结数种。肝气郁结者，证见精神抑郁，或胸闷胁痛，腹胀嗳气，不思饮食，脉多弦细。治宜疏肝理气为主，可用四逆散。气郁化火上逆者，症见头痛头晕，胸闷胁胀，口苦口干，苔黄舌红，脉多弦数，治宜清肝泻火，可用加味逍遥散。痰气郁结者，症见咽中似有物梗阻，咯之不出，咽之不下。治宜利气化痰，可选用半夏厚朴汤、温胆汤等方。虚证多见久郁伤神和阴虚火旺两类。久郁伤神者，症见精神恍惚，悲忧善哭，疲乏无力。治宜养心安神，可用甘麦大枣汤。阴虚火旺者，症见眩晕心悸，心烦易怒，失眠。治宜滋阴清火，养血柔肝，可用滋水清肝饮等方。参有关各条。

郁冒　证名。❶指昏冒神志不清的病证。《素问·至真要大论》：“郁冒不知人者，寒热之气乱于上也。”《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》：“下利，脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清谷者，必郁冒汗出而解，病人必微厥，所以然者，其面戴阳，下虚故也。”《医学入门》卷四：“郁冒不仁不省。郁乃气不舒，冒乃神不清，俗谓之昏迷也。经曰：诸虚乘寒则为厥。郁冒不仁，言寒气乘虚中人，如物蒙罩其首，恍惚不省人事，比之眩昏更重。太阳少阳病，头痛眩冒，时加结胸痞硬者，人参三白汤加川芎、天麻，吐下虚烦、气冲眩冒身摇者，茯苓桂术甘草汤；少阴症，脉沉迟，面微赤，身微热，下利清谷者，必郁冒汗出，理中、四逆汤、甘草干姜汤选用，血虚者，人参养荣汤加天麻，如下利止头眩，时时自冒者，难治；太阳病下之不愈，因复发汗，表里俱虚，其人必冒汗自出，则表和而愈。又痰饮郁冒厥逆者，三生饮；感湿头重眩晕者，芎术除眩汤。又有头重二证，太阳不能举者，宜发散；易病不能举者，宜补真元。妇人新产血虚挟寒必冒，见产后。”❷指血厥。《普济本事方》卷七：“郁冒，亦名血厥。”详该条。参见厥证，郁厥条。

郁咳　病名。又名火咳。指水亏火炎的咳嗽。《医学入门》卷五：“郁咳即火咳，久者干咳无痰，乃肾水焦枯，邪火独炎于肺，泻白散加苦梗为君以开之；久者河黎丸；虚者肾气丸；不得志者霞天膏；如肺燥皮枯，疮痒便闭者，活血润燥，生津饮。”参见郁嗽、咳嗽条。

郁热失血　证名。《金匮翼·诸血统论》：“郁热失血者，寒邪在表，闭热于经，血为热迫，而溢于络外也。勿用止血之药，但疏其表，郁热得舒，血亦自止。……若肺气已虚，客热不去，咳嗽咽干，吐血嗽血者，宜以甘润养血为主，而以辛药凉肺佐之。”可用宝鉴大阿胶丸、大蓟饮子、和剂龙脑鸡苏丸等方。参见外感吐血条。

郁热头痛　证名。指外寒束闭内热的头痛。《明医杂著·续医论》：“久头痛病，

略感风寒便发，寒月须重绵厚帕包裹者，此属郁热，本热而标寒。”由热郁于里，毛窍常疏，风寒易入，寒邪外束，其内热郁闭所致。症见头痛，略感风寒便发，心烦，头晕目花等。治当泻火凉血为主，佐以辛温散表之剂。可用安神丸、川芎散、清空膏、菊花散等方。参头痛条。

郁热衄血 证名。见《丹溪心法·衄血》。因肝胆郁热，心肾之阴受损所致。常伴见胁痛口苦、烦躁不眠等症。治宜清火解郁、滋阴泄热，用河间生地黄散加减。也有因外感，邪热郁于阳明不得发越所致者，症见目痛鼻干不眠，或身热口渴，脉长而洪等。无汗者，用干葛解肌汤；有汗者，用犀角地黄汤加升麻、干葛之类。本证可见于高血压、动脉硬化、肝硬变、血液病及多种传染病过程中。参见衄血条。

郁厥 厥证之一。即血厥，亦称郁冒。《类证治裁·厥症》：“郁厥亦血厥症。平居无疾，忽默默无知，目闭口噤，恶闻人声，移时方瘥，由热升风动，郁冒而厥，妇人多有之。羚羊角散。”参血厥条。

郁痰 痰证之一。指因七情郁结，肺脾气滞，郁而生痰者。又名结痰、顽痰、老痰。《症因脉治》卷二：“郁痰即结痰，顽痰。郁痰之症，胸满饱胀，九窍闭濇，懊恼烦闷，或咽中结核，睡卧不宁，或肠胃不爽，饮食有妨，或气逆不利，倚肩喘息。……郁痰之治，寒郁辛散，香芎二陈汤；热郁清解，栀连二陈汤；肺经郁痰，节斋化痰丸加昆布、胆星。”《证治汇补·痰症章》：“留于胃脘，多吞酸嘈杂，呕吐少食，噎膈嗳气，名曰郁痰。”又猝受惊恐，心虚停痰者称郁痰，症见惊惕心跳，甚则欲厥等。郁痰亦可由火痰郁久所致。《杂病源流犀烛·痰饮源流》：“郁痰即火痰郁于心肺间，久则凝滞胸膈，稠粘难咯，多毛焦，咽干口燥，咳嗽喘促，色白如枯骨。”此症在《医学入门》称为燥痰。方用节斋化痰丸、抑痰丸、霞天膏、清火豁痰丸、瓜蒌枳实汤等，参痰症有关条。

郁嗽 病名。一名火嗽。指水亏而邪火犯肺的咳嗽。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘病源流》：“郁嗽，即火嗽也。其脉数，必兼面赤，或肺胀喘急，睡不安，痰少，甚者干咳而无痰。乃肾水枯涸，邪火独炎所致。宜清化丸、清金降火汤。”参见郁咳、咳嗽条。

奔气 见《诸病源候论·奔气候》。即喘证。由于肺主气，肺气通行于脏腑，若肺受邪则气道不利，诸脏气壅，故致气逆上奔。参喘证各条。

奔豚 古病名。见《金匮要略·奔豚气病脉证治》。即奔豚气。又称贲豚。详贲豚条。

奔豚气 古病名。见《金匮要略·奔豚气病脉证治》。亦称奔豚、贲豚、贲豚气。详贲豚条。

奇恒痢 病名。指一种病情危重的痢疾。见《医学实在易》卷三。症见下痢不重而见神昏谵语，咽干喉塞，气呛喘逆等。本病发展迅速，属痢疾危证。由阳邪壅盛，上攻心肺，九窍皆塞，阳气旁溢，下窜肠腑所致。治宜泻阳救阴，可用大承气汤等方急下逐邪法。参痢疾等条。

顶巅痛 证名。又称巅顶痛。指头顶部疼痛。《丹溪心法·头痛》：“如顶巅痛，宜藁本、防风、柴胡。”《医宗必读·头痛》：“太阳、厥阴巅顶痛，宜来复丹。”《证治汇补·头痛》：“巅顶痛属肾。”由肾虚、相火偏旺，循督脉上扰所致。可用三才汤加牡蛎、龟板等。参头痛条。

转矢气 指肠中有气转动，时时放屁。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》：“阳明病，潮热……若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与小承气汤，汤入腹中，转矢气者，此有燥屎也，乃可攻之。”《伤寒论集注》卷五：“按矢气二字，从前书中皆云失气，此误也。缘矢字误写出头耳。盖矢与屎

同。矢气者，屁乃矢之气也。且失字之上，无转字之理，转乃转运也，以其气由转运而出。若果失字，夫何转之有？确为矢字无疑。”参失气条。

转注　古病名。又名传尸。《外台秘要·传尸方四首》：“传尸，亦名转注。”详转疰、传尸条。

转胞　病名。出《金匮要略·妇人杂病脉证治》。又称胞转、转脬。《诸病源候论·小便病诸候》：“胞屈辟不通，名为胞转。其病状，脐下急痛，小便不通是也。”多因强忍小便（忍尿疾走，忍尿入房、饱食忍尿等），或寒热所迫，或惊忧暴怒，气迫膀胱，使膀胱屈戾不舒所致。治宜疏导。方用蒲黄散、滑石散，或猪苓汤下甘遂末。年老者，宜补肾，用金匮肾气丸、六味地黄丸等方。惊忧暴怒，小便卒暴不通者，宜葱白汤。孕妇胎满压迫膀胱所致者，宜参术饮、补中益气汤，或令孕妇平卧床榻，脚端抬高，使胎不压脬，小便自通。适近临产者，可手入产户，托起其胎，小便即出。转胞困危者，可用导尿法。

转疰　病名。即转注。《太平圣惠方》卷五十六：“转疰者，死又易傍人，转注之状，与诸疰略同。以其在于身内，移转无常，故以为转疰也。”又：“转相染易，梦寐氛氳，肌体羸瘦，往来寒热，默默烦闷，欲寐不能，手足热，不能食，或欲向壁悲啼，或喜笑无常，宜服牛黄散。治转疰绝门，族族尽，转逐中外，复易亲友，雄黄圆方。”参见尸疰、风疰、鬼疰等条。

转脬　病名。即转胞。《证治汇补·癃闭》：“转脬者，胞系转戾，脐下并急而痛，小便不通者是也。”详转胞条。

转筋　证名。出《灵枢·阴阳二十五人》。指肢体筋脉牵掣拘挛，痛如扭转。多由阴阳气血衰少，风冷外袭，或血分有热所致。常发于小腿肚，甚则牵连腹部拘急。《金匮要略·趺蹶手指臂肿转筋狐疝虫病脉证并治》：“转筋之为病，其人臂脚直，脉上下行，微弦，转筋入腹者，鸡屎白散主之。”《诸病源候论·转筋候》：“转筋者，由荣卫气虚，风冷气搏于筋故也。手足之三阴、三阳之筋，皆起于手足指而并络于身，若血气不足，阴阳虚者，风冷邪气中于筋，随邪所中之筋，筋则转。”《素问玄机原病式·六气为病》：“外冒于寒而腠理闭密，阳气郁拂，热内作，热燥于筋，则转筋也。故诸转筋，以汤渍之，而使腠理开泄，阳气散则愈也。”《赤水玄珠·转筋》：“寻常转筋，四时皆有，不因霍乱而发者，其发多于睡中，或伸欠而作。丹溪谓此多属血热，以四物汤加苍术、红花、酒芩、南星水煎服。”参霍乱转筋条。

转筋霍乱　病名。见《景岳全书·杂证谟》。即霍乱转筋。详该条。

软脚瘟　病名。瘟疫见两足痿软者。一名湿温症。《杂病源流犀烛·瘟疫源流》：“软脚瘟，即湿温症，便清泄白，足肿难移是也。”治宜苍术白虎汤、增损双解散、升降散等方。不可轻下。参瘟疫、湿温条。

软痹　病名。《医学入门》卷五：“软痹者，乃膏粱火乘肝肾，以致血气涩，则痹厥不仁，虚则软缓无力，或麻木不举，三妙丸，搜风顺气丸。然肾主骨，虚则骨软阳虚，附虎四斤丸，阴虚虎潜丸，肾气丸。脚软筋痛者，大补阴丸去地黄加白芍、知母、甘草，倍牛膝。肝主筋，虚则脚膝顽麻，养真丹。肝肾脾俱虚者，五兽三匮丹。”

软懒症　证名。见《理虚元鉴》。多因伤食劳倦，或思虑过度，或房室不节，脏腑内伤，复感外邪所致。症见四肢倦怠，面色淡黄，胸闷，不思饮食，或见恶寒发热，脉沉迟软弱。迁延日久，则见黄肿、痰嗽、潮热等症。治宜审察表里，先去病邪，再养气养血；若起于忧惊思虑者，以交固心肾药善后。参见虚劳、虚损条。

抽筋痧　痧证之一。《杂病源流犀烛·

痧胀源流》："抽筋痧，两足筋抽疼甚，忽一身青筋胀起如筋粗。"宜放毒血，治宜丁香阿魏丸等。参痧条。

抽搐 瘛疭的别称。简称搐。《医碥》卷四："抽搐者，手足频频伸缩也。"《伤寒明理论》卷三："或缩或伸，动而不止者，名曰瘛疭，俗谓之搐者是也。"详瘛疭条。

拘 证名。筋病证候之一。拘为筋脉牵强不伸。常与挛、急并称，如拘挛、拘急等。多由湿热、风寒或血虚所致。《素问·生气通天论》："湿热不攘，大筋软短，小筋弛长。软短为拘，弛长为痿。"《杂证会心录》卷上："古书有风寒、湿热、血虚之不同，然总不外亡血，筋无荣养则尽之矣。盖阴血受伤则血燥，血燥则筋失所滋，为拘为挛。"参拘急、拘挛条。

拘苛 证名。指筋脉拘急，肌肉有沉重、麻木感觉。《素问·至真要大论》："筋肉拘苛。"王冰注："拘，急也；苛，重也。"《类经·运气类》："筋肉得寒则为急为痹，故筋急肉苛。"

拘急 证名。出《素问·六元正纪大论》。指肢体牵引不适或有紧缩感，碍于屈伸的症状。常见于四肢及腹部。四肢拘急，多因六淫外邪伤及筋脉，或血虚不能养筋所致。少腹拘急，多因肾阳不足，膀胱之气不化，常并见腰痛，小便不利。详四肢拘急、少腹拘急等条。

拘挛 证名。出《素问·缪刺论》。一作痉挛。多因阴血本亏，复由风寒湿热之邪侵袭筋脉，或瘀血留滞所致。以四肢多见。其状牵引拘急，活动不能自如。《杂证会心录·挛症》："拘挛属肝，肝主身之筋也。古书有风寒湿热血虚之不同，然总不外亡血，筋无荣养则尽之矣。盖阴血受伤则血燥，血燥则筋失所滋。……且精血不亏，虽有邪干，亦决无筋脉拘急之病。而病至坚强，其枯可知。治此者，必先以气血为主，若有微邪，亦不必治邪，气血复而血脉行，邪自不能留。"《医述》卷十二："拘挛则急多缓少，寒多热少，经谓寒则筋挛是也。其治莫如养血温经，使阳气以和柔之，阴津以灌溉之。"并可参用祛风湿、通经络等法。参见挛条。本证可见于类风湿性关节炎、脑血管意外后遗症及肌强直症等疾患。

拂郁痰 痰证之一。指气郁不宣，痰血结滞所致的病证。《不居集》卷十七："拂郁痰，痰挟瘀血结成窠囊，膈间胀闷；又胃脘之血为痰浊所滞，日积月累，渐成噎膈反胃。若用燥剂，其结愈甚。惟竹沥、韭汁、姜汁可以治之，进三、五杯，后用养血健脾药。"参见痰证条。

拂拂发热 证名。即翕翕发热。《内外伤辨惑论·辨寒热》："翕翕发热，又为之拂拂发热。"详见该条。

〔丨〕

非风 即类中风。《景岳全书·杂证谟》："非风一证，即时人所谓中风证也。此证多见卒倒。卒倒多由昏愦，本皆内伤积损颓败而然，原非外感风寒所致。而古今相传，咸以中风名之，其误甚矣。故余欲易去中风二字……竟以非风名之，庶乎使人易晓，而知其本非风证矣。"参见类中风条。

齿间血出 证名。又名齿衄、牙宣。《诸病源候论·牙齿病诸候》："手阳明之支脉，入于齿。头面有风，而阳明脉虚，风挟热乘虚入齿断，搏于血，故血出也。"详见齿衄条。

齿衄 证名。见《证治要诀·诸血门》。又称齿间血出、牙宣。《证治准绳·杂病》："血从齿缝中或齿龈中出，谓之齿衄，亦曰牙宣。"肾主骨，齿为骨之余，又胃脉络于上龈，大肠脉络于下龈，皆属阳明。故凡胃火上炎，或肾虚火旺，都可引起本证。凡胃火实证，多伴见口渴口臭，便秘龈肿，或有发热，脉象洪数。治以泻火为主，方如抽薪

饮、清胃饮、或通脾泻胃汤加藕节、蒲黄。胃火虚证，多反复难愈，伴见口燥龈糜，口不臭，脉细数。宜引火下行，兼滋胃阴，用玉女煎或甘露饮加蒲黄之类。肾虚火旺者，可伴见齿摇血渗，以及睡则血出，醒时血止。治宜益肾水、泻相火，用六味地黄汤加牛膝、天冬、麦冬、骨碎补、蒲黄；如上盛下虚，尺脉微弱，寸脉浮大者，加附子、肉桂以引火归元。亦有因上焦风热而致者，宜消风散加芒硝内服，并用盐外擦。又有大寒犯脑者，宜白芷散。参见衄血有关条。

肾中寒证　指肾受寒邪所致的病证。《三因极一病证方论·五脏中寒证》："肾中寒之状，色黑，气弱，吸吸少气，耳聋，腰痛，膝下清，拘挛而疼，昏不知人。"治宜温肾散寒为主。选用不换金正气散、附子五积散、姜附汤等方。如见脐腹痛，四肢厥，用附子理中汤。

肾气实　证名。❶指肾经邪气盛实的证候。《圣济总录》称为"肾气盛实"。《灵枢·本神》："肾气虚则厥，实则胀。"参肾气盛条。❷生理名词。指肾脏精气充实。《素问·上古天真论》："丈夫八岁，肾气实，发长齿更。"

肾气盛　证名。❶指肾经邪气盛实的证候。出《灵枢·淫邪发梦》。《诸病源候论·肾病候》："肾气盛，为志有余，则病腹胀飧泄，体肿喘咳，汗出憎风，面目黑，小便黄，是为肾气之实也。"肾气盛实，多由阳气盛而生热，或复感湿邪所致。治宜滋肾、清热、利湿等法。❷生理名词。指肾脏精气充盛。《素问·上古天真论》："女子七岁，肾气盛，齿更发长。""丈夫……二八肾气盛，天癸至，精气溢写，阴阳和，故能有子。"

肾气腰痛　证名。腰痛之一。见《医宗必读·腰痛》。指肾气亏损所致的腰痛。详肾虚腰痛条。

肾风　病名。❶指肾受风邪所致的疾患。《素问·风论》："肾风之状，多汗恶风，面庞然浮肿，脊痛不能正立，其色炲，隐曲不利，诊在肌上，其色黑。"《华氏中藏经》卷上："肾风之状，但踞坐而腰脚重痛也，视其胁下，未生黄点者可治。"《奇效良方》治风中于肾，用革薢散。《杂病源流犀烛》治肾风，用升麻胃风汤加肾之引经药。❷指肾脏自病而发生浮肿者。《素问·奇病论》："有病庞然如有水状，切其脉大紧，身无痛者，形不瘦，不能食，食少，……病生在肾，名为肾风。肾风而不能食，善惊，惊已，心气痿者死。"

肾风疝　古病名。《素问·四时刺逆从论》："太阳有余，病骨痹身重；不足病肾痹；滑则病肾风疝。"马莳注："其脉若滑，则病肾风疝，外感之邪也。"参风疝条。

肾心痛　证名。厥心痛之一。因肾病而邪上乘心所致。《灵枢·厥病》："厥心痛，与背相控，善瘛，如从后触其心，伛偻者，肾心痛也。"《医宗金鉴·杂病心法要诀》："歧骨陷处痛，若心痛。……连腰，名肾心痛。"《张氏医通·诸痛门》："肾心痛者，多由阴火上冲之故。"可用神保丸、神圣复气汤等方。参厥心痛、心痛条。

肾水　病名。五脏水肿病之一。《金匮要略·水气病脉证并治》："肾水者，其腹大，脐肿腰痛，不得溺，阴下湿如牛鼻上汗，其足逆冷，面反瘦。"多因肾阳虚不能化气行水所致。参见十水、水肿条。

肾伤　指肾脏伤损的疾患。《灵枢·邪气藏府病形》："凡有所用力举重，若入房过度，汗出如浴水则伤肾。"《诸病源候论·虚劳病诸候》："强力举重，久坐湿地伤肾。肾伤，少精，腰背痛，厥逆下冷。"《医学从众录·虚痨》："肾伤则短气，腰脚痛，厥逆下冷，脚痛下冷者，坎中之阳虚也，轻则八味丸，重则附子汤治之。"参见骨极、七伤条。

肾劳 病名。因劳损伤肾所致。《诸病源候论·虚劳病诸候》："肾劳者，背难以俯仰，小便不利，色赤黄而有余沥，茎内痛，阴湿囊生疮，小腹满急。"《备急千金要方·肾劳》："治肾劳实热，小腹胀满，小便黄赤，末有余沥，数而少，茎中痛，阴囊生疮，栀子汤。"《三因极一病证方论·五劳证治》："五加皮汤，治肾劳虚寒，恐虑失志，伤精损髓，噏吸短气，遗泄白浊，小便赤黄，阴下湿痒，腰痛如折，颜色枯悴。"《医醇剩义·劳伤》："肾劳者，真阴久亏，或房室太过，水竭于下，火炎于上，身热腰疼，咽干口燥，甚则咳嗽吐血，来苏汤主之。"参见虚劳、五劳条。

肾足少阴经病证 病证名。因足少阴肾经经气异常所致。《灵枢·经脉》："肾足少阴之脉，……是动则病饥不欲食，面如漆柴，款唾则有血，喝喝而喘，坐而欲起，目眩眩如无所见，心如悬，若饥状，气不足则善恐，心惕惕如人将捕之，是为骨厥。是主肾所生病者，口热，舌干，咽肿，上气，嗌干及痛，烦心，心痛，黄疸，肠澼，脊股内后廉痛，痿厥，嗜卧，足下热而痛。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。"《脉经·肾足少阴经病证》除上述"是动，所生"病外，尚列举了少气、两耳苦聋、腰痛、失精、饮食减少、厥逆、腹胀、腹大脐肿、不得溺、阴下湿、喘等症。参肾病有关各条。

肾郁 病证名。五脏郁证之一。《赤水玄珠》卷十一："肾郁者，小腹微硬，精髓乏少，或浊或淋，不能久立。治宜肉桂、茯苓、小茴香。"参五脏郁条。

肾中风 古病名。又名肾脏中风。风邪入中于肾经而致的症候。主症为腰痛不得俯仰。《诸病源候论·风病诸候》："肾中风，踞而腰痛。"参见肾脏中风条。

肾胀 证名。胀病之一。《灵枢·胀论》："肾胀者，腹满引背，央央然腰髀痛。"《医醇剩义·胀》："肾本属水，寒气乘之，……故腹满引背，时形困苦，腰髀痛则下元虚寒，营血不能流灌也。当温肾祛寒，温泉汤主之。"参胀病条。

肾疟 五脏疟之一。《素问·刺疟篇》："肾疟者，令人洒洒然，腰脊痛宛转，大便难，目眴眴然，手足寒，刺足太阳少阴。"治宜桂枝加归芍汤、乌梅丸等。参见五脏疟条。

肾疝 古病名。指脐下急痛小便数而清之症。多由肾虚而致。《医学纲目》卷十四："脐下撮急疼痛，并脐下周身一遭皆急痛，小便频数清，其五脉急，洪、缓、濇、沉，按之皆虚，独肾脉按之不急，皆虚无力，名曰肾疝。"治用丁香疝气丸，酒煮当归丸等方。

肾泄 病名。又名五更泄、五更泻。指肾虚闭藏失职所致的泄泻。见《普济本事方》。《世医得效方》卷五："安肾丸治肾泄腹痛无定处，似痢非痢，骨痛面黧，腰脚时冷，用七气汤送下。"《寿世保元·泄泻》："人病泄，每至五更辄即利，此肾泄也，用五味子散数服而愈。因起居不慎，泄复作，年余不差，此命门火虚，不能生脾土，法当补其母，火者土之母也，遂用八味丸补其母。"《张氏医通》卷七："五更泻，是肾虚失其闭藏之职也。……其泻每在五更天将明时，必洞泄二、三次，以肾旺于亥子五更之时，故特甚也。"可用震灵丹、胃关煎、四神丸等方，或破故纸、枣子煎汤调钟乳粉少许空心送服。参五更泄、肾虚五更泄泻条。

肾泻 病名。《医宗粹言》："元阴不足而泄泻者，名曰肾泻。其状则水谷不分，至圊即去，足胫冷，少腹下重，但去有常度，昼夜或一二次，与他证之泻不同，盖元阴之气衰弱，不能健运其水谷故也。"参肾泄条。

肾实证　指肾病因邪气盛实所出现的证候。多由寒热偏胜，水湿壅闭等所致。《脉经》卷二："肾实也，苦恍惚，健忘，目视眩眩，耳聋，怅怅，善鸣。"又："肾实，……病苦膀胱胀闭，少腹与腰脊相引痛。"《圣济总录》卷五十一："肾实，论曰：足少阴肾之经，其气实为有余，则舌燥咽肿，上气嗌干，咳喘汗出，腰背强急，体重内热，小便黄赤，腰脊引痛，足胫肿满。此由足少阴经实，或为邪湿所加，故有是证。"《景岳全书·传忠录》："肾实者，多下焦壅闭，或痛，或胀，或热见于二便。"方用泽泻汤、榆白皮饮等。参肾病、肾实热等条。

肾实热证　指肾经邪热炽盛的病证。《备急千金要方》卷十九："病苦舌燥咽肿，心烦嗌干，胸胁时痛，喘咳汗出，小腹胀满，腰背强急，体重骨热，小便赤黄，好怒好忘，足下热疼，四肢黑，耳聋，名曰肾实热也。"又："病苦痹，身热心痛，脊胁相引痛，足逆热烦，名曰肾实热也。"可伴小便涩痛等证。治宜清利湿热为主，选用清源汤、榆白皮饮、地黄汤等方。

肾经失血　证名。指房室过度伤肾所致的失血。《不居集》卷十三："肾经失血：肾主五液，因房劳而动血者，出于肾。"其症多伴见气喘咳嗽。或呕吐痰涎，面红，骨蒸盗汗，咽干，烦躁。甚者大吐大衄，失血不止，四肢厥冷，小便不利，脉微细。治宜补肾益元，肾阴亏者壮水制火，肾阳衰者益火归原。选用六味地黄丸、八味地黄汤、镇阴煎等方。参失血条。

肾经疟　病名。疟疾之一。又名温疟。《症因脉治·肾经疟》："肾经温疟之症，肌肉消，脑髓烁，先见烦躁发热，躁状畏人，热势稍衰，复返归肾，又见寒候，此肾经冬受风寒温疟之症也。肾经温疟之因，冬受风寒，藏于骨髓，至春阳气大发，邪气不能自出，因遇大暑，有所用力，邪气与汗皆出，从内出外，则始热终寒，乃成肾经疟疾之症矣。"治宜壮水之主，急救其阴，六味地黄汤加柴胡、白芍药、独活、细辛，以乙癸同源，肝肾同治。藉滋阴养肾之药，滋阴降火，以治始热，佐以升散之药。参见温疟条。

肾经咳嗽　病名。又称肾咳。指肾虚引起的咳嗽。《症因脉治·内伤咳嗽》："肾经咳嗽之症，咳则腰痛，五心烦热，涌泉热，阴火上炎，时见干咳，痰味带咸，此肾经咳嗽也。"多因劳伤肺气，金不生水，色欲过度，水虚火旺，肾火刑金，或真阳不足，水泛为痰所致。治疗如劳伤肺气，金不生水，生脉散合四君子汤；左尺滑数，知柏天地煎；真阴涸竭，人参固本丸、三才丹；右尺虚软，生脉散；真阳不足，八味丸主之。"亦有肾经受寒而致者。《不居集·咳嗽》："肾经咳嗽，肾咳之状，咳则腰脊相引而痛，甚则咳涎，麻黄附子细辛汤主之。"参见咳嗽、肾咳条。

肾经寒痰　痰证之一。见《不居集》卷十七。即寒痰。详见该条。

肾经腰痛　腰痛证之一。又名肾虚腰痛。《医宗必读·腰痛》："言肾经腰痛者，内伤房欲也。"详肾虚腰痛条。

肾咳　病名。❶指咳引腰背痛，甚则唾涎者。《素问·咳论》："肾咳之状，咳则腰背相引而痛，甚则咳涎。"因肾受寒邪所致者，用麻黄附子细辛汤；因肾阴枯涸所致者，用人参固本丸，或用都炁丸加人参等。参见肾经咳嗽条。❷十咳之一。《诸病源候论·咳嗽病诸候》："八曰肾咳。咳则耳聋无所闻，引腰脐中是也。"治宜刺足太溪。参见十咳、咳嗽条。❸五嗽之一。见《三因极一病证方论》卷十二。参见五嗽条。

肾浊　溺浊之一。见《世医得效方·溲浊》。因肾气虚寒，膀胱虚冷，元气不固所致。症见小便浑浊，遗精阳萎，腰膝痿软，精神困倦，耳鸣目花，面色黧黑等。治宜温肾固涩。选用秘精丸、固精丸、小菟丝子丸、附桂八味丸等方。腹痛者，可用酒煮当

归丸。参便浊条。

肾绝 五脏绝候之一。❶指肾气绝出现的危重脉证。《华氏中脏经》卷上："面黄，无左尺脉者，肾绝也。"《注解伤寒论·辨脉法》："溲便遗失，狂言，目反直视者，此为肾绝也。"《脉经》卷四："病人肾绝四日死，何以知之？齿为暴枯，面为正黑，目中黄色，腰中欲折，白汗出如流水（一日人中平，七日死）。"❷指中风脱证之一。《医林绳墨·中风》："遗尿面黑者，肾绝也。"参中风脱证条。

肾损 病名。五脏虚损之一。又称损肾。《慎斋遗书·虚损》："或从下而损上，如因情欲抑郁所致，则精伤而损肾，肾损则木枯而生火。"《难经·十四难》："五损损于骨，骨痿不能起于床。""损其肾者，益其精。"《古本难经阐注》："骨属肾，精亏则髓枯骨痿，必益其精而髓自充。经曰：精不足者，补之以味，味乃血肉厚味也，如鹿茸等类，兼地黄、人参、枸杞之属，俱能补精。"亦可选用六味地黄丸或金刚丸、煨肾丸等方。参虚损条。

肾热证 《素问·痿论》："肾热者，色黑而齿槁。"《证治准绳·杂病》："肾热者，轻按之不热，重按之至骨，其热蒸手，如火如炙。"肾热有虚实之分，参肾实热、肾虚热条。

肾热病 指肾受邪热所致的病证。《素问·刺热篇》："肾热病者，先腰痛骭痠，苦渴数饮，身热，热争则项痛而强，骭寒且痠，足下热，不欲言。"

肾热痿软 证名。指房劳太过，精耗髓虚所致的痿症。《症因脉治》卷三："肾热痿软之症，腰骨不举，尻以代踵，脊以代头，足不任地，骨痿不能起于床，此《内经》肾热痿弱之症也。"治宜补肾填精，滋阴清热，可用人参固本丸、坎离既济丸、知柏天地煎等。参痿、骨痿条。

肾哮 证名。指肾水凌肺所致的哮证。《类证治裁》卷三："肾哮，火急者，勿骤用苦寒，宜温劫之，用炒目五、六钱，研细，分二、三次，姜汤调服。"

肾积 古病名。五积之一。《难经·五十四难》："肾之积，名曰贲豚。"《脉经·平五脏积聚脉证》："诊得肾积脉沉而急，苦脊与腰相引痛，饥则见，饱则减，少腹里急，口干，咽肿伤烂，目瞇瞇，骨中寒，主髓厥，善忘，其色黑。"治宜大七气汤倍桂加茴香、炒楝子肉，兼吞奔豚丸（见《证治准绳·杂病》）。参贲豚条。

肾脏中风 古病名。亦称肾中风。泛指风邪入中于肾发生的症候。《太平圣惠方·治肾脏中风诸方》："夫肾气虚弱，风邪所侵，则踞而腰疼，不得俯仰，或则冷痹，或则偏枯，两耳虚鸣，语声浑浊，面多浮肿，骨节痠疼，志意沉昏，喜恐好忘，肌色黧黑，身体沉重，多汗恶风，隐曲不利，此是肾中风之候也。"参见肾中风。

肾脏风 古病名。即湿脚气。见《医门补要》卷中。详湿脚气条。

肾病 病名。指肾脏的各种病证。有寒热虚实之分。肾为水脏，主藏精，主骨，生髓，主二便，开窍于耳。肾病多由外邪侵袭，或劳欲过度，久病耗伤精气等所致。《素问·藏气法时论》："肾病者，腹大胫肿，喘咳，身重，寝汗出，憎风，虚则胸中痛，大腹小腹痛，清厥，意不乐。"《难经·十六难》："假令得肾脉，其外证面黑，善恐欠，其内证齐下有动气，按之若苦痛，其病逆气，小腹急痛，泄如下重，足胫寒而逆，有是者肾也。"《脉经》卷六："肾病，其色黑，其气虚弱，吸吸少气，两耳苦聋，腰痛，时时失精，饮食减少，膝以下清。"《太平圣惠方·肾脏论》："若肾虚则腰背切痛，不能俛仰，足胫小弱，多恶风寒，手足厥冷，呼吸少气，骨节烦疼，脐腹结痛，面色黧黑，两耳虚鸣，肌骨干枯，小便滑数，诊其脉浮细而数者，是肾虚之候也。"又："夫

肾主水，而藏于精，若实则阳气盛，若阳气盛则生热，热则舌燥咽肿，心烦嗌干，胸胁作痛，喘咳汗出，小腹胀满，腰背强急，体重骨热，小便赤黄，好怒好忘，足下热疼，诊其脉浮紧者，是肾实之候也。”《本草纲目·脏腑虚实标本用药式》：“肾藏志，属水，为天一之源，主听，主骨，主二阴。本病，诸寒厥逆，骨痿，腰痛，腰冷，如冰，足胫肿寒，少腹满急，疝瘕，大便闭滞，吐利腥秽，水液澄澈清冷不禁，消渴引饮。标病，发热不恶热，头眩，头痛，咽痛舌燥，脊股后廉痛。”《杂病源流犀烛·肾病源流》：“肾之脏，水犹海，火犹龙，水暖则龙潜，水寒则龙起，是肾火炎炽为患，皆由肾水虚寒，而肾既虚寒，益为脾土所克，其病自日生矣，此言水火不能相济，因为致病之由也，而不但已也。肾家本有水火两病。火病者，龙火腾炽，上烁为害也，其证有口热，咽干，烦心，心如悬，喝喝而喘，面如漆柴，咳唾有血等类。水病者，寒湿之淫所胜为灾也，其证有跗肿，骨痛阴痹，时眩清厥，腹大胫肿，喘咳身重，寝汗头项痛，饥不欲食，寒气自伤，意不乐等类，是则肾之病有可指数者。”治宜补肾填精，滋阴温阳，补肾纳气，通阳行水等法。参肾病各条。

肾疸 病名。❶九疸之一。《外台秘要》卷四：“肾瘅，其人唇干，葶苈子主之。”❷《辨证奇闻》：“肾疸之症，身体面目俱黄，小便不利，不思饮食，不得卧，人亦以为黄疸也，谁知是肾寒之故乎。”治法须补肾中之火而佐以健脾去湿之药。用济水汤等方。参黄疸有关条。

肾消 病名。❶亦作肾痟、下消。《太平圣惠方》卷五十三：“饮水随饮便下，小便味甘而白浊，腰腿消瘦者，肾痟也。”即下消详见该条。❷指强中。《张氏医通·杂门》：“肾消之病，古曰强中，又名内消。”详强中条。

肾黄 三十六黄之一。《外台秘要》卷四：“肾黄，小便不通，气急，心闷……。”治宜瓜蒂散。《太平圣惠方》卷五十五：“肾黄者，面色青黄，腰背疼痛，耳中飐飐百般声响，脚膝无力，多唾呕逆，不能下食，悲而不乐，若两脚浮肿，齿黑，如大豆者难治。”治宜附子散等方。《圣济总录》卷六十一：“病人脚冷，面目俱青，身上冷，脐下结鞕，气急冲心。”治宜用灸法或内服鸡参散。参黄疸有关各条。

肾虚五更泄泻 证名。又称脾肾泄、肾泄。指真阳不足，肾经虚寒不能闭藏所致的晨泄。《症因脉治·肾虚五更泄泻》：“肾虚泻之症，每至五更，即连次而泻，或当脐作痛，痛连腰背，腹冷膝冷。”脉多细小虚软，或浮大。治宜补肾益元，可用八味肾气丸、填坎汤、胃关煎、五味子丸、四神丸等方。参肾泄、脾肾泄等条。

肾虚头痛 证名。指肾中元阴或元阳虚衰所致的头痛。《证治准绳·头痛》：“下虚者，肾虚也，故肾虚则头痛。”肾阴虚为主者，症见头脑空痛，头晕耳鸣，腰膝无力，舌红脉细。治宜滋补肾阴为主，可用六味丸、大补元煎加减。肾阳虚为主者，则头痛而畏寒，四肢不温，面色白，舌淡，脉沉细。治宜温补肾阳，可用右归丸、正元丹等方加减。《类证治裁·头痛》：“肾虚水泛者，头痛如破，昏重不安，六味汤去丹皮，加沉香，更以七味丸，人参汤下。”参头痛条。

肾虚耳鸣 耳鸣的一种。多因肾虚精气不足所致。见《普济本事方》卷五。《张氏医通·耳》：“肾虚耳中潮声，蝉声，无休止时，妨害听闻者，当坠气补肾，正元散下黑锡丹，间进安肾丸。肾脏虚风耳鸣，夜间睡著如擂战鼓，四肢掣痛，耳内觉有风吹，奇痒，黄芪丸、四生散选用。”参见耳鸣条。

肾虚耳聋 耳聋的一种。见《圣济总

录》卷一百一十四。《太平圣惠方》卷三十六："夫肾为足少阴之经，内藏精而气通于耳，耳宗脉之所聚也。若精调和，则肾脏强盛，耳闻五音。若劳伤血气，气兼受风邪，损于肾脏，而精脱，精脱者则耳聋。……其候颊颧色黑。"《医林绳墨·耳》："耳属少阴肾经，肾之窍也。肾气实，则耳聪；肾气虚，则耳聋。"治宜补益肾气为主，如益智散、苁蓉丸、六味丸加黄柏、知母、远志肉、石菖蒲等药。参见耳聋条。

肾虚自汗 自汗证之一。《证治汇补·汗病章》："肾虚自汗，潮热咳嗽。"《医略六书杂病证治》卷二十："肾虚自汗，夜热骨蒸。"治宜滋肾以固封藏，可用都气丸、五味子汤等方。参自汗条。

肾虚证 指肾气、肾阴、肾阳不足所致的各种证候。《脉经》卷二："肾虚，……病苦心中闷，下重，足肿不可以按地。"《圣济总录》卷五十一："肾虚，论曰肾主水，受五脏六腑之精而藏之。若肾气虚弱，则足少阴之经不利，故其证腰背痠痛，小便滑利，脐腹痛，耳鸣，四肢逆冷，骨枯髓寒，足胫力劣，不能久立。"《本草经疏》："肾虚，即肾水真阴不足。十八证，肾虚腰痛，属精气虚；骨乏无力，属阴精不足，虚主骨故也；骨蒸潮热，属精血虚极；梦遗泄精，属肾风有火；溺有余沥，属气虚；溺血，血淋，属肾虚有火，热伤血分；伤精白浊，属房劳过度，以致精伤流出，似白浊证；五淋属肾虚，兼有湿热；精塞水窍不通，属房欲不竟，或思欲不遂，或惧泄忍精，或老人气不足以送精出窍，齿浮，真牙摇动，及下龈软，或齿衄，属肾虚有热；下消，属肾阴虚，火扰下焦；善恐，属肾气虚，肾藏志故也；阴窍漏气，属肾气虚不固，肾主纳气，虚则不能纳，故见是证；疝，属虚寒，湿邪乘虚客之所致；……奔豚，属肾虚，脾家湿邪下传客肾所致。"方用补肾丸、鹿茸丸、补肾磁石丸等方。参肾病、肾虚寒等条。

肾虚泄 病名。《世医得效方·大方脉杂医科》："五味子散治五更天明溏泄一次，名肾虚泄。"详肾泄、肾虚五更泄泻条。

肾虚热证 劳热之一。见《中国医学大辞典》。《杂病源流犀烛·虚损劳瘵源流》："肾热，极重按至骨乃得，肾主骨也。亥子时尤甚。必兼腰膝脊臂股后痛，耳鸣，遗泄，二便不调，骨痿不能起，……。"治宜滋肾养阴。选用滋肾丸、六味地黄丸等方。

肾虚眩晕 证名。指肾虚精气不足，不能上充脑髓所致的眩晕。《证治汇补·肾虚眩晕》："人身阴阳，相抱而不离，故阳欲上脱，阴下吸之。若淫梦过度，肾家不能纳气归元，使诸气逆奔而上，此眩晕出于肾虚也。"《医略六书·眩晕》："肾水亏少，虚火炎上，眩晕耳鸣，此嗜欲人多肾虚眩晕。"又："肾水不足，无以极养少火，而虚火炎上，不能纳气归元，故眩晕不已，谓之肾虚眩晕。"可用鹿茸肾气丸、左归丸、右归丸等方。参气虚眩晕等条。

肾虚胸胁痛 证名。见《金匮翼·胁痛统论》。多由房劳伤肾，气虚血涩所致。《不居集·胁痛》："凡房劳过度，肾虚羸弱之人，多有胸胁间隐隐作痛，此肝肾精虚，不能化气，气虚不能生血而然。"治宜补肾、培益气血。如大补元煎、小营煎、右归饮等方及补骨脂、杜仲、牛膝、阿胶、当归、熟地、枸杞子等药。参胁痛、房劳胁痛条。

肾虚寒证 指肾气亏损，肾阳虚衰所出现的证候。《备急千金要方》卷十九："病苦心中闷，下重足肿不可以按地，名曰肾虚寒也。"《三因极一病证方论·肾膀胱经虚实寒热证治》："肾虚寒，阴痿，腰脊痛，身重，缓弱，足腰不可以按，语音混浊，阳气顿绝。"可伴见耳鸣、目眩、小便清长等症。治宜温补肾阳为主，选用温肾散、益志汤、人参补肾汤、八味丸等方。

肾虚腰痛 证名。腰痛之一。见《千金

要方》卷十九。又称肾经腰痛。因房室不节、劳倦过度损伤肾脏精气所致。《金匮翼·腰痛》："肾虚腰痛者，精气不足，足少阴气衰也。……其症形羸气少，行立不支，而卧息少可。无甚大痛，而悠悠戚戚，屡发不已。"又有阳虚与阴虚之不同。肾阳虚者，症见腰间冷痛，手足不温，面色苍白，便溏溺清，舌淡，脉沉细或虚软无力。治宜温阳补肾。可用八味丸、二至丸、右归丸、补髓丹等方。肾阴虚者，症见腰痛绵绵，面色黧黑，头晕耳鸣，咽干口燥。阴虚而火旺者，更见面红升火，内热心烦，小便黄赤，舌质红，脉细数或洪而无力。治宜滋阴补肾。可用左归丸、当归地黄饮、大补阴丸等方。本证可见于慢性肾炎、肾下垂、腰肌劳损、脊椎结核等病。

肾着　古病名。指寒湿内着肾经而见腰部寒冷沉重者。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》："肾着之病，其人身体重，腰中冷，如坐水中，……久久得之，腰以下冷，腹重如带五千钱。"宜用甘姜苓术汤。参腰重条。

肾厥头痛　证名。指肾气上逆所致的头痛。《普济本事方》卷二："治肾气不足，气逆上行，头痛不可忍，谓之肾厥。其脉举之则弦，按之石坚。"症见头顶痛不可忍，四肢厥冷，胸脘痞闷，多痰，脉弦等。治宜温肾纳气。选用玉真丸、来复丹、黑锡丹等方。如痛愈甚者，宜茸硃丹。参头痛条。

肾遗　指肾病而致遗精的病症。《医宗必读》卷九："肾病而遗者，色黑而髓空。"治宜补肾固精为主。可以六味地黄丸加减。参遗精、五脏遗精条。

肾喘　证名。见《证治准绳·喘》。指肾中水邪上干于肺的气喘。《景岳全书·喘促》："水病为喘者，以肾邪干肺也，然水不能化而子病及母，使非精气之败，何以至此。"《医学纲目·喘》："肾喘则呕咳。经云，少阴所谓呕咳上气喘者，阴气在下，阳气在上，诸阳气浮，无所依从，故呕咳上气喘也。"治疗宜分虚实，实者泻肺逐水，虚者温肾利水，如泻白散、直指神秘汤、真武汤、加减金匮肾气汤等方均可选用。亦指肾中火衰，水泛为痰之喘。《石室秘录》卷二："凡人有气喘不得卧，吐痰如涌泉者，舌不燥而喘不甚，一卧则喘，如此非外感之风邪，乃肾中之寒气也。盖肾中无火则水无所养，乃上泛而为痰，将胃中之水尽助其汹涌之势，火亦可止遏矣。法当用六味丸汤加附子、肉桂大剂饮之。"参水喘、真元耗损喘条。

肾痨　病名。即肾劳。详该条。《慎柔五书》卷四以虫在于肾则成肾痨。治以千金散等方。

肾癃　病名。出《备急千金要方》卷五。可表现为多种症状。《医学入门·癃》："肾癃，面黑直视，如尸猪叫。"《景岳全书》卷四十一："面黑，目振，吐涎沫，形体如尸，其声如猪者曰肾癃。"《医林绳墨》卷六以癃症因淫欲太过，内气空虚，相火妄动，郁而生涎，因恐而发，腰背强直，头眩旋运者为肾癃。参见癃、五脏癃条。

肾蒸　二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

肾痿　证名。指骨痿。《医宗必读·痿》："肾痿者，骨痿也。"详骨痿条。

肾痹　病名。由骨痹发展而成，亦有称为骨痹者。《素问·痹论》："肾痹者，善胀，尻以代踵，脊以代头。"《圣济总录·肾痹》："骨痹不已，复感于邪，内舍于肾，是为肾痹。其证善胀，尻以代踵，脊以代头。盖肾者胃之关，关门不利，则胃气不行，所以善胀，筋骨拘迫，故其下挛急，其上蹉屈，所以言代踵代头也。"《症因脉治·肾痹》："肾痹之症，即骨痹也。善胀，腰痛，遗精，小便时时变色，足挛不能伸，骨痿不能起。"可用远志丸、防风丸、白附子丸、河车封髓丹、家秘滋肾丸等方。参骨

痹条。

肾满漏疾 古病名。《世医得效方》卷十："玉茎硬不痿，精流无歇时，时如针状，捏之则脆，乃为肾满漏疾。韭子、破故纸各一两为末，每服三钱。"

味痰 痰证之一。见《泰定养生主论》。即酒痰。详见该条。

呵欠 证名。又称欠。见《医碥·欠嚏》。详欠条。

呷咳 病名。即指呷嗽。见《外台秘要》卷九。详呷嗽条。

呷嗽 病名。指咳嗽呀呷有声。《诸病源候论·咳嗽病诸候》："呷嗽者，犹是咳嗽也。其胸鬲痰饮多者，嗽则气动于痰，上搏喉咽之间，痰气相击，随嗽动息，呼呷有声，谓之呷嗽。其与咳嗽大体虽同，至于投药则应加清痰破饮之物，以此为异耳。"《和剂局方》卷四："肺感寒邪，咳嗽上气，胸膈烦满，项背拘急，声重鼻塞，头昏目眩，痰气不利，呀呷有声。"方用射干丸、款冬花散、华盖散等。参见咳嗽条。

呴(xū)嗽 病名。见《普济本事方》卷二。指咳嗽气喘，喉中有哮鸣声者。方用紫金丹。考紫金丹药性峻烈，用时必须严格掌握剂量，以防中毒。参冷哮条。

果木渴 渴证之一。《证治要诀》卷八："有果木渴，因多食果子所致，宜麝香之药。"参渴条。

果中毒 病名。因食有毒或变质果类而出现中毒症状者。《本草纲目》卷四载有解果菜毒的药物，如麝香、猪骨灰、米醋、童便、甘草、酱汁、酒糟、葛汁、白兔藿、白花藤、杏根等。可参考。参饮食中毒、中毒条。

果菜积 病证名。指过食瓜果菜蔬而致积滞泻利者。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："果菜积，多食果菜成积，不时泻利，腹中若有傀儡也。宜丁香、麝香、肉桂。方用妙应丹，桂香丸，平胃散加丁、麝。"亦有过食瓜果致痢久不愈，而见便血时发时止，里急后重，时或不禁，脉软不数等症。可用醉香玉屑方。参积、食积条。

固泄 固，指二便不通；泄，指二便不禁。《素问·至真要大论》："诸厥固泄，皆属于下。"

固瘕 病名。❶指脾肾虚寒所致大便先硬后溏的病症。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》："阳明病，若中寒者不能食，小便不利，手足濈然汗出，此欲作固瘕。必大便初鞕后溏，所以然者，以胃中冷，水谷不别故也。"《伤寒来苏集》卷三："固瘕，即初鞕后溏之谓，肛门虽固结，而肠中不全干也。溏即水谷不别之象，以癥瘕作解者谬矣。"治宜温中散寒，如用理中汤加附子、肉桂等药。❷指大瘕泻。《医宗金鉴》卷四："固瘕者，大瘕泻也，俗谓之溏泻。固者，久而不止之谓也。"参见大瘕泻、溏泻条。

岭南脚气 古病名。见《圣济总录》卷八十四。又名瘴毒脚气。详该条。

〔丿〕

刮肠 病名。❶即直肠泻。见《杂病广要·泄泻》："日夜频并，饭食直过者，名曰刮肠。又《灵枢》所谓洞泄，《仓公传》遏风，皆此证也。"详见直肠泻条。❷指粪便排出粘稠物。因似肠中如刮而出，故名。《证治要诀》卷二："又有内不太满，犹生寒热，未可下而便下之，内虚热入，挟热自利，脐下必热，大便赤黄色，及下肠间津汁垢腻，名曰利肠。"宜选用白头翁汤、黄芩汤、芍药汤等方。参见痢疾、泄泻等条。❸指诸病坏证而下脓血等秽物者。《证治要诀》卷八："诸病坏证，久下脓血，或如死猪肝色，或五色杂下，频出无禁，有类于痢，俗名刮肠。此乃脏腑俱虚，脾气欲绝，故肠胃下脱，若投痢药则误矣，六柱饮为稳。"参见痢疾有关条。

季冬痹 病名。出《灵枢·经筋》。十二

经筋病中的手少阴筋病。《灵枢注证发微》："此证当发于十二月之时，故名之曰季冬痹也。"详手少阴经筋病候条。

季胁痛 证名。出《灵枢·经筋篇》。指软肋部疼痛。多由肝虚所致。《医学芻言》第十四章论两旁季胁痛认为"一属肝血虚，一属肝气虚也。"肝气虚常兼见胆怯善惊，疼痛绵绵不止，视物昏糊，耳鸣等症，治宜四君子汤合乌梅丸等方。肝血虚，常兼见时时烦热，口干，持续隐痛或有拘急感，头眩眼花，舌质红等症，治宜一贯煎、补肝散等方。季胁痛亦可由肾虚所致。《张氏医通》卷五："季胁痛，无不因肾虚者，加减八味丸、肾气丸选用。"参胁痛条。

季春痹 病名。出《灵枢·经筋》。十二经筋病中的足阳明筋病。《灵枢注证发微》："此证当发于三月之时，故名之曰季春痹也。"详足阳明经筋病条。

季秋痹 病名。出《灵枢·经筋》。十二经筋病中的足厥阴筋病。《灵枢注证发微》："此证当发于九月之时，故名之曰季秋痹也。"详足厥阴经筋病候条。

季夏痹 病名。出《灵枢·经筋》。十二经筋病中的手少阳筋病。《灵枢注证发微》："此证当发于六月之时，故名之曰季夏痹也。"详手少阳经筋病候条。

併病 指伤寒一经证候未解，而另一经证候已见。出《伤寒论》。《伤寒论大全·伤寒合病并病》："并病者，一经先病未尽，又过一经之传者，为并病。"《景岳全书·伤寒典》："并病与合病不同，合病者，彼此齐病也；并病者，一经先病，然后渐及他经而皆病也。如太阳先病，发热头痛，而后见目痛鼻干不眠等证者，此太阳并于阳明也；或后见耳聋胁痛，呕而口苦等证者，此太阳并于少阳也；或后见腹满嗌干等证者，此太阳并于太阴也；或后见舌干口燥等证者，此太阳并于少阴也；或后见烦满囊缩等证者，此太阳并于厥阴也。若阳明并于三阴者，必鼻干不眠而兼三阴之证；少阳并于三阴者，必耳聋呕苦而兼三阴之证。阴证虽见于里而阳证仍留于表，故谓之并。"阳经并病，如表症未罢，宜先解表。《伤寒括要·合病并病论》："太阳阳明并病，若并未尽，所谓太阳症不罢，面赤怫郁，烦躁短气，是传未尽，尚有表症，当麻黄桂枝各半汤汗之。"参见太阳少阳并病，二阳并病等条。

金石中毒 病名。因服食金石类药过量、过久而产生中毒症状者。《本草纲目》卷四载有解金石毒的药物，如甘草、大青、麦门冬、人参、荠苨汁、蓴心、冬葵子、瞿麦、金星草、葳蕤汁、萱根、蕉根汁、绿豆、胡豆、白扁豆、黑大豆、余甘子、冬瓜练、水芹汁、寒水石、魁蛤肉、牡蛎肉、蚌肉、蚬子肉、蛏肠、石蟹汁、鳗鲡鱼、田螺、雁肪肉、鸭肉、白鸭通、乌肉、犀角汁、猪膏、猪肉、猪骨、猪血、羊血、兔血、牛膍、兔肉等。可参考。

金劳黄 古病名。见《儒门事亲》卷六。即脾疸。详该条。

金郁 五郁之一。指肺气郁闭之症。出《素问·六元正纪大论》。《证治汇补·郁症》："癃闭、气喘、胀满、不眠，皆金郁也。治宜泄之。泄者渗泄而利小便，疏通其气也。"可用泄郁汤、和金汤、善泄汤等方。参五郁、郁证条。

往来寒热 证名。指寒症与热症间代而作，日发一次或数次的症状。为伤寒少阳病主症。《伤寒论·辨少阳病脉证并治》："本太阳病不解，转入少阳者，胁下鞕满，干呕不能食，往来寒热，尚未吐下，脉沉紧者，与小柴胡汤。"《类证活人书》卷八："往来寒热者，阴阳相胜也。阳不足则先寒后热，阴不足则先热后寒。往来寒热有三证，小柴胡汤、大柴胡汤、柴胡桂枝干姜汤。有表证而往来寒热者，用小柴胡也；有里证而往来寒热者，大柴胡也；已表或已下而往来

寒热者，皆可用柴胡桂枝干姜汤也。”《伤寒发微论·论伤寒七十二证候》：“寒热往来，此证有三。一者中风证，小柴胡汤；二者热入血室证，刺期门；三者状如温疟，黄龙汤证。”《景岳全书·杂证谟》：“凡寒热往来之病，其证有二，盖一以外邪不解而然，一以阳盛阴虚而然。此其一为表证，一为里证，所当辨治不可紊也。寒邪郁伏经络而为寒为热，此似疟非疟之类也。治法虽宜表散，然邪气得以久留者，必其元气之虚而正不胜邪也，故凡治此者，皆当以兼补血气为主。若血分微虚，形气本不甚弱而邪有不解者，三柴胡饮；若火盛血燥而寒热不已者，一柴胡饮；若因劳倦或气体本弱或肝脾不足而邪有不净者，四柴胡饮或五柴胡饮或补中益气汤；若阳邪陷入阴分，微兼内热而邪有不解者，补阴益气煎；若脾胃阳气不健，中气不暖而邪有不解者，温胃饮；若病久元气大虚而寒热不退者，但当单培元气，不必兼散，宜五福饮、归脾汤，或大补元煎、理阴煎之类，察其阴阳，择而用之。若果阳虚，非用温补不可。”又：“阴虚阳胜，或阴阳俱虚而为寒热往来者，此以真阴不足，总属虚损之病也。然其阴阳微甚，亦所当辨。”本证亦可见于虚劳。《风劳臌膈四大证治·虚劳》：“虚劳之症，皆见发热，而虚损之热，多发于外，轻手按之即得，或潮热，或往来寒热。”参见虚劳发热条。

往来寒热疟 疟疾之一。指先寒后热或先热后寒发作无定时者。《太平圣惠方》卷五十二：“夫往来寒热疟者，由寒气并于阴，则发寒；风气并于阳，则发热。阴阳二气，更实更虚，故寒热更相往来也。”症见往来寒热，发歇无时，发病时面色青黄，甚则经年不差，形体瘦弱等。治用人参散吐方、乌梅圆、神效方等。参见疟疾条。

肤胀 病名。指因阳气不足，寒气留于皮肤而出现的全身肿胀。《灵枢·水胀》：“肤胀者，寒气客于皮肤之间，鼓鼓然不坚，腹大，身尽肿，皮厚，按其腹窅而不起，腹色不变，此其候也。”《医醇賸义》以此症由于宗气失守，虚气无归，寒气流窜周身皮肤，故腹大身肿而皮厚。治宜扶正祛寒，理气化浊，用祛寒建中汤等方。参见风水条。

肤瞤 即肌肉瞤动。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病，医发汗，遂发热恶寒，因复下之，心下痞，表里俱虚，阴阳气并竭，无阳则阴独，复加烧针，因胸烦，面色青黄，肤瞤者，难治。今色微黄，手足温者，易愈。”参筋惕肉瞤条。

肤蒸 二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸。

肢节肿痛 指四肢关节肿胀疼痛。多因风、寒、湿、热侵袭或瘀阻经络所致。《张氏医通·身体痛》：“肢节肿痛，痛属火，肿属湿，盖为风寒所郁，而发动于经络之中，湿热流注于肢节之间而无已也。”《丹溪心法·肢节痛》：“如肢节肿痛，脉滑者，当用燥湿，宜苍术、南星，兼行气药木香、枳壳、槟榔，在下者加汉防己。若肢节肿痛脉涩数者，此是瘀血，宜桃仁、红花、当归、川芎及大黄微利之。”《杂病源流犀烛·诸痹源流》：“有肢节肿痛，日夜无已时者，宜没药散、虎骨丸。”

肢节烦疼 即支节烦疼。见《伤寒来苏集·柴胡汤证》。详支节烦疼条。

肢节痛 证名。指四肢关节疼痛。《灵枢·百病始生》：“六经不通四肢，则肢节痛，腰脊乃强。”多因风湿、痰饮、瘀血流滞经络，或因血虚不能养筋所致。《丹溪心法·附肢节痛》：“如肢节痛，须用羌活，去风湿亦宜用之。如肥人肢节痛，多是风湿与痰饮流注经络而痛，宜南星、半夏；如瘦人肢节痛，是血虚，宜四物加防风、羌活；如瘦人性急躁而肢节痛发热，是血热，宜四物汤加黄芩、酒炒黄柏；如肢节肿痛，脉滑者，当用燥湿，宜苍术、南星兼行气药木

香、枳壳、槟榔，在下者加汉防己。若肢节肿痛，脉涩数者，此是瘀血，宜桃仁、红花、当归、川芎及大黄微利之。如倦怠无力而肢节痛，此是气虚，兼有痰饮流注，宜参、术、星、半。”本证可见于痹证、痛风等疾患。

肢肿　证名。即四肢肿。《医林绳墨》卷五：“肢肿者，四肢作肿也。盖四肢者，脾之脉络也。脾有所郁，则气血不调，以见四肢作肿，大率滞于血者，则痛肿难移，滞于气者，则俛仰不便，行血宜芎归汤加丹皮、白芷、秦艽、续断；行气宜二陈汤加厚朴、山查、白术、黄芩。”《证治要诀·肿》：“四肢肿，谓之肢肿，宜五皮饮加姜黄、木瓜。”参见水肿、四肢肿条。

肢痹　病名。指患在四肢的痹症。见《临证指南医案·痹》。详风痹、寒痹、湿痹条。

肿腮　病名。《杂症会心录》卷下：“肿腮一症，是疫病，非伤寒也，是清邪中上焦，非风热也。……为疫病之最轻者。其症初起，恶寒发热，脉浮数，耳之前后作肿痛，隐隐有红色。”临床治疗，体实者可用甘桔汤加牛蒡、丹皮、当归之属，体虚者可用甘桔汤加何首乌、玉竹、丹皮、当归之属。参大头瘟及妇科儿科分册痄腮等条。

胀　❶病名。《灵枢·胀论》：“夫胀者，皆在于脏腑之外，排脏腑而廓胸胁、胀皮肤，故命曰胀。……五脏六腑，各有畔界，其病各有形状。”《临证指南医案·肿胀》：“胀病之因更多，所胀之位各异。或因湿因郁因寒因热因气因血因积因虫，皆可为胀。或在脏在腑，在经络，在皮肤，在身之上下、表里皆能作胀。”胀病按脏腑分，有肝胀、心胀、脾胀、肺胀、肾胀、胆胀、小肠胀、胃胀、大肠胀、膀胱胀、三焦胀等；按邪正盛衰分，有虚胀、实胀等；按病因分，有寒胀、热胀、食胀、气胀、蛊胀、酒胀、血胀等。❷证名。指胀闷不适的一种自觉症状。如头胀、胁胀、腹胀之类。详各有关条。

胀病　指以腹部胀满为主症的疾患。见《杂病源流犀烛》卷五。简称胀。《灵枢·胀论》载有五脏六腑胀病症状。《东医宝鉴·胀满》论胀病有七，即指寒胀、热胀、谷胀、水胀、气胀、血胀、蛊胀等。胀病有虚实之分。其病多由七情内伤，六淫外侵，饮食失节，房劳过度，致脾土受伤，转输失职，清浊相混，隧道壅塞，水湿痰瘀积滞不化而成。详胀病有关条。

股不收　指两腿弛缓无力，屈伸不利。出《素问·脉解篇》。

肺中风　古病名。又名肺脏中风。指风邪入中于肺经而致的症候。主症为口燥，胸满，气喘，身运不能自主，昏冒，肿胀等。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》：“肺中风者，口燥而喘，身运而重，冒而肿胀。”《诸病源候论·风病诸候》：“肺中风，偃卧而胸满短气，冒闷汗出，……。”参见肺脏中风条。

肺中寒证　指肺受寒邪所致的病症。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》：“肺中寒，吐浊涕。”《三因极一病证方论·五脏中寒证》：“肺中寒之状，喜吐浊涎，气短，不能报息，洒洒而寒，吸吸而咳。”治宜温肺散寒为主。选用华盖汤、温肺散等方。

肺气实　证名。见《圣济总录》卷四十九。即肺气盛。《灵枢·本神》：“肺气虚，则鼻塞不利，少气；实则喘喝，胸盈仰息。”详肺气盛条。

肺气盛　证名。出《灵枢·淫邪发梦》。又名肺气实。指肺经邪气盛实的证候。《诸病源候论·肺病候》：“肺气盛，为气有余，则病喘咳上气，肩背痛，汗出，尻阴股膝踹胫足皆痛，是为肺气之实也。”参肺病、肺实条。

肺手太阴经病证　病证名。因手太阴肺

经经气异常而致。《灵枢·经脉》："肺手太阴之脉，……是动则病肺胀满，膨膨而喘咳，缺盆中痛，甚则交两手而瞀，此为臂厥。是主肺所生病者，咳，上气喘，渴，烦心胸满，臑臂内前兼痛，厥，掌中热。气盛有余则肩背痛，风寒，汗出中风，小便数而欠。气虚则肩背痛，寒，少气不足以息，溺色变。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。"《脉经·肺手太阴经病证》："肺气虚则鼻息利少气，实则喘喝胸凭仰息。"并列举了吐血、漏汗、小便赤、肺痹、肺中风、肺胀、肺痈、息积等多种病症。

肺风 病名。❶指肺受风邪所致的疾患。《素问·风论》："肺风之状，多汗恶风，色皏然白，时咳短气，昼日则差，暮则甚，诊在眉上，其色白。"《奇效良方》治风中于肺，用五味子汤。❷指类似酒皶鼻的病症。见《丹溪心法·鼻病》又名肺风疮。主要症状为鼻色赤。《类证治裁·鼻口症》："有不饮酒而鼻色赤，名肺风，由血热郁于肺。清肺饮。"参见肺风疮条。❸指肺脏感受风毒而致皮肤生疮，搔痒，或面上生疮，鼻头赤烂等病症。见《圣济总录》卷五十。可选用牛黄散、枇杷叶丸、鹅梨煎丸、皂荚丸等方。

肺风疝 古病名。《素问·四时刺逆从论》："少阴有余，病皮痹、隐轸；不足病肺痹；滑则病肺风疝。"《类经》卷十七："滑实则君火为邪，故乘于肺，病在气也。"参见风疝条。

肺风疮 病名。又名肺风。《杂病源流犀烛·鼻病源流》："鼻上红肿……亦有不饮酒而色赤者，名肺风疮，由血热郁肺不散也。宜清肺饮子，或四物、五苓二方合用，加黄芩、黄柏。"参肺风条。

肺火恶寒 恶寒证之一种。《证治汇补·恶寒章》："肺火恶寒，肺受火克，毛窍常疏，不能固腠理而洒淅恶寒者，必兼咳嗽咽干，治宜清金润肺。"方用泻白散去梗米加黄芩、杏仁、阿胶，或甘桔汤加酒芩、山栀、麦冬、五味、酸枣仁等。参恶寒条。

肺心痛 厥心痛之一。因肺病而邪乘心所致。《灵枢·厥病》："厥心痛，卧若徒居，心痛间，动作痛益甚，色不变，肺心痛也。"《医宗金鉴》卷四十三："歧骨陷处痛，名心痛。横满连胸，名肺心痛。"《张氏医通·诸痛门》："肺心痛者，多由上焦不清，病在气分，若知其在气则顺之。"参厥心痛、心痛条。

肺水 病名。五脏水肿病之一。《金匮要略·水气病脉证并治》："肺水者，其身肿，小便难，时时鸭溏。"多因肺失宣肃，不能通调水道，下输膀胱所致。参见水肿、十水条。

肺邪胁痛 证名。见《症因脉治·胁痛论》。指肺受病邪所引起的胁痛。多因寒邪袭肺，水饮内停，或邪热灼肺，肺络受伤所致。症见恶寒发热，咳嗽气喘多痰，胁肋刺痛，或咳引胁痛。属寒者，常兼见咳吐稀涎痰沫，身热不高或无热，脉多弦紧。治宜发汗驱饮，如小青龙汤等方。属热者，常兼见咯痰腥臭，面赤，里热炽盛，脉数。治宜清肺涤痰，如泻青各半汤等方，并可针刺少商穴出血。参感冒胁痛、停饮胁痛条。

肺虫病 病名。九虫病之一。见《诸病源候论·九虫病诸候》。《普济本事方·诸虫飞尸鬼疰》："肺虫如蚕。……惟肺虫为急，肺虫居肺叶之内，蚀人肺系，故成瘵疾，咯血声嘶，药所不到，治之为难。"参痨虫病条。本病与肺吸虫病相类似。

肺伤 指肺脏伤损的疾患。《脉经》卷六："肺伤者，其人劳倦则咳唾血，其脉细紧浮数，皆吐血，此为操扰嗔怒得之，肺伤气拥所致。"《诸病源候论·虚劳病诸候》："形寒寒饮伤肺，肺伤，少气，咳嗽，鼻鸣。"参见气极、七伤条。

肺劳 病名。因劳损伤肺所致。《诸病

源候论·虚劳病诸候》："肺劳者，短气而面肿，鼻不闻香臭。"《圣济总录·虚劳门》："肺劳者。或因形寒饮冷，逆秋气所致。其证短气面肿，鼻不闻香臭，胸中结滞，气乏声嘶，咳嗽呀呷，咯唾稠粘，或唾脓血，或咽喉干痛，不能唾，上气喘满，渐至衰瘁，寒热时作，饮食减耗，皆肺劳之证。"可选用补气黄芪汤、桑白皮散、人参丸等方。《太平圣惠方·治肺劳诸方》："治肺劳，痰唾稠粘，日晚即寒热，面色赤，胁肋防满，宜服桔梗散。"又："治肺劳，痰嗽气急，抽牵，五脏不安，宜服鳖甲圆。"参见虚劳、五劳条。

肺极 病名。《奇效良方·痨瘵门》："肺极，则寒痹腰痛，心下坚，有积聚，小便不利，手足不仁。"治以天门冬大煎。参见六极条。

肺饮 痰饮之一。因饮邪在肺所致。《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证治》："肺饮不弦，但苦喘、短气。"参见痰饮、支饮条。

肺郁 五脏郁证之一。《赤水玄珠》卷十一："肺郁者，皮毛燥而不润，欲嗽而无痰。治宜桔梗、麻黄、豆豉。"参五脏郁证条。

肺鸣 证名。指肺气不利而发生喘鸣声。《素问·痿论》："有所失亡，所求不得，则发肺鸣。"王冰注："肺藏气，气郁不利，故喘息有声。"

肺胀 证名。胀病之一。《灵枢·胀论》："肺胀者，虚满而喘咳。"《金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治》："咳而上气，此为肺胀，其人喘，目如脱状，脉浮大者，越婢加半夏汤主之。""肺胀，咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下有水，小青龙加石膏汤主之。"《医醇賸义》："肺为气之脏，居于至高，寒气逆上，肺气壅塞，……故虚满而喘咳，当温肺降气，以解寒邪，温肺桂枝汤主之。"参喘、胀病条。

肺胀嗽 病名。《证治汇补·咳嗽章》："肺胀嗽者，喘急气粗，或左或右，则眠不得，有嗽久而成肺痈肺痿者，必云门中府引痛，咯吐脓血，腥秽异常。"《松崖医径·咳嗽》："肺胀嗽，用桔梗香薷汤。"参见肺胀条。

肺疟 病证名。五脏疟之一。《素问·刺疟篇》："肺疟者，令人心寒，寒甚热，热间善惊，如有所见者，刺手太阴、阳明。"治宜桂枝加芍药汤等。参见五脏疟条。

肺疝 古病名。指寒邪侵犯肺所致的疝症。《素问·大奇论》："肺脉沉搏为肺疝。"王冰注："皆寒薄于脏故也。"其症可见少腹与睾丸胀痛，小便不通等。参见疝条。

肺实证 证名。指肺病因邪气盛实所出现的证候。多由外邪侵袭，或气壅痰聚等所致。《脉经》卷二："肺实也，苦少气，胸中满彭彭，与肩相引。"又："肺实，……病苦肺胀汗出若露，上气喘逆，咽中塞如欲呕状。"《圣济总录》卷四十八："肺实热则喘逆胸凭仰息，手太阴经为热气所加，故为肺实之病。甚则口赤张，引饮无度，体背生疮，以至股膝腨胫皆痛。"《本草经疏》："肺实八证：喘急，属肺有实热及肺气上逆；气壅，属肺热气逆；声重痰稠，属肺热；肺痈，属肺热极；肺胀闷，属肺热；吐脓血，血痰，咳嗽，嗽血，属肺家火实热甚，此正邪气胜则实之谓；喉癣，属肺热，上消；属肺家实火，及上焦热。"方用地骨皮汤、葶苈丸等方。参肺病、肺实热等条。

肺实咳嗽 病名。指肺胀气逆所致的咳嗽。《不居集》卷十五："肺实咳嗽，肺胀者，肺统周身之气，因虚不能宣布于外，而反逆归本经，诸窍闭塞，不通而发胀，则中府、云门两胁间之经络，皆不能利，所以气高而似喘，实非喘症。若邪偏左，则左体不能贴席；偏右则右体不能贴席；贴席则喘嗽不止。其脉左则人迎弦急，右则气口弦紧而滑数。此为气实咳嗽，宜疏散。"参见咳

嗽、肺胀嗽条。

肺实热证 指肺经邪热炽盛的病证。《备急千金要方》卷十七："病苦肺胀，汗出若露，上气喘逆，咽中塞，如欲呕状，名曰肺实热也。"常伴见鼻孔煽张，咳嗽，或吐脓血等。治宜泻肺清热为主。选用地骨皮汤、清肺汤等方。

肺实嗽 证名。指病邪盛实，肺气壅阻的咳嗽。《万病回春》卷四："肺实嗽者，新嗽有邪也。桑皮、桔梗、杏仁、枳壳、苏叶主之。"《松崖医径》卷下："肺实嗽喘，两寸脉洪而有力者，用葶苈桑白皮汤。"参见咳嗽、新咳、肺实咳嗽等条。

肺经咳嗽 病名。又称肺咳。❶指风寒束肺之实咳。《不居集》卷十五："肺经咳嗽。肺咳之状，咳而喘息有音，甚则唾血，麻黄汤主之。"❷指真阴不足、肺脾素燥、劳伤或七情动火等伤肺而致咳者。《症因脉治·内伤咳嗽》："肺经咳嗽之症，气急喘咳，痛引缺盆，右胁下洒淅恶寒，或右臂筋吊痛，痰咯难出或吐白涎，口燥声嘶，此肺咳之症也。"多因真阴不足，劳伤火动，或肺脾素燥，不慎辛热炙煿，或恼怒思虑忧愁动火所致。治宜泻白一物汤、清肺饮；脉见迟细，人参补肺饮、人参生脉散、琼玉膏；肺有热痰，青黛海石丸、节斋化痰丸；久嗽肺虚，百花膏等方。参见咳嗽、肺咳条。

肺经燥痰 痰证之一。即燥痰。见《不居集》卷十七。参见该条。

肺经失血 证名。见《不居集》卷十三。多因悲忧伤肺，络损动血，或脾气不守，胃气不清，使经脉傍绝，真脏坏决而致。其症或鼻衄，或呕血。宜用麦冬饮子、大蓟饮、人参救肺汤、天冬丸、资成汤等方。参见失血条。

肺咳 病名。❶指咳喘有声，剧则唾血者。《素问·咳论》："肺咳之状，咳而喘息有音，甚则唾血。"因受寒所致者，用麻黄汤；肺虚有火者，用泻白一物汤、人参补肺汤，或用《千金》五味子汤去续断、地黄、赤小豆，加麦冬、玉竹、细辛等。参见肺经咳嗽条。❷十咳之一。《诸病源候论·咳嗽病诸候》："七曰肺咳。咳而引颈项而唾涎沫是也。"治宜刺手太泉。参见十咳、咳嗽条。

肺绝 五脏绝候之一。❶指肺气绝出现的危重脉证。《华氏中藏经》卷上："面赤，无右寸脉者，肺绝也。"《注解伤寒论·辨脉法》："若汗出发润，喘不休者，此为肺先绝也。"《脉经》卷四："病人肺绝三日死，何以知之？口张但气出而不还（一曰鼻口虚张，短气）。"❷指中风脱证之一。《医林绳墨·中风》："鼾睡自汗者，肺绝也。"《医宗必读·真中风》："若中风昏倒……声如鼾，肺绝。"参中风脱证条。

肺损 病名。五脏虚损之一。又称损肺。《慎斋遗书·虚损》："虚损一证，或从上而损下，如金衰卫弱而多外感之来，则气伤而肺损。"《难经·十四难》："一损损于皮毛，皮聚而毛落。"《杂病源流犀烛·虚损劳瘵源流》："损肺伤气，毛槁皮焦，急宜养气，宜四君子汤。"《类证治裁·虚损》："考《难经》治法，损其肺者，益其气，保元汤。"参虚损条。

肺损咯血 病证名。指久咳肺络损伤之咯血。初起宜清肺宁络，用薏苡仁散（见《杂病源流犀烛·诸血源流》）。日久气血两虚，客热不除，咳嗽咽干，多唾涎沫，血色鲜红者，宜补益气血，健脾和络，用大阿胶丸（见《丹溪心法·吐血》）。参见咯血条。

肺热久嗽 病名。指肺热而致长期不愈的咳嗽。《医说》卷四："肺热久嗽，身如炙，肌瘦，将成肺劳，以枇杷叶、木通、款冬花、紫苑、杏仁、桑白皮等分，大黄减半，如常制为末，蜜丸樱桃大一丸，食后夜卧含化，未终剂而愈。"《不居集》卷十五治肺热久嗽，用一物黄芩汤治疗。参见久

咳、咳嗽等条。

肺热身肿 证名。身肿类型之一。《症因脉治》卷三："肺热身肿之症，喘咳烦满，不得仰卧，喘息倚肩，身首皆肿，小便赤涩，此即内经诸气臜郁，肺热成肿之症也。肺热身肿之因，肺热叶焦，肺气怫郁，升降之令不行，治节之官失职，则经络壅闭，营卫不调，而遍身头面皆肿矣。"脉多洪数或见弦数。治宜选用家秘泻白散、二冬二母汤、泻心汤、泻青丸，以及葛根石膏汤、葶苈清肺饮等方。参见身肿、水肿条。

肺热证 指肺热引起的病症。《素问·痿论》："肺热者，色白而毛败。"并可见喘鸣等症。《证治准绳·杂病》："肺热者，轻手乃得，微按全无，瞥瞥然见于皮毛上，为肺主皮毛故也。日西尤甚，乃皮毛之热也。"肺热有虚实之分，参肺实热、肺虚热、皮毛痿条。

肺热病 指肺受邪热所致的病症。《素问·刺热篇》："肺热病者，先淅然厥，起毫毛，恶风寒，舌上黄，身热，热争则喘咳，痛走胸膺背，不得太息，头痛不堪，汗出而寒。"

肺热腹胀 证名。指肺热壅阻，气机失畅引起的腹胀。《症因脉治》卷三："肺热腹胀之症，喘息倚肩，不得仰卧，烦闷咳逆，腹胀胸痛，常胀不退。"多因肺素有热，或膏粱酒湿，火热熏肺，肺热焦满，壅阻气道所致。治宜清肺为主。喘息倚息，不得仰卧，烦闷咳逆，宜葶苈泻肺汤合泻白散。胃火熏蒸，腹胀作痛，大便结者，宜枳桔大黄汤。心火刑金，泻心各半汤。木中火发，泻青各半汤。参见腹胀、内伤腹胀条。

肺热痿 痿证之一。见《医宗必读·痿》。指皮毛痿。详该条。

肺热痿软 证名。又名肺热痿。多因郁火克金，肺热叶焦，或肾火上炎所致。《症因脉治》卷三："肺热痿软之症，皮肤干揭，上则喘咳，下则挛拳。此《内经》肺热成痿之症也。"治宜滋肾清肺。肾火上炎，可用知柏天地煎，玄武胶为丸；肺中伏火，可用二母二冬汤合家秘泻白散等。参痿、皮毛痿条。

肺热瘴疟 病名。疟疾之一。《症因脉治》卷四："肺热瘴疟之症，发则阳气盛而不衰，故但热而不寒，令人消烁脱肉。此《内经》肺素有热之瘴疟症也。肺热瘴疟之因，《内经》云，肺素有热，热盛于身，因有所用力，腠理开泄，风寒舍于皮肤之内，分肉之间，邪盛于阳，不涉于阴，则但热不寒，而肺热瘴疟之症作矣。"宜用防风泻白散，以散舍于皮肤之风寒；用石膏泻白散，以治肺素有热；用凉八味丸，滋阴清肺，以治阴虚阳亢，消烁脱肉。参见瘴疟、疟疾条。

肺热鼻衄 病证名。见《中国医学大辞典》。指因肺热上壅而致的鼻腔出血。《杂病源流犀烛·诸血源流》："有由肺经实热者，宜青黄散。"若阴虚火动，邪火上归于肺，当清肺降火，宜白虎汤加地黄、犀角、丹皮、白芍、山栀、扁柏。若风热犯肺，症见鼻燥而衄，口干，或身热，咳嗽痰少，舌红，脉数，治宜疏风清热，方如桑菊饮加桑皮、茅根之类；无表症者，去薄荷、桔梗，加黄芩、山栀等品，或加玄参、麦冬之类以养阴清肺。参见鼻衄条。

肺积 古病名。五积之一。《难经·五十四难》："肺之积，名曰息贲。"《脉经·平五脏积聚脉证》："诊得肺积脉浮而毛，按之辟易，胁下气逆，背相引痛，少气，善忘，目瞑，皮肤寒，……主皮中时痛，如蚤啮之状，甚者如针刺。时痒，其色白。"治宜大七气汤加桑白皮、半夏、杏仁，兼吞息奔丸（见《证治准绳·杂病》）。参息贲条。

肺脏中风 古病名。亦称肺中风。泛指风邪入中于肺发生的症候。《太平圣惠方·治肺脏中风诸方》："肺主于气。气为卫，卫为阳。阳气行于表，荣华于皮肤。若卫气

虚少，风邪相搏，则胸满短气，冒闷汗出，噫吸颤掉，语声嘶塞，身体沉重，四肢萎弱，其脉浮数者，是肺脏中风之候也。”参见肺中风条。

肺病 病名。指肺脏的各种病证。有寒热虚实之分。肺为娇脏，主皮毛，主一身之气，司呼吸，开窍于鼻，又为水之上源。多由外邪侵袭，或痰饮内聚，或肺气肺阴不足所致。《素问·藏气法时论》：“肺病者，喘咳逆气，肩背痛，汗出，尻阴股膝髀腨胫足皆痛。虚则少气，不能报息，耳聋，嗌干。”《难经·十六难》：“假令得肺脉，其外证面白，善嚏，悲愁不乐，欲哭，其内证齐右有动气，按之牢若痛，其病喘咳，洒淅寒热，有是者肺也。”《脉经》卷六：“肺病，其色白，身体但寒无热，时时咳，其脉微迟为可治。”《仁斋直指附遗方论》卷二：“肺病，面白悲愁，嚏哭，吐衄，交血喘咳，寒热，脐右动气。”《太平圣惠方·肺脏论》：“夫肺为华盖，覆于诸脏。若肺虚则生寒，寒则阴气盛，阴气盛则声嘶，语言用力，颤掉缓弱，少气不足，咽中干，无津液，虚寒之气，恐怖不乐，咳嗽及喘，鼻有清涕，皮毛焦枯，诊其脉沉缓者，此是肺虚之候也。”又“夫肺实则生热，热则阳气盛，阳气盛则胸膈烦满，口赤鼻张，饮水无度，上气咳逆，咽中不利，体背生疮，尻阴股膝踹胫足皆痛，诊其脉滑实者，是肺寒之候也。”《本草纲目·脏腑虚实标本用药式》：“肺藏魄属金，总摄一身元气，主闻，主哭，主皮毛。本病，诸气臌郁，诸痿喘呕，气短，咳嗽上逆，咳唾脓血，不得卧，小便数而欠，遗失不禁。标病，洒淅寒热，伤风自汗，肩背痛冷，臑臂前廉痛。”《杂病源流犀烛·肺病源流》：“夫肺主皮毛，……汗出中风，与形寒饮冷，皆能伤肺，故其现证，如鼻塞声重，喘咳，气逆，肩背痛，嚏喷，胸满烦心，亦与太阳同。五志之火上炎，阴虚内烁，肝火挟心而刑金，亦能伤肺，故其现证，如肺萎，肺痈，痿躄，吐血声嘶，息有音，鼽衄，掌热，喘不休，口血出，皮毛焦，皆由火燥焦卷之故。若虚，则有少气不能报息，耳聋，嗌干诸证，而此诸证，或由外伤，治与足太阳所感病同法，或邪盛郁塞，必于足太阳泻之，若伤于内者，正气衰，金被残贼，必于足少阴养之，使子能助母，而金气不至耗泄，于足太阴培之，使母能生子，而金气得以涵育，昔人云补水培土，是养金善法，洵有然也。”治宜祛风宣肺，清热润燥，肃肺化痰，温肺化饮，滋阴降火，益气养阴等法。参肺病各条。

肺疸 病名。❶九疸之一。《外台秘要》卷四：“肺疸，饮少，小便多。”一名膏疸。参见膏疸条。❷《辨证奇闻》载述肺疸为肺气虚，失其清肃之令，不能通调水道，以致湿热逗留而发黄者。症见鼻塞不通，头面俱黄，口淡咽干，小便不利。治宜宣通肺气，健脾利水。方用扬肺利湿汤。参黄疸有关条。

肺疽 病名。《圣济总录》作肺瘴。指饮酒伤胃吐血。《备急千金要方》卷十二：“肺疽者，或饮酒之后，毒满闷吐之时，血从吐后出，或一合、半升、一升是也。”《医钞类编》卷七：“仲景云酒客咳者必致吐血，此因极饮过度所致，即肺疽之属也。”详见伤酒吐血条。

肺痈 病名。指肺部发生的痈疡。《金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治》：“咳而胸满，振寒，脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥者，为肺痈。”一名肺雍。多由外感风热邪毒，或风寒化热蕴肺，肺受热灼，热壅血瘀，郁久腐败化脓所致。《医门法律》卷六：“肺痈由五脏蕴崇之火，与胃中停蓄之热，上乘乎肺，肺受火热熏灼，即血为之凝，血凝即痰为之裹，遂成小痈。”症见发热振寒，咳嗽，胸痛，气急，甚则咳喘不得平卧，吐出腥臭脓性粘

痰，或咳吐脓血等。治宜清肺化痰，解毒排脓等法。选用《千金》苇茎汤、清金饮、麦冬平肺饮、葶苈大枣泻肺汤、元参清肺饮等方。咳吐脓血者，用排脓散、《金匮》桔梗汤，酌加鱼腥草、野乔麦根等药。如日久伤及气阴，治宜养阴益气，清热化痰，可用桔梗杏仁煎、《济生》桔梗汤等。本病与肺脓疡、肺坏疽等相似。

肺痈喘　证名。指肺痈病症所出现的气喘。见《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》。其喘必兼口燥、胸中隐痛、咳唾腥臭脓痰及高热等症。多因邪火热毒挟痰瘀壅阻于肺所致。治宜保金化毒为主，如桔梗汤加防风、橘红、银花、麦冬或千金苇茎汤等方。参肺痈条。本证可见于肺脓疡等疾患。

肺痈嗽　病名。指肺痈病的咳嗽。《万病回春》卷四："肺痈嗽者，口中辟辟燥，嗽即胸中隐隐痛，嗽伤肺叶而成也。先用保肺治嗽药，后用收敛疮口，以合欢树皮、白芨、白敛煎服。"《校注医醇賸义·咳嗽》："肺气壅塞，致成肺痈，咳吐脓痰，气甚腥秽者，石花汤主之。"详肺痈条。

肺消　病名。❶指阳虚肺寒所致的多饮多溲。《素问·气厥论》："心移寒于肺，肺消。肺消者饮一溲二，死不治。"《景岳全书·杂证谟》以本症属阴消范围，参见阴消条。❷指因心火刑肺，肺燥津耗所致者。《辨证录·消渴门》："消渴之病，有气喘痰嗽，面红虚浮，口舌腐烂，咽喉肿痛，得水则解，每日饮水约得一斗，人以为上消之病也，谁知是肺消之症乎。"治宜清心润肺为主，可用清上止消丹、二冬苓车汤。参见消渴、上消条。

肺黄　三十六种黄之一。❶《太平圣惠方》卷五十五："肺黄者，眼目白色，头面微肿，鼻衄不止，多涕憎寒，遍身生赤粟子，壮热，腹胀胸满，上气。若粟子紫黑色及肿者，难治。"治宜用栝蒌散方及瓜蒂末搐鼻出黄水等法。❷《圣济总录》卷六十一："肺黄，口干舌缩，目赤鼻血出，……烦渴欲得饮水，及大便不利。"治疗可用灸法或黄消汤。参黄疸有关各条。

肺萎　见《杂病源流犀烛·肺病源流》。即肺痿。详肺痿条。

肺虚自汗　自汗证之一。见《医略六书·杂病证治》。因肺气虚而表不固所致。症见自汗，咳嗽，气喘，乏力等。治宜补肺以固其皮毛，选用黄芪六一汤、玉屏风散、生脉散等方。参自汗条。

肺虚身肿　证名。身肿类型之一。《症因脉治》卷三："肺虚身肿之症，泻利喘咳，面色惨白，或肿或退，小便清利，或气化不及，小便时闭，大便时溏，即《金匮》脉沉自喘之正水，此肺虚肿症也。肺虚身肿之因，劳役过度，肺气久虚，清肃之令不行，下降之权失职，卫气壅遏，营气不从，则肿症作矣。"脉细数或虚软，治宜选用生脉散、人参固本丸、都气丸、四君子加杏仁、贝母等药。参见身肿、水肿条。

肺虚证　指肺气、肺阴不足所出现的各种证候。《脉经》卷二："肺虚。……病苦少气不足以息，嗌干不朝津液。"《圣济总录》卷四十八："肺虚则生寒，寒则阳气盛，阳气盛则声嘶，语言用力，颤掉缓弱，少气不足，咽中干无津液，虚寒乏力，恐怖不乐，咳嗽及喘，鼻有清涕，皮毛焦枯，诊其脉沉缓，此是肺虚之候。"《本草经疏》："肺虚七证。鼾喘，属肺虚有热，因而痰壅；咳嗽吐血痰，属肺热甚；声哑，属肺热甚；咽喉燥痛，属水涸火炎，肺热之极，此证法所难治；肺痿，属肺气虚有热；龟胸，属肺热有痰；息贲，属肺气虚痰热壅结所致。"方用补肺汤、人参汤等方。参肺病，肺虚寒等条。

肺虚热证　劳热之一。见《中国医学大辞典》。《杂病源流犀烛·虚损劳瘵源流》："肺热，轻手即得，略重全无，肺主皮毛也。日西尤甚。必兼喘咳洒淅，善嚏，善

悲，缺盆痛，胸中及肩臂皆痛，脐右胀痛，小便数，皮肤痛及麻木。”治宜补肺清热为主。选用门冬清肺饮、生脉散、补肺阿胶散等方。

肺虚寒证 指肺气不足所出现的证候。见《备急千金要方》卷十七。《三因极一病证方论·肺大肠经虚实寒热证治》：“肺寒虚，逆满，上气，咽中闷塞，寒从背起，口中如含冰雪，语无音声，舌本干燥，吐沫，唾血，不能饮食。”《圣济总录》卷四十八：“肺虚寒，咳嗽，下利，少气。”可伴见形体怯冷，鼻多清涕等症。治宜补气温肺为主。选用补肺汤、人参茯苓丸、九味汤等方。

肺虚腹胀 证名。指肺脏虚衰，气失通调引起的腹胀。《症因脉治》卷三：“肺虚腹胀之症，面色惨白，气弱不振，时胀时退，二便清利，此肺经阳虚之症。若肌肉消瘦，咳嗽面红，多汗骨蒸，此肺经阴虚之症。二者皆名肺虚腹胀症也。”多由肺虚治节无权，气道涩滞所致。治宜补肺为主。可选用补肺人参散、补中益气汤、人参固本丸、生脉散、人参平肺散等方。参见腹胀条。

肺虚嗽 病名。指肺气、肺阴亏虚的咳嗽。见《赤水玄珠》卷七。《不居集》卷十五：“肺虚咳嗽，肺虚者，肺家元气自虚也。惟其自虚，则腠理不密，故外则无风而畏风，外则无寒而怯寒，内则气怯息短，力弱神虚，面白神羸，情志郁结，嗜卧懒言，遗精自汗，饮食减少，咳嗽无力，痰涎清薄，六脉虚微而涩弱，按之无神，此为阳虚脉症，宜大补元气，则嗽不治而自愈。若专于消热消痰以止嗽，未有不速其死也。”《万病回春·咳嗽》：“肺虚嗽者，久病久嗽虚也。宜滋阴补肺加天门冬、款冬花、马兜铃、紫菀、阿胶、五味子之类。”参见咳嗽条。

肺遗 指肺病而致遗精的病症。《医宗必读》卷九：“肺病而遗者，必皮革毛焦，喘急不利。”治宜清肺涩精。参遗精、五脏遗精条。

肺喘咳 病名。见《不居集》卷十五。即肺胀。详该条。

肺脾郁 郁证之一。《类证治裁》卷三：“肺脾郁，营损肌瘦。养营汤去桂心，减熟地黄。”参五脏郁证条。

肺痨 病名。即肺劳。《慎柔五书》卷四：“肺痨热，瘦损，有虫在肺，令人咳逆气喘。”治以五膈下气丸等方。本病与肺结核病相类似。参见肺劳、虚劳、劳瘵条。

肺痫 病名。出《备急千金要方》卷五。可表现为多种症状。《医学入门·痫》：“肺痫，面白，吐沫，腹胀，牛吼。”《景岳全书》卷四十一：“面如枯骨，目白反视，惊跳反折，摇头吐沫，其声如鸡者曰肺痫。”《医林绳墨》卷六以痫症因忧悲太重，痰涎入肺而发，声嘶啼泣，旋运颠倒，目睛上瞪，恶寒拘急，气下则甦者为肺痫。参见痫、五脏痫条。

肺痛 证名。指肺部作痛。多因气滞血瘀所致。治以散瘀止痛为主。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》：“下利肺痛，紫参汤主之。”

肺痈 病名。《素问·大奇论》：“肺之壅，喘而两胁满。”《甲乙经》作“痈”。详肺痈条。

肺蒸 二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

肺瘘 病名。❶肺叶枯萎所致的病证。一作肺萎。有虚热与虚寒之分。《金匮要略·肺瘘肺痈咳嗽上气病脉证治》：“热在上焦者，因咳为肺瘘。肺瘘之病，从何得之？师曰：或从汗出，或从呕吐，或从消渴，小便利数，或从便难，又被快药下利，重亡津液，故得之。……肺瘘吐涎沫而不咳者，其人不渴，必遗尿，小便数，所以然者，上虚不能制下故也，此为肺中冷，必眩，多涎唾。”虚热者，症见咳声不扬，吐稠粘涎沫，口干咽燥，气急喘促，形体消瘦，或见

潮热，皮毛干枯，舌干红，脉虚数等。治宜滋阴润肺，清热生津。选用举肺汤、元参清肺饮、麦门冬汤、清燥救肺汤、紫菀散等方。虚寒者，症见形寒，神疲，唾涎沫，口不渴，小便数，舌质淡，脉虚弱等。治宜温肺益气。选用甘草干姜汤，或人参、白术、茯苓等药。❷传尸之一种。《外台秘要·传尸方》："传尸之疾……气急咳者，名曰肺痿。"参传尸条。❸皮毛痿。《医宗必读·痿》："肺痿者，皮毛痿也。"参皮毛痿条。

肺痿喘　证名。指肺痿病症所出现的气喘。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："肺痿喘，唾有脓血或浊痰，宜紫菀散。"本证所指肺痿与通常所称之由肺损阴虚或肺寒阳虚的肺痿有别。《汤液本草》卷中："肺痿，咳唾脓血。"本证可见于肺脓疡、支气管扩张症等疾患。

肺痿嗽　病名。指肺痿病的咳嗽。因阴火灼肺，肺叶痿弱作嗽。《万病回春·咳嗽》："肺痿嗽者，声哑，咽喉破痛，浊唾涎沫，或唾中有红丝脓血，热在上焦，阴火炽焰，熏蒸肺叶而成，此真病也。宜养血滋阴，清金保肺，消痰降火。"《校注医醇賸义·咳嗽》以肺叶痿败，喘咳夹红者，宜白胶汤；肺萎骨蒸　或寒或热，或劳咳嗽，声嗄不出，宜秦艽扶羸汤；多年咳嗽，肺痿咯血，宜独胜散。亦可用滋阴降火汤合六味地黄丸相兼服。参咳嗽、肺痿条。

肺痹　病名。由皮痹发展而成，也有称为皮痹者。《素问·痹论》："肺痹者，烦满喘而呕。"《圣济总录·肺痹》："皮痹不已，复感于邪，内舍于肺，是为肺痹。其候胸背痛甚，上气，烦满，喘而呕是也。"《症因脉治·肺痹》："肺痹之症，即皮痹也。烦满喘呕，逆气上冲，右胁刺痛，牵引缺盆，右臂不举，痛引腋下。"可用桔皮丸、杏仁丸、当归汤、五味子汤、泻白散、生脉散、人参平肺散等。参皮痹条。

肺燥作泻　证名。指泄泻由肺中燥火引起者。《医学传灯·泄泻》："又有肺燥作泻者，人所不知，秋伤于燥，内热咳嗽，肺中之火无处可宣，传于大肠，故令作泻。"治宜清肺润燥，用清金润燥汤。

肺燥咳嗽　病名。指肺虚液少或燥邪伤肺所致的咳嗽。《症因脉治·伤燥咳嗽》："天行燥烈，燥从火化，肺被燥伤则必咳嗽。"《不居集》卷十五："肺燥咳嗽，金性喜清润，润则生水，以滋脏腑。若本体一燥，则水源渐竭，火无所制，金受火燥，则气自乱而咳嗽，嗽则喉干声哑，烦渴引饮，痰结便闭，肌肤枯燥，形神虚萎，脉必虚数，久则涩数无神。法当滋润清补。"《金匮翼·燥咳》："肺燥者，肺虚液少而燥气乘之也。其状咳甚而少涎沫，咽喉干，气哽不利。子和云，燥乘肺者，气壅不利，百节内痛，皮肤干燥，大便秘涩，涕唾稠粘。洁古云，咳而无痰者，宜以辛甘润其肺也。"方宜润肺止嗽方、清燥救肺汤、门冬饮子等。参咳嗽、伤燥咳嗽条。

肥气　古病名。即肝积。《灵枢·邪气藏府病形》："肝脉……微急为肥气，在胁下，若复杯。"《难经·五十四难》："肝之积，名肥气。在左胁下，如复杯，有头足。久不愈，令人发咳逆瘕疝，连岁不已。"《济生方》卷四："肥气之状，…诊其脉，弦而细，其色青，其病两胁下痛，牵引小腹，足寒转筋，男子为积疝，女子为瘕聚。"治疗用肥气丸。参肝积条。

胁下支满　证名。指胁下支撑胀满。多由水饮或肝气郁结，滞于胁肋部位，络脉不和所致。《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》："水在肝，胁下支满，嚏而痛。"《医宗金鉴》注："水在肝部，则病悬饮。"参悬饮、肝气胁痛、肝郁胁痛条。

胁下偏痛　证名。指胁肋部偏侧疼痛。由于阴寒实邪结聚所致。《金匮要略·腹满寒疝宿食病脉证治》："胁下偏痛，发热，

其脉紧弦，此寒也，以温药下之，宜大黄附子汤。”《金匮要略心典》卷中：“胁下偏痛而脉紧弦，阴寒成聚，偏着一处。”亦有以本文“偏”字是传写之讹。《医宗金鉴》正误存疑篇：“按胁下偏痛之‘偏’字，当是‘满’字，当改之。”

胁下痞鞕 证名。出《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。指胁肋部满闷按之坚硬的症状。胁肋为少阳经脉分布之区，病邪与水饮痰瘀凝聚于少阳之募，故见鞕满。治宜和解或兼用攻消，可用小柴胡汤加减。本症常兼见寒热，胸胁满闷，呕吐等症。可见于胆囊炎、胆结石等疾患。在肝、脾等内脏发生疾病时，亦可见胁下硬满、胀满等症状。

胁下痛 证名。指季肋部疼痛。《灵枢·本藏》：“肝偏倾则胁下痛也。”《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》：“留饮者，胁下痛引缺盆。”参两胁痛、两胁下痛、留饮各条。

胁下满 证名。指胁下胀满。多由气血不利，或为邪袭而致。《灵枢·胀论》：“肝胀者，胁下满而痛引少腹。”《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“伤寒四五日，身热恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。”参胁满、胁下支满条。

胁支痛 证名。出《素问·标本病传论篇》。指胁肋部撑持胀痛。参胁肋胀痛条。

胁支满 证名。指胁部撑胀满闷。可见于痰饮、心病、肝病等。《素问·藏气法时论》：“心病者，胸中痛，胁支满，胁下痛，膺背肩甲间痛……。”《素问·标本病传论》：“肝病，头目眩，胁支满。”《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证治》：“心下有痰饮，胸胁支满，目眩，苓桂术甘汤主之。”参胁满条。

胁肋胀痛 证名。指胁肋部发胀作痛的症状。见薛己注《明医杂著·痰饮》。多由气郁、痰凝，脉络阻滞所致。如肝气郁结者，多兼见胸闷纳减，胀痛常随情志变化而增剧。治宜疏肝理气为主，如逍遥散、柴胡疏肝散等方。如湿痰走注肝经者，多兼见头目眩晕，肢体麻木不仁等，治宜平肝豁痰，如导痰汤加白芥子或竹沥等药。亦有因肝经虚寒而见胁肋胀痛，多兼见气急，视物模糊，脉象迟弱等症，宜槟榔汤、补肝散等方。亦可由肝火犯肺或瘀血停滞所致。《万病回春·胁痛》：“胁肋胀痛，若大便通和，喘咳吐痰者，肝火侮肺也，用小柴胡汤加青皮、山栀清之。”《辨证录·胁痛门》：“人有跌扑之后，两胁胀痛，手不可按，……盖瘀血存于其中，积而不散，久而成痛也。”宜祛瘀止痛，如抵当丸等方，后便黑血，则瘀消痛止，可用四物汤加三七、丹皮等药调理。参气郁胁痛、痰饮胁痛、胁支痛各条。

胁痛 证名。指一侧或两侧胁肋部疼痛。出《素问·缪刺论》。《赤水玄珠》卷四：“胁痛有风寒，有食积，有痰饮，有死血，有虚，有气郁，有火，当分条类析，明别左右施治。”《济生方·胁痛》：“多因疲极嗔怒，悲哀烦恼，谋虑惊忧，致伤肝脏。既伤，积气攻注，攻于左，则左胁痛，攻于右，则右胁痛，移逆两胁，则两胁俱痛。”《景岳全书·杂证谟》：“胁痛之病本属肝胆二经，以二经之脉皆循胁肋故也。然而心、肺、脾、胃、肾与膀胱亦皆有胁痛之病。……胁痛有内伤外感之辨。凡寒邪在少阳经，乃病为胁痛耳聋而呕，然必有寒热表证者方是外感。如无表证，悉属内伤。但内伤胁痛者，十居八九，外感胁痛则间有之耳。”《医宗必读·心腹诸痛》中以胁痛左痛多留血，右痛多痰气。肾亏气虚亦可致胁痛。《医碥·胁肋痛》：“房劳伤肾，气虚血滞，胸胁多有隐隐作痛。”又如暑热、湿热、肝阴虚、肝血虚及肝肾不足，均可导致胁痛。详各有关条。

胁痛里急 证名。指胁肋部疼痛，拘急不舒。多由受寒血虚所致。《金匮要略·腹满寒疝宿食病脉证治》：“寒疝腹中痛，及

胁痛里急者，当归生姜羊肉汤主之。”尤在泾注：“血虚则脉不荣，寒多则脉绌急，故腹胁痛而里急也。当归生姜温血散寒，羊肉补虚益血也。”亦可由湿热内郁所致。《证治汇补·胁痛章》：“两胁搐急，腰腿痛，不能转侧者，湿热郁也。”参胁痛，胁肋胀痛条。

胁痛应嗽　证名。指因咳嗽引致胁痛发作，或因胁痛而致的咳嗽。《不居集》卷十五：“胁痛应嗽，肝藏血，咳嗽气涩不利，咳应两胁，小柴胡加青皮、苏子。”参见肝经咳嗽、咳嗽条。

胁满　证名。指胁肋部胀满。出《素问·六元正纪大论》。可由气滞、痰凝或少阳受邪所致。《诸病源候论·诸饮候》以痰饮停积，可致两胁胀满。《类经》十七卷：“少阳者，相火之气也，其合肝胆，其主筋，其脉行于胁肋，故少阳之邪有余者，当病筋痹、胁满。”《伤寒明理论》卷一：“胁满者，当半表半里症也，……以邪气初入里，未停留为实，气郁结而不行，致生满也，和解斯可矣。”参胁下满条。

周痹　病名。因虚而风寒湿邪侵入血脉、肌肉之中所致。《灵枢·周痹》：“周痹者，在于血脉之中，随脉以上，随脉以下，不能左右，各当其所。”又：“此内不在脏，而外未发于皮，独居分肉之间，真气不能周，故命曰周痹。”《医学正传》卷五：“因气虚而风寒湿三气乘之，故周身掣痛麻木并作者，古方谓之周痹。”症见周身疼痛，上下游行，或沉重麻木，项背拘急，脉濡涩等。治宜益气和营，祛邪通痹。用蠲痹汤等方。

昏运　证名。见《医林绳墨·眩运》。又作昏晕。详该条。

昏迷　证名。❶指神昏不省人事，或神识迷糊的症象。见《太平惠民和剂局方》卷一。又名神昏。多由邪阻清窍，神明被蒙所致。可见于伤寒、温病及中风、厥证、癫痫等多种疾病。不论外感、内伤，凡见此证，均属重症。治应审因论治，而以开窍醒神为先，选用苏合香丸、至宝丹、紫雪丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸等。危重者可中西医结合抢救。本病可见于急性感染性疾病，内分泌及代谢障碍性疾病，水、电解质平衡紊乱，中毒，物理因素疾病及中枢神经系统损伤等疾患。❷指郁冒。《伤寒明理论》卷三：“郁为郁结而气不舒也，冒为昏冒而神不清也，世谓之昏迷者是也。”参见郁冒条。

昏晕　证名。又作昏运。指头脑昏沉眩晕感觉。亦有指眩晕之常发于黄昏者。多因阴虚所致。《证治汇补·眩晕》：“日晡眩晕，得卧少可，谓之昏晕，此阴虚也。”详阴虚眩晕条。

卑慄（Diē　碟）　证名。指自怯畏惧之状。《证治要诀·怔忡》：“有痞塞不饮食，心中常有所怯，爱处暗或倚门后，见人则惊避，似失志状，此名为卑慄之证，以血不足故尔，谷神嘉禾散加当归半钱，黄芪半钱。”此症多迁延难愈，宜养血补心，定志安神。用天王补心丹、人参养营汤等。参怔忡条。

鱼脑痫　古病名。指赤白痫之下如鱼脑状者。《诸病源候论·痫病诸候》：“白脓上有赤脉薄血，状如脂脑，世谓之鱼脑痫也。”详赤白痫条。

鱼腥哮　因食服鱼腥而致发哮者。类似鲊喘。《医说》卷四：“因食盐鲊过多，遂得鲊喘之疾。”症见喘急而喉中有痰鸣声，喘鸣迫急，但坐不得卧等。治宜小青龙汤、越婢汤等方，亦可酌用甜瓜蒂研末吞服，以探吐痰涎。参鲊喘条。

鱼瘕　病证名。《诸病源候论·癥瘕病诸候》：“有人胃气虚弱者，食生鱼，因为冷气所搏，不能消之，结成鱼瘕，揣之有形状如鱼是也，亦有饮陂湖之水，误有小鱼入人腹，不幸便即生长。亦有形状如鱼也。”

参见瘕条。

鱼鳖蟹积 病证名。指食鱼蟹类过多而积滞不化者。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："鱼鳖蟹积，食此过多成积，腹中疼痛，胸中满闷，或吐或泻也。宜紫苏、陈皮、木香、姜汁。"方用妙应丸、遇仙丹等。参食积条。

狐疝风 古病名。出《素问·四时刺逆从论》。多由厥阴肝脉积气攻窜所致。《类经》卷十七："疝在厥阴，其出入上下不常，与狐相类，故曰狐疝风。此非外入之风，乃以肝邪为言也。"参见风疝、狐疝条。

狐疝 病名。出《灵枢·本脏》。又名阴狐疝气，狐疝风。俗称小肠气。指有物入阴囊，时上时下的病症。多因寒气凝结厥阴肝经所致。《儒门事亲》卷二："狐疝，其状如瓦，卧则入小腹，行立则出小腹入囊中。狐则昼出穴而溺，夜则入穴而不溺，此疝出入上下往来，正与狐相类也。亦与气疝大同小异。"《三因极一病证方论》卷十四："寒气下注，入于癫中，名曰狐疝，亦属癫病。"治宜疏肝理气、温经散寒为主。选用蜘蛛散、导气汤、酒煮当归丸、济生橘核丸、三层茴香丸。或二陈汤加香附、厚朴、青皮、青木香、苍术、干姜等。若有囊热者，去干姜加山栀仁。若日久气虚，不能提絜，劳累即发，可用升举之法，方如补中益气汤等。参气疝、阴狐疝气等条。

狐惑 病名。亦作狐蛩。指因感染虫毒，湿热不化而致的以目赤眦黑、口腔咽喉及前后阴腐蚀溃疡为特征的一种疾患。《金匮要略·百合狐惑阴阳毒病脉证并治》："状如伤寒，默默欲眠，目不得闭，卧起不安。蚀于喉为惑，蚀于阴为狐。不欲饮食，恶闻食臭，其面目乍赤、乍黑、乍白。蚀于上部则声嗄，甘草泻心汤主之；蚀于下部则咽干，苦参汤洗之。蚀于肛者，雄黄熏之。"又："病者脉数，无热微烦，默默但欲卧，汗出，初得之三四日，目赤如鸠眼，七八日，目四眦黑。若能食者，脓已成也，赤小豆当归散主之。"多由湿热邪毒内盛所致。治宜清热化湿，泻火解毒为主，兼用外治法。本病类似"口、眼、生殖器三联综合征。或谓本病系虫病之一种，又称蠹病。《金匮要略心典》卷上："狐惑，虫病。即巢氏所谓蠹病也。默默欲眠、目不得闭，卧起不安，其躁扰之象，有似伤寒少阴热证，而实为蠹之乱其心也。不欲饮食，恶闻食臭，有似伤寒阳明实证，而实为虫之扰其胃也。其面目乍赤、乍黑、乍白者，虫之上下聚散无时，故其色变更不一，甚者脉亦大小无定也。"《金匮要略浅注》卷二："狐惑之为病，虫病也。……虫蚀于喉为惑，蚀于阴为狐。"参见蠹病、虫病条。亦有谓本病是牙疳、下疳的古名者。《医宗金鉴》卷三十七："狐惑，牙疳，下疳等疮之古名也。近时惟以疳呼之。下疳即狐也，蚀烂肛阴；牙疳即惑也，蚀咽腐龈，脱牙穿腮破唇。毒因伤寒病后，余毒与湿蠹之为害也。或生斑疹之后，或生癖疾下利之后，其为患亦同也。其证则面色目眦或赤或白或黑，时时不一，喜睡目不能闭，潮热声哑，腐烂之处，秽气熏人。若胃壮能食，堪受攻病重药，或病之势缓，治多全也。"参疳条。

狐蛩 蛩通惑，即狐惑。详该条。

狐瘕 病名。八瘕之一。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："狐瘕，出入少腹间，或隐或见，男子即为狐疝，女子乃名狐瘕，其苦阴酸涩，小便难，少腹瘀痛，胸膈腰背上冲而痛，其瘕甚，有手足成形者。"《类证治裁·痃癖癥瘕诸积论治》："狐瘕，经行受惊，心志恍惚，邪入于阴，目闭溺难，宜狐瘕方。"参见瘕、癥瘕等条。本病可见于腹股沟疝、腹股沟直疝等病。

狗肉积 病证名。指食狗肉过多而积滞不化者。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："狗肉积，……满腹中觉热胀闷也。宜杏仁、山楂，方用三棱煎丸。"《医学纲

目·脾胃门》："食狗肉不消，心下坚或腹胀，口干发热，妄语，煮芦根汁饮之。"参食积、肉积条。

狗癫　病名。即犬痫。因痫发声如犬吠故名。《外台秘要》卷十五："狗癫则狗吠。"参见痫、癫、六畜痫条。

忽作喘　见《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》。古称卒上气、卒喘。多由感风感气，或多食多饮而然。治疗须察其所感施治，如用定喘汤加减等。参卒上气、喘证等条。

愕（è厄）逆　病名。即呃逆。《医学正传·愕逆》："韵书，愕与恶通，气上逆作声之名也。"详见呃逆条。

〔 t 〕

夜不安　证名。指入晚坐卧不宁。《医林改错·血府逐瘀汤所治症目》："夜不安者，将卧则起，坐未稳又欲睡，一夜无宁刻，重者满床乱滚。此血府血瘀。此方服十余付。"参不寐条。

夜疟　疟疾之一。指疟疾发于夜间者。❶即三阴疟。《医宗金鉴》卷四十二："疟在夜发，名曰三阴疟疾。"详见三阴疟条。❷即鬼疟。《张氏医通·疟》："夜疟俗名鬼疟。此邪入血分，宜升散血脉之邪。《千金》内补建中加升、柴、生首乌；脾胃素虚人，补中益气加首乌、桂枝、芍药。"参鬼疟条。

夜热　证名。指夜间发热，或热至夜间升高。多因热入血室，或阴血不足，或血瘀所致。《证治准绳》卷一："昼则安静，夜则发热、烦躁，是阳气下陷入阴中也，名曰热入血室，……夜热则行阴二十五度，四顺饮子。"《兰室秘藏》卷六："昼病则在气，夜病则在血，……夜发多而昼发少，是邪气下陷之深也。此杂证，当从热入血室而论。宜泻血汤，退热汤。"《血证论·发热》："血虚者，发热汗出，以血不配气，则气盛而外泄也。或夜则发热，以夜主血分故也。"亦有"每晚内热，兼皮肤热一时。"为内有瘀血所致，可用血府逐瘀汤（见《医林改错》）。

卒上气　见《肘后备急方》。指突然气喘发作。为卒喘的别称。《诸病源候论·卒上气候》："肺主于气，若肺气虚实不调，或暴为风邪所乘，则腑脏不利，经络否（痞）涩，气不宣和则上气也。又因有所怒，则气卒逆上。"详卒喘条。

卒口僻　口㖞的别称。指突发口唇歪斜的症象。《灵枢·经筋》："卒口僻，急者，目不合。"详见口㖞条。

卒中（cù zhòng促众）　病名。❶即中风。见《三因极一病证方论》卷二。一作猝中。又名卒中风。因中风系猝然发生，故名。详见中风。❷泛指猝然如死而气不绝者。《医学纲目》卷十七："卒中暴厥……，卒然不省人事，全如死尸，但气不绝，脉动如故，或脉无伦序，或乍大乍小，或微细不绝，而心胸暖者，是也。"

卒中风　古病名。见《备急千金要方》卷八。又名卒中。详见卒中❶。

卒中急风　病名。指头晕目眩，突然跌仆之症。见《太平惠民和剂局方》卷一。多因痰涎壅塞所致。症见头眩目花，突然跌倒，心神迷闷，牙关紧急，目睛上视等。治宜豁痰逐络为主。可用碧霞丹、辰砂天麻圆等方。参见急中风条。

卒心痛　证名。指突然发作的心痛。可由脏腑虚弱，冷、热、风邪等侵袭手少阴经所致。《素问·刺热篇》："心热病者，先不乐，数日乃热，热争则卒心痛。"《太平圣惠方》卷四十三："夫卒心痛者，由脏腑虚弱，风邪冷热之气客于手少阴之络，正气不足，邪气胜盛，邪正相击，上冲于心，心如寒状，痛不得息，故云卒心痛也。"参寒厥心痛、热厥心痛条。

卒耳聋　即暴聋。出《肘后方》卷六。

详该条。

卒忤 古病名。即中恶。《圣济总录·诸注门》："论曰，志弱心虚，精神失守，忤犯邪恶，令人心腹暴痛，闷乱如死，无所觉知，故曰中恶，又曰卒忤。盖阴阳否隔，气道厥逆，上下不通，阳气散乱，故令不知人也。气还则生，不还则死，久不已则变注。"备急散、桃皮汤、麝香散等均可选用。参中恶条。

卒疝 病名。指睾丸骤肿暴痛者。出《灵枢·经脉》。多因邪客肝络，厥气逆乱所致。《儒门事亲》卷二："病卒疝，暴痛不任。……邪气客于足厥阴之络，令人卒疝。"治宜先投导水丸，继进通经散，空腹淡酒调下，或急泻大敦二穴。参见疝有关条。

卒病 卒同猝。❶指急病或暴病。《灵枢·岁露论》："有卒病者，其故何也？……当是之时，遇贼风则其入深，其病人也卒暴。"如卒中，即指突然发生中风病。❷指新起之病。与痼疾相对而言。《金匮要略·脏腑经络先后病脉证》："夫病痼疾加以卒病，当先治其卒病，后乃治其痼疾也。"❸卒有众多的含义，引申为"杂"。如《伤寒卒病论》亦作《伤寒杂病论》。

卒聋 耳聋的一种。亦称暴聋。《卫生宝鉴·耳卒聋》："由肾气虚为风邪所乘，搏于经络，随其血脉上入耳，正气与邪气相搏，故令耳卒聋也。"《杂病源流犀烛·耳病源流》："暴聋者皆卒聋也。"详见暴聋条。

卒淋 病名。见《备急千金要方》卷二十一。指淋症之突发者。《圣济总录·诸淋门》："下焦有热，传入膀胱，其候卒然少腹急痛，小便淋数涩痛，故谓之卒淋。"治宜清热通淋。方用木通散、茅根汤等。参见淋、热淋条。本证可见于急性泌尿道感染及结石等疾患。

卒喘 证名。指猝然发作的气喘。《诸病源候论》称卒上气，《杂病源流犀烛》称忽作喘。多由暴感风邪或情志过极，气逆上壅。亦可由伤食、伤饮所致。参卒上气、忽作喘等条。

卒腰痛 证名。指突然发作的腰痛。《诸病源候论·腰背病诸候》："夫劳伤之人，肾气虚损，而肾主腰脚，其经贯肾络脊，风邪乘虚卒入肾经，故卒然而患腰痛。"多因骤感外邪及闪挫外伤所致。治疗以祛邪及疏通气血为主。参腰痛、外感腰痛等条。

卒厥死 古病名。见《备急千金要方·卒死》。指在睡梦中突然死去，系五绝之一。参五绝条。

疟 病名。《素问·疟论》："夏伤于暑，秋必病疟。"又："疟之始发也，先起于毫毛伸欠，乃作寒慄鼓颔，腰脊俱痛，寒去则内外皆热，头痛如破，渴欲冷饮。"即疟疾，详见该条。

疟母 病证名。疟疾日久不愈，顽痰挟瘀，结于胁下，形成的痞块。又称疟积、母疟、劳疟。《金匮要略·疟病脉证并治》："病疟以月一日发，当以十五日愈，设不差，当月尽解。如其不差，当云何？师曰："此结为癥瘕，名曰疟母，急治之，宜鳖甲煎丸。"《张氏医通》卷三："疟母者，顽痰挟血食而结为癥瘕，鳖甲煎丸，或小柴胡加鳖甲蓬术桃仁，……此金匮法也。"又："虚人久疟，时止时发，芎归鳖甲饮，不应，脾虚也，急用补中益气加鳖甲；少食痞闷，胃虚也，四兽饮加鳖甲当归蓬术肉桂。虚人疟母，必用补益。盖缘治之失宜，邪伏肝经，而胁下有块，仍寒热时作，不可以癖积治之，每见急于攻块者，多致不救。久疟不愈，必有留滞，须加鳖甲消之；如无留滞，只宜补益。"参劳疟条。

疟后黄 病证名。指患疟后，面黄、肤黄而目不黄的病证。《证治要诀》卷十："病疟后多黄，盖疟谓之脾寒，脾受病，故色见于面，宜理脾为先。异功散加黄芪、扁豆各半钱。诸痛后黄者亦宜。"本证可见于疟疾后贫血。参疟黄条。

疟劳　病名。疟疾之重危变证，亦称劳疟。《杂病源流犀烛·疟疾源流》："疟后变症，惟痢最为危急，……其次疟劳，或素有弱症而又患疟，以致旧病更深，或因疟煎熬，日久顿惫，精神衰耗，内热不清，肌肉消削，渐至往来潮热，致成痨瘵。急宜察其何经受病，以补益调理之。宜补中益气汤、八味丸为主。"参见劳疟条。

疟积　病名。即疟母。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕疟癖痞源流》："疟积，疟疾不善调理而成积，经汗吐下日久，荣卫亏损，邪气伏藏胁腹，结为癥癖，坚痛，名为疟母也。宜常山、鳖甲、三棱、蓬术、草果；方用十将军丸、鳖甲丸、消癖丸。"参见疟母条。

疟疾　病名。见《太平圣惠方》卷七十四。指以间歇性寒战、高热、出汗为特征的一种传染病。古人观察到本病多发于夏秋季节及山林多蚊地带。《内经》称疟、痎疟；《金匮要略》称疟病。多因风寒暑湿之邪，客于营卫所致。因体质强弱有别及所感病邪及流行特点、表现证候不同，大致分类如下。❶按临床证候分类有风疟、暑疟、湿疟、痰疟、食疟、寒疟、温疟、风热疟等。❷按发病时间分类，有间日疟、三日疟、正疟、子母疟、夜疟、鬼疟、暴疟、游疟、老疟、久疟、阴疟、阳疟等。❸按诱发因素及流行特点分类，有劳疟、虚疟、瘴疟、疫疟等。❹以脏腑、经络分类有五脏疟、三阳经疟、三阴疟等。治疗除服用辨证用药外，常可加用常山、草果、蜀漆、青蒿等，并可用针刺及穴位敷贴等，病情控制后，注意预防复发。详见各条。

疟黄　病名。亦称疟后黄。指患疟疾所致的发黄。即疟疾反复发作所致的贫血。《太平圣惠方》卷五十五："疟黄者，面色萎黄，憎寒壮热，头痛不止，口干多渴，四肢羸瘦，不能饮食，或好或恶，进退不定。"治宜截疟为先，如恒山散（常山散）等方。参疟后黄条。

疟脱　病名。指疟疾发作过程中出现大汗亡阳等虚脱之症者。清·吴楚《宝命真诠》："疟脱之症，魄汗淋漓，面色青黑。脉虚浮数，按之极虚。"治宜用补中益气汤去升麻、柴胡，倍参、芪，加白芍、五味、枣仁等。参疟疾条。

疟痞　病名。亦称疟母。见《鸡鸣录》。《症因脉治·疟母》："即痰血痃癖也。疟久不愈，胸腹胁肋，有癥瘕痞癖，为患不瘥，此疟母之症也。"本症即慢性疟疾或疟疾反复发作所致的肝脾肿大。详见疟母条。参痞条。

疟寒疾　病名。疟疾之古称。《周礼》："秋时有疟寒疾。"《素问·六元正纪大论》称"疟寒之疾"。亦指寒疟，参该条。

疝　病名。❶指脐腹剧痛，控引上下之症。出《素问·长刺节论》。多因气血虚弱，寒凝气滞所致。《金匮要略·腹满寒疝宿食病脉证治》："腹痛，脉弦而紧，弦则卫气不行，即恶寒，紧则不欲食，邪正相搏，即为寒疝。寒疝绕脐痛若，发则白汗出，手足厥冷，其脉沉紧者，大乌头煎主之。……寒疝腹中痛，及胁痛里急者，当归生姜羊肉汤主之。"又："寒疝腹中痛逆冷，手足不仁，若身疼痛，灸刺诸药不能治，抵当乌头桂枝汤主之。"《诸病源候论》卷二十："诸疝者，阴气积于内，复为寒气所加，使营卫不调，血气虚弱，故风冷入其腹内，而成疝也。"《金匮翼》卷八："疝者，痛也。不特睾丸肿痛为疝，即腹中攻击作痛，控引上下者，亦得名疝。"❷指睾丸肿大，控引小腹之症。《儒门事亲》卷二："及其为疝，乃属足厥阴肝经，盖环阴器而上入小腹者，足厥阴肝经也。……其病伤于寒则阴缩入，伤于热则纵挺不收。"《张氏医通·疝》："大抵疝之为证，受热则缓纵不收，受寒则牵引作痛，受湿则肿胀累垂，虚者亦然。三者之间，分其孰多孰少，而为施治。

……肿极而不甚痛者，当是太阴湿土为患，又上引者，宜用桂枝、吴萸、茴香等辛热治之，下坠者，宜用川楝、黄柏、苍术、香附苦燥治之。又痛处热而不欲人按者，湿热也。痛处寒而喜人按摩者，寒积也。”参见五疝、七疝、寒疝、气疝、阴狐疝气等条。

疝瘕 古病名。亦称疝癥、蛊。指少腹冤热而痛，溲出白液的一种疝病。《素问·玉机真藏论》：“脾传之肾，病名曰疝瘕。少腹冤热而痛，出白，一名曰蛊。”《诸病源候论》卷二十：“疝者痛也，瘕者假也，其病虽有结瘕而虚假可推移，故谓之疝瘕也。由寒邪与藏腑相搏所成。其病腹内急痛，腰背相引痛，亦引小腹痛。”《类证治裁》卷七：“少腹冤热而痛，出白，盲脾失运化，而传于所胜，……痛出白淫，乌头栀子汤加橘核、桃仁、吴萸。”

疙瘩瘟 病名。瘟疫的一种。以遍身红肿发块如瘤为特征。《伤寒温疫条辨》卷一：“疙瘩温，遍身红肿发块如瘤者是也。”证见遍身流走，病情危重。《杂病源流犀烛·瘟疫源流》：“疙瘩瘟，发块如瘤，遍身流走，旦发夕死是也。”治疗急宜三棱针刺委中出血，外用玉枢丹，内服人中黄散、增损双解散等方。参瘟疫条。

盲肠气 病名。后世称小肠气，即疝气。《太平圣惠方》卷七：“肾气虚微，为邪冷之气所侵，传注于小肠，则令小肠连阴疼痛，故号盲肠气也。”宜服荜澄茄散，手足逆冷者，绿云丸方。

郑声 证名。指患者语言重复，语声低弱，若断若续的危重症象。多见于疾病晚期，因正气虚衰，精神散乱，以致神识不清，不能自主。《伤寒论·辨阳明病脉证并治法》：“夫实则谵语，虚则郑声。郑声者，重语也。”《伤寒绪论》卷下：“郑声者谓虚。……脉虽微弱而和，手足温者，生脉散、人参三白汤；气息短促，而脉沉细欲绝，附子汤倍参。”

单鼓 病名。即鼓胀。《丹溪心法·鼓胀》：“鼓胀又名单鼓。”详鼓胀条。

单腹胀 病名。指四肢不肿而腹大如鼓的病症。《景岳全书·杂证谟》：“单腹胀者，名为鼓胀，以外虽坚满而中空无物，其象如鼓，故名鼓胀。又或以血气结聚，不可解散，其毒如蛊，亦名蛊胀。且肢体无恙，胀惟在腹，故又名单腹胀。此实脾胃病也。”又名蜘蛛蛊、蜘蛛胀、血鼓、蛊胀。详各该条。

沫痰 痰证之一。多因气虚不能约束津液所致。《不居集》卷十七：“沫痰，人有坐处，卒吐痰涎满地，其痰不甚稠粘，此气虚不摄而吐沫也。不可用利药。六君子汤加益智仁以摄之。”参见痰证条。

泄 病名。❶泄泻的简称。《素问·脉要精微论》：“胃脉实则胀，虚则泄。”《难经·五十七难》：“泄凡有五，其名不同。”亦有指泄为大便稀薄，与泻不同者。《奇效良方·泄泻门》：“泄者，泄漏之义，时时溏泄，或作或愈。”详泄泻条。❷指筋脉缓弱之症。《金匮要略·中风历节病脉证并治》：“味酸则伤筋，筋伤则缓，名曰泄。”详筋缓条。

泄风 古病名。❶指风在腠理而致汗泄的病症。《素问·风论》：“外在腠理，则为泄风。”《类经·风证》：“泄风者，表不固也。”《增补内经拾遗方论·泄风》：“腠理为渗泄之门，风若中之，外不得入，内不得出，风搏汗泄，故名泄风。”症见多汗，皮上湿如水渍，口干，不能劳事，身痛而寒。治宜玉屏风散等方。❷指皮疹以有搔痒为特征的病症。《金匮要略·水气病脉证并治》：“风气相搏，风强则为隐疹，身体为痒，痒为泄风，久为痈癞。”参漏风、首风条。

泄如蟹渤 证名。指便下多气泡如蟹沫状。见《世医得效方》卷六。为气痢证候之一。详见该条。

泄利　病名。即泄泻。《华氏中藏经·论膀胱虚实寒热生死逆顺脉证之法》："寒则精神不守，泄利不止。"详泄泻条。

泄注　水泻之古称。出《素问·气交变大论》。又称注泄、注下。以其泄下如水注，故名。详水泻条。

泄注赤白　证名。指便下赤白粘冻。《素问·至真要大论》："火淫所胜，则温气流行，……泄注赤白。"详见赤白痢条。

泄泻　病名。见《三因极一病证方论》卷十一。简称泄或泻。大便稀薄，甚至水样，次数增多，但一般无脓血和里急后重。也有将泄泻分开者，大便质薄而势缓者为泄；大便如水而势急者为泻。《奇效良方·泄泻门》："泄者，泄漏之义，时时溏泄，或作或愈；泻者，一时水去如注泄。"外感六淫，饮食不节，劳倦过度，情志失调，以致脾胃运化失常，或元气不足，脾肾虚衰，皆可引起泄泻。由于病因、症候不同，有风泄、寒泄、暑泻、湿泻、热泻、伤食泻、溢饮滑泄、酒泄，七情泻、积瘀泄、虚泻、五更泄、滑泄、溏泄、飧泄、直肠泄、大肠泄等，详各该条。

泄脓血　证名。又称便脓血、圊脓血。《中藏经》卷上："小肠实则伤热，热则口生疮，虚则生寒，寒则泄脓血。"泄脓血有因寒因热之别。详便脓血条。

泄痢　病名。痢，古通利。指泄泻。《局方发挥》："泄痢之病，水谷或化或不化，并无努责，惟觉困倦。"亦有称痢疾为泄痢者。参泄泻、痢疾等条。

泄满　证名。出《素问·六元正纪大论》。指泄泻而腹满的病症。参泄泻条。

河豚中毒　病名。河豚鱼古称鲅鲐鱼，俗称廷巴鱼。指误食河豚鱼出现中毒症状者。见《诸病源候论·食鲅鲐鱼中毒候》。症见呕吐、腹痛、腹泻、大便带血，继则口唇舌尖及肢体麻木，眼睑下垂，肢体软瘫，严重者可迅速出现呼吸衰竭而死亡。治疗宜中西医结合抢救。轻症可服大剂量鲜橄榄、鲜芦根汁等。《本草纲目》卷四载有解河豚毒药，如荻芽、芦花、萎蕤、胡麻油、白扁豆、大豆汁、橄榄、五倍子、槐花、黑豆汁、紫苏汁、青黛汁、蓝汁、蜈蚣、羊蹄叶等。《辨证录·中毒门》："人有爱食河豚，以致血毒中人，舌麻心闷，重者腹胀而气难舒，口开而声不出，……方用瓜蒂散加味治之。"均可参考。

油汗　证名。《杂病源流犀烛·诸汗源流》："一云油汗，即粘汗也。"详汗出如油条。

注　古病名。又称注病。见《诸病源候论·诸注候》。即疰病。详疰条。

注下　水泻的古称。又称注泄、泄注。出《素问·气交变大论》。因泄下如水注之状，故名。详水泻条。

注下赤白　证名。指便下脓血粘冻。《素问·至真要大论》："厥阴之胜，……少腹痛，注下赤白。"《医略十三篇·痢疾》："注下赤白，……此风湿相火伤于阴络，血液化为赤白，即痈疡化脓之意。"详见赤白痢条。

注心痛　病证名。简称注痛。注亦作疰，又名恶疰心痛。指感触秽浊之气所致的心痛。见《备急千金要方》卷十三。《医学入门》卷五："疰痛，卒感恶忤尸疰。素虚者，肾经阴气上攻，神昏卒倒，苏合香丸。痛引背伛偻者，沉香降气汤或五苓散，倍桂，韭汁为丸，小茴煎汤下。素实者，肾火上攻，小承气汤。"《医学从众录·心痛》："注痛，入山林古墓，感一切异气而痛，其人语言错乱，其脉乍大乍小，左右手若出两人，宜平胃散加藿香二钱，入些少麝香服之。"《医学心悟·心痛》："疰痛者，触冒邪祟，卒尔心痛，面目青暗，或昏愦谵语，……神术散、葱白酒、生姜汤并主之。"参中恶心痛。

注车注船　病名。即晕车、晕船。《诸

病源候论·妇人杂病诸候论》："无问男子、女人，乘车船则心闷乱，头痛吐逆，谓之注车注船，特由质性自然，非关宿挟病也。"

注泄 水泻的古称。出《素问·至真要大论》。又称泄注、注下。《圣济总录》卷七十四："腹胀下利，有如注水之状，谓之注泄，世名水泻。"详水泻条。

注夏 病名。注与疰通。即疰夏。《丹溪心法》卷一："注夏属阴虚，元气不足，夏初春末，头疼脚软，食少体热者，是宜补中益气汤去柴胡升麻加炒柏、白芍药。"详见疰夏条。

泻 病名。古亦作写。❶泄泻的简称。亦有仅指水泻者。《奇效良方·泄泻门》："泻者，一时去水如注泄。"详泄泻条。❷指呕吐。魏·张揖《广雅·释宫》："吐，泻也。"孔疏《礼记·曲礼》："写谓倒传之也。"详呕吐条。

泻痢 病名。痢，古通利。指泄泻。《局方发挥》："夫泻痢证，其类尤多，先贤曰湿多成泻，此确论也。"《痢证汇参》卷二："泻痢之证，并无虚坐努责，惟觉倦怠，若滞下则不然，或脓或血，或赤白兼下，虽有痛不痛之异，然皆里急后重。……大抵治泻痢当宗仲景为法，可温则温，可下则下，或散表，或利小便。"参见泄泻、痢疾条。

泻痧 痧证之一。指痧症水泻不止者。《痧症全书》卷中："泻痧，水泻不计遍数，不可下，又不可止涩，惟分理阴阳，用五苓散去桂，白术换苍术，加车前、木通之类。若由慢痧变来，但宜治痧，则泻自止。"

宗筋弛纵 指痿证一类疾病。宗筋，诸筋会聚之处。如宗筋弛缓不用，则发生足痿、阳痿等症。《素问·痿论》："思想无穷，所愿不得，意淫于外，入房太甚，宗筋弛纵，发为筋痿，及为白淫。"又："阳明者，五藏六府之海，主润宗筋，宗筋主束骨而利机关也……故阳明虚则宗筋纵，带脉不引，故足痿不用也。"《景岳全书·杂证膜》："凡肝肾湿热以致宗筋弛纵者，亦为阳痿。"参筋痿、阳痿等条。

宗筋纵 指足痿不用。出《素问·痿论》。详宗筋弛纵条。

实火眩晕 证名。指眩晕由风火相搏所致者。属火冲眩晕之一。《症因脉治·火冲眩晕》："言风主乎动，木旺火生，则为旋转，此五志厥阳之火上冲，而为实火眩晕之症。"《杂症会心录·眩运》："若实火眩运者，其人必强健，其症必暴发，其渴必引饮，其脉必洪数，其呕酸苦水之味，运稍定；其饮食寒冷之物，运稍缓；其大便燥结，解后运稍止，无非风火相搏，实热为害，盖有余则上盛而火炎，壅塞则火炽而旋转，此实火之运也。"治宜三黄汤、竹叶石膏汤等方。参火冲眩晕、眩晕等条。

实邪短气 证名。内伤短气之一。多由膏粱积热或水饮停留，壅塞肺道所致。《症因脉治》卷二："实邪短气症，身无寒热，短气不足以息，呼吸不利，喘息倚肩，胁肋作痛，不得仰卧，其形似肿。"脉多沉滑、沉紧或沉伏。治宜利水除饮或清热泻肺。祛除水饮，可选用葶苈大枣汤、桂苓术甘汤、十枣汤等方；兼表邪者，小青龙汤；如膏粱积热，用厚朴大黄汤；肝火上冲，用龙胆泻肝汤；肺热喘逆，用泻白散加知母、石膏；胃火上升，用栀连二陈汤等方。若兼虚象者，可用肾气丸。参短气条。

实证 八纲之一。指人体感受外邪，或因痰火、瘀血、食积、虫积、水湿等阻滞所致的实性证候。与虚证相对而言。《素问·通评虚实论》："邪气盛则实，精气夺则虚。"常见高热，口渴，烦躁，谵语，腹胀痛而拒按，便秘，小便短赤或涩痛，舌质苍老，苔黄干糙，脉实有力等症。治宜祛除病邪为主。实证有表实、里实、实热、寒实之分。详见各条。

实呕 证名。指外邪犯胃、痰饮停滞、宿食不消及气逆火郁所致的呕吐。《景岳全

书·实呕证治》："凡实邪在胃而作呕者，必有所因，必有见证。若因寒滞者，必多疼痛；因食滞者，必多胀满；因气逆者，必痛胀连于胁肋；因火郁者，必烦热燥渴，脉洪而滑；因外感者，必头身发热，脉数而紧。"治宜去邪和胃。详见外感呕吐、痰呕、食呕、寒呕、热呕、气呕等条。

实肿 病名。指水肿病属实者。见《中国内科医鉴·浮肿水肿》。多因外感六淫，内伤饮食，起病急速，来势多暴。《医宗必读·水肿胀满》以阳证多热，热证多实。先胀于内而后肿于外者为实；小便黄赤，大便秘结者为实；脉滑数有力者为实；色红气粗者为实。治宜祛邪为主，用疏风、宣肺、利湿、逐水、祛瘀等法。实肿有气肿、血肿、热水肿、风肿、湿肿之分。详各条。

实胀 证名。胀病之一。见《医宗必读·水肿胀满》。古人认为胀亦有虚有实，一般以食气痰热、瘀瘕坚积之邪为实胀。《张氏医通·鼓胀》："先胀于内，后胀于外，小便赤涩，大便秘结，气色红亮，声音高爽者，实也。木香、沉香、砂仁、枳实、厚朴、苍术、大腹皮以治脾也；桑皮、葶苈、壳蔻、苏子、桔梗、枳橘以治肺也；木通、防己、茯苓、车前、泽泻、猪苓以利小便也；麻黄、防风、羌活、葛根以发汗也。如气壮能食，年少新病者，大黄芒硝皆可应用。"《证治汇补·胀满章》："实胀宜下，腹坚惧按，舌黄脉牢者，此实邪有余，治宜推荡，所谓下之则胀已是也。"参鼓胀、胀病条。

实热 证名。❶指邪气盛实之发热。《张氏医通·寒热门》："凡暴热不止，脉滑数或洪盛，皆为实热。宜随表里孰轻孰重而清理之。"《证治准绳》卷一："骨肉筋血皮毛，阴足而热反胜之，是为实热，……能食而热，口舌干燥，大便难者，实热也。以辛苦大寒之剂下之，泻热补阴。经曰：阳盛阴虚，下之则愈，脉洪盛有力者是已。"《证治汇补·虚实热辨》："胸闷而恶心，引饮便实者，实热也。"《杂病源流犀烛·火证源流》："入门曰，气分实热，白虎汤；血分实热，四顺清凉饮。"实热还包括阳明腑证，痰积发热、瘀血发热、湿阻发热等。参见各条。❷指热病而见发狂等精神见症。《石室秘录·热症门》卷六："发狂如见鬼状者，实热也；热病不知人者，虚热也。实热宜泻火，虚热宜清火。"参见发热条。

实热证 证名。指邪热亢盛，内外俱实的病证。见《此事难知·热有虚实外何以别》。多因热邪入侵，里热炽盛，或痰瘀、宿食阻滞所致。《万病回春·伤寒总论》："伤寒阳毒斑黄者，狂叫欲走也。其症表里俱实，内外皆热，脉数有力而无汗，三黄石膏汤。"症见壮热烦躁，面红目赤，渴喜冷饮，胸痛痰黄，腹痛拒按，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄，脉洪数、滑实等。治宜清热泻火。可选用白虎汤、调胃承气汤、小陷胸汤等方。参见实证、热证条。

实热结胸 结胸证之一。即热实结胸。亦称热结胸。《医宗必读·伤寒》："结胸，……。懊侬躁渴，实热结胸也，三黄泻心汤。"参热实结胸、热结胸条。

实热衄血 病症名。见《丹溪心法附余》卷十一。指因肺胃热盛，迫血妄行的衄血。《张氏医通·衄血》："实热衄血，脉实大便秘者，犀角地黄汤加木香大黄。"参见鼻衄条。

实哮 证名。见《类证治裁·哮症论治》。指因寒邪、郁热、暑热、水饮、胶痰等实邪所致的哮吼。因所感病邪与症状表现的不同，治疗有散寒宣肺、涤痰化饮、清热降气等法。详冷哮、热哮、水哮、痰哮等条。

实秘 病名。指肠胃实邪壅结所致的腑气不通。见《洁古家珍·杂方》。《医学心悟·大便不通》："阳明胃实，燥渴、诂语、不大便者，实闭也，小承气汤下之。"《金

匮翼·便闭统论》："实闭有寒有热。热实者，宜寒下；寒实者，宜温下。麻仁丸、厚朴三物汤，治实而热者；逐气丸、温脾汤，治实而寒者也。"参见大便秘结条。

实挛 挛证之一。见《证治准绳·杂病》。详挛条。

实喘 证名。见《证治准绳·喘》。指邪气盛实所致的气喘。多由风寒束肺，暑火郁热，痰浊胶固，水饮上凌，致肺气壅塞，宣降无权，气道不利而成。《景岳全书·喘促》："实喘者，气长而有余，……胸胀气粗，声高息涌，膨膨然若不能容，惟呼出为快也。"临床表现，一般起病较急，病程较短，呼吸急促，气粗有力等。实喘中由于病因和见症不同，又分为风寒喘、寒喘、热喘、痰喘、水喘和火喘等。详各该条。

实痞 证名。指有邪有滞的痞症。多由湿浊内阻，寒滞脾胃，痰食内结，或肝气郁遏或外邪内恋所致。《景岳全书·杂证谟》："凡有邪有滞而痞者，实痞也。"症见胃脘痞塞满闷，伴有呕逆，大便秘结，甚则疼痛不能饮食。治宜调气机，祛湿痰，通腑气为主。如饮食寒凉伤胃痞满或疼痛者，可用大和中饮或和胃饮等方；寒克脾胃而痞者，用厚朴温中汤等方；停痰而痞者，用二陈汤或橘皮半夏汤等方；大便气秘上下不通而痞者，用河间厚朴汤等方；肝气郁结而痞者，用枳实消痞丸等方。参痞有关条。

实痰 痰症之一。泛指体、邪俱实之痰证。《景岳全书·杂证谟》："凡可攻者便是实痰。……以其年力犹盛，血气未伤，或以肥甘过度，或以湿热盛行，或风寒外闭皮毛，或逆气内连肝膈，皆能骤至痰饮，但察其形气病气俱属有余者，即实痰也。"其治"宜行消伐，但去其痰"。参见痰证条。

实痰眩晕 证名。指眩晕由风火积痰上逆所致者。《杂症会心录·眩运》："实痰眩运者，其症实而脉实，其积热在阳明，其阻塞在经络，其郁遏在肠间，无非风火结聚，积痰生灾。盖液凝则浊阴泛上，饮停则火逆上升，此实痰之运也。"症见痰盛呕吐，胸脘胀痛，头重不举，脉滑实等。治宜豁痰为主。方用二陈汤加芩连，滚痰丸，清晕化痰汤等。参眩晕、痰晕等条。

肩上热 指肩部灼热或有热感。见《灵枢·邪气脏腑病形》。肩背部位是手太阳小肠经和足太阳膀胱经等的循行部位，如该经络发生病变，可伴有肩上热的症状。

肩不举 指肩臂部不能抬举。多因风湿外袭或由外伤、劳损所致。《灵枢·经筋》："手阳明之筋，……其支者，绕肩胛，挟脊；直者，从肩髃上颈。"其病当所过者，支痛及转筋，肩不举。"《类证治裁》卷六："阳明脉衰，肩胛筋缓，不举而痛，宜调补络脉，生耆、于术、当归、防风根、姜黄、桑枝、甘杞子、橘络。"除祛风化湿、和血活络外，并可结合针灸、推拿治疗。参见肩痛条。

肩后痛 指肩后部肌肉、筋脉作痛。多由风热气郁手太阳经脉所致。治以祛风行气为主。《杂病源流犀烛·肩背肘臂腕手病源流》："肩后属小肠经，故肩后痛为小肠经病。以小肠中感受风热，气郁不行故致此。宜羌活、防风、藁本、木通、蔓荆子；若心血虚，必养血，宜当归、熟地。"参见肩痛条。

肩垂背曲 背曲肩随的别称。《临证指南医案·肩臂背痛》："背为阳明之府，阳明有亏，不能束筋骨，利机关，即肩垂背曲。"详见背曲肩随条。

肩项痛 指肩痛连项。见《针灸甲乙经》卷八。多由邪客经脉，或血失濡养所致。《素问·缪刺论》："邪客于足太阳之络，令人头项肩痛。"治用羌防泻白散或圣愈汤等方。参见肩痛、项痛条。若内脏病而痛引肩项者，病多危重。《素问·玉机真脏论》："胸中气满，喘息不便，内痛引肩项，期一月死，真脏见，乃予之期日。"

肩背痛　证名。出《素问·藏气法时论》。指肩背部筋脉、肌肉作痛。多因风湿或内伤脏腑、气血所致。《张氏医通·肩背痛》："肩背痛，不可回顾，此手太阳气郁不行也，以风药散之，通气防风汤；若面白脱色、短气者勿服，宜逍遥散加人参；火郁热盛，东垣升阳散火汤；形气虚甚，十全大补汤；肩背痛，脊强，腰似折，项似拔，此足太阳经气不行也，羌活胜湿汤。"亦有因湿热相搏，肩背沉重而痛，宜当归拈痛汤；因痰饮流注者，宜导痰汤；又有病后、房劳后、经行后走注肩背痛而见虚象者，宜调补为主。参见外感肩背痛、内伤肩背痛条。

肩前痛　指肩前部肌肉、筋脉疼痛。多因邪袭手阳明经脉或肺气郁阻所致。《杂病源流犀烛·肩臑肘臂腕手病源流》："肩前属大肠经，故肩前痛为大肠经病，盖肩端两骨及前臑，皆大肠脉所贯。风热乘肺，肺气郁甚，肺先病，当泻风通肺气，宜防风、羌活、升麻、柴胡、蔻仁、陈皮、桑皮、贝母；若面白气虚，必兼补，宜加人参、黄芪。"参见肩痛条。

肩息　形容抬肩以助呼吸的状态。《素问·通评虚实论》："喘鸣肩息者，脉实大也，缓则生，急则死。"本症多见于严重呼吸困难的患者。哮喘病发剧时亦可见此。参张口抬肩条。

肩息咳　病名。出《灵枢·本脏》。指咳嗽而兼见耸肩喘息等症。参见咳喘、痰饮咳嗽、息高等条。

肩痛　指肩关节、肩胛周围筋骨肌肉作痛。见《甲乙经》卷十。肩为手三阳经交会处，又属肺脏分域。由外感风湿所致者，肩痛偏后，常与背痛并见。治宜祛风化湿。方用羌活胜湿汤加减。若因肺受风热者，症见肩痛偏前，痛连手臂。方用防风汤、羌活散等。若因强力负重或跌仆损伤者，痛有定处，伸屈不利，或痛引颈项等。可结合伤科、推拿、针灸治疗。参见肩背痛、肩前痛、肩后痛、肩不举等条。本症可见于风湿性关节炎、肩关节周围炎、肩胛肌劳损等疾患。

房黄　三十六黄之一。《太平圣惠方》卷五十五："房黄者，眼赤身黄，骨髓烦疼，头目昏痛，多饶睡卧，体虚无力，夜多梦泄，神思不安，腰脚酸疼，小便黄赤。"《圣济总录》卷六十一："病人身体沉重，状似着热，不得睡卧，小便黄色，眼赤如朱，心下块起，状如痴人。"治用点烙法，内服鹿茸散等方。参黄疸有关条。

房劳胁痛　证名。见《中国医学大辞典》。《医碥·胁肋痛》："房劳伤肾，气虚血滞，胸胁多有隐隐作痛，宜补肾加芎归之类和血。"《辨证录·胁痛》："房劳之后胁痛，其亏于精者更多，乌可重治肝而轻治肾哉！方用填精益血汤。"详肾虚胸胁痛条。

房劳咳嗽　病名。指房劳伤肾所致的虚咳。《医学入门·咳嗽》："房劳伤肾，咳而腰背痛、寒热者，二陈芎归汤。"《不居集·咳嗽》："房劳咳嗽。咳而发作寒热、引腰背痛，或喘满，此因房劳，大菟丝子丸主之。"参见咳嗽、肾经咳嗽条。

房劳复　劳复证之一。《重订广温热论·温热复症疗法》："房劳复者，即女劳复，一名色复。温热瘥后，气血未充，早犯房事，则内损真气，外触邪气而复作也。其症头重不举，目中生花，腰胁痛，小腹里急绞痛，憎寒发热，或阴火上冲，头面烘热，胸中烦闷是也。若卵缩入腹，脉离经者死。舌伸出数寸者亦死。治法必用猴鼠屎汤调下烧褪散；虚极者，宜六味饮加麦冬、豆豉、栀子煎汤，调服烧褪散；虚极热盛者，则用陶氏逍遥汤调服；若小腹急痛，脉沉足冷，则用当归四逆加吴茱萸汤调服，外用吴茱萸五钱，食盐二两，拌炒热熨小腹。"《医宗金鉴》卷三十七："房劳复与阴阳易，二病情异证则同，病后犯色复自病，病传不病易之名。"参阴阳易条。

房劳蓄血 证名。见《中国医学大辞典》。指饱后行房，竭力伤肝所致的蓄血。《张氏医通·诸血门》："醉饱入房，竭力伤肝，蓄血在胃口者，韭汁、童便下越鞠丸。不应，合平胃散去苍术，加桃仁、丹皮相和服。虚人理中越鞠相和服。在少腹，代抵当丸，加熟附子三分。虚者必加人参钱许，以助药力"。

怔忡 病名。❶指心悸之重症，又名心忪、忪悸。《素问玄机原病式》："心胸躁动，谓之怔忡。"《医碥》卷四："悸即怔忡。悸者，心筑筑惕惕然动而不安，俗名心跳。"详虚损怔忡、阴火怔忡、气郁怔忡、痰火怔忡等条。❷指心跳并有恐惧感。《赤水玄珠》卷六："怔忡者，心中惕惕然动不自安也。"又："怔忡止于心不自安，悸则心既动而又恐恐然畏惧，如人将捕之。"参见心悸条。

怵惕 证名。怵，恐惧之意；惕，惊骇之状。多因七情内伤所致。《灵枢·本神》："故怵惕思虑者则伤神，神伤则恐惧流淫而不止。"详惊、善恐条。

怫热 证名。指郁热。《素问·至真要大论》："少阴司天，热淫所胜，怫热至。"张志聪注："少阴司天，子午岁也。怫，郁也。盖少阴之火，发于阴中，故为怫热。"《医经溯洄集·伤寒温病热病说》："盖怫热自内达外，热郁腠理，不得外泄。"参见发热、热郁条。

闷 指大便秘结。《素问玄机原病式·六气为病》："閟，俗作秘。大便涩滞也。"详大便秘结条。

〔一〕

孟冬痹 病名。出《灵枢·经筋》。十二经筋病中的手心主（即手厥阴）筋病。《灵枢注证发微》："此证当发于十月之时，故名之曰孟冬痹也。"详手心主经筋病候条。

孟春痹 病名。出《灵枢·经筋》。十二经筋病中的足少阳筋病。《灵枢注证发微》："此证当发于正月之时，故名之曰孟春痹也。"详足少阳经筋病条。

孟秋痹 病名。出《灵枢·经筋》。十二经筋病中的足太阴筋病。《灵枢注证发微》："此证当发于七月之时，故名之曰孟秋痹也。"详足太阴经病候条。

孟夏痹 病名。出《灵枢·经筋》。十二经筋病中的手阳明筋病。《灵枢注证发微》："此证当发于四月之时，故名之曰孟夏痹也。"详手阳明经筋病条。

九 画

〔一〕

春月咳嗽 指春月感受风寒所致的咳嗽。《不居集》卷十五："春月咳嗽：春月风寒所伤，咳嗽声重，头疼，用金沸草散。咳嗽声重，身热头疼，用《局方》消风散。盖肺主皮毛，肺气虚则腠理不密，风邪易入，治法当解表兼实肺气。肺有火，则腠理不闭，风邪外乘，治宜解表兼清肺火，火邪退即止。若数行解散，则重亡津液，邪蕴而为肺疽、肺痿矣。故凡肺受邪，不能输化，小便短少，皮肤渐肿，咳嗽日增者，宜用六君子汤，以补脾肺，六味丸以滋肾水。"《温热经解》："春咳嗽者，风气通肝，人气上升，法当清解，加减桑菊饮主之。"《类证治裁·咳嗽》："春季咳，木气升也。治宜兼降。前胡、杏仁、海浮石、栝蒌仁之属。"参见风寒咳嗽、咳嗽条。

春温 病名。见《温疫论补注·诸家温疫正误》。伏气温病的一种，系冬受寒邪，

伏至春季所发的温热病（见《温热经纬·叶香岩三时伏气外感篇》）。临床以初起即出现里热症状如发热、口渴、心烦、小便黄赤、舌红等为特征。治宜清泄里热为主，方用黄芩汤等。如兼有恶寒头痛，则用葱豉桔梗汤加黄芩以表里两解。如热入阳明、壮热口渴、汗多、脉洪大或潮热谵语，腹满便秘，则选用白虎汤、调胃承气汤等以清气泄热或攻下泄热。如热入营血，或伤阴动风，均可参用风温治法。一说本病亦属新感温病（见《增补详注温病条辨》卷一）。亦有因新感外寒，触动伏气而发（见《时病论》）。《类证治裁·温症》："温为春气，其病温者，因时令温暖，腠理开泄，或引动伏邪，或乍感异气，当春而发，为春温。"参见伏气温病、新感温病、风温等条。

毒注　注病之一。《诸病源候论·毒注候》："毒者是鬼毒之气，因饮食入人腹内，或上至喉间，状如有物，吞吐不出，或游走身体，痛如锥刀所刺，连滞停久，故谓之毒注。"参见疰条。

毒痢　病名。痢疾之因热毒所致者。见《三因极一病证方论》卷十二。其证痢下五色脓血，或如烂鱼肠，或如豚肝，心烦，腹痛如绞。治宜清热解毒凉血。方如茜根丸、三黄熟艾汤加忍冬藤、白头翁、马齿苋等药。本病可见于重症中毒性菌痢、急性肠道阿米巴痢疾、坏死性肠炎、沙门氏菌属食物中毒等疾患。参见痢疾、热毒痢条。

项软　指项颈软弱无力。《世医得效方·项软》："颈垂软，头不得正，或去前，或去后。"古称天柱骨倒。为督脉病变，多因肾气精髓衰耗所致。《素问·脉要精微论》："头者精明之府，头倾视深，精神将夺矣。"属五软之一，常见于小儿体虚，也可见于老年阳气衰退、虚劳、久病等。治宜补肾填精，强健筋骨为主。方如健骨散、生筋散等。参见天柱骨倒条。

项背强　亦称项脊强。指后项背脊间肌肉筋脉牵强板滞不适。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。多由风冷乘袭足太阳经，或气血凝滞，脉络不和所致。治宜温散、通络等法。方用葛根汤、姜黄散、香苏散等。又因负重背脊外伤疼痛者，用活血止痛法治疗。参见项脊强条。

项背强几几　指颈项、背部牵强不舒，有俯仰不能自如的感觉。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。"由于病邪在表，津液不达，太阳经脉拘急所致。多见于外感表证，有虚实之分。《伤寒明理论》卷上："二者均是项背强，而发散又有轻重者。盖发热汗出恶风者，为表虚，表虚者可解肌；无汗恶风者，为表实，表实者可发汗。是以为治不同也。"可选用桂枝加葛根汤、葛根汤等方。参见项背强、项脊强等条。

项脊强　项背强的别称。指后项背脊肌肉经脉牵强。《医学心悟·项脊强》："项脊者，太阳经所过之地，太阳病，则项脊强也。"详项背强条。

项痛　指项部肌肉筋脉作痛。出《灵枢·杂病》。多由风寒之邪侵袭，或气血凝滞经络所致。《医碥·项强痛》："多由风寒邪客三阳，亦有痰滞，湿停，血虚，闪挫，久坐，失枕所致。感冒风寒者，驱邪汤；痰盛者，消风豁痰汤；湿盛者，加味胜湿汤；血虚火盛筋燥者（项强急，动则微痛）……疏风滋血汤；闪挫、久坐、失枕所致项强不可转移，多由肾虚不能生肝，肝血虚，无以养筋，六味丸常服更妙。"有腮项相连肿痛，发热便闭者，宜防风通圣汤。参见颈项强痛条。

项强　出《素问·至真要大论》。亦称颈项强急。指颈项部肌肉筋脉牵强拘急。多因风寒湿邪侵袭太阳经脉，或感受暑温，或津血耗损，筋脉失养所致。本症可见于伤寒，暑温、中风、痉病等。《伤寒括要·项强》："太阳项强，无汗，脉浮紧，麻黄汤；有汗，

脉浮缓，桂枝汤；痉症独摇头，卒口噤，项强，小续命汤；结胸项强，如柔痉状，下之则和，大陷胸丸。”亦有因刀伤感染风邪而致者，又有因挫闪及久坐、失枕而致项强不可转移者，俗称落枕。详见有关各条。本证可见于脑炎、脑血管意外、颈肌痉挛等疾患。参见项强、颈项强痛条。

贲肫 古病名。亦称贲豚。《诸病源候论·积聚病诸候》：“肾之积名曰贲肫，发于少腹，上至心下，若肫贲走之状。”详贲豚条。

贲豚 古病名。亦作奔豚、贲肫，又称奔豚气。《难经·五十四难》：“肾之积，名贲豚，发于少腹，上至心下，若豚状，或上或下无时，久不已，令人喘逆，骨痿，少气。”《灵枢·邪气藏府病形》：“肾脉……微急为沉厥，奔豚。”《金匮要略·奔豚气病脉证治》：“奔豚病从少腹起上冲咽喉，发作欲死，复还止，皆从惊恐得之。”“奔豚，气上冲胸，腹痛，往来寒热。奔豚汤主之。”“发汗后，烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚，气从少腹上至心，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤主之。”“发汗后，脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。”《杂病源流犀烛·肾病源流》：“肾之积，曰奔豚……皆由肾虚，脾家湿邪下传客肾所致。”治宜补气健脾，辛温散结。选用奔豚丸或增损五积丸。一说肾积与奔豚气两病不同。如《难经集注》杨玄操注肾积条云：“此病状似豚而上冲心。又有奔豚气，此非积病也，名同而疾异焉。”

贲豚气 古病名。见《圣济总录·积聚门》。即贲豚。积气因发作部位不同，可见气逆冲心满闷，或见膀胱切痛，上冲腹胁满痛，上下攻走疼痛等证。治宜槟榔散、四味丸、天雄散等方。参贲豚条。

茧唇 病名。指唇皱裂肿痛如蚕茧状。《张氏医通》卷八：“皱裂如蚕茧者。名曰茧唇。……或因七情火动伤血，或因心火传脾，或因厚味积热伤脾。”《医碥》卷四：“唇茧肿起白皮皱裂如蚕茧，亦有唇下肿如黑枣者，亦有不肿缩紧小起白皮者名紧茧。皆烦热所致，治须润燥清火消风，大概以养血为要，肾虚者，内热口干，吐痰，体瘦，济阴地黄丸，肝火，柴胡清肝散，胃火，清胃散，脾经风湿，泻黄饮子。”本病又名紧唇、瘨唇，参见该条。

带脉病 证名。指带脉不和出现的病症。《素问·痿论》：“阳明虚，则宗筋纵，带脉不引，故足痿不用也。”《脉经》卷二：“带脉左右绕脐腹腰脊痛，冲阴股也。”《杂病源流犀烛·带脉病源流》：“中分不运，必病腹满。阴阳两虚，中分弱而不能镇定，必病腰溶溶如坐水中。心脾上郁，肝肾下虚，邪热留连而为滞淫，必病赤白带。阳不能胜，不能固守于天枢，阴气得以袭之，必病左右绕脐腰脊痛冲心腹。邪客于太阴之络，必病腰痛引小腹控肷，不可以养息。此皆带脉所生病也。”

茶积 病名。见《济生方》卷四。指嗜茶成癖而致积者。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“茶积，好饮茶成癖积，或喜吃干茶叶而成积。面黄，胸膈或空或胀无常也。宜姜黄、吴茱萸、苍术、白术、炮姜、川椒，方用星术丸、磨积丸。”《类证治裁·积聚》：“嗜茶成积，星术丸。好食茶叶成癖，椒仁、茶叶各一两，研末，炒飞，面糊丸，茶清下。”《医宗必读》卷七：“茶积，轻者姜、芝麻，甚者茱萸、椒、姜。”参积条。

茶癖 病名。见《丹溪心法·积聚痞块》。指嗜茶太过，积久所致的癖病。《儒门事亲》卷八：“好茶成癖，积在左胁。”症见饮食减少，面黄，乏力，腹痛等。治用磨积丸、星术丸等方。或用石膏、黄芩、升麻为末，砂糖水调服。参癖有关条。

药物中毒 病名。因误服大剂量药物，或治疗中错用误服及服用变质药物，或药物

配伍失度等所致而出现中毒现象者。《诸病源候论·服药失度候》："凡合和汤药，自有限剂，至于圭铢分两不可乖违。若增加失宜，便生他疾。其为病也，令人吐下不已，呕逆而闷乱，手足厥冷，腹痛转筋，久不以药解之，亦能致死。"古代对药毒有不同的命名。《古代疾病名候疏义·方言病疏》："凡饮药傅药而毒，南楚之外谓之瘌，北燕朝鲜之间谓之痨，东齐海岱之间谓之瞑，或谓之眩，自关而西谓之毒。……痨、瘌、瞑、眩、毒五字义同。"各种药物中毒有不同的表现及解救法。详参莨菪中毒、藜芦中毒、芫花中毒、狼毒中毒、乌头类中毒、巴豆中毒、钩吻中毒、杏仁中毒、半夏中毒、大戟中毒、蹶蹋中毒、野葛中毒、果中毒、商陆中毒、银杏中毒、雪上一枝蒿中毒、石药中毒、硫黄中毒、雄黄中毒、砒霜中毒、轻粉中毒、铜中毒、金石中毒、盐卤中毒、煤炭中毒、桐油中毒、漆中毒、夹竹桃中毒各该条。

药后喘　病名。见《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》。指因服药后引起的哮喘。可因药物过敏，或其人体气素虚，劳倦过度，或病后用攻伐药太过，以致喘不能收。治宜扶正为主，如补中益气汤等方。《医学入门·喘》："因服补药喘者，用三拗汤。"古代有因服石药致喘者。如《圣济总录》卷第一百八十四："乳石之发，……使人胸满短气，上喘咳嗽，不得安卧。"宜紫菀汤、麦门冬汤、贝母汤、葶苈丸等方。

药烦　证名。见《温疫论》上卷。指服药后出现烦闷及头、身发痒等症。《伤寒绪论》烦热："凡服药后，烦闷不安，头面发际遍身发痒者，谓之药烦，此胃虚不能胜药力也。与热姜汤徐徐呷之。药中宜加生姜以行胃气自安。"本证可见于药物反应、药物过敏引起的病症。

枯　骨痿的别称。《金匮要略·中风历节病脉证并治》："咸则伤骨，骨伤则痿，名曰枯。"详骨痿条。

砒霜中毒　病名。即三氧化二砷中毒。急性中毒多因突然吸入大量砒粉尘，或因药用、误服过量所致。前者主症为咳嗽，胸痛，呼吸困难。后者主症为烦躁如狂，心腹搅痛，头旋，欲吐不吐，或剧烈吐泻，面色青黑，四肢逆冷，甚则迅速昏迷，导致死亡。慢性中毒者，可见各种皮肤损害，毛发脱落，腹痛腹泻，黄疸及肢体麻木痛等。治疗宜中西医结合抢救。《本草纲目》卷四载有解砒毒药，如米醋、乌桕根、白芷、郁金、胡粉、白扁豆、蚤休、黑铅、鲨鱼枕、蓝汁、荠苨汁、酱汁、绿豆汁、豆粉、大豆汁、杨梅树皮汁、冬瓜藤汁、早稻杆灰汁、地浆、井泉水、白鸭通汁、鸭血、羊血、雄鸡血、胡麻油等。可参考。

砂淋　病名。又名砂石淋。即石淋。《华氏中藏经·论淋沥小便不利》："砂淋者，腹脐中隐痛，小便难，其痛不可忍，须臾从小便中下如砂石之类，有大者如皂子，或赤或白（一作黄），色泽不定。"详石淋条。

面无血色　见《金匮要略·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治》。指面部缺少红活润泽的病色，常可伴口唇、指甲色淡白等症。多见于衄血、吐血、下血等失血病证。

面目浮肿　证名。见《金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治》。有虚实之分。虚证亦称面目虚浮。多因脾、肺、肝、肾脏气虚衰所致。实证多由湿热壅盛、风火水气、阳明实热所致。《景岳全书·面病》："面肿有虚实，肿者为实，浮者为虚。实肿者，或热或痛，乃因风火上炎，此以邪之有余也，脉必紧数，证必寒热。风则散之，火则清之，壅滞秘结则通之利之，邪去而肿自消也。虚浮者，无痛无热而面目浮肿，此或以脾肺阳虚，输化失常，或以肝肾阴虚，水邪泛滥。然浮而就上，其形虚软者，多由乎气；肿而就下，按而成窝者，多由乎水。治气者，须从脾肺，虚则补之，实则顺之；治水者，须

从脾肾，虚则化之，实则泻之。然水气虽分上下，而气即水之母，水即气之质，故有相因之化，而亦有相因之治也。……面目虚浮，有因色欲过度，阴虚气越而致者，宜六味地黄汤或八味地黄汤或加减八味丸；若因劳倦伤脾，气虚不敛而面目虚浮者，宜参苓白术散、归脾汤或十全大补汤；若因饮酒过度，湿热上聚而面目浮肿者，宜葛花解酲汤或七味白术散；若因泻痢不止，脾肾气虚而面目浮肿者，宜胃关煎或温胃饮；若因饮食不节，阳明壅实，二便秘结而头面满胀者，宜廓清饮，惟小儿多有此证，甚者宜木香槟榔丸下之；若阳明实热，胃火上浮，或烦热干渴而头面浮肿者，宜抽薪饮或白虎汤，或大分清饮利之。”《证治汇补》卷四：“面浮，……眼下肿如卧蚕状，将有水肿之虞。若脉浮虚无力，是脾气不足，宜培脾实土，沉实有力，是肺气不顺正，降气泻水。”

面目虚浮 证名。指面目浮肿由虚所致者。见《景岳全书·面病》。详面目浮肿条。

面尘 指面有尘灰之色。《嵩崖尊生书》卷六：“面尘，面有尘气，胆经气郁，疏胆气兼清肺。”《证治准绳·杂病》：“针灸面尘，皆取肝胆二经。经云肝足厥阴之脉，是动病甚则嗌干，面尘脱色；又云胆足少阳之脉，是动病甚则面微有尘，皆视盛虚热寒陷下取之也。”

面色苍黑 指面黑枯暗如尘。见《华氏中藏经·察声色形证决死法》。《素问·脉要精微论》：“黑欲如重漆色，不欲如地苍。”《类经·脉色类》：“重漆之色，光彩而润，地之苍黑，枯暗如尘，此水色之善恶也。”面色苍黑提示病情危重。参见面色黧黑条。

面色萎黄 指面现枯萎晦黄的病色。多由脾胃虚弱，气血不能上荣所致。《中藏经·脾脏虚实寒热生死逆顺脉证之法》：“脾病则面色萎黄。”可见于多种慢性病及贫血、营养不良等疾患。

面色黧黑 黧，黑色。面色黧黑即指面部呈现黑色。多因饮邪久滞胸膈，或少阴气绝、血脉不流及肾虚水枯所致。《难经·二十四难》：“手少阴气绝，则脉不通，脉不通则血不流，血不流则色泽去，故面黑如黧，此血先死。”《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》：“膈间支饮，其人喘满，心下痞坚，面色黧黑，其脉沉紧，得之数十日，医吐下之不愈，木防己汤主之。虚者即愈，实者三日复发，复与不愈者，宜木防己汤去石膏加茯苓芒硝汤主之。”《医学纲目》：“肾外证，面黑。”参见面色苍黑条。

面如漆柴 指面黑如漆而形瘦如柴的症象，为心肾病危重症状之一。《灵枢·经脉》：“手少阴气绝，则脉不通，脉不通，则血不流，血不流，则髦色不泽，故其面黑如漆柴者，血先死。”《杂病源流犀烛·肾病源流》：“肾家本有水火两病。火病者，龙火腾炽，上烁为害也。其证有口热咽干，烦心，心如悬，喝喝而喘，面如漆柴，咳唾有血等类。”

面肿 指面部作肿。与面浮属虚者相对而言。《素问·平人气象论》：“面肿曰风。”多因食后冒风，或风热相搏，上攻头面所致。治疗以祛邪为主。《医学入门》卷五：“面肿乃食后冒风所致，能食者风虚，面麻木，牙关急搐，升麻胃风汤；不食者风热，面唇黑，心悬如饥，防风通圣散；内伤气促者，升麻顺气汤。”《景岳全书·面病》：“面肿有虚实，肿者为实，浮者为虚。实肿者，或热或痛，乃因风火上炎，此以邪之有余也，脉必紧数，证必寒热，风则散之，火则清之，壅滞秘结则通之利之，邪去而肿自消也。”《杂病源流犀烛·面部病》：“面肿为胃风症。……皆由阳明经络受风热毒气，故若此也。”治宜犀角升麻汤等方。参见面浮、胃风条。

面热 指面部热如火灼者。多因胃家郁热，或饮食不节，湿火上行，独燎其面所致。

《灵枢·邪气脏腑病形》："面热者足阳明病。"治宜清泄为主。方用调胃承气汤、升麻黄连汤等。

面浮　指面部虚浮微肿。多属虚证。《古今医统·面部门》："面浮属脾土肺金，……面浮则为虚。因脾伤劳役，饮食失节，水土不调，脾气输散不常，肺气传布失度，故面虚浮，眼下如卧蚕之状，或有气喘，皆其候也，此正气不足，脉必虚弱或浮而无力。"《景岳全书·面病》："面肿有虚实，肿者为实，浮者为虚。……虚浮者，无痛无热而面目浮肿。此或以脾肺阳虚，输化失常，或以肝肾阴虚，水邪泛滥。"脾肺阳虚者，宜补中益气汤，肝肾阴虚，水湿上泛者，宜六味、八味地黄汤。参见面肿条。

面垢　指面部如蒙尘垢，洗之不去之色。见《伤寒论·辨阳明病脉证并治》。多因感受暑邪或胃热熏蒸所致。《秘传证治要诀·伤暑》："伤暑必自汗、背寒、面垢。……宜香薷饮、六和汤。"《景岳全书·暑证》："暑有八证：脉虚、自汗、身热、背寒、面垢、烦渴、手足微冷、体重是也。凡治此者，宜调理元气为主，清利次之。"《医宗金鉴·订正伤寒论注》卷九："阳明主面，热邪蒸越，故面垢也。"治宜清泄保津，可用白虎汤等方。

面肿庞然壅　指面部足部浮肿。为水肿病常见证候之一。《素问·评热病论》："有病肾风者，面肿庞然壅。"王冰注："庞然，肿起貌；壅，谓目下壅如卧蚕形也。"马莳注："肿，足面也。"参见水肿、肿肿条。

面脱　指面部肌肉消瘦如脱。多由正气大虚，气血耗竭所致。《素问·玉版论要篇》："色夭面脱，不治。"

面焦　指面部泛现干枯焦黑的病色。出《素问·上古天真论》。多由阳明气衰，气血失荣所致。可见于久病及老衰患者。《医碥·面》："面焦，胃脉衰。人参、黄芪、甘草、白芍、升麻、葛根、白芷。"

面痛　证名。指鼻颊、口唇、颊车、发际等部痛不可触，甚至妨碍言语饮食者。《证治汇补·面痛》："面痛皆属于热，但暴病多实，久病多虚，饮食妨碍，皆因膏粱风毒，食卧少安，无非胃虚有火。"《张氏医通·诸痛门》："面为阳明部份，而阳维起于诸阳之会，皆在于面，故面痛皆因于火，而有虚实之殊。……高者抑之，郁者开之，血热者凉之，气虚者补之，不可专以苦寒降火为事。"治宜清热解毒，用犀角升麻汤等方。又："老人过劳，饥则面痛，补中益气加芩、栀、连翘、鼠粘、黑参；因郁结积成胃热，遂患面痛，越鞠丸加山栀、连翘、贝母、橘红之类。"本症可见于三叉神经痛等症。

面寒　证名。指面部有恶寒感觉者。见《丹溪心法·恶寒》。多因胃中有寒湿，或胃气虚所致。《医学入门》卷五："如阳明气不足，则身已前皆寒，寒湿上逆，则面反不能耐寒，先以附子理中汤数服，次以升麻葛根汤去芍加参、芪、附子、益智、草蔻、白芷、葱白"。

面瘦　指面部肌肉消瘦。多因体虚久病，气血耗损所致。《灵枢·阴阳二十五人》："血气皆少，则面瘦恶色。"

轻粉中毒　病名。轻粉系水银、白矾、食盐烧炼而成。因内服轻粉过量而出现中毒症状者。《本草纲目》卷九："若服之过剂，或不得法，则毒气被蒸窜入经络筋骨，莫之能出，痰涎既去，血液耗亡，筋失所养，营卫不从，变为筋挛骨痛，发为痈肿疳漏，或手足皲裂，虫癣顽痹，经年累月，遂成废痼。"文献载有解轻粉毒药，如黄连、贯众、酱汁、斑蝥、猪肉等。可参考。参金石中毒条。

指甲脱落　病名。指手指甲自行脱掉的病候。《石室秘录·指甲脱落》："有人手指甲尽行脱下，不痛不痒。此乃肾经火虚，又于行房之后，凉水洗手，遂成此病。方用六味汤加柴胡，白芍，骨碎补治之而愈。"其言可供参考。

挥霍撩乱 霍乱病证之形容词。见《素问病机气宜保命集》卷中。《字学》："摇手曰挥，反手曰擂。"指上吐下泻，病势急暴。《医碥·霍乱》："霍，言其手足之扰动如挥霍也，乱，言其内之邪正变乱也。"《证治汇补·霍乱章》："手足抽掣而挥霍，眼目旋转而撩乱也。"《赤水玄珠·霍乱门》："霍乱者，挥霍撩乱，其势急暴。"参霍乱条。

鸦黄 三十六黄之一。《太平圣惠方》卷五十五："鸦黄者，十指青绿，舌上生黑点，唇口青黑，身如黄铜。"宜用治胆黄方及点烙法。参黄疸有关条。

〔丨〕

背曲肩随 亦称肩垂背曲。指背脊高突，两肩下垂的症象。多因精气虚亏，不能濡养筋骨所致。《素问·脉要精微论》："背者胸中之府，背曲肩随，府将坏矣。"可见于老年阳衰、劳伤虚损患者。治宜补肝肾、益精气、养筋骨等法。

背伛偻 见《东医宝鉴·外形篇》。又名大偻、背偻、俗称"驼背"。指曲背俯身，部分脊椎突出，按之高耸之症。多属督脉病变。《杂病源流犀烛·胸膈脊背乳病源流》："背伛偻，年老伛偻者甚多，皆督脉虚而精髓不充之故，此当用补肾益髓之剂；若少壮之人，忽患伛偻，并足挛，脉沉弦而细，皆中湿故也，宜煨肾散。"亦可因体虚而感受风寒所致。参见大偻、背偻条。本症可见于胸椎结核或先天性胸椎后突畸形，及部分类风湿性脊柱炎患者。

背恶寒 证名。出《伤寒论·辨少阴病脉证并治》。指背部有寒冷感觉。《张氏医通》卷三："背为阳位，背上恶寒，阳受病而阴邪亢逆也。其病有七。一者暴中阴寒，四肢厥冷而背恶寒，脉必沉细，附子汤温散之；一者素禀阳衰，而背上常微畏寒，脉来微弱，八味丸温补之；一者热邪内伏，烦渴引饮而背恶寒，脉多沉滑，或伏匿，此火郁于内也，热病初发多此，白虎汤解散之；一者中暑喝热，亦多有背恶寒，人参白虎，清暑益气，按证清解之；一者湿痰内郁，肢体疼重，而痞闷头汗，其人必肥盛，其脉或缓滑、或涩滞，滑则指迷茯苓加胆星，涩则苓桂术甘加半夏、广皮分解之；一者瘀血内滞，而头汗目黄，小便清利，大便溏黑，小腹偏左、或胁中脘有疼处，脉必关尺弦紧，或带芤状，桃仁承气、犀角地黄，随上下虚实清理之；一者无故脉数，而背恶寒，疼重寒热者，为发痈疽之兆，膏粱多此，不可疑似而迟延，难疗也。"

背脊骨痛 证名。《石室秘录·背脊骨痛》："背脊骨痛者，乃肾水衰耗，不能上润于脑，则河车之路，干涩而难行，故尔作痛。此等症非一二剂可以见功，非久服补气之药以生阴，非大服补阴之药以生水，未易奏行也。"方用满河汤。参见脊痛条。

背胭筋痛 证名。胭，同膂。出《素问·标本病传论》。指背脊椎骨两侧的膂筋肌肉疼痛。多由脾、肾疾病，邪侵膀胱所致。

背偻 证名。又称背伛偻、大偻。指曲背俯身、脊椎突出。《诸病源候论·背偻候》："肝主筋而藏血，血为阴，气为阳，阳气精则养神，柔则养筋，阴阳和同，则血气调适，共相荣养也，邪不能伤。若虚则受风，风寒搏于脊膂之筋，冷则挛急，故令背偻。"亦可因督脉虚而精髓不充，或中湿邪所致。详见背伛偻条。

背痛 证名。出《素问·阴阳别论》。多由外感风寒之邪，侵袭足太阳经所致。其症背痛或兼板滞，牵连肩项，或连腰部，可兼有恶寒等。治宜祛风散寒，疏通经气为主。用羌活胜湿汤加减。又背为脏腑腧穴所在，脏腑发生疾病，都会引起背痛。如《杂病源流犀烛》："背痛，肺腧在背，故肺病令人逆气喘欬，肩背痛。"亦有肾气逆冲而致。《类证治裁·肩背手臂痛》："肾气逆冲，

挟脊而上攻背痛者，系督脉主病，治在少阴。……。亦有肝浊逆冲，从腹而上攻背痛者，系冲任主病，治在厥阴。”凡治背痛方药，可加羌活、防风引经。背痛亦可并见于胸痹、心痛等症。参见胸痹、心痛、胃脘痛、肩背痛条。

背腧诸经心痛　证名。外邪侵犯背腧诸经所致。《三因极一病证方论》卷九：“背腧诸经心痛，心与背相引，心痛彻背，背痛彻心。……诸腧、诸腑涉邪所致。病属外所因。”参心痛条。

战汗　证名。见《世医得效方·大方脉杂医科》。在外感热病过程中，突然发生战慄，继而全身出汗，称为战汗。是正气与邪气相争的表现。正能胜邪，则邪随汗解，病转痊愈。《广温热论·战汗》：“温证不论初起未传，俱以战汗为佳兆。以战则邪正相争，汗则正逐邪出。”有正不胜邪，战而汗不出者；有邪盛正虚，汗出而复热者；亦有战汗后气随汗脱者。《温疫论补注·战汗》：“但战而不汗者危，以中气亏微，但能降陷，不能升发也。”《温热经纬·叶香岩外感温热篇》：“盖战汗而解，邪退正虚，……若脉急疾，躁扰不卧，肤冷汗出，便为气脱之证矣。更有邪盛正虚，不能一战而解，停一二日再战汗而愈者，不可不知。”

战慄　证名。指身体抖动并有怕冷感觉。多因暴感寒邪，或心火热甚，阳气被遏所致。可见于外感热病、疟疾、暴受寒冷、饮酒、恐惧时。《素问玄机原病式·六气为病》：“战慄，动摇，火之象也。阳动阴静，而水火相反，故厥逆禁固，屈伸不便，为病寒也。慄者寒冷也。或言寒战为脾寒者，未明变化之道也。此由心火热甚，亢极而战，反兼水化制之，故寒慄也。然寒慄者，由火甚似水，实非兼有寒气也。故以大承气汤下之，多有燥粪下后，热退则战慄愈矣。或平人冒极寒而战慄者，由寒主闭藏，而阳气不能散越，则怫热内作故也。……或平人极恐而战慄者，由恐为肾志，其志过度，则劳伤本藏，故恐则伤肾、肾水衰则心火自甚，而为战栗也。又如酒苦性热，养于心火，故饮之过多，则心火热甚，而为战栗，俗谓之酒禁也。”《张氏医通·寒热门》：“若阳虚则但畏寒，阳郁则振寒、战慄，有火无火之分也。亦有暴感寒邪，恶寒脉伏而战慄者，麻黄汤发散之。”参寒慄、振寒、寒战条。

哑风　病名。指中风失音不语。《张氏医通·中风门》：“若饮食如常，但失音不语，俗呼哑风。”治用小续命汤去桂、附加菖蒲，或用诃子清音汤等。

哑嗽　病名。指咳嗽而声音嘶哑者。因邪郁于肺，肺气闭塞，或肺脏虚损所致。《类证治裁·咳嗽》卷二：“哑嗽。气促满闷失音，通声煎；肺实痰壅，宜杏、桔、蒌、橘、贝、枳、竹叶之属；肺虚喉燥，宜生脉散加玉竹、款冬花、蜜；外感寒包热者，细辛、半夏、蜜、姜辛散之；内伤火刑金者，六味汤合生脉散；顿咳至声不出者，痰郁火邪，桔梗汤加贝母、枇杷叶；久嗽失音，杏仁膏。”参见咳嗽条。本症可见于急性喉炎或久咳、剧咳患者。

咽干口燥　证名。见《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》。指自觉咽喉、口腔干燥之症。详口干、渴等条。

咽痛　证名。指咽部疼痛。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。《医学心悟·咽痛》：“咽者，少阴经脉所过之地也，热邪攻之，则咽痛。”“寒邪直中下焦，逼其无根失守之火，发扬于上，亦令咽痛。然必有下利清谷，四肢厥冷等证。”《医钞类编》卷十二：“或实热上攻或虚火妄行，痰涎结聚则成咽痛、咽疮，实火宜升之散之，若虚火宜用人参姜、附辛热之药。多有过服寒而病反甚者，不可不知。”如风热侵袭，宜加味荆芥散；脾肺火热，虚烦上壅，宜利膈汤；热壅咽痛，或痰中带血，宜金沸草散；实热咽痛，三黄丸，或用黄连、荆芥、薄荷为末蜜和姜汁调

噙或含山豆根及三黄丸水调涂足心，甚者祛毒牛黄丸。咽痛服冷剂反甚者，宜用生姜汁调消风散。亦有阴气大虚，阳气飞越，痰结在上，遂成咽痛者。宜用补阴敛阳法。

哕 ❶呃逆之古称。《灵枢·杂病》："哕，以草刺鼻，嚏而已。"《证治准绳·杂病》："呃逆即《内经》所谓哕也。"参见呃逆条。❷指干呕。《此事难知·呕吐哕胃所主各有治平》："哕属少阳，无物有声，乃气病也。"《医林绳墨》卷四："盖哕者，有声无物之谓，乃干呕也。"《医经溯洄集》则以哕为干呕之剧者。详见干呕条。

咯血 证名。见《儒门事亲·咯血衄血嗽血》。《赤水玄珠》卷九："咯血者，喉中常有血腥，一咯血即出，或鲜或紫者是也，又如细屑者亦是也。"《张氏医通·诸血门》："咯血者，不嗽而喉中咯出小块，或血点是也。其证最重，而势甚微，常咯两三口即止。盖缘房劳伤肾，阴火载血而上。亦有兼痰而出者，肾虚水泛为痰也。"治宜滋阴降火，选用沙参麦冬汤、六味地黄丸加牛膝，或合茜根散加减。偏肺热者，可用青饼子。若心经火旺，痰中带血丝，治宜清心为主，佐以清肺化痰，可用导赤饮加黄连、丹皮、血余、蒲黄、天冬、寸冬、贝母、茯苓，或用太平丸等方（见《血证论》）。

咬牙 龂齿的别称。《医述》引《指南续刻》："咬牙者，胃热走络也。若咬牙而脉证皆衰者，胃虚无谷气内荣，虚则喜实也。"《六因条辨·春温条辨》："春温，舌黑神昏，烦躁，咬牙、手足振颤，时或抽搐，此热极风生，已成痉厥。"治宜清热熄风为主。参见龂齿条。

咳 病名。出《素问·咳论》。《济生方·咳嗽》："经云：五脏六腑皆令人咳，非独肺也。由是观之，皮毛始受邪气、邪气先从其合，然后传为五脏六腑之咳，外则六淫所伤，内则七情所感。"《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："有声无痰曰咳，非无痰，痰不易出也。病在肺，肺主声，故声先而痰后。……因咳有痰，重在咳，肺为主。急宜顺气，肺恶温燥，桔红、贝母、桔梗、桑皮、知母、麦冬、紫菀为要药。"详嗽、咳嗽条。

咳血 证名。①又称嗽血。见《济生方》。指咳嗽有血。来自肺脏者。多因外感风热燥火，或木火刑金，阴虚火动，灼伤肺络所致。《医林绳墨·血论》："从嗽而来于肺者为咳血。"《症因脉治·吐血咳血总论》："咽中胃管呕出名吐血，喉中肺管嗽出名咳血。"《赤水玄珠》卷九："嗽出痰内有血者，名咳血，又云嗽血。其因有二，热壅于肺者易治，不过凉之而已，久嗽损于肺者难治，此已成劳也。"《张氏医通·诸血门》："咳血者，因咳嗽而见血，或干咳，或痰中见红丝血点一两口，气急喘促。此虽肺体自燥，亦为火逆，咳伤血膜，而血随痰出也。……治宜六味丸加门冬、五味、清金壮水为主，略兼阿胶、贝母、百合、款冬、紫菀，润肺止咳之剂。血止后胃虚少食，气息不续者，劫劳散去半夏加紫菀茸及琼玉膏调理之。咳血久而成劳，或劳而咳血，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心烦热，咽干颊赤，心冲潮热，盗汗减食，异功散加阿胶，或四君子加黄芪、鳖甲、麦冬、五味。阴虚火动而咳血，或痰中有血星如珠者，生料六味丸加茜根、乌贼骨、童便。"如外感风热者，症见喉痒干咳，血出鲜红，或痰少带血，口干鼻燥，或身热骨楚，脉浮数。治宜祛风宣肺，润燥宁络，用桑杏汤、千金麦门冬汤加减。肝火犯肺者，症见干咳阵作，痰少带血或纯血鲜红，胸胁刺痛，心烦易怒，头胀头痛，舌红苔黄，脉弦数。治宜清肝润肺，和络止血，用柴胡连梅散或泻白散合黛蛤散。②指咳血而少痰者。《景岳全书·杂证谟》："咳血嗽血，皆从肺窍中出，虽若同类，而实有不同也。盖咳血者少痰，其出较难；嗽血者多痰，其出较易。"参见嗽血、失血条。本病证可见于支

气管扩张、肺炎、肺部结核、肺癌等疾病。

咳逆　证名。指咳嗽见气上逆的疾患。出《素问·六元正纪大论》。《诸病源候论·咳逆候》："咳逆者，是咳嗽而气逆上也。气为阳，流行府藏，宣发腠理，而气肺之所主也。咳病由肺虚感微寒所成，寒搏于气，气不得宣，胃逆聚还肺，肺则胀满，气遂不下，故为咳逆。"《金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气病脉证并治》："咳逆上气，时时唾浊，但坐不得眠，皂荚丸主之。"又："咳而上气，喉中水鸡声，射干麻黄汤主之。"《肘后备急方》卷三："治小儿大人咳逆，短气，胸中吸吸，咳出涕唾，嗽出臭脓涕粘。淡竹沥一合，日三五服，大人一升。"参见咳嗽条。

咳逆上气　见《金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治》。指咳嗽气逆，呼吸急促。本证有虚实之分：实证多由外感风寒、痰饮内停或邪热炽盛所致；虚证多由久咳不愈或大病后元气耗伤，肺气虚耗，肾不纳气或心气虚衰所致。《诸病源候论·久咳逆上气候》："肺感而寒，微者则成咳嗽，久咳逆气。虚则邪乘于气逆奔上也。肺气虚极，邪则停心，时动时作，故发则气奔逆乘心，烦闷欲绝，少时乃定，定后复发，连滞经久也。"参咳嗽、喘证条。

咳逆嗽　病名。见《丹溪心法·咳嗽》。指咳呛气逆的痰嗽。治疗可用蛤粉、青黛、瓜蒌、贝母等。参见咳嗽、咳逆、痰嗽等条。

咳脓血　证名。指咳唾脓血。《金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治》："若口中辟辟燥，咳即胸中隐隐痛，脉反滑数，此为肺痈，咳唾脓血。脉数虚者为肺痿，数实者为肺痈。"多由邪火血热凝滞伤肺所致。本症可见于肺脓肿、支气管扩张症等。参肺痈条。

咳家　指经常咳嗽的病人。出《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》。详咳嗽条。

咳喘　证名。出《素问·六元正纪大论》。即咳嗽兼气喘之症。又名咳逆上气。参见肩息咳、咳逆上气条。

咳唾脓血　证名。即咳脓血。为肺痈主症之一。参咳脓血、肺痈条。

咳嗽　病名。出《素问·五脏生成篇》。宋以前，咳、嗽同义。《素问病机气宜保命集》："咳谓无痰而有声，肺气伤而不清也；嗽是无声而有痰，脾湿动而为痰也。咳嗽谓有痰而有声，盖因伤于肺气动于脾湿，咳而为嗽也。"多因外邪犯肺，或脏腑内伤，累及于肺所致。《医学三字经·咳嗽》："咳嗽不止于肺，而亦不离于肺也。"外感者，以祛邪宣肺为主；内伤者，以调理脏腑、气血为主。咳嗽从病邪分，有伤风咳嗽、风寒咳嗽、伤燥咳嗽、燥热咳嗽、痰饮咳嗽、风热嗽、热嗽、时行嗽、寒嗽、湿咳、暑咳、火咳、食咳等；从脏腑、气血分，有肺虚咳嗽、肺咳、心咳、肝咳、脾咳、肾咳、大肠咳、小肠咳、胃咳、膀胱咳、三焦咳、胆咳、劳嗽、气嗽、瘀血嗽等；从咳嗽的时间与特点分，有久咳、五更嗽、夜嗽、干咳嗽、呷嗽、哑嗽、顿嗽等。详各该条。

冒风　感冒之一种。指感受风邪所致的轻症。《医学入门·风》卷五："冒风恶风多属肺。"《时病论》卷二："冒风者，风邪冒于皮毛，而未传经入里也。汪訒庵曰：轻为冒，重为伤，又重则为中。可见冒风之病，较伤风为轻浅耳。"又："今谓冒风，乃因风邪复冒皮毛，皮毛为肺之合，故见恶风、微热、鼻塞、声重、头痛、咳嗽，脉来濡滑而不浮缓，此皆春时冒风之证据，与风伤卫之有别也，宜乎微辛轻解法治之。"参感冒、伤风等条。

冒心　证名。以手按心下之意。由于胸阴不足，病人自觉心下空虚而悸动不宁，故喜以手按心下。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。"成无己注："发汗过多亡阳也。阳受气于胸中，胸

中阳气不足，故病叉手自冒心。”参见心悸条。

冒眩 证名。见《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》。《医学入门》卷五：“头眩……或云眩晕，或云眩冒。眩言其黑，晕言其转，冒言其昏，一也。”冒眩义同眩冒。详该条。

冒暑 病名。指感受暑热，传入肠胃而致的疾病。见《丹溪心法》卷一。《医林绳墨》卷一：“冒暑者，其人元气有余，但不辞辛苦，暑热冒于肌表，而复传入于里，以成暑病也。是则腹痛水泻，口渴欲饮，心烦躁热，胃与大肠受之，宜以黄连香茹饮、天水散或六和汤。”《杂病源流犀烛·暑病源流》：“寻常感受暑气，致腹痛水泻者，乃胃与大肠感邪之故，或恶心呕吐者，乃胃口有痰饮，而又感邪之故，此皆名冒暑，是暑病之轻且小者。”治宜清暑十全饮、解暑三白汤和香薷饮等方。参暑病条。

冒暑眩晕 病证名。见《世医得效方》卷三。又称中暑眩晕。详该条。

冒寒 感冒之一种。见《丹溪心法附余·伤寒》。《时病论·冒寒》：“冒寒之病，乃寒气罩冒于躯壳之外，而未传经入里也。是以遍体酸疼，头亦微痛，畏寒发热而乏汗，脉象举之而有余，宜辛温解表法治之。”详见风寒感冒条。

胃不和卧不安 出《内经》。原为胃逆气喘不得安卧之意，后世释为内伤不得卧之症。多因胃强多食，脾弱不运，停滞胃家，成饮成痰所致。《症因脉治》卷三：“胃不和不得卧之症，胸前满闷，不思饮食，嗳气吞酸，恶心呕吐，或头眩眼黑，睡则气逆。”治宜和胃化湿祛痰。如二陈平胃散加石菖蒲、海石或加栀子、黄连；若大便坚结，导痰汤；胃脘作痛者，滚痰丸，甚则小胃丹。”参见不寐条。

胃气不足 证名。即胃气虚。指胃气虚弱所出现的证候。《诸病源候论·胃病候》：“胃气不足，则饥而不受水谷，飧泄，呕逆，是为胃气虚也。”治宜益气建中。选用小建中汤，补中益气汤等方。参见胃病条。

胃气虚喘 见《丹溪心法·喘》。即胃虚喘。详该条。

胃气痛 病名。见《春脚集》卷二。指胃脘气机失调所致胃脘部疼痛。《经验奇方》卷下：“胃气痛，此症甚者，每晨吐清水，或连头痛。制香附二钱，良姜一钱五分，砂仁末八分。如病重常吐清水，加吴茱萸二钱。右药水煎热服。”亦可由肝气犯胃而致。《石室秘录》卷一：“人病胃气痛，或脾气不好，不能饮食，或能饮食而不能化，非痛非满，上吐下泻者，此乃肝经来克土也。平其肝木，则脾胃之土得养，而前症俱愈矣。方用白芍三钱、甘草一钱，当归二钱，柴胡二钱，茯苓二钱，白芥子一钱。”参胃脘痛条。

胃反 病名。❶见《肘后备急方》卷四。指朝食暮吐或暮食朝吐者。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》：“以发其汗，令阳微，膈气虚，脉乃数，数为客热，不能消谷，胃中虚冷故也。脉弦者虚也。胃气无余，朝食暮吐，变为胃反。”“趺阳脉浮而涩，浮则为虚，涩则伤脾，脾伤则不磨，朝食暮吐，暮食朝吐，宿谷不化，名曰胃反。”“胃反呕吐者，大半夏汤主之。”“胃反，吐而渴，欲饮水者，茯苓泽泻汤主之。”胃反即反胃，亦称翻胃。参见反胃、翻胃条。❷霍乱病之别称。《诸病源候论》卷二十二：“霍乱有三名。一名胃反。”详霍乱条。

胃风 病名。❶指风邪中于胃者。以腹胀泄下、多汗、恶风为特征。《素问·风论》：“胃风之状，颈多汗，恶风，食饮不下，鬲塞不通，腹善满，失衣则膜胀；食寒则泄，诊形瘦而腹大。”治宜祛风散寒，温中理气。《圣济总录·胃风》：“治胃风颈项多汗恶风，饮食不下，膈塞不通，腹善满，失衣则膜胀，食寒则泄，形瘦而腹大，豆蔻丸方。”又：“治胃风腹胀，飧泄下痢，白术

丸方。”《宣明论方·诸证门》：“胃风汤，治风冷乘虚入客肠胃，水谷不化，肠胁虚满，疠痛及肠胃泄毒或下瘀血。”❷指胃中积热而生风者。以呕吐为主症。《赤水玄珠·呕吐哕门》：“胃风之症，治呕愈呕者是也，……此皆好食甘甜之物，膏粱之味，积久成热，因而生风，非一朝一夕之故也。”

胃火　证名。指胃火炽盛而出现的证候。《校注医醇賸义·胃火》：“胃火炽盛，烦渴引饮，牙龈腐烂，或牙宣出血，面赤发热，玉液煎主之。”《类证治裁·火症》：“治六腑火，胃火牙疼，颐肿，清胃散。”参见胃病及基础理论分册的胃热条。

胃火呕吐　证名。指饮食厚味，恼怒忧思，酿热化火所致的呕吐。《症因脉治·呕吐论》：“胃火呕吐之症，食入即吐，其味或酸或苦，五心烦热，夜卧不宁，口中干渴，二便阻涩。……胃火呕吐之治，胃火旺，家秘清胃汤合栀连平胃散、栀连二陈汤、栀连正气散；肝火动者，栀连柴胡汤；心火旺者，导赤各半汤；阴虚火旺，四物汤加知、柏。”参热呕条。

胃心痛　证名。厥心痛之一。因胃病而邪上乘心所致。《灵枢·厥病》：“厥心痛，腹胀胸满，心尤痛甚，胃心痛也。”《三因极一病证方论》卷九：“胃心痛者，腹胀满，不下食，食则不消。”《张氏医通·诸痛门》：“胃心痛者，多由停滞。……滞则通之。”《杂病源流犀烛·心病源流》：“腹胀胸满，胃脘当心痛，上支两胁，咽膈不通，胃心痛也。宜草豆蔻丸、清热解郁汤。”参厥心痛、心痛条。

胃虫病　病名。九虫病之一。《诸病源候论·九虫病诸候》：“胃虫，状如虾蟇。……依肠胃之间。若府藏气实，则不为害；若虚，则能侵蚀，随其虫之动，而能变成诸患也。”《东医宝鉴·虫》：“六曰胃虫，状如蝦蟆，令人呕吐，哕逆，嘈杂，爱吃泥炭、生米、茶、盐、姜、椒等物。”参九虫病条。

胃阴虚　证名。又称胃阴不足。指胃的阴液不足所出现的证候。见《类证治裁·脾胃》。多由胃热、胃火炽盛，或温热病耗伤胃阴所致。症见口干唇燥，嘈杂，干呕，饮食减少，或吞咽不利，食后胸膈不适，大便干结，舌红中心干，少苔，或舌光、干绛，脉细数等。治宜养阴益胃。《温病条辨·中焦篇》：“阳明温病，下后汗出，当复其阴，益胃汤主之（注：此阴指胃阴而言）。”《临证指南医案·脾胃》：“知饥少纳，胃阴伤也。麦冬、川斛、桑叶、茯神、蔗浆”等药均可选用。参见胃病条。

胃足阳明经病证　病证名。因足阳明胃经经气异常而致。《灵枢·经脉》：“胃足阳明之脉……，是动则病洒洒振寒，善呻，数欠，颜黑，病至则恶人与火，闻木声则惕然而惊，心欲动，独闭户塞牖而处，甚则欲上高而歌，弃衣而走，贲响腹胀，是谓骭厥。是主血所生病者，狂疟，温淫，汗出，鼽衄，口喝，唇胗，颈肿，喉痹，大腹水肿，膝膑肿痛，循膺乳、气街、股、伏兔、骭外廉、足跗上皆痛，中指不用，气盛则身以前皆热，其有余于胃，则消谷善饥，溺色黄；气不足，则身以前皆寒慄，胃中寒则胀满。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。”《脉经·胃足阳明经病证》除前列“是动、所生”病之外，尚列举了腹胀、胃管当心痛、饮食不下、膈塞不通、大便难或泻等。参胃病有关各条。

胃胀　病名。胀病之一。《灵枢·胀论》：“胃胀者，腹满，胃脘痛，鼻闻焦臭，妨于食，大便难。”《医醇賸义·胀》：“胃为水谷之腑，职司出纳。阴寒之气上逆，水谷不能运行，故腹满而胃痛，水谷之气腐于胃中，故鼻闻焦臭，而妨食便难也。当平胃祛寒，温中平胃散主之。”参胀病条。

胃疟　病名。疟疾的一种。亦称食疟。《素问·刺疟篇》：“胃疟者，令人且病也，善

饥而不能食，食而支满腹大，刺足阳明太阴横脉出血。”参见食疟条。

胃泄 病名。又称胃泻。出《难经·五十七难》。《儒门事亲》：“胃泄者，饮食不化，完谷出，色黄。风乘胃也，宜辛剂之类。”《宣明论方·濡泄证》：“胃泄如随气而下利，豆蔻散主之。”如因肠胃积滞未去，可用通下。《素问玄机气宜保命集》治胃泄用承气汤。参胃泻条。

胃泻 病名。又称胃泄。《医林绳墨·泄泻》：“胃泻色黄，食饮不化，此胃有虚寒也。”后世亦有以胃泻为伤食泻者。《医宗金鉴·杂病心法要诀》：“伤食作泻即胃泻。”详胃泄、伤食泻条。

胃实 证名。指胃腑病邪盛实的病症。见《脉经》卷二。胃实多兼热证。《太平圣惠方》卷五：“胃实则热，热则恒渴引水，头痛如疟，唇口皆干，喜哕，或生乳痈，及缺盆腋下肿，腹胀，身热心悬，消谷善饥，溺色黄者，则是胃实热之候也。”《本草经疏》：“胃实六证。谵语发狂发斑，弃衣而走，登高而歌，属胃家邪热实；口臭，数欲饮食，属胃火；嘈杂，属胃火；口淡属胃热；呕吐属胃火者，必面赤，小便短赤或涩，大便多燥，口苦或干渴；吞酸，属胃火。”可选用泻热栀子散、子芩散、黄连丸和清胃散等方。参见胃病、胃家实等条。

胃实秘 病名。见《医述·大便》。指大便秘结因胃实而致者。《洁古家珍·杂方》：“胃实而秘者，能饮食，小便赤，当以麻仁丸、七宣丸之类主之。”参见实秘条。

胃实腹胀 证名。伤寒腹胀之一。见《症因脉治·肿胀总论》。由指表邪已解，肠胃实热所致。症见里热不恶寒，自汗不大便，烦满燥实等。详伤寒腹胀条。

胃经失血 证名。见《不居集》卷十三。多因饮食太饱，或中气失调，邪热在中，迫血妄行所致。治宜清热凉血，药如犀角、地黄、丹皮、甘草、玄明粉之属。亦有饮食过饱，胃中寒冷不能消化，食物与气上冲，伤裂胃口而吐血鲜红或紫黯，脘腹绞痛，自汗，脉紧而数者，宜温中和营，用理中汤加川芎、干葛、扁豆等。参见伤胃吐血条。

胃咳 病名。指胃气上逆而致咳者，症见呕而咳，甚则吐蛔者。《素问·咳论》：“脾咳不已，则胃受之；胃咳之状，咳而呕，呕甚则长虫出。”治用乌梅丸、异功散加川椒、乌梅，加味二陈汤等。参见脾经咳嗽条。

胃络不和喘 证名。见《证治准绳·喘》。指胃气上逆所致的气喘。《医贯·喘》：“胃络不和喘，出于阳明之气逆，阳明之气下行，今逆而上行，故喘。”多因痰湿中阻，而致胃失和降。治宜和胃理气，化痰降逆，如分气紫苏饮、指迷七气汤加半夏、二陈汤加砂仁等药。本证与胃喘之由于胃热气盛和胃虚喘之由于胃虚气逆者有别。参胃喘、胃虚喘条。

胃热呕吐 证名。见《金匮翼·呕吐统论》。又称胃火呕吐、热呕。详热呕、胃火呕吐条。

胃热渴 渴证之一。见《圣济总录》卷五十九。因脾胃实热灼津所致。症见胸膈烦闷，口渴引饮。治宜清胃生津，用猪肚丸、赤茯苓散、玉女煎等方。

胃病 六腑病候之一。胃主受纳，腐熟水谷。胃与脾相为表里，共司升清降浊。胃病有寒热虚实之分。多由客寒积热、饮食不节、或胃气虚弱所致。临床表现，以呕逆飧泄、痞满疼痛、膜胀嘈杂为主。《灵枢·邪气藏府病形》：“胃病者，腹膜胀，胃脘当心而痛，上肢两胁，膈咽不通，饮食不下。”《诸病源候论·胃病候》：“气盛为有余，则病腹膜胀气满，是为胃气之实也，则宜泻之。胃气不足，则饥而不受水谷，飧泄呕逆，是为胃气虚也，则宜补之。”《中藏经》卷上：“实则中胀便难，肢节疼痛，不下食，呕吐不已。虚则肠鸣胀满，引水滑泄。寒则腹中痛，不能食冷物。热则面赤如醉人，四肢

不收持，不得安卧，语狂目乱，便硬者是也。病甚则腹胁胀满，吐逆不入食，当心痛，上下不通，恶闻食臭，嫌人语，振寒喜伸欠。胃中热则唇黑，热甚则登高而歌，弃衣而走，颠狂不定，汗出额上，鼽衄不止。虚极则四肢肿满，胸中短气，谷不化，中消也。胃中风，则溏泄不已。胃不足，则多饥不消食。”《太平圣惠方》卷五：“胃虚则生寒，寒则若（苦）饥，心腹恒痛，两胁虚胀，咽喉不利，食饮不下，面目浮肿，淅淅恶风，目中急，足胫寒，不得安卧，则是胃虚冷之候也。”“胃实则热，热则恒渴引水，头痛如疟，唇口皆干，喜哕，或生乳痈，及缺盆腋下肿，腹胀，身热心悬，消谷善饥，溺色黄者，则是胃实热之候也。”《本草经疏》：“胃实之证。谵语发狂发斑，弃衣而走，登高而歌，属胃家邪热实。口臭，数欲饮食，属胃火。嘈杂，属胃火。口淡，属胃热。呕吐属胃火者，必面赤小便短赤，或涩，大便多燥，口苦或干渴。吞酸，属胃火。”“胃虚七证。胃弱不纳食，及不思饮食。胃虚呕吐，宜分寒热。霍乱转筋，属胃虚，猝中邪恶气及毒气，兼有停滞所致。绞肠痧，属胃气虚，猝中天地邪恶秽污之气，郁于胸腹。中恶，腹中疠痛，属胃气虚，恶气客之所致。反胃，属胃气虚。中酒，属胃弱。”根据辨证，治疗可分别采取温胃散寒、清胃泄火、益气建中、消导化滞等法。参见胃病各条。

胃疸 病名。❶见《素问·平人气象论》。指已食而仍有饥饿感觉者为胃疸。《外台秘要》卷四：“胃疸，食多喜饮，栀子人主之。”❷九疸之一，见《诸病源候论·黄病诸候》。病由饮食过度，醉酒劳伤，脾胃有瘀热所致。其症以身面皆发黄，食多喜饮为特征。❸即谷疸。《杂病源流犀烛·诸疸源流》：“如食已头眩，寒热，心中怫郁不安，久则身黄，谷疸也，因饥饱所致，亦名胃疸，以胃气蒸冲得之。”参黄疸、谷疸等条。

胃消 病名。见《辨证录·消渴门》。因胃火炽盛，津液干涸所致。主要症候为嘈杂易饥，大渴恣饮，饮一溲二。治宜滋阴泻火。用闭关止渴汤、止消汤等方。参见消渴、中消等条。

胃家实 ❶证名。阳明经病和腑病的统称。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》：“阳明之为病，胃家实是也。”参见阳明经病、阳明腑病条。❷指瘀血阻胃。《血证论》卷二：“血入胃中，则胃家实，虽不似伤寒证，……然其血积在胃，亦实象也，故必然夺其实，釜底抽薪，然后能降气止逆，仲景泻心汤主之，血多者，加童便、茅根。”

胃黄 三十六黄之一。《太平圣惠方》卷五十五：“胃黄者，吐逆下利，心腹气胀，或时烦闷，不能饮食，四肢无力，若唇口面目舌根黑者，难治。”治用点烙法及服人参散等方。参黄疸有关条。

胃虚 证名。指胃气虚、胃阴虚所出现的病证。《脉经》卷二：“胃虚……病苦胫寒不得卧，恶寒淅淅、目急，腹中痛，虚鸣，……时寒时热，唇口干，面目浮肿。”参见胃病、胃气不足、胃阴虚等条。

胃虚汗 证名。指胃气虚弱而致自汗之证。《张氏医通·杂门》：“胃虚水谷气脱散者，汗自出，必气虚少食。”治宜补气运脾丸。参自汗条。

胃虚秘 病名。见《医述·大便》。指大便秘结由于胃虚而致者。《洁古家珍·杂方》：“胃虚而秘者，不能饮食，小便清利。”用厚朴汤，参见虚秘条。

胃虚喘 病名。见《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》，又称胃气虚喘。指胃气虚耗而致气逆不降的气喘。《医学入门·喘》：“胃虚极则气上逆。”症见抬肩撷肚，喘而不休。多由久病或大病后中气受伤所致。治宜补中气，养胃阴为主，如五味子汤、生脉散加杏仁、陈皮、白术等药。如胃虚有寒者，用理中丸加胡椒等药。

胃脘痛 病名。指上腹部近心窝处疼痛。

出《素问·五常政大论》。亦称胃痛、脘痛、心下痛，心痛等。多因七情郁结，劳累过度及饮食不节所致。有寒热虚实之分。亦有虚实错杂，寒热相兼者。文献有胃气痛，肝胃气痛，阴虚胃脘痛，气郁脘痛、火郁胃脘痛、积热胃脘痛，瘀血胃脘痛，蚘动脘痛，积冷胃脘痛、外感胃脘痛、内伤胃脘痛等记载，详各该条。

胃喘 病名。见《证治准绳·喘》。指外感病邪，胃热上壅的气喘。《赤水玄珠·喘门》："胃喘则身热而烦。经云，胃为气逆。又云，犯贼风虚邪者，阳受之，阳受之则入六腑，入六腑则身热不得卧，上为喘呼。又云，阳明厥则喘而惋（惋谓热内郁而烦），惋则恶人。"本证与"胃虚喘"属于中气耗损者有别。治宜清胃热，降肺气，如加减白虎汤等方。参胃络不和喘条。

胃寒呕吐 证名。指真阳不足，脾胃虚寒不能运化水谷所致的呕吐。《症因脉治·呕吐论》："胃寒呕吐之症，畏寒喜热，不思饮食，遇冷即呕，四肢清冷，二便清利，口不渴，唇不焦，食久不化，吐出不臭。"脉多沉迟。真阳不足者，宜八味肾气丸；脾胃素寒者，宜理中汤、四逆汤。参寒呕条。

胃蒸 二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

胃痹 病名。即指胸痹。见《症因脉治》卷三。详胸痹条。

思伤 指思虑过度所致的疾病。《医醇賸义·思伤》："思虑太过，心烦意乱，食少神疲，四肢倦怠。"用一志汤等方。

思郁 情志三郁之一。因思怨不解所致。《景岳全书·杂证谟》："若思郁者，……思则气结，结于心而伤于脾也。及其既甚，则上连肺胃而为咳喘、为失血、为噎膈、为呕吐，下连肝肾则为带浊、为崩淋、为不月、为劳损。"初起气机郁结者，宜顺气解郁，用和胃饮、沉香降气散、启脾丸等方。郁久变生失血、噎膈、劳损、不月等症者，详情志三郁、七情郁证条。

思膈 五膈之一。《三因极一病证方论》卷八："中脘实满，噎则醋心，饮食不消，大便不利，名曰思膈。"参见五膈条。

思噎 五噎之一。出《诸病源候论·否噎病诸候》。多见于思虑过多者。《备急千金要方》卷十六："思噎者，心悸动，喜忘，目视晾晾，此皆忧恚嗔怒，寒气上入胸膈所致也。"参见五噎、噎条。

思风 古病名。指食后少顷即下利完谷。《医说》引《史记》："思风者，饮食下嗌而辄出不留。"《张氏医通·大小府门》："餐泄者，史记名思风。水谷不化，湿兼风也。风邪干胃，木来贼土，清气在下。升阳除湿汤。若饮食下嗌，而辄出不留者死。"参餐泄、直肠泻条。

骨节烦疼 证名。骨节疼烦的别称。《备急千金方》卷七："风湿相薄，骨节烦疼，四肢拘急，不可屈伸。"详骨节疼烦条。

骨节疼烦 证名亦称骨节烦疼。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："风湿相搏，骨节疼烦、掣痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。"多由风湿相搏、或邪伤营卫、或邪热犯肾、或气血劳伤等所致。

骨极 病证名。指骨弱髓枯的危重疾患。《诸病源候论·虚劳病诸候》："骨极，令人痿削，齿苦痛，手足烦疼，不可以立，不欲行动。"其属虚寒者，症见腰背痛，不能久立，屈伸不利，面肿而垢黑，发堕齿槁，或四肢常冷等。宜用地黄煎、麋角丸等方。其属实热者，症见牙痛脑痛，耳鸣面黑，手足疼痛，大小便不通等。宜用三黄汤。参见骨绝、六极条。

骨枯髓减 指腰脊萎软不举，步履艰难之症。因精髓衰少，骨骼枯萎所致。《素问·痿论》："肾气热，则腰脊不举，骨枯而髓减，发为骨痿。"《脾胃论》卷中："肾

者水脏也。今水不能胜火则骨枯而髓虚，足不任身，发为骨痿。”《寿世保元》卷四：“骨枯髓减者，枯涸之极也。”参骨痿条。

骨绝　古病名。指骨髓困枯败绝的疾患。《备急千金要方·肾脏》：“扁鹊云，骨绝不治，痛而切痛，伸缩不得，十日死。骨应足少阴，少阴气绝，则骨枯，发无泽，骨先死矣。”《华氏中藏经》卷中：“骨绝。腰脊痛，肾中重，不可反侧，足膝后平者，五日死。”《杂病源流犀烛·身形门》：“迨至骨绝，齿必黄落。”参见骨极条。

骨厥　病名。❶足少阴经气是动病之一。《灵枢·经脉》：“肾，足少阴之脉，……是动则病饥不欲食，面如漆柴，咳唾则有血，喝喝而喘，坐而欲起，目眩眩如无所见，心如悬，若饥状；气不足，则善恐，心惕惕如人将捕之，是为骨厥。”❷指两手大热。《证治准绳·发热》：“两手太热为骨厥，如在火中，可灸涌泉穴。”参厥证条。

骨痛　证名。出《素问·脉要精微论》。《杂病源流犀烛·筋骨皮肉毛发病源流》：“人身之痛，或由风淫湿滞，或由血刺痰攻，浅不过肌肉皮毛，深亦止经络脏腑，若入里彻骨，作瘘作疼，虽因寒因热有不同，要其损伤劳极，为至甚而无加矣。宜虎骨散、二妙散。他如久立伤骨，骨伤之病，或亦有痛者，或渐至成痿者，当受伤之初，不可不急救也。宜补骨脂、牛骨髓、鹿茸、骨碎补。”

骨痿　证名。出《灵枢·本神》。指骨节痿楚。多由肾虚精伤所致。兼见腰膝软弱而冷，多属虚证；又因风湿或浊毒乘袭而引起者，则为实证。本证可见于痿、痹、虚劳等病。参该条。

骨蒸　病名。❶五蒸之一。因形容其发热自骨髓蒸发而出，故名。《外台秘要》卷十三：“骨髓中热，称为骨蒸。”《诸病源候论·虚劳骨蒸候》：“蒸病有五。一曰骨蒸，其根在肾，旦起体凉，日晚即热，烦躁，寝不能安，食无味，小便赤黄，忽忽烦乱，细喘无力，腰疼，两足逆冷，手心常热，蒸盛过伤，内则变为疳，食人五藏。”骨蒸常有盗汗、遗精、梦交，或经讯失调等症。多由阴虚内热所致，治宜养阴清热，常用秦艽鳖甲散、柴前梅连散等方。又为二十三蒸之一。参见蒸病、五蒸、二十三蒸等条。❷指痨瘵。《杂病广要·骨蒸》：“骨蒸即后世所称痨瘵是也。”详痨瘵条。

骨蒸劳　病名。见《太平圣惠方·治骨蒸劳诸方》。即骨蒸病的总称。详该条。

骨痿　痿症之一。亦称肾痿。由于肾热内盛，或邪热伤肾，阴精耗损，骨枯髓虚所致。症见腰脊痿软，不能伸举，下肢痿弱，不能行动，伴有面色暗黑，牙齿干枯等。《素问·痿论》：“肾主身之骨髓，……肾气热，则腰脊不举，骨枯而髓减，发为骨痿。”又：“有所远行劳倦，逢大热而渴，渴则阳气内伐，内伐则热舍于肾。肾者水藏也，今水不胜火，则骨枯而髓虚，故足不任身，发为骨痿。”治宜滋阴清热，补肾益精。选用虎潜丸、地黄饮子、滋阴补髓汤、金刚丸、牛膝丸等方。参痿条。

骨痹　病名。❶指风寒湿邪内搏于骨而致的痹症。多由骨髓空虚，邪气乘隙侵袭所致。《素问·长刺节论》：“病在骨，骨重不可举，骨髓痿痛，寒气至，名曰骨痹。”症见骨节疼痛，四肢沉重难举，有麻冷感。治宜补肾祛邪，用安肾丸、附子独活汤等方。❷指肾痹。《症因脉治》卷三：“肾痹之症，即骨痹也。”详肾痹条。❸指寒痹、痛痹。《医宗必读·痹》：“骨痹即寒痹、痛痹也。痛苦切心，四肢挛急，关节浮肿。”参寒痹、痛痹条。

骨癫疾　病证名。指癫病深入于骨者。《灵枢·癫狂》：“骨癫疾者，颠，齿、诸俞、分肉皆满而骨居，汗出，烦悗，呕多沃沫，气下泄，不治。”《灵枢·邪气藏府病形》：“肾脉急甚为骨癫疾。”参见癫条。

幽门不通　指便秘之由于幽门不通者。

症见噎噻气阻，大便不通。《脾胃论》卷下："幽门不通，上冲，吸门不开，噎噻，气不得上下，治在幽门闭，大便难。"用通幽汤。参见大便秘结条。

〔丿〕

秋月咳嗽 指秋月感受湿热或燥热所致的咳嗽。《不居集》卷十五："秋月咳嗽，秋月咳而身热自汗，口干便赤，脉虚而洪者，白虎汤；身热而烦，气高而短，心下痞满，四肢困倦，精神短少，香薷饮；若病邪既去，宜补中益气汤加山药、五味，以养元气、柴胡、升麻各二分，以升生气；秋深初冬，天久不雨，燥金用事，则肺燥咳嗽，当清金润肺，或兼清散。"《温热经解》："秋咳嗽者，人气内收，清气入肺，法当疏解，杏苏散主之。"《类证治裁·咳嗽》："秋季咳，燥气乘金也。治宜清润。玉竹、贝母、杏仁、阿胶、百合、枇杷膏之属。"参见咳嗽、肺燥咳嗽等条。

秋后晚发 指秋后发作、病势沉重的疟疾。《医宗己任编》卷八："有一种疟疾，秋后晚发，不论间日一日，热多寒少，或独热无寒，或寒热相半，势沉重者，总当以治感症之法治之。"亦指伏暑。《六因条辨》中卷："己任编有秋时晚发，以感证之法治之一语，因著伏暑之称。"详伏暑条。

秋时晚发 即伏暑。《时病论》卷五："伏天所受之暑者，其邪盛，患于当时，其邪微，发于秋后，时贤谓秋时晚发，即伏暑之病也。……其脉必滞，其舌必腻，脘痞气塞，渴闷烦冤，每至午后则甚，入暮更剧，热至天明得汗，则诸恙稍缓。"详伏暑条。

秋暑 病名。《时病论》卷五："七月大火西流，暑气渐减，而凉气渐生，其时炎燄尚存，一如盛夏，亦有较盛夏更热之年，人感其热而病者，为秋暑，即世俗所称秋老虎是也。斯时湿土主气，犹是暑湿交蒸，但见壮热烦渴，蒸蒸自汗，脉象洪濡或数，是秋暑之证，其治法与阳暑相同。"宜清凉涤暑法。参阳暑条。

秋温 病名。指秋季的一种热病。《温热经解·客气温病治法》："秋温，不大便五六日，舌苔焦燥者，热病也，大承气汤主之。秋温，化热十余日，邪入厥阴，唇焦齿燥，耳聋，舌根焦黑，手指蠕动欲痉者，三甲复脉汤主之。秋温，温邪下陷为热利，下重者，白头翁汤主之。……秋温下陷，泄泻不止，欲作痢者，葛根黄芩黄连汤主之。"上列各种证治，可见于一般热病，以病发于秋季，故名秋温。参见温病条。

秋燥 病名。见《医门法律·秋燥论》。指感受秋季燥气而发的热性病。一般病情较轻，传变较少。《六因条辨·秋燥辨论》："因秋令太温，雨泽愆期，风阳化燥，皴盪寰宇，以致消烁之势，乘虚袭肺，肺失清肃，则洒洒恶寒，翕翕发热，鼻鸣干燥，咳逆衄血，舌赤齿枯，诸症丛生。"《医碥》卷二："秋燥宜润，杏仁、瓜蒌之属。"可用滋燥养荣汤、清燥救肺汤、杏苏汤、桑杏汤等。秋燥有温燥与凉燥两类。《医醇賸义·秋燥》："燥者干也，对湿言之也。立秋以后，湿气去而燥气来，初秋尚热则燥而热，深秋既凉则燥而凉。"若肺受燥热，症见发热咳嗽，甚则喘而失血，可用清金保肺汤；若肺受燥凉，症见咳而微喘，气郁不下，可用润肺降气汤。本病可见于上呼吸道感染、急性支气管炎、肺炎等疾患。参见温燥、凉燥条。

咸哮咳 病名。指食咸味过度引起哮嗽者。《不居集》卷十五："咸哮咳，因食咸物所伤，以致哮嗽不止。用白面二钱，砂糖二钱，通搜和，用糖饼灰汁捻作饼子，放在炉内煤热，划出加轻粉四分，另炒略熟，将饼切作四亚，掺轻粉在内，令患人吃尽，吐出病根即愈。"参咳嗽条。

重暍 古病名。指湿温误治的重症。《伤寒类证活人书》卷六："两胫逆冷，胸腹满，多汗，头目痛苦，妄言，此名湿温也，……

其脉阳濡而弱，阴小而急，治在太阴。脾属土主湿，不可发汗，汗出必不能言，耳聋，不知痛所在，身青面色变，名曰重暍。”治宜白虎加苍术汤等方。参湿温条。

便血　证名。出《素问·阴阳别论》。又称下血。指血经肛门而出。《三因极一病证方论》卷九：“病者大便下血，或清，或浊，或鲜，或黑，或在便前，或在便后，或与泄物并下，……故曰便血。”便血多由湿热、积滞、结毒侵袭肠胃，或风、热客于下焦，血脉损伤所致。《金匮要略》以先便后血为远血，先血后便为近血。因血在便前者，其来近，近者或在广肠，或在肛门；血在便后者，其来远，远者或在小肠，或在于胃。近血又有肠风、脏毒之分。后世多从病因分类，而有湿热便血、积热便血、热毒下血、湿毒下血、酒积便血、中寒便血、肠澼下血、蛊注下血等名称，详见各条。便血经久不愈者，多由脏气亏损，或久病而致肝失所藏，脾虚不能摄血，肾虚不能固下所致。治宜注重扶正，或祛邪与扶正兼顾。痢疾亦见血便应予区别，详见痢疾条。本证可见于消化性溃疡，某些急性传染病、血液病，以及结肠、直肠、肛门疾患等。

便肠垢　指大便排出垢腻腐败物质。可见于热泻、热痢等病。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》：“大肠有寒者，多鹜溏；有热者，便肠垢。”《医学入门》卷五：“肠垢即热泻，鸭溏即寒泻。”《诸病源候论·痢病诸候》：“由热痢蕴积，肠间虚滑，所以因下痢而便肠垢也。”参见肠垢、热泻、热痢等条。

便浊　证名。❶指以小便浑浊不清为主症的疾患。见《医学正传·便浊遗精》。又称溺浊。浊而色白者为白浊，浊而有血色赤者为赤浊，赤浊实即尿血。有虚实之辨。实症多因痰湿或湿热下注膀胱所致；虚症有中气下陷、阴虚火动、下元虚弱等不同。湿痰流注者，小便白浊，胸脘满闷，苔腻。治宜燥湿化痰。用苍白二陈汤、固元丹、小分清饮等方。若属湿热下注者，更见口渴、舌苔黄腻、脉濡数。治宜清热利湿。用萆薢分清饮、徙薪饮等方。脾虚气弱，中气下陷者，症见便浊日久不愈，面色㿠白，神疲乏力，舌淡，脉虚软。治宜健脾益气。用补中益气汤。阴虚火动者，多见小便赤浊，烦热口干，舌红，脉细数。治宜滋阴清火。用知柏八味丸、清心莲子饮等方。下元虚冷者，症见面白肢冷，精神萎靡，舌淡，脉沉。治宜温肾固涩。用鹿茸补涩丸、八味地黄汤、秘元煎等方。本症可见于乳糜尿、磷酸盐尿、尿路感染、淋病等疾患。❷指浊病，包括溺浊与精浊。《景岳全书·淋浊》：“便浊证有赤白之分，有精溺之辨。”参见浊条。❸下消的症状之一。《太平圣惠方》卷五十三：“夫病肾，小便白浊如脂者，此由劳伤于肾，肾气虚冷故也。”

便秘　病名。见《杂病源流犀烛·大便秘结源流》。即大便秘结。详该条。

便脓血　证名。见《素问·脉要精微论》。又称泄脓血、圊脓血、清脓血。指大便下脓血，常为痢疾症候之一。有实热虚寒之分。如兼见口渴、脉数者，多属实热，治宜清热、调气、和营，可选用白头翁汤、香连丸、洁古芍药汤等方。如日久不愈、滑脱不禁者，多属虚寒，治宜温中固脱，可选用桃花汤，真人养脏汤等方。参见痢疾脓血痢条。

便痈　病名。即血疝。见《儒门事亲》卷四。《证治准绳·杂病》：“血疝，其状如黄瓜在小腹两傍、横骨两端约中，俗云便痈，得于春夏重感大燠，劳于使内，气血流溢，渗入脬囊，留而不去，结成痈肿。”治宜和血散瘀为主。可选用导水丸、桃仁承气汤、抵当汤等方。参见疝、血疝条。

徇（xun迅）蒙招尤　证名。《素问·五藏生成篇》：“徇蒙招尤，目冥耳聋，下实上虚。”徇蒙，目睛迅动而视物不明；招

尤，头晕作旋而动摇不定。徇蒙招尤者，常伴目瞑耳聋，多见于耳源性眩晕症等病。

鬼击 古病名。一名鬼排。指突然胸腹绞痛或出血的疾患。《肘后备急方》卷一："鬼击之病，得之无渐卒着，如人力刺状，胸胁腹内，绞急切痛，不可抑按。或即吐血，或鼻中出血，或下血。一名鬼排。"

鬼疟 病名。疟疾之一。❶《太平圣惠方》卷五十二："鬼疟者，由邪气所为也。其发作无时节，或一日三两度寒热，或两日一度发动，心神恍惚，喜怒无恒，寒则颤掉不休，热则燥渴不止，或差而复作，或减而更增，经久不痊，连绵岁月，令羸瘦也。"《三因极一病证方论》卷六："病者寒热日作，梦寐不祥，多生恐惧，名曰鬼疟。"《医宗金鉴》卷四十二："鬼疟亦多在夜发，由尸气注之，比三阴疟疾则夜多恶梦，时生恐怖。"治用麝香丸、苏合香丸等。❷即夜疟。见《张氏医通·疟》。详见该条。参见疟疾条。

鬼痓 病名。《太平圣惠方》卷五十六："人先天地痛，忽被鬼邪所击，当时心腹刺痛，或闷绝倒地，如中恶之类。其得差之后，余气不歇，停住积久，有时发动，连滞停住，乃至于死。死后注易傍人，故谓之鬼痓也。"可选用犀角散、常山散、鲛鱼皮散等。"参见痓有关条。

鬼黄 三十六黄之一。以黄疸而见言语错乱，故名。❶《太平圣惠方》卷五十五："鬼黄者，面色或青或黑，遍身皆黄，狂语多惊，皮肤枯，舌根赤涩，心中恍惚，常见鬼神，或自强言，诈作惺惺，若鼻中灰色，舌黑，毁裂衣裳者，难治。"治用点烙法。内服丹砂散。❷《圣济总录》卷六十一："病人汗不出，渐加困重，愦气心胀，唇黑遍身黄。妄见鬼物，道得古人名字。此是鬼黄。"治用灸法或龙齿汤。本病可见于慢性或严重肝病所致的肝性脑病。参黄疸有关各条。

鬼排 古病名。见《肘后备急方》卷一。即鬼击，详该条。

鬼魇 古病名。见《杂病源流犀烛·不寐多寐源流》。即魇。详该条。

鬼箭 病名。见《医略六书·杂病证治》。即鬼箭风。详该条。

鬼箭风 病名。又名鬼箭。❶《医略六书·杂病证治》："鬼箭风：遍身疼痛如钻，或偏手足如刺，俗名鬼箭。实由营卫空疏，腠理不密，贼风乘间入客经络，营卫不通，与邪相搏而病。"参见痛风、历节风条。❷行痹的别称。见《杂病源流犀烛·诸痹源流》。《证治汇补·痹症章》："行痹者，痛无定处，……今呼为鬼箭也。"详行痹、风痹条。

鬼箭打 病名。指遍身筋骨疼痛不已者。《古方汇精·奇急门》："鬼箭打，用山栀七个炒，桃头七个，面炒，共扦饼贴患上，次日取下。"亦名箭风痛，详该条。

钩吻中毒 病名。因误食钩吻而出现中毒症状者。见《诸病源候论·解毒诸候》。钩吻又名断肠草、胡蔓藤、烂肠草、黄藤、毒根等。有剧毒。误食后初见口咽脘腹烧灼疼痛，呕噁流涎，吞咽困难，或腹胀腹泻。继则眩晕语蹇，肢麻无力，甚则抽搐，惊厥，直至死亡。治宜中西医结合救治。民间常用大量猪油或生油灌服，大剂薤菜汁、金银花、细叶黄栀子、茅根、动物鲜血灌服抢救。亦可选用通肠解毒汤、白矾汤等。《本草纲目》卷四载解钩吻毒药有荠苨汁、薤菜汁、葛根汁、葱汁、桂汁、白鸭血、白鹅血、羊血、鸡子清、犀角汁、猪膏等。可参考。

食马肉中毒 病名。因食疫马等肉而出现中毒症状者。《诸病源候论·食马肉中毒候》："凡骏马肉及马鞍下肉皆有毒，不可食之，食之则死。其有凡马肉则无毒。因疫病死者，肉亦有毒。此毒中人，多洞下而烦乱。"参食六畜肉中毒条。

食中 病名。类中风之一。见《医宗必读·类中风》。又名中食。《医学心悟·类

中风》："食中，醉饱过度，或着恼怒，以致饮食填塞胸中，胃气不行，卒然昏倒。宜用橘红二两，生姜一两，炒盐一撮，煎汤，灌而吐之；次用神术散和之。其最甚者，胸高满闷，闭而不通，或牙关紧急，厥晕不醒，但心头温者，即以独行丸攻之。"参见中食条。

食牛肉中毒　病名。因食中毒和疫死的牛肉而出现中毒症状者。其症"令人心闷，身体痹，甚者乃吐逆下利，腹痛不可堪，因而致死者非一也。"(《诸病源候论·食牛肉中毒候》)。参食六畜肉中毒条。

食气霍乱　病名。指霍乱由饮食所伤，又感外邪引起者。多因饮食过饱，中气不运，膏粱厚味，肠胃凝泣，清气不升，浊气不降，又值风暑湿暍等邪外袭，则挥霍撩乱。《症因脉治》卷四："食气霍乱之症。胸前饱闷，胀痛，嗳气，吐泻交作，呕出食物，泻下酸馊。"脉滑大或沉实。治宜：在上因而越之，当用盐汤探吐之；在中者，枳朴平胃散消之；在下者，因而竭之，枳朴大黄汤下之。挟六气触发，原随六气散表，寒用温散，热用凉散，风则祛风，湿则利湿，暑用消暑。温散，败毒散；清散，冲和汤。参见霍乱条。

食六畜肉中毒　病名。因食变质六畜肉而出现中毒症状者。《诸病源候论·食六畜肉中毒候》："六畜者，谓牛马猪羊鸡狗也。凡此等肉本无毒，不害人，其自死及著疫死者，皆有毒。中此毒者，亦令人心烦闷而吐利无度。"治宜中西医结合救治。《本草纲目》卷四载有解六畜肉毒药如乌桕叶汁、白扁豆、小豆汁、豉汁、葱子、猪屎灰、甘草汁、兰草汁、阿魏、绿豆汁、黄蘗汁、地浆等。可参考。

食心痛　证名。指饮食不节所致的心痛。见《备急千金要方》卷十三。《医宗必读·心痛》："食积则饱闷，噫气如败卵，得食则甚，香砂枳术丸加神麯、莪术。"《医学从众录·心痛》："食痛，食积停滞，嗳腐吞酸，恶食腹满，其痛或有一条扛起者，脉实而滑，右关更实，宜平胃散加山查、麦芽、半夏各二钱。胀甚者，更加莱菔子生研一钱，水煎服。如初病食尚在胃，服此汤，即以手探吐之。"《医学心悟·心痛》："食痛者，伤于饮食，心胸胀闷，手不可按，或吞酸嗳腐，脉紧滑，保和汤主之。"参胃心痛条。

食已即吐　证名。指进食后片刻即吐出。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》："食已即吐者，大黄甘草汤主之。"《金匮要略心典》卷下："经云清阳出上窍，浊阴出下窍，……若下既不通，必反上逆，所谓阴阳反作，气逆不从，食虽入胃，而气反出之矣，故以大黄通其大便，使浊气下行浊道，而呕吐自止。"亦可用通幽汤。本证多因胸膈胃脘有热、痰气郁结、饮食停滞、瘀血内蓄等引起。又为噎膈症状之一。详上焦吐、热呕、痰呕、食呕、血呕、噎膈等条。

食夹痰嗽　病名。指痰食夹杂所致的咳嗽。《不居集》卷十五："食夹痰嗽，《机要》云，痰而能食者，大承气汤微下之；痰而不能食者，厚朴汤主之，或二陈汤加瓜蒌、卜子、山查、枳壳、神曲。"《医学入门》治本病并用滚痰丸疏导。参见食积咳嗽、食积痰嗽、咳嗽条。

食伤　病名。指饮食不节，损伤脾胃而致。出《金匮要略·血痹虚劳病脉证治》。初起多见胸脘痞闷，嗳气腐臭，厌食，恶心呕吐，泄泻，苔腻等症。一名伤食，详该条。

食后昏困　病证名。又称饭醉。食入则困倦，精神昏冒欲睡。《东医宝鉴·杂病篇》："食后昏困，宜用参芪汤、升阳补气汤。"参见饭醉、嗜卧等条。

食亦　古病名。一名食饰。其症多食而形体消瘦，由于肠胃和胆有燥热所致。《素问·气厥论》："大肠移热于胃，善食而瘦又谓之食亦；胃移热于胆，亦曰食亦。"参见食饰条。本病可见于糖尿病、甲状腺机能亢进、肠道寄生虫病等。

食劳复 病症名。一名食复。因病后饮食不节，脾虚气弱所致。《伤寒论·辨阴阳易差后劳复病脉证并治》："病人脉已解，而日暮微烦，以病新差，人强与谷，脾胃气尚弱不能消谷，故令微烦，损谷自愈。"《广温热论》："若因饱食过多而复者，舌苔必多黄。轻者损谷自愈，重者消导方愈。"

食劳疳黄 病证名。见《医学纲目》卷二十一。又名食劳黄、黄胖。多因脾虚宿有食积，劳伤过度，湿热虫积所致。症见肤色萎黄，面浮足肿，口淡口苦，脚痠，气急，腹胀泄泻，脉虚弦等。治宜培脾益血，清化湿热。方用大温中丸、小温中丸、绛矾丸等。本病可见于钩虫病、慢性血吸虫病等。参黄胖条。

食劳黄 病证名。见《医学纲目》卷二十一。❶又称食劳疳黄、黄胖。详各该条。❷为脾积之俗称。《儒门事亲》卷三："脾之积，名曰痞气。在胃脘，覆大如盘，久不已，令人四肢不收，发黄疸，饮食不为肌肤，俗呼为食劳黄也。"详痞气、脾积条。

食郁 证名。六郁之一。见《丹溪心法》卷三。因食滞不消，气机郁阻所致。《杂病源流犀烛·诸郁源流》："酸嗳腹满，不能食，黄疸鼓胀痞块，脉紧实，是食郁。"治宜消食解郁。用食郁汤，或二陈汤合保和丸等。见六郁、郁证条。

食郁头痛 病证名。《医学六要·头痛》："食郁，右关寸脉滑而实，症兼呕吐恶心，心下痞闷，或痛或寒热如疟，乃食郁头痛也。"治宜消导二陈汤加山查、厚朴、枳实、神曲等味。参伤食头痛条。

食郁肉中毒 病名。因食密闭容器内生、熟变质肉类而出现中毒症状者。《诸病源候论·食郁肉中毒候》："郁肉毒者，谓诸生肉及熟肉内器中密闭头，其气壅积不泄，则为郁肉有毒。不幸而食之，乃杀人。其轻者亦吐利烦乱不安。"本病类似于现代肉毒中毒病。

食呕 证名。《三因极一病证方论》卷十一："病者胸腹胀闷，四肢厥冷，恶闻食臭，食入即呕，朝食暮吐，暮食朝吐，名曰食呕。此由饮食伤脾，宿谷不化之所为也。"《证治要决》卷六："食呕，多因七情而得，有外感邪气，并饮食不节而生。"有寒、热之不同。偏热者，常食入则痛而呕，脉实数。偏寒者，常朝食暮吐，暮食朝吐，脉迟弦。治宜消食化滞。一般宜用保和丸、家秘消滞汤等方。偏寒者，可用治中汤、大养胃汤、草蔻大顺饮。偏热者，可用栀连平胃散。有下症者，可用煮黄丸。

食胀 病证名。胀病之一。见《世医得效方·胀满》。一名谷胀。亦称食积腹胀。指因饮食不节所致的肚腹胀满。《症因脉治·食积腹胀》："食积腹胀之因，嗜食不谨，胃强能食，脾弱不消，停滞脾胃之间，则食积腹胀之症作矣。"常见腹胀，心下痞满，不思饮食或食物不消，甚则腹痛，大便秘结或泄利等症。《医学入门·鼓胀》："食胀有热亦有寒，因食肉果菜不化，曰食胀。初起多寒湿，自利不食者，胃苓汤加山楂、麦芽，或人参养胃汤加香附、砂仁；甚者，治中汤加丁香，或厚朴、附子二味煎服；久则湿热乘脾，大便干燥者，保和汤；伤肉者，黄连，阿魏等分，醋浸蒸饼为丸，或三补丸，用香附，山楂煎汤下；伤杂果者，古桂香丸或盐汤探吐；膏粱厚味大便闭者，大承气汤加桂或厚朴汤；积热者，牵牛丸；虚者，木香槟榔丸，滋肾丸。"参胀、谷胀条。

食饱咳 病名。指饱食后发咳嗽。多因脾胃虚弱所致。《不居集》卷十五："食饱咳，每一食饱则发咳嗽，此脾胃虚寒也。宜用《千金》温脾汤。若咽中痛而声鸣者，加干姜一两。"参见咳嗽条。

食疟 病名。疟疾之一。又称胃疟。《三因极一病证方论·疟叙论》："病者寒热，善饥而不能食，食已支满，腹急疠痛，病以日作，名曰胃疟。六腑无疟，惟胃有者，盖

饮食饥饱所伤胃气而成，世谓之食疟，或因诸疟饮食不节，变为此证。”《张氏医通·疟》：“食疟，因饮食不节，中脘生痰，加以风气乘之，故善饥而不能食，食而支满，腹大善呕。实者二陈加枳壳、草果；因饥饱劳役而发，日久不止，脉虚者，理中汤加枳实、青皮；素有阴虚劳嗽，或因疟成劳，但于调理本药中稍加桂枝、姜、枣可也，不可纯用祛风豁痰药；若表邪势盛，可用小建中、黄芪建中为主，后与生料六味丸加桂枝、鳖甲”。参见胃疟、疟疾条。

食泄　病名。即伤食泻。《杂病源流犀烛·泄泻源流》：“食泄，脉弦紧，腹痛则泄，泄后痛减。”详伤食泻条。

食注　九注之一。《诸病源候论·食注候》：“有外邪恶毒之气，随食饮入五藏，沉滞在内，流注于外，使人肢体沉重，心腹绞痛，乍瘥乍发，以其因食得之，故谓之食注。”可用桔梗丸等方。参见九注条。

食侏　古病名。一名食亦。《脾胃论》卷上：“又有善食而瘦者，胃伏火邪于气分则能食，脾虚则肌肉削，即食侏也。”《宣明论方》卷一：“胃中结热，消谷善食，不生肌肉，此名食侏。”治疗以清胃健脾为主，宜参苓丸等方。参食亦条。

食泻　病名。即伤食泻。《医宗金鉴·杂病心法要诀》：“过食作泻，名曰食泻，即胃泻也。参伤食泻、胃泻条。

食咸哮嗽　证名。见《医宗必读·咳嗽》。即盐哮而兼见咳嗽者。治疗用砂糖、白面、轻粉制饼服用，以催吐痰涎。参盐哮条。

食咳　病名。指食积生痰所致的咳嗽。《医学入门》卷五：“食咳，因食积生痰，痰气冲胸，腹满者，二陈汤加厚朴、山楂、麦芽；伤生冷，以致肺胃不清，嗳酸吐泻，恶风寒者，五积散、理中汤、异功散；伤煎炒热物者，葶苈散，或三补丸加知母、贝母；伤酒食积者，香附瓜蒌青黛丸。”参见食积嗽、食积咳嗽、咳嗽条。

食复　证名。指大病愈后，因饮食失节致病复发者。《伤寒论·辨阴阳易差后劳复病脉证并治》：“病人脉已解，而日暮微烦，以病新差，人强与谷，脾胃气尚弱，不能消谷，故令微烦，损谷则愈。”《重订广温热论·温热复症疗法》：“食复：温热瘥后，胃气尚虚，余邪未尽，若纳谷太骤，则运化不及，余邪假食滞而复作。其症仍发热头痛，烦闷不纳，宜枳实栀子豉汤加山查肉、麦芽、连翘、莱菔汁等凉疏之；腹痛不大便者，加生锦纹。”

食哮　证名。见《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》。指饮食厚味，痰壅气阻所致的哮吼。《医旨绪余·哮》：“有饮食厚味伤脾，不能运化而发者。脾伤则津液不得布散而生痰涎，壅塞经隧，肺气为之不利。”症见胸满腹痛，盗汗潮热，昼夜发哮，声如拽锯等。《医钞类编》卷六：“清金丹治一切哮吼，或痰，或食遇厚味即发者尤妙。”食哮宜消食健脾、清痰利气为主，可用瓜蒌丸、保和丸等。

食积　九积之一。指食滞不消，日久成积者。《儒门事亲》卷三：“食积，酸心腹满，大黄、牵牛之类，甚者礞石、巴豆”。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“食积，食物不能消化，成积痞闷也，宜青礞石、鸡内金、枳实、巴豆、香附，方用保和丸，连萝丸、佐脾丸”。如肚腹胀硬拒按，吞酸嗳腐，不思饮食，用大和中饮消之。脾虚者，参用六君汤（见《医医偶录》）。参肉积、面积、果菜积等条。

食积五更泄泻　病证名。见《症因脉治·泄泻论》。指饮食过多损伤脾胃而致的晨泄。其症每至五更则腹中作痛，腹皮扛起，痛而欲泄，泄后稍减。脉多沉滑。若为热积，脉沉数；寒积，脉沉紧。治宜消导，用加减保和丸。热积用承气汤，寒积用煮黄丸。参食积泄泻条。

食积呕吐　证名。又称食呕。《症因脉

治·呕吐论》："食积呕吐之症，胸前满闷，嗳气作痛，痛则呕吐，得食愈痛，按之亦痛。……食积呕吐之因，饮食不节，损伤中气，不能运化，停食成积，中脘痞塞，则发呕吐矣。"参食呕条。

食积泄 病名。即伤食泻。《不居集·泄泻》："食积泄，泄下腐臭，噫气作醋。"详伤食泻、食积泄泻条。

食积泄泻 病证名。指饮食积滞伤脾所致的泄泻。又称伤食泻、食泻、积泻。《症因脉治》卷四："腹痛即泻，泻后即减，少顷复痛泻，腹皮扛起，或成块或成条，泻下臭如败卵，此食积泄泻之症也。"《医学心悟·泄泻》："胸满，痞闷，嗳腐吞酸，泻下臭秽，食积也。"《证治要诀·大小腑门》："食积腹疼而泻，不可遽用治中兜住，先用调脾饮，吞感应丸。或因食一物过伤而泻，后复食之即泻者，以脾为其所伤未复而然，宜健脾汤。因食冷物停滞伤脾，脾气不煖，所食之物不能消化，泻出而食物如故，宜治中汤加干葛（一作干姜），吞酒煮黄连丸。"参伤食泻条。

食积胁痛 证名。见《张氏医通·胁痛》。指由积滞导致的胁痛。多由饮食不节，食滞内停，气机壅阻所致。临床表现为胁肋疼痛，肋下有条状扛起，胸闷不舒，恶心，食欲减退，其脉多滑，亦可见胁痛连脘，恶寒发热等症。治宜消导去积为主，如保和丸、神保丸、消食丸等方。

食积泻 病名。即伤食泻。何惠川《文堂集验方·泄泻》："食积泻，或胀或痛，痛甚而泻，泻后痛减，得食又痛，粪色白者是。"详伤食泻条。

食积咳嗽 病名。指因食滞、痰积所致的咳嗽。《症因脉治》卷二："食积咳嗽之症，每至五更嗽发，嗽至清晨，或吐痰味甜，胸前饱闷。"脉洪大或沉滑，方用二陈平胃散、三子养亲汤、石膏泻白散加枳桔等。参见食咳、痰积嗽、食积嗽、食积痰嗽等条。

食积喘逆 证名见《症因脉治》卷二。即食喘。详该条。

食积痿 痿证之一。《证治汇补·痿躄章》："食积痿者，饮食太过，妨碍道路，升降失常，脾气不得运于四肢，手足软弱，或腹膨胀痛，或噁心嗳气，右手脉洪弦滑者，宜运脾消导，从食积治，俟食消积化，然后补脾。"宜木香槟榔丸，或导痰汤加山查、神曲、木瓜、防己；后用异功散、参苓白术散等补脾为主。参痿条。

食积腰痛 病证名。腰痛之一。因饮食停积不化所致。《金匮翼·腰痛》："食积腰痛者，食滞于脾而气传于肾也。夫肾受脾之精而藏焉者也。若食不消则所输于肾者，非精微之气，为陈腐之气矣，而肾受之，乱气伤精，能无痛乎？"宜用神麯酒吞服青娥丸。

食积腹胀 证名。指食积不化所致的腹胀。《症因脉治》卷三："食积腹胀之症，肚腹胀急，按之实痛，或一条扛起，或见垒垒小块，或痛而欲利，利后稍减。"多因饮食不节，食滞肠胃所致。治宜消食化积为主。肚腹胀急，按之实痛者，宜枳实散。一条扛起，而痛欲利，利后稍减者，枳朴大黄汤。参见腹胀、内伤腹胀条。

食积腹痛 证名。指因饮食不节，积滞不消所致的腹痛。《证治准绳·杂病》："食积作痛，痛甚欲大便，利后痛减，其脉必弦或沉滑。"《寿世保元·腹痛》："食积腹痛，其脉弦，其痛在上，以手重按愈痛。"《症因脉治》卷四："食积腹痛之症，胸腹胀满，痛不欲食，嗳气作酸。"治疗如胸胀腹痛，不能饮食，枳壳化滞汤。一条扛起，痛而欲利，承气汤。食在上脘，宜消不宜下，保和丸、枳术丸。热积应下，三承气汤。寒积应下，煮黄丸。亦可用木香槟榔丸、枳实导滞丸、治中丸、加味平胃散、丁香脾积丸等方。参见腹痛条。

食积痰嗽 病名。指食积或痰而致气上

逆所引起的咳嗽。《丹溪心法·咳嗽》："食积痰作嗽，发热者，半夏、南星为君，瓜蒌、罗卜子为臣，青黛、石碱为使。"《明医杂著》卷二："食积成痰，痰气上升，以致咳嗽，只治其痰，消其积，而咳自止，不必用肺药以治咳也。"《医学正传·咳嗽》："食积痰嗽，三补加二母炒为末，丸如椒核大，以竹沥、藕汁吞之。三补，芩、连、柏也；二母，知、贝母也。"食积痰嗽，饱闷者，用保和丸等。参见食积嗽、痰积嗽、食积咳嗽等条。

食积嗽　病名。指伤食生痰，久积所致的咳嗽。《万病回春》卷二："食积嗽者，痰嗽如胶也，……瓜蒌枳实汤加减。"《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："食积嗽，伤食生痰，久积发咳也，其脉数硬，必兼胸满噫酸，发热，或稠痰壅滞喘满，皆由胃火上炎，冲逼肺气，久而不愈也，此非青黛、瓜蒌不除。瓜蒌丸，二母宁嗽汤。总之，凡有食积者，必面青黄白不常，面上如蟹爪路，一黄一白者，此又可望色而知也。"参见食积咳嗽、食积痰嗽、痰积嗽、食咳等条。

食瘅　古病名。指食入易消之症，类似消中。《证治准绳·杂病》："有胃口热，食易消故瘅，《素问》谓之食瘅，亦类消中之状，俗名肚瘅。"参消中、中消、心瘅条。

食臭　❶食物的气味。《素问·脉解篇》："所谓恶闻食臭者，胃无气，故恶闻食臭也。"指闻到食物的气味即厌恶。❷指嗳气有酸臭味。多因宿食不消所致。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："伤寒汗出，解之后，胃中不和，心下痞鞕，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣，下利者，生姜泻心汤主之。"

食诸肉中毒　病名。因食疫畜肉而出现中毒症状者。《诸病源候论·食诸肉中毒候》："凡可食之肉，无甚有毒。自死者，多因疫气所毙，其肉则有毒，若食此毒肉，便令人困闷吐利无度，是中毒。"参食六畜肉中毒条。

食诸鱼中毒　病名。因食有毒或变质鱼类引起中毒症状者。见《诸病源候论·食诸鱼中毒候》。症见头晕、面肿、肤红起痹搔痒、心腹闷满烦乱；严重者心悸、气急，甚至死亡。治宜中西医结合救治。《本草纲目》卷四载有解鱼毒诸药，如紫苏、荏叶、水苏、芦根、芦花、菩萨草、大黄汁、马鞭草汁、苦参、缩砂仁、草豆蔻、酱汁、米醋、胡麻油、黑豆汁、冬瓜汁、橘皮、乌梅、橄榄、蜀椒、胡椒、莳萝、茴香、胡葱、大蒜、朴硝、蓬砂、鲛鱼皮、獭皮等。可参考。

食猪肉中毒　病名。因食病猪肉而出现中毒症状者。《诸病源候论·食猪肉中毒候》："凡猪肉本无毒，其野田间放，或食杂毒物而遇死者，此肉则有毒。人食之则毒气攻藏，故令人吐利困闷不安。"参见食六畜肉中毒条。

食厥　厥证之一。指暴饮暴食所致昏厥的病证。《赤水玄珠·厥证门》："有人醉饱之后，或感风寒，或着恼怒，忽然厥逆昏迷，口不能言，肢不能举者，此食厥也。盖食滞胸中，阴阳痞隔升降不通，故生此症。若误作中风而用祛风散气之剂，则胃气重伤，死可立待。宜煎姜盐汤探吐其食，后以平胃散茯苓、白术、麦芽、半夏之类调理；若有风寒尚在者，以藿香正气散解之；气滞不行者，以八味顺气散调之。"《明医杂着·风门》："食厥者，过于饮食，胃气不能运行，故昏冒也，用六君子加木香。"参厥证、酒厥等条。

食喘　证名。见《杂病源流犀烛》卷一。指因饮食不节引起的气喘，故又名食积喘逆。《症因脉治》卷二："食积喘逆之因：饮食自倍，肠胃乃伤，膏粱厚味，日积于中，太阴填塞，不能运化，下降浊恶之气，反上于清道，则喘呕不免矣"。症见胸满，胃痛腹痛，恶食饱闷，大便或结或溏，上气喘逆，

喘呕嗳气等。治宜消导为主，方如保和丸、资生丸，枳术丸等均可选用。寒积宜下者，用煮黄丸；热积用承气汤消导攻下。

食瘸 病名。指痫因小儿伤乳或伤食而发者。《诸病源候论·痫候》："食痫者，因乳哺不节所成。"症见发热，或不发热，或吐后发热，嗳吐馊气即发搐，大便酸臭等。治宜下之。用四味紫丸等。《奇效良方》卷六十四："食痫为病，伤肉食，手足搐动，角弓反张，或拳挛，或张狂大声，如羊如犬大叫，吐出饮食方定。其饮食尽被痰涎包裹在其中。"参见痫、五痫条。

食滞中满 证名。指饮食停滞，脾胃失司所致的脘腹胀满。《类证治裁·肿胀》："食滞中满者，专消导，和中丸。"食滞中满而痛者，宜温散，药如干姜、苍术、白芷、川芎、香附、姜汁之类。若宿食不消，面黄，吞酸，宜丁香脾积丸，或平胃散加草蔻、枳实、半夏（见《杂病源流犀烛·腹少腹病源流》）。参见中满条。

食滞脘痛 证名。指饮食停滞所致的胃痛。《类证治裁·胃脘痛》："食滞脘痛，必嗳腐，香砂枳术丸加半夏曲。"《张氏医通》卷五："食积作痛，保和丸。"《医宗己任篇·四明心法》："食痛者，胸膈按之痛甚，勺水不入，兼大便闭，闻谷气则欲吐。用二陈汤或平胃散加桔梗、枳实主之。"参胃脘痛条。

食减 指饮食减少。《素问·气交变大论》："岁土太过，雨湿流行，肾水受邪。民病腹痛，……食减，四肢不举。"治详不能食条。

食痰 痰证之一。一名食积痰。《东医宝鉴》卷二："食痰即食积痰也。因饮食不消，或挟瘀血，遂成窠囊，多为癖块痞满。宜青礞石丸、黄瓜蒌丸、正传加味二陈汤。"参见食积痰、痰证条。

食膈 五膈之一。见《外台秘要》卷八。多因气塞、火郁、脾运失常、食滞隔阻所致。症见烦满，疲乏，食不下，时呕沫等。治用食郁越鞠丸等方。一作食噎膈。参见噎膈、五膈条。

食痹 病名。出《素问·脉要精微论》。《素问·至真要大论》："食痹而吐。"王冰注："食痹，谓食已心下痛阴阴然，不可名也，不可忍也，吐出乃止。此为胃气逆而不下流也。"《杂病源流犀烛·胃病源流》："惟肝气相乘为尤甚……痛必上支两胁，里急，饮食不下，膈咽不通，名曰食痹，谓食入即痛，吐出乃止也。宜肝气犯胃方。"《证治汇补》卷五："食痹者，食已则心下痛，吐出乃止，此因胃脘痰饮恶血留滞于中所致，薤白半夏汤治之。"参胃脘痛条。

食瘕 病名。指食积成瘕。《医说·癥瘕》："其发语声嘶，挹言语而不出，此人食结在腹，其病寒，口中常有水出，四肢洒洒如症，饮食不能，郁郁而痛，此食瘕也。"本病与《诸病源候论》中的食症，其症状大致相同。参食癥条。

食噎 五噎之一。出《诸病源候论·否噎病诸候》。其症食无多少，胸中苦塞，疼痛，不得喘息等。治用五噎丸、五噎散、嘉禾散等。参五噎、噎条。

食噎膈 膈证之一。又名食膈。见《医方考》卷三。详食膈条。

食蕈菌中毒 病名。因误食有毒蕈菌而出现中毒症状者。见《诸病源候论·食诸菜蕈菌中毒候》。证轻者见头痛、呕吐、腹泻、昏睡、幻视、精神错乱等；重者可迅速致死。因蕈菌所含毒素不同，按临床表现，大致可分为速发型或精神型，迟发型或类霍乱，溶血型，中毒性肝炎型等四种类型。治疗宜中西医结合救治。《本草纲目》卷四载有解野菌毒药有甘草、防风汁、忍冬汁、蠡实、酱汁、生姜、胡椒、绿豆汁、荷叶、阿魏、地浆、黄土、童尿等。可参考。

食鲩鲊鱼中毒 病名。《诸病源候论·食鲩鲊鱼中毒候》："此鱼肝及腹内子有大

毒，不可食。食之，往往致死。”即河豚中毒。详该条。

食蟹中毒　病名。见《诸病源候论·食蟹中毒候》。症见胸闷烦乱，精神不安，或更见腹痛，吐利不止等。治宜解毒温中。《本草纲目》卷四载有解蟹毒药苏汁、藕汁、冬瓜汁、干蒜汁、芦根汁、橙皮、丁香等。

食癥　病名。十二癥之一。《诸病源候论·癥瘕病诸候》：“候其人发语声嘶，中满浊而后语，乏气拖舌，语而不出，此人食结在腹，病寒，日里常水出，四体洒洒，常如发疟，饮食不能常，自闷闷而痛，此食癥病也。”《圣济总录》卷七十二：“论曰，脾胃虚弱，饮食累伤，积久不去，结在肠内，与正气交争则心腹鞕痛，妨害饮食，肢体消瘦，以手按之，积块有形，谓之食癥。”《类证治裁·痃癖癥瘕诸积论治》：“食癥，脾胃先弱，饮食失调，生冷不化，日渐成块，治先主疏导而佐以和中，大和中饮或消食丸。若气壅血滞，形寒者，乌药散；脾气虚血不行者，芎归四君汤；脾气郁血不行者，归脾汤；肝脾血燥不行者，加味逍遥散。”亦可用槟榔丸、麦蘗汤、丁香丸等方。参见癥病、十二癥条。

胠胁肋痛　证名。胠指腋下，胠胁肋为腋下及胁肋部气郁、血瘀、痰饮、食积及外感之邪侵袭，均可发生胠胁肋部疼痛。《杂病源流犀烛·肝病源流》：“胠胁肋痛，固由于肝邪之实，而所谓肝邪者，不越气、血、痰、食、风寒五端。”详肝郁胁痛、死血胁痛、食积胁痛、停饮胁痛、感冒胁痛条。

胠胁痛　证名。指腋下至胁部疼痛。出《素问·气交变大论》。详胠胁肋痛条。

胪胀　证名。指腹部肌肉或腹皮胀急。《素问·六元正纪大论》：“民病腠理热，血暴溢，疟，心腹满热，胪胀，甚则肿肿。”《类经·运气类》：“胪，皮也。一曰腹前曰胪。”参腹胀、肿胀条。

胆气不足　证名。即胆虚。又称胆气虚。《诸病源候论·胆病候》：“胆气不足，其气上溢而口苦，善太息，呕宿汁，心下澹澹，如人将捕之，嗌中介介，数唾，是为胆气之虚也。”详见胆虚条。

胆风毒气　证名。指风毒之气入胆而昏困多睡之症。《圣济总录》：“治胆风毒气，虚实不调，昏困多睡，酸枣仁汤方。酸枣仁研，生用一两，腊茶以生姜汁涂炙令微焦二两。右二味，粗捣筛，每服二钱匕。水一盏，煎至七分，去渣温服，不计时候。”参嗜卧条。

胆火　证名。指胆火偏盛所出现的证候。《张氏医通·火》：“目黄，口苦，坐卧不宁，此胆火所动也。”《类证治裁·火症》：“胆火，眩晕口苦，羚羊角、丹皮、山栀、桑叶、连翘、龙胆草。”参见胆病条。

胆火不得卧　证名。内伤不得卧之一。指肝胆湿热郁火所致的不寐症。《症因脉治》卷三：“胆火不得卧之症，膈寒不利，胁肋胀满，胆火乘脾也；心烦躁乱，恍惚不宁，胆涎沃心也；甚则目黄目赤，夜不能寐。”治疗如胆火乘脾者，清胆竹茹汤；左关独大，龙胆泻肝汤加胆星；胆涎沃心者，胆星汤合泻心汤、牛黄清心丸。”参见不寐条。

胆足少阳经病证　病证名。因足少阳经经气异常而致。《灵枢·经脉》：“胆足少阳之脉，……是动则病口苦，善太息，心胁痛，不能转侧，甚则面微有尘，体无膏泽，足外反热，是为阳厥。是主筋所生病者，头痛，颔痛，目锐眦痛，缺盆中肿痛，腋下肿，马刀侠瘿，汗出振寒，疟，胸、胁、肋、髀、膝外至胫、绝骨、外踝前及诸节皆痛，小指次指不用。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷则灸之，不盛不虚，以经取之。”《脉经·胆足少阳经病证》除上述“是动、所生”病外，并列举了“善呕有苦汁，长太息，心中澹澹善悲，恐如人将捕之”等症。

胆郁　郁证之一。《赤水玄珠》卷十一：“胆郁者，口苦，身微潮热往来，惕惕

然如人将捕之。治宜柴胡、竹茹、干姜。”参郁证条。

胆胀 证名。胀病之一。《灵枢·胀论》：“胆胀者，胁下痛胀，口中苦，善太息。”《医醇賸义·胀》：“胆为中正之官，决断出焉。……胆气血皆少，为清静之腑，寒气干之，故胁痛口苦；气郁不舒，故善太息也。当轻扬和解，后辛汤主之。”参胀病条。

胆怯 指心中畏惧不敢见人之证。《石室秘录》卷三：“凡人胆怯不敢见人者，少阳胆经虚也。而所以致少阳胆经之虚者，肝木之虚也。而肝木之衰，又因肾水之不足。法当补肾以生肝木。方用熟地一两，山茱萸四钱，芍药五钱，当归五钱，柴胡一钱，茯神五钱，白芥子一钱，生枣仁一钱，肉桂一钱，水煎服。”《杂病源流犀烛·不寐多寐源流》：“有心胆惧怯，触事易惊，梦多不祥，虚烦不寐者，宜温胆汤。”

胆实多卧 证名。又称胆热多睡。《张氏医通》卷九：“胆实多卧，热也，酸枣仁一两，生为末，茶清调服。”参胆热多睡、嗜卧等条。

胆咳 病名。❶指咳而呕胆汁者。《素问·咳论》：“肝咳不已，则胆受之。胆咳之状，咳呕胆汁。”治用黄芩加半夏生姜汤、小柴胡汤加芦根汁等。参见肝经咳嗽条。❷十咳之一。《诸病源候论·咳嗽病诸候》：“九曰胆咳。咳而引头痛、口苦是也。”治宜刺足阳陵泉。参见十咳、咳嗽条。

胆热多睡 证名。又称胆实多卧。《太平圣惠方》卷三：“夫胆热多睡者，由荣卫气涩，阴阳不和，胸膈多痰，脏腑壅滞，致使精神昏浊，昼夜耽眠。此肾积热不除，肝胆气实，故令多睡也。”治宜清胆泄热，化痰醒神，如羚羊角散、茯神散、半夏汤、远志丸等方。参见嗜卧、胆实多卧等条。

胆热呕吐症 证名。指呕吐因胆热郁结所致者。清·罗应章《经验医库·胆热呕吐症》：“足少阴胆经，气怒郁结生火，热多寒少，胸胁胀痛，呕吐腹痛，寒热往来，郁结在三焦，有升无降，口渴咽干，一饮即吐，脉弦数有力。”治宜加减大柴胡汤。本证多见于急性胆囊炎、胆石症、急性胰腺炎等疾病。

胆病 六腑病候之一。出《灵枢·邪气藏府病形》。少阳属胆，与肝相为表里。其病有寒热虚实之分。多因肝气有余、湿热蕴胆、胆气虚怯或猝受惊恐所致。肝气与七情有密切关系，故胆病多有胁痛及精神神志方面症状。胆内藏清汁而主疏泄，所以胆液被阻，不得泄越，每致发黄。《脉经》卷二：“胆实，左手关上脉阳实者，足少阳经也。病苦腹中气满，饮食不下，咽干，头重痛，洒洒恶寒，胁痛。胆虚，左手关上脉阳虚者，足少阳经也。病苦眩，厥，痿，足指不能摇，躄，坐不能起，僵仆，目黄，失精，晾晾。”《太平圣惠方》卷三：“若虚则生寒，寒则恐畏，不能独卧，其气上溢，头眩口苦，常喜太息，多呕宿水，心下澹澹，如人将捕之，咽中介介，数数好唾，是为胆虚冷之候也。”又“若肝气有余，胆实，实则生热，热则精神惊悸不安，起卧不定，胸中冒闷，身体习习，眉头倾萎，口吐苦汁，心烦咽干，此是胆实热之候。”《儒门事亲》卷七：“胆者，敢也。惊怕则胆伤矣。”《临证指南医案·疸》：“阳黄之作，湿从火化，瘀热在里，胆热液泄，与胃之浊气共并，上不得越，下不得泄，熏蒸遏郁，侵于肺则身目俱黄，热流膀胱，溺色为之变赤，黄如橘子色。阳主明，治在胃。阴黄之作，湿从寒水，脾阳不能化热，胆液为湿所阻，渍于脾，浸淫肌肉，溢于皮肤，色如熏黄。阴主晦，治在脾。”治宜调肝利胆，清化湿热，和解少阳，温胆安神等法。参胆病各条。

胆黄 ❶三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一：“病人体上黄绿色，胸中气满，或硬，不下饮食，此是胆黄。”治宜用灸烙法或用黄芩汤。参见黄疸有关各条。❷指惊

恐胆虚而致的黄疸。《太平圣惠方》卷五十五："胆黄者，面色青黄，多惊少卧，悲泣不定，嗔怒无恒，舌上生疮，唇口干燥，若喘粗不止者，难治。"《景岳全书·黄疸》："胆黄证，凡大惊大恐及斗殴伤者皆有之。……其证则无火无湿，其人则昏沉困倦，其色则正黄如染。凡此数证，皆因伤胆，盖胆伤则胆气败而胆液泄，故为此证。"治宜选用甘温、酸涩、重镇等药，亦可用车前子散等方。参黄疸有关各条。

胆虚　证名。指胆气虚怯所出现的证候。《脉经》卷二："胆虚……病苦眩，厥，痿，足指不能摇，躄，坐不能起，僵仆，目黄，失精，眡眡。"又称胆气虚，胆气不足。《本草经疏》："胆虚二证：易惊，属胆气虚；病后不得眠，属胆虚。"症见多疑虑，常叹息，不得眠，或口苦目黄，呕苦水等。治宜温胆补虚为主。选用十味温胆汤，定志丸等方。

胆虚不得眠　证名。指胆虚受邪，神气不宁所致的失眠。《圣济总录》卷四十二："论曰：胆虚不得眠者，胆为中正之官，是少阳其经也。若其经不足，复受风邪则胆寒，故虚烦而寝卧不安也。"治宜补肝温胆，可用温胆汤、酸枣仁丸、五补汤等方，或用炒枣仁研末，以酒调服。参见不寐条。

胆蒸　二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

胆瘅　古病名。出《素问·奇病论》。《圣济总录》卷四十二："内经谓有病口苦，名曰胆瘅。……治肝胆俱虚，热气上熏，口中常苦，泄热益胆汤方。"

胆衡　古病名。衡通横。《小儿药证直诀·钱仲阳传》："又乳妇因大恐而病，病虽愈，目张不得瞑，人不能晓，以问乙（钱仲阳名乙），乙曰：煮郁李酒饮之，使醉则愈。所以然者，目系内连肝胆，恐则气结，胆衡不下，惟郁李去结，随酒入胆，结去胆下，目则能瞑矣，如言而效。"

肭肿　❶肭通肤。指全身浮肿。《素问·水热穴论》："上下溢于皮肤，故为肭肿。肭肿者，聚水而生病也。"❷指足面浮肿。《素问·评热病论》："有病肾风者，面肭庞然壅。"马莳注："肭，足面也。"参见水肿条。

肭疝　古病名。指脐下有硬结肿块的一种疝病。《诸病源候论》卷二十："腹中脐下有积聚，名曰肭疝也。"《医宗必读》卷八："癥疝，足阳明筋病，内有脓血，即巢氏之肭疝，子和之血疝也。宜用桃仁、玄胡索、甘草、茯苓、白术、枳壳、山查、橘核、荔枝核。"参见癥疝、血疝条。

胞转　病名。即转胞。《诸病源候论·小便病诸候》："胞屈辟，小便不通，名为胞转"。详转胞条。

胞疸　黄疸二十八候之一。《诸病源候论·黄病诸候》："胞疸之病，小肠有热，流于胞内，故大小便皆如蘖汁，此为胞疸。"参黄疸有关条。

胞蒸　二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

胞痹　病名。又名膀胱痹。因风寒湿邪久客膀胱，使膀胱虚寒，气化失常所致。症见小腹胀满，疼痛拒按，小便艰涩不利，鼻流清涕等。《素问·痹论》："胞痹者，少腹膀胱按之内痛，若沃以汤，涩于小便，上为清涕。"治宜温通。选用肾着汤、巴戟丸、金匮肾气丸等方。亦有因湿热蕴结膀胱而致者，治宜清利。用肾沥汤或八正散等方。

脉极　证名。指血脉亏损、重急的疾患。又称血极。《备急千金要方·心脏》："凡脉极者，主心也，心应脉，脉与心合，心有病从脉起。又曰，以夏遇病为脉痹，脉痹不已，复感于邪，内舍于心则食饮不为肌肤，咳脱血色白不泽，其脉空虚，口唇见赤色。"常伴见面无血色，头发脱落，易怒，言语不快，惊跳不定等症。宜用人参散、地黄汤、补荣汤等方。参脉绝条。

脉绝 古病名。指血脉枯涩败绝的疾患。《备急千金要方·心脏》："扁鹊云：脉绝不治三日死，何以知之？脉气空虚，则颜焦发落。脉应手少阴，手少阴气绝，则脉不通血先死矣。"参脉极条。

脉厥 厥证之一。❶指温疫里证，应下失下，六脉如无之重证。《温疫论》："温疫得里证，神色不败，言动自如，别无怪证。忽然六脉如丝，沉细不应指，似有如无，或两手俱无，或两手先伏。察其人不应有此脉，有此脉者，皆缘应下失下，内结壅闭，营气逆于内，不能达于四末，此脉厥也。亦有过用黄连、石膏诸苦寒药，强遏其热，致邪愈结，脉愈不通。"治宜承气汤缓下之，其脉自复。❷指战汗后暂见脉停而呼吸尚存之证。《伤寒寻源·战汗》："战定之后，其人忽沉沉睡去，如死一般。须察其脉仍和缓有根者勿讶，俟其气复即醒矣。亦间有脉停者，又必察其呼吸，如呼吸尚长，此属脉厥，久之自复。"参厥证、战汗条。

脉蒸 五蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。又为二十三蒸之一。详五蒸、二十三蒸条。

脉痿 痿证之一。亦称心痿。由于心热火炎，血气上逆，下部血脉空虚；或悲哀太甚，阳气内动，屡屡失血，脉失濡养所致。症见四肢关节如折，不能举动，足胫软弱，不能着地站立。《素问·痿论》："心主身之血脉……心气热，则下脉厥而上，上则下脉虚，虚则生脉痿，枢折挈，胫纵而不任地也。"又："悲哀太甚，则胞络绝，胞络绝，则阳气内动，发则心下崩，数溲血也。故《本病》曰：大经空虚，发为肌痹，传为脉痿。"治宜清心泻火，养血活血。可用导赤各半汤，或六味丸合丹溪大补丸，或用大生脉汤、铁粉丸、调营通脉汤等方。参痿条。

脉痹 病名。❶指风寒湿邪阻滞血脉所致的痹症。出《素问·痹论》。症见皮肤变色，皮毛枯萎，肌肉顽痹等。治宜导痹通脉，可用导痹汤、人参丸等方。❷指热痹。《医宗必读·痹》："脉痹即热痹也。"详见热痹条。❸指心痹。《症因脉治》卷三："心痹之症，即脉痹也。"参心痹条。

脉溢 病名。即毛窍血出，详见该条。

脉癫疾 病名。指癫病深入于脉者。《灵枢·癫狂》："脉癫疾者，暴仆，四肢之脉皆胀而纵。脉满，尽刺之出血；不满，灸之挟项太阳，灸带脉于腰相去三寸，诸分肉本输。呕多沃沫，气下泄，不治。"参见癫条。

胫肿 指小腿浮肿。出《素问·藏气法时论》。亦称足胫肿、足胕肿、足胫附肿。为水肿病常见症状之一。详脚肿、水肿条。

急中风 古病名。见《肘后备急方》卷三。又名急风。详见该条。

急风 古病名。见《肘后备急方》卷三。又名急中风。因毒厉之气乘虚入侵所致。《圣济总录》卷六："急风，其证筋脉紧急，身背强直，面黑鼻干，口噤不语，须臾风入五藏，与清气相引，则通身壮热，汗出如油，直视唇青，痰涎结聚，咽嗌壅塞，如拽锯声。诊两手脉阴阳俱细缓者生，或沉微浮数者难治。"

急劳 病名。见《太平圣惠方·治急劳诸方》。指虚劳病内有壅热者。《圣济总录·急劳》："缘禀受不足，忧思气结，荣卫俱虚，心肺壅热，金火相刑，藏气传克，或感外邪。故烦躁体热，颊赤心忪，头痛盗汗，咳嗽咽干，骨节痠疼，久则肌肤销铄，咯涎唾血者，皆其候也。"可选用乌梅散、退热汤、前胡饮等方。参虚劳条。

急病 即紧病。《素问病机气宜保命集·泻论》："暴泄如水，周身汗出，一身尽冷，脉微而弱，少气而不能语，其甚者加吐，此谓急病，宜治之以浆水散。"详紧病条。

急黄 病名。见《诸病源候论·黄病诸候》。指黄疸病中病势急骤、险恶的一类。多因湿热毒邪深重、燔灼营血所致。症见高

热烦渴，溲赤，卒然面目全身发黄（亦有初不发黄，死后身面发黄者），胸满腹胀，甚则神昏谵语，吐衄，便血，发斑等。脉多弦滑数，舌红绛，苔黄腻或燥。急黄与后世所称之瘟黄相似。治以清热解毒、凉血开窍为主。方如《千金要方》犀角散，黄连解毒汤、栀子丸、神犀丹、安宫牛黄丸等。并宜中西结合抢救治疗。参瘟黄条。本病可见于急性、亚急性肝坏死，化脓性胆管类及钩端螺旋体病之黄疸出血型等。

〔丶〕

疫　指具有剧烈流行性、传染性的一类疾病，多因时行疠气从口鼻传入所致。出《素问遗篇·刺法论》。《类证治裁》卷一："疫为时行疠气，有大疫，有常疫。大疫沿门阖境，多发于兵荒之后，不数见。常疫则一隅数家，一家数人，症多相似。春、夏、秋三时皆有之，而夏秋为甚。其厉邪之来，皆从湿土郁蒸而发，触之成病，其后更相传染，必由口鼻吸受，流入募原。……疫为燥热毒疠，从无辛温发散之例，一切风燥辛热，皆不可犯。至于大疫，又宜斟酌司天岁气方向，不拘一辙也。"参时疫、瘟疫、疫疠、时毒、大头瘟、绞肠瘟、疙瘩瘟、杨梅瘟等条。

疫疠　病名。❶指具有强烈传染性，可造成一时一地流行的疾病。见《诸病源候论》卷十。又名瘟疫、时气。《医学入门》卷四："疫疾如有鬼疠相似，故曰疫疠，又曰时气。"参瘟疫、时气等条。❷指湿温有强烈传染者。《六气感证要义·湿温》："湿温一证，即藏疫疠在内，一人受之则为湿温，一方受之则为疫疠。"❸指大头痛，溃裂脓出而又染他人者。《此事难知》卷下："大头痛者，虽为在身在上，热邪伏于已，又感天地四时非节，瘟疫之气所着，所以成此疾。至于溃烈脓出，而又染他人，所以谓之疫疠也。"参大头痛条。

疫疟　病名。疟疾之一。指在一个地区流行而病情凶重的疟疾。《三因极一病证方论·疟病不内外因证治》："病者发寒热，一岁之间，长幼相若，或染时行，变成寒热，名曰疫疟，以岁运推之。"《张氏医通·疟》："疫疟，夏秋之间，沿门阖境皆是也。其证壮热多汗而渴，宜达原饮；烦热大渴有表证，桂枝白虎汤；谵妄狂闷，凉膈散加草果；寒热便秘，大柴胡汤；虚人发散后热不止，人参败毒散。"或用不换金正气散、五瘟丹、如意丹等。参见疟疾条。

疫毒痢　病名。指痢疾之传染性强而病情危重者。见宋《史载之指南方》。亦称"疫痢"、"时疫痢"。《肘后备急方·治伤寒时气温病方》已有"天行毒病，挟热腹痛，下痢，升麻、甘草、黄连、当归、芍药、桂心、黄柏各半两，以水三升，煮取一升，服之当良"的记载。多由疫毒流行，互相染易，壅滞肠道，燔灼气血所致。主要症候为发病急骤，高热呕吐，烦躁口渴，腹痛剧烈，后重特甚，痢下脓血，多为紫红色或血水状，便次频多，甚至昏迷痉厥。儿童每于未痢之前，即呈昏迷、抽搐，甚或肢冷、喘促，脉微欲绝等危象。治法以清除肠积，凉血解毒，开窍解痉为主。可用白头翁汤、槟榔顺气丸、当归银花汤、犀角地黄汤、紫雪丹等方。本病类似中毒性痢疾，及痢疾伴有严重脱水，电介质紊乱的重症患者。宜中西医结合进行抢救。参疫痢条。

疫疹　病证名。指疫证发疹的疾患。见《疫疹一得》卷上。由于感受疫疠之邪，热毒内盛，外发于肌肤所致。疫疹见紧束有根、色紫或黑者为热盛毒重。轻者一病即发，毒愈重则透发愈迟，有迟至四、五日而仍不透者。初起时，伴见恶寒发热，头痛如劈，甚则烦躁谵语，唇焦，舌起红刺，脉数，或兼上呕下泄等症。治宜清热凉血解毒，以清瘟败毒饮为主方。亦可先用败毒散。热盛者可酌用凉膈散。（去硝、黄加石膏）参斑、疹

条。

疫痢 病名。指痢疾之由于天行疫毒所致者。具有强烈的传染性。《痢证汇参》卷四："疫痢之证，运气所致。或流衍之纪，雨湿连绵；或二火司令，赫义用事，湿热大作；或燥金行令，燥火时行，三者皆成疫痢。此所谓之天行疫痢也。"《症因脉治》卷四："长幼相似，沿门合境，一齐发作，下痢脓血，或下纯血，或下黄水，或下紫血水，身热头痛，胸满不食，此疫痢之症也。"治宜清热解毒为主。初起可兼表散，可用羌独柴葛之类。待表邪已散，然后分辨湿火燥火施治。湿热脉洪，香连丸、六一散；满闷不舒，香连平胃散；燥火脉数，当归银花汤，调六一散，送下当归大黄丸。参痢疾、疫毒痢条。

疫疡 疡证之一。《疫疡草·辨论疫邪由来》："疫疡者，疫毒直干肺脏，而喉烂气秽，甚者直陷心包，而神昏不救，瞬息之间，命遂夭殂，毒气传染，枉死甚众。"参妇儿科分册烂喉疡条。

疮闭咳嗽 病名。指咳嗽由疮疡蕴毒，内攻肺脏所致者。《杂症会心录》卷上："疮闭咳嗽，皮毛之毒内攻肺脏，肺受毒害也。"症见外疮虽没，而内毒更烈，通身肌肉浮肿，咳嗽喘促，胸满壅塞，不能平卧，痰鸣鼻动，小便短少。治疗急宜速救肺脏，而兼以解毒，加入鲜发之物，以托毒外出。方用保金宣毒饮等。参咳嗽条。

恍惚 证名。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。指神思不定，慌乱无主。《医林绳墨》卷三："恍者，疑而未定之象；惚者，似物所有之谓。"多因七情内伤，外邪内干，心气不足，心血虚亏所致。治宜养心安神。用朱砂安神丸、养心汤、定志丸等方。

类中 病名。见《景岳全书·杂证谟》。又名类中风。详该条。

类中风 病名。简称类中。指风从内生的中风病。见《医经溯洄集·中风辨》。因非外中风邪，故亦称非风。多由肾阴不足，心火炽盛，肝阳偏亢，肝风内动，或气虚血虚，或为湿痰壅盛，化热生风所致。《临证指南医案·中风》华岫云按："肝为风脏，因精血衰耗，水不涵木，木少滋荣，故肝阳偏亢，内风时起。"《类证治裁·中风》："迄乎河间主火，谓心火暴盛，肾水虚衰；东垣主气，谓猝中乃本气自病；丹溪主痰，谓湿生痰，痰生热，热生风，……皆辨明类中之由，与真中症异。"类中风分为火中、虚中、湿中、寒中、暑中、气中、食中、恶中。参中风及各该条。

类中暑 病名。指劳役血虚发热，类似中暑者。《六气感证要义·暑》："有伤于劳役，以致肌热面赤，烦渴引饮，脉大而虚，按之无力，此血虚发热，所谓类中暑也。东垣以当归补血汤治之。"参中暑条。

类伤寒 病名。指类似伤寒的发热性疾患。《医学心悟·伤寒类伤寒辨》："伤寒者，冬令感寒之正病也，类伤寒者，与伤寒相似而实不同也。世人一见发热，辄曰伤寒。"程氏以冬令感寒者为正伤寒，以春季发病为温病，夏季发病为热病。如冬温，湿温，中寒、时行寒疫、风温、暑病、痉病、伤食、脚气等均属类伤寒范畴。《伤寒绪论》卷上："类伤寒者，诸凡杂证发热，皆发于里，夜甚于昼，惟伤寒为表邪，郁发于外，而昼夜俱热也。"《伤寒心法要诀·类伤寒五证》："停痰，伤食，脚气，虚烦，内痈，相类伤寒有五证。"参见伤寒，温病等有关条。

类消 病名。指类似消渴的一种疾病。多因中气虚寒，阴火浮游于上所致。《杂病源流犀烛·三消源流》："又有类消症，其人渴欲求饮，饮一、二口即厌，不比消渴之无厌。此由中气虚寒，寒水泛上，逼出浮游之火于喉舌间，故上焦欲得水救，水到中焦，以水遇水，故厌也。宜理中汤送八味丸。"

前后血 证名。出《素问·腹中论》。指大小便皆出血，详见便血、溺血等条。

前闭 证名。《素问·厥论》："厥阴

厥逆，挛，腰痛，虚满前闭。”前指前阴。前闭，即小便闭塞不通。《类经》卷十五：“肝经之脉环阴器，故为前闭不通。”详癃闭条。

首风　古病名。《素问·风论》：“新沐中风，则为首风。”《圣济总录·首风》：“新沐之人，皮腠既疏，肤发濡渍，不慎于风，风邪得以乘之，故客于首而为病，其证头面多汗，恶风头痛。”《增补内经拾遗方论·首风》：“新沐之人……风若中之，则为首风，遇风则头痛是也。”《宣明论方》卷二：“首风旋晕眩急，外合阳气，风寒相搏，胃膈痰饮，偏正头疼，身拘倦。”《杂病源流犀烛·头痛源流》：“首风，风伤于卫病也，盖沐则腠理皆开……邪遂袭而入，则卫受之，故成首风，其症头面多汗，必恶风。”治宜大川芎丸、芎蒡散、防风饮、前胡汤、白僵蚕丸、天麻丸、茶调散、羌活散、白芷丸等方。

首如裹　指头如物裹、头面胀壅昏重的症象。多因湿邪壅遏清阳所致。《素问·生气通天论》：“因于湿，首如裹。”《类经》卷十三：“湿在上则首如裹，谓若以物蒙裹然者，凡人行瘴雾之中及酒多之后，觉胀壅颈面，即其状也。”参见头重条。

逆气　出《素问·藏气法时论》。指喘急气逆。有阳明气逆，肺络气逆，肾气上逆之分。《类证治裁·喘证论治》：“逆气，气上逆不得卧而息有音，……阳明脉逆，不得以其道，故不得卧而息有音也。……其不得卧，卧则喘者，是水气之客也。水者，循津液而流，肾为水脏，主津液，主卧与喘也。治阳明之气逆，四磨汤、七气汤；治肺络之气逆，杏子汤、小青龙汤、越婢汤、苏子降气汤；治肾气之逆，麻黄附子细辛汤、肾气汤、灵砂丹”。一般所指逆气，多指喘逆。《证治准绳》：“逆气者，但气上而奔急，肺壅而不下，宜详辨之”。参咳逆上气、奔气、喘证条。

洪肿　古病名。指水肿之剧者。《金匮要略·水气病脉证并治》：“风气相击，身体洪肿，汗出乃愈。”《诸病源候论·身面卒洪肿候》：“身面卒洪肿者，亦水病之候，肾脾虚弱所为。”洪肿可见于风水、皮水、石水等病证，亦可见于脚气、鼓胀、肠覃、石瘕等证，须辨属气属血，随证施治（见《三因极一病证方论》）。参见有关各条。

浊　浊病的简称。又名赤白浊、二浊。❶指小便浑浊之症。见《丹溪心法》卷三。小便浑浊，色赤或有血者称赤浊，无血而色白者称白浊。《时方妙用》卷四：“浊者，小水不清也。”由湿热下注则为浊病。湿胜于热则白，热胜于湿则赤，治宜导其湿热为主。❷指精浊之症。《证治准绳·赤白浊》以“浊病在精道”，其症窍端常有浊物，淋漓不断而小便自清。随浊物有血、无血，而有赤浊、白浊之分。❸指便浊与精浊。《证治汇补·便浊章》：“浊分精溺。”详便浊、精浊条。本证可见于慢性尿路感染、慢性前列腺炎及淋病等疾患。

洞　呕吐之古称。《灵枢·邪气藏府病形》：“洞者，食不化，下嗌还出。”《类经·脉色类》：“肾亏则命门气衰，下焦不化，下不化则复而上出，故病为洞而食入还出也。”详呕吐条。

洞肠泄　病名。即滑泄。《医略六书·杂病证治》：“洞肠泄，大孔如竹筒，关门不闭也。”详滑泄条。

洞泄　证名。出《素问·生气通天论》。❶指阴盛内寒所致的泄泻。《圣济总录》卷七十四：“洞泄谓食已即泄。……阴盛生内寒，故令人府藏内洞而泄。”《奇效良方·泄泻门》描述洞泄有心腹痛，大肠切痛，肠鸣食不化，手足厥冷脚转筋等症。治宜温中散寒，用附子丸、木香诃黎勒丸等方。参见寒泄条。❷濡泻的别名。《医宗必读·泄泻》：“洞泄，一名濡泻，泻下多水也。”详见濡泻条。❸脾泻的别名。《医学真传·痢》：“也有痢无积，日夜十余次，解时微

痛，是名脾泻，又名洞泻。”参脾泻、脾泄条。

洞泻 病名。指饮冷受寒所致的泄泻。《古今医彻·泄泻论》：“寒胜则洞泻而澄彻清冷。”《不知医必要·泄泻》：“洞泻一症，忽然大泻不止，或汗或喘，最为危候。多因夏月伏阴在内，虚寒人恣食寒凉蔬果所致。须连服大剂附子理中汤。”参洞泄条。

浑身麻木 证名。指自觉全身肢体麻木不适感。多由气血不充，卫气不行，或痰湿，或气郁血瘀所致。《兰室秘藏》卷二：“浑身麻木不仁，或头面手足肘背，或腿脚麻木不仁。”可用神效黄芪汤等。《杂病源流犀烛·麻木源流》：“有浑身麻木者，宜八仙汤、五积散。……因瘀血麻木者，宜四物汤加桃仁、红花、甘草；有身麻生疙瘩者，宜散滞汤；有因气麻木者，宜开结舒筋汤。”如湿痰者，或走注如核，肿起有形色白，宜化痰利湿，用二陈汤加苍术、枳壳、黄连、厚朴等。因气虚者，宜补气行气，用四君子汤加厚朴、香附等。血虚者，宜养血而生血，如四物汤加生地、红花、枸杞、香附之类。又有因阳气衰弱，湿伏阴分所致者。《张氏医通·麻木》：“东垣治闭眼则浑身麻木，开眼则渐退，久而方止，昼减夜甚，为阳气衰而湿伏阴分也，三痹汤去乌头，加苍术、黄柏。”参见麻木条。

客忤 古病名。指一种原因不明的暴发重病。属中恶之类。《肘后备急方》卷一：“客忤者，中恶之类也，多于道门（另本作涂）门外得之，令人心腹绞痛，胀满，气冲心胸，不即治，亦杀人。”《诸病源候论·中恶病诸候》：“卒忤者，亦名客忤。谓邪客之气，卒犯忤人精神也，此是鬼厉之毒气，中恶之类，人有魂魄衰弱者，则为鬼气所犯忤。”参卒忤、中恶条。

谵妄 即谵妄。《张氏医通·神志门》：“谵妄：谵，多言也。……妄，虚妄也。”详见谵妄条。

谵语 证名。一作谵语，又名谵言。指患者神识不清时妄言乱语。多见于外感热病邪气盛实之证。常因阳明实热，上乘于心，或邪热深入营分，以及妇人热入血室等，使心神昏乱所致。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》：“夫实则谵语，虚则郑声。”《注解伤寒论》卷五：“谵语，由邪气盛，而神识昏也。”如伤寒谵语，因胃气不和者，宜调胃承气汤。谵语发潮热，大便硬者，大、小承气汤选用。三阳合病，面垢，遗尿，自汗，谵语者，宜白虎汤。妇人热入血室，暮则谵语者，用小柴胡汤。如温病热入营分，邪陷心包，神昏谵语者，清宫汤，牛黄丸，紫雪丹，局方至宝丹可选用。

语言蹇吃 即语言蹇涩。《诸病源候论·蹇吃候》：“若府藏虚损，经络受邪，亦令语言蹇吃。”详见语言蹇涩条。

语言蹇涩 亦称语言蹇吃、口不能言。指舌体转动不灵活而说话艰难的症象。多因风邪乘袭，痰涎壅盛所致。《华氏中藏经·论治中风偏枯之法》：“人病中风偏枯，其脉数而面干黑黧，手足不遂，语言蹇涩。”《万病回春·中风》：“其半身不遂，口眼㖞斜，语言蹇涩，或瘫痪不伸，或舌强不语，痰涎壅盛，不省人事，牙关紧急，此皆中脏也。”常见于中风、瘫痪等病证。

神不守舍 证名。见《太平惠民和剂局方》卷一。指心神失于藏守，发生神志异常者。《灵枢·邪客》：“心者，五藏六府之大主也。精神之所舍也。”多因七情所伤，痰火犯心，或心气不足等所致。症见精神错乱，妄言妄见，时悲时喜，举止失常，或思虑恍惚，作事多忘。治以顺气豁痰，养心安神，活血化瘀为主。宜半夏茯神散、十味温胆汤、归神丹、养心汤、归脾汤、血府逐瘀汤等方。

神志不定 神志异常症之一。见《千金翼方》卷十六。多因心气不足所致。症可兼见惊悸恐怖，恍惚健忘等。治宜安神定志，

可用定志丸、宁志膏或千金镇心圆等方。

神昏　证名。指神识昏迷。见《普济本事方》卷八。详昏迷条。

鸠酒毒　病名。鸠是一种毒鸟，相传以鸠毛或鸠粪置酒内有剧毒。泛指饮毒酒所致中毒者。《辨证录·中毒门》："人有饮吞鸠酒，白眼朝天，身发寒颤，忽忽不知如大醉之状，心中明白但不能语言，至眼闭即死。"治宜用大剂清热解毒。方用消鸠汤、加味连草汤等。

〔ㄱ〕

昼热　证名。指白天发热，或热在白天升高。《证治准绳》卷一："昼则发热，夜则安静，是阳气自旺于阳分也。……昼热则行阳二十五度，柴胡饮子。"《增补万病回春·发热》："夜则静，昼则发热者，此热在气分也。小柴胡汤加栀子、黄连、知母，地骨皮。"《丹溪心法附余·发热门》："广按：昼夜发热，昼重夜轻，口中无味，阳虚之证也。"《证治汇补·昼夜热辨》："更有昼热阳虚，口中无味，病责之胃，宜甘温补气。"参发热条。

眉眶痛　病名。见《丹溪心法·眉眶痛》。即眉棱骨痛。详见该条。

眉棱骨痛　病名。指眼眶上缘额骨作痛。见《丹溪心法》卷四。又名眉框痛、眼框骨痛。《杂病源流犀烛·眉棱骨痛》："眉棱骨痛，风痰湿火，俱有病也。……有由风痰，眉骨痛连于目，不可开，昼静夜剧者，宜芎辛导痰汤；有由痰火，眉心并眉梁骨痛者，宜二陈汤送青州白元子；有由风热挟痰而痛者，宜芷芩散；有中风寒侵犯而痛者，宜羌乌散；有由湿痰，眉眶骨痛，而身重者，宜芎辛导痰汤加川乌、白术。大约选奇汤、上清散二方，俱为总治眉棱骨痛之剂。戴复庵分为二症，皆属于肝：一为肝经伤，头痛，眼不可开，必昼静夜剧，宜导痰汤加川乌、细辛；一为肝虚而痛，方见光明即发，宜生地黄丸、熟地黄丸。"参见眉眶痛、眼眶骨痛等条。

除中　古病名。指胃气败绝，当不能食，而反能食的危重病证。多因病进或药误所致。《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》："伤寒始发热六日，厥反九日而利。凡厥利者，当不能食，今反能食者，恐为除中。""伤寒脉迟，六七日，而反与黄芩汤彻其热，脉迟为寒，今与黄芩汤复除其热，腹中应冷，当不能食，今反能食，此名除中，必死。"治疗宜用人参、附子等回阳救逆。

怒　❶容易发怒或无故自怒的简称。出《灵枢·行针》。又称善怒、喜怒。《杂病源流犀烛·惊悸悲恐喜怒忧思源流》："怒者，肝胆病也。"详见善怒条。❷生理名词七情之一。出《素问·阴阳应象大论》。

怒气　七气之一。《诸病源候论·七气候》："怒气，则上气不可忍，热上抢心，短气欲死，不得气息也。"参七气、九气条。

怒气胁痛　证名。见《春脚集·胸胁部》。指恼怒伤肝，气郁胁肋而致的胁痛。治宜理气和血，如香附、川芎、当归、柴胡、青皮等药。《证治准绳·杂病》："怒气者，脉弦实有力，大剂香附合芎归之属。"参肝郁胁痛、肝气胁痛条。

怒气咳　病名。指因情绪激动，逆气冲上，损及肺络所致的咳嗽。《不居集》卷十五："怒气咳：怒则气上，积血在胸胁，咳嗽年久不愈，每咳则隐隐而痛。"宜用活血饮等方。参咳嗽条。

怒伤　指因郁怒所致的疾病。《医醇賸义·怒伤》："怒甚则胁痛，郁极则火生，心烦意躁，筋节不利，入夜不寐。"用冲和汤等。参善怒条。

怒郁　情志三郁之一。《景岳全书·杂证谟》："怒郁者，方其大怒气逆之时，则实邪在肝，多见气满腹胀，所当平也。及其怒后而逆气已去，惟中气受伤矣，既无胀满疼痛等证，而或为倦怠，或为少食。"暴怒

伤肝，或胀或痛者，宜用解肝煎、神香散、六郁汤等方；若郁怒化火，更见烦热、吐血、鼻衄等症者，宜用化肝煎；若肝脾受伤而倦怠少食者，宜选用五味异功散、大营煎、归脾汤等方。参三郁、七情郁症、内郁条。

怒喘 病名。见《类证治裁·喘症论治》。指因郁怒伤肝所致的气喘。宜用四七汤等方理气降逆。参气喘条❷。

怒膈 五膈之一。《三因极一病证方论》卷八："胸胁逆满，噎塞不通，呕则筋急，恶闻食臭，名曰怒膈。"参五膈条。

蚤嗽 病名。"蚤"通"早"。指平时尚可，至晨咳增。《不居集》卷十五："蚤嗽，蚤起嗽甚，胃中有食积，至此火流入肺中，宜知母、地骨皮以降肺火。"参见咳嗽、早晨嗽条。

怠堕 指身体疲倦。《素问·风论》："脾风之状，多汗恶风，身体怠堕，四肢不欲动。"多由劳倦伤中，脾气虚弱所致。

柔风 古病名。指气血虚而风邪入中，表现为四肢缓弱，腹里拘急的一种疾患。《诸病源候论·风病诸候》："血气俱虚，风邪并入，在于阳则皮肤缓，在于阴则腹里急。柔风之状，四肢不能收，里急不能仰。"治宜独活葛根汤等方。

柔汗 又名冷汗。《伤寒论·辨脉法》："柔汗发黄者，此为脾绝也。"成无己注："柔为阴。柔汗，冷汗也。"参冷汗、黏汗条。

柔痉 病名。一作柔痓。症见身热汗出，颈项强急，头摇口噤，手足抽搐，甚则角弓反张，脉沉迟。《金匮要略·痉湿暍病脉证治》："太阳病，发热汗出，而不恶寒，名曰柔痉。"（一作柔痉）。《金匮要略心典》卷上："太阳病发热汗出为表虚，则当恶寒，今不恶寒者，风邪变热，外伤筋脉为痉病也。"治用栝蒌桂枝汤加减。亦有因暑热、湿热所致者。《医醇賸义·暑湿热》："柔痉者，身体重着，肢节拘挛，有汗而热。暑热为天之气，其来甚速，其去亦甚速。体重筋挛，乃热邪为湿所留，故有汗而热不退也，白术苡仁汤主之。"参见痉条。

柔痓 病名。❶指肺热传肾所致骨强筋柔，肢体举动无力的疾患。《素问·气厥论》："肺移热于肾，传为柔痓。"王冰注："柔，谓筋柔而无力。痓，谓骨痓而不随。气骨皆热，髓不内充，故骨痓强而不举，筋柔缓而无力也。"❷即柔痉。见《金匮要略·痉湿暍病脉证治》。详该条。

柔痰 痰证之一。见《杂病源流犀烛·痰饮源流》。其症痰出如稀涎。因脾虚不运而致。方用参术健脾丸。参痰证条。

结阳 证名。指因气血不畅而引起的四肢浮肿。《素问·阴阳别论》："结阳者，肿四支。"《宣明论方·结阳证》："四肢肿，四肢热胜则肿，四肢者，谓诸阳之本，阳结者，故不行于阳脉，阳脉不行，故留结也。"治宜犀角汤等方。参四肢肿、肢肿及水肿有关条。

结阴 古病名。便血之一种。《素问·阴阳别论》："结阴者，便血一升，再结二升，三结三升。"《圣济总录·大小便门》："夫邪在五藏，则阴脉不和，阴脉不和，则血留之。结阴之病，以阴气内结，不得外行，血无所禀，渗入肠间，故便血也。"一说是厥阴肝血内结，不得阳气统运，则血渗入肠间而下，非谓阴寒内结。宜用补中益气汤倍黄芪加炮姜。不效，可用《卫生宝鉴》平胃地榆汤，结阴丹（见《张氏医通》卷五）。也有认为结阴便血属远血者。《血证论·便血》："先便后血为远血，谓其血在胃中，去肛门远，故便后始下，因名远血，即古所谓结阴下血也，黄土汤主之。"参便血条。

结阴便血 证名。❶便血之一。《景岳全书·血证》："结阴便血者，以风寒之邪，结于阴分而然，此非伤寒之比。盖邪在五脏留而不去，是谓之结阴，邪内结不得外行，则病归血分，故为便血，……以平胃地榆汤温

散之剂主之”。详便血、结阴等条。❷即远血。《血证论便血》：“先便后血为远血，谓其血在胃中，去肛门远，故便后始下，因名远血，即古所谓阴结下血也，黄土汤主之”。

结胸　证名。指邪气内结，胸腹胀满疼痛，手不可近者。多因太阳病、太少并病误下，表热内陷或实邪传里，与胸中水饮互结而成。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“太阳病，脉浮而动数，……医反下之，动数变迟，膈内拒痛，胃中空虚，客气动膈，短气躁烦，心中懊侬，阳气内陷，心下因鞕，则为结胸，大陷胸汤主之。”“结胸者，项亦强，如柔痉状，下之则和，宜大陷胸丸。”“太阳少阳并病，而反下之，成结胸，心下鞕，下利不止，水浆不下，其人心烦。”“伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤；但结胸，无大热者，此为水结在胸胁也，但头微汗出者，大陷胸汤主之。”“太阳病，重发汗，而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮热，从心下至少腹鞕满而痛，不可近者，大陷胸汤主之。”《伤寒来苏集·陷胸汤证》：“因误下热入，太阳寒水之邪，亦随热而内陷于胸胁间，水邪热邪结而不散，故名曰结胸。”《景岳全书·伤寒典下》：“有不因误下而实邪传里，心下鞕满，痛连小腹而不可近，或燥渴谵妄，大便鞕，脉来沉实有力者，此皆大陷胸汤所正宜也。”本病因证候、病情不同，有大结胸、小结胸、寒结胸、热结胸、水结胸、血结胸等。详各该条。

结筋　证名。指风冷侵袭筋脉而出现的结节。《诸病源候论·结筋候》：“体虚者，风冷之气中之，冷气停积，故结聚，谓之结筋也。”参筋结条。

结痰　痰症之一。指脾肺火郁痰气凝结者。又名郁痰、顽痰、老痰。《景岳全书·痰饮》：“结痰有因脾经郁结而伤阴血者，有因肾水亏损而阴火上炎者，有因脾肺火郁而生痰者。治法若因七情郁结，痰涎滞于喉间者，先用局方四七汤调和滞气，后用归脾汤调补脾血，脾火伤血用加味归脾汤，肾水亏损用六味地黄丸，肺经郁火用知母茯苓汤。”《症因脉治》卷二：“郁痰即结痰、顽痰。”详各该条。

结癖　古病名。指结病与瘕病之合证。《圣济总录·积聚门》：“结瘕者，积聚之类也。结，伏聚积久不散，谓之结；浮流腹内按抑有形，谓之瘕。结之症，形体瘦瘁，食不作肌肤，遇阴寒冷湿之气，则发而胁块硬，隐隐然痛者是也。瘕之症，腹中气痛动转，横连胁下，有如癖气，遇脾胃有冷，阳气不足而发动者是也。”治宜防己散、芎藭散、紫葛丸、羌活丸等方。参积聚、癥瘕等条。

绝汗　证名。出《素问·诊要经终论》。又名脱汗。指病情危重，汗出如珠如油，黏腻不流，常伴见呼吸短促，四肢厥冷，脉微欲绝等症。为阴阳相离，阳气欲脱之象。急宜回阳救脱，用参附汤加龙骨、牡蛎之类。参脱汗、汗出如油条。

绞肠瘟　病名。指瘟疫之腹痛如绞者。《杂病源流犀烛·瘟疫源流》：“绞肠瘟，肠鸣干呕，水泄不通，是此类绞肠痧，急宜探吐之，服双解散。”参瘟疫条。

绞肠痧　病名。❶痧证之一。一名盘肠痧。《杂疾源流犀烛·痧胀源流》：“绞肠痧，心腹绞切大痛，或如板硬，或如绳转，或如筋吊，或如锥刺，或如刀刮，痛极难忍。轻者亦微微绞痛，胀闷非常，放血可愈。若不愈必审脉症何因，辨明暑秽食积血痰气阻治之。须连进数剂，俟其少安，方可渐为调理。此症多有放血不愈，不肯服药，遂致痧毒攻坏肠胃而死者。”本症右手脉伏宜放血，用宝花散、沉香丸等。服下能熟睡即愈。如昏沉绞痛，口吐痰涎，宜先刺指头出血，用桃花散、冷砂仁汤调下，并散痧汤加山豆根、茜草、金银花、丹参、山查、腹子等药。如盘肠绞痛，脉俱伏，宜郁金散、棱术汤；或饮之稍愈后复绞痛非常，叫喊不已，宜大黄

丸、紫朴汤。参见痞条。❷即干霍乱。《症因脉治》卷四："乾霍乱，即绞肠痧。"详干霍乱条。

十 画

〔一〕

顽淋不痛症 见罗应章《经验医库·溲淋》。因淋症日久，虽溲行艰涩而不觉痛的病症。多因骨髓精血俱虚，心肾不交，心气下陷而成。症见小便滴沥不绝，臭气难闻，尿出不痛，脉弱无力。宜用威喜丸。参见淋条。

顽痰 痰证之一。❶指坚结胶固之痰。亦称老痰、结痰、郁痰。《症因脉治》卷二："顽痰，坚结胶固，吐咯难出，脉见沉牢，……痰在咽喉，咯不出，咽不下，即老痰、结痰也，宜节斋化痰丸。"又："郁痰即结痰、顽痰。"详郁痰、老痰、结痰条。❷指痰阻心窍而发癫狂者。《证治汇补》卷五："若抚掌大笑，言出不论，左顾右盼，如见神鬼，片时正性复明，深为赧悔，少顷态状如故者，此膈上顽痰泛滥洋溢，塞其道路，心为之碍，痰少降则正性复明，痰复升则又举发，名之曰癫。法当利肺、安心、安神，滚痰丸主之。"参见痰证有关条。

顽痹 病名。一作癏痹。见《诸病源候论·风病诸候》。指皮肤、肌肉麻木不知痛痒或手足酸痛等症。《医林绳墨·痹》："久风入中，肌肉不仁，所以为顽痹者也。"参癏痹条。

恚气 七气之一。《诸病源候论·七气候》："恚气，则积聚在心下，不可饮食。"参见七气、九气条。

恚（huì会）膈 五膈之一。见《肘后备急方》卷四。《诸病源候论·五鬲气候》："恚膈之为病，心下苦实满，噫辄酢心，食不消，心下积结牢在胃中，大小便不利。"参见五膈条。

盐哮 证名。属虚哮范畴。见《类证治裁·哮症论治》。多因偏嗜咸酸，久延体虚而致。详虚哮条。盐哮亦有偏实者，《医碥》卷二："食味酸咸太过，幼时多食盐醋，往往成此疾，俗谓之盐哮。渗透气管，痰入结聚，一遇风寒，气郁痰壅即发。"治宜利肺调气豁痰。亦偶用吐法。如"盐哮，喉中痰声不绝，以人参芦煎汤饮之，探吐"（见《原病集》）。

盐卤中毒 病名。因误服盐卤而出现中毒症状者。《辨证录·中毒门》："服盐卤之毒，必至口咸作渴，腹中疼痛，身蹉脚缩而死。……治法必用甘以解之。方用生甘草三两煎汤救之。如服卤未久，生甘草汤中泼豆豉一两，同煎饮之，必吐；如服已久，生甘草汤中加入当归二两，同煎饮之，肠润未必皆死也。""此症亦可用归麦榆草汤救之。"《增广验方新编·解救诸毒》载有解盐卤毒药，如生豆浆、活鹅鸭血、白砂糖水、淘米水等。可参考。

恐 ❶容易恐惧或无故自惧的简称。出《素问·调经论》。又称善恐。《杂病源流犀烛·惊悸悲恐喜怒忧思源流》："恐者，心肾肝胃病也。"详见善恐条。❷生理名词。七情之一。出《素问·阴阳应象大论》。

恐伤 指恐惧过度所致的疾病。《医醇賸义·恐伤》："恐则气馁，骨节无力，神情不安，补骨脂汤主之。"参恐条。

恐郁 七情郁证之一。恐为肾之志。恐郁，肾精亏损，治宜温肾养精。《类证治裁·郁症》："恐郁，阳消精怯，八味丸加减，或鹿角胶酒化服。"参恐、七情郁证、

内郁条。

恐膈　五膈之一。《三因极一病证方论》卷八："心腹胀满，咳嗽，气逆，腹下若冷，雷鸣绕脐，痛不能食，名曰恐膈。"参见五膈条。

恶中　类中风之一。见《万病回春》。又名中恶。因冒犯不正之气所致。《医宗必读·类中风》："恶中，……手足逆冷，肌肤粟起，头面青黑，精神不守，或错言妄语，牙闭口紧，昏晕不知人。宜苏合香丸灌之，俟少醒，服调气平胃散。"《医学心悟·类中风》："恶中，登冢入庙，冷屋栖迟，以致邪气相侵，卒然错语妄言，或头面青黯，昏不知人。急用葱姜汤灌之，次以神术散调之。"参见中恶条。

恶风　❶证名。可由外感或内伤引起。《伤寒明理论》卷一："伤寒恶风，何以明之？黄帝针经曰：卫气者，所以温分肉，充皮肤，肥腠理，司开阖者也。风邪中于卫也，则必恶风。何者？以风则伤卫，寒则伤荣，为风邪所中，于分肉不温而热矣，皮毛不充而缓矣。腠理失其肥，则疏而不密，开阖失其司，则泄而不固，是以恶风也。是恶风、恶寒二者均为表证。其恶风则比之恶寒为轻也。……恶风虽悉在表，而发散又自不同。若无汗而恶风者，则为伤寒，当发其汗。其汗出而恶风者，则为中风，当解其肌。里证虽具，而恶风未罢者，尤当先解其外也。又有发汗多亡阳，与其风湿，皆有恶风之证，盖以发汗多，漏不止则亡阳，外不固，是以恶风也。必以桂枝加附子汤温其经而固其卫。风湿相搏，骨节疼烦，湿胜，自汗而皮腠不密，是以恶风也。必以甘草附子汤散其湿而实其卫。由是观之，恶风属乎卫者，可知矣。"《内外伤辨惑论》卷上："其内伤与饮食不节、劳役所伤，然亦恶风。……与伤风伤寒俱不同矣。况鼻流清涕，头痛自汗，间而有之。鼻中气短，少气不足以息，语则气短而怯弱，妨食或食不下或不欲食，三者互有之。"参恶寒条。❷指病邪。《素问·脉要精微论》："来徐去疾，上虚下实，为恶风也。故中恶风者，阳气受也。"❸古病名。指厉气中人所致的疾患。《圣济总录》卷十八："恶风者，皆五风厉气所致也。……其毒中人五藏则生虫，亦有五种虫，生息滋蔓，入于骨髓，五藏内伤，形貌外应。故食肝则眉睫堕落；食肺则鼻柱倒塌；食脾则语声变散；食肾则耳鸣如雷鼓之声，心不受食，食心则为不可治。是故谓之恶风。"治用殊圣散、胡麻散、天麻散等方。

恶心　证名。一作噁心。指胃气上逆，泛噁欲吐的症状。《诸病源候论》卷二十一："恶心者，由心下有停水积饮所为也。……水饮之气不散，上乘于心，復遇冷气所加之，故令火气不宣，则心里澹澹然，欲吐，名为恶心也。"《罗氏会约医镜》卷八："恶心者，胃口作逆，兀兀欲吐欲呕之状，或又不能呕吐，觉难刻过，此曰恶心，而实胃口之病也。其症之因，则有寒、有食、有痰、有宿水、有火邪、有秽气所触、有阴湿伤胃，或伤寒疟痢诸邪之在胃口者，皆能致之。能察其虚、实二者，则得其源矣。实邪恶心者，其来速，其去亦速，邪去则止。虚邪恶心者，必得胃气复者方愈。且此症之虚者，十居八九，即有挟食、挟痰之实邪，亦必由脾气不健，不能运化而然。治者，当知实中有虚，勿得妄行攻击，以伤胃气也。"脾胃不和者，宜和胃理气，二陈汤或橘皮半夏汤；胃有寒邪者，宜温中，用理中汤；胃中热者，宜清火，二陈汤加芩、连，或左金丸等；感受暑热或火盛烦躁恶心者，竹叶石膏汤；胃有痰湿者，宜燥湿化痰，二陈汤、平胃散；胃有食滞者，宜消导，用保和丸；脾胃虚弱者，宜健脾和胃，用香砂六君汤；脾肾虚寒者，宜温补脾肾，用理阴煎、温胃饮等。参呕吐有关条。

恶血　❶证名。《素问·刺腰痛篇》：

“衡络绝，恶血归之。”《灵枢·水胀》：“石瘕生于胞中，寒气客于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，衃以留止，日以益大。”均指溢于经脉之外，积存在组织间的坏死血液，故又称“败血”。治宜祛瘀生新。方如桃红四物汤、少腹逐瘀汤之类。❷恶又读wù。恶血，谓忌出血。《素问·血气形志篇》：“刺少阳出气恶血。”言少阳多气少血，用针刺治疗时不宜出血。

恶（wù 误）食 证名。见食则恶之意。《内外伤辨惑论》卷上：“劳役所伤及饮食失节、寒温不适，三者俱恶食，口不知五味，亦不知五谷之味。”治疗宜分虚实。实者多因伤食所致。《医碥》卷二：“伤食则胸腹痞满，恶心嘈酸，噫败卵臭，恶食，头痛，发热恶寒。证似伤寒，但气口脉倍大于人迎及身不痛为异耳。轻则消导，重则吐下。在上脘者吐之，瓜蒂散之属；已下肠中者下之，其证热，所伤之物亦热者，承气汤。”中焦积食用枳实丸、保和丸等消导。如因脾胃气虚而兼见身体倦怠，面色萎黄诸症者，可用异功散、大剂参术以健脾。

恶（wù 误）热 指怕热。常为外感热病、阴虚内热及胃火亢盛的特征之一。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》：“阳明病，外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。”《温病条辨·上焦篇》：“太阴温病，脉浮洪，舌黄，渴甚，大汗，面赤，恶热者，辛凉重剂白虎汤主之。”《温病条辨·中焦篇》：“面目俱赤，语声重浊，呼吸俱粗，大便闭，小便涩，舌苔老黄，甚则黑有芒刺，但恶热，不恶寒，日晡益甚者，传至中焦，阳明温病也。脉浮洪躁甚者，白虎汤主之；脉沉数有力，甚则脉体反小而实者，大承气汤主之。”《格致余论·恶寒非寒病恶热非热病论》：“经曰：阴虚则发热。夫阳在外为阴之卫，阴在内为阳之守。精神外驰，嗜欲无节，阴气耗散，阳无所附，遂致浮散于肌表之间而恶热也。实非有热，当作阴虚治之，而用补养之法可也。”《杂病广要》引《统旨》：“恶热固为阴气之虚，而胃中有实火者，亦有恶热之证。予每见夫多酒厚味之人，饮食喜冷，厚衣则烦，此由热邪内积于胃之所致也。”治宜清火消积等法。参见发热等条。

恶疰 病名。《太平圣惠方》卷五十六：“恶疰者，是恶毒之气也，人体虚者受之。毒气入于经络，遂流移心腹，其状往来击痛，痛不一处，故名恶疰也。”可用牛黄散、恶疰腹痛方等。参见尸疰、风疰等条。

恶疰心痛 证名。疰亦作注。指邪毒疠气传注心包所致的心痛。见《太平圣惠方》卷四十三。《圣济总录》卷第五十六：“凡人将理失度，阴阳俱虚，血气不足，复因风寒暑湿客忤邪恶之气，乘虚入于肌体，流注经络，伏留脏腑，毒击心包，时发疼痛，积滞日久，转相注易，故曰恶注心痛也。”常见心痛如刀刺，或如蚘咬心，胸膈两胁拘急疼痛，呕吐清水，食饮不下，手足逆冷等症。治宜鬼箭羽散、槟榔散、消石圆、十注丸、当归散等方。参心痛、中恶心痛、注心痛条。

恶（wù 误）寒 证名。即怕冷。诸邪郁遏表阳，或阳虚卫弱所致。《素问·骨空论》：“风从外入，令人振寒，汗出头痛，身重恶寒。”《丹溪心法·恶寒》：“阳虚则恶寒。”《张氏医通·寒热门》：“有卫气虚衰，不能实表分肉而恶寒者；有上焦之邪，隔绝营卫，不能升发出表而恶寒者；有酒热内郁，不得泄而恶寒者。背恶寒是痰饮。……外感、内伤、伤食、温痰、火郁、皆有恶寒，非独阳虚也。”《证治汇补·恶寒》：“此第言阴阳正虚之病，他如风、寒、暑、湿、痰、火、郁、瘀、痈、疮，一切邪气拂郁于表，表中之阳气不能发越者，皆令恶寒。”又：“恶寒者，虽居密室帏幕之中，猛火近热之处，仍觉憎寒拘急，甚则毫毛毕直，鼓颔战栗，非若恶风之候，见风则

凛凛畏惧，无风则坦然自适也。”本证有外感恶寒、内伤恶寒两类。外感者，可见于感冒、伤寒、温病、疟疾等病症。内伤者，有阳虚恶寒、痰饮恶寒、郁火恶寒等。参有关各条。

真元耗损喘 证名。见《证治准绳·喘》。指肾虚不能纳气的气喘。多由喘证久延，或大病后元气受伤，真阳虚惫、肾气不能归元，孤阳浮越所致。《医贯·喘》：“真元耗损喘，出于肾气之上奔。其人平日若无病，但觉气喘，非气喘也，乃气不归元也。视其外证，四肢厥逆，面赤而烦躁恶热，似火非火也，乃命门真元之火离其宫而不归也。察其脉，两寸虽浮大而数，两尺微而无力，或似有而无为辨耳。”治宜八味丸、安肾丸、养正丹之类，煎人参生脉散送下。喘稍定后，以大剂参芪补剂加破故纸、阿胶、牛膝等。八味丸加河车为丸吞服亦可。《类证治裁·喘症论治》：“肾阳虚而气脱，孤阳浮越，面赤烦躁，火不归元，七味地黄丸加人参、麦冬。肾不纳气，身动即喘，阴阳枢纽失交，急须镇摄，肾气汤加沉香，从阴引阳，都气丸入青铅，从阳引阴。”参喘证条。

真中 病名。见《景岳全书·杂证谟》。又名真中风。详见该条。

真中风 病名。见《医经溯洄集·中风辨》。简称真中。系指外中风邪而致的中风病。与类中风之风从内生者不同。《医略十三篇》：“真中风者，真为风邪所中。”症见猝然倒仆，昏不知人，或口眼歪斜，半身不遂，舌强不能言。治疗大法：外见寒热等六经形证者，治宜疏解风邪为主，用小续命汤加减；内有二便不通，而形气尚盛者，治以通利为主，宜三化汤或《局方》麻仁丸；外无六经之形证，内无便溺之阻隔，仅见口眼歪斜，言语不利，或半身不遂等症者，宜养血祛风，用大秦艽汤加减；如见痰涎壅盛，昏不知人，属于闭证者，先与开窍，宜至宝丹之类；若伴见口开、手撒、眼合、遗尿、鼻鼾、汗多等症，属于脱证者，急用大剂理中汤或参附汤以扶正固脱。本病可见于脑血管意外等疾患。参见中风①。

真心跳 指不因惊恐等因而自心跳不宁的病症。《张氏医通》卷六：“有真心跳，乃血少，非惊悸也。”详心悸、怔忡条。

真心痛 病名。指心痛之极危重者。《灵枢·厥病》：“真心痛，手足清至节，心痛甚，旦发夕死，夕发旦死。”《诸病源候论·心病诸候》：“心为诸脏主而藏神，其正经不可伤，伤之而痛为真心痛。”《医碥·心痛》：“真心痛其证卒然大痛，咬牙噤口，气冷，汗出不休，面黑，手足青过节，冷如冰，旦发夕死，夕发旦死，不治。不忍坐视，用猪心煎取汤，入麻黄、肉桂、干姜、附子服之，以散其寒，或可死中求生。”《辨证录·心痛门》：“人有真正心痛，……其症心痛不在胃脘之间，亦不在两胁之处，恰在心窝之中，如虫内咬，如蛇内钻，不特用饭不能，即饮水亦不可入，手足冰冷，面目青经者是也。夫真心痛，原有两症：一寒邪犯心，一火邪犯心也。”寒邪犯心者，用人参一、二两，附子三钱急煎救之；火邪犯心用救真汤。真心痛亦可用苏合香丸、丹参注射液等药，并可中西医结合治疗。本病可见于心绞痛、急性心肌梗塞等病。参心痛、寒厥心痛、热厥心痛条。

真头痛 病症名。指头痛危症。《灵枢·厥病》：“真头痛，头痛甚，脑尽痛，手足寒至节。”《辨证录·头痛门》：“人有头痛连脑，双目赤红，如破如裂者，所谓真正头痛也。此病一时暴发，法在不救，盖邪入脑髓而不得出也。”症见剧烈头痛，连脑户尽痛，手足逆冷至肘膝关节。病情危重，宜急灸百会穴，服黑锡丹及大剂参附汤或救脑汤等。参头痛条。

真阴内损失血 病证名。指阴精虚涸导致的吐血咯血。《不居集》卷十三：“真阴

内损失血：凡吐血咯血，因劳损而气虚脉静，或微弦无力，既非火症，又非气逆，而血有妄行者，此真阴内损，脉络受伤而然。惟用甘醇补阴，培养脉络，使营气渐固，而血自安矣。”酌用一阴煎、左归饮、六味地黄汤、小营煎等方。

真实假虚证 证名。指病邪盛实，反现虚弱的假象。如热结胃肠，痰食壅滞，大积大聚，致使经络阻滞，气血不能外达而出现神志沉默，身寒肢冷，目睛昏花，脉沉伏或沉涩等。《医宗必读·疑似之症须辨论》：“至如至实有羸状，误补益疾；至虚有盛候，反泻含冤；阴症似乎阳，清之必毙；阳症似乎阴，温之转伤。当斯时也，非察于天地阴阳之故，气运经脉之微，鲜不误者。盖积聚在中，实也，甚则嘿嘿不欲语，肢体不欲动，或眩运昏花，或泄泻不实，皆大实有羸状也。”参见真虚假实证条。

真热假寒证 证名。即阳证似阴。指内热炽盛而外见寒象的证候。因内热过盛，阳气闭郁不能外达所致。《景岳全书·传忠录》：“阳极反能寒厥，乃内热而外寒，即真热假寒也。假寒者，火极似水也。凡伤寒热甚，失于汗下，以致阳邪亢极，郁伏于内，则邪自阳经传入阴分，故为身热发厥，神气昏沉，或时畏寒，状若阴证。凡真寒本畏寒，而假寒亦畏寒，此热深厥亦深，热极反兼寒化也。大抵此证，必声壮气粗，形强有力，或唇焦舌黑，口渴饮冷，小便赤涩，大便秘结，或因多饮药水，以致下利纯清水，而其中乃有燥粪及矢气极臭者，察其六脉，必皆沉滑有力，此阳证也。凡内实者，宜三承气汤择而用之，潮热者以大柴胡汤解而下之，内不实者，以白虎汤之类清之。若杂证之假寒者，亦或为畏寒或为战栗，此以热极于内，而寒侵于外，则寒热之气两不相投，因而寒慄。此皆寒在皮肤，热在骨髓，所谓恶寒非寒，明是热证。但察其内证，则或为喜冷，或为便结，或小水之热涩，或口臭而躁烦；察其脉必滑实有力。凡见此证，即当以凉膈芩连之属，助其阴而清其火，使内热既除，则外寒自伏，所谓水流湿者，亦此义也。故凡身寒厥冷，其脉滑数，按之鼓击于指下者，此阳极似阴，即非寒也。”参见阳证似阴、寒热错杂证条。

真眩运 病证名。指突然头脑昏乱旋转，伴有恶心呕吐的疾患。《医林绳墨·眩运》：“其症发于仓卒之间，首如物蒙，心如物扰，招摇不定，眼目昏花，如立舟舡之上，起则欲倒，恶心冲心，呕逆奔上，得吐少苏，此真眩运也。”本病多见于耳源性眩晕、迷路炎，前庭神经元炎等。参眩晕及痰晕各条。

真虚假实证 证名。指正气极虚之时，反见实证的假象。如内脏气血不足，运化无力，而出现腹满、腹胀、腹痛、脉弦等类似实证的现象。《景岳全书·传忠录》：“至虚之病，反见盛势。……如病起七情，或饥饱劳倦，或酒色所伤，或先天不足，及其既病，则每多身热便闭，戴阳，胀满，虚狂，假班等证。似为有余之病，而其实由不足。医不察，因从而得之，必枉死矣。”《医宗必读，疑似之症须辨论》：“至如至实有羸状，误补益疾；至虚有盛候，反泻含冤；阴症似乎阳，清之必毙；阳症似乎阴，温之转伤。当斯时也，非察于天地阴阳之故，气运经脉之微，鲜不误者。……脾胃损伤虚也。甚则胀满而食不得入，气不得舒，便不得利，皆至虚者有盛候也。”参见真实假虚证条。

真寒假热证 证名。即阴证似阳。指阴寒内盛而外见热象的证候。因阴寒内盛，格阳于外所致。《景岳全书·传忠录》：“寒热有真假者，阴证似阳，阳证似阴也。盖阴极反能躁热，乃内寒而外热，即真寒假热也。假热者，水极似火也。凡病伤寒，或患杂证，有其素禀虚寒，偶感邪气而然者；有过于劳倦而致者；有过于酒色而致者；有过

于七情而致者；有原非火证，以误服寒凉而致者。凡真热本发热，而假热亦发热，其证则亦为面赤躁烦，亦为大便不通，小便赤涩，或为气促咽喉肿痛，或为发热，脉见紧数等证。昧者见之，便认为热，妄投寒凉，下咽必毙。不知身虽有热而里寒格阳，或虚阳不敛者，多有此证。但其内证，则口虽干渴，必不喜冷，即喜冷者，饮亦不多；或大便不实，或先鞕后溏，或小水清频，或阴枯黄赤，或气短懒言，或色黯神倦，或起倒如狂，而禁之则止，自与登高骂詈者不同，此虚狂也；或斑如蚊迹而浅红细碎，自与紫赤热极者不同，此假斑也。凡假热之脉，必沉细迟弱，或虽浮大紧数而无力无神，此乃热在皮肤，寒在脏腑，所谓恶热非热，实阴证也。”当用四逆、八味、理阴煎、回阳饮等方。参见真热假寒证、阴证似阳等条。

真喘　证名。即实喘。指声高气粗而长，以呼出为快的症候。多由外感六淫，痰火水饮等袭肺所致。《景岳全书·杂证谟》：“真喘者，其责在肺。……肺主皮毛而居上焦，故邪气犯之，则上焦气壅而为喘。气之壅滞者，宜清宜破也。”参实喘等条。

莨菪中毒　病名。莨菪别名闹羊花、黄杜鹃、羊踯躅，又名天仙子。因误服莨菪叶、根、花、枝、种子过量而出现中毒症状者。症见面红，烦躁，哭笑不止，谵语，幻觉，口干肤燥，瞳孔散大，脉数等。严重者可致昏睡，肢强挛缩，甚至昏迷，死亡。治疗宜中西医结合救治。《千金要方》卷二十四载解莨菪毒的药物如荠苨、甘草、升麻、犀角、蟹等。可参考。

桐油中毒　病名。因误食桐油而出现中毒症状者。症见恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状外，还可见发热、气短、肢麻、水肿、心脏扩大、肝肾功能损害等。治宜中西医结合救治。《本草纲目》卷四载有解桐油毒的药物，如甘草、干柿等。可参考。

桃花斑　证名。指斑出色红，状如桃花者。见《温疫论补注》卷上。多因热毒入侵血分所致。凡外感热病而见发斑，为邪热自内达外，以红活者为佳。治宜清营泄热为主。用黄连解毒汤合白虎汤、犀角地黄汤或举斑汤等方。参斑条。

格气　病证名。指胸膈间气塞不通，食下即吐者。《医林绳墨》卷五：“食下即吐，其吐痰涎裹食，是谓之格气。”多由气机阻滞，痰食互阻所致。参见格食条。

格阳衄血　病证名。指因多劳过欲，真阴亏损，阳浮引阴血从上窍而出的衄血。《景岳全书·杂证谟》：“衄血有格阳证者，以阴亏于下，而阳浮于上，但察其六脉细微，全无热证，或脉且浮虚豁大，上热下寒，而血衄不止，皆其证也。治宜益火之源，古有八味地黄汤，乃其对证之剂。余复有镇阴煎之制，其效尤捷。盖此证不惟内伤者有之，即伤寒者亦有之，然必其素多斲丧，损及真阴者，乃见此证。”可用镇阴煎，或四物汤加人参、黄芪、麦冬、五味子，或磨沉香下养正丹等方。参见衄血条。

格阳虚火失血　病证名。指劳欲过度，真阴亏损，虚火上浮而致的大吐大衄。《不居集》卷十三：“格阳虚火失血：格阳失血，多因色欲劳伤过度，真阳失守于阴分，则无根虚火，浮泛于上，多见上热下寒，或头红面赤，或喘促躁烦，而大吐大衄，失血不止。但其六脉微细，四肢厥逆，或小水清利，大便不实者，此格阳虚火也。”急用镇阴煎、八味地黄汤之属，引火归源。

格食　证名。指饮食被格拒于外，不得下咽入胃者。《医林绳墨》卷五：“格食者，谓食不能下；格气者，谓气不能通。皆由中气闭塞，痰涎壅滞，聚而不散，如噎膈之状也。得病之因，有为怒气不得发越，食饮不得舒畅，朝暮郁闷，以睡为安，延绵日久，房事淘情，不期真气下陷而不复，邪气关格而闭塞。见食欲食，食不能下，是谓之格食。又或食下即吐，其吐痰涎裹食，是谓

之格气。格食者，脾病也；格气者，肺病也。……治者当先豁其痰涎，开其郁结，如二陈汤加厚朴、山楂、香附为主。初发加沉香、木香，久病加炒连、人参，脾虚不足加白术，肺虚不足加麦冬，使气清则痰行，气开则格散。戒食肥厚之味、动气之物，恐生痰也。”参噎膈、隔食条。

核瘟 病名。即鼠疫。《鼠疫抉微》：“鼠疫又名核瘟，言是症之必见结核也。”详鼠疫条。

索泽 指皮肤枯涩失去润泽。为精血枯涸的一种表现。《素问·阴阳别论》：“三阳为病，发寒热，下为痈肿及为痿厥踹腨。其传为索泽，其传为颓疝。”

索粉积 病证名。见《世医得效方》。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“索粉积，食之失度而成积，胸腹间若有所梗也。宜枳实、莱菔子。方用紫苏汤。”亦可用紫苏浓煎汁加杏泥服，即散（见《世医得效方》卷四）。

鬲 鬲，通隔。即噎膈。出《素问·大奇论》。详噎膈条。

鬲中热 鬲通膈。出《素问·刺热篇》。指心热。《素问识》卷四：“胸中膈上，乃心肺之宫城，主胸中热者，写肺热也，膈中热者，写心热也。不曰心肺，而曰胸中、膈中者，意言热在气分，而不干于藏真也。”

鬲气 见《诸病源候论·五鬲气候》。即膈气。详该条。

鬲消 病名。鬲，通膈。即膈消，详该条。

鬲偏枯 古病名。鬲，否鬲之意。因气血俱病，否鬲不通，而致半身不遂。《素问·大奇论》：“胃脉沉鼓涩，胃外鼓大，心脉小坚急，皆鬲偏枯。”《类经·脉色类》：“胃气既伤，血脉又病，故上下否鬲，半身偏枯也。”

鬲痈 病名。出《备急千金要方》卷五。症见痈发则目反，四肢不举等。参见痈条。

唇口瞤动 证名。指口唇颤动而不能自制的症象。见《世医得效方》卷十七。《嵩崖尊生书》卷六：“唇瞤唇动不止也，属肝风。柴胡、防风、荆芥、山栀、薏苡、赤小豆、生甘草、当归。”《杂病源流犀烛·口齿舌病源流》：“有唇口瞤动，或生核者，宜苡仁汤。”因血虚风燥引起的，用四物消风散；久病虚证而见此证者，多为脾虚不能收摄，应予补中为主。

唇口燥裂 证名。指口唇干燥，甚则裂开的症象。《温疫论·数下亡阴》：“津不到咽，唇口燥烈，缘其人阳脏多火而阴亏。今重亡津液，宜清燥养营汤。设热渴未除，里证仍在，宜承气养营汤。”多因阴津不足，脾热炽盛所致。治宜养阴清热为主。可用清凉散、清热养营汤等方。

唇反 证名。指口唇上反的症象。《灵枢·经脉》：“肌肉软则舌萎人中满，人中满则唇反，唇反者肉先死。”可见于危重病证，为脾气将绝的败象。

唇甲青 证名。指口唇与指甲泛现青紫的病色。《伤寒绪论》卷下：“唇甲青，色之青者为寒，赤者为热，以寒中于里，则血脉凝滞，不能荣行于外，所以唇爪青黑也。若热毒流入于里而为热厥，则唇甲亦青，但青中必带深紫，与阴寒之青黑不同。”本证常见于心、肺严重疾患并有明显缺氧者。

唇青 证名。指口唇泛现青暗的病色。多因寒中血脉凝滞，不能外荣所致。《灵枢·经脉》：“唇青，舌卷，卵缩，则筋先死。”《医学入门·伤寒杂症》：“无色泽而唇青者，必是寒中。阴症胸膈满，面色及唇皆无色泽，手足冷者，理中汤。若唇青苍者，则为狐惑。”参见唇甲青条。

唇萎 证名。指口唇萎废。可由瘀血内停所致。《金匮要略·惊悸吐衄下血胸满瘀

血病脉证治》："病人胸满，唇萎、舌青、口燥，但欲漱水不欲咽，无寒热，脉微大来迟，腹不满，其人言我满，为有瘀血。"亦可见于脾气衰竭者。《医寄伏阴论》："唇痿不收，脾气绝也。"

唇焦　证名。指口唇泛现焦黑色的症象。可由瘀血、食积、热病伤津所致。《医学入门·伤寒杂症》："无寒热而唇焦者，多因血瘀。"《温热经纬》卷四："唇焦大渴，津液耗伤，清化为宜。"《伤寒温疫条辨》卷二："唇燥裂，唇焦色，口臭，鼻孔如烟煤，此胃家实，多有此证急下之。"治疗瘀血者以活血为主，用鳖甲煎丸等；胃实宜下之，可选用承气之类；热病宜清之，选用冬瓜煮汤代茶煎药，或五汁饮加黄芩等。

唇缩　证名。指口唇内缩。多由脾经寒盛所致。《证治汇补·口唇章》："唇属于脾，经合于胃，脾胃受邪则唇为之病，风胜则动，寒胜则缩。"治宜理中汤等方。参见唇萎条。

夏月咳嗽　病名。指夏月伤于暑热所致的咳嗽。《不居集》卷十五："夏月咳嗽。夏月喘急而嗽，面赤潮热，其脉洪大者，黄连解毒汤；热躁而咳，栀子汤；咳唾有血，麦门冬汤。俱吞六味丸，壮水之主，以制阳光，而保肺金。《温热经解》："夏咳嗽者，火气炎上，人气外泄，法当苦降，杏朴芩连汤主之。"《类证治裁·咳嗽》："夏季咳，火气炎也。治宜兼凉。沙参、花粉、麦冬、知母、元参之属。"参见咳嗽、伤暑咳嗽等条。

夏月霍乱　病名。指夏季时节饮食后冒寒伤湿所致的霍乱。《张氏医通》卷四："夏月霍乱，吐泻作渴，胃苓汤加半夏、藿香；面赤口干，加炒川连。春夏秋三时，饮食后触冒暴寒，成此症者，藿香正气散。若吐利转筋，为风木行脾，平胃散加木瓜。"参见伤寒霍乱、霍乱条。

夏秋霍乱　病名。指夏秋季节饮冷伤食、湿热伏遏，或七情郁结所致霍乱吐泻者。《张氏医通》卷四："夏秋霍乱，多食冷水瓜果所致，宜木香、藿香、陈皮、厚朴、苏叶、生姜。四肢重著，骨节烦疼，此兼湿也，二术、二苓、厚朴、陈皮、泽泻。……凡夏秋霍乱，有一毫口渴，即是伏热，不可用温理脾胃药。如燥渴，小便不利，五苓散为主，本方中肉桂亦宜酌用。"参见霍乱条。

夏痿　症名。见《杂病源流犀烛·暑病源流》。又名痎夏，一作注夏。《证治准绳·杂病》："痿发于夏，俗名注夏。"多由素体脾胃虚弱，或阴气不足，感受暑令湿热之气所致。症见倦怠、四肢不举、羸瘦、不能食等。治当清暑益气，健脾扶胃。宜清暑益气汤。参痎夏条①。

破腘脱肉　证名。出《灵枢·本神》。指肢体肌肉膏肥消脱的危重症象。本证可见于慢性消耗性疾病后期及恶液质疾患。

振寒　证名。出《素问·至真要大论》。指发冷时全身颤动。有谓系战慄之轻者。《证治准绳·杂病》："振寒，谓寒而颤振也。"《灵枢·口问》："寒气客于皮肤，阴气盛，阳气虚，故为振寒、寒栗。"《张氏医通·寒热门》："经言，虚邪之中人也，洒洒动形，正邪之中人也，微见于色，不知其身。又曰，阳明所谓洒洒振寒，阳明者，午也，五月盛阳之阴也，阳盛而阴气加之，故洒洒振寒，当泻阳也。又曰，阳气客于皮肤，阴气盛，阳气虚，故振振寒栗，当补阳者也。如六脉弦细而涩，按之空虚，此大寒证，亦伤精气，当温补者也。泻阳，白虎加人参汤、竹叶石膏汤；补阳，黄芪建中汤。若夫真阳虚证，但寒慄耳，不作振也，或兼风寒则振，桂枝加附子汤。"参战慄条。

振慄　证名。指身体畏寒而颤抖。多因虚寒或热郁所致。出《素问·至真要大论》。《素问·六元正纪大论》："凡此阳明司天之政……民病咳，嗌塞，寒热发暴，振慄癰

闭。”张志聪注：民病嗌塞，振慄诸证，皆悉燥热之气而为病也。”《伤寒广要》卷三：“振近战也，而轻者为战矣。战为正与邪争，争则为鼓慄而战，振但虚而不至争，故止耸动而振也。下后复发汗振寒者，谓其表里俱虚也。亡血家发汗，则寒慄而振者，谓其血气俱虚也。”参振颤、战慄条。

损 ❶虚损之简称。《医林绳墨·虚损》：“虚者，气血之空虚也；损者，脏腑之坏损也。”《临证指南医案·虚劳》：“久虚不复谓之损。”详虚损条。❷指明显减慢的脉象。《难经·十四难》：“何谓损？一呼一至曰离经，再呼一至曰夺精，三呼一至曰死，四呼一至曰命绝。此损之脉也。”

损伤咳 病证名。即损嗽。《不居集》卷十五：“损伤咳，男妇因跌打损伤，负重辛苦，劳力伤损，肺脏既损，遇风寒则为咳嗽，或吐咯紫血。宜去心肺瘀血，当归饮。”参损嗽条。

损嗽 病名。一名损伤咳。指跌扑负重，劳力过度，损伤肺经所致的咳嗽。《世医得效方》卷五论损嗽：“男子因打损负重，女子因劳苦用力而伤肺经，肺经既损，遇风寒则为咳嗽，或咳血，或至紫黑。”治用当归饮、养荣汤等。参见损伤咳、咳嗽条。

热中 病名。❶指善饥能食、小便多的病症。见《灵枢·五邪》、《外台秘要》卷十一。以本病属中消（《证治要诀》列为脾消之一）。又有指多饮数溲为热中（见《素问·腹中论》王冰注）。亦有指热中即消瘅（见《杂病源流犀烛·三消源流》）。❷指风邪入侵于胃，而发生目黄的病症。《素问·风论》：“风气与阳明入胃，循脉而上至目内眦，其人肥，则风气不得外泄，则为热中而目黄。”❸指由于饮食劳倦损伤脾胃，气虚火旺而致的病症。《脾胃论》以饮食劳倦所伤，始得为热中，症见身热而烦，气喘，头痛，或口渴，脉洪大（兼见代脉或虚脉）等。治宜“辛甘温之剂补其中而升其阳，甘寒以泻其火”，用补中益气汤加减。

热气 七气之一。《诸病源候论·七气候》：“热气则说物不章，言而遑。”参见七气、九气条。

热气霍乱 病名。见《症因脉治·霍乱》。即热霍乱。详该条。

热心痛 证名。指邪热攻心所致的心痛。见《备急千金要方》卷十三。《医学入门》卷五：“热因心包络暑毒乘心，痛彻背俞，掌热，黄连香薷散加蓼草，或单黄连丸。”《医学心悟·心痛》：“热痛者，舌燥唇焦，溺赤便秘，喜冷畏热，其痛或作或止，脉洪大有力，清中汤主之。”《杂病源流犀烛·心病源流》：“曰热，必身热，烦躁，掌热，口渴，便秘，面目赤黄，大热作痛。由积热攻心，或暑热入心包也。宜金铃子散、剪红丸。”如积热内甚，可用下法。参心痛、热厥心痛条。

热水肿 病名。指水肿之偏于热重者。见《丹溪心法·水肿》。多因燥热伤肺，失于肃降，不能通调水道所致。主要表现为身面浮肿，先见喘促，胸腹胀闷，口渴心烦，小便赤涩等。治宜清肺利水，用麦冬汤、清肺饮合四苓散。二便不通，用八正散。两胁刺痛，烦躁不得卧，唇口干燥，用竹叶白虎汤。燥伤血分，用清凉饮子。有咳嗽，用石膏泻白散。参见水肿有关条。

热在皮肤 证名。与热在骨髓相对而言。一般指邪热在体表浮浅处的病症。亦作表热里寒解。又有释为真寒假热者。参见热在骨髓及有关各条。

热在骨髓 证名。指邪热在肌体深处的病症。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“病人身大热，反欲得近衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。”《伤寒缵论·太阳上篇》：“详仲景论，止分皮肤骨髓，而不曰表里者，盖以皮肉脉筋骨五者，主于外而充于身者也，惟曰藏曰府，方可言里。可见皮肤即

骨髓之上，外部浮浅之分；骨髓即皮肤之下，外部深沉之分，与经络属表，藏府属里之例不同。……至于壮盛素热之人，或酒客辈感邪之初，寒未变热，阴邪闭其伏热，阴凝于外，热郁于内，故内烦而不欲近衣，此所谓寒在皮肤，热在骨髓，药用辛凉必矣。一发之后，表解正和。”一说为表寒里热或表热里寒的一种辨证。《注解伤寒论》：“皮肤言浅，骨髓言深；皮肤言外，骨髓言内。身热欲得衣者，表热里寒也；身寒不欲衣者，表寒里热也。”《医宗金鉴》作寒热真假解。如“身大热，谓通身内外皆热，三阳证也。反欲近衣者，乃是假热虽在皮肤之浅，而真寒实在骨髓之深，阴极似阳证也。身大寒，谓通身内外皆寒，三阴证也。反不欲近衣者，乃是假寒虽在皮肤之浅，而真热实在骨髓之深，阳极似阴证也。”参见热在皮肤条。

热伤风　病名。伤风有热象者。《赤水玄珠》卷一：“热伤风，咳嗽喉疼，面热，此素有痰火郁热在内，热极生风或为风寒所束不得发越。此热为本，寒为标。治宜清热散寒。经云，火郁则发之。又曰，风寒外束者可发，二陈汤加桔梗、天花粉、玄参、薄荷、酒芩、前胡。”《类证治裁·伤风》：“热伤风，咳而咽痛，鼻塞吐痰，消风散加减。”参风热感冒、火伤风条。

热伤风咳嗽　病名。指天时应寒反暖，人感而致的咳嗽。《医学心悟·咳嗽兼症》：“俗称热伤风咳嗽者，何也？答曰：热伤风者，如冬温之候，天应寒而反温，自人受之，则为头痛、喉肿、咽干、咳嗽之属，与正风寒之咳稍异。”治用止嗽散、甘桔汤加味等。参见咳嗽、热伤风条。

热汗　证名。见《景岳全书·杂证谟》。亦名阳汗。详该条。

热劳　病名。见《圣济总录·热劳门》。指虚劳病之呈现热象者。《金匮翼·热劳》：“热劳者，因虚生热，因热而转虚也。”症见身热，面赤，头痛，心神烦躁，口渴，怔忡、盗汗，饮食无味，倦怠多卧，消瘦，或口舌生疮等。治宜养阴益气，清热除蒸。可用黄芪汤、蛤蚧丸、补阴丸等方。参见虚劳条。

热呃　病证名。见《丹溪心法·咳逆》。又称火呃。因胃火上逆，或痰火郁遏所致。《证治汇补·呃逆》：“火呃，呃声大响，乍发乍止，燥渴便难，脉数有力。”治宜和胃降火。可用安胃饮、小柴胡汤等方。热结便秘者，可用凉膈散。胃有痰火者，可用栀连二陈汤、半黄丸。胃虚膈热者，可用橘皮竹茹汤。参见呃逆条。

热证　八纲之一。指外感或内伤所致的热性证候。《素问·阴阳应象大论》：“阳胜则热。”《至真要大论》：“热者寒之。”热证有表热证、里热证、虚热证、实热证之分。详见各条。

热郁　证名。六郁之一。见《丹溪心法》卷三。因诸邪久延不愈，化热所致。《杂病源流犀烛》卷十八：“不发热，常觉自蒸不能解，目蒙口渴，舌燥便赤，脉沉而数，是热郁，或昏瞀，或肌热，扪之烙手，皆是热郁。”治宜清热散郁，用火郁汤、黄连解毒汤等方。参郁证，六郁，外郁条。

热呕　证名。《三因极一病证方论》卷十一：“病者胃中挟热，烦躁，聚结涎沫，食入即吐，名曰热呕。或因胃热伏暑，及伤寒伏热不解，湿疸之类，皆热之所为也。”《世医得效方·热呕》：“胃受邪热，心烦喜冷，呕吐不止。”可伴见口干面赤，二便不畅，脉洪数等。方用小柴胡汤、竹茹汤、大黄甘草汤等。参胃火呕吐条。本证可见于肝胆疾患、胰腺炎、胃炎等疾病。

热胀　病证名。胀病之一。《兰室秘藏·诸腹胀大皆属于热论》：“伤酒湿面及厚味之物、膏粱之人，或食已便卧，使湿热之气不得施化，致令腹胀满。此胀亦是热胀。”《证治汇补·胀满章》：“热胀宜清，诸腹

胀大皆属于热，因湿热之气不得施化，壅滞于中而成胀满者，宜以苦寒药治之，若脾气不宣，郁而成火吞酸，吞酸渐成胀满者，用药宜刚中带柔，连理汤主之。”《医学准绳六要》：“有火盛阴虚，热乘血分者，其腹虽胀而不甚大，按之益坚，小便黄赤，大便秘涩，其脉数实细小，不可误作湿食治。盖消导则阴愈伤，去湿则津愈涸，宜用苦寒之药，如当归龙荟丸加胡连之类。”亦可选用分消丸、厚朴七物汤等。参胀病条。

热疟 病名。疟疾之一。《普济方·诸疟门》：“邪在阳明经谓之热疟，治多下之。”参见足阳明疟条。

热疝 病名。指因火邪积聚于阴分所致的疝症。《景岳全书》卷三十三：“热疝大能作痛。凡火邪聚于阴分而为痛者，必有热证热脉，或大便秘结，或小水热闭不通，或为胀为满，而烦热喜冷者是也。”参见疝条。

热泄 病名。即热泻。《古今医鉴·泄泻》：“热泄，所下粘垢，小便赤涩，脉数烦渴。”详热泻、火泄条。

热泻 病证名。又称热泄、火泻、火泄。因热迫肠胃所致。症见肠鸣腹痛，痛泻阵作，泻下多黄色稠粘，或注泻如水，或米谷不化，肛门灼痛，后重不爽，口渴喜冷，小便赤涩，脉数。《丹溪心法·泄泻》：“热泻，粪色赤黄，肛门焦痛，粪出谷道犹如汤烧，烦渴，小便不利。”治宜清热泻火，可用黄芩汤、柴葛芩连汤、加味四苓散、香连丸等方。气虚有热者，可用卫生汤。阴虚火动者，可用升阴丸。本病可见于细菌性食物中毒及肠炎、菌痢等疾病。参火泄、火泻等条。

热实结胸 结胸证之一。又名实热结胸、热结胸。指邪热伏饮搏结胸膈的病证。《类证活人书》卷十：“有热实结胸，胸中烦躁，心内懊侬，舌上燥渴，脉沉滑者，皆热证也，大陷胸汤主之。”《医学入门·杂症》：“热实结胸者，心下满硬，懊侬烦躁而渴，柴胡汤，甚者大陷胸汤。”参结胸、实热结胸、热结胸条。

热毒 ❶病名。温毒的别称。《重订广温热论·论温热兼症疗法》：“其六兼毒，病名温毒，一名热毒，通称时毒。”详时毒条。❷病邪名。指火热病邪郁结成毒。《素问·五常政大论》：“太阳在泉，热毒不生。”

热毒下血 病证名。见《丹溪心法附余》卷十一。多因嗜食炙爆，或饮酒过多，热毒蕴结大肠，迫血妄行所致。症见大便下血，颜色鲜红，腹痛口渴，肛门灼热，舌红干燥，脉弦数等。治宜清热解毒，凉血止血。选用黄连丸、凉血地黄汤、芍药黄连汤，或四物汤加黄连、槐花之类。亦有热甚所下色黑者，解毒汤合四物汤加大黄。……毒者病邪蕴久，色浊，后重疼坠，四物汤加木香、槟榔，或四味香连丸等（见《医学入门·杂病》）。本证可见于细菌性痢疾、出血性小肠炎、溃疡性结肠炎等疾病。参见热痢、便血等条。

热毒风 病名。《圣济总录》卷十三：“热毒风之状，头面肿热，心神烦躁，眼目昏暗，时复语涩，痰粘口干，皮肤壮热，肢节疼痛是也。皆由脏腑虚弱，风邪因入，客于心胸，或服热药与饮酒过度，心肺壅滞，热积不散，故其证如此。”治宜清热解毒祛风为主。

热毒痢 病名。指痢疾之因骤受暑湿热毒所致者。见《医学传灯》卷下。《医门法律》卷五：“又有骤受暑湿之毒，水谷倾囊而出，一昼夜七八十行，大渴引水自救，百杯不止，此则肠胃为热毒所攻。”若里急后重者，宜大黄黄连甘草大剂频服；若无里急后重，宜芩芍调中汤加黄连、肉桂。参见痢疾、毒痢、暑痢等条。

热甚发痉 指热盛伤阴，筋脉失养所致的痉病。见上海中医学院主编《中医内科学讲义·痉证》。由于邪热壅滞，或热甚伤

阴，筋脉失于濡养所致。症见壮热，项背强，口噤龂齿，手足挛急，腹满便秘，甚则角弓反张，神识不清，舌苔黄，舌质红，脉洪数或沉滑有力。治宜泄热存阴，用增液承气汤。无腹满便秘者，宜清热救津，可用白虎加人参汤、玉女煎等方。参见痉条。

热结小便不利 病名。小便不利证之一。见《症因脉治》卷四。多由热结脏腑所致。热在肺与胃肠者，小便不利而兼见喘咳面肿，气逆胸满，脉数。宜用清肺饮、黄芩泻白散、黄连枳壳汤、清胃汤等方。热在心与小肠者，小便不利而兼见烦热闷躁，舌赤便秘，脉细数或大数。宜用泻心汤、导赤各半汤等方。热在肾与膀胱者，小便不利而兼见腰痛骨蒸，两足心热，脉细数或大数。宜用知柏地黄丸、车前木通汤等方。参小便不利、癃闭等条。

热结胸 结胸证之一。即热实结胸。亦称实热结胸。《伤寒全生集·辨伤寒结胸》："若懊恢，发热，烦渴，心下痛硬，大便秘，昏闷，名热结胸，少与大陷胸汤加黄连。"参热实结胸、实热结胸条。

热结旁流 指阳明腑实，肠内燥屎闭结，而时泄臭水者。《瘟疫论·大便》："热结旁流者，以胃家实，内热壅闭，先大便闭结，续得下利，纯臭水，全然无粪，日三四度，或十数度。宜大承气汤，得结粪而利止；服汤不得结粪，仍下利并臭水，及所进汤药，因大肠邪胜，失其传送之职，知邪犹在也，病必不减，宜更下之。"参见阳明病条。

热结腹痛 证名。指热邪内积所致的腹痛。《症因脉治》卷四："热结腹痛之症，身热腹热，烦躁不寐，时作时止，痛则汗出，或痛而作声，或痛而一汛即欲下痢，一利即止。此热积腹痛之症也。"多因心肝火动，煎熬于内，或饮食不节，停积发热所致。《寿世保元·腹痛》："肚腹满硬，痛久不止，大便实，脉数而渴者，积热也。"治宜清热消积导滞为主。方用枳壳川连汤、承气汤，或栀连平胃散加枳葛、保和丸加枳连、清胃汤、龙胆泻肝汤等。参见腹痛、内伤腹痛条。

热结膀胱腹胀 证名。伤寒腹胀之一。见《症因脉治·肿胀总论》。由伤寒表邪不解，内传膀胱所致。症见恶寒发热，自汗口渴，小便不利而小腹胀满等。详伤寒腹胀条。

热哮 证名。见《类证治裁·哮症论治》。指肺热炽盛，痰壅气升所致的哮吼。多在夏月暑火旺盛时发作。症见哮喘痰鸣，烦热燥渴等。治宜清肺泄热，佐以顺气化痰，如桑白皮汤、白虎汤加黄芩、枳壳、栝蒌等药。《鸡鸣录·哮喘》："热哮，俗名痰火。口渴、苔黄，小溲短赤者是也。莱菔子二两，风化硝一两，共研，蜜丸芡子大，每一丸，噙化。"

热晕 病证名。指眩晕由火热炎上所致者。《东医宝鉴·外形篇》："热晕，火热上攻，烦渴引饮，或暑月热盛，宜大黄散、荆黄汤。"参火冲眩晕条。

热积 证名。指邪热滞积于里者。《证治准绳·杂病》："热积，寒取之。《千金》硝石丸，醋煮三棱丸、神功助化散、圣散子。"《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："热积，伤热成积，或吐或泻，头晕，腹痛，心中烦躁也。宜黄芩、黄连、黄柏、石膏，方用清心汤、地骨皮散。"参积条。本证可见于慢性胃炎、慢性肠炎等疾病。

热秘 病名。见《圣济总录·大小便门》。由于热结大肠所致。又名阳结。《万病回春·大便闭》："身热烦渴，大便不通者，是热闭也。"《证治要诀·大便秘》："热秘，面赤身热，肠胃胀闷，时欲得冷，或口舌生疮，此由大肠热结。宜四顺清凉饮，吞润肠丸，或木香槟榔丸。"《金匮翼·便秘统论》："热秘者，热搏津液，肠胃燥结，伤寒热邪传里，及肠胃素有积热者，多有此疾。"用大黄饮子。《医学心悟·大

便不通》："热闭者，口燥，唇焦，舌胎黄，小便赤，喜冷、恶热，此名阳结。宜用清热攻下之法，三黄枳术丸主之。"参见大便秘结、阳明腑病、阳结各条。

热挛 挛证之一。见《证治准绳·杂病》。详挛条。

热病 病名。出《素问·刺热篇》。❶泛指一切外感热性病，意同广义的伤寒。《素问·热论》："今夫热病者，皆伤寒之类也。"参见伤寒、温病条。❷指伤寒病五种疾患之一。《难经·五十八难》："伤寒有五，……有热病，有温病。"❸指夏季伏气所发的暑病。《医宗必读·伤寒》："热病者，冬伤于寒，至夏乃发，头疼，身热恶寒，其脉洪盛。"《温热逢源》："伏气所发者，名为热病；而以暴感而病者，仍名曰暑病。"❹指五脏热病。见《素问·刺热篇》所论"肝热病"、"心热病"、"脾热病"、"肺热病"、"肾热病"等，详见各该条。

热病劳复 劳复证之一。见《诸病源候论·热病劳复候》。参劳复、温病劳复条。

热淋 病名。出《诸病源候论·淋病诸候》。因湿热蕴结下焦而成。主症为小便短、数、热、赤、涩、痛，并可伴有寒热、腰痛、小腹拘急胀痛、烦渴等，甚者尿出有血。治宜清热利湿为主。常用瞿麦汤、八正散、导赤散、五淋散等方。本病常见于急性泌尿系感染。又诸淋多属于热，故有将热淋视为诸淋总称者（见《医学心悟·热淋》）。参见淋条。

热厥 厥证之一。指热盛所致手足厥冷，甚至昏迷的病证。一名阳厥。《素问·厥论》："阴气衰于下，则为热厥。"《药症忌宜》："阳厥即热厥。其证四肢厥逆，身热面赤，唇燥大渴，口干舌苦，目闭或不闭，小便赤涩短少，大便燥结，不省人事。"《卫生宝鉴·厥逆》："手足虽冷，有时或温，手足心必暖，脉虽沉伏，按之则滑，其证或畏热，或渴欲饮水，或扬手掷足，烦躁不得眠，大便秘，小便赤，此名热厥。古人所谓阳极发厥也。治用白虎汤、大承气汤、双解散、凉膈散。以上四方，详证轻重选而用之。"《景岳全书》："阳厥者，热厥也。必其先自三阳传入阴分，故其初起必因头疼发热，自浅入深，然后及于三阴，变为四肢逆冷，或时乍温，其证必便结，躁烦，谵语，发渴，不恶寒，反恶热，脉沉有力，此以传经热证所化。外虽手足厥冷，内则因于热邪，阳证发厥，故为阳厥，乃阳极似阴也。"《杂病源流犀烛·诸厥源流》："手足独热者，为热厥，宣火郁汤；而热厥又有兼游赤者，宜升阳散火汤；又有便秘者，宜大柴胡汤；又有谵语身冷，遗溺自汗者，宜白虎汤；又有烦渴躁妄，失下而手足冷甚，但不过肘，或身冷而反见阴象者，正为热极似寒，俗工妄谓变成阴症，急用热药助阳，十无一生矣，宜白虎汤；又有妇人热入血室，因而发厥者，宜以童便为君，加赤芍、生地、牛膝、丹皮、桃仁。以上热厥所统。"本证可见于急性传染病或感染性热病过程，或伴有中毒性休克、中毒性脑病等。参阳厥、厥证条。

热厥头痛 病证名。因热盛气逆所致的头痛。见《证治准绳·头痛》："热厥头痛，虽严寒犹喜风寒微来，暖处，或见烟火，其痛复作。"由邪热上攻，经气厥逆所致。症见头痛积年不愈，烦热，虽当严冬，犹喜风寒，其痛便止，略近温暖或见烟火，其痛便甚。治宜清泄，可用清上泻火汤，或选奇汤加川芎、柴胡、黄连、生地、当归、黄柏、知母、荆芥、芽茶等药，后用补气汤。参头痛条。

热厥心痛 证名。指热郁气逆所致的心痛。《活法机要·心痛证》："热厥心痛者，身热足寒，痛甚则烦躁而吐，额自汗出，知为热也。其脉浮大而洪，当灸太溪及昆仑，谓表里俱泻之，是谓热病汗不出，引热下行，表汗通身而出者愈也。灸毕，服金

铃子散则愈。痛止，服枳术丸去其余邪也。”《医学入门》卷五：“热痛内因酒食积热，痰郁发厥，手足虽冷，而身热甚，则烦躁吐逆，额汗。古玄金散、三味川楝散、莎芎散。甚者大承气汤下之，后服枳术丸。”《证治汇补·心痛章》：“热痛，纵酒嗜辛，蓄热在胃，偶遇寒气，热郁而发。大便不通，面带阳色，痛必作止不常，甚则躁渴吐酸，额上有汗，手足温煖或身虽热而手足寒，谓之热厥。”参心痛、厥心痛、热心痛条。

热喘　证名。指肺热炽盛的气喘。《古今医鉴·喘急》：“肺实肺热，必有壅盛胸满，外闭上炎之状”。多由肺受热灼，水津不能下行，痰火壅阻气道所致，常发于炎夏季节。治宜泻热清肺为主。《临证指南医案·喘》邵新甫曰：“实而热者，不外乎蕴伏之邪，蒸痰化火，有麻杏甘膏、《千金》苇茎之治也”。双玉散（丸）、玉液散、泻火清肺汤、泻白散、桑白皮汤等方，均可选用。参火喘条。

热痢　病名。指痢疾之由肠胃酝热而致者。见《备急千金要方》卷十五。《时病论》卷三：“热痢者，起于夏秋之交，热郁湿蒸，人感其气，内干脾胃，……热挟湿食，酝酿中州，而成滞下矣。盖热痢之为病，脉滑数而有力，里急后重，烦渴引饮，喜冷畏热，小便热赤，痢下赤色，或如鱼脑、稠粘而秽者是也。”常伴见身热腹痛，舌苔黄腻等。治宜清热解毒，消荡积滞。可用白头翁汤、芩连芍药汤、香连丸等方，益以楂肉、槟榔、川军等药。参见痢疾、燥热痢、湿热痢等条。本证可见于急性细菌性痢疾、溃疡性结肠炎发作期及细菌性食物中毒等。

热痧　痧证之一。《七十二种痧症救治法·热痧》：“此系外受热邪，发热狂躁，一周时不治则死。治法：用三指捏曲池穴，拍出紫黯块，刺出微血；用香油钱刮两臂膊穴，余同上寒痧症各穴，服菉豆清汁碗半而愈。”参痧、阳痧、寒痧条。

热痿　痿证之一。指痿证由内热所致者。见《医学纲目》卷十七。多因内热灼阴耗血，筋失濡养所致。症见身热骨蒸，筋骨痿软，不能步履等。治宜滋阴清热，补肝肾，强筋骨等。方用虎潜丸加减。

热痹　病名。又称脉痹。出《素问·四时刺逆从论》。指热毒流注关节，或内有蕴热，复感风寒湿邪，与热相搏而致的痹症。《证治准绳·痹》：“热痹者，藏府移热，复遇外邪，客搏经络，留而不行，阳遭其阴，故瘅痹燔然而闷，肌肉热极，体上如鼠走之状，唇口反裂，皮肤色变。”并可见关节红肿热痛，发热，烦闷，口渴。治以清热祛邪，宣痹止痛，宜白虎加桂枝汤、升麻汤。若风寒湿邪未尽者，可用桂枝芍药知母汤。热毒盛者，用《千金》犀角汤加减。本病可见于风湿性关节炎活动期，类风湿性关节炎及痛风急性发作期等疾患。

热痰　痰证之一。❶指痰水与热相搏的病症。《诸病源候论·痰饮诸病候》：“热痰者，谓饮水浆，结积所生也。言阴阳否膈，上焦生热，热气与痰水相搏，聚而不散，故令身体虚热，逆害饮食，头面喻喻而热，故云热痰也。”❷即火痰。《杂病源流犀烛·痰饮源流》：“若由于外感而生者，……四曰热痰，即火痰也。多烦热燥结，头面烘热，或为眼烂喉闭，癫狂嘈杂，懊恼怔忡，其色亦黄，宜清气化痰丸、清热导痰汤。”❸指痰聚于心者。《杂病源流犀烛·痰饮源流》：“在心曰热痰，其色赤，结如胶而坚，多烦热，心痛，口干唇燥，喜笑，脉必洪，宜半黄丸。”一名心经热痰。参见该条。❹指素有痰疾因外感而喘咯咳唾者。《泰定养生主论》：“热痰者，因食辛辣烧炙煎爝，重裀厚褥及天时郁勃而然也。……此皆素抱痰疾者，因风寒气热昧而喘咯咳唾，非别有此五种之痰。”参见痰证条。

热痰嗽　病名。❶指夏月嗽而发热的疾患。《素问玄机气宜保命集·咳嗽论》：“夏

月嗽而发热者，谓之热痰嗽。小柴胡四两，加石膏一两，知母半两用之。”参见热嗽、伤暑咳嗽条。❷指伤热咳嗽。《症因脉治》卷二：“伤热咳嗽，……此即痰饮门热痰嗽。”详伤热咳嗽条。

热嗽 病名。指邪热犯肺或积热伤肺所致的咳嗽。《外台秘要》卷九：“热嗽者，年少力壮，体气充满，将息伤热，积热所成，故致热嗽。”《圣济总录·咳嗽门》：“热嗽之状，嗽而少涎。由邪热熏于上焦，客于肺经，使津液内燥，搏于咽嗌，喉咙不利，随其呼吸而咳嗽也。”《证治要诀》卷六：“热嗽，咽喉干痛，鼻出热气，其痰嗽而难出，色黄且浓，或带血缕，或带血腥臭，或坚如蛎肉。”方用金沸草散、旋覆汤等。亦有伤于暑热所致者。《洁古家珍·咳嗽》：“夏月嗽而发寒热者，谓热嗽。”《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》：“热嗽，伤于暑热而得嗽也，其脉数，必兼口燥声嘶，烦热引饮，或吐涎沫，甚至咯血，宜洗肺散，芩半丸，黄连化痰丸。”又指咳嗽饮水暂止，或酒后嗽甚者。《赤水玄珠》卷七：“饮水一二口而暂止者，热嗽也。……热嗽以小柴胡汤。”又：“凡饮酒后嗽甚者，热嗽也。”参见热痰嗽、伤热咳嗽、伤暑咳嗽等条。

热膈 五膈之一。《诸病源候论·五膈气候》：“热膈之为病，藏有热气，五心中热，口中烂生疮，骨烦四支重，唇口干燥，身体头面手足或热，腰背皆疼痛，胸痹引背，食不消，不能多食，羸瘦少气及癖也。”参见五膈条。

热霍乱 病名。见《医学纲目·伤寒部》。又称热气霍乱。多因感受暑热湿浊之邪，或内伤饮食厚味，郁遏中焦所致。《素问·六元正纪大论》：“热至则身热，吐下霍乱。”《霍乱论》：“倘热霍乱因暑邪深入而滞其经隧，显脉细、肢寒之假象者，必有溺赤便臭之真谛。”症见心腹绞痛，上吐下泻，烦闷扰乱，昏不知人。挟有停滞者，更兼吐下皆有酸臭味。脉多见洪数。治宜清热化湿，辟秽泄浊。方如连朴饮、燃照汤、黄连香薷饮、清暑益元散、急救回生丹、解毒活血汤等均可选用。参见霍乱条。

热瘴 病证名。瘴疟的一种。《瘴疟指南》卷上：“其病身发大热，神气沉昏，昼夜如卧炭火中，腰痛脚弱，大渴欲饮冷水，上脘痞闷，神昏妄语，头痛或不痛，或呕逆，或不呕逆，小便赤涩，或频数，或遗尿，大便或秘或自利，舌黑面赤目红，或吐血衄血，兼见之证，不能尽述，惟以其单单热不寒，谓之热瘴。”热瘴初起，刺病人两足腕出血，又刺舌下出血。头痛两额角脉胀者，与两额角脉上刺之出血，次服不换金正气散，又服和解汤，然后用截法，和解后热势稍缓，服养胃汤，吞截疟丸或四兽饮等方。参见瘴疟、冷瘴条。

顿呛 病名。指阵发性连咳不已的咳嗽。《医学真传·咳嗽》：“咳嗽，俗名曰呛，连咳不已，谓之顿呛。顿呛者，一气连呛二三十声，少则十数声，呛则头倾胸曲，甚则手足拘挛，痰从口出，涕泣相随，从膺胸而下应予少腹。大人患此，如同哮喘；小儿患此，谓之时行顿呛。”《温热经解》：“咳嗽气逆，连咳十余声，咳至不能转吸者，名顿呛。二冬膏主之。”

顿泻 病名。指脾虚湿盛所致的泄泻。《张氏医通·大小府门》：“日间无事，将晡腹膨，一夜肠鸣，不得宽泰，次早洞泻，此名顿泻。”治宜健脾利湿。偏湿盛者，用胃苓汤加木香、砂仁；偏脾虚者，用理苓汤加木香。

顿嗽 指咳嗽不咳则已，一咳则连续十数声至数十声。多因燥热灼津而致。《医述》载方星岩之说：“顿嗽症，大都肺燥津伤，故咳剧痰不易出，宜仿清燥救肺汤大意。”亦称顿呛，详见该条。

〔丨〕

鸿鹅瘟　病名。又名大头瘟、虾蟆瘟。《医学正传·瘟疫》："大头天行病，从颐颔肿热者者，又名鸿颡瘟。"《赤水玄珠·疫门》："头面肿，俗名鸿鹅瘟、虾蟆瘟。"《证治汇补·咽喉章》："有司天运气过亢，其年乡村染患相似者，此时气乘虚蕴蓄上焦，发作寒热，变为喉痛，俗名虾蟆瘟，又曰鸿鹅瘟。"参瘟疫、大头瘟、虾蟆瘟条。

紧唇　证名。又名瘭唇、茧唇。泛指口唇紧缩、不能开合的症象。《世医得效方·唇病》："口紧唇小不能开合，饮食不得，不急治则死。……名曰紧唇，又名瘭唇。"《杂病源流犀烛·口齿唇舌病源流》："更有茧唇一症，又名紧唇，又名瘭唇。"治疗可内服苡仁汤，外敷黄柏散、白灰散。参见茧唇条。

紧病　古病名。又称急病。指突然发生的剧烈水泻病症。以其病势紧急，病情紧要，故以"紧"名。《张氏医通·大小府门》："夏暑暴泻如水，周身疼痛，汗出，脉弱少气，甚者加吐，此名紧病。浆水散。"本病可见于急性肠胃炎、霍乱、副霍乱等疾病。详水泻、霍乱等条。

紧痧　痧证之一。指痧之急发痛晕而危者。《杂病源流犀烛·痧胀源流》："紧痧，其痛急，霎时晕倒，不消半刻即死，故曰紧。若知之者，急为放血焠刮。"方用涤痧丸。参痧条。

哮　病名。指呼吸急促，喉中痰鸣如水鸡声者。《医学正传》卷二："喘促喉中如水鸡声者，谓之哮。"《医宗必读》卷九："哮者与喘相类，但不似喘，开口出气之多，而有呀呷之音，呷者口开，呀者口闭，开口闭口，尽有声音，呀呷二音，合成哮字。"《医略六书·杂病证治》卷二十二："哮即痰鸣气喘之常发者，膈内有壅塞之气，肺中有胶固之痰，肺络又有风寒之感，三者闭拒气道，搏击有声，发为哮病。"哮又有冷哮、热哮之分。详冷哮、热哮条。

哮吼　病名。见《万病回春·哮吼》。即哮证。《医宗金鉴》卷四十一："呼吸气出急促者，谓之喘急，若更喉中有声响者，谓之哮吼。"《古今医鉴》卷四："夫哮吼专主于痰，宜用吐法。亦有虚而不可吐者，此寒包热也。治法必用薄滋味，不可纯用寒凉，须常带表散。"方用定喘汤等。参哮证、齁喘条。

哮证　证名。简称哮。见《医学正传·哮喘》。指发作性痰鸣气急的疾患。《医宗必读》卷九："别有哮证，似喘而非，呼吸有声，呀呷不已，良由痰火郁于内，风寒束于外，或因坐卧寒湿，或因酸咸过食，或因积火熏蒸，病根深久，难以卒除。"《症因脉治》卷二："哮病之症，短息倚肩，不能仰卧，伛偻伏坐，每发六七日，轻则三四日，或一月，或半月，起居失慎，则旧病复发。"哮症主要见喘急而喉中有痰如拉锯声，重症可见张口抬肩，目胀睛突，面色苍白，唇甲青紫，汗出似脱。又常因反复发作，导致脏气虚衰，真元耗损。宜培补脾肾，在发作时宜祛邪，宣降肺气，涤痰平喘。如虚实挟杂，则扶正与祛邪并用。由于致病原因和临床表现不同，可分为冷哮、热哮、痰哮、食哮、肾哮等。参喘鸣、喘喝、呷嗽、喘呼、哮吼条。

哮喘　病名。❶哮证与喘证的合称。哮，主要指呼吸气急而喉间有痰鸣声。喘，主要指呼吸迫促。哮与喘在发作严重时均可见张口抬肩，不能平卧等症。哮常并见喘，而喘则未必见哮。《医学正传·哮喘》："大抵哮以声响名，喘以气息言。夫喘促喉中如水鸡声者，谓之哮；气促而连属不能以息者，谓之喘。"详哮证、喘证条。❷指哮证。见《丹溪心法·哮喘》。因哮证发作时常兼见喘逆气急，故习称哮喘。《景岳全书

·喘促》："喘有夙根，遇寒即发，或遇劳即发者，亦名哮喘。"凡哮喘证，一般有发作时，有间歇时，发作时则喘息气促或喉有痰声，间歇时则喘平，呼吸如常。哮喘危症多难治。《证治汇补·喘病章》："发汗如油，汗出如珠，抬肩撷肚，直视谵语，鼻扇口开，及胸前高起，脉络散张，手足厥冷，脉散及数者死。"参哮证、喘证条。

眩 证名。出《灵枢·卫气》。❶指眩晕。《丹溪心法·头眩》："眩者，言其黑晕转旋，其状目闭眼暗，身转耳聋，如立舟船之上，起则欲倒。"❷指视物黑暗不明。《伤寒明理论·头眩》："眩为眼黑。"《证治汇补·眩晕章》："眩者言视物皆黑。"❸指感觉昏乱，旋转欲倒。《医学从众录·眩晕》："眩，昏乱旋转也。"参眩晕等条。

眩仆 证名。出《灵枢·五邪》。指因眩晕而跌倒。参眩晕、中风条。

眩运 病证名。即眩晕。《医碥·眩晕》："晕与运同，旋转也。所见之物，皆旋转如飞，世谓之头旋是也。"《顾氏医镜》卷十四："眩运者，目花黑暗旋倒也。其状头眩目闭，身转而聋，如立舟车之上"。详眩晕条。

眩冒 证名。出《素问·玉机真藏论》。眩，眼前发黑；冒，头昏不清，甚至昏厥。《伤寒明理论·头眩》："眩为眼黑，……冒为蒙冒之冒，世谓之昏迷者是矣。"《医学入门》卷五："头眩……或云眩晕，或云眩冒。眩言其黑，晕言其转，冒言其昏，一也。"本症可见于颈椎病、脑动脉硬化、脑血管痉挛等病引起的一过性脑缺血，或基底动脉供血不足。参眩晕条。

眩晕 病名。见《三因极一病证方论·眩晕证治》。又称眩运、头旋眼花。眩，视物黑暗不明或感觉昏乱；晕，感觉自身与周围景物旋转。《医碥·眩晕》："眩，惑乱也，从目从玄。玄，黑暗也，谓眼见黑暗也，虚人久蹲陡起，眼多黑暗是也；晕与运同，旋转也，所见之物皆旋转如飞，世谓之头旋是也。"《证治汇补·眩晕章》："其状目暗，耳鸣，如立舟车之上，起则欲倒，不省人事。盖眩者言视物皆黑，晕者言视物皆转，二者兼有，方曰眩晕。"多因外感六淫，内伤七情，或气血衰弱，脏腑阴阳失调等所致。《东医宝鉴·外形篇》："眩晕，有风，有热，有痰，有气，有虚，有湿。"历代医家有不同论述。如刘河间主风火。《素问玄机原病式·五运主病》："所谓风气甚，而头目眩运者，由风木旺，必是金衰不能制木，而木复生火。风火皆属阳，多为兼化，阳主乎动，两动相搏，则为之旋转。"朱丹溪主痰。《丹溪心法·头眩》："无痰则不作眩。"张景岳主虚。《景岳全书·杂证谟》："无虚不能作眩。"根据病因、症状之不同，可分为风晕、湿晕、痰晕、中暑眩晕、燥火眩晕、气郁眩晕、肝火眩晕、虚晕等。详各该条。本证可见于周围性及中枢性眩晕、耳源性眩晕、颅内血管性病变、药物中毒及晕动病等。

眩掉 证名。出《素问·六元正纪大论》。即掉眩。详该条。

晕厥 厥证之一。指突然头晕仆倒，神志迷糊，肢冷的病证。《古今医案按·厥》："今人所谓厥者，乃晕厥耳，亦兼手足逆冷，而其重在神昏若死也。"参厥证条。

晕痧 痧证之一。《杂病源流犀烛·痧胀源流》："晕痧，一时头眩眼暗，昏迷跌倒，乃毒痧所致，毒血一冲，必至败坏脏腑，其势甚急，不能少延。盖因毒血与食积痰气，结聚心腹胸膈，而经络不转，气血不通，虽放而血不流，虽刮而痧不显。治法视其食积痰血气阻，及暑热伏热秽气之类，消之散之，俟胸膈一松，则昏迷自醒，然后验其青紫筋以刺之。"宜沉香丸、沉香阿魏丸等方。参痧条。

鸭溏 病名。出《金匮要略·水气病脉

证并治》。又称骛溏、骛洲。《素问病机气宜保命集·泻论》："鸭溏者，大便如水，中有少结粪者是也。"《医学入门·杂病》："协寒自利，不渴，曰鸭溏，清白如鸭屎状。"《医宗金鉴·杂病心法要诀》："鸭溏，如鸭屎之溏，澄彻清冷也。"参寒泄条。

蚘心痛　症名。亦称蚘咬心痛。《备急千金要方》卷十三："蚘心痛，心腹中痛，发作肿聚，往来上下行，痛有休止，腹中热，善涎出，是蚘咬也。"《医灯续焰》卷八："蚘咬心痛……大痛不可忍，或吐青黄绿水涎沫，或吐虫出，发有休止，此是蚘心痛也。"可用乌梅丸、芜荑散等方。参心痛、虫心痛条。

蚘动脘痛　病证名。指因蛔虫积阻或攻窜所致的脘痛。《类证治裁》卷六："蚘动脘痛，必有休止，安蚘丸。"《张氏医通》卷五："因蚘作痛，痛有休止，令人吐蚘，蚘动故也。用川椒、乌梅、黄连、槟榔煎服。"参虫痛条。本证可见于胆道蛔虫症。

蚘虫病　病名。"蚘"通"蛔"，即蛔虫病。出《金匮要略·趺蹶手指臂肿转筋阴狐疝蚘虫病脉证并治》。详该条。

蚘咬心痛　病证名。见《圣济总录》卷五十六。又名蚘心痛。详该条。

蚘厥　厥证之一。指因蚘而痛厥者。《金匮要略·趺蹶手指臂肿转筋阴狐疝蚘虫病脉证治》："蚘厥者，当吐蚘，令病者静而复时烦，此为脏寒，蚘上入膈，故烦，须臾复止，得食而呕又烦者，蚘闻食臭出，其人当自吐蚘。蚘厥者，乌梅丸主之。"《伤寒绪论》卷下："凡人胃脘忽痛忽止，身上乍热乍凉，面上作赤作白，脉倏乱倏静，口中吐沫不食者，便是蚘厥之候。"本病证可见于胆道蛔虫症、蛔虫性肠梗阻等。参厥证、蛔厥条。

贼风　❶病证名。《圣济总录》卷七："贼风。……其证痛而不热，痛则不能按抑转动，不热则身内索冷，欲得热熨，即小宽也，加以风冷，则骨解深痛，按之彻骨，或遇冷气相薄，则结瘰疬或偏枯，风热相薄，则变附骨疽。"又"治贼风口噤，角弓反张，当归饮方。"❷又指病因。如《内经》中"虚邪贼风，避之有时。"

〔丿〕

积　病证名。见《灵枢·百病始生》。指胸腹内积块坚硬不移，痛有定处的一类疾患。《难经·五十五难》："积者，阴气也，其始发有常处，其痛不离其部，上下有所终始，左右有所穷处。"并有五积之分。心积名伏梁，肝积名肥气，脾积名痞气，肺积名息贲，肾积名贲豚。宋以后将饮食所伤而致的食滞气结之症，亦称为积，《济生方》卷四："积者伤滞也，伤滞之久，停留不化，则成积矣。"《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："他如脾胃虚弱，或饮食过常，或生冷过度，不能克化，又或起居无节，寒暖不调，致随其所食之物，及所伤寒热之气结成积聚，或有块，或无块，面色青，肌体瘦，心腹胀满，噫气吞酸者，又当条款而列陈之。"并在五积之外，又列酒、食、面、肉、果、菜、茶、水等十八种积。积病多由起居不时，忧喜过度，饮食失节，脾胃亏损，气机不运，沉寒郁热，痰水凝结，瘀血蕴里，食积久滞，邪正相结而致。治宜破坚消积为主。《素问·六元正纪大论》："大积大聚，其可犯也，衰其大半而止"。《证治准绳·杂病》："大抵治是病必分初中末三法。初治其邪入客后积块之未坚者，……治其始感之邪与留结之客者，除之，散之，行之，虚者补之，约方适其主所为治。及乎积块已坚，气郁已久，变而为热，热则生湿，湿热相生，块日益大，便从中治，当祛湿热之邪，其块之坚者削之，咸以耎之。此时因邪久凑，正气尤虚，必以补泻迭相为用。若块消及半，便以末治，即住

攻击之剂，因补益其气，兼导达经脉，使营卫流通，则块自消矣。”参积聚、癥瘕条。

积心痛 证名。积滞客于肠胃之间而心腹痛者。《三因极一病证方论·不内外因心痛证》：“久积心腹痛者，以饮啖生冷果实，中寒不能消散，结而为积，甚则数日不能食，便出干血，吐利不定，皆由积物客于肠胃之间，遇食还发，名积心痛。”《奇效良方·心痛门》：“饮食劳逸，触忤悲类，使脏气不平，痞膈于中，食饮遁注，变乱肠胃，发为疼痛；或饮啖生冷果实，中寒不能消散，结而为积，遇食还发，名积心痛。”参心痛等条。

积年肺气 古病名。见《苏沈良方》卷五。指经历数十年不愈的喘证。多因风寒癖饮积肺，气道壅阻所致。治宜温肺散寒，化饮平喘，用九宝散等方。病未发时，宜培益正气。参久喘条。

积年腰痛 证名。又名久腰痛。见《外台秘要·久腰痛方》。详久腰痛条。

积块 证名。指腹胁部结块坚硬可以触及者。即癥积之属。明·万全《保命歌括》：“大抵积块者，皆一物为之根，而血涎裹之，乃成形如杯如盘，按之坚硬也。”治宜行气活血，除痰消积。方如膈下逐瘀汤，或用海石、三棱、莪术、桃仁、红花、五灵脂、香附等药为丸，石硷、白术煎汤吞下。块去须用补法（见《丹溪心法·积聚痞块》）。参癥、积有关条。

积饮 指饮邪留蓄不散的病证。出《素问·六元正纪大论》。《素问玄机原病式》：“积饮，留饮积蓄而不散也。”亦泛指痰饮。《景岳全书·杂证谟》：“痰饮一证，其在《内经》止有积饮之说。”参见痰饮条。

积冷胃脘痛 证名。指冷饮内伤，阴寒凝积所致的胃脘痛。《症因脉治》卷一：“二便清利，手足逆冷，口吐涎沫，得寒饮则甚，此积冷症也。”可用豆蔻丸。《类证治裁·胃脘痛》：“积寒致痛，绵绵不绝，无增无减，当辛热通阳，术附汤加厚朴、草蔻。”《医学三字经·心腹痛胸痹第七》：“冷痛，身凉，脉细，口中和。宜理中汤加附子、肉桂主之。兼呕者，吴茱萸汤主之。”参胃脘痛条。

积泻 病名。即伤食泻。清·陈德求《医学传灯·泄泻》：“积泻者，腹痛而泻，泻后痛减，泻去稍宽。”详伤食泻条。

积结泻 病名。指饮食停滞肠胃所致的泄泻。《医略六书·杂病证治》：“积结泻，腹中绞痛，平胃散加消积药。……食积内结，发热，泄溏，消导药中加香连、干葛；不应，加大黄。”参积滞泄泻，食积泄泻条。

积热三消 证名。见《症因脉治》卷三。指多食膏粱厚味，积湿成热所致的三消症。热熏于肺为上消，症见烦渴引饮，用清肺饮。热积于胃为中消，症见烦热多食，食下则饥，口臭，用清胃汤加干葛。热流于下为下消，症见小便频数，如膏如油，足心常热。热在膀胱者，选用八正散、龙胆泻肝汤；热在肾者，用知柏八味丸、文蛤散。参见消渴条。

积热咳嗽 病名。指咳嗽由饮食积热，胃火乘肺引起者。《症因脉治·积热咳嗽》：“积热咳嗽之症，面赤烦躁，嗽则多汗，夜卧不宁，清晨嗽多，小便赤涩，此积热咳嗽之症也。”多因膏粱积热，酒客豪饮，阳明受热，肺被火刑所致。治宜家秘清胃汤以清中焦；咳嗽不已，家秘泻白散；热积大肠，枳壳黄连汤等方。参见咳嗽、酒嗽、食积嗽条。

积热泄泻 病证名。因多进膏粱厚味，酒湿辛辣等物，热积肠胃而致。《症因脉治》卷四：“积热泄泻之症，发热口渴，肚腹皮热，时或疼痛，小便赤涩，泻下黄沫，肛门重滞，时结时泻。”脉多沉数，或见促结。治宜清肠胃积热，方如黄连枳壳汤、龙

胆泻肝汤、清胃汤等。欲便不爽者，大黄枳壳汤。元气虚者加人参。参热泻条。

积热胃脘痛　证名。指热积于内所致的胃脘痛。《症因脉治》卷一："七情六欲之火，时动于中、膏粱炙煿之热，日积于内，热久成燥，积热之痛作矣。……时作时止，口渴唇燥，痛则多汗，栀连清胃汤，有下症，神芎丸。"《寿世保元·心胃痛》："以胃脘积有郁热，刺痛不可忍者，用清热解郁汤；如心胃刺痛，并两胁肋痛，呕吐胸痞，大便坚，用清上饮或抚芎、香附、百草霜等药。"参胃脘痛、内伤胃脘痛条。

积热便血　病证名。见《丹溪心法附余》卷十一。指因肠胃积热，热迫络损导致的大便下血。与热毒下血相类。《杂病源流犀烛·诸血源流》："有肠胃积热，及因酒毒下血，腹痛作渴，脉弦数者，宜黄连丸，酒蒸黄连丸。"又："有实热积于内而便血者，宜当归承气汤。"参见便血、热毒下血，等条。

积痢　病名。指痢疾之由食积内阻所致者。见《普济本事方·脏腑泄滑及诸痢》。又称饮食内伤痢。多由饮食积滞，日久不消所致。其症下痢赤白，或色黄如脓，或如鱼肠，或鹜溏鲊臭，脐腹撮痛，痛则痢下，痢下则痛减。治宜化积消导为主。《医宗必读·痢疾》："积者，湿热食痰也。法当下之。新积者，下后又生者也，或调或补，不可轻攻。"方用灵砂丹、胃苓散、保和丸、通元二八丹、治脾汤等。参见痢疾、寒积痢等条。

积滞泄泻　病证名。又称积结泻。因饮食积滞而致。《张氏医通·大小府门》："积滞泄泻，腹必绞痛方泄者是也，平胃散加磨积药。"参食积泄泻条。

积寒泄泻　病证名。指寒邪内积而致的泄泻。因过食生冷，或形寒饮冷，积渐而成。《症因脉治》卷四："积寒泄泻之症，腹中绵绵作痛，小便不赤，口唇不干，泻下清白鸭溏之色。"脉多沉细而迟，或沉而结。治宜温中散寒。寒积内滞者，用豆蔻丸；肠胃虚冷者，用理中汤、补中汤。参寒泄、鸭溏条。

积瘀泄　病证名。指瘀血所致的泄泻。《不居集·积瘀泄》："内有积瘀，胸胁腹痛，泄下光亮如黑漆退光色者是也。"《医林改错》治泄泻日久不愈，或五更泄补肾无效，作瘀血治，用膈下逐瘀汤。

积聚　病名。见《灵枢·五变》。积病与聚病的合称。《难经·五十五难》："病有积有聚，何以别之？然：积者，阴气也，聚者，阳气也，故阴沉而伏，阳浮而动。气之所积名曰积，气之所聚名曰聚，故积者五藏所生，聚者六府所成也。积者阴气也，其始发有常处，其痛不离其部，上下有所终始，左右有所穷处；聚者阳气者，其始发无根本，上下无所留止，其痛无常处，谓之聚。"积为脏病，脏有五，聚为腑病，腑有六，故又有五积六聚之名。积聚与癥瘕痃癖等证相类似。《圣济总录·积聚门》："癥瘕癖结者，积聚之异名也，证状不一，原其病本大略相似。"《医学入门》等书有以积聚为男子病，癥瘕为女子病者。又有从部位区分者。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："痞癖见于胸膈间，是上焦之病；痃积滞见于腹内，是中焦之病；癥瘕见于脐下，是下焦之病。……故积聚痃癖痞，多生于男子，而女子偶患之；癥瘕多生于女子，而男子偶患之。"详积、聚有关条。

健忘　证名。见《济生方》卷四。亦称善忘、喜忘、多忘。指记忆力减退，遇事易忘。多因心、肾、脑髓不足所致。《医林改错·脑髓说》："所以小儿无记性者，脑髓未满；高年无记性者，脑髓渐空。李时珍曰：脑为元神之府。金正希曰：人之记性皆在脑中。"《类证治裁》卷四："健忘者，陡然忘之，尽力思索不来也。夫人之神宅于心，心之精依于肾，而脑为元神之府，精髓

之海，实记性所凭也。……凡人外有所见，必留其影于脑。小儿善忘者，脑未满也。老人健忘者，脑渐空也。韵庵云：观此则知人每记忆，必闭目上瞬而追索之，亦凝神于脑之义。故治健忘者，必交其心肾，使心之神明，下通于肾，肾之精华，上升于脑。精能生气，气能生神，神定气清，自鲜遗忘之失。惟因病善忘者，或精血亏损，务培肝肾，六味丸加远志、五味；或萦思过度，当养心脾，归脾汤；或精神短乏，兼补气血，人参养营汤下远志丸；或上盛下虚，养心汤；或上虚下盛，龙眼汤；或心火不降，肾水不升，神明不定，朱雀丸；或素有痰饮，茯苓汤；或痰迷心窍，导痰汤下寿星丸；或劳心诵读，精神恍惚，安神定志丸；或心气不足，怔忡健忘，辰砂妙香散；或禀赋不足，神志虚扰，定志丸、孔圣枕中丹；或年高神衰，加减固本丸；若血瘀于内，而喜忘如狂，代抵当丸。”参善忘、多忘条。

臭毒头痛 病名。臭，古通嗅。指因嗅吸污毒气体而引起的头痛。见《证治准绳·头痛》。《杂病源流犀烛·头痛》：“有臭毒头痛，必烦闷恶心，宜炒香附一味煎。”亦有兼腹部疼痛。宜辨别毒气性质进行救治。参头痛条。

息贲 古病名。指肺积。《灵枢·邪气藏府病形》：“肺脉，……滑甚为息贲，上气。”《难经·五十四难》：“肺之积，名曰息贲。在右胁下，覆大如杯。久不已，令人洒淅寒热，喘咳，发肺壅。”杨玄操曰：“息长也，贲鬲也，言肺在膈上，其气不行，渐长而通于膈，故曰息贲。一曰：贲，聚也，言其渐长而聚蓄，肺为上盖，脏中阳也，阳气盛，故令人发肺痈也”（见《难经集注》）。《济生方》卷四：“息贲之状，在右胁下，大如覆杯，喘息奔溢，是为肺积。诊其脉，浮而毛，其色白，其病气逆，背痛少气，喜忘，目瞑，肤寒，皮中时痛，或如虱缘，或如针刺。”治疗宜选用息贲丸、调息丸、息贲汤等方。参肺积条。

息积 古病名。指胁下胀满，气逆息难或有形块的病症。《素问·奇病论》：“病胁下满，气逆，二三岁不已，是为何病？岐伯曰：病名曰息积，此不妨于食。”《证治准绳·积聚》：“息积，乃气息痞滞于胁下，不在藏府荣卫之间，积久形成，气不干胃，故不妨食。”一说“息积右胁下满，息难，未见形也”（见《医学阶梯》）。治宜调畅气机为主，如三因化气汤、木香调气散等方，并可用导引法。参积聚条。

息高 形容严重呼吸困难，喘促短气，张口抬肩的状态。《伤寒论·辨少阴病脉证并治》：“少阴病六七日，息高者，死。”《伤寒论后条辨》：“夫肺主气，而肾为生气之源，盖呼吸之门也，关系人之生死者最钜。息高者，生气已绝于下而不复纳，故游息仅呼于上，而无所吸也。”在危重疾病元气虚竭时，常可出现本证。参肩息、张口抬肩条。

息粗 息粗是指呼吸时声音粗大。《素问玄机原病式·六气为病》：“故病寒则气衰而息微，病热则气甚而息粗。……热则息数，气粗而为喘也。”在肺热炽盛或痰气水饮阻遏气道时常出现本症。参痰喘、水喘、火喘、胸喘等条。

射工病 古病名。指射工毒虫侵入所致的疾患。《诸病源候论·射工候》：“江南有射工毒虫，一名短狐，一名蜮，常在山涧水内，……夏月在水内，人行水上，及以水洗浴，或因大雨潦时，仍逐水便流入人家，或遇道上牛马等迹内即停住，其含沙射人影便病。初得时，或如伤寒，或似中恶，或口不能语，或身体苦强，或恶寒热，四肢拘急，头痛，骨难，屈伸张口欠欬，或清朝小苏，晡夕则剧，剧者不过三日，则齿间有血出，不即治杀人。又云初始证候，先寒热恶冷，欠欬，筋急，头痛目疼，状如伤寒，亦如中尸，便不能语，朝旦小苏，晡夕辄剧，

寒热闷乱是也。始得三四日可治，急者七日皆死。……其毒中人，初未有疮，但恶风瘆瘰寒热，或如针刺。及其成疮，初如豆粒黑子，或如火烧，或如蠼螋尿疮，皆肉内有穿空如大针孔也。其射中人头面尤急，腰以上去人心近者多死；中人腰以下者小宽，不治亦死；虽不死，皆百日内乃可保瘥。又云疮有数种，其一种，中人疮，正黑如麸子状，或周偏悉赤，衣被犯之如有芒刺痛；其一种，作疮，久即穿陷，或镇寒热；其一种，如火炙人肉，爆起作疮，此最急，数日杀人；其一种，突起如石疖状。俱能杀人，自有迟速耳。”治用赤苋茎叶或马齿苋捣汁饮，滓涂疮上，或用升麻、射干煎汤服等。

铁痂　痂证之一。《痂症全书》卷中：“铁痂，头面手足十指如锅煤色不治，以血凝也，或用火酒擦身法，委中刺出紫黑血两茶杯，竟有立愈者。”参痂、痂气条。

脊背强　证名。亦称脊强。见《备急千金要方》卷二十。指脊椎肌肉、筋脉强急。多因督脉、膀胱经脉病变所致。《杂病源流犀烛》：“脊背强，灵枢云，督脉之别，名曰长强，其病实，则脊强。又曰，足太阳之脉病，则腰脊强痛。此脊背强所由来也。”参见脊强、背痛条。

脊痛　证名。出《素问·风论》。指背部正中肌肉、筋脉、骨节疼痛。多因督脉及足少阴肾经病变所致。《杂病源流犀烛》卷二十七：“脊痛，督脉病也。背痛，肺经病也。……，二经虚，感受六淫之邪则害痛。”“脊以髓满为正，房欲过度，脊髓空则痛，宜补肾，宜六味丸。膀胱经脉挟脊，分左右上项，贼风乘虚入，倔强不能屈伸，宜羌活、前胡、防风、茯苓。先脊痛，及背与肩，是肾气上逆，宜和气饮。”亦有跌扑损伤、瘀血滞留，脊痛不可忍者，宜地龙汤。阳虚多脊背常感寒痛，方用八味丸加鹿角，狗脊等。参见背脊骨痛、脊强条。本症可见于脊柱损害，如脊髓炎、骨结核及腰椎盘突出症等。

脊强　证名。出《灵枢·经脉》。亦称脊背强。指脊椎骨部筋脉、肌肉强急，身不能前俯的症象。多由督脉受病，或风寒外袭，湿凝瘀滞所致。《类证治裁·肩背手臂痛》：“脊强，腰似折，项似拔，此足太阳经气郁不行，羌活胜湿汤。”《东医宝鉴·外形篇》卷二：“膀胱肾间冷气攻冲背膂，腰脊强俛仰不利，宜乌沉汤。”参见脊背强条。本症可见于类风湿性脊柱炎及强直性脊柱炎后期。

胸中热　出《素问·刺热篇》。指上焦心肺之热。《素问识》卷四：“胸中膈上，乃心肺之宫城，主胸中热者，写肺热也；膈中热者，写心热也。不曰心肺，而曰胸中、膈中者，意言热在气分，而不干于藏真也。”

胸中烦热　证名。出《素问·至真要大论》。指胸闷烦热的感觉。多由心火上炎，肺胃热盛，阴血亏耗，或外邪传里所致。《类经·运气》：“胸中烦热，嗌干等证，皆君火上炎，肺金受伤也。”《先醒斋医学广笔记·寒》：“食谷欲呕，属阳明，非少阳也。胸中烦热者，竹茹汤主之。”《中医临证备要·胸胁腋乳证状》：“胸中烦闷觉热，多为内热证。外感病见心烦懊侬不安，系外邪传入尚浅，用栀子豉汤吐之。身热退后，胸中烦热，或兼呕恶咳逆，为余热内恋，用竹叶石膏汤。杂证中胸中烦热，多为心火偏旺，用导赤散。血虚火炎而致失眠难寐者，用黄连阿胶汤或天王补心丹。……胸中烦热，兼手足心亦热，称为‘五心烦热’。也有与潮热同时出现，均属阴虚内热证候，用生料六味丸加减。”

胸中痞硬　证名。指胸中满闷不适而按之硬满者。《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》：“病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲咽喉不得息者，此胸有寒也，当吐之，宜瓜蒂散。”《伤寒

贯珠集》卷二："此痰饮类伤寒证，寒为寒饮，非寒邪也。《活人书》云：痰饮之为病，能令人憎寒发热，状类伤寒，但头不痛，项不强为异，正此之谓。"参痞有关条。

胸汗 见《中国医学大辞典》。指心胸局部多汗。《张氏医通·杂门》："别处无汗，独心胸一片有汗，……名曰心汗。"参心汗条。

胸胁苦满 证名。指胸胁部满闷不适的感觉。多由邪入少阳或肝胆气机失调所致。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或咳者，小柴胡汤主之。"参胸胁满条。

胸胁痛 证名。出《素问·刺热论》。多见于少阳病及肝胆疾患。《诸病源候论·胸胁痛候》："胸胁痛者，由胆与肝及肾之支脉虚，为寒气所乘故也。……此三经三支脉，并循行胸胁，邪气乘于胸胁，故伤其经脉，邪气之与正气交击，故令胸胁相引而急痛也。"《济生拔粹·此事难知》："少阳证，胸胁痛，往来寒热而呕，或咳而耳聋，脉尺寸俱弦，忌发汗，忌利小便，忌过大便，故名三禁。汤宜和解，小柴胡汤主之。"本症实证居多。可由气机郁滞，痰饮瘀血所致。《景岳全书·胁痛》："暴怒伤肝，气逆胀满，胸胁疼痛者，宜解肝煎。""气滞胸胁痛而兼喘者，宜分气紫苏饮。""痰饮停伏，胸胁疼痛者，导痰汤加白芥子。"《丹溪心法·胁痛》："气郁而胸胁痛者，看其脉沉涩，当作郁治。痛而不得伸舒者，蜜丸龙荟丸最快。"《医林绳墨·六郁》："血郁者，胸胁作痛，四肢无力，能食便红，脉亦芤数。"胸胁痛也可见于内伤虚损。《金匮翼》卷六："肾气虚弱，羸怯之人，胸胁之间，多有隐隐微痛，此肾虚不能纳气，气虚不能生血之故。……宜用熟地、破故纸之类补肾；阿胶、芎、归之类和血。"参胸痛、胁痛条。

胸胁满 证名。出《素问·刺热论》。指胸胁部胀满不舒。多由邪阻气郁所致。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利，此本柴胡证，下之而不得利，今反利者，知医以丸药下之，非其治也。潮热者，实也。先宜服小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。"又"伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满，微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤主之。"伤寒阳明病亦可见本症。"阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，小柴胡汤主之。"胸胁痛可由热入血室引起。《金匮要略·妇人杂病脉证并治》："妇人中风，发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除脉迟，身凉和，胸胁满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也。当刺期门，随其实而取之。"参胸胁苦满等条。

胸痞 证名。❶指胸中满塞不痛。《症因脉治·胸痛论》："若胸中满塞而不痛，又名胸痞。"《杂病源流犀烛·胸膈脊背乳病源流》："大约胸满不痛者为痞，满而痛者为结胸。治法虽始终略同，自有重轻之异。先即胸痞明之。东垣曰，太阴湿土，主壅塞，乃土来心下而为痞也，伤寒下早亦为痞。……酒积杂病，下之过亦作痞。"参心下痞满、痞条。❷指胸中闷痛，属胸痹。《三因极一病证方论》卷九："病者心下坚满，痞，急痛，肌中苦痹缓，急如刺，不得俛仰，其胸前皮皆痛，手不得犯，胸中愊愊而满，短气，咳唾引痛，咽塞不利，习习如痒，喉中干燥，时欲吐呕，烦闷，自汗时出，痛引彻背，不治则数日杀人，病名胸痞。由下虚极，气上控膈使然，其脉阳微阴结。"治用栝蒌丸、橘皮生姜汤等方。参胸痹条。

胸痛 证名。出《素问·脉解篇》。指

胸部正中或偏侧作痛。多与心、肺、肝三脏有关。《素问·藏气法时论》："心病者，胸中痛。"《医碥·胸痛》："胸者，肺之部分，则其痛尤多属肺可知，乃医书多以肝病为言，此举隅之论耳，勿泥。须知胸为清阳之分，其病也，气滞为多，实亦滞，虚亦滞。气滞则痰饮亦停，宜行气除饮，此治在肺。"《杂病源流犀烛·胸膈脊背乳病源流》："胸者，肝之分，肺心脾肝胆肾心包七经脉俱至胸，然诸经虽能令胸满气短，而不能使之痛，惟肝独令胸痛，故属肝病。""肝虚胸痛引腰，宜补肾，补肾所以补肝也，宜六味丸加首乌、牛膝；肝实胸痛不能转侧，善太息，宜疏肝，宜宽胸饮；胸痛常欲蹈压其胸，先未痛，但欲饮热，名曰肝着，宜旋复汤；胸痛短气，是水气，宜五苓散；胸痛痞塞，痰气为害，宜二陈汤；胸痹急痛如锥刺，难于俛仰，汗出，或彻背上，不速治，或至死，宜生韭汁；胸痹痛引背，喘息咳唾短气，寸沉迟，关紧数，宜瓜蒌一个，薤白半斤，白酒七斤，煮二升，分二服，加半夏四两尤妙；……胸膈隐痛，肾虚不纳气，气虚不生血也，宜补肝散。"亦有指膈痛或胸痹之重者。《医宗必读·心腹诸痛》："胸痛即膈痛。"《医宗金鉴·订正金匮要略注》卷二十："胸痹之病轻者即今之胸满，重者即今之胸痛也。"参胸痹、膈痛条。

胸痹　病名。出《灵枢·本藏》。❶指胸膺部闷窒疼痛的一种病证。《葛洪肘后备急方》卷四："胸痹之病，令人心中坚痞忽痛，肌中苦痹，绞急如刺，不得俛仰，其胸前皮皆痛，不得手犯，胸满短气，咳嗽引痛，烦闷自汗出，或彻引背膂。"《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证治》："夫脉当取太过不及，阳微阴弦，即胸痹而痛，所以然者，责其极虚也。今阳虚，知在上焦，所以胸痹、心痛者，以其阴弦故也。""本人无寒热，短气不足以息者，实也。""胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短气，寸口脉沉而迟，关上小紧数，栝蒌薤白白酒汤主之。""胸痹不得卧，心痛彻背者，栝蒌薤白半夏汤主之。""胸痹心中痞气结在胸，胸满，胁下逆抢心，枳实薤白桂枝汤主之，人参汤亦主之。""胸痹胸中气塞，短气，茯苓杏仁甘草汤主之，橘枳姜汤亦主之。""胸痹缓急者，薏苡附子散主之。"胸痹有按症情轻重分为胸满、胸痛者。参胸痛条。本病可见于冠心病、心绞痛等疾患。❷指胃痹。《症因脉治》卷三："胸痹之症，即胃痹也。胸前满闷，凝结不行，食入即痛，不得下咽，或时作呕。"

胸满　证名。出《素问·腹中论》。指胸部胀满不适。可因风寒、热壅、停饮、气滞、血瘀等所致。《医宗金鉴·订正金匮要略注》："表实无汗，胸满而喘者，风寒之胸满也；里实便涩，胸满烦热者，热壅之胸满也；面目浮肿，胸满喘不得卧者，停饮之胸满也；呼吸不快，胸满太息而稍宽者，气滞之胸满也；今病人无寒热他病，惟胸满，唇痿，舌青，口燥，漱水不欲咽，乃瘀血之胸满也。"亦可见于少阳证中。《医学心悟·少阳经证》："胸半以上，乃清阳之分，正在半表半里，邪至此，将入里而未深入于里也，故胸满而腹未满者，乃邪气而非有物也。……陶氏治法，少阳证兼胸满者，小柴胡加枳桔。"

脏毒　病名。见《圣济总录》一百四十三卷。❶指脏中积毒所致的痢疾。《三因极一病证方论》卷之十五："然肠风脏毒，自属滞下门。脏毒，即是脏中积毒。"❷指一种内伤积久所致的粪后下血。《医学入门》卷五："自内伤得者曰脏毒，积久乃来，所以色黯，多在粪后，自小肠血分来也。"以粪后下血污浊色暗为主症，可伴见胃纳不振，身疲乏力，舌苔黄腻，脉濡数等。治宜清解热毒为主，选用槐花散、脏连丸、黄连解毒汤、清胃散、防风黄芩丸等方。郁滞重

者，亦可先用调胃承气汤加减，次用清化之剂。❸指肛门肿硬类似痔漏的病证。《血证论》卷四："脏毒者，肛门肿硬，疼痛流血，与痔漏相似。"

脏毒下血 病证名。见《儒门事亲》卷四。又称脏毒便血。《证治要诀·肠风脏毒》："血清而色鲜者为肠风，浊而暗者为脏毒。……脏毒者，蕴积毒气，久而始见"。多由肠胃湿热郁滞脏毒引起，主要症状为下血污浊色暗，胃纳不振，身体疲乏，苔黄腻，脉濡数等。治宜清化湿热，初起用调胃承气汤加当归，次用芍药柏皮丸、黄连解毒丸。久不愈者，用防风黄芩丸。参见脏毒条。

脏结 证名。见《医学心悟》卷二。即藏结。详该条。

脏寒腹胀 证名。指阳虚受寒所致的腹胀。《症因脉治》卷三："脏寒腹胀之症，四肢常冷，小腹胀急，冷硬如冰，小便清利，大便时泻，不思饮食，唇口色白，言语轻微，内经所云正水，即脏寒生满病之症也。"多因真阳素虚，脏气不足，又口食冷物，身得寒气，阴寒痞塞所致。《金匮翼》卷四："有寒气入里而胀于内者，盖阴气凝聚，久而不散，内攻肠胃，则为寒中胀满泄利之症。经云：脏寒生满病是也。"治宜温阳散寒。肝肾虚寒，腹冷如冰，大便不实，八味丸。小便不利，金匮肾气丸。脾肺虚，不思饮食，言语轻微，理中汤。手足逆冷，四逆汤。参见腹胀、内伤腹胀条。

脐下悸 证名。指脐下悸动不安。常为奔豚证的征兆。多因肾阳虚衰，水气内动所致。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。"《伤寒论本义》："脐下者，膀胱之位也。肾属水，宜静不宜动，今反悸动，皆因发汗亡阳于上而阴邪乘之而起也。悸为奔豚之兆。"参奔豚条。

脐下痛 证名。见《时方妙用》卷二。指脐腹部疼痛。《医学刍言》："脐下寒痛、火痛。寒痛乃肾阳虚而阴寒凝结，宜真武汤，或桂枝茯苓汤。又有火痛者，必小便不利，或小便点滴胀痛，宜五苓散送下通关丸。大便不通者，宜下之。"如脐下冷撮痛，阴内冷如冰者，用延胡苦楝汤（见《金匮翼》）。参见腹痛条。

脐中出血 证名。《伤寒九十论·脐中出血》："本少阴证，而误汗之，故血妄行，自脐中出。……予以治少阴之本，而用姜附汤。"本证亦有由肾火外越而致者，宜用六味地黄汤加骨碎补等药。

脐中痛 证名。见《张氏医通》。指脐周部疼痛。《医学刍言》："脐中痛不可忍，喜按者，肾气虚寒也。宜通脉四逆加白芍。若脉沉实，口渴，腹满，便闭，是有燥屎，宜承气下之。"亦有因虫积引起者。参见虫积腹痛、当脐痛等条。

脑风 病名。指风冷袭侵脑户的病症。见《素问·风论》。《圣济总录》卷十五："风生高远，始自阳经，然督脉阳维之会，自风府而上至脑户。脑户者，督脉足太阳之会也。……今风邪客搏其经，稽而不行，则脑髓内弱，故项背怯寒，而脑户多风冷也。"《证治准绳·头痛总论》："项背怯寒，脑户极冷，神圣散主之。"亦指邪气上熏而头痛不止之症。《杂病源流犀烛·身形病源流》："亦有风邪但攻于上焦，而邪气上熏，令人日夜头痛不止者，亦为脑风，宜太阳丹。"参头风、头痛条。

脑鸣 证名。头脑鸣响的简称。亦称天白蚁。指头内如有虫蛀鸣响。《杂病源流犀烛·头痛》："有头脑鸣响，状如虫蛀，名曰天蚁者，宜茶子末吹鼻，效。"《张氏医通·诸痛门》："头内如虫蛀响者，名天白蚁。多属于火，亦有因痰湿在上者。丹溪云，瘦人皆属于火，宜薄荷、栀子、茯苓、甘草、细辛、川芎、黄芩、石膏、芽茶之类；肥人皆属湿痰，半夏、茯苓、枳实、黄连、天麻、胆星、苍术、黄柏、芽茶之类。戴复庵云，

头中鸣响，有虚有实。实者用凉膈散、礞石丸下夺之；虚者非独参、保元、六味、八味、茸朱丹、鹿茸丸等药调补不应也。”参见天白蚁条。

脑逆头痛　证名。厥逆头痛的别称。见《世医得效方》卷十。详厥逆头痛条。

脑衄　病证名。指鼻出血甚者。《医宗金鉴·杂病心法要诀》：“鼻出血如泉，曰脑衄。”《血证论》：“脑衄者，口鼻俱出血也。乃鼻血多，溢从口出，非别有一道来血也。亦非真从脑髓中来，此不過甚言鼻衄之重，而因名之曰脑衄耳。”宜参苏饮，用人参益气止血，苏木行血祛瘀。如衄甚不止，气短肢厥，气随血脱者，可用独参汤加附子浓煎呷服。参见鼻衄有关各条。

脑黄　黄疸二十八候之一。《诸病源候论·黄病诸候》：“热邪在骨髓，而脑为髓海，故热气从骨髓流入于脑，则身体发黄，头脑痛，眉疼，名为脑黄候。”治宜石膏散等方。参黄疸有关条。

脑痛　病证名。指外邪入脑而致的头脑剧痛。见《中藏经》卷中。《脉因证治·头目痛》：“脑痛。乃风热乘虚而入于脑，以辛凉之药散之行之。……羌活汤，治风热壅盛，上攻头目，昏眩疼痛及脑疼。”《医钞类编》卷十二：“冬月大寒入脑，令人脑痛连齿痛，名曰脑痛。肾虚者多患之，缓治则死，急宜羌活附子汤。又风寒湿犯脑头痛，脑痛项筋急，头动摇，以及脑痛连齿等证。宜羌活散、麻黄散、细辛散、白芷散、蝎梢散。”参脑风条。

脑蒸　二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

脑漏　病名。鼻渊的俗称。《景岳全书·鼻证》：“鼻渊证，总由太阳督脉之火，甚者上连于脑，而津津不已，故又名为脑漏。”《医醇賸义·脑漏》：“脑漏者，鼻如渊泉，涓涓流涕，致病有三：曰风也，火也，寒也。鼻为肺窍，司呼吸以通阳，贼风侵入，随吸入之气上彻于脑，以致鼻窍不通，时流清涕，此风伤之脑漏也。阳邪外烁，肝火内燔，鼻窍半通，时流黄水，此火伤之脑漏也。冬月邪寒，感冒重阴，寒气侵脑，鼻窍不通，时流浊涕，此寒伤之脑漏也。”参见鼻渊条。

脓血痢　病名。指痢下多脓血者。《诸病源候论·痢病诸候》：“积热蕴结，血化为脓，肠虚则泄，故成脓血痢也。”《杂病源流犀烛·痢疾源流》：“又有脓血痢，凡脓血稠粘，里急后重，皆属于火。……易老云：行血则便脓自愈，调气则后重自除。重剂则以大黄汤下之，轻剂则以芍药汤和之。然而所便脓血，自有三部：如脉沉，恶寒，或腰痛，脐下痛，此中部血也，非黄芩不能治；如烦躁，先便脓后见血，此上部血也，非黄连不能治；如脉沉，恶寒，先见血后便脓，此下部血也，非地榆不能治。”参见痢疾有关条。

脂瘕　病证名。八瘕之一。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“脂瘕，在脂膜间，猝难踪迹，其苦腰背如刺，左右走腹中而切痛，少腹沉重，身体解㑊，大小便血，时甚时止，此症妇人独患之。”《类证治裁·痃癖癥瘕诸积论治》：“新产交合早，胞伤，子户失禁，精血杂下如膏，宜坐导脂瘕方。”参见瘕、癥瘕、八瘕等条。

衄（nǜ忸）　病证名。出《灵枢·杂病》。指鼻出血。《诸病源候论·鼻病诸候》：“血性得热，则流散妄行。从鼻出者，谓之衄。”也有统指鼻、齿、耳、目、舌以及皮肤不因外伤的出血者。详见鼻衄、衄血等条。

衄血　病证名。❶指非外伤性所致的头部诸窍及肌表出血。《灵枢·百病始生》：“阳络伤则血外溢，血外溢则衄血。”阳络指在上或属表的络脉而言。见齿衄、耳衄、目衄、鼻衄、舌衄、肌衄等各条。❷指鼻出血。《丹溪心法·咳血》：“衄血者，鼻中、

出血也。”衄血除由阴虚火盛迫血妄行，或瘀血内阻血不归经外，尚有阳虚不能固阴、脾虚不能摄血所致者。治疗除可用泻火、清热、凉血、滋阴等法外，并可采用补气摄血、导火归元以及活血止血等法。详见各有关条。

衄衊（miè 灭） 病证名。《素问·气厥论》：“鼻渊者，浊涕下不止也，传为衄衊。”衄指鼻血，衊指汗孔出血。《圣济总录·鼻衄门》：“胆受胃热，循脉而上，乃移于脑，盖阳络溢则血妄行，在鼻为衄，在汗孔为衊。二者不同，皆热厥血溢之过也。”也指鼻出血。《类经·疾病类》：“衄衊皆为鼻血，但甚者为衄，微者为衊。”参见衄血有关条。

狼疝 古病名。《诸病源候论》卷二十：“小腹与阴相引而痛，大便难，名曰狼疝也。”参见疝条。

狼毒中毒 病名。因药服或误服狼毒过量而出现中毒症状者。症见头晕，呕吐，腹痛，腹泻，严重者可致休克，死亡。冲捣药物可产生接触性皮炎。治疗宜中西医结合。《本草纲目》卷四载有解狼毒毒的药物，如兰汁、盐汁、白欽、杏仁、木占斯等。可参考。

留饮 痰饮之一。指水饮蓄而不散者。《诸病源候论·痰饮诸病候》：“留饮者，由饮酒后饮水多，水气停留于胸膈之间而不宣散，乃令人胁下痛，短气而渴。”《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》：“夫心下有留饮，其人背寒冷如掌大。留饮者，胁下痛引缺盆，咳嗽则辄已。胸中有留饮，其人短气而渴。四肢历节痛，脉沉者，有留饮。”若饮留于肾，则囊及足胫肿等。可用甘遂半夏汤等方。《医醇賸义·痰饮》：“留饮者，留而不去也。心下痞满，作哕，头眩。苓归桂朴汤主之。”如中阳不复，旧饮虽暂得排泄，新饮又可再留积，故迁延难愈。治宜逐饮扶正为法，后以健脾温肾固本。参见饮、痰饮条。

留饮咳 病名。指饮邪留肺所致的咳嗽。《千金要方》卷十八：“留饮咳者，其人咳不得卧，引项上痛。咳者如小儿掣纵状。”《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证治》：“留饮者，胁下痛引缺盆，咳嗽则辄已。”《外台秘要》卷九：“支饮家，咳，烦，胸中痛者，……与十枣汤方。”参见咳嗽、痰饮咳嗽等条。

留痹 病名。指日久而留着不去的痹症。《灵枢·官针》：“傍针刺者，直刺傍刺各一，以治留痹久居者也。”

〔丶〕

挛 证名。出《素问·异法方宜论》。挛为曲而不伸之状，常与拘、急并称，如拘挛、挛急，多属筋病。可分虚实寒热四证。《证治准绳·杂病》：“《内经》言挛皆属肝，肝主身之筋故也。……有热，有寒，有虚，有实。”虚挛多因血虚不能养筋，治用四物汤、养血地黄丸等方。实挛由于外受风寒，内有实热等所致，宜活血通经汤。寒挛则胫逆而痛，筋挛骨痛，治宜乌头汤、《千金》薏苡仁汤等方。热挛经谓肝气热则筋膜干，筋膜干则筋急而挛。用生地、当归之属。或六味丸加牛膝、当归等。

挛节 证名。指骨节拘挛。为骨痹之外证。《素问·逆调论》：“病名曰骨痹，是人当挛节也。”《圣济总录》卷二十：“肾脂不长，则髓涸而气不行，骨乃痹而其证内寒也。……外证当挛节，则以髓少而筋燥，故挛缩而急也。”参拘挛条。

挛急 证名。出《灵枢·经脉》。义同拘挛、拘急。参拘挛、拘急条。

高消 病名。即膈消、上消。《兰室秘藏·消渴门》：“高消者，舌上赤裂，大渴引饮，《逆调论》云心移热于肺，传于膈消者是也。以白虎加人参汤主之。”参见上消、膈消条。

离魂症　病名。指一种神情不宁，有虚幻感觉的病症。多因肝虚邪袭，神魂离散所致。《杂病源流犀烛·不寐多寐源流》："有神气不宁，每卧则魂魄飞扬，觉身在床而神魂离体，惊悸多魇，通夕不寐者，此名离魂症。由肝藏魂，肝虚邪袭，魂无所归，故飞扬离体也。宜前后服真珠母丸、独活汤。"《辨证录·离魂门》："人有心肾两伤，一旦觉自己之身分而为两，他人未见而己独见之，人以为离魂之症也，谁知心肾不交乎。"可选用摄魂汤、合魂丹、舒魂丹、归魂饮等方。

疳利　病证名。《儒门事亲》卷四："夫病疳利，米谷不化，日夜无度，腹中雷鸣，下利完谷出。可用导水丸、禹功散，泻讫，一二日可服胃风汤，不愈则又可与桂枝麻黄汤，发汗则愈矣。"

疳蠹　病名。指嗜食甘味，肠虫侵蚀府藏所致的疾患。《诸病源候论·疳蠹候》："人有嗜甘味多，而动肠胃间诸虫，致令侵食府藏，此犹是蠹也。……但虫因甘而动，故名之为疳也。其初患之状，手足烦疼，腰脊无力，夜卧烦躁，昏昏喜忘，嘿嘿眼涩，夜梦颠倒，饮食无味，面失颜色，喜睡，起即头眩体重，股胫酸疼。其上食五藏，则心内懊恼，出食咽喉及齿龂皆生疮，出黑血，齿色紫黑。下食肠胃，下利黑血。出食肛门，生疮烂开。胃气逆，则变呕哕。急者数日便死，亦有缓者，正沉嘿，支节疼重，食饮减少，面无颜色，在内侵食，乃至数年，方上食口齿生疮，下至肛门，伤烂乃死。"《太平圣惠方》卷六十："疳蠹，令人下部痒，腰脊挛急也。"治用苦参汤等方。参湿蠹、心蠹、妇儿科分册疳条。

疳蠹　病名。《圣济总录》卷七十八："疳蠹。论曰疳有五种，久变为虫蠹。一曰白疳，令人皮肤干燥，而无润泽之气。二曰赤疳，令人毛发焦枯。三曰蛲疳，令人腰脊强重。四曰疳蠹，令人下部挛急，背强不能俯仰。五曰黑疳，患者必死，令人五藏俱损，或下瘀血。此盖肠胃虚弱，嗜甘味过度，致脾气缓弱，谷气衰微，荣卫虚损，肠间诸虫，因虚而动，虫蚀于上，则手足烦疼，心中懊恼，嘿嘿不欲饮食，腰脊无力，食不知味，精神恍惚，夜梦颠倒，喉咽生疮，齿龂黯黑损烂，脓血俱出，胃气逆则变呕哕，下蚀肠胃，便痢脓血，或下瘀黑，久不已，则肛门烂开，渐至危殆。"治用五皮汤，二白汤、石榴丸等方。

病后多汗　证名。指病后体虚而致多汗之证。见《证治要诀·盗汗自汗》。病后多汗，有因表虚卫气不固者，治宜益气固表，可用黄芪建中汤、玉屏风散。有因气血俱虚者，治宜补益气血，可用八珍散、十全大补汤；或补气为主，兼以补阴，方用摄阳汤。

病后多眠　病证名。指因病后余邪未净，正气未复而睡眠过多者。《杂病源流犀烛·不寐多寐源流》："病后多眠，身犹灼热，余邪未清，正气未复也。宜沈氏葳蕤汤。"又："惟汗下后酣眠者，为正气已复，可勿药也。"参见嗜卧条。

疝（shān山）疾　古病名。即疟疾。《说文》："疝，有热疟。"《左传》："齐侯疥，遂疝。"《丹溪心法·疟》："疟又名疝疾者。"明·卢之颐《痎疟论疏》："痎疟总名曰疝。疝者，秋时寒热兼作，即疝作而金伏者是也。"

疹　证名。❶指温热病发疹。见《伤寒九十论·发斑证》。又称疹子。《温热经纬·叶香岩外感温热篇》："或云头隐隐，或琐碎小粒者为疹。"又："疹从血络而出，属经。"多由风热郁肺，内闭营分，从血络外出所致。症见皮肤上发出红色小点，形如粟米，抚之碍手，伴见发热烦躁，咳嗽胸闷，口渴，舌绛等症。疹为邪气外达，故宜透发。疹色以红活为佳，紫赤者为热盛，紫黑者为毒重。疹出而神情清爽，为外解里

和。若神志不清，系热毒炽盛，正不胜邪，有内陷之象。治宜宣肺达邪，清营透疹为主。《温病条辨·上焦篇》："发疹者，银翘散去豆豉加细生地、丹皮、大青叶、倍元参主之。"又："神昏谵语者，清宫汤主之，牛黄丸、紫雪丹、局方至宝丹亦主之。"参见斑疹条。❷指疮疹。《丹溪心法·斑疹》："疹即疮疹。"❸指久病。《素问·奇病论》："无损不足益有余，以成其疹。"王冰注："疹，久病也。"

疹筋 证名。指肝病筋急而见腹中拘急者。《素问·奇病论》："此所谓疹筋，是人腹必急。白色黑色见，则病甚。"《内经吴注》卷十三："疹筋，病筋也，腹为宗筋所迳，故腹必急。"多由肾虚肝失滋养所致。参筋急、转筋条。

疹挛 证名。出《灵枢·邪客》。即拘挛。详该条。

疰 古病名。出《素问·五常政大论》。又称注病。疰有转注和留住的意思，指一些具有传染性和病程迁延的疾病。《金匮翼·诸疰》："疰者，住也。邪气停住而为病也。皆因精气不足，邪气乘之，伏于筋脉，流传藏府，深入骨髓，经久不已，时发时止，令人昏闭，无不痛处。"本病因变症多端，名称各异。如分十疰、九疰等。参见十疰、九注等条。

疰夏 病名。又名注夏。❶指有明显夏令季节发病的一种病证。见《丹溪心法》卷一。《时病论》："疰夏者，每逢春夏之交，日长暴暖，忽然眩晕，头痛，身倦，脚软，体热食少，频欲呵欠，心烦自汗是也。"治宜益气阴，消暑热。方用补中益气汤去柴胡、升麻，加麦冬、五味、黄柏，生脉散等。❷劳病之一。《杂病源流犀烛·暑病源流》："劳之为病，其脉浮。又手足烦热，寒精自出，脚酸削不能行，小腹虚满，春夏剧，秋冬瘥，谓之疰夏病。"可用黄芪建中汤。❸夏痧之别称。《医碥》卷三："痧发于夏者，俗名注夏。"《杂病源流犀烛·暑病源流》："疰夏，脾胃薄弱病也。然虽由脾胃薄弱。亦必因胃有湿热及留饮所致。昔人谓痧发于夏，即名疰夏。以疰夏之证，必倦怠四肢不举，羸瘦不能食。"参见暑病条。

痃 病名。亦称痃气。❶指腹部两侧筋脉扛起急痛的疾患。《太平圣惠方·治痃癖诸方》："痃者，在腹内近脐左右，各有一条筋脉急痛，大者如臂，次者如指，因气而成，如弦之状，名曰痃气也。"《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃痃癖痞源流》："痃者，悬也，悬于腹内，近脐左右各有一条筋脉扛起，大者如臂如筒，小者如指如笔管如弦。其原皆由阴阳之气不和，常多郁塞，又时忿怒，动气偏胜，或适当饮食，与气缠裹，适受寒冷，与气停留，且忿怒则肝火盛，而血随气结，痰亦缘火相附而升，遂合并而成形质，悬于脐之左右，故名曰痃。"治用麝香丸、积块丸、三棱散等方。❷指皮肉间的积块。《医宗金鉴·杂病心法要诀》："痃者，外结募原肌肉之间。"《罗氏会约医镜》卷八："痃者，因气滞为积，其皮厚，在肌肉之间，有可见者也。治宜理气补气，待正气旺，用艾炷之。"参痞块、癖等条。

痃气 病名。痃的别称。见《太平圣惠方·卷四十九》。详痃条。

痃癖 病名。见《外台秘要》卷十二。指脐腹偏侧或胁肋部时有筋脉攻撑急痛者。《太平圣惠方·卷四十九》："夫痃癖者，本因邪冷之气积聚而生也。痃者，在腹内近脐左右，各有一条筋脉急痛，大者如臂，次者如指，因气而成，如弦之状，名曰痃气也；癖者，侧在两胁之间，有时而僻，故曰癖。夫痃之与癖，名号虽殊，针石汤丸主疗无别。此皆阴阳不和，经络否隔，饮食停滞，不得宣疏，邪冷之气，搏结不散，故曰痃癖也。"可用桃仁丸、槟榔子丸、半夏汤等方。若冷则痛发，宜葱白散，再服鸡鸣

丸；若胁腹作痛，肝脾失和，用木香顺气散去苍术，加郁金、延胡。参癖、痃等有关条。

疲劳咳嗽　病名。指疲极伤肝所致的虚咳。《医学入门·咳嗽》："疲极伤肝，咳而左胁疼引小腹者，二陈汤加芎、归、芍药、青皮、柴胡、草龙胆、黄芩、竹茹，或黄芪建中汤。"《不居集·疲劳咳嗽》："咳而左胁偏痛，引小腹并膝腕疼。"参见咳嗽、劳咳条。

痉　病名。出《灵枢·经筋》。又称痓。以项背强急，口噤，四肢抽搐，角弓反张为主症。《金匮要略·痉湿暍病脉证治》："病者身热足寒，颈项强急，恶寒，时头热，面赤目赤，独头动摇，卒口噤，背反张者，痉病也。"痉有虚实二证。实证多因风、寒、湿、痰、火邪壅滞经络而成。虚证多因过汗，失血，素体虚弱，气虚血少，津液不足，筋失濡养，虚风内动所致。《金匮要略心典》卷上："盖病有太阳风寒不解，重感寒湿而成痉者，亦有亡血竭气，损伤阴阳，而病变成痉者。……阴阳既衰，筋脉失其濡养，而强直不柔矣。此痉病标本虚实之异，不可不辨也。"实证治以祛邪为主，可兼扶正。虚证以益气养血为主，兼予熄风。痉有刚痉、柔痉、阳痉、阴痉、三阳痉、三阴痉、风痉、风寒痉、风痰痉、痰火痉、湿热痉、热甚发痉、血虚发痉、虚痉等。详各条。

凉注　九注之一。《诸病源候论·诸注候》："凉注，心下乍热乍寒，一年之后，四支重，喜卧，噫酢，体常浮肿，往来不时，皮肉黑，羸瘦，生癖，目黄，爪甲及口唇青。"参见九注条。

凉燥　病名。亦称燥凉。指感受秋燥之邪而偏寒者，与温燥相对而言。《重订通俗伤寒论·秋燥伤寒》："秋深初凉，西风肃杀，感之者多病风燥，此属燥凉，较严冬风寒为轻。"《温病条辨》卷四："盖燥气寒化，乃燥气之正。……盖以燥统于寒，而近于寒。"此病初起，多见头痛身热，恶寒无汗，鼻塞流涕，状类风寒，惟唇燥咽干，干咳连声，舌苔薄白而干，脉浮弦紧等证，治宜辛开温润，用杏苏散、葱豉汤之类。如寒热已解，而胸满腹胀便秘，咳嗽不爽而多痰，此乃肺燥移于大肠，法当肃肺化痰，润肠通便，用五仁橘皮汤。参见秋燥、温燥等条。

涕痧　痧证之一。指患痧伴神志症状。《痧症全书》卷中："涕痧，初起跌倒，牙关紧闭，不省人事，捧心拱起，鼻扇耳鸣，急为大放毒血，用金七石一丸。"

酒风　古病名。又名漏风。《素问·病能论》："有病身热解堕，汗出如浴，恶风少气，……病名曰酒风。"详漏风条。

酒胀　胀病之一。《张氏医通·腹满》："嗜酒之人，病腹胀如斗，前后溲便俱有血，用利药转加，其脉数而涩。此得之湿热伤脾阴，不能统血，胃虽受谷，脾不输运，故成痞胀。当理脾气，祛湿热，兼养血之剂，如枳实、黄连、炮姜、半夏、茯苓、当归、芍药、阿胶、乌梅、砂仁之类。"参鼓胀、酒鼓条。

酒泄　病名。见《世医得效方·大方脉杂医科》。又称酒湿泄、纵酒泄泻、伤酒泄泻。因饮酒过度，损伤脾胃所致。有寒热之分。《不居集·酒伤》："人但知酒有湿热，而不知酒有寒湿也。"有善饮而先天禀厚者，大便泄泻，若一日不泻，反觉闷热，此属湿热。治宜清利，用四苓散、大分清饮、葛花解醒汤、酒蒸黄连丸之类。多饮酒而阳气虚弱者，酒湿从寒化，症见饮食渐减，形体渐瘦，困倦畏寒，泄泻日久，或五更作泄，或秋冬加剧，脉多弦细。治宜培补脾肾、温化寒湿，用平胃散、补中益气汤、理中汤、八味丸、胃关煎等方。

酒注　九注之一。《诸病源候论·诸注候》："酒注，体气动，热气从胸中上下，无处不痛，一年之后，四支重，喜卧，喜

哕，嘈酸，体面浮肿，往来不时。”参见九注条。

酒食齆 病证名。指伤于酒食而致的鼻齆。《三因极一病证方论》卷九：“病者饮酒过多，及啖炙爆五辛热食，动于血，血随气溢，发为鼻齆，名酒食齆。”用茅花汤、加味理中丸。参见鼻齆条。

酒哮 证名。指因酒伤所致的哮喘。属虚哮范畴。《类证治裁》卷二：“治虚哮，用麦冬三两，桔梗三钱，甘草二钱。……酒哮，加柞木三钱。”参虚哮条。

酒积 病证名。九积之一。见《儒门事亲》卷二。指因饮酒过多而成积滞者。《医碥》卷三：“酒积，目黄口干，肚腹胀痛，少食。宜葛根、枳实、麦芽之类。”亦可用曲蘗丸、酒积丸、乌白丸等方。（见《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》）。参积条。本证可见于酒精性胃炎、肝硬变等疾病。

酒积五更泄泻 病证名。见《症因脉治·泄泻论》。指饮酒过多，损伤脾胃，酿成湿热所致的晨泄。其症每至五更则腹中作痛，泄下黄沫，小便赤色或如米泔，脉洪数或弦数。治宜清化湿热，用平胃四苓散加葛根、黄柏，或家秘川连枳壳汤。参酒泄、纵酒泄泻条。

酒积泄 病证名。一作酒积泻。《不居集·泄泻》：“酒积泄，饮酒太多，清晨作泄，或五更腹痛，泄下黄赤，此酒湿入脏所致，非肾虚者比也。”参酒积五更泄泻条。

酒积泻 病证名。见《医略六书·杂病证治》。又称酒积泄、酒积五更泄泻。详各条。

酒积便血 病证名。多因嗜酒过度，湿热结蓄大肠所致。初起宜清湿热，解酒毒。选用黄连丸、酒蒸黄连丸、约营煎、聚金丸、槐角丸之类。日久下痢脓血，腹痛不瘥，宜用乌梅丸、椶白皮散。酒湿从寒化者，宜用二术煎、四君子汤或葛花解酲汤。参便血、痢疾条。

酒积腹痛 病证名。指嗜酒无度、湿热伤脾所致的腹痛。《症因脉治》卷四：“酒积腹痛之症，痛而欲利，利下黄沫，天明即发，饮酒痛甚，小便赤涩。”治疗如痛而欲利，脉沉数者，枳壳大黄汤；口苦舌干，干葛清胃汤；利下黄沫，栀连平胃散加枳壳；小便赤涩，益元散等方。参腹痛、内伤腹痛条。

酒疸 五疸之一。亦称酒黄疸，见《金匮要略·黄疸病脉证并治》。多因饮酒过度，湿热郁蒸，胆热液泄所致。《寓意草·论钱小鲁嗜酒积热之证》：“热淫内炽……，故胆之热汁，满而溢出于外，以渐渗于经络，则身目俱黄，为酒疸之病。”症见身目俱黄，面发赤斑，心中懊侬热痛，鼻燥，腹满不欲食，时时欲吐等。治宜清利湿热，解酒毒。若脉浮滑，欲吐甚者，当先探吐。脉沉滑而腹满大便秘者，当先下之。方如栀子大黄汤、葛花解酲汤、旺胆消酒汤等。本病可见于酒精性肝炎、酒精性肝硬化、胆汁郁积性肝炎等。参黄疸、五疸条。

酒黄 三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一：“病人五脏积热，面赤，言语带邪，昏沉错乱，目中黄色，此是酒黄。灸后心、百会、下廉三处百壮。若愦气上喘，脉如屋漏，此候不治，如只大便下血，宜服泽泻汤方。”参黄疸有关条。

酒黄疸 病名。即酒疸。《金匮要略·黄疸病脉证并治》：“酒黄疸，心中懊侬或热痛，栀子大黄汤主之。”又：“酒黄疸者，或无热，靖言了了，腹满欲吐，鼻燥，其脉浮者先吐之，沉弦者先下之。”参黄疸、酒疸条。

酒厥 厥证之一。指酒后四肢厥冷，不省人事的病证。《证治汇补·伤酒章》：“大醉之后，忽然战栗，手足厥冷，不省人事，名曰酒厥。”又“酒后发厥，四肢俱冷，不省，先以姜汤灌下，然后服药，不可即投寒

剂。”《杂病源流犀烛·诸厥源流》：“食厥者，……或因酒而得，亦名酒厥。宜二陈汤加青皮、葛根。”本病可见于急性酒精中毒。参厥证、食厥条。

酒渴　❶渴证之一。因饮酒过多所致。《证治要诀·拾遗门》：“酒渴者，干葛调五苓散。”参见渴条。❷消渴病之一种。又名酣饮。《类证治裁·三消》：“有酒渴，由嗜酒积热烦渴，专嗜冷物，乌梅木瓜汤。”详酣饮条。

酒湿泄　病症名。又名酒泄。《罗氏会约医镜·论泄泻》：“酒湿泄，用葛花解醒汤，此因酒之湿热也，而亦有因酒生寒湿者，以酒性去，而水性留为寒也，惟峻补命门则可。”详酒泄条。

酒痫　病名。指酒毒蓄积肠胃所致的痫疾。见《三因极一病证方论》卷九。亦作酒利。《医说》卷六：“有人日逐饮酒，遂成酒利。”其症腹痛，痫血，或下如鱼脑。久者形削骨立，终日不食，但饮酒一二盏。治宜解酒毒为主。葛根汤、香茸丸，或以丝瓜一条，连皮烧研，空心酒服（见《文堂集验方·痫疾》）。参痫疾条。

酒禁　证名。指饮酒后身体发冷颤抖。《素问玄机原病式·六气为病》：“酒苦性热，养于心火，故饮之过多，则心火热甚，而为战栗，俗谓之酒禁也。”参战栗、振寒条。

酒痰　痰证之一。❶指酒湿积聚所致者。《杂病源流犀烛·痰饮源流》：“酒痰，因饮酒不消，或酒后多饮茶水，但得酒，次日即吐，饮食不美，呕吐酸水等症，宜瑞竹堂化痰丸。”❷指素有痰疾，因饮食酒醪厚味而喘咯欬唾者，又名味痰。《泰定养生主论》：“味痰，又名酒痰。味痰者，因饮食酒醪厚味而唾痰也。……此皆素抱痰疾者，因风寒气热味而喘咯咳唾，非别有此五种之痰。”参味痰、痰证条。

酒嗽　病名。指饮酒过度伤肺所致的咳嗽。《丹溪心法·咳嗽》：“饮酒伤肺，痰嗽，以竹沥煎紫苏，入韭汁，就吞瓜蒌杏连丸。”《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》：“酒嗽，伤酒而成也。盖酒大热有毒，或冷热兼饮，日久渐伤胃脘，其气结聚不流，致成湿痰作嗽。”宜用瓜蒌青黛丸、蜂姜丸等。参咳嗽条。

酒瘕　病证名。指饮酒过多所致的瘕病。《诸病源候论·癥瘕病诸候》：“人有性嗜酒，饮酒既多，而食谷常少，积久渐瘦，其病遂常思酒，不得酒，即吐，多睡不复能食，云是胃中有虫使之然，名为酒瘕也。”参瘕条。

酒臌　病证名。臌胀之一。《不居集·酒臌》：“少年纵酒无节，多成酒臌。……其有积渐日久，而成酒臌者，则尤多也。盖酒性本湿，壮者气行则已，酒即血也，怯者著而成病，酒即水也，不惟以酒为水，而血气既衰，亦皆随酒悉化为水矣，所以凡治水臌者，必当以血气为主，而养阴利湿，是诚善矣。”参水鼓条。

酒癖　病名。指饮酒过度，水饮搏聚于胸膈、胁肋的癖病。《诸病源候论·酒癖候》：“夫酒癖者，因大饮酒后，渴而引饮无度，酒与饮俱不散，停滞在于胁肋下，结聚成癖，时时而痛，因即呼为酒癖，其状胁下气急而痛。”《外台秘要》卷八：“酒癖，饮酒停痰水不消，满逆呕吐，目视眩眩，耳聋，腹中水声。”《太平圣惠方·治酒癖诸方》：“酒癖，因酒后饮水，停留于胸膈之间及两胁下痛，短气而渴。”《圣济总录》卷七十三：“胃弱之人，因饮酒过多，酒性辛热，善渴而引饮，遇气道否塞，酒与饮俱不化，停在胁肋，结聚成癖，其状按之有形，或按之有声，胁下弦急，胀满，或致痛闷，肌瘦不能食，但因酒得之，故谓之酒癖。”治宜消癖化饮。可选用大七气汤、消饮丸、姜桂丸、曲蘖丸、海藻丸等方。参癖有关条。

酒瘿 病证名。指饮酒过多而形成的一种瘕病。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："如平时嗜酒，血入于酒，而成酒鳖。"其症状与气瘿、血瘿相似。治宜芜荑汤等方。参瘕、鳖瘕条。

酒齄鼻 证名。见《证治准绳·杂证》。即鼻齄。详该条。

消 病名。《素问·阴阳别论》："二阳结，谓之消。"二阳指阳明，阳明热盛阴伤，其症消谷善饥，饮食不荣肌肉，故称消。后世将消病分为三类。《医述·三消》："消病有三。曰消渴，曰消中，曰消肾。"《景岳全书·杂证谟》："消证有阴阳，尤不可不察。如多渴者，曰消渴；善饥者，曰消谷；小便淋浊如膏者，曰肾消。凡此者多由于火。"亦指中消。《杂病源流犀烛》："二阳结，谓之消，皆中消也。"参见三消、消渴、中消条。本病可见于糖尿病、甲状腺机能亢进症等。

消中 病名。出《素问·腹中论》。❶又称痟中。《太平圣惠方》卷五十三："吃食多而饮水少，小便少而赤黄者，痟中也。"❷一名内消。《圣济总录》卷十三："病消中者，不渴而多溲，一名内消。"❸即中消。见《杂病源流犀烛·三消源流》。其症多食善饥，口干饮水，大便硬，小便如泔。详中消条。

消心 病名。即上消。《证治要诀·三消》："上消消心，心火炎上，大渴而小便多。""消心之病，往往因欲饮食过多，及食啖辛热，饮引既多，小便亦多。当抑心火使之下降，自然不渴，宜半夏泻心汤。"参上消条。

消谷 指食物入胃后，很快消化。《灵枢·大惑》："胃热则消谷，谷消故善饥。"常为中消主症，参该条。

消谷善饥 证名。指食入易消，自觉易饥的症状。多由中焦热盛所致。《灵枢·经脉》："气盛则身以前皆热，其有余于胃，则消谷善饥，溺色黄。"常为中消主症之一。参该条。本症多见于糖尿病、甲状腺机能亢进等疾患。

消肾 病名。见《圣济总录》卷十三。即肾消。详该条。

消脾 病名。即中消。《证治要诀·大小腑门》："消脾，缘脾经燥热，食物易化，皆为小便，转食转饥。"详中消条。

消渴 病名。出《素问·奇病论》。亦作痟渴。❶泛指具有多饮，多食，多尿症状的疾病。分上消，中消，下消三种。《证治汇补·消渴章》："上消者，心也。多饮少食，大便如常，溺多而频。中消者，脾也。善渴善饥，能食而瘦，溺赤便闭。下消者，肾也。精枯髓竭，引水自救，随即溺下，稠浊如膏。"本证可见于糖尿病、尿崩症等。详上消、中消、下消各条。❷指口渴，多饮，多尿而小便甜的病症。《外台秘要》卷十一："渴而饮水多，小便数，无脂似麸片甜者，皆是消渴病也。"本证即现代所称糖尿病。❸消渴病一种。以口渴，尿少为主症。《太平圣惠方》卷五十三："夫痟渴者，为虽渴而不小便也。"

消瘅 病名。出《灵枢·五变》。❶即消渴病。《儒门事亲》："消瘅者，众消之总名。"《证治准绳·消瘅》："渴而多饮为上消，经谓膈消；消谷善饥为中消，经谓消中；渴而便数有膏为下消，经谓肾消。"参消渴、上消、中消、下消等条。❷即热中。《杂病源流犀烛·三消源流》："消瘅，肝心肾三经之阴虚而生内热病也，即经所谓热中，与三消异。"其症阴虚内热，肌肉消瘦，脉微细。治宜滋阴清肝，用生地黄饮子、玉泉丸等方。参热中条。

浮肿 证名。水肿病的常见证候之一。出《素问·气交变大论》。浮肿有虚实之分，以虚证为多见。《景岳全书·杂证谟》："今肺虚则气不化精而化水，脾虚则土不制水而反克，肾虚则水无所主而妄行，水不归

经则逆而上泛，故传入于脾而肌肉浮肿，传入于肺则气息喘急。”浮肿虚者，当以培补脾肾为主，方用实脾饮、金匮肾气汤、真武汤等。实者，当以逐水为先。《证治汇补·水肿章》：“牵牛散，治脾湿太过，遍身浮肿，喘不得卧，腹胀如鼓，大便不溏，小便涩滞。”参水肿等条。

浮痹　病名。指邪在皮肤表层的痹证。《灵枢·官针》：“毛刺者，刺浮痹于皮肤也。”

流火流痰痧　痧证之一。《痧胀玉衡·流火流痰痧》：“痧毒传变，不待时日，朝发于足而足肿痛，夕流于手而手肿痛，朝发于肌肤而肌肤红肿，夕入于里而痰喘不休。此等之痧，乍隐乍现，乍来乍去，按之脉而痧脉或不现，最难识认。如痧毒所流及之处，热者似流火而非流火，肿者似流痰而非流痰。或痛极难忍，或痒痛不已，又痧之变者也。欲知此痧，须看病势凶暴，不比流痰流火之轻缓者。验之于痧筋发现，刺之无疑。然后凭脉所犯风寒暑湿，及食积痰血气阻，分治之。”参痧条。

流饮　痰饮之一。❶指狭义的痰饮。《诸病源候论·痰饮诸病候》：“流饮者，由饮水多，水流走于肠胃之间，漉漉有声，谓之流饮。”参痰饮条。❷指痰饮流注无定者。《杂病源流犀烛·痰饮源流》：“流饮，饮水流行，遍体俱注无定在是也。宜三花神佑丸。”

浪子瘟　病名。瘟疫之一。即蝦蟆瘟。《古今医鉴·温疫》：“使人痰涎壅盛，壮热如火，头疼身痛，项强睛疼，声哑腮肿，俗呼浪子瘟，或称虾蟆瘟，城市乡村，家户相类。”治宜人参败毒散加干葛；若寒热往来，用小柴胡汤等方。详蝦蟆瘟条。

涌水　古病名。指水邪流于肠胃，上及肺部之疾患。症见行走时肠鸣，喘不得平卧者。《素问·气厥论》：“肺移寒于肾为涌水。涌水者，按腹不坚，水气客于大肠，疾行则鸣濯濯，如囊裹浆，水之病也。”王冰注：“肺藏气，肾主水，夫肺寒入肾，肾气有余则上奔于肺，故云涌水也。”《儒门事亲》卷六：“病涌水证，面黄而喘，两足皆肿，按之陷而复起，行则濯濯有声，常欲饮水，不能睡卧，戴人令上涌去痰而汗之，次以舟车丸、浚川散下之，以益肾散复下之，以分阴阳利水道之剂复下之，水尽皆瘥。”参痰饮条。

涎积　古病名。九积之一。指饮涎壅聚而成积者。《儒门事亲》卷三：“涎积，咽如拽锯，朱砂、腻粉之类，甚者瓜蒂、甘遂。”上药性烈有毒，宜慎用。参痰积条。

烦　证名。出《素问·生气通天论》。❶指热。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤。”《注解伤寒论》卷二：“烦者，热也。发汗身凉为已解，至半日许，身复热，脉浮数者，邪不尽也，可更发汗，与桂枝汤。”《伤寒明理论》卷一：“烦者，热也，……故又有烦疼，即是热疼，又有烦渴，即是热渴也，以烦为热，又何疑焉？至于胸中烦，心中烦，内烦，虚烦，皆以烦为热。”《诸病源候论·虚劳候》：“男子劳之为病，其脉浮大，手足烦，……。”❷指烦躁。《素问·生气通天论》：“烦则喘喝。”王冰注：“烦谓烦躁。”❸指内热心烦。《杂病源流犀烛·烦躁健忘源流》：“内热心烦曰烦，故烦者，但心中郁烦也。”参烦热、虚烦、心烦、烦躁条。

烦心　证名。出《素问·玉机真藏论》。即心烦。详该条。

烦乱　证名。指心烦意乱。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。参烦、烦躁条。

烦冤　证名。指心烦不宁，似有冤苦难言之状。以实热证较为多见，亦有因虚热而致者。《素问·阴阳应象大论》：“阳胜则身热，腠理闭，喘粗为之俯仰，汗不出而热，齿干以烦冤……。”《素问·示从容

论》："肝虚，肾虚，脾虚，皆令人体重烦冤。"

烦热 证名。出《素问·至真要大论》。❶表热的一种。《伤寒明理论》卷一："烦者热也，与发热若同而异也。发热者，怫怫然发于肌表，有时而已者是也；烦者，为烦而热，无时而歇者是也。二者均为表热，而烦热为热所烦，非若发热而时发时止也，故谓之烦热。"❷指闷热。《伤寒绪论》卷下："烦热，为郁闷不安，火热不得发越之象，不经汗吐下而烦热者，为太阳表证。经曰：病人烦热，汗出则解。如未作膈实，当和解而已；若心下满而烦，则有吐下之殊。烦热自汗而渴属阳明；烦热脉弦，喜呕，或烦而不呕属少阳，不可不辨。汗下后六、七日不大便，小腹满而烦，或胸中痛而烦热，喘逆者，为有燥屎，大承气汤急下之。"若肝火不清，时多郁怒而烦热者，可用徙薪饮；若三阴亏损，血虚火盛而烦热不止者，可用地黄膏、三才封髓丹（见《景岳全书·杂证谟》）。❸指发热烦躁不安。《伤寒温疫条辨》卷二："烦热者，因发热而烦躁不安也，惟温病为特甚。此盖杂气伏郁三焦，邪火亢闭，怫热燔灼，故心神无定耳。增损双解、增损三黄石膏之属，消息治之。"参发热等条。

烦悗 （mán 瞒）证名。指心胸烦闷，亦指四肢困闷不舒之感。亦称烦惋。《灵枢·热病》："热病，先身涩，倚烦而热，烦悗。"《灵枢·胀论》："脾胀者，善哕，《四肢烦悗，体重不能胜衣，卧不安。"

烦惋 烦悗的别称。指心胸烦闷。《素问·调经论》："血并于上，气并于下，心烦惋善怒。"马莳注："惋宜作悗，《灵枢经》俱用此悗字。"

烦冤嗽 病名。指肾虚气逆作咳。《素问·示从容论》："咳嗽烦冤者，是肾气之逆也。"《不居集·烦冤嗽》："《素问》云，咳嗽烦冤，是肾气之逆也，八味丸、安肾丸主之。"《证治汇补·咳嗽》："咳嗽烦冤，肾气之逆，以肾为藏气之脏也。凡咳嗽引动百骸，自觉从脐下逆奔而上者，乃肾虚气不归原，宜所服药中加补骨脂、五味子以敛之。"《医宗必读·咳嗽》："肾虚而龙火亢上则乘金而为咳嗽，烦热冤苦，此虚痨之候也。"《医门法律·咳嗽门》："伤肾之咳，气逆烦冤，牵引腰腹，俯仰不利，六味地黄汤加五味子。"参咳嗽、肾咳条。

烦满 证名。见《素问·热论》。指心烦而胸中闷满。多由邪热内盛，或痰瘀阻滞，或留饮、瘀血内停所致。可见于多种病证，如伤寒、肺痹、癫狂。

烦躁 证名。出《素问·至真要大论》。烦为心热、郁烦；躁为躁急、躁动。烦与躁常并见，而有先后之别。《伤寒明理论》卷二："所谓烦躁者，谓先烦渐至躁也"（先躁后烦，称为躁烦）。本证有虚实寒热之分。在外感热病中，凡不经汗下而烦躁者多实，汗下后烦躁者多虚。《类证治裁·烦躁》："伤寒有邪在表而烦躁者，脉浮紧，发热身痛，汗之则定，大青龙汤。有邪在里而烦躁者，脉数实有力，不大便，绕脐痛，下之则定，承气汤。有阳虚而烦躁者，汗下后，昼烦躁，夜安静，脉沉微，身无大热，干姜附子汤。有阴盛而烦躁者，少阴症，吐利，手足冷，烦躁欲死，吴茱萸汤。"《伤寒绪论·烦躁》："有温病、热病、时疫、温疫、表里俱邪、三焦大热、烦躁大渴者，白虎（汤）、解毒（清热解毒汤、黄连解毒汤）、凉膈（散）、双解（散）、承气（汤）、三黄石膏（汤）选用。"内伤杂证，常烦多于躁。如阴虚火动而烦，用生脉散加生地、枣仁、茯神（见《中医临证备要》）。亦有因脏腑实热而致烦躁者。《张氏医通·神志门》："火客心包，或酒客膏粱，上焦不清，令人烦躁，宜芩连山栀等凉药为君，稍用炮姜为使，甚则凉膈散下之。"若不烦而躁者，多属阴证，间有属热者。参烦、心烦、

燥烦、阴躁等条。

穷泄　即泄泻。穷指“后穷”。《素问·至真要大论》：“太阴之复，则湿变乃举……甚则入肾，穷泻无度。”详泄泻条。

诸菌中毒　病名。因食有毒蕈菌中毒。见《金匮要略·果实菜谷禁忌并治》。详食蕈菌中毒条。

诸腑心痛　证名。指外邪侵犯诸腑所致的心痛。《三因极一病证方论》卷九：“诸腑心痛，难以俛仰，小腹上冲，卒不知人，呕吐，泄泻。……诸腑涉邪所致，病属外所因。”参心痛条。

〔ㄱ〕

弱虫病　病名。九虫病之一。又名膈虫病。《诸病源候论·九虫病诸候》：“弱虫，状如瓜瓣。”其症令人多睡。参九虫病条。

通身肿　证名。即遍身肿。《诸病源候论·水肿病诸候》：“水病者，由肾脾俱虚故也。肾虚不能宣通水气，脾虚又不能制水，故水气盈溢，渗液皮肤，流遍四肢，所以通身肿也。令人上气体重，小便黄涩，肿处按之，随手而起是也。”《备急千金要方·水肿》：“猪苓散主虚满通身肿，利三焦，通水道。”参遍身肿、水肿条。

十一画

〔一〕

黄水　十水之一。《中藏经·论水肿脉证生死候》：“黄水者，其根起于脾，其状先从腹肿也。”参十水条。

黄肉随　疫病的一种。见《伤寒总病论》卷五。《三因极一病证方论·叙疫论》：“病者头重，颈直，皮肉强痹，或蕴而结核，起于喉颈之侧，布热毒于皮肤分肉之中，上散入发际，下贯颞颥，隐隐而热，不相断离，病名黄肉随。……其病从太阳阳明相格，寒湿不调，关节格滞。”治宜清解疫毒，或温脾化湿。

黄汗　病名。《金匮要略·水气病脉证并治》：“黄汗之为病，身体肿，发热，汗出而渴，状如风水，汗沾衣，色正黄如蘗汁，脉自沉……”可伴两胫冷，身疼重，腰髋弛痛或小便不利等。由汗出入水壅遏营卫，或脾胃湿热郁伏熏蒸肌肤引起。治宜实卫和营，行阳益阴，方用芪芍桂酒汤、桂枝加黄芪汤等。本病在《金匮要略》属水气篇而与风水、历节等不同，并指出：黄汗“汗出已反发热者，久久其身必甲错；发热不止者，必生恶疮。若身重，汗出已辄轻者，久久必身瞤，瞤即胸中痛”。《千金要方》以本病为五疸之一。《圣济总录》卷六十一：“其证使人身体虚浮，骨节疼痛，发热汗出而不渴者是也。”后世医书如《证治准绳》、《症因脉治》等以黄汗身肿者属水肿门，黄汗身不肿者属黄疸门。

黄汗身肿　病名。《症因脉治》卷三：“黄汗身肿之症，身热胸满，四肢黄肿而渴，状如风水，汗出沾衣，色如柏汁，久不愈，必致痈脓。又有不恶风，小便利，若上焦寒，口多涎，身冷肿痛，状如周痹，胸中窒，不能食。又有两胫不冷，反发热，名历节。食已汗出，常见盗汗，汗出不凉，反发热，久久必甲错，生恶疮，身瞤瞤，胸中痛，剧者不能食，身疼重，烦躁，小便不利，皆黄汗肿症也。黄汗身肿之因，以汗出入水，水邪

内侵，或汗出当风。汗与水皆寒湿之气，内结郁久，则成热成黄，而黄汗肿之症作矣。”多见沉脉。治用黄芪芍药桂酒汤、桂枝加黄芪汤等方。参身肿、水肿条。

黄昏嗽 又名黄昏咳。指咳嗽每在黄昏时发者。多因肾虚虚火上炎所致。亦有因食积痰湿引起。《丹溪心法·咳嗽》：“黄昏嗽者，是火气浮于肺，不宜用凉药，宜五味子、五倍子敛而降之。”《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》：“黄昏咳，肾经阳衰阴弱，虚火上炎也。当补脾肺，生肾水，不可专用嗽药，宜六味丸、六君子汤间服。不论大人小儿，黄昏熟睡中忽咳两三声，食积痰也，消其痰而咳自止，宜二陈汤加山楂、神曲、麦芽。”参咳嗽条。

黄胖 病名。又称食劳疳黄。见《医学纲目》卷二十一。《丹溪心法·疸》称黄肿。泛指全身肌肤萎黄，面浮足肿，神疲乏力而眼目不黄的一种慢性病。多由虫积、食积或劳役脱力所致。因于虫积者，可兼见呕吐黄水，毛发皆直，好食生米、茶叶、土炭等异物。治法先宜驱虫消积，再用健脾养血。驱虫如使君肉、槟榔、雷丸加绿矾丸等；健脾养血，如归脾汤、人参养荣汤诸方。因食积者则兼见纳食不化，口苦腹胀等，宜健脾消食法，如六君子汤合保和丸等方。因劳役所致者又称脱力黄。详该条。黄胖可见于钩虫病及营养不良或其他慢性疾患引起的贫血病症。

黄病 病名。指身体面目皆变黄的病证。《太平圣惠方·黄病论》：“黄病者，一身尽疼发热，面色洞黄，七八日后壮热，口里有血，当下之，如猪肝状，其人小腹满急。若其人眼睛涩疼，鼻骨痛，两膊及项强，腰背急，即是患黄也。黄病多大便涩，但令得小便快，即不虑死。不令大便多涩，涩即心胀不安，此由寒湿在表，则热蓄于脾胃，腠理不开，瘀热与宿谷相搏，烦郁不得消，则大小便不通，故身体面目皆变黄色。凡黄病，其寸口近掌无脉，口鼻气冷，并不可治也。”有急黄、阴黄、阳黄、劳黄等，详各条。

黄疸 病证名。古代亦称黄瘅。主要表现为目黄、皮肤黄、小便黄。《素问·平人气象论》：“溺黄赤安卧者，黄疸。”“目黄者曰黄疸。”《灵枢·论疾诊尺篇》：“身痛而色微黄，齿垢黄，爪甲上黄，黄疸也。”《伤寒论》和《金匮要略》认为其发病多由瘀热与湿相搏，不得泄越所致；也有因寒湿在里不解所引起者。本病有属阴属阳，在脏在腑之分。《临证指南医案·疸》：“黄疸，身黄目黄溺黄之谓也，病以湿得之，有阴有阳，在腑在脏。阳黄之作，湿从火化，瘀热在里，胆热液泄……熏蒸遏郁，侵于肺则身目俱黄，热流膀胱，溺色为之变赤，黄如橘子色，阳主明，治在胃。阴黄之作，湿从寒水，脾阳不能化热，胆液为湿所阻，渍于脾，浸淫肌肉，溢于皮肤，色如熏黄，阴主晦，治在脾。”一般把黄疸分成阳症和阴症两大类，称为阳黄和阴黄。历代又有五疸、三十六黄、黄疸二十八候等分类法。详各条。黄疸可见于肝细胞损伤、坏死，各种原因引起的胆道阻塞、胆汁郁滞及溶血性黄疸等。

黄疸二十八候 古代对黄病的一种分类法。见《诸病源候论·黄病诸候》。即黄病候、急黄候、黄汗候、犯黄候、劳黄候、脑黄候、阴黄候、内黄候、行黄候、癖黄候、噤黄候、五色黄候、风黄候、因黄发血候、因黄发痫候、因黄发痔候、因黄发癖候、因黄发病后小便涩兼石淋候、因黄发吐候、黄疸候、酒疸候、谷疸候、女劳疸候、黑疸候、九疸候、胞疸候、风黄疸候、湿疸候等二十八种黄病症候。详各条。其中因黄发血候、因黄发痫候、因黄发痔候、因黄发癖候、因黄发病后小便涩兼石淋候、因黄发吐候系黄疸并发症，详黄疸条；其余诸候详各条。

黄家 指素有黄疸病者。《金匮要略·黄疸病脉证并治》：“诸病黄家，但利其小便。假令脉浮，当以汗解之，宜桂枝加黄芪

汤主之。”又“黄家日晡时发热，而反恶寒，此为女劳得之。”……

黄瘕　病证名。八瘕之一。《杂病源流犀烛·积聚瘀瘕痃癖痞源流》：“黄瘕，左胁下有气，牢结不可抑，其苦腰背相引痛，小腹常急，下引阴中如刺，不得小便，或溺黄赤，时发寒热。”《类证治裁·痃癖瘀瘕诸积论治》：“黄瘕，经行不利，左胁气结，阴中刺痛，淋露黄汁，用坐导皂荚散。”参瘕、瘀瘕、八瘕条。

萎黄　病名。见《证治心得》。指皮肤色黄而枯槁不泽者。与黄胖之色黄而微肿不同。多为脾胃虚弱，气血不足引起的虚证。常兼神疲倦怠，语言低微，畏冷便溏，脉形无力等。治宜培补脾胃，补养气血。若因虫积引起者，当先驱除虫积，再予补益。萎黄证可见于贫血等一些慢性病。

梦失精　病证名。出《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》。又称梦遗。详该条。

梦泄　病名。见《外台秘要·虚劳》。亦称梦洩。即梦遗。详该条。

梦泄精　病名。见《诸病源候论·虚劳病诸候》。即梦遗。详该条。

梦洩　病名。见《备急千金要方》卷十九。即梦泄。详梦遗条。

梦遗　病证名。遗精的一种。见《普济本事方》卷三。又称梦失精、梦泄精、梦泄。指因梦而遗精者。多因见情思色，相火妄动，或思虑过度，心火亢盛所致。《类证治裁》：“心为君火，肝肾为相火。君火一动，相火随之，而梦泄焉。”治宜清心宁神为主，或兼滋肾固精。方用清心莲子饮、妙香散、静心汤、补心丹、知柏八味丸等。梦遗而气实火旺者，也可用龙胆泻肝汤直折其火。又有因湿热下扰而梦遗者，宜用秘精丸，大、小分清饮；因经络郁热而梦遗者，宜用清心丸。详遗精条。

梦魇　病名。见《杂病源流犀烛·不寐多寐源流》。即魇。详该条。

梅核气　病名。泛指咽喉部有异物感。《赤水玄珠·咽喉门》：“梅核气者，喉中介介如梗状。”《古今医鉴·梅核气》：“梅核气者，窒碍于咽喉之间，咯之不出，咽之不下，核之状者是也。始因喜怒太过，积热蕴隆，乃成厉痰郁结，致斯疾耳。”多因情志郁结，痰气凝滞所致。治宜理气、解郁、化痰。用半夏厚朴汤、加味四七汤、噙化丸等方。本证多见于慢性咽喉炎、神经官能症等疾患。

梅核膈　膈证之一。指喉间似为梅核所梗，膈间痛或闷者。多因气郁痰结或瘀血所致。《杂病源流犀烛·噎塞反胃关格源流》：“梅核膈者，喉中如有物，膈间痛，死血居多。宜昆布、当归、桃仁、韭汁、童便，甚加大黄；亦或因痰结，宜涤痰丸。《医鉴》谓，或结于咽喉，时觉有所妨碍，吐之不出，咽之不下，由气郁痰结而然者，正指此也。”参噎膈、梅核气条。

雪上一枝蒿中毒　病名。指因药用或服用雪上一枝蒿过量而中毒。证见流涎，呕吐，血压降低，呼吸困难等。文献载用黄土调水、米水或浓慈竹叶水饮服，可参考。病剧者可用阿托品进行抢救。

掉眩　证名。出《素问·至真要大论》。又称眩掉。《素问玄机原病式》：“掉，摇也；眩，昏乱旋运也。”泛指头摇、肢体震颤、头晕目眩等症。多因风邪及肝病所致。参颤振、痉、眩晕等条。

捻头瘟　瘟疫的一种。一名蝦蟆瘟。《杂病源流犀烛·瘟疫源流》：“捻头瘟，喉痹失音，项大腹胀，如蝦蟆状，故亦名蝦蟆瘟。宜荆防败毒散。”参瘟疫、蝦蟆瘟条。

捻衣摸床　证名。出《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。一作循衣摸床。详循衣摸床条。

〔丨〕

虚中　类中风之一。指元气虚衰而致的

卒然昏愦等症。《医宗必读·类中风》："虚中，东垣以卒倒昏愦，皆属气虚。过于劳役，耗损真元，脾胃虚衰，痰生气壅，宜六君子汤；虚而下陷者，补中益气汤；因于房劳者，六味地黄丸。"《证治准绳·杂病》："中风，有元气素弱，或过于劳役，或伤于嗜欲，而卒然厥仆，状类中风者，……亦有不仆而舌强语涩，痰壅，口眼㖞斜，肢体不遂者。"《类证治裁·中风》："虚中，皆属气虚，烦劳气陷，补中汤；房劳精脱，生脉补精汤。"治宜益气为主。若见手撒、口开等症，急需大剂参芪以益气固脱。气虚有痰者，《丹溪心法》用浓煎参汤加竹沥、姜汁。参虚中风条。

虚中风 虚中之一种。《寿世保元》："中风手足软弱，不能举动，外症自汗者，虚中风也。若手足强急，口眼㖞斜，伸纵痛者，实中风也。"参虚中条。

虚火咳嗽 病证名。指元气亏损，三焦火炎所致的咳嗽。《不居集》卷十五："虚火咳嗽，虚火者，非火不足也。因人元气亏损，三焦之火乘虚上炎，肺为火灼，则气逆而嗽，痰涎清薄，嗽时面红气喘，咽干，喉癣喉痒，口臭，烦渴，饮食减少，其脉虚弱或浮弦而无力。"治宜滋补为主。用虚火咳嗽方等。参见气虚咳嗽、咳嗽条。

虚火眩晕 病证名。《症因脉治·内伤眩晕》："若肝肾之真阴不足，龙雷之火，上冲清道，亦令人头旋眼黑。此阴火上冲，而为虚火眩晕之症。"属火冲眩晕之一种类型。详火冲眩晕、阴虚眩晕、肾虚眩晕等条。

虚阳上浮眩晕 病证名。属火冲眩晕之一。《症因脉治·内伤眩晕》："真阳不足，虚阳上浮，亦令人头目冒眩之症，此命门真火不足，而为虚阳上浮眩晕之症也。"宜用八味肾气丸等方。详火冲眩晕、阳虚眩晕等条。

虚劳 病名。出《金匮要略·血痹虚劳病脉证治》。又作虚痨。包括气血、脏腑等正气损伤所致的虚弱症和某些具传染性、表现为虚弱证候的疾病（见《诸病源候论·虚劳病诸候》）。后世多将前者称为虚损，后者称为劳瘵或传尸劳（见《三因极一病证方论》）。

虚劳失血 病证名。指劳损内伤，阴虚火亢而失血者，《杂病源流犀烛·诸血源流》："呕血者，……有因虚劳，五内崩损，涌出可升斗计者，宜花蕊石散。"参呕血条。

虚劳失精 遗精的一种。《诸病源候论·虚劳失精候》："肾气虚损，不能藏精，故精漏失。"可伴小腹弦急，阴头寒，目眩，目眶痛，发落，或有虚烦，心悸，脉数而散，或芤迟，或芤动微紧。治宜益阳固精。用黄芪散、龙骨散、桂枝龙牡汤等方。参遗精条。

虚劳发热 病证名。指虚劳亏损所致的发热。以阴虚为多见。《诸病源候论·虚劳热候》："虚劳而热者，是阴气不足，阳气有余，故内外生于热，非邪气从外来乘也。"《理虚元鉴》卷上："虚劳发热，皆因内伤七情而成。人之饮食起居，一失其节，皆能成伤，不止房劳一端为内伤也。凡伤久则荣卫不和而发热，热变蒸，蒸类不一。凡骨脉皮肉、五脏六腑皆能作蒸。其源多因醉饱后入房，及忧思劳役，或病饮食失调，暨大喜大怒大痛大泪，……故夜热内热虚热，为虚劳之初病；骨蒸内热潮热，则虚劳之本病也。宜及时调治，毋使滋蔓。治法以清金养荣，疏邪润燥为主，则热自退矣。"虚劳发热亦可因瘀血而致。《风劳臌膈四大证治·虚劳》："虚劳发热，未有不由瘀血者。……是必饮食起居过时失节，营卫凝滞，先成内伤，然后随其气所阻之处，血为瘀积。"此为虚中实证。治疗以活血化瘀为主，宜大黄䗪虫丸等方。参阴虚发热、阳虚发热、血虚发热，气虚热、劳热、潮热、骨蒸等条。

虚劳吐血 病证名。见《千金要方》卷十二。指由五脏虚损导致的吐血。如心经阴虚，火盛动血，证见虚烦不眠，怔忡健忘，

神气不安者，宜滋阴降火，用天王补心丹、朱砂安神丸等。若心阳不收，汗出惊悸，以及心火不下交于肾，而见梦遗溺赤等症，用上二方如龙骨、牡蛎、枣仁、莲心、浮小麦等；心经火虚不能生血，兼见瘦削悸怯，六脉细弱者，宜补脾胃，养心神，用人参养营汤。又如思虑伤脾，不能摄血，兼见健忘怔忡，惊悸盗汗，嗜卧少食，大便不调者，宜健脾养心，益气补血，归脾汤统治之。兼发热加丹皮、山栀；兼肺气燥者加麦冬、五味；兼胀满而水谷不健运者加陈皮、煨姜。或加阿胶以滋血，或加柴胡、贝母以解郁。脾阴虚，脉数身热，咽痛声哑，则用养真汤；脾阳不旺，不能磨化水谷，则用香砂六君汤等；肝阴虚，吐血兼见虚烦不寐，骨蒸梦遗等，宜滋养肝血，清热除烦，用四物汤加枣仁、知母、牡蛎、阿胶之属；肾水不足，虚火灼肺，吐血喘咳，足痿骨蒸，痰血痨瘵，宜滋补肾阴，用地黄汤、左归饮等。如足痿、骨蒸，用大补阴丸以滋阴潜阳；肾阳不足，命门火衰，上热下寒，吐血兼见头晕腰痛，肿喘癃闭者，用肾气丸，从阴化阳，补火济水；肺虚津竭，络脉燥损，血随气上，宜用辛字润肺膏以滋肺中阴液，或用地魄汤、生脉散等方（见《血证论》）。参内伤吐血、吐血等条。

虚劳自汗 自汗之一。见《世医得效方·大方脉杂医科》。多由气虚所致。证见自汗，怯冷，气喘，乏力等。治宜补气固表，可用芍药黄芪汤、黄芪建中汤等方。参自汗条。

虚劳盗汗 病证名。见《诸病源候论·虚劳病诸候》。有阳虚阴损之别。《圣济总录·虚劳盗汗》："此盖虚劳之人，阳气外虚，风在肌表，腠理虚疏，心气不足故也。不治则荣卫衰损，肌肉消悴，变为羸瘠。治虚劳荣卫不调，夜多盗汗，四肢烦疼，饮食进退，肌瘦面黄，麦煎汤。……虚劳夜多盗汗，面色萎黄，四肢无力，不思饮食，咳嗽不止，柴胡鳖甲汤。"《证治汇补·汗病》："盗汗者……此症多见于虚劳之人，阴气损伤，宜养荣清热。若大病之后，新产之余，及久出盗汗不止，则阳气亦虚，宜补气固阳。"阳气虚者，治宜益气敛汗，可用参芪汤、牡蛎散；心阳虚者，宜柏子仁汤；心肾两虚者，用心肾丸；阴虚者，可用黄芪鳖甲散、秦艽汤。参盗汗、阴虚盗汗条。

虚劳腰痛 病证名。腰痛之一。出《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》。多因过劳伤肾所致。《圣济总录·腰痛门》："虚劳腰痛者，劳伤于肾也。"详肾虚腰痛条。

虚呃 病证名。指正虚所致的呃逆。《证治汇补·呃逆》："虚呃，气不接续，呃气转大，脉虚无力。"因中气虚所致者，宜六君子汤、补中益气汤，甚则十全大补汤；因脾胃虚寒所致者，宜丁香柿蒂散、理中加丁香汤，或温胃饮加丁香；因脾肾虚寒所致者，宜理阴煎、大补元煎、右归饮等方；因肝肾阴虚、阴火上冲所致者，宜大补阴丸、滋肾丸等方；因真元虚脱而呃者，称虚脱呃，详虚脱呃、呃逆条。

虚坐努责 证名。指时时欲便，但登厕努挣而不排便。多因痢久伤及阴血所致。《丹溪心法·痢》："其或气行血和积少，但虚坐努责，此为无血证。倍用当归身尾，却与生芍药、生地黄、生桃仁佐之，复以陈皮和之，血生自安。"

虚冷上气喘 病证名。指气虚肺寒或肾阳虚衰，阴火上逆所致的气喘。属肺气虚寒者，喘逆常兼咳嗽，音低，乏力，自汗，怯冷等症。《张氏医通·喘》："虚冷上气，劳嗽喘乏。"治宜益气温肺散寒，如参苏温肺汤、保元汤、人参定喘汤等方；属下焦虚冷，命门真元之火离其宫而不归者，常见似火而非火，似喘而非喘之象，可见四肢厥逆，面赤而烦躁恶热，上气喘急等症。《医贯·喘论》："真元耗损喘，出于肾气之上奔。"治宜温肾纳气，温阳镇摄，如黑锡丹、安肾

丸、八味丸等方。参真元耗损喘条。

虚冷腹痛 病证名。指体虚受寒而致的腹痛。《千金要方·心脏》："虚冷腹痛，不下饮食，食复不消，胪胀，当归汤方。"如本体素弱，而复冷痛者，以人参养胃汤加肉桂、木香、吴茱萸，或理中汤加良姜，吴茱萸等。参见腹痛、寒气腹痛条。

虚证 八纲之一。指人体精气不足而出现的虚弱证候。与实证相对而言。《素问·通评虚实论》："邪气盛则实，精气夺则虚。"常见精神萎靡，面色㿠白，身倦无力，或五心烦热，形体消瘦，心悸气短，自汗盗汗，大便溏泄，小便频数或不禁，舌质淡胖或光绛，脉虚细无力等症。治宜补益滋养为主。虚证主要有阳虚、阴虚、气虚、血虚之分。详各条。

虚呕 病证名。指因胃虚或命门火衰所致的呕吐。《景岳全书·杂证谟》："凡胃虚作呕者，其证不一，当知所辨。若胃脘不胀者，非实邪也；胸膈不痛者，非气逆也；内无热燥者，非火证也；外无寒热者，非表邪也。无食无火而忽为呕吐者，胃虚也；呕吐无常而时作时止者，胃虚也；食无所停而闻食则呕者，胃虚也；气无所逆而闻气则呕者，胃虚也；或身背、或食饮微寒即呕者，胃虚也；或吞酸，或嗳腐，时苦恶心，兀兀然、泛泛然冷咽靡宁者，胃虚也；或因病误治，妄用克伐寒凉，本无呕而致呕者，胃虚也；或朝食暮吐，暮食朝吐，食入中焦而不化者，胃虚也；食入下焦而不化者，土母无阳，命门虚也。"治宜温补。可用六君子汤、人参理中汤、六味回阳饮等方。

虚肿 病证名。指水肿病属虚者。见《诸病源候论·水肿病诸候》。多因平日身心操劳，或酒色过度，日积月累，病起于渐。《医宗必读·水肿胀满》以阴证多寒，寒证多虚。先肿于外而后胀于里者为虚；小便清白，大便溏泄者为虚；色悴声短为虚。治宜温补脾肾为主。用实脾饮、参苓白术散、真武汤、《金匮》肾气丸等方。虚肿有脾虚身肿、肝肾虚肿、肺虚身肿等。详各条。

虚胀 胀病之一。见《医宗必读·水肿胀满》。有气虚血虚之分。《张氏医通·腹满》："有气虚不能裹血，血散作胀，必其人大便不坚，或时结时溏，溏则稍减，结则渐加，小便清利，甚则浑白如泔，其脉缓大而滞，气口益甚。不可用辛温耗气之药，宜四君子去白术加木香、泽泻、当归、芍药，以固其气中之血。有血虚不能敛气，气散作胀，必其人烦热便躁，小便黄数，其脉浮数而弦，人迎尤甚。慎不可用苦寒伤胃之药，宜四物汤去地黄加黄芪、肉桂、甘草、煨姜，以和其血中之气。"《景岳全书·杂证谟》："治胀当辨虚实。……第凡病肿胀者，最多虚证。若在中年之后，及素多劳伤，或大便溏滑，或脉息弦虚，或声色憔悴，或因病后，或因攻击太过而反致胀满等证，则皆虚损之易见者也。诸如此类。使非培补元气，速救根本，若虚在脾肺者，宜四君子汤、归脾汤之类主之。若脾虚兼寒者、宜理中汤、温胃饮、五君子煎。若脾虚兼痰者、宜六君子汤。若肾虚兼痰者，宜金水六君煎。若虚在肝肾者，宜六味地黄汤。若肾虚兼寒者，宜理阴煎，或八味地黄丸，甚者加减《金匮》肾气汤主之。"参胀病条。

虚疟 疟疾之一。《金匮翼》："虚疟者，或体虚而病疟，或因疟而致虚。六脉微弱，神气倦怠，是以补养正气为主。经云，症脉缓大虚，便用药，不宜用针。盖病疟而脉虚，气先馁矣。故不宜用针而宜用药。所谓阴阳形气俱不足者，勿刺以针，而调以甘药也。"治用人参养胃汤、新宝人参乌梅散等。《证治汇补》卷三："虚疟……又有入房感寒成疟者，昼则寒甚，夜则发热，服药不得汗者，用苍芎桃柳汤浸足至膝，内服补剂，其汗必行。又有虚极之人，疟发之时寒不成寒，热不成热，气急神扬，精神恍惚，六脉豁大，此元气衰脱，将有大汗昏晕之虞，宜

防之。”参疟疾条。

虚疝　病名。指疝证迁延致虚或虚体患疝者。《医钞类编》卷十四：“疝亦有挟虚而发者，其脉不甚沉紧而豁大无力者是也，然其痛亦轻，惟觉重坠牵引耳。”《景岳全书·疝气》：“疝久者必多虚证，或以元气本虚而偶患者亦有虚证，或不耐劳苦而微劳即发者亦有虚证，当以脉证辨之。凡治虚疝，当察其虚在阴分或在阳分。阴虚者，轻则暖肝煎、八味地黄丸，甚则理阴煎、补阴益气煎之类酌而用之；阳虚者，宜温胃饮、归脾汤、补中益气汤之类主之，若阳虚至甚者，必用桂附椒姜或以六味回阳饮之类主之。”参疝气条。

虚泄　病证名。《不居集》卷二十一：“虚泄，困倦无力，食减微溏，必兼体瘦。”即虚泻，详该条。

虚泻　病证名。见《医学入门》卷五。又称虚泄。经指因脏腑虚弱不足所致的泄泻，以脾肾虚弱最为多见。证见困倦无力，自汗，消瘦，大便溏泄清稀，甚至完谷不化，四肢清冷，脉多细弱。轻者属脾，重者属肾。治宜补益脾肾，选用参苓白术散、理中汤、升阳除湿汤、四神丸、椒附丸等方。参脾泄、肾泄、气陷泄泻等条。

虚实错杂证　指虚证和实证错杂互见的证候。《通俗伤寒论·气血虚实章》：“虚中挟实，虽通体皆现虚象，一二处独见实证，则实证反为吃紧；实中挟虚，虽通体皆现实象，一二处独见虚证，则虚证反为吃紧。景岳所谓‘独处藏奸’是也”《景岳全书》卷一：“实中复有虚，虚中复有实，故每以至虚之病又见盛势，大实之病又有羸状。此不可不辨也。”治宜攻补兼施，分别虚实的孰多孰少用药。本证有真虚假实证、真实假虚证、表虚里实证、表实里虚证之分。参各条。

虚损　病名。见《肘后备急方》。因七情、劳倦、饮食、酒色所伤，或病后失于调理，以致阴阳、气血、脏腑虚亏而成。虚损病可概括为气虚、血虚、阳虚、阴虚。气虚多见肺脾虚损。证见四肢无力，懒于言语，动作气短，自汗心烦。宜用补中益气汤。血虚多见心肝虚损。证见吐血便血，或妇女崩漏，头晕眼花，或成干血痨。宜用四物汤、当归补血汤。虚在心者，并用归脾汤；虚在肝者，并用二至丸；内有瘀血者，用大黄䗪虫丸。阳虚多见脾肾虚损。证见饮食减少，大便溏薄，或完谷不化，腰膝痠软，神疲乏力，畏寒肢冷，阳痿滑精，小便数而清长，面色苍白，舌淡苔白，脉沉细或沉迟。治宜温补。虚在脾者，可用附子理中汤；虚在肾者，可用附桂八味丸、右归丸等方。阴虚多见肺肾虚损。肺阴虚者，证见干咳，咯血，口干咽燥，潮热，盗汗，两颧潮红，舌红少津，脉细数。治宜养阴清肺，可用沙参麦冬汤。肾阴虚者，证见腰膝痠软，头晕耳鸣，遗精早泄，咽痛，颧红，舌红少津，脉沉细数。治宜滋补真阴，兼予降火，可用大补元煎、六味丸、大补阴丸等方。参虚劳条。

虚损怔忡　怔忡之一。《不居集》卷二十二论虚损怔忡：“怔忡之病，心胸筑筑振动，惶惶惕惕，无时的宁者是也。此症惟阴虚劳损之症恒有之。盖阴虚于下，则宗气无根，而气不归源，所以在上则浮撼于胸臆，在下则振动于脐旁，虚微者动亦微，虚甚者动亦甚。凡患此者，速宜节欲节劳，切戒酒色；凡治此者，速宜养气养精，滋培根本。”心脾血气虚损者，宜七福饮、大补元煎。真阴不足者，宜左归饮。真阳不足者，右归饮。阴阳两亏者，宜大营煎、理阴煎。参怔忡条。

虚热　病证名。见《诸病源候论·病热候》。❶指阴阳气血虚亏引起的发热。《医学入门》卷五：“凡虚热皆因精神外驰，嗜欲无厌，阴气耗散，阳无所附，遂致浮散肌表而发热，实非有热也。”《证治准绳》卷一：“若夫饮食劳倦，为内伤元气，此则真阳下陷，内生虚热，故东垣发补中益气之论，用人参、黄芪等甘温之药，大补其气而提其

下陷，此用气药以补气之不足也；又若劳心好色，内伤真阴，阴血既伤，则阳气偏胜而变为火矣，是谓阴虚火旺劳瘵之症，故丹溪发阳有余阴不足之论，用四物加黄柏知母补其阴而火自降，此用血药以补血之不足者也。”又“骨痿、肉燥、筋缓、血枯、皮聚、毛落，阴不足而有热疾，是为虚热。”“不能食而热，自汗，气短者，虚热也，以甘寒之剂泻热补气。”《杂病源流犀烛·火病源流》：“《入门》曰，气虚热，升阳以散之，宜补中益气汤、益胃升阳汤；血虚热，滋阴以降之，宜滋阴降火汤、坎离丸；气血俱虚热，升阳滋阴兼用之，宜十全大补汤、人参养营汤加知母、黄柏。”❷指热病见昏迷症状者。《石室秘录·热症门》：“发狂如见鬼状者，实热也；热病不知人者，虚热也。实热宜泻火，虚热宜清火。”参发热、气虚发热、血虚发热、阴虚发热、阳虚发热条。

虚热证 证名。指正气不足所出现的热证。《此事难知·热有虚实外何以别》：“若骨痿、肉烁、筋缓、血枯、皮聚、毛落，五阴不足而为热病，是虚热。”多因气血阴液不足，或邪盛伤正所致。证见心烦不眠，口燥咽干，潮热盗汗，大便秘结，舌红，脉细数等。治宜养阴清热，或甘温除热。可用当归六黄汤、黄连阿胶汤或补中益气汤等方。本证有阴虚、阳虚、气虚、血虚之分。参各条。

虚热渴 渴证之一。《圣济总录》卷五十九：“人因劳伤府藏，或大病后未复，荣血不足，阴虚于内，则生内热，热则津液燥少，故渴而引饮，饮不能多，多则腹满不消，气虚不胜于水故也。”若气虚燥渴引饮，可用黄芪汤；若阴虚舌燥渴饮不已，可用麦门冬丸、地黄丸。

虚哮 病名。指元气素虚，反复日久的哮证。《寿世保元·哮吼》：“哮吼十数年，发则上气喘促，咳嗽吐痰，自汗，四肢发冷，六脉沉细，此气虚脾弱。”《类证治裁·哮症》：“伤暑热而发者为热哮，为虚，其盐哮、酒哮、糖哮，皆虚哮也。”又“治虚哮，用麦冬三两，桔梗三钱，甘草二钱。……脾胃阳微者，急养正，四君子汤；久发中虚者，急补中，益气汤；宿哮沉痼者，摄肾真，肾气丸加减。”《临症指南医案·哮》：“宿哮肺病，久则气泄汗出，脾胃阳微，痰饮留著，有食入泛呕之状。夏三月，热伤正气，宜常进四君子汤以益气，不必攻逐痰饮。”哮病以温通肺脏，下摄肾真为主，久发中虚又必补益中气。参阳虚喘、阴虚喘条。

虚晕 病证名。见《东医宝鉴·外形篇》。包括气虚、血虚、阳虚、肾虚等原因所致的眩晕。详气虚眩晕、血虚眩晕、阳虚眩晕、肾虚眩晕条。

虚秘 病名。指因精血津液亏耗所致的便秘。多因体气素亏，或因发汗、利小便耗伤津液，或病后元气未复，精亏血枯所致。《圣济总录·大小便门》：“或因病后重亡津液，或因老弱血气不足，是谓虚秘。”《洁古家珍·杂方》：“胃虚而秘者，不能饮食，小便清利。”虚秘如因气虚、气滞而致者，可用厚朴丸等方。津液耗伤者，可用润肠丸。《医学心悟·大便不通》：“若老人精血不足，新产妇人气血干枯，以致肠胃不润，此虚闭也，四物汤加松子仁、柏子仁、肉苁蓉、枸杞、人乳之类以润之，或以蜜煎导而通之。若气血两虚，则用八珍汤。”《金匮翼·便秘统论》：“虚秘有二，一以阴虚，一以阳虚也。凡下焦阳虚，则阳气不行，阳气不行，则不能传送，而阴凝于下。下焦阴虚，则精血枯燥，精血枯燥，则津液不到而肠藏干槁。治阳虚者，但益其火，则阴凝自化；治阴虚者，但壮其水，则泾渭自通。”方如苁蓉润肠丸、益血润肠丸、五仁丸、黄芪汤等均可选用。参大便秘结条。

虚挛 挛证之一。见《证治准绳·杂病》。详挛条。

虚烦 证名。指因虚而致心胸烦热者。多由伤寒汗、吐、下后，邪热乘虚客胸中，

或病后余热留恋，或津涸、血虚、肾亏、痰饮、虚劳等所致。常伴郁闷不寐、口干咽燥等症。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："发汗吐下后，虚烦不得眠，……栀子豉汤主之。"《类证治裁·烦躁》："其杂症虚烦，因津涸燥结而烦者，人参固本丸加枣仁、竹叶。因血虚烦渴，至夜躁热尤甚者，当归补血汤。因肾水下竭，心火上炎而烦者，生料六味丸煎服。病后余热欲吐，虚烦不安者，人参竹叶汤、竹茹汤。病久烦热不止，六味汤加枣仁。肥人虚烦不眠为痰，温胆汤。"《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》："虚劳虚烦不得眠，酸枣仁汤主之。"亦有虚烦状似伤寒，但不恶寒，头身不痛，脉不紧数者，则可选竹叶汤（见《千金要方》卷九）。

虚烦不得卧 外感不得卧之一。因外感热病发汗太过，或误下伤里，或妄用吐法而致。《症因脉治》卷三："身表已纯，口虽作渴，不能消水，二便清利，神气懒怯，时时欲睡，时时惊醒，此虚烦不得卧之症也。"如脉见空大者，宜补中益气汤加黄柏、知母；脉见细数者，生脉散合凉天地煎；真阳不足，心神失守者，枣仁远志汤，甚则八味肾气丸。参不寐条。

虚烦不得眠 病证名。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："发汗吐下后，虚烦不得眠。若剧者，必反复颠倒，心中懊侬。栀子豉汤主之。"后人亦称为虚烦不得卧，详该条。

虚黄 病证名。见《明医指掌》卷四。指因七情不舒，劳倦太过，气血两虚所致的发黄。《证治汇补·黄病章》："虚黄，口淡，怔忡，耳鸣，脚软，怠惰无力，寒热微作，小便浊涩，皮肤虽黄而爪甲如常。"治宜益气健脾，养血固本。方用人参养荣汤、十全大补汤等。《丹溪心法·疸病证治》列为黄疸之虚证。方用四君子汤、四物汤、黄芪建中汤等。参脱力黄、萎黄条。

虚聋 耳聋的一种。指因虚证而致听力减退或消失者。《圣济总录》卷一百十四："虚聋者肃肃作声。"《丹溪心法·耳聋》："又有耳触风邪，与气相搏。其声嘈嘈，眼见光，为之虚聋。"多由肾虚气血亏耗，或病后风邪乘袭所致。属阴虚者，宜滋肾丸、四物汤、肾气丸等方；阳虚者，用八味丸、益肾散、磁石汤等方。《医述·耳》："虚聋由渐而成，必有兼证可辨：如面颊黧黑者，精脱；少气嗌干者，肺虚；目晾善恐者，肝虚；心神恍惚，惊悸烦躁者，心虚；四肢懒倦，眩晕少食者，脾虚。"参耳聋条。

虚脱呃 病证名。见《类证治裁》卷三。指真元欲脱所致的呃逆。为虚脱重症。《景岳全书·呃逆》："凡以大病之后，或以虚羸之极，或以虚损误攻而致呃逆者，此最危之证。"《杂病源流犀烛》卷十七："若呃一、二声而音低者，中气稍绝；而不能接续，则虚之极，旦发夕死；病后大发呃，亦由真元之气绝，不治。"选用归气饮、理阴煎、大补元煎、右归饮等方。参虚呃、呃逆条。

虚痉 病证名。见《证治汇补·痉病章》。指气血虚极，不能养筋所致的痉病。《医学正传·痉病》："亦有绝无风邪，而亦能使人筋脉挛急，而为角弓反张之候者，血脱无以养筋故也。"证见四肢搐搦，头昏目花，自汗，神疲，气短，舌质淡，脉细弦。治宜益气补血，兼予熄风。选用当归补血汤、八珍汤、大营煎等方加钩藤、蝎尾等熄风药。参痉条。

虚淋 病名。见《证治汇补·下窍门》。❶指肾虚精败之淋证。多因男子精未盛，老人精已衰，而为房劳所伤，致肾虚精败成淋。其证大小便牵引而痛，愈痛则愈便，愈便则愈痛。治宜温补。用《金匮》肾气丸，或生料鹿茸丸。❷即劳淋。见该条，参淋条。

虚斑 病证名。亦称阴证发斑。多由房劳过度，内伤脾肾，外感风寒而致。《重订通俗伤寒论·伤寒兼证》："若先由房劳太过，内伤肾阴，及凉遏太过，内伤脾阳，一

经新感寒气，逼其无根失守之火，上薰肺经，浮游于皮肤而发斑点者，此皆谓之阴证发斑，亦谓之虚斑。其形如蚊蚤虱咬痕，稀少而色多淡红，或淡白微红，亦有淡黑色而仅发于两腰小腹之间者。”治疗如内伤脾阳，阳为阴逼者，缓则参附三白汤，补中益气以扶阳；急则回阳急救汤，益气固脱以追阳。内伤肾阴、阴被阳消者，龟柏地黄汤，滋肾益阴煎。若因房劳，热入精室者，陶氏逍遥汤。此外，亦有因热盛气虚而致者，《伤寒捷诀·发斑》：“虚极发斑者，宜以人参白虎汤主之。”参发斑伤寒、阴证发斑等条。

虚喘 病证名。见《丹溪心法·喘》。指因正气虚衰所致的气喘。多由年老体弱，喘病久延，或大病后真元耗损，肺脾气虚，肾气不纳，或久服攻伐之药，损伤真气而成。《景岳全书·喘促》：“虚喘者，气短而不续，……慌张气怯，声低息短，皇皇然若气欲断，提之若不能升，吞之若不相及，劳动则甚，而惟急促似喘，但得引长一息为快也。”临床表现，一般起病较缓，病程较长，呼吸气短难续，以深吸气为快等。虚喘中由于病因和见症的不同，又分为气虚喘、阴虚喘、真元耗损喘、胃虚喘等。详各条。

虚痨 病名。见《医宗必读》卷六。即虚劳。详该条。

虚痞 病证名。指无物无滞的痞证。多由饮食伤中，劳倦过度，或脏腑阴阳亏损，气机斡旋无力所致。《景岳全书·杂证谟》：“痞者，痞塞不开之谓。……大有疑辨则在虚实二字。凡有邪有滞而痞者，实痞也；无物无滞而痞者，虚痞也。”临床表现以似觉胀闷而又不甚胀闷，不知饥食为特征。常伴中气短怯，大便溏泄，胸腹喜暖畏寒等症。治以培补温运为主。脾胃虚衰，嗳腐吞酸者，可选异功散或香砂六君子汤；心脾两虚，气失通畅者，可选归脾汤或治中汤；中焦虚寒，温运无力者，可选温胃饮或理中汤；脾肾不足，命门不暖者，可选六味回阳饮等方。参痞有关条。

虚痫 病名。指体虚患痫或痫久致虚的病证。有因气虚、血虚、房劳伤、痫久虚滑等不同。《医学入门》卷五：“虚痫困倦，谷食难化，腹微痛或大痛，并无努责。血虚淡红，通玄二八丹；日久，四物汤加升麻、香附、侧柏叶；房劳伤精血成毒者，肾气丸；虚劳挟痫者，香连猪肚丸；凡痫经下后，痛坠不减，虚坐努责，及久不愈者，皆阴血虚也，胃风汤去桂加熟地主之；气虚色白，如鼻涕冻胶，四君子汤、理中汤俱加木香、肉桂、厚朴、茯苓。”参痫疾、阴虚痫疾、虚滑痫、滑痫、劳痫条。

虚癎 病名。指本虚标实的癎病。《张氏医通》卷六：“癎证往往生于郁闷之人，多缘病后本虚，或复感六淫，气虚痰积之故。……古人虽分五癎，治法要以补肾为本，豁痰为标，随经见证用药。”“脉浮滑洪数为风癎，细弦微缓为虚癎。”参癎条。

虚滑痢 病证名。指体虚久痢滑脱不禁者。见《证治汇补》卷八。系因体虚脾气下陷，及久痢肠失禁固所致。证见四肢困倦，谷食不化，腹中彻痛，虚坐而无努责，脉沉伏等。治宜调补固涩。参虚痢、久痢、滑痢条。

虚寒证 证名。指阳气虚弱所致的证候。见《素问玄机原病式》卷二。症见面㿠少华，食欲不振，得热则舒，小便清长，大便稀薄，舌淡苔白，脉沉迟缓弱等。治宜温补为主。选用理中汤、《金匮》肾气丸等方。参虚证、寒证条。

虚痰 痰证之一。❶泛指因元气虚所致的痰证。《景岳全书·杂证谟》：“不可攻者，便是虚痰。……或以形羸气弱，年及中衰者，即虚痰也；或以多病，或以劳倦，或以忧思酒色，致成劳损，非风卒厥者，亦虚痰也；或脉见细数，脏无阳邪，时为呕恶泄泻，气短声暗等证，但察其形气病气，本无有余者，皆虚痰也。”治当调补为主。《不居集》卷十七：“虚痰，胫膝酸软，腰背强

痛，骨节冷痹，牵连隐痛，又多寒热”若气虚寒痰，用人参、茯苓、苡仁、半夏、陈皮、甘草、肉桂；若气虚热痰，用麦冬、花粉、甘草、陈皮、白芥子、神曲、白芍、茯苓、当归。❷即寒痰。见《医学入门》卷五。参寒痰、痰证条。

虚痰眩晕　病证名。见《罗氏会约医镜·杂证》。多因脾肾不足，津液不行，停滞成痰所致。证见头重眼花，脑转眩冒，倦怠嗜卧，脉缓而滑。治宜补脾肾，化痰浊。方用苓桂术甘汤、六君子汤、归脾汤、八味丸等。参眩晕、痰晕条。

虚嗽　病证名。指咳嗽之属气虚、血虚者。《冯氏锦囊》卷十二：“虚嗽有二，日间嗽，多吐痰白沫，或恶心者为气虚，宜六君子汤加款冬花、五味子。如夜嗽多渴，痰不易出，或发热，为血虚，宜六味汤加麦门冬、五味子。”参气虚咳嗽，血虚咳嗽，日间嗽，夜嗽，咳嗽条。

虚瘕　病证名。亦作伏瘕。指邪热伏于大肠所致的瘕病。《素问·气厥论》：“小肠移热于大肠，为虚瘕，为沉。”《宣明论方》卷一：“虚瘕证，主女病，大肠小肠移热名虚瘕，津液耗散，不能滑利，菀结而大肠秘涩。”可用槟榔丸等方。参瘕条。

晨运　病证名。见《医林绳墨·眩运》。又称晨晕、早起眩晕。指眩晕之常发生于清晨者。多因阳虚及痰浊固结所致。详晨晕、早起眩晕、阳虚眩晕、痰晕条。

晨泄　病证名。见《世医得效方·大方脉杂医科》。每至清晨即泄，故又称五更泄。多因肾虚所致，后世又称肾泄。详五更泄、肾泄条。

晨晕　病证名。又称晨运、早起眩晕。指眩晕之常发生于清晨者。《证治汇补·眩晕》：“有早起眩晕，须臾自定，日以为常，谓之晨晕，此阳虚也。”也可由痰浊固结所致。详阳虚眩晕、早起眩晕、痰晕条。

悬心　证名。指胃脘部悬空感，与嗜杂相近似。《灵枢·师传》：“胃中热则消谷，令人悬心善饥。”参嗜杂条。

悬水　古病名。即玄水。十水之一。《诸病源候论·水肿病诸候》：“悬水者，先从面肿至足，其根在胆。”参玄水、十水条。

悬饮　四饮之一。因饮邪停留于胁肋部所致。《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证治》：“饮后水流在胁下，咳唾引痛，谓之悬饮。”证见胁下胀满，咳嗽或唾涎时两胁引痛，甚则转身及呼吸均牵引作痛，或兼干呕、短气等。治宜逐饮为主。方用十枣汤、三花神佑丸等。本证类似多种原因所致的胸腔积液。参痰饮、四饮条。

悬癖　病名。指胁下有癖气起如弦索状，咳唾引痛者。《诸病源候论·癖病诸候》：“悬癖者，谓癖气在胁肋之间，弦亘而起，欬唾则引胁下悬痛，所以谓之悬癖。”本病多因水饮停聚胁下，积久成癖。常由悬饮迁延不愈所致。参癖、悬饮条。

圊血　证名。又作清血。指大便下血。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。《伤寒贯珠集》：“太阳病，以火熏之，不得汗，其人必躁，到经不解，必圊血，名为火邪。”又：“圊血、便血也。”详便血条。

圊脓血　证名。一作清脓血。指大便下脓血。圊指厕所。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》：“下利脉数而渴者，令自愈。设不差，必圊脓血，以有热故也。”详便脓血、脓血痢条。

野葛中毒　病名。野葛系钩吻的古籍别名。即钩吻中毒。详该条。

曼陀罗中毒　病名。曼陀罗别名洋金花、枫茄花。因药用或误服曼陀罗的花、叶、茎、根、子过量中毒。证见面红烦躁，哭笑不止，谵语幻觉，口干肤燥，瞳孔散大，脉数等，严重者可致昏睡，肢强挛搐，甚至昏迷，死亡。宜中西医结合救治。中药以清热解毒为主。常用绿豆衣、银花、连翘、甘草等。民间有多食黄糖、口含米醋以解毒的方法。可

参考。

眼眶骨痛 病证名。见《秘传证治要诀·眼眶骨痛》。即眉棱骨痛。详该条。

晚发 病名。伏气温病的别称。❶指冬令受寒，邪伏至“清明”后始发的温热病。《时病论·晚发》：“晚发者，亦由冬令受寒，当时未发，发于来年清明之后，夏至以前，较之温病晚发一节，故名晚发病也。”❷指夏受暑湿，留伏至秋冬而发的温热病。亦称伏暑晚发。《伤寒指掌》：“晚发者，夏受暑湿之邪，留伏于里，至秋新邪引动而发也。”《重订广温热论·湿火之症治》：“发于处暑以后者，名曰伏暑，病尚易治；发于霜降后冬至前者，名曰伏暑晚发，病最重而难治。”参伏暑、伏暑晚发条。

蛊 病名。❶泛指由虫毒结聚，络脉瘀塞引起胀满、积块的疾患。《赤水玄珠·虫蛊》：“蛊以三虫为首。……彼蛊证者，中实有物，积聚已久，湿热生虫。”《证治汇补》卷六：“胀满既久，气血结聚不能释散，俗名曰蛊。”参虫臌条。❷指少腹热痛，溺白浊的病证。《素问·玉机真藏论》：“少腹冤热而痛，出白，一名曰蛊。”❸指房事过度成疾。见《左传·昭公元年》。❹指古代用毒虫所制的一种毒药。《诸病源候论·蛊毒候》：“多取虫蛇之类，以器皿盛贮，任其自相啖食，唯有一物独在者，即谓之为蛊，便能变惑，随逐酒食，为人患祸。”

蛊下血 病证名。见《外台秘要》卷二十八。指因蛊蚀五脏所致的便血。症见下血瘀黑，如烂鸡肝，心烦腹痛。用茜根丸治之。参蛊毒病条。

蛊风 病名。《圣济总录》卷十二：“蛊风，论曰蛊风之状，在皮肤间一身尽痛，若划若刺，淫淫跃跃，如中蛊毒，故名蛊风。皆由体虚受风侵伤正气也。……治蛊风身痛如刀划，白花蛇煎方。”

蛊胀 病名。❶指有流行性，因蛊毒引起腹部胀大，四肢浮肿，形体消瘦者。见《千金要方》卷二十四。《医林绳墨·膨胀》：“至若蛊胀之症，所受山岚瘴气，或虫蛇蛊毒之物，遂使大腹作胀，肚见青红之纹。皆由山岚蛊毒之气，因感入腹，聚而不散，结为腹满之症。”参蛊注条。❷即鼓胀。《古今医鉴·胀满》：“经曰鼓胀，……其病胶固难治。又名蛊者，若蛊侵蚀，有虫之义。”❸指单腹胀。《医钞类编·胀病门》：“单腹胀，四肢头面不肿胀，惟在腹，故名为单腹胀，其实脾胃病也。又以其血气结聚，不可解散，其毒如蛊，故亦名蛊胀。”❹指腹膨大而中实有物者。《类证治裁·肿胀》：“别有蛊胀，因气血郁痹，久则凝滞不行，腹形充大，中实有物，非虫即血，非如鼓胀之腹皮绷急，中空无物也。”参胀病有关条。

蛊注 古病名。出《金匮要略·五藏风寒积聚病脉证并治》。《诸病源候论·蛊注候》：“注者住也，言其病连滞停住，死又注易傍人也。蛊是聚蛇虫之类，以器皿盛之，令其自相啖食，余有一个存者，为蛊也。而能变化，人有造作敬事之者，以毒害于佗，多于饮食内而行用之，人中之者，心闷腹痛，其食五藏尽则死。有缓有急，急者仓卒十数日之间便死，缓者延引岁月，游走腹内，常气力羸惫，骨节沉重，发则心腹烦懊而痛，令人所食之物，亦变化为蛊，渐侵食府藏尽而死，则病流注染着傍人，故谓之蛊注。”治可用《千金》桃奴汤、太乙备急散等方。参疰条。

蛊注毒痢 病名。见《张氏医通》卷七。即蛊注痢，详该条。

蛊注痢 病名。❶指痢疾如蛊注，下脓血瘀浊杂物者。又称蛊疰痢、蛊注毒痢、虫疰痢、蛊痢。《诸病源候论·蛊注痢候》：“虫注积候，此由岁时寒暑不调，则有湿毒之气伤人，……毒气侵蚀于藏府，如病蛊注之家，痢血杂脓，瘀黑有片如杂肝，与血杂下是也。”治宜地榆汤、桔梗散、猬皮丸等（方见《圣济总录·泄痢门》）。参蛊痢条。

❷指服食金石药，而致毒发热盛发生痢者。《医学入门》卷五："蛊疰痢，黑如鸡肝，发渴，五内切痛，乃服五石汤丸，逼损真阴，其血自百脉经络而来，茜根丸救之。"也可选用羚羊丸、乌梅丸、理中汤等方。参见痢疾条。

蛊毒病　病名。指中蛊毒所致的多种病候。包括射工病、沙虱病、水毒病、蛇蛊、蜥蜴蛊、虾蟆蛊、蜣螂蛊等。《诸病源候论·蛊毒病诸候》："凡蛊毒有数种，皆是变惑之气。……凡中蛊病，多趋于死，以其毒害势甚，故云蛊毒。"《备急千金要方》卷二十四："论曰蛊毒千品，种种不同，或下鲜血，或好卧暗室，不欲光明，或心性反常，乍嗔乍喜，或四肢沉重，百节痠疼。"参蛊、水蛊等条。

蛊疰痢　古病名。见《世医得效方》卷十。即蛊注痢，详该条。

蛊痢　病名。《圣济总录》卷七十七："凡下痢脓血间杂瘀黑有片，如鸡鸭肝，与血俱下者，蛊痢也。此由岁时寒暑不调，湿毒之气，袭人经脉，渐至藏府，毒气挟热，与血相搏，客于肠间，如病蛊注之状，故名蛊痢也。"蛊毒下痢，如鸡鸭肝片，腹痛，可用地榆汤、桔梗散、黄芩汤等方。参蛊毒痢条。

蚰蜒黄　三十六黄之一。《太平圣惠方》卷五十五："蚰蜒黄者，喉中似噎，喘息不调，四肢疼闷，言语不正，水米难下，若颊内有青脉出口角，手足乱动，冷者难治。"《圣济总录》卷六十一："病人身体凉冷，舌上黑脉，及两颊有青脉起，目黄时时变异，脑如针刺，头旋欲倒者，是蚰蜒黄。"治用点烙法，或者内服半夏散等方。参见黄疸有关条。

蛇蛊　蛊毒病之一。《诸病源候论·蛊毒病诸候》："著蛊毒，面色青黄者，是蛇蛊。其脉洪壮，病发之时，腹内热闷，胸胁支满，舌本胀强，不喜言语，身体恒痛。又心腹似如虫行，颜色赤，唇口干燥，经年不治，肝鬲烂而死。"参蛊、蛊毒病条。

蛇瘕　八瘕之一。《诸病源候论·癥瘕病诸候》："人有食蛇不消，因腹内生蛇瘕也。亦有蛇之精液误入饮食内，亦令病之。其状常若饥而食则不下，喉噎塞，食至胸内即吐出，其病在腹，摸揣亦有蛇状，谓蛇瘕也。"《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："蛇瘕，其形长大，在脐上下，或左右胁，上食心肝，其苦不得吐气，腰背痛，难以动作，少腹热，膀胱引阴挛急，小便黄赤，两股胫间时痛。"《类证治裁·痃癖癥瘕诸积论治》："蛇瘕，经后阴未复，食饮误中虺毒，成形，长而疠痛，宜蛇瘕方。"参瘕、八瘕条。

趺蹶　古病名。一作趺蹶。指一种行动障碍的病证。多因太阳经脉受伤所致。《金匮要略·趺蹶手指臂肿转筋狐疝蚘虫病脉证并治》："病趺蹶，其人但能前不能却，……此太阳经伤也。"《金匮要略浅注》卷八："得病因跌而致蹶，其人但能前步而不能后却。"

啮舌　啮通齧。啮舌见《灵枢经白话解·口问篇》。即齧舌，详该条。

唾血　证名。❶指痰中带血。《素问·咳论》："肺咳之状，咳而喘息有音，甚则唾血。"详咳血、嗽血、咯血等条。❷指血随唾液而出。多因脾不统血，肝不藏血，或肾水不足，阴虚火旺所致。脾不统血者，伴见心悸怔忡，睡卧不安，饮食减少，疲乏无力，宜用归脾汤、七珍散等方加减。肝不藏血者，伴见头痛，胁痛，口渴，便秘，宜用当归龙荟丸、泻心汤等方。阴虚火旺者，伴见咽干口燥，心烦失眠，舌质红，脉细数，治宜滋阴降火，用滋阴降火汤、麦冬养营汤等方。《张氏医通·诸血门》："唾血，平时津唾中有血如丝或浮散者，此属思虑伤脾，脾虚不能统血也。有兼心兼肾兼胃之不同。兼心，加味归脾汤；兼肾，六味丸加五味子、

肉桂；兼胃，四君子汤加黄芪、山药、粟米，名七珍散。”

唾脓血 证名。见《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》。指咳唾脓血。《金匮要略心典》卷上：“惟胸中痛，脉滑数，唾脓血，则肺痈所独也。”参咳唾脓血、肺痈条。

唍 唍通“哕”。指干呕。《类证活人书》卷十：“干呕者，令人所谓唍也。”《医经溯洄集·呕吐干呕哕咳逆辨》：“夫唍与哕，盖字异而音义俱同者也。”详见哕、干呕等条。

〔丿〕

铜中毒 病名。因大量吸入铜粉尘及烟雾，或服用过量铜盐中毒。症见头痛，头晕，全身乏力，口腔粘膜蓝染，口有金属味，恶心呕吐，剧烈腹痛腹泻，呕吐物及排泄物呈蓝色或绿色，或更见呕血，黑粪。严重者，次日发热，心动过速，血压下降及昏迷、痉挛等，肝肾功能异常，甚则衰竭。中毒时间延长，可见溶血现象。因接触所致者，可见接触性皮炎，湿疹，甚至坏死。宜中西医结合救治。《本草纲目》卷四载有解铜毒药物，如慈菇、胡桃、鸭通汁等，可参考。参金石毒条。

铜疸 疸证之一。《疸症全书》卷中：“铜疸，浑身上下头面眼珠，尽如姜黄色者，邪热攻乎脾胃，而土之本色现于外也。盖脾为阴脏，己土主燥；胃为阳腑，戊土主湿，一湿一燥，湿热熏蒸，如盒面状，故发黄也。”参疸、疸气条。

银杏中毒 病名。即白果中毒。详该条。

停饮心痛 病证名。《圣济总录》卷第五十六：“心属火，其气炎上，饮为水，其性趋下，……若水饮停积于胸中，火气不得宣通，则阳虚阴盛，其病心中淡淡然欲吐而痛，是为停饮心痛也。”参心痛、饮心痛条。

停饮胁痛 病证名。见《秘传证治要诀·胁痛》。多由于水饮痰浊流注厥阴之经，气机痹阻所致。临床表现为胁肋疼痛，或者胁痛没有定处，甚至于漉漉有声，咳嗽气急，脉多沉弦。治宜涤痰通络为主，如导痰汤、调中顺气丸、控涎丹等方。参见痰饮胁痛条。

停饮眩晕 病证名。指眩晕由心下或膈间停饮所致者。《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》：“心下有支饮，其人苦冒眩，泽泻汤主之。……卒呕吐，心下痞，膈间有水，眩悸者，小半夏加茯苓汤主之。”《证治汇补·眩晕》：“停饮眩晕，中气不运，水停心下，心火畏水，不敢下行，扰乱于上，头目眩晕，怔忡心悸，或吐涎沫，宜泻水利便，使心火下交，其眩自已。”治宜通阳利水，可用五苓散、苓桂术甘汤等方。参痰饮眩晕、痰晕条。

偏风 偏枯的别称。出《素问·风论》。多由于风邪乘虚客于躯体的偏侧所致。《诸病源候论·风病诸候》：“偏风者，风邪偏客于身一边也。人体有偏虚者，风邪乘虚而伤之，故为偏风也。”参见偏枯、半身不遂条。

偏头风 病证名。指头痛之偏于一侧者。又名偏头痛、边头风。《丹溪心法·头风》：“偏头风，在左而属风者。”《张氏医通·诸痛门》：“偏头风者，其人平素先有湿痰，加以邪风袭之，久而郁热为火，总属少阳厥阴二经。有左痛忽移于右，右痛忽移于左者，风火击动其痰湿之气，所以互换也。痛久不已，令人丧目，目者，肝之窍，肝风内动，则害空窍也。盖木邪亢盛，则生风生火，鼓动胸中之痰积，皆随火上逆为患耳。”治宜祛风通络，舒肝豁痰，补肝养血诸法。可用清空膏、散偏汤、加味四物汤等方。一般地认为：头痛偏左者，属风属血虚或血虚火盛；头痛偏右者，属痰属热，或气虚夹痰。参头风、头痛条。

偏头痛 病证名。又称头偏痛、偏头风。《兰室秘藏·头痛门》：“如头半寒痛者，

先取手少阳、阳明，后取足少阳、阳明，此偏头痛也。”《医林绳墨·头痛》：“有偏头痛者，发则半边痛，然痛于左者属气，此气胜生风也，宜以驱风顺气为先，如防风通圣散之类；痛于右者属痰，此风胜生痰也，治宜清痰降火为要，如贝母、二陈加芩、栀、甘菊之属。”参头痛、偏头风条。

偏沮（jù　句）　证名。指汗出偏于半身（左侧或右侧）。即半身有汗，半身无汗。多由气血不能畅流周身所致。《素问·生气通天论》：“汗出偏沮，使人偏枯。”马莳注：“或左或右，一偏阻塞而无汗，则无汗之半体，他日必有偏枯之患。”张志聪注：“沮，湿也。……如汗出而止半身沮湿者，是阳气虚而不能充身偏泽，必有偏枯之患矣。”

偏枯　病名。见《灵枢·刺节真邪》。又名偏风，亦称半身不遂。多由营卫俱虚，真气不能充于全身，邪气侵袭于半身偏虚之处所致。症见一侧上下肢偏废不用，或兼疼痛，久则患肢肌肉枯瘦，神志无异常变化。《灵枢·热病》：“偏枯，身偏不用而痛，言不变，志不乱，病在分腠之间。”《素问·大奇论》谓偏枯不瘖能言，舌转灵活者易治，瘖不能言者难治。治偏枯可从调阴阳、通经脉、益营卫中求之。《类证治裁·中风》：“治偏枯，宜从阴引阳，从阳引阴，从右引左，从左引右，使气血灌注，周流不息，莫如养血温经，补中汤少加附子，下七味地黄丸。……营卫俱虚者，黄芪五物汤。膝骨软，加牛膝、虎骨；节软，加木瓜、当归。”参半身不遂、左瘫右痪条。本证可见于脑血管意外后遗症等。

偏身青筋痧　痧证之一。《杂病源流犀烛·痧胀源流》：“偏身青筋痧，痧发，面色如靛，满身青筋胀起，粗如筋，痛自小腹起，攻上胸胁，困倦不堪。切不可误认作虚，急刺曲池、委中出黑血，宜涤痧丸以火酒下。”参痧条。

偏身肿胀痧　痧证之一。《痧胀玉衡·偏身肿胀痧》“痧者，暑热时疫恶毒之气，攻于里则为痰喘，为血瘀，昏迷沉重，不省人事。若元气壮实，内不受邪，不入于里，即散其毒于肌肤血肉之表，为肿为胀。若误饮热汤热酒，便成大害，此痧之暗者，宜从脉异处辨之。”治用刮痧、放痧，药用宝花散等。

偏渗小便不利　小便不利证之一。见《症因脉治》卷四。因水谷偏走大肠所致。主要症状为泄泻不止，腹中漉漉有声，或痛或不痛，小便量少或无，脉弦。因脾胃有热而致者，宜用清胃汤、黄连戊己汤合泻黄散、导赤各半汤等方。因脾胃有寒而致者，宜用理中汤。因脾虚气弱而致者，宜用四君子汤、补中益气汤等方。因胃中有痰而致者，宜用二陈平胃散。因小肠气滞而致者，宜用木通枳壳汤。参小便不利条。

偻附　证名。偻，屈背之意；附同俯。指行路时身背弯曲，头向下俯的症象。《素问·脉要精微论》：“膝者筋之府，屈伸不能，行则偻附，筋将惫矣。”多因肝肾精髓不足，筋骨失养所致。为督脉病变，以虚证居多。治疗宜补肝肾、强筋骨为主。参背伛偻、背偻条。

盘疝　病名。指脐周绞痛的一种疝气。《诸病源候论》卷二十：“腹中痛，在脐旁，名曰盘疝也。”参寒疝条。

盘肠痧　痧证之一。❶即紧痧。《痧胀玉衡·盘肠痧》：“痧毒肆行，盘转肠胃　虽不痛不疼　苦楚万状　命在须臾　此紧痧之症也。”❷即绞肠痧。《痧证汇要·绞肠痧（盘肠痧）》：“心腹绞痛，大痛，或如板硬，或如绳转，或如筋吊，或如锥触，或如刀割，痛极难忍。”参痧、紧痧、绞肠痧条。

盘脐痧　痧证之一。《七十二种痧症救治法·盘脐痧》：“此系肾经受邪，脐上盘旋，悠悠作痛。”治用香油刮膻中、中庭、

中脘，再刺中魁、小骨空穴。用砂仁、槟榔、芦粟梗、藿香、木通、灯心等。参痿条。

脚下痛 证名。指脚底肌肤、筋脉着地作痛。《素问·藏气法时论》："脾病者，身重，善肌，肉萎，足不收，行善瘛，脚下痛。"多由脾病湿盛所致。本证可见于痿、痹、脚气等病证。

脚气 病名。见《肘后备急方》卷三。古名缓风、壅疾，又称脚弱。因外感湿邪风毒，或饮食厚味所伤，积湿生热，流注腿脚而成。其证先见腿脚麻木，酸痛，软弱无力，或挛急，或肿胀，或萎枯，或发热，进而入腹攻心，小腹不仁，呕吐不食，心悸，胸闷，气喘，神志恍惚，言语错乱等。治宜宣壅逐湿为主，或兼祛风清热，调血行气等法。《医学正传·脚气》："故为治者，宜通用苍术、白术之类以治其湿，知母、黄柏、条芩之类以去其热，当归、芍药、生地黄之类以调其血，木瓜、槟榔之类以行其气，羌活、独活以利关节而散风湿，兼用木通、防己、川牛膝之类引药下行及消肿去湿。"常用方剂如鸡鸣散、济生槟榔汤、防己饮等。《肘后备急方》、《备急千金要方》等方书中，有大豆、乌豆、赤豆治脚气的记载，可用作辅助疗法。脚气有干脚气、湿脚气之分。湿脚气中又有寒湿脚气、湿痰脚气、湿热脚气、湿毒脚气等。此外，还有风毒脚气、瘴毒脚气、脚气冲心、脚气入腹、脚气迫肺等多种类型。又有按六经分类者。详各条。

脚气入腹 脚气危证之一。见《备急千金要方》卷七。指脚气从足而上入于腹。症见腹部不仁，腹胀，胸闷，气喘等。可选用《千金》半夏汤、茱萸汤，松节汤、苏子降气汤，沉香降气汤等方。参脚气条。

脚气伤寒 病证名。见《惠直堂经验方·伤寒门》。症见两跗忽然红肿，因而发热，两胫俱浮作痛等。由感染湿热，先从下受，治宜消其湿热，从膀胱下行，则身热自退，可用顺导汤等方。参脚气条。

脚气冲心 脚气危证之一。见《外台秘要》卷十八。又称脚气攻心、脚气入心。指脚气病见心悸，气喘，呕吐诸症，甚则神志恍惚，言语错乱者。由邪毒上攻心胸所致。湿脚气而见攻心者，由于湿毒上攻，多伤阳，急宜温阳散寒，逐湿泄毒，用吴茱萸汤合《千金》半夏汤加减；干脚气而见攻心者，由于湿火壅盛，毒气上攻，治宜宣壅逐湿，凉血清火，用吴茱萸汤合牛黄清心丸，或用犀角散加减。参脚气条。本病症可见于脚气性心脏病。

脚气迫肺 脚气重证之一。指脚气病症而见喘咳者。《圣济总录》卷八十二："毒气循经上入于肺，则气道奔迫，升降不顺，故令上气喘满。"《证治要诀·诸气门》："脚气迫肺，令人喘嗽，宜小青龙汤。每服加入槟榔一钱，重煎服。"参脚气条。

脚气肿满 脚气病之一。见《诸病源候论·脚气病诸候》。由风湿毒气，搏于肾经所致。《太平圣惠方》卷四十五："夫脚气肿满者，由风毒气搏于肾经。肾主于水，今为邪所搏，则经络壅涩，不能宣通水液，……致水气壅溢腑脏，浸渍皮肤，故令肿满也。"症见足胫肿胀，腹满，甚则遍身肿满，喘促烦闷，小便不利等。治宜祛风逐湿，宣通壅滞。选用风引大豆汤、汉防己散等方。

脚心痛 证名。见《证治要诀·脚气》。即足心痛。参该条。

脚汗 见《医学纲目》卷十七。有因脾胃湿热而致者，足心热而不时汗出。因于脾胃虚寒者，足心冷汗时出。参手足汗条。

脚板红 证名。指脚底皮肤泛现红色的症象。《石室秘录·奇治法》："人脚板中色红如火，不可落地，又非痰毒，终岁经年不愈。"由于阴虚火聚于脚心不散所致。治宜滋阴清火为主，方用六味地黄丸加甘菊花、玄参、麦冬、沙参、石斛、萆薢、牛膝、北五味、车前等。

脚软 证名。指足软弱无力。《医学入

门》卷五："脚软，筋痛者，大补阴丸，去地黄，加白芍、知母、甘草，倍牛膝。"《古今医察案·痿》："两脚软弱无力，不能起者，……淫热成痿，正合东垣清燥汤例，但药力差缓，难图速效。以独味杜仲，空心酒水各半煎服，日进清燥汤，下潜行散。"《类证治裁·脚气》："风毒甚，头痛身热，肢节痛，或一脚偏软，小续命汤加木瓜。"痓夏证亦可见脚软。《鲒溪医述·足》："夏令日长暴，身倦，脚软者何？曰：名曰痓夏，此时令之火为患。"参痿症、痓夏条。

脚肿　水肿病的常见症状之一。见《证治要诀·肿》。一作足肿。《医林绳墨》卷五："足肿者，谓腿足作肿也。有湿热太甚而作肿者，其色红肿，当清湿热，如当归拈痛汤亦可。有脾虚不足而作肿者，其色白肿，当养脾气，如参苓白术散加牛膝、苡仁。有脾虚气滞而不行者，肿久必有水出，破之难痊，宜当实脾为要，如参苓白术散加升麻、泽泻。有病久而作肿者，其肿下连足趺，如皮肿可治，肉肿难除，当养正健脾，如补中益气汤加牛膝、续断"。参水肿条。

脚弱　❶即脚气。《太平圣惠方》卷四十五："夫脚气者，晋宋以前名曰缓风，《小品》谓之脚弱。"详脚气条。❷指脚膝软弱之证，包括脚气和气脚。见《中藏经·论脚弱状候不同》。参气脚条。

脚跟痛　足跟痛的别称。《医学入门·脚气》："脚跟痛，有血热者，四物汤加知母、黄柏、牛膝；有痰者，五积散加木瓜，或开结导饮丸。"详足跟痛条。

脚膝痿弱　病证名。指两脚和膝部关节软弱无力者。《儒门事亲》卷一："凡见脚膝痿弱，难于行步，或一足不伸，便作寒湿脚气治之。"肾水衰少，虚火内炎或精血不足，筋骨失于濡养亦可导致。常见于痿证、半身不遂、脚气等疾患。

脖转　病名。即转胞。《太平圣惠方·治脖转诸方》："夫脖转者，是脖屈辟，小便不通。"详转胞条。

脖痹　病名。见《东医宝鉴》卷四。详胞痹条。

脱　指病情突变，阴阳相离，而见生命垂危的证候。《临证指南医案·脱》徐灵胎评语："脱之名，惟阳气骤越，阴阳相离，汗出如油，六脉垂绝，一时急迫之症，方名为脱。"如中风病以口开、手撒、眼合、遗尿、声如鼾，甚或有直视、肉脱、面赤如妆等。参中风脱证条。

脱力黄　病名。《杂病源流犀烛·诸疸源流》："力役人劳苦受伤，亦成黄胖病，俗名脱力黄。"与因虫食所致之黄胖病不同。证见黄胖而好食易饥，怠惰无力。治宜双砂丸、伐木丸加味。参黄胖条。

脱气　❶证名。指虚劳病出现阳气虚衰的疾患。《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》："脉沉小迟，名脱气，其人疾行则喘喝，手足逆寒，腹满，甚则溏泄，食不消化也。"治宜温补脾肾，方用附子理中汤等。参见气病条。❷指正气耗损。《素问·缪刺论》："针过其日数则脱气，不及日数则气不泻。"

脱血　病证名。又称血脱。《素问·平人气象论》："臂多青脉，曰脱血。……安卧脉盛，谓之脱血。"《类经·色脉类》："血脱则气去，气去则寒凝，凝泣则青黑，故臂见青色，言臂则他可知矣。……凡脉盛者邪必盛，邪盛者卧必不安。今脉盛而卧安，知非气分阳邪，而为阴虚脱血也。"详血脱条。

脱汗　证名。《医碥·汗》："脱汗，阴盛格阳，汗从阳脱，味淡不咸，如珠不流，为汗绝，不治。"详绝汗条。

脱阳痧　痧证之一。《痧症全书》卷中："脱阳痧，小腹急痛，肾缩面黑，气喘出冷汗，名为脱阳，有似发痧，用连须葱白三茎研烂，酒四碗，煮二碗，作三服。又炒盐熨脐下气海穴，令气热。"参基础理论分册脐

阳条。

脱肛 证名。指直肠或直肠粘膜脱出肛门外者。《诸病源候论·痢病诸候》："脱肛者，肛门脱出也。多因久痢后，大肠虚冷所为。"因气虚下陷，或胃肠湿热下注而致。气虚下陷者，治宜补气升提，方如补中益气汤重用人参、黄芪、升麻。虚中挟火而痛者，加黄芩、黄连、槐花。虚寒者，用理中汤。因胃肠湿热下注而肛脱肿痛者，可选用抽薪饮、大分清饮等方。同时可兼用局部薰洗搽敷：寒者用荆芥、胡葱煎洗，以伏龙肝、鳖头灰、百药煎研末，油调敷；热者用朴硝、白矾汤洗，以黄柏、牡蛎粉掺搽；煽红肿痛者，以田螺去屎，入冰片，化水搽（见《类证治裁·脱肛》）。《医学衷中参西录》用鲜蔓陀罗煎浓汁，再合黄肉浓煎取汁，拌党参末晒干贮存，用水煎汁，洗局部。

脱泻 病证名。泄泻重证。《医学传灯》："脱泻者，水谷皆下，日有百次，不但糟粕泻尽，并肠中所蓄之黄水，俱已竭尽而无余。"急宜止泻固脱。参紧病、滑泄条。

脱营 古病名。《素问·疏五过论》："凡未诊病者，必问尝贵后贱，虽不中邪，病从内生，名曰脱营。"后世沿用脱营之名，而所指不尽相同。❶指因情志所伤而成的一种虚劳证。《圣济总录》卷九十一："脱营之病，虚劳之类也。……形体日减，洒洒然时惊，甚则精气竭绝，形体毁沮，皮焦筋屈，痿蹙拘挛，是其候也。"宜用天门冬散、大补益石斛散等方。❷指因情志所伤而致的一种肿痛。又作失荣。《外科正宗·杂疮毒门》："失荣者，先得后失，始富终贫，亦有虽居富贵，其心或因六欲不遂，损伤中气，郁火相凝，隧痰失道停结而成。其患多生肩之已上，初起微肿，皮色不变，日久渐大，坚硬如石。"病较难治，可用和荣散坚丸、飞龙阿魏化坚丹等方。

脱营失精 古病名。出《素问·疏五过论》。指因精神刺激过度所致的病证。原意以先贵后贱所致者为脱营，先富后贫所致者称失精。后世有将脱营失精并称者。《杂病源流犀烛·内伤外感源流》："脱营失精，失志病也。……若后贫后贱之人，忧愁思虑，愤恨悲哀，无一不有，故内伤脏腑。伤则各经火动，并伤元气，日渐日深。病发则饮食无味，神倦肌瘦也。治之可不察其由哉。宜内服镇心丹、升阳顺气汤，外用香盐散，日擦牙齿，自愈。"参脱营、失精条。

猪黄 三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一："治猪黄口噤沫从口角出，九日可治，十日疾势已过，宜急灸两牙关二十七壮，次灸承浆二七壮。"参黄疸有关条。

猪癎 六畜痫之一。《丹溪心法·证治》："猪癎喜吐沫，以其病状偶类之耳。"即猪癫。详见六畜癎、猪癫条。

猪癫 病名。❶五痫之一。即猪痫。❷五痫的俗称。《景岳全书·杂证谟》："癫即痫也。""五痫，……即今人之谓羊癫、猪癫也。"《辨证录》卷四："一遇可惊之事便跌仆吐涎，口作猪羊之声，世医谓是猪羊之癫。"治宜培脾土，补命火为主。参痫、五痫条。

猝中 见《辨证录·中风门》。即卒中。详该条。

猝症 证名。即暴喑。《素问玄机原病式·六气为病》："暴喑，猝症也。"详暴喑条。

〔丶〕

麻木 证名。指肌肤感觉障碍。麻，一般如蚁走感或触电感；木，皮肉不仁如木厚之感。多由气血俱虚，经脉失于濡养，或气血凝滞，经络失畅，或寒湿痰瘀留阻脉络所致。《杂病源流犀烛·麻木源流》："麻木，风虚病亦兼寒湿痰血病也。麻，非痒非痛，肌肉之内，如千万孑虫乱行，或遍身淫淫如虫行有声之状，按之不止，搔之愈甚，有如麻之状。木，不痒不痛，自己肌肉如人肌肉，

按之不知，掐之不觉，有如木之厚。麻木皆有久暂。暂时虽因气血不足，未足为病，若用重剂，反损真元。惟经年累月，无一日不麻，必内气甚虚，风痰凑之之故。……气虚是本，风痰是标。当先以生姜为响导，枳壳开气，半夏逐痰，防风、羌活散风，木通、牙皂通经络，姜蚕为治虫行之圣药。在手臂用桑条，在股足加牛膝。待病减，用补中益气汤，多加参芪。”《张氏医通·麻木》：“日轻夜重，脉涩而芤或弦，属痰挟死血，宜活血行气，二陈加芎、归、桃仁泥、红花、牛膝、韭汁之类。大便见黑而不作泻者，小剂桃核承气汤微利之。十指麻木属胃中湿痰死血，二陈加二术、桃仁、红花，少加附子行经。湿热下流，两脚麻木，或如火燎者，二妙加牛膝作丸，不应，少加肉桂。”如遍体麻木，宜八仙汤、五积散；浑身麻木兼目缩，或昏或热者，宜神效黄芪汤；皮肤麻木，宜芍药补气汤；暑天手麻木，宜人参益气汤；左腿麻木沉重，宜除湿补气汤；体倦麻木，食汗善饥，舌强声哑声重者，宜清阳补气汤；四肢肿，肌肉麻者，宜续断丸；舌麻木，吐痰涎或身麻者，宜止麻消痰饮；气滞麻木，宜开结利气舒筋通络等法。

麻痹　证名。见《太平圣惠方》卷二十。泛指肢体或局部肌肤麻木，不知痛痒。《医学正传·麻木》：“夫所谓不仁者，或周身或四肢啷啷然麻木不知痛痒，如绳扎缚初解之状，古方名为麻痹者是也。”

痓瘴　瘴疟之一。《瘴疟指南》卷上：“瘴病初起，发热头痛，或呕逆，或不呕逆，兼证虽多，惟以其神昏不能言，但噫噫作声，或全不作声，谓之痓瘴，此热瘴之甚者。”痓瘴多属危证。治当散其血，宜急用麦冬汤调黑神散救治。如证见目上视，口噤，牙关紧闭，昏不知人，遗尿遗屎不能言者，宜以手重拿曲池、虎口、颊车、人中，亦知畏疼，不能出声叫哭，待热微时，稍能言语为痰迷心窍，宜用青州白丸子，二陈合星附汤，或三生饮等方。元气虚者，加人参。又附香散、养正丹、苏感丸、正舌散及全蝎、麝香、南星、茯苓等药均可选用。参瘴疟条。

痓　出《素问·五常政大论》。❶病名。同痉。《圣济总录》卷二十八：“痓又谓之痉者，盖痉痓一类，古人特以强直名之。”❷证名。痓与痉为二证。《杂病源流犀烛·破伤风源流》：“痉者，筋劲强直而不柔和；痓者，口噤而角弓反张。二者虽各有症状，其源则由血气内虚，痰涎壅盛。”

痰疟　病名。❶即疟疾。出《素问·疟论》等篇。①疟疾的通称。《圣济总录·疟病门》：“痰疟者，以疟发该时，或日作，或间日乃作也。……寒温瘴疟，动皆该时，故《内经》统谓之痰疟。”②指间日疟。《说文解字》：“痰，二日一发疟也。”《说文句读》：“谓隔一日（发）也。”③指老疟、久疟。《医学纲目》卷六：“痰疟者，老疟也。”“久疟者，痰疟也，以其隔二三日一发，缠绵不去。”④指疟邪未尽而复发于四季的疟疾。《诸病源候论·痰疟候》：“夫痰疟者，……其病秋则寒甚，冬则寒轻，春则恶风，夏则多汗。”参见疟疾条。❷传尸病的别称。《外台秘要·传尸》：“传尸病，亦名痰疟。”详该条。

商陆中毒　病名。因药服或误服商陆过量中毒。症见恶心，呕吐，头痛，腹泻，语言不清，躁扰抽搐。严重者昏迷，直至死亡。宜中西医结合救治。文献有用甘草、冷稀粥频服以解毒止泻的记载。可参考。

情志三郁　证名。指因情志抑郁所致的三种郁证。见《景岳全书·论情志三郁证治》。即怒郁、思郁、忧郁。详各条。

悸　证名。出《灵枢·癫狂》。❶跳动不宁为悸。心跳不宁者称心悸，脐下搏动者称脐下悸。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚。”《证治准绳·杂病》：“《伤寒明理论》释悸字云：悸，心忪也，筑筑惕惕然动，怔怔忪忪，

不能自安也。则悸即怔忡，而今人分为两条，谬矣。”❷心动不宁而又恐惧不安为悸。《赤水玄珠》卷六：“怔忡者，心中惕惕然动不安也。……怔忡止于心不自安，悸则心既动而又恐恐然畏惧，如人将捕之。”参心悸、怔忡条。

悸心痛 病证名。见《备急千金要方》卷十三。指心痛兼悸者。多因病久气血虚损，心脾失养所致。《医宗金鉴·杂病心法要诀》：“岐骨陷处痛，名心痛。……悸而痛，名悸心痛。”《医学从众录·心痛》：“虚痛即悸痛，脉浮而小细，或沉而短涩，其痛重轻相间，多日不愈，心悸，最喜摩按，得食小愈，饥则更痛。”《杂病源流犀烛·心病源流》：“其痛分九种。……曰悸，劳役则头面赤而下重，自烦发热，脉弦，脐上跳，心中痛，由心伤也。”宜用辰砂妙香散、加味四七汤、归脾汤等方。参九种心痛、心痛条。

惊 证名。❶遇事易惊或无故自惊的简称。出《素问·大奇论》。亦称喜惊、惊伤。《张氏医通·神志门》：“夫惊虽主于心，而肝胆脾胃皆有之。惊是火热烁动其心，心动而神乱也。若因内气先虚，故触事易惊，或卒然闻响大声，目击异物，遇险临危，皆使人有惕惕之状也。……宜温胆汤加熟枣仁。如远志丸、妙香散、平补正心丹、龙齿清魂散皆可选用。”若因大惊而病者，宜黄连安神丸；由肾虚而惊者，宜人参、黄芪、当归、白术、元参、陈皮、黄柏；由胆虚而惊者，宜人参、枳壳、肉桂、五味子、枣仁、熟地、杞子、柏子仁；由肝胆俱虚者，宜酒化鹿角胶，空服下五钱；或由心气不足，神不定而惊者，宜妙香散；由肝虚受风，卧若惊状者，宜珍珠母丸；由血虚而惊者，宜朱砂安神丸；由痰盛而惊者，宜加味定志丸；由思虑过度而惊者，宜清心补血汤；由气血俱虚而惊者，宜养心汤（见《杂病源流犀烛·卷六》）。参喜惊、惊伤条。❷生理名词。七情之一。

惊伤 指受惊吓所致的疾病。《张氏医通·神志门》：“惊则气乱，郁而生火生涎，涎与气搏，变生诸证，或短气，或自汗，或眠多异梦，随即惊觉。并宜温胆汤加熟枣仁，如远志丸、妙香散、平补正心丹、龙齿清魂散皆可选用。”《医醇賸义·惊伤》：“惊则气浮，真阳外越，真阴不守，心悸筋惕，大安汤主之。”参惊条。

惊伤胁痛 病证名。见《医宗必读·心腹诸痛》。指因受惊伤碍肝气所致的胁痛。治宜通阳疏肝理气，可用桂枝汤或散加减（《类证普济本事方》）。

惊狂 病证名。即癫狂。《素问·调经论》：“血并于阴，气并于阳，故为惊狂。”吴崐注曰：“惊狂，癫狂也。”也可作为证名。如《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“伤寒脉浮，医者以火迫劫之，亡阳，必惊狂，卧起不安者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。”

惊郁 七情郁证之一。见《类证治裁》卷三。《张氏医通·惊》：“惊则气乱，郁而生火生涎，涎与气搏，变生诸证。”症见短气、自汗、眠多异梦者，宜用温胆汤、远志丸、龙齿清魂散等方。若见胆怯神迷者，宜用人参、枣仁、茯神、龙骨、石菖蒲、南枣、小麦等药。若神乱欲狂者，宜清心温胆汤。参惊、七情郁证、内郁条。

惊怖 证名。指易惊善恐或因惊致恐之意。出《金匮要略·奔豚气病脉证治》。《金匮要略心典》：“惊怖即惊恐，盖病从惊得，而惊气即为病气也。”详惊、善恐条。

惊骇 证名。出《素问·金匮真言论》。亦称惊。《医学心悟·惊悸恐》：“惊者，惊骇也。”《慎斋遗书·惊骇》：“惊骇之证，乃心肾不交之故也。”参惊、喜惊条。

惊衄 证名。《素问·气厥论》：“脾移热于肝，则为惊衄。”王冰注：“肝藏血，又主惊，故热薄之则惊而鼻中血出。”《圣济总录》用伏龙肝汤治之。

惊黄 三十六黄之一。《太平圣惠方》

卷五十五："惊黄者，面色青黄，心多惊悸，口舌干燥，不肯眠卧，卧即多言语狂乱，身体壮热。"治用点烙法，内服犀黄散或牡荆汤等方。参黄疸有关条。

惊悸　证名。❶无故自惊而悸动不宁，名为惊悸。《诸病源候论·虚劳病诸候》："虚劳损伤血脉，致令心气不足，因为邪气所乘，则使惊而悸动不定。"参心悸、怔忡条。❷因惊而悸为惊悸。《三因极一病证方论》卷十："惊悸，则因事有所大惊，……遂使惊悸，名曰心惊胆寒。"❸突然心跳欲厥为惊悸。《医学正传·怔忡惊悸健忘证》："惊悸者，蓦然而跳跃惊动而有欲厥之状，有时而作者是也。"参惊、心悸、怔忡等条。

惊痫　病名。❶指痫因受惊而发者。《诸病源候论·痫候》："惊痫者，因惊怖大啼乃发。"治宜钱氏蛇黄丸等。❷指小儿惊风。唐宋医书所载的惊痫，即指小儿惊风。参痫、惊风条。❸指痫症发后可见头、口、目后遗症者。《奇效良方·五痫》："惊痫为病，废头目，吊口目，或一目双目，或昏或冒，或邪视，或头喎，或摇头，或战脑。"参五痫条。

惊痰　痰证之一。因痰迷心窍所致。《证治汇补·癫证》："迷于心为心痛，惊悸，怔忡，恍惚，梦寐奇怪，妄言见祟，癫狂痫瘖，名曰惊痰。"亦指受惊而痰结胸腹者。《杂病源流犀烛·痰饮源流》："惊痰，因惊痰结成块在胸腹，发则跳动，痛不可忍，或成癫痫，在妇人多有此证，宜妙应丸。"参痰证有关条。

惊躁　证名。出《素问·六元正纪大论》。指惊骇不安，躁动不宁之证。详惊、躁条。

凑肺　病证名。指因恣饮伤肺所致的咳嗽。《证治要诀·诸嗽门》："有饮冷热酒，或饮冷水，伤肺致嗽，俗谓之凑肺，宜紫菀饮。"《张氏医通》卷四："如饮冷热酒，伤肺致嗽，谓之凑肺。或兼煎燖伤胃，咳嗽咽痒，痰多唾血，喘急胁痛，不得安卧，改定紫菀茸汤。"参酒嗽、咳嗽条。

断泄　证名。又称断绝。指筋肉萎缩和肢体痿废不用，属痿躄之类。《金匮要略·中风历节病脉证并治》："味酸则伤筋，筋伤则缓，名曰泄；咸则伤骨，骨伤即痿，名曰枯。枯泄相搏，名曰断泄。"《金匮要略心典》卷上："此亦内伤肝肾，而由于滋味不节者也。枯泄相搏，即筋骨并伤之谓。曰断泄者，言其生气不续，而精神时越也。营不通而卫不行者，病在阴而及于阳也。不通不行，非壅而实，盖即营卫涸流之意。"参痿躄条。

断肠草中毒　病名。断肠草又名钩吻、胡蔓藤、烂肠草、黄藤、毒根等。因误服断肠草中毒。详钩吻中毒条。

断绝　证名。又称断泄。见《医宗金鉴》卷十九。详断泄条。

盗汗　证名。出《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》。又名寝汗。指睡中出汗，醒后即止。多见于虚劳，以阴虚者为多。《医略六书·汗病》："盗汗属阴虚……盗汗乃睡中汗出，醒则汗收，因阴气空虚，睡时卫气乘虚陷入，则表无护卫而营中之火独旺于外，蒸腾汗出，醒则卫气行阳而气固于表，其汗乃止，多见于虚劳之人，宜养阴清热。热盛者，当归六黄汤；阴虚者，六味地黄汤。"详见虚劳盗汗、阴虚盗汗条。盗汗亦可因阳虚、气虚、肝热、湿热、外感热病等所致。《伤寒明理论·盗汗》："杂病盗汗者，责其阳虚也，伤寒盗汗者，非若杂病之虚，是由邪气在半表半里使然也。"《张氏医通·盗汗》："酒客睡中多汗，此湿热外蒸也，二妙散加白术、防风、牡蛎。……伤寒阳明少阳证盗汗，柴胡、葛根随证主治。温热三阳合病，目合则汗，白虎汤。"《景岳全书·杂证谟》："若睡中盗汗而无火者，宜参苓散、独参汤主之；若阳气俱虚者宜参附汤、大建中汤之类主之。"《杂病源流犀

烛·诸汗源流》中盗汗有阴火盛者，宜正气汤；有肝热甚者，宜龙胆散。

清血 证名。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。亦作圊血。详圊血、便血条。也指下清鲜纯血。《医学纲目》卷十七："如下清血色鲜者，肠风也；血浊而色黯者，藏毒也。"参肠风条。

清便自调 清同圊。圊，厕所。清便自调，指排大便正常。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："伤寒，医下之，续得下利清谷不止，身疼痛者，急当救里；后身疼痛，清便自调者，急当救表。救里宜四逆汤，救表宜桂枝汤。"

清脓血 证名。见《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》。《金匮要略》作"圊脓血"。指大便下脓血。详便脓血、脓血痢条。

清晨嗽 病证名。见《类证治裁·咳嗽》。即早晨嗽。详该条。

清厥 厥证之一。寒厥之指尖独冷者。《杂病源流犀烛·诸厥源流》："大约手足寒者为寒厥。……又有独指尖冷者，则名清厥，宜理中汤。以上寒厥所统。"参寒厥条。

淋 病名。也称淋病或淋证。指小便涩痛，滴沥不尽，常伴见溲行急迫、短数者。出《素问·六元正纪大论》。《医学入门·淋》："淋，小便涩痛，欲去不去，不去又来，滴滴不断。"多因湿热结聚，流注膀胱，或中气下陷，肾虚气化无力而成。治疗热者宜清，涩者宜利，陷者宜升，虚者宜补。实证常用八正散、五苓散、草薢分清饮等方；虚证常用补中益气汤、知柏地黄汤、金匮肾气丸等方。淋症古有五淋、八淋之说，有寒热虚实之分。根据病因症情特点而有石淋、膏淋、气淋、血淋、劳淋、痰淋、暑淋等名称。并有暴淋、卒淋、顽淋不痛、肝热淋滞、精髓枯淋等。淋证伴尿出混浊者，称作淋浊。详各条。本证可见于泌尿系感染、结核、结石、肿瘤，以及前列腺炎、前列腺肥大、乳糜尿等疾患。

淋闭 病证名。又作淋閟、淋秘。出《素问·六元正纪大论》。❶淋与癃闭的总称。小便滴沥涩痛谓之淋，小便急满不通谓之闭。《备急千金要方》卷二十一："热结下焦则为溺血，令人淋闭不通。""下焦结热，小便赤黄不利，数起出少，茎痛或血出……热结下焦及散石热动，关格，小腹坚，胞胀如斗。"详淋、癃闭条。❷指癃。《丹溪心法·淋》："淋闭，古方为癃。癃者，罢也。不通为癃。"详癃条。

淋沥 证名。❶淋病主症之一。《诸病源候论·诸淋候》："肾虚则小便数，膀胱热则水下涩，数而且涩，则淋沥不宣，故谓之为淋。"《赤水玄珠》卷十五："淋淋沥沥，点滴而出，或涩而疼，一日数十次或百次，俗名淋病者是也。"详淋、五淋条。❷指排尿困难，点滴不畅的症状。见《三因极一病证方论·遗尿失禁证治》。《医阶辨证》："小便难，小水点滴而难出，茎中却不痛；小便淋沥，小水点滴而淋沥或痛。"多因心肾气虚，神志不守，下焦气化不利所致。常见于癃闭等疾患之虚者。参见癃闭条。❸指精浊从窍端淋沥不断的症状。《杂病源流犀烛·五淋二浊源流》："浊病之源，大抵由精败而腐者居半。……窍端时有秽物，如米泔、如粉糊、如疮脓、如目眵，淋沥不断，与便溺毫不相混，故曰是精病，非溺病也。"参浊、精浊条。本证可见于下尿路感染、结石、前列腺炎、前列腺肥大等疾患。

淋閟 病证名。见《素问·六元正纪大论》。閟通"闭"。详淋闭条。

淋浊 ❶病名。见《赤水玄珠·白浊门》。多因湿热痰浊下流，渗入膀胱所致。症见小便频数而痛，尿出混浊，或尿道流出浊物似脓。治宜渗湿化痰，清解热毒。可用二陈汤加木通、山栀、升麻、柴胡，或用八正散加土茯苓、草薢。❷淋证与浊证的合称。见淋、浊条。

淋秘 病证名。秘通闭。《金匮要略·

五脏风寒积聚病脉证并治》："热在下焦者，则尿血，亦令淋秘不通。"详淋闭条。

淋家　出《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。指素患淋证者。参淋条。

淋漓　证名。出《素问·本病论》。小便淋沥之意。详淋条。

淡饮　痰饮的古称。出《脉经·辨三部九候证第一》。详痰饮条。

深痹　病名。指病在人体较深部位的痹证。《灵枢·九针论》："八风伤人，内舍于骨解腰脊节腠理之间，为深痹也。"

宿食　病名。指饮食停积胃肠，日久不化的病证。出《金匮要略·腹满寒疝宿食病脉证治》："下利不欲食者，有宿食也，当下之，宜大承气汤。"亦可用谷神丸、大安丸等。又名宿滞、宿食不消，参各条。

宿食不消　即宿滞。《诸病源候论·宿食不消候》："宿食不消，由脏气虚弱，寒气在于脾胃之间，故使谷不化也。宿谷未消、新谷又入，脾气既弱，故不能磨之，则经宿而不消也。令人腹胀气急，噫气酢臭，时复憎寒壮热是也，或头痛如疟之状。"参伤食、宿食、宿滞条。

宿哮　病证名。《类证治裁·哮症论治》："宿哮沉痼者，摄肾真，肾气丸加减。"《临证指南医案·哮》："宿哮，……病发投以搜逐，而病去必当养正。"病时用葶苈大枣汤或皂荚丸。参哮证、冷哮、热哮条。

宿滞　病名。即宿食。《济生方》："禀受怯弱，饥饱失时，或过餐五味鱼腥乳酪，强食生冷果菜，停留胃脘，遂成宿滞。"治疗轻者宜消导，用枳术丸，保和丸等；甚者宜下，备急丹之类。详伤食、宿食、宿食不消条。

着痹　病证名。出《素问·痹论》。又名湿痹。详湿痹条。

密嘿　证名。嘿通"默"。密嘿，沉默不语之意。《灵枢·五乱》："故气乱于心，则烦心密嘿。"参忧郁条。

〔一〕

蛋积　病名。指食蛋过多而成积滞者。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："蛋积，食蛋不消成积，即嗳败卵气作酸坚痛也。宜白蔻仁、橘红、豆豉、姜汁，方用妙应丸。"亦有用大蒜汁探吐法治疗(见《济阴纲目·积聚痞块》)。

颈肿　证名。出《灵枢·经筋》。指颈部单侧或两侧肿胀粗大。多因气火郁逆，或痰滞内结所致。《杂病源流犀烛·颈项病源流》："有颈项肿痛，寒热头眩者，是气毒，宜加味藿香散；有颈项结核浮肿，先寒后热者，此风寒所搏，宜防风解毒汤；有颈项结核坚肿，色红渐热者，是热毒，宜连翘消毒饮。"《中医临证备要·颈粗》："颈前粗大，呈现食欲增进，心烦心悸，夜睡不安，呼吸困难，性情急躁，忧郁等肝火肝气交郁现象，用达郁汤法加夏枯草、青黛、丹皮、海藻。"本证可见于瘿瘤、瘰疬、痈等，参外科骨伤五官科分册瘿瘤、瘰疬、痈等条。

颈项强急　证名。指颈项肌肉筋脉牵强拘急。《金匮要略·痉湿暍病脉证并治》："病者身热足寒、颈项强急，恶寒、时头热面赤目赤，独头动摇，卒口噤，背反张者，痉病也。"《证治准绳·杂病》："颈项强急之证多由邪客三阳经也。……颈项强急，发热恶寒，脉浮而紧，此风寒客三阳经也，宜驱邪汤。"又"颈项强急，腰拟折，项似拔，加味胜湿汤。"参项强、颈项强痛各条。

颈项强痛　证名。指颈项肌肉筋脉牵强引痛。见《证治准绳·杂病》。常可与项强、项痛、颈肿并见。《杂病源流犀烛·颈项病源流》："颈项强痛，肝肾膀胱病也。三经感受风寒湿邪，则项强。风热胜，宜加味小柴胡汤；湿胜，宜加味逍遥散；肝血虚，肝火旺，亦筋燥强急，宜首乌汤。而其所属诸病，有项下卒肿坚硬者，由于肝肾之病，昆

布、海藻、海带必用，外则于风热湿三者参之；有常惯项痛者，宜六味丸，间服和气饮；有感冒项强或痛者，宜驱邪汤；有痰盛项痛者，宜治风豁痰汤；有湿盛项痛者，宜加味胜湿汤；有项筋急，不得转侧者，宜木瓜煎；有肾气上攻，项筋连背痛，不可转侧者，宜椒附散；有腮项相连肿痛，发热便闭者，宜防风通圣散；有项面肿，众人一般者，是疫疠，宜普济消毒饮；有脑后肿者，恐是疽，宜黄连救苦汤；若兼坚肿木硬，口燥舌干，恶心，烦渴，便秘，宜石决明汤；有颈项肿痛，寒热头眩者，是气毒，宜加味藿香散；有颈项结核浮肿，先寒后热者，此风寒所搏，宜防风解毒汤；有颈项结核坚肿，色红渐热者，是热毒，宜连翘消毒饮；有项强不能回顾，动则脑痛，脉弦数实者，是痰热客太阳经，宜二陈汤加酒炒黄芩、羌活、红花；有伤寒后，项前后肿硬作痛，身热者，宜柴胡葛根汤；有伤寒后项肿痛，却不红，身不热者，宜牛蒡甘桔汤；有项强，卒口噤，背反张，成痉病者，宜乌药顺气散加羌活、独活、木瓜，以上皆项强之病。”参项强、项痛等条。

颈脉动 证名。指结喉两旁的足阳明经人迎穴处动脉（即颈总动脉）搏动亢进。《灵枢·论疾诊尺》：“目窠上微痈，如新卧起状，其颈脉动，时咳，按其手足上，窅而不起者，风水肤胀也。”本证可见于水肿、喘证、怔忡等病证。

颈痛 证名。指颈部肌肉筋骨疼痛。见《针灸甲乙经》卷七。多因经脉病变所致。《灵枢·经筋》：“手太阳之筋……绕肩胛引颈而痛。”可见于瘿瘤、落枕等病症。参颈项强痛及外科骨伤五官科分册落枕条。

十二画

〔一〕

越经传 指外感热病不按六经次序传变所出现的证候。《此事难知·太阳六传》：“太阳传少阳胆木者，名曰越经传。”越经传有多种传入途径。《医学心悟·伤寒纲领》：“亦有越经传者，如寒邪初客太阳，有不传阳明而径传少阳者，有不传阳明经而径入阳明腑者，亦有由阳明不传少阳而径入本腑者，亦有少阳不传三阴而径入胃腑者，亦有传一、二经而止者，亦有始终只在一经者。虽所传各各不同，其为传经则一也。”参传经条。

斑 证名。见《诸病源候论·时气病诸候》。指发于肌肤表面的红色或紫、黑色斑点。点大成片，抚之不碍手。《丹溪心法·斑疹》：“斑有色点而无头粒者是也。”《温热经纬·叶香岩外感温热篇》：“点大而在皮肤之上者为斑。”又：“斑从肌肉而出，属胃。”多由外感热病，热郁阳明，迫及营血，从肌肉外发所致。斑色以红活为佳，若见紫、黑色为热盛毒重。《寿世保元·斑疹》：“大抵鲜红起发稀朗者吉，棕黑者难治。”斑点初见于胸膺部，迅速发展至背、腹及四肢等处，伴见发热，口渴引饮，烦躁不安，甚则神昏谵语，舌绛而干等症。治以清胃解毒，凉血化斑为主。方如化斑汤、消斑青黛饮等。神昏谵语者，兼用紫雪丹。若里热壅盛，斑出不快者，可酌用下法。《温病条辨·中焦篇》：“斑疹阳明证悉具，外出不快，内壅特甚者，调胃承气汤微和之，得通则已，不可令大泄，大泄则内陷。”斑证虽属热者多，亦有属于虚寒者。参斑疹及阳斑、阴斑、虚斑、内伤发斑等条。本证可见于流行性脑脊髓膜炎及各种感染性菌血症。

斑疹　证名。指热病过程中发于肌表的斑和疹两种证候。见《伤寒九十论·发斑证》。点大成片，斑斑如锦纹，抚之不碍手的称为斑，形如粟米，高出于皮肤之上，抚之碍手的叫做疹。斑疹的形色，总以松浮，稀疏，红活为邪浅病轻；紧束有根，稠密，色深（如紫、黑色）为邪毒深重。斑和疹虽系两证，然亦有斑疹齐见者。斑疹发出后，以神清者为佳。《温热经纬·叶香岩外感温热篇》："斑疹皆是邪气外露之象，发出宜神情清爽，为外解里和之意。如斑疹出而昏者，正不胜邪，内陷为患，或胃津内涸之故。"参斑、疹条。

斑痧　痧证之一。《杂病源流犀烛·痧胀源流》："斑痧，头眩眼花，恶心呕吐，身有紫斑，痧在血肉，急用刮放。迟则渐入于里，必生变症。"宜清凉至宝饮等方。参痧条。

喜　❶证名。指喜乐不禁之症。出《灵枢·本神》。又称喜笑不休、多喜。《杂病源流犀烛·惊悸悲恐喜怒忧思源流》："喜者，心肺二经病也。……宜定志丸加天冬、麦冬。"参喜笑不休条。❷生理名词。七情之一。出《素问·阴阳应象大论》。

喜气　七气之一。《诸病源候论·七气候》："喜气，即不可疾行，不能久立。"参七气、九气条。

喜伤　指喜乐过度所致的疾病。《医醇賸义·喜伤》："过喜，则心气大开，阳浮于外，经脉弛纵，建极汤主之。"参喜笑不休条。

喜忘　证名。《济生方》卷四："健忘者，常常喜忘是也。"即健忘。详该条。

喜怒　指容易发怒。出《灵枢·杂病》。又称善怒、怒。详善怒条。

喜笑不休　证名。指喜笑不能自制之症。出《灵枢·经脉》。又称多喜。简称喜。多因心火偏亢，痰热壅盛所致。治宜逐痰降火，定志安神。可用烧盐煎汤或二陈汤探吐，并服黄连解毒汤、定志丸等方。亦有因肾亏肝旺而致。《张氏医通》卷十一："若肾水亏涸，不胜心火，而喜笑不休，寻作不安之态者，六味地黄丸。肝木过盛，上挟心火，而喜笑不休者，柴胡清肝散。余兼别证，各从其类而添之。"参喜伤条。

喜梦　病证名。出《灵枢·淫邪发梦》。指睡眠多梦之症。多因心气虚衰，神不守舍；或脏腑阴阳不和，影响心神所致。治宜养心安神为主。《杂病源流犀烛·不寐多寐源流》："夫梦者，亦神不安之一验耳。凡人形接则为事，神遇则为梦。神役乎物，则魂魄因而不安。魂魄不安，则飞扬妄行，合目而多梦。又况七情扰之，六淫感之，心气一虚，随感而应。谚云'日之所接，夜之所梦'，洵有然也。宜别离散、益气安神汤。"亦有血瘀所致者。《医林改错·血府逐瘀汤所治症目》："夜睡梦多，是血瘀，此方一二付愈。"参不寐条。

喜惊　证名。指容易惊吓的病症。出《灵枢·百病始生》。又称善惊。《素问玄机原病式》："惊，心卒动而不宁也。火主于动，故心火热甚也，虽尔止为热极于里，乃火极似水，则喜惊也。反兼肾水之恐者，亢则害，承乃制故也。所谓恐则喜惊者，恐则伤肾而水衰，心火自甚，故喜惊也。"详见惊、善惊条。

喜悲　证名。又称善悲、悲。《灵枢·五邪》："邪在心，则病心痛，喜悲，时眩仆。"详善悲条。

喜膈　五膈之一。《三因极一病证方论》卷八："五心烦热，口舌生疮，四肢倦重，身常发热，胸痹引背，不能多食，名曰喜膈。"参五膈条。

落弓痧　痧证之一。《痧胀玉衡·落弓痧》："倏忽昏迷不醒，或痰喘不已，眼目上吊，形如小儿落弓之症。此暗痧难识，必须审脉辨症，的是痧毒，看其身体凉热，唇舌润燥如何，然后治之。宜大黄丸，如痧

气未尽，宜救苦丹加银花、山查、丹参、菔子。《治痧要略·落弓痧》："病者一时昏迷不醒，痰声如锯，形如落弓之状，此暗痧内攻，诊视其脉，或微细而数，或动止不匀，先放痧，后进药，以清痰降气，凉膈为主。"参痧条。

朝食暮吐 证名。出《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》。指早晨所进食物，至日暮吐出。也有傍晚所进食物，至第二天早晨吐出，称暮食朝吐。多属反胃范畴。《金匮要略心典》卷下："夫胃为阳，脾为阴。浮则为虚者，胃之阳虚也；涩则伤脾者，脾之阴伤也。谷入于胃而运于脾，脾伤则不能磨，脾不磨则谷不化。而朝食者暮当下，暮食者朝当下，若谷不化则不得下，必反而上出也。"亦可由食积所致。《三因极一病证方论》卷十一："病者胸腹胀闷，四肢厥冷，恶闻食臭，食入即呕，朝食暮吐，暮食朝吐，……此由饮食伤脾，宿谷不化之所为也。"详反胃条。

酣饮 指饮酒过度所致的消渴。见《世医得效方》卷七。因饮酒多，积热熏蒸，津液枯燥所致。证见渴嗜冷饮，小便多，肌肉消瘦。宜用乌梅木瓜汤、枳棋子丸、三神汤、朱砂黄连丸等方。

酢（cù 醋）心 即醋心。《齐民要术·作酢法》："酢，今醋也。"详醋心、吐酸条。

惑 ❶精神散乱，目有幻见为惑。《灵枢·大惑》："卒然见非常处，精神魂魄，散不相得，故曰惑也。"❷狐惑病之蚀于喉者为惑。《金匮要略·百合狐惑阴阳毒病脉证治》："狐惑之为病，状如伤寒，默默欲眠，目不得闭，卧起不安，蚀于喉为惑。"❸遇事多疑，犹豫不决称惑。《素问玄机原病式·六气为病》："惑，疑惑犹预浊乱而志不一也。"

硫黄中毒 病名。古代封建贵族为追求长生而恣意服石硫黄或含硫黄丹石药过多中毒。《本草纲目》卷四载有解硫黄毒的药物。如金星草、胡麻油、米醋、飞廉、细辛、余甘子、乌梅、黑铅、铁浆、朴硝、猪血、羊血、冷猪肉、鸭肉、猪脂等，可参考。参丹石中毒、金石中毒条。

厥心痛 病名。出《灵枢·厥病》。包括肾心病、胃心病、脾心病、肝心病、肺心病五种。❶指肾、胃、脾、肝、心有病，病气上逆乘心所致的心痛。《难经·第六十难》："其五脏气相干，名厥心痛。"杨玄操注："诸经络皆属于心，若一经有病，其脉逆行，逆则乘心，乘心则心痛，故曰厥心痛。是五脏气冲逆致痛，非心家自痛也。"❷指阳虚而阴气上逆所致的心痛。《圣济总录》卷第五十五："少阴，心主经也。心为阳中之阳，诸阳之所会合。若诸阳气虚，少阴之经气逆，则阳虚而阴厥，致令心痛，是为厥心痛。"证见心腹连季胁痛胀满，冷气上攻，面色青黑，甚则呕逆气闷绝，眼目直视等，用高良姜散、当归散、吴茱萸丸、麝香汤等方。❸指邪犯心包或他脏病邪犯心支脉导致的心痛发厥。《医学入门》卷五："厥心痛，因内外邪犯心包络，或他脏邪犯心之支脉。谓之厥者，诸痛皆少阴、厥阴气逆上冲，又痛极则发厥也。新者身既受寒，日又伤冷，郁遏元阳，宜草豆蔻丸、鸡舌香散温散之，或神保丸温利之。稍久寒郁为热，或因七情者始终是火，此古方多以苦寒泻火为主，辛热行气为向导也。"❹指中寒发厥而心痛。《医门法律》卷二："厥心痛，乃中寒发厥而心痛，寒逆心包，去真心痛一间耳。手足逆而通身冷汗出，便溺清利不渴，气微力弱。"参心痛、肾心痛、胃心痛、脾心痛、肝心痛、肺心痛、寒厥心痛、热厥心痛等条。

厥头痛 病证名。指经气逆乱所致的头痛。厥，逆乱之意。《灵枢·厥病》："厥头痛，面若肿起而烦心，取之足阳明、太阴。厥头痛，头脉痛，心悲，善泣，视头动脉反

盛者，刺尽去血，后调足厥阴。厥头痛，贞贞头重而痛，写头上五行，行五，先取手少阴，后取足少阴。厥头痛，意善忘，按之不得，取头面左右动脉，后取足太阴。厥头痛，项先痛，腰脊为应，先取天柱，后取足太阳。厥头痛，头痛甚，耳前后脉涌有热，泻出其血，后取足少阳。”参厥逆头痛条。

厥阴头痛　病证名。三阴头痛之一。❶《兰室秘藏·头痛门》：“厥阴头项痛，或吐痰沫，厥冷，其脉浮缓，吴茱萸汤主之。”❷指头痛表现在厥阴经脉循行部位者。《冷庐医话·头痛》：“厥阴之脉会于巅顶，故头痛在巅顶。”参头痛、三阴头痛条。

厥阴经脚气　脚气病之一。见《三因极一病证方论》卷三。指风寒暑湿流注足厥阴肝经而成的脚气。证见腰胁偏疼，从足大趾连及足跗上廉、上膕至内廉，循股环阴器，抵小腹，夹脐诸处胀痛，两脚挛急，咽干，呕逆，洞泄。若自汗者为风胜，无汗痛甚者为寒胜，热烦者为暑胜，重着肿满者为湿胜。治宜神应养真丹等方。

厥阴咳　病名。十咳之一。《诸病源候论·咳嗽病诸候》：“十曰厥阴咳。咳而引舌本是也。”治宜刺太陵。参十咳条。

厥阴病　病名。六经病之一。多因阴阳胜复，寒热错杂所致。其特征是气上冲心，心中热痛，消渴，饥不欲食，吐蛔及时厥时热等。《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》：“厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蚘，下之利不止。”《伤寒指掌》卷二：“此皆厥阴自病之热症，并非伤寒传经之热邪。盖厥阴内藏相火，其消渴，火盛水亏也；气上撞心，心中疼热，肝火乘心也；饥不欲食，食即吐蚘，风木尅土，胃中空虚也；下之即利，土受木贼，不禁再利也。”治宜清上温下，用乌梅丸等方。本病发厥，宜辨寒热。《伤寒贯珠集·厥阴温法十条》：“伤寒脉微而厥，寒邪中于阴也。”若阳虚寒厥，见脉微、恶寒、下利，厥冷，治宜回阳救逆，用四逆汤、四逆加人参汤等方；若血虚寒厥，见手足厥寒，脉细欲绝，治宜养血和营，通阳散寒，用当归四逆汤、当归四逆加吴茱萸生姜汤等方。《伤寒括要》卷上：“其症烦满囊拳，消渴舌卷，谵语便闭，手足乍温乍冷，脉沉有力。此热邪传入厥阴本病，大承气汤急下之。”厥阴病厥热胜复，可测病情进退。《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》：“伤寒一二日至四五日厥者，必发热，前热者后必厥，厥深者热亦深，厥微者热亦微。”《伤寒分经》卷四：“邪传厥阴，其热深矣。热深多发厥，证皆属阳，因阳与阴不相承接故致厥也。厥后发热，阳邪出表则易愈，厥多热少则病进，热多厥少则病退。”参伤寒、六经病、厥热胜复等条。

厥阴痉　病名。指厥阴病出现痉症者。《医宗金鉴·订正伤寒论注》：“睾丸上升，宗筋下注，少腹里急，阴中拘挛，膝胫拘急者，未尝非厥阴痉也。”《张氏医通·诸风门》：“足三阴痉，俱手足厥冷，筋脉拘急，汗出不止，项强脉沉。厥阴则头摇口噤，芪附汤加当归、肉桂。”参痉条。

厥阴厥　六经厥之一。《三因极一病证方论·叙厥论》：“泾溲不利，脏热，阴缩，名厥阴厥。……考其厥因，多以不胜乘其所胜，气不得行，遂致于逆。”参六经厥、厥证条。

厥证　出《素问·厥论》。❶指忽然昏晕，不省人事，手足逆冷者。《张氏医通·厥》：“今人又以忽然昏晕，不省人事，手足冷者为厥。”❷单指四肢逆冷。《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》：“凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷者是也。”❸指癫闭重症。《素问·奇病论》：“有癫者，一日数十溲，此不足也；身热如炭，颈膺如格，人迎躁盛，喘息，气逆，此有余也。……病在太阴，其盛在胃，颇在肺，病名曰厥，死不治。”根据病因和证状

不同，厥证分为寒厥，热厥，阳厥，阴厥，痰厥，蚘厥，晕厥，煎厥等。参厥证各条。

厥疟 病证名。指疟疾而见四肢厥冷者。《杂病源流犀烛·疟疾源流》："厥疟总由气血亏虚，调理失宜，或因寒而厚衣重被，至发热不去，过伤于暖；或因热而单衣露体，虽过时犹然，至又感寒，遂成厥疟。治当分别寒热，不得混施汤剂。热厥以升阳散火汤，寒厥宜建中汤及附桂、吴萸但可酌用。或兼气虚，参用参芪益气汤；或兼血虚，参用四物汤。"参疟疾条。

厥疝 古病名。出《素问·五藏生成篇》。多因积于腹中之寒气上逆所致。证见脐周绞痛，恶心，胃脘疼痛，吐出冷涎，四肢厥冷，脉象虚大等。《类证治裁》卷七："积气在腹中，有厥气，名曰厥疝，言脾受肝尅，气逆上升，《宝鉴》当归四逆汤、苦楝汤。"或用吴茱萸汤、当归干姜汤等方。参寒疝条。

厥逆 证名。❶指手足逆冷。《伤寒论·辨少阴病脉证并治》："少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者，通脉四逆汤主之。"《卫生宝鉴·厥逆》："厥者，逆也。阴阳不相顺接，故手足逆冷，冷至臂腿，名曰四肢厥逆。"❷指胸腹剧痛，两足暴冷的病证。《灵枢·癫狂》："厥逆为病也，足暴清；胸若将裂，肠若将以刀切之，烦而不能食，脉大小皆涩。"❸指久头痛的一种。《素问·奇病论》："人有病头痛以数岁不已，此安得之，名为何病？岐伯曰：当有所犯大寒，内至骨髓，髓者以脑为主，脑逆故令头痛，齿亦痛，病名曰厥逆。"参厥证条。

厥逆头痛 病名。指寒厥头痛。《兰室秘藏·头痛门》："有厥逆头痛者，所犯大寒，内至骨髓，髓者以脑为主，脑逆故令头痛，齿亦痛。"又称脑逆头痛。症见头痛连及齿痛，四肢厥冷，面青呕吐。治宜温中散寒，用羌活附子汤、白附子散加减，或灸巅顶泥丸宫。参头痛条。

厥热胜复证 病证名。指伤寒邪传厥阴，阴阳消长的一种临床表现。由阴阳胜复所致。《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》："伤寒病，厥五日，热亦五日，设六日，当复厥，不厥者自愈。"《伤寒论条辨》："厥五日，热亦五日，阴阳胜复无偏也。当复厥不厥，阳气胜也。阳主生，故自愈可知也。"阳胜则热，阴胜则厥。一般以厥多热少为病进，厥少热多为病退。参厥阴病条。

厥晕 证名。指温热病过程中，阳热亢极的一种重危证候。《伤寒绪论·厥晕》："温病热病，温毒阳毒，邪热内结，胸满痰盛，或当下失下，以致阳热亢极，忽然手足厥冷，口噤咬牙，昏晕，须臾复甦。……承气合解毒，或凉膈双解下之。"参厥证条。

厥深热深 证名。亦作热深厥深。指热厥证热邪越深伏，手足越厥冷。由于热伏于里，不能向外透达所致。《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》："伤寒一二日至四五日厥者，必发热。前热者，后必厥。厥深者，热亦深；厥微者，热亦微。厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。"《注解伤寒论》卷六："前厥后发热者，寒极生热也；前热后厥者，阳气内陷也。厥深热深，厥微热微，随阳气陷之深浅也。"宜用清下二法。参热厥条。

雄黄中毒 病名。因外用或误服雄黄过量中毒。中毒症状及解救法，参砒霜中毒条。

殗(yè叶) 殜(yè叶) 古病名。指传尸之初起不甚者。见《外台秘要·传尸方》："传尸，亦名转注，以其初得，半卧半起，号为殗殜。"可用吃力伽（白术）丸治之。参传尸条。

揽肠痧 病证名。即干霍乱。《世医得效方》卷二："心腹绞痛，冷汗出，胀闷欲绝，俗谓揽肠沙，今考之，此证乃名干霍

乱。”参痧、干霍乱条。

〔丨〕

悲 ❶容易悲哀或无故悲伤的简称。出《素问·宣明五气论》。又称善悲、喜悲。《杂病源流犀烛·惊悸悲恐喜怒忧思源流》：“悲者，心肝两虚病也。”详见善悲条。❷生理名词。七情之一。出《素问·阴阳应象大论》。

悲伤 指悲哀过度所致的疾病。《医醇賸义·悲伤》：“悲则气逆，愤郁不舒，积久伤肺，清肃之令不能下行。”用加味参苏饮。参善悲条。

悲郁 七情郁证之一。《类证治裁·郁症》：“悲郁脏躁欲泣，甘麦大枣汤。”参悲、七情郁症、内郁及妇科儿科分册脏躁等条。

紫云斑 证名。指斑出色紫成片如云状者。属于紫斑的范围。《温疫论补注》上卷：“斑则有斑疹、桃花斑、紫云斑。”参斑、紫斑条。

紫斑 证名。指外感热病见斑色发紫者。见《寿世保元·斑疹》。多由热盛毒熏所致。《温热经纬·叶香岩外感温热篇》：“按方书谓斑色红者属胃热，紫者热极。”治宜清热解毒，凉血化斑，用解毒化斑汤、犀角玄参汤等方。若斑见紫黑，显示病情严重。参斑条。

紫疱痧 痧证之一。《治痧要略·紫疱痧》：“痧毒郁遏不内攻则外溃，毒伏阳明，日久有发为紫疱，或如圆眼大，或如蚕豆大，溃有紫血，内陷一坑，须于指尖、臂湾、腿湾放之，尽去毒血，用苏木、泽兰、金银花之类，少加牛黄治之。”参痧条。

齘齿 证名。亦称咬牙。指上下牙齿磨切有声。出《金匮要略·痉湿暍病脉证治》。多由胃热炽盛，风邪侵袭筋脉及虫积所致。《诸病源候论·牙齿病诸候》：“齘齿者，是睡眠而相磨切也。此由血气虚，风邪客于牙车筋脉之间，故因睡眠气息喘而邪动，引其筋脉，故上下齿相磨切有声，谓之齘齿。”《黄帝内经太素·热病说》：“热而痓者，腰折瘛疭，齿噤齘也。”《杂病源流犀烛·口齿唇舌病源流》：“齿齘，乃睡中上下齿相摩有声，由胃热故也。”

掌中热 证名。指两手掌中有发热感觉。常为手三阴经是动、所生病症。《灵枢·经脉》“主肺所生病者：咳，上气，喘，渴，烦心，胸满，臑臂内前廉痛，厥，掌中热。”“主心所生病者：目黄、胁痛、臑臂内后廉痛，厥，掌中热痛。”“是主脉所生病者：烦心，心痛，掌中热。”《不居集·手掌中热》：“掌中劳宫穴也，手厥阴心包所主，是经少气而多血，是动则病掌中热。”一名手心热，参该条。

掌中寒 证名。指手掌中自觉发冷的症象。《灵枢·论疾诊尺》：“掌中寒者，腹中寒。鱼上白肉，有青血脉者，胃中有寒。”多由阴寒内盛所致。

瞤瘛 指肌肉或眼胞跳动，伴有抽掣的症状。《素问·气交变大论》：“肉瞤瘛。”《素问·至真要大论》：“目乃瞤瘛。”

暑中 类中风之一。见《医宗必读·类中风》。又名中暑（《万病回春》列为类中风之一）。因夏季酷热，猝中暑邪所致。症见面垢，闷倒，昏不知人，冷汗自出，手足微冷，或吐，或泻，或喘，或满，或渴。可先与通窍法，用苏合香丸灌服。《医学心悟·类中风》：“暑中，暑气逼迫，卒然昏倒，自汗面垢，昏不知人。急用《千金》消暑丸灌之。……灌醒后，以益元散清之，或以四味香薷饮去厚朴加丹参、茯苓、黄连治之。虚者加人参。”参中暑❶。

暑中阳邪 见《医宗金鉴》卷三十九。即阳暑。详该条。

暑中阴邪 见《医宗金鉴》卷三十九。即阴暑。详该条。

暑气呕吐 病证名，指呕吐因中气不

足，暑热之气入于肠胃所致者。《症因脉治》卷二："暑气呕吐之症，暑热行令，头眩目暗，呕吐暴作，身热恶寒，烦渴引饮，齿干唇焦，腹中疼痛，小便赤色，或混浊涩短。"脉虚大而涩，或沉细，或躁疾，或伏。宜用家秘香薷饮、人参石膏汤、土藿香汤调益元散等方。

暑风 病名。❶指中暑而兼昏迷、搐搦者。《六气感证要义·暑》："夏月猝倒无知，由于心火暴甚，暑热乘之，名曰暑风。"《增订伤暑全书》卷上："忽然手足搐挛，厉声呻吟，角弓反张，如中恶状，为暑风。"治宜以温热水化苏合香丸灌之，候其稍甦，即以黄连香薷散加羌活煎服。痰盛者，用六和汤、星香散等。《杂病源流犀烛·暑病源流》："先病热，服表散药后，渐成风病，谵语，狂呼乱走，气力百倍，此亦暑风，与阴风不同，宜解散化痰，不可汗下，宜竹叶石膏汤去参、术加黄连、知母。"本证可见于中枢神经系统感染、各种感染发热性疾病伴有中毒性脑病及重症中暑等疾患。❷即中暑。《医碥》卷一："中暑，或名暑风，以与中风相似也。"❸指暑月身痒赤肿的一种病证。《证治要诀·伤暑》："暑月身痒如针刺，间有赤肿处，亦名暑风。末子六和汤和消风散，酒调服。暑风而加以吐泻兼作者，六和汤、藿香正气散各半贴，加全蝎三个。"

暑劳 病名。❶《不居集》卷四："盛暑之月，火能烁金，不禁辛酒劳热躁攘，火动心脾，令人咳嗽气喘，骤然吐血衄血，头目不清，胸膈胀闷，烦渴不宁，即童稚老夫，亦有此病，昧者以为痨瘵，不知火载血而上升，非真阴亏损，而为虚劳者比也。"宜四物汤、黄连解毒、二陈汤合方去川芎、白芍、黄柏、半夏，加贝母、桔梗、薄荷、麦冬、五味，或加童便、藕汁，或黄连香薷饮等。❷即暑瘵。见《增订伤暑全书》卷上。详暑瘵条。

暑疟 病名。疟疾之一。❶指专受暑邪而得疟者。《证治汇补·疟疾》："暑疟者，其症大寒，大烦，大喘，大渴，静则多言，体若燔炭，汗出而散，单热微寒，宜清暑解表。"《杂病源流犀烛·疟疾源流》："暑疟者，专受暑而得，与凡疟之因暑而反受风寒以成者不同，故但热不寒，或多热，里实不泄，烦渴而呕，肌肉消削。宜益元散、香茹饮、小柴胡汤参用之，或加竹沥。"❷即瘴疟。见《普济方·诸疟门》。详瘴疟条。❸即湿疟，见《症因脉治》卷四，详该条。并参疟疾条。

暑泄 病名。即暑泻。《不居集》卷二十一："暑泄，夏月暴注水泄。"《杂病源流犀烛·泄泻源流》："又有暑泄，因受暑邪，烦渴，尿赤，自汗面垢，暴泻如水。宜茹令汤、桂苓甘露饮。"详暑泻条。

暑泻 病名。见《丹溪心法·泄泻》。又称暑泄。指暑毒之邪伤于肠胃所致的泄泻。《证治要诀》卷八："暑泻，由胃感暑气，或饮啖日中之所晒物，坐日中热处，证状与热泻略同，宜胃苓饮，或五苓散加车前子少许。"《杂病源流犀烛·暑病源流》："暑泻，专受暑而成泻利病也。其原有新有久。新者，暑毒入于口齿，伤于肠胃，数日间其邪即发，或挟食，或挟湿，以致烦渴尿赤，自汗，面垢，腹痛，所泻如水直注，日夜无度。宜以炒黄连为君，葛根、升麻佐之，或桂苓甘露饮。久者，暑邪留于三焦肠胃之间，以致久而成泄，所泻亦是水，但不如新者之暴迫直注，其兼症亦相同，宜玉龙丸。此新久之别也。而其症之所现，虽同属暑泻，其为治又有当分辨者。如暑伤心脾，呕吐泄泻，或霍乱转筋，及浮肿疟痢，宜六和汤；如暑热引饮过多，致水暑交并，而上吐下泻，宜解暑三白散；如伤暑，上吐下泻，而兼烦乱，宜香朴饮子；如暑月烦渴，引饮过多，脾胃停积冷湿，致成吐泻，宜大顺散；……若不过受暑而泻，别无他故，则

惟清暑足矣，宜消暑十全饮、香茹汤；其或有盛暑伤于外，阴冷伤于内，而为内外受迫者，此症更重，非可易视矣，宜连理汤、桂苓元、缩脾饮。”参热泻条。

暑毒失血　病证名。指感受暑邪热毒之气所致的失血。《金匮翼·诸血统论》：“暑毒失血者，脉大气喘，多汗烦渴，盖心主血，而暑气喜归心也。”平素嗜酒及阴虚者多见之。治宜清暑解毒。用《局方》枇杷叶散，或《千金》治酒客瘟疫中热毒干呕吐血方（蒲黄、犀角、栝蒌根、甘草各二两，桑寄生、葛根各三两）。参失血条。

暑迷　病证名。指中暑之轻者。《医碥》卷一：“暑迷一证，似中而轻，欲睡懒语。壮人香薷饮加黄连一钱，虚人星香散加香薷一钱。醒后冷汗不止，手足尚逆，烦闷多渴者，香薷饮。若过投冷剂致吐利不止，外热内寒，烦躁多渴，甚欲裸形，此阴盛格阳，宜温药香薷饮加附子浸冷服，渴者，缩脾饮加附子，亦浸冷服。”参中暑条。

暑病　病名。❶指邪伏于内，至夏而发的多种热性病。《注解伤寒论》卷二：“中而即病者，名曰伤寒；不即病者，寒毒藏于肌肤，至春变为温病，至夏变为暑病。”❷指感受暑邪随即发生的热性病症。《杂病源流犀烛·暑病源流》：“人受暑邪，当时即发谓之暑病。”暑病古称中暍。后世有中暑、伤暑、阳暑、阴暑之分，并有暑风、暑厥、暑瘧、暑瘵、痓夏、伏暑等病。详各条。

暑秽　病名。指感受暑湿秽浊之气所发的病证。《时病论》：“是证多发于夏秋之间，良由天暑下逼，地湿上腾，暑湿交蒸，更兼秽浊之气，交混于内，人受之，由口鼻而入，直犯募原。初起头痛而胀，胸脘痞闷，肤热有汗，频欲恶心，右脉迟钝者是也。然有暑湿之分。……如偏于暑者，舌苔黄色，口渴心烦，为暑秽也。”治宜芳香化浊为主。参暑病条。

暑淋　病名。见《医学入门·淋》。指因感受暑邪而成的淋症。实症宜用山栀仁、五苓散、益元散；虚症用生脉散。暑月汗多而小便赤涩者，宜春泽汤、桂苓甘露散。参淋条。

暑厥　病证名。常见于重症中暑。❶指夏月猝然倒仆，昏不知人。《医学传灯》卷上：“夏月猝然僵仆，昏不知人，谓之暑厥。当分阴阳二证。阳证，脉来洪数无力，身热汗出，谓之阳厥，此因暑食伤脾，食多而热亦多，宜用连芍调中汤，或辰砂六一散，先治其热，俟其人事清白，再看食之多寡调治。……至于脉来沉细无力，肌肤不热，曾食生冷瓜果，谓之寒厥，宜用厚朴温中汤治之。”❷指中暑昏迷而手足厥冷者。见《时病论·中暑》。证见忽然闷倒，昏不知人，手足逆冷，躯热汗微，气喘不语，牙关微紧，亦或口开，状若中风，脉洪濡或滑数者，治宜苏合香丸、来复丹研灌，或以蒜水灌之，俟稍醒后用却暑调元之剂。参暑病条。

暑喘　病证名。见《杂病源流犀烛》卷一。指夏季感受暑热，肺受热灼，清肃失常所致的气喘。证见喘促，多汗，烦躁或身体发热，静则多言等。治宜解暑，清热或兼益气，如白虎汤、清暑益气汤、益元散等方。

暑痢　病名。指痢疾由感受暑邪所致者。《杂病源流犀烛·痢疾源流》：“热痢与暑痢，似同而异。背寒，齿干，面垢，烦悗，燥渴引饮，皆暑症。”《证治要诀·大小腑门》：“若感暑气而成痢疾者，其人自汗发热，面垢呕逆，渴欲引饮，肠内攻刺，小便不通，瘀血频并。宜香薷饮加黄连一钱，佐以五苓散，白汤调服，不愈则用蜜水调。感暑成痢，疼甚而食不进者，六和汤、藿香正气散各半贴，名木香交加散。”《丹溪心法·痢》：“暑痢而脉虚者。香薷饮，或清暑益气。”《石室秘录》卷六谓“夏秋感热之气，患痢便血，一日间至百十次不止者”，可重用白芍、当归、及枳壳、槟榔、

甘草、滑石、广木香、萝卜子等药。参热痢条。

暑癇 病名。常见于重症中暑。指感受暑邪，热极神昏，卒然痉厥的病证。《温病条辨·上焦篇》："小儿暑温，身热，卒然痉厥，名曰暑癇，清营汤主之。亦可稍与紫雪丹。""大人暑癇，亦同上法。热初入营，肝风内乱，手足瘛疭，可于清营汤中，加钩藤、丹皮、羚羊角。"参暑病条。

暑痧 痧证之一。指暑天感受秽浊所致的痧症。《杂病源流犀烛·痧胀源流》："暑痧，头眩恶心，自汗如雨，脉洪拍拍，上吐下泻，腹痛或紧或慢。"治宜清暑化浊，用薄荷汤。参痧条。

暑湿眩晕 病证名。指暑令感受湿邪所致的眩晕。有湿热与寒湿之分（见《症因脉治·外感眩晕》）。详寒湿眩晕、湿热眩晕条。

暑湿喘逆 喘证之一。《症因脉治·喘症论》："暑湿喘逆之因，《内经》云，因于暑，汗烦则喘喝，此暑气也。因于湿，首如裹，面肿肿，呼吸气喘，此湿气也。暑湿袭于皮毛，干于肺胃。"症见喘息气粗，烦闷口渴，多言身重，汗出身仍热，脉多濡软或见微缓。治宜清暑利湿为主。如汗多口渴，用清暑益元散；脉大多言，用黄连解毒汤或竹叶石膏汤；如暑湿身痛，无汗喘逆者，宜汗解，用羌活胜湿汤等方。参暑喘、湿喘条。

暑湿腹痛 病证名。指感暑湿阻而致腹痛。《症因脉治·腹痛论》："暑湿腹痛之症，热令当权，忽尔腹中作痛，肠中作响，痛泻交作。此暑湿霍乱之类也。"多因夏令暑湿之邪，与肠胃水谷，互相混杂，暑热不得发越，食气不得运化所致。治宜清暑利湿为主。如黄连香薷散、清热胜湿汤等方。若痛泻阵作，平胃散煎汤调六一散。寒热脉伏，或寒热脉浮大，皆宜发表，败毒散。大便结，厚朴三物汤。腹痛呕吐，藿香正气散。参腹痛条。

暑湿痹 病名。见《温病条辨·中焦篇》。由于暑湿侵袭肌肤、经络所致。证见肢体痠痛重着，面赤，小溲黄少等。治宜辛温辛凉并用，如加减木防己汤等方。

暑温 病名。指发生于夏季的温热病。可见于乙型脑炎等病。暑多挟湿，暑温则指暑热偏盛者。《温病条辨·上焦篇》："暑温者，正夏之时，暑病之偏于热者也。"主要症状有壮热口渴，心烦而赤，汗多少气，脉象洪大等。病程中极易因邪陷心营而致引动肝风，出现神昏、嗜睡、斑疹、抽痉及角弓反张等症。初起宜用白虎汤，直清气分邪热以保津液；如见神情躁烦，意识不清或神昏谵语，舌苔黄，质红或红绛无苔，甚至抽搐等症者，宜用犀角地黄汤、清瘟败毒散、紫雪丹、至宝丹等方；若元气津液耗伤，则用人参白虎汤、王氏清暑益气汤等以益气生津；如身热已退，汗出不止，气喘脉散者，用生脉散以补敛津气。暑温每多挟湿，如伴有胸闷恶心，小便短赤，大便溏泄等症时，宜兼用芳香化浊利湿法。若见高热、头痛、呕吐、嗜睡、昏迷、抽搐等症者亦称暑癇。参中暑、湿温、暑痫等条。

暑渴 病证名。见《丹溪心法·中暑》。指因暑热所致的口渴证。宜清解暑热，养阴生津。用玉露散、麦冬汤、生津丸等方。详中暑条。

暑痿 病证名。❶指暑令患阳痿者。《杂病源流犀烛·暑病源流》："暑痿者，暑天膏粱之人，阳事顿痿，此不可全用热药，亦不可全用凉药，宜黄连解毒汤合生脉散。"❷指肢弱无力，筋弛不收的痿证。《类证治裁·痿症》："长夏暑湿成痿，清暑益气汤加减。"参痿证条。

暑痰 痰证之一。因暑热伤肺所致。《不居集》卷十七："暑痰、暑热伤肺，多有痰涎，神志不清。宜清时令之火，则金清而木有制；开郁结之痰，则神安而气自宁。"参

痰证条。

暑嗽　病名。指暑热或暑风袭肺所致的咳嗽。《类证治裁·咳嗽》："暑嗽，暑热蒸嗽，及暑风袭入肺卫，寸脉大，喉痒口渴，俱宜微辛微凉，竹叶、蒌皮、杏仁、石膏、薄荷、香薷。暑兼湿，咳而痰稠，气阻溺涩，宜苦降淡渗，厚朴、黄芩、苏子、苡仁、滑石、通草、花粉、西瓜翠衣，或益元散。"参伤暑咳嗽条。

暑瘵　病名。指感受暑热而突然咯血痰嗽，状似痨瘵的病证。《增订伤暑全书》卷上："盛暑之月，火能灼金，若不禁辛酒，脾火暴甚，有劳热躁扰，而火动于心肺者，令人咳嗽气喘，骤吐血衄血，头目不清，胸膈烦渴不宁。……宜四物汤、黄连解毒汤、二陈汤三药内去川芎、白芍、黄柏，以贝母易半夏，加桔梗以抑之，薄荷以散之，麦冬、五味以敛之，自愈。或加童便、藕汁；或黄连香薷饮一二剂亦可，静摄数日，忌酒煎炒自安，是名暑瘵，宜酌而善用焉。或用东垣参苓调中亦妙。"如暑热夹湿，口不渴而苔白滑者，宜用清络饮加杏仁、苡仁、滑石汤主之。参暑病条。

暑霍乱　病名。❶即湿霍乱。《医学入门·霍乱》："一种暑霍乱，即湿霍乱。"详该条。❷指感受暑热而致的霍乱。详伤暑霍乱条。

喘　证名。指呼吸急促。《说文》："喘，疾息也。"疾，指快速；息，指一呼一吸。疾息，即表示呼吸次数比正常人快速急迫。《素问·经脉别论》以五脏病症皆可致喘。《济生方·喘》："将理失宜，六淫所伤，七情所感，或因坠堕惊恐，度水跌仆，饱食过伤，动作用力，遂使脏气不和，营卫失其常度，不能随阴阳出入以成息，促迫于肺，不得宣迫而为喘也。"《丹溪心法·喘》："喘病，气虚、阴虚，有痰。"《医碥·喘哮》："喘谓呼吸迫促，劳动之人多有之，如奔走则气喘是也。其在病机，则气之上奔也。古人又以短气名之，谓呼吸之气短促也。然有实喘虚喘之分，所当详辨。实者有邪，邪气实也；虚者无邪，正气虚也。实喘之状，张口抬肩，摇身撷肚，胸胀气粗，声高息涌，惟呼出之为快也；虚喘之状，气少而不续，慌张短怯，声低息微，皇皇然若气之欲断，似喘不抬肩，似呻吟而无痛，呼吸虽急而无痰声是也。"《医宗必读·喘》："气虚而火入于肺者，补气为先，六君子汤、补中益气汤；阴虚而火来乘金者，壮水为亟，六味地黄丸；风寒者解其邪，三拗汤、华盖散；湿气者利其水，渗湿汤；暑邪者涤其烦，白虎汤、香薷汤；肺热者清其上，二冬二母、甘桔栀芩；痰壅者消之，二陈汤；气郁者疏之，四七汤；饮停者吐之，吐之不愈，木防己汤主之；火实者清之，白虎汤加瓜蒌仁、枳壳、黄芩神效；肺痈而喘，保金化毒，苡仁、甘草节、桔梗、贝母、防风、金银花、橘红、门冬；肺胀而喘，利水散邪；……肾虚火不归经，导龙入海，八味丸主之；肾虚水邪泛滥，逐水下流，《金匮》肾气丸。"参喘证、实喘、虚喘条。

喘证　证名。简称喘，亦称喘逆、喘促。古称上气、喘息，一般统称气喘。以呼吸急促为特征。发病多与肺肾有密切关系。《类证治裁·喘证论治》："肺为气之主，肾为气之根，肺主出气，肾主纳气，阴阳相交，呼吸乃和，若出纳升降失常，斯喘作焉。"《景岳全书·喘促》："气喘之病，最为危候，治失其要，鲜不误人，欲辨之者，亦惟二证而已。所谓二证者，一曰实喘，一曰虚喘也。……盖实喘者有邪，邪气实也；虚喘者无邪，元气虚也。"外感六淫，水饮痰浊壅阻于肺，气失宣降者，多属实；素体虚弱或元气亏损，致肺气失主，肾不纳气者，多属虚。治实喘以祛除病邪为主，虚喘以培本摄纳为主。亦有喘久病邪未除，元气已损，症见虚实夹杂，当扶正与祛邪兼顾，或在发病时用祛邪，间歇时用扶正。气喘发

作时，一般多兼见咳嗽。如喘而声高气粗，喉中痰鸣如拉锯者称为哮或哮喘。治疗除服用药物外，并可选用针刺、灸法、药物穴位电离子透入法或敷贴疗法等。本症因致病原因和表现证候各有不同，故在实喘与虚喘的基础上又可分为多种证型。详见各种喘条。

喘呼 证名。指气喘时声音粗大。可见于热病患者。《素问·太阴阳明论》："故犯贼风虚邪者，阳受之，……入六腑则身热，不时卧，上为喘呼。"亦可见于肿胀病者。《素问·水热穴论篇》："故水病下为胕肿大腹，上为喘呼，不得卧者，标本俱病，故肺为喘呼，肾为水肿。"参痰喘、水喘、鬲喘条。

喘鸣 证名。指呼吸喘急，喉间有痰鸣者。后世多称为哮或痰喘。《素问·阴阳别论》："阴争于内，阳扰于外，魄汗未藏，四逆而起，起则熏肺，使人喘鸣。"《类经》卷十三："魄汗未藏者，表不固也，四逆而起者，阳内竭也，甚至正不胜邪，则上熏及肺，令人气喘声鸣。此以营卫下竭，孤阳独浮，其不能免矣。"如哮喘而见孤阳上浮者，多属危象。详哮证、鬲喘、真元耗损喘条。

喘促 ❶指呼吸时急促，气逆不平。与喘急为同义语。《景岳全书·杂证谟》列有喘促门，概括虚喘与实喘等多种喘证。❷指呼吸时短气不足以息，动则气促的病症。多由肺气耗伤，肾不纳气等所致。《赤水玄珠·喘门》："喘促，脉伏而数者"。方用《活人》五味子汤等。参虚喘、真元耗损喘、气虚喘、气促等条。

喘息 证名。见《素问·举痛论》。息，指呼吸。《素问·平人气象论》："呼吸定息。"喘息即指呼吸时气喘。详喘证各条。

喘胀 病证名。指气喘胸腹胀满。多由水湿壅阻，气道不利，肺失肃降，脾失运化所致。《医学入门·喘》："水气胀肺而喘，然喘必生胀，胀必生喘，二症相因，皆小便不利。肺主气，先喘而后胀者，宜清金降火而行水次之；脾主湿，先胀而后喘者，宜燥脾行水而清金次之。"可选用葶枣散、白前汤、胃苓汤等方。另有虚证喘胀。《张氏医通·喘》："若属虚证，误与泄气，祸不旋踵，即暴喘腹胀，大便实者，方可用药，加以溏泄，必死勿治，此阴火暴逆于手足太阴，所以喘胀，肾气失守，所以便溏。"宜温补肺脾肾为主，忌用攻泄药。参水喘条。

喘逆 喘而气逆的简称，即喘证。见《素问·脉要精微论》。《症因脉治·喘症论》有外感喘逆、内伤喘逆等论述。详喘证各条。

喘家 出《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。指气喘病久延不愈，时时发作的患者。

喘粗 喘粗是形容气喘时声音粗大。《素问·阴阳应象大论》："阳胜则身热，腠理闭，喘粗为之俯仰。"本症多见于热盛、痰盛的喘证。参火喘、痰喘、鬲喘、息粗条。

喘喝 证名。指气喘时见吼呵声音。虚喘实喘均可见此。《灵枢·五乱》："清气在阴，浊气在阳，荣气顺脉，卫气逆行，清浊相干，……乱于肺，则俯仰喘喝，接手以呼。"《灵枢·本神》："肺气虚则鼻塞不利，少气，实则喘喝，胸盈仰息。"《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》："脉沉小迟，名脱气，其人疾行则喘喝。"参喘证、虚喘、实喘、哮证条。

喘痰 痰证之一。指喘而有痰者。虚喘、实喘皆可见此症。《不居集》卷十七："喘痰：虚喘者，气乏身凉，痰冷如冰；实者，气胀胸满，身热便硬，喘动有痰而有声。"方用定喘汤加减。参喘证有关条。本症可见于哮喘性支气管炎、支气管哮喘及慢性支气管炎、肺气肿等疾患。

喘满 证名。指呼吸促急，胸部满闷。多因水饮射肺，脾湿酿痰，痰气壅阻所致。《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》："膈

间支饮，其人喘满，心下痞坚，面色黧黑，其脉沉紧，得之数十日，医吐下之不愈，木防己汤主之。”《证治准绳·类方》：“心腹坚胀，胁下满硬，胸中痞塞，喘满短气。”方用三棱煎丸等。亦可由肾虚不能纳气所致。《素问·生气通天论》：味过于甘，心气喘满，色黑，肾气不衡。”《杂病源流犀烛·脏腑门》：“《得效》曰，下元虚冷，肾气不得归元，上喘气急，安肾丸、八味丸主之。”参喘证、水喘、真元耗损喘条。

喉吭　证名。指喉中如有蒂状异物阻塞感觉的症象。多为心火上炎所致。见《灵枢·邪气脏腑病形》。常见于喉痹、梅核气等。参梅核气及外科骨伤五官科喉痹条。

喑俳　病名。指舌喑不能语，足废不为用者。《圣济总录》卷五十一：“喑俳之状，舌喑不能语，足废不为用。盖肾脉络舌本，肾气内夺，气厥不至舌本，故不能语而为喑；肾脉循阴股，循行内踝，入足下，肾气不顺，故足废而为俳。”治宜益肾气，补骨脂丸等方。

喝呷咳嗽　古病名。指咳嗽时喉中作声。《肘后备急方》卷三：“久患喝呷咳嗽，喉中作声不得眠，取白前捣为末，温酒调二钱匕服。”参呷嗽条。

跌扑胁痛　病证名。见《杂病源流犀烛·肝病源流》。多由跌扑损伤，污血凝滞胁肋所致。临床多见胁痛昼轻夜重，或肋下有块，午后发热，或兼见喘逆，疼痛部位固定，脉多涩。治宜活血行气，化瘀通络。如复元活血汤、膈下逐瘀汤等方。

跌蹶　出《金匮要略浅注》卷八。即跌蹶。详该条。

跗肿　证名。跗（fū），同趺。即足背。指足背肿。出《素问·气交变大论》。为水肿病症状之一。参水肿、脚肿条。

遗失　遗失应作遗矢（音、义同屎）。指粪便不受控制而排出。《素问·咳论》：“大肠咳状，咳而遗失。”参大肠咳条。

遗泄　病证名。见《三因极一病证方论·虚损证治》。又称遗精。详该条。

遗沥　病证名。见《诸病源候论·虚劳病诸候》。《证治要诀·遗精》论述遗沥比之遗精稍少，小便有数点稠粘，茎头微痛，或小便已停，有时方有一、二滴沾裩。”治同遗精。详该条。

遗尿　病名。出《伤寒论·辨阳明病脉证并治》。又称遗溺。包括睡中遗尿、昏迷时小便自遗、清醒时小便自出不知及小便频数而尿出难以自制等情况。详遗溺、小便失禁条。

遗毒　病证名。指一种时疫坏证。《杂症会心录》卷下：“又有时疫坏症，神识昏迷，邪陷厥少，从耳后发出，名曰遗毒。治法与肿腮不同。而医者非进甘桔，即用膏连，邪复内陷，万无生理矣。”治宜救阴以回津液，补元以生真气，可用救阴保元汤等方。

遗洩　洩通泄。即遗精。详该条。

遗热　指热病邪热未尽，或因食、因劳而复发。《素问·热论》：“诸遗者，热甚而强食之，故有所遗也。”《伤寒全生集·劳复》：“病新瘥后，血气未平复，余热未尽。……若劳动再发，为劳复。血气尚虚，但当安卧守静以养血气，设或早晚劳役，使血气沸腾，而邪热遂还于经络而发热也，谓之遗热。”参劳复、食复条。

遗溺　病名。即遗尿。《素问·宣明五气论》：“膀胱不利为癃，不约为遗溺。”《景岳全书·杂证谟》：“遗溺一证，有自遗者，以睡中而遗失也。有不禁者，以气门不固而频数不能禁也。又有气脱于上则下焦不约而遗失不觉者，此虚极之候也。”《类证治裁》卷七：“大抵遗溺失禁，由肺肾膀胱气虚。肺虚，补中益气汤加五味、牡蛎；肾虚，菟丝子散；膀胱虚，固脬丸；挟寒，家韭子丸；挟热，白薇散；滑脱，秘元丹、牡蛎丸；命火衰，右归饮、巩堤丸。”《张

氏医通·遗溺》："有热客肾部而遗尿者。经曰：淫气遗溺，痹聚在肾，此系热证。其证发热作渴，或时闭涩，或时自遗，或阴挺不能约制。午前小剂补中益气加黑山栀，午后大剂生料六味丸加五味子，常服自效。夏月暑病遗尿者，白虎加人参汤，一服即应。有先因病淋，服利药太多，致溺不禁者，补中益气少佐熟附子。有所伤损，污血畜于胞中，亦令遗失，鹿角屑炙黄为末，和桃仁泥等分，酒调三钱。咳而遗溺，属膀胱，茯苓甘草汤；不应，五苓散。小儿胎中受冷遗尿，一味补骨脂，炒研，临卧红酒调服，即不遗。"亦可用桑螵蛸散等方。参遗尿、小便不禁条。

遗精 病证名。见《普济本事方》卷三。又称失精、遗泄。凡不在性交时精液泄出均称遗精。因梦而精出，称梦遗；无梦而精出，称滑精。精藏于肾而主于心，故遗精多因烦劳思虑过度，房室不节，损伤心肾所致。也有因醇酒厚味过度，脾胃湿热下流，扰动精室，以及郁热、痰壅而然者。操劳过度，多思妄想，损多在心。证见心悸，夜寐不安，梦遗频仍。治宜清心摄肾。用静心汤、补心丹、清心莲子饮、妙香散、定志丸等方。思欲不遂，房室过度，损多在肾。肾精不足，相火妄动者，证见腰膝软弱，夜燃自汗，阴茎易举，遗精频频，舌质红，脉细数。治宜滋阴降火。用旺水汤、大补阴丸、三才封髓丹、补天大造丸等方。肾阳亏损，精关不固者，症见滑精，头晕耳鸣，腰酸神疲，畏寒肢冷，舌质淡，脉沉细。治宜温肾固摄。用右归丸、鹿茸大补丸等方。思虑劳倦而遗精者，多属脾虚。常伴面色萎黄，神疲乏力，脉细软无力。治宜健脾固摄。用补中益气汤或归脾汤，合用聚精丸。湿热下扰精室者，证见梦遗滑精，口苦或口渴，小便热赤，舌苔黄腻，脉象濡数。治宜清热化湿。用秘精丸、大小分清饮、二妙散等方。因经络郁热者，夜必脊心热，恍惚膈热，梦遗。治宜清泄郁热。用清心丸、猪苓丸、滋肾丸加减。因忧思或饮酒厚味太过，酿湿成痰，扰动心神而遗精者，治宜导痰为主。用猪苓丸或导痰汤等方。又有病后体虚，心悸怔忡，夜梦遗精，宜用牡蛎散。本证可见于慢性前列腺炎、性神经衰弱等疾患。

蛲虫病 九虫病之一。《诸病源候论·三虫候》："蛲虫至细微，形如菜虫也，居胴肠间，多则为痔，极则为癞，因人疮处，以生诸痈、疽、癣、瘘、痈、疥、齲虫，无所不为。"《太平圣惠方》卷六十："蛲虫者，九虫内之一虫也，在于肠间。若脏腑气实，则虫不妄动，胃弱肠虚，则蛲虫乘之。重者成疮，或虫从肛门溢出，轻者侵蚀肛门但痒也。"症见夜晚肛痒，甚则烦惊不安。可内服化虫丸等。外用蛲娘丸塞肛门，或百部液、大蒜液灌肠。参九虫病条。

蛲虫痢 病名。指蛲虫等寄生于肠道引起机械性刺激所致的痢疾样腹泻。《张氏医通》卷七："蛲虫痢，其证腹大，皮肤黄粗，循循戚戚然，……或痒，或（虫）从谷道中溢出。"治疗以杀虫为主。方如化虫丸、乌梅丸、扫虫煎。外用百部煎剂灌肠。后以补脾胃、清湿热调理。本病可见于肠寄生虫病。

蛲瘕 病证名。指蛲虫结聚于肠胃而形成的瘕病。《史记·扁鹊仓公列传》："蛲瘕为病，腹大上，肤黄粗，循之戚戚然。"参瘕条。

蛔虫病 病名。九虫病之一。蛔亦作蚘，又称蚘虫病、心虫病。多因脾胃虚弱，杂食生冷甘肥油腻，或不洁瓜果蔬菜所致。《诸病源候论·蚘虫候》："蚘虫者，是九虫内之一虫也。长一尺，亦有长五六寸。或因府藏虚弱而动，或因食甘肥而动。其发动，则腹中痛，发作肿聚，去来上下，痛有休息，亦攻心痛，口喜吐涎及吐清水，贯伤心者则死。"《张氏医通》卷四："盖蚘闻酸则静，得苦则安，遇辣则伏而不动也。"宜用乌梅丸、

化虫丸等方。参九虫病条。本病可见肠蛔虫症及胆道蛔虫症等。

蛔结痞　痞证之一。《杂病源流犀烛·痞胀源流》："蛔结痞，痞毒攻胃故蛔死，入于大肠与宿粪相结，腹中大痛，是为蛔结。又有痞毒入胃，胃必热胀之极，蛔不能存，因而上涌，乘吐而出；或蛔结腹痛，不大便，或入大肠由大便而出。与伤寒吐蛔，伏阴在内者不同。法当清其痞胀为主，先用刮放，后服药。"宜细辛大黄丸、大黄丸等。"参痞条。

蛔厥　厥证之一。即蚘厥。《医林绳墨·厥》："有蛔厥者，胃中虚冷，蛔不能养，妄行於上，致令上吐，蛔虫多出，心气虚惊，傍惶不宁，致使手足冰冷而作厥也，故曰蛔厥。治宜安蛔煖胃，如二陈汤，加吴萸，干姜，白术，黄连，乌梅之类。"参厥证，蚘厥条。

蛔蛕（huí　蛔）　蛔虫的别称。《灵枢·厥病》："心肠痛，侬作痛，肿聚，往来上下行，痛有休止，腹热喜渴，涎出者，是蛟蛕也。"张志聪注："蛟蛕者，蚘虫也。"参蛔虫病条。

黑水　古病名。十水之一。《中藏经·论水肿脉证生死候》："黑水者，其根起于肾，其状先从足肤肿。"参十水条。

黑骨温　古病名。指发于冬季的一种疫病。见《伤寒总病论》卷五。《三因极一病证方论·叙疫论》："夫疫病者……冬时应寒，而暖气折之，则责邪在肾，病曰黑骨温。"其症"里热外寒，意欲守火，而反引饮，腰痛欲折，或胸胁切痛，类如刀刺，不得转动，热彭彭，服冷多，则洞泻"。治宜清热解肌，或温肾散寒。选用苦参石膏汤、知母解肌汤或治黑骨温等方。

黑疸　五疸之一。出《金匮要略·黄疸病脉证并治》。多因酒疸、女劳疸等日久不愈，肝肾虚衰，瘀浊内阻所致。症见身黄不泽，目青，面额色黑，心中懊侬，肤燥，爪甲不仁，大便黑，膀胱急，足下热，脉浮弱；甚则腹胀，如有水状，面浮，脊痛不能正立等。治宜扶正补肝肾为主，攻邪化瘀浊为辅。可用硝石矾石散等方。《杂病源流犀烛》用黑疸方合滋补肝肾药。本病可见于多种阻塞性黄疸疾病晚期。参黄疸、五疸条。

黑黄　三十六黄之一。《太平圣惠方》卷五十五："黑黄者，面色或黄或黑，眼目青色，腰脊拘急，口中两颊，有黑脉出口角者难治。"用鬼臼汁方或灸烙法。参黄疸有关条。

黑斑　证名。指外感热病斑出发黑之证。由热毒炽盛所致。证属危重。《诸病源候论·时气病诸候》："剧者黑斑出，十死一生。"《温热经纬·叶香岩外感温热篇》："黑斑而光亮者，热胜毒盛，虽属不治，若其人气血充者，或依法治之，尚可救。"可选用化斑汤、升麻葛根汤、玄参升麻汤、黑膏黑奴丸等方。参斑条。

黑痧　病名。又称满痧。《文堂集验方》卷一："黑痧，俗名满痧。患者立时昏倒，微觉肚疼，面色黑胀，不呼不叫，甚者过两三时即不救。急用荞麦数合，焙燥研碎，去皮为末，每服三钱，温汤调服。重者再一服即愈。服药时，忌吃茶。"

骭厥　病名。足阳明经经气逆乱的病候。《灵枢·经脉》："胃，足阳明之脉，……是动则病：洒洒振寒，善呻，数欠，颜黑。病至则恶人与火，闻木声则惕然而惊，心欲动，独闭户塞牖而处，甚则欲上高而歌，弃衣而走，贲响腹胀，是谓骭厥。"《类经·十二经病》："贲响，肠胃雷鸣也。骭，足胫也。阳明之脉自膝膑下胫骨外廉，故为胫骭厥逆。贲，奔同。骭音干"参厥证等条。

〔丿〕

掣节　证名。《灵枢·五邪》："邪在肝……行善掣节。"掣，牵引；节，关节。行善掣节，是行动时多牵掣其关节之意。

短气 证名。见《灵枢·颠狂》。指呼吸短促，如不能接续。《医宗必读·喘》："短气者，呼吸虽急而不能接续，似喘而无痰声。"有虚实之分。虚证常兼见形瘦神疲，声低息微，头眩乏力等症，多由体气素虚或病后真元耗损所致。实证常兼见胸腹胀满，呼吸声粗，心胸窒闷等症，多由痰饮、瘀阻、气滞等导致。《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证治》："平人无寒热，短气不足以息者，实也。"又《痰饮咳嗽病脉证并治》："短气有微饮，当从小便去之。"《诸病源候论·短气候》："肺虚则气少不足，亦令短气，则其人气微，常如少气不足以呼吸。"《石室秘录》："盖短气乃肾气虚耗，气冲于上焦，壅塞于肺经，症似有余而实不足。"参少气、外感短气、实邪短气、气虚短气、喘证条。

短气不足以息 指呼吸短促困难。《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证并治》："平人无寒热，短气不足以息者，实也。"《金匮要略心典》卷中："无寒热，无新邪也，而乃短气不足以息，当是里气暴实，或痰或食或饮，碍其升降之气而然。盖短气有从素虚宿痰而来者，有从新邪暴遏而得者，二端并否，其为里实无疑。"后世对短气，气促等病症，一般则多以肺肾气虚论治。参短气、气促条。

短气嗽 病证名。指肺气不足，寒邪迫聚而致喘嗽。《诸病源候论》卷十四："肺主气，候皮毛，气虚为微寒客皮毛，入伤于肺则不足，成咳嗽。夫气得温则宣和，得寒则否涩，虚则气不足而为寒所迫，并聚上肺间，不得宣发，故令咳而短气也。"亦可由肝肾亏损，气不归元所致。多见于症情危重病人。《不居集》卷十五："短气嗽。气亏于下，元海无根，上浮胸臆，呼不能升，咽不能降，气短喘咳，不相接续者，大虚之症，贞元饮。"参咳嗽、虚嗽条。

犊黄 三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一："治犊黄舌两边先从后起，次生向前，两傍有赤脉，状如蚯蚓。宜急烙断，毒气贯舌，其状紫色，次灸两口角，及人中并承浆。"参黄疸有关条。

衄 病名。即耳衄。《红炉点雪·痰火失血》："耳出血曰衄。"《证治准绳·杂病》："耳中出血，以龙骨吹入即止。左关脉弦洪，柴胡清肝散，尺脉或躁或弱，六味地黄丸。"参耳衄条。

遁尸 病名。指一种突然发作的危重病证。《太平圣惠方》卷五十六："遁尸者，言其停遁，在人肌肉血脉之间。若卒有犯触即发动，令心腹胀满刺痛，喘息急，偏攻两胁，上冲心胸，其候，停遁不消者是也。"治用木香散、鹿骨圆等方。

循衣摸床 证名。出《伤寒论·辨阳明病脉证并治》。亦作捻衣摸床。指患者神昏时，二手不自主地抚摸衣被或床缘的动作。多见于邪盛正虚或元气将脱的危重病候。《伤寒括要》卷上："循衣摸床，必兼见撮空及怵惕。肝主筋，肝热甚，故动惕也。……仲景主下者，因其不大便也。若内无燥屎，而脉重按无力者，往往以大补气血而愈。此法外之变通也。"参撮空理线条。

循经传 指外感热病按六经顺序传变所出现的证候。《此事难知·太阳六传》："太阳传阳明胃土者，名曰巡（循）经传，为发汗不彻，利小便，余邪不尽，透入于里也。"《医学心悟·伤寒纲领》："传经者，由太阳传阳明，由阳明传少阳，由少阳传太阴，由太阴传少阴，由少阴传厥阴。此名循经传也。"参传经条。

翕翕发热 证名。指轻微发热。出《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。《伤寒论条辨》："翕翕发热，乃形容热候之轻微。"《内外伤辨·辨寒热》："翕翕发热，又为之拂拂发热，发于皮毛之上，如羽毛之拂，明其热在表也。"为太阳中风发热的一种表现，常与自汗、恶风、恶寒等症并见，治宜

桂枝汤。又瘀血在肌肉亦可引起本症。《血证论·发热》："又有瘀血发热者，瘀血在肌肉，则翕翕发热，证象白虎，口渴心烦，支体刺痛，宜当归补血汤合甲己化土汤加桃仁、红花、柴胡、防风、知母、石膏。血府逐瘀汤亦治之。"参发热条。

筋极　六极之一。指筋脉疲怠、重急的疾患。《备急千金要方·肝脏》："筋极者，主肝也，肝应筋，筋与肝合，肝有病，从筋生。又曰，以春遇病为筋痹，筋痹不已，复感于邪，内舍于肝，则阳气入于内，阴气出于外。"《诸病源候论·虚劳病诸候》："筋极，令人数转筋，十指爪甲皆痛，苦倦不能久立。"严重者，更见舌卷、卵缩、唇青。宜用滋补养荣丸等方。又有偏实者，症见筋急，爪甲青黑，足心痛，口干，躁热，易怒，胁肋胀痛等。宜用羚羊角散、犀角地黄汤等方。参六极、筋绝条。

筋疝　古病名。指阴茎痛痒，挺纵不收，出白如精之症。多因房室劳伤所致。《儒门事亲》卷二："筋疝，其状阴茎肿胀，或溃或脓，或痛而里急筋缩，或茎中痛，痛极则痒，或挺纵不收，或白物如精，随溲而下，久而得于房室劳伤，……宜以降心之剂下之。"《医林绳墨》卷四用滋阴降火之法。方用四物汤加炒黄柏、知母、青皮、黄连、龙胆草之类。又称疝瘕、癥疝。《重订通俗伤寒论》第九章："筋疝者，即经之疝瘕，病源谓之癥疝。"参疝瘕、癥疝条。

筋枯　病证名。指血不养筋，肢节活动不利，动则作痛的病症。《丹溪心法·中风》："筋枯者，举动则痛，是无血不能滋养其筋。"可见于年老体弱之人。亦为中风后遗症之一。

筋骨疼痛痧　痧证之一。《痧胀玉衡·筋骨疼痛痧》："筋骨疼痛，多延蔓终身，治此者，或风，或湿，或气阻、血凝，或流痰、流火，如此而已，然有效，有不效，或为痧暗相缠，令人莫识，此痧甚慢，不可不知也。"治宜放痧，方用园红散、蒲黄饮、必胜汤等。参痧条。

筋脉拘急　证名。见《景岳全书·奇证谟》。指肢体筋脉收缩抽急，伸屈不利。多因阴血耗伤，外邪乘袭，筋脉失养所致。参筋挛、筋急条。

筋急　证名。指筋脉拘急不柔，屈伸不利。出《素问·五脏生成篇》。多因风寒侵袭筋脉，或肝热筋伤，或血虚津耗，筋脉失养所致。《诸病源候论·筋急候》："凡筋中于风热，则弛纵；中于风冷，则挛急。十二经筋皆起于手足指，循络于身也，体虚弱，若中风寒，随邪所中之筋，则挛急不可屈伸。"《张氏医通·诸风门》："经所谓肝气热则筋膜干，筋膜干则筋急而挛，六味丸加牛膝、当归之类。……虚邪搏筋则筋急，五积散。血虚则筋急，增损四物汤。"《杂病源流犀烛·筋骨皮肉毛发病源流》："仲景言血虚则筋急，此又筋急之原，由血脉不荣于筋之故也。丹溪以四物汤治筋急，本事方以养血地黄汤治筋急。"本证可见于痉病、痹证、惊风等。参各条。

筋结　证名。指身体出现连贯成串的结块。多因肝失调达，气血凝聚所致。《杂病源流犀烛·筋骨皮肉毛发病源流》："肝之经脉不调，气血失节，往往有筋结之患，不论骸体间，累累然若胡桃块状是也。"

筋绝　古病名。指筋脉伤损败绝的疾患。《灵枢·经脉》："足厥阴气绝则筋绝。厥阴者肝脉也，肝者筋之合也，筋者聚于阴器，而脉络于舌本也。故脉弗荣则筋急，筋急则引舌与卵，故唇青、舌卷、卵缩。"《华氏中藏经》卷中："筋绝。魂惊，虚恐，手足爪甲青，呼骂不休。"参筋极条。

筋挛　证名。亦称筋瘛。指肢体筋脉收缩抽急，不能舒转自如。《灵枢·刺节真邪》："虚邪之中人也，洒淅动形，起毫毛而发腠理，其入深，……搏于筋，则为筋挛。"多因感受外邪，或血少津亏，筋脉失

于荣养所致。《张氏医通·挛》："《内经》言：挛皆属肝，肝主筋故也。有热有寒，有虚有实。热挛者，经所谓肝气热则筋膜干，筋膜干则筋急而挛，六味丸加牛膝、当归之类；因于湿首如裹，湿热不攘，大筋软短，小筋弛张，软短为拘，弛张为痿，先搐瓜蒂散，次与羌活胜湿汤；虚邪搏筋，则筋急，五积散；血虚则筋急，增损四物汤；剧劳筋脉拘急疼痛少眠者，黄芪丸，更于暖室中近火按摩为佳；虚风袭于经脉，手足拘挛，屈伸短缩，腹痛，爪甲唇俱青，转筋不思饮食，甚则舌卷囊缩，木瓜散；拘挛瘫痪，口目㖞斜，骨节疼酸，行步不正者，舒筋三圣散；痹湿筋挛骨痛者，续断丸；误汗漏风，筋挛缩急，或方士用木鳖发汗；见风筋脉拘挛者，并宜桂枝汤倍桂加归附；病初起者，分表里治。"本证常见于痹、痉、中风等病。参各条。

筋惕肉瞤 证名。指筋肉惊惕跳动。见《伤寒论·太阳病脉证并治》。多因汗多伤阳，血虚津耗，筋脉失养所致。《伤寒明理论》卷三："其于筋惕肉瞤，非常常有之者，必待发汗过多亡阳，则有之矣。……发汗过多，津液枯少，阳气太虚，筋肉失所养，故惕惕然而跳，瞤瞤然而动也。"《杂病源流犀烛·筋骨皮肉毛发病源流》："伤寒发汗过多，则伤其血，血虚无以荣筋，因拘急而惕惕然跳，且四体百骸，亦瞤瞤然动，是筋惕肉瞤，由于筋肉失养。"因血虚所致者，宜四物汤加减，阳气虚者，宜真武汤等方。

筋痛 证名。指筋脉疼痛。《灵枢·经筋》："手少阴之筋，……其病当所过者支转筋，筋痛。"可因血少、气血痹阻、或津液耗损，筋失滋养所致。《医学正传》卷一："若动止筋痛，是无血滋筋故痛。"

筋缓 证名。指筋脉弛缓，不能随意运动。多因肝肾虚亏，或肝藏受风，或血热所致。《难经·十二难》："肾肝内绝，绝则骨痿筋缓。"《证治要诀·诸中门》："盖肝主筋属木，风易入之，各从其类，肝受风则筋缓不荣。"《杂病源流犀烛·筋骨皮肉毛发病源流》："筋缓之原血热，无足疑者；……筋缓宜五加皮散。"本证可见于脑血管意外后遗症及脑炎后遗症、进行性肌营养不良症、多发性肌炎等疾患。

筋蒸 二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

筋痿 ❶痿证之一。亦称肝痿。由于肝热内盛，阴血不足，筋膜干枯所致。证见肢体筋急拘挛，渐至痿弱不能运动，伴有口苦，爪枯等症。《素问·痿论》："肝主身之筋膜……肝气热，则胆泄口苦，筋膜干。筋膜干则筋急而挛，发为筋痿。"治宜清热，补血，养肝。选用补阴丸、家秘肝肾丸，或补血荣筋丸，紫葳汤等方。参痿条。❷指阴痿。《杂病源流犀烛·过欲伤源流》："入房太甚，宗筋弛纵，发为筋痿。"多因强忍房事、有伤宗筋，亦致阴痿不起。参阴痿条。

筋痹 病名。❶指风寒湿邪入侵于筋所致的痹证。《素问·长刺节论》："病在筋，筋挛节痛，不可以行，名曰筋痹。"《圣济总录》卷二十："内经曰：风寒湿三气杂至，合而为痹。又曰：以春遇此者为筋痹。其状拘急，屈而不伸是也。"治宜舒筋养血，参以祛邪，用羚羊角散、天麻丸等方。❷指肝痹。《症因脉治》卷三："肝痹之症，即筋痹也。"参肝痹条。❸指风痹。《医宗必读·痹。》："筋痹即风痹也。游行不定，上下左右，随其虚邪，与血气相搏，聚于关节，或赤或肿，筋脉弛纵。"参风痹条。

筋缩 ❶证名。又称缩筋。指筋脉挛急不舒、疼痛。《脉经》卷三："脉弗营则筋缩急。"《杂病源流犀烛·筋骨皮肉毛发病源流》："筋缩为热，缩者短促。……是其意实以缩即为拘挛之义。"多由受寒，或热伤筋脉，或血虚无以养筋所致。可见于痉病、痹证等病。若兼唇青、舌卷、卵缩为危

候。❷穴位名。在第九脊椎下。

筋瘛　证名。筋挛的别称。《杂病源流犀烛》卷二十五："故筋挛亦曰筋瘛。"详筋挛条。

筋燥　病证名。指筋脉干燥，屈伸不能自如之证。《圣济总录纂要》卷二："天癸亏而凝涩，则肾脂不长。肾脂不长，则髓涸而气不行，……外证当挛节，则以髓少而筋燥，故挛缩而急也。"多由肝经燥热，血液衰少，或肾虚髓少，筋失濡养所致。参筋急、拘挛条。

筋癫疾　病名。指癫病深入于筋者。《灵枢·癫狂》："筋癫疾者，身倦挛，急大，刺项大经之大杼脉。呕多沃沫，气下泄，不治。"参癫条。

番沙　瘄证之一。又名黑瘄。《张氏医通》卷九："近时有感恶毒异气，而骤发黑瘄，俗名番沙。卒然昏倒腹痛，面色黑胀，不呼不叫，如不急治，两三时即毙。有微发寒热，腹痛麻瞀，呕恶神昏者，或溅溅汗出，或隐隐发斑，此毒邪烦发于表也；亦有发即泻利厥逆，腹胀，无脉者，此毒邪内伏，不能外发也，所患最暴，多有不及见斑而殂者。经谓大气入于脏腑，虽不病而卒死是也。初觉先将纸捻点焠头额，即以荞麦焙燥，去壳，取末三钱，温汤调服。重者，少顷再服即安。"并宜理气、解表，清热解毒，如香苏散加薄荷、荆芥或栀子豉汤加牛蒡、生甘草，热甚者，黄芩汤、凉膈散、三黄汤、白虎汤等方均可选用。如毒甚面黑者，急取委中穴，刺出黑血，以泄毒邪。参瘄条。

胭血　指血从胭窝（委中穴处）流出。《证治汇补·胸膈门》："有膝脘後委中穴，搔之血出不止，谓之胭血。此肾与膀胱虚热也。"《杂病源流犀烛·诸血源流》："有胭中出血不止，乃血虚者，宜十全大补汤。"参肌衄、毛窍出血条。

脾中风　古病名。又名脾脏中风。风邪入中于脾经而致的证候。主症为发热，形如醉人，皮目瞤动，短气，腹满，身黄等。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》："脾中风者，翕翕发热，形如醉人，腹中烦重，皮目瞤瞤而短气。"《诸病源候论·风病诸候》："脾中风，踞而腹满，身通黄，……。"参脾脏中风条。

脾中寒证　指脾受寒邪所致的病证。《三因极一病证方论》卷二："脾中寒之状，心腹膜胀，四肢挛急，嗳噫不通，脏气不传，或秘或泄。"治宜温脾散寒为主。选用不换金正气散、附子五积散、姜附汤、温脾丸等方。

脾气实　病证名。见《外台秘要》卷十六。即脾气盛。《灵枢·本神》："脾气虚，则四肢不用，五藏不安；实则腹胀，泾溲不利。"详脾气盛条。

脾气盛　证名。出《灵枢·淫邪发梦》。又名脾气实。指脾经邪气盛实的证候。《诸病源候论·脾病候》："脾气盛，为形有余，则病腹胀，溲不利，身重苦饥，足瘛不收，胎善瘈，脚下痛，是为脾气之实也。"参脾病、脾实等条。

脾风　病名。指脾受风邪所致的疾患。《素问·风论》："脾风之状，多汗恶风，身体怠堕，四肢不欲动，色薄微黄，不嗜食，诊在鼻上，其色黄。"《奇效良方》治风中于脾，用白术汤。肝风传脾，亦可致本病。《素问·玉机真藏论》："肝传之脾，病名曰脾风，发瘅，腹中热，烦心出黄。"

脾风疝　古病名。《素问·四时刺逆从论》："太阴有余，病肉痹、寒中；不足病脾痹；滑则病脾风疝。"马莳注："其脉若滑，则病脾风疝，外感之邪也。"张志聪注："太阴脉滑，则土邪有余，脾风疝者，即癫肿重坠之属，病在湿也。"参风疝条。

脾心痛　证名。厥心痛之一。因脾病而邪上乘心所致。《灵枢·厥病》："厥心痛，痛如以锥针刺其心，心痛甚者，脾心痛也。"《三因极一病证方论》卷九："脾心痛者，如针椎刺其心腹，蕴蕴然气满。"《张氏医

通·诸痛门》："脾心痛者，多由寒逆中焦。……寒多虚，则或温或补之。"《杂病源流犀烛》治脾心痛用诃子散、复元通气散等方。参厥心痛、心痛条。

脾水 病证名。五脏水肿病之一。指脾阳虚困，不能运化水湿所致的水肿。《金匮要略·水气病脉证并治》："脾水者，其腹大，四肢苦重，津液不生，但苦少气，小便难。"参水肿、十水条。

脾虫病 病名。脾虫即寸白虫。《本事方释义·诸虫飞尸鬼疰》："脾虫曰寸白。"即寸白虫病。详该条。

脾伤 指脾脏伤损的疾患。《脉经》卷六："凡有所击仆，若醉饱入房，汗出当风，则伤脾，脾伤则中气阴阳离别，阳不从阴。"《诸病源候论·虚劳候》："大饱伤脾，脾伤，善噫，欲卧，面黄。"《慎斋遗书·虚损》："若房劳辛苦之人，七情六欲，损伤元气，心神失养，相火亢烈，亢烈之火，不能生土，则脾土有伤矣。脾伤则金气不足，不能平肝木，木转以克土则后天伤；金气不足则水无从以生，而先天伤，二天俱伤，则不能转相滋养。"治以养脾胃为主，方如生脉散加芪术或保元汤等。参肉极、七伤条。

脾约 病名。便秘的一种。出《伤寒论·辨阳明病脉证并治》。约，约束之意。这里指脾虚津少，肠液枯燥以致大便艰涩难出的病证。《注解伤寒论·辨阳明病脉证并治法第八》："胃强脾弱，约束津液，不得四布，但输膀胱，致小便数，大便难，与脾约丸。"《三因极一病证方论·秘结证治》："或饮食燥热而成热中，胃气强涩，大便坚秘，小便频数，谓之脾约。"《杂病源流犀烛·大便秘结源流》："脾约，液枯证也。仲景论阳明伤寒，自汗出，小便数，则津液内竭，大便必难，其脾为约，脾约丸主之。盖液者，肺金所布，肺受火烁，则津液自竭，而不能行清化之令，以输于脾，是肺先失传送之职，脾亦因爽转输之权，而大便有不燥结者乎，但仲景以脾约丸主之。……当大病后或东南人虚羸，恐虽热甚，而偶误服此，必脾愈弱而肠愈燥也。故本病只宜以滋养阴血，使阳火不炽为上。宜当归润燥汤、苁沉丸、润肠丸。"参大便秘结条。

脾劳 病名。因饮食劳倦伤脾所致。《诸病源候论·虚劳病诸候》："脾劳者，舌本苦直，不得咽唾。"《外台秘要·脾劳》："脾劳热，身体、眼目、口唇悉痿黄，舌本强直，不能得咽唾，生地黄煎。"又："脾劳虚损，消瘦，四肢不举，毛悴色夭，牛髓补虚寒丸。"《三因极一病证方论·五劳证治》："茱萸膏，治脾劳虚寒，气胀，咽满，食不下通，噫宿食臭。"参虚劳、五劳条。

脾足太阴经病证 病证名。足太阴脾经经气异常所致。《灵枢·经脉》："脾足太阴之脉，……是动则病舌本强，食则呕，胃脘痛，腹胀善噫，得后与气则快然如衰，身体皆重。是主脾所生病者，舌本痛，体不能动摇，食不下，烦心，心下急痛，溏瘕泄，水闭，黄疸，不能卧，强立，股膝内肿厥，足大指不用。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。"《脉经·脾足太阴经病证》除上列"是动、所生"病之外，尚列举了身重，四肢不用，不嗜食，食不化，肠鸣、溏泄，小便难、吐逆等多种病证。参脾病有关条。

脾郁 五脏郁证之一。《赤水玄珠》卷十一："脾郁者，中脘微满，生涎少食，四肢无力。治宜陈皮、半夏、苍术。"参五脏郁证条。

脾肾泄 病名。又称脾肾泻。《医学从众录·泄泻》："五更天将明时，必洞泄一二次，名曰脾肾泄，……四神丸加味主之。大抵初泻与泻之未甚，宜利水，次补脾。久泻大泻，宜补肾，以胃关煎、八味丸之类为主，兼服补中益气汤，以升其下陷之气。"参肾虚五更泄泻条。

脾肾泻　病名。又称脾肾泄。指五更泄之因脾肾虚弱者。《丹溪心法·泄泻》："但得日间上半夜无事，近五更，其泻复作，此病在肾。俗呼为脾肾泻。分水饮下二神丸及椒朴丸，或平胃散下小茴香丸。病久而重，其人虚甚，宜椒附汤。"参肾虚五更泄条。

脾胀　病名。胀病之一。《灵枢·胀论》："脾胀者，善哕，四肢烦悗，体重不能胜衣，卧不安。"《医醇賸义·胀》："脾为湿土而主四肢，寒气乘之，则土德衰而真阳不运，故善哕而肢体疲重，夜卧不安也。当抉土渗湿，兼解寒邪，姜术二仁汤主之。"脾胀又名水胀。《金匮翼·胀满诸论》："脾胀，湿气归脾，壅塞不行，其脉濡，其体重，其便不利，大便溏而不畅，……脾土受湿，不能制水，水渍于肠胃而溢于皮肤、漉漉有声，怔忡喘息，即为水胀是也。"治宜小温中丸，胃苓汤，禹余粮丸等方。参胀条。

脾疟　五脏疟之一。《素问·刺疟篇》："脾疟者，令人寒，腹中痛，热则肠中鸣，鸣已汗出，刺足太阴。"治宜小建中汤、橘皮散等。参五脏疟条。

脾泄　病名。又称脾泻。因寒湿损脾或饮食伤脾，脾气虚弱所致。《难经·五十七难》："脾泄者，腹胀满，泄注，食即呕吐逆。"《丹溪心法·泄泻》："老人奉养太过，饮食伤脾，常常泄泻，亦是脾泄。"《寿世保元·泄泻》："气弱易饱，常便稀溏者，此脾泄也。"用机要白术芍药汤、扶脾散。脾泄日久者，宜兼固涩，参滑泄、脾泻条。

脾泻　病名。见《医林绳墨·泄泻》。即脾泄。多因寒湿积滞，脾虚失运所致。《万病回春·泄泻》："脾泻者，食后倒饱，泻去即宽，脉细是也。"方用香砂六君子汤。《不居集·泄泻》："脾泻，腹胀满，泄注，食即呕吐，建中汤，理中汤。"亦称洞泄。《医学真传》："痢无积，日夜十余次，解时微痛，是名脾泻，又名洞泄。"参洞泄、脾泄条。

脾实证　证名。指脾病因邪气盛实所出现的证候。多由湿热困脾或瘀血停积等所致。《脉经》卷二："脾实也，苦肠中伏伏如坚状，大便难。"又："脾实，……病苦足寒，胫热，腹胀满，烦扰不得卧。"《圣济总录》卷四十四："脾实论曰脾藏盛实，则生热，热气熏蒸，则令人舌本肿胀，语言謇涩，腹胁坚硬，四肢不举，身体沉重，面目焦黄，不得安卧，而唇口干燥也。"《本草经疏》："脾实，即湿热邪胜六证：蛊胀，由于脾家湿热积滞或内伤瘀血停积而成；易饥，属脾家郁火；口唇生疮，口糜，中消，属脾家实火；湿热腹痛，按之愈甚。"方用泻热汤，泻脾升麻汤等。参脾病、脾实热条。

脾实热证　指脾经邪热炽盛的病证。《备急千金要方》卷十五："病苦足寒胫热，腹胀满，烦扰不得卧，名曰脾实热也。"《太平圣惠方》卷五："夫脾实则生热，热则阳气盛，阳气盛则心胸烦闷，唇口干焦，身热颊疼，体重不能转侧，语声沉而心急，咽喉痛而不利，舌本肿强，口内生疮，腹胁胀满，不能安卧……。"常伴泾溲不利、面目焦黄等症。治宜泻脾清热为主，方选泻热汤、泻脾大黄汤、泻脾赤茯苓汤等。

脾实腹胀　病证名。指湿热伤脾所致的腹胀。《症因脉治》卷三："脾实腹胀之症，眼目黄肿，夜不得卧，肚腹时热，小便赤色，大便或结或泻，或时作痛，泻下黄沫，肛门热痛。"多因膏粱积热，湿热之气，聚于脾中，转输失常所致。治宜清热化湿为主。眼目黄肿，宜龙胆泻肝汤。肚腹时热，宜川连戊己汤，川连枳壳汤。小便赤色，宜导赤各半汤。泻下黄沫，家秘泻黄散。肛门热，川连枳壳汤加黄柏、槐米。胸前满闷，栀连二陈汤，栀连平胃散加枳实以消痞满。参腹胀、内伤腹胀条。

脾经失血　病证名。指脾不统血所致的

失血。《不居集》卷十三："脾为后天之本，三阴之首也。脾气健则元气旺，而阴自足。故血症中有脾虚者，当补脾以统其血。"伴饮食无味，不知饥饱，胸腹胀满，痰多。宜归脾汤、柔脾汤等方。参失血条。

脾经咳嗽 病证名。又称脾咳。指脾胃湿热，上熏于肺，或脾虚土不生金所致的咳嗽。《症因脉治·内伤咳嗽》："脾经咳嗽之症，咳而右胁下隐隐作痛，痛引心脾，神衰嗜卧，面色痿黄，腹胀黄肿，身重不可以动，动则咳剧，此脾咳嗽之症。"辨治：肺有热者，家秘泻白散；脾胃热积，栀连二陈汤；肺气不足，生脉散；土不生金，四君子汤；有痰，六君子汤，虚热，加丹皮、山栀、热甚加栀、连。《不居集·脾经咳嗽》："脾咳之状，咳则右胠下痛，阴阴引肩背，甚则不可以动，动则咳剧，升麻汤主之。咳而涎出，续续不止，引小腹谓之脾咳。"参咳嗽、脾咳条。

脾经湿痰 痰证之一，即湿痰。见《不居集》卷十七。详该条。

脾咳 病名。❶指咳则右胁下引及肩背痛，动则咳剧者。《素问·咳论》："脾咳之状，咳则右胁下痛，阴阴引肩背，甚则不可以动，动则咳剧。"治用升麻汤。如脾胃积热者，用栀连二陈汤；脾虚痰湿者，用六君子汤加枳壳、桔梗，或术米汤。参脾经咳嗽条。❷十咳之一。《诸病源候论·咳嗽病诸候》："六曰脾咳，咳而涎出，续续不止，引少腹是也。"治宜刺足太白。参十咳、咳嗽条。❸五嗽之一。见《三因极一病证方论》卷十二。参五嗽条。

脾胃郁 郁证之一。《类证治裁》卷三："脾胃郁，气噎哕呃。金匮麦门冬汤加竹茹、丁香。"参五脏郁证条。

脾浊 溺浊之一。见《世医得效方·大方脉科》。病因脾虚气陷，精微下注而成。证见小便浑浊，腰痛神疲，舌淡脉软。治宜健脾益气，升清固涩。用苍术难名丹、补中益气汤。参便浊条。

脾结气陷泄泻 病证名。指思虑伤脾，中气下陷所致的泄泻。见《医略六书·杂病证治》。《张氏医通·大小府门》："忧思太过，脾气结而不能升举，陷入下焦而成泄泻者，逍遥散去归，加升麻、木香；或越鞠、枳术相和服。"参脾泄、气泻条。

脾绝 五脏绝候之一。❶指脾气绝出现的危重脉证。《华氏中藏经》卷上："面青，无右关脉者，脾绝也。"《注解伤寒论·辨脉法》："环口黧黑，柔汗发黄者，此为脾绝也。"《脉经》卷四："病人脾绝十二日死，何以知之？口冷，足肿，腹热，胪胀，泄利不觉，出无时度（一曰五日死）。"《灵枢·经脉》："足太阴气绝者，则脉不荣肌肉，唇舌者，肌肉之本也，脉不荣则肌肉软，肌肉软则舌萎人中满，人中满则唇反，唇反者，肉先死。甲笃乙死，木胜土也。"❷指中风脱证之一。《医宗必读·真中风》："若中风昏倒……手撒脾绝。"参中风脱证条。

脾损 病名。五脏虚损之一。又称损脾。《难经·十四难》："三损损于肌肉，肌肉消瘦，饮食不为肌肤。"又："损其脾者，调其饮食，适寒温。"虞庶注："脾化水谷以生气血，今见脾损，饮食不为肌肉，宜调节饮食，无令伤脾也。"可选服四君子汤以补脾益气。《杂病源流犀烛》卷八："损脾伤仓廪，饮食不为肌肤，急应时饮食，适寒温，宜十全大补汤。"参虚损条。

脾热身肿 病证名。身肿类型之一。《症因脉治》卷三："脾热身肿之症，面肿目黄，烦躁不卧，皮肤常热，小便赤，大便时泄时结，常肿不退。此脾热肿之症也。脾热身肿之因，膏粱厚味，日积月累，热聚脾中，则脾热肿之症作矣。"脉弦数或沉滑，治宜选用加味泻黄散、栀连枳壳汤、龙胆泻肝汤、家秘戊己汤等方。参身肿、水肿条。

脾热证 病证名。《素问·痿论》："脾

热者，色黄而肉蠕动。”《证治准绳·杂病》：“脾热者，轻手扪之不热，重按至筋骨又不热，不轻不重，在轻手重手之间，此热在肌肉，遇夜尤甚。”脾热有虚实之分，详脾实热、脾虚热条。

脾热病　病证名。指脾受邪热所致的病证。《素问·刺热篇》：“脾热病者，先头重颊痛，烦心，颜青，欲呕，身热，热争则腰痛不可用俛仰，腹满泄，两颔痛。”

脾热痿软　病证名。指膏粱积热，湿热伤脾所致的痿证。《症因脉治》卷三：“脾热痿软之症，唇焦齿燥，口干作渴，肌肉不仁，身重不能转侧，纵缓不能举动，此《内经》脾热痿弱之症也。”治宜清热化湿。水湿生热者，可用栀连平胃散、栀连二陈汤；膏粱积热者，可用川连枳壳汤或泻黄散等。参痿、肉痿条。

脾积　古病名。五积之一。《难经·五十四难》：“脾之积，名曰痞气。”《脉经·平五脏积聚脉证》：“诊得脾积，脉浮大而长，饥则减，饱则见，膜起与谷争减，心下累累如桃李起，见于外，腹满呕泄，肠鸣，四肢重，足胫肿厥，不能卧，是主肌肉损，其色黄。”治宜七气汤下红丸子，兼吞痞气丸（见《证治准绳·杂病》）。参痞气条。

脾脏中风　古病名。亦称脾中风。泛指风邪入中于脾发生的证候。《太平圣惠方·治脾脏中风诸方》：“夫脾气虚弱，肌肉不实，则腠理开疏，风邪乘虚入于足太阴之经，则令身体怠惰，多汗恶风，舌本强直，言语謇涩，口面㖞僻，肌肤不仁，腹胀心烦，翕翕发热，神思如醉，手足不能动摇，诊其脉浮缓者，是脾中风之候也。”参脾中风。

脾病　指脾脏的各种病证。脾司运化，主四肢肌肉，统摄血液，为气上生化之源，开窍于口。脾病有寒热虚实之分。多由饮食劳倦所伤，脾失健运，水湿不化，或脾阳虚衰，中气下陷所致。《素问·藏气法时论》：“脾病者，身重，善肌，肉痿，足不收，行善瘛，脚下痛。虚则腹满肠鸣，飧泄，食不化。”《难经·十六难》：“假令得脾脉，其外证面黄，善噫，善思，善味，其内证当齐有动气，按之牢若痛，其病腹胀满，食不消，体重节痛，怠堕嗜卧，四肢不收，有是者脾也。”《太平圣惠方·脾脏论》：“夫脾者，位居中央，王于四季，受水谷之精气，化气血以荣华，周养身形，灌溉脏腑者也，若虚则生寒，寒则阴气盛，阴气盛则心腹胀满，水谷不消，喜噫吞酸，食则呕吐，气逆，霍乱，腹痛肠鸣，时自泄利，四肢沉重，常多思虑，不欲闻人声，多见饮食不足，诊其脉沉细软弱者，是脾虚之候也。”又：“夫脾实则生热，热则阳气盛，阳气盛则心胸烦闷，唇口干焦，身热颊疼，体重不能转侧，语声沉而心急，咽喉痛而不利，舌本肿强，口内生疮，腹胁胀满，不得安卧，梦多见歌乐，四肢怠惰，诊其脉紧实者，是脾实之候也。”《本草纲目·脏腑虚实标本用药式》：“脾藏智属土，为万物之母，主营卫，主味，主肌肉，主四肢。本病，诸湿肿胀，痞满，噫气，大小便闭，黄疸，痰饮，吐泻，霍乱，心腹痛，饮食不化。标病，身体肿肿重困，嗜卧，四肢不举，舌本强痛，足大趾不用，九窍不通，诸痉项强。”《杂病源流犀烛·脾病源流》：“盖脾统四脏，脾有病必波及之，四脏有病，亦必待养于脾。……至若本经为病，不外湿淫热郁两端，湿由水气，病则壅，壅则伤气，气虚而不运，必腹胀，胃痛，肠鸣飧泄，身重，食不化。热由火气，病则不濡，不濡则伤血，血枯而燥，必胃气厚，善肌，肉痿，足不能行，善瘛，脚下痛，口干，舌本强，食即吐，食不下，烦心，水闭，黄疸，脾约，皆脾经病也。治之者，务使三焦之气流转和通，则土润而升，不忧其燥。而火气不得病之，土健而运，不忧其湿，而水气亦不得病之矣。”脾病治宜健脾化湿，温阳运脾，补益中气，

益气摄血等法。参脾病各条。

脾疸 病名。❶九疸之一。见《诸病源候论·黄病诸候》。由饮食过度，醉酒劳伤，脾胃瘀热所致。证见身面发黄，溺赤而少，心惴惴若恐。治宜秦王散及栝蒌等药。❷《辨证奇闻》谓脾疸由寒湿困扰，脾阳不振所致。症见身黄如秋葵色，汗及涕唾有黄，小便不利，恶闻人声。治宜健脾温阳，佐以利水。参黄疸有关条。

脾消 病名。❶即脾痹。详该条。❷指消中、寒中、热中。《证治要诀·大小腑门》："然脾消又自有三，曰消中，曰寒中，曰热中。"参有关条。

脾黄 三十六黄之一。❶《太平圣惠方》卷五十五："脾黄者，遍身如金色，眼目俱黄，唇口生疮，或吟或咏，有时吐逆，不能下食，大便涩，若脐凸者难治"。治宜土瓜根散等方。❷《圣济总录》卷六十一："病人两颊生青脉起，目黄，齿龂皆青，唇黑生疮，通身黄色，鼻中煤生，心腹胀满，不下饮食，大便不通，即是脾黄。"治宜猪苓汤、盐蜜煎等方，并宜灸法。参黄疸有关条。

脾虚生风 指脾虚引起内风的证候。多由吐泻或药饵损脾所致。主要表现为手足微有抽搐，伴肢体逆冷，口鼻气微，昏睡露睛等症。《张氏医通·诸风门》："若体倦神昏不语，脉迟缓，四肢欠温者，脾虚生风也。"治宜温补脾胃为主，用归脾汤加钩藤、羌活或六君子汤加炮姜、肉桂、蝎尾等。

脾虚自汗 自汗证之一。《证治汇补·汗病章》："脾虚自汗，倦怠少食。"《医宗必读·汗》："脾虚者壮其中气，补中益气汤、四君子汤。"参自汗条。

脾虚身肿 病证名。身肿类型之一。《症因脉治》卷三："脾虚身肿之症，小便清利，大便溏泄，面色萎黄，语言懒怯，常肿常退，此脾虚肿之症也。脾虚身肿之因，大病后，久泻后，脾土之真阴受伤，转输之官失职，不能运化水谷，则诸经凝窒，而肿症作矣。"脉见濡软或弦数或见浮大。治宜温中健脾。可选用理中汤、白术散。金匮肾气丸、六君子汤、加味归脾汤等方。参身肿、水肿条。

脾虚证 指脾气、脾阳、脾阴不足所出现的各种证候。《脉经》卷二："脾虚，……病苦泄注，腹满，气逆，霍乱，呕吐，黄疸，心烦不得卧，肠鸣。"《圣济总录》卷四十四："脾虚，论曰脾象土，位处中焦，主腐化水谷，通行营卫，脾气和则可以坤诸脏，灌四旁。若虚则生寒，令人心腹胀满，水谷不消，噫气吞酸，食辄呕吐，霍乱泄利，四肢沉重，多思气结，恶闻人声。"《本草经疏》："脾虚十二证，饮食劳倦，伤脾发热，饮食不消化，属脾气虚；伤食必恶食，停食，为恣饮汤水，或冷茶、冷酒所致。水肿属脾气虚，脾虚中满，属脾气虚，兼脾阴虚；噎膈，属气血两虚，由于血液衰少，而非痰气壅逆所成。脾虚，属气虚；健忘，属气血两虚；倦怠，嗜卧，属脾气不足；脾虚腹痛，按之则止，属血虚；痞气，属脾气虚，及气郁所致。"方用养脾散、大理中丸等方。参脾病、脾虚寒等条。

脾虚呕吐证 证名。见《经验医库》。指呕吐因脾胃虚弱所致者。《石室秘录》卷三："胃吐出于脾虚。脾气不下行，自必上反而吐。补其脾气则胃气自安。"宜用附子理中汤等。

脾虚泄泻 病证名。指脾气素虚，或病后过服寒冷，或饮食不节，劳伤脾胃所致的泄泻。《症因脉治·脾虚泄泻》："脾虚泻之症，身弱怯冷，面色痿黄，手足皆冷，四肢倦怠，不思饮食，时时泻薄。"脉多微弱，或迟缓。治宜健脾温运。用理中汤、四君子汤、参苓白术散等方。参脾泄、气陷泄泻条。

脾虚热证 劳热之一。见《中国医学大辞典》。《杂病源流犀烛·虚损劳瘵源流》："脾热，轻重按俱不得，热在不轻不重间，

脾主肌肉也。夜尤甚。必兼怠惰嗜卧，四肢不收，无气以动。”可伴面黄，腹胀，肠鸣，泄泻，吐逆，不欲食，食不化，足肿等症。治宜甘温除热，补脾益气。可用补中益气汤等方。参劳热条。

脾虚秘　病证名。指大便秘结由于脾虚而致者。《医学原理》卷五：“脾病不能克化水谷，是以不思饮食，水谷外入既少，则内便溺亦无，况又胃气不生，脾血不濡，大肠枯燥，是以大便或二三日只一见，或涩而不行。夫弦乃肝脉，缓属脾脉，肝脉乘脾，脾虚可验，治宜补中升阳益气。”《张氏医通·大便不通》：“脾虚不能运化，倦怠懒于言动，补中益气倍升柴当归，煎成调生蜜麻油，清气一升，浊气自降。”参虚秘条。

脾虚寒证　病证名。指脾气、脾阳不足所出现的证候。见《备急千金要方》卷十五。《三因极一病证方论·脾胃经虚实寒热证治》：“脾虚寒病，泄泻，腹满，气逆，呕吐，心烦不得卧，肠鸣，虚胀，饮食不消，劳倦，虚羸，喜噫，四肢逆冷，多卧少起，情意不乐。”治宜补脾温中为主。选用补脾汤、厚朴汤、白术汤等方。

脾虚腹胀　病证名。指脾虚运化不健所致的腹胀。《症因脉治》卷三：“脾虚腹胀之症，食少身倦，脾虚不运，二便清利，言语轻微，心腹时胀时退，朝宽暮急。”因脾气素虚，饮食难化，凝积肠胃所致。治宜健脾消食为主。脾气不实者，宜参苓白术散；言语轻微者，宜四君子汤；心腹时胀，饮食难消者，加减枳术汤。参腹胀、内伤腹胀条。

脾遗　病名。指脾病而致遗精。《医宗必读》卷九：“脾病而遗者，色黄肉消，四肢懈惰。”治宜健脾固精。可用补中益气汤与聚精丸、水陆二仙丹合用。参遗精、五脏遗精条。

脾痨　病名。❶即脾痨。详该条。❷《慎柔五书》卷四以虫在于脾则成脾痨。治以吴萸根等方。

脾痛　病名。又作脾消。《世医得效方》卷六：“脾痛之证，饮食入腹，如汤浇雪，随小便而出，落于溷僻沟渠中，皆旋结如白脂，肌肤日益消瘦，……精神恍惚，口舌焦干，或阳强兴盛，不交而泄。”可用姜粉散、附子猪肚丸等方。参中消、消渴条。

脾痫　病名。出《备急千金要方》卷五。可表现为多种症状。《医学入门·痫》：“脾痫，面黄，下利，吐舌，羊吼。”《景岳全书》卷四十一：“面色痿黄，目直，腹满自利，四肢不收，其声如牛者曰脾痫。”《医林绳墨》卷六以痫症因饮食失节，饥饱无时，痰蓄气逆而发，手足搐搦，唇口掀动，痰沫外出，卒然而仆者为脾痫。参痫、五脏痫条。

脾蒸　二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

脾痿　病名。指肉痿。《医宗必读·痿》：“脾痿者，肉痿也。”详肉痿条。

脾痹　病名。由肌痹发展而成。亦有称为肌痹者。《素问·痹论》：“脾痹者，四支解堕，发咳呕汁，上为大塞。”《圣济总录·脾痹》：“肌痹不已，复感于邪，内舍于脾，是为脾痹。”《症因脉治·脾痹》：“脾痹之症，即肌痹也。四肢怠惰，中州痞塞，隐隐而痛，大便时泻，面黄足肿，不能饮食，肌肉痹而不仁。”可用黄耆丸、白术汤、大半夏汤、枳术丸、保和丸、四君子汤等方。参肌痹条。

脾瘅　病名。出《素问·奇病论》。指过食甘肥所致，口中发甜的病证。日久遂成消渴。《圣济总录》卷四十五：“内经曰，有病口甘者，此五气之溢也，名曰脾瘅。夫食入于阴，长气于阳，肥甘之过，令人内热而中满，则阳气盛矣，故单阳为瘅，其证口甘，久而弗治，转为消渴，以热气上溢故也。”《张氏医通·口》：“口甘。经云，有病口甘者，此五脏之溢也，名曰脾瘅。治

之以兰，除陈气也，兰香饮子，若脉弦滑兼嘈杂，属痰火，滚痰丸，此指实火而言。平人口甘欲渴，或小便亦甜而浊，俱属土中湿热，脾津上乘，久之必发痈疽，须断厚味气脑。服三黄汤加兰叶、白芍、生地，燥渴甚者，为肾虚，日服加减八味丸，可保无虞。”参中消条。

腋汗 证名。见《医林绳墨·汗》。指两腋下多汗。有因肝虚挟热者，治以补肝养血为主，用六味地黄丸加减。有因少阳挟热者，治宜和解少阳，清化湿热，用小柴胡汤、逍遥散。并可外用牡矾丹擦出汗处。

腋痛 证名。《症因脉治》卷一：“腋痛者，在两胁之上，奶旁外侧，痛连缺盆，肺经症也。若在腋之下，原是胁痛，而非腋痛。”致病原因，有外感、内伤之别。外感多因风寒、燥热等邪侵肺所致；内伤多因郁怒伤肝、积热熏肺或肾火上冲引起。因风寒者可见恶寒发热，喘急咳嗽，多痰，腋痛时牵引锁骨上窝部等症。治宜疏邪肃肺为主，如麻黄杏子汤、加味泻白散等方。因燥热者可见腋痛，口渴，面赤，吐痰干涸，小便短赤等症。治宜清燥泻火为主，如燥热伤气，用加味泻白散，燥热伤血，用青金泻白散；肝肺火盛者，用知石泻白散加柴胡、黄芩等药。内伤者，如郁怒伤肝，可见腋痛，烦躁多怒，胸膈痞塞等；若木火刑金或积热熏肺，则兼见咳嗽气逆等症。治宜疏肝清肺为主，可选用加味泻白散、严氏推气散、加味清胃汤等方。肾火上冲，多因房劳过度，精伤肺损所致。常见腋胁隐隐作痛等症。宜用左归丸、家秘天地煎合黄芩泻白散等方。亦可因湿热所致。《张氏医通》卷五：“少阳湿热留薄，则腋下肿痛，小柴胡加抚芎、枳壳；实人去参加草龙胆；体肥痰盛加白芥子；有痰饮搏聚而痛者，加味导痰汤加柴胡为向导。”参外感腋痛、内伤腋痛条。

腋漏 病名。指腋窝及手足心、鼠蹊部、阴囊等处汗湿之症。《古今医统》卷七十五：“两腋下并手足心、阴股及囊常如汗湿污衣，名曰腋漏。”用六物汤（干枸杞根、干蔷薇根、生甘草、胡粉、商陆根、滑石）研末，醋调外涂。

猥退风 古病名。见《备急千金要方》卷八。一作腲腿风。本病以半身不遂、失音不语为主症，属于中风之类的疾患。参中风、瘖痱条。

飧（sūn 孙）泄 病证名。出《素问·藏气法时论》。一作飧泄。又名飧泻、水谷痢。以泻下完谷不化为特征。《圣济总录》卷七十四：“夕食谓之飧。以食之难化者，尤在于夕，故食不化而泄出，则谓之飧泄。此俗所谓水谷痢也。”脾胃气虚阳弱，或内伤七情，或风、湿、寒、热诸邪客犯肠胃皆可导致飧泄。详寒泻、风泻、湿泻、热泻、七情泻、脾泻、餐泄等条。

飧泻 病证名。《医宗金鉴·杂病心法要诀》：“完谷不化名飧泻。”飧通飧。详飧泄条。

愔(é 噎) ①同噎，愔之伪字。②《东医宝鉴》：“咳逆古人谓之愔是也。”详见呃逆条。

〔·〕

痨虫病 病名。指痨瘵一类疾患。又称肺虫病。《血证论》卷五：“面色乍赤乍白，乍青乍黄，唇口生疮，声嗄咽痒，烦梦不宁，遗精白浊，发焦舌燥，寒热盗汗，口出秽气，不知香味，喜见人过，常怀忿怒，梦见亡先，惊悸咳逆，或腹中有块，或脑后两边有小结核。……皆为痨虫之候也。月华丸主之。多食鳗鱼肉，既有滋补，又善杀痨虫，或用鳗鱼骨烧黑，鳖甲炒为末，煎人参、当归、白芍、白薇汤送下，补虚杀虫，相辅而行。若专事杀虫，金蟾丸亦可间服，金线蛙烧服亦妙。”又：“痨虫居肺叶间，咯血声嘶者，皆能治之。”《石室秘录》卷一：“痨病已成，人最难治。盖痨虫生之以食人

之气血也。……方于大补气血之由加入杀虫之药，则元气既全，真阴未散，虫死而身安矣。”参肺虫病条。

痨瘵　病名。见《世医得效方·大方脉杂医科》。又作劳瘵。详该条。

痨瘵咳嗽　病证名。指痨瘵病的咳嗽。见《不居集·痨瘵咳嗽》。《明医杂著·劳瘵》：“睡中盗汗，午后发热，哈哈咳嗽，倦怠无力，饮食少进，甚则痰涎带血，咯吐出血，或咳血、吐血、衄血，身热，脉沉数，肌肉消瘦，此名痨瘵。”《寿世保元·劳瘵》：“夫阴虚火动，劳瘵之疾，由相火上乘肺金而成之也。……盖肾水一虚，则相火旺动，相火上炎，则克肺金，肺受火邪所克，所以为咳，为嗽，为热、为痰，为喘息、为盗汗，为吐血，为衄血，为便血、尿血，为四肢倦怠，为五心烦热，为咽干声哑，为耳鸣、眼花，为遗精、便浊，为虫胀肿满，为一应难状之症。治者宜滋肾水、养心血，扶元气，健脾胃，以培其本，降相火，清湿热，化痰涎，润肺金，以治其标。宜以清离滋坎汤、补中益气汤、河车地黄汤、太平丸、瑞莲丸、宁嗽膏、白雪膏之类，宜对症选用。”《世医得效方·痨瘵》以劫劳散治心肾俱虚劳嗽，阿胶丸治劳嗽并嗽血、唾血。亦可用痨嗽方。参咳嗽、痨瘵条。

痞　病证名。❶指胸腹部痞满、按之不痛的疾患。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“病发于阳，而反下之，热入，因作结胸；病发于阴，而反下之，因作痞。”又：“若心下满而硬痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之；但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。”《赤水玄珠·痞气门》：“刘宗厚曰：痞之为病，由阴伏阳蓄，气上不运而成，处心下，位中央，膜满痞塞，皆土之病也。胀满有轻重之分，痞则内觉痞闷，而外无胀急之形；胀满则外有形也。前人所论皆指误下而致之，亦有不因误下而然者，如中气虚弱，不能运化精微，则为痞；饮食痰积不能施化则为痞；湿热太盛，土乘心下则为痞。既痞与湿同治，惟上下分消其气，如果有内实之症，庶可略与疏导。”根据病因、症状、部位之不同，可分气痞、痰痞、虚痞、实痞、上痞、中痞、下痞等。详各条。❷指胸腹部有癥块，属积聚一类。《临证指南医案·痞》徐灵胎评：“痞有二义。痞结成形之痞，是病胸膈痞满。是症痞结之痞，即积聚之类，另立一门亦可。但痞满之痞，不拘何病皆有。”《杂病源流犀烛·肿胀源流》：“痞者，闭也。痞必有块，块则有形，总在皮里膜外，其源皆由伤于饮食。”参积聚有关条。

痞气　❶古病名。指脾积。见《难经·五十四难》。《济生方》卷四：“痞气之状，留于胃脘，大如复杯，痞塞不通，是为脾积。诊其脉微大而长，其色黄，其病饥则减，饱则见，腹满呕泄，足肿肉削。久不愈，令人四肢不收。”治疗用大七气汤下红丸子，痞气丸等方。参脾积条。❷病证名。指气痞。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。“脉浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞。按之自濡，但气痞耳。”明·吴桔南《伤寒补天石》续集卷下：“太阳无汗，当服麻黄汤。由误下之，邪乘虚结于心下，但满而不痛者，此为痞气。”宜用半夏泻心汤、枳实理中汤等方。

痞块　病名。❶指腹腔内的肿块。《丹溪心法·积聚痞块》：“痞块在中为痰饮，在右为食（一云痰），积在左为血块，气不能作块成聚，块乃有形之物也，痰与食积死血而成也。”《杂病广要·积聚》：“大抵积块者，皆因一物为之根，而血涎裹之，乃成形如杯如盘，按之坚硬也。食积败血，脾胃有之，痰涎之积，左右皆有之。”❷即肝积。《慎斋遗书·痞块》：“痞块，肝积也，肝经湿热之气，聚而成也。”详肝积条。❸即癥瘕。《东医宝鉴·积聚》：“痞块一名癥瘕，其不能移动者，是癥块也；或有或

无，或上或下，或左或右者，是瘕块也。”参癥瘕、积聚条。

痞饮 古病名。出《素问·六元正纪大论》。指水液内停见胸腹胀满者。参痰饮、积饮条。

痞胀 证名。指胸脘痞满而兼腹胀者。《张氏医通·腹满》：“此得之湿热伤脾阴，不能统血，胃虽受谷，脾不输运，故成痞胀。当理脾气，祛湿热，兼养血之剂，如枳实、黄连、炮姜、半夏、茯苓、当归、芍药、阿胶、乌梅、砂仁之类。”《杂病源流犀烛·胸膈脊背乳病源流》：“酒积杂病，下之过亦作痞。盖胸中之气，因虚下陷于心之分野，故心下痞。宜升胃气，以血药兼之，若全用导气，则气愈下降，必变为中满鼓胀矣。”如伤饮食胸痞者，用枳术丸；食后感寒，以致饮食不化者，二陈汤加山楂、麦芽、神曲；虚寒不散，或宽或急，常喜热物者，理中汤加枳实；稍久郁成湿热者，平补枳术丸（见《医学入门·痞满》）。参痞、痞满条。

痞积 病证名。指过食生冷油腻所致的痞块。《医林绳墨·痞块》：“有因好食生冷油腻而食所得者，名曰痞积。”证见胸中满闷，膈塞不通等。参痞条。

痞满 证名。《素问》称否、满、痞塞。指胸脘痞塞满闷不痛。《医方考》卷四：“土郁者痞满。”《景岳全书·伤寒典》：“若但满不痛者，此为痞满，非结胸也。凡痞满之证，乃表邪传至胸中，未入于府，此其将入未入犹兼乎表，是即半表半里之证，只宜以小柴胡之属加枳壳之类治之。”《寿世保元·痞满》：“痞满与胀满不同，胀满是内胀而外亦形，痞则内觉痞闷，而外无胀急之形也。……痞满，宜调中补气血，消痞清热，攻补兼施。”《杂病源流犀烛·肿胀源流》：“痞满，脾病也。本由脾气虚，及气郁不能运行，心下痞塞填满，故有中气不足，不能运化而成者，有食积而成者，有痰结而成者，有湿热太甚而成者，虚则补其中气，宜调中益气汤；实则消食，宜资生丸；豁痰宜豁痰汤；除湿宜二陈汤加猪苓、泽泻；有湿热清热，宜当归拈痛汤而消导之，亦不可用峻剂，致伤元气。”参气痞、痰痞、虚痞、实痞条。

痟 ❶痟通消。如“痟瘦”，即“消瘦”。《灵枢·经水》：“若夫度之人，痟瘦而形肉脱者，恶可以度量刺乎。”又如“痟渴”、“痟中”，即“消渴”、“消中”。❷指头痛症，《周礼·天官疾医》：“春时有痟首疾。”痟首疾即头酸痛病。

痟中 古病名。见《太平圣惠方》卷五十三。即中消，详该条。

痟肾 病名。三消之一。又名消肾。《太平圣惠方·治痟肾诸方》：“小便滑数，口干心烦，皮肤干燥，腿膝消细，渐至无力，熟干地黄散方。……治痟肾，肾气虚损，发渴，小便数，腰膝痛，肾沥圆方。”亦可选用白茯苓圆、肉苁蓉圆、鹿茸圆等方。参消渴、三消条。

痟渴 病名。痟通“消”。见《世医得效方》卷六。即消渴，详该条。

痟（yūan 渊）心 古病名。《素问·经脉别论》：“真虚痟心。”《内经吴注》：“痟心，心酸痛也。”《类经·脉色类》：“肝邪独至，真气必虚，木火相干，故心为痟痛。”参肝心痛条。

痫 病名。见《肘后备急方》卷四。痫疾的简称。《痫症三字诀》：“古名肠澼，又曰滞下，今名曰痫，以其下利而不爽也。”详痫疾条。

痫风 证名。见《太平惠民和济局方》卷一。指痫后脚痛缓弱，不能行履。又名痫后风。详该条。

痫后风 痫疾的一种继发症。又名痫风。主症为两脚酸软，不能行走。《证治要诀·痫》：“痫后风：因痫后下虚，不善调将（一作摄），或多行，或房劳，或感外邪，

致两脚酸软，若痛若痹。”治宜扶正祛邪，活血脉，壮筋骨。方用大防风汤，或独活寄生汤吞虎骨四斤丸。参痢后痿、痿条。

痢后痿　痿证之一。因痢后亡阴，或积瘀不清所致。《证治汇补·痿躄章》：“痢后痿：痢后脚软胫疼或膝肿者，此下多亡阴所致，宜补脾兼升举之剂。……间有痢后兜涩太早，积瘀不清，下注隧道经络而成痿者，此又当行气逐瘀，与前症迥异矣。”《丹溪心法·痢》：“痢后脚弱渐细者，苍术、酒芩、白芍、酒柏为末，粥丸，以四物汤加陈皮、甘草，水煎送下。”参痢后风、痿条。

痢疾　病名。见《济生方》。《内经》作“肠澼”，《伤寒论》称“下利”、“热利”，《肘后备急方》称“下痢”，《诸病源候论》称为痢病，《千金要方》称作“滞下”，后世多称痢疾。本病以腹部疼痛，大便次数增多而量少，里急后重，下粘液及脓血样大便为特征。常因外受六淫及疫毒之气，内伤七情劳役，或饮食不慎，积滞肠中，传导失常所致。治宜分辨虚实。实证用清热化湿，凉血解毒，消积导滞等法。虚证用补中益气，温阳固涩等法。邪盛正虚者，宜扶正与祛邪法。亦可兼用行血调气，前人有“行血则便脓自愈，调气则后重自除”之说。痢疾从病因分，有风痢、瘀痢、暑痢、湿热痢、寒痢、热痢、疫痢、毒痢、气痢。从大便性状分，有赤痢、白痢、血痢、赤白痢、脓血痢、五色痢等。从病情轻重和病程分，有噤口痢、休息痢、奇恒痢、久痢、虚痢等。详见各条。本病常见于细菌性痢疾，阿米巴痢疾、溃疡性结肠炎、过敏性结肠炎、食物中毒及肠吸收功能障碍性疾病。

痫　病名。出《素问·大奇论》。❶指一种发作性神志异常的疾病。《张氏医通》卷六：“痫病发时，昏不知人，卒然眩仆倒地，甚则瘈疭抽搐，目上视，或口眼㖞斜，或口作六畜声，将醒时吐涎沫，醒后又复发。有连日发者，有一日三五次发者。”多因七情内伤，心肾虚怯，或饮食不节，劳累过度，或风火热痰，上壅心包，阳气逆乱所致。治宜培补为本，豁痰、降火为标。通治用定痫丸，参汤下；或人参琥珀丸。若气血虚兼痰火者，宜攻补兼施，清心抑胆汤；若风痰者，宜追风祛痰丸；若痰火者，宜清心滚痰丸；若痰多者，导痰汤加木香、竹沥。痫证已愈，然须防其再发，宜十全大补加枣仁、远志、麦冬。又有痫病发时狂叫奔走而不知人者，专主治痰，宜用二陈汤；又有胎痫得之母腹中者，治宜镇其怯，方用烧丹丸。本病即现称之癫痫。参癫痫、阳痫、阴痫、五脏痫、六畜痫、鬲痫、肠痫、虚痫条。❷古代痫、癫二字通用，有癫即癎之说。又文献有发病年龄在十岁以上者为癫，十岁以下为癎之说。参癫条。

痫黄　三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一：“痫黄，病人身如金色、不多言语，四肢无力，好眠卧，口吐粘涎者，宜服茵陈汤方。”参黄疸有关条。

痧　病名。❶指感触秽浊不正之气而出现腹痛，吐泻等症。多见夏秋二季。《痧胀玉衡》卷上：“痧症先吐泻而心腹绞痛者，从秽气痧发者多；先心腹绞痛而吐泻者，从暑气痧发者多；心胸昏闷，痰涎胶结，从伤暑伏热痧发者多；遍身肿胀，疼痛难忍，四肢不举，舌强不言，从寒气冰伏过时，郁为火毒而发痧者多。”《急救痧症全集》卷上：“痧者，厉气也，入气分则作肿作胀，入血分则为蓄为瘀，遇食积痰火则气阻血滞，最忌热汤热酒。”《古方选注》：“痧者，寒热之湿气，皆可以为患，或四时寒湿，凝滞于脉络；或夏日湿热，郁遏于经隧；或鼻闻臭气，而阻逆经气；或内因停积，而壅塞府气，则胃脘气逆，皆能胀满作痛，甚至昏愦欲死。”《痧症全书·论痧》：“古无痧字……惟霍乱条下有不吐泻而腹绞痛者，曰干霍乱，亦名绞肠痧，缘南方体气不

实之人，偶触粪土沙秽之气，多腹痛闷乱，名之曰痧，即沙字之讹也。”外治用刮法、刺法、推拿法，内服平安散、武候行军散、散痧汤等。痧证有热痧、寒痧、暑痧、瘟痧、阳痧、阴痧、绞肠痧等，参见各该条。❷即疹。《临症指南医案》邵新甫按：“痧者，疹之通称，有头粒而如粟象，瘾者，即疹之属，肿而易痒。”

痧气 病名。即痧证。又称痧胀、痧秽。《通俗伤寒论·伤寒兼痧》：“日间触闻臭秽，夜间露宿贪凉，其大要也，夏秋最多。缓则寒湿凝滞于脉络，或湿热郁遏于经隧；急则鼻闻臭毒而阻逆上气，或内因食积而壅塞中气，皆能气胀成痧，故通称痧气，又称痧胀，或称痧秽。”详痧条。

痧块 证名。指痧胀刮、放后余毒未尽，留于气分、血分聚结成块作痛。《痧胀玉衡·痧块》：“痧毒留于气分，成气痞痛，留于血分成血块痛，壅于食积阻滞，成食积块痛。盖因刮痧、放痧稍愈，痧毒未尽，不用药以消之之故。施治之法，在气分者，用沉香、砂仁之类治之；在血分者，用桃仁、红花之类治之；食积阻滞者，用蔔子、槟榔之类治之，或气血二分俱有余毒者，当兼治之，若更兼食积所阻，有余毒者，当并合治之。”参痧、痧胀条。

痧胀 病名。即痧证。又称痧气、痧秽。见《通俗伤寒论·伤寒兼痧》。《痧症要略》：“痧胀者，气之闭也，火之逆也。气为毒壅，火为毒升，故胸膈作胀，头目不清。治痧者，必先开其气、降其火，而后胀可消也。若食阻痧气于上者，则吐之；食壅痧气于中者，则消之；食结痧气于下者，则导之。……故治胀必治气，治气必治血，盖血活痧行，血破痧气走，血败痧气散，而降火亦在其中矣，此治痧之要术也。”参痧、痧气条。

痧胀腹痛 病证名。指感受痧气而致胸腹胀痛。《症因脉治·腹痛论》：“痧胀腹痛之症，忽尔胸腹胀痛，手足厥冷，指甲带青，痛不可忍，不吐不泻，或吐或泻，按之痛甚，俗名绞肠痧，此即痧胀腹痛之症也。”多因受寒、阻湿或感厉气毒邪及山岚不正之气侵袭肠胃所致。治宜祛秽泄毒为主。十指青冷者，宜刺指出血；欲吐不吐者，宜盐汤探吐；攻刺胁肋，宜刺期门或双臂臑刮出红痧；腹痛，两足转筋抽搐，及小腹闷痛，宜刺三里、委中穴；恶寒发热、脉浮大者，宜败毒散等方。参痧、绞肠痧条。

痧烦痧睡 痧证之一。即“心烦嗜睡痧”。《痧胀玉衡·痧烦痧睡》：“痧气冲于心胸，故心烦或嗜睡。此等之痧，俱属慢痧之类。轻而且浅，人多误以心烦嗜睡治之，日甚一日，倘日服热酒热汤热物，虽非骤然紧急，势必日渐凶险，故并录之以示戒。”治用刮痧、放痧法。

痧秽 病名。又称痧气、痧胀。见《通俗伤寒论·伤寒兼痧》。详痧气条。

痧筋 证名。指痧发时见于腿弯、肘弯上下，呈深青色、紫色、或深红色的细筋。《痧症度针》卷上：“凡两臂弯、两腿弯上下有细筋如丝，深青色，或紫或深红，或淡红者，痧筋也。”《痧胀玉衡》卷上：“痧筋有现有微现，有乍隐乍现，有伏而不现。痧筋之现者，毒入于血分者多；……微现者，毒阻于气分者多；伏而不现者，毒结于血分者多。”治疗以放痧为主。若痧筋不现，当结于血者散其痧，结于食者消其食，结于痰积者，治其痰积；待结散之后，痧筋复现，然后刺血以泄痧毒。参痧条。

痧痢 古病名。指肠胃虚弱，或有积滞，复染秽浊之气所致的痢疾。《痢证汇参》卷四：“痧痢之证，先泻后痢者居多，盖因肠胃空虚，秽气易触，则成痧痢。或天气炎热，或时行疫痢，感触肠胃，因积而发，亦致痧痢。夫痢不兼痧，积去便痊，痧不兼痢，括放即愈，痧积兼全，腹必疙痛非常，……务必先治其痧，兼消其积，则痧除积

去，痛止而痹除矣。”并宜兼用括痿、调气、活血、导瘀等法。参痹疾条。

痛风　病名。亦有名痛痹、历节、白虎历节、风痹、白虎风者。《格致余论·痛风论》：“彼痛风者，大率因血受热，已自沸腾，其后或涉冷水，或立湿地，或扇取凉，或卧当风，寒凉外搏，热血得寒，汗浊凝涩，所以作痛，夜则痛甚，行于阴也。”《医学准绳六要》：“痛风，即内经痛痹，……古云三气合而为痹。今人多内伤，气血亏损，湿痰阴火，流滞经络，或在四肢，或客腰背，痛不可当，一名白虎历节风是也。”《张氏医通·痛风》：“痛风一证，《灵枢》谓之贼风，《素问》谓之痹，《金匮》名曰历节，后世更名白虎历节。多因风寒湿气，乘虚袭于经络，气血凝滞所致。”《医略六书·痛风》：“轻则骨节疼痛，走注四肢，难以转侧，肢节或红或肿；甚则遍体瘰块，或肿如匏，或痛如掣，昼静夜剧。……主以四物汤加秦艽、威灵仙，在上加桂枝、羌活；在下加牛膝、防己；湿痰加南星、半夏；血瘀加桃仁、红花；湿热加苍术、黄柏；气虚加人参、黄芪；血虚加阿胶、黄明胶；阴虚加生地、龟板；阳虚加虎骨、鹿茸。”因于寒者，亦可用乌头汤、仓公当归汤等方；化热者，可用桂枝芍药知母汤或《千金》犀角汤等方。又因疼痛走注不定，亦有以为即风痹。《景岳全书·杂证谟》：“风痹一证，即今人所谓痛风也。”参历节风、寒痹、风痹、白虎历节风条。

痛风身肿　病证名。见《证治汇补·水肿章》。即风肿。详该条。

痛风肿　病名。见《医学入门·水肿》。即风肿。详该条。

痛痹　病名。出《素问·痹论》。又名寒痹。《金匮翼·痹症统论》：“痛痹者，寒气偏胜，阳气少，阴气多也。夫宜通而塞则为痛，痹之有痛，以寒气入经而稽迟，注而不行也。”详寒痹条。一说痛痹即痛风。《医学正传·痛风》：“夫古之所谓痛痹者，即今之痛风也。”参痛风条。

游气　古病名。指气满游于体内，不得宣散的病证。《诸病源候论·游气候》：“夫五藏不调，则三焦气满，满则气游于内，不能宣散，故其病，但烦满虚胀。”参气病条。

游疟　疟疾之一。指三阴疟疟邪游溢他经而成。《症因脉治·游疟》“游疟之症，先起三疟，后又加一发，连发二日，只停一日，如少阴经子午卯酉日之疟，至明日辰戌丑未又加一发，此少阴之疟，余邪游入太阴；又如辰戌丑未之疟，至明日寅申巳亥，又加一发，此太阴之疟，余邪游入厥阴，故曰游疟之症也。”本病多因血气亏损，脏气不足，外邪客阴经，三疟乃作。若疟邪充盛则游溢他经，故连发二日，止停一日。症见脉多细数、沉细，或见虚大，或见弦滑。宜先治本经见症，如厥阴之疟，先以加减逍遥散加升麻、柴胡；少阴之疟，加减地黄汤加升麻、柴胡；太阴之疟，以加减白术膏加升麻、柴胡，提还本经，则所游之经自退。参疟疾条。

善饥　证名。指容易饥饿。《素问·至真要大论》：“少阴之胜，心下热，善饥。”多因胃热所致，宜清泄胃火，养阴生津，可用生地八味汤、玉女煎等方。善饥常是消渴主症之一，参该条。

善忘　证名。出《素问·玉机真脏论》。即健忘。详该条。

善怒　证名。又称喜怒、怒。指容易发怒甚至无故自怒之症。《素问·脏气法时论》：“肝病者，两胁下痛引少腹，令人善怒。”肝实气滞者，善怒而胁痛腹满。治宜疏泄，用香甘散、生铁落饮、柴胡疏肝散、四磨汤等方。血少肝燥者，稍有刺激即怒甚。治宜养血柔肝，用解怒平肝汤、加味归芍汤等方。肾水不足，水亏肝旺者，症见心烦易怒，至夜口干舌燥，睡眠短少。治宜滋水柔肝，用润肝汤、萸芍地黄汤等方。参怒

伤条。

善恐 证名。出《素问·四时逆刺论》。又称恐。其症心中畏惧，胆怯不安，不敢单独坐卧，常有被捉之感。多由脏气损伤所致，尤以肾伤为多见。《杂病源流犀烛·惊悸悲恐喜怒忧思源流》："恐病由心者，宜镇其神，宜定志丸加金银箔、琥珀、犀角、龙齿等。恐病由胃者，宜壮其气，宜四君子汤倍茯苓。恐病由胆与肝者，宜养其阴，宜酸枣仁汤去黄芪、莲肉，加山萸、丹皮、白芍。恐病由肾本经伤者，宜壮其水，宜人参散去肉桂，加牛膝，远志。"《张氏医通》载述治肾伤宜补精髓，六味丸加枸杞、远志；治肝虚宜养阴血，六味丸加枣仁、龙齿；属胆虚，六君子加柴胡、防风、当归；恐惧面色变者，补胆防风汤；肾脏阳虚善恐，八味丸等方。参恐伤条。

善眠 证名。时常困倦欲眠之症。出《素问·六元正纪大论》。参嗜卧、多寐、多卧、多眠条。

善惊 证名。出《素问·奇病论》。指遇事容易惊吓，或无故突然自惊之证。又称喜惊。详惊、喜惊条。

善悲 证名。指容易悲哀或无故悲伤之症。出《素问·风论》。又称喜悲、悲。多因肺燥，心肝血虚，心火炽盛所致。《杂病源流犀烛·惊悸悲恐怒忧思源流》："所谓善悲者，不必实有可悲之事，心中只是快悒不快。"加味温胆汤，安神补心汤、甘麦大枣汤、生脉散、黄连解毒汤等方均可选用。

善酸 证名。出《灵枢·邪气藏府病形》。指经常感觉筋骨四肢酸痛。

滞下 痢疾的古称。见《千金要方》卷十五。因痢下脓血粘腻，排便滞涩难下，故名。《景岳全书》卷二十四："痢疾一证……因其闭滞不利，故又谓之滞下。"多由湿火、气食积滞所致。《医学入门》卷五："湿火滞于肠中，故名滞下。"《证治汇补》卷八："滞下者，谓气食滞于下焦。"详痢疾条。

湿中 类中风之一。见《医宗必读·类中风》。又名痰中。指痰湿酿热生风而致突然昏仆之证。《医学心悟·类中风》："湿中者，即痰中也。凡人嗜食肥甘，或醇酒乳酪，则湿从内受。或山岚瘴气，久雨阴晦，或远行涉水，坐卧湿地，则湿从外受。湿生痰，痰生热，热生风，故卒然昏倒无知也。苍白二陈汤主之。"参痰中条。

湿气呕吐 证名。指呕吐因湿气袭胃，胃失和降所致者。《症因脉治》卷二："湿气呕吐之症，胸前满闷，头重身重，面目浮肿，呕恶而吐，口不渴，吐多痰涎。"脉多濡软，或沉伏。寒湿者脉兼迟，湿热者脉兼数。治宜化湿为主。身热脉浮者，宜人参败毒散、香苏平胃散等方。寒湿，宜香砂二陈汤、术附汤。湿热，宜栀连二陈汤、栀连平胃散等方。

湿气霍乱 病名。指霍乱由湿气太盛，伤及中州所致者。《症因脉治·霍乱》："湿气霍乱之症，既非饮食所伤，无七情恼怒，但因时令湿淫之气，一旦挥霍撩乱，吐泻水饮。"脉沉伏，或濡软。治用五苓散、平胃散、正气散加青藿香等。参湿霍乱条。

湿火三消 病证名。见《症因脉治》卷三。指由于湿热郁久，化火转燥而成的三消证。湿火伤肺为上消。证见烦渴引饮，咳嗽面肿，寸脉数大，宜用清肺饮；湿火伤胃为中消，证见多食易饥，面黄身肿，关脉数大，宜用加味清胃汤；湿火伤小肠、膀胱为下消，证见小便频数，如膏如油，或如米泔，其味甜，尺脉数大，宜用导赤各半汤、益元散等方。参消渴条。

湿冷腰痛 腰痛之一。又称寒湿腰痛。与肾着相似。《金匮翼·腰痛》："湿冷腰痛者，坐卧冷湿，久久得之，《金匮》所谓肾着是也。"详寒湿腰痛、肾着条。

湿郁 六郁之一。见《丹溪心法》卷三。因外感湿邪，郁而不散所致。《杂病源流犀

烛·诸郁源流》："雾露风雨坐卧，湿衣湿衫，皆致身重疼痛，首如物蒙，倦怠好卧，阴寒则发，脉沉涩而缓是湿郁。"治宜除湿解郁，用湿郁汤、渗湿汤或升阳除湿汤等。参六郁、郁证条。

湿肿　水肿病之一。多因久居湿地或感寒湿，水湿浸渍，不能运行所致。《奇效良方·水肿》："病水寒不得宣行，成湿肿证，脉来沉迟，色多青白，不烦不渴，小便艰少而涩，大便滑泄。"《证治要诀·肿》："感湿而肿者，其身虽肿，而自腰以下至脚重，腿胀满尤甚于身，气或急或不急，大便或溏或不溏，但宜通利小便。"《赤水玄珠·水肿》："但有湿肿，气肿，初亦颇相似，然以手按之成凹不即起者，湿也。湿与水有微甚之意。"治宜健脾通阳、渗利水湿，用防己黄芪汤、五苓散、除湿汤等方。《医林绳墨·臌胀》："湿肿者，当清其源，苍术、厚朴、泽泻、茵陈。"参水肿条。

湿疟　疟疾之一。❶因外着雨露，内停水湿所致者。《三因极一病证方论·疟叙论》："病者寒热，身重，骨节烦疼，胀满，溲溲自汗，善呕。因汗出复浴，湿舍皮肤，及冒雨湿，名曰湿疟。"治用术附汤、草果厚朴汤等。❷即暑疟。《症因脉治》卷四："湿疟即暑疟。湿热疟之症，身体重痛，肢节烦疼，呕逆胀满，胸膈不舒，此湿热疟之症也。湿热疟之因，《内经》云，因得秋气，汗出遇风，及得之以浴，水气舍于皮肤之内，与卫气并居。卫气者，昼日行于阳，夜行于阴，此气得阳而外出，得阴而内薄，内外相薄则疟日作。"治疗上，身体重痛、肢节烦疼、脉浮紧者，羌活败毒散；右脉弦长、呕逆胸满者，柴葛平胃散；六脉洪数、湿热者，加味香薷饮。参疟疾、暑疟条。

湿疝　病名。指因湿聚而致的疝症。《景岳全书》卷三十三："湿疝多为重坠胀满，然亦有痛者，……有不痛而久坠不愈者，是即癫疝之属。"参疝、癫疝条。

湿泻　病名。见《丹溪心法·泄泻》。又名濡泄、洞泄。指湿伤脾胃所致的泄泻。《证治要诀·大小腑门》："湿泻，由坐卧湿处，以致湿气伤脾，土不克水。梅雨阴久，多有此病。宜除湿汤吞戊己丸，佐以胃苓汤。重者宜术附汤。如其人本不甚泻，每日两三次鸭溏，此脾家不燥，常服平胃散自愈。"《医学传灯·泄泻》："湿泻者，腹中不痛，所泻皆水，或遍身发肿，身热脉数者，病属于阳。初起宜用分消饮，久以柴苓汤主之。若肢冷脉细，元气大虚，宜用消肿健脾汤，即金匮肾气丸，亦宜服也。"《金匮翼·泄泻诸症统论》："湿泻一名濡泄。其脉濡细，其症泄水，虚滑肠鸣，身重腹不痛。由脾胃有湿，则水谷不化，清浊不分。久雨潮溢，或运气湿土司令之时，多有此疾。《内经》所谓湿胜则濡泄，《左传》所谓雨淫腹疾者是也。又水寒之气，入客肠间，亦令人濡泻。经云太阳之胜，寒客下焦，传为濡泄是也。"参濡泄、洞泄条。

湿毒下血　病证名。见《丹溪心法附余》卷十一。《证治准绳·杂病》："下血腹中不痛，谓之湿毒下血。"多因湿毒结蓄大肠，损伤脉络所致。证见大便下血，血色不鲜，或紫黑如赤豆汁，小便不利，胸膈胀闷，饮食减少，或面色深黄等。又有下血散漫，腰部沉重，腹中不痛，血色紫黑，病在阳明少阳证，亦属湿毒一类。治宜化湿解毒。选用当归和血散、槐花散、升麻去湿和血汤、升麻补胃汤等方。参便血条。

湿毒脚气　病名。见《圣济总录》卷八十二。指以肿满、小便少为主症的一种脚气。属于湿脚气的范围。参湿脚气条。

湿咳　病证名。❶指水气内停所致的咳嗽。《儒门事亲》卷三："喘咳者，水气并于阳明，亦湿咳也；风水，不能正偃则咳，亦湿咳也；肾气腹大胫肿，喘咳身重，亦湿咳也。"可用五苓散、桂苓甘露散、白术

丸，三花神佑丸等方。参见风水等条。❷指外感湿邪所致的咳嗽。即伤湿咳嗽。详该条。

湿热头痛 病证名。指湿热上蒙清窍所致的头痛。《兰室秘藏·头痛门》："心烦头痛者，病在膈中，过在手巨阳少阴，乃湿热头痛也。"多由湿热熏蒸，上蒙清窍所致。证见头痛且重，心烦身重，肢节疼痛，或面目、四肢浮肿，舌苔黄腻，脉濡数等。治宜清热化湿，用清空膏、二陈汤加味。参头痛条。

湿热发黄 病证名。见《丹溪心法·疸》。多因湿与热搏，郁而发黄。属阳黄范畴。《伤寒全生集·辨伤寒发黄》："湿热发黄，一身尽痛，发热口渴，小便不利，色如熏黄，暗而不明也。"湿重于热者，兼见头重身倦，胸脘痞满，治宜利湿为主，参以清热，可用茵陈五苓散、甘露消毒丹等。若热重于湿者，色如橘黄鲜明，口渴甚，则宜清热为主，佐以利湿。可用茵陈蒿汤、大黄硝石汤等。参阳黄条。

湿热身肿 病证名。身肿类型之一。《症因脉治》卷三："湿热身肿之症，身热目黄，小便赤涩，胸腹胀闷，四肢黄肿，口渴心烦，此湿热作肿，即阳水肿之症也。湿热身肿之因，或湿热行令，袭人肌表，或先伤于湿，湿气久留，郁而成热，则湿热肿症作矣。"脉多洪数或沉滑。治宜清金利水，可选用清肺饮合四苓散、八正散、二妙丸、羌活胜湿汤等方。参身肿、水肿条。

湿热呕吐 病证名。指呕吐因肠胃素有积热，又外感湿热之邪所致者。《症因脉治》卷二："湿热呕吐之症，内热烦躁，口臭身热，面目黄肿，满闷恶心，闻谷气即呕。"脉多数大。治宜清化湿热，用家秘清胃汤、栀连二陈汤、栀连平胃散等方。

湿热便血 病证名。见《金匮翼》卷二。多因饮酒嗜辛，胃中蕴积湿热，下注大肠，灼伤阴络所致。《石室秘录·通治法》："血之下也，必非无故。非湿热之相侵，即酒毒之深结。若不逐去其湿热、酒毒，而徒尚止涩之味，吾未见其下血之能止也。"证见下血鲜红，先血后便，大便不畅，或腹中微痛，舌苔厚腻，脉象濡数。治宜清化湿热，凉营止血，选用约营煎，聚金丸、槐角丸，或地榆散合赤小豆当归散等方。参湿毒下血、热毒下血、便血等条。

湿热眩晕 病证名。见《症因脉治·外感眩晕》。感受湿热时邪所致。证见头晕目眩，自汗，面垢背寒，口渴欲饮，小便黄赤，或见身热，舌苔黄腻，脉濡数等。治宜清热化湿。用人参白虎汤、黄连香薷饮等方。参眩晕条。

湿热痉 病名。指由湿热病传变所致的痉症。多因湿热挟风，侵入筋脉；或邪入手足厥阴，热盛动风所致。薛生白《湿热病篇》："湿热证，三四日即口噤，四肢牵引拘急，甚则角弓反张，此湿热侵入经络脉隧中。宜鲜地、秦艽、威灵仙、滑石、苍耳子、丝瓜藤、海风藤、酒炒黄连等味。""湿热证，壮热口渴，舌黄或焦红，发痉，神昏谵语或笑，邪灼心包，营血已耗，宜犀角、羚羊角、连翘、生地、玄参、钩藤、银花露、鲜菖蒲、至宝丹等味。""湿热证，发痉，神昏笑妄，脉洪数有力，开泄不效者，湿热蕴结胸膈，宜仿凉膈散；若大便数日不通者，热邪闭结肠胃，宜仿承气微下之例。""湿热证，壮热烦渴，舌焦红或缩，斑疹，胸痞，自利，神昏痉厥，热邪充斥表里三焦，宜大剂犀角、羚羊角、生地、玄参、银花露、紫草、方诸水、金汁、鲜菖蒲等味。"湿热痉亦有因热闭所致者："湿热证，发痉神昏，独足冷阴缩，下体外受客寒，仍宜从湿热治，只用辛温之品煎汤熏洗。""湿热证，发痉撮空，神昏笑妄，舌苔干黄起刺或转黑色，大便不通者，热邪闭结胃腑，宜用承气汤下之。"参痉条。

湿热脚气 病名。指脚气因湿热相搏所

致者。《寿世保元·脚气》："湿热脚气为病，肢节烦痛，肩背沉重，胸胁不利，兼遍身疼痛．下注足胫肿痛，脚膝生疮赤肿，及内外生疮，脓水不绝，或痒或痛。"治宜当归拈痛汤加减。参脚气条。

湿热痢　病名。指痢疾之由湿热积滞所致者。见《症因脉治》卷四。证见腹痛，里急后重，下痢赤白，稠粘臭秽，肛门灼热，小便短赤，苔黄腻，脉滑数等。或见发热。治宜清热燥湿，调气行血。可用芍药汤、白头翁汤、香连丸等方。若恶寒头痛、身热有表邪者，荆防败毒汤解表；身热甚，用葛根芩连汤。湿火伤于气分，黄连枳壳汤；湿热伤于血分，河间黄连汤。气滞食滞偏重，腹痛，里急后重明显，用枳实导滞丸等方。地锦草、马齿苋、白槿花、一见喜、大蒜等药亦均可服用。参痢疾、热痢、湿痢条。

湿热腰痛　病名。腰痛之一。见《丹溪心法·腰痛》。因感受时令湿热，或因饮食厚味，内蕴湿热所致。《症因脉治》卷一："湿热腰痛之症，内热烦热，自汗口渴，二便赤涩，痠痛沉重。"并有腰间热，或肢节红肿，苔黄，脉数等。治宜清热利湿。方用加味二妙散、大分清饮、柴独苍术汤等。兼虚者，宜七味苍柏散。本证可见于类风湿性脊椎炎、风湿性关节炎、急性肾盂肾炎、肾周围炎等病。

湿热腹胀　病证名。指湿热内郁肠胃所致的腹胀。《症因脉治》卷三："湿热腹胀之症，面目黄肿，小便赤涩，大便或结，或泄黄糜，或日晡潮热，烦渴口苦，口甘口淡，腹胀胁痛。"治宜清热泻火利湿为主。面黄目黄，胁痛口苦，肝胆有火者，宜龙胆泻肝汤，小便赤涩者，宜木通六一散。二便皆滥，八正散。大便黄糜，家秘泻黄散。日晡潮热，大柴胡汤。烦渴口淡，乾葛石膏汤。口苦清胆火，口甘清脾火，口淡清胃火，口咸清肾火。身热脉浮，应汗者，宜辛凉散表，荆芥汤。参腹胀条。

湿热腹痛　病证名。指因湿热内结，通降失调所致的腹痛。《杂病源流犀烛·腹少腹病源流》："湿热腹痛，按之愈甚，宜升提，利小便。宜升麻、柴胡、防风、葛根、木通、黄连、黄芩、滑石、车前。不愈，微利之，宜加熟大黄，即土郁则夺之之义。"治宜清化湿热，通腑导滞。参腹痛条。

湿热痿　痿证之一。见《医学纲目》卷十七。由于湿热伤筋所致。《素问·生气通天论》："湿热不攘，大筋软短，小筋弛长，软短为拘，弛长为痿。"证见腿足痿软、微肿，或足趾麻木，伴有身重胸闷，小便赤涩，舌苔黄腻，脉象濡数。治宜清热燥湿，健脾渗湿等法。选用加味二妙丸、东垣健步丸、清燥汤等方。参痿条。

湿晕　病证名。又称伤湿眩晕。《东医宝鉴·外形篇》："湿晕，冒雨伤湿，鼻塞声重而晕，宜芎术汤。"湿晕有寒湿、湿热之分。详寒湿眩晕、湿热眩晕条。

湿秘　病名。见《济生方·大便》。指肠胃有湿而致的大便秘结。《景岳全书·杂病谟》："湿秘……湿岂能秘，但湿之不化，由气之不行耳，气之不行，即虚秘也，亦阴结也。"参五秘、虚秘、阴结条。

湿疸　黄疸二十八候之一。见《诸病源候论·黄病诸候》。指黄疸之湿重于热者。其症色黄而晦，一身尽疼，四肢沉重，不欲饮水，小便不利，发热等。治宜化湿利水，如茵陈五苓散、除湿丹之类。如湿疸七八日后壮热，热在里，有血当下，其少腹满者，急下之（见《千金要方·伤寒发黄》论湿疸）。参黄疸各条。

湿家　平素湿重患者的古称。多指身黄发热、胸满身疼、小便不利等症。《金匮要略·痉湿暍病脉证治》："湿家之为病，一身尽疼（一云疼烦），发热，身色如熏黄也。""湿家，其人但头汗出，背强，欲得被覆向火。若下之早则哕，或胸满，小便不利，舌上如胎者，以丹田有热，胸上有寒，

渴欲得饮而不能饮，则口燥烦也。”

湿黄 病名。见《证治准绳·杂病》。指黄疸之湿邪偏重者。《医学入门》卷五：“湿黄湿胜，色黄而晦，大便润利。又湿病与黄病相似，但湿病在表，一身尽痛，黄病在里，一身不痛。”如证见小便不利，四肢沉重，似渴不欲饮者，大茵陈汤；大便自利而黄，有实热者，茵陈栀子黄连三物汤；无实热者，小建中汤；往来寒热，一身尽黄者，小柴胡加栀子汤；腹痛而呕者，小柴胡汤。湿黄并可用发汗，利小便等法，麻黄连翘赤小豆汤、茵陈五苓散等方均可选用。参黄疸、湿疸等条。

湿脚气 脚气病之一。见《太平圣惠方》卷四十五。指脚气病见脚膝浮肿者。多因水湿之邪，从下感受，经络不得宣通所致。证见足胫肿大，麻木重着，软弱无力，或生癣疮，小便不利，舌苔白腻，脉濡缓等。本病与现代医学所称的脚气病湿型类似。治宜宣壅逐湿为主，用鸡鸣散加减，或选用除湿汤、槟榔散等方。如属湿热偏胜，见口渴尿赤，苔黄腻，脉濡数，宜宣通清利，可用防己饮等方。

湿厥头痛 病证名。指湿浊上蒙，清阳不升而致的头痛。《东医宝鉴·外形篇》：“湿厥头痛，冒雨伤湿，头重眩痛，阴雨则甚。”由湿浊上壅所致。证见头痛眩晕，头重身重，阴雨时病情加剧，苔白腻，脉濡滑等。治宜温阳化湿为主。用芎辛汤、芎术除眩汤等方。参寒湿头痛条。

湿喘 病名。见《杂病源流犀烛》卷一。指因湿致喘。多由外受水湿或湿气内蒸，肺失宣降，脾不运化而致水道不调，气机壅逆。症见胸腹痞胀，气逆喘促，甚至张口呼吸等。治疗以利水为要，如渗湿汤等方。《医学纲目》卷二十七：“霖雨之湿，饮食之热，湿热大盛，上攻于肺，神气躁乱，故为喘满。”治疗宜泻盛实之气，用平气散等方。参喘证条。

湿痫 病名。指痫疾之因感受湿邪所致者。有寒湿痫与湿热痫之别。《时病论》卷三：“湿痫，有寒热之分焉。”亦指痫疾危证。《医学入门》卷四：“湿痫，腹胀，身重，下如豆汁，或赤黑混浊，危症也。”治疗可选用当归和血散、升阳除湿防风汤、升阳益胃汤、除湿汤等方。详寒湿痫、湿热痫条。

湿温 病名。出《难经·五十八难》。❶指好发于夏秋季节的一种热性病。《医门棒喝·湿温》：“湿温者，以夏令湿盛，或人禀体阳虚多湿，而感四时杂气，遂成湿温。虽四时皆有，而夏秋为多。湿热二气胶粘，淹缠难愈。如从下受，则足肿体重，上受，则头目昏闷，胸满腹膨，乍寒乍热，胃不思食，渴不欲饮，大便溏泄，频而不爽，小便黄赤，短而不利，或变黄疸，或化疟痫，皆湿热二气合病也。良由清阳不振，阴邪窃踞，故宜苦温芳香，以宣三焦气化，使小便通利为法。如藿香正气、五苓、六和、消暑丸等方，审证选用。”辨证如湿重于热，身热稽留，汗出热不退，胸闷泛恶，四肢倦怠，大便溏泄，苔白腻等，治以化湿为主，清热为辅，如选用藿朴夏苓汤、不换金正气散、三仁汤等方；热重于湿，身热增高，胸痞干呕，心烦溲赤，便秘或溏而不爽，苔黄腻或干燥等，治宜清热为主，化湿为辅，如选用王氏连朴饮、黄芩滑石汤、甘露消毒丹等方。病情发展，可以传营、入血，发生神昏、痉厥或大便出血等症，宜用芳香开窍、清营凉血，阳虚者可用温中止血。❷指见头痛、胸腹满，妄言，多汗，两胫逆冷等症的一种疾患，治宜白虎加苍术汤等方（见《普济本事方·伤寒时疫》）。❸指疫疠轻症。《杂病源流犀烛·瘟疫源流》：“盛夏湿温之症，即藏疫疠，一人受之为湿温，一方传遍即为疫疠，以春夏间湿热暑三气交蒸故也。”本病可见于伤寒、副伤寒、沙门氏菌属感染、急性血吸虫病等疾患。参温病有关条。

湿腰痛 腰痛之一。见《济生方·腰

痛》。因雨露水湿侵袭腰部所致。证见腰冷腰痛，如坐水中，身体沉重，或见身肿，逢阴雨则痛剧，脉缓。治宜温化水湿。小便不利者则宜渗利，可用不换金正气散、肾着汤、渗湿汤等方。湿本阴邪，若寒偏重者，称寒湿腰痛；与风相兼者称风湿腰痛；与热相兼者称湿热腰痛。详各条。

湿痹　病名。❶指湿气盛而成痹者。见《金匮要略·痉湿喝病脉证并治》。又名着痹、肌痹。《证治准绳·杂病》："湿痹者，留而不移，汗多，四肢缓弱，皮肤不仁，精神昏塞。"《症因脉治》卷三："湿痹之症，或一处麻痹不仁，或四肢手足不举，或半身不能转侧，或湿变为热，热变为燥，收引拘挛作痛，蜷缩难伸，名曰着痹，此湿痹之症也。湿痹之因，或身居卑湿，湿气袭人，或冲风冒雨，湿留肌肉，内传经脉，或雨湿之年，起居不慎。……湿痹之治，发汗，羌活除湿汤；胸满闷，茯苓汤；风湿，苍防二妙汤；寒湿，术附汤；湿热，苍柏二妙丸。"亦可用茯苓川芎汤、除湿羌痹汤等方。参着痹、肌痹条。❷脚气病之一种。《寿世保元》卷五："脚气者……亦有疼痛不仁者，名曰湿痹。"参脚气条。

湿痰　痰证之一。①《医学入门》卷五："生于脾，多四肢倦怠，或腹痛肿胀泄泻，名曰湿痰。"多由外感而生。治宜山精丸、三仙丸等。②指痰湿聚于脾的病证。《杂病源流犀烛·痰饮源流》："在脾曰湿痰，其色黄，滑而易出，多倦怠，软弱喜卧，腹胀食滞，脉必缓，宜白术丸；或挟虚，宜六君子汤；挟食，宜保和丸；挟暑，宜消暑丸；挟惊，宜妙应丸。各宜从脾分治。"又名脾经湿痰。参该条。湿痰有外感湿痰与内伤湿痰之分。参痰证有关条。

湿痰发热　病证名。指痰湿内停，郁久所致的发热。《丹溪心法·发热》："湿痰发热，炒片芩，炒黄连，香附，苍术。右为末，用瓜蒌穰丸。湿痰，夜发热，以三补丸加白芍药为末。"详发热、痰积发热，痰症发热等条。

湿痰眩晕　病名。见《证治汇补·眩晕章》。因湿痰壅遏清阳所致。证见头目昏重，胸闷纳呆，恶心呕吐，体多肥胖，苔白腻，脉濡。治宜燥湿化痰。用半夏白术天麻汤、温胆汤等方。兼见气虚者，宜六君子汤。参痰晕条。

湿痰脚气　病名。见《丹溪心法·脚气》。由湿盛生痰，湿痰下注而成。证见腿足重木，软弱无力，兼有大便滑泄等。宜用丹溪治湿痰脚气方（苍术、防风、槟榔、香附、川芎、条芩、滑石、甘草）。参脚气条。

湿痰腰痛　腰痛之一。又称痰注腰痛。见《丹溪心法·腰痛》。详痰注腰痛条。

湿痰痿　痿证之一。见《证治汇补·痿躄章》。多发于体肥之人，因湿痰客于经脉所致。《张氏医通·痿痹门》："痿，属湿痰者，手足软弱，脉沉滑，兼腰膝麻木，或肿。"治宜燥湿化痰为主。《丹溪心法·痿》："湿痰，二陈汤加苍术、白术、黄芩、黄柏、竹沥、姜汁。"参痿条。

湿痰嗽　病名。指痰湿壅肺所致的咳嗽。《万病回春》卷四："湿痰嗽者，有痰，痰出嗽止是也。"详痰嗽、咳嗽条。

湿嗽　病名。指咳嗽由湿邪伤脾引起者。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："湿嗽，湿伤脾也。其脉濡细，必兼骨节烦疼，四肢沉重，或有汗，小便不利，痰多，宜白术汤、白术丸。"参伤湿咳嗽、感湿嗽、湿嗽条。

湿蠹　病名。指水湿内侵，肠虫侵蚀所致的疾患。《诸病源候论·湿蠹病诸候》："湿蠹病，由脾胃虚弱为水湿所乘，腹内虫动，侵食成蠹也。多因下利不止，或生病后客热结腹内所为。其状不能饮食，忽忽喜睡，绵绵微热，骨节沉重，齿无色，舌上尽白，细疮如粟。若上唇生疮，是虫食五藏，则心烦懊；若下唇生疮，是虫食下部，则肛门烂

开。甚者府藏皆被食，齿下上断悉生疮，齿色紫黑。”治用《千金要方》治湿蜃方、懊侬散等。参心蜃、疳蜃条。

湿霍乱 病名。见《外台秘要》卷六。❶《医林绳墨·霍乱》：“若吐利并行而腹中绞痛，坐卧不安，甚则转筋，名之曰湿霍乱也。”多因饮食生冷，或感受寒、湿、暑邪所致。本病较干霍乱之欲吐泻而不得者有别。亦有以干霍乱较湿霍乱为重之说。《伤寒明理论·霍乱》：“干霍乱死者多，湿霍乱死者少，盖吐利则所伤之物得以出泄，虽霍乱甚，则止于胃中水谷，泄尽则止矣。”参见霍乱、干霍乱条。❷指暑霍乱。《医学入门·霍乱》：“一种暑霍乱，即湿霍乱，但此疾夏秋惟甚，纵寒月亦多由伏暑，故名。”参暑霍乱条。

湿癖血箭 病名。又名肠癖、血箭。指大便出血如注或如筛四散漏下者。《医学入门·便血》：“湿癖血箭……原因伤风犯胃飧泄，久而湿毒成癖，注于大肠，传于少阴，名曰肠癖，俗呼血箭。因其便血即出，有力如箭射之远也。又有如筛四散漏下者。初起湿热或发当长夏者，当归和血散，凉血地黄汤加木香、槟榔，久而色紫黑者，湿毒甚也，升阳除湿和血汤，升阳补胃汤，或补中益气汤去柴、陈，加芩、连、川芎、槐角、枳壳。”参便血等条。

湿癫 五癫之一。《诸病源候论》卷二：“湿癫，眉头痛，身重。坐热沐头，湿结脑，脑汗止得之。”参癫、五癫条。

温 病名。❶指春季发生的热性疾病。《素问·热论》：“凡病伤寒而成温者，先夏至日者为病温，后夏至日者为病暑。”❷温病的简称。如暑季发病的称暑温，秋季发病的称秋温，冬季发病的称冬温，因感受湿热之邪而发的称湿温，因感受风热之邪而发病的称风温等。参温病条。

温疟 病名。❶疟疾之一。以先热后寒或无寒但热为主症。又称风伤卫疟、阳明瘅瘅、肾经疟。《素问·疟论》：“先伤于风，而后伤于寒，故先热而后寒也，亦以时作，名曰温疟。”《金匮要略·疟病脉证并治》：“温疟者，其脉如平，身无寒但热，骨节疼烦，时呕，白虎加桂枝汤主之。”《诸病源候论·疟病诸候》：“温疟者得之冬中于风寒，寒气藏于骨髓之中，至春则阳气大发，邪气不能出，因遇大暑，腠髓烁，脉肉消释，腠理发泄，因有所用力，邪气与汗偕出，此病藏于肾，其气先从内出之于外，如此则阴虚而阳盛则热衰则气复反入，入则阳虚，阳虚则寒矣。故先热而后寒名曰温疟。”参见有关各条。❷疫疠的一种。《温疫论·温疟》：“凡疟者，寒热如期而发，余时脉静身凉，此常疟也，以疟法治之。设传胃者，必现里证，名为温疟，以疫法治者生，以疟法治者死。”参疟疾、温疫条。

温疠 即瘟疫。《素问·六元正纪大论》：“凡此太阴司天之政，……其病温疠大行，远近咸若。”详瘟疫条。

温毒 病名。见《肘后备急方》卷二。❶指春温发斑的病证。《医学入门》卷三：“伤寒阳症发斑，谓之阳毒，春温发斑，谓之温毒。”❷感受温邪热毒疾患的总称。《温病条辨·上焦篇》：“温毒者，诸温挟毒，秽浊太甚也。”一般发生于冬春两季。主要表现为突然寒战高热，头痛恶心，骨节痠痛，烦躁口渴，舌苔黄，脉洪数。继即出现头面红肿，或颐肿，或咽喉肿痛白腐，或身发斑疹等。治以清热解毒为主，方如加减普济消毒饮、升麻葛根汤、三黄石膏汤、黄连解毒汤等。如热入营血，则宜凉营解毒，如用清瘟败毒散加减。参大头瘟、烂喉痧等条。本病可见于麻疹、流行性腮腺炎、头面丹毒、猩红热、斑疹伤寒等疾患。

温毒发斑 病证名。见《肘后备急方·治伤寒时气温病方》。又名时疫发斑、瘟疫发斑，时气发斑。多因毒气弥漫营卫，三焦壅闭，燔灼气血所致。《重订广温热论·论

温热兼症疗法》："温毒发斑，不因失汗、失下。初起脉浮沉俱盛，壮热烦躁，起卧不安；外或头面红肿，咽喉肿痛，吐脓血，面赤如锦纹，身痛如被杖；内则烦闷呕逆，腹痛狂乱，躁渴，或狂言下利。如是而发斑者，点如豆大而圆，色必紫黑而显，胸背腰腹俱稠。毒气弥漫营卫，三焦壅闭，燔灼气血，斯时而任白虎之化斑，犀角大青之解毒，邪毒得凉而愈郁，反致不救；惟下之则内壅一通，邪气因有出路，斑毒亦从而外解矣。治法惟紫草承气汤、拔萃犀角地黄汤二方合用，加金汁，皂角刺最效。病势极重者，症必浑身发臭，不省人事，口开吹气，舌现黑苔黑瓣底，必须用十全苦寒救补汤，生石膏加重四倍。……惟斑色紫者虽为危候，黄连解毒合犀角地黄汤连投数剂，亦可十中救二三。"参温毒、瘟疫、时疫发斑、瘟疫发斑条。

温疫　病名。出《素问·本病论》。即瘟疫。《温病条辨》："温疫者，厉气流行，多兼秽浊，家家如是，苦役使然也。"详瘟疫条。

温疫发斑　病证名。又名时气发斑、时疫发斑、温毒发斑。《瘟疫论补注·发斑》："温疫发斑，寒热虚实皆有之，重者二三日便见，轻者五六日方出，淡红稀小者吉，稠密紫赤者凶。必察元气虚实，脉之有力无力。欲出未出，葛根升麻汤。斑已出，不宜再发，烦渴热甚，脉洪数者，白虎汤，脉虚者加人参。"参瘟疫、时气发斑、时疫发斑、温毒发斑条。

温热病　病名。见《外台秘要》卷四。❶温病的别称。泛指各种温病、热病。也有以感受热邪的轻重与季节的不同，分称为"温病"与"热病"者。《类证活人书》卷五："因春温气而变，名曰温病；因夏热气而变，名曰热病。温、热二名，直以热之多少为义。"参见温病、热病条。❷温病之一种。指温病之偏热盛而不兼风、寒、暑、湿等他邪者。《温病条辨·上焦篇》："温病者，有风温，有温热、有温疫、有湿毒、有暑温、有湿温、有秋燥、有冬温、有温疟。"又："温热者，春末夏初，阳气弛张，温盛为热也。"

温病　病名。出《素问·六元正纪大论》，又简称"温"。❶多种外感急性热病的总称。后世泛称"温热病"。《素问·评热病论》："有病温者，汗出辄复热，而脉躁疾不为汗衰，狂言不能食。"温病一般起病较急，发热较甚，传变较快，容易化燥伤津，后期尤多阴枯液涸等。温病的治疗，一般按卫、气、营、血或三焦辨证理论，选用解表、清气、和解、化湿、通下、清营凉血、开窍、熄风、滋阴、回阳固脱等法。因发病季节、四时之气、流行特点的不同，有风温、温热、温疫、温毒、冬温、暑温、秋温、春温、温疟、秋燥、伏气温病、晚发等区别，详有关条。❷伤寒病五种疾患之一。《难经·五十八难》："伤寒有五，有中风，有伤寒，有湿温，有热病，有温病。"参伤寒条。❸指春季发生的热性病。《素问·热论》："凡病伤寒而成温者，先夏至日者为病温……。"此说成为后世医家"伏气温病"的理论根据。参伏气温病条。

温病劳复　劳复证之一。《诸病源候论·温病劳复候》："谓病新瘥，津液未复，血气尚虚，因劳动早，更生于热，热气还入经络，复成病也。"参劳复、气虚劳复、阴虚劳复条。

温淫　指温病热象炽盛。《灵枢·经脉》："温淫汗出。"张介宾注："温气淫泆（通溢）则汗出"（见《类经》卷十四）。

温燥　病名。指感受秋燥之邪而偏热者。与凉燥相对而言。《重订通俗伤寒论·秋燥伤寒》："久晴无雨，秋阳以曝，感之者多病温燥。"初起多见身热头痛，干咳无痰，即或有小量咯痰亦粘腻不爽，气逆而喘，咽喉干痛，鼻干唇燥，心烦口渴，苔薄白而燥，舌尖边俱红等。治宜辛凉解表，佐

以润肺，方用桑杏汤。如燥从热化而劫津伤阴，则宜甘凉濡润，选用沙参麦冬汤、玉竹麦门冬汤、清燥救肺汤等。燥伤胃阴，五汁饮。胃液干燥，外感已净者，用牛乳饮，如燥证气血两燔者，用玉女煎。若燥久伤及肝肾之阴，上盛下虚，昼凉夜热，或干咳，或不咳，舌光绛，脉弦细，甚则痉厥，则治宜育阴潜阳，方如三甲复脉汤、专翕大生膏之类（见《温病条辨·秋燥》）。参秋燥、凉燥条。

渴 证名。出《灵枢·五味》。又称口渴。❶指自觉口咽干燥之证。多因肺胃有热，津耗血少所致。也可因水湿、痰饮、瘀血阻滞，或脾虚不运，或肾阳虚衰不能化气，使津液不能上承而致肺胃有热者，渴喜冷饮，便秘溺赤，苔黄脉数。治宜清热泻火。选用麦门冬饮子、白虎汤、承气汤等。津液亏耗者，咽干口燥，烦热升火，舌干少津。治宜养阴生津。用六味地黄丸、增液汤、五汁饮等，热恋伤阴者，可用连梅汤。血虚者，多见于大失血及产后，头晕目花，面白唇淡，舌质淡，脉芤。治宜补血益气，用四物汤、当归补血汤等；水湿停留者，渴不欲饮，胸闷纳呆，腹胀肢肿，小便不利，苔腻脉濡。治宜祛湿利水，用胃苓汤、五皮饮等；痰饮内停者，口渴胸闷，短气，吐痰涎，心下悸，或呕吐、反胃等。治宜温阳化饮，用小青龙汤、苓桂术甘汤、半夏茯苓汤等。瘀血内阻者，口渴而但欲嗽水不欲咽，唇萎，唇紫，脉涩。治宜活血祛瘀。用桃红四物汤、血府逐瘀汤等；脾虚不运者，口渴而稍饮即止，或喜热饮，四肢困倦，脉弱无力。治宜健运。用七味白术散、春泽汤等；肾阳虚衰者，口渴欲饮，饮一、二口即厌，或水入即吐出，恶寒肢冷，嗜卧，脉细。治宜温阳补肾。用金匮肾气丸、通脉四逆汤加猪胆汁等。口渴频饮，多食多尿者，为消渴病，详该条。❷指口咽干燥而欲饮之症。《景岳全书·传忠录》："凡病人问其渴否，则曰口渴。问其欲汤水否，则曰不欲……此口干也，非口渴也。"参口干条。

渴利 病名。《诸病源候论·消渴病诸候》："渴利者，随饮小便故也。由少时服乳石，石热盛，时房室过度，致令肾气虚耗，下焦生热，热则肾燥，燥则渴。肾虚又不得传制水液，故随饮小便。以其病变，多发痈疽。"《奇效良方》卷三十二："兰叶散：治渴利，口干烦，热背生痈疽，赤煨疼痛。"

滑泄 病名。见《华氏中藏经·论脾脏虚实寒热生死逆顺脉证之法》。又称滑泻。《杂病源流犀烛·泄泻源流》："滑泄，其泄不禁，泻久不止，大孔如竹筒，日夜无度。"常兼见饮食减少，手足厥冷或肿胀，形寒气短，消瘦，或发虚热等症。多因泄久气陷下脱所致。治宜固涩止脱，扶正祛邪。又分寒滑、热滑。寒滑者，脾肾虚寒，轻者可用补中益气汤或六君子汤加肉豆蔻、补骨脂、炮姜、肉桂之类，重者宜八柱散、扶脾丸、诃子丸等方。热滑者，中气下脱而热邪稽留，宜用固肠丸、诃子散等方。参久泄条。

滑泻 病名。见《万病回春·泄泻》。即滑泄。详该条。

滑痢 病名。指下痢滑脱不禁，甚者兼见脱肛。见《局方发挥》。有血虚、气虚之分。《医学入门》卷五："滑痢，……血分，四物汤加参、术、地榆、樗白皮；气分，真人养脏汤、大断下丸、灵砂苍榆汤。"参虚痢、虚滑痢、久痢条。

滑痰 指一咳即出之痰。《症因脉治》卷二："一咳而痰便出者，名滑痰。属脾湿。宜南星与半夏之类燥之，滋润之味，所当忌也。"参痰证条。

滑精 病证名。遗精的一种。《景岳全书·杂证谟》："不因梦而精自出者，谓之滑精。"又称精滑。甚者见情思色而精液自出，称为漏精。多因色欲所伤，肾元亏损，精关不固所致。治宜温补肾元，固涩精关。

方用右归丸、参苓菟丝丸、鹿茸大补汤等方。因湿热下流扰动精室所致者。治宜清化湿热为主。用秘精丸，大、小分清饮等方。参遗精条。

溲血　证名。出《素问·四时刺逆从论》。又名溺血、尿血。详尿血条。

寒中　❶类中风之一。又名中寒。由于暴中寒邪所致。《医宗必读·类中风》："寒中，身体强直，口噤不语，四肢战掉，卒然眩晕，身无汗者，此寒毒所中也。"治宜温里散寒。用姜附汤或附子麻黄汤加减。重证先用苏合香丸以开其闭。❷指邪在脾胃而见里寒的病症。见《灵枢·五邪》及《内外伤辨惑论》等。多因脾胃虚寒，邪从寒化，或由劳倦内伤传变而成。证见脘腹疼痛，肠鸣泄泻等。治以温中散寒为主。用沉香温胃丸加减。

寒气　七气之一。《诸病源候论·七气候》："寒气，则呕吐恶心。"参七气、九气条。

寒气呕吐　病证名。指呕吐因胃气素寒，复感寒邪所致者。《症因脉治》卷二："寒气呕吐之症，偶遇寒冷，顿发呕吐，胸前绵绵而来，身无内热，小便清白，大便通顺。"脉多弦紧，或迟缓，或沉细，甚者沉伏。治宜散寒温胃。宜用姜桂六君子汤、理中汤、四逆汤等方。参寒呕条。

寒气腹痛　病证名。指感受寒邪所致的腹痛。多见于阳气虚衰者。见《医方考·腹痛》。《症因脉治》卷四："寒气腹痛之症，面黄唇白，手足多冷，恶寒不热，二便清利，腹中绵绵作痛，此寒气腹痛之症也。"《张氏医通·腹痛》："绵绵而痛无增减，欲得热手按，及喜热饮食，脉沉迟者寒也。"治宜散寒，方用桂枝芍药汤、金匮建中汤、四逆汤、理中汤等。参腹痛、感寒腹痛、寒冷腹痛条。

寒气霍乱　病名。见《症因脉治·霍乱》。因阳气素虚，中气不足，偶值时令寒邪，直中三阴所致。证见恶寒身痛，腹痛吐、利，唇青爪青，脉多沉迟等。治宜温运。方用理中汤、补中汤、四逆汤。内有积滞者用治中汤。参寒湿霍乱、霍乱条。

寒包热咳嗽　病证名。指肺有郁热复感于寒所致的咳嗽。古称寒喘。《类证治裁》卷二："寒包热，热郁肺俞，遇秋冬寒凉辄发咳，寸脉坚，声音窒，但解其寒而热自散。麻杏石甘汤或金沸草散。"参寒喘条。

寒包热哮　病证名。见《中国医学大辞典》。指肺素有热，寒气外束所致的哮吼。《医略六书杂病证治·哮病》："皮毛为肺之合，肺素有火，毫窍常疏，风寒易入，谓之寒包热。"《类证治裁·哮症论治》："症由痰热内郁，风寒外束，初失表散，邪留肺络，宿根积久，随感辄发。……胶痰与阳气并于膈中，不得洩越，热壅气逆，故声粗为哮。"治宜散寒以解郁热，如麻黄定喘汤、越婢加半夏汤。参冷哮、热哮条。

寒包热喘　病证名。指由寒邪外束，痰热内积，肺气壅阻所致的气喘。《赤水玄珠·喘门》："喘凡遇冬而发，此寒包热也。"《张氏医通·喘》："寒郁热邪而喘，中有积痰，遇冷即发。"临床表现，一般多见恶寒无汗，咳嗽气喘，胸中烦热满闷，咯痰不爽等症。治宜表散为主，用定喘汤、越婢加半夏汤等方加减。

寒伤荣证　病证名。指麻黄汤证。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病，头痛、发热、身疼、腰痛、骨节疼痛、恶风、无汗而喘者，麻黄汤主之。"《注解伤寒论》卷三："此太阳伤寒也，寒则伤荣。"《张氏医通·诸伤门》："如见恶寒、发热、头疼、骨节痛、无汗而喘，脉浮紧者，寒伤营证也。以寒为阴邪，故直伤于营分，营伤，所以腠理固闭，无汗而喘，身疼，骨节痛，而脉不柔和。"《伤寒论大全》卷一："因寒则伤荣，恶寒、头痛、脉浮紧而无汗，则用麻黄汤开发腠理以散邪，得汗即愈。"参太阳伤寒条。

寒呃 病证名。见《证治准绳·杂病》。指因脏气本寒，复感风寒或伤于生冷所致的呃逆。《证治汇补·呃逆》："寒呃，朝宽暮急，连续不已、手足清冷、脉迟无力。"治宜温散。可用丁香散、沉香降气汤、荜澄茄散、羌活附子汤、理中加丁香汤等方。如系脾胃虚寒，宜温补下元，用归气饮、理阴煎等。参呃逆条。

寒冷腹痛 病证名。见《圣济总录·心腹门》。指感寒饮冷而致腹痛。《金匮翼·寒冷腹痛》："腹痛属寒冷者，多是口食寒物，鼻吸冷气，脉滛气阻，则为疼痛。其症四肢逆冷，唇口变青，其脉沉或紧。经云，寒气客于脉中则脉寒，脉寒则缩绻，缩绻则脉绌急，绌急则外引小络，故卒然而痛，得炅（jiǒng炯，热也），则痛立止。"详寒气腹痛条。

寒证 八纲之一。指外感或内伤所致的寒性证候。《素问·阴阳应象大论》："阴胜则寒。"《至真要大论》："寒者热之。"寒证有表寒证、里寒证、虚寒证、寒实证之分。详各条。

寒证发狂 病名。指寒痰所致的发狂。《医钞类编》卷二十："寒证发狂得之气菀不舒，怒气不能发洩去，宜祛痰为主而佐以补气之药。人参、茯神、白术、法半、南星、附子、菖蒲水煎服。或加柴胡尤妙。"参癫狂条。

寒郁 证名。郁证之一。见《景岳全书·杂证谟》。因寒邪内郁所致。《杂病源流犀烛》卷十八："寒之所郁，呕吐清水，腰腹痛，癫疝癥瘕，下利清白者是。"治宜温散，用理中汤、五积散等方，或干姜、肉桂、附子、吴茱萸、荜拔、胡椒、花椒之类。参郁证、外郁条。

寒呕 病证名。《三因极一病证方论》卷十一："病者胃中寒，心下淡淡，四肢厥冷，食既呕吐，名曰寒呕。或因伤食，多致伤胃气；或因病曾经汗下，致胃气虚冷之所为也。"选用四逆汤、生硫黄丸、灵液丹、丁附汤等方。参胃寒呕吐、寒气呕吐条。

寒胀 胀病之一。《兰室秘藏·诸腹胀大皆属于热论》中载有寒胀："如或多食寒凉及脾胃久虚之人，胃中寒则胀满，或藏寒生满病。"《杂病源流犀烛·肿胀》："胀病有七，医旨曰：一曰寒胀，腹满濡时减，吐利厥冷，宜温之。"常兼见不欲饮食，便溏，心下痞闷，脉迟弱等症。治宜温中祛寒。选用中满分消汤、朴附汤、大正气汤等方。参胀病条。

寒疟 病名。疟疾之一。《素问·疟论》："夫寒者阴气也。风者阳气也。先伤于寒而后伤于风，故先寒而后热也。病以时作，名曰寒疟。"❶指寒邪内伏，秋凉而发者。《证治汇补·疟疾章》："纳凉之风寒，沐浴之水寒，先伏于腠中，因秋风凉肃而发。其症腰背头项疼痛，先寒后热，治当大汗。"方用柴胡桂枝干姜汤，或宜羌活、紫苏、桂枝、柴胡、草果、厚朴等。参疟疾条。❷指先受暑热之气，复感寒邪外束而发者。《症因脉治·外感疟疾》："寒疟之症，《内经》云，先寒后热，腰背头项痛，脊膂强，呵欠呻吟，始则寒极而战动，终则大热而汗解，发在午前者，此太阳经疟；若目痛鼻干，寒慄鼓颔，略寒即热，发在午后者，此阳明经疟。以上二条，乃《内经》寒邪伤营，名寒疟之症也。寒疟之因，夏伤暑热之气，入于皮肤之内，肠胃之外，营气所舍之处，又值早晚寒冷之邪，外束暑热，至日中阳旺之时，发泄不出，后感寒邪近表，是以先寒，先感暑热在里，是以后热，此先寒后热之疟作矣。"寒疟之治法为：邪在太阳者，桂枝羌活汤；在阳明者，桂枝葛根汤；在少阳者，桂枝柴胡汤；三经俱见症者，三方互用。参疟疾条。

寒疝 病名。见《金匮要略·腹满寒疝宿食病脉证治》。❶指由内脏虚寒，复感风寒所致的剧烈腹痛。《诸病源候论》卷二

十："寒疝者，阳气积于内，则卫气不行，卫气不行则寒气盛也。故令恶寒不欲食，手足厥冷，绕脐痛，自汗出，遇寒即发，故云寒疝也。"治宜温经散寒，活血通下等法，选用大乌头汤，乌头桂枝汤、大建中汤、当归生姜羊肉汤、大黄附子汤等方。❷指阴囊肿大结硬疼痛。多因寒邪侵袭厥阴经所致。《儒门事亲》卷二："寒疝，其状囊冷，结硬如石，阴茎不举，或控睾丸而痛。得于坐卧湿地，或寒月涉水，或冒雨雪，或卧坐砖石，或风冷处使内过劳，宜以温剂下之。"如寒微者，宜用荔香散，暖肝煎、肾气丸、神应丁香楝实丸；寒甚者用医林四神丸，百一选方十补丸，胡芦巴丸、沉香桂附丸等。❸七疝之总称。《医学纲目·诸疝》："疝图虽七，然寒疝即疝之总名。"参阴疝、疝条。

寒泄　病证名。又名寒泻、鹜溏。指脾胃寒盛所致的泄泻。《素问病机气宜保命集·泻论》："又有寒泄者，大腹满而泄；又有鹜溏者，是寒泄也。"《丹溪心法·泄泻》："寒泄，寒气在腹，攻刺作痛，洞下清水，腹内雷鸣，米饮不化者，理中汤，或吞大巳寒丸，宜附子桂香丸；畏食者，八味汤。"《症因脉治》卷四又分本证为外感寒邪泻和积寒泄泻两种。详各条。

寒注　九注之一。《诸病源候论·寒注候》："人虚为寒邪所伤，又搏于阴，阴气久不泄，从外流内结积。其病之状，心腹痛而呕沫爪青，休作有时，至冬便剧，故名为寒注也。"或伴腰脊强痛、便血等。治用五野丸等方。参九注条。

寒泻　病证名。又名寒泄。见《证治要诀》卷八。多因寒气内袭，脾阳虚衰所致。《时病论》卷三："盖寒泻致病之原，良由感受乎寒，寒气内袭于脾，脾胃受寒则阳虚，虚则不司运用，清阳之气，不主上升，反下陷而为便泻。故所下澄沏清冷，俨如鸭粪，腹中绵痛，小便清白，脉来缓怠近迟。"《张氏医通·大小府门》："寒泻，腹胀泄注，食即呕吐，理中汤加肉桂、诃子、升麻。"详寒泄条。

寒实证　指阴寒盛实所致的证候。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。多因寒邪入侵脏腑，或寒痰湿浊结滞所致。证见胸腹胀满，身无热，口不燥渴，四肢冷或腹痛便秘，脉象沉弦等。《伤寒论今释》："其证喘鸣气促，肢冷汗出，窒息欲死，故曰寒实。"治宜温里通解。可选用大陷胸汤、三物白散等方。参寒证条。

寒实结胸　结胸证之一。又称寒结胸。指水寒互结胸膈者。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："寒实结胸，无热证者，与三物小陷胸汤，白散亦可服。"《医宗金鉴·订正伤寒论注》卷一："结胸证，身无大热，口不燥渴，则为无热实证，乃寒实也，与三物白散。然此证脉必当沉紧。若脉沉迟或证见三阴，则又非寒实结胸可比，当以枳实理中汤治之矣。"亦可由误下所致。《伤寒来苏集·三白散证》："太阴腹满时痛，而反下之，寒邪与寒药相结，成寒实结胸。"《伤寒论述义》卷四："本有寒分，下之作结胸者，亦是寒实。然阳素虚，……误下作结胸，须增损理中丸。"参结胸条。

寒毒下利　病证名。指下利之因寒毒所致者。《卫生宝鉴·补遗》："寒毒下利，脐下寒，腹胀满，大便或黄白，或清黑，或有清谷。治用理中汤，或四逆汤，或白通汤。"参寒泄、下利条。

寒战　证名。见《素问玄机原病式·六气为病》。指冷得发抖。多因寒甚或热郁所致。参寒慄、振寒、战慄条。

寒咳　十咳之一。指由饮食寒冷所致的咳嗽。《诸病源候论·咳嗽病诸候》："二曰寒咳。饮冷食寒入注胃，从肺脉上气，内外合，因之而咳是也。"参咳嗽、寒嗽条。

寒疫　病名。❶指疫疠阴证。见《三因极一病证方论》卷六。《说疫全书》卷二："寒疫、世之言疫者，将瘟疫二字读滑。随

曰疫止有瘟而无寒也，……至于当天气方温热之时而凄风苦雨骤至，毛窍正开，为寒气所束，众人同病，乃天实为之，故亦得以疫名也。”证见发热怕冷，气壅痰喘，欬嗽胸痛，鼻塞声重，涕唾稠粘，咽痛齿痛等。《温热暑疫全书》卷四：“入于阴，入则其人必先内慄，足膝逆冷，便溺妄出，清便下重，脐筑湫痛，正与俗称绞肠瘟、软脚瘟之说符也。”可选用苏羌饮和圣散子等方。参阴毒条。❷指太阳伤寒证。《时病论·寒疫》：“观此见症与冬令伤寒初客太阳无异，因在春令，所以不名伤寒，又因众人之病相同，所以名为寒疫。然其治法，又与伤寒相去不远矣。”详时行寒疫条。

寒结 病名。指寒气袭于肠道而致的大便秘结。参阴结条。《医碥·大便不通》：有寒结，冷气隐于肠胃，阴凝不运，津液不通，故结也，脉沉迟不能食，腹痛。即仲景所谓阴结也。”即冷秘。详该条。

寒结胸 结胸证之一。即寒实结胸。《伤寒论大全》卷二：“懊侬满闷，身无热者，寒结胸，三物白散。”详寒实结胸条。

寒热往来 证名。即往来寒热。《诸病源候论·冷热病诸候》：“夫寒气并于阴则发寒，阳气并于阳则发热。阴阳二气虚实不调。故邪气更作，寒热往来也。”详往来寒热条。

寒热错杂证 指寒证与热证错杂互见的病证。如《伤寒论》乌梅丸证即为治寒热夹杂者。《方函口诀》：“厥阴多寒热错杂之证。”除上下寒热交错之外，又有表寒里热证、表热里寒证等。详表证、里证、寒证、热证条。

寒积 病证名。指寒邪留积于里。《证治准绳·杂病》：“寒积，热取之，鸡爪三棱丸、硇砂煎丸、红丸子。”《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“寒积，感伤寒冷成积，腹中疼痛，必以手重按，或将物顶住稍可，口吐清水也。宜干姜、柴胡、丁香、肉桂、附子，方用附子理中汤、沈氏棉子丸。”参积条。本证可见于慢性胃、肠炎，胃、十二指肠溃疡，胃肠功能紊乱等疾病。

寒积五更泄泻 病证名。见《症因脉治·泄泻论》。指受寒饮冷，寒积中焦所致的晨泄。其症每至五更则腹部绵绵作痛，继而作泄，粪色淡白，脉多迟。治宜温中散寒，用理中汤、通白四逆汤。寒实有积滞者，用煮黄丸下之。参积寒泄泻条。

寒积痢 病名。痢疾之属虚寒而兼有积滞者。《保命集·泻论》：“治寒积痢，男子、小儿、妇人皆不同。赤白或清痢如水，不后重者，寒也。经云：‘澄沏清冷，皆属于寒。’此为虚寒中有积也。宜附子、巴豆之类下之，见利则愈，空心服。”参寒痢、冷痢、积痢、痢疾条。

寒积腹痛 病证名。指阳气不足，阴寒积滞所致的腹痛。《症因脉治》卷四：“寒积腹痛之症，绵绵而痛，无增减，得热稍止，得寒更甚，身无热，小便清利，痛则下痢，此寒积腹痛之症也。”多因真阳不足，身受寒邪，饮食生冷，胃阳不能腐熟消化，寒积凝滞所致。脉多沉迟。治宜温阳祛寒消积，用豆蔻丸、理中汤、建中汤、治中汤等方。参腹痛、寒气腹痛条。

寒秘 病名。《奇效良方·秘结门》：“寒秘者，年高肠冷，及痃癖、冷气结滞，大便秘结。”即冷秘。详该条。

寒挛 挛证之一。见《证治准绳·杂病》。详挛条。

寒淋 病名。❶淋证之一。《诸病源候论·淋病诸候》：“寒淋者，其病状先寒战然后尿是也。由肾气虚弱，下焦受于冷气，入胞与正气交争，寒气胜则战寒而成淋，正气胜战寒解，故得小便也。”本证即冷淋。参该条。❷胞痹的别称。《医学入门·小便不通》：“胞痹即寒淋，小便痛引脐腹，上有清涕，肾着汤；热者，泻肾汤。”参胞痹条。

寒厥 厥证之一。指因阳衰阴盛所致四

肢逆冷的病证。一名冷厥、阴厥。《素问·厥论》："阳气衰于下，则为寒厥。"《药症宜忌》："阴厥即寒厥。其证四肢厥逆，身冷面青，踡卧，手指爪青黯，腹痛，大便溏，或完谷不化，小便自利，不渴，不省人事。"《杂病源流犀烛·诸厥源流》："大约手足寒者为寒厥，宜附子理中汤。而寒厥又有因气虚者，宜参芪益气汤；又有手足冷，表热里寒，下利清谷，食入即吐，脉沉者，宜四逆汤。"参厥、冷厥、清厥、阴厥条。

寒厥心痛　证名。《治法机要·心痛证》："寒厥心痛者，手足逆而通身冷汗出，便溺清利，或大便利而不渴，气微力弱，急以术附汤温之。寒厥暴痛，非久病也，朝发暮死，急当救之，是知久病无寒，暴病非热也。"《赤水玄珠·心痛门》："心痛彻背，背痛彻心，此寒厥心痛。"治宜金匮赤石脂丸。参心痛、厥心痛、冷心痛、冷气心痛条。

寒喘　证名。指内寒所致的气喘。《万病回春》卷四："寒喘者，四肢逆冷，脉沉细也"。本证多属寒胜阳微，治以温阳降气为主，方如九味理中汤加附子等，参冷喘、虚冷上气喘条。亦指外寒所致的气喘。《医林绳墨》卷二："或因风寒闭肺，无汗气逆而生喘也"。治宜宣肺散寒，用加味三拗汤、五味子汤等方。参风寒喘条。

寒痢　病名。指痢疾因于寒客肠胃者。《时病论》卷三："寒痢之证，实因炎热贪凉，过食生冷，冷则凝滞，中州之阳，不能运化，清气不升，脾气下陷，以致腹痛后重，痢下白色，稀而清腥，脉迟苔白者，当去其寒，兼扶脾土。……然而寒痢亦有赤色者，不可不别，总之以脉迟苔白为据。"治宜理中汤加诃子、肉豆蔻、木香、砂仁等。《医学入门》治寒痢色白稀溏，肠鸣下坠不甚，用不换金正气散加乌梅、陈皮；肢冷便清，用姜附汤、理中汤，日久用黄连补肠汤。参冷痢、痢疾条。

寒疟　疟证之一。❶指寒饮太过，疟毒寒凝胸中的病证。《疟胀玉衡·寒疟辨》："若一有食积血阻于中，而服大寒之饮，则食不消、积不行、血不散，而疟毒反冰伏凝阻于中，未有得宁者矣……，是名寒疟。"治宜放疟救治，后用三备丸等。❷指疟证而有寒气外袭的病证。《七十二种疟证救治法》："寒疟，此系外受寒邪，寒气入经，身发潮热。治法，用钱刮两臂臑穴、两曲池穴，用针刺中魁、大骨空、小骨空穴。"药用砂仁、粟梗、藿香、槟榔、灯心等。参疟条。

寒湿水肿　病名。身肿类型之一。《症因脉治》卷三："寒湿身肿之症，身重身痛，足胫冷，胸满闷，遍身肿，此寒湿肿之症也。寒湿身肿之因，或时令阴雨，天气寒冷，或居处阴湿，阴寒之气，袭于肌表。或因汗出遇水，水寒所伤，则寒湿肿之症成矣。"脉多沉小或沉迟。治宜温经散湿，可选用麻黄桂枝汤、羌独败毒散、胜湿汤、导水茯苓汤等方。参身肿、水肿条。

寒湿头痛　病证名。指寒湿上蔽，经气凝涩所致的头痛。《兰室秘藏·头痛门》："如气上不下，头痛巅疾者，下虚上实也，过在足少阴巨阳，甚则入肾，寒湿头痛也。"《医钞类编》卷五："寒湿头痛，首如裹，面如蒙，恶风恶寒，拘急不仁，……宜苍朴紫苏之属。寒湿头痛，眩运，渗湿汤；湿气在表，头痛，头重，羌活胜湿汤。"参头痛条。

寒湿发黄　病证名。见《证治汇补·黄病章》。属阴黄范畴。多由寒湿郁滞，脾阳不振，胆汁外溢所致。证见身目黄色晦暗，神疲畏寒，食欲减退，脘闷腹胀，大便不实，小便短少，舌淡苔腻，脉濡缓等。治宜温中化湿，用理中汤或茵陈术附汤加减。参黄疸、阴黄、湿热发黄等条。

寒湿眩晕　病证名。见《症因脉治·外

感眩晕》。为湿气内逆，寒气不行，太阳上留之证。证见恶寒无热，鼻塞声重，身重体疼，无汗拘紧，头目旋晕，脉迟缓等。治宜温化寒湿。用羌活胜湿汤合术附汤、苓术除眩汤、三因苓辛汤等方。参伤湿眩晕、眩晕条。

寒湿脚气 病名。见《三因极一病证方论》卷三。由寒湿外侵，经气不行，血脉不和所致。证见脚膝软弱，行动无力，顽木浮肿。或拘挛疼痛，或恶寒肢冷。治宜温经除湿为主。兼予活血，通络，舒筋。选用木瓜牛膝丸、酒浸牛膝丸、独活汤、葫芦巴丸、搜风散等方。参脚气条。

寒湿痢 病名。指痢疾之由感受寒湿而致者。《症因脉治》卷四："寒湿痢之症，初起恶寒发热，身痛头疼，呕吐不食，不作渴，痢下脓血，或下黑水，腹反不痛。"治疗如身痛发热，脉浮紧者，宜用败毒散辛温散表；呕吐饱闷，脉长者，干葛平胃散和胃宽胸；小水不利者，散表利湿，五苓散。《时病论》卷三："夫寒湿之为痢也，腹绵痛而后坠，胸痞闷而不渴；不思谷食，小便清白或微黄，痢下色白，或如豆汁，脉缓近迟之象，宜用温化湿邪法加木香治之。"参湿痢、寒痢、冷痢、痢疾条。

寒湿腰痛 病证名。腰痛之一。见《丹溪心法·腰痛》。又名湿冷腰痛。因寒湿着腰伤肾所致。《医学入门》卷五。"久处卑湿，雨露浸淫，为湿所着，腰重如石，冷如水，喜热物熨。不渴便利，饮食如故，肾着汤加附子；停水沉重，小便不利，五积散、渗湿汤。"也可用术附汤、五积散、独活苍术汤等方。外治用摩腰丹。

寒湿腹胀 证名。指感受寒湿所致的腹胀。《症因脉治》卷三："寒湿腹胀之症，身重不温，手足厥冷，腹胀无汗，此寒湿腹胀之症也。"可因气候失常，天冷阴雨，或坐卧卑湿，寒湿袭于腠理，壅闭脉络所致。治宜祛寒化湿为主。身重、身冷、无汗者，宜甘草麻桂汤、麻桂术甘汤；下身重，多汗者，宜防己茯苓汤；寒湿内伏，宜术附汤；中气虚弱，宜理中汤。参腹胀、外感腹胀条。

寒湿霍乱 病名。见《霍乱论·病情篇》。多因脾胃素虚，中阳不振，寒湿内盛所致。发于秋后者较多。亦有因暑夏贪凉，过吞生冷而致者。证见腹痛吐泻，吐利清水，或如米泔水，不甚秽臭，口和不渴，四肢清凉等。临床表现有寒偏胜或湿偏盛之分。治宜辛温散寒或芳香宣化为主。轻则藿香正气散，或平胃加木香、藿香、生姜、半夏之类。湿盛而四肢重着，骨节烦疼者，胃苓汤加木香、藿香、大腹皮之类；七情郁结，寒食停滞者，七香饮；头疼恶寒无汗者，以香薷饮先解其表，随以大顺散等调其里；如脉弱阳虚，腹痛喜得温按，泻出不臭者，来复丹；若吐泻不止，元气耗散，或水粒不入，或口渴喜冷而不多饮，或恶寒战慄，手足逆冷，或烦热发躁，揭去衣被，但察其泻出不臭者，乃内虚阴盛格阳，宜理中汤，甚则四逆汤加食盐少许；更有暴泻如水，冷汗四逆，脉弱不能言者，急进浆水散，并宜冷服。参霍乱条。

寒温 病名。《杂病源流犀烛·春温病源流》："有治病温，少阴伏邪发出，更感太阳客邪，名曰寒温。"主要症状有发热、咽痛、口苦、微恶寒等。治宜清热解毒为主，用黄芩汤加桂枝、石膏，或以葱豉汤先治其表，后用本汤。甚可用葳蕤汤加减。参伏气温病条。

寒暄 古病名。指素有痰热，复因外受风寒所致的咳嗽证。《医学入门·咳嗽》："又有一种遇寒则咳者，谓之寒暄。乃寒包热也。解表则除，枳梗汤加麻黄、防风、杏仁、陈皮、紫苏、木通、黄芩。"《证治汇补·伤风》："肺家素有痰热，复受风邪束缚，内火不得舒洩，谓之寒暄。"参感冒、风寒感冒、风热感冒、寒包热咳嗽条。

寒腰痛　病证名。腰痛之一。指外感寒邪或阳虚生寒所致的腰痛。《证治要诀·诸痛门》："若寒腰痛，见热则减，见寒则增。"因感寒邪所致者，腰痛而腰间冷如冰，或连背拘急，脉紧。治宜温散寒邪。用五积散、羌附汤等方；外用摩腰膏。因阳虚而寒者，详肾虚腰痛条。

寒痹　病名。又名痛痹、骨痹。《灵枢·贼风》："此皆尝有所伤于湿气，藏于血脉之中，……腠理闭而不通，其开而遇风寒，则血气凝结，与故邪相袭，则为寒痹。"《证治准绳·杂病》："寒痹者，四肢挛痛，关节浮肿。"《症因脉治》卷三："寒痹之症，疼痛苦楚，手足拘紧，得热稍减，得寒愈甚，名曰痛痹。……寒痹之治，寒伤太阳，在营分无汗，麻黄续命汤；伤卫有汗，桂枝续命汤；寒伤阳明，干葛续命汤；在少阳，柴胡续命汤。今家秘立十味羌活汤通治之。"亦可用茯苓汤、五积散等方。痛甚者，可用五灵散。一说寒痹即皮痹。《张氏医通》卷六："皮痹者，即寒痹也，邪在皮毛，瘾疹风疮，搔之不痛，初起皮中如虫行状。"参痛痹、皮痹条。

寒痰　痰证之一。❶一名虚痰。《医学入门》卷五："聚于肾，多足膝酸软，腰背强痛，肢节冷痹骨痛，名曰寒痰，又名虚痰。""寒痰因形寒饮冷，色深青黑如灰，善唾，或喘，轻者五积散、藿香正气散；重者温中化痰丸、古半硫丸。"参虚痰条。❷一名冷痰。《杂病源流犀烛·痰饮源流》："若由于外感而生者，……二曰寒痰，即冷痰也。骨痹，四肢不举，气刺痛，无烦热，凝结清冷，宜温中化痰丸，温胃化痰丸。"参冷痰条。❸指痰聚于肾的病症。《杂病源流犀烛·痰饮源流》："兹即痰之在一身者言之，……在肾曰寒痰，其色有黑点，吐出多稀，多小便急痛，足寒逆，心恐怖，脉必沉，宜胡椒理中丸，或加星、半。此痰之由于五脏者也。"又名肾经寒痰。参见该条。❹指素有痰疾，又感寒冷不节之气而喘咯咳唾者。《泰定养生主论》："寒痰者，因冲冒风凉不节之气而然也，……此皆素抱痰疾者，因风寒气热味，而喘咯咳唾，非别有此五种之痰。"参见痰证条。

寒慄　证名。指凛慄恶寒。《灵枢·口问》："寒气客于皮肤，阴气盛，阳气虚，故为振寒、寒慄。"参振寒条。

寒嗽　病名。❶指感受寒邪所致的咳嗽。《证治要诀》卷六："感寒而嗽者，恶风无汗，或身体发热，或鼻流清涕，宜杏子汤。"《医说·咳嗽》："寒嗽，痰薄，宜服热药，……以理中汤加五味子治寒嗽。"❷指冬月嗽而发寒热的疾患。《素问玄机气宜保命集》卷下："冬月嗽而发寒热，谓之寒嗽，小青龙加杏仁服之。"❸指脾肺受寒所致的咳嗽。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："寒嗽，脾肺皆受寒邪也。其脉弦微，必兼面白口甘，水反侮土，寡于畏也，腹中大寒，痰白作泡，口甘涎沫者，胃寒不和，必以辛甘热去之。宜紫苏饮子、半夏温肺汤。"❹指饮酒后嗽减而痰涎青白的疾患，见《赤水玄珠》卷七。参咳嗽、冷嗽条。

寒膈　五膈之一。见《肘后备急方》卷四。《诸病源候论·五膈气候》："寒膈之为病，心腹胀满，咳逆，腹上苦冷，雷鸣，绕脐痛，食不消，不能食肥。"参五膈条。

寒霍乱　病名。见《症因脉治·霍乱》。即寒气霍乱。详该条。

寒瘴　病证名。《瘴疟指南》卷上："瘴疟形状，……以有寒有热者为寒瘴。"即冷瘴，详该条。

寒癖　病名。指寒邪挟水饮停积胁下所致的癖病。《诸病源候论·癖病诸候》："寒癖之为病，是水饮停积胁下，弦强是也。因遇寒即痛，所以谓之寒癖。脉弦而大者，寒癖也。"《圣济总录》卷七十三："寒癖者，有癖积在胁下，遇寒即痛是也。此由饮冷过

度，停积不散。”如寒癖，留滞不消，用葫芦巴丸等；如见饮食不化，心下虚满如水状，用枳实汤等方。参癖有关条。

遍体麻木 浑身麻木的别称。《医林绳墨·麻木不仁》：“遍体麻木者，多因湿痰为病。”详浑身麻木条。

遍身肿 水肿类型之一。见《圣济总录·水肿门》《证治要诀·肿》：“肿病不一，遍身肿、四肢肿、面肿、脚肿，方谓之水气。然有阳水，有阴水，并宜先用五皮饮、升降汤或除湿汤加木瓜、腹皮。”“遍身肿，烦渴，小便赤涩，大便多闭，此属阳水，轻宜四磨饮，添磨生枳壳，兼进莱菔饮，重则疏凿饮子、万灵饮利之，以通为度。亦有虽烦渴而大便已利者，此不可更利，宜用五苓散加木通、大腹皮。遍身肿，不烦渴，大便自调，或溏泄，小便虽少而不涩赤，此属阴水，宜实脾饮。”参水肿、阳水、阴水条。

禄食泻 古病名。指食入即泻。见《丹溪心法·泄泻》。又称漏食泄。《症因脉治》卷四：“脾气久虚，不受饮食者，食毕即肠鸣腹急，尽下所食之物方快，不食则无事，经年累月，此禄食泻之症。”治宜温补脾肾，用快脾丸、五味丸。亦有因脾胃积热而致者，宜栀连平胃散、川连枳壳汤等加减。参直肠泄条。本症可见于胃原性腹泻，神经官能忙腹泻、类癌综合征等疾病。

〔一〕

强上 证名。指颈项强急而上仰。《素问·脉解篇》：“强上引背者，阳气大上而争，故强上也。”可见于热病、痉、厥等病证。

强中 病证名。❶指阳兴不痿，不能洩精或精液自出者。《诸病源候论·消渴病诸候》：“强中病者，茎长兴盛不痿，精液自出。”由于饵食金石丹药，火毒内盛，或因肾气衰弱，虚阳妄动所致。证见阴茎常举，不能洩精或精液自泄等。因火毒内盛者，治宜泻火解毒，用石子荠苨汤、黄连猪肚丸。火盛阴虚者，加元参、麦冬、生地，或用倒阳汤。因肾气衰弱，虚火妄动者，治宜温补肾元，用鹿茸丸、苁蓉丸等方。❷消渴病证之一。《证治要诀·三消》：“消肾为病，比诸为重，古方谓之强中，又谓之内消。”详消肾条。

强阳不倒 病证名。见《石室秘录》卷二。指阴茎常举不痿之证。详强中条。

强直 出《素问·至真要大论》。指颈项、肢体僵硬，不能活动自如者。《内经知要·病能》：“强者，筋强；直者，体直而不能屈伸也。”强直是痉、痫、破伤风等病的主要症状。参痉、痫等条。

隔 隔，通膈。即噎膈。见《素问·阴阳别论》。详噎膈条。

隔食 证名。指饮食不能下膈入胃者。《医学从众录·膈症反胃》：“膈者，阻隔不通，不能纳谷之谓也。又谓之隔食，病在胸膈之间也。”参噎膈、反胃、格食条。

缠丝痧 痧证之一。《异痧奇验方·缠丝痧》：“其证肚腹胀，头疼、心烦、前后心或有紫黑黄点子，用针挑破，以醋擦之即愈，如觉偏体麻木，无此点子者，即心痧子证。将胳膊弯、腿弯青筋刺出紫血，用炒盐煎汤服之。”参痧条。

缓风 脚气的古称。《济生方·脚气》：“黄帝时名为厥，两汉之间名曰缓风，宋齐之后谓之脚气，其名虽不同，其实一也。”详脚气条。

十三画

〔一〕

鼓胀 病证名。❶腹皮绷急如鼓，中满膨胀疾患的统称。《灵枢·水胀》：鼓胀，

“腹胀身皆大，大与肤胀等也。色苍黄，腹筋起，此其候也。”《素问·腹中论》：“有病心腹满，旦食则不能暮食，名为鼓胀。”后世文献，鼓、臌相通，鼓胀亦作臌胀。《医林绳墨》卷五：“臌胀者，如鼓之形，外坚中空，击之有声，按之有形，皮肉之急胀，脾肺之大病也。”鼓胀亦泛称蠱胀。《风劳臌膈四大证治·水肿臌胀》：“许学士云，脐腹四肢悉肿者为水，但腹胀四肢不甚肿为蠱，……腹皮胀急而光，内空空然如鼓，是矣。俗知谓之蠱胀。”病由情志郁结，饮食不节，嗜酒过度，或虫积日久，肝脾受损，气滞血瘀，水湿不行所致。亦有由癥瘕、积块发展而成。因病因及证候不同，有气鼓、血鼓、水鼓、虫鼓、食鼓等区分。治宜健脾渗湿、化瘀通络、理气逐水、益肾养肝等法。详各条。❷指气胀。《医碥》卷三：“气胀又名鼓胀，此其外虽坚满，中空无物，有似鼓也。”详气胀条。❸指单腹胀。《景岳全书·杂证谟》：“单腹胀者，名为鼓胀。”详单腹胀条。

蓄血发黄　病证名。《伤寒全生集·辨伤寒发黄》：“蓄血发黄者，其人身黄，脉沉结，小腹满硬，小便自利，大便黑色，其人如狂，此为蓄血在下焦，用桃仁承气汤下之，盖血下则黄退也。”参黄疸、伤寒蓄血证条。

蓄血证　病证名。一作蓄血。出《伤寒论·辨阳明病脉证并治》。❶指外感热病，邪热入里，与血相搏，而致瘀热蓄结于内的证候。《重订伤寒补天石·续集》卷下：“蓄血者，瘀血蓄结于内也。或当汗不汗，或不当汗而汗，皆能致此也。大要热能燥血，故血不流行，而蓄结于内耳。凡伤寒有热，小腹鞕满，小便反利者，蓄血证也。甚者喜怒如狂、屎黑、身黄。通用抵当丸、桃仁承气汤主之。若有外症不解者，先用桂枝汤解外，后用桃仁承气汤。下尽瘀血为愈。上焦蓄血，胸中手不可近而痛者，犀角地黄汤。中焦蓄血，中脘手不可近而痛者，桃仁承气汤。下焦蓄血，小腹手不可近而痛者，抵当汤。”❷泛指多种瘀血郁结于内的证候。《杂病源流犀烛·诸血源流》：“蓄血，瘀血郁结也……当有上、中、下之分。如衄、呕、唾、吐血，皆属上部。苟蓄于此，其症必兼善忘；血结胸中，则属中部。苟蓄于此，其症必兼胸满、身黄、漱水不欲咽；血凝下焦，又属下部。苟蓄于此，其症必兼发狂、粪黑、小腹硬痛……非蓄血止属伤寒热病才有之也”。《证治准绳·杂病》：“蓄血，夫人饮食起居，一失其宜，皆能使血瘀滞不行。故百病由污血者多。”或由醉饱入房，竭力伤肝，或因登高坠下，重物撞打、箭镞刃伤所致。又《血证论·蓄血》：“癫犬咬伤，毒聚胞中，故令发狂，皆属蓄血之证。”

蓄血腹胀　证名。伤寒腹胀之一。见《症因脉治·肿胀总论》。由表邪已解，血蓄下焦所致。症见腹胀硬满，小便自利，大便色黑。详伤寒腹胀条。

蓄热吐血　病证名。见《金匮翼·诸血统论》。指火热蕴盛或瘀热内蓄所致的吐血。由热蓄血中，迫血妄行。症见口鼻皆出，势如泉涌，膈上热，胸中满痛，脉洪大弦长，按之有力，精神不倦，或血是紫黑成块，或小腹满、小便不利，或喜忘如狂，身热屎黑等。如蓄血喜忘如狂，身热屎黑者，瘀已甚也。但小腹满，小便不利者轻也。治宜清热破瘀为主，须用生地、赤芍、茜根、丹皮、制大黄、滑石、桃仁之属。如简要济众方，从大便导之。体虚者，用藕节茯苓饮等方。参见吐血条。

蒸病　病名。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。以潮热、虚弱为特征。因其热自内向外蒸发而名。病属虚劳范畴，亦称劳蒸。蒸病有五蒸、二十三蒸之分。常为劳瘵主症之一。以骨蒸为多见，故蒸病又称骨蒸。习惯上，多归入劳瘵。详五蒸、骨蒸、劳瘵等条。

蒸蒸发热 证名。指内热炽盛，薰蒸于外。常为热聚阳明所致。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》："太阳病三日，发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也，调胃承气汤主之。"《伤寒论条辨》卷四："蒸蒸，热气上行貌，言热自内腾达于外，犹蒸炊然，故曰属胃也。"参发热条。

禁口痢 见《世医得效方》卷六。即噤口痢。详该条。

飧泄 飧系飧之异字。即飧泄。见该条。

雷头风 病名。指头痛鸣响、面起核块的病证。见《保命集·大头论》。多由风邪外袭或痰热生风所致。《张氏医通》卷五："头痛而起核块者，雷头风也。或头中如雷之鸣，为风客所致。"《赤水玄珠·头痛门》："夫此病未有不因于痰火者，盖痰生热，热生风故也。核块疙瘩皆有形可征，痰火上升，壅于气道，兼于风化，则自然有声，轻则或如蝉之鸣，重则或如雷之响，故以声如雷而为名也。或以其发如雷之迅速也。设如前论尽作风热治之，恐认标而忘其本也。"治疗如风热宜清宣升散，可用清震汤、荆防败毒散等方；痰热可用祛痰丸。根据病势缓急，古有大雷头风、小雷头风名称。见《证治准绳·杂病》。参大雷头风、小雷头风、头痛条。

感雷 病名。指外感风寒或时令不正之气所致的表证。见《丹溪心法·中寒》。有轻重寒热之分。《证治要诀》卷二："感冒为病，亦有风寒二证，即是伤寒外证初起之轻者，故以感冒名之。"证见喷嚏、鼻塞、流涕，头痛，全身痠楚，恶风寒，或发热，或咳嗽，或咽痛等。治宜辛散。风寒感冒者，宜辛温解表，如荆防败毒散等方；风热感冒者，宜辛凉解表，如银翘散等方；虚人感冒者，宜兼扶正，可用参苏饮等方。感冒为流行性者，称时行感冒，病情较一般感冒为重。详见风寒感冒、风热感冒、时行感冒等条。感冒又称伤风。《杂病源流犀烛·感冒源流》："感冒，肺病也，……风邪袭人，不论何处感受，必归于肺，其症或头疼、身热，轻则否，鼻必塞，兼流清涕，必恶风、恶寒，或声重，或声哑，甚者痰壅气喘，合口不开，咳嗽、咽干、自汗、脉浮而缓，此外感也。"《医宗必读·伤风》用消风散、神术散、川芎茶调散等方治四时感冒伤风见头痛，鼻塞声重，发热恶寒，如兼咳嗽涕唾稠粘，用参苏饮。桑菊饮、银翘散等亦可选用。

感雷胁痛 病证名。《症因脉治》卷一："感冒胁痛之症，并无时行传染，因自冒风寒，先见恶寒发热，胁痛耳聋，呕而口苦，此伤寒少阳经胁痛症也。若寒热已除，后乃胁痛干呕，此表解里未和，热邪痰饮之症。"又："感冒胁痛之治，风邪在表，柴胡羌活汤；热邪在半表半里，小柴胡汤；热邪在里，小柴胡加山栀、青皮、枳壳；表已散，里气不和作痛，审知是燥痰结饮，轻则瓜蒌仁汤，重则十枣汤；若肝胆郁火成痰，家秘胆星汤主之。"参风寒胁痛条。

感雷头痛 病证名。又称伤风头痛。指头痛由感受风邪所致者。《丹溪心法·头痛》："如感冒头痛，宜防风、羌活、藁本、白芷。"症见头痛鼻塞声重，自汗恶风，脉浮缓等。治宜祛风解表，用芎芷香苏散、十味芎苏饮等。感冒头痛，往往挟寒、挟热、挟湿。详风寒头痛、风热头痛、风湿头痛条。

感暑眩晕 病证名。见《三因极一病证方论·眩晕证治》。又称中暑眩晕。详该条。

感湿嗽 病名。指肺感湿邪引起的咳嗽。《张氏医通·咳嗽》："感湿嗽者，脉细而缓，身体重著，骨节烦疼，或自汗，或小便不利。麻黄加术汤。"参咳嗽、伤湿咳嗽条。

感寒腹痛 病证名。指因感受寒邪所致的腹痛。《类证治裁·腹痛》："感寒腹痛者，气滞阳衰，喜热手按，脉沉迟，治在温中，香砂理中汤去白术。"详寒气腹痛条。

碍气嗽 病名。指瘀血阻于气道所致的咳嗽。《不居集》卷十五："碍气嗽者，血

碍气作嗽也。”治以活血祛瘀，如桃仁、大黄、姜汁等。参瘀血咳条。

摇头　即头摇。见《伤寒论·平脉法》。详头摇条。

搐搦　证名。❶癫疯的别称。见《太平圣惠方》卷二十二。《证治准绳·伤寒》：“瘛者，筋急而缩也；疭者，筋缓而伸也。或伸缩而不止者，瘛疭也。俗谓之搐搦。”详瘛疭条。❷指四肢抽搐，伴十指开合，两手握拳的症状。《医碥》卷四：“抽搐者，手足频频伸缩也。或言抽搐者搦，谓十指频频开合，两拳紧捏也。”

摊缓　病证名。见《备急千金要方》卷七。又名摊缓风或瘫缓风。指瘫痪轻症。《圣济总录》卷七：“摊则懈惰而不能收摄，缓则弛纵而不能制物。故其证四肢不举，筋脉关节无力，不可枝梧者，谓之摊。其四肢虽能举动，而肢节缓弱，凭物方能运用者，谓之缓。”参瘫痪条。

摊缓风　病证名。见《太平圣惠方》卷二十。即摊缓。详该条。

〔丨〕

督脉病　病证名。指督脉经气异常而致的病症。《灵枢·经脉》：“督脉之别，名曰长强，挟脊上项，散头上，下当肩胛左右，别走太阳，入贯膂。实则脊强；虚则头重高摇摇。挟脊之有过者，取之所别也。”《素问·骨空论》：“督脉为病，脊强反折。……此生病，从少腹上冲心而痛，不得前后，为冲疝；其女子不孕，癥痔遗溺嗌干。”《脉经》卷二：“督脉之为病，脊疆而厥。”又：“尺寸俱浮，直上直下，此为督脉。腰背强痛不得俛仰，大人癫病，小儿风痫。”《杂病源流犀烛·督脉病源流》用羌活、荆芥、秦艽、细辛、黄连、附子总治督脉病。强厥者，用苏合香丸、藿香正气散；头重者，用川芎茶调散、白芷丸。

蒙昧　见《医学纲目》卷十七。即朦昧。详该条。

睛不和　病证名。指目视不清且眼球转动不灵活。见《伤寒论·辨阳明病脉证并治》。《伤寒溯源集》注：“睛，目瞳子也。睛不和，精神不能贯注，故视不明也。”《医宗金鉴》：“睛不和者，阳证也。此热结神昏之渐，危恶之候，急以大承气汤下之，泻阳救阴，以全未竭之水。”参目中不了了条。

暗风　病名。见《素问玄机原病式》。指由脏腑失调所致的风阳上亢的疾患，与内风相似。因在不知不觉中自内部逐渐发生，故称“暗”。以头晕目花为主要证候。《医钞类编·头痛门》：“暗风，头旋眼黑，昏眩倦怠，痰涎壅甚，骨节疼痛。”治疗可用羚犀汤等方。参肝阳眩晕、肝火眩晕、风痰眩晕条。

暗痧　痧证之一。❶《痧胀玉衡·暗痧》：“心中闷闷不已，欲食不食，行坐如常，即饮温热，不见凶处，更无心腹腰背疼痛之苦，但渐渐憔悴，日甚一日，若不知治，亦成大害，此痧之慢而轻者也，放之即愈。亦有头痛发热，心中作胀，类于伤寒；亦有寒热往来，似疟非疟，闷闷不已；亦有咳嗽烦闷，有似伤风；亦有头面肿胀，两目如火；亦有四肢红肿，身体重滞，不能转侧，此痧之慢而重者也。误服热汤、热酒、热物，遂乃沉重，或昏迷不醒，或痰喘气急，狂乱见凶。如遇是症，必先审脉辨症的确，果系何因，在表者刮，在中者放，在里者或丸，或散，或煎剂，必须连进数服，俟其少安，渐为调理。”方用宝花散、蒺藜散、沉香郁金散等。❷即妇女倒经痧。《杂病源流犀烛·痧胀源流》：“妇女倒经痧，经行之际，适遇痧发，经阻逆行，或鼻红，或吐红，肚腹肿胀，卧床不能转侧，肚腹不痛，亦为暗痧。若痧毒攻坏脏腑者不治，急放痧。宜五十三号大壮方。”参痧条。

嗜卧　病证名。出《素问·诊要经终论》。

又称多卧、善眠、多眠、多寐。指困倦欲睡，忽忽喜眠之症。多因湿胜、脾虚、胆热所致。湿胜者，兼见肢体虚浮或沉重，或大便溏薄，脉多濡缓，宜胃苓汤、平胃散等方。脾虚者，兼见四肢无力，精神困倦，脉弱，或见食后昏困，宜人参益气汤、六君子汤等方。胆热者，症见口苦，昏困多睡，宜半夏汤等方。参见胆热多睡条。也有因体气虚，不能适应气候变化所致者，如秋燥而见怠惰嗜卧，畏寒，不思饮食，兼见肺病，为阳气不伸之故，宜升阳益胃汤；长夏而见懒惰无力，坐定即昏倦欲睡，为肺脾气虚，不胜炎暑之故，宜清暑益气汤等方；病后嗜睡，多因正虚，余邪未净。伤寒少阴病见昏昏欲寐，属阳气虚衰之象。参多寐、多卧、多眠、善眠、饭醉、胆热多睡、病后多眠、胆风毒气、但欲寐等条。

嗌干 证名。出《素问·脉解篇》。嗌，即咽喉。指口咽干燥。详口干条。

嗌痛 证名。指咽部作痛，多由邪火上盛所致。《素问·缪刺论》："邪客于足少阴之络，令人嗌痛，不可内食。"《赤水玄珠·咽喉门》："嗌即咽之低处也。"又"盖病喉痹者，必兼咽嗌痛，病咽嗌痛不能兼喉痹也。"

噯气 证名。见《丹溪心法·噯气》。指气从胃中上逆，冒出有声之症。其声沉长，不似呃逆之声短促。常伴见胃脘饱胀。多因脾胃虚弱，胃气不和，或挟气、食、痰、火，使胃气上逆所致。也有因肺气不降而噯者。治宜和胃降逆为主。胃虚者，旋复代赭汤；脾肾虚寒者，理阴煎；胃虚气滞者，十味保和汤；胃有宿食者，曲术丸、保和丸；胃寒饮食难化者，养中煎或理中丸；胃虚挟痰者，和胃二陈煎；胃有痰火者，星夏栀子汤；肺气不降而噯者，苏子降气汤。

噯腐 证名。指噯气有腐臭味。多因脾胃虚弱，饮食失节，食滞不化，停积胃肠所致。《类证治裁·嘈症》："但由脾虚，饮食不化，吐沫噯腐，治宜健运。六君子汤加砂仁、鸡内金。……食后噯腐，保和丸。"参宿食病、伤食条。

蜈蚣中毒 病名。因被蜈蚣螫咬中毒。见《外台秘要》卷三十一。症见伤处剧痛，红肿热痛，淋巴管炎症甚至坏死。重者可伴头痛，发热，眩晕，呕吐，甚者可致昏迷。《本草纲目·百病主治药》载有解蜈蚣伤毒药物，如蜗牛、蛞蝓、五灵脂、独蒜、芸苔子油、蛇含、香附、苋菜、马齿苋、蚯蚓泥、胡椒、茱萸、桑根汁、雄黄、井底泥、食盐、鸡冠血、鸡子等。可参考。

蜣螂蛊 病名。蛊毒病之一。《诸病源候论·蛊毒病诸候》："其脉缓而散者，病发之时，身体乍冷乍热，手脚烦疼无时节，吐逆，小便赤黄，腹内闷，胸痛，颜色多青，毒或吐出，似蜣螂有足翅，是蜣螂蛊。经年不治，啖人血脉，枯尽而死。"参蛊、蛊毒病条。

〔丿〕

稠痰 痰证之一。《不居集》卷十七："稠痰，饮食衣褥过厚，火蒸津液成痰稠浊，又有火郁于心肺。"宜用海石、瓜蒌、半夏、诃子、杏仁、贝母、五倍子等。参痰证条。

愁气 七气之一。《诸病源候论·七气候》："愁气，则喜忘不识人，置物四方，还取不得去处，若闻急即手足筋挛不举。"参七气、九气条。

鼠疫 病名。疫疠之一。又名核瘟。指一种烈性传染病。见《鼠疫扶微·病情篇》。多因感触病鼠秽气，疫毒侵入血分所致。《鼠疫约编》："何谓鼠疫，疫将作而鼠先毙，人触其气，遂成为疫。"证见发病急骤，寒战发热，头痛面赤，肢节痠痛剧烈，全身尤以腋、胯起核，肿痛红热，或更见衄血、吐血、溲血、便血，或咳嗽气促，或迅速出现神志昏糊，周身紫赤，唇焦舌黑等。遇有病情，急向当地防疫部门报告。治宜清血热，

解疫毒，活血化瘀为主。参疫、瘟疫、疫疠等条。

鼠疸　病名。指因误食鼠粪污染之食物所致的黄病。《杂病广要·黄疸》："鼠疸。鼠盗饮食五谷。遗粪在内。人不拣择。误食则生黄。"治用神仙解毒万病丸。参黄疸条。

微风　古病名。以肌肉蠕动为主要症状。《素问·调经论》："肌肉蠕动，命曰微风。"多因风邪伤卫所致。详肌肉蠕动条。

微热　证名。指发热不甚的症状。可见于多种病症。❶阳明里实证的一种热型。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》："伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者，此为实也，急下之，宜大承气汤。"❷指阴虚血虚的发热。《证治准绳·杂病》："有每遇夜身发微热，……饮食如常，既无别证可疑，只是血虚阴不济阳，宜润补之。"❸指阴证发热。《类证活人书》卷四："身微热，烦躁面赤，脉沉而微，此名阴证似阳也。"❹指五脏微热。《景岳全书·杂证谟》："治五脏之热，当察微甚，如心经之微热者，宜二阴煎、安神丸、天王补心丹、导赤散之类，皆可随证酌用。"参发热条。

腠理热　病症名。❶泛指皮肤、肌肉间有发热感觉。见《素问·六元正纪大论》。❷指少阳发热。一般以皮肤属太阳，肌肉属阳明，腠理属少阳。《伤寒贯珠集·少阳篇》："血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下，正邪分争，往来寒热，休作有时，嘿嘿不欲饮食，藏府相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。"《伤寒论翼·少阳病解》："少阳为游部，其气游行三焦，循两胁，输腠理，是先天真元之气，所以谓之正气，正气虚，不足以固腠理，邪因腠理之开，得入少阳之部。"故腠理热即少阳病之往来寒热，病在半表半里，治宜和解。参发热条。

膜郁　指呼吸急促，胸部满闷。《素问·至真要大论》："诸气膜郁，皆属于肺。"《内经知要》卷下："膜者，喘急上逆；郁者，否塞不通。肺主气，气有余者，本经自伏之火，气不足者，则火邪乘之；虚实之分，极易淆误，所当精辨。"虚喘、实喘或其他疾患皆可见此证。参喘胀、喘满、喘证等条。

膜菀　菀，古与"郁"音义相通。膜菀即膜郁。详膜郁条。

腰以下肿　水肿证型之一。《金匮要略·水气病脉证并治》："诸有水者，腰以下肿，当利小便。"腰以下肿，病邪在里在下，可用利小便的方法，使潴留于下部的水以小便的形式排出。《金匮要略》用防己茯苓汤、蒲灰散等方；《医方考·水肿门》用加味五皮饮；《医宗金鉴》用五苓、猪苓等方；《杂病源流犀烛·肿胀源流》谓肿在腰以下者，宜利小便，即经所谓洁净府也。治宜防己、昆布、海藻、海金沙、赤小豆、茯苓、猪苓等药。参水肿条。

腰以上肿　水肿证型之一。《金匮要略·水气病脉证并治》："诸有水者，腰以下肿，当利小便；腰以上肿，当发汗乃愈。"腰以上肿，由于病邪在表在上，一般用发汗的方法，使潴留于上部的水以汗液的形式排出。《金匮要略》用越婢汤、越婢加术汤；《医方考·水肿门》用九味羌活汤；《杂病源流犀烛·肿胀源流》："肿在腰以上者，宜发汗，即经所谓开鬼门也……。宜麻黄、羌活、防风、柴胡、牛蒡子、葱白、忍冬藤以开之。"参水肿条。

腰尻痛　证名。出《灵枢·本脏》。尻，脊骨之末端。腰尻痛以肾与督脉虚寒最为多见。治宜温补。也有因湿痰与血瘀所致者。详肾虚腰痛、湿痰腰痛、瘀血腰痛等条。

腰足痛　证名。见《针灸甲乙经》卷九。又称腰脚痛。详该条。

腰软　证名。见《医学入门》卷四。自觉腰部软弱无力。因于湿袭经络者，宜肾着汤、渗湿汤；风袭腰背者，宜牛膝酒；房室过度、肾阴不足者，宜八味丸、补髓丹、煨

肾丸等；肾虚风袭者，宜安肾丸等方。参腰痛条。

腰股痛 证名。出《素问·气交变大论》。又称腰腿痛。指腰痛连及股部之症。以肾虚风寒湿侵袭者多见。治宜补肾，祛风散寒化湿为主。可选用萆薢散、牛膝丸等方。

腰背痛 证名。出《灵枢·五癃津液别》。指腰部疼痛连及背部之症。多因肾气虚弱，风寒侵袭所致。治宜补肾祛邪。可用独活寄生汤、菊花酒。若久坐则腰背作痛，可用补中益气汤、八珍汤。参腰痛条。

腰重 证名。见《中藏经·论肾藏虚实寒热生死逆顺脉证之法》。指自觉腰部沉重。多因肾虚水湿停滞所致。宜用甘姜苓术汤、三圣汤、渗湿汤、轻腰汤等方。参肾着条。

腰热 指腰部有热的感觉。见《灵枢·论疾诊尺》。腰为肾之府，肾虚或邪气在肾，可见腰热。《医学纲目》卷五："热在腰或痛属肾。肾居腰，肾热则当腰亦热。"参发热条。

腰胯疼痛 证名。指腰痛连及两股俱痛者。见《太平圣惠方》卷四十四。因肾虚风邪侵袭所致者，可用虎骨散、牛膝丸等方；因湿热下流所致者，可用清热胜湿汤。《张氏医通·诸痛门》："寒湿流注于足少阳之经络，则为腰胯痛，盖腰乃胆经之所过。"因受寒湿者，可用渗湿汤加减；因痰滞经络者，可用导痰汤加减。

腰脊痛 证名。出《素问·标本病传论》。指腰椎及其近处疼痛。多因扭挫损伤、瘀血停滞、风寒湿邪侵袭经络及过劳伤肾所致。详闪挫腰痛、瘀血腰痛、风湿腰痛、肾虚腰痛等条。

腰脊强 证名。出《素问·热论》。指腰脊部筋肉拘紧，活动不利。可见于伤寒、痉、痹等病症。详各条。

腰疼 证名。见《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证治》。疼，义同痛。详腰痛条。

腰脚冷痹 证名。因风寒湿毒之气侵袭腰脚所致。《太平圣惠方》卷四十四："夫腰脚冷痹者，由风寒湿三毒之气，共伤于人，合而成痹也。此皆肾弱髓虚，为风冷所搏故。肾居下焦而主腰脚，其气荣润骨髓，今肾虚受于风寒，湿气留滞于经络，故令腰脚冷痹疼痛也。"宜用仙灵脾散、独活散等方。参痹条。

腰脚痛 证名。又称腰足痛。指腰痛连及下肢之症。多因肾虚，风寒湿侵袭所致。《诸病源候论·腰背病诸候》："肾气不足，受风邪之所为也。劳伤则肾虚，虚则受于风冷，风冷与真气交争，故腰脚痛。"治宜补肾强骨，祛风散寒化湿。可用壮肾散、萆薢散、牛膝丸、地黄酒等方。

腰脽（chuí）痛 证名。脽，臀部。腰痛连及臀部。多因寒湿侵袭，气血瘀滞所致。《素问·六元正纪大论》："感于寒，则病人关节禁固、腰脽痛，寒湿推于气交而为疾也。"治参寒腰痛、寒湿腰痛、瘀血腰痛等条。

腰腿痛 证名。见《普济本事方·肾脏风及足膝腰腿气》。又称腰股痛。如肾经虚损，腰腿疼痛者，可用青娥丸、壮肾散等方。有外邪者，治以壮筋祛邪。详腰股痛条。

腰痛 证名。出《灵枢·经脉》。指腰部疼痛。腰为肾之外候，诸脉多贯于肾而络于腰背。故凡年高、病久，劳倦过度，情志所伤，房室不节而使脏气虚衰；或因感邪、外伤而使腰部经脉不利，气血不畅等，皆可导致腰痛。《济生方·腰痛》："腰者肾之府，转摇不能，肾将惫矣。审如是说，则知肾系于腰，因嗜欲过度，劳伤肾经，肾脏既虚，喜怒忧思，风寒湿毒，得以伤之，遂致腰痛。又有坠下闪肭气凝血滞，亦致腰痛。"大抵外邪、外伤所致者，以急性腰痛居多，治以祛邪疏通为主；内伤虚损以慢性腰痛多见，治以补肾强筋为主。《景岳全书·杂证谟》："腰痛证凡悠悠戚戚，屡发不已者，

肾之虚也；遇阴雨或久坐痛而垂者，湿也；遇诸寒而痛，或喜暖而恶寒者，寒也；遇诸热而痛及喜寒而恶热者，热也；郁怒而痛者，气之滞也；忧愁思虑而痛者，气之虚也；劳动即痛者，肝肾之衰也。辨其所因而治之。”根据腰痛程度、部位、病因、症状的不同，有腰脊痛、腰背痛、腰胯痛、腰脚痛、卒腰痛、久腰痛及外感腰痛、内伤腰痛等。详各条。本证可见于各种脊椎炎、腰椎间盘脱出、脊椎肿瘤、纤维织炎、腰肌劳损及肾下垂、肾盂肾炎、肾结核、肾结石和盆腔疾病等。

腰痛痧　痧证之一。《痧胀玉衡·腰痛痧》：“痧毒入肾，则腰病不能俛仰。若误饮热汤、热酒，必然烦躁昏迷，手足搐搐，舌短耳聋，垂毙而已。”痧中肾脉或左尺虚微，右尺洪实，或兼歇止者，急刺腿湾出黑血；刺中魁穴，以香油钱刮命门穴。方用桃花散等。参痧条。

腰酸　证名。指腰部酸楚不适的感觉。多因肾虚所致。《张氏医通·诸痛门》：“腰酸悉属房劳肾虚，惟有峻补。”方用青娥丸、六味丸、八味丸加减。然腰酸与腰痛有相似之处，且常可酸痛并见，也有虚实寒热之别。参腰痛条。

腰膝注痛　证名。见《本草纲目》卷四。指腰痛连及膝部之症。多因肾亏风湿侵袭所致。宜用独活寄生汤、牛兔丸、海桐皮酒等方。

腿腿　病证名。见《医说》卷三。即腿腿风。详该条。

腿腿风　即猥退风。见《医学纲目》卷十。《万病回春·中风》：“腿腿风者，半身不遂，失音不语也。”参猥退风条。

腨痈　古病名。指小腿肚痰痛的症象。《素问·阴阳别论》：“三阳为病，发寒热，下为痈肿，及为痿厥腨痈。”腨，俗称腿肚，为足太阳经脉循行部位。《医碥》卷三：“腨痈，足肚痰疼也。痈音渊。足太阳膀胱病，防风、羌活、紫苏、蔓荆之类。”

腹上麻痹　证名。指腹部皮肤麻木不仁。见《医学入门》卷八。《杂病源流犀烛·腹少腹源流》：“夏月洗浴后，往往露腹当风，其腠理开，邪因入皮毛，适与卫气相值，因搏击而为麻顽不仁。”可用葱白煮食治疗。

腹中干痛　证名。指不吐不泻、痛有间歇的腹痛，多因虫扰作痛。《医方考·腹痛门》：“腹中干痛有时者，虫痛也。……干痛者，不吐不泻而但痛也。”治用雄黄槟榔丸；甚者，加吐下驱虫药。参虫积腹痛条。

腹中如铁石　病证名。《医学入门》卷八：“腹中如铁石，脐中出水，旋变作虫行之状，绕身匝啄，痒痛难忍，翎毛拨扫不尽，外用苍术煎浓汤浴之，内用苍术为末，入麝香少许，水调服之即愈。”

腹中疡（jiǎo）痛　证名。指腹部筋脉拘急，绵绵作痛。多由血虚寒气阻滞所致。《金匮要略·妇人妊娠病脉证并治》：“妇人怀娠，腹中疗痛，当归芍药散主之。”又《金匮要略·妇人产后病脉证治》：“产后腹中疗痛，当归生姜羊肉汤主之；并治腹中寒疝，虚劳不足。”《金匮要略方论集注·妇人产后病脉证治》：“徐忠可曰：疗痛者，缓缓痛也。概属客寒相阻，故以当归通血分之滞，生姜行气分之寒。然胎前责实，故当归白芍散内加茯苓泽泻；泻其水湿，此之产后大概责虚，故君之以羊肉，所谓形不足者补之以味也。”参腹痛条。

腹中窄狭　病证名。指自觉腹中窄狭，饮食难进的病症。《丹溪心法》卷四：“腹中窄狭，须用苍术。若肥人自觉腹中窄狭，乃是湿痰流灌脏腑，不升降，燥饮用苍术，行气用香附。如瘦人自觉腹中窄狭，乃是热气薰蒸脏腑，宜黄连、苍术。”《医林绳墨·腹痛》：“饮食不进，而腹中窄狭者，此症何所属也？皆因本元虚弱，肠胃空虚，不能健运，有致膈蓄稠痰，胃纳邪气，以致饮食不进，水谷不化，出纳之官有阻，健运之司失职。治宜健脾温中之剂，如二陈汤加苍

术、厚朴、干姜、香附之类。又有思虑太甚，饮酒伤脾，房劳太过，腹中窄狭者，遇饮食咽嗌不下，闭塞不开，有难进退者也，大法宜以补养脾胃，而兼清气宽中之剂，如二陈汤加归、术、苍、朴、沉香、木香可也。”亦可选用越鞠丸，平胃散等方。

腹中绞痛 证名。指腹部痉挛性的剧痛。❶痞症主要症状之一。见《痞胀玉衡》。参绞肠痧条。❷伤寒病劳复证候之一，见《类证活人书》卷五。由于伤寒新愈，阴阳之气未和，过早行房而致。参阴阳易、腹痛条。

腹中痛 证名。见《中藏经·论胃虚实寒热生死逆顺脉证》。详腹痛条。

腹中雷鸣 证名。即肠鸣。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：“伤寒汗出解之后，胃中不和，心下痞鞕，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣，下利者，生姜泻心汤主之。”参肠鸣条。

腹中满痛 证名。见《伤寒明理论》卷一。指腹内胀满疼痛。有表里虚实之分，《类证活人书》卷十一：“腹满时痛，是有表复有里，仲景所以用桂枝加芍药汤主之。”又“腹满时痛，属太阴也，自利不渴者，脏寒也，当温之，宜四逆汤、理中汤也。”《医学纲目·伤寒部》：“病腹中满痛者，此为实也，宜大承气汤下之。”《伤寒补天石》卷下：“腹满不减，或按之硬而痛者，为内实，须下之，大承气汤。腹满时减，或按之可揉而软者，为内虚，须温之，宜理中汤。”参腹痛条。

腹皮急 证名。指腹壁绷急紧张。可见于肠痈等病。《金匮要略·疮痈肠痈浸淫病脉证并治》：“肠痈之为病，其身甲错，腹皮急。”参外科骨伤五官科分册肠痈条。

腹皮绷急 证名。指腹部皮肤紧绷。见《杂病源流犀烛·腹少腹病源流》。常见于单腹胀，鼓胀等病。详各条。

腹皮痛 证名。出《灵枢·经脉》：“任脉之别，名曰尾翳，下鸠尾，散于腹，实则腹皮痛……。”马莳注：“邪气有余，则腹皮必痛。”参腹痛条。

腹冷痛 证名。见《丹溪心法·腹痛》。指感寒或脾胃虚冷所致的腹痛。《伤寒类证活人书·问腹痛》：“尺脉弦，肠鸣泄利而痛者，冷痛也，小建中汤主之。”《证治要诀·腹痛》：“若冷痛，用温药不效，痛愈甚，大便不甚通，当微利之，用藿香正气散，每服加官桂、木香、枳壳各半钱，吞下来复丹或用苏感丸，不利，则量虚实用神保丸。”又：“有全不喜食，其人本体素怯弱，而又加以腹冷疼者，养胃汤。”如手足俱冷，其痛绵绵不休，脉迟而微细，宜附子理中汤加吴萸、肉桂等。参腹痛、冷气腹痛条。

腹胀 证名。出《素问·玉机真藏论》。一作腹疼。指腹部胀满不适，或腹部胀大。《诸病源候论·腹胀候》：“腹胀者，由阳气外虚，阴气内积故也。阳气外虚，受风冷邪气，风冷，阴气也。冷积于府藏之间不散，与脾气相壅，虚则胀，故腹满而气微喘。”《张氏医通·腹满》：“腹胀诸证，虽属寒者多，属热者少，然世治胀，喜用辛温散气之药。……有气虚不能裹血，血散作胀，必其人大便不坚，或时结时溏，溏则稍减，结则渐加，小便清利，甚则浑白如泔，其脉缓大而滞，气口益甚，慎不可用辛温耗气之药，宜四君子去白术加木香、泽泻、当归、芍药，以固其气中之血。有血虚不能敛气，气散作胀，必其人烦热便燥，小便黄数，其脉浮数而弦，人迎尤甚，慎不可用苦寒伤胃之药，宜四物汤去地黄加黄芪、肉桂、甘草、煨姜，以和其血中之气。外因六气成胀，藿香正气散。内因七情成胀，沉香降气散。忧思过度，致伤脾胃，心腹膨胀，喘促烦闷，肠鸣气走，漉漉有声，大小便不利，脉虚而濇，局方七气汤。浊气在上，则生膜胀，生姜泻心汤加木香、厚朴。脾胃不温，不能腐熟水谷而胀，附子理中汤。肾藏虚寒，不能生化脾土而胀，济生肾气丸。”食积、虫积、痰饮等亦可导

致腹胀。详腹胀诸条。

腹痛　证名。出《素问·气交变大论》。指脘腹、脐腹、少腹部等疼痛。《症因脉治·腹痛论》："痛在胃之下，脐之四傍，毛际之上，名曰腹痛。"《东医宝鉴·腹》卷三："腹痛有六，有寒、有热、有死血、有食积、有痰饮、有虫。"《景岳全书·心腹痛》："痛有虚实，……但当察其可按者为虚，拒按者为实，久痛者多虚，暴痛者多实，得食稍可者为虚，胀满畏食者为实；痛徐而缓，莫得其处者多虚，痛剧而坚，一定不移者为实；痛在肠脏中，有物有滞者多实，痛在腔胁经络，不干中脏而牵连腰背，无胀无滞多虚。"《医宗必读》卷八："腹痛分为三部，脐以上痛者太阴脾，当脐而痛者为少阴肾，少腹痛者为厥阴肝及冲、任、大小肠。"《临证指南医案·腹痛》邵新甫按："腹处乎中，痛因非一，须知其无形及有形之为患，而主治之机宜，已先得其要矣。所谓无形为患者，如寒凝火郁，气阻营虚，及夏秋暑湿痧秽之类是也；所谓有形为患者，如蓄血食滞，癥瘕虫蛲内疝及平素偏好成积之类是也。"《症因脉治·腹痛》则概括腹痛为内外二因，以风气、寒气、暑湿、燥火、痧胀等为外感，热积、食积、酒积、血滞、气凝、寒积、痰积、虫积、血虚、气虚等为内伤。《寿世保元·腹痛》："治之皆当辨其寒热虚实，随其所得之症施治，若外邪者散之，内积者逐之，寒者温之，热者清之，虚者补之，实者泻之，泄则调之，闭则通之，血则消之，气则顺之，虫则追之，积则消之，加以健理脾胃，调养气血，斯治之要也。"参腹痛诸条。

腹满　证名。俗称肚胀。指腹部胀满的感觉。《素问·藏气法时论》："脾病者，……虚则腹满肠鸣，飧泄食不化。"《伤寒明理论》卷一："腹满者，俗谓之肚胀是也。"有虚实寒热之分。《本经疏要》卷三："胀满而按之痛者为实，不痛者为虚；胀满而时能减者为寒，不减者为热。厚朴生姜甘草人参汤、大建中汤、附子粳米汤，虚而寒者之治也；大承气汤、大柴胡汤、厚朴七物汤、厚朴三物汤，实而热者之治也。"亦可见于蛊胀病。《医林绳墨·臌胀》："由山岚蛊毒之气，因感入腹，聚而不散，结为腹满之症。治当利其肠胃，去其寒积，则蛊自除，而胀可平矣。如承气汤加黄连、甘草、雄黄、槟榔之类。"参蛊胀条。

腿痛　证名。指腿部肌肉、筋脉或关节间作痛。《张氏医通·腿痛》："腿痛亦属六经。……痛有血虚、血寒、寒湿、风湿、湿热流注、阴虚阳虚、肾虚风袭之殊。"因寒者，症见腿痛轻甚，或麻，或肿，恶寒喜暖，宜温散为主，方用白术附子汤、舒筋三圣散等；因湿热者，症见腿痛或上或下，或红肿，或热，溲赤等。治宜清化为主，方用当归拈痛汤等；因湿痰流注经络者，常见腰胁有块，两腿互换作痛，痛无定处，泛恶头眩等。治宜燥湿化痰，方用二陈汤加羌活、白术等。阴虚者用六味丸等；阳虚者用八味丸等。肾虚风袭者，用安肾汤。腿为足六经所循，可按病痛部位的不同选用各引经药。参臂痛条。

触恶　病名。霍乱的俗称。《证治要诀》卷一称："霍乱之病，挥霍变乱，起于仓卒，与中恶相似，俗呼为触恶。"详见霍乱条。

解㑊　病证名。指肢体困倦，筋骨懈怠，肌肉涣散无力。《素问·平人气象论》："尺脉缓涩，谓之解㑊。"《类经》卷十六："解，懈也；㑊，迹也。身体解㑊，谓不耐烦劳，形迹困倦也。"《杂病源流犀烛·虚损痨瘵源流》："解㑊，肝肾虚病也。……解㑊者，寒不寒，热不热，弱不弱，壮不壮，伥不可名，谓之解㑊也。据此，则知解㑊一症，洵由肝肾二经之虚，盖肝主筋，肾主骨，肝虚则筋软缓而无力以束，无力以束则周身之肌肉皆涣散而若解。肾虚则骨萎苶而不能自强，

不能自强则遍体之骨节皆松懈而多怵。”可见于虚损、痨瘵等慢性消耗性疾患及热性病的恢复期等。

〔丶〕

痲 古病名。通“淋”。《古代疾病名候疏义·释名病疏》：“古之所谓痲，指小便淋沥涩痛而言。”详淋条。

痱 病名。指上下四肢废而不用的疾患。又名风痱。《灵枢·热病》：“痱之为病也，身无痛者，四肢不收。智乱不甚，其言微知，可治。甚则不能言，不可治也。”详风痱条。

瘤冷证 指寒邪长期沉伏于肠胃，阳结不解的病证。见《千金要方》卷十六。《三因极一病证方论·瘤冷积热证治》：“瘤冷者，中寒也。多因真气既微，胃气不实，复啖生冷冰雪之属，致肠胃虚寒，阴既停凝，阳不能正，大便洞泄，小便频并，鼻多清涕，呕吐涎沫，水谷不化，洒洒淅淅，皆阳虚阴盛之所为也。”治宜温补下元，健脾养胃，祛寒邪，固真气，如金液丹、真武汤、附子理中汤、四神丸，以及回阳返本汤等，均可选用。

瘤病 即瘤疾、瘤病。《灵枢·九针论》：“四时八风之客于经络之中，为瘤病者也，……必笃其身而锋其末，令可以泻热出血，而瘤病竭。”参瘤疾、瘤病条。

瘤疾 亦称瘤病、瘤病。指久延不愈的顽固疾病。见《难经·十八难》。瘤疾与卒病相对而言。如先有瘤疾，又得卒暴病证，一般当先治卒病，后治瘤疾，有时也可兼治。参瘤病、瘤病条。

痫疚 即癫疚。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。详癫疚条。

痴呆 病名。癫病的别称。《景岳全书》卷三十四：“痴呆证，凡平素无痰，而或以郁结，或以不遂，或以思虑，或以疑贰，或以惊恐，而渐至痴呆。言辞颠倒，举动不经，或多汗，或善愁，其证则千奇万怪，无所不至；脉必或弦或数、或大或小，变易不常。此其逆气在心或肝胆二经，气有不清而然。但察其形体强壮，饮食不减，别无虚脱等证，则悉宜服蛮煎治之，最稳最妙。然此证有可愈者，有不可愈者，亦在乎胃气元气之强弱，待时而复，非可急也。凡此诸证，若以大惊猝恐一时偶伤心胆，而致失神昏乱者，此当以速扶正气为主，宜七福饮或大补元煎主之。”参见癫、呆病条。

痿 病名。出《素问·痿论》。亦称痿躄。指四肢痿软无力。尤以下肢痿废，甚至肌肉萎缩的一种病症。《证治准绳·杂病》：“痿者手足痿软而无力，百节缓纵而不收也。”《儒门事亲》卷一：“躄者，足不能伸而行也。”其发病原因，《内经·痿论》谓因五脏之热，以皮、肉、脉、筋、骨五种分属五脏，并有肺热叶焦，发为痿躄之说。又阳明经脉虚，血气少，不能润养宗筋与劳累过度，居处潮湿，也可导致本病。仲景在《伤寒论》中认为伤寒病汗、吐、下后可以成痿；在《金匮要略》谓酸伤筋，咸伤骨亦足以致痿。朱丹溪倡肾水不能胜心火，火上烁肺与湿热、湿痰、瘀血，可以致痿。后世又有暑痿、夏痿、食积痿、血虚痿、气虚痿、肾肝下虚痿、痢后痿等名。治疗法则，《内经》谓“独取阳明”，朱丹溪主“补南泻北”。此外，尚有清热润燥、清热燥湿、滋阴养血、补益肝肾、益气健脾、化痰、行瘀、消导等，并可结合针灸、推拿。本病可见于中枢或周围神经、肌肉、内分泌及其它系统的多种器质性或功能性疾患。

痿阳不振 病证名。见《石室秘录》卷二。即阳痿。详该条。

痿易 古病名。痿的别称。因四肢痿弱，变易正常的作用，故名。《素问·阴阳别论》：“三阳三阴发病，为偏枯痿易，四支不举。”张志聪注：“痿易者，委弃而不能如常之动作也。”详痿条。

痿黄　病证名。即萎黄。见《金匮要略·黄疸病脉证并治》。指身黄而色不润泽，但两目并不发黄的病症。详萎黄、黄胖、脱力黄条。

痿厥　病证名。指痿病而致气血厥逆的病证。《灵枢·邪气藏府病形》："脾脉……缓甚为痿厥。"《类经·刺四支病》："痿厥者必体废，张其四支而取之，故血气可令立快也。"《张氏医通·厥》："痿厥者，痿病与厥杂合而足弱痿无力也。"参痿、厥证条。

痿躄　病名。指痿病四肢痿弱，足不能行之症。又为五脏痿病之总称。《素问·痿论》："五藏因肺热叶焦，发为痿躄。"《顾氏医镜》："言五脏之痿，皆因于肺气之热，致五脏之阴俱不足而为痿躄。五痿虽异，总曰痿躄。"详痿条。

痹　❶病名。指风寒湿邪侵袭经络、痹阻气血，引起以关节、肌肉疼痛、拘急为主症的一类疾病。《素问·痹论》："风寒湿三气杂至，合而为痹也。其风气胜者为行痹，寒气胜者为痛痹，湿气胜者为着痹也。"❷泛指病邪闭阻肢体、经络、脏腑所致的各种疾病，包括前义所指病症。《中藏经·论痹》："痹者闭也。五脏六腑，感于邪气，乱于真气，闭而不仁，故曰痹。"痹症有风痹、寒痹、湿痹、热痹、痛风、走注、周痹、众痹、顽痹、血痹、气痹、皮痹、肌痹、脉痹、筋痹、骨痹、心痹、肝痹、脾痹、肺痹、肾痹、胞痹、肠痹及十二经筋病等。详各该条。

痹气　古病名。指气血痹闭而致的一类疾病。由于阳气虚少，阴寒内盛，以致气滞血涩，而闭阻不通。可见身冷或身痛等症。《素问·逆调论》："是人多痹气也，阳气少，阴气多，故身寒如从水中出。"《灵枢·官针》："病痹气痛而不去者，取以毫针。"《圣济总录·痹气》："痹气内寒者，以气痹而血不能运，阳虚而阴自胜也，血凝泣而脉不通，故其证身寒如从水中出也。"可用温补鹿茸丸、补益黄芪丸，以及附子丸等方施治。

瘀血头痛　病证名。指头部外伤或由久病入络引起的头痛。见《医碥·头痛》。症见头痛如锥刺，痛有定处，时发时止，经久不愈，或面色晦滞，舌有瘀斑，脉涩等。《医林改错》以头痛"无表症，无里症，无气虚痰饮等症，忽犯忽好，百方不效"者，属瘀血。宜活血化瘀为主。常用通窍活血汤、血府逐瘀汤加减。兼气虚者加黄芪，痛甚者加全蝎、蜈蚣、地龙、白芷等。本证可见于血管性头痛，脑震荡后遗症等病。参头痛条。

瘀血发热　病证名。指因瘀血所致的发热。《伤寒全生集·辨内伤瘀血症发热状类伤寒》："凡跌扑损伤，或被人踢打，或物相撞，或致挫闪，一时不觉，过至半日或一二三日而发者有之，十数日或半月一月而发者有之。一般寒热交作，其心胸胁下小腹满痛，按之手不可近者，此有瘀血也。或一时伤重，就发寒热，瘀血上冲，则昏迷不省如死之状，良久复苏，轻则当归导滞汤，重则桃仁承气汤加苏木、红花、牛膝、桔梗、姜汁，量其元气，下其瘀血则愈。"《金匮翼·瘀血作热》："瘀血发热者，其脉濇，其人但漱水而不欲咽，两脚必厥冷，少腹必结急，是不可以寒治，不可以辛散，但通其血，则发热自止，当归承气汤。"《不居集》下集："瘀之日久，则发为热，热涸其液，则干枯于经络之间，愈干愈热，愈热愈干，而新血皆枯，……补之不可，凉之不可，而立大黄䗪虫丸。"因瘀血部位不同，证治各有所异。《血证论·发热》："瘀血发热者，瘀血在肌肉则翕翕发热，证象白虎，口渴心烦，支体刺痛，宜当归补血汤，合甲巳化土汤加桃仁、红花、柴胡、防风、知母、石膏；血府逐瘀汤亦治之。瘀血在肌腠则寒热往来，以肌腠为半表半里，内阴外阳，互相胜复也。宜小柴胡汤加当归、白芍、丹皮、桃仁、荆

芥、红花治之，桃奴散加黄芩、柴胡亦治之。瘀血在腑，则血室主之。证见日晡潮热，昼日明了，暮则谵语，以冲为血海，其脉丽于阳明，故有阳明燥热之证，桃仁承气汤治之，小柴胡汤加桃仁、丹皮、白芍亦治之。瘀血在脏，则肝主之，以肝司血故也。证见骨蒸痨热，手足心烧，眼目青黑，手发摧折，世以为难治之证，而不知热血在肝脏使然，宜柴胡清骨散加桃仁、琥珀、干漆、丹皮治之。”参发热等条。

瘀血发黄 病证名。见《医学入门》卷五。即蓄血发黄。《证治汇补》卷三：“瘀血发黄，喜忘如狂，溺清，便黑。”《张氏医通·杂门》：“有瘀血发黄，大便必黑，腹胁有块或胀，脉沉或弦，大便不利，脉稍实而不甚弱者，桃核承气汤。下尽黑物则退。”详蓄血发黄条。

瘀血闭结 病证名。指便秘之由于瘀血而致者。《血症论·便闭》：“瘀血闭结之证，或失血之后血积未去，或跌打损伤内有瘀血，停积不行，大便闭结，或时通利，仍不多下，所下之粪又带黑色，腹中时时刺痛，口渴发热，脉带涩象，宜用桃仁承气汤治之。或失笑散加杏仁、桃仁、当归、白芍。”参血秘条。

瘀血胃脘痛 病证名。指瘀血内结所致的胃脘痛。见《东医宝鉴·外形篇》卷三。《症因脉治》卷一：“遇夜痛甚，逢冷即痛，按之有形，或饮食入胃，从半边而下，此淤血痛也。”《医学三字经》卷一：“瘀血作痛，痛如刀割，或有积块，脉涩，大便黑，宜桃仁承气汤、失笑散。”《四明心法·胃脘痛》：“血痛者，胸膈刺痛，脉必濡滥，食可进，四物汤加大黄、桃仁、红花主之。”参胃脘痛、血心痛条。

瘀血咳 病证名。又称瘀血嗽、瘀血咳嗽。指咳嗽之由瘀血引起者。《医学入门》卷五：“瘀血咳，则喉间常有腥气。轻者，泻白散加生地、山栀、牡丹皮、麦门冬、桔梗；重者，桃仁、大黄、姜汁为丸服。或因打损劳役伤肺，遇风寒则咳，或见血紫黑色者，四物汤去芎加大黄、苏木为末，酒调服，利去心肺间瘀血即止，后服人参养荣汤调理。肺胀满，即痰与瘀血碍气，所以动则喘急，或左或右，眠一边不得者是，四物汤加桃仁、诃子、青皮、竹沥、姜汁。”参瘀血嗽、瘀血咳嗽、损嗽、咳嗽条。

瘀血咳嗽 病证名。指瘀血壅阻肺脏引起的咳嗽。《血证论·咳嗽》：“有咳嗽侧卧一边，翻身则欬益甚者。……盖瘀血偏著一边，以一边气道通，一边气道塞，气道通之半边，可以侧卧，气道塞之半边，侧卧则更闭塞，是以翻身则愈加欬逆也，宜血府逐瘀汤加杏仁、五味子主之。侧卧左边者，以左边有瘀血，故不得右卧也，右卧则瘀血翻动，益加壅塞，宜加青皮、鳖甲、莪术，以去左边之瘀血。侧卧右边者，以右边有瘀血，故不得左卧也，宜加郁金、桑皮、姜黄，以去右边之瘀血。凡此瘀血咳嗽之证。”参瘀血咳、咳嗽条。本证可见于支气管扩张、肺结核或一侧性胸腔积液。

瘀血短气 病证名。见《医学衷中参西录·血病门》。指血阻于内致气机升降不利者。多因负重拼伤，或郁怒伤肝，血络瘀阻所致。证见胁下支撑作痛，呼吸困难，有短促感。形体羸弱，遇怒恼则胁痛加剧等。治宜化瘀为主，可用麦芽煎汤吞服参三七粉或桃红四物汤、复元活血汤等。

瘀血腰痛 病证名。腰痛之一。又名血瘀腰痛、沥血腰痛。《金匮翼·腰痛》：“瘀血腰痛者，闪挫及强力举重得之。盖腰者一身之要，屈伸俯仰，无不由之。若一有损伤，则血脉凝涩，经络壅滞，令人卒痛，不能转侧，其脉濇，日轻夜重者是也。”详沥血腰痛条。

瘀血腹痛 病证名。见《古今医鉴·腹痛》。多由寒凝血阻，或热与血结，或久病入络，气滞血瘀，或跌扑损伤，瘀血停聚而

成。证见腹痛固定一处，喜热拒按，持续不愈，或有积块，或遇夜更痛，舌质紫暗或有瘀点，脉濇等。治宜活血祛瘀，行气止痛。选用消瘀饮、活血汤，膈下逐瘀汤，少腹逐瘀汤等方。参腹痛、血滞腹痛条。

瘀血嗽　病证名。见《万病回春》卷四。即瘀血咳。详该条。

瘀呃　病证名。指瘀血阻滞所致的呃逆。《证治汇补·呃逆》："瘀呃，心胸刺痛，水下即呃，脉芤沉涩。"《医林改错》卷上："呃逆俗名打咯忒，因血府血瘀。"《张氏医通·呃逆》："有饮热饮冷而呃，背微恶寒，目睛微黄，手足微冷，大便溏黑者，属瘀血。"亦可见连连作呃，日久不愈，至晚发热等证。治宜活血化瘀，用桃核承气汤、血府逐瘀汤等。参呃逆条。

瘴　❶读作"疸"（dǎn）；又读作"旦"（dàn），通疸。黄瘴病，即黄疸。《伤寒明理论·发黄》："瘴者黄也。"详见黄疸条。❷音"单"（dān），指热症。出《素问·奇病论》。如脾热口甘称脾瘴；胆热口苦称胆瘴。详脾瘴、胆瘴条。

瘴疟　病名。疟疾之一。❶以但热不寒为主症之症。又称暑疟、温疟、阳明瘴热。《素问·疟论》："其但热而不寒者，阴气先绝，阳气独发，则少气烦冤，手足热而欲呕，名曰瘴疟。""瘴疟者，肺素有热，气盛于身，厥逆上冲，中气实而不外泄，因有所用力，腠理开，风寒舍于皮肤之内，分肉之间而发，发则阳气盛，阳气盛而不衰，则病矣。其气不及于阴，故但热而不寒，气内藏于心，而外舍于分肉之间，令人消烁脱肉，故名曰瘴疟。"《景岳全书》卷十四："瘴疟一证……治此之法有三，如热邪内蓄而表邪未解者，则当散以苦凉；如热因邪致，表虽解而火独盛者，则当清以苦寒，此皆治其有余也；若邪火虽盛而气血已衰，真阴日耗者，急宜壮水固元，若但知泻火，则阴日以亡，必致不救。"参见有关各条。❷指疟发于三阴者。《保命集·诸疟论》："《内经》曰，五脏皆有疟，其治各别，……在阴经则不分三经，总谓之温疟。"参疟疾条。

瘴热　古病名。指热性病。《灵枢·论疾诊尺》："冬伤于寒，春生瘴热。"亦指热盛。《素问·举痛论》："热气留于小肠，肠中痛，瘴热焦渴，则坚干不得出，故痛而闭不通矣。"参发热条。

痰中　病名。类中风之一。见《证治汇补·似中风章》。又名湿中。《医学心悟·类中风》："湿中者，即痰中也。"多由湿盛生痰，痰生热，热生风而致病。症见猝然眩晕，发麻，昏倒不省人事，舌本强直，喉有痰声，四肢不举，脉象洪滑等。治宜化痰为主，参以熄风。用苍白二陈汤或导痰汤加减。可见于脑血管痉挛、脑血栓形成等病。

痰火头痛　病证名。指痰火上扰所致的头痛。见《证治汇补·头痛》。《医钞类编·头痛门》："因痰火者，痰生热，热生风故也。痰火上升，壅于气道，兼乎风化，则自然有声。轻如蝉鸣，重如雷声。"证见头痛脑鸣，或偏侧头痛，胸脘满闷，呕恶，泛吐痰涎，心烦善怒，面红目赤，口渴便秘，舌苔黄腻，脉洪滑数。治宜化痰泻火，可用礞石滚痰丸、石膏散等方。参头痛条。

痰火耳鸣　耳鸣的一种。《证治准绳·耳》："此是痰火上升，郁于耳中而为鸣。"《明医杂著》卷三："大抵此症，多先有痰火在上，又感恼怒而得，怒则气上，少阳之火客于耳也。"证见两耳蝉鸣，有时闭塞如聋，胸闷，痰多口苦，二便不畅，舌苔黄腻，脉弦滑。治宜化痰清火，用龙荟丸、二陈汤加芩、连、竹沥等。参耳鸣条。

痰火耳聋　耳聋的一种。《医学入门·耳》："耳聋有痰火。"多因膏粱胃热上升，两耳蝉鸣，热郁甚则气闭而致。《杂病源流犀烛·耳病源流》："以聋之为病，多由痰火郁络，非磁石镇坠，乌桂椒辛，菖蒲辛散以通利老痰，则郁火何由而开。"治宜化痰

清火为主。方用龙荟丸、二陈汤、滚痰丸等。参耳聋条。

痰火证 病证名。即肺痨。《红炉点雪》卷一："痰火证论。夫痨者劳也，以劳伤精气血液，遂致阳盛阴亏，火炎痰聚。因其有痰有火，病名酷厉可畏者，故今人讳之曰痰火也。"参痨瘵各条。

痰火怔忡 怔忡之一。见《类证治裁》卷四。《丹溪心法·惊悸怔忡》："时作时止者，痰因火动。"本证可见于阵发性心动过速、神经官能症等疾病。治宜化痰、清火、镇心，用参胡温胆汤、金箔镇心丸等方。参怔忡条。

痰火眩晕 病证名。见《赤水玄珠·眩晕门》。因痰浊挟火，上蒙清阳所致。症见眩晕，头目胀重，心烦而悸，恶心，泛吐痰涎，口苦，尿赤，舌苔黄腻，脉弦滑。治宜化痰降火。用清上丸、黄连温胆汤等方。参眩晕、痰晕等条。

痰火痉 病名。见《万病回春·痉病》。由于痰火壅盛所致的痉病。症见眼牵嘴扯，手足振摇或搐搦，身热，咳嗽多痰，脉滑数。治宜清热泻火，豁痰止痉。用瓜蒌枳实汤加减。《景岳全书·杂证谟》："痉有痰盛者，不得不先清上焦，若火盛多痰者，宜用清膈煎、抱龙丸。"参痉、痓条。

痰血 证名。指痰唾中带有血液。《不居集》卷十三："痰血，咳咯唾皆有之，兼带血屑血丝血点是也。"详痰涎血、咳血、咯血、唾血条。

痰呃 病证名。指痰结气逆所致的呃逆。《证治汇补·呃逆》："痰呃，呼吸不利，呃有痰声，脉滑有力。"治宜豁痰利气。可先用盐汤探吐，后用导痰汤。属痰火者，可用牛黄丸、栀连二陈汤。参呃逆条。

痰饮 病名。出《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证治》。古称澹（亦作淡）饮。指体内水湿不化而生饮酿痰。（1）为多种饮证痰证之总称。《诸病源候论·痰饮诸病候》："痰饮者，由气脉闭塞，津液不通，水饮气停在胸府，结而成痰。"因饮停部位、久暂不同，分为流饮、留饮，癖饮，支饮，溢饮，悬饮、肺饮、伏饮、积饮等。《赤水玄珠》卷六："痰饮，胶固稠粘者痰也、清而稀薄者饮也，痰饮为病，所感不同。"《景岳全书·痰饮》："痰之与饮，虽曰同类，而实有不同也。盖饮为水液之属，凡呕吐清水及胸腹膨满，吞酸嗳腐，渥渥有声等证，……是即所谓饮也。若痰有不同于饮者，饮清沏而痰稠浊。"痰饮的形成，多因肺、脾、肾功能失调，水液输化失常所致。治宜温补脾肾固本，利水逐饮治标。（2）饮证之一。因饮邪留于肠胃所致。《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证治》："其人素盛今瘦，水走肠间，沥沥有声，谓之痰饮。"治宜温阳化饮，方用苓桂术甘汤，金匮肾气丸等。本证一名流饮。参流饮条。

痰饮呕吐 病证名。指呕吐因寒饮、热痰留滞所致者。《症因脉治》卷二："痰饮呕吐之症，呕而肠鸣，漉漉有声，眼黑眩晕，时时恶心。"多因脾虚不运，停痰留饮，积于中脘，得热则上炎，遇寒则凝塞而致。寒饮所致者，舌苔薄腻，脉沉迟，宜用桂苓半夏汤、茯苓半夏汤、二陈汤、来复丹；热痰所致者，舌苔黄腻，脉滑数，宜用栀连二陈汤等方。参呕吐、痰呕等条。

痰饮胁痛 病证名。见《东医宝鉴·外形篇》："痰饮流注于厥阴之经，亦能使胁下痛，病则咳嗽气急引胁痛。"《赤水玄珠》卷四："痰饮停伏，胁痛，宜导痰汤。"甚则十枣汤，控涎丹等方。参停饮胁痛条。

痰饮胃脘痛 病证名。指痰湿水饮所致的胃脘痛。《东医宝鉴·外形篇》："痰饮胃脘痛。胃中若有流饮清痰作痛，腹中漉漉有声，及手足寒痛，或腰膝背胁抽掣作痛。宜用小胃丹，控涎丹，三花神祐丸，芎夏汤，加味二陈汤，加味枳术丸。"参痰积脘痛条。

痰饮咳嗽　病证名。指痰饮病所致的咳嗽。《丹溪心法附余·咳嗽》："辰砂半夏丸，治一切痰饮咳嗽。"《医门法律·咳嗽续论》："盖以咳嗽必因之痰饮，而五饮之中，独膈上支饮，最为咳嗽根底，外邪入而合之固嗽，即无外邪，而支饮渍入肺中，自足令人咳嗽不已。"痰饮咳嗽，如见咳嗽多痰，色白，或如泡沫，咳引胁痛者，治宜温化，用小青龙汤，苓桂术甘汤等方。逐饮，用十枣汤等方。如见畏寒肢冷，水肿，脉沉细等肾阳不足虚象者，当兼温阳利水，可用真武汤，肾气丸等方。参痰饮、支饮、悬饮等条。

痰饮恶寒　恶寒证之一种。《证治汇补·恶寒》："痰饮恶寒，由痰滞上焦，营卫阻滞，抑遏清道，不能固密腠理而恶寒。肥人多有此证。脉滑或沉，周身沉重，胸满食减，肌肉如故。"又："浊痰滞膈，先用姜茶探吐，后用通圣散加减。"《张氏医通·寒热门》："背恶寒是痰饮。仲景云，心下有留饮，其人背恶寒，冷如冰。指迷茯苓丸。"治以通阳化痰为主，亦可用苓桂术甘汤、二陈汤等方。参恶寒、内伤恶寒条。

痰饮眩晕　病证名。见《症因脉治·内伤眩晕》。又称醉头风。有虚痰眩晕、实痰眩晕、湿痰眩晕、停饮眩晕、风痰眩晕、痰火眩晕之不同。详各条。

痰饮喘逆　病证名。《症因脉治·喘症论》："痰饮喘逆之因：饮水过多，脾弱不能四布，水积肠间，成痰成饮，上干肺家。"证见时咳时呕，卧下喘逆，面色虚白，肠中漉漉有声，甚则喘息倚肩。脉多弦滑，如弦紧则为寒饮、弦数为痰热。治疗可选用苓桂术甘汤、小半夏汤、甘遂半夏汤、二陈汤等。兼表症者用小青龙汤，大便闭者，宜导痰汤加大黄，甚者滚痰丸、十枣汤等均可用。参痰喘、痰甚喘条。

痰饮腹胀　病证名。指痰饮留滞所致的腹胀。《症因脉治》卷三："痰饮腹胀之症，胸腹满闷，怔忡喘急短息倚肩，呕恶痰涎。或腹中漉漉有声。"多因脾胃传化失职，痰饮不化所致。治宜祛痰化饮为主。胸闷怔忡，宜小半夏汤、二陈汤；喘息倚肩，宜葶苈泻肺汤；呕恶痰涎，平胃二陈汤；腹中漉漉有声，导痰汤。参腹胀、内伤腹胀条。

痰饮霍乱　病证名。见《症因脉治·霍乱》。因脾气素虚，水饮不节，痰饮聚于中脘，升降失常所致。症见胸前懊恼不舒，心胁下闷痛，时时欲呕，兀兀欲吐，或时腹如雷鸣，或时怔忡惊悸，忽尔呕泻，胸腹大痛。脉多滑大，或沉滑或滑数。治宜二陈汤、平胃散、导痰汤等。参霍乱条。

痰证　病证名。痰古作澹或淡。指痰浊停留体内的病症。《诸病源候论》已有寒痰、热痰等名。《丹溪心法·痰十三》："痰之为物，随气升降，无处不到。……凡痰之为患，为喘为咳，为呕为利，为眩为晕、心嘈杂、怔忡、惊悸，为寒热痛肿，为痞膈，为壅塞，或胸胁间漉漉有声，或背心一片常为冰冷，或四肢麻痹不仁。"《症因脉治·痰症》："痰之为病，变化百出，皆内因七情，外感六气，中宫失清化之令，薰蒸结聚而成。须分所兼之邪治之。"《景岳全书·杂证谟》："五脏之病，虽俱能生痰，然无不由乎脾肾，盖脾主湿，湿动则为痰；肾主水，水泛亦为痰；故痰之化，无不在脾，而痰之本，无不在肾。所以凡是痰证，非此则彼，必与二脏有涉。"痰又与肺关系密切。故有"脾为生痰之源，肺为储痰之器"之说。由于痰浊停留部位、病因及症状表现不同，有风痰、寒痰、湿痰、燥痰、热痰、气痰、虚痰、实痰等病证。详各条。

痰证发热　病证名。指因痰所致的发热。《证治汇补·发热》："痰证发热，向夜大作，天明渐止，必兼胸膈不快，恶心不食，肢倦体瘦。盖痰滞中宫阻碍升降，故恶心痞满。血无所滋，故夜分转甚。津液不化而体瘦，气血阻滞而倦怠。均宜健脾化痰，宽中

清火，则痰利而热除矣。如果实痰为患，滚痰、化痰二丸，皆可选用。”参湿痰发热，痰积发热等条。

痰证自汗 自汗证之一。见《医学入门》卷四。《证治汇补·汗病》：“痰证自汗，头眩呕逆，胸满吐痰。”治宜和胃化痰，用抚芎汤、理气降痰汤，兼脾气虚弱者，宜理中降痰汤。参自汗条。

痰郁 六郁之一。见《丹溪心法》卷三。因痰气郁结所致的病证。《杂病源流犀烛·诸郁源流》：“动则喘满或嗽，寸脉沉而滑，是痰郁。”治宜涤痰解郁。用痰郁汤、涤痰汤、升发二陈汤、润下丸等方。参六郁、郁证条。

痰郁心悸 心悸之一种。《不居集》卷二十二论痰郁心悸：“停积痰涎，使人有惕惕不宁之状，甚则心跳欲厥，其脉滑大者是也。”治宜涤痰定悸。用温胆汤、茯苓饮子。风热生痰，上乘心膈而惊悸者，宜简要济众方。心虚而兼痰火者，宜八物定志丸。参心悸条。

痰呕 病证名。又名痰饮呕吐。《三因极一病证方论》卷十一：“病者素盛今瘦，肠中沥沥有声，食入即呕，食与饮并出，名曰痰呕。”详痰饮呕吐条。

痰胀 痰证之一。因痰气阻滞胸腹所致。《重订通俗伤寒论·挟痰伤寒》：“中满腹胀，上气喘逆，二便不利，甚或面肢俱肿者，此湿痰挟气阻滞胸腹也，名曰痰胀。先当去郁陈莝，经验理中消胀丸为主。继则视其喘肿胀之进退，酌量施治。若腹胀减轻，喘肿未除者，法当降气达膜，五子五皮饮加减。终则培元利水，七味枳术汤调服天一丸，善其后以杜复发。”参痰证条。

痰疟 病名。疟疾之一。《证治汇补·疟疾》：“痰疟，因夏月多食瓜果油面，郁结成痰，热多寒少，头疼肉跳，吐食呕沫，甚则昏迷卒倒。寸口脉浮大者，吐之；关脉弦滑者，化之；若胸满热多，大便燥实，大柴胡汤下之。”《杂病源流犀烛·疟疾源流》：“痰疟者，痰结胸中，与凡疟所挟之痰更甚，故寒热乍已，胸中满闷不退，或头疼肉跳，吐食呕沫，甚则昏迷卒倒，皆是痰涎结聚之故，宜二陈汤、导痰汤。”《医学入门》卷五：“痰疟……宜柴陈汤加草果；呕吐者，二陈汤倍白豆蔻流行三焦，呕疟自止；气虚呕者，单人参汤，或用常山炒过；久不止者，露姜饮截之。”参疟疾条。

痰注腰痛 病证名。腰痛之一。又称湿痰腰痛。《症因脉治·内伤腰痛》：“脾湿不运，水饮凝结，则为痰注腰痛。”症见腰间重滞，牵引背脊，一块冷痛，得寒更甚，得热稍减，或兼见大便泄泻，或见腰间肿而按之濡软不痛，皮色不变，脉滑或沉伏。治宜涤痰化湿。可选用南星二陈汤、导痰汤、龟椁丸、控涎丹等方。兼虚者，可并用六君子汤、八味丸。

痰泄 病证名。见《医宗必读·泄泻》。即痰泻。详该条。

痰泻 病证名。又称痰泄、痰积泄泻。《医学入门》卷五：“痰泻，或泻或不泻，或多或少，此因痰留肺中，以致大肠不固。”症见时泻时止，时轻时重，或下白胶如蛋白，头晕恶心，胸闷食减，腹中鸣响，脉多弦滑。治宜化痰祛湿，用二陈汤、节斋化痰丸、海青丸、青州白丸子等方。脾虚者，可用六君子汤。参泄泻条。

痰实疟 疟疾的一种。《诸病源候论·痰实疟候》：“痰实疟者，谓患人胸鬲先有停痰结实，因成疟病，则令人心下胀满，气逆烦呕也。”详痰疟条。

痰话 证名。指因痰火而失神乱语。《万病回春·痰饮》：“痰话者，痰火作热，惊惕不安，错语失神者也。”治宜清火、豁痰、宁神。方用加减温胆汤等。参痰证条。

痰甚喘 证名。见《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》。指喘逆而痰声更甚者。本证轻者类似痰喘、胸喘，重者即为哮证。详

痰喘、鲋喘、哮证条。

痰咳　病名。一名痰嗽。指痰盛致咳。《医学入门》卷四："痰咳，痰出咳止。胸膈多满。……痰郁肺经，咳则涎多。或结胸者，二陈汤加枳、梗、瓜蒌、黄芩、贝母，甚者鹤顶丹；痰积流入肺脘，久咳不得睡者，兜铃丸；痰因火动者，二陈汤加芩，连，或清气化痰丸；痰因宿食者，化痰丸；痰因酒湿者，蜂姜丸，全因酒者，瓜连丸；如痰甚能食便闭者，小承气汤下之，不能食便闭者，厚朴汤或滚痰丸疏导之。"参痰嗽、酒嗽条。

痰涎血　病证名。见《丹溪心法·咯血》。指痰唾涎中带有血丝、血点。《杂病源流犀烛·诸血源流》："痰涎血者，脾家畜热所致，宜加味逍遥散，清肺汤；而痰唾中带有红丝红点，病尤为甚，其条分缕判，则有由六经之火者，宜山栀地黄汤；有由思虑伤心伤肺者，宜天门冬汤；有由于阴分虚弱者，宜清火滋阴汤。"《证治汇补》卷五："痰涎血。痰中带血，多属脾经，须分痰血先后施治，先见血而后嗽痰者，此相火上炎，煎熬成痰，降火为主，若用消痰，则血溢而不止。其先痰嗽而后见血者，是积热生痰，载血上行，清痰为要，若用血药，则痰滞而不行。"参咳血、嗽血、唾血条。

痰涎症　痰证之一。因痰涎阻滞心膈所致。《万病回春·痰饮》："痰涎症者，浑身胸背胁痛，不可忍也，牵掣钓痛，手足冷痹，是痰涎在心膈也。"参痰证条。

痰结　痰证之一。因火邪灼津，燥痰日久，气虚津枯，痰液粘结所致。以结于喉部为多见。《明医杂著·痰饮》："喉中有物，咯不出，咽不下，此痰结也。"治宜散结化痰可用加味甘桔汤合清化丸。一名梅核气。参老痰条。亦有结于胸膈胁下者。《万病回春·痰饮》："胸膈有痰不化，元气虚弱，津液干燥，咯难得出，喘嗽身热，痛难转侧者，是痰结也。""胁下有痰，作寒热咳嗽，气急作痛者，亦痰结也。"方用瓜蒌枳实汤。参痰证条。

痰结实　古病名。指痰水积聚胸膈而结实不消者。《诸病源候论·痰饮诸病候》："痰水积聚，在于胸府，遇冷热之气相搏，结实不消，故令人心腹否满，气息不安，头眩目暗，常欲呕逆，故言痰结实。"一名膈痰。参膈痰、痰证条。

痰哮　病名。指痰浊壅盛所致的哮吼。见《证治汇补·哮病》。该书论："哮虽肺病，而肺金以脾土为母，故肺中之浊痰亦以脾中之湿热为母，俾脾气溷浊，则上输浊液尽变稠痰，肺家安能清净？所以清脾之法尤要于清肺也。"《临证指南医案·哮》："痰哮……大概以温通肺脏、下摄肾真为主，久发中虚，又必补益中气，其辛散苦寒豁痰破气之剂，在所不用。此可谓治病必求其本者矣。"治当清金化痰或温通肺脏，培脾摄肾为主。如苏沉九宝汤、清金丸、五虎汤、小青龙汤、六君子汤、参蛤散等方。参哮证、哮喘条。

痰哮嗽　病名。指喉间痰多哮鸣咳嗽。《不居集》卷十五："痰哮嗽。痰哮咳嗽，痰声喉中如拽锯。本事方加半夏三枚同煎。"详痰哮、痰饮咳嗽条。

痰晕　病证名。见《世医得效方》卷三。属痰饮眩晕范畴。《症因脉治·内伤眩晕》："痰饮眩晕之因，饮食不节，水谷过多，胃强能纳，脾弱不能运化，停留中脘，有火者则煅炼成痰，无火者则凝结为饮，中州积聚，清明之气，窒塞不伸，而为恶心眩晕之症也。"证见胸前饱闷，恶心呕吐，膈下漉漉有声，眩悸不止，头额作痛。本证有虚痰眩晕、实痰眩晕、湿痰眩晕、停饮眩晕、风痰眩晕、痰火眩晕之分。详各条。

痰积　九积之一。见《儒门事亲》卷三。指痰浊凝聚胸膈而成的积证。《医碥·积聚》："痰积，证见麻木眩晕，痞闷嘈杂，其人平素多痰。"可伴见涕唾稠粘，咳咯难出，胸间隐痛，咽门至胃脘窄狭如线，目眩，头旋，

腹中累累有块等症状。治以开胸涤痰为主。方如导痰汤、竹沥达痰丸之类。倘证重而形气俱实，可用控涎丹。如胸膈痞闷较甚，恶心欲吐，亦有使用吐法。参积条。

痰积发热 病证名。指痰积中脘所致的发热。《金匮翼·痰积发热》："其脉弦滑，其证胸膈痞塞，背心疼痛。活人书所谓中脘有痰，令人憎寒发热，状类伤寒，但头不痛，项不强为异。"参发热、痰症发热等条。

痰积泄泻 病证名。又称痰泻、痰泄。《症因脉治》卷四："或泻或止，或多或少，或下白胶如蛋白，腹中漉漉有声，或如雷鸣，或两肋攻刺作痛，此痰积泄泻也。"详痰泻条。

痰积脘痛 证名。指痰阻气滞所致的胃脘痛。《类证治裁·胃脘痛》："痰积脘痛必呕恶。"《张氏医通》卷五："痰积作痛，脉滑而实，恶心烦满，时吐酸水。此因气滞碍其道路，不得运行而作痛。清中汤加香附、苍术、南星、滑石、木香、海石之类。如痰甚者，导痰汤加白螺蛳壳煅过一钱。"《症因脉治》卷一治痰癖胃脘病有块，常痛不休，用滚痰丸。参痰饮胃脘痛条。

痰积腹痛 病证名。指脾胃功能失调、水湿停积成痰而致的腹痛。《症因脉治》卷四："痰积腹痛之症，时痛时止，利下白积，光亮不臭，或恶心眩运，或响如雷鸣。"《杂病源流犀烛·腹少腹病源流》："痰积腹痛，下白物，时眩，喜热汤，脉滑。宜消痰暖内，宜星半安中丸。"如眩运恶心者，宜二陈汤；胸膈不舒，痰热结聚上焦，宜济生瓜蒌丸；白积自下，导痰汤；痛甚应下者，滚痰丸。参腹痛、内伤腹痛条。

痰积嗽 病证名。见《丹溪心法·咳嗽》。多因食积湿痰生火，上凌于肺所致。故治疗常以青黛、瓜蒌为主药。参食积痰嗽、食积嗽等条。

痰秘 病名。因痰饮湿热阻滞肠胃所致。《张氏医通·大小府门》："痰秘者，痰饮湿热阻碍，气不升降，头汗喘满，胸胁痞闷，眩晕腹鸣。半夏、茯苓、木香、槟榔、枳实、橘红、香附、白芥子、姜汁、竹沥。不应，加大黄、黄连。甚则控涎丹下之。"参便秘条。

痰疾癫狂 病名。指癫狂因痰热所致者。见《疑难急症简方》。治宜补脾消痰。方用化狂丹等。参狂、癫狂条。

痰淋 病名。见《医碥·淋》。多由痰气郁结，湿痰渗注而成。用七气汤、青州白丸子、渗湿汤等方。如因膏粱太过，食积成痰，流注成淋者，宜尿浸山楂、川连、丹皮、海浮石、玄明粉之类。参淋条。

痰厥 厥证之一。指痰盛气闭所致的四肢厥冷，甚至昏厥的病证。《丹溪心法·厥》："痰厥者，乃寒痰迷闷，四肢逆冷，宜姜附汤。"《寿世保元·厥》："论痰厥者，卒然不省人事，喉中有水鸡声者是也。用牙皂、白矾等分研末，吹鼻，即以香油一盏，入姜汁少许灌之，立醒。或烧竹沥、姜汁，灌之亦可。"《医林绳墨·厥》："有痰厥者，痰气妄行于上，咳嗽连续不已，气急喘盛，坐不得卧，以致上盛下虚而作厥也，名之曰痰厥。宜以二陈汤加厚朴、白术、黄芩、山查，降下痰气，使复归于脾之脉络，则足可温，不致厥矣。"参厥证等条。

痰厥头痛 病证名。指痰水内结，阴气上逆的头痛。《外台秘要》卷八："痰厥头痛方：病源谓，痰水在于胸膈之上，又犯大寒，使阳气不行，令痰水结聚不散，而阴气逆上与风痰相结，上冲于头，即令头痛。或数载不已，久连脑痛。"《张氏医通·诸痛门》："痰厥头痛，两寸脉滑而弦，眼重头旋，恶心烦乱，吐清水，气短促，心神不安，语言颠倒，目不敢开，如在风露中，头疼如裂，身重如山，胸满呕逆，四肢厥冷，半夏白术天麻汤。有肥白气虚多痰人，卒然头痛，脉沉细，四肢厥逆，痰响吐涎，星香汤加生附子。"参头痛条。

痰喘　病证名。见《丹溪心法·喘》。指痰浊壅肺所致的气喘。症见呼吸急促，喘息有声，咳嗽，咯痰粘腻不爽等。治宜祛痰降气为主。《医学入门·痰类》："痰喘，必有痰声。风痰，千缗汤或合导痰汤；痰气，苏子降气汤、四磨汤；食积湿痰，古二母散、神保丸、大萝皂丸。"《类证治裁·喘症论治》："痰喘必涤其源，气郁生涎，温胆汤；火动生痰，清膈煎。"《景岳全书·喘促》："痰盛作喘者，虽宜治痰，如二陈汤、六安煎、导痰汤、千缗汤、滚痰丸、抱龙丸之类，皆可治实痰之喘也。六君子汤、金水六君煎之类，皆可治虚痰之喘也。然痰之为病，亦惟为病之标耳，犹必有生痰之本。故凡痰因火动者，必须先治其火，痰因寒生者，必须先去其寒，至于或因气逆，或因风邪，或因湿滞，或因脾肾虚弱，有一于此，皆能生痰，使欲治痰，而不治其所以痰，则痰终不能治，而喘何以愈哉。"参喘症条。

痰痞　病证名。指痰气凝结所致的痞症。《杂病源流犀烛·胸膈脊背乳病源流》："因乎痰者为痰痞，脉必滑，胁下痛。"《类证治裁·痃癖癥瘕诸积论治》："痞由中脘痰气不利者，宜用砂枳二陈汤；痰结胸满，用顺气导痰汤；心下痞，发热而呕，用半夏泻心汤；心下积冷如覆杯，按之有水声，热手熨之如冰，脉沉迟者，用三圣散吐之，次服白术调中汤。"参痞条。

痰痫　病名。《奇效良方》卷六十四："痰痫为病，此患似张狂，作之不常，或半年一作，或一年，或一月，或一日一次，或一日三次，一身惊搐，不废手足，不废头目，其人张狂如梦中，如半醉，灯下不知人，皆从梦寐中作，所以无常也，忽耳不能闻，其目不能视，如狂。"参痫、五痫条。

痰滞蓄血　病证名。指先有郁痰，后因血滞，或失血气滞，日久生痰，痰血相搏而成的蓄血。其症胸部胀闷，痛处少移或不移，身体寒热，或吐血、衄血，便下焦黑。治宜导痰破血，先用导痰汤加苍术、香附、枳壳、白芥子以开郁化痰；次用当归、桃仁、红花、苏木、丹皮、莪术等以破血行气（见《中国医学大辞典》）。

痰湿头痛　病证名。指痰湿上蒙所致的头痛。《张氏医通·诸痛门》："有痰湿头痛，其人呕吐痰多，发作无时。"症见头部沉重，疼痛如裹，胸脘满闷，呕恶痰多，发作无时，舌苔白腻，脉滑。治宜化痰祛湿，可用半夏白术天麻汤、芎辛汤、导痰汤等。本证可见于肌肉紧张性头痛等病。参痰厥头痛条。

痰瘀嗽　病名。指痰挟瘀血阻肺引起之咳嗽。《不居集》卷十五："痰瘀嗽。肺胀而嗽，或左或右不得眠。此痰挟瘀血，凝气而病。宜养血以流动乎气，降火疏肝以清痰，四物汤加诃子、青皮、竹沥。"参咳嗽、瘀血咳嗽条。

痰嗽　病名。一名痰咳。指痰盛致嗽。见《济生方·咳嗽》。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》："痰嗽，嗽动便有痰声，痰出即嗽止也。其脉浮滑，必兼胸膈满，痰涎多，或寒热交作，面浮如盘。缘湿痰在胃，上干于肺也。宜半瓜丸、滴油散、澄清散。其有一种发咳时，直至顿吐饮食，痰物俱尽方少安者，此乃肝木克脾土，风痰壅盛所致也。宜白圆子。"参痰咳，咳嗽条。

痰膈　膈证之一。指因七情郁结，痰涎凝聚所致的病证。《重订通俗伤寒论》第九章："饮食入胃，便吐粘涎，膈塞不通，便结而粪如羊矢者，此气郁挟痰阻塞胃脘也。名曰痰膈。"治用辛润涤痰法。如五汁饮加狗宝，或程氏启膈饮加味等。参膈、噎膈条。

痰嘈　嘈杂之一种。《景岳全书·杂证谟》："痰多气滞，似饥非饥，不喜食者，痰嘈也。"湿痰壅盛者，宜白术丸、曲术丸。痰火者，宜和中汤、三圣丸、软石膏丸等方。参嘈杂条。

痰噎膈　见《医方考》卷二。即痰膈。

详该条。

痰燥 燥疑躁误。痰症之一。指因痰火而致烦躁的病证。《万病回春·痰饮》："痰燥者，痰火作热烦躁也。"方用加减温胆汤等。参痰燥、痰证条。

痰癖 病名。指水饮酿痰，流聚胸胁之间而成的癖病。《诸病源候论·癖病诸候》："痰癖者，由饮水未散，在于胸府之间，因遇寒热之气相搏，沉滞而成痰也。痰又停聚，流移于胁肋之间，有时而痛，即谓之痰癖。"本病与饮癖相类似。参饮癖条。

痰躁 痰证之一。指因火痰而致躁烦不宁的病证。《重订通俗伤寒论·夹痰伤寒》："咳嗽不爽，胸中气闷，夜不得眠，烦躁不宁者，此火痰郁遏胸膈也。名曰痰躁。"治宜豁痰降火。方用陷胸、泻心汤等。参痰证条。

痰咳 指初患咳嗽，或久病忽咳的病证。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘病源流》："新咳者，肺有实邪。风则散之，宜参苏饮；寒则发之，宜二陈汤加紫苏、葛根、杏仁、桔梗；热则清之，宜金沸草散去麻黄、半夏，加薄荷、五味、杏仁、桑皮、贝母、茯苓、桔梗、枇杷叶之属；火则泻之，宜清火止咳汤；湿则除之，宜白术汤；痰则涤之，宜加味二陈汤。有久病忽咳，病虽久而咳则暴，亦为新咳，必新伤风、食也。风则疏之，宜消风宁嗽汤；食则消之，宜大安丸去连翘、黄连，加桔梗、枳实等。"参咳嗽条。

新痰 痰证之一。指痰证初起者。《不居集》卷十七："新痰，新起之痰，其症轻，其形色青白稀薄，其气味亦淡。初起头痛发热，类外感伤寒。半夏、陈皮、花粉、茯苓、甘草、苏子。"参痰证条。

新感温病 指四时中感受外邪，随感随发的温病。又称"外感温病"。明·汪石山曰："有不因于伤寒而病渴者，此特春温之气，可名曰春温。如冬之伤寒、秋之伤湿，夏之中暑相同，此新感之温病也。"新感温病初起病邪在表，主要症状为发热重，恶寒轻，头痛，口渴，无汗或汗少，苔薄，舌红，脉浮数等，也可兼见颐肿，咳嗽、喉痛等。其传变过程与治则，正如《温热论》所述："卫之后方言气，营之后方言血。在卫汗之可也，到气才可清气，入营犹可透热转气，……入血就恐耗血动血，直须凉血散血。"凡逆传心包等险症，也可发生。详温病等条。

数欠 证名。又称善欠。指经常打呵欠。《素问·宣明五气》："五气所病，心为噫，肺为咳，肝为语，脾为吞，肾为欠为嚏。"《灵枢·口问》："阳者主上，阴者主下。故阴气积于下，阳气未尽，阳引而上，阴引而下，阴阳相引，故数欠。"《灵枢·经脉》："胃，足阳明之脉。……是动则病，洒洒振寒，善伸，数欠。"《张氏医通》卷九："然必由少阴经气下郁，不能上走阳明，胃气因之不舒而频呼数欠。以泄其气，舒其经。"

煎厥 厥证之一。❶指虚损、精绝所致昏厥的病证。《素问·生气通天论》："阳气者，烦劳则张，精绝，辟积于夏，使人煎厥。目盲不可以视，耳闭不可以听，溃溃乎若坏都，汩汩乎不可止。"《不居集》卷四："人身肾与膀胱竭绝，于己午之月，故倦怠欲睡，痿弱无力，尔时则宜补益；若或劳役犯房欲，精血内耗，阴火沸腾，致目昏耳闭，举动懒倦，失其常度，五心烦热，如火燔灼，名曰煎厥，此亦虚损之类。"❷指阳气抑郁不伸，气煎迫而厥逆者。《素问·脉解篇》："少气善怒者，阳气不治，阳气不治，则阳气不得出，肝气当治而未得，故善怒，善怒者，名曰煎厥。"参厥证条。

煤气中毒 病名。即一氧化碳中毒。因吸入煤、木炭及其他含碳物质不完全燃烧产生的一氧化碳中毒。急性中毒者，症见皮肤、指甲和粘膜，特别是口唇，呈樱红色；头晕头痛，心悸，乏力，甚则神志昏迷，痉挛，呼吸困难而死亡。慢性中毒者，可见面色苍

白，四肢无力，周身疼痛，视野缩小等。治宜中西医结合救治。

溪毒　古病名。见《肘后备急方》卷七。即水毒病。详该条。

溪病　古病名。❶水毒病的通称。《诸病源候论·水毒候》："自三吴已东及南诸山郡山县，有山谷溪源处，有水毒病，春秋辄得。……以其病与射工诊候相似，通呼溪病，其实有异。"❷又指无疮的水毒病。《诸病源候论·水毒候》："有疮是射工，无疮是溪病。"详水毒病条。

溪温　古病名。见《诸病源候论·水毒候》。又称水毒病。详该条。

溏泄　病名。出《素问·气交变大论》。❶指大便稀薄。《奇效良方·泄泻门》："泄者，泄漏之义，时时溏泄，或作或愈；泻者，一时水去如注。"❷指泄下污积粘垢。《张氏医通·大小府门》："戴复庵云：溏泄者，污积粘垢。湿兼热也。参见泄泻条。"❸诸泄总称溏泄。见《证治要诀·大小腑门》。

溢饮　证名。四饮之一。多因大渴暴饮过多，或水气溢于肢体肌表所致。《素问·脉要精微论》："溢饮者渴暴多饮，而易入肌皮肠胃之外也。"《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》："饮水流行，归于四肢，当汗出而不汗出，身体疼重，谓之溢饮。"证见身体痛重，支节烦疼，或兼见喘咳胸闷等。治宜温肺化饮，发汗去邪。方用大青龙汤、小青龙汤、桂苓神术汤等。参痰饮、四饮条。

溢饮滑泄　病证名。见《素问病机气宜保命集·泻论》。又称饮泻。《张氏医通·大小府门》："水渍入胃，名为溢饮滑泄。渴能饮水，水下复泄，泄而大渴。茯苓甘草汤、五苓散，并灸大椎三五壮立已，乃督脉之病也。"参饮泻、水恣条。

溺白　证名。指小便浑浊色白。见《素问·至真要大论》。《景岳全书·淋浊》："溺白证如泔如浆者，亦多属膀胱水道之热，宜导赤散、徙薪饮之类以清之，若无内热而溺白者，多由饮食湿滞，宜小分清饮或苓术二陈汤减去干姜以燥之利之。……若胞气不固而液浊不清者，此亦败精之属也，宜秘元煎或水陆二仙丹以固之。"详便浊条。

溺死　指落水淹没而致死者。《诸病源候论·中恶病诸候》："人为水所没溺，水从孔窍入，灌注府藏，其气壅闭，故死。若早拯救得出，即泄沥其水，令气血得通，便得活。"《证治准绳·杂病》："溺水死，捞起以尸伏牛背上，无牛以凳，挖去其水，冬月以棉被围之，却用皂角以生姜自然汁灌之，上下以炒姜擦之，得苏可治。"《寿世保元·五绝》："救溺水死者，先以刀斡开溺者口，横放筋一只，令其牙啣之，使可出水。又令一健夫，屈溺人两足，着肩上，以背相贴，倒驼之而行，令其出水。"

溺血　证名。出《素问·气厥论》。又名溲血、尿血。指血随小便排出而无疼痛者。详尿血条。

溺后漏精　病证名。指排尿后有精液滑出，多因气虚不能固摄所致。《张氏医通·大小府门》："小便过多，而便后常有滑精者，补中益气汤下缩泉丸。痛而小便频数者，禁用缩泉，以益智壮火，乌药耗气，非阴虚多火人所宜。"参滑精条。

溺赤　证名。出《素问·至真要大论》。详小便黄赤、小便赤涩条。

溺浊　证名。见《类证治裁·淋浊》。即便浊。见该条。

满疒　病名。见《文堂集验方》卷一。即黑疒。详该条。

寝汗　证名。出《素问·六元正纪大论》。又名盗汗。详该条。

〔ㄱ〕

臀腰　病证名。闪挫腰痛的古称。《诸病源候论·腰背病诸候》："臀腰者，谓卒然伤损于腰而致痛也。"详闪挫腰痛条。

十 四 画

〔一〕

齧（niè）舌 指自咬舌头的症象。《灵枢·口问》："此厥逆走上，脉气辈至也，少阴气至则齧舌。"为内风证状之一。

聚 病证名。《灵枢·五变》称大聚。指腹中有块而聚散无常的病症。《难经·五十五难》："聚者，阳气也。其始发无根本，上下无所留止，其痛无常处，谓之聚。"《景岳全书·杂病》："聚者聚散之谓，作止不常也。……其病多在气分，气无形而动也。"《医灯续焰·积聚脉证》："如肠腹攻冲，疝痃瘕热，胸腹胀满，切痛雷鸣等证，皆聚之类也。"本证多由情志抑郁，肝气失调，气机不畅所致。治以行气消聚为主。可用散聚汤、化积丸等方。参积聚、六聚、癥瘕等条。

聚咳 病名。指风寒袭肺所致的剧咳。《不居集》卷十五："聚咳，风寒入肺，每一咳则连数百不止，不能转气，宜三拗汤。久则杏仁煮猪肺，或姜汁调蜜亦好，参苏饮加细辛。"参顿呛、风寒咳嗽、咳嗽条。

〔丨〕

嘈 证名。见《三因极一病证方论·醋咽证治》。嘈杂之简称，俗称心嘈。详嘈杂条。

嘈杂 证名。见《丹溪心法》。一作慒杂。俗称心嘈。《医学正传·嘈杂嗳气》："夫嘈杂之为证也，似饥不饥，似痛不痛，而有懊侬不自宁之状者是也。"有火慒、痰慒、酸水浸心作嘈、气郁胸膈作嘈及蛔虫作嘈之分。因火所致嘈杂者，兼见食已即饥，虽食不饱，治宜降火为主，可用和中汤、三圣丸、左金丸等方。若湿痰壅盛者，见气闷多痰，似饥非饥，不欲饮食，治宜和胃化痰，可用白术丸、曲术丸。若系痰火，可用软石膏丸，或三补丸加半夏、苍术。如食郁作热者，先治火后消导。酸水浸心作嘈者，多因脾胃虚寒，水谷不化，故停饮作酸，症见泛吐酸水，治宜温中和胃，可用温胃饮、六君子汤。伤及阴分者，用理阴煎、金水六君煎。气郁胸膈作嘈者，症见胸膈痞闷，脉沉而濇，治宜理气宽胸，可用气郁汤、逍遥丸。蛔虫作嘈者，驱虫自愈。参火慒、痰慒条。

嘈杂嗳气 证名。指似饥不饥，似痛不痛，胃脘痞满嗳气之证。多由心血虚少，痰火扰动所致。《松崖医径·嘈杂嗳气》："嘈杂者，似饥不饥，似痛不痛。主心血虚少，痰火所挠，而有懊侬不自宁之况者是也。其证或兼嗳气，或兼痞满，或兼恶心，渐至胃脘作痛，痰火之为患也。治法消其痰，降其火，健脾行湿，是治其本也。秘传加味四物汤。"

嗽 病名。出《素问·五脏生成篇》。古代与咳同义。后世以有痰无声或声不甚响者为嗽。《宣明论方》卷九："夫嗽者，五脏皆有嗽，皆因内伤脾胃，外感风邪，皮毛属肺，风寒随玄府而入，腠理开张，内外相合。"《奇效良方》卷三十："清气不分，浊气上干于华盖，加以协水停饮，肺不得清，则为嗽矣。"在《素问病机气宜保命集》中以有声无痰为咳，有痰无声为嗽。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘病源流》："有痰无声曰嗽，非无声，痰随嗽出，声不甚响也。病在脾，脾藏痰，故痰出而嗽止。"详咳、咳嗽条。

嗽血 证名。见《证治要诀·诸血门》。①泛指血由咳嗽而出之症。又称咳血。《症因脉治》卷二："咳血即嗽血。"有外感、

内伤之别，详见外感嗽血、内伤嗽血条。②指咳声轻而多痰、痰中挟血之症。《景岳全书·杂证谟》："咳血、嗽血皆从肺窍中出，虽若同类而实有不同也。盖咳血者少痰，其出较难；嗽血者多痰，其出较易。"治宜清痰降火，用瓜蒌、贝母、阿胶、海浮石、竹沥之属。亦有脾虚者，可兼见食少泄泻，宜用理脾阴正方、六君子汤加桑皮、五味子，有火加逍遥散。本证可见于支气管扩张、肺化脓症、肺结核等疾病。参咳血、嗽血有关条。

蜘蛛胀　病名。单腹胀的俗称。《类证治裁》："单腹胀俗名蜘蛛胀。腹肿，四肢瘦。由脾气虚极，真脏已伤也。"参单腹胀条。

蜘蛛蛊　病名。《医学入门》卷五："单腹肿大而四肢极瘦者，名蜘蛛蛊。"即单腹胀。详该条。

蝎蜥蛊　病名。蛊毒病之一。《诸病源候论·蛊毒病诸候》："其面赤黄者，是蝎蜥蛊。其脉浮滑而短，病发之时，腰背微满，手脚唇口，悉皆习习，而喉脉急，舌上生疮，……乱下脓血，羸瘦，颜色枯黑而死。"参蛊、蛊毒病条。

〔丿〕

鼻大衄　病证名。亦称大衄。指鼻大量出血并见口、耳一齐出血。《诸病源候论·鼻病诸候》："鼻大衄者，是因鼻衄而口耳鼻皆出血，故云鼻大衄也。"多因劳伤过度，府藏生热，热乘血气而致。用远志汤、苦参汤、牡蛎散（见《圣济总录》卷七十）。参大衄、鼻衄各条。

鼻孔煽张　证名。指鼻孔两翼张合的症象。《医学心悟·鼻》："若见鼻孔煽张，为肺气将绝之证也。"《医述·鼻》引林慎菴："鼻扇有虚实新久之分，不可概为肺绝，初病鼻扇，有邪热风火壅塞肺气，实热居多；久病鼻扇喘汗，是为肺绝不治。"

鼻汗　证名。指鼻上局部多汗。《医林绳墨·汗》："或有鼻汗者，凡遇食饮汤饭，则鼻上多汗，此肺虚乘热也。宜以益肺凉血，可用人参固本丸。"

鼻如烟煤　证名。指鼻孔色黑如涂烟煤的症象。《世补斋医书后集·广温热论》："温证鼻如烟煤者，邪热燥热也。"可见于温病、温毒、疫痢等证。

鼻衄　病名。见《千金要方》卷六。指鼻腔出血。《证治准绳·杂病》："衄者，因伤风寒暑湿，流传经络，涌泄于清气道中而致者，皆外所因。积怒伤肝、积忧伤肺、烦思伤脾、失志伤肾、暴喜伤心，皆能动血，随气上溢所致者，属内所因。饮酒过多，啖炙爆辛热，或坠车马伤损致者，皆非内非外因也。"详外感衄血、内伤衄血、酒食衄等条。鼻衄除辨证施治外，常施用外治法，如十灰散塞鼻、山栀烧灰吹鼻、人爪甲煅末吹鼻、白矾吹鼻、温水浸足等，可获速效。本证可见于鼻病、血液病、风湿热、高血压、动脉硬化、肝硬变等及多种传染病过程中。

鼻流浊涕　证名。指鼻腔流出稠厚浊液。见《医学入门·鼻》。《杂病源流犀烛·鼻病源流》："鼻渊其症，鼻流浊涕或稠涕。"详鼻渊条。

鼻流清涕　证名。古称鼻鼽。指鼻腔内时流清水样粘液。多由肺卫不固，风寒侵袭鼻窍所致。《中藏经·论肺脏虚实寒热生死顺逆脉证之法》："肺气通于鼻，和则能知香臭矣，有寒则善咳，……实则鼻流清涕。"《杂病源流犀烛·鼻病源流》："有鼻鼽者，鼻流清涕不止，由肺经受寒而成也。"症见突然发作，鼻腔作痒，喷嚏不已，鼻塞时流清涕等。治宜宣肺疏散。方用苍耳散，温肺止流丹、细辛膏等。如反复发作者，加黄芪、白术等药。

鼻掀胸挺　指气喘时出现鼻翼煽动、胸膺高挺的症状。常见于严重的呼吸困难疾患。参息高、张口抬肩条。

鼻渊 病名。指鼻腔内时流稠浊涕液的病证。俗称脑漏。《素问·气厥论》："胆移热于脑，则辛頞鼻渊，鼻渊者，浊涕下不止也。"《杂病源流犀烛·鼻病》："有鼻渊者，即脑漏也。由风寒凝入脑户，与太阳湿热交蒸而成，或饮酒多而热炽，风邪乘之，风热郁不散而成。"有急性、慢性之分。急性发作，证见鼻流稠黄浊涕，恶寒发热、头痛鼻塞等。治宜清散风热，用苍耳子散，防风通圣散等方；慢性多由鼻塞日久，郁积鼻窍而成，证见鼻流脓浊涕，气臭，眉额胀痛，嗅觉减退等。宜清肺泄热，方用辛夷清肺饮，取渊汤等。本证可见于急慢性副鼻窦炎等。

鼻痛 指鼻腔疼痛。多因风邪郁热、痰火上阻清窍所致。《诸病源候论·鼻痛候》："肺气通于鼻，风邪随气入于鼻内，搏于血气，邪正相击，气道不宣，故鼻痛。"症见鼻塞隐痛，口舌干燥等，治宜宣肺通窍，用藿香正气散、祛风通气散等。若因痰火冲肺，鼻中隐痛者，宜二陈汤加黄芩、山栀、桔梗、麦冬等。

鼻塞 指鼻腔阻塞，呼吸不利。《灵枢·本神》："肺气虚则鼻塞不利，少气。"《类证治裁·鼻口症论治》："肺感风寒，则鼻塞声重，参苏饮、羌活汤；若风热壅肺，亦致噫涕声重，宜疏散，菊花茶调散；肺火盛鼻塞，宜清解，黄连清肺饮；鼻塞甚者，往往不闻香臭，毕澄茄丸。"

鼻鼽（qiú求） 即鼻流清涕。《素问·脉解篇》："所谓客孙脉，则头痛、鼻鼽、腹肿者。"《素问玄机原病式》："鼽者，鼻出清涕也。"详鼻流清涕条。

鼻齇 病名。俗称酒齇鼻，又名鼻赤。指肺素有热或阳明血热而致鼻红。饮酒者多见。《嵩崖尊生书》卷六："鼻齇，阳明血热，大半得之好酒，肺受热郁，得热愈红，亦或热红遇寒，污浊凝结，见紫黑色，治宜化滞血生新血，兼祛风热，用丹参、生地、当归、红花、山栀、桑皮、防风、荷叶煎服；若素不饮酒，肺风也，加荆芥；亦或脏中有虫，加去虫药。"《证治准绳·杂证》："鼻赤，一名酒齇鼻，乃血热入肺也，肺气通于鼻，鼻为清气出入之道路，多饮酒人，邪热熏蒸肺叶，伏留不散，故见于鼻，或肺素有风热，虽不饮酒，其鼻亦赤，谓之酒齇，盖俗名也。"以枇杷叶拭去毛，不须涂炙锉细煎浓汤，候冷调消风散，亦可服升麻防风散、泻青丸等方。参酒齇鼻条。

魄汗 证名。肺藏魄，肺经之汗称为魄汗。《素问·生气通天论》马莳注："肺经内主藏魄，外主皮毛，故所出之汗，亦可谓之魄汗也。"一说魄、白古通，魄汗即白汗。参白汗条。

膜外气 病名。指气攻腹膜之外而虚胀、肿满者。《圣济总录》卷八十："膜外气……本于肺受寒邪，传之于肾，肾气虚弱，脾土又衰，不能制水，使水湿散溢于肌肤之间，气攻于腹膜之外，故谓之膜外气，其病令人虚胀，四肢肿满，按之没指是也。……治膜外气水病，不限年月深浅，洪肿大喘，须臾不可过，朝服暮差，防己汤方。"

膜（chēn嗔）胀 病证名。❶胸膈胀满之意。《素问·阴阳应象大论》："浊气在上，则生膜胀。"明·张景岳《类经》："浊阴主降，阴滞于上而不能降，故为膜胀。"多由脾失健运，消化不良，气机阻滞所致。❷即气胀。《金匮翼》卷四："膜胀，即气胀。"详该条。

膈 病名。❶即噎膈。见《素问·阴阳别论》。详噎膈条。❷噎塞与反胃的通名。《杂病源流犀烛·噎塞反胃关格源流》："噎塞反胃，二者皆在膈间受病，故通名为膈也。"参见噎塞、反胃条。❸膈，通格。指格逆呕吐。《儒门事亲》卷五："正理论曰：格则吐逆，故膈亦当为格。"参见关格条。

膈中 病名。《灵枢·邪气藏府病形》："脾脉急甚为瘈疭，微急为膈中，食饮入而还出。"即噎膈。详该条。

膈内拒痛　指胸膈部疼痛拒按。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："太阳病，脉浮而动数，……医反下之，动数变迟，膈内拒痛，胃中空虚，客气动膈，短气躁烦，心中懊侬，阳气内陷，心下因硬，则为结胸，大陷胸汤主之。"多由正邪相搏于胸膈所致。《医学衷中参西录·太阳病大陷胸汤证》："膈内拒痛者，胸中大气与痰水凝结之气，互相撑胀而作痛，按之则其痛益甚，是以拒按也。"

膈气　即膈证。多因心情抑郁，寒热不调，食饮伤损等所致。《圣济总录》卷六十二："人之胸膈，升降出入，无所滞碍，命曰平人。若寒温失节，忧恚不时，饮食乖宜，思虑不已，则阴阳拒隔，胸脘否塞，故名膈气。"一名鬲气。参噎膈、鬲气条。

膈虫病　病名。膈虫即弱虫。《诸病源候论·九虫病诸候》："弱虫又名膈虫。"详弱虫病条。

膈洞　出《灵枢·根结》。膈，饮食格拒不下；洞，大便泄泻如注。详噎膈、洞泄条。

膈消　病名。又作鬲消。即上消。《素问·气厥论》："心移热于肺，传为鬲消。"张志聪注："鬲消者，鬲上之津液耗竭而为消渴也。"详上消条。

膈痛　证名。❶指疼痛横连胸膈。《证治要诀·膈痛》："膈痛与心痛不同，……膈痛则痛横满胸间，比之心痛为轻，痛之得名，俗为之称耳。"《证治准绳·杂病》："膈痛多因积冷与痰气而成，宜五膈宽中散，或四七汤加木香、桂各半钱，或枳脾汤加木香如数。痰涎壅盛而痛者，宜小半夏茯苓汤加枳实一钱，间进半硫丸。"❷指胸痛。《医宗必读》卷八："胸痛即膈痛。"❸指胁痛。《罗氏会约医镜》卷七："胁痛即膈痛。"参胸痛、胁痛、心痛条。

膈痰　痰证之一。又名痰结实。《圣济总录》卷六十四："膈痰者，气不升降，津液否涩，水饮之气聚于膈上，久而结实，故令气道奔迫，痞满短气不能卧，甚者头目旋运，常欲呕吐。"治宜降气涤痰为主。参痰证、痰结实条。

膈噎　病名。《古今医鉴》卷五："膈噎者，谓五膈、五噎也。"即噎膈。详该条。

膀胱中暍证　病证名。《证治汇补》卷一："不恶寒但恶热而渐厥者，为膀胱中暍证。……中暍宜泻火益元。"参暑病、中暑条。

膀胱气　❶病名。见《普济本事方》卷三。《医宗必读·疝气》："膀胱气，小腹肿痛，不得小便是也。"《杂病源流犀烛·膀胱病源流》："膀胱气，膀胱经病也。其症小腹肿痛，必小便秘涩。宜五苓散加茴香、葱白、盐。服药后，若下小便如墨汁，膀胱之邪去矣，邪去而便通痛止矣。宜随用硼砂丸。"❷指疝之别称。《奇效良方·疝门》："世俗呼为小肠气，膀胱气、奔肠气、蟠肠气……由疝之为病，其名别也。"《医碥·疝》："疝……由膀胱经得者，旧名膀胱气，毛际上小腹作痛。"参疝条。

膀胱足太阳经病证　病证名。指足太阳膀胱经经气异常所致的病症。《灵枢·经脉》："膀胱足太阳之脉，……是动则病冲头痛，目似脱，项如拔，脊痛腰似折，髀不可以曲，腘如结，踹如裂，是为踝厥。是主筋所生病者，痔，疟，狂，癫疾，头额顶痛，目黄，泪出，鼽衄，项、背、腰、尻、腘踹、脚皆痛，小指不用。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。"《脉经·膀胱足太阳经病证》除上列"是动、所生"病外，尚列举了少腹偏肿而痛、小腹满而气癃等证。参膀胱病有关各条。

膀胱胀　病证名。胀病之一。《灵枢·胀论》："膀胱胀者，少腹满而气癃。"《医醇賸义·胀》："膀胱主藏津液，气化则出。盖水气循下焦而渗入膀胱，津液之藏，皆由

气化渗入，然后能出。寒气上逆，则水气窒塞不通，故少腹满而小便癃也。当理气行水，俾寒水得其阳而通利，既济汤主之。”参胀病条。

膀胱呕吐症 证名。指呕吐因寒湿侵犯膀胱所致者。《经验医库·膀胱呕吐症》：“足太阳膀胱，感受寒湿，膀胱阳虚，不能化散，小腹胀痛呕吐，手足微寒，脉沉紧。”治宜温散，用加减五苓散。

膀胱咳 病名。指咳而小便自出者。《素问·咳论》：“肾咳不已，则膀胱受之；膀胱咳状，咳而遗溺。”治用茯苓甘草汤、《校注医醇賸义》加味茯菟汤等。参咳嗽条。

膀胱病 六腑病候之一。膀胱主贮存津液，化气行水，与肾相为表里。其病有虚寒与实热之分。多因湿热蕴结或肾阳不足，气虚客寒，气化失司所致。临床表现以小便失常为主。《素问·标本病传论》：“膀胱病，小便闭。”《诸病源候论·膀胱病候》：“其气盛为有余，则病热，胞瘭小便不通，小腹偏肿痛，是为膀胱之气实也，则宜泻之，膀胱气不足，则寒气客之，胞滑小便数而多也，面色黑，是膀胱之虚也，则宜补之。”《太平圣惠方》卷七：“虚则生寒，寒则脬滑，小便不禁，尿多白色，面黑胫酸，两胁胀满，则是膀胱虚冷之候也。”“实则生热，热则膀胱急，口舌燥，咽肿痛，小便不通，尿黄赤色，举体沉重，四肢气满，面肿目黄。少腹偏痛者，则是膀胱实热之候也。”《本草经疏》：“膀胱实一证。癃闭，属膀胱实热。”“膀胱虚三证。小便不禁，属气血虚。遗尿，属本经气虚。……膀胱气。”《杂病源流犀烛·膀胱源流》：“膀胱病者，热结下焦，小腹苦满胞转，小便不利，令人发狂。冷则湿痰上溢，而为多唾，小便淋沥，故遗尿。鳌按，小便不禁，由膀胱气虚，……小便不通，由膀胱邪热。”治宜宣通气化，渗湿利水，温肾固脬等法。参膀胱病各条。

膀胱蒸 二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

膀胱痹 病名。见《症因脉治》卷三。又名胞痹。详该条。

㿗杂 证名。见《景岳全书·杂证谟》。㿗——作嘈，即嘈杂。详该条。

㿗症 嘈杂的别称。见《类证治裁·㿗症》。详嘈杂条。

〔丶〕

膏疸 病名。见《诸病源候论·黄病诸候》。为九疸之一。《外台秘要》卷四。以肺癉为膏疸，症见身面皆黄，饮少而小便多。多因饮食过度，醉酒劳伤，脾胃有瘀热所致。治宜秦椒散等方。参黄疸条。

膏淋 病名。又名肉淋。指淋症而见小便如米泔或脂膏者。多因肾虚不固或湿热蕴蒸下焦所致。《诸病源候论·淋病诸候》：“膏淋者，淋而有肥状似膏，故谓之膏淋，亦曰肉淋。此肾虚不能制于肥液，故与小便俱出也。”《证治要诀·淋闭》：“有似淋非淋，小便色如米泔，或便中有如鼻涕之状，此乃精液俱出，精塞窍道，故便欲出不能而痛，……此即膏淋。”治宜补益脾肾，固涩脂液为主。方用鹿角霜丸、菟丝子丸、六味地黄丸、补中益气丸等。膏淋因湿热蕴蒸下焦所致者。尿出时灼热，涩痛较虚症明显。《医碥·淋》：“膏淋，湿热伤气分，水液浑浊，如膏如涕如米泔。”治宜清利湿热为主。方用萆薢饮、八正散、海金沙散等。参淋条。本证可见于乳糜尿、前列腺炎、泌尿系感染等疾患。

膏肓病 病证名。❶指危重病证。《左传·成公十年》：“疾不可为也，在肓之上，膏之下，攻之不可，达之不及，药不至焉。”膏肓部位有指为膈中者。《外台秘要·五膈》：“膈中之患，名曰膏肓。”❷指劳嗽。《杂病源流犀烛·咳嗽哮喘源流》：“又有肺劳热，生虫如蚕，咳逆气喘，谓之膏肓病。”参见劳嗽条。❸指冷劳。《扁鹊心书》：“人

因七情六欲，形寒饮冷，损伤肺气，令人咳嗽，胸膈不利，恶寒作热，……此乃冷气入于肺中，侵于膏肓，亦名冷劳。”可用全真丹、金液丹等方。

瘈 出《灵枢·邪气藏府病形》。通瘛。详该条。

瘈疭 出《灵枢·邪气藏府病形》。即瘛疭。详该条。

瘖疟 疟疾之一。瘖同痎，即痎疟。《黄帝内经太素·三疟解》：“夏伤于暑，秋必瘖疟。”《难经·五十六难》：“令人发咳逆，瘖疟。”参痎疟条。

瘟疫 指感受疫疠之气造成的一时一地大流行的急性烈性传染病。又名时行、天行时疫、疫疠、疫。《素问·本病论》称温疫。《丹溪心法·瘟疫五》：“瘟疫，众人一般病者是，又谓之天行时疫。”其发病急剧，证情险恶。若疠气疫毒伏于募原者，初起可见憎寒壮热，旋即但热不寒，头痛身疼，苔白如积粉，舌质红绛，脉数等。治以疏利透达为主，用达原饮、三消饮等方。若暑热疫毒，邪伏于胃或热灼营血者，可见壮热烦躁，头痛如劈，腹痛泄泻，或见衄血、发斑、神志皆乱、舌绛苔焦等。治宜清瘟解毒，用清瘟败毒饮、白虎合犀角升麻汤等方。参疫、天行、时行、温疫发斑等条。

瘟黄 病名。指触感疫疠之气所致的黄疸。《明医杂著》卷二：“若时气发热，变为黄病，所谓瘟黄也。”《杂病源流犀烛·诸疸源流》：“有天行疫疠以致发黄者，俗谓之瘟黄，杀人最急。”症见高热神昏，身目呈浑黄色，小便赤如浓茶，腹胀，胁痛，甚至吐衄，便血或发斑，舌红绛，苔黄燥，脉弦洪数。治宜清热化湿、凉营解毒、芳香开窍等法，如茵陈蒿汤合清瘟败毒饮、甘露消毒丹、紫雪丹或安宫牛黄丸、神犀丹等。危重者，急宜中西医结合抢救。本病亦称急黄。见《杂病广要·黄癉》。参急黄条。

瘟痧 痧证之一。《痧胀玉衡·瘟痧》：“寒气郁伏于肌肤血肉之间，至春而发，变为瘟症，是名瘟痧；又暑热伤感凝滞于肌肤血肉之中，至秋而发，亦名瘟痧。但春瘟痧毒受病者少，不相传染，时或有之；秋瘟痧毒受病者多，老幼相传，甚至一家数人犯痧，或一方数人犯痧。其发也必恶寒发热，或腹痛，或不腹痛，似疟非疟，或气急发喘，头面肿胀，胸腹饱闷，或变下痢脓血，轻者常连岁月，重者危急一时。治宜放痧消食积为主。俟痧毒已泄，然后和解清理，除其寒热，健脾养血，补其中虚。”参痧条。

瘨疝 古病名。疝病的一种。《灵枢·经脉》：“足厥阴之脉……是动，则病腰痛，不可以俛仰，丈夫瘨疝，妇人少腹肿。”后世多指阴囊肿大或溃肿流脓血的病证。《医宗必读》：“瘨疝，足阳明筋病，内有脓血，即巢氏之胕疝，子和之血疝也。”《类证治裁》卷七：“肝脉滑甚为瘨疝，言肝木乘胃，或至溃脓下血。荔枝橘核汤，橘核散。”参疝条。

瘣疰 病名。《太平圣惠方》卷五十六：“人先天他痛，忽被鬼邪所击，当时心腹刺痛，或闷绝倒地，如中恶之类。其得差之后，余气不歇，停住积久，有时发动，连滞停住，乃至于死。死后注易傍人，故谓之鬼疰也。”可选用犀角散、常山散、鲛鱼皮散等方。

瘖 病名。通“癃”。《史记·平原君列传》：“臣不幸有罢（音义同“疲”）瘖之疾。”详癃条。

瘖俳 即瘖痱。《素问·脉解》：“内夺而厥，则为瘖俳，此肾虚也。”详瘖痱条。

瘖痱 病证名。一作瘖俳。出《素问·脉解》。又作阴俳。多由肾精亏损，以致肾气厥逆而成。《奇效良方·风门》：“瘖痱之状，舌瘖不能语，足废不为用。”治宜滋肾阴，参以补肾阳。方用地黄饮子等。

瘕 病证名。出《素问·大奇论》。《诸病源候论·瘕病候》：“瘕病者，由寒温不

适，饮食不消，与藏气相搏，积在腹内，结块瘕痛，随气移动是也。言其虚假不牢，故谓之为瘕也。”《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“瘕者假也，假血成形，腹中虽硬，其实聚散无常也，亦往往见于脐下，其原由寒暖失宜，饮食少节，脏腑之气先虚，又复多所劳伤，外而感受风寒，停蓄于内，是故正虚邪实，正不能胜邪，邪遂挟其力，反假游行之血，相聚相结，而成颗块，推之而动，按之而走，故名曰瘕。”《罗氏会约医镜》：“瘕者得之伤血，肋间有块如石，按之痛引少腹，去来无常，肚硬而胀，食减餐泥，假物成形，如血鳖之类。……治宜调养脾胃，磨积消痞，奏效迟缓。”古代瘕病名目繁多，有食瘕、鳖瘕、虫瘕、蛲瘕、虚瘕、血瘕、酒瘕、谷瘕、水瘕、青瘕、燥瘕、黄瘕、脂瘕、狐瘕、肠覃、石瘕等。详各条。

瘕泻 病名。《医林绳墨·泄泻》：“瘕泻不便，后重窘痛，此因湿热蕴积，二便不利，气滞有动于火也。宜以利气之剂兼用清凉。”参大瘕泄条。

精少 病证名。指精液稀少。见《辨证录·种嗣门》。又称少精。详该条。

精伤 指精气、精血耗损的疾患。《灵枢·本神》：“恐惧而不解则伤精，精伤则骨酸、痿厥、精时自下。”参肾伤条。

精极 六极之一。指脏腑精气衰竭等疾患。见《诸病源候论·虚劳病诸候》。《太平圣惠方·治精极诸方》：“夫精极者，通主五脏六腑之病候也。若五脏六腑衰，则形体皆极，眼视无明，齿焦而发落，身体重，耳聋，行不正。”可伴见羸瘦、惊悸、阳萎、遗精、白浊等症。宜用牛髓煎、磁石丸、巴戟丸等方。若见虚热，烦闷，骨疼痛者，宜天门冬散、竹叶汤等方。参六极条。

精时自下 证名。出《灵枢·本神》。即指滑精。详该条。

精冷 病证名。见《古今医统·原始要终论》。又称精寒。详该条。

精浊 病证名。指尿色清而窍端时流糊状浊物者。见《景岳全书·淋浊》。《证治要诀·白浊》：“如白浊甚，下淀如泥，或稠粘如胶，频逆而涩痛异常，此非是热淋，此是精浊窒塞窍道而结。”多因酒色无度，败精瘀阻；或肾精亏损，相火妄动，败精挟火而出；或湿热流注精室而成。症见阴茎口常流米泔样或糊状浊物，茎中或痒或痛，甚则如刀割火灼，而尿色自清。浊物色白者称白浊，挟血者称赤浊。若浊物淋沥，尿出灼痛甚者，多属火盛，宜抽薪饮、治浊固本丸、大分清饮等方。若兼见小便频数者，多属湿热流注精室，宜五苓散合益元散。若日久不愈，涩痛全无，多属心肾不足，宜九龙丹、固阴煎、秘元煎、菟丝子丸等方。如见肾气虚寒，则宜右归丸、附桂八味丸、益智汤等方。本证多见于淋病慢性前列腺炎、精囊炎等疾患。

精热 病证名。见《辨证录·种嗣门》。其症入房甚久，泄精之时，女方胞宫有热灼感，多影响生育。治宜补益肾水，不宜泻火。用平火散、镇阳丸等方。

精虚三消 病证名。见《症因脉治》卷三。指由情志、房劳损伤阴精所致的三消。悲哀过度伤肺为上消。症见干渴而饮水不多，气怯喘咳。治以生脉散、人参固本丸等方。思虑太过伤脾为中消。症见时食时饥，饥不欲食。治以地黄膏、琼玉膏等方。纵欲无度伤肾为下消。症见小便频数，牵引作痛，滴沥如膏。治以三才封髓丹。如先见小便过多，然后多饮，为真阳失守，不能蒸动生津，宜用金匮肾气丸以益肾温阳。

精虚痰 指因元精虚亏所致的痰证。《症因脉治》卷二：“精虚痰，骨蒸潮热，虚火时升，脉多细数。”治宜补精化痰。方用地黄丸、加减二冬汤、固本丸加玄武胶，佐以理气药等。参痰证条。

精清 病证名。清，清冷、清薄之意。指精液清冷稀薄者。见《古今医统·原始要

终论》。详精寒、精薄条。

精滑　病证名。见《济生方·虚损》。又称滑精。详该条。

精寒　病证名。见《辨证录·种嗣门》。又称精冷。其症泄精清冷，多影响生育。因命门和心包火衰所致。治宜温补心肾。用温精毓子丹、胜寒延嗣丹等方。

精薄　证名。指精液稀薄。见《辨证录·种嗣门》。其症泄精稀薄，常与滑精早泄并见，每影响生育。多因心肾不足所致。宜温壮心肾。用济火延嗣丹、补天育麟丹等方。

精髓枯淋症　淋证之一。多因气血虚衰，精髓干枯所致（见罗应章《经验医库·溲淋》）。多见于老年体弱者。症见小便滴沥不断，其痛难忍。治以干茯汤。参淋条。

慢痧　痧证之一。指痧毒滞结脏腑经络而慢性发作的病证。《痧胀玉衡·慢痧必须速治》："痧若紧者，只在顷刻。慢者或期至十日半月而死，或期至一月二月而死，甚有期至三四月而死，此诚痧之慢矣。……痧毒蔓延于肠胃经络间者，正多凶险之处，即如痧毒滞结于身之或左或右，或上或下，或里或中或表，既有若是之滞结者，必不犹然若是之滞结而已也，将且在内者先坏脏腑，在中者先损经络，在表者先溃肌肉，虽未即毙，而其难治之形，必然先见，若一不治，便成死症。"《痧症全书》卷中："慢痧……盖由胃气本虚，故尔数犯，俟痧退后，当用木八方充其胃气，则痧自断矣。"参痧条。

漆中毒　病名。因漆入目或皮肤接触致病。《本草纲目》卷三十五："凡人畏漆者，嚼蜀椒涂口鼻，则可免生漆疮者；杉木汤、紫苏汤、漆姑草汤、蟹汤浴之，皆良。"参外科骨伤五官科分册漆疮条。

漉汗　出《灵枢·五变》。漉，如水滤过之意。漉汗，指汗出淋漓的症状。

漩多　证名。见《世医得效方·大方脉杂医科》。又称小便利多、小便多。详小便多条。

漩浊　指小便浑浊。见《世医得效方·大方脉科》。即便浊。详该条。

漏气　古病名。指饮食入胃，先吐后下的病症。多因风邪内干肠胃所致。《三因极一病证方论》卷十一："病者身背皆热，肘臂挛痛，其气不续，膈间厌闷，食入，则先吐而后下，名曰漏气。此因上焦伤风，开其腠理，上焦之气，慓悍滑疾，遇开即出，经气失道，邪气内着，故有是证。"宜用麦门冬汤、千金麦冬理中汤。肥盛多痰者，宜泽泻汤。

漏风　古病名。又名酒风。因饮酒后感受风邪所致。《素问·风论》："饮酒中风，则为漏风。"《备急千金要方》卷八："因醉取风为漏风，其状恶风多汗，少气，口干善渴，近衣则身如火烧，临食则汗流如雨，骨节懈惰，不欲自劳。"《张氏医通·杂门》："漏风之状、多汗，常不可以单衣，食则汗出，甚则身汗，喘急，恶风，衣常濡，口干善渴，不能劳事，先宜五苓散热服取汗，后与黄芪建中加白术泽泻。"亦可用泽泻散、白术散、漏风汤等方。参酒风条。

漏汗　证名。指汗出如水，漏泄不止。又作灌汗。多因发汗太过所致。《伤寒论·辨太阳病脉证并治法》："太阳病，发汗，遂漏不止。"后人据此称之为漏汗。《脉经》卷六："肺脉……其濡而散者，当病漏汗（漏，一作灌）。"漏汗不止，可导致阳气伤亡，津液耗损，出现小便短少，四肢拘急，屈伸不利，甚至筋惕肉瞤，身振振欲擗地等症。治以温经复阳为主，可用桂枝加附子汤、真武汤等方。参灌汗条。

漏底伤寒　病名。指伤寒见下利甚至泄利不止的疾患。《伤寒全生集》卷一："若身热面赤，足冷脉沉，下利清谷，身体疼痛，此为阴利寒证，俗呼漏底伤寒，医用四逆加人参、茯苓、白术、肉桂、肉果、砂仁、木通、灯心、升麻。"《重订通俗伤寒论·伤寒兼证》："外感证一起，即直肠洞泻，不

因攻下而自利者，世俗通称为漏底伤寒。然有协风、协寒、协热、协食之别。”协风者，可用肠风汤加味；协寒者，轻则胃苓汤，重则附子理中汤；协热者，先与葛根芩连汤，继用加味白头翁汤；协食者，先与枳实导滞汤，继与芩连二陈汤。参太阴脏病条。

漏泄 古病名。出《灵枢·营卫生会》。由于感受风邪，腠理开疏，复因热食之气蒸泄所致。主症为热饮食入胃，随即汗出，或出于面，或出于肾，或出于半身。《证治要诀》卷九：“胃气不固，荣血漏泄，宜黄芪建中汤加浮麦少许。”

漏食泄 古病名。见《医学原理》卷六。即录食泻。详该条。

漏腋 即腋漏。见《杂病源流犀烛·肝病源流》。详腋漏条。

漏精 病证名。见《诸病源候论·虚劳病诸候》。指见情思情即精液自出者。《寿世保元·浊证》：“因见闻而出者，曰漏精。”详滑精条。

〔ㄱ〕

瞥闷 证名。出《素问·六元正纪大论》。指昏昧兼烦闷的症状。《医学纲目》卷十六：“盖瞥者，昏也；闷者，烦也。凡瞥而不闷者，名曰昏迷。闷而不瞥者，名曰虚烦。今曰瞥闷者，谓昏迷虚烦并病。”

瞥昧 证名。指神情烦乱昏昧。《素问·六元正纪大论》：“少阳所至，为惊躁，瞥昧，暴病。”

瞥热 证名。指闷乱烦热之状。出《素问·至真要大论》。参闷瞥条。

鹜（wù 误）泄 病名。见《宣明论方》卷十。又称鹜溏、鸭溏、鹜泻。《医宗必读·泄泻》：“鹜泄，中寒糟粕不化，色如鸭粪，澄沏清冷，小便清白，附子理中汤。”参寒泄条。

鹜溏 证名。出《素问·至真要大论》。又称鹜泄、鸭溏。《张氏医通·大小府门》：“鹜溏者，中寒糟粕不化，色如鸭粪，所以澄沏清冷，小便清白，湿兼寒也。附子理中汤。”《金匮翼·泄泻诸症统论》：“鹜溏者，水粪并趋大肠也。夫脾主为胃行其津液者也。脾气衰弱，不能分布，则津液糟粕并趋一窍而下，金匮所谓脾气衰则鹜溏也。又寒气在下，亦如令人水粪杂下，而色多青黑，所谓大肠有寒则鹜溏也。”参寒泄条。

缩筋 证名。出《素问·气穴论》。筋缩的别称。指筋脉挛急不舒。详筋缩条。

缩脚痧 痧证之一。《七十二种痧证救治法·缩脚痧》：“此系肺经受邪，有四症，小儿患者多，满身经络收束，手足拘挛，或左手，或右手，或左足，或右足独缩。治法先以三指拍曲池穴、阳交穴，拍出紫块，先以钱刮骨边腻穴，续刺阳交穴，斜刺曲池穴，曲池、阳交先拍后刺。”可以宣木瓜、陈皮、辣蓼煎汤洗手足，并用藿香、木香、沉香、陈皮、乌药、白扁豆、制厚朴、制香附、神曲煎水，玉枢丹磨冲服。参痧条。

十 五 画

〔一〕

縶縶汗出 出《伤寒论·辨阳明病脉证并治》。形容微微汗出之状。

醋心 见《素问玄机原病式·六气为病》。又称中酸。指吞酸之轻症。《医学正传·吞酸》：“或微而止为中酸，俗谓之醋心。”详吞酸、吐酸条。

醋抢喉嗽 病名。抢同呛。指因食醋刺激咽喉所致的呛咳。《赤水玄珠·咳嗽门》：

“醋抢喉嗽。甘胆丸，治吃醋抢喉，因成咳嗽不止，诸药无效。用甘草二两，去皮作二寸，段中半劈开，以猪胆汁五枚，浸三日取出，火上炙干为末，炼蜜为丸。每服四十丸，茶清吞下，卧服。”参咳嗽条。

醋哮　病名。见《鸡鸣录·哮喘》。即醋呛哮。详该条。

醋呛哮　病名。亦称醋哮。指醋呛入气管而致的哮吼。《鸡鸣录》：“醋哮，醋抢喉管，哮嗽不止。”《医略六书·杂病证治》：“醋呛哮，甘草二两，中半劈开，猪胆汁五枚，浸五日炙末蜜丸，临卧茶清吞二、三钱。”

醋咽　证名。又称吞酸、咽酸、噫醋。《太平圣惠方》卷五十：“夫醋咽者，由上焦有停痰，脾胃有宿冷，故不能消谷，谷不能消，则胀满而气逆，所以好咽而吞酸，致气息酸臭也。”《三因极一病证方论·醋咽证治》：“食后噫醋吞酸，皆宿食证，俗谓之咽酸是也。”详吞酸、咽酸、噫醋、吐酸条。

醉头风　病名。痰饮眩晕的别称。《循经考穴编·足少阳之经》：“痰饮头晕，呕吐不已，恶闻人声，名曰醉头风。”详痰饮眩晕、痰晕条。

撮空　见《中藏经》。又名两手撮空。详该条。

撮空理线　指患者神识不清，两手向空抓物，同时拇指和食指不断捻动，犹如理线之状。系病情危重，邪盛正虚，或元气将脱的表现。《温疫论·补泻兼施》：“证本应下，耽迟失治，或为缓药因循，火邪壅闭，耗气搏血，精神殆尽，邪火独存，以致循衣摸床，撮空理线，肉瞤筋惕，肢体振战，目中不了了，皆缘应下失下之咎。邪热一毫未除，元神将脱，补之则邪毒愈甚，攻之则几微之气不胜。攻之不可，补之不可，补泻不能，两无生理。不得已勉用陶氏黄龙汤。”如阴液耗竭，虚风内动者，可用三甲复脉汤等方。参循衣摸床，两手撮空条。

髮瘕　病症名。见《医说》卷五。指误食髮丝而成的瘕病。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“如食髮成瘕，心腹作痛，咽间如有虫行，欲得油饮，宜香泽油。”其重者，腰痛牵心，发则气绝，心腹膨胀，身体羸瘦，可用雄黄内服。本证与发癥内容大略相同，参癥、髮癥条。

髮癥　病证名。七癥之一。《诸病源候论·癥瘕病诸候》：“（髮癥候）有人因食饮内误有头髮，随食而入成癥，胸喉间如有虫上下来去者是也。”本病与髮瘕相似。参见髮瘕、癥、七癥条。

〔丨〕

暴疟　病名。疟疾之一。指疟邪盛发于三阳经者。《保命集·诸疟诸论》：“在太阳经者，谓之风疟，治多汗之；在阳明经者，谓之热疟，治多下之；在少阳经者谓风热疟，治多和之；此三阳受病，皆谓之暴疟。”详见各条。

暴泄　病名。见《素问病机气宜保命集·泻论》。又称暴泻。暴，有急骤、猛烈意。有因寒邪传脾所致者。《杂病源流犀烛·泄泻源流》：“又有暴泄，太阳传太阴，大肠不能固禁，卒然而下，大便如水，其中有小结粪硬物，欲起又下，欲了不了，小便多清，或身冷自汗，气难布息，脉微，呕吐，此寒也，急以重药温之，宜浆水散。”又有因热者。《金匮翼》卷七：“热泻者，夏月热气乍乘太阴，与湿相合，一时倾泻如水之注，亦名暴泄。内经所谓暴注下迫，皆属于热是也，其症腹痛，自汗，烦渴，面垢，脉洪数或虚，肛门热痛，粪出如汤，或兼呕吐，心腹绞痛者，即霍乱之候也。”详热泻、寒泄、紧病、霍乱条。

暴注　病证名。指突然起病，水泻如注之症。《素问玄机原病式·六气为病》：“暴注，卒暴注泄也。”详热泻、水泻紧病等条。

暴注下迫　证名。出《素问·至真要大

论》。暴注，突然水泻，下迫，迫急后重。《素问病机气宜保命集·泄泻论》："暴注者，是注泄也……下迫者，后重里急，窘迫急痛也。"详水泻、里急后重条。

暴泻 病名。见《世医得效方·大方脉杂医科》。又称暴泄。详该条。

暴热 出《素问·五常政大论》。指突然发生的高热。《医林指月·发热》："暴热者，热之燔灼，阳气亢害也。"《证治准绳·杂病》："暴热者病在心肺。"《张氏医通·寒热门》："凡暴热不止，脉滑数或洪盛，皆为实热，宜随表里孰轻孰重而清理之。或脉虽沉而按之实坚者，为里实，必用苦寒下夺之。"

暴病 出《素问·六元正纪大论》。指急而重的病症，亦可指急性病、新发病。

暴聋 病名。出《灵枢·寒热病》。指突然丧失听觉。亦称卒聋、卒耳聋。多由风热壅闭清窍，少阳经气遏阻，或情志怫郁，气机逆乱所致。《诸病源候论·耳聤吟候》："耳聤聍者，耳里津液结聚所成，人皆有之，轻者不能为患，若加以风热乘之，则结鞕成丸核，塞耳，亦令耳暴聋。"《世医得效方》卷第十："小柴胡治发热耳暴聋，……由少阳之气厥，而热留其经也。"《医林绳墨·耳》："又有气逆壅盛而暴聋者，宜以清痰降火理气为先。"《杂病源流犀烛·耳病源流》："有肾气虚，风邪传经络，因入于耳，邪与正相搏而卒无闻者，谓之卒聋，亦曰暴聋，宜芎芷散、清神散，或由厥逆之气，如经云，少阳之厥，暴聋者，皆卒聋也，须用塞耳法。宜蒲黄膏、龙脑膏。"参耳聋条。

暴淋 病名。指淋症突然发作病情较重者。《医学入门·淋》："热淋暴淋痛甚，八正散或五苓散合败毒散，加味石膏汤。"参见淋、热淋条。

暴厥 厥证之一。指卒然昏厥，不省人事的严重病证。一名暴蹷。《素问·大奇论》："脉至如喘，名曰暴厥，暴厥者，不知与人言。"《景岳全书·厥逆》："脉至如喘者，谓脉之急促如喘，此血气败乱之候，故致暴厥不言，即今人所谓中风不语之属也。"参厥证、中风、暴蹷条。

暴感咳嗽 病名。指咳嗽由猝感风寒引起者。《不居集·暴感咳嗽》："暴感风寒，不恶寒发热，止是咳嗽，鼻塞声重。此感之轻者，宁嗽化痰汤。"参风寒咳嗽、咳嗽条。

暴痹 病名。指突然发生的痹症。《灵枢·九针论》："虚邪客于经络而为暴痹者也。"参三痹条。

暴嗽 病名。指卒然发作的咳嗽。见《肘后备急方》。多因外感风寒所致。《类证治裁·咳嗽》："感风暴嗽、鼻流清涕，桂枝汤加葱豉；感寒暴嗽，肩背怯冷，华盖散；兼感风寒暴嗽，鼻塞声重，芎苏饮。"肾虚亦有暴嗽。《证治要诀·诸嗽门》："有暴嗽服药不效者……此乃肾虚所致。"宜用生料鹿茸丸，大菟丝子丸等方，参咳嗽、风寒咳嗽、肾咳条。

暴瘖 证名。亦称猝瘖。出《素问·气交变大论》。指突然失音或语音嘶哑。多因突然冒寒，或寒包热邪，或肺伤津枯所致。《张氏医通·瘖》："失音大都不越于肺，然须以暴病得之，为邪郁气逆；久病得之，为津枯血槁。盖暴瘖总是寒包热邪，或本内热而后受寒，或先外感而食寒物。并宜辛凉和解，稍兼辛温散之，消风散用姜汁调服，缓缓进之，或只一味生姜汁亦可，冷热嗽后失音尤宜。若咽破声嘶而痛，是火邪遏闭伤肺，昔人所谓金实不鸣，金破亦不鸣也。古法用清咽宁肺汤，今改用生脉散合六味丸作汤。"参瘖条。

暴壅 病证名。即暴厥。《史记·扁鹊仓公列传》："中庶子曰：太子病血气不时交错而不得泄，暴发于外，则为中害。精神不能止邪气，邪气积蓄而不得泄，是以阳缓而阴急，故暴蹷而死。"参暴厥、厥证条。

暴癥　病名。指发生较为急暴的腹部癥块。《诸病源候论·癥瘕病诸候》："暴癥者，由腑藏虚弱，食生冷之物，藏既虚弱，不能消之，结聚成块，卒然而起，其生无渐，名曰暴癥。"常见食少无力，四肢瘦瘁，心腹胀痛，甚则腹中有物如石，痛如刀刺，昼夜啼呼。可用蜥蜴丸、巴豆丸等方（见《太平圣惠方》卷四十九）。本证类似腹腔癌肿。参癥病有关条。

噎　❶病名。五噎的总称。《医说》卷五："噎病亦有五种：气噎、忧噎、食噎、劳噎、思噎。"《诸病源候论·否噎病诸候》："阴阳不和则三焦隔绝，三焦隔绝则津液不利，故令气塞不调理也，是以成噎，此由忧恚所致。忧恚则气结，气结则不宣流，使噎。噎者，噎塞不通也。"详噎膈、五噎等条。❷指饮食时猝觉噎塞，逾时即愈的症象。《古今医鉴》卷五："噎者，饮食之际，气卒阻滞，饮食不下，而为噎也。"

噎塞　病名。见《备急千金要方》卷十六。即噎膈。详该条。

噎膈　病名。见《济生方》卷二。《内经》作隔、鬲、膈中、隔塞、鬲咽。《千金要方》称噎塞。又名膈噎、噎、膈、膈气。（1）指食入阻隔，未曾入胃即吐出者。《医贯》卷五："噎膈者，饥欲得食，但噎塞迎逆于咽喉胸膈之间，在胃口之上，未曾入胃即带痰涎而出。"（2）指饮食不得下，大便闭结者。《医学入门》卷五："饮食不下而大便不通，名膈噎。"（3）亦指反胃。《丹溪心法》卷三："翻胃即膈噎，膈噎乃翻胃之渐。"本病有虚实之分。《金匮翼》卷三："噎膈之病，有虚有实。实者或痰或血，附着胃脘，与气相搏，翳膜外裹，或复吐出，膈气暂宽，旋复如初。虚者津枯不泽，气少不充，胃脘干瘪，食涩不下。虚则润养，实则疏瀹，不可不辨也。"因忧思而气结生痰，交阻胸膈所致者，治宜解郁化痰，可用五膈宽中散，香砂宽中丸，启膈散等方。因酒色过度，肾阴亏损所致者，治宜滋补肾阴，可用六味地黄丸。因阴虚火旺，瘀热交阻所致者，治宜养阴清火，活血化瘀，可用通幽汤，滋血润肠丸。因津液枯槁所致者，宜生津益胃，可用麦门冬汤。因脾气亏损所致者，治宜益气健脾，可用补气运脾丸，噎膈证古分五噎、五膈及外感噎膈、内伤噎膈。根据症情不同，又有隔食、格气、梅核膈等。详有关各条。

瞑眩　指头目昏花，胸中烦闷的症象。《尚书·说命》："若药弗瞑眩，厥疾弗瘳。"孔颖达疏："瞑眩者，令人愦闷之意也。"

蝦蟆蛊　病名。蛊毒病之一。《诸病源候论·蛊毒病诸候》："其面色青白，又云其脉沉濡，病发时，咽喉塞，不欲闻人语，腹内鸣唤，或下或上，天阴雨转剧，皮内如虫行，手脚烦热，嗜醋食，咳唾脓血，颜色乍白乍青，腹内胀满，状如蝦蟆，若或虫吐出成蝌斗形是蝦蟆蛊。经年不治，啖人脾胃尽，唇口裂而死。"参蛊、蛊毒病条。

蝦蟆黄　三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一："治蝦蟆黄，舌上青脉起，七日盛，九日病过，急烙大椎即效，此病昼夜不睡，宜服豉栀汤方。"参黄疸有关条。

蝦蟆瘟　病名。❶瘟疫的一种。指头面肿赤为特证的疫病。又名浪子瘟、大头瘟、捻头瘟。《古今医鉴·温疫》："病者大小无异，大抵使人痰涎壅盛，壮热如火，头痛身痛，项强睛疼，声哑腮肿，俗呼浪子瘟，或称蝦蟆瘟。城市乡村，家户相类。"《景岳全书·瘟疫》："大头瘟者，以天行邪毒客于三阳之经，所以憎寒，发热，头目颈项或咽喉俱肿，甚至腮面红赤，肩背斑肿，状如蝦蟆，故又名蝦蟆瘟。"参大头瘟条。❷指众人同时患咽痛，或音哑者。《瘟疫论补注·杂气论》："或时众人咽痛，或时音哑，俗名为蝦蟆瘟是也。"❸指时行嗽。证治要诀·诸嗽门》："时行嗽，发热恶寒，头痛

鼻塞，气急，状如伤冷热，连咳不已。初得病，即伏枕一两日即轻。记壬午秋，满城有此病，……得免者少，并呼为蝦蟆瘟。”宜用参苏饮、人参败毒散等方。参时行啾条。

踝厥 病证名。足太阳经经气逆乱的病候。《灵枢·经脉》：“膀胱，足太阳之脉，……是动则病，冲头痛，目似脱，项如拔，脊痛，腰似折，髀不可以曲，腘如结，腨如裂，是为踝厥。”参厥证条。

〔丿〕

箭风 病名。痛风的别称。《张氏医通·痿痹门》：“按痛风一证，灵枢谓之贼风，素问谓之痹，金匮名曰历节，后世更名白虎历节，多由风寒湿气乘虚袭于经络，气血凝滞所致。”本病俗名箭风。参痛风、历节条。

箭风痛 病名。见《春脚集》。俗称鬼箭打。指痛风一类的疾患。由于气血不足，外感风邪，壅郁脉络所致。症见头项、肩背、手足、腰胁、筋骨疼痛等。治用白薇煎（东白薇二钱、泽兰叶三钱、穿山甲片一钱，炒黄、研，用好酒煎服）。外用炒山栀、桃头各七个，面（炒）共扦饼贴患处。

膝痛 指膝部肌肉、筋脉及骨节间作痛。《张氏医通·膝痛》：“膝痛无有不因肝肾虚者，虚则风寒湿气袭之。”治宜补肝益肾，祛邪通络为主。如膝痛在筋，屈不能伸而肿者，多挟风热，宜二妙散加味；兼阴虚则热痛而不肿，宜虎潜丸；湿重流入脚膝，痹弱疼重者，宜千金独活寄生汤；虚寒挟风湿而痛者，宜虎骨四斤丸；肝肾虚热，筋骨痿弱颤掉而痛者，宜鹿茸四斤丸。膝关节肿痛日甚，亦有发展为鹤膝风者。文献又有痛在委中腨肠者，属足太阳经；痛在外廉者，属足少阳经；痛在内廉者，属足三阴经之说。宜参照经络加用引经药。

〔乀〕

瘛 病名。一作瘈。指筋脉拘急，手足挛掣的疾患。《素问·玉机真藏论》：“病筋脉相引而急，病名曰瘛。”参瘛疭条。

瘛病 病名。《圣济总录》卷四十三：“瘛病。论曰：《内经》谓病蛊弗治，肾传之心病，筋脉相引而急，病名曰瘛。夫精属肾，筋属肝，脉属心，精盛则滋育诸筋，荣灌诸脉，故筋脉和柔。今风客于肾，病蛊出白，则精已亏矣。经所谓风客淫气，精乃亡，邪伤肝者如此，其证筋脉燥急相引而瘛是也。治瘛病筋脉相引而急，建中汤方。”

瘛疭 证名。见《灵枢·热病》。亦作瘈疭或痫疭，又称抽搐、搐搦、抽风等。指手足伸缩交替，抽动不已。《伤寒明理论》卷三：“瘈者筋脉急也，疭者筋脉缓也；急者则引而缩，缓者则纵而伸。或缩或伸，动而不止者，名曰瘈疭。”多由热盛伤阴、风火相煽、痰火壅滞，或因风痰、痰热所致。治宜平肝熄风，清心泻火，祛风涤痰等法。亦有热伤元气者，四肢困倦，指麻瘛疭，宜人参益气汤。有脾胃虚弱者，呕吐泄泻，时作瘛疭，宜补中益气汤加桂、附。有肝脏虚寒者，胁痛，眼目昏花，时时瘛疭，宜续断丸。有失血之后，气血耗伤，筋脉失养而瘛疭者，宜八珍汤加减。本证可见于多种疾患。如脑炎、脑瘤、癫痫、肝性脑病、尿毒症、高热中暑、破伤风、药物中毒等。

癜（diān 颠） 证名。指发狂或晕倒。《素问·腹中论》：“热中、消中，不可服高粱、芳草、石药，石药发癜，芳草发狂。”详癫条。

瘴黄 病名。❶指阴气盛之黄疸。《外台秘要》卷四：“病源阳气伏，阴气盛，热毒加之，故但身面色黄，头痛而不发热，名为瘴黄也。广济疗瘴黄，身面眼俱黄，小便如豉汁色，茵陈散方。”❷三十六黄之一。《圣济总录》卷六十一：“病人色青次却色赤，或经下后，头发自落，吃食渐少，吐逆心烦，睡则梦与鬼交，气力虚乏，或食物难消。……如是小便赤涩，鼻中煤生，齿焦眼

黑，不堪医也。”治疗用点烙法或内服桑螵蛸方。参黄疸有关条。

癗（wán 顽）痹 病名。《素问·五藏生成篇》：“卧出而风吹之，血凝于肤者为痹。”王冰注：“谓癗痹也。”癗，音、义同顽。详顽痹条。

瘤病 出《灵枢·九针》。❶又称痼病痼疾。瘤者，邪气稽留之意。详见痼疾条。❷指肿瘤。《圣济总录·瘿瘤门》：“论曰，瘤之为义，留滞而不去也。……及郁结壅塞，则乘虚投隙，瘤所以生，初为小核，寖以长大，若杯盂然，不痒不痛，亦不结强。方剂所治，与治瘿法同，但瘿有可针割，而瘤慎不可破尔。”参外科骨伤五官科分册瘿等条。

瘫痪 病证名。见《外台秘要》卷十四。又名瘫痪风。指四肢不用的疾患。《医贯·中风论》：“瘫者坦也，筋脉弛纵，坦然而不举也；痪者涣也，血气涣散而无用也。”多由肝肾亏虚，气血不足，复因邪气（如风寒湿热痰瘀等病邪）侵袭经络所致。症见四肢痿废，不能运动，轻则手足虽能活动，但肢节缓弱，必须扶持方能运用。治宜审察病因，采用药物、针灸及推拿等综合疗法。若一侧肢体偏废不用，称为偏枯，亦称半身不遂。下肢瘫痪，属于半肢风的范围。参偏枯、半身不遂，左瘫右痪、半肢风等条。本病可见于中枢、周围神经的病变，如炎症、外伤、血管病变、中毒等。

瘫痪风 病名。见《外台秘要》卷十四。即瘫痪。详该条。

瘫缓风 病名。见《肘后备急方》卷三。一作摊缓风。即摊缓。详该条。

瘚 瘚与厥通。《灵枢·邪气藏府病形》：“脾脉，……缓甚为痿厥。”详厥证条。

糍糕积 病名。指食糍糕类过多而成积滞者。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“糍糕积，食之过伤成积，噫气吞酸，心腹作痛也。宜白芍、谷芽、神曲。方用青木香丸。”参食积条。

懊侬 证名。指心胸烦热，闷乱不宁之状。见《素问·六元正纪大论》。又名心中懊侬。详该条。

憕（chéng）忡 即怔忡。《证治要诀》卷九：“憕忡，久思所爱，触事不意，虚耗真血，心血不足，遂成憕忡，俗谓心忡脉乱是也。”详怔忡条。

潮热 证名。指发热如潮汛之有定时。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。《张氏医通》卷三：“潮热有作有止，若潮水之来，不失其时，一日一发。若日三五发者，即是发热，非潮热也。有虚有实，惟伤寒日晡发热，乃胃实，别无虚证。其余有潮热者，当审其虚实。若大便坚涩，喜冷畏热，心下幅然，睡卧不着，此皆气盛，所谓实而潮热也，凉膈散、大柴胡辈下之；若胃气消乏，精神憔悴，饮食减少，日渐尪羸，病虽暂去，而五心常有余热，此属虚证，宜逍遥散、小柴胡等加减。有每遇夜身发微热，病人不觉，早起动作无事，饮食如常，既无别证可疑，只是血虚阴不济阳，朝用加味逍遥散，暮用六味丸，不应，用当归补血汤，加减八味丸；有潮热似疟，胸膈痞塞，背心疼痛，气弱脉弦，服补药不效者，此属饮证，随气而潮，故热亦随饮而潮，于痰饮门求之；气口脉滑，内有宿食，常暮发热，明日复止者，于伤食门求之。”《寿世保元·发热》：“论男子血虚，有汗潮热者，以人参养荣汤；男子气虚，有汗潮热者，以补中益气汤；血虚，无汗潮热者，以茯苓补心汤；气虚，无汗潮热者，以人参清肌散；女子血虚，有汗潮热者，以茯苓补心汤；气血两虚，无汗潮热者，以逍遥散。”参日晡发热、伤寒潮热等条。

额上黑 证名。指头额部泛现晦黑的病色。多因肝肾虚衰有热所致。《金匮要略·黄疸病脉证并治》：“额上黑，微汗出，手足中热，薄暮即发，膀胱急，小便自利，名曰女劳疸。”“黄家日晡所发热，而反恶寒，

此为女劳得之，膀胱急，少腹满，身尽黄，额上黑，足下热，因作黑疸，其腹胀如水状，大便必黑，时溏。”参见女劳疸、黑疸条。本症可见于慢性肝病、肝硬化、慢性肾上腺皮质功能不全等疾患。

额汗 证名。指头额局部多汗。《金匮要略·痉湿暍病脉证》称为额上汗出。分虚实二证，实证湿热者居多，虚证多为亡阳虚脱之候。《类证治裁·汗症》：“胃热上蒸，额汗发黄，小水不利者，五苓散加茵陈，甚则茵陈蒿汤利之。”又：“额汗如雨，喘促肢冷，皆阳脱不治。”《杂病源流犀烛》卷七：“湿邪搏阳，亦汗出头额，宜参用胜湿汤。”参头汗条。

谵言 即谵语。指神昏妄言。又称评语。《素问·热论》：“两感于寒者，……二日则阳明与太阴俱病，则腹满，身热，不欲食，谵言。”详评语条。

谵妄 证名。指多言乱语、妄见妄闻的证候。见《素问·气交变大论》。一作评妄。多由阳热亢盛，或因血气不足，痰浊蒙蔽，而神志失常所致。实热者，伴见大便不通，心腹胀满，宜凉膈散、大承气汤等方。若虚病痰病，可兼惊悸，夜寐不宁等症，宜清神汤或平补镇心丹。

谵语 证名。见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》。即评语。详该条。

十六画

〔一〕

槊（gǔ谷）气 病名。槊通谷。指食滞所致的胁痛。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》：“槊气者，胁下痛。”《金匮要略心典》：“谷（槊）气者，食气也，食积太阴，敦阜之气，抑遏肝气，故病在胁下。”治宜疏肝运脾，理气消导为主。参食积胁痛。

薄厥 厥证之一。指大怒致厥者。《素问·生气通天论》：“阳气者，大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥。”《普济方·薄厥》：“黄芪汤。治恚怒气逆，上而不下则伤肝，血菀胸中，使人薄厥，甚则呕血，烦闷者。”参厥证，煎厥条。

霍乱 病名。出《灵枢·五乱》。俗称触恶。泛指突然剧烈吐泻，心腹绞痛的疾患。《诸病源候论·霍乱病诸候》：“霍乱者，由人温凉不调，阴阳清浊二气有相干乱之时，其乱在于肠胃之间者，因遇饮食而变发。”《杂病源流犀烛·霍乱源流》：“皆由中气素虚，或内伤七情，或外感六气，或伤饮食，或中邪恶、污秽气及毒气，往往发于夏秋。”❶指剧烈吐泻有传染性的病症。《伤寒溯源集·霍乱证治》：“此皆六气胜复之变也，……或为诸寒湿之间气客气所胜者亦然，且尤于阴晴风雨，酷暑暴寒之中，每每有之。一家之中，一里之内，或阖境皆然，乃时行寒湿也。”症见突然心腹绞痛，上吐下泻，躁乱烦闷，甚则转筋，手足厥逆等。治宜温阳散寒为主，如附子理中汤、急救回阳汤、解毒活血汤、急救回生丹、卫生防疫宝丹等。外治可用刺法、熨法、刮痧法等。危重时宜中西两法结合抢救。❷指严重吐泻的病症。多因暑天感湿，或饮食失节所致。《医学入门》卷二：“三焦水谷道路，邪在上焦，吐而不利，邪在下焦，利而不吐，邪在中焦，上吐下利。病因饮食不节，清浊相干，阴阳乖隔，轻者止曰吐利，重者辉霍扰乱，乃曰霍乱。”《医学心悟》卷三：“又有暑天受湿，呕吐泻利，发为霍乱。此停食伏饮所致。宜分寒热治之，热者口必渴，黄连香薷饮主

之；寒者口不渴，藿香正气散主之。”根据病因与症状不同，有干霍乱、湿霍乱、暑霍乱、热霍乱等，详各该条。本证可见于霍乱、副霍乱、嗜盐菌性胃肠炎等疾患，也可见于某些食物中毒。

霍乱转筋　病名。又名转筋霍乱。指霍乱吐利后筋脉挛急者。多因大吐大泻，津液暴失，血气亏损，筋脉失养，或复感风冷所致。《诸病源候论·霍乱转筋候》：“霍乱而转筋者，由冷气入于筋故也，足之三阴、三阳之筋，起于人足趾；手之三阴三阳之筋，起于手指，并循络于身。夫霍乱大吐下之后，阴阳俱虚，其血气虚极，则手足逆冷，而荣卫不理，冷搏于筋，则筋为之转，冷入于足之三阴三阳，则脚筋转，入于手之三阴三阳，则手筋转。”《圣济总录·霍乱门》：“霍乱转筋，缘风冷伤于三焦，传于脾胃，得冷则阳气不得宣行，致四肢筋络不得舒缓，此盖中下不足。其候胃闷不安，胫筋挛结，挛肉紧痛，反急于上，盖足阳明之经虚，膀胱之脉寒也。”《罗氏会约医镜·论霍乱》：“今既吐既下，血气大损，津液顿亡，宗筋失养，必致挛缩，甚则阴缩舌卷，为难治。经曰：‘经筋之病，寒则反折筋急，热则筋弛纵不收。’此转筋霍乱，正反折筋急之病。”如理中丸、胡椒汤、木瓜汤、金苓露、鸡舌香散等均可选用。参霍乱、寒霍乱、热霍乱条。

霍乱痧　痧证之一。《杂病源流犀烛·痧胀源流》：“霍乱痧，痛而不吐泻者，名干霍乱，毒入血分也，宜放痧。新食宜吐，久食宜消，食积下结宜攻。痛而吐泻者，毒入气分也，宜刮痧；有痧筋则放，宜调其阴阳之气。须知肠胃食积，宜驱不宜止，止则益痛。若吐泻而后痛者，此因泻粪秽气所触，宜用藿香正气散。须防食积血滞，或消或攻，或活血，山药、茯苓不可乱施；燥湿之品，温暖之药，俱在所禁。干霍乱盘肠大痛，先放痧，后即服药。”宜宝花散与润下丸。参痧、霍乱条。

霍乱烦渴　渴证之一。指吐、泻之后，津液耗伤所致的口渴症。《圣济总录》卷三十九：“霍乱吐利之人，重亡津液，则藏气不和，上焦热，津液不足，故霍乱而烦渴也。”《症因脉治》又分为外感霍乱烦渴和内伤霍乱烦渴两种。外感霍乱烦渴者，吐泻之后，心下烦闷，唇口干燥，口渴引饮，脉多沉滑，或躁疾。宜用知母石膏汤、葛根清胃汤、人参白虎汤等方。内伤霍乱烦渴者，吐泻之后，心烦而渴，渴不引饮，干在口而唇舌不干，脉沉细而软，或躁疾，或浮大而空。宜用人参生脉散、六味地黄丸、独参汤等方。

〔丨〕

噤口痢　病名。指痢疾而见饮食不进，食即吐出，或呕不能食者。见《丹溪心法》卷三。又名禁口痢常见于疫痢、湿热痢重症等病程中。多因湿浊热毒蕴结肠中，邪毒亢盛，胃阴受劫，升降失常所致。亦有见于久痢，脾肾虚寒，中气败坏者。症见不思饮食，呕恶不纳，下痢频繁，肌肉瘦削，胸脘痞闷等。治疗可选用清热、解毒、辟秽、降逆和补益脏气等法。《丹溪心法》创用人参、石莲、黄连一法，徐徐呷下。《医学心悟》用开噤散。亦有用荷叶、陈仓米二味同炒煎服。《时病论》卷三：“大抵初痢噤口，为热痰在胃口，故宜苦燥。若久痢口噤不食，此胃气告匮，……惟大剂参、术，佐以茯苓、甘草、藿香、木香、煨葛之属，大补胃气，兼行津液，乃可耳。”本病可见于中毒性菌痢，部分细菌性食物中毒等疾患。参痢疾条。

噤口痧　痧证之一。《痧胀玉衡·噤口痧》：“默默不语，语亦无声，形如哑子。此乃痧气壅盛，热痰上升，阻逆气管，故咽喉闭塞而然。治宜先放其痧，审其肺肾脾三经之脉为要。然后推详余经之脉，则知病之所本矣。”方用三香散、陈皮厚朴汤等，或陈香橼一枚煎汤微冷服。痧症宜先用刮痧、

刺血法以泄痧毒。参痧条。

噤黄　黄病二十八候之一。《诸病源候论·黄病诸候》："心脾二藏有瘀热所为。心主于舌，脾之络脉，出于舌下，若身面发黄，舌下大脉起青黑色，舌噤强不能语，名为噤黄也。"参黄疸有关条。

噫　又称嗳气。出《素问·脉解篇》。《景岳全书·杂证谟》："噫者，饱食之息，即嗳气也。"详嗳气条。

噫气　见《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》。即嗳气。《证治准绳·杂病》："噫气。《内经》所谓噫，即今所谓嗳气也。"详该条。

噫醋　证名。指嗳气吞酸。《诸病源候论·呕哕诸病》："噫醋者，由上焦有停痰，脾胃有宿冷，故不能消谷。谷不消则胀满而气逆，所以好噫而吞酸，气息醋臭。"宜用半夏丸、丁香散、曲术丸等方。

餐泄　病名。又称迴风。多因湿兼风邪，清气不升所致。《证治准绳·杂病》："戴云，餐泄者，水谷不化而完出，湿兼风也。"《张氏医通·大小府门》："餐泄者，《史记》名回（迴）风，水谷不化，湿兼风也。风邪干胃，木来贼土，清气在下，升阳除湿汤。"亦有因火不生土所致者。《医略六书·杂病证治》："餐泄，完谷不化，是火不生土也。"又："餐泄，食不化，四神丸加木香、诃子。"餐泄疑飧泄之误。参迴风、飧泄条。

〔丿〕

鼽衄　出《素问·金匮真言论》。指鼻流涕与鼻腔出血的病症。王氷注："鼽，谓鼻中水出；衄，谓鼻中血出。"详鼻流涕、鼻衄条。

膨脖　病名。蛊胀的俗称。《证治要诀·蛊胀》："蛊胀，俗谓之膨脖……。"详蛊胀条。

〔、〕

瞒（bǔ）　证名。指肢体、筋脉弛缓无力。《灵枢·口问》："胃不实则诸脉虚，诸脉虚则筋脉懈惰，筋脉懈惰则行阴用力，气不能复，故为瞒，因其所在，补分肉间。"《类经·疾病类》："瞒，释曰：下垂貌。"参手足瞒曳条。

瘴气　病症名。感受南方山林间湿热瘴毒所致的一种温病。《诸病源候论·瘴气候》："夫岭南青草黄芒瘴，犹如岭北伤寒也。南地暖，故太阴之时，草木不黄落，伏蛰不闭藏。杂毒因暖而生，故岭南从仲春讫仲夏行青草瘴。季夏讫孟冬，行黄芒瘴。量其用药体性，岭南伤寒，但节气多温，冷药小寒于岭北，时用热药，亦减其锱铢，三分去二。但此病外候小迟，因经络之所传，与伤寒不异。然阴阳受病，会同表里，须明识患源，不得妄攻汤艾。假令宿患痼热，今得瘴毒，毒得热更烦，虽形候正盛，犹在于表，未入肠胃，不妨温而汗之；已入内者，不妨平而下之。假令本有冷，今得温瘴，虽暴壮热烦满视寒，正须温药汗之，汗之不歇，不妨寒药下之。……其一日二日，瘴气在皮肤之间，故病者，头痛恶寒，腰背强重。若寒气在表，发汗及针必愈。三日以上，气浮于上，填塞心胸，使头痛胸满而闷，宜以吐药，吐之必愈。五日已上，瘴气深结在脏府，故腹胀身重，骨节烦疼，当下之。"

瘴疟　病证名。地方性疟疾之一。多因感受山岚疠毒之气，湿热郁蒸所致。《诸病源候论·疟病诸候》："此病生于岭南，带山瘴之气，其状发寒热，休作有时，皆有山溪源岭瘴湿毒气故也。其病重于伤暑之疟。"《瘴疟指南》卷上："瘴疟形状，其病有三，而形状不外于头痛，发热，腰重，脚软，或冷，或呕，或泄，或大便秘，或小便赤，面赤，目红，口渴，心烦，胸中大热，舌或黑，狂言谵语，欲饮水，欲坐水中，或吐血，或

衄血，或腹痛，或有汗，或无汗诸证。”有冷瘴、热瘴、哑瘴之分，详见各条。

瘴毒脚气　病名。见《太平圣惠方》卷四十五。又名江东脚气、岭南脚气。指发于南方地区之脚气，因感受风湿毒气所致。症见脚膝缓弱，渐至麻痹或疼痛，恶寒发热，头痛心烦，两胫微肿，不能饮食，甚则小腹不仁，冲心闷乱。治疗大法同脚气，方如知母散、猪苓散（《太平圣惠方》）、旋复花汤（见《圣济总录》卷八十四）等。参脚气条。

癃　病名。一作瘚。❶淋症的古称。《素问·奇病论》：“有癃者，一日数十溲。”《三因极一病证方论·淋闭叙论》：“淋，古谓之癃。”详见淋条。❷指小便不利，属癃闭之轻者。《类证治裁·闭癃遗溺》：“闭者小便不通，癃者小便不利。”详见癃闭条。❸罢癃病。见《史记·平原君列传》。一说罢癃病为背疾，腰曲而背隆高；一说为躄，足不能行之疾。

癃闭　病名。见《景岳全书·杂证谟》。《灵枢·本输》称闭癃。《类证治裁·闭癃遗溺》：“闭者小便不通。癃者小便不利。”今将小便排出甚少及完全无尿排出，统称癃闭，包括现代医学所称的尿潴留和尿闭。可因肺热气壅、热结膀胱、水道阻塞、气虚、气滞、阴液不足、肾阳虚衰、转胞等所致。肺为水之上源。肺热壅盛，肺气不能通调水道，则小便点滴而下，或全然不通，呼吸急促，咽干，烦渴欲饮，苔薄黄，脉数。治宜清肺润燥。用清肺饮加减，或用探吐法。膀胱为藏溺之腑，热结膀胱，阻碍气化，则小便量少色赤，甚至闭塞不出，小腹急满胀痛，渴不多饮，舌苔黄，脉数。治宜清热通利。选用通关瞿麦汤、滋肾通关丸、罗太无白花散等方。败精瘀血，阻塞水道，则见尿闭不出，或滴沥而下，或尿出如线，小腹胀满，隐痛拒按，或茎中痛，苔青紫，脉细涩或细数。治宜行瘀散结。选用代抵挡丸、桃仁承气汤、牛膝膏、蒲灰散等方。气虚、气滞、阴液不足、命门火衰、转胞所致者，详气闭、气虚小便不利、阴虚小便不利、阳虚小便不利、转胞各条。

癃闷　病名。出《素问·五常政大论》。指大、小便不通之症。癃，小便不利；闷，通“秘”，大便秘结不通。《内经吴注》卷二十：小便不通为癃，大便不通为闷。”详癃闭、便秘、关格各条。

瘵　❶病名。指一种传染性疾病，类似结核病。《证治要诀·虚损门》：“传尸劳，骨肉相传，甚至灭门。此其五脏中皆有劳虫，古名曰瘵疾，难以医之。”详传尸劳条。❷指虚劳重症。《杂病源流犀烛·虚损痨瘵源流》：“五脏之气，有一损伤，积久成痨，甚而为瘵。”详虚劳条。

壅疾　脚气的古称。见《济生方·脚气》。详脚气条。

壅嗽　病名。指痰多气壅引起的咳嗽。《证治要诀·诸嗽门》：“壅嗽，声重痰稠，或咳有血，以薄荷、生胡麻各一撮，细嚼，煎苏子降气汤送下。”参咳嗽、痰嗽、痰饮咳嗽、痰积嗽等条。

糖哮　证名。指因偏嗜甘味所致的哮喘。属虚哮范畴。《类证治裁》卷二：“治虚哮用麦冬三两，桔梗三钱，甘草二钱。……糖哮加佩兰三钱，再用海螵蛸火煅研末，大人五钱，小儿二钱，黑沙糖拌匀调服。”参虚哮条。

十七画

〔一〕

戴阳　证名。指以面颧色淡红如妆，游移不定的病证。多因下元虚衰，真阳浮越所致。《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》：“其面戴阳，下虚故也。”常伴见口鼻作衄，或

口燥齿浮，足胫逆冷，脉浮大，按之空虚无力，或微细欲绝等。治宜补气、敛阳、固脱为主。急用参附汤、白通汤、十全大补汤、八味地黄汤等。参见阴盛格阳条。亦可由阳气怫郁在表所致。《杂病源流犀烛·面部病源流》："面戴阳症，一因浮火所冲，一因阳气怫郁于表。……其因阳气怫郁者，当发表，不可攻里，火郁则发之是也"。

戴眼 证名。指睛不转而上视。乃病情危重见症。《素问·三部九候论》："足太阳气绝者，其足不可屈伸，死必戴眼。"、《素问·诊要经终论》："太阳之脉，其终也戴眼，……绝汗乃出，出则死矣。"多因正气耗竭，使神志不慧，藏精之气不上荣目，太阳脉绝所致，亦可见于小儿急惊风、厥阴风痰闭阻等病证。

藏结 证名。亦作脏结。❶指阳气虚衰，阴浊凝结，状如结胸的病证。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："何谓藏结？答曰：如结胸状，饮食如故，时时下利。寸脉浮，关脉小细沉紧，名曰藏结。舌上白胎滑者，难治。""藏结无阳证，不往来寒热（一云寒而不热），其人反静，舌上胎滑者，不可攻也。"成无己注："结胸者，邪结在胸；藏结者，邪结在藏。二者皆下后邪气乘虚入里所致。……与阴相结者，为藏结，以阴受之则入五藏故尔。"治用理中汤、四逆汤等方。❷指胁下素有积聚痞块，并连在脐旁，痛引少腹的病症。或谓疝气亦属此类。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》："病胁下素有痞，连在脐旁，痛引少腹入阴筋者，此名藏结。"《伤寒来苏集·陷胸汤证》："少腹者，厥阴之部，两阴交尽之处；阴筋者，宗筋也。今人多有阴筋上冲小腹而痛死者，名曰疝气，即是此类。"❸指脏气不平，阴阳关格所致的便秘。《三因极一病证方论·秘结证治》："……或藏气不平，阴阳关格，亦使人大便不通，名曰藏结。"参便秘条。

藏厥 厥证之一。因阳气素虚，肾脏真阳衰极所致。《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》："伤寒，脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁无暂安时者，此为藏厥。"《张氏医通·伤寒诸论》："藏厥者，胃中阳虚不能生化脾土，则脾藏气衰不运，不运则水谷不化，胃气不行，经脉不通，故周身皆冷而厥也。"又："藏厥者，其人阳气素虚，肾藏之真阳衰极。"宜用附子理中汤及灸法。参厥证条。

〔丨〕

噫 出《灵枢·口问》。俗称喷嚏。常为感冒、鼻渊等病的症状之一。详感冒、鼻渊条。

〔丶〕

黏汗 证名。见《杂病源流犀烛·诸汗源流》。即油汗。详绝汗条。

鼾嗽 病名。指因气虚而致痰涌气急的咳嗽。《不居集》卷十五："鼾嗽，咳嗽气急，喉声如鼾者，大虚之症。宜独参汤"。本证可见于心源性哮喘、急性肺水肿等危症。参见短气嗽、气高、痰饮咳嗽条。

朦昧 证名。出《素问·气交变大论》。一作蒙昧。指神情昏昧，意识不清，如有物蒙蔽之状。

〔丶〕

燥火三消 病证名。又名风消。见《症因脉治》卷三。指由于燥火所伤而成的三消症。上消为燥火伤肺，症见口渴多饮不止，唇口开裂，烦躁不宁。用知母石膏汤加干葛。中消为燥火伤胃。症见多食易饥，形体消瘦，用人参白虎汤。下消为燥火伤于小肠、膀胱。症见小便频数，淋沥如膏如油。用益元散、导赤各半汤。参消渴、风消等条。

燥火身肿 病证名。身肿类型之一。《症因脉治》卷三："燥火身肿之症，喘促气急，两胁刺痛，身面浮肿，烦躁不得卧，唇口干

燥，小便赤涩，即河间燥伤肺气、节斋先喘后肿之症也。燥火身肿之因，时值燥令，燥火刑金，绝水之源，肺气焦满，清化不行，小水不利，气道闭塞，而燥火肿症作矣。”脉浮数或沉数。治用竹叶白虎汤、清凉饮子、石膏泻白散等方。参身肿、水肿条。

燥火呕吐　病证名。指呕吐因肺胃有热，复伤燥邪所致者。《症因脉治》卷二：“燥火呕吐之症，喘逆呕吐，吐则气急，呕少难出，口唇干燥，烦渴引饮。”脉多浮数或数大。宜选用清燥汤、葛根石膏汤、门冬知母汤等方。

燥火眩晕　病证名。见《症因脉治·外感眩晕》。可因岁运加临或时邪感冒所致。症见身热烦躁，口渴引饮，夜卧不宁，头旋眼黑，小便赤涩，脉躁疾。治宜清火润燥。用柴胡清肝饮、清肺汤、竹叶石膏汤等方。参眩晕条。

燥火喘逆　病证名。《症因脉治·喘症论》：“燥火喘逆之因，燥万物者，莫燥乎火，故喘症燥火居多，原病式叙喘于热淫条下，盖燥火烁人，则诸逆冲上，诸痿喘呕，诸气膹郁，肺家不宁，喘症作矣。”症见喘咳气逆，吐痰难出，口渴身热，二便赤涩，面赤唇焦，脉多数大或滑数。治宜清肺润燥，泻火平气为主，如栝蒌根汤、知母甘桔汤，脉大口渴用人参白虎汤调益元散，大便秘结用凉膈散等方。参火喘、热喘条。

燥火痢　见吴本立《痢证汇参》卷二。即燥热痢。详见该条。

燥火腹痛　证名。指燥热耗伤津液、气机不利所致的腹痛。《症因脉治·腹痛论》：“燥火腹痛之症，满腹刺痛，攻注胁肋，口渴身热，烦躁不寐，小便黄赤，不吐不泻，此燥火腹痛之症也。”多因令值燥热，燥气伤人，肠胃干涸，不得流利所致。治宜清热润燥为主。方用芍药黄连汤、葛根石膏汤等。若腹痛攻刺胁肋者，柴胡清肝饮。目黄便赤，痛连小腹，龙胆泻肝汤。小便赤涩，木通汤调益元散。大便结，四顺饮合本事凉膈散。参腹痛条。

燥矢　证名。矢通屎。又称燥屎。指燥结的粪便。多因胃肠实热内结，津液被耗而致。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》：“阳明病，谵语，有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也。”治宜急下存阴等法。

燥屎　见《伤寒明理论·腹满》。即燥矢。详该条。

燥热咳嗽　病证名。指外感风热燥邪，耗伤肺金所致者。症见干咳无痰，或痰少粘稠，咯出不爽，鼻燥咽干，舌红少津，咳甚则胸胁痛，或有形寒身热等表症。治宜清肺润燥。用桑杏汤、清金润燥天门冬丸等。详见咳嗽、伤燥咳嗽、肺燥咳嗽条。

燥热痢　病证名。指痢疾由燥火热邪引起者。又称燥火痢。《症因脉治》卷四：“燥热痢之症，内热烦躁，口燥舌干，腹痛频并，脓血稠粘，枯涸难下，肛门热痛，小便全无，夜卧不宁。”治法有燥伤气分、血分和气血两伤之别。《痢证汇参》卷二“燥火伤气则白，燥火伤血则赤，赤白兼下，气血俱伤。”如燥伤血分，可选用当归大黄丸、当归银花汤等方；燥伤气分，用枳壳大黄汤合益元散等方；如下痢红积，腹中痛甚，乃燥热伤及气血，可用乌药黄连汤等方。参痢疾条。

燥热痿　痿证之一。见《症因脉治》卷三。由于燥热伤津耗血，宗筋失于营养所致。症见手足痿软，不能行动，伴有皮毛干枯，口燥唇焦等症。治宜清热润燥，滋阴养血。用知母石膏汤、滋燥养荣汤加减。《血证论·痿废》：“肺气热，则津痿不能灌溉于足，疲乏不行，清燥救肺汤治之。”参痿条。

燥凉　病证名。见《通俗伤寒论·秋燥伤寒》。即凉燥。详该条。

燥痰　痰证之一。①《医学入门》卷五：“升于肺，多毛焦，面白如枯骨，咽干口燥，欬嗽喘促，名曰燥痰。”②即火痰。见《症

因脉治》卷二。详见该条。③即气痰。见《医宗必读·痰饮》。参见气痰条。④指痰恋于肺的病证。《杂病源流犀烛·痰饮源流》："在肺曰燥痰，其色白，咯出如米粒，多喘促，寒热，悲愁，脉必涩，宜利金丸。"一名肺经燥痰。参见该条。燥痰又有内伤、外感之分。参见内伤燥痰、外感燥痰条。⑤指痰之难咯者。《症因脉治》卷二引张三锡曰："如连欬数声，痰不出者，名燥痰，属肺燥，宜门冬、知母、杏仁之类润之，香燥之药亦当忌也。"参痰证条。

燥嗽 病名。指秋燥伤肺的咳嗽。五嗽之一，见《外台秘要》卷九。《类证治裁》卷二："燥嗽。秋燥嗽渴，气促，宜甘润，玉竹、沙参、麦冬、梨、蜜、杏仁、蔗汁之属，或复脉汤去姜、桂。"参见五嗽、伤燥咳嗽条。

燥瘕 病证名。八瘕之一。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："燥瘕，状如半杯，上下腹中不定，其苦痛连两胁，上下引心而烦，胸及腹中不得太息，腰背重，足痿削而久立痛，遗尿失精，便难盗汗，妨于饮食，时欲呕吐。"《类证治裁·痃癖癥瘕诸积论治》："经行胃热，心烦汗多，大便难涩，瘕聚如杯，加味四物汤。"参瘕、癥瘕、八瘕等条。

濡泄 病名。指湿盛伤脾的泄泻。出《素问·气交变大论》。又称濡泻，湿泻、洞泄、脾虚泄。《卫生宝鉴·泄痢门》："内经云：湿胜则濡泄。……夫脾为五脏之至阴，其性恶寒湿。今寒湿之气，内客于脾，故不能裨助胃气，腐熟水谷，致清浊不分，水入肠间，虚莫能制，故洞泄如水，随气而下，谓之濡泄。法当除湿利小便也，对金饮子主之。"《杂病源流犀烛·泄泻源流》："惟濡泄一症，又名洞泄，乃为湿自甚，即脾虚泄也。由土虚不能制湿，肠胃不固，湿反胜而成病，故脉迟而缓，小便不利，身重，腹不痛，肠鸣漉漉，所下多水。宜四苓汤加二术、胃苓汤加草蔻。"参洞泄、湿泻条。

濡泻 病名。出《素问·阴阳应象大论》。又称濡泄、湿泻、洞泄。《圣济总录》卷七十四："寒湿之气，内客于脾，则不能裨助胃气，腐熟水谷，致清浊不分，水入肠间，虚莫能制，故洞泄如水，随气而下，谓之濡泻。"详濡泄、湿泻条。

〔ㄱ〕

臂热 证名。指手臂有发热感觉。《灵枢·论疾诊尺》："臂中独热者，腰腹热。"多因风热或血虚内热所致。《杂病源流犀烛·肩臑肘臂腕手病源流》："臂忽发热极痛，为风热也。宜桑枝浓煎汤，多服；臂发热痛，从里彻外，为血衰也。宜秦艽地黄汤。"参发热条。

臂厥 证名。指手太阴，手少阴经经气逆乱的病候。《灵枢·经脉》："肺，手太阴之脉，……是动则病肺胀满，膨膨而喘咳，缺盆中痛，甚则交两手而瞀，此为臂厥。"又："心，手少阴之脉，……是动则病嗌干，心痛，渴而欲饮，是为臂厥。"《类经·十二经病》："瞀，木痛不仁也。手太阴脉由中府出腋下，行肘臂间，故为臂厥。"又："手少阴循臂内后廉出小指之端，故为臂厥。"参厥证条。

臂痛 证名。指上下臂关节、肌肉作痛。多由风寒湿邪侵袭、痰饮留滞、血不荣筋、阳气不足、气滞血瘀或提挈重物损伤所致。《证治要诀·臂痛》："臂为风寒湿所搏，或饮液流入，或因提挈重物，皆致臂痛，有肿者，有不肿者。……外有血虚一证，血不荣于筋，或致臂痛。"《类经图翼》卷十一："凡人肩冷臂痛者，每遇风寒，肩上多冷，……此以阳气不足，气血衰少而然。"若臂痛由风寒湿侵袭所致，治宜蠲痹汤，若由血不荣筋，瘦弱，臂痛，则兼养血，宜蠲痹汤合四物汤。若怒动肝火而臂痛者，宜小柴胡汤加川芎、当归。若痰饮流注而臂连肩

背酸痛者，宜二陈汤、星香散合用。若挈重伤筋，以致臂痛，宜琥珀散、劫劳散，或和气饮。若臂痛由脾虚邪气相搏，宜补中益气汤加威灵仙、桂枝、姜黄等。若臂痛不能举物，气血凝滞者，宜舒筋汤。臂痛部位与经络循行相关。《医钞类编·臂痛门》："臂痛，有六道经络，定其痛在何经络之间，以行本经药行其气血，气血通则愈矣。"如臂前廉痛属阳明，宜升麻、白芷、葛根；臂后廉痛属太阳，宜藁本、羌活；臂外廉痛属少阳，宜柴胡、连翘；臂内廉痛属厥阴，宜柴胡、当归、青皮；臂内前廉痛属太阴，宜升麻、白芷、葱白；臂内后廉痛属少阴，宜细辛、当归、独活等。

臂痹 指臂痛上连肩胛的痹症。《金匮翼·痹症统论》："臂痹者，臂痛连及筋骨，上支肩胛，举动难支，由血弱而风中之也。"治用十味剉散，或桑枝切片、炒香，水煎服。

十 八 画

〔一〕

藜芦中毒 病名。因药服或误服藜芦过量中毒。症见出汗，流涎，无力，胃部灼热疼痛，剧烈呕泻，甚至便血。严重者迅即抽搐，谵妄，昏迷，甚至死亡。治疗宜中西医结合救治。《千金要方》卷二十四载解藜芦毒药有雄黄、煮葱汁、温汤等。可参考。

〔丨〕

蹠跛 证名。《素问·通评虚实论》："蹠跛，寒风湿之病也。"指足引跛痛。《内经吴注》卷八："足前点步谓之蹠，一足偏引谓之跛。"多由风寒湿三气侵袭所致。可见于风湿痹证、脚气等病。

〔丿〕

翻胃 病名。见《肘后备急方》卷四。❶即反胃，亦称胃反。详反胃、胃反条。❷指大便溏利，每食必吐之膈症。《医宗己任篇·膈症》："有一种大便甚利且溏，每食必吐，是名翻胃。王太仆云：食入反出，是无火也，八味丸主之。此验症全在大便，如一干结，便非无火，一味滋润如前法。"

〔·〕

瀋唇 证名。即紧唇。见《世医得效方·唇病》。详紧唇条。

癞 病名。即疠风。亦称大风恶疾。见《世医得效方》卷十三。《医学衷中参西录》谓治癞证，蛇退一味在所必需，以其既善解毒（以毒攻毒），又善祛风，且有以皮达皮之妙。详疠风条。

癞疝 病名。癞又作颓。出《素问·阴阳别论》。❶指寒湿下传引起的阴囊肿大。《儒门事亲》卷二："癞疝，其状阴囊肿缒，如升如斗，不痒不痛者是也。得之地气卑湿所生，故江淮之间，湫溏之处，多感此疾。宜以去湿之药下之。"《类证治裁》卷七："传为癞疝，囊丸肿大如栲栳，顽痹不仁。三层茴香丸、荔枝散。"或用燥阴散，寒加吴萸、大茴；湿加泽泻、木通；湿热者，加小茴、山栀、黄柏等。❷指妇女少腹肿或妇女阴户突出的病症。《素问·脉解篇》："厥阴所谓癞疝，妇人少腹肿者，厥阴者辰也。"《儒门事亲》卷二："癞疝……女子阴户突出，虽亦此类，乃热则不禁固也，不可便谓虚寒而涩之、燥之、补之。"❸指阴疝。《圣济总录》："邪气聚于阴，致阴器肿大而痛

者，阴疝也，一名癫疝。”参阴疝条。

癖 病名。又称癖气。指痞块生于两胁，平时寻摸不见，痛时则可触及者。《诸病源候论·癖病诸候》：“因饮水浆过多，便令停滞不散，更遇寒气积聚而成癖。癖者，谓僻侧在于两胁之间，有时而痛是也。”《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“癖者，匿也，潜匿两胁之间，寻摸不见，有时而痛，始觉有物，其原皆由荣卫失调，经络阻隔，而又起居饮食无度，伤脾伤胃，有所劳力，强忍作劳，以致精伤血铁，邪冷之气搏结不散，藏于隐僻之所，故名曰癖。《医学传灯·积聚癥瘕痃僻痞块》：“僻者，隐在两胁之间，时痛时止，故名曰癖，痰与气结也。”根据病因，症状之不同，可分水癖、饮癖、痰癖、酒癖、寒癖等，详各该条。

癖气 病名。癖的别称。见《太平圣惠方·癖气》。《圣济总录》卷七十三：“聚于两胁间，有时而痛是也。以其僻在肋下，故名癖气。”详癖条。

癖饮 痰饮之一。《诸病源候论·痰饮诸病候》：“此由饮水多，水气停聚两胁之间，遇寒气相搏，则结聚而成块，谓之癖饮。在胁下弦互起，按之则作水声。”一名饮癖。参痰饮、饮癖条。

癖结 病名。指水邪与宿食相搏，结聚于胁下而成的癖块。《诸病源候论·癖病诸候》：“此由饮水聚停不散，复因饮食相搏，致使结积在于胁下，时有弦互起或胀痛，或喘息短气，故云癖结，脉紧实者，癖结也。”参癖有关条。

癖积 病名。九积之一。指水痰互结所致的积症。《儒门事亲》卷三：“癖积，两胁刺痛，三棱、广茂之类。”《医钞类编》卷九：“陈飞霞曰：癖者，血膜裹水，侧癖胁旁，时时作痛，时发潮热，或寒热往来似疟。故疟家多有此症，凡疟发过之后，必令其热退尽，方可饮食，若热未尽而饮食之，则中脘多蓄黄水，日久而成癖积。”参癖、积等条。

癖黄 黄病二十八候之一。《诸病源候论·黄病诸候》：“气水饮停滞结聚成癖，因热气相搏，则郁蒸不散，故胁下满痛，而身发黄，名为癖黄。”《太平圣惠方》卷五十五治癖黄用半夏散方。参黄疸有关条。

十九画

〔丨〕

巅顶痛 证名。顶巅痛的别称。《医林绳墨·头痛》：“足太阳膀胱之脉，起于目锐眦，上额交巅，令人头痛，则曰巅顶痛。”详顶巅痛条。

巅疾 病名。巅，指头顶。巅疾，泛指头部的疾病，但多指各种头痛。《素问·方盛衰论》：“气上不下，头痛巅疾。”参头痛、头风、眩晕条。

噎酸 又称吞酸、醋咽。《三因极一病证方论》卷十一：“食后噫醋吞酸，皆宿食证，俗谓之咽酸是也。”详吞酸、吐酸条。

〔丿〕

鲃喘 证名。见《医说》卷四。又称鲃鮹。指喘急而喉中有痰鸣声，类哮证。多因过食鱼虾盐咸，内有积痰寒饮，外寒与内饮搏击，肺气壅阻所致。《金匮翼·鲃喘》：“鲃喘者，积痰在肺，遇冷即发，喘鸣迫塞，但坐不得卧，外寒与内饮相搏，宜小青龙汤主之；若肺有积热，热为寒束者，宜越婢汤主之。……丹溪治鲃喘之症，未发，以扶正气为主，八味、肾气，温肾行水之谓也；已发，用攻邪气为主，越婢、青龙，泄肺蠲饮之谓也。”《万病回春·哮吼》：“凡遇天

阴欲雨，便发齁喘，甚至坐卧不得，饮食不进，此乃肺窍中积有冷痰，乘天阴寒气从背、口、鼻而入，则肺胀作声。此病有苦至终身者，亦有子母相传者。”《医学传灯·齁喘》：“齁喘之病，方书皆名哮吼，为其声之恶也。此因误啖盐酱咸物，搏结津液，熬煎成痰，胶粘固结，聚于肺络，不容呼吸出入，而呼吸正气反触其痰，所以喘声不止也。肺有痰热，毛窍常开，热气得以外泄，所以伏而不发，一遇秋冬，寒气外束，邪热不得宣通，故令发喘。脉来浮数滑大者，宜用定喘汤。……齁病属热者固多，而肺寒者亦有，不可泥定是热。凡脾胃虚寒，气不能运，积成冷痰，上注于肺，亦成齁喘。其人四肢厥冷，脉沉细缓，按之无力，即其候也。宜用六君子汤加款冬、金沸草、杏仁、炮姜治之。”

齁嗽　病名。指哮喘咳嗽鼻息有痰声者。《不居集》卷十五：“齁嗽，齁者痰声，即远年近日喘哮咳嗽也。用糯米泔水磨茶子滴入鼻中，令病人吸入口内服之。”参咳嗽、痰哮条。

齁鲒证名。见《医说》卷四。即齁喘。详该条。

〔丶〕

颤振　❶证名。《医学纲目》卷十一：“颤，摇也；振，动也。”指头部或四肢掉摇抖动之症。多由阴血不足，筋脉失养，肝阳偏亢，阳盛化风，或气虚、心虚、痰浊相挟所致。轻者有时手足颤振或头摇，重则手抖不能持物，足不能行走，头摇动不止。《证治准绳·杂病》：“颤振，此病壮年鲜有，中年以后乃有之，老年尤多。夫老年阴血不足，少水不能制盛火。”治宜滋阴养血，平肝熄风为主，可用空振丸、摧肝丸。因气虚者，用参术汤。因心虚者，用平补正心丹。因痰浊者，用导痰汤加味。❷指战栗。《张氏医通·诸风门》：“颤振，经云寒气客于皮肤，阴气盛，阳气虚，故为振寒寒栗。深师曰：振乃阴气争胜，故为战；栗则阳气不复，故为颤。”本证常见于震颤麻痹、老年性震颤等疾患。

癡呆　病名。指举动迟钝、言辞颠倒的一种神志病。多因神志刺激过度所致。《医钞类编》卷二十：“癡呆证，或以菀结，或以事不遂，或以思虑、疑贰、惊恐而渐致。或言辞颠倒，举动不经，或多汗，或善愁，其证千奇万怪，无所不至。脉必或弦或数，或大或小，变易不常。此其逆气在心，或肝胆二经气有不清而然。但察其形体强壮，饮食不减，别无虚脱等证，则悉宜服蛮煎，治之最稳最妙。然有大惊猝恐，偶伤心胆而致失神昏乱者，当以速扶正气为主。”参情志三郁、呆病等条。

瘪螺痧　痧证之一。系霍乱的俗称。因患时吐泻交作，血液停滞，手指螺纹下陷故名。本证可见于剧烈吐泻所引起之重度脱水。

鳖瘕　病证名。八瘕之一。《诸病源候论·癥瘕病诸候》：“鳖瘕者，谓腹中瘕结如鳖状是也。”《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“鳖瘕，形大如杯，若存若亡，持之应手，其苦小腹内切痛，恶气左右走，上下腹中痛，腰背亦痛，不可以息，面目黄黑，脱声少气，甚亦有头足成形者。”《类证治裁·痃癖癥瘕诸积论治》：“鳖瘕，经行浴水，水精与邪气袭入子户，形如小袢，少腹切痛，宜鳖瘕方。”本病与《诸病源候论》所说鳖癥大略相同。参瘕、鳖癥、气鳖、血鳖、酒鳖等条。

鳖癥　病证名。七癥之一。《诸病源候论·癥瘕病诸候》：“鳖癥者，谓腹内癥结如鳖之形状。”主要症状为癥块固定不移，少腹切痛，甚则牵连腰背，面目黄黑等。多由脾胃气弱，食物触冷，积滞久阻，挟痰瘀内结所致。参癥、七癥等条。

二十画

〔一〕

麵积 病名。指食面类食品过多而成积滞者。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》："麵积，食麵太多，或受寒，或懊侬以致成积，胸胃饱闷也。宜麦芽、莱菔子，方用阿魏丸。"或用莱菔子酒煎服（见《医宗必读》）。参食积条。

〔丨〕

躁 证名。指身体躁动、躁急，或手足扰动不宁。有阳躁、阴躁之分。阳躁因火热所致。《素问·玉真要大论》："诸躁狂越，皆属于火。"《素问玄机原病式·六气为病》："躁扰，躁动烦热，扰乱而不宁，火之体也，热甚于外，则支体躁扰，热甚于内，则神志躁动。"《卫生宝鉴·补遗》："躁为躁愦，皆为热证。"阴躁多因阴火炎上或阴盛格阳所致。《医碥》卷四："躁者，手足扰动不宁也，……肾火为阴火，炎则躁。"《杂病源流犀烛·烦躁健忘源流》："外热身躁曰躁，故躁者，并身外热躁也，……外热属无根之火，其原本于寒。"《类证治裁·烦躁》："若不烦而躁，欲卧泥水中，但饮水不得入口者，此为阴盛格阳。"可选用附子理中汤、附子四逆汤等方。参烦躁、阴躁、阳躁条。

躁烦 证名。指先躁后烦的证候。出《素问·至真要大论》。《伤寒明理论》卷二："所谓躁烦者，谓先发躁，而迤逦复烦者也。"有谓内热曰烦，外热曰躁；烦属阳，躁属阴；内热为有根之火，外热为无根之火者。故但躁不烦，及先躁后烦者，多属阴虚危重之证。《伤寒论·辨少阴病脉证并治》："少阴病，吐利，躁烦，四逆者死。"躁亦可由火热所致。伤寒躁烦，有属热属实者。多系太阳病误下，邪热壅于胸膈所致。参见躁、烦躁、阴躁条。

〔丶〕

癥 病证名。指腹内结块，坚硬不能移动者。《诸病源候论·癥瘕病诸候》："癥者，由寒温失节，致府藏之气虚弱，而食饮不消，聚结在内染渐生长块段，盘牢不移动者，是癥也，言其形状，可徵验也。若积引岁月，人即柴瘦，腹转大，遂致死。"多由饮食不节，胃气衰，脾气弱，邪正相搏，气血痰瘀积滞于腹中所致。症见腹中积块、固定不移、痛或无痛，或兼见胁痛腹胀，吐逆，饮食不下，消瘦等症。治宜审察病情，选用理气、祛瘀、化痰、消食及扶正等法。也有将痞块聚散无常称为癥者。《医林绳墨》卷七："气聚而成癥，发无定处也。又曰发于小腹，下上无时，发作见形，发已而不知所去者也。"癥有暴癥、食癥、血癥、米癥、肉癥、发癥、鳖癥、水癥等名称，详癥瘕及有关条。

癥疝 古病名。指脘腹部有块癃起疼痛的一种疝气。《诸病源候论》卷二十："腹中气乍满，心下尽痛，气积如臂，名曰癥疝也。"参见疝条。

癥瘕 病证名。见《金匮要略·疟病脉证并治》。指腹腔内结聚成块的一类疾病。《诸病源候论·癥瘕病诸候》："其病不动者，直名为癥。若病虽有结癥而可推移者，名为癥瘕。"后世一般以坚硬不移，痛有定处的为癥；聚散无常，痛无定处的为瘕。《圣济总录·积聚门》："牢固推之不移者癥也。"又："浮流腹内，按抑有形，谓之瘕。"癥瘕与积聚之别，《圣济总录》以癥瘕与积

聚为一类。如“癥瘕结癖者，积聚之异名也。证状不一，原其根本，大略相类。”《医学入门》等书以积聚是男子病，癥瘕是女子病。《杂病源流犀烛·积聚癥瘕痃癖痞源流》：“癥瘕见于脐下，是下焦之病。……多生于女子，而男子偶患之。”详见癥、瘕、七癥、八瘕、十二癥等条。本证可见于腹腔内肿瘤和炎性包块等疾病。

灌汗 指汗多如灌水之状。《素问·脉要精微论》：“肺脉……其耎而散者，当病灌汗。”《类经》卷六：“汗出如水，故云灌汗。”《脉经》“灌汗”作“漏汗”。参漏汗条。

瀼（ráng攘）泄 古病名。又称瀼泻。❶指停饮积食所致的泄泻。《医学入门·杂病》：“停蓄饮食，数日乃泻，腹胀者，名瀼泻。枳术丸、没食子丸；烦渴或兼呕者，钱氏白术散、参苓白术散；食少肠鸣，四肢困倦者，升阳除湿汤；日止夜泻者，启脾丸。”❷肾泄的别名。《杂病源流犀烛·泄泻源流》：“肾泄，即五更泄。一名晨泄，又名瀼泄。”详肾泄条。

瀼泻 病证名。见《医学入门·杂病》。又称瀼泄。详该条。

二十一画

〔丿〕

鱢嗽 病名。鱢音骚，臭也。指肺受外邪所致的咳嗽。《太平惠民和剂局方》卷四：“备急五嗽圆，治五种咳嗽。一曰上气嗽，二曰饮嗽，三曰鱢嗽，四曰冷嗽，五曰邪嗽，皆有肺受风寒，气不宣通所致。”亦指传染性咳嗽。《不居集·咳嗽》：“鱢嗽，乃邪恶鬼注之嗽，乃五嗽中之一嗽也。主以四满丸。”参咳嗽、五嗽条。

〔丶〕

癫 病名。出《灵枢·癫狂》。❶指精神失常的疾病。多因思虑忧郁，损伤心脾，或瘀阻包络，痰热蒙心所致。又名痴呆、呆病。症见精神抑郁，表情淡漠，多静而神志常昏，或默默不语，或复多言谩说，或言语无序，或歌或哭，或吟或笑，或噉食粪污，不知秽洁。治疗当分虚实。实者以豁痰、开闭、泄火、化瘀为主，宜用滚痰丸、癫狂梦醒汤、清心丸等。虚者以调补为主，宜归脾汤、养营汤等。若虚实兼治，宜用祛癫汤等。本病类似精神分裂症、躁狂抑郁性精神病及反应性精神病等。参见痴呆、呆病、五癫、花癫、失心风等条。❷指痌病。《景岳全书·杂证谟》：“癫即痌也。”又：“癫病之至，忽然僵仆而时作时止。”又称为“胎病”。《素问·奇病论》：“人生而有病癫疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名为胎病，此得之在母腹中时，其母有所大惊，气上而不下，精气并居，故令子发为癫疾也。”即癫痌病。参见痌条。❸指神志清楚但手足动摇，语言蹇涩的病症。《医林绳墨》卷六：“癫者行动如常，人事亦知，但手足战掉，语言蹇涩，头重身轻，其脉浮滑而疾。”多因心气、心血不足，痰气郁阻所致。治宜益气养血化痰为主，方如二陈汤加全蝎，白附子、防风、黄芪、当归、秦艽等。本病可见于老年性震颤、脑动脉硬化及脑血管意外等疾病。

癫狂 病名。指精神错乱的疾病。出《灵枢·癫狂》。《难经·二十难》：“重阳者狂，重阴者癫。”癫属阴，多偏于虚，患者多静默；狂属阳，多偏于实，患者多躁动。但癫病经久，痰郁化火，可以出现狂证；狂病延久，正气不足，亦可出现癫证，故两

证常并称。《证治要诀》卷九："癫狂，由七情所郁，遂生痰涎，迷塞心窍，不省人事，目瞪不瞬，妄言叫骂，甚则逾垣上屋，裸体打人。"《杂病源流犀烛·癫狂源流》："癫狂，心与肝胃病也，而必挟痰挟火，癫由心气虚，有热，狂由心家邪热，此癫狂之由。……癫为久病，狂为暴病；癫病多喜，狂病多怒；癫有时人不之觉，是癫之轻者，狂有时人不及防，是狂之骤者。癫病痰火一时忽动，阴阳相争，亦若狂之状，狂病痰火经久煎熬，神魂迷瞀，亦兼癫之状，此癫狂之形势宜辨。"治疗以化痰、清火、活血、祛瘀、攻下、涌吐、补益、重镇、开窍、宁神等法。参见癫、狂等有关条。

癫眩 证名。即头眩。《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》："假令瘦人脐下有悸，吐涎沫而癫眩，此水也。"《医宗金鉴》卷二十一："癫眩之癫字，当是巅字，巅者，头也。文义相属，此传写之讹。"参眩晕、头晕、头眩条。

癫蛊 病名。指误食动植物菌类中毒所致的癫症。《增广验方新编》卷下："受毒者，……则人心昏头眩，笑骂无常，或遇饮酒时药毒辄发，忿怒凶狠不可制者，名曰癫蛊。"本病症可见于因误服含阿托品类生物碱的植物，如蔓陀罗及莨菪类的花、叶、果实；部分毒蕈、毒草等。参见蛊、蛊毒条。

癫痫 病名。见《备急千金要方》卷十四。❶即痫病。《医学纲目》卷十一："痰溢膈上则眩甚，仆倒于地而不知人，名之曰癫痫。徐嗣伯云，大人曰癫，小儿曰痫，其实一疾也。"详见痫条。❷癫病与痫病的合称。《证治准绳·杂病》："《素问》止言癫而不及痫。《灵枢》乃有痫瘈、痫厥之名。诸书有言癫狂者，有言癫痫者，有言风痫者，有言惊痫者，有分癫痫为二门者，迄无定论。……要之，癫、痫、狂大相径庭，非各殊而实一之谓也。"参见癫、痫条。

二十二画

〔一〕

囊缩 证名。指阴囊与睾丸上缩之证。出《素问·热论》。又称卵缩。属阴缩范畴。本证常与舌卷并见于危重病中。多由厥阴经受病所致。《证治要诀》卷二："厥阴舌卷囊缩。"若因阳明热盛，邪传厥阴者，宜急下存阴，用大承气汤之类。因寒邪直中者，用当归四逆汤、吴茱萸汤等方。参阴缩、卵缩条。

鬚髮早白 指年龄未衰老而出现须髮灰白的症象。《医述·须髮眉》："血虚者，其须发早白。"多由肾虚营血衰少，失却润养所致。宜益肾滋阴血为主。用首乌延寿丹，或旱莲膏等常服。

〔丨〕

髓疽 病名。九疽之一。《外台秘要》卷四："髓疽，目眶深，多嗜卧，牡蛎、泽泻主之。"参黄疸有关条。

髓黄 三十六黄之一。❶《太平圣惠方》卷五十五："髓黄者，身体赤黄，四肢不举，肌肉战掉，鼻中出血，两脚疼闷，一手专安额上，身不壮热，爱冷处卧。"治用点烙法，内服地骨皮散。❷《圣济总录》卷六十一："髓黄，病人四肢疼痛无力，好眠冷地，身体遍黄，次便青绿色起，唇齿俱白，眼带微肿。"宜用黄芪散等方并施灸法。参黄疸有关条。

髓蒸 二十三蒸之一。见《诸病源候论·虚劳骨蒸候》。详二十三蒸条。

二十三画

〔一〕

魇（yǎn）　病名。亦称梦魇、鬼魇。其症恶梦离奇，或如有重物压身，常突然惊觉。《肘后备急方》卷一："魇，卧寐不寤者，皆魂魄外游，为邪所执。"《杂病源流犀烛·不寐多寐源流》："梦而魇则更甚者，或由心实，则梦惊忧奇怪之事而魇，宜静神丹；或由心虚，则梦恍惚幽昧之事而魇，宜清心补血汤；甚有精神衰弱，当其睡卧，魂魄外游，竟为鬼邪侵迫而魇者，此名鬼魇，宜雄朱散。"镇心丹、小定心汤亦可选用。

颧赤　证名。指两颧骨部呈现鲜红之色。出《灵枢·五阅五使》。《景岳全书·面病》："两颧鲜赤，如脂如缕，而余地不赤者，此阴虚也。"多因肝肾阴亏，虚阳上浮所致。治宜滋阴降火为主。方用八仙长寿丸、大补阴丸等。亦有心火上炎所致者。《杂病源流犀烛·面部病源流》："亦有由于心病者，《灵枢》曰：心病者颧赤。察其色赤，且诊其脉，病果属心，则急降心火，宜黄连安神丸清之。"常见于痨瘵、虚劳等病证。

汉语拼音索引

A

ài 嗳…… 378
碍…… 376
àn 暗…… 378
ào 懊…… 409

B

bā 巴……87
八……3
bái 白……99
bǎi 百…… 113
bān 斑…… 328
bàn 半…… 105
bǎng 膀…… 399
bāo 胞…… 261
暴…… 405
bèi 背…… 240
悲…… 333
bēn 贲…… 236
bèn 奔…… 200
bí 鼻…… 397
bì 闭…… 144
痹…… 385
閟…… 234
臂…… 416
biàn 遍…… 374
便…… 251
biǎo 表…… 196
biē 鳖…… 419
瘪…… 449
bìng 病…… 297
併…… 211
bó 魄…… 398
薄…… 410
bù 不……36

C

cān 餐…… 412
cáo 慒…… 400
嘈…… 396
cen 岑…… 210
chá 茶…… 236
chán 缠…… 374
chàn 颤…… 419
cháng 肠…… 186
cháng 长……62
cháo 潮…… 409
朝…… 330
chè 掣…… 341
chēn 瞋…… 398
chén 晨…… 315
沉…… 194
chī 吃…… 119
痴…… 384
chǐ 齿…… 202
尺……87
chì 瘛…… 408
chì 赤…… 164
瘈…… 384
chóng 重…… 250
冲…… 146
chóng 虫…… 117
chōu 抽…… 201
chóu 愁…… 378
稠…… 378
chòu 臭…… 280
chū 出……97
chú 除…… 267
chù 触…… 383
怵…… 234
搐…… 377
chuán 传…… 122
chuǎn 喘…… 337
chuāng 疮…… 264
chūn 春…… 234
唇…… 276
cì 刺…… 198
cí 糍…… 409
còu 凑…… 325
腠…… 379
cù 卒…… 225
猝…… 322
醋…… 404
cuō 撮…… 405
cùn 寸……15

D

dǎ 打……93
dà 大……11
dāi 呆…… 173
dài 怠…… 268
带…… 236
戴…… 413
dān 丹……49
单…… 228
dǎn 胆…… 259
dàn 但…… 176
蛋…… 327
淡…… 326
dǎng 当…… 115
dào 盗…… 325
dēng 灯…… 147
diān 巅…… 418
癫…… 408
癫…… 421
diào 吊…… 119
diē 跌…… 339
dōng 冬…… 104
dòng 洞…… 265
动…… 111
dǐng 顶…… 200
dū 督…… 377
dú 毒…… 235
犊…… 284
duǎn 短…… 341
duàn 断…… 325
dùn 顿…… 284
遁…… 342
duō 多…… 143

E

é 额…… 409
è 恶…… 271
呃…… 171
ěr 鲕…… 342
耳…… 112
èr 二…… 2

F

fà 髮…… 109
fá 乏……63
fān 番…… 345
翻…… 417
fán 烦…… 303
fǎn 反……62

fàn 饭…… 188
犯…… 143
fáng 房…… 233
féi 非…… 202
肥…… 221
fēi 肺…… 213
痱…… 384
fèn 膑…… 379
fēng 风……63
fǒu 否…… 169
fū 肤…… 212
跗…… 339
fú 浮…… 302
附…… 261
佛…… 234
拂…… 202
庶…… 315
伏…… 123
fù 腹…… 381

G

gān 疳…… 297
肝…… 178
干……89
gǎn 感…… 376
gàn 骭…… 341
gāng 肛…… 185
刚…… 119
gào 膏…… 400
gāo 高…… 296
gē 格…… 275
疙…… 228
膈…… 398
隔…… 374
gèn 茛…… 275
gōu 钩…… 252
gǒu 狗…… 224
gǔ 蛊…… 316
骨…… 248
股…… 213
谷…… 194
臌…… 412
鼓…… 374
gù 固…… 210
痼…… 384
guā 刮…… 210
瓜…… 100
guān 关…… 145
guàn 灌…… 421
guǐ 鬼…… 252
guō 过…… 114
guǒ 果…… 210

H

hái 咳…… 242
hān 鼾…… 414
hán 酣…… 330
hàn 汗…… 147
hán 寒…… 367
hē 呵…… 210
hé 核…… 276
河…… 229
合…… 141
hēi 黑…… 341
hōu 齁…… 418
hóu 喉…… 339
hòu 后…… 141
hóng 洪…… 265
红…… 162
hū 忽…… 225
hú 狐…… 224
huā 花…… 165
huá 滑…… 366
huái 踝…… 408
huài 坏…… 163
huǎn 缓…… 374
huáng 黄…… 305
huǎng 恍…… 264
huī 挥…… 240
huí 蛔…… 340
huì 恚…… 270
瘣…… 401
hūn 昏…… 223
hún 浑…… 240
huǒ 火……76
huò 惑…… 330

J

jī 击……91
饥…… 105
肌…… 141
鸡…… 195
积…… 287
脊…… 291
jí 急…… 262
jì 季…… 210
悸…… 324
jiā 夹…… 113
jiǎ 瘕…… 401
jiān 煎…… 394
奸…… 162
痫…… 355
肩…… 232
jiǎn 茧…… 236
jiàn 健…… 289
间…… 190
箭…… 408
见……49
jiāng 江…… 147
jiāo 蛟…… 341
交…… 144
jiǎo 脚…… 320
绞…… 269
角…… 187
jiào 叫……94
jiē 痎…… 323
痛…… 104
结…… 268
jīn 禁…… 376
筋…… 343
金…… 211
jǐn 紧…… 285
jìn 近…… 177
噤…… 411
jīng 睛…… 377
惊…… 324
精…… 402
茎…… 198
jǐng 颈…… 327
jìng 痉…… 299
胫…… 262
jiǔ 酒…… 300
九……4
久……18
jū 拘…… 202
jù 聚…… 396
jué 绝…… 269
厥…… 330
jiǎo 搅…… 332

K

kǎ 咯…… 242
kě 渴…… 366
kè 客…… 266
kǒng 恐…… 276
kǒu 口……16
kū 枯…… 237
kuáng 狂…… 187

L

láng 狼…… 296
làng 浪…… 303
láo 劳…… 165
痨…… 352
lǎo 老…… 111
léi 雷…… 376
lèi 类…… 264

lí 离…… 297
藜…… 417
lǐ 里…… 175
lí 沥…… 194
鬲…… 276
利…… 176
历……37
liáng 凉…… 299
liǎng 两…… 168
lěng 冷…… 190
lín 淋…… 326
liú 流…… 303
留…… 296
瘤…… 409
瘤…… 409
硫…… 330
liù 六……75
lóng 癃…… 413
lóu 偻…… 319
lòu 漏…… 403
lú 鸬…… 285
胪…… 259
lù 禄…… 374
luán 挛…… 296
luǎn 卵…… 188
lún 瘟…… 401
luo 落…… 325

M

má 麻…… 322
痳…… 384
mǎ 马……26
mài 脉…… 261
mǎn 满…… 395
màn 曼…… 315
慢…… 403
máng 盲…… 228
máo 毛……49
mào 冒…… 243
瞀…… 404
méi 梅…… 307
眉…… 267
煤…… 394
mēn 闷…… 190
méng 朦…… 414
mèng 梦…… 307
孟…… 234
mǐ 米…… 146
mì 密…… 327
miàn 面…… 237
麵…… 407
míng 瞑…… 404
mó 膜…… 398
mò 沫…… 228
mǔ 牡…… 176
母…… 111
mù 目……93
木……27

N

náng 囊…… 422
náo 蛲…… 339
nǎo 脑…… 294
nèi 内……44
nì 逆…… 265
溺…… 395
niǎn 捻…… 307
niào 尿…… 195
niè 啮…… 317
齧…… 396
niú 牛……49
niǔ 纽…… 196
nóng 脓…… 295
nù 怒…… 267
nǚ 女……22
nǜ 衄…… 295
nüè 疟…… 226

O

ǒu 呕…… 170

P

pán 盘…… 319
pāo 胞…… 321
pī 砒…… 237
pí 疲…… 298
脾…… 345
皮…… 109
pǐ 痞…… 353
癖…… 417
piān 偏…… 318
píng 平……93
pò 破…… 277
pū 扑……93
仆……62

Q

qī 七……2
漆…… 403
qì 气……52
qí 脐…… 294
奇…… 200
qián 前…… 264
qiàn 欠……63
qiāng 蜣…… 378
qiáng 强…… 374
qiào 窍…… 305
qǐn 寝…… 395
qīng 青…… 197
清…… 326
圊…… 315
qíng 轻…… 239
情…… 323
qiū 秋…… 250
鼽…… 412
qū 胠…… 259
qù 去……91
qú 疽…… 298
quán 颧…… 423
quǎn 犬……36
qún 癜…… 409

R

ráng 瀼…… 421
rè 热…… 278
rén 人……4
rèn 任…… 125
rì 日……40
róu 柔…… 268
ròu 肉…… 119
rú 如…… 162
濡…… 416
ruǎn 软…… 201
ruò 弱…… 395

S

sān 三……5
sè 色…… 144
shā 砂…… 237
沙…… 194
杀…… 141
痧…… 356
shān 山……18
痁…… 297
shǎn 闪…… 105
shàn 疝…… 227
善…… 357
shāng 伤…… 125
shāng 商…… 323
shàng 上……15
shǎo 少……38
shé 舌…… 121
折…… 170
shè 射…… 290
shēn 深…… 327
身…… 177

shén 神…… 266
shěn 瀋…… 416
shèn 肾…… 203
shēng 声…… 165
生……97
shī 尸……21
失……97
湿…… 358
shí 石……92
十…… 2
食…… 252
实…… 290
时…… 171
似…… 140
shì 嗜…… 377
shōu 收…… 162
shǒu 首…… 265
手……50
shǔ 暑…… 333
鼠…… 378
shù 数…… 394
shuǐ 水……87
sī 思…… 248
sǐ 死…… 113
sì 四……95
sōu 溲…… 367
sòu 嗽…… 396
sù 缩…… 404
宿…… 327
suǐ 髓…… 422
sūn 飧…… 352
sǔn 损…… 272
suǒ 索…… 276

T

tài 太……32
tān 瘫…… 409
摊…… 377
tán 痰…… 387
táng 糖…… 413
táo 桃…… 275
tǐ 体…… 176
tì 嚏…… 414
tiān 天……26
tiě 铁…… 291
tíng 停…… 318
tóng 铜…… 318
桐…… 275
tòng 痛…… 357
tóu 头…… 107
tǔ 土……9
tù 吐…… 115
tuí 癀…… 401
tuǐ 腿…… 383
tūn 吞…… 176
tuō 脱…… 321
tuò 唾…… 317

W

wā 腕…… 318
wài 外…… 100
wán 顽…… 270
wǎn 晚…… 316
wáng 亡……20
wǎng 往…… 211
wàng 妄…… 144
wēi 微…… 379
萎…… 307
wěi 尾…… 194
腲…… 381
猥…… 352
痿…… 384
wèi 胃…… 244
味…… 210
wēn 温…… 364
wò 卧…… 198
wū 乌……74
污…… 147
wú 无……27
蜈…… 378
wǔ 午……49
五……27

X

xī 息…… 290
膝…… 208
翕…… 342
溪…… 195
xǐ 喜…… 329
xiā 呷…… 210
xiá 暇…… 339
蝦…… 407
xià 下……10
夏…… 277
xiān 先…… 120
涎…… 303
xiàng 项…… 235
xiāo 消…… 302
哮…… 285
痟…… 354
xiǎo 小……22
xián 鹹…… 333
咸…… 250
xié 协…… 115
邪…… 115
胁…… 221
xiè 泻…… 230
xīn 新…… 394
心……78
xíng 行…… 141
xìng 杏…… 168
xióng 雄…… 332
xiū 休…… 124
xū 虚…… 307
鬚…… 422
xú 响…… 210
xuán 玄…… 105
悬…… 315
漩…… 403
痃…… 298
眩…… 286
xuě 雪…… 307
xuè 血…… 133
xún 寻…… 147
循…… 342
徇…… 251

Y

yā 鸭…… 286
鸦…… 240
yà 哑…… 241
yá 牙……37
yǎ 瘂…… 323
yán 盐…… 270
yǎn 眼…… 316
魇…… 423
yàn 嚥…… 241
厌…… 113
yáng 阳…… 147
羊…… 144
杨…… 168
yáo 摇…… 377
yǎo 咬…… 243
yào 药…… 236
噎…… 407
yé 恹…… 225
yě 野…… 315
殽…… 332
yè 夜…… 225
腋…… 352
噫…… 412
遗…… 339
yì 疫…… 263
溢…… 395
嗌…… 378
yīn 瘖…… 401

阴…… 154
癌…… 408
喑…… 339
yín 银…… 378
yóng 壅…… 413
涌…… 303
yōu 忧…… 190
幽…… 249
蚰…… 287
yóu 游…… 357
蚰…… 317
油…… 229
遊…… 357
yòu 右……92
yū 瘀…… 385
yú 鱼…… 323
余…… 178
yǔ 郁…… 198
yù 玉……91
yuān 瘖…… 354
yuán 芫…… 165
yuǎn 远…… 162
yuě 哕…… 242
yuè 越…… 328
yūn 晕…… 286

Z

zài 再…… 113
zàng 藏…… 414
脏…… 293
zǎo 早…… 115
zǎo 蚤…… 268
zào 躁…… 420
燥…… 414
zéi 贼…… 287
zhài 瘵…… 413
zhàn 战…… 241
zhān 谵…… 410
评…… 266
zhāng 张…… 195
zhǎng 掌…… 333
zhàng 胀…… 213
瘴…… 412
zhēn 真…… 273
zhén 疹…… 297
zhèn 振…… 277
zhēng 正……91
怔…… 234
蒸…… 375
癥…… 288
zhèng 郑…… 228
zhī 蜘…… 397
支……32
脂…… 295
指…… 239
肢…… 212
直…… 198
zhí 蹠…… 417
zhì 瘈…… 401
zhì 志…… 165
zhōng 中……40
zhòng 众…… 141
仲…… 125
zhōu 周…… 223
zhǒu 肘…… 185
zhòu 昼…… 267
zhū 猪…… 322
诸…… 305
zhù 疰…… 298
注…… 229
zhuǎ 爪……62
zhuǎn 转…… 200
zhuàng 壮…… 146
zhúo 浊…… 265
着…… 327
zá 杂…… 143
zǐ 子……26
紫…… 333
zì 自…… 132
zōng 宗…… 230
zòng 纵…… 195
zǒu 走…… 163
zú 足…… 173
zuì 醉…… 405
zuǒ 左……91
zuò 酢…… 330

[General Information]
书名=中医大辞典 内科分册（试用本）
作者=
页数=428
SS号=0
出版日期=