方名目录

上　册

（一　画）

一

00001　一上散 …… (1)
00002　一见消 …… (1)
00003　一甲煎 …… (1)
00004　一仙丹 …… (1)
00005　一扫光 …… (1)
00006　一扫光 …… (1)
00007　一扫光 …… (1)
00008　一扫光 …… (1)
00009　一字金 …… (1)
00010　一字散 …… (2)
00011　一字散 …… (2)
00012　一字散 …… (2)
00013　一字散 …… (2)
00014　一字散 …… (2)
00015　一阴煎 …… (2)
00016　一块气 …… (2)
00017　一枝春 …… (3)
00018　一奇散 …… (3)
00019　一抹散 …… (3)
00020　一炁丹 …… (3)
00021　一金散 …… (3)
00022　一服饮 …… (3)
00023　一贯煎 …… (3)
00024　一匣丹 …… (4)
00025　一炮散 …… (4)
00026　一笔消 …… (4)
00027　一笑散 …… (4)
00028　一黄散 …… (4)
00029　一捻金 …… (4)
00030　一捻散 …… (5)
00031　一粒金 …… (5)
00032　一粒笑 …… (5)
00033　一紫散 …… (5)
00034　一煎散 …… (5)
00035　一醉饮 …… (5)
00036　一醉散 …… (5)
00037　一捏金散 …… (5)
00038　一柴胡饮 …… (5)
00039　一捻金散 …… (6)
00040　一捻金散 …… (6)
00041　一捻金散 …… (6)
00042　一捻金散 …… (6)
00043　一粒金丹 …… (6)
00044　一握七丸 …… (6)
00045　一号扫风丸 …… (6)
00046　一号癣药水 …… (7)
00047　一甲复脉汤 …… (7)
00048　一字救苦散 …… (7)
00049　一灵三圣散 …… (7)
00050　一味竹茹汤 …… (7)
00051　一味红油散 …… (7)
00052　一味铁氧汤 …… (7)
00053　一味黄芩汤 …… (7)
00054　一味僵蚕散 …… (8)
00055　一味薯蓣饮 …… (8)
00056　一味蟾蜍汤 …… (8)
00057　一物瓜蒂汤 …… (8)
00058　一服立愈汤 …… (8)
00059　一带五参散 …… (8)
00060　一加减正气散 …… (9)
00061　一味莱服子汤 …… (9)

乙

00062　乙癸愈蟹饮 …… (9)

（二　画）

二

00063　二子饮 …… (9)
00064　二贝丸 …… (9)
00065　二仁丸 …… (9)
00066　二气丹 …… (9)
00067　二气散 …… (9)
00068　二乌丸 …… (10)
00069　二乌散 …… (10)
00070　二丹丸 …… (10)
00071　二六丸 …… (10)
00072　二术散 …… (10)
00073　二术煎 …… (10)
00074　二石汤 …… (10)
00075　二仙丸 …… (10)
00076　二仙汤 …… (10)
00077　二冬汤 …… (11)
00078　二冬散 …… (11)
00079　二冬膏 …… (11)
00080　二生汤 …… (11)

00081 二白丸 …… (11)
00082 二白散 …… (12)
00083 二白散 …… (12)
00084 二汁饮 …… (12)
00085 二圣丸 …… (12)
00086 二圣散 …… (12)
00087 二圣散 …… (12)
00088 二母丸 …… (12)
00089 二母散 …… (12)
00090 二至丸 …… (12)
00091 二合散 …… (12)
00092 二阴煎 …… (12)
00093 二防饮 …… (13)
00094 二辛煎 …… (13)
00095 二陈汤 …… (13)
00096 二妙丸 …… (14)
00097 二妙丸 …… (14)
00098 二妙散 …… (14)
00099 二妙散 …… (15)
00100 二妙散 …… (15)
00101 二妙散 …… (15)
00102 二青散 …… (15)
00103 二苓汤 …… (15)
00104 二矾汤 …… (15)
00105 二奇方 …… (15)
00106 二贤散 …… (15)
00107 二明散 …… (16)
00108 二物汤 …… (16)
00109 二物汤 …… (16)
00110 二物散 …… (16)
00111 二物散 …… (16)
00112 二和散 …… (16)
00113 二金汤 …… (16)
00114 二金散 …… (16)
00115 二金散 …… (16)
00116 二宝丹 …… (16)
00117 二宜丹 …… (16)
00118 二参汤 …… (16)
00119 二胡散 …… (16)
00120 二草丹 …… (17)
00121 二香丸 …… (17)
00122 二香丸 …… (17)
00123 二香散 …… (17)
00124 二香散 …… (17)
00125 二香散 …… (17)
00126 二美膏 …… (17)
00127 二姜丸 …… (17)
00128 二神丸 …… (17)
00129 二神散 …… (18)
00130 二神散 …… (18)
00131 二神散 …… (18)
00132 二消散 …… (18)
00133 二海丸 …… (18)
00134 二英散 …… (18)
00135 二黄丸 …… (18)
00136 二黄丸 …… (18)
00137 二黄丹 …… (18)
00138 二黄丹 …… (19)
00139 二黄汤 …… (19)
00140 二黄汤 …… (19)
00141 二黄散 …… (19)
00142 二黄散 …… (19)
00143 二黄散 …… (19)
00144 二黄散 …… (19)
00145 二黄膏 …… (19)
00146 二蜕散 …… (19)
00147 二蜡膏 …… (20)
00148 二鲜饮 …… (20)
00149 二霜膏 …… (20)
00150 二黝散 …… (20)
00151 二八木丹 …… (20)
00152 二门冬饮 …… (20)
00153 二龙大申 …… (20)
00154 二白锉散 …… (20)
00155 二芎饼子 …… (20)
00156 二柴胡饮 …… (21)
00157 二八通玄丹 …… (21)
00158 二仁绛覆汤 …… (21)
00159 二术二陈汤 …… (21)
00160 二术四苓汤 …… (21)
00161 二术救痹饮 …… (21)
00162 二号化毒丹 …… (21)
00163 二号扫风丸 …… (21)
00164 二号癞药水 …… (22)
00165 二甲复脉汤 …… (22)
00166 二仙扫痱汤 …… (22)
00167 二冬二母散 …… (22)
00168 二加龙骨汤 …… (22)
00169 二圣不老丹 …… (22)
00170 二圣救苦丸 …… (22)
00171 二母二冬汤 …… (23)
00172 二地二冬汤 …… (23)
00173 二连四物汤 …… (23)
00174 二陈双核饮 …… (23)
00175 二妙地黄丸 …… (23)
00176 二冬化毒汤 …… (23)
00177 二味消毒散 …… (23)
00178 二味隔纸膏 …… (24)
00179 二参还睛汤 …… (24)
00180 二香三建汤 …… (24)
00181 二香二棱丸 …… (24)
00182 二香定痛散 …… (24)
00183 二黄三白汤 …… (24)
00184 二加减正气散 …… (24)
00185 二百味花草膏 …… (24)
00186 二物茯苓粉散 …… (25)
00187 二十四味飞步散 … (25)
00188 二十四味建中汤 … (25)
00189 二圣大宝琥珀散 … (25)
00190 二十四味大建中汤 …… (25)
00191 二陈加山栀黄连生姜汤 …… (25)

十

00192 十水丸 …… (26)
00193 十生丸 …… (26)
00194 十灰丸 …… (26)
00195 十灰散 …… (26)
00196 十灰散 …… (26)
00197 十华散 …… (26)
00198 十全丹 …… (27)
00199 十全散 …… (27)
00200 十补丸 …… (28)
00201 十补丸 …… (28)
00202 十补丸 …… (28)
00203 十补丸 …… (28)
00204 十枣汤 …… (28)
00205 十宝丹 …… (30)
00206 十宝丹 …… (30)
00207 十珍丸 …… (30)
00208 十珍丸 …… (30)
00209 十珍汤 …… (30)
00210 十种丸 …… (30)
00211 十香丸 …… (31)

00212 十香丸 …… (31)
00213 十将丹 …… (31)
00214 十神汤 …… (31)
00215 十膈散 …… (31)
00216 十膈散 …… (31)
00217 十精丸 …… (31)
00218 十精丸 …… (31)
00219 十四友丸 …… (31)
00220 十味锉散 …… (32)
00221 十圣夺命丹 …… (32)
00222 十皮五子饮 …… (32)
00223 十全大补汤 …… (32)
00224 十全补阴汤 …… (32)
00225 十全育真汤 …… (32)
00226 十全济阴丸 …… (32)
00227 十全流气饮 …… (33)
00228 十补心肾丸 …… (33)
00229 十味白术丸 …… (33)
00230 十味导赤散 …… (33)
00231 十味导痰汤 …… (33)
00232 十味香附丸 …… (34)
00233 十味香薷饮 …… (34)
00234 十味保和汤 …… (34)
00235 十味流气饮 …… (34)
00236 十味温胆汤 …… (34)
00237 十宝化毒散 …… (35)
00238 十鼓通证散 …… (35)
00239 十二味异功散 …… (35)
00240 十八味戚烟丸 …… (35)
00241 十六味保元汤 …… (35)
00242 十六味流气饮 …… (36)
00243 十四味建中汤 …… (36)
00244 十味大建中汤 …… (36)
00245 十五味大建中汤 … (36)
00246 十八味丁沉透膈汤 …… (37)

丁

00247 丁沉丸 …… (37)
00248 丁沉丸 …… (37)
00249 丁沉丸 …… (37)
00250 丁附丸 …… (37)
00251 丁附汤 …… (37)
00252 丁香丸 …… (37)
00253 丁香丸 …… (37)
00254 丁香丸 …… (37)
00255 丁香丸 …… (38)
00256 丁香丸 …… (38)
00257 丁香丸 …… (38)
00258 丁香丸 …… (38)
00259 丁香丸 …… (38)
00260 丁香丸 …… (38)
00261 丁香汤 …… (38)
00262 丁香汤 …… (38)
00263 丁香汤 …… (38)
00264 丁香散 …… (38)
00265 丁香散 …… (39)
00266 丁香散 …… (39)
00267 丁香散 …… (39)
00268 丁香散 …… (39)
00269 丁香散 …… (39)
00270 丁香散 …… (39)
00271 丁香散 …… (39)
00272 丁香散 …… (39)
00273 丁香散 …… (39)
00274 丁香散 …… (39)
00275 丁桂散 …… (39)
00276 丁公仙枕 …… (40)
00277 丁沉煎丸 …… (40)
00278 丁香饼子 …… (40)
00279 丁附治中汤 …… (40)
00280 丁胡三建汤 …… (40)
00281 丁香二陈汤 …… (40)
00282 丁香开胃丸 …… (40)
00283 丁香平气丸 …… (40)
00284 丁香生胃散 …… (41)
00285 丁香半夏丸 …… (41)
00286 丁香半夏丸 …… (41)
00287 丁香半夏汤 …… (41)
00288 丁香安胃汤 …… (41)
00289 丁香豆蔻散 …… (41)
00290 丁香附子散 …… (41)
00291 丁香柿蒂汤 …… (41)
00292 丁香柿蒂散 …… (41)
00293 丁香茱萸汤 …… (41)
00294 丁香烂饭丸 …… (42)
00295 丁香透膈汤 …… (42)
00296 丁香透膈汤 …… (42)
00297 丁香温中汤 …… (42)
00298 丁香楝实丸 …… (42)
00299 丁香柿蒂竹茹汤 … (42)

七

00300 七子散 …… (42)
00301 七气汤 …… (43)
00302 七气汤 …… (43)
00303 七气汤 …… (43)
00304 七仙丸 …… (43)
00305 七仙丹 …… (43)
00306 七仙酒 …… (43)
00307 七生丸 …… (43)
00308 七白散 …… (44)
00309 七圣丸 …… (44)
00310 七圣汤 …… (44)
00311 七圣散 …… (44)
00312 七皮散 …… (44)
00313 七伤散 …… (44)
00314 七针丹 …… (44)
00315 七枝煎 …… (44)
00316 七枣汤 …… (44)
00317 七拗汤 …… (44)
00318 七贤散 …… (45)
00319 七味丸 …… (45)
00320 七味散 …… (45)
00321 七物汤 …… (45)
00322 七疝丸 …… (45)
00323 七疝汤 …… (45)
00324 七宝丸 …… (45)
00325 七宝丹 …… (45)
00326 七宝汤 …… (45)
00327 七宝汤 …… (46)
00328 七宝饮 …… (46)
00329 七宝散 …… (46)
00330 七宝散 …… (46)
00331 七宝散 …… (46)
00332 七宝散 …… (47)
00333 七宝散 …… (47)
00334 七宝散 …… (47)
00335 七宝散 …… (47)
00336 七宝膏 …… (47)
00337 七珍丸 …… (47)
00338 七珍汤 …… (47)
00339 七珍散 …… (47)
00340 七厘散 …… (47)
00341 七厘散 …… (48)

00342 七星剑 …… (48)
00343 七星散 …… (48)
00344 七香丸 …… (48)
00345 七香丸 …… (48)
00346 七香散 …… (49)
00347 七胰散 …… (49)
00348 七福饮 …… (49)
00349 七德丸 …… (49)
00350 七定散子 …… (49)
00351 七气手拈散 …… (49)
00352 七白挺子膏 …… (49)
00353 七圣君子散 …… (49)
00354 七味地黄丸 …… (49)
00355 七味苍柏散 …… (50)
00356 七味葱白汤 …… (50)
00357 七制固脂丸 …… (50)
00358 七制香附丸 …… (50)
00359 七宝美髯丹 …… (50)
00360 七鲜育阴汤 …… (51)
00361 七物小五味子汤 … (51)

八

00362 八子丸 …… (51)
00363 八反膏 …… (51)
00364 八风丹 …… (51)
00365 八风散 …… (51)
00366 八正散 …… (52)
00367 八仙丸 …… (53)
00368 八仙丸 …… (53)
00369 八仙丹 …… (53)
00370 八仙汤 …… (53)
00371 八仙酒 …… (53)
00372 八仙散 …… (53)
00373 八仙散 …… (53)
00374 八仙散 …… (53)
00375 八仙散 …… (54)
00376 八仙散 …… (54)
00377 八仙散 …… (54)
00378 八仙糕 …… (54)
00379 八仙糕 …… (54)
00380 八圣丹 …… (54)
00381 八味丸 …… (54)
00382 八味汤 …… (54)
00383 八物汤 …… (55)
00384 八物汤 …… (55)
00385 八宝丹 …… (55)
00386 八宝丹 …… (55)
00387 八宝饮 …… (55)
00388 八珍丹 …… (55)
00389 八珍散 …… (55)
00390 八珍散 …… (55)
00391 八珍散 …… (55)
00392 八珍糕 …… (56)
00393 八厘散 …… (56)
00394 八厘散 …… (56)
00395 八将丹 …… (56)
00396 八神丹 …… (57)
00397 八仙玉液 …… (57)
00398 八宝眼药 …… (57)
00399 八威灵散 …… (57)
00400 八仙长寿丸 …… (57)
00401 八仙寿神汤 …… (57)
00402 八仙斑龙胶 …… (57)
00403 八味平胃散 …… (58)
00404 八味地黄丸 …… (58)
00405 八味地黄丸 …… (58)
00406 八味回阳饮 …… (58)
00407 八味还睛散 …… (58)
00408 八味顺气散 …… (58)
00409 八味消风饮 …… (59)
00410 八味理中丸 …… (59)
00411 八物定志丸 …… (59)
00412 八物温经汤 …… (59)
00413 八制保躔丸 …… (59)
00414 八宝生肌丹 …… (59)
00415 八宝红灵丹 …… (59)
00416 八宝珍珠散 …… (60)
00417 八宝珍珠散 …… (60)
00418 八宝蠲痛汤 …… (60)
00419 八珍益母丸 …… (60)
00420 八将擒王丸 …… (60)
00421 八味补骨脂丸 …… (60)
00422 八味款冬花散 …… (60)
00423 八珍益母十全丸 … (61)

人

00424 人甲散 …… (61)
00425 人乳膏 …… (61)
00426 人参丸 …… (61)
00427 人参丸 …… (61)
00428 人参丸 …… (61)
00429 人参丸 …… (61)
00430 人参丸 …… (61)
00431 人参丸 …… (62)
00432 人参丸 …… (62)
00433 人参丸 …… (62)
00434 人参丸 …… (62)
00435 人参丸 …… (62)
00436 人参丸 …… (62)
00437 人参丸 …… (62)
00438 人参汤 …… (62)
00439 人参汤 …… (62)
00440 人参汤 …… (63)
00441 人参汤 …… (63)
00442 人参汤 …… (63)
00443 人参汤 …… (63)
00444 人参汤 …… (63)
00445 人参汤 …… (63)
00446 人参汤 …… (63)
00447 人参汤 …… (63)
00448 人参汤 …… (64)
00449 人参汤 …… (64)
00450 人参汤 …… (64)
00451 人参汤 …… (64)
00452 人参汤 …… (64)
00453 人参汤 …… (64)
00454 人参汤 …… (64)
00455 人参饮 …… (64)
00456 人参饮 …… (64)
00457 人参饮 …… (64)
00458 人参饮 …… (65)
00459 人参散 …… (65)
00460 人参散 …… (65)
00461 人参散 …… (65)
00462 人参散 …… (65)
00463 人参散 …… (65)
00464 人参散 …… (65)
00465 人参散 …… (65)
00466 人参散 …… (66)
00467 人参散 …… (66)
00468 人参散 …… (66)
00469 人参散 …… (66)
00470 人参散 …… (66)
00471 人参散 …… (66)
00472 人参散 …… (66)

00473 人参散 …… (66)
00474 人参散 …… (67)
00475 人参散 …… (67)
00476 人参散 …… (67)
00477 人参散 …… (67)
00478 人参散 …… (67)
00479 人参散 …… (67)
00480 人参散 …… (67)
00481 人参散 …… (67)
00482 人参散 …… (67)
00483 人参散 …… (68)
00484 人参散 …… (68)
00485 人参散 …… (68)
00486 人参散 …… (68)
00487 人参散 …… (68)
00488 人参散 …… (68)
00489 人参散 …… (68)
00490 人参散 …… (68)
00491 人参散 …… (69)
00492 人参散 …… (69)
00493 人参粥 …… (69)
00494 人参煎 …… (69)
00495 人参膏 …… (69)
00496 人中白散 …… (69)
00497 人中白散 …… (69)
00498 人中白散 …… (70)
00499 人中黄丸 …… (70)
00500 人参饮子 …… (70)
00501 人参饮子 …… (70)
00502 人参煮散 …… (70)
00503 人马平安散 …… (70)
00504 人马平安散 …… (70)
00505 人参丁香散 …… (70)
00506 人参丁香散 …… (71)
00507 人参丁香散 …… (71)
00508 人参三白汤 …… (71)
00509 人参三白汤 …… (71)
00510 人参三白汤 …… (71)
00511 人参大黄汤 …… (71)
00512 人参门冬汤 …… (71)
00513 人参开胃汤 …… (71)
00514 人参开胃汤 …… (72)
00515 人参木香散 …… (72)
00516 人参内补散 …… (72)
00517 人参乌梅汤 …… (72)
00518 人参平补汤 …… (72)
00519 人参平肺散 …… (72)
00520 人参石脂汤 …… (72)
00521 人参石膏汤 …… (72)
00522 人参石膏汤 …… (72)
00523 人参四物汤 …… (73)
00524 人参冬梨方 …… (73)
00525 人参生犀散 …… (73)
00526 人参白术汤 …… (73)
00527 人参白术散 …… (73)
00528 人参白虎汤 …… (73)
00529 人参宁肺汤 …… (73)
00530 人参半夏丸 …… (73)
00531 人参半夏丸 …… (74)
00532 人参半夏丸 …… (74)
00533 人参半夏汤 …… (74)
00534 人参地黄丸 …… (74)
00535 人参芎归汤 …… (74)
00536 人参芎附汤 …… (74)
00537 人参再造丸 …… (74)
00538 人参当归汤 …… (74)
00539 人参当归汤 …… (75)
00540 人参竹叶汤 …… (75)
00541 人参竹叶汤 …… (75)
00542 人参竹茹汤 …… (75)
00543 人参安肺汤 …… (75)
00544 人参安胃散 …… (75)
00545 人参麦冬汤 …… (75)
00546 人参麦冬汤 …… (76)
00547 人参远志丸 …… (76)
00548 人参远志丸 …… (76)
00549 人参豆蔻汤 …… (76)
00550 人参豆蔻散 …… (76)
00551 人参豆蔻散 …… (76)
00552 人参利膈丸 …… (76)
00553 人参利膈汤 …… (76)
00554 人参羌活散 …… (76)
00555 人参羌活散 …… (76)
00556 人参诃子丸 …… (77)
00557 人参补气汤 …… (77)
00558 人参补气汤 …… (77)
00559 人参补气汤 …… (77)
00560 人参补肾汤 …… (77)
00561 人参补肺散 …… (77)
00562 人参启脾丸 …… (77)
00563 人参枣仁汤 …… (77)
00564 人参败毒散 …… (77)
00565 人参败毒散 …… (79)
00566 人参固本丸 …… (79)
00567 人参固本酒 …… (79)
00568 人参定喘汤 …… (79)
00569 人参建中汤 …… (79)
00570 人参荆芥散 …… (80)
00571 人参荆芥散 …… (80)
00572 人参南星丸 …… (80)
00573 人参厚朴汤 …… (80)
00574 人参轻骨散 …… (80)
00575 人参复脉散 …… (80)
00576 人参保肺汤 …… (80)
00577 人参顺气散 …… (81)
00578 人参顺气散 …… (81)
00579 人参养卫汤 …… (81)
00580 人参养血丸 …… (81)
00581 人参养肺丸 …… (81)
00582 人参养肺汤 …… (82)
00583 人参养荣汤 …… (82)
00584 人参养胃汤 …… (82)
00585 人参桔梗散 …… (82)
00586 人参柴胡散 …… (82)
00587 人参健脾丸 …… (82)
00588 人参润肺丸 …… (82)
00589 人参益气汤 …… (82)
00590 人参益气汤 …… (82)
00591 人参益肺散 …… (83)
00592 人参理中汤 …… (83)
00593 人参黄耆汤 …… (83)
00594 人参黄耆散 …… (83)
00595 人参黄耆散 …… (83)
00596 人参黄耆散 …… (83)
00597 人参鹿角膏 …… (84)
00598 人参鹿茸丸 …… (84)
00599 人参鹿茸丸 …… (84)
00600 人参鹿茸丸 …… (84)
00601 人参清肺汤 …… (84)
00602 人参清肺散 …… (84)
00603 人参清肺散 …… (84)
00604 人参琥珀丸 …… (84)
00605 人参款花膏 …… (85)
00606 人参萆薢丸 …… (85)
00607 人参紫金丹 …… (85)

00608 人参蛤蚧丸 …… (85)
00609 人参蛤蚧散 …… (85)
00610 人参温脾散 …… (85)
00611 人参酸枣汤 …… (85)
00612 人参薯蓣丸 …… (85)
00613 人参藿香汤 …… (86)
00614 人参鳖甲丸 …… (86)
00615 人参鳖甲散 …… (86)
00616 人参大再造丸 …… (86)
00617 人参五味子汤 …… (86)
00618 人参地骨皮散 …… (86)
00619 人参泽兰叶汤 …… (87)
00620 人参款冬花膏 …… (87)
00621 人参竹叶石膏汤 … (87)
00622 人参橘皮竹茹汤 … (87)
00623 人参燕窝百合汤 … (87)

儿

00624 儿枕散 …… (87)
00625 儿茶散 …… (87)
00626 儿茶散 …… (87)
00627 儿茶五倍散 …… (87)

九

00628 九一丹 …… (87)
00629 九子丸 …… (87)
00630 九气汤 …… (87)
00631 九分散 …… (88)
00632 九龙丸 …… (88)
00633 九龙丸 …… (88)
00634 九龙丹 …… (88)
00635 九龙丹 …… (88)
00636 九龙针 …… (89)
00637 九仙丸 …… (89)
00638 九仙散 …… (89)
00639 九生丸 …… (89)
00640 九圣丸 …… (89)
00641 九圣散 …… (89)
00642 九华膏 …… (89)
00643 九炼丹 …… (89)
00644 九宝汤 …… (89)
00645 九宝散 …… (90)
00646 九宝散 …… (90)
00647 九珍散 …… (90)
00648 九黄丹 …… (90)
00649 九痛丸 …… (90)
00650 九蜜煎 …… (90)
00651 九转灵丹 …… (91)
00652 九子地黄丸 …… (91)
00653 九仙灵应散 …… (91)
00654 九仙驱红散 …… (91)
00655 九华粉洗剂 …… (91)
00656 九转灵砂丹 …… (91)
00657 九转黄精丹 …… (91)
00658 九味平胸丸 …… (91)
00659 九味安肾丸 …… (91)
00660 九味芦荟丸 …… (92)
00661 九味羌活汤 …… (92)
00662 九味败毒汤 …… (92)
00663 九味柴胡汤 …… (92)
00664 九味资生丸 …… (93)
00665 九味萸连丸 …… (93)
00666 九味解毒汤 …… (93)
00667 九味蟠葱散 …… (93)
00668 九制香附丸 …… (93)
00669 九蒸苍术散 …… (93)
00670 九物大黄薄贴 …… (93)

(三 画)

三

00671 三七汤 …… (93)
00672 三才丸 …… (93)
00673 三才汤 …… (94)
00674 三仁丸 …… (94)
00675 三仁汤 …… (94)
00676 三化汤 …… (95)
00677 三气饮 …… (95)
00678 三公散 …… (95)
00679 三分散 …… (95)
00680 三反膏 …… (95)
00681 三石水 …… (96)
00682 三石汤 …… (96)
00683 三石散 …… (96)
00684 三甲散 …… (96)
00685 三仙丸 …… (96)
00686 三仙丹 …… (96)
00687 三仙丹 …… (96)
00688 三仙汤 …… (96)
00689 三仙酒 …… (97)
00690 三仙散 …… (97)
00691 三仙散 …… (97)
00692 三仙散 …… (97)
00693 三仙粥 …… (97)
00694 三仙膏 …… (97)
00695 三生丸 …… (97)
00696 三生饮 …… (97)
00697 三生饮 …… (98)
00698 三生散 …… (98)
00699 三白丸 …… (98)
00700 三白汤 …… (98)
00701 三白散 …… (98)
00702 三白散 …… (98)
00703 三白散 …… (98)
00704 三白散 …… (98)
00705 三白散 …… (98)
00706 三白膏 …… (98)
00707 三汁膏 …… (99)
00708 三圣丸 …… (99)
00709 三圣丸 …… (99)
00710 三圣丸 …… (99)
00711 三圣丸 …… (99)
00712 三圣丸 …… (99)
00713 三圣丸 …… (99)
00714 三圣饮 …… (99)
00715 三圣散 …… (99)
00716 三圣散 …… (99)
00717 三圣散 …… (99)
00718 三圣散 …… (99)
00719 三圣散 …… (100)
00720 三圣散 …… (100)
00721 三圣膏 …… (100)
00722 三圣膏 …… (100)
00723 三圣膏 …… (100)
00724 三邪饮 …… (100)
00725 三合汤 …… (100)
00726 三军丸 …… (100)
00727 三阳汤 …… (101)
00728 三阴煎 …… (101)
00729 三豆汤 …… (101)
00730 三豆饮 …… (101)
00731 三花汤 …… (101)
00732 三补丸 …… (101)
00733 三灵汤 …… (101)
00734 三妙丸 …… (102)

00735 三妙丸 …… (102)
00736 三妙散 …… (102)
00737 三妙散 …… (102)
00738 三妙散 …… (102)
00739 三妙散 …… (102)
00740 三奇汤 …… (102)
00741 三奇饭 …… (102)
00742 三奇散 …… (102)
00743 三拗汤 …… (103)
00744 三肾丸 …… (103)
00745 三味丸 …… (103)
00746 三物汤 …… (103)
00747 三物散 …… (103)
00748 三和散 …… (103)
00749 三金汤 …… (104)
00750 三油膏 …… (104)
00751 三宝粥 …… (104)
00752 三建丹 …… (104)
00753 三建汤 …… (104)
00754 三建膏 …… (104)
00755 三柴丸 …… (104)
00756 三星汤 …… (105)
00757 三香汤 …… (105)
00758 三香酒 …… (105)
00759 三香散 …… (105)
00760 三香散 …… (105)
00761 三祛汤 …… (105)
00762 三神丸 …… (105)
00763 三神丸 …… (105)
00764 三神丸 …… (105)
00765 三神汤 …… (106)
00766 三神散 …… (106)
00767 三神散 …… (106)
00768 三神煎 …… (106)
00769 三真汤 …… (106)
00770 三倍汤 …… (106)
00771 三消丸 …… (106)
00772 三消丸 …… (106)
00773 三消饮 …… (106)
00774 三益膏 …… (106)
00775 三萸丸 …… (106)
00776 三黄丸 …… (107)
00777 三黄丸 …… (107)
00778 三黄丸 …… (107)
00779 三黄丸 …… (107)
00780 三黄丸 …… (107)
00781 三黄丸 …… (107)
00782 三黄丸 …… (107)
00783 三黄丹 …… (107)
00784 三黄汤 …… (107)
00785 三黄汤 …… (108)
00786 三黄汤 …… (108)
00787 三黄汤 …… (108)
00788 三黄汤 …… (108)
00789 三黄汤 …… (108)
00790 三黄粉 …… (109)
00791 三黄散 …… (109)
00792 三黄散 …… (109)
00793 三黄散 …… (109)
00794 三黄散 …… (109)
00795 三黄散 …… (109)
00796 三捷汤 …… (109)
00797 三蛇丹 …… (109)
00798 三脘散 …… (109)
00799 三棱丸 …… (110)
00800 三棱丸 …… (110)
00801 三棱丸 …… (110)
00802 三棱丸 …… (110)
00803 三棱丸 …… (110)
00804 三棱丸 …… (110)
00805 三棱汤 …… (110)
00806 三棱散 …… (110)
00807 三棱散 …… (111)
00808 三棱散 …… (111)
00809 三棱煎 …… (111)
00810 三痞丸 …… (111)
00811 三痫丹 …… (111)
00812 三解汤 …… (111)
00813 三痹汤 …… (111)
00814 三痹汤 …… (112)
00815 三霜丸 …… (112)
00816 三之一汤 …… (112)
00817 三不鸣散 …… (112)
00818 三五七散 …… (112)
00819 三五七散 …… (112)
00820 三生萝卜 …… (112)
00821 三色敷药 …… (113)
00822 三豆饮子 …… (113)
00823 三柴胡饮 …… (113)
00824 三黄洗剂 …… (113)
00825 三棱煎丸 …… (113)
00826 三棱煎丸 …… (113)
00827 三二肾气丸 …… (114)
00828 三二承气汤 …… (114)
00829 三才大补膏 …… (115)
00830 三才封髓丹 …… (115)
00831 三子地黄汤 …… (115)
00832 三子养亲汤 …… (115)
00833 三子调气丸 …… (115)
00834 三仁承气汤 …… (116)
00835 三甲复脉汤 …… (116)
00836 三仙散火汤 …… (116)
00837 三生益元散 …… (116)
00838 三白广生汤 …… (116)
00839 三合保胎丸 …… (116)
00840 三豆解酲汤 …… (117)
00841 三花五子丸 …… (117)
00842 三花神祐丸 …… (117)
00843 三味川楝散 …… (117)
00844 三味曲末丸 …… (117)
00845 三味建中汤 …… (117)
00846 三物备急丸 …… (117)
00847 三物胶艾汤 …… (118)
00848 三物黄芩汤 …… (118)
00849 三品一条枪 …… (118)
00850 三黄二地汤 …… (119)
00851 三黄石膏汤 …… (119)
00852 三黄四物汤 …… (119)
00853 三黄四物汤 …… (119)
00854 三黄四物汤 …… (119)
00855 三黄地榆油 …… (119)
00856 三黄补血汤 …… (119)
00857 三黄宝蜡丸 …… (120)
00858 三黄枳术丸 …… (120)
00859 三黄熟艾汤 …… (120)
00860 三黄熟艾汤 …… (120)
00861 三棱消积丸 …… (120)
00862 三增茴香丸 …… (120)
00863 三加减正气散 …… (121)

干

00864 干枣丸 …… (121)
00865 干姜丸 …… (121)
00866 干姜丸 …… (121)
00867 干姜丸 …… (121)

00868 干姜汤 …… (121)
00869 干姜粥 …… (121)
00870 干脓散 …… (122)
00871 干眼药 …… (122)
00872 干葛散 …… (122)
00873 干颓汤 …… (122)
00874 干漆散 …… (122)
00875 干地黄丸 …… (122)
00876 干地黄丸 …… (122)
00877 干地黄丸 …… (123)
00878 干地黄丸 …… (123)
00879 干地黄丸 …… (123)
00880 干地黄汤 …… (123)
00881 干地黄汤 …… (123)
00882 干地黄汤 …… (123)
00883 干地黄散 …… (123)
00884 干地黄散 …… (123)
00885 干荷叶散 …… (123)
00886 干荷叶散 …… (124)
00887 干胭脂膏 …… (124)
00888 干生地黄散 …… (124)
00889 干姜四物汤 …… (124)
00890 干姜白术散 …… (124)
00891 干姜附子汤 …… (124)
00892 干姜黄连丸 …… (124)
00893 干葛石膏汤 …… (125)
00894 干葛解肌汤 …… (125)
00895 干姜人参半夏丸 … (125)
00896 干姜黄芩黄连人参汤 …… (125)

土

00897 土朱散 …… (126)
00898 土狗散 …… (126)
00899 土槐饮 …… (126)
00900 土鳖酒 …… (126)
00901 土大黄膏 …… (126)
00902 土牛膝散 …… (126)
00903 土瓜根散 …… (126)
00904 土茯苓丸 …… (126)
00905 土槿皮酊 …… (126)
00906 土茯苓合剂 …… (126)

下

00907 下气汤 …… (127)
00908 下虫丸 …… (127)
00909 下胎散 …… (127)
00910 下疳散 …… (127)
00911 下痰丸 …… (127)
00912 下品锭子 …… (127)
00913 下瘀血汤 …… (127)
00914 下乳涌泉散 …… (127)
00915 下疳珍珠散 …… (128)

大

00916 大丸 …… (128)
00917 大夫酒 …… (128)
00918 大风丸 …… (128)
00919 大仙饮 …… (128)
00920 大生丸 …… (128)
00921 大圣丸 …… (128)
00922 大圣散 …… (128)
00923 大朴散 …… (128)
00924 大安丸 …… (129)
00925 大红丸 …… (129)
00926 大红膏 …… (129)
00927 大麦汤 …… (129)
00928 大豆方 …… (129)
00929 大豆汤 …… (129)
00930 大豆酒 …… (129)
00931 大豆煎 …… (129)
00932 大龟丸 …… (130)
00933 大补丸 …… (130)
00934 大补丸 …… (130)
00935 大附丸 …… (131)
00936 大青丸 …… (131)
00937 大青汤 …… (131)
00938 大青汤 …… (131)
00939 大青汤 …… (131)
00940 大青煎 …… (131)
00941 大青膏 …… (131)
00942 大枣丸 …… (132)
00943 大枣丸 …… (132)
00944 大枣汤 …… (132)
00945 大枣汤 …… (132)
00946 大枣汤 …… (132)
00947 大金丹 …… (132)
00948 大泽汤 …… (132)
00949 大顺汤 …… (133)
00950 大顺散 …… (133)
00951 大造丸 …… (133)
00952 大造丸 …… (133)
00953 大造丸 …… (134)
00954 大效散 …… (134)
00955 大通丸 …… (134)
00956 大营煎 …… (134)
00957 大黄丸 …… (134)
00958 大黄丸 …… (134)
00959 大黄丸 …… (134)
00960 大黄丸 …… (135)
00961 大黄丸 …… (135)
00962 大黄丸 …… (135)
00963 大黄丸 …… (135)
00964 大黄丸 …… (135)
00965 大黄丸 …… (135)
00966 大黄丸 …… (135)
00967 大黄丸 …… (135)
00968 大黄丸 …… (135)
00969 大黄汤 …… (136)
00970 大黄汤 …… (136)
00971 大黄汤 …… (136)
00972 大黄汤 …… (136)
00973 大黄汤 …… (136)
00974 大黄汤 …… (137)
00975 大黄汤 …… (137)
00976 大黄汤 …… (137)
00977 大黄汤 …… (137)
00978 大黄汤 …… (137)
00979 大黄汤 …… (137)
00980 大黄汤 …… (137)
00981 大黄散 …… (137)
00982 大黄散 …… (137)
00983 大黄散 …… (137)
00984 大黄散 …… (138)
00985 大黄散 …… (138)
00986 大黄散 …… (138)
00987 大黄散 …… (138)
00988 大黄散 …… (138)
00989 大黄散 …… (138)
00990 大黄散 …… (138)
00991 大黄散 …… (138)
00992 大黄散 …… (138)
00993 大黄散 …… (139)
00994 大黄散 …… (139)
00995 大黄散 …… (139)

00996 大黄散 …… (139)
00997 大黄散 …… (139)
00998 大麻丸 …… (139)
00999 大惊丸 …… (140)
01000 大清饮 …… (140)
01001 大戟丸 …… (140)
01002 大戟丸 …… (140)
01003 大戟丸 …… (140)
01004 大戟汤 …… (140)
01005 大戟散 …… (140)
01006 大温丸 …… (140)
01007 大蒜酒 …… (140)
01008 大蓟饮 …… (140)
01009 大蓟散 …… (141)
01010 大腹散 …… (141)
01011 大僻汤 …… (141)
01012 大七香丸 …… (141)
01013 大七香丸 …… (141)
01014 大三黄丸 …… (141)
01015 大川芎丸 …… (141)
01016 大已寒丸 …… (141)
01017 大已寒丸 …… (141)
01018 大元胡散 …… (142)
01019 大内伤丸 …… (142)
01020 大分清饮 …… (142)
01021 大风引汤 …… (142)
01022 大风髓丹 …… (142)
01023 大正气散 …… (142)
01024 大玉容丹 …… (142)
01025 大四斤丸 …… (142)
01026 大白术散 …… (143)
01027 大宁嗽汤 …… (143)
01028 大半夏汤 …… (143)
01029 大半夏汤 …… (143)
01030 大半夏汤 …… (143)
01031 大半夏汤 …… (143)
01032 大芎黄汤 …… (144)
01033 大百劳散 …… (144)
01034 大竹沥汤 …… (144)
01035 大决明散 …… (144)
01036 大安胎饮 …… (144)
01037 大异香散 …… (144)
01038 大防风汤 …… (144)
01039 大防风汤 …… (145)
01040 大麦芽散 …… (145)
01041 大芫荑汤 …… (145)
01042 大芦荟丸 …… (145)
01043 大芦荟丸 …… (145)
01044 大连翘饮 …… (145)
01045 大连翘饮 …… (146)
01046 大连翘饮 …… (146)
01047 大利惊丸 …… (146)
01048 大沉香丸 …… (146)
01049 大羌活汤 …… (146)
01050 大羌活汤 …… (146)
01051 大补元汤 …… (146)
01052 大补元煎 …… (147)
01053 大补天丸 …… (147)
01054 大补心丹 …… (147)
01055 大补脾丸 …… (147)
01056 大阿胶丸 …… (147)
01057 大阿胶丸 …… (148)
01058 大附子丸 …… (148)
01059 大青龙汤 …… (148)
01060 大岩蜜丸 …… (148)
01061 大固阳汤 …… (149)
01062 大和中饮 …… (149)
01063 大乳没散 …… (149)
01064 大油煎散 …… (149)
01065 大定风丸 …… (149)
01066 大定风珠 …… (149)
01067 大定心汤 …… (150)
01068 大建中汤 …… (150)
01069 大建中汤 …… (151)
01070 大建中汤 …… (151)
01071 大承气汤 …… (152)
01072 大胡连丸 …… (153)
01073 大胡麻散 …… (153)
01074 大茵陈汤 …… (154)
01075 大茴香丸 …… (154)
01076 大厚朴丸 …… (154)
01077 大省风汤 …… (154)
01078 大香连丸 …… (154)
01079 大保安汤 …… (154)
01080 大追风散 …… (154)
01081 大追毒散 …… (154)
01082 大活络丹 …… (154)
01083 大济阴汤 …… (155)
01084 大养胃汤 …… (155)
01085 大养脾丸 …… (155)
01086 大神术汤 …… (155)
01087 大秦艽汤 …… (155)
01088 大秦艽散 …… (156)
01089 大桃花汤 …… (156)
01090 大柴胡汤 …… (156)
01091 大健脾丸 …… (158)
01092 大射干汤 …… (158)
01093 大益母丸 …… (158)
01094 大益智散 …… (158)
01095 大调经散 …… (158)
01096 大陷胸丸 …… (158)
01097 大陷胸汤 …… (159)
01098 大萝皂丸 …… (160)
01099 大菟丝丸 …… (160)
01100 大菟丝饼 …… (160)
01101 大黄膏汤 …… (160)
01102 大排风汤 …… (160)
01103 大麻子散 …… (160)
01104 大麻仁丸 …… (160)
01105 大清凉散 …… (160)
01106 大断下丸 …… (161)
01107 大续命汤 …… (161)
01108 大续命汤 …… (161)
01109 大戟枣子 …… (161)
01110 大葛根汤 …… (161)
01111 大葶苈丸 …… (161)
01112 大黑虎膏 …… (161)
01113 大温中丸 …… (162)
01114 大温中丸 …… (162)
01115 大温中丸 …… (162)
01116 大温中饮 …… (162)
01117 大温经丸 …… (162)
01118 大温经汤 …… (163)
01119 大温脾汤 …… (163)
01120 大蒜糊剂 …… (163)
01121 大硼砂散 …… (163)
01122 大蜈蚣散 …… (163)
01123 大腹皮汤 …… (163)
01124 大腹皮汤 …… (163)
01125 大腹皮饮 …… (163)
01126 大腹皮散 …… (163)
01127 大腹皮散 …… (164)
01128 大腹皮散 …… (164)
01129 大腹皮散 …… (164)
01130 大腹皮散 …… (164)

01131 大镇心丹 …… (164)
01132 大橘皮汤 …… (164)
01133 大橘皮汤 …… (164)
01134 大橘皮汤 …… (164)
01135 大橘皮汤 …… (164)
01136 大醒风汤 …… (165)
01137 大藿香散 …… (165)
01138 大力夺命丸 …… (165)
01139 大三五七散 …… (165)
01140 大小茴香丸 …… (165)
01141 大天南星丸 …… (165)
01142 大五味子丸 …… (165)
01143 大圣泽兰散 …… (166)
01144 大圣茯苓散 …… (166)
01145 大圣保命丹 …… (166)
01146 大圣浚川散 …… (166)
01147 大延胡索散 …… (166)
01148 大全宝光散 …… (166)
01149 大安汤饮子 …… (167)
01150 大补二天膏 …… (167)
01151 大补地黄丸 …… (167)
01152 大补阴阳汤 …… (167)
01153 大补肾气丸 …… (167)
01154 大补真元汤 …… (167)
01155 大补真阴汤 …… (167)
01156 大补黄庭丸 …… (167)
01157 大明复光散 …… (167)
01158 大胡黄连丸 …… (168)
01159 大药紫金丹 …… (168)
01160 大造固真膏 …… (168)
01161 大效琥珀散 …… (168)
01162 大菟丝子散 …… (168)
01163 大黄六合汤 …… (169)
01164 大黄甘草汤 …… (169)
01165 大黄甘遂汤 …… (169)
01166 大黄左经汤 …… (169)
01167 大黄当归散 …… (169)
01168 大黄当归散 …… (170)
01169 大黄牡丹汤 …… (170)
01170 大黄附子汤 …… (171)
01171 大黄泄热汤 …… (171)
01172 大黄泻肝散 …… (171)
01173 大黄牵牛散 …… (171)
01174 大黄桔梗汤 …… (171)
01175 大黄消石汤 …… (172)
01176 大黄黄连汤 …… (172)
01177 大黄葶苈丸 …… (172)
01178 大黄寒水散 …… (172)
01179 大黄䗪虫丸 …… (172)
01180 大黄䗪虫丸 …… (173)
01181 大戟芫花散 …… (173)
01182 大人参半夏丸 …… (173)
01183 大圣一粒金丹 …… (173)
01184 大虫魄五味散 …… (174)
01185 大补内黄耆汤 …… (174)
01186 大神效活络丹 …… (174)
01187 大黄甘草饮子 …… (174)
01188 大青龙加黄芩汤 … (174)
01189 大料神秘左经汤 … (174)
01190 大通圣白花蛇散 … (175)
01191 大黄黄连泻心汤 … (175)
01192 大柴胡加萎蕤知母汤 …… (175)

万

01193 万圣丹 …… (175)
01194 万全膏 …… (175)
01195 万安丸 …… (175)
01196 万安汤 …… (176)
01197 万安散 …… (176)
01198 万安散 …… (176)
01199 万安散 …… (176)
01200 万应丸 …… (176)
01201 万应丸 …… (176)
01202 万应丸 …… (176)
01203 万应丹 …… (177)
01204 万应丹 …… (177)
01205 万应锭 …… (177)
01206 万应膏 …… (177)
01207 万应膏 …… (177)
01208 万应膏 …… (177)
01209 万灵丸 …… (178)
01210 万灵丸 …… (178)
01211 万灵丹 …… (178)
01212 万灵丹 …… (178)
01213 万灵膏 …… (178)
01214 万灵膏 …… (178)
01215 万金丸 …… (178)
01216 万金丹 …… (178)
01217 万金散 …… (179)
01218 万金散 …… (179)
01219 万金散 …… (179)
01220 万金散 …… (179)
01221 万金散 …… (179)
01222 万金散 …… (179)
01223 万金膏 …… (179)
01224 万金膏 …… (179)
01225 万金膏 …… (180)
01226 万存膏 …… (180)
01227 万胜散 …… (180)
01228 万病丸 …… (180)
01229 万益丹 …… (180)
01230 万应灵膏 …… (180)
01231 万氏润燥膏 …… (180)
01232 万全茯苓散 …… (180)
01233 万全逍遥散 …… (180)
01234 万寿地芝丸 …… (181)
01235 万应午时茶 …… (181)
01236 万应吹喉散 …… (181)
01237 万应抵金散 …… (181)
01238 万应宝珍膏 …… (181)
01239 万应保胎丸 …… (181)
01240 万应紫金膏 …… (181)
01241 万应紫金膏 …… (182)
01242 万应愈风酒 …… (182)
01243 万灵黑虎丹 …… (182)
01244 万金水澄膏 …… (182)
01245 万病无忧膏 …… (182)
01246 万病黄精丸 …… (183)
01247 万病紫菀丸 …… (183)
01248 万山观芦吸散 …… (183)
01249 万灵至宝仙酒 …… (183)
01250 万金不易妙灵丹 … (183)

寸

01251 寸气丸 …… (184)
01252 寸金丸 …… (184)
01253 寸金丹 …… (184)
01254 寸金散 …… (184)
01255 寸金散 …… (184)

上

01256 上丹 …… (184)
01257 上马丸 …… (184)
01258 上清丸 …… (184)
01259 上清丸 …… (184)

01260 上清丸 …… (185)
01261 上清丸 …… (185)
01262 上清丸 …… (185)
01263 上清丸 …… (185)
01264 上清汤 …… (185)
01265 上清散 …… (185)
01266 上下甲丸 …… (185)
01267 上品锭子 …… (185)
01268 上清饮子 …… (185)
01269 上下清凉散 …… (185)
01270 上宫清化丸 …… (186)
01271 上痛光明汤 …… (186)
01272 上清白附子丸 …… (186)

口

01273 口疮汤 …… (186)
01274 口糜散 …… (186)
01275 口糜散 …… (186)

山

01276 山甲散 …… (186)
01277 山芋丸 …… (186)
01278 山芋丸 …… (186)
01279 山芋丸 …… (186)
01280 山芋汤 …… (187)
01281 山芋散 …… (187)
01282 山芋散 …… (187)
01283 山虎汤 …… (187)
01284 山药丸 …… (187)
01285 山药丸 …… (187)
01286 山药丸 …… (187)
01287 山药汤 …… (187)
01288 山药粥 …… (188)
01289 山鹿丸 …… (188)
01290 山楂粥 …… (188)
01291 山精丸 …… (188)
01292 山薯面 …… (188)
01293 山鞠散 …… (188)
01294 山白草丸 …… (188)
01295 山豆根丸 …… (188)
01296 山豆根汤 …… (188)
01297 山豆根汤 …… (188)
01298 山栀子汤 …… (188)
01299 山栀子散 …… (189)
01300 山栀仁汤 …… (189)
01301 山茵陈散 …… (189)
01302 山茱萸丸 …… (189)
01303 山茱萸丸 …… (189)
01304 山茱萸散 …… (189)
01305 山茱萸散 …… (189)
01306 山萸肉粥 …… (189)
01307 山甲内消散 …… (189)
01308 山栀五苓散 …… (190)
01309 山栀香附丸 …… (190)
01310 山楂曲术丸 …… (190)
01311 山楂橘核丸 …… (190)

千

01312 千里鞋 …… (190)
01313 千针散 …… (190)
01314 千金丸 …… (190)
01315 千金饮 …… (190)
01316 千金散 …… (190)
01317 千金散 …… (190)
01318 千金散 …… (190)
01319 千秋丸 …… (191)
01320 千捶膏 …… (191)
01321 千捶膏 …… (191)
01322 千捶膏 …… (191)
01323 千缗汤 …… (191)
01324 千里光汤 …… (191)
01325 千里光散 …… (191)
01326 千斤保命丸 …… (191)
01327 千里光洗剂 …… (191)
01328 千里健步散 …… (191)
01329 千里流水汤 …… (192)
01330 千金一笑散 …… (192)
01331 千金不换饼 …… (192)
01332 千金内托汤 …… (192)
01333 千金内托散 …… (192)
01334 千金内托散 …… (192)
01335 千金化气汤 …… (192)
01336 千金化铁丸 …… (192)
01337 千金失笑散 …… (192)
01338 千金地黄丸 …… (192)
01339 千金补肾丸 …… (193)
01340 千金补肾丸 …… (193)
01341 千金定吼丸 …… (193)
01342 千金封脐膏 …… (193)
01343 千金种子丹 …… (193)
01344 千金保孕方 …… (193)
01345 千金保胎丸 …… (194)
01346 千金润下丸 …… (194)
01347 千金衔化丸 …… (194)
01348 千金腹痛方 …… (194)
01349 千捶绿云膏 …… (194)
01350 千缗导痰汤 …… (194)
01351 千金大养脾丸 …… (194)
01352 千金牡丹皮散 …… (194)
01353 千金保胎孕丸 …… (195)
01354 千捶万应化痞膏 …… (195)
01355 千金苇茎汤加滑石杏仁汤 …… (195)

川

01356 川乌丸 …… (195)
01357 川乌丸 …… (195)
01358 川乌散 …… (195)
01359 川乌散 …… (195)
01360 川乌粥 …… (195)
01361 川芎丸 …… (195)
01362 川芎丸 …… (196)
01363 川芎丸 …… (196)
01364 川芎汤 …… (196)
01365 川芎汤 …… (196)
01366 川芎散 …… (196)
01367 川芎散 …… (196)
01368 川芎散 …… (196)
01369 川芎散 …… (196)
01370 川芎散 …… (196)
01371 川芎散 …… (197)
01372 川芎散 …… (197)
01373 川芎散 …… (197)
01374 川附丸 …… (197)
01375 川椒丸 …… (197)
01376 川椒丸 …… (197)
01377 川椒散 …… (197)
01378 川椒散 …… (197)
01379 川楝丸 …… (197)
01380 川楝汤 …… (197)
01381 川楝散 …… (197)
01382 川膝煎 …… (198)
01383 川大黄丸 …… (198)
01384 川大黄散 …… (198)
01385 川山甲散 …… (198)

01386 川乌头丸 …… (198)
01387 川苦楝散 …… (198)
01388 川黄连丸 …… (198)
01389 川楝子汤 …… (198)
01390 川乌灵脂丸 …… (198)
01391 川芎二黄散 …… (199)
01392 川芎石膏汤 …… (199)
01393 川芎石膏汤 …… (199)
01394 川芎当归散 …… (199)
01395 川芎肉桂汤 …… (199)
01396 川芎行经散 …… (199)
01397 川芎茶调散 …… (199)
01398 川芎茶调散 …… (200)
01399 川芎神功散 …… (200)
01400 川楝茴香散 …… (200)

久

01401 久嗽噙化丸 …… (200)

广

01402 广泽汤 …… (200)
01403 广嗣良方 …… (200)
01404 广嗣良方 …… (200)
01405 广大重明汤 …… (201)
01406 广大重明汤 …… (201)
01407 广茂溃坚汤 …… (201)
01408 广笔鼠粘汤 …… (201)
01409 广术香附桃仁丸 … (201)

门

01410 门冬膏 …… (201)
01411 门冬膏 …… (202)
01412 门冬饮子…… (202)
01413 门冬甘露饮…… (202)
01414 门冬清肺汤…… (202)
01415 门冬清肺饮…… (202)

己

01416 己戌丹 …… (202)
01417 己字化毒丸…… (202)

巳

01418 巳寒丸 …… (202)

卫

01419 卫生汤 …… (202)
01420 卫生汤 …… (203)
01421 卫生汤 …… (203)
01422 卫真汤 …… (203)
01423 卫生防疫宝丹…… (203)

女

01424 女贞丹 …… (203)
01425 女金丸 …… (203)
01426 女科白凤丹…… (203)

小

01427 小圣散 …… (204)
01428 小红丸 …… (204)
01429 小红丸 …… (204)
01430 小麦汤 …… (204)
01431 小麦汤 …… (204)
01432 小麦粥 …… (204)
01433 小豆散 …… (204)
01434 小灵丹 …… (204)
01435 小青丸 …… (205)
01436 小金丹 …… (205)
01437 小胃丹 …… (205)
01438 小营煎 …… (206)
01439 小黄丸 …… (206)
01440 小黄丸 …… (206)
01441 小黄膏 …… (206)
01442 小蓟汤 …… (206)
01443 小蓟汤 …… (206)
01444 小蓟汤 …… (206)
01445 小蓟散 …… (207)
01446 小丁香丸…… (207)
01447 小七香丸…… (207)
01448 小已寒丸…… (207)
01449 小木香散…… (207)
01450 小五退散…… (207)
01451 小分清饮…… (207)
01452 小乌沉汤…… (208)
01453 小风引汤…… (208)
01454 小风引汤…… (208)
01455 小风引汤…… (208)
01456 小凤髓丹…… (208)
01457 小甘露饮…… (208)
01458 小龙荟丸…… (208)
01459 小半夏丸…… (208)
01460 小半夏汤…… (209)
01461 小半夏汤…… (209)
01462 小芎辛汤…… (209)
01463 小朱砂丸…… (209)
01464 小安肾丸…… (210)
01465 小防风汤…… (210)
01466 小灵宝丹…… (210)
01467 小阿魏丸…… (210)
01468 小阿魏丸…… (210)
01469 小青龙汤…… (210)
01470 小刺蓟煎…… (212)
01471 小拨云散…… (212)
01472 小败毒膏…… (212)
01473 小和中饮…… (212)
01474 小金丝膏…… (213)
01475 小定风珠…… (213)
01476 小定心汤…… (213)
01477 小定志丸…… (213)
01478 小建中汤…… (213)
01479 小建中汤…… (215)
01480 小建中汤…… (215)
01481 小降气汤…… (215)
01482 小驻车丸…… (215)
01483 小承气汤…… (215)
01484 小承气汤…… (217)
01485 小承气汤…… (217)
01486 小柏叶汤…… (217)
01487 小胡连丸…… (217)
01488 小茵陈丸…… (217)
01489 小茵陈汤…… (217)
01490 小茴香丸…… (217)
01491 小复苏饮…… (217)
01492 小香连丸…… (218)
01493 小保安汤…… (218)
01494 小保和丸…… (218)
01495 小独圣丸…… (218)
01496 小活络丹…… (218)
01497 小柴胡汤…… (218)
01498 小柴胡汤…… (220)
01499 小柴胡汤…… (220)
01500 小胶艾汤…… (220)
01501 小调经散…… (220)
01502 小陷胸汤…… (220)
01503 小理中丸…… (221)
01504 小理中汤…… (221)
01505 小鹿茸丸…… (221)
01506 小麻仁丸…… (221)

01507 小清凉散……(221)
01508 小续命丸……(221)
01509 小琥珀散……(221)
01510 小葶苈汤……(221)
01511 小惺惺丸……(221)
01512 小温中丸……(222)
01513 小温经汤……(222)
01514 小蓟饮子……(222)
01515 小硼砂散……(222)
01516 小镇心散……(222)
01517 小儿太极丸……(222)
01518 小儿回春丹……(222)
01519 小儿惊风散……(223)
01520 小牛角鳃散……(223)
01521 小肉苁蓉散……(223)
01522 小荜澄茄煎……(223)
01523 小菟丝子丸……(223)
01524 小蓟琥珀散……(223)
01525 小黄连阿胶丸……(223)
01526 小半夏加茯苓汤……(223)
01527 小青龙加石膏汤……(224)
01528 小柴胡加地黄汤……(224)
01529 小柴胡加枳桔汤……(224)
01530 小柴胡加栀子汤……(224)
01531 小柴胡加葛根汤……(224)
01532 小陷胸加枳实汤……(225)
01533 小柴胡加牡丹皮汤……(225)
01534 小承气加芍药地黄汤……(225)
01535 小柴胡加芒消大黄汤……(225)
01536 小青龙去麻黄加杏仁汤……(225)
01537 小青龙去麻黄加附子汤……(225)
01538 小青龙去麻黄加茯苓汤……(225)
01539 小半夏加茯苓汤再加厚朴杏仁方……(225)
01540 小柴胡去参枣生姜加五味子干姜汤……(225)

飞

01541 飞步丸……(225)
01542 飞虎散……(226)
01543 飞尸走马汤……(226)
01544 飞龙夺命丹……(226)
01545 飞龙夺命丹……(226)
01546 飞龙夺命丹……(226)
01547 飞龙阿魏化坚膏……(226)

马

01548 马齿丹……(226)
01549 马齿粥……(227)
01550 马鸣散……(227)
01551 马勃散……(227)
01552 马勃散……(227)
01553 马牙消散……(227)
01554 马牙消散……(227)
01555 马齿苋粉……(227)
01556 马齿苋膏……(227)
01557 马齿苋羹……(227)
01558 马兜铃汤……(227)
01559 马兜铃散……(227)
01560 马兜铃散……(228)
01561 马鞭草散……(228)
01562 马齿苋洗方……(228)
01563 马齿苋洗剂……(228)
01564 马齿苋还黑散……(228)

子

01565 子午丸……(228)
01566 子芩丸……(228)
01567 子芩散……(228)
01568 子芩散……(229)
01569 子悬汤……(229)
01570 子悬汤……(229)
01571 子淋散……(229)
01572 子肿子气汤……(229)

(四 画)

比

01573 比天膏……(229)
01574 比和饮……(229)
01575 比金丸……(229)
01576 比金散……(229)
01577 比圣饼子……(230)

支

01578 支感丹……(230)

云

01579 云母丸……(230)
01580 云林润身丸……(230)

元

01581 元朱丹……(230)
01582 元阳丹……(230)
01583 元灵散……(230)
01584 元戟膏……(230)
01585 元霜散……(230)
01586 元霜锭……(230)
01587 元胡索散……(231)

无

01588 无比丸……(231)
01589 无比散……(231)
01590 无价宝……(231)
01591 无名丸……(231)
01592 无忧丸……(231)
01593 无忧汤……(231)
01594 无忧散……(231)
01595 无忧散……(232)
01596 无忧散……(232)
01597 无忧散……(232)
01598 无忧散……(232)
01599 无敌丸……(232)
01600 无碍丸……(232)
01601 无上光明丹……(232)
01602 无比地黄丸……(233)
01603 无比薯蓣丸……(233)
01604 无忌紫金丸……(233)
01605 无比蔓荆子汤……(233)

天

01606 天一丸……(233)
01607 天丁散……(234)
01608 天仙散……(234)
01609 天仙膏……(234)
01610 天冬膏……(234)
01611 天台散……(234)
01612 天丝饮……(234)
01613 天地丸……(234)
01614 天池膏……(234)

01615 天花散 …… (235)
01616 天花散 …… (235)
01617 天青膏 …… (235)
01618 天竺散 …… (235)
01619 天星丸 …… (235)
01620 天香散 …… (235)
01621 天疮散 …… (235)
01622 天真丸 …… (235)
01623 天真丹 …… (235)
01624 天浆散 …… (236)
01625 天萝散 …… (236)
01626 天黄丸 …… (236)
01627 天麻丸 …… (236)
01628 天麻丸 …… (236)
01629 天麻丸 …… (236)
01630 天麻丸 …… (236)
01631 天麻丸 …… (237)
01632 天麻丸 …… (237)
01633 天麻丸 …… (237)
01634 天麻丸 …… (237)
01635 天麻丸 …… (237)
01636 天麻丸 …… (237)
01637 天麻丸 …… (238)
01638 天麻丸 …… (238)
01639 天麻丸 …… (238)
01640 天麻丸 …… (238)
01641 天麻丸 …… (238)
01642 天麻丹 …… (238)
01643 天麻汤 …… (238)
01644 天麻汤 …… (238)
01645 天麻汤 …… (238)
01646 天麻酒 …… (238)
01647 天麻散 …… (239)
01648 天麻散 …… (239)
01649 天麻散 …… (239)
01650 天麻散 …… (239)
01651 天麻散 …… (239)
01652 天麻散 …… (239)
01653 天麻散 …… (239)
01654 天麻散 …… (239)
01655 天麻散 …… (239)
01656 天葵丸 …… (240)
01657 天雄丸 …… (240)
01658 天雄丸 …… (240)
01659 天雄丸 …… (240)
01660 天雄丸 …… (240)
01661 天雄散 …… (240)
01662 天雄散 …… (241)
01663 天雄散 …… (241)
01664 天雄散 …… (241)
01665 天门冬丸…… (241)
01666 天门冬丸…… (241)
01667 天门冬丸…… (241)
01668 天门冬丸…… (241)
01669 天门冬丸…… (241)
01670 天门冬汤…… (242)
01671 天门冬汤…… (242)
01672 天门冬饮…… (242)
01673 天门冬散…… (242)
01674 天门冬散…… (242)
01675 天门冬粥…… (242)
01676 天门冬煎…… (242)
01677 天门冬煎…… (243)
01678 天门冬膏…… (243)
01679 天仙藤散…… (243)
01680 天仙藤散…… (243)
01681 天花粉丸…… (243)
01682 天花粉散…… (243)
01683 天竺饮子…… (243)
01684 天竺黄丸…… (243)
01685 天竺黄丸…… (244)
01686 天竺黄散…… (244)
01687 天南星丸…… (244)
01688 天南星丸…… (244)
01689 天南星丸…… (244)
01690 天南星丸…… (244)
01691 天南星丸…… (244)
01692 天南星丸…… (244)
01693 天南星丸…… (245)
01694 天南星散…… (245)
01695 天南星散…… (245)
01696 天南星散…… (245)
01697 天南星散…… (245)
01698 天浆子散…… (245)
01699 天麻浸酒…… (245)
01700 天一生水丸…… (245)
01701 天一生津饮…… (245)
01702 天门冬饮子…… (245)
01703 天王补心丸…… (246)
01704 天王补心丸…… (246)
01705 天王补心丹…… (246)
01706 天王补心丹…… (246)
01707 天王补心丹…… (246)
01708 天水涤肠汤…… (248)
01709 天生白虎汤…… (248)
01710 天台乌药散…… (248)
01711 天花刮毒散…… (249)
01712 天保采薇汤…… (249)
01713 天根月窟膏…… (250)
01714 天麻二陈汤…… (250)
01715 天麻白术丸…… (250)
01716 天麻半夏汤…… (250)
01717 天麻防风丸…… (250)
01718 天麻防风丸…… (251)
01719 天麻钩藤汤…… (251)
01720 天麻钩藤饮…… (251)
01721 天麻退翳散…… (251)
01722 天麻除湿汤…… (252)
01723 天麻黄耆汤…… (252)
01724 天麻搜风汤…… (252)
01725 天麻四君子汤…… (252)
01726 天下第一金疮药…… (252)
01727 天下第一消发背方 …… (252)

专

01728 专翕大生膏…… (252)

开

01729 开心散 …… (253)
01730 开闭丹 …… (253)
01731 开关散 …… (253)
01732 开关散 …… (253)
01733 开关散 …… (253)
01734 开关散 …… (253)
01735 开关散 …… (253)
01736 开阳汤 …… (253)
01737 开怀散 …… (253)
01738 开郁汤 …… (254)
01739 开郁汤 …… (254)
01740 开郁散 …… (254)
01741 开明丸 …… (254)
01742 开明散 …… (254)
01743 开迷散 …… (254)
01744 开笑散 …… (254)

01745 开噤汤 …… (254)
01746 开刀麻药 …… (254)
01747 开气消痰汤 …… (254)
01748 开郁二陈汤 …… (255)
01749 开郁二陈汤 …… (255)
01750 开郁种玉汤 …… (255)
01751 开郁香连丸 …… (255)
01752 开郁流气散 …… (255)
01753 开郁理气汤 …… (255)
01754 开胃生姜丸 …… (255)
01755 开胃进食汤 …… (255)
01756 开胃利膈丸 …… (255)
01757 开胃填精汤 …… (255)
01758 开结化痰汤 …… (256)
01759 开结妙功丸 …… (256)
01760 开结枳实丸 …… (256)
01761 开结舒经汤 …… (256)
01762 开障去翳散 …… (256)
01763 开郁顺气解毒汤 …… (256)

不

01764 不二散 …… (256)
01765 不忘散 …… (257)
01766 不龟手膏 …… (257)
01767 不换金丹 …… (257)
01768 不换金散 …… (257)
01769 不换金散 …… (257)
01770 不换金正气散 …… (257)
01771 不换金正气散 …… (257)
01772 不换金卷云丹 …… (258)

木

01773 木瓜丸 …… (258)
01774 木瓜丸 …… (258)
01775 木瓜丸 …… (258)
01776 木瓜丸 …… (258)
01777 木瓜丹 …… (258)
01778 木瓜汤 …… (258)
01779 木瓜汤 …… (259)
01780 木瓜汤 …… (259)
01781 木瓜汤 …… (259)
01782 木瓜散 …… (259)
01783 木瓜散 …… (259)
01784 木瓜煎 …… (259)
01785 木瓜煎 …… (259)
01786 木兰膏 …… (259)
01787 木耳散 …… (259)
01788 木耳散 …… (260)
01789 木耳粥 …… (260)
01790 木耳粥 …… (260)
01791 木香丸 …… (260)
01792 木香丸 …… (260)
01793 木香丸 …… (260)
01794 木香丸 …… (260)
01795 木香丸 …… (260)
01796 木香丸 …… (260)
01797 木香丸 …… (260)
01798 木香丸 …… (261)
01799 木香丸 …… (261)
01800 木香丸 …… (261)
01801 木香丸 …… (261)
01802 木香丸 …… (261)
01803 木香丸 …… (261)
01804 木香丸 …… (261)
01805 木香丸 …… (261)
01806 木香丸 …… (261)
01807 木香丸 …… (261)
01808 木香汤 …… (262)
01809 木香汤 …… (262)
01810 木香汤 …… (262)
01811 木香汤 …… (262)
01812 木香汤 …… (262)
01813 木香汤 …… (262)
01814 木香汤 …… (262)
01815 木香汤 …… (262)
01816 木香饮 …… (262)
01817 木香散 …… (262)
01818 木香散 …… (263)
01819 木香散 …… (263)
01820 木香散 …… (263)
01821 木香散 …… (263)
01822 木香散 …… (263)
01823 木香散 …… (263)
01824 木香散 …… (263)
01825 木香散 …… (263)
01826 木香散 …… (263)
01827 木香散 …… (264)
01828 木香散 …… (264)
01829 木香散 …… (264)
01830 木香散 …… (264)
01831 木香散 …… (265)
01832 木香散 …… (265)
01833 木香散 …… (265)
01834 木香散 …… (265)
01835 木香散 …… (265)
01836 木香散 …… (265)
01837 木香散 …… (265)
01838 木香散 …… (265)
01839 木香散 …… (265)
01840 木香散 …… (265)
01841 木香散 …… (266)
01842 木香散 …… (266)
01843 木香散 …… (266)
01844 木香散 …… (266)
01845 木香散 …… (266)
01846 木香膏 …… (266)
01847 木贼散 …… (266)
01848 木贼散 …… (266)
01849 木通丸 …… (266)
01850 木通丸 …… (266)
01851 木通丸 …… (266)
01852 木通丸 …… (267)
01853 木通丸 …… (267)
01854 木通汤 …… (267)
01855 木通汤 …… (267)
01856 木通汤 …… (267)
01857 木通汤 …… (267)
01858 木通汤 …… (267)
01859 木通汤 …… (267)
01860 木通汤 …… (267)
01861 木通汤 …… (267)
01862 木通汤 …… (267)
01863 木通汤 …… (268)
01864 木通饮 …… (268)
01865 木通饮 …… (268)
01866 木通饮 …… (268)
01867 木通散 …… (268)
01868 木通散 …… (268)
01869 木通散 …… (268)
01870 木通散 …… (268)
01871 木通散 …… (269)
01872 木通散 …… (269)
01873 木通散 …… (269)
01874 木通散 …… (269)
01875 木通散 …… (269)

01876 木防己丸……（269）
01877 木防己汤……（269）
01878 木防己汤……（270）
01879 木香饼子……（270）
01880 木香顿散……（270）
01881 木猪苓丸……（270）
01882 木瓜牛膝丸……（270）
01883 木瓜茱萸汤……（270）
01884 木香二皮丸……（270）
01885 木香三棱丸……（270）
01886 木香见睍丸……（271）
01887 木香化滞汤……（271）
01888 木香化滞散……（271）
01889 木香分气丸……（271）
01890 木香分气丸……（271）
01891 木香分气丸……（271）
01892 木香分气丸……（271）
01893 木香分气丸……（271）
01894 木香甘连汤……（271）
01895 木香生化汤……（272）
01896 木香白术散……（272）
01897 木香白术散……（272）
01898 木香半夏丸……（272）
01899 木香导滞丸……（272）
01900 木香导滞汤……（272）
01901 木香豆蔻丸……（272）
01902 木香豆蔻散……（272）
01903 木香补肾丸……（272）
01904 木香金铃丸……（272）
01905 木香枳术丸……（273）
01906 木香枳术丸……（273）
01907 木香枳壳丸……（273）
01908 木香枳壳丸……（273）
01909 木香茵陈汤……（273）
01910 木香厚朴汤……（273）
01911 木香顺气丸……（273）
01912 木香顺气汤……（273）
01913 木香顺气散……（274）
01914 木香消胀丸……（274）
01915 木香消痞丸……（274）
01916 木香流气饮……（274）
01917 木香流气饮……（274）
01918 木香益黄散……（274）
01919 木香宽中散……（274）
01920 木香调气散……（274）
01921 木香调气散……（274）
01922 木香理中汤……（275）
01923 木香理中汤……（275）
01924 木香理气丸……（275）
01925 木香蛤蚧丸……（275）
01926 木香塌气丸……（275）
01927 木香塌气丸……（275）
01928 木香楝子散……（275）
01929 木香槟榔丸……（275）
01930 木香槟榔丸……（276）
01931 木香槟榔汤……（276）
01932 木贼茱皮汤……（276）
01933 木通子芩汤……（276）
01934 木通犀角散……（276）
01935 木茯车前子汤……（276）
01936 木香郁李仁丸……（277）
01937 木香荜澄茄丸……（277）
01938 木防己加茯苓芒消汤……（277）
01939 木香人参生姜枳术丸……（277）

瓦

01940 瓦垄丸……（277）
01941 瓦粉瓜篓丸……（277）

王

01942 王瓜散……（277）
01943 王母桃……（278）
01944 王不留行散……（278）
01945 王不留行散……（278）
01946 王道无忧散……（278）

五

01947 五子丸……（278）
01948 五子丸……（278）
01949 五子丸……（278）
01950 五子散……（278）
01951 五仁丸……（278）
01952 五斤丸……（278）
01953 五石膏……（278）
01954 五龙散……（279）
01955 五龙膏……（279）
01956 五仙散……（279）
01957 五仙膏……（279）
01958 五生丸……（279）
01959 五生膏……（279）
01960 五白散……（279）
01961 五汁饮……（279）
01962 五汁饮……（279）
01963 五汁煎……（280）
01964 五汁膏……（280）
01965 五加酒……（280）
01966 五圣丸……（280）
01967 五圣散……（280）
01968 五皮汤……（280）
01969 五皮散……（280）
01970 五皮散……（281）
01971 五皮散……（281）
01972 五灰散……（281）
01973 五灰散……（281）
01974 五灰散……（281）
01975 五灰膏……（281）
01976 五邪汤……（281）
01977 五阴煎……（281）
01978 五花丸……（281）
01979 五花汤……（282）
01980 五饮丸……（282）
01981 五补丸……（282）
01982 五补丸……（282）
01983 五补丸……（282）
01984 五灵丸……（282）
01985 五灵丸……（283）
01986 五灵丸……（283）
01987 五妙汤……（283）
01988 五苓散……（283）
01989 五苓散……（284）
01990 五苓散……（284）
01991 五苓散……（284）
01992 五拗汤……（284）
01993 五拗汤……（284）
01994 五虎丹……（284）
01995 五虎汤……（284）
01996 五虎汤……（285）
01997 五虎散……（285）
01998 五味汤……（285）
01999 五味膏……（285）
02000 五物汤……（285）
02001 五物煎……（285）
02002 五泻汤……（285）

02003 五宝丹 …… (285)
02004 五宝丹 …… (285)
02005 五参丸 …… (285)
02006 五参散 …… (286)
02007 五珍丹 …… (286)
02008 五香丸 …… (286)
02009 五香汤 …… (286)
02010 五香汤 …… (286)
02011 五香汤 …… (286)
02012 五香散 …… (286)
02013 五香散 …… (286)
02014 五顺汤 …… (287)
02015 五宣散 …… (287)
02016 五美丹 …… (287)
02017 五神汤 …… (287)
02018 五神散 …… (287)
02019 五神散 …… (287)
02020 五神散 …… (287)
02021 五退散 …… (287)
02022 五退散 …… (287)
02023 五积丸 …… (287)
02024 五积丸 …… (287)
02025 五积饼 …… (288)
02026 五积散 …… (288)
02027 五倍丸 …… (289)
02028 五倍汤 …… (289)
02029 五倍散 …… (289)
02030 五痟丸 …… (289)
02031 五黄丸 …… (289)
02032 五黄散 …… (289)
02033 五黄膏 …… (289)
02034 五淋汤 …… (289)
02035 五淋散 …… (289)
02036 五淋散 …… (289)
02037 五痫丸 …… (290)
02038 五槐丸 …… (290)
02039 五蒸丸 …… (290)
02040 五蒸汤 …… (290)
02041 五解汤 …… (290)
02042 五痹汤 …… (290)
02043 五瘘汤 …… (290)
02044 五福饮 …… (291)
02045 五膈散 …… (291)
02046 五精酒 …… (291)
02047 五噎散 …… (291)
02048 五噎散 …… (291)
02049 五德丸 …… (291)
02050 五蟾丸 …… (291)
02051 五石软膏 …… (292)
02052 五汁饮子 …… (292)
02053 五汁肺丸 …… (292)
02054 五加皮丸 …… (292)
02055 五加皮汤 …… (292)
02056 五加皮汤 …… (292)
02057 五加皮汤 …… (292)
02058 五加皮酒 …… (292)
02059 五加皮酒 …… (292)
02060 五加皮酒 …… (293)
02061 五加皮酒 …… (293)
02062 五加皮酒 …… (293)
02063 五加皮散 …… (293)
02064 五加皮散 …… (293)
02065 五加皮散 …… (293)
02066 五加皮散 …… (293)
02067 五灵脂丸 …… (293)
02068 五灵脂丸 …… (293)
02069 五灵脂丸 …… (293)
02070 五灵脂汤 …… (293)
02071 五灵脂散 …… (294)
02072 五灵脂散 …… (294)
02073 五灵脂散 …… (294)
02074 五灵脂散 …… (294)
02075 五灵脂散 …… (294)
02076 五君子煎 …… (294)
02077 五味子丸 …… (294)
02078 五味子丸 …… (294)
02079 五味子丸 …… (294)
02080 五味子丸 …… (295)
02081 五味子汤 …… (295)
02082 五味子汤 …… (295)
02083 五味子汤 …… (295)
02084 五味子汤 …… (295)
02085 五味子汤 …… (295)
02086 五味子汤 …… (295)
02087 五味子汤 …… (295)
02088 五味子汤 …… (295)
02089 五味子汤 …… (296)
02090 五味子汤 …… (296)
02091 五味子散 …… (296)
02092 五味子散 …… (296)
02093 五宝仙丹 …… (296)
02094 五柴胡饮 …… (296)
02095 五倍子丸 …… (296)
02096 五倍子汤 …… (297)
02097 五倍子散 …… (297)
02098 五倍子散 …… (297)
02099 五倍子散 …… (297)
02100 五倍子散 …… (297)
02101 五倍子膏 …… (297)
02102 五蛊胀丸 …… (297)
02103 五磨饮子 …… (297)
02104 五七犀角饮 …… (297)
02105 五子十皮汤 …… (297)
02106 五子五皮汤 …… (297)
02107 五子五皮饮 …… (298)
02108 五子全鹿丸 …… (298)
02109 五子衍宗丸 …… (298)
02110 五仁斑龙胶 …… (298)
02111 五仁橘皮汤 …… (298)
02112 五叶芦根汤 …… (298)
02113 五叶茅根汤 …… (299)
02114 五仙助肾丹 …… (299)
02115 五汁一枝煎 …… (299)
02116 五汁安中饮 …… (299)
02117 五加二皮散 …… (299)
02118 五加皮浸酒 …… (299)
02119 五色戒烟丸 …… (299)
02120 五色鸡肝散 …… (299)
02121 五利大黄汤 …… (300)
02122 五秀重明丸 …… (300)
02123 五苓甘露饮 …… (300)
02124 五虎二陈汤 …… (300)
02125 五虎追风散 …… (300)
02126 五味子蜜丸 …… (300)
02127 五味去湿散 …… (300)
02128 五味活血汤 …… (300)
02129 五味消毒饮 …… (300)
02130 五物香薷汤 …… (301)
02131 五香导气丸 …… (301)
02132 五香连翘汤 …… (301)
02133 五香连翘汤 …… (301)
02134 五香连翘汤 …… (301)
02135 五香连翘汤 …… (302)
02136 五香连翘汤 …… (302)
02137 五香流气饮 …… (302)

02138 五积交加酒……（302）
02139 五倍子复方……（302）
02140 五倍芦矾散……（302）
02141 五疳消食丸……（302）
02142 五疳消食丸……（302）
02143 五疳消积丸……（303）
02144 五海瘿瘤丸……（303）
02145 五淋二赤散……（303）
02146 五兽三贾丹……（303）
02147 五痫通明丸……（303）
02148 五福化毒丹……（303）
02149 五福化毒丹……（303）
02150 五福化毒丹……（303）
02151 五福延寿丹……（304）
02152 五膈宽中散……（304）
02153 五膈宽中散……（304）
02154 五噎膈气丸……（304）
02155 五加减正气散……（304）
02156 五味天浆子散……（304）
02157 五子益肾补元丸……（305）
02158 五子益肾养心丸……（305）
02159 五胆偃月坠翳丸……（305）

牙

02160 牙仙丹 ……（305）
02161 牙皂散 ……（305）
02162 牙宣药 ……（305）
02163 牙疳散 ……（305）
02164 牙疳散 ……（305）
02165 牙疼塞耳丸……（305）
02166 牙痛立止散……（306）

车

02167 车前饮 ……（306）
02168 车前饮 ……（306）
02169 车前散 ……（306）
02170 车蓼散 ……（306）
02171 车前子丸……（306）
02172 车前子汤……（306）
02173 车前子饮……（306）
02174 车前子散……（306）
02175 车前子散……（307）
02176 车前子散……（307）

太

02177 太一丹 ……（307）
02178 太一膏 ……（307）
02179 太乙丹 ……（307）
02180 太乙膏 ……（307）
02181 太仓丸 ……（307）
02182 太仓丸 ……（308）
02183 太平丸 ……（308）
02184 太平丸 ……（308）
02185 太白散 ……（308）
02186 太白散 ……（308）
02187 太阳丹 ……（308）
02188 太阳丹 ……（308）
02189 太阳膏 ……（308）
02190 太极丸 ……（309）
02191 太和丸 ……（309）
02192 太和饼 ……（309）
02193 太清饮 ……（309）
02194 太乙神丹……（309）
02195 太乙神针……（310）
02196 太乙混元丹……（310）
02197 太乙紫金丹……（310）
02198 太山磐石散……（310）

廿

02199 廿四味流气饮……（310）

巨

02200 巨胜丸 ……（311）
02201 巨胜酒 ……（311）
02202 巨胜子丸……（311）
02203 巨胜茯苓丸……（311）

止

02204 止吐汤 ……（311）
02205 止血丹 ……（311）
02206 止血散 ……（312）
02207 止血散 ……（312）
02208 止血散 ……（312）
02209 止血散 ……（312）
02210 止汗散 ……（312）
02211 止汗散 ……（312）
02212 止鸣丹 ……（312）
02213 止泻散 ……（312）
02214 止带丸 ……（312）
02215 止带汤 ……（312）
02216 止逆汤 ……（313）
02217 止衄散 ……（313）
02218 止崩汤 ……（313）
02219 止崩汤 ……（313）
02220 止痒丸 ……（313）
02221 止喘丸 ……（313）
02222 止喧丹 ……（313）
02223 止痛丸 ……（313）
02224 止痛膏 ……（314）
02225 止嗽丸 ……（314）
02226 止嗽散 ……（314）
02227 止嗽散 ……（314）
02228 止汗神丹……（314）
02229 止汗粉药……（314）
02230 止汗温粉……（314）
02231 止痒药粉……（314）
02232 止痒洗剂……（315）
02233 止血立应散……（315）
02234 止血定痛散……（315）
02235 止泪补肝散……（315）
02236 止泪补肝散……（315）
02237 止泻如神丸……（315）
02238 止疼消肿汤……（315）
02239 止痉愈风散……（315）
02240 止麻消痰饮……（315）
02241 止痒永安汤……（315）
02242 止痒永安汤……（316）
02243 止痛当归散……（316）
02244 止痛灵宝散……（316）
02245 止痛乳香丸……（316）
02246 止痛神功散……（316）
02247 止嗽七汁膏……（316）
02248 止嗽六君汤……（316）
02249 止漏绝神丹……（316）

少

02250 少阴甘桔汤……（316）
02251 少腹化瘀汤……（316）
02252 少腹逐瘀汤……（317）

中

02253 中丹 ……（317）
02254 中正汤 ……（317）
02255 中白散 ……（318）
02256 中和汤 ……（318）
02257 中和汤 ……（318）

02258 中后汤 …… (318)
02259 中黄丸 …… (318)
02260 中国人丹…… (318)
02261 中品锭子…… (318)
02262 中和种子丸…… (318)
02263 中消黄耆汤…… (319)
02264 中满分消丸…… (319)
02265 中满分消丸…… (319)
02266 中满分消汤…… (319)
02267 中满分消汤…… (319)

内

02268 内托散 …… (320)
02269 内灸丸 …… (320)
02270 内灸丸 …… (320)
02271 内灸丹 …… (320)
02272 内灸散 …… (320)
02273 内补丸 …… (320)
02274 内补散 …… (321)
02275 内补散 …… (321)
02276 内消丸 …… (321)
02277 内消丸 …… (321)
02278 内消方 …… (321)
02279 内消散 …… (321)
02280 内消散 …… (321)
02281 内消散 …… (321)
02282 内消散 …… (321)
02283 内消散 …… (321)
02284 内消散 …… (322)
02285 内塞散 …… (322)
02286 内府仙方…… (322)
02287 内托千金散…… (322)
02288 内托升麻汤…… (322)
02289 内托生肌散…… (322)
02290 内托安神散…… (322)
02291 内托羌活汤…… (323)
02292 内托荣卫汤…… (323)
02293 内托复煎散…… (323)
02294 内托消毒散…… (323)
02295 内托黄耆汤…… (323)
02296 内托黄耆汤…… (323)
02297 内托黄耆散…… (323)
02298 内托黄耆散…… (324)
02299 内补地黄丸…… (324)
02300 内补苁蓉散…… (324)
02301 内补黄耆汤…… (324)
02302 内补黄耆汤…… (324)
02303 内固清心散…… (324)
02304 内金鹿茸丸…… (324)
02305 内消连翘丸…… (325)
02306 内消牡蛎丸…… (325)
02307 内消沃雪汤…… (325)
02308 内消乳痈方…… (325)
02309 内消退管丸…… (325)
02310 内消瘰疬丸…… (325)
02311 内疏黄连汤…… (325)
02312 内补当归建中汤 … (326)

贝

02313 贝母丸 …… (326)
02314 贝母丸 …… (326)
02315 贝母汤 …… (326)
02316 贝母汤 …… (326)
02317 贝母饮 …… (327)
02318 贝母散 …… (327)
02319 贝母散 …… (327)
02320 贝母粥 …… (327)
02321 贝齿散 …… (327)
02322 贝齿膏 …… (327)
02323 贝母瓜蒌散 …… (327)
02324 贝母麦冬饮 …… (327)

见

02325 见睍丸 …… (327)

日

02326 日精丹 …… (327)

仁

02327 仁寿丸 …… (328)
02328 仁香汤 …… (328)
02329 仁熟散 …… (328)

化

02330 化气丸 …… (328)
02331 化气汤 …… (328)
02332 化气散 …… (328)
02333 化风丸 …… (328)
02334 化龙丹 …… (328)
02335 化虫丸 …… (329)
02336 化虫丸 …… (329)
02337 化虫丸 …… (329)
02338 化虫丸 …… (329)
02339 化虫散 …… (329)
02340 化血丹 …… (329)
02341 化阳汤 …… (329)
02342 化块丸 …… (329)
02343 化坚油 …… (329)
02344 化坚膏 …… (330)
02345 化针散 …… (330)
02346 化狂丹 …… (330)
02347 化肝煎 …… (330)
02348 化毒散 …… (330)
02349 化逆汤 …… (330)
02350 化核膏 …… (330)
02351 化积丸 …… (331)
02352 化积丸 …… (331)
02353 化积散 …… (331)
02354 化疸汤 …… (331)
02355 化痒汤 …… (331)
02356 化斑汤 …… (331)
02357 化斑汤 …… (331)
02358 化痞丸 …… (332)
02359 化痞膏 …… (332)
02360 化滞汤 …… (332)
02361 化滞汤 …… (332)
02362 化痰丸 …… (332)
02363 化痰丸 …… (332)
02364 化痰丸 …… (332)
02365 化痰膏 …… (332)
02366 化瘿丹 …… (333)
02367 化癖膏 …… (333)
02368 化癥丸 …… (333)
02369 化耳聋方 …… (333)
02370 化铁金丹 …… (333)
02371 化癫神丹 …… (333)
02372 化水种子汤 …… (333)
02373 化坚二陈丸 …… (334)
02374 化疔内消散 …… (334)
02375 化毒救生丹 …… (334)
02376 化毒清表汤 …… (334)
02377 化毒解毒汤 …… (334)
02378 化食养脾汤 …… (334)
02379 化斑解毒汤 …… (334)
02380 化滞调中汤 …… (334)
02381 化瘀四物汤 …… (334)
02382 化瘀通经散 …… (335)

02383 化瘀理膈丹 …… (335)
02384 化瘀解毒汤 …… (335)
02385 化痰玉壶丸 …… (335)
02386 化痰降火汤 …… (335)
02387 化痰清火汤 …… (335)
02388 化腐生肌散 …… (335)
02389 化腐生肌散 …… (335)
02390 化腐紫霞膏 …… (336)
02391 化癥回生丹 …… (336)
02392 化毒排脓内补十宣散 …… (336)

从

02393 从龙汤 …… (337)

气

02394 气虚散 …… (337)

仓

02395 仓连煎 …… (337)
02396 仓卒散 …… (337)
02397 仓廪汤 …… (337)
02398 仓公下气汤 …… (337)
02399 仓公当归汤 …… (337)

分

02400 分气饮 …… (337)
02401 分珠散 …… (337)
02402 分消汤 …… (338)
02403 分清饮 …… (338)
02404 分清散 …… (338)
02405 分心气饮 …… (338)
02406 分心气饮 …… (338)
02407 分气补心汤 …… (338)
02408 分气紫苏饮 …… (338)
02409 分气紫苏饮 …… (339)
02410 分利五苓散 …… (339)

手

02411 手拈散 …… (339)
02412 手拈散 …… (339)

毛

02413 毛姜浸酒 …… (339)

午

02414 午时茶 …… (339)

牛

02415 牛车肉 …… (339)
02416 牛涎丸 …… (339)
02417 牛脑丸 …… (339)
02418 牛脑丹 …… (339)
02419 牛蒐丸 …… (339)
02420 牛黄丸 …… (340)
02421 牛黄丸 …… (340)
02422 牛黄丸 …… (340)
02423 牛黄丸 …… (340)
02424 牛黄丸 …… (340)
02425 牛黄丸 …… (340)
02426 牛黄丸 …… (340)
02427 牛黄丸 …… (340)
02428 牛黄饮 …… (340)
02429 牛黄散 …… (341)
02430 牛黄散 …… (341)
02431 牛黄散 …… (341)
02432 牛黄散 …… (341)
02433 牛黄散 …… (341)
02434 牛黄膏 …… (341)
02435 牛黄膏 …… (341)
02436 牛榔散 …… (341)
02437 牛蒡汤 …… (341)
02438 牛膝丸 …… (341)
02439 牛膝丸 …… (341)
02440 牛膝丸 …… (342)
02441 牛膝丸 …… (342)
02442 牛膝丸 …… (342)
02443 牛膝丸 …… (342)
02444 牛膝汤 …… (342)
02445 牛膝汤 …… (342)
02446 牛膝酒 …… (342)
02447 牛膝散 …… (343)
02448 牛膝散 …… (343)
02449 牛膝散 …… (343)
02450 牛膝散 …… (343)
02451 牛髓汤 …… (343)
02452 牛角觥丸 …… (343)
02453 牛角觥散 …… (343)
02454 牛角觥散 …… (343)
02455 牛蒡子丸 …… (344)
02456 牛蒡子汤 …… (344)
02457 牛蒡子汤 …… (344)
02458 牛蒡子汤 …… (344)
02459 牛蒡饮子 …… (344)
02460 牛膝煎丸 …… (344)
02461 牛髓膏子 …… (344)
02462 牛马一宝散 …… (344)
02463 牛皮癣药酒 …… (344)
02464 牛黄上清丸 …… (345)
02465 牛黄双解散 …… (345)
02466 牛黄生肌散 …… (345)
02467 牛黄白术丸 …… (345)
02468 牛黄至宝丹 …… (345)
02469 牛黄承气汤 …… (345)
02470 牛黄清心丸 …… (345)
02471 牛黄清心丸 …… (346)
02472 牛黄琥珀丸 …… (346)
02473 牛黄解毒丸 …… (346)
02474 牛黄解毒丸 …… (346)
02475 牛蒡甘桔汤 …… (346)
02476 牛蒡解肌汤 …… (346)
02477 牛膝四物煎 …… (346)
02478 牛黄小乌犀丸 …… (347)

升

02479 升阳汤 …… (347)
02480 升阳汤 …… (347)
02481 升阳汤 …… (347)
02482 升阳汤 …… (347)
02483 升阳汤 …… (347)
02484 升降汤 …… (347)
02485 升降散 …… (348)
02486 升带汤 …… (348)
02487 升胃散 …… (349)
02488 升结汤 …… (349)
02489 升陷汤 …… (349)
02490 升麻丸 …… (349)
02491 升麻丸 …… (349)
02492 升麻汤 …… (350)
02493 升麻汤 …… (350)
02494 升麻汤 …… (350)
02495 升麻汤 …… (350)
02496 升麻汤 …… (350)
02497 升麻汤 …… (350)
02498 升麻汤 …… (350)
02499 升麻汤 …… (350)
02500 升麻散 …… (350)

02501 升麻散 …… (350)
02502 升麻散 …… (351)
02503 升麻散 …… (351)
02504 升麻散 …… (351)
02505 升麻散 …… (351)
02506 升麻煎 …… (351)
02507 升朝汤 …… (351)
02508 升葛汤 …… (351)
02509 升提汤 …… (351)
02510 升气实脏丸 …… (351)
02511 升发二陈汤 …… (352)
02512 升阳四物汤 …… (352)
02513 升阳利湿汤 …… (352)
02514 升阳补气汤 …… (352)
02515 升阳降浊汤 …… (352)
02516 升阳顺气汤 …… (352)
02517 升阳举经汤 …… (353)
02518 升阳举经汤 …… (353)
02519 升阳除湿汤 …… (353)
02520 升阳除湿汤 …… (353)
02521 升阳除湿汤 …… (354)
02522 升阳除湿汤 …… (354)
02523 升阳柴胡汤 …… (354)
02524 升阳益血汤 …… (354)
02525 升阳益胃汤 …… (354)
02526 升阳调元汤 …… (355)
02527 升阳调经汤 …… (355)
02528 升阳散火汤 …… (356)
02529 升肝舒郁汤 …… (357)
02530 升举大补汤 …… (357)
02531 升麻化毒汤 …… (357)
02532 升麻六物汤 …… (357)
02533 升麻石膏汤 …… (357)
02534 升麻四物汤 …… (357)
02535 升麻发表汤 …… (357)
02536 升麻补胃汤 …… (358)
02537 升麻补胃汤 …… (358)
02538 升麻和气饮 …… (358)
02539 升麻泄热散 …… (358)
02540 升麻柴胡汤 …… (358)
02541 升麻透斑汤 …… (358)
02542 升麻消毒饮 …… (358)
02543 升麻消毒散 …… (358)
02544 升麻黄芩汤 …… (359)
02545 升麻黄连丸 …… (359)
02546 升麻黄耆汤 …… (359)
02547 升麻散火汤 …… (359)
02548 升麻散坚汤 …… (359)
02549 升麻葛根汤 …… (359)
02550 升麻葛根汤 …… (360)
02551 升麻葛根汤 …… (360)
02552 升麻解毒汤 …… (360)
02553 升麻鳖甲汤 …… (360)
02554 升清降浊汤 …… (360)
02555 升葛补中汤 …… (361)
02556 升麻牛蒡子散 …… (361)
02557 升麻牛蒡子散 …… (361)
02558 升麻加附子汤 …… (361)
02559 升阳去热和血汤 … (361)
02560 升阳除湿防风汤 … (361)
02561 升麻鳖甲汤去雄黄
蜀椒方 …… (362)

长

02562 长生丹 …… (362)
02563 长春丹 …… (362)
02564 长春方 …… (362)
02565 长春散 …… (362)
02566 长将散 …… (362)
02567 长生保命丹 …… (362)
02568 长肉八宝丹 …… (362)
02569 长春广嗣丹 …… (363)
02570 长春至宝丹 …… (363)
02571 长春不老仙丹 …… (363)
02572 长春真人保命丹 … (364)

乌

02573 乌及散 …… (364)
02574 乌云煎 …… (364)
02575 乌云膏 …… (364)
02576 乌贝散 …… (364)
02577 乌石散 …… (364)
02578 乌龙丸 …… (364)
02579 乌龙丹 …… (364)
02580 乌龙散 …… (364)
02581 乌龙膏 …… (365)
02582 乌龙膏 …… (365)
02583 乌头丸 …… (365)
02584 乌头丸 …… (365)
02585 乌头丸 …… (365)
02586 乌头丸 …… (365)
02587 乌头丸 …… (365)
02588 乌头汤 …… (365)
02589 乌头汤 …… (366)
02590 乌头汤 …… (366)
02591 乌头汤 …… (366)
02592 乌头散 …… (366)
02593 乌头散 …… (366)
02594 乌头散 …… (366)
02595 乌头散 …… (366)
02596 乌头煎 …… (367)
02597 乌发丸 …… (367)
02598 乌豆汤 …… (367)
02599 乌辛茶 …… (367)
02600 乌沉丸 …… (367)
02601 乌沉汤 …… (367)
02602 乌灵丸 …… (367)
02603 乌附膏 …… (367)
02604 乌鸡丸 …… (368)
02605 乌鸡丸 …… (368)
02606 乌鸡丸 …… (368)
02607 乌鸡丸 …… (368)
02608 乌鸡丸 …… (368)
02609 乌鸡丸 …… (368)
02610 乌鸡煎 …… (369)
02611 乌金丸 …… (369)
02612 乌金散 …… (369)
02613 乌金散 …… (369)
02614 乌金散 …… (369)
02615 乌金散 …… (370)
02616 乌荆丸 …… (370)
02617 乌茜汤 …… (370)
02618 乌药散 …… (370)
02619 乌须丸 …… (370)
02620 乌姜散 …… (370)
02621 乌桂汤 …… (370)
02622 乌梅丸 …… (371)
02623 乌梅丸 …… (372)
02624 乌梅丸 …… (372)
02625 乌梅丸 …… (372)
02626 乌梅丸 …… (372)
02627 乌梅汤 …… (372)
02628 乌梅散 …… (372)
02629 乌梅粥 …… (372)
02630 乌梅膏 …… (373)

02631 乌黄散 …… (373)
02632 乌蛇丸 …… (373)
02633 乌蛇丸 …… (373)
02634 乌蛇丸 …… (373)
02635 乌蛇散 …… (373)
02636 乌蛇散 …… (373)
02637 乌蛇散 …… (373)
02638 乌蛇散 …… (374)
02639 乌蛇散 …… (374)
02640 乌蛇散 …… (374)
02641 乌蛇散 …… (374)
02642 乌银丸 …… (374)
02643 乌犀丸 …… (374)
02644 乌犀膏 …… (375)
02645 乌蝎丸 …… (375)
02646 乌头煎丸 …… (375)
02647 乌鸡煎丸 …… (375)
02648 乌金饼子 …… (375)
02649 乌金煎丸 …… (376)
02650 乌骨鸡丸 …… (376)
02651 乌梅肉丸 …… (376)
02652 乌蛇浸酒 …… (376)
02653 乌鲤鱼汤 …… (376)
02654 乌风决明丸 …… (376)
02655 乌风补肝散 …… (376)
02656 乌头桂枝汤 …… (376)
02657 乌头摩风膏 …… (377)
02658 乌附椒姜汤 …… (377)
02659 乌鸡白凤丸 …… (377)
02660 乌苓通气散 …… (377)
02661 乌药平气汤 …… (377)
02662 乌药顺气散 …… (377)
02663 乌药顺气散 …… (378)
02664 乌须明目丸 …… (378)
02665 乌梅山萸汤 …… (378)
02666 乌梅甘草汤 …… (378)
02667 乌梅北枣丸 …… (378)
02668 乌蛇驱风汤 …… (378)
02669 乌蛇搜风汤 …… (378)
02670 乌头五灵脂丸 …… (378)
02671 乌蝎六君子汤 …… (379)
02672 乌蝎四君子汤 …… (379)

匀

02673 匀气散 …… (379)
02674 匀气散 …… (379)
02675 匀气散 …… (379)

丹

02676 丹皮汤 …… (379)
02677 丹皮散 …… (379)
02678 丹青饮 …… (379)
02679 丹参丸 …… (379)
02680 丹参汤 …… (380)
02681 丹参饮 …… (380)
02682 丹参膏 …… (380)
02683 丹栀饮 …… (380)
02684 丹砂丸 …… (380)
02685 丹砂丸 …… (380)
02686 丹砂丸 …… (380)
02687 丹砂丸 …… (380)
02688 丹砂散 …… (380)
02689 丹黄汤 …… (380)
02690 丹参饮子 …… (380)
02691 丹参蠲痛丹 …… (380)
02692 丹栀逍遥散 …… (381)
02693 丹地乌梅四物汤 … (381)

月

02694 月黄膏 …… (381)

风

02695 风引汤 …… (381)
02696 风癫汤 …… (381)
02697 风六合汤 …… (381)
02698 风六合汤 …… (381)
02699 风湿气膏 …… (382)
02700 风药圣饼子 …… (382)
02701 风湿续断汤 …… (382)

凤

02702 凤衣散 …… (382)
02703 凤衣散 …… (382)
02704 凤雏膏 …… (382)
02705 凤髓丹 …… (382)
02706 凤髓膏 …… (382)
02707 凤麟膏 …… (382)

六

02708 六一丸 …… (383)
02709 六一汤 …… (383)
02710 六丁饮 …… (383)
02711 六子丸 …… (383)
02712 六半汤 …… (383)
02713 六合汤 …… (383)
02714 六合散 …… (383)
02715 六安煎 …… (383)
02716 六军丸 …… (383)
02717 六郁汤 …… (384)
02718 六物汤 …… (384)
02719 六物汤 …… (384)
02720 六和汤 …… (384)
02721 六和散 …… (384)
02722 六柱散 …… (384)
02723 六神丸 …… (384)
02724 六神丸 …… (385)
02725 六神丹 …… (385)
02726 六神汤 …… (385)
02727 六神散 …… (385)
02728 六神散 …… (385)
02729 六真膏 …… (385)
02730 六磨汤 …… (385)
02731 六君子汤 …… (385)
02732 六君子汤 …… (386)
02733 六一顺气汤 …… (386)
02734 六味平胃散 …… (386)
02735 六味回阳饮 …… (386)
02736 六味异功散 …… (386)
02737 六味香薷饮 …… (386)
02738 六味清凉汤 …… (386)
02739 六物附子汤 …… (387)
02740 六神全蝎丸 …… (387)
02741 六神通解散 …… (387)
02742 六味合五子丸 …… (387)
02743 六味消风痰散 …… (387)
02744 六味地黄丸加黄柏知母方 …… (387)

文

02745 文武膏 …… (387)
02746 文蛤汤 …… (387)
02747 文蛤汤 …… (388)
02748 文蛤散 …… (388)
02749 文蛤散 …… (388)
02750 文蛤散 …… (388)

02751 文蛤散 …… (388)
02752 文蛤散 …… (388)

火

02753 火龙丹 …… (388)
02754 火龙膏 …… (388)
02755 火郁汤 …… (389)
02756 火郁汤 …… (389)
02757 火轮丸 …… (389)
02758 火府丹 …… (389)
02759 火府丹 …… (389)
02760 火郁越鞠丸 …… (389)

斗

02761 斗门散 …… (389)
02762 斗门散 …… (389)

心

02763 心肾丸 …… (389)
02764 心咳汤 …… (390)
02765 心救汤 …… (390)
02766 心痛汤 …… (390)
02767 心痛汤 …… (390)
02768 心肾交补丸 …… (390)

双

02769 双玉散 …… (390)
02770 双合汤 …… (390)
02771 双补丸 …… (390)
02772 双补丸 …… (391)
02773 双补汤 …… (391)
02774 双和汤 …… (391)
02775 双和汤 …… (391)
02776 双和散 …… (391)
02777 双治汤 …… (391)
02778 双柏散 …… (391)
02779 双砂汤 …… (392)
02780 双黄丸 …… (392)
02781 双解散 …… (392)
02782 双解散 …… (392)
02783 双解贯金丸 …… (392)
02784 双解复生散 …… (392)
02785 双解消毒散 …… (392)
02786 双解通圣汤 …… (392)
02787 双解通圣散 …… (393)

引

02788 引下汤 …… (393)
02789 引气汤 …… (393)
02790 引火汤 …… (393)
02791 引交汤 …… (393)
02792 引神丹 …… (393)
02793 引寐汤 …… (393)
02794 引气归血汤 …… (393)
02795 引火两安汤 …… (393)
02796 引精止血汤 …… (394)

孔

02797 孔子枕中神效方 … (394)

丑

02798 丑宝丸 …… (394)

巴

02799 巴豆丸 …… (394)
02800 巴豆丸 …… (394)
02801 巴豆蒜 …… (394)
02802 巴附丸 …… (394)
02803 巴黄散 …… (394)
02804 巴戟丸 …… (395)
02805 巴戟丸 …… (395)
02806 巴戟丸 …… (395)
02807 巴戟丸 …… (395)
02808 巴戟丸 …… (395)
02809 巴戟丸 …… (395)
02810 巴戟散 …… (395)
02811 巴戟散 …… (395)
02812 巴豆油膏 …… (396)
02813 巴戟天丸 …… (396)
02814 巴戟天汤 …… (396)
02815 巴菊枸杞丸 …… (396)

水

02816 水火散 …… (396)
02817 水龙散 …… (396)
02818 水仙膏 …… (396)
02819 水芝丸 …… (396)
02820 水沉散 …… (396)
02821 水陆丹 …… (396)
02822 水肿串 …… (397)
02823 水调散 …… (397)
02824 水眼药 …… (397)
02825 水银膏 …… (397)
02826 水蛭丸 …… (397)
02827 水蛭饮 …… (397)
02828 水晶桃 …… (397)
02829 水解散 …… (397)
02830 水滑膏 …… (398)
02831 水澄膏 …… (398)
02832 水葫芦丸 …… (398)
02833 水木华滋汤 …… (398)
02834 水火分清饮 …… (398)
02835 水火分清饮 …… (398)
02836 水沉金丝膏 …… (398)
02837 水肿至神汤 …… (398)
02838 水煮木香丸 …… (398)
02839 水煮木香丸 …… (399)
02840 水煮木香丸 …… (399)
02841 水煮金花丸 …… (399)
02842 水煮金花丸 …… (399)

〔五 画〕

打

02843 打虫丸 …… (399)
02844 打老儿丸 …… (399)

扑

02845 扑粉 …… (400)

艾

02846 艾叶汤 …… (400)
02847 艾煎丸 …… (400)
02848 艾煎丸 …… (400)
02849 艾叶洗剂 …… (400)
02850 艾附暖宫丸 …… (400)

平

02851 平木汤 …… (400)
02852 平气饮 …… (400)
02853 平气饮 …… (400)
02854 平火散 …… (400)
02855 平肌散 …… (401)
02856 平安饼 …… (401)
02857 平阳汤 …… (401)
02858 平肝饮 …… (401)
02859 平肝散 …… (401)
02860 平补丸 …… (401)

02861 平陈汤 …… (401)
02862 平肺汤 …… (401)
02863 平肺汤 …… (401)
02864 平肺散 …… (401)
02865 平胃丸 …… (402)
02866 平胃丸 …… (402)
02867 平胃散 …… (402)
02868 平胃散 …… (402)
02869 平胃散 …… (403)
02870 平崇散 …… (403)
02871 平膈丹 …… (403)
02872 平肝饮子 …… (403)
02873 平胡饮子 …… (403)
02874 平肝上清丸 …… (403)
02875 平肝补脾汤 …… (403)
02876 平肝泻火汤 …… (403)
02877 平肝清火汤 …… (403)
02878 平肝清脑汤 …… (403)
02879 平肝潜阳汤 …… (403)
02880 平补固真丹 …… (404)
02881 平补枳术丸 …… (404)
02882 平补萆薢丸 …… (404)
02883 平补虚弱汤 …… (404)
02884 平补镇心丹 …… (404)
02885 平补镇心丹 …… (404)
02886 平胃分消饮 …… (404)
02887 平胃加消汤 …… (404)
02888 平胃地榆汤 …… (405)
02889 平胃渗湿汤 …… (405)
02890 平胃蒜肚丸 …… (405)
02891 平惊通圣散 …… (405)
02892 平肝开郁止血汤 … (405)
02893 平肝顺气保中丸 … (405)

灭

02894 灭虫汤 …… (405)
02895 灭毒丹 …… (405)
02896 灭瘢丹 …… (406)

正

02897 正元丹 …… (406)
02898 正元丹 …… (406)
02899 正元散 …… (406)
02900 正元散 …… (406)
02901 正元散 …… (406)
02902 正中丸 …… (407)
02903 正气汤 …… (407)
02904 正气散 …… (407)
02905 正心汤 …… (407)
02906 正舌散 …… (407)
02907 正舌膏 …… (407)
02908 正阳丸 …… (407)
02909 正诚丹 …… (407)
02910 正经汤 …… (408)
02911 正胃散 …… (408)
02912 正笑丹 …… (408)
02913 正容汤 …… (408)
02914 正容散 …… (408)
02915 正翻散 …… (408)
02916 正凤髓丹 …… (408)
02917 正柴胡饮 …… (408)
02918 正气天香散 …… (408)
02919 正气趋痛散 …… (409)
02920 正气温中汤 …… (409)
02921 正骨紫金丹 …… (409)

玉

02922 玉女煎 …… (409)
02923 玉龙丹 …… (409)
02924 玉龙膏 …… (409)
02925 玉仙散 …… (410)
02926 玉仙散 …… (410)
02927 玉兰丸 …… (410)
02928 玉芝丸 …… (410)
02929 玉尘散 …… (410)
02930 玉竹粥 …… (410)
02931 玉华丹 …… (410)
02932 玉华散 …… (411)
02933 玉华煎 …… (411)
02934 玉池散 …… (411)
02935 玉关丸 …… (411)
02936 玉红膏 …… (411)
02937 玉灵丹 …… (411)
02938 玉灵膏 …… (411)
02939 玉环丹 …… (411)
02940 玉环煎 …… (412)
02941 玉抱肚 …… (412)
02942 玉钥匙 …… (412)
02943 玉泉丸 …… (412)
02944 玉泉丸 …… (412)
02945 玉泉散 …… (412)
02946 玉屏散 …… (412)
02947 玉真丸 …… (412)
02948 玉真散 …… (413)
02949 玉壶丸 …… (413)
02950 玉烛汤 …… (413)
02951 玉烛散 …… (414)
02952 玉烛散 …… (414)
02953 玉粉丸 …… (414)
02954 玉粉散 …… (414)
02955 玉粉散 …… (414)
02956 玉容丸 …… (414)
02957 玉容丸 …… (414)
02958 玉容粉 …… (414)
02959 玉容散 …… (414)
02960 玉容散 …… (414)
02961 玉屑散 …… (415)
02962 玉屑膏 …… (415)
02963 玉黄膏 …… (415)
02964 玉堂丸 …… (415)
02965 玉盘散 …… (415)
02966 玉液丸 …… (415)
02967 玉液丹 …… (415)
02968 玉液汤 …… (415)
02969 玉液散 …… (415)
02970 玉液煎 …… (416)
02971 玉锁丸 …… (416)
02972 玉锁丹 …… (416)
02973 玉锁匙 …… (416)
02974 玉霜丸 …… (416)
02975 玉露丸 …… (416)
02976 玉露饮 …… (416)
02977 玉露散 …… (416)
02978 玉露散 …… (417)
02979 玉露散 …… (417)
02980 玉露膏 …… (417)
02981 玉露霜 …… (417)
02982 玉竹饮子 …… (417)
02983 玉米粉粥 …… (417)
02984 玉钥匙散 …… (417)
02985 玉屏风散 …… (417)
02986 玉石清胃汤 …… (418)
02987 玉环来笑丹 …… (418)
02988 玉容西施散 …… (418)
02989 玉屑无忧散 …… (418)

02990 玉匙开关散 …… (419)
02991 玉液上清丸 …… (419)
02992 玉锁固真丹 …… (419)
02993 玉竹麦门冬汤 …… (419)

古

02994 古瓦汤 …… (419)
02995 古庵心肾丸 …… (419)

去

02996 去铃丸 …… (419)
02997 去铃丸 …… (420)
02998 去斑膏 …… (420)
02999 去腐灵药 …… (420)
03000 去翳膜丹 …… (420)
03001 去恶清心汤 …… (420)
03002 去湿健脾汤 …… (420)

术

03003 术连丸 …… (420)
03004 术附汤 …… (420)
03005 术附汤 …… (421)
03006 术附汤 …… (421)
03007 术附汤 …… (421)
03008 术附汤 …… (421)
03009 术附汤 …… (421)
03010 术附汤 …… (421)
03011 术附汤 …… (421)
03012 术苓汤 …… (421)
03013 术桂汤 …… (421)
03014 术附姜苓汤 …… (422)
03015 术附理中丸 …… (422)
03016 术桂防稀汤 …… (422)

世

03017 世传白花蛇酒 …… (422)

甘

03018 甘石散 …… (422)
03019 甘石散 …… (422)
03020 甘松粥 …… (422)
03021 甘草丸 …… (422)
03022 甘草丸 …… (422)
03023 甘草汤 …… (422)
03024 甘草汤 …… (423)
03025 甘草汤 …… (423)
03026 甘草汤 …… (423)
03027 甘草汤 …… (423)
03028 甘草汤 …… (423)
03029 甘草散 …… (423)
03030 甘草煎 …… (423)
03031 甘草膏 …… (424)
03032 甘桔汤 …… (424)
03033 甘桔汤 …… (424)
03034 甘桔汤 …… (424)
03035 甘桔汤 …… (424)
03036 甘桔汤 …… (424)
03037 甘桔汤 …… (424)
03038 甘菊汤 …… (424)
03039 甘菊汤 …… (424)
03040 甘甜丸 …… (424)
03041 甘遂丸 …… (425)
03042 甘遂丸 …… (425)
03043 甘遂丸 …… (425)
03044 甘遂方 …… (425)
03045 甘遂汤 …… (425)
03046 甘遂散 …… (425)
03047 甘遂散 …… (425)
03048 甘遂散 …… (425)
03049 甘遂散 …… (425)
03050 甘缓汤 …… (425)
03051 甘蔗粥 …… (426)
03052 甘露汤 …… (426)
03053 甘露饮 …… (426)
03054 甘露饮 …… (426)
03055 甘露饮 …… (426)
03056 甘露膏 …… (426)
03057 甘露膏 …… (426)
03058 甘菊花汤 …… (426)
03059 甘菊花汤 …… (426)
03060 甘菊花散 …… (427)
03061 甘露饮子 …… (427)
03062 甘露神膏 …… (428)
03063 甘草干姜汤 …… (428)
03064 甘草石膏汤 …… (429)
03065 甘草归蜡膏 …… (429)
03066 甘草附子汤 …… (429)
03067 甘草附子汤 …… (430)
03068 甘草泻心汤 …… (430)
03069 甘草涂敷方 …… (431)
03070 甘草粉蜜汤 …… (431)
03071 甘草麻黄汤 …… (432)
03072 甘草鼠粘汤 …… (432)
03073 甘桔牛蒡汤 …… (432)
03074 甘桔泻肺汤 …… (432)
03075 甘桔射干汤 …… (432)
03076 甘菊花饮子 …… (432)
03077 甘遂半夏汤 …… (433)
03078 甘遂通结汤 …… (433)
03079 甘遂麻黄散 …… (433)
03080 甘露消毒丹 …… (434)
03081 甘草梢黑豆汤 …… (434)
03082 甘草小麦大枣汤 … (434)
03083 甘桔加阿胶紫菀汤 …… (435)
03084 甘草干姜茯苓白术汤 …… (435)

东

03085 东风散 …… (436)
03086 东流饮 …… (436)
03087 东篱散 …… (436)
03088 东方一号膏 …… (436)
03089 东方甲乙丹 …… (437)

布

03090 布海丸 …… (437)
03091 布袋丸 …… (437)
03092 布楮起痿汤 …… (437)

石

03093 石子汤 …… (437)
03094 石韦汤 …… (437)
03095 石韦汤 …… (437)
03096 石韦散 …… (438)
03097 石韦散 …… (438)
03098 石韦散 …… (438)
03099 石韦散 …… (438)
03100 石灰散 …… (438)
03101 石灰散 …… (438)
03102 石灰膏 …… (438)
03103 石灰膏 …… (438)
03104 石花汤 …… (438)
03105 石连散 …… (438)
03106 石珍散 …… (439)

03107 石柏散 …… (439)
03108 石南丸 …… (439)
03109 石南丸 …… (439)
03110 石南丸 …… (439)
03111 石南散 …… (439)
03112 石胆丸 …… (439)
03113 石胆散 …… (439)
03114 石胆散 …… (439)
03115 石室丹 …… (440)
03116 石莲丸 …… (440)
03117 石莲汤 …… (440)
03118 石莲汤 …… (440)
03119 石莲散 …… (440)
03120 石莲散 …… (440)
03121 石莲散 …… (440)
03122 石莲散 …… (440)
03123 石脂膏 …… (440)
03124 石粉散 …… (440)
03125 石斛丸 …… (440)
03126 石斛丸 …… (441)
03127 石斛丸 …… (441)
03128 石斛丸 …… (441)
03129 石斛散 …… (441)
03130 石斛散 …… (441)
03131 石斛散 …… (441)
03132 石斛散 …… (441)
03133 石斛露 …… (442)
03134 石榴汤 …… (442)
03135 石榴汤 …… (442)
03136 石榴散 …… (442)
03137 石碱丸 …… (442)
03138 石膏丸 …… (442)
03139 石膏丸 …… (442)
03140 石膏汤 …… (442)
03141 石膏汤 …… (443)
03142 石膏汤 …… (443)
03143 石膏汤 …… (443)
03144 石膏散 …… (443)
03145 石膏散 …… (443)
03146 石膏散 …… (443)
03147 石膏散 …… (443)
03148 石膏散 …… (443)
03149 石膏散 …… (443)
03150 石膏散 …… (443)
03151 石膏散 …… (444)
03152 石膏散 …… (444)
03153 石膏粥 …… (444)
03154 石决明丸 …… (444)
03155 石决明丸 …… (444)
03156 石决明散 …… (444)
03157 石决明散 …… (444)
03158 石决明散 …… (444)
03159 石决明散 …… (444)
03160 石南叶散 …… (444)
03161 石钟乳丸 …… (445)
03162 石莲子散 …… (445)
03163 石菖蒲丸 …… (445)
03164 石菖蒲汤 …… (445)
03165 石菖蒲散 …… (445)
03166 石斛浸酒 …… (445)
03167 石硫黄膏 …… (445)
03168 石榴皮汤 …… (445)
03169 石膏饮子 …… (445)
03170 石燕子煎 …… (445)
03171 石韦瞿麦散 …… (446)
03172 石刻安肾丸 …… (446)
03173 石首鱼脑汤 …… (446)
03174 石斛清胃散 …… (446)
03175 石膏大青汤 …… (446)
03176 石膏升麻散 …… (446)
03177 石膏白及膏 …… (446)
03178 石膏竹茹汤 …… (446)
03179 石膏羌活散 …… (446)
03180 石膏枯矾膏 …… (447)
03181 石膏神术汤 …… (447)
03182 石膏黄芩汤 …… (447)
03183 石膏菊花散 …… (447)
03184 石膏粳米汤 …… (447)
03185 石髓平渊散 …… (447)
03186 石膏鼠粘子散 …… (447)

右

03187 右归丸 …… (447)
03188 右归饮 …… (448)

左

03189 左归丸 …… (449)
03190 左归饮 …… (449)
03191 左金丸 …… (450)
03192 左金汤 …… (451)
03193 左经丸 …… (451)
03194 左经汤 …… (451)
03195 左金加陈米汤 …… (451)

龙

03196 龙凤丸 …… (451)
03197 龙火汤 …… (451)
03198 龙肝膏 …… (451)
03199 龙肉丸 …… (451)
03200 龙齿丸 …… (452)
03201 龙齿丹 …… (452)
03202 龙齿丹 …… (452)
03203 龙齿汤 …… (452)
03204 龙齿散 …… (452)
03205 龙虎丹 …… (452)
03206 龙虎丹 …… (452)
03207 龙虎丹 …… (452)
03208 龙虎丹 …… (452)
03209 龙虎丹 …… (452)
03210 龙虎饮 …… (452)
03211 龙虎膏 …… (452)
03212 龙荟丸 …… (452)
03213 龙砂汤 …… (452)
03214 龙星丹 …… (452)
03215 龙骨丸 …… (452)
03216 龙骨丸 …… (453)
03217 龙骨汤 …… (454)
03218 龙骨汤 …… (454)
03219 龙骨汤 …… (454)
03220 龙骨汤 …… (454)
03221 龙骨散 …… (454)
03222 龙骨散 …… (454)
03223 龙骨散 …… (454)
03224 龙骨散 …… (454)
03225 龙骨散 …… (454)
03226 龙骨散 …… (455)
03227 龙骨散 …… (455)
03228 龙骨散 …… (455)
03229 龙骨散 …… (455)
03230 龙香散 …… (455)
03231 龙胆丸 …… (455)
03232 龙胆丸 …… (455)
03233 龙胆丸 …… (455)
03234 龙胆汤 …… (455)
03235 龙胆汤 …… (455)

03236 龙胆饮 …… (455)
03237 龙胆散 …… (455)
03238 龙胆煎 …… (456)
03239 龙珠散 …… (456)
03240 龙珠膏 …… (456)
03241 龙脑丸 …… (456)
03242 龙脑丸 …… (456)
03243 龙脑丸 …… (456)
03244 龙脑丸 …… (456)
03245 龙脑散 …… (457)
03246 龙脑散 …… (457)
03247 龙脑散 …… (457)
03248 龙脑膏 …… (457)
03249 龙脑膏 …… (457)
03250 龙脑膏 …… (457)
03251 龙眼汤 …… (458)
03252 龙蛇散 …… (458)
03253 龙尾神针 …… (458)
03254 龙骨饼子 …… (458)
03255 龙胆饮子 …… (458)
03256 龙胆草丸 …… (458)
03257 龙脑饮子 …… (458)
03258 龙眼肉粥 …… (458)
03259 龙马自来丹 …… (458)
03260 龙牡复脉汤 …… (459)
03261 龙牡菟韭丸 …… (459)
03262 龙齿壮胆汤 …… (459)
03263 龙齿安神丹 …… (459)
03264 龙齿补心汤 …… (459)
03265 龙齿清魂散 …… (459)
03266 龙齿镇心丹 …… (459)
03267 龙虎交加散 …… (460)
03268 龙虎寿生丹 …… (460)
03269 龙虎济阴丹 …… (460)
03270 龙骨远志丸 …… (460)
03271 龙胆芦荟丸 …… (460)
03272 龙胆苦参丸 …… (460)
03273 龙胆泻肝丸 …… (460)
03274 龙胆泻肝汤 …… (460)
03275 龙胆泻肝汤 …… (462)
03276 龙胆泻肝汤 …… (462)
03277 龙胆泻肝汤 …… (462)
03278 龙胆泻肝汤 …… (462)
03279 龙胆泻肝汤 …… (462)
03280 龙胆泻肝汤 …… (463)
03281 龙胆泻肝汤 …… (463)
03282 龙胆草擦剂 …… (463)
03283 龙莲芡实丸 …… (463)
03284 龙蛭理痰汤 …… (463)
03285 龙脑天麻煎 …… (463)
03286 龙脑鸡苏丸 …… (463)
03287 龙鲤宣痹丸 …… (464)
03288 龙胆羚羊角汤 …… (464)

戊

03289 戊己丸 …… (464)
03290 戊己丸 …… (464)
03291 戊己汤 …… (464)

可

03292 可保立苏汤 …… (464)

归

03293 归元散 …… (465)
03294 归气饮 …… (465)
03295 归芍汤 …… (465)
03296 归芍汤 …… (465)
03297 归芍汤 …… (465)
03298 归花汤 …… (465)
03299 归连丸 …… (465)
03300 归肠汤 …… (465)
03301 归灵汤 …… (466)
03302 归肾丸 …… (466)
03303 归荆汤 …… (466)
03304 归荆散 …… (466)
03305 归茸丸 …… (466)
03306 归茸丸 …… (466)
03307 归须汤 …… (466)
03308 归姜汤 …… (466)
03309 归神丹 …… (466)
03310 归神丹 …… (467)
03311 归耆饮 …… (467)
03312 归圆酒 …… (467)
03313 归葛饮 …… (467)
03314 归葵汤 …… (467)
03315 归脾汤 …… (467)
03316 归脾汤 …… (467)
03317 归脾汤 …… (469)
03318 归脾汤 …… (469)
03319 归术保产汤 …… (470)
03320 归术破瘕汤 …… (470)
03321 归地滋阴汤 …… (470)
03322 归芍红花散 …… (470)
03323 归血凉荣汤 …… (470)
03324 归附地黄丸 …… (470)
03325 归养心肾丸 …… (470)
03326 归养心脾汤 …… (470)
03327 归神定志丸 …… (471)
03328 归桂化逆汤 …… (471)
03329 归脾养荣汤 …… (471)
03330 归芍六君子汤 …… (471)

北

03331 北枣散 …… (471)
03332 北亭丸 …… (471)
03333 北平太守八味散 … (471)

卢

03334 卢同散 …… (471)
03335 卢氏异方感应丸 … (472)

田

03336 田季散 …… (472)
03337 田螺水 …… (472)
03338 田螺饮 …… (472)
03339 田螺膏 …… (472)
03340 田螺解胀敷脐方 … (472)
03341 田螺解胀敷脐方 … (472)

甲

03342 甲乙饼 …… (472)
03343 甲乙化土汤 …… (473)
03344 甲乙归藏汤 …… (473)

四

03345 四七汤 …… (473)
03346 四川丸 …… (473)
03347 四仁汤 …… (473)
03348 四斤丸 …… (473)
03349 四斤丸 …… (473)
03350 四乌汤 …… (473)
03351 四仙丸 …… (473)
03352 四仙散 …… (473)
03353 四生丸 …… (474)
03354 四生丸 …… (474)
03355 四生丸 …… (474)
03356 四生散 …… (474)

03357 四白丹 …… (474)
03358 四白汤 …… (474)
03359 四白散 …… (474)
03360 四汁膏 …… (475)
03361 四圣串 …… (475)
03362 四圣散 …… (475)
03363 四圣散 …… (475)
03364 四圣散 …… (475)
03365 四圣散 …… (475)
03366 四圣散 …… (475)
03367 四圣散 …… (475)
03368 四圣散 …… (475)
03369 四圣散 …… (476)
03370 四合汤 …… (476)
03371 四色散 …… (476)
03372 四阴煎 …… (476)
03373 四红丸 …… (476)
03374 四灵散 …… (476)
03375 四妙丸 …… (476)
03376 四妙丸 …… (476)
03377 四妙丸 …… (477)
03378 四妙丸 …… (477)
03379 四妙散 …… (477)
03380 四苓汤 …… (477)
03381 四苓散 …… (477)
03382 四虎散 …… (477)
03383 四味丸 …… (477)
03384 四物汤 …… (478)
03385 四物汤 …… (480)
03386 四和汤 …… (480)
03387 四炒丸 …… (480)
03388 四宝丸 …… (480)
03389 四宝丹 …… (480)
03390 四宝丹 …… (480)
03391 四柱散 …… (480)
03392 四香散 …… (480)
03393 四逆汤 …… (480)
03394 四逆汤 …… (483)
03395 四逆散 …… (483)
03396 四神丸 …… (486)
03397 四神丸 …… (486)
03398 四神丸 …… (486)
03399 四神丸 …… (486)
03400 四神丸 …… (486)
03401 四神丸 …… (486)
03402 四神丸 …… (487)
03403 四神丸 …… (487)
03404 四神丹 …… (488)
03405 四神汤 …… (488)
03406 四神散 …… (488)
03407 四神散 …… (488)
03408 四神散 …… (488)
03409 四神散 …… (488)
03410 四神散 …… (489)
03411 四退散 …… (489)
03412 四倍丸 …… (489)
03413 四倍汤 …… (489)
03414 四倍散 …… (489)
03415 四消丸 …… (489)
03416 四黄丸 …… (489)
03417 四黄散 …… (489)
03418 四黄散 …… (489)
03419 四黄散 …… (489)
03420 四黄散 …… (489)
03421 四虚丹 …… (490)
03422 四兽饮 …… (490)
03423 四维散 …… (490)
03424 四温散 …… (490)
03425 四蜕散 …… (490)
03426 四精丸 …… (490)
03427 四精丸 …… (490)
03428 四磨汤 …… (491)
03429 四磨饮 …… (491)
03430 四君子汤 …… (492)
03431 四君子汤 …… (492)
03432 四七调气汤 …… (492)
03433 四子明目散 …… (492)
03434 四圣朝元丹 …… (492)
03435 四色断痢丸 …… (492)
03436 四君归芍汤 …… (492)
03437 四君芎归汤 …… (492)
03438 四妙勇安汤 …… (492)
03439 四苓五皮汤 …… (493)
03440 四味乌沉汤 …… (494)
03441 四味补心丸 …… (494)
03442 四味枳实散 …… (494)
03443 四味茴香散 …… (494)
03444 四味香连丸 …… (494)
03445 四味萸连丸 …… (494)
03446 四物五子丸 …… (494)
03447 四物龙胆汤 …… (494)
03448 四物白通汤 …… (494)
03449 四物瓜蒌散 …… (494)
03450 四物加味汤 …… (494)
03451 四物当归汤 …… (495)
03452 四物安神汤 …… (495)
03453 四物导痰汤 …… (495)
03454 四物坎离丸 …… (495)
03455 四物补心汤 …… (495)
03456 四物补肝散 …… (495)
03457 四物补经汤 …… (495)
03458 四物缝覆汤 …… (496)
03459 四物逍遥散 …… (496)
03460 四物益母丸 …… (496)
03461 四物消风饮 …… (496)
03462 四物麻仁丸 …… (496)
03463 四制香附丸 …… (496)
03464 四制香附丸 …… (496)
03465 四制鲮鲤丸 …… (496)
03466 四治黄连丸 …… (497)
03467 四炭阿胶汤 …… (497)
03468 四顺附子汤 …… (497)
03469 四顺清凉散 …… (497)
03470 四逆茱萸汤 …… (497)
03471 四海舒郁丸 …… (497)
03472 四蒸木瓜丸 …… (498)
03473 四加减正气散 …… (498)
03474 四苓合芩芍汤 …… (498)
03475 四物龙胆草汤 …… (498)
03476 四物加人参汤 …… (498)
03477 四物加地榆汤 …… (498)
03478 四物加芩连汤 …… (498)
03479 四物加柴胡汤 …… (498)
03480 四物加葵花汤 …… (498)
03481 四物黄连薄贴 …… (499)
03482 四顺清凉饮子 …… (499)
03483 四逆加人参汤 …… (499)
03484 四逆加茯苓散 …… (499)
03485 四味调经止痛散 … (500)
03486 四物汤倍芎归汤 … (500)
03487 四物苍术各半汤 …… (500)
03488 四乌鲗骨一藘茹丸 …… (500)
03489 四时加减柴胡饮

子 …… (500)
03490 四苓加厚朴秦皮汤 …… (501)
03491 四物加香附黄连汤 …… (501)
03492 四柱子加姜附厚朴汤 …… (501)
03493 四物汤加芩连姜夏方 …… (501)
03494 四君子加芍药高良姜汤 …… (501)
03495 四君子汤加竹沥姜汁方 …… (501)
03496 四苓加木瓜厚朴草果汤 …… (501)
03497 四逆散加五味子干姜汤 …… (501)
03498 四物汤加黄芩黄柏槐花方 …… (501)
03499 四物汤加桃仁红花竹沥姜汁方 …… (502)

史

03500 史国公万病无忧药酒 …… (502)

代

03501 代刀散 …… (502)
03502 代刀散 …… (502)
03503 代刀散 …… (502)
03504 代杖汤 …… (502)
03505 代针散 …… (502)
03506 代谷丸 …… (502)
03507 代灸膏 …… (503)
03508 代参膏 …… (503)
03509 代参膏 …… (503)
03510 代茶饮 …… (503)
03511 代匙散 …… (503)
03512 代赭丸 …… (503)
03513 代赭丸 …… (503)
03514 代赭散 …… (503)
03515 代抵当丸 …… (503)
03516 代抵当丸 …… (503)
03517 代抵当汤 …… (504)
03518 代赭石散 …… (504)

仙

03519 仙酒 …… (504)
03520 仙人饭 …… (504)
03521 仙人散 …… (504)
03522 仙人粥 …… (504)
03523 仙人粮 …… (504)
03524 仙子散 …… (504)
03525 仙术饮 …… (504)
03526 仙饭丸 …… (505)
03527 仙灵丸 …… (505)
03528 仙茅丸 …… (505)
03529 仙茅酒 …… (505)
03530 仙露汤 …… (505)
03531 仙露汤 …… (505)
03532 仙人肢丸 …… (505)
03533 仙灵脾丸 …… (505)
03534 仙灵脾散 …… (506)
03535 仙灵脾散 …… (506)
03536 仙灵脾散 …… (506)
03537 仙鹤草膏 …… (506)
03538 仙人杖浸酒 …… (506)
03539 仙方地黄散 …… (506)
03540 仙方隔纸膏 …… (506)
03541 仙传午时茶 …… (506)
03542 仙传生牙丹 …… (507)
03543 仙传黑虎丹 …… (507)
03544 仙灵脾浸酒 …… (507)
03545 仙灵脾煎丸 …… (507)
03546 仙传史国公浸酒 … (507)
03547 仙传神效梅花丸 … (507)

外

03548 外灸方 …… (508)
03549 外消散 …… (508)
03550 外消膏 …… (508)
03551 外痹汤 …… (508)
03552 外敷神膏 …… (508)
03553 外敷麻药 …… (508)
03554 外痔神消散 …… (508)
03555 外敷接骨散 …… (508)

冬

03556 冬瓜丸 …… (508)
03557 冬瓜汤 …… (508)
03558 冬瓜饮 …… (509)
03559 冬瓜粥 …… (509)
03560 冬瓜羹 …… (509)
03561 冬花散 …… (509)
03562 冬荣散 …… (509)
03563 冬葵散 …… (509)
03564 冬瓜子散 …… (509)
03565 冬瓜子散 …… (509)
03566 冬葵子汤 …… (509)
03567 冬葵子汤 …… (509)
03568 冬葵子汤 …… (510)
03569 冬葵子散 …… (510)
03570 冬葵子散 …… (510)
03571 冬葵子散 …… (510)
03572 冬瓜洗面药 …… (510)
03573 冬地三黄汤 …… (510)
03574 冬虫夏草酒 …… (510)
03575 冬葵草藓散 …… (510)

失

03576 失心丸 …… (510)
03577 失笑丸 …… (510)
03578 失笑散 …… (511)
03579 失笑散 …… (511)
03580 失笑散 …… (511)
03581 失笑散 …… (511)

生

03582 生化汤 …… (512)
03583 生化汤 …… (513)
03584 生气汤 …… (513)
03585 生气散 …… (513)
03586 生发方 …… (513)
03587 生发酊 …… (513)
03588 生地散 …… (513)
03589 生血丹 …… (514)
03590 生血汤 …… (514)
03591 生肌丸 …… (514)
03592 生肌药 …… (514)
03593 生肌散 …… (514)
03594 生肌散 …… (514)
03595 生肌散 …… (514)
03596 生肌散 …… (515)
03597 生肌散 …… (515)
03598 生肌散 …… (515)
03599 生肌散 …… (515)
03600 生肌散 …… (515)

03601 生肌散 …… (516)
03602 生肌散 …… (516)
03603 生肌散 …… (516)
03604 生肌散 …… (516)
03605 生肌膏 …… (516)
03606 生肌膏 …… (516)
03607 生附汤 …… (516)
03608 生韭饮 …… (516)
03609 生胃丸 …… (517)
03610 生胃丹 …… (517)
03611 生香散 …… (517)
03612 生香膏 …… (517)
03613 生脉散 …… (517)
03614 生津饮 …… (519)
03615 生姜汤 …… (519)
03616 生姜散 …… (519)
03617 生姜散 …… (520)
03618 生姜粥 …… (520)
03619 生姜粥 …… (520)
03620 生姜煎 …… (520)
03621 生犀丸 …… (520)
03622 生犀饮 …… (520)
03623 生犀饮 …… (520)
03624 生犀饮 …… (520)
03625 生犀散 …… (520)
03626 生犀散 …… (521)
03627 生犀散 …… (521)
03628 生慧汤 …… (521)
03629 生石斛酒 …… (521)
03630 生发软膏 …… (521)
03631 生地制散 …… (521)
03632 生地黄丸 …… (521)
03633 生地黄汤 …… (521)
03634 生地黄汤 …… (522)
03635 生地黄汤 …… (522)
03636 生地黄汤 …… (522)
03637 生地黄汤 …… (522)
03638 生地黄汤 …… (522)
03639 生地黄汤 …… (522)
03640 生地黄汤 …… (522)
03641 生地黄汤 …… (522)
03642 生地黄饮 …… (522)
03643 生地黄饮 …… (523)
03644 生地黄鸡 …… (523)
03645 生地黄酒 …… (523)
03646 生地黄散 …… (523)
03647 生地黄散 …… (523)
03648 生地黄散 …… (523)
03649 生地黄散 …… (523)
03650 生地黄散 …… (523)
03651 生地黄散 …… (523)
03652 生地黄粥 …… (524)
03653 生地黄粥 …… (524)
03654 生地黄粥 …… (524)
03655 生地黄煎 …… (524)
03656 生地黄煎 …… (524)
03657 生地黄煎 …… (524)
03658 生地黄膏 …… (524)
03659 生地黄膏 …… (524)
03660 生地黄膏 …… (524)
03661 生舌仙丹 …… (524)
03662 生肌药丁 …… (524)
03663 生苎根散 …… (525)
03664 生附子汤 …… (525)
03665 生铁落饮 …… (525)
03666 生铁落饮 …… (525)
03667 生铁落饮 …… (525)
03668 生铁落饮 …… (525)
03669 生萝卜粥 …… (525)
03670 生蒲黄汤 …… (525)
03671 生嘉禾散 …… (525)
03672 生熟地汤 …… (526)
03673 生干地黄丸 …… (526)
03674 生干地黄散 …… (526)
03675 生干地黄散 …… (526)
03676 生干地黄散 …… (526)
03677 生干地黄散 …… (526)
03678 生干地黄散 …… (526)
03679 生干地黄散 …… (526)
03680 生化益气汤 …… (526)
03681 生气养胃丸 …… (527)
03682 生气救脱汤 …… (527)
03683 生发一号丸 …… (527)
03684 生发二号丸 …… (527)
03685 生地八物汤 …… (527)
03686 生地化毒汤 …… (527)
03687 生地冬芩汤 …… (527)
03688 生地玄参汤 …… (527)
03689 生地芩连汤 …… (527)
03690 生地芩连汤 …… (528)
03691 生地败毒散 …… (528)
03692 生地黄汁散 …… (528)
03693 生地黄饮子 …… (528)
03694 生地黄饮子 …… (528)
03695 生地黄饮子 …… (528)
03696 生地清肺饮 …… (528)
03697 生血止崩汤 …… (528)
03698 生血起废汤 …… (528)
03699 生血润肤饮 …… (529)
03700 生肌八宝丹 …… (529)
03701 生肌风雏膏 …… (529)
03702 生肌玉红膏 …… (529)
03703 生肌定痛散 …… (529)
03704 生阴开结汤 …… (529)
03705 生阴壮髓丹 …… (529)
03706 生麦益阴煎 …… (529)
03707 生附白术汤 …… (530)
03708 生附除湿汤 …… (530)
03709 生枸杞子酒 …… (530)
03710 生脉地黄汤 …… (530)
03711 生脉补精汤 …… (530)
03712 生脉保元汤 …… (530)
03713 生津四物汤 …… (530)
03714 生津代茶饮 …… (530)
03715 生津补血汤 …… (530)
03716 生津养血汤 …… (530)
03717 生津润肺丸 …… (530)
03718 生津益液汤 …… (531)
03719 生姜半夏汤 …… (531)
03720 生姜泻心汤 …… (531)
03721 生料健脾丸 …… (532)
03722 生熟三黄汤 …… (532)
03723 生熟地黄丸 …… (532)
03724 生熟地黄丸 …… (532)
03725 生熟地黄丸 …… (532)
03726 生熟地黄丸 …… (532)
03727 生熟地黄丸 …… (533)
03728 生熟地黄汤 …… (533)
03729 生熟地黄汤 …… (533)
03730 生熟地黄汤 …… (533)
03731 生蟹足敷方 …… (533)
03732 生髓育麟丹 …… (533)
03733 生地黄汁饮子 …… (533)
03734 生地黄黄连汤 …… (534)
03735 生芦根五味饮 …… (534)

03736 生津甘露饮子 …… (534)
03737 生精种子奇方 …… (534)
03738 生血地黄百花丸 … (534)
03739 生脉散加香薷方 … (534)
03740 生津止渴益水饮 … (534)

白

03741 白散 …… (534)
03742 白丸子 …… (536)
03743 白丸散 …… (536)
03744 白及丸 …… (536)
03745 白及肺 …… (536)
03746 白及散 …… (536)
03747 白及散 …… (536)
03748 白及散 …… (536)
03749 白及散 …… (536)
03750 白及散 …… (536)
03751 白及膏 …… (536)
03752 白王丹 …… (536)
03753 白牙散 …… (536)
03754 白牙散 …… (537)
03755 白凤丸 …… (537)
03756 白凤丹 …… (537)
03757 白凤膏 …… (537)
03758 白丑散 …… (537)
03759 白玉膏 …… (537)
03760 白玉膏 …… (538)
03761 白玉膏 …… (538)
03762 白玉膏 …… (538)
03763 白术丸 …… (538)
03764 白术丸 …… (538)
03765 白术丸 …… (538)
03766 白术丸 …… (538)
03767 白术丸 …… (538)
03768 白术丸 …… (538)
03769 白术丸 …… (538)
03770 白术丸 …… (539)
03771 白术丸 …… (539)
03772 白术丸 …… (539)
03773 白术丸 …… (539)
03774 白术丸 …… (539)
03775 白术汤 …… (539)
03776 白术汤 …… (539)
03777 白术汤 …… (539)
03778 白术汤 …… (539)
03779 白术汤 …… (540)
03780 白术汤 …… (542)
03781 白术汤 …… (542)
03782 白术汤 …… (542)
03783 白术汤 …… (542)
03784 白术汤 …… (542)
03785 白术汤 …… (542)
03786 白术汤 …… (542)
03787 白术汤 …… (542)
03788 白术汤 …… (543)
03789 白术饮 …… (543)
03790 白术酒 …… (543)
03791 白术散 …… (543)
03792 白术散 …… (543)
03793 白术散 …… (544)
03794 白术散 …… (544)
03795 白术散 …… (544)
03796 白术散 …… (544)
03797 白术散 …… (544)
03798 白术散 …… (544)
03799 白术散 …… (544)
03800 白术散 …… (544)
03801 白术散 …… (544)
03802 白术散 …… (545)
03803 白术散 …… (545)
03804 白术散 …… (545)
03805 白术散 …… (545)
03806 白术散 …… (545)
03807 白术散 …… (545)
03808 白术散 …… (545)
03809 白术散 …… (545)
03810 白术散 …… (545)
03811 白术散 …… (546)
03812 白术散 …… (546)
03813 白术散 …… (547)
03814 白术散 …… (547)
03815 白术散 …… (547)
03816 白术散 …… (547)
03817 白术散 …… (547)
03818 白术散 …… (547)
03819 白术散 …… (547)
03820 白术散 …… (547)
03821 白术膏 …… (547)
03822 白龙丸 …… (548)
03823 白龙丸 …… (548)
03824 白龙丸 …… (548)
03825 白龙丹 …… (548)
03826 白龙丹 …… (548)
03827 白龙汤 …… (548)
03828 白龙散 …… (548)
03829 白龙散 …… (549)
03830 白龙散 …… (549)
03831 白归汤 …… (549)
03832 白瓜丸 …… (549)
03833 白芍汤 …… (549)
03834 白灰散 …… (549)
03835 白豆散 …… (549)
03836 白芷丸 …… (549)
03837 白芷汤 …… (549)
03838 白芷汤 …… (549)
03839 白芷散 …… (550)
03840 白芷散 …… (550)
03841 白芷散 …… (550)
03842 白芷散 …… (550)
03843 白芷散 …… (550)
03844 白芷散 …… (550)
03845 白芷散 …… (550)
03846 白芷散 …… (550)
03847 白芷散 …… (550)
03848 白芷膏 …… (550)
03849 白芷膏 …… (550)
03850 白芷膏 …… (551)
03851 白花膏 …… (551)
03852 白花膏 …… (551)
03853 白芥丸 …… (551)
03854 白连散 …… (551)
03855 白疔散 …… (551)
03856 白疕丸 …… (551)
03857 白灵药 …… (551)
03858 白灵药 …… (551)
03859 白附丹 …… (552)
03860 白蚬片 …… (552)
03861 白茅汤 …… (552)
03862 白茅煎 …… (552)
03863 白矾酊 …… (552)
03864 白矾散 …… (552)
03865 白矾散 …… (552)
03866 白矾散 …… (552)
03867 白矾散 …… (552)
03868 白矾散 …… (552)

03869 白矾散 …… (553)
03870 白矾散 …… (553)
03871 白矾散 …… (553)
03872 白矾散 …… (553)
03873 白矾散 …… (553)
03874 白矾煎 …… (553)
03875 白矾煎 …… (553)
03876 白虎丸 …… (553)
03877 白虎汤 …… (553)
03878 白虎汤 …… (554)
03879 白果汤 …… (555)
03880 白金丸 …… (555)
03881 白金散 …… (555)
03882 白金散 …… (555)
03883 白金散 …… (555)
03884 白油膏 …… (555)
03885 白降丹 …… (555)
03886 白降丹 …… (556)
03887 白降丹 …… (556)
03888 白药丸 …… (556)
03889 白药散 …… (557)
03890 白带丸 …… (557)
03891 白带丸 …… (557)
03892 白带丹 …… (557)
03893 白垩丸 …… (557)
03894 白前汤 …… (557)
03895 白前汤 …… (557)
03896 白前汤 …… (557)
03897 白前汤 …… (557)
03898 白前汤 …… (557)
03899 白姜散 …… (557)
03900 白蚕丸 …… (557)
03901 白莲散 …… (557)
03902 白胶汤 …… (557)
03903 白胶散 …… (557)
03904 白酒煎 …… (557)
03905 白通汤 …… (558)
03906 白梅丸 …… (559)
03907 白梅丸 …… (559)
03908 白黄散 …… (559)
03909 白黄散 …… (559)
03910 白雪丸 …… (559)
03911 白雪糕 …… (559)
03912 白眼药 …… (559)
03913 白绿丹 …… (559)
03914 白斑散 …… (559)
03915 白散子 …… (559)
03916 白葱散 …… (559)
03917 白薇丸 …… (560)
03918 白薇散 …… (560)
03919 白薇散 …… (560)
03920 白薇膏 …… (560)
03921 白薇膏 …… (560)
03922 白薇薄 …… (560)
03923 白鲜汤 …… (560)
03924 白膏药 …… (560)
03925 白蜜膏 …… (560)
03926 白敷药 …… (560)
03927 白薇丸 …… (561)
03928 白薇丸 …… (561)
03929 白薇丸 …… (561)
03930 白薇汤 …… (561)
03931 白薇汤 …… (561)
03932 白薇散 …… (561)
03933 白马茎丸 …… (561)
03934 白凤饮子 …… (562)
03935 白玉神膏 …… (562)
03936 白石英丸 …… (562)
03937 白石英汤 …… (562)
03938 白石英汤 …… (562)
03939 白石英散 …… (562)
03940 白石英散 …… (562)
03941 白石脂丸 …… (562)
03942 白龙骨丸 …… (563)
03943 白龙骨丸 …… (563)
03944 白瓜子丸 …… (563)
03945 白头翁丸 …… (563)
03946 白头翁汤 …… (563)
03947 白头翁汤 …… (564)
03948 白头翁酒 …… (564)
03949 白头翁散 …… (564)
03950 白头翁煎 …… (564)
03951 白芍药散 …… (564)
03952 白朱砂散 …… (564)
03953 白华玉丹 …… (564)
03954 白羊心汤 …… (565)
03955 白羊肾羹 …… (565)
03956 白羊肾羹 …… (565)
03957 白杨皮散 …… (565)
03958 白花蛇丸 …… (565)
03959 白花蛇丸 …… (565)
03960 白花蛇丸 …… (565)
03961 白花蛇酒 …… (565)
03962 白花蛇散 …… (566)
03963 白花蛇散 …… (566)
03964 白花蛇散 …… (566)
03965 白花蛇散 …… (566)
03966 白花蛇膏 …… (566)
03967 白芥子散 …… (566)
03968 白豆蔻丸 …… (566)
03969 白豆蔻丸 …… (566)
03970 白豆蔻汤 …… (567)
03971 白豆蔻散 …… (567)
03972 白豆蔻散 …… (567)
03973 白豆蔻散 …… (567)
03974 白豆蔻散 …… (567)
03975 白豆蔻散 …… (567)
03976 白沉香散 …… (567)
03977 白附子丸 …… (567)
03978 白附子丸 …… (567)
03979 白附子丸 …… (568)
03980 白附子散 …… (568)
03981 白茅根汤 …… (568)
03982 白茅根汤 …… (568)
03983 白茅根散 …… (568)
03984 白茅根散 …… (568)
03985 白矾灰散 …… (568)
03986 白矾灰散 …… (568)
03987 白果蛋方 …… (568)
03988 白降雪散 …… (569)
03989 白茯苓丸 …… (569)
03990 白茯苓丸 …… (569)
03991 白茯苓汤 …… (569)
03992 白茯苓散 …… (569)
03993 白茯苓散 …… (569)
03994 白茯苓散 …… (569)
03995 白茯神散 …… (569)
03996 白药子散 …… (570)
03997 白牵牛散 …… (570)
03998 白牵牛散 …… (570)
03999 白扁豆粥 …… (570)
04000 白荷花露 …… (570)
04001 白菊花酒 …… (570)
04002 白蛇浸酒 …… (570)
04003 白银锭子 …… (570)

04004 白蔻脂方 …… (570)
04005 白蒺藜丸 …… (570)
04006 白蒺藜丸 …… (571)
04007 白蒺藜汤 …… (571)
04008 白蒺藜散 …… (571)
04009 白蒺藜散 …… (571)
04010 白蒺藜散 …… (571)
04011 白鲜皮汤 …… (571)
04012 白鲜皮汤 …… (571)
04013 白鲜皮汤 …… (571)
04014 白鲜皮酊 …… (571)
04015 白鲜皮散 …… (571)
04016 白僵蚕丸 …… (572)
04017 白僵蚕丸 …… (572)
04018 白螺壳丸 …… (572)
04019 白藕汁膏 …… (572)
04020 白癜风酒 …… (572)
04021 白及枇杷丸 …… (572)
04022 白及莲须散 …… (572)
04023 白云换肺丸 …… (572)
04024 白术八味散 …… (572)
04025 白术木香散 …… (572)
04026 白术四逆汤 …… (572)
04027 白术半夏汤 …… (573)
04028 白术圣散子 …… (573)
04029 白术芍药汤 …… (573)
04030 白术安胃散 …… (573)
04031 白术防风汤 …… (573)
04032 白术附子汤 …… (573)
04033 白术和中汤 …… (573)
04034 白术和中汤 …… (573)
04035 白术泽泻散 …… (573)
04036 白术枳壳丸 …… (574)
04037 白术茯苓汤 …… (574)
04038 白术茯苓汤 …… (574)
04039 白术茯苓汤 …… (574)
04040 白术厚朴汤 …… (574)
04041 白术除湿汤 …… (574)
04042 白术消肿散 …… (575)
04043 白术调中丸 …… (575)
04044 白术黄耆散 …… (575)
04045 白术猪肚粥 …… (575)
04046 白芷升麻汤 …… (575)
04047 白芷胃风汤 …… (575)
04048 白芷暖宫丸 …… (575)
04049 白芷螵蛸丸 …… (575)
04050 白疕一号方 …… (575)
04051 白疕二号方 …… (576)
04052 白虎承气汤 …… (576)
04053 白虎续命汤 …… (576)
04054 白虎葛根汤 …… (576)
04055 白虎解毒汤 …… (576)
04056 白敬宇眼药 …… (576)
04057 白薇薏苡汤 …… (576)
04058 白附子化痰丸 …… (576)
04059 白虎加人参汤 …… (577)
04060 白虎加苍术汤 …… (578)
04061 白虎加栀子汤 …… (578)
04062 白虎加桂枝汤 …… (578)
04063 白虎合解毒汤 …… (578)
04064 白鲜皮七味汤 …… (579)
04065 白术茯苓干姜汤 … (579)
04066 白芷细辛吹鼻散 … (579)
04067 白虎桂枝柴胡汤 … (579)
04068 白通加猪胆汁汤 … (579)
04069 白头翁加甘草阿胶汤 …… (579)
04070 白虎加人参以山药代粳米汤 …… (580)

瓜

04071 瓜子散 …… (580)
04072 瓜子散 …… (580)
04073 瓜石汤 …… (580)
04074 瓜石汤 …… (580)
04075 瓜蒂汤 …… (581)
04076 瓜蒂散 …… (581)
04077 瓜蒂散 …… (581)
04078 瓜蒌丸 …… (582)
04079 瓜蒌丸 …… (582)
04080 瓜蒌丸 …… (582)
04081 瓜蒌汤 …… (582)
04082 瓜蒌汤 …… (582)
04083 瓜蒌散 …… (582)
04084 瓜蒌散 …… (582)
04085 瓜蒌散 …… (582)
04086 瓜蒌散 …… (582)
04087 瓜蒌煎 …… (583)
04088 瓜子仁汁 …… (583)
04089 瓜子眼药 …… (583)
04090 瓜蒌子散 …… (583)
04091 瓜蒌仁汤 …… (583)
04092 瓜蒌实丸 …… (583)
04093 瓜蒌根汤 …… (583)
04094 瓜蒌内托散 …… (583)
04095 瓜蒌必效散 …… (583)
04096 瓜蒌托里散 …… (584)
04097 瓜蒌竹茹汤 …… (584)
04098 瓜蒌枳实汤 …… (584)

用

04099 用效润肠丸 …… (584)

乐

04100 乐令黄耆汤 …… (584)

汉

04101 汉椒散 …… (584)
04102 汉防己丸 …… (584)
04103 汉防己散 …… (584)
04104 汉防己散 …… (584)
04105 汉防己散 …… (585)
04106 汉防己煮散 …… (585)

立

04107 立圣散 …… (585)
04108 立行饮 …… (585)
04109 立安丸 …… (585)
04110 立安丸 …… (585)
04111 立安散 …… (585)
04112 立应丸 …… (585)
04113 立应汤 …… (585)
04114 立应散 …… (586)
04115 立应散 …… (586)
04116 立应膏 …… (586)
04117 立金汤 …… (586)
04118 立胜散 …… (586)
04119 立效丸 …… (586)
04120 立效丹 …… (586)
04121 立效饮 …… (586)
04122 立效饮 …… (586)
04123 立效散 …… (586)
04124 立效散 …… (587)
04125 立效散 …… (587)
04126 立效散 …… (587)
04127 立效散 …… (587)
04128 立效散 …… (587)

04129 立效散 …… (587)
04130 立效散 …… (587)
04131 立效散 …… (587)
04132 立效散 …… (587)
04133 立效散 …… (587)
04134 立效散 …… (587)
04135 立效散 …… (588)
04136 立效散 …… (588)
04137 立效散 …… (588)
04138 立消丸 …… (588)
04139 立消汤 …… (588)
04140 立消汤 …… (588)
04141 立消散 …… (588)
04142 立消散 …… (588)
04143 立消散 …… (588)
04144 立消散 …… (588)
04145 立消膏 …… (588)
04146 立思丹 …… (589)
04147 立效饼子 …… (589)
04148 立马回疔丹 …… (589)
04149 立止吐血膏 …… (589)
04150 立止咳血膏 …… (589)
04151 立应绀珠丹 …… (589)
04152 立命开阳汤 …… (590)
04153 立消疔疮外治神效方 …… (590)

玄

04154 玄及膏 …… (590)
04155 玄妙散 …… (590)
04156 玄明散 …… (590)
04157 玄参丸 …… (590)
04158 玄参丸 …… (590)
04159 玄参丸 …… (590)
04160 玄参散 …… (591)
04161 玄参散 …… (591)
04162 玄参散 …… (591)
04163 玄参散 …… (591)
04164 玄胡丸 …… (591)
04165 玄胡饼 …… (591)
04166 玄胡散 …… (591)
04167 玄胡散 …… (591)
04168 玄桂丸 …… (591)
04169 玄菟丹 …… (592)
04170 玄精丹 …… (592)
04171 玄霜膏 …… (592)
04172 玄明粉散 …… (592)
04173 玄胡索散 …… (592)
04174 玄胡索散 …… (593)
04175 玄胡索散 …… (593)
04176 玄胡索散 …… (593)
04177 玄胡索散 …… (593)
04178 玄胡索散 …… (593)
04179 玄精石散 …… (593)
04180 玄丹麦冬汤 …… (593)
04181 玄麦地黄汤 …… (593)
04182 玄参升麻汤 …… (593)
04183 玄参升麻汤 …… (593)
04184 玄参升麻汤 …… (594)
04185 玄参清肺饮 …… (594)
04186 玄参解毒汤 …… (594)
04187 玄参解毒散 …… (594)
04188 玄胡四物汤 …… (594)
04189 玄胡苦楝汤 …… (594)
04190 玄霜雪梨膏 …… (594)

兰

04191 兰草汤 …… (594)

宁

04192 宁中膏 …… (595)
04193 宁气汤 …… (595)
04194 宁心膏 …… (595)
04195 宁血汤 …… (595)
04196 宁志丸 …… (595)
04197 宁志丸 …… (595)
04198 宁志丸 …… (595)
04199 宁志膏 …… (596)
04200 宁肺汤 …… (596)
04201 宁肺汤 …… (596)
04202 宁肺散 …… (596)
04203 宁沸汤 …… (596)
04204 宁荨丸 …… (596)
04205 宁荨丸 …… (596)
04206 宁胃汤 …… (597)
04207 宁神丹 …… (597)
04208 宁神丹 …… (597)
04209 宁神散 …… (597)
04210 宁静汤 …… (597)
04211 宁嗽汤 …… (597)
04212 宁嗽汤 …… (597)
04213 宁嗽膏 …… (597)
04214 宁心益志丸 …… (597)
04215 宁志化痰汤 …… (598)
04216 宁坤至宝丹 …… (598)
04217 宁神安卧丸 …… (598)
04218 宁嗽化痰丸 …… (598)
04219 宁嗽化痰汤 …… (598)

永

04220 永和公主药澡豆 … (598)

必

04221 必孕汤 …… (598)
04222 必胜丸 …… (598)
04223 必胜散 …… (599)
04224 必胜散 …… (599)
04225 必效散 …… (599)
04226 必效散 …… (599)
04227 必效散 …… (599)
04228 必效散 …… (599)
04229 必效煎 …… (599)
04230 必捷散 …… (599)
04231 必效四物汤 …… (599)

头

04232 头风摩散 …… (600)

半

04233 半贝丸 …… (600)
04234 半瓜丸 …… (600)
04235 半字散 …… (600)
04236 半附汤 …… (600)
04237 半苓汤 …… (600)
04238 半夏丸 …… (600)
04239 半夏丸 …… (600)
04240 半夏丸 …… (600)
04241 半夏丸 …… (600)
04242 半夏丸 …… (600)
04243 半夏丸 …… (601)
04244 半夏丸 …… (601)
04245 半夏汤 …… (601)
04246 半夏汤 …… (601)
04247 半夏汤 …… (601)
04248 半夏汤 …… (602)
04249 半夏汤 …… (602)
04250 半夏汤 …… (602)

04251 半夏汤 …… (602)
04252 半夏汤 …… (602)
04253 半夏汤 …… (602)
04254 半夏汤 …… (602)
04255 半夏汤 …… (602)
04256 半夏汤 …… (603)
04257 半夏汤 …… (603)
04258 半夏汤 …… (603)
04259 半夏汤 …… (603)
04260 半夏汤 …… (603)
04261 半夏汤 …… (603)
04262 半夏汤 …… (603)
04263 半夏饮 …… (603)
04264 半夏饮 …… (603)
04265 半夏散 …… (604)
04266 半夏散 …… (604)
04267 半夏散 …… (604)
04268 半夏散 …… (604)
04269 半夏散 …… (604)
04270 半夏散 …… (604)
04271 半夏散 …… (604)
04272 半夏散 …… (604)
04273 半夏散 …… (604)
04274 半夏散 …… (604)
04275 半夏散 …… (605)
04276 半夏散 …… (605)
04277 半夏散 …… (605)
04278 半夏散 …… (605)
04279 半钱散 …… (605)
04280 半黄丸 …… (605)
04281 半硫丸 …… (605)
04282 半解汤 …… (606)
04283 半枝莲饮 …… (606)
04284 半夏饮子 …… (606)
04285 半夏拔刀 …… (606)
04286 半夏熨方 …… (606)
04287 半附理中汤 …… (606)
04288 半夏干姜散 …… (606)
04289 半夏左经汤 …… (606)
04290 半夏白术丸 …… (606)
04291 半夏曲芽汤 …… (607)
04292 半夏曲芽汤 …… (607)
04293 半夏利膈丸 …… (607)
04294 半夏芩术汤 …… (607)
04295 半夏泻心汤 …… (607)
04296 半夏枳术丸 …… (608)
04297 半夏茯苓汤 …… (608)
04298 半夏茯苓汤 …… (608)
04299 半夏茯苓汤 …… (609)
04300 半夏茯神散 …… (609)
04301 半夏茯神散 …… (609)
04302 半夏厚朴汤 …… (609)
04303 半夏厚朴汤 …… (610)
04304 半夏厚朴汤 …… (610)
04305 半夏神曲汤 …… (610)
04306 半夏栝楼丸 …… (610)
04307 半夏麻黄丸 …… (610)
04308 半夏温肺汤 …… (610)
04309 半夏藿香汤 …… (611)
04310 半温半热汤 …… (611)
04311 半夏千里流水汤 … (611)
04312 半夏白术天麻汤 … (611)
04313 半夏白术天麻汤 … (612)
04314 半夏黄连解毒汤 … (612)

加

04315 加干散 …… (612)
04316 加皮酒 …… (612)
04317 加味二冬汤 …… (612)
04318 加味二陈汤 …… (612)
04319 加味二陈汤 …… (612)
04320 加味二陈汤 …… (612)
04321 加味二陈汤 …… (613)
04322 加味二陈汤 …… (613)
04323 加味二陈汤 …… (613)
04324 加味二陈汤 …… (613)
04325 加味二陈汤 …… (613)
04326 加味二陈汤 …… (613)
04327 加味二陈汤 …… (613)
04328 加味二陈汤 …… (613)
04329 加味二陈汤 …… (614)
04330 加味二陈汤 …… (614)
04331 加味二陈汤 …… (614)
04332 加味二陈汤 …… (614)
04333 加味二陈汤 …… (614)
04334 加味二妙丸 …… (614)
04335 加味二妙汤 …… (614)
04336 加味二妙散 …… (614)
04337 加味二妙散 …… (614)
04338 加味二妙散 …… (614)
04339 加味十全汤 …… (615)
04340 加味七子丸 …… (615)
04341 加味七气汤 …… (615)
04342 加味七气汤 …… (615)
04343 加味七神丸 …… (615)
04344 加味七福饮 …… (615)
04345 加味八仙汤 …… (615)
04346 加味八味丸 …… (615)
04347 加味八珍汤 …… (616)
04348 加味八珍汤 …… (616)
04349 加味八珍汤 …… (616)
04350 加味二生饮 …… (616)
04351 加味三妙丸 …… (616)
04352 加味三黄丸 …… (616)
04353 加味大造汤 …… (616)
04354 加味小胃丹 …… (617)
04355 加味天水散 …… (617)
04356 加味五皮汤 …… (617)
04357 加味五苓散 …… (617)
04358 加味五苓散 …… (617)
04359 加味五积散 …… (617)
04360 加味五淋散 …… (617)
04361 加味五痹汤 …… (617)
04362 加味太一膏 …… (618)
04363 加味化肾汤 …… (618)
04364 加味升麻汤 …… (618)
04365 加味升葛汤 …… (618)
04366 加味乌沉汤 …… (618)
04367 加味乌荆丸 …… (618)
04368 加味丹栀汤 …… (618)
04369 加味六子丸 …… (618)
04370 加味六君汤 …… (619)
04371 加味玉烛散 …… (619)
04372 加味甘桔汤 …… (619)
04373 加味甘桔汤 …… (619)
04374 加味甘桔汤 …… (619)
04375 加味甘露饮 …… (619)
04376 加味左经汤 …… (619)
04377 加味归脾汤 …… (619)
04378 加味四七汤 …… (620)
04379 加味四七汤 …… (620)
04380 加味四斤丸 …… (620)
04381 加味四圣膏 …… (620)
04382 加味四君汤 …… (620)
04383 加味四苓汤 …… (620)

04384 加味四苓散 …… (620)
04385 加味四苓散 …… (620)
04386 加味四物汤 …… (621)
04387 加味四物汤 …… (621)
04388 加味四物汤 …… (621)
04389 加味四物汤 …… (621)
04390 加味四物汤 …… (621)
04391 加味四物汤 …… (621)
04392 加味四物汤 …… (621)
04393 加味四物汤 …… (622)
04394 加味四物汤 …… (622)
04395 加味四物汤 …… (622)
04396 加味四物汤 …… (622)
04397 加味四物汤 …… (622)
04398 加味四物汤 …… (622)
04399 加味四物汤 …… (622)
04400 加味四物汤 …… (622)
04401 加味四物汤 …… (622)
04402 加味四物汤 …… (622)
04403 加味四物汤 …… (622)
04404 加味四物汤 …… (622)
04405 加味四物汤 …… (623)
04406 加味四物汤 …… (623)
04407 加味四逆汤 …… (623)
04408 加味四神丸 …… (623)
04409 加味生化汤 …… (623)
04410 加味生化汤 …… (623)
04411 加味生化汤 …… (623)
04412 加味生脉散 …… (623)
04413 加味白虎汤 …… (623)
04414 加味白虎汤 …… (623)
04415 加味宁志丸 …… (624)
04416 加味地黄丸 …… (624)
04417 加味地黄丸 …… (624)
04418 加味地黄丸 …… (624)
04419 加味地黄汤 …… (624)
04420 加味芎归汤 …… (624)
04421 加味芎归饮 …… (624)
04422 加味芎劳汤 …… (624)
04423 加味百花丸 …… (624)
04424 加味百花膏 …… (625)
04425 加味当归散 …… (625)
04426 加味当归膏 …… (625)
04427 加味竹叶汤 …… (625)
04428 加味竹茹汤 …… (625)
04429 加味交加散 …… (625)
04430 加味羊肝丸 …… (625)
04431 加味导赤汤 …… (626)
04432 加味导痰汤 …… (626)
04433 加味导痰汤 …… (626)
04434 加味阴阳散 …… (626)
04435 加味防风汤 …… (626)
04436 加味如神散 …… (626)
04437 加味妇沉汤 …… (626)
04438 加味麦冬汤 …… (626)
04439 加味寿星丸 …… (626)
04440 加味苍术膏 …… (626)
04441 加味苍柏散 …… (627)
04442 加味扶桑饮 …… (627)
04443 加味连理汤 …… (627)
04444 加味佛手散 …… (627)
04445 加味佛手散 …… (627)
04446 加味辛夷散 …… (627)
04447 加味羌活散 …… (627)
04448 加味补血汤 …… (627)
04449 加味补血汤 …… (627)
04450 加味虎潜丸 …… (628)
04451 加味肾气丸 …… (628)
04452 加味肾热汤 …… (628)
04453 加味败毒散 …… (628)
04454 加味固本丸 …… (628)
04455 加味固阴煎 …… (629)
04456 加味泻白散 …… (629)
04457 加味泻白散 …… (629)
04458 加味泻肝汤 …… (629)
04459 加味泻黄散 …… (629)
04460 加味治中汤 …… (629)
04461 加味定风珠 …… (629)
04462 加味定志丸 …… (629)
04463 加味定志丸 …… (629)
04464 加味定志丸 …… (629)
04465 加味定志丸 …… (629)
04466 加味建中汤 …… (630)
04467 加味参术汤 …… (630)
04468 加味参苏散 …… (630)
04469 加味参附汤 …… (630)
04470 加味枳术丸 …… (630)
04471 加味枳术汤 …… (630)
04472 加味胡麻散 …… (630)
04473 加味茶调散 …… (630)
04474 加味胃苓汤 …… (630)
04475 加味香苏饮 …… (630)
04476 加味香苏散 …… (631)
04477 加味香连丸 …… (631)
04478 加味香附丸 …… (631)
04479 加味香蔻饮 …… (631)
04480 加味修肝散 …… (631)
04481 加味保和丸 …… (631)
04482 加味胜湿汤 …… (631)
04483 加味养荣丸 …… (631)
04484 加味神术汤 …… (632)
04485 加味桂枝汤 …… (632)
04486 加味桔梗汤 …… (632)
04487 加味柴胡汤 …… (632)
04488 加味柴胡汤 …… (632)
04489 加味逍遥散 …… (632)
04490 加味逍遥散 …… (633)
04491 加味逍遥散 …… (633)
04492 加味逍遥散 …… (633)
04493 加味逍遥散 …… (633)
04494 加味铁落饮 …… (633)
04495 加味脏连丸 …… (633)
04496 加味消毒饮 …… (633)
04497 加味益气汤 …… (634)
04498 加味益气汤 …… (634)
04499 加味陷胸汤 …… (634)
04500 加味通心散 …… (634)
04501 加味通心散 …… (634)
04502 加味通圣散 …… (634)
04503 加味理中汤 …… (634)
04504 加味理中汤 …… (634)
04505 加味理中汤 …… (634)
04506 加味理中汤 …… (635)
04507 加味理中汤 …… (635)
04508 加味理建汤 …… (635)
04509 加味黄芩汤 …… (635)
04510 加味黄耆汤 …… (635)
04511 加味控涎丸 …… (635)
04512 加味救肺饮 …… (635)
04513 加味麻仁丸 …… (635)
04514 加味清心饮 …… (635)
04515 加味清胃散 …… (635)
04516 加味清胃散 …… (636)
04517 加味清震汤 …… (636)
04518 加味绿矾丸 …… (636)

04519 加味紫菀汤 …… (636)
04520 加味逍遥汤 …… (636)
04521 加味温胆汤 …… (636)
04522 加味温胆汤 …… (636)
04523 加味滋阴丸 …… (637)
04524 加味滋肾丸 …… (637)
04525 加味槐角丸 …… (637)
04526 加味蜈蚣散 …… (637)
04527 加味解毒汤 …… (637)
04528 加味解毒散 …… (637)
04529 加味滋朱丸 …… (637)
04530 加味藿香散 …… (637)
04531 加剂除湿汤 …… (638)
04532 加减一阴煎 …… (638)
04533 加减八味丸 …… (638)
04534 加减八味丸 …… (639)
04535 加减四物汤 …… (639)
04536 加减四物汤 …… (639)
04537 加减白术散 …… (639)
04538 加减白通汤 …… (639)
04539 加减瓜蒌散 …… (639)
04540 加减地仙丹 …… (639)
04541 加减地芝丸 …… (640)
04542 加减地黄丸 …… (640)
04543 加减辛夷散 …… (640)
04544 加减补筋丸 …… (640)
04545 加减肾气丸 …… (640)
04546 加减固本丸 …… (640)
04547 加减泻心汤 …… (640)
04548 加减泻白散 …… (640)
04549 加减泻黄散 …… (640)
04550 加减茯苓丸 …… (641)
04551 加减胃苓汤 …… (641)
04552 加减思食丸 …… (641)
04553 加减复脉汤 …… (641)
04554 加减洗心散 …… (641)
04555 加减退赤散 …… (642)
04556 加减秦艽汤 …… (642)
04557 加减真武汤 …… (642)
04558 加减逍遥散 …… (643)
04559 加减凉膈散 …… (643)
04560 加减益气汤 …… (643)
04561 加减黄耆汤 …… (643)
04562 加减麻黄汤 …… (643)
04563 加减续命汤 …… (643)
04564 加减续命汤 …… (643)
04565 加减葳蕤汤 …… (644)
04566 加减葛根汤 …… (644)
04567 加减痞气丸 …… (644)
04568 加减温胆汤 …… (644)
04569 加减磁石散 …… (644)
04570 加减镇阴煎 …… (644)
04571 加诃子四柱散 …… (644)
04572 加味大承气汤 …… (644)
04573 加味小建中汤 …… (644)
04574 加味小柴胡汤 …… (645)
04575 加味小柴胡汤 …… (645)
04576 加味小柴胡汤 …… (645)
04577 加味小续命汤 …… (645)
04578 加味六君子汤 …… (645)
04579 加味六君子汤 …… (645)
04580 加味六君子汤 …… (645)
04581 加味玉屏风散 …… (645)
04582 加味四君子汤 …… (645)
04583 加味四君子汤 …… (646)
04584 加味四君子汤 …… (646)
04585 加味白头翁汤 …… (646)
04586 加味地骨皮饮 …… (646)
04587 加味麦门冬汤 …… (646)
04588 加味青州白丸 …… (646)
04589 加脑子收阳粉 …… (646)
04590 加减三五七散 …… (646)
04591 加减大建中汤 …… (646)
04592 加减小续命汤 …… (646)
04593 加减小续命汤 …… (647)
04594 加减木防己汤 …… (647)
04595 加减玉竹饮子 …… (647)
04596 加减四味饮子 …… (647)
04597 加减何首乌散 …… (647)
04598 加减桑螵蛸散 …… (648)
04599 加减黑逍遥散 …… (648)
04600 加味十全大补汤 … (648)
04601 加味三才封髓丹 … (648)
04602 加味三仁葱豉汤 … (648)
04603 加味五子明目丸 … (648)
04604 加味化瘀消坚汤 … (648)
04605 加味六味地黄丸 … (649)
04606 加味甘麦大枣汤 … (649)
04607 加味甘草泻心汤 … (649)
04608 加味龙胆泻肝汤 … (649)
04609 加味四物二陈汤 … (649)
04610 加味当归建中汤 … (649)
04611 加味当归活血汤 … (649)
04612 加味补中益气汤 … (649)
04613 加味补中益气汤 … (649)
04614 加味补养心肾方 … (650)
04615 加味补益养血汤 … (650)
04616 加味附子理中汤 … (650)
04617 加味苓桂术甘汤 … (650)
04618 加味明目流气饮 … (650)
04619 加味育阴润燥饮 … (650)
04620 加味参苓白术散 … (651)
04621 加味种子四物汤 … (651)
04622 加味养血生发汤 … (651)
04623 加味养血凉血汤 … (651)
04624 加味理中地黄汤 … (651)
04625 加味黄耆五物汤 … (651)
04626 加味清肝开窍汤 … (651)
04627 加味葛根芩连汤 … (652)
04628 加味薏子茯苓散 … (652)
04629 加味疏风祛疹汤 … (652)
04630 加味疏风凉血饮 … (652)
04631 加减龙胆泻肝汤 … (652)
04632 加减龙胆泻肝汤 … (652)
04633 加减归芍地黄汤 … (653)
04634 加减当归补血汤 … (653)
04635 加减导赤泻白散 … (653)
04636 加减补阴益气汤 … (653)
04637 加减金匮肾气丸 … (653)
04638 加减金锁固精汤 … (653)
04639 加减散花去癫汤 … (653)
04640 加减普济消毒饮 …… (654)
04641 加减代赭旋覆花汤 …… (654)
04642 加减定血黑消遥散 …… (654)
04643 加味益气养血救脱汤 …… (654)

对

04644 对姜丸 …… (654)

驭

04645 驭中汤 …… (654)

圣

04646 圣力散 …… (654)
04647 圣功丹 …… (654)
04648 圣功散 …… (654)
04649 圣术煎 …… (655)
04650 圣灵丸 …… (655)
04651 圣灵丹 …… (655)
04652 圣灵丹 …… (655)
04653 圣灵丹 …… (655)
04654 圣金丹 …… (655)
04655 圣金散 …… (655)
04656 圣草散 …… (655)
04657 圣饼子 …… (656)
04658 圣饼子 …… (656)
04659 圣饼子 …… (656)
04660 圣神汤 …… (656)
04661 圣效散 …… (656)
04662 圣效散 …… (656)
04663 圣效散 …… (656)
04664 圣散子 …… (656)
04665 圣散子 …… (656)
04666 圣愈汤 …… (657)
04667 圣愈汤 …… (657)
04668 圣僧丸 …… (657)

丝

04669 丝瓜酒 …… (657)
04670 丝瓜散 …… (657)
04671 丝瓜散 …… (657)

皮

04672 皮炎膏 …… (657)
04673 皮枯膏 …… (657)
04674 皮脂散 …… (657)
04675 皮癣水 …… (657)
04676 皮癣汤 …… (658)
04677 皮癣膏 …… (658)

发

04678 发灰丸 …… (658)
04679 发灰散 …… (658)
04680 发灰散 …… (658)
04681 发灰散 …… (658)
04682 发动汤 …… (658)
04683 发声散 …… (658)
04684 发声散 …… (658)
04685 发际散 …… (658)
04686 发蒙丸 …… (658)
04687 发背膏药 …… (658)
04688 发汗麻黄汤 …… (659)

司

04689 司肾丸 …… (659)

母

04690 母鸡汤 …… (659)
04691 母丁香膏 …… (659)
04692 母猪蹄汤 …… (659)

(六 画)

戎

04693 戎盐汤 …… (659)

巩

04694 巩堤丸 …… (659)

地

04695 地丁汤 …… (659)
04696 地丁饮 …… (659)
04697 地丁饮 …… (659)
04698 地丁膏 …… (660)
04699 地六汤 …… (660)
04700 地龙丸 …… (660)
04701 地龙散 …… (660)
04702 地龙散 …… (660)
04703 地龙散 …… (660)
04704 地龙散 …… (660)
04705 地龙散 …… (660)
04706 地龙膏 …… (660)
04707 地仙丹 …… (660)
04708 地仙丹 …… (660)
04709 地仙散 …… (661)
04710 地芝丸 …… (661)
04711 地芝丸 …… (661)
04712 地血散 …… (661)
04713 地肤丸 …… (661)
04714 地肤饮 …… (661)
04715 地骨散 …… (661)
04716 地黄丸 …… (661)
04717 地黄丸 …… (662)
04718 地黄丸 …… (662)
04719 地黄丸 …… (664)
04720 地黄丸 …… (664)
04721 地黄丸 …… (664)
04722 地黄丸 …… (664)
04723 地黄丸 …… (664)
04724 地黄丸 …… (665)
04725 地黄丸 …… (665)
04726 地黄丸 …… (665)
04727 地黄丸 …… (665)
04728 地黄丸 …… (665)
04729 地黄丸 …… (665)
04730 地黄丸 …… (665)
04731 地黄丸 …… (666)
04732 地黄丸 …… (666)
04733 地黄汤 …… (666)
04734 地黄汤 …… (666)
04735 地黄汤 …… (666)
04736 地黄汤 …… (666)
04737 地黄汤 …… (666)
04738 地黄汤 …… (666)
04739 地黄汤 …… (666)
04740 地黄汤 …… (666)
04741 地黄汤 …… (666)
04742 地黄汤 …… (667)
04743 地黄汤 …… (667)
04744 地黄汤 …… (667)
04745 地黄汤 …… (667)
04746 地黄饮 …… (667)
04747 地黄饮 …… (668)
04748 地黄饮 …… (668)
04749 地黄饮 …… (668)
04750 地黄酒 …… (668)
04751 地黄酒 …… (668)
04752 地黄酒 …… (668)
04753 地黄酒 …… (668)
04754 地黄散 …… (668)
04755 地黄散 …… (669)
04756 地黄散 …… (669)
04757 地黄散 …… (669)
04758 地黄散 …… (669)
04759 地黄散 …… (669)
04760 地黄散 …… (669)
04761 地黄散 …… (669)
04762 地黄散 …… (669)
04763 地黄散 …… (669)

04764 地黄散 …… (669)
04765 地黄散 …… (670)
04766 地黄散 …… (670)
04767 地黄散 …… (670)
04768 地黄散 …… (670)
04769 地黄散 …… (670)
04770 地黄粥 …… (670)
04771 地黄粥 …… (670)
04772 地黄煎 …… (670)
04773 地黄煎 …… (670)
04774 地黄煎 …… (671)
04775 地黄煎 …… (671)
04776 地黄煎 …… (671)
04777 地黄煎 …… (671)
04778 地黄煎 …… (671)
04779 地黄煎 …… (671)
04780 地黄膏 …… (671)
04781 地黄膏 …… (671)
04782 地黄膏 …… (672)
04783 地黄膏 …… (672)
04784 地黄膏 …… (672)
04785 地黄膏 …… (672)
04786 地黄醴 …… (672)
04787 地榆丸 …… (672)
04788 地榆丸 …… (672)
04789 地榆水 …… (672)
04790 地榆汤 …… (672)
04791 地榆汤 …… (673)
04792 地榆饮 …… (673)
04793 地榆散 …… (673)
04794 地榆散 …… (673)
04795 地榆散 …… (673)
04796 地榆散 …… (673)
04797 地榆膏 …… (673)
04798 地髓汤 …… (673)
04799 地龙饼子 …… (673)
04800 地龙浸液 …… (674)
04801 地肤子丸 …… (674)
04802 地肤子汤 …… (674)
04803 地肤子汤 …… (674)
04804 地骨皮丸 …… (674)
04805 地骨皮丸 …… (674)
04806 地骨皮汤 …… (674)
04807 地骨皮汤 …… (674)
04808 地骨皮汤 …… (674)
04809 地骨皮汤 …… (674)
04810 地骨皮汤 …… (674)
04811 地骨皮汤 …… (675)
04812 地骨皮汤 …… (675)
04813 地骨皮饮 …… (675)
04814 地骨皮饮 …… (675)
04815 地骨皮散 …… (675)
04816 地骨皮散 …… (675)
04817 地骨皮散 …… (675)
04818 地骨皮散 …… (675)
04819 地骨皮散 …… (675)
04820 地骨皮散 …… (675)
04821 地骨皮散 …… (675)
04822 地骨皮散 …… (676)
04823 地骨皮散 …… (676)
04824 地骨皮散 …… (676)
04825 地骨皮露 …… (676)
04826 地黄饮子 …… (676)
04827 地黄饮子 …… (676)
04828 地黄饮子 …… (676)
04829 地黄饮子 …… (676)
04830 地黄煎丸 …… (677)
04831 地黄煎丸 …… (677)
04832 地黄煎丸 …… (677)
04833 地榆合剂 …… (677)
04834 地榆油膏 …… (677)
04835 地肤大黄汤 …… (677)
04836 地肤子洗剂 …… (678)
04837 地肤子煎剂 …… (678)
04838 地骨皮饮子 …… (678)
04839 地黄大补丸 …… (678)
04840 地黄门冬酒 …… (678)
04841 地黄竹茹汤 …… (678)
04842 地黄余粮汤 …… (678)
04843 地黄青娥汤 …… (678)
04844 地黄紫苏煎 …… (678)
04845 地榆芍药汤 …… (678)
04846 地榆防风散 …… (679)
04847 地榆败毒散 …… (679)
04848 地榆槐角丸 …… (679)
04849 地黄龙牡榴梅散 … (679)

朽

04850 朽木汤 …… (679)

朴

04851 朴附丸 …… (679)
04852 朴附丸 …… (679)
04853 朴附丸 …… (679)
04854 朴栀散 …… (679)
04855 朴消散 …… (680)
04856 朴消散 …… (680)
04857 朴消散 …… (680)
04858 朴消散 …… (680)
04859 朴消散 …… (680)
04860 朴麝散 …… (680)
04861 朴附二陈汤 …… (680)
04862 朴果四皮饮 …… (680)
04863 朴实六合汤 …… (680)
04864 朴消荡胞汤 …… (680)

芋

04865 芋粥 …… (681)

芍

04866 芍甘汤 …… (681)
04867 芍药丸 …… (681)
04868 芍药丸 …… (681)
04869 芍药丸 …… (681)
04870 芍药汤 …… (681)
04871 芍药汤 …… (681)
04872 芍药汤 …… (681)
04873 芍药汤 …… (681)
04874 芍药汤 …… (682)
04875 芍药汤 …… (682)
04876 芍药汤 …… (682)
04877 芍药汤 …… (682)
04878 芍药汤 …… (682)
04879 芍药汤 …… (682)
04880 芍药汤 …… (682)
04881 芍药汤 …… (682)
04882 芍药汤 …… (683)
04883 芍药汤 …… (683)
04884 芍药汤 …… (683)
04885 芍药汤 …… (684)
04886 芍药汤 …… (684)
04887 芍药散 …… (684)
04888 芍药散 …… (684)
04889 芍药散 …… (684)

04890 芍药散 …… (684)
04891 芍药散 …… (684)
04892 芍药散 …… (684)
04893 芍药散 …… (684)
04894 芍药干姜汤 …… (684)
04895 芍药木香汤 …… (684)
04896 芍药六合汤 …… (685)
04897 芍药甘草汤 …… (685)
04898 芍药甘草汤 …… (685)
04899 芍药地黄汤 …… (686)
04900 芍药地榆汤 …… (687)
04901 芍药补气汤 …… (687)
04902 芍药知母汤 …… (687)
04903 芍药枳术丸 …… (687)
04904 芍药柏皮丸 …… (687)
04905 芍药柏皮丸 …… (687)
04906 芍药栀豉汤 …… (687)
04907 芍药润燥丹 …… (687)
04908 芍药黄连汤 …… (687)
04909 芍药黄耆汤 …… (687)
04910 芍药黄耆汤 …… (687)
04911 芍药黄耆汤 …… (688)
04912 芍药清肝散 …… (688)
04913 芍药蒺藜煎 …… (688)
04914 芍药甘草附子汤 … (688)
04915 芍药四物解肌汤 … (688)
04916 芍药芩连葛根汤 … (688)
04917 芍药枣仁柴胡汤 … (688)

芒

04918 芒消散 …… (688)

芎

04919 芎乌散 …… (689)
04920 芎术丹 …… (689)
04921 芎术汤 …… (689)
04922 芎术散 …… (689)
04923 芎归丸 …… (689)
04924 芎归汤 …… (689)
04925 芎归汤 …… (689)
04926 芎归汤 …… (689)
04927 芎归饮 …… (689)
04928 芎归散 …… (690)
04929 芎仙丸 …… (690)
04930 芎皮散 …… (690)
04931 芎芷散 …… (690)
04932 芎芷散 …… (690)
04933 芎芷散 …… (690)
04934 芎苏饮 …… (690)
04935 芎苏散 …… (690)
04936 芎苏散 …… (691)
04937 芎连散 …… (691)
04938 芎辛丸 …… (691)
04939 芎辛汤 …… (691)
04940 芎辛汤 …… (691)
04941 芎辛汤 …… (691)
04942 芎辛散 …… (692)
04943 芎羌散 …… (692)
04944 芎附饮 …… (692)
04945 芎附散 …… (692)
04946 芎附散 …… (693)
04947 芎荆散 …… (693)
04948 芎活散 …… (693)
04949 芎桂散 …… (693)
04950 芎蒡丸 …… (693)
04951 芎蒡丸 …… (693)
04952 芎蒡汤 …… (693)
04953 芎蒡汤 …… (693)
04954 芎蒡汤 …… (693)
04955 芎蒡汤 …… (694)
04956 芎蒡汤 …… (694)
04957 芎蒡汤 …… (694)
04958 芎蒡汤 …… (694)
04959 芎蒡汤 …… (694)
04960 芎蒡汤 …… (694)
04961 芎蒡饮 …… (694)
04962 芎蒡酒 …… (694)
04963 芎蒡散 …… (695)
04964 芎蒡散 …… (695)
04965 芎蒡散 …… (695)
04966 芎蒡散 …… (695)
04967 芎蒡膏 …… (695)
04968 芎蒡膏 …… (695)
04969 芎黄汤 …… (695)
04970 芎黄散 …… (695)
04971 芎麻汤 …… (695)
04972 芎葛汤 …… (695)
04973 芎犀丸 …… (696)
04974 芎术香苏散 …… (696)
04975 芎归二陈汤 …… (696)
04976 芎归白草饮 …… (696)
04977 芎归安心汤 …… (696)
04978 芎归补中汤 …… (696)
04979 芎归补血汤 …… (696)
04980 芎归明目丸 …… (697)
04981 芎归养荣汤 …… (697)
04982 芎归养荣汤 …… (697)
04983 芎归养荣汤 …… (697)
04984 芎归桂朴汤 …… (697)
04985 芎归胶艾汤 …… (697)
04986 芎归益母丸 …… (697)
04987 芎归疏肝汤 …… (698)
04988 芎当泻心汤 …… (698)
04989 芎芷石膏汤 …… (698)
04990 芎芷香苏散 …… (698)
04991 芎芷香苏散 …… (698)
04992 芎辛导痰汤 …… (698)
04993 芎辛菊花散 …… (698)
04994 芎蒡天麻丸 …… (698)
04995 芎蒡补中汤 …… (698)
04996 芎蒡补血汤 …… (699)
04997 芎归六君子汤 …… (699)
04998 芎术姜桂二陈汤 … (699)
04999 芎蒡当归加芍药
汤 …… (699)

吉

05000 吉利散 …… (699)
05001 吉祥丸 …… (699)

老

05002 老龙丸 …… (699)
05003 老军散 …… (699)
05004 老疟丸 …… (700)
05005 老疟饮 …… (700)
05006 老痰丸 …… (700)
05007 老膜散 …… (700)
05008 老柏皮散 …… (700)
05009 老鹳草膏 …… (700)
05010 老年白带方 …… (700)
05011 老君益寿散 …… (700)

西

05012 西瓜霜 …… (700)
05013 西瓜霜 …… (701)

05014 西清汤 …… (701)
05015 西洋参酒 …… (701)
05016 西州续命汤 …… (701)
05017 西州续命汤 …… (701)
05018 西州续命汤 …… (701)
05019 西洋十宝散 …… (701)
05020 西黄化毒丹 …… (702)
05021 西黄化毒丹 …… (702)
05022 西王母四童散 …… (702)
05023 西川石刻安肾丸 … (702)
05024 西川罗赤脚仙还少丹 …… (702)

再

05025 再生丹 …… (702)
05026 再生散 …… (702)
05027 再造丸 …… (702)
05028 再造丸 …… (703)
05029 再造丹 …… (703)
05030 再造散 …… (703)
05031 再造至宝丹 …… (704)

耳

05032 耳疖散 …… (704)
05033 耳底油 …… (704)
05034 耳炎散 …… (704)
05035 耳脓散 …… (704)
05036 耳疳散 …… (704)
05037 耳脓独龙丹 …… (704)
05038 耳聋左慈丸 …… (704)
05039 耳聋烧肾散 …… (704)
05040 耳聋开窍神效丹 … (705)

夺

05041 夺天丹 …… (705)
05042 夺命丹 …… (705)
05043 夺命丹 …… (705)
05044 夺命丹 …… (705)
05045 夺命丹 …… (705)
05046 夺命丹 …… (705)
05047 夺命丹 …… (705)
05048 夺命丹 …… (706)
05049 夺命丹 …… (706)
05050 夺命丹 …… (706)
05051 夺命丹 …… (706)
05052 夺命汤 …… (706)
05053 夺命汤 …… (706)
05054 夺命散 …… (706)
05055 夺命散 …… (706)
05056 夺命散 …… (707)
05057 夺命散 …… (707)
05058 夺命散 …… (707)
05059 夺真丹 …… (707)
05060 夺命方丹 …… (707)
05061 夺命回生散 …… (707)
05062 夺命抽刀散 …… (707)
05063 夺命神蛇散 …… (707)

压

05064 压惊丸 …… (707)
05065 压掌散 …… (708)
05066 压热神白膏 …… (708)

厌

05067 厌生方 …… (708)

灰

05068 灰米膏 …… (708)
05069 灰浆膏 …… (708)

存

05070 存阴汤 …… (708)
05071 存命汤 …… (708)
05072 存注丹 …… (708)

达

05073 达生散 …… (708)
05074 达生散 …… (709)
05075 达郁汤 …… (709)
05076 达郁汤 …… (709)
05077 达原饮 …… (709)

百

05078 百二散 …… (709)
05079 百中散 …… (710)
05080 百合丸 …… (710)
05081 百合丹 …… (710)
05082 百合汤 …… (710)
05083 百合汤 …… (710)
05084 百合汤 …… (710)
05085 百合汤 …… (710)
05086 百合散 …… (710)
05087 百合散 …… (710)
05088 百合散 …… (710)
05089 百合散 …… (711)
05090 百合煎 …… (711)
05091 百花丸 …… (711)
05092 百劳丸 …… (711)
05093 百劳散 …… (711)
05094 百劳散 …… (711)
05095 百补汤 …… (711)
05096 百灵汤 …… (711)
05097 百枝膏 …… (711)
05098 百杯丸 …… (712)
05099 百沸汤 …… (712)
05100 百草膏 …… (712)
05101 百点膏 …… (712)
05102 百顺丸 …… (712)
05103 百部丸 …… (712)
05104 百部丸 …… (712)
05105 百部汤 …… (712)
05106 百部汤 …… (712)
05107 百部酒 …… (713)
05108 百部散 …… (713)
05109 百部散 …… (713)
05110 百部膏 …… (713)
05111 百粉丸 …… (713)
05112 百粒丸 …… (713)
05113 百解散 …… (713)
05114 百发神针 …… (713)
05115 百合饮子 …… (713)
05116 百合洗方 …… (714)
05117 百草霜方 …… (714)
05118 百部洗方 …… (714)
05119 百部根汤 …… (714)
05120 百子建中丸 …… (714)
05121 百合二母汤 …… (714)
05122 百合地黄汤 …… (714)
05123 百合鸡子汤 …… (715)
05124 百合茅根汤 …… (715)
05125 百合固金汤 …… (715)
05126 百合知母汤 …… (716)
05127 百合滑石散 …… (716)
05128 百补构精丸 …… (716)
05129 百部紫菀丸 …… (716)
05130 百合桔梗鸡子汤 … (716)

05131 百草血余棕灰散 …… (716)

夹

05132 夹纸膏 …… (716)
05133 夹纸膏 …… (716)
05134 夹纸膏 …… (716)
05135 夹纸膏 …… (717)
05136 夹纸膏 …… (717)

托

05137 托里散 …… (717)
05138 托里散 …… (717)
05139 托里散 …… (717)
05140 托里散 …… (717)
05141 托里散 …… (717)
05142 托胎丸 …… (717)
05143 托里内补散 …… (718)
05144 托里内补散 …… (718)
05145 托里当归汤 …… (718)
05146 托里败毒散 …… (718)
05147 托里定痛散 …… (718)
05148 托里建中汤 …… (718)
05149 托里茯苓汤 …… (718)
05150 托里养荣汤 …… (718)
05151 托里举斑汤 …… (718)
05152 托里透脓汤 …… (719)
05153 托里消毒散 …… (719)
05154 托里消毒散 …… (719)
05155 托里消毒散 …… (719)
05156 托里益中汤 …… (719)
05157 托里益气汤 …… (719)
05158 托里黄耆汤 …… (719)
05159 托里黄耆汤 …… (719)
05160 托里清中汤 …… (719)
05161 托里越鞠汤 …… (720)
05162 托里温中汤 …… (720)
05163 托里温中汤 …… (720)
05164 托里温经汤 …… (720)

扫

05165 扫风丸 …… (720)
05166 扫虫煎 …… (720)
05167 扫疥散 …… (721)
05168 扫雪散 …… (721)
05169 扫云开光散 …… (721)

过

05170 过气丸 …… (721)
05171 过期饮 …… (721)
05172 过街笑 …… (721)

至

05173 至仁丹 …… (721)
05174 至圣丹 …… (721)
05175 至圣散 …… (722)
05176 至圣膏 …… (722)
05177 至灵散 …… (722)
05178 至明膏 …… (722)
05179 至宝丹 …… (722)
05180 至宝丹 …… (723)
05181 至宝丹 …… (723)
05182 至宝丹 …… (723)
05183 至真散 …… (723)
05184 至圣来复丹 …… (723)
05185 至圣保命丹 …… (724)
05186 至效独乌膏 …… (724)

夷

05187 夷则丸 …… (724)

贞

05188 贞元饮 …… (724)

当

05189 当归丸 …… (724)
05190 当归丸 …… (724)
05191 当归丸 …… (724)
05192 当归丸 …… (724)
05193 当归丸 …… (724)
05194 当归丸 …… (725)
05195 当归丸 …… (725)
05196 当归丸 …… (725)
05197 当归汤 …… (725)
05198 当归汤 …… (725)
05199 当归汤 …… (725)
05200 当归汤 …… (725)
05201 当归汤 …… (725)
05202 当归汤 …… (725)
05203 当归汤 …… (725)
05204 当归汤 …… (726)
05205 当归汤 …… (726)
05206 当归汤 …… (726)
05207 当归饮 …… (726)
05208 当归饮 …… (726)
05209 当归饮 …… (726)
05210 当归饮 …… (726)
05211 当归饮 …… (726)
05212 当归饮 …… (726)
05213 当归饮 …… (727)
05214 当归饮 …… (727)
05215 当归饮 …… (727)
05216 当归饮 …… (727)
05217 当归散 …… (727)
05218 当归散 …… (727)
05219 当归散 …… (727)
05220 当归散 …… (728)
05221 当归散 …… (728)
05222 当归散 …… (728)
05223 当归散 …… (728)
05224 当归散 …… (728)
05225 当归散 …… (728)
05226 当归散 …… (728)
05227 当归散 …… (728)
05228 当归散 …… (729)
05229 当归散 …… (729)
05230 当归散 …… (729)
05231 当归散 …… (729)
05232 当归散 …… (729)
05233 当归散 …… (729)
05234 当归散 …… (729)
05235 当归散 …… (729)
05236 当归散 …… (729)
05237 当归散 …… (730)
05238 当归散 …… (730)
05239 当归散 …… (730)
05240 当归散 …… (730)
05241 当归散 …… (730)
05242 当归煎 …… (730)
05243 当归膏 …… (730)
05244 当归膏 …… (730)
05245 当归膏 …… (730)
05246 当归饮子 …… (731)
05247 当归饮子 …… (731)
05248 当归须散 …… (731)
05249 当归三黄汤 …… (731)

05250 当归干姜汤 …… (731)
05251 当归川芎散 …… (731)
05252 当归川芎散 …… (731)
05253 当归元参饮 …… (731)
05254 当归木香汤 …… (731)
05255 当归止血汤 …… (732)
05256 当归化毒汤 …… (732)
05257 当归六黄汤 …… (732)
05258 当归龙荟丸 …… (732)
05259 当归龙荟丸 …… (732)
05260 当归龙荟丸 …… (732)
05261 当归龙骨丸 …… (732)
05262 当归龙胆汤 …… (733)
05263 当归四逆汤 …… (733)
05264 当归四逆汤 …… (733)
05265 当归白术汤 …… (733)
05266 当归立效散 …… (734)
05267 当归地黄丸 …… (734)
05268 当归地黄饮 …… (734)
05269 当归芍药汤 …… (734)
05270 当归芍药汤 …… (734)
05271 当归芍药汤 …… (734)
05272 当归芍药汤 …… (734)
05273 当归芍药散 …… (734)
05274 当归羊肉汤 …… (735)
05275 当归羊肉汤 …… (735)
05276 当归导滞汤 …… (735)
05277 当归导滞散 …… (735)
05278 当归连翘汤 …… (736)
05279 当归连翘饮 …… (736)
05280 当归补血汤 …… (736)
05281 当归补血汤 …… (736)
05282 当归补血汤 …… (737)
05283 当归补血汤 …… (737)
05284 当归补血汤 …… (737)
05285 当归补血汤 …… (737)
05286 当归补血汤 …… (737)
05287 当归阿胶汤 …… (737)
05288 当归附子汤 …… (737)
05289 当归拈痛汤 …… (737)
05290 当归和血散 …… (738)
05291 当归泽兰丸 …… (738)
05292 当归泽兰汤 …… (738)
05293 当归承气汤 …… (738)
05294 当归承气汤 …… (738)
05295 当归厚朴汤 …… (738)
05296 当归活血丸 …… (738)
05297 当归活血汤 …… (738)
05298 当归活血汤 …… (739)
05299 当归活血汤 …… (739)
05300 当归活血汤 …… (739)
05301 当归活血汤 …… (739)
05302 当归活血饮 …… (739)
05303 当归活血散 …… (739)
05304 当归活血散 …… (739)
05305 当归养血丸 …… (739)
05306 当归养血汤 …… (740)
05307 当归养荣汤 …… (740)
05308 当归桂枝汤 …… (740)
05309 当归桃仁汤 …… (740)
05310 当归润燥汤 …… (740)
05311 当归润燥汤 …… (740)
05312 当归润燥汤 …… (740)
05313 当归黄耆饮 …… (740)
05314 当归温疟汤 …… (740)
05315 当归蒲延散 …… (741)
05316 当归郁李仁汤 …… (741)
05317 当归贝母苦参丸 … (741)
05318 当归生姜羊肉汤 … (741)
05319 当归保命承气汤 … (742)
05320 当归补血加葱白汤 …… (742)
05321 当归四逆加吴茱萸生姜汤 …… (742)

光

05322 光明丸 …… (744)
05323 光明丹 …… (744)
05324 光明散 …… (744)
05325 光明散 …… (744)
05326 光明散 …… (744)
05327 光明眼药 …… (744)
05328 光明夜灵散 …… (744)
05329 光明洗眼方 …… (744)

吐

05330 吐血丹 …… (744)
05331 吐血散 …… (745)
05332 吐血神效方 …… (745)

吃

05333 吃力伽丸 …… (745)

吕

05334 吕祖奇灵膏 …… (746)
05335 吕祖发背灵宝膏 … (746)
05336 吕祖紫金夺命膏 … (746)
05337 吕洞宾仙传化毒汤 …… (747)
05338 吕洞宾仙传芦吸散 …… (747)

吊

05339 吊肾丸 …… (747)

同

05340 同气散 …… (747)
05341 同春丸 …… (747)

团

05342 团鱼丸 …… (747)
05343 团参丸 …… (747)
05344 团参汤 …… (747)
05345 团参散 …… (747)
05346 团参散 …… (748)
05347 团参饮子 …… (748)
05348 团参黄耆散 …… (748)

回

05349 回元汤 …… (748)
05350 回令丸 …… (748)
05351 回生丹 …… (748)
05352 回生酒 …… (748)
05353 回生散 …… (748)
05354 回生膏 …… (749)
05355 回阳丹 …… (749)
05356 回阳丹 …… (749)
05357 回阳汤 …… (749)
05358 回阳汤 …… (749)
05359 回阳汤 …… (749)
05360 回阳散 …… (749)
05361 回阳散 …… (749)
05362 回阳膏 …… (749)
05363 回乳汤 …… (750)
05364 回春丸 …… (750)
05365 回春丹 …… (750)
05366 回春散 …… (750)

05367 回首散 …… (750)
05368 回稍散 …… (750)
05369 回燕膏 …… (750)
05370 回声饮子 …… (750)
05371 回疮锭子 …… (750)
05372 回天大补膏 …… (751)
05373 回生续命丹 …… (751)
05374 回阳三建汤 …… (751)
05375 回阳升陷汤 …… (751)
05376 回阳玉龙膏 …… (752)
05377 回阳生肌散 …… (752)
05378 回阳返本汤 …… (752)
05379 回阳固精丸 …… (752)
05380 回阳救急汤 …… (753)
05381 回乳四物汤 …… (753)
05382 回阳生肌药捻 …… (753)
05383 回疮金银花汤 …… (753)
05384 回生保命玉咽丹 … (753)

曲

05385 曲术丸 …… (754)
05386 曲术丸 …… (754)
05387 曲术丸 …… (754)
05388 曲术散 …… (754)
05389 曲直汤 …… (754)
05390 曲麦二陈汤 …… (754)
05391 曲芽枳术丸 …… (754)
05392 曲麦山楂地骨知母汤 …… (754)

虫

05393 虫心痛汤 …… (754)

肉

05394 肉果饮 …… (754)
05395 肉桂丸 …… (755)
05396 肉桂散 …… (755)
05397 肉桂散 …… (755)
05398 肉桂膏 …… (755)
05399 肉豆蔻丸 …… (755)
05400 肉豆蔻丸 …… (755)
05401 肉豆蔻丸 …… (755)
05402 肉豆蔻丸 …… (755)
05403 肉豆蔻丸 …… (756)
05404 肉豆蔻丸 …… (756)
05405 肉豆蔻丸 …… (756)
05406 肉豆蔻饮 …… (756)
05407 肉豆蔻散 …… (756)
05408 肉豆蔻散 …… (756)
05409 肉苁蓉丸 …… (756)
05410 肉苁蓉丸 …… (756)
05411 肉苁蓉丸 …… (757)
05412 肉苁蓉丸 …… (757)
05413 肉苁蓉丸 …… (757)
05414 肉苁蓉丸 …… (757)
05415 肉苁蓉丸 …… (757)
05416 肉苁蓉丸 …… (757)
05417 肉苁蓉丸 …… (757)
05418 肉苁蓉汤 …… (758)
05419 肉苁蓉散 …… (758)
05420 肉苁蓉散 …… (758)
05421 肉苁蓉散 …… (758)
05422 肉苁蓉粥 …… (758)
05423 肉果理中汤 …… (758)

竹

05424 竹叶汤 …… (758)
05425 竹叶汤 …… (759)
05426 竹叶汤 …… (759)
05427 竹叶汤 …… (759)
05428 竹叶汤 …… (759)
05429 竹叶汤 …… (759)
05430 竹叶汤 …… (759)
05431 竹叶汤 …… (759)
05432 竹叶汤 …… (759)
05433 竹叶汤 …… (760)
05434 竹叶汤 …… (760)
05435 竹叶汤 …… (760)
05436 竹叶汤 …… (760)
05437 竹叶粥 …… (760)
05438 竹皮汤 …… (760)
05439 竹皮汤 …… (760)
05440 竹沥汤 …… (760)
05441 竹沥汤 …… (760)
05442 竹沥汤 …… (761)
05443 竹沥汤 …… (761)
05444 竹沥汤 …… (761)
05445 竹沥饮 …… (761)
05446 竹沥饮 …… (761)
05447 竹沥粥 …… (761)
05448 竹沥膏 …… (762)
05449 竹茹汤 …… (762)
05450 竹茹汤 …… (762)
05451 竹茹汤 …… (762)
05452 竹茹汤 …… (762)
05453 竹茹汤 …… (762)
05454 竹茹汤 …… (762)
05455 竹茹汤 …… (763)
05456 竹茹汤 …… (763)
05457 竹茹汤 …… (763)
05458 竹茹饮 …… (763)
05459 竹茹散 …… (763)
05460 竹茹散 …… (763)
05461 竹叶饮子 …… (763)
05462 竹皮大丸 …… (763)
05463 竹沥饮子 …… (764)
05464 竹茹饮子 …… (764)
05465 竹茹饮子 …… (764)
05466 竹茹饮子 …… (764)
05467 竹叶石膏汤 …… (764)
05468 竹叶石膏汤 …… (766)
05469 竹叶石膏汤 …… (766)
05470 竹叶石膏汤 …… (766)
05471 竹叶石膏汤 …… (766)
05472 竹叶归耆汤 …… (766)
05473 竹叶泻经汤 …… (766)
05474 竹叶黄耆汤 …… (766)
05475 竹叶黄耆汤 …… (767)
05476 竹叶常山汤 …… (767)
05477 竹叶清心汤 …… (767)
05478 竹皮逍遥散 …… (767)
05479 竹沥二陈汤 …… (767)
05480 竹沥石膏汤 …… (767)
05481 竹沥四物汤 …… (767)
05482 竹沥达痰丸 …… (767)
05483 竹沥达痰丸 …… (768)
05484 竹沥枳术丸 …… (768)
05485 竹沥涤痰汤 …… (768)
05486 竹茹二陈汤 …… (768)
05487 竹茹地黄汤 …… (769)
05488 竹茹温胆汤 …… (769)
05489 竹茹麦门冬汤 …… (769)

舌

05490 舌化丹 …… (769)
05491 舌恬散 …… (769)

先

05492 先期丸 …… (769)
05493 先期汤 …… (769)
05494 先天大造丸 …… (769)
05495 先天大造丸 …… (769)
05496 先天归一汤 …… (770)
05497 先天青龙散 …… (770)

年

05498 年大将军洗痛方 … (770)

朱

05499 朱沉煎 …… (770)
05500 朱附丸 …… (770)
05501 朱附丸 …… (771)
05502 朱珀散 …… (771)
05503 朱砂丸 …… (771)
05504 朱砂丸 …… (771)
05505 朱砂丸 …… (771)
05506 朱砂丸 …… (771)
05507 朱砂散 …… (771)
05508 朱砂散 …… (771)
05509 朱砂散 …… (771)
05510 朱砂煎 …… (771)
05511 朱砂煎 …… (771)
05512 朱砂膏 …… (772)
05513 朱砂膏 …… (772)
05514 朱雀丸 …… (772)
05515 朱雀汤 …… (772)
05516 朱麝丹 …… (772)
05517 朱砂安神丸 …… (772)
05518 朱砂安神丸 …… (773)
05519 朱砂安神丸 …… (773)
05520 朱砂红丸子 …… (773)
05521 朱砂凉膈丸 …… (773)
05522 朱砂凉膈丸 …… (773)
05523 朱砂黄连丸 …… (773)
05524 朱砂鹿茸丸 …… (774)
05525 朱砂滚涎丸 …… (774)
05526 朱砂滚痰丸 …… (774)
05527 朱僧热麝方 …… (774)
05528 朱砂金银饰物汤 … (774)

休

05529 休疟饮 …… (774)

伏

05530 伏虎丹 …… (774)
05531 伏梁丸 …… (774)
05532 伏龙肝汤 …… (775)
05533 伏龙肝汤 …… (775)
05534 伏龙肝汤 …… (775)
05535 伏龙肝汤 …… (775)
05536 伏龙肝饮 …… (775)
05537 伏龙肝散 …… (775)
05538 伏龙肝散 …… (775)
05539 伏龙肝散 …… (775)
05540 伏龙肝散 …… (775)
05541 伏龙肝散 …… (776)

伐

05542 伐木丸 …… (776)
05543 伐毛丹 …… (776)

任

05544 任督两滋汤 …… (776)

伤

05545 伤心汤 …… (776)
05546 伤药膏 …… (776)
05547 伤筋药水 …… (776)
05548 伤后清脑汤 …… (776)
05549 伤科十宝丹 …… (777)
05550 伤湿止痛膏 …… (777)
05551 伤湿止痛膏 …… (777)
05552 伤科回生第一仙丹 …… (777)

华

05553 华佗散 …… (778)
05554 华盖散 …… (778)
05555 华盖散 …… (778)
05556 华盖散 …… (778)
05557 华盖散 …… (778)
05558 华盖散 …… (778)
05559 华盖煮散 …… (778)
05560 华佗累效散 …… (778)
05561 华佗救脱阳方 …… (778)

延

05562 延年丸 …… (779)
05563 延寿丸 …… (779)
05564 延寿丹 …… (779)
05565 延寿丹 …… (779)
05566 延寿丹 …… (779)
05567 延寿丹 …… (779)
05568 延寿丹 …… (780)
05569 延寿丹 …… (780)
05570 延附汤 …… (780)
05571 延胡散 …… (780)
05572 延息汤 …… (780)
05573 延龄丹 …… (780)
05574 延胡索丸 …… (781)
05575 延胡索汤 …… (781)
05576 延胡索汤 …… (781)
05577 延胡索散 …… (781)
05578 延胡索散 …… (781)
05579 延胡索散 …… (781)
05580 延胡索散 …… (781)
05581 延胡索散 …… (781)
05582 延胡索散 …… (782)
05583 延年益嗣丹 …… (782)
05584 延年断汗汤 …… (782)
05585 延寿获嗣酒 …… (782)
05586 延胡丁香丸 …… (782)
05587 延龄广嗣丸 …… (782)
05588 延龄护宝丸 …… (782)
05589 延龄固本丹 …… (782)
05590 延龄育子丸 …… (783)
05591 延龄育子方 …… (783)
05592 延龄益寿丹 …… (784)
05593 延龄广嗣仙方 …… (784)
05594 延年益寿不老丹 … (784)

自

05595 自汗汤 …… (784)
05596 自然铜散 …… (784)
05597 自然铜散 …… (785)
05598 自然铜膏 …… (785)
05599 自拟降压汤 …… (785)
05600 自制经验大枣汤 … (785)

血

05601 血余丸 …… (785)
05602 血余散 …… (785)
05603 血余散 …… (785)

05604 血余散 …… (785)
05605 血余散 …… (785)
05606 血余散 …… (785)
05607 血余散 …… (785)
05608 血余膏 …… (785)
05609 血郁汤 …… (786)
05610 血郁汤 …… (786)
05611 血痹汤 …… (786)
05612 血瘀散 …… (786)
05613 血竭丸 …… (786)
05614 血竭散 …… (786)
05615 血竭散 …… (786)
05616 血癥丸 …… (786)
05617 血府逐瘀汤 …… (786)
05618 血崩神效方 …… (788)
05619 血竭冰硼散 …… (788)
05620 血翳泻心汤 …… (788)
05621 血余固本九阳丹 … (788)

向

05622 向荣汤 …… (789)
05623 向胜破笛丸 …… (789)

行

05624 行气散 …… (789)
05625 行军散 …… (789)
05626 行健汤 …… (789)
05627 行气开痹饮 …… (789)
05628 行气香苏散 …… (789)
05629 行经红花汤 …… (790)
05630 行湿补气养血汤 … (790)
05631 行湿滋筋养血汤 … (790)

后

05632 后辛汤 …… (790)

舟

05633 舟车丸 …… (790)

全

05634 全生饮 …… (791)
05635 全虫方 …… (791)
05636 全虫散 …… (792)
05637 全羊丸 …… (792)
05638 全阳方 …… (792)
05639 全身饮 …… (792)
05640 全趾饮 …… (792)
05641 全鹿丸 …… (792)
05642 全鹿丸 …… (793)
05643 全鹿丸 …… (793)
05644 全蝎丸 …… (793)
05645 全蝎丸 …… (793)
05646 全蝎散 …… (793)
05647 全蝎散 …… (793)
05648 全蝎散 …… (793)
05649 全蝎散 …… (794)
05650 全蝎散 …… (794)
05651 全蝎散 …… (794)
05652 全蝎散 …… (794)
05653 全蝎散 …… (794)
05654 全蝎膏 …… (794)
05655 全鳖丸 …… (794)
05656 全鳖丸 …… (794)
05657 全鳖丸 …… (794)
05658 全生止逆汤 …… (795)
05659 全生活血汤 …… (795)
05660 全真一气汤 …… (795)
05661 全蝎生皮散 …… (796)
05662 全蝎观音散 …… (796)
05663 全蝎乳香散 …… (796)
05664 全蝎星香散 …… (796)

会

05665 会脓散 …… (796)
05666 会厌逐瘀汤 …… (796)

合

05667 合囟散 …… (797)
05668 合欢丸 …… (797)
05669 合欢饮 …… (797)
05670 合明散 …… (797)
05671 合明散 …… (797)
05672 合香丸 …… (797)
05673 合掌散 …… (797)
05674 合魂丹 …… (798)
05675 合口收功散 …… (798)
05676 合欢保元膏 …… (798)

杀

05677 杀虫丸 …… (798)

多

05678 多子锭 …… (798)
05679 多皮饮 …… (798)

刘

05680 刘寄奴散 …… (798)
05681 刘寄奴散 …… (799)
05682 刘寄奴散 …… (799)

充

05683 充髓丹 …… (799)
05684 充髓汤 …… (799)

交

05685 交加丸 …… (799)
05686 交加散 …… (799)
05687 交加散 …… (799)
05688 交加散 …… (799)
05689 交合汤 …… (800)
05690 交泰丸 …… (800)
05691 交泰丸 …… (800)
05692 交泰散 …… (800)
05693 交感丹 …… (800)
05694 交感丹 …… (800)
05695 交加地黄丸 …… (800)
05696 交感地黄煎丸 …… (801)

产

05697 产宝汤 …… (801)

庆

05698 庆云散 …… (801)

闭

05699 闭白丸 …… (801)
05700 闭血汤 …… (801)
05701 闭真丸 …… (801)
05702 闭管丸 …… (801)
05703 闭精丸 …… (801)
05704 闭精散 …… (801)
05705 闭关止渴汤 …… (802)

灯

05706 灯花丸 …… (802)

冲

05707 冲关散 …… (802)
05708 冲和汤 …… (802)
05709 冲和汤 …… (802)
05710 冲和膏 …… (802)
05711 冲和仙膏 …… (802)
05712 冲脉饮子 …… (803)
05713 冲和灵宝饮 …… (803)
05714 冲和顺气汤 …… (803)

决

05715 决水汤 …… (803)
05716 决明丸 …… (803)
05717 决明丸 …… (803)
05718 决明丸 …… (804)
05719 决明丸 …… (804)
05720 决明汤 …… (804)
05721 决明散 …… (804)
05722 决明散 …… (804)
05723 决明散 …… (804)
05724 决明散 …… (804)
05725 决明散 …… (804)
05726 决明散 …… (804)
05727 决明散 …… (804)
05728 决津煎 …… (804)
05729 决流汤 …… (805)
05730 决明子散 …… (805)
05731 决明子粥 …… (805)
05732 决明鸡肝散 …… (805)
05733 决明夜灵散 …… (805)
05734 决明洗眼方 …… (805)
05735 决明益阴丸 …… (805)
05736 决壅顺流汤 …… (806)

冰

05737 冰片散 …… (806)
05738 冰片散 …… (806)
05739 冰片散 …… (806)
05740 冰片散 …… (806)
05741 冰心散 …… (806)
05742 冰玉散 …… (806)
05743 冰白散 …… (806)
05744 冰芫散 …… (806)
05745 冰柏丸 …… (806)
05746 冰梅丸 …… (806)
05747 冰黄散 …… (807)
05748 冰黄散 …… (807)
05749 冰黄膏 …… (807)
05750 冰硫散 …… (807)
05751 冰蛳散 …… (807)
05752 冰硼散 …… (807)
05753 冰霜散 …… (807)
05754 冰麝散 …… (808)
05755 冰片鸡蛋油 …… (808)
05756 冰麝还睛丸 …… (808)

汗

05757 汗斑粉 …… (808)
05758 汗斑散 …… (808)

江

05759 江鳔丸 …… (808)

汤

05760 汤泡饮 …… (808)
05761 汤泡散 …… (808)
05762 汤火止痛散 …… (808)

汝

05763 汝言化痰丸 …… (809)

壮

05764 壮元丸 …… (809)
05765 壮元丹 …… (809)
05766 壮火丹 …… (809)
05767 壮本丹 …… (809)
05768 壮阳丸 …… (809)
05769 壮阳丹 …… (809)
05770 壮阳丹 …… (810)
05771 壮阳汤 …… (810)
05772 壮肾散 …… (810)
05773 壮原汤 …… (810)
05774 壮脾丸 …… (810)
05775 壮脾丸 …… (810)
05776 壮火温脾汤 …… (810)
05777 壮水明目丸 …… (811)
05778 壮阳种子丹 …… (811)
05779 壮骨去湿丹 …… (811)
05780 壮筋补骨丹 …… (811)
05781 壮精固本丸 …… (811)
05782 壮阳暖下药饼 …… (811)
05783 壮阳固本地黄丸 … (811)
05784 壮神益志保孕汤 … (812)

守

05785 守中丸 …… (812)
05786 守宫丸 …… (812)
05787 守效丸 …… (812)
05788 守瘿丸 …… (812)
05789 守中金丸 …… (812)
05790 守阳碧云膏 …… (812)

宅

05791 宅中汤 …… (812)

安

05792 安土汤 …… (813)
05793 安中散 …… (813)
05794 安中散 …… (813)
05795 安心汤 …… (813)
05796 安老汤 …… (813)
05797 安虫丸 …… (813)
05798 安虫饮 …… (813)
05799 安虫散 …… (813)
05800 安冲汤 …… (814)
05801 安志丸 …… (814)
05802 安肾丸 …… (814)
05803 安肾丸 …… (814)
05804 安肾丸 …… (814)
05805 安肾丸 …… (814)
05806 安肾丸 …… (815)
05807 安肾丸 …… (815)
05808 安肾汤 …… (815)
05809 安肺散 …… (815)
05810 安经汤 …… (815)
05811 安荣散 …… (815)
05812 安荣散 …… (815)
05813 安胃丸 …… (816)
05814 安胃汤 …… (816)
05815 安胃汤 …… (816)
05816 安胃汤 …… (816)
05817 安胃汤 …… (816)
05818 安胃饮 …… (816)
05819 安胃饮 …… (816)

05820 安胃散 …… (816)
05821 安胃散 …… (816)
05822 安胎丸 …… (816)
05823 安胎饮 …… (817)
05824 安胎饮 …… (817)
05825 安胎饮 …… (817)
05826 安胎饮 …… (817)
05827 安胎饮 …… (817)
05828 安胎散 …… (817)
05829 安胎散 …… (818)
05830 安神丸 …… (818)
05831 安神汤 …… (818)
05832 安神散 …… (818)
05833 安神散 …… (818)
05834 安神散 …… (818)
05835 安眠散 …… (818)
05836 安眠散 …… (818)
05837 安眠散 …… (818)
05838 安脏汤 …… (819)
05839 安脐散 …… (819)
05840 安脐散 …… (819)
05841 安营散 …… (819)
05842 安豚丹 …… (819)
05843 安惊丸 …… (819)
05844 安蛔汤 …… (819)
05845 安蛔散 …… (819)
05846 安脾散 …… (819)
05847 安痛散 …… (820)
05848 安魂汤 …… (820)
05849 安睡丹 …… (820)
05850 安嘈汤 …… (820)
05851 安石榴汤 …… (820)
05852 安胎饮子 …… (820)
05853 安息香丸 …… (820)
05854 安息香丸 …… (820)
05855 安息香丸 …… (821)
05856 安中调气丸 …… (821)
05857 安心绝梦汤 …… (821)
05858 安枕无忧散 …… (821)
05859 安卧如神汤 …… (821)
05860 安肺宁嗽丸 …… (821)
05861 安胃定胎散 …… (821)
05862 安胎四物汤 …… (821)
05863 安胎当归汤 …… (821)
05864 安胎扶元饮 …… (821)
05865 安胎和气饮 …… (822)
05866 安胎和气散 …… (822)
05867 安胎神应丸 …… (822)
05868 安胎寄生汤 …… (822)
05869 安宫牛黄丸 …… (822)
05870 安神生化汤 …… (823)
05871 安神补心汤 …… (823)
05872 安神定志丸 …… (823)
05873 安神定志丸 …… (823)
05874 安神定志丸 …… (824)
05875 安神定智汤 …… (824)
05876 安神滚痰丸 …… (824)
05877 安神镇心丸 …… (824)
05878 安神醒心丸 …… (824)
05879 安息活血丹 …… (824)
05880 安喘至圣丹 …… (824)
05881 安蛔理中汤 …… (825)
05882 安莫二天汤 …… (825)
05883 安神熟地黄散 …… (825)
05884 安胎万全神应散 … (825)

并

05885 并提汤 …… (825)

关

05886 关节炎汤 1 号 …… (825)
05887 关节炎汤 2 号 …… (826)

羊

05888 羊心汤 …… (826)
05889 羊肉丸 …… (826)
05890 羊肉汤 …… (826)
05891 羊肉汤 …… (826)
05892 羊肉汤 …… (826)
05893 羊肉汤 …… (827)
05894 羊肉饼 …… (827)
05895 羊肉羹 …… (827)
05896 羊肉臛 …… (827)
05897 羊花散 …… (827)
05898 羊肝丸 …… (827)
05899 羊肝丸 …… (827)
05900 羊肝丸 …… (828)
05901 羊肝丸 …… (828)
05902 羊肝丸 …… (828)
05903 羊肝丸 …… (828)
05904 羊肝散 …… (829)
05905 羊肝散 …… (829)
05906 羊肝煎 …… (829)
05907 羊角散 …… (829)
05908 羊肾丸 …… (829)
05909 羊肾丸 …… (829)
05910 羊肾丸 …… (829)
05911 羊肾丸 …… (829)
05912 羊肾汤 …… (829)
05913 羊肾汤 …… (830)
05914 羊肾羹 …… (830)
05915 羊肾羹 …… (830)
05916 羊乳丸 …… (830)
05917 羊肺汤 …… (830)
05918 羊肺汤 …… (830)
05919 羊肺羹 …… (830)
05920 羊胃汤 …… (830)
05921 羊骨汤 …… (830)
05922 羊骨饮 …… (830)
05923 羊胆丸 …… (831)
05924 羊胆膏 …… (831)
05925 羊胆膏 …… (831)
05926 羊脊粥 …… (831)
05927 羊脂汤 …… (831)
05928 羊脂粥 …… (831)
05929 羊脏羹 …… (831)
05930 羊蹄散 …… (831)
05931 羊髓煎 …… (831)
05932 羊髓膏 …… (831)
05933 羊肉索饼 …… (831)
05934 羊胫灰丸 …… (832)
05935 羊脊骨汤 …… (832)
05936 羊蹄根酒 …… (832)
05937 羊蹄根酒 …… (832)
05938 羊肉当归汤 …… (832)
05939 羊肉杜仲汤 …… (832)
05940 羊肉扶羸丸 …… (832)
05941 羊肉黄耆汤 …… (832)
05942 羊肝明目丸 …… (833)
05943 羊肝退翳丸 …… (833)
05944 羊肝猪胆丸 …… (833)
05945 羊角补中汤 …… (833)
05946 羊肾苁蓉羹 …… (833)
05947 羊肾补肾汤 …… (833)
05948 羊肾附子丸 …… (833)

05949 羊骨补肾汤 …… (833)
05950 羊蹄根涂方 …… (834)

米

05951 米饮 …… (834)
05952 米莲散 …… (834)
05953 米黄散 …… (834)
05954 米糖膏 …… (834)

军

05955 军持露 …… (834)
05956 军门一笑膏 …… (834)
05957 军门立效散 …… (834)
05958 军中一捻金 …… (834)

异

05959 异功散 …… (834)
05960 异功散 …… (835)
05961 异功散 …… (835)
05962 异功散 …… (835)
05963 异功散 …… (835)
05964 异香散 …… (835)
05965 异效散 …… (835)
05966 异方油煎散 …… (836)
05967 异香四神散 …… (836)
05968 异类有情丸 …… (836)

导

05969 导散 …… (836)
05970 导气丸 …… (836)
05971 导气丸 …… (836)
05972 导气丸 …… (837)
05973 导气汤 …… (837)
05974 导气汤 …… (837)
05975 导气汤 …… (837)
05976 导气饮 …… (837)
05977 导水散 …… (837)
05978 导水散 …… (837)
05979 导赤丸 …… (837)
05980 导赤汤 …… (838)
05981 导赤散 …… (838)
05982 导赤散 …… (838)
05983 导赤散 …… (839)
05984 导经汤 …… (839)
05985 导热散 …… (839)
05986 导滞汤 …… (839)
05987 导滞汤 …… (839)
05988 导滞散 …… (839)
05989 导痰汤 …… (839)
05990 导痰汤 …… (839)
05991 导痰汤 …… (839)
05992 导痰汤 …… (840)
05993 导癥囊 …… (840)
05994 导气枳壳丸 …… (840)
05995 导气枳实丸 …… (840)
05996 导气除燥汤 …… (840)
05997 导气槟榔散 …… (840)
05998 导水茯苓汤 …… (840)
05999 导水消肾丸 …… (840)
06000 导赤地榆汤 …… (841)
06001 导赤各半汤 …… (841)
06002 导赤承气汤 …… (841)
06003 导赤清心汤 …… (841)
06004 导滞通经汤 …… (841)
06005 导痰小胃丹 …… (841)

寻

06006 寻痛丸 …… (842)
06007 寻痛丸 …… (842)
06008 寻痛丸 …… (842)
06009 寻痛住痛散 …… (842)
06010 寻痛舒筋丸 …… (842)

阳

06011 阳旦汤 …… (842)
06012 阳和丸 …… (842)
06013 阳和丸 …… (842)
06014 阳和汤 …… (843)
06015 阳春酒 …… (844)
06016 阳消散 …… (844)
06017 阳起石丸 …… (844)
06018 阳起石丸 …… (844)
06019 阳起石丸 …… (844)
06020 阳起石丸 …… (844)
06021 阳起石丸 …… (844)
06022 阳起石丸 …… (844)
06023 阳起石丸 …… (845)
06024 阳起石汤 …… (845)
06025 阳燧锭子 …… (845)
06026 阳和二陈汤 …… (845)
06027 阳和化癌汤 …… (845)
06028 阳和解凝膏 …… (845)
06029 阳毒升麻汤 …… (845)
06030 阳春白雪膏 …… (846)

阴

06031 阴旦汤 …… (846)
06032 阴阳散 …… (846)
06033 阴痈方 …… (846)
06034 阴铁箍散 …… (846)
06035 阴阳二气丹 …… (846)
06036 阴阳两救汤 …… (846)
06037 阴阳兼培丸 …… (846)
06038 阴蚀黄连膏 …… (847)
06039 阴虚生内热方 …… (847)

防

06040 防己丸 …… (847)
06041 防己丸 …… (847)
06042 防己丸 …… (847)
06043 防己汤 …… (847)
06044 防己汤 …… (847)
06045 防己汤 …… (847)
06046 防己汤 …… (848)
06047 防己饮 …… (848)
06048 防己饮 …… (848)
06049 防己散 …… (848)
06050 防己散 …… (848)
06051 防己散 …… (848)
06052 防己散 …… (848)
06053 防风丸 …… (849)
06054 防风丸 …… (849)
06055 防风丸 …… (849)
06056 防风汤 …… (849)
06057 防风汤 …… (849)
06058 防风汤 …… (849)
06059 防风汤 …… (849)
06060 防风汤 …… (849)
06061 防风汤 …… (850)
06062 防风汤 …… (850)
06063 防风汤 …… (850)
06064 防风汤 …… (850)
06065 防风汤 …… (850)
06066 防风汤 …… (850)
06067 防风汤 …… (850)

06068 防风汤 …… (850)
06069 防风汤 …… (851)
06070 防风汤 …… (851)
06071 防风汤 …… (851)
06072 防风汤 …… (851)
06073 防风汤 …… (851)
06074 防风汤 …… (851)
06075 防风汤 …… (851)
06076 防风汤 …… (851)
06077 防风汤 …… (852)
06078 防风汤 …… (852)
06079 防风汤 …… (852)
06080 防风汤 …… (852)
06081 防风汤 …… (852)
06082 防风汤 …… (852)
06083 防风汤 …… (852)
06084 防风汤 …… (852)
06085 防风汤 …… (853)
06086 防风汤 …… (853)
06087 防风汤 …… (853)
06088 防风汤 …… (853)
06089 防风汤 …… (853)
06090 防风饮 …… (853)
06091 防风饮 …… (853)
06092 防风饮 …… (853)
06093 防风酒 …… (853)
06094 防风散 …… (854)
06095 防风散 …… (854)
06096 防风散 …… (854)
06097 防风散 …… (854)
06098 防风散 …… (854)
06099 防风散 …… (854)
06100 防风散 …… (854)
06101 防风散 …… (854)
06102 防风散 …… (855)
06103 防风散 …… (855)
06104 防风散 …… (855)
06105 防风散 …… (855)
06106 防风散 …… (855)
06107 防风散 …… (855)
06108 防风散 …… (855)
06109 防风散 …… (855)
06110 防风散 …… (856)
06111 防风散 …… (856)
06112 防风散 …… (856)
06113 防风散 …… (856)
06114 防风散 …… (856)
06115 防风散 …… (856)
06116 防风散 …… (856)
06117 防风散 …… (856)
06118 防风散 …… (856)
06119 防风散 …… (857)
06120 防风散 …… (857)
06121 防风散 …… (857)
06122 防风散 …… (857)
06123 防风散 …… (857)
06124 防眩汤 …… (857)
06125 防葵散 …… (857)
06126 防犀饮 …… (857)
06127 防风饮子 …… (857)
06128 防风根汤 …… (858)
06129 防己地黄汤 …… (858)
06130 防己苡仁汤 …… (858)
06131 防己茯苓汤 …… (858)
06132 防己黄耆汤 …… (859)
06133 防己葶苈丸 …… (859)
06134 防己葶苈丸 …… (860)
06135 防风一字散 …… (860)
06136 防风天麻散 …… (860)
06137 防风牛蒡汤 …… (860)
06138 防风升麻汤 …… (860)
06139 防风升麻汤 …… (860)
06140 防风归芎汤 …… (860)
06141 防风四物汤 …… (860)
06142 防风必效散 …… (860)
06143 防风当归汤 …… (860)
06144 防风当归散 …… (861)
06145 防风羊角汤 …… (861)
06146 防风如神散 …… (861)
06147 防风赤芍汤 …… (861)
06148 防风羌活汤 …… (861)
06149 防风羌活汤 …… (861)
06150 防风泻肝散 …… (861)
06151 防风荆芥散 …… (861)
06152 防风神术汤 …… (862)
06153 防风秦艽汤 …… (862)
06154 防风消毒饮 …… (862)
06155 防风通圣散 …… (862)
06156 防风通圣散 …… (863)
06157 防风黄芩丸 …… (863)
06158 防风黄连汤 …… (863)
06159 防风黄耆汤 …… (864)
06160 防风散结汤 …… (864)
06161 防风散结汤 …… (864)
06162 防风葛根汤 …… (864)
06163 防风葛根汤 …… (864)
06164 防风煮肝散 …… (864)
06165 防风解毒汤 …… (864)
06166 防风解毒汤 …… (864)
06167 防独神术汤 …… (864)
06168 防葛石膏汤 …… (864)
06169 防风当归饮子 …… (864)
06170 防风蔓荆子丸 …… (865)
06171 防己椒目葶苈大黄丸 …… (865)

收

06172 收火汤 …… (865)
06173 收舌散 …… (865)
06174 收血汤 …… (865)
06175 收汗丹 …… (865)
06176 收汗丹 …… (866)
06177 收汗丹 …… (866)
06178 收阳粉 …… (866)
06179 收阴散 …… (866)
06180 收束散 …… (866)
06181 收肛散 …… (866)
06182 收肛散 …… (866)
06183 收肛散 …… (866)
06184 收泪散 …… (866)
06185 收泪散 …… (866)
06186 收珠散 …… (866)
06187 收痔丸 …… (867)
06188 收湿粉 …… (867)
06189 收膜汤 …… (867)
06190 收膜散 …… (867)
06191 收口掺药 …… (867)
06192 收口八宝散 …… (867)
06193 收功万全汤 …… (867)
06194 收功尽根丸 …… (867)
06195 收血双解散 …… (867)
06196 收带六合丸 …… (868)
06197 收肠养血和气丸 … (868)

如

06198 如玉散 …… (868)

06199 如圣丸 …… (868)
06200 如圣丸 …… (868)
06201 如圣丸 …… (868)
06202 如圣丸 …… (868)
06203 如圣丸 …… (868)
06204 如圣汤 …… (869)
06205 如圣汤 …… (869)
06206 如圣汤 …… (869)
06207 如圣饮 …… (869)
06208 如圣饮 …… (869)
06209 如圣散 …… (869)
06210 如圣散 …… (869)
06211 如圣散 …… (869)
06212 如圣散 …… (870)
06213 如圣散 …… (870)
06214 如圣散 …… (870)
06215 如圣散 …… (870)
06216 如圣散 …… (870)
06217 如圣散 …… (870)
06218 如圣散 …… (870)
06219 如圣散 …… (870)
06220 如圣散 …… (870)
06221 如圣散 …… (871)
06222 如圣散 …… (871)
06223 如圣散 …… (871)
06224 如圣散 …… (871)
06225 如圣散 …… (871)
06226 如圣散 …… (871)
06227 如圣散 …… (871)
06228 如圣膏 …… (871)
06229 如圣膏 …… (871)
06230 如神丸 …… (871)
06231 如神丹 …… (871)
06232 如神汤 …… (871)
06233 如神汤 …… (871)
06234 如神散 …… (872)
06235 如神散 …… (872)
06236 如神散 …… (872)
06237 如神散 …… (872)
06238 如神散 …… (872)
06239 如神散 …… (872)
06240 如神膏 …… (872)
06241 如意丸 …… (872)
06242 如意丸 …… (872)
06243 如意丹 …… (872)
06244 如意汤 …… (872)
06245 如意散 …… (873)
06246 如圣饮子 …… (873)
06247 如圣饼子 …… (873)
06248 如圣饼子 …… (873)
06249 如圣饼子 …… (873)
06250 如圣金刀散 …… (873)
06251 如圣胜金锭 …… (873)
06252 如圣胜金锭 …… (874)
06253 如圣黄耆汤 …… (874)
06254 如金解毒散 …… (874)
06255 如神开骨膏 …… (874)
06256 如神木香丸 …… (874)
06257 如神白虎汤 …… (874)
06258 如神救苦散 …… (874)
06259 如神断痫丸 …… (874)
06260 如意金黄散 …… (875)
06261 如意铁箍散 …… (875)
06262 如意通圣散 …… (875)

妇

06263 妇宝丸 …… (875)
06264 妇宝丹 …… (875)
06265 妇人归附丸 …… (876)
06266 妇女乌发丹 …… (876)
06267 妇女紫金丹 …… (876)
06268 妇女痛经丸 …… (876)
06269 妇宝宁坤丸 …… (876)
06270 妇宝胜金丹 …… (876)
06271 妇宝调经汤 …… (876)

好

06272 好槐枝汤 …… (876)

观

06273 观音丸 …… (876)
06274 观音灸 …… (877)
06275 观音散 …… (877)
06276 观音散 …… (877)
06277 观音全蝎散 …… (877)
06278 观音救生散 …… (877)
06279 观音救苦散 …… (877)
06280 观音人参胡桃汤 … (877)
06281 观音救苦甘露饮 … (878)

羽

06282 羽白散 …… (878)
06283 羽泽散 …… (878)
06284 羽泽散 …… (878)
06285 羽泽散 …… (878)

孙

06286 孙武散 …… (878)
06287 孙真人五汁膏 …… (878)

驯

06288 驯龙汤 …… (878)
06289 驯龙驭虎汤 …… (878)

红

06290 红油 …… (878)
06291 红粉 …… (878)
06292 红膏 …… (879)
06293 红丸子 …… (879)
06294 红丸子 …… (879)
06295 红丸子 …… (879)
06296 红升丹 …… (880)
06297 红玉散 …… (880)
06298 红玉散 …… (880)
06299 红玉散 …… (880)
06300 红玉膏 …… (880)
06301 红玉膏 …… (880)
06302 红末子 …… (881)
06303 红白散 …… (881)
06304 红曲酒 …… (881)
06305 红豆丸 …… (881)
06306 红豆丸 …… (881)
06307 红豆散 …… (881)
06308 红花汤 …… (881)
06309 红花酊 …… (881)
06310 红花酒 …… (881)
06311 红花散 …… (881)
06312 红花散 …… (881)
06313 红花散 …… (881)
06314 红花散 …… (882)
06315 红花膏 …… (882)
06316 红吹散 …… (882)
06317 红灵丹 …… (882)
06318 红灵酒 …… (882)

06319 红灵散 …… (882)
06320 红枣散 …… (882)
06321 红雨丹 …… (882)
06322 红矾丸 …… (882)
06323 红矾散 …… (883)
06324 红油膏 …… (883)
06325 红香粉 …… (883)
06326 红铅散 …… (883)
06327 红绵丹 …… (883)
06328 红绵散 …… (883)
06329 红棉散 …… (883)
06330 红缎膏 …… (883)
06331 红膏药 …… (883)
06332 红膏药 …… (884)
06333 红膏药 …… (884)
06334 红膏药 …… (884)
06335 红薯粥 …… (884)
06336 红藤煎 …… (884)
06337 红内消散 …… (884)
06338 红内消散 …… (884)
06339 红水眼药 …… (884)
06340 红芍药散 …… (884)
06341 红衣大炮 …… (885)
06342 红豆蔻散 …… (885)
06343 红蓝花汤 …… (885)
06344 红蓝花酒 …… (885)
06345 红蓝花散 …… (885)
06346 红蓝花散 …… (885)
06347 红花四物汤 …… (885)
06348 红花当归汤 …… (885)
06349 红花当归饮 …… (885)
06350 红花当归散 …… (886)
06351 红花桃仁汤 …… (886)
06352 红花桃仁汤 …… (886)
06353 红花桃仁煎 …… (886)
06354 红花散瘀汤 …… (886)
06355 红铅造化丹 …… (886)
06356 红绵龙骨散 …… (886)
06357 红花白芷防风饮 … (886)

约

06358 约阴丸 …… (887)
06359 约营煎 …… (887)
06360 约骨煎 …… (887)
06361 约精丸 …… (887)

(七 画)

弄

06362 弄舌散 …… (887)

麦

06363 麦天汤 …… (887)
06364 麦斗金 …… (887)
06365 麦斗金 …… (887)
06366 麦冬丸 …… (887)
06367 麦冬汤 …… (887)
06368 麦冬散 …… (888)
06369 麦汤散 …… (888)
06370 麦芽煎 …… (888)
06371 麦饯散 …… (888)
06372 麦兜散 …… (888)
06373 麦煎汤 …… (888)
06374 麦煎饮 …… (888)
06375 麦煎散 …… (888)
06376 麦煎散 …… (888)
06377 麦煎散 …… (889)
06378 麦煎散 …… (889)
06379 麦糵丸 …… (889)
06380 麦门冬丸 …… (889)
06381 麦门冬丸 …… (889)
06382 麦门冬丸 …… (889)
06383 麦门冬丸 …… (889)
06384 麦门冬丸 …… (889)
06385 麦门冬丸 …… (889)
06386 麦门冬汤 …… (890)
06387 麦门冬汤 …… (890)
06388 麦门冬汤 …… (891)
06389 麦门冬汤 …… (891)
06390 麦门冬汤 …… (891)
06391 麦门冬汤 …… (891)
06392 麦门冬汤 …… (891)
06393 麦门冬汤 …… (891)
06394 麦门冬汤 …… (891)
06395 麦门冬汤 …… (891)
06396 麦门冬汤 …… (891)
06397 麦门冬汤 …… (892)
06398 麦门冬汤 …… (892)
06399 麦门冬汤 …… (892)
06400 麦门冬汤 …… (892)
06401 麦门冬汤 …… (892)
06402 麦门冬汤 …… (892)
06403 麦门冬汤 …… (892)
06404 麦门冬汤 …… (892)
06405 麦门冬汤 …… (893)
06406 麦门冬汤 …… (893)
06407 麦门冬汤 …… (893)
06408 麦门冬饮 …… (893)
06409 麦门冬饮 …… (893)
06410 麦门冬饮 …… (893)
06411 麦门冬饮 …… (893)
06412 麦门冬饮 …… (893)
06413 麦门冬饮 …… (894)
06414 麦门冬饮 …… (894)
06415 麦门冬散 …… (894)
06416 麦门冬散 …… (894)
06417 麦门冬散 …… (894)
06418 麦门冬散 …… (894)
06419 麦门冬散 …… (894)
06420 麦门冬散 …… (894)
06421 麦门冬散 …… (894)
06422 麦门冬散 …… (894)
06423 麦门冬散 …… (895)
06424 麦门冬散 …… (895)
06425 麦门冬散 …… (895)
06426 麦门冬散 …… (895)
06427 麦门冬散 …… (895)
06428 麦门冬粥 …… (895)
06429 麦门冬饮子 …… (895)
06430 麦门冬饮子 …… (895)
06431 麦门冬饮子 …… (895)
06432 麦冬平肺饮 …… (896)
06433 麦冬甘露饮 …… (896)
06434 麦冬养荣汤 …… (896)
06435 麦冬清肺汤 …… (896)
06436 麦门冬人参汤 …… (896)
06437 麦门冬理中汤 …… (896)

寿

06438 寿星丸 …… (896)
06439 寿星丸 …… (896)
06440 寿胎丸 …… (896)

戒

06441 戒烟丸 …… (897)

06442 戒烟膏 …… (897)
06443 戒鸦片烟瘾方 …… (897)

进

06444 进食丸 …… (897)
06445 进食散 …… (897)
06446 进食散 …… (897)
06447 进退四物汤 …… (897)
06448 进退黄连汤 …… (898)
06449 进退大承气汤 …… (898)

远

06450 远邪汤 …… (898)
06451 远志丸 …… (898)
06452 远志丸 …… (898)
06453 远志丸 …… (899)
06454 远志丸 …… (899)
06455 远志丸 …… (899)
06456 远志丸 …… (899)
06457 远志丸 …… (899)
06458 远志丸 …… (899)
06459 远志丸 …… (899)
06460 远志丸 …… (899)
06461 远志丸 …… (899)
06462 远志丸 …… (900)
06463 远志丸 …… (900)
06464 远志汤 …… (900)
06465 远志酒 …… (900)
06466 远志散 …… (900)
06467 远志散 …… (900)
06468 远志散 …… (900)
06469 远志散 …… (900)
06470 远志散 …… (901)
06471 远志膏 …… (901)
06472 远彻膏 …… (901)
06473 远桔汤 …… (901)
06474 远志饮子 …… (901)
06475 远志饮子 …… (901)

攻

06476 攻火汤 …… (901)
06477 攻坚散 …… (901)
06478 攻积丸 …… (901)
06479 攻痹汤 …… (901)
06480 攻坚败毒膏 …… (901)

坎

06481 坎中丹 …… (902)
06482 坎炁丹 …… (902)
06483 坎离丸 …… (902)
06484 坎离丸 …… (902)
06485 坎离丸 …… (902)
06486 坎离丸 …… (902)
06487 坎离砂 …… (903)
06488 坎离膏 …… (903)
06489 坎粒砂 …… (903)
06490 坎宫锭子 …… (903)
06491 坎气潜龙汤 …… (903)
06492 坎离互根汤 …… (903)
06493 坎离既济丸 …… (904)
06494 坎离既济丹 …… (904)

均

06495 均气八仙汤 …… (904)

杜

06496 杜仲丸 …… (904)
06497 杜仲丸 …… (904)
06498 杜仲丸 …… (904)
06499 杜仲丸 …… (904)
06500 杜仲丸 …… (905)
06501 杜仲汤 …… (905)
06502 杜仲汤 …… (905)
06503 杜仲酒 …… (905)
06504 杜仲酒 …… (905)
06505 杜仲酒 …… (905)
06506 杜仲散 …… (905)
06507 杜仲散 …… (905)
06508 杜仲散 …… (905)
06509 杜痔丸 …… (905)
06510 杜牛膝丸 …… (905)

极

06511 极效膏 …… (906)

杞

06512 杞苓丸 …… (906)
06513 杞实粥 …… (906)
06514 杞圆膏 …… (906)
06515 杞菊丸 …… (906)
06516 杞菊六味丸 …… (906)

杨

06517 杨花散 …… (906)
06518 杨梅一剂散 …… (906)

却

06519 却忿散 …… (907)
06520 却痛散 …… (907)
06521 却老从蓉丸 …… (907)
06522 却老乌须健阳丹 … (907)
06523 却老乌须健阳丹 … (907)

劫

06524 劫劳散 …… (907)
06525 劫嗽丸 …… (907)

豆

06526 豆麦粥 …… (907)
06527 豆附丸 …… (907)
06528 豆附散 …… (908)
06529 豆卷散 …… (908)
06530 豆蔻丸 …… (908)
06531 豆蔻丸 …… (908)
06532 豆蔻汤 …… (908)
06533 豆蔻汤 …… (908)
06534 豆蔻汤 …… (908)
06535 豆蔻汤 …… (908)
06536 豆蔻饮 …… (908)
06537 豆蔻散 …… (908)
06538 豆蔻散 …… (909)
06539 豆蔻散 …… (909)
06540 豆蔻散 …… (909)
06541 豆蔻散 …… (909)
06542 豆蔻粥 …… (909)
06543 豆青软膏 …… (909)
06544 豆卷腹皮汤 …… (909)
06545 豆蔻分气饮 …… (909)
06546 豆蔻平胃散 …… (909)
06547 豆蔻白术丸 …… (909)
06548 豆蔻香连丸 …… (909)
06549 豆蔻理中丸 …… (910)

丽

06550 丽泽通气汤 …… (910)

06551 丽泽通气散 …… (910)

克

06552 克银癣软膏 …… (910)

芙

06553 芙蓉丸 …… (910)
06554 芙蓉丹 …… (910)
06555 芙蓉膏 …… (910)
06556 芙蓉膏 …… (910)
06557 芙蓉膏 …… (910)
06558 芙蓉膏 …… (910)
06559 芙蓉内托散 …… (910)
06560 芙蓉海马丹 …… (911)

芫

06561 芫花丸 …… (911)
06562 芫花丸 …… (911)
06563 芫花散 …… (911)
06564 芫花散 …… (911)
06565 芫花饼子 …… (911)
06566 芫根白皮丸 …… (911)

芜

06567 芜荑丸 …… (911)
06568 芜荑汤 …… (912)
06569 芜荑散 …… (912)
06570 芜荑散 …… (912)
06571 芜荑消疳汤 …… (912)

苇

06572 苇叶汤 …… (912)
06573 苇茎汤 …… (912)

芸

06574 芸苔散 …… (913)
06575 芸苔散 …… (913)
06576 芸苔子散 …… (913)

苯

06577 苯苡汤 …… (913)

芷

06578 芷贝散 …… (913)
06579 芷芩散 …… (913)
06580 芷梅汤 …… (913)

苋

06581 苋菜散 …… (914)

花

06582 花丁散 …… (914)
06583 花龙丸 …… (914)
06584 花叶丸 …… (914)
06585 花草膏 …… (914)
06586 花粉散 …… (914)
06587 花蛇酒 …… (914)
06588 花叶洗剂 …… (914)
06589 花乳石散 …… (914)
06590 花蕊石散 …… (914)
06591 花蕊石散 …… (914)
06592 花蛇续命汤 …… (915)
06593 花斑癣特灵 …… (915)

芹

06594 芹菜粥 …… (915)

芥

06595 芥子散 …… (915)
06596 芥菜卤 …… (915)

苁

06597 苁蓉丸 …… (915)
06598 苁蓉丸 …… (915)
06599 苁蓉丸 …… (915)
06600 苁蓉丸 …… (915)
06601 苁蓉丸 …… (916)
06602 苁蓉丸 …… (916)
06603 苁蓉丸 …… (916)
06604 苁蓉丸 …… (916)
06605 苁蓉汤 …… (916)
06606 苁蓉饮 …… (916)
06607 苁蓉散 …… (916)
06608 苁蓉粥 …… (917)
06609 苁蓉牛膝丸 …… (917)
06610 苁蓉羊肉粥 …… (917)
06611 苁蓉杏仁汤 …… (917)
06612 苁蓉独活散 …… (917)
06613 苁蓉琐阳粥 …… (917)
06614 苁蓉菟丝丸 …… (917)

芩

06615 芩术汤 …… (917)
06616 芩芍汤 …… (917)
06617 芩芷散 …… (918)
06618 芩术四物汤 …… (918)
06619 芩术安胎饮 …… (918)
06620 芩术樗皮丸 …… (918)
06621 芩连二母丸 …… (918)
06622 芩连二陈汤 …… (918)
06623 芩连二陈汤 …… (918)
06624 芩连二陈汤 …… (918)
06625 芩连平胃汤 …… (919)
06626 芩连平胃散 …… (919)
06627 芩连四苓散 …… (919)
06628 芩连四物汤 …… (919)
06629 芩连四物汤 …… (919)
06630 芩连芍药汤 …… (919)
06631 芩连败毒散 …… (920)
06632 芩连消毒汤 …… (920)
06633 芩连消毒饮 …… (920)
06634 芩连清心丸 …… (920)
06635 芩柏樗皮丸 …… (920)
06636 芩连橘半枳术丸 … (920)

苍

06637 苍术丸 …… (920)
06638 苍术丸 …… (920)
06639 苍术丸 …… (920)
06640 苍术丸 …… (921)
06641 苍术丸 …… (921)
06642 苍术丸 …… (921)
06643 苍术汤 …… (921)
06644 苍术汤 …… (921)
06645 苍术汤 …… (921)
06646 苍术散 …… (921)
06647 苍术散 …… (921)
06648 苍术膏 …… (921)
06649 苍术膏 …… (922)
06650 苍龙丸 …… (922)
06651 苍地丸 …… (922)
06652 苍耳丸 …… (922)
06653 苍耳饮 …… (922)
06654 苍耳酒 …… (922)
06655 苍耳散 …… (922)

06656 苍连汤 …… (922)
06657 苍龟丸 …… (922)
06658 苍柏饮 …… (922)
06659 苍柏散 …… (923)
06660 苍莎丸 …… (923)
06661 苍耳叶羹 …… (923)
06662 苍耳草膏 …… (923)
06663 苍矾洗剂 …… (923)
06664 苍玉潜龙汤 …… (923)
06665 苍术石膏汤 …… (923)
06666 苍术半夏丸 …… (923)
06667 苍术地榆汤 …… (923)
06668 苍术芍药汤 …… (923)
06669 苍术防风汤 …… (924)
06670 苍术灵仙散 …… (924)
06671 苍术复煎散 …… (924)
06672 苍术难名丹 …… (924)
06673 苍术黄柏丸 …… (924)
06674 苍术猪肝散 …… (924)
06675 苍曲樗皮丸 …… (924)
06676 苍附五苓散 …… (924)
06677 苍附六君汤 …… (924)
06678 苍附导痰丸 …… (924)
06679 苍苓白虎汤 …… (925)
06680 苍柏辛芎散 …… (925)
06681 苍柏樗皮丸 …… (925)
06682 苍桂五苓散 …… (925)
06683 苍梧道士陈元膏 … (925)

芡

06684 芡实丸 …… (925)
06685 芡实丸 …… (925)
06686 芡实粥 …… (925)
06687 芡实茯苓牛角散 … (925)

芳

06688 芳香散 …… (925)
06689 芳香化湿汤 …… (925)

芒

06690 芒根汤 …… (926)
06691 芒麻粥 …… (926)

芦

06692 芦巴丸 …… (926)
06693 芦吸散 …… (926)
06694 芦荟丸 …… (926)
06695 芦荟丸 …… (926)
06696 芦荟丸 …… (926)
06697 芦荟丸 …… (926)
06698 芦荟丸 …… (926)
06699 芦荟丸 …… (927)
06700 芦荟丸 …… (927)
06701 芦荟散 …… (927)
06702 芦荟散 …… (927)
06703 芦根汤 …… (927)
06704 芦根汤 …… (927)
06705 芦根汤 …… (927)
06706 芦根汤 …… (927)
06707 芦根汤 …… (927)
06708 芦根汤 …… (927)
06709 芦根汤 …… (927)
06710 芦根饮 …… (928)
06711 芦根散 …… (928)
06712 芦根散 …… (928)
06713 芦根散 …… (928)
06714 芦筒散 …… (928)
06715 芦连消疳丸 …… (928)
06716 芦柏地黄丸 …… (928)
06717 芦荟肥儿丸 …… (928)
06718 芦荟肥儿丸 …… (928)
06719 芦荟消疳饮 …… (929)
06720 芦根白酒汤 …… (929)

苏

06721 苏子汤 …… (929)
06722 苏子散 …… (929)
06723 苏子粥 …… (929)
06724 苏木汤 …… (929)
06725 苏气汤 …… (929)
06726 苏叶汤 …… (929)
06727 苏羌饮 …… (929)
06728 苏葛汤 …… (930)
06729 苏葛汤 …… (930)
06730 苏解散 …… (930)
06731 苏木饮子 …… (930)
06732 苏方木散 …… (930)
06733 苏合香丸 …… (930)
06734 苏子六安散 …… (930)
06735 苏子定喘丸 …… (931)
06736 苏子降气汤 …… (931)
06737 苏叶黄连汤 …… (931)
06738 苏红洗肝散 …… (931)
06739 苏羌达表汤 …… (931)
06740 苏陈九宝汤 …… (931)
06741 苏葛二陈汤 …… (931)
06742 苏葶定喘丸 …… (932)
06743 苏葶滚痰丸 …… (932)
06744 苏子导痰降气汤 … (932)

苡

06745 苡仁丸 …… (932)
06746 苡仁汤 …… (932)
06747 苡仁散 …… (932)

劳

06748 劳淋汤 …… (932)
06749 劳痛饮 …… (932)

走

06750 走马散 …… (932)
06751 走马夺命散 …… (932)
06752 走马回疔丹 …… (933)
06753 走马牙疳敷药方 … (933)

赤

06754 赤丸 …… (933)
06755 赤玉散 …… (933)
06756 赤龙丸 …… (933)
06757 赤龙丸 …… (933)
06758 赤龙丹 …… (933)
06759 赤龙散 …… (934)
06760 赤龙散 …… (934)
06761 赤白散 …… (934)
06762 赤苓汤 …… (934)
06763 赤苓汤 …… (934)
06764 赤金豆 …… (934)
06765 赤参汤 …… (934)
06766 赤荆汤 …… (934)
06767 赤脂丹 …… (934)
06768 赤淋丸 …… (935)
06769 赤箭丸 …… (935)
06770 赤箭丸 …… (935)
06771 赤箭丸 …… (935)
06772 赤箭汤 …… (935)

06773 赤箭散 …… (935)
06774 赤霜散 …… (935)
06775 赤小豆汤 …… (935)
06776 赤小豆汤 …… (936)
06777 赤小豆汤 …… (936)
06778 赤小豆散 …… (936)
06779 赤小豆粥 …… (936)
06780 赤石脂丸 …… (936)
06781 赤石脂丸 …… (936)
06782 赤石脂丸 …… (936)
06783 赤石脂丸 …… (936)
06784 赤石脂丸 …… (936)
06785 赤石脂散 …… (936)
06786 赤石脂散 …… (937)
06787 赤石脂散 …… (937)
06788 赤石脂散 …… (937)
06789 赤石脂散 …… (937)
06790 赤石脂散 …… (937)
06791 赤芍药丸 …… (937)
06792 赤芍药汤 …… (937)
06793 赤芍药散 …… (937)
06794 赤芍药散 …… (937)
06795 赤芍药散 …… (937)
06796 赤茯苓丸 …… (937)
06797 赤茯苓丸 …… (938)
06798 赤茯苓丸 …… (938)
06799 赤茯苓丸 …… (938)
06800 赤茯苓汤 …… (938)
06801 赤茯苓汤 …… (938)
06802 赤茯苓汤 …… (938)
06803 赤茯苓汤 …… (938)
06804 赤茯苓汤 …… (938)
06805 赤茯苓散 …… (938)
06806 赤茯苓散 …… (938)
06807 赤茯苓散 …… (939)
06808 赤茯苓散 …… (939)
06809 赤茯苓散 …… (939)
06810 赤茯苓散 …… (939)
06811 赤茯苓散 …… (939)
06812 赤茯苓散 …… (939)
06813 赤茯苓散 …… (939)
06814 赤茯苓散 …… (939)
06815 赤茯苓散 …… (939)
06816 赤茯苓散 …… (939)
06817 赤茯苓散 …… (940)
06818 赤茯苓散 …… (940)
06819 赤蜈蚣散 …… (940)
06820 赤芍连翘散 …… (940)
06821 赤小豆当归散 …… (940)
06822 赤豆薏苡仁汤 …… (940)
06823 赤石脂禹余粮汤 … (941)
06824 赤眼神效八宝丹 … (941)

孝

06825 孝感丸 …… (941)

杏

06826 杏子汤 …… (941)
06827 杏子汤 …… (941)
06828 杏子汤 …… (941)
06829 杏仁丸 …… (941)
06830 杏仁丸 …… (941)
06831 杏仁丸 …… (942)
06832 杏仁丸 …… (942)
06833 杏仁丸 …… (942)
06834 杏仁汤 …… (942)
06835 杏仁汤 …… (942)
06836 杏仁汤 …… (942)
06837 杏仁饮 …… (942)
06838 杏仁散 …… (942)
06839 杏仁散 …… (942)
06840 杏仁粥 …… (943)
06841 杏仁粥 …… (943)
06842 杏仁粥 …… (943)
06843 杏仁煎 …… (943)
06844 杏仁煎 …… (943)
06845 杏仁煎 …… (943)
06846 杏仁煎 …… (943)
06847 杏仁煎 …… (943)
06848 杏仁煎 …… (943)
06849 杏仁膏 …… (944)
06850 杏仁膏 …… (944)
06851 杏仁膏 …… (944)
06852 杏仁膏 …… (944)
06853 杏仁膏 …… (944)
06854 杏仁露 …… (944)
06855 杏叶煎 …… (944)
06856 杏灰散 …… (944)
06857 杏苏饮 …… (944)
06858 杏苏饮 …… (944)
06859 杏苏散 …… (944)
06860 杏连散 …… (945)
06861 杏矾汤 …… (945)
06862 杏参散 …… (945)
06863 杏酥散 …… (945)
06864 杏酥膏 …… (945)
06865 杏蜜汤 …… (945)
06866 杏霜丹 …… (945)
06867 杏霜汤 …… (945)
06868 杏仁煮散 …… (946)
06869 杏仁石膏汤 …… (946)
06870 杏仁半夏丸 …… (946)
06871 杏仁半夏汤 …… (946)
06872 杏仁麻黄汤 …… (946)
06873 杏仁紫菀丸 …… (946)
06874 杏仁滑石汤 …… (946)
06875 杏仁薏苡汤 …… (946)
06876 杏术续命汤 …… (946)
06877 杏仁萝卜子丸 …… (947)
06878 杏仁龙胆草泡散 … (947)

李

06879 李仁丸 …… (947)
06880 李根皮汤 …… (947)
06881 李氏天仙藤散 …… (947)
06882 李氏家传快气汤 … (947)

两

06883 两仪膏 …… (947)
06884 两地汤 …… (947)
06885 两收汤 …… (947)
06886 两静汤 …… (948)
06887 两感夺命汤 …… (948)

束

06888 束带汤 …… (948)
06889 束胎丸 …… (948)
06890 束胎丸 …… (948)
06891 束胎丸 …… (948)
06892 束睛丹 …… (948)
06893 束毒金箍散 …… (948)

更

06894 更生丸 …… (948)
06895 更衣丸 …… (949)

06896 更衣丸 …… (949)

还

06897 还元丹 …… (949)
06898 还元丹 …… (949)
06899 还元丹 …… (950)
06900 还元丹 …… (950)
06901 还少丹 …… (950)
06902 还少丹 …… (950)
06903 还少丹 …… (950)
06904 还阳汤 …… (950)
06905 还阳散 …… (950)
06906 还神汤 …… (951)
06907 还童丹 …… (951)
06908 还童丹 …… (951)
06909 还童酒 …… (951)
06910 还魂汤 …… (951)
06911 还魂汤 …… (951)
06912 还魂汤 …… (952)
06913 还睛丸 …… (952)
06914 还睛丸 …… (952)
06915 还睛丸 …… (952)
06916 还睛丸 …… (952)
06917 还睛丸 …… (952)
06918 还睛丸 …… (952)
06919 还睛丸 …… (952)
06920 还睛丸 …… (953)
06921 还睛散 …… (953)
06922 还睛散 …… (953)
06923 还睛散 …… (953)
06924 还睛散 …… (953)
06925 还睛散 …… (953)
06926 还睛散 …… (953)
06927 还睛散 …… (953)
06928 还元明目汤 …… (953)
06929 还元保真汤 …… (954)
06930 还少乳乌丸 …… (954)
06931 还阴解毒汤 …… (954)
06932 还神至圣汤 …… (954)
06933 还睛补肾丸 …… (954)
06934 还睛神明酒 …… (954)
06935 还睛紫金丹 …… (954)

辰

06936 辰砂丸 …… (955)
06937 辰砂丸 …… (955)
06938 辰砂丸 …… (955)
06939 辰砂丹 …… (955)
06940 辰砂散 …… (955)
06941 辰砂散 …… (955)
06942 辰砂散 …… (956)
06943 辰砂一粒丹 …… (956)
06944 辰砂天麻丸 …… (956)
06945 辰砂五苓散 …… (956)
06946 辰砂五香丸 …… (956)
06947 辰砂宁志丸 …… (956)
06948 辰砂半夏丸 …… (956)
06949 辰砂远志丸 …… (956)
06950 辰砂抱龙丸 …… (957)
06951 辰砂定痛散 …… (957)
06952 辰砂茯神膏 …… (957)
06953 辰砂既济丸 …… (957)
06954 辰砂秘真丹 …… (957)
06955 辰砂益原散 …… (957)
06956 辰砂僵蚕散 …… (958)
06957 辰砂石菖蒲散 …… (958)

来

06958 来苏汤 …… (958)
06959 来苏散 …… (958)
06960 来苏散 …… (958)
06961 来痛饮 …… (958)

扶

06962 扶元汤 …… (958)
06963 扶中汤 …… (958)
06964 扶危散 …… (959)
06965 扶弱汤 …… (959)
06966 扶脾丸 …… (959)
06967 扶气止啼汤 …… (959)
06968 扶正消毒饮 …… (959)
06969 扶正散邪汤 …… (959)
06970 扶老理中散 …… (959)
06971 扶阳助胃汤 …… (959)
06972 扶劳四物汤 …… (960)
06973 扶命生火丹 …… (960)
06974 扶桑至宝丹 …… (960)
06975 扶脾生脉散 …… (960)
06976 扶脾逐水丸 …… (961)
06977 扶桑延年至宝丹 … (961)

拒

06978 拒风丸 …… (961)
06979 拒风丹 …… (961)

折

06980 折郁汤 …… (961)

抑

06981 抑七丸 …… (961)
06982 抑气丸 …… (961)
06983 抑气散 …… (961)
06984 抑气散 …… (961)
06985 抑火汤 …… (962)
06986 抑火汤 …… (962)
06987 抑阴散 …… (962)
06988 抑扶煎 …… (962)
06989 抑肝散 …… (962)
06990 抑青丸 …… (962)
06991 抑青丸 …… (962)
06992 抑金散 …… (962)
06993 抑痰丸 …… (962)
06994 抑木和中汤 …… (963)
06995 抑阳酒连散 …… (963)
06996 抑肝导赤汤 …… (963)
06997 抑肝扶脾汤 …… (963)
06998 抑肝消毒散 …… (963)
06999 抑肝清气饮 …… (963)

投

07000 投杯汤 …… (963)
07001 投杯汤 …… (963)

护

07002 护元丹 …… (964)
07003 护从丸 …… (964)
07004 护心散 …… (964)
07005 护心散 …… (964)
07006 护舌丹 …… (964)
07007 护命散 …… (964)
07008 护胎饮 …… (964)
07009 护膜散 …… (964)
07010 护心夺命丹 …… (964)
07011 护阳和阴汤 …… (965)
07012 护胃承气汤 …… (965)

07013 护眉神应散 …… (965)

报

07014 报恩丸 …… (965)

拟

07015 拟金丸 …… (965)

连

07016 连归丸 …… (965)
07017 连朴饮 …… (965)
07018 连壳丸 …… (965)
07019 连茱丸 …… (965)
07020 连理汤 …… (966)
07021 连梅汤 …… (966)
07022 连萝丸 …… (966)
07023 连翘丸 …… (966)
07024 连翘丸 …… (966)
07025 连翘汤 …… (966)
07026 连翘饮 …… (966)
07027 连翘饮 …… (967)
07028 连翘饮 …… (967)
07029 连翘散 …… (967)
07030 连翘散 …… (967)
07031 连翘散 …… (967)
07032 连翘散 …… (967)
07033 连翘散 …… (967)
07034 连翘煎 …… (967)
07035 连蛤散 …… (967)
07036 连蛤散 …… (967)
07037 连蒲散 …… (967)
07038 连翘饮子 …… (968)
07039 连子衠衠方 …… (968)
07040 连芩茱萸丸 …… (968)
07041 连附四物汤 …… (968)
07042 连柏湿疹膏 …… (968)
07043 连梅安蛔汤 …… (968)
07044 连翘赤豆饮 …… (968)
07045 连翘败毒散 …… (968)
07046 连翘败毒散 …… (968)
07047 连翘金贝煎 …… (969)
07048 连翘消毒饮 …… (969)
07049 连翘消毒饮 …… (969)
07050 连翘野菊散 …… (969)
07051 连翘散坚汤 …… (969)
07052 连翘橘叶汤 …… (969)

医

07053 医痫无双丸 …… (969)

步

07054 步莲散 …… (970)

坚

07055 坚软汤 …… (970)
07056 坚齿散 …… (970)

吹

07057 吹口丹 …… (970)
07058 吹云膏 …… (970)
07059 吹耳散 …… (970)
07060 吹耳散 …… (970)
07061 吹喉药 …… (970)
07062 吹喉散 …… (970)
07063 吹喉散 …… (970)
07064 吹喉散 …… (971)
07065 吹喉散 …… (971)
07066 吹鼻散 …… (971)
07067 吹鼻散 …… (971)
07068 吹鼻散 …… (971)
07069 吹霞散 …… (971)
07070 吹耳麝陈散 …… (971)
07071 吹喉七宝散 …… (971)
07072 吹喉朴消散 …… (971)
07073 吹喉珠黄散 …… (971)
07074 吹鼻六神散 …… (971)
07075 吹鼻桂辛散 …… (972)
07076 吹喉珍珠生肌散 … (972)

时

07077 时毒药 …… (972)
07078 时珍正容散 …… (972)

助

07079 助仙丹 …… (972)
07080 助老汤 …… (972)
07081 助阳丸 …… (972)
07082 助阳丹 …… (972)
07083 助阳汤 …… (972)
07084 助阴汤 …… (972)
07085 助胃膏 …… (973)
07086 助胃膏 …… (973)
07087 助思汤 …… (973)
07088 助脾丸 …… (973)
07089 助脾散 …… (973)
07090 助气仙丹 …… (973)
07091 助气补漏汤 …… (973)
07092 助气解麻汤 …… (973)
07093 助血调肠汤 …… (973)
07094 助阴孕子丸 …… (974)
07095 助肝益脑汤 …… (974)

吴

07096 吴仙丹 …… (974)
07097 吴蓝饮 …… (974)
07098 吴茱萸丸 …… (974)
07099 吴茱萸丸 …… (974)
07100 吴茱萸丸 …… (975)
07101 吴茱萸丸 …… (975)
07102 吴茱萸丸 …… (975)
07103 吴茱萸丸 …… (975)
07104 吴茱萸丸 …… (975)
07105 吴茱萸丸 …… (975)
07106 吴茱萸丸 …… (975)
07107 吴茱萸汤 …… (975)
07108 吴茱萸汤 …… (976)
07109 吴茱萸汤 …… (976)
07110 吴茱萸汤 …… (977)
07111 吴茱萸汤 …… (977)
07112 吴茱萸汤 …… (977)
07113 吴茱萸汤 …… (977)
07114 吴茱萸汤 …… (977)
07115 吴茱萸汤 …… (977)
07116 吴茱萸汤 …… (977)
07117 吴茱萸汤 …… (977)
07118 吴茱萸汤 …… (977)
07119 吴茱萸汤 …… (977)
07120 吴茱萸饮 …… (977)
07121 吴茱萸散 …… (978)
07122 吴茱萸散 …… (978)
07123 吴茱萸散 …… (978)
07124 吴茱萸散 …… (978)
07125 吴茱萸散 …… (978)
07126 吴茱萸散 …… (978)
07127 吴茱萸散 …… (978)

07128 吴茱萸散 …… (978)
07129 吴茱萸散 …… (978)
07130 吴茱萸散 …… (979)
07131 吴茱萸散 …… (979)
07132 吴茱萸粥 …… (979)
07133 吴茱萸煎 …… (979)
07134 吴茱四逆汤 …… (979)
07135 吴萸天水散 …… (979)
07136 吴茱萸加附子汤 … (979)

足

07137 足麻贴药 …… (979)

旱

07138 旱莲丸 …… (979)
07139 旱莲膏 …… (979)

囲

07140 囲药 …… (980)
07141 囲毒散 …… (980)
07142 囲药铁井栏 …… (980)

牡

07143 牡丹丸 …… (980)
07144 牡丹丸 …… (980)
07145 牡丹汤 …… (980)
07146 牡丹汤 …… (980)
07147 牡丹汤 …… (980)
07148 牡丹饮 …… (981)
07149 牡丹散 …… (981)
07150 牡丹散 …… (981)
07151 牡丹散 …… (981)
07152 牡丹散 …… (981)
07153 牡蛎丸 …… (981)
07154 牡蛎丸 …… (981)
07155 牡蛎丸 …… (981)
07156 牡蛎丸 …… (981)
07157 牡蛎丸 …… (982)
07158 牡蛎汤 …… (982)
07159 牡蛎汤 …… (982)
07160 牡蛎粉 …… (982)
07161 牡蛎散 …… (982)
07162 牡蛎散 …… (982)
07163 牡蛎散 …… (982)
07164 牡蛎散 …… (982)
07165 牡蛎散 …… (982)
07166 牡蛎散 …… (983)
07167 牡蛎散 …… (983)
07168 牡蛎散 …… (983)
07169 牡蛎散 …… (983)
07170 牡蛎散 …… (983)
07171 牡蛎散 …… (983)
07172 牡蛎散 …… (983)
07173 牡蛎散 …… (983)
07174 牡蛎散 …… (983)
07175 牡蛎散 …… (984)
07176 牡蛎散 …… (984)
07177 牡蛎散 …… (984)
07178 牡丹皮汤 …… (984)
07179 牡丹皮汤 …… (984)
07180 牡丹皮散 …… (984)
07181 牡丹煎丸 …… (984)
07182 牡蛎粉散 …… (984)
07183 牡黄二子煎 …… (984)
07184 牡蛎泽泻散 …… (985)

针

07185 针砂丸 …… (985)
07186 针砂丸 …… (985)
07187 针砂汤 …… (985)
07188 针砂五果丸 …… (985)
07189 针砂平胃散 …… (985)

钉

07190 钉胎丸 …… (985)

利

07191 利气丸 …… (986)
07192 利气散 …… (986)
07193 利气散 …… (986)
07194 利胆丸 …… (986)
07195 利胆汤 …… (986)
07196 利济汤 …… (986)
07197 利膈丸 …… (986)
07198 利膈丸 …… (986)
07199 利膈汤 …… (987)
07200 利膈汤 …… (987)
07201 利气泄火汤 …… (987)
07202 利水调经汤 …… (987)
07203 利水渗湿汤 …… (987)
07204 利血通经丸 …… (987)
07205 利肝分水饮 …… (987)
07206 利肝解湿汤 …… (988)
07207 利胆排石片 …… (988)
07208 利窍聪耳方 …… (988)
07209 利湿通经汤 …… (988)
07210 利膈化痰丸 …… (988)
07211 利膈豁痰汤 …… (988)

乱

07212 乱发散 …… (988)
07213 乱发灰散 …… (988)

秃

07214 秃鸡丸 …… (988)
07215 秃鸡丸 …… (989)
07216 秃鸡散 …… (989)
07217 秃疮膏 …… (989)

体

07218 体气散 …… (989)

何

07219 何人饮 …… (989)
07220 何首乌丸 …… (989)
07221 何首乌丸 …… (989)
07222 何首乌汤 …… (989)
07223 何首乌酒 …… (990)
07224 何首乌散 …… (990)
07225 何首乌散 …… (990)
07226 何仙姑庆世丹 …… (990)

佐

07227 佐关煎 …… (990)
07228 佐金丸 …… (990)
07229 佐脾丸 …… (990)

伸

07230 伸筋膏 …… (990)
07231 伸腰散 …… (991)
07232 伸筋草洗方 …… (991)

佝

07233 佝偻汤 …… (991)

住

07234 住痛散 …… (991)

佛

07235 佛手散 …… (991)
07236 佛手散 …… (991)
07237 佛手散 …… (991)
07238 佛手散 …… (991)
07239 佛手膏 …… (991)
07240 佛手膏 …… (992)
07241 佛手柑粥 …… (992)

皂

07242 皂子丸 …… (992)
07243 皂角丸 …… (992)
07244 皂角丸 …… (992)
07245 皂角丸 …… (992)
07246 皂角丸 …… (992)
07247 皂角散 …… (992)
07248 皂角散 …… (993)
07249 皂角膏 …… (993)
07250 皂刺散 …… (993)
07251 皂矾散 …… (993)
07252 皂荚丸 …… (993)
07253 皂荚丸 …… (993)
07254 皂荚丸 …… (993)
07255 皂荚丸 …… (993)
07256 皂荚丸 …… (993)
07257 皂荚丸 …… (994)
07258 皂荚丸 …… (994)
07259 皂荚散 …… (994)
07260 皂荚散 …… (994)
07261 皂萝散 …… (994)
07262 皂棘散 …… (994)
07263 皂角煎丸 …… (994)
07264 皂荚针散 …… (994)
07265 皂角化痰丸 …… (994)
07266 皂角苦参丸 …… (994)
07267 皂荚膏摩方 …… (995)

身

07268 身痛逐瘀汤 …… (995)

彻

07269 彻清膏 …… (995)

近

07270 近制清暑益气汤 … (995)

返

07271 返阴丹 …… (995)
07272 返精丸 …… (995)
07273 返睛丸 …… (996)
07274 返魂丹 …… (996)
07275 返汗化水汤 …… (996)

含

07276 含丸 …… (996)
07277 含煎 …… (996)
07278 含化丸 …… (997)
07279 含化丸 …… (997)
07280 含咽丸 …… (997)
07281 含香丸 …… (997)
07282 含杏仁丸 …… (997)
07283 含化三黄丸 …… (997)
07284 含化升麻散 …… (997)
07285 含化菖蒲煎 …… (997)

谷

07286 谷神丸 …… (997)
07287 谷神丸 …… (997)
07288 谷疸丸 …… (998)
07289 谷疸丸 …… (998)
07290 谷精丸 …… (998)
07291 谷精散 …… (998)
07292 谷糠油 …… (998)
07293 谷精夜明散 …… (998)
07294 谷芽枳实小柴胡汤 …… (998)

坐

07295 坐药 …… (998)
07296 坐药 …… (998)
07297 坐药龙盐膏 …… (998)

犹

07298 犹龙汤 …… (999)

饭

07299 饭虎汤 …… (999)
07300 饭匙丸 …… (999)

肝

07301 肝疳丸 …… (999)
07302 肝肾双补丸 …… (999)
07303 肝肾两舒汤 …… (999)
07304 肝肾兼补丸 …… (999)
07305 肝胆两益汤 …… (999)

肚

07306 肚脐饼 …… (1000)
07307 肚蒜丸 …… (1000)

肠

07308 肠宁汤 …… (1000)
07309 肠痈丸 …… (1000)
07310 肠痈汤 …… (1000)
07311 肠痈汤 …… (1000)
07312 肠覃汤 …… (1000)
07313 肠风黑散 …… (1000)
07314 肠粘连缓解汤 … (1001)

龟

07315 龟甲汤 …… (1001)
07316 龟甲散 …… (1001)
07317 龟甲散 …… (1001)
07318 龟头散 …… (1001)
07319 龟豕膏 …… (1001)
07320 龟版丸 …… (1001)
07321 龟柏丸 …… (1001)
07322 龟背丸 …… (1001)
07323 龟背散 …… (1001)
07324 龟胸丸 …… (1002)
07325 龟胸丸 …… (1002)
07326 龟龄集 …… (1002)
07327 龟柏姜梔丸 …… (1002)
07328 龟首种子丸 …… (1002)
07329 龟鹿二仙胶 …… (1003)

免

07330 免怀汤 …… (1003)

弃

07331 弃杖散 …… (1003)

辛

07332 辛芎散 …… (1003)

07333 辛夷丸 …… (1003)
07334 辛夷汤 …… (1004)
07335 辛夷散 …… (1004)
07336 辛香散 …… (1004)
07337 辛夷消风散 …… (1004)
07338 辛夷清肺饮 …… (1004)
07339 辛凉清解饮 …… (1004)
07340 辛黄三白汤 …… (1004)
07341 辛温平补汤 …… (1004)

应

07342 应圣丸 …… (1004)
07343 应神散 …… (1004)
07344 应痛丸 …… (1004)
07345 应痛丸 …… (1005)
07346 应痛丸 …… (1005)
07347 应验打老丹 …… (1005)

疔

07348 疔毒复生汤 …… (1005)

疗

07349 疗淋散 …… (1005)
07350 疗本滋肾丸 …… (1005)

快

07351 快气汤 …… (1005)
07352 快活丸 …… (1006)
07353 快膈丸 …… (1006)
07354 快膈汤 …… (1006)
07355 快气饼子 …… (1006)
07356 快脾饮子 …… (1006)
07357 快膈消食丸 …… (1006)

冻

07358 冻疮膏 …… (1006)
07359 冻疮膏 …… (1006)

冷

07360 冷风汤 …… (1006)
07361 冷补丸 …… (1006)
07362 冷哮丸 …… (1007)
07363 冷香饮子 …… (1007)

冶

07364 冶金煎 …… (1007)

沐

07365 沐头方 …… (1007)
07366 沐头汤 …… (1007)

沙

07367 沙参散 …… (1007)
07368 沙参粥 …… (1007)
07369 沙参麦冬汤 …… (1008)

沃

07370 沃雪汤 …… (1008)
07371 沃雪汤 …… (1008)
07372 沃焦散 …… (1008)

没

07373 没沉汤 …… (1008)
07374 没药丸 …… (1008)
07375 没药丸 …… (1009)
07376 没药丸 …… (1009)
07377 没药丸 …… (1009)
07378 没药散 …… (1009)
07379 没药散 …… (1009)
07380 没药散 …… (1009)
07381 没药散 …… (1009)
07382 没药散 …… (1009)
07383 没药散 …… (1010)
07384 没石子丸 …… (1010)
07385 没石子丸 …… (1010)
07386 没药四生丹 …… (1010)
07387 没药降圣丹 …… (1010)
07388 没药除痛散 …… (1010)

沉

07389 沉水膏 …… (1010)
07390 沉附汤 …… (1010)
07391 沉香丸 …… (1011)
07392 沉香丸 …… (1011)
07393 沉香散 …… (1011)
07394 沉香散 …… (1011)
07395 沉香散 …… (1011)
07396 沉香散 …… (1011)
07397 沉香散 …… (1011)
07398 沉香散 …… (1011)
07399 沉香散 …… (1011)
07400 沉香散 …… (1011)
07401 沉香散 …… (1011)
07402 沉香散 …… (1012)
07403 沉香散 …… (1012)
07404 沉香散 …… (1012)
07405 沉香散 …… (1012)
07406 沉香散 …… (1012)
07407 沉香煎丸 …… (1012)
07408 沉香天麻汤 …… (1012)
07409 沉香开隔散 …… (1013)
07410 沉香不二丸 …… (1013)
07411 沉香内消丸 …… (1013)
07412 沉香化气丹 …… (1013)
07413 沉香化滞丸 …… (1013)
07414 沉香化滞丸 …… (1013)
07415 沉香化痰丸 …… (1013)
07416 沉香匀气散 …… (1014)
07417 沉香四磨汤 …… (1014)
07418 沉香永寿丸 …… (1014)
07419 沉香圣饼子 …… (1014)
07420 沉香百补丸 …… (1014)
07421 沉香交泰丸 …… (1014)
07422 沉香快气丸 …… (1014)
07423 沉香陈曲丸 …… (1015)
07424 沉香附子丸 …… (1015)
07425 沉香定痛丸 …… (1015)
07426 沉香降气丸 …… (1015)
07427 沉香降气丹 …… (1015)
07428 沉香降气汤 …… (1015)
07429 沉香降气散 …… (1016)
07430 沉香降气散 …… (1016)
07431 沉香养气丸 …… (1016)
07432 沉香养脾汤 …… (1016)
07433 沉香桂附丸 …… (1016)
07434 沉香鹿茸丸 …… (1016)
07435 沉香琥珀丸 …… (1016)
07436 沉香温胃丸 …… (1017)
07437 沉香温胃丸 …… (1017)
07438 沉香温脾汤 …… (1017)
07439 沉香磁石丸 …… (1017)
07440 沉香磨脾散 …… (1017)
07441 沉桂芦巴丸 …… (1017)
07442 沉麝香茸丸 …… (1017)
07443 沉香苁蓉煎丸 … (1017)

沈

07444 沈氏止涎汤 …… (1018)
07445 沈氏止蛔丹 …… (1018)
07446 沈氏中暑汤 …… (1018)

07447 沈氏双砂丸 …… (1018)
07448 沈氏血癥丸 …… (1018)
07449 沈氏固胞汤 …… (1018)
07450 沈氏固泉丸 …… (1018)
07451 沈氏荷叶汤 …… (1018)
07452 沈氏棉子丸 …… (1019)
07453 沈氏温脐丸 …… (1019)

状

07454 状元丸 …… (1019)

羌

07455 羌乌散 …… (1019)
07456 羌吴汤 …… (1019)
07457 羌附汤 …… (1019)
07458 羌活丸 …… (1019)
07459 羌活丸 …… (1019)
07460 羌活丸 …… (1019)
07461 羌活丸 …… (1019)
07462 羌活汤 …… (1020)
07463 羌活汤 …… (1020)
07464 羌活汤 …… (1020)
07465 羌活汤 …… (1020)
07466 羌活汤 …… (1020)
07467 羌活汤 …… (1020)
07468 羌活汤 …… (1020)
07469 羌活汤 …… (1021)
07470 羌活散 …… (1021)
07471 羌活散 …… (1021)
07472 羌活散 …… (1021)
07473 羌活散 …… (1021)
07474 羌活散 …… (1021)
07475 羌活散 …… (1021)
07476 羌活散 …… (1021)
07477 羌活散 …… (1021)
07478 羌活散 …… (1022)
07479 羌活散 …… (1022)
07480 羌活散 …… (1022)
07481 羌活散 …… (1022)
07482 羌活散 …… (1022)
07483 羌活散 …… (1022)
07484 羌活散 …… (1022)
07485 羌活散 …… (1022)
07486 羌活散 …… (1023)
07487 羌活散 …… (1023)
07488 羌活散 …… (1023)
07489 羌活膏 …… (1023)
07490 羌活膏 …… (1023)
07491 羌活膏 …… (1023)
07492 羌菊丸 …… (1023)
07493 羌防内托散 …… (1023)
07494 羌防四苓散 …… (1023)
07495 羌防行痹汤 …… (1024)
07496 羌活石膏散 …… (1024)
07497 羌活冲和汤 …… (1024)
07498 羌活导滞汤 …… (1024)
07499 羌活防风汤 …… (1024)
07500 羌活防风散 …… (1024)
07501 羌活苍术汤 …… (1024)
07502 羌活连翘汤 …… (1024)
07503 羌活附子汤 …… (1024)
07504 羌活附子汤 …… (1025)
07505 羌活胜风汤 …… (1025)
07506 羌活胜湿汤 …… (1025)
07507 羌活胜湿汤 …… (1025)
07508 羌活胜湿汤 …… (1025)
07509 羌活退翳丸 …… (1025)
07510 羌活退翳汤 …… (1026)
07511 羌活退翳膏 …… (1026)
07512 羌活除风汤 …… (1026)
07513 羌活除湿汤 …… (1026)
07514 羌活桃仁汤 …… (1026)
07515 羌活续断汤 …… (1026)
07516 羌活黑附汤 …… (1026)
07517 羌活蒲蓝汤 …… (1026)
07518 羌葶蒲薄汤 …… (1027)

完

07519 完肌散 …… (1027)
07520 完肌散 …… (1027)
07521 完肺饮 …… (1027)
07522 完带汤 …… (1027)
07523 完胞饮 …… (1028)
07524 完疮散 …… (1028)
07525 完舌围药 …… (1028)

牢

07526 牢牙散 …… (1028)
07527 牢牙散 …… (1028)
07528 牢牙散 …… (1028)
07529 牢牙散 …… (1028)
07530 牢牙地黄散 …… (1028)

诃

07531 诃子丸 …… (1028)
07532 诃子丸 …… (1029)
07533 诃子丸 …… (1029)
07534 诃子汤 …… (1029)
07535 诃子饮 …… (1029)
07536 诃子散 …… (1029)
07537 诃子散 …… (1029)
07538 诃子散 …… (1029)
07539 诃术散 …… (1030)
07540 诃黎丸 …… (1030)
07541 诃子皮散 …… (1030)
07542 诃子灰散 …… (1030)
07543 诃黎勒丸 …… (1030)
07544 诃黎勒丸 …… (1030)
07545 诃黎勒丸 …… (1030)
07546 诃黎勒丸 …… (1031)
07547 诃黎勒丸 …… (1031)
07548 诃黎勒丸 …… (1031)
07549 诃黎勒丸 …… (1031)
07550 诃黎勒丸 …… (1031)
07551 诃黎勒汤 …… (1031)
07552 诃黎勒散 …… (1031)
07553 诃黎勒散 …… (1032)
07554 诃黎勒散 …… (1032)
07555 诃黎勒散 …… (1032)
07556 诃黎勒散 …… (1032)
07557 诃黎勒散 …… (1032)
07558 诃黎勒散 …… (1032)

补

07559 补下丸 …… (1032)
07560 补元汤 …… (1032)
07561 补天丸 …… (1032)
07562 补天丸 …… (1033)
07563 补天丹 …… (1033)
07564 补天串 …… (1033)
07565 补中丸 …… (1033)
07566 补中汤 …… (1033)
07567 补中汤 …… (1033)
07568 补气汤 …… (1033)
07569 补气汤 …… (1033)

07570 补气汤 …… (1034)
07571 补火丸 …… (1034)
07572 补心丸 …… (1034)
07573 补心丸 …… (1034)
07574 补心丸 …… (1034)
07575 补心丸 …… (1034)
07576 补心丸 …… (1034)
07577 补心丹 …… (1034)
07578 补心丹 …… (1034)
07579 补心汤 …… (1035)
07580 补心汤 …… (1035)
07581 补心汤 …… (1035)
07582 补心汤 …… (1035)
07583 补心汤 …… (1035)
07584 补心汤 …… (1035)
07585 补血汤 …… (1035)
07586 补阳汤 …… (1035)
07587 补阴丸 …… (1036)
07588 补阴丸 …… (1036)
07589 补阴丸 …… (1036)
07590 补阴丸 …… (1036)
07591 补阴丹 …… (1036)
07592 补阴汤 …… (1036)
07593 补阴散 …… (1037)
07594 补肝丸 …… (1037)
07595 补肝丸 …… (1037)
07596 补肝丸 …… (1037)
07597 补肝丸 …… (1037)
07598 补肝汤 …… (1037)
07599 补肝汤 …… (1037)
07600 补肝汤 …… (1038)
07601 补肝汤 …… (1038)
07602 补肝汤 …… (1038)
07603 补肝汤 …… (1038)
07604 补肝汤 …… (1038)
07605 补肝散 …… (1038)
07606 补肝散 …… (1038)
07607 补肝散 …… (1038)
07608 补肝散 …… (1038)
07609 补肾丸 …… (1039)
07610 补肾丸 …… (1039)
07611 补肾丸 …… (1039)
07612 补肾丸 …… (1039)
07613 补肾丸 …… (1039)
07614 补肾丸 …… (1039)
07615 补肾丸 …… (1039)
07616 补肾丸 …… (1040)
07617 补肾丸 …… (1040)
07618 补肾丸 …… (1040)
07619 补肾丸 …… (1040)
07620 补肾汤 …… (1040)
07621 补肾汤 …… (1040)
07622 补肾汤 …… (1040)
07623 补肾汤 …… (1040)
07624 补肾汤 …… (1040)
07625 补肾羹 …… (1040)
07626 补肺丸 …… (1040)
07627 补肺丸 …… (1041)
07628 补肺汤 …… (1041)
07629 补肺汤 …… (1041)
07630 补肺汤 …… (1041)
07631 补肺汤 …… (1041)
07632 补肺汤 …… (1041)
07633 补肺饮 …… (1041)
07634 补肺散 …… (1041)
07635 补肺散 …… (1042)
07636 补肺散 …… (1042)
07637 补肺散 …… (1042)
07638 补肺散 …… (1042)
07639 补荣汤 …… (1042)
07640 补胃丸 …… (1042)
07641 补胆汤 …… (1042)
07642 补胎汤 …… (1042)
07643 补胎饮 …… (1042)
07644 补宫丸 …… (1042)
07645 补宫汤 …… (1043)
07646 补真丸 …… (1043)
07647 补真丸 …… (1043)
07648 补真丹 …… (1043)
07649 补真丹 …… (1043)
07650 补真汤 …… (1043)
07651 补脑丸 …… (1043)
07652 补益丸 …… (1043)
07653 补虚汤 …… (1044)
07654 补虚汤 …… (1044)
07655 补虚饮 …… (1044)
07656 补脬汤 …… (1044)
07657 补筋丸 …… (1044)
07658 补脾丸 …… (1044)
07659 补脾丸 …… (1044)
07660 补脾汤 …… (1044)
07661 补脾饮 …… (1044)
07662 补脾散 …… (1045)
07663 补漏丹 …… (1045)
07664 补髓丹 …… (1045)
07665 补骨脂丸 …… (1045)
07666 补骨脂丸 …… (1045)
07667 补骨脂丸 …… (1045)
07668 补骨脂丸 …… (1045)
07669 补骨脂丸 …… (1045)
07670 补骨脂丸 …… (1046)
07671 补骨脂丸 …… (1046)
07672 补骨脂酊 …… (1046)
07673 补骨脂散 …… (1046)
07674 补骨脂煎 …… (1046)
07675 补瞳神丹 …… (1046)
07676 补天大造丸 …… (1046)
07677 补天大造丸 …… (1047)
07678 补天育麟丹 …… (1047)
07679 补中地黄汤 …… (1047)
07680 补中虎潜丸 …… (1047)
07681 补中养胃汤 …… (1047)
07682 补中益气汤 …… (1047)
07683 补中益气汤 …… (1049)
07684 补中益气汤 …… (1050)
07685 补气升胁饮 …… (1050)
07686 补气运脾丸 …… (1050)
07687 补气固经丸 …… (1050)
07688 补气养血汤 …… (1050)
07689 补气养荣汤 …… (1050)
07690 补气黄耆汤 …… (1050)
07691 补气解晕汤 …… (1050)
07692 补心四物汤 …… (1050)
07693 补心宁志丸 …… (1051)
07694 补心神效丸 …… (1051)
07695 补水宁神汤 …… (1051)
07696 补北健行汤 …… (1051)
07697 补血当归汤 …… (1051)
07698 补血行滞汤 …… (1051)
07699 补血定痛汤 …… (1051)
07700 补血荣筋丸 …… (1051)
07701 补血祛风汤 …… (1052)
07702 补阳还五汤 …… (1052)
07703 补阳抑阴汤 …… (1052)
07704 补阳滋阴汤 …… (1052)

07705 补阴止汗汤 …… (1052)
07706 补阴再造丸 …… (1053)
07707 补阴助阳汤 …… (1053)
07708 补阴降火汤 …… (1053)
07709 补阴益气煎 …… (1053)
07710 补阴益气煎 …… (1053)
07711 补肝四物汤 …… (1053)
07712 补肝抑肺汤 …… (1053)
07713 补肾生肝饮 …… (1053)
07714 补肾地黄丸 …… (1054)
07715 补肾地黄丸 …… (1054)
07716 补肾养脾丸 …… (1054)
07717 补肾益键汤 …… (1054)
07718 补肾鹿茸丸 …… (1054)
07719 补肾磁石丸 …… (1054)
07720 补肾磁石丸 …… (1054)
07721 补肾磁石丸 …… (1054)
07722 补肾磁石汤 …… (1055)
07723 补肺阿胶散 …… (1055)
07724 补肺养阴汤 …… (1055)
07725 补肺黄耆散 …… (1055)
07726 补肺清金饮 …… (1055)
07727 补经固真汤 …… (1055)
07728 补胃燥痰汤 …… (1055)
07729 补胆防风汤 …… (1055)
07730 补络补管汤 …… (1056)
07731 补真玉露丸 …… (1056)
07732 补脑振痿汤 …… (1056)
07733 补益石斛丸 …… (1056)
07734 补益杞圆酒 …… (1056)
07735 补益附子丸 …… (1056)
07736 补益消癌汤 …… (1056)
07737 补虚生荣汤 …… (1056)
07738 补虚利腰汤 …… (1056)
07739 补偏愈风汤 …… (1057)
07740 补脾人参散 …… (1057)
07741 补漏生肌散 …… (1057)
07742 补髓青娥丸 …… (1057)
07743 补肾肉苁蓉丸 … (1057)
07744 补肾虚磁石丸 … (1057)
07745 补肾脂肭脐丸 … (1057)
07746 补益干地黄丸 … (1058)
07747 补益黄耆浸酒 … (1058)
07748 补益覆盆子丸 … (1058)
07749 补脾诃黎勒散 … (1058)
07750 补天五子种玉丹 … (1058)
07751 补气升阳和中汤 … (1058)
07752 补肝元柏子仁丸 … (1058)
07753 补益钟乳天雄丸 … (1059)
07754 补脾胃泻阴火升阳汤 …… (1059)

启

07755 启关散 …… (1059)
07756 启宫丸 …… (1059)
07757 启峻汤 …… (1059)
07758 启窍汤 …… (1059)
07759 启脾丸 …… (1060)
07760 启脾散 …… (1060)
07761 启膈散 …… (1060)
07762 启心救胃汤 …… (1060)

良

07763 良附丸 …… (1060)
07764 良姜丸 …… (1060)
07765 良姜汤 …… (1061)
07766 良姜散 …… (1061)
07767 良姜散 …… (1061)
07768 良姜粥 …… (1061)

张

07769 张天师草还丹 … (1061)
07770 张走马家飞步丸 … (1061)

改

07771 改容丸 …… (1061)
07772 改容膏 …… (1061)
07773 改容膏 …… (1061)

灵

07774 灵乌丹 …… (1061)
07775 灵龙丹 …… (1061)
07776 灵仙丸 …… (1062)
07777 灵圣散 …… (1062)
07778 灵龟散 …… (1062)
07779 灵雨汤 …… (1062)
07780 灵宝丹 …… (1062)
07781 灵宝散 …… (1062)
07782 灵砂丹 …… (1062)
07783 灵砂丹 …… (1062)
07784 灵香丸 …… (1062)
07785 灵速散 …… (1063)
07786 灵脂丸 …… (1063)
07787 灵脂酒 …… (1063)
07788 灵脂散 …… (1063)
07789 灵脂醋 …… (1063)
07790 灵效丸 …… (1063)
07791 灵液丹 …… (1063)
07792 灵乌二仁膏 …… (1063)
07793 灵宝化积膏 …… (1063)
07794 灵砂安神丸 …… (1063)
07795 灵脂厚朴散 …… (1064)

君

07796 君子丸 …… (1064)
07797 君朴丸 …… (1064)

阿

07798 阿胶丸 …… (1064)
07799 阿胶丸 …… (1064)
07800 阿胶丸 …… (1064)
07801 阿胶丸 …… (1064)
07802 阿胶丸 …… (1064)
07803 阿胶丸 …… (1064)
07804 阿胶丸 …… (1065)
07805 阿胶丸 …… (1065)
07806 阿胶丸 …… (1065)
07807 阿胶丸 …… (1065)
07808 阿胶汤 …… (1065)
07809 阿胶汤 …… (1065)
07810 阿胶汤 …… (1065)
07811 阿胶汤 …… (1065)
07812 阿胶汤 …… (1065)
07813 阿胶汤 …… (1065)
07814 阿胶汤 …… (1066)
07815 阿胶汤 …… (1066)
07816 阿胶饮 …… (1066)
07817 阿胶散 …… (1066)
07818 阿胶散 …… (1066)
07819 阿胶散 …… (1066)
07820 阿胶散 …… (1066)
07821 阿胶散 …… (1066)
07822 阿胶散 …… (1066)
07823 阿胶散 …… (1067)
07824 阿胶散 …… (1067)

07825 阿胶散 …… (1067)
07826 阿胶散 …… (1067)
07827 阿胶粥 …… (1067)
07828 阿魏丸 …… (1067)
07829 阿魏丸 …… (1067)
07830 阿魏丸 …… (1067)
07831 阿魏丸 …… (1067)
07832 阿魏丸 …… (1068)
07833 阿魏丸 …… (1068)
07834 阿魏散 …… (1068)
07835 阿魏膏 …… (1068)
07836 阿艾五苓散 …… (1068)
07837 阿胶五苓散 …… (1068)
07838 阿胶四苓散 …… (1068)
07839 阿胶地黄丸 …… (1068)
07840 阿胶枳壳丸 …… (1069)
07841 阿胶梅连丸 …… (1069)
07842 阿胶黄连汤 …… (1069)
07843 阿胶麻仁汤 …… (1069)
07844 阿魏化痞散 …… (1069)
07845 阿魏软坚散 …… (1069)
07846 阿魏撞气丸 …… (1069)
07847 阿魏麝香散 …… (1070)
07848 阿胶鸡子黄汤 … (1070)

陈

07849 陈曲丸 …… (1070)
07850 陈茗粥 …… (1070)
07851 陈黄汤 …… (1070)
07852 陈槐汤 …… (1070)
07853 陈橘丸 …… (1070)
07854 陈橘皮丸 …… (1070)
07855 陈橘皮汤 …… (1071)
07856 陈橘皮饮 …… (1071)
07857 陈橘皮散 …… (1071)
07858 陈橘皮散 …… (1071)
07859 陈橘皮散 …… (1071)
07860 陈橘皮散 …… (1071)
07861 陈橘皮散 …… (1071)
07862 陈橘皮散 …… (1071)
07863 陈橘皮散 …… (1071)
07864 陈氏乌须丸 …… (1071)
07865 陈氏玉龙汤 …… (1072)
07866 陈氏咳喘膏 …… (1072)
07867 陈皮石韦散 …… (1072)
07868 陈皮滑石散 …… (1072)
07869 陈米消胀丸 …… (1072)
07870 陈氏脓窠疮药 … (1072)
07871 陈苓术芍甘连汤 … (1072)

附

07872 附子丸 …… (1072)
07873 附子丸 …… (1072)
07874 附子丸 …… (1072)
07875 附子丸 …… (1073)
07876 附子丸 …… (1073)
07877 附子丸 …… (1073)
07878 附子丸 …… (1073)
07879 附子丸 …… (1073)
07880 附子丸 …… (1073)
07881 附子丸 …… (1073)
07882 附子汤 …… (1073)
07883 附子汤 …… (1074)
07884 附子汤 …… (1074)
07885 附子汤 …… (1074)
07886 附子汤 …… (1074)
07887 附子汤 …… (1074)
07888 附子汤 …… (1074)
07889 附子汤 …… (1075)
07890 附子汤 …… (1075)
07891 附子汤 …… (1075)
07892 附子饮 …… (1075)
07893 附子饼 …… (1075)
07894 附子散 …… (1075)
07895 附子散 …… (1075)
07896 附子散 …… (1075)
07897 附子散 …… (1076)
07898 附子散 …… (1076)
07899 附子散 …… (1076)
07900 附子散 …… (1076)
07901 附子散 …… (1076)
07902 附子散 …… (1076)
07903 附子散 …… (1076)
07904 附子散 …… (1076)
07905 附子散 …… (1076)
07906 附子散 …… (1077)
07907 附子散 …… (1077)
07908 附子散 …… (1077)
07909 附子散 …… (1077)
07910 附子散 …… (1077)
07911 附子散 …… (1077)
07912 附子散 …… (1077)
07913 附子粥 …… (1077)
07914 附子煎 …… (1077)
07915 附子煎 …… (1078)
07916 附子煎 …… (1078)
07917 附子膏 …… (1078)
07918 附术汤 …… (1078)
07919 附苓散 …… (1078)
07920 附苓丸 …… (1078)
07921 附矾丸 …… (1078)
07922 附栀煎 …… (1078)
07923 附香散 …… (1078)
07924 附姜汤 …… (1078)
07925 附桂汤 …… (1079)
07926 附子丁香散 …… (1079)
07927 附子八物汤 …… (1079)
07928 附子八物汤 …… (1079)
07929 附子乌鸡丸 …… (1079)
07930 附子六合汤 …… (1079)
07931 附子六物汤 …… (1079)
07932 附子四逆汤 …… (1080)
07933 附子败毒汤 …… (1080)
07934 附子泻心汤 …… (1080)
07935 附子建中汤 …… (1080)
07936 附子茴香散 …… (1080)
07937 附子神曲丸 …… (1080)
07938 附子都气丸 …… (1081)
07939 附子涂脚方 …… (1081)
07940 附子理中丸 …… (1081)
07941 附子理中汤 …… (1081)
07942 附子理中汤 …… (1082)
07943 附子理苓汤 …… (1082)
07944 附子绿豆汤 …… (1082)
07945 附子温中丸 …… (1082)
07946 附子温中汤 …… (1083)
07947 附子粳米汤 …… (1083)
07948 附子粳米汤 …… (1083)
07949 附子粳米汤 …… (1083)
07950 附虎四斤丸 …… (1083)
07951 附姜归桂汤 …… (1083)
07952 附姜白通汤 …… (1083)
07953 附桂理中丸 …… (1083)
07954 附子大建中汤 … (1084)
07955 附子赤石脂丸 … (1084)

07956 附子赤石脂丸 …（1084）
07957 附姜归桂参甘汤 …（1084）
07958 附子理中汤去甘草加厚朴广皮汤 …（1084）

陀

07959 陀柏散 ……（1084）
07960 陀僧散 ……（1084）
07961 陀僧散 ……（1084）
07962 陀僧散 ……（1084）

坠

07963 坠痰丸 ……（1084）
07964 坠痰丸 ……（1085）
07965 坠痰丸 ……（1085）
07966 坠膈丸 ……（1085）
07967 坠翳丸 ……（1085）
07968 坠翳丸 ……（1085）
07969 坠翳散 ……（1085）
07970 坠血明目丸 ……（1085）
07971 坠翳明目丸 ……（1085）

妙

07972 妙功丸 ……（1085）
07973 妙功丸 ……（1085）
07974 妙应丸 ……（1086）
07975 妙应丸 ……（1086）
07976 妙应丸 ……（1086）
07977 妙应丸 ……（1086）
07978 妙应丸 ……（1086）
07979 妙应丸 ……（1086）
07980 妙应丹 ……（1086）
07981 妙灵丹 ……（1087）
07982 妙灵散 ……（1087）
07983 妙贴散 ……（1087）
07984 妙香丸 ……（1087）
07985 妙香散 ……（1087）
07986 妙功十一丸 ……（1088）
07987 妙功藏用丸 ……（1088）
07988 妙贴止疼散 ……（1088）

忍

07989 忍冬丸 ……（1088）
07990 忍冬汤 ……（1088）
07991 忍冬汤 ……（1088）
07992 忍冬膏 ……（1089）

鸡

07993 鸡子羹 ……（1089）
07994 鸡矢醴 ……（1089）
07995 鸡汁粥 ……（1089）
07996 鸡舌散 ……（1089）
07997 鸡舌散 ……（1089）
07998 鸡苏丸 ……（1089）
07999 鸡苏散 ……（1089）
08000 鸡苏散 ……（1089）
08001 鸡肝药 ……（1090）
08002 鸡肝粥 ……（1090）
08003 鸡肠散 ……（1090）
08004 鸡肠散 ……（1090）
08005 鸡鸣丸 ……（1090）
08006 鸡鸣散 ……（1090）
08007 鸡金散 ……（1091）
08008 鸡肺散 ……（1091）
08009 鸡胆丸 ……（1091）
08010 鸡胫汤 ……（1091）
08011 鸡黄散 ……（1091）
08012 鸡清散 ……（1091）
08013 鸡蛋饮 ……（1091）
08014 鸡蛋油 ……（1091）
08015 鸡内金丸 ……（1091）
08016 鸡肉煎丸 ……（1091）
08017 鸡舌香汤 ……（1092）
08018 鸡舌香散 ……（1092）
08019 鸡血藤膏 ……（1092）
08020 鸡血藤膏 ……（1092）
08021 鸡苏饮子 ……（1092）
08022 鸡屎白散 ……（1092）
08023 鸡屎米煎 ……（1092）
08024 鸡屎醴散 ……（1092）
08025 鸡腿胫丸 ……（1092）
08026 鸡腿胫汤 ……（1093）
08027 鸡腿胫散 ……（1093）
08028 鸡子黄连膏 ……（1093）
08029 鸡峰乌金散 ……（1093）
08030 鸡胫茅根汤 ……（1093）

驱

08031 驱风丹 ……（1093）
08032 驱风散 ……（1094）
08033 驱风散 ……（1094）
08034 驱风膏 ……（1094）
08035 驱风膏 ……（1094）
08036 驱邪汤 ……（1094）
08037 驱疟汤 ……（1094）
08038 驱绦汤 ……（1094）
08039 驱秽散 ……（1094）
08040 驱痫散 ……（1094）
08041 驱风上清散 ……（1094）
08042 驱风化痰汤 ……（1095）
08043 驱风换肌膏 ……（1095）
08044 驱毒保脱汤 ……（1095）
08045 驱蛔承气汤 ……（1095）
08046 驱风散热饮子 …（1095）

驴

08047 驴尿一物饮 ……（1095）

纯

08048 纯阳正气丸 ……（1095）
08049 纯阳青蛾丹 ……（1095）
08050 纯阳真人养脏汤 …（1095）

纳

08051 纳气丸 ……（1096）

下　册

（八　画）

玫

08052 玫瑰丸 ……（1097）

青

08053 青药 ……（1097）
08054 青云散 ……（1097）
08055 青龙丸 ……（1097）
08056 青龙丸 ……（1097）
08057 青龙丹 ……（1097）
08058 青龙散 ……（1098）

08059 青龙散 …… (1098)
08060 青龙散 …… (1098)
08061 青白散 …… (1098)
08062 青丝散 …… (1098)
08063 青皮汤 …… (1098)
08064 青芝丹 …… (1098)
08065 青冰散 …… (1098)
08066 青阳汤 …… (1098)
08067 青韦散 …… (1098)
08068 青苋膏 …… (1099)
08069 青吹散 …… (1099)
08070 青灵丹 …… (1099)
08071 青盂汤 …… (1099)
08072 青枣散 …… (1099)
08073 青矾散 …… (1099)
08074 青果膏 …… (1100)
08075 青金丹 …… (1100)
08076 青金丹 …… (1100)
08077 青金丹 …… (1100)
08078 青金丹 …… (1100)
08079 青金散 …… (1100)
08080 青金散 …… (1100)
08081 青金散 …… (1100)
08082 青金散 …… (1100)
08083 青金散 …… (1101)
08084 青金散 …… (1101)
08085 青金散 …… (1101)
08086 青鱼散 …… (1101)
08087 青宝丹 …… (1101)
08088 青胃散 …… (1101)
08089 青衿散 …… (1101)
08090 青珠丸 …… (1101)
08091 青莲膏 …… (1101)
08092 青盐丸 …… (1101)
08093 青铅饮 …… (1102)
08094 青凉膏 …… (1102)
08095 青娥丸 …… (1102)
08096 青娥丸 …… (1102)
08097 青梅散 …… (1102)
08098 青黄汤 …… (1102)
08099 青黄散 …… (1103)
08100 青黄散 …… (1103)
08101 青黄散 …… (1103)
08102 青铜散 …… (1103)
08103 青葙丸 …… (1103)
08104 青蛤散 …… (1103)
08105 青蒿丸 …… (1103)
08106 青蒿丸 …… (1103)
08107 青蒿丸 …… (1103)
08108 青蒿丸 …… (1104)
08109 青蒿饮 …… (1104)
08110 青蒿散 …… (1104)
08111 青蒿散 …… (1104)
08112 青蒿煎 …… (1104)
08113 青蒲散 …… (1104)
08114 青橘丸 …… (1104)
08115 青橘饮 …… (1104)
08116 青黛丸 …… (1104)
08117 青黛汤 …… (1105)
08118 青黛散 …… (1105)
08119 青黛散 …… (1105)
08120 青黛散 …… (1105)
08121 青黛散 …… (1105)
08122 青黛散 …… (1105)
08123 青露散 …… (1105)
08124 青露散 …… (1105)
08125 青囊丸 …… (1105)
08126 青麟丸 …… (1105)
08127 青麟丸 …… (1106)
08128 青木香丸 …… (1106)
08129 青木香丸 …… (1106)
08130 青木香丸 …… (1106)
08131 青竹茹汤 …… (1107)
08132 青葙子丸 …… (1107)
08133 青葙子丸 …… (1107)
08134 青葙子汤 …… (1107)
08135 青葙子散 …… (1107)
08136 青蒿饮子 …… (1107)
08137 青蒿煎丸 …… (1107)
08138 青礞石丸 …… (1107)
08139 青囊药酒 …… (1108)
08140 青云独步丹 …… (1108)
08141 青风还睛散 …… (1108)
08142 青风羚羊汤 …… (1108)
08143 青皮甘草散 …… (1108)
08144 青州白丸子 …… (1108)
08145 青羊补肝汤 …… (1109)
08146 青金泻白散 …… (1109)
08147 青草苍柏汤 …… (1109)
08148 青铅六味饮 …… (1109)
08149 青蒿鳖甲汤 …… (1109)
08150 青黛石膏汤 …… (1109)
08151 青黛海石丸 …… (1109)
08152 青黛雄黄散 …… (1109)
08153 青娥丸加黄柏知母方 …… (1109)

表

08154 表解散 …… (1110)
08155 表实六合汤 …… (1110)

坤

08156 坤宁散 …… (1110)
08157 坤顺丹 …… (1110)
08158 坤顺汤 …… (1110)

林

08159 林钟丸 …… (1110)

枇

08160 枇杷散 …… (1110)
08161 枇杷膏 …… (1111)
08162 枇杷叶丸 …… (1111)
08163 枇杷叶汤 …… (1111)
08164 枇杷叶汤 …… (1111)
08165 枇杷叶汤 …… (1111)
08166 枇杷叶散 …… (1111)
08167 枇杷叶散 …… (1111)
08168 枇杷叶散 …… (1111)
08169 枇杷叶散 …… (1111)
08170 枇杷叶散 …… (1112)
08171 枇杷叶散 …… (1112)
08172 枇杷叶散 …… (1112)
08173 枇杷叶散 …… (1112)
08174 枇杷叶粥 …… (1112)
08175 枇杷叶膏 …… (1112)
08176 枇杷地榆液 …… (1112)
08177 枇杷清肺饮 …… (1112)

杵

08178 杵糠丸 …… (1113)

板

08179 板蓝根汤 …… (1113)
08180 板蓝根复方 …… (1113)

松

08181 松膏 …… (1113)
08182 松节酒 …… (1113)
08183 松节酒 …… (1113)
08184 松花散 …… (1113)
08185 松枝酒 …… (1113)
08186 松实丸 …… (1113)
08187 松脂散 …… (1114)
08188 松脂散 …… (1114)
08189 松脂膏 …… (1114)
08190 松叶浸酒 …… (1114)
08191 松香合剂 …… (1114)
08192 松黄通幽汤 …… (1114)

耵

08193 耵耳通气散 …… (1114)

取

08194 取虫丸 …… (1114)
08195 取渊汤 …… (1114)
08196 取痣饼 …… (1114)
08197 取癖丸 …… (1115)

刺

08198 刺蓟汤 …… (1115)
08199 刺蓟散 …… (1115)
08200 刺蓟散 …… (1115)
08201 刺猬皮散 …… (1115)

苦

08202 苦参丸 …… (1115)
08203 苦参丸 …… (1115)
08204 苦参丸 …… (1115)
08205 苦参丸 …… (1115)
08206 苦参丸 …… (1115)
08207 苦参丸 …… (1115)
08208 苦参丸 …… (1116)
08209 苦参丸 …… (1116)
08210 苦参丸 …… (1116)
08211 苦参丸 …… (1116)
08212 苦参丸 …… (1116)
08213 苦参水 …… (1116)
08214 苦参汤 …… (1116)
08215 苦参汤 …… (1116)
08216 苦参汤 …… (1116)
08217 苦参汤 …… (1116)
08218 苦参汤 …… (1117)
08219 苦参汤 …… (1117)
08220 苦参汤 …… (1117)
08221 苦参酒 …… (1117)
08222 苦参散 …… (1117)
08223 苦参散 …… (1117)
08224 苦参散 …… (1117)
08225 苦参膏 …… (1117)
08226 苦酒汤 …… (1117)
08227 苦楝丸 …… (1118)
08228 苦楝丸 …… (1118)
08229 苦楝汤 …… (1118)
08230 苦参子膏 …… (1118)
08231 苦参洗剂 …… (1118)
08232 苦葶苈丸 …… (1118)
08233 苦楝子膏 …… (1118)
08234 苦楝根粥 …… (1118)
08235 苦参子仁酊 …… (1119)
08236 苦参地黄丸 …… (1119)
08237 苦参栀子丸 …… (1119)
08238 苦酒鸡子汤 …… (1119)
08239 苦参苡米洗剂 … (1119)

英

08240 英藤汤 …… (1119)
08241 英夷戒烟丸 …… (1119)

苓

08242 苓术汤 …… (1119)
08243 苓术散 …… (1119)
08244 苓术二陈煎 …… (1119)
08245 苓术菟丝丸 …… (1119)
08246 苓泽石膏汤 …… (1120)
08247 苓姜术桂汤 …… (1120)
08248 苓桂理中汤 …… (1120)
08249 苓夏补中汤 …… (1120)
08250 苓蔻人参汤 …… (1120)
08251 苓甘五味姜辛汤 … (1120)
08252 苓甘五味加姜辛半杏大黄汤 …… (1120)
08253 苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤 …… (1120)

茄

08254 茄根散 …… (1121)
08255 茄子根浸酒 …… (1121)

茅

08256 茅花汤 …… (1121)
08257 茅花散 …… (1121)
08258 茅根汤 …… (1121)
08259 茅根汤 …… (1121)
08260 茅根汤 …… (1121)
08261 茅根汤 …… (1121)
08262 茅根饮 …… (1121)
08263 茅根散 …… (1121)
08264 茅根散 …… (1121)
08265 茅根散 …… (1122)
08266 茅根饮子 …… (1122)

枣

08267 枣仁汤 …… (1122)
08268 枣仁温胆汤 …… (1122)
08269 枣肉平胃散 …… (1122)
08270 枣花豁还睛散 … (1122)

雨

08271 雨益汤 …… (1122)

矾

08272 矾飞散 …… (1122)
08273 矾石丸 …… (1122)
08274 矾石丸 …… (1122)
08275 矾石丸 …… (1123)
08276 矾石丸 …… (1123)
08277 矾石汤 …… (1123)
08278 矾石汤 …… (1123)
08279 矾石散 …… (1123)
08280 矾石散 …… (1123)
08281 矾石散 …… (1123)
08282 矾石散 …… (1123)
08283 矾石散 …… (1123)
08284 矾石煎 …… (1123)
08285 矾附丸 …… (1123)
08286 矾黄丸 …… (1123)
08287 矾葛散 …… (1124)
08288 矾硫散 …… (1124)

08289 矾石软膏 …… (1124)
08290 矾石四物汤 …… (1124)
08291 矾石消垒散 …… (1124)

郁

08292 郁金丸 …… (1124)
08293 郁金丹 …… (1124)
08294 郁金汤 …… (1124)
08295 郁金散 …… (1124)
08296 郁金散 …… (1124)
08297 郁金散 …… (1125)
08298 郁金散 …… (1125)
08299 郁金散 …… (1125)
08300 郁金散 …… (1125)
08301 郁金散 …… (1125)
08302 郁金散 …… (1125)
08303 郁金散 …… (1125)
08304 郁李仁丸 …… (1125)
08305 郁李仁丸 …… (1125)
08306 郁李仁丸 …… (1125)
08307 郁李仁丸 …… (1125)
08308 郁李仁丸 …… (1126)
08309 郁李仁丸 …… (1126)
08310 郁李仁汤 …… (1126)
08311 郁李仁饮 …… (1126)
08312 郁李仁散 …… (1126)
08313 郁李仁散 …… (1126)
08314 郁李仁粥 …… (1126)
08315 郁金酒调散 …… (1126)
08316 郁金黄连丸 …… (1126)

奔

08317 奔豚丸 …… (1127)
08318 奔豚汤 …… (1127)

奇

08319 奇妙丸 …… (1127)
08320 奇效丸 …… (1127)
08321 奇应轻脚丸 …… (1127)
08322 奇效四物汤 …… (1128)
08323 奇验金箍散 …… (1128)
08324 奇授藿香丸 …… (1128)

顶

08325 顶风立效散 …… (1128)

拔

08326 拔针散 …… (1128)
08327 拔疔丹 …… (1128)
08328 拔疔散 …… (1128)
08329 拔疔散 …… (1128)
08330 拔疔膏 …… (1128)
08331 拔毒散 …… (1129)
08332 拔毒散 …… (1129)
08333 拔毒散 …… (1129)
08334 拔毒散 …… (1129)
08335 拔毒膏 …… (1129)
08336 拔管丸 …… (1129)
08337 拔毒生肌散 …… (1129)

拈

08338 拈痛丸 …… (1129)
08339 拈痛丸 …… (1129)
08340 拈痛散 …… (1129)
08341 拈痛散 …… (1129)

抽

08342 抽刀散 …… (1130)
08343 抽刀散 …… (1130)
08344 抽刀散 …… (1130)
08345 抽风汤 …… (1130)
08346 抽风散 …… (1130)
08347 抽风散 …… (1130)
08348 抽薪汤 …… (1130)
08349 抽薪汤 …… (1130)
08350 抽薪饮 …… (1130)
08351 抽薪散 …… (1130)

抵

08352 抵圣丸 …… (1131)
08353 抵圣汤 …… (1131)
08354 抵圣散 …… (1131)
08355 抵圣散 …… (1131)
08356 抵圣散 …… (1131)
08357 抵当丸 …… (1131)
08358 抵当汤 …… (1132)
08359 抵痰汤 …… (1132)
08360 抵当乌头桂枝汤 … (1133)

抱

08361 抱龙丸 …… (1133)
08362 抱龙丸 …… (1133)
08363 抱龙丸 …… (1133)
08364 抱龙丸 …… (1133)
08365 抱龙丸 …… (1134)
08366 抱胆丸 …… (1134)

拂

08367 拂手汤 …… (1134)

拨

08368 拨粥 …… (1134)
08369 拨云丸 …… (1134)
08370 拨云丹 …… (1134)
08371 拨云汤 …… (1134)
08372 拨云散 …… (1135)
08373 拨云散 …… (1135)
08374 拨云散 …… (1135)
08375 拨云散 …… (1135)
08376 拨云散 …… (1135)
08377 拨云散 …… (1135)
08378 拨云膏 …… (1135)
08379 拨风云膏 …… (1135)
08380 拨云退翳丸 …… (1136)
08381 拨云退翳丸 …… (1136)
08382 拨云退翳丹 …… (1136)

转

08383 转天汤 …… (1136)
08384 转舌丸 …… (1137)
08385 转呆丹 …… (1137)

斩

08386 斩关丸 …… (1137)

软

08387 软坚汤 …… (1137)
08388 软坚汤 …… (1137)
08389 软金丹 …… (1137)
08390 软金丹 …… (1137)
08391 软石膏丸 …… (1137)
08392 软硬皂子丸 …… (1138)

卧

08393 卧龙丹 …… (1138)
08394 卧龙丹 …… (1138)

虎

08395 虎杖汤 …… (1138)
08396 虎杖汤 …… (1138)
08397 虎杖液 …… (1138)
08398 虎杖散 …… (1138)
08399 虎杖散 …… (1138)
08400 虎杖散 …… (1139)
08401 虎龟丸 …… (1139)
08402 虎挣散 …… (1139)
08403 虎骨丸 …… (1139)
08404 虎骨酒 …… (1139)
08405 虎骨散 …… (1139)
08406 虎骨散 …… (1139)
08407 虎潜丸 …… (1140)
08408 虎杖二金汤 …… (1140)
08409 虎骨木瓜丸 …… (1140)
08410 虎骨四斤丸 …… (1140)

肾

08411 肾气丸 …… (1140)
08412 肾气丸 …… (1142)
08413 肾气丸 …… (1142)
08414 肾约汤 …… (1142)
08415 肾沥汤 …… (1142)
08416 肾沥汤 …… (1143)
08417 肾沥汤 …… (1143)
08418 肾沥汤 …… (1143)
08419 肾热汤 …… (1143)
08420 肾疸汤 …… (1143)
08421 肾着汤 …… (1144)
08422 肾着汤 …… (1144)
08423 肾着散 …… (1144)
08424 肾炎汤Ⅰ号 …… (1144)
08425 肾炎汤Ⅱ号 …… (1144)
08426 肾浊秘精丸 …… (1144)
08427 肾着灵效汤 …… (1144)

咀

08428 咀华清喉丹 …… (1144)

鸣

08429 鸣金汤 …… (1145)

败

08430 败龟散 …… (1145)
08431 败毒汤 …… (1145)
08432 败毒汤 …… (1145)
08433 败毒饮 …… (1145)
08434 败毒散 …… (1145)
08435 败毒散 …… (1145)
08436 败毒散 …… (1145)
08437 败酱汤 …… (1145)
08438 败酱汤 …… (1145)
08439 败酱散 …… (1146)
08440 败酱草散 …… (1146)
08441 败酱草膏 …… (1146)
08442 败毒圣神丹 …… (1146)
08443 败毒荆防汤 …… (1146)
08444 败毒流气饮 …… (1146)
08445 败毒流气散 …… (1146)
08446 败毒黄连丸 …… (1146)

明

08447 明心汤 …… (1146)
08448 明目丸 …… (1146)
08449 明目枕 …… (1147)
08450 明睛散 …… (1147)
08451 明目二陈汤 …… (1147)
08452 明目大补汤 …… (1147)
08453 明目四物汤 …… (1147)
08454 明目四神丸 …… (1147)
08455 明目地黄丸 …… (1147)
08456 明目地黄丸 …… (1147)
08457 明目地黄丸 …… (1147)
08458 明目地黄丸 …… (1148)
08459 明目至宝丹 …… (1148)
08460 明目壮水丸 …… (1148)
08461 明目夜光丸 …… (1148)
08462 明目细辛汤 …… (1148)
08463 明目退翳汤 …… (1148)
08464 明目益肾丸 …… (1148)
08465 明目蒺藜丸 …… (1148)
08466 明目硼消水 …… (1149)
08467 明目地肤子散 … (1149)
08468 明眼生熟地黄丸 …… (1149)

畅

08469 畅卫舒中汤 …… (1149)

昆

08470 昆仑丸 …… (1149)
08471 昆布丸 …… (1149)
08472 昆布丸 …… (1149)
08473 昆布丸 …… (1150)
08474 昆布丸 …… (1150)
08475 昆布丸 …… (1150)
08476 昆布汤 …… (1150)
08477 昆布散 …… (1150)
08478 昆布散 …… (1150)
08479 昆花汤 …… (1150)

昌

08480 昌阳泻心汤 …… (1150)

易

08481 易产汤 …… (1150)
08482 易黄汤 …… (1150)

罗

08483 罗汉散 …… (1151)
08484 罗备金散 …… (1151)

国

08485 国老汤 …… (1151)
08486 国老散 …… (1151)

固

08487 固下丸 …… (1151)
08488 固下丸 …… (1151)
08489 固下丸 …… (1151)
08490 固元汤 …… (1151)
08491 固元煎 …… (1151)
08492 固气汤 …… (1152)
08493 固心丹 …… (1152)
08494 固本丸 …… (1152)
08495 固本丸 …… (1152)
08496 固本丹 …… (1152)
08497 固本散 …… (1152)
08498 固阳丸 …… (1152)
08499 固阳丹 …… (1152)
08500 固阳丹 …… (1153)
08501 固阳汤 …… (1153)
08502 固阴煎 …… (1153)

00001 一上散

【方源】《古今医鉴》卷十五引王少泉方。

【异名】一扫光(《回春》卷八)

【组成】枯白矾一两 硫黄七钱 人言三分 五倍子五钱（炒） 花椒五钱

【用法】上为末。香油煎鸡子令熟，去鸡子，以油调搽。

【主治】疥疮。

00002 一见消

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】川乌三两 草乌三两 川倍子四两 闹羊花三两 大黄六两 血余四两 生南星三两 生半夏三两 白及五两 白蔹五两 当归六两 土贝母四两 金银花三两 白芷四两

【用法】上药用麻油五斤，浸三日，煎枯去滓滤净，入红丹四十两收成膏，水浸去火毒。任意摊贴。初起疖毒，须留头摊贴。

【主治】风气，折伤并痈毒。

00003 一甲煎

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】生牡蛎二两（碾细）

【用法】水八杯，煮取三杯，分温三服。

【主治】①《温病条辨》：温病下后，大便溏甚，一昼夜三四次，脉仍数者。②《中医杂志》(1965；12:19)：伤寒肠出血。

【方论选录】下法后，当数日不大便，今反溏而频数，非其人真阳素虚，即下之不得其道，有亡阴之虑。若以复脉滑润，是以存阴之品，反为泻阴之用。故以牡蛎一味，单用则力大，既能存阴，又涩大便，且清在里之余热，一物而三用之。

【临证举例】伤寒肠出血 《中医杂志》(1965；12:19)：靖某，男性，18岁。罹病已十六日，经服中西药无效，近两日病情加剧。脉虚大，体温39.5℃，头晕耳聋，口干舌燥，渴而不欲饮，手足心热，甚于手足背，大便稀黑如柏油样。辨证为温病瘀血（伤寒肠出血）拟以一甲煎治疗。一剂诸证悉减，连服四剂基本痊愈。继服一甲复脉汤数剂，巩固疗效。

00004 一仙丹

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】川牛膝 威灵仙各等分

【用法】上为细末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心酒下；白滚汤亦可。

【主治】脚疾肿痛拘挛。

【宜忌】忌茶。

00005 一扫光

【方源】《医统》卷八十一。

【组成】硫黄二钱 雄黄一钱 水银二钱 花椒五分 大风子肉一钱 蛇床子 枯矾各五分 信一分 潮脑三分 槟榔五分

【用法】上为细末。用柏油调，擦疮上。即刻愈。

【主治】疥疮。

00006 一扫光

【方源】《寿世保元》卷九。

【异名】玉绣球。

【组成】大风子肉四十九个 杏仁（泡，去皮）四十九个 花椒（去子）四十九个（上三味同研）白矾（生用，另研）二钱 茶叶（另研末）一钱 樟脑二钱（另研） 轻粉一钱

【用法】上和匀再研，听用。先以槐、柳、桃、楮、桑五木枝煎汤洗疥，拭干，将前药量疥多少，用柏油入盐少许，热和药擦上，每日搽三次。

【主治】诸疮疥癞。

【宜忌】忌羊、鸡、鱼、猪头等物。

00007 一扫光

【方源】《疡科心得集·方汇》卷一。

【组成】烟膏二斤 苦参二斤 红砒一两 明矾半斤 川椒（炒）半斤 升药底半斤 硫黄半斤 樟冰四两 枯矾半斤 蛇床子半斤 小麦（炒黑）八合 大枫子二百粒（一方有黄柏、木鳖肉、水银、轻粉、无升药底、小麦）

【用法】上为细末，熟猪油二斤四两捣为丸，如龙眼大。浸水后，用擦疮上。

【主治】①《疡科心得集·方汇》：一切疥疮。②《外科传薪集》：小儿头疮。

【宜忌】破皮者不可用。

00008 一扫光

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】炉甘石五钱（为末，乳汁，涂沾碗底内。再以艾叶一团点着，将碗覆盖艾火，下透孔，以艾火浇完为度） 艾叶灰三分 梅片三分

【用法】上为末。香油和抹。即愈。

【主治】两眼周围赤烂，惟小眦为甚，疼轻痒重，羞明流泪，常结成黄色痂，将睫毛胶粘成束，迎风为甚。

【宜忌】避风，忌辣。

00009 一字金

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】僵蚕（去丝） 威灵仙（去芦）各四钱

明白矾（生用）二钱　细辛（去叶）一钱　甘草（生用）二钱半

【用法】 上锉，焙，为末。每服一字至半钱，姜汁、沸汤调和，以指抹入牙关内。治卒中，急慢惊证，口噤不开，用盐梅汤调擦上下牙根二处。

【主治】 初生婴儿，七日之外，欲成脐风撮口；及卒中，急慢惊风，牙关紧急，痰涎上壅。

00010　一字散

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】 芎藭　乌头（生用，去皮脐）　麻黄（去根节）　地龙（炒）　防风（去叉）　羌活（去芦头）　白附子（炮）　天麻各半两　草乌头（去皮尖）半钱

【用法】 上为细散。每服一字，食后葱白、薄荷茶调下；温酒亦得。

【主治】 风不仁，手足痹麻；及妇人血风，头面虚肿，遍身风疥。

00011　一字散

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】 大天南星半两（微炮裂）　蝉壳（去土）一分（微炒）　干蝎一分　僵蚕（去丝嘴）一分

【用法】 上为细末，次入荞麦面一分。用酸石榴一个，去瓤、子，留壳，将诸药入在内，盐泥封裹，于灶内慢火烧至泥干燥为度，取出，再研极细。每服一字，温酒调下，不拘时候。

【功用】 退风爽神。

【主治】 ①《卫生总微》：小儿天钓眼上。②《永乐大典》引《仁存方》：小儿惊风，神困不醒。

00012　一字散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】 全蝎八个　防风一分　僵蚕半两　天麻一两　川乌一个（炮）　南星一个（重半两以上者，研为末，生姜自然汁和成一块，入朱砂一粒豆大，乳香一粒豆大，和南星，用文武火煨令香熟，切作薄片，焙干）

【用法】 上为末，入麝香、朱砂各半两，拌匀。每服一字，食后葱、酒、茶调下

【主治】 偏正头疼。

00013　一字散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 蝎梢　细辛　荜茇　胡椒　高良姜　露蜂房（炒黄）各半两

【用法】 上为细末。每用半字，噙温水，随痛左右鼻内搐。更用半钱，揉牙痛处，有津即吐，误咽不妨，不拘时候。

【主治】 牙齿疼痛。

00014　一字散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】 蜈蚣（去毒，炒）一条　全蝎一对（炒，去毒并头足）

【用法】 上为细末。发时用一字擦牙缝内；或吹鼻中。

【主治】 破伤风抽搐，角弓反张。

00015　一阴煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 生地二钱　熟地三五钱　芍药二钱　麦冬二钱　甘草一钱　牛膝一钱半　丹参二钱

【用法】 水二钟，煎七分，食远温服。

【功用】《中医内科临床治疗学》：滋阴清热，润肺止咳，止血。

【主治】 肾水真阴虚损，而脉证多阳，虚火发热，及阴虚动血；或疟疾伤寒，屡散之后，取汗既多，脉气虚弱而烦渴不止，潮热不退者。

【加减】 如火盛躁烦者，加真龟胶二三钱化服；如气虚者，间用人参一二钱；如心虚不眠多汗者，加枣仁、当归各一二钱；如汗多烦躁者，加五味子十粒，或加山药、山萸肉；如见微火者，加女贞子一二钱；如虚火上浮，或吐血，或衄血不止者，加泽泻一二钱、茜根二钱，或加川续断一二钱以涩之，亦妙。

【方论选录】《中医内科临床治疗学》：二地、芍药、麦冬滋阴清热，合丹参以清血分之热，合牛膝引血下行，甘草调和诸药，故全方有滋阴清热，润肺止咳，兼有止血之功。

【备考】 此治水亏火胜之剂，故曰“一阴”。

00016　一块气

【方源】《扶寿精方》。

【异名】 神仙一块气（《回春》卷三）。

【组成】 香附（童便浸，炒）　陈皮　青皮　三棱　莪术各一两　神曲　麦芽　郁金　莱菔子　黄连　槟榔　白牵牛（头末）各五钱　枳实　皂角　百草霜各二钱五分

【用法】 上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服二十五或三十丸，视疾上下，为食后先，热酒、姜汤任下。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：消食化积，理气散郁。

【主治】 ①《扶寿精方》：男女噎膈痞满，胸胁刺痛，癥瘕疝气。②《回春》：诸气食积。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：孕

妇勿服。忌生冷硬物。

00017 一枝春

【方源】《增补内经拾遗》卷三引《经验良方》。

【组成】桂枝 薄荷 白芷 威灵仙各四钱

【用法】水一钟，酒一钟，煎八分，温服。

【主治】伤湿一身尽痛。

【备考】桂枝温能解表，故曰一枝春。

00018 一奇散

【方源】《医钞类编》卷十七。

【组成】当归 川芎等分（俱酒洗，炒） 生姜五片

【用法】焙干，同煎服。

【主治】产后血虚头痛。

00019 一抹散

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】天南星 草乌头各一枚（生用）

【用法】上为细散。用羊蹄根捣绞自然汁调涂。不过三两上，愈。

【主治】干癣。

00020 一炁丹

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 制附子各等分

【用法】炼蜜为丸，如绿豆大。每用滚白汤送下三五分或一钱。

【主治】脾肾虚寒，不时易泻，腹痛，阳痿，怯寒。

【备考】此即参附汤之变方也。

00021 一金散

【方源】《朱氏集验方》卷七。

【组成】大蒜

【用法】上为末。左鼻贴左脚心，右鼻贴右脚心，两鼻贴两脚心。

【主治】鼻衄，出血过多，昏冒欲死。

00022 一服饮

【方源】《医说》卷三引《类编》。

【异名】香附散（《百一》卷八）、立应散（《元戎》）、二妙香良散（《医学入门》卷七）、姜附散（《不知医必要》卷二）、一服散（《寿世新编、杂方》）。

【组成】高良姜 香附子各等分

【用法】上为细末。每服二钱匕，空心温陈米饮送下。

【主治】①《医说》：心脾疼痛，数年不愈者。②《百一》：心腹疠痛。

【临证举例】心脾疼痛 福唐梁绲，心脾疼痛，数年之间，不能得愈，服药无效。后得良药一服饮，服而果验。

【备考】①《百一》：入盐米饮调服。二味须各炒，同炒即不效。②《不知医必要》：因寒痛者，姜加倍；因气痛者，附加倍。

00023 一贯煎

【方源】《续名医类案》卷十八。

【组成】北沙参 麦冬 地黄 当归 杞子 川楝

【功用】滋阴舒肝。

①《广东中医》（1960；3:13）：养肝血，滋肝阴，泄肝气。②《中医杂志》（1963；10:18）：滋阴充液，疏肝调气。③《山东中医学院学报》（1979；3:12）：补肝肾之阴，佐以疏肝。

【主治】肝肾阴虚气郁，胸胁脘腹胀痛，吞酸吐苦，咽干口燥，及疝气瘕聚，舌红少苔，脉弦细而数。现用于慢性肝炎。

①《续名医类案》：胁痛，吞酸，吐酸，疝瘕，一切肝病。②《中风斠诠》：肝肾阴虚，气滞不运，胁肋攻痛，胸腹膨胀，脉反细弱，或虚弦，舌无津液，喉嗌干燥者；肝肾阴虚而腿膝痠痛，足软无力，或环跳、髀枢、足跟掣痛者。亦治痢后风及鹤膝、附骨、环跳诸证。③《山东中医学院学报》（1979；3:12）：慢性肝炎。

【宜忌】兼有停痰积饮，舌苔浊垢，无阴虚征象者忌用。

①《中风斠诠》：此方下舌无津液四字最宜注意，如其舌苔浊垢，即非所宜。②《新医学》（1976；4:190）：凡属气、血、火、食、痰、湿诸郁，不兼阴虚者忌用。③《医方发挥》：本方滋腻之药较多，对于兼有停痰积饮者，不宜使用。

【加减】口苦而燥者，加酒连。

【方论选录】①《中风斠诠》：胁肋胀痛，脘腹撑撑，多是肝气不疏，刚水恣肆为病。治标之法，每用香燥破气，轻病得之，往往有效。然燥必伤阴，液愈虚而气愈滞，势必渐发渐剧，而香药、气药不足恃矣。若脉虚舌燥，津液已伤者，则行气之药尤为鸩毒。柳洲此方，虽是从固本丸、集灵膏二方脱化而来，独加一味川楝，以调肝气之横逆，顺其条达之性，是为涵养肝阴第一良药。凡血液不充，络脉窒滞，肝胆不驯，而变生诸病者，皆可用之。②《中医杂志》（1963；10:18）：一贯煎方剂组织缜密，配伍精当，它的唯一特点是以脏腑制化关系来作为遣药立法的依据。本方主治是肝病，肾为肝之母，滋水即能生木，以柔其刚悍之性，故以

地黄、杞子滋水益肾为君。肺主一身之气，肺气清肃，则治节有权，诸脏皆滋其灌溉，而且养金即能制木，以平其横逆之威；胃为阳土，本受木克，但土旺则不受其侮，故以沙参、麦冬清肺益胃，二者为臣。当归入肝，补血活血，而辛香善于走散，乃血中气药，故用以为佐。更加一味川楝，泄肝通络，条达气机，故用以为使。合为滋水涵木，疏土养金的良方。③《方剂学》：方中重用生地为君，滋阴养血以补肝肾。以沙参、麦冬、当归、枸杞子为臣，配合君药滋阴养血生津以柔肝。更用少量川楝子疏泄肝气为佐使。共奏滋阴柔肝以代疏肝之功。其中川楝子性味苦寒，虽有苦燥伤阴之说，但若配在滋阴养血的方药中，却无伤阴之害，而这正是本方有别于以理气疏肝为主的诸方的不同之点。本方与逍遥散同治肝郁胁痛，但两方证候各不相同。逍遥散以情志不遂而肝气滞郁，引起胁痛；且以肝逆而乘脾，兼现神倦食少，故以疏肝解郁，健脾养血为治。一贯煎则以肝阴不足，气郁生热，而致胁痛；且以郁热不散而犯胃，兼现吞酸吐苦，故以滋养肝肾，疏泄肝气立法。

【临证举例】 ①疝气 《续名医类案》：鲍二官，六七岁时，忽腹痛发热，夜则痛热尤甚。或谓风寒，发散之不效；又谓生冷，消导之不效。诊之面洁白，微有青气。按其虚里，则筑筑然跳动；问其痛，云在少腹；验其囊，则两睾丸无有。曰：此疝痛也。与生地、甘杞、沙参、麦冬、川楝、米仁，二剂痊愈。②慢性肝炎 《山东中医学院学报》(1979；3:12)：礼某，女，40岁。患慢性肝炎数年，肝功能反复不正常，症状表现时轻时重，每遇劳累后加剧，经年服中药、西药，始终不愈。就诊时肝区隐痛，腹胀，食欲不振，失眠多梦，全身乏力，下午下肢轻度泛肿，自觉发热，有时午后低烧，月经量少。舌红苔少，脉沉细少数。肝肋下可及，有触痛，质中等。蛋白电泳r25%。辨证为肝肾阴虚有热。予一贯煎加丹参30克，活血、行血、凉血，祛瘀生新，以通为补。患者服二十七剂后症状完全消失。复查肝功、电泳均正常。恢复工作，随访一年未见复发。

00024 一厘丹

【方源】《救伤秘旨》。

【组成】 无名异二分 自然铜（煅）八分 狗脊二钱 麝香五分

【用法】 上为细末。每服一分，酒冲服。

【功用】 接骨。

【主治】 骨折。

00025 一炮散

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】 真犀黄七分 雄精一钱 冰片七分 皮消一钱五分（炒，研）

【用法】 先将消炒燥，同雄精研细，方入犀黄、冰片，共研极匀，瓷瓶密贮，勿使出气。临用吹入喉间。

【主治】 单乳蛾并及喉风、喉痹，饮食不下，命在危急。

00026 一笔消

【方源】《外科全生集》卷三。

【组成】 大黄二两 藤黄一两 明矾 蟾酥各五钱 麝香 乳香 没药各二钱

【用法】 用蜗牛捣烂作锭。小疖空出疖顶，取锭醋磨，新笔蘸药圈围，干再圈，圈至疖消方止。

【功用】《全国中药成药处方集》（吉林方）：消瘀散肿，活血去毒，镇痛止痒。

【主治】 ①《外科全生集》：疖毒。②《全国中药成药处方集》（吉林方）：痈疽发背，各种疔毒恶疮，及一切无名肿毒。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（武汉方）：白疽忌用。

00027 一笑散

【方源】《内经拾遗》卷一。

【组成】 干姜（炒黑） 山栀子（姜汁拌炒）

【用法】 上用酒二钟，煎八分，不拘时服。

【主治】 心疝心痛及寒痛。

【备考】 医中至宝。心疝心痛，服之立止，不觉欣然而一笑也。

00028 一黄散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 黄连一两

【用法】 上为末，水调，摊碗内；内加川山甲一分，烧黑，以纯黑为度；加轻粉五钱、冰片二分。槐枝煎油调敷，或猪胆汁调敷。

【主治】 黄水疮，头疡，眉疡，耳蚀，羊胡子，燕窠，脓窠等疮。

00029 一捻金

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【异名】 牛黄散(《人己良方》)，人参一捻金、一捻金散(《全国中药成药处方集》吉林方)。

【组成】 大黄 槟榔 二牵牛 人参各等分

【用法】 上为细末。每服一字，蜜水调下。

【主治】 小儿风痰、积滞，气喘咳嗽，肚腹膨胀，不思饮食，大便秘结。

①《古今医鉴》：小儿风痰吐沫，气喘咳嗽，肚腹膨胀，不思饮食；肺胀喘满，胸高气急，两胁搧动，陷下作坑，两鼻窍张，闷乱嗽渴，声嗄不鸣，痰涎潮塞，俗云马脾风。②《金鉴》：初生儿腹中脐粪未下，腹满气短，呕吐不乳；滞热丹毒，见唇焦便秘者。③《全国中药成药处方集》（哈尔滨方）：乳食积聚，乳呕逆，不思饮食，晡热自汗，睡卧惊醒，大便秘结，小溲不利。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（哈尔滨方）：忌食生冷、油腻。

00030 一捻散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】青黛 黄柏 诃子（炮） 密陀僧各等分 枯白矾少许 蒲黄少许

【用法】上每用少许，贴口疮处。

【主治】小儿口疮。

00031 一粒金

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】荜茇不以多少（研细，用猪胆汁拌匀，再入胆内，悬阴干）藁本 玄胡索 白芷 川芎各一两 青黛二两

【用法】上为末，入制荜茇末一两半，用无根水为丸。每用一丸，长流水化开搐鼻，以铜钱二三文，口咬定出涎。

【主治】①《丹溪心法》：偏头风。②《医部全录》：耳鸣、耳聋、或耳中生疮。

00032 一粒笑

【方源】《饲鹤亭集方》。

【异名】牙痛一粒笑（《全国中药成药处方集》杭州方）。

【组成】麝香五分 蟾酥一钱 乳香 没药各三钱

【用法】上为末，蟾酥为丸，如白芥子大。用置患处，待化。如虚火牙痛，兼服知柏八味丸，老人兼服少丹。

【主治】风火虫牙痛，及牙根浮肿。

00033 一紫散

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】紫金皮（童便浸七日，晒干） 生地黄各等分

【用法】上砍烂。茶清调匀敷贴。余处伤不用制。

【主治】伤损眼胞，青黑紫色肿痛。

00034 一煎散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】当归尾 皂角刺 桃仁泥 川山甲（炒） 甘草各二钱 黄连一钱五分 枳壳 槟榔 乌药 白芷 天花粉 赤芍 生地各一钱 红花五分 玄明粉 大黄各三钱

【用法】用水二钟，浸一宿，次早煎一滚，空心服之。俟行三四次，以薄粥补之。

【主治】脏毒初起肿痛。

00035 一醉饮

【方源】方出《宋史·钱乙传》卷四六二，名见《一草亭》。

【组成】郁李

【用法】煮酒饮之。

【主治】肝胆气结，目张不得瞑者。

【方论选录】目系内连肝胆，恐则气结，胆衡不下。郁李去结，随酒入胆，结去胆下，目则能瞑矣。

【临证举例】目张不得瞑 一乳妇因惊而病，既愈，目张不得瞑。乙曰：煮郁李酒，饮之使醉。即愈。

【备考】《一草亭》用郁李仁二钱，泡去皮，酒一瓶，煮熟饮之。

00036 一醉散

【方源】《玉案》卷五。

【组成】青皮 小茴香 陈皮 青木香 荔枝核 橘核 大茴香各一钱五分 青盐五分 生姜五片

【用法】不拘时服。

【主治】寒热不调，致患疝气。

00037 一捏金散

【方源】《医学正传》卷四引《局方》。

【组成】玄胡索 川楝子（酒煮） 全蝎（去毒，炒） 茴香各等分

【用法】上为细末。每服二钱匕，热酒调下。

【主治】①《医学正传》：脐腹大痛，及奔豚小肠气。②《杂病源流犀烛》：男子内结七疝，女子带下瘕聚，少腹绕脐下引横骨及阴中切痛。

00038 一柴胡饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】柴胡饮（《会约》卷十）。

【组成】柴胡二三钱 黄芩一钱半 芍药二钱 生地一钱半 陈皮一钱半 甘草八分

【用法】水一钟半，煎至七八分，温服。

【主治】阴虚外感，内兼火邪，寒热往来，口中燥渴，妇人热入血室，及时感后阴虚而有潮热者。

①《景岳全书》：凡感四时不正之气，或为发热，或为寒热，或因劳因怒，或妇人热入血室，或产

后、经后因冒风寒，以致寒热如疟等证，但外有邪而内兼火者。②《医级》：时感后阴虚未复，余邪潮热。③《会约》：四时不正之气，内外俱有火证而疟邪不散。④《笔花医镜》：肝燥胃渴。

【加减】 如内热甚者，加连翘一二钱；如外邪甚者，加防风一钱；如邪结在胸而痞满者，去生地，加枳实一二钱；如热在阳明而兼渴者，加天花粉或葛根一二钱；热甚者，加知母、石膏。

【方论选录】《退思集类方歌注》：此大柴胡变局也。去半夏、枳实、姜、枣，加陈皮、甘草调气，生地凉营分之热。如邪结胸而痞满者，仍宜去生地加枳实为妙。

00039 一捻金散

【方源】《朱氏集验方》卷三引《本事》。

【组成】 玄胡索 川楝子（炒） 舶上茴香（炒） 全蝎（炒）各一两 附子半两（去皮脐，生用）

【用法】 上为细末。每服二钱，痛作时热酒调下。甚者不过再服。

【主治】 奔豚小肠诸气，痛不可忍。

00040 一捻金散

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】 胡椒一两二钱半 肉桂（去粗皮）一两 高良姜半两 干姜半两

【用法】 上为细末。每服二钱，夏月冷酒调下，冬月温酒或米饮调下，不拘时候。

【主治】 久新心气痛，呕吐清痰。

00041 一捻金散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 蝎梢二钱 川芎一两 华阴细辛 香白芷各半两

【用法】 上为细末。每服少许，以指蘸药擦牙痛处，吐津，误咽不妨，不拘时候。

【主治】 牙齿疼痛。

00042 一捻金散

【方源】《婴童百问》卷四。

【组成】 雄黄三钱 硼砂一钱 甘草半钱 片脑少许。

【用法】 上为细末。干掺患处；或用蜜调涂。

【主治】 ①《婴童百问》：小儿鹅口，口疮。②《幼科类萃》：小儿重舌，木舌。

00043 一粒金丹

【方源】《宣明论》卷十三。

【异名】 无名丹（《袖珍》卷一）、捉虎丹（《臞仙活人方》卷下）、秘传捉虎丹（《松崖医径》卷下）、捉虎丸（《医学入门》卷七）、一粒金（《回春》卷五）、乌龙串（《串雅内编》卷三）。

【组成】 草乌头 五灵脂各一斤 木鳖子四两 白胶香半斤 地龙四两（去土，炒） 细墨一两 乳香一两 当归二两（焙） 没药二两 麝香一钱

【用法】 上为末，再研一千下，糯米面糊为丸，如梧桐子大。每服一丸至二丸，温酒送下。吃药罢，遍身微汗有验。

【主治】 风寒湿痹，腰膝走注疼痛，脚气，痛风，白虎历节，及中风瘫痪、麻痹不仁。

①《宣明论》：腰膝走注疼痛如虎啮。②《袖珍》：寒湿脚气，无问远年日近，一切走注疼痛不可忍；及风重瘫痪，麻木不仁，手足不能屈伸，偏枯；初风不省人事，牙关不开。③《丹溪心法附余》：一切风疾，及白虎历节。④《医碥》：痹证。⑤《伤科补要》：周身筋骨疼痛，诸药不效。

【备考】 按：方中白胶香，《伤科补要》作“白松香”。《袖珍》用法有：寒湿脚气，一切走注疼痛，临发时空心服一丸；赶到脚面上赤肿痛不散，再服一丸，赶至脚心出黑汗乃除根。如痛在上，食后、临卧酒下，汗出定疼为验。风重瘫痪，麻痹不仁，手足不能屈伸，偏枯，酒下二丸，进二服。初风不省人事，牙关不开，研二丸，酒调灌下，以省为验。

00044 一握七丸

【方源】《三因》卷七。

【组成】 神曲半斤（炒黄） 大附子二只（炮，去皮脐） 甘草二两（炙）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，每左手一握，分作七丸。每服一丸，细嚼，米饮送下。

【功用】 健脾暖胃，坚骨强阳。

【主治】 脏腑宿蕴风冷，气血不和，停滞宿饮，结为癥瘕痞块，妇人血瘕；肠胃中塞，饮食不下，咳逆胀满，下痢赤白，霍乱转筋；踡躄拳挛，腰脊脚膝疼痛，行步不能。

00045 一号扫风丸

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】 大风子三斤半 苡仁八两 荆芥八两 苦参 白蒺藜 小胡麻 苍耳子 防风各四钱 白花蛇一两 苍术 白附子 桂枝 当归 秦艽 白芷 草乌 威灵仙 川芎 钩藤 木瓜 菟丝子 肉桂 天麻 川牛膝 何首乌 千年健 青礞石（制） 川乌 知母 栀子各二两

【用法】 上为细末，水泛为小丸，干燥后待用。成人初用二钱，每日二次。三天后如无呕吐、恶心反应，可每次加五分，至第八天后，每日三次。最

大剂量可增至每日一两八钱。

【功用】 祛风，利湿，杀虫。

【主治】 初期结核杆菌型麻风及晚期麻风。

【宜忌】 《中医皮肤病学简编》：忌吃鱼腥、葱、辣等。

00046 一号癣药水

【方源】 《中医外科临床手册》。

【组成】 土槿皮十两 大风子肉十两 地肤子十两 蛇床子十两 硫黄五两 白鲜皮十两 枯矾二斤半 苦参十两 樟脑五两

【用法】 将土槿皮打成粗末，大风子肉捣碎，硫黄研细，枯矾打松，用50%酒精温浸。第一次加8升，浸二天后，倾取清液；第二次再加6升，再浸二天，倾取清液；第三次加6升，去滓取液。将三次浸出之药液混和。再以樟脑用50%酒精溶解后，加入药液中，俟药液澄清，倾取上层清液备用。搽擦患处，每日三至四次。

【功用】 杀虫止痒。

【主治】 鹅掌风，脚湿气，圆癣等。

【宜忌】 有糜烂者禁用。

00047 一甲复脉汤

【方源】 《温病条辨》卷三。

【组成】 加减复脉汤去麻仁，加牡蛎一两。

【主治】 下焦温病，但大便溏者。

【备考】 温病深入下焦劫阴，必以救阴为急务。然救阴之药多润滑，但见大便溏，不必待日三四行，即以一甲复脉法，复阴之中，预防泄阴之弊。

00048 一字救苦散

【方源】 《御药院方》卷九。

【组成】 香白芷一两 草乌头半两（去皮脐，心白者用、心黑不用） 雄黄一钱半（另研）

【用法】 上为极细末，与雄黄拌匀。每服用药末少许，擦于患处，待少时以温水漱。

【主治】 牙痛。

00049 一灵三圣散

【方源】 《济阴纲目》卷十二。

【组成】 干荷叶 生干地黄 牡丹皮 生蒲黄（另研）各二钱

【用法】 上前三味浓煎汤，调入蒲黄末。一服即定。

【主治】 ①《济阴纲目》：产后败血冲心，发热，妄言奔走，脉虚大者。②《竹林女科》：心神闷乱，发狂言，或中风痰或躁烦，或血瘀元虚。

00050 一味竹茹汤

【方源】 《续易简》卷六。

【组成】 人参 白术 麦门冬 橘红各一两 厚朴（去皮，姜汁制） 赤茯苓各半两 炙甘草一分 淡竹茹一团如弹子大

【用法】 上锉散。每服四匕，水一盏半，加生姜五片，同煎至八分，去滓温服，不时频进。

【主治】 妇人初妊，择食，呕逆，头痛，寒热间作，四肢不和，烦闷。

00051 一味红油散

【方源】 《千金珍秘方选》。

【组成】 红枣不拘多少

【用法】 瓦上煅存性，为细末。麻油调敷。

【主治】 唇上生羊须疳疮。

00052 一味铁氧汤

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 长锈生铁

【用法】 和水磨取其锈，磨至水皆红色，煎汤服之。

【功用】 善镇肝胆，补养血分。

【主治】 痫风及肝胆之火暴动成胁痛，或头痛目眩，或气逆喘吐，上焦烦热，及一切上盛下虚之证。

【方论选录】 铁锈为铁氧，以铁与氧气化合而成锈也。其善于镇肝胆者，以其为金之余气，借金以制木也。其善治上盛下虚之证者，因其性重坠，善引逆上之相火下行。其能补养血分者，因人血中原有铁锈，且取铁锈嗅之，又有血腥之气，此乃以质补质，以气补气之理。且人身之血，得氧气则赤，铁锈原铁与氧气化合，故能补养血分也。

【临证举例】 ①痫风 一六岁幼女，初数月一发痫风，后至一日数发，精神昏昏若睡，未有醒时，且两目露睛，似兼慢惊。遂先用《福幼编》治慢惊之方治之，而露睛之病除。继用本方，其病竟愈。连服数日，痫风永不再发。②呕吐 族家嫂，年六旬。夜间忽然呕吐，头痛，心中怔忡甚剧，上半身自汗，其家人以为霍乱证。诊其脉，关前浮洪，摇摇而动。俾急磨浓铁锈水，煎汤服下愈。

00053 一味黄芩汤

【方源】 《本草纲目》卷十三引李杲方。

【组成】 片芩一两

【用法】 水二钟、煎一钟，顿服。

【主治】 ①《本草纲目》引李杲方：骨蒸发热，肤如火燎，咳嗽吐痰，烦渴，脉浮洪。②《不居集》：风劳肤如火燎，重按不热，日西更甚，喘嗽，洒淅寒热，目赤心烦。

【临证举例】 骨蒸发热 予年二十时，因感冒咳

嗽既久，且犯戒，遂病骨蒸发热，肤如火燎，每日吐痰碗许，暑月烦渴，寝食几废，六脉微洪，遍服柴胡、麦门冬、荆芥诸药，月余益剧，皆以为必死矣。先君偶思李东垣治肺热如火燎，烦躁引饮而昼盛者，气分热也，宜一味黄芩汤，以泻肺经气分之火。遂按方用片芩一两，水二钟，煎一钟，顿服。次日身热尽退，而痰嗽皆愈。

00054 一味僵蚕散

【方源】《外科十三方考》。

【组成】 大白僵蚕七枚

【用法】 放瓦上焙黄，研成极细末，作为一次量。米饮调服，每日一次。病重者可加服一次。

【主治】 哮喘。

00055 一味薯蓣饮

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生怀山药四两（切片）

【用法】 上药煮汁两大碗，以之当茶，徐徐温饮之。

【功用】 补肺肾，补脾胃，滋阴利温。

【主治】 劳瘵发热，或喘或嗽，或自汗，或心中怔忡，或因小便不利致大便滑泻，及一切阴分亏损之证。

【临证举例】 产后喘嗽 一妇人产后十余日，大喘大汗，身热劳嗽。医者用黄耆、熟地、白芍等药，汗出愈多。后愚诊视，脉甚虚弱，数至七至，审证论脉，似在不治。俾其急用生山药六两，煮汁徐徐饮之，饮完添水重煮，一昼夜所饮之水，皆取于山药中。翌日又换山药六两，仍如此煮饮之。三日后诸病皆愈。

00056 一味蟾蜍汤

【方源】《人己良方》。

【组成】 蟾蜍两只（要取黄色者佳，头、爪、皮、肚皆有毒，俱宜去之，去骨取肉）

【用法】 每早晨用水半碗，黄酒一小杯煮食。

【功用】 退热止泻，补阴。

【主治】 丁奚，哺露危症。手足细小，颈长骨露，两臂无肉，肚胀脐突，名丁奚。每食而加呕哕，头骨分开。渴消引饮，虫从口出，名曰哺露。

00057 一物瓜蒂汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 瓜蒂汤（原书卷中）、一物瓜蒂散（《医略十三篇》）。

【组成】 瓜蒂二七个（一本云二十个）

【用法】 上锉。以水一升，煮取五合，去滓顿服。

【主治】 ①《金匮》：太阳中暍，身热疼重，而脉微弱。此以夏月伤冷水，水行皮中所致。②《金鉴》：身面四肢浮肿。

【方论选录】 ①《张氏医通》：此方之妙，全在探吐，以发越郁遏之阳气，则周身汗出表和，而在内之烦热得苦寒涌泄，亦荡涤无余。②《金匮要略心要》：瓜蒂苦寒，能吐能下，去身面四肢水气，水去而暑无所依，将不治而自解矣。此治中暑兼湿者之法也。③《金鉴》：瓜蒂治身面浮肿，散皮中水气，苦以泄之耳。④《温病条辨》：此热少湿多、阳郁致病之方法也。瓜蒂涌吐其邪，暑湿俱解，而清阳复辟矣。

【临证举例】 ①太阳中暍 《伤寒九十论》：毗陵一时官得病，身疼痛，发热，体重，其脉虚弱。人多作风湿，或作热病，则又疑其脉虚弱不敢汗也，已数日矣。予诊视之，曰中暍证也。仲景云：太阳中暍者，身热体疼而脉微弱。此以夏月伤冷水，水行皮中所致也。予以瓜蒂散治之，一呷而愈。②身重呕吐《伤寒发微》：予治新北门永兴隆板箱店顾五朗，时甲子六月也。予甫临病者卧榻，病者默默不语，身重不能自转侧，诊其脉则微弱，证情略同太阳中暍，独多一呕吐。考其病因，始则饮高粱大醉，醉后口渴，继以井水浸香瓜五六枚。卒然晕倒。因念酒性外发，遏以凉水浸瓜，凉气内簿，湿乃并入肌腠。此与伤冷水，水行皮中正复相似。予乃使店友向市中取香瓜蒂四十余枚，煎汤进之，入口不吐。须臾尽一瓯，再索再进，病者即沉沉睡，遍身微汗，迨醒而诸恙悉愈矣。

00058 一服立愈汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】 杜仲五钱 故纸四钱 萆薢三钱半 续断二钱 牛膝三钱 狗脊（去毛）一钱 木瓜一钱半 炙草五分 胡桃一两五钱（一半同药煎，一半嚼下）

【用法】 酒二碗煎，加盐下。

【主治】 腰痛。

00059 一带五参散

【方源】《增补内经拾遗》卷三。

【组成】 白花蛇（酒浸，去皮骨，取肉，炙）人参 玄参 沙参 丹参 苦参（看蛇有三分，五参只用三分之二）

【用法】 上各为细末。每服一钱至二钱，食后，临卧酒调下。

【主治】 大风不仁，皮肤顽麻，绕腰遍身，似蛇皮黑瘾，旋生旋没，通身痹痹。

00060 一加减正气散

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】藿香梗二钱 厚朴二钱 杏仁二钱 茯苓皮二钱 广皮一钱 神曲一钱五分 麦芽一钱五分 绵茵陈二钱 大腹皮一钱

【用法】水五杯，煮二杯，再服。

【主治】三焦湿郁，升降失司，脘连腹胀，大便不爽。

【方论选录】正气散本苦辛温兼甘法，今加减之，乃苦辛微寒法也。去原方之紫苏、白芷，无须发表也；去甘、桔，此证以中焦为扼要，不必提上焦也；只以藿香化浊，厚朴、广皮、茯苓、大腹泻湿满；加杏仁利肺与大肠之气，神曲、麦芽升降脾胃之气，茵陈宣湿郁而动生发之气，藿香但用梗，取其走中道不走外也；茯苓但用皮，以诸皮皆凉，泻湿热独胜也。

00061 一味莱菔子汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】莱菔子二两（生者一两，熟者二两）

【用法】共捣碎，煎汤一大茶杯，顿服之。

【主治】伤寒、温病结胸。其证胸膈痰饮，与外感之邪互相凝结，上塞咽喉，下滞胃口，呼吸不利，满闷短气，饮水不能下行，或转吐出；兼治疫证结胸。

【临证举例】结胸证 许某，年二十余，得温病，三四日觉中脘郁结，饮食至其处不下行，仍上逆吐出。其脉沉滑而实，舌苔白而微黄，表里俱觉发热，然不甚剧。自言素多痰饮，受外感益甚，因知其中脘之郁结，确系外感之邪与痰饮相凝滞也。先投以荡胸汤，两点钟后，仍复吐出。为拟此方，一剂结开，可受饮食，继投以清火理痰之品，两剂痊愈。

00062 乙癸愈蟹饮

【方源】《张皆春眼科证治》卷二。

【组成】酒生地 15 克 玄参 盐知母各 9 克 五味子 3 克 酒白芍 9 克

【主治】蟹睛证。蟹睛软而平塌，来势缓而痛轻。属虚证者。

【方论选录】方中酒生地、玄参、盐知母滋补肝肾之阴，以降虚火；五味子、酒白芍味酸性敛，能使蟹睛渐平；酒白芍且有滋补肝胆之能。共成一剂，具有壮水制火，渐缩蟹睛之功。

00063 二子饮

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】苏子 火麻子（去壳）各半合

【用法】拣净洗，研极细，用水再研，取汁一杯，分三次煮粥食之。

【主治】产后郁冒汗多，大便闭；老人、诸虚人风闭。

00064 二贝丸

【方源】《疡医大全》卷十八引萧纯源方。

【组成】朱砂七钱 大贝母 紫贝天葵各二两 海藻 海粉 明矾各一两

【用法】上为细末，用夏枯草二斤，熬膏为丸，如梧桐子大。每服三钱，临卧时茶清送下。

【功用】消痰疬。

【主治】瘰疬。

00065 二仁丸

【方源】《妇人良方》卷八。

【组成】杏仁（去皮尖，面炒黄） 麻仁（别研） 枳壳（去瓤，麸炒赤） 诃子（慢火炒，捶，去核）各一两

【用法】上药后二物为细末，同二仁杵，炼蜜为丸，如梧桐子大。温水下二三十丸。未知稍增。

【主治】①《妇人良方》：风秘。②《得效》：虚人、老人风秘，不可服大黄者。

00066 二气丹

【方源】《宣明论》卷十一。

【异名】二气丸（《济阴纲目》卷二）。

【组成】大黄四两（别为末，醋一升，慢火熬成膏子） 当归二两 白芍二两

【用法】上为末，以膏子为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前淡醋汤送下，每日三次。有燥热，以柴胡饮子相参服之。

【主治】①《宣明论》：月水不调，继绝不产，面黄肌瘦，恒不思美食。②《医略六书》：经闭脉数涩，左右强弱不调者。

【加减】如月水不通，加入干漆三钱（炒焦用），没药半两，硇砂三钱（研），官桂二钱，斑蝥三钱（去头足，炒热用，生用则吐泻）。

【方论选录】《医略六书》：热瘀不清，经血暗耗，故经脉闭遏，月事不行焉。当归养既耗之血，白芍敛热伤之阴，大黄净汁，熬膏入药，丸服。醋以引之入肝，饮以濡之和胃，使热化血荣，则冲任蓄泄有权，何患经闭不通乎！

【备考】本方方名，原作“二气汤”，与剂型不符，据《医方类聚》改。

00067 二气散

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】山栀子（炒） 干姜（炮）各一两

【用法】 上为粗末。每服二钱，水一盏，同煎至五分，去滓，食后热服。

【主治】 阴阳痞结，咽膈噎塞，状如梅核，妨碍饮食，久而不愈，即成翻胃。

00068 二乌丸

【方源】《魏氏家藏方》卷一一。

【组成】 川乌头（生，去皮脐） 海桐皮 草乌头（生，去皮尖） 五灵脂各一两（别研）

【用法】 上为细末。先取不蛀皂角二挺，捶碎酒浸，揉取脂，滤去滓，面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，茶、酒任下。

【主治】 风气走注疼痛。

00069 二乌散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】 川乌 草乌（俱用童便浸，炒去毒） 细辛 羌活 黄芩 甘草各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，茶清调下。

【主治】 ①《医统》：眉棱骨痛，兼有风病。②《明医指掌》：风热二气，攻于太阳等经，头脑作痛。

00070 二丹丸

【方源】《保命集》卷中。

【异名】 二丹丹（《医学正传》卷一）、加减固本丸（《医学入门》卷七）、二参丹（《东医宝鉴·杂病篇》卷二）、二参丸（《医灯续焰》卷十八）。

【组成】 丹参一两半 丹砂二钱（为衣） 远志（去心）半两 茯神一两 人参五钱 菖蒲五钱 熟地黄一两半 天门冬一两半（去心） 麦冬一两（去心） 甘草一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空心，食前服五十丸至一百丸。

【功用】 养神定志和血。内安心神，外华腠理。

【主治】 健忘。

【备考】 ①《保命集》：此治之法，一药安神，一药清肺。故清中清者，归肺以助天真；清中浊者，坚强骨髓；血中之清，荣养于神；血中之浊，荣华腠理。②《医学法律》：中风证，心神一虚，百骸无主，风邪扰乱，莫由驱之使出。此方安神益虚，养血清热息风，服之安睡，功见一斑矣。相传用愈风汤吞下，殊失用方之意。

00071 二六丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 白术五钱 白芍 砂仁 半夏 当归各三钱 桃仁 黄连 神曲 陈皮各二钱 吴萸一钱半 人参 甘草各一钱

【用法】 上为末。蒸饼为丸服。

【主治】 气血俱虚，挟食积痰火心痛。

00072 二术散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 蝉蜕 白术 黄连 枸杞子 苍术（米泔浸，炒） 龙胆草 地骨皮 牡丹皮各等分

【用法】 上为末。每服一钱，食后荆芥汤下。

【功用】 去翳障。

【主治】 睑硬睛疼，翳障。

00073 二术煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 白术（炒）二钱或三钱 苍术（米泔浸，炒）一二钱 芍药（炒黄）二钱 陈皮（炒）一钱五分 炙甘草一钱 茯苓一二钱 厚朴（姜汤炒）一钱 木香六七分 干姜（炒黄）一二钱 泽泻（炒）一钱半

【用法】 水一钟半，煎七分，食远服。

【主治】 肝强脾弱，气泄、湿泄。

00074 二石汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】 白芍一两 熟地三两 金钗石斛 牛膝各五钱 石膏三钱

【用法】 水煎服。

【功用】 泻肝火、平肝气。

【主治】 肝经痿症，大怒之后，两胁胀满，胸间两旁时常作痛，遂至饮食不思，口渴索饮，久则两腿痿痛，后则遍身亦痛，或痛在两臂之间，或痛在十指之节，痛来时可卧不可行，足软筋麻，不可行动。

00075 二仙丸

【方源】《古今医鉴》卷九引贺兰峰方。

【组成】 侧柏叶八两（焙干） 当归（全身）四两

【用法】 上为末，水糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，早、晚各一服，黄酒、盐汤任下。

【主治】 头发脱落。

【宜忌】 忌铁器。

【备考】 本方原名三仙丸，与所用药数不符，据《东医宝鉴·外形篇》改。

00076 二仙汤

【方源】《妇产科学》。

【组成】 仙茅三钱 仙灵脾三钱 当归三钱 巴戟天三钱 黄柏一钱半 知母一钱半

【用法】 水煎，分二次服。

【功用】《中医方剂临床手册》：温肾阳，补肾

精，泻肾火，调理冲任。

【主治】 肾阴、肾阳不足而虚火上炎之更年期综合征，高血压病，肾炎，肾盂肾炎，尿路感染，闭经。

①《妇产科学》：更年期综合征，肾阴肾阳二虚证。②《中医方剂临床手册》：高血压病，闭经，以及其他慢性疾病，见有肾阴、肾阳不足而虚火上炎者。③《中医方剂手册》：肾阳不足，虚火浮越，头晕，头痛，目眩，肢冷，尿频，阳萎，早泄；妇女月经不调。④《古今名方》：肾炎、肾盂肾炎、尿路感染、闭经等见有肾虚火旺证候者。

【方论选录】《中医方剂临床手册》：本方的配伍特点是壮阳药与滋阴药同用，以针对阴阳俱虚于下，而又有虚火上炎的证候。方中仙茅、仙灵脾、巴戟天温肾阳，补肾精；黄柏、知母泻相火而滋肾阴；当归温润，养血而调冲任。

【现代研究】 ①调整内分泌功能《辽宁中医》(1986；4:31)：现代药理证实，温补肾阳药，能作用于下丘脑—垂体—性腺轴，并调整三轴的功能紊乱，进而调整全身的内分泌功能。仙灵脾、仙茅更具有雄激素的作用。②降压《中医方剂临床手册》：实验研究，二仙汤对高血压有显著降压作用。

00077 二冬汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 天冬（去心）二钱 麦冬（去心）三钱 花粉一钱 黄芩一钱 知母一钱 甘草五分 人参五分 荷叶一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 润肺清胃。

【主治】 上消。

【方论选录】《证因方论集要》：人参、甘、麦大甘以复胃津；天冬、花粉苦甘以清肺热；黄芩、知母苦降以泄肺胃之火。

00078 二冬散

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 天冬 麦冬（各去心） 玄参各等分

【用法】 上为细末，为丸。含齿舌间，丸化即愈。

【主治】 口舌生疳，久患不愈。

【备考】 本方方名，据剂型当作“二冬丸”。

00079 二冬膏

【方源】《摄生秘剖》卷四。

【异名】 天麦二冬膏(《全国中药成药处方集》西安方)。

【组成】 天门冬（去心）一斤 麦门冬（去心）一斤

【用法】 二冬入砂锅，水煎取汁，再将滓水煎，以无味为度，入蜜，熬成膏。空心白汤送下二三匙。

【功用】 ①《摄生秘剖》：清心润肺，降火消痰。②《北京市中药成方选集》：清肺益肾，生津止渴。

【主治】 肺胃燥热，咳嗽痰少，痰中带血，咽痛音哑。

①《摄生秘剖》：虚损痰咳，烦渴热燥。②《张氏医通》：肺胃燥热，痰涩咳嗽。③《北京市中药成方选集》：咳逆上气，咽喉疼痛，燥渴音哑。④《中国药典》：燥咳痰少，痰中带血，鼻干咽痛。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（西安方）：忌食辛辣之物；风寒咳嗽忌服；消化不良，便溏者不宜。

【方论选录】 ①《摄生秘剖》：是膏用天冬清金降火，益水之源，故能下通肾气以滋阴；更以麦冬气薄主升，味厚为阴，有清心润肺之功，堪与天冬相并而施膏泽，以濡其枯槁焉。②《丸散膏丹集成》：二冬禀少阴水精之气。麦冬禀水精而上通于阳明，天冬禀水精而上通于太阳。夫冬主闭藏，门主开转，咸名门冬者，俱能开转闭藏而上达。合二冬制熬成膏，消痰润肺，生脉清心。久服则肾固气平，体健身轻，不老不饥，为益非浅。

00080 二生汤

【方源】 方出《传信适用方》卷一引叶梦锡方，名见《济生》卷四。

【组成】 附子一两 半夏半两（洗）

【用法】 上㕮咀，分三服。水二盏，加生姜二十片，煎八分，空心服。

【主治】 胃有寒痰，呕吐不止。

①《传信适用方》：痰嗽。②《奇效良方》：胃冷有痰。③《产科发蒙》：呕吐不止，及药入咽即吐逆者。

【备考】《济生》本方用附子（生，去皮脐）、半夏（生用）等分。每服四钱，水二盏，姜三片，煎服。

00081 二白丸

【方源】《元戎》卷十一。

【组成】 白矾一块（约一两）

【用法】 上用蒸饼剂裹，蒸熟去皮，加轻粉一字或半钱（量虚实加减）为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，生姜汤送下。小儿丸小。

【功用】《玉机微义》引《元戎》：坠痰清神。

【主治】 ①《元戎》：痫症。②《医学正传》：痰

涎为病患，以致癫痫、狂妄、惊悸。

00082 二白散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】南星 贝母各等分

【用法】上为末。鸡子清和米醋调敷。

【功用】消肿。

【主治】痰核。

00083 二白散

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】白石脂一两 白蔹一两 苦杏仁一两

【用法】用鸡蛋清调药，外涂。

【功用】祛湿，散风，化瘀。

【主治】痤疮（肺风粉刺），酒渣鼻。

【宜忌】慎勿入目。

00084 二汁饮

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】甘蔗汁二份 姜汁一份

【用法】上药和匀。每温服一碗，一日三次。

【主治】反胃。

00085 二圣丸

【方源】《医方类聚》卷二十四引《吴氏集验方》。

【组成】大川乌五两（生，去脐尖皮） 五灵脂五两

【用法】上为末，入龙脑、麝香，多为妙，同研令细，滴水为丸，如弹子大。空心服一丸，先以生姜自然汁研化，次以温酒调服，每日二次。

【主治】瘫痪风，手足弹曳，口眼㖞斜，言语謇涩，步履不正。

00086 二圣散

【方源】《医方类聚》卷七十四引《济生》。

【异名】白矾散（《奇效良方》卷六十一）、二仙散（《医学入门》卷七）。

【组成】鸭嘴胆矾二钱 白僵蚕（去丝嘴）半两

【用法】上为细末。每服少许，吹入喉中。

【主治】缠喉风，急喉痹，牙关紧急，痰涎壅塞者。

00087 二圣散

【方源】《医方类聚》卷七十七引《澹寮》。

【组成】吴茱萸（去浮者，炒） 地龙（去土，炒）

【用法】上为细末。每服用药由各五钱，醋调，涂两脚心，油单隔，片帛系定，临卧用，次日便见效。

【主治】老人、虚人口疮。

00088 二母丸

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】知母 贝母各一两 细辛五分 杏仁（去皮）七分 紫菀 款冬花各三分 麻黄四分

【用法】上为末，以猪肺一个煮烂，捣膏为丸，如梧桐子大。每服五十丸，桑白皮煎汤送下。

【主治】喘嗽久不愈。

00089 二母散

【方源】《准绳·类方》卷二引《局方》。

【组成】知母 贝母各等分

【主治】咳嗽，痰壅喘急。

①《准绳·类方》引《局方》：咳嗽。②《急救仙方》：喘急倒头不得，痰涎壅盛。③《医林纂要》：肺痨有热。

【加减】如喘急，加苦寒葶苈末；如久嗽不止，加马兜铃末，如无，以粟壳代，去筋膜不制。

【方论选录】《成方切用》：用贝母化痰泻肺火，知母滋肾清肺金，取其苦寒胜热，润能去燥也。

00090 二至丸

【方源】《医方类聚》卷九十五引《济生》。

【组成】鹿角（镑）一两 麋角（镑）二两 附子（炮，去皮）一两 桂心（不见火）一两 补骨脂（炒）一两 杜仲（去皮，锉，炒丝断）一两 鹿茸（酒蒸，焙）一两 青盐（别研）半两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心用胡桃肉细嚼，以盐酒、盐汤任下。

【主治】①《医方类聚》引《济生》：老人、虚弱人，肾气虚损，腰痛不可屈伸。②《张氏医通》：老人肾虚腰痛，不可屈伸，头旋眼黑，下体痿软。

【加减】恶热药者，去附子，加肉苁蓉一两。

【备考】方中鹿角、麋角，《张氏医通》作“鹿角胶”、“麋茸”。

00091 二合散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】铅粉（炒） 槐花（炒）各等分（为末） 老松香一两 银朱四钱

【用法】上为末。纸卷成条，麻油浸透，火燃着，一头滴下油药，以器接之，用调前药，涂敷患处。

【主治】黄水、头炼、眉炼、耳蚀、羊胡子、燕窠、脓窠等疮。

00092 二阴煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地二三钱 麦冬二三钱 枣仁二钱

生甘草一钱　玄参一钱半　黄连一二钱　茯苓一钱半　木通一钱半

【用法】 水二钟，加灯草二十根，或竹叶亦可，煎七分，食远服。

【主治】 ①《景岳全书》：水亏火盛，烦躁热渴而怔忡惊悸不宁者；心经有热，水不制火，惊狂失志，多言多笑，或疡疹烦热失血。②《会约》：劳伤，心脾火发上炎，口舌生疮。

【加减】 如痰胜热甚者，加九制胆星一钱，或天花粉一钱五分。

00093　二防饮

【方源】 《医学正传》卷三。

【组成】 人参　白术　黄耆各一钱　甘草（炙）五分　川归　川芎　芍药　熟地黄各一钱　防风　防己　羌活　牛膝各七分　杜仲（姜汁拌炒）　草薢各一钱　附子（童便浸三日，去皮脐）七分（冬月一钱）

【用法】 上细切，作一服。加生姜三片，大枣二个，水二盏，煎至一盏，去滓，空心温服。

【功用】 《杏苑》：补气补血，驱风散湿，行经络，散风寒，壮筋骨。

【主治】 鹤膝风，因痢后感冒寒湿，或涉水履霜，以致两足痛痹，如刀劏虎咬之状，膝膑肿大，不能行动。

00094　二辛煎

【方源】 《景岳全书》卷五十一。

【组成】 北细辛三钱　生石膏一两

【用法】 用水二碗，煎一碗，乘热频漱之。

【主治】 ①《景岳全书》：阳明胃火，牙根口舌肿疼不可忍者。②《医级》：胃热龈浮，肾热齿蛀，肿胀疼痛。

【方论选录】 《山西中医》（1986；3:29）：方中生石膏、细辛，其味皆辛，妙取石膏之辛寒与细辛之辛温相配伍，使其方辛而不热，寒而不遏。

【临证举例】 牙痛　《山西中医》（1986；3:29）：吴某某，牙痛十余日，就诊前每日注射青霉素80万U，并间断服用去痛片，痛不得止。察患者牙龈红肿，口干口渴，舌红苔黄，脉滑数。辨证属胃火牙痛，投二辛煎：生石膏45克，细辛4.5克，二味药水煎两次，将两次药液混匀，一半漱口，一半分两次服下，日一剂，漱口后三分钟痛止，三剂痊愈。

00095　二陈汤

【方源】 《局方》卷四（绍兴续添方）。

【组成】 半夏（汤洗七次）　橘红各五两　白茯苓三两　甘草（炙）一两半

【用法】 上㕮咀。每服四钱，用水一盏，生姜七片，乌梅一个，同煎六分，去滓热服，不拘时候。

【功用】 燥湿化痰，理气和中。

①《玉机微义》：去痰和中。②《外科发挥》：和中理气，健脾胃，消痰，进饮食。③《证治汇补》：健脾燥湿，顺气和中化痰，安胃气，降逆气。

【主治】 湿痰为患，脾胃不和。胸膈痞闷，呕吐恶心，头痛眩晕，心悸嘈杂，或咳嗽痰多者。

①《局方》：痰饮为患，或呕吐恶心，或头眩心悸，或中脘不快，或发为寒热，或因食生冷，脾胃不和。②《女科百问》：妊娠恶阻，产后饮食不进。③《直指》：气郁痰多眩晕，及酒食所伤眩晕；食疟，诸疟。④《得效》：咳嗽呕痰；痰壅吐食。⑤《金匮钩玄》：关格有痰，以本方吐之，吐中便有降。⑥《外科发挥》：臂痈，流注。⑦《医方考》：中风风盛痰壅。⑧《便览》：上中下一身之痰。⑨《景岳全书》：疡痈，中脘停痰。⑩《济阳纲目》：痰多小便不通，用此探吐。⑪《证治宝鉴》：痰嘈，痰多气滞，似饥非饥，不喜食者，或兼恶心，脉象必滑；呃有痰声而脉滑者。⑫《古今名医方论》：肥盛之人，湿痰为患，喘嗽，胀满。⑬《证治汇补》：心痛，腹痛；膏粱太过，脾胃湿热遗精；脾胃湿痰下注而淋。⑭《郑氏家传女科万金方》：妇人月水准信，因痰闭子宫而不受胎者。⑮《医方简义》：子眩。

【宜忌】 热痰，燥痰，吐血，消渴，阴虚，血虚均忌用。

①《医学入门》：酒痰、燥痰不宜。②《济阳纲目》：劳疾吐血诸血证皆不可用，以其能燥血气，干津液也。天道暑热之时亦当禁用。丹溪云，阴虚、血虚、火盛干咳嗽者勿用。③《医林纂要》：阴虚火炎，至有火痰及肺伤干咳烦渴者，自非所宜。④《会约》：肺经燥痰，肾经虚痰不用。

【方论选录】 ①《丹溪心法附余》：此方半夏豁痰燥湿，橘红消痰利气，茯苓降气渗湿，甘草补脾和中。盖补脾则不生湿，燥湿渗湿则不生痰，利气降气则痰消解，可谓体用兼赅，标本两尽之药也。今人但见半夏性燥，便以他药代之，殊失立方之旨。若果血虚燥症，用姜汁制用何妨。抑尝论之，二陈汤治痰之主药也。②《医方考》：名曰二陈，以橘、半二物贵乎陈久耳。③《古今名医方论》：李士才曰，肥人多湿，湿挟热而生痰，火载气而逆上。半夏之辛，利二便而去湿；陈皮之辛，通三焦而理气；茯苓佐半夏，共成燥湿之功；甘草佐陈

皮，同致调和之力，成无已日，半夏行水气而润肾燥，《经》曰，辛以润之是也。行水则土自燥，非半夏之性燥也，④《张氏医通》：此方本《本经》半夏汤及《金匮》小半夏汤、小半夏加茯苓汤等方而立，加甘草安胃，橘皮行气，乌梅收津，生姜豁痰，乃理脾胃，治痰湿之专剂也。⑤《医林纂要》：痰者，水湿之滞而不行也，半夏之辛，本润肾补肝，开胃泻肺，去湿行水之药，而滑能通利关节，出阴入阳，是能治水滞下行，故主为治痰君药；水随气运，水湿之滞而成痰，以气不行故也，橘皮之甘苦辛温，主于行气，润命门，舒肝木，和中气，燥脾湿，泻肺邪，降逆气，故每合半夏为治痰之佐；痰本水也，水渍土中则为湿，湿积不化则为痰，茯苓生土中而味淡，专主渗土中之湿；脾不厚不能胜湿，故甘草以厚脾，然不多用者，以甘主缓，过缓则恐生湿也；生姜之辛，亦以行湿祛痰，非徒以制半夏毒也。⑥《时方歌括》：此方为祛痰之通剂也。痰之本，水也，茯苓制水以治基本；痰之功，湿也，茯苓渗湿以镇其动。方中只此一味是治痰正药，其余半夏降逆，陈皮顺气，甘草调中，皆取之以为茯苓之佐使耳。故仲景书风痰多者俱加茯苓，呕者俱加半夏，古圣不易之法也。今人不穷古训，以半夏为祛痰之专品，仿稀涎散之法，制以明矾，致降逆之品反为涌吐，堪发一叹。⑦《浙江中医学院学报》(1986；2:40)：乌梅滋阴敛肝，佐甘草合和，取其酸甘化阴以滋胃津。方中夏、橘虽贵在陈久，仍不失劫阴之弊，伍以乌梅兼制半夏之燥性，使半夏之燥性尽失，而无伤阴之虞，乌梅生津而无滋腻之虑，相辅相成，相得益彰。乌梅厥伟，其功不可泯也，为方中画龙点睛之处。二陈汤中乌梅滋养胃阴，收敛肝气之功，后世多忽而不察，失其制方之本旨。

【临症举例】 ①气厥 《名医类案》：倪维德治一妇病气厥，哭笑不常，人以为鬼祟所恼，倪诊脉俱沉，胃脘必有积，有所积必作疼，遂以二陈汤导之，吐痰升许而愈。此盖积痰类祟也。②咬牙《岳美中医案集》：咬牙一证，多见于小儿虫积，成年人则很少见。友人一子，25岁，每夜入睡后，即上下齿相切磋，震震有声，可闻于户外，同屋之人，往往惊醒。因切其脉滑象显露，望其体，肥壮面色光亮，断为痰饮蓄于中焦，足阳明之脉入上齿，痰阻经络，滞碍气机，或导致咬牙。为拟二陈汤加焦荷叶以燥湿化痰，水煎服十剂。服五剂后，咬牙声即减少。十剂后，同屋之人已不复闻其齿牙相击声了。嘱再服数剂，以巩固疗效。③夜咳《浙江中医杂志》(1981；1:36)：舒某，男，教师，1980年3月31日就诊，干咳痰滞，胸闷已二月，昼轻夜甚，苔薄白，脉弦滑。予二陈汤加当归，五剂后诸症大减，原方续服五剂而愈。

【备考】 本方改为丸剂，名"二陈丸"(见《饲鹤亭集方》)。

00096 二妙丸

【方源】《医学纲目》卷二十引朱震亨方。

【异名】 阳明二妙丸、苍柏二妙丸(《症因脉治》卷三)。

【组成】 黄柏末 苍术末各等分

【用法】 炼蜜为丸，如梧桐子大。

【功用】《北京市中药成方选集》：清热燥湿。

【主治】 湿热下注之足膝肿痛、痿证，湿疮，湿疹，丹毒，白带，腰痛。

①《医学纲目》引朱震亨方：下焦湿疮。②《正体类要》：下焦湿热肿痛，或流注游走，遍身疼痛。③《明医指掌》：湿热腰痛。④《症因脉治》：热痹，肌肉热极，唇口干燥，筋骨痛不可按，体上如鼠走状，属湿热伤气分者。⑤《古今医彻》：脚气。⑥《成方便读》：湿热盛于下焦，而成痿证者。⑦《北京市中药成方选集》：湿热下注，腿脚发沉作肿，及膝下生疮。⑧《中国药典》：湿热下注，足膝红肿热痛，下肢丹毒，白带，阴囊湿疹等。⑨《中医外科学》：湿疮，臁疮等证，肌肤焮红，作痒出水，属于湿热内盛者。

【方论选录】《成方便读》：湿热之邪，虽盛于下，其始未尝不从脾胃而起，故治病者必求其本，清流者必洁其源。方中苍术辛苦而温，芳香而燥，直达中州，为燥湿强脾之主药；但病既传于下焦，又非治中可愈，故以黄柏苦寒下降之品，入肝肾直清下焦之湿热，标本并治，中下两宜。

00097 二妙丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 棉花子一斤 朴消四两(入小酒瓶内，加老酒四碗，入瓶内封口，炭火煅，烟尽为度，取出)

【用法】 上为末。每服三钱，空心白酒调服，每日二次。

【主治】 内痔，脏毒出血。

【宜忌】 忌生酒，热物。

00098 二妙散

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】 黄柏(炒) 苍术(米泔浸，炒)

【用法】 上为末。沸汤入姜汁调服。

【主治】 筋骨疼痛因湿热者。

【备考】 二物皆有雄壮之气，表实气实者，加酒少许佐之。有气加气药，血虚者加补药；痛甚者，加生姜汁热辣服之

00099 二妙散

【方源】《回春》卷七。

【组成】 蜣螂不拘多少（六七月间，寻牛粪中者，用线串起阴干收贮）

【用法】 用时，取一个，要全者，放净砖上，四面以炭火烘干，以刀从腰切断。如大便闭，用上半截；小便闭，用下半截；二便俱闭，全用。研为细末，新汲水调服。

【主治】 小儿大小便不通。

00100 二妙散

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】 蒲黄（炒黑） 海螵蛸各等分

【用法】 上为细末。涂患处。另用石膏三钱，薄荷五分，煎汤含之。

【主治】 舌肿出血。

00101 二妙散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 荔枝核（炮） 小茴香（炒）各等分

【用法】 上为末。空心烧酒下三钱。

【主治】 寒疝偏坠肿痛。

00102 二青散

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】 青黛 白及 白蔹 白薇 白芷 白鲜皮 朴消 水龙骨 黄柏各一两 天花粉三两 大黄四两 青露（即芙蓉叶）三两

【用法】 上为末。用醋、蜜调敷；如已成者，则敷四围，留顶，贴膏针膏。

【主治】 ①《外科大成》：一切焮热红肿热痛阳毒，脓未成者。②《疫喉浅论》：疫喉痧遗毒，颈项漫肿，尚未化脓者。

00103 二苓汤

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【组成】 赤茯苓 木猪苓 白术各半两 滑石一两 通草一钱 白豆蔻一钱 丁皮三钱 陈皮二钱 桂枝半两

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓热服。

【主治】 水饮内停，胸膈满闷，时时呕逆，肢节疼，两胁下痛，腹中鸣。

【加减】 小便未快，加瞿麦三钱；呕未止，加半夏半两；渐渐恶寒甚，每服加葱白三寸。

00104 二矾汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】 二矾散（《外科大成》卷二）。

【组成】 白矾 皂矾各四两 孩儿茶五钱 柏叶半斤

【用法】 用水十碗，用上药四味煎数滚，候用。先用桐油搽抹患处，以桐油蘸纸捻点着，以烟焰向患上熏之片时，方将前汤乘滚贮净桶内，手架上，用布盖，以汤气熏之，勿令泄气，待微热倾入盆内，蘸洗良久。

【主治】 鹅掌风，皮肤枯厚，破裂作痛。

【宜忌】 轻则不宜，七日忌下汤水。

00105 二奇方

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】 白术五钱 滑石三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 水肿。

00106 二贤散

【方源】 方出《百一》卷五，名见《医学纲目》卷二十五。

【异名】 二贤汤（《普济方》卷一六五）、三圣散（《医灯续焰》卷十二）、涤痰散（《回春》卷二）。

【组成】 橘皮（去白取红）一斤 甘草 盐各四两

【用法】 水五碗，慢火煮，焙干，捣为细末。点服。

【功用】 ①《医学纲目》：消积块，进饮食。②《回春》：清肺，消痰，定嗽，解酒毒。

【主治】 痰饮内停，食后胸满，翻胃，噎膈，肝气痛。

①《百一》：痰。②《医方集解》：膈中痰饮。③《绛囊撮要》：肝气痛，常服除根。④《回生集》：脾家冷积，每食已辄胸满不下，百药不效者，兼治一切痰气。⑤《鸡鸣录》：翻胃及痛，噎膈。

【宜忌】《医方集解》：虚弱人慎用。

【方论选录】《医方集解》：此足太阴、阳明药也。陈皮燥湿而利气，湿去则痰涸，气顺则痰行。食盐润下而软坚，润下则痰降，软坚则痰消。痰在膈中，故用甘草引入胃，甘草经蜜炙，能健脾调胃，脾胃健则痰自行矣。

【临证举例】 食后胸满 外舅莫强中服之，腹痛，利下物数块如铁弹子，臭不可闻，旧苦食后胸满之疾豁然顿愈。

【备考】 本方改为丸剂，名“润下丸”（见《医方集解》）。

00107 二明散

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】 苍术四两（米泔浸七日，逐日换泔，切片别研，青盐一两同炒黄色，去盐用术） 木贼二两（童便浸一两日，洗，焙）

【用法】 上为散。每服一钱匕，米饮调下。

【主治】 内外障眼。

00108 二物汤

【方源】《千金》卷二十五。

【组成】 大麻子三升 大葱白二十枚

【用法】 上各捣令熟，用水九升，煮取一升半，顿服之。若血出不尽，腹中有脓血，更合服。当吐脓血。

【主治】 金疮，腹中瘀血。

00109 二物汤

【方源】《直指》卷八。

【组成】 薄桂三钱 石菖蒲一钱

【用法】 上㕮咀。新水煎，细呷。

【主治】 风寒邪气，留滞失音。

00110 二物散

【方源】《外台》卷十引《范汪方》。

【组成】 麻黄一斤（去节） 杏仁一百枚

【用法】 上各为散。上气发时，服方寸匕，可至三方寸匕。以气下为候，不必常服。

【主治】 上气兼咳。

00111 二物散

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】 白僵蚕 黄连各等分

【用法】 上为末。临卧掺口内。

【主治】 口疮。

00112 二和散

【方源】《鸡峰》卷三十。

【异名】 二和汤（《准绳·幼科》卷五）。

【组成】 藿香叶 香附子（去皮）各等分

【用法】 上为细末。每服一钱，水二盏，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 ①《鸡峰》：调适阴阳，和养荣卫。②《奇效良方》：和冷热，消食快气。

【主治】 ①《鸡峰》：心胃气痞，饮食不进，凡伤寒阴阳不分者。②《奇效良方》：疮疹，并伤寒冷热不和，阴阳痞气，气不升降。

00113 二金汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 鸡内金五钱 海金沙五钱 厚朴三钱 大腹皮三钱 猪苓三钱 白通草二钱

【用法】 水八杯，煮取三杯，分三次温服。

【功用】 宣通气分。

【主治】 夏秋湿热气蒸，外干时令，内蕴水谷，病黄疸而肿胀者。

00114 二金散

【方源】 方出《圣惠》卷八十六，名见《普济方》卷三八一。

【组成】 砒霜一分 麝香一分

【用法】 上药先将砒霜在纸上炒过，后入麝香同研令细。以鸡羽扫在疮上，一日三二度。

【主治】 小儿急疳，虫蚀却口鼻牙齿。

【宜忌】《普济方》：宜随时展去药物，勿令咽津。

00115 二金散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】 郁金 鸡内金（是肚内黄皮，焙）各等分

【用法】 上为散。先用盐浆盥漱，后贴之。

【主治】 大人、小儿蚀透腮颊，初生如米豆，名金腮疮。

【宜忌】 忌米食。

【备考】 本方所治金腮疮，《奇效良方》作“含腮疮。”

00116 二宝丹

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 升药 熟石膏各等分

【用法】 上为极细末。卷于纸捻上，插入疮口。

【功用】 提脓生肌。

00117 二宜丹

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】 磁石（四面坚者，火煅，酒淬七遍，汤洗，焙干，研如粉）二两 辰砂（水飞）一两

【用法】 上药研匀，糯米粉糊为丸，如鸡头子大，阴干。每服一丸，空心、食前人参汤送下。

【主治】 水火不足，耳内虚鸣，健忘怔忪，头目眩晕。

00118 二参汤

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 人参 玄参各二钱或五七钱

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《外科大成》：牙龈属虚火者。②《金鉴》：胃经虚火，牙龈腐烂，淡血渗漏不已者。

00119 二胡散

【方源】《医统》卷五十六。

【组成】 玄胡索 胡椒各等分

【用法】 上为细末。每服五钱，食前温酒调服。

【主治】 冷气心痛及疝气心腹痛。

00120 二草丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 金陵草（即旱莲草） 车前草各等分

【用法】 捣汁。每空心服三杯。愈乃止。

【主治】 溺血。

00121 二香丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】 肉豆蔻（面裹煨香） 丁香 木香 干姜（炮）各等分

【用法】 上药一处，用白面裹定，慢火煨，令面熟为度，取出去面不用，同为末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温米饮送下。

【主治】 冷痢久不愈，诸药不能治者。

00122 二香丸

【方源】《直指》卷十五。

【组成】 南木香 丁香 胥皮（浸，去白，晒） 橘红 草果仁 肉豆蔻（生） 白豆蔻（仁） 五灵脂（香润者，别研）各半两 蓬术（炮，乘热碎碾） 缩砂仁各七钱半

【用法】 上为细末，用川巴豆肉半两，研如泥，渐入药末，研和，白面稀糊丸，如麻子大，候干。每服三丸，加至五七丸止，姜汤送下；壅嗽，紫苏、生姜煎汤送下。

【主治】 积滞气秘，心腹刺痛，中满壅嗽。

00123 二香散

【方源】《妇人良方》卷十二。

【组成】 香附子一两 藿香叶 甘草各二钱

【用法】 上为细末。每服二钱，入盐少许，百沸汤点下。

【主治】 妊娠胎气不安，气不升降，饮食不美，呕吐酸水、起坐觉重。

00124 二香散

【方源】《普济方》卷一一七引《如宜方》。

【组成】 香薷 白扁豆 厚朴 陈皮 香附 苏叶 甘草各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 夏日得病，头疼身热，伏暑、伤寒疑惑之间者。

【加减】 脑痛，加连须葱煎。

00125 二香散

【方源】《济阳纲目》卷九十二。

【组成】 木香 沉香各等分

【用法】 上为末。煎陈皮茯苓汤调下，空心服。

【主治】 气郁于下，小便隐秘不通。

00126 二美膏

【方源】《医级》卷八。

【组成】 生地 熟地 沙参 玄参 知母 贝母 丹皮 骨皮 天冬 麦冬 杏仁 枣仁各等分

【用法】 上药熬汁三次，滤去滓，熬膏将成，加白蜜四两为膏，以米仁末收之。不时挑二三匙，含化或点汤服。

【主治】 阴虚火炎，咳嗽颧红，骨蒸夜热。

00127 二姜丸

【方源】《局方》卷三（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 干姜（炮） 良姜（去芦头）各等分

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，食后橘皮汤送下。

【功用】 养脾温胃，去冷消痰，宽胸下气，进美饮食。

【主治】 心脾疼痛；一切冷物所伤。

【宜忌】 妊娠妇人不宜服。

00128 二神丸

【方源】《本事》卷二。

【异名】 钻胃丸（《东医宝鉴·杂病篇》卷四）。

【组成】 破故纸四两（炒香） 肉豆蔻二两（生）

【用法】 上为细末，加大肥枣四十九个，生姜四两，切片同煮，枣烂去姜，取枣剥去皮核，用肉研为膏，入药和杵为丸，如梧桐子大。每服三十丸，盐汤送下。

【功用】《饲鹤亭集方》：温脾暖胃，进食固肠。

【主治】 脾肾虚寒，五更泄泻不思饮食，或食而不化，或作呕，或作泻，或久泻不止，腰痛，水肿。

①《本事》：脾肾虚弱，全不进食。②《直指》：脾肾俱虚泄泻不食，或饭食后常泄。③《外科发挥》：一切脾肾俱虚，侵晨作泻，或饮食少思，或食而不化，或作呕，或作泻，或久泻不止，脾经有湿，大便不实者。④《保婴撮要》：疮疡，因脾肾阴虚泄泻。⑤《医统》：老人胃冷脾泻。⑥《医方集解》：肾泻，脾泻。⑦《兰台轨范》：腰痛肾虚，全不进食。⑧《饲鹤亭集方》：火衰不能生土，脾胃虚寒，食少泻痢，腰痛脾泻，屡投补剂不应者。

【方论选录】 ①《增补内经拾遗》：方用肉豆蔻以补脾，破故纸以安肾，故称二神。②《医方考》：脾主水谷，肾主二便，脾弱则不能消磨水谷，肾虚则不能禁固二便，故令泄泻不止。肉豆蔻辛温而涩，温能益脾，涩能止泻；破故纸味辛而温，辛能散邪，温则暖肾，脾肾不虚不寒，则泄泻止矣。③

《古今名医方论》：柯韵伯曰，夫鸡鸣至平旦，天之阴，阴中之阳也。因阳气当至而不至，虚邪得以留而不去，故作泻于黎明。其由有四：一为脾虚不能制火，一为肾虚不能行水，故二神丸君补骨脂之辛燥者，入肾以制水，佐肉豆蔻之辛温者，入脾以暖土，丸以枣肉，又辛甘发散为阳也。一为命门火衰不能生土，一为少阳气虚无以发陈，故五味子散君五味子之酸温，以收坎宫耗散之火，少火生气以培土也；佐吴茱萸之辛温，又顺肝木欲散之势，为水气开滋生之路，以奉春生也。此四者，病因虽异而见症则同，皆水亢为害。二神丸是承制之剂，五味散是化生之剂也。二方理不同而用则同，故可互用以助效，亦可合用以建功。④《医方集解》：火乃土之母，破故纸补肾为癸水，肉豆蔻厚肠胃为戊土。戊癸化火，同为补土母之药。

【临证举例】 ①不食 《本事》：有人全不进食，服补脾药皆不验，予授此方，服之欣然能食。此病不可全作脾虚，盖因肾气怯弱，真元衰劣，自不是能消化饮食。譬如鼎釜之中，置诸米谷，下无火力，虽终日米不熟，其何能化。②水肿 《外科发挥》：李某，年逾四十，遍身发肿，腹胀如鼓，甚危，诸药不应，用此丸数服，饮食渐进，其肿渐消，兼以除湿健脾之剂而愈。③五更泻 《校注妇人良方》：一妇人年五十，不食夜饭，五更作泻，二十年矣。后患痢，午前用香连丸，午后用二神丸，各二服而痢止。又用二神丸数服，而食夜饭，不月而形体如故。④产后泻痢 《赤水玄珠》：一产妇泻痢，发热作渴，叶痰，肌体消瘦，饮食少思，或胸膈痞满，或小腹胀坠年余矣。乃脾胃之泻，朝用二神丸，暮用六君子，三月余而痊。

00129 二神散

【方源】《直指》卷十六。

【组成】 黄色海金沙七钱半 滑石半两

【用法】 上为细末。每服二钱半，多用灯心、木通、麦门冬草，新水煎，入蜜调下。

【主治】 诸淋急痛。

00130 二神散

【方源】《医统》卷四十二。

【组成】 陈槐花（炒焦黑）二两 百草霜五钱

【用法】 上为细末。每服三钱，茅根煎汤调下。治血崩下血，皆空心服之效。舌上忽然肿破出血，用此掺之。

【主治】 男女吐血，血崩下血，舌上忽然肿破出血。

00131 二神散

【方源】《医统》卷六十二。

【组成】 大黄 朴消各等分

【用法】 上为末，津调涂鼻上。

【主治】 赤鼻久不愈。

00132 二消散

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】 蝼蛄一个（大者佳） 大戟 芫花各二钱

【用法】 上为细末。好酒调服。

【主治】 十种臌症。

【宜忌】 忌房事、辛辣、油腻、湿热之物。

00133 二海丸

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】 海藻 昆布（各酒洗，晒干）各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如杏核大。稍稍咽汁。又用海藻洗净，切碎，油醋熟，作常菜食之。

【主治】 气瘿。

00134 二萸散

【方源】《妇科玉尺》卷三。

【组成】 吴萸 山萸 川楝子各一钱 白蒺藜九分 海藻 延胡索 桔梗 青皮各八分 小茴 五味各七分 茯苓五分

【用法】 米汤调下。

【主治】 茄病。

【备考】 有儿胞下后，名曰茄病。

00135 二黄丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】 黄连（去须，炒） 黄柏（去粗皮，炙，锉） 附子（炮裂，去皮脐） 乌梅肉（炒） 干姜（炮）各半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心米饮送下。

【主治】 洞泄寒中。

00136 二黄丸

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】 黄连（去须）一两半 大黄（锉，炒）一两 细辛（去苗叶） 龙脑各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧温浆水送下，每日二次。小儿量减。

【主治】 倒睫拳挛，目眦赤烂。

00137 二黄丹

【方源】《外科证治全书》卷四引孙真人方。

【组成】 黄柏五钱 轻粉一钱

【用法】 上为末。鸡子黄熬油调搽。

【主治】 疥疮脓窠痛甚者。

00138 二黄丹

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 硫黄31克 雄黄31克 冰片1.5克 樟脑1.5克

【用法】 上为细末。香油调搽。

【主治】 疥。

00139 二黄汤

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】 生干地黄（焙） 蒲黄各一两

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加竹叶七片，煎七分，去滓放冷，食后细呷。

【主治】 吐血不止。

00140 二黄汤

【方源】《医学正传》卷二引东垣方。

【组成】 黄芩（酒制，炒） 黄连（酒制，炒） 生甘草各等分

【用法】 上细切。每服三钱，水一盏，煎七分，温服，徐徐呷之。如未退，用鼠粘子不拘多少，水煎，入芒消等分，亦时时少与，毋令饮食在后；如未已，只服前药，取大便利，邪气已则止。

【主治】 ①《医学正传》引东垣方：大头天行疫病。②《古今名医方论》：上焦头盛，头面大肿，目赤肿痛，心胸咽喉口舌耳鼻热盛，及生疮毒者。

【加减】 阳明渴，加石膏；少阳渴，加瓜蒌根。阳明行经，升麻、芍药、葛根、甘草；太阳行经，甘草、荆芥、防风，并与上药相合用之。或云：头痛酒芩，口渴干葛，身痛羌活、桂枝、防风、芍药，俱宜加之。

【方论选录】 ①《医方考》：头大者，炎上作火之象也。故用芩、连之苦以泻之，甘草之甘以缓之。②《古今名医方论》：柯韵伯曰，诸肿痞痛，皆属于心，必用芩、连以泻心。然伤寒热结在内，而心下痞者，是为客邪，治客当急，故君大黄，率芩、连，用麻沸汤渍绞其汁，而速驱之，不使暂留也。此热浮于内，而上炎头目者，是为正邪，治之当缓，故用甘草与芩、连分等分同煎，漫饮以渐渍之，不使下行也。盖心下本虚而火实之，法当并泻其子，土郁夺之，而火速降矣；上焦本清而火扰之，法当先培其子，土得其令，而火邪自退矣。芩、连得大黄，不使其子令母实；芩、连得甘草，又不使其母令子虚。同一泻心，而其中又有攻补之不同如此。③《金鉴》：三黄汤用黄芩泻上焦火，黄连泻中焦火，大黄泻下焦火。若夫上焦实火，则以此汤之大黄易甘草，名二黄汤。使芩、连之性，缓缓而下，留连膈上。

【备考】 本方改为丸剂，名"二黄丸"（见《温热暑疫全书》）。

00141 二黄散

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】 黄柏一两 黄蜀葵花一分 白及二钱 生干地黄半两 青黛二块

【用法】 上为散。先渫疖，用朴消水调涂之。

【主治】 痔。

00142 二黄散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】 黄芩 大黄 防风 薄荷各半两

【用法】 上锉散。每服三钱，水一盏半，蜜少许煎，食后、临卧温服。

【主治】 脔肉攀睛。

00143 二黄散

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】 大黄（烧存性） 生地黄各三钱

【用法】 上为末，作一服。空心好酒调下。

【主治】 妇人室女经脉不通。

00144 二黄散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】 大黄 朴消 硫黄 轻粉 乌头尖各等分

【用法】 上为末。用萝卜汁调搽上，三次即愈。内服雄猪胆汁一个，每日早以好酒调汁，热服之，不过半月痊愈。

【主治】 酒渣鼻。

00145 二黄膏

【方源】《痈疽验方》。

【异名】 二黄散（《绛囊撮要》）。

【组成】 黄柏 大黄各等分

【用法】 上为末。用醋调搽。如干，用水润之。

【主治】 ①《痈疽验方》：一切肿毒，坐板疮。②《景岳全书》：敷一切肿毒，热浮在外，或时气热壅者。

【备考】《绛囊撮要》本方用法：为末，入猪油共捣匀，搽。

00146 二蜕散

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】 蛇蜕（细剪令碎） 蝉蜕（细剪碎）各四两 白矾一两（火煅） 皂角二挺（为末）

【用法】 上药共和令匀，分为六贴。每用时，以药一贴于瓦器内烧，坐在桶中，桶盖上作一小窍，正坐熏之。

【主治】 痔漏久不愈者。

00147 二蜡膏

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十九。

【组成】 菜油四两 葱白（连须）三个 川椒十四粒 白蜡 黄蜡 白矾各二钱 东丹三钱

【用法】 将连须葱白、川椒入菜油中，熬至色枯，去滓，再入白蜡、黄蜡、白矾，熔化离火，俟沸稍定，入东丹，急急搅匀，倒在碗内，放阴土地上一日一夜去火毒。然后将生矾五六分，滚水泡一碗，将疮洗净拭干，将药涂上如钱厚，以油纸贴，外以粗草纸略揉软盖上，绢帛缚之。每日一洗一涂，缚扎如法，数日即愈矣。但疮虽愈，四边必多水泡，痒极，切不可爬搔。若搔碎，即又成疮矣。故虽愈，仍将药照旧洗涂，并水泡亦涂在内，如是三四日，全愈不痒矣。

【功用】 去腐生肌。

【主治】 臁疮，下部湿毒疮。

00148 二鲜饮

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 鲜茅根四两（切碎） 鲜藕四两（切片）

【用法】 煮汁常常饮之。旬日中自愈。

【主治】 虚劳证，痰中带血。

【加减】 若大便滑者，茅根宜减半。再用生山药细末两许，调入药汁中，煮作茶汤服之。

【方论选录】 茅根善清虚热而不伤脾胃，藕善化瘀血而兼滋新血，合用之为涵养真阴之妙品。且其形皆中空，均能利水。血亦水属，故能引泛滥逆上之血徐徐下行，安其部位也。至于藕以治血证，若取其化瘀血，则红莲者较优；若用以止吐衄，则白莲者胜于红莲者。

【临证举例】 血证 堂兄某，年五旬，得吐血证，延医治疗不效。脉象滑数，摇摇有动象，按之不实，时悬在少年，不敢轻于疏方，因拟此便方，煎汤两大碗，徐徐当茶温饮之，当日即见愈，五六日后病遂脱然。自言未饮此汤时，心若虚悬无着，既饮后，觉药力所至，若以手按心，使复其位，此其所以愈也。

00149 二霜膏

【方源】《续本事》卷四。

【组成】 南硼砂一钱 蕤仁十四粒（出油） 姜霜末半钱 脑子少许

【用法】 上为细末，用糖半两，研匀为膏。铜箸点之。

【主治】 冷泪眼。

00150 二黝散

【方源】《汉药神效方》。

【组成】 反鼻（烧存性） 蒲黄（炒黑）各半

【用法】 上为极细末，敷患处。内服，温汤点服。

【功用】 止血。

【主治】 外伤出血（外用）；吐血，下血（内服）。

00151 二八木丹

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】 阳丹八厘 阴丹二厘 粉霜二厘 元明粉（风化）二厘 硼砂二分 明矾一厘 麝香二厘 梅花片三厘

【用法】 点眼。

【主治】 暴发赤眼，近年翳膜。

【备考】 方中阴丹、阳丹制法，见“一九金丹”。

00152 二门冬饮

【方源】《医统》卷四十二引《集成》。

【组成】 天门冬（去心） 麦门冬（去心）各八分 紫菀 远志（去心）各五分 知母八分 地黄 泽泻 贝母各六分 黄柏八分 桔梗八分 牡蛎一钱 桂五分 百部八分

【用法】 水钟半，煎七分，不拘时服。

【主治】 ①《医统》：肾虚咳血。②《医部全录》：肺伤，咯、嗽血。

00153 二龙大串

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】 尖槟榔四两 黑白丑（头末）各一两五钱 锅灰一两 雷丸五钱 大黄一两五钱 枳壳一两 莪术八钱

【用法】 上为末。每服三钱，砂糖调下。

【功用】 追虫打积。

【主治】 水肿，小儿腹大肚疼。

00154 二白锉散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】 大天南星一个（炮裂，出火毒） 大半夏四个（汤洗七次，去滑，并锉作块子）

【用法】 以水一大盏半，加生姜七片，慢火煎至一呷服之。入冬瓜子同煎更妙。

【主治】 小儿膈上痰壅，吐逆不食，渐生惊候，胸中满塞，咽嗌不利。

00155 二芎饼子

【方源】《医方类聚》卷八十一引《济生》。

【组成】 抚芎 川芎 干姜（炮） 藁本（去芦） 苍耳（炒） 天南星（炮，去皮） 防风（去芦） 甘草（炙）各等分

【用法】 上为细末，姜汁浸蒸饼为丸，如鸡头子大，捏作饼子，晒干。每服五饼，细嚼，茶、酒任下，不拘时候

【功用】 清头目，化风痰。

【主治】 气厥，上盛下虚，痰饮风寒伏留阳经，偏正头疼，痛在脑巅，吐逆恶心，目瞑耳聋。

00156 二柴胡饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 陈皮一钱半 半夏二钱 细辛一二钱 厚朴一钱半 生姜三五七片 柴胡一钱半或二三钱 甘草八分

【用法】 水一钟半，煎七八分，温服。

【主治】 四时外感，或其人元气充实，脏气素平无火，或时逢寒胜之令，本无内热等证者。

【加减】 如邪甚者，可加羌活、白芷、防风、紫苏之属，择而用之；如头痛不止者，加川芎一二钱；如多湿，加苍术；如阴寒气胜，必加麻黄一二钱，或兼桂枝。

00157 二八通玄丹

【方源】《赤水玄珠》卷三十引梅东先生方。

【组成】 宣连八两（用茱萸四两炒，去茱萸） 川归二两 乌梅肉 槐角 枳壳各二两

【用法】 上为末，以雄猪肚一个，洗净，入药在内，外以韭菜四五斤，包其肚，用水、醋共数碗，煮肚熟为度，去韭菜并肚，以药烂捣丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心白汤送下。

【主治】 痔漏。

00158 二仁绛覆汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 光桃仁七粒 柏子仁二钱 归须 真新绛各钱半 旋覆花三钱（包煎） 青葱管五寸（冲）

【用法】 以上方调下七厘散。

【功用】 活血消瘀。

【主治】 温热伏邪夹瘀，瘀血不从呕泄而出，致变呃逆，甚发血厥。

00159 二术二陈汤

【方源】《医统》卷二十四。

【异名】 苍白二陈汤（《证治汇补》卷八）、二陈二术汤（《医略六书》卷二十一）。

【组成】 苍术（土炒） 白术（土炒） 半夏（滚水泡七次，姜制） 陈皮（去白） 茯苓各一钱 甘草（炙）五分

【用法】 水二盏，加生姜三片，大枣一个，煎八分，稍热服。

【功用】《医略六书》：健中燥湿。

【主治】 脾失健运，痰湿不化，呕吐清水，头痛。

①《医统》：呕吐清水如注。②《张氏医通》：脾虚痰食不运。③《医略六书》：湿痰头痛，脉弦细。

【加减】 虚寒者，加人参、煨干姜；痰饮，加南星，倍半夏；宿食，加神曲、砂仁。

【方论选录】《医略六书》：脾亏，痰湿闭遏清阳，不能分布营卫以奉上于头，故头痛经久，已成头风。苍术燥湿强脾，兼擅升阳；白术助脾燥湿，力主健运；陈皮治生痰之由；茯苓渗湿，杜生痰之源；半夏燥湿化痰，兼醒脾胃；甘草调中缓逆，且和诸药也；生姜煎服，使脾健气调，则痰湿自化，而清阳敷布，头痛无不自止。

00160 二术四苓汤

【方源】《医统》卷十七。

【组成】 白术 苍术 茯苓 猪苓 泽泻 黄芩 羌活 芍药 栀子仁 甘草各等分

【用法】 水三盏，加生姜三片，灯心一撮，煎服。

【主治】 诸湿肿满，一身尽痛，发热烦闷，二便不利。

00161 二术救痹饮

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 白术 白芍 茯神各五钱 陈皮 肉桂 柴胡各一钱 枳壳五分 远志 白芥子 苍术各三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 肝痹。气血不足，风寒湿邪乘之，肝气常逆，胸膈引痛，睡卧多惊，饮食不思，吞酸作呕，筋脉拘急。

00162 二号化毒丹

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 牛黄 1.5 克 轻粉 3 克

【用法】 先将牛黄研细，再加轻粉研细，以不见星为度，装瓶密封。量儿大小，每日服 0.15 克～0.3 克，蜂蜜少许调服。

【功用】 清化解毒。

【主治】 胎毒，胎瘾疹（婴儿湿疹），头面热毒，疖肿，大便干秘者。

【宜忌】 服药期间，忌食鸡蛋、花生、鱼腥发物。

00163 二号扫风丸

【方源】《中医皮肤学简编》。

【组成】 大风子（土炒，去毛）62 克 何首乌

31克 白蒺藜31克 菊花15克 橘红15克 防风15克 牛膝15克 全蝎15克 当归尾15克 黄连15克 车前子15克 金银花15克 马钱子4克（上炒，去毛，用香油拌，另研） 黄芩6克 苦参7克 麝香6克 红白胡麻各12克 全蛇皮一条

【用法】 上为细末，用荞面四两和匀，煮成膏，放凉后，再将麝香放在半杯白烧酒内溶化，掺于前药内为丸。成人每次6克，一日二次，徐徐增量，每次增2克。一周后可改为一日三次，最大剂量，可增至每日25克，饭前开水泡陈茶送下。

【主治】 麻风。

00164 二号癣药水

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 土槿皮1.25千克 千金子6克 斑蝥40只（布包）

【用法】 用白酒（高粱酒）5升，加入上药，装入大口瓶内，密封，浸泡半月至一月，去滓备用。每日用毛笔刷外涂一二次。

【功用】 灭菌止痒。

【主治】 体癣，汗斑，单纯糠疹（桃花癣）。

00165 二甲复脉汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 加减复脉汤加生牡蛎五钱 生鳖甲八钱

【主治】 热邪深入下焦，脉沉数，舌干齿黑，手指但觉蠕动。

【方论选录】 温病七八日以后，热深不解，口中津液干涸，但觉手指掣动，即当防其痉厥，故以复脉育阴，加入介属潜阳，使阴阳交纽，庶厥不可作也。

【临证举例】 虚劳 《吴鞠通医案》：陈某，十九岁，脉虚数，头目眩冒，暮有微热，饮食少减，面似桃花，身如柳叶，与二甲复脉法。熟地六钱，生鳖甲八钱，白芍（生）六钱，麦冬（不去心）五钱，生牡蛎五钱，麻仁二钱，阿胶三钱，炙甘草六钱。煮三杯，分三次服。服二十贴，红退晕止，食进，后用专翕大生膏四斤收功。

00166 二仙扫痱汤

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】 枣叶一升 好滑石末二两

【用法】 用水数碗，共合一处，熬二炷香，乘热浴洗。二三次即愈。

【主治】 伏热遍身痱痒。

00167 二冬二母散

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 淡天冬 提麦冬 知母各一钱 川贝母 南北沙参各三钱

【用法】 上药用水煎去滓，加梨汁、竹沥各二瓢，姜汁三滴，和匀服。

【功用】 养阴化痰。

【主治】 温燥热退而津气两伤，液郁化痰者。

00168 二加龙骨汤

【方源】《外台》卷十六引《小品方》。

【组成】 龙骨 甘草（炙）各二分 牡蛎三分（熬） 白薇三分 附子三分（炮） 芍药四分 大枣四枚（擘） 生姜五分

【用法】 以水四升，煮取一升半，分再服。

【功用】《血证论》：清散上焦，温补下焦。

【主治】 虚劳发热自汗，遗精梦交，吐血咳血。

①《外台》引《小品方》：虚羸浮热汗出。②《时方歌括》：虚劳不足，男子失精，女子梦交，吐血，下利清谷，浮热汗出，夜不成寐。③《血证论》：肾阳虚，肺阴虚，上热下寒之咳血。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、生葱、猪肉、冷水。

【方论选录】 ①《血证论》：此方用甘、枣，从中宫以运上下；姜、薇清散，使上焦之火不郁；附、芍、龙、牡温敛，使下焦之火归根。合观其方，以温为正治，以清为反佐，真寒假热，虚阳上浮，为对证。②《江苏中医》（1986；11:22）：二加龙骨汤以白薇配附子，龙骨配牡蛎为两组主药，取附子温导浮阳，守而不走；白薇从阴中泄热。寒热互用，导火泄热，不治阴虚而阴自安。配以龙、牡镇潜摄纳，咸降益阴，合为用阳和阴之法。

00169 二圣不老丹

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 侧柏叶（酒浸，九蒸，晒） 白松香（煮炼九次）各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，蜜汤送下，每日三次。

【主治】 癞风、麻风，眉发脱落。

00170 二圣救苦丸

【方源】《回春》卷二。

【异名】 二圣救苦丹（《金鉴》卷二十八）。

【组成】 锦纹大黄四两（酒拌，蒸，晒干） 牙皂二两（如猪牙者）

【用法】 上为末，水打稀糊为丸，如绿豆大。每服五七十丸，冷绿豆汤送下。以汗为度。

【主治】 ①《回春》：伤寒瘟疫。不论传经、过经者。②《喉科紫珍集》：大头瘟，目赤咽肿。

【方论选录】《医宗金鉴》：疫气从鼻而入，一受

其邪，脏腑皆病，若不急逐病出，则多速死。急逐之法，非汗即下，故古人治疫之方，以下为主，以汗次之，是为病寻出路也。方中用皂角开窍而发表，大黄泻火而攻里，使毒亦从汗下而出也。

00171 二母二冬汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【异名】二冬二母汤。

【组成】知母 贝母 麦门冬 天门冬

【功用】清养肺胃，润燥化痰。

【主治】①《症因脉治》：内伤噎膈；燥热咳喘，甚则烦满身肿。②《医略六书》：阴虚热炽，肺金受烁，干咳虚烦，脉濡涩。

【加减】痰多，暂加青黛、海石；肠枯，暂加当归、芍药；气凝痰滞，暂加半夏、香附，以行本方之滞；肾水竭，加生地、熟地；元气虚，加人参。

【方论】《医略六书》：方中天门冬清心润肺以益肾水；麦冬润肺清心以生津液；川贝母凉心解郁，清肺气以化热痰；肥知母滋肾涤热，除虚烦以润肺金。洵为润燥除烦之剂，乃干咳虚烦之专方。

00172 二地二冬汤

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】生地五钱 麦冬三钱（去心）熟地五钱 天冬三钱（去心）

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】阴虚肺燥，干咳虚烦，脉虚数者。

【方论选录】阴虚肺燥，干咳无痰，此水不配火，而金水不能相生焉，故口燥心烦不已。生地滋阴以壮九天之水，而心火降；熟地补肾以滋九地之阴，而肾水升；天冬清心滋水；麦冬润肺生津。务使水升火降，则燥润咳除，而心烦口燥，无不自解矣。

00173 二连四物汤

【方源】《元戎》（拔萃本）。

【组成】四物汤（内用生地黄）加黄连 胡黄连（真者）

【用法】温饮清汁。

【主治】妇人血虚发热，口舌生疮，经闭。

①《元戎》：妇人或因伤酒，或因产亡血，或虚劳五心烦热者。②《校注妇人良方》：妇人血虚发热，口舌生疮，或夜发寒热。③《医林纂要》：血虚生热，伤于冲任而经闭者。

【备考】本方方名，东垣十书本作“四物二连汤”。

00174 二陈双核饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】陈皮 青皮（醋炒） 橘核（炒） 荔枝核（炒）各二钱 甘草五分 乳香 白茯苓 半夏 没药 大茴香各八分

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】疝气，遇劳碌、风寒即发，外肾肿大坠痛。

00175 二妙地黄丸

【方源】《冯氏锦囊》卷十一。

【组成】熟地黄八两（微火炒燥） 山茱萸四两（去核，酒拌炒） 牡丹皮四两（焙） 白茯苓三两（焙） 怀山药四两（炒黄） 汉泽泻三两（淡盐水拌，晒干，炒） 川黄柏七钱 熟附子五钱（二味盐、酒同浸一宿，各拣开，黄柏炒褐色，附子焙燥） 茅山苍术二两（切大块，米泔水浸透，切片，黑芝麻拌，炒黄）

【用法】上为细末，用金石斛四两，煎浓汁，入白蜜二十两，同炼为丸。每早、晚食前白汤送服三钱。

【主治】湿热内郁而为便浊。

【宜忌】忌食酒、面、鸡、鱼、湿热炙煿之物。

【加减】如湿多热少，用附子七钱、黄柏五钱；如湿少热多，用附子五钱、黄柏七钱。

00176 二苓化毒汤

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】白茯苓一两 土茯苓二两 金银花二两 当归一两 紫草三钱 生甘草二钱

【用法】水、酒各半，煎服。

【功用】补血泻毒。

【主治】杨梅疮，遍体皆烂，疼痛非常。

00177 二味消毒散

【方源】《外科大成》卷一。

【异名】二味拔毒散（《金鉴》卷六十二）、二味败毒散（《药奁启秘》）。

【组成】白矾一两 明雄黄二钱

【用法】上为末。茶清调化，鹅翎蘸扫患处。

【功用】①《浙江中医杂志》（1958；12：封三）：杀菌化腐，燥湿敛疮。②《中药成药制剂手册》：除湿止痒。

【主治】风湿热毒引起的疮疡、湿疹，红肿痒痛，及毒虫咬伤。

①《外科大成》：热疖、痱、痤、疥、疹、风湿痒疮。②《疡科遗编》：喉袋蛇缠，湿热时毒。③《验方新编》：毒虫咬伤。④《中药成药制剂手册》：湿毒引起的疮疡，红肿痛痒流水，及湿疹，慢性中耳炎。⑤《中医皮肤病学简编》：皮炎、疮疹。

【临证举例】 ①麻风神经痛 《浙江中医杂志》(1958；12:封三)：山东省北坛医院采用浓茶汁调二味拔毒散外治80例麻风神经痛，收到了良好效果。一般在敷药10～15分钟后，疼痛基本消失，局部仅留有轻度胀感，24小时后将药解除，胀大的神经已显著变细变软。80例中，经敷贴一次治愈的有66例（占82.5%），敷贴两次治愈的有13例（占16.25%），只一例敷贴四次，疗效达100%。②风毒肿 《江苏中医》(1965；3:38)：以雄黄、明矾各等分，共研极细末，与野菊花根捣汁拌匀如糊，涂于风毒肿之浮肿部，日搽二至三次，治疗轻、中、重三型之风毒肿36例，除2例未坚持治疗外，均愈。

00178 二味隔纸膏

【方源】 《景岳全书》卷六十四。

【异名】 二圣膏(《仙拈集》卷四)。

【组成】 石膏（煅） 枯矾各等分

【用法】 上为末，用桐油调成膏，作隔纸膏贴之。更服荆防败毒散，如数剂不愈，再服黄耆人参汤。

【主治】 臁疮，湿毒疮。

00179 二参还睛汤

【方源】 《张皆春眼科证治》。

【组成】 人参1.5克 元参 熟地 当归 酒白芍 旱莲草 麦门冬 车前子各9克

【功用】 补肝肾以益精血，健脾胃以养瞳神。

【主治】 肝肾两亏，或脾胃虚弱，精气不能上荣，或肝经风热，耗伤精汁，睛珠失濡所致圆翳内障。

00180 二香三建汤

【方源】 《袖珍》卷一引《济生》。

【异名】 三建二香汤(《法律》卷三)。

【组成】 天雄 附子 川乌各一两（生用） 木香半两（不见火） 沉香（旋磨水）

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜十片，煎七分，温服。

【功用】 《法津》：逐阴救阳。

【主治】 中风虚极，言语謇涩，手足偏废，六脉俱微者。

【方论选录】 《法律》：此方天雄、附子、乌头，同时并用其生者，不加炮制，惟恐缚孟贲之手，莫能展其全力耳。必因其人阴邪暴甚，埋没微阳，故用此纯阳无阴，一门三将，领以二香，直透重围，驱逐极盛之阴，拯救将绝之阳。

【备考】 《永类钤方》：虚极气乏，天雄、附子、川乌宜炮熟用。

00181 二香三棱丸

【方源】 《圣济总录》卷七十三。

【组成】 丁香 木香各一两 京三棱（煨，锉） 鸡爪三棱 石三棱各三分 硇砂（研） 牵牛子（炒） 大黄（炮） 蓬莪术（炮）各半两 槟榔（锉）一两 巴豆五十个（去皮心，出油七分，细研） 乌梅肉（焙干）二两

【用法】 上为末，再研匀，酒煮面糊为丸，如绿豆大。每服五丸至七丸，食后陈橘皮汤送下。

【主治】 痃癖结块，面黄肌瘦，心腹引痛，不欲饮食，宿滞冷痰。

00182 二香定痛散

【方源】 《便览》卷三。

【组成】 广木香 小茴香 川楝子肉各等分

【用法】 上为末。每服二钱，热酒调下。连三服。

【主治】 疝病。

00183 二黄三白汤

【方源】 《妇科玉尺》卷五。

【组成】 酒扁柏 川连 黄柏各五钱 醋香附 白石脂 白术 白芍各一两 椿白皮二两

【主治】 阴虚烦热，赤白带下；或七情所伤，脉数带下，属热者。

00184 二加减正气散

【方源】 《温病条辨》卷二。

【组成】 藿香梗三钱 广皮二钱 厚朴二钱 茯苓皮三钱 木防己三钱 大豆黄卷二钱 川通草一钱五分 薏苡仁三钱

【用法】 水八杯，煮取三杯，三次服。

【主治】 湿温。湿郁三焦，脘闷便溏，身痛舌白，脉象模糊。

00185 二百味花草膏

【方源】 《医说》卷四引《癸志》。

【异名】 二百花草膏(《一草亭》)。

【组成】 羯羊胆（去其中脂）

【用法】 上药满填好蜜，拌匀蒸之，候干即入瓶，研细为膏，以匙抄少许入口。

【主治】 烂缘血风。病目两睑间赤湿流泪，或痛或痒，昼不能视物，夜不可近灯光。

【方论选录】 ①《医方考》：内热则睑赤、肝热则出泣，微热则痒，热盛则痛，或痛或痒，皆火之故也。气热则神浊昏冒，故令昼不能视物；阳胜者恶火，故令不可近灯光，此《经》所谓天明则日月不明，邪害空窍也。羯羊胆，苦物也，足以胜热；

蜜，润物也，足以济火。然曰入口，不曰入眼，则固服食之剂耳！用之者，使频频噙之，药力相继为良。②《医方集解》：此足少阳、厥阴药也。羊胆苦寒，益胆泻热；蜂蜜甘润，补中缓肝，曰二百味花草膏者，以羊食百草，蜂采百花也。

【临证举例】 烂缘血风 福州人病目，两睑间赤湿流泪，或痛或痒，甚不能视物，夜不可近灯光，兀兀痴坐。其友赵谦子春语之曰：是为烂缘血风，我有一药，正治此疾，名曰二百味花草膏。病者惊曰：用药品如是，世上方书所未有，岂易遽办？君直相戏耳！赵曰：我适间有药，当以与君。明日携一钱匕至，坚凝成膏，便以匙抄少许入口，一日泪止，二日肿消，三日痛定，豁然而愈。

00186 二物茯苓粉散

【方源】《千金》卷五。

【组成】 茯苓 牡蛎各四两

【用法】 上药治下筛，以粉八两，合捣为散。有热辄以粉，汗即自止。

【主治】 ①《千金》：少小头汗。②《普济方》：小儿盗汗不止。

【备考】 本方方名，《外台》引作“二味茯苓粉散”。

00187 二十四味飞步散

【方源】《回春》卷五。

【组成】 当归 白芷 赤芍 牛膝（酒洗） 杜仲（姜汁炒） 木瓜 茯苓（去皮） 骨碎补 乌梅 何首乌 川续断 破故纸 小茴香（盐水炒） 独活 桑寄生 五加皮 苍术（米泔浸） 陈皮 防风（去芦） 天麻各一两 川芎 槟榔 半夏（姜汁炒）各五钱 甘草三钱

【用法】 上锉。加生姜三片，水煎，入酒一半，空心热服；或用好酒五壶，煮前药服之。

【主治】 下元虚损，脚膝酸软、疼痛，并寒湿风气，麻木不仁，及打伤跌损，行步艰辛。

【宜忌】 忌生冷。

00188 二十四味建中汤

【方源】《简易方》引《卫生家宝》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】 黄耆（蜜炙） 官桂 秦艽 肉豆蔻煨柴胡 荆芥 白芷 川芎 鳖甲（醋炙） 桔梗各二两 当归 莪术（炮） 麦门冬（去心） 白芍药 人参（去芦） 茯苓 甘草（炙） 木香 酸枣仁（炒） 海桐皮 枳壳（去瓤，煨） 干地黄各一两 沉香 槟榔各半两

【用法】 上为细末。每二钱半，水一盏，加生姜三片，乌梅二个，煎至七分，温服。如觉脏腑冷，即空心热服；小便多，即食后、临卧时服。

【主治】 虚劳，体倦骨疼，羸瘦少力，心忪胸满，痞闷不食；妇人血气风劳，月水不调，不孕者。

00189 二圣大宝琥珀散

【方源】《妇人良方》卷二。

【组成】 生地黄一斤 生姜一斤（二味各研取自然汁，将地黄汁炒生姜滓，姜汁炒地黄滓，各稍干，焙为细末） 当归 川芎 牡丹皮 芍药 莪术 蒲黄 香白芷 羌活（八味各炒） 桂心（不见火） 熟地黄（炒）各一两

【用法】 上为细末，于瓷盆内收之。妇人冷气痛，并血海不调，膈气，炒姜、酒下二钱；产后胞衣不下，暖酒调下二钱；产妇临月，每日三次，则滑胎易产，温酒调二钱；产后血犯心，眼见鬼神，用童便半盏、酒半盏同煎，调二钱；一生无子者，久服则有孕。此药治妇人百病，空心、日午食前，每日二次。产后百病，并暖酒调下。

【主治】 妇人血海不调，膈气，不孕；产后胞衣不下，瘀血犯心，眼见鬼神。

00190 二十四味大建中汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 桔梗（炒） 柴胡（去苗） 甘草（炙） 陈皮（去瓤） 当归（去芦） 秦艽（洗净） 川芎 阿胶（蛤粉炒） 半夏（汤泡七次） 柏子仁 草果子 乌药各一两 白芍药 黄耆（蜜炙） 鳖甲（米醋炙） 地黄（熟煮） 乌梅肉 五味子各三钱 槟榔半钱 地骨皮（去骨） 木香一钱（不见火） 肉桂一钱半（去粗皮，不见火）

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，枣子二个，煎至八分，去滓，不拘时候服。

【主治】 虚劳。寒热往来，日久未愈，不思饮食，肌肉消瘦，口燥咽干者。

00191 二陈加山栀黄连生姜汤

【方源】 方出《丹溪心法》卷三，名见《医方考》卷三。

【异名】 二陈加栀连生姜汤（《证治宝鉴》卷四）。

【组成】 二陈汤加炒山栀 黄连 生姜

【功用】《证治宝鉴》：清胃化痰。

【主治】 ①《丹溪心法》：呕吐，胃中有热，膈上有痰者。②《证治宝鉴》：嘈杂，胃中痰火相合，致饮食输化不清，或见恶心吞酸，微烦少寐，似饥非饥，虽饱食亦不能止，脉洪者。

【方论选录】 ①《医方考》：有声之谓呕，有物之谓吐。声者，气与火也；物者，痰与涎也。半夏燥痰湿，茯苓渗痰湿，陈皮利痰气，甘草益脾气，此二陈治痰之旨也。苦可以泻火，故用黄连、栀子；辛可以行滞，故用生姜。②《医林纂要》：黄连以泻心脾之火，栀子以泄三焦之火，且除心烦，生姜以行膈上之痰，且稍制栀、连之寒也。热痰在膈上，则当心分，故黄连以泻之，行之以栀子，使湿热自三焦而降也。三焦、心包相表里，加生姜以和之。

【备考】《医方考》本方用：半夏、陈皮（去白）、茯苓、甘草（炙）、山栀子（炒黑）、黄连（炒）、生姜各等分。

00192 十水丸

【方源】《医心方》卷十引《小品方》。

【组成】 椒目 甘遂 大戟 芫花 玄参 赤小豆 桑根白皮 泽漆 巴豆 葶苈各等分

【用法】 上十种，随其病始所在，增其所主药一分，巴豆四分（去心皮），为末，合下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸。得下为度。不下，日三服亦可。亦可作散服，每用半钱匕。如大便利，明朝复服如法，再服病愈。

【主治】 十种水肿。

【加减】 肿从头起名白水，加椒目一分；从胸起名黄水，加甘遂一分；从面起名青水，加大戟一分；从腹起名气水，加芫花一分；从股起名黑水，加玄参一分；从面起至足名悬水，加赤小豆一分；从内起坚块四肢肿名石水，加桑根一分；从四肢起腹肿名风水，加泽漆一分；从腹起名冷水，加巴豆四分；从胸起名赤水，加葶苈一分。

00193 十生丸

【方源】《普济方》卷一一六引《卫生家宝》。

【组成】 干姜 半夏 天南星 白僵蚕 川乌（去皮尖） 白附子各一两 全蝎一分 人参一分 干葛一两 附子七钱（去皮尖）

【用法】 上为细末，生姜自然汁煮糊为丸，如梧桐子大，以蛤粉为衣。每服三十丸，生姜自然汁破汤吞下，不拘时候。

【主治】 瘫痪。

【宜忌】 服后忌热物少时。

00194 十灰丸

【方源】《济生》卷六。

【组成】 绵灰 黄绢灰 艾叶灰 马尾灰 藕节灰 莲蓬灰 油发灰 赤松皮灰 棕榈灰 蒲黄灰 各等分

【用法】 上为细末，用醋煮糯米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，加至一百丸，空心米饮送下。

【主治】 崩中，下血不止。

00195 十灰散

【方源】《修月鲁般经后录》引《劳证十药神书》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】 大蓟 小蓟 柏叶 荷叶 茅根 茜根 大黄 山栀 牡丹皮 棕榈皮各等分

【用法】 烧灰存性，研极细，用纸包了，以碗盖地上一夕，出火毒。用时先将白藕捣破绞汁，或萝卜汁磨真京墨半碗，调灰五钱，食后服下。

【主治】 劳证呕吐血，咯血，嗽血。

【方论选录】《成方便读》：此方汇集诸凉血、涩血、散血、行血之品，各烧灰存性，使之凉者凉，涩者涩，散者散，行者行。由各本质而化为北方之色，即寓以水胜火之意。

【临证举例】 肺结核 《福建中医药》（1960；3：14）：采用中药十灰散治疗27例肺结核咯血患者。有效者22例，占81%，其中疗效良好者20例。多半于服药后4～6天内止血，平均止血时间为5天，3例两天止血，2例药后咯血减少，5例无效为大量反复咯血者。27例中，除一例为慢性纤维空洞型肺结核外，皆为浸润型。除10例为好转期，或好转部分硬结期外，余17例为溶解期、播散期或进展期。十灰散对好转期肺结核疗效很好，很快止血，而溶解期、播散期或进展期肺结核则疗效较差。本组病例在应用十灰散期间除按肺结核咯血的常规护理和予以抗痨治疗外，未曾用其他止血剂。

【备考】《张氏医通》有薄荷，无荷叶。

00196 十灰散

【方源】《医级》卷八。

【组成】 藕节 败棕 男发 百草霜 蒲黄 荆芥 侧柏 姜灰 苎麻 茅草根各等分

【用法】 各炒炭研匀。每服二钱，加大枣五个，煎汤下。

【主治】 血病日久，微甚不休，一切吐血、咳血、咯血及溲血、便血、妇人崩淋不止者。

00197 十华散

【方源】《局方》卷二（绍兴续添方）。

【组成】 五加皮 陈皮（去白） 干姜（炮） 甘草各六两 大川乌三两 附子（炮）六两 桔梗（炒） 肉桂（去粗皮） 绵黄耆（去芦，炒） 苍术（去皮，炒） 羌活各八两八钱

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜二片，大枣一个，煎六分，不拘时候；热盐酒调服

亦得。

【主治】 丈夫五劳七伤，浑身疼痛，四肢拘急，腰膝无力；脾元气虚，不思饮食，霍乱吐泻，四肢冷麻；二毒伤寒，脚气流注肿痛，行步不得及虚劳等证。

00198 十全丹

【方源】《三因》卷三。

【组成】 苁蓉（酒浸） 石斛（酒浸） 狗脊（火去毛） 萆薢 茯苓 牛膝（酒浸） 地仙子 远志（去心，炒）各一两 熟地黄三两 杜仲（去皮，锉，炒）三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒、盐汤送下。

【主治】 脚气上攻，心肾相系，足心隐痛，小腹不仁，烦渴，小便或秘或利，关节挛痹疼痛。

00199 十全散

【方源】《传信适用方》卷二。

【异名】 十补汤（《易简方》）、十全大补汤（《局方》卷五吴直阁增诸家名方）、十全饮（《局方》卷五续添诸局经验秘方）、大补十全散（《元戎》）、千金散（《丹溪心法附余》卷二十一）、十全大补散（《准绳·类方》卷一）、加味八珍汤（《会约》卷十四）。

【组成】 人参（去芦） 白术 白芍药 白茯苓 黄耆 川芎 干熟地黄 当归（去芦） 桂（去皮） 甘草（炒）各等分

【用法】 上㕮咀。每服三钱，加生姜三片，大枣二个（擘破），水一盏半，煎八分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 温补气血。

①《传信适用方》：补诸虚不足，养荣卫三焦，五脏六腑，冲和清快。②《局方》（吴直阁增诸家名方）：养气育神，醒脾止渴，顺正辟邪，温暖脾肾。③《外科理例》：生血气。④《医方集解》：助阳固卫。⑤《傅青主女科》：壮其元阳。

【主治】 气血两虚，虚劳潮热，面色㿠白，气短心悸，头晕目眩，自汗盗汗，体倦乏力，四肢不温；妇女崩漏，月经不调；疮疡不敛。现用于各种贫血，慢性胃肠病，妇女月经病，以及外科手术后，肿瘤等慢性消耗性疾病见上述证候者。

①《局方》（吴直阁增诸家名方）：男子、妇人诸虚不足，五劳七伤，不进饮食；久病虚损，时发潮热，气攻骨脊，拘急疼痛，夜梦遗精，面色萎黄，脚膝无力，一切病后气不如旧；忧愁思虑伤动血气，喘嗽中满，脾肾气弱，五心烦闷。②《普济方》：久嗽生寒热，似痨瘵。③《外科发挥》：溃疡发热，或恶寒，或作痛，或脓多，或清，或自汗盗汗；及流注、瘰疬、便毒久不作脓，或脓成不溃，溃而不敛。④《内科摘要》：遗精白浊，自汗盗汗；或内热、晡热、潮热、发热；或口干作渴、喉痛舌裂；或胸乳膨胀，胁肋作痛；或脐腹阴冷，便溺余滴；或头颈时痛，眩晕目花；或心神不宁，寤而不寐；或形体不充，肢体作痛；或鼻吸气冷，气趋喘促。⑤《口齿类要》：气血俱虚，牙齿肿痛，或口舌生疮，或恶寒发热，自汗盗汗，食少体倦；或寒热作渴，头痛眩晕，或似中风之状。⑥《正体类要》：杖疮，气血俱虚，肿痛不消，腐而不溃，溃而不敛；若怯弱之人，患处青肿而肉不坏，或溃而脓水清稀，肌肉不生，或口干作渴而饮汤者。⑦《万氏女科》：产后玉户不敛。⑧《济阴纲目》：坠胎及多产育伤血，或误服汗下克伐之药，以致血衰气乏而经不行者；又治妇人冷劳。⑨《杂病源流犀烛》：疹子，诸厥，诸痛。

【方论选录】 ①《元戎》：桂、芍药、甘草，小建中汤也；黄耆与此三物，即黄耆建中汤也；人参、茯苓、白术、甘草，四君子汤也；川芎、芍药、当归、熟地黄四物汤也；以其气血俱衰，阴阳并弱，天得地之成数，故名曰十全散。②《法律》：此方合黄耆建中汤、四君子汤、四物汤三方，共得十味，合天地之成数，名曰十全大补，以治气血俱衰，阴阳并弱之候，诚足贵也。但肉桂之辛热，未可为君。审其肾虚腰腹痛，少用肉桂；若营卫之虚，须少用桂枝调之，取为佐使可也。③《古方选注》：四君、四物加黄耆、肉桂，是刚柔复法。盖脾为柔脏，制以四君刚药，恐过刚损柔，乃复黄耆维持柔气；肝为刚脏，制以四物柔药，恐过柔损刚，乃复肉桂回护刚气。调剂周密，是谓十全。④《成方便读》：八珍并补气血之功，固无论矣。而又加黄耆助正气以益卫，肉桂温血脉而和营。且各药得温养之力，则补性愈足，见效愈多，非惟阳虚可遏，即阴虚者亦可温，以无阳则阴无以生，故一切有形之物，皆属于阴，莫不生于春夏而杀于秋冬也。凡遇人之真阴亏损，欲成痨瘵等证，总宜以甘温之品收效。或虚之盛者，即炮姜、肉桂，亦可加于大队补药之中，自有神效。若仅以苦寒柔静，一切滋润之药，久久服之，不特阴不能生，而阳和生气，日渐衰亡，不至阳气同归于尽不止耳。

【临证举例】 ①卒然晕倒 《杏苑》：有一证，卒然晕倒，冷汗自出，气定复醒，不时举作，似乎中风，乃气虚阳衰之故，不可用治风治气之药。以十

全大补汤主之。甚则加黑附子。②疟疾 《石山医案》：一人年近三十，形瘦淡紫，八月间病疟。予疹之，左脉颇和而快，右脉弱而无力。令用消暑益气汤加减服之，觉胸膈痞闷，遂畏人参。更医作疟治，而疟或进或退，服截药病稍增。延至十月，复邀予诊，脉皆浮小而濡带数，右则尤近不足。曰：正气久虚，邪留不出，疟尚不止也，宜用十全大补汤减桂加芩倍参，服之渐愈。③痿证 《芷园臆草存案》：织造刘大监，病痿一年，欲求速效，人亦咸以旦暮效药应之。二月，予诊之，六脉细弱，血气大虚，用十全大补汤，药将百帖而能起矣。④顽固性荨麻疹 《河南中医》（1983；6:40）：顽固性荨麻疹迁延日久，屡治不愈，往往因体质虚弱，气血两亏之故，乃投益气补血之十全大补汤并加活血祛风止痒之药，治愈22例。

【现代研究】 ①增强机体免疫功能 《炎症》（1986；4:405）：十全大补汤具有显著的免疫增强效果，能明显促进特异性抗体生成。当用绵羊红细胞于体外一次免疫小鼠脾细胞后，发现脾脏溶血空斑数（PFC）明显增多，且与剂量有关。其热水浸出物按0.5、1.0、2.0g/kg剂量连续灌服7天，PFC分别增加20%、40%和80%，2.0g/kg即达最大效果。用绵羊红细胞静脉注射免疫小鼠，如在免疫前或免疫后给予十全大补汤均可使PFC有所增加，于免疫前后连续给药，可使PFC增多70%，与对照组比较，有显著性差异，表明本方可促进抗体生成。②抗癌活性及对抗癌药作用的影响 《汉方医学》（1986；4:13）：十全大补汤，具有抗癌活性，采用双重软琼脂培养基，以克隆形成细胞检测法的研究表明，本方热水提取物与人乳癌细胞体外培养于37℃作用1小时，对雌激素受体ER及雄激素受体P_{gR}均阳性的MCF－7株及两种受体均阴性的ES_{79-1}株克隆形成率均无明显影响，时间延长两周，则可显著抑制两株细胞之克隆形成，于0.8～500μg/ml浓度时呈浓度依赖性抑制，且以对ES株为敏感，100μg/ml浓度时癌细胞存活率约为40%，于500μg/ml时为17%，而对MCF－7株于500mg/ml时存活率为40%，本方的作用较补中益气汤为强，较小柴胡汤更强。

【备考】 本方改为丸剂，名“十全大补丸”（见《麻疹全书》）；改为膏剂，名“十全大补膏”（见《中药成方配本》）。

00200 十补丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 五味子各二两 山茱萸（取肉） 山药（饼，炒） 牡丹皮（去木） 鹿茸（去毛，酒蒸） 熟地黄（酒蒸） 肉桂（去皮，不见火） 白茯苓（去皮） 泽泻各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐酒、盐汤送下。

【主治】 肾脏虚弱，面色黧黑，足冷足肿，耳鸣耳聋，肢体羸瘦，足膝软弱，小便不利，腰脊疼痛。

00201 十补丸

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【异名】 大补丸（《普济方》卷二一七引《仁存方》）。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 干姜（炮） 肉桂（去粗皮） 菟丝子（酒浸软，别研细） 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 巴戟（去心） 远志（去心，姜汁浸，炒） 破故纸（炒） 赤石脂（煅）各一两 川椒（炒出汗，去目及闭口者）二两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，温酒、盐汤任下。

【功用】 补五脏，行营卫，益精髓，进饮食。

【主治】 真气虚损，下焦伤竭，脐腹强急，腰脚疼痛，亡血盗汗，遗泄白浊，大便自利，小便滑数；或三消渴疾，饮食倍常，肌肉消瘦，阳事不举，颜色枯槁。

00202 十补丸

【方源】《普济方》卷二一九引《瑞竹堂方》。

【组成】 肉苁蓉（酒浸） 菟丝子（酒浸） 牛膝（酒浸） 干山药 熟地黄 川乌头（泡） 泽泻 人参 当归 官桂（不见火）各等分

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下。

【功用】 暖丹田。

【主治】 阳损久虚下冷，夜频起。

00203 十补丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 黄耆 白术各二两 茯苓 山药各一两五钱 人参一两 大熟地三两 当归 白芍各一两 山萸肉 杜仲 续断各二两 枣仁二两 远志一两 北五味 龙骨 牡蛎各七钱五分

【用法】 金樱膏为丸。每服四钱，开水送下。或用石斛四两熬膏和炼蜜为丸。每早开水送下四钱。

【主治】 ①《医学心悟》：体虚遗精。②《笔花医镜》：血气大亏，健忘，心肾不交者。

00204 十枣汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 三星散(《普济方》卷三八〇引《傅氏活婴方》)、大枣汤(《伤寒大白》卷二)。

【组成】 芫花（熬） 甘遂 大戟等分

【用法】 上各为散，以水一升半，先煮大枣肥者十个，取八合，去滓，纳药末。强人服一钱匕，羸人服半钱，温服之。若下少病不除者，明日更服，加半钱。得快下利后，糜粥自养。

【功用】 攻逐水饮。

【主治】 水饮内停。咳唾胸胁引痛，心下痞硬，干呕短气，头痛目眩，或胸背掣痛不得息，脉沉弦。现用于结核性胸膜炎，慢性肾炎所致的胸水，腹水，或全身水肿，而体质尚实者。

①《伤寒论》：太阳中风，下利呕逆，其人漐漐汗出，发作有时，头痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕短气，汗出不恶寒，表里未和者。②《金匮要略》：悬饮；咳家，其脉弦，为有水；支饮家，咳烦胸中痛。③《宣明论》：水肿腹胀，并酒食积胀，痃癖坚积，蓄热，暴痛，疟气久不已；风热燥甚，结于下焦，大小便不通；实热腰痛，及小儿热结，乳癖积热，作发惊风潮搐，斑疹热毒不能了绝者。④《普济方》引《傅氏活婴方》：积疳，遍身浮肿。⑤《妇科玉尺》：带下，湿而挟热，大便或泄或闭，小便塞，脉涩而气盛。

【方论选录】 ①《内台方议》：下利呕逆者，里受邪也。若其人漐漐汗出，发作有时者，又不恶寒，此表邪已解，但里未和。若心下痞硬满，引胁下痛，干呕，短气者，非为结胸，乃伏饮所结于里也。若无表证，亦必烈快之剂泄之乃已。故用芫花为君，破饮逐水；甘遂、大戟为臣；佐之以大枣，以益脾而胜水为使。经曰：辛以散之者，芫花之辛，散其伏饮。苦以泄之者，以甘遂、大戟之苦，以泄其水。甘以缓之者，以大枣之甘，益脾而缓其中也。②《伤寒附翼》：仲景利水之剂种种不同，此其最峻者也。凡水气为患，或喘或咳，或利或吐，或吐或利而无汗，病一处而已。此则外走皮毛而汗出，内走咽喉而呕逆，下走肠胃而下利。水邪之泛溢者，既浩浩莫御矣，且头痛短气，心腹胁下皆痞硬满痛，是水邪尚留结于中，三焦升降之气，拒隔而难通也。表邪已罢，非汗散所宜；里邪充斥，又非渗泄之品所能治，非选利水之至锐者以直折之，中气不支，亡可立待矣。甘遂、芫花、大戟，皆辛苦气寒，而秉性最毒，并举而任之，气同味合，相须相济，决渎而大下，一举而水患可平矣。然邪之所凑，其气已虚，而毒药攻邪，脾胃必弱，使无健脾调胃之品主宰其间，邪气尽而元气亦随之尽，故选枣之大肥者为君，预培脾土之虚，且制水势之横，又和诸药之毒，既不使邪气之盛而不制，又不使元气之虚而不支，此仲景立法之尽善也。用者拘于甘能缓中之说，岂知五行承制之理乎？

【临证举例】 ①悬饮 《金匮玉函要略辑义》引《嘉定县志》：唐杲，字德明，善医。太仓武指挥妻，起立如常，卧则气绝欲死，杲言是为悬饮，饮在喉间，坐之则坠，故无害；卧则壅塞诸窍，不得出入而欲死也。投以十枣汤而平。②胸膜腔积液《解放军医学杂志》(1965；2:150)：治疗渗出性胸膜炎51例，胸水在11天内改善者达96%，20天内完全消失者达88.2%，积液平均消失时间为16.2天。结果表明，十枣汤治疗本病较单用西药可提高疗效40%，较单用抗痨法的效果好一倍左右。《中医药学报》(1984；1:53)：王某，男，19岁，发烧以午后为重，盗汗咳嗽，吐少量白痰，右侧胸痛半月，体温39℃，脉搏128次/分，呼吸32次/分，血压100/70mmHg。右侧胸廓饱满，呼吸明显受限，心尖搏动于左锁骨中线第五肋间外0.5cm处，心界左移。右肺呼吸音消失，叩呈浊音，X线胸片所见：右肺前二肋以下呈致密阴影，肋膈角消失，上界呈反抛物线样，胸水常规，李凡他氏反应阳性，血沉第一小时50mm，第二小时75mm。经用十枣汤二次，48小时体温恢复正常，胸不痛，呼吸平稳。X胸片胸水全部吸收，有胸膜肥厚征象。血沉复查：第一小时为5mm，第二小时10mm，告愈出院，随访6个月良好。上方治疗结核性胸膜炎28例，男17例，女11例，最小者15岁，最大者45岁，胸水量，经X线检查，胸水在2～3前肋以下18例，3～4前肋以下6例，4～5前肋以下4例。治疗结果：24小时内吸收者13例；48小时内吸收者9例；72小时以上吸收者6例。③肾炎水肿 《经方实验录》：南宗景先生曰：舍妹患腹胀病，初起之时，面目两足皆微肿，继则腹大如鼓，漉漉有声，渴喜热饮，小溲不利，呼吸迫促，夜不成寐，愚本《内经》开鬼门，洁净府之旨，投以麻黄、附子、细辛合胃苓散加减，服后虽得微汗，而未见何效。西医诊为肾脏炎症，与以他药及朴消等下利，便泻数次，腹胀依然，盖以朴消仅能下积，不得下水也。翌日，忽头痛如劈，呕吐痰水则痛稍缓。愚曰，此乃水毒上攻之头痛，即西医所谓自家中毒。乃拟方用甘遂二分（此药须煨透，服后始未致作呕，否则吐泻并作），大戟、芫花炒，各一钱半。因体质素不壮盛，改用枣膏和

丸，欲其缓下，并令侍役先煮红米粥以备不时之需。药后四五小时，腹中雷鸣，连泻粪水十余次，腹皮弛缓，头痛也除，惟神昏似厥，呼之不应，进已冷之红米粥一杯，即泻止神清；次日腹中微有水气，因复投十枣丸一钱半，下其余水，亦祛疾务尽之意。嗣以六君子汤补助脾元，调理旬日，即获痊愈。④肝硬化腹水 《上海中医药杂志》(1963；6:14)：殷氏用逐水法为主治疗25例肝硬化腹水，从逐水效果看，十枣汤较好。⑤胃酸过多症 《福建中医药》(1963；3:42)：林氏用十枣汤治愈14例胃酸过多症，无一例复发。服法是将大戟、芫花、甘遂各7.5克研细末，大枣十个，先将大枣煎汤两碗，早晨空腹服一碗，一小时后，将药末投入另一碗中服下。服后可有胸中呕恶，腹内嘈杂感，二小时后开始泻下二至三次，泻后自觉疲倦，可用大枣煮粥食之，再用党参、茯苓、橘红、半夏、大枣煎服善后。

00205 十宝丹

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】 龙骨八分 象皮七分 琥珀六分 血竭五分 黄丹五分 冰片四分 珍珠二分（豆腐煮） 牛黄二分 乳香 没药各一钱三分

【用法】 上为细末，收贮听用。

【主治】 痔漏。

00206 十宝丹

【方源】《喉科家训》卷一。

【组成】 薄荷末一两 生甘草五钱 孩儿茶二两 滴乳石四钱 真琥珀三钱 雪梅丹一两 上冰片四钱 真血竭三钱 明珍珠三钱 犀牛黄一钱

【用法】 上为极细末。吹患处。

【主治】 一切口舌白腐或肿痛，及喉蛾、痈、痹，喉内腐溃等。

00207 十珍丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】 草乌头八两（半生，去皮脐尖，半炮） 天南星五两三钱（河水浸三日，炮） 缩砂仁一两 肉桂（去粗皮） 川芎 防风（去芦头） 香白芷 桔梗（去芦头）各二两七钱 细松烟墨二两（烧留性） 麻黄（去根节）七两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两作三十丸。每服一丸，食后细嚼，茶、酒任下。

【主治】 诸风掉运，痰厥头旋，项背拘急，肢体疼痛，麻木不仁。

00208 十珍丸

【方源】《修月鲁般经》引《劳证十药神书》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】 猪背膂一条 羊背膂一条 鳖鱼一只 乌骨鸡一只（四味制净，去骨留肉，煮酒一大瓶，鳖肉煮熟，擂碎） 大山药一条 莲肉半斤 京枣一百个 霜柿十个（上四味，用井水一大瓶，于沙糖甑内煮熟，擂细，却与前药一处，用慢火熬，却下） 明胶四两 真黄蜡三两

【用法】 上二味，旋旋下，与前八味和作一处，擂成膏子，和平胃散末，四君子汤末，并知母、黄柏各一两，共十两，搜和成剂，如十分硬了时，再入白蜜同熬，取起，放青石上，用水捶打如法，匀了，为丸如梧桐子大。每服一百丸，枣汤吞下，不拘时候。

【功用】 此药服之半月，精神完复，气血津和。服之一月，饮食倍加，轻居轻快。服之两月，百病消除，诸气益补。服之三月，丹田常暖，水火既济。服之四月，老者反壮，行步如龙飞。服之五月，发白再黑，齿落更生。

【主治】 一切劳。大怯极虚甚惫，骨干津涸，血枯气竭，火乘金位者，服白凤膏愈后，即服此药。

【备考】 本方方名，《十药神书》（陈修园注本）作“补髓丹”。

00209 十珍汤

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 生地（酒洗）二钱 当归（酒洗）一钱半 白芍（炒） 地骨皮（炒） 知母（盐酒拌炒） 丹皮（童便浸，炒） 天门冬（去心） 麦门冬（去心）各一钱半 人参（去芦） 甘草梢各五分

【用法】 上锉。白水二钟，煎至八分，去滓温服。

【功用】 滋阴降火，养血清肝。

【主治】 赤痛如邪症，阴虚火动，目赤痛，头痛，寒热交作，如风寒疟疾状。

00210 十种丸

【方源】《医方类聚》卷一二九引《王氏集验方》。

【组成】 雄黄（去砂石） 大戟 商陆 甘遂（去直者） 芫花（醋煮，焙） 椒目 槟榔 葶苈子（隔纸炒） 桑白皮各一两 巴豆（去油）半两（一法去椒目，用泽泻）

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，五更初温枣汤送下。利下黄水并恶物为效。

【主治】 水气浮肿，上气喘急，手足头面腹肚皆肿，一切癥瘕积聚，两胁胁疼痛，小肠疝气，脬囊

浮肿。

00211 十香丸

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】沉香 麝香 白檀香 青木香 零陵香 白芷 甘松香 藿香 细辛 芎藭 槟榔 豆蔻各一两 香附子半两 丁香三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。绵裹，日夕含之咽津，味尽即止。

【功用】令人身体百处皆香。

【宜忌】忌五辛。

00212 十香丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】木香 沉香 泽泻 乌药 陈皮 丁香 小茴香 香附（酒炒） 荔核（煨焦）各等分 皂角（微火烧烟尽） 一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如弹子大者，磨化服；丸梧桐子大者，汤引下；癫疝之属，温酒下。

【功用】《北京市中药成方选集》：舒气，散寒，止痛。

【主治】①《景岳全书》：气滞、寒滞诸痛。②《北京市中药成方选集》：胃疼，腹痛，妇女行经腹痛，男子疝气，气郁不舒，两胁痛腹胀肠鸣。

00213 十将丹

【方源】《药奁启秘》。

【组成】腰黄（飞）四钱 蝎尾（炙）十支 蜈蚣（炙）十条 蝉衣二钱（去翅足） 冰片四分 麝香三分 五倍子（瓦上炙）八钱 炙甲片三钱 半夏 南星各四钱

【用法】上为极细末。掺膏药内贴。

【主治】一切痈疽大毒，未溃者即消。

00214 十神汤

【方源】《局方》卷二（续添诸局经验秘方）。

【组成】陈皮（去瓤，去白） 麻黄（去根节） 川芎 甘草（炙） 香附子（杵去毛） 紫苏（去粗梗） 白芷 升麻 赤芍药各四两 干葛十四两

【用法】上为细末。每服三大钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】①《局方》（续添诸局经验秘方）：时令不正，瘟疫妄行，阴阳两感，或风寒湿痹。②《景岳全书》：时气瘟疫，感冒风寒，发热憎寒，头痛，咳嗽，无汗。

【加减】如发热头痛，加连须葱白三茎；中满气实，加枳壳数片同煎。

00215 十膈散

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】人参 茯苓 厚朴 黄橘皮 京三棱 枳实 神曲 甘草 白术 诃子 干姜 桂各一两 槟榔 木香各一分（一法添麦芽一两 莪术一分 槟榔 木香各加一分）

【用法】上为细末。每服一钱，入盐点之。如脾虚腹胀，心胸满闷，以水一盏，加生姜三片，大枣两个，盐少许，煎至七分，和滓热服。

【主治】冷、热、忧、悲、喜、怒、愁、恚、食、气疾十膈，并因忧惊冷热不调，又乖将摄，更加喜怒无则，贪嗜饮食，因而不化，滞积在胸中，上喘痰嗽，岁月渐深，胸膈噎塞，渐至疲羸。

【备考】方中枳实、黄橘皮，《卫生宝鉴》作"枳壳"、"青皮"。

00216 十膈散

【方源】《直指》卷十七。

【组成】人参 茯苓 厚朴（制） 橘红 莪术 枳壳（制） 半夏曲 甘草（炙） 生白姜 辣桂 槟榔 木香各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，加生姜二片，大枣二枚，水煎服。

【主治】七气为膈，饮食不消，谷胀、气胀。

00217 十精丸

【方源】《百一》卷十五。

【组成】吴茱萸 茴香 台椒（三味同炒焦黄色） 破故纸（炒） 川楝子（去核，炒） 陈皮 青皮 苍术 大川乌（用青盐炒赤色，去皮尖） 良姜（炒）各一两

【用法】上为细末，酒糊为丸。每服二十至三十丸，空心盐汤、温酒任下；妇人米醋汤送下。

【主治】下部久冷。

00218 十精丸

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】枸杞子 甘菊花 菟丝子（酒煮，捣成饼）各二两 山茱萸 天门冬 白茯苓各三两 官桂 淮熟地（用生者，酒蒸九次）四两 肉苁蓉（酒浸一宿） 汉椒（去目）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐、酒送下。

【主治】精寒阳萎。

00219 十四友丸

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】熟地黄 白茯苓 白茯神（去木） 人参 酸枣仁（炒） 柏子仁（别研） 紫石英（别研） 肉桂 阿胶（蛤粉炒） 当归 黄耆 远志（汤浸，去心，酒洒，蒸）各一两 辰砂（别研）

一分 龙齿（别研） 一两

【用法】 上为末，同别研四味，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后枣汤送下。

【功用】 ①《局方》（续添诸局经验秘方）：补心肾虚。②《普济方》：补虚益血，收敛心气。

【主治】 怔忡昏愦，神志不宁，睡卧不安。

00220 十味锉散

【方源】 《医方类聚》卷二十引《叶氏录验方》。

【组成】 附子三两（炮，去皮脐） 当归（去土，洗，切） 黄耆（炙） 白芍药各二两 川芎（不见火） 防风（去芦） 白术各一两半 肉桂（去粗皮，不见火）一两 茯苓 熟地黄（洗净，用少酒熬令干，焙之）各七钱半

【用法】 上修制了再称，㕮咀。每服四钱，水一大盏，加生姜八片，大枣三个（擘开），煎七分，去滓，通口服，食后、临卧，每日三次。温覆厚衣将养。

【功用】 补心益血，养筋生力。

【主治】 ①《医方类聚》引《叶氏录验方》：中风血弱臂痛，连筋及骨，举动艰难。②《张氏医通》：湿痹周身疼痛。

【方论选录】 ①《法律》：臂痛乃经脉不舒，体盛者，可去其筋脉中之风，然既已血痹，所受风燥之累不浅，故取此方。养血之中，加附子之力，通其阳气；而用防风，反佐黄耆，出其分肉腠理之风也。②《张氏医通》：此即十全大补去人参、甘草之甘缓补气，而加附子、防风以通达外内也。

00221 十圣夺命丹

【方源】 《臞仙活人方》。

【组成】 人参 甘草各一钱 南木香二钱 南星二钱（姜制） 半夏五钱（姜制） 枳壳一两（去瓤，面炒） 白矾（火枯） 豆豉一两 厚朴五钱（姜制炒干） 糖球子一钱

【用法】 上药候清，夜间露过，以人参、厚朴煎汤，调米糊作饼子，如小钱大，慢火焙干。每服一饼，嚼碎，姜汤调平胃散送下。

【主治】 翻胃、噎食。

【宜忌】 忌诸般生冷、腥味及酒之类。

00222 十皮五子饮

【方源】 《冯氏锦囊》卷十四。

【组成】 茯苓皮 草果皮 牡丹皮 地骨皮 五加皮 大腹皮 甘草皮 菟丝子 大腹子 车前子 生姜皮 木通皮 木瓜皮 紫苏子 葶苈子各一钱五分

【用法】 水煎服。如要断根者，将十五味药等分为细末，用未下水之雄猪肝一个，先将温水煮一滚，取出，用竹尖钻孔数个，入药在内，蒸熟切片，捣蒜蘸食之。不过一二个，永不发也。

【主治】 一切鼓肿胀，并气虚中满，单腹胀。

00223 十全大补汤

【方源】 《会约》卷六。

【组成】 人参（或以淮山药炒黄三钱代之） 白术钱半 茯苓 炙甘草各一钱 当归一二钱 抚芎一钱 白芍（酒炒）一钱 熟地二钱 黄耆（蜜炙）二钱 肉桂钱半 石菖蒲（炒）六分

【用法】 加生姜、大枣为引。

【主治】 气血两虚，耳鸣耳闭。

00224 十全补阴汤

【方源】 《中医妇科治疗学》。

【组成】 天冬 麦冬 女贞 旱莲 白芍各三钱 甘草二钱 茅根 藕节 丹参各四钱 香附二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 月经周期不定，经期或经后吐血或衄血，头晕耳鸣，时有潮热或咳嗽，唇红，口燥，苔黄，脉细数。

00225 十全育真汤

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 野台参四钱 生黄耆四钱 生山药四钱 知母四钱 玄参四钱 生龙骨（捣细）四钱 生牡蛎（捣细）四钱 丹参二钱 三棱一钱半 莪术一钱半

【主治】 虚劳，脉弦、数、细、微，肌肤甲错，形体羸瘦，饮食不壮筋力，或自汗，或咳逆，或喘促，或寒热不时，或多梦纷纭，精气不固。

【加减】 气分虚甚者，去三棱、莪术，加生鸡内金三钱；喘者，倍山药，加牛蒡子三钱；汗多者，以白术易黄耆，倍龙骨、牡蛎，加山萸肉、生白芍各六钱。

00226 十全济阴丸

【方源】 《济阴纲目》卷六。

【组成】 当归身（酒洗） 熟地黄 香附子（童便煮）各四两 干山药 白术各二两五钱 枸杞子 人参各二两 蕲艾叶（去梗筋）二两（同香附用陈醋、老酒煮一时，捣烂，焙干） 川芎 白芍药 牡丹皮 紫石英（火煅淬）各一两五钱 泽兰一两 紫河车一具（在净水内洗去秽血，用银针挑去紫筋）

【用法】 上㕮咀，同河车入砂锅内，用陈老酒三碗，陈米醋一碗，清白童便一碗，米泔水数碗和匀，倾入锅内，浮于药寸许，如尚少，再加米泔，

以锅盖盖密，勿令透气，桑柴火慢煮，以河车融化，汁干为度，同药俱取出，在石臼内捣极烂，捻作饼子，日晒夜露三昼夜，宜在月满之时，以受日精月华，仍焙干为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，渐加至八九十丸，空心淡盐汤送下。随用早饭，使药下行。

【功用】 调经养血，顺气开郁。

【主治】 月经不调，子宫寒冷不孕。

【宜忌】 忌食生萝卜。

【方论选录】 此方以当归身养血和气为君，入手少阴经，以主心血也；入足太阴经，以脾裹血也；入足厥阴经，以肝藏血也。熟地黄补肾中元气，生心血，与芍药同用，又生肝血；川芎乃血中之气药，下行血海，通经导气为臣。人参通经活血，助熟地黄以补下元；白术利腰脐间血，与人参同用，补益脾气；香附疏气散郁，佐泽兰能生新血，而和平气体；牡丹皮养新血去坏血，固真气行结气；山药能强阴补虚；枸杞子补肾水，而止下血腰疼为佐；紫石英补心气，散心中结气，填补下焦；艾叶助香附和百脉，温子宫，兼行血药而平其寒；炙甘草通经脉血气而和诸药，且缓肝经之急为使。

00227 十全流气饮

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 陈皮 赤苓 乌药 川芎 当归 白芍各一钱 香附八分 青皮六分 甘草五分 木香三分

【用法】 加生姜三片，大枣二个，水二钟，煎八分，食远服。

【主治】 忧郁伤肝，思虑伤脾，致脾气不行，逆于肉里，乃生气瘿肉瘤，皮色不变，日久渐大者。

00228 十补心肾丸

【方源】《医心六要·治法汇》卷七。

【组成】 熟地黄四两（姜汁制） 干山药三两 山萸肉 枸杞子各二两 牡丹皮（酒洗） 黄柏 川牛膝（酒洗） 败龟版（酥炙）各一两五钱 茯神（去皮，为末，水淘，去浮筋，取沉腻者，焙干，净用）三两（以人乳渗之） 人参 柏子仁 酸枣仁（隔纸炒香） 麦冬（酒浸）各二两五钱 辰砂（研极细，甘草煎水飞三次，浸去脚，不见火） 五味子各一两 天冬一两五钱 鹿角霜 鹿角胶 鹿茸（煮者尤佳，酒融化，入蜜同炼）各二两 肉苁蓉（酒洗去浮膜，蒸一个时辰，酥油涂炙） 菟丝子（酒洗，捣烂，焙干） 虎胫骨（酒浸，酒炙）各一两五钱 紫河车一具（首胎者更佳）

【用法】 除茯神、龟版、虎骨、辰砂共为末，柏子仁另研，鹿角霜、胶候各末俱完，酒融化入炼蜜和药外，其余皆㕮咀；紫河车在净水内洗去秽血，用银针挑去紫筋，同咀片，入砂锅内，用陈老酒三碗，陈米醋一碗，清白童便一碗，米泔水数碗，和匀倾入锅内，浮于药寸许，如少再加米泔，以锅盖盖密，桑柴火煮干，为末，和前末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每空心盐汤送下一百丸，各随入脏腑偏盛偏虚加减。

【主治】 诸虚不足，久不妊娠，骨热形羸，崩中带下；凡入少精神，多惊悸，怔忡，健忘，遗精，滑泄，阳萎，阴虚盗汗，劳热，目昏，耳鸣，头眩，腰膝痠痛。

【加减】 如梦遗，加黄柏、知母各一两；如大便秘，加肉苁蓉二两；如素多疝气，加橘核二两，小茴香一两；精滑不禁，加金樱膏代蜜，更加龙骨、牡蛎各一两；凡肠风下血多者，加阿胶一两（蛤粉炒为珠）；赤白痢，加何首乌一两五钱（同黑豆蒸），黄连一两（吴萸炒），干姜五钱（炒黑），地榆、槐角（炒）各一两。

00229 十味白术丸

【方源】《活人心统》。

【组成】 黄连（炒）五钱 白术 陈皮 山药 神曲 芍药 归身 山楂 茯苓各一两 莲子（去心）一两 薏苡仁二两

【用法】 上为末，丸如梧桐子大。每服七十丸，米汤送下。

【主治】 脾胃虚弱，内有痰火，心下满闷，饮食无味，血少气虚。

00230 十味导赤散

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】 黄连 黄芩 麦冬 半夏 茯苓 赤芍 木通 生地 地骨皮 甘草各五分 姜五片

【主治】 心脏实热，口舌生疮、惊悸烦热诸症。

00231 十味导痰汤

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】 导痰汤加羌活 天麻 蝎尾

【用法】 临服入雄黄末少许。

【功用】《医略六书》：祛风豁痰。

【主治】 ①《张氏医通》：痰湿上盛，头目不清。②《医略六书》：风湿痰盛，脉弦浮滑者。

【方论选录】《医略六书》：痰湿内壅，挟风邪而胸胁满闷，经气不能布护，故手足抽搐不已焉。南星散风痰之闭遏，半夏燥湿痰之内壅，枳实破滞气以降下，羌活疏经络以散风，伏苓渗湿和中，天麻

疏风化痰，陈皮利气和胃，甘草缓中和脾，蝎尾祛风清经络，雄黄燥湿豁痰涎，内化则风自外解而经络清和，何有胁满抽搐之患哉。

00232 十味香附丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 地黄 当归 芍药 川芎各四两 白术 陈皮 泽兰叶各二两 黄柏 甘草各一两 香附一斤（分四份，用酒、醋、童便、盐水各浸七日，焙干）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】 妇人经候不调。

00233 十味香薷饮

【方源】《百一》卷七。

【异名】 十味香薷散(《杏苑》卷三)。

【组成】 香薷叶一两 人参（去芦） 白术 陈皮（温汤浸少时，去皮） 白茯苓 黄耆（去芦） 厚朴（去粗皮，锉碎，生姜自然汁拌和，炒至黑色） 干木瓜 白扁豆（炒，去壳） 甘草（炙）各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏，加大枣一个，同煮至七分，去滓，不拘时服。

【功用】 祛暑解表，益气和中。

①《百一》：消暑，健脾进饮食。②《济阳纲目》：养阴避暑，调理阴阳。③《明医指掌》：益气和中，安胎保孕。

【主治】 暑湿内伤，脾胃不和，食少腹胀。

①《百一》：脾胃不和，乘胃暑气，心腹膨闷，饮食无味，呕哕恶心，五心潮热，力乏体倦。②《玉机微义》：伏暑，身体倦怠，神昏头重，吐利。③《诚书》：暑疟。

【方论选录】《医方考》：暑能伤气，故身体倦怠，神思昏沉；暑为阳邪，故并于上而头重；暑邪干胃，故既吐且利。火热横流，肺气受病，人参、黄耆，益肺气也；肺为子，脾为母，肺虚者宜补其母，白术、茯苓、扁豆、甘草，皆补母也；火为母，土为子，火实者宜泻其子，厚朴、陈皮，平其敦阜，即泻子也；香薷之香，散暑邪而破湿热；木瓜之酸，收阴气而消脾湿。脾气调则吐利自息，肺气复则倦怠自除。

00234 十味保和汤

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【异名】 十味保和散(《医钞类编》卷十)。

【组成】 人参 白术 茯苓 半夏（制） 陈皮各一钱 藿香 香附 砂仁各六分 炙甘草 木香各三钱

【用法】 水一钟半，加生姜三片，大枣二个，煎七分，食前温服。

【主治】 胃虚气滞作嗳。

00235 十味流气饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 制香附 苏叶梗各一钱半 枳壳 橘红 姜半夏 川朴 赤苓各一钱 桔梗七分 广木香五分 炙甘草三分

【功用】 理气发汗。

【主治】 伤寒夹痞结。初起头痛身热，恶寒无汗，胸膈痞满，满而不痛，气从上逆，甚则发厥，不语如，或胸满而兼痛，或胁满痛，或腹胀疼，舌苔白滑，甚或白滑而厚，或前半无苔，中后白腻而厚。

00236 十味温胆汤

【方源】《得效》卷八。

【组成】 半夏（汤洗） 枳实（去瓤，切，麸炒） 陈皮（去白）各三两 白茯苓（去皮）一两半 酸枣仁（微炒） 大远志（去心，甘草水煮，姜汁炒）各一两 北五味子 熟地黄（切，酒炒） 条参各一两 粉草五钱

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一个煎，不拘时服。

【功用】 化痰宁心。

【主治】 ①《得效》：心胆虚怯，触事易惊，梦寐不祥，异象感惑，遂致心惊胆慑，气郁生涎，涎与气搏，变生诸证，或短气悸乏，或复自汗，四肢浮肿，饮食无味，心虚烦闷，坐卧不安。②《张氏医通》：寒涎沃胆，胆寒肝热，心悸不眠，短气恶心，耳鸣目眩，四肢浮肿。

【方论选录】 ①《成方便读》：温胆汤加人参、远志、枣仁、熟地。治惊悸不寐因虚而得，以致梦遗惊惕，虚多邪少之象，恐一子除痰，则虚者益虚，其病益盛。故以人参、熟地之大补气血，协同枣仁以入子肝胆之地；用远志者，取其辛散宣泄之品，一则可行补药之滞，一则可交通心肾，心肾交则魂亦可赖以安身。②《天津中医》（1968；3：44）：运用本方时，党参、半夏、茯苓、枳实应重用，并以半夏、茯苓为主药，意在渗燥结合，湿化痰消；取党参益气健脾以治生痰之源；枳实调气行痰，诚如丹溪所云："治痰者，不治痰而治气，气顺则一身之津液亦随之而顺。"

【临证举例】 ①失眠 《江西中医药》（1986；2:20)：吕某，女，49岁。患精神分裂症反复发作

20余年，经常失眠，伴头昏，乏力耳鸣，心烦不安，手足心热，表情呆滞，口干不欲饮，喉中似有物梗阻，吞咽不利，舌红，苔薄黄而腻，脉象细弦。证属阴血不足，兼挟痰湿，心神不宁所致，治当滋阴安神，兼化痰湿，拟十味温胆汤加淮山、黄连，水煎服，每日二次。内服5剂，寤寐正常，续服5剂，诸症悉减。②精神痴呆症 《浙江中医杂志》（1965；4:114）：郑某，室女，18岁，学生。其母代诉：患者平日善思多虑，去年因受惊恐，常显胆怯不宁。夜寐不安，常发梦呓。近感风邪，发热，神志失常，而语无伦次，忽悲忽喜，失眠厌食，月信四月未至，带下甚多。此乃思虑伤脾，湿热下注，以涤痰清热兼散风邪为治。方用十味温胆汤加减，连诊三次，进方6剂，诸病尽除，精神恢复正常，继以逍遥散、天王补心丹数剂调治，食欲渐振，月信亦至，情况良好。

【备考】《金匮翼》有竹茹，无五味子。

00237 十宝化毒散

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】蚌壳粉一钱 琥珀屑五分 雄精五分 飞朱砂三分 月华丹五分 人中黄一钱 人中白一钱 海浮散五分 西黄二分 珠粉一分 冰片一分

【用法】研和。干掺或麻油调搽。

【主治】下疳腐烂。

00238 十鼓通证散

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】大戟 甘遂 麻黄 乌梅 葫芦巴 葶苈 芫花 黑牵牛 细辛 汉防己 槟榔 海蛤 陈皮 桑皮

【用法】上为细末。每服一钱，或二三钱，五更用生姜汤调服。

【主治】十鼓证。气鼓、食鼓、热鼓、风鼓、劳鼓、湿鼓、虫鼓、血鼓、疳鼓，胸腹肿胀，并四肢肿者。

【宜忌】忌盐、醋、酱一百日。

【方论选录】方中大戟取膀胱水；甘遂取肝水；麻黄取肤水；乌梅取腹水；葫芦巴取胃水；葶苈取心水；芫花取遍身水；黑牵牛子取遍身水；细辛取气水；汉防己取胃水；槟榔取血水；海蛤取肺水；陈皮去白取牙水；桑皮取肠水。

00239 十二味异功散

【方源】《陈氏小儿痘疹方论》。

【异名】陈氏异功散（《活幼心书》卷下）、异功散（《袖珍》卷四引《集验》）、神应异功散（《外科正宗》卷一）。

【组成】木香一钱半 官桂二钱（去粗皮） 当归三钱半 人参二钱半 茯苓一钱 陈皮 厚朴各二钱半（姜制） 白术二钱 半夏（姜制）一钱 丁香 肉豆蔻各二钱半 附子（泡去皮）一钱半

【用法】上为粗散。每服三钱，水一大盏半，加生姜五片，肥枣三个，煎至六分，去滓，空心温服。三岁儿作二服，五岁儿作两服，一周两岁儿作三五服。

【主治】①《陈氏小儿痘疹方论》：痘出不光泽，不起胀，根窠不红，表虚痒塌。②《外科正宗》：溃疡阴盛阳虚，发热作渴，手足并冷，脉虚无力，大便自利，至饮沸汤而不知其热者。

【方论选录】①《医方考》：中气有余，气血充满，则痘光泽起发，根窠红活，表无痒塌之患；中气不足，则表亦虚，而诸证作矣。是方也，人参、白术、茯苓、当归所以补胃；附子、肉桂、丁香、豆蔻，所以温胃；半夏、木香、陈皮、厚朴所以调胃。胃，阳明也。陈氏云：阳明主肌肉，胃气充足，则肌肉温暖，自然光泽起胀，而无痒塌之患，亦见道之论也。②《古方选注》：异功散，治脾肾里虚之方也。证因内虚而变，故方中破滞之味轻，助阳之力大。人参、茯苓和胃，白术、广皮健脾，俾胃暖脾温而营卫无滞，自能升提痘毒，出于皮毛。附子理虚而收战栗，官桂鼓阳气以安塌痒，丁香安胃，木香理脾，半夏破滞化痰，厚朴温胃破滞，肉果温脾止泻，当归活血成浆。表虚里实，独用生姜，里虚表陷，姜、枣并用。

00240 十八味戒烟丸

【方源】《饲鹤亭集方》引林文忠公方。

【组成】明党参 纹党参 橘红 杜仲 枣仁各三钱 茯苓四钱 法半夏五钱 玉竹 旋覆花 益智仁 罂粟壳各二钱 枸杞 炮姜 炙甘草各一钱五分 沉香六分 赤糖四两 红枣十个 烟灰五钱

【用法】熬膏，或为丸。随瘾大小，酌量加减。

【功用】戒烟。

00241 十六味保元汤

【方源】《寿世保元》卷上。

【组成】黄耆一钱 石斛七分 巴戟肉二钱 白茯苓一钱 升麻七分 圆眼肉三钱 贯仲（去根土）三钱 人参二钱 山药一钱 川独活一钱 当归身二钱 连蕊一钱 黄柏（酒炒）八分 生甘草三分 杜仲（小茴、盐、醋汤浸，炒）一钱五分 骨碎补（先以稻草火上烙去毛，以粗布拭净）二钱

【用法】上锉一剂。水煎，空心温服。

【功用】生血固真，补心益肾。

【主治】 带下。

【加减】 潮热，加柴胡八分，黄芩（酒炒）一钱；带甚者，月经必少，其有聚而反来，适来适断，而淋沥不净者，加荆芥一钱，黄连（酒炒）七分，地榆八分；若五心烦躁而口舌干者，加知母一钱，麦门冬一钱，地骨皮八分。

00242 十六味流气饮

【方源】《玉机微义》卷十五。

【异名】 疮科流气饮（《外科发挥》卷五）、流气饮（《痘疹心法》卷十二）、消毒流气饮（《杏苑》卷七）。

【组成】 川芎 当归 芍药 防风 人参 木香 黄耆 官桂 桔梗 白芷 槟榔 厚朴 乌药 甘草 紫苏 枳壳各等分

【用法】 上㕮咀。水煎服。

【主治】 肝气郁结，血液瘀滞，或风寒湿邪外侵，气血不和，结成肿块，皮色不变者。

①《玉机微义》：无名恶肿痈疽等证。②《医学正传》：奶岩。③《外科发挥》：流注及一切恚怒气结肿作痛，或胸膈痞闷，或风寒湿毒，搏于经络，致气血不和，结成肿块，肉色不变，或漫肿木闷无头。④《杏苑》：气毒湿毒，流注遍身攻肿。

【方论选录】《济阴纲目》：乳岩之病，大都生于郁气。盖肝主怒，其性条达，郁而不舒，则曲其挺然之质，乳头属厥阴经，其气与痰，时为积累，故成结核，兹以风药从其性，气药行其滞，参、耆、归、芍以补气血，官桂血药以和血脉。

【临证举例】 ①结核 《医方口诀集》：余曾治一妇女，其人全身各处肿且痛，梅核状结核数十个。每年春夏之间，其中5～7个破溃流出脓血，继则排出腐绵状之物，疮根随之脱落。来年其它处破溃之旧根脱落，新根核渐次生出。如此之病状已持续20余年，其间历经内、外科诸方治疗无效。余诊之，此病因气血之郁而生，宜用十六味流气饮。服方200余贴，次年未生新核，旧核亦渐渐消散。②乳腺肿瘤 《从症汉方治疗实际》：患者38岁，女。4～5年前因生气右乳房疼痛。诊察，右乳房有大梅干状之肿瘤，与周围组织不粘连，皮肤亦无凹陷、疼痛和压痛。其他无特殊变化。给予十六味流气饮15日量，分5次投药，肿瘤完全消退。

00243 十四味建中汤

【方源】《局方》卷五（宝庆新增方）。

【异名】 大建中汤（《证治要诀类方》卷一）。

【组成】 当归（去芦，酒浸，焙干） 白芍药（锉） 白术（锉，洗） 甘草（炙） 人参（去芦） 麦门冬（去心） 川芎（洗净） 肉桂（去粗皮） 附子（炮，去皮脐） 肉苁蓉（酒浸一宿） 半夏（汤洗七次） 黄耆（炙） 茯苓（去皮） 熟地黄（洗去土，酒蒸一宿，焙干）各等分

【用法】 上为粗散。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，枣子一个，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】 气血不足，脾肾久虚，虚损羸瘦，面白脱色，短气嗜卧，手足多冷，夜卧汗多，梦寐惊悸，大便频数，小便滑利；肾虚腰痛，不能转侧。

①《局方》（宝庆新增方）：荣卫不足，脏腑俱伤，积劳虚损，形体羸瘠，短气嗜卧，寒热头痛，咳嗽喘促，吐呕痰沫，手足多冷，面白脱色，小腹拘急，百节尽疼，夜卧汗多，梦寐惊悸，小便滑利，大便频数，失血虚极，心忪面黑。②《证治要诀类方》：肾虚腰痛，转侧不能，嗜卧疲弱。③《医方集解》：阴证发斑，寒甚脉微。④《会约》：伤寒中气不足，脉息虚大，一切虚斑。

【方论选录】《医方集解》：此足三阴、阳明气血药也。黄耆益卫壮气，补中首药；四君补阳，所以补气；四物补阴，所以养血。阴阳调和，则血气各安其位矣。半夏和胃健脾，麦冬清心润肺，苁蓉补命门相火之不足，桂、附引失守之火而归元，于十全大补之中而有加味，要以强中而戢外也。

00244 十味大建中汤

【方源】《简易方》引《叶氏录验方》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】 白芍药 桂心 甘草（炙） 黄耆（蜜炙） 当归（酒浸） 人参 白茯苓 远志（去心） 龙骨各一两 泽泻半两

【用法】 上为粗末。每服五钱，水二盏，加生姜五片，大枣二个，煎取一盏，临时入饴糖一匙，空心、食前服。

【主治】 血脉虚少，筋骨不荫，身倦力弱，心忪痰逆，腹痛膝软，或失血后，虚羸不复常，妇人月水不调，带下，腹胁作痛。

00245 十五味大建中汤

【方源】《普济方》卷二一七引《叶氏方》。

【组成】 黄耆 当归 熟地黄各一两 人参 白术 白茯苓 白附子（酒浸，去皮） 五味子 石斛（锉，酒浸半日，炒） 牛膝（酒浸） 苁蓉（酒浸） 薏苡仁 白芍药 桂心各一两 甘草二分

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一大盏半，加生姜五片，大枣三个，小麦数粒，煎七分，去滓，空心服。

【功用】 滋养荣卫，理劳伤。

【主治】 虚损，虚汗、盗汗。

00246 十八味丁沉透膈汤

【方源】《局方》卷三（续添诸局经验秘方）。

【异名】 丁沉透膈汤（《丹溪心法》卷四）、十八味丁沉透膈散（《普济方》卷二十六）。

【组成】 白术二两 香附（炒） 人参 缩砂仁各一两 丁香（炙） 麦芽 肉豆蔻（煨） 白豆蔻 木香 青皮各半两 甘草（炙）一两半 半夏（汤泡七次）二钱半 藿香 厚朴（姜炒）各七钱半 神曲（炒） 草果各二钱半 沉香 陈皮各七钱半（一本无丁香、白豆蔻，有白芷、槟榔各半两）

【用法】 上㕮咀。每四钱，水二大盏，加生姜三片，大枣一个，煎八分，去滓热服。

【主治】 脾胃不和，中寒上气，胁肋胀满，心腹疠痛，痰逆恶心；或时呕吐，饮食减少，十膈五噎，痞塞不通，噫气吞酸，口苦失味。

00247 丁沉丸

【方源】 方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷一〇一。

【组成】 沉香五两 藁本三两 白瓜瓣半升 丁香五合 甘草 当归 芎劳 麝香各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大。食后服五丸，每日三次。

【功用】 久服令举身皆香。

【主治】 七窍臭气。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“丁香丸”、“香遍满方”。

00248 丁沉丸

【方源】《局方》卷三。

【组成】 甘草（炙） 青皮（去瓤，锉，炒） 丁香 白豆蔻仁 沉香 木香 槟榔 肉豆蔻仁各五两 白术（锉，微炒）四十两 人参（去芦） 茯苓（去皮） 诃黎勒（煨，取皮）各十两 肉桂（去粗皮） 干姜（炮裂）各二两半 麝香（别研）一两

【用法】 上为细末，入麝香令匀，炼蜜为丸，如酸枣大。每服一丸，空心、食前细嚼，炒生姜、盐汤送下；温酒亦得。

【主治】 一切冷气攻心腹，胁肋胀满刺痛，胸膈噎塞，痰逆恶心，噫气吞酸，不思饮食，胃中冷逆，呕吐不止；及翻胃膈气，宿食留饮，心痛霍乱；妇人血气心腹痛。

00249 丁沉丸

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】 丁香二两 沉香一两 人参（去芦头）半两 肉豆蔻十枚（面裹，煨熟）

【用法】 上为细末，用甘草十两，捶碎，入水一斗，揉尽去滓，熬成膏子为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】 胸膈痞闷，呕逆恶心，腹胁胀满。

【备考】 本方方名，《普济方》卷二〇五引作“丁香丸”。

00250 丁附丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】 丁香一两 附子（炮，去皮脐） 肉豆蔻（面裹煨熟） 胡椒各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两，作一十五丸。每服十五丸，嚼破，橘皮汤送下。

【主治】 脾胃虚冷，呕吐不止。

00251 丁附汤

【方源】《证治要诀类方》卷一。

【组成】 治中汤加丁香 附子

【主治】 寒呕，中脘停寒，饮食喜辛热，物入口即吐出。

【宜忌】 须冷服。盖遇冷则相人，庶不吐出。

00252 丁香丸

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】 丁香半两 胡椒半两 白术一两 桂心一两 人参一两（去芦头） 木香半两 白茯苓一两 当归三分（锉，微炒） 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜、大枣汤送下，不拘时候。

【主治】 心腹冷气，往来疼痛，脾胃气弱，不能饮食，四肢无力。

00253 丁香丸

【方源】《医方类聚》卷九十三引《神巧万全方》。

【组成】 丁香 萝卜子（微炒） 槟榔各一两 木香 橘皮（去白） 白术各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤嚼下。

【主治】 脏腑虚冷，气虚腹胀，肠鸣切痛，不思饮食，四肢少力。

00254 丁香丸

【方源】《局方》卷三。

【组成】 丁香 木香 猪牙皂角（去皮，炙焦黑，为细末） 肉桂（去粗皮） 干姜（炮） 好墨（烧，醋淬）各一两 青皮（去白）三两 附子（炮，去皮脐） 京三棱（炮，捣碎） 蓬莪术（炮，捣碎） 黑牵牛（炮） 川大黄（别为细末） 干漆

（碎，炒令烟尽，为细末）各二两　巴豆霜一钱半（先用醋煎硇砂令热，下巴豆霜，煎三两沸，下大黄末熬膏）　硇砂（别研）二两

【用法】 上以大黄、硇砂、巴豆膏为丸，如绿豆大，每服一二丸，茶、酒任下。如要化癥瘕癖块，用生姜汤送下七丸，并食后临卧服之。

【功用】 消饮食，行滞气。

【主治】 积滞不消，心腹坚胀，痰逆呕哕，噫酸吞酸，胁肋刺痛，胸膈痞闷；反胃恶心，食饮不下，气上冲胸，痞噎不通；食癥酒癖，血瘕气块，时发刺痛，全不思食。

00255　丁香丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 丁香　母丁香　丹砂（研）　麝香（研）　硫黄（研）　干姜（炮裂）　矾石（飞过）　附子（炮裂，去皮脐）　吴茱萸（汤洗，焙干）　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒）各一分

【用法】 上为末，拌匀，别用肥好巴豆三十枚，去皮心膜净，别研为膏，出八分油了，与前末同研拌匀，用蒸枣肉和剂为丸，如豌豆大，放干。每服三五丸，不拘时候，温生姜汤送下。

【主治】 胃寒痰饮，噫醋吞酸，胸膈妨闷。

00256　丁香丸

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】 丁香　木香　当归（切，焙）　白豆蔻各半两　龙脑（研）一分

【用法】 上为末，再同研匀，米醋煮蒸饼和为丸，如绿豆大。每服七丸，炒生姜、盐汤送下；甚者每服十五丸，炒姜酒送下，不拘时候。

【主治】 心痛不能食。

00257　丁香丸

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】 丁香二七粒　木瓜（切）　木香（炮）各一分　槟榔（锉）一枚　肉豆蔻（去壳，炮）一枚　半夏一分（姜制）　青橘皮（去白，炒）七片

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，生姜汤送下。

【主治】 膈气，呕逆不下食，壅闷恶心。

00258　丁香丸

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】 丁香半两　甘草二两　细辛　桂心各一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服二丸，临卧含化。

【主治】 口气臭秽。

00259　丁香丸

【方源】《传信适用方》卷一引何仲颜方。

【组成】 大丁香半两　木香二钱　胡椒二钱　藿香三钱　干姜三钱　甘草二钱

【用法】 上为末，蒸饼糊为丸，如绿豆大，焙干。时时下嚼下。

【主治】 因食冷物，凝滞胃间，呕吐不止。

【宜忌】 忌饮汤水，水下则愈吐。

【加减】 如觉痿弱，加附子。

【备考】《普济方》有肉桂三钱。

00260　丁香丸

【方源】《医方类聚》卷七十七引《济生续方》。

【组成】 丁香三钱　甘草一钱（炙）　芎藭二钱　白芷半钱（以上不见火）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。绵裹一丸，含咽津。

【主治】 口臭秽。

00261　丁香汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 丁香母三粒（捶碎）　陈橘皮一枚（全者，汤浸，去白，焙）

【用法】 用水一盏，煎取半盏，去滓热呷。

【主治】 胃冷呕逆，气厥不通。

00262　丁香汤

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】 丁香　胡椒（炒）各一分　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　桂（去粗皮）　茴香子（炒）　甘草（炙，锉）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】 久患心痛不止。

00263　丁香汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】 丁香半两　甘草（炙，锉）　桂（去粗皮）　干姜（炮）各三分　厚朴（去粗皮，生姜汁涂炙）　赤芍药（锉）各一两一分　人参　白术各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏，酒半盏，同煎至八分，去滓，空心温服，良久再服。

【主治】 心腹冷痛。

00264　丁香散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 丁香半两　人参三分（去芦头）　赤茯苓三分　白术半两　甘草一分（炙微赤，锉）　木瓜三分　草豆蔻三分（去皮）　干姜半两（炮裂，

锉） 诃黎勒三分（煨，用皮） 茅香花三分

【用法】 上为细散。每服一钱，以生姜、大枣汤调下，不拘时候。

【主治】 脾胃冷热气不和，心腹虚胀，痰逆，少思饮食，四肢无力。

【宜忌】 忌生冷、油腻、湿面。

00265 丁香散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】 丁香半两 当归三分 赤芍药三分 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 青橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 木香三分 桂心三分 人参半两（去芦头） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川椒一分（去目及闭口者，微炒去汗）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 虚劳，冷气攻心腹疼痛。

00266 丁香散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】 丁香一两 人参二两（去芦头） 枇杷叶一两（拭去毛，炙微黄）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 反胃呕哕不止。

00267 丁香散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 丁香半两 青橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 白茯苓一两 人参一两（去芦头） 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄） 桂心一两 半夏一两（汤洗七遍去滑）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣二个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 膈气呕逆，不能下食，脾胃气弱，四肢乏力。

00268 丁香散

【方源】《博济》卷二。

【组成】 肉豆蔻（去皮） 人参各半两 白茯苓（去皮） 苍术三分 青木香半两 吴茱萸 丁香各一分 厚朴（去皮，姜汁炙香）半两 荆三棱（炮）半两 干姜（炮，锉）半两 芍药半两（炙） 甘草一分

【用法】 上为细末。每服二钱，空心、食前米饮调下。

【功用】 暖脾助胃。

【主治】 脾胃虚冷，心腹切痛，不思饮食，呕逆泻痢。

00269 丁香散

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】 丁香（捣末） 虾蟆灰各一两 麝香（研）一分 五倍子（捣末） 白矾（熬令汁枯，冷） 腻粉各半两

【用法】 上为散。敷于癣上，以愈为度。先涂漏芦膏，后用此方。

【主治】 一切癣病。

00270 丁香散

【方源】 方出《中藏经》卷六，名见《活人书》卷十一（王作肃增注）。

【组成】 丁香 柿蒂各一钱 甘草 良姜各半钱

【用法】 上为末。用热汤猛点，乘热一服。

【主治】 ①《中藏经》：伤寒咳逆、噫、汗。②《医方集解》：久病呃逆因于寒者。

00271 丁香散

【方源】《三因》卷十八。

【组成】 石莲肉十个（去心，炒） 丁香十枚

【用法】 上为末。水半盏，煎数沸服。

【主治】 产后咳逆。

【备考】《普济方》有茯苓一两。

00272 丁香散

【方源】《御药院方》卷九。

【异名】 二十八宿散（《杂类名方》引《元戎》）。

【组成】 丁香 荜茇 蝎梢 大椒各七个

【用法】 上为细末。每用少许，以指蘸药擦于牙痛处，有津即吐。

【主治】 牙齿疼痛。

00273 丁香散

【方源】 方出《奇效良方》卷二十四，名见《医统》卷五十三。

【组成】 丁香一钱 白芷半两 瓜蒂一两

【用法】 上为细末。每用半字，吹入鼻中即愈。

【主治】 头痛不止。

00274 丁香散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】 苦丁香七个 枯矾五分 轻粉五分

【用法】 上为末。将息肉针破，用此药末点搽。

【主治】 鼻息肉。

00275 丁桂散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】 丁香三钱 肉桂一两

【用法】 上为末。在伤膏内用之。

【功用】 《中医外科学》：温化痰湿，散寒止痛。

【主治】 ①《外科传薪集》：头痛。②《青囊秘传》：无形寒湿，附骨流注。

00276 丁公仙枕

【方源】 《验方新编》卷九。

【组成】 真川椒 桔梗 荆实子 柏子仁 姜黄 吴茱萸 白术 薄荷 肉桂 川芎 益智仁 枳实 全当归 川乌 千年健 五加皮 蒺藜 羌活 防风 辛夷 白芷 附子 白芍 藁本 苁蓉 北细辛 猪牙皂 芜荑 甘草 荆芥 菊花 杜仲 乌药 半夏各一两

【用法】 务要顶好鲜明，咀片，研为细末，绢袋盛之，用槐木薄板做枕一个，高三寸三分，宽四寸五分，长一尺二寸，如天盖地，一面上钻孔一百二十八个，如梧桐子大，用上药装入枕中。药料三五个月一换。

【功用】 种子，消百病，长精神，延年益寿。

【备考】 丁公，康熙时人，年逾七十无嗣，遇异人授此方，不二年精力强壮，至八十一岁已生二十一子矣。如夫妇皆以此作枕，更见奇效。

00277 丁沉煎丸

【方源】 《局方》卷三（绍兴续添方）。

【组成】 丁香十二两 沉香二两 木香一钱半 丁香皮一两 白豆蔻仁九两半

【用法】 上为细末，别用甘草熬膏子为丸，每一两分作二百五十丸。每服一丸，空心，含化。

【功用】 辟雾露寒邪，散膈脘凝滞，调顺三焦，和养荣卫。

【主治】 心胸痞闷，噫醋吞酸，呕逆痰水，津液不收，两胁刺痛，腹中坚满，口苦无味，不思饮食。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“丁香煎丸”。方中丁香皮，《普济方》作“广皮”。

00278 丁香饼子

【方源】 《寿亲养老》卷四。

【组成】 半夏（汤泡）二两 白茯苓（去皮）一两 丁香半两（不见火） 白术一两（炒） 川白姜一两（炮） 甘草一两（炙） 白扁豆一两（用姜汁浸，蒸熟，焙） 橘红二两（去白膜，姜汁浸一宿，焙）

【用法】 上为细半，用生姜汁煮薄面糊为饼，如大棋子大。每服一饼，细嚼，生姜汤送下，不拘时候。

【功用】 温胃去痰，解酒进食，宽中和气。

【主治】 积滞不消，心腹坚胀，痰逆呕吵，噫醋吞酸，胁肋刺痛，胸膈痞闷，反胃恶心。

00279 丁附治中汤

【方源】 《医方大成》卷二引《局方》。

【组成】 丁香 甘草（炙） 青皮（炒） 陈皮（炒） 人参各半两 附子（炮） 白术（煨） 干姜（煨）各一两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏，加生姜五片，煎八分，空心热服。

【主治】 ①《医方大成》引《局方》：胃冷停痰，呕吐不已。②《医学正传》引《局方》：胃伤寒冷之物，致心腹疼痛而呕吵不止。

【备考】 《医学正传》引《局方》有大枣二个。

00280 丁胡三建汤

【方源】 《古今医鉴》卷十。

【组成】 丁香 良姜 官桂各一钱五分

【用法】 上锉一剂。水一碗，煎七分，用胡椒五十粒，炒黄色为末，调入汤药内，顿服。

【主治】 ①《古今医鉴》：冷心疼，面青唇黑，手足厥冷。②《寿世保元》：胃脘痛，属寒者。

00281 丁香二陈汤

【方源】 《医学入门》卷八。

【组成】 陈皮二钱 茯苓 半夏各一钱半 甘草 藿香各五分 丁香四分

【用法】 加生姜，水煎，入姜汁三五匙调服。

【主治】 呃逆。

00282 丁香开胃丸

【方源】 《魏氏家藏方》卷五。

【组成】 白豆蔻 甘草（炙） 半夏曲各半两 丁香一两半（不见火） 肥生姜三斤（薄切，焙干，取三两） 人参三两（去芦）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，一两作十丸。每服一丸，食前白汤嚼下。

【主治】 脾胃虚寒，停痰呕吵，不思饮食。

00283 丁香平气丸

【方源】 《杨氏家藏方》卷五。

【组成】 肉桂五两（去粗皮） 丁香三两 人参（去芦头） 肉豆蔻（面裹，煨熟） 青橘皮（去白） 陈橘皮（去白）各一两半 白茯苓二两（去皮） 缩砂仁二两 白豆蔻仁三两 桔梗（去芦头）二两半 甘草（炙）二两半 木香半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两作十丸。每服一丸，细嚼，生姜、陈橘皮汤送下；如妇人心腹痛，食前当归酒送下。

【主治】 气刺气闷，中酒恶心，呕吐不定。

00284 丁香生胃散

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】丁香 藿香叶 肉桂（去粗皮） 姜黄 甘草（炙）各等分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜二片，煎至七分，去滓，食前温服。

【功用】进饮食，止呕逆，消痰。

【主治】中焦不和，气滞不下，呕逆恶心，饮食进退，肢体困倦。

00285 丁香半夏丸

【方源】《局方》卷四。

【异名】半夏藿香丸(《鸡峰》卷十八)。

【组成】肉豆蔻仁 木香 丁香 人参（去芦头） 陈皮（去白）各一分 藿香叶半两 半夏（汤洗七次，姜汁炒黄色）三两

【用法】上为细末，以生姜汁煮面糊为丸，如小豆大。每服二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】①《局方》：脾胃宿冷，胸膈停痰，呕吐恶心，吞酸噫醋，心腹痞满，胁肋刺痛，短气噎闷，不思饮食。②《鸡峰》：脾胃久虚寒，痰壅滞，呕吐苦水，哕逆清涎，头痛目眩，咳嗽上喘，腹中水响。

【备考】本方方名，《景岳全书》引作“半夏丁香丸”。

00286 丁香半夏丸

【方源】《奇效良方》卷十九。

【组成】丁香（不见火）一两 白术一两半 半夏（汤泡七次） 干姜（炮） 橘红各二两

【用法】上为细末，用生姜自然汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食远生姜汤送下。

【主治】胃寒呕吐，吞咽酸水。

00287 丁香半夏汤

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】丁香（不见火） 半夏（汤泡七次） 干姜（泡洗）各半两 香附子一两（去毛）

【用法】上为末。每服三钱，水一盏半，加生姜十片，煎至七分，去滓服，不拘时候。

【主治】冷气上攻，恶心呕逆，不思饮食，寒痰不止。

00288 丁香安胃汤

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】丁香四分 人参五分 白术五分 茯苓一钱 甘草五分 陈皮一钱 半夏一钱 藿香一钱

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】胃虚呕吐不止，食不得入。

00289 丁香豆蔻散

【方源】《局方》卷六。

【组成】京三棱（炮） 木香（不见火） 厚朴（去粗皮，姜汁制） 芍药 肉豆蔻（炮） 人参（去芦） 干姜（炮） 茯苓（白者，去皮）各五两 吴茱萸（汤洗七次，焙） 甘草（炙） 丁香各三两半 苍术（去皮）七两

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个（擘破），同煎至八分，空心、食前温服。如不及煎，以盐少许，汤点服亦得。

【主治】脾胃虚弱，宿寒停积，或饮食生冷，内伤脾胃，泄泻注下，水谷不化，胸满短气，呕逆恶心，脐腹疞痛，胁肋胀满，腹内虚鸣，饮食减少；及积寒久痢，纯白或白多赤少，日夜无度；或脾胃虚寒，泄泻日久，愈而复发者。

00290 丁香附子散

【方源】《宣明论》卷十二。

【组成】附子一两 母丁香四十九个 生姜半斤（取自然汁半碗）

【用法】用附子钻孔四十九，以丁香填孔内，将生姜汁用文武火熬尽；又用大萝卜一个，取一穴子，人附子又填内，将萝卜盖之，又用文武桑柴火烧香熟为度，取出，切附子作片子，焙干，捣为细末。每服一钱，米汤一盏调下，每日三次。

【主治】脾胃虚弱，胸膈痞块，吐逆不止。

00291 丁香柿蒂汤

【方源】《妇人良方》卷八。

【组成】丁香十粒 柿蒂十五个

【用法】上㕮咀。用水一盏半，煎至八分，去滓热服。

【主治】咳逆。

00292 丁香柿蒂散

【方源】《得效》卷四。

【异名】温中散(《古今医鉴》卷五)、丁香柿蒂汤(《杂病源流犀烛》卷十七)。

【组成】人参 茯苓 橘皮 半夏 良姜（炒） 丁香 柿蒂各一两 生姜一两半 甘草五钱

【用法】上锉散。每服三钱，水一盏煎，乘热顿服。或用此调苏合香丸亦妙。

【主治】吐利及病后胃中虚寒，咳逆至七八声相连，收气不回者。

00293 丁香茱萸汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】干生姜二分 黄柏二分 丁香五分 炙甘草五分 柴胡五分 橘皮五分 半夏五分 升麻

七分 吴茱萸一钱 草豆蔻一钱 黄耆一钱 人参一钱 当归身一钱五分 苍术二钱

【用法】 上药锉如麻豆大。每服半两，水二盏，煎至一盏，去滓，食前稍热服

【主治】 胃虚呕哕吐逆，膈咽不通。

【宜忌】 忌冷物。

00294 丁香烂饭丸

【方源】《内外伤辨》卷下。

【组成】 丁香 京三棱 广茂（炮） 木香各一钱 甘草（炙） 甘松（去土） 缩砂仁 丁香皮 益智仁各三钱 香附子五钱

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服三十丸，白汤送下，或细嚼亦可，不拘时候。

【主治】 ①《内外伤辨》：饮食所伤。②《脾胃论》：食伤太阳，卒心胃痛。

00295 丁香透膈汤

【方源】《得效》卷五。

【组成】 丁香五钱 沉香五钱 木香五钱（不见火） 人参（去芦）半两 青皮（去白） 神曲各一两 茯苓（去皮） 甘草（炙） 陈皮（去白） 厚朴（姜汁制） 草果仁 藿香叶（去土） 半夏（炮）七次 缩砂仁（去壳）各二两 白豆蔻（去壳） 白术（去芦，炒） 麦芽（炒） 香附子（炒，去毛）各一两

【用法】 上锉散。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，红枣一个同煎，去滓热服。

【主治】 气满不快，饮食不入，胸膈痞闷，或时膨胀，腹中刺痛。

00296 丁香透膈汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 丁香 木香 麦芽 青皮 肉豆蔻 白豆蔻各二分半 沉香 藿香 陈皮 厚朴各三分 甘草七分半 草果 神曲 半夏各一分半 人参 茯苓 砂仁 香附各五分 白术一钱

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 脾胃不和，痰逆恶心呕吐，饮食不进，十膈五噎，痞塞不通。

00297 丁香温中汤

【方源】《易简方》。

【组成】 丁香半两 半夏一两 橘红二两 人参 干姜 白术 甘草二两

【用法】 加生姜十片，水煎服。

【主治】 脾胃不和，饮食减少，短气虚羸，呕逆恶心者。

00298 丁香楝实丸

【方源】《医学发明》卷一。

【异名】 酒煮当归丸（《活法机要》）。

【组成】 当归（去芦，锉碎） 附子（炮制，去皮脐，锉） 川楝子（锉碎） 茴香（炒）各一两（上四味锉碎，以好酒三升同煮，酒尽为度，焙干作细末，每称药末一两，再入下项药） 丁香 木香各二钱 全蝎十三个 玄胡一两（上四味同为细末，入前药末内拌和）

【用法】 酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至一百丸，空心、食前温酒送下。

【主治】 肾肝受病，男子七疝，痛不可忍；妇人瘕聚、带下。

【方论选录】 凡疝气带下者，皆属于风，全蝎治风之圣药；茴香、川楝子皆入小肠经；当归、玄胡和血止痛；疝气、带下，皆积寒邪入小肠之间，故以附子佐之，丁香、木香为其引导。

【备考】《景岳全书》引本方有没药五分。

00299 丁香柿蒂竹茹汤

【方源】《医方考》卷三。

【异名】 丁香柿蒂汤（《医学集成》卷二）。

【组成】 丁香三粒 柿蒂 竹茹各三钱 陈皮一钱

【主治】 大病后，中焦气塞，下焦呃逆。

【方论选录】 大病后，五脏皆伤，升降失常，故令中焦否塞；五脏之阴既伤，则少阳之火奋于下，故令下焦呃逆，直冲清道而上也。是方也，丁香、陈皮，辛温者也，理中气之否塞；竹茹、柿蒂，苦寒者也，疗下焦之呃逆。或问降逆何以不用栀、柏？余曰：此少阳虚邪，非实邪也，故用竹茹、柿蒂之味薄者以主之；若栀、柏味厚，则益戕其中气，否塞不益盛乎？古人盖亦深权之矣。

00300 七子散

【方源】《千金》卷二。

【组成】 五味子 牡荆子 菟丝子 车前子 荠蕖子 石斛 薯蓣 干地黄 杜仲 鹿茸 远志各八铢 附子 蛇床子 芎藭各六铢 山茱萸 天雄 人参 茯苓 黄耆 牛膝各三铢 桂心十铢 巴戟天十二铢 苁蓉十铢 钟乳粉八铢 （一方加覆盆子八铢）

【用法】 上药治下筛。酒服方寸匕，一日二次。不知增至二匕，以知为度。禁如药法。不能酒者，蜜和丸服亦得。

【主治】 ①《千金》：丈夫风虚目暗，精气衰少，无子。②《普济方》：因五劳七伤，虚羸百病所致妇人无子。

【方论选录】《千金方衍义》：此方专为欲勤精薄，阳气不振者设。参、耆、鹿茸，方中君主，精不足者，补之以味也；钟乳、雄、附，方中主帅，形不足者，温之以气也；参、耆温厚，非雄、附不能激之；钟乳慓悍，非鹿茸无以濡之；巴戟、苁蓉、五味、山萸、菟丝、薯蓣、杜仲、牛膝乃参、耆之匡辅；萆薢、蛇床、桂心、远志则雄、附之寮佐；然无阴则阳无以化，地黄、芎藭不特化气成形，并化胎息蕴毒，制剂之妙，无以喻之。至于牡荆专主风虚，车前职司气化，牡荆势纷，石斛监之，车前力薄，茯苓助之，以其襄既济之功，克绍广嗣之绩，允为欲勤精薄之金锸。

00301 七气汤

【方源】《千金》卷十七。

【组成】干姜 黄芩 厚朴 半夏 甘草 栝楼根 芍药 干地黄各一两 蜀椒三两 枳实五枚 人参一两 吴茱萸五合

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服，一日三次。

【主治】忧气、劳气、寒气、热气、愁气，或饮食为膈气，或劳气内伤，五脏不调，气衰少力。

00302 七气汤

【方源】《全生指迷》卷二。

【异名】大七气汤（《女科百问》卷上）、聚气汤（《袖珍》卷二引《仁存方》）、大化气汤（《回春》卷三）。

【组成】京三棱 蓬莪茂 青橘皮 香附子（去毛） 陈橘皮（洗） 桔梗 藿香叶 桂（取心） 益智各一两半 甘草（炙）三钱

【用法】上为散。每服五钱，水二盏，加生姜二片，大枣二枚，煎至一盏，食前温服。

【功用】行气消滞，和血消积。①《寿世保元》：化痰饮，宽胸腹，顺气进食，消胀软硬。②《明医指掌》：散聚气。③《济阳纲目》：辛温消导。

【主治】情志不舒，气郁血滞。胸脘痞闷，腹部胀痛，或有积聚，肌黄食少者。①《全生指迷》：聚气，由惊、恐、恚、怒，或冒寒热，留而不去，为郁伏之气，因气流行，随经上下相搏痛，久久令人痞闷，其脉短涩。②《医方类聚》引《济生》：六聚，状如癥瘕，随气上下，发作有时，心腹疞痛，攻刺腰胁，上气窒塞，喘咳满闷，小腹膨胀，大小便不利，或复泄泻，淋沥无度。③《医钞类编》：多饮成酒癖积块，腹胀疼痛，身肿肌黄，少食。

00303 七气汤

【方源】《三因》卷十一。

【组成】半夏（汤洗）五两 厚朴（姜制） 桂心各三两 茯苓 白芍药各四两 紫苏叶 橘皮各二两 人参一两

【用法】上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，大枣一个，煎七分，去滓，空腹服。

【主治】喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七气郁发，致五脏互相刑克，阴阳反戾，挥霍变乱，吐利交作，寒热眩晕，痞满咽塞。

00304 七仙丸

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】菟丝子（酒浸，另研为末）五两 苁蓉（酒浸，去皮炒，切，焙干）一两 巴戟（去心）一两 车前子 熟干地黄 枸杞子各三两 甘菊花（拣净）四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空心、食前每服三十丸至五十丸，温酒送下；盐汤亦得。

【功用】补肝肾，增目力。

【主治】肝肾俱虚，眼常昏暗，多见黑花，或生翳障，视物不明，迎风有泪。

00305 七仙丹

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【组成】何首乌（甜瓜瓣者，九蒸九晒）四两 人参（去芦）二两 生地黄二两（酒洗） 熟地黄二两（酒洗） 麦门冬（去心）二两 天门冬（去皮心）二两 小茴香二两（炒黄色，秋、冬用） 白茯苓（去皮）二两（春、夏用）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，嚼烂，好黄酒送下，盐汤亦可；或丸如梧桐子大，每服五十丸，空心酒送下亦可。

【功用】补心肾，驻容颜，黑髭发。

【宜忌】忌三白（葱、蒜、萝卜）、房事，合时勿犯铁器。

00306 七仙酒

【方源】《仙拈集》卷三引《要览》。

【组成】香附 陈皮 半夏 枳壳 柴胡各四钱 大黄八两 蒲公英四两

【用法】用真烧酒五斤浸药。早、晚服。更用五倍子焙干为末，醋调常敷患处。

【主治】乳岩。

00307 七生丸

【方源】《妇人良方》卷四引徐明仲方。

【组成】川乌 草乌 南星（三味并生，去皮） 半夏（冷水洗，去滑） 川芎 石膏 白芷（并生

用）各等分

【用法】 上为细末，研韭菜自然汁为丸，如梧桐子大。每服七丸，加至十丸，嚼生葱，茶送下。

【主治】 男子、妇人八般头风，及一切头痛，痰厥、肾厥、饮厥，伤寒、伤风头痛，不可忍者。

【临证举例】 头痛 邓安人头痛如破，服诸药无效，本方加北细辛等分，全蝎减半，为丸，服二十粒，即愈。

00308 七白散

【方源】《永类钤方》卷二。

【组成】 白蔹 白术 白牵牛 白附子 白芷 白芍药 白僵蚕

【用法】 洗面。

【主治】 面鼾黯，面生疮。

00309 七圣丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】 白茯苓（去黑皮）二两 桂（去粗皮） 远志（去心） 人参 天门冬（去心，焙） 菖蒲 地骨皮各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。食后茶、酒下二十丸。

【功用】 益心智，令人聪明。

【主治】 健忘。

00310 七圣汤

【方源】《明医指掌》卷五。

【组成】 半夏一钱 黄连二钱 白豆蔻一钱 人参一钱 白茯苓一钱 竹茹一钱 生姜三片

【用法】 上锉一剂。水二钟，煎八分，空心热服。

【功用】《类证治裁》：豁痰。

【主治】 ①《明医指掌》：翻胃、呕吐。②《类证治裁》：噎膈。

00311 七圣散

【方源】《局方》卷一（绍兴续添方）。

【组成】 续断 独活 防风 杜仲 萆薢 牛膝（酒浸一宿） 甘草各等分

【用法】 上件各修事净，焙干半两，为细末。每服二钱，温酒调下。

【主治】 风湿流注经络间，肢节缓纵不随，或脚膝疼痛，不能步履。

00312 七皮散

【方源】《济生》卷四。

【组成】 大腹皮 陈皮 茯苓皮 生姜皮 青皮 地骨皮 甘草皮各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一大盏，煎八分，温服，不拘时候。

【主治】 水肿。

00313 七伤散

【方源】《医学纲目》卷十七引丹溪方。

【组成】 黄药子 白药子各一两半 赤芍药七钱半 知母 玄胡索各半两 郁金二钱半 当归半两 山药 乳香 没药 血竭各二钱

【用法】 上为末。每服二钱，茶汤调下。一法，红花、当归煎汤下。

【主治】 劳嗽吐血痰。

00314 七针丹

【方源】《异授眼科》。

【组成】 白菊花三钱 花椒三钱 青盐二钱五分 铜绿三钱五分 胆矾三钱五分 乌梅一个（去核） 新绣花针七枚（用丝线穿就）

【用法】 上为细末，水调，同针入瓷瓶内封浸七日，隔水煮六个时辰，针化为度。去滓，取水点眼。

【主治】 双目成瞽。

00315 七枝煎

【方源】 方出《奇方类编》卷上，名见《仙拈集》卷一。

【组成】 槐枝 桃枝 柳枝 椿枝 楮枝（即垢树） 茄枝 蕲艾

【用法】 上煎水三桶，大盆浸洗，如冷又添热水。以被盖出汗，避风。未愈，再洗几次。

【主治】 ①《奇方类编》：中风年久瘫痪。②《仙拈集》：筋骨疼痛。

00316 七零汤

【方源】《局方》卷六。

【组成】 茴香（去土，炒） 川乌（炮，去皮脐） 缩砂（取仁）各八两 厚朴（去粗皮，姜制）一斤 益智（去皮）半斤 干姜（炮）四两 甘草六两

【用法】 上为粗末。每服二钱，水一盏，入大枣七个（擘破），同煎至七分，去滓，食前、空心温服。

【主治】 脾胃虚弱，内受寒气，泄泻注下，水谷不分，腹胁胀满，脐腹疞痛，心下气逆，腹中虚鸣，呕吐恶心，胸膈痞闷，困倦少力，不思饮食。

00317 七拗汤

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】 麻黄（去节） 杏仁 半夏 石膏 芽茶 北五味 甘草（炙一半，生一半）各等分

【用法】 上用水二钟，加生姜三片，煎至七分服，于二更时分进一服，三更四更进一服。服毕以

被覆之，少言语为佳。

【主治】 喘病，及伤寒喘嗽。

【加减】 喘甚，加紫苑、马兜铃。

00318 七贤散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 茯苓 山药 牡丹皮 山茱萸 熟地黄 人参各一钱 黄耆二钱

【用法】 水二茶钟，加煨姜三片，大枣二枚，煎八分，食前服。

【主治】 肠痈溃后疼痛，淋沥不已，或精神减少，饮食无味，面色萎黄，四肢无力，自汗盗汗，睡卧不宁。

00319 七味丸

【方源】《医级》卷八。

【异名】 附子七味丸(《饲鹤亭集方》)。

【组成】 六味丸加附子

【主治】 ①《医级》：阴虚火不归根，及吐衄因虚火者。②《饲鹤亭集方》：阳亏虚冷，自汗便溏，虚火上炎，形体瘦弱。

00320 七味散

【方源】《千金》卷十五。

【组成】 黄连八分 龙骨 赤石脂 厚朴各二分 乌梅肉二分 甘草一分 阿胶三分

【用法】 上药治下筛。浆水服二方寸匕，一日二次；小儿一钱匕。

【主治】 痢下久不愈。

【方论】《千金方衍义》：七味药中，但以黄连、厚朴祛解湿热之滞；甘草、阿胶滋培偏伤之血；龙骨、石脂、乌梅并收五液之脱。在久痢得之为金锷，暴澼得之为戈戟。

00321 七物汤

【方源】《女科百问》卷上。

【异名】 七沸汤(《准绳·女科》卷一)。

【组成】 当归 芎藭 白芍 蓬术 川姜 熟地(酒蒸，焙干) 木香各等分

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏，煎八分，温服，不拘时候。

【主治】 妇人荣卫气虚，经水愈期，或多或少而腹痛。

【方论】《济阴纲目》汪淇笺释：本方以血药治愈期，以气药治腹痛，重在腹痛上，妙在等分，不然，蓬术、川姜、木香何以用也。

00322 七疝丸

【方源】《外台》卷七引《张文仲方》。

【组成】 椒四分（汗） 桔梗 芍药 干姜 厚朴（炙） 细辛 附子（炮）各二分 乌头一分（炮）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如大豆大。每服三丸，加至七八丸，一日三次。

【主治】 七疝。暴心腹厥逆，不得气息，痛达背脊，名曰尸疝；心下坚痛，不可手迫，名曰石疝；脐下坚痛，得寒冷食辄剧，名曰寒疝；胁下坚痛，大如手，痛时出见，若不痛不见，名曰盘疝；脐下结痛，女人月事不时，名曰血疝；少腹胀满，引膀胱急痛，名曰脉疝。

【宜忌】 忌猪肉、冷水、生菜。

00323 七疝汤

【方源】《寿世保元》卷五引刘水山方。

【组成】 延胡索 小茴香（酒炒） 川楝子 全蝎（炒） 人参 大附子 山栀子 木香各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，空心温酒调服。

【主治】 七疝及奔豚小肠气，脐腹大痛。

00324 七宝丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【组成】 龙脑一分 人参一两 珍珠五钱 石决明二两（另捣罗细研） 琥珀 青鱼胆 熊胆各二两 茺蔚子二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前茶送下。

【主治】 涩翳内障。初患之时，眼朦胧如轻烟薄雾，渐渐失明，翳如凝脂。

00325 七宝丹

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 老烟膏 31 克 生地榆（先研细末）31 克 寒水石 31 克 淡秋石 31 克 血余炭 31 克 胡黄连（先研细末）31 克 血竭 31 克

【用法】 上为细末。撒于疮面；或麻油调敷。

【主治】 下肢溃疡。

00326 七宝汤

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】 草豆蔻五枚（面裹煨熟，去面及皮） 白茯苓（去黑皮） 人参各一分 大腹皮（锉）四枚 诃黎勒（炮，去核）五枚 半夏一分（汤浸洗五度，生姜汁浸一宿，去姜汁，炒黄） 甘草（炙，锉）半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣二枚（擘破），同煎至七分，去滓温服。

【主治】 脾胃不和，腹中刺痛，胃逆气冷，不能饮食。

00327 七宝汤

【方源】《传信适用方》卷一。

【组成】 附子（大者，炮裂，汤泡，去皮脐，锉碎）四两 人参（去芦，洗净，切片，焙）二两 干山药（去黑皮）一两 白术（去芦，洗净，锉，焙）一两半 干姜（川者，炮裂，洗净，锉，焙）一两 木香（湿纸裹，煨，锉碎）一两 肉豆蔻（炮裂，洗净，锉碎）一两

【用法】 上为细末，和匀。每服二钱，水一盏，加生姜五片，枣子二个，煎七分，食前服。

【主治】 脾元虚弱，肠鸣腹痛，脏气不和，四肢痠疼，心虚忡畏，胸膈不利，不欲饮食。

00328 七宝饮

【方源】《简易方》引《局方》（见《医方类聚》卷一二二）。

【异名】 七宝散（《杨氏家藏方》卷三）、七宝汤（《易简方》）、七物汤（《直指》卷十二）。

【组成】 厚朴（姜汁制） 陈皮 甘草（炙） 草果仁 常山（鸡骨者） 槟榔 青皮各等分

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水一盏半，酒半盏，煎取一盏，去滓，露一宿，来早又煲温服，睡片时。忌热物半日。寒多加酒，热多加水，须慢火煎令熟，不吐不泻，一服即效。

【功用】《中医方剂临床手册》：燥湿劫痰。

【主治】 ①《简易方》引《局方》：一切疟疾，无问寒热多少先后，连日间日；及不伏水土，山岚瘴气，寒热如疟。②《中医方剂学》：疟疾数发不止，寸口脉弦滑浮大，体壮痰湿甚者。

【宜忌】 ①《医方类聚》引《局方》：服药后忌热物半日。②《易简方》：虚怯人不宜服此，脾胃素虚寒者，亦不宜服。

【方论选录】 ①《医方考》：疟疾三四发后，寸口脉来弦滑浮大者，此方吐之。三四发后，可截之时也，脉弦为饮，滑为实，浮为表，大为阳，故在可吐。师云：无痰不作疟。疟痰为患，常山善吐，槟榔善坠，草果善消，厚朴、青皮亦理气行痰之要药，陈皮、甘草乃消痰调胃之上材也。是方也，唯脉来弦滑浮大者可用，若脉来沉涩细微者，与之则逆矣，慎之。②《医方集解》：此足少阴、太阴药也。常山能吐老痰积饮，槟榔能下食积痰结，草果能消太阳膏粱之痰，陈皮利气，厚朴平胃，青皮伐肝，皆为温散行痰之品，加甘草入胃，佐常山以吐疟痰也。③《中医方剂临床手册》：常山的抗疟作用，已经临床及实验室肯定。惟其易引起呕吐，配以厚朴、青皮、陈皮、甘草等健脾理气和中之药，既能减少它的副作用，又能缓和疟疾兼有胃肠道的症状。截疟方剂，多数加酒入煎，据药理实验，酒是很好的溶媒，常山等截疟药的有效成分，得酒易溶于水中。

【临证举例】 疟疾 《上海中医药杂志》（1964；8:6）：用七宝饮加减治疗45例间日疟，全部病例均于服药后终止发作。其中服2剂而终止发作者25例，3剂者15例，4剂者5例。

【现代研究】 抗呕吐反应 《湖南医学院学报》（1978；3:18）：七宝饮的抗疟之效，主要来自常山，但其他各药之配合则有助于解热和促进消化功能，并能减轻和防止常山致吐的副作用。复方实验研究证明，方中各药均不减弱常山的抗疟效果，而本方对鸽的致吐作用则比常山小3—4倍。除去厚朴等，并不增加其致吐程度，除去槟榔则致吐强度与单味常山相同；仅用常山和槟榔两药，致吐强度与七宝饮相似，说明槟榔是本方中抗常山呕吐反应的主要药物。

【备考】 按：本方方名，《医学正传》引作“截疟七宝饮”。

00329 七宝散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】 海蛤 琥珀 真珠 白石英 玛瑙 光明砂各一两 麝香一分

【用法】 上为散，于乳钵内重研令细。每日取柳枝，打碎一头，点药揩齿。

【功用】 令齿白净。

00330 七宝散

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】 珍珠末一分（研） 石决明三分 琥珀三分（研） 龙脑一分（研） 熊胆一分（研） 水精半两（研） 贝齿半两

【用法】 上为细散，再研匀。每夜卧时点眼眦中。

【主治】 眼生胬肉侵睛，外障虽已钩割熨烙亦宜点。

00331 七宝散

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】 琥珀 没药 乳香 蒲黄 白部末 桃胶 郁李仁（汤浸，去皮，研，入面少许，研匀令干，入温水和作饼子，焙，为末）各等分

【用法】 上为末。酒调下一钱，空腹服。服前先用引药好胡桃一个，烧存性，细研，酒一盏调服。移时服七宝散。

【主治】 石淋。热伏留肠间，与水液相搏，结而

成石，沙石自小便出，出辄欲死，脉散涩而无常度。

00332 七宝散

【方源】《奇效良方》卷六十一。

【异名】七宝吹喉散(《喉科秘诀》卷下)。

【组成】僵蚕（直者）十个 硼砂 雄黄 全蝎十个（头尾全者，去毒） 明矾 猪牙皂角一挺（去皮弦）各一钱 胆矾半钱

【用法】上为细末。每用一字，吹入喉中。

【主治】喉闭及缠喉风。

00333 七宝散

【方源】《银海精微》卷四。

【组成】琥珀 珍珠各三钱 硼砂五分 珊瑚一钱五分 朱砂 硇砂各五分 玉屑一钱 蕤仁三十粒 片脑 麝香各一分

【用法】上将前药俱细研如尘埃，方入麝香、片脑、蕤仁三件再研，熟官绢筛过于罐内。临卧时，以铜簪挑一米大许，点于有翳膜处。

【主治】翳膜遮睛。

00334 七宝散

【方源】《理瀹》。

【组成】山豆根 牙消 胆矾 白矾 鸡肫皮 辰砂 冰片各等分

【用法】上为末。吹喉。

【主治】喉闭，喉缠，慈痫下垂。

00335 七宝散

【方源】《外科方外奇方》卷三。

【组成】西牛黄五分 真濂珠二钱 大梅片二分 真象牙屑三钱（焙黄） 真青黛六钱 人指甲五分（男用女，女用男） 壁喜窠四五个（多多益善，板上者不用）

【用法】共乳无声为度。吹之。

【主治】喉痧，一切喉风急症。

00336 七宝膏

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】珍珠末 龙脑 熊胆各一分 石决明 琥珀各三分 水晶 龙齿各五钱

【用法】上为末，研令极匀。水五升，石器内煎至一升，去滓，煎至一盏，入蜜半两和为膏。每至夜卧后点之，早晨不可点。

【主治】①《秘传眼科龙木论》：胬肉侵睛外障。②《一草亭目科》：诸翳障。

00337 七珍丸

【方源】《普济方》卷三十三引《博济》。

【异名】四神煎（原书同卷）、草四神煎(《圣济总录》卷一八五)。

【组成】肉苁蓉半斤（细切，酒煮，烂研成膏） 补骨脂（炒） 巴戟天（去心） 附子（炮，去皮脐）各二两 杏仁（汤浸，去皮尖） 桃仁（汤浸，去皮尖） 胡桃仁（研）各一两

【用法】上将后六味捣研成末，与苁蓉膏同研匀，更入炼蜜捣三五百杵为丸，如梧桐子大。每服一丸，热酒化下，日三服。

【功用】补真益气，壮腰膝，进饮食。

【主治】小便白浮。

00338 七珍汤

【方源】《医统》卷九。

【组成】青蒿 蕲艾 忍冬藤 苍耳子 桑条 桃条 柳条（三味以石捶碎）

【用法】上煎水一桶，入炒盐半斤，间日一洗浴，密室中以簟蓆围之洗。出汗为妙。不过十次愈。

【主治】大风。

【备考】《景岳全书》有槐条，无桃条。

00339 七珍散

【方源】《本事》卷二。

【异名】七阳散(《普济方》卷二十五引《卫生家宝》)。

【组成】人参（去芦） 白术 黄耆（蜜水涂炙） 山芋 白茯苓（去皮） 粟米（微炒） 甘草（炙）各一两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜、大枣，同煎至七分，日三四服。

【功用】开胃，养气，进食，调脾胃。

【主治】伤寒、疟疾、中暑得愈之后，不思饮食。

00340 七厘散

【方源】《同寿录》卷尾。

【组成】上朱砂一钱二分（水飞净） 真麝香一分二厘 梅花冰片一分二厘 净乳香一钱五分 红花一钱五分 明没药一钱五分 瓜儿血竭一两 粉口儿茶二钱四分

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮，黄蜡封口，贮久更妙。治外伤，先以药七厘，烧酒冲服；复用药以烧酒调敷伤处。如金刃伤重，或食嗓割断，不须鸡皮包扎，急用此药干掺。

【功用】散瘀消肿，定痛止血。

①《同寿录》：定痛，止血。②《中药成方配本》(苏州)：活血祛瘀，止痛收口。③《北京市中药成方选集》：消肿。④《全国中药成药处方集》(上海

方）：舒筋。

【主治】 跌打损伤，筋断骨折，瘀血肿痛；刀伤出血，无名肿毒，烧伤烫伤。

①《同寿录》：金疮，跌打损伤，骨断筋折，血流不止，金刃伤重，食嗓割断；无名肿毒。②《良方集腋》：汤泡火灼。③《饲鹤亭集方》：闪腰挫气，筋骨疼痛，瘀血凝结。

【宜忌】 本方药性走窜，耗气堕胎，不可多服；孕妇忌服。

①《同寿录》：不可多服；孕妇忌服。②《良方集腋》：伤轻者，不必服，只用敷。

【方论选录】 《中医方剂学讲义》：本方是伤科名方。方中血竭、红花祛瘀活血；乳香、没药行气祛瘀，消肿止痛；儿茶清热止血；朱砂镇心安神；麝香、冰片辛散走窜，善于行气血，止疼痛。合用以奏活血散瘀，定痛止血之效。惟方中香窜走泄，行气祛瘀之药，皆能耗气堕胎，故孕妇忌服。

【临证举例】 ①冠心病 《天津医药》（1977；6：284）：七厘散加减治疗100例冠心病患者，气阴两虚型加用黄耆、首乌、太子参，阴虚阳亢型加用首乌、寄生、勾藤等。对心绞痛总有效率为70.8%，对心电图总有效率为47%。疗程最长已达二年，无不良反应。②带状疱疹 《中医杂志》（1965；12：18）：治带状疱疹11例。治疗日期3～6天，平均4.6天。服药1～2天后疼痛减轻或停止，2～3天红斑丘疹消退，4～6天水变干，结痂，无后遗症。③痔疮 《山东中医学院学报》（1981；1：72）：本方为主治疗痔疮20例，内痔15例，外痔5例。痊愈17例，好转3例。疗程短者15～20天，长者30天。先用温开水3000毫升，加入高锰酸钾1克，洗浴肛门半小时，再用疮药膏或磺胺软膏5克，加七厘散3克调糊状，涂于肛门内外患处，每晚一次，连用2～4周，忌食辛辣及饮酒，避免重体力劳动。

【备考】《辽宁中医杂志》（1982；2：12）：两例局部外敷七厘散患者，发生过敏性皮炎，皮损呈红斑、水肿、水疱大泡，为急性、亚急性起病。经局部用3%硼酸水湿敷，口服强的松和抗组织胺药，静注10%葡萄糖酸钙，均在1周内痊愈。斑贴试验证实，血竭是主要致敏原。

00341 七厘散

【方源】《纲目拾遗》卷三引《杨氏便易良方》。

【组成】 龙骨 硼砂 血竭（酒洗） 儿茶 天芝麻（即土连翘）各五分

【用法】 上为细末。每服七厘。

【功用】 止痛。

【主治】 金刃伤。

00342 七星剑

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 野菊（嫩头） 苍耳头 豨莶草 半枝莲 地丁草各三钱 麻黄一钱 草河车二钱

【用法】 用好酒一斤，煎至一碗。滤清热服。被盖，汗出为度。

【主治】 ①《外科正宗》：十三种疔疮初起，憎寒作热，恶心呕吐，肢体麻木，痒痛非常，心烦作躁，甚者昏愦。②《医钞类编》：疔毒走黄，心烦昏愦。

【临证举例】 疔疮 《中医杂志》（1957；10：535）：用七星剑汤治疗疔疮六例，体温38℃以上，加连翘、银花；心烦口渴，加黄连、山栀；局部炎肿剧烈，加丹皮、赤芍；恶寒，以薄荷代麻黄。平均4～5天体温恢复正常，5～6天局部炎症消失。

【备考】 冬月无鲜草，宜预采阴干，临时煎服之。

00343 七星散

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 成炼钟乳粉（别研） 款冬花 佛耳草 肉桂（去粗皮）各半两 白矾三钱（飞过） 甘草三钱（炙）

【用法】 上为细末。每服半钱，分七处，食后用芦管逐一吸之，用温白汤少许送下。

【主治】 肺气虚寒，咳嗽不已，渐成劳证。

00344 七香丸

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】 白豆蔻仁 丁香 藿香 零陵香 青木香 白芷 桂心各一两 香附子二两 甘松香 当归各半两 槟榔二枚 沉香一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如大豆大。常含一丸，咽汁，日三夜一；亦可常含咽汁。

【功用】 下气去臭。

【主治】 口及身臭。

【宜忌】 慎五辛。

【备考】 服药后，五日口香，十日体香，二七日衣被香，三七日下风人闻香，四七日洗手水落地香，五七日把他人手亦香。

00345 七香丸

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】 香附二钱 麦芽一钱 丁香皮三钱半 砂仁 藿香 官桂 甘草 陈皮各二钱半 甘松 乌药各六分半

【用法】 蜜为丸服。

【主治】 ①《嵩崖尊生》：伤寒物，内寒。②《医级》：脾胃虚冷，胸膈噎塞，渐成膈气，及脾泄泻利，反胃呕吐。

【宜忌】《医级》：忌生冷、油腻。

00346 七香散

【方源】《点点经》卷三。

【组成】 丁香 沉香 木香 乳香各二钱 降香三分 雀香 茴香 陈皮 青皮 枳实 厚朴 槟榔各一钱半 肉桂一钱 寸香（冲服，引）

【功用】 定痛。

【主治】 血凝气滞，肚腹疼痛。

00347 七胰散

【方源】《赤水玄珠》卷十三。

【组成】 皮消七钱 猪胰七个

【用法】 每一钱皮消擦一胰，醃七日，铁器上焙干燥，为末服。

【主治】 痞气，积块。

00348 七福饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 五福饮加枣仁二钱 远志三五分（制用）

【用法】 水二钟，煎七分，食远温服。

【功用】 ①《景岳全书》：收复神气。②《笔花医镜》：安神魂，敛心气。

【主治】 气血虚亏，心神不安。

①《景岳全书》：气血俱虚，心脾为甚者。②《会约》：大恐大惧，损伤心脾肾气，神消精竭，饮食减少。③《笔花医镜》：心血虚惊悸者。

00349 七德丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 台乌药 吴茱萸（制） 干姜（炒黄） 苍术（炒）各二两 木香 茯苓各一两 补骨脂（炒）四两

【用法】 神曲糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸或百丸，滚白汤送下。

【主治】 生冷伤脾，泻痢肚腹疼痛。凡年壮气血未衰及寒湿食滞，宜和胃者。

00350 七宝散子

【方源】《医方类聚》卷六十五引《龙树菩萨眼论》。

【组成】 真珠 龙脑 琥珀 朱砂各少许 紫贝（烧过） 乌贼鱼骨 石决明（烧过）各等分

【用法】 上为细末，夜卧时敷眼中。翳尽为度。

【主治】 外障，眼翳膜渐生。

00351 七气手拈散

【方源】《准绳·女科》卷五。

【组成】 玄胡索 小茴香 白芍药 干漆（炒） 枳壳各二钱 黄连 石菖蒲 香附子 苏叶各一钱半 没药 乳香各一钱 甘草六分

【用法】 上锉散，分作二服。每服用水一盏半，加生姜三片，煎至七分，空心服。

【主治】 产后心气攻痛。

00352 七白挺子膏

【方源】《医方类聚》卷八十引《千金月令》。

【异名】 七白膏（《御药院方》卷十）。

【组成】 白芷 白蔹 白术 白附子 白茯苓 细辛各一分 白及三分

【用法】 上为细末，以鸡子白和为挺子，如姜芽大，阴干。每洗面讫，以浆水于面上磨涂之。

【功用】 令面手光白细润，去黯。

00353 七圣君子散

【方源】《袖珍》卷三引《烟霞圣效方》。

【组成】 白樟柳根 葛根 桑白皮 甘遂 葶苈子 槟榔 牵牛各等分

【用法】 上为末。每服三钱，病重服七钱，煎绿豆汤调下。如服药取下虫，或如脑长虫相似。

【主治】 一切水食鼓病。

【宜忌】 忌生硬、油腻、荤腥、盐、酱、面、鱼、肉一切发病之物，房室一百日；宜服白粥米食补之。

【备考】 要辨患人：面生黑色者，肝死；两肩凸者，肺死；脐中突出者，脾死；两手无纹者，心死；下注脚肿者，肾死。此五证内显一证者，不治也。

00354 七味地黄丸

【方源】《摄生秘剖》卷一。

【异名】 肉桂七味丸（《证治宝鉴》卷三）、七味丸（《张氏医通》卷十六）。

【组成】 熟地黄八两（忌铁，杵膏） 山茱萸（酒润，去核） 干山药（炒）各四两 牡丹皮（酒洗，微炒） 白茯苓（去皮，乳制） 泽泻（去毛，酒浸，焙）各三两 肉桂（去皮，忌火） 一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心淡盐汤送下。

【功用】 ①《摄生秘剖》：引火归元。②《北京市中药成方选集》：滋阴益气，补肾祛寒。

【主治】 肾水不足，虚火上火，发热作渴，口舌生疮，或牙龈溃烂，咽喉作痛，或形体憔悴，寝汗发热，五脏齐损，火拒上焦。

【宜忌】 忌萝卜。

00355 七味苍柏散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 苍术 黄柏 杜仲 故纸 川芎 当归 白术各一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 湿热腰痛，动止滞重，不能转侧。

00356 七味葱白汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 防风一钱 苏叶嫩枝钱半 生姜皮一钱 淡豆豉三钱 秦艽钱半 络石藤三钱 鲜葱白四个 嫩桑枝一两

【功用】 通络祛风。

【主治】 风湿证。头痛发热，微汗恶寒，骨节烦疼，体重微肿，小便欠利，脉来浮缓，属风胜者。

00357 七制固脂丸

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】 固脂十斤（一制淘米水浸一夜，晒七日；二制用黄柏二斤，熬浓汁，泡一夜，晒七日；三制杜仲、四制生盐、五制鱼膘、六制核桃肉，俱照前；七制黑枣、糯米共煮粥，将固脂磨细末，和匀，捣融）。

【用法】 为丸，如梧桐子大。每早空心服一钱，淡盐水送下。每服至一月后，加三分，加至二钱为止。若阴虚水亏者，早服此药，晚服六味地黄丸。半年后方效。

【功用】 补火壮阳，固精种子，保真元，壮筋骨，健脾胃，长精神，除疾病。

【主治】 命门火亏，下元虚损，耳聋眼花，腰痛腿软，肾冷精流，阳萎不举，小便过多，筋骨疼痛，肚腹畏寒，脾胃虚弱，饮食难消，夜多盗汗，精神疲倦，时爱躺卧。

【宜忌】 忌食羊血、油菜（又名芸苔）、菜油。忌铁器。

00358 七制香附丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 香附米十四两（分七分，一分同当归二两酒浸，一分同莪术二两童便浸，一分同牡丹皮、艾叶各一两米泔浸，一分同乌药二两米泔浸，一分同川芎、玄胡索各一两水浸，一分同三棱、柴胡各一两醋浸，一分同红花、乌梅各一两盐水浸。春三、夏二、秋七、冬十日，晒干）

【用法】 取香附为末，浸药水打糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，临卧酒送下。

【主治】 诸虚百损，气血不调，月水前后，结成癥瘕，或骨蒸发热，四肢无力。

00359 七宝美髯丹

【方源】《本草纲目》卷十八引《积善堂方》。

【异名】 七珍至宝丹、乌须健阳丹（《扶寿精方》）、美髯丹（《医级》卷八）、七宝美髯丸（《全国中药成药处方集》武汉方）、首乌补益丸（《实用中成药手册》）。

【组成】 赤、白何首乌各一斤（米泔水浸三四日，瓷片刮去皮，用淘净黑豆二升，以砂锅木甑，铺豆及首乌，重重铺盖蒸之，豆熟取出，去豆晒干，换豆再蒸，如此九次，晒干，为末） 赤、白茯苓各一斤（去皮，研末，以水淘去筋膜及浮者，取沉者捻块，以人乳十碗浸匀，晒干，研末） 牛膝八两（去苗，酒浸一日，同何首乌第七次蒸之，至第九次止，晒干） 当归八两（酒浸，晒） 枸杞子八两（酒浸，晒） 菟丝子八两（酒浸生芽，研烂，晒） 补骨脂四两（以黑脂麻炒香）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大，共一百五十丸。每日三丸，侵晨温酒送下，午时姜汤送下，卧时盐汤下；其余并丸如梧桐子大，每日空心酒服一百丸。

【功用】 补肾，固精，乌发，壮骨。

①《本草纲目》：乌须发，壮筋骨，固精气，续嗣延年。②《中药制剂手册》：滋阴益气，调理荣卫。③《上海市中药成药制剂规范》：培补肝肾，益气养血。

【主治】 肝肾不足，白发，脱发，不育，崩带，齿牙动摇，腰膝痿软，肾虚无子。

①《医方集解》：气血不足，羸弱，周痹，肾虚无子，消渴，淋沥遗精，崩带，痈疮，痔肿。②《全国中药成药处方集》（天津方）：女子血亏脱发，精神衰弱，男子腰肾不足，筋骨不壮。③《中药制剂手册》：由肾水亏损，血气不足引起的须发早白，牙齿动摇。④《上海市中药成药制剂规范》：肝肾两亏，腰痿腿软。

【宜忌】 ①《本草纲目》引《积善堂方》：忌诸血、无鳞鱼、萝卜、蒜、葱、铁器。②《中国医学大辞典》：忌食糟、醋。

【方论选录】《医方集解》：此足少阴、厥阴药也。何首乌涩精固气，补肝坚肾为君；茯苓交心肾而渗脾湿；牛膝强筋骨而益下焦；当归辛温以养血；枸杞甘寒而补水；菟丝子益三阴而强卫气；补骨脂助命火而暖丹田。此皆固本之药，使荣卫调适，水火相交，则气血太和，而诸疾自已也。即有加减，当各依本方随病而施损益。今人多以何首乌

加入地黄丸，合两方为一方，是一药二君，安所适从乎？失制方之本旨矣。

【临证举例】 ①肾虚乏嗣 《本草纲目》引《积善堂方》：嘉靖初，邵应节真人，以七宝美髯丹方上进，世宗肃皇帝服饵有效，连生皇嗣。②脱发 《福建中医药》（1983；5:19）：用七宝美髯丹加减内服，并配合油麻楠、柳枝洗头，治疗脱发症，疗程6～17周，共治愈24例。

【现代研究】 提高应激生存能力 《中成药研究》（1986；12:40）：用七宝美髯丹给大、小鼠饲养15日后，通过应激试验证明，能显著提高小鼠在缺氧状况下的应激生存能力。测定喂养前后大鼠血红蛋白（Hb）、血清铁与过氧化氢酶（CAT）含量，结果表明：本方能增加大鼠蛋白质合成，提高大鼠聚铁能力和CAT活性，降低有害色素的累积。

【备考】 《扶寿精方》：初服三四日，小便多或杂色，是五脏中杂病出；二七日唇红生津液，再不夜起，若微有腹痛，勿惧，是搜病也；三七日身体轻便，两乳红润；一月鼻觉辛酸，是诸风百病皆出；四十九日补血生精，泻火益水，强筋骨，黑须发。

00360 七鲜青阴汤

【组成】 鲜生地五钱 鲜石斛四钱 鲜茅根五钱 鲜稻穗二支 鲜雅梨汁 鲜蔗汁各二瓢（冲） 鲜枇杷叶（去毛，炒香）三钱

【功用】 滋养阴液。

【主治】 伏暑伤寒，郁热转出阳分而解后阴液重亏者。

00361 七物小五味子汤

【方源】 《外台》卷三十六引《小品方》。

【异名】 五味子散（《圣惠》卷八十三）。

【组成】 五味子（碎） 紫菀 黄芩 甘草（炙） 麻黄（去节） 生姜 桂心各一分

【用法】 上㕮咀。以水一升，煮取七合，分五服。

【主治】 ①《外台》引《小品方》：小儿咳嗽腹胀。②《圣惠》：小儿咳逆上气，睡卧不安。

00362 八子丸

【方源】 《圣济总录》卷一一一。

【组成】 青葙子 决明子（炒） 葶苈子（炒） 车前子 五味子 枸杞子 地肤子 茺蔚子 麦门冬（去心，焙） 生干地黄（洗，焙） 细辛（去苗叶） 肉桂（去粗皮） 赤茯苓（去黑皮） 泽泻 防风（去叉） 黄芩（去黑心）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，茶清送下，温米饮亦得，一日三次。

【功用】 《全国中药成药处方集》（沈阳方）：祛风热，补肝肾，疏气血。

【主治】 ①《圣济总录》：风毒热眼，翳膜侵遮，不计久新，及一切内外障眼。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：风火赤眼，翳膜遮睛，内外两障，暴发赤痛，干涩昏花。

【宜忌】 《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌食葱、蒜、辣物。

00363 八反膏

【方源】 《种福堂方》。

【组成】 鳖头 苋菜 葱 蜜 甘草 甘遂 芫花 海藻 阿魏 鳖甲 水红花子

【用法】 上应为末者为末，应捣烂者捣烂，入末再捣，如和不匀，加烧酒调之。先以水调白面作圈，围痞上，大六七分厚，其药敷在痞上，外用锡注二把，放烧酒在内，熨痞上，冷则更换，至痞内动，痛方止。明日大便下脓血即除根。

【主治】 痞块。

00364 八风丹

【方源】 《局方》卷一。

【异名】 八风丸（《圣济总录》卷十六）。

【组成】 滑石（细研） 天麻（酒浸）各一两 龙脑（研） 麝香（研）各一分 白僵蚕（微炒） 白附子（炮）各半两 半夏（白矾制）二两 寒水石（火烧通赤，细研，水飞）半斤

【用法】 上为细末，入研者药同研令匀，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，食后细嚼，温荆芥汤下；茶清亦得。

【主治】 诸风及痰热上攻，头痛面赤，目眩旋运，鼻塞咽干，颈项不利，痰唾稠浊，神情如醉，百节疼痛，耳啸蝉鸣，面上游风，口眼蠕动。

00365 八风散

【方源】 《局方》卷一。

【异名】 八风汤（《保婴撮要》卷二十）。

【组成】 藿香（去土）半斤 白芷 前胡（去芦）各一斤 黄耆（去芦） 甘草（炙） 人参（去芦）各二斤 羌活（去芦） 防风（去芦）各三斤

【用法】 上为细末。每服二钱，水一中盏，入薄荷少许，同煎至七分，去滓，食后温服；或以腊茶清调一大钱亦得。小儿虚风，乳香、腊茶清调下半钱。

【主治】 ①《局方》：风气上攻，头目昏眩，肢体拘急烦疼，或皮肤风疮痒痛，及治寒壅不调，鼻塞声重。②《保婴撮要》：疮疹既发，声音不出，

形气俱病。

【临证举例】 眩晕瘙痒 《续名医类案》：薛立斋治一人头目晕眩，皮肤瘙痒，搔破成疮，以八风散治之即愈。

00366 八正散

【方源】 《局方》卷六。

【异名】 八珍散(《得效》卷十六)。

【组成】 车前子 瞿麦 萹蓄 滑石 山栀子仁 甘草（炙） 木通 大黄（面裹煨，去面，切，焙）各一斤

【用法】 上为散。每服二钱，水一盏，加灯心，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。小儿量力少少与之。

【功用】 ①《中医方剂学》：清热泻火，利水通淋。②《中医方剂选讲》：消炎，利水散结，通便。

【主治】 湿热下注，热淋，血淋，石淋，或小便癃闭不通，小腹急满；心经邪热上炎，口舌生疮，咽干口燥，目赤睛疼，唇焦鼻衄，咽喉肿痛，舌苔黄腻，脉滑数。现用于泌尿系感染，泌尿系结石，产后及术后尿潴留等。

①《局方》：大人、小儿心经邪热，一切蕴毒，咽干口燥，大渴引饮，心忪面热，烦躁不宁，目赤睛疼，唇焦鼻衄，口舌生疮，咽喉肿痛。又治小便赤涩，或癃闭不通，及热淋，血淋。②《得效》：妊娠心气壅，胎气八个月散坠，手足浮肿，急痛不安，难产。③《普济方》：小儿伤寒壮热，及潮热积热，斑疮水痘，心躁发渴，大便不通，小便赤涩，口舌生疮。④《银海精微》：心经实热，或思虑劳神，或饮食太过，致使三焦发热，心火愈炽，目大眦赤脉传睛。⑤《增补内经拾遗》：阳水为病，脉来沉数，色多黄赤，或烦或渴，小便赤涩，大便多秘。⑥《准绳·疡医》：下疳、便毒，小便淋漓，脉证俱实者。⑦《宋氏女科》：妊娠转胞，小便不通者。⑧《金鉴》：石淋，尿则茎中作痛，常带砂石，因膀胱蓄热日久所致。

【宜忌】 《新医学》(1975；5:262)：孕妇及虚寒病者忌用。本方多服会引起虚弱的症状，如头晕、心跳、四肢无力，胃口欠佳。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手足太阳、手少阳药也。木通、灯草清肺热而降心火，肺为气化之源，心为小肠之合也；车前清肝热而通膀胱，肝脉络子阴器，膀胱津液之府也；瞿麦、萹蓄降火通淋，此皆利湿而兼泻热者也。滑石利窍散结；栀子、大黄苦寒下行，此皆泻热而兼利湿者也。甘草合滑石为六一散，用梢者，取其径达茎中，甘能缓痛也；虽治下焦而不专于治下，必三焦通利，水乃下行也。②《医略六书》：热结膀胱，不能化气，而水积下焦，故小腹硬满，小便不通焉。大黄下郁热而膀胱之气自化，滑石清六腑而水道闭塞自通，瞿麦清热利水道，木通降火利小水，萹蓄泻膀胱积水，山栀清三焦郁火，车前子清热以通关窍，生草梢泻火以达茎中。为散，灯心汤煎，使热结顿化，则膀胱肃清而小便自利，小腹硬满自除矣。此泻热通窍之剂，为热结溺闭之专方。③《医方论》：此方治实火下注小肠、膀胱者则可。若阴虚夹湿火之体，便当去大黄，加天冬、丹参、丹皮、琥珀等味，不可再用大黄，以伤其元气。④《成方便读》：此方以大黄导湿热直下大肠，不使其再下膀胱，庶几源清而流自洁耳。其既蓄于膀胱者。又不得不疏其流。以上诸药，或清心而下降，或导浊以分消，自然痛可止热可蠲，湿热之邪尽从溺道而出矣。

【临证举例】 ①小便不通 《保婴撮要》：一小儿患腹痛，小便不利，大便干实，此形病俱实，先用八正散二剂，二便随通；又用加味清胃散二剂，再用仙方活命饮一剂而痊。②肾盂肾炎 《辽宁中医杂志》(1986；1:19)：以八正散随证加黄连、黄柏等治疗辨证为湿热蕴结型的急性肾盂肾炎女性菌尿67例。该组病例经尿菌培养均有不同程度的致病菌生长，其中大肠杆菌35例，菌落计数均在10万以上。结果治愈54例，（临床症状消失，尿检正常，尿菌培养2次均为阴性），临床治愈5例（临床症状消失，尿检正常，尿菌培养尚未转阴），无效8例。③泌尿系感染 《中医药学报》(1984；1:33)：应用八正散加减治疗泌尿系感染属膀胱湿热型者94例。结果痊愈和基本治愈者共86例。④泌尿系结石 《浙江中医杂志》(1983；2:59)：以八正散加减为基本方（海金沙50克，金钱草50，牛膝30克，滑石50克，大黄20～30克，木通15克，车前子20克，萹蓄20克，瞿麦20克，石韦20克，甘草10克），每日1剂，冲服消石散（地龙、鸡内金、琥珀，按3:2:1比例配制，共为细末）15克，治疗泌尿系结石34例。结果治疗后排尿者21例，结石下移2厘米以上者9例，总有效率为88.3%。本组中，共排出结石28块，平均排石时间为6.2天，最短3天，最长为108天。⑤下疳 《全国名医验案类编续编》：尹性初治一患者，小便涩痛，尿血，阴茎肿大，皮破水流，花柳科所谓下疳是也。病属血淋阴肿，系热毒侵入血室，遗入膀胱，郁结不能渗泄故也。治拟仿八正散之旨，清热渗湿，解毒行瘀。萆薢、栀子、车前子、瞿

麦、萹蓄各三钱，升麻一钱，大黄、银花各二钱，生甘草梢、琥珀末各一钱。另用黄连末，甘草末各三钱，用白蜜调搽。服四剂肿消大半，再服四剂而愈。⑥产后及术后尿潴留 《赤脚医生杂志》(1976；12:24)：以八正散加减（萹蓄、瞿麦、滑石各15克，木通3克，车前子9克，甘草梢6克，元明粉9～15克分冲），治疗自然产、手术产以及其他下腹部手术所致的尿潴留32例。结果获效者（服药后4小时内自行排尿）15例，缓效（服药后4～8小时内排尿，但不通畅，须服药2～5剂始愈）17例。

【现代研究】 抑菌作用 《中医杂志》(1985；8:57)：八正散的实验研究表明：在体外无明显抑菌和杀菌作用，但能显著地抑制尿道致病性大肠杆菌凝集人的P型红细胞及粘附尿道上皮细胞的作用，后者的抑制率达95%（P<0.001）。

【备考】 本方改为汤剂，名“八正汤”（见《宋氏女科》）。

00367 八仙丸

【方源】 《扁鹊心书·神方》。

【组成】 附子（炮） 高良姜 荜茇 砂仁 肉豆蔻各一两 生姜三两 厚朴四两（姜汁制）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下。

【主治】 脾胃久冷，大便泄泻，肠中疼痛，米谷不化，饮食不进。

00368 八仙丸

【方源】 《杨氏家藏方》卷九。

【组成】 肉苁蓉 牛膝 天麻（去苗） 木瓜（去子，切）各四两（并用好酒浸三日，取出焙干） 当归（洗，焙）二两 附子（炮，去皮脐）二两 鹿茸一两（火燎去毛，涂酥炙） 麝香一分（别研）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒送下。

【主治】 ①《杨氏家藏方》：元脏气虚，头昏面肿，目暗耳鸣，四肢疲倦，步履艰难，肢节麻木，肌体羸瘦，肩背拘急，两胁胀满，水谷不消，吃食无味，恍惚多忘，精神不清。②《奇效良方》：元气虚损，血气不足，耳鸣目暗，腰膝酸疼，肌体羸瘦，饮食无味。

00369 八仙丹

【方源】 《本事》卷二。

【组成】 伏火朱砂 真磁石 赤石脂 代赭石 石中黄 禹余粮（以上五味并火煅，醋淬） 乳香（乳钵坐水盆中研） 没药各一两

【用法】 上为细末，匀研极细，糯米浓饮为丸，如梧桐子大或如豆大。每服一粒，空心盐汤送下。

【功用】 补精髓，壮筋骨，益心智，安魂魄，令人悦泽，驻颜轻身，延年益寿，闭固天癸。

【主治】 虚损。

【临证举例】 虚劳 有人年几七旬，梦漏，羸弱，气惫恍然，虚损，得此方服之，顿尔强壮，精气闭固，饮食如旧。

00370 八仙汤

【方源】 《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】 当归一钱 茯苓一钱 川芎 熟地 陈皮 半夏 羌活各七分 白芍八分 人参 秦艽 牛膝各六分 白术四钱 桂枝三分 柴胡四分 防风五分 炙甘草四分

【用法】 水煎服。

【主治】 浑身麻木。

00371 八仙酒

【方源】 《饲鹤亭集方》。

【异名】 八仙庆寿酒（《全国中药成药处方集》吉林方）。

【组成】 川乌 草乌 薄荷 炮姜 当归 淡竹叶 陈皮 甘草各一两 烧酒十斤 醋十二两 黄糖二十两 河水 井水各二十两

【用法】 上药泡浸，密封十日。量饮。

【主治】 左瘫右痪，筋软，麻痹等症。

【宜忌】 《全国中药成药处方集》（吉林方）：孕妇忌服。

00372 八仙散

【方源】 《妇人良方》卷七。

【组成】 当归 厚朴 芍药 枳壳（制） 人参各四分 甘草 茯苓各五分 肉豆蔻二分

【用法】 上为末。水二升，煎取八合，空心分三服。

【主治】 妇人血气，心腹疼痛。

00373 八仙散

【方源】 《外科精义》卷下引《卫生方》。

【组成】 细辛 荆芥 白芷 川芎 黄芩 防风 甘草 地骨皮各等分

【用法】 上为粗末。每用药二两，水二碗，煎十沸，去滓，热淋渫患处。

【主治】 游风肿痒，疥癣疮；或因洗头，游风瘙痒生疮。

00374 八仙散

【方源】 《普济方》卷三七一引《傅氏活婴方》。

【组成】 天麻一钱（热汤泡洗） 人参一钱 白

术一钱　白茯苓一钱半　御米一钱（炒去油）　糯米（姜汁浸七次）　扁豆一钱（炒）　陈皮一钱　莲肉（去心）一钱　藿香叶一钱　甘草一钱（炒）

【用法】 上为细末，如常调匀。用盐汤调下，或盐米饮调下，不拘时候；如吐泻，霜梅汤调下；慢惊者，冬瓜仁、陈皮煎汤调下，入盐少许。

【主治】 一切身冷，瘈疭，四肢弱，吐泻不食，精神困慢，面色青黑，不省人事。

00375　八仙散

【方源】 《普济方》卷六十七。

【组成】 防风　荆芥　白芷　川芎　细辛　地骨皮　甘草　羌活各等分

【用法】 上为粗末。淋洗患处。

【主治】 牙疳。

00376　八仙散

【方源】 《普济方》卷二七二。

【组成】 川山甲（炮）　白药子　瓜蒌仁　大黄　木黎　槐花　白矾　山栀子各等分

【用法】 用水一大盏煎过，舍上迎露，日未出服之。

【主治】 诸疮。

00377　八仙散

【方源】 《喉科指掌》卷一。

【组成】 人中白一两（煅存性用）　生大黄一两二钱　生石膏五钱　元参六钱（盐水炒）　黄芩一两四钱（酒炒）　玄明粉七钱　僵蚕末三钱　瓜硝八钱　轻粉一钱

【用法】 上为细末，用炼蜜为锭。每服二钱，放舌上，津化咽下，连连不断，则烂斑自去矣。

【主治】 咽喉溃烂。

00378　八仙糕

【方源】 《回春》卷三。

【组成】 枳实（去瓤，麸炒）四两　白术（陈壁土炒）四两　白茯苓（去皮）二两　陈皮（炒）二两　干山药四两　莲肉（去心皮）二两　山楂肉（去核）二两　拣参一两（气盛者，砂仁一两代之）

【用法】 上为末，用白粳米五升、糯米一升半，打粉，用蜜三斤入药末和匀；如做糕法，先就笼中划小块，蒸熟取出，火烘干，瓦罐收贮封固。取三五片食之，以白汤漱口。

【功用】 理脾胃，消饮食。

【主治】 脾胃虚损，泄泻不止。

00379　八仙糕

【方源】 《仙拈集》卷三引《传家宝》。

【组成】 白术　白茯苓　莲肉　芡实（饭上蒸熟，晒干，临合微炒）　山药各八两　陈皮　甘草各三两　腊月炒米三斗

【用法】 每年腊月极冻之日，炒糯米，用大簸放天井中间，铺开冷透，同药共磨筛细，收瓷罐内。食时旋入糖，用滚水冲服。

【功用】 补脾胃，肥壮身体。

【主治】 饮食不消，大便泻痢。

【备考】 腊月磨此糕，虽收三五年不坏不蛀，愈陈久功效愈大；若不在腊月炒磨，多生蛀虫网丝，难以久收。坛放高燥处，勿近地气潮湿，勿用盛酒盐者；白糖须食时旋入冲调，若同药拌入，糕俱潮坏。

00380　八圣丹

【方源】 《奇方类编》卷下。

【异名】 八圣种子丹（《同寿录》卷一）。

【组成】 沙蒺藜八两　川续断四两（酒洗）　覆盆子四两（酒洗，去蒂）　干枸杞四两　山萸（去核，酒洗）二两　菟丝子（酒煮）二两　芡实四两　莲须四两

【用法】 蒸饼，酒打为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心白滚汤送下。

【功用】 种子。

【主治】 无子。

00381　八味丸

【方源】 《寿亲养老》卷四。

【组成】 川巴戟一两半（酒浸，去心，用荔枝肉一两，同炒赤色，去荔枝肉不要）　高良姜一两（锉碎，用麦门冬一两半，去心，同炒赤色为度，去门冬）　川楝子二两（去核，用降真香一两，锉碎同炒，油出为度，去降真香）　吴茱萸一两半（去梗，用青盐一两，同炒后，茱萸炮，同用）　胡芦巴一两（用全蝎十四个，同炒后，胡芦巴炮，去全蝎不用）　山药一两半（用熟地黄同炒焦色，去地黄不用）　茯苓一两（用川椒一两，同炒赤色，去椒不用）　香附子一两半（去毛，用牡丹皮一两，同炒焦色，去牡丹皮不用）

【用法】 上为细末，盐煮，面糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心、食前盐汤送下；温酒亦得。

【功用】 老人常服延寿延年，温平补肝肾，清上实下，分清浊二气，补暖丹田。

【主治】 积年冷病，累岁沉疴，遗精白浊，赤白带下。

00382　八味汤

【方源】 《杨氏家藏方》卷六。

【异名】 人参八味汤(《医略六书》卷十九)。

【组成】 吴茱萸（汤洗七次） 干姜（炮）各二两 木香 橘红 肉桂（去粗皮） 丁香 人参（去芦头） 当归（洗，焙）各一两

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【功用】 《医略六书》：温中逐寒。

【主治】 ①《杨氏家藏方》：脾胃虚寒，气不升降，心腹刺痛，脏腑虚滑。②《丹溪心法》：内寒泄泻，恶食。

【方论选录】 ①《杏苑》：用吴茱萸、干姜、肉桂、丁香等诸辛热以散寒，陈皮、木香行郁，人参补气，当归益血。②《景岳全书》：此汤味太刚烈，当加炙甘草方妙。③《医略六书》：人参扶元补气，肉桂暖血温营，丁香温中散滞气，炮姜逐冷暖中州，当归养血，木香调气，陈皮利气开胃，吴萸温肝降逆。

00383 八物汤

【方源】 《保命集》卷下。

【组成】 白术 人参 黄耆 茯苓 川芎 熟地黄 当归 芍药各等分

【用法】 上为粗末。每服五七钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服。

【功用】 益气和血。

【主治】 心肺虚损，皮聚而毛落；血脉虚损，妇人月水愆期。

00384 八物汤

【方源】 《保命集》卷下。

【组成】 四物内加玄胡 苦楝各一两 槟榔 木香各半两

【主治】 ①《保命集》：妇人经事欲行，脐腹绞痛。②《中国医学大辞典》：痛经及血淋。

00385 八宝丹

【方源】 《种福堂方》卷四。

【组成】 蠡蛸一两（去骨） 赤石脂一钱二分（煅） 文蛤一钱二分（炒焦） 白龙骨八钱 儿茶一钱 枯矾一钱 黄丹一钱 宫粉七分

【用法】 上为末。掺疮上。

【主治】 黄水疮。

00386 八宝丹

【方源】 《疡医大全》卷九。

【组成】 珍珠（布包，人豆腐内煮一伏时，研细）一钱 牛黄五分 象皮（切片） 琥珀（灯心同乳） 龙骨（煅） 轻粉各一钱五分 冰片三分 炉甘石（银罐内煅红，研细）三钱

【用法】 上为极细末，瓷瓶密贮。每用少许。

【功用】 生肌长肉，收口。

【主治】 痈疽不能收口。

00387 八宝饮

【方源】 《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 罂粟壳（去瓤蒂顶，蜜炒） 橘红 款冬花 百合 桑白皮 桔梗（炒） 人参（去芦） 阿胶（锉，蚌粉炒成珠）各等分

【用法】 上为粗末。每服三大钱，水一盏半，加生姜五大片，乌梅一枚，北枣二个（擘开），同煎至八分，去滓，临卧温服。

【主治】 咳嗽。

00388 八珍丹

【方源】 《卫生鸿宝》卷一。

【组成】 白花藕粉 白茯苓 白扁豆（炒） 莲肉（去皮心） 川贝 山药（焙） 白蜜等分 人乳（另人）

【用法】 上为细末。遇食，用一两，冲滚水服。

【功用】 大补虚损。

【主治】 男妇虚劳。

00389 八珍散

【方源】 《圣济总录》卷五十九。

【组成】 水银（入铅丹，点少水，研令星尽） 栝楼根各一两 苦参（锉） 知母（焙）各一两半 铅丹半两 密陀僧（研） 牡蛎（熬） 黄连（去须）各一两

【用法】 上药除水银、铅丹外，捣罗为细散，入水银，铅丹末和匀。每服一钱匕，温水调下，不拘时候。

【主治】 消渴后，烦热结成痈疽。

00390 八珍散

【方源】 《本事》卷二。

【组成】 人参（去芦） 白术 黄耆（蜜水涂炙） 山芋 白茯苓（去皮） 粟米（微炒） 甘草（炙） 白扁豆（蒸用）各一两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜、大枣，同煎至七分，日三四服。

【功用】 开胃，养气，进食，调脾胃。

【主治】 无故不思饮食。

00391 八珍散

【方源】 《瑞竹堂方》卷四。

【异名】 八物汤(《医学正传》卷三)、八珍汤(《外科发挥》卷二)。

【组成】 当归（去芦） 川芎 熟地黄 白芍药 人参 甘草（炙） 茯苓（去皮） 白术各一两

【用法】 上㕮咀，每服三钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎至七分，去滓，不拘时候，通口服。

【功用】 ①《瑞竹堂方》：调畅营卫，滋养气血，能补虚损。②《外科发挥》：进养饮食，退虚热。

【主治】 气血两虚，面色苍白或萎黄，头昏目眩，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，食欲减退；妇人气血不足，月经不调，崩漏不止，胎萎不长，或习惯性流产；外证出血过多，溃疡久不愈合者。

①《瑞竹堂方》：脐腹疼痛，全不思食，脏腑怯弱，泄泻，小腹坚痛，时作寒热。②《医方类聚》引《袖珍》：妇人脏躁，自笑自哭。③《正体类要》：伤损失血过多，或因克伐，血气耗损，恶寒发热，烦躁作渴。④《口齿类要》：气血俱虚，口舌生疮，或齿龈肿溃，恶寒发热，或烦躁作渴，胸胁作胀，或便血吐血，盗汗自汗。⑤《准绳·女科》：肝脾气血俱虚，不能养筋，以致筋挛骨痛，或不能行履，或发热晡热，寒热往来。⑥《外科正宗》：溃疡。⑦《张氏医通》：妇人胎产崩漏。⑧《医灯续焰》：眩晕昏愦，或大便不实，小便淋赤。

【方论选录】 ①《医方考》：血气俱虚者，此方主之。人之身，气血而已。气者百骸之父，血者百骸之母，不可使其失养者也。是方也，人参、白术、茯苓、甘草、甘温之品也，所以补气；当归、川芎、芍药、地黄，质润之品也，所以补血。气旺则百骸资之以生，血旺则百骸资之以养。②《沈氏女科辑要笺正》：四君、四物合为八珍，按之药理功能，可谓四君气药，能助脾阳；四物血药，能养脾阴。一属于血。只可专主脾胃讲，决不能泛泛然谓四君补气，四物补血。

【临证举例】 ①血枯 《内科摘要》：一妇人久患血崩，肢体消瘦，饮食到口，但闻腥臊，口出津液，强食少许，腹中作胀，此血枯之症，肺肝脾亏损之患，用八珍汤、乌贼骨丸，兼服两月而经行，百余剂而康宁如旧矣。②习惯性流产 《福建中医药》（1960；10:封3）：用加味八珍汤防治习惯性流产38例，全部治愈。患者年龄一般多在二十五至三十岁之间，流产次数最少为二胎，最多为五胎。治疗方药：八珍汤加砂仁，紫苏。如气虚，加黄芪；血虚，加阿胶；虚火盛而呕者，加黄芩、竹茹；虚火引起咽干口燥者，去熟地，加生地、玉竹。

【现代研究】 促进急性贫血的血细胞再生 《中医药研究参考》（1976；5:29）：八珍汤与四物汤药理研究发现，两方均能促进急性贫血的血细胞再生，其主要表现在网状红细胞的转变成熟过程，尤以八珍汤作用较显著。本方能促使血压很快恢复正常，并维持一定时间，而且对机体整个机能状态也有改善，说明急性大量失血时，气血双补较之单纯养血补血为佳。

【备考】 本方改为丸剂，名“女科八珍丸”（见《中国医学大辞典》）；又名“八珍丸”（见《中药成方配本》）。

00392 八珍糕

【方源】 《饲鹤亭集方》。

【组成】 白茯苓 怀山药 生米仁 白扁豆 建莲 芡实各一斤 使君子五两 砂仁四两 糯米 白米各一斗五升 （一方有五谷虫）

【用法】 蒸糕。

【功用】 健脾开胃，和中利湿，固本培元，补气消积。

【主治】 小儿疳膨食滞，面黄瘦。

00393 八厘散

【方源】 《金鉴》卷八十八。

【组成】 苏木面一钱 半两钱一钱 自然铜（醋淬七次）二钱 乳香二钱 没药二钱 血竭二钱 麝香一分 红花一钱 丁香五分 番木鳖（油炸，去毛）一钱

【用法】 上为细末。黄酒温服；童便调亦可。

【功用】 接骨散瘀。

【主治】 眼胞伤损而瞳神不碎者；被坠堕打伤震动盖顶骨缝，以致脑筋转拧疼痛，昏迷不省人事，少时或明者。

【宜忌】 忌生冷发物，猪头肉、茶水、糠米粥。

00394 八厘散

【方源】 《疡医大全》卷二十六。

【组成】 土鳖虫（焙干） 乳香（去油） 没药（去油） 血竭各一钱 生半夏（大者） 当归（酒浸） 巴豆霜 砂仁 雄黄 香甜瓜子各五分

【用法】 上为细末，收贮听用。每服八厘，好酒调下，小儿三厘。但能开口，服下即得活矣。

【主治】 跌打损伤。

00395 八将丹

【方源】 《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【异名】 八将散（《伤科方书》）。

【组成】 西黄三分 冰片三分 蝉蜕（烘）七枚 大蜈蚣（炙）七条 麝香三分 山甲（炙）七片 全虫（炙）七个 五倍子（焙）二钱

【用法】 上为细末。用少许掺于疮顶上，以膏盖之。

【功用】 提毒化毒。

【主治】 一切疽毒不起，疔毒不透，腐肉不脱。

【临证举例】 结核性外科疾患 《江西中医药》(1958；11:21)：用八将丹加减治疗结核性溃疡、阴疽、寒性脓疡各一例，疗程分别为六日、半月和一年。认为本方对结核性的寒性脓疡和瘘管有很好的治疗作用。

00396 八神丹

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】 地龙（去土，炒） 五灵脂（炒） 威灵仙 防风（去芦） 木鳖子（去壳） 草乌头各一两（炒） 白胶香（另研） 乳香（另研）各三钱

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五七丸至十丸，温酒送下，不拘时候。若汗出，其瘫麻自散，是其效也。

【主治】 风虚走注疼痛，昏迷无力，四肢麻木。

00397 八仙玉液

【方源】《顾松园医镜》卷十二。

【组成】 藕汁二杯 梨汁 蔗浆 芦根汁 茅根（水煎取浓汁） 人乳 童便各一杯 生鸡子白三枚

【用法】 上将诸汁炖滚，与鸡子白和匀，频服之。余尝用米仁、山药、莲肉、麦冬各一两，白花百合二两，枇杷叶十片，煎浓汁一碗，冲入玉液，再加贝母末、真柿霜和匀，频饮之。

【主治】 阴虚咳嗽，痰血。

【方论选录】 藕汁性寒带涩，涤热止血；梨汁降火消痰，定喘止嗽；蔗浆消痰止咳；芦根汁清胃止呕；茅根凉金定喘；人乳补阴养血；童便引火下行。

00398 八宝眼药

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 珠粉一钱 西牛黄三分 麝香三分 冰片一钱五分 珊瑚五分 玛瑙五分 熊胆六分 青鱼胆二只 制甘石五钱 海螵蛸七分 黄连二钱 荸荠粉二钱五分 蕤仁霜一钱

【用法】 先将黄连煎汁去滓，化熊胆、青鱼胆，拌入制甘石内，晒干研末；再将珠粉、珊瑚、玛瑙各飞净末；后将其余西牛黄等六味，各取净末，与前药末一并和匀，共研至极细为度，约成粉一两二钱五分，分装一百二十瓶，每瓶一分。轻者每日点二至三次，重者点四至五次，点于大眼角。

【功用】 清火止痛，消肿退翳。

【主治】 暴发火眼，肿痛眵粘，障翳胬肉，羞明流泪。

00399 八威灵散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 大附子一钱 川乌 草乌各一钱 雄黄 朱砂各五分 红砒四分 硫黄三分 麝香三分

【用法】 上为细末。用鸡子清调稀，浆小麻布手巾二条，阴干，用河水、姜汁、米醋三味，和一处，以药手中蘸湿擦患处，待行动汁出时擦之。夏月治尤佳。

【主治】 紫、白癜风。

00400 八仙长寿丸

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】 大怀生地黄（酒拌，入砂锅内蒸一日黑，掐断，慢火焙干）八两 山茱萸（酒拌蒸，去核）四两 白茯神（去皮木筋膜） 牡丹皮（去骨）各三两 五味子（去梗）二两 麦门冬（水洗，去心）二两 干山药 益智仁（去壳，盐水炒）各二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空心温酒调下；或炒盐汤调服；夏、秋滚汤调服。

【主治】 年高之人阴虚，筋骨柔弱无力，面无光泽或暗淡，食少痰多，或喘或咳，或便溺数涩，阳萎，足膝无力；肾气久虚，形体瘦弱无力，憔悴盗汗，发热作渴；虚火牙齿痛浮、耳聩及肾虚耳鸣。

【宜忌】 忌铁器。

【加减】 腰痛，加木瓜、续断、鹿茸、当归；消渴，加五味子、麦门冬各二两；老人下元冷，胞转不得小便，膨急切痛，四五日困笃欲死者，用泽泻，去益智；诸淋沥，数起不通，倍茯苓，用泽泻，去益智；夜多小便，加益智一两，减茯苓一半。治耳聩及肾虚耳鸣，另用全蝎四十九枚，炒微黄色，为末，每服三钱，酒调送下，早晨空心服。

00401 八仙寿神汤

【方源】《家庭治病新书》。

【组成】 何首乌 地骨皮 茯苓各四钱 党参 生地黄 熟地黄 天门冬 麦门冬各二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 身体虚弱，精神疲倦。

00402 八仙斑龙胶

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】 人参 天门冬（去心） 怀生地黄（酒洗） 怀熟地黄（酒蒸） 麦门冬（去心） 怀牛膝（去芦用）各五两 甘枸杞子 白何首乌 赤何首乌（以上俱锉咀片）各八两 老鹿茸（燎去毛，截二寸长，劈两片，水洗净）二十两

【用法】 将上药均入大砂锅内，熬汁五次，将滓滤净，再熬至五碗，则成胶矣。每服银茶匙二三

匙，好酒调化，空心服；或酒化胶为丸尤佳。

【功用】 补益。

【主治】 诸虚百损，五劳七伤，虚甚者。

00403 八味平胃散

【方源】 《易简方》。

【组成】 厚朴三两半 苍术五两半 橘红三两半 甘草一两 缩砂 香附子各二两 茯苓 丁香各三两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一个，煎至六分，去滓，食前服。

【主治】 气不舒快，中脘痞塞，不进饮食。

00404 八味地黄丸

【方源】 《医部全录》卷三三一引《体仁汇编》。

【异名】 加味地黄丸、八仙长寿丸(《痘疹传心录》卷十五)、冬味地黄丸(《胎产心法》卷上)、八仙长寿丹(《医钞类编》卷十三)、麦味地黄丸(《汤头歌诀白话解》)、麦味丸(《全国中药成药处方集》)。

【组成】 熟地黄（酒蒸） 山茱萸（酒浸去核，取净肉）各八钱 丹皮 泽泻各二钱 白茯神（去皮木） 山药（蒸）各四钱 五味（去梗） 麦冬（去心）各五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。每日七十丸，空心白汤送下；冬天酒下亦宜。

【功用】 滋补。

【主治】 ①《会约》：产后虚羸久咳。②《汤头歌诀白话解》：虚损劳热，咳嗽吐血，潮热盗汗。

【备考】 本方改为汤剂，名“冬味地黄汤”（见《胎产心法》），又名“麦味地黄汤”（见《金鉴》）。

00405 八味地黄丸

【方源】 《嵩崖尊生》卷六。

【组成】 丹皮 茯苓 泽泻各三两 山萸 山药各四两 熟地黄八两 川附 桂心各二两 全蝎（炒黄色）二钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服百丸。三服效。

【主治】 肾虚耳聋。

【加减】 相火盛，去桂、附，加知母、黄柏各二两，远志、菖蒲各二两。

00406 八味回阳饮

【方源】 《会约》卷三。

【异名】 回阳饮(《喉科种福》卷五)。

【组成】 人参（无者，以蜜炒黄耆一两代之） 附子二三钱 干姜（炒） 二三钱 当归身三钱（如泄泻者，或血热动血者，去之） 熟地数钱或一二两 甘草（炙）一钱 白术二四钱 黄耆（蜜炒）三钱

【用法】 水煎，温服。

【主治】 ①《会约》：伤寒脉虚将绝，阴阳将脱。②《喉科种福》：白喉，其痛甚，其无白色处，色紫红，脉沉紧者。

【加减】 如泄泻者，加乌梅二个；虚火上浮者，加茯苓二钱、麦冬一钱；如肝滞而胁胀痛者，加肉桂一钱半。

【方论选录】 《喉科种福》：此方阴盛格阳于上之证，宜回阳饮，热药凉用。按其用姜、附、归、地也，回阳于肾以温中；其用参、耆、术、草也，暖气于肺以达外。服后如发战下利，则加倍再服，惟归、地不可再加，以归、地为阴药故也。

00407 八味还睛散

【方源】 《得效》卷十六。

【异名】 还睛散(《医学入门》卷八)。

【组成】 白蒺藜（炒，去尖） 防风 粉草（炙） 木贼 山栀（炒，去壳）各半两 草决明一两（炒） 青葙子一分（微炒） 蝉退一分

【用法】 上为末。麦门冬去心煎汤，食后调下。

【主治】 ①《得效》：风热停留，肝肺相传，致患滑翳，有如水银珠子，但微含黄色，不疼不痛，无泪，遮绕瞳仁；涩翳，微如赤色，或聚或开，两旁微光，瞳仁上如凝脂色，时复涩痛，而无泪出；散翳，形如鳞点，或睑下起粟子而烂，日夜痛楚，瞳仁最痛，常下热泪。②《医学入门》：肝肺一切风热翳膜，及肾风热，或睛忽痛如针刺，或小儿疳眼，初起涩痛，久则生疮、翳肿，泪出难开，一切肝风及泻痢后虚热上行，不可点者。

00408 八味顺气散

【方源】 《医方类聚》卷二十一引《济生》。

【异名】 乌药顺气散(《医宗必读》卷八)、八物顺气汤(《医学从众录》卷四)、顺气散(《医学金针》卷二)。

【组成】 白术 白茯苓（去皮） 青皮（去白） 香白芷 陈皮（去白） 天台乌药 人参各一两 甘草（炙）半两

【用法】 上为细末。每服三钱，水一大盏，煎至七分，温服，不拘时候。仍以酒化苏合香丸间服。

【主治】 中风、中气、气滞痰阻，神志昏愦，牙关紧急，痰涎上壅，腹胀气喘；亦用于气滞腰痛。

①《医方类聚》引《济生》：中风。②《普济方》：中风，半身不遂，口眼㖞斜，语言蹇涩，神志昏愦，筋力挛拳，痰涎壅滞，麻痹不仁，遍身疼

痛，中气。③《医宗金鉴》：气滞腰痛。④《张氏医通》：类中风，虚胀喘逆。

【方论选录】 ①《玉机微义》：四君子补脾胃中气药也，更用白芷去手阳明经风，乌药通肾胃间气，陈皮理肺气，青皮泄肝气。若风果在手阳明经，而肝、肺、肾、胃之气实者可用。但人身经有十二，皆能中邪，五脏之气互有胜负，此方安能尽其变乎？又况真气先虚之人亦难用此也。②《医方考》：人参、白术、茯苓、甘草，四君子汤也。《经》曰：邪之所凑，其气必虚，故用四君子以补气。治痰之法，利气为先，故用青皮、白芷、台乌、陈皮以顺气，气顺则痰行，而无壅塞之患矣。此标本兼施之治也。

【备考】 有风之人，先宜服此，次进治风药。

00409 八味消风饮

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 生地9克 连翘9克 红花6克 桃仁6克 白鲜皮15克 地肤子6克 僵蚕9克 蝉蜕9克

【用法】 水煎服。

【主治】 荨麻疹。

【加减】 血热风盛，加丹皮、赤芍、银花；肺热便燥，加青黛、大黄、白芷；风热上犯，加白芷、白蒺藜、荷叶；湿热外渗，加苦参、黄柏、苍术、荆芥、防风；风冷喘咳，加杏仁、前胡、苏子、桔梗、牛蒡子；表虚，加甘草、黄耆。

00410 八味理中丸

【方源】《百一》卷二。

【组成】 川姜 缩砂仁 麦芽各二两 神曲（炒） 白茯苓 人参各一两 甘草一两半（炙） 白术四两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每两分作十丸。空心姜汤嚼下；或加半夏曲一两，入盐点服亦可。

【主治】 ①《百一》：脾胃虚弱，胸膈痞闷，心腹疼痛，腹满身重，四肢不举，肠鸣泄泻，饮食不化。②《永类钤方》：呕吐痰水。

【备考】《普济方》加半夏曲，入盐点服，名"八味理中汤"。

00411 八物定志丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 人参（去芦） 远志（煮，去心） 茯神（去木） 酸枣仁（去皮，微炒）各一两（别研） 朱砂（别研） 紫石英（火煅，醋淬七次，别研水飞） 石菖蒲（米泔浸一宿） 乳香（别研）各半两

【用法】 上为细末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，枣汤或温酒送下，不拘时候。

【主治】 心气不足。

00412 八物温经汤

【方源】《女科旨要》卷一。

【组成】 当归 香附 鹿茸（醋炙，如热少用） 川芎 熟地 白术 山萸 小茴各二钱 甘草一钱

【用法】 分四帖。加生姜三片，水煎，空心服。

【主治】 妇人二十一二，经脉不调，赤白带下，或如梅汁，或片，或二三月不行，潮热，咳嗽，饮食不思，四肢困倦。

【加减】 盗汗，加枣仁、黄耆各二钱；嗽，加杏仁、五味子各二钱；潮热，加黄芩、柴胡各二钱。

00413 八制保瞳丸

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】 枸杞一斤（分作八分，先用酒润透，一用蜜拌，一用乳拌，一用青盐拌，一用黑芝麻拌，一用川椒拌，一用小茴香拌，一用独活拌，一用菖蒲拌，俱用三钱，各炒，须不变红色为佳，若变黑色便不效）

【用法】 上药各为细末，稍加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱。

【主治】 肝肾两亏，瞳神失宁，视物不明。

00414 八宝生肌丹

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 熟石膏一两 轻粉一两 黄丹三钱 龙骨三钱 血竭三钱 赤石脂一两 乳香 没药各三钱

【用法】 上为极细末。掺患处，上盖薄贴。

【功用】 生肌收口。

【主治】 ①《药奁启秘》：疮证正气太薄，腐脱肌生，不收敛者。②《中医皮肤病学简编》：硬结红斑。

00415 八宝红灵丹

【方源】《应验简便良方》卷下。

【组成】 真豆砂（要明亮好）五钱 明雄黄（老色）三钱 西月石五钱 青礞石（煅红，用米醋淬七次）一钱 真神金（顶好）三十张 西血珀四块 当门子三钱 大梅片二钱

【用法】 入乳钵内乳碎，不见金星，再乳好，再将前各研细末如灰，合入金箔内，再乳数次，可无响声如水，下大梅片二钱，再乳数百下，可点眼内，无砂不痛，用瓶贮收，不可泄气。年久加好冰片更好。初起痈疽、对口疔疮，真米醋调搽患处数次；指头生疔，用鸡蛋一个，敲一小孔，纳药五厘入蛋内，搅匀套指头上；大小男女生白蛇串（即腹

边一路红点是也），用药二五厘，米醋调搽；小儿急惊风，用此二三厘吹入鼻内；一切痧症，手足厥冷，上呕下泻，用些微点入眼角内（男左女右），用药五厘，手足厥冷，姜汁调服，手足热忌姜，开水调送下，盖被出汗立愈；风火烂眼弦，用药点大小眼角内；妇女月水不调，小肠作气，用药二分，童便、米醋各半调服一二次，盖被出汗；汤火伤人及跌打损伤，用药一二分，米醋、童便调服，汤火伤，外用麻油调搽；跌打损伤，用米醋调搽伤处；咽喉肿痛，用药吹患处数次，须徐徐咽下咽喉；阴证用药三分，姜汁一茶匙，开水送下。

【主治】 痈疽对口，疔疮初起，指头生疔，白蛇串，小儿急惊风，痧症手足厥冷，上吐下泻，风火烂眼弦，妇女月水不调，小肠作气，汤火伤，跌打损伤，咽喉肿痛。

【宜忌】 忌发物。

00416 八宝珍珠散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】 炉甘石一斤（倾银锅煅通红，入三黄汤内，铜锅煮二时，汤干就焙干，退冷，再乳三日，如尘无声，筛过听合众药用） 血竭二钱 胆矾一钱 白硼半两 朱砂三钱 雄胆 乳香（制） 没药（制）各四钱 轻粉二钱

【用法】 上为极细末，俱以皮纸筛过，外加冰片末，每药三钱，加冰片三分。外用点眼。

【主治】 一切风热流泪，翳膜诸眼疾。

00417 八宝珍珠散

【方源】《金鉴》卷六十六。

【组成】 儿茶 川连末 川贝母（去心，研） 青黛各一钱五分 红褐（烧灰存性） 官粉 黄柏末 鱼脑石（微煅） 琥珀末各一钱 人中白（煅）二钱 硼砂八分 冰片六分 京牛黄 珍珠（豆腐内煮半炷香时取出，研末）各五分 麝香三分

【用法】 上药各为极细末，共兑一处，再研匀。以细笔管吹入喉内烂肉处。

【主治】 喉痹腐烂。

00418 八宝蠲痛汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 玄胡索 乳香 甘草 沉香各一钱二分 官桂八分 陈皮 当归 白豆蔻各二钱

【用法】 水煎，温服。

【主治】 七情伤感，六气为病，心疼腹痛不可忍者。

00419 八珍益母丸

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】 益母草四两（不见铁器，只用上半截带叶者） 人参（去芦） 白术（土炒） 茯苓（去皮）各一两 炙甘草（去皮）五钱 当归（酒洗）二两 川芎 白芍药（醋炒）各一两 熟地黄（酒洗）二两

【用法】 上为末，蜂蜜为丸，如弹子大。每次一丸，空心蜜汤送下。如不能嚼者，丸以细粒如小豆大，每服七八十丸。

【功用】《中国药典》：补气血，调月经。

【主治】 妇人气血两虚，脾胃并弱，饮食少思，四肢无力，月经违期，或先期而至，或腰疼腹胀缓而不至，或愆期不收，或断或续，或赤白带下，身作寒热，久不受孕。

【加减】 脾胃虚寒者，加砂仁一两（姜汁炒）；腹中胀闷者，加山楂一两（净肉，饭上蒸）；多郁者，加香附子一两（童便制）。

【备考】 方中除益母草外，用量原缺，据《景岳全书》补。

00420 八将擒王丸

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】 带子蜂房三钱 象牙屑五钱 僵蚕三钱 蝉蜕三钱 全蝎一对 木香三钱 乳香二钱 没药二钱

【用法】 上为细末，以黄占八两滚化熬过，入药末搅匀，倾水中取出为丸，如枣仁大。每服一丸，空心滚酒送下，连服三日。待其药从满口透出，隔一日再服一丸，至第五日再服一丸。

【主治】 一切痈疽发背，疮痔成漏。

00421 八味补骨脂丸

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】 补骨脂（炒） 巴戟天（去心） 桑螵蛸（炒） 菟丝子（酒浸三日，别捣） 牛膝（酒浸，切，焙） 熟干地黄（焙）各一两 干姜（炮）半两 枳壳（麸炒，去瓤）三分

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温酒送下；粟米饮亦得。

【主治】 小便滑数。

00422 八味款冬花散

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】 款冬花（洗，焙） 紫菀茸 五味子 甘草（炙）各七钱半 桑白皮（炒） 麻黄（去节） 杏仁（汤洗，去皮尖，麸炒） 紫苏叶各二两

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一盏半，入黄蜡皂子大，煎至一盏，去滓，食后热服。

【主治】 肺寒热不调，涎嗽不已。

00423 八珍益母十全丸

【方源】《医统》卷八十四引《医林集要》。

【组成】益母草（五月五日、六月六日俱可采，阴干，折去下半截，用上半截，连穗叶，石臼杵捣，筛为极细末）八两 人参（饭上蒸） 白术（饭上蒸） 白茯苓（饭上蒸）各一两 甘草（炙）五分 当归身（酒浸）二两 川芎五分 熟地黄（酒浸）二两 白芍药（醋炒）一两 角沉香四钱

【用法】上药各为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服九十丸，空心蜜汤送下，食干果子压之。不善吞者，化开服尤效，冬月酒送下。

【功用】资益坤元，补养气血，除淋沥带下，俾羸形体壮，有调经、受孕之功，胎前和气，产后补虚。

【备考】妇女经脉不调者，或有气血两虚而身体素弱，服此以养且调。当年而经不通者，服一料则通；经不调者，服一月则调；素不孕者，服一月即孕。胎前间或用一服则胎固而自安；妊娠微觉胎动，随用一服即安。产后用一服，以童便、酒化开调下，则无壅滞血运之候。多服之补虚活血。又治产后诸病极稳，急欲取效，以酒调化服。

00424 人甲散

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】人手足指甲（烧烟尽）六钱 朱砂（另研） 南星（姜制） 独活（去皮）各二钱

【用法】上为细末，分三服，酒调下。

【主治】破伤风，手足颤掉不已。

00425 人乳膏

【方源】方出《千金》卷二十二，名见《简明中医妇科学》。

【组成】人乳汁

【用法】和面敷之。

【主治】①《千金》：痈有脓令溃。②《简明中医妇科学》：乳岩已久，溃烂而脓不易出。

【方论选录】《简明中医妇科学》：乳岩已久，溃烂而脓不易出，这是气血虚的缘故，除内服补托药之外，再用人乳或人参末等外敷之，既能使脓易出，也能使肌肉易生，再与其他外治方法随证综合施治，确有良效。

00426 人参丸

【方源】《千金》卷二。

【组成】人参 甘草 茯苓各二两 麦门冬 菖蒲 泽泻 薯蓣 干姜各二两 桂心一两 大枣五十枚

【用法】上为末，以蜜、枣膏为丸，如梧桐子大。食前服二十丸，酒送下，日三夜一。不知稍增。

【主治】产后人虚，心悸，志意不安，不自觉恍惚恐畏，夜不得眠，虚烦少气；男子虚损心悸。

【加减】若有远志，纳二两为善；若风气，纳当归、独活二两。

00427 人参丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】人参一两（去芦头） 麦门冬一两（去心，焙） 茯神一两 龙齿一两 远志一两（去心） 黄耆一两（锉） 菖蒲一两 赤石脂一两 熟干地黄二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后以清粥饮送下。

【功用】①《圣济总录》：通行血脉。②《法律》：安心神，补心血。

【主治】①《圣惠》：心气不足，多惊悸，耳目不明，健忘。②《圣济总录》：脉痹。

00428 人参丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【异名】补虚丸（《圣济总录》卷九十二）。

【组成】人参一两（去芦头） 麦门冬一两半（去心，焙） 黄耆一两（锉） 甘草一两（炙微赤，锉） 石菖蒲一两 防风一两（去叉） 远志一两（去心） 附子一两（炮裂，去皮脐） 白茯苓一两 五味子一两 桂心一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，不拘时候，以粥饮送下。

【主治】虚劳脉极，惊跳，乍安乍发。

00429 人参丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】人参二两（去芦头） 桂心一两 赤茯苓一两 诃黎勒皮一两 甘草一分（炙微赤，锉） 干姜半两（炮裂，锉） 槟榔一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候，以生姜汤送下。

【主治】气膈，心腹痞满，不下饮食，或时呕吐，四肢不和。

00430 人参丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】人参一两（去芦头） 远志一两（去心） 白茯苓一两 生干地黄一两

【用法】上为末，用枣肉为丸，如梧桐子大。每服十五丸，生姜、薄荷汤送下，不拘时候。

【功用】 镇心安神，化痰利胸膈。

【主治】 惊悸。

00431 人参丸

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】 人参二两 白术二两半 干姜（炮）半两 山芋二两 附子（炮裂，去皮脐）一两 甘草（炙，锉）一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，水一盏，加大枣二枚（擘破），同煎至六分，去滓温服；白汤嚼服亦得。

【主治】 ①《圣济总录》：脾胃气虚弱，呕吐不下食。②《普济方》：心腹刺痛，频并泄利。

00432 人参丸

【方源】《圣济总录》卷五十丸。

【异名】 人参鹿茸丸(《圣济总录纂要》卷九)。

【组成】 人参三分 鹿茸（去毛，酒炙）一两 黄耆（锉）三分 栝楼根一两 桑螵蛸（炙）一两 杜仲（去粗皮，炙，锉）三分 鸡胜胫四枚（炙） 山茱萸三分 菟丝子（酒浸一宿，焙干，别捣为末）一两半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎大枣汤送下，一日二次。

【主治】 消肾，身体羸瘦，小便频数。

00433 人参丸

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】 人参一两 蛤蚧一对（全者净洗，酥炙） 白部（切） 紫菀（去苗土）各一两 大黄（锉，炒）半两 葶苈（隔纸炒）一分 款冬花 百合 贝母（去心） 知母（焙） 白前各半两 山芋 半夏（汤洗十遍，焙） 桑根白皮（炙黄，锉） 五味子（炒）各三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，糯米饮送下；橘皮汤亦得。

【主治】 年深喘嗽，春秋发动，痞满短气，痰涕如胶，睡卧不宁。

00434 人参丸

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】 人参 玄参 沙参 丹参 苦参 防风（去叉）各一两 虻虫三十枚（熬） 附子（炮裂，去皮脐）一两 巴豆（去皮心，煮，研出油）三十枚 蜀椒（去目并闭口，炒出汗）一合 干姜（炮）半两 葶苈（微炒，研）一合

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，食后米饮送下。未利再服。

【主治】 癖块久聚，心腹胀满。

00435 人参丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【异名】 磁石千金方(《普济方》卷三十三)。

【组成】 人参 麦门冬（去心，焙） 赤石脂 远志（去心） 续断各三分 韭子（炒）一两 鹿茸（去毛，酥炙）三分 茯神（去木） 龙齿（研） 磁石（煅，醋淬） 肉苁蓉（酒浸，切，焙）各一两 丹参 柏子仁（炒，别研）各半两 熟干地黄（焙）一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日服二十丸，空腹温酒送下。

【主治】 ①《圣济总录》：精极虚寒，少腹拘急，耳聋发落，行步不正，梦寐失精。②《普济方》：惊悸遗沥，小便白浊，甚则劳弱咳嗽。

00436 人参丸

【方源】《局方》卷十（吴直阁增诸家名方）。

【异名】 参术丸(《普济方》卷三九三)。

【组成】 人参（去芦） 丁香 陈皮（去白） 干姜（炮） 白术各一分 半夏（汤洗七次）半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每三岁小儿服十丸，温汤送下，不拘时候，一日二次。

【主治】 ①《局方》（吴直阁增诸家名方）：小儿乳哺，饮冷过度，伤冷脾胃，腹胁胀满，多吐痰涎。②《普济方》：小儿宿食不消，吐痰涎；逆食，干呕食少。

00437 人参丸

【方源】《奇效良方》卷三十。

【组成】 人参 桔梗 甘草（炙）各一两 阿胶（蛤粉炒如珠） 北五味子各半两 肉桂（去皮） 杏仁（泡去皮，炒） 乌梅肉各二钱半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每两作十五丸，每服一丸，用新绵裹定，于汤内湿过，噙化咽津。

【主治】 远年近日咳嗽，诸药不效者。

00438 人参汤

【方源】 方出《千金》卷十六，名见《圣济总录》卷四十七。

【组成】 人参一两 泽泻 甘草 桂心各二两 橘皮 干姜各三两 茯苓四两 青竹茹五两 大黄六两

【用法】 上㕮咀。以水八升，煮取三升，一服七合，日三夜一。

【主治】 胃虚反，食下咽便吐。

【加减】 已利者，去大黄。

00439 人参汤

【方源】《圣济总录》卷八

【组成】 人参三分 麻黄（去节，先煎，掠去沫，焙干）一两半 石膏二两半（捣碎） 芍药三分 芎藭 防己（锉） 桂（去粗皮） 防风（去叉）一两 附子（炮裂，去脐皮）一枚重半两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）四十九枚

【用法】 上药锉如麻豆。每服五钱匕，水二盏，加生姜半分（切），煎至一盏，去滓温服，空心一服，相去如人行五里再一服。衣覆微汗，勿触外风。

【主治】 中风，四肢拘挛，舌强不能语，精神恍惚。

【加减】 如体中觉热，每服加竹沥一合。

00440 人参汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 人参一两 麻黄（去节，煎，掠去沫，焙）一两半 甘草（炙，锉）一两 白术一两 防风（去叉）一两半 羚羊角（镑）二两 独活（去芦头）一两 芎藭一两 升麻一两 石膏二两 防己一两 芍药一两半 桂（去粗皮）一两 黄芩（去黑心）一两 附子（炮裂，去皮脐）三分

【用法】 上锉，如麻豆大。每用十钱匕，以水三盏，加生姜十片，煮取一盏半，入竹沥一合，更煎三沸，去滓，分三服，日二夜一，微热服之。

【主治】 偏风，半身不遂，手足常冷。

【加减】 若有冷气，加陈橘皮（汤浸，去白，焙）、牛膝（去苗）、五加皮（锉细）各一两。

00441 人参汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】 人参三两 白术四两 桂（去粗皮） 防己 甘草（炙，锉）各三两 乌头（炮裂，去皮脐）七枚 防风（去叉）三分 赤茯苓（去黑皮）二两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服四钱匕，水一盏半，加生姜三片，同煎至一盏，入醋少许，更煎三四沸，去滓温服，日二夜一。当觉热痹。未觉，加药末并醋，如前煎服，觉热痹即止。

【主治】 历节风疼痛，日夜发歇不可忍。

00442 人参汤

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【异名】 人参散（《宣明论》卷一）。

【组成】 人参 远志（去心） 赤茯苓（去黑皮） 防风（去叉）各二两 芍药 麦门冬（去心） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 白术各一两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎取八分，去滓温服，一日二次。

【主治】 煎厥气逆，头目昏愦，视听不明，少气善怒。

00443 人参汤

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】 人参 茯神（去木） 羌活（去芦头） 芍药 黄耆各三分 龙齿 桂（去粗皮）各半两

【用法】 上细锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜三片，同煎至八分，去滓温服，一日二次。

【主治】 心虚不足，惊悸不安，言语谬乱。

00444 人参汤

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】 人参 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 半夏（汤洗七遍去滑，焙） 枳壳（去瓤，麸炒） 草豆蔻（去皮）各三分 丁香 木香 芍药 甘草（炙，锉）各一分 赤茯苓（去黑皮）半两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（切），煎取八分，去滓温服。

【主治】 久患气胀，上壅心胸，食物不化，肠中切痛不止。

00445 人参汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】 人参 龙骨 当归（切，焙） 干姜（炮裂） 白茯苓（去黑皮）各半两 甘草（炙，锉）半两 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙熟）一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，空心服，日晚再服。如小儿患，量大小以意加减。

【主治】 白滞痢及小便白。

00446 人参汤

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】 人参三分 杜仲（去粗皮，锉，炒） 桂（去粗皮）各一两 芍药三两 熟干地黄（焙） 白术 木通（锉） 玄参 当归（切，焙）各三分 芎藭 桑寄生各一两 防风（去叉） 牡丹皮 独活（去芦头）各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，空心、日午、夜卧服。

【主治】 五种腰痛。

【宜忌】《普济方》：忌生葱、桃、李。

00447 人参汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】 人参一两半 木通（锉）一两半 茯神（去木）一两 麦门冬（去心，焙）一两半 百合一两 龙齿一两半 柴胡（去苗）一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，用水一盏半，加大枣二枚（擘破），煎至一盏，去滓，分温二服，食后相次服之。

【主治】 心劳。多言喜乐过度伤心，或愁忧思虑伤血，不欲视听，心烦惊悸，言语谬误。

00448 人参汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】 人参 白茯苓（去黑皮） 前胡（去芦头） 麦门冬（去心，焙） 黄芩（去黑心） 枳壳（去瓤，麸炒） 木通（锉） 甘草（炙，锉） 生干地黄（焙） 防风（去叉） 独活（去芦头）各一两 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 旋覆花各一两半

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分（切），煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】 心劳，烦闷虚满，胸膈痞塞，饮食不下，气噎。

00449 人参汤

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】 人参一两 地骨皮半两 青蒿二钱 山栀子（去皮）半两 甘草（炙）一两

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加小麦少许，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 热劳，肌热烦躁，面红颊赤。

00450 人参汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】 人参 柴胡（去苗） 桑上寄生 青橘皮（汤浸，去白，焙） 甘竹茹 续断 芎藭各一两 艾叶（焙干）半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加大枣二枚（擘破），同煎至七分，去滓，空心温服。

【主治】 妊娠因惊，胎内转动。

00451 人参汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】 人参 当归（切，微炒） 阿胶（炙令燥）各二两 甘草（炙令赤） 芎藭 黄芩（去黑心） 艾叶各一两 吴茱萸（汤洗，焙） 生干地黄（微炒）各二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜一枣大（切），同煎至七分，去滓，空心温服，一日三次。

【主治】 妊娠卒下血，致胎动不安，少腹疼痛。

00452 人参汤

【方源】 方出《续本事》卷一，名见《普济方》卷一二〇。

【组成】 人参一两 茯苓二两（白者） 附子（每枚七钱重，炮，去皮脐）一两 牡蛎一两（煅） 粉草半两 黄耆一两（盐炙）

【用法】 上为末。每服三大钱，盐汤点服。

【功用】 健胃气，生肌肉，进饮食，顺荣卫。

【主治】 唇青面黄，肚里冷痛牵引小腹，以致翻胃，口苦舌干，少寐多寤，脚手不遂，远年日近一切脾胃冷病。

【宜忌】 忌生冷、油面、粘腻等物。

【临证举例】 翻胃 一妇人，年四十余岁，患十年翻胃，面目黄黑，历三十余人医不取效，脾腧诸穴烧灸交通，其疾愈甚。服此药不五七日间顿然无事。服至一月，遂去其根。

00453 人参汤

【方源】《袖珍》卷一引《经验方》。

【组成】 麻黄（去节） 杏仁（去皮尖，炒）各一两 甘草（炙）四两 桑白皮 五味子 粟壳（制） 陈皮各五钱 麦门冬三钱 紫菀一两 人参（去芦）四钱 阿胶七钱（炒）

【用法】 上㕮咀。每服一两，水二盏，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】 远年咳嗽。

【备考】 本方方名，《医方类聚》引作"人参散"。

00454 人参汤

【方源】《异授眼科》。

【组成】 人参三钱 黄连五钱 蔓荆子（炒）三钱 甘草二钱 白芍二钱 黄柏（盐水炒）二钱 知母（盐水炒）二钱

【用法】 水煎，温服。

【主治】 迎风流泪，目中多膜而昏痛。

00455 人参饮

【方源】《外台》卷六引《延年秘录》。

【组成】 人参一两 橘皮三两 生姜一两

【用法】 上切。以水四升，煮取一升五合，分温三服。

【主治】 呕吐。

00456 人参饮

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】 人参一两 白茯苓（去黑皮） 甘草（炙）各半两 麦门冬（去心）一分

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。以水五盏，煎取二盏，去滓，温，顿服之。

【主治】 消渴，胸膈烦闷，燥渴，饮水无度。

00457 人参饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】 人参二两 白茯苓（去黑皮） 厚朴（去粗皮，涂生姜汁，炙七遍） 白术各一两半 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 葛根（锉）各一两

【用法】 上为粗末 每服三钱匕，以水一盏，加生姜五片，同煎至六分，去滓温服，一日三次。

【主治】 妊娠阻病，心中懊侬，头目眩，四肢沉重懈怠，恶闻食气，好吃酸咸果实，多卧少起，三月、四月皆多呕逆，百节不能自举者。

00458 人参饮

【方源】《直指》卷八。

【组成】 人参 北梗 半夏曲 五味子 细辛 枳壳（制） 赤茯苓 杏仁（不去皮）各一分 甘草（炙）半分

【用法】 上锉细。每服三钱，加生姜五片、乌梅半个，食后煎服。

【主治】 咳嗽痰壅。

00459 人参散

【方源】 方出《肘后方》卷三，名见《圣济总录》卷六十八。

【组成】 人参

【用法】 上为末。每服方寸匕，一日五六次。

【主治】 卒上气，鸣息便欲绝。

【宜忌】《普济方》引《肘后方》：忌腥、咸、醋、酱、面等，并勿过醉饱。

00460 人参散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 人参一两（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 神曲一两（微炒令黄） 白术三分 麦芽一两（炒微黄） 吴茱萸半两（汤洗七遍，焙干，微炒） 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 干姜半两（炮裂） 陈橘皮一两半（汤浸，去白瓤，焙） 甘草一分（炙微赤，锉） 草豆蔻一两（去皮）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候，稍热服。

【主治】 脾胃虚冷，食不消化，腹胁气胀，不思饮食，四肢少力。

00461 人参散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 人参三分（去芦头） 白术半两 赤茯苓半两 黄耆半两（锉） 附子三分（炮裂，去皮脐） 木香半两 桔梗半两（去芦头） 大腹皮半两（锉） 甘草一分（炙微赤，锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 诃黎勒一两（煨，用皮）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 胃中虚冷，胸膈腹胁胀满，四肢不利。

00462 人参散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】 人参一两（去芦头） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 麦门冬半两（去心） 栀子仁半两 茯神半两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 伤寒，发汗大下之后，余热不去，心中多烦。

00463 人参散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】 人参一两（去芦头） 五味子半两 桂心三分 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 细辛三分 石菖蒲三分 附子三分（炮裂，去皮脐） 诃黎勒皮半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候，稍热服。

【主治】 风冷失声，肺寒少气。

00464 人参散

【方源】 方出《圣惠》卷二十八，名见《普济方》卷二三三。

【组成】 人参一两（去芦头） 龙骨一两半 桑螵蛸一两（微炒） 熟干地黄一两半 桂心三分 黄耆一两（锉） 茯神一两 麦门冬一两半（去心，焙） 甘草半两（炙微赤，锉） 白术三分 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 虚劳羸瘦，夜卧失精，心神虚烦，咽喉不利，少思饮食。

00465 人参散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【异名】 人参煮散（《鸡峰》卷七）。

【组成】 人参一两（去芦头） 白芍药三分 桂心三分 黄耆二两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 茯神一两 白龙骨一两 牡蛎一两（烧为粉） 远志一两（去心） 泽泻一两 酸枣仁二两（微炒）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 虚劳惊悸，心神不安。

00466 人参散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】人参二两（去芦头） 麦门冬一两（去心） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 黄耆一两（锉） 紫苏茎叶一两 赤茯苓一两 枇杷叶一两（拭去毛，炙微黄） 诃黎勒皮一两半 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣二枚，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】上气，胃中烦热，痰壅吐逆，不能下食。

00467 人参散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】人参（去芦头） 白茯苓 桔梗（去芦头） 干木瓜 白术 桂心 当归（锉，微炒）各三两 诃黎勒一两（炮裂，锉） 干姜半两（炮裂，锉） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干微炒） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为细散。每服一钱，以热粥热调下，不拘时候。

【主治】久冷心痛，气攻两胁，妨闷，不能饮食。

00468 人参散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【异名】人参汤（《圣济总录》卷五十四）。

【组成】人参一两（去芦头） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 干姜三分（炮裂，锉） 麻黄三分（去根节） 桂心半两 甘草半两（炙微赤，锉） 五味子三分 紫菀三分（去苗土） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加大枣二枚，煎至六分，去滓温服，一日三次。

【主治】气嗽，心胸滞闷，四肢不和。

00469 人参散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】人参半两（去芦头） 厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 白术半两 沉香半两 紫苏茎叶一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候，稍热服。

【主治】膈气，噎塞不能下食，食即呕逆。

【备考】本方方名，《普济方》引作“人参汤”。

00470 人参散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】人参半两（去芦头） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 桂心半两 干姜半两（炮裂，锉） 白术半两 草豆蔻一两（去皮） 甘草半两（炙微赤，锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄） 荜茇半两 大腹皮一两（锉） 丁香半两 诃黎勒皮一两 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候，稍热服。

【主治】五噎，胃管气滞，心胸满闷，咽中噎塞，不能下食。

00471 人参散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】人参二两（去芦头） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 木香半两 半夏一两（汤洗七遍去滑） 陈橘皮二两（汤浸，去白瓤，焙） 高良姜一两（锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候，稍热服。

【主治】食毕即醋咽，心胸气滞，腹胁疼痛，不能下食。

00472 人参散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】人参三分（去芦头） 地骨皮一两 赤茯苓三分 麦门冬二两（去心） 甘草三分（炙微赤，锉） 芦根二两（锉） 葛根三分（锉） 黄耆三分（锉） 川升麻一两 黄芩半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，淡竹叶二十片，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】消渴，口舌干燥，烦热。

00473 人参散

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】人参（去芦头） 茯神 远志（去心） 赤石脂 龙骨 干姜（炮裂，锉） 当归（锉，微炒） 甘草（炙微赤，锉） 白术 白芍药 熟干地黄 桂心 防风（去芦头） 紫菀（去苗土）各一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候温服，一日三次。

【主治】心气虚悸，恍惚多忘，或梦寤惊魇，肾

气不足。

00474 人参散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】人参一两（去芦头） 当归一两（锉，微炒） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 芎藭一两 艾叶半两（微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加大枣三枚，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】妊娠胎不安，漏下腹痛。

00475 人参散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】人参半两（去芦头） 白术半两 白茯苓半两 甘草一分（炙微赤，锉） 藿香一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不拘时候，稍热服之。

【主治】小儿哕逆不止，心神烦乱。

00476 人参散

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【组成】人参 知母 贝母 半夏 杏仁（生） 马兜铃（去皮，用肉） 麻黄（不去节）各半两 天仙藤二两

【用法】上㕮咀。每服八钱，水二盏，加乌梅一个，蜜一匙，煎至八分，去滓，食后、临卧温服。年久者四五服，日近者三四服。

【主治】诸咳嗽喘急，语言不出者。

【宜忌】忌酒、醋、鸡、面、咸、酸、生冷。

00477 人参散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】人参汤（《圣济总录》卷四十三）。

【组成】人参半两（去芦头） 远志一两（去心） 石菖蒲一两

【用法】上为散。每服二钱，水一中盏，加生姜三片，薄荷三五叶，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心脏虚烦，恍惚多忘，神思不宁。

00478 人参散

【方源】《医方类聚》卷一二三引《神巧万全方》。

【组成】人参 桂心 葵子 磁石（火烧红，醋淬，研，水飞过） 滑石 川大黄（炒） 腻粉 木通 琥珀 木香各半两

【用法】上为散。每服二钱，食前以葱白、灯心汤调下。

【主治】石淋，水道涩痛，频下砂石。

00479 人参散

【方源】《局方》卷十。

【组成】干葛二两 人参 白茯苓（去皮）各一两 木香 甘草（炙） 藿香叶各一分

【用法】上为末。每服一钱，水一中盏，煎七分，去滓，放温服，不拘时候。

【功用】调中和气，止呕逆，除烦渴。

【主治】①《局方》：小儿昏困多睡，乳食减少，及伤寒时气，胃气不顺，吐利止后，燥渴不解。②《圣济总录》：小儿宿有痰气，心肺壅热，内亡津液，烦渴不止。

【备考】《奇效良方》有生姜五片，红枣一枚。

00480 人参散

【方源】《本草衍义》卷十五。

【异名】樗参散（《医学入门》卷七）、人参樗皮散（《医方集解》）、樗白皮散（《杂病源流犀烛》卷十七）。

【组成】樗根白皮一两 人参一两

【用法】上为末。每服二钱匕，空心以温酒调服。如不饮酒，以温米饮代。

【主治】大肠风虚，饮酒过度，挟热下痢脓血，疼痛，多日不愈。

【宜忌】忌油腻、湿面、青菜、果子、甜物、鸡、猪、鱼腥等。

【方论选录】《医方集解》：此手足阳明药也。人参之甘，以补其气，樗皮之苦，以燥其湿，寒以解其热，涩以收其脱，使虚者补而陷者升，亦劫剂也。

【临证举例】脏毒 洛阳一女子，年四十六七，耽饮无度，多食鱼蟹，摄理之方蔑如也。后以饮啖过常，蓄毒在脏，日夜二三十泻，大便与脓血杂下，大肠连肛门痛不堪忍。医以止血痢药不效，又以肠风药则益甚。凡如此已半年余，气血渐弱，食渐减，肌肉渐瘦。稍服热药，则腹愈痛，血愈下；服稍凉药，即泄注气羸，粥愈减；服温平药则病不知，如此将期岁，医告术穷，垂命待尽。或有人教服人参散。才一服，知；二服，减；三服，脓血皆定，自此不十服，其疾遂愈。

00481 人参散

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】人参一两 白茯苓（去黑皮） 黄耆（锉、炙） 山芋 甘草（炙，锉） 乌药各一分

【用法】上为细散。每服一钱匕，沸汤点，不拘时候温服。

【主治】膀胱咳，咳而遗尿。

00482 人参散

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】人参 远志（去心） 赤小豆（炒） 白茯苓（去黑皮） 细辛（去苗叶） 桂（去粗皮） 干姜（炮） 防风（去叉）各一两 熟干地黄（焙） 黄芪（炙，锉）各两半 龙齿（研）半两 菖蒲（洗，锉，焙） 白术各三分

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，一日三次。

【主治】妇人风邪惊悸，恍惚不安。

00483 人参散

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】人参 芍药（锉） 甘草（炙） 龙骨各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，麝香温酒调服，一日三次。

【主治】产后虚汗不止，烦热体痛，渴燥引饮。

00484 人参散

【方源】《全生指迷方》卷二。

【异名】参芦散（《医方集解》）。

【组成】人参芦

【用法】上为末。每服一二钱，水调下。

【主治】①《全生指迷方》：若吐血服汤后，转加闷乱烦躁，纷纷欲呕，颠倒不安，由胸上有留血，其脉沉伏。②《医方集解》：虚弱人痰涎壅盛。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴、足太阳药也，痰涎上壅，法当涌之。病人虚羸，故以参芦代藜芦、瓜蒂，宣犹带补，不致耗伤元气也。

00485 人参散

【方源】《本事》卷四。

【组成】人参（去芦） 白术 白茯苓（去皮） 柴胡（去苗，洗） 半夏曲 当归（洗，去芦，薄切，焙干） 赤芍药 干葛 甘草各一两（炙） 子芩半两（去皮）

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜四片，大枣二个，煎至八分，不拘时候，带热服。但是有劳热证，皆可服，热退即止。

【功用】补和真气，解劳倦。

【主治】邪热客于经络，肌热痰嗽，五心烦躁，头目昏痛，夜多盗汗；妇人血热，虚劳骨蒸并皆治。

【方论选录】《法律》：此方治邪热浅在经络，未深入脏腑，虽用柴胡、干葛之轻，全借参、术之力，以达其邪。又恐邪入痰隧，用茯苓、半夏兼动其痰，合之当归、赤芍、黄芩并治其血中之热，且只用三钱（一本作二钱）为剂。盖方成知约，庶几敢用柴胡、干葛耳。

00486 人参散

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】人参三钱 白术 泽泻 瓜蒌 桔梗 栀子 连翘各半两 葛根 黄芩 大黄 薄荷 白茯苓各一两 甘草一两半 石膏二两 滑石 寒水石各三两

【用法】上为末，加缩砂仁三钱。每服五钱，水一盏，煎至七分，入蜜少许，再煎二三沸，去滓，食前服。食后服消痞丸。

【主治】①《宣明论》：消肾善饮，食后小便数者。②《医学正传》引东垣方：小便频数，白浊如膏。

【备考】《医学正传》：肾消食前服，上消食后服。

00487 人参散

【方源】《三因》卷十二。

【异名】敲枕散（《普济方》卷三八七）。

【组成】人参 款冬花 罂粟壳各等分（醋炙）

【用法】上锉散。每服四大钱，水一盏半，阿胶一片，加乌梅半个，同煎七分，去滓，睡正着时，急唤醒服。

【主治】咳嗽，肺虚不能制下，大肠泄泻，上气喘咳，服热药不效。

00488 人参散

【方源】方出《百一》卷六，名见《普济方》卷一八八。

【组成】紫参 人参 阿胶（蛤粉炒成珠子）各等分

【用法】上为细末。乌梅汤调下。

【主治】吐血不止。

00489 人参散

【方源】《得效》卷十五。

【组成】人参 知母 秦艽 款冬花 麻黄 杏仁 苦梗 马兜铃 寒水石 南星 地骨皮 粉草 半夏各等分

【用法】上锉散。每服三钱，水一盏半，麦门冬（去心）二十粒，水煎，温服。

【主治】妇人血风劳嗽，午寒午热；伤寒咳嗽，起坐不能。

【加减】喘嗽，加乌梅；气急，加桑白皮。

00490 人参散

【方源】《医学纲目》卷二十三。

【组成】人参 黄耆各一钱 厚朴八分（炒） 地黄七分 桃仁 枳壳（炒）各一钱 甘草少许

（炙）

【用法】 水煎，加竹沥、姜汁饮之。

【主治】 脾约，血虚肠燥，大便秘涩，小便如常，咽塞不通，食下便有痰出，脉涩，左右手同。

00491 人参散

【方源】 《准绳·类方》卷三。

【组成】 人参 麝香 片脑各少许

【用法】 上为末。甘草汤调服

【主治】 ①《准绳·类方》：关格。②《张氏医通》：噎肺胃反，关格不通

【方论选录】 ①《张氏医通》：此云岐子治噎膈胃反、关格不通九方之一。用独参汤峻补其胃，稍加脑、麝，以发越其气，得补中寓泻之至诀。乃肥盛气虚、痰窒中脘、及酒客湿热、郁痰固结之专剂。以中有脑、麝，善能开结利窍散郁也。

【备考】 ①《法律》：此方辄用脑、麝，耗散真气，才过胸中，大气、宗气、谷气交乱，生机索然尽矣，能愈病乎？②《法律》与《张氏医通》，均称此方出云岐子，考今《云岐子保命集》关格门无此方。

00492 人参散

【方源】 《幼幼集成》卷四。

【组成】 人参一钱 大麦冬二钱 川黄柏五分 炙甘草一钱 生姜三片

【用法】 水煎服。

【主治】 气虚津液不足，小便不通。

00493 人参粥

【方源】 《圣济总录》卷一八九。

【组成】 人参（为末）半两 生姜（取汁）半两

【用法】 以水二升，煮取一升，入粟米一合，煮为稀粥，觉饥即食之。

【功用】 《长寿药粥谱》：益元气，补五脏，抗衰老。

【主治】 ①《圣济总录》：反胃，吐酸水。②《长寿药粥谱》：年老体弱，五脏虚衰，久病羸瘦，劳伤亏损，食欲不振，慢性腹泻，心慌气短，失眠健忘，性机能减退等一切气血津液不足的病症。

【宜忌】 《长寿药粥谱》：宜秋、冬季节早餐空腹食用。凡属阴虚火旺体质，或身体壮实的中老年人以及炎热的夏季忌用。

00494 人参煎

【方源】 《圣济总录》卷五十八。

【组成】 人参一两 葛根（锉）二两

【用法】 上为末。每发时，须得焊猪汤一升已来，入药末三钱匕，又入蜜二两，都一处于铛子内，慢火熬之，至三合已来，似稠黑饧，便取出，贮于新瓷器内。每夜饭后取一匙头，含化咽津。重者不过三服。

【主治】 消渴。

00495 人参膏

【方源】 《丹溪心法·附录》。

【组成】 人参

【用法】 煎膏服。并灸气海穴。

【功用】 《韩氏医通》：回元气。

【主治】 ①《丹溪心法·附录》：滞下，昏仆目上视，溲注而汗泄，阴虚阳暴绝，嗽而肺虚者。②《寿世保元》：诸症因攻击之过，以致元气耗惫，用此补之。

【临证举例】 滞下昏厥 浦江郑义士，病滞下。一夕，忽昏仆，目上视，溲注而汗泄。翁诊之，脉大无伦。即告曰：此阴虚阳暴绝也。盖得之病后酒且肉，然吾能愈之。急命治人参膏，而且促灸其气海。顷之手动，又顷而唇动。及参膏成，三饮之，苏矣。其后服参膏尽数斤，病已。

【备考】 《摄生众妙方》：用好人参（去芦）或一斤二斤，随意切片，入瓷锅，水浮于药一手背，文武火煎干一半，倾置一瓶盛之；又将渣煎，又如前并之于瓶，凡煎三次，验参渣嚼无味乃止。却将三次所煎之汁去滓，仍入瓷锅内，文武火慢慢熬成膏。如一斤参，只好熬得一饭碗足矣。及成膏入碗，隔宿必有清水浮上，亦宜去之，只留稠膏。

00496 人中白散

【方源】 《医学正传》卷二。

【组成】 人中白二两 黄柏（盐酒拌炒褐色） 生甘草 青黛各五钱

【用法】 上为细末。每服二钱，童便调服。

【主治】 阴虚火盛，及五心烦热。

00497 人中白散

【方源】 《外科正宗》卷四。

【异名】 六仙散（《仙拈集》卷三）、青黛散（《全国中药成药处方集》）。

【组成】 人中白（溺壶者佳，煅红）二两 孩儿茶一两 黄柏 薄荷 青黛（各末）各六钱 冰片五分

【用法】 上为极细末。先用温汤漱净，吹药疳上，日用六七次。吹药后涎从外流为吉，内收涎毒入里为凶。

【主治】 小儿口疳、走马疳及牙龈腐烂黑臭者；葡萄疫而牙根腐烂者。

【备考】 本方方名，《青囊秘传》引作“中白

散"。

00498 人中白散

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】 真青黛 硼砂 人中白 粉儿茶各一钱 元明粉 马勃 龙脑薄荷叶各五分 梅花冰片二分

【用法】 上为极细末。擦之；咽喉病，以芦管吹之，日三次，夜二次。

【主治】 口舌糜烂，走马牙疳，咽喉肿痛，牙床腐溃。

【加减】 病甚者，可加西黄三分，珍珠五分。

00499 人中黄丸

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】 大黄 黄连 黄芩 人参 桔梗 苍术 防风 滑石 香附 人中黄各等分

【用法】 上为末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，气虚，四君子汤送下；血虚，四物汤送下；痰多，二陈汤送下；热者，加童便。如无人中黄，用粪缸岸代之，或朱砂、雄黄为衣亦好。

【主治】 ①《医学入门》：春夏秋冬疫疠。②《张氏医通》：温疫诸热毒。

【方论选录】《张氏医通》：此方专以伊尹三黄，大解湿热疫疠之邪；其奥妙全在人中黄一味，以污秽之味，同气相求，直清中上污秽热毒；合滑石、益元之制，则兼清渗道；用苍术、香附者，宣其六气之郁也；用桔梗者，清其膈上之气也；用防风者，开其肌腠之热也；十味去邪散毒药，不得人参鼓舞其势，无以遥迅扫之力也；用神曲为丸者，取其留中而易化也。

00500 人参饮子

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 人参一两（去芦头） 甘草一分（炙微赤，锉） 陈橘皮一两（汤浸去白瓤，焙） 薤白十四茎 生姜半两

【用法】 上锉细。以水二大盏，煎取一盏二分，去滓，不拘时候，稍热分为三服。

【主治】 脾胃气虚弱，食即呕吐。

00501 人参饮子

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 人参饮(《嵩崖尊生》卷八)。

【组成】 麦门冬二分 人参（去芦） 当归身各三分 黄耆 白芍药 甘草各一钱 五味子五个

【用法】 上为粗末，都作一服。用水二盏，煎至一盏，去滓，稍热服。

【主治】 ①《兰室秘藏》：脾胃虚弱，气促气弱，精神短少，衄血吐血。②《证因方论集要》：暑月衄血。

【方论选录】《证因方论集要》：《内经》云：必先岁气，无伐天和。故时当暑月则肺金受克，令人乏气之时也，理宜清金益气。清金故用麦冬、五味；益气故用参、耆、甘草；白芍之酸所以收其阴；当归之辛所以养其血；此亦虚火可补之剂也。

00502 人参煮散

【方源】《局方》卷三（续添诸局经验秘方）。

【组成】 人参四两 青皮（去白）十二两 甘草（炙）十两 干姜（炮）六两 三棱（煨，捣碎）十二两 芍药一斤 丁皮六两 茯苓（去皮） 苍术（去皮）各半斤

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜五片，大枣三个，同煎至七分，食前、空心温服。

【主治】 脾胃不和，中脘气滞，心腹胀痛，不思饮食，宿寒留饮，停积不消。或因饮冷过度，内伤脾气，呕吐痰逆，寒热往来，或时汗出。又治肠胃冷湿，泄泻注下，水谷不分，腹中雷鸣，胁肋虚满。并疗伤寒阴盛，四肢逆冷。

【备考】 本方方名，《观聚方要补》引作"人参煮煎"。

00503 人马平安散

【方源】《良朋汇集》卷五。

【异名】 红平安散(《北京市中药成方选集》)。

【组成】 大块朱砂四钱 明雄四钱 麝香四分 硼砂五钱六分 火消二钱四分 大赤金十六张 冰片四分

【用法】 上为细末。男左女右，点大眼角。

【功用】《北京市中药成方选集》：祛暑散寒，辟秽解毒。

【主治】 ①《良朋汇集》：四时感风寒。②《北京市中药成方选集》：中暑中寒，呕吐恶心，霍乱腹痛，暑邪郁闷，四肢厥冷，绞肠痧症。

【宜忌】 孕妇忌服。

【备考】《北京市中药成方选集》本方用法：每服二分，温开水送下，或闻入鼻内少许。

00504 人马平安散

【方源】 徐评《外科正宗》卷十二。

【组成】 西牛黄四分 冰片六分 麝香六分 蟾酥一钱 火消三钱 滑石四钱 石膏二两（煅） 大赤金箔四十张

【用法】 上为极细末，瓷瓶收藏。吹鼻中。

【主治】 夏月受暑，头目昏晕，或不省人事，或患痧腹痛。

00505 人参丁香散

【方源】《妇人良方》卷十二。

【组成】 人参半两　丁香　藿香叶各一分

【用法】 上为散。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妊娠恶阻，胃寒呕逆，翻胃吐食及心腹刺痛。

00506　人参丁香散

【方源】《妇人良方》卷十二。

【组成】 人参　丁香　柿蒂各二两　甘草　良姜各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，热汤点下，不拘时候。

【主治】 妊娠恶阻，胃寒呕逆，翻胃吐食及心腹刺痛。

00507　人参丁香散

【方源】《局方》卷三（续添诸局经验秘方）。

【组成】 白芍药半斤　当归（去芦）　丁香　丁皮　肉桂（去粗皮）　莪茂术　人参各二两　干姜（炮）　茯苓（去皮）　香附（炒）　白术　甘草（炒）　山药各四两

【用法】 上为细末。每服五钱，水一盏，加生姜三片，同煎至七分，空心、食前温服。小儿二岁，可服半钱，水五分盏，加生姜一片，同煎四分以下，温服。

【功用】 和脾胃，进饮食。

【主治】 呕吐之病，皆因三焦不调，脾胃虚弱，冷热失和，邪正相干，清浊不分，阴阳错乱，停痰留饮，不能运化，呕吐不已，粥饮汤药不下；或胸膈痞满，呕逆恶心，腹胁胀痛，短气噎闷，咳呕痰水，噫酸吞酸，不思饮食，渐至羸瘦；及疗女人妊娠阻病，心中烦懊，头目眩重，憎闻食气，呕吐烦闷，颠倒不安，四肢困弱，不自胜持，多卧少起。又治久病羸弱，脾胃虚极，中满呕逆，全不人食。

00508　人参三白汤

【方源】《卫生宝鉴·补遗》。

【异名】 人参三白散（《伤寒广要》卷七引《伤寒蕴要》）。

【组成】 白术　白芍药　白茯苓各一两　人参二两

【用法】 上锉。每服五钱，水二盏，加生姜三片，煎八分，去滓温服。

【主治】 伤寒阴证或汗下后，手足厥冷，身微热，烦躁少气，或见黑斑，脉沉细微弱。①《卫生宝鉴·补遗》：伤寒阴证，手足冷或身微热，脉皆沉细微弱而烦躁者。②《伤寒广要》引《伤寒蕴要》：伤寒发汗后，脉虚人弱者。③《准绳·伤寒》：伤寒阴斑。

【加减】 手足冷或身微热，脉皆沉细微弱而烦躁者，用人参三白汤加竹茹。如病后无他证，独见呃逆者，治用人参三白汤加当归。

【临证举例】 伤寒黑斑　《准绳·伤寒》：曾治一人，伤寒七八日，因服凉药太过，遂变身凉，手足厥冷，通身黑斑，惟心头温暖，乃伏火也。诊其六脉沉细，昏沉不知人事，亦不能语言，状似尸厥，遂用人参三白汤加附子半枚，干姜二钱，水二钟，煎一钟与之服下，待一时许斑色渐红，手足渐暖而苏醒。

【备考】 原书治上证，用本方加竹茹一两。

00509　人参三白汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】 人参　白术　白芍　白茯各一钱半　柴胡三钱　川芎一钱　天麻五分

【用法】 水煎，温服。

【主治】 太阳病误下误汗，表里俱虚，以致郁冒不得汗解者。

00510　人参三白汤

【方源】《医学心悟》卷二。

【组成】 人参二钱　白术　白芍　白茯苓各一钱五分　甘草（炙）五分　附子（炒）一钱　枣二枚

【用法】 水煎服。

【主治】 女劳复。其症头重不举，目中生花，腰背疼痛，小腹里急绞痛。

00511　人参大黄汤

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】 人参　当归　大黄（炒）各一钱　桂心　瞿穗　赤芍　茯苓各一钱　葶苈二分

【主治】 经脉不利化水，身肿胀，皮肉赤纹。

00512　人参门冬汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 人参　麦门冬　小麦　茯苓各一钱　竹茹一团　白芍八分　甘草五分

【用法】 水煎服。

【主治】 虚热烦渴。

00513　人参开胃汤

【方源】《直指》卷六。

【组成】 人参　橘红　丁香　木香　藿香　神曲（炒）　麦芽（炒）　白术　茯苓　缩砂仁　莲子肉　厚朴（制）　半夏曲　甘草（炙）各等分

【用法】 上锉散。每服三钱，加生姜四片，水煎服。

【功用】 助胃进食。

【主治】 脾胃不和，不思饮食。

00514 人参开胃汤

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】 人参五分 白术一钱半（炒） 丁香一钱 藿香二钱 神曲二钱（炒） 麦芽二钱（炒） 茯苓一钱半 陈皮一钱半 甘草五分

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 脾胃虚衰，停食不化，脉细涩滞者。

【方论选录】 脾胃虚衰，寒邪内滞而不能运化，故易于停食焉。人参扶元补胃气，白术燥湿健脾元，丁香温中散滞，藿香开胃辟寒，神曲消食，麦芽化滞，陈皮利气和中，炙草缓中益胃，茯苓渗湿和脾，生姜散寒开胃也。水煎温服，使胃暖寒消，则中气自健，而停食无不化，何脾胃虚衰之足虑哉。此补中消食之剂，为脾胃虚衰停食之专方。

00515 人参木香散

【方源】《医统》卷三十一引《良方》。

【组成】 人参 木香 茯苓 白术 滑石 猪苓 泽泻 甘草 槟榔 琥珀各等分

【用法】 上为末。每服五钱，水一盏半，加生姜三片，煎七分，不拘时服，一日三次。

【主治】 水气肿病。

00516 人参内补散

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】 芍药（炒） 黄芩（炒） 茯苓各一两 粉草（炙） 一两半 桂心 人参各一两 麦门冬 当归（酒浸，炒） 熟地黄（自制） 木香各二两

【用法】 每服五钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 痈疽而气血虚弱者。

00517 人参乌梅汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 人参 莲子（炒） 炙甘草 乌梅 木瓜 山药

【主治】 久痢伤阴，口渴舌干，微热微咳。

【备考】 此方为酸甘化阴法，于救阴之中，仍然兼护脾胃。若液亏甚而土无他病者，则去山药、莲子，加生地、麦冬，又一法也。

00518 人参平补汤

【方源】《直指》卷八。

【异名】 滋肾汤（《回春》卷五）。

【组成】 人参 川芎 当归 熟地黄（洗，晒） 白芍药 白茯苓 菟丝子（酒浸烂，研细） 北五味子 杜仲（去粗皮，锉，姜汁制，炒去丝） 巴戟（酒浸，去心，晒） 橘红 半夏曲各半两 牛膝（酒浸，焙） 白术 补骨脂（炒） 胡芦巴（炒） 益智仁 甘草（炙）各二钱半 石菖蒲一钱半

【用法】 上锉细。每服三钱，加生姜五片，大枣一枚，食前煎吞山药丸十七粒，五更头肾气开，不得咳唾，言语默然，再进上药。

【主治】 肾虚声不出。

00519 人参平肺散

【方源】《医学发明》卷六。

【异名】 人参平肺饮（《正体类要》卷下）、人参平肺汤（《医学六要·治法汇》卷三）。

【组成】 桑白皮一两 知母七钱 炙甘草 地骨皮各半两 五味子三百个 茯苓 青皮 人参各四钱 陈皮半两（去白） 天门冬（去心）四钱

【用法】 上㕮咀。水二盏，煎至一盏，食后去滓温服。

【主治】 ①《医学发明》：心火刑肺，传为肺痿，咳嗽喘呕，痰涎壅盛，胸膈痞满，咽嗌不利。②《准绳·类方》：肺受热而喘。

【加减】 热甚，加黄芩四钱，紫苏叶、半夏（洗）各半两。

00520 人参石脂汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 人参三钱 赤石脂（细末）三钱 炮姜二钱 白粳米（炒）一合

【用法】 水五杯，先煮人参、白米、炮姜令浓，得二杯，后调石脂细末和匀，分二次服。

【主治】 久痢阳明不固。

【备考】 本方为辛甘温合涩法，即桃花汤之变法也。

00521 人参石膏汤

【方源】《宣明论》卷六。

【组成】 人参二钱半 石膏一两 川芎一两 黄芩二钱 茯苓三钱 甘草半两 防风三钱

【用法】 上为细末。每服五钱，水一盏半，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 清头目，定喘嗽。

【主治】 ①《宣明论》：伤寒头痛，心烦闷，风热并汗后余热，自汗多。②《伤寒标本》：咳嗽不已。

00522 人参石膏汤

【方源】《洁古家珍》。

【组成】 人参半两 石膏一两二钱 知母七钱 甘草四钱

【用法】 上为粗末。水煎，食后服。

【主治】 膈消，上焦燥渴，不欲多食。

00523 人参四物汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】 生地黄 当归 川芎 白芍各一钱 知母（酒炒） 麦冬（去心）各八分 甘草五分（炙）

【用法】 生姜、大枣为引，水煎，空心服。

【主治】 形瘦血热经闭。

【备考】 本方名人参四物汤，但方中无人参，疑脱。

00524 人参冬梨方

【方源】《医学从众录》卷二。

【组成】 人参 天冬 麦冬各一钱五分 茯苓五分 杏仁二个（去皮尖） 红枣二个（去核） 莲子六个（去皮心） 入乳三匙 白蜜三匙 大甜梨一个（用铜刀挖去心）

【用法】 将前药制碎，纳梨内，仍以梨盖盖之，用绵纸封固，饭上蒸熟。日间吃其药，临卧吃此梨。

【主治】 痰火骨蒸，吐血不足。

00525 人参生犀散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 人参（切，去芦）三钱 前胡（去芦）七钱 甘草（炙黄）二钱 桔梗 杏仁（去皮尖，略晒干，为末）各五钱

【用法】 将前四味为末，后入杏仁，再粗箩罗过。每服二钱，水一盏，煎至八分，去滓，食后温服。

【功用】 解时气，调胃进食。

【主治】 小儿时气寒壅，咳嗽，痰逆喘满，心忪惊悸，脏腑或秘或泄；及一切风热，服寻常凉药即泻而减食者。

【方论选录】《小儿药证直诀译注》：方用前胡之祛风宣肺，下气祛痰，桔梗宣肺开闭，祛痰排脓，桔梗主升，前胡能降，故两药相配，为一升一降，是宣肺祛痰的主药；杏仁疏肺散寒，降气祛痰以平喘咳；人参、炙草补虚扶正。故本方能治体虚而外感风寒咳嗽有痰之方。

00526 人参白术汤

【方源】《宣明论》卷十。

【异名】 人参白术散（《儒门事亲》卷十三）。

【组成】 人参 白术 当归 芍药 大黄 山栀子 荆芥穗 薄荷 桔梗 知母 泽泻各半两 茯苓（去皮） 连翘 瓜蒌根 干葛各一两 甘草三两 藿香叶 青木香 官桂各一分 石膏四两 寒水石二两 滑石半斤

【用法】 上为细末。每服抄五钱，水一茶盏，入盐消半两，加生姜三片，煎至半盏，绞汁，入蜜少许，温服。渐加至十余钱，得脏腑流利取效。如常服，以意加减，兼服消痞丸散，以散肠胃结滞。

【主治】 胃膈痰热，烦满，饥不欲食；痰成为消中，善食而瘦；燥热郁甚而成消渴，多饮而数小便。兼疗一切阳实阴虚，风热燥郁，头目昏眩，风中偏枯，酒过积毒，一切肠胃燥涩，倦闷壅塞，疮疥痿痹；并伤寒杂病，产后烦渴，气液不得宣通。

【加减】 湿热内甚自利者，去大黄、芒消。

00527 人参白术散

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】 白术一两 人参半两 丁香 甘草（炙）各一分

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 妊娠恶阻，恶闻食臭，但嗜一物，或大吐，时吐清水。

00528 人参白虎汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 人参五分 石膏 知母各一钱半 甘草三分 麦门冬（去心） 白术各七分 栀子 茯苓芍药各一钱 陈皮七分 香薷一钱 扁豆八个

【用法】 上锉。加莲肉十个、乌梅一个，水煎服。

【主治】 夏日中暍。其症身热头痛，洒然毛耸，微寒口开，前板齿燥，舌燥生苔刺，大烦渴。

【加减】 热极，小便遗尿不止，加黄柏（炒）；烦躁，加辰砂末、酸枣仁；若腹痛呕哕，吐泻饱闷，切不可用石膏。

00529 人参宁肺汤

【方源】《奇效良方》卷三十。

【组成】 人参 陈皮各二钱 粟壳 乌梅各一钱半 桑皮 甘草各一钱

【用法】 上作一服。用水二钟，煎至一钟，入蜜一匙，临睡服。

【主治】 日久咳嗽不止。

00530 人参半夏丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】 人参 细辛 陈皮各二两 丁香 半夏 厚朴各四两

【用法】 上为细末，用生姜汁煮面糊为丸，如麻子大。食后服二十丸，生姜汤送下。

【主治】 肺胃受冷，咳嗽气急，胸膈痞满，喉中呀呷，呕逆涎沫，饮食不下。

【备考】 原书卷二十四无陈皮。服法中有三岁儿每服十丸，量儿大小加减。

00531 人参半夏丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】 人参 茯苓（去皮） 南星 薄荷各半两 寒水石 白矾（生） 半夏 姜屑各一两 蛤粉二两 藿香二钱半

【用法】 上为末，水面糊为丸，如梧桐子大。食后每服二十丸，生姜汤送下，一日三次；温水送亦得。

【功用】 化痰坠涎，止咳定喘。

【主治】 风痰、食痰、一切痰逆呕吐，痰厥头痛。或风气偏正头痛，或风壅头目昏，或耳鸣、鼻塞、咽干、胸膈不利。

00532 人参半夏丸

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】 人参 半夏 南星 茯苓 薄荷 明矾 蛤粉 藿香 寒水石

【主治】 妇人肥白，痰闭子宫，月水准信，其腹不痛，不受胎者。

00533 人参半夏汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 人参二钱 半夏三钱 广皮一钱 茯苓二钱 当归二钱 沉香五分 郁金二钱 砂仁一钱 佩兰一钱 苡仁四钱 牛膝二钱 佛手五分 白檀香五分

【主治】 关格。痰气上逆，食入即吐。

00534 人参地黄丸

【方源】《袖珍小儿》卷七。

【组成】 人参（去芦）二钱 熟地黄四钱 鹿茸（酒炙） 山药（去皮） 白茯苓（去皮） 牡丹皮（去心） 山茱萸（去核）各三钱

【用法】 上为极细末，炼白蜜为丸，如芡实大。食远用人参煎汤送下。

【主治】 婴孩、小儿颅囟开解，头缝不合。

00535 人参芎归汤

【方源】《直指》卷十七。

【组成】 当归七钱五分 半夏（制）三分 川芎一两 蓬术 木香 缩砂仁 乌药 甘草（炙）各半两 人参 辣桂 五灵脂各一分

【用法】 上锉散。每服三钱，加生姜五片，大枣二个，紫苏四叶，水煎，食前服。

【主治】 ①《直指》：胀满，血胀。②《丹溪心法》：血胀，烦躁，漱水不咽，迷忘，小便多，大便黑，或虚厥逆，妇人多有此证。

【备考】 方中当归用量原缺，据《准绳·类方》补。《丹溪心法》有白芍，无乌药。

00536 人参芎附汤

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】 人参 川芎 川附

【主治】 虚寒雷头风痛，头面疙瘩，耳闻雷声。

00537 人参再造丸

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 人参二两 麝香五钱 炙黄耆二两 炒于术一两 熟地二两 制首乌二两 炒玄参二两 当归二两 川芎二两 炒赤芍一两 蕲蛇肉四两 全蝎二两五钱 炙虎骨二两 炙僵蚕一两 炙地龙五钱 炙龟版一两 去节麻黄二两 防风二两 炒白芷二两 细辛一两 炒天麻二两 沉香一两 广木香四钱 母丁香一两 制香附一两 豆蔻仁二两 广藿香二两 羌活二两 威灵仙二两五钱 制乳香一两 制没药一两 制川朴五钱 炒青皮一两 天竺黄一两 胆星一两 琥珀二两 血竭八钱 冰片二钱五分 制大黄二两 黄连二两 红花八钱 片姜黄二两 桑寄生二两五钱 茯苓二两 炙甘草二两 草蔻仁二两 制附子一两 肉桂二两 酒炒毛姜一两 炒乌药一两 炙穿山甲二两 川萆薢二两 炒葛根二两五钱 飞朱砂一两 葱制松香五钱（制二次）

【用法】 各取净末和匀，约计净粉八十五两二钱，加白蜜八十五两，炼熟，和温开水三十五两，打和为丸，分作七百粒，蜡壳封固。每日服一丸，分二次化服，酒或开水皆可化服。连续服十天为一疗程。

【功用】 行血祛风，舒筋活络。

【主治】 真中，类中，左瘫右痪，半身不遂，步履艰难，口眼歪斜，舌强语謇，手足麻木，筋骨酸痛。

【宜忌】 孕妇忌服。

00538 人参当归汤

【方源】《千金》卷三。

【异名】 人参当归散（《局方》卷九续添诸局经验秘方）、人参当归饮、人参汤（《产孕集》卷下）。

【组成】 人参 当归 麦门冬 桂心 干地黄各一两 大枣二十个 粳米一升 淡竹叶三升 芍药四两

【用法】 上㕮咀。以水一斗二升，先煮竹叶及米，取八升；去滓纳药，煮取三升，去滓，分三服。若烦闷不安者，当取豉一升，以水二升，煮取一升，尽服之。甚良。

【主治】 ①《千金》：产后烦闷不安。②《局方》（续添诸局经验秘方）：产后去血过多，血虚则阴虚，阴虚生内热，内热曰烦。其证心胸烦满，呼吸短气，头痛闷乱，骨节疼痛，睡时辄甚，与大病后虚烦相类。

【方论选录】《千金方衍义》：此以气血两虚，虚火上炎而烦闷不安，故用人参、大枣以益气，归、芍、地黄以滋血，竹叶、门冬、粳米以除烦，用桂心者，专摄上炎之火也。

【备考】 ①《局方》（续添诸局经验秘方）：地黄宜用生干者，虚甚则用熟者。②本方去竹叶，加生姜，名"当归芍药汤"（见《张氏医通》）。

00539 人参当归汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】 人参 当归 熟地 麦冬 白芍各二钱 五味三分 桂枝一钱

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 产后血虚，心烦短气。

00540 人参竹叶汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】 人参 竹叶 麦冬 甘草 软柴胡 黄芩

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 伤寒过经，烦热不解。

【加减】 舌干口燥，欲饮水者，加石膏、知母；胃弱者，加炒粳米；如口苦不干燥，有津液，若呕者，加半夏；口苦心烦，加黄连；无热不渴，脉沉足冷，加熟附。

00541 人参竹叶汤

【方源】《医略六书》卷二十二。

【组成】 人参一钱半 黄连一钱半 麦冬三钱（去心） 黄芩一钱半 炙草七分 山栀一钱半（炒） 竹叶三钱

【用法】 水煎，去滓热服。

【主治】 上消，热盛脉数者。

【方论选录】 心火刑金，元津暗耗，不能分布上朝，故消渴不止焉。黄连清心火以存阴，黄芩清肺火以生水，麦冬滋热伤之津液，人参补热伤之元气，炙草缓中和胃，竹叶清膈凉心，山栀降火下行，从小便而出。俾热降气布，则肺金清肃，而津液得全，消渴无不止矣。此降火回津之剂，为上消热伤元津之专方。

00542 人参竹茹汤

【方源】《普济方》卷二〇六引《卫生家宝》。

【组成】 人参一两 橘皮一两（去白） 半夏一两（汤洗） 甘草半两（炙） 新竹茹一两（青者）

【用法】 上㕮咀。每服四钱重，水二盏，加生姜十片，煎至七分，去滓，通口服。

【主治】 一切呕逆，及伤寒、中暑等呕吐不止。

00543 人参安肺汤

【方源】《普济方》卷一五七。

【组成】 人参 杏仁 麻黄 枳壳 甘草 乌梅 五味子 桑白皮各等分

【用法】 上为细末。加枣子、生姜同煎，去滓，临卧温服。

【主治】 咳嗽。

00544 人参安胃散

【方源】《东垣试效方》卷四。

【组成】 人参一钱 黄耆二钱 生甘草 炙甘草各五分 白芍药七分 白茯苓四分 陈皮三分 黄连二分

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，食前大温服。

【主治】 脾胃虚热，呕吐泄泻，致成慢惊，及口舌生疮、弄舌者。

①《东垣试效方》：胃中风热。因热药巴豆之过剂损其脾胃，或因暑天伤热乳食损其脾胃而吐泻，口鼻中气热而成慢惊者。②《校注妇人良方》：脾胃虚热，呕吐泄泻，或饮食不人，服峻剂损脾胃，口舌生疮。③《张氏医通》：小儿心脾虚极弄舌。

【方论选录】 ①《东垣试效方》：《内经》云，热淫于内，治以甘寒，以甘泻之，以酸收之。甘草、人参、黄耆之甘温，能补元气，甘能泻火补土；白茯苓甘平，白芍药酸寒，补肺金之不足；陈皮、黄连之苦寒为佐，以退火邪，土金得平，风证无由作矣。②《冯氏锦囊·杂症》：脾胃虚伤，补中益气，或四君子、异功散可也。此独于甘温剂中，加芍药之酸寒，黄连之苦寒，盖因乍虚而内有燥热，故暂用以伐其标也。白术为补胃正药，何不用乎？此名安胃，与补胃不同，胃气纯虚，术为要品，今虽虚而有燥热，则胃不安，未至纯虚也，故不用术耳。以三钱之参、耆，投以二分之炒连，与世之肆用苦寒者不同也。

00545 人参麦冬汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】 人参 麦冬 生地 栝楼根 炙甘草各二钱

【用法】 先取淡竹叶十片，粳米一合，煎汤一盏，去米、叶，加生姜三片，大枣二枚，煎至七分，温服。

【主治】 产后去血甚多，津液内耗，胃气暴虚，顿生内热，口燥咽干而渴。

00546 人参麦冬汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】 人参 枸杞 茯苓 甘草各七钱五分 五味五钱 麦冬五钱

【主治】 消渴及老人、虚弱人大渴。

00547 人参远志丸

【方源】《医统》卷五十引《圣惠》。

【组成】 人参 远志 白茯苓 天门冬 黄耆 酸枣仁 石菖蒲 桔梗各一两 丹砂半两 官桂二钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服二十丸至三十丸，米汤送下。

【主治】 神思不安，健忘惊悸。

00548 人参远志丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】 人参 远志（去心） 黄耆（薄切） 酸枣仁各一两 桂（去粗皮） 桔梗（去芦头，炒） 丹砂（别研）各半两 天门冬（去心，焙） 菖蒲 白茯苓（去黑皮）各一两半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】 思虑过多，心气不安，惊悸恍惚，烦倦，神思不清。

00549 人参豆蔻汤

【方源】《景岳全书》卷五十四引《局方》。

【组成】 人参 白豆蔻各五分 白术 陈皮（去白） 半夏曲各八分 藿香 丁香各三分 厚朴（姜炒） 萝卜子（炒研） 当归各八分 甘草（炙） 石菖蒲各五分

【用法】 水一盏半，加生姜三片，粟米一撮，煎七分服。

【功用】 宽中顺气。

【主治】 膈噎。

00550 人参豆蔻散

【方源】《妇人良方》卷八引石道人方。

【组成】 人参 肉豆蔻 干姜 厚朴 甘草 陈橘皮各一两 川芎 桂心 诃子 北茴香各半两

【用法】 上为细末。每服三钱，水一小盏，加生姜三片，大枣一枚，煎至六分服。

【主治】 久泄不止，服诸药无效。

00551 人参豆蔻散

【方源】《直指》卷十四。

【组成】 木香 厚朴（制） 苍术（米泔浸，晒） 干姜（炮） 肉豆蔻（生）各二两 半夏曲 陈皮 阿胶（炒）各四两 缩砂 甘草（炒）各二两半 罂粟壳（去筋萼，醋淹，炒）四两

【用法】 上锉。每服三钱，加生姜、大枣，水煎，食前服。

【主治】 冷证泻痢。

00552 人参利膈丸

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】 枳壳 厚朴 大黄 人参 甘草 木香 当归 藿香 槟榔 桃仁 火麻仁

【用法】 蜜为丸服。

【主治】 噎膈翻胃，胸痛如刺，便如羊粪。

00553 人参利膈汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 木香 槟榔 人参 当归 藿香 甘草 枳实 厚朴 大黄

【功用】 调气。

【主治】 气呃。劳役过度，怒伤中焦，丹田之气逆而上行，故呃。

00554 人参羌活散

【方源】《局方》卷十。

【异名】 羌活散（《幼幼新书》卷十九引《孔氏家传》）、惺惺散（《普济方》卷四〇三）、人参羌活汤（《婴童百问》卷二）。

【组成】 柴胡（去苗） 独活（去芦） 羌活（去苗）各二两 人参（去芦） 芎藭 枳壳（去瓤，麸炒） 茯苓（去皮） 甘草（炙）各一两 桔梗 前胡 天麻（酒浸，炙） 地骨皮（去土）各半两

【用法】 上为散。每服一钱，水七分盏，入薄荷少许，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 《普济方》：散风邪，除风热。

【主治】 ①《局方》：小儿寒邪温病，时疫疮疹，头痛体痛，壮热多睡，及潮热烦渴，痰实咳嗽。②《普济方》：初作急惊；小儿疹痘，因服热药，多发而不透，身体头面两目皆肿，连日风搐，奋身硬直。

00555 人参羌活散

【方源】《穷乡便方》。

【组成】 人参三分 羌活 猪苓 泽泻 防风各七分 甘草二分 柴胡 枳壳各八分 半夏 木通 赤芍药各一钱

【用法】 加生姜，水煎服。初用芎苏五苓饮，二用人参羌活散。

【主治】 湿温，有头痛潮热，身体沉困，或汗或泄。

00556 人参诃子丸

【方源】《局方》卷四（宝庆新增方）。

【组成】 缩砂仁 诃子（去核） 藿香（去梗） 龙脑 薄荷叶各一两 百药煎 葛粉各八两 甘草五两 乌梅肉三两 人参一两二钱

【用法】 上为末，面糊为丸。每服一二丸，食后、临卧含化咽津。

【主治】 大人、小儿上膈热，或伤风感冷，搏于肺经，语声不出，痰涎不利，咳嗽喘急，日夜不止，咯唾稠粘。

00557 人参补气汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 人参补虚汤（《普济方》卷二二八）。

【组成】 丁香末二分 生甘草梢 炙甘草各三分 生地黄 白芍药各五分 熟地黄二分 人参 防风 羌活 黄柏 知母 当归身 升麻各七分 柴胡一钱 黄耆一钱五分 全蝎一个 五味子二十个

【用法】 上锉如麻豆大，都作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，空心稍热服。

【主治】 四肢懒倦，自汗无力。

00558 人参补气汤

【方源】《医学纲目》卷二十五。

【组成】 黄耆一钱半 人参七分 甘草（炙）三分 生地五分 防风七分 白芍五分 五味二十粒 升麻七分 肉桂二分 熟地六分 生甘草一分 黄柏七分 知母七分

【用法】 上为粗末，作一服。水二盏，煎至一盏，滤去滓，空心热服。

【主治】 四肢懒倦。

00559 人参补气汤

【方源】《普济方》卷一八五。

【组成】 黄耆八分 人参五钱 生甘草根半两 炙甘草二钱 五味子一百四十个 白芍药三钱 升麻二钱 柴胡根二钱

【用法】 上㕮咀，作四服。煎法如常。

【主治】 两手麻木。

【备考】 ①《法律》：诸阳起于指，风已见端，宜亟补其气，以御外人之风，故用此为绸缪计也。②方中黄耆，《奇效良方》用八钱。

00560 人参补肾汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】 人参 甘草（炙） 桂心 橘皮 茯苓各三两 杜仲 白术各四两 生姜五两 羊肾一具（去膏，四破） 猪肾一具（去膏，四破） 薤白（切）一升

【用法】 上切。以水三斗，煮取六升，去滓，分为六服，昼四夜二服。覆头眠。

【主治】 肾劳虚寒，关格塞，腰背强直，饮食减少，气力渐羸。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、生葱、酢物、桃、李、雀肉等。

00561 人参补肺散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 人参 麻黄（去节） 白术 防己 防风各等分 桑白皮倍加

【用法】 上㕮咀。每服半两，以浆水一碗，煎至半碗，去滓温服。

【主治】 咳嗽。

00562 人参启脾丸

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】 人参五钱 白术（土炒）五钱 白茯苓五钱 陈皮四钱 扁豆（炒）五钱 山药（炒）五钱 木香（煨）二钱 谷芽（炒）三钱 神曲（炒）三钱 炙甘草二钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，重一钱。用建莲汤化下。

【主治】 丁奚疳。遍身骨露，其状似丁，肌肉干涩，啼哭不已，手足枯细，面色黧黑，项细腹大，肚脐突出，尻削身软，精神倦怠，骨蒸潮热，燥渴烦急。

【备考】 先用五疳消积丸化其滞，继用人参启脾丸理其脾病，丁奚疳可渐愈矣。

00563 人参枣仁汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 人参一钱半 枣仁三钱 五味一钱半 茯神二钱（去木） 归身三钱 草灰六分 萸肉三钱 乌梅三钱

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 产后汗雨不止，脉虚者。

【方论选录】 产后心肾乏竭，元气疏泄，不能统摄津液而汗雨不收，势甚危急。人参扶元以济心肾之气，枣仁养神以摄心肾之液，萸肉涩精和气，乌梅摄液敛津，伏神入心以安神，归身入冲以养血，草灰和胃燥湿，五味敛液收津以复耗散之气也。水煎温服，俾精血内充，则心肾气密而汗雨自收，何危急之有哉。

00564 人参败毒散

【方源】《局方》卷二。

【异名】 败毒散（《活人书》卷十七）、羌活汤（《圣济总录》卷二十一）、十味汤（《圣济总录》卷

一七四)、人参前胡散(《鸡峰》卷五)。

【组成】 柴胡(去苗) 甘草(炙) 桔梗 人参(去芦) 芎藭 茯苓(去皮) 枳壳(去瓤,麸炒) 前胡(去苗,洗) 羌活(去苗) 独活(去苗)各三十两

【用法】 上为粗末。每服二钱,水一盏,加生姜、薄荷各少许,同煎七分,去滓,不拘时服。寒多则热服,热多则温服。

【功用】 ①《医方集解》:扶正匡邪,疏导经络,表散邪滞。②《中医方剂学讲义》:益气发汗,散风祛湿。

【主治】 外感风寒湿邪,正气不足,憎寒壮热,头痛项强,身体烦疼,无汗,胸膈痞满,鼻塞声重,咳嗽有痰,苔白腻,脉浮软者。也用于疮疡、痢疾等病证初起,见有上述症状者。

①《局方》:伤寒时气,头痛项强,壮热恶寒,身体烦疼。及寒壅咳嗽,鼻塞声重;风痰头痛,呕哕寒热。②《活人书》:伤风、温疫、风温,头目昏眩,四肢痛,憎寒壮热,项强目睛疼。寻常风眩,拘倦。③《幼科证治大全》引《瀹寮》:小儿噤口痢,毒气冲心肺,食即吐逆。④《外科经验方》:痈疽、疔肿、发背、乳痈等证,憎寒壮热,甚至头痛拘急,状似伤寒者。⑤《保婴撮要》:斑疹发热,恶寒咳嗽等症。⑥《准绳·幼科》:小儿风热瘙痒,顽核毒疮。⑦《寿世保元》:肠风下血,色清而鲜,其脉又浮。⑧《痘科类编释意》:痘毒壅遏,出不快,发不透。及腦后痘疔溃成坑,见筋骨者。⑨《医方集解》:时气疫疠,岚瘴鬼疰,或声如蛙鸣,赤眼口疮,湿毒流注,脚肿腿肿,喉痹毒痢。⑩《金鉴》:外感风寒成痢者。⑪《温病条辨》:暑湿风寒杂感,寒热迭作,表证正盛,里证复急,腹不和而滞下者。

【宜忌】《温病条辨》叶霖按:非夹表证不可用。

【方论选录】 ①《寓意草》:伤寒病有宜用人参入药者,其辨不可不明。若元气素虚之人,药虽外行,气从中馁。轻者半出不出,留连为困;重者随元气缩入,发热无休。所以虚弱之体,必用人参三、五、七分,入表药中,少助元气,以为驱邪之主,使邪气得药,一涌而出,全非补养虚弱之意也。②《医方集解》:此足太阳、少阳、手太阴药也。羌活入太阳而理游风,独活入少阴而理伏风,兼能去湿除痛,柴胡散热升清,协川芎和血平肝,以治头痛目昏,前胡、枳壳降气行痰,协桔梗、茯苓以泄肺热而除湿消肿,甘草和里而发表,人参辅正以匡邪,疏导经络,表散邪滞,故曰败毒。③《张氏医通》:问时疫初起,用人参败毒,得毋助邪为虐之患乎,又必何以治非时寒疫,汗后热不止?盖时疫之发,入伤中土,上主百骸,无分经络,毒气流行,随虚辄陷,最难叵测。亟乘邪气未陷时,尽力峻攻,庶克有济。其立方之妙,全在人参一味,力致开合,始则鼓舞羌、独、柴、前,各走其经,而与热毒分解之门;继而调御津精血气,各守其乡,以断邪气复入之路。以非时之邪,混厕经中,屡行疏表不应,邪伏幽隐不出,非藉人参之大力,不能载之外泄也。④《温病条辨》:此证乃内伤水谷之酿湿,外受时令之风湿,中气本自不足之人,又气为湿伤,内外俱急,立方之法,以人参为君,坐镇中州,为督战之帅,以二活、二胡合芎藭,从半表半里之际领邪外出,喻氏所谓逆流挽舟者此也,以枳壳宣中焦之气,茯苓渗中焦之湿,以桔梗开肺与大肠之痹,甘草和合诸药,乃陷者举之之法,不治痢而治致痢之源。痢之初起,憎寒壮热者,非此不可也。⑤《成方便读》:方中必先以人参补正却邪,羌活走表,以散游邪,独活行里,以宣伏邪,柴胡、桔梗散热升清,枳壳、前胡消痰降气,川芎芳香以行血中之气,茯苓淡渗以利气中之湿,甘草协和各药,使之不争,生姜辟秽祛邪,令其无滞。于是各建其长,以收全功,皆赖人参之大力,驾驭其间耳。至于治痢用此者,比喻氏逆流挽舟之法,以邪从表而陷里,仍使里而出表也。

【临证举例】 ①时行瘟病 《寓意草》:嘉靖己未,五六七月间,江南淮北,在处患时行瘟热病,沿门阖境,传染相似,用本方倍人参,去前胡、独活,服者尽效,全无过失。万历戊子己丑年,时疫盛行,凡服本方发表者,无不全活。②痢疾 《医学六要·治法汇》:一人病痢,发寒热,头痛,左脉浮紧,而右脉滑大,乃内伤挟外感也,先用败毒散加姜、葱一服,表证悉退。但中脘作胀闷,后重不已,以平胃散加枳壳、木香、槟榔、山楂,又二服胀闷移于小腹,投木香槟榔丸三钱,下粘硬物而愈。《江苏中医》(1962;8:24):王某,男,患痢疾,前医用白头翁、芩、连等药证情趋重,病延一周,里急后重,肛门下脱,畏风憎寒,脉弦紧,苔白厚腻,经用人参败毒散原方,每用四钱,研末煎服,一剂而汗出畅适,痢下减轻,三服即痢止痛除,其病如失。后以香砂六君法调治而愈。③小儿斑疹 《云南中医杂志》(1981;6:20):王某,男,一岁,患儿发热三天,全身出现猩红热样皮疹,颌下、颈部及腹股沟淋巴结肿大,肝肋下二指,血常规:白血球26000/立方毫米,分类淋巴51%,有

异常淋巴细胞，诊为：传染性单核细胞增多症。面色萎黄，六脉细浮数，舌尖红，苔薄津少。用人参败毒散（人参改党参）加丹皮、紫草、赤芍、板兰根，连服三剂，病情较减，后隔日一剂，加减服药二旬而愈。

00565　人参败毒散

【方源】《白喉全生集》。

【组成】 洋参（或用条参） 防风（去芦） 白芷 浙贝（去心）各二钱 桔梗 银花 僵蚕（姜汁炒） 鼠粘各三钱 荆芥 人中黄各一钱 蝉蜕七只（去头翅足） 皂角刺三针（煨）

【用法】 水煎服。

【主治】 白喉热证尚轻，热邪尚在表，白见于外关，或薄或小，淡红微肿略痛，声音响亮，牙关饮食稍碍，口干，头闷目胀，舌苔与小便微黄。

00566　人参固本丸

【方源】《简易方》引《叶氏录验方》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【异名】 二黄丸（原书同卷）、地黄丸（《普济方》卷二二六引《如宜方》）、固本丸（《医方类聚》卷七十引《简奇方》）、生料固本丸（《医略六书》卷二十二）。

【组成】 生地黄（洗） 熟地黄（洗，再蒸）天门冬（去皮） 麦门冬（去心）各一两 人参半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒、盐汤送下。

【功用】 ①《医略六书》：扶元润燥。②《饲鹤亭集方》：滋阴养血，清金降火，补精益肾。

【主治】 虚劳肺肾阴虚，咳嗽痰血，盗汗自汗，虚热燥渴，小便短赤；反胃，津枯胃燥者。

①《外科发挥》：肺气燥热作渴，或小便短少赤色，及肺气虚热，小便涩滞如淋。②《医略六书》：反胃，津枯便燥脉涩者。③《饲鹤亭集方》：肺劳虚热，真阴亏损，咳嗽失血，自汗盗汗，水泛为痰。

【宜忌】《外科发挥》：中寒人不可服。

【方论选录】 ①《医方类聚》引《叶氏录验方》：夫人心生血，血生气，气生精，精盛则须发不白，颜貌不衰，延年益寿；其夭阏者，多由服性热之药，不能滋生精血也。而药之滋补者，无出生熟二地黄，天麦二门冬，人徒知服二地黄，而不知以二门冬为引也。盖生地黄能生精血，用天门冬引入所生之地，熟地黄能补精血，用麦门冬引入所补之地，四味互相该载；本章又以人参为通心气之主使，五味并归于心。而药之滋补，诚无过此。②《医方集解》：此手太阴、足少阴药也。肺主气，而气根于丹田，故肺肾为子母之脏，必水能制火，而火不刑金也，二冬清肺；二地益肾水，人参大补元气，气者水之母也，且人参之用，无所不宜，以气药引之则补阳，以血药引之亦补阴也。③《成方便读》：夫虚劳一证，有阴虚阳虚之分，其由于阴虚者，皆始于肾，而终于肺。以肾水不足，则虚火凌逼肺金，金受火刑，不能生水。于是肾愈虚，金愈燥，煎熬焚灼，不至同归于尽不止也。故以二地滋肾水，二冬保肺金，然二地二冬，皆重浊滋腻，有质而无气。虽有补肾保肺之能，而不能使金水相生，循环上下，不得不赖人参之气厚力足者，从中而赞助之。且脾胃者中流砥柱，肺肾阴虚之盛者，总宜以甘药补中，使上下受荫耳。

00567　人参固本酒

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】 人参二两 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 怀生地 怀熟地 枸杞子各四两 虎胫骨二两（酥炙黄脆） 龟版二两（酥炙黄脆） 何首乌四两（大者佳，竹刀去皮，切片，米泔水浸一宿，用黑豆三升浸软，一层豆，一层药，密盖蒸熟，九蒸九晒） 当归一两

【用法】 用好酒三十斤，盛入二罐内，将药分一半，用好绢小袋盛药，吊入罐内，将面封固，桑柴文武火煮二炷香为度，埋土内。一七后，空心任服。

【功用】 固精健骨，补精髓。

00568　人参定喘汤

【方源】《局方》卷四（续添诸局经验秘方）。

【组成】 人参（切片） 麻黄（去节） 甘草（炙） 阿胶（炒） 半夏曲各一两 桑白皮 五味子各一两半 罂粟壳（蜜刷，炙）二两

【用法】 上为粗末，入人参片拌匀。每服三大钱，水一盏半，加生姜三片，同煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】 丈夫、妇人远年近日肺气咳嗽，上喘气急，喉中涎声，胸满气逆，坐卧不安，饮食不下；肺感寒邪，咳嗽声重，语音不出，鼻塞头昏；小儿久病，肺气喘急，喉中涎声，胸膈不利，呕吐痰涕。

00569　人参建中汤

【方源】《景岳全书》卷五十三。

【组成】 即《金匮》小建中汤加人参二两

【用法】 同小建中汤。

【主治】 虚劳自汗。

00570 人参荆芥散

【方源】《局方》卷九。

【组成】荆芥穗 羚羊角（镑） 酸枣仁（微炒） 生干地黄 枳壳（麸炒，去瓤称） 人参 鳖甲（醋浸，去裙，炙黄） 肉桂（去粗皮） 白术 柴胡各七两半 甘草（锉，煨） 芎 赤芍药 牡丹皮 当归 防风（去苗叉）各五两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，煎至八分，去滓热服，不拘时候，一日二次。

【主治】妇人血风劳气，身体疼痛，头昏目涩，心怔烦倦，寒热盗汗，颊赤口干，痰嗽胸满，精神不爽；或月水不调，脐腹疞痛，痃癖块硬，疼痛发歇；或时呕逆，饮食不进；或因产将理失节，淹延瘦瘁，乍起乍卧，甚即着床。

【宜忌】有孕不宜服。

【方论选录】《医方集解》：此足太阴、厥阴、手少阴药也。陈来章曰：血中之风，荆芥、防风散之；木盛生风，羚角、柴胡平之；阴虚发热，地黄、鳖甲滋之；血气痛滞，月水不调，芎劳、当归、桂心、枳壳调之；烦怠食少，盗汗心忡，人参、白术、炙草、枣仁补而收之。

00571 人参荆芥散

【方源】《济生》卷二。

【异名】人参荆芥汤（《法律》卷五）。

【组成】荆芥穗 麻黄（去根节） 细辛（去土，洗） 桔梗（去芦，锉，炒） 陈皮（去白） 半夏（汤泡七次） 杏仁（去皮尖） 人参 通草 甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】肺感寒邪，或感风热，痰多咳嗽，头目不清，言语不出，咽干痰实，或项背强硬，皮肤不仁。

00572 人参南星丸

【方源】《宋氏集验方》卷一。

【组成】天南星（生） 白附子（生） 白茯苓 天麻 人参 远志肉 酸枣仁（炒熟）各等分

【用法】上为细末，薄荷水糊为丸，如梧桐子大，用生朱砂为衣。每服三五十丸，食后或卧时用姜汤吞下。

【主治】心虚，因为惊气所触，风邪乘虚而入，或因气触，或因惊触，或因微热流人心经，则神志昏乱，涎潮，手足搐搦，如风之状。

00573 人参厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】人参 厚朴（去粗皮，涂生姜汁，炙透熟） 桂（去粗皮） 半夏（汤洗去滑，姜汁制，炒干）各二两 陈橘皮（去白，炒） 甘草（炙，锉） 白术各一两

【用法】上为粗末，分作十帖。每帖以水二盏，加生姜半分（拍破），同煎取一盏，去滓，空心顿服。

【主治】胃反，胃气虚弱，停饮相击，发为痞胀，其气逆上，食已反出。

00574 人参轻骨散

【方源】《局方》卷二（吴直阁增诸家名方）。

【组成】贝母（去心） 白茯苓（焙） 半夏（煮）各一两 枳壳（去瓤，炒）二两半 苍术（浸一宿）六两 人参 白术（焙） 白芷（不见火） 陈皮（去白） 秦艽 赤芍药各二两 川芎 当归（去芦，焙） 肉桂（去粗皮） 干姜（炮）各一两半 柴胡（去芦） 麻黄（去根节）各三两 桔梗（去芦） 甘草（炙） 厚朴各四两（姜汁浸）

【用法】上件为细末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，同煎至七分，通口稍热服，不拘时候。

【主治】四时伤寒，头痛壮热，项背拘急，骨节烦疼，憎寒恶风，肢体困倦，大便不调，小便赤涩，呕逆烦渴；或伤风感寒，头痛体热，鼻塞声重，咳嗽痰涎；或山岚瘴气，时行疫疠，潮热往来；或疗五劳七伤，中脘气滞，心腹痞闷，停痰呕逆，冷气奔冲，攻注刺痛；妇人血气撮痛，经候不调。

【加减】身体倦怠，加乌梅一个；咳嗽，加大枣二枚。

00575 人参复脉散

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】人参二钱 白术一钱半（去芦） 麦门冬（去心）二钱 白茯苓（去皮）三钱 五味子四分 陈皮二钱 半夏（姜炒）二钱 竹茹四钱 甘草八分

【用法】上锉。加生姜五片，水煎服。

【主治】咳逆而无脉者。

00576 人参保肺汤

【方源】《宣明论》卷九。

【异名】人参补肺散（《御药院方》卷五）。

【组成】人参 柴胡 当归 芍药 桑白皮 知母 白术 川芎 黄耆 紫菀 荆芥 地骨皮各一分 茯苓（去皮） 黄芩 连翘 大黄 薄荷 山栀子仁各半两 甘草 桔梗各一钱 石膏 滑石

寒水石半两

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓温服。

【主治】 ①《宣明论》：五劳七伤，喘气不接，涎痰稠粘，骨蒸潮热。②《御药院方》：一切风痰热证。

【加减】 泄者，去大黄，同人参半夏丸服。

00577 人参顺气散

【方源】《活人书》卷十七。

【组成】 麻黄（去节称）一两半 干葛一两 白术一两 甘草一两（炙） 桔梗（去芦）一两 人参一两 干姜半两（炮） 香白芷一两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一大盏，加生姜三片，葱白二寸，煎至八分，通口服。如要出汗，连进二服。

【主治】 ①《活人书》：伤寒头痛，憎寒壮热，四肢疼痛。②《普济方》引《如宜方》：风邪上攻，头目昏痛，耳鸣目眩，鼻塞，肉瞤拘急。

00578 人参顺气散

【方源】《局方》卷二（宝庆新增方）。

【异名】 通气祛风汤（《准绳·类方》卷八）、人参通气散（《证治宝鉴》卷十）。

【组成】 干姜 人参各一两 川芎 甘草（炙） 苦梗（去芦） 厚朴（去粗皮，姜汁制） 白术 陈皮（洗，去白） 白芷 麻黄（去节）各四两 干葛（去粗皮）三两半

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一枚，薄荷五七叶，同煎八分，不拘时候。

【功用】 ①《普济方》：疏风顺气。②《准绳·类方》：疏通气道。

【主治】 ①《局方》（宝庆新增方）：风虚气弱，荣卫不和，肢节疼痛，身体沉重，头目眩晕，肩背拘急，手足冷麻，半身不遂，口眼㖞斜，痰涎不利，言语謇涩；或脾胃不和，心腹刺痛，胸膈痞满，倦怠少力，霍乱转筋，吐泻不止，胎前产后。②《证治宝鉴》：一切上焦风热。

【加减】 如伤风感冷，头疼腰重，咳嗽鼻塞，加葱白煎。

00579 人参养卫汤

【方源】《证治汇补》卷二。

【组成】 人参 白术（炒） 麦门冬（去心）各二钱 黄芪（蜜炒） 陈皮各一钱半 五味子十粒（研） 炙甘草七分

【用法】 加生姜、大枣，水煎，食前服。

【功用】《医略六书》：补气生津。

【主治】 ①《证治汇补》：劳役辛苦，用力过多，以致内伤发热。②《医略六书》：劳倦伤气，发热口渴，脉软数者。

【加减】 如劳倦甚者，加熟附子五分。

【方论选录】《医略六书》：劳伤元气，倦怠乏力，不能摄火而津液暗耗，故发热口渴，不喜冷饮焉。人参扶元补气，黄芪实卫补中，炙草缓中益胃，麦冬润燥生津，五味收耗散之气，陈皮理香、草之滞，使滞化气行，则脾胃内强而精微四达，营卫调和，其发热口渴，无不自除，何倦怠乏力之有？此补气生津之剂，为劳倦发热口渴之专方。恶寒加熟附子，乃补火扶阳，以助参芪养卫之力欤。

【备考】《医略六书》无白术。

00580 人参养血丸

【方源】《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。

【组成】 乌梅肉三两 熟干地黄五两 当归（去苗）二两 人参 川芎 赤芍药 菖蒲（微炒）各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸至百丸，食前用温酒或米汤送下。

【功用】 ①《局方》（续添诸局经验秘方）：补冲任，调血脉。②《永类钤方》：补冲任，调经候，暖下元，生血气。

【主治】 女人禀受怯弱，血气虚损；或妇人怀身，腹中绞痛，口干不食，崩伤眩晕；及产出月，羸瘦不复常者。

【方论选录】《济阴纲目》汪淇注：禀弱者，先天之气弱也。血生于气，气生于下，故用熟地为君，人参佐之，以生下焦之气，使阴气旺而生血也；臣以乌梅，以生液而敛血入肝。夫既生矣，敛矣，而不为流行之，则血凝而不通，故以归、芎为使；其或瘀也，以赤芍破之；其或溃也，以炒蒲黄涩之，庶乎生而不壅，止而不塞，降中有升，温之不热。

00581 人参养肺丸

【方源】《局方》卷四（宝庆新增方）。

【组成】 黄芪（去芦，蜜涂炙） 人参各一两八钱 白茯苓（去皮） 瓜蒌根各六两 杏仁（去皮尖，麸炒）二两四钱 皂角子（炒）三百个 半夏（洗，为末，姜汁作曲）四两（炒）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后细嚼，用紫苏汤送下；如喘急，用桑白皮汤送下。

【主治】 肺胃俱伤，气奔于上，客热熏肺，咳嗽

气急，胸中烦悸，涕唾稠粘，或有鲜血，上气喘急，不得安卧，肢体倦痛，咽干口燥，饮食减少，渐至瘦弱喘乏；或坠堕恐惧，渡水跌仆；或因叫怒，醉饱房劳，致伤肺胃，吐血呕血。

00582 人参养肺汤

【方源】《袖珍》卷一。

【组成】人参（去芦） 甘草 阿胶珠各一钱 茯苓一钱半 柴胡四钱 五味子 贝母 杏仁（炒） 桔梗（炒）各一钱半 桑白皮二钱 枳实一钱半

【用法】上㕮咀。每服八钱，加生姜三片，枣子一枚，水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】肺痿证。咳嗽有痰，午后热，并声嘶者。

00583 人参养荣汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】人参八分 麦门冬七分 辽五味一钱 地黄五分 当归身八分 白芍药一钱五分 知母七分 陈皮六分 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】瘟疫邪实正虚，纯用承气，下证稍减，神思稍苏，续得肢体振战，怔忡惊悸，如人将捕之状，四肢反厥，眩晕郁冒，项背强直，循衣摸床，撮空，此皆大虚之候也。

00584 人参养胃汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】人参一钱半 白术二钱（生） 草果一钱（炒） 条芩一钱半 炙草五分 茯苓三钱 陈皮一钱半 茵陈三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】妊娠黄肿，脉细数者。

【方论选录】妊娠胃虚，湿热壅塞于中，不能纳化饮食，故湿热郁蒸于内，而浮肿面黄子外焉。人参扶元补胃虚，白术壮胃健脾气，条芩清热安胎，草果消滞进食，陈皮理气和中，炙草缓中益胃，茯苓渗湿气以退肿，茵陈泻湿热以除黄也。水煎温服，使湿热化而胃气充，则脾气健而运化如常，何致饮食不进，面黄浮肿不退乎？

00585 人参桔梗散

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】人参一两 桔梗（炒）四两 甘草（炙，锉）一两半 白茯苓（去黑皮） 恶实（慢火炒）各二两

【用法】上为细散。每服一钱匕，不拘时候，沸汤点服。

【主治】心咳，咽喉肿痛。

00586 人参柴胡散

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】人参 白术 白茯苓 柴胡 甘草（炙） 半夏曲 当归 干葛 赤芍药各等分

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，加生姜四片，大枣二个，煎至八分，带热服，不拘时候。但是有劳热证皆可服，病退即止。

【功用】补和真气，透肌解热。

【主治】邪热客于经络，肌热痰嗽，五心烦躁，头目昏痛，夜有盗汗，劳倦；及妇人血热，虚劳骨蒸。

00587 人参健脾丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】党参 冬术 神曲 麦芽各四两 枳实六两 陈皮二两 山楂三两

【用法】上为末。水法丸服。

【功用】健补脾胃。

【主治】脾胃虚弱，食不消化，胸膈饱闷，便溏泄泻，内热体倦，伤酒吞酸，反胃呕吐。

00588 人参润肺丸

【方源】《局方》卷四（续添诸局经验秘方）。

【组成】人参 款冬花（去梗） 细辛（去叶，洗） 杏仁（去皮尖，麸炒） 甘草（炙）各四两 知母六两 肉桂（去粗皮） 桔梗各五两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，食后细嚼，淡姜汤送下；含化亦得。

【主治】肺气不足，咳嗽喘急，痰涎不利，胸膈烦闷，涕唾稠粘，唇干口燥；及风壅痰实，头目昏眩，精神不爽；或肺胃俱虚，久嗽不已，渐成虚劳，肢体羸瘦，胸腹短气，行动喘乏，饮食减少；或远年日近诸般咳嗽。

00589 人参益气汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄耆八钱 生甘草 人参各五钱 白芍药三钱 柴胡二钱五分 炙甘草 升麻各二钱 五味子一百四十个

【用法】上㕮咀，分作四服。每服水二盏，煎至一盏，去滓，稍热食远服。

【主治】热伤元气，两手指麻木，四肢困倦，怠惰嗜卧。

00590 人参益气汤

【方源】《卫生宝鉴》卷二十四。

【组成】黄耆五分 人参 黄柏（去皮） 升麻 柴胡 白芍药各三分 当归 白术 炙甘草各二分

陈皮三分　生甘草二分

【用法】 上㕮咀，都为一服。水二盏半，先浸两时辰，煎至一盏，去滓热服，早食后、午饭前各一服。

【功用】 补气，益水，清热。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：过汗亡阳变证。②《医统》：虚而瘛搐。

【方论选录】《内经》曰：热淫所胜，治以甘寒，以酸收之。人参、黄耆之甘温，补其不足之气而缓其急搐，故以为君；肾恶燥，急食辛以润之，生甘草甘微寒，黄柏苦辛寒以救肾水而生津液，故以为臣；当归辛温和血脉，橘皮苦辛，白术苦甘，炙甘草甘温，益脾胃，进饮食；肺欲收，急食酸以收之，白芍药之酸微寒，以收耗散之气而补肺金，故以为佐；升麻、柴胡苦平，上升生发不足之气，故以为使，乃从阴引阳之谓也。

【临证举例】 伤湿过汗　中山王知府次子醉里，因戏水，衣服尽湿，其母责之。至晚，觉精神昏懒，怠惰嗜卧。次日，病头痛身热，腿脚沉重。一女医用和解散发之，闭户塞牖，覆以重衾。以致苦热不胜禁，遂发狂言，欲去其衾。明日，寻衣撮空，又以承气汤下之，下后语言渐不出，四肢不能收持，有时项强，手足瘛疭，搐急而挛，目左视而白睛多，口唇肌肉蠕动，饮食减少，形体羸瘦。命予治之。具说前由。予详之，盖伤湿而失于过汗也。今盛暑之时，大发其汗，汗多则亡阳，百脉行涩，故三焦之气，不能上荣心肺，心火旺而肺气焦。夺汗无血，今发汗过多，气血俱衰，筋无所养，其病为痉。脾热则肌肉蠕动。气欲竭，热留于脾，故四肢不用。此伤湿过汗而成坏证明矣。当治时之热，益水之原救其逆，补上升生发之气。以人参益气汤治之，投之三日后，语声渐出，少能行步，四肢柔和，食饮渐进，至秋而愈。

00591　人参益肺散

【方源】《医学发明》卷五。

【异名】 升麻柴胡汤（《济阳纲目》卷七十八）。

【组成】 柴胡　升麻　黄耆各一钱　羌活　防风　人参　甘草　陈皮各五分　藁本三分　青皮　黄芩　白豆蔻仁各二分

【用法】 上㕮咀，都作一服。水二盏，煎至一盏，食后去滓温服。

【功用】 泻风热。

【主治】 风热乘肺，肺气郁甚，肩背痛，汗出，小便数而欠者。

【宜忌】 如面色白，脱色气短者，不可服。

00592　人参理中汤

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】 人参　干姜　甘草（炙）各三两　茯苓四两　橘皮四两　桂心三两　黄耆二两

【用法】 上切。以水九升，煮取三升，去滓，分三次温服。

【主治】 霍乱洞泄不止，脐上筑筑，肾气虚。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、生葱、酢物。

00593　人参黄耆汤

【方源】《校注妇人良方》卷十三。

【组成】 人参　黄耆（炒）　当归　白术（炒）　白芍药（炒）　艾叶各一钱　阿胶（炒）二钱

【用法】 上作一剂。水煎服。

【主治】 小产气虚，血下不止。

00594　人参黄耆散

【方源】《局方》卷五。

【组成】 天门冬（去心）三十两　半夏（汤洗七次，姜汁制）　知母　桑白皮（锉，炒）　赤芍药　黄耆　紫菀　甘草（炙）各十五两　白茯苓（去皮）　柴胡（去苗）　秦艽（去土）　生干地黄　地骨皮各二十两　人参　桔梗各十两　鳖甲（去裙，醋炙）一两

【用法】 上为粗末。每服二大钱，以水一盏，煎至七分，食后去滓温服。

【主治】 虚劳客热，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心烦热，口燥咽干，颊赤心忪，日晚潮热，夜有盗汗，胸胁不利，减食多渴，咳唾稠粘，时有脓血。

【备考】 方中生干地黄，《医方类聚》引作生熟地黄。

00595　人参黄耆散

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】 黄耆二两　紫菀　款冬花　知母　芍药　人参　阿胶各一两　食茱萸　桂各半两　糯米半升　伏龙肝一鸡子大　鳖甲一个

【用法】 上为细末。水一盏，煎三钱，食后、临卧热服。

【主治】 劳嗽，呕咯血出。

【加减】 盗汗，加竹叶三片；咽痛，加干姜皂大；困乏，加葱二寸，生姜七片，大枣二个；嗽甚，加杏仁七个；惊悸，加茯神半钱；烦渴，加乌梅二个（捶碎）；气逆，加橘皮二钱；头目痛，加生甘草二寸；咯血，加红花少许。

00596　人参黄耆散

【方源】《冯氏锦囊》卷十六。

【组成】 川归身　茯苓各一钱　芍药（炒）　真

地骨皮 白术八分川芎 人参各八分 车前子五分 黄耆一钱 炙甘草五分 熟地一钱五分 鹿角胶（如气虚者入五茶匙）

【用法】 水一钟，加大枣二枚，水煎服。

【主治】 久患白带，瘦弱无力，腰腹腿痛，饮食无味，面黄浮肿，小水淋沥，气虚血少。

00597 人参鹿角膏

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】 人参四两 鹿角胶四两

【用法】 人参咀片，入铜锅，或砂锅亦可，用水八碗，约熬二碗，去滓，又熬一碗取起，又将鹿角胶入京酒三杯熬化，同人参膏和匀，以瓷瓶贮之，入好白蜜四两，铜锅隔水煮，候膏滴水成珠为度。每早淡酒调数匙，就以食压之。

【功用】 种子。

00598 人参鹿茸丸

【方源】《普济方》卷二十六。

【组成】 人参 柏子仁 赤石脂 川续断 鹿茸 大当归 白茯苓 酸枣仁 代赭 萆薢 干莲肉 山药 天麻仁 桑寄生

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三四十丸，以莲肉（去皮心）煎汤，早、晚送服。

【主治】 劳心过度，心肾不足，小便频数，津液随下，虚损食少，身体羸瘦。

00599 人参鹿茸丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】 人参 鹿茸（酥炙） 熟地 当归 枸杞 枣仁（炒） 茯神 附子 牛膝 远志（姜汁浸，炒） 山药 沉香 苁蓉（酒浸）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐汤送下。

【功用】 补心肾，益气血。

【主治】 诸虚百损，五劳七伤。

00600 人参鹿茸丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 人参（去芦）二两五钱 鹿茸（去毛）二两 当归四两 杜仲（炒）四两 补骨脂（盐水炒）四两 巴戟天（炙）四两 菟丝子四两 牛膝四两 茯苓四两 黄耆四两 五味子（炙）四两 冬虫草一两 桂元肉四两 香附（醋炙）四两 黄柏四两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，重三钱，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下；黄酒亦可。

【功用】 滋肾益气，补血生精。

【主治】 精神衰弱，目暗耳鸣，遗精盗汗，腰腿酸软。

【宜忌】 忌食生冷。

00601 人参清肺汤

【方源】《局方》卷四（续添诸局经验秘方）。

【异名】 人参清肺饮（《医学入门》卷八）、人参清肺散（《便览》卷二）。

【组成】 地骨皮 人参（去芦） 阿胶（蛤炒） 杏仁（去皮尖，麸炒） 桑白皮（去粗皮） 知母 乌梅（去核） 甘草（炙） 罂粟壳（去盖，蜜炙） 各等分

【用法】 上为粗散。每服三钱，水一盏半，加乌梅、枣子各一个，同煎至一盏，滤去滓，食后、临卧温服。两滓留并煎作一服。

【主治】 肺胃虚寒，咳嗽喘急，胸膈噎闷，腹胁胀满，迫塞短气，喜欲饮冷，咽嚏隐痛；及疗肺痿劳嗽，唾血腥臭，干呕烦热，声音不出，肌肉消瘦，倦怠减食。

【备考】《得效》有桔梗。主治中肺胃虚寒，《便览》作“肺胃虚热”。

00602 人参清肺散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 人参（去芦头） 甘草（生） 山栀子 盆消各一两 薄荷叶 黄芩（净） 川大黄（生） 各一两半 连翘三两 黄连五钱（去须） 白附子七钱（去皮）

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 脾肺不利，风热攻冲，咽喉肿痛，咽物妨闷。

00603 人参清肺散

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】 人参一钱半 陈皮一钱半 半夏一钱 桔梗一钱 麦门冬半钱 五味子十个 茯苓一钱 甘草半钱 桑白皮一钱 知母一钱 地骨皮一钱 枳壳一钱 贝母一钱半 杏仁一钱 款冬花七分 黄连一钱

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 痰嗽咽干，声不出。

00604 人参琥珀丸

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】 人参（去芦） 琥珀（另研） 茯神（去木） 白茯苓（去皮） 石菖蒲（节密小者） 远志 各半两（酒浸半日，去心） 乳香（另研） 酸枣仁（温酒浸半日，去壳，纸上炒令香熟） 朱砂（另

研，水飞）各二钱半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后温酒送下，一日二次；如不能饮，大枣汤送下。可常服。

【主治】 癫、痫、狂、惊悸失眠，恍惚不宁。①《准绳·类方》：癫病。②《景岳全书》：癫痫。③《医灯续焰》：失神狂乱，哀乐无由，惊悸不时，夜不能寐，一切恍惚不宁。

00605 人参款花膏

【方源】《局方》卷四（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 款冬花（去梗） 人参（去芦） 五味子（去梗，炒） 紫菀（去芦，洗） 桑白皮（去赤皮）各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，食后细嚼，淡姜汤送下；或每一大丸分作四小丸，含化亦得。

【主治】 肺胃虚寒，久嗽不已，咽膈满闷，咳嗽痰涎，呕逆恶心，腹胁胀满，腰背倦痛；或虚劳冷嗽，及远年日近一切嗽病。

【备考】 本方方名，据剂型当作“人参款花丸”。

00606 人参葶苈丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】 人参一两（去芦） 苦葶苈四两（炒）

【用法】 上为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前煎桑白皮汤送下。

【主治】 一切水肿，及喘满不可当者。

00607 人参紫金丹

【方源】《金鉴》卷八十八。

【组成】 人参三钱 丁香一两 五加皮二两 甘草八钱 茯苓二钱 当归（酒洗）一两 血竭一两 骨碎补一两 五味子一两 没药（去油）二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。每服三钱，早、晚淡黄酒化服；童便化服亦可。

【功用】 提补元气，健壮脾胃，止渴生津，增长精神，和通筋血。

【主治】 跌仆闪撞而气虚者。

【备考】 原书谓：肉破出血者，当先用马勃粉止血，次用榆树皮炙熨法，内服本方。

00608 人参蛤蚧丸

【方源】《医级》卷九。

【组成】 人参一两 胡桃（取紫衣者） 补骨脂 菟丝子 芡实各二两 龙骨 牡蛎 益智仁 川椒各一两 首乌 黄肉 山药各三两 鹿鞭一条（横切） 雀脑五十个（煮） 蛤蚧一对

【用法】 将蛤蚧刷去浮鳞，除头、足，浸一日，洗净，炙用。先将胡桃、雀脑捣，再入余药末，溶鹿胶为丸。每服三四钱，白汤送下。

【主治】 妇人气血不足，胞宫虚冷，精滑不能受孕；并男子衰滑易遗。

00609 人参蛤蚧散

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】 蛤蚧一对（蜜炙） 人参（去芦头） 百部 款冬花（去梗） 贝母（去心） 紫菀茸各半两 阿胶（蛤粉炒） 柴胡（去苗） 肉桂（去粗皮） 黄耆（蜜炙） 甘草（炙） 鳖甲（醋炙） 杏仁（汤浸，去皮尖） 半夏（生姜汁制）各一分

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，煎至一盏，温服，不拘时候。

【主治】 虚劳咳嗽咯血，潮热盗汗，不思饮食。

【宜忌】 肉桂虽去风寒，有热人不宜服，则当改用细辛。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“蛤蚧散”。

00610 人参温脾散

【方源】《永乐大典》卷九八一引《方便集》。

【组成】 人参 白茯苓 白术（炮） 肉豆蔻（面裹煨） 木香 黄耆（锉） 白附子 藿香 陈皮（汤浸，去白，焙干） 白附子 藿香 陈皮（汤浸，去白，焙干） 白僵蚕（直者佳） 防风 羌活 冬瓜子仁（微炒，取仁） 山药 芎藭各半两 北南星半两（每个破作四分，同醋涂黄土煮，内一点黄豆大白为度，洗去泥用） 甘草一钱（炙微赤）

【用法】 上为细末。三岁儿每用一钱，水一盏，加生姜三片，淮枣一个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 温调脾胃。

【主治】 小儿慢脾风，脾虚胃冷，作吐泻。

00611 人参酸枣汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 人参 枣仁（炒，研） 山栀（熬黑） 生地黄 麦门冬（去心） 当归各等分 甘草（炙）减半

【用法】 水煎，温服。

【主治】 小儿心肺虚热，烦躁不宁。

00612 人参薯蓣丸

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】 生地黄 人参 防风 薯蓣 五味子 茯苓各一两 麦门冬二两半 贝母 远志各半两 熟地黄 百部 柏子仁 丹参 杜仲 茯神 黄耆各三分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大，或梧桐子大。每服十丸，食后熟水送下。

【功用】 聪明耳目，保定骨髓，开心强记，去惊怖，除邪热。

【主治】 虚劳，肾脏虚弱，客风流入四肢，四肢烦满沉重，腰背拘急，不能俯仰，体热身重，毒风上攻，心胸闷满，攻注颈项，志意不乐，肌肤消瘦，嗜卧无力，喜怒好忘，若服暖药，又加转甚者。

00613 人参藿香汤

【方源】《局方》卷四（续添诸局经验秘方）。

【组成】 藿香（去梗） 人参（切片）各六两半夏（汤洗七次，姜汁制）二两半

【用法】 上为粗末，入人参令匀。每服三钱，水一盏半，加生姜十片，煎至一盏，去滓，通口服。

【功用】 温脾胃，化痰饮，消宿冷，止吐呕。

【主治】 脾胃气弱，呕吐哕逆，饮食不下，手足逆冷，涎痰稠粘。又治似喘不喘，欲呕不呕，彻心愦愦，闷乱不安，或瘴疟诸疾，水浆粥药入口便吐，及久病翻胃。

【宜忌】 孕妇忌服。

00614 人参鳖甲丸

【方源】《局方》卷九（淳祐新添方）。

【组成】 杏仁（汤浸，去皮尖，炒） 人参 当归（洗，焙） 赤芍药 甘草（炙） 柴胡（去苗） 桔梗（去芦）各一两 地骨皮 宣黄连（去须） 胡黄连各一分 肉桂（去粗皮） 木香各半两 麝香（别研）半分 鳖甲一枚（重二两者，醋炙黄色为度）

【用法】 上为细末，用青蒿一斤，研烂，绞取汁，童便五升，酒五升，同熬至二升以来；次入真酥三两，白沙蜜三两，再熬成膏，候冷，方下众药末，搜和令匀为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】 妇人一切虚损，肌肉瘦悴，盗汗心忪，咳嗽上气，经脉不调，或作寒热，不思饮食。

【方论选录】《济阴纲目》汪淇笺释：此方谓治虚损者，为气血不足也，故用参、归。惟不足，则津液枯而肌肉瘦，故用酥蜜以润之，且酥、蜜同杏仁、甘、桔，又可润肺下气而除嗽也。然气不足则寒而心忪，血不足则热而盗汗，故又于补气血之中，一加柴胡、地骨、黄连以除热；一加肉桂、木香以温寒，赤芍散血中之瘀，杏仁破气中之滞，胡连、鳖甲、青蒿、童便搜骨蒸之热。而以麝香为引者，是欲内外通而结热散也。

00615 人参鳖甲散

【方源】《妇人良方》卷二十一引胡氏方。

【组成】 人参 桂心 当归 桑寄生 白茯苓 白芍药 桃仁 熟地黄 甘草 麦门冬各半两 续断一分 牛膝三分 鳖甲（炙） 黄耆各一两

【用法】 上为细末。每服先以猪肾一对，去筋膜，以水二大盏，生姜半分，大枣二个，煎至一盏，去猪肾、姜、枣，然后下药末二钱、葱三寸、乌梅一个，荆芥五穗，煎至七分，去滓，空心、晚食前温服。

【主治】 妇人产后未满百日，体中虚损，血气尚弱，失于将理，或劳动作伤，致成薄劳。其状虚羸，乍起乍卧，饮食不消，时有咳嗽，头目昏痛，发歇无常，夜有盗汗，寒热如疟，背膊拘急，沉困在床。

00616 人参大再造丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 水安息 蕲蛇各一两 人参 琥珀 肉桂 黄耆 熟地 首乌 茯苓 当归 麻黄 大黄 黄连 姜黄 元参 天麻 川贝 川芎 羌活 防风 藿香 白芷 草蔻 蔻仁 甘草 山甲 两头尖各五钱 犀黄 冰片各六分二厘五 犀角 血竭 红花各二钱 麝香 松香 地龙各一钱二分一 灵仙六钱二分五 葛根 桑寄生 全蝎各六钱二分一 附子 母丁香 胆星 申姜 沉香 乌药 白术 赤芍 香附 青皮 乳香 没药 竺黄 龟版 僵蚕 细辛 辰砂各二钱五分 木香一钱 虎膝一对

【用法】 炼蜜为丸，每重三钱，金箔为衣，封固。淡姜汤送下。

【功用】 固本培元，搜风顺气，平肝养血，豁痰清心，宣通百脉。

【主治】 中风中寒，痰迷气厥，口眼喎斜，癫痫痰疾，风寒湿痹，瘫痪风痱，半身不遂，骨节疼痛，筋脉拘挛，手足麻木，步履艰难；及小儿急慢惊风，紫白癜风。

【宜忌】 孕妇忌服。

00617 人参五味子汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】 人参一钱 漂白术一钱五分 白云苓一钱 北五味五分 杭麦冬一钱 炙甘草八分

【用法】 加生姜三片，大枣三枚，水煎，温服。

【主治】 久嗽脾虚，中气怯弱，面白唇白。

00618 人参地骨皮散

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】 人参 地骨皮 柴胡 黄耆 生地黄各

一两半　知母　石膏各一两　茯苓半两

【用法】 上㕮咀。每服一两，水一盏，加生姜三片，大枣一枚，煎至一盏，去滓，细细温服，连夜顿服。间服生精补虚地黄丸。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：营中热，脉象按之不足，举之有余，是阴不足，阳有余。②《不居集》：风劳，午后发热恶风，四肢沉困，小便色黄，又治汗后发热。

00619　人参泽兰叶汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】 人参五钱　泽兰叶　丹皮　牛膝各二钱　生地三钱　熟地五钱

【用法】 加藕节五枚，水煎，冲童便服。

【主治】 产后胃绝肺败，恶露不下，虚火载血上行，变黑色见于口鼻。

00620　人参款冬花膏

【方源】《普济方》卷一五七。

【异名】 人参款花膏(《奇效良方》卷三十)。

【组成】 麻黄（去节）　桔梗　粉草　杏仁　葶苈（炒）　知母　贝母　款冬花　人参　乌梅各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。含化一丸。

【主治】 多年咳嗽变为瘕。

00621　人参竹叶石膏汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】 人参五钱　石膏一两　麦冬一两　竹叶三百片　知母三钱　甘草一钱　糯米一撮

【用法】 水煎服。

【功用】 泻胃火。

【主治】 ①《辨证录》：阳明火起发狂，腹满不得卧，面赤而热，妄见妄言。②《石室秘录》：胃中有火，大渴饮水，有汗如雨。

00622　人参橘皮竹茹汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】 橘皮　竹茹　生姜　厚朴　半夏　甘草　人参　藿香

【功用】 补胃和中。

【主治】 胃虚呃逆。

00623　人参燕窝百合汤

【方源】《医医偶录》卷二。

【组成】 人参一钱（如无力，以洋参、沙参二三钱代之）　燕窝三钱　百合五钱

【用法】 共炖烂食之。

【功用】 润肺清金。

【主治】 肺痿。

00624　儿枕散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】 乌药　香附（盐水炒）　红花　丹皮　赤芍　官桂　干姜（炒黑）　陈皮　姜黄　元胡　桃仁（或加山楂、归尾、川芎、甘草、熟地）

【主治】 产后恶露不行，儿枕痛。

00625　儿茶散

【方源】《痘科类编》卷二。

【组成】 硼砂二钱　孩儿茶五钱

【用法】 上为细末。每服一匙，凉水一钟调下。

【主治】 麻疹声哑无音者。

00626　儿茶散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 儿茶适量　冰片少许

【用法】 儿茶为细末，加冰片少许。吹患处。

【主治】 牙根肿，极痛，微赤有白泡，舌尖粉碎者。

00627　儿茶五倍散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 儿茶 6 克　五倍子 6 克　冰片 0.6 克　马钱子 6 克　炉甘石粉 6 克　黄连末 1 克

【用法】 用白醋或冷开水调成糊状。外敷。

【主治】 带状疱疹。

00628　九一丹

【方源】《金鉴》卷七十二。

【异名】 清凉散(《外科传薪集》)、珠宝丹(《青囊秘传》)、九仙丹(《药奁启秘》)。

【组成】 石膏（煅）九钱　黄灵药一钱

【用法】 上为极细末。撒于患处。

【功用】 清热、搜脓、生肌。

【主治】 疔疮破溃。

00629　九子丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 菟丝子（酒煮）　枸杞子　韭子（炒）　车前子　酸枣仁　覆盆子　益智子（去壳，盐炒）　鸡头子　柏子（去壳）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，莲子汤送下。

【功用】 益阳补肾。

【主治】 男子诸虚，心气不足，遗精梦泄。

00630　九气汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】 香附米　郁金　甘草

【用法】 上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】 膈气、风气、寒气、忧气、惊气、喜气、怒气、山岚瘴气、积聚痞气，心腹刺痛，不能饮食，时止时发，攻则欲死。

00631 九分散

【方源】《急救应验良方》（善化堂本）。

【组成】 马钱子四两（去皮毛） 麻黄四两（去节） 乳香四两（去油） 没药四两（去油）

【用法】 上各为细末，再合研极细，收瓷瓶内，勿令泄气，遇有受伤人，即与准九分服下，以无灰老酒调。药力甚大，服时万不可过九分。外伤处破者，干上；若未破，只见青肿，用烧酒调涂。服药后，如觉胸中发闹，周身发麻，此是药力行动，勿恐。若受伤甚重，服后不见动静，过一个半时辰，再用无灰老酒调服九分。如此敷服，无论何样重伤，皆能起死回生，真破伤第一方也。

【功用】《北京市中药成方选集》：活血止痛。

【主治】《北京市中药成方选集》：跌打损伤，坠车落马，伤筋动骨，青肿疼痛。

【宜忌】 孕妇忌服。

【备考】 本方方名，原书啸园本作“九厘散”，每服不过九厘。

00632 九龙丸

【方源】《袖珍》卷二引《圣惠》。

【异名】 九仙丹（《简明医彀》卷五）。

【组成】 川芎 石膏 白芷 川乌头 草乌头 半夏 南星各半两 细辛 全蝎各二钱半

【用法】 上为末，韭汁为丸，如梧桐子大。每服五七丸，茶清送下。

【主治】 男女八般头风，一切头痛。

00633 九龙丸

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 当归 苦参各二两 防风 荆芥 羌活各半两 蝉蜕 川芎各五钱 全蝎（滚水泡去威）一钱 大风仁八两 （一方无川芎，蝉蜕，有大麻仁二两，风藤一两）。

【用法】 上为细末，红米饭为丸，如梧桐子大。不得见火、日，阴干，布囊盛之。每服三钱，茶清送下，一日三次。病起一年者服一料，十年余者服十余料。

【主治】 疠风燃肿痒痛。

【加减】 如下体甚者，加牛膝二两，防己一两。

00634 九龙丹

【方源】《医学正传》卷六引丹溪方。

【组成】 枸杞子 金樱子 山果子（又名山楂） 莲肉 佛座须（莲花心也） 熟地黄 芡实 白茯苓 川归各等分

【用法】 上为末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，或酒或盐汤送下。如精滑便浊者，服二、三日，溺清如水，饮食倍常，行步轻健。妇人厌产者，二三服便住孕。如仍欲产，服通利之药。

【主治】 肾水不足，精关不固，男子滑精，女子梦交。

①《医学正传》：精滑；②《增补内经拾遗》：白淫。③《张氏医通》：斫伤太过，败精失道，滑泄不禁。

【方论选录】《医方考》：精浊者，宜滋肾清心，健脾固脱。是方也，枸杞、熟地、当归，味厚者也，可以滋阴，滋阴则是以制阳光；金樱、莲须、芡实，味涩者也，可以固脱，固脱则无遗失；石莲肉苦寒，可以清心，心清则淫火不炽；白茯苓甘平，可以益土，益土则制肾邪；而山楂肉者，又所以消阴分之障碍也。

【备考】 本方方名，《医统》引作“九龙丸”。方中山果子《医统》作“山茱萸肉”。

00635 九龙丹

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】 九龙败毒丸（《经验奇方》卷上）、九龙丸（《中药成方配本》）、花柳九龙丹（《全国中药成药处方集》福州方）。

【组成】 儿茶 血竭 乳香 没药 巴豆（不去油） 木香各等分

【用法】 上为末，生蜜调成一块，瓷盒盛之。临时旋丸寒豆大，每服九丸，空心用热酒一杯送下。行四五次，方吃稀粥。肿甚者，间日再用一服，自消。

【功用】《北京市中药成方选集》：活血，消肿，败毒。

【主治】 ①《外科正宗》：鱼口，便毒，骑马痈，横痃，初起未成脓者。②《经验奇方》：梅毒初发，遍身见红点者。或阳物肿痛破烂者。

【宜忌】《北京市中药成方选集》：孕妇忌服。

【方论选录】《成方便读》：本方所治病证，皆湿热蕴结，挟痰与血，酿成大毒，有牢不可破之势。若以轻浅通套之药，祛其湿热，解其郁毒，杯水车薪，决难济事，即以大黄、芒消等寒药下之，亦如以水沃石，水去而石依然。故必以巴豆之大辛大热，无坚不破，无闭不开，腐化一切有形之物，由大便荡涤而下，方能剿寇擒巨，悉无遗类。至于血竭之行瘀，本香之理气，儿茶之化痰，乳香没药，芳香通络，定痛疏邪，皆为巴豆之辅佐，而各搜求

其病本耳。

00636 九龙针

【方源】《串雅补》卷四。

【组成】硫黄二两 雄黄一钱 肉桂三分 朱砂一钱 川乌三分 草乌三分 原麝三分 干蝎尾三分 蜈蚣箭三分

【用法】上为细末，放碗中微火熔，倾作片子。每用一米粒许，患上先用铜钱一枚，放药于中灼之；或用米饭三粒，捻作饼子，先贴患上，纳药于中灼之，其痛立止。

【主治】一切风痛痹湿，闪跌拳伤。

00637 九仙丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】黑驴肾（并肾子、腰子，全切片，以伏龙肝为末，铺锅底，将前物铺上，再用伏龙肝末盖之，慢火焙干，去伏龙肝） 枸杞子二两 巴戟（去心） 核桃肉（去皮）各四两 莲蕊 白芍（酒洗） 当归（酒炒） 破故纸（炒） 茯苓 胡芦巴（酒炒） 芡实 肉苁蓉（酒洗） 牡蛎（煅） 牛膝（酒蒸） 龙骨（煅，童便淬） 杜仲（盐水炒） 沙苑蒺藜各二两（炒） 大茴一两

【用法】上为末，酒糊为丸。每服二钱，清晨开水送下。如欲种子，可日三服，先忌房事三七日效。此药须长服为妙。

【功用】益肾固精，壮阳种子。

00638 九仙散

【方源】《卫生宝鉴》卷十二引太医王子昭方。

【组成】人参 款冬花 桑白皮 桔梗 五味子 阿胶 乌梅各一两 贝母半两 御米壳八两（去顶，蜜炒黄）

【用法】上为细末。每服三钱，白汤点服。嗽住止后服。

【主治】一切咳嗽。

【方论选录】《中医方剂学》：本方主治久咳不愈，以致肺气耗散，肺阴亏损之证。久咳不已，伤肺伤气，用人参以补气，阿胶以补肺；喘则气耗，用五味子之酸收，以敛耗散之肺气；益以乌梅、罂粟壳敛肺止咳；复用款冬、桑皮、贝母止咳平喘，兼以化痰；桔梗载药上行。合用具有益气、敛肺、止咳之效。凡咳嗽经久不愈，气耗阴亏，咳喘自汗者，本方较为合适。若痰涎壅盛，或外有表邪者，切勿误用，以免留邪为患。

00639 九生丸

【方源】《普济方》卷四十六。

【组成】半夏 南星 大草乌 川芎 白芷 硬石膏 细辛各等分

【用法】上为末，生韭汁、飞罗面为丸。每服十丸，生姜汤送下。

【主治】头风。

00640 九圣丸

【方源】《得效》卷六。

【异名】紧皮丸。

【组成】罂粟壳（去蒂膜，米醋炒）一两 川乌（炮，去皮脐） 黄连（去须） 南木香 北赤石脂 枯矾 肉豆蔻（火煨） 干姜 白茯苓（去皮）各五钱

【用法】上为末，醋煮陈米粉糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下，腹痛不止，当归、乳香汤送下。

【主治】下痢赤白，日夜无度，里急后重紧痛。

00641 九圣散

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】苍术一两五钱 黄柏 苏叶各二两 杏仁（去皮）四两 生乳香 生没药各一两二钱 薄荷二两（共为细粉） 轻粉 红粉各五钱

【用法】上为细末，和匀，二钱重装袋，用花椒油调均，敷患处。

【功用】消肿渗湿，解毒止痛。

【主治】各种湿疮，臁疮、脚气、黄水疮，红肿溃烂，流脓流水，疼痛不止。

00642 九华膏

【方源】《中医外科学》。

【组成】滑石 600 克 月石 90 克 龙骨 120 克 川贝 18 克 冰片 18 克 朱砂 18 克

【用法】上为细末，放凡士林油中调成 20% 的软膏，冬季可适当放入香油。外用。

【功用】消肿止痛，生肌润肤。

【主治】内外痔发炎。

00643 九炼丹

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地八两 制附子四两 肉豆蔻（面炒）二两 焦姜 吴茱萸 补骨脂（酒炒） 荜茇（炒） 五味子（炒）各二两 粉甘草（炒）一两

【用法】炼白蜜为丸，或山药糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸或百丸，滚白汤送下。

【主治】脾肾虚寒，如五德丸证之甚者。

【加减】如气虚者，加人参二两或四两，尤妙甚。

00644 九宝汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】 桑皮 陈皮 官桂 杏仁 乌梅 薄荷 甘草 紫苏 茅根 大腹皮

【用法】 加生姜三片，水二钟煎，食远服。

【主治】 男妇咳嗽，睡卧不得，有血。

00645 九宝散

【方源】《苏沈良方》卷五。

【异名】 九宝汤(《易简方》)、九宝饮(《洪氏集验方》卷五)、苏沈九宝汤(《证治要诀类方》卷一)、苏陈九宝汤(《医统》卷四十四)。

【组成】 大腹并皮 肉桂 甘草（炙） 干紫苏 杏仁（去皮尖） 桑根白皮各一两 麻黄（去根） 陈皮（炒） 干薄荷各三两

【用法】 上为粗末。每服十钱匕，用水一大盏，童便半盏，加乌梅二个，生姜五片，同煎至一中盏，滤去滓，食后、临卧服。

【主治】 感风伏热，肺气壅滞，咳嗽喘急，积年累发；或时下感冒，鼻塞流涕。

①《苏沈良方》：积年肺气。②《妇人良方》：感风伏热，一切咳嗽喘急。③《易简方》：时下感冒，头重鼻塞，或流清涕，或作咳嗽。④《洪氏集验方》：小儿因伤寒邪，不曾解利，致成远年嗽。

【宜忌】《易简方》：虚劳自汗不可服。

【临证举例】 喘证 两浙张大夫，病喘二十年，每至秋冬辄剧，不可坐卧，百方不愈，后得临平僧法本方服之遂愈。法本凡病喘三十年，服此药半年，乃绝根本，永不复发。凡服此药须久乃效。

00646 九宝散

【方源】《准绳·幼科》卷九。

【异名】 九宝饮(《诚书》卷十二)。

【组成】 麻黄（去节） 薄荷 大腹皮 紫苏各半两 陈皮 杏仁（去皮尖） 桑白皮（炙） 肉桂 枳壳各二钱半 甘草一钱

【用法】 上锉散。每服二钱，加生姜、乌梅，水煎服。

【主治】 小儿咳嗽，肺脏感寒。

【加减】 冷症，去薄荷；热症，去陈皮、肉桂。

00647 九珍散

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 细辛（去叶土） 射干 半夏（汤洗七次） 麻黄（去根节） 黄芩 白芍药 五味子 款冬花 甘草（炙）各等分

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏半，加生姜七片，煎至八分，去滓，食后、临卧热服。

【主治】 肺脏乘寒，咳嗽喘急，喉中有声。

00648 九黄丹

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 没药 乳香各二钱 川贝 雄黄各二钱 升丹三钱 辰砂一钱 月石二钱 梅片三分 石膏（煅）六钱

【用法】 上为极细末。掺疮口，上盖薄贴。

【功用】 ①《药奁启秘》：提毒拔脓，去瘀化腐。②《外伤科学》：止痛平脓。

【主治】 ①《外伤科学》：痈疽已溃，脓流不畅，肿胀疼痛。②《中医皮肤病学简编》：淋巴腺结核；疖、疔、痈、疽、溃疡。

00649 九痛丸

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 附子丸(《外台》卷七引《经心录》)。

【组成】 附子三两（炮） 生狼牙一两（炙香） 巴豆一两（去皮心，熬，研如脂） 人参 干姜 吴茱萸各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。强人初服三丸，一日三次，酒送下，弱者二丸。

【主治】 九种心痛，兼治卒中恶，腹胀痛，口不能言；又治连年积冷，流注心胸痛，并冷冲上气，落马坠车血疾等。

【宜忌】《外台》引《必效方》：忌猪肉、芦笋。

【方论选录】 ①《法律》：仲景于胸痹证后，附九痛丸，治九种心痛，以其久著之邪，不同暴病，故药则加峻，而汤改为丸，取缓攻不取急荡也。九种心痛，乃久客之剧证，即肾水乘心，脚气攻心之别名也。痛久血瘀，阴邪团结，温散药中，加生狼牙、巴豆、吴茱萸驱之，使从阴窍而出。以其邪据胸中，结成坚垒，非捣其巢，邪终不去耳。②《金匮要略直解》：心痛虽分九种，不外积聚、痰饮、结血、虫注、寒冷而成。附子、巴豆，散寒冷而破坚积；狼牙、茱萸，杀虫注而除痰饮；干姜、人参，理中气而和胃脘，相将治九种之心痛；巴豆除邪杀鬼，故治中恶腹胀痛。口不能言，连年积冷，流注心胸痛，冷气上冲，皆宜于辛热，辛热能行血破血，落马坠车，血凝血积者，故并宜之。

【备考】《外台》引《必效方》：疗九种心痛。一，虫心痛；二，注心痛；三，气心痛；四，悸心痛；五，食心痛；六，饮心痛；七，冷心痛；八，热心痛；九，去来心痛。方中生狼牙，《千金》作“生狼毒”。

00650 九蜜煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 当归 熟地各三钱 芍药（酒炒焦） 茯苓各钱半 炙甘草 干姜（炒） 肉桂 北细辛

各一钱　吴茱萸（制）五分

【用法】 水二钟，煎服。

【主治】 产后阳气虚寒，或阴邪入脏，心腹疼痛，呕吐不食，四肢厥冷。

00651　九转灵丹

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】 黑丑　白丑　槟榔各五两　大黄二两　芜荑　雷丸各一两

【用法】 上为末。每服三四钱，木香汤送下。晚食米粥，次服双和饮。

【主治】 诸肿。

【宜忌】 忌生冷、油荤。

00652　九子地黄丸

【方源】《蒲辅周医疗经验》。

【组成】 熟地黄二两　山萸肉　山药　茯苓　泽泻　丹皮　五味子　枸杞子　沙苑子　决明子　青葙子　茺蔚子　菟丝子　覆盆子　车前子各五钱

【用法】 上为细末；醋制龟版一两，另研细；灵磁石一两，火煅醋淬三次，另研细；沉香粉一钱，不见火，诸药和匀，炼蜜为丸。早、晚各服三钱，淡盐汤送下。

【功用】 滋补肝肾，明目除疾。

【主治】 内眼病及白内障。

【宜忌】 忌辛辣、酒、大蒜；不过用目力。

00653　九仙灵应散

【方源】《回春》卷四。

【异名】 九品扶阳散（《医学正印》卷上）。

【组成】 黑附子　蛇床子　紫梢花　远志　菖蒲　海螵蛸　木鳖子　丁香各二钱　潮脑一钱五分

【用法】 上为末。每用五钱，水三碗，煎至一碗半，温洗阴囊并湿处，日洗二次。留水温洗，多洗更好。

【主治】 男子阴湿，阳痿。

00654　九仙驱红散

【方源】《增补内经拾遗》卷四引《集验方》。

【组成】 黄芩（酒炒）　黄连（酒炒）　当归（酒洗）　生地（酒洗）　栀子（酒炒）　蒲黄（隔纸炒）　槐花（炒）各一钱　积雪草五钱（即千年矮）　上部血用藕节三枚（捣烂）　下部血用地榆一钱半

【用法】 水二钟，煎八分，看血上下，分食前后服。

【主治】 呕吐血，便血，妇人崩中。

【加减】 如胸膈饱闷，加莱菔子七分。

00655　九华粉洗剂

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 朱砂18克　川贝母18克　龙骨120克　月石90克　滑石620克　冰片18克

【用法】 上药各为细末，研和，每用30克，加甘油30克，蒸馏水1升，配成洗剂。用毛笔刷涂布。

【功用】 收湿止痒。

【主治】 脂溢性皮炎，丘疹性湿疹。

00656　九转灵砂丹

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】 破故纸五两（芝麻同炒香熟，去芝麻）　杜仲三两（去皮，锉细，麦麸同炒去丝，麸不用）　川当归二两（去芦皮及须用）　川巴戟二两（汤浸，去心用肉）　川萆薢二两（切作薄片，新瓦焙微黄）　木香一两（形如枯骨者。薄切，醋浸一宿）　苍术四两（酒浸二两，米泔浸二两，各一宿，去黑皮，切片，用黑叶葱头炒香黄）　川茴香一两（盐炒微黄香，去盐）　大胡桃三十个（酒浸，去膜，切成薄片，铺子纸上一宿）

【用法】 上先将前八味制度毕，称净分两定，为末罗过后，入胡桃同药再碾细，酒面糊丸，如梧桐子大。空心温酒送下；如不能饮，盐汤亦可。初服二十丸，每日加五丸，至五十丸；看药力未到，至七十丸。

【功用】 补腰肾，祛风湿，壮脾肾。

【主治】 腰脚疼痛，筋脉不舒，行步艰难。

【宜忌】 忌咸猪肉、湿面并房事七日。

00657　九转黄精丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】 黄精丹（原书）、九转黄精丸（《中药制剂汇编》引《北京市中成药规范》）。

【组成】 上药用黄酒三百二十两入罐内，浸透加热，蒸黑为度，晒干，研为细末，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，日服二次，温开水送下。

【功用】 补气养血。

【主治】 身体衰弱，面黄肌瘦，饮食减少。

00658　九味平胸丸

【方源】《麻疹阐注》卷三。

【组成】 百合　天冬　杏仁　桑皮　石膏　大黄　葶苈　木通　枳壳

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。清汤送下。

【功用】 清肺，化痰，降火。

【主治】 麻后余毒，留于肺经，阳火熏灼而成龟胸。

00659　九味安肾丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】破故纸 小茴香 胡芦巴 川楝肉 续断 桃仁 杏仁 山药 茯苓各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【主治】肾虚腰痛，目眩耳聋，面黑羸瘦。

00660 九味芦荟丸

【方源】《原机启微·附录》。

【组成】芦荟半两 胡黄连 当归 龙胆草（酒浸，炒） 芍药 川芎 芜荑各一两 木香 甘草（炙）各三钱

【用法】上为末，茯神糊为丸，如麻子大。每服五七十丸，滚汤送下。

【主治】三焦及肝胆经风热，目生云翳；或瘰疬，耳内生疮，寒热作痛；或肝火肌体消瘦，发热作渴，饮食少思，肚腹不调；或肝疳口内生疮，牙龈溃烂；或牙齿蚀落，颊腮腐烂，发热口渴，饮食少用，下部生疮。

00661 九味羌活汤

【方源】《此事难知》卷上引张元素方。

【异名】大羌活汤（《医方类聚》卷六十二引《经验秘方》）、羌活冲和汤（《伤寒全生集》卷二）、冲和汤（《医统》卷十四）、神解散（《寿世保元》卷二）、羌活散（《嵩崖尊生》卷十五）。

【组成】羌活一两半 防风一两半 苍术一两半 细辛五分 川芎一两 香白芷一两 生地黄一两 黄芩一两 甘草一两

【用法】上㕮咀，水煎服。若急汗，热服，以糜粥投之；若缓汗，温服之，而不用汤投之。

【功用】解利伤寒。

【主治】外感风寒湿邪，恶寒发热，无汗头痛，肢体骨节酸痛，口中苦而微渴，苔薄白，脉象浮或浮紧者。

①《伤寒全生集》：感冒风寒，非时暴寒，春可治温，夏可治热，秋可治湿，四时时疫，脉浮紧，发热恶寒，头痛，骨节烦疼之表证。②《医方考》：水病，腰以上肿者。③《准绳·幼科》：痘出不快。

【宜忌】《医方考》：阴虚气弱者慎用。

【加减】中风行经者，加附子；中风秘涩者，加大黄；中风并三气合而成痹等证，各随十二经上、下、内、外、寒、热、温、凉、四时、六气，加减补泻用之。

【方论选录】①《医方考》：触冒四时不正之气，而成时气病，憎寒壮热，头疼身痛，口渴，人人相似者，此方主方。羌、防、苍、细、芎、芷皆辛物也，分经而治：邪在太阳者，治以羌活；邪在阳明者，治以白芷；邪在少阳者，治以黄芩；邪在太阴者，治以苍术；邪在少阴者，治以细辛；邪在厥阴者，治以川芎；而防风者，又诸药之卒徒也。用生地所以去血中之热，而甘草者，又所以和诸药而除气中之热也。②《退思集类方歌注》：诸药气味辛温，恐其僭亢，故用黄芩苦寒以监制之，甘草以调和之。生地、川芎引诸药入血祛邪，即借以调营。徐灵胎嫌生地寒滞，易以当归。其是，宜遵之。

【临证举例】风寒感冒 《福建中医药》（1964；5:13）：以本方随证加减，治疗风寒感冒患者149例，经复诊及随访者120例。结果：有效者112例，占93.33%；无效者8例，占6.67%；有反应者9例。其诊断依据为：以恶寒发热、寒多热少、头痛、肢体痠痛为主证，其次结合脉浮、舌苔白、鼻塞、咳嗽、纳差等作为诊断风寒感冒之依据。作者指出：本方对风寒外束，病在阳经，寒重热轻无汗者，取效频捷，且对痹证有一定疗效。

【备考】《洁古家珍》载此方，有方名而无内容，方见《此事难知》。本方改为丸剂，名“九味羌活丸”（见《中国药典》）。

00662 九味败毒汤

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】黄连 荆芥 黄芩 连翘 牛蒡子 薄荷叶 木通 山栀各一钱 甘草（生）四分

【用法】加灯心一撮，水煎，去滓温服。

【主治】紫舌胀，一名木舌。心脾壅热，舌肿，色如猪肝，胀塞满口，坚硬疼痛，不能转动，粥药不入。

00663 九味柴胡汤

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】柴胡 黄芩（炒）各一钱 人参 山栀（炒） 半夏 龙胆草（炒焦） 当归 芍药 甘草各五分

【用法】水煎服。

【主治】①《校注妇人良方》：肝经湿热下注，便毒肿痛，或小腹胁肋结核；肝胆经一切疮疡或风热结核瘰疬。②《医略六书》：阴痛，寒热，脉数洪涩。

【方论选录】《医略六书》：湿热郁子厥阴营气有伤子肝胆，故寒热往来，阴部肿痛焉。龙胆草清热泻湿以清经脉；柴胡梢升阳散郁以清肝胆；人参扶元补气，兼通血脉；当归养血荣筋，善利经脉；黄芩清热燥湿；半夏燥湿醒脾；山栀降湿火以屈曲下行；炙草缓中气以调和脾胃也。水煎温服，使湿热

化而营气调，则寒热解而阴部之肿痛无不并除矣。

00664 九味资生丸

【方源】《张氏医通》卷十六。

【异名】资生丸(《霍乱论》卷下)。

【组成】人参 白术各三两 茯苓一两半 炙甘草半两 橘红 槟肉 真神曲各二两 川黄连 白豆蔻各三钱半

【用法】炼蜜为丸服。

【功用】健脾开胃，消食止泻，调和脏腑，滋养营卫。

【主治】老人食难克运。

00665 九味萸连丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】吴茱萸 陈皮 苍术 黄连（土炒） 黄芩（土炒） 桔梗 茯苓 半夏各一两

【用法】上为末，神曲糊为丸，如绿豆大。每服二三十丸，时时津液送下。

【功用】清痰降火。

【主治】郁积酸证，吞酸嘈杂。

00666 九味解毒汤

【方源】《明医杂著》卷六。

【组成】黄连三分 金银花 连翘 漏芦各五分 山栀四分 白芷六分 当归八分 防风三分 甘草二分

【用法】每服二钱，水煎服。

【主治】一切热毒肿痛，或风热瘙痒，脾胃无伤者。

00667 九味蟠葱散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】延胡索一两 肉桂五钱 干姜（炮）二钱 丁香一钱 茯苓六钱 甘草（炙） 苍术（泔浸，炒） 槟榔 羌活各三钱

【用法】上为散。每服五钱，加连须葱白二茎，水煎，食前热服。取微汗效，不愈再服。

【功用】《医略六书》：散寒开结。

【主治】疝因风寒湿气，睾丸肿痛。

【加减】腹胀便秘，有食积梗痛，去羌活，加三棱、莪术、缩砂仁。

【方论选录】《医略六书》：风寒湿三气交互乘间袭入经中，故疝结小腹，睾丸痛不止。羌活散风寒以胜湿，苍术燥脾湿以消肿，槟榔破滞气以开结，延胡通经气以活血，丁香温中散寒，肉桂暖血祛风，茯苓和脾胜湿，甘草和中和胃，干姜暖胃气以散寒湿；为散，葱白汤下以通阳，连须更通络脉，使滞化结开，则风寒解散而湿气无不化，疝气无不消，何睾丸肿痛之不瘳哉。

00668 九制香附丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】香附十四两 艾四两

【用法】春三日，夏一日，秋三日，冬七日，一次酒，二次醋，三次盐，四次童便，五次小茴香二两，六次益智仁二两，七次丹参二两，八次姜汁，九次莱菔子二两，制如法，糊为丸，每服三四钱，开水送下。

【功用】安胎种子，养血调经，健脾胃，开郁结。

【主治】妇人经事不调，赤白带下，气血凝滞，腹痛胸闷，两胁胀满，呕吐恶心，气块血块，胎前产后诸症。

00669 九蒸苍术散

【方源】《医方考》卷二。

【组成】苍术（九蒸九晒）

【用法】上为极细末。每服一钱，浆水调下。

【主治】湿痰腹痛。

【方论选录】湿痰腹痛，是土实也。经曰：土欲实，木当平之。苍术九蒸九晒，则其气轻清而薄，风木胜湿之品也，故治湿痰腹痛神良。

00670 九物大黄薄贴

【方源】《外台》卷二十四引《删繁方》。

【异名】大黄薄贴(《普济方》卷二八三)。

【组成】大黄 黄芩各三两 白芷二两 寒水石五两 白蔹五两 黄柏二两 石膏 赤石脂 黄连各三两

【用法】上药治下筛，以三合投粉糜二升中和之。薄涂纸，贴肿上，燥易之。肿下，止；不下，厚敷之。

【主治】痈疽发背。

【宜忌】忌生冷、热面、大酢。

00671 三七汤

【方源】《外科集腋》卷二。

【组成】生地 当归 川芎 玄参 黄芩 三七根 荆芥炭 甘草

【主治】鼻衄。

00672 三才丸

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】三才封髓丹、三才丹(《症因脉治》卷二)、天地人三才丸(《麻疹全书》)。

【组成】人参 天门冬（去心） 熟干地黄各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。含化

服之。

【功用】 ①《御药院方》：滋阴养血，润补不燥。②《饲鹤亭集方》：生津润燥。

【主治】 阴虚咳嗽。

①《赤水玄珠》：痨瘵。②《症因脉治》：肾经咳嗽，真阴涸竭。③《张氏医通》：气血俱虚，精神不固，元阳失合。④《医方集解》：脾肺虚劳咳嗽。⑤《兰台轨范》：上下纯虚而不嗽者。

【方论选录】《医方集解》：天冬以补肺生水；人参以补脾益气；熟地以补肾滋阴。以药有天、地、人之名，而补亦在上、中、下之分，使天地位育，参赞居中，故曰三才也。

【备考】 本方改为膏剂，名"三才膏"（见《诚书》）；改为汤剂，名"三才汤"（见《医方集解》）。

00673 三才汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 人参三钱 天冬二钱 干地黄五钱

【用法】 水五杯，浓煎两杯，分二次温服。

【主治】 暑邪久热，寝不安，食不甘，神识不清，阴液元气两伤者。

【加减】 欲复阴者，加麦冬、五味子；欲复阳者，加茯苓、炙甘草。

【方论选录】 凡热病久入下焦，消烁真阴，必以复阴为主。其或元气亦伤，又必兼护其阳。三才汤两复阴阳，而偏于复阴为多者也。

00674 三仁丸

【方源】《济生》卷四。

【组成】 郁李仁 杏仁（炮，去皮尖） 薏苡仁各一两

【用法】 上为细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，不拘时候，米饮送下。

【主治】 水肿喘急，大小便不利。

00675 三仁汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 杏仁五钱 飞滑石六钱 白通草二钱 白蔻仁二钱 竹叶二钱 厚朴二钱 生薏仁六钱 半夏五钱

【用法】 甘澜水八碗，煮取三碗，每服一碗，一日三次。

【功用】 ①《中医方剂学》：宣化畅中，清热利湿。②《蒲辅周医疗经验》：芳香化浊，通阳利湿。

【主治】 湿温初起，邪在气分，湿热互结，留恋三焦，及暑湿初起，头痛恶寒，身重疼痛，而色淡黄，胸闷不饥，午后身热，口不渴或渴不欲饮之湿重于热者。现用于急性黄疸型肝炎，急性肾炎、肾盂肾炎，及伤寒、副伤寒之属于湿热为患者。

①《温病条辨》：头痛恶寒，身重疼痛，舌白不渴，脉弦细而濡，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，状若阴虚，病难速已，名曰湿温。②《谦斋医学讲稿》：湿温邪在中焦，亦照顾上下两焦。③《实用中医学》：湿温初起，湿热互结，而湿重于热者。④《历代名医良方注释》：湿温初起，邪留气分，未曾化燥，湿胜热微，及暑温挟湿。

【宜忌】《古今名方》：若湿已化燥者，不宜使用。

【方论选录】 ①《温病条辨》：湿为阴邪，自长夏而来，其来有渐，且其性氤氲粘腻，非若寒邪之一汗而解，温热之一凉则退，故难速已。世医不知其为湿温，见其头痛恶寒身重疼痛也，以为伤寒而汗之，汗伤心阳，湿随辛温发表之药蒸腾上逆，内蒙心窍则神昏，上蒙清窍则耳聋目瞑不言。见其中满不饥，以为停滞而大下之，误下伤阴，而重抑脾阳之升，脾气转陷，湿邪乘势内渍，故洞泄。见其午后身热，以为阴虚而用柔药润之，湿为胶滞阴邪，再加柔润阴药，二阴相合，同气相求，遂有缠结而不可解之势。惟以三仁汤轻开上焦肺气，盖肺主一身之气，气化则湿亦化也。②《中医热病论》：本方用杏仁宣肺利气以化湿，薏仁、厚朴、半夏芳化理气以燥湿，通草、苡仁、滑石淡渗利湿，竹叶以透热于外，合而共奏宣畅气机，清热利湿之效。

【临证举例】 ①湿温 《中原医刊》（1983；5：23）：张某某，男，35岁，工人。身热，午后尤甚，时有汗出，身困无力，胸闷纳呆，心烦少寐，口渴不欲饮，舌红苔黄腻，脉滑数，此乃湿热交阻，治以芳香化温，佐以清热，投三仁汤加减：杏仁12克，白蔻仁10克，生薏仁15克，滑石30克，半夏12克，竹叶15克，香薷10克，银柴胡12克，连翘20克，车前草20克，陈皮12克，6剂而愈。②伤寒、副伤寒 《新中医》（1982；7：23）：以三仁汤加减治疗伤寒31例，副伤寒6例。其中初期13例，极期22例，缓解期1例，并发肠穿孔中转手术者1例。证属湿重于热者，选加藿香、法半夏；热重于湿者，选加生石膏、知母、黄连；湿热并重者，选加柴胡、黄芩、连翘。大部分病例于服药后2～3天体温下降，5天体温正常，消化道症状也相应改善。③急性黄疸型肝炎 《浙江中医杂志》（1985；9：397）：以三仁汤加味治疗急性黄疸型肝炎72例，其中男45例，女27例，年龄3～68岁，黄疸指数12～150，30以上者39例；谷丙转氨酶57～200以上，200以上者51例，

以本方加丹参10克，秦艽6克，茵陈、虎杖各15克，重症剂量加倍，儿童用量酌减，疗程最短17天，最长49天，平均24.2天，痊愈64例（症状消失，肝功能正常），显效7例（症状消失，谷丙转氨酶或黄疸指数一项正常），无效1例。④肾盂肾炎 《中医杂志》（1966；5:41）：用三仁汤加减治疗肾盂肾炎15例，其中急性9例，慢性而急性发作6例。症状表现多有腰痛、尿频、尿急、尿道热痛，口干不欲饮，胸闷不饥，或恶寒发热，身重疼痛，舌苔白腻或黄腻，脉象濡数或濡缓；尿常规化验，15例均有不同程度的蛋白，脓细胞及红血球，尿培养致病菌均为阳性。根据湿重、热重等症情随症加味，每日一剂，煎取浓汁200毫升左右，分二次服。经治疗痊愈5例，临床治愈7例，好转3例，症状消失时间平均为6.4天，尿菌转阴时间平均为26.6天。⑤急性肾炎 《中医杂志》（1980；12:33）：许某某，男，8岁。半月前因发寒热，咽痛咳嗽，治疗后外感已除，但晨起面目浮肿，尿少，神疲乏力，纳食不佳，面色苍白少华，舌质正红，苔白而腻，脉来沉缓，尿检蛋白（+++），红细胞（++），颗粒管型（+），治以三仁汤加赤小豆30克，茯苓皮15克，每日一剂，服三剂后病情好转；惟虑其正气虚弱，增人黄耆9克，再服三剂，浮肿全消，舌脉正常，尿检呈阴性。

【备考】 本方改为合剂，名“三仁合剂”（见《中药制剂汇编》）。

00676 三化汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 厚朴 大黄 枳实 羌活各等分

【用法】 上锉，如麻豆大。每服三两，水三升，煎至一升半，终日服之，不拘时候。以微利为度。

【主治】 中风入脏，邪气内实，热劳极盛，二便不通；及阳明发狂谵语。

①《保命集》：中风内有便溺之阻隔者。②《医学入门》：中风九窍俱闭，唇缓舌强。③《医学心悟》：中风入脏，热势极盛，闭结不通。④《文堂集验方》：大肠燥闭，不见虚症者。

【宜忌】《玉机微义》：非内实者不可用。

【方论选录】 ①《医方考》：大黄、厚朴、枳实，小承气汤也。上焦满，治以厚朴；中焦满，破以枳实；下焦实，夺以大黄；用羌活者，不忘乎风也。服后二便微利，则三焦之气无所阻塞，而复其传化之职矣，故曰三化。②《增补内经拾遗》：三者，风、滞、痰也。化，变化以清散之也。方用羌活以化风，厚朴、大黄以化滞，枳实以化痰，故曰三化。

【临证举例】 阳明发狂证 《名医类案》：滑伯仁治一僧，病发狂谵语，视人皆为鬼，诊其脉，累累如薏苡子，且喘且挥。曰：此得之阳明胃实。《素问》云：阳明主肉，其经血气并盛，甚则弃衣升高，踰垣骂詈。遂以三化汤三四下，复进以火剂（黄连解毒汤）乃愈。

00677 三气饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 当归 枸杞 杜仲各二钱 熟地三钱或五钱 牛膝 茯苓 芍药（酒炒） 肉桂各一钱 北细辛（或代以独活） 白芷 炙甘草各一钱 附子随宜一二钱

【用法】 水二钟，加生姜三片，煎服。此饮亦可浸酒，大约每药一斤，可用烧酒六七升，浸十余日，徐徐服之。

【主治】 血气亏损，风寒湿三气乘虚内侵，筋骨历节痹痛之极，及利后鹤膝风痛。

【加减】 如气虚者，加人参、白术随宜；风寒胜者，加麻黄一二钱。

00678 三公散

【方源】《医方类聚》卷二十三引《濟寮方》。

【异名】 三蚣散（《普济方》卷九十二）。

【组成】 蜈蚣三条（一蜜炙，一酒浸，一纸裹煨熟，各去屎） 南星三个（每个切作四段，逐个如蜈蚣法制） 白芷半两

【用法】 上为细末。入真麝香少许，热酒调一钱，食后服。

【主治】 诸口眼㖞斜。

00679 三分散

【方源】《保命集》卷下。

【异名】 三圣散（《丹溪心法附余》卷二十一引《济生》）、三合散（《医学纲目》卷三十五）。

【组成】 白术 茯苓 黄耆 川芎 芍药 熟地黄 当归各一两 柴胡一两六钱 黄芩六钱 人参一两六钱 半夏六钱 甘草六钱

【用法】 上为粗末。每服一两，水一盏，煎至半盏，温服清，每日一服。

【主治】 ①《保命集》：产后日久虚劳，针灸、服药俱不效者。②《医学入门》：产后伤寒并痢。

【备考】《奇效良方》有生姜三片，红枣一枚。本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作“三合汤”。

00680 三反膏

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】 生甘草 甘遂 芫花各三钱 鳖肉一两

硇砂一钱　木鳖子肉四个（去壳）

【用法】 加葱白七根，入蜜少许，捣成膏。摊狗皮上贴之。如药略干，加葱、蜜润下。用二次愈。

【主治】 小儿痞块。

00681　三石水

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 炉甘石 90 克　滑石 90 克　赤石脂 90 克　冰片 9 克　甘油 150 毫升

【用法】 上为细末，加入蒸馏水 10 升中，最后加入甘油，配成药水。用时摇动，然后用毛笔涂布皮损上。

【功用】 收湿止痒。

【主治】 丘疹性湿疹，皮肤瘙痒症，脂溢性皮炎，过敏性皮炎。

00682　三石汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 飞滑石三钱　生石膏五钱　寒水石三钱　杏仁三钱　竹茹（炒）二钱　银花三钱（花露更妙）　金汁一酒杯（冲）　白通草二钱

【用法】 水五杯，煮成二杯，分二次温服。

【功用】 ①《温病条辨》：辛凉清热，芳香败毒化浊。②《温病学》：清热利温，宣通三焦。

【主治】 ①《温病条辨》：暑温蔓延三焦，舌滑微黄，邪在气分者。②《温病学》：身热，面赤耳聋，胸闷脘痞，下利稀水，小便短赤，咳痰带血，不甚渴饮，舌红赤。

【方论选录】 ①《温病条辨》：三石，紫雪丹中之君药，取其清热退暑利窍，兼走肺胃者也；杏仁、通草为宣气分之用，且通草直达膀胱，杏仁直达大肠；竹茹以通脉络；金汁、银花败暑中之热毒。②《温病学》：本证属暑湿弥漫三焦，故予三石汤清宣上中下三焦暑湿之邪。方中以杏仁宣开上焦肺气，气化则暑湿易化；石膏、竹茹清泄中焦邪热，滑石、寒水石、通草清利下焦湿热；另用银花、金汁涤暑解毒。全方重在清暑泄热，兼以利湿。

00683　三石散

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】 制炉甘石　熟石膏　赤石脂各三两

【用法】 上为细末。麻油调搽。

【功用】 收涩生肌。

【主治】 一切湿疹及烫伤。

00684　三甲散

【方源】《温疫论》卷下。

【组成】 鳖甲　龟甲（并用酥炙黄，如无酥，各以醋炙代之，为末）各一钱　穿山甲（土炒黄，为末）五分　蝉蜕（洗净，炙干）五分　僵蚕（白硬者，切断，生用）五分　牡蛎（煅，为末）五分（咽燥者酌用）　䗪虫三个（干者擘碎，鲜者捣烂，和酒少许取汁，入汤药同服，其渣入诸药同煎）白芍药（酒炒）七分　当归五分　甘草三分

【用法】 水二钟，煎八分，去滓温服。

【主治】 瘟疫伏邪已溃，正气衰微，不能托出表邪，客邪胶固于血脉，主客交浑，肢体时疼，脉数身热，胁下锥痛，过期不愈，致成痼疾者。

【宜忌】 服后病减半，勿服，当尽调理法。

【加减】 若素有老疟或瘅疟者，加牛膝一钱，何首乌一钱（胃弱欲作泻者，宜九蒸九晒）；若素有郁痰者，加贝母一钱；有老痰者，加瓜蒌霜五分（善呕者勿用）；若咽干作痒者，加花粉、知母各五分；若素有燥嗽者，加杏仁（捣烂）一钱五分；若素有内伤瘀血者，倍䗪虫（如无䗪虫，以干漆炒烟尽为度，研末五分，及桃仁捣烂一钱代之）。

【方论选录】《瘟疫论评注》：方中以鳖甲、龟甲、穿山甲三甲为主，扶正不恋邪，达邪不伤正；蝉蜕、僵蚕祛邪熄风；牡蛎平肝，归、芍和血，甘草和中，加䗪虫引诸药入血脉，搜剔血中之邪。立意新颖，用药独特。

00685　三仙丸

【方源】《医统》卷一〇八。

【组成】 侧柏叶八两（烘干）　当归（全身）四两　榧子仁二两

【用法】 上为末，水糊为丸，如梧桐子大。每五七十丸，黄酒、盐汤任下，早、晚各一服。

【主治】 头发脱落。

【宜忌】 忌铁器。

00686　三仙丹

【方源】《慎斋遗书》卷九。

【组成】 川芎一两五钱（盐炒）　茴香三两（炒）　苍术二两（葱白同炒）

【用法】 酒煮面糊为丸。盐水、酒任下。

【主治】 腰痛。

00687　三仙丹

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 升丹三分　橄榄炭三分　梅片一分

【用法】 上为极细末。麻油调敷或干掺。

【主治】 下疳腐烂。

00688　三仙汤

【方源】《仙拈集》卷一引《海上方》。

【组成】 马齿苋二斤　五加皮半斤　苍术四两

【用法】 上为末，以水煎汤洗澡。急用葱、生姜捣烂，冲热汤一碗服之。暖处取汗，立时痛止。

【功用】 止痛。

【主治】 筋骨疼痛，不拘风湿、杨梅。

00689 三仙酒

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 荔枝核（烧存性）三钱 小茴香 川楝肉各钱半

【用法】 上为末，酒调。入盐少许，热服，再以葱汤催汗出为妙。

【主治】 疝。

00690 三仙散

【方源】《回春》卷三。

【组成】 干姜 大附子（炮，去皮脐） 官桂

【用法】 上为细末。每服三钱，滚酒调服。

【主治】 ①《回春》：阴症。②《寿世保元》：一切阴症，手足厥冷。

00691 三仙散

【方源】《痘科类编》卷三。

【异名】 云盖三仙散（《慈幼新书》卷七）。

【组成】 山楂 神曲 麦芽各一两

【用法】 上为细末。每服二钱，入白糖一分，百沸汤调下。

【功用】《北京市中药成方选集》：消食化滞。

【主治】 ①《痘科类编》：痘疮愈后，数日之间，内伤饮食，外感风寒，身忽烧热，发出盖痘疹如云成片，一名云头疹。②《北京市中药成方选集》：小儿宿食停滞，消化不良，腹痛胀满，饮食减少。

00692 三仙散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 大风子 槟榔各五钱 硫黄三钱

【用法】 醋煎滚，调搽。

【主治】 癣遍身及面。

00693 三仙粥

【方源】《济众新编》卷七。

【异名】 三仁粥（《东医宝鉴·内景篇》卷四）。

【组成】 海松子（去皮） 桃仁（泡，去皮尖）各一合 郁李仁（泡，去皮）一钱

【用法】 上同捣烂，和水滤取汁，入碎粳米少许，煮粥，空心服之。

【主治】 老人风秘，脏腑壅滞，气聚脑中，忽然头痛、腹痛，恶心不食。

00694 三仙膏

【方源】《辩证录》卷六。

【组成】 熟地五两 人参二两 丹皮一两

【用法】 水煎服。

【主治】 血精。

00695 三生丸

【方源】《本事》卷三。

【组成】 半夏二两 南星 白附子各一两

【用法】 上并生为末，滴水为丸，如梧桐子大，以生面滚衣，阴干。每服十丸至二十丸，生姜汤送下。

【主治】 痰饮内伏，头晕目眩，呕吐酸水；中风痰多，口眼㖞斜，半身不遂；痰厥头痛。

①《本事》：中脘风涎痰饮，眩瞑，呕吐酸水，头疼恶心。②《济生》：痰厥头痛。③《医学入门》：中风昏迷，痰涎壅并，口眼㖞斜，半身不遂，脉沉无热者。④《本草纲目》：小儿暑风，暑毒入心，痰塞心乳，昏迷抽搐。

【方论选录】《本事方释义》：半夏气味辛温入足阳明，天南星气味苦辛温入手足太阴，白附子气味辛甘大温入足阳阴。三味皆生用以姜汤送者，以脘中之痰饮窃据为患，致瞑眩呕吐，头疼恶心，非峻利之药，不能扫除也。

00696 三生饮

【方源】《易简方》。

【组成】 南星一两 川芎半两 生附半两 木香一分

【用法】 上㕮咀。每服半两，水二盏，加生姜十片，煎至六分，去滓温服。

【主治】 寒痰壅于经络，卒中不知人事，痰涎壅盛，语言謇涩，或口眼㖞斜，或半身不遂。

①《易简方》：卒中，昏不知人，口眼㖞斜，半身不遂，咽喉作声，痰气上壅，无问外感风寒，内伤喜怒，或六脉沉伏，或指下浮盛；兼治痰厥饮厥，及气虚眩晕。②《直指小儿》：柔痉自汗，肢体厥冷。③《朱氏集验方》：虚怯之人发痰疟。④《中风斠诠》：卒中壅塞，昏仆不醒，脉沉无热。

【宜忌】《岭南卫生方》：若挟热中风者，不宜。

【方论选录】 ①《明医杂著》薛己按：三生饮乃行经络、治寒痰之药，有斩关夺旗之功。每服必用人参两许，以祛其邪而补助真气。否则不惟无益，适足以取败矣。观先哲用薯附、参附等汤，其义可见。②《删补名医方论》引柯琴：此取三物之大辛大热者，且不炮不制，更佐以本香，乘其至刚至锐之气而用之，非专以治风，兼以治寒也。然邪之所凑，其气必虚，但知勇于攻邪，若正气虚而不支，能无倒戈乎？必用人参两许以驾驭其邪，此薛己真知确见，立于不败之地，而收万全之效者也。今之

11548 胶蜡汤 …… (1560)
11549 胶蜜汤 …… (1561)
11550 胶艾芎归汤 …… (1561)
11551 胶艾榴皮汤 …… (1561)

脑

11552 脑漏散 …… (1561)
11553 脑麝祛风丸 …… (1561)

脓

11554 脓溃生肌散 …… (1561)

鸱

11555 鸱头丸 …… (1561)

皱

11556 皱肺丸 …… (1561)
11557 皱肺丸 …… (1561)

逢

11558 逢原饮 …… (1562)

高

11559 高良姜丸 …… (1562)
11560 高良姜汤 …… (1562)
11561 高良姜散 …… (1562)
11562 高良姜散 …… (1562)
11563 高良姜粥 …… (1562)
11564 高良姜粥 …… (1562)
11565 高枕无忧散 …… (1562)

离

11566 离珠丹 …… (1562)
11567 离照汤 …… (1563)
11568 离宫锭子 …… (1563)

疳

11569 疳积丸 …… (1563)
11570 疳积饼 …… (1563)
11571 疳积散 …… (1563)

痄

11572 痄腮汤 …… (1563)

悦

11573 悦脾汤 …… (1563)

烧

11574 烧伤散 …… (1563)
11575 烧肾散 …… (1563)
11576 烧胃丸 …… (1564)
11577 烧裤散 …… (1564)
11578 烧脾散 …… (1564)
11579 烧脾散 …… (1564)
11580 烧腰散 …… (1564)

烟

11581 烟胶散 …… (1564)
11582 烟熏散 …… (1564)

凌

11583 凌花散 …… (1565)
11584 凌霄散 …… (1565)
11585 凌霄花汤 …… (1565)
11586 凌霄花散 …… (1565)
11587 凌霄花散 …… (1565)

凉

11588 凉血丸 …… (1565)
11589 凉血饮 …… (1565)
11590 凉肾汤 …… (1565)
11591 凉肺汤 …… (1565)
11592 凉肺汤 …… (1566)
11593 凉肢散 …… (1566)
11594 凉胃汤 …… (1566)
11595 凉胆丸 …… (1566)
11596 凉胎饮 …… (1566)
11597 凉惊丸 …… (1566)
11598 凉解汤 …… (1566)
11599 凉膈散 …… (1566)
11600 凉膈散 …… (1567)
11601 凉膈散 …… (1567)
11602 凉膈散 …… (1567)
11603 凉膈散 …… (1567)
11604 凉膈散 …… (1568)
11605 凉髓丹 …… (1568)
11606 凉七味汤 …… (1568)
11607 凉血饮子 …… (1568)
11608 凉心清肝汤 …… (1568)
11609 凉血五花汤 …… (1568)
11610 凉血五根汤 …… (1568)
11611 凉血四物汤 …… (1568)
11612 凉血四物汤 …… (1569)
11613 凉血地黄汤 …… (1569)
11614 凉血地黄汤 …… (1569)
11615 凉血地黄汤 …… (1569)
11616 凉血地黄汤 …… (1569)
11617 凉血抑火汤 …… (1569)
11618 凉血明目汤 …… (1569)
11619 凉血固真汤 …… (1569)
11620 凉血活血汤 …… (1570)
11621 凉血消风散 …… (1570)
11622 凉血润燥饮 …… (1570)
11623 凉血调经丸 …… (1570)
11624 凉血清肠散 …… (1570)
11625 凉血清肺饮 …… (1570)
11626 凉血清脾饮 …… (1570)
11627 凉血解毒丸 …… (1570)
11628 凉血解毒汤 …… (1570)
11629 凉肝导赤汤 …… (1571)
11630 凉荣泻火汤 …… (1571)
11631 凉营清气汤 …… (1571)
11632 凉膈白虎汤 …… (1571)
11633 凉膈清脾饮 …… (1571)

酒

11634 酒调散 …… (1571)
11635 酒调散 …… (1571)
11636 酒癥丸 …… (1571)
11637 酒煮当归丸 …… (1571)
11638 酒煮黄连丸 …… (1572)
11639 酒蒸黄连丸 …… (1572)

消

11640 消化丸 …… (1572)
11641 消化汤 …… (1572)
11642 消丹饮 …… (1572)
11643 消风饮 …… (1572)
11644 消风散 …… (1572)
11645 消风散 …… (1573)
11646 消风散 …… (1573)
11647 消风散 …… (1573)
11648 消风散 …… (1573)
11649 消风散 …… (1573)
11650 消石汤 …… (1574)
11651 消石散 …… (1574)

之。

【主治】 内外臁疮。

00707 三汁膏

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】 萝卜汁 梨汁 姜汁各一钱

【用法】 加蜜半钟，蒸熟，不拘时服。

【主治】 咳嗽痰喘。

00708 三圣丸

【方源】《养老奉亲》。

【组成】 威灵仙（净洗，去土，拣择，焙干）五两 干姜二两（炮制） 乌头二两（炮制，去皮脐）

【用法】 上为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，温姜汤送下。

【功用】 祛逐风冷气，进食和胃，去痰滞。

【主治】 腰膝冷痛。

00709 三圣丸

【方源】《幼幼新书》卷二十一引《赵氏家传》。

【组成】 黄连 干姜（炮） 甘草（炙）等分

【用法】 上为末，面糊丸，如绿豆大。每服七丸，赤痢，甘草汤送下；白痢，干姜汤送下；赤白痢，二宜汤送下。

【主治】 冷热不调，泻痢不止，腹中疼痛。

00710 三圣丸

【方源】《普济方》卷三三四。

【组成】 当归（酒浸，去芦） 干漆（炒烟尽）各一两 大黄（湿纸煨）半两

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心当归酒送下。

【主治】 妇人月经不利，小腹急痛。

00711 三圣丸

【方源】《医学正传》卷三。

【组成】 白术四两 黄连五钱 橘红一两

【用法】 上为细末，神曲糊丸，如绿豆大。每服五十丸，津唾下；或姜汤送下。

【功用】《慈禧光绪医方选议》：消积化食。

【主治】 嗜杂。

00712 三圣丸

【方源】《不居集》下集卷八。

【组成】 半夏一两 槟榔 雄黄各二钱

【用法】 研末为丸。姜汤送下。

【主治】 虚劳，恶心欲吐并喘者。

00713 三圣丸

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】 半夏 陈皮 黄连

【用法】 上为末，曲糊为丸。生姜煎汤送下。

【主治】 顽痰，饮癖，呕酸嗜杂，心悬如饥。

00714 三圣饮

【方源】《朱氏集验方》卷五引肖行之方。

【组成】 桔梗（用百合子根煮一伏时） 甘草 贝母（姜汁炒）各等分

【用法】 上为细末，热酒调服；如作咬咀，则用姜煎亦可。

【主治】 痰嗽。

00715 三圣散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】 胡黄连二两 柴胡二两（去苗） 鳖甲二两（生用）

【用法】 上为细散。每服一钱，用生姜酒调下，早晨、日午、临卧各一服。

【主治】 骨蒸劳气烦热，四肢无力，夜卧虚汗，唇口干焦，面无血色，日渐羸瘦。

00716 三圣散

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 丁香四十九枚 胡椒十四枚 半夏七枚（大者，先以锥子钻透心，用麻线穿过，井花水浸，一日一度，七日后焙干）

【用法】 上为散。大人，生姜汤调一字；小儿，箸头蘸生姜汁后点药少许口中。

【主治】 ①《圣济总录》：哕逆不止。②《医统》：胃寒呕逆不食。

00717 三圣散

【方源】《百一》卷三。

【异名】 舒筋散（原书同卷）、神应散（《普济方》卷一五四引《家藏经验方》）、如神汤（《妇人良方》卷四）、延胡散（《普济方》卷三五一）、延胡索散（《校注妇人良方》卷二十）、舒筋汤（《准绳·类方》卷四）、如神散（《治痘全书》卷十三）、舒筋三圣散（《张氏医通》卷十三）、元胡散（《仙拈集》卷二）。

【组成】 当归（洗，焙） 肉桂（去皮） 玄胡索（灰炒）各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，温酒调下，空心，临卧日进三服。

【主治】 中风瘫痪，腰痛，产后瘀血腹痛。

①《百一》：中风手足拘挛，口眼㖞斜，左瘫右痪，骨节酸疼，脚弱无力，行步不正。②《妇人良方》：男妇腰痛。③《校注妇人良方》：产后恶血凝滞，脐下作痛，或作寒热。④《准绳·类方》：闪肭血滞，腹中疞痛，产后服之更妙。

【宜忌】 孕妇忌服。

00718 三圣散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】 三仙散(《丹溪心法附余》卷二十四)。

【组成】 防风三两（去芦） 瓜蒂三两（拣净研破，以纸卷定，连纸锉细，去纸，用粗罗子罗过，另放末，将渣炒微黄，次入末一处同炒黄用） 藜芦（去苗及心，加减用之）或一两，或半两，或一分

【用法】 上各为粗末。每服约半两，以面汁三茶盏，先用二盏，煎三五沸，去面汁，次入一盏，煎至三沸，却将原二盏同一处熬三沸，去滓澄清，放温徐徐服之。牙关紧闭者，鼻内灌之。不必尽剂，以吐为度。

【主治】 中风闭证，痫、癫、狂，痰厥头痛。

①《儒门事亲》：中风失音闷乱，口眼㖞斜，不省人事，牙关紧闭。②《东医宝鉴·杂病篇》引《必用全书》：阳痫及癫狂。③《医方集解》：痰厥头痛。

【方论选录】《东医宝鉴·杂病篇》引《必用全书》：此方汗吐下俱行，防风发汗，瓜蒂下泄，藜芦涌吐。

【临证举例】 ①癫 阳夏张主薄，病癫十余年，眉须皆落，皮肤皱涩如树皮，戴人断之曰：是有汗者，可治之，当大发汗，其汗出当臭，其涎当腥，乃置燠室中，遏塞风隙，以三圣散吐之，汗出周身，如卧水中，其汗果粘臭不可闻，痰皆腥如鱼涎，两足心微有汗，次以舟车丸、潜川散大下五七行，如此数次乃愈。②妇人痰积不孕 有一卒妻，心下有冷积如复杯，按之如水声，以热手熨之如水聚，诊其脉沉而迟，尺脉洪大而有力，先以三圣散吐涎一斗，心下平软，次服白术调中汤、五苓散，后以四物汤和之，不再月，气血合度，数月而娠二子。

00719 三圣散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 细辛一两（锉） 荆芥穗二两（锉） 苍耳茎三两（锉）

【用法】 上㕮咀。每用半两，水三盏，煎至一盏半，去滓，热漱冷吐，误咽无妨。以痛止为度。

【主治】 牙齿疼痛久不已。

00720 三圣散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 闹羊花（净末）一钱 槿树花（净末）一钱 大枫子（白肉去油）五分

【用法】 上为末。每服六分，葱、酒调服。洗浴发汗。

【主治】 男妇头痛，不论偏正新久，但夏月欲重绵包裹者。

00721 三圣膏

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 黑附子（生） 蔓荆子 柏子仁各半两

【用法】 上为细末，乌鸡脂和捣研千下，于瓷合内密封百日。取出，涂在髭发落处。

【主治】 髭发髭脱落。

00722 三圣膏

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】 未化石灰半斤（为末） 大黄（为末）一两 桂心（为末）半两

【用法】 先将石灰于瓦器中炒令淡红色，提出火，候热稍减，次下大黄末，就炉外炒，候热减，下桂心末略炒，入米醋熬搅成黑膏。厚纸摊贴患处。

【主治】 积聚痞块。

00723 三圣膏

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】 硫黄（生，研） 黄丹各半两（研）

【用法】 上件用生绢袋盛，紧缚定。沾生姜自然汁于白癜上搽之，日夜十次。

【主治】 白癜风。

00724 三邪饮

【方源】《简明医彀》卷三。

【组成】 麻黄 苍术 浮萍（七月半采） 白芷 苦参 桑皮 川芎 甘松各一钱

【用法】 水、酒煎服。暖室出汗，三日再服。

【主治】 风寒湿邪成痹，痛甚，四肢麻木不举。

00725 三合汤

【方源】《医方考》卷六。

【组成】 人参 白术 茯苓 甘草 当归 川芎 芍药 地黄 半夏 陈皮

【用法】 水煎服，探吐。

【主治】 妊娠转胞，不得小便者。

【方论选录】 胞，非转也，由孕妇中气怯弱，不能举胎，胎压其胞，胞系了戾，而小便不通耳。故用二陈、四物、四君子三合煎汤而探吐之，所以升提其气，上窍通而下窍自利也。

00726 三军丸

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】 大黄（酒浸，九蒸九晒）四两 血竭（研） 没药各五钱（去油）

【用法】 上为末，水为丸。每服七八十丸，以熟地、白芍、当归、川芎各一钱煎汤送下。候大便利

一二次，经脉自通。

【功用】 荡涤瘀秽。

【主治】 妇人三十二三岁，气血盛实，热结血闭，脐腹疼痛，手不可近者。

00727 三阳汤

【方源】 方出《元戎》卷，名见《东医宝鉴·外形篇》卷一。

【组成】 羌活 防风 荆芥 升麻 葛根 白芷 柴胡 川芎 芍药 细辛 葱白（连须）

【用法】 分两旋加。水煎服。

【主治】 三阳头痛。

【备考】《玉机微义》引本方有石膏。《东医宝鉴·外形篇》本方用羌活、防风、石膏、白芷、柴胡、川芎各一钱，荆芥、升麻、葛根、芍药、细辛各五分，连根葱白三茎。

00728 三阴煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 当归二三钱 熟地三五钱 炙甘草一钱 芍药（酒炒）二钱 枣仁二钱 人参随宜

【用法】 水二钟，煎七分，食远服。

【主治】 肝脾虚损，精血不足，及营虚失血。凡中风，血不养筋，及疟疾汗多邪散而寒热犹不能止者；产后阴虚发热，怔忡恍惚。

【加减】 如呕恶者，加生姜三五片；汗多烦躁者，加五味子十四粒；汗多气虚者，加黄耆一二钱；小腹隐痛，加枸杞二三钱；如有胀闷，加陈皮一钱；如腰膝筋骨无力，加杜仲、牛膝。

【临证举例】 失眠 《吉林中医药》(1986；3：24)：赵某，女，24岁。患失眠证月余，服多种中西药罔效。诊见：每晚不易入睡，入睡即多作恶梦而醒，醒后再难入眠，神疲乏力，心悸纳少，两目干涩，食后腹胀，时有便溏，舌质淡，苔薄白，脉细数。证属肝脾阴虚型失眠。治宜补脾、养肝、安神。方用三阴煎加黄耆、远志，水煎服。每午、晚各服一次。继服十一剂疾愈。

00729 三豆汤

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】 赤小豆 豆豉 天南星（制） 白蔹各一钱

【用法】 上为细末。每用半钱，用芭蕉自然汁调，敷脐四傍，一日一次，二日二次。若得小腑下白即安。

【主治】 小儿脐突。

00730 三豆饮

【方源】《医级》卷八。

【组成】 赤小豆 绿豆 大豆黄卷等分

【用法】 水煎服；或为末作散，日服。

【主治】 水肿胀满，脉数而虚细，小便不利，不堪行水者。

00731 三花汤

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】 当归二两 川芎一两 生甘草五分 天花粉三钱 紫地丁一两 甘菊花五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 对口初起。

00732 三补丸

【方源】 方出《圣惠》卷五十九，名见《丹溪心法》卷三。

【异名】 三黄丸(《内科摘要》卷下)。

【组成】 黄连（去须，微炒） 黄柏（炙微赤） 黄芩各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前以粥饮送下。

【功用】 ①《丹溪心法》：泄五脏火。②《医统》：泻三焦火。

【主治】 三焦积热，热毒血痢，眼目赤肿，口舌生疮，咽喉齿痛，脉痿，肠风痔漏，妇女赤带。

①《圣惠》：血痢日夜不止，腹中疞痛，心神烦闷。②《丹溪心法》：上焦积热。③《内科摘要》：热痢腹痛，或口舌咽喉齿痛，大小便结涩，及一切实火之症。④《万氏女科》：不及期而经先行，由于血热者。⑤《医方考》：心气热，下脉厥而上，色赤，络脉满溢，枢纽折挈，胫纵而不任地者，名曰脉痿。⑥《准绳·杂病》：口疮，胃中有热，脉洪大。⑦《审视瑶函》：三焦积热上攻，眼目赤肿，小便赤涩，大便结燥，五脏俱热，肠风痔漏。⑧《会约》：赤带，血热之甚者。

【宜忌】《校注妇人良方》：忌煎炒、椒、姜、辛辣等热物。

【方论选录】《医方考》：少火宜升，壮火宜降。今以三物降其三焦之壮火，则气得其生，血得其养，而三焦受益矣，故曰三补。黄芩苦而枯，故清热于上；黄连苦而实，故泻火于中；黄柏苦而润，故泻火于下。虽然，火有虚实，是方但可以治实火，若虚者用之，则火反盛，谓降多亡阴也。

00733 三灵汤

【方源】《医醇賸义》卷四。

【组成】 当归二钱 白芍一钱 羚羊角一钱五分 龙齿二钱 石决六钱 半夏曲三钱 柴胡一钱 葛根二钱 茯神二钱 白术一钱 青皮一钱

【用法】 冬瓜子三钱，煎汤代水。

【功用】 养血疏肝，兼调脾胃。

【主治】 肝痹。夜卧则惊，多饮，数小便，腹大如怀物。

00734 三妙丸

【方源】《医学正传》卷五。

【组成】 黄柏四两（切片，酒拌，略炒） 苍术六两（米泔浸一二宿，细切，焙干） 川牛膝（去芦）二两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心姜、盐汤任下。

【功用】《中医方剂临床手册》：清热，燥湿。

【主治】 肝肾不足，湿热下注，腰腿疼痛麻木，脚气，湿疮，淋病，白带。

①《医学正传》：湿热下流，两脚麻木，或如火烙之热。②《顾松园医镜》：湿热腰痛，或作或止。③《中医方剂临床手册》：湿热下注引起的脚气病，腰膝关节酸痛，湿疮，以及带下、淋浊。

【宜忌】 ①《医学正传》：忌鱼腥、荞麦、热面、煎炒等物。②《中国药典》：孕妇慎用。

【方论选录】《成方便读》：邪之所凑，其气必虚，若肝肾不虚，湿热决不流入筋骨。牛膝补肝肾，强筋骨，领苍术、黄柏入下焦而祛湿热也。

00735 三妙丸

【方源】《谦斋医学讲稿》。

【组成】 苍术 黄柏 知母

【用法】 下肢痛，属湿热下注者。

00736 三妙散

【方源】《金鉴》卷六十七。

【组成】 槟榔 苍术（生） 黄柏（生）各等分

【用法】 上为细末，干撒肚脐；治湿癣，以苏合油调搽。

【功用】 止痒渗湿。

【主治】 ①《金鉴》：脐痈。脐中不痛不肿，甚痒，时津黄水，浸淫成片。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：湿热流注，黄水疮，一切温毒诸疮。

【宜忌】 忌酒、面、生冷、果菜。

00737 三妙散

【方源】《仙拈集》卷四引《济世奇方》。

【组成】 夏枯草 金银花 蒲公英各五钱

【用法】 酒、水煎，频服之。

【主治】 结核瘰疬遍满脖项者。

【方论选录】《串雅内编选注》：金银花味甘性寒，轻扬入肺，为散达解毒之品；蒲公英味苦，有清热解毒、消肿散结之力。二药合用，可解一切痈疡肿毒。夏枯草味辛苦，辛能散结，苦能泄热，故凡瘰疬、乳痈、目赤、头晕之疾，服之可以清肝火、散结气，古今用本品治疗瘰疬均收到良好效果。

【备考】 本方原名"二妙散"，据《经验广集》卷四改。

00738 三妙散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 轻粉二钱 白矾五钱 杏仁七粒（去皮）

【用法】 上为末。吹鼻中。

【主治】 鼻痔。

00739 三妙散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 黄柏 31 克 寒水石 156 克 青黛 31 克

【用法】 上为细末。花生油调，外涂。

【主治】 急性湿疹。

00740 三奇汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十一。

【组成】 桔梗三两（蜜拌甑蒸） 甘草二两（半生半炒） 诃子大者四个（去核，两个炮，两个生）

【用法】 上为末。每服十钱匕，入砂糖一小块，水五盏，煎至三盏，时时细呷，一日服尽，其声速出。

【主治】 感寒语声不出。

00741 三奇顶

【方源】《串雅内编》卷三。

【组成】 经霜天烛子 腊梅花各三钱 水蜒蚰一条（俱预收）

【用法】 水煎服。

【主治】 小儿天哮。

00742 三奇散

【方源】《普济方》卷一六二引《经验方》。

【组成】 款冬花二百枚 熟地黄（干）二两 佛耳草五十枚

【用法】 上药焙干，碾为粗末。每次二钱，装猛火于香炉中烧之，用纸作筒子，一头大，一头小，如粽样，安在炉上，以口吸烟尽为度，即以清茶咽下。有痰涎吐之。

【主治】 一切咳嗽，不问新旧，喘顿不止，昼夜无时。

【临证举例】 咳嗽 陈氏云：予家一仆，久苦此疾，数令医治，如石投水。在典江置得杭州一婢，亲制此药，两服而愈。

00743 三拗汤

【方源】《局方》卷二（续添诸局经验秘方）。

【组成】 甘草（不炙） 麻黄（不去根节） 杏仁（不去皮尖）各等分

【用法】 上为粗散。每服五钱，水一盏半，姜钱五片，同煎至一盏，去滓，通口服。以衣被盖覆睡，取微汗为度。

【功用】《方剂学》：发汗解表，止咳平喘。

【主治】 感冒风邪，鼻塞声重，咳嗽多痰，胸满气短，痰稠喘急。

①《局方》（续添诸局经验秘方）：感冒风邪，鼻塞声重，语音不出；或伤风伤冷，头痛目眩，四肢拘倦，咳嗽多痰，胸满气短。②《普济方》：寒燠不常，人多暴嗽，咽痛声嘎鼻塞，痰稠喘急。③《医学正传》：肺感风寒，喘急不已。

【方论选录】 ①《医方集解》：麻黄留节，发中有收；杏仁留尖，取其发，连皮，取其涩；甘草生用，补中有发也。②《中医内科临床治疗学》：麻黄辛温，辛则入肺，温则散寒，质地体轻中空，轻轻上浮，发散风寒，宣肺平喘；杏仁苦温，专入肺经，助麻黄温散肺寒，下气定喘；甘草合麻黄，辛甘发散而解表，合杏仁，止嗽化痰而利肺。合有发散风寒，止嗽平喘的作用。

【临证举例】 ①伤风咳嗽 《四川中医》（1983；4:49）：任某，女，40岁。体温38℃，头身疼痛，鼻塞声重，流清涕，喉痒，咽部微充血，咳嗽，吐白色泡沫痰，纳差神疲，经服四环素等未效。诊得脉浮，苔薄白。辨证属外感风寒，肺气不宣，治以三拗汤加味；麻黄6克，杏仁10克，桔梗6克，蝉衣6克，陈皮10克，甘草3克，煎服。嘱其服药后覆被而卧，进热粥，一服得微汗，热退，形寒解，头身疼痛减半，咳痰稀少。守方再剂，后痊愈。②哮喘 《旧德堂医案》：秦商张玉环感寒咳嗽，变成哮喘，口张不闭，语言不续，呀呷有声，外闻邻里。投以二陈枳、桔，毫不见减，延予救之。诊六脉，右手寸关俱见浮紧，重取带滑，断为新寒外束，旧痰内搏，闭结清道，鼓动肺金。当以三拗汤宣发外邪，涌吐痰涎为要。一剂而汗出津津，一日夜而吐痰斗许，哮喘遂平。

00744 三肾丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 人参（去芦）十六两 当归一百六十两 鹿鞭子（代睾丸）五条 枸杞子八十两 白术（炒）一百六十两 川芎十六两 驴鞭子（代睾丸）五条 杜仲炭一百六十两 茯苓 百六十两 生地一百六十两 狗鞭（代睾丸）三十条 续断一百六十两 甘草十六两 白芍八十两 鹿茸（去毛）六十四两 川牛膝一百六十两 葫芦巴（炒）一百六十两 巴戟肉（炙）八十两 补骨脂（炒）八十两 锁阳一百六十两 冬虫夏草四十八两 青盐六十四两 小茴香（盐炒）一百六十两 菟丝子 一百六十两 韭菜子一百六十两 肉苁蓉（炙）一百六十两 五味子（炙）十六两

【用法】 以上除三鞭外，重二千六百四十两，用黄酒一千六百两下罐蒸（包括三鞭），蒸后晒干。共研为细末，过罗，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，日服二次，温开水送下。

【功用】 滋阴益气，补肾壮阳。

【主治】 肾水亏损，阳痿不举，命门火衰，精神疲倦。

00745 三味丸

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【异名】 出声散（《普济方》卷二十六）。

【组成】 桔梗一两（切，用蜜拌，于饭上蒸三日） 诃黎勒（去核）四个（二个炮，二个生用，趁热捣） 甘草一两（半生半炙）

【用法】 上为末，每服二钱匕，用马勃同砂糖少许拌和为丸。含化咽津。

【主治】 肺虚声音不出。

00746 三物汤

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】 生地黄七两半 阿胶（炙令燥）三分 白蔹八两

【用法】 上药㕮咀，如麻豆大。每服七钱匕，水二盏，煎至八分，去滓，空腹温服。

【主治】 吐血及大小便血。

00747 三物散

【方源】《苏沈良方》卷八引陈应之方。

【异名】 乌梅三物散（《鸡峰》卷十四）、三物汤（《普济方》卷三九七）。

【组成】 胡黄连 乌梅肉 灶下土各等分

【用法】 上为末。腊茶清调，食前空腹温服。

【主治】 痢血。

【临证举例】 痢血 丞相庄肃梁公痢血，应之曰：此授水谷，当用三物散。数服而愈。

00748 三和散

【方源】《局方》卷三。

【异名】 三和汤（《圣济总录》卷五十四）。

【组成】 羌活（去芦） 紫苏茎叶（去粗梗） 沉香 宣州木瓜（薄切，焙干） 大腹皮（炙焦黄）

各一两 芎劳 甘草（炒） 陈皮（去白） 木香 槟榔（面裹煨熟，去面） 白术各三分

【用法】 上为粗末。每服二大钱，水一盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《局方》：五脏不调，三焦不和，心腹痞闷，胁肋膨胀，风气壅滞，肢节烦痛，头面虚浮，手足微肿，肠胃燥涩，大便秘难，虽年高气弱，并可服之；又治背痛、胁痛，有妨饮食；及脚气上攻，胸腹满闷，大便不通。②《圣济总录》：三焦病气不升降，水道不利，渐成水胀。

00749 三金汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》引上海曙光医院经验方。

【组成】 金钱草 海金沙 鸡内金 石韦 冬葵子 瞿麦

【用法】 水煎服。

【功用】 清热利湿，通淋排石。

【主治】 石淋。

【方论选录】《福建中医药》（1983；1:13）：以金钱草为君药，其性味微咸平，入肝、肾、膀胱经，具有利水通淋、清热消肿的功效，治疗石淋有特效，盖取其咸能软坚之意，有利于尿道结石的排出，故列为君药；海金沙性味甘寒，入小肠、膀胱经，有利水通淋作用，治石淋茎痛，助金钱草的排石之功，故列为臣药；炙鸡内金性味甘平，入脾、胃、小肠、膀胱经，具有健脾理肠的作用，防止消石之品碍胃之弊；再以冬葵子、石韦相辅，均具有通淋的功效。所以本方治疗尿路结石有良好疗效。

00750 三油膏

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 柏油 牛油 香油各一两 黄蜡一两 银朱一两 铅粉二钱 麝香二钱

【用法】 成膏。搽患处，火烘之，以油干为度。

【主治】 鹅掌风及血风等疮。

【备考】 本方原名二油膏，与方中所用三油之数不符，据《金鉴》改。

00751 三宝粥

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生山药（轧细）一两 三七（轧细）二钱 鸦蛋子（去皮）五十粒

【用法】 上药先用水四钟，调和山药末煮作粥。煮时，不住以箸搅之，一两沸即熟，约得粥一大碗，即用其粥送服三七末、鸦蛋子。

【主治】 痢久，脓血腥臭，肠中欲腐；兼下焦虚惫，气虚滑脱者。

【临证举例】 痢疾 己巳之岁，愚客居德州，有卢雅雨公曾孙女，年五十六，于季夏下痢赤白，迁延至仲冬不愈。因诊之，脉象微弱，至数略数，饮食减少，头目时或眩晕，心中微觉烦热，便时下坠作疼，然不甚剧。询其平素下焦畏凉，是以从前服药，略加温补，上即烦热；略为清理，下又腹疼泄泻也。为拟此方，一日连服两次，其病遂愈。

00752 三建丹

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】 阳起石（火煅通红） 附子（炮，去皮脐） 钟乳粉各等分

【用法】 上为细末，和匀，用糯米糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食前用米饮送下。

【功用】 壮元阳，补真气。

【主治】 劳伤虚损，下经衰竭，肾气不固，精溺遗失，脏腑自利，手足厥冷；或脉理如丝，形肉消脱；或恶闻食气，声嘶失音。

【宜忌】 忌豉汁、羊血。

00753 三建汤

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】 天雄（炮，去皮脐） 附子（炮，去皮脐） 大川乌（炮，去皮脐）各等分

【用法】 上为粗末。每服四钱，水二盏，加生姜十五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【功用】《永类钤方》：除痼冷，扶元气。

【主治】 真气不足，元阳久虚，寒邪攻冲，肢节烦疼，腰背痠痛，自汗厥冷，大便滑泄，小便白浊；及中风涎潮，不省人事；伤寒阴证，厥逆脉微。

00754 三建膏

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】 天雄 附子 川乌各一枚 桂心 观桂 桂枝 细辛 干姜 蜀椒各二两

【用法】 上切为片。麻油二斤浸，春五、夏三、秋七、冬十日，煎熬去滓，滤净再熬，徐下黄丹，不住手搅，滴水不散为度。阴疽，以葱汤洗净，摊成加银粉少许，贴患处；腹痛、少食、泄泻、摊成加丁香末少许，贴脐中及中脘；阳衰精冷，摊成加阿芙蓉少许，贴脐中及丹田；冷哮喘嗽，摊成加麝少许，贴肺俞及华盖、膻中；癥瘕冷积，摊成加麝香、阿魏少许贴患处。

【主治】 阴疽歹肉不化，腹痛泄泻，阳衰精冷，冷哮喘嗽，癥瘕冷积。

00755 三茱丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】 山茱萸 吴茱萸（汤洗七次） 食茱萸 青橘皮（去白） 茴香（微炒） 肉桂（去粗皮） 金铃子（去核，炒） 陈橘皮（去白） 木香各等分

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，食前用温酒或盐汤送下。

【主治】 膀胱疝气，时发疼痛，久而不除，渐至坚大。

00756 三星汤

【方源】《辩证录》卷十三。

【组成】 金银花二两 蒲公英一两 生甘草三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《辩证录》：对口痈。患对口之后，忽生小疮，先痒后痛，随至溃烂。②《外科真诠》：妇人乳痈。乳头腐烂，延及周围。

00757 三香汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 瓜蒌皮三钱 桔梗三钱 黑山栀二钱 枳壳二钱 郁金二钱 香豉二钱 降香末三钱

【用法】 水五杯，煮取二杯，分二次温服。

【主治】 温热受自口鼻，自募原直走中道，不饥不食，机窍不灵。

【方论选录】 此证由上焦而来，其机尚浅，故用蒌皮、桔梗、枳壳微苦微辛开上；山栀轻浮微苦清热；香豉、郁金、降香化中上之秽浊而开郁。

【临证举例】 右胁胸痛 《浙江中医杂志》(1982；6:257)：周某，男，28岁。负重右侧胸胁被撞，自觉疼痛，影响呼吸。平日嗜酒，兼咳嗽有痰，有时不易咯出，口渴，尿黄，大便燥结，食纳较差，舌尖稍红，苔薄黄，脉数而略弦滑。服三香汤加减，二剂告愈。

00758 三香酒

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】 南木香三钱 小茴香三钱 八角茴香三钱 川楝肉三钱

【用法】 上合一服，锅内炒，入连须葱白五根，水一碗，淬入锅，将碗罩住，候煎至半碗，取出去滓，加陈酒半碗合和，入炒盐一茶匙，空心热服。

【主治】 ①《古今医鉴》：偏坠气。②《仙拈集》引《外科全生集》：疝初起肿痛。

00759 三香散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 沉香 紫苏 白豆蔻各等分

【用法】 上为细末。每服五七分，柿蒂煎汤调下。

【主治】 胃冷呃逆，经久不止。

00760 三香散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 沉香 木香 蔻仁 苏叶 藿香

【用法】 食呃。饮食堵塞胸中，或食物太甚，咽而不下，发为呃逆。

00761 三祛汤

【方源】 方出《丹溪心法》卷四，名见《观聚方要补》卷四引《百代医宗》。

【组成】 酒片芩 一两 苍术 羌活 防风各五钱 细辛二钱 苍耳三钱

【用法】 上为末。每服三钱，加生姜一大片，同擂匀，茶汤荡起服之。

【主治】 ①《丹溪心法》：头风。②《观聚方要补》引《百代医宗》：风湿热头痛。

00762 三神丸

【方源】《济生》卷六。

【组成】 橘红二两 延胡索（去皮，醋煮）一两 当归（去芦，酒浸，醋略炒）一两

【用法】 上为细末，酒煮米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，加至一百丸，空心艾汤送下，米饮亦得。

【主治】 妇女血气相搏，腹中刺痛，痛引心端，经行涩少；或经事不调，以致疼痛。

【方论选录】《医略六书》：心肝血滞，不能输化子经隧，故经行涩少，牵引作痛。橘红调肝以化滞气，当归养血以荣心，延胡活血止痛以调经脉。酒煮为糊以丸之，艾汤以温之，米饮以下之，无不血调经荣，则心肝二气和平，可无牵引作痛之患，何有经水涩少之虞。

00763 三神丸

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】 枳壳（炒，去瓤） 皂角（烧存性） 五倍子各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三二十丸，食前温水送下。

【主治】 痔疾。

00764 三神丸

【方源】《临证指南医案》卷七。

【组成】 五味子 补骨脂 肉果

【功用】《温病条辨》：温补肾阳，收涩止痢。

【主治】 痢久伤肾阴，下焦坎阳亦衰，八脉不固，肠膩自滑而下，纳谷运迟。

【备考】 本方改为汤剂，名“三神汤”（见《镜京直指》）。

00765 三神汤

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】 苍术七钱 川萆薢七钱 小茴香一两

【用法】 上锉，加生姜三片煎，入盐一捻同服。

【主治】 遗精白浊。

00766 三神散

【方源】《内经拾遗》。

【组成】 大茴香 荔枝核 橄榄核各一钱五分

【用法】 上为细末。空心酒调下。

【主治】 寒疝疼痛。

00767 三神散

【方源】 方出《直指附遗》卷二十六，名见《医部全录》卷一七一。

【组成】 明白矾 黄丹

【用法】 加麝少许，研末。敷。

【主治】 腋气。

【备考】《医部全录》：明矾、黄丹各一钱，麝香少许。上为细末。频擦之。

00768 三神煎

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】 桃仁一千三（二）百粒（汤浸，去皮尖双仁，研，旋以水滤取浓汁五升） 荆三棱三两（炮裂，锉） 鳖甲三两（涂醋炙微黄，去裙襕）

【用法】 上件药，除桃仁外，捣罗为末。于铛中先煎桃仁汁耗一半，下二味药末，以木蓖不住手搅，煎良久；又下好酒三升，煎如稀饧，收瓷瓶中盛。每日空心及晚食前以热酒一中盏，调下一茶匙。

【主治】 虚劳癥瘕，结块不消者。

【宜忌】 忌苋菜、生冷、湿面。

00769 三真汤

【方源】《洞天奥旨》卷六。

【组成】 地榆一斤 生甘草二两 金银花一两

【用法】 水十碗，先煎地榆至三碗，再入后二味同煎至一碗，服一剂。服完则消。

【主治】 大小肠痈。

00770 三倍汤

【方源】《局方》卷十（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 草豆蔻仁二两 甘草一两 生姜五两 炒盐五两

【用法】 上药杵和匀，入瓷器内淹一宿，焙干为末。沸汤点服。

【主治】 脾胃不和，胸膈闷满，饮食不化，呕逆恶心，或霍乱呕吐，心腹刺痛，肠鸣泄痢，水谷不分。

00771 三消丸

【方源】《问春》卷三。

【组成】 甘遂 木香 巴豆（去壳）各一钱

【用法】 上为末，寒粟米饭为丸，如梧桐子大。量人虚实用之，实者每服二分，虚者每服分半。先用五苓散加瞿麦、车前、木通、滑石煎服，后服此三消丸。消上用陈皮汤送下；消下用葱白汤送下。隔一日进一服，三服止。若动三五次，以冷粥补之。消完后用白术三两，陈皮二两，甘草（炙）二两，厚朴（姜炒）二两，皂矾三两，用面炒尽烟，或用醋炒皂矾三五次，同煎药研为末。醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米汤送下，每日进一服，连服四十九日而安。

【主治】 肿胀。

【宜忌】 忌恼怒，戒煎炒及无鳞鱼、诸般发物。

00772 三消丸

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】 黄连一两（一半用吴萸煎汁去渣浸炒，一半用益智仁炒，去益仁不用） 川芎五钱 莱菔子一两五钱（炒） 桃仁十粒 山栀 青皮 三棱 莪术各五钱（俱用醋炒） 山楂一两 香附一两（童便浸，炒）

【用法】 上为末，蒸饼为丸。食远服，用补中益气汤送下五六十丸；或用白术三钱，陈皮五钱，水一钟，煎五分送下亦可。

【主治】 妇人产后死血、食积、痰饮凝滞不散，而致恶露不尽者。

00773 三消饮

【方源】《温疫论》卷一。

【组成】 槟榔 草果 厚朴 白芍 甘草 知母 黄芩 大黄 葛根 羌活 柴胡

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 温疫毒邪表里分传，膜原尚有余结，舌根渐黄至中央者。

00774 三益膏

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 银朱 蓖麻子肉

【用法】 杵如泥，作夹纸膏贴。去黑肉令尽，随煮猪头肉汤洗之；次用青布五寸，入牛猪板油一两，白蜡末三钱，卷条燃着，接其油搽之。

【主治】 血风藤疮。

00775 三萸丸

【方源】《保命歌括》卷二十。

【组成】 六一散一料 吴茱萸（制） 一两

【用法】 上为末，捣饭为丸服。

【主治】 吞酸，自利。

00776 三黄丸

【方源】《圣惠》卷十七。

【异名】 小三黄丸(《得效》卷三)、清热三黄丸(《全国中药成药处方集》武汉方)。

【组成】 黄芩二两 黄连一两（去须） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。不拘时候，每服三十丸，以温水送下。

【功用】《中药制剂手册》：清热通便。

【主治】 三焦积热，目赤肿痛，口舌生疮，消渴烦躁，尿赤便秘；或热迫血行，吐血、衄血、便血；或热毒壅聚，致生疮疖、痔疮等。

①《圣惠》：热病烦渴，诸脏不安。②《局方》(吴直阁诸家名方)：丈夫、妇人三焦积热。上焦有热，攻冲眼目赤肿，头项肿痛，口舌生疮；中焦有热，心膈烦躁，不美饮食；下焦有热，小便赤涩，大便秘结，五脏俱热，即生痈疖疮痍；及五般痔疾，粪门肿痛，或下鲜血。③《得效》：三焦积热，头目昏痛，肩背拘急，肢节烦疼，热气上冲，口苦唇焦，咽喉肿痛，痰涎壅滞，眼赤睛痛。④《永类钤方》：小儿诸热及身黄黄疸，鼻衄便血，积热吐血，咽膈不利。⑤《普济方》：肾咳恶热。⑥《医学正传》引河间：三焦火盛，消渴不生肌肉。⑦《仁术便览》：脾热口甜。

【宜忌】《中药制剂手册》：孕妇忌服。

00777 三黄丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 黄芩半两（去心） 大黄（去皮，湿纸裹煨） 黄连（去须）各一钱

【用法】 上为细末，面糊为丸，绿豆大或麻子大。每服五七丸至十五丸、二十丸，食后米饮送下。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：小儿诸热。②《卫生总微》：热症心躁夜啼，亦治昼啼。

【备考】《卫生总微》用人参汤送服。

00778 三黄丸

【方源】《三因》卷八。

【异名】 金黄丸(《普济方》卷三十三)。

【组成】 黄芩六两（冬用三两） 大黄二两（冬用四两，夏用三两） 黄连四两（夏用七两，秋用六两，冬用二两）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如豆大。每服十丸至十五丸，米饮送下。

【主治】 骨实极热，耳鸣，面色焦枯，隐曲膀胱不通，牙齿脑髓苦痛，手足酸疼，大小便闭。

00779 三黄丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 大黄 黄芩 黄柏各等分

【用法】 上为末，水为丸。每服二十丸，水送下。

【主治】 ①《儒门事亲》：男子、妇人咯血、衄血、嗽血、咳脓血。②《良朋汇集》：杨梅疮。

00780 三黄丸

【方源】《袖珍》卷三。

【异名】 噙化三黄丸(《奇效良方》卷四十八)。

【组成】 大黄 黄芩 黄连各二两半 黄药子 白药子各一两半 山豆根 黄柏 苦参各一两 硼砂二两 京墨三钱 麝香少许 片脑一钱半

【用法】 上为末，猪胆调，摊甑内蒸药三次后，入片、麝、硼为丸，如豆大。噙化一丸，后食。

【主治】 喉痹。

【加减】 冬，加知母。

00781 三黄丸

【方源】《明医指掌》卷六。

【组成】 苍术一两半 陈皮一两半 黄连七钱半 连翘半两

【用法】 上为末，生地捣烂糊丸，如梧桐子大。白汤送下。

【主治】 积热便血。

00782 三黄丸

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 熟大黄三两 乳香 没药末各一两 雄精五钱 麝香一钱五分 西牛黄三分

【用法】 先将熟大黄酒浸透，隔水蒸软，捣烂；然后以乳、没、雄、麝、西五末和入，再捣千捶为丸，如梧桐子大。每服五钱，连服十次。

【主治】 悬痈，红肿疼痛，热毒大痈，杨梅广疮结毒。

【宜忌】《验方新编》：孕妇忌服。

00783 三黄丹

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 大黄 90 克 黄柏 30 克 黄连 9 克 煅石膏 60 克 枯矾 180 克

【用法】 上为细末。用麻油调搽，每日一次。

【功用】 清热，解毒，收湿。

【主治】 黄水疮。

00784 三黄汤

【方源】《祖剂》卷一引伊尹。

【异名】 火齐汤(《张氏医通》卷十六引仓公方)。

【组成】 大黄二两（如丸，春一两、夏秋二两、冬五两） 黄连一两（如丸，春四两、夏五两、秋三两、冬二两） 黄芩一两（如丸，春四两、夏秋六两）

【用法】 上药以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，分温再服。

【主治】 心下痞，按之濡，关上脉浮。

00785 三黄汤

【方源】《千金》卷八引张仲景方。

【异名】 千金三黄汤（《金匮》卷上附方）、加减三黄汤（《圣济总录》卷十）、三黄散（《普济方》卷三一六）、三黄独活汤（《校注妇人良方》卷三）。

【组成】 麻黄三十铢（去节） 黄耆十二铢 黄芩十八铢 独活一两 细辛十二铢

【用法】 以水五升，煮取二升，分二服。一服小汗出，两服大汗。

【主治】 ①《千金》引张仲景方：中风，手足拘挛，百节痛烦，烦热心乱，恶寒经日，不欲饮食。②《普济方》：贼风偏猥腿风，半身不遂，失音不语。

【加减】《千金》引仲景：心中热，加大黄半两；胀满，加枳实六铢；气逆，加人参十八铢；心悸，加牡蛎十八铢；渴，加栝楼十八铢；先有寒，加八角附子一枚。

【方论选录】 ①《张氏医通》：此方《千金》云仲景三黄汤，治恶寒经日不止，不欲饮食，全似内外虚寒之候，而方中仅用黄芩之苦寒，岂不疑麻黄辈之温散乎？既用麻黄，复用黄耆，岂不疑表气之闭拒乎？曷知恶寒经日不止，虽有似乎虚寒，而实卫虚不能胜邪所致；不欲饮食，亦是风热内蕴之故；观烦热心乱一语，病情灼然。故方中虽以麻黄、独活、细辛开发腠理于外；即以黄芩清解风热于内，更虑卫虚难于作汗，乃以大剂黄耆助之，与黄耆建中之义不殊。其用黄耆之意有二：一以佐麻黄开发之权，一以杜虚风复入之路也。方后复云，心热加大黄，言服前药后心中烦热不除，知黄芩不能祛之外散，即以本方加大黄以引之下泄也。其加枳实、加人参、加牡蛎、加栝楼等法，或治旺气，或助本元，各随标本而施。加附子者，专佐麻黄之蒸发，助黄耆温经，殊非阴寒之谓，与麻黄附子细辛汤同源异流。②《法律》：此方治风入荣卫肢节之间，扰乱既久，证显烦热恶寒不食，邪盛正虚可知。其用麻黄为君者，以麻黄能通阳气而开痹也；故痹非得汗不开，然内虚当虑，须用参、耆以佐之；而虚复有寒热之不同，虚热则用黄芩，虚寒则加附子。

00786 三黄汤

【方源】《千金翼》卷十五。

【异名】 泻心三黄汤（《活人书》卷十九）、泻心汤（《得效》卷八）。

【组成】 大黄 黄连 黄芩各三两

【用法】 上㕮咀。以水七升，煮取三升，分为三服。

【主治】 三焦壅热，烦躁谵语，腹痛胀满，大便秘结，胬肉攀睛。

①《千金翼》：服石后，石忽发动，目赤口疳，腹痛胀满卒急。②《活人书》：妇人伤寒六七日，胃中有燥屎，大便难，烦躁谵语，目赤，毒气闭塞不得流通。③《兰台轨范》引《本事》：三焦实热，一切有余火症，大便秘结者。④《得效》：心受积热，谵语发狂，逾墙上屋。⑤《银海精微》：脾胃积热，胬肉攀睛。⑥《嵩崖尊生》：热症口疳。

00787 三黄汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】 黄连 黄芩 山栀 石膏 芍药 白术（去芦）减半 桔梗 陈皮 茯苓（去皮）各等分 甘草减半 乌梅一个

【用法】 上锉一剂。水煎，食后服。

【主治】 脾热口甜。

00788 三黄汤

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】 黄连钱半 黄芩钱半 黄柏钱半 山栀钱半（炒） 玄参钱半 知母钱半 石膏五钱 甘草五分 淡豉钱半

【用法】 水煎服。

【主治】 膏粱积热，三焦见诸火证，脉洪数者。

【方论选录】 膏粱积热，蕴蓄于中，不得舒泄，而弥漫三焦，故发火证。黄连清心、脾之火，黄芩清肺、肠之火，黄柏清肾、膀胱之火，栀子清三焦之火，玄参清浮游之火，知母清肠胃之火，石膏清胃泻热，甘草缓中和药，佐淡豉以发泄热邪也。使热化火降，则三焦肃清而经络宣通，安有火发之患哉！此清收疏热之剂，为三焦热盛之专方。

00789 三黄汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 银花31克 连翘31克 黄芩9克 黄连9克 黄柏9克 紫草9克 栀子9克 蒲公英15克

【用法】 水煎，内服。

【主治】 疖。

00790 三黄粉

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】雄黄二钱 硫黄二钱 雌黄五分 白附子五钱 密陀僧二钱 白及二钱 麝香三分 冰片三分 朱砂二钱

【用法】治疗白癜风，用茄蒂或茄皮蘸药外用；圆形脱发，用生姜蘸药外用；面部色素沉着，用牛奶或蜂蜜水调药外用。

【功用】和营血，生毛发，消斑痣。

【主治】白癜风，圆形脱发，面部色素沉着。

【宜忌】肉芽溃疡疱面及汞过敏者禁用；慎勿入口。

00791 三黄散

【方源】《小儿药证直诀·附方》。

【组成】牛黄 大黄 生地黄 木香 青黛各等分

【用法】上为末。每服一钱匕，熟水调服。

【主治】①《小儿药证直诀·附方》：肾疳。②《准绳·幼科》：牙龈肿烂出血，牙齿摇动，口内气臭，身微潮热。

00792 三黄散

【方源】《本事》卷五。

【组成】大黄一两（湿纸裹，甑上蒸） 黄连半两（去须） 黄芩（去皮）半两

【用法】上为细末。每服二钱，新水调下；蜜水亦得。

【主治】①《本事》：衄血无时。②《卫生总微》：小儿伤寒发黄。

【方论选录】《本事方释义》：大黄气味苦寒，入足阳明、太阴；黄连气味苦寒，入手少阴、太阳；黄芩气味苦寒，入手太阴、阳明。此阳气上逆，血热妄行，非大苦寒之药，不能使阳气下行，乃正治之方也。

00793 三黄散

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】大黄 黄柏 黄连各等分

【用法】上为末。猪胆汁调涂头心及贴脚心。

【主治】一切丹肿毒。

00794 三黄散

【方源】《疡医大全》卷十七。

【组成】生地 蒲黄 牛黄 冰片

【用法】上为极细末。用芭蕉根汁或扁柏叶汁和蜜调敷。如肿硬不消，因气凝血滞，或痰块结而不散，则兼阴证矣，宜用姜汁、葱汁调敷。

【主治】头痈，面痈，小儿丹毒。

00795 三黄散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】生大黄 姜黄各二钱 生蒲黄五分 冰片五厘 麝香二厘

【用法】上为细末。用白蜜调，加葱、姜汁二三匙敷患处；或芭蕉根汁、扁柏叶汁和蜜调俱可。

【主治】颈痈、面痈、打腿痈、小儿丹毒。兼阴症疮疡。

00796 三捷汤

【方源】《医学传心录》。

【组成】青皮一钱 官桂五分 归尾一钱 槟榔二钱 大茴香七分（微炒） 黄柏三分 橘核二钱 木通二钱 紫苏七分 香附一钱 赤茯苓二钱 柴胡一钱 荔枝核七个（炒） 姜一片

【用法】水三钟，煎一钟，空心热服。

【主治】肝经湿热下注，不得泄越，或为偏坠，或为疝痛。

00797 三蛇丹

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】三蛇愈风丹（《本草纲目》卷四十三）。

【组成】土桃蛇 乌桃蛇 白花蛇各一条 苦参四两

【用法】上为末，用皂角煎膏为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，煎防风通圣散送下，粥饭压之，日二服，三日一洗。

【主治】大风手足麻木，发脱眉落，遍身疮疹瘙痒，一切疥癣风痰。

【备考】方中土桃蛇，《本草纲目》作"土腹蛇"。

00798 三脘散

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【异名】大三脘散（《传家秘宝》卷三）、三脘汤（《普济方》卷三五四）。

【组成】大腹皮（酒浸一遍，更以大豆汁洗三遍，焙干用）一两 白术 木香 甘草（微炙） 槟榔 陈橘皮（汤浸，去瓤） 川芎各三分 独活 紫苏（并梗） 沉香 木瓜（干者）各一两

【用法】上为散。每服一分，水二盏，同煎至一盏，去滓温服。取大便通效。

【主治】①《脚气治法总要》：脚气，三焦气逆，大便秘滞，胸膈胀憋气。②《妇人良方》：妇人中焦虚痞，两胁气痛，面目手足浮肿，大便秘涩。

【临证举例】妇人胁痛 《妇人良方》：一妇人，中焦虚痞，腹胁胀痛，大便秘结，六脉微弱，更数医服药无效，投此药不终剂而愈。

婴

12956 婴儿湿疹软膏 …(1735)

铜

12957 铜末散 ……(1736)
12958 铜青散 ……(1736)
12959 铜粉丸 ……(1736)
12960 铜绿散 ……(1736)
12961 铜绿软膏 ……(1736)

银

12962 银白散 ……(1736)
12963 银花汤 ……(1736)
12964 银杏汤 ……(1736)
12965 银杏散 ……(1736)
12966 银杏散 ……(1736)
12967 银杏膏 ……(1736)
12968 银荷汤 ……(1737)
12969 银粉散 ……(1737)
12970 银液丹 ……(1737)
12971 银翘汤 ……(1737)
12972 银翘散 ……(1737)
12973 银苇合剂 ……(1738)
12974 银杏无忧散 ……(1738)
12975 银杏瓜蒌散 ……(1739)
12976 银翘马勃散 ……(1739)
12977 银翘辛夷汤 ……(1739)
12978 银翘散加生地丹皮赤芍麦冬方 ……(1739)
12979 银翘散去牛蒡子玄参加杏仁滑石方 …(1739)
12980 银翘散去牛蒡子玄参芥穗加杏仁石膏黄芩方 ……(1739)
12981 银翘散去豆豉加细生地丹皮大青叶倍玄参方 ……(1739)

移

12982 移毒散 ……(1739)
12983 移险散 ……(1739)
12984 移热汤 ……(1739)

甜

12985 甜浆粥 ……(1739)
12986 甜瓜子丸 ……(1740)
12987 甜瓜子散 ……(1740)
12988 甜葶苈丸 ……(1740)
12989 甜葶苈丸 ……(1740)
12990 甜葶苈丸 ……(1740)
12991 甜葶苈丸 ……(1740)
12992 甜葶苈散 ……(1740)

梨

12993 梨膏 ……(1740)

偏

12994 偏风散 ……(1740)

假

12995 假苏散 ……(1741)

兜

12996 兜涩固精丸 ……(1741)

徙

12997 徙薪饮 ……(1741)

得

12998 得效百部丸 ……(1741)

衔

12999 衔化丸 ……(1741)

敛

13000 敛汗丸 ……(1741)
13001 敛汗汤 ……(1741)
13002 敛肠丸 ……(1741)
13003 敛肺汤 ……(1741)
13004 敛毒散 ……(1741)
13005 敛带丸 ……(1741)
13006 敛疮丹 ……(1742)
13007 敛疮丹 ……(1742)
13008 敛阴泻肝汤 ……(1742)

猪

13009 猪心丸 ……(1742)
13010 猪肝丸 ……(1742)
13011 猪肝脯 ……(1742)
13012 猪肝散 ……(1742)
13013 猪肝散 ……(1743)
13014 猪肝羹 ……(1743)
13015 猪肚丸 ……(1743)
13016 猪肚丸 ……(1743)
13017 猪肚丸 ……(1743)
13018 猪肚丸 ……(1743)
13019 猪肚羹 ……(1743)
13020 猪苓丸 ……(1743)
13021 猪苓汤 ……(1744)
13022 猪苓汤 ……(1745)
13023 猪苓汤 ……(1745)
13024 猪苓散 ……(1745)
13025 猪苓散 ……(1745)
13026 猪肾丸 ……(1746)
13027 猪肾丸 ……(1746)
13028 猪肾汤 ……(1746)
13029 猪肾汤 ……(1746)
13030 猪肾粥 ……(1746)
13031 猪肾羹 ……(1746)
13032 猪肤汤 ……(1746)
13033 猪肺丸 ……(1747)
13034 猪胆丸 ……(1747)
13035 猪胆膏 ……(1747)
13036 猪胆膏 ……(1747)
13037 猪脊汤 ……(1747)
13038 猪胰酒 ……(1747)
13039 猪脂丸 ……(1747)
13040 猪脏丸 ……(1747)
13041 猪脏丸 ……(1747)
13042 猪脏丸 ……(1747)
13043 猪脾粥 ……(1748)
13044 猪蹄汤 ……(1748)
13045 猪蹄汤 ……(1748)
13046 猪蹄汤 ……(1748)
13047 猪蹄粥 ……(1748)
13048 猪心血丸 ……(1748)
13049 猪肾子饮 ……(1748)
13050 猪膏发煎 ……(1748)
13051 猪肝枸杞酒 ……(1749)
13052 猪肚黄连丸 ……(1749)
13053 猪肾荠苨汤 ……(1749)
13054 猪腰青盐杜仲方 …(1749)

猫

13055 猫头丸 ……(1749)

酸水，翻胃脾疼；食积气块，攻刺腹胁，不思饮食，日渐羸瘦；年高气弱，三焦痞塞，常觉妨闷。

00807 三棱散

【方源】《普济方》卷三九三。

【组成】 三棱（炮） 莪术（炮） 益智仁（去壳） 甘草（炙） 神曲 麦芽 橘红各五分

【用法】 上为末。白汤调下。

【功用】 疏脾土，消食化积。

【主治】 ①《婴童百问》：乳哺不节，过伤于脾，久则成疳。②《丹溪心法附余》：小儿积聚癖块。

00808 三棱散

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】 三棱八钱 川芎四钱 大黄（醋煨）一钱

【主治】 ①《嵩崖尊生》：一切积聚。②《杂病源流犀烛》：气痛。

【备考】《中国医学大辞典》本方用法：研为末，清水煎服。

00809 三棱煎

【方源】《三因》卷十八。

【异名】 三棱丸(《景岳全书》卷五十五)。

【组成】 三棱 蓬术各四两 青皮 半夏（汤洗七次） 麦芽各三两

【用法】 上用好醋六升煮干，焙为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，醋汤送下；痰积，生姜汤送下。

【主治】 妇人血癥、血瘕、食积、痰滞。

00810 三痟丸

【方源】《本事》卷六。

【异名】 瓜莲丸(《直指》卷十七)、三消丸(《赤水玄珠》卷十一)。

【组成】 好黄连（去须，细末）不计多少

【用法】 锉冬瓜肉，研裂，自然汁和黄连末做成饼子，阴干；再用末，再用汁浸和，如是七次，即用冬瓜汁为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，以冬瓜汁煎大麦仁汤送下。寻常渴，只一服。

【主治】 消渴。

【方论选录】《本事方释义》：川连气味苦寒，入手少阴；冬瓜气味微寒，入手太阳、手足阳明。此治三消之证致消渴不止者，皆由火气上炎，津液被劫，以苦寒、甘寒之味，制其上炎之火，而津液自振矣。

00811 三痫丹

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷十一引钱乙方。

【异名】 全蝎五痫丸(《直指小儿》卷二)、五痫丹(《医部全录》卷四三二)。

【组成】 蜈蚣一条 牛胆南星二钱 全蝎 防风 白附子 远志 芦荟 延胡索 辰砂各一钱 麝香一字 金、银箔各三片

【用法】 上为末，糊为丸，如梧桐子大，金、银箔为衣。每服一丸，以薄荷汤化下。

【主治】 急惊为痫。

【备考】《直指小儿》：每服一丸，菖蒲、紫苏煎汤调下。

00812 三解汤

【方源】《医方考》卷二。

【组成】 麻黄（去节） 柴胡（去芦） 泽泻各三钱

【主治】 时行之疟，长幼相似者。

【方论选录】 ①《医方考》：病有三在：在表，在里，在半表半里也。人在气交之中，鼻受无形之气，藏于分肉之间，邪正分争，并于表则在表，并于里则在里，未有所并，则在半表半里。是方也，麻黄之辛，能散表邪，由汗而泄；泽泻之咸，能引里邪，由溺而泄；柴胡之温，能使半表半里之邪，由中以解，则病之三在，此方率治之矣。虽然，此方但可以泻实耳，虚者犹当辨其气血而补之，所谓虚者十补，勿一泻也。②《增补内经拾遗》：壶隐子曰，夏伤于暑，秋必痎疟，故用泽泻泻心经之热自小肠中出也；寒热不清，故用柴胡以清之；无汗要有汗，故用麻黄以发之。三解云者，谓药能通解之也。③《医林纂要》：麻黄以经言，则行太阳经，浮在皮毛，而太阳经夹膂脊以行者；以脏言，则麻黄泻肺邪，而肺俞则附于脊骨之第三椎下。寒凉之气袭于皮毛，栖于膂脊，故用麻黄最为对证之药，勿以过于表散疑之也。因湿暑之留伏于内，而导而下之，泽泻以渗湿，而暑气亦随之以下。以阳气之郁而不能升也，藉柴胡以升之，柴胡主能散邪，不必问其专经。疟之初起，此方为最宜。疟之邪气方殷，无庸虑其虚而遽加补也。

【备考】《增补内经拾遗》本方用法：水二钟，煎八分，未发先温服。

00813 三痹汤

【方源】《妇人良方》卷三。

【组成】 川续断 杜仲（去皮，切，姜汁炒） 防风 桂心 华阴细辛 人参 白茯苓 当归 白芍药 甘草各一两 秦艽 生地黄 川芎 川独活各半两 黄耆 川牛膝各一两

【用法】 上为末。每服五钱，水二盏，加生姜三片、大枣一枚，煎至一盏，去滓热服，不拘时候，

但腹稍空服之。

【主治】 ①《妇人良方》：血气凝滞，手足拘挛、风痹、气痹等疾。②《谦斋医学讲稿》：下肢痛，常因坐卧阴冷潮湿之处引起，痛时伴有寒冷、沉重感觉，或足胫有轻微浮肿。

【方论选录】 ①《法律》：此用参、耆、四物一派补药，内加防风、秦艽以胜风湿，桂心以胜寒，细辛、独活以通肾气。凡治三气袭虚而成痹患者，宜准诸此。②《医方集解》：风痹诸方，大约祛风胜湿泻热之药多，而养血补气固本之药少。惟此方专以补养为主，而以治三气之药从之，散药得补药以行其势，辅正驱邪，尤易于见功。③《古今名方》：本方与独活寄生汤的功效与证治近似，但独活寄生汤略重于治腰腿痹痛，偏于血弱；本方略重于治手足拘挛，偏于气虚。使用时应有所区别。

【临证举例】 手指不便 有人病左臂不随，后已痊平，而手指不便，无力，试诸药不验，服此药才半即安。

00814 三痹汤

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 人参 黄耆（酒炒） 白术 当归 川芎 白芍 茯苓各一钱 甘草（炙） 桂心 防己 防风 乌头（炮）各五分 细辛三分 生姜三片 红枣二个

【用法】 水煎，不拘时候热服。

【主治】 ①《张氏医通》：治风寒湿气合病，气血凝滞，手足拘挛。②《一盘珠》：治腰痛兼湿，痛必酸而麻木者。

【方论选录】 此方合保元、四君、内补建中、防己黄耆、防己茯苓汤、《千金》防己汤等方，但加防风以搜气分之风，川芎以搜血分之风，细辛搜骨髓之风。于原方中削去生地、牛膝、杜仲、续断、秦艽、独活，增入防己、白术、乌头以祛除风湿，则参附、耆附、术附、桂附、真武等法俱在其中。彼用附子之雄以播真阳，此藉乌头之烈以祛痹着。盖杂合之气，须杂合之方，方为合剂。第恐地黄、牛膝辈阴柔之药难振迅扫之威，是不得不稍为裁酌。

【备考】 本方方名，《观聚方要补》引作“改定三痹汤”。

00815 三霜丸

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 姜粉 枯矾 白硼砂

【用法】 上为末，口津液调和如粟米大。要用时将一丸放于大眦内。

【主治】 目疾，痒极难忍者。

00816 三之一汤

【方源】《洁古家珍》。

【组成】 柴胡八分 黄芩 人参 半夏 甘草（炒） 川芎 芍药 熟地黄 当归各三分

【用法】 上为粗末。依小柴胡汤煎服。

【主治】 ①《洁古家珍》：产后虚劳，虽日久而脉盛浮疾。②《奇效良方》：产后虚劳发热，日久不安。

【方论选录】《增补内经拾遗》：四物汤全用以养血，小柴胡汤但用三分之一为清热，故曰三之一。

00817 三不鸣散

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】 蝼蛄（水边、灯下、道旁各一个）

【用法】 上纳于瓶中，封之，令相噬，取活者一个，焙干为末。每服一钱匕，温酒调服，立通。

【主治】 小便不通及五淋。

00818 三五七散

【方源】《三因》卷七。

【组成】 大附子三两（炮，去皮脐） 山茱萸五两 山药七两

【用法】 上为末。每服二钱匕，酒调服；或㕮咀，每服四大钱，水盏半，加生姜五片，大枣一个，煎七分，去滓服。

【主治】 外感风寒，恶寒，头痛，眩晕，口眼㖞斜，耳聋，以及风湿寒痹。

①《三因》：感寒头眩，恶寒，口眼㖞斜，耳聋。②《永乐大典·医药集》引《风科集验方》：风湿寒痹。③《增补内经拾遗》：脑风头痛。

【方论选录】《增补内经拾遗》：“三”，附子三两；“五”，山茱萸五两；“七”，干山药七两，因数而名也。

【备考】 本方方名，《医方类聚》卷一〇九引作“三五七汤”。

00819 三五七散

【方源】《校注妇人良方》卷四。

【组成】 附子（炮） 细辛各三两 山茱萸 干姜（炮）各五两 防风 山药（炒）各七两

【用法】 上为末。每服二钱，温酒调服。

【主治】 八风五痹，肢体不仁，或风寒入脑，头痛目旋，耳内蝉鸣。

00820 三生萝卜

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】 水萝卜一枚

【用法】 周围钻七孔，入巴豆七粒，入土种之。

待其结子，取子又种。待萝卜成，仍钻七孔，入巴豆七粒，再种。如此三次。至第四次将开花时，连根拔起，阴干，收净磁器内。遇臌胀者，取一个捶碎，煎汤服之。重者二个即愈。

【主治】 臌胀。

00821 三色敷药

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】 黄荆子（去衣，炒黑）八两 紫荆皮（炒黑）八两 全当归 五加皮 木瓜 丹参 羌活 赤芍 白芷 片姜黄 独活各二两 甘草六钱 秦艽一两 天花粉二两 怀牛膝二两 川芎一两 连翘八钱 威灵仙二两 木防己二两 防风二两 马钱子二两

【用法】 上为细末。用蜜或饴糖调拌如厚糊状，敷于患处。

【功用】 消肿止痛，续筋骨，利关节。

【主治】 ①《中医伤科学讲义》：寒湿痹痛。②《中医方剂临床手册》：跌打损伤。

00822 三豆饮子

【方源】《伤寒总病论》卷四。

【异名】 三豆饮（《得效》卷十一）、三豆汤（《医学正传》卷八）、三豆饼子（《医统》卷九十一）、三豆稀痘丹（《痘疹仁端录》卷十三）、三豆子汤（《便览》卷四）。

【组成】 赤小豆 黑豆 绿豆各一升 甘草一两

【用法】 净淘，水八升煮熟。逐日空心任性食豆饮汁七日，永不发。预服此则不发。

【功用】 ①《伤寒总病论》：预防痘疹。②《得效》：活血解毒。

【主治】 痘疮，瘟疫。①《伤寒总病论》：天行疮痘。②《医统》：时行瘟疫。③《痘疹金镜录》：痘瘟热烦躁。

【备考】 ①《医学正传》：三豆淘净，同甘草用雪水八升（无则用长流水）煮豆熟为度，去甘草，将豆晒干，又入汁再浸再晒，汁尽为度，逐日取豆水煮，任意食之。②《医统》：饮之七日后疮必发快。

00823 三柴胡饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 柴胡二三钱 芍药一钱半 炙甘草一钱 陈皮一钱 生姜三五片 当归二钱（溏泄者，易以熟地）

【用法】 水一钟半，煎七八分，温服。

【主治】 素禀阴分不足，或肝经血少而偶感风寒者；或感邪不深，可兼补而散者；或病后、产后感冒，不得不从解散，而血气虚弱不能外达者。

【加减】 微寒咳呕者，加半夏一二钱。

00824 三黄洗剂

【方源】《外伤科学》。

【组成】 大黄 黄柏 黄芩 苦参各等量

【用法】 上为细末。10～15克加入蒸馏水100毫升、医用石碳酸1毫升，摇匀，以棉签蘸搽，每日多次。

【功用】 ①《外伤科学》：清热止痒，保护收敛。②《中医耳鼻喉科学》：解毒除湿。

【主治】 风热湿毒蕴结所致的皮炎、疖毒、耳疮。①《外伤科学》：各种急性无渗出性皮炎，单纯性皮肤瘙痒。②《中医症状鉴别诊断学》：风热湿毒耳痒。③《中医耳鼻喉科学》：旋耳疮。患处红肿焮痛，瘙痒，出水者。④《中医外科学》：急性皮肤病、疖病等有红肿焮痒，渗液者。

00825 三棱煎丸

【方源】《局方》卷三。

【异名】 大三棱煎丸（《古今医鉴》卷六）。

【组成】 杏仁（汤浸，去皮尖，麸炒黄色）硇砂（飞，研）各一两 神曲（碎，炒） 麦芽（炒）各三两 青皮（去白） 干漆（炒） 萝卜子（微炒）各三两 三棱（生，细锉，捣罗为末）八两（以酒三升，石器内熬成膏）

【用法】 上为末，以三棱膏匀搜和为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，食后温米饮送下。

【功用】 ①《局方》：顺气宽中，消积滞，化痰饮。②《寿世保元》：消胀软坚。

【主治】 食积痰饮，阻于中脘，气机不宣，脘痞腹胀，噫气不畅，呕吐痰涎，食欲不振，大便或溏或泻。①《局方》：中脘气痞，心腹坚胀，胁下紧硬，胸中痞塞，喘满短气，噫气不通，呕吐痰逆，饮食不下，大便不调，或泄或秘。②《得效》：脾虚，为肉食所伤，停久不散，发为腹满膨痛；宿食积聚，翻吐酸秽；膨满，食积气块，伤食夹脐痛甚。③《奇效良方》：癥瘕。

【备考】《得效》：加阿魏五钱重，名阿魏丸，又名起祖三棱丸。《医方类聚》引《经验秘方》"三棱煎丸"有蓬莪术、木香。

00826 三棱煎丸

【方源】《济生》卷六。

【组成】 京三棱 蓬术各二两 芫花半两 青皮（去瓤净）一两半

【用法】 上锉，如豆大，用好醋一升，煮干，焙为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食

前用淡醋汤送下。

【主治】 妇人、室女血瘕，月经不通，脐下坚结大如杯，久而不治，必成血蛊。

00827 三一肾气丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十九。

【组成】 熟地黄 生地黄 山药（俱怀庆者） 山茱萸肉各四两 牡丹皮 赤、白茯苓 泽泻 瑞阳 龟版各三两 牛膝（川者） 枸杞子（甘州者） 人参（辽） 麦门冬 天门冬各二两 知母 黄柏 五味子（辽） 肉桂各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，渐加至六七十丸，空心淡盐汤送下；或温酒送下。

【功用】 ①《丹溪心法附余》：补心肾诸脏精血，泻心肾诸脏火湿。②《北京市中药成方选集》：滋阴补气，强肾助阳。

【主治】《北京市中药成方选集》：身体衰弱，四肢无力，气血虚损，精髓不足。

【加减】 虚甚，加鹿茸一两，虚胫骨一两。

【方论选录】 人之一身，阳常有余，阴常不足，气常有余，血常不足，故滋阴补血之药，自幼至老，不可缺也。古方如肾气丸、补阴丸，俱是滋阴补血之剂，然因本丸胸满有痰者忌之，补阴丸脾虚有湿者忌之。惟肾气丸专于补血滋阴而兼理痰湿，最为切当，但品味数少，不足以尽其度。今广将三方合而为一，略用加减，名曰三一肾气丸，有补有泻，其故何哉？夫五脏藏精血者也，精血一虚，邪火乘之，而为湿热。补者，所以补其精血；泻者，所以泻其湿热也。世人徒知五脏精血虚而生火，殊不知五脏精血虚而邪火得以乘之。此方既用知母、黄柏以泻火，又用茯苓、泽泻以渗湿，尤为备也。

00828 三一承气汤

【方源】《宣明论》卷六。

【异名】 三乙承气汤（《得效》卷四）。

【组成】 大黄半两（去皮） 芒消半两 厚朴半两（去皮） 枳实半两 甘草一两

【用法】 上锉，如麻豆大。水一盏半，加生姜三片，煎至七分，纳消，煎二沸，去滓服。

【功用】《血证论》：攻下火结。

【主治】 伤寒、杂病里热壅盛，大、小、调胃三承气汤证兼备，腹满实痛，谵语下利，内热不便；及中风僵仆，风痫发作；产妇胞衣不下；小儿斑疹黑陷。

①《宣明论》：伤寒、杂病，内外所伤，日数远近，烦渴谵妄，心下按之硬痛，小便赤涩，大便结滞；或湿热内甚而为滑泄，热甚喘咳，闷乱惊悸，狂癫目疼，口疮舌肿，喉痹痈疡，阳明胃热发斑，脉沉可下者；小儿热极，风惊抽搐，气喘昏塞，并斑疹黑陷，小便不通，腹满欲死；或斑疹后热不退，久不作痂；或作斑纹疮癣，久不已者；佛热内成疹癖；坚积黄瘦，卒暴心痛，风痰酒隔，肠垢积滞，久缠风热，暴伤酒食，烦心闷乱，脉数沉实；或肾水阴虚，阳热独甚，而僵仆卒中，一切暴喑不语，蓄热内甚，阳厥极深，脉反沉细欲绝；或表之冲和正气，与邪热并之于里，则里热亢极，阳极似阴，反为寒战，脉微而绝；或风热燥甚，客于下焦，而大小便涩滞不通者；或产妇死胎不下，及两感表里热甚，须可下者。②《医方类聚》引《修月鲁般经》：伤寒结胸，虽脉浮而里势恶，虽可下者。③《医学入门》：玉茎中痛。④《准绳·类方》：伤寒大承气汤证腹满实痛，调胃承气汤证谵语下利，小承气汤证内热不便，三一承气汤合而为一也。及治中风僵仆，风痫发作。

【方论选录】 ①《医方类聚》引《修月鲁般经》：此方河间先生所制，缓下急下，善开发而解郁结，可通用三一承气，最为妙也。盖大黄苦寒，而通九窍二便，除五脏六腑积热；芒消咸寒，破痰散热，润肠胃；枳实苦寒，为佐使，散滞气，消痞满，除腹胀；厚朴辛温，和脾胃，宽中通气；四味虽下剂，有泄有补，加甘草以和其中。然以甘草之甘，能缓其急结，湿能润燥，而又善以和合诸药而成功，是三承气而合成一也。善能随证消息，但用此方，则不须用大、小承气并调胃等方也。②《成方切用》：谓合三承气为一方也。成无己曰：若大承气证，反用小承气，则邪不服；若小承气证，反用大承气，则过伤元气，而腹满不能食。仲景所以分而治之，后人以三方合而为一，云通治三方之证，及伤寒、杂病，内外一切所伤。与仲景之方，甚相违戾，失轩岐缓急之旨，使病人暗受其害，将谁咎哉？

【临证举例】 少阴伏暑 《全国名医验案类编·续编》引朱镜洲案：病者女，年十八岁。嫁未弥月，贪凉过食，患伏暑症，恶寒发热，投发散风寒，佐以芳香透达，寒热将罢，下利纯清，脉象长洪，舌苔厚腻，色带糙黄，系少阴热症。仲景有急下之法，盖暑虽属于三焦，膜原出入于阳明、太阳之间，然肠胃有宿食，少阴有伏气，燥屎不下，热结旁流，所下非血也，若不急下，必致内陷亡阴，用三一承气汤下之。大黄、芒消、枳实、厚朴、甘草。大便解后，黄苔即退，脉形洪大，转为柔软，

病即愈。

00829 三才大补膏

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】 生地黄一斤 熟地黄一斤 天门冬四两 麦门冬四两 人参四两 甘枸杞四两 牛膝四两 何首乌八两

【用法】 上㕮咀。勿犯铁器，同入大砂锅内，用水二十碗，煎至七碗，取汁别贮；药渣如前再煮九次，共得汁七十碗，滤渣极净；别用中等砂锅，入汁七碗，慢火煎熬，耗汁一碗，方添一碗，六十三碗皆添尽，则汁已浓矣，盖只得汁六碗；却用山白蜜去蜡，可一斤半，同前药入砂锅内，重汤煮汁，滴水不散，则成膏矣。瓷罐盛之，埋土中七日，取出，如前再煮一昼夜，再埋一宿，乃分贮小罂内封固。自煎至煮，但用桑柴火，药本寻常，妙在火候。不拘时以醇酒调服，味美而功多。若惩忿窒欲之人，又深居简出，时服此膏，亦可以擅其天年矣。

【功用】 补益。

00830 三才封髓丹

【方源】《医学发明》卷七。

【组成】 天门冬（去心） 熟地黄 人参（去芦）各半两 黄柏三两 缩砂仁一两半 甘草七钱半（炙）

【用法】 上为细末，水糊为丸，如梧桐子大。空心服五十丸，用苁蓉半两，切作片子，酒一大盏，浸一宿，次日煎三四沸，去滓，送下前丸。

【功用】 ①《医学发明》：降心火，益肾水。②《卫生宝鉴》：滋阴养血，润补下燥。

【主治】 ①《症因脉治》：肾虚舌音不清。肾经咳嗽，真阴涸竭。②《医方论》：梦遗走泄。

【方论选录】 ①《法律》：此子三才丸方内加黄柏、砂仁、甘草。以黄柏人肾滋阴，以砂仁入脾行滞，而以甘草少变天冬、黄柏之苦，俾合人参建立中气。②《医方集解》：此手足太阴少阴药也。天冬以补肺生水，入参以补脾益气，熟地以补肾滋阴。以药有天、地、人之名，而补亦在上、中、下之分，使天地位育，参赞居中，故曰三才也。③《医方论》：此方治龙雷之火不安，梦遗走泄则可，若肾气久虚，精宫不固者，岂得再用苦寒！断宜补肾纳气之法为是。

00831 三子地黄汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 熟地12克 山药 山萸肉 茯苓各9克 泽泻 牡丹皮各6克 菟丝子 沙苑子各9克 枸杞子12克

【功用】 补肾填精，

【主治】 肾中精气不足，症见神光受截，幻影色黑，不任久视，头晕耳鸣，腰膝酸软。

【方论选录】 方中六味地黄汤，滋补肾精以填精；菟丝子、沙苑子、枸杞子皆为甘温之品，阴阳双补，以助真元，真元充沛，神光升发，幻影自除。

00832 三子养亲汤

【方源】《杂病广要》引《皆效方》。

【异名】 三子汤（《寿世保元》卷三）。

【组成】 紫苏子 芥菜子 萝卜子

【用法】 上药各洗净，微炒，击碎。看何证多，则以所主者为君，余次之。每剂不过三钱，用生绢袋盛之，煮作汤饮，随甘旨，代茶水啜用，不宜煎熬太过。

【功用】《中医方剂学》：顺气降逆，化痰消食。

【主治】 高年咳嗽，气逆痰痞。

【加减】 若大便素实者，临服加熟蜜少许；若冬寒，加生姜三片。

【方论选录】 ①《韩氏医通》：紫苏子，主气喘咳嗽，白芥子主痰，萝卜子主食痞兼痰。②《医方考》：年高痰盛气实者，此方主之。痰不自动也，因气而动，故气上则痰上，气下则痰下，气行则痰行，气滞则痰滞。是方也，卜子能耗气，苏子能降气，芥子能行气。气耗则邪不实，气降则痰不逆，气利则膈自宽，奚痰患之有？此方为人子事亲者设也。虽然治痰先理气，此治标之论耳，终不若二陈有健脾去湿治本之妙也，但气实之证，则养亲汤亦径捷之方也。③《医方集解》：此手足太阴药也。白芥子除痰，紫苏子行气，莱菔子消食。然皆行气豁痰之药，气行则火降，而痰消矣。④《成方便读》：夫痰之生也，或因津液所化，或由水饮而成，然亦有因食而化者，皆由脾运失常，以致所食之物，不化精微而化为痰。然痰壅则气滞，气滞则伤肺，气失下行之令，于是为咳嗽，为喘逆等证矣。病因食积而起，故方中以莱菔子消食行痰；痰壅则气滞，以苏子降气行痰；气滞则膈塞，白芥子畅膈行痰。三者皆治痰之药，而又能于治痰之中各逞其长，食消气顺，喘咳日宁，而诸证自愈矣。

00833 三子调气丸

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】 苏子 白芥子 萝卜子 半夏曲 滑石（飞）各一两 前胡六钱 桂心三钱 黄芩 黄连各五钱，生诃子三钱 桔梗七钱 甘草四钱 橘红

（明矾、硼砂、玄明粉各二钱，煮干）二两

【用法】 上为末，生姜汁少许，竹沥一碗，打糊为丸，如绿豆大。食后服一钱，白汤送下，一日三次。

【主治】 梅核气。

00834 三仁承气汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 大麻仁三钱（炒香） 松子仁三钱（研透） 小枳实一钱半（炒香） 大腹皮二钱 光杏仁三钱（勿研） 生川军一钱（蜜炙） 油木香五分 猪胰（略炒）一钱

【功用】 缓下脾脏结热。

【主治】 胃燥脾约，液枯便闭。

【方论选录】 脾与胃以膜相连，膜者，脂膜也；上济胃阴，下滋肠液，皆脾所司。若发汗利小便太过，则胆火炽盛，烁胃熏脾；胃中燥而烦实，实则大便难，其脾为约，约则脾之脂膜枯缩矣。故君以麻、杏、松仁等多脂而香之物，濡润脾约，以滋胃燥；然胃热不去，则胆火仍炽，又必臣从生军、枳实，去胃热以清胆火，所谓釜底抽薪是也；佐以油木香、大腹皮者，以脾气喜焦香，而油木香则滑利脂膜，脾络喜疏通，而大腹皮又能直达脾膜也；妙在使以猪胰，善去油腻而助消化，以洗涤肠中垢浊。此胃燥脾约，液枯便闭之良方。

00835 三甲复脉汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 炙甘草六钱 干生地六钱 生白芍六钱 麦冬五钱（不去心） 阿胶三钱 麻仁三钱 生牡蛎五钱 生鳖甲八钱 生龟版一两

【用法】 水八杯，煮取三杯，分三次服。

【功用】《医方发挥》：滋阴清热，潜阳熄风。

【主治】 ①《温病条辨》：下焦温病，热深厥甚，脉细促，心中大动，甚则心中痛者。②《医方发挥》：温病后期，热烁肝肾之阴，虚风内动之手指蠕动，心中憺憺大动，舌干齿黑，唇裂，脉沉细数。

【加减】 剧者，加甘草一两，地黄、白芍各八钱，麦冬七钱，日三夜一服。

【方论选录】 二甲复脉，防痉厥之渐，即痉厥已作，亦可以二甲复脉止厥。兹又加龟版名之三甲者，以心中大动，甚则痛而然也。心中动者，火以水为体，肝风鸱张，立刻有吸尽西江之势，肾水本虚，不能济肝而后发痉，既痉而水难猝补，心之本体欲失，故憺憺然大动也。甚则痛者，阴维为病主心痛，此证热久伤阴，八脉丽于肝肾，肝肾虚而累及阴维，故心痛，非如寒气客于心胸之痛可用温通，故以镇肾气、补任脉、通阴维之龟版止心痛，合入肝搜邪之二甲，相济成功也。

00836 三仙散火汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 玄参三两 生地二两 白芍一两

【用法】 水煎服。

【主治】 肾经实火挟心包实火上冲，而见吐血色黑，痰嗽甚，口渴思饮。

00837 三生益元散

【方源】《医方考》卷四。

【组成】 生柏叶 生藕节 生车前汁各一杯 益元散三钱

【用法】 调服。

【主治】 血淋。

【方论选录】 淋虽有五，皆主于热。此知要之言也。是方也，三物之生，皆能疗热；析而论之，则柏叶凉心，藕节消血，车前导利。益元散者，滑石、甘草也。滑石能清六腑之热，而甘草者，和中泻火，能协木石之性者也。

00838 三白广生汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】 地骨皮 白术 白芍 茯苓 甘草 陈皮 枣仁 山药 贝母 丹皮 芡实 莲肉 乌梅

【主治】 虚损痨瘵，吐痰白色，胃逆不思饮食，食不消化，遗浊便溏，神瘁肉削。

00839 三合保胎丸

【方源】《幼幼集成》卷一。

【组成】 大怀地十二两（用砂仁三两，老姜三两，将地黄入砂锅内，先以净水煮两昼夜，俟地黄将烂，始入好酒煮之，总以地黄糜烂为度，将酒煮干取起，拣去砂仁，姜滓不用，将地黄捣膏听用） 大当归（去头尾，取身切片）十二两（以好酒洗过，晒干听用） 漂白术（取净干片）十二两（以黄土研碎拌炒，极黄取出，筛去土） 实条芩（枯飘者不用，取小实者切片）六两（酒炒三次） 棉杜仲（切片）十二两（盐水拌炒，以丝断为度） 川续断（切片）十二两（酒炒）

【用法】 上将后五味和为一处，火焙干燥，石磨磨细末，筛过，以前地黄膏和匀，少加炼蜜入石臼内，捣千余杵为丸，如绿豆大。每早盐汤送下三钱，晚临卧酒送下三钱，每日如此，不可间断。孕妇素怯者，须两料方可。自一月服起，过七个月方保无虞。

【主治】 素惯堕胎者。

【加减】 孕妇肥白气虚者，再加白术二两；黑瘦

者，再加条芩一两，性躁者二两；至怯者，加人参。

【方论选录】 以古之内补丸、杜仲丸、白术散三方合凑，名三合保胎丸。发条芩清肝火而凉血，白术扶中气以健脾，当归养血宁心，熟地滋阴补肾，续断填损伤而坚胞系，杜仲益腰膝而暖子宫。药虽平易，功胜神丹，诚所谓针芥相投，捷如影响。

00840 三豆解酲汤

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四。

【组成】 葛根二钱 苍术一钱半 陈皮 木瓜 赤茯苓 半夏各一钱 神曲七分 泽泻五分 干生姜三分 黑豆 绿豆 赤小豆各二钱

【用法】 上作一服。水煎，不拘时候，微温服。

【功用】 善解酒毒。

【主治】 中酒发病，头痛呕吐，烦渴，及因酒患消渴者。

【加减】 夏月及酒渴者，加黄连五分。

00841 三花五子丸

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷一引《医林集要》。

【组成】 密蒙花 旋覆花 甘菊花 决明子 枸杞子 菟丝子（酒制） 鼠粘子 地肤子 石决明（煅） 甘草各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，麦门冬汤送下。

【主治】 ①《东医宝鉴·外形篇》引《医林集要》：眼见黑花飞蝇，或生翳障。②《医统》：五脏风热上攻，肝虚头痛。

00842 三花神祐丸

【方源】《宣明论》卷八。

【异名】 神祐丸（《张氏医通》卷十六）。

【组成】 甘遂 大戟 芫花（醋拌湿，炒）各半两 牵牛二两 大黄一两（为细末） 轻粉一钱

【用法】 上为末，滴水为丸，如小豆大。初服五丸，后每服加五丸，温水送下，每日三服。加至快利，利后却常服，病去为度。病癖闷极甚者，便多服则顿攻不开，转加痛闷，则初服二丸，后每服加二丸，至快利为度。小儿丸如麻子大，随强弱增损，三四岁者三五丸，依前法。

【功用】 ①《宣明论》：宣通气血，消进酒食。②《普济方》：进饮食，削痞满。

【主治】 ①《宣明论》：中满腹胀，喘嗽淋闷，一切水湿肿满，湿热肠垢沉积，变生疾病；久病不已，黄瘦困倦，气血壅滞，不得宣通；或风热燥郁，肢体麻痹，走注疼痛；风痰涎嗽，头目旋运；疟疾不已，癥瘕积聚，坚满痞闷；酒积食积，痰饮呕逆；妇人经病不快，带下淋沥，无问赤白；男子妇人伤寒、湿热腹满实痛，久新瘦弱，久新腰痛，一切下痢；小儿惊疳积热，乳癖肿满。②《张氏医通》：阳水肿胀，大小便秘。

【方论选录】 ①《医方考》：甘遂能达痰涎窠臼之处，大戟、芫花能下十二经之饮，黑丑亦逐饮之物，大黄乃推荡之剂，佐以轻粉者，取其无窍不入，且逐风痰积热，而解诸药之辛烈耳。②《张氏医通》：此方守真本仲景十枣汤加牵牛、大黄、轻粉三味。较十枣倍峻，然作丸缓进，则威而不猛。

00843 三味川楝散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 川楝肉 山栀各一两 菖蒲二钱

【用法】 上为末。每次二钱，淡姜汤调服。

【主治】 热厥心痛。

00844 三味曲末丸

【方源】《明医杂著》卷六。

【组成】 神曲（炒）三两 苍术（泔浸三宿，洗净日干，炒） 一两半 陈皮一两

【用法】 上为末，生姜汁煮神曲糊为丸。生姜汤送下。

【主治】 中脘宿食流饮，酸蜇心痛，口吐清水。

00845 三味建中汤

【方源】《景岳全书》卷五十三。

【组成】 芍药二钱 甘草一钱 官桂五分

【用法】 加生姜三片，大枣一枚，水煎服。

【主治】 表虚自汗。

00846 三物备急丸

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 备急丸（《千金翼》卷二十）、抵圣备急丸（《医方类聚》卷一〇七引《千金月令》）、巴豆三味丸（《外台》卷六引《许仁则方》）、追魂丹（《普济方》卷二五四引《圣惠》）、备急三物丸（《圣济总录》卷一八〇）、返魂丹（《鸡峰》卷九）、独行丸（《景岳全书》卷五十五引易老方）、备急大黄丸（《内外伤辨》卷十一）、备急丹（《卫生宝鉴》卷四）、大黄备急丸（《医学入门》卷七）、三圣丹（《仙拈集》卷一）、三仙串（《串雅补》卷二）。

【组成】 大黄一两 干姜一两 巴豆一两（去皮心，熬，外研如脂）

【用法】 上药各须精新，先捣大黄、干姜为末，研巴豆纳中，合治一千杵，炼蜜为丸。密器中贮之，莫令泄。若中恶客忤，心腹胀满，卒痛如锥刺，气急口噤，停尸卒死者，以暖水若酒，服大豆

13863 葶苈散 …… (1856)
13864 葶苈散 …… (1856)
13865 葶苈散 …… (1856)
13866 葶苈膏 …… (1857)
13867 葶苈大丸 …… (1857)
13868 葶苈大枣汤 …… (1857)
13869 葶苈木香散 …… (1857)
13870 葶苈苦参散 …… (1857)
13871 葶苈苦酒汤 …… (1857)
13872 葶苈茯苓丸 …… (1857)
13873 葶苈猪苓散 …… (1857)
13874 葶苈大枣泻肺汤 …… (1857)

蔺

13875 蔺茹散 …… (1858)
13876 蔺茹膏 …… (1858)

蒌

13877 蒌贝散 …… (1858)
13878 蒌连丸 …… (1858)
13879 蒌贝养荣汤 …… (1858)

蒋

13880 蒋氏化毒丹 …… (1858)

落

13881 落花生粥 …… (1858)
13882 落翳神应方 …… (1858)

董

13883 萱草膏 …… (1858)
13884 萱草忘忧汤 …… (1859)

蒿

13885 蒿蕾汤 …… (1859)

葵

13886 葵子汤 …… (1859)
13887 葵子汤 …… (1859)
13888 葵子散 …… (1859)
13889 葵子散 …… (1859)
13890 葵子散 …… (1859)
13891 葵子茯苓散 …… (1859)

粟

13892 粟壳散 …… (1859)

焚

13893 焚香透膈散 …… (1859)
13894 焚香透膈筒 …… (1860)

煮

13895 煮朴丸 …… (1860)
13896 煮朴丸 …… (1860)
13897 煮肝散 …… (1860)
13898 煮肝散 …… (1860)
13899 煮肝散 …… (1860)
13900 煮肝散 …… (1860)
13901 煮附丸 …… (1860)
13902 煮附丹 …… (1860)

逼

13903 逼毒散 …… (1861)

越

13904 越桃丸 …… (1861)
13905 越桃散 …… (1861)
13906 越婢汤 …… (1861)
13907 越婢汤 …… (1861)
13908 越鞠丸 …… (1861)
13909 越鞠汤 …… (1862)
13910 越婢加术汤 …… (1862)
13911 越鞠保和丸 …… (1862)
13912 越婢加半夏汤 …… (1862)

趁

13913 趁风膏 …… (1862)
13914 趁痛丸 …… (1863)
13915 趁痛丸 …… (1863)
13916 趁痛丸 …… (1863)
13917 趁痛丸 …… (1863)
13918 趁痛丸 …… (1863)
13919 趁痛散 …… (1863)
13920 趁痛散 …… (1863)

硫

13921 硫朱丸 …… (1864)
13922 硫矾散 …… (1864)
13923 硫黄丸 …… (1864)
13924 硫黄散 …… (1864)
13925 硫黄散 …… (1864)
13926 硫黄膏 …… (1864)
13927 硫痒膏 …… (1864)
13928 硫椒蛋油 …… (1864)
13929 硫黄不二散 …… (1864)

雄

13930 雄朱丸 …… (1864)
13931 雄朱散 …… (1864)
13932 雄辛散 …… (1865)
13933 雄灵散 …… (1865)
13934 雄矾散 …… (1865)
13935 雄黄丸 …… (1865)
13936 雄黄丸 …… (1865)
13937 雄黄油 …… (1865)
13938 雄黄酊 …… (1865)
13939 雄黄散 …… (1865)
13940 雄黄散 …… (1865)
13941 雄黄散 …… (1865)
13942 雄黄散 …… (1865)
13943 雄黄散 …… (1865)
13944 雄黄膏 …… (1866)
13945 雄黄膏 …… (1866)
13946 雄黄膏 …… (1866)
13947 雄蛇散 …… (1866)
13948 雄槟丸 …… (1866)
13949 雄漆丸 …… (1866)
13950 雄麝散 …… (1866)
13951 雄黄合剂 …… (1866)
13952 雄黄圣饼子 …… (1866)
13953 雄黄神金散 …… (1866)
13954 雄黄斑蝥酊 …… (1867)
13955 雄黄款冬花散 …… (1867)

揉

13956 揉牙散 …… (1867)
13957 揉黄药粉 …… (1867)

揩

13958 揩齿散 …… (1867)
13959 揩齿石膏散 …… (1867)

提

13960 提肛散 …… (1867)

者每插十余条，插至七日，患孔药条满足方住。以后所患四边自然裂开大缝，共至十四日前后，其疔核、瘰疬、痔漏诸管，自然落下，随用汤洗，搽上玉红膏，虚者兼服健脾之药。

【主治】 十八种痔，五漏翻花，瘰疬，疔疮，发背，脑疽。现用于早期宫颈癌。

【宜忌】《中成药研究》（1981；8:27）：本方治早期宫颈癌的禁忌症为：①宫颈鳞癌早期浸润脉管型者（淋巴管、血管内有栓者）；②宫颈鳞癌早期浸润，癌灶汇合、融合者；③宫颈鳞状上皮原位癌、宫颈鳞癌早期间质浸润波及阴道穹隆者；④老年妇女，宫颈高度萎缩者；⑤单纯颈管癌不便观察浸润深度者；⑥并发急性传染病或心、肝、肾脏等脏器有严重疾病者。

【临证举例】 早期宫颈癌 《中成药研究》（1981；8:27）：将本方改成饼、杆状剂型，外敷于宫颈局部，临床对照观察治疗早期宫颈癌210例，获得较好疗效。其中宫颈间变1例，宫颈原位癌140例，宫颈鳞癌Ⅰa期61例，Ⅰb期8例。临床近期治愈204例，近愈率97.1%。其中4例患者于治后1至4年各足月妊娠正常分娩，母子健存，6例患者治疗后病情恶化，改用放疗或手术切除。

【现代研究】 ①化学成分研究《中成药研究》（1981；8:27）："三品"制剂，是比较复杂的无机化合物。经用火焰发射光谱分析和经X光衍射仪检测，证明制剂主要有效成分为三价砷，制剂中三氧化二砷的含量以15%±1%为宜。②抗肿瘤作用《中成药研究》（1981，8:27）：抑瘤试验证明三价砷有直接杀伤瘤细胞作用，其杀瘤作用是渐进性的，治愈过程是：凝固坏死→结痂→痂皮下瘢痕愈合；实验进一步还证明"三品"杀伤瘤组织的范围，与其有效剂量局部分布区相一致。③临床前毒性试验《中成药研究》（1981.8:27）：动物实验证明，给最大耐受量时，实验动物骨髓无明显抑制，肝、肾功能未见明显影响。临床前人体试用，局部一次最大药量为0.8克（约16毫克/公斤）。人体毒、副反应，轻者早期出现恶心、呕吐、纳减等，数天内可自行恢复；重者腹泻、排深棕色稀便，心电图检查ST段明显下降至T波倒置。

00850 三黄二地汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 生地黄 熟地黄各一钱半 苍术 厚朴 陈皮 黄连 黄柏 黄芩 归身 白术 人参各一钱 甘草 防风 泽泻 地榆各六分 乌梅二个

【用法】 水二钟，煎八分，食前服。

【主治】 肠风诸痔，便血不止，及面色萎黄，四肢无力。

00851 三黄石膏汤

【方源】《准绳·类方》卷一。

【组成】 黄连二钱 黄柏 山栀 玄参各一钱 黄芩 知母各一钱五分 石膏三钱 甘草七分

【用法】 水煎服。

【主治】《准绳·杂病》：暑毒深入，结热在里，谵语烦渴，不欲近衣，大便秘结，小便赤涩。

00852 三黄四物汤

【方源】《医方集解》。

【组成】 四物汤加黄柏 黄芩 甘草

【主治】 阴虚潮热。

00853 三黄四物汤

【方源】《金鉴》卷四十四。

【组成】 当归 白芍 川芎 生地 黄连 黄芩 大黄

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 内热壅迫，经前吐衄。

00854 三黄四物汤

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】 四物汤加黄连 黄芩 黄柏

【主治】 ①《金鉴》：溃疡，六腑阳火烦热者。②《温热经解》：妇人血热肝旺症。

【备考】《温热经解》本方用黄柏、酒芩、川连、川芎各五分，当归、白芍各一钱，生地二钱。

00855 三黄地榆油

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 黄柏31克 黄芩31克 大黄31克 地榆15克 五倍子15克 罂粟壳15克 冰片1克 香油500毫升

【用法】 文火煎熬至药呈焦黄色，滤渣，放入冰片，装瓶外用。

【主治】 烫火伤。

00856 三黄补血汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 牡丹皮 黄耆 升麻各一钱 当归 柴胡各一钱五分 熟地黄 川芎各二钱 生地黄三钱 白芍药五钱

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服五钱，水二大盏，煎至一大盏，去滓，食前稍热服。

【主治】 ①《兰室秘藏》：吐血、衄血，六脉俱大，按之空虚，心动善惊，面赤，上热者。②《医略六书》：衄血不止，脉软数者。

【方论选录】 ①《兰室秘藏》：此气盛多而亡血，以甘寒镇坠之剂，大泻其气，以坠其浮；以甘辛温微苦，峻补其血。②《医方集解》：二地补血，丹皮凉血，黄耆补气，升、柴升阳。气旺则能生血，阳生则阴自长矣。③《医略六书》：血气两虚，虚阳迫肺，不能摄血，而从鼻上溢，故衄血久不止焉。黄耆补肺气以摄血，白芍敛肺阴以止衄，生地滋阴凉血，熟地滋肾补阴，当归养血归经，丹皮凉血止血也。俾血气完复，则虚阳自敛，而肺气清宁焉，有衄血久不止之患乎？

【备考】 按：《医略六书》无升麻、柴胡。

00857 三黄宝蜡丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】 藤黄二两 天竹黄二两 大戟一两 归尾一两 牛黄一两 刘寄奴一两 麝香一两 琥珀一两 雄黄五钱 血竭五钱 儿茶五钱 乳香五钱 冰片五钱 水银五钱

【用法】 上为细末，用净黄蜡十二两为丸，每丸重一钱。外治内服均可，外敷用清香油调化，鹅翎摘敷。

【功用】 破顽痰，保元气，解诸毒，活经络，接筋骨，消瘀血。

【主治】 诸疮恶毒，一切跌打损伤，闪腰岔气，伤力成痨及破伤风；或妇女经闭不通；或产妇胎衣不下；或半身不遂，不能动履。

【宜忌】 外敷不可见火。服药初期，应忌食生冷、瓜果、烧酒及发物。

00858 三黄枳术丸

【方源】《内外伤辨》卷下。

【组成】 黄芩二两 黄连（酒洗） 大黄（湿纸裹煨） 神曲（炒） 橘皮 白术各一两 枳实（麸炒）五钱

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大一倍。每服五十丸，白汤送下。量所伤服之。

【主治】 伤肉食湿面辛辣厚味之物，填塞闷乱不快。

00859 三黄熟艾汤

【方源】《活人书》卷十八。

【组成】 黄芩 黄连 黄柏各三分 熟艾半鸡子大

【用法】 上锉，如麻豆大。以水二大盏，煎至七分，去滓温服。

【功用】 ①《活人书》：除热止利。②《普济方》：解毒。

【主治】 热毒而成之痢疾。

①《活人书》：伤寒四五日而大下，热利时作，白通汤诸药多不得止者。②《得效》：时行毒痢。③《普济方》：疮正出、下利黄赤脓血，身热大渴，乃毒入大肠。④《准绳·幼科》：痘后咽寒喉痹，小儿脏腑积滞，下痢赤白。⑤《济阴纲目》：妊娠挟热下痢。

00860 三黄熟艾汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】 黄芩 黄柏 黄连 熟艾 猪苓 泽泻 芍药 苍术

【用法】 加灯心、乌梅，水煎服。

【功用】《重订通俗伤寒论》：酸苦泄热，芳香利湿。

【主治】 ①《伤寒全生集》：伤寒，协热下利不止。②《重订通俗伤寒论》：漏底伤寒，协热自利。

【备考】《重订通俗伤寒论》无苍术，方中用条芩一钱，川连六分，川柏四分，熟艾二分，猪苓、泽泻、生白芍各一钱半，乌梅肉二分，灯心二小帚。

00861 三棱消积丸

【方源】《内外伤辨》卷下。

【组成】 京三棱（炮） 广莪（炒） 炒曲各七钱 青橘皮 巴豆（和皮，米炒黑焦，去米） 茴香（炒） 陈橘皮各五钱 丁皮 益智各三钱

【用法】 上为细末，醋加面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，加至二十丸，食前温生姜汤下。量虚实加减。如更衣，止后服。

【主治】 伤生冷硬物，不能消化，心腹满闷。

00862 三增茴香丸

【方源】《百一》卷十五。

【异名】 三层茴香丸（《准绳·类方》卷六）、一二三层茴香丸（《全国中药成药处方集》济南方）。

【组成】 第一料：茴香（舶上者，用海盐半两同炒至焦黄，和盐称） 川楝子（炮，去核） 沙参（洗，锉） 木香（洗）各一两

第二料：加荜茇一两 槟榔半两

第三料：又加白茯苓四两（紧小实者，去黑皮） 黑附子半两（炮，去皮脐称。或加作一两）

【用法】 第一料：为细末，以水煮米粉稠糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒或盐汤送下，空心食前，每日三次。小病此一料可安。才尽，便可服第二料。

第二料：入前件药，共六味，重五两半，细末，依前法糊丸，汤使丸数服之。若病大末愈，便服第三料。

第三料：通前件药共八味，重十两，并依前法糊丸，汤使丸数服之；加至三十丸。新久大病，不过此三料可愈。

【功用】 温导阳气，渐退寒邪，补虚消疝，暖养肾经。

【主治】 肾与膀胱俱虚，为邪气搏结，遂成寒疝，伏留不散，脐腹撮痛，阴核偏大，肤囊壅肿，重坠滋长，有妨行步，瘙痒不止，时行黄水，浸成疮疡；或长怪肉，屡治不痊，致令肾经闭结，阴阳不通，外肾肿胀，冷硬如石，渐渐丑大者。

00863 三加减正气散

【方源】 《温病条辨》卷二。

【组成】 藿香三钱（连梗叶） 茯苓皮三钱 厚朴二钱 广皮一钱五分 杏仁三钱 滑石五钱

【用法】 水五杯，煮取二杯，再服。

【主治】 秽湿着里，舌黄脘闷，气机不宣，久则酿热。

【方论选录】 《温病学讲义》：舌黄脘痞，为湿阻中焦而微有化热之象，故以藿梗、厚朴、陈皮疏理中焦，滑石、茯苓皮渗湿泄热，因湿渐化热，所以用藿香叶以透热向外，杏仁宣利肺气，气化则湿热俱化。

00864 干枣丸

【方源】 方出《千金》卷十，名见《外台》卷二。

【组成】 大枣二十枚 乌梅十枚

【用法】 上药合捣，炼蜜为丸，如杏核大。含咽其汁。

【主治】 伤寒热病后，口干喜唾，咽痛。

00865 干姜丸

【方源】 《医心方》卷九引《效验方》。

【组成】 吴茱萸二两 小麦二两（熬） 杏仁二两（去皮、熬） 干姜二两 好豉二两（熬） 蜀椒二两（去目，汗）

【用法】 上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，一日三次。

【功用】 温中下气，进食。

【主治】 胃反，大吐逆，不得食饮，胸痛羸瘦。

00866 干姜丸

【方源】 《本事》卷三引《圣惠》。

【组成】 干姜（炮） 葛根 枳壳（去瓤，锉，麸炒） 橘红 前胡（去苗，净洗）各半两 白术 半夏曲各一两 甘草（炙） 吴茱萸（汤泡七次，焙）各一分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】 酒癖停饮，吐酸水。

【方论选录】 《本事方释义》：干姜气味辛温，入手足太阴；葛根气味辛微温，入足阳明，能解酒毒；枳壳气味苦寒，入足太阴；橘红气味辛微温，入手足太阴；前胡气味苦辛微寒，入手太阴；白术气味甘温，入手足太阴；半夏曲气味辛微温，入足阳明；甘草气味甘平入脾；吴茱萸气味辛热，入足阳明、厥阴。此方治酒癖停饮，呕吐酸水，皆中宫脾土受困，以辛温培土之药乾健佐运，以辛散升腾之药鼓动阳气，则中土之阳气振，阴浊自然扫除矣。

00867 干姜丸

【方源】 《本事》卷四。

【组成】 干姜（炮） 巴豆（去心，炒黄，研） 大黄（湿纸裹，甑上蒸） 人参各一钱（去芦）

【用法】 上除巴豆，余为末，同研，炼蜜为丸，如梧桐子大。用温脾汤吞下一丸，米饮亦得。

【主治】 忧愁中伤，食结积在肠胃，故发吐利。

【方论选录】 《本事方释义》：干姜气味辛温，入手足太阴；巴豆气味辛温，入足太阴阳明；大黄气味苦寒，入足阳明；人参气味甘温，入足阳明。此即古方中之备急丸加参也。因忧愁中伤，食积久在肠胃，吐利频发，暑月更甚，以数年久不愈之证，欲攻病虑其体虚，欲补虚虑其留邪，故温下之药，佐以扶正，则两不相悖矣。

00868 干姜汤

【方源】 《外台》卷九引《深师方》。

【组成】 干姜四两 紫菀一两 杏仁七十枚（去皮尖双仁，切） 麻黄（去节）四两 桂心 甘草（炙）各二两 五味子一两

【用法】 上切。水八升，煮取二升七合，分三服。

【主治】 冷咳逆气。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、生葱等。

00869 干姜粥

【方源】 《寿世青编》卷下。

【组成】 白米四合 干姜 良姜各一两

【用法】 水煎服。

【功用】 《药粥疗法》：温暖脾胃，散寒止痛。

【主治】 ①《寿世青编》：一切寒冷气郁，心痛，胸腹胀痛。②《药粥疗法》：脾胃虚寒，心腹冷痛，呕吐，呃逆，泛吐清水，肠鸣腹泻。

【宜忌】 《药粥疗法》：凡发热之时以及阴虚内热的病人，不可选用。

00870 干脓散

【方源】《妇人良方》卷二十二引《产乳》。

【组成】 乌贼骨 黄丹 天竺黄各二钱 轻粉二匕 麝香一字 老降真骨三钱

【用法】 上为细末。干掺疮口。

【功用】 敛疮口。

【主治】 乳痈已溃。

00871 干眼药

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 制甘石四两 净荠粉四两 冰片八钱

【用法】 各取净末，共研至极细为度，约成粉八两六钱。每日二次至三次，点于大眼角内。

【功用】 退赤止泪。

【主治】 目赤昏糊，怕光流泪。

00872 干葛散

【方源】《传家秘宝》卷三。

【组成】 干葛十二两（如白面肥好者） 甘草三两（上者，生用） 齐州半夏三两（用生姜汁半盏，水一斗，同煮，切，焙干）

【用法】 上为散。每服一钱，加生姜三片，大枣二枚，青竹茹、槐子，同煎至七分，去滓，日二服。小儿每服一钱。

【主治】 胃膈热，吐逆不定，诸药无效。

00873 干颓汤

【方源】《衷中参西录》中册。

【组成】 生箭耆五两 当归一两 甘枸杞果一两 净杭萸肉一两 生滴乳香三钱 生明没药三钱 真鹿角胶六钱（捣碎）

【用法】 先将黄耆煎十余沸，去滓；再将当归、枸杞、萸肉、乳香、没药入汤同煎十余沸，去滓；入鹿角胶末融化，取汤两大钟，分两次温饮下。

【主治】 肢体痿废，或偏枯，脉象极微细无力者。

【方论选录】 方中重用黄耆以升补胸中大气，且能助气上升，上达胸中，而血液亦即可随气上注。惟其副作用能外透肌表，具有宣散之性，去滓重煎，则其宣散之性减，专于补气升气矣。当归为生血之主药，与黄耆并用，古名补血汤，因气旺血自易生，而黄耆得当归之濡润，又不至燥热也。萸肉性善补肝，枸杞性善补肾，肝肾充足，元气必然壮旺，且二药又善赞助当归生血也。用乳香、没药者，因二药善开血痹，血痹开则痿废者久瘀之经络自流通矣。用鹿角胶者，诚以脑既贫血，其脑髓亦必空虚，鹿角其所熬之胶善补脑髓，脑髓足则脑中贫血之病自易愈也。

【临证举例】 四肢痿废 天津于某，年过四旬，自觉呼吸不顺，胸中满闷，言语动作皆渐觉不利，头目昏沉，时作眩晕。延医治疗，投以开胸理气之品，则四肢遽然痿废。再延他医，改用补剂而仍兼用开气之品，服后痿废加剧，言语竟不能发声。愚诊视其脉象沉微，右部尤不任循按，知其胸中大气及中焦脾胃之气皆虚陷也。于斯投以拙拟升陷汤加白术、当归各二钱。服两剂，诸病似皆稍愈，而脉象仍如旧。因将耆、术、当归、知母各加倍，升麻改用钱半，又加党参、天冬各六钱，连服三剂，口可出声而仍不能言，肢体稍能运动而不能步履，脉象较前有起色似堪循按。因但将黄耆加重至四两，又加天花粉八钱，先用水六大盅将黄耆煎透，去滓，再入他药，煎取清汤两大盅，分两次服下，又连服三剂，勉强可作言语，然恒不成句，人扶之可以移步。遂改用干颓汤，惟黄耆仍用四两，服过十剂，脉搏又较前有力；步履虽仍需人，而起卧可自如矣；言语亦稍能达意，其说不真之句，间可执笔写出；从前之头目昏沉眩晕者，至斯亦见轻。

00874 干漆散

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】 干漆（炒出烟） 蓬莪术（炮）各一两半 桂（去粗皮） 吴茱萸（汤浸一宿，炒干）各一两

【用法】 上为散。每服二钱匕，温酒或醋汤调下，不拘时候。

【主治】 九种心痛，冷热吐逆，疼刺疼痛。

00875 干地黄丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 熟干地黄二两 柏子仁一两 山茱萸一两 牛膝一两（去苗） 肉桂二两（去皱皮） 酸枣仁一两（微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【功用】 益筋骨，除四肢疼痛。

【主治】 筋极。四肢疼痛。

00876 干地黄丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】 熟干地黄三两半 白茯苓（去黑皮） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，切，焙）一两 远志（去心） 牛膝（酒浸，切，焙） 山芋 山茱萸 蛇床子（微炒） 续断 黄耆（炙，锉） 覆盆子（去萼） 石斛（去根） 巴戟天（去心） 泽泻 附子（炮裂，去皮脐）各一两半 菟丝子（酒浸，别捣） 桂（去粗皮） 牡丹皮 杜仲（去皱皮，锉，炒）

人参 鹿茸（去毛，酥炙）各一两一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹温酒送下，一日三次。加至四十丸。

【主治】 肾脏虚损，腰重不举，阳气痿弱，肢体瘦瘁。

00877 干地黄丸

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】 生干地黄（酒洗去土，炙令干）二两（锉） 干漆（炒令烟出）半两 白术一分半 甘草（炙令赤，锉）一分半 桂（去粗皮）半两 石钟乳（炼成者）一分（研） 酸枣仁（微炒，去皮）一分（别研） 柏子仁（微炒，别研）一分

【用法】 除研药外，捣罗为末，和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹温酒送下，夜卧再服。渐增之。

【功用】 令人肥白。

【主治】 虚劳羸瘦，虚损少气。

00878 干地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】 熟干地黄（焙） 五味子 菟丝子（酒浸一宿，别捣） 蕤仁（去皮，研） 车前子各一两 细辛（去苗叶） 甘草（炙，锉） 防风（去叉） 白茯苓（去黑皮） 柏子仁（研）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【主治】 肝虚，泪出不止，翳晕侵睛，视物不远，或睛昏浊，黑白不明。

00879 干地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【异名】 地黄丸(《普济方》卷三六三)。

【组成】 熟干地黄（焙） 芍药 当归（切，焙） 白术各半两 桂（去粗皮）一分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如黍米大。每服七丸，乳食前粥饮送下。

【主治】 小儿气血虚弱，囟陷不平。

00880 干地黄汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 生干地黄 麦门冬（去心，焙） 栝楼根各三两 甘草（炙，锉） 枳壳（去瓤，麸炒） 黄芩（去黑心）各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎取七分，去滓温服，日二三次。

【主治】 食亦。胃热善食而瘦。

00881 干地黄汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【异名】 地黄汤(《普济方》卷三十二)。

【组成】 熟干地黄（焙） 鹿茸（去毛，酥炙） 巴戟天（去心） 枸杞子 丹参 五加皮各二两 车前子一两 桂（去粗皮）三分 防风（去叉）一两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服四钱匕，水二盏，煎取一盏，去滓，通口服。

【主治】 肾虚多唾。

00882 干地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】 生干地黄（焙） 白术 芍药 赤茯苓（去黑皮）各一两 桑根白皮（锉）二两 甘草（锉）半两 赤小豆五合 黄耆（锉） 商陆根（锉）各二两

【用法】 上九味，并生用，为粗散。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后遍身头面浮肿。

00883 干地黄散

【方源】 方出《千金》卷二十，名见《圣济总录》卷五十三。

【组成】 赤雄鸡肠两具 鸡脞胫两具 干地黄三分 桑螵蛸 牡蛎 龙骨 黄连各四分 白石脂五分 苁蓉六分 赤石脂五分

【用法】 上药治下筛，纳鸡肠及脞胫中缝塞，蒸之令熟，晒干，合捣为散。以酒和方寸匕，日三服。

【主治】 膀胱寒，小便数，漏精稠厚如米白泔。

【方论选录】《千金方衍义》：方中赤、白石脂固脱，龙骨、牡蛎、桑螵蛸涩精，地黄、苁蓉滋髓，鸡肠、脞利水消积，川连专治便如泔汁也。

00884 干地黄散

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】 熟干地黄一两 甘草一两（炙微赤，锉） 麦门冬一两（去心） 黄芩一两 五味子一两 桑寄生一两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一大盏，加生姜八分，大枣三枚，煎至五分，去滓，每于食前温服。

【功用】 预防小产。

【主治】 妊娠曾伤五月胎。

00885 干荷叶散

【方源】《普济方》卷三〇一引《直指》。

【异名】 干荷散(《御药院方》卷六)。

【组成】 干荷叶 牡蛎粉 蛇床子 浮萍草各等分

【用法】 上为细末，用罗筛。每次用两匙，水一碗，同煎二五沸，滤去滓，淋汁洗。避风冷。

【主治】 阴囊肿痛，湿润瘙痒，及阴萎弱。

00886 干荷叶散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 干荷叶三两（炒） 刘寄奴三两 桃仁泥三两 生蒲黄三两

【用法】 上为散。每服三钱，童便煎，去滓温服。

【主治】 恶露不尽，脉滞者。

【方论选录】 产后血瘀，冲任不能营运于经，故腹痛不止，恶露不下焉。干荷叶升阳散瘀，桃仁泥破血开结，生蒲黄破瘀下血，刘寄奴破血通经，为散，童便煎，使瘀化气调，则清阳上升而浊阴下降，何患腹痛不退，恶露不通乎？

00887 干胭脂膏

【方源】《婴童百问》卷四。

【组成】 干胭脂 白龙骨 白矾（煅） 白石脂（研）等分

【用法】 上为末，用枣肉为丸，如枣核大。以绵裹一丸，纳耳中，日三换之。

【主治】 小儿脓耳，常出脓水不止。

00888 干生地黄散

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】 干生地黄二钱 柏叶 黄芩各一钱 阿胶（炒）八分

【用法】 上以水盏半，加生姜三片，煎七分，温服。

【主治】 妇人尿血不止。

00889 干姜四物汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 熟地五钱 人参钱半 白术钱半（炒） 当归三钱 白芍钱半 川芎钱半 干姜钱半

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 产后身痛，脉虚细者。

【方论选录】 产后中风虚寒，不能统运营气，而营血暗耗，无以灌注一身，故遍身疼痛不休焉。人参扶元补气，善通血脉；白术健脾生血，能运血脉；熟地补血以滋经脉，当归血以荣经脉；川芎行血中之气；白芍敛营中之阴；干姜温中气以散寒，而复其布护之常也。水煎温服，俾中气内充则营血完复而灌溉如常，经络润泽，何遍身疼痛之不已哉。

00890 干姜白术散

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】 白术 干姜 附子 地榆 黄连各一两 阿胶 龙骨各二两 赤石脂三两

【用法】 上为粗末。每服二钱，水一盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 赤白痢久不止，肠中疼痛。

00891 干姜附子汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 姜附汤（《局方》卷二）。

【组成】 干姜一两 附子一枚（生用，去皮，切八片）

【用法】 以水三升，煮取一升，去滓顿服。

【功用】《伤寒来苏集》：回阳。

【主治】 汗下伤阳，昼躁夜静，不呕不渴，表证不见，身无大热，脉沉微；中焦阳虚，寒饮内停，心腹冷痛；中寒晕倒，四肢厥冷，眩晕无汗，或自汗淋漓者。

①《伤寒论》：下之后，复发汗，昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕不渴，无表证，脉沉微，身无大热。②《局方》：暴中风冷，久积痰水，心腹冷痛，霍乱转筋。③《三因》中寒，卒然晕倒，或吐逆涎沫，状如暗风，手脚挛搐，口噤，四肢厥冷或复躁热。④《医方集解》：中寒厥逆，眩晕无汗，或自汗淋漓，及外热烦躁，阴盛格阳。

【方论选录】 ①《古方选注》：干姜附子汤，救太阳坏病转属少阴者，由于下后复汗，一误再误，而亡其阳，致阴躁而见子昼日，是阳亡在顷刻矣。当急用生干姜助生附子，纯用辛热走窜，透入阴经，比四逆之势力尤峻，方能驱散阴霾，复涣散其阳，若犹豫未决，必致阳亡而后已。②《伤寒瘟疫条辨》：此即四逆减去甘寒之甘草，为回阳重剂。若加增药味，反牵制其雄悍之力，必致迂缓无功矣。干姜辛以润燥散烦，和表里之误伤；附子热以温中固表，调阴阳于既济，阳回即可用平补之药。盖阳既安堵，即宜休养其阴，切勿误用辛热太过之药，转化他患也，审之慎之。

00892 干姜黄连丸

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 干姜一两 黄连一两 白术二两（炒） 阿胶二两（粉炒） 川芎一两 木香一两

【用法】 上为末，乌梅肉三两，醋煮为丸。每服三钱，白痢，砂仁汤送下；赤痢，砂糖汤送下。

【主治】 孕妇赤白痢，脉紧数者。

【方论选录】 妊娠冷热不调，肠胃敷化之权顿失，无以传送糟粕，故下痢赤白，胎孕不安焉，黄连清心脾之火以燥湿，干姜暖肠胃之冷以止痢，白

术健脾生血，阿胶益血补阴，川芎行血海以升阳，木香调中气以醒脾胃也。为末，乌梅肉捣丸，白痢，熟砂仁汤下，赤痢，炒砂糖汤下，使血气各有所归，则肠胃之冷热无不化，而下痢之赤白无不除，何胎孕有不安者乎？

00893 干葛石膏汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】干葛 柴胡 黄芩 石膏 广皮 甘草

【主治】阳明伤寒，中暑烦渴，自汗、盗汗，面赤，脉洪长者；及阳明温疫。

00894 干葛解肌汤

【方源】《伤寒六书》卷四。

【异名】葛根汤。

【组成】柴胡 干葛 甘草 黄芩 芍药 羌活 白芷 桔梗

【主治】伤寒足阳明胃经受证，目痛鼻干，不眠，微头痛，眼眶痛，脉来微洪。

00895 干姜人参半夏丸

【方源】《金匮》卷下。

【组成】干姜一两 人参一两 半夏二两

【用法】上为末，以生姜汁糊为丸，如梧桐子大。饮服十丸，一日三次。

【主治】妊娠呕吐不止。

【方论选录】①《金匮玉函经二注》：妊娠二月之后，胚化成胎，浊气上冲，中焦不胜其逆，痰饮遂涌，呕吐不已，中寒乃起，故用干姜止寒，人参补虚，生姜、半夏治痰散逆也。②《金匮要略浅注》：此为妊娠之呕吐不止而出其方也。半夏得人参，不惟不碍胎，且能固胎。③《金鉴》：恶阻者，谓胃中素有寒饮，恶阻其胎而妨饮食也。主之以干姜去寒，半夏止呕；恶阻之人，日日呕吐，必伤胃气，故又佐人参也。

【临证举例】①妊娠呕吐 《钱伯煊妇科医案》：郭某，女。妊娠一个半月，泛恶呕吐黄水，不能饮水进食，头晕，大便干燥，心中烦热，口干且苦，但喜热饮，胃脘作痛，少腹胀坠，舌苔淡黄腻，根微垢，脉左细弦数，右滑数。病因痰湿中阻，胃浊不克下降。治以益气温中，化痰降浊。党参3克，干姜6克，清半夏3克，研末。早晚各服1.5克，加生姜汁4滴，调和徐服。②产后呕吐 《金匮要略今释》引《橘窗书影》：一妇人年二十许，产后胃中不和，时时吐饮食，羸瘦极，遂发大呕吐，药食不能入口，脉微细，四肢微冷，口干燥，欲冷水。余诊之，作半夏干姜人参丸料，煎为冷液，令时时饮少许；又三日，啜稀粥，胃气渐复。③吐水《金匮要略今释》引《橘窗书影》：某女人，年四十余。尝有叶水之癖，经炎暑，其病益甚，食气绝粒，身体骨立，心中疼热，好冷水。余与半夏干姜人参丸料，兼服乌梅丸，呕吐顿止，心中疼热日减，方得进饮食。

【备考】本方改为汤剂，名"干姜人参半夏汤"（见《产科发蒙》）。

00896 干姜黄芩黄连人参汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】四味人参汤（《卫生总微》卷七）、干姜芩连人参汤（《医学入门》卷四）、干姜黄连黄芩汤（《伤寒大白》卷二）、人参黄芩黄连干姜汤（《麻科活人》卷三）

【组成】干姜三两 黄芩三两 黄连三两 人参三两

【用法】以水六升，煮取二升，去滓，分温再服。

【主治】①《伤寒论》：伤寒，本自寒下，医复吐下之；寒格，更逆吐下，食入口即吐者。②《张氏医通》：虚客热痞满。

【方论选录】①《注解伤寒论》：食入口即吐，谓之寒格；更复吐下，则重虚而死，是更逆吐下。与干姜黄芩黄连人参汤以通寒格。辛以散之，甘以缓之，干姜、人参之甘辛以补正气；苦以泄之，黄连、黄芩之苦以通寒格。②《医方考》：中气既虚且寒，便恶谷气，故食入口即吐。入口即吐者，犹未下咽之谓也。用干姜之辛热，可以散寒；用人参之甘温，可以补虚；复用芩、连之苦寒者，所以假之从寒而通格也。③《伤寒本旨》：食入口即吐者，阻在上脘，阴阳不相交通，故以干姜、芩、连寒热并用，通其阴阳，辛苦开泄以降浊；人参补正而升清，则中宫和而吐利可止矣。④《伤寒论今释》：本方证，胃虽热而肠则寒，故芩、连与干姜并用，以其上热下寒，故入厥阴篇。

【临证举例】①冒风伤胃 《伤寒论方运用法》：患者女，6岁。前日注射百日咳疫苗，当夜发寒热。某医给服下剂后，反见饮食入口即吐，胸痛，大便三日未解。神志昏沉，肛温38℃，舌苔黄白，舌尖红，脉沉细。证属发热冒风，复伤其胃。干姜黄芩黄连人参汤加味：干姜6克，黄芩6克，黄连4.5克，党参6克，川桂枝4.5克，法半夏4.5克，服一剂。药后神志清醒，肛温37.5℃，吐止，胸痛除。②胃虚呕吐 《伤寒论汇要分析》：林某，50岁。患胃痛已久，经常呕吐，胸间痞闷，一见食物便产生恶心感，有时勉强进食少许，有时食下即

呕，口微燥，大便溏泄，脉虚数。与干姜黄芩黄连人参汤：横纹潞 15 克，干姜 9 克，黄芩 6 克，黄连 4.5 克，水煎，待稍温时分四次服。一剂后呕恶泄泻均愈。

【备考】 本方方名，《外台》引作“干姜黄连人参汤”。

00897 土朱散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 土朱 青黛各二钱 滑石 荆芥各一钱

【用法】 上为末。蜜水调搽；服之亦可。

【主治】 丹毒。

00898 土狗散

【方源】 方出《医宗必读》卷七，名见《仙拈集》卷一。

【组成】 土狗（一名蝼蛄）

【用法】 焙干，为末服。

【功用】 上半截消上身之水，下半截消下身之水，左可消左，右可消右。

【主治】 ①《医宗必读》：水肿。②《卫生鸿宝》：十种水病，肿满，气喘不得卧，小便闭者。

【备考】《卫生鸿宝》本方用法：水服半钱。

00899 土槐饮

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 土茯苓一两 生槐花一两 生甘草三钱

【用法】 煎煮服用；或泡水代饮。

【功用】 除湿，清热，解毒。

【主治】 亚急性湿疹，慢性湿疹，植物日光性皮炎，脂溢性皮炎，牛皮癣。

00900 土鳖酒

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 土鳖十余个（焙干）

【用法】 上为末。滚黄酒冲服。

【功用】 接骨。

【备考】《绛囊撮要》：地鳖虫生捣绞汁，用滚黄酒冲服。

00901 土大黄膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 硫黄八两 生矾四两 点红川椒二两

【用法】 上各为末，用土大黄根捣汁，和前药调成膏，碗贮。新癣，抓损擦之；多年顽癣，加醋和擦；如日久药干，以醋调搽；牛皮癣，用穿山甲抓损擦之。

【主治】 干湿顽癣，不论新久，但皮肤顽厚，串走不定，惟痒不痛者。

00902 土牛膝散

【方源】《奇效良方》卷六十三。

【组成】 土牛膝 当归尾各一两 桃仁（去皮，麸炒，别研） 红花各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，空心用温酒调下。

【主治】 妇人室女血闭不通，五心烦热。

00903 土瓜根散

【方源】《金匮》卷下。

【组成】 土瓜根 芍药 桂枝 䗪虫各三两

【用法】 上为散。酒服方寸匕，每日三次。

【主治】 带下，经水不利，少腹满痛，经一月再见者；亦主阴癫肿。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：土瓜根者，能通月水，消瘀血，生津液，津生则化血也；芍药主邪气腹痛，除血痹，开阴寒；桂枝通血脉，引阳气；䗪虫破血积，以消行之，非独血积冲任者有是证，肝藏血，主化生之气，与冲任同病，而脉循阴器，任、督脉亦结阴下，故皆用是汤治之。②《张氏医通》：土瓜根，黄瓜根也，往往以栝楼根代用，考之《本经》，栝楼根性味虽同苦寒，而无散瘀血通月闭之功，此治虽专，惜乎其力缓缓，故以桂、䗪辅之，芍药监之，与旋覆花汤之用新绛不殊。③《金匮要略浅注》：土瓜，即王瓜也，主驱热行瘀；佐以䗪虫之蠕动逐血，桂、芍之调和阴阳，为有制之师。

00904 土茯苓丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 土茯苓 310 克 白鲜皮 125 克 山豆根 250 克 草河车 250 克 黄药子 125 克 夏枯草 250 克

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸重 6 克。每次三丸，开水送服，一日二次。

【功用】 清热解毒。

【主治】 银屑病进行期。

00905 土槿皮酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 土槿皮 30 克 斑蝥 10 克 高粱酒 100 毫升

【用法】 浸出过滤，再加升华硫黄及樟脑各 5 克混合。外用。

【主治】 体癣。

00906 土茯苓合剂

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】 土茯苓一两至二两 金银花四钱 威灵仙三钱 白鲜皮三钱 生甘草二钱 苍耳子五钱

【用法】 加水800毫升，煎成400升。每日服一剂，分早、中、晚三次服完，连服二个月为一疗程。

【主治】 梅毒。

00907 下气汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】 大腹槟榔二七枚 杏仁四七枚

【用法】 上㕮咀。以童便三升，煎取一升半，分为二服。

【主治】 胸腹背闭满，上气喘急。

【方论选录】《千金方衍义》：杏仁以下气，大腹槟榔以泄满，童便导之下行。然唯初病气实者为宜。

00908 下虫丸

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】 新白苦楝根皮（酒浸，焙） 绿色贯众 木香 桃仁（浸，去皮，焙） 芜荑（焙） 鸡心槟榔各二钱 鹤虱（炒）一钱 轻粉半钱 干虾蟆（炙焦）三钱 使君子（略煨，取肉）五十枚

【用法】 上为末，飞面糊为丸，如麻子大。每服二十丸，天明清肉汁送下。

【主治】 疳蛔诸虫。

【加减】 治脊疳兼疳劳，择加当归、川黄连各二钱半。

00909 下胎散

【方源】《医略六书》卷二十九。

【组成】 大黄三两 桃仁三两 肉桂一两半 甘草一两半 冬葵子三两

【用法】 上为散。每服三钱，葱白汤调下。

【主治】 子死胞干，脉大者。

【方论选录】 产妇胎死腹中，胀满疼痛，致二便不通，气迫欲绝焉。大黄荡涤壅闭以逐死胎，肉桂开通产门以宣壅闭，桃仁破瘀开结以下胎，甘草和胃缓中以调气，冬葵子利窍门以滑死胎也。为散，葱白汤下，使二便通利，则瘀化气行，而死胎不致久羁腹中，何患胀满不退、气迫不顺乎？

00910 下疳散

【方源】《医学纲目》卷二十引丹溪方。

【组成】 蛤粉 蜡茶 苦参 密陀僧 青黛

【用法】 上为末。河水洗净患处，腊猪油调敷。

【主治】 下疳，臁疮。

00911 下痰丸

【方源】《增补验方新编》。

【组成】 白矾一两 细茶叶五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食远姜汤送下。

【主治】 风痰眩晕，癫痫，久不愈者。

00912 下品锭子

【方源】《外科发挥》卷五。

【组成】 白明矾二两 白砒一两五钱 乳香二钱五分 没药二钱五分 牛黄三分

【用法】 先将砒末入紫泥罐内，次用矾末盖之，以炭火煅令烟尽，取出研极细末，用糯米糊和为挺子，头如线香，阴干。纤疮内三四次，年深者五六次，其根自腐溃。如疮露在外，更用蜜水调搽，干上亦可。

【主治】 瘰疬、气核、疔疮、发背、脑疽诸恶证。

【备考】 本方为原书“三品锭子”之第三方。

00913 下瘀血汤

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 瘀血汤（《普济方》卷三五一）、大黄䗪虫丸（《古方选注》卷中）。

【组成】 大黄二两 桃仁二十枚 䗪虫二十枚（熬，去足）

【用法】 上为末，炼蜜和为四丸，以酒一升，煎一丸，取八合，顿服之。新血下如豚肝。

【主治】 产妇腹痛，腹中有干血着脐下，经水不利。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：血之干燥凝着者，非润燥荡涤不能去也。芍药、枳实不能治，须用大黄荡逐之。桃仁润燥，缓中破结；䗪虫下血；用蜜补不足，止血，和药，缓大黄之急，尤为润也。②《金匮要略心典》：大黄、桃仁、䗪虫下血之力颇猛，用蜜丸者，缓其性不使骤发，恐伤上二焦也。酒煎顿服者，补下治下制以急，且去疾惟恐不尽也。

【临证举例】 腹痛 《汉方新解》引《腹证奇览》：余旧在东都时，一男子三十四五岁，大腹痛、脐下痛者三年，百药无效。余诊之，暗然觉冷气，腹皮强急，如有头足。乃与大建中汤，一月许，渐渐告愈。忽又觉脐下疼痛难忍，乃与下瘀血汤，数日痊愈。

00914 下乳涌泉散

【方源】《清太医院配方》。

【组成】 当归 川芎 天花粉 白芍药 生地黄 柴胡各一两 青皮 漏芦 桔梗 木通 白芷 通草各五钱 穿山甲一两五钱 王不留行三两 甘草二钱五分

【用法】 上为细末。每服二至三钱，临卧黄酒调

14856 豨莶酒 …… (1979)
14857 豨桐丸 …… (1980)

摧

14858 摧肝丸 …… (1980)

雌

14859 雌黄丸 …… (1980)
14860 雌雄四黄散 …… (1980)

嗽

14861 嗽烟筒 …… (1980)

赚

14862 赚气散 …… (1980)

蜡

14863 蜡苓丸 …… (1980)
14864 蜡矾丸 …… (1980)
14865 蜡矾纸 …… (1980)
14866 蜡油膏 …… (1980)
14867 蜡香丸 …… (1981)
14868 蜡煎散 …… (1981)

蜘

14869 蜘蛛散 …… (1981)

蝉

14870 蝉花散 …… (1981)
14871 蝉花散 …… (1981)
14872 蝉花散 …… (1981)
14873 蝉花散 …… (1981)
14874 蝉退散 …… (1981)
14875 蝉退散 …… (1981)
14876 蝉蚕散 …… (1982)
14877 蝉蝎散 …… (1982)
14878 蝉花饼子 …… (1982)
14879 蝉花无比丸 …… (1982)
14880 蝉花无比散 …… (1982)
14881 蝉花无比散 …… (1982)
14882 蝉花无比散 …… (1982)
14883 蝉蜕钓藤饮 …… (1982)

鹘

14884 鹘突羹 …… (1982)

罂

14885 罂粟汤 …… (1983)
14886 罂粟粥 …… (1983)
14887 罂粟膏 …… (1983)
14888 罂榆汤 …… (1983)

毓

14889 毓麟丸 …… (1983)
14890 毓麟膏 …… (1983)

箍

14891 箍药 …… (1983)
14892 箍瘤膏 …… (1983)
14893 箍毒神丹 …… (1983)

管

14894 管仲散 …… (1984)

熏

14895 熏痔散 …… (1984)
14896 熏膈丸 …… (1984)
14897 熏陆香丸 …… (1984)
14898 熏痔立效方 …… (1984)

僧

14899 僧矾散 …… (1984)

鼻

14900 鼻炎灵 …… (1984)
14901 鼻衄丹 …… (1984)
14902 鼻窦灌注液 …… (1984)

膈

14903 膈气散 …… (1984)
14904 膈噫膏 …… (1985)
14905 膈下逐瘀汤 …… (1985)

鲜

14906 鲜石斛膏 …… (1985)
14907 鲜生地露 …… (1986)
14908 鲜佛手露 …… (1986)
14909 鲜佩兰露 …… (1986)
14910 鲜荷叶汤 …… (1986)
14911 鲜藿香露 …… (1986)

膏

14912 膏淋汤 …… (1986)

腐

14913 腐尽生肌散 …… (1986)

瘦

14914 瘦胎丸 …… (1986)
14915 瘦胎饮 …… (1986)
14916 瘦胎散 …… (1986)

慢

14917 慢白汤 …… (1986)
14918 慢脾散 …… (1987)

熘

14919 熘肿膏 …… (1987)

漆

14920 漆黄丸 …… (1987)
14921 漆雄丸 …… (1987)

漱

14922 漱风散 …… (1987)
14923 漱毒散 …… (1987)
14924 漱口地黄散 …… (1987)

滴

14925 滴耳油 …… (1987)
14926 滴眼汤 …… (1987)
14927 滴鼻灵 …… (1988)
14928 滴鼻栀子仁煎 … (1988)

漏

14929 漏风汤 …… (1988)
14930 漏芦丸 …… (1988)
14931 漏芦汤 …… (1988)
14932 漏芦汤 …… (1988)
14933 漏芦汤 …… (1988)
14934 漏芦汤 …… (1988)
14935 漏芦散 …… (1988)
14936 漏胎安胎饮 …… (1988)

赛

14937 赛空青 …… (1989)

【方论】 鼻赤者，热也；所以赤者，血也。大黄之寒能泻热，朴消之咸能败血。

【宜忌】 戒酒。

00924 大安丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】 山楂二两 神曲（炒） 半夏 茯苓各一两 陈皮 萝卜子 连翘各半两 白术二两

【用法】 上为末，粥糊为丸服。

【功用】 消导脾经积滞。

【主治】《景岳全书》：小儿饮食酒积停滞，胸膈痞满腹胀。

00925 大红丸

【方源】《理伤续断方》。

【组成】 赤敛一斤（即何首乌，焙干） 川乌一斤七两（火煨坼） 天南星一斤（焙） 芍药一斤（焙） 土当归十两（焙） 骨碎补一斤（姜制，焙） 牛膝十两（酒浸，焙） 细辛八两（去苗叶，焙） 赤小豆二升（焙） 自然铜四两（煅存性） 青桑炭五斤（煅，醋淬。欠此一味亦可。其上俱要制焙后，方秤斤两）

【用法】 上敛、星、芍、归、补、膝、辛七味，并用当土者，同余药罗为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，温酒送下；醋汤亦可。损在上，食后服；在下，空心服；伤重不拘时服。或与小红丸互用亦可。

【功用】 常服补损，坚筋固骨，滋血生力。

【主治】 扑损伤折，骨碎筋断，疼痛痹冷，内外俱损，瘀血留滞，外肿内痛，肢节痛倦。

【宜忌】 孕妇莫服。

00926 大红膏

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】 蓖麻肉五两（打烂） 嫩松香十两 杏仁霜二两 银朱二两 广丹二两 扫盆二两 茶油夏用一两五钱，冬用二两

【用法】 捣透，千捶成膏，不可太老。外贴之。

【主治】 一切痈疽疮疖，未成能消，已成能溃，已溃能拔毒排脓。

00927 大麦汤

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】 羊肉一脚子（卸成事件） 草果五个 大麦仁二升（淡水淘洗净，微煮熟）

【用法】 上件草果熬成汤，滤净；下大麦仁熬熟，加盐少许，调和令匀，下事件肉。

【功用】 温中下气，壮脾胃，止烦渴，破冷气，去腹胀。

00928 大豆方

【方源】《养老奉亲》。

【组成】 大豆二升 白术二两 鲤鱼一斤

【用法】 上以水和煮，令豆烂熟，空心常食之。食鱼、豆，饮其汁，尤佳。

【主治】 水气胀满，手足俱肿，心烦闷无力者。

00929 大豆汤

【方源】《外台》卷二十引《深师方》。

【组成】 大豆一升 杏仁一升（去皮尖，熬） 黄耆二两 防风三两 白术五两 木防己四两 茯苓四两 麻黄四两（去节） 甘草四两（炙） 生姜六两 清酒一升

【用法】 上切。以水三斗，先煮豆，取一斗，去滓；纳酒及药，煮取七升，分七服，一日一夜令尽。当下小便极利。

【主治】 风水气，举身肿满，短气欲绝。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、桃、李、雀肉、大酢等。

00930 大豆酒

【方源】 方出《肘后方》卷三，名见《普济方》卷九十二。

【异名】 豆淋酒（《证类本草》卷二十五引《产书》）、豆淋紫酒（《卫生家宝产科备要》卷七）。

【组成】 大豆五升（熬令黄黑）

【用法】 以酒五升渍，取汁，以物强发口而灌之。取汗。

【主治】 中风口噤口喎，身体强直，角弓反张；风湿顽痹；头风；妇人产后中风诸病。

①《肘后方》：卒中风，口噤不开。②《千金》：卒中风，口喎，头破脑出，中风口噤。③《医方类聚》引《必用全书》：阴证急伤寒。④《普济方》：头风，伤风湿，身体痹痹。⑤《本草纲目》：阴毒腹痛，小便尿血，妇人产后一切中风诸病。

【方论选录】《千金方衍义》：黑大豆去风活血，更兼酒沃，通行经络。产蓐前后，一切虚风关节不利，无不宜之。

【备考】《千金》本方用法：炒豆令焦，以酒淋汁顿服；豆熬，捣末，熟蒸，以酒淋之温服。《卫生家宝产科备要》：豆炒出烟，以好酒浸，即漉出豆，饮之。《医方类聚》引《必用全书》：豆熬熟，下无灰好酒煮沸顿服。《普济方》：豆炒至无声，乘热入清酒中，密泥头七日温服；豆炒极熟，以清酒沃之，旋旋温服。

00931 大豆煎

【方源】《医心方》卷十引《经心录》。

【组成】 生桑根白皮（入土一尺者，细切）三升 大豆一斗

【用法】 以水六斗，煮取一斗，去滓；下生姜汁二升更煎，取汁四升，每服五合，日三夜一。以知为度。

【主治】 风水。

00932 大龟丸

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】 大乌龟一个（重一斤多） 雄黄五钱 胡椒三钱 川山甲三钱

【用法】 上为末，入龟颈内，以麻绳横缚定，勿令头出，面裹严，外用盐泥固济，火煅红透，取出为末，炼蜜为丸。每服五十丸，酒送下。

【主治】 瘰疬毒。

00933 大补丸

【方源】《三因》卷十三。

【异名】 苁蓉大补丸(《局方》卷五续添诸局经验秘方)。

【组成】 木香（炮） 附子（炮，去皮脐） 茴香（炒） 苁蓉（酒浸） 川椒（炒去汗）各十两 桃仁（炒，去皮尖） 葫芦巴 牛膝（酒浸） 巴戟（去心） 五味子 黄耆 白蒺藜（炒，去刺） 泽泻各五两 羌活 槟榔 天麻 川芎 桂心各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心盐汤、盐酒任下。

【主治】 元脏虚惫，血气不足，白浊遗泄，自汗自利，口苦舌干，四肢羸瘦；及妇人诸虚。

00934 大补丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】 大补阴丸(《医学正传》卷三)。

【组成】 黄柏（炒褐色） 知母（酒浸，炒）各四两 熟地黄（酒蒸） 龟版（酥炙）各六两

【用法】 上为末，猪脊髓、蜜为丸。每服七十丸，空心盐白汤送下。

【功用】 降阴火，补肾水。

【主治】 肝肾不足，阴虚火旺的骨蒸潮热，盗汗遗精，尿血淋浊，腰膝酸痛；或咳嗽咯血，烦热易饥，眩晕耳鸣，舌红少苔，脉细数等。亦用于甲状腺机能亢进、肾结核、骨结核、糖尿病等属阴虚火旺者。

①《摄生众妙方》：遗精，尿血。②《明医指掌》：肾虚腰痛。③《医方集解》：水亏火炎，耳鸣耳聋，咳逆虚热，肾脉洪大，不能受峻补者。④《张氏医通》：阴虚燥热。⑤《会约》：肾水亏败，小便淋浊如膏，阴火上炎，左尺空虚者。⑥《中医方剂学》：肝肾阴虚，虚火上炎、骨蒸潮热，盗汗遗精，咳嗽咯血，心烦易怒，足膝疼热或酸软，舌红少苔，尺脉数而有力。⑦《医方发挥》：甲状腺机能亢进、肾结核、骨结核、糖尿病等属阴虚火旺者。

【宜忌】 ①《删补名医方论》：虽有是证，若食少便溏，则为胃虚，不可轻用。②《医方论》：此治阴火炽盛以致厥逆者则可，至内伤虚热，断不可用。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足少阴药也，四者皆滋补肾阴之药，补水即所以降火，所谓壮水之主，以制阳光是也。加脊髓者，取其能通肾命，以骨入骨，以髓补髓是也。②《古方选注》：丹溪补阴立法，义专重于黄柏，主治肾虚劳热，水亏火炎，以之治虚火呃逆，亦为至当。第肝肾之气，在下相凌，左肾属水，不能自逆，而右肾为相火所寓，相火炎上，挟其冲气，乃能逆上为呃。主之以黄柏，从其性以折右肾之相火，知母滋肾水之化源，熟地固肾中之元气，龟版潜通其脉，伏藏冲任之气，使水不妄动。治虚呃用参术汤下之者，人之阴气，依胃为养，胃土损伤，则相火直冲清道而上，此土败于相火之贼，当崇土以制龙雷之火也。③《删补名医方论》：是方能骤补真阴，承制相火，较之六味功效尤捷。盖因此时以六味补水，水不能遽生，以生脉保肺，金不免犹燥，惟急以黄柏之苦以坚肾，则能制龙家之火，继以知母之清以凉肺，则能全破伤之金。若不顾其本，则病去犹恐复来，故又以熟地、龟版大补其阴，是谓培其本，清其源矣。④《血证论》：苦寒之品，能大伐生气，亦能大培生气，盖因虚火旺者，非此不足以泻火滋阴。夫人之生气根于肾，此气全赖水阴含之，若水阴不足，则阳气亢烈，烦逆痿热。方用知、柏折其亢，龟版潜其阳，熟地滋其阴，阴足阳秘，而生气不泄矣。⑤《成方便读》：治肾水亏极，相火独旺，而为梦遗、骨蒸、痨瘵等证。夫相火之有余，皆由肾水之不足，故以熟地大滋肾水为君。然火有余则少火化为壮火，壮火食气，若仅以滋水配阳之法，何足以导其猖厥之势，故必须黄柏、知母之苦寒入肾，能直清下焦之火者，以折服之。龟为北方之神，其性善藏，取其甘寒益肾，介类潜阳之意，则龙雷之火自能潜藏勿用。猪为水畜，用骨髓者，取其能通肾命，以有形之精髓而补之也。和蜜为丸者，欲其入下焦，续以奏功也。

【备考】 本方方名，《本草纲目》引作“补阴丸”。

00935 大附丸

【方源】《三因》卷十六。

【异名】葱附丸(《医方类聚》卷八十一引《济生》)、葱涎丸(《医方类聚》卷八十一引《澹寮》)。

【组成】大附子(炮,去皮脐)一枚

【用法】上为末,葱汁糊丸,如绿豆大。每服十丸至十五丸,茶清送下。

【主治】元气虚壅上攻,偏正头痛不可忍者。

00936 大青丸

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】大青(去根) 甘草(炙,锉) 枳壳(去瓤,麸炒) 苦参(锉)各三分 黄连(去须) 生干地黄(焙) 升麻各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后热水送下,一日二次。

【主治】心脾中热,口糜生疮,乍发乍退,久不瘥。

00937 大青汤

【方源】方出《肘后方》卷二,名见《外台》卷二引《深师方》。

【异名】大青四物汤(《活人书》卷十八)、阿胶汤(《圣济总录》卷二十七)、阿胶大青汤(《古今医彻》卷一)。

【组成】大青四两 甘草 胶各二两 豉八合

【用法】以水一斗,煮二物,取三升半,去滓;纳豉煮三沸,去滓,乃纳胶。分作四服。尽又合。

【功用】①《外台》引《深师方》:止下痢。②《千金》:除热,止吐泻。

【主治】伤寒、热病,发热多日,汗、吐、下不解;或下利不止,或发黄疸,或发斑疹,烦躁不安者。

①《肘后方》:伤寒、时疫、温病得至七八日,发汗不解,及吐下大热。②《外台》引《深师方》:伤寒劳复。③《千金》:下利不止,斑出。④《普济方》:伤寒一二日及十余日,发黄疸,斑出,烦躁不得卧。

【宜忌】《外台》引《深师方》:忌菘菜、海藻。

【方论选录】《千金方衍义》:大青乃蓝之一种,善解陷伏至阴之邪;豆豉专搜少阴不正之气;阿胶滋血润燥;甘草解毒和中。不特为阳毒发斑之专药,一切时行温热汗吐不解,下利不止,并得用之取其解散阴经热毒也。

00938 大青汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】大青(无大青,以青黛代之) 木通 元参 桔梗 知母 山栀 升麻 石膏

【用法】水煎,调路东黄土末二三钱服之。

【主治】疹出为风寒所中,毒邪内陷,一日即没者。

【加减】大便结闭,口干腹胀,身热烦燥者,此为热秘,加酒炒大黄。

00939 大青汤

【方源】《痧喉汇言》。

【组成】大青三分 知母八分 荆芥一钱 木通六分 石膏四钱 生地三钱 甘草六分 地骨皮二钱 元参一钱

【用法】水煎,热服。

【主治】喉痧得透,惟口渴烦躁,小便短少,热盛舌绛。

00940 大青煎

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】大青 黄柏(去粗皮,蜜炙) 升麻 射干 蔷薇根各半两 苦竹叶一握(细切) 生地黄半两 玄参一两 白蜜二两 天门冬(去心,焙)半两

【用法】上除蜜外,细锉。用水三升,煎取一升,去滓下蜜,再煎成膏。每服半匙,含化咽津,不拘时候。

【主治】喉中热塞,及舌上腭生疮。

00941 大青膏

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】天麻(末)一钱 白附子(末,生)一钱五分 青黛(研)一钱 蝎尾(去毒,生,末) 乌梢蛇肉(酒浸,焙干取末)各一钱 朱砂(研) 天竺黄(研)

【用法】上同再研细,生蜜和成膏。每服半皂子大至一皂子大,月中儿粳米大,同牛黄膏、温薄荷水一处化服。五岁以上,同甘露散服之。

【功用】《小儿药证直诀》:发散。

【主治】小儿血气未实,外受风热,身热恶风,呵欠顿闷,口中气热,热盛动风,手足动摇;或心肝热盛,又触惊邪,而成痫证,惊搐神昏者。

①《小儿药证直诀》:小儿伤风后发搐。口中气出热,呵欠顿闷,手足动摇。小儿生本怯者,多此病也;小儿热盛生风,欲为惊搐,血气未实,不能胜邪,故发搐。②《御药院方》:小儿外伤寒,其候伸欠顿闷,口中气热,或怕畏人,恶风脉浮者。③《金鉴》:小儿心肝热盛,偶被惊邪所触,因而神气溃乱,遂成痫证,发时吐舌急叫,面色乍红乍白,惊惕不安,如人将捕之状。

【临证举例】 伤风发搐 李司户孙病，生百日，发搐二五次。诸众医治，作天钓或作胎惊痫，皆无应者。后钱用大青膏如小豆许，作一服发之，复与涂囟法封之，及浴法，三日而愈。何以然？婴儿初生，肌骨嫩怯，被风伤之，子不能任，故发搐。频发者，轻也。何者？客风在内，每遇不任即搐。搐稀者是内脏发病，不可救也。搐频者，宜散风冷，故用大青膏。不可多服，盖儿至小，易虚易实，多即生热，止一服而已，更当封浴，无不效者。

【备考】 周学敏按："聚珍本"蝎尾、蛇梢肉各五分，有麝香（研），同朱砂、竺黄各一字匕。方末附录云：阎氏集《宝生信效方》内小儿诸方，言皆得于汝人钱氏，其间大青膏无天麻，有大青生研一分，其余药味，分料和制，与此皆同。其方下证治云：治小儿伤风，其候伸欠顿闷，口中气热，恶风脉浮，比此为祥，只用薄荷汤下。

00942 大枣丸

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】 大枣十五枚（去核） 蓖麻子一百粒（去皮）

【用法】 上药，烂捣，捻如枣核。塞耳中，二日效。

【主治】 耳聋。

00943 大枣丸

【方源】《外科正宗》卷五。

【组成】 山羊屎 大枣

【用法】 将山羊屎晒干，入锅炒炭存性，闷息，磨粉收藏。遇久烂不堪，将见内脏者，以大枣去皮核，先捣烂如泥，然后酌量分前粉，捣至成丸。每服四钱，仍以黑枣汤送下。

【主治】 ①《徐评外科正宗》：瘰疬。②《古方汇精》：风湿热毒、痈疽等患，日久溃烂，将见内脏者。

【备考】《古方汇精》本方用山羊粪八两，大枣八两。并云："服至腐去生新，外贴膏加脓溃生肌散，可渐收口。"

00944 大枣汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】 大枣十五枚 黄耆四两 附子一枚 生姜二两 麻黄五两 甘草一尺

【用法】 上㕮咀。以水七升，煮取三升，服一升，每日三次。

【主治】 历节疼痛。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、冷水、海藻、菘菜。

【方论选录】《张氏医通》：麻黄附子甘草汤加黄耆、姜、枣，日三服之。发表重剂莫如麻黄，温经峻药首推附子，表里补泻，功用天渊。仲景于少阴病脉沉发热，二味合用，单刀直破坚垒，而建补天浴日之功。在一二日间，势难叵测，则用细辛以助其锐。二三日无里证，则用甘草以缓其治，各有权度。《金匮》于水肿治例，亦用二汤，喘嗽则兼细辛，以开肺气之壅；脉沉则兼甘草，以缓肾气之逆，与初起防变，二三日无里证互发。而仓公乃于麻附细辛方中，加当归、防、独，以疗贼风口噤发痉。《千金》复以麻附甘草汤内加黄耆、姜、枣，以治历节疼痛，总赖麻黄、附子，彻外彻内，迅扫其邪，杲日当阳，何有阴霾之患乎？

00945 大枣汤

【方源】《本事》卷四。

【组成】 白术三两 大枣三枚

【用法】 白术㕮咀。每服半两，水一盏半，大枣拍破，同煎至九分，去滓温服，一日三四次，不拘时候。

【主治】 四肢肿满。

【方论选录】《本事方释义》：白术气味甘温微苦，入足太阴；大枣气味甘酸微温，入手少阳、足太阴、阳明。四肢浮肿，由乎中宫气弱土衰，不能运湿，故用培土之药。得中焦气旺，脾胃不致失职，自然肿消而病安矣。

00946 大枣汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】 麦冬一钱 石菖蒲六分 浮小麦六合 枣仁一钱半 茯神一钱半 天冬一钱 柏子仁三钱 大枣十个 甘草六分 白芍一钱 元参五钱 黄芩一钱 竹茹一钱 当归一钱

【主治】 妇人脏燥，妊娠无故悲泣。

00947 大金丹

【方源】《外科传薪集》。

【组成】 朱砂三钱 雄精一钱 硼砂一钱 川连三钱 西黄一分 甘草一钱 枯矾三分 黄精三钱 淡秋石一钱 制熟附一钱半

【用法】 上为细末。吹患处。

【主治】 虚火上升，咽喉疼痛。

00948 大泽汤

【方源】《医醇賸义》卷四。

【组成】 天冬二钱 生地六钱 人参一钱五分 龟版八钱 麦冬一钱五分 茯神二钱 柏仁二钱 蛤粉四钱 丹参二钱 石斛二钱 灯心三尺 藕五大片

【主治】 阴液大亏，心火上炽，舌色绛红，边尖

破碎，舌有血痕而痛者。

00949 大顺汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】野党参一两 当归一两 生赭石（轧细）二两

【用法】用卫足花子炒爆一钱为引，或丈菊花瓣一钱作引皆可，无二物为引亦可。不可早服，必胎衣破后，小儿头至产门者，然后服之。

【主治】产难。

【方论选录】赭石性至和平，虽重坠下行，而不伤气血，况有党参补气，当归生血，参、归之微温，济赭石之微凉，温凉调和，愈觉稳妥也。矧产难者，非气血虚弱，即气血壅滞，不能下行。人参、当归虽能补助气血，而性皆微兼升浮，得赭石之重坠，则力能下行，自能与赭石相助为理，以成催生开交骨之功也。至于当归之滑润，原为利产良药，与赭石同用，其滑润之力亦愈增也。

00950 大顺散

【方源】《局方》卷二。

【异名】二宜汤（原书卷十）。

【组成】甘草（锉寸长）三十斤 干姜 杏仁（去皮尖，炒） 肉桂（去粗皮，炙）各四斤

【用法】上先将甘草用白沙炒及八分黄熟，次入干姜同炒，令姜裂，再入杏仁又同炒，候杏仁不作声为度，用筛隔净，后入桂，一处捣罗为散。每服二钱，水一中盏，煎至七分，去滓温服。如烦躁，井花水调下，不拘时候；以沸汤点服亦得。

【功用】《医方集解》：温中散暑。

【主治】①《局方》：冒暑伏热，引饮过多，脾胃受湿，水谷不分，清浊相干，阴阳气逆，霍乱呕吐；脏腑冷热不调，泄泻多渴，心腹烦闷、痢下赤白，腹痛后重。②《会约》：中阴暑，食少体倦，发热作渴，腹痛吐泻，脉沉微者。

【方论选录】①《医方集解》：脾胃者，喜燥而恶湿，喜温而恶寒，干姜、肉桂散寒燥湿，杏仁、甘草利气调脾，皆辛甘发散之药，升伏阳于阴中，亦从治之法也。如伤暑无寒证者，不可执泥。②《古方选注》：《局方》祖仲景大青龙汤，以肉桂易桂枝，而变为里法。病由暑湿伤脾也，故先将甘草、干姜同炒，辛甘化阳以快脾欲；再入杏仁同炒，利肺气以安吐逆；白沙，本草主治绞肠痧痛，用之拌炒，以燥脾湿；复以肉桂为散，俾芳香入阴，升发阳气以交中焦，去脾之湿。湿去而阳气得升，三焦之气皆顺，故曰大顺。

【备考】①《景岳全书》：此方加附子，即名"附子大顺散"。②本方改为丸剂，名"杏仁丸"（见《普济方》）。

00951 大造丸

【方源】《扶寿精方》。

【异名】河车大造丸（《不居集》上集卷二）。

【组成】紫河车一具（米泔水洗净，新瓦上焙干。用须首生者佳。或云砂锅随水煮干，捣烂）败龟版（年久者，童便浸三日，酥炙黄）二两 黄柏（去粗皮，盐酒浸，炒褐色）一两五钱 杜仲（酥炙，去丝）一两五钱 牛膝（去苗，酒浸，晒干）一两二钱 怀生地黄二两五钱（肥大沉水者，纳人砂仁末六钱，白茯苓一块重二两，稀绢包，同入银罐内，好酒煮七次，去茯苓不用） 天门冬（去心）一两二钱 麦门冬（去心）一两二钱 人参一两

【用法】上除地黄另用石木舂一日，余共为末，和地黄膏，再加酒米糊为丸，如小豆大。每服八九十丸，空心、临卧盐汤、沸汤、姜汤任下；寒月好酒下。

【主治】①《扶寿精方》：男子阴萎遗精，妇人带下，素无孕育；大病后久不能作声，足痿不任地者。②《医方集解》：虚损劳伤，咳嗽潮热。

【加减】夏月，加五味子七钱；妇人，加当归二两，去龟版；男子遗精，妇人带下，并加牡蛎（煅粉）两半。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴、足少阴药也。河车本血气所生，大补气血为君；败龟版阴气最全，黄柏禀阴气最厚，滋阴补水为臣。杜仲润肾补腰，腰者肾之府；牛膝强筋壮骨，地黄养阴退热，制以茯苓、砂仁，入少阴而益肾精；二冬降火清金，合之人参、五味，能生脉而补肺气。大要以金水为生化之源，合补之以成大造之功也。

【临证举例】①阳萎、足痿 《本草纲目》引《诸证辨疑》：一人病弱，阳事大萎，服此二料，体貌顿异，连生四子。一人病痿，足不任地者半年，服此后能远行。②补虚益寿 《本草纲目》引《诸证辨疑》：一妇年六十已衰惫，服此寿至九十，犹强健。

00952 大造丸

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《医方集略》。

【组成】紫河车一具（泔浸，洗净，盛竹器，长流水中浸一刻，以回生气；盛小瓦盆于木甑或瓦甑内，蒸极熟如糊，取出，先倾自然汁别贮，将河车石臼内捣千下，同前汁和匀） 生干地黄四两 龟

版 杜仲 天门冬 黄柏（盐酒炒）各一两半 牛膝 麦门冬 当归身各一两二钱 人参一两 五味子五钱

【用法】 上为末，河车汁和米糊烂捣为丸。每服一百丸，以温酒或盐汤任下，一日二次。

【功用】 滋阴补阳，养寿。

【主治】 ①《东医宝鉴·杂病篇》引《医方集略》：六脉虚微，血气衰弱。②《杂病源流犀烛》：阴虚遗泄。

00953 大造丸

【方源】《古方选注》卷中。

【组成】 紫河车一具（用米泔水浸，逾时轻轻摆开，换水洗洁净，白如杨妃色者佳，用竹器盛于长流水内浸一刻，取生气，提回，再入川椒滚汤内一过，以铅罐封固，隔汤煮一伏取出，先倾汁入药，用石臼木椎捣极匀，入后药） 熟地（以生地五两，砂仁一两二钱，茯苓切块四两，绢袋盛，入瓦罐，酒煮七次，去砂、苓，晒干）二两 生地一两五钱 淡天门冬七钱（去心，清水浸五日，晒干） 当归七钱 枸杞子一两五钱 牛膝七钱（酒拌蒸） 五味子七钱 淡肉苁蓉七钱（去甲，切片，浸，去白膜，以淡为度，晒干） 黄柏七钱（盐水炒） 锁阳七钱（酒净） 生杜仲一两（另磨去绵）

【用法】 上为末，河车捣，量加炼蜜为丸。每服三钱，清晨百滚汤送下。

【功用】 金水相生，肝肾同治，潜阴固阳。

【方论选录】 大造者，其功之大，有如再造，故名。河车得父母精中之气而成，乃乾坤之橐龠，铅汞之匡廓，所谓胚胎兆九，混元归一者也，为补养先天之妙品；用熟地，即以生地为佐，乃白飞霞天一生水之法；当归、枸杞益血添精；牛膝、杜仲强筋壮骨；肉苁蓉暖肾中真阳；五味子摄肾中真阴；天冬保肺，恐邪火上僭烁金；黄柏坚阴，下守丹田真气；复以锁阳之涩，封固周密。诸法具备，力量宏深，夫是谓之大造，庶得曰可。

00954 大效散

【方源】《百一》卷二引罗太亟方。

【组成】 田螺壳 黄蚬壳二件不以多少（久在泥土中多年，陈者尤佳，各另烧成白灰）

【用法】 上每剂用白梅肉四两，田螺壳灰二两，黄蚬壳灰一两，同搜拌令匀，作团，用砂盒子盛，盖了，盐泥固济，发顶火煅令焦黑存性，取出研细。每服二钱，食前用人参、缩砂汤调下；陈米饮亦得。如无盒子，只用建盏两只相合，依前法烧。

【主治】 翻胃。

00955 大通丸

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】 生地二钱 朴消一两 没药五分

【用法】 上为末。酒调下。

【主治】 血灌瞳仁。

00956 大菅煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 大荣煎（《会约》卷十四）。

【组成】 当归二三钱（或五钱） 熟地三五七钱 枸杞二钱 炙甘草一二钱 杜仲二钱 牛膝一钱半 肉桂一二钱

【用法】 水二钟，煎七分，食远温服。

【主治】 ①《景岳全书》：真阴精血亏损，及妇人经迟血少，腰膝筋骨疼痛；或气血虚寒，心腹疼痛等证。②《通俗内科学》：阴萎。

【加减】 如寒滞在经，气血不能流通，筋骨疼痛之甚者，必加制附子一二钱；如带浊腹痛者，加故纸一钱（炒用）；如气虚者，加人参、白术；中气虚寒呕恶者，加炒焦干姜一二钱。

00957 大黄丸

【方源】 方出《医心方》卷十二引《葛氏单方》，名见《圣济总录》卷九十七。

【组成】 大黄三两 芍药三两 厚朴三两 枳实六斤 麻子仁六合

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，一日三次。稍增，以通利为度，可恒将之。

【主治】 ①《医心方》引《葛氏单方》：脾胃不和，常患大便坚强难者。②《圣济总录》：内有虫滞。

00958 大黄丸

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】 川大黄（锉碎，微炒） 黄连（去须） 黄芩 黄柏（锉） 曲末 栀子仁各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温水送下，不拘时候。

【主治】 时气遍身发黄，心膈烦热。

00959 大黄丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】 川大黄一斤（生，为末） 鳖甲三两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 枳壳二两半（麸炒微黄，去瓤） 当归一两半（锉，微炒） 赤芍药一两半 京三棱三两（微煨，锉） 吴茱萸一两（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】 上为散，先以米醋三升，熬大黄为膏，次入诸药为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以

温酒送下。

【主治】 痃癖气，时攻心腹疼痛，令人不思饮食，渐为瘦病。

00960 大黄丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】 川大黄半两（锉碎，微炒） 木香半两 肉豆蔻半两（去壳） 硼砂半两（细研） 干姜半两（炮裂，锉） 青橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 吴茱萸一两（汤浸七分，焙干，微炒） 槟榔半两 桂心半两 蓬莪术一两 巴豆一分（去皮心，研，纸裹压去油）

【用法】 上为末，入巴豆、硼砂，研令匀，以醋熬成膏为丸，如梧桐子大。每服三丸，空心以粥饮送下。

【主治】 癥病，心腹妨闷，不欲饮食，四肢不和。

00961 大黄丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【异名】 大黄桃仁丸(《圣济总录》卷七十三)。

【组成】 川大黄一两（锉碎，微炒） 干姜三分（炮裂，锉）高良姜三分（锉） 小草三分 芎藭一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川椒一两（去目及闭口者，微炒去汗）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，一日三次

【主治】 酒癖，痰吐不止，两胁胀痛，气喘上奔，不下食欲。

【备考】 方中小草，原作“甘草”，据《圣济总录》改。

00962 大黄丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 川大黄三两（锉碎，微炒） 栝楼根一两 芎藭三分 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 槟榔一两 桂心三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温水送下，不拘时候。

【功用】 利大小肠。

【主治】 消渴腹胀。

00963 大黄丸

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 川大黄二两（锉碎，微炒） 大戟一两（锉碎，微炒） 赤芍药一两 川朴消一两 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 杏仁五十枚（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以葱白汤送下。

【主治】 小肠热结胀满，小便不通。

00964 大黄丸

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】 川大黄三分（锉，微炒） 天门冬（去心，焙） 百合 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒微黄） 木通（锉） 桑根白皮（锉） 甜葶苈（隔纸炒令紫色） 川朴消各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以温水研破服，不拘时候。

【主治】 小儿龟胸，肺热壅滞，心膈满闷。

00965 大黄丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】 大黄（炮，锉）半两 桔梗（炒） 枳壳（炒，去瓤） 芎藭 羌活（去芦头） 木香 柴胡（去苗） 独活（去芦头）各一分 牵牛子一两（半炒熟，半生用）

【用法】 上为末，熟煮菜脯，入药末，同于木臼内捣，令丸得为度，丸如梧桐子大。每服三十丸，食后、临卧熟汤送下。加至四十丸。

【主治】 大肠秘热，心胸烦躁，头痛便难，腹胁胀满，口舌干燥。

00966 大黄丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】 大黄（锉，炒） 消石 大戟（去皮，炒） 甘遂（炒） 芫花（醋炒焦） 椒目（炒出汗） 葶苈（炒）各一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服一丸，空心桑根白皮汤送下，一日二次。渐增，以知为度。

【主治】 十水。

00967 大黄丸

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】 大黄（锉，炒） 蔓荆实（去皮） 丹参 吴蓝 土瓜根（锉） 防风（去叉） 甘菊花 秦皮（去粗皮） 黄连（去须） 蒌蒿 陈橘皮（去白，焙） 前胡（去芦头）各一两 决明子（微炒） 冬瓜子 青葙子 地肤子 车前子各一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒下，一日二次。

【主治】 白睛肿胀，痛不可忍。

00968 大黄丸

【方源】《小儿药证直诀·附方》。

【组成】 大黄一两（酒洗过，采下蒸熟，切片，

晒干） 川芎一两（锉） 甘草一分（锉，炙） 黑牵牛半两（半生熟炒）

【用法】 上为细末，稀糊为丸，如麻子大。二岁每服十丸，温蜜水送下，乳后服。以溏利为度。未利，加丸数再服。

【主治】 ①《小儿药证直诀·附方》：风热里实，口中气热，大小便闭赤，饮水不止，有下证者。②《奇效良方》：疮痈初起而能食，食而胀满，不大便而喘急，昏甚而谵语者。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：此方大黄、黑丑攻涤泻下，而以川芎升之，甘草缓之，相辅而行，使泻下而有所制。

00969 大黄汤

【方源】 方出《肘后方》卷二，名见张文仲引许推然方（见《外台》卷三）。

【组成】 大黄 黄连 黄柏 栀子各半两

【用法】 水八升，煮六七沸，纳豉一升，葱白七茎，煮取三升，分服。

【功用】《兰台轨范》：除六经之热。

【主治】 ①《肘后方》：伤寒五六日以上者。②张文仲引许推然：天行，若已五六日不解，头痛壮热，四肢烦疼，不得饮食。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、冷水。

00970 大黄汤

【方源】 方出《金匮》卷下，名见《普济方》卷三一二。

【组成】 大黄一两（切，浸，汤成下） 绯帛如手大（烧灰） 乱发如鸡子大（烧灰用） 久用炊单布一尺（烧灰） 败蒲一握（三寸） 桃仁四十九个（去皮尖，熬） 甘草如中指节（炙，锉）

【用法】 上药以童便量多少煎，汤成纳酒一大盏，次下大黄，去滓，分温三服。先锉败蒲席半领，煎汤浴，衣被盖覆。斯须通利数行，痛楚立愈。利及浴水赤，勿怪，即瘀血也。

【功用】《普济方》：利大便，散风活血。

【主治】 ①《金匮》：马坠及一切筋骨损。②《普济方》：坠马及一切筋骨损，腹中有惊风瘀血，烦闷，不省人事。

【方论选录】《古方选注》：驰骋之时，阳鼓于上，卒然而坠，伤在子首，病头胀颈粗，发热体痛，故其所治有不同于平常跌扑所伤者。方中多用陈败之物，取其伏阳而行瘀也。败蒲席须作帆之蒲，惟乡船中尝以为卧具者佳，借其精神所凭，可以伏阳，且陈蒲可逐上焦瘀血；炊单布久蒸，则受汤熟之气，可以化阳自熄，退肿除陈；乱发疗惊安神；绯帛行瘀捜伤；大黄、桃仁、甘草，即桃仁、调胃承气二汤之义，用以扫除三焦之瘀；外用败蒲沐浴，以逐肌肉筋骨之瘀，内外兼治。

【备考】 本方方名，《古方选注》引作“败蒲煎”。

00971 大黄汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【异名】 五利汤（《千金》卷二十二）、五利大黄汤（《圣济总录》卷一三〇）。

【组成】 大黄三两 栀子五十个 升麻二两 黄芩三两 芒消一两

【用法】 上切。以水五升，煮取二升四合，去滓，下消搅调，分温三服。快利为度。

【主治】 痈疽，发背，时毒。

①《鬼遗》年四十已，还强壮，常大患热痛无定处，大小便不通。②《普济方》：发背。③《外科发挥》：时毒焮肿赤痛，烦渴便秘，脉实数。

【方论选录】《千金方衍义》：升麻升举清阳于上，消、黄荡涤热毒于下，黄芩、栀子兼清表热，从渗道而泄也。

【临症举例】 时毒 《外科正宗》：一男子冬月耳面赤肿，发热口干，脉洪实而便秘，此三阳蕴热症也。必舍时从症治之，以五利大黄汤一剂，便行二次，赤肿稍退，内热稍疏。又以升麻解毒汤二服，肿消而病愈。此为用寒远寒之意也。

00972 大黄汤

【方源】《千金》卷十一。

【组成】 大黄 茯苓各半两（一本作黄芩） 乌贼骨二枚 皂荚六枚（如猪牙者） 甘草（如指大者）一尺 芒消（如鸡子）一枚

【用法】 上㕮咀。以水六升，煮三沸，去滓纳消。适寒温，尽服之。十日一剂，作如上法，欲服之宿勿食，平旦服，当下病根也。

【主治】 ①《千金》：蛇癥。②《外台》引崔氏：蛇瘕。

【宜忌】《普济方》：忌海藻、菘菜等。

00973 大黄汤

【方源】 方出《千金》卷二十二，名见《三因》卷十四。

【异名】 单煮大黄汤（《外科精要》卷中）。

【组成】 大黄

【用法】 单煮为汤服。

【功用】《外科精要》：宣热拔毒。

【主治】 痈疽，大便秘结，脉实。

①《千金》：痈疽。②《三因》：痈疽，热盛脉数

者。③《外科精要》：痈疽，大便秘结，热毒蓄于内。④《准绳·疡医》：脉实沉而数，膏粱食肉之辈，大腑秘者。

00974 大黄汤

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】 大黄（锉，炒）一两 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄，研）半两 水蛭（米炒黄）一分 木通半两（锉）

【用法】 上四味，除桃仁外，为粗末，加桃仁同研令匀。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒，内有瘀血，大便不利，小腹急痛。

00975 大黄汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】 大黄（锉，炒）一钱半 甘草（炙，锉）一分 桑根白皮（炙，锉）三分 葱白（并根）三茎

【用法】 上锉，如麻豆大，童便一盏半，同煎至七分，去滓，空腹温服。

【主治】 肺热，久咳嗽，涕唾多。

00976 大黄汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】 大黄（锉，炒） 山栀子（去皮） 黄连（去须） 龙胆 郁金 黄柏子各半两 甘草一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加竹叶七片，同煎至六分，去滓放温，食后服。

【主治】 肝经邪热攻眼，赤涩肿痛，畏日羞明。

00977 大黄汤

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】 大黄（锉）一两 芒消（研） 黄连（去须） 黄柏（炙）各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，加蜜半匙，酥少许，细呷含咽。

【主治】 口糜生疮。

00978 大黄汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 大黄（锉碎，微炒） 朴消 当归（微炙） 芍药各一两 芎䓖一两一分 桂（去粗皮）二两半 厚朴（去粗皮，生姜汁炙烟出，如此七遍）一两一分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓温服。血行即止服。

【主治】 妇人月水来腹痛，脐下坚硬，积血不下。

00979 大黄汤

【方源】《绫本事》卷二。

【组成】 大黄一两（生姜自然汁半茶盏，炙大黄令干，又淬入姜汁中，如此淬尽，切，焙，为末）

【用法】 上每服二钱，加陈米一撮，葱白二茎，水一大盏，煎至七分，先食葱白，次服其药。不十日去根。

【主治】 冷涎翻胃。其候欲发时先流冷涎，次则吐食。

00980 大黄汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】 将军饮（《古今医鉴》卷五）、酒煎大黄汤（《症因脉治》卷四）。

【组成】 大黄一两

【用法】 上细锉。好酒二大盏，同浸半日许，再同煎至一盏半，去大黄不用，将酒分为二服，顿服之。痢止一服，如未止再服。以利为度。

【主治】 痢疾，脓血稠粘，里急后重，腹痛，脉实。

①《保命集》：泄痢久不愈，脓血稠粘，里急后重，日夜无度，久不愈者。②《医方类聚》引《医林方》：便血，身热，脉胜。③《医统》：痢初作及久不愈，或脉实。④《古今医鉴》：休息痢。⑤《症因脉治》：湿热痢无表邪者。

【方论选录】《玉机微义》：此乃阳明经荡涤邪热之药，用酒煎者，欲其上至顶巅，外彻皮毛也。

00981 大黄散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 川大黄一两（锉碎，微炒） 黄芩一两 赤芍药半两 柴胡一两（去苗） 知母一两 黄连半两（去须） 甘草半两（炙微赤，锉） 葳蕤半两 秦艽半两（去苗）

【用法】 上为粗末。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 心脏实热，身体烦疼，口干多燥。

00982 大黄散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 川大黄一两（锉碎，微炒） 黄芩三分 赤芍药三分 冬葵子一两 紫苏茎叶三分 槟榔二分 瞿麦一两 木通二分（锉） 白茅根三分（锉）

【用法】 上为粗末。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，同煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 膀胱实热，腹胁胀满，小便不利。

00983 大黄散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 川大黄一两（锉碎，微炒） 泽泻一两 黄芩一两 栀子仁一两 柴胡一两（去苗） 羚羊角屑一两 木香（石膏）二两 甘草一两（炙微赤，锉） 木通一两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加淡竹叶二七片，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 心劳热，口疮，心烦腹满，小肠不利。

【宜忌】 忌炙煿、热面、生果。

00984 大黄散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】 川大黄（锉碎，微炒） 大青 羚羊角屑 栀子仁 桑根白皮（锉）各一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，加生地黄汁半合服之，一日三四次。

【主治】 肝肺大热，白睛肿胀，盖覆瞳仁，疼痛。

00985 大黄散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 川大黄一两（锉碎，微炒） 犀角屑三分 射干三分 川升麻三分 玄参二分 大青三分 络石三分 木通三分（锉） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至三分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 心脾热毒，生木舌，肿涩妨闷。

00986 大黄散

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】 川大黄一两（锉，微炒） 当归一两（锉，微炒） 白术一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 柴胡一两半（去苗） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 痃癖坚急，气连心胁相引痛。

00987 大黄散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 川大黄一两（锉碎，微炒） 苦参一两（锉） 贝齿一两（烧为灰） 滑石一两

【用法】 上为细散。每服二钱，煮葵根汤调下，不拘时候。

【主治】 关格。风冷气入小肠，忽痛坚急，大小便不通；或小肠有气结如升大，胀起如吹状。

00988 大黄散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】 川大黄一两（锉碎，微炒） 当归一分 川芒消半两 黑豆皮半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 牛蒡子一分（微炒） 芎劳一分 甘草半两（生，锉）

【用法】 上为末，分为三服。每服以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。以利为度。

【主治】 石痈，肿硬疼痛，心腹烦闷，不得宣畅。

00989 大黄散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 川大黄一两（锉，微炒） 川朴消半两 牛膝三分（去苗） 当归三分（锉，微炒） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 虻虫一分（炒令黄，去翅足） 赤芍药三分 水蛭一分（炒微黄） 土瓜根三分 干漆半两（捣碎，炒令烟出） 桂心半两

【用法】 上为细散。每服一钱，食前温酒调下。

【主治】 妇人月水不通，心腹妨闷，四肢烦疼。

00990 大黄散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 川大黄二两（锉，微炒） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕） 牛膝一两（去苗） 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 桂心三分 当归三分（锉，麸微炒） 白术三分 芎劳三分 防葵三分

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，每于食前稍热服。

【主治】 妇人月水不通，腹内有癥块，或时寒热，渐加羸瘦。

00991 大黄散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】 川大黄半两（锉碎，微炒） 黄连半两（去须） 栝楼根半两 黄芩半两 栀子仁半两

【用法】 上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 小儿诸黄。

00992 大黄散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】 川大黄一分（锉，微炒） 木通一分（锉） 桑根白皮半两（锉） 羌活一分 川朴消三分

【用法】 上为粗散。一二岁儿，每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】 小儿阴肿。

00993 大黄散

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】 地黄汁半升 生大黄末一方寸匕

【用法】 煎地黄汁三沸，下大黄末调匀。空腹时温饮一小盏，每日三次。血即止。

【主治】 吐血百治不愈。

00994 大黄散

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】 大黄如枣大一块 斑蝥（全者）七个

【用法】 上为细散。以醋调如糊，先揩破癣疮，然后涂药，候干洗之。

【主治】 一切癣。

00995 大黄散

【方源】《普济方》卷三十九。

【组成】 大黄五钱（炮） 甘草五钱 滑石五钱 绿豆一合

【用法】 上为细末。每服二钱，新汲水调，去滓服之。

【主治】 大小便不通。

00996 大黄散

【方源】《普济方》卷一九五。

【组成】 大黄（炒）二两 朴消 梔子仁各二两 黄柏 冬葵子各一两

【用法】 上为散。每服四钱，水一盏，煎至六分，温服，每日四五次。以利为度。

【主治】 黄病，腹胀满，小便赤而涩。

00997 大黄散

【方源】《类证治裁》卷三。

【组成】 三棱 大黄

【用法】 生姜、橘皮煎汤调下。

【主治】 痞结，胁坚如石。

00998 大麻丸

【方源】《医方类聚》卷九十六引《千金月令》。

【异名】 大黄丸（《圣惠》卷二十三）、搜风顺气丸（《直指》卷三引《圣惠》）、顺气丸（《袖珍》卷一引《简易》）、消风顺气丸（《医林绳墨大全》卷六）、镇风润气丸（《杂病源流犀烛》卷十七）。

【组成】 大黄十五两 枳壳三两（炒） 槟榔五两 郁李仁五两 薯蓣五两 牛膝五两 独活三两 防风三两 山茱萸三两 麻仁十两（别研） 菟丝子四两（酒浸，别捣粉） 车前子六两

【用法】 上为散，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，加至五十丸，空腹温水送下；如腹脏热，即浆水下。自然微利。

【功用】 疏风顺气，益阴润肠。

①《袖珍》引《简易》：补精壮颜，疏风顺气。②《普济方》引《如宜方》：补益通利。③《明医指掌》：润三焦，和五脏，润肠，除风湿。

【主治】 中风后，风壅气滞，阴亏津伤，大便秘涩，身体羸瘦，腰膝冷痛，四肢无力，遍身虚痒。

①《医方类聚》引《千金月令》：脚气，及一切风气虚损。②《圣惠》：风壅大肠涩滞。③《医方类聚》引《简易》：三十六种风，七十二般气，上热下冷，腰脚疼痛，四肢无力，多睡少食，渐加羸瘦，颜色不定，或黄或赤，恶疮下疰，口苦无味，憎寒毛耸，积年癥癖气块，丈夫世事断绝，女子久无子息，久患寒疝，吐逆泻利，变成劳疾，百节酸疼。④《普济方》引《如宜方》：腰膝无力，大肠闭则痛发，膝下似水冷。⑤《普济方》：脚气欲发，大便先闭。⑥《医方集解》：中风，风秘，气秘；便溺阻隔，遍身虚痒，脉来浮数。亦治肠风下血，中风瘫痪。

【宜忌】 ①《医方类聚》引《千金月令》：忌牛肉生。②《医方类聚》引《简易》：孕妇勿服。如服药觉脏腑微动，以羊肚肺羹补之。

【方论选录】《医方集解》：此手足阳明药也。大黄苦寒峻猛，能下燥结而祛瘀热，加以蒸晒，则性稍和缓，故以为君；麻仁滑利，李仁甘润，并能入大肠而润燥通幽；车前利水，牛膝下行，又能益肝肾而不走元气；燥本于风，独活、防风之辛以润肾而搜风；滞由于气，枳壳、槟榔之苦以破滞而顺气；数药未免攻散，故又用山药益气固脾，山茱温肝补肾，菟丝益阳强阴，以补助之也。

【临证举例】 ①便秘 《医方类聚》引《简易方》：教授韩远举，福唐人，言渠祖母昔年常苦大便闭涩，初作即腰足冷痛，久遂不能行。渠取游氏与蔡君谟所藏异方，服之一日，而腰膝温暖如初。即从此大肠复无前日之苦，平时头风、血气诸疾，消除殆尽。饮食快美，肌肤充肥，迨今七十七，而步履轻健，耳目聪明，皆韩同年所传药功力之效。②言语謇涩 《医方类聚》引《简易》：予通判邵阳，日遇王仲及舍人，自靖解官还郡中。见其手颤，言语謇涩，似有瘫痪候，授以此方，随即平复如常。

【备考】《直指》引《圣惠》此方中无山茱萸、菟丝子，疑脱。《医方类聚》引《简易》本方用法：上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，茶、酒、粥饮送下，百无所忌，平旦、临卧各一服。服经一月消食，二月去肠内宿滞，三月无倦少睡，四月精神强盛，五月耳目聪明，六月腰脚轻

健，一年百病皆除，老者返少。

00999 大惊丸

【方源】《局方》卷十。

【异名】 罢惊丸(《御药院方》卷十一)。

【组成】 蛇黄（火煅，醋淬九次，研，飞）二钱 青礞石（研） 一钱 朱砂（研，飞）三钱 虾蟆灰 雄黄各一钱 铁粉（研）二钱半

【用法】 上为末，水浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服一丸，煎薄荷水磨剪刀股化下，一日二三次。

【功用】 治惊化涎。

【主治】 小儿惊风诸痫，壮热昏愦，神志恍惚，痰涎壅塞；或发搐搦，目睛直视。

01000 大清饮

【方源】《不居集》上集卷十六。

【组成】 知母 石斛 木通各一钱五分 石膏（生用）五七钱（一方加麦冬）

【主治】 脾经实热，轻手扪之不热，重按至筋骨又不热，不轻不重，在轻手重手之间，乃热在肌肉，遇夜尤甚，心烦，怠惰嗜卧，四肢不收，无气以动。

01001 大戟丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】 大戟一两（锉碎，微炒） 牵牛子一两（微炒） 皂荚一两（去皮，涂酥炙令黄焦，去子） 海蛤一两（细研） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 川大黄一两（锉碎，微炒） 桑根白皮一两（锉） 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日空心服二十丸，以温水送下。以利为效。

【主治】 十种水气，遍身肿满，上气喘息，大小便俱涩。

01002 大戟丸

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】 大戟 芫花（醋炒） 甘遂 海带 海藻 郁李仁 续随子各半两 樟柳根一两（上八味，为末，每料抄药末十五钱七分，便入后药） 硇砂 轻粉 粉霜各一钱 水银沙子一皂子大 龙脑半钱 巴豆二十一个（生用，去皮）

【用法】 上八味以下同研匀，用枣肉为丸，如绿豆大。每服五丸至七丸，食后、临卧用龙脑、腊茶送下。

【主治】 十种水气，肿胀喘满，热寒咳嗽，心胸痞闷，背项拘急，膀胱紧，肿于小腹，小便不通，反转大便溏泄，不能坐卧。

01003 大戟丸

【方源】《三因》卷十四。

【异名】 麝香大戟丸(《局方》卷八续添诸局经验秘方)。

【组成】 大戟（去皮，锉，炒黄）半两 葫芦巴四两（炒） 木香一两 附子（炮，去皮脐） 舶上茴香 诃子（煨，去核） 槟榔各一两 川楝五两（后入） 麝香半钱（别研）

【用法】 上为末，独留川楝，以好酒一二升，葱白七枚，长三四寸，煮川楝软，去皮核，取肉，和上药为丸，如梧桐子大。每服五七丸至十丸，空心温酒送下；姜汤亦得；潮发疼痛，炒姜热酒送下十五丸。

【主治】 阴癫肿胀，或小肠气痛。

01004 大戟汤

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】 大戟（去皮，炒） 甘遂（炒）各等分

【用法】 上为粗末。每服一钱匕，水一盏半，加大枣三枚（劈破），煎至七分，去滓温服。

【主治】 水蛊，水肿。

01005 大戟散

【方源】《洁古家珍》。

【组成】 大戟 白牵牛（头末） 木香各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，以猪腰子一对，批开，掺药在内，烧熟，空心食之；如肿不能全去，于腹绕脐涂甘遂细末，饮甘草水，其肿尽去。

【主治】 水肿，腹大如鼓，或遍身皆肿。

01006 大温丸

【方源】《痰火点雪》卷二。

【组成】 大附子（童便煮一炷香） 人参（去芦）三分 桔梗一钱 生地黄一钱 蛤粉五分 玄参七分 升麻四分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，金箔为衣。薄荷汤送下。

【主治】 口舌生疮，服诸凉药不效者。

【备考】 方中附子用量原缺。

01007 大蒜酒

【方源】《仙拈集》卷一引王永先方。

【组成】 独头蒜

【用法】 一岁一个，去皮，真窝儿白酒六七分，对水白酒二三成，量酒盖过蒜为度，蒸熟。如夏月露一宿，再温热用；冬月乘热连白酒服完。从大便出虚气，即下秽物，其肿自消，一服除根。

【主治】 诸臌。

01008 大蓟饮

【方源】《奇效良方》卷五十。

【组成】 大蓟汁 地黄汁 生姜汁 麦门冬汁 刺蓟汁各二合

【用法】 上用白蜜半匙相和匀，冷服。

【主治】 吐呕血。

01009 大蓟散

【方源】《济生》卷二。

【异名】 大蓟饮子(《东医宝鉴·内景篇》)卷二引《丹溪心法》)。

【组成】 大蓟根（洗） 犀角（镑） 升麻 桑白皮（炙） 蒲黄（炒） 杏仁（去皮尖） 桔梗（去芦）各一两 甘草（炙）半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 饮啖辛热，热邪伤肺，呕吐出血一合或半升许，名曰肺疽。

01010 大腹散

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】 大腹皮（锉）桑根白皮（锉） 槟榔（锉）各一两 当归二两（切，炒） 牡丹皮 甘遂各半两 苦葶苈一分（炒） 牛膝（去苗，酒浸，切，焙） 赤茯苓（去黑皮） 生干地黄（焙）各一两 人参 木香各半两

【用法】 上为散。每服二钱匕，浓煎紫苏汤调下，一日二次。

【主治】 妇人血分，身体通肿，虚烦不食。

01011 大僻汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】 升麻 干葛 羌活各五分 防风二分半 甘草六分（半生半炙） 柴胡三分 人参 白芍各五分

【用法】 加葱白，水煎服。

【主治】 热郁，手心热。

01012 大七香丸

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【组成】 香附子（炒）一百九十二两 麦芽（炒）一百两 丁香皮三百三十两 缩砂仁 藿香叶各二百五十两 甘松 乌药各六十四两 肉桂（去粗皮） 甘草（炒）陈皮（去白，洗）各二百五十两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一粒，盐酒、盐汤嚼下；妇人脾血气，如经水不调，并用炒姜酒嚼下；醋汤亦得。

【功用】《御药院方》：消谷进食。

【主治】 ①《局方》（绍兴续添方）：男子、妇人脾元气冷，胃气虚乏，不思饮食，心膈噎塞，渐成膈气，脾泄泻痢，气刺气注，中酒吐酒，冷痰翻胃，霍乱吐泻。②《御药院方》：脾胃不和，二焦痞滞，气不宣通，食欲迟化。

【宜忌】 忌生冷、肥腻。

01013 大七香丸

【方源】《证治要诀类方》卷四。

【组成】 木香 丁香 檀香 甘松 丁皮 橘皮 砂仁 白豆蔻 三棱 莪术（醋煮）各四两 大茴香二两半

【用法】 上为末，米糊为丸，如绿豆大。每服三十丸，姜汤送下。

【主治】 中脘停滞，气不流传，水谷不分，致生气泻，肠鸣，气走胸膈，痞闷腹急而痛，泻则腹下须臾又急，亦有腹急气塞而不通者。

01014 大三黄丸

【方源】《得效》卷八。

【组成】 大柏皮 黄连 山豆根 黄芩各四钱 滑石二钱 黄药二钱 硼砂二钱 脑子 麝香 甘草各一钱 百草霜四钱

【用法】 上为末，新汲井华水为丸，如小指头大。每服一丸，入口噙化，旋旋咽下。

【主治】 上焦壅热，咽喉肿闭，心膈烦躁，小便赤涩，口舌生疮，目赤睛疼，燥渴心烦，齿痛。

01015 大川芎丸

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】 川芎一斤 天麻四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，每两作十丸。每服一丸，食后茶、酒细嚼送下。

【主治】 首风，眩晕眩急，外合阳气，风寒相搏，胃膈痰饮，偏正头痛，身拘倦。

01016 大已寒丸

【方源】《局方》卷二（绍兴续添方）。

【组成】 荜茇 肉桂各四斤 干姜（炮） 高良姜各六斤

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前米饮送下。

【主治】 久寒积冷，脏腑虚弱，心腹疼痛，胁肋胀满，泄泻肠鸣，自利自汗，米谷不化，阳气暴衰，阴气独盛，手足厥冷；伤寒阴盛，神昏脉短，四肢怠惰。

01017 大已寒丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 川乌头（炮，去皮脐，作豆大，再炒黄） 干姜（炮裂） 良姜（炒） 官桂（去粗皮） 吴茱萸各一两

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食前米饮送下。

【功用】 《御药院方》：退阴助阳，除脏腑积冷。

【主治】 ①《儒门事亲》：恶冷湿痹，肘臂挛急，寒嗽痰厥，心中澹澹大动，屈伸不便，积水足浮肿，囊缩。②《御药院方》：中焦气弱，脾胃受寒，饮食不美，气不调和，心腹疼痛，大便滑泄，腹中雷鸣，霍乱吐泻，手足厥逆，便利无度；及疗伤寒阴湿，形气沉困，自汗。

01018 大元胡散

【方源】 《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】 乌药 灵脂 当归 熟地 白芍 川芎 三棱 香附 甘草 元胡 陈皮 官桂 厚朴 防风

【主治】 儿枕痛。

【方论选录】 产时其血块与儿俱下，则产后无患。若产妇脏腑风冷，使血瘀小腹不下，结聚疼痛，名曰儿枕痛。七日后血块仍不下，此积寒夙冷结血而成块，难以速消。痛久则血愈虚，产妇愈惫也，故用熟地、白芍、川芎、当归以补血，用三棱以削坚祛积，防风以祛风冷，厚朴以温中。总以辛温去血块为第一。

01019 大内伤丸

【方源】 《准绳·类方》卷三。

【组成】 白术（黄土炒） 枳壳（麸炒） 黄芩（酒炒）各六钱 厚朴（姜汁炒） 香附（童便炒） 苍术（米泔水洗，葱汁炒） 草果（炒） 木瓜 赤曲（炒） 三棱（蜜炙）各五钱 莪术（蜜水炒）七钱 青皮（麸炒） 川芎 白芍药（酒炒） 神曲（炒） 枳实（麸炒） 石菖蒲各一两 小茴香（炒） 肉桂 甘草（炙） 乳香（出汗）各一两

【用法】 上为细末，神曲糊为丸，如弹子大，朱砂一两为衣。汤、酒任下。多不过二丸。

【主治】 血瘀。

01020 大分清饮

【方源】 《景岳全书》卷五十一。

【组成】 茯苓 泽泻 木通各二钱 猪苓 栀子（或倍之） 枳壳 车前子各一钱。

【用法】 水一钟半，煎八分，食远温服。

【功用】 《证治宝鉴》：清利。

【主治】 ①《景岳全书》：积热闭结，小水不利，或致腰腹下部极痛；或湿热下利，黄疸，溺血，邪热蓄血，腹痛淋闭。②《医学集成》：耳鸣属火盛者。

【加减】 内热甚者，加黄芩、黄柏、草龙胆之属；大便坚硬胀满者，加大黄二三钱；黄疸小水不利热甚者，加茵陈二钱；邪热蓄血腹痛者，加红花、青皮各一钱五分。

01021 大风引汤

【方源】 《千金》卷七引《胡洽方》。

【组成】 独活 茯苓 人参各三两 防风 当归 甘草 桂心 黄耆各二两 附子一枚 大豆二升

【用法】 上㕮咀，以水九升，酒三升，煮取三升，分四服。服别相去如人行十里久。

【主治】 中风腰脚疼痛弱者。

01022 大凤髓丹

【方源】 《元戎》卷十。

【组成】 黄柏（炒）二两 缩砂一两 甘草半两 半夏（炒） 木猪苓 茯苓 莲花蕊 益智仁各二钱五分

【用法】 酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，早晨温酒送下。

【功用】 固真元，降心火，益肾水。

【主治】 心火狂阳太盛，肾水真阴虚损，夜梦遗精。

01023 大正气散

【方源】 《医方类聚》卷一三〇引《济生》。

【异名】 大正气汤（《赤水玄珠》卷五）。

【主治】 厚朴（姜制炒） 藿香叶 半夏（汤泡七次） 橘红 白术各一两 甘草（炙） 槟榔 桂枝（不见火） 枳壳（去瓤，麸炒） 干姜（炮）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，枣子二枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脾胃怯弱，风寒湿气伤动冲和，心腹胀满，有妨饮食。

01024 大玉容丹

【方源】 《串雅外编》卷三。

【组成】 白僵蚕三钱 白丁香一钱五分 白附子三钱 白芷三钱 三奈三钱 滑石五钱 硼砂三钱 白荷花瓣三钱 密陀僧三钱 白茉莉子（研粉）三钱 绿豆粉二两 白冬瓜子三钱（晒研） 白蜜一两五钱

【用法】 上为丸。敷面。

【主治】 雀斑、痱瘰。

01025 大四斤丸

【方源】 《直指》卷四。

【组成】 宣木瓜（去瓤，切，焙） 天麻（锉） 牛膝（锉，焙） 苁蓉（洗，切，焙）各一斤（用

好酒五升浸三日） 熟附子 虎骨（酥炙）各二两 当归三分 乳香 没药 五灵脂各半两 麝香一钱

【用法】 上为末，用浸药酒调面糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，用木瓜煎汤送下。

【主治】 脚气。

01026 大白术散

【方源】《得效》卷一。

【组成】 白术 附子（炮裂，去皮脐） 川乌头（制同上） 桔梗（去芦头） 细辛各一两 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】 上为末。每服二钱，水一中盏，煎至六分，不拘时候，稍热温。

【主治】 阴毒伤寒，心间烦躁，四肢逆冷。

01027 大宁嗽汤

【方源】《直指》卷九。

【组成】 北五味子 茯苓 桑白皮（炒） 紫苏 细辛 橘皮 枳壳（制） 杏仁（去皮，炒） 阿胶（炒酥） 甘草（炙） 罂粟壳（去筋萼，截碎，蜜、酒炒热）各一分 半夏（制）二分

【用法】 上锉散。每服三钱，加生姜五片，大枣二枚，乌梅半个，食后煎服。

【主治】 劳嗽；诸嗽通用。

【加减】 劳嗽，多加川芎。

01028 大半夏汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 半夏二升（洗，完用） 人参三两 白蜜一升

【用法】 以水一斗二升，和蜜扬之二百四十遍，煮药取二升半，温服一升，余分再服。

【主治】 脾阴不濡，胃虚气逆，朝食暮吐；膈间痰饮，心下痞硬，肠中沥沥有声。

①《金匮》：胃反呕吐。②《肘后方》：膈间痰饮。③《外台》：呕，心下痞坚。④《三因》：心气不行，郁生涎饮，聚结不散，心下痞硬，肠中沥沥有声，食入即吐。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：阳明，燥金也，与太阴湿土为合。腑脏不和，则湿自内聚，为痰为饮，燥自外袭，为胃脘痛；玄府干涸，而胃之上脘尤燥，故食难入，虽食亦反出也。半夏解湿饮之聚结，分阴阳，散气逆；人参补正；蜜润燥；以水扬之者，《内经》云：清上补下，治之以缓，水性走下，故扬以缓之；佐蜜以润上脘之燥也。②《金匮要略心典》：胃反呕吐者，胃虚不能消谷，朝食而暮吐也。又胃脉本下行，虚则反逆也。故以半夏降逆，人参、白蜜益虚安中。东垣云：辛药生姜之类治呕吐，但治上焦气壅表实之病，若胃虚谷气不行，胸中闭塞而呕者，惟宜益胃推扬谷气而已，此大半夏汤之旨也。③《古方选注》：大半夏汤，通补胃腑之药，以人参、白蜜之甘，厚于半夏之辛，则能兼补脾脏，故名其方曰大。以之治胃反者，胃中虚冷，脾因湿动而不磨谷，胃乃反其常道而为朝食暮吐。朝暮者，厥阴肝气尽于戌，旺于丑也，宿谷藉肝气上升而乃吐出。主之以半夏辛温利窍除寒，人参扶胃正气，佐以白蜜扬之二百四十遍，升之缓之，俾半夏、人参之性下行不速，自可斡旋胃气，何患其宿谷不消，肝气僭升也乎？④《金匮要略浅注补正》：此反胃即脾阴不濡，胃气独逆，今之膈食病足矣，或粪如羊屎，或吐后微带血水。用半夏降冲逆，即是降胃，用参、蜜滋脾液以濡化水谷，则肠润谷下。

【例案举例】 噎膈 《医宗必读》：邑宰张孟端夫人，忧怒之余，得食则噎，胸中隐隐痛。余诊之曰：脉紧且滑，痰在上脘，用二陈加姜汁、竹沥。长公伯元曰：半夏燥乎？余曰：湿痰满中，非此不治。遂用四剂，病尚不减，改大半夏汤，服四帖，胸痛乃止，又四帖，而噎亦减，服二十剂而安。若泥半夏为燥，而以他药代之，其能愈乎？惟痰不盛、形不肥者，不宜予也。

01029 大半夏汤

【方源】《外台》卷八引《集验方》。

【组成】 人参一两 茯苓四两 青竹茹五两 大黄六两 橘皮 干姜各三两 泽泻甘草（炙） 桂心各二两

【用法】 上切。以水八升（用泉水、东流水尤佳），煮取三升，服七合，日三夜一。

【主治】 胃反不受食，食已呕吐。

【加减】 已利，去大黄。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、生葱、大酢。

01030 大半夏汤

【方源】《千金》卷十六。

【组成】 半夏三升 人参二两 白蜜一升 白术一升 生姜三两

【用法】 上㕮咀。以水五升，和蜜扬之二三百下，煮取一升半，分三服。

【主治】 胃反不受食，食已即呕吐。

【方论选录】《千金方衍义》：《金匮》大半夏汤本治胃反呕逆，取人参助半夏之祛痰，白蜜滋半夏之辛燥，《千金》加白术、生姜，不但佐参、半之祛痰，且善行白蜜之滞也。

01031 大半夏汤

【方源】《升金》卷十六。

【组成】半夏一升　大枣二十枚　甘草　附子　当归　人参　厚朴各二两　桂心五两　生姜八两　茯苓　枳实各二两　蜀椒二百粒

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【功用】下气。

【主治】①《千金》：胃中虚冷，腹满塞。②《三因》：中虚胃冷胀满。肝气不平，胜克于脾，脾郁不行，结聚涎沫，闭于脏气，腑气不舒，胃中胀满，其脉弦迟。

【方论选录】《千金方衍义》：《金匮》治胃反呕逆大半夏汤，止人参、半夏、白蜜三味。此以胃虚腹满，故去白蜜之腻滞，加椒、姜、附子以散寒结，枳实、厚朴以泄腹满，当归、茯苓以和血气，生姜、大枣以和荣卫，甘草代白蜜之和脾，并和椒、姜、附子之烈也。

01032　大芎黄汤

【方源】《保命散》卷中。

【异名】芎黄汤(《杏苑》卷八)。

【组成】川芎二两　羌活　黄芩　大黄各一两

【用法】上㕮咀。每服五七钱，水一盏半，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。宜利为度。

【主治】①《保命集》：破伤风，脏腑秘，小便赤，自汗不止。②《景岳全书》：破伤风，邪传于里，舌强口噤，项背反张，筋惕搐搦，痰涎壅盛。

【备考】先用芎黄汤二三服后，用大芎黄汤下之。

01033　大百劳散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】蛤蚧一对（蜜炙）　元州鳖甲一个（去裙，醋炙）　附子一两　人参　柴胡　川干姜　白茯苓（去皮）　白术　茴香　青皮（去白）　杏仁（去皮尖）　知母　贝母　陈皮（去白）　官桂　甘草（炙）　半夏（生姜制）　苍术（汤浸）各一两　苏木　龙胆草各半两

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣二枚，乌梅二枚，同煎，空心稍热服。

【主治】一切劳疾，肌劣，喘息不卧，痰涎不食。

【加减】有汗加小麦二十粒。

【宜忌】不用铁器。

01034　大竹沥汤

【方源】《千金》卷七。

【组成】竹沥一斗四升　独活　芍药　防风　芎芎　甘草　白术　葛根　细辛　黄芩　芎藭各二两　桂心　防己　人参　石膏　麻黄各一两　生姜　茯苓各三两　乌头一枚

【用法】上㕮咀。以竹沥煮取四升，分六服，先未汗者取汗，一状相当即服。

【主治】①《千金》：卒中风。口噤不能言，四肢缓纵，偏痹挛急，风经五脏，恍惚志怒无常，手足不随。②《圣惠》：脚气痹挛，风毒所致。口噤不能语，四肢顽痹缓弱，挛急疼痛。

01035　大决明散

【方源】《得效》卷十六。

【异名】石决明散(《普济方》卷七十一)。

【组成】石决明一两（炒）　草决明（炒）　羌活　山栀子各半两　木贼五钱　大黄（煨）　荆芥各一分　青葙子（炒）　芍药各半钱

【用法】上为末。每服二钱，麦门冬（去心）煎汤调，食后服。

【主治】肝脏积热，眼先患赤痛肿疼，怕日泪涩难开，忽生翳膜肿；或初患一目不见，以致两目齐患。

01036　大安胎饮

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】当归二钱　熟地黄　白术（蜜炙）　川芎（煨）　白芍（酒炒）　续断（盐水炒）　条芩（酒炒）　砂仁（炒，不去壳）　桑寄生各一钱　人参　炙甘草　荆芥穗各五分

【用法】水一钟半，煎七分服。

【主治】妊娠一月，素体弱及惯堕胎者。

【加减】如气不顺而喘，加苏梗一钱。

01037　大异香散

【方源】《直指》卷十七。

【异名】大异功散(《医钞类编》卷九)。

【组成】京三棱　蓬术　青皮　陈皮　半夏曲　藿香　北梗　益智仁　枳壳（制）　香附（炒）各半两　甘草（炙）三分

【用法】上锉散。每服三钱，加生姜五片，大枣二枚，水煎服。

【主治】积聚胀满，早食暮不能食。

①《直指》：谷胀，气胀。②《得效》：谷胀，失饥伤饱，痞闷停酸，早食暮不能食。③《景岳全书》：积聚胀满。

01038　大防风汤

【方源】《百一》卷三。

【组成】防风（去芦）　白术　杜仲（去粗皮，炒令丝断）　川当归（洗）　熟干地黄（洗）　白芍

药 黄耆（微炒）各二两 羌活（去芦） 牛膝（去芦） 甘草（炒） 人参（去芦）各一两 附子（炮，去皮脐） 川芎各一两半（抚芎不可用）

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一盏半，加生姜七片，大枣一枚，同煎至八分，去滓，食前温服。

【功用】 祛风顺气，活血脉，壮筋骨，除寒湿，逐冷气。

【主治】 《局方》（续添诸局经验秘方）：患痢后脚痛痿弱，不能行履，名曰痢风；或两膝肿大痛，髀胫枯腊，但存皮骨，拘挛蹉卧，不能屈伸，名曰鹤膝风。

【方论选录】 《医学正传》：此方用归、芎、芍药、熟地以补血，用参、耆、白术、甘草以补气，用羌活、防风散风湿以利关节，用牛膝、杜仲以补腰膝，用附子以行参、耆之气而走周身脉络。盖治气血两虚、挟风湿而成痿痹不能行者之圣药也，观其治痢后风可见矣。然可以治不足之痿弱，而不可以治有余之风痹也。

【临证举例】 鹤膝风 善法寺僧如真师孙遂良，绍熙壬子年，患痢之后，足履痿弱，遂成鹤膝风，两膝肿大而痛，髀胫枯腊，但存皮骨而已，拘挛蹉卧，不能屈伸，待人抱持而后能起，如此数月，分为废人。淮东赵德远参议之甥李二十七官人，惠以此方，服之气血流畅，肌肉渐生，遂能良行，不终剂平复如故，真奇方也！

01039 大防风汤

【方源】 《重订通俗伤寒论》。

【组成】 防风二钱 当归 熟地 生黄耆 川杜仲各三钱 党参 白术 羌活 川芎各一钱半 淮牛膝 生赤芍各一钱 淡附片 官桂 清炙草各五分

【主治】 肢脱，有脱一足者，有脱二足者，有仅脱足趾者，由秋夏露卧，为寒所袭，郁热内作，搏于肢节，痛彻于骨，遇寒尤甚，以热熨之稍减者。

01040 大麦芽散

【方源】 《医学从众录》卷八。

【组成】 大麦芽（炒）一合

【用法】 上为末。每服三钱，陈酒调下。

【主治】 产后腹胀闭结，臌闷气结，坐卧不安。

01041 大芜荑汤

【方源】 《兰室秘藏》卷下。

【异名】 栀子茯苓汤。

【组成】 防风 黄连各一分 炙甘草 麻黄（不去根节） 羌活各二分 山栀子仁 柴胡 茯苓各三分 当归四分 大芜荑 白术各五分

【用法】 上锉，如麻豆大，都作一服。用水一大盏半，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【功用】 滋营润燥，除寒热，致津液。

【主治】 ①《兰室秘藏》：小儿黄疸，胃热荣燥，小便利，发黄脱落，鼻、下龈作疮，能乳，喜食土，面黑、大便青，为寒。②《保婴撮要》：小儿脾疸，少食，发热作渴，大便不调。

01042 大芦荟丸

【方源】 《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 芦荟（研） 木香 青橘皮 胡黄连 黄连 白芜荑（去扇称） 雷丸（破开，白者佳，赤者杀人，勿用） 鹤虱（微炒）各半两 麝香二钱（另研）

【用法】 上为细末，粟米饭为丸，如绿豆大。每服二十丸，米饮送下，不拘时候。

【功用】 治疳杀虫，和胃止泻。

【主治】 ①《普济方》：小儿疳积、虫积。肚腹紧胀，心胸臌满，消瘦神困，肚胀青筋，肠鸣泻臭，食即呕哕。喜食酒肉，食不生肌，胸满胁胀，烦躁迷闷，眠不安席。②《保婴撮要》：肝脾疳积，食积发热，目生云翳；或疳热，颈项结核；或耳内生疮，肌体消瘦，发热作渴，饮食少思，肚腹膨胀；或牙龈蚀落，颊腮腐烂；阴囊、玉茎生疮；或胸胁小腹作痛。

01043 大芦荟丸

【方源】 《古今医鉴》卷十三。

【组成】 苍术（米泔浸，炒） 陈皮 厚朴（姜炒） 青皮 枳实（炒） 槟榔 神曲（炒） 山楂（去子） 麦芽（炒） 三棱（煨） 莪术（煨） 砂仁 茯苓 黄连 胡黄连 芜荑仁 使君子 青黛 芦荟各等分

【用法】 上为细末，使君子壳煎汤浸，蒸饼为丸，如弹子大。每服一丸，清米汤化服。

【主治】 小儿五疳，皮黄肌瘦，发直尿白，肚大青筋，好食泥炭米茶之物，或吐或泻。

01044 大连翘饮

【方源】 《回春》卷七。

【组成】 连翘 瞿麦 滑石 车前子 牛蒡子 赤芍 栀子 木通 当归 防风各四分 柴胡 黄芩 荆芥各一钱二分 蝉蜕五分 甘草一钱六分

【用法】 上锉。加竹叶十个，灯心十茎，水煎，温服，不拘时候。

【主治】 ①《回春》：小儿伤风感冒，发热痰壅，风热丹毒肿痛，颈项有核，腮赤痈疖，眼目赤肿，

口舌生疮，咽喉疼痛，小便淋沥，胎毒，痘疹余毒，一切热毒。②《冯氏锦囊》：三焦积热，二便不利，重舌、木舌，咽痛疮疡。

【加减】 风痰热、变蒸，加麦冬；实热、丹热，加大黄；胎热、疮疹余毒，加薄荷叶；痈疖、热毒，加大黄、芒消。

01045 大连翘饮

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 连翘 瞿麦 滑石 车前子 牛蒡子 赤芍 山栀 木通 当归 防风 黄芩 柴胡 甘草 荆芥 蝉蜕 石膏各五分

【用法】 水二钟，加灯心二十根。煎八分，母子同服。

【主治】 小儿丹毒发热。痰涎壅盛，一切诸疮痧疹。颈项生核；或伤风伤寒，时行发热等证。

01046 大连翘饮

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】 连翘 黄芩 瓜蒌 力子 防风 蝉蜕 甘草 栀炭 赤芍 木通 荆芥 楂粉

【用法】 水煎服。

【主治】 胎热，遍体赤色，大小便不利，丹毒。

01047 大利惊丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 南星二钱 白附子 牙消 天麻 五灵脂 全蝎各一钱 轻粉五分 巴霜一字

【用法】 上为末，糊为丸，如麻子大。每服一丸，薄荷、生姜泡汤送下。

【功用】 下痰利惊。

【主治】 小儿脐风，肚胀脐肿，身体重着，四肢柔直，日夜多啼，不能吮乳，甚则发为风搐；及钩肠锁肚撮口，内气引痛，肠胃郁结不通。

01048 大沉香丸

【方源】《局方》卷三。

【组成】 天台乌药 白芷 甘松（洗，晒） 甘草（煨）各二斤半 姜黄（去皮） 檀香 干姜（炮） 肉桂（去粗皮）各二十两 白豆蔻（去皮）十两 沉香二十两 香附子（去毛，煨）五斤

【用法】 上为末，炼蜜搜和，每一两作二十丸。每服一丸，嚼破，炒生姜盐汤下，元气发动，炒茴香热酒下，空心、食前服。

【主治】 一切冷气攻心腹刺痛，胸膈噎塞，呕吐痰水，噫气吞酸，口苦舌涩，不思饮食；膀胱、肾间冷气攻冲，腰痛拘急，脐腹绞痛，手足逆冷，小便滑数；又治卒暴心痛，霍乱吐利，疝瘕气痛，妇人血气刺痛。

01049 大羌活汤

【方源】《此事难知》卷上。

【组成】 防风 羌活 独活 防己 黄芩 黄连 苍术 白术 甘草（炙） 细辛各三钱 知母 川芎 地黄各一两

【用法】 上㕮咀。每服半两，水二盏，煎至一盏半，去滓，得清药一大盏，热饮之。不解，再服二四盏解之亦可，病愈则止。若有余证，并依仲景随经法治之。

【功用】 ①《医方考》：升阳散热，滋养阴脏。②《方剂学》：发散风寒，祛湿清热。

【主治】 两感伤寒，太阳与少阴俱病。头痛，发热，恶寒，口干，烦满而渴。

【宜忌】《会约》：若内伤，不系外感传里者，忌用。

【方论选录】《医方考》：经曰：气薄则发泄，故用羌活、独活、防风、苍术、细辛、川芎之气薄者，以升发其传经之邪；又曰：寒胜热，故用黄连、黄芩、防己、生地、知母之苦寒者，以培养其受伤之阴。以升散诸药而臣以寒凉，则升者不峻；以寒凉诸药而君以升散，而寒者不滞。白术、甘草，脾家药也，用之者，所以益其脾胃而建中营之职尔。

01050 大羌活汤

【方源】《卫生宝鉴》卷二十三。

【组成】 羌活 升麻各一钱 独活七分 苍术 防风（去芦） 威灵仙（去芦） 白术 当归 白茯苓（去皮） 泽泻各半钱

【用法】 上㕮咀，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓温服，食前一服，食后一服。

【功用】《杂病源流犀烛》：疏风理湿。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：湿气流于四肢，肢节肿痛。②《杂病源流犀烛》：风湿相搏，肢节肿痛，不可屈伸。

【宜忌】 忌酒、面、生冷、硬物。

【方论选录】《内经》云：湿淫于内，治以苦温，以苦发之，以淡渗之。又云：风能胜湿。羌活、独活苦温，透关节而胜湿，故以为君；升麻苦平，威灵仙、防风、苍术苦辛温，发之者也，故以为臣；血壅而不流则痛，当归辛温以散之，甘草甘温，益气缓中，泽泻咸平，茯苓甘平，导湿而利小便，以淡渗之也，使气味相合，上下分散其湿也。

【备考】 方中防风，《医学正传》作“防己”。

01051 大补元汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】 人参二钱 淮山药（炒）二钱 黄耆（蜜炒）二钱 白术二钱 熟地二三钱或多加 当归二三钱 山茱萸一钱 枸杞二三钱 甘草一二钱 五味（蜜炒）七分 杜仲（姜炒）二钱 生姜八分 红枣二枚

【用法】 水煎服。

【主治】 气血虚甚，元气将脱，一时昏沉、掉摇等证。

【加减】 如元阳不足多寒者，加附子、肉桂、炮姜之类；如无力用人参者，再加黄耆三四钱；如气滞，减黄耆二分，加去白陈皮一钱；如血滞，去山茱萸，加川芎一钱；如泄者，去当归，加补骨脂钱半、肉豆蔻一钱（面炒）；如腹痛喜按者，加吴茱萸，汤泡二次，用一钱。

01052 大补元煎

【方源】《景岳全书》。

【异名】 补元煎（《经验广集》卷一）。

【组成】 人参少则用一二钱，多则用一二两 山药（炒）二钱 熟地少则用二三钱，多则用二三两 杜仲二钱 当归二三钱 山茱萸一钱 枸杞二三钱，炙甘草一二钱

【用法】 水二钟，煎七分，食远温服。

【功用】 回天赞化，救本培元。

【主治】 男妇气血大坏，精神失守。

【加减】 元阳不足多寒者，加附子、肉桂、炮姜之类；气分偏虚者，加黄耆、白术，胃口多滞者不必用；血滞者，加川芎，去山茱萸；滑泄者，去当归，加五味、故纸之属；畏酸吞酸者，去山茱萸。

01053 大补天丸

【方源】《医统》卷四十八。

【组成】 黄柏（蜜炒褐色） 知母（乳汁炒） 龟版（酥炙）各三两 怀熟地黄五两 牛膝（酒洗） 麦门冬（去心） 肉苁蓉（酒洗） 虎胫骨（酥炙） 山药（炒） 茯神 黄耆（蜜炙）各一两半 杜仲（制） 甘枸杞子 何首乌（制） 人参各两 当归（酒洗） 天门冬 五味子各一两 怀生地黄（酒洗，用砂锅煮烂，捣）一两 白芍药（酒炒）二两（冬月只用一两） 紫河车一具（取初胎者，米泔洗净，入小砂罐内，水一碗煮沸，候冷取起，放竹篮中，四围纸糊密，烘干为末，入群药和匀）

【用法】 上为细末，炼蜜加猪脊髓三条为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心淡盐汤送下，冬月酒送下。

【主治】 男妇虚损劳伤，形体羸乏，腰背疼痛，遗精带浊。

【加减】 冬，加干姜半两（炒黑）。

01054 大补心丹

【方源】《三因》卷九。

【异名】 补心神效丸（《百一》卷一）、安神补气丸（《中药制剂手册》）。

【组成】 黄耆（蜜炒） 茯神 人参 酸枣仁（炒） 熟地黄各一两 远志（去心，炒） 五味子 柏子仁各半两（别研）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，用辰砂为衣。每服三十丸，米汤、温酒任下；盗汗不止，麦麸汤送下；乱梦失精，人参、龙骨汤送下，卒暴心痛，乳香汤送下；肌热虚烦，麦门冬汤送下；吐血，人参、卷柏汤送下；大便下血，当归、地榆汤送下；小便尿血，赤茯苓汤送下；中风不语，薄荷、牛黄汤送下；风痫涎潮，防风汤送下。

【功用】 安心神，调血脉，镇惊补心。

【主治】 狂证，因忧愁思虑过多，而致神志不宁，魂魄失守。阳虚外泄则自汗，呕吐，泻利频数，诸阴不生，则语言重复，忪悸眩晕；兼治大病后虚烦不得眠，羸瘦困乏。

01055 大补脾丸

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】 人参 白术 当归 熟地 白芍 甘草 茯苓 杜仲 黄芩 广皮 木香 砂仁

【功用】 大补脾胃，开郁。

【主治】 妊娠忧郁不解，以致阴血衰耗，胎燥而萎。

【方论选录】 是方四君以补气，归、芍、熟地以养血，芩、术清热凉血，佐以木香、香附、砂仁行气开郁，而总以补脾土为主，故曰大补脾丸。

01056 大阿胶丸

【方源】《局方》卷四。

【组成】 麦门冬（去心） 丹参 贝母（炒） 防风（去芦叉头） 柏子仁 茯神（去木） 杜仲（去粗皮，炒） 百部根各半两 干山药 阿胶（炒） 茯苓（去皮） 熟干地黄 五味子各一两 远志（去心） 人参各一分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每两作二十四丸。每服一丸，水一中盏，煎至六分，和滓温服，少少频呷，不拘时候。

【功用】《鸡峰》：补肺去风。

【主治】 肺虚客热，咳嗽气急，胸中烦悸，肢体倦痛，咽干口燥，渴欲饮冷，多吐涎沫，或有鲜血，肌瘦发热，减食嗜卧；又治或因叫怒，或即房劳，肺胃致伤，吐血呕血。

01057 大阿胶丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十一。

【组成】阿胶（锉碎，炒） 卷柏（去土） 生地黄 大蓟（独根者，日干） 干山药 五味子 薄荷各一两 柏子仁 人参 远志 百部 麦门冬 茯苓（去皮） 防风各半两 熟地黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服半丸，加至一丸，浓煎小麦并麦门冬汤嚼下，不拘时候。

【主治】咳嗽，并嗽血、唾血。

【宜忌】若觉气虚，空心不可服此。

01058 大附子丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】大附子 禹余粮 白马蹄 鹿茸各二两 乌贼鱼骨 龙骨各一两 当归一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【主治】血崩日夜不绝，将欲困笃。

01059 大青龙汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】甘草汤（《圣济总录》卷十三）。

【组成】麻黄六两（去节） 桂枝二两（去皮） 甘草二两（炙） 杏仁四十枚（去皮尖） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘） 石膏如鸡子大（碎）

【用法】以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升。取微似汗，汗出多者，温粉扑之；一服汗者，停后服；若复服，汗多亡阳，遂虚，恶风烦躁不得眠也。

【功用】①《医方集解》：风寒两解。②《伤寒论方解》：发汗定喘，解热除烦，利小便以驱除水气。

【主治】外感风寒，内有郁热，发热恶寒俱重，头痛身疼，无汗烦躁，脉浮紧；或咳嗽气喘；或溢饮有表证兼里热者。

①《伤寒论》：太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者；伤寒，脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者。②《金匮》：病溢饮者。③《方极》：喘及咳嗽，渴欲饮水，上冲，或身疼，恶风寒者。④《伤寒论方古今临床》：用于急性热病之初起高热者，如上呼吸道感染、流感、急性支气管炎（风寒型）、哮喘性支气管炎、流行性脑脊髓膜炎等病。

【宜忌】若脉微弱，汗出恶风者，不可服之。

【方论选录】①《尚论篇》：解肌兼发汗，而取义于青龙者，龙升而云兴，云兴而雨降，郁热顿除，烦躁乃解。观仲景制方之义，本是桂枝、麻黄二汤合用，但因芍药酸收，为兴龙致雨所不宜，故易以石膏之辛甘大寒。辛以散风，甘以散寒，寒以胜热，一药而三善俱备，且能助青龙升腾之势，所以为至当至神之法也。②《伤寒附翼》：此麻黄汤之剧者，故加味以治之也。喘者是寒郁其气，升降不得自如，故多用杏仁之苦以降气；烦躁是热伤其气，无津不能作汗，故特加石膏之甘以生津；然其性沉大寒，恐内热顿除，而表寒不解，变为寒中而挟热下利，是引贼破家矣，故必备麻黄以发表，又倍甘草以和中，更用姜、枣以调营卫。一汗而表里双解，风热两除，此大青龙清热攘外之功，所以佐麻、桂二方之不及也。

【临证举例】①感冒 《浙江中医学院通讯》（1977；2:60）：康氏患感冒，恶寒无汗，头身痛，烦躁呻吟，脉浮紧稍数。自处大青龙汤：麻黄12克，石膏30克，桂枝6克，杏仁6克，甘草6克，大枣4枚，生姜9克，水煎服。药后不及10分钟，则见汗出津津，随即恶寒发热及周身疼痛均见明显减轻，烦躁呻吟亦除，遂得酣睡一夜。次日身仍潮润，热除身静，病去七八。故改桂枝汤以和营卫，止头痛，一剂即愈。②支气管肺炎 《古方临床之运用》：患者男性，年三十七。初因感冒咳嗽而起，后成肺炎，气急，胸痛、咳嗽，痰中带瘀血，病已两周，高热无汗，身疼痛，颜面及两颧绯红，烦躁谵语，喘咳气急，两胁痛，脉弦紧，径与大青龙汤加鲜竹沥，是夜大汗淋漓，即呈分利解热，诸证悉退，病家惊为神异。③溢饮浮肿 《生生堂治验》：一妇人，产后浮肿腹满，大小便不利，饮食不进。其夫医人也，躬亲疗之不验，可一年而疾愈进，短气微喘，时与桃花加芒消汤无效。于是请救于师。师往诊之，脉浮滑，按其腹，水声漉漉然。因与大青龙，温覆之。其夜大发热，汗如流，翌又与如初，三四日小便通利，日数行，五六日间，腹满如忘。与前方百余贴复故。

01060 大岩蜜丸

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】防风 灵脂 延胡 生地 当归 甘草 赤芍 益母草 川芎 干姜 乌药 白芷 蒲黄 陈皮 细辛 吴茱萸

【功用】温经散寒。

【主治】产后心痛，因虚寒血凝上冲于心之包络。

【方论选录】产后虚寒血凝，故用四物加益母、蒲黄、甘草以养血，干姜、吴茱萸、乌药、陈皮以

温中，防风、细辛、白芷以逐寒，温经散寒则血不滞；恐其凝而上冲也，加延胡、灵脂以祛瘀止痛。至于火因血虚而上升冲心包络致痛者，则非吴萸、干姜之辛热所能止者，即痛止而血必得热则行，血来太甚，产妇益弱矣。

01061 大固阳汤

【方源】《得效》卷八。

【组成】 附子一两（炮，切作八片） 白术 干姜各半两 木香一分

【用法】 上锉散。用水二碗，煎至八分，去滓，放冷灌服，须臾又进一服。

【主治】 脱阳证。或因大吐大泻之后，四肢逆冷，元气不接，不省人事；或伤寒新瘥误行房，小腹紧痛，外肾抽缩，面黑气喘，冷汗自出。

01062 太和中饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 陈皮一二钱 枳实一钱 砂仁五分 山楂二钱 麦芽二钱 厚朴一钱半 泽泻一钱半

【用法】 水一钟半，煎七八分，食远温服。

【主治】 饮食留滞积聚等证。

【加减】 胀甚者，加白芥子；胃寒无火或恶心者，加炮干姜一二钱；疼痛者，加木香、乌药、香附之类；多痰者，加半夏。

01063 大乳没散

【方源】《杂病源流犀烛》卷三十。

【组成】 白术 当归 白芷 炙甘草 没药（研匀）各三钱 乳香二钱（另研） 桂心一钱半

【用法】 上为极细末。每服三钱，温酒送下。

【主治】 跌扑损伤，痛不可忍。

01064 大油煎散

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】 海桐皮 桑白皮（炙） 川乌头（炮，去皮尖） 五加皮 乌药 甘草（炙） 牡丹皮 白芍药 地骨皮 当归（洗，焙） 没药（别研）各等分

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一枚，滴麻油数点，同煎至八分，去滓温服。

【主治】 经候不调，脐腹胀痛，腰腿无力，烦渴潮热，身体拘倦；日渐羸瘦。

01065 大定风丸

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】 苍术八两 草乌三两 杏仁 川乌 白芷 半夏各四两

【用法】 上药用生姜二斤，葱一斤，取汁拌匀，以姜、葱渣一半铺瓶底，将药铺瓶内，瓶上又将渣一半盖上，埋土内，春五、夏三、秋七、冬九日，取出，晒干为末，外加猴姜、牛膝，红花末各二两，当归，草薢根末各四两，酒糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，茶、酒任下，一日三次。

【主治】 痛风，历节风。

01066 大定风珠

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 生白芍六钱 阿胶三钱 生龟版四钱 干地黄六钱 麻仁二钱 五味子二钱 生牡蛎四钱 麦冬（连心）六钱 炙甘草四钱 鸡子黄（生）二枚 鳖甲（生）四钱

【用法】 水八杯，煮取三杯，去滓，再入鸡子黄，搅令相得，分三次服。

【功用】 ①《中医方剂学讲义》：滋液熄风。②《温病条辨白话解》：滋阴潜阳。

【主治】 ①《温病条辨》：热邪久羁，吸烁真阴，或因误表，或因妄攻，神倦瘛疭，脉气虚弱，舌绛苔少，时时欲脱者。②《谦斋医学讲稿》：肝肾阴血极虚，内风煽动不息，眩晕不能张目，耳鸣，筋惕肉瞤，心慌泛漾。

【宜忌】《中医方剂学讲义》：如阴液虽虚，而邪气犹盛者，非本方所宜。

【加减】 喘，加人参；自汗者，加龙骨、人参、小麦；悸者，加茯神、人参、小麦。

【方论选录】 ①《温病条辨》：此邪气已去八九，真阴仅存一二之治也。观脉虚苔少可知，故以大队浓浊填阴塞隙，介属潜阳镇定。以鸡子黄一味，从足太阴下安足三阴，上济手三阴，使上下交合，阴得安其位，斯阳可立根基，俾阴阳有眷属一家之义，庶可不致绝脱欤！②《中医方剂学讲义》：本方从加减复脉汤（炙甘草、干地黄、生白芍、麦冬、阿胶、麻仁）加减而成。方用加减复脉汤甘润存阴，加龟版、鳖甲、牡蛎育阴潜阳；五味子与甘草合用，取其酸甘化阴；鸡子黄为血肉有情之品，可以滋阴液、熄风阳。合用以奏酸甘化阴，滋液熄风之效。③《医方发挥》：本方用鸡子黄味甘入脾，镇定中焦，上通心气，下达肾气，阿胶为血肉有情之品，补血滋阴力强，为治血虚之要药，二药合用滋阴以熄风，为主药；白芍苦酸微寒，甘草甘平，五味子酸温，三药合用酸甘化阴，滋阴柔肝，生地黄养阴生津，麦门冬养阴润肺，火麻仁质润多脂滋养补虚，上六药皆能加强鸡子黄、阿胶滋阴养液之效，共为辅药；复用龟版、鳖甲、牡蛎等介类药育阴潜阳，为佐药；其中甘草又可调和诸药，为使。

各药合用，使阴液增，浮阳潜，虚风熄，共奏滋阴熄风之效。为治疗虚风内动的有效方剂。

【临证举例】 ①流行性乙型脑炎后遗症—失语《中医杂志》（1956；5:239）：患者赵某，四周岁，患流行性乙型脑炎，后遗失语、意识不清、痴呆、乱跑不安静、吃石头瓦块纸屑、咬人、晚上睡眠惊悸、有时发热、颜面潮红等症。作者认为，久患热性病，势必热邪伤阴，血络燥结，神经失其滋润，以致神经干燥而蠕动，筋脉拘挛，故有乱跑不安静、夜眠惊悸、发热等症状，拟用育阴镇静剂，遂仿定风珠方加减。生杭芍二钱、阿胶一钱、生龟版二钱、生地八分、生牡蛎一钱、麦冬一钱、条沙参一钱、生石决明二钱、菖蒲五分、鸡子黄一枚。将药煎成过滤，待温和鸡子黄顿服。服后睡眠安静，乱跑减少，白天能午睡约一个多小时，再不发烧，后每十天服一剂，服至三剂，除失语外，其他症状逐渐消失，意识较前清醒。服至第六剂，语言完全恢复。②肝厥 《吴鞠通医案》：额氏，二十二岁，除夕日亥时，先是受寒痹痛，医用桂、附等极燥之品，服之大效；医见其效也，以为此人非此不可，用之一年有余，不知温燥与温养不同，可以治病，不可以养身，以致少阴津液被劫无余，厥阴头痛，单巅顶一点痛不可忍，至子窗间有豆大微光即大叫，必室漆黑而后稍安，一日厥去四五次，脉弦细数，按之无力，危急已极。勉与定风珠潜阳育阴，以熄肝风。大生地八钱、麻仁四钱、生白芍四钱、生龟版六钱、麦冬（不去心）四钱、生阿胶四钱、生鳖甲六钱、海参二条、生牡蛎六钱、鸡子黄（去渣后，化入搅匀）二枚、甘草（炙）五钱，煮成八杯，去渣，上火煎成四杯，不时频服。服后见小效，加鲍鱼片一两，煮成十杯，去渣，煎至五杯，服如前。上方服二日，厥止，头痛大减，犹畏明，方法如前。服至第四日，腰以上发热，腰以下冰凉，上下浑如两截；身左半有汗，身右半无汗，左右浑如两畔。此症当令其复厥后再安则愈。照前方定风珠减半，加青蒿八分，当夜即厥二三次。至第五日，仍照定风珠原方分量，服至第八日而愈。③高血压 《中医杂志》(1983；6:33)：谭某，男，65岁，素嗜饮酒，且禀性刚强，因劳累过度，五天前突然眩仆，前医从虚论治，屡进温补，病情加重。症见面赤颧红，唇干口燥，舌质红，苔薄黄，脉象细数。血压180/90毫米汞柱。此乃肝肾阴亏，五志之火无制。治用滋阴涵阳法，拟大定风珠加味：阿胶10克（烊冲）、鸡子黄2枚（冲）、白芍15克、干地黄15克、麻仁10克、五味子5克、生牡蛎30克、麦冬10克、炙草5克、鳖甲10克、龟版10克、乌梅10克、蔗汁100毫升（兑服）。上方连服四剂，头目眩晕减半，血压160/80毫米汞柱。再服十二剂，诸证悉除，随访一年未见复发。④放疗后舌萎缩 《浙江中医杂志》（1985；6:275）：施某，女，50岁，1982年8月18日诊。因患鼻咽癌，曾在医院作放射治疗，治后病情稳定，但出现舌僵硬、左歪、萎缩，感觉基本消失，言语不清，吞咽障碍，不能饮食，脉象弦细，按之无力，舌薄红少苔。此属热伤阴分，津液被劫，舌体失荣，予大定风珠。五剂后舌较柔和，言语略清，能进稀粥，连服十七剂，言语基本清楚，能进粥及软饭。⑤产后郁冒自汗 《吴鞠通医案》：王氏，郁冒，自汗出，大便难，产后三大症俱备。因血虚极而身热发厥，六脉散大。俗云产后惊风，不知皆内症也。断断不可误认外感症，仅翕摄真阴法。大生地六钱、麦冬（不去心）三钱、白芍二钱（炒）、生龟版五钱、阿胶三钱、五味子（制）一钱、生牡蛎三钱、鲍鱼三钱、炙甘草一钱、鸡子黄二枚（去滓后搅人，上火二三沸），海参二条，煮三杯，分三次服。

01067 大定心汤

【方源】《千金》卷十四。

【组成】 人参 茯苓 茯神 远志 龙骨 干姜 当归 甘草 白术 芍药 桂心 紫菀 防风 赤石脂各二两 大枣二十枚

【用法】 上㕮咀。以水一斗二升，煮取二升半，分五服，日三夜二。

【主治】 心气虚悸，恍惚多忘，或梦寤惊魇，志少不足。

【方论选录】《千金方衍义》：本方即于小定心汤中加白术以理中气，辅桂心以和营血，更须龙骨、赤脂以镇心肝之怯，其余茯神、防风、当归、紫菀则又桂心、茯苓、芍药、大枣之佐也。

01068 大建中汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 三物大建中汤(《张氏医通》卷十六)。

【组成】 蜀椒二合（去汗） 干姜四两 人参二两

【用法】 以水四升，煎取二升，去滓，纳胶饴一升，微火煮取一升半，分温再服。如一炊顷，可饮粥二升，后更服，当一日食糜，温覆之。

【功用】 ①《医方论》：补心脾，祛寒气。②《中医方剂学讲义》：温中补虚，降逆止痛。

【主治】 中阳虚衰，阴寒内盛，或蛔虫为患，脘

腹寒痛，呕不能食，腹皮高起，出现头足状包块，痛而拒按，或腹中漉漉有声，舌苔白滑，脉细紧，甚则肢厥脉伏。

①《金匮》：心胸中大寒痛，呕不能饮食，腹中寒，上冲皮起，出见有头足，上下痛而不可触近。②《千金》：饮食下咽，自知偏从一面下流，有声泱泱然。③《金匮要略心典》：心腹寒痛，呕不能食，腹中虫物乘之而动。④《医部全录》：阴黄。⑤《金鉴》：厥逆，脉伏。⑥《金匮要略今释》引《类聚方广义》：寒饮升降，心腹剧痛而呕；疝瘕腹中痛者；又治挟蛔虫者。

【宜忌】《医方发挥》：实热内结，湿热积滞，阴虚血热等腹痛忌用。

【方论选录】①《医方集解》：此足太阴阳明药也。蜀椒辛热，入肺散寒，入脾暖胃，入肾命补火；干姜辛热通心，助阳逐冷散逆；人参甘温，大补脾肺之气；饴糖甘能补土，缓可和中。盖人之一身，以中气为主，用辛辣甘热之药，温健其中脏，以大祛下焦之阴，而复其上焦之阳也。②《千金方衍义》：虚寒积聚之治，此方最力，故《千金》效《金匮》用之。其方中人参辅椒、姜温散之法，人皆得之。至于胶饴为助满之首列，而反用以治病呕不能食，是专用助满之味，引领椒、姜、入参为泄满之通使。③《医方论》：非人参不能大补心脾，非姜、椒不能大祛寒气，故曰大建中。又有饴糖之甘缓以杀姜、椒之辛燥。非圣于医者，不辨有此。④《金匮要略释义》：《本草经》谓蜀椒主邪气，温中，逐痹痛，下气。夫大寒乃邪气也。心胸中大寒痛，呕而不能食，法当温中。寒气上冲皮起，出见有头足，又宜下气，故舍蜀椒莫与。从而可知中不受温，痛痹之不必下气者，则非蜀椒所宜矣。干姜亦温中之品，此证沉寒痼冷之在中者，性动而猖，其势向上，因用蜀椒复佐以干姜，镇以静而抑之使平。有谓附子驱寒止痛，何以舍而不用？曰：夫向上者，阴中有阳，实中有虚，何则？呕为实而有火之证，呕而不能饮食，中气大伤，自不得以附子攻也。爰用人参、饴糖补其虚乏。方名大建中汤者，宜矣。

【临证举例】①腹痛呕吐《环溪草堂医案》：腹中痛甚则有块，平则无形，每每呕吐酸水。此属中虚，阳气不运。当与大建中汤。党参、蜀椒、干姜、金橘饼。②蛔虫性肠梗阻《金匮要略浅述》：杨某，男，6岁。患蛔虫性肠梗阻，脐腹绞痛，呕吐不能食，呕出蛔虫一条。患儿面色萎黄有虫斑，身体瘦弱，手脚清冷，按其腹部有一肿块如绳团状，舌苔薄白，脉沉细。此中气虚寒，蛔虫内阻。治以温中散寒，祛虫止痛，用大建中汤。西党10克、川椒3克、干姜3克、饴糖30克，加槟榔10克、使君子10克，嘱服2剂。因患儿哭闹不休，进城买药缓不济急，乃先用青葱、老姜切碎捣烂，加胡椒末拌匀，白酒炒热，布包揉熨腹部，冷则加热再熨。肠鸣转气，腹痛渐减。药买到后急煎成汤，分小量多次服，一剂呕吐已止，再剂腹痛消失，并排出蛔虫一百多条。③嗜睡《新中医》(1986；5:50)：刘某，女，18岁。患病半年。起初胸脘闷痛，渐次困顿喜卧，多眠睡。近一月余来，无论上课或进餐行路时均不自主地入睡，以致辍学。神经科诊断为“发作性睡病”。刻诊精神困顿，时时入睡，呼之蒙昧，胸腹时时窜痛，余无所苦。舌质淡，苔白润，脉沉缓。此乃脾胃阳衰，中焦寒甚，阳为阴困，不得舒展，阳入于阴则寐；中阳虚衰，阴寒之气攻冲则胸腹窜痛。治拟温中健脾，大健中阳。人参、蜀椒各9克，干姜12克，饴糖30克，水煎服。服药五剂后，胸腹窜痛消失，嗜睡稍减，舌质淡，苔薄白，脉沉缓。原方继进五剂，嗜睡大减，精神振作，舌质淡，苔薄，脉沉。更以原法加减服药十余剂，诸恙悉平。半年后随访无复发。

01069 大建中汤

【方源】《济生》卷一。

【组成】黄耆（去芦） 附子（炮、去皮脐） 鹿茸（酒蒸） 地骨皮（去木） 续断 石斛（去根） 人参 川芎 当归（去芦，酒浸） 白芍药 小草 各一两 甘草（炙）半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】诸虚不足，小腹急痛，胁肋胀胀，骨肉酸痛，短气喘咄，痰多咳嗽，潮热多汗，心下惊悸，腰背强痛，多卧少气。

【加减】咳嗽者，加款冬花；咳血者，加阿胶；便精遗泄者，加龙骨；怔忡者，加茯神。

01070 大建中汤

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《管见大全良方》。

【组成】人参（去芦） 粉草（炙）各二两 龙齿（研） 当归（酒洗，去芦） 酸枣仁（去皮） 黄耆（去芦）各三两 白芍药四两 远志（去心） 白茯苓（去皮） 石莲肉（去心） 泽泻各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，大枣二枚，煎至七分，去滓，入饧少许，再

煎溶，空心温服，一日二次。

【主治】 思虚太过，心气耗弱，阳气流散，精神不收，阴无所归，小便或赤或白，甚则尿精滑数，夜梦鬼交，或睡而汗出，日渐瘦悴，或生虚热，六脉虚弱，或大而软，按之不应。

01071 大承气汤

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 小承气汤（《理伤续断方》）。

【组成】 大黄四两（酒炒） 厚朴半斤（炙，去皮） 枳实五枚（炙） 芒消三合

【用法】 用水一斗，先煮二物，取五升，去滓；纳大黄，更煮取二升，去滓；纳芒消，更上微火一二沸，分温再服。得下，余勿服。

【功用】 峻下热结。①《医方集解》：急下救阴。②《温病条辨》：通胃结，救胃阴。③《金匮要略浅注》：泻阳明之燥气而救其津液，清少阴之热气而复其元阴。④《医方论》：荡涤三焦之坚实。⑤《中医方剂学讲义》：峻泻热结。

【主治】 伤寒、温病或瘟疫阳明府实。身热，大便秘结，频转矢气，胸脘痞满，腹部胀痛拒按，甚或潮热谵语，舌苔焦黄而厚，甚或起刺，或焦黑燥裂，脉象沉实或弦数，甚或沉迟；或热结旁流，下利清水臭秽，脐腹疼痛，按之坚实，口舌干燥者；或热厥、痉病，神志昏迷而见阳明热实者。现用于急性单纯性肠梗阻、急性菌痢等属里实热证者。①《伤寒论》：阳明病，脉迟、虽汗出不恶寒者，其身必重，短气、腹满而喘，有潮热，手足濈然汗出者；阳明病，潮热，大便微硬者；伤寒若吐、若下后不解，不大便五、六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语如见鬼状；阳明病，谵语有潮热，反不能食者；二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足漐漐汗出，大便难而谵语者；阳明病，下之，心中懊侬而烦，胃中有燥屎者；病人烦热，汗出则解，又如疟状，日晡所发热，属阳明，脉实者；大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛者；病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不能卧，有燥屎；伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者；阳明病，发热汗多者；发汗不解，腹满痛者；腹满不减，减不足言；脉滑而数，有宿食；少阴病，得之二三日，口燥咽干者；少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者；少阴病，六七日，腹胀不大便者。②《金匮》：痉为病，胸满口噤，卧不着席，脚挛急，必龂齿；下利不欲食者，有宿食。③《理伤续断方》：男子伤重，瘀血不散，腹肚膨胀，大小便不通，上攻心腹，闷乱至死者。④《瘟疫论》：温疫伏邪传胃，烦躁发热，通舌变黑生刺，鼻如烟煤，此邪最重，复瘀到胃。⑤《温病条辨》：阳明温病，面目俱赤，肢厥，甚者通体皆厥，不癍疹，但神昏，不大便，七八日以外，小便赤，脉沉伏，或并脉亦厥，胸腹满坚，甚则拒按，喜凉饮者。

【宜忌】 里实虽具，外证未解，脾胃虚寒，肾阳不足及孕妇均忌用。①《伤寒论》：伤寒呕多，虽有阳明证，不可攻之；阳明病，心下硬满者，不可攻之；阳明病，面合色赤，不可攻之；阳明病，脉迟，若汗多，发热恶寒者，外未解也，其热不潮，未可与承气汤；阳明病，潮热，大便不硬者，不可与之。②《伤寒论今释》：肠窒扶斯（肠伤寒）将出血穿孔时，亦腹痛拒按；腹膜炎附子粳米汤证，痛至手不可近，皆禁下。③《古方临床之运用》：病初起即便溏而体力衰弱者，则不得妄用本方。④《医方发挥》：孕妇禁用。

【方论选录】 ①《医方考》：伤寒阳邪入里，痞、满、燥、实、坚全具者，急以此方主之。厚朴苦温以去痞，枳实苦寒以泄满，芒消咸寒以润燥软坚，大黄苦寒以泄实去热。②《金鉴》：诸积热结于里而成痞、满、躁、实者，均以大承气汤下之也。满者，胸胁满急膨胀，故用厚朴以消气壅；痞者，心下痞塞硬坚，故用枳实以破气结；燥者，肠中燥屎干结，故用芒消润燥软坚；实者，腹痛大便不通，故用大黄攻积泻热。然必审四证之轻重，四药之多少，适其宜，始可与之，若邪重剂轻，则邪气不服；邪轻剂重，则正气转伤，不可不慎也。③《金鉴》：诸病皆因于气，秽物之不去，由气之不顺也，故攻积之剂，必用气分之药，故以承气名；汤分大小，有二义焉。厚朴倍大黄，是气药为君，味多性猛，制大其服，欲令大泄下也；大黄倍厚朴，是气药为臣，味少性缓，制小其服，欲微和胃气也。煎法更有妙义，大承气汤之先后作三次煎者，何哉？盖生者气锐而先行，熟者气钝而和缓，欲使芒消先化燥屎，大黄继通地道，而后枳朴除其痞满也。④《本经疏证》：柯韵伯云：厚朴倍大黄为大承气，大黄倍厚朴为小承气，是承气者在枳、朴，应不在大黄矣。曰：此说亦颇有理。但调胃承气不用枳、朴，亦名承气，则不可通耳！三承气汤中有用枳、朴者，有不用枳、朴者；有用芒消者，有不用芒消者；有用甘草者，有不用甘草者，唯大黄则无不用，是承气之名，固当属之大黄。况厚朴三物汤，即小承气汤，厚朴分数且倍于大黄，而命名反不加承气字，犹不可见承气不在枳朴乎！

【临证举例】 ①阳明热实 《经方实验录》：江阴街吴姓妇人，病起已六七日，壮热，头汗出，脉大，便闭七日未行，满头剧痛，不言语，眼胀，瞳神不能瞬，人过其前，亦不能辨，证颇危重。余曰：目中不了了，睛不如，燥热上冲，此阳明三急下之第一证也。不速治，病不可为矣。于是遂书大承气汤方与之：大黄四钱，枳实二钱，川朴一钱，芒消三钱。并嘱其家人速煎服之，竟一剂而愈。②阳明府实，热深厥深 《卫生宝鉴》：南省参议官常德甫，至元甲戌三月间，路感伤寒证，迁延数日，病不瘥。予诊得六脉沉数，外症却身凉，四肢厥逆，发斑微紫，见于皮肤，唇及齿龈破裂无色，咽干声哑，默默欲眠，目不能闭，精神郁冒，反侧不安。此证乃热深厥深，其证最急。此因平时积热于内，已燥津液，又兼发汗过多，津液重竭，因转属阳明。急以大承气汤下之，得更衣，再用黄连解毒汤，病减大半，复与黄连犀角汤，数日而安。③妇人伤寒阳明壅实 《伤寒论直解》：一妇人患伤寒九日，发狂面白，谵语不识人，循衣摸床，口目瞤动，肌肉抽搐，遍身手足尽冷，六脉皆脱，聆听其声重而长。此阳明壅实，热郁于内，故令脉迟不通，非脉脱。即作大承气汤，启齿而下。夜间即解黑便半床，次晨脉出身热，人事亦知。④手术后腹部胀痛 《新医学》(1975；4:212)：陈某，男，35岁。急性坏疽性阑尾炎切除术后三天，出现肠梗阻症。腹部胀满，阵发性疼痛，饮食不下，大便秘结，肠鸣亢进，下腹部胀痛，以左下侧为甚，脉弦数，苔黄干厚。辨证属里实热，气血郁滞，宜攻里通下。投以大承气汤加黄芩，一剂，服后半小时呕吐，乃改用大承气汤灌肠，注入后不久，排出多量大便，症状减轻，次日再灌肠一剂，大便通畅，症状消失，恢复饮食。《新医药学杂志》(1977；2:31)以本方加味，治疗腹部手术后胀气者98例。其中重度者33例，中度52例。手术类型为阑尾炎切除，胃穿孔修补，小肠切除以及肠粘连。方用大黄、芒消各9～15克，厚朴、枳壳、桃仁、赤芍药各9克，莱菔子15～30克。成人每天一剂，儿童酌减，一次给药50～100毫升，口服或经胃肠减压管注入，并随即停止减压2～3小时。结果：94例有效，有效率95.92%。⑤急性痢疾 《中医教学》(1977；2:28)丁某，男，47岁。夏日炎暑，腹中绞痛，下痢红白，红多白少，里急后重，一夜之间大便30多次。形体壮实，面色潮红，兼见垢腻，渴喜冷饮，小便短赤，口唇干红，舌边尖俱红，舌苔黄厚，六脉滑数有力。拟"通因通用"法为治。投大承气汤，清泻肠胃实热。方用大黄15克，厚朴9克，枳实9克，元胡粉12克(冲服)。水煎分二次服完。一剂病减，再剂诸症均退，改用葛根黄芩黄连汤善后，诸症消失，恢复健康。

【现代研究】 ①泻下作用 《天津医药杂志》(1965；10:790)：根据动物实验结果，大承气汤经口投药后，有明显增加消化道推进运动的作用，在投药后10分钟，作用就很明显。此外，还有明显增加肠容积的作用。实验表明，大承气汤的泻下作用，是通过肠壁的纵肌和环肌的收缩增强和肠腔容积增加来完成的。在肠内注入大承气汤后，原来安静的肠管，立即开始收缩和蠕动，同时肠容积急骤的增加，使肠腔处于充盈状态，由于运动和肠腔容积的增加，推进肠管运动不断前进，故使套叠的肠管得以迅速还纳。实验还表明，本方对肠管的作用，以局部作用为主，静脉注射或切断迷走神经，既不能使肠套叠加速还纳，亦不能干扰其对肠管的局部作用。②大黄煎法 《哈尔滨中医》(1964；6:27)大黄在不同煎煮条件下，所含的蒽醌甙成分有所变化；生药在加热水煮过程中，其结合状态蒽醌甙是不稳定的，随着温度的增高和时间的延长，逐渐减低其含量。大承气汤的大黄是后下法，所测得的大黄蒽醌甙总量较高，尤以结合状态成分保留的多，而鞣质的煎出率较低。调胃承气汤测定的蒽醌甙含量较低，而鞣质的煎出率稍高。由于大黄的蒽醌甙是泻下成分，鞣质是收敛成分，两者关系至为密切，直接影响临床疗效。先煎法要比后下法的泻下程度缓和些，轻些，可能是这方面的原因之一。

01072 大胡连丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 胡黄连 银柴胡 黄芩 当归 白芍 茯苓 陈皮 熟地 知母各一两 人参 白术 川芎 桔梗 甘草 地骨皮 半夏 秦艽各八钱 黄耆一两二钱 黄柏 五味子各一两半 牛黄二钱 犀角二钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，茶清送下。

【主治】 传尸痨热，面红咳嗽。

01073 大胡麻散

【方源】《医统》卷五十五。

【组成】 胡麻子二两 苦参 荆芥 何首乌 威灵仙 防风 石菖蒲 牛蒡子 菊花 蔓荆子 白蒺藜 甘草各七钱

【用法】 上为细末。每服二钱，薄荷汤调下。助以热葱汤出汗。

【主治】 风热瘾疹瘙痒。

01074 大茵陈汤

【方源】《千金》卷十。

【组成】 茵陈 黄柏各一两半 大黄 白术各三两 黄芩 栝楼根 甘草 茯苓 前胡 枳实各一两 栀子二十枚

【用法】 上㕮咀。以水九升，煮取三升，分三服。得快下，消息三四日，更治之。

【主治】 内实热成发黄，黄如金色，脉浮大滑实紧数者。

【方论选录】《千金方衍义》：发黄本乎湿热，湿热本乎脾虚。此以枳、术、苓、甘加入茵陈蒿汤中，助脾逐湿；佐以前胡、栝楼下气通津，黄柏、黄芩燥湿清火，皆本经治诸热黄疸之专药。较茵陈蒿功力倍常，因以大字衔之。

01075 大茴香丸

【方源】《奇效良方》卷三十四。

【组成】 大茴香 酸枣仁（炒） 破故纸（炒） 白术 白茯苓 牡蛎（用左顾者，砂锅内慢火煅爆为度） 益智仁 人参各等分

【用法】 上为细末，用青盐、酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前用温酒或米饮送下。

【主治】 小便白浊，出髓条。

01076 大厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】 厚朴（去粗皮，生姜汁炙焦） 白术各一两 陈曲（炒） 陈橘皮（汤浸，去白，焙干）各二分 麦芽（炒） 人参 沉香（锉） 木香 丁香 甘草（炙）各半两 缩砂仁 草豆蔻（去皮） 槟榔（锉）各一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，空心、食前细嚼，橘皮汤送下。

【主治】 脾胃虚冷，食已胀满，水谷不化。

01077 大省风汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 防风 生半夏各一两 甘草 生川乌 生南星 生白附子 木香各五钱 全蝎二两

【用法】 每服五钱，加生姜十片，水煎服。

【主治】 中风痰涎壅盛，口眼歪斜，半身不遂。

01078 大香连丸

【方源】《局方》卷六（吴直阁增诸家名方）。

【异名】 香连丸（《直指》卷十四）、二味香连丸（《全国中药成药处方集》青岛方）。

【组成】 黄连（去芦须） 二十两（用茱萸十两同炒令赤，去茱萸不用） 木香（不见火） 四两八钱八分

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，饭饮吞下。

【主治】 丈夫妇人肠胃虚弱，冷热不调，泄泻烦渴，米谷不化，腹胀肠鸣，胸膈痞闷，胁肋胀满；或下痢脓血，里急后重，夜起频并，不思饮食；或小便不利，肢体怠惰，渐即瘦弱。

01079 大保安汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 白术 当归 人参 茯苓 川芎 白芍 山茱萸 黄耆 山药 丹皮 熟地 五味子各一钱 肉桂 甘草 麦门冬 熟附子各五分 煨姜三片 大枣二枚 莲肉七粒

【用法】 水煎，食前后服。

【主治】 脑项诸发、痈疽、恶疮、大毒已溃之后，脓水出多，气血虚弱，精神短少，饮食少思，坐卧不宁，烦躁不眠，昼则安静，夜则发热，及虚阳烦渴。

01080 大追风散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 川乌头（炮） 防风 羌活 川芎各一两 全蝎（去毒，醋泡，炒黄） 地龙（去土，炒脆） 南星（炮） 天麻（煨）各五钱 荆芥 甘草（炙） 僵蚕（炒黄） 石膏（煅）各八钱

【用法】 上为散。每服二钱，临卧茶清调服。

【主治】 一切头风攻注属虚寒者。

01081 大追毒散

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】 甘草一两 苍术二两 麻黄二两（去节） 滑石四两

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 伤寒两感。

01082 大活络丹

【方源】《兰台轨范》卷一引《圣济》。

【异名】 神效大活络丹（《经验各种秘方辑要》）。

【组成】 白花蛇 乌梢蛇 威灵仙 两头尖（俱酒浸） 草乌 天麻（煨） 全蝎（去毒） 首乌（黑豆水浸） 龟版（炙） 麻黄 贯仲 炙草 羌活 官桂 藿香 乌药 黄连 熟地 大黄（蒸） 木香 沉香各二两 细辛 赤芍 没药（去油，另研） 丁香 乳香（去油，另研） 僵蚕 天南星（姜制） 青皮 骨碎补 白蔻 安息香（酒熬） 黑附子（制） 黄芩（蒸） 茯苓 香附（酒浸，焙） 玄参 白术各一两 防风二两半 葛根 虎胫骨（炙） 当归各一两半 血竭（另研） 七钱

地龙（炙） 犀角 麝香（另研） 松脂各五钱 牛黄（另研） 片脑（另研）各一钱五分 人参二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如龙眼核大，金箔为衣。陈酒送下。

【主治】 一切中风瘫痪，痿痹痰厥，拘挛疼痛，痈疽流注，跌扑损伤，小儿惊痫，妇人停经。

01083 大济阴汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】 当归一钱五分 白芍一钱五分 川芎八钱 生地二钱 熟地二钱 丹参一钱五分 丹皮一钱五分 麦冬一钱五分 黄耆一钱 人参八分 防风五分 五味子五分 蔓荆子八分 小麦一撮

【功用】 补阴敛阳。

【主治】 产后去血多，阴虚而孤阳上越，身无汗，但头有汗，至颈而还。

【方论选录】 是方四物加丹皮、丹参、麦冬峻补其阴，人参、五味、麦冬以敛心火，缘汗乃心之液也；防风、黄耆、小麦以敛汗，头汗虽喜其抑阳以济阴，然既为孤阳，亦不可过汗，致阳虚也。

01084 大养胃汤

【方源】《三因》卷十一。

【组成】 厚朴（去皮） 生姜各二两 肥枣三两（锉，上三味同炒） 白术 山药（炒） 人参 川芎 橘皮 当归 五味子 藿香 甘草（炙） 枇杷叶（刷毛，姜炙） 黄耆各一两

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，煎七分，去滓，空腹服；或为细末，米汤调下。

【主治】 饮食伤脾，宿谷不化，朝食暮吐，暮食朝吐，上气复热，四肢冷痹，三焦不调；及胃虚寒气在上，忧气在下，二气并争，但出不入，呕不得食。

01085 大养脾丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】 人参（去芦头） 白术 附子（炮，去皮脐） 荜茇 红豆 胡椒 诃子（煨，去核） 缩砂仁 白豆蔻仁 肉豆蔻（面裹煨熟）各一两 白茯苓（去皮）半两 丁香半两 干姜（炮）二两 肉桂（去粗皮）二两 厚朴（去皮，姜制）一两半 甘草（炙）一两半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两作十丸。每服一丸，空心、食前白汤化下；或水煎五七沸亦得。

【主治】 脾胃久虚，不进饮食，胸膈痞闷，腹胁膨胀，呕吐不止，倦怠嗜卧；及大病之后气血虚羸，胃弱少食。

01086 大神术汤

【方源】《此事难知》。

【组成】 苍术四两（制） 羌活 防风 川芎各一两 黄芩 枳壳（一作枳实） 甘草各半两 白芷一两半 石膏二两 细辛三钱 知母七钱

【用法】 上㕮咀，石膏为细末入药。水煎，欲汗之，热汤投服。

【主治】 四时伤寒。

【加减】 春，倍防风、羌活；夏，倍黄芩、知母；季夏淫雨，倍术、白芷；秋，加桂五钱；冬，加桂至一两亦可。

【宜忌】 非发热而渴，不可用石膏、知母；非里实心下满，不可用枳实。

01087 大秦艽汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】 秦艽汤（《校注妇人良方》卷三）。

【组成】 秦艽三两 甘草二两 川芎二两 当归二两 白芍药二两 细辛半两 川羌活 防风 黄芩各一两 石膏二两 吴白芷一两 白术一两 生地黄一两 熟地黄一两 白茯苓一两 川独活二两

【用法】 上锉。每服一两，水煎，去滓温服。

【功用】《张氏医通》：养血荣筋。

【主治】 血弱不能养筋，风邪初中经络，手足不能运动，舌强不能言语；或半身不遂，口眼歪斜。

①《保命集》：中风，外无六经之形证，内无便溺之阻格，知血弱不能养筋，故手足不能运动，舌强不能言语。②《法律》：阴虚不能养筋，筋燥而手足不能运动，指爪干燥，属风热甚者。③《金鉴》：㖞斜偏废。

【加减】 如遇天阴，加生姜七八片煎；如心下痞，每两加枳实一钱同煎。

【方论选录】 ①《医学正传》：此方用归、芎、芍药、生、熟地黄，以补血养筋，甚得体。既曰外无六经之形证，但当少用羌活、秦艽，引用以利关节。其防风、独活、细辛、白芷、石膏等药，恐太燥而耗血。虽用此，川芎只可六分之一，尤宜加竹沥、姜汁同剂最好，达者详之。②《明医指掌》：中风，虚邪也。许学士云：留而不去，其病则实。故用祛风养血之剂。以秦艽为君者，攻一身之风也；以石膏为臣者，去胸中之火也；羌活散太阳百节之风疼；防风为诸风药中之军卒；三阳数变之风邪，责之细辛；三阴内淫之风湿，责之苓、术；去厥阴经之风，则有川芎；去阳明经之风，则有白芷；风热干乎气，清以黄芩；风热干乎血，凉以生

地；独活疗风湿在足少阴；甘草缓风邪上逆于肺；用归、芍、熟地者，所以养血于疏风之后，一以济风药之燥，一使手得血而能握，足得血而能步也。③《医方论》：此方刘宗厚与喻嘉言俱谓其风药太多，不能养血益筋骨；汪讱庵又谓用此方者，取效甚多，各执一见。予谓方中四物咸备，不可谓无血药也。若中风初起，表邪重者，用之尚可取效，然石膏、细辛二味必须减去。

【临证举例】 风湿热痹 《广西中医药》（1983；5:49）：杜某，右肩关节反复疼痛，活动不便，每逢阴雨天气症状加剧已八年。入院时体温36.5℃，右肩关节红、肿、痛、热，主、被动运动均障碍，舌质红，脉滑数，诊为风湿热痹痛，用大秦艽汤治疗。服药一剂，疼痛明显减轻；服药二剂，肿痛全消。随访一年，未见复发。

01088 大秦艽散

【方源】《得效》卷十三。

【组成】 条参（去芦） 川羌活（去芦） 枳壳（去瓤） 秦艽（去芦） 赤芍药 苦梗（去芦） 前胡（去芦） 川芎 白芷 黄芩 薄荷 桑白皮（去赤） 天麻 防己 防风 粉草 荆芥穗 赤茯苓 木瓜 川牛膝（去苗）各等分

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，水煎，温服，不拘时候。

【主治】 中风，风痰壅盛，四体重著，或软瘫疼痛，或拘挛，麻痹颤掉，口干目赤，烦热，睡卧不宁。

01089 大桃花汤

【方源】《千金》卷十五。

【异名】 附子汤、牡蛎汤（《圣济总录》卷七十五）。

【组成】 赤石脂 干姜 当归 龙骨 牡蛎各三两 附子二两 白术一升 甘草 芍药各一两 人参一两半

【用法】 上㕮咀。以水一斗二升，煮术取九升；纳诸药，煮取二升，分三服。

【功用】 ①《千金》：冷白滞痢，腹痛。②《张氏医通》：下痢久脱虚冷。

【加减】 脓者，加厚朴三两；呕者，加橘皮三两。

01090 大柴胡汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 柴胡半斤 黄芩三两 芍药三两 半夏半升（洗） 生姜五两（切） 枳实四枚（炙） 大枣十二枚（擘）

【用法】 以水一斗二升，煮取六升，去滓再煎，温服一升，一日三次。

【功用】 ①《医方论》：发表攻里。②《伤寒论讲义》：和解少阳，通下里实。

【主治】 少阳、阳明合病。往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，脐腹痞硬或满痛，大便不解或协热下利，舌苔黄，脉弦有力。现用于急性胰腺炎、急性胆囊炎、胆石症见上述证候者。

①《伤寒论》：太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤，呕不止，心下急，郁郁微烦者；伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者；伤寒发热，汗出不解，心中痞硬，呕吐而下利者。②《金匮》：按之心下满痛者。③《肘后方》：若有热实，得汗不解，腹满痛烦躁，欲谬语者。④《普济方》引《旅舍备要方》：疟，寒热呕逆，脉弦小紧，间日频日，发作无时；及伤寒热在里，腹满谵语，烦渴，大小便涩。⑤《局方》：伤寒十余日，邪气结在里，寒热往来，大便秘涩，腹满胀痛，语言谵妄，心中痞硬，饮食不下，或不大便五六日，绕脐刺痛，时发烦躁；及汗后如疟，日晚发热，兼脏腑实，脉有力者。⑥《得效》：下痢舌黄口燥，胸满作渴，身热腹胀，谵语，有燥屎。⑦《玉机微义》：伤寒、杂证，发热，脉沉实弦数，热日数多，或有表复有里，脉洪，头痛而谵妄，或湿热自利，表里证已急。⑧《准绳·幼科》：风热痰嗽，腹胀及里证未解。⑨《证治汇补》：地道不通，因而呃逆，及火郁为患者；心脾胃脘积热，壅滞作痛而便闭者。⑩《幼幼集成》：夹食伤寒，其证壮热头痛，嗳气腹胀，大便酸臭，延绵不解。⑪《急腹症方药新解》：急性胆道感染，胆石病并发感染；胰腺炎，溃疡病穿孔第二期。⑫《实用中医外科学》：急性阑尾炎，急性胰腺炎。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜、羊肉、饧。

【方论选录】 ①《伤寒明理论》：大柴胡为下剂之缓也。柴胡味苦平微寒，伤寒至于可下，则为热气有余，应火而归心。苦先入心，折热之剂，必以苦为主，故以柴胡为君；黄芩味苦寒，王冰曰，大热之气，寒以取之。推除邪热，必以寒为助，故以黄芩为臣；芍药味酸苦微寒，枳实味苦寒，《内经》曰：酸苦涌泄为阴。泄实折热，必以酸苦，故以枳实、芍药为佐；半夏味辛温，生姜味辛温，大枣味甘温，辛者，散也，散逆气者，必以辛，甘者，缓也，缓正气者，必以甘，故以半夏、生姜、大枣为之使也。一方加大黄，以大黄有将军之号，而功专于荡涤，不加大黄，恐难攻下，必应以大黄为使

也。②《医方考》：表证未除者，寒热往来、胁痛口苦尚在也；里证又急者，大便难而燥实也。表证未除，故用柴胡、黄芩以解表；里证燥实，故用大黄、枳实以攻里。芍药能和少阳，半夏能治呕逆，大枣、生姜，又所以调中和荣卫也。③《伤寒附翼》：此方是治三焦无形之热邪，非治胃府有形之实邪也。因往来寒热，故倍生姜，佐柴胡以解表，热结在里，故去参、甘，加枳、芍以破结。条中并不言及大便硬，而且有下利证，仲景不用大黄之意晓然。后人因有下之二字，妄加大黄以伤胃气，非大谬乎？④《古方选注》：热邪从少阳而来，结于阳明，而少阳未罢，不得不借柴胡汤以下阳明无形之热，故于小柴胡汤去人参、甘草实脾之药，倍加生姜，佐柴胡解表，加赤芍破里结，则枳实、大黄下之不碍表邪矣。柴胡治中，大黄导下，二焦并治，故称大。⑤《金鉴》：柴胡证在，又复有里，故立少阳两解之法。以小柴胡汤加枳实、芍药者，解其外以和其内也。去参、草者，以里不虚也；少加大黄，所以泻结热也；倍生姜者，因呕不止也。斯方也，柴胡得生姜之倍，解半表之功捷，枳、芍得大黄之少，攻半里之效徐。虽云下之，亦下中之和剂也。

【临证举例】 ①热结在里证 《伤寒九十论》：羽流蒋尊病，其初心烦喜呕，往来寒热，医初以小柴胡汤与之，不除。予诊之日，脉洪大而实，热结在里，小柴胡安能除之也。仲景云，伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡。二服而病除。②急性胰腺炎 《辽宁中医杂志》（1986；2:21）：本方随证加减，水煎口服。治疗结果：痊愈129例（急性水肿型），死亡3例（急性坏死型）。腹痛平均4.2天缓解，尿淀粉酶平均3.9天恢复正常。③胆绞痛 《中医杂志》（1986；4:48）：本方加减治疗324例，结果：单服本方解除疼痛者306例（94.5%）。④胆道感染 《辽宁中医杂志》（1980；8:43）：本方加减治疗胆系感染69例，除2例因胆囊极度肿大，积脓过多，化脓性胆管炎合并休克而转手术治疗外，其余平均13天痊愈。⑤肝炎 《浙江中医杂志》（1981；5:207）：治疗毛细胆管型肝炎20例，其中7例属阴黄，用本方加减（年老体弱，兼脾虚者酌减苦寒药；阴黄去黄芩加附片；血瘀者加水蛭粉吞服），症状全部消除，其中8例肝肿大恢复正常。肝功能除3例锌浊度偏高外，余均恢复正常。⑥糖尿病 《汉方临床》（1968；4:37）：本方加地黄治疗2例，疗效良好。认为本方有调整新陈代射机能的作用，对证候属实者较好。

【现代研究】 ①对肾上腺与胸腺的影响 《药学杂志》（1980；6:602）：大鼠口服本方可使肾上腺肥大，约增加20%，肾上腺组织内可见囊状带及网状细胞的细胞质内脂质小滴显著增加，类似于肾上腺皮质在应激状态下恢复或在脑垂体障碍时的改变。本方并能使胸腺萎缩，相对重量较对照组减少约14%。并发现大鼠血中甾体类化合物含量超出正常大鼠。②消炎作用 《药学杂志》（1980；6:603）：对小鼠角叉菜胶性水肿抑制率为16.4%，与200mg/kg阿司匹林作用相同；对葡萄糖性水肿的抑制率为12.8%，与10mg/kg消炎痛作用相等；以小鼠足跖皮内注射乳酪死菌第六天的炎症峰为第一次，第24天的峰为第二次，则两次的抑制率分别为20.2%和36.1%。③对血液流变学的影响 《中医杂志》（1986；4:48）36例胆绞痛患者，西医诊断为胆石胆囊炎者19例，化脓性胆管炎者4例，胆道蛔虫伴感染者13例，根据中医辨证，分为气滞证、血瘀证两大类。治疗前血瘀证之全血粘度（高切变和低切变）、血浆粘度、全血还原粘度、白细胞电泳时间均较气滞证高，两者差异显著或非常显著，提示气滞证治疗前属“低粘综合征”，血瘀证属“高粘综合征”。用大柴胡汤原方浓煎150毫升灌肠，静脉滴注丹参注射液，并辅以抗感染、抗休克、驱虫等对症处理方法。经治疗后，全血粘度，气滞证较治疗前有所增高，差异显著；血瘀证则有所降低，差异非常显著。血浆粘度，气滞证较治疗前亦有增高，差异显著，血瘀证则有所降低，差异显著。红细胞电泳时间，气滞证治疗前后无变化，血瘀证治疗后有所缩短，差异显著。血沉，气滞证治疗前后变化不明显，血瘀证治疗后明显下降，差异非常显著。所有指标，气滞证治疗后大多有不同程度的升高；血瘀证都有不同程度的下降。治疗前后，气滞证与血瘀证对比观察结果表明，治疗前两组对比，除红细胞电泳时间，血小板电泳时间、血沉、红细胞压积外，各项指标差异均显著；治疗后则仅细胞电泳时间（红细胞、白细胞及血小板）差异显著，其他均无明显差异。④利胆作用 《上海中医药杂志》（1981；1:45）：用实验狗经十二指肠导管灌注复方大柴胡汤（柴胡、木香、白芍各25克，黄芩、枳壳、玄胡各15克，大黄后下40克，金钱草50克）4ml/kg，给药后胆汁返流量约增加3倍，与对照组比较，有非常显著性差异。说明本方具有明显利胆和降低括约肌张力的作用，且不抑制括约肌的运动机能，对解除胆汁瘀滞有积极作用。其利胆作用有助于炎症的消退。

【备考】《金匮》有大黄二两。

01091 大健脾丸

【方源】《医统》卷二十三。

【异名】百谷丸。

【组成】人参（清河者）二两（饭上蒸） 白术（无油者）三两（土炒） 枳实一两（饭上蒸） 广陈皮二两（米泔洗） 广青皮一两（米醋炒） 白茯苓二两（饭上蒸） 半夏曲一两（炒） 谷芽一两六钱（炒） 山楂肉一两（饭上蒸） 川黄连一两六钱（用吴茱萸半两浸，炒赤色，去萸） 广木香半两（不见火） 白蔻仁半两（炒）

【用法】上为末，长流水煮老米荷叶汤为丸，如绿豆大。每服百丸，食前白汤送下。

【功用】①《医统》：健脾养胃，滋谷气，除湿热，宽胸膈，去痞满，久服强中益气，百病不生，元精炯炯，长寿之基。②《北京市中药成方选集》：理气健脾，和胃祛湿。

【主治】①《墨宝斋集验方》：小儿脾胃脆弱，饱则易伤者。②《北京市中药成方选集》：饮食不节，停湿伤脾，食物不化，体倦神疲。

【备考】方中半夏曲，《墨宝斋集验方》作“神曲”，有当归身，无山楂肉。

01092 大射干汤

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】射干 当归 麻黄各一钱 肉桂三分 桑皮一钱 枳壳 紫菀 独活 杏仁各六分 半夏一钱二分 甘草五分

【用法】上㕮咀，加生姜五片，水煎服，不拘时候。

【主治】暴寒，热伏于内，咳嗽呕吐。

01093 大益母丸

【方源】《中药成方配本》。

【组成】益母膏八两 当归四两 白芍四两 川芎四两 肉桂三钱 广木香二两

【用法】上为细末，用益母膏打和为丸，分作九十粒，每粒约干重二钱。每服一丸至二丸，开水或黄酒化服。

【功用】调经止痛。

【主治】经行不畅，少腹疼痛。

【宜忌】孕妇忌服。

01094 大益智散

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】熟地黄 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 从蓉（酒浸）各二两 菟丝子（酒浸） 远志（去心）各七钱半 蛇床子二钱半

【用法】上为细末。每服一钱，食后米饮调下，一日二次。

【主治】心志不宁，语言健忘。

【宜忌】忌食猪肉。

01095 大调经散

【方源】《三因》卷十七。

【组成】大豆（炒，去皮） 一两半 茯神一两 真琥珀一钱

【用法】上为末。浓煎乌豆、紫苏汤调下。

【主治】①《三因》：产后血虚，恶露未消，气血未平，气为败浊凝滞，荣卫不调，阴阳相乘，憎寒发热，或自汗，或肿满。②《普济方》：产后肿满，喘急烦渴，小便不利，乍寒乍热。

【方论选录】《济阴纲目》：此方重在恶露未消，而茯神之用，所以和阴阳也。有谓此方如神者，功在琥珀、大豆汤饮间也。

01096 大陷胸丸

【方源】《伤寒论》。

【异名】陷胸丸（《圣惠》卷十五）。

【组成】大黄半斤 葶苈子半斤（熬） 芒消半升 杏仁半升（去皮尖，熬黑）

【用法】上药捣筛二味，纳杏仁、芒消，合研如脂，和散，取如弹丸一枚；别捣甘遂末一钱匕，白蜜二合，水二升，煮取一升；温顿服之，一宿乃下。如不下，更服，取下为效。

【功用】①《医方发挥》：热破结，下气逐饮。②《伤寒论讲义》：逐水破结，峻药缓攻。

【主治】热实结胸，胸中硬满而痛，颈项强直，自汗出，大便不通，脉沉实。①《伤寒论》：太阳病，而反下之，热入因作结胸；结胸者，项亦强，如柔痉状。②《圣惠》：时气结胸，热实在内，其脉沉坚，心下痛满，按之如石。③《云岐子保命集》：太阳经病，项背强，如柔痉状，自汗直视，脉寸沉、关浮、尺弱。④《退思集类方歌注》：阳明热喘，及水肿初起形实者。⑤《中医方剂临床手册》：胸胁积水，痞满疼痛，大便燥结，小便短少者。

【宜忌】《丸散膏丹集成》：利水攻积之力甚捷，然非身体壮实者，不宜轻服。

【方论选录】①《注解伤寒论》：大黄、芒消之苦咸，所以下热；葶苈、杏仁之苦甘，所以泄满；甘遂取其直达，白蜜取其润利，皆以下泄满实物也。②《医方集解》：此足太阳、阳明药也。大黄性寒苦以泄热，芒消性咸寒以软坚，杏仁性苦甘以降气，葶苈、甘遂取其行水而直达，白蜜取其润滑

而甘缓。③《古方选注》：大陷胸丸，从高陷下，三焦并攻。结胸项强，邪据太阳之高位矣，故用葶苈、杏仁以陷上焦，甘遂以陷中焦，大黄、芒消以陷下焦，庶上下之邪，一治成功。其法之微妙，并申明之。捣为丸者，唯恐药性峻利，不能逗留于上而攻结也。不与丸服者，唯恐滞而不行也。以水煮之，而纳白蜜者，又欲其缓攻于下也。④《伤寒贯珠集》：大陷胸丸以荡涤之体，为和缓为用，盖以其邪结在胸，而至如柔痉状，则非峻药不能逐之，而又不可以急剂一下而尽，故变汤为丸，煮而并渣服之。及峻药缓用之法，峻则能胜破坚荡实之任，缓则能尽除上迄下之邪也。

01097 大陷胸汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 陷胸汤(《儒门亲事》卷十二)。

【组成】 大黄六两（去皮） 芒消一升 甘遂一钱匕

【用法】 以水六升，先煮大黄，取二升，去滓；纳芒消，煮一两沸；纳甘遂末，温服一升。得快利，止后服。

【功用】《中医方剂学》：泻热逐水。

【主治】 结胸证。从心下至少腹硬满而痛不可近，大便秘结，日晡潮热，或短气躁烦，舌上燥而渴，脉沉紧有力。现用于肠梗阻、胆道感染、胆石病、急性胰腺炎等见有上述证候者。

①《伤寒论》：太阳病，脉浮而动数，头痛发热，微盗汗出，反恶寒，表未解，医反下之，动数变迟，膈内拒痛，胃中空虚，客气动膈，短气躁烦，心中懊侬，阳气内陷，心下因硬，则为结胸；伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之石硬者；结胸，无大热，水结在胸胁，但头微汗出者；太阳病，重发汗而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮热，从心下至少腹硬满而痛不可近者。②《新急腹症学》：各类腹腔炎症发展到严重阶段而出现的肠麻痹、肠梗阻；胆道系统感染和胆石病；急性出血、坏死性胰腺炎合并麻痹性肠梗阻。③《急腹症方药新解》：单纯性肠梗阻肠腔积液较多者；幽门梗阻、急性胃扩张、急性胰腺炎，里壮里实者。

【宜忌】 ①《伤寒附翼》：平素虚弱，或病后不任攻伐者，当念虚虚之祸。②《成方便读》：三者皆峻下之品，非表邪尽除，内有水热互结者，不可用之。

【方论选录】 ①《伤寒明理论》：结胸，由邪结在胸中，处身之高分。邪气与阳气互结，不能分解，气不通，壅于心下，为硬为痛，是邪正因结于胸中，非虚烦、膈实之所同，是须攻下之物可理。低者举之，高者陷之，以平为正。结胸为高邪，陷下以平之，故治结胸，曰陷胸汤。甘遂味苦寒，苦性泄，寒胜热，陷胸破结，是以甘遂为君；芒消味咸寒，《内经》曰：咸味下泄为阴。又曰：咸以软之。气坚者，以咸软之；热胜者，以寒消之，是以芒消为臣；大黄味苦寒，将军也，荡涤邪寇，除去不平，将军之功也，陷胸涤热，是以大黄为使。利药之中，此为快剂。伤寒错恶，结胸为甚，非此汤则不能通利之。剂大而数少，取其迅疾，分解结邪，此奇方之制也。②《内台方议》：脉沉者，为病在里，紧为里实；心下结者，邪气上结也，此为大结胸之症。若非大下泄之，其病不去也。故用大黄为君，而荡涤邪结，苦以散之；芒消为臣，以软其硬，盐以软之；甘遂为佐为使，以通其水，而下其邪之峻烈者也。③《医方考》：三阳经表证未解，而用承气汤以攻里者，此下之早也。下之早则里虚，里虚则表邪乘之而入，三焦皆实，故心下至少腹硬满而痛不可近也。此其为证危急，寻常药饵不能平矣，故用大黄以荡实，消石以软坚，甘遂以直达。④《伤寒附翼》：甘遂以浚太阳之水，消、黄以攻阳明之实。汤以荡之，是为两阳表里之下法也。⑤《古方选注》：大陷胸汤，陷胸膈间与肠胃有形之垢并解，邪从心下至少腹硬满而痛不可近，邪不在一经矣。胸膈为阳明之维，太阳之门户，太阳寒水之气结于阳明，当以猛烈之剂，竟从阳明攻陷。大黄陷热结，甘遂攻水结，佐以芒消之监制二者之苦，不令直行而下，使其引入硬满之处，软坚破结，导去热邪。⑥《衷中参西》：结胸之证，虽填塞于胸中异常满闷，然纯为外感之风热内陷，与胸中素蓄之水饮结成，纵有客气上干至于动膈，然仍阻于膈而未能上达，是以若枳实、厚朴一切开气之药皆无须用。惟重用大黄、芒消以开痰而清热，又虑大黄、芒消之力虽猛，或难奏效于顷刻，故以少佐以甘遂，其性以攻决为用，异常迅速，与大黄、芒消化合为方，立能清肃其空旷之府，使毫无障碍。制此方者，乃霹雳手段也。

【临证举例】 ①结胸证 《伤寒九十论》：李某，始病头痛，发热恶风，医者下之，忽尔心下坚硬，项强短气，宛然结胸中证也。予曰：幸尔脉不浮，心不烦躁，非陷胸汤不可，投之，一宿乃下。②大陷胸汤证 《经方实验录》：陈胜孩，年十四，一日忽得病，脉洪大，大热，口干，自汗，右足不得伸屈。病属阳明，然口虽渴，终日不欲饮水，胸部如

塞，按之似痛，不胀不硬，又类悬饮内痛。大便五日未通，上湿下燥，于此可见。且太阳之湿内入胸膈，与阳明内热同病。不攻其湿痰，燥热焉除？于是遂书大陷胸汤与之。制甘遂一钱五分，大黄三钱，芒消二钱。服后大便畅通，燥屎与痰涎先后俱下，其余诸恙，均各霍然，乃复书一清热之方以肃余邪。③肠梗阻 《中草药通讯》（1979；9:35）：用大陷胸汤治疗30例肠梗阻，治愈27例，3例（均为肠扭转）转手术治疗。④急性胰腺炎 《医学情况交流》（1975；5:56）：用大陷胸汤加减治疗急性胰腺炎20例，其腹痛缓解平均时间为19.5小时，腹痛完全消失平均为68小时。⑤溃疡病穿孔 《中草药通讯》（1979；9:35）：大陷胸汤治疗24例上消化道穿孔，23例治愈，1例因属胃癌穿孔无效。⑥胆道疾患 《哈尔滨中医》（1960；11:56）：用大陷胸汤治疗胆道疾患44例（包括胆石症胆囊炎32例，胆道感染2例，胆道蛔虫症9例），配合输液及对症治疗，治愈39例。

01098 大萝皂丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 萝卜子（炒）二两 皂角（烧存性）一两 南星（制） 半夏（制） 杏仁 栝楼仁 香附（便制） 青黛 陈皮各五钱

【用法】 上为末，神曲煮糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，生姜汤吞下。

【主治】 气喘，痰喘，风痰，食痰，酒痰，面毒。

01099 大菟丝丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 鹿茸 熟地 苁蓉 戟肉 茯苓 石斛 牛膝 防风 泽泻 川断 杜仲 小茴香 补骨脂 沉香 荜茇 桑螵蛸各三两 萸肉二两 龙骨 菟丝子 附子 肉桂各一两 川芎 五味子 覆盆子各五钱

【用法】 米糊为丸。每服三钱，淡盐水送下。

【功用】 温固下元，升举督脉。

【主治】 肾气虚损，五劳七伤，脚膝酸痛，目眩耳鸣，心悸气短，阳痿精泄。

01100 大菟丝饼

【方源】《普济方》卷二一八。

【组成】 菟丝子（酒浸一宿，别捣） 鹿茸（去毛，酥炙） 附子（炮裂，去皮脐） 泽泻 石龙芮各一两 巴戟天（去心） 桑螵蛸（炒） 芎藭 五味子 覆盆子 木香各半两

【用法】 上为末，酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒或盐汤送下。

【主治】 虚劳痿弱，元阳痼冷。

【备考】 本方方名，据剂型当为“大菟丝丸”。

01101 大黄耆汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】 黄耆 桂心 巴戟（去心） 石斛（酒浸） 泽泻 茯苓 干姜（炮）各三两 防风 独活 人参各二两 天雄（炮，去皮脐） 芍药 附子（炮，去皮脐） 半夏（汤浸七次） 细辛（去苗） 白术 黄芩 瓜蒌根各一两

【用法】 上锉散。每服四钱，水二盏，加生姜七片，煎七分，去滓，食前服。

【主治】 肉虚极，体重怠惰，四肢不欲举，关节疼痛，不嗜饮食，食则咳，咳则右胁下痛，阴引背及肩，不可动转。

01102 大排风汤

【方源】《千金翼》卷十七。

【组成】 白鲜皮 附子（炮，去皮） 麻黄（去节） 杏仁（去皮尖，熬） 白术 防风 葛根 独活 防己 当归 人参 茯神 甘草（炙）各三两 石膏六两（碎） 桂心二两 白芷一两

【用法】 上㕮咀。以水一斗七升，先煮麻黄，取一升半，去沫澄清，纳药煮取四升，分四服，日三夜一服。

【主治】 半身不遂，口不能言，及诸偏枯。

01103 大麻子散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】 大麻子三斤（捣碎） 商陆四两 防风三两（去芦头） 附子一两（去皮脐，生用） 赤小豆一斤 桑根白皮二两（锉）

【用法】 以水二斗，先煮麻子至一斗，入药并小豆同煮，取四升，去滓，每于食前饮汁一小盏。相次任性随多少食小豆。

【主治】 水气，遍身浮肿。

01104 大麻仁丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 大麻仁二两（别捣如膏） 川大黄二两（锉碎，微炒） 槟榔一两 木香一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】 上为末，入大麻仁膏，研令匀，以炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以温水送下。

【主治】 妇人肠胃风结，大便常秘。

01105 大清凉散

【方源】《伤寒温疫条辨》卷四。

【组成】 白僵蚕（酒炒）三钱　蝉蜕（全）十二个　全蝎（去毒）三个　当归　生地（酒洗）　金银花　泽兰各二钱　泽泻　木通　车前子（炒，研）　黄连（姜汁炒）　黄芩　栀子（炒黑）　五味子　麦冬（去心）　龙胆草（酒炒）　丹皮　知母各一钱　甘草（生）五分

【用法】 水煎，去滓，加蜂蜜三匙，冷米酒半小杯，童便半小杯，和匀冷服。

【功用】 ①《伤寒温疫条辨》：通泻三焦之热。②《血证论》：清热利水。

【主治】 温病表里三焦大热，胸满胁痛，耳聋目赤，口鼻出血，唇干舌燥，口苦自汗，咽喉肿痛，谵语狂乱者。

【方论选录】 《血证论》：诸药清热利水，使瘟毒伏热，从小便去；妙在三虫引药及酒达于外，使外邪俱豁然而解，是彻内彻外之方。

【备考】 《血证论》有天门冬。

01106　大断下丸

【方源】 《百一》卷六引史防御方。

【组成】 附子二两（炮）　细辛一两半　干姜（炮）　良姜（炮）　白龙骨　赤石脂　酸石榴皮（醋煮干为度，焙干）各三两　肉豆蔻　牡蛎（火煅）各二两

【用法】 上为细末，糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白汤送下。

【主治】 滑泄。

01107　大续命汤

【方源】 《外台》卷十八引《深师方》。

【组成】 当归二两　芎藭一两　桂心一两　麻黄二两（去节）　芍药一两　石膏一两　生姜三两　人参一两　防风二两　黄芩一两　杏仁四十枚　甘草一两（炙）

【用法】 上切。以水九升，煮取三升，去滓，分四服。

【主治】 ①《外台》卷十八引《深师方》：手足挛急及不随；苦脚气上；中风，四肢壮热如火，挛急，或纵不随，气冲胸中。②《圣惠》：脚气痹挛不随，风毒攻四肢，壮热如火，头项挛急，气冲胸中。

01108　大续命汤

【方源】 《千金》卷八。

【组成】 麻黄八两　石膏四两　桂心　干姜　芎藭各二两　当归　黄芩各一两　杏仁三十枚　荆沥一升

【用法】 上㕮咀。以水一斗，先煮麻黄两沸，掠去沫，下诸药，煮取四升，去滓，又下荆沥煮数沸，分四服。

【主治】 中风喑哑，昏迷不省，半身不遂，口眼歪斜。

①《千金》：卒然喑哑，五脏偏枯贼风。②《圣济总录》：妇人产后中风。③《张氏医通》：中风肥盛，多痰多渴，肢体不遂。④《医林纂要》：风中五脏，舌纵难言，昏迷不省，半身不遂，口眼歪斜。

【备考】 《千金翼》有甘草。

01109　大戟枣子

【方源】 《医方考》。

【组成】 大戟（连根叶）一握　大枣一斗

【用法】 用水同煮一时，去大戟不用。旋旋吃枣，无时，服尽。

【功用】 攻水。

【主治】 臌胀。

【宜忌】 忌甘草。

【方论选录】 大戟气大寒而味苦甘，有小毒，能下十二经之水；大枣味甘，取其大补脾胃，而不为攻下伤耳。

01110　大葛根汤

【方源】 《伤寒大白》卷一。

【组成】 干葛　石膏　枳壳　大黄　广皮　甘草　知母

【主治】 ①《伤寒大白》：阳明表邪未尽，大便秘结，积热上冲，头痛。②《医级》：阳明经表未解，里热内结，口渴便秘。

【宜忌】 若带恶寒表热，症兼太阳者，即不可用。

01111　大萆薢丸

【方源】 《圣济总录》卷八十。

【组成】 萆薢一两一分（熬，研如泥）　泽漆茎（熬）　赤茯苓（去黑皮）　陈橘皮（汤浸，去白，焙）各半两　甘遂　牵牛子各三分　郁李仁（研）半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，稍加至七丸，以赤小豆饮及大麻子饮送下，一日二次。以大小便微利为度。若渴，即饮以小豆、麻子等汁。

【主治】 水肿，上气不得卧，头面身体悉肿。

01112　大黑虎膏

【方源】 《万氏家抄方》卷四。

【组成】 白芷　大黄　黄连　白及　白蔹　黄芩　木鳖子　黄柏　羌活　独活　金毛狗脊　杏仁　当

归 芍药 川芎 肉苁蓉 生地 前胡 肉桂 柴胡 荆芥 黄耆 连翘 防风 蓖麻子各一两 乳香 没药 血竭各一两 樟脑 血余各四两 香油三斤 飞丹一斤 麝香五钱 槐柳枝各二两

【用法】 乳香等细药另研，听用。余药入油熬黑枯色，滤去滓，再熬，滴水不散，入飞丹，以槐柳枝不住手搅，入水和软，不断不粘，住火；入乳香、没药、血竭三味，次入樟脑，麝香搅匀，收用摊贴。

【主治】 痈疽发背，跌扑损伤，折骨，疔疮。

01113 大温中丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】 温中丸(《保命歌括》卷二十七)。

【组成】 陈皮 苍术 厚朴 三棱 蓬术 青皮各五两 香附一斤 甘草一两 针砂二两（醋炒红）

【用法】 上为末，醋糊为丸。空心姜、盐汤送下；午后、饭前酒送下；脾虚者，以参、术、芍药、陈皮、甘草作汤使下。

【功用】 制肝燥脾。

【主治】 ①《丹溪心法》：食积，黄肿。②《医方考》：谷疸、酒疸。

【宜忌】 忌犬肉、果、菜。

【方论选录】《医方考》：方名温中者，主疗湿郁于中之义也。水谷酒食，无非湿化，传化得宜则治。一或积于中宫，则遏少火，热而病黄矣。故用苍术、香附、陈皮、青皮、厚朴以平胃中之敦阜而利其气，气利则水谷不滞；用三棱、莪术以削坚，削坚则积滞渐除，用针砂者，一借其锐金之令，以伐土中之木邪，一用其清肃之气，以除少火之蒸热也，甘草之用，和中而协诸药尔。

01114 大温中丸

【方源】《医学六要·治法汇》卷六引丹溪方。

【组成】 香附（醋浸）一斤（春、夏一宿，秋、冬二宿） 甘草二两 针砂（炒红，醋淬七次）一两 厚朴（姜制） 陈皮 山楂各五两 苍术五两（泔浸） 白术 茯苓各二两 青皮六两 芍药 黄连 三棱 蓬术 苦参各五两

【用法】 上为细末，醋为丸，如梧桐子大。苍黑筋骨露，气实者，米饮送下五六十丸；肥白气虚者，白术汤送下三四十丸。服七日后，便觉手掌心热惊，口唇内有红晕，半月愈。

【主治】 黄病久者。

【宜忌】 忌一切油腻、生冷、肉、面、鸡、鹅、羊、鸭、糍粽难化之物。

01115 大温中丸

【方源】《重订通俗伤寒论》

【组成】 制苍术二两 炒山楂一两半 川朴 广皮 青皮 云苓 炒白术 醋炒针砂各一两 生甘草梢二钱

【用法】 六神曲糊为丸。每服二三钱。

【主治】 ①《重订通俗伤寒论》：黄胖水臌，腹膨肿满。②《饲鹤亭集方》：脾虚生湿，湿郁为热，腹膨肿满，黄肿水臌，气化不行，饮食衰少。

【备考】《饲鹤亭集方》本方用法：炼蜜为丸，瘦人米饮送下，肥人白术汤送下。

01116 大温中饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 大温中汤(《医学从众录》卷八)。

【组成】 熟地三五七钱 冬白术三五钱 当归三五钱（如泄泻不宜用，或以山药代之） 人参二五钱（甚者一两，或不用亦可） 炙甘草一钱 柴胡二三四钱 麻黄一二三钱 肉桂一二钱 干姜（炒熟）一二钱（可煨生姜三五七片亦可）

【用法】 水二钟，煎七分，去浮沫，温服。或略盖取微汗。

【主治】 ①《景岳全书》：阳虚伤寒，及一切四时劳倦、寒疫阴暑之气，身虽炽热，时犹畏寒，即在夏月，亦欲衣被覆盖，或喜热汤，或兼呕恶泄泻，但六脉无力，肩背祛寒，邪气不能外达。②《验方新编》：小儿痘疹，气虚兼寒者。

【宜忌】 ①《景岳全书》：此方宜与理阴煎、麻桂饮相参用。②《成方切用》：此方惟气血两虚而重感寒邪者宜之，非正伤寒治法。

【加减】 如气虚，加黄耆二三钱；如寒甚阳虚者，加制附子一二钱；头痛，加川芎或白芷、细辛；阳虚气陷，加升麻；如肝腹泄泻，宜少减柴胡，加防风、细辛亦可。

【方论选录】《景岳全书》：此元阳大虚，正不胜邪之候，若非峻补托散则寒邪日深，必致不救。温中自可散寒，即此方也。服后畏寒悉除，觉有燥热，乃阳回作汗佳兆，不可疑之畏之。此外，凡以素禀薄弱之辈或感阴邪时疫，发热困倦，虽未见如前阴证，而热邪未盛者，但于初感时，即速用此饮，连进二三服，无不随药随愈。

01117 大温经丸

【方源】《女科指掌》卷一。

【组成】 吴茱萸一两 当归 川芎 白芍各五钱 熟地二两 牡丹皮五钱 石菖蒲一两 阿胶五钱 人参五钱 茯苓一两 肉桂五钱 艾叶一两（醋

炒） 琥珀三钱（另研） 附子七钱（炮） 朱砂二钱（另研）

【用法】 炼蜜为丸。每服四十丸，饮送下。

【主治】 带下恶寒腹痛，饮食少进，或时时利，吞酸水，足冷腰痛，面色不荣，脉沉迟。

01118 大温经汤

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】 人参五分 白术（土炒） 五分 当归八分 白芍七分 川芎五分 熟地五分 砂仁（炒） 小茴各四分 茯苓五分 甘草三分 香附八分（童便制） 陈皮（炒）四分 沉香三分（另研） 吴茱萸（炮） 玄胡索（炒） 鹿茸（酒炙）各五分

【用法】 上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】 ①《古今医鉴》：妇人气血虚弱，经水不调，或赤白带下，或如梅汁淋沥，或成片，有隔二三个月，渐生潮热，饮食少进，四肢倦怠，日久生骨蒸，即成劳疾。②《女科切要》：血海虚寒，少腹冷痛。

【加减】 汗出不止，加黄耆、酸枣仁（炒）各四分；潮热、加柴胡、黄芩各五分；咳嗽，加杏仁、桔梗、五味子、半夏。

【备考】《寿世保元》有黄耆（蜜炒）五分、阿胶（炒）、肉桂各三分。

01119 大温脾汤

【方源】《外台》卷十六引《深师方》。

【组成】 黄芩 人参 芍药 附子（炮）各一两 甘草（炙） 干姜 大黄 厚朴（炙）各二两

【用法】 上切。以水八升，煮取二升八合，分为三服，亦可四服。得下佳；不下，须臾复服。

【主治】 脾胃中寒，不得食，又谷不消，腹响胀满，时苦下痢。

【宜忌】 忌猪肉、海藻、菘菜。

01120 大蒜糊剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 独头蒜 10 克 豆豉 2 克 精食盐 0.5 克 5%醋酸（食用醋）2 毫升

【用法】 上药混合，捣烂如泥。外敷，每次敷 20～30 分钟，隔三日一次。

【主治】 神经性皮炎。

01121 大硼砂散

【方源】《医方类聚》卷七十五引《施圆端效方》。

【组成】 硼砂 茯苓 甘草各半两 马牙消 盆消 朴消 薄荷叶各一两 僵蚕二两 蛇退皮一条

【用法】 上为细末。腊月牛胆汁和成膏，瓤在胆内，高悬阴干。每用一钱，绵裹咽津。

【主治】 喉闭，咽肿疮痛、水米难下。

01122 大蜈蚣散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十三。

【组成】 蜈蚣二条 鱼鳔（炒） 左蟠龙（即野鸽粪，炒烟尽）各五钱

【用法】 上为末。每服二钱，防风汤调下。

【主治】 破伤风，腰脊反张，四肢僵直，牙噤口喎，遍身冷，不知人者。

01123 大腹皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】 大腹皮（锉） 槟榔（煨，锉） 前胡（去芦头） 赤茯苓（去黑皮） 防己 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 赤芍药各一两 甘草（炙，锉）半两 桑根白皮（锉） 木通（锉）各二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至五分，去滓温服，一日二次。

【主治】 虚劳，身体浮肿，上气喘促，小便不利。

01124 大腹皮汤

【方源】《古今医彻》卷五。

【组成】 大腹皮一钱五分 桑白皮（蜜炒）一钱 生姜皮五分 茯苓皮一钱五分 广陈皮一钱 白术（土炒）一钱 条芩七分 车前子二钱（焙，研） 木瓜七分 大枣二枚

【用法】 水煎服。

【主治】 子肿。

01125 大腹皮饮

【方源】《三因》卷十八。

【组成】 大腹皮 防己 木通 厚朴（姜制） 栝楼 黄耆 枳壳（麸炒） 桑白皮（炙） 大黄（蒸） 陈皮 青皮 五味子各等分

【用法】 上锉散。每服一两，水一碗，煎至六分盏，去滓，入酒一分，温服，不拘时候。

【主治】 妇人血癖，单单腹肿。

【备考】 方中主治“血癖”，原作“血瘿”，据《准绳·女科》改。

01126 大腹皮散

【方源】《济生》引《校正时贤胎前十八论治》（见《医方类聚》卷二二四）。

【异名】 大腹皮汤（《准绳·女科》卷四）、大腹皮饮（《郑氏家传女科万金方》）卷二）。

【组成】 枳壳（去瓤，麸炒） 大腹皮 甘草（炙）各一钱 赤茯苓（去皮）三钱

【用法】 上为细末。每服二钱，浓煎葱白汤调下，不拘时候。

【主治】 ①《济生》引《校正时贤胎前十八论治》：妊娠大小便赤涩。②《济阴纲目》：妊妇八九月，胎形肥硕，胎气逼塞，膀胱之气不行，小便短少，小腹胀，身重恶寒，起则晕眩欲倒。

01127 大腹皮散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】 大腹皮三分（锉） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 百合半两 紫菀三分（去苗土） 半夏半两（汤浸七遍，去滑） 赤茯苓一两 桔梗三分（去芦头） 桑根白皮一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 咳嗽上气，肺胀喘急，胸中满闷。

01128 大腹皮散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 大腹皮（锉） 赤茯苓 木香 丁香 芎劳 白术 沉香 陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 人参（去芦头） 草豆蔻（去皮） 厚朴（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 桂心各半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 膈气，心胸壅滞，妨闷。

01129 大腹皮散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 大腹皮一两（锉） 吴茱萸一两（汤浸七遍，焙干，微炒） 白术一两 旋覆花一两 枇杷叶一两（拭去毛，炙微黄） 桔梗一两（去芦头） 甘草三分（炙微赤，锉） 木香三分 桂心一两 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 膈气。胸中痰结，食不消化，腹中胀满雷鸣。

01130 大腹皮散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】 大腹皮一两（锉） 槟榔一两 桑根白皮二两（锉） 前胡一两（去芦头） 赤茯苓一两 木通二两（锉） 汉防己一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 赤芍药一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，一日三四次。

【主治】 气水肿满，喘息，小便涩。

01131 大镇心丹

【方源】《三因》卷九。

【异名】 镇心丹（《医学纲目》卷十三）、镇心丸（《赤水玄珠》卷六）。

【组成】 辰砂（用黄松节酒煮） 龙齿（用远志苗醋煮）各等分

【用法】 上只取辰砂、龙齿为末，猪心血为丸，如鸡头子大。每服一丸，以麦门冬叶、绿豆、灯心、生姜、白蜜水煮，豆熟为度，临卧咽下；小儿磨化半丸。

【主治】 癫痫惊狂，谵妄颠倒，昏不知人，喷吐涎沫；及心惊胆寒，清醒不睡，或左胁偏疼。

01132 大橘皮汤

【方源】《伤寒总病论》卷二。

【异名】 橘皮汤（《济生》卷二）、橘皮竹茹汤（《得效》卷四）。

【组成】 橘皮一两半 生姜二两 枣二十四个 甘草半两 人参一分 竹茹半两

【用法】 上㕮咀。水三升，煎一升半，去滓，温服一盏，食顷再服。

【主治】 ①《伤寒总病论》：动气在下，不可发汗，发汗则心中大烦，骨节苦痛，目运恶寒，食则反吐，谷不得入；亦主手足冷，呕哕。②《济生》：吐利后，胃中虚，膈上热，咳逆。

01133 大橘皮汤

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】 橘皮一两（去白） 木香一分 滑石六两 槟榔三钱 茯苓一两（去皮） 木猪苓（去皮） 泽泻 白术 官桂各半两 甘草二钱

【用法】 上为末。每服五钱，水一盏，加生姜五片，煎至六分，去滓温服。

【主治】 湿热内甚，心腹胀满，水肿，小便不利，大便滑泄。

01134 大橘皮汤

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】 滑石九钱 炙甘草 木香 槟榔各一钱半 陈皮三钱

【用法】 上分二贴。水煎服。

【主治】 感湿面肿上喘。

01135 大橘皮汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 广陈皮三钱 赤苓三钱 飞滑石四钱

槟榔四匙（冲） 杜苍术一钱 猪苓二钱 泽泻一钱半 官桂三分

【功用】 温化湿热。

【主治】 湿温初起，湿重热轻，或湿遏热伏。

【方论选录】 湿温初起，如湿重热轻，或湿遏热伏，必先用辛淡温化，始能湿开热透，故以橘术温中燥湿为君；臣以二苓、滑、泽，化气利溺；佐以槟榔导下；官桂为诸药通使。合而为温运中气、导湿下行之良方。

01136 大醒风汤

【方源】《局方》卷一（淳祐新添方）。

【组成】 南星（生）八两 防风（生）四两 独活（生） 附子（生，去皮脐） 全蝎（微炒） 甘草（生）各二两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水二大盏，加生姜二十片，煎至八分，去滓温服，不拘时候，一日二次。

【主治】 中风痰厥，涎潮昏运，手足搐弱，半身不遂，及历节痛风，筋脉挛急。

【备考】 本方方名，《张氏医通》引作"大省风汤"。

01137 大藿香散

【方源】《医方类聚》卷一〇五引《济生》。

【组成】 藿香叶 半夏曲 白术 木香（不见火）各一两 白茯苓（去皮） 桔梗（去芦，锉，炒） 人参 枇杷叶（拭去毛） 官桂（不见火） 甘草（炙）各半两

【用法】 上为细末。每服三钱，水一大盏，加生姜五片，大枣一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 忧、愁、思、虑、悲、恐、惊七情伤寒，气郁于中，变成呕吐；或作寒热，眩晕痞满，不进饮食。

01138 大力夺命丸

【方源】《医学正传》卷三。

【异名】 杵糠丸（《医学入门》卷七）。

【组成】 杵头糠 牛转草各半斤 糯米一斤

【用法】 上为细末，取黄母牛口中涎沫为丸，如龙眼大。入锅中，慢火煮熟食之。加沙糖二三两人肉丸尤佳。

【主治】 膈噎不下食及翻胃等。

01139 大三五七散

【方源】《千金》卷十三。

【异名】 天雄散（《圣惠》卷二十二）、三五七散（《圣济总录》卷五十一）。

【组成】 天雄 细辛各三两 山茱萸 干姜各五两 蓍藁 防风各七两

【用法】 上药治下筛，每服五分匕，清酒送下，一日二次。不知稍加。

【主治】 肝肾不足，风寒外袭，头痛眩晕，口眼㖞斜，耳聋耳鸣，风寒湿痹。

①《千金》：头风眩，口㖞目斜，耳聋。②《千金翼》：面骨痛，风眩痛。③《医方类聚》引《济生》：阳虚风寒入脑，头痛目眩，如在舟车之上，耳内蝉鸣，或如风雨之声应，风寒湿痹，脚气缓弱。④《普济方》：产后风。

【方论选录】《医方考》：大寒中于风府，令人头痛，项筋紧急者，此方主之。风府，脑后之穴，督脉之所主也。寒者，天地严凝之气，故令项筋紧急。干姜、附子，辛热之物也，可以散真寒；细辛、防风、气薄之品也，可使至高巅；山萸养督脉之阴，茯苓和督脉之阳。

01140 大小茴香丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】 小茴香 吴茱萸 川楝子（去核） 川椒各一两

【用法】 上为末，连须葱白八两，同药捣成饼子，晒干，用粘米半升，同药饼捣碎，微火炒黄，为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，空心盐汤或酒送下。

【主治】 疝气。

【宜忌】 忌发气物。

01141 大天南星丸

【方源】《局方》卷十。

【异名】 天南星丸（《圣济总录》卷一七一）。

【组成】 龙脑（研） 牛黄（研） 乳香（研）各一钱 天南星（牛胆制者）半两 人参 天麻（去芦） 防风（去芦）各一分 朱砂（研）三钱 干蝎十四个（汤浸润，去土，微炒，为末） 麝香（研）一钱半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如大鸡头子大。每服一丸，荆芥、薄荷汤化下，不拘时候。

【主治】 小儿急慢惊风，涎潮发搐，目睛上视，口眼相引，牙关紧急，背脊强直，精神昏塞，连日不省。

01142 大五味子丸

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 五味子一两 干姜一钱（炮） 肉桂（去粗皮）三分 甘草一钱半（炙） 款冬花二钱 紫菀一钱半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两作一十五丸。空腹时用热汤化下。

【主治】 肺胃受寒，咳嗽不已，呕吐痰沫，胁肋引痛，喘满气短，睡卧不安。

01143 大圣泽兰散

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】 泽兰三两 生地五两 白芍两半（炒） 当归三两 石膏三两 人参一两半 甘草六钱 白薇一两半 川芎八钱 柏子仁三两 茯苓一两半 白术一两半（炒）

【用法】 上为散。砂糖灰汤煎三钱，去滓温服。

【主治】 产后狂病，脉洪数软涩者。

【方论选录】 产后气血大虚，阳明伏热而上扰心包，故神明失指，狂叛无知焉。今以四君补气，四物补血，石膏泻火清热，白薇抑阳扶阴，泽兰通利血脉，柏仁安定心神。为散，砂糖灰汤下，使血气安定，则伏热自解，而瘀去新生，心神得养，何有狂叛之患哉。

01144 大圣茯苓散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】 茯苓 麦冬 香附 陈皮 厚朴 黄耆 紫苏 茯神 黄芩 黄连 川芎 当归 白芍 地黄 人参 白术 木香 甘草

【功用】 安心神，保胎定痛。

【主治】 妊娠无外感症，血虚内热乘心，忽然心悸如怔忡状，醒则烦闷，睡则多惊，或卧中言语恍惚，加以膨胀腹满，连脐急痛，坐卧不宁，气逆迫胎。

【方论选录】 妊娠患此，由受孕则血聚养胎，血已虚而又有邪热乘之，血虚则生内热。是方麦、神安神清心；四君、黄耆补气生血；芩、连清上、中二焦之热；四物养血益荣，陈、朴消胀除满；木、附通利三焦之气。本病则心悸，标病则胀满迫痛。此方标本两治而胎自安矣。

01145 大圣保命丹

【方源】《局方》卷一（续添诸局经验秘方）。

【组成】 大黑附子（炮，去皮尖） 大川乌头（炮，去皮尖） 新罗白附子（炮）各二两 白蒺藜（炒，去尖刺） 白僵蚕（洗，去丝，微炒） 五灵脂（研）各一两 没药（别研） 白矾（枯，别研） 麝香净肉（研） 细香墨（磨汁） 朱砂（研）各半两 金箔二百箔（为衣）

【用法】 上为细末，拌匀，用上件墨汁和药，每一两分作六丸，窨干，用金箔为衣。每服一丸，用生姜半两和皮擦取自然汁，将药丸于姜汁内化尽为度，用无灰酒半盏暖热，同浸化，温服。量病人酒性多少，更吃温酒一二升，投之以助药力。次用衣被盖覆便卧，汗出为度。势轻者，每服半丸，不拘时候。如有风疾，常服尤佳。

【功用】 补五脏，固真元，通流关节，祛逐风邪，壮筋骨，活血驻颜。

【主治】 一切风疾，气血俱虚，阴阳偏废，卒暴中风，僵卧昏塞，涎潮搐搦，脚手颤掉，不省人事，舌强失音，手足躄曳，口眼喎斜，或瘫痪偏枯，半身不遂，语言蹇涩，举止错乱，四肢麻木；又治癫痫倒卧，目瞑不开，涎盛作声，或角弓反张，目睛直视，口噤闷绝，牙关紧急；又治风搏于阳经，目眩头痛，耳作蝉声，皮肤瞤搐，频欠好睡，项强拘急，不能回顾；及肾脏风虚，脚膝疼痛，步履艰辛，偏风流注一边，屈伸不得。

01146 大圣浚川散

【方源】《医学纲目》卷四引张从正。

【异名】 浚川散。

【组成】 大黄一两（煨） 甘遂半钱 牵牛一两（头末） 木香三钱 郁李仁一两 芒消三钱半

【功用】 下诸积。

【主治】《金鉴》：阳水，身热盛，烦渴，大便难，小便赤涩，脉沉数。

【备考】《金鉴》本方用法：上为细末，姜汤调下。量儿大小用之。

01147 大延胡索散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】 延胡索一钱五分 肉桂一钱 木香八分 红花八分 青皮八分 枳壳八分 香附（醋炒）一钱五分 艾叶（搓热）一钱 当归二钱 川芎一钱五分 赤芍一钱 生地一钱五分 吴茱萸八分（川连二分，汁拌炒）

【功用】 行气和血。

【主治】 妇人经正来而腹痛。

【方论选录】 妇人经正行而腹痛，是血滞。是方延胡索、红花、赤芍、生地行血，肉桂、吴茱萸祛寒逐滞，香附、青皮、木香、枳壳行气止痛，当归、川芎、艾叶补血温经，行周身筋骨。

01148 大全宝光散

【方源】《瑞竹堂方》卷三。

【组成】 黄连半斤（去须） 当归二两 蕤仁一两六钱（去皮油） 生白矾二两二钱 甘草二三分 杏仁二两四钱（去皮尖） 龙胆草四两八分 干姜二两四分 赤芍药三两三钱

【用法】 上用骨刀子锉细，如秋米大，不捣。每

用二钱，水一大盏，煎数沸，去滓，热洗。

【功用】 除昏退翳，止泪，截赤定痛。

【主治】 远年近日风弦烂眼。

01149 大安汤饮子

【方源】 《宋氏女科》。

【组成】 白术 茯苓 条芩 砂仁 桑寄生 当归 甘草

【用法】 上剂作二贴，水煎温服，六日一服。

【主治】 怀妊六月，觉胎气不安，或胀满，或微动，或胎动不安。

01150 大补二天膏

【方源】 《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】 熟地 丹皮 山茱萸 黄耆 白术 枣仁 云苓 泽泻 山药 远志肉 当归 白芍 茯神 龙眼肉

【用法】 内服。作煎亦可。

【功用】 滋补阴血，补脾和胃。

【主治】 室女天癸已至，复止不来。

【方论选录】 先后二天俱不足，是以任脉虽通，冲脉未盛，气血不能充满，当二七之期，天癸乍至而仍断也。是方用山茱萸、熟地、丹皮、山药、茯苓、泽泻以补肾水，即六味丸遗意也。用黄耆、当归、白芍、白术、茯神、远志、枣仁、龙眼肉以补脾土，即归脾汤治也。先天不足则补肾，以益真阴；后天不足则补脾，以生阴血。气血充足，则月事自以时下矣。

01151 大补地黄丸

【方源】 《准绳·类方》卷一。

【组成】 黄柏（盐酒炒） 熟地黄（酒蒸）各四两 当归（酒洗） 山药 枸杞子（甘州佳）各三两 知母（盐酒炒） 山茱萸肉 白芍药各二两 生地黄二两五钱 肉苁蓉（酒浸） 玄参各一两五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心淡盐汤送下。

【主治】 精血枯涸，燥热。

01152 大补阴阳汤

【方源】 《会约》卷十五。

【组成】 黄耆三钱（蜜炙） 白术 益智仁 山药（炒）各一钱半 当归（去尾） 熟地 益母草各二钱 牡蛎（煅，研粉）三钱 甘草（炙） 白芍（酒炒）各一钱 干姜（炒）六分

【用法】 生姜、大枣为引。速进二三剂。或加附子七分，以助药力。

【主治】 产后气血两虚，遗尿莫禁。

01153 大补肾气丸

【方源】 《痢疽验方》。

【组成】 五味子（炒） 黄柏（酒炒）各一两 知母（去皮，酒拌，捣膏）一两 龟版（童便炙）二两 熟地黄二两（用生者，酒拌，铜锅内蒸半日，捣膏）

【用法】 上为细末，入二膏，加酒糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，五更酒送下；盐汤亦可。

【主治】 痢疽愈后作渴。

01154 大补真元汤

【方源】 《眼科临症笔记》。

【组成】 大熟地一两 生龟板四钱 萸肉四钱 枸杞四钱 泽泻三钱 云苓三钱 生牡蛎四钱 生龙骨四钱 黄耆六钱 丹皮三钱 边桂五分 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 补气强阴。

【主治】 视定反动症，两眼不疼不红，又无云翳，视物皆动，常觉头晕目眩。

01155 大补真阴汤

【方源】 《会约》卷九。

【组成】 当归二三钱（血虚有寒者宜多用，血虚有热者宜少用） 熟地四五钱（或再重用） 甘草（炙）一二钱 山药 杜仲 枸杞 女贞子各二钱 牛膝（酒炒） 一钱 枣皮一钱半

【用法】 空心多服。

【功用】 滋阴救根，以接真气。

【主治】 左尺脉弱，肝肾真阴亏损，气自小腹冲上，呼吸似喘而不能接续。

【加减】 如虚火上炎，宜用纯阴之品，本方去枸杞，加龟板胶（用蛤蚧粉炒成珠）二钱，麦冬钱半；如火烁肺金兼咳者，加百合二钱；如夜热骨蒸，加地骨皮钱半；如脏平无火，加骨脂（盐炒）一钱。

01156 大补黄庭丸

【方源】 《张氏医通》卷十三。

【组成】 人参一两 茯苓一两 山药二两

【用法】 上为末，用鲜紫河车一具，河水二升，稍入白蜜，隔水熬膏，代蜜为丸。每服三钱，空心淡盐汤送下。

【主治】 虚劳，食少便溏，不宜阴药者。

01157 大明复光散

【方源】 《古今医鉴》卷上。

【组成】 当归尾（酒洗） 生地黄（酒浸） 黄柏（酒炒） 黄连 黄芩 柴胡 白茯苓 枳壳 羌活

防风　荆芥　石膏（煅）　甘菊花　蝉蜕　车前子（炒）　蜜蒙花　白蒺藜（炒）　木贼（童便浸，焙）　青葙子（炒）　羚羊角　石决明（煅）　甘草

【用法】　上锉。每服一两，食后温服。

【主治】　眦赤生眵，胬肉浸睛，羞明流泪，视物不清。

【加减】　大眦赤者，乃心经实热，加龙胆草、赤芍、白术，减车前、荆芥；小眦赤者，乃心经虚热，加白茯苓、黄耆、朱砂，去青葙子、石决明；赤而不痛，乃肝经实热，加柴胡、陈皮、白术，减荆芥；赤而昏者，乃肝之虚也，加苍术、楮实子，减蒺藜；羞明怕日，乃脾之实，加蜜蒙花，减柴胡；视物不真，乃脾之虚，加苍术、细辛，减防风、木贼；眵多结硬，乃肺之实，加桑白皮、茅根、白术，减蝉蜕、石膏；眵虚不结，乃肺虚，加阿胶、陈皮，减归尾、枳壳；迎风出泪，乃肾虚，加熟地黄、石斛，减生地黄、菊花；白珠鲜红常痛，加山栀子、乳香、没药、防风、黄芩，减青葙子、蒺藜；胬肉侵睛，加大黄、牵牛、牛蒡子，减石膏、枳壳；白膜侵睛，加蒺藜、木贼、连翘、车前子、荆芥；痒极难当，加僵蚕、草乌，减菊花、木贼；风中泪出，加旋覆花、草乌（煨），减归尾、石决明；坐起生花，加山药、熟地黄，减防风、荆芥；两眼眨睛，加藿香、白芷、茯苓、荆芥。

01158　大胡黄连丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】　胡黄连　黄连　苦楝子各一两　白芜荑（去扇）半两（秋初三分）　芦荟（另研）　干蟾头（烧，存性，另研）各一分　麝香一钱（另研）　青黛一两半（另研）

【用法】　上先将前四味为细末，猪胆汁和为剂，每一胡桃大，入巴豆仁一枚置其中，用油单一重裹之，蒸熟，去巴豆，用米一升许，蒸米熟为度，入后四味为丸。如难丸，少入面糊为丸，如麻子大。每服十丸、十五丸，食后、临卧清米饮送下，一日二三次。

【功用】　杀虫，消胀进食。

【主治】　一切惊疳，腹胀虫动，好吃泥土生米，不思饮食，多睡吼哩，脏腑或秘或泻，肌肤黄瘦，毛焦发黄，饮水，五心烦热。

01159　大药紫金丹

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】　川乌头（炮，去皮脐）　五灵脂各二两（别研）　乳香（别研）　没药各一两半（别研）　地龙（去土）　木鳖子（去壳）　白胶香各一两（别研）　自然铜（火煅，醋淬七次）　天麻各半两　麝香肉二钱（别研）

【用法】　上为细末，取长流水为丸，作一百六十丸，阴干。霹雳酒（用铁秤锤，猛火内烧通红，淬入酒中）磨下，如风证病重者，一更、二更、三更各一服；如病轻者，用酒化下，不拘时候，即愈。手臂不能屈伸，只磨药敷臂上。

【主治】　左瘫右痪，不能坐立；伤寒汗不流，腰脚搐搦；妇人产后软瘫，脚膝细弱；打扑伤损，筋骨损败；寻常伤风，及头风，筋骨挛急，不能转侧。

01160　大造固真膏

【方源】《冯氏锦囊·杂证》卷十四。

【异名】　大造固真丹（《类证治裁》卷七）。

【组成】　补骨脂六两（盐、酒浸一宿，炒香）　胡桃仁（酒蒸，去皮，另研）三两　山药四两（炒黄）　山茱萸（去核，酒蒸，焙）三两　菟丝子（酒洗，晒干，炒燥，另磨细末，不出气）四两　小茴香一两五钱（焙）　肉苁蓉（酒洗，去鳞甲，焙）二两　巴戟天（酒洗，去心，焙）二两　鹿茸（去毛骨，酥炙）二两　五味子一两五钱（蜜酒拌蒸、晒干，焙）　人参二两（锉片，隔纸焙）　地黄十二两（酒煮，去滓，熬膏）　枸杞子六两（水煮，去滓，熬膏三两）　子白术（米泔水浸一宿，锉片，晒干，人乳拌蒸，炒黄，水煮，去滓，熬成膏）三两　紫河车一具（酒洗，酒煨，去筋膜，熬成膏）

【用法】　前药各制度，共为细末，前后四膏和剂，如干，加炼老蜜少许，杵千下为丸，如梧桐子大。每早、晚食前各服三钱，白汤、温酒任下。

【功用】　填补精血，壮固元阳。

【主治】　阳萎。

01161　大效琥珀散

【方源】《妇人良方》卷七引《灵苑方》。

【异名】　乌药散（《圣济总录》卷一五一）、琥珀散（《校注妇人良方》卷七）。

【组成】　乌药　莪术各二两　当归一两

【用法】　上药并生为细末。每服二钱，温酒调下，服后以食压之，如是产后诸疾，炒生姜、酒调下。

【主治】　妇人心膈迷闷，腹脏掐撮疼痛，气急气闷，月经不调。

【宜忌】　忌生冷、油腻等物。

01162　大菟丝子散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 菟丝子 苁蓉各二两 黑附子 五味子 鹿茸 鸡睾脬 桑螵蛸各一两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】 内虚里寒，自汗不止，小便不禁。

【备考】 本方名大菟丝子散，据剂型当作"大菟丝子丸"。

01163 大黄六合汤

【方源】《元戎》。

【异名】 四物汤(《玉机微义》卷十三)。

【组成】 四物汤四两 大黄半两 桃仁十个（去皮尖，麸炒）

【主治】 ①《元戎》：妊娠伤寒，大便硬，小便赤，气满而脉沉数，阳明、太阳本病也。②《玉机微义》：脏结秘涩者。

【备考】《玉机微义》本方用法：上㕮咀。水煎，或为丸服亦可。

01164 大黄甘草汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 大黄四两 甘草一两

【用法】 以水三升，煮取一升，分温再服。

【主治】 食已即吐者。

【方论选录】《高注金匮要略》：此胃热上熏之吐，为吐家之变证变治，而非胃反也。以苦寒泻火之大黄为君，而佐以守中之甘草，不特浮大黄下趋之性，使从胃脘而下，且治急冲者，惟宜以缓降胜之也。

【临证举例】 呕吐《成都中医学院学报》(1979；2:57)：李某某，男，20岁。呕吐近半月，胃脘热痛，大便干燥，舌质红，苔薄黄少津，脉实有力，右关脉滑，精神尚佳，初用连苏饮加竹茹、甘草。服两剂无效。仍每餐刚完即吐（平时不吐），并伴口臭，胃脘灼热，胀痛，大便三日未解，小便短黄，脉滑有力。此系积热在胃，腑气不通，胃热上冲之呕吐。改用泄热和胃之大黄甘草汤（大黄12克，甘草3克）。服一剂后，食已不吐，大便畅通；服完二剂，诸证消失。

01165 大黄甘遂汤

【方源】《金匮》卷下。

【组成】 大黄四两 甘遂二两 阿胶二两

【用法】 以水三升，煮取一升，顿服之。其血当下。

【主治】 妇人产后，水与血结于血室，少腹满如敦状；及男女膨胀、癃闭、淋毒，小腹满痛者。

①《金匮》：妇人少腹满如敦状，小便微难而不渴，生后者，此为水与血俱结在血室也。②《金匮要略今释》引《类聚方广义》：经水不调，男女癃闭，小腹满痛者；淋毒沉滞，梅淋小腹满痛不可忍，尿脓血者。③《金匮要略方义》：膨胀，瘀血内阻，水气内停，腹大坚满，脉络即张，胁腹攻痛，大便难，小便涩，口不渴，舌暗苔白者。

【方论选录】 ①《金匮要略心典》：敦，音对。按《周礼》注：槃以盛血，敦以盛食，盖古器也。少腹满如敦状者，言少腹有形高起，如敦之状，与《内经》胁下大如覆杯之文略同。小便难，病不独在血矣；不渴，知非上焦气热不化；生后即产后，产后得此，乃是水血并结，而病属下焦也。故以大黄下血，甘遂逐水，加阿胶者，所以去瘀浊而兼安养也。②《金匮要略方义》：方中以大黄破血攻瘀；甘遂攻逐水邪。盖产后多虚，易伤阴血，纯用破逐之剂，恐重伤阴血，故佐以阿胶益阴养血，使攻邪而不伤正。

【临证举例】 ①淋证 《金匮要略今释》引《古方便览》：一僧年二十八，患淋沥数年，时出脓血，或如米泔水，大便下利，时又秘闭，下利时淋漓稍安，秘闭则甚。余诊之，少腹满如敦状，按之引茎中痛，乃作此方饮之，大下利，病顿退，数日而全愈。②产后尿潴留 《河南中医》(1983；4:30)：李某，女，26岁，1970年11月就诊，第一胎是足月横位难产。产后三日，腹胀日重，疼痛加剧，少腹与脐周隆起，如孕六七月状，按之硬，小便不利，滴滴可下，尚不甚急迫，脉沉涩，舌质红暗苔滑，乃投《金匮》大黄甘遂汤而愈。

01166 大黄左经汤

【方源】《三因》卷三。

【组成】 大黄（蒸） 细辛（去苗） 茯苓 防己 羌活 黄芩 前胡 枳壳（麸炒，去瓤） 厚朴（去皮，锉，姜制，炒） 甘草（炙） 杏仁（麸炒，去皮尖，别研）

【用法】 上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，煎七分，去滓，空腹热服。

【主治】 风寒暑湿流注足阳明经，使腰脚痹痛，行步艰难，涎潮昏塞，大小便秘涩，腹痛呕吐，或复下利，恶闻食气，喘满肩息，或自汗谵妄。

【加减】 腹痛，加芍药；秘结，加阿胶；喘，加桑白皮、紫苏；小便秘，加泽泻；四肢疮痒浸淫，加升麻。所加并等分。

01167 大黄当归散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 当归 芍药 川芎 菊花 大黄 黄芩

杏仁 薄荷各等分

【用法】 上㕮咀。水煎，食后温服。

【主治】 胃中有热，眼生赤膜垂下，遮于黑睛疼痛者。

01168 大黄当归散

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】 大黄一两 当归一钱 木贼一两 黄芩一两 栀子五钱 菊花三钱 苏木五钱 红花八钱

【用法】 上为细末，令匀。每服二钱，食远茶清调下。宜服止痛没药散，止痛后服。

【主治】 血灌瞳仁，目睛疼痛。

01169 大黄牡丹汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 瓜子汤(《千金》卷二十三（注文）引《肘后方》)、大黄汤(《外科集腋》卷四)、大黄牡丹皮汤(《杂病证治新义》)。

【组成】 大黄四两 牡丹一两 桃仁五十个 瓜子半升 芒消三合

【用法】 以水六升，煮取一升，去滓；纳芒消，再煎沸，顿服之。有脓当下；如无脓，当下血。

【功用】 泻热破瘀，散结消肿。

①《金匮要略今释》引《方函口诀》：排血利尿。②《杂病证治新义》：攻下荡热消痈，清肠消炎。③《云南中医杂志》(1983；6:19)：抗菌消炎，增进血液循环，促进胃肠蠕动，排除肠内积物。

【主治】 肠痈初起，湿热瘀滞，少腹肿痞，疼痛拒按，小便自调，或善屈右足，牵引则痛剧，或时时发热，身汗恶寒，舌苔薄腻而黄。现用于湿热瘀滞的急性阑尾炎、妇女急性盆腔炎、附件炎、痔漏。

①《金匮》：肠痈者，少腹肿痞，按之即痛如淋，小便自调，时时发热，自汗出，复恶寒，其脉迟紧，脓未成。②《金匮要略今释》引《类聚方广义》：产后恶露不下，小便不利，血水壅遏，少腹满痛，通身浮肿，大便难者；经水不调，赤白带下，赤白痢疾，小腹凝结，小便赤涩，或有水气者。③《金匮要略今释》引《方函口诀》：瘀血冲逆；桃核承气汤证而小便不利；内痔、毒淋、便毒。

【宜忌】 ①《杂病证治新义》：阑尾炎既经化脓，本方所用大黄之刺激肠管增强蠕动，往往有引起化脓灶之溃破穿孔之虞，故不宜用。②《医方发挥》：凡重型急性化脓或坏疽性阑尾炎，阑尾炎并发腹膜炎（或有中毒性休克，或腹腔脓液多者），婴儿急性阑尾炎，妊娠阑尾炎合并弥漫性腹膜炎，阑尾寄生虫病等，均不宜用本方。

【方论选录】 ①《千金方衍义》：大黄下瘀血血闭；牡丹治瘀血留舍；芒消治五脏积热，涤去蓄结，推成致新之功，较大黄尤锐；桃仁治痼癖邪气，下瘀血血闭之功，亦与大黄不异；甜瓜瓣，《别录》治腹内结聚，戒溃脓血，专于开痰利气，为内痈脉迟紧未成脓之专药。②《金鉴》引李彣：大黄、芒消泄热，桃仁行瘀，丹皮逐血痹，去血分中伏火，瓜子主溃脓血。③《成方便读》：夫肠痈之病，皆由湿热瘀聚郁结而成。故用大黄之苦寒行血，芒消之咸寒软坚，荡涤一切湿热瘀结之毒，推之而下。桃仁入肝破血，瓜子润肺行瘀，丹皮清散血分之郁热，以除不尽之余气耳。

【临证举例】 ①肠痈 《云南中医杂志》(1983；6:19)：大黄牡丹汤为主中西医结合治疗急腹症104例。急性阑尾炎20例，包裹性阑尾脓肿20例，粘连性肠梗阻20例，肠道蛔虫堵塞10例，急性胆囊炎15例，结石性胆道感染并中毒性休克5例，急性坏死性胰腺炎4例。痊愈100例，中转手术者仅4例。治愈率达96.15%。②血瘀经闭《金匮要略今释》引《方伎杂志》：某妇人，经水不来三四个月，一医以为妊娠，至五个月，产婆亦以为妊，施镇带（即妊娠带）。其人曾产数胎，以经验故，亦信为妊。然至十一月，全无产意，于是乞诊于余。余熟诊之，腹状虽似妊，实非妊也。因告以经闭。夫妇闻之大惊，频乞药，乃与大黄牡丹汤，日用四服，服至四五日，下紫血坏死甚夥，二十日许而止，腹状如常。翌月月信来，自其月妊娠，翌年夏，举一子，此瘀血取尽之故也。③痔疾《山东中医杂志》(1984；3:50)：用大黄牡丹汤治疗血栓性外痔20例，19例痊愈，1例无效。一般服药一至三剂疼痛锐减，痔核明显内缩，三至六剂痔核逐渐吸收。④交肠 《生生堂治验》：一妇人，年可三十，后窍闭塞不通，大便却从前阴泄。如是旬许，而腰腹阵痛，大烦闷，燥屎始通，前阴所出亦自止，嗣后周而又发。盖患之十余年，医药百端，无不为矣。容貌日羸，神气甚乏。师诊之，其脉数而无力，始按其脐下，有粘屎即从前阴出，再按有一块应手。师问曰：月事不行者几年？曰：十余年矣。先与大黄牡丹汤缓缓下之，佐以龙门丸（梅肉、山栀、巴豆、轻粉、滑石）泻之者，月一次，自是前后阴口得其所居。数旬，白谓曰：妾有牡痔，方临厕也，疾痛不可忍。师视之，肛旁有如指头者，以药线截而治之，仍服前方一周年许，块亦自消。

【备考】《金匮要略今释》：盲肠阑尾之炎，当其发炎而脓未成之际，服本方则炎性渗出物随下，其状亦似脓。方后所云：有脓当下者，盖指此。非谓脓成之证亦可用本方也。脓成与否，为本方与薏苡附子败酱散之界画，不容假借。其证候，在肿痛处之痞硬与濡软，在寒热与无热，在脉之迟紧与数，学者详焉。

01170　大黄附子汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】大黄附子细辛汤(《金匮要略今释》卷三引《漫游杂记》)。

【组成】大黄三两　附子三枚（炮）　细辛二两

【组成】以水五升，煮取二升，分温三服。若强人煮取二升半，分温三服。服后如人行四五里，进一服。

【功用】《中医方剂学》：温阳散寒，通便止痛。

【主治】阳虚寒结，腹痛便秘，胁下偏痛，发热，手足厥冷，舌苔白腻，脉紧弦。现用于肋间神经痛、坐骨神经痛，肾结石、胆结石、慢性阑尾炎、胰腺炎、腹股疝等见上述证候者。

①《金匮》：胁下偏痛，发热，其脉紧弦，此寒也，以温药下之。②《张氏医通》：色疸者，身黄，额上微汗，小便利，大便黑，此因房事过伤，血蓄小腹而发黄，故小腹连腰下痛。③《金匮要略今释》引《类聚方广义》：此方实能治偏痛，然不特偏痛而已，亦治寒疝、胸腹绞痛延及心胸腰部、阴囊焮肿、腹中时有水声、恶寒甚者。

【方论选录】①《金鉴》引张璐：大黄附子汤，为寒热互结，刚柔并济之和剂。近世但知寒下一途，绝不知有温下一理。盖暴感之热结而以寒下，久积之寒结亦可寒下乎？大黄附子汤用细辛佐附子，以攻胁下寒结，即兼大黄之寒以导之。寒热合用，温攻兼施，此圣法昭然，不可思议者也。②《温病条辨》：附子温里通阳，细辛暖水脏而散寒湿之邪；肝胆无出路，以用大黄，借胃腑以为出路也。大黄之苦，合附子、细辛之辛，苦与辛合，能降能通，通则不痛也。③《成方便读》：阴寒成聚，偏着一处，虽有发热，亦是阳气被郁所致。是以非温不能散其寒，非下不能去其积，故以附子、细辛之辛热善走者搜散之，而后用大黄得以行其积也。

【临证举例】①腹痛　《古方便览》：一男子，年五十余，腹痛数年。余诊之，心下痞硬，腹中雷鸣，乃作半夏泻心汤饮之，未奏效。一日，忽然大恶寒战慄，绞痛倍于常时，于是更作大黄附子汤饮之，痛顿止。续服数日，病不再发。②肋间神经痛　《日本东洋医学会志》（12卷，3号）：71岁男子，主诉右侧胸痛剧烈来院就诊，面色不华，贫血貌，足活动受限，行走不便。脉洪大，舌润无苔，腹力中等，略微柔软，腹直肌挛急，便4～5日一次。给予大黄附子汤，经过良好，服药25日痊愈。③美尼尔氏综合征　《浙江中医杂志》(1985；8:35)：齐某，女，40岁。素患美尼尔氏综合征，时常发作。一周前，因感冒过劳，眩晕又作，视物旋转，卧床不起，头身动则加剧，呕吐痰涎，脐下3寸处胀痛，泻下清稀，纳呆，口干而欲饮，舌淡，苔白厚粘腻，脉滑缓。以痰饮作眩而论，拟《金匮》泽泻汤合二陈汤加味，治之未效。再诊舌象，参以脐下痛证，悟此为阳虚寒实，积聚子里而胀痛，三焦痞塞，清阳不升，浊阴不降而致眩晕。改投大黄附子汤加味：附子8克，大黄10克，细辛，人参各6克，2剂。药后轻泻一次，眩晕和胀痛已减大半；再2剂，诸证悉除。

01171　大黄泄热汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】泄热汤(《圣济总录》卷九十二)。

【组成】大黄　泽泻　黄芩　栀子仁　芒消各二两　桂心二两　大枣三十枚　石膏八两（碎，绵裹）　甘草一两（炙）

【用法】上切。以水九升，先取一升水，别渍大黄一宿，以余八升煮诸药，取二升五合，去滓；下大黄，更煮两沸，去大黄滓；下芒消，分为三服。

【主治】心劳热，口中生疮，大便难，闭塞不通，心满痛，小腹热。

【宜忌】忌海藻、生葱、菘菜。

【备考】《千金》有通草。

01172　大黄泻肝散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】郁李仁　荆芥各二钱半　甘草　大黄各五钱

【用法】水煎，食后服。

【主治】乌风内障。

01173　大黄牵牛散

【方源】《保命集》卷中。

【组成】大黄一两　牵牛（头末）五钱

【用法】上为细末。每服二钱，食后服。有厥冷，用酒调下三钱；无厥冷而手足烦热者，蜜汤调下。微利为度。

【主治】相火之气，游走脏腑，大便秘结。

01174　大黄桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷十二

【组成】 大黄（锉，醋炒）二两　桔梗（炒）一两　甘草（炙，锉）　朴消各半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 伤寒热病饮水，结胸硬满。

01175　大黄消石汤

【方源】 《金匮》卷中。

【异名】 大黄黄柏栀子芒消汤（《脉经》卷八）、大黄汤（《千金翼》卷十八）、大黄黄柏皮栀子消石汤（《外台》卷四）、大黄黄柏汤（《普济方》卷一四二）、消黄汤（《杂病源流犀烛》卷十六）。

【组成】 大黄　黄柏　消石各四两　栀子十五枚

【用法】 以水六升，煮取二升，去滓；纳消，更煮取一升，顿服。

【主治】 湿热黄疸，黄色鲜明如橘色，腹满汗出，口渴，大便秘，小便不利，苔黄腻，脉沉实或滑数；或湿热淋浊等。

①《金匮》：黄疸腹满，小便不利而赤，自汗出，此为表和里实。②《金匮要略今释》引方舆辀：热淋暴淋，不见血者。③《金匮要略今释》引《类聚方广义》：嘈杂，胸中煎熬，腹满有块，二便不利，或口中觉苦辛酸咸等，此症后为膈噎者。

【方论选录】 ①《金匮要略论注》：此为黄疸之有里无表者言之，谓疸色黄，见于表矣，乃腹满，小便不利且赤，里热可知。黄疸最难得汗，乃自汗，则表从汗解，故曰此为表和里实。实者邪也，有邪则宜去，故主大黄消石汤。大黄、消石解气血中之实热，黄柏苦寒主下焦，栀子虽轻浮在上，能使里热从上而下，故以为使，且轻浮则与郁结相宜也。②《金鉴》引李彣：腹满、小便不利而赤，里病也；自汗出，表和也。里病者，湿热内甚，用栀子清上焦湿热，大黄泻中焦湿热，黄柏清下焦湿热，消石则于苦寒泻热之中，而有燥烈发散之意，使药力无所不至，而湿热悉消散矣。

【临证举例】 黄疸　《静俭堂治验》：获原辨藏患黄疸，更数医，累月不见效，发黄益甚，周身如橘子色，无光泽，带黯黑，眼中黄如金色，小便短少，色黄如柏汁，呼吸迫促，起居不安。求治于予，乃以指头按胸肋上，黄色不散，此疸证之尤重者也。乃合茵陈蒿汤、大黄消石汤，作大剂，日服三四贴。及三十日，黄色才散去，小便清利而痊愈。

【备考】 ①《金匮玉函要略述义》按：消石，即火消。②《金匮要略今释》：消石，《脉经》、《千金》并作芒消，日医亦多用芒消，盖非。宋本、俞桥本，消石并误作滑石。

01176　大黄黄连汤

【方源】 《金鉴》卷四十二。

【组成】 大黄　黄连

【用法】 好酒煎服。

【主治】 痢疾里热盛，上冲心作呕，噤口者。

【备考】 本方方名，《治痢南针》引作“大黄黄连酒”。

01177　大黄葶苈丸

【方源】 方出《续本事》卷五，名见《普济方》卷一六三。

【组成】 大黄五钱（炒）　葶苈子（洗净，瓦上炒）一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七丸，桑白皮汤送下。

【主治】 气喘咳嗽。

01178　大黄寒水散

【方源】 《医方类聚》卷一九四引《施园端效方》。

【组成】 大黄一两　生寒水石半两

【用法】 上为细末。清油调，扫烧破处。

【主治】 汤火烧疮。

01179　大黄䗪虫丸

【方源】 《金匮》卷上。

【异名】 妇科大黄䗪虫丸（《饲鹤亭集方》）。

【组成】 大黄十分（蒸）　黄芩二两　甘草二两　桃仁一升　杏仁一升　芍药四两　干地黄十两　干漆一两　虻虫一升　水蛭一百个　蛴螬一升　䗪虫半升

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服五丸，酒送下，一日三次。

【功用】 活血化瘀，通经消癥。

①《金匮》：缓中补虚。②《金鉴》：攻热下血。③《中国药典》：活血破瘀，通经消痞。

【主治】 瘀血内停，腹部肿块，肌肤甲错，形体羸瘦，目眶黯黑，潮热，食欲不振；妇人瘀血经闭不行。

①《金匮》：五劳虚极，羸瘦腹满，不能饮食；食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络营卫气伤，内有干血，肌肤甲错，两目黯黑。②《金匮要略今释》引《类聚方广义》：妇人经水不利，渐为心腹胀满，烦热咳嗽，而色煤黄，肌肤干皮细起，状如麸片，目中昙暗，或赤涩羞明怕日者；小儿疳眼，生云翳，睑烂羞明，不能视物，并治雀目。③《金匮要略今释》：早期肝硬化。

【宜忌】《中国药典》：孕妇禁用，若出现皮肤过敏者停服。

【方论选录】①《医方考》：是方也，干漆、桃仁、虻虫、水蛭、蛴螬、䗪虫去干血之品也；君以大黄，是听令于将军矣；佐以芍药、地黄，生新血也；佐以杏仁、甘草，致新气也；佐以黄芩，驱游热而坚肠胃也。②《金鉴》引李中梓：劳伤之证，肌肤甲错，两目黯黑，此内有瘀血者也。仲景洞见此证，补之不可，凉之无益，而立此方。《经》曰：血上濡之，故以地黄为君；坚者削之，故以大黄为臣；统血者脾也，脾欲缓急，食甘以缓之；又酸苦涌泄为阴，故以甘、芍、桃仁为佐；咸走血，苦胜血，故以干漆之苦，四虫之咸为使。③《张氏医通》：夫五劳七伤，多缘劳动不节，气血凝滞，郁积生热，致伤其阴。世俗所称干血痨是也。所以仲景乘其元气未漓，先用大黄、䗪虫、水蛭、虻虫、蛴螬等蠕动啖血之物；佐以干漆、生地、桃仁、杏仁，行去其血；略兼甘草、芍药以缓中补虚，黄芩开通郁热，酒服以行药热。待干血行尽，然后纯行缓中补虚收功。

【临证举例】①慢性活动性肝炎 《陕西中医》(1986；7：301)：用本方治疗慢性活动性肝炎40例。治愈17例（症状体征消失，肝功能恢复正常，HBSAg转阴）；有效19例（症状体证消失，肝功能恢复正常，HBSAg呈阳性，或肝功能损害减轻，但未恢复正常，HBSAg呈阳性）；无效4例。②早期肝硬化 《岳美中医话集》：张某，男，49岁，经某医院确诊为早期肝硬变。中医诊为血瘀气滞而肝硬，处以大黄䗪虫丸，日二丸，早晚各服一丸，并用《冷庐医话》化瘀汤，日一贴，计服䗪虫丸240丸，化瘀汤180剂，其间服柴芍六君汤加当归、瓦楞、橘叶。一年后肝脾不能扪及，肝功化验正常。③慢性盆腔炎，继发性不孕 《北京中医》(1984；2：54)：孔某，女，32岁。小腹胀痛，腰骶酸痛，经期更剧。月经量少色紫黑有块，经期延后，经前经期乳胀痛，素日白带量多，质清稀，舌质黯红，舌尖有瘀点，苔白稍腻，脉象沉涩。十年前生一女孩已殁。有产后发热腹痛史，后未再孕。检查：阴道分泌物多，宫体活动受限，两侧压痛，增厚，可扪及条索状物。诊断为：慢性盆腔炎，继发性不孕症。投以大黄䗪虫丸，消其癥结，祛其瘀阻，然后以补肾调经法收其全功。

01180 大黄䗪虫丸

【方源】《镜京直指》卷二。

【组成】牛锦纹 荆三棱 䗪虫 蓬莪术 干漆 元明粉

【用法】为丸服。

【主治】腹胀血蛊，先有积块化胀，或石瘕肠覃，脉实形壮者。

01181 大戟芫花散

【方源】方出《圣惠》卷五十四，名见《普济方》卷一九一。

【组成】大戟一两（锉碎，微炒） 芫花一两（醋拌，炒令干） 苦葫芦子一两（微炒） 甜葶苈一两（隔纸炒，令紫色）

【用法】上为细散。每服一钱，以陈大麦面二钱，水一中盏，煎至四分，每日空心和滓温服，良久腹内作雷声，更吃热茶投之，使大小肠利，不过三服效。

【主治】十种水病，肿满喘促，不得眠卧。

01182 大人参半夏丸

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】人参 茯苓（去皮） 天南星 薄荷叶 各半两 半夏 干姜 白矾（生） 寒水石 蛤粉 各一两 藿香叶一分

【用法】上为末，面糊为丸，如小豆大。每服二三十丸，生姜汤送下；食后温水下亦得一法，加黄连半两，黄柏二两，水为丸，取效愈妙。

【功用】化痰坠涎，止嗽定喘，宣通气血，调和脏腑，进饮食。

【主治】诸痰呕吐，痰逆、痰厥头痛，风气偏正头疼，风缠头目昏眩，耳鸣鼻塞，咽膈不利，心腹痞满，筋脉拘挛，肢体麻痹疼痛，中风偏枯，咳唾稠粘，肺痿，酒病。

01183 大圣一粒金丹

【方源】《传信适用方》卷一。

【异名】保命金丹。

【组成】黑附子（生，去皮脐） 川乌头（如上） 白附子 五灵脂 白僵蚕（炒） 白蒺藜（炒）各一两（以上六味别为末） 白矾（枯）一两 朱砂（别研）半两 没药半两 麝香（研）一钱 乳香（研）半两 全蝎半两（碎亦可用）

【用法】将上诸药和得所，以井花水磨细墨半两，滴水为丸，如弹子大，窨干，金箔为衣。每服一粒，用生姜一两去皮细捣，取自然汁，将药丸于姜汁内磨，化尽为度，用无灰酒一盏温服。量病人酒性多少，更吃温酒一二升，投之以助药力。次用衣被盖覆便卧，汗出为效。疾势轻者，每服半丸，不拘时候。

【功用】补益五脏，固密真元，通流关节，祛逐

风邪，壮筋续骨。

【主治】 男子、妇人一切诸风，气血俱虚，阴阳偏废；卒暴中风，僵仆昏瘖，涎潮搐搦，不省人事，失音舌强，手足瘫曳，口眼㖞斜；或瘫痪偏枯，半身不遂，语言謇涩，举止错乱，四肢麻痹；及治癫痫倒仆，目瞑不开，涎盛作声；或角弓反张，目睛直视，口噤闷绝，牙关紧急；并治风搏于阳经，目眩头痛，耳作蝉鸣，皮肤瞤搐，频欠喜睡，项强拘急，不能回顾，及肾脏风虚，脚膝疼痛，步履艰难，偏风流注，一边屈伸不得。

01184 大虫魄五味散

【方源】《外台》卷二十七引《许仁则方》。

【异名】 五味散(《普济方》卷二一四)。

【组成】 大虫魄（即琥珀）六两 石苇三两（去毛） 瞿麦穗四两 冬葵子一升 茯苓六两

【用法】 上为散。煮桑白皮作饮子。初服一方寸匕，每日二次。稍加至三匕。

【主治】 淋病，体气热，小便涩，出处酸酒。

【宜忌】 忌酢物。

01185 大补内黄耆汤

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】 黄耆 半夏各三两（洗） 大枣三十枚 当归 干地黄 桂心 人参 茯苓 远志（去心） 芍药 泽泻 五味子 麦门冬（去心） 白术 甘草各二两（炙） 干姜四两

【用法】 上㕮咀。以水一斗半，煮取二升，每服五合，一日三次。

【主治】 妇人七伤，骨髓疼，小腹急满，面目黄黑，不能饮食；诸虚不足，少气，心悸不安。

01186 大神效活络丹

【方源】《奇效良方》卷二。

【异名】 活络丹(《北京市中药成方选集》)；大活络丹(《中药制剂手册》)。

【组成】 白花蛇二两（酒浸，焙干） 乌梢蛇半两（酒浸，焙干） 麻黄二两（去节） 细辛一两（去土） 全蝎一两半（去毒，炒） 两头尖二两（酒浸） 赤芍药一两 贯芎二两 防风二两半 葛根一两半 没药一两（另研） 血竭七钱半（另研） 朱砂一两（另研） 乌犀屑半两 地龙半两（去土） 甘草二两（去皮，炙） 丁香一两（去枝） 白僵蚕一两（炒） 乳香一两（另研） 麝香半两（另研） 片脑一钱半（另研） 官桂二两（去粗皮） 草豆蔻二两 川羌活二两 虎胫骨一两（酥炙） 玄参一两 牛黄二钱半（另研） 威灵仙一两半（酒浸） 天麻二两 藿香二两（去土） 天竺黄一两 败龟板一两（炙） 人参一两 何首乌二两 白芷二两 乌药一两 安息香一两 青皮一两 黑附子一两（炮，去皮脐） 香附一两 白豆蔻一两 骨碎补一两 黄连二两 茯苓一两 黄芩二两 白术一两 熟地黄二两 松香脂半两 大黄二两 当归一两半 木香二两 沉香一两 金箔（为衣）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，温酒、茶清漱下，随证上下服之。头风，擂茶下。

【功用】 清心明目，宽胸活血，养气暖膝。

【主治】 风湿诸痹，筋骨疼痛，腰臂疼痛，口眼㖞斜，行步艰辛，筋脉拘挛。

01187 大黄甘草饮子

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】 大豆五升（先煮三沸，淘去苦水，再煮） 大黄一两半 甘草（大粗者）四两（打碎）

【用法】 用井水一桶，将前药同煮三五时，如稠糊水，少候大豆软，盛大盆中，放冷。令病人食豆，渴食豆汤，不拘时候。脏腑自然清润。如渴尚不止，再服前药，不三五日自愈。

【主治】 一切消渴，饮水不止者。

【方论选录】《医方考》：此治中、上二焦消渴之方也。大黄能去胃中实热，甘草能缓燥急之势，大豆能解诸家热毒，而必冷服者，寒因寒用也。

01188 大青龙加黄芩汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【组成】 麻黄二两 桂枝 甘草六钱二字半 杏仁四十个 生姜一两 大枣十二枚 石膏二鸡子大 黄芩六钱二字半

【主治】 ①《伤寒图歌活人指掌》：太阳无汗，恶风烦躁。②《济阳纲目》：寒疫头痛，身热无汗，恶风烦躁者。

【方论选录】《医方考》：春分以后，至秋分节前，天有暴寒，抑遏阳气，不得泄越，有上件诸证者，皆为时行寒疫。表有风寒，故见太阳证，头痛身热，无汗恶风；里有温热，故见烦躁。麻黄、桂枝、甘草、杏仁、生姜、大枣，辛甘物也，辛以解风寒，甘以调营卫。石膏、黄芩，寒苦物也，寒以清温热，苦以治烦躁。

【备考】《济阳纲目》本方用法：每服五钱，水煎，温服，取汗。

01189 大料神秘左经汤

【方源】《三因》卷三。

【异名】 神秘左经汤(《得效》卷九)。

【组成】 麻黄（去节） 干葛 细辛 厚朴（姜

制，炒） 茯苓 防己 枳壳（麸炒，去瓤） 桂心 羌活 防风（去叉） 柴胡 黄芩 小草（即远志苗） 白姜（炮） 半夏（汤洗去滑） 甘草 麦门冬（去心）各等分

【用法】 上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，煎七分，去滓，空腹服。

【功用】 下气，消痰，散风湿，退肿，进饮食，令人不虚。

【主治】 风寒暑湿流注足三阳经，手足拘挛疼痛，行步艰难，憎寒发热，自汗恶风，头眩腰重，关节掣痛；或卒中昏塞，大小便秘涩；或腹痛，呕吐下利，恶闻食臭，髀腿顽痹，缓纵不随，热闷惊悸，心烦气上，脐下冷痹，喘满肩息。

【加减】 自汗，加牡蛎、白术，去麻黄；肿满，加泽泻、木通；热甚无汗，减桂，加橘皮、前胡、升麻；腹痛吐利，去黄芩，加芍药、附子（炮）；大便秘，加大黄、竹沥；喘满，加杏仁、桑白皮、紫苏，所加并等分。

01190 大通圣白花蛇散

【方源】 《局方》卷一。

【异名】 大通散（《圣济总录》卷十二）。

【组成】 海桐皮（去粗皮） 杜仲（锉，炒） 天麻（去苗） 干蝎（炒） 郁李仁 赤箭 当归（去芦头，酒浸） 厚朴（生姜汁制） 蔓荆子（去白皮） 木香 防风（去苗） 藁本（去土） 白附子（炮） 肉桂（去粗皮） 羌活（去芦头） 草薢（酒浸一宿） 虎骨（醋炙） 白芷 山药 白花蛇（酒浸，炙，去皮骨，用肉） 菊花（去枝梗） 牛膝（去苗） 甘草（炙） 威灵仙（去土）各一两

【用法】 上为末。每服一钱至二钱，空心温酒调下；荆芥汤亦得。久病风人，尤宜常服。

【功用】 祛逐风气，通行荣卫。

【主治】 ①《局方》：诸风，无问新久，手足躄曳，腰脚缓弱，行步不正，精神昏冒，口面㖞斜，语言蹇涩，痰涎壅盛；或筋脉挛急，肌肉顽痹，皮肤搔痒，骨节烦疼；或痛无常处，游走不定，及风气上攻，面浮耳鸣，头痛目眩；下注腰脚，腰疼腿重，肿痒生疮。②《圣济总录》：风气冷热不调，四肢厥冷，心神烦惋。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“白花蛇散”。

01191 大黄黄连泻心汤

【方源】 《伤寒论》。

【组成】 大黄二两 黄连一两

【用法】 以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，分温再服。

【主治】 心下痞，按之濡，其脉关上浮者。

【方论选录】 《古方选注》：痞有不因下而成者，君火亢盛，不得下交于阴而为痞，按之虚者，非有形之痞，独用苦寒，便可泄却。如大黄泻营分之热，黄连泄气分之热，且大黄有攻坚破结之能，其泄痞之功即寓于泻热之内，故以大黄名其汤。以麻沸汤渍其须臾，去滓，取其气，不取其味，治虚痞不伤正气也。

【备考】 《伤寒论》林亿按：大黄黄连泻心汤诸本皆二味，又后附子泻心汤，用大黄、黄连、黄芩、附子，恐是前方中亦有黄芩，后但加附子一味也。《活人书》本方有黄芩。

01192 大柴胡加葵蕤知母汤

【方源】 《千金》卷九。

【组成】 柴胡半斤 黄芩 芍药各三两 半夏半升 生姜五两 大黄 甘草各一两 人参三两 葵蕤 知母各二两

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升，去滓，服一升，一日三次。取下为效。

【主治】 伤寒七八日不解，默默心烦，腹中有干粪，谵语。

01193 万圣丹

【方源】 《永乐大典》卷一一一四一二引《经验普济加减方》。

【组成】 刺猬皮（去上浮）半两 乌鱼骨三钱 猪指甲（去肉）三钱（三味盛盒子内，盐泥固济，烧取研细） 轻粉 硇砂 密佗僧（研）各一钱 蕤仁（去皮，研）二钱

【用法】 上为细末，熔黄蜡半两，消和搅匀作块，为丸绿豆大。入绒线少许，于指甲上按作饼子，觑翳膜大小加减。临卧，夜贴于眼睛上有翳膜处，至明日早晨洗了。不过十次，粘贴下脂膜，多年病眼，不过半月取下。

【主治】 久翳不愈，晕膜昏暗瘀肉。

01194 万全膏

【方源】 《育婴秘诀》。

【组成】 羌活 川芎 细辛 石菖蒲 木通 麻黄各一钱 脑麝各一字

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，灯心汤化下；或用一丸，棉包塞鼻中。

【主治】 鼾鼻。

01195 万安丸

【方源】 《医方类聚》卷一五二引《瑞竹堂方》。

【组成】 肉苁蓉四两（酒浸） 干薯蓣 五味子

各一两半　杜仲二两（炒）　牛膝（酒浸）　菟丝子（酒浸）　泽泻　白茯苓（酒浸）　熟干地黄　当归　山茱萸各二两（去核）　巴戟三两（去心）　赤茯苓（去皮）

【用法】 上为细末，用苁蓉末半斤，酒熬膏和为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心温酒送下。

【功用】 《普济方》：补下元，起阴阳，安魂定魄，和三焦，破积聚，消五谷，安脏腑，除心中伏热，强骨轻身，明目，去冷除风。

【主治】 下元极虚。

【宜忌】 ①《医方类聚》引《瑞竹堂方》：忌醋、陈腐、自死之物。②《普济方》：忌猪羊肉、血七日。

【备考】 方中赤茯苓用量原缺。

01196　万安汤

【方源】 《魏氏家藏方》卷七。

【组成】 人参（去芦）　甘草（炙）各半两　大川乌（炮，去皮脐，锉，盐炒黄，去盐）　草果子（面裹煨）　干姜（炮，洗）各二两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜二片，枣子一个（去核），同煎至八分，去滓，空心、食前热服。

【主治】 脾泄冷痢，腹痛里急，寒中色白，米谷不化。

01197　万安散

【方源】 《圣济总录》卷一七九。

【组成】 海金炒　滑石　续随子（炒）各半两　蝼蛄七枚（炒令黑）

【用法】 上为细散。每服半钱匕，空心、食前煎灯心汤温调下。

【主治】 小儿小便不通欲死。

01198　万安散

【方源】 《济阴纲目》卷三。

【组成】 小茴香（炒香）　木香各二钱半　黑牵牛一两（另取头末）

【用法】 上为细末。以生姜自然汁调二钱，临卧服。取尽恶物为效。未尽，间日再服二钱，后以白粥补之。

【主治】 女人赤白带下，或出白物如脂，或有臭浊污水。

【宜忌】 忌热毒物。

01199　万安散

【方源】 《痧喉证治汇言》。

【组成】 桔梗一钱　硼砂一钱　生甘草一钱　冰片一分　山豆根一钱

【用法】 上为极细末。

【主治】 喉痧

01200　万应丸

【方源】 《医学正传》卷四引《外台》。

【组成】 槟榔五两　大黄八两　黑丑四两（以上三味为末）　皂荚七挺（不蛀者）　苦楝根皮一斤

【用法】 上先以皂荚、苦楝，用水二大碗熬成膏，一处搜和药末为丸，如梧桐子大；又以沉香、木香、雷丸各一两为末为衣，先以沉香衣，次用雷丸衣，又次用木香衣。每服三丸，四更时用砂糖水送下。

【功用】 下诸虫。

【主治】 虫积心痛腹胀，有块硬起，吐清水，面黄肌瘦，小便如泔。

①《袖珍》：诸虫。②《证治汇外》：虫积心痛。③《张氏医通》：腹中诸虫血积。④《高崖尊生》：虫痛有块硬起，吐清水。⑤《丸散膏丹集成》：面黄肌瘦，小便如泔。

【宜忌】 《张氏医通》：孕妇忌服。

01201　万应丸

【方源】 《本草纲目》卷三十五引《指南方》。

【异名】 万病丸（《三因》卷十八）、地黄煎丸（《普济方》卷三五二）。

【组成】 干漆一两（打碎，炒烟尽）　牛膝末一两　生地黄汁一升

【用法】 入银、石器中慢熬，俟可丸，丸如梧桐子大。每服一丸，加至三五丸，酒、饮任下。以通为度。

【主治】 月经瘀闭不来，绕脐寒疝痛彻；及产后血气不调，诸癥瘕病。

01202　万应丸

【方源】 《便览》卷三。

【组成】 大腹子二两（同槟榔制法）　使君子二十枚　贯众（去土）五钱　土朱五钱　雷丸（水浸，刮去黑皮）五钱（红者不用）　木香三钱（另研）　鸡心槟榔二两（用无灰酒浸半日，至心黑为度，以黄豆煎汤洗）　自然铜一两（有金星小者佳，用醋煅七次，以酥为度）　锦纹大黄五两五钱（湿纸裹，煨半生半熟）　黑牵牛四两（炒半生半熟，取头末二两）　滑石一两（白者佳）

【用法】 上为细末，皂角水煎成膏为丸，如梧桐子大。大人三钱，小人减半，莫食晚饭，四更时冷茶送下。行五七次无妨。候虫积诸毒下尽，以温米粥补之。

【功用】 追虫取积。

【主治】 虫积，面色萎黄，肌肤羸瘦，胸膈停痰，宿食不化，肚腹膨胀，虫咬心疼，吃泥炭米物。五脏中诸气血积聚，妇人癥瘕。

【宜忌】 忌腥冷面食。孕妇忌服。

01203 万应丹

【方源】《纲目拾遗》卷八引海昌方。

【组成】 人中白（以露天不见粪者方佳，火煅醋淬七次）一两 神曲 白卜子 地骷髅（即土中萝卜）各五钱 砂仁二钱（以上俱炒） 陈香橼一个

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二五七丸，灯草汤或酒送下。

【主治】 黄疸变为臌胀，气喘，翻胃，胸膈饱闷，中脘疼痛；噤口痢疾，结胸伤寒，伤力黄肿；小儿疳疾结热。

01204 万应丹

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】 建青黛（水飞去渣，晒干）五钱 鸡肫皮（洗，炙干）一钱 牛胆消三钱 山栀仁（拣净仁，炒黑，碾细末）三钱 黄连末三钱 生黄芩三钱 真熊胆一钱 人中白（取经霜雪多年者，火煅三次）五钱 大红绒灰一钱 西牛黄一钱 雄黄一钱 青梅干（煅，存性）五钱（临时加才妙） 硼砂三钱 枯矾二钱 儿茶三钱 铜青二钱 珍珠一分

【用法】 上为极细末，和匀。加真麝香五分，大梅片七分，再研和匀，入瓷罐内，以乌金纸塞紧口。每用少许吹患处，日夜徐徐吹之，流出痰涎渐愈。如有腐臭，急用蚌水洗净，或用猪牙草、扁柏子和捣，加水去滓洗净，再以前药去青梅干，加滴乳香（去油）二钱，吹用。

【主治】 咽喉口舌肿闭，并穿腮腐臭延烂。

【备考】 制青梅法：大青梅一斤，去核，略捣碎，入白矾、食盐各五钱，拌和，再加蜒蜡不拘多少，层层间之。一日夜取梅晒干，收尽汁再晒干，煅灰存性，临用加入。制胆消法：冬月约入朴消在黑牛胆内，挂在风前一百二十日，去皮用消。

01205 万应锭

【方源】《中医医学大辞典》。

【异名】 金鼠氏（《全国中药成药处方集》抚顺方）。

【组成】 京墨二两 儿茶 胡黄连 川黄连各一两 冰片六分 麝香当门子 犀牛黄各五分 熊胆二钱

【用法】 上为细末，再用人乳合糊为丸，如梧桐子大，金箔为衣。内证每服四五分，小儿减半，熟汤化下；外证用醋研敷。

【功用】 清热镇惊，凉血止血。

①《北京市中药成方选集》：清热祛暑，解毒止血。②《全国中药成药处方集》：清火，凉血舒风。③《中国药典》：镇惊。

【主治】 ①《中国医学大辞》：中风中痰，中寒中暑，半身不遂，口眼歪斜，喉闭乳蛾，牙疳，霍乱，瘟疫，疟痢，血热便血，斑疹，伤寒，黄病，疔毒攻心；小儿痘证，惊风；无名肿毒，臁疮，伤水疮。②《北京市中药成方选集》：吐血衄血，口舌生疮，牙齿疼痛，及小儿热症。

【宜忌】 孕妇忌服。

01206 万应膏

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】 黄柏 芍药 白芷 黄耆 木鳖仁 杏仁 当归 白及 生地黄 官桂 玄参（去皮，锉碎） 没药 乳香各五钱（研） 白蔹 黄蜡各一两 黄芩 大黄各二两 黄丹一斤 脂麻油二斤八两

【用法】 上药入油内浸一宿，绝早入沙锅慢火熬，用生柳条搅至申时，以焦褐色出火，去粗滓，又以重绵滤过，入丹再熬，旋滴水中成珠子不散者，出火毒绝烟，入乳香、没药、黄蜡搅匀，用瓷器收贮于土内埋七日，取出摊用。一切疮疡初生，煎葱白水热淋两炊时，良久再淋，肿消为度。

【功用】 收敛聚脓。

【主治】 疮疡初生，肿焮甚，及疮老不能愈者。

01207 万应膏

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】 川乌 草乌 生地 白蔹 白及 象皮 官桂 白芷 当归 赤芍 羌活 苦参 土木鳖 穿山甲 乌药 甘草 独活 玄参 定粉 大黄各五钱

【用法】 上十九味，定粉在外，用净香油五斤，将药浸入油内，春五、夏三、秋七、冬十，候日数已足，入洁净大锅内，慢火熬至药枯浮起为度；住火片时，用布袋滤去渣，将油称准，每油一斤，对定粉半斤，用桃柳枝不时搅之，以黑如漆、亮如镜为度，滴入水内成珠。薄纸摊贴。

【主治】 痈疽，发背，对口，诸疮，瘰核，流注。

01208 万应膏

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】 附子 红花 血余 莪术 桂枝 羌活 独活 僵蚕 秦艽 麻黄 当归 川乌 防风 威灵仙 草乌 大黄 赤芍 山栀 桃仁 三棱 白

芷 全虫 五加皮 良姜各二两 生地 香附 乌药各四两

【用法】 麻油十五斤，加丹六十两，收膏后，再加肉桂粉五钱，苏合油五钱，及香料药二两。摊贴。

【主治】 跌打损伤，负重闪腰，筋骨疼痛，胸腹气痛，腹胀寒痛。

01209 万灵丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【异名】 大黄丸(《普济方》卷二四二)。

【组成】 大黄一两（生用） 黑牵牛一两（炒） 破故纸一两（炒香）

【用法】 上为细末，用不蛀皂角十挺，水浸一宿，揉皂角去滓，用汁煎成膏，和前药末为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心、临卧用温热水送下。

【主治】 干湿脚气，膝胫疼痛，大便秘涩，小便赤黄。

01210 万灵丸

【方源】《医方类聚》卷一一三引《瑞竹堂方》。

【异名】 万应丸(《准绳·类方》卷八)。

【组成】 黑牵牛一斤（取头末十两，生用） 大腹子一斤（扁者，取七两末，生用，如尖者是槟榔） 京三棱五两（炮） 广木香五两（面裹煨干为度） 雷丸五两（炮） 蓬术（煨）二两

【用法】 上为细末，和匀，用好紫色皂角半斤，去皮弦，切碎，用水两大碗浸一宿，冬月两宿，捞去粗滓，铜、瓷器内熬数沸，白沫出为度，放冷，和药必须揉杵捣，丸如梧桐子大。每服四钱重，五更用沙糖水送下，温冷不妨。至天明去利四五行者，看取下是何虫积，以温白粥补之。

【功用】 取虫宣积。

【宜忌】 忌生冷腥硬之物，孕妇勿服。

01211 万灵丹

【方源】《永乐大典》卷一三八八〇引《风科集验方》。

【异名】 灵龟丹（原书同卷引《极济方》）。

【组成】 败龟壳七钱半（醋炙） 五灵脂（微炒） 虎胫骨（醋浸，焙干） 自然铜（煅，醋淬） 生地黄（酒浸，焙干） 麻黄（去节）各一两 川乌（生用） 草乌（锉如豆，盐炒）各半两（不用盐） 乳香（别研） 木香各三钱半 干木瓜二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如小弹子大，每两作十丸。每丸分作二服，用生姜自然汁同温酒化开服，更饮好酒一二盏，空心、临卧各一服。初服觉口唇吻微麻，勿怪。

【主治】 风寒湿三气合而成痹，腿脚沉重，手足麻木，久则偏枯，脚气不能行履，腰胯不能动移；痪风、湿痹、瘫中者。

【宜忌】 忌食油腻热物。

01212 万灵丹

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 半夏（姜制） 南星（姜汁炒） 瓦楞子（煅） 青礞石（煅） 沉香（锉）各二两 青皮（醋炒） 莪术（醋煮） 三棱 香附（醋炒） 白芍各一两二钱

【用法】 上为末，醋糊为丸。每服二钱，空心酒送下。

【主治】 痰积成块。

01213 万灵膏

【方源】《本草纲目》卷十七引《摘玄方》。

【组成】 甘遂二两 蓖麻子仁四两 樟脑一两

【用法】 捣作饼。贴之。

【主治】 麻木疼痛。

01214 万灵膏

【方源】《金鉴》卷八十八。

【组成】 鹳筋草 透骨草 紫丁香根 当归（酒洗） 自然铜（醋淬七次） 瓜儿血竭 没药各一两 川芎八钱 赤芍二两 半两钱（酒淬）一枚 红花一两 川牛膝 五加皮 石菖蒲 茅山苍术各五钱 木香 秦艽 蛇床子 肉桂 川附子（制） 半夏（制） 石斛 草薢 鹿茸各三钱 虎胫骨一对 麝香二钱

【用法】 上除血竭、没药、麝香三味各研细末另包外，共二十三味，先将香油十斤微火煨浸三日，然后将群药入油内，熬黑为度，去滓，加黄丹五斤再熬，将至滴水成珠，离火；俟少时药温，将血竭、没药、麝香下入搅匀，取起出火气。

【功用】 消瘀散毒，舒筋活血，止痛接骨。

【主治】 跌打损伤，兼去麻木风痰、寒湿疼痛。

01215 万金丸

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】 平胃散加夜明砂（略炒） 针砂（醋淬，炒） 皂矾（醋煮干，煅红）各等分

【用法】 上为末，红枣肉为丸，如绿豆大。空心米饮送下。

【功用】 磨积块，去黄胖。

【宜忌】 忌一切血及荞麦面。

01216 万金丹

【方源】《医方类聚》卷二五九引《瑞竹堂方》。

【组成】 朱砂五钱（别研） 麝香二钱半（别研） 珍珠半钱 白僵蚕十个（炒） 琥珀一钱（明者） 全蝎十个（去尾，火炙） 脑子（别研） 犀角（镑） 干胭脂上三味不拘多少 天南星一钱 钩藤五钱 巴豆五粒（去皮油）

【用法】 上为细末，用薄荷汤打糊为丸，如麻子大。一岁小儿服十八丸，急惊，薄荷汤送下；慢惊，煎地龙汤送下。

【主治】 小儿急慢惊风。

01217 万金散

【方源】 《三因》卷十二。

【异名】 万金饮（《局方》卷六续添诸局经验秘方）。

【组成】 罂粟壳一两（赤用蜜炙；白不炙；赤白杂，半生半炙） 橘皮 甘草（并如上法）各一两

【用法】 上为散。每服四钱，以百沸汤七分盏，急用盏盖之，候温，澄清者服。

【功用】 《全国中药成药处方集》（沈阳方）：收敛止泻。

【主治】 ①《三因》：冷热痢。②《局方》（续添诸局经验秘方）：脾胃虚弱，内受风寒，或饮食生冷，伤于脾胃，呕吐泄泻，脐腹疠痛，胁肋胀满，肠内虚鸣；及肠胃受湿，脓血相杂，下如豆汁，或下瘀血，里急后重，日夜无度，饮食减少，渐至瘦弱者。

【加减】 血痢，加乌梅一个。

【宜忌】 《传信适用方》：切忌生冷、鱼腥。

01218 万金散

【方源】 《外科精要》卷上。

【异名】 内托散（《朱氏集验方》卷十二）。

【组成】 栝楼一个（杵细） 大甘草节二钱 没药一钱（研末）

【用法】 用酒二碗，煎一碗，去滓，入没药服。

【功用】 ①《外科精要》薛己注：消毒破血。②《杏苑》：排脓托里。

【主治】 ①《外科精要》：一切痈疽已溃未溃者。②《杏苑》：恶核肿痛，发脑、发颐、发背。

【备考】 《外科精要》薛己注：上散有消毒破血之功，无溃腐生肌之力。

01219 万金散

【方源】 《得效》卷七。

【组成】 槐花不拘多少。

【用法】 上为末。每服二钱，食后热酒调服。

【主治】 咯血。

01220 万金散

【方源】 《普济方》卷八十五。

【组成】 郁金一钱 荜茇 薄荷 甘草 道人头 细辛 盆消各二钱 蜈蚣一个 两头尖 青黛 川芎 雄黄各二钱 白芷 乳香各二钱 石膏半两 蝎梢半分 麻黄五分（烧存性）

【用法】 上为细末。口噙水，搐之。

【主治】 夹脑头风，一切眼疾。

01221 万金散

【方源】 方出《本草纲目》卷五十引《邵氏经验方》，名见《绛囊撮要》。

【组成】 猪胆五六个 黄连 青黛 薄荷 僵蚕 白矾 朴消各五钱

【用法】 腊月初一日取胆，将药装入胆内，青纸包固，挖地方、深各一尺，以竹棒横悬此胆在内，盖好，候至立春日取出，待风吹干，去胆皮膏纸，研末蜜收。每日吹少许。

【主治】 乳蛾，喉闭。

01222 万金散

【方源】 《外科理例·附方》。

【组成】 栝楼一个（全） 没药 乳香各一钱（研） 甘草节二钱

【用法】 先以栝楼、甘草用无灰酒二碗煎至一碗，去滓，入乳、没，不拘时候服。

【主治】 痈疽、恶核肿痛，发背等疮，不问已溃未溃。

01223 万金膏

【方源】 《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】 黄连 黄柏 黄芩 白及 白蔹 龙骨 当归（洗，焙） 厚朴（去粗皮） 川芎 没药（研） 槐枝 柳枝 猪牙皂角 鳖甲 苦参 香白芷 木鳖子仁 草乌头 乌贼鱼骨各一分（同锉碎） 乳香一钱（研） 黄丹一两半 清麻油四两（冬月用半斤）

【用法】 上除黄丹外，银、石器中将诸药油内慢火煎得油色紫赤，滤去药不用，入一半黄丹在油内，不住手搅，煎微黑，更入一半黄丹，不住手搅，只是用慢火熬得紫黑色，滴在水上不散，捻不粘手，然后更入黄丹少许，再熬，如捻着硬时，却更入油少许，但不粘手即止。如寻常膏药，摊在纸花上，看疮大小敷贴。

【主治】 ①《杨氏家藏方》：痈疽发背，及诸般恶疮。②《局方》（淳祐新添方）：从高坠堕，打扑伤损，脚膝生疮，远年臁疮，五般痔漏。

01224 万金膏

【方源】 《菊崖尊生》（致和堂本）卷十一。

【组成】 天冬八钱 杏仁 贝母 百部各四钱 紫菀一钱 冬花五钱 百合四钱

【用法】 水煎，味尽去滓，加饴糖八钱，蜜一两六钱，再熬；又入阿胶、茯苓末各四钱，入前汁，和匀如膏。不拘时挑服之。

【主治】 痨瘵。

【备考】 本方方名，原书三让堂本作"补金膏"。

01225 万金膏

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】 川羌活 正川芎 北细辛 淮木通 净麻黄 石菖蒲各一钱

【用法】 上为末。每次一钱，以蜜和匀，姜汤化服。

【主治】 小儿风热侵肺，鼻齆不闻香臭。

01226 万春膏

【方源】《理瀹》。

【组成】 桑枝 槐枝 柳枝各四斤 麻油四斤 生大黄一两半 白芷 当归 红花 防风 羌活 独活 生香附 南星 木瓜 佛手 乳香 没药 沉香 丁香 木香各八钱 白芥子二钱 肉桂五钱 麝一钱

【用法】 将桑、槐、柳枝入麻油内熬，以铅粉收膏，桃枝搅。余药研末，和入膏内，忌火。掺贴。

【主治】 肝胃气，痞块，癥瘕，鹤膝，疝气，脾虚泄泻，一切内症疼痛，跌扑闪挫，风气。

【加减】 如火衰泄泻，加硫黄；痞，加米炒斑蝥（去头足）。

【备考】 原书注云：原方有黄耆、川乌、牛膝、麻黄、茜草，无香附、木瓜、佛手，此从张刻本减，然原方力大。

01227 万胜散

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】 海带 海藻 海蛤 芫花（醋浸，炒） 甘遂 大戟 甜葶苈 樟柳根 续随子 巴戟（去心）各等分

【用法】 上为末。每服三钱至五钱，临卧温酒调下，一日二次。

【主治】 十种水气。

01228 万病丸

【方源】《产乳备要》。

【异名】 滋阴养血丸（《鸡峰》卷十六）、滋阴万病丸（原书冀致君注引《十便良方》）、内补丸（原书冀致君注引《郑汝明产经》）。

【组成】 熟干地黄 当归各四两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温粥饮送下。

【主治】 ①《产乳备要》：妇人久虚，血气衰少，怠惰嗜卧，饮食不进，肌体瘦悴，精神不足。②《鸡峰》：妇人劳虚血弱，肌肉枯燥，手足多烦，肢节酸疼，鬓发脱落，面少颜色，腹中拘急，痛引腰背，去血过多，崩伤内竭，胸中短气，昼夜不得眠，情思不乐，怔忡多汗；诸虚不足，腹胁疼痛，翕翕发热，及妇人经病，月事不调。

01229 万益丹

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】 滴乳香一两（去尽油） 没药一两（去尽油） 真血竭一两 明硼砂一两

【用法】 上为极细末。每用少许，吹入刀患。

【主治】 金刃所伤，血流不止。

01230 万应灵膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 当归 赤芍 川军 白及 白蔹 羌活 乌药 木鳖子 苦参 连翘 皂角 生地 防风 甘草 山柰 五灵脂 半夏各一两 槐 柳 桃 枣 桑枝各一两

【用法】 麻油五斤，入药煎枯去渣，下净血余二两，烊化，再入炒过广丹二斤，熬成膏，入后细料药：细辛、附子、良姜、官桂、乳香、没药、丁香、甲片、洋樟、川草乌、阿魏各一两，麝香一钱，研末，调入膏内。红布摊贴。

【主治】 筋骨疼痛，跌打损伤，一切泻痢，妇人赤白带下，肚痛。

01231 万氏润燥膏

【方源】《金鉴》卷六十六。

【组成】 猪脂一斤（切碎，炼油，去滓） 白蜜一斤（炼）

【用法】 搅匀候凝。挑服二匙，每日三五次。

【功用】 降火清金。

【主治】 阴虚喉痛，失音，大便干。

01232 万全茯苓散

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】 赤茯苓（去黑皮） 黄连（去须） 阿胶（炙燥） 黄柏（去粗皮）各等分

【用法】 上为散。每服二钱匕，空腹甘草汤调下，日二次。以愈为度。如三岁以下小儿，每服半钱匕，五岁至十岁，每服一钱匕。

【主治】 赤白痢。

01233 万全逍遥散

【方源】《济阴纲目》卷四。

【组成】 人参 黄耆 白术 白茯苓（去皮）

柴胡（去苗）各等分

【用法】 上为散。每服三钱，加甘草一寸同煎，温服。

【主治】 血风劳。五心烦躁，心多怔忡，恍惚忧惧，头目昏重，夜多盗汗。

01234 万寿地芝丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 生姜四两（焙） 天门冬四两（去心） 枳壳二两（去瓤，炒） 甘菊二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，食后用茶清或温酒送下。

【功用】 能愈大风热。

【主治】 目能近视，不能远视。

01235 万应午时茶

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】 川厚朴（炙） 砂仁 桔梗 羌活 干葛 香薷 茵陈 白芍药 枳壳 黄芩（酒炒） 木瓜 防风 陈皮 苏叶 白芷 大腹皮 青蒿 茯苓各一两 麦芽（炒焦） 苍术（米泔浸） 扁豆 藿香 山楂（炒焦） 滑石（飞）各二两 薄荷 甘草 川黄连（酒炒）各五钱 陈红茶八两

【用法】 生晒共研为末，面糊为块。每服一二块，清水煎，温服。

【功用】 辟暑止渴，开胃进食。

【主治】 内伤饮食，外感风寒暑湿，寒热交作，霍乱吐泻，胸膈膨胀，头疼骨痛，腹痛便泻，或酒湿伤脾，倦怠恶食，及一切山岚瘴气，时疫传染，疟疾痢疾，不服水土。

【加减】 若风寒太甚，鼻流清涕，发热不休，加生姜三片，生葱二根，同煎热服，盖被取汗。

01236 万应吹喉散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 牛黄一钱 珍珠一钱 灯草炭三钱 梅片一钱 黄柏三钱 甘草三钱 血竭三钱 乳香五分 朱砂一钱 儿茶五钱 白芷二钱 薄荷七钱 青黛三钱

【用法】 上为细末，和匀。吹患处。

【主治】 喉痹、喉风、乳蛾、喉痈、阴虚咽痛。

01237 万应抵金散

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】 罂粟壳二钱（蜜炙） 萝卜子一钱半 黑豆一钱半（炒） 石榴皮二钱 甘草一钱

【用法】 上锉细。用水二钟，煎至八分，空心服。一方用白酒煎。

【主治】 久痢诸药不效者。

01238 万应宝珍膏

【方源】《中国医学大辞典》。

【异名】 内伤膏药、万应内伤膏、万应太乙膏、万应红毛膏（《全国中药成药处方集》南京方）。

【组成】 生地黄 茅术 枳壳 五加皮 莪术 桃仁 山柰 当归 川乌 陈皮 乌药 三棱 川军 何首乌 草乌 柴胡 防风 刘寄奴 牙皂 川芎 官桂 羌活 威灵仙 赤芍药 天南星 香附 荆芥 白芷 海风藤 藁本 川续断 高良姜 独活 麻黄（去节） 甘松 连翘各三钱

【用法】 用麻油四斤，入药煎枯，滤去滓，下净血余二两溶化，再下佛丹三十两，熬成膏，再下肉桂、麝香（后下）各一钱，附子片、木香各二钱，冰片、洋樟、茴香、乳香、没药、阿魏、细辛各三钱，共研细末，搅入膏内，退火摊匀。五劳七伤，筋骨疼痛，负重伤力，腰膝酸软，贴两膏肓穴及两肾俞穴；左瘫右痪，手足麻木，率急偏枯，满肩疼痛，贴两肩井穴、两曲池穴、两手腕穴、两膝眼穴；心胃气痛，肚腹饱胀，贴膻中穴及中脘穴；鼻塞脑漏，偏正头风，贴太阳穴及风门穴；冷哮咳嗽，痰鸣气急，贴肺俞穴及膻中穴；遗精、滑精、淋浊，贴丹田穴及俞门穴；月经不调，赤白带下，贴关元穴及尾闾穴；满身走气，闪挫疼痛，贴章门穴；寒湿脚气，鹤膝酸软，贴膝眼穴；小肠疝气，偏坠木子，贴气海穴；脾虚泄泻，久泻痢疾，受寒腹痛，贴腹脐穴；一切跌打损伤，风湿积聚，瘰疬流注，各贴患处。

【功用】《全国中药成药处方集》（南京方）：舒筋活络，消肿止痛。

【主治】 五劳七伤，筋骨疼痛，左瘫右痪，手足麻木；心胃气痛，肚腹饱胀，鼻塞脑漏，偏正头风，冷哮咳嗽，痰鸣气急；月经不调，赤白带下；寒湿脚气，鹤膝酸软；小肠疝气，偏坠木子；脾虚泄泻，久泻痢疾；跌打损伤，瘰疬流注。

01239 万应保胎丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】 于术三两 延胡索 黄芩 香附 益母 红花各一两 茯苓二两 没药三钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，熟汤送下。

【主治】 妊娠气血虚弱，不能滋养胎元，致腹痛经漏，或至小产。

01240 万应紫金膏

【方源】《回春》卷八。

【组成】 沥青二斤半 威灵仙二两 蓖麻子一百

粒（去壳，研） 木鳖子二十八个（去壳，研烂） 乳香一两（箬箬炙，为末） 没药一两（为末） 黄蜡二两 生姜一斤（捣汁一碗） 麻油夏二两，春、秋三两，冬四两（先同灵仙熬，去渣，滴水不散为度）

【用法】 上将沥青研末，同二汁下锅熬化，看二汁尽时，却起火，桃、柳条不住手搅匀，却入前灵仙油同熬，再下木鳖子、蓖麻子捣匀入内搅，又下乳、没、黄蜡再搅，即成膏矣。每用好厚绢纸摊贴，先将姜擦患处，后贴上，即用烘热鞋底熨之。泻痢，贴丹田；咳嗽、吐血，贴背心；心疼，贴心上。

【主治】 跌扑伤损，手足肩背并寒湿脚气风毒，痛不可忍；泻痢，咳嗽、吐血，心疼。

01241 万应紫金膏

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】 赤芍 当归 红花 黄芩 连翘 黄柏 僵蚕 蝉退 白芷 甘草 胎发 大黄 银花 蜈蚣 川乌 草乌 羌活 苍术 细辛 川椒 秦艽 乳香 没药 骨碎补 首乌 蛇床子 木鳖子 大风子 生南星 生半夏各五钱

【用法】 用猪油、麻油、桐油各半斤，将前药浸入油内，如春、夏天浸三日，秋、冬浸七日，倾入铜器内，文武火熬至药色焦黑，取起滤渣，再熬，加炒黄丹十两，用槐枝不住手搅动，熬至滴水成珠，再加白蜡五钱，随即起取，用槐枝搅匀，收入瓦罐，浸水中，拔去火毒，用时以布摊贴。哮吼喘嗽贴心窝，泻痢贴脐眼，余俱贴患处。

【主治】 男妇大小瘰疬痰疬，对口发背，乳痈，鱼口便毒，臁疮热疖，手足腰背疼痛，闪挫伤损，及一切无名肿毒，哮吼喘嗽，泻痢。

【备考】《寿世新编》有防风、荆芥。

01242 万应愈风酒

【方源】《中国医学大辞典》引越人氏方。

【组成】 金毛狗脊（炙，去毛） 川牛膝 海风藤 广木香 川桂枝 左秦艽 大熟地 补骨脂 川杜仲 千年健 追地风 藏红花 枸杞子 肥玉竹 西羌活 独活 生川乌 官桂 黄耆 党参 肉桂 明天麻 黄皮 女贞子 淡附子各一两 威灵仙 全当归 油松节 野桑枝（切）各四两 红曲五钱 大枣 赤沙糖各一斤 白蜜糖八两 桂元肉 鹿角胶（炖）各二两

【用法】 装入夏布袋内，先用陈酒五斤，将药袋炖透，再合烧酒二十五斤，共装入坛内，加香味封固，待半月后取用。轻者每服二三斤即愈，重者不过六七斤断根。

【主治】 气血虚损，感受风湿，手足酸麻，腰膝百节疼痛，甚至半身不遂，口眼㖞斜，及一切远近风证。

01243 万灵黑虎丹

【方源】《中国医学大辞典》引马氏方。

【组成】 蜈蚣（烘） 全蝎（烘） 僵蚕（炙）各七条 穿山甲（炙）七片 磁石（飞） 公丁香（炒） 母丁香（炒） 元寸香 冰片各一钱

【用法】 上为极细末，收入小口瓶，勿令泄气。每用少许，掺膏药上贴之。初起即消，已成即溃，已溃即敛。

【功用】 提毒拔脓，消肿止痛。

【主治】 痈疽，发背，对口。

01244 万金水澄膏

【方源】《疡科选粹》卷八

【组成】 乳香 没药（用灯心捻去油） 广木香（不见火）各三钱 轻粉一钱 雄黄 辰砂各四钱（以上俱另为末） 白及八两 黄药子二两 乌骨鸡骨二钱六分（要白毛乌骨乌肉的一只，生刮去腿肉，用腿骨晒，称如前数，以火煅存性，另研和内，不许煮熟用之）

【用法】 上为末，用冷井水半钟，以药少许调化，候药澄钟底，随以钟内余水滤去听用。将底药敷红肿处，空一顶，再用棉纸贴于顶，纸穿一孔，以败毒气；候纸干，将前药水浸润纸外，勿令干，病轻每日二次，病重日夜三四次。

【主治】 一切无名肿毒，发背，痈疽已溃、未溃。

01245 万病无忧膏

【方源】《回春》卷八。

【异名】 万应膏（《奇方类编》卷下）。

【组成】 川乌 草乌 大黄各六钱 当归 赤芍 白芷 连翘 白蔹 白及 乌药 官桂 木鳖子各八钱 槐 桃 柳 桑 枣枝各四钱 苦参 皂角各五钱（一方加苏合香二钱）

【用法】 上锉，用真香油二斤浸药一宿，用火熬至药焦色，以生绢滤去滓不用，将油再熬一滚，入飞过黄丹十二两炒过，陆续下，槐柳棍搅不住手，滴水成珠为度。离火，次入乳香、没药末各四钱，搅匀收贮，退火毒听用。治跌扑闪挫伤损，一切疼痛，心腹痛，俱贴患处；哮吼喘嗽，贴背心；泻痢，贴脐上；头痛、眼痛，贴太阳穴；无名肿痛、痈疽发背、疔疮疖毒、流注湿毒、臁疮，初觉痛痒，便贴患处即消。

【功用】 止痛箍脓，长肉生肌。

01246 万病黄精丸

【方源】《济阳纲目》卷六十八。

【组成】 黄精十斤（净洗、蒸令烂熟） 天门冬（去心，蒸烂熟） 白蜜各二斤

【用法】 上药于石臼内捣一万杵，再分为四剂，每一剂再捣一万杵为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，一日三次，不拘时候。

【功用】 延年益气。

01247 万病紫菀丸

【方源】《元戎》。

【异名】 万应紫菀丸(《奇效良方》卷六十三)。

【组成】 紫菀（去苗土） 吴茱萸（汤洗七次，焙干） 菖蒲 柴胡（去须） 厚朴（姜制）各一两 桔梗（去芦） 茯苓（去皮） 皂荚（去皮弦子等，炙） 桂枝 干姜（炮） 黄连（去须）八钱 蜀椒（去目及闭口，微炒） 巴豆（去皮膜，出油，研） 人参（去芦）各半两 川乌（炮，去皮脐）三钱 羌活 独活 防风各半两

【用法】 上为细末，入巴豆匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，渐加至五七丸，食后、临卧生姜汤送下。具引子后：痔漏肠风，酒送下；赤白痢，诃子汤送下；脓血痢，米饮汤送下；坠伤血闷，四肢不收，酒送下；蛔虫咬心，槟榔汤送下；气噎忧噎，荷叶汤送下；打扑伤损，酒中毒，骨灰、甘草汤送下；一切风，升麻汤送下；寸白虫，槟榔汤送下；霍乱，干姜汤送下；咳嗽，杏仁汤送下；腰肾痛，豆淋汤送下；阴毒伤寒，温酒送下；吐逆，生姜汤送下；食饮气块，面汤送下；时气，井花水送下；脾风，陈皮汤送下；头痛，水送下；心痛，温酒送下，大小便不通，灯草汤送下；因物所伤，以本物汤送下；吐水，梨汤送下；气病，干姜汤送下；小儿天风钩搐，防风汤送下，防已亦可；小儿疳痢，葱白汤送下；小儿乳食伤，白汤送下；月信不通，煎红花酒送下；妇人腹痛，川芎汤送下；怀孕半年后胎漏，艾汤送下；有子气冲心，酒送下；产晕痛，温酒送下；血气痛，当归酒送下；产后心痛、腹胀满，豆淋汤送下；难产，益智汤送下；产后血痢，当归汤送下；赤白带下，酒煎艾汤送下；解内伤伤寒，粥饮送下；室女血气不通，酒送下；子死，葵子汤送下。

【主治】 久患痃癖如碗大，及诸黄病，每地气起时，上气冲心，绕脐绞痛，一切虫咬，十种虫痛，十种蛊病，及胃冷吐令，呕逆恶心，饮食不消，天行时病，妇人多年月露不通，或腹如怀孕多血，天阴即发；十二种风，顽痹不知年岁，昼夜不安，梦与鬼交，头多白屑，或哭或笑，如鬼魅所着，腹中生疮。

【宜忌】 初有孕者不宜服。

【临证举例】 ①风气冲心 杨驸马患风气冲心，饮食吐逆，遍身枯瘦，日服五丸至七丸，服至二十日，泻出肉块如虾蟆五六枚，白脓二升，愈。②呕吐 赵侍郎先食后吐，目无所见，耳无所闻，服五十日，泻出青蛇五七条，长四寸许，恶脓三升，愈。③麻风 王氏患大风病，眉发堕落，掌内生疮，服之半月，泻出癞虫二升，如马尾，长寸许，后愈。④肥气 李灵患肥气病，日服五丸，经一月，泻出肉鳖二枚，愈。⑤中风 黄门卒中风，病发时服药，泄出恶脓四升，赤黄水一升，一两虫如乱发，愈。⑥血崩 李知府妻梅氏，带下病七年，血崩不止，骨瘦着床，日服五丸至十丸、十五丸，取下脓血五升，黄水一升，肉块如鸡子大，愈。

01248 万山观芦吸散

【方源】《医统》卷四十四。

【组成】 款冬花三钱 鹅管石 佛耳草各二钱 枯矾五分 甘草（炙）一钱半 官桂一钱

【用法】 上为细末。每服一钱，竹筒吸入喉内，日夜三服。

【功用】 止嗽。

【主治】 男妇一切风寒咳嗽喘急。

01249 万灵至宝仙酒

【方源】《医部全录》卷三三三引《身经通考》。

【组成】 淫羊藿（酒洗净，剪碎）十两 列当（如无，以肉苁蓉代之） 仙茅（糯米泔浸一宿，竹刀削去粗皮黑顶）各四两 雄黄（研） 黄柏（去粗皮） 知母（去尾）各二两 当归（酒洗，浸）八两

【用法】 上㕮咀，无灰酒十五斤，装入瓶内封固，桑柴文武悬煮三小时，埋地内三昼夜，去火毒取出，待七日将药捞出，晒干为细末，糯米粉打糊为丸，如梧桐子大。酒药同服，仍以干物压之。此酒用银壶或瓷壶重汤煮热服。酒后不可妄泻，待时而动，少则三月，多则半年，精泻胞成，屡试屡验。

【功用】 生精益肾，助阳补阴。

【主治】 肾阴阳亏虚，阳萎不举，妇人赤白带下，月水不调，肚冷脐痛，不孕。

【宜忌】 忌牛肉、铁器。宜阴脏人。

01250 万金不易妙灵丹

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】 生甘草四钱（秋、冬用五钱） 大黄六

钱（秋、冬用五钱） 黑丑 白丑 槟榔各一两二钱 白雷丸五钱

【用法】 上为细末。每服二钱，临卧时沙糖汤调下。翌晨利下积物。

【主治】 喜食生米、茶炭、瓦泥之物，及酒积气块心痛，小儿疳胀食积。

01251 寸气丸

【方源】《普济方》卷一九二。

【组成】 大蒜五枚（锉，去皮，碎） 附子一大只（去脐，切） 赤小豆（拣）五两

【用法】 上同于砂锅中，先用水三升，渐添至五升，煮取二为度，只取附子为末，余不用，却入后药：白花商陆根半两，车前子二钱半，沉香二钱，木香三钱。上件同附子、薏苡仁末，煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心薏苡仁汤送上，一日三次。

【主治】 脾肾气虚，肾水流溢，四肢作肿。

01252 寸金丸

【方源】《直指》卷十八。

【组成】 当归 延胡索 舶上茴香（炒） 胡芦巴（炒）各一两 桃仁（浸，去皮，焙） 桑螵蛸（酒蒸，焙） 川五灵脂（别研） 白芍药 川楝肉各半两 荜澄茄 木香二钱半 全蝎十个（焙）

【用法】 上为末，米醋打面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，少量盐水酒送下。有热，小便秘，车前子、赤茯苓煎汤送下。

【主治】 奔豚，诸疝作痛。

01253 寸金丹

【方源】《普济方》卷四十六。

【组成】 川芎 乌头 甘草 荆芥 薄荷各等分

【用法】 上为末，酒打面糊为丸，如皂子大。每服一丸，食后细嚼，茶清送下。

【主治】 头风，偏正头风。

01254 寸金散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】 鸡子壳十个（生却子者） 槟榔一枚 麝香（研） 腻粉各半钱 黄柏（去粗皮） 密陀僧各一钱

【用法】 上为散。用温盐浆水洗疮，干贴。

【主治】 恶疮久不效。

01255 寸金散

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】 天花粉三两 赤芍 白芷 姜黄 白及 芙蓉叶各一两

【用法】 上为细末。每用姜汁二分，凉茶七分，未破敷头，已破敷四傍，留顶。

【主治】 痈疽肿毒。

01256 上丹

【方源】《元和纪用经》。

【组成】 五味子半斤 百部（酒宿浸，焙） 玉女（即菟丝子，酒宿浸，焙） 苁蓉（酒宿浸） 思仙木（即杜仲，炒） 不凋草（即巴戟，去心） 细草（即远志，去心） 仙人杖（即枸杞子） 防风（无叉枝者） 白茯苓 思益（即蛇床子，炒） 柏子仁 （另研） 干薯蓣各二两

【用法】 上为末，蜜煎面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食前温酒送下；不饮者，盐汤送下；春，干枣汤送下。

【功用】 养五脏，补不足，秘固真元，均调二气，和畅荣卫，保神守中；久服轻身耐劳，健力能食，明目，降心火，交肾水，益精气，开心臆，安魂魄，消饮食，养胃和中。

【主治】 男子绝阳，庶事不堪，女子绝阴，乃不能妊。腰膝重痛，筋骨衰败，面黑，心劳志昏，寤寐恍惚，烦懊多倦，余沥梦遗，膀胱邪气，五劳七伤，肌肉羸悴，上热下冷。

【宜忌】 不犯金、石、桂、附。

【加减】 夏，五味子加四两，通称十二两；四季，苁蓉加六两，通称半斤，各十八日四立之前也；秋，仙人杖加六两；冬，细草加六两；戊寅、戊申相火司天，中见火运，饭后兼饵养肺平热药。

【备考】 本方为原书“耘苗丹”之第一方。

01257 上马丸

【方源】《普济方》卷一一八。

【组成】 川乌（炮） 木香半两（不见火） 虎骨（酥炙） 牛膝 杜仲 木瓜 当归（酒浸） 败龟版（酥炙） 自然铜（醋淬） 黄耆（蜜炙） 白术各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，温酒送下。

【主治】 寒湿臂痛，腿脚疼，筋骨诸疾。

01258 上清丸

【方源】《奇效良方》卷六十一。

【组成】 薄荷一斤 川芎 防风各二两 桔梗五两 砂仁半两 甘草四两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如皂角子大。每服一丸，不拘时候噙化。

【主治】 咽喉肿痛，痰涎壅盛。

01259 上清丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十一。

【组成】 百药煎 薄荷（净末）各四两 缩砂仁一两 片脑一钱 玄明粉 甘松 桔梗 诃子 硼砂各五钱 寒水石一两

【用法】 上为细末，甘草熬膏为丸，如梧桐子大。每服一丸，噙化；或嚼三五丸，茶汤送下。

【功用】 清声润肺，宽膈化痰，爽气宁神。

【主治】 口舌生疮，咽喉肿痛，咳嗽烦热。

01260 上清丸

【方源】《医统》卷六十五。

【组成】 苏州薄荷叶一斤 百药煎半斤 砂仁一两 硼砂二两 冰片二钱 桔梗一两 甘草 玄明粉 诃子各半两

【用法】 上为极细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，临睡噙化；或为小丸，茶清送下亦可。

【功用】 止嗽、清音、润肺，宽膈利气。

【主治】 口舌生疮，咽喉肿痛，咳嗽。

01261 上清丸

【方源】《便览》卷一。

【组成】 玄参五钱 乌梅三个 薄荷叶一斤 川芎 防风各二两 桔梗五钱 砂仁五钱 甘草四两（一方加硼砂五钱）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。噙化。

【主治】 咽喉肿痛，痰涎壅盛、堵塞。

01262 上清丸

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】 龙脑二分（另研） 硼砂二分（另研） 薄荷末一两 川芎末五钱 桔梗末二钱 甘草末二钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，临卧噙化；或食后茶清咽下。

【主治】 心脾有热，上焦痰火咳嗽。

01263 上清丸

【方源】《异授眼科》。

【组成】 羚羊角（镑）一两 犀角（镑）一两 牛黄五钱 琥珀三钱 厚朴（姜汁炒）一两 黄芩（酒炒）一两 川芎五钱 白芷五钱 菊花八钱 防风八钱 羌活八钱 草决明一两 生地七钱 熟地七钱 防己八钱 黑牵牛八钱 蝉蜕（去头足）七钱 地肤子（炒）一两 滑石一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后服。并用虎液膏点眼。

【主治】 风热上攻，目有昏花，迎风流泪，怕日羞明。

01264 上清汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 通气防风汤（《东垣试效方》卷二）、上清散（《准绳·类方》卷二）。

【组成】 人参 蔓荆子各五分 防风一钱 葛根一钱五分 黄芪三钱 甘草四钱

【用法】 上㕮咀，分作二服。水二盏，煎至一盏，去滓，临卧热服。以夹衣盖覆，不语，须臾汗出为效。

【功用】 清利头目，宽快胸膈。

【主治】《准绳·类方》：痞而头目不清。

01265 上清散

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】 川芎 郁金 芍药 荆芥穗 薄荷叶 芒消各半两 乳香 没药各一钱 脑子半钱

【用法】 上为细末。每用一字，搐鼻内。

【主治】 因风所致头痛、眉骨痛、眼痛。

01266 上下甲丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷三，名见《医学入门》卷七。

【组成】 鳖甲 龟版各一两 侧柏 瓜蒌子 半夏 黄连 黄芩 炒柏

【用法】 上为末，炊饼为丸服。

【主治】 劳热，食积，痰。

【备考】 方中诸药，《医学入门》用各五钱，并云：鳖甲、龟版善治阴虚食积发热。

01267 上品锭子

【方源】《外科发挥》卷五。

【组成】 白明矾二两 白砒一两零五分 乳香三钱五分 没药三钱五分 牛黄三钱

【用法】 先将砒末入紫泥罐内，次用矾末盖之，以炭火煅令烟尽，取出研极细末，用糯米糊和为挺子，状如线香，阴干。纤疮内三四次，年深者五六次，其根自腐溃。如疮露在外，更用蜜水调搽，干上亦可。

【主治】 十八种痔。

【备考】 本方为原书“三品锭子”之第一方。

01268 上清饮子

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】 灯心 通草各六分 车前子 泽泻 瞿麦 琥珀 扁蓄各八分 茯苓 猪苓各一钱 木通八分

【用法】 上㕮咀。水煎，空心热服。

【主治】 邪热在上焦气分，渴而小便闭涩不利。

01269 上下清凉散

【方源】《会约》卷七。

【组成】 黄芩二三钱 麦冬 白芍 甘草 栀子

各一钱五分

【用法】 热服。

【主治】 实热腹痛，发热口干，便燥，火焰，腹痛，脉洪数而有力。

【加减】 如口渴喜冷，加生石膏二三钱；如大便闭结，加大黄一二钱，不效，再加芒消二三钱，所谓通则不痛也；如气逆而痛，加木香五分，乌药一钱；如小便赤涩，加泽泻一钱；如咽干燥，加元参一钱半；如血热妄行，加生地、青蒿、知母、黄柏之类。

01270 上宫清化丸

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】 黄连（去毛）六钱 桔梗（去芦）六钱 山豆根四钱 粉草四钱 薄荷叶一钱 白硼砂六分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。时常噙化。

【主治】 喉痹。积热上攻，痰涎壅塞，喉痛声哑，肿痛难禁。

01271 上痛光明汤

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】 青葙子 密蒙花 龙胆草 甘菊花 地骨皮 一寸金 金鸡舌 天荞麦 藤鸡辰

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 拳毛倒睫。

01272 上清白附子丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】 白附子（炮） 半夏（汤洗七次） 川芎 天南星（炮） 白僵蚕（炒） 菊花 陈皮（去白） 旋覆花 天麻各一两 全蝎（炒）半两

【用法】 上为细末，生姜汁浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后生姜汤送下。

【功用】 常服除风化痰，清利头目。

【主治】 诸风痰甚，头痛目眩，旋晕欲倒，呕哕恶心，恍惚不宁，神思昏懵，肢体倦疼，颈项强硬，手足麻痹。

01273 口疮汤

【方源】《外台》卷二十二引《古今录验》。

【组成】 细辛 甘草 桂心各三两

【用法】 上切。以酒一升，煮取六合，含之。

【主治】 口疮。

01274 口糜散

【方源】《医方考》卷五。

【组成】 黄柏 黄连各一两 雄黄 没药各二钱 片脑五分

【用法】 上为细末。每用分许，着于疮上良。

【主治】 口疮糜烂者。

【方论选录】 口糜本于湿热，湿热不去，必至疳蚀。寒可以胜热，苦可以坚肤，故用黄连、黄柏；雄黄之悍，杀虫而利气；冰脑之窜，杀虫而入膝；没药之苦，散血而愈疮。

01275 口糜散

【方源】《摄生秘剖》卷三。

【组成】 薄荷叶六分 川黄柏 青黛（水飞）各四分 白硼砂三分 朱砂（水飞）二分 冰片（另研）一分

【用法】 上为细末，用小瓷罐密封收贮。每取少许，着于疮上，良。

【主治】 口疮糜烂。

【方论选录】 口疮本于湿热，湿热不去，必至疳蚀。寒可以胜热，苦可以坚肤，故用薄荷、黄柏、青黛、白硼砂苦寒之品；乃朱砂者，令其解热毒也；冰片者，令其散热结也。湿热既蠲，而口糜自愈矣。

01276 山甲散

【方源】《医级》卷九。

【组成】 山甲 通草 橘叶 蒌仁 荆子 麦芽 公英 钩藤 王不留行

【功用】 通壅滞。

【主治】 妇人肝胃热邪壅滞，致患内吹、外吹，寒热，胀痛热肿，势欲成痈者。

01277 山芋丸

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】 山芋 酸枣仁（微炒）各一两 柏子仁（研） 茯神（去木） 山茱萸各三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，米饮亦得，不拘时候。

【主治】 胆虚冷，精神不守，寝卧不宁，头目昏眩，恐畏不能独处。

01278 山芋丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】 山芋 熟干地黄（焙） 黄耆（锉）各一两 菖蒲半两 远志（去心）一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒或米饮送下，不拘时候。

【主治】 心脏气虚，恐怖惊悸，恍惚健忘，烦闷羸瘦。

01279 山芋丸

【方源】《圣济总录》卷一十四。

【组成】 山芋 熟干地黄（切，焙） 磁石（煅，醋淬七遍） 菊花（微炒） 黄耆（锉） 茯神（去

木） 木通（锉）各一两 升麻 独活（去芦头）各三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下；渐加至三十丸。

【主治】 耳聋，耳鸣。

01280 山芋汤

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】 山芋 牛干地黄（焙） 防风（去叉，锉） 茯神（去木） 山茱萸（炒） 桂（去粗皮） 天雄（炮裂，去皮脐） 远志（去心） 细辛（去苗叶） 枳实（麸炒，去瓤） 甘菊花各一两 甘草（炙，锉）三分

【用法】 上药锉细，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】 煎厥。动作烦劳，阳气张大，肝精不守，善怒少气，头目昏愦。

01281 山芋散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】 山芋 甘草（炙，锉） 五味子 甘菊花（择）各半两 细辛（去苗叶） 山茱萸 升麻 蔓荆实各三分 防风（去叉）一两

【用法】 上为细散。每服三钱匕，空心温酒调下。

【主治】 头风目眩，眼痛耳聋。

01282 山芋散

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】 山芋 防风（去叉） 细辛（去苗叶）各一两 山茱萸 蔓荆实（去白皮）各三分 芍药 升麻各半两

【用法】 上为散。每服二钱匕，温酒调下。

【主治】 肝虚血弱，风邪毒气，乘虚客搏，眼轮昏浊，黑白不明，发为目晕。

01283 山虎汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 蛤蚧尾一对（酒洗） 生地四钱（切片，蛤粉炒） 沉香五分 破故纸一钱五分（核桃肉拌炒） 人参二钱 沙参四钱 茯苓二钱 山药三钱 贝母二钱 杏仁三钱 麦冬一钱五分

【用法】 煎汤，加人乳半杯，姜汁两滴，同冲服。

【主治】 肾经之咳，或呛或喘，痰味咸而有黑花。

01284 山药丸

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 山药 菟丝子（洗净，酒浸一宿，研成饼） 附子（炮，去皮脐） 韭菜子（炒） 肉桂（去粗皮，不见火） 五味子（去枝） 牛膝（去芦） 白茯苓（去皮） 金钗石斛（酒浸）各一两 肉苁蓉三两（酒浸，去皱皮） 熟干地黄二两（洗） 白龙骨一两半（煅，别研） 山茱萸（去核） 牡丹皮 车前子各三分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】 虚劳，肾脏衰弱，小便白浊，腿膝无力。

01285 山药丸

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】 干山药 牛膝（酒浸一宿，焙干）各一两半 苁蓉（酒浸一宿，焙干） 石菖蒲 巴戟（去心） 褚实 山茱萸 五味子 远志（去白） 白茯苓（去皮） 杜仲（去皮，姜汁涂、炙） 枸杞子 茴香（盐炒）各一两 熟地黄半两

【用法】 上为细末，蜜同枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒或盐汤送下，一日三次。

【功用】 大补心肾脾胃。服后五日有力，十日精神爽健，半月气稍盛，二十日明目，一月夜思饮食，冬月手常温；久服令人身轻体健，筋力壮盛，怡光难老；常服齿牢，永无瘴疟；妇人服之，滋养荣光。

【主治】 一切虚损，神志俱耗，筋力顿衰，腰脚沉重，身体倦怠，血气俱乏，小便浑浊。

【加减】 如身热，加山栀子一两；心气不宁，加麦门冬三两；精神短少，加五味子一两；阳弱，加续断一两。

01286 山药丸

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】 杜仲八两（糯米煎汤浸透，炒，为末） 续断二两（酒浸，焙干，为末） 山药五两（为末）

【用法】 以山药末打糊为丸。空心米汤送下。

【主治】 频惯堕胎，三四月即堕者。

01287 山药汤

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】 山药半两（炒） 白术半两（炒） 粟米一分（略炒） 木香一钱（湿纸裹煨） 人参（去芦）半两 甘草一钱（炙）

【用法】 上为细末。每服二钱，水半盏，加陈紫苏一大叶，同煎至一半，去滓，食前温服。

【主治】 脾胃怯弱，不喜饮食。

01288 山药粥

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】羊肉一斤（去脂膜，烂煮熟，研泥）山药一斤（煮熟，研泥）

【用法】上药入肉汤内，下米三合，煮粥。空腹食之。

【主治】虚劳骨蒸，久冷。

01289 山鹿丸

【方源】《不居集》上集卷十四。

【组成】山药一两　鹿角五钱　发灰二钱

【用法】上为末，芒根捣汁，打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸。

【主治】房室劳伤，小便出血。

01290 山楂粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】山楂 3040 克（或鲜山楂 60 克）　粳米 60 克　沙糖 10 克

【用法】先用山楂入砂锅煎取浓汁，去滓，然后加入粳米，沙糖煮粥。山楂粥酸甜，可作上、下午点心服用，不宜空腹食，以 7～10 天为一疗程。

【功用】健脾胃，消食积，散瘀血。

【主治】食积停滞，肉积不消，腹痛，便泻；妇女产后瘀血痛，恶露不尽，月经过期不通，痛经；小儿乳食不消；以及高血压，冠心痛，冠状动脉供血不足，心绞痛，高血脂症。

【宜忌】慢性脾胃虚弱的病人不宜食用。

01291 山精丸

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】术一斗（净刮去皮，洗控令浥浥，细锉）

【用法】上为末，以清酒二升，净瓮中浸之，一日一夜，绞去滓，纳铜器中，入釜以重汤煮之，又入白蜜一斤，阿胶四两煎之，搅令相得，候如膏即丸，如弹子大，放干，盛不津器中。每服一丸，细嚼酒下，一日三次。

【功用】久服面体光泽，百病除去，轻身延年。

01292 山薯面

【方源】《臞仙活人方》。

【组成】山薯

【用法】去皮，薄切，日中晒干，捱为末，筛。如常面食之。加酥蜜为醇面尤精。

【功用】补养。

01293 山鞠散

【方源】方出《本草纲目》卷十二引《夏子益奇疾方》，名见《串雅内编》卷四。

【组成】芎藭　当归各一斤

【用法】以半斤锉散，入瓦器内，用水煎浓，不拘多少，频服。仍以一斤半锉块，于病人桌下烧烟，令将口鼻吸烟；用尽未愈，再作一料。仍以蓖麻子一粒，贴其顶心。

【主治】产后乳悬。妇人产后两乳忽长，细小如肠，重过小肚，痛不可忍，危亡须臾。

01294 山白草丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】山豆根 90 克　白鲜皮 90 克　草河车 90 克　夏枯草 45 克　鱼腥草 90 克　炒三棱 45 克　炒莪术 45 克　王不留行 45 克　大青叶 45 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重 6 克。每服三丸，开水送下，一日二次。

【功用】清热解毒，散风软坚。

【主治】银屑病静止期皮损较厚者。

01295 山豆根丸

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】山豆根一两　北大黄　川升麻　朴消（生）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如皂子大。每一丸以薄绵包，少痛便含，咽液。

【主治】积热，咽喉闭塞肿痛。

01296 山豆根汤

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】射干　麦冬　花粉　甘草　玄参　山豆根

【主治】肉蛾。太阳少阴之火，为风寒壅遏，关隘不通，留连咽喉发肿，痰涎稠浊，疼痛难堪。

01297 山豆根汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】山豆根二分　射干二分　猪牙皂角二分　杏仁（去皮尖）十粒

【用法】煎浓汁含漱，稍稍咽之。

【主治】喉痹。

【方论选录】山豆根降泻心火，主治喉痛；射干去君相二火，散血消肿，除痰结核；猪牙皂辛咸，行肝木之郁，散心火之结，荡除秽浊，破肿消坚，涌吐痰涎，通关利窍；杏仁降逆气，破坚，润心肺。

01298 山栀子汤

【方源】《鸡峰》卷十八。

【异名】五淋散（《局方》卷六宝庆新增方）、五淋汤（《医学实在易》卷七）。

【组成】当归　芍药（赤者）　茯苓（赤者）　甘

草 山栀子各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，煎至八分，温服。

【主治】 ①《鸡峰》：五淋及血淋。②《局方》（宝庆新增方）：肾气不足，膀胱有热，水道不通，淋沥不宣，出少起多，脐腹急痛，蓄作有时，劳倦即发，或尿如豆汁，或如砂石，或冷淋如膏，或热淋便血。

【方论选录】《医学实在易》：此方用栀、苓治心腹，以通上焦之气，而心火清；归、芍滋肝肾，以安下焦之气，而五脏阴复；甘草调中焦之气，而阴阳分清，则太阳之气化，而膀胱之府洁矣。

01299 山栀子散

【方源】《本事》卷五

【组成】 山栀子不拘多少（烧存性）

【用法】 上为末。搐入鼻中。

【主治】 衄血。

【临证举例】 衄血 蔡子渥传云：同官无锡监酒赵无疵，其足衄血甚，已死，入殓血尚未止，偶一道人过门，闻其家哭，询问其由，道人云：是曾服丹或烧炼药，予有药用之，即于囊间出此药半钱匕，吹入鼻中立止，良久得活。并传此方。

01300 山栀仁汤

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】 山栀（炒黑） 半夏 广皮各一钱 竹茹一团 木香五分 甘草（炙）三分 黄连七分（吴茱萸制）

【用法】 加灯心一握，水煎服。

【主治】 心痛稍久，寒郁为热，烦躁呕酸，面赤脉数者。

01301 山茵陈散

【方源】《直指》卷十六。

【异名】 茵陈汤（《医统》卷十八）。

【组成】 栀子一两 茵陈一两 枳实（制）七枚 赤茯苓 葶苈 甘草（炙）各一分

【用法】 上锉。每服三钱，加生姜三片，水煎服。

【主治】 黄疸，大小便秘涩。

01302 山茱萸丸

【方源】《准绳·幼科》卷二引《养生必用》。

【组成】 山茱萸二两 熟地黄 牡丹皮 牛膝 茯苓 泽泻各一两 鹿茸半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后盐汤送下。

【主治】 小儿眼白多，多属虚。

01303 山茱萸丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】 山茱萸一两 黄耆（细锉） 杜仲（去粗皮，炙，锉） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙）各一两半 桂（去粗皮） 牛膝（去苗，酒浸，焙） 韭子（慢火炒）各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎黄耆汤送下，一日三次。

【主治】 消肾。自腰以下，瘦弱无力，小便数或不禁。

01304 山茱萸散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 山茱萸一两 赤石脂二两 草薢一两（锉） 牛膝一两（去苗） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去粗皮，炙干） 狗脊一两 牡蛎一两（烧为粉） 黄耆一两（锉） 土瓜根一两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 小便数，日夜无时。

01305 山茱萸散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 山茱萸一两 甘菊 人参 山药 茯神 川芎各五钱

【用法】 上为末。每服二钱，茶清或酒调下。

【主治】 风眩头晕。

01306 山萸肉粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】 山茱萸肉 15～20 克 粳米 60 克 白糖适量

【用法】 先将山萸肉洗净，去核，与粳米同入砂锅煮粥，待粥将熟时，加入白糖稍煮即可。3～5 天为一疗程，疾病完全治愈后，即可停服。或再间断食用一个时期，以巩固疗效。

【功用】 补益肝肾，涩精敛汗。

【主治】 肝肾不足，头晕目眩，耳鸣腰酸，遗精，遗尿，小便频数，虚汗不止，肾虚带下。

【宜忌】 在发热期间，或小便淋涩的患者，均不可服食。

【加减】 肾虚病人，特别是老年肾虚患者，腰酸腿软，头晕耳鸣，配合枸杞子一同煮粥则更好；如出现遗精、遗尿、小便次数过多，可配合芡实煮粥尤妙；如虚汗不止，盗汗过久，则配合浮小麦煮粥。

01307 山甲内消散

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】 黄甲串(《外科十三方考》)。

【组成】 当归梢 甘草节 大黄各三钱 穿山甲(炒)三大片 僵蚕 黑牵牛各一钱 土木鳖三个

【用法】 水、酒各一碗，煎八分，空心服，滓再煎服。大便行三四次，方吃稀粥，淡味饮食为妙。

【主治】 ①《外科正宗》：鱼口、便毒、骑马痈、横痃初起未成脓者。②《金鉴》：中脘疽，色紫坚硬者。

01308 山栀五苓散

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】 栀子仁（炒） 白术（炒） 白茯苓 猪苓 泽泻各一钱 官桂五分

【用法】 上为极细末。每服一钱或五分，用蜜汤、灯心汤调下。

【主治】 小儿脐突。

01309 山栀香附丸

【方源】《医统》卷五十六。

【组成】 山栀子（炒焦）六钱 香附子一钱 吴茱萸（汤泡）一钱

【用法】 上为末，蒸饼为丸，如小豆大。每服五十丸，生地黄、生姜汤送下。

【主治】 气实心痛。

01310 山楂曲术丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷二，名见《东医宝鉴·内景篇》卷四。

【组成】 黄芩（炒）半两 白术（炒）二两 白芍（酒拌，炒） 半夏各一两（炮） 神曲（炒） 山楂（炒）各一两半

【用法】 上为末，青荷叶包饭烧熟研为丸，如梧桐子大。食前白汤下。

【主治】 脾泄。老人奉养太过，饮食伤脾，常常泄泻。

【备考】《东医宝鉴·内景篇》：上为末，以青荷叶裹烧饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

01311 山楂橘核丸

【方源】《医统》卷六十引丹溪方。

【组成】 山楂四两 橘核（炒） 茴香（炒） 山栀（炒）各二两 柴胡 牡丹皮 桃仁（炒） 大茴香（炒）各一两 吴茱萸（泡）半两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心盐汤送下。

【主治】 诸疝痛。

【备考】《丹溪心法》卷四治疝痛方有枳实，无橘核。

01312 千里鞋

【方源】《串雅外编》卷四。

【组成】 草乌 细辛 防风各等分

【用法】 上为末，掺鞋底内。如草鞋，以水微湿掺之。而之可行千里。

【主治】 远行足肿。

01313 千针散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】 刺蓟 木贼各一分 白面一钱

【用法】 上为散。每服一钱匕，研青蒿心七枚，新水调下，并二服。

【主治】 鼻衄不止。

01314 千金丸

【方源】《普济方》卷一六三引《仁存方》。

【组成】 南星 半夏各一两 白矾一两半（枯）

【用法】 以生栝楼一个，去子，入药在内，湿纸裹煨热，取出为末。再用生白矾一两，将栝楼瓤、汁并栝楼仁研细为丸，如梧桐子大。每服十五丸，临卧用淡姜汤送下。

【主治】 喘嗽。

01315 千金饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】 广木香 防己 五加皮 地骨皮各一钱二分 桑白皮 紫苏 木瓜各一钱

【用法】 加灯心三十茎，水煎，食远服。

【主治】 一切子气。

01316 千金散

【方源】《施圆端效方》引马君玉方（见《医方类聚》卷二一〇）。

【组成】 熟地黄一两 生地黄 干刺蓟 蒲黄各半两 芍药 当归 川芎各一两

【用法】 上为粗末。每服四钱，酒一盏半，煎至七分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】 妇人血崩不止。

01317 千金散

【方源】《普济方》卷四十五。

【组成】 川芎 细辛 防风 甘菊花 甘草 石菖蒲 青藤根 全蝎 细茶芽 藁本各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一盏半，加葱白一根，同煎至七分，去滓，食后、临卧服，滓再煎。

【主治】 偏正头疼诸症。

【加减】 一方，如眼目疼痛者，加贯众一两。

01318 千金散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 乳香 没药 轻粉 朱砂 白信 赤石脂 五倍子 醋制蛇含石 雄黄各15克

【用法】 上为细末，装瓶备用。将药末以冷开水调涂患处，外用纱布、胶布固定，三天换一次。

【功用】 腐蚀恶肉。

【主治】 寻常疣，鸡眼。

01319 千秋丸

【方源】《普济方》卷一三六。

【组成】 芎藭三两 天南星三两 草乌头四两（生）

【用法】 上药治下筛，以千年韭根汁为丸，如梧桐子大。每服三丸，白饮送下。

【主治】 少阴病，头痛不可忍者。

01320 千捶膏

【方源】《种福堂方》卷三。

【组成】 松香（锅内溶化，倾入清水内片时，揉白取用）约一斤 蓖麻子六两（净） 柏油二两 白蜡二两 大黄 银朱各二两 左顾牡蛎二两（用粗草包好，入火内煨，存性）

【用法】 捶膏之法：在光平青石下，先将松香一二两，与蓖麻一二两，铺于石上，用铁锤打碎，干则加蓖麻，湿则加松香，余药亦渐渐掺入，捶至极细腻为度。遇无名肿毒，摊贴，用麝香少许，初起者一张便效。若已溃者，用阿魏少许，即止痛，且易收口。

【主治】 无名肿毒及已溃者。

【宜忌】 忌见火，须隔汤炖软摊之。

01321 千捶膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】 嫩松香四两 巴豆仁五粒 蓖麻仁七钱 杏仁（去皮） 乳香（去油） 没药（去油） 铜绿各一钱

【用法】 共入石臼内，捣二千余下，即成膏矣。取起，浸清水中。用时，随疮大小，用手捻成薄片，贴疮上，以绢盖之。痈疽疮，初起即消，如治瘰疬，连根拔出。

【主治】 痈疽疔毒初起，瘰疬，小儿鳝拱头，臁疮久不收口。

01322 千捶膏

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 麝香一钱 冰片五分 制乳香一钱五分 制没药一钱五分 樟脑一两 银朱一钱 白蜡一钱五分 蒸制松香四两 蓖麻子肉一两

【用法】 各取净末，先将蓖麻子肉研烂，和松香置石臼内，同打至二味和匀，再将余药放入，边打边拌，至细腻、颜色透明为度，约成膏六两，贴患处。

【功用】 软坚消肿，拔毒生肌。

【主治】 瘰疬臁疮，小儿鳝攻头。

01323 千缗汤

【方源】《妇人良方》卷六。

【组成】 齐州半夏七枚（炮制，四片破之） 皂角（去皮，炙）一寸 甘草（炙）一寸 生姜如指大

【用法】 水一碗，煮去半，顿服。

【主治】 ①《妇人良方》：痰喘不能卧。②《法律》：风痰壅盛喘急，日夜不得卧，人扶而坐者。

【方论选录】《医方考》：痰涎上涌，喉中有声，不渴者，此方主之。湿土生痰，故用半夏以燥湿；气塞则痰滞，故用皂角以利气；肺苦气上逆，故用甘草以缓急。又甘草能益脾，皂角能去垢、半夏能破逆。曰千缗者，重其效也。

01324 千里光汤

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】 千里光（即石决明） 海金沙 甘草 菊花各等分

【用法】 上㕮咀。每服八钱，水一钟半，煎至一钟，去滓，食后温服。

【主治】 怕日羞明。

01325 千里光散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 菊花 千里光 甘草各等分

【用法】 上为末。每服三钱，夜间临卧用茶清调下。

【主治】 能近视不能远视。

01326 千斤保命丸

【方源】《灵验良方汇编》卷三。

【组成】 杜仲四两（同糯米炒断丝，米不用） 川续断（酒浸）二两

【用法】 上为末，山药糊为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，空心米饮送下。

【主治】 孕妇腰背痛，堕胎。

【宜忌】 忌酒、醋、恼怒。

01327 千里光洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 千里光31～93克

【用法】 用纱布捆包，加水1～1.5升，煎煮五至十分钟，熏洗。

【主治】 湿疹，皮炎。

01328 千里健步散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】细辛 防风 白芷 草乌各等分

【用法】上为末，掺在鞋底内。如底干，即以水微湿过。

【主治】远行两脚肿痛。

01329 千里流水汤

【方源】《千金》卷十二。

【异名】半夏汤(《圣济总录》卷九十)、温胆汤(《普济方》卷三十四)、千里水汤(《普济方》卷二十三)、千金流水汤(《准绳·伤寒》卷三)。

【组成】半夏 麦门冬各三两 茯苓四两 酸枣仁二升 甘草 桂心 黄芩 远志 草蘼 人参 生姜各二两 秫米一升

【用法】上㕮咀，以千里流水一斛煮米，令蟹目沸，扬之万遍，澄清，取一斗煮药，取二升半，分三服。

【主治】虚烦不得眠。

01330 千金一笑散

【方源】《玉案》卷四。

【组成】北细辛 人参 秦艽 甘菊花各一钱五分 白芷 甘草 当归 薄荷各二钱 葱白五枚

【用法】水煎服。

【主治】诸般头疼并一切头风。

01331 千金不换饼

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】雄黄五分 细辛 官桂 牙皂 川乌 羌活 骨碎补 白附子各一钱 苍术一钱 麝香三分

【用法】水和作饼，棋子大。将筷头点患处，凡遇酸痛异常，即系受病之源，或一二处，以墨记之，用药饼安上，以艾灸之，以筋脉能动而止。

【主治】手足拘挛，跛至十余年者。

01332 千金内托汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】党参（或用人参） 黄耆 防风 官桂 川朴 白芷 川芎 桔梗 当归 生甘草

【用法】分两随时斟酌，水煎服。

【主治】乳岩溃者，一切溃烂红痈。

【宜忌】阴证忌服。

01333 千金内托散

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】党参 银花各一钱五分 甘草五分 当归 连翘（去心） 赤芍 花粉 蒌仁 桔梗 白术各一钱 陈皮 防风 川芎 青皮 厚朴 荆芥各七分 黄耆一钱五分

【用法】加灯心二十寸，水二钟，煎七分，徐徐咽下。

【主治】乳蛾，喉痛，舌痛。

01334 千金内托散

【方源】《喉科枕秘》。

【组成】玄参 人参 桔梗 青皮 陈皮 连翘 甘草 川芎 当归 赤芍 蒌仁 花粉 银花 川朴 防风

【用法】加灯心，水煎，食后服。

【主治】牙疔。牙根末痛连腮脸，破则流血，发热恶寒，头痛身强者。

01335 千金化气汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】青皮 陈皮 枳壳（去瓤） 香附 白豆蔻 砂仁各一两 木香五钱 丁香三钱 半夏（姜制） 草果 干姜各七钱 槟榔一两半 川芎 白芷 三棱（醋炒） 莪术 玄胡索各一两 厚朴（姜汁炒） 大腹皮 白芍各一两 小茴香五钱 甘草三钱

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，半空心服。

【主治】男子腹中气块疼痛。

01336 千金化铁丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】当归（酒炒） 一两半 白芍（酒炒）一两半 川芎七钱 怀生地（酒洗）一两半 白术（去芦，炒）一两半 白茯苓（去皮）一两 陈皮（去白）一两 青皮七钱半 半夏（姜汁炒）一两 枳实（麸炒）七钱五分 木香（炒）七钱五分 香附（炒）一两 槟榔五钱 莱菔子（炒）五钱 三棱（炒）五钱 红花五钱 干漆（炒令烟尽）五钱 桃仁（去皮尖）五钱 莪术（醋炒）一两五钱 硇砂（为末，瓷器内煨过）五钱 琥珀五钱

【用法】上为细末，醋打面糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，白汤送下，早、晚各进一服。

【主治】积聚。腹中有块，坚硬如石，有时作痛，肚腹膨闷，经水不调，或前或后，或多或少，或闭而不通，白带频下，夜间发热，脉急数。

01337 千金失笑散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】当归尾 没药各等分

【用法】每用一大钱，炒。用红花酒，面北呷之。

【主治】室女经脉不通。

01338 千金地黄丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】川黄连（去须）四两（粗末） 生地黄半斤（研，取汁，连滓）

【用法】上药拌匀，晒干，为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后麦门冬汤送下。

【主治】心热。

01339 千金补肾丸

【方源】方出《千金》卷六，名见《寿世保元》卷六。

【组成】山茱萸 干姜 巴戟天 芍药 泽泻 桂心 菟丝子 黄耆 干地黄 远志 蛇床子 石斛 当归 细辛 苁蓉 牡丹 人参 甘草 附子各二两 菖蒲一两 羊肾二枚 防风一两半 茯苓三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。食后服十五丸，一日三次，加至三四十丸。

【功用】补肾。

【主治】肾虚劳聋、气聋、风聋、虚聋、毒聋、久聋、耳鸣。

01340 千金补肾丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】党参膏八两 熟地 山药 杜仲 当归各二两 茯苓 萸肉 枸杞子 菟丝子 淡苁蓉各四两

【用法】上为末，将党参膏炼为丸。每服三钱，空心淡盐汤送下；温酒亦可。

【主治】精气不足，肾水亏乏，肝火上乘，耳聋鸣响。

01341 千金定吼丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】南星 半夏各四两（用生姜、牙皂各三两，浸星、半一宿，切片，再加白矾二两入汤内，同星、半煮至汤干，去姜、皂不用，用南星、半夏） 锦纹大黄（酒拌，九蒸九晒）一两 白附子 贝母（杵碎） 枳实（麸炒） 黄连（姜炒） 连翘（去心） 天麻 僵蚕（炒） 瓜蒌各一两 桔梗一两 沉香五钱 青礞石（用消煅如金色者）五钱 黄芩（酒炒）一两

【用法】上为细末，竹沥、姜汁和为丸，如弹子大。每服一丸，临卧口含化下；或丸如黍米大，姜汤送下亦可。

【主治】素患哮吼之疾，发则喘急，痰嗽上壅，不时举发。

【宜忌】慎劳役，戒厚味，节欲。

01342 千金封脐膏

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】天门冬 生地黄 熟地黄 木鳖子 大附子 蛇床子 麦门冬 紫梢花 杏仁 远志 牛膝 肉苁蓉 官桂 肉豆蔻 菟丝子 虎骨 鹿茸各二钱

【用法】上为末，入油一斤四两，文武火熬黑色，去滓，澄清，入黄丹半斤，水飞过松香四两熬，用槐柳条搅，滴水不散为度。再下硫黄、雄黄、朱砂、赤石脂、龙骨各三钱，为末入内。除此不用见火，将药微冷定，再下腽肭脐一副、阿芙蓉、蟾酥各三钱，麝香一钱，不见火，阳起石、沉木香各三钱，俱不见火。上为细末，入内，待药冷，下黄蜡六钱，贮瓷器盛之，封口，放水中，浸三日，去火毒，取出摊缎子上，或红绢上亦可。贴之六十日，方无力，再换。

【功用】存精固漏，活血通脉，壮阳助气，返老还童。

【主治】男子下元虚冷，小肠疝气，痞疾，单腹胀满，并一切腰腿骨节疼痛，半身不遂，妇人子宫久冷，赤白带下，久不坐胎。

01343 千金种子丹

【方源】《扶寿精方》。

【组成】沙苑蒺藜四两（净末如蚕种，同州者佳，再以重罗罗，二两极细末，二两粗末，用水一大碗，熬膏伺候） 莲须（极细末）四两（金色者固精，红色者败精） 山茱萸（极细末三两，须得一斤，用鲜红有肉者佳，去核取肉，为细末） 覆盆子（南者佳，去核取极细末）二两 鸡头实五白个（去壳，如大小不等，取极细末四两） 龙骨五钱（五色者佳，火煅。煅法：以小砂锅，将龙骨入锅内，以火连砂锅煅红，去火毒方用）

【用法】上用伏蜜一斤炼，以纸粘去浮沫数次，无沫，滴水中成珠者伺候，只用四两；将前六味，重罗过，先以蒺藜膏和作一块，再入炼蜜四两，入石臼内捣千余下方可，丸如黄豆样大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【功用】延年益寿。

【主治】虚损梦遗，白浊。

【宜忌】忌欲事二十日。

01344 千金保孕方

【方源】《妇科玉尺》卷二。

【组成】糯米一升（煮粥） 杜仲八两（捣去丝，拌粥晒干，再拌再晒，粥完为度，炒，研） 川断六两

【用法】将山药四两，打糊为丸。空心米汤送

下。

【功用】 固胎

【主治】 胎动不安。

01345 千金保胎丸

【方源】《同春》卷六。

【异名】 保胎丸(《仙拈集》卷三)。

【组成】 当归（酒洗）二两 川芎一两 熟地（姜汁炒）四两 阿胶（蛤粉炒）二两 艾叶（醋制）一两 砂仁（炒）五钱 条芩（炒）二两 益母草二两 杜仲（去根皮、姜汁、酒炒）四两 白术（土炒）四两 陈皮一两 续断（酒洗）一两 香附米二两（醋酒、盐水、童便各浸二日，炒）

【用法】 上为细末。煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心米汤送下。

【主治】 女人受胎，气血不足，中冲脉有伤，经二月而胎堕者。

【宜忌】 节饮食，绝欲，戒怒。

01346 千金润下丸

【方源】《会约》卷八。

【组成】 大麻仁（微炒）一两 郁李仁（泡，去皮） 菟丝子（酒蒸） 枳壳（麸炒） 牛膝（酒浸） 车前子 山药各七钱 肉苁蓉（酒洗）一两半 威参（蜜蒸）二两 大黄（酒蒸）二两 陈皮（去白）五钱 桃仁（去皮）五钱

【用法】 先将大黄、威参杵成膏，后加药末，炼蜜为丸。每服四十丸，白汤送下，早、晚各一次。若肠润而肛门紧，用猪胆汁，少加皂角末，和以导之。便下宜止，即服滋阴养胃之剂，以扶其本。

【主治】 大便燥结，胀闷之甚，而脉未至大虚者。

01347 千金衔化丸

【方源】《玉案》卷三。

【组成】 玄明粉 石膏（煅红，黄连煎汁淬，如此九次） 玄参各二两 白硼砂 薄荷叶 黄柏各四钱 冰片五分

【用法】 上为末，生蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，含化。外用珍宝散掺上即愈。

【主治】 上焦实热，口内溃烂，饮食难进。

01348 千金腹痛方

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 熟地五两 黄耆三两（酒炒） 白术两半（制） 当归三两 白芍一两半（酒炒） 川芎一两 炙草五钱 桂心一两半 大枣八枚 炮姜八钱

【用法】 上为散，酒煎五钱，去滓温服。

【主治】 产后腹中绞痛，脉软紧细者。

【方论选录】 产后血气两虚，寒邪内伏，故腹中绞痛，时发寒热焉。熟地补血以滋血室，黄耆补气以实卫阳，白术健脾生血，当归养血荣经，白芍敛阴和血脉，炙草益胃缓中气，川芎入血海以行血中之气，桂心入营血以御经中之寒，炮姜温中逐冷，大枣缓中益脾也。为散醇酒煎服，务使血气内充，则寒邪自解，而经脉融和，血气完复，安有腹中疞痛时发寒热之患乎？

01349 千捶绿云膏

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】 蓖麻子（去壳） 松香（葱头汁煮）四两 海藻（炙，研）五钱 昆布（炙，研）五钱 南星（研）五钱 半夏（研）五钱 杏仁五钱 糠青（研）一两 （一方有乳香、没药各五钱）

【用法】 捣成膏。

【主治】 痰核。

01350 千缗导痰汤

【方源】《古今医鉴》卷四。

【组成】 天南星（制）一钱 半夏七个（火炮破皮，每一个切作四片） 陈皮一钱 枳壳（去瓤）一钱 赤茯苓一钱 皂荚一寸（炙，去皮脂） 甘草（炙）一钱

【用法】 上锉一剂，加生姜三片，水煎服。

【主治】 痰喘不能卧。

01351 千金大养脾丸

【方源】《局方》卷三（续添诸局经验秘方）。

【组成】 枳壳 神曲 陈皮（去白） 麦芽（炒） 茴香 白姜（炮） 缩砂（去皮） 肉豆蔻 三棱（炮） 茯苓（去皮） 良姜 薏苡仁 益智（去壳） 胡椒 木香 白扁豆（炒） 丁香 白术 红豆 藿香（去梗） 山药 苦梗（炒） 人参 甘草（炙） 蓬莪术（炮）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心、食前细嚼，白汤送下；温酒亦得。

【主治】 脾胃虚弱，停寒留饮，膈气噎塞，反胃吐食，心胸痞满，胁胀虚胀，胸腹冲痛，牵引背膂，食少多伤，言微气短，口苦舌涩，恶心呕哕，喜唾咽酸，久病泄泻，脾性胃虚滑，或大病气不复常，饮食无味，形容憔悴，酒后多痰。

01352 千金牡丹皮散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 牡丹皮三钱 苡仁五钱 桃仁十粒 瓜蒌仁（去壳，去油，净）二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 腹内痛。

【备考】《千金》治肠痈用薏苡仁、牡丹皮、桃仁、瓜瓣仁。《医学心悟》此方，即以上方中之瓜瓣仁改为瓜蒌仁。

01353 千金保胎孕丸

【方源】《胎产护生篇》。

【组成】川续断四两 杜仲四两（盐水炒） 白术三两（土炒） 黄芩三两（酒炒） 当归三两（酒炒）

【用法】山药糊为丸。每服三钱，空心用砂仁一二分点汤下。

【主治】怀胎妇人，素患腰疼，元气不足，犹恐胎堕者。

01354 千锤万应化痞膏

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】乳香 硇砂 天竺黄 轻粉 没药 儿茶 阿魏 芦荟 土木鳖各五钱 蓖麻仁三两 蜈蚣七条（焙干） 川山甲一两（土炒） 百草霜一两五钱

【用法】上为末，松香一斤，水煮过，布滤滓，埋土内七日，共和捶万余下，锤头常用香油涂上，捶成膏，极匀，如系入罐中，蜡封。大人每用三钱，小儿减半，蒸化用绢摊开，看块之大小用之。如贴起泡，暂去二三日再贴。久用痞化成脓血随大便。

【主治】痞块。

01355 千金苇茎汤加滑石杏仁汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】苇茎五钱 薏苡仁五钱 桃仁二钱 冬瓜仁二钱 滑石三钱 杏仁三钱

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次服。

【主治】太阴湿温喘促者。

01356 川乌丸

【方源】方出《圣惠》卷十九，名见《普济方》卷一八五。

【组成】川乌头二两（去皮、切碎，以大豆同炒，候豆出汗即住） 干蝎半两（微炒）

【用法】上为细末，以醋醋一中盏，煎熬成膏，可丸即丸，如绿豆大。每服七丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】风痹，荣卫不行，四肢疼痛。

01357 川乌丸

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】大川乌（去皮尖） 木鳖子（去壳） 当归 赤芍药 苏木 独活 羌活各一两 没药（另研） 五灵脂（去沙，微炒） 穿山甲（蛤粉炒）各一两

【用法】上药各为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【功用】活经络。

【主治】发背。

01358 川乌散

【方源】《济阳纲目》卷八十五。

【组成】川乌 天麻 南星（姜汤泡） 半夏（姜汤炮）各等分

【用法】上为细末。每服一钱，黑豆淋酒调下，仍饮酒一二盏。

【主治】破伤风欲死者。

01359 川乌散

【方源】《异授眼科》。

【组成】川乌（煨） 细辛 川芎 防风 生地 当归 乌药 甘草 人参各等分

【用法】上为末。每服二钱，酒送下。

【主治】目有白星散乱，头昏眼花黑暗，属于气血衰者。

01360 川乌粥

【方源】《本事》卷三。

【异名】乌头粥（《普济方》卷一八五）。

【组成】川乌（生，去皮尖，为末）

【用法】上用香熟白米作粥半碗，药末四钱，同米用慢火熬熟，稀薄不要稠，下姜汁一茶匙，蜜三大匙，搅匀，空腹吸之，温为佳。

【主治】风寒湿痹，麻木不仁。手足四肢不遂，痛重不能举。

【加减】中湿，更入薏苡仁末二钱，增米作一中碗。

【方论选录】①《本事》：此粥大治手足四肢不遂，痛重不能举者。有此证预防服之。左氏云：风淫末疾，谓四肢为四末也。脾主四肢，风邪客于肝，则淫脾，脾为肝克，故疾在四末。谷气能引风温之药径入脾经，故四肢得安，此汤剂极有力。予尝制此方，以授人服者良验。②《本事方释义》：川乌气味苦辛大热，入足太阳、少阴，能行走经络。风寒湿三气之邪，流入经脉隧道，至气血壅滞，麻痹不仁，四肢不遂。夫邪客于肝，肝必侵犯脾土，故肝脾相犯之候，每多此症，非辛热善行走之药不能直入病所，独用一味者，欲其力量之大而专也。

01361 川芎丸

【方源】《局方》卷一。

【异名】大川芎丸（《法律》卷五）。

【组成】 川芎 龙脑薄荷叶（焙干）各七十五两 细辛（洗）五两 防风（去苗）二十五两 桔梗一百两 甘草（炙）三十五两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两半，分作五十丸。每服一丸，食后、临卧细嚼，腊茶清送下。

【功用】 消风壅，化痰涎，利咽膈，清头目。

【主治】 头痛旋运，心忪烦热，颈项紧急，肩背拘倦，肢体烦疼，皮肤瘙痒，脑昏目疼，鼻塞声重，面上游风，状如虫行。

01362 川芎丸

【方源】《普济方》卷五十七。

【组成】 草乌（生用）半两（去皮尖） 苍术（生）一两 川芎（生用）二两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食后茶清送下。

【主治】 脑泻臭秽。

【宜忌】 服药后，忌一时久热食。

01363 川芎丸

【方源】《类证治裁》卷五。

【组成】 川芎四两 天麻一两

【用法】 炼蜜为丸，每两作十丸。每服一丸，细嚼，茶、酒任下。

【主治】 首风，汗多恶风。

01364 川芎汤

【方源】《此事难知》。

【组成】 川芎 羌活（制） 苍术各等分

【用法】 上㕮咀，水煎五七钱饮。

【主治】 伤寒无汗。

【加减】 若汗少，恶寒甚者，加麻黄一二钱匕。

01365 川芎汤

【方源】《宋氏女科》。

【组成】 川芎五钱 当归五钱 荆芥穗五钱（炒黑）

【用法】 作一服，水煎，入酒、童便服之。

【主治】 产后去血过多，血晕不省。

01366 川芎散

【方源】《本事》卷二引庞先生方。

【组成】 山茱萸一两 山药 甘菊花（去萼梗，不可误用野菊） 人参（去芦） 茯神（去木） 小川芎各半两

【用法】 风眩头晕。

【方论选录】《本事方释义》：川芎气味辛温，入肝胆；山茱萸气味酸甘平微温，入肝；山药气味甘平，入脾；人参气味甘温，入脾胃；甘菊花气味辛凉，入肝胆；茯神气味甘平，入心；以酒送药，亦取其升也。风眩头晕，以辛温辛凉之药升散其风；以酸甘甘温之药调和中宫正气，则厥功奏捷矣。

01367 川芎散

【方源】《本事》卷四。

【异名】 川芎甘菊散（《杏苑》卷五）。

【组成】 川芎（洗） 柴胡（去苗，洗）各一两半 夏曲 甘草（炙） 甘菊 细辛（去叶） 人参（去芦） 前胡（去苗，洗） 防风（去叉股）各半两

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏，加生姜四片，薄荷五叶，同煎至七分，去滓温服。

【主治】 风盛膈壅，鼻塞清涕，热气攻眼，下泪多眵，齿间紧急，作偏头疼。

【方论选录】《本事方释义》：川芎气味辛温，入肝胆；柴胡气味甘平，入足少阳；半夏曲气味辛温，入足阳明；甘草气味甘平，入足太阴；甘菊花气味辛凉，入肝胆；细辛气味辛温，入足少阴；人参气味甘温，入足阳明；前胡气味苦辛微寒，入手足太阴、阳明，其功长于下气；防风气味辛温，入足太阳，再佐以生姜之辛温散，薄荷之辛凉而散，使上壅者得以宣降，则所患之症得甘平甘温之品护中，而辛温辛凉之药各得施其技焉。

01368 川芎散

【方源】《妇人良方》卷二十二。

【异名】 芎乌散（《医方类聚》卷八十一引《济生续方》）、川乌散（《普济方》卷三五一）。

【组成】 真天台乌药皮 大川芎各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，秤锤淬酒调服。

【主治】 ①《妇人良方》：产后头痛。②《普济方》引鲍氏方：男子气厥头疼，妇人气盛头疼。

01369 川芎散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 川芎三分 柴胡七分 羌活 防风 藁本 生甘草 升麻各一钱 熟甘草 酒生地黄各二钱 酒黄连（炒） 酒黄芩各四钱五分

【用法】 上为细末。每服一钱，或二三钱，食后茶清调下。

【主治】 ①《兰室秘藏》：头目不清利。②《景岳全书》：风热头痛不清及目病。

【宜忌】 忌酒、湿面。

01370 川芎散

【方源】《施圆端效方》引延津王子安方（见《医方类聚》卷二一〇）。

【组成】 川芎 当归 生地黄 伏龙肝 龙骨

芍药　蒲黄各一两　御米壳（去蒂，蜜浴，炒焦）四两

【用法】　上为细末。每服二钱，食前用温酒或米饮调下。

【主治】　妇人崩漏带下，诸方不效者。

01371　川芎散

【方源】《得效》卷十三。

【组成】　五加皮　海桐皮　川乌　牡丹皮　川芎　赤芍药各五钱　干姜　肉桂各一钱

【用法】　上为末。每服三钱，水一盏，将古铜钱一个入清油内浸，每煎药入钱同煎，不拘时候服。

【主治】　鸡爪风，手口搐动，不能举物。

01372　川芎散

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】　川芎　细辛　羌活　槐花　石膏　香附子　甘草（炙）各半两　荆芥　薄荷　茵陈　防风（去叉）　菊花各一两

【用法】　上为末。每服三钱，食后茶清调下，一日三次。

【主治】　头风，偏正头疼，昏眩。

【宜忌】　忌动风物。

01373　川芎散

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】　白僵蚕六钱（生用）　甘菊花　石膏　川芎各三钱

【用法】　上为末。每服三钱，食后茶清调下。

【主治】　偏头痛。

【宜忌】　忌猪肉、荞麦面。

01374　川附丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】　川乌　附子　官桂　川椒　菖蒲　甘草各一两　骨碎补　天麻　白术各五钱

【用法】　上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下，一日三次。

【主治】　气痹。

01375　川椒丸

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】　川椒五两（去目及闭口者，微炒去汗）　苣藤一升　瓦松半斤　茜根二斤（锉）　熟干地黄三升（斤）　覆盆子一斤　牛膝一斤（去苗）　菟丝子五两（酒浸三日，晒干，别捣为末）

【用法】　上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，食前以温酒送下。

【功用】　补益，令发黑。

【主治】　血脑虚，发早白。

01376　川椒丸

【方源】《三因》卷十一。

【组成】　黄连（炒）　乌梅肉　当归　川椒（炒出汗）　桂心　干姜（炮）各等分

【用法】　上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空腹以米汤送下。

【主治】　①《三因》：肌虚，泄泻无度。②《普济方》：胃寒。

01377　川椒散

【方源】《直指》卷十八。

【组成】　真川椒（去目并合口者，微炒去汗）　官桂各半两　川芎　当归　青皮　陈皮（制）　枳壳　槟榔　赤茯苓　青木香　南木香　荜澄茄　白豆蔻仁　甘草（炙）各一分

【用法】　上为粗末。每三钱，加生姜、大枣，水煎，食前服。

【主治】　疝气，外肾肿痛。

01378　川椒散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】　大红开口川椒（微炒，盖出汗）　诃子（煨，取肉）　川白姜（生者）　辣桂　川芎　细辛　净白术各等分

【用法】　上为末。每服二钱，温酒调下。

【主治】　风冷随气乘于鼻脑，津液不能自收，流涕。

01379　川楝丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】　川楝子　茴香各二两　附子一两

【用法】　用酒一升，煮尽为度，焙干，炒为末；每药末一两，用延胡索半两，全蝎十八个，丁香十八粒，别为末，与前末和匀，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒送下；痛甚者，当归煎汤送下。

【主治】　奔豚，小腹痛。

01380　川楝汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】　川楝子（炒）　大茴　小茴　猪苓　泽泻　白术各一钱（蜜炙）　乌药（炒）　槟榔　乳香（去油）　玄胡索各八分　木香五分　麻黄六分

【用法】　加生姜三片，葱一根，水煎服。

【主治】　经来有两条筋从阴吊至两乳，痛不可忍，身上发热。

01381　川楝散

【方源】《局方》卷五（宝庆新增方）。

【组成】　川楝子（蒸，去皮核）　破故纸（炒）

茴香（炒）各四两　干姜（炮）一两　葫芦巴（酒浸，炒）二两　附子（炮，去皮脐）一两半

【用法】 上为细末。每服二钱，空心、食前热酒调下

【主治】 膀胱小肠气痛，脐下撮疼，上冲心腹，面色萎黄，脚下隐痛，四肢倦怠，不思饮食，夜多旋溺，外肾瘙痒。

01382　川膝煎

【方源】《三因》卷三。

【组成】 大乌头十个（端正者，捶破，以纸袋盛，用乌豆一斗，糟覆蒸一日，取出，去豆不用，去皮尖）　牛膝二两（去芦穰，干）

【用法】 上药并不得见铜铁器及火与日。木臼捣碎牛膝，同入石磨中磨为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，用无灰酒一瓶，中样木瓜一个，切作片，入瓶中，煨木瓜烂为度，用此酒送下，不拘时候。

【主治】 肝肾虚，为风寒湿毒所中，流注腿膝，历节疼痛，如锥刀锻刺，不可名状。

01383　川大黄丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】 川大黄一分（锉碎，微炒）　川朴消一分　大戟一分（锉碎，微炒）　甘遂一分（煨令微黄）　芫花一分（醋拌，炒令干）　椒目一分（微炒去汗）　甜葶苈一分（隔纸炒令紫色）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心以粥饮送下。当得快利；如未利，晚食前再服。

【主治】 十种水气。面目四肢肿满，心腹虚胀，三焦壅滞，坐卧喘急。

01384　川大黄散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】 川大黄三分　赤芍药半两　黄耆（锉）　黄芩　玄参各一两　丹参三分　枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温粥饮调下。

【主治】 大肠风热所攻，肛门赤痛。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“大黄散”。

01385　川山甲散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 露蜂房一两　蛇蜕二钱五分　头发二钱五分（烧存性）　川山甲二钱五分

【用法】 上为末。每服二三钱，加乳香末五分，温酒调下。

【功用】 托里排脓，内消止痛。

【主治】 痈疽漫肿，不变色者；附骨疽。

01386　川乌头丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】 川乌头半两（炮裂，去皮脐）　芫花半两（醋拌，炒令干）　京三棱半两（锉，醋拌，炒）　桂心半两　鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕）　防葵半两　干漆半两（捣碎，炒令烟出）　硼砂一两半（不夹石者，细研）　川大黄一两（锉碎，醋拌，微炒）　木香一两

【用法】 上为细末，先以米醋三升，熬令稍稠，入少面作糊，和溶为丸，如绿豆大。每服七丸，空心以温酒送下；渐加至十丸。以取下积滞物为度，隔两日再服。

【主治】 伏梁气，结固在心下，横大如臂，饮食渐少，肢体消瘦。

01387　川苦楝散

【方源】《医学发明》卷五。

【异名】 川楝散（《育婴秘诀》卷二）。

【组成】 木香一两（另为细末）　茴香（拣净）一两（盐一匙，一处炒茴香黄色，去盐不用）　川楝子一两（锉碎，用巴豆十个，微破皮，与川楝子一处炒黄，不用巴豆）

【用法】 上为极细末。每服二钱，空腹用温酒一盏调下。

【主治】 癞疝。

01388　川黄连丸

【方源】《直指》卷十七。

【异名】 麦门冬丸（《普济方》卷一七六）。

【组成】 川黄连（净）五两　白天花粉　麦门冬（去心）各二钱半

【用法】 上为末，以生地黄汁并牛乳汁调和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，粳米饮送下。

【主治】 诸渴。

01389　川楝子汤

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】 川楝肉二钱　木香七分　槟榔　熟半夏　枳壳（曲炒）　广皮各一钱　炙甘草三分

【用法】 加生姜，水煎，入砂糖少许，和服。

【主治】 虫痛时作时止，口吐清水，或如咬状。

01390　川乌灵脂丸

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】 川乌头三只（去皮脐）　天南星三个五两者（焙）　五灵脂（炒，别研）各等分

【用法】 上为细末，以生姜自然汁为丸，如梧桐

子大。每服十丸至十五丸，空心、食前用薄荷自然汁入酒送下，一日三次。

【主治】 左瘫右痪，口眼㖞斜，寒湿脚气，一切风疾。

01391 川芎三黄散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】 大黄（湿纸裹蒸） 川芎 黄连（净） 黄芩各等分

【用法】 上为末。每服二钱，食后井水调服。

【主治】 实热衄血。

【备考】 本方改作汤剂，名“川芎三黄汤”（见《产科发蒙》）。

01392 川芎石膏汤

【方源】《宣明论》卷三。

【异名】 川芎石膏散（《审视瑶函》卷六）。

【组成】 川芎 赤芍药 当归 山栀 黄芩 大黄 菊花 荆芥 人参 白术各半两 滑石四两 寒水石二两 甘草三两 桔梗二两 缩砂仁一分 石膏 防风 连翘 薄荷叶各一两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，煎至六分，去滓，食后服；水调亦得。

【功用】 清神利头，宣通气血。解中外诸邪，调理诸病劳复传染。

【主治】 ①《宣明论》：风热上攻头面，目昏眩，痛闷，风痰喘嗽，鼻塞口疮，烦满淋闭，眼生翳膜，中风偏枯。②《普济方》引《医方大成》：目疾时发，缠生翳膜，烦躁多渴，疮癣皱揭。

【宜忌】 忌姜、醋、发热物。

01393 川芎石膏汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】 川芎 石膏 麻黄 苍术 葛根 甘草

【主治】 时气壮热，头痛无汗，脉洪长，恶风烦渴者。

【加减】 渴，加天花粉；热甚，加黄芩、柴胡。

01394 川芎当归散

【方源】《妇人良方》卷四。

【组成】 川芎一两 当归三分 羌活 旋覆花 华阴细辛 蔓荆子 防风 石膏 藁本 荆芥穗 半夏曲 干地黄 甘草各半两

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓温服。

【主治】 妇人血风头痛。

01395 川芎肉桂汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 川羌肉桂汤（原书目录）。

【组成】 酒汉防己 防风各三分 神曲 独活各五分 川芎 柴胡 肉桂 当归梢 甘草 苍术各一钱 羌活一钱五分 桃仁五个（去皮尖，研如泥）

【用法】 上㕮咀，都作一服，好酒三大盏，煎至一大盏，去滓，稍热食远服。

【主治】 露宿寒湿之地，腰痛不能转侧，两胁搐急作痛。

01396 川芎行经散

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 羌活 白芷 防风 荆芥 薄荷 蔓荆子 独活各四分 柴胡 炙甘草 当归 川芎 枳壳各六分 桔梗五分 茯苓三分 红花少许

【用法】 小二盏，煎至一盏，去滓，食后大热服。

【主治】 ①《原机启微》：目中青翳如物伤状，重者白睛如血贯。②《伤科汇纂》：眼目被伤，血灌瞳神及积血未散，至生翳膜。

【方论选录】 以枳壳、甘草和胃气为君；白芷、防风、荆芥、薄荷、独活疗风邪、升胃气为臣；川芎、当归、红花行滞血，柴胡去结气，茯苓分利除湿为佐；羌活、蔓荆子引入太阳经，桔梗利五藏为使，则胃脉调，小肠、膀胱皆邪去凝行也。

01397 川芎茶调散

【方源】《局方》卷二（吴直阁增诸家名方）。

【异名】 茶调散（《得效》卷十）、茶调汤（《医方类聚》卷八十二引《经验良方》）、川芎茶调饮（《不居集》下集卷二）。

【组成】 薄荷叶（不见火）八两 川芎 荆芥（去梗）各四两 香附子（炒）八两（别本作细辛去芦一两） 防风（去芦）一两半 白芷 羌活 甘草（炙）各二两

【用法】 上为细末。每服二钱，食后茶清调下。

【功用】 清头目。

【主治】 偏正头痛，伤风壮热，肢体烦疼，风热隐疹。

①《局方》：丈夫、妇人诸风上攻，头目昏重，偏正头疼，鼻塞声重；伤风壮热，肢体烦疼，肌肉瞤动，膈热痰盛；妇人血风攻注，太阳穴疼。②《普济方》引《如宜方》：肾气虚，脑髓不固，鼻渊。③《医方类聚》引《直指》：风热隐疹。

【方论选录】《医林纂要》：薄荷辛寒，轻虚上浮，上清头目之风热，旁搜皮肤之湿热，中去肝胆之虚热，下除肠胞之血热，此用以为君药，所谓“风淫于内，治以辛凉也”。荆芥辛苦温，上行祛头

目之风，除经隧之湿，去血中之风湿郁热，此以佐薄荷而为臣。芎藭甘辛，行血中之气，排筋骨之湿，上通巅顶，下彻血海，为厥阴肝经表药；羌活苦辛，此以祛太阳之风热；白芷辛温，此以祛阳明之风热；防风辛甘，缓肝补肝，以防风淫之内浸，故曰防风，其祛风不拘经络，无所不到；细辛辛温，达肾气，使上行以清耳目，主治少阴头痛；甘草以补土和中；茶叶甘苦寒，轻清上浮，能升清阳于上，而降浊阴于下，聪明耳目，开爽精神，虽非风药，而能助诸药，以散风除热，清头目。

【临证举例】 偏头痛 《哈尔滨中医》(1961；7：16)：作者用《局方》川芎茶调散原方治疗126例偏头痛患者，取得满意效果，有效率达83.3%。患者偏头痛为阵发性，可以固定或交替发作，右侧多于左侧，且都伴有神经忧郁状态。

01398 川芎茶调散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 川芎（酒拌） 荆芥 白芷 桔梗（炒） 甘草 黄芩（酒炒） 川贝母（去心）各一两 黑山栀二两

【用法】 上为细末。每服二钱，食后陈松萝细茶调下，一日三次。

【功用】 通窍清热。

【主治】 鼻渊，鼻中常出浊涕，源源不断。

01399 川芎神功散

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】 川芎四钱 甘草一分 川乌头 吴白芷 天南星 麻黄各半两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，煎至半盏，投清酒半盏。

【功用】 清神。

【主治】 风寒上攻，偏正头痛，无问微甚久新，头面昏眩。

【宜忌】 服后避风。

01400 川楝茴香散

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】 木香 茴香（盐炒香，不用盐） 川楝子（切片，盐炒，同盐用）各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，热酒一盏，空心调下。

【主治】 小肠疝气疼痛。

01401 久嗽噙化丸

【方源】《广笔记》卷二。

【组成】 真龙脑薄荷叶三两五钱 百部（酒浸，去心）三两五钱 麦门冬（去心）二两 天门冬（去心）二两 桑白皮（蜜炙）三两 枇杷叶（蜜炙）三两 贝母（去心）二两 桔梗（米泔浸，蒸，去芦）一两 甘草（蜜炙）七钱 天花粉二两 玄参一两 北五味（蜜炙）一两 款冬花蕊二两 紫苑八钱 真柿霜二两 橘红一两

【用法】 上为极细末，炼蜜为丸，如弹子大。不拘时候噙化，临卧更佳。

【主治】 久嗽。

01402 广泽汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】 麦冬二两 生地一两 车前子 刘寄奴各三钱

【用法】 水煎服。

【功用】 益肾补肺、利水。

【主治】 大病之后，肾水竭，膀胱枯，不能小便。

01403 广嗣良方

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】 山茱萸（水浸，去核）五两 天门冬（水浸，去心皮）五两 麦门冬（水浸，去心）五两 黄耆（去皮，蜜炙）二两 补骨脂（酒浸，水洗，炒黄）八两 菟丝子（拣净，酒浸一宿，晒干）三两 枸杞子（去枝蒂）三两 当归（酒洗，去芦，全用）二两 覆盆子（微炒）三两 蛇床子（水洗净，微炒）三两 川巴戟（酒浸，去心）三两 山药（洗净）一两 熟地黄（酒浸，捣如泥）三两 黄犬肾（酥炙，焙干）二副 白龙骨（火煅七次，童便盐酒淬，布包悬井底三日）二两 人参一两五钱 韭子（酒洗净，炒）三两 琐阳（酒洗，酥炙）二两 白术（水洗，土拌炒）一两 杜仲（去皮，酥炙）一两五钱 陈皮（水洗，去白，微炒）一两 紫河车一具（初生男胎者佳，将米泔水洗，用银针挑破，挤出紫血，待净入水坛内，好酒二斤，封固重汤煮烂如泥）

【用法】 上为极细末，入炼蜜，木臼内捣极匀，丸如梧桐子大。每服五、六十丸，渐加至一百丸止，空心盐汤送下；出外减半服之。

【主治】 男子不育。

01404 广嗣良方

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】 山茱萸（酒浸，去核）五两 香附子（去毛，四制）五两 川芎（酒洗）三两 熟地黄（酒洗，捣极烂）三两 白芍药（去皮，酒炒黄）四两 益母草三两 条芩（酒炒）二两 蛇床子（水洗净，微炒）二两 覆盆子（微炒）二两 玄

胡索（微炒）二两　陈皮（水洗，去白）二两　苍术（米泔水浸一宿）二两　砂仁（去壳）一两五钱　丹参（水洗）二两　当归（酒洗，去芦，全用）三两　白丝毛乌骨雄鸡一只（预先喂养一月，不令与雌鸡同处，临合将线绁死，不出血，干去毛，剖开去肠内污物，并膝内宿食，肫内黄皮，用酒洗净，一应事件仍装入鸡肚内，不令见水，置土坛内，入酒二斤，封固，重汤煮烂取出，刮下净肉，捣如泥，仍将鸡骨酥油和原汁或酒炙酥为末，入药末拌匀）

【用法】 上为极细末，同鸡肉地黄入醋煮米糊拌匀，木臼内捣极细为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，渐加至八九十丸，空心清米饮送下。

【主治】 女子不孕。

【加减】 如月信先期而至者，加黄芩、地骨皮、黄连各一两五钱，清米饮送下；如月信后期而至者，加黄耆一两，人参、白术各一两五钱，温酒淡盐汤任下；如下白带者，加苍术、白术、柴胡、升麻、白芷各一两五钱，淡姜汤送下。

01405　广大重明汤

【方源】 《兰室秘藏》卷上。

【组成】 龙胆草　防风　生甘草　细辛各一钱

【用法】 上锉如咀，纳甘草不锉，只作一锭。先以水一大碗半，煎龙胆一味，至一半，再入余三味，煎至少半碗，滤其滓，用清汁带热洗，以重汤坐令热，日用五七次。但洗毕，合眼一时。

【主治】 两目睑赤烂，热肿疼痛，及眼睑痒痛，抓之至破，眼弦生疮，目多眵泪，隐涩难开；胬肉泛长而痒。

01406　广大重明汤

【方源】 《审视瑶函》卷三。

【组成】 防风　川花椒　龙胆草　甘草　细辛各等分

【用法】 上锉如麻豆大，纳甘草不锉，只作一挺。先以水一大碗半，煎龙胆草一味，干一半，再入余三味，煎小半碗，去滓。用清汁带热洗，以重汤炖令极热，日用五七次，洗毕，合眼须臾，痒亦减矣。

【主治】 两目睑赤烂热肿痛，并梢赤，及眼睑痒极，抓至破烂，眼楞生疮痂，目多眵痛，隐涩难开。

01407　广茂溃坚汤

【方源】 《兰室秘藏》卷上。

【组成】 广茂　红花　升麻　吴茱萸各二分　生甘草　柴胡　泽泻　神曲　青皮　陈皮各三分　厚朴（生用）　黄芩　黄连　益智仁　草豆蔻仁　当归梢各五分　半夏七分

【用法】 上锉，如麻豆大。水二大盏，煎至一盏，食远稍热服。

【主治】 中满腹胀，内有积聚，坚硬如石，其形如盘，令人不能坐卧，大小便涩滞，上喘气促，面色萎黄，通身虚肿。

【宜忌】 忌酒、醋、湿面。

【加减】 如渴，加葛根四分。

【备考】 服二服之后，中满减半，只有积不消，再服后药（原书同卷“半夏厚朴汤”）。

01408　广笔鼠粘汤

【方源】 方出《广笔记》卷三，名见《金鉴》卷六十六。

【异名】 广笔牛子汤（《喉科种福》卷五）。

【组成】 贝母（去心）三钱　鼠粘子（酒炒，研）二钱　玄参二钱五分　射干二钱（不辣者是）　甘草二钱五分　栝楼根二钱　怀生地三钱　白僵蚕一钱（略炒，研）　连翘二钱　竹叶二十片

【用法】 水二钟，煎八分，饥时服。

【主治】 喉癣内热，咽嗌暗红，痛痒而燥，次生苔癣，甚则有小孔如蚁蛀，时吐臭涎，妨碍饮食。

①《广笔记》：喉癣内热。②《金鉴》：咽嗌干燥，初觉时痒，次生苔癣，色暗木红，燥裂疼痛，时吐臭涎，妨碍饮食。③《医碥》：胃火上炎灼肺，喉间生红丝如哥窑纹，又如秋海棠叶背，干燥而痒，久则烂开，有小孔如蚁蛀，名天白蚁。④《喉科种福》：喉内红色，暗而不鲜，于暗红色中，现出白色，疼痛而痒。

【宜忌】 《金鉴》：患者清心寡欲，戒厚味发物。

【备考】 《金鉴》本方用法：服汤同时，未溃吹矾精散，已溃吹清凉散。

01409　广术香附桃仁丸

【方源】 《保命歌括》卷二十七。

【组成】 海石　三棱　莪术　香附子（以上俱用醋煮，炒干）　红花　桃仁（去皮尖）　五灵脂各等分

【用法】 上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】 腹中积块。

01410　门冬膏

【方源】 《活人心统》卷下。

【组成】 天门冬（捣碎）

【用法】 取自然汁一碗，入蜜少许，二次分服。

【主治】 吐血、衄血，诸药不效者。

01411 门冬膏

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】麦门冬（去心）一斤

【用法】取自然汁一碗，入蜜少许，二次分服。

【主治】吐血、衄血，诸药不效者。

01412 门冬饮子

【方源】《元戎》引易老方。

【异名】麦门冬饮(《风劳臌膈》)。

【组成】人参 枸杞 白茯苓 甘草各三钱 五味子 麦门冬（去心）各半两

【用法】上为粗末，加生姜，水煎服。

【主治】①《元戎》：老弱虚人大渴。②《风劳臌膈》：肺虚，皮肤干燥，日渐黑瘦。

【备考】本方方名，《张氏医通》引作“门冬饮”。方中茯苓，《风劳臌膈》作“茯神”。

01413 门冬甘露饮

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】麦门冬二钱（去心） 黑参 黄芩 栝楼根 连翘各一钱 生甘草五分 灯心二十茎 竹叶二十片

【用法】水煎，温服。

【主治】麻疹热甚而渴。

01414 门冬清肺汤

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】天门冬 麦门冬 净知母 鲜桑叶 怀生地 枯黄芩 地骨皮 信前胡 北沙参 炙甘草

【用法】灯心为引。水煎服。

【主治】麻后咳嗽不已，身热而烦。

01415 门冬清肺饮

【方源】《内外伤辨》卷中。

【异名】麦门冬饮子(《卫生宝鉴》人卫本卷十)、门冬饮子(《卫生宝鉴》拔粹本)、麦冬清肺饮(《杏苑》卷三)。

【组成】紫菀茸一钱五分 黄耆 白芍药 甘草各一钱 人参（去芦） 麦门冬各五分 当归身三分 五味子三个

【用法】上㕮咀，分作二服。每服水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】①《内外伤辨》：脾胃虚弱，气促气弱，精神短少，衄血吐血。②《证治汇补》：劳伤气虚，火旺咳嗽。

【方论选录】①《杏苑》：方中人参、黄耆补中益气为君；紫菀、麦冬、五味泄火清肺金为臣；白芍、归身救阴血为使。②《张氏医通》：此生脉、保元合用，以滋金化源，其紫菀佐黄耆而兼调营卫，深得清肺之旨。其余芍药酸收，当归辛散，且走血而不走气，颇所非宜，不若竟用生脉、保元清肺最妥。先哲有保元、生脉合用，气力从足膝涌出，以黄耆实胃，五味敛津，皆下焦之专药耳。

01416 己戊丹

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】麝香1克 牛黄1克 炉甘石1克 雄黄1克 火消1克 黄丹1克 冰片1克

【用法】上为极细末。点于眼角。

【功用】凉血止血，清热解毒。

【主治】毒蛇咬伤。

01417 己字化毒丸

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】牛黄 牙皂各五分 木香二钱 生生乳一钱 乳香 没药各一钱七分 川山甲 白鲜皮 朱砂 雄黄 月月红各一钱五分 熟大黄 僵蚕各二钱 血竭一钱七分

【用法】上为末，用神曲末五钱打稠糊，入药捣匀为丸，如梧桐子大，另研朱砂为衣。每早空心服十三丸，每晚空腹服九丸，人参汤送下；沙糖汤亦可。

【主治】毒结于脾胃二经，外为小块肌肉蛀烂蔓延，或发大块破溃腿膝，或手足生鹅掌风癣，或传传经，致生别病。

01418 已寒丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十五引王海藏方。

【组成】附子（炮） 干姜（炮） 茴香（炒）各一两 良姜七钱 茯苓五钱 桂三钱

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食前温酒送下。

【功用】回阳返阴。

【主治】沉寒痼冷，脐腹冷痛。

01419 卫生汤

【方源】《元和纪用经》。

【组成】当归 余容（白者）各四两 黄耆（陕西者）八两 甘草（炙）一两

【用法】上为末，如米豆大。每服三匕，甘澜泉二升，石器中煮，七上七下，取清汁，分温二服，不拘时候。年老，水、酒各一升煮之。

【功用】祛风补劳，强五脏，益气除烦，养真阳，退邪热，通顺血脉，宣壅破积，止痛缓中，安和神志，润泽容色，止腰痛，散寒邪时疫；常服血脉通畅，不生痈疡，消痰养胃，明目益精；平凉而补火运之岁，以调荣卫。

【主治】①《元和纪用经》：孕妇腹中疠痛。冷

气心下急满，产后血晕，内虚气乏，崩中久痢。②《玉机微义》：带下不止，脉微弱。

01420 卫生汤

【方源】《医方类聚》卷二一五引《徐氏胎产方》。

【组成】白芍药 当归各二两 黄耆三两 甘草一两 人参一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水煎，空心服。

【主治】妇人，女子虚弱，月事不来。

01421 卫生汤

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】白芷 连翘 花粉各八分 荆芥 甘草节 莠子各一钱 防风 乳香 没药各五分 金银花二钱 贝母 当归尾各一钱五分

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒消痈，活血止痛。

【主治】痈疡初起。

【加减】大便秘结，热势极盛者，加酒炒大黄二三钱。

01422 卫真汤

【方源】《本事》卷二。

【组成】人参一两半 当归（酒浸一宿） 青皮（去白） 丁香各一两 川牛膝（童便、酒各半盏，浸一宿） 生地黄各二两 白茯苓 木香 肉豆蔻 熟地黄（温水洗） 山药各三两 金钗石斛五两

【用法】上为细末。每服三大钱，空心、食前酒调下，盐汤亦得；妇人诸疾，空心用童便同酒调下。

【功用】补气固摄，实丹田，填五脏。

【主治】丈夫、妇人元气衰惫，荣卫怯弱，真阳不固，三焦不和，上盛下虚，夜梦鬼交，觉来盗汗，面无精光，唇口舌燥，耳内蝉鸣，腰痛背倦，心气虚乏，精神不宁，惊悸健忘，饮食无味，日渐瘦悴，外肾湿痒，夜多小便，腰重冷痛，牵引小腹，足膝缓弱，行步艰难；妇人血海久冷，经候不调，或过期不至，或一月两来，赤白带下，漏分五色，子宫感寒，久不成孕。

01423 卫生防疫宝丹

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】粉甘草十两（细末） 细辛一两半（细末） 香白芷一两（细末） 薄荷冰四钱（细末） 冰片二钱（细末） 朱砂三两（细末）

【用法】先将前五味和匀，用水为丸，如梧桐子大，晾干（不宜日晒），再用朱砂为衣，勿令余剩，装以布袋，杂以琉珠，来往撞荡，务令光滑坚实，如此日久，可不走气味。若治霍乱证，宜服八十丸，开水送下；余证宜服四五十丸。服后均宜温覆微汗。若平素含化以防疫疠，自一丸至四五丸皆可。

【功用】醒脑养神。

【主治】霍乱吐泻转筋，下痢腹疼，及一切痧症。头疼、牙疼，心下、胁下及周身关节经络作疼。气郁、痰邪、食郁、呃逆、呕哕。防一切疫疠传染。

01424 女贞丹

【方源】《扶寿精方》。

【异名】二至丸（《医便》卷一）。

【组成】冬青子（去梗叶，酒浸一昼夜，粗布袋擦去皮，晒干为末）

【用法】待旱莲草出时，采数担捣汁熬浓，与前末为丸，如梧桐子大。每夜酒送下一百丸。

【功用】益肝肾，壮筋骨，乌发，止血。

①《扶寿精方》：乌发，健腰膝，强阴不足。②《医便》：清上补下。③《中国药典》：补益肝肾，滋阴止血。

【主治】《中国药典》：肝肾阴虚，眩晕耳鸣，咽干鼻燥，腰膝酸痛，月经量多。

【方论选录】《医方集解》：此足少阴药也。女贞甘平，少阴之精，隆冬不凋，其色青黑，益肝补肾；旱莲甘寒，汁黑入肾补精，故能益下而荣上，强阴而黑发也。

01425 女金丸

【方源】《中国药典》一部。

【组成】当归 140 克 白芍 70 克 川芎 70 克 熟地黄 70 克 党参 55 克 白术（炒）70 克 茯苓 70 克 甘草 70 克 肉桂 70 克 益母草 200 克 牡丹皮 70 克 没药（制）70 克 延胡索（醋制）70 克 藁本 70 克 白芷 70 克 黄芩 70 克 白薇 70 克 香附（醋制）150 克 砂仁 50 克 陈皮 140 克 赤石脂（煅）70 克 鹿角霜 150 克 阿胶 70 克

【用法】上为细末，过筛，混匀，每 100 克粉末加炼蜜 120～150 克制成大蜜丸，每丸重 9 克。口服：每次一丸，一日二次。

【功用】调经养血，理气止痛。

【主治】月经不调，痛经，小腹胀痛，腰腿酸痛。

【宜忌】孕妇慎用。

01426 女科白凤丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 白丝毛雌鸡一只 川石斛 香青蒿各四两（煎汤煮） 人参 北沙参 麦冬 生地 熟地 丹参 白术 茯苓 黄耆 当归 牛膝 秦艽 鳖甲胶 艾叶 地骨皮 川贝 川芎 川连 丹皮 银胡各一两

【用法】 米糊为丸服。

【功用】 补虚益劳，调经种子。

【主治】 妇人骨蒸内热，面黄肌瘦，浊淋带下，子宫寒冷，月事参差，难于生育者。

01427 小圣散

【方源】《施圆端效方》引洹用赵彦和方（见《医方类聚》卷一四一）。

【组成】 御米壳（去蒂，蜜浴，炒黄）三两 陈皮（去白） 干姜（炮） 甘草（炙）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，煎至七分，去滓，入蜜少许，食前温服。

【主治】 赤白冷痢，腹痛后重。

01428 小红丸

【方源】《理伤续断方》。

【组成】 骨碎补六两（姜制，焙取） 土当归六两（焙取） 川乌六两（煨） 白杨皮六两（焙） 肉桂四两（不见火） 莪术二两（焙） 丁香三两 干姜二两（焙） 川芎三两 细辛四两（焙） 附子三两半（煨，去皮） 乳香三钱（别研，不焙） 没药三钱（别研） 芍药六两（焙）

【用法】 上补、药、归、杨四味用当土者，余八味研为细末，乳、没别制，和醋糊为丸，如绿豆大，信朱为衣。每服三十丸，温酒送下，或用生姜煎酒，或盐汤送下，不拘时候；敷用生姜自然汁煎酒，或盐汤皆可，不拘时候。

【功用】 壮筋骨，治经络，生气血。

【主治】 跌折伤损，皮破骨出，手足碎断，筋肉坏烂，疼痛，甚至昼夜叫呼，百治不止；手足久损，筋骨差爻，举动不得；损后伤风湿，肢节挛缩，遂成偏废；劳伤筋骨，肩背疼痛，四肢疲乏，动用无力。

【宜忌】 孕妇莫服。

【备考】《医统》有续断一两。

01429 小红丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 天南星（末）一两（生） 朱砂半两（研） 巴豆一钱（取霜）

【用法】 上为末，姜汁面糊为丸，如黍米大。百日者一丸，一岁者二丸，随乳下。小儿一岁以内，常服极妙。

【功用】 化痰涎，宽膈，消乳癖，化惊风。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：乳癖、惊风、食痫、诸疳。②《鸡峰》：风热。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：南星以除痰；朱砂以镇惊；巴豆以除癖。

【备考】 本方为原书“三圣丸”之第二方。

01430 小麦汤

【方源】《医心方》卷十二引《古今录验》。

【组成】 小麦一升 栝楼根（切）一升 麦门冬一升

【用法】 以水三斗，煮取一斗半，饮之。

【主治】 消渴，日饮六七斗者。

01431 小麦汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】 小麦一合 芦根一握（锉） 竹茹 人参各一两 白茯苓（去黑皮）二两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎取一盏，去滓温服。不拘时候。

【主治】 心热多汗，及心胃客热，呕逆不睡。

01432 小麦粥

【方源】《药粥疗法》引《饮食辨录》。

【组成】 小麦 30～60 克 粳米 100 克 大枣 5 个

【用法】 将小麦洗净后，加水煮熟，捞去小麦取汁，再入粳米、大枣同煮；或先将小麦捣碎，同枣、米煮粥食用。以三至五天为一疗程，每天温热服食二至三次。

【功用】 养心神，止虚汗，补脾胃。

【主治】 心气不足，神经性心悸，怔忡不安，失眠，妇人脏躁病，自汗，盗汗，脾虚泄泻。

【备考】 根据临床用药，小麦有淮小麦、浮小麦之分，应针对病情，分别选用。

01433 小豆散

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】 赤小豆（烧熟）

【用法】 上为细末。每服二钱，食前温调下；葱白酒尤佳。

【主治】 肿满，小便不利。

01434 小灵丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】 白官硼二钱 朴消三钱 辰砂一钱半 乳香（去油） 没药（去油）各二分

【用法】 吹敷俱可。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：清热解毒，止痛生肌。

【主治】 ①《杂病源流犀烛》：疹后余毒壅遏在咽喉，肿痛，咽物不下，或结一切余毒，牙齿破烂。②《全国中药成药处方集》（沈阳方），牙齿破烂，舌唇焦裂，口疮等症。

01435 小青丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 青黛一钱 牵牛末二钱 腻粉一钱

【用法】 上为末，面糊为丸，如黍米大。百日者一丸，一岁者二丸，随乳送下。小儿一岁以内，常服极妙。

【功用】 化痰涎，宽膈，消乳癖，化惊风。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：痰涎、乳癖、惊风、食痢、诸疳。②《鸡峰》：热。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：腻粉治痰涎积滞；加青黛以熄肝风；牵牛以化乳癖而除疳。

【备考】 本方为原书"三圣丸"之第一方。

01436 小金丹

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】 小金丸（《中国药典》一部）。

【组成】 白胶香 草乌 五灵脂 地龙 木鳖各（制末）一两五钱 没药 归身 乳香各（净末）七钱五分 麝香三钱 墨炭一钱二分（陈年锭子墨，略烧存性，研用）

【用法】 以糯米粉一两二钱为厚糊，和入诸末，捣千锤为丸，如芡实大，此一料约为二百五十丸，晒干忌烘，固藏。临用取一丸，布包放平石上，膈布敲细，入杯内，取好酒几匙浸药，用小杯合盖，约浸一二时，以银物加研，热陈酒送下，醉，盖取汗。幼孩不能服煎剂及丸子者，服之甚妙。如流注等症，成功将溃，溃久者，当以十丸作五日早晚服，服则以杜流走，患不增出。

【功用】 ①《中药成方配本》：消痰化坚。②《北京市中药成方选集》：活血止痛，消结散毒。

【主治】 ①《外科全生集》：流注初起，及一应痰核、瘰疬、乳岩、横痃初起。②《中国药典》：阴疽初起，皮色不变，肿硬作痛，多发性脓肿。

【宜忌】 ①《外科全生集》：内有五灵脂，与人参相反，不可与有参之药同日而服。②《全国中药成药处方集》（北京方）：忌饮烧酒及食生冷，孕妇勿服。

【方论选录】《历代名医良方注释》：方中用草乌逐寒湿，通经络，开顽痰；当归、麝香、地龙温经养血，开通经络；五灵脂、乳香、没药活血祛瘀，消肿定痛；白胶香调气血，消痈疽；木鳖子祛皮里膜外凝结之痰毒，消结肿，恶疮；墨炭消肿化瘀；糯米以养胃气，酒服以助药势，使诸药速达病所。全方共奏化痰祛瘀，祛痰通络之功。

【临证举例】 流注 《外科全生集》：一儿岁半，太阳一毒，背上心脐对处二毒，颈后口对此一毒，腰腹二毒，两腿五毒，共十一毒，皆皮色无异，其大腿二毒，已经医者开刀，闻余至请治，以小金丹令日服二次，至五日消其九毒，消后，又以小金丹日服一次，十日后，二孔皆红润，以保元汤（耆、草皆用生者），加肉桂三分，煎杯许，另水煎参六分和服，半月后，以耆、草易炙者，一月收功。

01437 小胃丹

【方源】《医统》卷四十三引《三因》。

【组成】 芫花 甘遂 大戟各一两 大黄（酒拌蒸）一两半 黄柏（炒褐色）二两

【用法】 上为细末，粥为丸，如麻子大。每服十丸，温汤送下。

【功用】 ①《医统》引《三因》：上可去胸膈之痰，下可利肠胃之痰。②《中国医学百科全书·方剂学》：泻积利水通便。

【主治】 水饮痰热互结之肩膊、胸腹疼痛，食积，哮喘，咳嗽、心悸头眩，带下。

①《丹溪心法》：膈上痰热，风痰，湿痰，肩膊诸痛，食积痰实者；哮喘。②《医方考》：痰涎蓄积胃脘，胸腹作痛者。③《准绳·女科》：结痰白带。④《证治宝鉴》：水饮停膈而悸者，其人必觉头眩，身不热，而脉弦，属实者。⑤《饲鹤亭集方》：痰饮咳嗽，胸膈肠胃之间湿热痰郁，痞痹肿满，气血壅滞。

【宜忌】 ①《丹溪心法》：能损胃气，不宜多。②《济阴纲目》：唯胃虚少食者忌用。

【方论选录】《医方考》：小，消也；小胃者，消去胃中之痰物也。甘遂、芫花、大戟，能下十二经之湿痰，大黄佐之下行，黄柏制其辛烈。是方也，大毒之剂，攻杀击刺之兵也，善用则治，弗善用之则乱。

【临证举例】 ①哮 《续名医类案》：丹溪治一人哮，一日一发，此病在上焦，不得汗泄，正当十月，遂以麻黄、黄芩各二钱，入姜汁煎服，临卧进小胃丹三十粒而安。②痰饮 《医宗必读》：朱文学遍体如虫螫，口舌糜烂，余诊之，寸脉乍大乍小，意其为鬼祟，细察两关弦滑且大，遂断定为痰饮之病。投滚痰丸二钱，虽微有所下，而病患如旧，更以小胃丹二钱与之服，下痰积及水十余碗，遍体之痛减半，更以人参三钱、白术二钱，煎汤服小胃丹

三钱，大泻十余行，约有二十碗许，病若失矣。乃以六君子为丸，服四斤而愈。③白带 《准绳·女科》：陶遵道外姑，年七十，形瘦，善咳，白带，食前姜汤吞大补丸五十丸一二次，午膳后及临卧时各与小胃丹十五丸愈。

【备考】《丹溪心法》本方用法：芫花（好醋拌匀，过一宿，瓦器不住手搅，炒令黑，不要焦）、甘遂（湿面裹，长流水浸半日，再水洗晒干。又云，水浸冬七，春、秋五日，或水煮亦可）、大戟（长流水煮一时，再水洗晒干）各半两，大黄（湿纸裹煨，勿焦，切，焙干，再酒润，炒熟焙干）一两半，黄柏三两（焙炒），每服二三十丸，临卧津液吞下，或白汤一口送下，取其膈上之湿痰热积，以意消息之，欲利则空心服。按：《医学纲目》本方用法：上为末，以白术膏为丸，如萝卜子大。

01438 小营煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归二钱 熟地二三钱 芍药（酒炒）二钱 山药（炒）二钱 枸杞二钱 炙甘草一钱

【用法】水二钟，煎七分，食远温服。

【功用】①《景岳全书》：专补真阴；培养气血；滑胎。②《妇科玉尺》：临月服之易生。

【主治】①《景岳全书》：三阴亏弱，血虚经乱，无热无寒，经期腹痛，痛在经后者；妇人体本虚而血少，产后腹痛；产后阴虚发热，必素禀脾肾不足及产后气血俱虚，其证倏忽往来，时作时止，或昼或夜，进退不常，或精神困倦，怔忡恍惚，但察其外无表证，而脉见弦数，或浮弦豁大，或微细无力，其来也渐，非若他证之暴至者。②《妇科玉尺》：血亏则涩而难产；胎衣不下。

【加减】如营虚于上而为惊恐、怔忡不眠、多汗者，加枣仁、茯神各二钱；如营虚兼寒者，去芍药，加生姜；如气滞有痛者，加香附一二钱，引而行之。

01439 小黄丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】南星（汤洗）一两 半夏（洗）一两 黄芩一两半

【用法】上为细末，生姜汁浸，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸至七十丸，食后生姜汤送下。

【主治】热痰咳嗽，脉洪面赤，烦热心痛，唇口干燥，多喜笑。

01440 小黄丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄芩一两 半夏（姜汤制） 白术各五钱 陈皮 青皮（去白） 黄耆各三钱 泽泻二钱 干姜一钱五分

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服五十丸，食远温水送下。

【功用】化痰涎，和胃气，除湿。

【主治】胸中不利。

01441 小黄膏

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】黄龙膏（《卫生宝鉴》卷十三）。

【组成】黄柏 黄芩 大黄各等分

【用法】以上细末。以水调为糊，比前药（枯瘤方）大一遭贴之，三日一易。

【功用】《杂病源流犀烛》：凉肌退肿。

【主治】①《儒门事亲》：瘤。②《杂病源流犀烛》：颈项疮疡，石瘤。

【备考】原书以枯瘤方与本方同时应用。

01442 小蓟汤

【方源】《全生指迷方》卷四。

【异名】小蓟根汤（《鸡峰》卷十七）。

【组成】小蓟茎叶（洗、切、研，服汁）一盏 生地黄汁一盏 白术半两（细锉）

【用法】以水一盏，同煎，取一半，去滓，分二服。

【功用】《鸡峰》：补阴。

【主治】①《全生指迷方》：阴虚阳搏，为热所乘，伤于冲任，血得热则流散，冲任不能收。经候过多，遂至崩漏，色鲜明如水下，得温则烦，至于昏闷，其脉数疾微小为顺，大者逆。②《明医指掌》：气血两虚，内热太甚，崩中不止。

01443 小蓟汤

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】伏龙肝一斤（先于盆中，以水二斗，令碎，澄清，取一斗二升用） 桑寄生 续断 地榆 艾叶各三两 阿胶 当归 赤石脂 厚朴各二两 生姜五两 小蓟根三两

【用法】以伏龙肝水煮，取三升，绞去滓，分三服。

【主治】妇人崩中，无问远近。

01444 小蓟汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】小蓟根 生地 赤芍 木通 蒲黄 甘草梢 淡竹叶各一钱 滑石二钱 灯心四十五寸

【功用】水煎服。

【主治】产后尿血。败血流入膀胱，小腹痛，或内热小腹不通，但尿时涩痛者。

【加减】 败血，加归梢、红花各一钱；兼内热，加黄芩、麦冬各一钱。

01445 小蓟散

【方源】《得效》卷十七。

【组成】 白草霜 小蓟 香附子（炒，去毛） 真蒲黄各五钱

【用法】 上为末。揩牙齿上。立愈。

【主治】 牙齿宣露出血。

01446 小丁香丸

【方源】《局方》卷三。

【异名】 丁香丸(《普济方》卷三九四)。

【组成】 五灵脂十二两 丁香三两 木香一两半 肉豆蔻（去壳）三十个 巴豆（去皮膜，去油）二百一十个

【用法】 上为细末，入巴豆令匀，面糊为丸，如黍米大。每服五丸至七丸，食后温生姜汤送下，橘皮汤亦得；如霍乱吐逆，煎桃叶汤放冷送下。小儿吐逆不定，三岁儿服三丸，五岁以下服四丸，用生姜、桃叶汤送下。

【功用】 ①《局方》：消积滞生冷、留饮宿食，止痰逆恶心、霍乱呕吐；常服顺脾胃，进饮食。②《圣济总录》：止呕逆，利关膈，温脾胃，进乳食，定心腹痛。

【主治】 ①《局方》：心腹胀闷，胁肋刺痛，胸膈痞满，噎塞不通。②《圣济总录》：小儿宿食不消。

01447 小七香丸

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【异名】 七香丸(《百一》卷二引冯仲柔传徐家方)。

【组成】 甘松（炒）八十两 益智仁（炒）六十两 香附子（炒，去毛） 丁香皮 甘草（炒）各一百二十两 蓬莪术（煨，乘热碎） 缩砂仁各二十两

【用法】 上为末，水浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服二十丸，温酒、姜汤、熟水任下；或气胀满，磨乌药水煎汤下；或酒食过度，头眩恶心，胸膈满闷，先嚼二十丸，后吞二十丸，生姜、紫苏汤送下。

【功用】 ①《局方》（绍兴续添方）：温中快膈，化积和气。②《医方类聚》引《医方大全》：化积气，消宿食，止泻痢。

【主治】 ①《局方》：中酒吐酒，呕逆咽酸，气膈食噎，饮食不下，冷涎翻胃，腹胀脾疼，远年茶酒食积，眼睑俱黄，赤白痢疾，脾毒泄泻。妇人脾血气，小儿疳气。②《玉机微义》：郁怒忧思，或因闪挫撅扑，一切气滞腰痛。

01448 小已寒丸

【方源】《元戎》。

【异名】 强中丸。

【组成】 艾叶四两 苍术一两（炒） 陈皮二两（炒） 吴茱萸二两（炒）

【用法】 上药用米醋二升浸一宿，漉出晒干，再于原浸药醋内拌和匀，炒令紫色，焙干为末，稀糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前温酒、盐汤、醋汤送下。

【功用】 进食，止自汗，厚肠胃。

【主治】 脾胃积冷，中寒洞泄，倦怠，不思饮食。

01449 小木香散

【方源】《博济》卷三。

【异名】 定胃散(《博济》卷三注文引《胡氏经效方》)、木香汤(《圣济总录》卷四十七)。

【组成】 胡椒二十一粒 木香一小块 糯米一撮

【用法】 上药同炒至米熟为度，杵为末。分作两服，每服水一盏，煎至六分，温服。

【功用】 开胃和气。

【主治】 翻胃，全不下食。

01450 小五退散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】 蝉蜕 蛇蜕 蚕纸 乌鸡卵壳 男子发

【用法】 上药烧存性，研为末。每用一钱，和羊肝汤吃，不拘时候常服。

【主治】 内障眼。

01451 小分清饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 茯苓二三钱 泽泻二三钱 薏仁二钱 猪苓二三钱 枳壳一钱 厚朴一钱

【用法】 水一钟半，煎七八分，食前服。

【功用】 ①《成方切用》：消导，燥湿。②《谦斋医学讲稿》：利尿，理气。

【主治】 小水不利，湿滞肿胀泄泻者；湿胜无寒而泻者；湿热下流，火伏阴中而遗精者；溺白证，饮食湿滞无内热者；湿热证热微者；淫浊初起，无火而但有窒塞者；气痕，气结膀胱，小水不利者；小儿吐泻；痘疹，湿热下利，烦热大渴，小水热涩面腹痛者；小水不利，湿滞肿胀，不能受补者。

【加减】 如阴虚水不能达者，加生地、牛膝各二钱；如黄疸者，加茵陈二钱；如无内热而寒滞不行者，加肉桂一钱。

01452 小乌沉汤

【方源】《局方》卷二（绍兴续添方）。

【异名】乌附汤（《丹溪心法附余》卷十四）、抑气散（《张氏医通》卷十四）。

【组成】乌药（去心）十两　甘草（炒）一两　香附子（沙盆内断去皮毛，焙干）二十两

【用法】上为细末。每服一钱，入盐少许，或不着盐，沸汤点服，不拘时候。

【功用】调中快气。

【主治】气不调和所致的心腹刺痛、便血。

①《局方》：心腹刺痛。②《外科发挥》：气不调和，便血不止。③《成方便读》：气闭血瘀，心腹刺痛。

【方论选录】①《张氏医通》：此乃《局方》乌沉汤之变法，中去参、姜，而易香附，其破气之力虽峻，而功力稍逊，故以小字加之，立方之意微矣。②《成方便读》：此方全不用血药，但以香附、乌药辛苦而温，芳香而燥，专行气分之品，可宣可散；沉香之降气，上至天而下至泉，使表里上下无一毫留着，自然血自行而痛自消矣；用甘草者，痛则筋脉急而正气伤，以和中而缓急也。

【备考】按：本方名小乌沉汤，但方中无沉香，疑脱。《张氏医通》本方用法：三味水煎，即用药汁磨沉香五分，入盐一字，热服。

01453 小风引汤

【方源】《千金》卷七引《胡治方》。

【组成】独活　茯苓　人参各三两　防风　甘草　干姜各二两　附子一枚　大豆二升

【用法】上㕮咀。以水九升，酒三升，煮取三升，分四服。

【主治】中风腰脚疼痛弱者。

01454 小风引汤

【方源】《千金》卷七。

【组成】独活　茯苓　人参各三两　防风　当归　甘草　干姜　石斛各二两　附子一枚　大豆二升

【用法】上㕮咀。以水九升，酒三升，煮取三升，分四服。服别相去如人行十里久。

【主治】中风，腰脚疼痛弱者。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜、猪肉、冷水、醋等。

【方论选录】《千金方衍义》：此本长沙四逆加人参汤以攻伏匿之本邪，加独活、防风以祛下部之贼风，茯苓、石斛以化外淫之标热，当归、大豆以润血脉之引急也。

01455 小风引汤

【方源】《本事》卷一。

【组成】防风（去叉股）　独活（去芦，洗，焙）　细辛（去叶）　川芎（洗，焙）　五味子（拣）　白茯苓（去皮）　人参（去芦）　白芍药　白术　甘草（炙）各等分

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，杏仁五个（去尖，拍碎），同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】《普济方》：调气，进食，宽中。

【主治】①《本事》：中风。②《普济方》：左瘫右痪，素有风湿。

01456 小凤髓丹

【方源】《元戎》卷十。

【异名】养真丹。

【组成】甘草半两　黄柏（炒）二两

【功用】《赤水玄珠》：泻心包络相火，益肾水。

【主治】《赤水玄珠》：梦遗。

【备考】《赤水玄珠》本方用法，上为末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸。

01457 小甘露饮

【方源】《济生》卷一。

【组成】黄芩　升麻　茵陈　栀子仁　桔梗（去芦，锉，炒）　生地黄（洗）　石斛（去根）　甘草（炙）各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾劳实热，身体眼目悉黄，舌干，咽喉痛。

01458 小龙荟丸

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】当归　草龙胆（酒洗）　山栀（炒）　黄连（炒）　川芎各半两　大黄（煨）半两　芦荟三钱　木香一钱　（一方有黄芩、柴胡各半两，无大黄、木香。一方有甘草、柴胡、青皮，无当归，栀子）

【用法】上为末，入麝香少许，粥糊为丸，如绿豆大。每服五十丸，姜汤送下。仍以琥珀膏贴痛处。

【主治】①《丹溪心法》：胁痛，肝火盛；有积，因饮食大饱，劳力行房。②《杂病源流犀烛》：大怒气逆，或谋虑不遂，肝火动甚，胠胁肋痛。

01459 小半夏丸

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【异名】沉香堕痰丸（《御药院方》卷五）、半夏丸（《普济方》卷一六六）。

【组成】半夏二两（为末，生姜汁作饼，晒干）

木香 沉香各半分 青橘皮（汤浸，去白，炒）一分 槟榔（大者）一枚（面裹，煨熟，切，焙）

【用法】 上为末，以生姜汁浸，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服十五丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】 ①《圣济总录》：留饮不散，膈脘不利，宿食不消，呕逆恶心。②《御药院方》：宿饮不消，咽膈不利，咳嗽痰涎，头目昏晕，呕逆恶心，胸膈不快。

01460 小半夏汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 半夏生姜汤（《活人书》卷十八）、半夏汤（《卫生总微》卷七）、鲜陈汤（《古今医鉴》卷五）。

【组成】 半夏一升 生姜半斤

【用法】 以水七升，煮取一升半，分温再服。

【功用】 蠲饮和胃，降逆止呕。

①《医宗必读》：定吐，开胃，消食。②《法律》：温胃燥湿。③《医学金针》：除痰，降气，开胃。

【主治】 痰饮内停，呕吐，反胃，呃逆，霍乱，心下痞，不寐。

①《金匮》：呕家不渴，心下有支饮；黄疸病，小便色不变，欲自利，腹满而喘，不可除热，热除而哕者；诸呕吐，谷不得下者。②《外台》引仲景：呕哕，心下悸，痞硬不能食。③《外台》引《救急》：天行后哕，兼主伤寒。④《圣济总录》：霍乱呕吐涎沫，医反下之，心下作痞。⑤《医学正传》：阳明伤寒，不纳谷而呕吐不已者。⑥《医学入门》：呃逆，谷气入口即吐，及发汗后水药不下。⑦《景岳全书》：反胃，寒痰甚者。⑧《古今名医方论》引赵以德：膈上痰，心下坚，呕逆，目眩。⑨《证治汇补》：胃实呕吐。⑩《医学金针》：不寐。

【宜忌】《外台》引仲景：忌羊肉、饧。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》赵以德：半夏之味辛，其性燥，辛可散结，燥可胜湿，用生姜以制其悍；孙真人云：生姜呕家之圣药，呕为气逆不散，故用生姜以散之。②《古方选注》：小制之方，以脾胃二经分痰饮立治法。盖胃之支脉有饮，则胃逆为呕而不渴，主之以半夏辛温泄饮，生姜辛散行阳，独治阳明，微分表里。③《金鉴》：引李彣：半夏、生姜温能和胃气，辛能散逆气。

【临证举例】 ①呕吐 《上海中医药杂志》（1970；4：25）：陈某某，男，53岁，因慢性胃窦炎伴息肉样变而行胃次全切除术，术后第六天发生胆汁性呕吐，持续70多天不能进食，而行二次手术（松解粘连），但呕吐未能缓解。予中药旋覆代赭汤、泻心汤、左金丸等加减以及益气养阴，生津和胃等剂治疗亦无效。改用小半夏汤加人参，方用生半夏9克，生姜9克，别直参9克（另煎），浓煎40毫升，分两次服，连服五剂后呕吐止，并能进食。②咳 《临证指南医案》：脉沉短气，咳甚，呕吐饮食，便溏泄。乃寒湿郁痹，渍阳明胃，营卫不和。胸痹如冈，无非阳不旋运，夜阴用事，浊泛呕吐矣。庸医治痰顺气，治肺论咳，不思《内经》胃咳之状，咳逆而呕耶。小半夏汤加姜汁。

01461 小半夏汤

【方源】《千金》卷十八。

【异名】 橘皮半夏汤（《宣明论》卷九）。

【组成】 半夏一升 生姜一斤 橘皮四两（一方用人参二两）

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【功用】 ①《宣明论》：养液润燥，解肌热，止咳嗽。②《千金方衍义》：温理中气。

【主治】 痰饮胸满，呕逆恶心，头痛眩晕。

①《千金》：心腹虚冷，游痰气上，胸胁满，不下食，呕逆，胸中冷者。②《鸡峰》：呕逆恶心，头疼眩运，臂痛背寒，嗜烦多睡。③《宣明论》：痰壅涎嗽，久不已者。④《局方》（吴直阁增诸家名方）：肺胃虚弱，好食酸冷，寒痰停积，呕逆恶心，涎唾微稠粘，或积吐，粥药不下，手足逆冷，目眩身重；又治伤寒时气，欲吐不吐，昏懵闷乱；或饮酒过多，中寒停饮，喉中涎声，干哕不止。⑤《伤寒大白》：水饮喘逆而无火者。

【宜忌】 羸弱及老人尤宜服之

【加减】 若心中急及心痛，纳桂心四两；若腹满痛，纳当归三两。

01462 小芎辛汤

【方源】《普济方》卷四十六引《济生》。

【组成】 川芎一两 细辛（去芦） 白术（去芦，炒） 甘草（炙）各半两

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，茶芽少许，煎至七分，不拘时候温服。

【主治】 ①《普济方》引《济生》：风寒在脑，或感湿头重头痛，眩晕欲倒，呕吐不定。②《杏苑》：眼眶疼，身重有痰者。

【备考】 本方方名，《医方类聚》引作“芎辛汤”。

01463 小朱砂丸

【方源】《幼幼新书》卷十九引《刘氏家传》。

【组成】朱砂一两　胆星　人参　茯苓　珍珠　半夏（姜制）各半两　龙脑　麝香各少许

【用法】蒸饼为丸，如黍米大。每服四五丸，金银汤送下，不拘时候。

【功用】①《幼幼新书》引《刘氏家传》：化风痰，安神。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：镇惊化痰。

【主治】①《幼幼新书》引《刘氏家传》：小儿睡眠多惊。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：痰涎壅塞，身热面赤，急惊风症；咳嗽失眠，心跳怔忡，痰厥昏睡。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌食辣物。

01464　小安肾丸

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验方）。

【组成】香附子　川乌　川楝子各一斤（以上用盐四两，水四升同煮，候干，锉，焙）　熟干地黄八两　茴香十二两　川椒（去目及闭口者，微炒出汗）四两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、卧时盐汤、盐酒任下。

【功用】补虚损，益下元。

【主治】肾阳不足，夜多小便，腰膝沉重，肠鸣泄泻，耳鸣目暗，牙齿动摇出血，寒湿疝气。

①《局方》：肾气虚乏，下元冷惫，夜多旋溺，肢体倦怠，渐觉羸瘦，腰膝沉重，嗜卧少力，精神昏惫，耳作蝉鸣，面无颜色，泄泻肠鸣，眼目昏暗，牙齿蛀痛。②《景岳全书》：久泻；阳虚于下，虚火上浮，口不臭，牙不痛，但齿摇不坚，或微痛不甚而牙缝多出血者；痿证。③《张氏医通》：小腹寒疝作痛。④《金匮翼》：肾虚冷惫，阴火上升，喘嗽，齿疼，腰痛。⑤《饲鹤亭集方》：女人胞门受寒，小腹疼痛。

【方论选录】《杂病证治》：风寒袭入肾经，不能主骨而牙失所养，故牙齿疼痛、牙根摇动焉。熟地补阴坚齿牙，川乌入肾逐风寒，川椒温中逐冷，茴香温经散寒，香附调血中之气，楝子泻湿中之热以肃清经腑也，盐汤润下，酒服温行，使风寒外解，则肾气清融；而骨得所养，则齿无不坚，何疼痛之不痊哉。此补虚逐冷之剂，为风寒袭肾齿痛之专方。

01465　小防风汤

【方源】《简易方》引《录验方》（见《医方类聚》卷二十）。

【组成】防风（去芦）　秦艽（去苗）　羌活　附子（炮，去皮脐）各等分

【用法】上为粗末。每服三大钱，水一盏半，加生姜三片，煎至七分，去滓，入生地黄汁两合，再煎数沸，空心服。

【主治】中风，手足麻木不仁。

01466　小灵宝丹

【方源】《元戎》。

【组成】附子（炮）二两　天麻　全蝎　白僵蚕（炒）　藿香叶　南星（炮）　白附子（炮）各半两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，温酒送下。

【功用】疏散风寒。

【主治】风痛。

01467　小阿魏丸

【方源】《医学纲目》卷二十五引《得效》。

【组成】三棱（醋炙）一两　蓬术（醋制）一两　青皮（醋制）二两　胡椒三钱　木香一两　麝香二分　阿魏二钱半

【用法】上为末，醋煮陈苍米粉为丸，如梧桐子大。

【主治】胁下积块。

01468　小阿魏丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】石碱丸（《医学入门》卷七）。

【组成】山楂三两　石碱三钱　半夏一两（皂角水浸透，晒干）

【用法】上为末，阿魏半两，醋浸糊为丸。每服三十丸，白汤送下。

【主治】食积。

①《丹溪心法》：肉积。②《医学纲目》引《丹溪心法》：小儿食积，腹如蜘蛛状，肚痛，小便白浊。③《准绳·幼科》：小儿腹胀。④《医学入门》：痰饮成积。⑤《中国医学大辞典》：食肉太多，腹中积聚胀痛。

01469　小青龙汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】青龙汤（《外台》卷八引《千金》）、细辛五味汤（《御药院方》卷五）。

【组成】麻黄（去节）　芍药　细辛　干姜　甘草（炙）　桂枝（去皮）各三两　五味子半升　半夏半升（洗）

【用法】以水一斗，先煮麻黄减二升，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

【功用】解表散寒，温肺化饮。

①《金镜内台方议》：发越风寒，分利水气。②《医方集解》：行水发汗。③《金鉴》：外发太阳之表实，内散三焦之寒饮。

【主治】 外感风寒，内停水饮。恶寒发热，无汗，咳嗽喘促，痰多而稀，不渴饮，或身体疼重，头面四肢浮肿，舌苔白，脉浮或浮滑。

①《伤寒论》：伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者；伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴。②《金匮》：溢饮；咳逆倚息不得卧；妇人吐涎沫。③《御药院方》：肺气不利，咳嗽喘急，胸膈烦闷，痰盛涎多，喉中有声，鼻塞清涕，头痛目眩，肢体倦怠，咽嗌不利，呕逆恶心。④《景岳全书》：时行风邪在肺，咳嗽喘急多痰，而阴寒气甚，邪不易解者；瘟疫，若伤风兼寒而发热咳嗽者；外感之嗽，若冬月寒盛气闭，邪不易散者；实喘，若冬月风寒感甚者。肝肺受寒，咳嗽喘急。⑤《济阳纲目》：水寒相搏发呃。⑥《医灯续焰》：水寒射肺而咳，脉浮；痰饮停于胸胃咳嗽；劳极，形寒寒饮伤肺，肺伤少气，咳嗽鼻鸣。⑦《伤寒附翼》：水寒在胃，久咳肺虚。⑧《金匮翼》：冷嗽；喘因寒邪入肺者，皮肤痛，寒热，上气，喘咳动肩背，呼吸不利，右寸沉而紧，亦有六部俱伏者；胸喘者，积痰在肺，遇冷即发，喘鸣迫寒，但坐不得卧，外寒与内饮相搏。⑨《产科发蒙》：妊娠感风寒喘嗽。⑩《温病条辨》：秋湿内伏，冬寒外加，脉紧无汗，恶寒身痛，喘咳稀痰，胸满舌白滑，恶水不欲饮，甚则倚息不得卧，腹中微胀。

【宜忌】 《外台》引《千金》：忌海藻、菘菜、羊肉、饧、生菜、生葱。

【加减】 若渴，去半夏，加栝楼根三两；若微利，去麻黄，加荛花如一鸡子（熬令赤色）；若噎者，去麻黄，加附子一枚（炮）；若小便不利，少腹满者，去麻黄，加茯苓四两；若喘，去麻黄，加杏仁半斤（去皮尖）。

【方论选录】 ①《伤寒明理论》：麻黄味甘辛温，为发散之主，表不解，应发散之，则以麻黄为君。桂味辛热，甘草味甘平，甘辛为阳，佐麻黄表散之，用二者所以为臣。芍药味酸微寒，五味子味酸温，二者所以为佐者，寒饮伤肺，咳逆而喘，则肺气逆。《内经》曰：肺欲收，急食酸以收之，故用芍药、五味子为佐，以收逆气。干姜味辛热，细辛味辛热，半夏味辛微温，三者所以为使者，心下有水，津液不行，则肾气燥。《内经》曰：肾苦燥，急食辛以润之。是以干姜、细辛、半夏为使，以散寒水。逆气收，寒水散，津液通行，汗出而解矣。水蓄则津液不行，气燥而渴，半夏味辛温，燥津液者也，去之则津液易复；栝楼根味苦微寒，润枯燥者也，加之则津液通行，是为渴所宜也。水气下行，渍入肠间，则为利，下利者，不可攻其表，汗出必胀满，麻黄专为表散，非下利所宜，故去之；荛花味苦寒，酸苦为涌泄之剂，水去利则止，荛花下水，故加之。噎为胃气虚竭，麻黄发汗，非胃虚冷所宜，故去之；附子辛热，热则温其气，辛则散其寒，而噎者为当，两相佐之，是以祛散冷寒之气。水蓄下焦，渗泄可也，发汗则非所当，故去麻黄；而茯苓味甘淡，专行津液，故加茯苓。喘为气逆，麻黄发阳，去之则气易顺，杏仁味甘苦温，加之以泄逆气。②《医方考》：青龙者，东方木神，主发育万物，方以发散为义，故名之。③《重订通俗伤寒论》何秀山按：风寒外搏，痰饮内伏，发为痰嗽气喘者，必须以小青龙加减施治。盖君以麻、桂辛温泄卫，即佐以芍、草酸甘护营；妙在干姜与五味拌捣为臣，一温肺阳而化饮，一收肺气以定喘；又以半夏之辛滑降痰，细辛之辛润行水，则痰饮悉化为水气，自然津津汗出而解。④《研经言》：古经方必有主药，无之者小青龙是也。何以言之？方中麻、芍、姜、辛、桂、甘各三两，味、夏各半升。考古半升，约古分亦三两。仲景每以半夏半斤配生姜三两，五味半升配生姜三两，此方正其例也。八味轻重同则不相统，故曰无主药。或谓麻黄先煎即是主药，岂知麻黄以有沫当去，不得不先煎，与先煎泽漆、先煎大黄有别。特以肺为水源，以此疏其壅塞耳！且本方加减法云去麻黄者四，麻黄在可去之例，岂主药乎？匪特麻黄非主药也，即桂枝亦不过因表不解发热而用之，其与芍药、甘草同用，全乎桂枝汤矣。桂枝即非主药，芍药、甘草更可知已，又何论半夏乎？此方本从桂枝来，而其义则在干姜、五味、细辛三味。本论于柴胡汤、四逆散方下云：咳者，加干姜、五味子、细辛，即此方主治之义。柴胡汤方下又云：咳者，去人参、生姜、大枣，加五味子、干姜，即此方用桂枝汤，所以必去枣、姜之义。然则小青龙为治饮家咳之方，故凡用干姜、五味子，而与若桂、若麻并施者，皆自此出。如《金匮》厚朴麻黄汤、射干麻黄汤、苓桂五味甘草姜辛汤、苓桂五味甘草姜辛半夏汤、苓桂五味甘草姜辛半夏杏仁汤、苓桂五味甘草姜辛半夏杏仁大黄汤六方是也。⑤《衷中参西》：仲景之方，用五味即用干姜，诚以外感之证皆忌五味，而兼痰嗽者尤忌之，以其酸敛之力甚大，能将外感之

邪锢闭肺中永成劳嗽，唯济之以干姜至辛之味，则无碍。而愚近时临证品验，则另有心得，盖五味之皮虽酸，其仁则含有辛味，以仁之辛济皮之酸，自不至因过酸生弊。

【临证举例】 ①喘急 《马元仪医案》：发热喘急，头痛下行胸胁，昼夜不安，面赤，不渴，二便如常，左脉弦虚，右脉空大，此无形之感挟有形之痰，表里合邪，互结于胸胁之位也，与仲景小青龙汤。②哮喘 《中成药研究》(1983；12:21)：用重剂小青龙汤（蜜炙麻黄15克、桂枝9克、五味子9克、干姜9～15克、制半夏30克、白芍30克，细辛6～9克、甘草9～15克）加减治疗寒喘型及热喘型支气管哮喘24例，其中20例服本方1剂后，哮喘即平息，最快的约在服药半小时后即气喘平息，两肺哮鸣音霍然消失。其余4例分别服至6～10剂后亦见效。其中寒喘型如寒痰粘稠者可加旋覆花、白芥子、莱菔子、苏子，热喘型加石膏，痰热壅肺者加鱼腥草、开金锁、象贝母、淡竹沥。③咳嗽 《经方实验录》：姜佐景治张某，暑天多水浴，因而致咳，诸药乏效，遇寒则增剧，此为心下有水气，与小青龙汤，净麻黄钱半、川桂枝钱半，大白芍二钱、生甘草一钱、北细辛钱半、五味子钱半、干姜钱半、姜半夏三钱。二日后，咳已全愈，但觉微喘耳，此为余邪，宜三拗汤轻剂。④溢饮 《南雅堂医案》：水饮流行，归于四肢，当汗不汗，身体疼重，即经所谓溢饮也，此症以得汗为出路，然饮既流溢，亦随人之脏气寒热而化，今饮从寒化，忌用辛凉发汗之剂，宜以辛温发汗利水方合，治法拟用小青龙主之，麻黄三钱（去根节，先煎去沫）、白芍药三钱、干姜三钱、炙甘草三钱、桂枝木三钱、五味子一钱五分、法半夏一钱五分、细辛三钱同煎服。⑤肺胀 《南雅堂医案》：诊得脉浮大，目如脱，气急而喘，是肺胀之实症，幸下元未虚，可施以发散，拟用小青龙汤主之，麻黄二钱（去根切，先煎，去沫）、白芍药二钱、炙桂枝二钱，干姜二钱、法半夏二钱、五味子一钱、细辛八分，水同煎。⑥小儿肺炎 《中西医结合杂志》(1985;5:276)：辨证为表寒实证者，用小青龙汤（麻黄、桂枝、芍药各6克，五味子、细辛各2克，干姜、半夏、甘草各3克）小儿喘息型肺炎11例，方中麻黄、桂枝、干姜、五味子快火急煎；细辛后下。烦重者重用五味子，痰稠者加竹沥，苔黄者加黄芩。一剂两煎，混合后分4～6次口服，喘重者隔30分钟服一次。病情好转后换服二陈汤善后，11例全部治愈。症状消失时间，其中最短2天，最长12天，平均3.8天。

【现代研究】 ①平喘作用 《中成药研究》(1982;3:22)：用本方及其主要组成药的不同组合的水煎剂和醇提取液与对照药（盐酸麻黄碱、盐酸肾上腺素等注射液）进行对比研究。实验表明，本方及其主要组成药的水煎剂和醇提取液，对豚鼠离体气管平滑肌均有不同程度的松弛作用；并有抗组胺、抗乙酰胆碱和抗氯化钡作用。实验还表明，麻黄、半夏在本方中不占主要地位，本方去麻黄，半夏后的醇提取液仍显示很强的抗组胺等作用。另外，对豚鼠药物性哮喘有明显保护作用。②抗过敏作用 《国外医学中医中药分册》(1988;2:57)：注射抗原前2或3小时给小青龙汤(100mg/kg)。结果表明：本方能明显抑制由蛋清(EA)和抗EAIgE抗体引起的豚鼠被动皮肤过敏症，对组胺、血清素和乙酰胆碱引起的炎症反应均有抑制作用。③对兔耳血管及大鼠足跖温度的影响 《中成药研究》(1985;8:41)：实验表明：本方醇提水剂能明显增加离体兔耳血管的流出量；给大鼠腹腔注射本方后半小时，足跖温度明显高于对照组（注射生理盐水），且表现为先升后降的作用。

01470 小刺蓟煎

【方源】 《鸡峰》卷十。

【组成】 刺蓟 白薄荷各二两 荆芥 生地黄 柏叶 赤芍药 甘草各一两半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后茶清嚼下。

【主治】 吐血。

01471 小拨云散

【方源】 《银海精微》卷下。

【组成】 黄芩 甘草 栀子 大黄 芍药 郁金 龙胆草 羌活 蝉蜕 木贼 当归 蒙花 蒺藜

【主治】 男妇目涩痛烂，泪出羞明怕日，血灌瞳神者。

01472 小败毒膏

【方源】 《赵炳南临床经验集》。

【组成】 大黄五两 蒲公英十两 陈皮四两 木鳖子（打碎）一两 黄柏五两 金银花一两 乳香（醋炙）一两 白芷三两 甘草一两 天花粉三两 赤芍五两 当归一两

【用法】 每服五钱，热开水冲服，一日二次。

【功用】 散瘤清热，消肿止痛。

01473 小和中饮

【方源】 《景岳全书》卷五十一。

【组成】 陈皮一钱五分 山楂二钱 茯苓一钱半 厚朴一钱五分 甘草五分 扁豆（炒）二钱

【用法】 水一钟半，加生姜三五片，水煎服。

【主治】 胸膈胀满，或妇人胎气滞满；因食而成疟痢；病后浊气未净，或余火未清，胃口不开，饮食不进；呃逆；食饮寒凉，或误食性寒生冷等物，致伤胃气因而作呕，寒滞未散而兼胀兼痛；吐利因于过食，或瓜果生冷，以致食留不化，遂成痞膈霍乱；积聚，不堪攻击，只宜消导渐磨者；恶阻，饮食停滞作胀；小儿伤食呕吐，但有食滞而胃不寒者；小儿痞块，兼胃脘停积，食滞作胀；痘疹，饮食停滞，中满作痛者。

【加减】 如呕者，加半夏一二钱；如胀满气不顺者，加砂仁七八分；如火郁于上者，加焦栀子一二钱；如妇人气逆血滞者，加紫苏梗、香附之属；如寒滞不行者，加干姜、肉桂之属。

01474 小金丝膏

【方源】 《本草纲目》卷三十四。

【组成】 沥青 白胶香各二两 乳香二钱 没药一两 黄蜡三钱

【用法】 以香油三钱，同熬至滴下不散，倾入水中，扯千遍收贮。每捻作饼，贴之。

【主治】 疮疖肿毒。

01475 小定风珠

【方源】 《温病条辨》卷三。

【组成】 鸡子黄一枚（生用） 真阿胶二钱 生龟版六钱 童便一杯 淡菜三钱

【用法】 水五杯，先煎龟版、淡菜，得二杯，去滓，入阿胶，上火烊化，纳鸡子黄，搅食令相得，再冲童便，顿服之。

【主治】 下焦温病，既厥且哕（俗名呃忒），脉细而劲。

【宜忌】 《时病论》：小定风珠似乎腻滞，非脉证审确，不可轻用。

【方论选录】 《温病条辨》：温邪久踞下焦，烁肝液为厥，扰冲脉为哕，脉阴阳俱减则细，肝木横强则劲。故以鸡子黄实土而定内风；龟版补任而镇冲脉；阿胶沉降，补液而熄肝风；淡菜生于咸水之中而能淡，外偶内奇，有坎卦之象，能补阴中之真阳，其形翕阖，故又能潜真阳之上动；童便以浊液仍归浊道，用以为使也。名定风珠者，以鸡子黄宛如珠形，得巽木之精，而能熄肝风，肝为巽木，巽为风也。

01476 小定心汤

【方源】 《千金》卷十四。

【组成】 茯苓四两 桂心三两 甘草 芍药 干姜 远志 人参各二两 大枣十五枚

【用法】 上㕮咀。以水八升，煮取二升，分四服，日三夜一。

【主治】 ①《千金》：虚羸，心气惊弱多魇。②《普济方》引《千金》：心劳虚寒，惊悸恍惚多忘，梦寐惊魇，神志不定。

【方论选录】 《千金方衍义》：定心首宜实脾，以御阴火之逆，方下所主惊弱多魇，明是土气虚实，不能营养肝木，所以神魂不宁，故于桂枝汤中易干姜、桂心以温肝脾，兼参、苓、远志交流心肾以安神明也。

01477 小定志丸

【方源】 《三因》卷九。

【异名】 定志丸（《证治要诀类方》卷四）。

【组成】 菖蒲（炒） 远志（去心，姜汁，淹）各二两 茯苓 茯神 人参各三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服五十丸，米汤送下。

【功用】 《普济方》：常服益心强志，令人不忘。

【主治】 心气不定，五脏不足，甚者忧忧愁愁不乐，忽忽喜忘，朝瘥暮剧，暮愈朝发，及因事有所大惊，梦寐不详，登高涉险，致神魂不安，惊悸恐怯。

01478 小建中汤

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 芍药汤（《外台》卷十七引《古今录验》）、桂心汤（《圣济总录》卷九十一）、建中汤（《伤寒明理论》卷四）、桂枝芍药汤（《伤寒图歌活人指掌》卷四）。

【组成】 桂枝三两（去皮） 甘草二两（炙） 大枣十二个（擘） 芍药六两 生姜三两（切） 胶饴一升

【用法】 以水七升，煮取三升，去滓，纳饴，更上微火消解，温服一升，一日三次。

【功用】 温中补虚，和里缓急。

①《圣济总录》：补血，止腹痛。②《伤寒明理论》：温建中脏。③《金匮要略心典》：和阴阳，调营卫。④《金鉴》：缓肝和脾。⑤《血证论》：建胃滋脾。

【主治】 中气虚寒，营卫不调，阴阳不和，或土虚木乘所致的虚劳里急腹痛，心悸虚烦，衄血吐血，面色萎黄，遗精。再生障碍性贫血、功能性低热等病，因如上所述者。

①《伤寒论》：伤寒，阳脉涩，阴脉弦，腹中急痛；伤寒二三日，心中悸而烦者。②《金匮》：虚劳里急，悸，衄，腹中痛，梦失精，四肢酸疼，手足烦热，咽干口燥；男子黄，小便自利；妇人腹中

痛。③《肘后方》：凡男女因积劳虚损，或大病后不复常，若四体沉滞，骨肉疼酸，吸吸少气，行动喘惙，或小腹拘急，腰背强痛，心中虚悸，咽干唇燥，面体少色，或饮食无味，阴阳废弱，悲忧惨戚，多卧少起，久者积年，轻者才百日，渐至瘦削。④《外台》引《古今录验》：妇人少腹痛。⑤《医方类聚》引《通真子伤寒括要》：阳明病，反无汗，小便利，呕而咳，手足厥，头痛者；少阴病，下利止，恶寒而踡，手足温者；厥阴病，其脉不浮。⑥《景岳全书》：痘疹腹痛，寒气犯胃，或食生冷而呕恶吐泻，腹无胀满而但有疼痛者；误饮冷水凉菜，寒湿留中，小水不利而腹痛者。⑦《济阳纲目》：胃虚不能约血，吐血，自汗。⑧《法律》：男子数扰其阳，致虚阳上泛为黄。⑨《证治汇补》：脾胃劳伤，肝木太过，及阳气不足诸病。⑩《张氏医通》：风木乘脾，寒热腹痛。⑪《嵩崖尊生》：鼻血，色白不泽，脉细弦涩，此脱血大寒。⑫《温病条辨》：温病愈合，面色萎黄，舌淡不欲饮水，脉迟而弦，不食者。

【宜忌】 ①《伤寒论》：呕家不可用建中汤，以甜故也。②《外台》引《古今录验》：忌海藻、菘蕹、生葱。③《法律》：必小便自利，证非湿热者乃可用之。

【方论选录】 ①《伤寒明理论》：脾者，土也，处四脏之中，为中州，治中焦，生育荣卫，通行津液。一有不调，则荣卫失所育，津液失所行，必以此汤温建中脏，是以建中名之焉。胶饴味甘温，甘草味甘平，脾欲缓，急食甘以缓之，健脾者，必以甘为主，故以胶饴为君，甘草为臣；桂辛热，辛，散也，润也，荣卫不足，润而散之；芍药味酸微寒，酸，收也，泄也，津液不速，收而行之，是以桂、芍药为佐；生姜味辛温，大枣味甘温，胃者卫之源，脾者荣之本，甘辛相合，脾胃健而荣卫通，是以姜、枣为使。②《脾胃论》：以芍药之酸于土中泻本为君；饴糖、炙甘草甘温补脾养胃为臣；水挟木势亦来侮土，故脉弦至腹痛，肉桂大辛热，佐芍药以退寒水；姜、枣甘辛温，发散阳气，行于经脉皮毛为使。建中之名于此见焉。③《伤寒附翼》：此肝火上逆于心脾，于桂枝加芍药汤中更加饴糖，取酸苦以平肝胆之火，辛苦以调脾家之急，又资其谷气以和中也。此方安内攘外，泻中兼补，故名曰建。外症未除，资姜、桂以散表，不全主中，故称曰小。④《千金方衍义》：桂本血药而辛温散邪，恐其动血，故以芍药护持荣气，不能随桂外泄，得甘草之甘温，而和寒热诸邪，姜、枣之辛甘，而和荣卫诸气，为风伤卫之首方，参入胶饴一味，取稼穑之甘，便为建中专药，所以寒伤荣之尺中脉微，虚寒之里气不足，咸赖乎此，允为虚羸和解中外之圣法。小建中为诸建中之母，本桂枝汤表药，藉胶饴之甘温入脾通津。⑤《伤寒溯源集》：建中者，建立中焦之脾土也。盖土为五行之主，脾为四脏之本，即洪范建中立极之义也。中气虚馁，脾弱不运，胃气不行，致心中悸动，故以建立中气为急也。谓之小建中者，以风邪未解，未可以参、术补中，只加胶饴，倍芍药于桂枝全汤，和卫解郁之中以稍裨中土，故谓之小建中汤。芍药性虽酸收，既无寒邪，在所不计，李时珍谓其益脾，能于土中泻木，故倍用之。饴糖为米芽之上品，能和润中州，中气既和，阳邪得解，则心中之悸烦自止矣。⑥《金匮要略心典》：此和阴阳，调营卫之法也。夫人生之道，曰阴曰阳，阴阳和平，百疾不生。若阳病不能与阴和，则阴以其寒独行，为里急，为腹中痛，而实非阴之盛也；阴病不能与阳和，则阳以其热独行，为手足烦热，以咽干口燥，而实非阳之炽也。昧者以寒攻热，以热攻寒，寒热内贼，其病益甚，惟以甘酸辛热和合成剂，调之使和，则阳就于阴，而寒以温；阴就子阳，而热以和。医之所以贵识其大要也，岂徒云寒可治热，热可治寒而已哉。或问和阴阳，调营卫是矣，而必以建中者何也？曰：中者脾胃也，营卫生成于水谷，而水谷转输于脾胃，故中气立，则营卫流行而不失其和。又中者，四运之轴而阴阳之机也，故中气立，则阴阳相循，如环无端，而不极于偏。是方甘与辛合而生阳，酸得甘助而生阴，阴阳相生，中气自立。是故求阴阳之和者，必于中气；求中气之立者，必以建中也。⑦《古方选注》：建中者，建中气也。名之曰小者，酸甘缓中，仅能建中焦营气也。前桂枝汤是芍药佐桂枝，今建中汤是桂枝佐芍药，义偏重于酸甘，专和血脉之阴。芍药、甘草有戊己相须之妙，胶饴为稼穑之甘，桂枝为阳木，有甲乙化土之义，使以姜、枣助脾与胃行津液者，血脉中之柔阳，皆出于胃也。⑧《金鉴》：是方也，即桂枝汤倍芍药加胶饴也。名曰小建中者，谓小小建立中气也。盖中气早虚，表尚未和，不敢大补，故仍以桂枝和营卫，倍芍药加胶饴调建中州，而不啜稀粥温复令汗者，其意重在心悸中虚，而不在伤寒之表也。中州建立，营卫自和，津液可生，汗出乃解，悸烦可除矣。⑨《医方论》：小建中汤之义，全在仰木扶土。当从吴氏之说，用肉桂而不用桂枝。肉桂温里，桂枝解表，用各有当也。且肉桂性能杀

木，合芍药以制肝，又用姜、枣、甘草、饴糖之甘温以补脾，斯中州之阳气发舒，而阴寒尽退矣。⑩《湖南中医学院学报》（1985；1:39）：小建中汤非治中焦虚寒之方、温脾阳之剂，方中滋阴药与助阳药并用，而前者的份量超过后者，其意不在“阴中求阳”，以补脾阳之虚，而在于滋养脾阴。故重用饴糖、芍药滋脾阴之品为君，以甘酸化阴，补虚养血，缓解急迫，其中饴糖的作用是滋润，而非温补；白芍配甘草甘缓和中，饴糖伍大枣滋脾阴；少佐桂枝、生姜甘温益阳，使阳生阴长，以刚济柔之意。综观全方，具有酸得甘助以益气生津，辛甘化液以滋脾，阳生阴长，脾土得润，中气自立。共奏育阴健脾，补虚缓急，调养气血之功。把本方当作温中剂，有悖仲景原意，与临床实际运用也有一定距离，因此，似应将本方归入补阴剂中。

【临证举例】 ①虚劳 《吴鞠通医案》：施某，20岁，形寒而六脉弦细，时而身热，先天不足，与诸虚不足小建中法，白芍六钱、炙甘草三钱、生姜四钱、桂枝四钱、胶饴一两（去滓后化入）、大枣（去核）四枚，煮三杯，分三次服。服六十剂后，诸皆见效，阳虽转面虚未复，于前方内减姜、桂之半，加柔药（大生地、麦冬、五味子）兼与护阴。②腹痛 《经方实验录》：王某，腹痛喜按，痛时自觉有寒气自上下迫，脉虚弦，微恶寒，此为肝乘脾，小建中汤主之，川桂枝三钱、大白芍六钱、生草二钱、生姜五片、大枣十二枚、饴糖一两。③吐血 《吴鞠通医案》：胡某，31岁，劳伤吐血，汗多足麻，六脉弦细不数，小建中汤主之，白芍六钱、甘草（炙）三钱、生姜五钱、桂枝四钱、胶饴（后入）一两、大枣（去核）三枚，煮三杯，去滓后，将胶饴化入，上火二三沸，搅合匀，分三次服。服七剂后，汗减，足麻愈，食少。再服七剂后，诸症皆愈，惟咳嗽未止，于原方中加云苓、半夏而愈。④咳嗽 《临证指南医案》：某，色白肌柔，气分不足，风温上受而咳，病固轻浅，无如羌、防辛温，膏、知沉寒，药重已过病所，阳伤背寒，胃伤减谷，病恙仍若，身体先惫，小建中汤主之。⑤黄疸 《湖南中医杂志》（1987；5:30）：资某，男，58岁，患黄疸一年余，面部及肌肤发黄，色淡暗晦，巩膜微黄而暗滞，四肢软弱乏力、心悸短气，语言低微，纳呆便溏，舌淡，苔薄白，脉濡细，实验室诊断：溶血性黄疸。乃脾虚失运，气血不能正常化生所致。治予温中补虚，益气生血，处方：桂枝9克，白芍12克，炙甘草9克，大枣20枚，生姜3片，黄耆30克，当归6克，水煎去滓取汁，纳饴糖120克口服。每日一剂，服20余剂后诸症悉除。⑥小儿尿频 《千家妙方》：孙某，女，4岁，尿频月余，一日几十次，每次量少，喜甜食，食量不大。发育一般，较瘦，神情不活泼，面色稍苍黄，腹部较紧张。诊为中气不足，脾胃虚弱，予小建中汤。十剂后，尿频好转，每日减至二十多次，面色转红。继服原方加黄耆七剂后，尿频愈，每昼夜小便仅十次左右，食量增，面色红润，体力增强，活泼，较前体胖。

01479 小建中汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】 桂枝 甘草各三钱 生姜二钱 白芍六钱 阿胶（炒）一合 黄芩三钱

【用法】 加大枣二个，水煎服。

【主治】 虚，里急腹痛，遗精，四肢酸痛，手足烦热，咽干口燥，自汗。

01480 小建中汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】 官桂 陈皮 干姜 甘草各等分

【用法】 水煎，空心温服。

【主治】 腹痛。

01481 小降气汤

【方源】《局方》卷三（吴直阁增诸家名方）。

【异名】 快气散（《丹溪心法》卷四）。

【组成】 缩砂仁八两 香附子（炒去毛）三十二两 甘草（煨）四两

【用法】 上为粗末。每服一钱，入生姜同煎服。

【功用】 快气美食，温养脾胃。

【主治】 一切气疾，心腹胀满，胸膈噎塞，嗳气吞酸，胃中痰逆呕吐，及宿酒不解不思饮食。

01482 小驻车丸

【方源】《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】 当归（去芦）二两 诃子（炮，去核）一两 干姜（炮） 黄连（去须）各三分

【用法】 上为细末，用阿胶一两三分，水煎成汁，搜和为丸，如粟米大。每一岁儿服十丸至二十、三十丸，温饭饮送下，随乳亦得。更量岁数加减与服。

【主治】 小儿冷热不调，或乳哺失节，泄泻不止，或下痢鲜血，或赤多白少，腹痛后重，肠胃虚滑，便数频并，减食困倦，一切泻痢。

01483 小承气汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 大黄四两（酒洗） 厚朴二两（炙，去皮） 枳实三枚（大者，炙）

【用法】 水四升，煮取一升二合，去滓，分温二服。初服汤当更衣，不尔者，尽饮之；若更衣者，勿服之。

【主治】 泻热通便，消痞除满。

①《伤寒论》：微和胃气。②《医统》：泻上焦之痞热。③《重订通俗伤寒论》何秀山按：直下小肠结热。④《新急腹症学》：通里清热，宽中行气。

【主治】 阳明腑实证，热邪与积滞互结，潮热谵语，大便秘结，胸腹痞满，苔黄糙，脉滑数；或热结旁流，下利清水；或痢疾初起，腹痛胀满，里急后重。

①《伤寒论》：阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵语；阳明病，腹大满不通者；阳明病，潮热，不大便六七日；阳明病，谵语，发潮热，脉滑而疾者；太阳病，若吐、若下、若发汗后，微烦，小便数，大便因硬者；得病二三日，脉弱，无太阳柴胡证，烦躁心下硬，至四五日，虽能食者；厥阴病，下利谵语，有燥屎。②《千金翼》：霍乱，大便不通，哕数口，谵语。③《得效》：下利赤黄，但烦饮冷，小便不利，得热则极，心烦躁，喜渴。④《麻疹全书》：杂病上焦痞满不通。⑤《卫生宝鉴·补遗》：心胸连脐腹大闷，腹中疼，坐卧不安，胃闷喘急，或腹中微满，不大便。⑥《医学入门》：里症已见三四，脐腹胀满而不甚坚硬，或胸满潮热不恶寒，狂言而喘，病属小热小实小满者。⑦《便览》：痢疾初发，积气盛，腹痛难忍，或作胀闷，里急后重，数至圊而不能便，窘迫之甚。⑧《景岳全书》：麻疹已出，便秘甚者。⑨《玉案》：伤寒传里，有痞满实，而无燥坚者。⑩《医宗必读》：失下呃逆，大便实者。⑪《广瘟疫论》：渴，痛在脐上及当脐，关脉滑大，邪已传胃，舌多黄胎，腹满而不痛；自利，按其心下至少腹无硬痛处。⑫《医学心悟》：邪传少阴，口燥咽干而渴，或下利肠垢，目不明。⑬《杂病源流犀烛》：恶寒发热，腹满背恶寒，邪入里；背恶寒，又潮热，腹满，胃中实热。⑭《温病条辨》：阳明温病，诸证（而目俱赤，语声重浊，呼吸俱粗，大便闭，小便涩，舌苔老黄，但恶热，不恶寒，口晡益甚）悉有而微数，脉不浮者；阳明温病，汗多谵语，舌苔老黄而干者；阳明温病，下利谵语，阳明脉实，或滑疾者；阳明暑温，湿气已化，热结独存，口燥咽干，渴欲饮水，面目俱赤，舌燥黄，脉沉实者。⑮《医醇剩义》：小结胸，发热，谵语，便硬，胸痞拒按，舌焦黄，脉实有力。

【方论选录】 ①《内台方议》：证属阳明者，比为可下也。若大满、大实者，属大承气汤。今此大热，大便硬，未至于大实，只属小承气汤也。以大黄为君，而荡除邪热；以枳实为臣，而破坚实；以厚朴为佐使，而调中除结燥也。②《医方考》：邪在上焦则作满，邪在中焦则作胀，胃中实则作潮热，阳乘于心则狂，热干胃口则喘。枳、朴去上焦之痞满，大黄荡胃中之实热。此其里证虽成，病未危急，痞、满、燥、实、坚犹未全俱，以是方主之，则气亦顺矣，故曰小承气。③《伤寒附翼》：夫诸病皆因于气，秽物之不去，由于气之不顺，故攻积之剂，必用行气之药以主之。亢则害，承乃制，此承气之所由。又病去而元气不伤，此承气之义也。大黄倍厚朴，是气药为臣，名小承气。味少，性缓，制小，其服欲微和胃气也，故名曰小。三物同煎，不分次第，而服只四合，此求地道之通，故不用芒消之峻，且远于大黄之锐矣，故称为微和之剂。④《重订通俗伤寒论》何秀山按：小肠火腑，非苦不通，故君以生军之苦寒，以涤小肠；臣以枳实之苦降，直达幽门；但苦非辛不通，故佐以厚朴之苦辛，助将军一战成功也。此为阳明实热，蕴结小肠之良方。⑤《古方选注》：承气者，以下承上也，取法乎地，盖地以受制为资生之道，故胃以酸苦为涌泄之机，若阳明腑实，燥屎不行，地道失矣，乃用制法以去其实。大黄制厚朴，苦胜辛也，厚朴制枳实，辛胜酸也，酸以胜胃气之实，苦以化小肠之糟粕，辛以开大肠之秘结，燥屎去，地道通，阴气承，故曰承气。独治胃实，故曰小。

【临证举例】 ①伤寒阳明腑实证 《本事》：一人病伤寒，大便不利，日晡潮热，手循衣缝，两手撮空，直视喘急。许曰：此诚恶候，得之者十中九死，仲景虽有证而无治法，但云脉弦者生，涩者死。此已经吐下，难于用药，漫且救之，若大便得通而脉弦者，庶可治也。与小承气汤一服，而大便利，诸疾渐退，脉且微弦，半月愈。②伤寒协热利《医宗必读》：王某，伤寒至五日，下利不止，懊侬目胀，诸药不效，有以山药、茯苓与之，虑其泻脱。诊之，六脉沉数，按其脐则痛，此协热自利，中有结粪。与小承气倍大黄服之，得结粪数枚，诸症悉安。③热结旁流 《蒲辅周医案》：梁某，男，28岁，患流行性乙型脑炎已六日，曾连服中药清热解毒、养阴之剂，病势有增无减。诊时，体温40.3℃，脉沉数有力，腹满微硬，哕声连续，目赤不闭，无汗，手足妄动，烦躁不宁，有欲狂之势，神昏谵语，四肢微厥，昨日下行纯青黑水，此虽病邪羁踞阳明，热结旁流之象，但未至大实满，而且

舌苔秽腻，色不老黄，未可与大承气汤，乃用小承气汤微和之。药后诸证豁然，再以养阴和胃之剂调理而愈。④胃脘痛 《经方实验录》：史某，脘上痛，胃中气机不顺，前医投平胃数不应，当必有停滞之宿食，纳谷日减，殆以此也。拟小承气汤以和之（生川军三钱后下，中川朴二钱，枳实四钱），服后应手。⑤呃逆 《伤寒名案选新注》：张意田治董友七旬之母，病已八日，脉亦软缓而迟滞，发热日晡益甚，舌苔黄厚，大便不行，畏寒呃逆。阅诸方咸以老年正气虚，用丁香柿蒂散与补阴之剂，此乃表邪未解，而陷里之热急，致气机逆塞而发呃，法当下之，毋以高年为虑也。与小承气汤，服后大便转矢气，兼有心烦不宁之象，与一剂，临晚下黑屎数枚，二更战慄壮热，四更大汗，天明又便黑屎，然后呃止神清而睡。⑥小儿胆道蛔虫症 《湖北中医杂志》（1981；6:45）：用小承气汤为主治疗小儿胆道蛔虫症9例，一般服药1～2剂均获痊愈。例：方某某，男，10岁。右上腹阵发性绞痛，拒按，痛甚则唇紫肢冷，呕吐黄苦水，舌稍红，苔花白而薄，脉细沉迟，胆道造影示：总胆管内有一长条状阴影，诊为胆道蛔虫病。处方：大黄、川朴、白芍各12克，枳实、槟榔各10克。服上方一剂后大便二次，呈褐黑色泡沫状，排蛔虫数条，腹痛止，胆道造影阴性。

【现代研究】 对血管通透性的影响 《中成药研究》（1983；10:28）：采用^{125}I－白蛋白放射活性测定小承气汤对小鼠腹部血管通透性的影响。实验结果，小承气汤能降低小鼠腹部血管通透性，抑制异物从血循环渗出，而对血管吸收过程，本方起降低作用。

【备考】 阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵语，小承气汤主之，若一服谵语止者，更莫复服；阴阳病，谵语，发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之，因与承气汤一升，腹中转气者，更服一升，若不转气者，勿更与之。

01484 小承气汤

【方源】 《云岐子脉诀》。

【组成】 生地黄 黄芩 山栀子仁各一两 大黄半两

【用法】 上㕮咀。水煎一两服。以利为度。

【主治】 三阳合病，脉紧数而弦，狂言谵语，阳明实者。

01485 小承气汤

【方源】 《银海精微》卷上。

【组成】 大黄 薄荷 杏仁 蝉蜕 甘草 羌活 天麻 当归 赤芍药 防风

【用法】 水煎服。

【主治】 小儿胎风赤烂，小儿眼生翳。

01486 小柏叶汤

【方源】 《鸡峰》卷十。

【组成】 柏叶 艾叶 干姜 阿胶各等分

【用法】 上为粗末。每服二钱，水一盏，煎至六分，去滓温服。

【主治】 吐血不止。

01487 小胡连丸

【方源】 《医学入门》卷六。

【组成】 胡黄连五分 阿魏一钱半 神曲 黄连各二钱 麝香一粒

【用法】 上为末，猪胆汁为丸，如黍米大。每服三十丸，白术煎汤送下。

【主治】 小儿食疳，肚大青筋。

【方论选录】 胡黄连去果积，阿魏去肉积，神曲去食积，黄连去热积。

01488 小茵陈丸

【方源】 《鸡峰》卷九。

【组成】 茵陈 枳壳 白术 赤茯苓 甜葶苈各一分 半夏 当归 川椒 大黄各三分 甘遂一分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前白汤送下。

【主治】 黑疸，身体间黑，小便赤色。

01489 小茵陈汤

【方源】 《伤寒微旨论》卷下。

【组成】 附子一个（破作八片） 甘草一两 茵陈蒿二两

【用法】 上为细末。水二升，煮取一升半，去滓放温，分作三服。

【主治】 阴黄证，脉沉细迟，四肢及遍身冷。

01490 小茴香丸

【来源】 《鸡峰》卷二十。

【组成】 船上茴香 土茴香各二两 干生姜四两 附子一个 桃仁一两半 黄橘皮 川楝子（不去核） 胡芦巴 巴戟末 赤茯苓 木通各一两 丁香 木香各半两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如豌豆大。每服二三十丸，空心温酒或盐汤送下。

【主治】 膀胱小肠留滞寒邪热邪，胁肋牵引，发渴，肿满痛。

01491 小复苏饮

【方源】 《寒温条辨》卷四。

【组成】 白僵蚕三钱 蝉蜕十个 神曲三钱 生

地三钱　木通　车前子（炒）各二钱　黄芩　黄柏　栀子（炒黑）　黄连　知母　桔梗　牡丹皮各一钱

【用法】 水煎去滓，入蜜三匙，黄酒半小杯，小便半小杯，和匀冷服。

【主治】 温病大热，或误服发汗解肌药，以致谵语发狂，昏迷不省，燥热便秘，或饱食而复者。

01492　小香连丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 木香　诃子肉各一分　黄连半两（炒）

【用法】 上为细末，饭为丸，如绿豆大。每服十丸至三五十丸，食前米饮送下，频服之。

【主治】 冷热腹痛，水谷利，滑肠。

01493　小保安汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 当归　茯苓　川芎　黄耆　麦门冬　陈皮　桔梗　人参　白术各一钱　半夏　甘草　藿香各五分

【用法】 加生姜三片，大枣二个，水二茶钟，煎八分，食远服。

【主治】 脑疽诸发，已溃流脓。

01494　小保和丸

【方源】《医方集解》。

【组成】 山楂三两（去核。或云核亦有力）　神曲（炒）　茯苓各一两　陈皮五钱　白术　白芍

【用法】 蒸饼糊为丸服。

【功用】 助脾进食。

【备考】 方中白术、白芍用量原缺。

01495　小独圣丸

【方源】《局方》卷三。

【组成】 巴豆（连皮称）半两（去皮心膜，炒熟，得三钱，研）　肉桂（去粗皮）一斤　硇砂（研，飞）一两　半夏（汤洗七次）　丁皮（船上者）　乌梅（去核）　干姜（炮）　当归（去芦）　三棱（煨，捣碎）各四两

【用法】 上为细末，入巴豆、硇砂研匀，水煮面糊为丸，如麻子大。每服三丸至五丸，食后用温水送下。

【功用】 化滞气，利胸膈，止逆消食。

【主治】 脾胃不和，饮食多伤，心腹刺痛，呕哕恶心，噎痞吞酸，干嗽食臭，腹胁胀闷，不思饮食。

01496　小活络丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 川乌（炙）一两五钱　草乌（炙）一两五钱　当归一两　川芎一两　白芍五钱　乳香（炙）七钱五分　没药（炙）七钱五分　地龙肉七钱五分　香附（醋炙）一两　胆星一两五钱

【用法】 上为细末，过罗，炼蜜为丸，重二钱，朱砂为衣。每服一丸，温黄酒送下，开水亦可，一日二次。

【功用】 舒筋活络，散风止痛。

【主治】 风湿痹痛，麻木不仁，四肢酸痛，半身不遂。

01497　小柴胡汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 柴胡汤（《金匮》卷中）、黄龙汤（《千金》卷十）、三禁汤（《此事难知》）、人参汤（《得效》卷十一）、和解散（《伤寒六书》卷一）。

【组成】 柴胡半斤　黄芩三两　人参三两　半夏半升（洗）　甘草（炙）　生姜各三两（切）　大枣十二个（擘）

【用法】 以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，一日三次。

【功用】《伤寒明理论》：和解表里。

【主治】 伤寒少阳病，寒热往来，胸胁苦满，不思饮食，心烦喜呕，口苦咽干，目眩头痛，舌苔薄白，脉弦数，或妇人伤寒，热入血室。以及疟疾、黄疸等杂病见少阳证者。

①《伤寒论》：伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸、小便不利，或不渴、身有微热，或咳；伤寒四五日，身热恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴；妇人中风七八日，续得寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室，其血必结；伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具；呕而发热。②《金匮》：诸黄，腹痛而呕；产妇郁冒，其脉微弱，呕不能食，大便反坚，但头汗出。③《千金》：妇人在蓐得风，盖四肢苦烦热，皆自发露所为，头痛。④《局方》：伤寒、温热病，身热恶风，颈项强急，胸满胁痛，呕哕烦渴，寒热往来，身面皆黄，小便不利，大便秘硬，或过经未解，或潮热不除；及愈后劳复，发热疼痛；妇人伤风，头痛烦热；经血适断，寒热如疟，发作有时；及产后伤风，头痛烦热。⑤《医方类聚》引《简易方》：发热，耳暴聋，颊肿胁痛，脐不可以运。⑥《得效》：伤暑发疟，热多寒少，或但热不寒，咳嗽烦渴，小便赤；败毒瘴心，毒涎聚于脾，血乘上焦，病欲来时，令人迷困，甚则发躁狂妄，亦有哑不能言者。为挟岚嶂溪源蒸毒之气，岭南地毒苦炎，燥湿不常，人多患此

状。⑦《外科理例》：瘰疬，乳痈，便毒，下疳，及肝经一切疮疡。⑧《准绳·疡医》：一切扑伤等证，因肝胆经火盛作痛、出血者。⑨《景岳全书》：肝胆经风热，肿痛色赤。

【宜忌】《此事难知》：忌发汗，忌利小便，忌通大便。

【加减】若胸中烦而不呕者，去半夏、人参，加栝楼实一枚；若渴，去半夏，加人参，合前成四两半，栝楼根四两；若胁下痞硬，去大枣，加牡蛎四两；若不渴，外有微热者，去人参，加桂枝三两，温覆微汗愈。

【方论选录】①《伤寒明理论》：柴胡味苦平微寒，黄芩味苦寒。《内经》曰：热淫于内，以苦发之。邪在半表半里，则半成热矣。热气内传，攻之不可，则迎而夺之，必先散热，是以苦寒为主，故以柴胡为君，黄芩为臣，以成撤热发表之剂。人参味甘平，甘草味甘缓，邪气传里，则里气不治，甘以缓之，是以甘物为之助，故用人参、甘草为佐，以扶正气而复之也。半夏味辛微温，邪初入里，则里气逆，辛以散之，是以辛物为之助，故用半夏为佐，以顺逆气而散邪也。里气平正，则邪气不得深入，是以三味佐柴胡以和里。生姜味辛温，大枣味甘温。《内经》曰：辛甘发散为阳。表邪未已，迤逦内传，既未作实，宜当两解。其在外者，必以辛甘之物发散，故生姜、大枣为使，辅柴胡以和表。七物相合，两解之剂当矣。②《医方考》：柴胡性辛温，辛者金之味，故用之以平木，温者春之气，故就之以人少阳；黄芩质枯而味苦，枯则能浮，苦则能降，君以柴胡，则入少阳矣；然邪之伤人，常乘其虚，用人参、甘草者，欲中气不虚，邪不得复传入里耳！是以中气不虚之人，虽有柴胡证俱，而人参可去也；邪初入里，里气逆而烦呕，故用半夏之辛以除呕逆；邪半在表，则荣卫争，故用姜、枣之辛甘以和荣卫。③《古今名医方论》引程郊倩：方中柴胡以疏木，使半表之邪得以外宣；黄芩清火，使半里之邪得从内彻；半夏能开结痰，豁浊气以还清；人参能补久虚，滋肺金以融木；甘草和之；而更加姜、枣助少阳生发之气，使邪无内向也。总之，邪在少阳，是表寒里热两郁不得升之故。小柴胡之治，所谓升降浮沉则顺之也。④《衷中参西》：小柴胡汤证，原忌发汗，其去滓重煎者，原所以减柴胡发表之力，欲其但上升而不外达也。

【临证举例】①伤寒少阳证《本事》：有人患伤寒五六日，头汗出，自颈以下无汗，手足冷，心下痞闷，大便秘结，或者见四肢冷，又汗出满闷，以为阴证。予诊其脉沉而紧，予曰：此症诚可疑，然大便结，非虚结也，安得为阴？脉虽沉紧，为少阴证，多是自利，未有秘结者。予谓此正半在里表在表，投以小柴胡汤得愈。②左胁痛（渗出性胸膜炎）《江苏中医》（1961；2:26）：吴某，男，36岁。形寒发热三天，咳嗽气促，左胁牵痛，胸闷欲吐，遍身酸楚，胃呆，口渴不欲饮，舌苔薄白，脉弦数。体温40℃，叩诊左下背部呈浊音，听诊呼吸音消失。胸透诊为左下渗出性胸膜炎。即用小柴胡汤加葶苈子6克，服药仅二剂，热退净，咳嗽胸胁痛大减。③热入血室《皇汉医学》：一妇人患伤寒，经水适来，谵语如见鬼状，且渴欲饮水，禁而不与，病势益甚。诊之脉浮滑，是热入血室兼白虎汤证也。即与水不禁，而投小柴胡汤。此即仲景所谓其人如狂，血自下，血下自愈。病势虽如此，犹当从经水而解也。五六日果痊愈。④疟疾《皇汉医学》：一女子病疟，热多寒少。一医用药而呕，一医用药反泄。诊时疟利并作，且呕，脉之但弦。投以小柴胡汤加芍药，未至五贴，诸证并瘳。⑤久咳《河南中医学院学报》（1979；3:1）：孙某，女，47岁。从小咳嗽至今，历40年，每年秋末发作，冬季较甚，夏季自愈。发作期间，昼轻夜重，甚则难以入寐，痰多而稀，喉咙发痒。投以小柴胡汤加减：柴胡9克，半夏9克，黄芩9克，党参9克，五味子9克，甘草6克，生姜9克，大枣4枚。水煎服。一剂便能安然入睡，四剂咳嗽已去大半，继服数剂而咳止。⑥黄疸《中级医刊》（1979；10:46）：李某，男，40岁。患病月余，口苦咽干，轻度黄疸，小便黄，大便正常，舌质红，苔薄黄，脉沉弦。血胆红素3.6毫克%。用小柴胡汤加茵陈、金钱草。药服十八剂，诸症消失。⑦高热《江苏中医》（1986；5:36）：作者用小柴胡汤加减治疗86例高热，其中呼吸系统36例，胆道感染20例，泌尿系统感染9例，产后感染4例，败血症2例，肝炎3例，乙脑2例，伤寒2例，腮腺炎5例，菌痢3例。病程1～30天，平均15天。退热天数1～5天，平均3天。在急性感染性疾病过程中，起初恶寒发热，时作时止，继则但热不寒，定时如潮，此后见寒热往来、休作有时，在此期间，抓住上述三个热型之高热兼证（高热伴头痛眩晕，咳嗽胸闷；或口苦纳差；或汗出恶风小便难；或心胸烦闷，或恶心呕吐）之一者，即可投与本方加减。剂量及用法：高热用柴胡10～14克，党参10～30克，黄芩10～30克，甘草10～20克，半夏、生姜各10～20克，大枣10～30克；高热无

汗，重用柴、芩，柴胡后下；高热微汗，重用柴、芩，等量同煎。汗出问题：大剂柴胡用于高热，每多汗出，“必蒸蒸而振，却复发热汗出而解”；当柴胡汤剂仿仲景再煎法时，服之可致无汗或微汗；当柴胡量倍于黄芩时，每可致汗。

【现代研究】 ①抑制四氯化碳所致的肝损害《国外医学·中医中药分册》(1981；4:30)：通过经四氯化碳造成肝损害的小鼠服小柴胡汤原方，证实该方能相当地抑制四氯化碳所致的肝损害。②促进被损害肝细胞的修复 《药学杂志》 (1980；6:602)：小柴胡汤可使大鼠肾上腺重量增加，大鼠体内甾体类化合物的含量亦增高，从而促进被损害的肝细胞的修复。

01498 小柴胡汤

【方源】 《云岐子脉诀》。

【组成】 柴胡 黄芩 五味子 制半夏各半两 白芍药 人参 桑白皮各二钱半

【用法】 上㕮咀。每服一两，水二盏，加生姜七片，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】 肺伤咳嗽气促，冷汗自出，背膊劳强，夜卧不安，脉象按之不足，举之有余。

01499 小柴胡汤

【方源】 《口齿类要》。

【组成】 柴胡一钱 黄连一钱半 半夏 人参各一钱 甘草（炙）五分

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 肝胆经风热侮脾土，唇口肿痛，或寒热往来，或日晡发热，或潮热身热，或怒而发热胁痛，甚者转侧不便，两胁痞满，或泻利咳嗽，或吐酸苦水。

【加减】 怒动肝火，牙齿痛，寒热，加山栀、黄连。

01500 小胶艾汤

【方源】 《济阴纲目》卷八。

【组成】 阿胶（炒成珠）一两 艾叶二两

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 伤损动胎，下血腹痛。

01501 小调经散

【方源】 《校注妇人良方》卷二十二。

【异名】 调经散(《傅青主女科》卷下)、桂珀调经散(《顾氏医径》卷四)。

【组成】 没药 琥珀 桂心 芍药 当归各一钱

【用法】 上为末。每服半钱，姜汁温酒调下。

【功用】 ①《傅青主妇科》：行血消肿，调经。②《顾氏医径》：行血通经。

【主治】 ①《校注妇人良方》：产后四肢浮肿，败血乘虚流注。②《傅青主妇科》：月经不调，腹痛；产后恶露不净，停留胞络，致令浮肿。

01502 小陷胸汤

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 陷胸汤(《圣惠》卷十五)。

【组成】 黄连一两 半夏半升（洗） 栝楼实大者一枚

【用法】 上三味，以水六升，先煮栝楼，取三升，去滓，纳诸药，煮取二升，去滓，分温三服。

【功用】 ①《医方集解》：除膈上结热。除痰去热。②《金鉴》：涤胸膈痰热，开胸膈气结。

【主治】 小结胸病，心下按之则痛，舌苔黄腻，脉浮滑。及痰热互结而成的胸痹，或痰热在膈上而致的咳嗽面赤，胸腹常热，脉洪，苔黄腻。

①《伤寒论》：小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑。②《圣惠》：时气结胸，心下坚，按之即痛，其脉沉滑。③《寿世保元》：伤寒发渴而饮水太过，成水结胸而发呃。④《医方集解》：痰热塞胸。⑤《中医方剂学讲义》：痰热互结而成的胸痹，及热痰在膈上所致的咳嗽面赤，胸腹常热，唯手足时有觉凉，脉洪。

【方论选录】 ①《医方考》：黄连能泻胸中之热，半夏能散胸中之结，栝楼能下胸中之气。②《古今名医方论》引程扶生：以半夏之辛散之，黄连之苦泻之，栝楼之苦润涤之，所以除热散结于胸中也。先煮栝楼，分温三服，皆以缓治上之法。③《医宗金鉴》：黄连涤热，半夏导饮，栝楼润燥下行，合之以涤胸膈痰热，开胸膈气结，攻虽不峻，亦能突围而入，故名小陷胸汤。④《医林纂要》：黄连以泄结热，半夏以通阴阳，瓜蒌甘寒润滑，以清心肺之热，以荡上焦垢腻。胸中热必伤肺，此实以瓜蒌为君。热结未深，独在上焦，未近阳明之分，则无庸芒消、大黄之下达。保肺去热，洁其膻中，无使阴阳扞格而已。⑤《寒温条辨》：黄连用代大黄；半夏用代甘遂；栝楼用代芒消。⑥《成方便读》：此则因痰热互结，未成胃实。观其脉浮滑，知其邪在上焦，故但以半夏之辛温散结豁痰，栝楼之甘寒润燥涤垢，黄连之苦寒降火泄热。此方以之治伤寒亦可，以之治杂病亦可，即表未解而里有痰热者，皆可兼用之。

【临证举例】 ①伤寒发黄胸腹满 《医学纲目》：郑某，因患伤寒，胸腹满，面黄如金色。遂下小陷胸汤，其病遂良愈。明日面色改白。②胃脘痛《叶氏医案存真疏注》：热邪入里，脘痞，按之痛，

脉浮滑，此邪结阳分，拟仲景小陷胸汤。川黄连、栝楼实、半夏、杏仁、枳实。③咳喘（肺心病）《伤寒论方医案选编》：王某某，男，59岁。咳逆倚息不得卧，心悸而气短，每日靠狄戈辛维持，面色黧黑，大便数日未解，舌苔白腻根黄，脉数而时结。处方：瓜蒌30克（先煎），半夏9克，黄连6克。服两剂，大便畅通，喘咳俱减，已能平卧。

01503 小理中丸

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【组成】 红豆 莪术（煨，乘热捣碎） 缩砂仁各一两 草豆蔻（煨） 青皮（去白瓤） 陈皮（去白） 干姜（炮） 京三棱（煨，乘热捣碎） 肉桂（去粗皮）各二两 良姜 牵牛（炒香熟）各三两 阿魏（醋化，去沙石，研）三两

【用法】 上为末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜、橘皮汤送下，温汤亦得，不拘时候。

【主治】 三脘气弱，中焦积寒，脾虚不磨，饮食迟化，吃物频伤，胸膈满闷，胁肋疠刺，呕吐哕逆，噫醋恶心，腹胀肠鸣，心腹疼痛，噎塞膈气，翻胃吐食，饮食减少。

【备考】 此药无利性，不损气，脾胃偏虚寒者最宜服。

01504 小理中汤

【方源】《局方》卷十（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 苍术（米泔浸，焙）五两 生姜五斤 甘草（生用）十两 盐（炒）十五两

【用法】 上锉，同碾，淹一宿，焙干，碾为细末。每服一钱，空心沸汤点下。

【功用】 温中逐水去湿。

【主治】 脾胃不和，中寒上冲，胸胁逆满，心腹疠痛；饮酒过度，痰逆恶心，或时呕吐，心下虚胀，隔塞不通，饮食减少，短气羸困；肠胃冷湿，泄泻注下，水谷不分，腹中雷鸣；霍乱吐利，手足厥冷；胸痹心痛，逆气结气。

01505 小鹿茸丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】 鹿茸（酒浸，炙） 苁蓉（酒浸，炙） 当归（去芦，酒浸） 熟地黄（洗） 茴香（淘去沙，炒） 破故纸（炒） 石斛（酒浸） 人参（去芦） 白术（炒） 五味子各一两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如麻子大。每服二十丸，空心、食前盐汤送下。

【主治】 小儿胎气不足，精血虚少，头大开解。

01506 小麻仁丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 麻仁 当归 桃仁 生地 枳壳各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心白汤送下。

【主治】 血燥，大便秘。

01507 小清凉散

【方源】《寒温条辨》卷四。

【组成】 白僵蚕（炒）三钱 蝉蜕十个 银花 泽兰 当归 生地各二钱 石膏三钱 黄连 黄芩 栀子（酒炒）

【用法】 水煎，去滓，入蜜、酒、童便，冷服。

【主治】 温病，壮热烦躁，头沉面赤，咽喉不利，或唇口颊腮肿者。

01508 小续命丸

【方源】《幼幼新书》卷十引《庄氏家传》。

【异名】 附硫丸（《活幼口议》卷十五）。

【组成】 附子（尖）一枚 硫黄枣许大 蝎梢七枚

【用法】 上为末，生姜、面糊为丸，如黄米大。每服十丸至百丸。量儿加减。

【主治】 慢脾风；小儿久泻尪羸。

01509 小琥珀散

【方源】《女科指掌》卷一。

【组成】 当归 乌药 蓬术（醋炒）

【用法】 上为末。每服二钱，酒调下。

【主治】 妇女炎天临月经，误伤生冷忽然停，后来欲至先疼痛。

01510 小萝藦汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】 萝藦三分（隔纸炒，别捣研，丸如樱桃大） 桑根白皮二两半 大枣十个（去核）

【用法】 上药除萝藦外，㕮咀如麻豆。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，入萝藦一丸，更煎一二沸，去滓，空腹温服。

【主治】 喘咳上气，多唾，面目浮肿，气逆。

【加减】 心下痞硬者，去桑根白皮。

01511 小惺惺丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 母猪粪（腊月取，烧存性） 辰砂（水研飞） 脑麝各二钱 牛黄一钱（各别研） 蛇黄（西山者，烧赤，醋淬三次，水研飞，干用）半两

【用法】 东流水作面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服二丸，钥匙研破，食后温水化下。小儿才生，便宜服一丸，除胎中百疾。

【功用】 解毒。

【主治】 急惊，风痫，潮热，及诸疾虚烦，药毒上攻，躁渴。

01512 小温中丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】 苍术 川芎 香附 神曲 针砂（醋炒红）

【主治】 疸，食积。

【加减】 春，加川芎；夏，加苦参或黄连；冬，加吴茱萸或干姜。

01513 小温经汤

【方源】《袖珍》卷四引《简易方》。

【异名】 温经汤(《妇科玉尺》卷一)。

【组成】 当归 附子（炮）各等分

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏，煎至八分，空心温服。

【主治】 ①《袖珍》：经候不调，血脏冷痛。②《妇科玉尺》：冲任虚，月经不调，或曾半产，瘀血停留，唇口干燥，五心烦热，少腹冷痛，久不受胎。

01514 小蓟饮子

【方源】《玉机微义》卷二十八引《济生》。

【异名】 小蓟汤(《医学正传》卷六)、小蓟饮(《明医指掌》卷三)。

【组成】 生地黄 小蓟根 通草 滑石 山栀仁 蒲黄（炒） 淡竹叶 当归 藕节 甘草各等分

【用法】 上㕮咀。每服半两，水煎，空心服。

【功用】《中医方剂学讲义》：凉血止血，利水通淋。

【主治】 下焦结热血淋，小便频数，赤涩热痛，血尿，舌红，脉数有力。现用于急性肾小球肾炎等。

①《玉机微义》引《济生》：下焦结热，尿血成淋。②《金鉴》：尿血同出，茎中不时作痛。③《医方新解》：小便频数，赤涩热痛，血尿，舌红，脉数有力。

【方论选录】 ①《成方便读》：山栀、木通、竹叶，清心火下达小肠，所谓清其源也；滑石利窍，分消湿热从膀胱而出，所谓疏其流也；但所瘀之血决不能复返本原，瘀不去则病终不能瘳，故以小蓟、藕节退热散瘀；然恐瘀去则新血益伤，故以炒黑蒲黄止之，生地养之；当归能使瘀者去而新血生，引诸血各归其所当归之经；用甘草者，甘以缓其急，且以泻其火也。②《中医方剂学讲义》：方用小蓟、生地、蒲黄、藕节凉血止血；木通、竹叶降心肺之火，从小便而出；栀子泄三焦之火，引热下行；滑石利水通淋；当归引血归经；甘草协调诸药。合用成为凉血止血、利水通淋之剂。

【临证举例】 急性肾小球肾炎 《新中医》(1982；9:46)：陈某，男，13岁。感冒发热，咽喉肿痛半月后发现头面、下肢浮肿，头晕，小便不利，尿少黄，口渴心烦，口角生疮，咽红肿，舌尖红苔少，脉浮数。血压120/90毫米汞柱。尿镜检：呈黄赤浑浊，蛋白（+++），红细胞散在，管型0～1。方用小蓟饮子加减：小蓟15克，生地10克，藕节15克，蒲黄10克，木通6克，竹叶10克，滑石12克，当归10克，山栀子10克，钩藤20克，夏枯草20克，水煎服。六剂药后全身浮肿消退，尿量增多，色转淡。尿镜检蛋白阴性，白细胞0～3。血压90/60毫米汞柱。继服上方三剂，诸证悉除。

01515 小硼砂散

【方源】《医方类聚》卷七十五引《施圆端效方》。

【组成】 硼砂 马消石各三钱 桔梗 甘草 薄荷各一两

【用法】 上为细末。干掺咽中。

【主治】 咽喉肿，疮生疼痛。

01516 小镇心散

【方源】《千金》卷十四。

【组成】 人参 远志 白术 附子 桂心 黄耆 细辛 干姜 龙齿 防风 菖蒲 干地黄 赤小豆各二两 茯苓四两

【用法】 上药治下筛。每服二方寸匕，酒下，一日三次。

【主治】 心气不足，虚悸恐畏，悲思恍惚，心神不宁，惕惕然而惊。

01517 小儿太极丸

【方源】《温疫论》卷下。

【异名】 太极丸(《幼幼集成》卷二)。

【组成】 天竺黄五钱 胆星五钱 大黄三钱 麝香三分 冰片三分 僵蚕三钱

【用法】 上为细末，端午日时修合，糯米饭捣为丸，如芡实大，朱砂为衣。凡遇疫证，每服一丸，姜汤化下。

【主治】 小儿时疫，挨延失治，即便二目上吊，不时惊搐，肢体发痉，十指钩曲，甚至角弓反射。

01518 小儿回春丹

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 西牛黄二分 珠粉五分 天竺黄二钱 胆星二钱 煅青礞石二钱 川贝二钱 制半夏二钱

制南星二钱　黄连二钱　胡黄连二钱　九节菖蒲三钱　麝香二分　飞朱砂二钱

【用法】 各取净末和匀，用钩藤二钱，薄荷二钱煎汤去滓，炼蜜为丸，分做四百粒，每粒约干重六厘，每蜡丸装五粒。周岁以下，服二粒至三粒；周岁以上，服五粒；或用二粒研末贴脐。

【功用】 清热化痰。

【主治】 小儿急惊，痰热蒙蔽，神昏气喘，烦躁发热等症。

01519　小儿惊风散

【方源】 《中国药典》一部。

【组成】 全蝎 130 克　僵蚕（炒）224 克　雄黄 40 克　朱砂 60 克　甘草 60 克

【用法】 上药雄黄、朱砂分别水飞或粉碎成极细末；其余全蝎等三味粉碎成细末，与上述粉末配研，过筛混匀。口服，周岁小儿一次 1.5 克，一日二次。周岁以内酌减。

【功用】 镇惊熄风。

【主治】 小儿惊风，抽搐神昏。

01520　小牛角腮散

【方源】 《千金》卷四。

【组成】 牛角腮一枚（烧令赤）　鹿茸　禹余粮　当归　干姜　续断各二两　阿胶三两　乌贼骨　龙骨各一两　赤小豆二升

【用法】 上药治上筛。每服方寸匕，空腹以酒送下，一日三次。

【主治】 妇人带下五贲，外实内虚。一曰热病下血，二曰寒热下血，三曰经脉未断，为房事则血漏，四曰经来举重，伤络脉下血，五曰产后脏开经利。

【方论选录】 《千金方衍义》：此方专主五贲下血。方用角腮以治带下血崩，鹿茸以治漏下恶血，一止一散，先为五贲之专药；禹余粮以治带下赤白，血闭癥瘕，能行能止，匡佐上二味之功益力；更以龙骨辅角腮，乌贼辅鹿茸，皆寓止散之机；阿胶专主内崩，干姜专温中气，小豆专清小肠，当归、续断专主冲带二脉之病，为崩带之紧关也。

01521　小肉苁蓉散

【方源】 《鸡峰》卷九。

【组成】 肉苁蓉　枸杞子　天雄各一两　石斛三分　远志半两　续断　原蚕蛾各三分　菟丝子　熟干地黄一两半

【用法】 上为细末。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 虚劳羸损，阴萎，精气乏弱。

01522　小荜澄茄煎

【方源】 《鸡峰》卷十二。

【组成】 青橘皮　陈橘皮各二两　缩砂　荜澄茄各一两　神曲　大麦芽各二两

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如麻子大。每服二三十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】 脾气虚，心腹胀。

01523　小菟丝子丸

【方源】 《局方》卷五（吴直阁增诸家名方）。

【异名】 菟丝子丸（《摄生众妙方》卷二）、菟丝丸（《郑氏家传女科万金方》卷四）。

【组成】 石莲肉二两　菟丝子（酒浸，研）五两　白茯苓（焙）一两　山药二两（内七钱半打糊）

【用法】 上为细末，用山药糊搜和为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒或盐汤送下；如脚无力，木瓜汤送下，晚食前再服。

【功用】 填骨髓，续绝伤，补五脏，去万病，明视听，益颜色，轻身延年，聪耳明目。

【主治】 ①《局方》：肾气虚损，五劳七伤，少腹拘急，四肢酸疼，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鸣，心忪气短，夜梦惊恐，精神困倦，喜怒无常，悲忧不乐，饮食无味，举动乏力，心腹胀满，脚膝痿缓，小便滑数，房室不举，股内湿痒，水道涩痛，小便出血，时有遗沥。②《直指》：色疸。赤白浊。

01524　小蓟琥珀散

【方源】 《衡要》卷五。

【组成】 小蓟　琥珀各等分

【主治】 血淋。

【方论选录】 蓟根能治下焦瘀血，琥珀能治膀胱血热。

01525　小黄连阿胶丸

【方源】 《局方》卷十。

【组成】 肉豆蔻　茯苓（去皮）　诃子（炮，去核）各一两　黄连（去须，微炒）二两

【用法】 上为细末，用阿胶一两醋煎溶，搜为丸，如粟米大。每服，一岁儿十丸至十五、二十丸，用温饮送下，随乳亦得，更量岁数加减服，不拘时候。

【主治】 小儿乳食无度，冷热不调，下痢赤白，或如鱼脑，白多赤少，后重腹痛，烦渴引饮，小便不利，便圊频数，食减少力。

01526　小半夏加茯苓汤

【方源】 《金匮》卷中。

【异名】 大半夏汤（《活人书》卷十八）、半夏茯

苓汤(《鸡峰》卷十八)、茯苓半夏汤(《宣明论》卷六)、小半夏汤(《伤寒心要》)、小半夏茯苓汤(《直指》卷七)、小茯苓半夏汤(《普济方》卷一三八)、茯苓散(《普济方》卷一六六)。

【组成】 半夏一升 生姜半斤 茯苓三两 (一法四两)

【用法】 以水七升，煮取一升五合，分二次温服。

【主治】 ①《金匮》：卒呕吐，心下痞，膈间有水，眩悸者。②《张氏医通》：痰饮多汗，小便不利。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：经云：以辛散之。半夏、生姜皆味辛，《本草》：半夏可治膈上痰、心下坚、呕逆者；眩，亦上焦阳气虚，不得升发，所以半夏、生姜并治之；悸，则心受水凌，非半夏可独治，必加茯苓去水，下肾逆以安神，神安则悸愈矣。②《医方集解》：此足太阳、阳明药也，半夏、生姜行水气而散逆气，能止呕吐；茯苓宁心气而泄肾邪，能利小便；火因水而下行，则悸眩止而痞消矣。

【临证举例】 胃脘痛 《四川中医》(1983，2：26)：格桑某某，女，30岁，藏族牧民。因饮食生冷而胃脘痛，呃逆，吐清水痰涎，畏寒，痛时喜温、喜熨、喜按，腹胀，食欲减退，吞酸嗳气，口不渴喜热饮，舌苔白，脉微沉紧。为过食生冷，寒积于中，阳气不振，寒邪犯胃所致。治宜温胃散寒，祛痰止痛，引水下行。半夏40克(先煎半小时)、茯苓30克、生姜30克。服药四剂后诸证全部消失而愈。

【备考】 本方方名，《外台》引作“半夏加茯苓汤”。

01527 小青龙加石膏汤

【方源】《金匮》卷上。

【组成】 麻黄 芍药 桂枝 细辛 甘草 干姜各三两 五味子 半夏各半升 石膏二两

【用法】 水一斗，先煮麻黄，去上沫，纳诸药，煮取二升，强人服一升，羸者减之，一日三次。小儿服四合。

【主治】 ①《金匮》：肺胀，咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下有水。②《千金》：胁下痛引缺盆，其人常倚伏。

【方论选录】 ①《金鉴》引李彣：心下有水，麻黄、桂枝发汗以泄水于外，半夏、干姜、细辛温中以散水于内，芍药、五味子收逆气以平肝，甘草益脾土以制水，加石膏以去烦躁，兼能解肌出汗也。②《金匮要略论注》：《伤寒论》中寒得风脉而烦躁者，主以青龙汤，故此亦主小青龙；然壅则气必热，故仍加石膏耳。③《金匮要略心典》：此外邪内饮相搏之证而兼烦躁，则挟有热邪。麻、桂药中，必用石膏，如大青龙之例也。心下寒饮，则非温药不能开而去之，故不用越婢加半夏，而用小青龙加石膏，温寒并进，水热俱捐，于法尤为密矣。

01528 小柴胡加地黄汤

【方源】《普济方》卷三一八引《圣惠》。

【异名】 地黄汤(《女科百问》卷上)、小柴胡汤(《妇人良方》卷六)、人参汤(《普济方》卷三一八)、小柴胡加生地黄汤(《痘疹心法》卷二十三)。

【组成】 柴胡一两一分 人参 半夏(汤洗七次) 黄芩 甘草 生干地黄各半两

【用法】 上为粗末。每用五钱，水二盏，加生姜五片，大枣二个，同煎至八分，去滓温服。

【主治】 妇人室女伤寒发热，经水适来或适断，昼则明了，夜则谵语，如见鬼状。亦治产后恶露方来，忽尔断绝。

【方论选录】《本事方释义》：柴胡气味辛甘平，入足少阳；人参气味甘温，入足明阳；半夏气味辛温，入足明阳；黄芩气味苦寒，入手太阴、少阳；甘草气味甘平，入足太阴，能缓诸药之性；生干地黄气味甘苦微寒，入手足少阴、厥阴；姜、枣之辛甘，入荣卫。妇人病伤寒或发寒热，经水适来适断，昼则明了，夜则谵语，如见鬼状，谓之热入血室。外邪已入血分，更恐其深入至阴之处，故用小柴胡汤加生地，以泻其血分，则热缓而神安矣。

01529 小柴胡加枳桔汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】 柴胡 黄芩 广皮 甘草 枳壳 桔梗

【主治】 热邪结聚，寒热胸满而呕苦。

01530 小柴胡加栀子汤

【方源】《玉机微义》卷四十五。

【组成】 小柴胡汤加栀子

【功用】 ①《玉机微义》：和解。②《幼科释迷》：解利风热。

【主治】 发黄，往来寒热，一身尽黄。

【备考】《法律》本方用法：水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，一日三次。

01531 小柴胡加葛根汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】 柴胡一两 甘草六钱 大枣三个 人参二钱 黄芩三钱 生姜三分 葛根三分

【用法】 上锉细。每服一两，水三盏，煎服。

【主治】 妇人伤寒，太阳经传阳明，表证仍在而自利。

01532 小陷胸加枳实汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 黄连二钱 栝楼三钱 枳实二钱 半夏五钱

【用法】 急流水五杯，煮取二杯，分二次服。

【主治】 阳明暑温，水结在胸，脉洪滑，面赤身热头晕，不恶寒，但恶热，舌上黄滑苔，渴欲凉饮，饮不解渴，得水则呕，按之胸下痛，小便短，大便闭。

【方论选录】 暑兼湿热，热甚则渴，引水求救，湿郁中焦，水不下行，反而上逆则呕；胃气不降，则大便闭。故以黄连、栝楼，清在里之热痰，半夏除水痰而强胃；加枳实者，取其苦辛通降，开幽门而引水下行也。

01533 小柴胡加牡丹皮汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】 柴胡二两 黄芩七钱半 人参二两 半夏六钱 大枣三枚 甘草七钱 生姜七钱半 牡丹皮二两

【用法】 上锉细。每服一两，加生姜，同煎服。

【主治】 妇人伤寒，身热脉长而弦，属阳明、少阳，往来寒热，夜躁昼宁，如见鬼状，经水适断，热入血室，不满实者。

01534 小承气加芍药地黄汤

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】 大黄二钱 厚朴钱半（炒） 枳实一钱（炒） 芍药二钱 生地六钱

【用法】 流水煎一杯，温服。

【主治】 温疫，阳明腑证，潮热汗出，谵语，腹痛便秘。

01535 小柴胡加芒消大黄汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】 柴胡二两 黄芩七钱半 半夏（制）一两五钱 甘草七钱半 大黄七钱半 芒消七钱 大枣三个 生姜七分半

【用法】 上锉细。每服一两，生姜同煎，去滓下芒消，再沸，温服。

【主治】 妇人伤寒，头痛脉浮，医反下之，邪气乘虚而传于里，经水闭而不行，心下结硬，口燥舌干，寒热往来，狂言如见鬼状，脉沉而数者。

01536 小青龙去麻黄加杏仁汤

【方源】 方出《伤寒论》，名见《圣济总录》卷二十四。

【异名】 小青龙去麻黄加杏子汤（《医统》卷十四）。

【组成】 小青龙汤去麻黄，加杏仁半升。

【主治】 伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳喘。

01537 小青龙去麻黄加附子汤

【方源】 方出《伤寒论》，名见《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【组成】 小青龙汤去麻黄，加附子半两。

【主治】 ①《伤寒论》：伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，若噎者。②《伤寒图歌活人指掌》：伤寒水寒相搏，咳逆。

01538 小青龙去麻黄加茯苓汤

【方源】 方出《伤寒论》，名见《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【组成】 小青龙汤去麻黄，加茯苓一两。

【主治】 伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，小便不利，少腹满。

01539 小半夏加茯苓汤再加厚朴杏仁方

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 半夏八钱 茯苓块六钱 厚朴三钱 生姜五钱 杏仁三钱

【用法】 甘澜水八杯，煮取三杯，温服，一日三次。

【主治】 两太阴暑温，咳嗽，声重浊，痰多不甚渴，渴不多饮者。

【方论】 此暑温而兼水饮者也。故以小半夏加茯苓汤，蠲饮和中；再加厚朴、杏仁，利肺泻湿，预夺其喘满之路；水用甘澜，取其走而不守也。

01540 小柴胡去参枣生姜加五味子干姜汤

【方源】 方出《伤寒论》，名见《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【组成】 小柴胡汤去人参、大枣、生姜，加五味子半升，干姜二两。

【主治】 伤寒五六日中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕而咳者。

01541 飞步丸

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】 木鳖子仁（取肉别研，去油） 川乌（生，去皮脐） 草乌（生，去皮脐） 白胶香 白芍药各二两 乳香一两（别研）

【用法】 上为细末，用赤小豆末煮糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，木瓜汤送下，病在上，食后临卧服；病在下，空心服。

【主治】 筋脉、骨节、手足、腰背诸般疼痛，挛

缩不伸之患。

【宜忌】 忌热物片时及热汤。

01542 飞虎散

【方源】《瑞竹堂方》引郑参政方（见《医方类聚》卷八十二）。

【组成】 白附子 香白芷 荆芥穗 石膏（火煅，研） 薄荷叶 天麻 川芎 防风各半两 两头尖一两（黑心者不用，明白者佳） 苍术一两（泔浸）

【用法】 上为极细末。每服一钱，临卧温茶清调下。

【主治】 偏正头风。

【宜忌】 服后忌食热物。

01543 飞尸走马汤

【方源】《外台》卷七引张仲景方。

【异名】 走马汤（《千金》卷十三）、走马散（《圣惠》卷四十八）、外台走马汤（《金匮》卷上附方）。

【组成】 巴豆二枚（去心皮，熬） 杏仁一枚（去尖皮）

【用法】 上药取绵缠，捶令极碎。投热汤二合，捻取白汁服之。须臾愈。未愈更一服，老小量之。

【主治】 ①《外台》引张仲景：寒疝；鬼击有尸疹者。②《千金》：中恶，心痛腹胀，大便不通。

【宜忌】 忌野猪肉、芦笋。

【备考】 用法中热汤，《圣惠》作“热酒”。

01544 飞龙夺命丹

【方源】《急救仙方》卷二。

【异名】 渊然真人夺命丹（《丹溪心法附余》卷十六引《仙传济阴方》）、再生丹（《增补内经拾遗》卷四）。

【组成】 蟾酥二钱（干者，老酒化） 血竭一钱 乳香二钱 没药二钱 雄黄二钱 轻粉半钱 胆矾一钱 麝香半钱 铜绿二钱 寒水石一钱 朱砂二钱 海羊二十一个（即是蜗牛，连壳用） 天龙一条（即蜈蚣，酒浸，炙黄，去头足） 脑子半钱（如无亦可）

【用法】 上为细末，将海羊研作泥，和前药为丸，如绿豆大。若丸不就，酒煮面糊为丸。每服只二丸，先用葱白三寸，令病人嚼烂，吐于手心，男左女右，将丸子裹在葱白内，用无灰热酒三四盏送下。于避风处以衣被盖覆，约人行五六里之久，再用热酒数杯，以助药力，发热大汗出为度。如病重汗不出，再服二丸，汗出即效。若初服二丸，但消三五病，重者再进二丸。如疔疮走黄过心者，难治。汗出冷者亦死。如病人不能嚼葱，捣碎裹药，用酒送下。疮在上，食后服；在下，食前服。

【功用】 消肿败毒。

【主治】 疔疮、发背、脑疽、乳痈、附骨疽、一切无头肿毒恶疮、狐臭。

【宜忌】 服药后忌冷水、黄瓜、茄子、油面、猪、羊、鱼肉。

01545 飞龙夺命丹

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】 大南星一钱 雄黄 巴豆各一钱 黄丹 信石 乳香各五分 麝香少许 斑蝥十六个（去翅足） 硇砂五分

【用法】 上为末，取蟾酥和为丸，如黄黍米大。每服十一二丸，或十四五丸，看疮上下，食前、后好酒送下。量人虚实与之。

【主治】 一切疔疮恶肿，痈疽初发，或发而黑陷，毒气内陷者。

【宜忌】 忌油腻、鱼、荤物七日。

01546 飞龙夺命丹

【方源】《霍乱论》卷下。

【组成】 朱砂（飞）二两 明雄黄 灯心炭各一两 人中白（漂、煅）八钱 明矾 青黛（飞）各五钱 梅冰 麻黄（去节）各四钱 真珠 牙皂 当门子 硼砂各三钱 西牛黄二钱 杜蟾酥 火消各一钱五分 飞真金三百页

【用法】 上药各为细末，和匀，瓷瓶紧装。以少许吹鼻取嚏；重者再用开水调服一分；小儿减半。

【主治】 痧胀绞痛，霍乱转筋，厥冷脉伏，神昏危急之证；及受温暑瘴疫、秽恶阴晦诸邪，而眩晕痞胀，昏乱昏狂；或卒倒身强，遗溺不语，身热瘛疭，宛如中风；或时证逆传，神迷狂谵；小儿惊痫，角弓反张，牙关紧闭。

01547 飞龙阿魏化坚膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】 阿魏化坚膏（《金鉴》卷六十四）、飞龙化坚膏（《外科集腋》卷三）。

【组成】 蟾酥丸药末一料，加金头蜈蚣五条（炙黄，去头足，研末）

【用法】 同入熬就乾坤一气膏二十四两，化开搅和。重汤内顿化，红缎摊贴，半月一换。轻者渐消，重者亦可，不必停止，常贴保后无虞。

【主治】 失荣症及瘿瘤、乳岩、瘰疬、结毒初起坚硬如石，皮色不红，日久渐大，或疼或不疼，但未破者。

01548 马齿丹

【方源】《喉科种福》卷三。

【组成】 马齿苋 白面

【用法】 醋调。厚敷颈上

【主治】 温疫红喉，颈项肿者。

01549 马齿粥

【方源】 方出《证类本草》卷二十九引《食疗本草》，名见《圣惠》卷九十六。

【异名】 马齿菜粥(《饮膳正要》卷一)。

【组成】 马齿菜二大握（切） 粳米三合（折细）

【用法】 以水和马齿菜煮粥，不着盐、醋。空腹淡食。

【主治】 ①《证类本草》引《食疗本草》：痢疾腹痛。②《饮膳正要》：脚气、头面水肿，心腹胀满，小便淋涩。

01550 马鸣散

【方源】 《张氏医通》卷十五。

【组成】 人中白（煅）一钱 蚕退纸（如无，僵蚕代之） 五倍子（生半煅半） 白矾（生半枯半） 硼砂（生半煅半）各五分

【用法】 上为散。先以青布蘸水拭净，用鹅翎管吹口中患处。

【主治】 ①《张氏医通》：口舌生疮，痘后疳烂。②《麻症集成》：牙疳，颊穿齿崩。

01551 马勃散

【方源】 《疡科遗编》卷下。

【组成】 马屁勃一大块

【用法】 剪片。含在舌下，二三日即愈。

【主治】 舌底忽生痰包。

01552 马勃散

【方源】 《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 马勃 薄荷 桔梗 连翘 杏仁 通草

【主治】 耳聋。

01553 马牙消散

【方源】 《圣惠》卷三十三。

【异名】 白龙散(《普济方》卷七十八)。

【组成】 马牙消半两 黄连末一两 硇砂半分 芦荟末一分 珍珠末一分 龙脑半分

【用法】 上为末。每以铜箸取如麻子大点之。

【主治】 眼生花翳侵睛，向明不得。

【备考】 方中硇砂，《普济方》作“硼砂”。

01554 马牙消散

【方源】 《圣惠》卷三十五。

【组成】 马牙消 消石 硼砂各半两

【用法】 上药以瓷瓶子纳盛，用盐泥固济，候干，以慢火煅成汁，良久，取出候冷，于地坑子内，先以甘草水洒，后用纸三重裹药，以土盖之三宿，出火毒后取出，细研为散。每服半钱，用蓖子抄纳咽中，咽津，更以竹管吹入喉中。

【主治】 喉痹气欲绝。

01555 马齿苋粉

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 蛇床子20克 马齿苋20克 侧柏叶粉20克 丝瓜叶20克 芙蓉叶20克 蚌壳粉20克 苦参20克 大黄20克 陈小麦粉20克 枯矾10克 炉甘石10克 甘草10克

【用法】 上为细末。急性水疱渗液，以干末直接撒布；无渗液，以植物油或凡士林调，外用。

【主治】 急性湿疹。

01556 马齿苋膏

【方源】 《外科大成》卷一。

【组成】 马齿苋

【用法】 用此一味，或服或敷，甚有功效。治杨梅遍身如癞，喉硬如管者，取苋碗粗一握，酒水煎服出汗；治发背诸毒，用苋一握，酒煎或水煮，冷服出汗，再服退热去腐，三服即愈，并杵苋敷之；治多年顽疮、臁疮，疼痛不收口者，杵苋敷之，取虫，一日一换，三日后腐肉已尽，红肉如珠时，换生肌药收口；治面肿唇紧，捣汁涂之；治妇人脐下生疮，痛痒连及二阴者，用苋四两，青黛一两，研匀敷之；治湿癣白秃，取石灰末炒红，用苋汁熬膏，调匀涂之；治丹毒，加蓝靛根和捣敷之。

【功用】 解诸毒。

【主治】 杨梅遍身如癞，喉硬如管者，发背诸毒，多年顽疮、臁疮，疼痛不收口者，面肿唇紧，妇人脐下生疮，痛痒连及二阴者，湿癣白秃，丹毒。

01557 马齿苋羹

【方源】 《寿世青编》卷下。

【组成】 马齿苋菜

【用法】 煮熟，入咸豉或姜醋拌匀食之。

【主治】 下痢赤白，水谷不化，腹痛。

01558 马兜铃汤

【方源】 《圣济总录》卷六十五。

【组成】 马兜铃 桑根白皮各一两 甘草（炙） 葶苈（炒）各半两 半夏（汤洗去滑，生姜汁制，焙干）三分

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏，加生姜五片，煎取七分，去滓，食后温服。

【主治】 肺热嗽，气急喘闷。

01559 马兜铃散

【方源】 《圣惠》卷四十六。

【组成】 马兜铃一两 人参一两（去芦头） 贝

母一两（煨微黄） 甘草一两（炙微赤，锉） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 麻黄一两（去根节） 知母一两 皂荚一两（去黑皮，涂酥，炙微黄焦，去子） 五灵脂一两 威灵仙一两 桑根白皮一两（锉） 款冬花一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 黄明胶二两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】 上为粗散。每服五钱，以淡浆水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 咳嗽喘急，面目四肢浮肿。

01560 马兜铃散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】 马兜铃汤（《圣济总录》卷五十）、五味子汤（《圣济总录》卷四十八）。

【组成】 马兜铃一两 麻黄一两（去节） 五味子一两 甘草一两（炙令黄色）

【用法】 上为散。每服二钱，水一中盏，加沙糖少许，同煎至六分，食后、临卧温服。

【主治】 ①《医方类聚》引《简要济众方》：肺脏虚实不调或痰滞咳嗽，颊红虚烦。②《外科大成》：鼻渊。

01561 马鞭草散

【方源】《妇人良方》卷五。

【组成】 马鞭草（去粗梗） 荆芥穗 北柴胡 乌梅肉各二两 枳壳 白术 羌活 白芍药各一两 秦艽 天台乌药 麻黄各半两 木香半两 当归 川乌（炮） 甘草各一两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜二片，大枣一个，葱白二寸，煎至七分，日午、临卧温服。常服无忌。

【主治】 血风攻透，肢体疼痛，或觉搔痒，或觉麻痹，作寒作热，饮食减味。

【宜忌】 有孕莫服。

01562 马齿苋洗方

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 马齿苋二两（鲜马齿苋半斤）

【用法】 净水洗净后，用水四斤煎煮二十分钟，过滤去滓。（鲜药煮十分钟）用净纱布六七层沾药水湿敷患处，每日二至三次，每次 20～40 分钟。

【功用】 清热解毒，除湿止痒。

【主治】 急性湿疹，过敏性皮炎，接触性皮炎（湿毒疡），丹毒，脓疱病（黄水疮）。

01563 马齿苋洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 马齿苋 31 克 苍术 9 克 苦参 15 克 细辛 6 克 陈皮 15 克 蜂房 9 克 蛇床子 12 克 白芷 9 克

【用法】 水煎，熏洗。

【主治】 青年扁平疣。

01564 马齿苋还黑散

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】 马齿苋子一升 白茯苓一两 熟干地黄四两 泽泻二两 卷柏二两 人参二两（去芦头） 松脂四两（炼成者） 桂心一两

【用法】 上为细散。每服二钱，空心以温酒调下，渐加至三钱，晚食前再服，一月效。

【主治】 血脑虚，发白早。

【宜忌】 忌生葱、萝卜、大蒜等。

01565 子午丸

【方源】《得效》卷七。

【组成】 榧子（去壳）二两 莲肉（去心） 枸杞子 白龙骨 川巴戟（去心） 破故纸（炒） 真琥珀（另研） 苦楮实（去壳） 白矾（枯） 赤茯苓（去皮） 白茯苓（去皮） 莲花须（盐蒸） 芡实 白牡蛎（煅） 文蛤各一两

【用法】 上为末，酒蒸肉苁蓉一斤二两，烂研为丸，如梧桐子大，朱砂一两半重，细研为衣。浓煎萆薢汤空心送下。

【主治】 ①《得效》：心肾俱虚，梦寐惊悸，体常自汗，烦闷短气，悲忧不乐，消渴引饮，漩下赤白，停凝浊甚，四肢无力，眼昏，形容瘦悴，耳鸣头晕，恶风怯冷。②《医统》：滑精。

【宜忌】 忌劳力房事。

01566 子芩丸

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】 条芩四两（醋浸，纸裹，煨七次） 当归二两（酒洗）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心露蒡酒送下，一日三次。

【主治】 崩漏。妇人四十九岁以后，天癸当住，每月却行，或过多不止。

【加减】 加香附（醋制）二两尤妙。

01567 子芩散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】 子芩三分 栀子仁半两 远志一分（去心） 桂心半两 黄连三分（去须）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒吐血，心神烦闷。

01568 子芩散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】子芩一两 蒲黄三分 伏龙肝三分 青竹茹三分

【用法】上为散。每服二钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入生藕汁一合，搅令匀，温服。

【主治】鼻衄不止。

01569 子悬汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】生地二钱 当归一钱 白芍八分 丹皮八分 黄芩八分 栀子八分 木通六分 杜仲八分

【用法】水煎服。

【主治】子悬。

01570 子悬汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参一钱 当归身 白芍各二钱 黄芩 丹参 苏叶 陈皮 砂仁 香附（制）各八分

【用法】加生姜三片，葱白三茎，水煎服。

【主治】子悬。妊娠四五月，君相二火以养胎，平素火盛，以致胎气不和逆上，心胸胀满疼痛。

01571 子淋散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】麦冬三两（去心） 赤苓二两 大腹绒半两 车前子二两 淡竹叶三两

【用法】上为散。每服三钱，水煎，去滓温服。

【主治】孕妇淋痛溺涩，脉微数者。

【方论选录】妊娠胎燥，气壅不能施化津液，而决渎无权，水府不快，故小便涩痛淋漓不已焉。麦冬清心润肺以滋水之上源；赤苓利柔化气以洁水之下流；大腹绒泻滞气专利三焦之用；淡竹叶清膈热更雄决渎之权；车前子清肝热以利小水也。为散水煎，使气化调和，则胎燥自润而小水通行无不畅快，何涩痛淋沥之不止哉！

01572 子肿子气汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】白术一钱 香附一钱 当归一钱 川芎八分 茯苓八分 苍术八分 腹毛八分 苏梗八分

【用法】水煎服。

【主治】子肿、子气。

01573 比天膏

【方源】《摄生众妙方》卷一。

【组成】片脑 牛黄 乳香 没药 龙骨 血竭 赤石脂 麝香 轻粉 麻黄 川芎 白芷 薄荷 草乌 全蝎各一两 连翘 防风 黄芩 黄连 大黄 知母 贝母 当归 苍术 羌活 栀子仁 桔梗 柴胡 荆芥 五倍子 海螵蛸 白及 穿山甲 木鳖子 大枫子 椿皮 桑枝 槐枝 乱发各三两 蛇蜕二条 柳枝长一尺七条

【用法】上药片脑、麝香、牛黄、乳香、没药、龙骨、血竭、赤石脂、轻粉另研细末，其余诸药俱切碎，用油浸一宿，外用密陀僧二斤研细，每药一料，用麻油三斤，以浸过为度，文武火煎药枯发焦无踪影，退火待冷，去滓，复入火，以密陀僧四五钱，时时入内，用柳枝不住手搅，令冷，水一碗，滴药成珠不散，方下乳香等五味搅匀，退火待温，方下片脑、麝香、牛黄三味搅匀，入瓷罐内收，过一七方可用。如贴身疼痛及半身不遂、风湿等疾，取生姜捣汁炒热，擦患处二三十遍，火烘膏药贴上，如觉痒，则揭起，少顷，再烘贴上此药。如贴噎膈、气患，加狗肾三钱。若无牛黄、狗肾，加天鹅油三钱代之。

【主治】身体疼痛，半身不遂，风湿及噎膈、气蛊。

01574 比和饮

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】人参一钱 白术一钱 茯苓一钱 藿香八分 陈皮五分 砂仁五分 神曲一钱（炒） 甘草五分

【用法】上锉作一剂。用十年以上陈仓米一合，顺流水二钟煎沸，泡伏龙肝，研细搅混，澄清取一钟；另加生姜三片，大枣二个，同煎七分，稍冷服，别以陈仓米饮时啜之，日进三服，即止。

【主治】①《古今医鉴》：水谷不纳，闻食气即呕。②《类证治裁》：病久胃虚呕吐。

01575 比金丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】天南星（炮） 全蝎（去毒，微炒） 白花蛇（酒浸一宿，去皮骨取肉，焙干秤） 草乌头（烧灰留性） 麝香（研）各半两 蜈蚣一条（蘸酒炙热） 乳香（别研） 朱砂（别研）各一分

【用法】上为细末，酒浸蒸饼为丸，如梧桐子大，微捏扁。每服一丸，薄荷汤浸少时化下；阴痫，生姜汤化下；周晬儿，服二丸，不拘时候。

【主治】小儿胎风、诸风手足瘛疭，目睛上视，头项强直，牙关紧急，口吐涎沫；及吐泻昏困，遂成脾风。

01576 比金散

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】麻黄 白芷 细辛 荆芥穗 菊花 防风 石膏 何首乌 川芎 薄荷 干蝎 草乌头各

等分

【用法】 上为末。每服一钱，水一盏煎，温服；酒、茶亦得。

【主治】 伤寒冒风，头目痛，四肢拘急，鼻塞。

01577 比圣饼子

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】 大戟 甘遂各一两

【用法】 上为细末。每服一钱匕，以大麦面一两，新水和作饼子烧熟，每五更徐徐烂嚼茶下。移时小便多是效，未退再服。

【主治】 十种水气腹胀。

01578 支饿丹

【方源】《普济方》卷一八〇引《郑氏家传渴浊方》。

【组成】 菟丝子（酒炙） 白茯苓各五钱 秋石一两

【用法】 上为末，百沸汤一盏，井花水一盏，为阴阳水，煮糊为丸。盐、酒汤送下。

【主治】 白浊，遗精。

01579 云母丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】 云母粉五两 白茯苓四两 钟乳粉三两 柏子仁三两 人参三两（去芦头） 续断三两 桂心二两 甘菊花五两 生干地黄四两

【用法】 上为散，取天门冬七斤，捣绞取汁，搜诸药，用黍米五斗下蒸之，令米熟，取药晒干，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【功用】 补益脏腑，轻身耐老，变白，明目，强力，益精，悦泽颜色，壮健筋骨，精神灵明，不复有病。

01580 云林润身丸

【方源】《回春》卷二。

【组成】 当归（酒洗）六两 白术（去芦）六两 白茯苓（去皮）三两 香附米（童便浸，炒）三两 陈皮三两 枳实（麸炒）三两 黄连（姜汁炒）三两 白芍药（酒炒）三两 山楂肉三两 神曲（炒）三两 人参二两 山药（炒）二两 莲肉（去心）二两 甘草（炙）五钱

【用法】 上为细末，荷叶煎汤，煮饭为丸，如梧桐子大。每服百余丸，米汤或酒送下。

【功用】 清火化痰开郁，健脾理胃，养血和气。

【主治】 肌肉怯弱，精神短少，饮食不甘。

01581 元朱丹

【方源】《增订治疗汇要》卷下。

【组成】 硼砂 元明粉各五钱（制） 朱砂六分 梅片五分

【用法】 上为细末。吹之。

【功用】 长肌肉，生新去腐。

【主治】 喉中溃烂。

01582 元阳丹

【方源】《阴证略例》。

【组成】 乌头 干姜各等分（并生用）

【用法】 酒面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前生姜汤送下。

【功用】 还阳退阴，补益和气。

【主治】 阴毒伤寒始得，头痛腰重，眼睛疼，身体倦怠而甚热，四肢厥逆冷，额上及手背冷汗不止，或多烦渴，精神恍惚，如有所失，六脉沉细而疾，尺部短小，寸口或大。并治气痛。

01583 元灵散

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 五灵脂（去砂石） 元胡索（炒） 莪术（火煨） 良姜（炒） 当归各等分

【用法】 上为末。每服二钱，热醋汤调下。

【主治】 急心痛。

01584 元戟膏

【方源】 方出《医宗必读》卷七，名见《仙拈集》卷一。

【异名】 调敷散（《医级》卷八）。

【组成】 大戟 芫花 甘遂 海藻各等分

【用法】 上为细末，用醋调面和药，摊绵纸上。覆贴肿处，以软帛裹住。

【主治】 腹满如石，或阴囊肿大。

【备考】 先用甘草嚼，后用此。

01585 元霜散

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【异名】 万金散。

【组成】 薄荷叶 僵蚕 青黛（飞净） 朴消 白矾 川连 硼砂各五钱

【用法】 上为细末，腊月初取雄猪胆五六枚，倒出汁小半；和药拌匀，灌入胆内，以线扎头，用纸包裹，将地掘阔深一尺，以竹杆横吊药胆，上用板铺，以土密盖，立春日取出，挂在风口阴干，去胆壳瓶贮。每两加牛黄、冰片各三分，研细，吹喉。

【主治】 喉蛾痹闭，并口舌诸症。

01586 元霜锭

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】 牙皂（煨，切片，研）二百四十筴 玄胡索（生晒，研）三两 青黛六分 当门子一钱

【用法】 上为极细末，将冷水拌打成锭，每重三分。以冷水磨服。吐出顽痰即愈。

【主治】 喉风急闭，痰如潮涌，命在顷刻。

01587 元胡索散

【方源】《朱氏集验方》卷三引朱仁卿方。

【异名】 玄蝎散(《医学入门》卷七)。

【组成】 元胡索（盐炒） 干蝎等分

【用法】 上为细末。温酒下。

【主治】 小肠气痛。

01588 无比丸

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】 高良姜（炮） 缩砂仁 桂（去粗皮） 干姜（炮） 赤芍药各三两

【用法】 上为末，醋面糊为丸，如小弹子大。每服一丸，生莱菔一片，和药细嚼，热汤送下，不拘时候。

【主治】 九种心痛。

01589 无比散

【方源】《洁古家珍》。

【组成】 青黛 白僵蚕 甘草 马牙消 板蓝根 紫河车 薄荷 桔梗各等分

【用法】 上为细末。干掺。炼蜜为丸，噙化亦可。

【主治】 咽喉诸恙。

01590 无价宝

【方源】《伤寒标本》卷下。

【异名】 壮阳丹。

【组成】 川楝子二两 牛膝一两（酒浸） 槟榔一两 菟丝子一两（另研，酒浸） 蛇床子一两 干姜五钱 穿山甲一大片（酥炙） 莲肉一两（不去心） 乳香三钱（另研） 沉香五钱（另研） 白檀香五钱（另研） 鹿茸一两（炙） 巴戟一两 大茴香一两 仙灵脾三钱 破故纸五钱 凤眼草三钱 胡芦巴五钱 人参一两 泽泻一两 山药一两 五味子一两 熟地黄二两 麦门冬 肉苁蓉 茯苓各一两 白芍药五钱

【用法】 上药除乳香、沉香、白檀香、菟丝子四味另研为细末，其余二十三味各为细末，同前四味炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，增至九十丸，好酒送下，以干物压之。修合之日，加丁香一钱

【主治】 五劳七伤，四肢无力，脚腿沉困，骨节酸疼，面目无光，阳痿不起，下元虚冷，梦失精液。

01591 无名丸

【方源】《医方类聚》卷一二九引《急救仙方》。

【组成】 赤茯苓 大戟 甘遂各一两（切忌甘草） 芫花 槟榔 青皮 黑牵牛各半两

【用法】 上为末，薄面糊为丸，如梧桐子大。五更空心每服三十丸。汤使如后：水肿，海藻、破故纸、白术煎汤送下；面肿，陈皮煎汤送下；肚肿，升麻煎汤送下；腰肿，葶苈子煎汤送下；四肢肿，桑白皮煎汤送下；脚肿，生米一撮，将水洗过米，次擦洗摇碎，用沸汤泡饮送下；如若大便来多不住，用冷水浸脚手便住。如脚膝肿，服药后当阁起两足而卧，令水流至脚间，从大小便出，则肿自消。此药不可多服，亦不可连日服用，如一次取水不尽，当三日一次用药，其余二日，可服生料五苓散，嘉禾散，相和用姜、枣煎服，以能理脾进食，清利水道，肿自消矣。

【主治】 水肿病，心腹坚胀，遍身肿痛，咳嗽喘急。

【宜忌】 其日不可另服他药，更忌甘草，并断盐半年。妇人胎前产后忌服。

01592 无忧丸

【方源】《伤寒标本》卷下。

【组成】 黑牵牛一斤（取末十三两） 槟榔（好者）二两 猪牙皂角二两 三棱二两 莪术二两（各用好醋浸，湿纸裹煨香熟，取出切碎）

【用法】 上药晒干为末，又用大皂角二两，煎汤打面糊为丸。每服二钱半，白汤送下，茶亦可，或姜汤送下。

【主治】 一切食积、气积、茶积、酒积、泻痢、气蛊，腹胀膨闷、肚腹疼痛。

01593 无忧汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】 白芍五钱 竹茹三钱（炒） 枣仁三钱 人参三钱 当归五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 胆气怯弱，夜不能寐，恐鬼祟来侵，睡卧反侧，辗转不定，或少睡而即惊醒，或再睡而恍如捉拿。

01594 无忧散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】 重楼金线草 甜消 板蓝根 茯苓 蒲黄 紫河车 百药煎 贯众 莲子心 白僵蚕 小豆子 山豆根 土马骔 马屁勃 螺儿青各一分 甘草四分 龙脑少许

【用法】 上为细末。每服一二钱，食后蜜水调下；亦可以蜜为丸，含化。

【主治】 热毒上冲，咽喉肿疾。

01595 无忧散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 黄耆 木通 桑白皮 陈皮各一两 胡椒 白术 木香各半两 牵牛（头末）四两

【用法】 上为细末 每服三五钱，食后以生姜自然汁调下。

【主治】 诸积不化。

【备考】《普济方》引本方无牵牛头末、胡椒，有官桂半两。主治腹肚盅胀，大便不利。

01596 无忧散

【方源】《医方类聚》卷二二九引《济生》。

【异名】 保产无忧散（《普济方》卷十六）、保生无忧散（《女科·撮要》卷下）。

【组成】 当归（去芦，酒浸） 川芎 白芍药各三钱 木香（不见火） 甘草（炙）各一钱半 枳壳（去瓤，麸炒） 乳香（别研）各三钱 血余（发灰，以猪猪心血和之） 一钱半

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏，煎至八分，一日三次，不拘时候。

【主治】 妊娠身居富贵，口厌甘肥，聚药不常，食物无度，既饱便卧，至令胞胎肥厚，根蒂坚牢，行动气急，临产难生者。

01597 无忧散

【方源】《增补内经拾遗》卷四。

【异名】 保产无忧散、保产神效方（《傅青主女科》补编）、保产无虞散（《郑氏家传女科万金方》卷三）、千金不换方（《胎产心法》卷中）、保生无忧散（《医林纂要》卷八）、保安煎（《古方汇精》）、保产无忧汤（《笔花医镜》卷四）、便产神方（《良方集腋》卷下）、仙传保产无忧散（《卫生鸿宝》卷五）。

【组成】 菟丝饼一钱五分 当归（酒洗）一钱五分 川芎 钱三分 白芍一钱二分（冬月只用一钱） 甘草五分 荆芥穗八分 炙黄耆八分 厚朴（姜汁炒）七分 枳壳六分 艾叶五分 真贝母 一钱五分（去心） 羌活五分

【用法】 上药依方修合。另将真川贝为细末，候药煎好，冲入同服。服八剂，或间日一服。

【功用】 令产时不疼即下。

【主治】 ①《傅青主女科》：孕妇偶伤胎气，腰疼腹痛，甚至见红不止，势欲小产；或临产时交骨不开，横生逆下，或子死腹中，命在垂危。②《郑氏家传女科万金方》：血晕阴脱。

01598 无忧散

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】 黑牵牛（取头末）六钱 槟榔四钱 大黄四钱 雷丸二钱 木香二钱 芫荑一钱

【用法】 上药依法修合，各为细末和匀。每服大人三钱，小儿一二钱，空心沙糖调下，取去虫积为度；或皂荚煎膏为丸，如梧桐子大，每服二钱，沙糖汤送下亦可。

【主治】 面黄腹胀，喜吃茶盐之物，腹中疼痛，有虫积而壮实者。

01599 无敌丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十七。

【组成】 川萆薢 虎骨（酥炙） 续断（酒浸一宿）各一两 川山甲半两（酥炙） 乳香五钱 没药二钱半 茴香（炒） 狗脊 当归（酒浸） 砂仁（炒） 鹿茸各一两（酥炙） 杜仲二两（炒断丝） 地龙（去土）七钱半 青盐（去土）七钱半 菟丝子四两（酒浸一宿，为末）

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐、酒送下。

【主治】 肾虚腰痛。

01600 无碍丸

【方源】《苏沈良方》卷四。

【组成】 大腹（炙）二两 蓬莪术 三棱（皆湿纸裹煨熟）各一两 木香（面裹煨熟）五钱 槟榔（生） 一分

【用法】 上为末，炒麦粉为糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，生姜汤送下。

【主治】 ①《苏沈良方》：脾病，横泻四肢，喘，手足背肿。②《三因》：脾气横泄，四肢浮肿，心腹胀满，喘不得卧。

01601 无上光明丹

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】 鹰爪黄连一两五钱（毛多者为上，连毛洗去泥土净，先用铁杵杵碎，借铁气令细毛入水不浮上，磨，并粗渣俱为细末，取净末）一两 玄明粉（上白净者） 一两六钱（若倒毛流泪烂皮，火赤风眼，外加五钱） 苏薄荷（金钱者佳）春分至秋分用四分，秋分至春分用六分

【用法】 上为极细末，将大号铜锅入好清水二碗半，要二人各持两指阔薄竹一片，待药一滚，即以竹片不住手搅四围及锅底，如火沸起，药水粘锅，两旁二人各盛清水半盏，忙用竹片挑水将粘定药水洗下，沸起又洗下。若火气太盛，将锅提起一旁，待洗药水净，再安火上缓缓煮成稠酱样取起，将大好细瓷盘盛之，日中晒极干，其色真黄者为上，重研筛为细末，小口瓷罐盛之，塞紧罐口，莫令透

风，若透风便潮，久则成水矣。此药最是难煮，若不细心洗铲，倘药粘定锅底及两旁，即成焦黑，晒干时便成绿色，药定不灵，付之无用。

上好真青胆矾（去下面粗脚净）一两，朱砂（光明有墙壁者）一钱五分，黄丹（上好者，用水飞过），共为极细末，另收一罐。凡用时草药二股，石药一股，调药用尖样瓷杯洗净，放药一分许，入井水几点，以净指调令稠，再加水调稀，然后多下水，浸过三四分，调匀，纸盖少顷，药水或绿色，将新羊毛小笔或鸡鹅翎轻轻取上面清水洗搽，不论遍数，一干又搽。如烂皮流泪，火赤风眼，悬毛倒刺，只洗皮外，不必放药水入眼内，洗半尽即愈。若悬毛倒刺，每日洗十数次，久之眼皮绉缩，其毛向外矣。若翳膜外障，胬肉攀睛，重者石药多加重些，洗眼时将眼角少睁开些，令药水入内，一觉痛即将手巾放在热水内浸透熏洗之，药气乘热而散，其痛自止。去膜、去翳、去攀睛，时常搽看，倘去十分之七，前药即住，不复洗。另用复明药缓缓洗之，翳膜渐去自然复明，若一时求净，用药太急，定至伤目。

【主治】 眼睑烂皮流泪、火赤风眼、悬毛倒刺，翳膜外障，胬肉攀睛。

【宜忌】 洗药时，最忌酒与豆腐；清晨饿肚不可搽及；有孕妇不可洗，洗之伤婴儿眼目。

01602 无比地黄丸

【方源】《普济方》卷七十二引《经验良方》。

【组成】 肉苁蓉四两（酒浸） 枸杞子四两 当归 川芎 防风（去芦）各二两 菊花 楮实（拣，焙） 巴戟（去心） 荆芥穗 白蒺藜各一两半 决明子（炒）一两 生干地黄四两

【用法】 上为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下；或温无灰酒送下亦可。

【主治】 肝肾虚，眼生黑花，乍结内障，目力亏损，逢风有泪。

01603 无比薯蓣丸

【方源】《千金》卷十九。

【异名】 无比山药丸（《局方》卷五）、山芋丸（《圣济总录》卷五十二）、苁蓉丸（《圣济总录》卷八十九）、山药丸（《直指》卷十）、万安丸（《御药院方》卷六）。

【组成】 薯蓣二两 苁蓉四两 五味子六两 菟丝子 杜仲各三两 牛膝 泽泻 干地黄 山茱萸 茯神（一作茯苓） 巴戟天 赤石脂各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食前以酒送下，一日二次。

【功用】 补虚健体，祛热安神，消食破积。

①《千金》：令人健，四体润泽，唇口赤，手足暖，面有光悦，消食，身体安和，音声清明。②《圣济总录》：补元脏，益阳气，轻身驻颜，壮气血，补益筋脉，安和脏腑，除心中伏热，强筋骨，轻身，明目，去冷除风。③《御药院方》：安魂定魄，开三焦，破积聚。

【主治】 ①《千金》：诸虚劳百损。②《局方》：丈夫诸虚百损，五劳七伤，头痛目眩，手足逆冷，或烦热有时，或冷痹骨疼，腰髋不随，饮食虽多，不生肌肉；或少食而胀满，体无光泽，阳气衰绝，阴气不行。

【宜忌】 禁醋、蒜、陈臭之物。

【加减】 若求大肥，加敦煌石膏二两；失性健忘，加远志一两。

01604 无忌紫金丸

【方源】《得效》卷三。

【异名】 紫金丸（《赤水玄珠》卷十六）。

【组成】 针砂（醋煮通红） 紫金皮（酒浸） 香附子（炒） 三棱（醋浸一宿，煮） 苍术（米泔浸） 陈皮（去白） 青皮（去白） 厚朴（姜汁制） 缩砂各一两

【用法】 上醋糊为丸。每服三十丸，酒、熟水送下；川椒汤服亦可。

【功用】 理脾胃，退黄。

【主治】 ①《得效》：积黄。②《赤水玄珠》：脾胃食积结块，四肢怠惰，身面俱黄，肚腹膨胀，俗名黄胖病。

01605 无比蔓荆子汤

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 黄耆 人参各一钱 黄连 柴胡各七分 蔓荆子 当归 葛根 防风各五分 生草 钱 细辛叶三分

【用法】 作一服，水二盏，煎至一盏，去滓稍热服。

【主治】 眼棱紧急，以致倒睫拳毛，损睛生翳，及上下睑眦赤烂，羞涩难开，眵泪稠粘。

【方论选录】 肺气虚，黄耆、人参实之，为君；心受邪，黄连除之，肝受邪，柴胡除之，小肠受邪，蔓荆子除之，为臣；当归和血，葛根解除为佐；防风疗风散滞，生甘草大泻热火，细辛利九窍，用叶者，取其升上之意为使也。

01606 天一丸

【方源】《韩氏医通》卷下。

【异名】 天乙丸（《医学入门》卷八）、天一水串

(《串雅内编》卷二)。

【组成】 灯心十斤(以米粉浆染，晒干研末，入水澄之，浮者为灯心，取出，又晒干入药，用二两五钱。而沉者为米粉，不用) 赤白茯苓(去皮，兼用茯神去木)五两 滑石(水飞过)五两 猪苓(去皮)二两 泽泻(去须)三两 人参一斤(去芦，切片，煎浓汤，去滓澄净，炼汤成膏，如糖饴)

【用法】 上药灯心等五味，各为细末，以人参膏和成丸，如龙眼大，朱砂为衣，贴金箔。每用一丸，任病换引。

【功用】 清心利水，健脾止泄。

①《韩氏医通》：通利水道。②《医学入门》：清心利便，散火。③《北京市中药成方选集》：健脾利水，理脾止泄。

【主治】 小儿元气不足，心脾蕴热，心烦口渴，呕吐泄泻，小便不利，丹毒。

①《医学入门》：小儿瘟热丹毒，惊风痰热，变蒸发热及呕吐泻痢。②《串雅内编》：孕妇难产不下者。③《重订通俗伤寒论》：痰胀，腹胀喘肿已减者。④《北京市中药成方选集》：小儿脾胃不和，肚腹胀满，呕吐泄泻，心烦口渴，小水不利。

01607 天丁散

【方源】《外科精义》卷下。

【异名】 天疔散(《普济方》卷二七三)。

【组成】 山丹花蕊 香白芷各二钱 牛蒡子根(春采，去皮) 天丁(乃皂角刺) 苍耳芽 大力子各五钱 雄黄一两

【用法】 上为细末。每用好醋涂纸，封之疔疮上；有黑甲者，必须胡桃油浸，次涂之自可。急服托里内消。

【主治】 一切疔疮及诸恶疮初生。

01608 天仙散

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】 天仙子 草乌头(生，去皮尖) 蛇床子 牡蛎(煅) 干姜(炮)各三两

【用法】 上㕮咀。平分作两次，每用水五升，煎五七沸，去滓淋渫。以被盖之，汗出是验。

【主治】 遍身麻木，腰脚疼痛，筋急骨疼。

01609 天仙膏

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】 天南星一枚 白及一钱 草乌头一枚 白僵蚕七枚

【用法】 上药并生为细末。用生鳝鱼血调敷㖞处，觉正，便用温水洗去，却服后凉药天麻丸。

【主治】 男子、妇人卒暴中风，口眼㖞斜。

01610 天冬膏

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】 天门冬一斤(用水泡透) 生地黄二斤(用水泡透)

【用法】 上药安木臼内捣一二千杵，取其汁再入温汤，更捣，又取其汁，不论几次，直待二药无味方止，以文武火熬成膏子，盛瓷器内。每服一匙，温酒化下，不拘时候，一日三次。

【主治】 风癫。

01611 天台散

【方源】《古今医鉴》卷二。

【组成】 麻黄(去节)七分 陈皮 乌药 僵蚕 川芎 枳壳(麸炒) 桔梗 白芷 干姜 防风 羌活 天麻各八分 当归 续断 威灵仙 乳香 没药各一钱 甘草六分 麝香少许

【用法】 上㕮咀。加生姜三片，水二盏，煎一盏，不拘时候服。

【主治】 中风，手足瘫痪疼痛。

01612 天丝饮

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】 巴戟天一两 菟丝子一两

【用法】 水煎服。

【主治】 健忘。

01613 天地丸

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生续方》。

【异名】 辟谷丹(《万氏家抄方》卷三)。

【组成】 天门冬(去心)二两 熟地黄(九蒸、曝)一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，用熟水、人参汤任下，不拘时候。

【主治】 心肾阴虚，心烦喜冷，口干咽燥，怔忡恍惚；咳血，吐血，衄血。

①《医方类聚》引《济生续方》：心血燥少，口干咽燥，心烦喜冷，怔忡恍惚，小便黄赤，或生疮疡。②《万氏家抄方》：咳血。③《济阳纲目》：吐衄，诸药不止。

【备考】 本方原名天地煎，与剂型不符，据《准绳·类方》改。《万氏家抄方》本方用法：炼蜜为丸，如弹子大，每服三丸，温酒或汤下，日进三服。

01614 天池膏

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 天花粉 黄连各半斤 人参 知母(去壳) 白术(炒，去芦)各四两 五味子三两 麦

门冬六两（去心） 藕汁二碗 怀生地黄汁二碗 人乳 牛乳各一碗 生姜汁二酒杯

【用法】 上先将天花粉七味切片，用米泔水十六碗，入砂锅内浸半日，用桑柴火慢熬至五六碗，滤清，又将渣捣烂，以水五碗，煎至二碗，同前汁又煎二三碗，入生地等汁，慢熬如饧，加白蜜一斤，煎去沫，又熬如膏，乃收入瓷罐内，用水浸三日，去火毒。每用二三匙，安舌咽之，或用白汤送下。

【主治】 三消。

01615 天花散

【方源】《直指》卷十七。

【异名】 玉泉散（《古今医鉴》卷十）、天华散（《寿世保元》卷五）。

【组成】 天花粉 生干地黄（洗）各一两 干葛 麦门冬（去心） 北五味子各半两 甘草一分

【用法】 上为粗末。每服三钱，加粳米百粒，水煎服。

【主治】 消渴。

【备考】 方中粳米，《古今医鉴》作“糯米”。

01616 天花散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】 天花粉一钱半 白芷一钱 乳香二分 没药五分 赤芍药一钱七分 贝母七分 归尾一钱 金银花三钱 穿山甲（炒黄色）一钱二分

【用法】 上锉一剂。好酒一钟半，煎服。

【主治】 瘰疬溃烂疼痛。

【宜忌】 忌鲜鱼、鸡、羊等物。

01617 天青膏

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】 青黛 天麻各一钱 白附子一钱半 麝香三分 天竺黄一钱半 全蝎 乌梢蛇（酒浸，去骨，瓦上焙干）各五分

【用法】 上为末，蜜调为膏，密贮于瓷器中。大儿服一分，小儿服半分，薄荷汤下。

【主治】 小儿急、慢惊风，咳嗽喘急。

01618 天竺散

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】 天竺黄 马牙消 甘草（炙）各半两 蛤粉（白者）二两 丹砂（研）一分

【用法】 上为细散。每服半钱匕，取新汲水搓薄荷相和，入龙脑少许，食后、临卧汤化服之。

【主治】 小儿喉痹，上焦积热壅毒。

01619 天星丸

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】 胆星 全蝎 蝉退各二钱半 防风 白附子 天麻 僵蚕各一钱半 麝香五分

【用法】 上为末，枣肉为丸，如绿豆大。每服三丸，荆芥、生姜煎汤送下。

【主治】 肺痫。面白，反视，惊掣，吐沫潮涎。

01620 天香散

【方源】《普济方》卷四十六引《圣惠》。

【组成】 天南星（汤泡七次） 半夏（制同上） 川乌（生，去皮脐） 川香白芷各等分

【用法】 上为末。每服七钱或十钱，水一碗半，煎至一碗，入生姜自然汁半碗，再煎至八分，热服。药汁稍黑难服，须要勉强吃二三服。

【主治】 ①《普济方》引《圣惠》：远年日近头风，才发则顽痹麻痒，不胜爬搔或块瘰，停痰呕吐，饮食莫入。②《会约》：风痰头痛。

【宜忌】 忌房事。

【备考】 《会约》：半夏与乌头相反，此处同用，须慎！

01621 天疮散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】 滑石一两 粉草五钱 枯矾三钱 绿豆粉五钱

【用法】 上为细末。

【主治】 天泡疮。

01622 天真丸

【方源】《普济方》卷九十四引《仁存方》。

【组成】 南星（炮） 白附子（生） 川乌（生，去皮）各二两 半夏五两（泡） 全蝎一两（炒） 乌蛇肉半两（炒） 白僵蚕（去嘴足）一两（炒） 花蛇肉半两 麝香半钱 朱砂三钱

【用法】 上为末，姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】 中风，半身不遂，手足顽麻，口眼㖞斜，痰涎壅塞；小儿惊风，大人头风，妇人血风，及一切风。

01623 天真丹

【方源】《医学发明》卷七。

【组成】 沉香 巴戟（酒浸，去心） 茴香（盐炒香，去盐用） 萆薢（酒浸，炒） 胡芦巴（炒香） 破故纸（炒香） 杜仲（炒去丝） 牵牛（盐炒香黑，去盐） 琥珀各一两 肉桂半两

【用法】 上为细末，用原浸药酒打面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至七八十丸，空心温酒送下。

【主治】 ①《医学发明》：下焦阳虚。②《古方选注》：下焦阳虚，脐腹痛冷，腿肿如斗，囊肿如

升，肌肉坚硬，按之不育。

【方论选录】《古方选注》：是方用沉香入肾，消风水之肿毒；琥珀达命门，利水道，破坚癥；巴戟疗脚气寒湿，胡芦巴搜下焦冷气潜伏；茴香香辟膀胱冷气，除下焦气分之湿；补骨脂暖腰膝，逐囊湿；杜仲健腰脊，除阴下湿；肉桂除下焦沉寒痼冷；萆薢味苦，疗痹痹，去下焦风湿；牵牛子性大热，除气分之湿，三焦壅结，脚浮水肿。以上诸药，辛香者居多，其苦辛无香者，或藉酒浸，或令炒香，俾阳通湿去，其肿自消，肌肉自柔，于以迎阳下返，积气全形，命曰天真，形不坏也。

【备考】本方改为散剂，名"天真散"。（见《中国医学大辞典》）。

01624 天浆散

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】罂粟壳五枚（蜜炙） 乌梅半枚 甘草半寸 干姜一块（炮） 酸石榴皮一片如钱大

【用法】上只作一服。用水二盏，煎全一盏，温服，不拘时候。

【主治】下痢腹痛，脓血相杂。

【加减】白痢，不用甘草；赤痢，不用干姜。

01625 天萝散

【方源】方出《医学正传》卷五，名见《外科大成》卷三。

【组成】丝瓜藤（近根）三五寸许（烧存性）

【用法】上为细末。酒调服之。

【主治】鼻渊。鼻中时流臭黄水，甚者脑亦时痛，俗名控脑砂。

【备考】《外科大成》本方用法：每服二三钱，黄酒调服。

01626 天黄丸

【方源】《医宗必读》卷九。

【组成】天花粉十两 黄连十两

【用法】竹叶汤为丸，如绿豆大 每服三钱，姜汤送下。

【主治】痰在心经者，名曰热痰，脉洪面赤，烦热心痛，口干唇燥，时多喜笑，其痰坚而成块。

【备考】本方原名天黄汤，与剂型不符，据《医钞类编》改。

01627 天麻丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】天麻一两 独活一两 人参三分（去芦头） 防风三分（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心一两 麻黄一两（去根节） 细辛三分 当归三分（锉，微炒） 白术三分 羚羊角屑三分 薏苡仁三分 干蝎三分（微炒） 牛膝三分（去苗） 芎藭三分 茯神三分 牛黄一分（研） 天南星三分（锉，醋拌，炒令黄） 朱砂半两（细研） 龙脑一分（细研） 乌蛇肉一两（酥拌，炒令黄） 麝香一分（细研） 白僵蚕三分（微炒）

【用法】上为细末，入研了药，更同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以温酒送下，加至十五丸，不拘时候。

【主治】脾脏中风，身体怠惰，四肢缓弱，恶风头痛，舌本强直，言语謇涩，皮肤顽痹。

01628 天麻丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】天麻一两 踯躅花一两 独活一两 麻黄二两（去根节） 附子一两（炮裂，去皮脐） 白附子一两（炮裂） 晚蚕蛾一两 乌蛇肉二两（酒浸，炙令黄） 防风一两（去芦头） 道人头一两 白蒺藜一两（微炒，去刺） 麝香半两（细研） 桂心一两 当归一两 川乌头一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末，入麝香都研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】刺风。皮肤如针刺，或顽痹不仁。

【宜忌】如有汗出，切宜避风。

01629 天麻丸

【方源】《普济方》卷九十五引《博济》。

【组成】天麻 附子（炮裂，去皮脐） 干蝎（全者，炒） 白僵蚕（直者，炒） 芎藭 牛膝（去苗，酒浸，切，焙）各一两 干姜（炮） 甘草（炙）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下。

【主治】中风躺曳，手足不收，口眼不正，语言謇涩，筋骨疼痛。

01630 天麻丸

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】天麻二两（酒浸二宿，焙干用） 防风（去叉） 甜瓜子 威灵仙（去苗土）各半两 玄参（洗净，焙干） 地榆（洗净，焙干） 乌头（去皮脐，生用）各一两 龙脑（研） 麝香（研）各一钱

【用法】上为极细末，用蜜四两，河水四盏，同煎至四两，将药末一两半，入在蜜内，更煎三五沸，候冷，入余药拌合为丸，如鸡头子大。每服一丸，细嚼，茶、酒任下

【主治】肝风。头目瞤动，筋络拘急，或肢体弛

缓不收。

01631 天麻丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】天麻二两 玄参 防风（去叉） 干浮萍（紫背者，洗，焙） 地榆 干薄荷 乌头（炮裂，去皮脐） 牛膝（酒浸，切，焙）各一两 不蛀肥皂荚五挺（就地坑内烧成黑灰，以瓷碗合定，候冷，用半两细研，入诸药） 牛黄 龙脑各一钱（别研入）

【用法】上药除别研外，为细末，和匀，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，温酒嚼下。

【主治】风气瘫缓。

01632 天麻丸

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】天麻二两 地榆一两 没药三分（研） 玄参 乌头（炮裂，去皮脐）各一两 麝香一分（研）

【用法】上药除麝香、没药细研外，同为末，与研药拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、晚食前温酒送下。

【主治】中风手足不随，筋骨疼痛，行步艰难，腰膝沉重；皮肤瘰痹。

01633 天麻丸

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】天麻半两 蜗梢（微炒） 没药各一分（研） 麻黄（去根节） 地龙（去土，炒）各半两 丹砂（研） 麝香各一分（研） 防风（去叉）半两 乌头（去皮脐，生用） 乳香（研） 自然铜（煅，醋淬）各半两 安息香一两（酒化，入蜜，同熬成膏）

【用法】上药除安息香外，捣研为末，再同研匀，以安息香膏和为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以薄荷酒送下，不拘时候。

【主治】中风。四肢筋脉拘挛，骨节疼痛，少力。

【宜忌】忌羊血。

【加减】素有热人，减乌头一半。

【备考】有人患手臂不随，又有患腿膝无力，行步辄倒，服之并效。

01634 天麻丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【异名】荆芥汤（《普济方》卷一〇七）。

【组成】天麻 苘蒡各一两 荆芥穗 鸡苏叶各二两 白附子（炮） 甘草（炙）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，嚼破，茶、酒任下。

【主治】风循经络，肌肉瞤动，头目昏眩，手足麻痹。

01635 天麻丸

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】天麻一两半 附子（炮裂，去皮脐）一两 半夏（汤洗七遍去滑）一两 荆芥穗半两 木香半两 桂（去粗皮）一分 苘蒡半两

【用法】上为末，入乳香和匀，滴水为丸，如梧桐子大。每服五丸，渐加至十丸，茶清送下，一日三次。

【主治】偏正头疼，首风攻注，眼目肿疼昏暗，及头目旋运，起坐不能。

01636 天麻丸

【方源】《保命集》卷中。

【异名】易老天麻丸（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】天麻六两（酒浸三日，晒干称） 牛膝六两（同上浸） 杜仲七两（锉，炒去丝） 萆薢六两（别研为细末） 玄参六两 当归十两 生地黄十六两 羌活十两 附子一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。常服五七十丸，病大至百丸，空心、食前温酒或白汤送下。平明服药至日高，饥则止。服药大忌壅塞，失于通利，故服药半月稍觉壅，微以七宣丸轻疏之，使药再为用也。

【功用】①《医略六书》：养阴疏热。②《中国药典》：祛风除湿，舒筋通络，活血止痛。

【主治】风湿痹痛，经脉不利，手足麻木，步履艰难，腰腿痠痛或筋脉抽掣。

①《景岳全书》：诸风肢节麻木，手足不随。②《医略六书》：肾虚有风，尺脉浮弦细数者。③《中国药典》：肢体拘挛，手足麻木，腰腿痠痛。

【方论选录】①《保命集》：牛膝、萆薢治筋骨，杜仲使筋骨相著，天麻、羌活和风之胜药，当归、地黄养血，能和荣卫，玄参主用，附子佐之行经也。②《医略六书》：肾虚有风，必有脚膝痿弱之病，此虽略不言证，观尺脉之浮弦细数可知。故以天麻散风湿，玄参退虚热，羌活疏邪于表，附子扶阳于里，萆薢渗湿热，白蜜润虚燥，牛膝、杜仲壮腰膝以强筋骨，当归、生地养血脉以滋肾也。俾肾阴内充，则肝血自足而虚热退藏，虚风无不外解矣。此养阴疏热之剂，为肾虚召风挟热之专方。③《成方切用》：此方大意，主治肾热生风。其以天麻入牛膝同制，取其下达；倍用当归、地黄，生其阴血；萆薢、玄参，清下焦之湿热；附子补下焦之真

阳，盖为肾中阳虚，故风得以久据其地也；用羌活之独本者，即真独活，不必更加也。

【备考】 按：《元戎》有独活五两。

01637 天麻丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 天麻一两 半夏 南星各一两 雄黄少许

【用法】 上以白面二两，滴水为丸，如梧桐子大。每服五十丸至百丸，煎淡水令沸，下药煮十余沸，漉出，食前生姜汤送下。

【主治】 咳嗽。

01638 天麻丸

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】 天麻 川乌（生，去皮）各三钱 草乌（生） 雄黄各一钱

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】 破伤风。

01639 天麻丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】 天麻二两 秦艽（去芦） 川续断 防风（去芦） 独活各一两 威灵仙五钱 桂枝三钱 片芩五钱（炒）

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，滚水送下。

【主治】 诸痛属火，兼受风寒湿热之气，发动于经络之中，以致肩臂手膊疼痛。

01640 天麻丸

【方源】《古今医鉴》卷二。

【组成】 天麻一两五钱 牛膝（酒洗）一两半 草蔴一两五钱 玄参一两五钱 当归二两五钱 羌活一两五钱 独活一两 生地黄四两 杜仲（酒炒断丝）一两五钱 附子（制）五钱 知母（盐酒炒）一两

【用法】 上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心温酒送下。

【功用】 滋阴抑火，行荣卫，壮筋骨。

【主治】 中风先兆，风因热而生，热胜则风动。大指、次指麻木不仁，或手足少力，或肌肉微掣。

01641 天麻丸

【方源】《傅青主女科》。

【组成】 天麻一钱 防风一钱 川芎七分 羌活七分 人参 远志 柏子仁 山药 麦冬各一钱 枣仁一两 细辛一钱 南星曲八分 石菖蒲一钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，辰砂为衣。每服六七十丸，清汤送下。

【主治】 产后中风，恍惚语涩，四肢不利。

01642 天麻丹

【方源】《丹溪心法附余》卷四。

【组成】 乌头八两 苍术四两 全蝎一两 荆芥 防风 天麻各二两

【用法】 上为细末，用豆腐和匀作饼，入铜铫以水满煮药至半沉半浮，存性为度，取出，待半干为丸，如梧桐子大，以朱砂为衣。临卧时先嚼木瓜一片，以好酒吞下二三十丸。服后觉昏沉，吐痰涎一二时为效。

【主治】 诸风瘫痪及白虎历节风。

01643 天麻汤

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】 天麻 独活（去芦头） 酸枣仁（炒） 薏苡仁 防风（去叉）各一两 赤茯苓（去黑皮） 芎藭 羚羊角（镑） 甘草（微炒，锉） 桂（去粗皮） 麻黄（去节，煎，掠去沫，焙）各半两

【用法】 上为末。每服三钱匕，水一盏，加薄荷少许，同煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 肝脏风毒流注，四肢拘急，筋脉抽掣，百节麻木，身体疼痛，头目昏眩。

01644 天麻汤

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 天麻 家菊花 川芎 当归身 羌活 白芍药 甘草各等分

【用法】 上锉。白水二钟，煎至八分，去滓，食后热服。

【主治】 目疾，白珠俱青症。郁邪蒸逼，走入珠中，膏汁游出，入于气轮、致白睛色忽变青蓝，瞳神必有大小。

【加减】 伤寒疟后，白珠青者，加柴胡、麦门冬（去心）、黄芩、天花粉；毒气所攻，白珠青者，加黄芩、牛蒡子（炒，研）、连翘、黄连。

01645 天麻汤

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】 天麻 黄耆 甘草 人参 茯苓 桂 续断 草蔴 升麻 羌活 巴戟 牛膝 苍术

【主治】 经络中有湿，身重，脉沉，挟虚，遇阴天或久坐湿地而发者。

01646 天麻酒

【方源】《普济方》卷二一七引《十便良方》。

【组成】 天麻二两（切） 牛膝二两 附子二两 杜仲二两

【用法】 上锉细，以生绢袋盛，用好酒一斗五

升，浸经七日。每服温饮下一小盏。

【主治】 妇人风痹，手足不遂。

01647 天麻散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】 天麻一两 干蝎一两（微炒） 乌蛇二两（酒浸，炙微黄，去皮骨） 天南星三分（炮裂） 白附子一分（炮裂） 天雄半两（炮裂，去皮脐） 白僵蚕三分（微炒） 干姜三分（炮裂，锉） 槟榔半两 人参二分（去芦头） 芎藭半两 麻黄一两（去根节）

【用法】 上为细散。每服一钱，以热酒调下，顿三服，不拘时候。以厚衣盖，汗出为度。

【主治】 中风不能语，四肢强。

01648 天麻散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】 天麻半两 白附子半两（炮裂） 羌活半两 防风半两（去芦头） 牛膝三分（去苗） 麻黄一两（去根节） 芎藭半两 草薢三分（锉） 独活半两 当归半两（锉，微炒） 桂心半两 干蝎一分（微炒） 白僵蚕半两（微炒）

【用法】 上为细散。每服二钱，暖竹沥酒调下，不拘时候。

【主治】 风湿痹。身体顽麻，皮肤瘙痒，筋脉急，言语謇涩，手足不遂。

01649 天麻散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】 天麻半两 麒麟竭半两 白僵蚕半两（微炒） 干蝎半两（微炒） 防风半两（去芦头） 犀角屑半两 麻黄一两（去根节） 牛黄一分（细研） 麝香一分（细研）

【用法】 上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 卒中风，仆倒不识人，口角㖞斜。

01650 天麻散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】 天麻二两 乌蛇二两（酒浸，去皮骨，炙微黄） 白附子一两（炮裂） 白僵蚕一两（微炒） 防风一两（去芦头） 麻黄二两（去根节） 甘菊花一两半 白鲜皮一两 藁本一两 羌活一两 独活一两 细辛一两 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 干蝎一两（微炒） 当归一两 桂心一两 白茯苓一两 干姜半两（炮裂，锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 中风半身不遂。

【宜忌】 忌生菜、猪、鸡肉、油腻。

01651 天麻散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】 天麻一两 天南星半两（炮裂） 犀角屑三分 独活半两 防风半两 （去芦头） 阿胶五分（捣碎，炒令黄燥） 芎藭半两 酸枣仁半两（微炒） 麻黄三分（去根节） 白附子半两（炮裂） 羚羊角屑半两 龙脑一分（研入）

【用法】 上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以竹沥调下，不拘时候。

【主治】 妊娠中风痉，身体强直，或时反张，口噤失音。

01652 天麻散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】 天麻 天竺黄 天南星 干蝎（并生用）等分

【用法】 上为散。每服半钱匕，温酒调下；小儿半字。

【主治】 中急风。

01653 天麻散

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】 天麻 附子（炮裂，去皮脐） 麻黄（去根节） 白花蛇肉（酥拌，炒） 防风（去叉） 细辛（去苗叶） 芎藭 菖蒲 荆芥穗 黄耆（锉） 桑根白皮（锉） 蒺藜子（炒，去角） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒，研）各三分 牛黄（研） 麝香（研）各一分

【用法】 上为散，与研者三味拌匀，再罗。每服一钱匕，薄荷酒调下，不拘时候。

【主治】 皮痹。肌肉不仁，心胸气促，项背硬强。

01654 天麻散

【方源】《直指》卷二十四。

【组成】 天麻 川芎 川升麻 半夏（制）各三钱 防风 细辛 羌活 荆芥穗 蝉壳（去嘴足） 甘草（焙）各二钱

【用法】 上细锉。每服二钱，加生姜三片，井水煎服。

【主治】 风热瘾疹

【加减】 挟寒者，加官桂；挟暑者，加柴胡、黄芩；挟湿者，加茯苓、苍术。

01655 天麻散

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】 天麻 天南星（炮，去脐） 防风各一

两 荆芥二钱

【用法】 上为细末。每用五钱，连须葱白煎汤调下。

【主治】 破伤风。因跌打伤头脑，而客邪乘之，以致手足搐搦，人事昏愦。

01656 天葵丸

【方源】《古今医鉴》卷十五引黄宾江方。

【组成】 紫背天葵一两半 海藻一两 海带一两 昆布一两 贝母一两 桔梗一两 海螵蛸五钱

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食后温酒送下。

【主治】 瘰疬。

【方论选录】 此方用桔梗开提诸气，贝母以消毒化痰，海藻、昆布以软坚核，治瘰疬之圣药也。

01657 天雄丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】 天雄一两（炮裂，去皮脐） 羚羊角屑半两 牛黄一分（细研） 麝香一分（细研） 天麻一两 桑螵蛸半两（微炒） 蝉壳半两 牛膝半两（去苗） 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心半两 当归半两 芎藭半两 羌活半两 白僵蚕半两（微炒） 五加皮半两 乌蛇肉二两（酒浸，炙微黄） 薏苡仁半两 麻黄一两（去根节） 防风半两（去芦头） 干蝎半两（微炒） 乳香一两 仙灵脾一两 道人头一两 朱砂半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下，渐加至三十丸，日三四服。

【主治】 中风半身不遂，言语謇涩，肌肤顽痹，筋脉不利，骨节疼痛。

【备考】 方中朱砂用量原缺，据《普济方》补。

01658 天雄丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 天雄二两（炮裂，去皮脐） 覆盆子一两 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙微黄） 巴戟一两 菟丝子二两（酒浸三日，曝干，别捣为末） 五味子一两 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮皮皱皮，炙干） 牛膝一两半（去苗） 桂心一两 石龙芮一两 石南一两 熟干地黄二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 虚劳羸弱，阳气不足，阳痿，小便数。

01659 天雄丸

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】 天雄（炮裂，去皮脐） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 桂（去粗皮）一两半 干姜（炮）三两 防风（去叉）三两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，日二夜一。

【主治】 ①《圣济总录》：风湿痹，皮肉不仁，骨髓疼痛，不可忍者。②《奇效良方》：风寒湿痹。

01660 天雄丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】 蛤蚧一对 朱砂二钱 沉香三钱 丁香三钱 阳起石三钱 钟乳粉半钱 木香二钱半 紫梢花半两 晚蚕蛾一两半 牡蛎粉二钱半 天雄一个 桂二钱半 石燕子一对（炭火烧，淬醋七次） 鹿茸半两（酥炙） 白术二钱半 苁蓉半两（酒浸三日，焙干） 菟丝子三钱（酒浸，焙干） 龙骨二钱半 海马一对 乳香三钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心细嚼，好酒煎木通，入麝香少许送下，不得过三服。

【主治】 真气不足，阳气衰惫，失精腰痛，脐腹痞急，及阳事不兴，男子本气脱者。

01661 天雄散

【方源】《金匮》卷上。

【组成】 天雄三两（炮） 白术八两 桂枝六两 龙骨三两

【用法】 上为散。每服半钱匕，酒送下，一日三次。不知，稍增之。

【功用】《金匮要略心典》：补阳摄阴。

【主治】 肾阳虚衰，畏寒腰冷，阳痿遗精，小便频数或不利。

①《金匮》：虚劳。②《本草纲目》：男子失精。③《金匮要略今释》引《类聚方广义》：老人腰冷。小便频数，或遗溺，小腹有动者。④《方机》：失精，脐下有动而恶寒，或冲逆，或小便不利者。⑤《医醇剩义》：阳虚亡血，失精。

【方论选录】 ①《金匮要略方论本义》：天雄散一方，纯以温补中阳为主，以收涩肾精为佐，想为下阳虚甚而上热较轻者设也。②《金匮方歌括》元犀按：方中白术入脾以纳谷，以精生于谷也；桂枝入膀胱以化气，以精生于气也；龙骨……以精归于肾……，深得《难经》所谓损其肾者益其精其旨。然天雄不可得，可以附子代之，断不可泥于小家天雄主上，附子主下之分。③《金匮要略方义》：药用天雄为君，乃大热纯阳之品，善能助阳事、暖命门，殆为阳虚而阴萎者设；臣以桂枝，配天雄以益火之源，鼓舞肾阳之气，佐龙骨以涩精，是为遗精、早泄而设；加入白术者，以补后天之本，与天

雄相伍，以收脾肾并补之功。综合诸药，可以助肾阳，益脾气，固精止遗，适于肾阳虚衰，阳萎早泄，遗精等证。

【临证举例】 滑精 《金匮要略今释》引《方函口诀》：一人常苦阴囊冷，精汁时自出，长服此方丸药而愈。

01662 天雄散

【方源】《千金》卷二十。

【组成】 天雄 五味子 远志各一两 苁蓉十分 蛇床子 菟丝子各六两

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，酒送下，一日三次。常服勿止。

【主治】 五劳七伤，阴萎不起，衰损。

01663 天雄散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】 天雄一两（炮裂，去皮脐） 白敛一两 桂心一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 干姜半两（炮裂，锉） 薯芋一两 干漆一两（捣碎，炒令烟出） 狗脊一两 防风一两（去芦头） 当归一两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】 上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 中风跛蹇，偏枯不遂，肢节疼痛，昼夜呻吟。

【宜忌】 忌生冷、油腻。

01664 天雄散

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】 天雄（炮裂，去皮脐）三两 细辛（去苗叶）三两 山茱萸五两 干姜（炮）二两 山芋七两

【用法】 上为散。每服一钱匕，空心温酒调下，一日二次。

【主治】 风聋，头目痛。

01665 天门冬丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 天门冬一两（去心，焙） 牛膝一两（去苗） 麦门冬二两 人参一两（去芦头） 紫菀三分（洗，去苗土） 黄耆一两（锉） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 白茯苓一两 鳖甲二两（涂酥，炙令黄，去裙襕） 薯蓣一两 五味子一两 石斛一两（去根，锉） 枸杞子一两 熟干地黄二两 沉香一两 诃黎勒皮一两 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以枣汤送下。

【主治】 肺痨痰嗽，气促，下焦虚损，上焦烦热，四肢羸瘦。

【宜忌】 忌鲤鱼、苋菜。

01666 天门冬丸

【方源】《圣惠》卷三十一。

【异名】 天冬丸（《仙拈集》卷二）。

【组成】 天门冬二两半（去心，焙） 贝母一两（煨微黄） 白茯苓一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。绵裹一丸，含化咽津。

【功用】 ①《圣惠》：润心养肺。②《仙拈集》：润肺止嗽。

【主治】 ①《圣惠》：骨蒸劳，咳嗽。②《仙拈集》：吐血，咯血。

01667 天门冬丸

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】 天门冬（去心，焙）二两 甘草（炙，锉） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各一两 人参三分 贝母（去心，焙） 五味子 阿胶（炙令燥） 桑根白皮（炙，锉）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，食后、临卧温人参汤嚼下；含化咽津亦得。

【主治】 肺痿，咽干烦躁，痰壅咳嗽，小便赤涩，眠睡不安，喉咽肿痛。

01668 天门冬丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】 天门冬（去心，焙）二两半 鸡内金三具（微炙） 桑螵蛸十枚（炙） 土瓜根（干者） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 熟干地黄（焙） 栝楼根 知母（焙） 泽泻（锉） 鹿茸（去皮毛，酒浸，炙） 五味子 赤石脂各一两半 牡蛎（煅）二两 苦参一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎粟米饮送下。

【主治】 初得消中，食已如饥，手足烦热，背膊疼闷，小便白浊。

01669 天门冬丸

【方源】《本事》卷五。

【组成】 天门冬一两（水泡，去心） 甘草（炙） 杏仁（去皮尖，炒熟） 贝母（去心，炒） 白茯苓（去皮） 阿胶（碎之，蛤粉炒成珠子）各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。含化一丸，咽津。日夜可十丸，不拘时候。

【功用】 润肺，安血，止嗽。

【主治】 吐血，咯血。

【方论选录】《本事方释义》：天门冬气味苦寒，入手足少阴、厥阴；甘草气味甘平，入足太阴；杏仁气味苦微温，入手太阴；贝母气味苦微寒，入手太阴、少阴，白茯苓气味甘平淡渗，入足阳明，能引诸药入于至阴之处；阿胶气味咸寒，入足厥阴、少阴。此治吐血、咯血之方也。肺家不润，虚火上炎，血不安宁，咳呛不止者，以甘寒润肺之品，调和阴阳，则上炎之火下行潜伏，嗽焉有不止耶？

01670 天门冬汤

【方源】《全生指迷方》卷四。

【异名】 天冬汤(《盘珠集》卷下)。

【组成】 天门冬（去心） 紫菀（去苗及枯燥者，焙） 知母（焙）各一两 桑白皮 五味子 桔梗各半两

【用法】 上为散。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 肺咳，恶热，喉燥，脉数，甚则咯血。

【加减】 咳血者，加阿胶半两（炒燥）；大便涩而喘，加葶苈半两。

01671 天门冬汤

【方源】《济生》卷二。

【异名】 天冬汤(《冯氏锦囊·杂证》卷十一)。

【组成】 远志（甘草水浸，去心） 白芍药 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 黄耆（去芦） 藕节 阿胶（蛤粉炒） 没药 当归（去芦） 生地黄各一钱 人参 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 思虑伤心，吐衄不止。

01672 天门冬饮

【方源】《医学正传》卷七引《局方》。

【组成】 天门冬 紫菀茸 知母（去毛，酒洗） 桑白皮（蜜炙）各一钱 五味子 桔梗（去芦）各五分

【用法】 上药细切，作一服。水一盏半，煎至一盏。

【主治】 子嗽。妊娠外感风寒，久嗽不已。

【加减】 嗽血者，加阿胶五分；大便涩者，加苦葶苈子五分。

01673 天门冬散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】 天门冬一两半（去心，焙） 前胡三分（去芦头） 赤茯苓一两 甘草三分（炙微赤，锉） 川升麻三分 百合半两 黄芩三分 白前半两 柴胡一两（去苗） 杏仁二分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 桑根白皮一两（锉） 桔梗一两（去芦头）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 骨蒸，心肺烦热，喘息气促，唾不去唇，渐加羸瘦。

01674 天门冬散

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】 天门冬（去心，焙） 石菖蒲 远志（去心） 熟干地黄（焙） 山茱萸 桂（去粗皮） 石韦（去毛） 白术各一两 白茯苓（去黑皮）二两

【用法】 上为细散。每服一钱匕，热水调下，服药至三十日后，筋力倍加，至百日后，耳目聪明，老少皆可服。

【功用】 补虚益精血，除百疾；久服驻颜益寿。

【主治】 虚劳脱营，气血耗夺，形体毁沮，失精少气，洒洒然时惊。

01675 天门冬粥

【方源】《药粥疗法》引《饮食辨录》。

【组成】 天门冬 15～20 克 粳米 50～100 克 冰糖少许

【用法】 先用天门冬取浓汁，去滓，入粳米煮粥，沸后加入冰糖适量，再煮成粥。以三至五日为一疗程，间隔三日再服。

【功用】 滋阴润肺，生津止咳。

【主治】 肾阴不足，阴虚内热，津少口干，及肺阴不足，肺虚有热，干咳少痰或无痰，痰中带血，以及午后低热，夜间盗汗的肺结核患者。

【宜忌】 虚寒腹泻及外感风寒咳嗽者，均不宜用。

【方论选录】《药粥疗法》：天门冬味甘微苦，无毒，肥厚多脂，入肺、肾经，所以能养肺肾之阴，善治肺肾虚热。在煮粥时，适当加些冰糖，不仅可纠正微苦之味，还能增强它的滋养作用。

01676 天门冬煎

【方源】 方出《肘后方》卷三，名见《圣济总录》卷四十九。

【组成】 生天门冬（捣取汁一斗） 酒一斗饴一升 紫菀四合

【用法】 置铜器中，于汤上煎可丸。每服如杏子大一丸，一日三次。

【主治】 肺痿咳嗽，吐涎沫，心中温温，咽燥而

不渴者。

01677 天门冬煎

【方源】《外台》卷十引《延年秘录》。

【组成】 生天门冬汁一升 橘皮二两 生地黄汁五升 白蜜五合 牛酥二合 白糖五两 杏仁一升（去皮尖） 贝母 紫菀 通草各三两 百部根 白前 甘草（炙）各二两 人参二两

【用法】 上切，以水六升，煮贝母等药，取二升五合，去滓，纳天门冬、地黄汁，煎可减半，纳酥、蜜、生姜等，煎令可丸。取如鸡子黄大，含咽之，日四五度。

【主治】 肺热兼咳声不出。

【宜忌】 忌鲤鱼、芜荑、海藻、菘菜等。

01678 天门冬膏

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】 天门冬二两（去心） 麦门冬二两（去心） 款冬花一两 贝母一两（煨微黄） 紫菀一两（去苗土） 白前一两 生地黄汁五合 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄，研如膏） 白蜜五合 酥二两

【用法】 天门冬等六味锉细，以水五大盏，煎至一大盏，去滓，纳地黄汁、杏仁膏、酥、蜜等子银锅中，以慢火煎成膏，盛于不津器中。每日夜五七度，含一茶匙，咽津。

【主治】 咳嗽，肺脏壅热，咽喉闭塞，不得睡卧。

01679 天仙藤散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】 天仙藤 香附 陈皮 甘草 乌药 茯苓 白术 大腹皮 人参 紫苏 当归 杏仁 厚朴 白芍

【主治】 子气（亦名胎肿）。妊娠三月，两足自脚面渐肿至腿膝，行步艰辛，以致胸膈喘闷，饮食减少，似水气状，脚趾间有黄水出者。此系素有风气，或冲任二经有血风所致。

【方论选录】 是方四君补正气，归、芍养胎血；附、陈、乌、腹利气消胀；杏、朴快膈温中，天仙佐之；紫苏主治妇人血风之气。肿消之后，当用四物、四君、杜仲、远志、山药、木香之属，峻补气血。

01680 天仙藤散

【方源】《妇人良方》卷十五引陈景初方。

【异名】 香附散（原书同卷）、天仙藤饮（《灵验良方汇编》卷三。）

【组成】 天仙藤（洗，略炒） 香附子（炒） 陈皮 甘草 乌药（不须要天台者，但得软白、香而辣者良）各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，水一大盏，加生姜三片，木瓜二片，紫苏三叶，同煎至七分，放温澄清，空心、食前服，每日三次。小便利，气脉通，体轻，肿渐消，更不须多服。

【主治】 子气。妊娠自三月成胎之后，两足自脚面渐肿腿膝以来，行步艰辛，以至喘闷，饮食不美，似水气状，至于脚趾间有黄水出者。

【备考】 本方方名，《仙拈集》卷三引作“水肿饮”。

01681 天花粉丸

【方源】《直指》卷十七。

【组成】 天花粉 黄连（去须）各一两 茯苓 当归各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，茅根煎汤送下。

【主治】 消渴，饮水多，身体瘦。

01682 天花粉散

【方源】《类证治裁》卷四。

【组成】 花粉 生地 麦冬 干葛各二钱 五味 甘草各一钱 粳米百粒

【主治】 上消。

01683 天竺饮子

【方源】《局方》卷十。

【异名】 天竺散（《永类钤方》卷十一）、天竺黄散（《得效》卷八）。

【组成】 天竺黄五钱 川郁金（用皂角水煮，切作片，焙干） 甘草（炙）各二十两 大栀子仁（微炒） 连翘各二十两 雄黄（飞研） 五两 瓜蒌根十斤

【用法】 上为细末。每服一大钱，小儿半钱，食后、临卧用新水调服。

【主治】 大人、小儿脏腑积热，烦躁多渴，舌颊生疮，咽喉肿痛，面热口干，目赤鼻衄，丹瘤结核，痈疮肿痛；又治伏暑燥热，疮疹余毒，及大便下血，小便赤涩。

【备考】 方中天竺黄原脱，据《得效》补。

01684 天竺黄丸

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】 天竺黄三分 牛黄一分（细研） 朱砂三分（细研，水飞过） 麝香一分（细研） 黄连一两（去须） 铁粉一两 远志（去心） 甘菊花半两 马牙消半两（细研） 龙齿三分 茯神半两 龙脑一分（细研） 金银箔各五十片（细研） 甘草一分

（炙微赤，锉）

【用法】 上为末，都令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以荆芥汤或薄荷汤嚼下，不拘时候。

【主治】 热病，心气热盛，恍惚不定，发狂，妄有所见。

01685 天竺黄丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 南星 半夏各二两 天花粉 贝母各一两

【用法】 合一处，用姜汤煮过，炙干为末，炼蜜为丸。用灯心汤送下。

【主治】 小儿身热咳嗽，气喘痰壅，并急慢惊风；瘰疬，痰咳。

【备考】 本方名天竺黄丸，但方中无天竺黄，疑脱。

01686 天竺黄散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 天竺黄一两（细研） 黄连半两（去须） 栀子仁半两 川大黄半两（锉碎，微炒） 马牙消半两（细研） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】 上为细散，入研了药令匀。每服二钱，食后煎竹叶水调下。

【主治】 消渴。心神烦躁，口干舌涩。

01687 天南星丸

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】 天南星一两（炮裂） 桂心一两 独活一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 白附子一两（炮裂） 天麻一两 芎藭一两 当归一两 麻黄二两（去根节） 麝香一分（细研） 香墨半两 牛黄一分（研入） 鹿角胶一分（捣碎，炒令黄燥）

【用法】 上为末，入研了药，都研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以豆淋酒送下，不拘时候。

【主治】 中风缓风，无问老少，手足不遂，及破伤风。

01688 天南星丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 天南星一两（炮裂） 天麻一两 白附子半两（炮裂） 白僵蚕半两（微炒） 乌蛇肉一两（酒浸，炙微黄） 羌活三分 赤茯苓一两 干蝎一分（微炒） 朱砂半两（细研）

【用法】 上为末，入朱砂更研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】 手足顽麻风。

【宜忌】 忌羊血。

01689 天南星丸

【方源】《局方》卷一。

【组成】 天南星一斤（每个重一两上下者，用温汤浸洗，刮去里外浮皮并虚软处，令净。用法：酒浸一宿，用桑柴蒸，不住添热汤，令釜满，甑内气猛，更不住洒酒，常令药润，七伏时满，取出，用铜刀切开一个大者，嚼少许，不麻舌为熟，未即再炊，候熟，用铜刀切细，焙干） 辰砂（研飞）二两（一半为衣） 丁香 麝香（研）各一两 龙脑（研）一两半

【用法】 上为细末，入研药匀，炼蜜并酒搜和为丸，每两作五十丸，以朱砂末为衣。每服一丸，烂嚼，浓煎生姜汤送下，不拘时候。

【功用】 治风化痰，精神爽气，利胸膈；消酒毒，酒后含化，除烦渴，止呕逆。

【主治】 风痰上逆，胸膈烦满，头目昏眩，中酒呕吐，小儿慢惊。

①《局方》：痰逆恶心，中酒呕吐。②《圣济总录》：风痰胸膈烦满，头目昏眩。③《直指小儿》：慢惊痰壅，身热。

01690 天南星丸

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】 天南星（炮） 天麻 附子（炮裂，去皮脐） 干蝎（全者，去土，炒） 白僵蚕（直者，炒） 藿香叶 白附子（炮）各半两

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五丸至十丸，空心、食前薄荷温酒送下。

【主治】 中风，手足不随，筋骨挛急，行履艰难，口眼㖞斜，时发搐搦。

01691 天南星丸

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】 天南星（浆水煮，切，焙） 半夏（浆水煮，焙） 天麻（酒浸，切，焙） 石膏各半两 白附子（生）一两 滑石二两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食后荆芥汤送下。

【主治】 风头痛，痰逆烦满，筋脉拘急，手足麻痹。

01692 天南星丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【异名】 硫黄丸（《朱氏集验方》卷九）。

【组成】 天南星（炮） 硫黄（研） 石膏（研，水飞） 消石（研）各等分

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每

服二十丸，温酒送下，一日二次。渐加至三十丸。

【主治】 肾脉厥逆，头痛不可忍。

01693 天南星丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】 全蝎（去毒，微炒） 白附子（炮） 五灵脂（去砂石） 蝉蜕（去土） 天南星（炮）各等分

【用法】 上为细末，煮米醋旋滴为丸，每一两作四十丸，阴干。每服半丸至一丸，煎生姜、荆芥汤磨下，不拘时候。

【主治】 小儿急、慢惊风，涎盛搐搦，呕吐涎沫，神昏贪睡。

01694 天南星散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】 天南星（酸浆水煮透心软，切，晒干）一两 菊花三分 自然铜（烧赤，醋淬）一两 防风半两（用水一碗，同菊花、自然铜、防风三味煮，水尽为度，去防风、自然铜不用，只用菊花） 芎藭一两

【用法】 上五味，除二味不用外，捣罗为细散。每服半钱匕，腊茶清少许调，只作一口啜尽，分作三咽，每咽点头一点。

【主治】 偏头痛。

01695 天南星散

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】 蜈蚣一条（全者，去头足，炙黄） 天南星（生用） 防风（去芦头，生用） 草乌头（生，去皮尖）各二钱半

【用法】 上为细末。每服一钱，热酒调下，不拘时候。

【主治】 破伤风，游入四肢，口不能语及四肢强硬。

01696 天南星散

【方源】《普济方》卷三六四。

【组成】 天南星（大者，微泡去皮）

【用法】 上为细末。淡醋调涂绯帛上，贴囟上，火炙热手，频熨之。

【主治】 囟开不合，鼻塞不通。

01697 天南星散

【方源】《保婴易知录》卷下。

【组成】 天南星（去皮脐，研细末）

【用法】 用醋调涂脚心，男左女右，厚皮纸贴；如干，再用醋润之。

【主治】 小儿重脚，上脚层叠肿硬，甚则上脚成疮如黄粟，口中腥臭。

01698 天浆子散

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【异名】 三味天浆子散（《御药院方》卷十一）。

【组成】 天浆子 白僵蚕（炒） 干蝎（炒）各三枚

【用法】 上为散。每服一字匕，煎麻黄汤调下，一日三次，不拘时候。汗出为效。

【主治】 小儿慢惊风。

01699 天麻浸酒

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】 天麻 骨碎补各半两 松节（锉）败龟（醋炙）各一两 龙骨 虎骨（酒炙） 乌蛇（酒浸，去皮骨，炙） 白花蛇（酒浸，去皮骨，炙） 恶实根（切，焙）各半两 附子（炮裂，去皮脐）一枚 羌活（去芦头） 独活（去芦头） 牛膝（酒浸，切，焙）各半两 当归（切，焙） 芎藭各一两 大麻仁二两 干熟地黄（焙）半两 茄子根（切，焙）二两 原蚕沙（炒）二两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大，用酒二斗浸，密封，春、夏三日，秋冬七日。每服一盏，不拘时候温服。

【主治】 摊缓风，不计深浅，久在床枕。

01700 天一生水丸

【方源】《穷乡便方》。

【组成】 熟地黄八两 山茱萸（去核） 白茯苓（去皮） 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 黄柏（制） 知母（制） 山药各四两

【用法】 青盐澄水，煮面糊为丸。每服三钱，空心百沸汤下。

【主治】 阴虚火动。

01701 天一生津饮

【方源】《证治宝鉴》卷四。

【组成】 怀生地 人参 天花粉 天门冬 麦冬 肥知母 宣木瓜 白芍 当归 生甘草 升麻

【用法】 水煎服。

【功用】 养血滋水。

【主治】 消渴。

01702 天门冬饮子

【方源】《医方类聚》卷二二四引《济生·校正时贤胎前十八论治》。

【异名】 天冬饮（《叶氏女科》卷二）。

【组成】 天门冬（去心） 知母 茺蔚子各一两 防风（去芦）半两 五味子 伏苓（去皮） 川羌活（去芦） 人参七钱半

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜

三片，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】 妊妇临月，两眼忽然失明，灯火不见，头痛目晕，项腮肿满，不能转颈，其眼带吊起，人物不辨，辘轳转关。

【宜忌】 大忌酒面、煎炙烧爆、鸡、羊、鹅、鸭、豆腐、辛辣，一切毒物，并房劳及稍温药。如其不然，眼不复明也。

01703 天王补心丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【异名】 天王补心丹(《得效》卷七)。

【组成】 熟干地黄（洗，焙）四两 白茯苓（去皮） 茯神（去木） 当归（洗，焙） 远志（去心） 石菖蒲 黑参 人参（去芦头） 麦门冬（去心） 天门冬（去心） 桔梗（去芦头） 百部 柏子仁 杜仲（姜汁炒） 甘草（炙） 丹参（洗） 酸枣仁（炒） 五味子（去梗）各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两作十丸，金箔为衣。每服一丸，食后、临卧煎灯心、大枣汤化下。

【功用】 宁心保神，益血固精，壮力强志，令人不忘；清三焦，化痰涎，祛烦热，除惊悸，疗咽干口燥，育养心气。

【主治】《张氏医通》：心肾虚耗，怔忡不宁。

01704 天王补心丸

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】 人参（去芦）五钱 当归（酒浸） 五味子 麦门冬（去心） 天门冬（去心） 柏子仁 酸枣仁各一两 白茯苓（去皮） 玄参 丹参 桔梗 远志各五钱 生地黄四两 黄连（酒洗，炒）二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服二三十丸，临卧用灯草、竹叶煎汤送下。

【功用】 宁心保神，益血固精，壮力强志，令人不忘；除怔忡，定惊悸，清三焦，化痰涎，祛烦热，疗咽干，育养心神。

01705 天王补心丹

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】 白芍 当归 生地 熟地 丹参 远志 麦冬 天冬 玄参 枣仁 杜仲 丹皮 菖蒲 茯苓 茯神 桔梗 柏子仁 石莲肉

【用法】 辰砂为衣。

【主治】 产后血虚，恍惚无主，似惊非惊，似悸非悸，欲安而惚烦，欲静而反扰，甚或头旋目眩，坐卧不常，夜则更加，饥则尤剧。

01706 天王补心丹

【方源】《奇效良方》卷二十三。

【组成】 人参（去芦） 丹参（洗） 白茯苓（去皮） 酸枣仁（洗） 远志（去心） 百部（洗） 石菖蒲（去毛） 柏子仁 桔梗（去芦） 玄参 天门冬（去心） 五味子 茯神（去木） 当归 熟地各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每两作十丸，以金箔为衣。食后临卧用灯心、大枣汤化下；或作梧桐子大丸，吞服亦得。

【功用】 宁心保神，益血固精，壮力强志，令人不忘；清三焦，化痰涎，祛烦热，除惊悸，疗咽干口燥，育养心气。

01707 天王补心丹

【方源】《校注妇人良方》卷六。

【组成】 人参（去芦） 茯苓 玄参 丹参 桔梗 远志各五钱 当归（酒浸） 五味 麦门冬（去心） 天门冬 柏子仁 酸枣仁（炒）各一两 生地黄四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，用朱砂为衣。每服二三十丸，临卧竹叶煎汤送下。

【功用】 宁心保神，益血固精，壮力强志，令人不忘；清三焦，化痰涎，祛烦热，除惊悸，疗咽干，育养心神。

【主治】 阴血亏少，虚烦少寐，心悸神疲，梦遗健忘，大便干结，口舌生疮，舌红少苔，脉细数。

①《校注妇人良方》：妇人热劳，心经血虚，心神烦躁，颊赤头痛，眼涩唇干，口舌生疮，神思昏倦，四肢壮热，食饮无味，肢体酸疼，心怔盗汗，肌肤日瘦，或寒热往来。②《医方考》：过劳伤心，忽忽喜忘，大便难，或时溏利，口内生疮者。③《证治宝鉴》：颤振，脉数而无力。④《江苏中医》(1958；2:32)：心肾不交，水火不济之遗泄，性机能失常。

【宜忌】 ①《校注妇人良方》：方内天、麦门冬、玄参、生地虽能降火，生血化痰，然其性沉寒，损伤脾胃，克伐生气，若人饮食少思，大便不实者，不宜用。②《摄生秘剖》：忌胡荽、大蒜、萝卜，鱼腥、烧酒。

【方论选录】 ①《医方考》：人参养心气，当归养心血，天、麦门冬所以益心津，生地、丹、玄所以解心热，柏子仁、远志所以养心神，五味、枣仁所以收心液，茯苓能补虚，桔梗能利膈，诸药专于补心，劳心之人宜常服也。②《摄生秘剖》：是丸以生地为君者，取其下入足少阴，以滋水主，水盛

可以伏火；况地黄为血分要药，又能入手少阴也。枣仁、远志、柏仁，养心神者也；当归、丹参、玄参生心血者也；二冬助其津液；五味收其耗散；参、苓补其气虚；以桔梗为使者，欲载药入心，不使之速下也。③《古今名医方论》引柯琴：心者主火，而所以主者神也。神衰则火为患，故补心者必清其火而神始安。补心丹用生地黄为君者，取其下足少阴以滋水主，水盛可以伏火，此非补心之阳，补心之神耳；凡果核之有仁，犹心之有神也，清气分无如柏子仁，补血无如酸枣仁，其神存耳；参、苓之甘以补心气，五味酸以收心气，二冬之寒以清气分之火，心气和而神自归矣；当归之甘以生心血，玄参之咸以补心血，丹参之寒以清血中之火，心血足而神自藏矣；更假桔梗为舟楫，远志为向导，和诸药入心而安神明。以此养心则寿，何有健忘，怔忡，津液干涸，舌上生疮，大便不利之虞哉！④《医方集解》：此手少阴药也。生地、玄参北方之药，补水所以制火，取其既济之义也；丹参、当归所以生心血，血生于气；人参、茯苓所以益心气，人参合麦冬、五味又为生脉散，盖心主脉，肺为心之华盖而朝百脉，百脉皆朝于肺，补肺生脉，脉即血也，所以使天气下降也，天气下降，地气上腾，万物乃生；天冬苦入心而寒泻火，与麦冬同为滋水润燥之剂；远志、枣仁、柏仁所以养心神，而枣仁、五味酸以收之，又以敛心气之耗散也；桔梗清肺利膈，取其载药上浮而归于心，故以为使；朱砂色赤入心，寒泻热而重宁神。⑤《古方选注》：补心者，补心之用也。心藏神，而神之所用者，魂、魄、意、智、精与志也。补其用而心能任物矣。《本神篇》曰：随神往来者谓之魂，当归、柏子仁、丹参流动之药，以悦其魂；心之所忆谓之意，人参、茯神调中之药，以存其意；因思虑而处物谓之智，以枣仁静招乎动而益其智；并精出入者谓之魄，以天冬、麦冬、五味子宁静之药而安其魄；生之来谓之精，以生地、元参填下之药定其精；意之所存谓之志，以远志、桔梗动生于静而通其志。若是，则神之阳动而生魂，魂之生而为意，意交于外而智生焉；神之阴静而生魄，魄之生而为精，精定于中而志生焉，神之为用不穷矣，故曰补心。

【临证举例】 ①狂症（精神病）《中华神经精神科杂志》（1958；6:434）：本方加味用于狂症（精神病）恢复期善后调理，如虚弱患者，亦可先用本方，再用吐、下诸法，后再以本方善后。共治62例，均愈，复发者，再用此法亦获效。②失眠《江苏中医》（1959；1:11）：用本方加味改制成合剂，组成为酸枣仁三两，柏子仁一两，朱茯苓一两，远志肉五钱，桂圆肉一两，大生地三两，麦冬二两，五味子一两五钱，当归一两，阿胶一两，磁石十两，潼蒺藜各二两，党参一两，治疗失眠患者76例，有效74例，无效2例。例如：王某某，失眠症已八年，常通宵失眠，治疗时，每夜亦仅能入睡二小时左右，且多梦寐。用合剂三瓶即好，梦亦消失。③期前收缩 《疑难病证中医治验》：邹某某，女，20岁。四月前因风湿性心肌炎、心律紊乱治疗二月多，症状缓解出院。近来病情加重，心悸心慌，胸背闷胀，针刺样痛；精神疲乏，失眠多梦，烦躁少气，自汗盗汗，劳累尤甚，渴不欲饮，食后腹胀，大便干结。投复脉汤半月未效。诊见，舌尖紫黑瘀点，舌苔少，脉弦细而结，心电图提示："多发性室性期前收缩"，血沉39毫米，抗"O"大于800单位，诊断："风湿性心脏病，心律不齐。"证属心脏气阴两虚，脉络瘀阻之心悸，拟天王补心丹加减：黄耆15克，党参12克，丹参12克，酸枣仁10克，玄参12克，麦冬12克，远志6克，五味子6克，当归10克，生地黄16克，茯苓12克，乳没各6克（包煎），桔梗5克，朱砂2克（冲服），前后六诊，共服药32剂。药后病除，血沉正常，抗"O"小于600单位，余无不适，以前方调理半月，日益康复，坚持工作。④慢性结膜炎 《浙江中医学院学报》（1980；2:67）：张某某，男，39岁，因患急性结膜炎未彻底治疗，并在灯光下坚持工作至深夜，20余天来，目红干涩畏光，视物不清，有异物感，逐渐加重，不肿不痛，无分泌物；午后心烦，夜多恶梦，经用青、链霉素及清心、凉肝、行气、活血、补肾阴等法治疗乏效。来诊时，舌红无苔，脉象弦数，拟滋阴安神，兼以柔肝法，用天王补心丹加味煎服，10剂后，诸症悉除，续服丸剂善后。⑤慢性荨麻疹《上海中医药杂志》（1965；8:26）：杨某某，女，36岁。10年前因胸痛，咳嗽，痰中带血，经X线检查为肺结核病。随即全身发风疹疙瘩，时隐时现，时轻时重，瘙痒甚剧。自发皮疹后即患失眠症，有时初睡即不能安睡，有时睡而易醒，甚则整夜梦幻连绵。后肺结核病经治疗而愈，冬季遇风仍发风疹疙瘩，且以夜间为甚，天气转暖即愈。1962年11月底，前述皮疹又发，瘙痒甚，有灼热感，影响睡眠，头额昏晕，眼花，耳鸣。检查：面色无华，二颊稍泛红晕，体倦神疲，内眦暗陷，全身散发黄豆大小之风疹，或红或白；皮肤划痕症强阳

性；X线透视右上肺有钙化点；舌尖红苔薄白，脉细带数，尺脉无力，此由肾水不足，真阴不升致心火亢盛，消耗营阴，阴亏血少则生风，故发瘾疹。按养心法治之：太子参三钱，天门冬二钱，麦门冬二钱，茯苓三钱，朱茯神三钱，当归三钱，丹参三钱，酸枣仁五钱，五味子一钱半，远志肉三钱，大生地四钱，桔梗二钱，炙甘草一钱，服四剂后，皮疹即少发，睡眠时间亦延长，皮疹划痕症明显减轻。原方加熟地三钱，杞子三钱，又服五剂，皮疹未见再发。此后日服天王补心丹四钱，连服二周，药后除夜间时有梦扰外，头额昏晕，耳鸣等症消失，一冬未见瘾疹再发。⑥过敏反应 《中华皮肤科杂志》(1959；1:60)：一青年学生患失眠症，用本方加炒枣仁、龙眼肉、莲子肉水煎服。八日后出现全身红疹，如针尖，其痒难忍，微热口渴。停药一周后消退。数月后又服上方，二天后复出红疹，经用桑叶、蝉衣、地肤子、茯苓、甘草、枇杷叶煎服后消失。推测可能是方中朱砂所致。

【现代研究】 对心肌梗塞的保护作用 《中西医结合研究资料（山西省中医研究所）》（1975；5:8)：补心丹加味（人参15克、麦冬、五味子各30克、玄参、炮附子、远志、公丁香、甘草各15克、丹参、茯神、枣仁、天冬、柏子仁、红花、当归各30克、生地120克、蒲黄18克）对健康雄性小鼠实验性心肌梗塞确有保护作用。实验结果表明：本方对由异丙肾上腺素所致的实验性心肌梗塞有满意的拮抗作用，不仅能防止缺血性心电图改变和心肌病理学损害，而且对缺血心肌的生化代谢有良好影响，如通过对心肌琥珀酸脱氢酶、三磷酸腺苷酶活化作用来改善细胞线粒体呼吸和电子传递系统，促使线粒体能量转换，并使心肌兴奋一收缩耦联机制正常化。实验显著降低心肌梗塞的发生率，提高了动物的存活率。此外，本方还能改善动物的非特异性防御功能和应激状态。实验提示，本方加味适宜治疗心绞痛、心肌梗塞伴有心脏泵和电衰竭者，尤其适宜治疗“梗塞前综合征”。

【备考】 《景岳全书》：此方之传，未考所自，《道藏》偈云：昔志公和尚日夜讲经，邓天王悯其劳者也，赐之此方，因以名焉。

01708 天水涤肠汤

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 生山药一两 滑石一两 生杭芍六钱 潞党参三钱 白头翁三钱 粉甘草二钱

【主治】 久痢不愈，肠中浸至腐烂，时时切痛，身体因病久羸弱者。

【加减】 若服此汤不效，则酌加三七，鸭蛋子，金银花；或加生地榆亦可。

【临证举例】 热痢 一媪，年六十一岁，于中秋痢下赤白，服药旋愈，旋又反复，如此数次，迁延两月。因少腹切痛，自疑寒凉，烧砖熨之。初熨时稍觉轻，以为对证，遂日日熨之，而腹中之疼益甚，昼夜呻吟，噤口不食；所下者痢与血水相杂，且系腐败之色；其脉至数略数，虽非洪实有力，实无寒凉之象；舌上生苔，黄而且厚。病人自谓下焦凉甚，若用热药温之疼当甚。愚曰：前此少腹切痛者，肠中欲腐烂也。今为热砖所熨而腹疼益甚，则血淋漓，则肠中真腐烂矣。再投以热药，危可翘足而待。病人亦似会悟，为制此方，连服四剂，疼止，痢亦见愈。减去滑石四钱，加赤石脂四钱，再服数剂，病愈十之八九。因上焦气微不顺，俾用鲜藕四两，切细丝煎汤，频频饮之，数日而愈。

【备考】 河间天水散（即六一散），原为治热痢之妙药，此方中重用滑石、甘草，故名“天水涤肠汤”。

01709 天生白虎汤

【方源】 《冯氏锦囊·杂证》卷九。

【组成】 西瓜汁

【用法】 捣西瓜取汁，滤去滓。灌之即醒。

【主治】 中暑。

01710 天台乌药散

【方源】 《医学发明》卷五。

【组成】 天台乌药 木香 茴香（炒） 青皮（去白） 良姜（炒）各半两 槟榔（锉）二个 川楝子十个 巴豆七十粒

【用法】 先以巴豆微打破，同楝子用麸炒，候黑色，豆、麸不用，余为细末。每服一钱，温酒送下；疼甚者，炒生姜、热酒送下亦得。

【功用】 《中医方剂学》：行气疏肝，散寒止痛。

【主治】 肝经寒凝气滞，小肠疝气牵引脐腹疼痛，睾丸偏坠肿胀；妇人瘕聚，痛经等。

①《医学发明》：肾肝受病，男子七疝，痛不可忍，妇人瘕聚、带下。②《卫生宝鉴》：小肠疝气，牵引脐腹疼痛。③《成方便读》：阴凝成积者。④《福建中医药》（1964；5:21)：寒凝气滞，肝郁横逆所致疝气、腹痛、胃痛、虫痛、痛经。

【宜忌】 ①《福建中医药》(1964；5:21)：因湿热为患而见咽干，口苦，目赤，烦热，小便淋痛及阴虚火旺之候，均所禁忌。②《浙江中医学院学报》(1985；4:51)：气疝虚证，阴囊肿胀偏痛，发作缓急无时者，非本方所能治疗。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足厥阴手太阴药也。乌药散膀胱冷气，能消肿止痛；川楝导小肠邪热，因小便下行；木香、青皮行气而平肝；良姜、茴香散寒而暖肾；槟榔性如铁石，能下水渍坚；巴豆斩关夺门，破血瘕寒积；皆行气祛湿散寒之品也。②《温病条辨》：乌药祛膀胱冷气，能消肿止痛；木香透络定痛；青皮行气伐肝；良姜温脏劫寒；茴香温关元、暖腰肾，又能透络定痛；槟榔至坚，直达肛门，散结气，使坚者溃，聚者散，引诸药逐浊气，由肛门而出；川楝导小肠湿热由小便下行，炒以斩关夺门之巴豆，用气味而不用形质，使巴豆帅气药散无形之寒，随槟榔下出肛门，川楝得巴豆迅烈之气，逐有形之湿，从小便而出，俾有形、无形之结邪一齐解散而病根拔矣。③《成方便读》：方中乌药、木香辛温香烈，善行善散，能上能下，以宣气中之滞；茴香暖下而祛寒，良姜温中而止痛；青皮入肝破气；槟榔导积下行。其妙用在巴豆与川楝二味同炒，去巴豆不用，但取其荡涤攻坚刚猛直前之性味，同川楝入肝，导之下行，又不欲其直下之意。一如用兵之法：巴、楝钦点之上将也，青、槟前导之先锋也，乌药、茴香为偏裨之将，茴香、良姜为守营之官。立方之神，真战无不克也。④《方剂学》（五版教材）：乌药行气疏肝，散寒止痛，为君药；配入木香、小茴香、青皮、高良姜一派辛温芳香之品，行气散结，祛寒除湿，以加强行气疏肝、散寒止痛之力，共为臣药；更以槟榔直达下焦，行气化滞破坚；以苦寒之川楝子与辛热之巴豆同炒，去巴豆而用川楝子，既可减去川楝子之寒，又能增强其行气散结之功，共为佐使药。诸药合用，使寒凝得散，气滞得疏，肝络和调，则疝痛自愈。

【临证举例】 ①疝瘕 《吴鞠通医案》：马氏，24岁，瘕痛十数年不愈，三日一发，或五日、十日一发，或半月一发，发时痛不能食，无一月不发者。与天台乌药散。发时服二钱，痛轻服一钱，不痛时服三五分。一年以外，其瘕化尽，永不再发。②积聚 《吴鞠通医案》：吴，31岁，脐右结癥，迳广五寸，睾丸如鹅卵大，以受重凉，又加暴怒而得。痛不可忍，不能立、坐、卧。服辛香流气饮，三日服五帖，重加附子、肉桂至五七钱之多，丝毫无效；因服天台乌药散，初服二钱，满腹热如火烧，明知药至脐右患处，如搏物者然，痛加十倍，少时腹中起蓓蕾无数，凡一蓓蕾下浊气一次，如是者二三十次，腹中痛楚松快，少时痛又大作，服药如前，腹中热痛、起蓓蕾、下浊气亦如前，但少轻耳。自己初服药起，至亥正共服五次，每次轻一等；次早腹微痛，再服乌药散，则腹中不知热矣。以后每日服二三次，七日后肿痛全消。③寒疝《福建中医药》（1964；5:21）：陈某某，男，38岁，农民，秋雨季节，连日抢收，夜间又值宿田野，看守稻粮，以致少腹冷痛，拘急，左睾偏坠，筋肿掣痛，上行脘腹胸胁，不能行动，食少，形寒肢冷，有时泛恶，欲吐，大便带有白色粘液，脉沉细弦，舌苔薄腻。证属寒湿聚于厥阴，肝气失于疏泄，木横侮土，升降不和。法以温通厥阴，和胃化浊。拟方：天台乌药散末三钱，每服一钱，生姜三大片煎汤送下。药后痛止厥回，诸症消失，休息数日而愈。④虫积腹痛 《福建中医药》（1964；5:21）：李某某，男，35岁，木业工人，主诉：有腹痛史，每年发作数次。近日因偶食生冷，致久病复作。心下至少腹胀痛，拒按，痛剧则汗出淋漓，肢厥欲呕，痛止则神清自若，大便二日未行，脉沉紧，舌淡白，左下唇发现粟状颗粒。良由寒湿阻遏，气不化运，以致蛔虫窜扰。法当利气化湿，温脏安蛔。药用：广木香八分，台乌药三钱，细青皮八分，高良姜一钱，川楝子五钱（巴豆二十个同炒），尖槟榔四钱，开口花椒八分，乌梅二钱，小茴香一钱。服药一剂，大便溏泻二次，排出蛔虫十数条，胀痛全消，病竟霍然。

01711 天花刮毒散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】 天花粉 黄柏各三两 南星 赤芍药 姜黄各一两

【用法】 上为末。井水调，入醋和，暖刷患处，夏令冷刷亦可。

【主治】 一切肿毒，焮赤疼痛。

01712 天保采薇汤

【方源】《幼科发挥》。

【组成】 羌活 前胡 半夏 陈皮 柴胡 赤芍 白茯苓 川芎 枳壳 厚朴 桔梗 苍术 升麻 葛根 藿香 独活 甘草

【主治】《幼科铁镜》：麻疹发出不快，及不透发；或红点见面，偶挟风邪而隐者；或误除烧热，隐而不见，腹内作痛。

【临证举例】 麻疹 《幼科铁镜》：本邑陶一公涯玉之子，麻症发热方两日，医人误为除热，麻伏不出，形状似惊。差役请予治，面色花杂，喘急不嗽，必有内毒。予太阳穴以口涎擦之，皮内隐有红点，知是麻毒内攻，无烧不出，用天保采薇汤，倍加升麻、干葛，一服额上见点，色不红起，面色唇

口惨淡无泽，知为内虚，即用固真汤，一服通身发热。陶公惊怖。予曰：麻非热不出。仍服天保采薇汤，一剂，通体透发而愈。

01713 天根月窟膏

【方源】《温病条辨》卷五。

【组成】 鹿茸一斤 乌骨鸡一对 鲍鱼二斤 鹿角胶一斤 鸡子黄十六枚 海参二斤 龟板二斤 羊腰子十六枚 桑螵蛸一斤 乌贼骨一斤 茯苓二斤 牡蛎二斤 洋参二斤 菟丝子一斤 龙骨二斤 莲子二斤 桂圆肉一斤 熟地四斤 沙苑蒺藜二斤 白芍二斤 芡实二斤 归身一斤 小茴香一斤 补骨脂二斤 枸杞子二斤 肉苁蓉二斤 萸肉一斤 紫石英一斤 生杜仲一斤 牛膝一斤 萆薢一斤 白蜜三斤

【用法】 上药用铜锅四口，以有情归有情者二，无情归无情者二，文火次第煎炼取汁；另入一净锅内，细炼九昼夜成膏，后下胶、蜜，以方中有粉无汁之茯苓、莲子、芡实、牡蛎、龙骨、鹿茸、白芍、乌贼骨八味为极细末，和前膏为丸，如梧桐子大。每服三钱，一日三次。

【功用】 阴阳两补，通守兼施。

【主治】 下焦阴阳两伤，八脉告损，急不能复，胃气尚健，无湿热证者；男子遗精滑泄，精寒无子，腰膝腹痛之属肾虚者；老年体瘦，痱中，头晕耳鸣，左肢麻痹，缓纵不收，属下焦阴阳两虚者；妇人产后下亏，淋带癥瘕，胞宫虚寒无子，数数殒胎，或少年生育过多，年老腰膝尻胯痠痛者。

【宜忌】 胃弱不能传化重浊之药者，有湿热者，单属下焦阴虚者不宜此方。

01714 天麻二陈汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】 半夏 白茯苓 广皮 甘草 天麻

【主治】 ①《症因脉治》：内伤头痛，恶心呕吐，属积痰留饮者。②《医方简义》：厥头痛。

【备考】《医方简义》：本方用煨天麻一钱，姜半夏一钱五分，茯苓三钱，陈皮一钱，炙甘草五分，生姜三片，水煎服。

01715 天麻白术丸

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 天麻（去苗） 白术 天南星（炮） 半夏（汤洗涤） 白附子（炮） 川芎 白僵蚕（炒，去丝嘴） 寒水石（煅过） 薄荷叶（去土） 赤茯苓（去皮） 旋覆花各等分

【用法】 上为细末，以生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大，细研雄黄为衣。每服四十丸，食后温生姜、紫苏汤送下。

【主治】 风湿痰饮，攻冲头目，昏运重痛，咽膈壅滞不利，及一切痰饮。

01716 天麻半夏汤

【方源】《卫生宝鉴》卷二十二。

【组成】 天麻 半夏各一钱 橘皮（去白） 柴胡各七分 黄芩（酒制，炒） 甘草 白茯苓（去皮） 前胡各五分 黄连三分（去须）

【用法】 上㕮咀，都为一服，水二盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 风痰内作，胸膈不利，头旋眼黑，兀兀欲吐，上热下寒，不得安卧。

【宜忌】 忌酒、面、生冷物。

【方论选录】《历代名医良方注释》：柴胡有调节全身功能失调的作用，疗效确切。天麻为祛风药，前胡佐之；黄连清热，黄芩佐之；半夏降逆，陈皮佐之；茯苓渗湿利尿。因全身功能失调引起的眩晕，本方的疗效是可靠的。

【临证举例】 风痰 参政杨公，七旬有二，宿有风疾，于至元戊辰春，或病头旋眼黑，目不见物，心神烦乱，兀兀欲吐，复不吐，心中如懊侬之状，头偏痛，微肿而赤色，腮颊亦赤色，足胻行冷。命予治之。予料之：此少壮之时，喜饮酒，久积湿热于内，风痰内作，上热下寒，是阳不得交通，否之象也。《经》云：治热以寒。虽良工不敢废其绳墨而更其道也。然而病有远近，治有轻重，参政今年高气弱，上焦虽盛，岂敢用寒凉之剂损其脾胃。经云：热则疾之。又云：高巅之上，射而取之。予以三棱针约二十余处刺之，其血紫黑，如露珠之状；少顷，头目便觉清利，诸证悉减。遂处方云：眼黑头旋，虚风内作，非天麻不能除，天麻苗谓之定风草，此草独不为风所摇，故以为君；头偏痛者，乃少阳也，非黄芩（酒制）、柴胡不能治，黄连苦寒，酒炒以治上热，又为因用，故以为臣；橘皮苦辛温，炙甘草甘温补中益气，为佐；生姜、半夏辛温，能治风痰，茯苓甘平利小便，导湿热引而下行，故以为使。服之数服，邪气平、生气复而安矣。

01717 天麻防风丸

【方源】《局方》卷十。

【异名】 天麻煎丸（《御药院方》卷十一）、琥珀丸（《普济方》卷三七三）。

【组成】 白僵蚕（去丝嘴，炒） 干蝎（炒）各半两 天麻（去苗） 防风（去苗） 人参各一两 朱砂（研，飞） 雄黄（研） 麝香（研） 甘草

（炙）各一分　牛黄一钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸至二丸，薄荷汤化下，不拘时候。

【主治】 小儿一切惊风，身体壮热，多睡惊悸，手足抽掣，精神昏愦，痰涎不利，及风温邪热。

01718　天麻防风丸

【方源】《医林绳墨大全》卷五。

【组成】 防风　天麻　川芎　羌活　白芷　草乌头　白附子　荆芥　当归　甘草（炙）各五钱　白滑石二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。酒送下。

【主治】 风湿麻痹，肢节走痛、注痛，中风偏枯，或内外风热壅滞，昏眩。

01719　天麻钩藤汤

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】 钩藤三分　天麻　蝉蜕（去土）　防风（去芦叉枝，切）　人参（去芦）　麻黄（去根节）　僵蚕（去丝嘴，炒黄）　蝎尾（去毒，炒）各半两　甘草（炙）　芎劳各一分　麝香一钱（研）

【用法】 上为细末。每用二钱，水一盏，煎至六分，量大小与服，不拘时候。

【主治】 因吐利，脾胃虚而生风，变慢惊。

【加减】 冷多，面青，唇白，四肢冷，入附子末半钱。

01720　天麻钩藤饮

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】 天麻　钩藤　生决明　山栀　黄芩　川牛膝　杜仲　益母草　桑寄生　夜交藤　朱茯神

【用法】 水煎服。

【功用】 ①《杂病证治新义》：平肝降逆，镇静精神，降压缓痛。②《中医伤科学》：清热化痰，平肝潜阳。

【主治】 肝阳偏亢，肝风上扰，头痛眩晕，失眠抽搐，半身不遂。现用于高血压病，高血压脑病，脑溢血，高热惊厥，癫痫，美尼尔氏病，神经官能症等。

①《杂病证治新义》：高血压，头痛，晕眩，失眠。②《古今名方》：耳鸣眼花，震颤或半身不遂，舌红，脉弦数。③《中医伤科学》：脑震荡引起的眩晕、抽搐。

【加减】 重症者，可易决明为羚羊角，则药力益著；若进入后期血管硬化之症，可酌入槐花、海藻。

【方论选录】《杂病证治新义》：本方以天麻、钩藤、生决明之平肝祛风降逆为主，辅以清降之山栀、黄芩，活血之牛膝，滋肝肾之桑寄生、杜仲等，滋肾以平肝之逆，并辅夜交藤、朱茯苓，以安神安眠，缓解其失眠，故为用于肝厥头痛。晕眩之良剂。若以现代之高血压头痛而论，本方所用黄芩、杜仲、益母草、桑寄生等，均经研究有降低血压之作用，故有镇静精神，降压缓痛之功。

【临证举例】 ①高血压病　《江西中医药》（1959，10:19）：袁某某，男性，43岁。主诉：经常头昏一年。体检：心尖搏动在左第五肋间锁骨中线上，A_2亢进，无异常杂音，下肢浮肿。眼底检查无异常发现，X线见左心室轻度扩大，心电图检查提示心肌损害。治疗前每日上午八九时测量血压，共测八次，其平均血压为154/105毫米汞柱，脉浮滑。给予本方一剂后，血压下降为130/80毫米汞柱。以后再服三周，其间平均血压为131/85毫米汞柱，自觉症状消失。②美尼尔氏病　《乡村医学》（1985，12:18）：徐某，女，39岁。初患眩晕证，经确诊为"美尼尔氏病"，经治疗稍有好转。本年六月十二日，病情突然加重。其证头晕目眩，耳鸣，两太阳穴部位疼痛，两眼视物昏花，斜视建筑物时则有旋转感，行路不稳，转弯时需十分谨慎，心悸，少寐，多梦，时口渴，尿黄，月经正常，血压150/100毫米汞柱。体型丰腴，舌质红，舌苔薄黄，脉象弦数。中医辨证属肾阴不足，水不涵木，肝阳偏亢。治宜滋水涵木，平肝熄风，予天麻钩藤饮加熟地20克、枸杞20克。先后共服药十五剂，眩晕心悸，少寐多梦诸证悉除，病愈而恢复工作。

【现代研究】 ①对生理生化指标的影响　《药学通报》（1963，1:25）：实验结果表明：天麻钩藤饮对二氧化碳吸入反应、血清胆碱酯酶活性、尿中17羟类固醇排出量和肾血流量没有显著影响，其降压作用与这几项指标的生理功能无关。其降压机理可能是影响其他生理功能作用所致。②降压与调节高级神经活动　《中医药研究参考》（1975，9:25）：本方200%水煎剂能降低高血压狗和大白鼠的血压；对血压正常的动物则无明显变化。当高血压动物的高级神经活动发生障碍时，本方可改善皮层的功能状态，出现阳性条件反射量增加，分化抑制加强，力的关系改变；当动物的皮层功能状态正常时，本方对高级神经活动没有明显影响。实验结果表明：本方既有降压作用，又有调节高级神经活动的作用。这为本方用于某些类型高血压的疗效提供了一些药理理论基础。

01721　天麻退翳散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】当归一两（好酒浸，焙干） 熟地黄一两（酒浸，焙干） 川芎一两五钱 赤芍药二两五钱（热水泡） 白僵蚕一两（热水泡过，洗去丝，姜汁炒） 蝉蜕五十个（水泡洗，去头足） 羌活 防风 荆芥 木贼（去根节）各一两 石决明一两（烧过存性） 白蒺藜一两五钱 白芷一两五钱 甘草七钱 麦门冬二两 黄芩尾 羊角天麻（炒存性） 厚枳壳（炒） 蔓荆子各一两（打少碎） 菊花一两 密蒙花七钱

【用法】每服加莲子三个，灯心七根，水一钟半，煎至八分，食后温服。

【主治】垂帘翳障，昏暗不明。

【加减】若眼红，加黄连。

01722 天麻除湿汤

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【异名】白术散（《普济方》卷一五四）。

【组成】白术四两 天麻三两 人参（去芦头）三两 干姜二两（炮） 全蝎二两（用糯米一盏，炒黄色，去糯米不用） 附子（生，去皮脐，切开，取生姜自然汁一盏，浸一宿，取出炙尽，无浸姜汁为度，薄切，焙干）二两

【用法】上为细末。每服三钱，食前、空心温酒下。

【主治】湿留肢节，身体烦痛，手足肿痛，或时麻木。

01723 天麻黄芪汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】天麻 芍药 神曲（炒） 羌活 茯苓各三分 人参 黄连各四分 当归五分 黄耆 甘草 升麻 葛根 黄柏 苍术各六分 泽泻七分 柴胡九分

【用法】上㕮咀，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食远温服。

【主治】素有风证，因连日酣饮，其证复来，右口角并眼颊有侧视，及左手左脚腿麻木疼痛。

【加减】或加猪苓六分；如肢节不痛，则减去羌活。

01724 天麻搜风汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】明天麻三钱 防风三钱 钩藤三钱 僵蚕二钱 全蝎二钱 蜈蚣一条 生石膏二两 甘草一钱 犀角一钱

【用法】水煎服。

【功用】除风、清热、消痰。

【主治】辘轳转关症（眼球震颤）。

01725 天麻四君子汤

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】人参 白术 白茯苓 天麻 甘草各二钱

【用法】上为末。每服半钱，热汤点服。慢惊体弱者，冬瓜仁、枣子汤点服。

【主治】①《普济方》：小儿变蒸，吐乳泄泻，慢惊体弱。②《伤寒大白》：气虚眩运。

01726 天下第一金疮药

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】雄猪油（熬化去渣）一斤四两 松香（熬化去渣）六两 黄蜡（熬化去渣）六两 面粉（炒，筛）四两 樟脑（研极细）三两 麝香六分 冰片六分 血竭一两 儿茶一两 乳香（箬皮上烘去油）一两 没药（箬皮上烘去油）一两

【用法】上为极细末，先将猪油、松香、黄蜡三味熬化合为一处，待将冷，再入药末，搅匀，瓷瓶收贮，不可泄气。外敷患处。

【功用】止痛止血。

【主治】凡刀斧损伤，跌扑打碎。

【宜忌】伤处不可见水。

01727 天下第一消发背方

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】紫花地丁 金银花 川连（酒制） 黄花地丁 槐花各一两

【用法】分四剂，水煎服。随用温水洗四肢，取微汗后，毒气下行，四肢生小疮而发背自消。

【主治】发背。

01728 专翕大生膏

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】人参二斤（无力者以制洋参代之） 茯苓二斤 龟版一斤（另熬胶） 乌骨鸡一对 鳖甲一斤（另熬胶） 牡蛎一斤 鲍鱼二斤 海参二斤 白芍二斤 五味子半斤 麦冬二斤（不去心） 羊腰子八对 猪脊髓一斤 鸡子黄二十圆 阿胶二斤 莲子二斤 芡实二斤 熟地黄三斤 沙苑蒺藜一斤 白蜜一斤 枸杞子一斤（炒黑）

【用法】上药分四铜锅（忌铁器搅，用铜勺），以有情归有情者二，无情归无情者二，文火细炼六昼夜，去滓，再熬三昼夜，陆续合为一锅，煎炼成膏，末下三胶，合蜜和匀，以方中有粉无汁之茯苓、白芍、莲子、芡实为细末，合膏为丸。每服二钱，渐加至三钱，一日三次，约一日一两，期年为度。

【主治】 燥久伤及肝肾之阴，上盛下虚，昼凉夜热，或干咳，或不咳，甚则痉厥者。

【加减】 肝虚而热者，加天冬一斤，桑寄生一斤同熬膏，再加鹿茸二十四两为末。

【方论选录】 专翕取乾坤之静，多用血肉之品，熬膏为丸，从缓治。盖下焦深远，草木无情，故用有情缓治。专翕之妙，以下焦丧失皆腥臭脂膏，即以腥臭脂膏补之。较之丹溪之知柏地黄，云治雷龙之火而安肾燥，明眼自能辨之。盖凡甘能补，苦能泻，独不知苦先入心，其化以燥乎？再雷龙不能以刚药直折也。肾水足则静，自能安其专翕之性；肾水亏则动而躁，因燥而躁也。善安雷龙者，莫如专翕。

01729 开心散

【方源】 《千金》卷十四。

【异名】 远志散(《医方类聚》卷十引《简要济众方》)。

【组成】 远志 人参各四分 茯苓二两 菖蒲一两

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，饮送下，一日三次。

【主治】 好忘。

01730 开闭丹

【方源】 《辨证录》卷三。

【组成】 黄耆一两 当归五钱 肉桂 甘草各五分 菖蒲 远志 柴胡 香附各一钱 天花粉二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 耳痛之后虽愈而耳鸣如故，以手按其耳则其鸣少息，证属阳虚气闭者。

01731 开关散

【方源】 《丹溪心法附余》卷十二引《应验方》。

【组成】 川芎 薄荷 盆消 白芷 全蝎各一钱 僵蚕 天麻各半钱 细辛一钱

【用法】 上为末。每用少许，以指蘸药满口，擦牙龈上，噙半时，用温水漱吐。

【主治】 牙关紧急不开，因风热攻注牙齿者。

01732 开关散

【方源】 《证类本草》卷十一引《经验方》。

【异名】 破棺散(《普济方》卷八十九引《经验良方》)。

【组成】 天南星（捣为末） 白龙脑各等分

【用法】 研。用此末子一字至半钱，以中指点末揩齿三二十，揩大牙左右。其口自开。

【主治】 急中风，目瞑牙噤，无门下药者。

01733 开关散

【方源】 方出《本草纲目》卷二十九，名见《济阳纲目》卷一。

【组成】 乌梅肉

【用法】 揩擦牙龈，涎出即开。

【主治】 中风、惊痫、喉痹、痰厥僵仆，牙关紧闭者。

01734 开关散

【方源】 《活人方汇编》卷五。

【组成】 升麻（取绿色坚实者，酒拌周时，俟润透，晒干，炒黑色用）八钱 台乌（盐水拌透，炒黄色用）八钱 苍术（米泔水润透，炙至白烟起，碗覆存性用）一钱

【用法】 上药用水二碗，煎一碗，隔汤炖热勿冷。令病者仰卧正枕，以洗净新羊毛笔蘸药，使病人吮之。欲吐则任其吐，吐后复吮，至五六口，当吐痰，不吐药；吮至半碗，并痰不吐；吮完，自能进食。

【主治】 翻胃初起，不拘三脘，迟速吐逆及噎膈之症。

01735 开关散

【方源】 《慈航集》卷下。

【组成】 白僵蚕二钱（烘） 全蝎二钱（洗去尾勾） 牙消二钱 硼砂二钱 胆矾三钱 薄荷叶一钱 牙皂二钱 冰片三分

【用法】 上各为细末，瓷瓶收好，不可走其药性。遇咽喉急症，吹入。吐出风涎，即愈。

【主治】 喉闭、喉风、喉痹、双单蛾、喉瘟。

01736 开阳汤

【方源】 《医醇剩义》卷四。

【组成】 附子八分 补骨脂一钱五分 益智一钱 当归二钱 杜仲二钱 乌药一钱 木香五分 广皮一钱 青皮一钱 茯苓二钱 姜三片

【主治】 少腹厥痛。

01737 开怀散

【方源】 《古今医鉴》卷六。

【组成】 青皮（去瓤） 陈皮 半夏（姜炒） 白茯苓（去皮） 三棱（醋炒） 莪术（醋炒） 香附 槟榔 草豆蔻倍用 柴胡倍用 红花 枳实（麸炒） 甘草

【用法】 上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】 心下积块，作痛闷，间或发热。

【加减】 口干，加干葛。

【备考】 《东医宝鉴·杂病篇》引本方用：柴胡、草豆蔻各一钱，三棱、莪术（并醋炒）、青皮、陈皮、半夏、白茯苓、香附子、槟榔、枳实、红花、

甘草各七分。

01738 开郁汤

【方源】《程松崖先生眼科》。

【组成】柴胡六分 青皮八分 香附八分（酒炒） 青葙子八分 防风六分 荆芥六分 决明八分 车前子八分 川芎八分 栀仁八分

【用法】生姜一薄片引。

【主治】气郁，眼睛不红不肿而痛者。

【加减】黑珠夜暮痛者，加夏枯草一钱；红丝者，加归尾八分、生地一钱。

01739 开郁汤

【方源】《医彻》卷三。

【组成】山栀（炒黑） 陈神曲（炒） 桔梗 香附（醋炒） 川贝母（去心，研） 茯苓 广皮各一钱 抚芎五分

【用法】加生姜一片，荷叶蒂三个，水煎服。

【主治】膈噎初起有火者。

01740 开郁散

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】真郁金三钱 生明矾一钱五分

【用法】上为末。青竹叶汤调服。

【主治】惊痰瘀血，流滞心窍，及忧郁气结，致成失心癫痫诸症。

【方论选录】盖郁金入心去血，明矾能化顽痰也。

01741 开明丸

【方源】《得效》卷十六。

【组成】熟地黄一两半（酒洗） 菟丝子（酒洗） 车前子 麦门冬（去心） 蕤仁（去皮） 决明子 地肤子 茺蔚子 枸杞子 黄芩 五味子 防风（去芦） 泽泻 细辛（去叶，不见火） 杏仁（炒，去皮尖） 北葶苈（炒） 青葙子各一两 桂皮半两 羊肝（须用白羊者。只用肝，薄切，瓦上焙干了作末。或只以肝煮，研烂为丸，庶可久留；少则以蜜凑之）

【用法】上为末，为丸如梧桐子大。每服三十丸，熟水送下，一日三次。

【主治】年深日近，翳障昏蒙，寂无所见，一切目疾。

【宜忌】忌生姜、糟酒、炙煿等热物。

01742 开明散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】蒺藜（炒，去刺） 防风 羌活 川芎 天麻 茯苓 蝉壳（去足） 苍术（童尿浸一宿，焙）各半两 华阴细辛 荆芥 茺蔚子 甘草（炙）各一分 甘菊（去萼）二两

【用法】上为末。每二钱，盐一点，食后沸汤调下。

【主治】风毒气眼，蒙涩障膜。

01743 开迷散

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】当归一钱 白术（炒） 一钱 白芍药一钱 柴胡八分 白茯苓八分 甘草（炙）七分 桃仁一钱五分 苏木一钱 红花一钱 远志（泡，去骨）一钱五分 生地黄一钱五分

【用法】上锉。加生姜，水煎服。或炼蜜为丸，辰砂为衣。

【主治】妇人癫疾，歌唱无时，逾垣上屋，属荣血逆于心包者。

01744 开笑散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】白芷 细辛（净） 良姜 荜茇 川椒 香附 蜂房（炒）各等分

【用法】上为末。擦牙搐鼻。

【主治】风冷齿痛。

01745 开噤汤

【方源】《回春》卷三引徐元济方。

【组成】砂仁一钱（研） 砂糖七钱 细茶五钱 生姜五片

【用法】上锉一剂。水二钟，煎至八分，露一宿，次早温服。外用木鳖子二钱（去壳）、麝香二分，共捣，置脐中，即思食。

【主治】噤口痢疾。

01746 开刀麻药

【方源】《串雅内编》卷二。

【组成】草乌 川乌 半夏 生南星 蟾酥各一钱 番木鳖 白芷 牙皂各三分

【用法】上为末。临时水调，敷一饭时。

【功用】令开刀不疼。

【方论选录】《串雅内编选注》：这是局部麻药方。所用草乌、川乌、南星、胡椒均系辛温、辛热之品，这些药物与皮肤接触，能使末梢感觉迟钝，以致麻痹不知疼痛；再佐以番木鳖、白芷、牙皂、蟾酥消肿止痛，共成局部皮肤浅表麻醉剂。

【备考】原书庚生按：草乌、川乌宜用尖，半夏宜用生，或胡椒末亦可，用烧酒调更速。

01747 开气消痰汤

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】开结导痰汤（《寿世保元》卷六）。

【组成】陈皮一钱 半夏七分（炮） 枯芩一钱

前胡八分 桔梗一钱二分 枳壳一钱 枳实七分 香附一钱二分（童便炒） 木香五分 僵蚕一钱二分 羌活七分 荆芥七分 槟榔八分 射干七分 威灵仙七分 甘草六分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，水煎服。

【主治】 胸中胃脘至咽门窄狭如线，疼痛，及手足俱有核如胡核者。

01748 开郁二陈汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】 陈皮 白茯苓 苍术 香附 川芎各一钱 半夏 青皮 莪术 槟榔各七分 甘草 木香各五分

【用法】 生姜为引。

【主治】 经闭不行，因气郁而闭者。

【备考】 本方方名，《医钞类编》引作“开菀二陈汤”。

01749 开郁二陈汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】 苍术 香附（童便制） 川芎各一钱 青皮 莪术 槟榔各七分 木香五分

【用法】 生姜为引。

【功用】 开郁行滞。

【主治】 形瘦血郁经闭。

01750 开郁种玉汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【异名】 开郁种子汤（《医学集成》卷三）。

【组成】 白芍一两（酒炒） 香附三钱（酒炒） 当归五钱（酒洗） 白术五钱（土炒） 丹皮三钱（酒洗） 茯苓三钱（去皮） 花粉二钱

【用法】 水煎服。

【功用】 解肝脾心肾四经之郁，开胞胎之门。

【主治】 妇人怀抱素恶，肝气郁结，不能生子者。

01751 开郁香连丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 川黄连四两 香附子四两（制）

【用法】 上为末，神曲为丸，如梧桐子大。每服七十丸，白汤送下。

【主治】 久郁，心胸不快或塞痞疼痛。

01752 开郁流气散

【方源】《古方汇精》卷三。

【组成】 槐花二钱（炒） 远志三钱

【用法】 上为末。每日陈酒调服。半月取效。外用远志葱蜜饼敷之。

【主治】 乳硬如石。

01753 开郁理气汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 香附 沉香 半夏各一钱 苏子 枳实 萝卜子各一钱五分 丁香 大腹皮 藿香各八分

【用法】 水煎，热服。

【主治】 气郁不散，肚腹胀满。

01754 开胃生姜丸

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】 桂心一两 生姜一斤（切作片子，盐三两，腌一日，再焙干） 青皮（去白） 陈皮（去白） 甘草（炙）各二两 缩砂仁四十九个 广术 当归各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食前细嚼，沸汤化下。

【功用】 宽中开胃，进饮食。

【主治】 中焦不和，胃口气塞，水谷不化，噫气不通，噎塞痞满，口淡吞酸，食时膨胀，哕逆恶心，呕吐痰水，宿食不消，咳嗽诸肋刺痛。

01755 开胃进食汤

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】 六君子汤加丁香 木香 藿香 莲子 厚朴 缩砂 麦芽 神曲

【功用】 开胃进食。

【主治】 不思饮食，少食不能消化，脾胃两虚之证。

01756 开胃利膈丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】 瓜蒌皮六钱 枳实六钱（炒） 落水沉三钱 砂仁四钱 香附（制）六钱 桔梗四钱（苦） 白蔻仁四钱 苍术四钱（炒） 藿香梗五钱 广皮六钱 中厚朴五钱（炙） 三仙二两（焦）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如高粱粒大。每服二钱，白开水送下。

【功用】 开郁顺气，利膈消食。

【主治】 胸脘疼痛，食积结滞。

01757 开胃填精汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】 人参三钱 白术五钱 熟地一两 麦冬三钱 山茱萸三钱 北五味一钱 巴戟天一两 茯苓三钱 肉豆蔻一枚

【用法】 水煎服。

【功用】 开胃气，进饮食，生精神。

【主治】 入房纵欲，不知保涩，以致形体瘦削，面色痿黄，两足乏力，膝细腿摇，皮聚毛落，不能任劳，难起床席，盗汗淋漓，此损精而成痨症。

01758 开结化痰汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】陈皮一钱 半夏（制）二钱 茯苓二钱 桔梗八分 枳壳七分 贝母一钱 瓜蒌仁二钱 黄连五分 黄芩二钱 栀子二钱 苏子二钱 桑皮三钱 朴消八分 杏仁三钱 甘草八分

【用法】上锉。水煎，入姜汁磨木香服。

【主治】痰结。热痰在胸膈间不化，吐咯不出，寒热气急，满闷作痛。

01759 开结妙功丸

【方源】《宣明论》卷七。

【异名】妙功丸（《儒门事亲》卷十二）、妙效丸（《普济方》卷一七一）。

【组成】荆三棱（炮） 茴香各一两（炒） 川乌头四两 神曲 麦芽 大黄各一两（好醋半升熬成稠膏。不破坚积，不须熬膏） 干姜二钱 巴豆二个（破坚积用四个） 半夏半两 桂二钱 牵牛三两

【用法】上为末，膏为丸，如小豆大。每服十丸、十五丸，生姜汤送下；温水、冷水亦得。或心胃间稍觉药力暖性，却减丸数，以加至快利三五行，以意消息，病去为度。

【功用】《卫生宝鉴》：宣通气血，消酒进食，解积。

【主治】佛热内盛，痃癖坚积，肠结，癥瘕积聚，疼痛胀闷，作发有时，三焦壅滞，二肠闭结，胸闷烦心不得眠，咳喘啰逆不能食；或风湿气两腿为肿胀，黄瘦，眼涩昏暗，一切所伤心腹暴痛，肝肾燥郁，偏止头疼，筋脉拘挛，肢体麻痹，走注疼痛，头目昏眩，中风偏枯，邪气上逆，上实下虚，腰膝麻木，不通气血。

【备考】方中川乌头，《御药院方》用四钱，《普济方》用四分。主治中心腹暴痛，原作“心腹暴热”，据《卫生宝鉴》改。

01760 开结枳实丸

【方源】《医学发明》卷八。

【异名】开结导引丸（《东医宝鉴·外形篇》卷四引《宝鉴》）、开郁导饮丸（《东医宝鉴·外形篇》卷四引《丹溪心法》）。

【组成】橘皮 白术 泽泻 茯苓 麦蘖面 炒曲各一两 干生姜 青皮各半两 枳实（麸炒）一两半 半夏（汤洗七次）一两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三五十丸至七十丸，食远温水送下。

【功用】《外科发挥》：导引行水，化脾气。

【主治】①《医学发明》：饮食不消，心下痞闷。②《外科发挥》：腿脚肿痛。

【加减】如有积块，加巴豆霜一钱半。

【备考】本方方名，《丹溪心法》引作“开结导饮丸”。

01761 开结舒经汤

【方源】《古今医鉴》卷七。

【异名】开结舒筋汤（《杂病源流犀烛》卷十三）。

【组成】紫苏八分 陈皮八分 香附（醋炒）八分 台乌八分 川芎八分 苍术（米泔浸三日，锉碎，炒）八分 羌活八分 南星八分（制） 半夏八分（制） 当归八分 桂枝四分 甘草四分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，入竹沥、姜汁各半盏服。

【主治】七情六郁，气滞经络，手足麻痹。

01762 开障去翳散

【方源】《春脚集》卷一。

【组成】黄连 黄芩 川军 连翘 小生地 胆草 菊花 银花 薄荷 木贼 川羌活 蝉蜕 赤芍 防风 荆芥 甘草 黄柏各一钱

【用法】上药水煎浓汤，去净滓土，澄清，放碗中，拣上好羊脑炉甘石一两煅红，淬入药汤内，连煅、淬三次，即将甘石浸在药汤内，再将碗口用纸封好，勿令落尘。俟过数日后极干时，再加入：铜绿二分，胆矾二分，朱砂三分（水飞），雄黄三分（水飞），硼砂五分，冰片八分，麝香三分，共研极细如尘，收瓷瓶内，封固口，用凉水骨簪点少许。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：磨云退翳。

【主治】①《春脚集》：翳障。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：目珠云障，赤肿作痛，畏日羞明，迎风流泪，各种翳膜，视物不清，暴发火眼，沙眼。

【宜忌】真有翳障，方可点之。

01763 开郁顺气解毒汤

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】青皮 当归 甘草 抚芎 生地 柴胡 香附 陈皮 栀仁 赤芍 连翘 砂仁 桔梗 花粉 乌药 黄芩 羌活 金银花

【用法】再用夏枯草四两，水三四碗，砂罐煎服。

【主治】奶痨。

【加减】冬天加桂、玄胡索。

01764 不二散

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】 密陀僧三钱 硫黄一两 草乌三钱 红砒一钱

【用法】 上为细末，米醋调搽。

【主治】 汗斑。

01765 不忘散

【方源】 方出《千金》卷十四，名见《准绳·类方》卷五。

【组成】 菖蒲二分 茯苓 茯神 人参各五分 远志七分

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，酒送下，一日三次。

【功用】 令人不忘。

01766 不龟手膏

【方源】 《外科大成》卷四。

【组成】 猪脂油四两 白蜡二两（溶化，离火加） 白芷 升麻各一钱 猪牙皂一钱 丁香五分 麝香二分

【用法】 上为细末，入前油蜡内和匀。先用葱汤洗手净，拭干，烘手热，取前膏一块于手心内搓之，令手掌油润，去药，则只手于火上烘之、搓之，以油干为度。

【功用】 滋润肌肤。

【主治】 冬月手背裂痛。

01767 不换金丹

【方源】 《医学启源》卷中。

【组成】 荆芥穗 白僵蚕（炒） 天麻 甘草各一两 羌活（去芦） 川芎 白附子（生） 川乌头（生） 蝎梢（去毒，炒） 藿香叶各半两 薄荷三两 防风一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服细嚼，茶清送下。如口喎向左，即右腮上涂之。

【功用】 退风散热，行经和血，开发腠理。

【主治】 中风口喎。

01768 不换金散

【方源】 《圣济总录》卷一四三。

【组成】 槐实（及时采，炒） 臭椿根皮（锉，暴干） 荆芥穗各一两

【用法】 上为散。每服一钱匕，用粟米饮调下；年深者服二钱匕，一日三次。

【主治】 肠风痔瘘，泻血久不愈。

01769 不换金散

【方源】 《易简方》。

【异名】 不换金正气散（《局方》卷二吴直阁增诸家名方）、真方不换金正气散（《普济方》卷一四七）。

【组成】 藿香 厚朴 苍术 陈皮 半夏 甘草等分

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏，加生姜三片，煎至六分，去滓热服。

【功用】 ①《局方·吴直阁增诸家名方》：辟岚气，调和脾胃，美饮食。②《直指》：解散寒邪。

【主治】 四时伤寒，瘴疫时气，霍乱吐泻，肠风便血；外伤湿邪，关节疼痛。

①《易简方》：外感风寒，内伤生冷，憎寒壮热，头目昏疼，肢体拘急，不问风寒二证及内外之殊，以及山岚瘴气，四时瘟疫。②《局方·吴直阁增诸家名方》：四时伤寒，瘴疫时气，头疼壮热，腰背拘急；五劳七伤，山岚瘴气，寒热往来，下痢赤白。③《直指》：肠风便血。④《得效》：久在卑湿，或为雨露所袭，身重脚弱，关节疼，发热恶寒，小便涩，大便泄，身汗或浮满。⑤《普济方》：痘疮外为风寒所折，荣卫不知，内为乳食所伤，内气壅遏，以至冰硬。⑥《景岳全书》：疮疡，脾气虚弱，寒邪相搏，痰停胸膈，致发寒热。⑦《济阴纲目》：妊妇伤湿泄泻。

【宜忌】 忌生冷、油腻、毒物。

【方论选录】 《医方考》：是方也，苍术、厚朴、陈皮、甘草，平胃散也，可以平湿土敦阜之气而消岚瘴；乃半夏之燥，所以醒脾；藿香之芬，所以开胃。方名曰正气者，谓其能正不正之气故尔！

01770 不换金正气散

【方源】 《外科精要》卷下。

【组成】 苍术（米泔浸，炒）四两 厚朴（姜汁拌炒）四两 粉甘草（炙）二两 橘红（焙）三两 藿香叶 半夏（姜制）各二两 木香（湿纸裹煨） 人参 白茯苓各一两

【用法】 每服五钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 痈疽感冒风寒，或伤生冷，或瘴疟，或疫疠。

01771 不换金正气散

【方源】 《医统》卷七十六。

【组成】 厚朴（姜炒） 苍术（米泔水泡） 陈皮（去白） 半夏（制） 藿香叶（净） 甘草（炙）各一钱 草果五分

【用法】 水二盏，加生姜三片，大枣二枚，水煎，温服。

【功用】 和脾胃，止吐泻，温中，下痰饮。

【主治】 一切山岚瘴气，八般疟疾，四时伤寒，五种膈气，腹痛胀满，吞酸噫气，噎塞干呕，恶心；内受寒湿，外感风邪，头痛头眩，鼻塞；及一

切霍乱时气，不伏水土。

01772 不换金卷云丹

【方源】《医统》卷六十一。

【异名】 不换金拔云丹(《审视瑶函》卷六)。

【组成】 大石蟹一个（照后制法） 黄连 黄柏 黄芩 大黄 细辛 桔梗 防风 荆芥 栀子 薄荷 羌活 乌药 陈皮 枳壳 前胡 当归 姜黄 木贼 菊花 干姜 桑白皮各等分

【用法】 上将二十一味锉细，铜器用水三碗浸三日，用布滤去滓，却将石蟹微火煅令紫色，入药汁内，醮冷取起，细研为末，就将药水淘飞浮清者，以净器盛浮水，安静室勿动，以物覆器上，毋使尘垢入内，俟其澄清，倾去药水，以蟹粉晒干取用，配后诸药：石蟹、坯子各五钱，熊胆、胆矾、硼砂各二钱，朱砂、银朱、蕤仁（制）、轻粉各一钱，川椒、胡黄连、夜明砂、牛黄、珍珠、鹰条各五分，血竭、巴豆霜、金墨各二分。上各依制法合乳极细无声，瓷罐贮之听用，名曰丹头，随病轻重加减点眼。轻号：丹头五分，大冰片一分，麝香三厘，坯子一钱。上共研极细，专治一切风热暴赤烂弦，迎风流泪，怕日羞明，或半年一发，或一年一发，歇作无时，悉以轻剂点之，不可轻用重药，病轻药重，反受其害，内服合病之剂为助。次轻号：丹头六分，冰片一分，麝香三厘，坯子一钱。上专治久患不愈，珠上必生薄翳，或有红筋赤脉，悉以此次轻药点之，日三五次；若见退减，日点二次，愈则勿点。重号：丹头七分，冰片一分，麝香三厘，坯子一钱。上治眼患颇重，或翳障垂帘，或赤带痛涩，用此吹点，日三四次，日渐好即止，吹药点数亦减，内服本经药为愈。至重号：丹头九分，冰片一分，麝香三厘，坯子一钱。上专治重眼厚膜遮睛，银疔白翳昏盲无见，方点此药，日点五次渐愈渐减。

【主治】 一切远年膜障。

【备考】《审视瑶函》有柴胡。

01773 木瓜丸

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】 木瓜（干者）一两 陈橘皮（浸去白瓤，焙） 人参（去芦头）一两 桂心半两 丁香半两 槟榔二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以生姜汤送下，不拘时候。

【主治】 湿脚气上攻，心胸壅闷，痰逆。

01774 木瓜丸

【方源】《局方》卷五（宝庆新增方）。

【组成】 狗脊（去毛）六两 大艾（去梗，糯米糊调成饼，焙干为末）四两 木瓜（去瓤）四两 天麻（去芦） 当归（酒浸制） 萆薢 苁蓉（去芦，酒浸） 牛膝（洗去土，酒浸一宿）各二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空心、食前温酒吞下，盐汤亦可。

【主治】 肾经虚弱，腰膝沉重，腿脚肿痒，疰破生疮，脚心隐痛，筋脉拘挛，或腰膝缓弱，步履艰难，举动喘促，面色黧黑，大小便秘涩，饮食减少，无问新久，并宜服之。

01775 木瓜丸

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】 木瓜（大者，切去盖子，入硇砂半两在内，却盖合蒸熟，去皮）一枚 附子（炮裂，去皮脐） 白附子（炮裂） 羌活（去芦头）各一两 没药半两 木香一两

【用法】 上药先以五味为末，与木瓜同捣成剂，为丸如梧桐子大。每日二十丸至三十丸，空心盐汤送下。

【主治】 风脚软，膝腕枢纽不用，步履不能。

01776 木瓜丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 牛膝（温酒浸，切，焙）二两 木瓜一枚（去顶瓤，入艾叶一两蒸熟） 巴戟天（去心） 茴香（炒） 木香各一两 桂心（去皮）半两

【用法】 上为细末，入熟木瓜并艾同杵千下，如硬更下蜜，为丸如梧桐子大。每服二十丸，空心盐汤送下。

【功用】 补益，壮筋骨。

【主治】 腰痛。

01777 木瓜丹

【方源】《传信适用方》卷上。

【组成】 宣州木瓜一个（杜木瓜大者亦可用） 羌活一两 独活二两 附子（炮）半两（同为末）

【用法】 将木瓜取出瓤隔，切去盖子，用好熟艾填在木瓜内，须满实，却用盖子复之。竹枝签定，饭甑上蒸烂。入羌活、独活、附子末。先杵木瓜令烂，下药末捣成膏子，为丸如梧桐子大。每服三五十粒，食前温酒或盐汤送下。

【功用】 补肾气，调血脉。

【主治】 脚膝疼重，不能远行久立。

01778 木瓜汤

【方源】 方出《圣惠》卷四十七，名见《圣济总录》卷一六二。

【异名】 木瓜煎(《妇人良方》卷十四)。

【组成】 木瓜二两 生姜半两 吴茱萸一两（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】 上锉细。以水三大盏，煎至一盏二分，去滓，分为三服，频频服之。

【主治】 霍乱吐泻，转筋。

①《圣惠》：霍乱泻后，脚转筋。②《圣济总录》：产后霍乱吐利，脚转筋。③《妇人良方》：妊娠霍乱吐泻，转筋入腹则闷绝。

01779 木瓜汤

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】 木瓜（干者去瓤）一枚 厚朴（去粗皮，姜汁炙）半两 干姜（炮）一两 人参一两一分

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓服，不拘时候。

【主治】 霍乱干呕。

01780 木瓜汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】 干木瓜（去瓤，锉） 吴茱萸（洗，焙干，炒） 陈橘皮（汤洗，去白，焙） 高良姜一两一分 槟榔（锉）五枚

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，服前温服，如人行五里再服。

【主治】 脚气冲心，吐逆不止，渐至困笃。

01781 木瓜汤

【方源】《三因》卷十一。

【异名】 木瓜散(《明医指掌》卷九)。

【组成】 木瓜干一两 吴茱萸（汤浸七次）半两 茴香一分 甘草（炙）一钱

【用法】 上为散。每服四大钱，水一盏半，加生姜三片，紫苏十叶，煎七分，去滓，食前服。

【主治】 ①《三因》：霍乱，吐下不已，举体转筋，入腹则闷绝。②《保命歌括》：或因饮冷，或冒寒，或失饥，或大怒，或乘车船，伤动胃气，令人上吐下泻不止，头旋眼花，手足转筋，四肢逆冷。

01782 木瓜散

【方源】《医方大成》卷四引《济生》。

【组成】 虎胫骨（酥炙） 五加皮（洗） 木瓜（去瓤） 当归（去芦，酒浸） 甘草 酸枣仁（炒，去壳） 人参 桑寄生 柏子仁（炒） 黄耆（去芦）各一两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏，加生姜五片，煎服，不拘时候。

【主治】 筋虚极，脚手拘挛，伸动不得，腹内转痛，十指甲痛，数转筋，甚则舌卷囊缩，唇青，面色苍白，不得饮食。

01783 木瓜散

【方源】《直指》卷四。

【异名】 木瓜汤(《奇效良方》卷三十九)。

【组成】 大腹皮 紫苏 羌活 木香 茯苓 陈皮 甘草（炙）各半两 宣木瓜干一两

【用法】 上为粗末。每用三钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 脚气。

01784 木瓜煎

【方源】《本事》卷一。

【组成】 宣州木瓜二个（取盖，去瓤） 没药二两（研） 乳香一分（乳钵坐水盆中研）

【用法】 上二味纳木瓜中，用盖子合了，竹签定之，饭上蒸三四次，烂研成膏子。每服三五匙，地黄酒化下。生地黄汁半盏，无灰上酝二盏和之，用八分一盏热暖化膏。

【主治】 筋急项强不可转侧。

【方论选录】《本事方释义》：木瓜气味酸平，人手足太阴，能行下焦，治霍乱转筋诸恙；没药气味苦平，通瘀血，人足阳明；乳香气味辛微温，人足少阴，宣通瘀痹病，致筋急项强不能转侧者，得木瓜之收敛正气，通行下焦，又兼二味之通瘀神经，生地黄汁润下，酒之辛温上升，使经络之中安妥，病何由得留哉。

【临证举例】 项强 有人患此病，自午后发，黄昏时定。予投此方，三服而愈。

01785 木瓜煎

【方源】《妇人良方》卷十四。

【组成】 吴茱萸（汤泡七次） 生姜（切）各一分 木瓜一两半 茴香一分 甘草一钱 茱萸半两

【用法】 上锉细，水二盏，加紫苏煎一盏二分，去滓，分三次热服。不拘时候。

【主治】 妊娠霍乱，吐泻转筋，入腹则闷绝。

01786 木兰膏

【方源】《医心方》卷四引《鬼遗方》。

【组成】 木兰二两 栀子三两

【用法】 上切细，渍苦酒一宿，明旦猪膏一升煎，去滓，稍稍摩之。

【主治】 渣鼻。

01787 木耳散

【方源】《产科发蒙·附录》引《百一》。

【组成】 陈棕 木耳 莲房 槐木（各煅存性）

等分

【用法】 上为细末。每服二钱，温酒或米汤调下。

【主治】 血崩。

01788 木耳散

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】 木耳一两（焙干研末） 白砂糖一两

【用法】 上和匀，以温水浸如糊，敷之缚之。

【主治】 溃烂诸疮。

01789 木耳粥

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】 白木耳（洗，细切）二两 白粳米（淘净）二合

【用法】 上药相和，以豉汁煮粥，任下葱、椒、盐等。空心食之。

【主治】 赤白痢。兼治肠胃滑。

01790 木耳粥

【方源】《长寿药粥谱》。

【组成】 银耳 5～10 克（或黑木耳 30 克） 粳米二两 大枣 3～5 枚

【用法】 先将银耳或黑木耳浸泡半天，用粳米、大枣煮粥，待煮沸后加入木耳、冰糖适量，同煮为粥。晚餐或作眯心服食。

【功用】 润肺生津，滋阴养胃，益气止血，补脑强心。

【主治】 中老年体质衰弱，虚咳嗽，痰中带血，肺痨病阴虚内热，以及慢性便血、痔疮出血等。

【宜忌】 风寒感冒咳嗽忌服。

01791 木香丸

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】 木香半两 槟榔半两 赤芍药半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 诃黎勒一两（煨用皮） 桂心半两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炮）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 心腹痛胀满，食不消化，四肢不和。

01792 木香丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】 木香三分 干姜半（一）两（炮裂，锉） 当归一两（锉，微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 羌活一两 桂心一两 莨菪子三合（水淘去浮者，水煮令芽出，候干，炒令黄黑色）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】 久冷，腰胯疼痛。

01793 木香丸

【方源】 方出《圣惠》卷四十八，名见《圣济总录》卷七十一。

【组成】 川大黄四两（锉碎，与鳖甲同煮，焙干） 木香二两 鳖甲四两（以米醋二升与大黄同煮令醋尽炙令黄）

【用法】 上为细末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以生姜汤送下。

【主治】 肥气，积聚不散。

01794 木香丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】 木香一两半 鳖甲一两半（涂醋，炙令黄，去裙襕） 桂心一两半 吴茱萸一两半（汤浸七遍，焙干，微炒） 诃黎勒皮一两半 槟榔一两（半） 枳实一两（麸炒微黄） 牵牛子三两（微炒）

【用法】 上为细末，以酒煮面糊丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【主治】 息贲气，胸膈闷，腹胁坚急，四肢不和，食少无力。

01795 木香丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】 木香一两 桂心一两 五灵脂一两 干姜一两（炮裂，锉） 香墨一两 巴豆半两（去皮心，研，纸裹，压去油） 猪牙皂荚一两（去黑皮，涂酥，炙令焦黄，去子）

【用法】 上为末，入巴豆研令匀，用软糯米饭为丸，如绿豆大。每服五丸。食前以生姜、橘皮汤送下。

【主治】 食癥，及吃食不下。

01796 木香丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】 木香半两 京三棱半两（微煨，锉） 五灵脂半两 芫花半两（醋拌炒，令干） 百草霜半两 硼砂半两 皂荚五枚（去黑皮，涂酥，炙令焦黄，去子）

【用法】 上为末，每一钱药末，研不去心膜巴豆一粒，每十钱入十粒，旋旋入香墨浓汁，捣二千杵，干湿得所，可丸即丸，如黍米大。每服五丸，以温送下。看脏腑虚实加减服之。疏通后只吃粥一两日，一切气，橘皮生姜汤送下；血气，每服三丸，当归酒送下。

【主治】 厌食，及腹内气块。

01797 木香丸

【方源】《普济方》卷一九三引《指南方》。

【组成】 木香 槟榔 陈皮 商陆 木通各半两

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，米饮送下。

【功用】《鸡峰》：消滞积，行水。

【主治】 ①《普济方》引《指南方》：气鼓。②《鸡峰》：水气。

01798 木香丸

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】 木香 茴香子（炒） 缩砂蜜（去皮） 青橘皮（汤浸，去白，焙） 蓬莪术（煨，捶碎） 红豆 高良姜 楝实（锉，炒） 丁香皮（锉） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各半两 桔（炒）三两 芍药二两 益智（去皮）一两半 五味子 桂（去粗皮）各一两 甘草（炙，锉）三分 胡椒半两

【用法】 上为末，用粟米饭为丸，如绿豆大。每服十五丸，加至三十丸，生姜汤送下，如伤水，多嚼服亦得。

【主治】 脾胃气虚，不思饮食。

01799 木香丸

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】 木香 青橘皮（汤浸，去白，焙） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 羌活（去芦头） 半夏（汤洗七遍）各半两 槟榔（锉） 桔梗（去芦头） 枳实（麸炒黄色，秤） 厚朴（去粗皮，姜制，秤） 白术 甘草各半两（炙黄，锉）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜汤送下，一日三次。

【主治】 寒气结为胸痹，心下坚痞。

01800 木香丸

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】 木香 蜀椒（去闭合及目，炒令汗出） 干姜（炮裂）各一两

【用法】 上为末，熔蜡为丸，如梧桐子大。每服七丸，空心温酒送下。

【主治】 痃气胃冷，不入饮食。

01801 木香丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】 木香一两 诃黎勒（炮，去核）二两

【用法】 上为末，用粥饮为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温浆水送下，日午再服。

【主治】 气痢久不止。

01802 木香丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】 木香 肉豆蔻仁 缩砂仁 赤石脂各半两

【用法】 上为末，以枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温米饮送下。

【主治】 诸气痢不止。

01803 木香丸

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】 木香 槟榔（生锉） 羌活（去芦头） 桂（去粗皮） 陈橘皮（汤去白，焙）各一两 大黄（湿纸裹煨）二两 牵牛子（用半斤取末）四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，以生姜、紫苏送下。渐加至三十丸。

【功用】 疏风顺气。

【主治】 大肠秘涩。

01804 木香丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】 木香半两 川乌（生，去皮尖） 一两

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，陈皮醋汤送下。

【主治】 冷气下泻。

【方论选录】《本事方释义》：木香气味辛温，入足太阴，川乌气味苦辛大热，入足太阴、少阴，醋糊丸，陈皮醋汤送，欲药性之达病所也。此冷气内伏，下利不止，非辛温大热之药不能直入以驱除之。

01805 木香丸

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】 没药 木香 船上茴香（炒） 钩藤等分 全蝎 乳香各半两

【用法】 上先将乳香、没药别研，次入诸药末和毕，取大蒜少许研细为丸，如梧桐子大，晒干。每服二丸，钩藤汤送下。

【主治】 惊风内钓，肚痛惊啼。

01806 木香丸

【方源】《医学纲目》卷十六。

【组成】 木香 丁香 三棱 莪术 青皮 陈皮各二钱半 槟榔二钱 白豆蔻一钱 巴豆肉十五粒（用醋煮，令无白心）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如麻子大。

【主治】 食积心痛。

01807 木香丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 木香 丁香各一钱五分 干姜三钱 麦芽（炒）五钱 陈皮三钱 巴豆（去壳，炒黑）三十粒

【用法】 神曲煮糊为丸。每服十丸或二十丸，开水送下，痛甚者倍之。

【主治】 寒积冷食，腹痛拒按，或大便闭结。

【备考】 所食之物，应随利出。如利不止，以冷粥饮之，即止。

01808 木香汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 木香（锉）半两 胡椒一分 高良姜（锉，炒）一分 甘草（炙）一两 蓬莪术（炮）二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 胃反，不下食。

01809 木香汤

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】 木香 干姜（炮）各半两 桂（去粗皮） 芍药 白术 枳壳（去瓤，麸炒） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各三分 甘草（炙，锉）一分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服，一日二次。

【主治】 心痛如刺，不能食。

01810 木香汤

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】 木香 桂（去粗皮）各三分 赤木 茯苓（去黑皮） 槟榔（锉） 桑根白皮（锉）各一两半 甘草（炙）半两 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 紫苏茎叶各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半枣大（拍破），煎至七分，去滓温服，空心、日午、近晚各一次。

【主治】 积气不散，久伏于脐腹间，发似豚状，奔上冲心。

01811 木香汤

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】 木香 槟榔（生锉） 乌头（炮裂，去皮脐） 细辛（去苗叶） 当归（切，焙） 吴茱萸（汤洗，焙干，炒） 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙）各一两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 厥疝逆上，攻腹冷痛。

01812 木香汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】 木香 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 半夏（生姜汁浸一宿，汤洗三遍，切，焙） 白术 甘草（炙） 桂（去粗皮） 大腹皮（各半两） 黄芪（锉） 人参 桔梗（炒） 芍药各三分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜一枣大（拍碎），煎至六分，去滓，食后热服，一日三次。

【主治】 咽喉噎滞，如有物妨闷。

01813 木香汤

【方源】《直指》卷十六。

【异名】 二木散（《医学入门》卷七）、木香散（《明医指掌》卷七）

【组成】 木香 木通 槟榔 舶上茴香（焙） 当归 赤芍药 青皮（去白） 泽泻 辣桂 橘红 甘草（炙）

【用法】 上锉散。每服三钱，加生姜五片，水煎服。

【主治】 冷气凝滞，小便淋涩作痛，身体冷清。

01814 木香汤

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】 木香钱半 槟榔一钱 木通钱半 青皮钱半（炒） 小茴半钱（盐水炒） 陈皮钱半 泽泻钱半 生草梢一钱

【用法】 水煎，去滓温服。

【功用】 通调气化。

【主治】 气淋涩痛，脉沉者。

【方论选录】 木香调中气以通淋，槟榔破滞气以通闭，青皮平肝气以疏泄膀胱，陈皮和胃气以通调水道，木通通小便，泽泻利膀胱，小茴温经调气化，草梢和药缓茎中也，水煎温服，使中气调和，则诸气皆顺，而膀胱之气无不化。

01815 木香汤

【方源】《医衡》卷三。

【组成】 木香 香附（醋炒） 青皮 广皮 枳实（麸炒） 柴胡 苏梗各一钱 炙草三分

【用法】 加炒熟砂仁末一钱，水煎服。

【主治】 心痛因怒而发，心膈胀闷，脉沉伏，四肢冷者。

01816 木香饮

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】 木香 黄芩（去黑心） 木通（锉，炒） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各三分 冬葵子（研） 瞿麦穗各一两 槟榔 茅根 赤茯苓（去黑皮）各半两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】 下焦热，大小便不通，气胀满闷。

01817 木香散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 木香半两 丁香半两 乳香半两 茴香子半两 桂心三分 硫黄半两（细研入）

【用法】 上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以炒生姜、热酒调下，不拘时候。

【主治】 肾脏积冷，气攻心腹疼痛，或吐冷沫，不思饮食。

01818 木香散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】 木香一两 桂心一两 人参一两（去芦头） 细辛半两 诃黎勒皮半两 干姜半两（炮裂，锉） 白术半两 甘草一两（炙微赤，锉） 附子半两（炮裂，去皮脐） 鳖甲一两半（涂醋，炙微黄，去裙襕） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 京三棱三分 槟榔半两 赤茯苓三分 厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 当归三分 茴香子半两

【用法】 上为粗散。每服五钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，每于食前稍热服。

【主治】 七气，心腹积聚，结块如杯，呕吐寒热，胸心中短气，不能下食。

01819 木香散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】 木香 青橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 赤芍药 吴茱萸（汤浸七遍，焙干，微炒） 当归（锉，微炒） 槟榔 附子（炮裂，锉）各一两 柴胡一两（去苗） 麝香三钱（细研）

【用法】 上为粗散。入麝香和令匀。每服二钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不拘时候稍热服。

【主治】 冷气攻心，腹痛不可忍。

01820 木香散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】 木香三分 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒） 当归三分（锉，微炒） 赤芍药三分 槟榔半两 干姜半两（炮裂，锉） 细辛半两 桂心半两 人参三分（去芦头）

【用法】 上为细散。每服二钱，以生姜、大枣汤调下，不拘时候。

【主治】 心痛多唾，不能饮食。

01821 木香散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】 木香三分 草豆蔻三分（去壳） 桂心三分 附子三分（炮裂，去皮脐） 白术三分 白芍药三分 丁香三分 甘草一分（炙微赤，锉） 诃黎勒皮三分（微煨）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加煨姜半分煎至五分，去滓，稍热服。

【主治】 中焦虚寒，或时吐泻腹痛。

01822 木香散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】 木香半两 诃黎勒皮半两 槟榔半两 白术一分 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 赤茯苓三分 人参一分（去芦头） 厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 桂心一分

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下；生姜、大枣汤调下亦得。

【主治】 积聚，心腹疼痛，胸膈气滞，四肢无力，不思饮食。

01823 木香散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】 木香一两 高良姜半两（锉） 赤芍药半两 赤茯苓半两 芎藭三分 干姜半两（炮裂，锉） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 诃黎勒半两（煨，用皮） 草豆蔻三分（去皮） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 牵牛子三分（微炒）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候稍热服。

【主治】 寒疝，心痛闷绝。

01824 木香散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 木香半两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 荜茇半两 干姜半两（炮裂，锉） 诃黎勒皮一两 大腹皮三分 桂心半两 附子一两（炮裂，去皮脐） 甘草二分（炙微赤，锉）

【用法】 上为细散。每服一钱，以热酒下，不拘时候。

【主治】 五膈气，脾胃虚冷，食不消化，呕吐酸水，四肢不和，面色青黄，渐加羸弱。

01825 木香散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 木香三分 桂心三分 大麻仁二两 葵子一两 瞿麦一两 泽泻一两 苣藤一两 青橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加葱白七寸，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 冷淋，小腹气满，不得宣通。

01826 木香散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】 木香半两 附子三分（炮裂，去皮脐）

阿胶半两（捣碎，炒令黄燥） 白术三分 赤石脂三分 草豆蔻一两（去皮） 干姜三分（炮裂，锉） 桂心三分 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】 上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】 冷痢，心腹疼痛，不欲饮食，渐加羸弱。

01827 木香散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】 木香三分 京三棱三分（炮裂，锉） 蓬莪术半分（两） 芎藭三分 延胡索三分 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 当归三分（锉，微炒） 桂心三分 牛李子三分 麝香一分（研入） 琥珀三分 槟榔半两

【用法】 上为细散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】 妇人痃癖，心腹疼痛，不欲饮食。

01828 木香散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【异名】 十一味木香散、十一味异功散（《小儿痘疹方论》）、陈氏木香散（《张氏医通》卷十五）。

【组成】 木香一分 大腹皮一分（锉） 人参一分（去芦头） 赤茯苓一分 青橘皮一分（汤浸，去白瓤，焙） 诃黎勒皮一分 桂心一分 前胡一分（去芦头） 半夏一分（汤浸七遍，去滑） 丁香一分 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加生姜半枣大，煎至五分，去滓温服。

【功用】《普济方》：和表里，通津液，清上实下，扶助阴阳。

【主治】 小儿脾胃虚寒气滞，或小儿痘疹，腹胀泄泻，烦渴，不思饮食。

①《圣惠》：小儿冷热不调，胃气壅滞，少思饮食。②《小儿痘疹方论》：痘疹已出未出之间，或泻渴，或腹胀，或气促，谓之里急者；痘疹始出，一日至五七日之间，虽身热或腹胀，足梢冷，或身热泻渴，或身热惊悸腹胀，或身热出汗者；痘疹欲靥已靥之间，而忽不能靥，兼腹胀烦渴者；痘疮已靥，烦渴不止，或头温足冷，或腹胀，或泻，或咬牙；③《景岳全书》：小儿痘疹，虚寒多滞者。

【方论选录】 ①《医方考》：胃虚而寒，则生泄泻；泻失津液，则令人渴。是方也，人参、甘草，所以补胃；木香、丁香、肉桂，所以温胃；腹皮、青皮、半夏、前胡、赤苓，所以调胃；乃诃子者，所以止泻而生津也。此亦以胃气为主，盖胃不虚寒，则泻自止，津液自生，而渴自除矣。②《古方选注》：木香散，手太阴阳明之方也。肺气表虚，变为寒燥，毒陷泄泻，里虚表白，白必灰，灰必陷，泻必胀，胀必毒滞，症因表虚而变，内毒不透，当以破滞透毒为先，补虚止泻次之。故君以木香顺气散滞；丁香赞助元阳，肉桂温表虚，转灰白为红润；诃子破滞气，又能止泻，青皮破下焦之滞，胀宽则毒松，腹皮宽膨消毒，其功莫大；半夏通阴，甘草和中，人参佐暖药和阳，扶破药养正；使以前胡清肺，赤苓泻心，俾心肺宁而营卫和，且热药不伤肺，破药不伤营也。

【临证举例】 小儿痘疹 《小儿痘疹方论》薛按：一小儿九岁，出痘六日，痒塌寒战，院使钱密庵用十一味木香散二剂，贯脓；用参芪托里散而靥。后痕白作痒，用十全大补汤而愈。

01829 木香散

【方源】《苏沈良方》卷二。

【组成】 羌活一两 麻黄（去节，水煮少时，去沫）二两 防风三分 木香 槟榔 附子（炮，去皮） 白术 川乌头（炮，去皮） 草豆蔻（和皮用） 陈橘皮 牛膝（酒浸一宿） 杏仁（生，去皮尖） 当归（酒浸一宿） 人参 茯苓 甘草（炙） 川芎 官桂（不得见火）各半两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服一两，水一碗，加生姜七片，煎至一盏，去滓，得七分，温服。

【功用】《妇人良方》：调气进食宽中。

【主治】 偏风瘫痪，脚气。

【加减】 大肠不通，加大黄末，每服一钱，如久不通，加至三五钱不害；心腹胀，加葶苈并滑石末，每服各一钱，滑石汤送下；如上膈壅滞，痰嗽气急，加半夏、升麻、天门冬、知母末，各二钱同煎，其药滓两合为一服，用水一碗半，煎至一盏，服此药。

【备考】 按：本方方名，《妇人良方》引作“木香煮散”。

01830 木香散

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】 木香三两 诃黎勒（煨，用皮）半两 附子（炮裂，去皮脐）一两 干姜（炮）一两 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙）二两 枳实（去瓤，麸炒）一两 赤茯苓（去黑皮）一两 甘草（炙，锉）半两 当归（锉，微炒）一两

【用法】 上为细末。每服二钱匕，食前粥饮调下。

【主治】 肠痹，腹胀飧泄，小便不利。

01831 木香散

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】 木香 丁香 檀香各半两（锉） 人参 沉香（锉） 白茯苓（去黑皮）各一两 甘草 槟榔（锉）各一分

【用法】 上药约水多少，慢火熬水尽，焙干，捣罗为细末。每服一钱匕，入盐，沸汤点服。

【功用】 和胃下气。

【主治】 干呕。

01832 木香散

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】 木香一两 青橘皮（汤浸，去白，焙）二两 白豆蔻（去皮）三分 郁李仁（汤浸，去皮，微炒，别研成膏）二两

【用法】 上药除郁李仁外，三味为细末，和研令匀。每服二钱匕，空心、食前煎椒汤调下。

【主治】 气逆膈气，胸中痰结，饮食不下。

01833 木香散

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】 木香一两 青橘皮（汤浸，去白，焙） 白芷（炒） 沉香（锉） 茴香子（炒） 桂（去粗皮） 蓬莪术（炮，锉） 杉木节各半两 枳壳（去瓤，炒） 木瓜（焙）各三分

【用法】 上为散。每服二钱匕，炒生姜、盐汤调下。

【主治】 一切气，及肾脏奔豚气上冲，心胸闷乱。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“木香汤”。

01834 木香散

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】 木香 阿胶（炙，炒） 诃黎勒（炮，去核） 黄连（去须，炒）各半两 干姜（炮） 吴茱萸（汤浸，焙，炒） 龙骨各一分

【用法】 上为散。每服三钱匕，空心米饮调下，日晚再服。

【主治】 肠胃冷气，飧泄不止。

01835 木香散

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】 木香 白术 五味子 细辛 甘草各三钱 干姜 款冬花 桂各半两 附子

【用法】 上为粗末。每服二钱，水一盏，大枣一枚（劈破），同煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】 寒嗽。

【备考】 方中附子用量原缺。

01836 木香散

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】 益智子一两 陈皮 茴香 姜黄 香附子 京三棱 神曲各二两 盐四两

【用法】 上为细末。白汤点服二钱，不拘时候。

【主治】 膈气，心腹疞痛，饮食无味，口苦舌涩，呕逆不定，嗳气吞酸，一切气疾。

【备考】 本方名木香散，但方中无木香，疑脱。

01837 木香散

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】 木香 陈皮各一两 良姜 干姜 诃子皮 赤芍药 枳实各半两 草豆蔻 黑牵牛各三两 川芎三两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【功用】《古方选注》：辛香下气。

【主治】 ①《宣明论》：心疝，小腹痛，闷绝不已者。②《会约》：冲疝，肝邪上厥，气上冲心，二便不通，小腹与阴相引痛甚。

【方论选录】《古方选注》：木香散辛香下气，乃火郁发之兼下夺之法也。木香疏泄腹间滞寒冷气，得良姜、干姜、草豆蔻相为佐使，其效尤速；陈皮、枳实破气分之滞；赤芍、川芎开血分之郁；诃子皮能消利腹中一切恶物；牵牛禀火之气，善走经络，利大小便有殊功。

01838 木香散

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 木香 槟榔各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，隔夜空腹食前煎桔梗汤调下。

【主治】 上焦气逆上冲，食已暴吐，脉浮而洪。

01839 木香散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 木香 大戟 白牵牛各等分

【用法】 上为细末。每用三钱，猪腰子一对，批开，掺药在内，烧熟，空心服之。如水肿不能全去，于腹上涂甘遂末，在绕脐满胀，少饮甘草水，其肿便去。

【主治】 水肿。

01840 木香散

【方源】《百一》卷十五。

【组成】 木香 青皮（去白） 玄胡索 土茴香（炒） 马扑儿（新瓦上焙干）各等分

【用法】 上为细末。每服抄二钱，空心温酒调下。

【主治】 疝气。

【宜忌】 忌滞气食物，如豆腐、鸡、鸭子、湿面、蕹菜等。

01841 木香散

【方源】《永类钤方》卷二十。

【组成】 黑牵牛末（半生，半熟） 大腹子各一两半 槟榔 雷丸 锡灰（醋炒） 三棱 莪术（并煨） 木香 大黄各一两

【用法】 上为细末。每服三钱，空心蜜水或砂糖水调下；仍先用烧猪肉一片，细嚼不吞，仍吐出，却服药引虫。

【主治】 虫痛。

01842 木香散

【方源】《得效》卷六。

【组成】 南木香五钱 地榆一两 黄连七钱 青皮（去瓤） 赤芍药 枳壳（煨，去瓤） 乳香 甘草各五钱

【用法】 上为末。每服二钱，熟汤调下。

【主治】 痢疾腹痛。

01843 木香散

【方源】《普济方》卷二〇七。

【组成】 米壳二两 神曲半两 甘草一两 干姜半两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水二盏，煎去滓，不拘时候服。

【主治】 泻痢。

【备考】 本方名木香散，但方中无木香，疑脱。

01844 木香散

【方源】《冯氏锦囊·杂证》卷五。

【组成】 木香 甘草（炒黄） 肉果（面裹煨，粗纸打去油） 诃子肉（炒黄）各五钱 苍术（炒黄） 泽泻（炒） 厚朴（姜汁拌炒） 茯苓（焙） 干姜（炒深黄） 车前子（焙） 广皮（炒） 白术（土炒） 木通（焙）各一两 猪苓（炒）二两 肉桂（去皮，不见火）三钱

【用法】 上为末。生姜炒、砂仁汤调下。

【主治】 久泻脾虚，及变慢脾风候。

01845 木香散

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】 甘草 干姜各二两 附子一两 丁香 木香 肉豆蔻 广藿香 诃子肉 赤石脂各一两

【用法】 上为散。每服三钱，陈米汤下。

【主治】 虚寒滑泄不止。

01846 木香膏

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】 木香 细辛（去苗叶） 当归（切，焙） 芎藭 木通 蕤仁（研） 白芷各半两

【用法】 上细锉，纳银石器中，入羊髓微火煎，候白芷色黄膏成，去滓澄凝。每取小豆大，纳鼻中，一日二次。以愈为度。

【主治】 鼻中窒塞，气不通利。

01847 木贼散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 木贼节一两 赤芍药一两 神曲半两（微炒） 荷叶一分 柏叶半两（微炒）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以当归酒调下。

【主治】 妇人月水不断。

01848 木贼散

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】 木贼（去节，炒） 一两 木馒头（炒） 枳壳（制） 槐角（炒） 茯苓 荆芥各半两

【用法】 上为末。每服二钱，浓煎枣汤调下。

【主治】 肠风下血。

01849 木通丸

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】 木通一两（锉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 干姜一两（炮裂，锉） 赤茯苓一两 防风一两（去芦头） 桂心二两 细辛一两 麻黄一两半（去根节） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服二十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】 风失声，声喑不出。

01850 木通丸

【方源】 方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷五十六。

【组成】 木通（锉） 细辛 附子（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如枣核大。每夜临卧纳一丸于鼻中。

【主治】 ①《圣惠》：鼻塞，气息不通。②《普济方》：鼻有息肉及鼻鼻齆。

01851 木通丸

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】 木通一两（锉） 玄参一两 连翘一两 川升麻一两 败酱三分 大麻仁一两 川大黄二两（锉碎，微炒） 赤芍药三分 犀角屑三分 黑豆一两（炒熟，去皮） 昆布一两（洗去咸味）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服

二十丸，食后以酸浆水送下。

【主治】 瘰疬结肿，身体寒热，心胸壅滞。

01852 木通丸

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】 木通（锉） 菖蒲 磁石（煅，醋淬七遍，研） 熏陆香（研） 杏仁（汤浸，去双仁皮尖，炒，研） 巴豆（去皮壳，炒，研） 蜡各半两 附子（炮裂，去皮脐）一分

【用法】 上药除研外，捣罗为末，次将诸药入鹅膏，同捣可丸，捻如枣核大。绵裹塞耳中，每日换一次。

【主治】 久聋不瘥。

01853 木通丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】 磁石三两（煅赤，醋淬九次） 石菖蒲 远志（去心） 破故纸（炒）各一两 木通半两 麝香一钱（别研）

【用法】 上为细末，用葱白汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至四十丸，食前煎通草汤送下。

【主治】 耳聋。

01854 木通汤

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】 木通（锉） 羚羊角（镑） 芍药 络石各一两 升麻二两 射干一两半 杏仁（汤浸，去皮尖双仁）半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加竹叶七片，煎至六分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】 热病，喉中闭塞疼痛。

01855 木通汤

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】 木通（锉）二两 大黄（锉，生用） 滑石各三两 麻子仁一合（研如膏）

【用法】 上药将前三味为粗末，与麻子仁拌匀。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，入芒消末半钱匕，更煎二沸，空心服之。

【主治】 大小便不通。

01856 木通汤

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】 木通 石韦（去毛） 瞿麦穗各二两 冬葵子一升

【用法】 上锉，如麻豆大。以水十盏，煎取二盏，去滓，纳滑石末一两，分三次温服。微利为度。

【主治】 ①《圣济总录》：小便不通。②《普济方》：热淋，小便不利，茎中急痛。

01857 木通汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】 木通（锉） 冬葵子各半两 冬瓜子 滑石各一两半 瞿麦穗 黄芩各一两 白茅根一握（锉）

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加竹叶七片，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 小肠客热，小便淋涩赤痛。

01858 木通汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】 木通（锉）二两半 鸡苏叶 石膏（碎）各二两 刺蓟根一握（洗，切，焙） 生干地黄（切，焙）三两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一大盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 血淋疼痛。

01859 木通汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】 木通（细锉） 黄芩（去黑心） 石韦（去毛）各一两 榆白皮（细切） 冬葵子（炒）各二两 甘草（炙）三分 白术一两半（锉）

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服，一日二次。

【主治】 产后小便不通。

01860 木通汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】 木通（锉碎） 桑根白皮（锉，焙） 滑石（研） 芒消 葵子（陈者）三分

【用法】 上为粗末。每服一钱匕，水一小盏，煎至五分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】 小儿诸淋。

01861 木通汤

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】 木通 石菖蒲 防风 北梗 桑螵蛸 全蝎 直僵蚕 甘草（并炒）各一分 南星（略炮）半两

【用法】 上锉散。每服三字，加紫苏三叶、生姜三片，煎熟与之。

【主治】 小儿诸风失音。

【加减】 大便不通，更加枳壳、杏仁。

【备考】《直指》有羌活，无北梗。

01862 木通汤

【方源】《普济方》卷三七八。

【异名】 木通散（《奇效良方》卷八十四）。

【组成】 木通 石菖蒲 防风（去芦头） 枳壳 全蝎（焙） 僵蚕（焙） 甘草 木香 南星

【用法】 上锉。加猪心二片，或紫苏、生姜，水煎服。

【功用】《奇效良方》：通心气，祛风邪。

【主治】 ①《普济方》：小儿痫愈不能语。②《奇效良方》：小儿急惊初发。及血滞于心，心窍不通，语言不出者。

01863 木通汤

【方源】《济阳纲目》卷七十八。

【组成】 木通二两（锉细）

【用法】 以长流水煎汁，顿服。

【主治】 ①《济阳纲目》：因感风湿，得白虎历节风，遍身抽掣疼痛，足不能履地。②《金鉴》：行痹、痛痹、着痹，皆以此方加味服。

【临证举例】 白虎历节 一男子因感风湿得白虎历节风，遍身抽掣疼痛，足不能履地者三年，百方不效。一日梦服木通汤愈，遂以四物汤加木通服，不效。后以木通二两，锉细，长流水煎汁，顿服后，遍身痒甚，体发红丹如小豆粒大，随手没去，汗出至腰而止，上体不痛矣。次日又照前煎服，身体又发红丹，方汗至足底，汗干，遍身舒畅而无痛矣。后以此法治数人皆验。

01864 木通饮

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】 木通（锉） 黄芩 滑石（碎）各一两 甘草（炙）一分 漏芦（去芦头）三分 甜葶苈（纸上炒）一分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓，食前温服。取小便利为度，未利再一二服。

【主治】 卒淋沥，秘涩不通。

01865 木通饮

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】 木通（锉） 茅根（锉） 瞿麦（去梗） 芍药各二两 滑石（碎）三两 乱发鸡子大二枚（烧灰）

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 卒淋。

01866 木通饮

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】 木通（锉）一两 桑根白皮（锉） 泽泻 防己 赤茯苓（去黑皮） 石韦（去毛）各三分 大腹（锉）四枚

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，一日三次。如水通利，即疏服。

【主治】 妇人水分，先病水肿，日久不消，致经水断绝。

01867 木通散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】 木通一两（锉） 紫苏茎叶一两 猪苓一两（去黑皮） 桑根白皮二两（锉） 槟榔二两 赤茯苓二两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，葱白二七寸，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 脚气，遍身肿满，喘促烦闷，小便不利。

【方论选录】《医略六书》：风湿热三气交乘，袭入足太阳经，膀胱之气不得施化，故小便不利而遍身肿满，喘逆烦闷，遂成脚气肿痛焉。木通降心火，力能利水涤热；紫苏理血气，性善散风除湿；槟榔导滞气，以攻逆满；桑皮泻湿热，以除喘满；猪苓专走气分，通利三焦之湿；赤苓兼走血分，渗利脾肺之湿；更以生姜散满，葱白通阳。煎汁去渣，务使气化得施，则小便通利，而太阳经邪尽解不留，喘逆烦闷自退，安有脚气肿痛之患乎。此通闭分解之剂，为脚气肿痛溺闭之专方。

01868 木通散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【异名】 木通汤（《圣济总录》卷九十八）。

【组成】 木通一两（锉） 石韦一两（去毛） 王不留行一两 滑石一两 白术一两 瞿麦一两 鸡苏一两 葵子一两 赤茯苓一两 木香一两 当归一两（锉，微炒） 赤芍药一两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 劳淋，小便涩滞，脐中满，急痛。

01869 木通散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 木通三分（锉） 车前子半两 甘草半两（炙微赤，锉） 葵根三分 瞿麦半两 滑石一两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 妇人小便不通。

01870 木通散

【方源】《普济方》卷二八六引《圣惠》。

【组成】 木通（锉） 薏苡仁各一两 生干地黄二两 甘草（炙微赤，锉） 桔梗（去芦头）各一两 丹参二两 麦门冬一两（去心） 赤芍药一两半 赤茯苓一两 败酱二两 牡丹一两 黄耆一两（锉）

【用法】 上为粗散。每服四钱，水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候温服。以小便利为度。

【主治】 肠痈，小便不利似淋，腹中苦痛，寒热汗出，时时利脓。

01871 木通散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】 木通 滑石 甘草 赤芍 生地 陈皮 人参 黄耆 川芎 山栀 归尾 葱白 冬葵子 车前子

【主治】 产后小便不通。

【方论选录】 产后小便不通，寻常时属膀胱热结，产后津液内亡所致。于大补气血药中加通利，则小便自通；若专于利水，则津液已竭而重亡其阴，虚虚之祸不可言矣。方中四物补血凉血；参、耆、陈、甘性味甘温益气，能除内热；车前、滑石、山栀利水清热；冬葵、葱白滑窍通结。气充血长，津液自生，小便自利矣。

01872 木通散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】 海金砂 舶上茴香 巴戟 大戟 甘遂 芫花 木通 滑石 通草各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，以大麦面和作饼子，如当二钱大，烂嚼，生姜汤送下。

【主治】 水肿。

01873 木通散

【方源】《妇人良方》卷七引《明理方》。

【组成】 木通（去皮节） 青皮（去白） 川楝子（去皮核）各一两（以上三味，用巴豆半两炒黄，去巴豆不用） 萝卜子（炒） 舶上茴香一两（炒） 莪术 木香 滑石各半两

【用法】 上为细末。煎葱白，酒调三钱，一服愈。甚者不过再服。

【主治】 ①《妇人良方》：胁肋苦痛，并心下、胁肋、小腹牵引痛者。②《会约》：肝肾气滞，自下而上痛连两胁。

01874 木通散

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】 木通 薏苡仁 葶苈（炒） 甘草（炙） 川升麻 北梗 桃仁（浸去皮，炒） 赤茯苓 牡丹皮各一两 生干地黄 甜瓜子 败酱 赤芍药各一两半 大黄半两 朴消一分

【用法】 上锉为散。每服三钱，井水一盏半，加生姜五片，煎服。

【主治】 肠痈热证，腹痛而强，发热恶寒，小便似淋，脓未成者。

01875 木通散

【方源】《女科指掌》卷五。

【组成】 木通五钱 土贝母三钱 白芷二钱 甘草一钱

【用法】 水煎，顿服。

【主治】 吹乳。

01876 木防己丸

【方源】《普济方》卷一九一。

【组成】 木防己八分 川大黄八分（别捣） 人参八分 葶苈子分（熬） 杏仁八分（去皮尖双仁，熬紫色，别捣）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。食后以白饮送下，初服七丸，一日二次；日加一丸至十二丸，还日减一丸至七丸，复渐加至十二丸，循环服之。

【主治】 水病。

【宜忌】 忌酒、面、羊肉；其牛肉一色，永断不得食。

【加减】 若病人热多，加黄芩八分；如病人冷多，加厚朴八分；如病人久心惊，加钩藤八分。

01877 木防己汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 防己桂枝汤（《三因》卷十三）、汉防己汤（《保命歌括》卷九）、防己汤（《杏苑》卷四）。

【组成】 木防己三两 石膏十二枚（鸡子大） 桂枝二两 人参四两

【用法】 上以水六升，煮取二升，分二次温服。

【功用】《医钞类编》：补虚散饮。

【主治】 膈间支饮，其人喘满，心下痞坚，面色黧黑，其脉沉紧，得之数十日，医吐下之不愈，属虚者。

【方论选录】 ①《法律》：木防己味辛温，能散留饮结气，又主肺气喘满；石膏辛甘微寒，主心下逆气，清肺定喘；人参甘美，治喘消膈饮，补心肺不足；桂枝辛热，通血脉，开结气，宣导诸气，在气分服之即愈。②《千金方衍义》：用木防己以散留饮结气；石膏主心肺逆气；人参助胃祛水；桂心和荣开结，且支饮得温则行。若邪客之浅，在气分

多而虚者，服之即愈；若邪客之深，在血分多而实者，则愈后必复发。

01878 木防己汤

【方源】《吴鞠通医案》。

【组成】生石膏一两 桂枝六钱 木防己四钱 杏仁四钱 生香附三钱 炙甘草二钱 苍术五钱

【用法】水煎三杯，滓再煮一杯，分四次服。

【功用】两开表里。

【主治】痹证。风湿相搏，一身尽痛，复误汗伤表，误下伤里，渴思凉饮，得饮反停，胁胀胸痛，面赤舌绛。

01879 木香饼子

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【组成】缩砂仁一十二两 檀香四两 甘松（洗）五两 丁香四两半 蓬莪术一十两 木香二两半

【用法】上为细末，别用甘草熬膏为丸，每两作二百五十丸，捏作饼子。每服三五饼子，细嚼，生姜汤送下，温酒亦得，不拘时候。

【功用】宽胸膈，散滞气，消停寒，美饮食。

【主治】脾经虚冷，胃脘寒痰，胸膈噎痞，口淡舌涩，心腹撮痛，呕逆宿水，胁下疼闷，喘满气急，倦怠少力，全不思食。

01880 木香顿散

【方源】《医方大成》卷四引《澹寮》。

【组成】木香（不见火） 缩砂仁 良姜（炒） 干姜（炮） 丁香各半两 胡椒 陈皮（去白） 青皮（去白） 红豆（取仁） 草果仁 甘草各三钱 白豆蔻仁二钱

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一枚，煎取一盏，去姜、枣，再以银器盛所煎药，于重汤内再煎八分，空心热服。

【主治】脾胃虚弱，停食不化，心腹绞痛，肠滑自利，呕吐膨胀。

01881 木猪苓丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】半夏五两（大者切作四块，中者三块，小者不须） 木猪苓八两（劈作块子，同上）

【用法】上同入无油器中，慢火炒，候半夏紫色则止，拣出木猪苓不用，只取半夏杵细末，以陈粟米饭为丸，如梧桐子大，晒药丸子微干；却将木猪苓杵碎为粗末，与前药丸子入铫子内再同炒，候丸子药干，筛去木猪苓不用。每服五十丸，空心温粟米饮送下。

【功用】补虚。

【主治】梦泄精滑不禁。

01882 木瓜牛膝丸

【方源】《三因》卷三。

【组成】木瓜（大者）三四个（切开盖，去瓤，先用糯米浆过，盐焙干，为末，却将盐末入瓜内令满，仍用盖针定，蒸三次，烂研作膏） 川乌（大者，去皮尖，用无灰酒一升浸，薄切，酒煮干，研为膏）三两 牛膝（酒浸） 萆薢 茴香（炒） 羌活 青皮 青盐（别研入） 狗脊（燎去毛） 巴戟 海桐皮各一两

【用法】上为末，入青盐和匀，将前二膏搜为丸，如硬，再入酒，杵数千下为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前盐汤或盐酒任下。

【功用】大固肾气，活血，壮筋络。

【主治】寒湿脚气，冷湿下注，脚弱无力，或肿急疼痛，兼治妇人血风。

01883 木瓜茱萸汤

【方源】方出《圣惠》卷四十五，名见《得效》卷九。

【异名】吴茱萸汤（《圣济总录》卷八十二）。

【组成】吴茱萸三分（汤浸七遍，焙干，微炒） 木瓜（干者）三两 槟榔二两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】①《圣惠》：脚气冲心，闷乱不识人，手足脉欲绝。②《得效》：脚气入腹，困闷欲死，腹胀喘急。

01884 木香二皮丸

【方源】方出《直指》卷十七，名见《医统》卷三十二。

【组成】木香 槟榔 陈皮 青皮 大戟 甘遂 肉豆蔻各二钱半 牵牛末一两半

【用法】上为末，水为丸，或商陆汁为丸，如绿豆大。每服五十丸，空心白汤送下。

【主治】水肿，气蛊。

01885 木香三棱丸

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】青木香 破故纸 茴香 黑牵牛 甘遂 芫花 大戟 京三棱 蓬莪术 川楝子 葫芦巴 巴戟各一两 巴豆（去皮，不出油）二分 陈米三合（将巴豆一处同炒黑） 缩砂仁一两半

【用法】上药除缩砂、木香外，余药用好醋二升浸一宿，入锅，煮尽为度。干为细末，醋面糊为丸，如绿豆大。食后每服五七丸。

【主治】一切气闷，胸膈痞满，荣卫不和，口吐

酸水，呕逆恶心，饮食不化，胁胁疼痛，无问久新。

01886 木香见睍丸

【方源】《内外伤辨》卷下。

【异名】巴豆三棱丸(《兰室秘藏》卷上)。

【组成】神曲（炒黄色） 京三棱（煨）各一两 石三棱（去皮，煨） 草豆蔻（面裹，煨熟取仁） 香附子（炒香）各五钱 升麻 柴胡各三钱 木香二钱 巴豆霜五分

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆一倍大。每服三十丸，温白汤送下。量所伤多少服之。

【主治】伤生冷硬物，心腹满闷疼痛。

01887 木香化滞汤

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】枳实二分 柴胡四分 木香三分 陈皮五分 甘草一分 半夏一钱 草蔻五分 当归二分 红花一分 香附五分

【主治】气郁。

【加减】胸满，加枳壳、桔梗、砂仁、香附；腹胀，加厚朴、枳实；小腹病，加青皮、木香、槟榔；怒者，加炒栀、柴胡；有热，加栀子；气痛，加木香、乌药。

01888 木香化滞散

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】木香 白术 陈皮 桔梗 腹皮 茯苓 人参 砂仁 青皮 藿香 姜黄 檀香 白果

【功用】破滞气。

【主治】脾胃不和，胸膈噎塞，腹胁疼痛，气促喘急，心下胀闷。

01889 木香分气丸

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】陈皮（去白） 槟榔各一两 破故纸二两（炒） 木香一两半 黑牵牛十二两（炒香熟，取末五两半，余不用）

【用法】上为末，滴水为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，食后、临卧生姜汤送下。

【主治】积滞，癖块不消，心腹痞结，疼痛抢刺，如复杯状。

01890 木香分气丸

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）。

【组成】木香 甘松（洗去泥）各一两 甘草（炙）六两 香附子十六两 蓬莪术（煨）八两

【用法】上为细末，水糊为丸。每服二十粒，煎生姜橘皮汤送下，不拘时候。脾胃虚弱人，最宜常服。

【功用】宽中顺气，进食。

【主治】一切气逆，心胸满闷，腹胁虚胀，饮食不消，干呕吐逆，胸膈痞满，上气咳嗽，冷痰，气不升降。

01891 木香分气丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】白附子（炮） 白豆蔻 片子姜黄（炮，洗） 缩砂仁各一两 木香半两（面裹，煨） 丁香一两半（不见火） 甘草四两（炙）

【用法】上为细末，水浸蒸饼为丸，如鸡头子大。每服十丸，白汤嚼下。

【主治】脾胃虚寒。

01892 木香分气丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】木香 槟榔 青皮（汤浸，去白） 陈皮（汤浸，去白瓤） 姜黄 玄胡 荆三棱（湿纸裹，炮香为度，捶碎） 蓬莪术（炮制） 干生姜 当归（切，炒） 白术 赤茯苓（去皮） 肉豆蔻各等分

【用法】上为细末，白面糊为丸，如小豆大。每服三四十丸，食后生姜汤送下，一日三次。

【主治】脾胃不和，心腹胀满，两胁膨胀，胸膈注闷，痰嗽喘息，醋心干呕，咽喉不利，饮食不化。

【宜忌】忌马齿，生茄子。

【加减】秋冬，加丁香。

【备考】《杂类名方》有枳壳。

01893 木香分气丸

【方源】《局方》卷三（新添诸局经验秘方）。

【组成】木香 丁香皮 香附子（炒，去毛） 蓬莪术（煨） 缩砂仁 甘草各四两 藿香叶 川姜黄 檀香 甘松（洗）各一两

【用法】上晒干，不见火，捣罗为细末，稀糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，生姜、橘皮汤吞下，不拘时候。脾胃虚弱人最宜服之。

【功用】宽中顺气，进饮食。

【主治】一切气逆，心胸满闷，腹胁虚胀，饮食不消，干呕吐逆，胸膈痞满，上气咳嗽，冷痰，气不升降。

01894 木香甘连汤

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】黄连一两 甘草二钱 木香二钱

【用法】水二钟，煎至一钟，食前服。先一日预服五苓散三贴，次早服此，即止。

【主治】 血痢。

01895 木香生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】 川芎二钱 当归六钱 陈皮三分 黑姜四分

【用法】 服时磨木香二分在内。

【主治】 产后怒气逆，胸膈不利，血块又痛；及产后血块已除，因受气者。

01896 木香白术散

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 木香一钱 白术半两 半夏曲一两 槟榔二钱 茯苓半两 甘草四钱

【用法】 上为细末。每服一二钱，浓煎芍药、生姜汤调下。

【主治】 呕吐，腹中痛。

01897 木香白术散

【方源】《洁古家珍》。

【异名】 丁香半夏汤。

【组成】 木香 丁香各一钱 半夏曲一两 白术五钱 槟榔二钱 茯苓五钱 炙甘草四钱

【用法】 上为末。每服一二钱，浓煎芍药、生姜汤调下。

【主治】 呕而吐食，腹中痛。

01898 木香半夏丸

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】 木香 半夏 丁香各五钱 白僵蚕 白术 青皮 陈皮各二钱半

【用法】 上为末，蒸饼为丸，如麻子大。一岁十丸，二岁倍之，米汤灌下。

【主治】 小儿滞颐，冷涎自流渍于颐间，乃胃虚不能收约。

01899 木香导滞丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】 枳实（炒） 厚朴（姜汁炒） 槟榔各五钱 黄连 黄芩 黄柏 大黄各七钱半 木香二钱五分 黑牵牛（半生半炒，取头末）二钱半

【用法】 上为末，酒糊为丸，如小豆大，白汤送下。

【主治】 痢不问赤白，有湿热食积，可下者。

01900 木香导滞汤

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】 木香二钱 白芍 当归 枳壳各一钱二分 槟榔一钱五分 大黄二钱 黄连一钱

【用法】 水煎，食前温服。

【主治】 赤白痢。

01901 木香豆蔻丸

【方源】《医方考》卷二引《稽神录》。

【组成】 青木香 肉豆蔻

【用法】 枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸。

【主治】 泄泻。

【方论选录】 青木香能伐肝，肉豆蔻能温中，枣肉能健脾。久泄脾虚，中气必寒，肝木必乘其虚而克制之，此方之用，宜其效也。

【临证举例】《稽神录》云：江南司农少卿崔万安，常苦脾泄困甚，家人为之祷于后土祠。万安梦一妇人，簪珥珠履，授以此方，如其言服之而愈。

【备考】《济阳纲目》本方用青木香一两，肉豆蔻二两。

01902 木香豆蔻散

【方源】《直指》卷七。

【组成】 人参 木香 肉豆蔻（面裹煨）各半两 白豆蔻仁一分 甘草（炒）一钱半

【用法】 上为粗末。每服三钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 翻胃呕吐。

01903 木香补肾丸

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 怀庆生地四两（酒煮捣膏） 菟丝子 肉苁蓉 黄精 黑枣肉 牛膝 蛇床子（微炒） 茯苓 远志各一两二钱 当归身二两四钱 丁香三钱 大茴香 木香各六钱 枸杞子一两五钱 巴戟 杜仲各一两 青盐五钱 人参五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，空心温酒送下。偏坠者，灸后宜服此，俱可内消。

【主治】 偏坠，一名木肾，不疼不痒，渐渐而大，最为顽疾，有妨行动，多致不便；诸疝，不常举发者；及精寒血冷，久无嗣息。

【备考】 此药功效不独治疝，中年后服之益寿延年，黑发壮筋，填髓明目，聪耳补肾，助元阳，调饮食。其功不可尽述。妇人服之，颜如童女，肌肤莹洁如玉。

01904 木香金铃丸

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】 木香 乳香 没药 大附子（面裹，火煨） 小茴香（盐炒） 川楝肉 玄胡索 全蝎 人参各等分

【用法】 上为末，陈酒打糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心陈酒送下。

【主治】 外肾肿痛，诸般疝气。

01905 木香枳术丸

【方源】《内外伤辨》卷下。

【异名】木香枳实丸(《普济方》卷二十四)。

【组成】木香 枳实(麸炒，去瓤)各一两 白术二两

【用法】上为细末，荷叶烧饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食远温水送下。

【功用】①《内外伤辨》：破滞气，消饮食，开胃进食。②《妇人良方》：消化痰涎。

01906 木香枳术丸

【方源】《东垣试效方》卷一。

【组成】木香一两半 枳实一两 白术二两 干姜二钱 陈皮一两 炒曲一钱 人参三钱

【用法】上为末，荷叶烧饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温水送下。

【功用】破寒滞气，消寒饮食，开胃进食。

01907 木香枳壳丸

【方源】《瑞竹堂方》卷一。

【组成】木香 枳壳(炒，去瓤) 槟榔 半夏(汤浸七次) 青皮(去瓤) 陈皮(去白) 白茯苓(去皮)各一两 白术(煨)一两半 京三棱(煨) 广茂(煨)各三两三钱 黑牵牛(微炒，取末)三两 人参 神曲(微炒) 大麦蘖(微炒) 枳实(炒)各半两 干姜(炒)七钱

【用法】上为细末，水糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后姜汤送下。

【功用】升降滞气，消化宿食，去痰，进饮食。

【主治】中焦气涩，胸膈痞闷，饮食迟化，四肢困倦，呕吐恶心。

01908 木香枳壳丸

【方源】《类证治裁》卷三。

【组成】大黄 黑丑各二两 茯苓 白术 厚朴 半夏曲 人参 木香 青皮 陈皮 槟榔 神曲 三棱 莪术 麦芽各一两

【用法】生姜汁打糊为丸服。

【主治】积聚。

01909 木香茵陈汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】木香 茵陈 槟榔 枳壳 莪术 黄连 黄柏 大黄 牵牛 香附 当归 田螺壳

【主治】酒积。

【备考】方中茵陈原脱，据《中国医学大辞典》补。

01910 木香厚朴汤

【方源】《宣明论》卷十三。

【组成】木香 桂心 桃仁 陈皮 厚朴各一两 肉豆蔻 赤石脂各半两 皂角子一两(去皮，醋炙黄) 大附三分(炮)

【用法】上为末。每服二钱，食前温粥饮调下。

【主治】痔漏，脱肛，肠胃间冷，腹胁虚胀，不思饮食。

01911 木香顺气丸

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】沉香五钱 木香三钱 当归一两(酒浸) 白茯苓一两 山药一两 郁李仁二两 槟榔二两 菟丝子一两(酒制) 牛膝二两(酒浸) 枳壳二两(面炒) 独活一两 防风一两 火麻仁二两 大黄(酒蒸)五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，白滚汤送下。

【主治】翻胃，大便闭结者。

01912 木香顺气汤

【方源】《医学发明》卷四。

【组成】木香三分 厚朴(姜制)四分 青皮(去白) 陈皮 益智仁 白茯苓(去皮) 泽泻 干生姜 半夏(汤洗) 吴茱萸(汤洗)各二分 当归五分 升麻 柴胡各一分 草豆蔻(面裹烧，去皮)二分 苍术(泔浸)三分

【用法】上㕮咀，都作一服，水二大盏，煎至一盏，去滓，食前大温服。

【主治】①《医学发明》：浊气在上，则生膜胀。②《医方集解》：阴阳壅滞，气不宣通，胸膈痞闷，腹胁胀满，大便不利。

【宜忌】忌生冷、硬物及怒。

【方论选录】①《医学发明》：经云：留者行之，结者散之。以升麻、柴胡苦平，行少阳、阳明二经，发散清气，运行阳分为君；以生姜、半夏、草豆蔻仁、益智仁辛甘大热，消散中寒为臣；厚朴、木香、苍术、青皮苦辛大温，通顺滞，当归、人参、陈皮辛甘温，调和营卫，滋养中气。浊气不降，以苦泄之，吴茱萸苦热，泄之者也；气之薄者，阳中之阴，茯苓甘平，泽泻咸平，气薄，引导浊阴之气，自天而下，故以为佐。气味相合，散之泄之，上之下之，使清泄之气各安其位也。②《医方集解》：此足太阴阳明药也。木香、厚朴、青皮、陈皮，辛能行气，兼能平肝；草蔻、益智，香能舒脾；苍术、半夏，燥能胜湿；干姜、吴茱，温能散寒；升、柴之轻，以升其阳；苓、泻之淡，以泄其阴。盖脾为中枢，使中枢运转，则清升浊降，上下宣通，而阴阳得位矣。然皆气药，恐其过燥，故重

用当归以濡其血，共成益脾消胀之功也。

【临证举例】 心腹胀满 范夫骕夫人，先因劳役，饮食失节，加之忧思气结，病心腹胀满，日食则不能尊食，两胁刺痛；诊其脉弦而细，至夜浊阴之气当降而不降，膨胀尤甚。大抵阳主运化，饮食劳倦损伤脾胃，阳气不能运化精微，聚而不散，故为胀满，先灸中脘，乃胃之募穴，引胃中生发之气上行阳道，又以前药助之，使浊阴之气自此而降矣。

【备考】 按：《医学正传》引本方有人参；《东医宝鉴·杂病篇》引本方有人参、甘草。

01913 木香顺气散

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】 乌药 木香 香附子 姜黄 砂仁 甘草

【用法】 上㕮咀。每服半两，水二钟，加生姜五片，大枣二枚，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 理卫气，顺三焦。

【主治】 妇人之病，因气而生者。

01914 木香消胀丸

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】 木香二钱半 槟榔半两 陈皮一两 大腹子一两 萝卜子二两 枳壳 桑白皮 紫苏子 香附子各一两

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，生姜汤送下。

【主治】 胀满。

01915 木香消痞丸

【方源】《玉机微义》卷三十七引《秘藏》。

【组成】 木香半两 柴胡四钱 橘皮三钱 甘草（炙） 半夏各一两 干姜半两 当归尾二钱 红花半钱

【用法】 上为细末，水浸蒸饼为丸服。

【主治】 因忧，气结中脘，腹皮里微痛，心下痞满，不思饮食。

01916 木香流气饮

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】 半夏（汤浸七次，焙）二两 香附子（去毛） 甘草（炙） 蓬术（煨） 紫苏（去梗） 大腹皮 白芷 陈皮（去白） 丁香皮 肉桂 厚朴（去皮，姜炒） 藿香叶 槟榔 木香 草果仁 天门冬（去心） 赤茯苓 干木瓜 白术 人参（去芦） 石菖蒲

【用法】 上㕮咀。每服四钱，加生姜三片，大枣一枚，水一钟半，煎至七分，温服。

【主治】 诸气痞塞不通，胸膈膨胀，面目虚浮，四肢肿满，口苦咽干，大小便秘结。

01917 木香流气饮

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 川芎 当归 紫苏 桔梗 青皮 陈皮 乌药 黄耆 枳实 茯苓 防风 半夏 白芍各一钱 甘草节 大腹皮 木香 槟榔 泽泻 枳壳各五分 牛膝下部加一钱

【用法】 水三钟，加生姜三片，大枣一枚，煎八分，食远服。

【主治】 流注瘰疬，及郁结为肿，或血气凝滞，遍身走注作痛，或心胸痞闷，咽嗌不利，胁腹膨胀，呕吐不食，上气喘急，咳嗽痰盛，或四肢面目浮肿者。

01918 木香益黄散

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】 陈皮一两 青皮 诃子肉（微炒）各半两 丁香二钱 木香 甘草（炙）各二钱半

【用法】 上为细末。每服一钱，加陈米少许，水煎服。

【主治】 胃虚腹痛，泄利。

01919 木香宽中散

【方源】《明医杂著》卷六。

【组成】 青皮 陈皮 丁香各四两 厚朴（制）一斤 甘草（炙）五两 白豆蔻二两 香附（炒） 砂仁 木香各三两

【用法】 上为末。每服二钱，姜、盐汤点服。

【主治】 七情伤子脾胃，以致胸膈痞满，停痰气逆；或成五膈之病。

【宜忌】 属脾胃亏损之症不可多服，当与六君子汤兼服之。

01920 木香调气散

【方源】《回春》卷二。

【组成】 木香（另研）五分 乌药 香附 枳壳（麸炒） 青皮（去瓤）各一钱 砂仁五分 厚朴（姜炒） 陈皮各一钱 官桂二分 抚芎 苍术（米泔浸）各一钱 甘草三分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，水煎，磨木香同服。

【主治】 ①《回春》：气郁，腹胁胀满，刺痛不舒。脉沉。②《杂病源流犀烛》：息积病。

01921 木香调气散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 白蔻仁（去壳，研） 檀香 木香各一两 丁香三钱 香附五两 藿香四两 甘草（炙） 砂仁 陈皮各二两

【用法】 上为细末。每服二钱，入盐少许。点服。

【功用】 平肝气，和胃气。

【主治】 类中风。由七情气结，或怒动肝气，以致气逆痰壅，牙关紧急，极与中风相似，但身凉，脉沉者。

01922 木香理中汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】 陈皮 半夏 甘草 木香 白术 砂仁 枳实 青皮

【用法】 加生姜，水煎服。

【功用】《通俗伤寒论》：调和中气。

【主治】 ①《伤寒全生集》：气痞，伤寒不因下早而心下痞满，按之软。②《通俗伤寒论》：夹痞伤寒，经治痞满虽解而胃脘胀痛者。

【加减】 气痞，大便秘实，加槟榔、大黄；有烦热、加姜炒黄连。

01923 木香理中汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 白术三钱（炒） 炮姜钱半 木香八分 楂肉三钱（炒） 泽兰三钱 肉桂钱半（去皮） 茯苓三钱 荆芥钱半（炒炭） 赤芍钱半（醋炒） 砂糖五钱（炒炭）

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 产后泄泻不止，脉紧细者。

【方论选录】 产后脾土有亏，寒邪凝滞，故身热腹痛而泄泻不止，势甚危急焉。白术健脾土之虚，炮姜逐中寒之寒，木香调气醒脾胃，茯苓渗湿和脾胃，赤芍破血泻瘀以除腹痛，荆芥散邪和血以解身热，楂肉化滞血，泽兰通经脉，肉桂温经暖血，最通血闭，砂糖去瘀和血，专主调经也；水煎温服，使寒滞化而脾土强，则经脉通而腹痛止，身热泄泻无不自已，何危急之有哉。

01924 木香理气丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】 青橘皮一两 桔梗 桂 槟榔各半两 木香 杏仁各一分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下。未知，渐加至三十丸。

【主治】 积聚。风寒之气伏留而不散，胁下满，气逆不妨于食，连年不除。

01925 木香蛤蚧丸

【方源】《直指》卷九。

【组成】 蛤蚧一对（尾全者，洗净，酥炙） 生鳖甲（去裙，醋炙焦） 白茯苓 川芎 当归 北五味子 牛膝各七钱半 绵黄耆 柴胡 知母 贝母（去心） 鸡心槟榔 明阿胶（炒酥） 巴戟（酒浸，去心） 桃仁（酒浸，去皮，焙）各半两 肉豆蔻三个（生） 木香 秦艽（洗） 羌活 破故纸（炒） 生发（纸燃火烧存性）各三钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，煎枣汤空心嚼下。

【主治】 劳瘵久嗽声干，骨蒸瘦瘁。

01926 木香塌气丸

【方源】《医学发明》卷六。

【组成】 陈皮（去白） 萝卜子（炒）各半两 胡椒 木香 草豆蔻（面裹，烧，去皮） 青皮（去白）各三钱 蝎尾（去毒）二钱半

【用法】 上为细末，水糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温米饮汤送下。小儿为丸，如麻子大，每服十丸，桑白皮汤送下，一日三次。

【主治】 中满腹胀，下焦虚损者。

【宜忌】 忌油腻，服白粥百日，重者一年。

【备考】 如阴囊洪肿水冷，次用沧盐、干姜、白面各三钱，水和膏，摊纸上涂用。

01927 木香塌气丸

【方源】《元戎》卷十。

【组成】 丁香 胡椒各二钱 郁李仁四钱 蝎尾 木香 槟榔各半两 枳实 白牵牛各一两

【用法】 上为细末，饭为丸，如绿豆大。每服十丸至十五丸，陈皮、生姜汤任下。

【主治】 单腹胀。

01928 木香楝子散

【方源】《准绳·类方》卷六引《易简方》。

【异名】 木香神效散（《医钞类编》卷十四）。

【组成】 川楝子三十个（巴豆二十枚同炒黄赤色，去巴豆不用） 萆薢半两 石菖蒲一两（炒） 青木香一两（炒） 荔枝核二十枚（炒）

【用法】 上为细末。每服二钱，加麝香少许，空心炒茴香、盐、酒调下。

【主治】 小肠疝气，膀胱偏坠，久不愈者。

01929 木香槟榔丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 木香 槟榔 青皮 陈皮 广术（烧） 黄连 商枳壳（麸炒，去瓤）各一两 黄柏 大黄各三两 香附子（炒） 牵牛各四两

【用法】 上为细末，水为丸，如小豆大。每服三十丸，食后生姜汤送下。

【功用】《医学正传》引子和：流湿润燥，推陈致新，滋阴抑阳，散郁破结，活血通经。

【主治】 湿热积滞内蕴，心胸满闷，胁肋膨胀，或泄泻痢疾，里急后重。

①《儒门事亲》：一切冷食不消，宿食不散，亦类伤寒，身热恶寒，战慄头痛，腰背强；一切沉积，或有水，不能食，使头目昏眩，不能清利；一切虫兽所伤，及背疮肿毒，杖伤瘀发，或透入里者；痔漏肿痛。②《医学正传》引子和：男子妇人呕吐酸水，痰涎不利，头目昏眩，并一切酒毒食积，及米谷不化，或下利脓血，大便秘塞，风壅积热，口苦烦渴，涕唾粘稠，膨胀气满。③《御药院方》：一切气滞，心腹满闷，胁肋膨胀，大小便结滞不快利者。④《不居集》：肺痰喘嗽，胸膈不利，脾湿黄疸，宿食不消，一切杂症。

【方论选录】 木香、香附行气之药，能通三焦，解六郁；陈皮理上焦肺气；青皮平下焦肝气；枳壳宽肠而利气；而黑丑、槟榔又下气之最速者也；黄柏黄连燥湿清热；三棱能破血中气滞；莪术能破气中血滞；大黄芒消血分之药，能除血中伏热，通行积滞，并为摧坚化痞之峻品。湿热积滞去，则二便调而三焦通泰矣。

【备考】《医学正传》引本方有当归；《医方集解》引本方有三棱、芒消。

01930 木香槟榔丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 槟榔一两半 木香一两半 枳壳一两半 青皮一两半 陈皮一两半 白蔻一两（去壳，炒） 沉香一两 苏梗三两

【用法】 上为末，粥为丸。每服三钱，米饮送下。

【主治】 产妇气闭，脉沉滞者。

【方论选录】 产妇气闭。素多忧怒，气滞于中，而肠胃不能传送糟粕，故大便不通。槟榔导滞气以疏利三焦，木香醒脾胃以调和中气，白蔻宽胸快膈，枳壳泻滞通肠，青皮破气以平肝，陈皮利气以和胃，苏梗顺气宽胸，沉香顺气降逆也；粥丸米饮下，使肝胃调和，则脾能健运，而诸气皆顺。

01931 木香槟榔汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】 木香六分 槟榔一钱 香附子 枳壳 缩砂仁 橘皮各八分 青皮五分

【用法】 上㕮咀。水煎熟，空心温服。

【主治】 气实腹痛。

01932 木贼菜皮汤

【方源】《浙江中医杂志》(1983；6:257)。

【组成】 木贼 15 克 麻黄 紫荆皮 白鲜皮 地肤子各 12 克 苍术 20 克

【用法】 内服时，煎沸后再煎 10 分钟，切勿久煎；外洗时，煎沸后再煎 15～20 分钟左右，过滤，待不灼手时，乘热熏洗 15 分钟以上，手足癣要浸没患处，时间越长越好。每日洗二三次。

【主治】 松皮癣，鹅掌风，灰指（趾）甲。

【加减】 有疮面者，加银花 15 克，连翘、生山栀各 12 克；浸淫流水、渗出较多者，加苦参 12 克；搔痒重者，于外洗方中加石南叶 10 克；皮损焮红、肿痛者，麻黄减至 10 克以下，加白芥子、石楠叶、赤芍各 10 克。

【临证举例】 牛皮癣 王某某，男，24 岁。汗出时入水游泳，夜间即感皮肤瘙痒，全身及两手背渐起红色丘疹，继则皮损大如钮扣，小如黄豆，尔后云集成片，搔之脱屑，迭起迭出，皮损处有手抓痕，伴少量出血。手背部皮肤增厚、角化，呈灰褐色，状如蟾皮，皮损较它处为甚。确诊为牛皮癣（中医诊为松皮癣）。予上方加白芥子、赤芍各 10 克内服；加木贼、紫荆皮均至 20 克外洗。连治两周获痊，肤色一如常人。迄今四年来未曾复发，即食刺激性食物、饮酒或游泳后亦无异样感觉。

01933 木通子芩汤

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 白茅根三两 赤芍药一两 滑石 木通各二两 子芩 乱发灰各一两半 葵子半两

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏，同煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 尿血，水道中痛不可忍。

01934 木通犀角散

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】 木通（锉） 犀角（镑） 桑根白皮（锉） 黄芩（去黑心） 大黄（锉，炒） 玄参 茯神（去木） 旋覆花各一两 甘菊花半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】 上为散。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，不去滓，食后温服。

【主治】 白睛肿起如水泡。

01935 木茯车前子汤

【方源】《医统》卷三十五。

【组成】 白术 茯苓 车前子 泽泻 芍药 陈皮 炙甘草各等分

【用法】 上㕮咀。每服七钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一枚，灯心，煎七分服。

【主治】 一切泻泄。

【加减】 伤食泄黄或食积，加神曲、麦芽、山楂

子各八分、黄连七分以消之；腹中窄狭饱闷，再加厚朴、枳实、木香各五分；小便赤涩短少，加猪苓、木通、山栀各五钱，湿泻者，加茵陈、苍术各一钱；若夏秋之间，湿热大行，暴注水泻，加炒黄连、苍术、升麻、木通各五分；发热躁渴，加干葛、石膏各一钱；口渴引饮，加葛根、人参、麦门冬各一钱，升麻、乌梅肉各二分；暑月泻泄，加香薷、厚朴；寒月溏泻，清冷腹痛，或伤冷食，加神曲、麦芽、干姜（煨）各一钱，砂仁、木香、益智各五分；胜湿，须加防风、羌活、白芷、苍术、半夏；胃气下陷，加人参、黄耆、升麻、柴胡以升清气；久泻肠胃虚滑不禁，加肉蔻（煨）、石脂（煅）、诃子（煨）、木香（炒）、干姜各五分；清晨溏泄，加破故纸（炒）、茴香（炒）、肉蔻（煨）。

01936　木香郁李仁丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】木香一两　郁李仁（去皮，生用）三两　沉香（锉）　槟榔（锉）　桂（去粗皮）　青橘皮（去白，焙）　附子（炮裂，去皮脐）　茴香子（炒）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，茴香子或薄荷酒送下，一日三次。脐下有块，服一月除。

【主治】奔豚。气从少腹奔冲上心，昏乱呕吐，痛甚。

01937　木香荜澄茄丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【异名】荜澄茄丸（原书卷二十）。

【组成】荜澄茄　川楝子　木香　舶上茴香　桃仁各一两　蝎一分

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如豌豆大。每服二三十丸，空心温酒或盐汤送下。

【主治】疝气及下部湿冷，脐腹疼痛。

01938　木防己加茯苓芒消汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】木防己汤去石膏加茯苓芒消汤（原书卷中）、防己加茯苓芒消汤（《医醇剩义》卷三）。

【组成】木防己　桂枝各二两　人参四两　芒消三合　茯苓各四两

【用法】以水六升，煮取二升，去滓，纳芒消，再微煎，分二次温服。微利则愈。

【主治】①《金匮》：膈间支饮，其人喘满，心下痞坚，面色黧黑，其脉沉紧，得之数十日，医吐下之不愈，用木防己汤后三日复发。②《家塾方与方极》：心下痞坚而悸。

【方论选录】《法律》：木防己味辛温，能散留饮结气，又主肺气喘满；石膏辛甘微寒，主心下逆气，清肺定喘；人参甘美，治喘消膈饮，补心肺不足；桂枝辛热，通血脉，开结气，宣导诸气。在气分，服之即愈。若饮在血分，深连下焦，必愈而复发，故去石膏气分之药，加芒消入阴分，开痞结，消血。石膏与茯苓，去心下坚，且伐肾邪也。

01939　木香人参生姜枳术丸

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】木香人参干姜枳术丸（《保命歌括》卷五）。

【组成】干生姜二钱五分　木香三钱　人参二钱五分　陈皮四钱　枳实一两（炒黄）　白术一两五钱

【用法】上为细末，荷叶烧饭为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食前温水送下。

【功用】开胃进食。

【宜忌】忌饱食。

01940　瓦垄丸

【方源】《济阴纲目》卷一。

【异名】瓦垄子丸（《女科指掌》卷一）。

【组成】香附（醋煮）四两　当归　牡丹皮　桃仁（去皮尖）　大黄（蒸）各一两　川芎　红花各半两　瓦垄子（煅，醋煮一昼夜）二两

【用法】上为末，炊饼为丸。每服三四丸，空心温酒送下。

【主治】瘀血作痛。

【方论选录】丹溪治血块多用瓦垄子，古方治血块多用姜桂热药，而此用大黄寒药。宜寒宜热，智者别之。

01941　瓦粉瓜蒌丸

【方源】《医统》卷四十三。

【组成】瓦垄子（一名蚶子，将壳火煅，醋淬二次，研为极细末）　黄瓜蒌（霜后黄熟时取瓤并子和瓦粉烂捣成膏，为饼）　广陈皮（去白）各等分

【用法】上各精制晒干为末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服八十丸，食后临卧姜汤送下。

【主治】一切顽痰结滞，咯吐难出，久嗽不已，气塞妨闷，痰火劳嗽。

01942　王瓜散

【方源】《卫生宝鉴》卷十五。

【组成】王瓜根　桂心各一两　白石脂　菟丝子（酒浸）　牡蛎（盐泥裹，烧赤，候冷去泥）各二两

【用法】上为末。每服二钱，食前大麦煎粥汤调下，一日三次。

【主治】 肾虚，小便自利如泔色。

01943 王母桃

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 白术（用冬术腿片，味甘者佳，苦者勿用，以米泔浸一宿，切片，炒） 大怀熟（蒸，捣） 各等分 何首乌（九蒸） 巴戟（甘草汤炙） 枸杞子 上三味减半 或加人参

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。每用三四丸，饥时嚼服，滚汤送下。

【功用】 培补脾肾。

01944 王不留行散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】 王不留行一两 赤芍药三分 木通三分（锉） 当归三分 滑石一两 子芩半两 生干地黄一两 榆白皮三分（锉）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温粥饮调下。

【主治】 虚劳小肠热，小便淋沥，茎中痛。

01945 王不留行散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 王不留行一两 甘遂半两（煨微黄） 葵子一两半 车前子一两 木通一两（锉） 滑石一两半 赤芍药半两 桂心半两 蒲黄半两 当归半两（锉，微炒）

【用法】 上为散。每服一钱，食前以粥饮调下。

【主治】 血淋疼痛不止。

01946 王道无忧散

【方源】《同春》卷三。

【组成】 当归 白芍（炒） 川芎 生地黄各八分 赤芍五分 白术（土炒） 白茯苓（去皮）各一钱二分 赤茯苓 砂仁 枳实（麸炒） 香附 乌药 陈皮 半夏（姜汁炒） 藿香 槟榔 猪苓 木通 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 黄柏（人乳炒） 知母（人乳炒） 黄芩（炒）各八分 粉甘草三分

【用法】 上锉一剂。水煎，温服。

【主治】 翻胃膈噎。年老之人，阴血枯槁，痰火气结，升而不降，饮食不下者。

01947 五子丸

【方源】《永类钤方》卷十三引《澹寮》。

【组成】 菟丝子（酒蒸） 家韭子（炒） 益智子仁 茴香（炒） 蛇床子（去皮，炒）各等分 （一方加川椒）

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，米饮或盐汤送下。

【功用】《阿鹤亭集方》：温固下元，通阳补肾。

【主治】 ①《永类钤方》引《澹寮》：小便频数，时有白浊。②《得效》：小便夜多，头昏，脚弱，老人虚人多有此证，大能耗人精液，令人卒死。

01948 五子丸

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】 火麻仁 紫苏子 松子肉 杏仁（炒，去皮尖） 芝麻（炒）

【用法】 共研如泥，瓷器收贮。每服一丸，如弹子大，蜜水化下。

【主治】 老人大肠燥结便秘。

01949 五子丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】 苏子 葶苈子 车前子 大腹子 卜子 各等分

【用法】 上为末，茯苓汤作丸。每服一钱五分，淡姜汤送下。

【主治】 痰饮水气，面浮，气短似喘。

01950 五子散

【方源】《回春》卷三。

【组成】 白萝卜子 紫苏子 白芥子各五钱 山楂子（去核） 香附子（去毛）各一钱

【用法】 上各为细末，合一处，作芥末用。

【主治】 气膈，鼓胀，噎食。

01951 五仁丸

【方源】《医级》卷七。

【组成】 郁李仁 瓜子仁 柏子仁 松子仁 麻仁

【用法】 同捣烂，滑石为丸。

【主治】 肠胃热结，燥闭不便。

01952 五斤丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】 大木瓜（去皮瓤） 牛膝（去芦头，用无灰酒浸一宿，极干，切，焙） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 天麻（透明者，切，焙）各一斤 虎骨（涂酥，炙令黄） 没药（别研） 川乌头（炮，去皮脐） 山药各四两

【用法】 上将木瓜烂蒸，研作糊，和众药末，如和不就，更用原浸牛膝酒打面糊搜匀为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，空心、食前温酒、盐汤任下。

【功用】 常服活血驻颜，身轻体健。

【主治】 精血不足，腰脚缓弱，行步艰难，腿膝无力，及寒湿脚气等疾。

01953 五石膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】青黛9克 黄柏末9克 枯矾9克 蛤粉60克 炉甘石60克 煅石膏90克 滑石12克 凡士林370克 麻油250毫升

【用法】上为细末，加入凡士林及香油内，调和成膏。薄涂皮损上。

【功用】收湿止痒。

【主治】湿疹渗水不多时。

01954 五龙散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】生南星一两 生半夏五钱 全当归五钱 生大黄五钱 陈小粉一斤四两（炒黑）

【用法】上为细末，调涂。火盛以芙蓉汁调；寒重用姜汁调。

【主治】痈疽、疔毒、瘰疬初起。

01955 五龙膏

【方源】《普济方》卷二七九引《十便良方》。

【组成】硫黄 白矾 白芷 川椒 吴茱萸各等分

【用法】上为细末。煎油调涂之。

【主治】疥癣。

01956 五仙散

【方源】方出《赤水玄珠》卷二十九，名见《仙拈集》卷四。

【组成】红粉霜五分 明矾一钱 密陀僧三钱 川槿皮一钱 杏仁（去皮油）一钱

【用法】上为末。津唾调搽，一日三次。

【主治】牛皮癣及久年顽癣。

01957 五仙膏

【方源】《回春》卷三。

【组成】大黄 肥皂角 生姜半斤 生葱半斤 大蒜半斤

【用法】上共捣烂，用水煎，取出汁去滓，再煎汁熬成膏，黑色为度，摊绢帛上。先用针刺患处，后贴膏药。

【主治】一切痞块、积气、癖疾，肚大青筋，气喘上壅，或发热咳嗽，吐血衄血。

01958 五生丸

【方源】《玉机微义》卷四十一引李仲南方。

【组成】南星 半夏 川乌 白附子各一两 大豆（去皮）一两

【用法】上为细末，滴水为丸。每服三丸至五丸，不过七丸，生姜汤送下。

【主治】风痫有痰，阴脉弦细缓者。

01959 五生膏

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】生附子（去皮脐）半两 当归 吴茱萸 桂 木香各半两

【用法】上为细末。每用药末二钱，取生姜自然汁调如膏。摊于蜡纸上，贴痛处，干即更易新者，上用绵子或软帛系定。

【主治】寒湿客于经络，留结不散，疼痛不止。

01960 五白散

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】白附子（炮） 白僵蚕（炒） 白蒺藜（炒） 白鲜皮各一两 白花蛇（酒浸，去皮骨，炙）三两

【用法】上为细散。每服一钱匕，空心、临卧温酒调下。

【主治】皮肤风痒，昼夜不止。

01961 五汁饮

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】梨汁 荸荠汁 鲜苇根汁 麦冬汁 藕汁（或用蔗浆）

【用法】临时斟酌多少，和匀凉服；不甚喜凉者，重汤炖温服。

【功用】甘寒救液。

【主治】太阴温病，口渴，吐白沫粘滞不快者。瘅疟，阴气先伤，阳气独发，但热不寒，或微寒多热，舌干口渴。

【加减】欲清表热，则加竹叶、连翘；欲泻阳明独胜之热，而保肺之化源，则加知母；欲救阴血，则加生地、元参；欲宣肺气，则加杏仁；欲行三焦开邪出路，则加滑石。

【方论选录】《成方便读》：方中五物，皆用鲜汁，取其甘凉退热，而其力较干者煎汤为尤其。且五物之中，虽皆属甘寒，而各自为用。如梨之清肺，芦之清胃，二味皆能流利大肠；温邪虽属无形，恐内有痰滞，荸荠可以消导之；热伤阴血，则血热相瘀，藕汁可以行散之；甘蔗甘平，和中养胃，一如方中用甘草之意，此亦善于立方者耳。

【临证举例】①不食 《吴鞠通医案》：庆室女，16岁。不食十余日，诸医不效，面赤，脉洪。与五汁饮降胃阴法，兼服牛乳，三日而大食矣。②低热 《吴鞠通医案》：邱，18岁。温热愈后，午后微热不除，脉弦数，面赤。与五汁饮三日，热退进食，七日全愈。

01962 五汁饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】竹沥 梨汁 莱菔汁各一瓢 鲜石菖蒲

汁一小匙　薄荷油三滴

【用法】 重汤炖温服

【功用】 辛凉润肺，生津化痰。

【主治】 外感秋燥伤肺，烁津液而化粘痰，咳嗽痰吐质粘。

01963　五汁煎

【方源】 方出《妇人良方》卷七，名见《医统》卷八十三。

【组成】 生藕汁　刺蓟汁　生地黄汁各三两　生姜汁半合　白蜜一合

【用法】 上和匀，煎三二沸，不拘时候，以小盏、调炒面尘一钱服。

【主治】 妇人热毒上攻，吐血不止。

01964　五汁膏

【方源】 《医级》卷八。

【组成】 梨汁　藕汁　萝卜汁　荸荠汁　姜汁

【用法】 上取自然汁各一钟，或入人乳、白蜜各钟许，熬膏。不时挑服二三匙。

【主治】 痰火咳嗽，燥结咯艰。

01965　五加酒

【方源】 《千金》卷十二。

【组成】 五加皮，枸杞根皮各一斗

【用法】 上㕮咀，以水一石五斗，煮取汁七斗，分取四斗，浸曲一斗，余三斗用拌饭下米如常酿法。熟，压取服之，多少任性。

【主治】 虚劳不足。

【宜忌】 禁房事。

【备考】 本方方名，《普济方》引作"五加皮酒"。

01966　五圣丸

【方源】 《仙拈集》卷二。

【组成】 五灵脂二钱　肉桂　乳香　没药各一钱　木香五分

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服一丸，热酒送下。

【主治】 心气胃痛。

01967　五圣散

【方源】 《瑞竹堂方》卷五。

【异名】 五圣汤(《医学入门》卷八)。

【组成】 大黄一两　生姜一两　瓜蒌一个　皂角针二两　甘草一两　金银花一两

【用法】 上㕮咀。用好酒二升，同煎至八分，去滓服，不拘时候。

【主治】 痈疽疔疮。

①《瑞竹堂方》：疔疮。②《医方类聚》引《经验秘方》：一切恶疮初发。③《医学入门》：一切疔肿痈疽，初觉憎寒头痛。

01968　五皮汤

【方源】 《育婴秘诀》卷四。

【组成】 桑白皮　大腹皮　茯苓皮　生姜皮　五加皮各等分

【主治】 小儿肿病。

【加减】 喘甚者，加真苏子；上半身肿多者，加苏叶、诃子、葛根；下半身肿多者，加木通、木瓜；腹胀者，加木香、藿香、枳壳；大便秘者，加枳实、大黄微利之，或枳朴大黄丸亦效。

01969　五皮散

【方源】 《中藏经·附录》。

【异名】 五皮饮(《三因》卷十四)。

【组成】 生姜皮　桑白皮　陈橘皮　大腹皮　茯苓皮各等分

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓，不拘时候温服。

【功用】 疏理脾气，消退虚肿。

【主治】 水肿，脾虚湿盛。面目四肢浮肿，心腹胀满，小便不利，脉虚而大，以及妊娠水肿等。

①《中藏经》：男子妇人脾胃停滞，头面四肢悉肿，心腹胀满，上气促急，胸膈烦闷，痰涎上壅，饮食不下，行步气奔，状如水病。②《妇人良方》引《指迷方》：胎水。③《三因》：皮水。四肢头面悉肿，按之没指，不恶风，其腹如故，不喘不渴，脉浮。④《御药院方》：他病愈后，或久痢之后，身体面目四肢浮肿，小便不利，脉虚而大。⑤《奇效良方》：小儿诸般浮肿，气急可食。⑥《便览》：水肿烦渴，小便赤涩，大便闭，此属阳水，面肿尤妙。

【宜忌】 忌生冷、油腻、硬物。

【方论选录】 《成方便读》：水病肿满，上气喘急，或腰以下肿，此亦肺之治节不行，以致水溢皮肤，而为以上诸证。故以桑皮之泻肺降气，肺气清肃，则水自下趋；而以茯苓之从上导下，大腹之宣胸行水，姜皮辛凉解散，陈皮理气行痰。皆用皮者，因病在皮，以皮行皮之意。然肺脾为子母之脏，子病未有不累及其母也。故肿满一证，脾实相关，否则脾有健运之能，土旺则自可制水，虽肺之治节不行，决无肿满之患。是以陈皮、茯苓两味，本为脾药，其功用皆能行中带补，匡正除邪。一举而两治之，则上下之邪，悉皆涣散耳。

【临证举例】 妊娠水肿　《赤脚医生杂志》(1978；5·3)：以本方加玉米须治疗妊娠水肿43

例，效果满意。基本方为桑白皮 15 克，茯苓皮 9 克，大腹皮 12 克，陈皮 9 克，生姜皮 6 克，玉米须（干）30 克或鲜品 60 克。

01970 五皮散

【方源】《局方》卷三（新添诸局经验秘方）。

【组成】 五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮 茯苓皮各等分

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 ①《局方》（新添诸局经验秘方）：男子、妇人脾气停滞，风湿客搏，脾经受湿，气不流行，致头面虚浮，四肢肿满，心腹膨胀，上气促急，腹胁如鼓，绕脐胀闷，有妨饮食，上攻下注，来去不定，举动喘乏。②《永类钤方》：皮水、胎水。

【宜忌】 忌生冷、油腻、坚硬等物。

【方论选录】《医方集解》：此足太阳、太阴药也。五加祛风胜湿，地骨退热补虚，生姜辛散助阳，大腹下气行水，茯苓渗湿健脾，于散泻之中犹寓调补之意。皆用皮者，水溢皮肤，以皮行皮也。

01971 五皮散

【方源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】 五加皮

【用法】 上为末。酒调，涂敷颈骨上，再用酒调服。

【主治】 小儿项软、行迟。

01972 五灰散

【方源】《普济方》卷二九五引《肘后方》。

【异名】 鳖甲散。

【组成】 鳖甲 猬皮 猪左悬蹄甲 蜂房 蛇蜕各等分（一方有麝香，无猬皮）

【用法】 上烧存性，为末。井花水调二钱，空心、临卧各一服，粥饮调下。五剂不愈，更服。一方亦以敷疮上。

【主治】 五痔，不问内外、牝牡、寒温、劳湿，悉主之。

【方论选录】 鳖甲治牡痔，猬皮治牝痔，猪左悬蹄甲治肠痔，蜂房治脉痔，蛇蜕治气痔，上药用量各随所治之痔而加倍。

01973 五灰散

【方源】《回春》卷三。

【组成】 莲蓬壳 黄绢 血余 百草霜 棕皮（各烧灰） 山栀（炒黑） 蒲黄（炒黑） 墨血竭

【用法】 上为细末，调入煎药服之。或炼蜜为丸，每服五十丸，清米汤送下。

【主治】 ①《回春》：血不止成崩。②《东医宝鉴·内景篇》：一切失血。

【备考】《东医宝鉴·内景篇》本方用法：每三钱，以生藕汁、生萝卜汁调服。

01974 五灰散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 蜈蚣 穿山甲 生鹿角 血管鹅毛 血余等分（各煅存性）

【用法】 上为末，和匀。每服五钱，空心黄酒调下。

【功用】 托毒排脓。

【主治】 阴虚湿热下注，脏毒肿痛，生于肛门内者。

01975 五灰膏

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 荞麦（烧灰）一升（淋水） 石灰（风化者佳）二两 青桑柴（烧灰）一升 （各淋水一碗，同风化灰共熬干为末，听用） 白砒三钱（煅，研末） 白明矾一两（煅烟尽为度，研末）

【用法】 上为末，以水十碗，熬末至一碗，方入风化石灰搅匀。用新笔扫眼弦睫上。数次，毛即落，勿入眼内。

【主治】 倒睫拳毛。

01976 五邪汤

【方源】《外台》卷十五引《范汪方》。

【组成】 人参 白术 茯苓 菖蒲 茯神各三两

【用法】 上切。以水一斗，煮取三升。先食服八合，一日三次。

【主治】 五邪气入人体中，鬼语诸妄有所语，闷乱恍惚不足，意志不定，发作往来有时。

【宜忌】 忌桃、李、雀肉、羊肉、饧、醋物。

01977 五阴煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 五饮煎（《虚损启微》卷下）。

【组成】 熟地五七钱或一两 山药（炒）二钱 扁豆（炒）二三钱 炙甘草一二钱 茯苓一钱半 芍药（炒黄）二钱 五味子二十粒 人参随宜用 白术（炒）一二钱

【用法】 水二钟，加莲肉（去心）二十粒，煎服。

【主治】 真阴亏损，脾虚失血，或见溏泄未甚者。

01978 五花丸

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 金沸草二两 砂仁（炒） 川椒皮各七

钱 甘草（炙）四钱 白菊花 黄柏（酒制） 枸杞子各一两半 巴戟八钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心或盐汤、或温酒送下。

【主治】 漏睛脓出，目停风热在胞中，结聚脓汁，和泪相杂，常流涎水，久而不治，至乌珠坠落。

01979 五花汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 水芦花 红花 槐花 茅花 白鸡冠花各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 遍身出血。

01980 五饮丸

【方源】《医统》卷四十三。

【组成】 青皮 陈皮（去白）各一两 半夏（制） 南星（制）各二两 枳实（炒） 茯苓各一两 白术（炒）二两 香附子 真苏子 山楂肉 神曲（炒）各半两 白矾一两 皂角 生姜各二两（捣）

【用法】 上以南星、半夏同皂角、白矾、生姜煮，南星无白点为度。以南星、半夏焙干，同前药为末，竹沥、姜汁作糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食后或临卧白汤送下。

【功用】 理脾顺气，消食宽胸。

【主治】 一切停痰留饮。

01981 五补丸

【方源】《千金》卷十九。

【组成】 人参 五加皮 五味子 天雄 牛膝 防风 远志 石斛 薯蓣 狗脊各四分 苁蓉 干地黄各十二分 巴戟天六分 茯苓 菟丝子各五分 覆盆子 石龙芮各八分 萆薢 石南 蛇床子 白术各二分 天门冬七分 杜仲六分 鹿茸十五分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，酒送下，一日三次。稍加至三十丸。不得增，常以此为度。

【功用】 久服却病延年。

【主治】 肾气虚损，五劳七伤，腰脚痠疼，肢节苦痛，目暗眩眩，心中喜怒恍惚不定，夜卧多梦，觉则口干，食不得味，心常不乐，多有恚怒，房室不举，心腹胀满，四体疼痹，口吐酸水，小腹冷气，尿有余沥，大便不利。

【宜忌】 慎醋、蒜、鲙、陈臭、大冷、醉吐。

【加减】 有风，加天雄、芎藭、当归、黄耆、五加皮、石南、茯神、独活、柏子仁、白术各三分；有气，加厚朴、枳实、橘皮各三分；冷，加干姜、桂心、吴茱萸、附子、细辛、蜀椒各三分；泄精，加韭子、白龙骨、牡蛎、鹿茸各三分；泄痢，加赤石脂、龙骨、黄连、乌梅肉各三分；夏加地黄五分、黄芩三分、麦门冬四分，冷则去此，加干姜、桂心、蜀椒各三分。

【方论选录】《千金方衍义》：五补者，补五劳之损伤也。方中助阳之味居多，略兼地黄、天冬以助阴长之力。唯取防风外通阳气，石龙芮内除阴翳，则诸药各随脏气之虚，而施补益之功。

01982 五补丸

【方源】《医方类聚》卷一五七引《吴氏集验方》。

【组成】 巴戟 牛膝 山药 白蒺藜各二两 菟丝子（酒浸三日，洗，焙干） 木香 人参 白茯苓 黄耆 川椒（微炒） 苁蓉 远志（去心）各一两半 附子（炮，去皮脐） 桂（去皮） 舶上茴香 北五味子 山茱萸 破故纸（微炒）各一两

【用法】 上择净称，为末，以酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤或温酒送下。

【主治】 男子本脏虚惫，下元冷极，阳道衰弱，夜多小便，膀胱积滞，脐下疼痛，疝气攻注，梦中遗泄，精神恍惚，眼暗耳鸣，腰膝生痠，筋力困乏，齿牙浮动。妇人血海虚冷，面色无光，心腹冷疼，四肢瘦弱，产后诸疾。

01983 五补丸

【方源】《医方类聚》卷二一四引《仙传济阴方》。

【组成】 黄耆一两 人参半两 附子一个 当归三钱 白芍五钱

【用法】 上炼蜜为丸，祛风散送服。

【主治】 妇人体虚，感受风湿毒邪，遍身不知痒痛，麻痹不仁，眼花。

01984 五灵丸

【方源】 方出《本草衍义》卷十七，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷二。

【组成】 五灵脂二两 没药一两 乳香半两 川乌头（炮，去皮）一两半

【用法】 上为末，滴水为丸，如弹子大。每服一丸，生姜温酒磨服。

【主治】 ①《本草衍义》：风冷气血凝闭，手足身体疼痛冷麻。②《类证治裁》：痛痹，历节挛痛甚者。

【备考】 本方改为散剂，名“五灵散”（见《类证治裁》）。

01985 五灵丸

【方源】《本事》卷二。

【异名】 五灵脂丸(《普济方》卷一七一)。

【组成】 五灵脂（拣如鼠屎者） 二两半 木香半两 马兜铃（去壳，炒） 一分 葶苈（苦者，隔纸炒香） 一分

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下，一日三次。

【主治】 ①《本事》：肺喘久而成息贲。②《直指》：久喘。

【方论选录】《本事方释义》：五灵脂气味甘温，入手太阴、足厥阴；木香气味辛温，入手足太阴；葶苈气味苦辛寒，入肺；马兜铃气味苦辛微寒，入手太阴。肺家壅痹，气机不宣，咳喘不止，欲成息贲，故以入血之药，佐以辛温及轻扬泄肺之品。又以枣之甘，姜之辛调其荣卫，则病自去。

01986 五灵丸

【方源】《医方类聚》卷一〇四引《医林方》。

【组成】 丁香六钱 辰砂六钱 五灵脂四钱

【用法】 上为细末，用狗胆汁为丸，如鸡头子大。每服一丸，生姜汤送下。

【主治】 反胃吐食。

01987 五妙汤

【方源】《纲目拾遗》卷八。

【组成】 头锅豆腐浆一碗 腐皮一张 生鸡蛋一个（打碎，冲入浆内） 圆眼肉十四枚 白糖一两

【用法】 上药入浆内，烧滚，五更空心服。

【主治】 产后弱症。

01988 五苓散

【方源】《伤寒论》。

【异名】 猪苓散(《圣惠》卷九)、五苓汤(《宣明论》卷五)、生料五苓散(《直指》卷五)、五苓饮子(《朱氏集验方》卷二)。

【组成】 猪苓十八铢（去皮） 泽泻一两六铢 白术十八铢 茯苓十八铢 桂枝半两（去皮）

【用法】 上为散。以白饮和服方寸匕，一日三次。多饮暖水，汗出愈。

【功用】 ①《古今名医方论》引程郊倩：开结利水，化气回津。②《慈禧光绪医方选议》：健脾祛湿，化气利水。

【主治】 外有表证，内停水湿，头痛发热，烦渴欲饮或水入即吐，小便不利，苔白脉浮者；水湿内停，水肿身重，霍乱吐利，泄泻；水饮停积，脐下动悸，吐涎沫而头眩，或短气而咳者。

①《伤寒论》：太阳病，发汗后，脉浮，小便不利，微热，消渴者；中风发热，六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者；霍乱头痛发热，身疼痛，热多欲饮水者。②《金匮》：瘦人脐下有悸，吐涎沫而颠眩。③《宣明论》：瘟疫、瘴疟烦渴。④《外科经验方》：下部湿热疮毒，小便赤少。⑤《医方集解》：通治诸湿腹满、水饮水肿、呕逆泄泻；水寒射肺，或喘或咳；中暑烦渴，身热头痛；膀胱积热，便秘而渴；霍乱吐泻，湿疟，身痛身重。

【宜忌】 ①《医方集解》：若汗下之后，内亡津液，而便不利者，不可用五苓，恐重亡津液，而益亏其阴也。②《成方切用》：一切阳虚不化气，阴虚而泉竭，以致小便不利者，若再用五苓以劫其阴阳，祸如反掌，不可不慎。

【方论选录】 ①《医方考》：茯苓、猪苓、泽泻、白术，虽有或润或燥之殊，然其为淡则一也，故均足以利水。桂性辛热，辛热则能化气。②《古今名医方论》引赵羽皇：五苓散一方，为行膀胱之水而设，亦为逐内外水饮之首剂也。方用白术以培土，土旺而阴水有制也；茯苓以益金，金清而通调水道也；桂味辛热，且达下焦，味辛则能化气，性热专主流通，州都温暖，寒水自行；再以泽泻、猪苓之淡渗者佐之，禹功可奏矣。③《医方集解》：二苓甘淡，入肺而通膀胱为君；泽泻甘咸，入肾、膀胱，同利水道为臣；益土所以制水，故以白术苦温健脾去湿为佐；膀胱者津液藏焉，气化则能出矣，故以肉桂辛热为使，热因热用，引入膀胱以化其气，使湿热之邪皆从小水而出也。④《伤寒六经辨证治法》：盖多服暖水，犹服桂枝汤啜稀热粥之法，但啜粥以助胃中营卫之气，而暖水乃助膀胱水府之津，俾膀胱气盛则溺汗俱出，经腑同解，至妙之法，可不用手！⑤《古方选注》：苓，臣药也，二苓相辅则五者之中可为君药矣，故曰五苓。猪苓、泽泻相须，借泽泻之咸以润下；茯苓、白术相须，借白术之燥以升精，脾精升则湿热散，而小便利，即东垣欲降先升之理也；然欲小便利者，又难越膀胱一腑，故以肉桂热因热用，内通阳道，使太阳里水引而竭之。

【临证举例】 ①水逆证 《名医类案》：一仆十九岁，患伤寒发热，饮食下咽，少顷尽吐，喜饮凉水，入咽亦吐，号叫不定，脉洪大浮滑。此水逆证，投五苓散而愈。②急性肾炎 《哈尔滨中医》(1959；12:19～20)：40例急性肾炎患者均为较重病例，有明显的水肿、高血压、血尿及肾功能减退，部分病例伴有腹水和肾性心力衰竭。经应用五

苓散治疗，一日总药量重症者9克，中等者6克，轻症者3克，七日为一疗程。并配合保温（尤其肾区保温）、减盐饮食及安静休息等。40例全部有效，平均住院日数为164天。③湿疹 《伤寒解惑论》：周某，男，六十四岁。患两下肢及颈项部湿疹已两年多，时轻时重，本次发作月余，所见渗水甚多，点滴下流，轻度瘙痒，身微恶寒，汗出较多，口干饮水，大便正常，小便略黄，苔薄白，脉濡缓略浮。证属阳虚不能行气利水，湿邪郁于肌表。治宜温阳化气利水，用五苓散加减：茯苓10克、桂枝9克、泽泻9克、白术9克、苡仁24克，三剂好转，又三剂症状消失，一年随访，未复发。

【现代研究】 利尿消肿作用 《日本药学会杂志》(1985；3:29)：复方实验研究表明，本方煎剂给正常大鼠灌胃及健康人和家兔口服，均有显著的利尿效果。《第二届和汉药讨论会记录》：对用盐水注射，而引起局限性水肿，造成水代谢障碍的家兔，给予五苓散，可利尿并促进局限性水肿的吸收。

01989 五苓散

【方源】《便览》卷一。

【组成】 辰砂 泽泻 白术 茯苓 官桂

【用法】 水一钟半，加生姜五片，灯心十茎，水煎服。

【主治】 中暑烦渴，身热头痛，霍乱吐泻，小便赤少，心神恍惚不宁。

01990 五苓散

【方源】《回春》卷三。

【组成】 茯苓（去皮） 白术（去芦） 猪苓 泽泻 山药 陈皮 苍术（米泔制） 砂仁（炒） 肉蔻（面包煨，捶去油） 诃子（煨，去核）各八分 官桂 甘草（炙）各五分

【用法】 上锉一剂。加生姜一片，乌梅一个，灯心一团，水煎，温服。

【主治】 湿泻。泻水多而腹不痛，腹响雷鸣，脉细。

01991 五苓散

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】 白术（土炒） 泽泻 猪苓 肉桂 小茴香 赤茯苓

【用法】 水煎服。

【主治】 寒淋。冷气入胞，以致小便闭塞，胀痛难禁，不时淋漓，少腹隐痛。

01992 五拗汤

【方源】《医方大成》卷二引《濟寮》。

【异名】 五拗散(《普济方》卷一三四)。

【组成】 麻黄（不去节） 杏仁（不去皮尖） 甘草（生用） 荆芥（不去梗） 桔梗各等分（一方去桔梗，荆芥，用半夏、枳实）

【用法】 上㕮咀。加生姜三片，水煎，温服。

【主治】 感寒咳嗽，肺气喘急；或感寒而语声不出，或至咽喉肿痛者。

【加减】 咽喉痛甚者，煎熟后加朴消少许。

01993 五拗汤

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】 麻黄（不去节） 干姜（不去皮） 杏仁（去皮尖）各二钱 细芽茶五钱 生石膏三钱

【用法】 生姜、葱为引，水煎服。微取汗。

【主治】 ①《墨宝斋集验方》：伤寒伤风后，咳嗽，痰火盛作鼻旬喘者。②《痘疹会通》：面青鼻扇，麻疹俱收者。

01994 五虎丹

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 水银62克 白矾62克 青矾62克 牙消62克 食盐31克

【用法】 先将水银与矾磨研，以不见水银为度，再将余药加入共研细末。将上药末置入小铁锅内，盖大碗一只，用泥土密糊封闭，文火炼二三小时，待冷却，轻轻除去泥土，将碗取出，碗底附着如霜之白色结晶，即为五虎丹。糊剂：五虎丹结晶体18克，蟾蜍0.5克，红娘0.5克，斑蝥0.5克，羊金花粉1克，用浆糊调成糊状，粘涂肿块上面，以普通膏药贴之；钉剂：药物份量同上，用米饭赋形，搓成两头尖的梭状条，每支长2～3厘米，重0.65克，阴干，用时插入癌组织。肿块脱落坏死后，改用红升丹细粉末撒布，贴膏药至疮面愈合。

【功用】《古今名方》：祛腐拔毒，生新。

【主治】 ①《中医皮肤病学简编》：皮肤癌。②《古今名方》：痈疽疔疮，慢性瘘管，淋巴结核等需要腐蚀脱落者。

【宜忌】 不可口服。

01995 五虎汤

【方源】《直指附遗》卷八。

【异名】 五虎斩劳汤(《便览》卷二)、麻黄汤(《准绳·幼科》卷五)。

【组成】 麻黄七分 杏仁（去皮尖）一钱 甘草四分 细茶八分（炒） 石膏一钱半

【用法】 上㕮咀。水煎服。

【主治】 外感风寒，内蕴痰热，痰气喘急，咳嗽。

①《直指附遗》：痰气喘急。②《育婴秘诀》：小

儿哮喘，因感寒而得之，恶寒发热，面赤唇红，鼻息不利，清便自调。③《片玉心书》：小儿咳嗽初起，夹风寒外感者。④《寿世保元》：外邪在表，无汗而喘者。⑤《景岳全书》：风寒所感，热痰喘急。⑥《金鉴》：暴喘。因寒邪客于肺俞，寒化为热，闭于肺经，胸高气促，肺胀喘满，两胁煽动，陷下作坑，鼻窍煽张，神气闷乱。

01996 五虎汤

【方源】《证治汇补》卷五。

【组成】麻黄 杏仁 石膏 甘草 桑皮 细辛 生姜

【用法】水煎服。

【主治】痰哮。

【宜忌】此方为劫剂，不宜久服；虚人自汗禁用。

01997 五虎散

【方源】《刺疔捷法》。

【组成】姜黄一两 炉甘石五钱 花粉五钱 大黄一两 川柏五钱

【用法】上为细末。白蜜调敷。

【功用】退肿。

【主治】红丝、黑疔疮。

01998 五味汤

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【异名】五味子汤(《杂病源流犀烛》卷一)。

【组成】五味九个 人参一钱 麦冬八分 杏仁八分 陈皮一钱 白术一钱

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】哮喘，胃虚抬肩撷肚，喘不休。

01999 五味膏

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【异名】五味子膏(《济阳纲目》卷五十六)。

【组成】北五味子一斤（洗净，水浸一宿）

【用法】以手拔去核，再用温水将核洗取，余味通置砂锅内，用布滤过，入好冬蜜二斤，炭火慢熬成膏，待数日后，略去火性。每服一、二茶匙，空心白滚汤调服，火候难于适中，先将砂锅称定斤两，然后称五味汁并蜜，大约煮至二斤四两为度。

【主治】遗精。

02000 五物汤

【方源】《直指》卷二十二引《究原方》。

【组成】瓜蒌（研）一枚 皂角刺（半烧带生）没药各半两 乳香 甘草各二钱半

【用法】上为粗末。醇酒三升，煎取二升。时时饮之。

【主治】痈疽、发背、乳痈痛不可忍。

02001 五物煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归三五七钱 熟地二四钱 芍药二钱（酒炒） 川芎一钱 肉桂一二三钱

【用法】水一钟半，水煎服。

【主治】妇人血虚凝滞，蓄积不行，小腹痛急，产难经滞，及痘疮血虚寒滞。

【加减】兼胃寒或呕恶者，加干姜炮用；水道不利，加泽泻或猪苓；气滞者，加香附或丁香、木香、砂仁、乌药；阴虚疝痛者，加小茴香；血瘀不行，脐下若覆杯，渐成积块者，加桃仁或酒炒红花；痘疮血虚寒胜，寒邪在表者，加细辛、麻黄、柴胡、紫苏之属。

02002 五泻汤

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】黄柏 知母 木通 栀子 生地黄 甘草 黑参 桔梗 黄芩 防风

【用法】上㕮咀。每服六七钱，用水煎，食后服。

【主治】瞳人干缺火旺，及五脏虚火旺动者。

【加减】热甚，加羚羊角、犀角、黄连。

02003 五宝丹

【方源】《一草亭》。

【组成】夜明砂（水洗极净，晒干，醋炒） 晚蚕砂（拣去土子，极净，醋炒） 凤凰退（壳内白衣，洗净，微火焙干，如焦者不用） 老母鸭肝（水泡切片，新瓦焙干，忌铁器） 嫩雄鸡肝（制如前）各等分

【用法】上各为极细末，和匀。每日早晚用酒调服三钱，服至七日见效；如重者，再服一料自愈。

【功用】开瞽复明，瞳神缺者能圆，陷者能起，突者能平。

02004 五宝丹

【方源】《中医喉科学讲义》。

【组成】熟石膏五钱 腰黄一钱 胆矾五分 硼砂五钱（炒） 冰片四分

【用法】上为极细末，用吹药器喷入。

【主治】喉痹，喉痛，喉风，乳蛾。

02005 五参丸

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】玄参 沙参 丹参 苦参 人参 秦艽（去苗土）各一两 干姜（炮）半两 酸枣仁一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】 口干，舌上生疮。

02006 五参散

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】 人参 沙参 丹参 苦参 玄参（坚者）各一两 白花蛇（酒浸，去皮骨，炙） 一两半

【用法】 上为细散。每服二钱匕，食后、夜卧温酒调下。加至三钱匕。

【主治】 风不仁，皮肤痹麻，绕腰遍身似蛇皮黑瘾，旋生旋没，通身痹痹。

02007 五珍丹

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】 天南星（炮） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 川乌头（炮，去皮脐） 蝎梢（用糯米一合，炒黄黑色，拣去米不用） 半夏（切片，汤浸七遍）各一两

【用法】 上为细末，醋煮面糊为丸，每一两作十五丸。每服一丸，用生姜自然汁化下，不拘时候。

【主治】 男子、妇人中风，涎潮不语，牙关紧急，半身不遂，口眼㖞斜。

02008 五香丸

【方源】《疡科心得集》。

【组成】 杏仁（去皮）三两 升药底一两 花椒（炒）五钱 樟冰五钱 大黄一两 蛇床子一两 黄柏一两 西丁一两 大风子肉三两

【用法】 上为细末，将风子肉，杏仁研和，再加油胡桃、雄猪板油捣和为丸，如芡实大。遇疥疮、顽癣，用夏布包药擦之。

【主治】 疥癞顽癣，肥疮，坐板疮，血热等疮。

02009 五香汤

【方源】《外台》卷二十三引《古今录验》。

【异名】 五香散（《圣惠》卷三十五）。

【组成】 沉香二两 熏陆香一两 麝香二分（研，汤成下） 青木香二两 鸡舌香二两

【用法】 以水五升，煮取一升半，去滓，分三服。

【主治】 外感秽恶毒气，咽喉肿痛，结核，一切毒肿。

①《外台》引《古今录验》：诸恶气，喉肿结核。②《医心方》引《古今录验》：恶核肿毒入腹。③《圣惠》：一切毒肿，疼痛不止。④《卫生宝鉴》：毒气入腹，烦闷气不通者。

【宜忌】《卫生宝鉴》：热渴昏冒，口燥咽干，大便硬，小便涩者，皆莫与服之。

02010 五香汤

【方源】《千金》卷二十二。

【异名】 五香散（《局方》卷三新添诸局经验秘方）、木香散（《普济方》卷一八一）。

【组成】 青木香 藿香 沉香 丁香 熏陆香各一两

【用法】 上㕮咀。以水五升，煮取二升，分三服。不愈更服之，并以滓薄肿上。

【功用】《局方》（新添诸局经验秘方）：升降诸气，宣利三焦，疏导壅滞，发散邪热。

【主治】 热毒肿痛，痈疽疔疮，恶脉病，尿血。

①《千金》：热毒气，卒肿痛结作核，或似痈疖而非，使人头痛、寒热、气急者，数日不除。②《医心方》：恶疮疔肿。③《普济方》：恶脉病。④《证治要诀类方》：尿血。⑤《金鉴》：上栗。由行崎岖之路，劳伤筋骨血脉而成，生在足跟旁，形如枣栗，亮而色黄，肿若琉璃，又名琉璃疽。⑥《杂病源流犀烛》：黄鳅痈。由肝脾两经湿热或积怒致痈，发于足小肚上半，三四寸许大，红肿坚硬如石，痛甚者。

02011 五香汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【异名】 五香鸭（《串雅外编》卷三）。

【组成】 人参半两 白术九钱 肉桂一钱 肥鸭一只

【用法】 将药末入鸭腹内煮之极烂，外以五味和之，葱、椒俱不忌，更以腐皮同煮，恣其饱餐食尽，如不能尽，亦听之，不必再食米饭也，一餐而痛如失。

【主治】 胃口寒痛，手按之而少止。

02012 五香散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】 木香 丁香 藿香叶各一分 沉香 乳香 连翘 木通 续断 桑寄生 甘草（微炙）各半分

【用法】 上锉细。每服三钱，并水一碗，煎七分，加麝少许，患在上，食后服；患在下，食前服。

【功用】 透达经络。

【主治】 痈疽五发证，令人头痛恶心，寒热气急，拘挛。

【加减】 有热，加灯心、桑白皮。

02013 五香散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 沉香 檀香 木香 零陵香各二钱 麝香三分

【用法】 上为细末。每用五厘，津调搽擦两腋下，三日一次，或用香末二钱，绢袋盛贮，挂于腋

下亦效。

【主治】 狐气。

02014 五顺汤

【方源】《传信适用方》卷四。

【组成】 生姜一斤（切片，晒干） 草果半斤（去壳并白皮） 甘草四两（炒） 缩砂四两 胡椒半两

【用法】 上为末。入盐如常服。

【主治】《魏氏家藏方》：脾胃虚弱，不思饮食，吐逆满闷，胸膈不利，心腹刺痛。

【备考】 本方为原书“六和豆蔻汤”之第四方。

02015 五宣散

【方源】《续本事》卷六。

【组成】 瞿麦 木通 甘草 虎杖 滑石各等分

【用法】 上㕮咀。每服二大钱，水一盏，灯心数茎，煎至七分，临卧时温服。

【功用】 行滞气。

【主治】 大小便不通。

02016 五美丹

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】 熟地一两 当归 山茱萸 麦冬 山药各五钱

【用法】 水煎服。

【功用】 大补肾水，平其旺木。

【主治】 妇人肾虚木旺，身躯瘦怯，久不孕育，一交男子，卧病终朝。

02017 五神汤

【方源】 方出《圣惠》卷七十，名见《云岐子保命集》卷下。

【异名】 四汁饮（《永类钤方》卷十七）。

【组成】 生藕汁三合 生地黄汁三合 白蜜一合 刺蓟汁三合 生姜汁半合

【用法】 上药相和，煎三两沸，不拘时候，取一小盏调下炒面尘一钱。

【主治】 妇人热毒上攻，吐血不止。

02018 五神散

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】 荆芥穗四两 白术 木贼各二两 青盐一两（研） 甘草（炙）半两

【用法】 上为散。每服二钱匕，好茶点服。

【主治】 目偏视风牵。

02019 五神散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 轻粉 枯矾 黄柏各五钱 朱砂 雄黄各一钱

【用法】 上为末。先用川椒汤洗净，然后敷药。

【主治】 坐板疮。

02020 五神散

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】 雄黄 硫黄 黄丹 密陀僧 南星

【用法】 上为细末。先用葱搽患处，次用姜蘸药末搽之，搽后渐黑，搽至黑散则愈。

【主治】 紫白癜风，初起斑点游走成片，久之可延蔓遍身，初无痛痒，久则微痒。

02021 五退散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】 蝉退（洗） 蛇退（醋煮） 荆芥 猪蹄退一分（微炒） 穿山甲（烧存性） 川乌（炮，去皮） 粉草各半两 蚕退二钱半

【用法】 上为末。每服二钱，盐汤调下。

【主治】 脾受风热，倒睫拳毛，泪出涓涓，翳膜渐生，乍愈乍发，多年不安，眼皮渐急，睫倒难开，如刺样痛，瞳仁不安；或脾受风毒，风牵睑出，上下睑俱赤，而或翻出一睑在外。

【备考】 按：方中蝉退、蛇退、荆芥用量原缺。

02022 五退散

【方源】《种福堂方》卷三。

【组成】 人退（即指甲，乳汁炒为末） 山甲（炒） 蝉退（洗净，炒） 龙退（即蛇壳，炒） 凤退（即鸡子壳内白膜，炒）

【用法】 上为极细末。每用三厘，令患人含水一口，患左眼吹入右鼻，患右眼吹入左鼻，再以锡作眼样，合患眼上。如此三次，则翳膜或血丝俱落。

【主治】 远年攀睛翳膜。

02023 五积丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】 丑头末一两 黄连半两 陈皮一两 青皮半两 山楂半两

【用法】 上炒焦黑色，为末。每用巴豆霜半钱，前药末半钱，宿蒸饼为丸，如麻子大。小儿二岁十丸，五更姜汤送下。至天明大便泄为度，温粥补之。未利，再服三五丸。

【主治】 小儿诸般疳积。

02024 五积丸

【方源】《增补内经拾遗》卷三。

【组成】 人参 白茯苓 厚朴 黄连 川乌 巴豆

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

【主治】 五脏之积。肝积肥气，心积伏梁，脾积痞气，肺积息贲，肾积奔豚。

02025 五积饼

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】三棱（醋炒）一钱 莪术（醋炒）一钱 青皮（去瓤）一钱 陈皮一钱 木香一钱 黄连（姜汁浸炒）一钱 川楝肉二钱 槟榔二钱 神曲（炒）三钱 麦芽（炒）三钱 砂仁三钱 使君子肉五钱 胡黄连五钱 白术（炒）六钱 龙胆草六分 山楂肉二两 干蟾蜍五只

【用法】上为细末，用炒过白面五斤，黑糖二斤，并前药和匀，用印印作饼子，约重一钱。每服三五饼。服过半月大效。

【主治】小儿疳积、食积、虫积、肉积、气积、冷积，腹胀大如鼓，青黄肌瘦，泄泻发热，不能服药者。

02026 五积散

【方源】《理伤续断方》。

【异名】催生汤（《医方类聚》卷二二九引《简易方》）、异功五积散（《医方类聚》卷五十六引《管见大全良方》）、熟料五积散（《医方集解》）、百病无忧散、调中健胃汤（《郑氏家传女科万金方》卷一）。

【组成】苍术 桔梗各二十两 枳壳 陈皮各六两 芍药 白芷 川芎 川归 甘草 肉桂 茯苓 半夏（汤泡）各三两 厚朴 干姜各四两 麻黄（去根节）六两

【用法】上除枳壳、桂两件外，余锉细，用慢火炒，令色变摊冷，入枳壳、桂令匀。每服三钱，水一盏，加生姜三片，煎至半盏热服。凡被伤头痛，伤风发寒，姜煎二钱，仍入葱白，食后热服。

【功用】发表温里，顺气化痰，活血调经。

①《局方》：调中顺气，除风冷，化痰饮。②《卫生家宝产科备要》：临产时助气催产。③《医方集解》引王海藏：解表温中，消痞调经。

【主治】外感风寒，内伤生冷，身热无汗，头痛身痛，肩背拘急，胸满恶食，呕吐腹痛；以及脚气痹痛，疮疡痈疽，妇女血气不和，心腹疼痛，月经不调等属于寒湿者。

①《理伤续断方》：五痨七伤，被伤疼痛，伤风发寒。②《局方》：脾胃宿冷，腹胁胀痛，胸膈停痰，呕逆恶心。或外感风寒，内伤生冷，心腹痞闷，头目昏痛，肩背拘急，肢体怠惰，寒热往来，饮食不进。及妇人血气不调，心腹撮痛，经候不调，或经闭不通。③《活人书》：阴经伤寒，脾胃不和。④《三因》：太阴伤寒，积聚腹痛。⑤《妇人良方》：风寒所伤，以致脚气疼痛，或寒拘急，呕吐不食。⑥《直指》：感寒发疟初作。⑦《普济方》引《如宜方》：寒湿伤肾，气滞腰疼，不可俯仰。⑧《丹溪心法》：脚气有兼痰气、寒湿者。⑨《外科理例》：风寒湿毒客于经络，致筋挛骨痛，或腰脚痿痛，或身重痛拘急。⑩《济阴纲目》：产后身痛，兼感寒伤食。⑪《医方集解》：身热无汗，头痛身痛，项背拘急，胸满恶食，呕吐腹痛。冷秘，寒疝，寒疟，恶寒无汗。⑫《疡科遗编》：附骨、咬骨二疽，初起不红不热，如同伤寒，渐次漫肿无头，筋骨疼痛，腿不能伸者。

【方论选录】①《医方集解》：此阴阳表里通用之剂也。麻黄、桂枝所以解表散寒；甘草、芍药所以和中止痛；苍术、厚朴平胃上而祛湿；陈皮、半夏行逆气而除痰；芎、归、姜、芷入血分而祛寒湿；枳壳、桔梗利胸膈而清寒热；茯苓泻热利水、宁心益脾。所以为解表温中除湿之剂，去痰消痞调经之方也。一方统治多病，惟治法者变而通之。②《方剂学》：本方为治寒、湿、气、血、痰五积而设，故名五积散。方中麻黄、白芷发汗解表，干姜、肉桂温里祛寒，为本方的主要部分；配伍苍术、厚朴燥湿健脾；陈皮、半夏、茯苓理气化痰；当归、川芎、芍药活血止痛。桔梗与枳壳同用，有升降气机，加强理气化痰之效，适宜于痰阻气滞之证。炙甘草和中健脾，调和诸药。以上均为本方的辅助部分。由于本方能行气和血，温里祛寒，故对妇女气血不和，寒凝气滞的心腹疼痛，月经不调等，亦可加减运用。

【临证举例】①喘证 《中医杂志》（1964；6：33）：一男性农民，年约三十，素体坚强。自某年秋在田间遭受暴风雨之淋袭以后，即常发喘息咳嗽，遇冷即发，时发时愈，已有二、三年。症见咳嗽喘促，痰多泡沫，喉间如水鸡声，胸闷不能平卧，头痛，肩痛，腰背痛，两目似突，苦闷欲绝，并见头上有汗而两足冰冷，诊其脉沉弦而紧，舌苔白腻。予处方五积散，以麻黄、桔梗、陈皮、半夏等为君药，服药一剂，喘促大减，续服二剂，病去大半，嗣后，配制丸剂继续服用，即不闻再发。②寒性深部脓肿 《陕西新医药》（1977；4：53）：张某，女，26岁，因右腿疼痛两天。查右大腿内侧上1/3处疼痛，局部肿块，按之痛剧，皮色不红，微恶寒，体温37℃，白细胞13400/立方毫米，嗜中性79%。诊断：寒性深部脓肿。拟予五积散煎剂：麻黄五分，白芷、当归、川芎、法半夏、陈皮各三钱，苍术、川朴、枳壳、桔梗、甘草、川芎、桂枝各钱半，生姜三片，连须葱头五个。煎服两剂而愈。③产后发热 《江苏中医杂志》（1980；5：

30)；郎某，女，26岁。产后36天因感受风寒而发热，服西药半月略有好转，但体温波动在37.6～38.2℃之间，查血、小便均正常。现头痛身疼，项背拘急，食纳尚好，二便如常，体胖面红润，脉弦滑苔薄。为产后外感风寒，气血瘀阻，营卫失和，投五积散全方四剂低热即退净，诸症悉平。

【备考】 本方诸药生用，名"生料五积散"（见《易简方》）；《得效》本方去麻黄，名"异功散"。

02027 五倍丸

【方源】《永类钤方》卷二十一引《全婴方》。

【组成】 五倍子（焙）

【用法】 上为末，蜜为丸，如小豆大。三岁三十丸，米汤化下。

【主治】 小儿大便下血，如肠风脏毒。

02028 五倍汤

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】 五倍子

【用法】 煎汤，露一宿，次早取上面清者温服。

【主治】 尿血不止。

02029 五倍散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】 五倍子（半生、半熟等分）

【用法】 上为末。每服二钱，空心冷水调下。

【主治】 血崩。

02030 五疳丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【异名】 五疳保童丸(《局方》卷十)。

【组成】 青黛（细研） 雄黄（细研） 麝香（细研） 芦荟（细研） 熊胆（研入） 胡黄连 黄连（去须） 龙胆（去芦头） 苦楝根 白鳝鱼（炙令焦黄） 虾蟆灰 蜗牛（炒令微黄） 夜明砂（微炒） 蟾头一枚（炙令黄焦） 五倍子 青橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 天浆子（内有物者，微炒）以上各一分

【用法】 上为末，都研令匀，用粳米饭为丸，如绿豆大。每服三丸，以粥饮送下，一日三次。

【主治】 小儿五疳，乳食不养肌肤，心腹胀满，或时下痢，壮热昏沉，眼涩口干，爱吃生冷，毛发干竖，揉鼻多嚏，日渐羸瘦。

02031 五黄丸

【方源】《洁古家珍》。

【组成】 大黄五钱 芒消三钱 甘草一钱 生地黄三钱 栀子一钱 黄芩一钱 黄连一钱半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。温水送下。

【主治】 衄血不止，大便结燥者。

02032 五黄散

【方源】《活法机要》。

【异名】 乳香膏(《普济方》卷三〇五)。

【组成】 黄丹 黄连 黄芩 黄柏 大黄 乳香 各等分

【用法】 上为细末，新水调成膏。用绯绢帛上摊贴。

【功用】 ①《活法机要》：定痛。②《普济方》：拔毒消肿。

【主治】 ①《活法机要》杖痛。②《中医方剂临床手册》：挫伤，热毒肿痛者。

02033 五黄膏

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】 大黄 黄芩 黄柏 黄连 姜黄各等分

【用法】 上为细末，冷水调敷。

【主治】 ①《普济方》：一切疮肿。②《中医皮肤病学简编》：湿疹、天泡疮。

02034 五淋汤

【方源】《顾松园医镜》卷十五。

【组成】 生地 二冬 知母 黄柏 甘草梢 牛膝 车前 茯苓

【主治】 淋症。

【加减】 气淋，加沉香、郁金；血淋，加茅根、藕汁；膏淋，加川萆薢、川石斛；砂淋，加滑石末调服；因房劳伤肾者，加枸杞、苁蓉；因思劳心者，加柏仁、丹参；因劳倦伤脾者，加人参。

【方论选录】 生地壮水滋阴，血淋多用；二冬清肺气，化及州都，小便自然顺利；知母泄膀胱、肾家之火，又能利水；黄柏利水窍涩痛；甘草梢止茎中作痛；牛膝治小便不利、茎中痛甚者立效，血淋更宜；车前开窍通淋；茯苓渗湿利水。此方通治五淋，须随症活法加减用之。

02035 五淋散

【方源】《直指》卷十六。

【组成】 赤茯苓 赤芍药 山栀仁 生甘草各三分 当归 黄芩各二分

【用法】 上为细末。每服二钱半，水一盏，煎至八分，空腹服，或以五苓散和之，用竹园麦门冬草、葱头、灯心煎汤调下。

【主治】 ①《直指》：诸淋。②《济阴纲目》：孕妇热结膀胱，小便淋沥。

02036 五淋散

【方源】《局方》卷六添诸局经验秘方)。

【组成】 木通（去节） 滑石 甘草（炙）各六

两　山栀仁（炒）十四两　赤芍药　茯苓（去皮）各半斤　淡竹叶四两　山茵陈（去根，晒干）二两

【用法】　上为末。每服三钱，水一盏，煎至八分，空心服。

【主治】　肾气不足，膀胱有热，水道不通，淋沥不宜，出少起多，脐腹急痛，蓄作有时，劳倦即发，或尿如豆汁，或如砂石，或冷淋如膏，或热淋便血。

【方论选录】《医略六书》：热结膀胱，气化有伤而溺窍不利，故茎痛溺赤，淋沥不止焉。茵陈清湿热以治淋，滑石通窍门以利溲，生草泻火缓茎中之痛，木通降火利小肠之水，山栀清三焦之热，赤芍利膀胱之血，赤苓渗血分之湿以清水府，竹叶清膈上之热以快水道也。为散，灯心汤下，使热结顿开，则膀胱无不化之气，而水府无不清之液，何患淋沥不快，溲痛不痊哉。此通利之剂，为淋沥溲痛之专方。

02037　五痫丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【异名】　神应丸（《医级》卷八）、医痫丸、医痫无双丸（《北京市中药成方选集》）。

【组成】　天南星一两（炮）　乌蛇一两（酒浸一宿，去皮骨，焙干称）　朱砂一分（别研）　全蝎二钱（去毒）　半夏二两（汤浸七次）　雄黄一钱半（研）　蜈蚣半条（去头足，炙）　白僵蚕一两半（炒去丝嘴）　白附子半两（炮）　麝香二字（别研）　白矾一两　皂角四两（捶碎，用水半升，搓汁去滓，与白矾一处熬干为度，研）

【用法】　上为细末，生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温生姜汤送下。

【主治】　癫痫朝发，不问久新。

【宜忌】《北京市中药成方选集》：孕妇忌服。

【备考】　按：本方方名，《景岳全书》引作"五痫神应丸"。《北京市中药成方选集》本方用法：用冷开水泛为小丸，用朱砂二钱五分、滑石粉二两五钱为衣，闯亮。每服一钱，日服二次，温开水送下。

02038　五槐丸

【方源】《续本事》卷九。

【组成】　五倍子　槐花（陈者）　百药煎（好者）各等分

【用法】　上焙干为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米汤送下，一日三次。

【主治】　肠风脏毒，酒痢下血。

02039　五蒸丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】　胡黄连五钱　地骨皮一两　生地黄一两　川归七钱　石膏一两　青蒿（童便浸）一两　鳖甲一片（酒炙）

【用法】　上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食前小麦汤送下。

【主治】　男子妇人烦蒸潮热，脉数口干。

02040　五蒸汤

【方源】《外台》卷十二引《范汪方》。

【异名】　五蒸饮（《红炉点雪》卷二）、五蒸散（《医钞类编》卷十三）。

【组成】　甘草一两（炙）　茯苓三两　人参二两　竹叶二把　葛根　干地黄各三两　知母　黄芩各二两　石膏五两（碎）　粳米一合

【用法】　上切。以水九升，煮取二升半，分为三服。亦可以水三升，煮小麦一升，乃煮药。

【功用】　解五蒸。

【主治】　①《外台》引《范汪方》：虚劳骨蒸。②《玉机微义》：骨蒸发热，自汗。

【宜忌】　忌海藻、菘菜、芜荑、火醋。

02041　五解汤

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】　山栀子仁　黄芩（去黑心）　甘草（炙，锉）　大黄（锉，醋炒）各一分　朴消二钱

【用法】　上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】　阳毒伤寒，发热烦躁。

02042　五痹汤

【方源】《局方》卷一淳佑新添方）。

【异名】　舒经汤（《永类钤方》卷九）。

【组成】　片子姜黄（洗去灰土）　羌活　白术　防己各一两　甘草（微炙）半两

【用法】　上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜十片，煎至八分，去滓，病在上，食后服；病在下，食前服。

【主治】　风寒湿邪客留肌体，手足缓弱，麻痹不仁，或气血失顺，痹滞不仁。

【方论选录】《医略六书》：羌活散太阳之寒以利关节，白术燥太阴之湿以运脾元，防己泻湿热，甘草缓中州，生姜散寒邪以温胃，姜黄行手臂以除麻，且以鼓舞诸药之力，则寒湿可去，缓弱可伸，何麻痹之不除者哉。此建中祛湿之剂，为麻痹手足缓弱之专方。

02043　五瘘汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 人参 白术 茯苓各一钱 甘草（炙）四分 当归一钱五分 苡仁二钱 麦冬二钱 黄柏（炒褐色） 知母各五分

【用法】 水煎服。

【主治】 五脏痿。

【加减】 心气热，加黄连三分，丹参、生地各一钱；肝气热，加黄芩、丹皮、牛膝各一钱；脾气热，加连翘一钱，生地一钱五分；肾气热，加生地、牛膝、石斛各一钱五分；肺气热，加天冬、百合各二钱；夹痰，加川贝、竹沥；湿痰，加半夏曲；瘀血，加桃仁、红花。

【方论选录】《证因方论集要》：治痿之法不外补中祛湿，养阴清热而已。人参、白术、炙草以补中；当归、麦冬以养阴；茯苓、苡仁以祛湿；黄柏、知母以清热。

02044 五福饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 人参 熟地 当归各二三钱 白术（炒） 一钱半 炙甘草一钱

【用法】 水二钟，煎七分，食远温服。或加生姜三五片。

【主治】 五脏气血亏损；痘收靥而痂不落，昏昏欲睡；胎动不安。

①《景岳全书》：五脏气血亏损。②《妇科玉尺》：胎动不安。③《痘麻绀珠》：邪气已退，正气未复，脾胃虚弱，痘收靥时而痂不落，昏昏欲睡。④《古方汇精》：五脏气血亏损，日晡潮热，阴虚盗汗，脾胃不香，疟痢反复，经久不愈，怔忡心悸，遗精滑脱等。

【加减】 宜温者，加姜、附；宜散者，加升麻、柴、葛。

02045 五膈散

【方源】《济生》卷二。

【异名】 五噎散（《医统》卷二十七）、五膈汤（《医学入门》卷七）。

【组成】 枳壳（去瓤，麸炒） 木香（不见火） 青皮（去白） 大腹子 白术 半夏曲（锉，炒） 丁香（不见火） 天南星（汤泡去皮） 干姜（炮） 麦芽（炒） 草果仁各一两 甘草（炙）半两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一中盏，加生姜五片，煎至六分，温服，不拘时候。

【主治】 五膈，胸膈痞闷，诸气结聚，胁肋胀满，痰逆恶心，不进饮食。

【备考】 方中大腹子，《医学入门》作“大腹皮”；木香原脱，据《医方类聚》补。

02046 五精酒

【方源】《千金翼》卷十三。

【组成】 黄精四斤 天门冬三斤 松叶六斤 白术四斤 枸杞五斤

【用法】 上五味皆生者，以水三石，煮之一日，去滓，以汁渍曲，如家酿法。酒熟，取清汁，任性饮之。

【功用】 却病延年，发白返黑，齿落更生。

02047 五噎散

【方源】《三因》卷八。

【异名】 五噎汤（《医学入门》卷七）。

【组成】 人参 茯苓 厚朴（去粗皮，锉，姜汁制，炒） 枳壳（麸炒，去瓤） 桂心 甘草（炙） 诃子（炮，去核） 白术 橘皮 白姜（炮） 三棱（炮） 神曲（炒） 麦（炒）各二两 木香（炮） 槟榔 蓬术（炮）各半两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜三片、枣子一枚，煎七分，空心温服；盐汤点亦得。

【主治】 五种噎，食饮不下，胸背痛，呕哕不彻，攻刺疼痛，泪与涎俱出。

02048 五噎散

【方源】《济生》卷二。

【组成】 人参 半夏（汤泡七次） 桔梗（去芦，锉，炒） 白豆蔻仁 木香（不见火） 柞头榛 白术 苹澄茄 沉香（不见火） 枇杷叶（拭去毛） 干生姜各一两 甘草（炙）半两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一中盏，加生姜七片，煎至六分，食后温服。

【主治】 五噎。食不下，呕呃痰多，咽喉噎塞，胸背满痛。

【备考】 本方方名，《景岳全书》引作“五膈散”。

02049 五德丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 补骨脂四两（酒炒） 吴茱萸（制）二两 木香二两 干姜四两（炒） 北五味二两（或以肉豆蔻代之，面炒用，或用乌药亦可）

【用法】 汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，甚者百余丸，滚白汤或人参汤或米汤俱可送下

【主治】 脾肾虚寒，飧泄鹜溏，或暴伤生冷，或受时气寒湿，或酒湿伤脾，腹痛作泄，或饮食失宜，呕恶痛泄无火者。

【加减】 腹痛多呕者，加胡椒二两更妙。

02050 五蟾丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】干蟾五个（大者，细锉，和骨，用好酒五升，文火煎至二升，滤去骨，于砂盆内研，以绢滤去滓，入熟蜜四两于重汤内煮令成膏） 胡黄连一两 黄连二两（去须） 白芜荑二两（轻炒，去皮）

【用法】上为末，入前煎内为丸，如麻子大。每服三丸，用人参汤送下；乳汁下亦得。

【主治】小儿五疳，齿焦，四肢黄瘦。百晬后至十五岁以前，并宜服此。

02051 五石软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】制甘石 31 克 煅石膏 46 克 飞滑石 9 克 明矾 4 克 青黛 4 克

【用法】上为细末后，取 31 克，用凡士林 46 克，麻油 30 毫升，放入铜锅内，加热搅匀后即成。外用。

【主治】婴儿湿疹。

02052 五汁饮子

【方源】《医家四要》卷三。

【组成】甘蔗汁 藕汁 韭菜汁 梨汁 鲜芦根汁

【用法】和匀煮服。

【主治】噎塞膈食。

02053 五汁肺丸

【方源】《良方集腋》卷上。

【组成】雄猪肺一个（不落水，去筋膜） 藕汁二碗 油秋梨汁一碗 甘蔗汁二碗 茅草根汁一碗 百合汁一碗

【用法】先将各汁代水，煮烂猪肺，滤去滓，收膏，量用建莲粉糊丸，如梧桐子大。每服五钱，早、晚淡盐汤送下。

【功用】清肺益阴止血。

【主治】肺热咯血。

02054 五加皮丸

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】续断（炒） 杜仲各二两半 芎藭 独活各三两 五加皮 狗脊 萆薢 芍药 诃子肉各四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心酒送下，一日三次。

【主治】妊娠腰痛不可忍，或连胯痛。

02055 五加皮汤

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】五加皮 萆薢 独活（去芦头） 防己 牛膝（酒浸，切，焙）各二两 桂（去粗皮） 赤茯苓（去黑皮） 防风（去叉） 附子（炮裂，去皮脐） 薏苡仁 当归（切，焙） 秦艽（去苗土） 茵芋 海桐皮 赤芍药各一两 羌活（去芦头） 麻黄（去根节） 丹参各三分

【用法】上锉如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（拍碎），同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风腿腿，四肢缓弱，骨节疼痛，皮肤不仁，肌肉虚满，腰脚沉重，举止无力。

02056 五加皮汤

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】五加皮（锉） 玄参 桑根白皮（锉） 麦门冬（去心，焙）各一两 茯神（去木）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎取七分，去滓，加荆沥半合，再煎一两沸，放温，食后、临卧服。

【主治】青盲，目无所见。

02057 五加皮汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】五加皮十两 丹参八两 石斛（酒浸）六两 杜仲（酒浸，炒丝断） 附子（炮，去皮脐）各五两 牛膝（酒浸） 秦艽 川芎 防风 桂心 独活各四两 茯苓四两 麦门冬（去心） 地骨皮各三两 薏苡仁一两

【用法】上为锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜五片，大麻子一撮（研破），同煎七分，去滓，食前服。

【主治】肾劳虚寒，恐虑失志，伤精损髓，嘘吸短气，遗泄白浊，小便赤黄，阴下湿痒，腰脊如折，颜色枯悴。

02058 五加皮酒

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】五加皮（细锉）一升

【用法】以清酒一斗，渍十日。温服一中盏，一日三次；亦可与术、地黄各二十斤（细锉），以水一石五斗，煮取一石，以渍细曲十斤，黍米一石，净淘炊熟，都拌和入瓮，盖覆如法。候熟，任性饮之，不令至醉。

【主治】风痹不仁，四肢挛急疼痛。

02059 五加皮酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】五加皮（洗，刮去骨）

【用法】煎汁，和曲、米酿成，饮之；或切碎，袋盛浸酒煮饮。

【功用】 壮筋骨，填精髓。

【主治】 一切风湿痿痹。

02060 五加皮酒

【方源】 《赤水玄珠》卷十一。

【组成】 五加皮半斤 苍耳子六两 枸杞子 苡仁各四两 生地黄二两 木香五钱

【用法】 以好酒一大埕，将药用囊盛悬埕中，浸七日取出，焙干为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，空心酒送下；其酒听饮，但常使酒气频相接为妙。

【主治】 筋痿拘挛疼痛，不便屈伸。

02061 五加皮酒

【方源】 《增补内经拾遗》卷四。

【组成】 五加皮三两 宣木瓜三两

【用法】 上用无灰好酒一樽，入前二药，煮一炷香，食前饮之。

【主治】 足胫痛。

02062 五加皮酒

【方源】 《外科大成》卷二。

【组成】 五加皮八两 当归五两 牛膝四两 无灰酒一斗

【用法】 煮三炷香。一日二服，以醺为度。

【主治】 鹤膝风。

02063 五加皮散

【方源】 《圣惠》卷二十三。

【组成】 五加皮一两 桂心一两 芎藭一两半 羌活一两 秦艽一两半（去苗） 防风一两半（去芦头） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 萆薢一两（锉） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 当归一两半（锉，微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 牛膝一两（去苗） 薏苡仁一两 丹参一两

【用法】 上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，空心温服，良久再服。衣覆，得微汗佳。

【主治】 中风手足不遂，肌肉顽痹，骨节疼痛。

【宜忌】 忌生冷、油腻、毒滑、动风物。

02064 五加皮散

【方源】 《圣惠》卷六十九。

【组成】 五加皮一两 萆薢一两 海桐皮一两 虎胫骨一两半（涂酥，炙令黄） 牛膝一两（去苗） 防风一两（去芦头） 薏苡仁一两 鼠粘子一两 仙灵脾一两 当归一两（锉，微炒） 续断一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 杜仲一两（去粗皮，微炙，锉） 熟干地黄一两

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 妇人风痹，手足不随，行立无力。

02065 五加皮散

【方源】 《直指小儿》卷四。

【异名】 牛膝散（《袖珍小儿》卷七）。

【组成】 真五加皮一分 牛膝 酸木瓜（干）各半分

【用法】 上为末。每服一钱半，粥饮调，次入好酒两点，再调，食前服，一日二剂。

【主治】 小儿行迟。

02066 五加皮散

【方源】 《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】 五加皮 油松节 木瓜

【用法】 上为末。每服二三钱，酒调下。

【主治】 筋缓。

02067 五灵脂丸

【方源】 《圣济总录》卷五。

【组成】 五灵脂（别为末） 附子（炮裂，去皮脐） 天麻各五分 白僵蚕（生用） 天南星（生用） 乌头（去皮，酒浸） 乌蛇（酒浸，去皮骨，炙）各三两 白花蛇（酒浸，去皮骨，炙） 地龙（去土）各五两 牛黄 龙脑 麝香各二钱（并细研） 白附子（生用）二两

【用法】 上为末，用醇酒五升，以五灵脂末并入细面一两煎成膏，与众药杵丸，如鸡头子大。每服一丸，用葱白二寸，生姜一寸（细锉），酒一盏煎，临熟去滓，入薄荷汁少许，放温磨下。

【主治】 中风，精神昏昧，四肢纵缓，言语謇涩。

02068 五灵脂丸

【方源】 《玉机微义》卷四十九。

【组成】 灵脂十两 神曲二两

【用法】 水煎，去滓澄清，再煎成膏，入神曲为丸，如梧桐子大。每服三二十丸，温酒送下。

【主治】 血山崩不止。

02069 五灵脂丸

【方源】 《赵炳南临床经验集》。

【组成】 五灵脂五十两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。每丸一钱重，每次半丸至一丸半，温开水送下，一日二次。

【功用】 活血破瘀，软坚化滞。

【主治】 瘢痕疙瘩。

【宜忌】 体虚及胃肠功能障碍者减量或慎服。

02070 五灵脂汤

【方源】 《妇科玉尺》卷四。

【组成】 归尾 陈皮 白术各一钱 川芎 白芍 茯苓 人参各八分 炙草三分 五灵脂五分

【用法】 加砂仁，清水煎服。

【主治】 产后闪伤，腹痛血崩。

02071 五灵脂散

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】 五灵脂二两

【用法】 上为末，捣罗为细散。每服一钱匕，男子热酒调下；女子当归酒调下。

【主治】 心痛。

02072 五灵脂散

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】 五灵脂一两半 当归（切，焙）一两 蜀椒（去目并闭口，炒出汗）一分 姜黄一两

【用法】 上为散。每服二钱匕，水半盏，酒半盏，同煎六分，食前温服。

【主治】 妇人血风，走注疼痛。

02073 五灵脂散

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】 五灵脂（炒令过熟出尽烟）

【用法】 上为末。每服二钱，加当归二片，酒一中盏，煎至六分，去滓热服，连三服。立效。如血室有干血，用醋一盏，煎七分，和滓空心热服。

【主治】 经候不止。

02074 五灵脂散

【方源】《得效》卷三。

【组成】 五灵脂 荆芥穗 防风 羌活 独活 甘草结 穿山甲 骨碎补 草乌各五钱 麝香少许

【用法】 上为末。临睡用温酒调下。

【主治】 ①《得效》：臂脾痛。②《普济方》：浑身损伤疼痛。

【备考】《普济方》：如浑身损伤，加没药、木香，酒调，空心下。

02075 五灵脂散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 五灵脂（水飞）31 克 雄黄 15 克

【用法】 上为细末。用酒调服 6 克，再将药末敷患部。

【主治】 毒蛇咬伤。

02076 五君子煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 人参二三钱 白术 茯苓各二钱 炙甘草一钱 干姜（炒黄）一二钱

【用法】 水一钟半煎服。

【主治】 脾胃虚寒，呕吐泄泻而兼湿者。

02077 五味子丸

【方源】《普济方》卷二十九引《护命》。

【组成】 五味子 龙骨 牡蛎（火煅） 牛膝（酒浸，切，焙） 桂（去粗皮） 山茱萸 萆薢 白茯苓（去黑皮） 巴戟天（去心） 山芋 石斛（去根，锉） 续断 附子（炮裂，去皮脐）各半两 吴茱萸（汤洗，焙干，炒）一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心、日午、夜卧盐汤送下。见效即住药。

【主治】 肾脏虚惫，房色过度，阳气亏乏，关键不牢，真元失禁，精自流出。

02078 五味子丸

【方源】《本事》卷二。

【组成】 五味子（拣） 川巴戟（酒浸，去心） 肉苁蓉（酒浸，水洗，焙干） 人参（去芦） 菟丝子（酒浸，晒干，用纸条子同碾为末） 熟地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干） 覆盆子 白术 益智仁（炒） 土茴香（炒香） 骨碎补（洗，去毛） 白龙骨 牡蛎（盐泥固济，干，火烧通赤，去泥用）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，焙干。每服三十丸，空心、食前米饮送下，一日二三次。

【功用】 收敛精气，补真戢阳，充悦肌肤，进美饮食，止汗。

【主治】 ①《本事》：虚劳肝肾俱虚者。②《证治要诀》：每日五更初洞泻，服止泻药并无效者。

【方论选录】《本事方释义》：五味子气味酸咸微温，入足少阴；川巴戟气味甘温，入足少阴、厥阴；肉苁蓉气味咸温，入肾；人参气味甘温，入脾胃；菟丝子气味甘平，入脾肾；熟地黄气味甘苦微寒，入肾；覆盆子气味辛甘微温，入肝肾；白术气味甘温，入脾；益智仁气味辛温，入足太阴；茴香气味辛温，入肝肾；骨碎补气味苦温，入足少阴；白龙骨气味凉涩，入足少阴，能收敛浮越之气；牡蛎气味咸涩微寒，入足少阴。此方主治肝肾皆虚，精气不能收敛，肌肤不能润泽，补下药中必兼补中焦之品者，以精气必生于五谷也。

【备考】 本方方名；《证治要诀类方》引作“五味丸”。

02079 五味子丸

【方源】《普济方》卷一八〇引《经验良方》。

【组成】 五味子四两 熟地黄六两 肉苁蓉八两 菟丝子二两（酒浸，蒸）

【用法】 上为末，酒煮山药末为糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，米饮送下。

【主治】 禀赋弱，小便数亦不禁。

02080 五味子丸

【方源】《准绳·类方》卷六。

【组成】 人参 五味子 破故纸（炒） 白术各二两 山药（炒） 白茯苓各一两半 吴茱萸 川巴戟（去心） 肉果（面裹煨）各一两 龙骨（煅）五钱

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】 下元虚寒，火不生土，及肾中之土不足，以致关门不闭，名曰肾泄，亦名脾肾泄。

02081 五味子汤

【方源】《普济方》卷三十四引《护命》。

【组成】 五味子 白茯苓（去皮） 人参 芎藭 远志（去心） 酸枣仁 熟地黄（焙） 麦门冬各一分（去心） 桑寄生五钱

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，加大枣二枚，煎七分，任意服。

【主治】 胆虚冷，头痛，心中惊悸，睡卧不安，常如人将捕之，精神不守。

02082 五味子汤

【方源】《活人书》卷十七。

【异名】 加味生脉散(《医学入门》卷四)。

【组成】 人参一分 五味子半两 麦门冬（去心）一分 杏仁（去皮尖） 一分 橘皮（去白）一分

【用法】 上锉，如麻豆大。加生姜十片，枣子三枚，以水三大白盏，煎至一盏半，去滓，分二次服。

【主治】 伤寒、痘疹、产后等见气虚喘促咳嗽，脉伏而厥者。

①《活人书》：伤寒喘促，脉伏而厥。②《医方类聚》引《伤寒心要》：汗下后，气闭咳嗽。③《丹溪心法》：虚喘脉微，色青黑，四肢厥，小便多。④《准绳·幼科》：痘疹喘促咳嗽。⑤《准绳·女科》：产后喘促，脉伏而厥。

【备考】《济阴纲目》汪箕箧：此补肺法，果虚者宜之。

02083 五味子汤

【方源】《三因》卷五。

【组成】 五味子 附子（炮，去皮脐） 巴戟（去心） 鹿茸（燎去毛，酥炙） 山茱萸 熟地黄 杜仲（制炒）各等分

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，盐少许，煎七分，去滓，食前服。

【主治】 肾虚坐卧湿地，腰膝重着疼痛，腹胀满，濡泄无度，行步艰难，足痿清厥，甚则浮肿，面色不常，或筋骨并辟，目视眩眩，膈中咽痛。

02084 五味子汤

【方源】《三因》卷十二。

【组成】 陈橘皮二两 麻黄（去节） 甘草（炙） 杏仁（去皮尖，麸炒） 五味子 白茯苓各一两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，煎七分，去滓，食后、临卧带热服，一日三次。

【主治】 秋、冬之交，皮肤为寒湿所搏，寒气内折，咳嗽昼夜不已。

02085 五味子汤

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】 五味子一两 黄耆（炒）三两 人参二两 麦门冬一两 粉草（炙）五钱

【用法】 上每服五钱，水煎，日夜服五七剂。

【主治】 ①《外科精要》：痈疽，肾水枯涸，口燥舌干。②《普济方》：肾水枯竭，运用不上，致令口中干燥，舌上坚硬，或如鸡内金。

02086 五味子汤

【方源】《直指》卷八。

【组成】 北五味子 杏仁（去皮，麸炒） 橘红各一两 麻黄（去节）一两半 甘草（炙） 生干姜 辣桂各半两

【用法】 上为粗末。每服二钱半，加苏叶三片，水煎服。

【主治】 寒喘。

【加减】 肺虚，加炒阿胶；喘甚，加马兜铃。

02087 五味子汤

【方源】《朱氏集验方》卷五。

【组成】 五味子 胡桃肉各一两半 生姜五两（去皮） 甘草 杏仁各一两

【用法】 上将五味子四味于钵中研烂如泥，同甘草末再研令得所，入瓷盒中，取沸汤调服。加人参尤妙。

【功用】 益肺。

【主治】 寒嗽。

02088 五味子汤

【方源】《奇效良方》卷一。

【异名】 五味汤(《嵩崖尊生》卷十)。

【组成】 五味子 杏仁（炒，去皮尖） 桂心各一钱 防风（去芦） 甘草（炙） 赤芍药 川芎各二钱 川椒三分

【用法】 上作一服。水二钟，煎一钟，不拘时候服。

【主治】 肺脏中风，多汗恶风，时咳短气，昼愈夜甚，其状偃卧胸满，息促冒闷，其鼻两边，下至于口，上至于眉白色。

【方论选录】《医略六书》：风中肺脏，卫外不密而真阳暗虚，故多汗恶风，喘咳短气焉。五味、桂心温营气以收肺，白芍、防风敛营血以祛风，杏仁降逆气，炙草缓中州，川椒补真火以纳气也，俾气顺痰消，则肺叶宁而呼吸有权，何患喘咳短气乎？此敛散合用之剂，为阳虚风中肺脏，喘咳多汗之专方。

02089 五味子汤

【方源】《医方集解》。

【组成】 生脉散加陈皮 甘草

【主治】 肺虚少气，咳嗽自汗。

【备考】 本方改为丸剂，名"补气丸"(见原书)。

02090 五味子汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】 五味 山萸 龙骨 牡蛎 首乌 远志 五倍子 地骨皮

【主治】 肾虚而汗。

02091 五味子散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 五味子二两 诃黎勒一两半（煨，用皮） 紫菀一两（洗去苗土） 桂心一两 麻黄一两（去根节） 干姜半两（炮裂，锉） 前胡一两（去芦头） 细辛一两 款冬花一两 木香半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 气极，寒伤于肺，咳嗽短气，不得息，胸中迫急。

02092 五味子散

【方源】《本事》卷四。

【异名】 溏泄散(《仙拈集》卷一)。

【组成】 五味子二两（拣） 吴茱萸半两（细粒，绿色者）

【用法】 上药同炒香熟为度，研细末。每服二钱，陈米饮送下。

【主治】 ①《本事》：肾泄。②《医略六书》：五更泄泻，腹痛，脉弱者。

【方论选录】 ①《济阳纲目》：五味子以强肾水，补养五脏；吴茱萸除脾中之湿，湿少则脾健，脾健则制水不走。②《医略六书》：肾虚木旺，腹痛泄泻每于五更寅卯之时，可知寅卯属木，而木应乎肝，以肝主疏泄，肾气不能收摄焉。五味子敛肺，专收肾气之虚乏，吴茱萸温中，能平肝木之独旺，为散，米饮调，使肝木和平，则脾胃健旺而敷化有权，津液四布，安有五更泄泻、腹痛之患乎？③《本事方释义》：五味子气味酸咸微温，入足少阴，然研碎用则五味皆全，兼能入五脏也；吴茱萸气味辛温，入足阳明、厥阴。此方治肾泄不止，而送药以米饮者，中宫有谷气可恃，使药性直入少阴，则所感之阴气得辛温之益，而肾中之阳自振矣。

【临证举例】 肾泄 顷年有一亲识，每五更初欲晓时，必溏痢一次，如是数月。有人云：此名肾泄，肾感阴气而然，得此方服之而愈。

02093 五宝仙丹

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【异名】 五宝散(《外科正宗》卷三)、五宝丹(《景岳全书》卷六十四)、五宝圣灵丹(《外科学讲义》)。

【组成】 珍珠一分半 琥珀一分半 片脑一分半 朱砂一分半 滴乳石三分 飞面（炒过）三分 土茯苓十二斤（每一日用一斤煎汤十二碗，一日要饮尽，不可用别汤水，日日如此，服尽十二帖为愈）

【用法】 上为细末，分作十二帖。每服一分，空心土茯苓汤调下。

【主治】 天疱顽疮、杨梅溃烂、顽癣经年不愈者。

02094 五柴胡饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 柴胡一二三钱 当归二三钱 熟地三五钱 白术二三钱 芍药钱半（炒用） 炙甘草一钱 陈皮酌用或不用

【用法】 水一钟半，煎七分，食远热服。

【主治】 中气不足，外邪不散；伤寒，疟疾，痘疮。

【加减】 寒胜无火者，减芍药，加生姜三五七片，或炮干姜一二钱，或再加桂枝一二钱则更妙；脾滞者，减白术；气虚者，加人参随宜；腰痛者，加杜仲；头痛者，加川芎；劳倦伤脾、阳虚者，加升麻一钱。

【备考】 此与四柴胡饮相表里，但四柴胡饮止调气分，此则兼培血气以逐外邪，尤切于时用者。

02095 五倍子丸

【方源】《医学从众录》卷三。

【组成】 五倍子（青盐煮，晒，焙） 茯苓各二两

【用法】 蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，空心盐汤送下，或以药汁送下，一日二次。

【主治】 遗精。

02096 五倍子汤

【方源】 《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】 五倍子一两

【用法】 煎汤，入皮消，熏洗。

【主治】 脱肛。

02097 五倍子散

【方源】 《圣济总录》卷一一八。

【组成】 五倍子（去心中虫） 槐花（择）各等分

【用法】 上为细散。每用蜜调敷唇上。如疮口干，以葱涎调涂之。

【主治】 口唇生疮。

02098 五倍子散

【方源】 《普济方》卷三三〇。

【组方】 大艾一两（醋煮） 五倍子二两（炒末） 乌梅半两（去核） 川芎半两

【用法】 上为末。每服二钱，空心米饮送下。两服止。

【主治】 血崩，带下。

02099 五倍子散

【方源】 《外科正宗》卷三。

【组成】 五倍子 癞虾蟆草 轻粉 冰片

【用法】 五倍子大者，敲一小孔，用阴干癞虾蟆草揉碎填塞五倍子内，用纸塞孔，湿纸包煨，片时许取出，待冷去纸，碾为细末，每一钱加轻粉三钱、冰片五厘，共研极细。用洗痔枳壳汤洗后，用此干搽痔上，即睡勿动，其肿痛即除。

【主治】 诸痔举发，坚硬疼痛难忍。或脏毒，肛门泛出，肿硬不收。

02100 五倍子散

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 五倍子 15 克 生甘草 15 克 乌梅 15 克 黄柏 15 克 枯矾 15 克

【用法】 上为细末。外用。

【主治】 女阴溃疡。

02101 五倍子膏

【方源】 《本草纲目》卷三十九引《集灵方》。

【组成】 五倍子

【用法】 上为末，津调。填脐中，缚定。

【主治】 自汗，盗汗。

02102 五蛊胀丸

【方源】 《赤水玄珠》卷五。

【组成】 官桂 归尾 槟榔 橘红 枳壳（炒） 莪术（炒） 三棱（炒） 大黄（酒煮） 青皮 黑丑（君） 白商陆（君） 芫花（君） 大戟 甘遂（去心，面包，煮） 赤小豆 椒目 木香 砂仁 干漆（炒烟尽，君） 枳实（炒）

【用法】 醋糊为丸，如梧桐子大。初服三日，每服九十丸；过三日，服八九十丸；又过三日，服七十丸。空心用葱七根煎汤送下，又行四五次为度。行后以温粥补之。不行而吐者亦妙，次用补法。

【主治】 蛊胀。

【宜忌】 忌盐四十日。

02103 五磨饮子

【方源】 《医便》卷三。

【组成】 木香 乌角沉香 槟榔 枳实 台乌药 各等分

【用法】 白酒磨服。

【主治】 ①《医便》：七情郁结等气，或胀痛，或走注攻冲。②《医方考》：暴怒暴死者，名曰气厥。

【方论选录】 《医方考》：怒则气上，气上则上焦气实而不行，下焦气逆而不吸，故令暴死。气上宜降之，故用沉香、槟榔；气逆宜顺之，故用木香、乌药；佐以枳实，破其滞也；磨以白酒，和其阴也。

02104 五七犀角饮

【方源】 《银海精微》卷上。

【组成】 犀角 人参 茯苓 甘草 远志各一两 麝香少许 龙胆草 黄芩各五钱

【用法】 上㕮咀。水煎服。

【主治】 小儿通睛。黄仁水轮皆黑，似无黄仁，瞳仁水散，似无瞳仁，黄仁与瞳仁通混不分。

02105 五子十皮汤

【方源】 《玉案》卷五。

【组成】 茯苓皮 草果皮 牡丹皮 生姜皮 大腹皮 地骨皮 木瓜皮 木通皮 五加皮各一钱 甘草皮五分 大腹子 车前子 葶苈子 紫苏子 菟丝子各一钱二分

【用法】 加灯心三十茎，水煎，空心服。

【主治】 一切蛊胀，气虚中满，单腹胀。

02106 五子五皮汤

【方源】 《温热经纬》卷五。

【组成】 五加皮 地骨皮 茯苓皮 大腹皮 生姜皮 杏仁 苏子 葶苈子 白芥子 莱菔子

【主治】 ①《温热经纬》：喘胀。②《湿温时疫治疗法》：阴水肿而且喘。

【备考】 本方方名，《湿温时疫治疗法》引作"五子五皮饮"。

02107 五子五皮饮

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】 苏子三钱（炒） 葶苈二钱（甜） 桑皮钱半 腹绒钱半 葫子三钱 车前三钱 陈皮钱半 地肤子三钱（炒） 苓皮三钱 姜皮钱半

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 喘胀浮肿，脉滑实者。

【方论选录】 痰气内壅，湿热外溢而肺胃气逆，故喘胀不眠，肤肿面浮焉。葶苈泻湿热以定喘，苏子降痰逆以散气，桑皮清肺肃金，腹绒泄滞宽胀，葫子消痰食；陈皮利中气，车前子利水以清热，地肤子利水以益阴，苓皮渗皮肤之湿热，姜皮散皮肤之浮肿。使滞散气行，则痰消而湿热自化，何患喘胀不除，浮肿不退乎。

02108 五子全鹿丸

【方源】《赤水玄珠》卷十。

【组成】 金樱子（去核） 枸杞子（酒洗，去蒂） 菟丝子（水淘净，酒浸三日，焙干） 黄柏（去粗皮）各五斤 白茯苓（去皮） 牛膝（去芦） 杜仲（去粗皮，姜汁炒）各二斤 车前子（洗净）一斤 五味子（酒洗）一斤半

【用法】 上为粗末，用角鹿一只，取血拌药晒干，其角煎胶；肉与五脏煮极烂，将药末拌匀，捣成饼，焙干；骨用油炙酥，皮煮成胶，将前饼复磨为细末，用鹿角胶及鹿皮胶加酒拌匀，再加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心及下午食前淡盐汤送下；寒月酒送下。

【功用】 补五脏，养精神，填骨髓，壮元阳，健筋骨，多生育，延年益寿。

02109 五子衍宗丸

【方源】《摄生众妙方》卷十一。

【组成】 甘州枸杞子八两 菟丝子八两（酒蒸，捣饼） 辽五味子二两（研碎） 覆盆子四两（酒洗，去目） 车前子二两（扬净）

【用法】 上各药俱择道地精新者，焙、晒干，共为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服空心九十丸，上床时五十丸，白沸汤或盐汤送下，冬月用温酒送下。修合日，春取丙丁巳午，夏取戊己辰戌丑未，秋取壬癸亥子，冬取甲乙寅卯。

【功用】 男服此药，填精补髓，疏利肾气，种子。

【主治】《中国药典》：肾虚腰痛，尿后余沥，遗精早泄，阳萎不育。

【方论选录】《陕西中医》(1986；7:314)：本方皆为植物种仁，味厚质润，既能滋补阴血，又蕴含生生之气，性平偏温，擅于益气温阳。方中菟丝子温肾壮阳力强；枸杞填精补血见长；五味子五味皆备，而酸味最浓，补中寓涩，敛肺补肾；覆盆子甘酸微温，固精益肾；妙在车前一味，泻而通之，泻有形之邪浊，涩中兼通，补而不滞。

02110 五仁斑龙胶

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】 鹿角（连脑盖骨者佳，自解者则不用，去盖用生）五十两（截作三寸段，新汲淡泉井水浸洗去垢，吹去角内血腥秽水尽） 人参五两 天门冬（去心皮）五两 麦门冬（去心）五两 甘枸杞子八两（去蒂） 川牛膝（去芦）五两

【用法】 五品药，以角入净坛内，注水至坛肩，用笋壳、油纸封固其口，大锅内注水，用文武火密煮三昼夜足；时常加入沸汤于锅内，以补干耗，取出，滤去滓，将汁复入阔口砂锅内，煎熬成胶听用；和药末。

【功用】 生精养血，益智宁神，顺畅三焦，培填五脏，补肾精，美颜色，却病延年。

【主治】 真阳元精内乏，以致胃气弱，下焦虚惫，梦泄自汗，头眩，四肢无力。

02111 五仁橘皮汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 甜杏仁三钱（研细） 松子仁三钱 郁李净仁四钱（杵） 原桃仁二钱（杵） 柏子仁二钱（杵） 广橘皮钱半（蜜炙）

【功用】 润燥滑肠。

【主治】 体虚便秘。

【加减】 若欲急下，加元明粉二钱，提净白蜜一两，煎汤代水可也；挟滞，加枳实导滞丸三钱；挟痰，加礞石滚痰丸三钱；挟饮，加控涎丹一钱；挟瘀，加抵当丸三钱；挟火，加当归龙荟丸三钱；挟虫，加椒梅丸钱半，或吞服，或包煎。

【方论选录】 杏仁配橘皮，以通大肠气闭；桃仁合橘皮，以通小肠血秘；气血通润，肠自滑流，故以为君；郁李仁得橘皮，善解气与水互结，洗涤肠中之垢腻，以滑大便，故以为臣；佐以松、柏通幽，幽通则大便自通。

02112 五叶芦根汤

【方源】 方出《温热经纬》引《薛生白湿热病篇》，名见《湿温时疫治疗法》。

【组成】 藿香叶 薄荷叶 鲜荷叶 枇杷叶 佩兰叶 芦根 冬瓜仁

【功用】《通俗伤寒论》：轻扬发表。

【主治】 ①《温热经纬》引《薛生白湿热病篇》：湿热症数日后，湿热已解，余邪蒙蔽清阳，胃气不舒，脘中微闷，知饥不食者。②《重订通俗伤寒论》：伤寒温热病，阳郁外闭。

【备考】《湿温时疫治疗法》用藿香叶、佩兰叶、薄荷叶、鲜荷叶各一钱。先用去毛枇杷叶一两、鲜冬瓜皮、活水芦根各二两，煎汤代水。本方方名，《中医内科临床治疗学》引作“五叶汤”。

02113 五叶茅根汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 桑叶二钱 淡竹叶二钱 枇杷叶五钱（去毛） 兰叶三钱 生侧柏叶二钱 鲜茅根一两

【主治】 风湿证，头痛发热，微汗恶寒，骨节烦疼，体重微肿，小便欠利，脉来浮缓，经祛风通络，利湿清热后，余热尚存者。

02114 五仙助肾丹

【方源】《扶寿精方》。

【组成】 八角茴香 破故纸 杜仲（青盐末炒去丝） 青盐各八分 肉苁蓉（酒洗，去浮甲）

【用法】 上为细末，大猪腰子一枚，去筋膜，分四片，下相续夹末片中，包以荷叶，外加湿纸，慢火上炙熟。空心酒送下。

【主治】 腰痛。

02115 五汁一枝煎

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 鲜生地汁四大瓢 鲜茅根汁两大瓢 鲜生藕汁两大瓢 鲜淡竹沥两大瓢 鲜生姜汁两滴 紫苏旁枝二钱（切寸）

【用法】 先将紫苏旁枝煎十余沸，取清汤盛盖碗中，和入五汁，重汤炖，温服。

【功用】 清润心包，濡血增液。

【主治】 心包邪热，开透肃清后，血虚生烦，懊憹无奈，心中不舒，间吐粘涎，呻吟错语。

【方论选录】 方中鲜地、茅根、藕汁三味，清润心包血液为君；臣以姜、沥二汁，辛润流利，以涤络痰；妙在佐紫苏旁枝，轻清宣络，以复其旁通四本之常。

02116 五汁安中饮

【方源】《新增汤头歌诀》引张任候方。

【组成】 牛乳六分 韭汁 姜汁 藕汁 梨汁各一分

【用法】 和服。

【主治】 ①《新增汤头歌诀》引张任候：火盛血枯、或瘀血寒痰阻滞胃口所致之反胃噎膈。②《中医内科学讲义》：噎膈。胸膈痞满隐痛，吞咽梗阻，口干咽燥，大便艰涩，形体逐渐消瘦，舌质红，脉弦细者。

【方论选录】 牛乳润燥养血为君，韭汁、藕汁消瘀益胃，姜汁温胃散痰，梨汁消痰降火。

02117 五加三皮散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 五加皮二两 桂皮一两 绵皮一钱五分 良姜五钱 砂仁五钱

【用法】 上为末。每服三茶匙，黄酒调服。

【主治】 跌扑损伤。

【加减】 如骨碎，加丹皮一两，乳香、没药、血竭各一钱。

02118 五加皮浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】 五加皮三两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 独活一分 地骨皮二两 防风一两（去芦头） 丹参一两半 熟干地黄三两 牛膝二两（去苗） 乌喙二两（炮裂，去皮脐） 干姜一两（炮裂，锉） 石南叶二两 虎胫骨五两（涂酥，炙微黄）

【用法】 上锉细，以生绢袋盛，用清酒二斗，于瓷瓶中浸，密闭七日后开。每次温饮一小盏，一日三五次，常令熏熏，以愈为度。

【主治】 风毒气攻腰脚，连骨髓，日夜疼痛。

02119 五色戒烟丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 潞党参二钱 炙黄耆二钱 肥玉竹二钱 制半夏一钱五分 旋覆花二钱 薄橘红一钱二分 甘杞子二钱 云茯苓二钱 白蔻仁三分 使君子二钱 厚杜仲二钱 益智仁一钱五分 酸枣仁一钱五分 炮姜炭二钱 上肉桂五分 广木香五分 沉香片五分 罂粟壳二钱 金牛草二钱 川贝母一钱 青盐三钱 赤砂糖二两 甘草一钱 淡菜二两 红枣二两 烟灰五钱

【功用】 戒烟。

02120 五色鸡肝散

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】 石决明一两（九孔者，童便煅） 炉甘石六钱（煅） 赤石脂五钱（煅） 朱砂五钱（水飞，不见火） 海螵蛸四钱（炒黄） 雄黄四钱 白滑石八钱

【用法】 上为极细末。每岁一分，用不落水鸡肝一具，竹刀切开，掺药在内，箬包扎，瓦罐内米泔

煮熟食之。

【主治】 疳积夜眼。

【宜忌】 此药忌见铜、锡、铁器。

02121 五利大黄汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】 大黄六钱 丹皮三钱 冬瓜子三钱 桃仁二十粒 滑石三钱

【用法】 水煎服。如下后虚乏者，宜参用参耆地黄汤。

【主治】 大肠生痈。

02122 五秀重明丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】 甘菊（开头者）五百朵 荆芥穗五百穗 木贼五百根 楮实五百个 川椒五百粒（炒，去目）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后细嚼，时时咽下；含化亦得。

【功用】 常服清利头目。

【主治】 翳膜遮睛，隐涩昏花。

【宜忌】 忌酒、肉、热物。

02123 五苓甘露饮

【方源】《金鉴》卷三十八。

【组成】 五苓散加寒水石 滑石 石膏

【主治】 水停内热。

02124 五虎二陈汤

【方源】《古今医鉴》卷四。

【组成】 麻黄（去节）一钱 杏仁十四粒（泡） 石膏（煅过）一钱 橘皮一钱 半夏（姜制）一钱 茯苓（去皮）八分 甘草八分 人参八分 木香七分 沉香七分 细茶一钱

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，葱白三茎，蜜三匙，水煎服。

【主治】 哮吼喘急痰盛。

02125 五虎追风散

【方源】《中医杂志》（1955；10）。

【组成】 蝉蜕一两 天南星二钱 明天麻二钱 全虫（带尾）七个 僵蚕（炒）七条

【用法】 水煎服。用黄酒二两为引。服前先将朱砂面五分冲下，每服后五心出汗即有效。但出汗与否，应于第二日再服，每日一付，服完三付后，第二日用艾灸伤口。

【功用】《中医方剂临床手册》：祛风痰，止痉抽。

【主治】 破伤风。

02126 五味子蜜丸

【方源】《新医药学杂志》（1973；9）

【组成】 北五味子（陕西产，烘干或阴干）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸含生药6克。成人每次服0.5～1丸（相当于生药一至二钱），每天3次，一个月为一疗程。小儿剂量减半。谷丙转氨酶值降至正常后，可酌情减半量服用。对个别疗效不明显的病例，亦可加大剂量，每次可服1.5～2丸（相当于生药三至四钱）。

【功用】 降转氨酶，改善肝功能。

【主治】 传染性肝炎。

02127 五味去湿散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 黄柏31克 蛤粉62克 轻粉31克 白芷31克 石膏62克 冰片6克

【用法】 上为极细末，和匀；亦可调成油膏。外用。

【主治】 慢性湿疹。

02128 五味活血汤

【方源】《千家妙方》。

【组成】 公英30克 地丁30克 银花30克 紫背天葵30克 蚤休30克 归尾10克 赤芍12克 红丹参20克 鸡血藤20克 川牛膝20克 黄耆15克 防己15克

【用法】 每日一剂，水煎服。

【功用】 清热解毒，活血化瘀。

【主治】 热毒流注。寒湿郁久化热成毒，经络阻塞，气血瘀滞，肉腐，筋烂，骨枯，骨脱者。常用于血栓闭塞性脉管炎。

02129 五味消毒饮

【方源】《金鉴》卷七十二。

【异名】 五味消毒汤（《家庭治病新书》引《外科探源》）、消毒饮（《吉人集验方》下集）。

【组成】 金银花三钱 野菊花 蒲公英 紫花地丁 紫背天葵子各一钱二分

【用法】 水二钟，煎八分，加无灰酒半钟，再滚二三沸时热服。滓如法再煎服。被盖出汗为度。

【功用】《方剂学》：清热解毒，消散疔疮。

【主治】 各种疔毒，痈疮疖肿。

①《金鉴》：红丝疔、暗疔、内疔、羊毛疔，初起服蟾酥丸汗之，毒势不尽，憎寒壮热仍作者。②《家庭治病新书》引《外科探源》：疔疮发无定处，未化或已化，或走黄者。③《方剂学》：火毒结聚的痈疮疖肿。初起局部红肿热痛、或发热恶寒；疮形如粟，坚硬根深，状如钉丁，舌红，苔黄，脉数。

【方论选录】 ①《方剂学》：痈疮疔毒，多由脏腑蕴热，火毒结聚。故治用清热解毒为主，以便积热火毒清解消散。方以银花两清气血热毒为主；紫花地丁、紫背天葵、蒲公英、野菊花均各有清热解毒之功，配合使用，其清解之力尤强，并能凉血散结以消肿痛。加酒少量是行血脉以助药效。②《中医杂志》(1984；4:52)：方中金银花、野菊花，功擅清热解毒散结，金银花入肺胃，可解中上焦之热毒，野菊花入肝经，专清肝胆之火，二药相配，善清气分热结；蒲公英、紫花地丁均具清热解毒之功，为痈疮疔毒之要药；蒲公英兼能利水通淋，泻下焦之湿热，与紫花地丁相配，善清血分之热结；紫背天葵能入三焦，善除三焦之火。五药合用，气血同清，三焦同治，兼能开三焦热结，利湿消肿。

【临证举例】 疔疮 《广东中医》(1958；6:24)：丁某某，男，28岁，三天前喉部发生疔疮，疼痛异常，颈项不能转动，曾经注射青霉素90万单位，并内服磺胺类药物，但病情无好转，渐趋严重。处方：银花五钱，杭菊三钱，蒲公英三钱，天葵子三钱，紫花地丁三钱，金石斛三钱。服二剂即愈。

02130 五物香薷汤

【方源】《直指》卷二。

【异名】 五物香薷饮(《医方集解》)、五味香薷饮(《医钞类编》卷三)。

【组成】 香薷三两 白扁豆(姜制) 厚朴(制) 白茯苓各一两半 甘草(炙) 一两

【用法】 上锉。每服三钱，水煎，温服。

【功用】 ①《直指》：驱暑和中。②《普济方》：调营卫，益脾温胃，散宿痰停饮。

【主治】 ①《直指》：中暑。②《普济方》：饮食不节，饥饱失时，或冷物过多，或硬物壅驻，或食毕便睡，或惊忧悲，或劳役动气便欲饮食，致令脾胃不和，三脘痞滞，内感风冷，外受寒邪，憎寒壮热，遍体疼痛，胸膈满闷，霍乱呕吐，脾疼翻胃，中酒不醒，四时伤寒头痛。

【方论选录】《证因方论集要》：香薷辛温香散，能入脾肺气分，发越阳气，以散皮肤之蒸热；厚朴辛温，除湿散满，以解心腹之凝结；茯苓、扁豆甘淡，能消脾胃之暑湿，降浊而升清；甘草和中健脾；香薷乃夏月解表之药，如冬月之麻黄，气虚者尤不可服。

02131 五香导气丸

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】 沉香一两 檀香一两 制香附一两 广木香一两 紫丁香六钱 砂仁一两 枳实八钱 槟榔一两 姜汁厚朴一两五钱 石菖蒲五钱 郁李仁六钱(去壳)

【用法】 上为细末，用神曲糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，淡姜汤送下。

【主治】 一切食积气滞，五脏不和，九窍不通，大便闭结，胸中饱胀，心胃气痛。

02132 五香连翘汤

【方源】《千金》卷五。

【异名】 五香散(《圣惠》卷九十)。

【组成】 青木香 熏陆香 鸡舌香 沉香 麻黄 黄芩各六铢 大黄二两 麝香三铢 连翘 海藻 射干 升麻 枳实各半两 竹沥三合(一方不用麻黄)

【用法】 上㕮咀。以水四升，煮药减半，纳竹沥，煮取一升二合，儿生百日至二百日，一服三合；二百日至期岁，一服五合。

【主治】 小儿风热毒肿，肿色白，或有恶核瘰疬，附骨痈疽，节解不举，白丹走竟身中，白疹瘙痒不已。

02133 五香连翘汤

【方源】《集验背疽方》。

【异名】 李氏五香连翘散(《医方类聚》卷一七五引《澹寮》)。

【组成】 木香三分(不见火) 沉香三分(不见火) 连翘(全者，去蒂)三分 射干三分 升麻三分 黄耆三分(拣无叉附者，生用) 木通三分(去节) 甘草半两(生用) 丁香半两(拣去枝杖，不见火) 乳香半两(别碾) 大黄(微炒，锉)半两 麝(真者，别碾)一钱半 桑寄生三分(难得真者，缺之亦可) 独活三分

【用法】 上为粗末，和匀。每服三大钱，水一盏，煎至七分，去滓服。留滓二服，用水二盏再煎作一服。积四散滓，用水二盏，又再煎作一服，然后不用其滓。一方用银器煎药，如无银器入银一片同煎。

【主治】 ①《集验背疽方》：痈疽。②《普济方》：一切积热恶核、瘰疬、痈疽、恶疮、发脑、发背。

【加减】 若无真桑寄生，则升麻分量当倍用。

02134 五香连翘汤

【方源】《妇人良方》卷二十。

【组成】 木香 沉香 丁香 乳香 麝香 升麻 独活 桑寄生 连翘 木通各二两(一方有大黄一两)

【用法】 上为粗散。每服五钱，水二盏，入竹沥

少许，搅停，去滓温服。

【主治】 ①《妇人良方》：产后血滞于经络，恶露方行，忽然渐少，断绝不来，腰中重痛，下注两股，痛如锥刀刺痛，恐作痈者。②《普济方》：产后伤于经血，虚损不足，或分解之时，恶血不尽，在于腹中，而脏腑挟于宿冷，致气血不调，令恶露淋漓不绝。

02135 五香连翘汤

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】 沉香 藿香叶 木香 丁香各一两 麝香一字（五味为粗末，另研） 连翘 射干 独活 升麻 甘草（炙） 寄生草各一两 大黄一两五钱

【用法】 后七味㕮咀，与前五味和匀。每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，食前温服。取利为效，末效则再服。

【主治】 人年四十以前，气血盛多，患疮疽，大小便秘者。

【备考】 本方去五香，名“七味连翘汤”。

02136 五香连翘汤

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】 乳香 木香 沉香 丁香 香附 黄耆 射干 连翘 升麻 木通 独活 桑寄生 甘草各一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 脑疽、痈疽、时毒邪气郁滞不行者。

02137 五香流气饮

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 金银花二两 僵蚕 连翘 羌活 独活 瓜蒌仁 小茴各一两五钱 藿香五钱 丁香一钱 木香 沉香 甘草各一钱

【用法】 上分为十剂，水煎，随上下服。如为丸，绿豆大，雄黄五分为衣，滚水送下。

【主治】 ①《外科大成》：结核痰核及阴毒流毒。②《金鉴》：黄鳅痈。由肝、脾二经湿热凝结而成，生于小腿肚里侧，疼痛肿硬，长有数寸，形如泥鳅，其色微红。

【临证举例】 急性血栓性静脉炎 《江苏医药·中医分册》（1979；3:25）：用本方治疗七例急性血栓性静脉炎，皆获显效。并发现本方具有迅速控制炎症，防止疾病荏苒迁延之功。如一中年男性，因患大隐静脉曲张，血栓性静脉炎（急性期），已服清热解毒、活血化瘀之品不见效，近四天病情加重，伴有身热纳差，红肿痛甚，由原来5公分发展到18公分。试投“五香”二剂后，全身症状改善，病灶停止发展，疼痛锐减。继进五剂，全身症状消失，局部红肿消退。又给五剂，复查惟见6公分之索状静脉，但无压痛，临床治愈，转用活血化瘀法治疗。

02138 五积交加酒

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】 白芷 陈皮 厚朴 枳壳 桔梗 川芎 白芍 苍术 当归 茯苓 半夏 官桂 干姜 麻黄 甘草 小茴（酒炒） 牛膝（酒炒） 杜仲（酒炒） 大附子（制） 川乌 吴茱萸 槟榔 木瓜 草果 砂仁 破故纸（酒炒） 羌活 胡芦巴 威灵仙各等分

【用法】 共合一斤，用陈酒十壶，生姜十斤，大枣十格，瓦罐炊熟。每日空心温服。

【主治】 诸湿足膝麻木，冷痹缓弱，及腰痛脚气下虚之疾。

02139 五倍子复方

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 五倍子（文火炙黄）15克 人中白9克 青黛1.5克 精梅片1克 煅石膏10克

【用法】 上为细末。吹口腔内，一日四五次。

【主治】 鹅口疮。

02140 五倍苦矾散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 五倍子10克 枯矾10克

【用法】 上为细末。外用。

【主治】 足癣。

02141 五疳消食丸

【方源】《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】 麦芽 使君子（去壳，炒） 黄连（去须，微炒） 橘红（焙） 草龙胆 芜荑各等分

【用法】 上为细末，粟米糊为丸，如粟米大。每服二三十丸，空心米饮送下，不拘时候。

【功用】 大能进食，悦颜色，长肌肤，杀虫。

【主治】 小儿五疳八痢，疳劳及走马，牙齿唇烂，肚大青筋。

02142 五疳消食丸

【方源】《玉机微义》卷五十。

【异名】 五疳消积丸（《幼科指南》卷下）。

【组成】 使君子（肉炒） 麦蘖（炒） 陈皮 麦曲 芜荑 草龙胆 黄连（炒） 糖球子各等分

【用法】 上为细末，陈米饭为丸，如黍米大。每服十丸，米饮送下。

【功用】 消疳杀虫，退热磨积，进食。

【主治】 疳积。

①《玉机微义》：小儿五疳。②《幼科指南》：诸

疳。小儿略见黄瘦，肚大腹痛，不思乳者。③《金鉴》：丁奚疳。肌肉干涩，啼哭不已，手足枯细，面色黧黑，项细腹大，肚脐突出，尻削身软，精神倦怠，骨蒸潮热，燥渴烦急者。

02143 五疳消积丸

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】 三棱 蓬术 陈皮各六两 神曲（炒） 麦芽（炒） 青皮 山楂（去核） 萝卜子（炒）各四两 槟榔 川楝子各二两

【用法】 上为末，面糊为丸，如龙眼大。白汤调下。

【主治】 疳积。遍体生疮，泻痢，兼好吃土泥生米壳、炭煤、茶叶。

02144 五海瘿瘤丸

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】 海带二两 海藻二两 海螵蛸二两 昆布二两 浮麦二两 白芷一两 广木香二钱 海粉二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，二钱重。大人每服一丸，九岁至六岁每服半丸，五岁至两岁每丸分三次服。一日二次，早、晚用开水送下。

【功用】 软坚化核，消肿散瘀，活血舒气。

【主治】 瘿瘤瘰疬，气脖乳核，无名肿毒。

02145 五淋二赤散

【方源】《医统》卷七十一。

【组成】 赤芍药二钱 赤茯苓（去皮） 山栀子各半两 甘草 当归（酒浸）各三钱二分

【用法】 作二服。每服水一盏半，灯心二十茎煎，空心服。

【主治】 诸淋，或如豆汁沙石，或血尿如膏。

02146 五兽三匮丹

【方源】《医方类聚》卷九十八引《澹寮》。

【异名】 五兽三匮丸（《医学入门》卷七）。

【组成】 鹿茸（酥炙） 麒麟竭（即草竭也） 虎胫骨（解片，酥炙） 牛膝（去芦，浸酒） 狗脊（亦草根也，燎去毛）各等分（上修事为细末，即五兽丹料） 辰砂一两（细末） 附子大者一只（生，去皮脐，旋中心空，入辰砂于内） 宣木瓜一只（剜去心，仍薄薄去皮，入上附子于内，以旋附子末盖附子口，正坐于银暖罐中，重汤蒸十分烂，附子断白为度，即三匮丹也）。

【用法】 上用三匮丹研膏，调和五兽末子，为丸如鸡头子大。木瓜酒和降气汤送下。

【主治】 气血虚损，肝肾不足，两脚痿弱。

02147 五痫通明丸

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】 牙皂（去筋皮） 一两六钱（用羊肝一片煮牙皂，去羊肝） 半夏六钱（用朱砂五分炒黄色，去朱砂） 生南星二钱 黑丑（炒） 二钱

【用法】 姜糊为丸，朱砂为衣。每服七十丸，姜汤送下。

【主治】 羊痫风。

【宜忌】 忌鱼、鸡、母猪、牛、羊等肉。

02148 五福化毒丹

【方源】《局方》卷十。

【异名】 青黛丸（《得效》卷十一）、化毒丸（《普济方》卷二六四）。

【组成】 桔梗（微炒） 玄参（洗，焙）各六两 青黛（研） 牙消（枯） 人参（去芦）各二两 茯苓（去皮）五两 甘草（炒）一两半 银箔八片（为衣） 麝香（研）半钱 金箔八片（为衣）

【用法】 上为细末，入研药匀，炼蜜为丸，每两作十二丸。每一岁儿，一丸分四服，用薄荷水送下；及疮疹后余毒上攻口齿，涎血臭气，以生地黄自然汁化一丸，用鸡翎扫在口内；热疳肌肉黄瘦，雀目夜不见物，食后、临卧用陈粟米泔水化下。

【功用】《医方类聚》引《经验良方》：清膈凉血。

【主治】 小儿热毒内蕴，口舌生疮，常患疮疖。

①《局方》：小儿蕴积毒热，惊惕狂躁，颊赤咽干，口舌生疮，夜卧不宁，谵语烦渴，头面身体多生疮疖。②《医方类聚》引《经验良方》：蜜鼻疳疮，热疳肌肉黄瘦，雀目夜不见物。③《金鉴》：胎敛疮。小儿热极，皮肤火热，红晕成片，游走状如火丹。

02149 五福化毒丹

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 生熟地黄（焙）各五两 元参 天门冬（去心） 麦门冬（去心，焙）各三两 甘草（炙） 甜消各二两 青黛一两半

【用法】 上为细末，后研入消、黛，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服半丸或一丸，食后水化下。

【功用】《准绳·幼科》：凉心膈。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：疮疹余毒上攻口齿，躁烦咽干，口舌生疮，及蕴积毒热，惊惕狂躁。②《景岳全书》：胎毒，及痘后头面生疮，眼目肿痛。

02150 五福化毒丹

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】 五福化毒丸（《鳞爪集》卷下）。

【组成】 玄参 桔梗 赤苓各二两 人参三钱 黄连 龙胆草 青黛 牙消各一两 甘草五钱 冰片五分 朱砂三钱 金箔二十张（为衣）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，薄荷、灯心汤化下；疮疹后余毒上攻，口齿涎血臭秽，以生地黄汁化下。如无地黄，竹叶灯心汤亦可用。

【主治】 ①《外科正宗》：小儿蕴积胎毒，以及诸疮瘾疹，伤风斑症，口舌生疮，痰涎壅盛，谵语烦躁，夜睡不宁者。②《金鉴》：小儿赤游丹毒。

02151 五福延寿丹

【方源】 《便览》卷三。

【组成】 五味子六两 肉苁蓉四两（酒浸，焙） 牛膝三两（酒浸） 菟丝子（酒浸，炒）二两 杜仲（姜炒断丝）三两 天冬（去心）二两 广木香一两 巴戟（去心）二两 山药二两 鹿茸（酥油炙透）一两 车前子（炒）二两 菖蒲（焙）一两 泽泻（去毛）一两 生地一两（酒洗） 熟地一两（酒制） 人参（去芦）一两 乳香一两（另研） 没药五钱（另研） 枸杞子一两 大茴（炒）二两 覆盆子一两 赤石脂（煅）一两 地骨皮二两 杏仁（去皮尖）一两 山茱萸（去核）二两 柏子仁一两 川椒（去目，合口炒）七钱 川楝肉（炒）一两 远志（去心）一两 龙骨（煅）五钱 白茯苓（去皮）一两 当归（酒洗）一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤或盐酒送下。

【主治】 男子女人诸虚百损，五劳七伤，未及半百而须发早白，行路艰难，形容羸瘦，眼目昏花，远年近日咳嗽，吐痰见血，夜梦遗精，并妇人久不生育。

02152 五膈宽中散

【方源】 《局方》卷三。

【异名】 宽中散《得效》卷三。

【组成】 白豆蔻（去皮）二两 甘草（炙）五两 木香三两 厚朴（去皮，生姜汁炙熟）一斤 缩砂仁 丁香 青皮（去白） 陈皮（去白）各四两 香附子（炒去毛）十六两

【用法】 上为细末。每服二钱，加生姜二片，盐少许，沸汤点服，不拘时候。

【主治】 ①《局方》：因忧恚寒热，动气伤神，致阴阳不和，脏腑生病，结于胸膈之间，遂成五膈之病：一曰忧膈，胸中气结，津液不通，饮食不下，羸瘦短气；二曰恚膈，心下实满，噫气酸心，饮食不消，大小便不利；三曰气膈，胸胁逆满，噎塞不通，噫闻食臭；四曰寒膈，心腹胀满，咳嗽气逆，腹上苦冷雷鸣，绕脐痛，不能食肥；五曰热膈，五心中热，口中烂生疮，四肢烦重，唇口干燥，身体或热，腰背疼痛，胸痹引背，不能多食，及一切气疾。②《济阳纲目》：中脘停滞，气不流转，胸膈痞闷，腹痛泄泻，久而不愈。

02153 五膈宽中散

【方源】 《张氏医通》卷十三。

【组成】 厚朴（姜汁炒）二两 甘草（炙）一两 木香五钱 白豆蔻仁三钱

【用法】 上为散。每服三钱，加生姜二片，水煎，入盐一字，和滓服。

【主治】 七情郁结，痰气痞塞，遂成五膈。

02154 五噎膈气丸

【方源】 《本事》卷三。

【组成】 半夏（汤浸七次，薄切，焙） 桔梗各二两 （炒） 肉桂（不见火） 枳壳（去瓤，麸炒）各一两半。

【用法】 上为细末，姜汁糊丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后、临卧姜汤送下。

【主治】 气、食、忧、劳、思虑，致成五噎膈气。

【方论选录】 《本事方释义》：半夏气味辛温，入足阳明；桔梗气味苦辛平，入手太阴，为诸药之舟楫，能引药达上；肉桂气味辛甘大热，入足厥阴；枳壳气味苦寒，入足太阴；姜汁丸、姜汤送，欲令药之入里也。此七情六欲之伤致成五噎膈气之痼，所用之药，乃苦辛以开其郁，使升降无阻，自然奏效矣。

02155 五加减正气散

【方源】 《温病条辨》卷二。

【组成】 藿香梗二钱 广皮一钱五分 茯苓块三钱 厚朴二钱 大腹皮一钱五分 谷芽一钱 苍术二钱

【用法】 水五杯，煮取二杯，一日二次。

【主治】 秽湿着里，脘闷便泄。

【方论选录】 秽湿而致脘闷，故用正气散之香开；便泄而知脾胃俱伤，故加大腹运脾气，谷芽升胃气也。

02156 五味天浆子散

【方源】 《御药院方》卷十一。

【组成】 天浆子一钱 朱砂末一钱半 龙脑一钱 蜈蚣十条（炙） 干蝎十个（炒）

【用法】 上为细末。每服一字，煎薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】 小儿急、慢惊风。

02157 五子益肾补元丸

【方源】《增补内经拾遗》卷四

【组成】 生地八两（掐开内红紫色者佳，酒洗净，以竹刀切片，用少壮乳汁一钟，无灰酒一钟，拌匀，浸一日，入砂锅微炒，不住手，将半燥时，取起，日晒夜烘干） 白茯苓四两（坚白、云南者佳，去皮，同地黄为末，绢包之，藏于糯米饭内蒸一熟，如此制配，引地黄入黄庭宫而用之也） 山茱萸（红润者佳，洗净去核用肉）五两 泽泻（不蛀、色白者佳，去毛根）三两（同山茱萸为末，绢包，饭上蒸一熟，如此制配，引山茱入丹田，则泽泻不为渗矣） 干山药（怀庆者）五两 牡丹皮（壮厚片不枯腐者）四两（温水洗净，即时乘湿拌山药末，绢包，砂锅上白汤蒸一熟，晒干为末，引山药入心包络而生精血也） 柏子仁三两（微炒，另研） 覆盆子（水洗净）二两（炒） 楮实子三两（淘净，炒） 枸杞子（甘州者佳，去梗蒂，取净末）四两 菟丝子四两（淘净，用青盐二钱，煎汤煮熟，杵烂炒干）

【用法】 上各为细末，用真蜡蜜二十两，炼将熟，以浮小麦拣净，取粉四两，芡实子粉四两。少壮妇乳汁三盏，入水二钟打匀，复炼极熟，和前末入石臼内杵为丸，如梧桐子大，晒干。每日一百丸，空心用淡盐汤送下，随即纳风干甘栗子一二枚，或煮熟莲肉十余粒，或煮熟龙眼之类，以助药力归于下元也。

【功用】 益肾精，补元气。

【主治】 肾精亏损，失精。

02158 五子益肾养心丸

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】 六味地黄丸加甘枸杞子四两 柏子仁二两 覆盆子二两 楮实子（炒）二两 沙苑蒺藜子（微炒）二两

【用法】 上为细末，用蜜八两，入斑龙胶先炼，次入浮小麦粉四两，芡实粉四两，水调，亦入胶蜜同炼熟，和药再杵为丸，如梧桐子大。每日服百丸，淡盐汤送下。

【功用】 大补元气，培填虚损。

02159 五胆偃月坠翳丸

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 石决明一两 麝香少许 青鱼胆 鲤鱼胆 青羊胆各七个 牛胆五钱 熊胆一分

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五分，空心茶清送下。

【主治】 日病偃月内障。缘脑风积热注入眼中，肝肾俱劳，以致瞳神内上半边有白气一湾，隐隐似新月之状，复垂向下。

02160 牙仙丹

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 玄参一两 生地五一两

【用法】 水煎服。

【主治】 诸火牙齿痛。

【加减】 心包之火，加黄连五分；肝经之火，加炒栀子二钱；胃经之火，加石膏五钱；脾经之火，加知母一钱；肺经之火，加黄芩一钱；肾经之火，加熟地一两，川柏、知母亦可。

【方论选录】 玄参尤能泻浮游之火，生地亦能止无根之焰，二味又泻中有补，故虚实咸宜，实治法之巧而得其要者也。况又能辨各经之火，而加入各经之药，有不取效如神乎！

02161 牙皂散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 猪牙皂角 紫背浮萍 白梅肉各等分

【用法】 上为末。每洗面时搽洗其斑。

【主治】 雀斑。

02162 牙宣药

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】 牙宣散（《景岳全书》卷六十）。

【组成】 荜茇 胡椒 良姜 乳香（另研） 麝香 细辛 青盐 雄黄各等分

【用法】 上为细末。先以温浆水刷净，后用药末于痛处擦。追出顽涎，休吐了，漱数十次，痛止。

【主治】 牙痛。

【宜忌】 忌油腻一二日。

02163 牙疳散

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】 人中白（煅存性） 绿矾（烧红） 五倍子（炒黑）各等分 冰片少许

【用法】 上为极细末。先用水拭净牙齿，再以此散敷之。

【主治】 牙疳。

【加减】 有虫者，加槟榔。

02164 牙疳散

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 煅甘石二钱 镜面朱砂二分 牛黄五厘 珍珠五厘（煅）

【用法】 上为细末。日敷三次。

【主治】 牙疳。

02265 牙疼塞耳丸

【方源】《理瀹》。

【组成】 川乌底 草乌尖 蜈蚣顶 全蝎梢 雄黄 川椒

【用法】 捲纸，醋酒炙干。塞两耳。

【主治】 骨槽风阴症者；亦治耳聋。

02166 牙痛立止散

【方源】《丁甘仁医案》。

【组成】 荜茇一钱 川椒五分 石膏五分 青盐四分

【用法】 上为细末。点于痛处。

【功用】 立能止痛。

【主治】 牙痛。

02167 车前饮

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 车前子（炒） 蒙花（去枝） 草决明 羌活 白蒺藜（炒，去角） 龙胆草 菊花 粉草

【主治】 肝经积热，上攻眼目，逆顺生翳，血灌瞳人，羞明怕日，多泪。

02168 车前饮

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 车前子三钱 生地五钱 条芩钱半 草梢八分

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 孕妇小便淋沥涩痛，脉数。

【方论选录】 妊娠湿热伤阴，水源不能清利，故小便淋沥涩痛，胎孕因之不安焉。生地滋阴壮水以安胎，车前利水通淋以化热，条芩清热安胎，草梢泻火缓痛也。水煎温服，使湿热并解，则真水内充而气得施化，小便无不清利，何涩痛淋沥之有？胎孕无不安矣。

02169 车前散

【方源】《医方大成》卷七引《曾帅干家藏方》。

【组成】 密蒙花（去枝叶） 羌活 菊花（去枝叶） 白蒺藜（炒、去刺） 粉草 草决明 车前子（各炒） 黄芩 龙胆草（洗净）各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，食后饭汤调服。

【主治】 肝经积热，上攻眼目，逆顺生翳，血灌瞳仁，羞明多泪。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“车前子散”。

02170 车鳖散

【方源】《传信适用方》卷下。

【组成】 紫背大车鳖（一名车蛾，每个用草先扎定，上用盐泥固济，日干，簇火煅之，候通红，半时辰许离火，候通手取，敲去泥，以器皿合在净地上，出火毒半日许，令碾，罗为细末，沙合收） 甘草（炙，碾为末） 轻粉

【用法】 每服抄车鳖末二钱，甘草末一钱，轻粉末半钱，温麦门冬熟水调下，五更初服。至日出时候，大便不痛，下青绿苔，或如黑煤，恶物下也。

【主治】 五发（发脑、发鬓、发眉、发颐，发背）、痈疽、瘰、瘤、癌、才觉发热，疮已现，发渴。

02171 车前子丸

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】 车前子 人参 决明子（微炒） 黄连（去须） 黄芩（去黑心） 大黄（锉，炒） 细辛（去苗叶）各一两 甘草（炙，锉）半两

【用法】 上细锉，焙过为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温浆水送下，临卧再服。

【主治】 肝肾风热，目赤肿瞒痛，生努肉。

02172 车前子汤

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】 车前子五两（生用） 木通（锉）四两 黄芩（去黑心） 郁李仁（汤浸，去皮尖双仁，研如膏）各三两

【用法】 上四味，将前三味为粗末，与郁李仁拌匀。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，入朴消末半钱匕，更煎二沸，食前温服，一日三次。

【主治】 大小便俱不通。

02173 车前子饮

【方源】《养老奉亲》。

【异名】 车前粥（《医统》卷八十七）。

【组成】 车前子五合（绵裹，用水二升，煎取一升半汁） 青粱米三合（一方作四合）

【用法】 上取煎汁煮作饮，空心食之，每日二次。

【功用】 ①《养老奉亲书》：常服明目，除热毒。②《长寿药粥谱》：利水消肿，养肝明目，祛痰止咳。

【主治】 老人赤白痢，日夜无度，烦热不止；老人淋病，小便下血，身体热盛。

【备考】 本方方名，《长寿药粥谱》引作“车前子粥”。

02174 车前子散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】 车前子三分 王不留行半两 冬葵子半两 生干地黄一两 桂心半两 甘草一分（炙微赤，锉） 木通半两（锉） 石韦半两（去毛） 滑石三分

【用法】 上为散。每服二钱，食前以麻子粥饮调下。

【主治】 虚劳小便淋涩，茎中痛。

02175 车前子散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 车前子 赤茯苓 玄参 防风（去芦头） 黄芩 川大黄（锉碎，微炒） 犀角屑 甘草（炙微赤，锉） 栀子仁各半两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服，夜临卧再服。

【主治】 眼白睛肿胀裹瞳仁。

02176 车前子散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 车前子一两 贝齿一两（烧赤） 赤茯苓一两 白术一两 木通一两（锉） 赤芍药一两

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 膏淋。有肥状似膏，与小便俱出。

02177 太一丹

【方源】《传信适用方》卷上。

【组成】 川芎 川乌（去皮尖） 草乌（去皮尖） 白芷 白附子 黑附子（去皮脐） 细辛（去叶，洗） 半夏（洗） 天南星（洗） 天麻等分

【用法】 上并生为细末。如药二十两，即入白面二十两，同拌匀，滴水为丸，如弹子大，日中晒干。每服一粒，茶、酒任嚼下；荆芥、薄荷茶亦得。如伤风、伤寒，头目昏疼，用生葱白一茎同嚼，热茶清送下，不拘时候。

【功用】 消风化痰，清头目，利胸膈。

【主治】 诸风及瘫痪偏风，手足顽麻，肢节缓弱，骨肉疼痛；并治头风；偏正头痛，项颈拘急，头旋目晕，呕吐痰水，或耳鸣耳聋，风痰上盛；及伤风、伤寒，头疼不可忍者。

02178 太一膏

【方源】《百一》卷二十。

【异名】 神仙太一膏（《局方》卷八吴直阁增诸家名方）、太乙膏（《证治要诀类方》卷四）、神效太乙膏（《保婴撮要》卷十六）、太乙灵应膏（《外科经验方》）、太乙清凉膏（《饲鹤亭集方》）、太乙膏丸（《杂病源流犀烛》卷三）。

【组成】 赤芍药 大黄 香白芷 官桂 玄参 当归 生干地黄各一两

【用法】 上锉。先煎清油二斤令香，候沫尽，即入药煎至黑色，取出不用，将油滤过，然后入黄丹一斤，用青柳枝不住手搅，滴于水中成珠不粘手为度，倾入瓷器中，以砖盖口，掘窖子埋树荫下，以上覆三日出火毒，丸如鸡头子大。发背，先以温水洗疮，拭干，用帛子摊膏药贴之，温水送下一丸；久远瘰疬，摊贴，温水送下一丸；诸瘿疮，盐汤洗，贴，酒送下一丸；打扑伤损，摊贴，橘皮汤送下一丸；腰膝疼痛，盐汤送下一丸；妇人血气，木通、甘草汤送下一丸；赤白带下，酒送下一丸；唾血、桑白皮汤送下一丸；风赤眼，摊贴，栀子汤送下一丸；咳嗽，咽喉肿，绵裹一丸含化；一切风劳病，柴胡汤送下一丸；一切疮疖并肿痛，及诸般疥癞，别炼入油少许，打膏令匀，涂之。其它诸疾亦度情而用。

【主治】 ①《百一》：一切恶疮。②《局方》（吴直阁增诸家名方）：八发痈疽，一切恶疮软疖，不问年月深远，已成脓未成脓者；并治蛇、虎、蝎、犬、汤火、刀斧所伤。

02179 太乙丹

【方源】《疡医大全》卷二十二引敬恕堂江方。

【组成】 顶好藤黄五十两 赤小豆 天南星各二十两 川五倍子一百两（炒微黄） 当门子五两

【用法】 上为极细末，用白及二十两打糊和捣成锭。用醋磨敷，自消。

【主治】 一切无名肿毒。

02180 太乙膏

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】 肉桂一钱五分 白芷 当归 玄参 赤芍 生地 大黄 土木鳖各五钱 乳香（末）二钱 没药（末）二钱 阿魏一钱 轻粉一钱五分 血余一团 黄丹六两五钱

【用法】 以上各药，用真麻油一斤浸入，春五、夏三、秋七、冬十日，倾入锅内，文武火熬至药枯浮起为度，住火片时，用布袋滤净药滓，将锅展净，入油，下血余再熬，以柳枝挑看，俟血余熬枯浮起，方算熬熟。每净油一斤，将炒过黄丹六两五钱，徐徐投入，不住手搅，候锅内先发青烟，后至白烟迭迭旋起，其膏已成，将膏滴入水中，试软硬得中，端下锅来，方下阿魏撒膏面上，候化尽，次下乳香、没药、轻粉，搅匀，倾入水内，以柳木搅成一块。

【功用】 提脓。

【主治】 一切痈疽肿毒。

02181 太仓丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】 白豆蔻仁 缩砂各二两 陈米一升（淘洗，略蒸过，铛内炒） 丁香半两（不见火）

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如小豆大。每服五七十九至一百丸，米饮送下。

【主治】 ①《魏氏家藏方》：气膈脾胃，全不进食。②《医方类聚》引《济生续方》：脾胃虚弱，翻胃不食。

【备考】 《济生续方》本方用法：生姜自然汁法丸，如梧桐子大。每服百丸，食后用淡姜汤送下。

02182 太仓丸

【方源】 《奇效良方》卷十八。

【组成】 白豆蔻仁 缩砂仁各二两 陈仓米一升（用黄土炒熟，去土不用）

【用法】 上为细末，用生姜自然汁为丸，如梧桐子大。每服一百丸，食后用淡生姜汤送下。

【主治】 脾胃虚弱，不思饮食；翻胃不食。

02183 太平丸

【方源】 《修月鲁般经》引《劳证十药神书》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【异名】 噙化太平丸（《寿世保元》卷四）、宁嗽金丹（《十药神书》陈修园注解本）。

【组成】 天门冬 麦门冬 知母 贝母 款冬花 杏仁各三两 当归 地黄 黄连 阿胶珠各一两半 蒲黄 京墨 桔梗 薄荷各一两 白蜜四两 麝香少许

【用法】 上药依常法修制净，为极细末，和匀，却用银铛一只，先下白蜜炼熟，取起，下诸药末搅匀，再上火，入麝香，略熬三二沸，可丸即丸，如弹子大。每日三次，食后煎薄荷汤灌嗽喉中，细嚼一丸，津唾送下，溶化，上床时用。如是痰盛，先用饴糖烊消化丸一百丸吞下，即噙嚼此丸，仰卧而睡，使药流入肺窍，则肺清润，嗽亦退除。

【功用】 《证治宝鉴》：益阴润肺。

【主治】 劳证久嗽，肺痿肺痈。

【备考】 本方方名，《北京市中药成方选集》引作"宁嗽太平丸"。

02184 太平丸

【方源】 《景岳全书》卷五十一。

【组成】 陈皮 厚朴 木香 乌药 白芥子 草豆蔻 三棱 莪术（煨） 干姜 牙皂（炒断烟） 泽泻各三钱

【用法】 上为细末。巴豆（用滚汤泡，去皮心膜）一钱，用水一碗，微火煮至半碗，将巴豆捞起，用乳钵研极细，仍将前汤搀入研匀，然后量药多寡，入蒸饼浸烂捣，丸前药如绿豆大。每用三分或五分，甚者一钱，随证用汤引送下。凡伤寒停滞，即以本物汤送下；妇人血气痛，红花汤或当归汤送下；气痛，陈皮汤送下；疝气，茴香汤送下，寒气，生姜汤送下；欲泻者，用热姜汤送下一钱，未利再服；利多不止，用冷水一二口即止。

【主治】 胸腹疼痛胀满，及食积、气积、血积、气疝、血疝、邪实秘滞，痛剧者。

【加减】 如欲其峻，须用巴豆二钱。

02185 太白散

【方源】 《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 草乌头（炮，去皮尖） 天南星（炮） 藿香叶（去土） 人参（去芦头） 当归（洗，焙）各二两 水银一钱（用锡一钱半，结作沙子） 麝香一钱（别研）

【用法】 上为细末。每服半钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】 破伤风，虽患人口已噤，但心腹间暖者。

【宜忌】 忌冷水，如饮冷水，再发不可疗。

02186 太白散

【方源】 《普济方》卷四十四引《仁存方》。

【组成】 石膏（煅）二两 川芎半两 甘草一分（一方无甘草）

【用法】 上为末。茶芽少许，热汤调二分，食后服。

【主治】 头痛。

02187 太阳丹

【方源】 《证治要诀类方》卷四引《局方》。

【组成】 川乌 南星等分

【用法】 上为末，连须葱白捣烂调贴太阳痛处。

【主治】 偏正头风作痛，痛连于脑，常如牵引之状，发则目不可开，眩晕不能抬举。

【备考】 本病宜服芎辛汤，间进太阳丹。

02188 太阳丹

【方源】 《异授眼科》。

【组成】 大川乌（炮）一两 石膏（煅）二两 白芷一两 甘菊一两

【用法】 上为末，蜜和面糊为丸，朱砂、羌活一两，甘草二两，细辛五钱为衣。每服八十丸，淡姜汤送下。

【主治】 雷头风，太阳穴疼痛者。

【备考】 方中朱砂用量原缺。

02189 太阳膏

【方源】 《鲁府禁方》卷二。

【组成】 川乌 天南星 白芷

【用法】 上为细末，用葱白连须同药捣烂。贴太阳穴上，纸盖之。

【主治】 头痛头风。

02190 太极丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】 黄柏（去皮，盐、酒浸三日，微炒褐色，净末）三两六钱 知母（去毛，酒浸一宿，微炒，净末）二两四钱 破故纸（新瓦炒香，净末）二两八钱 胡桃仁（去皮，研烂）三两二钱 砂仁一两（分作二分，五钱生用，五钱同花椒一两炒香，去椒不用）

【用法】 上各为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，早晚沸汤、茶、酒任下。服至三年，百病消除。

【功用】《摄生众妙》：调和五脏，长生益寿。

【主治】 ①《东医宝鉴》：肾虚。②《杂病源流犀烛》：尿血。

【方论选录】 黄柏属水，滋肾，苦以坚精；知母属金，主润肺，苦以降火，佐黄柏为水金相生；破故纸属火，收敛神明，能使心包之火与命门之火相通，故元阳坚固，骨髓充实，涩以治脱也；胡桃仁属木，润血，血属阴，阴恶燥，故油以润之，佐故纸为木火相生；砂仁属土，醒脾开胃，引诸药归宿丹田，香而窜，和五脏中和之气。

02191 太和丸

【方源】《回春》卷二。

【组成】 人参（去芦）五钱 白术（去芦，土炒）四两 白茯苓（去皮）半两 陈皮一两 半夏（面炒）二两二钱 枳实（麸炒）一两 黄连（姜汁炒）一两 当归（酒洗）一两 山楂（蒸，去子）一两 木香五钱 白芍（酒炒）一两半 香附（童便炒）一两 神曲（炒）一两半 麦芽（炒）一两半 白豆蔻（去壳）一两三钱 龙眼肉一两三钱 大粉草（炙）七钱

【用法】 上为末，荷叶一个煎汤，打仓米糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，不拘时候，米汤送下。

【功用】 补气生血，健脾养胃，开胸快膈，清郁化痰，消食顺气，平和调理。

【主治】 元气、脾胃虚损，不思饮食，肌体羸瘦，四肢无力，面色萎黄。

02192 太和饼

【方源】《景岳全书》卷六十二。

【组成】 人参 白术 白茯苓各五钱 山药（炒）四钱 木香 炙甘草各二钱 肉果（面煨）四个 白豆蔻十四个 砂仁十四个 山楂肉一两 史君子肉六十个

【用法】 炼蜜捣和为小饼。量儿大小与服，或再对证加减药味用之。

【主治】 小儿泄泻。

02193 太清饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 知母 石斛 木通各一钱半 石膏（生用）五七钱（或加麦门冬）

【用法】 水一钟半，煎七分，温服或冷服。

【主治】 胃火烦热，发狂、发斑、呕吐者。

02194 太乙神丹

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【异名】 追毒丹、紫金丹（原书同卷）、万病解毒丹（《疮疡经验全书》卷十三）、紫金锭（《片玉心书》卷五）、加减解毒丸（《准绳·疡医》卷五）、太乙紫金丹（《外科正宗》卷二）、神仙紫金锭《济阴纲目》卷九十、太乙紫金锭（《金鉴》卷六十六）、玉枢丹（《麻科活人》卷四）、千金解毒丸（《霉疮证治秘鉴》卷下）、太乙玉枢丹（《慈禧光绪医方选议》）。

【组成】 雄黄一两 文蛤（一名五倍子。捶碎，洗净，焙）三两 山慈姑（去皮，洗净，焙）二两 红芽大戟（去皮，洗净，焙干燥）一两半 千金子（一名续随子。去壳，研，去油取霜）一两 朱砂五钱 麝香三钱

【用法】 上除雄黄、朱砂、千金子、麝香另研外，其余三味为细末，却入前四味再研匀，以糯米糊和剂，杵千余下，作饼子四十个如钱大，阴干。生姜薄荷汁入井花水磨服；大人中风、诸痫，用酒磨服；小儿急慢惊风，五疳八痢，一饼作五服，入薄荷一叶，同井花水磨服，牙关紧者涂之即开；痈疽发背，疔肿，一切恶疮，用井花水磨服及涂患处。未溃者，觉痒立消；头痛，用酒入薄荷同研烂，以纸花贴太阳穴上。体实者，一饼作二服；体虚者，一饼作三服。凡服此丹，得通行一二行，其效尤速。如不要行，以米粥补之。若用涂疮，立消。

【功用】 ①《外科正宗》：解诸毒，利关窍。②《北京市中药成方选集》：辟秽解毒，消肿止疼。

【主治】 ①《丹溪心法附余》：一切医所不疗之疾；毒药、蛊毒、瘴气、狐狸、鼠莽、恶菌、河豚等毒；吃死牛马肉；毒蛇、犬、恶虫所伤；中恶，瘟疫，伤寒结胸发狂，缠喉，诸风隐疹，赤肿丹瘤。②《中国药典》：中暑，脘腹胀痛，恶心呕吐，痢疾泄泻，小儿痰厥；外治疔疮疖肿，痄腮丹毒，喉风。

【宜忌】 孕妇不可服。

【方论选录】《成方便读》：方中以毒攻毒之品居其大半，山慈姑辛寒有毒，功专泻热散结；千金子辛温有毒，功专行水破血，导滞通肠；大戟辛苦而寒，能通能散，专主逐水行瘀。三者功用相仿，皆能以毒攻毒，辟蛊除邪。然疫毒之邪散漫不定，恐攻不胜攻，逐不胜逐，故以五倍子酸咸性涩者，敛而降之，使之归聚不散，然后三者之力，方可展其长。但疫毒之来，元气为之壅闭，且恐药饵有所不受，故必用麝香以开其闭；朱砂、雄黄，皆禀土之精气结成，俱能辟恶镇邪，以疫毒既自土中而出，仍以土中之精华解化之，所谓百毒遇土则化，况又假宝气以镇邪乎！

02195 太乙神针

【方源】《伤寒标本》卷下。

【组成】 羌活 独活 黄连各四两（为末） 麝香二钱 乳香二钱

【用法】 上用三月三艾（四月八日亦可），晒干打绒，入前药末和匀，用好白纸卷包前药如箸大。灸七炷、二七炷、三七炷。

【主治】 风痹。或在腿，或在腰，或在肱。

02196 太乙混元丹

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】 紫河车（晒干）三钱 白梅花三钱 辰砂一两（甘草一两，水煮半日，去甘草） 滑石六两（用丹皮二两，水煎，去丹皮，煮水干为度） 香附米一两（蜜水煮透） 粉草二钱 甘松四钱 莪术（火煅）三钱 砂仁（去皮）三钱 益智（去壳）六钱 山药（姜汁炒）二钱半 人参（去芦）一钱 黄耆（蜜炙）一钱 白茯苓三钱 白茯神（去皮木）二钱半 远志（甘草泡，去心）一钱半 桔梗（去芦）一钱 木香一钱 麝香三分 牛黄二分 天竺黄一钱（一方无混元衣、梅花）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大，金箔为衣。每服量大小加减。中风痰厥，不省人事，生姜汤研下；伤寒夹惊发热，生姜、葱汤研下，宜出汗；停食呕吐腹胀，大便酸臭，生姜汤送下；霍乱，紫苏、木瓜汤送下；泄泻，米汤送下；赤白痢，陈仓米汤送下；咳嗽喘急，麻黄、杏仁汤送下；积聚腹痛，姜汤送下；虫痛，苦楝根汤送下；疝气偏坠，大小茴香汤送下；夜啼不止，灯草灰汤送下；急惊搐搦，薄荷汤送下；慢惊，人参、白术汤送下；大便下血，槐花、陈仓米汤送下；小便不通，车前子汤送下；夜出盗汗，浮小麦汤送下；发热，金钱薄荷汤送下；痘疹不出，升麻汤送下；中暑烦渴，灯心汤送下；疳热身瘦肚大，手足细，或淋或泻，或肿或胀，或喘或嗽，陈仓米汤送下。

【主治】 中风痰厥，伤寒发热，霍乱吐泻，停食积聚，惊风搐搦，痘疹疳热等。

02197 太乙紫金丹

【方源】《重庆堂随笔》卷上引薛生白。

【组成】 山慈姑 川文蛤各二两 红芽大戟 白檀香 安息香 苏合油各一两五钱 千金霜一两 雄黄（飞净） 琥珀各五钱 冰片 当门子各五钱

【用法】 上各为极细末，再合研匀，浓糯米饮为丸，如绿豆大，外以飞净辰砂为衣。每服一钱许，滚开水送下。

【主治】 暑湿温疫之邪，弥漫熏蒸，神明昏乱，及霍乱吐泻，痧胀腹痛，水土不服，岚障中恶。

【备考】 本方比苏合香丸而无热，较至宝丹而不凉，兼太乙丹之解毒，备二方之开闭，洵为济生之仙品。

02198 太山磐石散

【方源】《医统》卷八十五。

【异名】 泰山磐石散（《景岳全书》卷六十一）、安胎散（《文堂集验方》卷三）。

【组成】 人参 黄耆各一钱 白术 炙甘草五分 当归一钱 川芎 白芍药 熟地黄各八分 续断一钱 糯米一撮 黄芩一钱 砂仁五分

【用法】 水一钟半，煎八分，食远服。但觉有孕，三五日常用一服，四月之后方无虑也。

【功用】 兼养气血脾胃。

【主治】 妇人气血两虚，身体素弱，或肥而不实，或瘦而血热，或脾胃少食倦怠，素有堕胎之患。

【宜忌】 戒欲事恼怒，远酒醋辛热之物。

【加减】 脾胃有热者，倍加黄芩、少用砂仁；胃弱者，多用砂仁，少加黄芩。

【方论选录】《方剂学》：本方证是由气血虚弱，胞宫不固，胎元失养，以致胎动不安，甚或流产。故用人参、黄耆、白术、炙草以补脾益气；当归、熟地、芍药、续断补益肝肾，养血和血。其中白术与黄耆相配，具有健脾清热以安胎之功，少用砂仁，取其辛温而涩，既可理气和中，亦可安胎。川芎配在补血、养血药中，是调和血中之气。糯米甘平养脾胃而固胎元。诸药配伍，共收益气健脾，补养肝肾而安胎元之功。

【备考】 本方改为丸剂，名“太山盘石丸”。（见《女科指掌》）。

02199 廿四味流气饮

【方源】《局方》卷二（新添诸局经验秘方）引《集验方》。

【组成】半夏（汤洗七次）二两　陈皮（去白）一斤　厚朴（去粗皮，姜制，炒）　青皮（去白）甘草（爁）　香附（炒去毛）　紫苏叶（去枝梗）各一斤　人参　赤茯苓（去黑皮）　干木瓜　白术　白芷　麦门冬各四两　草果仁　肉桂（去粗皮，不见火）　莲莪茂（煨，切）　大腹皮　丁香皮　槟榔　木香（不见火）各六两　木通（去节）八两　沉香六两　枳壳（去瓤，麸炒）四两　大黄（面裹，煨，去面，切）二两

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，大枣二枚，煎七分，去滓热服。如伤寒头痛，才觉得疾，入连根葱白三寸煎，升降阴阳，汗出立愈；脏腑自利，入粳米煎；妇人血气癥瘕，入艾、醋煎。不拘时候。

【功用】调顺荣卫，通流血脉，快利三焦，安和五脏。

【主治】诸气痞滞不通，胸膈膨胀，口苦咽干，呕吐少食，肩背腹胁走注刺痛；及喘急痰嗽，面目虚浮，四肢肿满，大便秘结，水道赤涩；忧思太过，怔忪郁积，脚气风热，聚结肿痛，喘满胀急。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作"二十四味流气饮"。《丹溪心法附余》引作"木香流气饮"。原书同卷木香流气饮，即本方去沉香、枳壳、大黄，加石菖蒲四两、藿香叶六两。

02200　巨胜丸

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】巨胜子四两　覆盆子　巴戟　天雄（炮裂，去皮脐）　酸枣仁　甘菊花　白茯苓　薯蓣　桂心各二两　天门冬三分（去心，焙）　熟干地黄三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹以温酒送下，任意加之。

【功用】延年益寿。

02201　巨胜酒

【方源】《医方类聚》卷二十四引《食医心鉴》。

【异名】巨胜浸酒（《圣济总录》卷二十）。

【组成】巨胜三升（炒）　薏苡仁一升　生干地黄半升（切）

【用法】上药以生绢袋盛，用酒二升浸，经三五宿，任性暖服之。

【主治】①《医方类聚》引《食医心鉴》：风虚湿痹，脚膝无力，筋挛急痛。②《养老奉亲》：老人风虚痹弱，四肢无力，腰膝疼痛者。

02202　巨胜子丸

【方源】《丹溪心法》卷三

【组成】熟地黄四两　生地黄　首乌　牛膝（酒浸）　天门（去心）　枸杞　苁蓉　菟丝　巨胜子　茯苓　柏子仁　天雄（炮）　酸枣仁　破故纸（炒）　巴戟（去心）　五味　覆盆子　山药　楮实　续断各一两　韭子　鸡头实　川椒　莲蕊　胡芦巴各五钱　木香一钱半

【用法】上为末，炼蜜为丸服。

【功用】补损。

【主治】《摄生众妙方》：右尺命脉虚微欲脱，阳痿不举，阳脱之证。

02203　巨胜茯苓丸

【方源】《圣惠》卷九十四引陶隐居方。

【组成】巨胜一石（九蒸九曝，去黑皮，熬之令香，蒸熟，于臼中急捣为末，仍以疏马尾罗之）白茯苓三斤（去黑皮，锉如鸡头大，用水煮十余沸，漉出令干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡子大。每服以温水化破一丸，一日三服为准。

【功用】延年轻身。

02204　止吐汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】扁豆衣9克　扁豆花9克　旋覆花（布包）6克　代赭石（布包）12克　砂仁壳6克　豆蔻壳6克　藿香6克　姜竹茹6克　陈皮9克　姜半夏9克　茯苓9克　炒吴茱萸　炒黄连各1.5克

【用法】用灶心土60克，煮汤代水煎药，每日一付，分两次温服。

【功用】降逆止吐，和胃温中。

【主治】急性胃炎。呕吐频作，胃脘作痛，舌苔白，脉滑。

【方论选录】方中扁豆衣、扁豆花、陈皮、藿香和胃；旋覆花、代赭石降逆；竹茹、黄连清胃；砂仁壳、豆蔻壳、吴茱萸温胃；云苓利湿；半夏燥湿；吴茱萸、黄连一温一清，能泄肝和胃，降逆开郁。本方对胃失和降、胃气上逆而呕吐频作者，较为适宜。

02205　止血丹

【方源】方出《本草纲目》卷十九引《简便方》，名见《青囊秘传》。

【组成】蒲黄（炒黑）

【用法】上为末，掺患处。

【主治】①《本草纲目》引《简便方》：耳中出血。②《药奁启秘》：血出不止。

【备考】《青囊秘传》本方用法：口服。

02206 止血散

【方源】《简明医彀》卷四。

【组成】龙骨三钱 无名异一两 乳香 没药各二钱 五倍子二两（半生半炒） 白矾一两（半生半枯）

【用法】上药各为细末，和匀。掺伤处。

【功用】止血，定痛，生肌。

【主治】刀斧伤出血不止。

【加减】或加石灰（风化）、定粉各一两，去无名、倍子。

02207 止血散

【方源】《实用正骨学》。

【组成】参三七

【用法】上为极细末，玻璃瓶收贮。可内服，也可外敷。内服时，每服五分至一钱，温开水送下，每日二三次。

【功用】去瘀生新，止血镇痛。

02208 止血散

【方源】《全国中药成药处方集》（大同方）。

【组成】莲蓬壳 黄绢 血余 百草霜 棕榈皮各一两

【用法】将各药烧存性，为极细末。每服三钱，白水送服。

【主治】吐血，衄血，血崩，及一切出血。

02209 止血散

【方源】《上海中医药杂志》（1965；4:17）。

【组成】白矾八钱 孩儿茶一两（以此比例，按需要量配制）

【用法】上药各为细末，加入乳糖适量作赋形剂。混匀后，装入有色玻璃瓶内贮藏；或分装于胶囊内备用，药量分0.1克和0.2克两种。小量咯血者，每次服0.1～0.2克，每天服三次，白开水送下；中等量咯血或偶发性短时期的咯血，每次服0.2～0.3克，每4小时服一次；对大咯血者则不宜采用。上述服法，可连续服至咯血停止。

【功用】止血。

【主治】肺结核咯血。

02210 止汗散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】败蒲散（《痘疹传心录》卷十五）。

【组成】故蒲扇灰（如无扇，只将故蒲烧灰研细）

【用法】每服一二钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】①《小儿药证直诀》：小儿六阳虚汗。厚衣卧而额汗出，上至顶，不过胸者。②《普济方》：遍身自汗，肌肉虚也。

02211 止汗散

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【异名】止汗汤（《蒿崖尊生》卷十四）。

【组成】人参二钱 当归二钱 熟地一钱半 麻黄根五分 黄连五分（酒炒） 浮小麦一大撮 大枣一枚

【主治】产后盗汗。

02212 止鸣丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】白芍五钱 柴胡二钱 炒栀子三钱 生地三钱 麦冬三钱 菖蒲五分 茯苓三钱 半夏五分

【用法】水煎服。

【主治】少阳胆气不舒，而风邪乘之，火不得散，双耳忽然肿痛，内流清水，久则变为脓血，身发寒热，耳内如沸汤之响，或如蝉鸣。

02213 止泻散

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】车前子（以青盐水炒七次）二两 白茯苓（炒）二两 山药（炒）二两 炙甘草六钱

【用法】上为细末。每服二三钱，炒米汤调下；乌梅汤更好。

【主治】久泻。

02214 止带丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】当归（酒洗） 川芎 白术（去芦） 人参（去芦） 山药 杜仲（姜汁、酒炒去丝） 香附（醋炒） 青黛（减半） 牡蛎（火煅） 破故纸（酒炒） 续断 椿根皮（酒炒）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心清米汤吞下。

【功用】《济阴纲目》：补气调血，强腰益肾。

【主治】妇人赤白带下，腰酸，头晕眼花，小腹胀痛，四肢无力，困倦而虚。

【加减】腹痛，加玄胡索、茴香，去人参；饱闷，加砂仁，去人参；夏月，加黄柏；冬月，加煨干姜少许；肥人，加姜汁、半夏；瘦人，加酒炒黄柏。

02215 止带汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】桑螵蛸 海螵蛸 生龙骨各9克 生牡蛎24克 莲须6克 白果10克 菟丝子12克 沙苑子9克 桑寄生30克 薏苡仁18克 茯苓

川续断各12克

【功用】 固肾，利湿，收涩。

【主治】 虚寒带下，白带清稀量多、久不止，腰酸腿软，舌苔白腻，脉濡。

【方论选录】 方中菟丝子、沙苑子、桑寄生、川续断固肾；桑螵蛸、海螵蛸、生龙骨、生牡蛎、莲须、白果收涩止带；茯苓、薏苡仁利湿。

02216 止逆汤

【方源】《传信适用方》卷上。

【组成】 川干姜二两（炮） 甘草一两（炙赤色）

【用法】 上为粗末。每服四五钱，用水二盏，煎至八分，食前热服。

【主治】 胃冷生痰，致头目眩晕，吐逆。

02217 止衄散

【方源】《三因》卷九。

【组成】 黄耆六钱 赤茯苓 白芍药各三钱 当归 生干地 黄阿胶（炙）各三钱

【用法】 上为细末。每服二钱匕，煎黄耆汤调下。未知，再作。

【主治】 气虚衄血。

①《三因》：气郁发衄。②《朱氏集验方》：气虚发衄。③《医方考》：饥困劳役，动其虚火，致衄不止者。

【方论选录】 ①《医方考》：饥困劳役而动其火，其人本虚可知矣。虚火可补，故用黄耆、当归、阿胶甘温之品以补之；然赤茯苓能导丙丁（之火从小水而下行），白芍药能收阴气，生地黄能凉血热，三物者，去血中之热，自是冲和，与芩、连苦寒之剂殊别。实火宜用连、芩，虚火则惟此类为宜也。②《血证论》：生地凉血，当归和血，白芍降血，阿胶秉阿水潜行地中之性，能潜伏血脉，此最易见者也。妙在黄耆运气摄血，则血不外泄；赤苓渗水利气，则引血下行。但黄耆一味，气虚者得之，则鼓动充满，而血得所统矣；设气实者得之，以水济水，以涂附涂，益气横决，愈逼血妄行矣。此用方者，所以贵有加减。

02218 止崩汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】 当归 川芎 白芍 生地 荆芥（炒黑） 条芩（炒）各一钱 防风 升麻 白术 蒲黄各八分 阿胶 地榆 黄柏各六分

【用法】 调发灰服。

【主治】 崩下。

02219 止崩汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 生地炭 熟地炭各9克 阿胶珠12克 莲房炭15克 山萸炭 当归身各9克 黑升麻3克 黑芥穗6克 仙鹤草12克 五味子3克 五倍子9克 茅根炭60克 鸡冠花炭15克

【用法】 水煎服。

【功用】 养血止血。

【主治】 崩漏（功能性子宫出血）。子宫骤然大量下血或淋漓不断，舌质淡，苔白，脉浮大无力，或沉细无力。

【方论选录】 本方以养血止血为主。生地、熟地、阿胶珠、当归身养血；莲房、仙鹤草、五味子、五倍子、茅根、鸡冠花止血；山萸肉补肝肾，收涩止血；莲房炭为治疗子宫出血的专药，能走子宫，又为引经药；荆芥穗能入血分，炒炭用可止血，治崩漏下黑紫血块有效；升麻有升举阳气的作用，因崩漏为下部出血，用升麻可引血上行，与当归配伍能使血循经，恢复正常血液循环，则崩漏易止。

02220 止痒丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 生地310克 玄参90克 当归90克 红花90克 茜草90克 白芍90克 苦参90克 苍耳子90克 白蒺藜90克

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸重9克。每服一至二丸，一日二次，开水送下。

【功用】 润肤止痒。

【主治】 皮肤瘙痒症，神经性皮炎，脂溢性皮炎。

02221 止喘丸

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷五引《类聚》。

【组成】 荜茇 胡椒 人参 胡桃肉各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，一两作三十丸。每服一丸，细嚼，温水送下。

【主治】 冷喘。

02222 止喧丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】 白芍三两 柴胡三钱 栀子三钱 熟地三两 山茱萸三两 麦冬一两 白芥子三钱

【用法】 水煎服。服一月即愈。

【功用】 补肾平肝。

【主治】 肾水耗尽，又加怒气伤肝，耳中闻蚂蚁战斗之声音。

02223 止痛丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】 高良姜一两（新瓦炒干，为末） 没药

四钱（别研）

【用法】 上为末。每服二钱，热酒调下；如怕辣，用浓米饮为丸，每服三十丸，白汤送下。

【主治】 心脾疼，及心腹胀满，痛不可忍。

02224 止痛膏

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】 羊脂三分 松脂三分 猪脂三分 蜡半两

【用法】 上药取猪、羊脂于铫子内，以肥松木节点火，煎三五沸，次下松脂、蜡等，令熔，搅和，倾于新瓷器内盛。日三两度涂之。

【功用】《普济方》：止痛灭瘢。

【主治】 ①《圣惠》：汤火所损，昼夜热疼。②《准绳·疡医》：灸疮。

02225 止嗽丸

【方源】 方出《幼幼集成》卷三，名见《卫生鸿宝》卷三。

【组成】 川贝母五钱（淡姜汤润湿，饭上蒸过） 甘草（半生半炒）二钱五分

【用法】 上为细末，砂糖为丸，如龙眼核大。每服一丸，米饮化服。

【主治】 小儿百晬咳，痰壅喘咳。

02226 止嗽散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 桔梗一钱五分 甘草（炙）五分 白前一钱五分 橘红一钱 百部一钱五分 紫菀一钱五分

【用法】 水煎服。

【主治】 伤寒咳嗽。

【加减】 风寒初起，加防风、荆芥、紫苏子。

02227 止嗽散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 桔梗（炒） 荆芥 紫菀（蒸） 百部（蒸） 白前（蒸）各二斤 甘草（炒）十二两 陈皮（水洗，去白）一斤

【用法】 上为末。每服三钱，食后、临卧开水调下；初感风寒，生姜汤调下。

【功用】 止咳化痰，疏表宣肺。

【主治】 诸般咳嗽。

【方论选录】 ①《血证论》：普明子制此方，并论注其妙，而未明指药之治法，余因即其注而增损之曰：肺体属金，畏火者也，遇热则咳，用紫菀、百部以清热；金性刚燥，恶冷者也，遇寒则咳，用白前、陈皮以治寒；且肺为娇脏，外主皮毛，最易受邪，不行表散则邪气流连而不解，故用荆芥以散表；肺有二窍，一在鼻，一在喉，鼻窍贵开而不贵闭，喉窍贵闭不贵开，今鼻窍不通，则喉窍启而为咳，故用桔梗以开鼻窍。此方温润和平，不寒不热，肺气安宁。②《方剂学》：方中紫菀、白前、百部止咳化痰，治咳嗽不分新久，皆可取效；以桔梗、橘红宣降肺气，止咳消痰；荆芥祛风解表，甘草调和诸药，二者与桔梗配合，更能清利咽喉。诸药合用，温润和平，不寒不热，既无攻击过当之虞，大有启门驱贼之势。是以客邪易散，肺气安宁。

02228 止汗神丹

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】 人参一两（或黄耆二两代之） 当归一两 北五味一钱 桑叶七片

【用法】 急为煎服。

【主治】 大汗之病，阳气尽随汗而外越，若不急为止抑，则阳气立散，即时身死者。

【方论选录】 此方即补血汤之变，妙在补气药多于补血，使气旺则血自生，血生汗可止。况方中加五味子以收汗，加桑叶以止汗，有不相得益彰者乎？倘以大汗之际，气必大喘，不可以参、耆重增其气，纯用补血之品，未为无见。然而血不可骤生，气所当急固，不顾气徒补血，未见功成。此似是而非，又不可不急辨之也。

02229 止汗粉药

【方源】《外台》卷二十三引《集验方》。

【组成】 牡蛎二两（熬） 附子半两（炮） 麻黄根二两

【用法】 上为末。以白粉一升和合，粉汗。

【主治】 汗出不止。

【宜忌】 汗止，忌猪肉。

02230 止汗温粉

【方源】《三因》卷十。

【组成】 川芎 白芷 藁本各一分

【用法】 上为末，入米粉三分。绵裹扑体上。

【主治】 白汗。

02231 止痒药粉

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 老松香一两 官粉一两 枯矾一两 乳香二两 轻粉五钱 冰片二钱 密陀僧五钱 炉甘石一两

【用法】 装入布袋。外扑皮损，或用油调外敷，也可配成5～20%软膏外用。

【功用】 去湿收敛，杀虫止痒。

【主治】 湿疹（湿疮），神经性皮炎（湿癣），皮

肤搔痒症（瘾疹）。

【宜忌】 本药有一定刺激性，对于急性炎症性皮肤病、粘膜病损慎用。对汞过敏者禁用。

02232 止痒洗剂

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】 黄柏 地榆 苦参 甘草 银花 荆芥 各适量

【用法】 煎水外洗。

【功用】 清热收敛，消炎止痒。

【主治】 急性皮炎及湿疹瘙痒等。

02233 止血立应散

【方源】《古今医鉴》卷七引王双湖方。

【组成】 大黄（酒浸）五钱 青黛一钱 槐花（炒）一钱 血余五钱（煅存性）

【用法】 上为末。每服三钱，用梔子、丹皮各二钱，煎汤调，食后服。

【主治】 吐衄不止。

【加减】 有热，汤内加地骨皮三钱。

02234 止血定痛散

【方源】《伤科大成》。

【异名】 止血定痛丹（《内外验方秘传》）。

【组成】 生南星二钱 生大黄三钱 降香末三钱 蒲黄炭一钱五分 血竭二钱 煅龙骨二钱 黄连一钱五分 儿茶一钱五分 棉花灰三钱 陈石灰三钱

【用法】 上为末。加擂工至无声。干掺。

【主治】 刀斧伤破出血。

【加减】 富者加牛黄一钱，犀角屑一钱。

02235 止泪补肝散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 蒺藜 当归 熟地黄 白芍药 川芎 木贼 防风 夏枯草各等分

【用法】 上为末。每服二三钱，茶清送下。

【主治】 肝虚，迎风泪出不止。

【加减】 血虚者，去夏枯草。

02236 止泪补肝散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 白蒺藜（炒，去刺） 当归 熟地黄各二两 川芎 白芍 木贼 防风 羌活各一两 香附（童便制）二两

【用法】 上为散。每服三钱，加生姜三片，红枣一枚，水煎，去滓热服。

【主治】 肝虚，迎西北风流泪不止。

【加减】 肥人，加夏枯草一两；瘦人，加桂枝一两。

02237 止泻如神丸

【方源】《三因》卷十一。

【异名】 如神止泻丸（《局方》卷六续添诸局经验秘方）。

【组成】 半夏（汤泡七次，去滑） 苍术（米泔浸，去黑皮，焙干）各半斤 川乌（米泔浸软，去皮，切作片，焙干，用盐四两同炒，黄色为度，去盐不用）四两

【用法】 上为细末，姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前饭饮吞下。

【主治】 脏腑虚寒，脾胃受湿，泄泻无度，肠鸣腹痛，不进饮食，渐致羸瘦。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“如神丸”。

02238 止痒消肿汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】 黄连 生地 赤芍 归尾 赤茯苓 防风 细辛各一钱 大黄 桑白皮各二钱 甘菊 谷精草 生甘草各三钱

【用法】 上为末。每服三钱，水煎服。

【主治】 眼暴发赤肿，二三日、五七日者。

02239 止痉愈风散

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】 全蝎 蜈蚣各三钱 炒芥穗五钱 独活一钱

【用法】 上为末。用黄酒兑开水冲一钱，如无效，二小时后再服。若无黄酒，可用醪糟汁冲开水服。

【功用】 祛风止痉。

【主治】 产后突然发痉，昏昧不识人，颈项强直，牙关紧闭，手握不开，身体发热，面色时红时青，呈苦笑状，脉浮弦而劲。

02240 止麻消痰饮

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】 黄连 半夏 瓜蒌 黄芩 茯苓 桔梗 枳壳 陈皮 天麻 细辛 甘草 南星

【主治】 口舌麻木，涎及嘴角，头面亦麻，或呕吐痰涎，或头眩眼花，恶心，并遍身麻木。

【宜忌】 忌生冷、鱼腥、发风发热之物。

【加减】 血虚，加当归；气虚，加参；亦有十指麻木，胃中有湿痰死血，加二术，少佐熟附子。

【备考】《杂病源流犀烛》本方用法：水煎服。

02241 止痒永安汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 苍术 12 克 麻黄 6 克 白芷 9 克 蝉蜕 9 克 薄荷 6 克 独活 6 克 赤芍 6 克 天麻 9 克 桃仁 6 克 甘草 6 克 荆芥穗 9 克 当归尾 6

克 僵蚕9克 藏红花4克（另冲服）

【用法】 水煎服。

【主治】 皮肤瘙痒症。

【加减】 瘙痒重，在后背及上半身，加羌活；腰背痒，加炙杜仲；腰及下肢痒，加川牛膝；全身头面痒，加防风。

02242 止痒永安汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 荆芥9克 防风9克 麻黄6克 桂枝9克 白芷6克 羌活9克 蝉衣6克 当归9克 赤芍9克 桃仁9克 红花9克

【功用】 祛风散寒，活血和营。

【主治】 冷激性荨麻疹。

【方论选录】 前六味药，辛温祛风散寒；蝉衣散风；归、芍、桃、红活血祛风，调和营卫。用于遇风着冷即起的风痦瘾之证。

02243 止痛当归散

【方源】《济阳纲目》卷八十六。

【组成】 白芷二两 粟壳（去蒂隔）四两 炙甘草一两 乳香 没药各少许（另研，临服另入）

【用法】 上㕮咀。每服三四钱，水一大盏，酒半盏，煎至八分，去滓，入没药、乳香，不拘时温服。

【主治】 打扑损伤，肿痛不可忍。

02244 止痛灵宝散

【方源】《外科精要》卷中。

【组成】 鬼系腰（生于阴湿竹篱石岸，络石而生者，其藤柔细，两叶相对，形生三角，用藤叶）一两（洗净晒干） 皂角刺一两（锉，新瓦上炒黄） 瓜蒌（大者）一个（杵，炒，用仁） 甘草节五分 没药 明乳香各三钱（另研）

【用法】 每服一两，水、酒各半煎服。

【主治】 肿疡，毒气凝聚作痛。

【宜忌】 溃后慎用。

【备考】 ①鬼系腰，即薜萝也，又名络石。②本方方名，《本草纲目》引作“灵宝散”。

02245 止痛乳香丸

【方源】《春脚集》卷一。

【组成】 五灵脂二钱 乳香 没药 草乌 夏蚕砂各五钱 木鳖子五枚

【用法】 上为细末，用老酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服七丸，薄荷汤或茶清任下。如头痛甚，三服即止。

【主治】 眼痛，头痛，瘀血攻冲，遍身疼痛。

02246 止痛神功散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】 大黄二钱 没药五钱 甘草四钱 绿豆粉 苏木 乳香各二钱

【用法】 每服一钱，白汤调下。

【主治】 臀痈溃破后，毒热未退，大疼不止，日夜坐卧不安者。

02247 止嗽七汁膏

【方源】《同寿录》卷二。

【组成】 枇杷叶（刷去毛，剪去边，抽去筋膜，蜜水炙约二斤，河、井水各五碗，熬汁去渣）二碗 藕汁 梨汁 白果汁 荸荠汁 萝卜汁 人乳 秋露水 童便各一碗（一方有竹沥一碗）

【用法】 同入瓷罐内，熬至一半；加姜汁一小杯，真柿霜二两，又熬干碗许；加白糖二两，又熬干至碗许；加好雄猪板油（去皮，切小块）二两，又熬，不住手搅至滴水不散，下白蜜二两，收成膏，出火气。每服四五钱，早、午、晚空心白滚水调服。

【主治】 男妇新久咳嗽，不分昼夜。

02248 止嗽六君汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】 党参（去芦，饭蒸） 陈皮 核桃（去壳留衣，杵） 款冬花（蜜炙） 半夏（制） 茯苓各一钱五分 白术（净炒）二钱 炙甘草一钱

【用法】 加炮姜七分，北五味六分，水煎服。

【主治】 老人痰嗽，年久不愈者。

02249 止漏绝神丹

【方源】《万氏女科》末卷。

【组成】 白术五钱 熟地一两 三七根末三钱

【用法】 水煎服。

【功用】《胎产心法》：安胎。

【主治】 胎漏。

【方论选录】 此方妙在三七根，乃止血神品，故奏效如响。

02250 少阴甘桔汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 桔梗二钱 甘草一钱 陈皮 川芎 黄芩 柴胡 玄参各六分 羌活 升麻各四分

【用法】 水二钟，加葱白一根，煎八分，不拘时服。

【主治】 ①《外科正宗》：少阴咽痛，头眩，脉沉细而身犹热者。②《喉证指南》：慢喉风，午后作痛、作渴。

02251 少腹化癥汤

【方源】《新急腹症学》。

【组成】 红藤一两 牛膝八钱 桃仁 红花 当归各五钱 元胡 赤芍各三钱 炮姜二钱 柴胡一钱 桂枝二钱 香附三钱 川楝子 小茴香各三钱

【用法】 水煎服。每日一剂。

【功用】 活血化瘀。

【主治】 急性阑尾炎瘀血期，此期属各型阑尾炎后期，或形成包块者。

02252 少腹逐瘀汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】 小茴香七粒（炒） 干姜二分（炒） 元胡一钱 没药二钱（研） 当归三钱 川芎二钱 官桂一钱 赤芍二钱 蒲黄三钱（生） 灵脂二钱（炒）

【用法】 水煎服。

【功用】 ①《医林改错》：去瘀，种子，安胎。②《方剂学》：活血祛瘀，温经止痛。

【主治】 ①《医林改错》：少腹积块疼痛，或有积块不疼痛，或疼痛而无积块，或少腹胀满，或经血见时先腰酸少腹胀，或经血一月见三五次，接连不断，断而又来，其色或紫或黑，或块或崩漏，兼少腹疼痛，或粉红兼白带。或孕妇体壮气足，饮食不减，并无伤损，三个月前后，无故小产，常有连伤数胎者。②《医林改错评注》：对妇科多种疾患，如冲任虚寒、瘀血内阻的痛经，以及慢性盆腔炎、肿瘤等，均有较好的疗效。

【方论选录】《医林改错评注》：本方取《金匮》温经汤之意，合失笑散化裁而成少腹逐瘀汤。方中小茴香、干姜、官桂温经散寒，通达下焦；元胡、没药利气散瘀，消肿定痛；蒲黄、灵脂活血祛瘀，散结止痛，其中蒲黄生用，重在活血祛瘀，灵脂用炒，重在止痛而不损胃气；当归、川芎乃阴中之阳药，血中之气药，配合赤芍用以活血行气，散滞调经。全方能温经散寒、活血祛瘀、消肿止痛。

【临证举例】 ①不孕证《医林改错》：道光癸未年，直隶布政司索纳公，年六十，因无子甚忧，商之于余。余曰：此易事耳。至六月，令其如君（妾）服此方，每月五付，至九月怀孕，至次年甲申六月二十二日生少君，今七岁矣。②痛经《浙江中医杂志》（1964；11:267）：用此方治疗54例痛经，症见经来少腹疼痛，腰痠痛，其痛可有胀痛、坠痛，痛时喜按、拒按等不同，或兼见月经不调，白带多，因痛而致恶心呕吐，不能食等，属于气滞血瘀者，服本方加减1～8剂后，46例痊愈，4例显效，3例暂效，1例无效。③月经量少、淋漓、经闭、痛经、不孕、崩漏、症瘕、堕胎小产《新中医》（1978；5:27）：共治疗上述六种病证各一例，六例患者均有少腹瘀血见证。辨证要点为：a. 所见经血其色或黑，或紫，其质有块。b. 腹痛，少腹尤甚，疼痛性质，多见绞痛、冷痛、胀痛，或刺痛，痛不移处，且疼痛拒按。c. 瘀结不散，瘀久成块，故腹腔可触到积块。d. 有诸内必形诸外，察舌尖、边或体有瘀点或瘀斑，或舌质紫暗，诊脉见沉弦或沉涩。以上四点，兼或具备两三点者，即认定为本方适应证。六种不同的妇科病证均用本方加减进行治疗，皆获痊愈。服本方最少者十剂，最多者五十余剂。④恶露不绝《福建中医药》（1984；2:44）：王某某，女，农民。自诉产后已二个月，恶露不绝，中西药治疗均无效。患者面容愁苦，面色㿠白，气短，恶露淋漓不断，出血量少，微有血块，小腹疼痛及下坠感，伴腰痠痛，舌质淡红，舌边有瘀点，苔薄白，脉沉涩。此为瘀血阻滞胞宫，滞留不化。治宜活血化瘀。当归6克，赤芍药6克，川芎6克，没药9克，五灵脂6克（炒），延胡索6克（醋炒），生蒲黄15克，肉桂粉1.5克（冲），小茴香1.5克，炮干姜1.5克，黄耆20克，槐花15克（炒黑）。共服三剂，血止，症状消失。以归脾汤二剂调理善后。

【备考】《医林改错评注》：本方用于安胎时，一般多在习惯性流产的基础上，且孕妇身体壮实，确属血瘀所致，并有瘀症可查者，方可使用。

02253 中丹

【方源】《元和纪用经》。

【组成】 黄耆（白水者，半裏阴也；陇西者，半裏阳也） 白芍药 当归各四两 黑附子（炮，去皮脐，大者佳） 黄芩各一两（与黑附子同末，生姜汁和） 蜀椒（去子）一两（出汗） 白茯苓 人参 桂（去皮，辛者）各二两

【用法】 上为末，粟米粥为丸，如梧桐子大。每服二三十粒，酒送下，食前服。

【功用】 长肌肉，泽容色，实髓壮筋，不染邪疫，身轻目明耐老。

【主治】 百损久虚，体劣羸瘦不堪，荣卫不足，善惊昏愦，上焦客热，胃膈冷痰引饮，过食则心腹痞满，脾胃气衰不能消谷，血妄时崩，四肢沉困。

【备考】 本方为原书“耘苗丹”之第二方。

02254 中正汤

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【异名】 酸枣散（《普济方》卷三十四）。

【组成】 茯神（去木） 酸枣仁（微炒） 黄耆（锉） 羌活（去芦头）各一两 熟干地黄（切，

焙） 甘菊花 柏子仁 防风（去叉）各三分 人参 白芍药 当归（切，焙） 甘草（炙，锉）各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 胆气不足，常多恐惧，头眩痿厥，四肢不利，僵仆目黄。

【宜忌】《普济方》：忌生冷、猪、鱼。

02255 中白散

【方源】《喉科家训》卷一。

【组成】 人中白一钱 粉儿茶一钱 净青黛一钱 薄荷末五分 元明粉五分 轻马勃五分 酸梅片二分

【用法】 上为细末。

【主治】 长幼走马牙疳，并咽喉疼痛，腐烂红赤，舌肿龈臭，牙床溃腐等。

【加减】 如病重者，加犀黄一分，珍珠五分，其效最速。

02256 中和汤

【方源】《简易方》引叶氏方《见《医方类聚》卷一〇〇)。

【组成】 麻黄（去节） 杏仁（去皮尖，炒） 紫苏子（炒） 桑白皮（炒） 赤茯苓（去皮） 柴胡（去芦） 陈皮（去白）各半两 款冬花三分 细辛 甘草（炙） 马兜铃各一分

【用法】 上㕮咀。每服二钱，水一盏，煎七分，去滓温服。

【主治】 肺有风寒，痰壅咳嗽。

02257 中和汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 人参 黄耆 白术 白芷 川芎 当归 甘草 桔梗 白芍各一钱 肉桂 麦冬 藿香各五分

【用法】 水二钟，加生姜三片，大枣二枚煎，临服入酒一杯，食后服。

【主治】 骨槽风。外症已经穿溃，流脓臭秽，疼痛不止者。

02258 中岳汤

【方源】《传信适用方》卷二。

【组成】 赤芍药六两 甘草半两（炙）

【用法】 上㕮咀。每服半两，水二大盏，煎八分一盏，去滓服，不拘时候。

【主治】 湿气，腿脚赤肿疼痛，及胸膈痞满，气不升降，遍身疼痛；并治脚气。

02259 中黄丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 缸砂（水浸半月，微煅）一两 条芩（每斤用皂角子仁、侧柏各四两，水煮半日，汁干为度）二两 黄连 槐角子各二两 栀子 黄花地丁各一两 青黛五钱

【用法】 上为末，用大柿饼肉为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心清汤送下。

【主治】 翻花痔。

02260 中国人丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】 仁丹(《全国中药成药处方集》北京方)、人丹(《中药制剂手册》)。

【组成】 甘草八两 草豆蔻一两 木香一两五钱 槟榔一两 茯苓一两 砂仁一两 橘皮一两 肉桂一两 小茴香一两 公丁香五钱 青果一两 薄荷冰九钱 冰片三钱 红花五钱 麝香一分

【用法】 上为末，糯米粉四两为糊，制为小丸，朱砂为衣，闯亮。每服二十丸，小儿酌减，温开水送下。

【功用】 清热祛暑，镇静止呕。

【主治】 夏令受暑，晕车晕船，恶心呕吐。

02261 中品锭子

【方源】《外科发挥》卷五。

【组成】 白明矾二两 白砒一两五钱 乳香 没药各三钱 牛黄二钱

【用法】 先将砒末入紫泥罐内，次用矾末盖之，以炭火煅令烟尽，取出研极细末，用糯米糊和为梃子，状如线香，阴干，纳疮内三四次，年深者五六次，其根自腐溃。如疮露在外，更用蜜水调搽，干上亦可。

【主治】 五漏及翻花瘤，气核。

【备考】 本方为原书三品锭子之第二方。

02262 中和种子丸

【方源】《医学正印》卷上。

【组成】 菟丝子（拣净水淘，舂去粗皮，用无灰酒煮烂，以丝出为度，捣如泥，为薄饼，晒干，磨为末）四两 白茯苓三两 山茱萸（酒拌蒸，取净肉）四两 怀熟地（取大生地五两，酒洗净，用砂仁末三钱、好酒半斤，拌浸一宿，置瓷器，坐砂锅内，隔汤炖黑烂为度，另捣） 怀山药三两 枸杞子（甘州者佳）四两 远志（甘草汤泡，捶去骨取肉，再用甘草汤煮，晒干）二两 车前子（净，用泔浸蒸，晒干）二两 覆盆子（去蒂，酒蒸，晒干）四两 麦门冬三两（去心） 五味子二两（辽东与北来者佳） 鱼膘胶四两（用牡蛎粉炒成珠，

去牡蛎） 嫩鹿茸四两（酥油慢火炙透） 当归身（酒洗，晒干）三两 柏子仁（去壳，取白净肉）二两（另捣） 人参二两 川牛膝（盐酒炒）三两 沙苑蒺藜四两（微焙为末，入药；另取二两煮膏，同炼蜜为丸） 川杜仲（盐酒炒）三两

【用法】 上药除别捣者外，磨为极细末，隔汤炼真川蜜为丸。空心、淡盐汤送下三钱，临卧灯心汤送下二钱。

【主治】 元禀虚弱，或因色欲过度，以致气血两亏，心肾不交，百病内蚀，不能成育者。

【加减】 阴虚火盛，加盐、酒、蜜三制炒黄柏、知母各三两；虚寒无火甚，加童便制熟附子、肉桂各一两，或去附、桂，加肉苁蓉（去鳞膜）、巴戟肉、补骨脂（盐酒炒）各三两；肥人有痰，加广橘红三两，减熟地二两；瘦人上焦有火，加姜汁炒黄连二两；梦遗滑精，加蜜炙黄柏四两，砂仁末二两，酸枣仁（炒香）三两。

02263 中消黄耆汤

【方源】《古今医彻》卷二。

【组成】 黄耆二钱 人参二钱 石膏二钱（煅熟） 炙甘草三分 知母一钱 粳米一撮

【用法】 加竹叶五片，水煎服。

【主治】 中消。

02264 中满分消丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 白术 人参 炙甘草 猪苓（去黑皮） 姜黄各一钱 白茯苓（去皮） 干生姜 砂仁各二钱 泽泻 橘皮各三钱 知母（炒）四钱 黄芩（去腐，炒，夏用）一两二钱 黄连（净，炒） 半夏（汤洗七次） 枳实（炒）各五钱 厚朴（姜制）一两

【用法】 上除茯苓、泽泻、生姜外，共为极细末，入上三味和匀，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服一百丸，焙热，白汤送下，食远服。量病人大小加减。

【主治】 中满热胀，鼓胀，气胀，水胀。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足太阴阳明药也。厚朴、枳实行气而散满；黄连、黄芩泻热而消痞；姜黄、砂仁暖胃而快脾；干姜益阳而燥湿；陈皮理气而和中；半夏行水而消痰；知母治阳明独胜之火，润肾滋阴；猪苓、泽泻泻脾肾妄行之水，升清降浊；少加参、术、苓、草补脾胃，使气运则胀消也。②《成方便读》：此方之治脾虚湿热为胀为满，则用六君之补脾，以芩、连之清热，枳、朴之辛苦以行其气，猪、泽之淡渗以利其湿。然湿热即结，即清之、行之、利之，尚不足以解其粘腻之气，故用干姜之辛热燥以散之，姜黄、砂仁之香烈热以动之，而后湿热之邪从兹解化。用知母者，因病起于胃，不特清阳明独胜之热，且恐燥药过多，借此以护胃家之津液也。丸以蒸饼者，助土以使其化耳。

02265 中满分消丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 枳实 黄连（去须） 厚朴各五分 干姜 姜黄 猪苓各一钱 橘皮 甘草 白术各一钱五分 砂仁 泽泻 茯苓各三钱 半夏四钱 黄芩一两二钱

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如黍米大。每服三五十丸，温水送下。

【主治】 小儿中满。

02266 中满分消汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 川乌 泽泻 黄连 人参 青皮 当归 生姜 麻黄 柴胡 干姜 草澄茄各二分 益智仁 半夏 茯苓 木香 升麻各三分 黄耆 吴茱萸 厚朴 草豆蔻仁 黄柏各五分

【用法】 上锉如麻豆大，都作一服。水二大盏，煎至一盏，食前热服。

【主治】 中满寒胀，寒疝，大小便不通，阴躁，足不收，四肢厥逆，食入反出，下虚中满，腹中寒，心下痞，下焦躁寒沉厥，奔豚不收。

【宜忌】 忌房室、酒、湿面、生冷及油腻等物。

【方论选录】《医方集解》：此足阳明太阴药也。川乌、干姜、吴萸、澄茄、益智、草蔻除湿开郁，暖胃温肾，以祛其寒；青皮、厚朴以散其满；升麻、柴胡以升其清；茯苓、泽泻以泻其浊；人参、黄耆以补其中；陈皮以调其气；当归以和其血；麻黄以泄其汗；半夏以燥其痰；黄连、黄柏以祛湿中之热，又热因寒用也。

02267 中满分消汤

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】 半夏一钱 厚朴 黄连 黄柏（上四味俱姜制） 川乌（炮） 干姜（炮） 吴茱萸（净，用开口者，炒） 草豆蔻（炒，研） 木香 人参各五分 茯苓 泽泻各一钱五分 生姜五片

【用法】 水煎，稍热食前服。

【主治】 中满寒胀。

【加减】 身热、脉浮、喘满有表证，加麻黄五分；血虚至夜烦热，加归身、黄耆各五分；阳气下陷，便溺赤涩，加升麻、柴胡各三分；脾胃虚寒，

饮食不磨，去黄柏，加益智仁、荜澄茄、青皮各二分。

【宜忌】 大忌房劳、生冷、炙煿、酒面、糟醋、盐酱等物。

02268 内托散

【方源】《本事》卷六。

【异名】 护心散(《外科精要》卷上)、粉乳托里散(《直指》卷二十二)、内托香粉散(《普济方》卷二七三)、乳香万全散、托里散、乳香散(《医方类聚》卷一七四)、托里护心散(《奇效良方》卷五十四)、内托护心散(《医学正传》卷六)、护心托里散(《医统》卷八十一)、乳粉托里散(《疮疡经验全书》卷四)。

【组成】 绿豆粉一两（细研） 通明乳香一分（慢火于银石器中炒，手指搅使不可撚，急倾出在纸上，用扇扇冷，便研令极细用）

【用法】 上为末。凡一切恶疮，难名痈肿，每服二钱至三钱，食后、临卧浓煎甘草汤调下；如打扑及诸般内损，用温酒调下，食后、空心服。些少即内消，大损则败血从大便出矣。

【功用】 ①《普济方》：托里止痛，解烦渴，退虚热。②《景岳全书》：解金石砒硫发疽之毒。

【主治】 一切疮毒、恶疮，难名痈肿，打扑及诸般内损。

【宜忌】《外科精要》：若发热焮肿作渴，饮汤而呕者，不宜用。

02269 内炙丸

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】 荜茇半两 诃黎勒半两（煨，用皮） 干姜一两（炮裂，锉） 附子半两（炮裂，去皮脐） 桂心半两 白茯苓半两 人参半两（去芦头） 肉豆蔻半两（去皮） 缩砂半两（去皮） 当归三分（锉，微炒） 木香半两 胡椒半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜醋汤送下，不拘时候。

【主治】 久积冷气，攻心腹胀痛，或时吐逆下利，不思饮食。

02270 内炙丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】 高良姜四两（切成片子，水两碗，慢火煮，水尽为度） 肉桂（去粗皮） 当归（洗，焙） 茴香（微炒） 干姜（炮） 肉豆蔻（面裹煨香）各二两 半夏一两半（生姜制） 附子（炮，去皮脐）一两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心食前温酒送下。

【主治】 肠胃虚寒，里急后重，痢下赤白，脐腹疞痛。

02271 内炙丹

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】 荜茇 胡椒 干姜（炮，洗） 良姜（炒） 丁香（不见火） 附子（炮，去皮脐） 吴茱萸（汤泡七次）各一两 肉桂（去粗皮，不见火） 山茱萸（去核，炒） 肉豆蔻（面裹煨） 草豆蔻（去壳）各半两

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前陈米饮任下，一日三次。

【主治】 脏腑滑泄，里急肠鸣。

02272 内炙散

【方源】《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。

【组成】 茴香 藿香 丁香皮 熟干地黄（洗，焙） 肉桂（去粗皮）各一两半 甘草（炙赤） 山药 当归（去芦，洗） 白术 白芷各八两 藁本（去芦） 干姜（炮） 川芎 黄耆（去苗）各二两 木香一两 陈皮（去白）四两 白芍药十两

【用法】 上为细末。每服三钱，水一大盏，加生姜五片，艾一团，同煎至七分，空心、食前热服；温酒调下亦得。

【功用】《准绳·女科》：温经理气和血。

【主治】 妇人产前产后一切血疾，血崩虚惫，腹胁疞痛，气逆呕吐，冷血冷气凝积，块硬刺痛，泄下清白，或下五色，腹中虚鸣，气满坚胀，沥血腰疼，口吐清水，频产血衰，颜色青黄，劳伤劣弱，月经不调，下血堕胎，血迷、血运、血瘕，时发疼痛，头目眩运，恶血上心，闷绝昏迷，恶露不干，体虚多汗，手足逆冷，但腹中虚冷，血气不和，并宜服。丈夫虚冷气刺；心腹疼痛，尤宜服之。

【加减】 产后下血过多，加蒲黄煎服；恶露不快，加当归、红花煎服；水泻，加肉豆蔻末煎服；呕吐，加藿香、生姜煎服；上热下冷，加荆芥煎服。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“代炙散”。

02273 内补丸

【方源】《本事》卷十。

【异名】 内补当归丸(《女科百问》卷下)。

【组成】 熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙）二两 当归（去芦，洗、切，焙干，微炒）一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，温酒送下。

【功用】 补血安胎。

【主治】 ①《本事》：妊娠，冲任脉虚。②《盘珠集》：胎气自痛。

【方论选录】《本事方释义》：熟地黄气味甘苦微寒，入足少阴；当归气味辛甘微温，入手少阴、足厥阴。妇人怀妊，皆冲任脉用事，冲任脉虚，不能受胎，即使有娠，亦不能安固。故妇人补血安胎，在所必用。

【备考】 本方改为汤剂，名"地黄当归汤"（见《保命集》）。

02274 内补散

【方源】《千金》卷二十二。

【异名】 排脓散（《外台》卷二十四引《广济方》）、当归散（《圣济总录》卷一三一）。

【组成】 当归 桂心各二两 人参 芎藭 厚朴 防风 甘草 白芷 桔梗各一两

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，以酒调服，日二夜二，未愈，更服勿绝。

【功用】 排脓生肉。

【主治】 痈疽发背已溃。

【方论选录】《千金方衍义》：本气虚寒之人，虽热邪痼结，非助以温补不能化毒成脓。芎藭、归、参、桂心补托于内，防、芷、甘、桔通达于外，厚朴内外兼通，以散结滞之气，此膏粱豢养者宜之。

02275 内补散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】 蒲黄二两 当归一两（锉，微炒） 白芷一两 甘草一两（炙微赤，锉） 黄连一两（去须） 芎藭一两 白石脂二两 熟干地黄二两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】 肠风下血不止，黄瘦虚羸。

02276 内消丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】 广茂（炮） 三棱（炮）各三钱 青皮（去白） 陈皮各一两（去白） 牵牛半斤（取头末） 薄荷叶 皂角（不蛀者，水煮软揉取汁，去滓，熬成膏）各半两 沉香半两

【用法】 上为末，入牵牛头末，和匀，用膏为丸，如绿豆大。每服三十丸，食后煎连翘汤送下。

【主治】 疮肿初生，及瘰疬结核，热毒郁滞。

02277 内消丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】 陈皮 青皮 三棱（煨） 莪术（煨） 神曲（炒） 麦芽（炒） 香附（炒）各等分

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，清茶送下。

【主治】 痞闷，气积，食积。

02278 内消方

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】 金银花四两 甘草二两 蒲公英一两 元参五钱 当归一两

【用法】 水煎服。

【主治】 痈疽肿疡。

02279 内消散

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】 皂荚刺皮一两（为末） 乳香（研）二钱

【用法】 上为末，和匀。每服二钱匕，酒一盏，煎七分，温服。其毒内消，或微利是效。

【主治】 疮肿久不愈。

02280 内消散

【方源】 方出《本事》卷六，名见《保婴撮要》卷十六。

【组成】 生地黄（研如泥成膏） 木香（细末）

【用法】 以地黄膏随肿大小摊于纸上，掺木香末一层，又再摊地黄膏一层，贴肿上。

【主治】 打扑伤损及一切痈肿未破者。

【方论选录】《本事方释义》：生地黄气味甘苦微寒，入手、足少阴、厥阴，能凉血；木香气味辛温，入足太阴，能疏滞，打伤扑损、痈肿未破者，皆能内消。大凡损伤痈肿，必因气血不消畅，今气既得疏，血亦流行，肿岂有不消者哉？

02281 内消散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】 红内消（即何首乌）二两 玄参 苦参 蔓荆子 威灵仙各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，温酒调下，热水亦可，不拘时候。

【功用】 去脓积瘀血，止痛退寒热，进饮食，活百脉。

【主治】 痈疽已破。

02282 内消散

【方源】《回春》卷二。

【组成】 陈皮 半夏（姜制） 白茯苓（去皮） 枳实（去瓤，麸炒） 山楂肉 神曲（炒） 砂仁 香附 三棱 莪术 干生姜

【用法】 上锉一剂。水煎，温服。

【主治】 过食寒硬之物，食伤太阴，或呕吐痞满胀痛。

02283 内消散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】瓜蒌一个　皂刺一两　金银花　大黄　生姜　甘草各五钱　白芷二钱

【用法】用黄酒二碗，煎八分服。

【主治】疔疮。

02284　内消散

【方源】《外科集腋》卷一。

【组成】金银花　知母　大贝　白及　半夏　穿山甲　乳香　皂角刺

【用法】水、酒同煎服。

【主治】一切肿毒。

02285　内塞散

【方源】《外科大成》卷二。

【异名】龙射丸。

【组成】牛黄　天竺黄　轻粉各五分　乳香　没药　薄荷叶各一钱　冰片二分

【用法】上为末，用蜒蚰捣烂为丸，如枣核大，再研冰片为衣。卧时塞一丸入谷道内，七夜为止。如脏头收入，内有疼痛，用此药塞入谷道内三四夜。

【主治】内痔肿痛。

02286　内府仙方

【方源】《回春》卷二。

【组成】僵蚕二两　姜黄二钱半　蝉蜕二钱半　大黄四两

【用法】上为细末，姜汁打糊为丸，重一钱一枚。大人服一丸，小儿半丸，蜜水调服。

【主治】肿项大头病、虾蟆瘟病。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作"加味僵黄丸"。

02287　内托千金散

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】人参　当归　黄耆　芍药　川芎　防风　甘草　瓜蒌　白芷　官桂　桔梗各三钱　金银花二钱

【用法】上㕮咀。每服七八钱，水二大盏，煎至七分，入酒半盏，去滓温服，一日三次。两服之后，疮口内有黑血出者，或遍身汗出，皆药之功效也。如病势猛恶，每服一两，水一大碗煎服。

【主治】脑背痈疽，乳、便等恶疮。

【加减】痛甚者，倍加当归、芍药，或加乳香二钱。

【备考】方中金花用量原缺，据《普济方》补。

02288　内托升麻汤

【方源】《医机微义》卷十五引东垣方。

【组成】瓜蒌仁三钱　连翘三钱　甘草节　青皮各一钱　升麻二钱

【用法】作一服。水煎，食后细细呷之。

【主治】妇人乳中结核。

【备考】方中升麻原脱，据《奇效良方》补。

02289　内托生肌散

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆四两　甘草二两　生明乳香一两半　生明没药一两半　生杭芍二两　天花粉三两　丹参一两半

【用法】上为细末。每服三钱，开水送下，一日三次。若将散剂变为汤剂，须先将花粉改用四两八钱，一剂分作八次煎服，较散剂生肌尤速。

【主治】瘰疬疮疡破后，气血亏损不能化脓生肌；或其疮数年不愈，外边疮口甚小，里边溃烂甚大，且有串至他处不能敷药者。

【方论选录】此方重用黄耆，补气分以生肌肉，有丹参以开通之，则补而不滞；有花粉、芍药以凉润之，则补而不热；又有乳香、没药、甘草化腐解毒，赞助黄耆以成生肌之功。况甘草与芍药并用，甘苦化合，味同人参，能双补气血，则生肌之功愈速也。至变散剂为汤剂，花粉必加重者，试以黄耆煎之则热力增，花粉煎之则凉力减，故必加重而其凉热之力始能平均相济也。至黄耆必用生者，因生用则补中有宣通之力，若炙之则一于温补，固于疮家不宜也。

【临证举例】疮疡　一人年二十余，因抬物用力过度，腰疼半年不愈。忽于疼处发出一疮，在脊梁之旁，微似红肿，状若复盂，大径七寸。疡医以为腰疼半年，始现此疮，其根蒂必深而难治。且其内外发热，饮食懒进，舌苔黄厚，脉象滑数。知其证兼外感实热，先后投以白虎加人参汤退热，消乳汤加减清火消肿解毒，外用五倍子、三七、枯矾、金线重楼、白及为末以束其根；乳香、没药、雄黄、金线重楼、三七为末以敷其顶，皆用醋调之。旬日疮消三分之二，其顶甚软。遂以乌金膏调香油敷其软处。二日，疮破出稠脓若干。将此内托生肌散改作汤剂投之，外敷化腐生肌散。七八日间疮口长平，结痂而愈。

02290　内托安神散

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】内托安神汤（《外科大成》卷四）、安神散（《梅氏验方新编》卷七）。

【组成】人参　茯神　黄耆　白术　麦门冬　玄参　陈皮各一钱　酸枣仁　远志　甘草　石菖蒲

五味子各五分

【用法】 水二钟，煎八分，临服入朱砂末三分和匀，食远服。

【主治】 疔疮针后已出脓，时元气虚弱，睡卧惊悸，心志不宁；或毒未尽流入心窍，致生健忘。

02291 内托羌活汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 肉桂三分 连翘炙 甘草 苍术 橘皮各五分 当归梢 防风 羌本各一钱 黄耆一钱五分 黄柏（酒制） 羌活各二钱

【用法】 上㕮咀，都作一服。水二盏，酒一盏，煎至一盏，去滓，稍热空心服，以夹衣盖痈上，使药力行罢，去盖之衣。

【主治】 足太阳经中左右尺脉俱紧，按之无力，尻臀生痈，坚硬肿痛大作。

02292 内托荣卫汤

【方源】《医学发明》（人卫本）卷六。

【组成】 黄耆半两 柴胡 连翘各二钱 羌活 防风 当归身 生黄芩各钱半 炙甘草 人参各一钱 苍术三钱 红花 桂枝各半两

【用法】 上㕮咀，都作一服。水、酒各一大盏，同煎至一盏，去滓，大温服。

【功用】 发汗，通荣卫。

【主治】 疮肿，湿热郁其手、足少阳，致血脉凝逆，使营卫周身元气消弱，面色赫赤而肿，微黯色，颜必忿色，其人多怒，其疮之色亦赫赤肿硬，微带黯色，奋然高起，结硬作痛，其脉左寸外洪缓，左关洪缓而弦。

【备考】 本方方名，原书拔粹本作“托里荣卫汤”。

02293 内托复煎散

【方源】《保命集》卷下。

【异名】 内托复煎汤（《疡科选粹》卷二）、内外复煎散（《洞天奥旨》卷十四）。

【组成】 地骨皮 黄耆 芍药 黄芩 白术 茯苓 人参 柳桂（味淡者） 甘草 防己 当归各一两 防风二两

【用法】 上㕮咀。先煎苍术一斤，用水五升，煎至三升，去术滓，入前药十二味，再煎至三四盏，绞取清汁，作三四服，终日服之；又煎苍术滓为汤，去滓，再依前煎服十二味滓。如或未已，再作半料服之。若大便秘及烦热，少服黄连汤；如微利及烦热已过，服半料即行。

【功用】 除湿散郁热，使胃气和平。

【主治】 ①《保命集》：疮疡，肿焮于外，根盘不深，形证在表，其脉多浮，痛在皮肉。②《医学入门》：阴疽痈毒，蕴结于中。

02294 内托消毒散

【方源】《准绳·伤寒》卷七。

【组成】 人参 黄耆 防风 白芷 川芎 当归 桔梗 连翘 升麻 柴胡 金银花 甘草节

【用法】 上药用水一钟，好酒一钟，同煎一钟，去滓，徐徐温服。疮破者以玄武膏贴之。四周赤肿不退者，仍以见肿消草、生白及、白蔹、土大黄、生大蓟根、野苎麻根，共捣成饼，入朴消一钱，和匀，贴肿上，留头勿贴。兼服蜡矾丸最妙。

【主治】 发颐，已破或未破有脓不可消者。

02295 内托黄耆汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 内托黄耆柴胡汤（《东垣试效方》卷三）、内托耆柴汤（《医学入门》卷八）、内托耆柴酒煎汤（《疡科选粹》卷二）。

【组成】 生地黄一分 黄柏二分 肉桂三分 羌活五分 当归梢七分半 土瓜根（酒制） 柴胡梢各一钱 连翘一钱三分 黄耆二钱

【用法】 上㕮咀，都作一服。酒一盏，水二盏，煎至一盏，去滓，空心热服。

【主治】 小儿附骨痈，不辨肉色，浸肿，皮泽木硬，疮势甚大，其脉左三部细而弦，按之洪缓微有力。

02296 内托黄耆汤

【方源】《外科理例》卷五。

【组成】 柴胡钱半 连翘 肉桂各一钱 黄耆 归尾各二钱 鼠粘子（炒）一钱 黄柏 甘草（炒）各半钱 升麻七分

【用法】 上锉，酒一盏半，水一盏半，同煎至二盏，去滓，空心宿食消尽，大温服。少时以早饮压之，不令大热上攻，犯中上二焦也。

【主治】 附骨疽。

【临证举例】 附骨疽 王老，年七十，季春因寒湿地气，得附骨疽于左腿足少阳分，微侵足阳明，阔六七寸，长一尺，坚硬漫肿，肉色不变，皮泽深，但行步作痛，以指按至骨大痛，服内托黄耆汤一服立止，再服肿消。

02297 内托黄耆散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 川芎 当归 陈皮 白术 黄耆 白芍 穿山甲 角刺各一钱 槟榔三分

【用法】 水二钟，煎八分，食前服。

【功用】 溃脓。

【主治】 脓毒已成，红色光亮，已欲作脓者。

02298 内托黄耆散

【方源】《金鉴》卷六十四。

【异名】 内托黄耆饮(《疡科遗编》卷上)。

【组成】 当归 白芍（炒） 川芎 白术（土炒） 陈皮 穿山甲（炒，研） 皂刺 黄耆各一钱 槟榔三分 紫肉桂五分

【用法】 水二钟，煎八分，食前服。

【主治】 ①《金鉴》：中指手，气血虚，疮不能发长者。②《疡科遗编》：悬痈已溃。

02299 内补地黄丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 熟地 归身 白芍 生地 玄参 知母 川柏 山药 萸肉 甘杞子 淡苁蓉

【用法】 炼蜜为丸。每服三钱，空心盐汤送下。

【主治】 秋燥，燥在血脉，血虚生风证。

【备考】 以此方治内，并配合滋燥养营汤治外。

02300 内补苁蓉散

【方源】《鬼遗》卷二。

【异名】 内补方(《外台》卷二十九引《古今录验》)、内补散(《千金》卷二十五)、内补当归散(《圣惠》卷六十八)、当归散(《普济方》卷三〇三)、苁蓉散(《普济方》卷三〇三)。

【组成】 苁蓉 当归 甘草（炙） 芎藭 黄芩 桂心 人参 芍药 干姜 吴茱萸 白及 厚朴（炙） 黄耆各一两 蜀椒三分（出汗，去目及闭口）

【用法】 上为末，理令匀。每服方寸匕，温酒调下，日三夜一服。

【主治】 金疮出血多，虚竭。

【方论选录】《千金方衍义》：生肌长肉，全赖气血和煦，故用参、耆、甘草以固气，芎、归、芍药以和血，桂、姜、椒、萸以温中，苁蓉、白及滋精止血，厚朴、黄耆泄滞消肿，旺气散而正气安矣。

【备考】 方中白及，《外台》引《古今录验》作“桑白皮”。

02301 内补黄耆汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】 黄耆三两 干地黄 人参 茯苓各二两 当归 芍药 芎藭 桂心 远志（去心）各一两 甘草一两半 麦门冬（去心）三两 生姜五两 大枣十四枚

【用法】 以水一斗，煮取三升二合，去滓。分温四服，日三夜一。

【主治】 ①《鬼遗》：发背已溃，大脓汁，虚惫少气力。②《外科发挥》：溃疡作痛，倦怠少食，无睡自汗，口干或发热，久不愈。

【方论选录】《金鉴》：内补黄耆汤于十全大补汤内去白术，加远志、麦门冬，水煎服，治溃疡口干。去白术者，避其燥能亡津也；加远志、麦冬者，以生血生津也。

02302 内补黄耆汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【异名】 内补黄耆散(《圣惠》卷六十二)、托里黄耆汤(《圣济总录》卷一三〇)。

【组成】 黄耆二两 茯苓 桂心 人参各二两 麦门冬三两（去心） 甘草六分（炙） 生姜四两 远志二两（去心） 当归二两 五味子四两 大枣二十枚

【用法】 上切。以水一斗，煮取四升，分六服，日四夜二。

【主治】 发痈疽，肿溃去脓多，里有虚热。

02303 内固清心散

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】 茯苓 辰砂 人参 玄明粉 白豆蔻 甘草 乳香 明雄黄 冰片各一钱 真豆粉二两

【用法】 上为细末。每服一钱五分，蜜汤调下，不拘时候。

【功用】 预防毒气内攻。

【主治】 痈疽、发背、对口、疔疮，热甚焮痛，烦躁饮冷。

02304 内金鹿茸丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】 鸡内金 鹿茸（去毛，醋炒） 黄耆（蜜炙） 牡蛎（火煅） 五味子 附子（炮，去皮脐） 肉苁蓉（酒浸） 龙骨 远志 桑螵蛸各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒或米饮送下。

【主治】 因产后劳伤血气，胞络受寒，小便白浊，昼夜无度，脐腹疼痛，腰膝少力。

【方论选录】 ①《济阴纲目》：鹿茸、苁蓉、黄耆、附子有益精益气温肾之功，内金、牡蛎、螵蛸、龙骨有固涩禁便之用，五味、远志生津液而入肾以补正气。其为补下无疑，男女俱可服。②《医略六书》：阳气虚损，湿滞胞门，而带脉不能收引，故脐间隐痛，带下无度焉。鹿角补阳以壮督脉，附子补火以壮真阳，苁蓉温暖精血，远志交通心肾，黄耆补气举陷，五味子敛液生津，龙骨固涩精气，牡蛎收摄虚脱，桑螵蛸涩带脉以止带下也，内金皮汁丸，以化其滞，砂仁灰汤化下，以行其气。俾气

阳内充，则滞气自化，而胞门清肃，带脉融和，何虑脐间隐痛不退，带下无度不愈乎。

【备考】《医略六书》本方用内金皮一两半（炒炭），煎汁为丸，收入砂仁灰二分，煎汤化下二钱。

02305 内消连翘丸

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】连翘三两 漏芦 胡桃肉 夏枯草 土瓜根 射干 泽兰 沙参 白及各一两半

【用法】上为末，入胡桃肉研匀，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心、食前盐酒送下。

【功用】《赵炳南临床经验集》：化核软坚。

【主治】瘰疬，马刀。

02306 内消牡蛎丸

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】牡蛎（煅过，为末）三两 皂荚子二升（取白水浸一宿）

【用法】上二味，先将皂荚子以水三升，煮令烂，取出入瓷盆内，研为膏，入牡蛎末为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心温酒送下，日晚再服。

【主治】瘰疬。

02307 内消沃雪汤

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】当归身 白芍药 黄耆 甘草节 金银花 天花粉 连翘 香白芷 穿山甲 皂角刺 贝母 乳香（研） 没药（研） 木香 青皮 广陈皮

【用法】水、酒煎服。

【主治】①《古今医鉴》：肚内生痈及痈疽。②《外科正宗》：发背并五脏内痈，尻臀诸肿，大小肠痈、肛门脏毒，初起但未出脓，坚硬疼痛不可忍者。

【加减】甚者加大黄。

【备考】《东医宝鉴》引本方用当归身、白芍药、甘草节、黄耆、射干、连翘、白芷、贝母、陈皮、皂角刺、天花粉、穿山甲、金银花、木香、青皮、乳香、没药各五分，大黄（酒制）一钱半。锉作一贴，酒、水相半煎服。

02308 内消乳疬方

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】大贝母 白芷各等分

【用法】上为末。每服二钱，白酒调下。

【主治】乳疬。

【加减】如有郁症，加白蒺藜。

【宜忌】若有孕，忌用白芷。

02309 内消退管丸

【方源】《外科大成》卷三。

【异名】血竭内消丸。

【组成】蜂房（带子者，煅存性） 一个 刺蝟皮一个（重五两，煅存性） 血竭二两 象牙（醋炒为末）五钱 僵蚕 蝉蜕 木香 火消 乳香 没药各三钱

【用法】上为末，用黄蜡八两，熬熟取起，待温入药，搅匀为丸，如梧桐子大。每服三钱，酒送下，一日三次。连服七日，脓水更多，以后一日一服。半月后，毒将尽，肉管长出，渐渐剪去，用生肌散。如毒未尽，用火腿肉汤日洗二三次，干脓收口。

【功用】退管收口。

【主治】痔漏，疮毒成漏。

02310 内消瘰疬丸

【方源】《医学启蒙》卷三。

【组成】夏枯草八两 玄参五两 青盐五两（煨） 海藻 海粉 贝母 天花粉 白蔹 连翘 桔梗 当归（酒洗） 生地（酒洗） 枳壳（麸炒） 大黄（酒蒸） 薄荷叶 消石 甘草各一两

【用法】上为末，酒糊滴为丸，如绿豆大。每服百余丸，食后、临卧抵枕用白汤吞下，就卧一时。瘰疬未溃内消，溃者自愈，外贴太乙膏收口。

【功用】①《北京市中药成方选集》：消坚散结。②《全国中药成药处方集》：软坚散结，消肿化痰。

【主治】①《医学启蒙》：瘰疬。②《全国中药成药处方集》：由痰凝气滞引起的瘰疬痰核，颈项瘿瘤，皮色不变，或肿或痛。

【宜忌】①《北京市中药成方选集》：忌食牛肉。②《全国中药成药处方集》：忌食辛辣等刺激食物。

02311 内疏黄连汤

【方源】《保命集》卷下。

【异名】黄连内疏汤（《外科心法》卷七）。

【组成】黄连 芍药 当归 槟榔 木香 黄芩 薄荷 山栀子 桔梗 甘草各一两 连翘二两

【用法】除槟榔、木香二味为细末外，并锉。每服一两，水一盏半，煎至一盏，先吃一二服；次每服加大黄一钱，再服加二钱。以利为度。

【功用】《金鉴》：除里热。

【主治】疮疡、痈疽热毒在里者。

①《保命集》：疮疡，呕哕心逆，发热而烦，脉沉而实，肿硬木闷，皮肉不变色，根深大，病在内，脏腑秘涩。②《丹溪心法》：疮，皮色肿硬，发热而呕，大便闭，脉洪实者。③《金鉴》：痈疽阳毒在里，大热发狂发热，二便秘涩，烦躁呕哕，舌干口渴饮冷。

【临证举例】 ①腹痈 《外科发挥》：一男子腹患痈，肿硬愈闷，烦热便秘，脉数而实。以本方一剂少愈；以黄连解毒汤二剂顿退；再以金银花散四剂，出水而消。②发背 《外科发挥》：一男子已四日，疮头如黍，焮痛背重，脉沉实。与本方二剂少退，更与仙方活命饮二剂而消。③杨梅疮 《外科发挥》：一妇人焮痛，便秘作渴，脉沉实，以本方二剂，里证已退；以龙胆泻肝汤数剂，疮毒顿退；间服萆薢汤，月余而愈。

02312 内补当归建中汤

【方源】《千金》卷三。

【异名】 当归建中汤(《千金翼》卷六)、内补当归汤(《鸡峰》卷十六)、内补建中汤(《产科发蒙》卷三)。

【组成】 当归四两 芍药六两 甘草二两 生姜六两 桂心三两 大枣十枚

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，一日令尽。产后一月，日得服四五剂为善。

【功用】《鸡峰》：散风冷寒邪，养卫气，和血止痛，温中补虚续绝。

【主治】 妇人产后体虚羸瘦，腹中疞痛，食欲不振，面色萎黄，唇口干燥，乳汁缺乏。

①《千金》：产后虚羸不足，腹中疞痛不止，吸吸少气，或苦小腹拘急，痛引腰背，不能饮食。②《鸡峰》：胁肋牵痛，皮肤枯槁，肌肉消瘦，妇人产血过多，崩伤内竭，面目脱色，唇口干燥，产后服之，令人丁壮。③《产科发蒙》：产后三四朝，若无寒热，脉虚数而乳汁绝不出者。

【加减】 若大虚，纳饴糖六两，汤成纳之于火上，饴消；若无生姜，则以干姜三两代之；若其人去血过多，崩伤内竭不止，加地黄六两，阿胶三两，合入神汤成，去滓，纳阿胶；若无当归，以川芎代之。

【方论选录】《张氏医通》：此即黄耆建中之变法。彼用黄耆以助卫外之阳；此用当归以调内营之血。然助外则用桂枝，调中则宜肉桂，两不移易之定法也。

02313 贝母丸

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】 贝母半两（煨令微黄） 细辛三分 桂心一两 菖蒲三分 甘草一分（炙微赤，锉） 百合（半两） 紫菀三分（洗，去苗土） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，以绵裹，含咽津，不拘时候。

【主治】 肺脏伤风冷，喘促咳嗽，言语声嘶，咽喉不利。

02314 贝母丸

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】 贝母（去心）二两 甘草（炙）三分 旋覆花半两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，研如膏）四两 天门冬（去心，焙）一两

【用法】 上五味，捣罗四味为末，入杏仁同研匀，炼蜜为丸，如弹子大。每食后含化一丸，咽津。

【主治】 伤寒心肺有热，咳嗽上气，喉中作声，痰涕口干。

02315 贝母汤

【方源】《外台》卷十引《小品方》。

【组成】 贝母 甘草（炙）各二两 麻黄（去节） 桂心各四两 半夏（洗） 干姜各三两 杏仁七十枚

【用法】 上切。以水二斗三升，先煮麻黄得十沸，纳药煮取三升，温服七合，每日三次。

【主治】 咳逆，喉中如水鸡声。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、生葱、羊肉、饧。

02316 贝母汤

【方源】《本事》卷三。

【组成】 贝母一两（去心，姜制半日，焙） 黄芩（生，去皮） 干姜（生，各一两） 陈皮（去白） 五味子（拣）各一两 桑白皮（洗净，蜜炙黄） 半夏（汤浸七次） 柴胡（去苗，净洗） 桂心（不见火）各半两 木香一分 甘草一分（炙）

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一盏半，加杏仁七个（去皮尖，碎之）生姜七片，同煎至七分，去滓热服。

【主治】 诸嗽久不愈。

【方论选录】《本事方释义》：贝母气味苦甘微寒，入手太阴少阴；黄芩气味苦寒，入手太阴；干姜气味辛温，入手足太阴；陈皮气味苦辛微温，入手足太阴；五味子气味俱全，兼入五脏；桑白皮气味苦辛温，入手太阴；半夏气味辛温，入足阳明；柴胡气味辛甘平，入足少阳；桂心气味辛甘大热，入足厥阴；木香气味辛温，入足太阴；甘草气味甘平入脾，能和诸药之性，兼入十二经络，再佐以生姜之达表，不专为肺经咳嗽而设也。经云五脏六腑皆能令人咳嗽，故方中之品兼行五脏，积久成瘤，能一旦肃清矣。

【临证举例】 久嗽 黄师文云：戊申冬，有姓蒋者，其妻积年嗽，制此方授之，一服愈。以此治嗽，悉皆愈。

02317 贝母饮

【方源】《外台》卷九引《深师方》。

【异名】 贝母汤(《千金》卷十七)。

【组成】 贝母 石膏（绵裹，碎） 桂心 麻黄（去节） 甘草（炙）各二两 杏仁三十枚（去皮尖双仁者） 生姜五两 半夏五两（洗）

【用法】 上切。以水一升，煮取三升，去滓，分三服。

【主治】 上气，咽喉窒塞，短气不得卧，倚壁而息，腰背苦痛，支胁满，不能食，面色萎黄。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、羊肉、生葱、饧等。

【方论选录】《千金方衍义》：咽喉窒塞胸满，必是寒郁热邪不得发越，故用麻、杏、甘、石，加姜、半以涤痰涎，桂心以通血脉，贝母以清肺气，虽云辅佐，实缓麻黄、石膏之性耳。

02318 贝母散

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】 贝母三两 麻黄（去节） 干姜各二两 桂心 甘草（炙）各一两

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，平旦酒调下，一日二次；不知，增之至二匕，大剧可至再服，酒随饮多少。

【主治】 久咳上气，喉中鸣，昼夜不得卧。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、生葱等。

02319 贝母散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】 贝母 白芷 当归 乳香 没药各三钱

【用法】 上为末。每服五钱，热黄酒送下。

【主治】 乳痈，乳疖。

02320 贝母粥

【方源】《长寿药粥谱》引《资生录》。

【组成】 粳米100克 砂糖适量 贝母（极细粉末）5～10克

【用法】 先以粳米、砂糖煮粥，待粥将成时，调入贝母粉末，再煮二三沸即可。可供上、下午点心，温热服食。

【功用】 润肺养胃，化痰止咳。

【主治】 老年慢性气管炎，肺气肿，咳嗽气喘。

02321 贝齿散

【方源】 方出《千金》卷六，名见《普济方》卷八十二。

【组成】 贝齿七枚（烧末） 真珠各等分

【用法】 上为细末。以注翳肉上，一日三次。

【主治】 目中生息肉、肤翳，稍长，欲满目闭瞳子，及生珠管；亦治目中眯不出。

02322 贝齿膏

【方源】《鸡峰》卷十六。

【异名】 贝齿汤(《普济方》卷二十四)。

【组成】 贝齿四个（烧作末） 蒺藜子一升 石膏五两（研） 滑石三两（研）

【用法】 先以水七升，煮二物，取二升，去滓；纳二石末及猪脂一合，更煎，分三服服之。

【主治】 妇人结气成淋，小便引痛，上至小腹，或时溺血，或如豆汁，或如胶饴，每发欲死，食不生肌，面目萎黄。

02323 贝母瓜蒌散

【方源】 《医统》卷八。

【组成】 贝母 瓜蒌 南星（炮） 荆芥 防风 羌活 黄柏 黄芩 黄连 白术 陈皮 半夏（汤泡七次） 薄荷 甘草（炙） 威灵仙 天花粉各等分

【用法】 每服水二盏，加生姜三片，煎八分，至夜服。

【主治】 肥人中风，口眼㖞斜，手足麻木，左右俱作痰治。

02324 贝母麦冬饮

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】 贝母 麦冬 薄荷叶 元参 栝楼仁 桔梗 甘草

【用法】 水煎服。

【主治】 麻疹咳嗽。

02325 见睍丸

【方源】《卫生宝鉴》(人卫本)卷十八。

【组成】 附子四钱（炮，去皮脐） 鬼箭羽 紫石英各三钱 泽泻 肉桂 玄胡 索木香各二钱 槟榔二钱半 血竭一钱半（另研） 水蛭一钱（炒烟尽） 京三棱五钱（锉） 桃仁三十个（浸，去皮尖，麸炒，研） 大黄二钱（锉，用酒同三棱浸一宿，焙）

【用法】 上十三味，除血竭、桃仁外，同为末，入另研二味和匀，用原浸药酒打糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前淡醋汤送下；温酒亦得。

【主治】 寒气客于下焦，血气闭塞而成瘕聚，坚大久不消者。

【备考】 本方方名，原书《济生拔萃》本作“见睍丹”。

02326 日精丹

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】黄连二两 黄柏二两 龙胆草 防风 大黄 赤芍药 黄芩 当归 栀子各五钱 白菊花 脑荷各二钱（又方，可加鸡柏树根，不拘多少）

上浸药水，煅淬炉甘石，收贮诸法悉同阳丹。

炉甘石一两 朱砂 硼砂各二钱 麝香三分 白矾（生）一分

【用法】上为极细末。每末一钱，加片脑一分，研细罗过，点眼。

【主治】一切火热赤眼，烂弦风等稍轻者。

【加减】如有翳膜，配和月华丹对匀点之。

02327 仁寿丸

【方源】《三因》卷二。

【组成】附子（炮熟，去皮脐）一两 桂心 白茯苓 山茱萸 五味子 杜仲（去皮，姜制，炒丝断） 续断 枸杞子 熟地黄（洗） 巴戟（去心） 菟丝子（酒浸湿，研） 防风各半两 牛膝（酒浸）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食前温酒、盐汤任下。

【功用】补肝元，行营卫，养气血。

【主治】①《三因》：肝肾气虚，风冷所中，筋脉瞤动、口眼㖞斜。②《杨氏家藏方》：真元气虚，脚膝缓弱，及素有风，手足拘挛，气血衰少，饮食不进。

02328 仁香汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】白蔻仁六分（分冲） 杜藿香钱半 广木香六分 生香附钱半 春砂仁八分（同煎） 白檀香五分 母丁香四分 广陈皮钱半 生甘草三分 淡竹茹三钱

【功用】疏肝快脾，辟秽散痧。

【主治】素有肝气，一受痧秽，即胸膈烦闷，络郁腹痛。

【方论选录】凡素有肝气，一受痧秽，即胸膈烦闷，络郁腹痛，夏秋最多，吾绍通称痧气，故以二仁、五香为君，芸香辟秽，辛香流气；臣以广皮疏中，竹茹通络；使以些须生甘草，以缓和辛散之气，此为疏肝快脾，辟秽散痧之良方。

【宜忌】勿过投，免致耗气劫液。

02329 仁熟散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】人参 枳壳 五味子 桂心 山茱萸 甘菊花 茯神 枸杞子各三分 柏子仁 熟地各一两

【用法】上为末。每服二钱，温酒调下。

【主治】胆虚，常多畏恐，不能独卧，头目不利。

02330 化气丸

【方源】《女科切要》卷八。

【组成】香附 青皮 陈皮 砂仁 木香 川芎 茴香

【用法】上为末，曲糊为丸服。

【主治】妇女经行腹痛。

02331 化气汤

【方源】《局方》卷三（新添诸局经验秘方）。

【异名】化气散（《张氏医通》卷十三）、木香化气汤（《中国医学大辞典》）。

【组成】沉香 胡椒各一两 木香 缩砂（去壳） 桂心（去粗皮）各二两 丁香皮 干姜（炮） 蓬莪术（煨） 茴香（炒） 青皮（去白，麸炒） 陈皮（去瓤，麸炒） 甘草（炙）各四两

【用法】上为细末。每服二钱，姜、苏、盐汤调下，妇人淡醋汤下。

【主治】①《局方》：一切气逆，胸膈噎闷，偏胀膨满；心脾疼痛，呕吐酸水；丈夫小肠气，妇人脾血气。②《三因》：息积，癖于腹胁之下，偏胀膨满，不妨饮食，诸药不能取转。

02332 化气散

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】三棱 莪术 青皮 陈皮 厚朴 神曲 麦芽 甘草 台乌 香附

【用法】水煎服。

【功用】《杏苑生春》：驱食积，疏壅气，消宿食，导积滞，化气。

【主治】诸食积并宿食不消。

02333 化风丸

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】天南星（用浆水浸七日，取出，切，暴干） 白附子（炮） 乌头（炮裂，去皮脐）各二两 寒水石（研） 半夏末（用生姜汁和作饼，焙干）各四两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至二十丸，生姜汤送下，腊茶亦可，不拘时候。

【主治】风痰肢体缓纵，偏正头痛。

02334 化龙丹

【方源】《回春》卷三。

【组成】大鲤鱼一个 巴豆四十粒

【用法】将鱼剧了，将鱼脊割开两刀，将巴豆下

在两刀路合住，用纸包裹，慢火烧熟。去豆食鱼，米汤下。

【主治】 单腹胀。

02335 化虫丸

【方源】《局方》卷十。

【异名】 化虫丹(《幼幼新书》卷三十一)。

【组成】 胡粉（炒） 鹤虱（去土） 槟榔 苦楝根（去浮皮）各五十两 白矾（枯）十二两半

【用法】 上为末，以面糊为丸，如麻子大。一岁儿服五丸，温浆水入生麻油一两点，调匀下之，温米饮送下亦得，不拘时候。其虫细小者皆化为水，大者自下。

【主治】 小儿疾病多有诸虫，或因脏腑虚弱而动，或因食甘肥而动，其动则腹中疼痛，发作肿聚，往来上下，痛无休止，亦攻心痛，叫哭合眼，仰身扑手，心神闷乱，呕哕涎沫，或吐清水，四肢羸困，面色青黄，饮食虽进，不生肌肤，或寒或热，沉沉默默，不的知病之去处，其虫不疗，则子母相生，无有休止，长一尺则害人。

02336 化虫丸

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】 芜荑 川鹤虱 鸡心槟榔 干虾蟆（炙焦）各一分 芦荟半分

【用法】 上为末，雄猪胆汁为丸，如麻子大。每服五丸，陈米饮送下；或史君子煎汤送下。凡虫月首则头向上，凌晨可服药。

【主治】 小儿虫痛。

02337 化虫丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 芜荑（去梗） 白雷丸各五钱 槟榔二钱五分 雄黄一钱五分 木香 白术 陈皮各三钱 神曲（炒）四钱

【用法】 以百部二两，熬膏糊为丸，如梧桐子大。每服一钱五分，米饮送下。

【主治】 ①《医学心悟》：虫啮心痛。②《笔花医镜》：虫症，唇内起白点，其人日渐消瘦。

02338 化虫丸

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】 鹤虱二两 槟榔一两 胡粉六钱 白矾一两 芜荑三两 使君三两 楝根皮二两 人参一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。量虚实服。

【主治】 虫证，体弱脉不虚者。

【方论选录】 湿积生虫，气弱不能运化虫湿，脏府体亏，脉不甚虚者，宜主此方。槟榔破滞杀虫；鹤虱祛湿杀虫；胡粉体重坠，防虫之上窜；白矾性却湿，杜虫之生源；楝根皮泻湿热以杀虫；芜荑仁温中气以杀虫；使君健脾胃以消虫积；人参扶气弱以助药力也；丸以白蜜，诱入虫口。洵为扶元、化滞、杀虫之剂，乃体弱虫湿不化之专方。

02339 化虫散

【方源】《会约》卷十三。

【组成】 使君子（去壳）十个 雷丸 鹤虱 甘草（炙） 大黄（体虚者不用） 花椒 槟榔各二钱

【用法】 上为细末。人大二钱，人小一钱，用猪肉煮汤调，照上下虫大法服之。

【主治】 大小蛔厥腹痛，多似慢惊，但唇口紫者。

02340 化血丹

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 花蕊石（煅存性）三钱 三七二钱 血余（煅存性）一钱

【用法】 上为细末。分两次，开水送服。

【功用】 理瘀血。

【主治】 咳血，吐衄及二便下血。

【方论选录】 世医多谓三七为强止吐衄之药，不可轻用，非也。盖三七与花蕊石，同为止血之圣药，又同为化血之圣药，且又化瘀血而不伤新血，以治吐衄，愈后必无他患。此愚从屡次经验中得来，敢敢确实言之。即单用三七四五钱，或至一两，以治吐血、衄血及大、小便下血皆效。常常服之，并治妇女经闭成癥瘕。至血余，其化瘀血之力不如花蕊石、三七，而其补血之功则过之。以其原为人身之血所生，而能自还原化，且煅之为炭，而又有止血之力也。

02341 化阳汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】 元参二两 熟地一两 前仁三钱 肉桂二分

【主治】 阴虚溺闭。

02342 化块丸

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷六。

【组成】 海粉（酒煮） 三棱 蓬术（并醋煮） 红花 桃仁 五灵脂 香附子各一两 石碱五钱

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，白术汤送下。

【主治】 痞块及血块。

02343 化坚油

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 透骨草一钱 伸筋草二钱五分 茜草二

钱　木通二钱五分　松节一钱五分　紫草根二钱五分　地榆二钱　昆布二钱　刘寄奴一钱　香油十二两

【用法】 油浸群药二昼夜，用文火将药炸成焦黄色，去滓备用。用时微加温，直接涂于皮损。

【功用】 活血化瘀，通络软坚。

【主治】 烫烧伤后大面积增生性瘢痕，红斑落屑角化性皮肤病。

02344　化坚膏

【方源】 《中医伤科学讲义》。

【组成】 白芥子二两　甘遂二两　地龙肉二两　威灵仙二两五钱　急性子二两五钱　透骨草二两五钱　麻根三两　细辛三两　乌梅肉四两　生山甲四两　血余一两　江子一两　全蝎一两　防风一两　生草乌一两　紫硇砂六钱（后入）

【用法】 用香油五斤，东丹二斤半，将上药入香油内熬枯去滓，炼油，滴水成珠时下丹，将烟搅净后再下硇砂。敷贴。

【功用】 《中医伤科学》：祛风化瘀。

【主治】 损伤后期，软组织硬化或粘连者。

02345　化针散

【方源】 《眼科临症笔记》。

【组成】 青盐三钱　硼砂二钱　铜绿二钱　白矾二钱　乌梅三个　川椒七个　杏仁七个　花针七个

【用法】 共为一处，水半碗，泡七日即洗，一日一次。

【主治】 垂帘障症。从风轮上边生出白膜一块，下侵瞳神，大小眦略赤，不痠疼流泪，只觉昏涩羞明。

【临证举例】 垂帘障　南乐县李某某，女，50岁。素日常见头晕，视物昏花，起初自为年老昏花，不为病。日后越来越盛，视物如隔罗，才知是病。1958年来院就诊。按其脉，厥阴沉细，惟太阴洪大。知是肝血不足，而肺气有余之所致。先将上星、强间、攒竹轮流刺之；内服活血除风汤，二月余始轻。以后目有赤丝不退，再用化针散常常洗之，年余始愈。

02346　化狂丹

【方源】 《傅青主男科重编考释》。

【组成】 人参一两　白术一两　茯神一两　附子一分　半夏三钱　菟丝子三钱　菖蒲三钱　甘草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 心气亏虚，以致邪热、痰气乘虚内侵而致终年狂而不愈，或拿刀杀人，或詈骂人，不认儿女，见水大喜，见食大恶。

【方论选录】 此方妙在补心、脾、胃三经，化其痰而不去泻火。盖泻火则心气益伤，而痰涎益盛，狂何以止乎？尤妙微用附子，引补心消痰之品，直入心中，则气易补而痰易消，又何用泻火之多事哉！

02347　化肝煎

【方源】 《景岳全书》卷五十一。

【组成】 青皮　陈皮各二钱　芍药二钱　丹皮　栀子（炒）　泽泻各钱半（如血见下部者以甘草代之）　土贝母二三钱

【用法】 水一钟半，煎七分，食远温服。

【主治】 ①《景岳全书》：怒气伤肝，因而气逆动火，致为烦热、胁痛、胀满、动血等。②《谦斋医学讲稿》：肝脏气火内郁的胸胁满痛，或气火上逆犯肺的咳吐痰血。

【加减】 如大便下血者，加地榆；小便下血者，加木通各一钱五分；如兼寒热，加柴胡一钱；如火盛，加黄芩一二钱；如胁腹胀痛，加白芥子一钱；胀滞多者勿用芍药。

【方论选录】 《谦斋医学讲稿》：本方重在治肝，用白芍护肝阴，青、陈皮疏肝气，丹、栀清肝火，宜于肝脏气火内郁的胸胁满痛，或气火上逆犯肺的咳吐痰血等证。因气火能使痰湿阻滞，故加川贝、泽泻，川贝兼有解郁作用。

02348　化毒散

【方源】 《中西医结合皮肤病学》。

【组成】 五倍子6克　松香6克　官粉6克　樟丹6克　冰片3克

【用法】 上为细末。用粉剂或花生油调匀外用。

【功用】 杀菌，消炎，去湿止痒。

【主治】 渗出性湿疹，脓疱疮。

02349　化逆汤

【方源】 《医醇剩义》卷一。

【组成】 黄连六分　吴萸三分　厚朴　青皮各一钱　藿香一钱半　木瓜一钱　木香五分　白蔻六分　独活一钱　乌药一钱　蒺藜四钱　茯苓二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 暑月受邪，郁子中焦，上吐下泻，手足厥冷，筋脉抽掣。

02350　化核膏

【方源】 《外科全生集》。

【组成】 菜油四斤　壁虎十四条　蜘蛛二十八个　蜗牛二十六枚

【用法】 后三味入油锅熬至枯，浮油面，取出；

再入新鲜首乌藤叶、甘菊根、薄荷、牛蒡、苍耳等草各半斤，武火熬至草枯，出渣，俟油冷，再入连翘，元参、苦参、白蔹、白芥子、僵蚕、水红子仁（各捣碎），大黄、荆芥、防风各四两，浸一宿，熬至黑枯，以油沥清，见过斤两，加制木鳖油半斤，配炒黄丹慢入慢搅，搅匀，文火再熬，熬至滴水成珠，膏不粘指为度；再加入丁香油，麝香各二钱，苏合油一两，搅匀，退火。摊贴。

【主治】 瘰疬，结核，恶核。

【宜忌】 《全国中药成药处方集》（沙市方）：无结核者忌用。

【备考】 凡瘰疬结核恶核，此膏贴即暗消，但毒根不除，必以子龙丸日服三次，外用膏贴，方可除根，以杜后发。

02351 化积丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷三，名见《济阴纲目》卷五。

【组成】 黄连一两半（一半用吴茱萸炒，去茱萸；一半用益智炒，去益智） 山栀（炒） 川芎 三棱 莪术（醋煮） 神曲 桃仁（去皮尖）各半两 香附（童便浸）一两 萝卜子（炒）一两半 山楂一两

【用法】 上为末，蒸饼为丸服。

【主治】 食块，死血、痰积成块，在两胁动作，腹鸣嘈杂，眩晕身热，时作时止。

【方论选录】 《济阴纲目》汪淇笺释：此方以茱萸制连而治左，以益智制连而治右，以山栀治块中之火，其余破气消食散血，诚稳当药也。

02352 化积丸

【方源】 《杂病源流犀烛》卷二。

【异名】 化痞丸（《全国中药成药处方集》武汉方）。

【组成】 三棱 莪术 阿魏 海浮石 瓦楞子 香附 雄黄 五灵脂 苏木

【用法】 水为丸服。

【主治】 ①《杂病源流犀烛》：诸气内痛。②《药庵医学丛书》：诸气凝滞于内，痞积疼痛。

02353 化积散

【方源】 《审视瑶函》卷三。

【组成】 白丁香五粒 净朴消少许 硇砂一分 冰片少许

【用法】 上研极细腻无声。点之。

【主治】 眼生鱼子石榴症，其状一片，外面累颗聚萃而生，或淡红，或淡白色，状如榴子绽露于房，其病红肉颗，或四、或六、或八，四角生来，障满睛珠，视亦不见，是血部瘀实之病。

02354 化疸汤

【方源】 《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】 茵陈 苍术 木通 山栀 茯苓 猪苓 泽泻 苡仁

【主治】 诸疸。

【加减】 停滞加神曲、麦芽、山楂；酒疸加葛根、苜蓿；女劳加当归、红花；瘀血加琥珀、丹皮、红花、红曲、蒲黄、桃仁、五灵脂、延胡索。

02355 化痒汤

【方源】 《石室秘录》卷四。

【组成】 炒栀子三钱 甘草二钱 天花粉三钱 白芍四钱 柴胡三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 内火郁结而不散，致胃肠中作痒，而无法搔扒者。

02356 化斑汤

【方源】 《活人书》卷十八。

【组成】 人参半两 石膏半两 葵蕊 知母 甘草各一分

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加糯米一合，煎至八分，取米熟为度，去滓温服。

【主治】 斑毒。

02357 化斑汤

【方源】 《温病条辨》卷一。

【组成】 石膏一两 知母四钱 生甘草三钱 元参三钱 犀角二钱 白粳米一合

【用法】 水八杯，煮取三杯，日三服；滓再煮一钟，夜一服。

【主治】 太阴温病，不可发汗，发汗而汗不出，反发斑疹者。

【方论选录】 此热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘法也，前人悉用白虎汤。作化斑汤者，以其为阳明证也，阳明主肌肉，斑家遍体皆赤，自内而外，故以石膏清肺胃之热，知母清金保肺，而治阳明独胜之热，甘草清热解毒和中，粳米清胃热而保胃液，白粳米阳明燥金之岁谷也。本论独加元参、犀角者，以斑色正赤，木火太过，其变最速。但用白虎燥金之品，清肃上焦，恐不胜任，故加元参，启肾经之气，上交于肺，庶水天一气，上下循环，不致泉源暴绝也。犀角咸寒，禀水木火相生之气，为灵异之兽，具阳刚之体，主治血毒蛊注，邪鬼瘴气，取其咸寒，救肾水以济心火，托斑外出，而又败毒辟瘟也。再病至发斑，不独在气分矣，故加二味凉

血之品。

02358 化痞丸

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】木香 人参 黄耆 当归 桔梗 黄连 三棱 莪术 鳖甲 夜明砂 绿矾 枳实 使君子 苦楝根 河子各一两 蛤蟆灰七钱半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三十丸，米饮送下。

【功用】消癖进食，止泻和胃追虫。

【主治】诸痞癖积。

【加减】大人癥瘕，去夜明砂、蛤蟆、黄连，为丸梧桐子大服。

【宜忌】忌生冷、杂果发脾之物。

02359 化痞膏

【方源】《外科全生集》。

【组成】香油一斤 密陀僧六两 阿魏五钱 羌活一两 水红花子 麝香各三钱

【用法】熬膏退火摊贴。凡患痞癖之处，肌肤定无毫毛，须看准以笔圈记，方用膏贴，内服尅坚酒。用水红花子研末三钱，浸火酒二斤，时刻呷，至愈乃止。

【主治】痞癖。

02360 化滞汤

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】槟榔钱半 厚朴钱半（制） 黄连钱半 黄芩钱半 白芍钱半（炒） 木香钱半 当归二钱 青皮钱半（炒） 滑石三钱 甘草五分

【用法】水煎，去滓温服。

【功用】化滞清热。

【主治】气滞痢，后重窘迫，脉数沉涩者。

【方论选录】气滞于中，湿热不化，不能运化精微，故白痢窘迫，后重不除焉。槟榔破滞气以攻积，厚朴宽中州以化滞，黄连清火燥湿，黄芩清热宽肠，木香调中气，青皮破滞气，白芍收痢亡之阴，当归养已耗之血，甘草缓中和药，滑石通利湿热也。使湿热清化则肠胃清和而传化有权，后重无不除，何白痢窘迫不痊哉！此化滞清热之剂，为气滞痢、后重窘迫之专方。

02361 化滞汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生杭芍一两 当归五钱 山楂六钱 莱菔子五钱（炒，捣） 甘草二钱 生姜二钱

【主治】下痢赤白，腹疼，里急后重初起者。

【加减】若身形壮实者，可加大黄、朴消各三钱下之。

02362 化痰丸

【方源】《本事》卷三。

【组成】半夏（汤洗七次，别末） 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 白术 桔梗（切作小块，姜汁浸） 各一两 枳实（去瓤，麸炒） 香附子（麸炒，春去皮） 前胡（去苗，净洗） 甘草（炙）各半两

【用法】上为细末，用半夏、姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，生姜汤送下。

【主治】停痰宿饮。

【方论选录】《本事方释义》：半夏气味辛温，入足阳明；人参气味甘温，入脾胃；茯苓气味甘平淡渗，入足阳明；白术气味甘温，入手足太阴；桔梗气味苦辛平，入手太阴，为诸药之舟楫；枳实气味苦寒，入脾；香附子气味辛甘平，入足厥阴、少阳；前胡气味苦辛微寒，入手太阴；甘草气味甘平，入足太阴，此主治停痰宿饮之方也。古人有云，邪之所凑，其里必虚，参、苓、术、甘四味乃四君子汤也，用以守护中宫；而消痰驱饮之药，以姜为引，直捣其巢，宿饮自除矣。

02363 化痰丸

【方源】《简明医彀》卷四引丹溪方。

【组成】陈皮 半夏 枳实各六两 茯苓 黄芩（枯） 黄连 南星各五两 瓜蒌仁 杏仁 天粉 前胡各四两 甘草二两

【用法】上为末，竹沥、姜汁或水为丸，如绿豆大。每服二钱，食后白汤送下。

【主治】上焦痰火壅盛，咳嗽烦热，胸满气急。

02364 化痰丸

【方源】《明医杂著》卷一。

【异名】节斋化痰丸（《医学入门》卷七）。

【组成】天门冬（去心） 黄芩（酒炒） 海粉 橘红各一两 桔梗 连翘 香附（杵碎，淡盐水浸炒）各五钱 青黛（另研） 芒消（另研）各三钱 瓜蒌仁（取肉另研）一两

【用法】上为细末，炼蜜入生姜汁少许，和药杵极匀为丸，如小龙眼大。噙化一丸，或嚼烂，清汤细咽之；或丸如黍米大，淡姜汤送下五六十丸。

【功用】开郁降火，清润肺金，消凝结之痰。

【主治】痰因火上，肺气不清，咳嗽时作，及老痰、郁痰结成粘块，凝滞喉间。

【方论选录】此方用天门冬、黄芩泄肺火也，海粉、芒消咸以软坚也，瓜蒌仁润肺清痰，香附米开郁降气，连翘开结降火，青黛降郁火，故皆不用香燥之剂。

02365 化痰膏

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 生半夏三钱 生胆星三钱

【用法】 上为细末。干醋调涂。

【主治】 眼胞内痰核。

02366 化瘿丹

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 海带 海藻 海蛤 昆布（四味皆焙） 泽泻（炒） 连翘各等分 猪靥 羊靥各十枚

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。临卧噙化一二丸。

【主治】 ①《儒门事亲》：瘿。②《疡科选粹》：瘿瘤。

【宜忌】《疡科选粹》：忌油腻。

02367 化癣膏

【方源】《古今医鉴》卷十三引范任庵方。

【组成】 真香油一斤 好黄丹半斤 川乌五钱 甘遂五钱 当归五钱 甘草五钱 蜣螂二十个 穿山甲五钱 木鳖子五钱（仁）

【用法】 上先将油入锅内，用前七味熬焦，去滓，入黄丹熬成珠，离了火，入后药：芦荟五钱，阿魏五钱，硇砂五钱，硼砂五钱，皮消五钱，麝香五钱，水红花七钱，此七味为细末，入内随用，每一个，重三钱。头贴时，先用皮消水洗患处极净，然后贴上，三日觉肚皮痒，七日觉疾甚痛，即其验也。

【主治】 癣疾。

【宜忌】 忌生冷油腻等物。

02368 化癥丸

【方源】《续本事》卷一。

【组成】 巴豆五两（去油膜） 蓬莪术三两（醋煮） 荆三棱三两（醋煮） 丁香皮二两 木香一两半 厚朴三两 石菖蒲二两 良姜一两 虻虫一两半 川牛膝一两 香附子四两 石莲二两

【用法】 上为细末，稀面糊为丸，如小绿豆大。积年癥瘕成块，第一服用熟水下二十丸，自后每日三丸五丸，更量虚实加减与之，五日去尽积块；日近脾胃有积者，每服五丸，饭饮吞下，一服取效；妇人血气成块及血瘕，每服二十丸，苏木同酒、童子便各一半，煎五七沸令温，空心吞下，自后每日用温酒送下三丸，其血块遂旋消，从大小二便去尽自知；小儿蛔虫腹痛不能忍，日夜叫唤，百药不救者，橘皮汤送下七丸，诸虫皆下，常服，白汤或姜汤送下三五丸；中酒及酒积，大便鲊臭者，白汤、旧酒各半，吞下七丸；一切噫塞，心下硬痛，皆用枣汤送下五丸，不拘时候。

【主治】 丈夫、妇人、小儿年深日近，沉积癥块，面色黄青，时上抢心，吐水吞酸，舌生白沫，妇人积年月经不调，渐成血气或盘块，中焦之间，覆如杯碗，连年累月，渐至瘦瘠，寒热往来，一切脾胃受寒，久不痊愈之疾。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“治癥丸”。《医学纲目》有丁香、薏苡仁、使君子。

02369 化耳聋方

【方源】《易简方便医书》卷二。

【组成】 雄黄一钱 轻粉八分 硇砂三钱 冰片五厘

【用法】 上为细末。用草笔点上，化为水，每日点五七次不等。

【主治】 耳聋。

02370 化铁金丹

【方源】《回春》卷三。

【组成】 黄耆 人参 白术 当归 川芎 陈皮 青皮（去瓤） 香附 乌药 槟榔 枳壳（麸炒） 枳实（麸炒） 木香 沉香 苍术（米泔浸） 山楂肉 神曲（炒） 草果 麦芽（炒） 草豆蔻 萝卜子 苏子 白芥子 三棱 莪术 厚朴（姜汁炒） 小茴香 白矾 牙皂 黄连 赤芍 柴胡 龙胆草 甘草各五钱 大黄（生用）六钱 牵牛（用头末）八钱 乳香 没药 阿魏 硇砂（用瓷罐煨过）各五钱 皮消一两

【用法】 上为细末，醋酒打稀糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米汤送下，午间白水送下，夜白水送下，一日三次。

【主治】 积块。

02371 化癣神丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 玄参一两 麦冬一两 五味子一钱 白薇一钱 鼠粘子一钱 百部三钱 甘草一钱 紫菀二钱 白芥子二钱

【用法】 水煎服。

【功用】 补肾水，益肺气，杀虫。

【主治】 咽门生喉癣，喉咙疼痛。

02372 化水种子汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【异名】 化水种玉丹（《辨证录》卷十一）。

【组成】 巴戟一两（盐水浸） 白术一两（土炒） 茯苓五钱 人参三钱 菟丝子五钱（酒炒） 芡实五钱（炒） 车前二钱（酒炒） 肉桂一钱（去粗，研）

【用法】 水煎服。

【功用】 壮肾气，益肾火。

【主治】 妇人膀胱气不化，水湿不行，渗入胞胎，小水艰涩，腹胀脚肿，不能受孕者。

【方论选录】 此方利膀胱之水，全在补肾中之气；暖胞胎之气，全在壮肾中之火。至于补肾之药，多是滋润之品，不以湿而益助其湿乎？然方中之药，妙在补肾之火，而非补肾之水；尤妙于补火而无燥烈之虞，利水而非荡涤之猛，所以膀胱气化，胞胎不湿，而发荣长养无穷欤！

02373 化坚二陈丸

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】 陈皮 半夏（制）各一钱 白僵蚕二两（炒） 白茯苓一两五钱 甘草三钱（生） 川黄连三钱

【用法】 上为细末，荷叶熬汤为丸，如梧桐子大。每服二钱，白滚水送下。

【主治】 痰核结子上下眼胞皮里肉外，其形大者如枣，小者如豆，推之移动，皮色如常，硬肿不疼，由湿痰气郁而成。

02374 化疔内消散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 皂角针 金银花 知母 贝母 天花粉 穿山甲 白及 乳香 赤芍 半夏 甘草 紫河车 各一钱

【用法】 水、酒各一茶钟，煎一半，量病上下，食前后服之。

【主治】 疔疮初起。

【备考】 方中半夏，《金鉴》作“当归”。

02375 化毒救生丹

【方源】《洞天奥旨》卷十六。

【组成】 生甘草五钱 金银花八两 玄参三两 蒲公英三两 天花粉三钱

【用法】 水十余碗，煎四碗，一日三次服。

【主治】 头面无故生疮，第一日头面重如山，二日即青紫，三日身亦青紫。

【临证举例】 疔疮 《赵炳南临床经验集》：刘某，男，37岁。患者五天前于左肘部生一小疙瘩作痒，骤然发红，剧痛而肿，就诊前一天已累及手腕部，肿胀疼痛，同时伴有心慌，恶心烦躁，头痛头晕，纳食不香，大便尚可。舌质红，苔白，脉弦数。检查：左侧肘部红肿，已有脓点欲溃，屈腕困难。证属毒热郁聚（肘疖）。治以清热解毒，消肿护心。处方：金银花五钱，连翘三钱，菊花三钱，公英五钱，黄芩三钱，瓜蒌一两，生地三钱，甘草三钱。服二剂后，疮已溃破，痛减肿消，继服连翘败毒丸以巩固疗效。

02376 化毒清表汤

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】 葛根 薄荷叶 地骨皮 牛蒡子（炒，研） 连翘（去心） 防风 黄芩 黄连 玄参 生知母 木通 生甘草 桔梗

【用法】 引用生姜、灯心，水煎服。

【主治】 毒热壅遏，麻疹已发而身仍大热者。

02377 化毒解毒汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 升麻4克 石膏15克 连翘子9克 牛蒡子9克 黄连6克 知母6克 元参9克 竹叶7克

【用法】 水煎服。

【主治】 药物性皮炎。

02378 化食养脾汤

【方源】《赤水玄珠》卷十三。

【组成】 人参 白茯苓 陈皮 半夏 神曲（炒） 麦芽（炒） 山楂各一钱 砂仁八分 甘草三分 白术一钱半

【用法】 水三钟，加生姜三片，煎八分，食远服。

【主治】 伤食。

【加减】 胸膈痞胀甚者，加厚朴、枳实各一两；胃脘痛，加草蔻仁一钱；气滞痰盛者，去人参，加香附一钱，半夏倍之。

02379 化斑解毒汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 黑玄参五钱 肥知母二钱 生石膏五钱 川黄连二钱 青连翘三钱 干生地四钱 凌霄花三钱 生甘草三钱

【功用】 清热解毒，活血化斑。

【主治】 丹毒，漆性皮炎（漆疮），紫癜。

02380 化滞调中汤

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】 白术一钱五分 人参 白茯苓 陈皮 厚朴（姜制） 山楂肉 半夏各一钱 神曲（炒） 麦芽（炒）各八分 砂仁七分

【用法】 水二钟，加生姜三片，煎八分，食前服。

【主治】《景岳全书》：食滞胀满。

【加减】 胀甚者，加萝卜子（炒）一钱，面食伤尤宜用。

02381 化痰四物汤

【方源】《女科指要》卷五。

【组成】 熟地四钱 当归二钱 白芍一钱半（酒炒） 川芎一钱 香附二钱（醋炒） 五灵脂二钱（炒黑）

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 产妇血虚气滞，瘀血留结，腹痛不止，恶露不能遽净焉。

【方论选录】 熟地补血以滋冲任，当归养血以雄经脉，白芍敛阴和血，香附调气解郁，川芎行血海以调血脉，灵脂去瘀血以除腹痛，而定血露不绝也。水煎温服，使瘀化气调，则经血自充，而冲任融和，瘀血自化，焉有腹痛不退，恶露不净乎？

02382 化瘀通经散

【方源】 《衷中参西》下册。

【组成】 炒白术 天冬 生鸡内金各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，开水送下，一日二次；山楂片三钱煎汤，冲化红蔗糖三钱，以之送药更佳。

【功用】 消癥瘕，通经闭。

【主治】 癥瘕坚结，及月事不通。

【方论选录】 鸡内金消瘀通经；伍以白术者，恐脾胃虚弱，不任鸡内金之开通也；更辅以天冬者，恐阴虚有热，不受白术之温燥也。

02383 化瘀理膈丹

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 三七二钱（捣细） 鸭胆子四十粒（去皮）

【用法】 开水送服，一日二次。

【主治】 力小任重，努力太过，以致血瘀膈上，常觉短气；若吐血未愈者，多服补药或凉药，或多用诸药炭强止其血，亦可有此病。

【备考】 凡服鸭胆子，不可嚼破；若嚼破，即味苦不能下咽，强下咽亦多呕出。

02384 化瘀解毒汤

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 牛蒡子9克 连翘9克 元参9克 知母9克 黄连6克 生石膏31克 鲜生地31克 制首乌31克 银花9克 紫草9克 白薇9克 竹叶6克

【用法】 水煎服。

【功用】 清热，凉血，解毒。

【主治】 藜日光皮炎，颜面、手、足背发痒刺痛，随即高度浮肿，颜面肿大，眼合成线，唇口外翻，指不能屈；且皮肤暗红发亮，起瘀斑浆疱，低热倦怠。

02385 化痰玉壶丸

【方源】 《局方》卷四。

【异名】 玉壶丸（《传家秘宝》卷三）。

【组成】 天南星（生） 半夏（生）各一两 天麻半两 头白面三两

【用法】 上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服三十丸，用水一大盏，先煎令沸，下药煮五七沸，候药浮即熟，滤出放温，别用生姜汤下，不拘时候服。

【主治】 ①《局方》：风痰吐逆，头痛目眩，胸膈烦满，饮食不下，及咳嗽痰盛，呕吐涎沫。②《幼幼新书》卷二十七引《王氏手集》：小儿久吐。

【临证举例】 风痰眩晕 《金匮翼》：东垣壮岁病头痛，每发时，两额尽黄，眩晕，目不欲开，懒于言语，身体沉重，兀兀欲吐，数日方过。洁古老人曰：此厥阴、太阴合而为病，名曰风痰。以《局方》玉壶丸加雄黄、白术治之。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典》引作“玉壶丹”。

02386 化痰降火汤

【方源】 《回春》卷七。

【组成】 陈皮（去白） 半夏（姜汁制） 茯苓（去皮） 泽泻 黄柏（酒炒） 知母（酒炒） 甘草各等分

【用法】 上锉。必用木香、前胡为引。

【主治】 阴虚痰火，尾骨节痛。

【加减】 若痛不止，加乳香、没药。

02387 化痰清火汤

【方源】 《古今医鉴》卷五。

【组成】 南星 半夏 陈皮 苍术 白术 白芍 黄连 黄芩 栀子 知母 石膏 甘草

【用法】 上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】 嘈杂。

【方论选录】 以南星、半夏、橘红之类以消其痰，芩、连、栀子、知母之类以降其火，苍术、白术、芍药之类以健脾行湿，壮其本元。又当节欲，无有不安者也。

02388 化腐生肌散

【方源】 《眼科临证笔记》。

【组成】 煅甘石五钱 轻粉二分 血竭二钱 制乳香二钱 制没药二钱 梅片三分 麝香一分 珍珠二分

【用法】 上为极细末。点眼大眦内。

【主治】 急性泪囊炎初期，肿胀赤痒，大眦清黄液常流。

02389 化腐生肌散

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】红升丹3克 朱砂9克 煅石膏15克 乳香9克 没药9克

【用法】上为细末。外用。

【功用】化腐生肌。

【主治】疮面腐肉未净，慢性顽固性创面久不愈者。

02390 化腐紫霜膏

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】化腐紫霜膏(《外科十法》)。

【组成】轻粉 草麻仁（研）各三钱 血竭二钱 巴豆（研，白仁）五钱 朝脑一钱 金顶砒五分 螺蛳肉（用肉晒干为末）二个

【用法】上药各为末，共碾一处，瓷罐收贮。临用时旋用麻油调搽顽硬肉上，以绵纸盖上；或膏贴俱可。至顽者不过二次即软，腐烂为脓，点渚疮顶亦破。

【主治】发背已成，瘀肉不腐，及不作脓者；又诸疮内有脓而外不穿溃者。

02391 化癥回生丹

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】人参六两 安南桂二两 两头尖二两 麝香二两 片子姜黄二两 公丁香三两 川椒炭二两 虻虫二两 京三棱二两 蒲黄炭一两 藏红花二两 苏木三两 桃仁三两 苏子霜二两 五灵脂二两 降真香二两 干漆二两 当归尾四两 没药二两 白芍四两 杏仁三两 香附米二两 吴茱萸二两 元胡索二两 水蛭二两 阿魏二两 小茴香炭三两 川芎二两 乳香二两 良姜二两 艾炭二两 益母膏八两 熟地黄四两 鳖甲胶一斤 大黄八两（为细末，以高米醋一斤半熬浓，晒干为末，再加醋熬，如是三次，晒干，末之）

【用法】上为细末，以鳖甲、益母、大黄三胶和匀，再加炼蜜为丸，重一钱五分，蜡皮封护。用时温开水和，空心服；瘀甚之证，黄酒下。

【主治】燥气延入下焦，搏于血分，而成癥者。癥结不散不痛，癥发痛甚；血痹；妇女干血痨证之属实证；疟母左胁痛而寒热者；妇女经前作痛，古谓之痛经者；妇女将欲行经而寒热者；妇女将欲行经，误食生冷腹痛者；妇女经闭；妇女经来紫黑，甚至成块者；腰痛之因于跌扑死血者；产后瘀血，少腹痛，拒按者；跌扑昏晕欲死者；金疮棒疮之有瘀滞者。

【方论选录】化癥回生丹法，系燥淫于内，治以苦温，佐以甘辛，以苦下之也。方从《金匮》鳖甲煎丸与回生丹脱化而出。此方以参、桂、椒、姜通补阳气，白芍、熟地守补阴液，益母膏通补阴气而清水气，鳖甲胶通补肝气而消癥瘕，余俱芳香入络而化浊。且以食血之虫，飞者走络中气分，走者走络中血分，可谓无微不入，无坚不破；又以醋熬大黄三次，约入病所，不伤他脏，久病坚结不散者，非此不可。或者病其药味太多，不知用药之道，少用独用，则力大而急；多用众用，则功分而缓，古人缓化之方皆然。所谓有制之师不畏多，无制之师少亦乱也。

02392 化毒排脓内补十宣散

【方源】《局方》卷八（绍兴续添方）。

【异名】托里十补散（原书同卷）、内补散(《秘传外科方》引《李防御五痔方》)、化毒排脓内补散(《洪氏集验方》卷二)、化毒排脓内补十味散(《传信适用方》卷三)、内托散(《医说》卷六)、十奇散、十宣散(《济生》卷六)、十宣内补散(《医方类聚》卷一七三引《简易方》)、排脓内补十宣散(《外科精要》卷下)、十全内托散(《医方类聚》卷一七六引《瑞竹堂方》)、托里散(《普济方》卷四〇三)、内补十宣散(《袖珍》卷三)、十味托里散(《外科启玄》卷十一)、托里十宣散(《简明医彀》卷八)。

【组成】黄耆（洗净，寸截，捶破，丝擘，以盐汤润透，用盏盛，姜汤瓶上一炊久焙燥，随众药入碾成细末）一两 人参（洗净，去芦，薄切，焙干，捣用） 当归（温水洗，薄切，焙干）各二两 厚朴（去粗皮，切，姜汁淹一宿，炖熟，焙燥，勿用桂朴） 桔梗（洗净，去头尾，薄切，焙燥） 桂心（别研，不见火） 芎藭（净洗，切，焙） 防风（净洗，切，焙） 甘草（生用） 白芷各一两

【用法】上十味，选药贵精，皆取净，晒、焙极燥方称。除桂心外，一处捣罗为细末，入桂令匀。每服自三钱加至五六钱，热酒调下，日夜各数服，以多为妙。服至疮口合，更服尤佳，所以补前损，杜后患也。不饮酒人，浓煎木香汤调下，然不若酒力之胜也；或饮酒不多，能勉强间用酒调，并以木香汤解酒，功效当不减于酒也。未成者速散，已成者速溃，败脓自出，无用手挤，恶肉自去。大抵痈疽才觉便服，倍加数服，服之醉，则其效尤速。

【功用】①《局方》（绍兴续添方）：发散风毒，流行经络，排脓止痛，生肌长肉。②《普济方》：活血匀气、调胃补虚，内托疮毒。

【主治】①《局方》（绍兴续添方）：一切痈疽疮疖。②《普济方》：小儿痘疮，毒根在里，或气血虚弱，或风邪秽毒冲触，使疮毒内陷，伏而不出，

出不匀快者。

【备考】《普济方》本方用法：为末，拌匀，木香、紫草汤调下。

02393 从龙汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】龙骨一两（不用煅，捣） 牡蛎一两（不用煅，捣） 生杭芍五钱 清半夏四钱 苏子四钱（炒，捣） 牛蒡子三钱（炒、捣）

【主治】外感痰喘，服小青龙汤病未全愈，或愈而复发者。

【加减】热者，酌加生石膏数钱或至一两。

02394 气虚散

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【异名】参蒲散。

【组成】石菖蒲 人参 甘草各一钱 当归 木通 骨碎补各二钱

【用法】水煎服；外用牙皂、石菖蒲末塞鼻。

【主治】气虚耳鸣、耳聋。

02395 仓连煎

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】陈仓米赤痢用三钱，白痢用七钱，赤白相兼用五钱黄连赤痢用七钱，白痢用三钱，赤白相兼用五钱

【用法】上锉。水一钟半，煎至七分，露一宵，空心温服。

【主治】噤口痢，不拘赤白。

02396 仓卒散

【方源】《三因》卷七。

【异名】夺命散(《普济方》卷二十四)。

【组成】山栀子四十九个（烧半过） 附子一枚（炮）

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，酒半盏，煎至七分，入盐一捻，温服。即愈。

【主治】寒疝入腹，心腹卒痛；及小肠膀胱气绞刺，脾肾气攻，挛急极痛不可忍，屈伸不能，腹中冷，重如石，白汗出。

02397 仓廪汤

【方源】方出《传信适用方》卷二，名见《医方类聚》卷一四一引《澹寮》。

【异名】仓廪散(《普济方》卷二一三)。

【组成】败毒散加陈仓米五六十粒

【用法】水煎服。

【主治】噤口痢，时痢及疟痢并行

①《传信适用方》：噤口痢。②《增补内经拾遗》引《仁存方》：疟痢并行。③《金鉴》：时痢，身热无汗，遍身疼痛，热为邪束，频作呕逆。

02398 仓公下气汤

【方源】《妇人良方》卷十二

【异名】下气散(《女科万金方》)、下气汤(《校注妇人良方》卷十二)。

【组成】羌活 赤芍药 甘草 槟榔 青皮 大腹皮 陈皮 赤茯苓 半夏 桑白皮 桂心各半两 紫苏茎二两

【用法】上㕮咀。每服三钱重，水一盏，加生姜五片，大枣二个，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠心腹胀满，两胁肋闷，不下饮食，四肢无力。

【备考】本方方名，《郑氏家传女科万金方》引作“仓公下气散”。

02399 仓公当归汤

【方源】《千金》卷八。

【异名】当归汤(《圣济总录》卷八)、仓公当归酒(《三因》卷七)、仓公酒(《普济方》卷一〇五引《鲍氏方》)。

【组成】当归 防风各十八铢 独活一两半 麻黄二十铢 附子一枚 细辛半两

【用法】上㕮咀。以酒五升，水三升，煮取三升，服一升；口不开者，格口纳汤。一服当苏，二服小汗，三服大汗。

【主治】贼风口噤，角弓反张，痉者。

【临证举例】风痉 《伤寒补亡论》：尝见口噤似痉，略知人事，但坐而顺掣，腰脊仰倒者，亦风痉也，服仓公当归汤而愈。

02400 分气饮

【方源】《直指小儿》卷四。

【异名】分气散(《幼科类萃》卷十三)。

【组成】北梗 赤茯苓 陈皮 桑白皮（炒） 大腹皮 枳壳（制） 半夏曲 真苏子（微炒） 紫苏 甘草（炙）各二钱 草果仁一钱

【用法】上锉。每一钱半，水一小盏，加生姜三片，大枣一个，煎半服。

【主治】小儿肿胀作喘，气短而急。

02401 分珠散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【异名】安珠散(《眼科菁华录》卷上)。

【组成】槐花 白芷 地黄 栀子 荆芥 甘草 黄芩 龙胆草 赤芍药 当归各一两

【用法】水煎服。

【主治】眼患血灌瞳神，恶血不散。

【加减】 春，加大黄泻肝；夏，加黄连泻心；秋，加桑白皮泻肺。

02402 分消汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】 苍术（米泔浸，炒） 白术（去芦） 陈皮 厚朴（姜汁炒） 枳实（麸炒）各一钱 砂仁七分 木香三分 香附 猪苓 泽泻 大腹皮各八分 茯苓一钱

【用法】 上锉一剂。加生姜一片，灯草一团，水煎服。

【主治】 中满成鼓胀，兼治脾虚发肿满饱闷。

【加减】 气急，加沉香；肿胀，加萝卜子；胁痛面黑是气鼓，加青皮，去白术；胁满小肠胀痛、身上有血丝缕是血鼓，加当归、芍药、红花、牡丹皮、去白术、茯苓；嗳气作酸、饱闷腹胀是食鼓，加山楂、神曲、麦芽、萝卜子，去白术、茯苓；恶寒、手足厥冷、泻出清水是水鼓，加官桂；胸腹胀满、有块如鼓者是痞散成鼓，加山楂、神曲、半夏、青皮、归尾、玄胡、鳖甲，去白术、茯苓、猪苓、泽泻。

02403 分清饮

【方源】《直指》卷十。

【异名】 分清散（《普济方》卷三二一）、萆薢分清饮（《郑氏家传女科万金方》卷一）。

【组成】 益智仁一两（醋浸） 川萆薢 石菖蒲（去毛） 天台 乌药 白茯苓各一两 甘草四钱

【用法】 上为末。每二钱，盐少许，同煎，食前服。

【主治】 ①《直指》：思虑过度，清浊相干，小便白浊。②《郑氏家传女科万金方》：白带。

02404 分清散

【方源】《普济方》卷三十三。

【异名】 分清饮（《明医指掌》卷七）。

【组成】 益智仁 萆薢 菖蒲各等分

【用法】 上为末。每服三二钱。

【主治】 白浊。

02405 分心气饮

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）。

【组成】 木香（不见火） 桑白皮（炒）各半两 丁香皮一两 大腹子（炮） 桔梗（去芦，炒） 麦门冬（去心） 草果仁 大腹皮（炙） 厚朴（去粗皮，姜汁制） 白术 人参（锉）各半两 香附子（炒，去毛） 紫苏（去梗） 陈皮（去白） 藿香各一两半 甘草（炙） 一两

【用法】 上㕮咀。每服二钱，水一盏，加生姜三片、枣子一个（擘破去核），及灯心十茎，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 男子、妇人一切气不和。多因忧愁思虑，怒气伤神，或临食忧戚，或事不随意，使抑郁之气留滞不散，停于胸膈之间，不能流畅，致心胸痞闷，胁肋虚胀，噎塞不通，噫气吞酸，呕哕恶心，头目昏眩，四肢倦怠，面色萎黄，口苦舌干，饮食减少，日渐羸瘦，或大肠虚秘；或因病之后，胸膈虚痞，不思饮食。

02406 分心气饮

【方源】《局方》卷三（续添诸局经验秘方）

【组成】 木通（去节） 赤芍药 赤茯苓 肉桂（去粗皮） 半夏（汤洗七次） 桑白皮（微炒） 大腹皮 陈皮（去瓤） 青皮（去白） 甘草（炙） 羌活各一两 紫苏（去粗梗）四两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，大枣二个，灯心五茎，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 消化滞气，升降阴阳，调顺三焦，和脾进食。

【主治】 男子、妇人一切气不和，多因忧愁思虑，怒气伤神，或临食忧戚，或事不随意，使抑郁之气留滞不散，停于胸膈之间，不能流畅，致心胸痞闷，胁肋虚胀，噎塞不通，噫气吞酸，呕哕恶心，头目昏眩，四肢倦怠，面色萎黄，口苦舌干，饮食减少，日渐羸瘦，或大肠虚秘；或因病之后，胸膈虚痞，不思饮食。

02407 分气补心汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】 大腹皮（炒） 香附（炒去毛） 白茯苓 桔梗各一两 木通 甘草（炙） 川芎 前胡（去苗） 青橘（炒） 枳壳（麸炒，去瓤） 白术各三分 细辛（去苗） 木香各半两

【用法】 上锉散。每服四大钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个，煎七分，去滓，食前温服。

【主治】 心气郁结，忪悸噎闷，四肢浮肿，上气喘急。

02408 分气紫苏饮

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【异名】 分气紫苏汤（《直指》卷五）。

【组成】 五味子（去梗，洗） 桑白皮（炙，锉） 陈皮（去白，净洗） 桔梗（锉） 草果仁 大腹皮 甘草（炙） 茯苓各三斤

【用法】 上为粗末，称二十斤，净入，拣嫩枝叶干紫苏十五斤捣碎，同一处拌匀。每服四钱，水一

大枣，姜钱二片，入盐少许，同煎至七分，去滓，空心、食前服。

【功用】 和胃进食。

【主治】 男子、妇人脾胃不和，胸膈噎塞，腹胁疼痛，气促喘急，心下胀闷，饮食不思，呕逆不止。

02409 分气紫苏饮

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】 枳壳 茯苓 大腹皮 陈皮 甘草 苏子 草果 白术 当归 紫苏 半夏 桑皮 五味子

【用法】 上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】 脾胃不和，胸膈噎塞，腹胁疼痛，气促喘急，心下胀闷。

02410 分利五苓散

【方源】《胎产新书》卷三。

【组成】 猪苓 泽泻 白术 赤芍各一钱 阿胶 当归 川芎各八分

【用法】 空心服。

【功用】 解热毒，顺阴阳。

【主治】 差经。经来大小便俱出。

02411 手拈散

【方源】《百一》卷八。

【异名】 游山方(《景岳全书》卷五十四引《良方》)、顺气手拈散(《胎产新书》卷二)、游山散(《春脚集》卷二)。

【组成】 草果 玄胡索 五灵脂 没药各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，温酒调下。

【功用】《北京中药成方选集》：顺气宽胸，消胀定痛。

【主治】 心胃气痛。

①《百一》：脾痛。②《普济方》：妇人血气刺痛不可忍及诸般气痛。③《北京中药成方选集》：心胃疼痛，胸中膨闷；肝郁不舒，两胁胀满。

【备考】 本方改为丸剂，名“手拈丸”(见《北京市中药成方选集》)。

02412 手拈散

【方源】《女科万金方》。

【异名】 七情手拈散(《郑氏家传女科万金方》卷四)。

【组成】 枳壳 延胡索 小茴香各一钱一分 白芍药 乳香 没药各一钱 甘草六分

【用法】 水煎服。

【主治】 产后七情所伤而致诸气不和，忽然心气痛不可忍者。

02413 毛姜浸酒

【方源】《外伤科学》。

【组成】 毛姜

【用法】 将毛姜浸于75%酒精内至成糊状。外涂患部皮肤，每日2至3次。

【主治】 白癜风，斑秃。

02414 午时茶

【方源】《急救经验良方》。

【组成】 茅术十两 陈皮十两 柴胡十两 连翘十两 白芷十两 川朴十五两 枳实 槟肉 羌活 防风 前胡 藿香 甘草各十两 陈茶二十斤 桔梗 麦芽 苏叶各十五两 建曲十两 川芎十两

【用法】 上为细末，拌匀，宜五月五日午时合糊成小块。每服三钱，加葱、生姜各少许，水煎，热服。汗出即效。

【功用】《中药制剂手册》：解表和中。

【主治】 ①《急救经验良方》：一切风寒感冒停食，及不服水土，腹泻腹痛。②《全国中药成药处方集》：感冒头痛，胸闷腹泻。

02415 牛车肉

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】 紫河车(洗净，煮烂)牛肚(切碎)

【用法】 上和一处，同煮熟，随便食之。

【主治】 失心癫狂。

02416 牛涎丸

【方源】《本草纲目》卷五十引《医学集成》。

【组成】 老牛涎糯米末

【用法】 拌和为小丸。煮熟食之。

【主治】 噎膈反胃。

02417 牛脑丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】 熟地四两 杞子 萸肉 山药各二两 鹿胶 菟丝子各两半 龙齿一两 牛脑一个(蒸) 黄耆二两

【用法】 上为末，先将前地黄和牛脑捣烂，入末为丸。每服六七十丸，空心白汤送下。

【主治】 脑鸣眩晕，髓枯精涸。

02418 牛脑丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】 白芷 川芎各三钱

【用法】 上为末，抹黄牛脑子上，瓷器内加酒炖熟。乘热食之，尽量一醉。

【主治】 头风。

02419 牛蒡丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】 牛膝 菟丝子各一两

【用法】 同入银器内，酒浸一寸五分，晒为末，将原酒煮糊为丸。空心酒送下。

【主治】 腰膝疼痛，或顽麻无力者

02420 牛黄丸

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】 牛黄半两（细研） 麝香半两（细研） 白附子三分（炮裂） 天麻一分 白僵蚕一两（微炒） 乌蛇二两半（酒浸，炙微黄，去皮骨） 附子一两（炮裂，去皮脐） 羌活一两 天南星半两（炮裂） 干姜三分（炮裂，锉） 桂心三分 芎藭三分

【用法】 上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以薄荷酒送下，不拘时候。

【主治】 中风。舌强不语，筋骨拘急，饮食不得，翕翕发热，形神如醉。

02421 牛黄丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】 牛黄一两（细研） 麝香一分（细研） 赤箭一两半 白僵蚕一两（微炒） 白附子一两（炮裂） 白花蛇肉二两（涂酥，炙微黄） 羌活三分 桂心三分 干蝎三分（微炒）

【用法】 上为末，研入牛黄、麝香令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前以温酒送下。

【主治】 中风。半身不遂，或举体痹麻。

02422 牛黄丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 三味牛黄丸(《景岳全书》卷六十二)。

【组成】 雄黄（研，水飞） 天竺黄各二钱 牵牛末一钱

【用法】 上同再研，面糊为丸，如粟米大。每服三丸至五丸，食后薄荷汤送下。常服尤佳，大者加丸数。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：小儿疳积。②《景岳全书》：惊热。

02423 牛黄丸

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】 白花蛇（酒浸） 人参 茯神 独活各半两 钩藤一分 脑子 麝香 牛黄各一钱 朱砂（另研）三钱 雀儿饭瓮三十个

【用法】 上件除研药外，为末，后同研令匀，炼蜜为丸，一两作三十丸，金箔为衣。每一岁儿服一丸，人参汤或薄荷汤化下。

【主治】 小儿风痫，时发时止，岁月不休。

02424 牛黄丸

【方源】《医方类聚》卷二十一引《管见大全良方》。

【组成】 牛黄一钱 麝香半钱 辰砂（以上并研） 南星（炮） 白附子（炮）各半两 蝎梢一分

【用法】 上为细末，姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，不拘时候，淡姜汤送下。

【主治】 失音不语。

02425 牛黄丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十三。

【组成】 大黄一两 白牵牛（头末）半两

【用法】 上为细末。每服三钱，有厥冷，用酒调下，无厥冷而手足烦者，蜜调下。

【主治】 上焦热，脏腑秘结。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“牛黄散”。

02426 牛黄丸

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 牛黄 珍珠 天竺黄 琥珀 青黛 僵蚕各等分 白附子（炮） 地龙各等分 麝香少许 金箔（量加为衣） 苏合油 香油

【用法】 以上前九味，各另研极细，共为一处，用细甘草梢煎汁三分之二，次入苏、香二油三分之一兑匀，共和为丸，金箔为衣。量其大小，薄荷汤化下。

【功用】《医宗金鉴》：疏风镇惊。

【主治】 小儿通睛。皆因失误筑打，触着头面额角，兼倒仆，令儿肝受惊风，遂使两目斗睛。

【宜忌】 乳母及小儿忌一切酒、面、猪肉、辛热生痰等物。

02427 牛黄丸

【方源】《医林纂要》卷六。

【组成】 胆南星 全蝎（去足，炙） 蝉蜕各二钱五分 牛黄 白附子 僵蚕（洗，焙，去丝） 防风 天麻各一钱五分 珍珠 犀角 麝香各五分

【用法】 上为末，另煮枣肉，和水银五分细研，合入药末为丸。或荆芥汤、或薄荷汤、或姜汤送下。

【主治】 风痫迷闷，抽掣潮涎。

02428 牛黄饮

【方源】《圣济总录》卷十四。

【异名】 牛黄散(《普济方》卷一〇二)。

【组成】 牛黄（别研入）三分 人参二两 豉（炒）三合 升麻一两 铁精（捣研，别入）一两 龙骨 白茯苓（去黑皮）各二两 栀子仁一两 天门冬（去心，焙）二两 麦门冬（去心，焙）三两

【用法】 上药除别研外，为粗末。每服三钱匕，

水一盏，煎至七分，去滓，加荆沥少许，再煎令沸，入牛黄、铁精末各半字调匀，日午、临卧温服。

【主治】 风惊悸、心神恍惚，半身不随。

02429 牛黄散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 牛黄一分 龙脑一分 朱砂一分 太阴玄精二两

【用法】 上为细散。每次用药半钱，先于重舌上以铍针针破出血，用盐汤漱口，然后掺药于舌下，咽津。

【主治】 重舌，口中涎出，水浆不收。

02430 牛黄散

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】 牛黄（研） 朴消（研） 甘草（炙，锉）各一两 升麻 山栀子（去皮） 芍药各半两

【用法】 上药各为细散，再同研令匀。每服一钱匕，食后煎姜、蜜汤，放冷调下。

【主治】 伤寒咽喉痛，心中烦躁，舌上生疮。

02431 牛黄散

【方源】《洁古家珍》。

【组成】 白牵牛头末五钱 大黄一两

【用法】 上为细末。每服三钱，有厥冷，用酒调下；无厥冷而手足烦者，蜜汤调下。

【主治】 上焦热，脏腑秘结。

02432 牛黄散

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】 牛黄一分 片脑一分 硼砂一分 雄黄二分 青黛二分 朴消一分半 黄连八分（末） 黄柏八分（末） 辰砂二分

【用法】 上为细末。每用少许，敷入口内。

【主治】 小儿口中百病，鹅口、口疮，重腭不能吮乳，及咽喉肿塞，一切热毒。

02433 牛黄散

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】 陈胆星二钱五分 蝉退二钱五分（去头足） 防风一钱五分 白附子钱半（生用） 天麻一钱五分 僵蚕钱半（净，炒） 麝香一分二厘五毫 全蝎二钱半（去头翅，净炙） 牛黄一分二厘五毫

【用法】 上为细末。姜汁调服。

【主治】 风痫。

02434 牛黄膏

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 牛黄二钱半 朱砂 郁金各三钱 脑子 甘草各一钱 牡丹皮三钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如皂子大。新汲水化下。

【主治】 热入血室，发狂不认人。

02435 牛黄膏

【方源】《万氏家抄方》卷下。

【组成】 牛胆 南星 川黄连（姜汁炒） 全蝎（洗，炙） 蝉蜕（去足）各二钱半 僵蚕（炒） 白附子 防风 明天麻（煨）各一钱半 木香一钱 麝香五分

【用法】 上为细末，蒸枣（去皮核、取肉）研成膏为丸，如小豆大。食远荆芥、生姜汤研化服。

【主治】 小儿风痫。

02436 牛榔散

【方源】《本草纲目》卷十八引《普济方》。

【异名】 牛郎顶（《串雅内编》卷三）。

【组成】 黑牵牛半两 槟榔二钱半

【用法】 上为末，每服一钱，紫苏汤调下。

【功用】 追虫去积。

【主治】 ①《本草纲目》引《普济方》：气筑奔冲不可忍。②《仙拈集》：鼓胀，水肿，虫积。

【备考】 本方原名牛郎丸，与剂型不符。据《仙拈集》改。

02437 牛蒡汤

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】 牛蒡子一钱 升麻 黄药子 玄参 浮萍 桔梗 甘草 天花粉

【主治】 ①《嵩崖尊生》：喉中生疮。②《杂病源流犀烛》：喉痹。

02438 牛膝丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 牛膝二两（去苗） 虎胫骨一两（涂酥，炙微黄） 羌活一两 海桐皮三分 当归三分（两）（锉，微炒） 巴戟三分 芎藭三分 薏苡仁三分 防风三分（两）（去芦头） 桂心三分 杜仲一两（去粗皮，微炙，锉） 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙微黄） 石斛三分（去根，锉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 熟干地黄一两 酸枣仁三分（微炒） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 仙灵脾三分 补骨脂三分（微炒） 干蝎三分（微炒） 天麻三分 木香三分 槟榔一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 肾脏风毒流注，腰脚筋骨疼痛，行立艰难。

02439 牛膝丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】牛膝一两（半）（去苗） 柏子仁三分 桂心一两 白茯苓三分 白石英一两（细研，水飞过） 黄耆一两（锉） 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙令微黄） 五味子三分 人参三分（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 覆盆子一两 菟丝子一两（酒浸三日，曝干） 山茱萸三分 芎藭三分 杜仲三分（去粗皮，炙令微黄，锉） 熟干地黄三分 防风三分（去芦头） 石斛一两（去根，锉） 肉苁蓉一两（酒洗，去皱皮，微炙） 磁石一两（烧，醋淬七遍，捣细细研，水飞过） 补骨脂一两（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】肾脏虚损，骨痿无力，坐而难起，目视茫茫，短气不足，肌体羸瘦。

02440 牛膝丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】牛膝三两（去苗） 石斛一两半（去根，锉） 狗脊一两半 桂心一两半 川椒一两半（去目及闭口者，微炒出汗） 附子一两半（炮裂，去皮脐） 干姜一两半（炮裂，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】腰脚疼痛，挛急不得屈伸，及腿膝冷麻。

【备考】方中石斛，《普济方》作"续断"。

02441 牛膝丸

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【异名】大牛膝丸（《鸡峰》卷四）。

【组成】牛膝（酒浸） 川芎 续断 萆薢 丹参（去芦） 黑狗脊（去毛） 杜仲（锉，炒去丝） 独活 白术 枳壳 当归 白芍药 防风 干木瓜 熟干地黄各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心木瓜汤送下，稍加至三十丸；酒下亦可。

【主治】风毒流注，腰腿两脚疼重挛痛，及肾虚目见黑花。

02442 牛膝丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】牛膝（酒浸） 萆薢 杜仲（炒去丝） 苁蓉（酒浸） 防风 菟丝子（酒浸） 白蒺藜各等分 桂枝减半

【用法】上为细末，酒煮猪腰子捣为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心酒送下。

【功用】益精缓中。

【主治】肾肝损，骨痿不能起于床，筋缓不能收持。

02443 牛膝丸

【方源】《御药院方》卷六。

【异名】接骨丹（《普济方》卷九十八）。

【组成】苁蓉（酒浸） 牛膝（酒浸） 防风（去芦头） 萆薢（切碎，炒） 海桐皮（去粗皮） 自然铜（醋淬七次） 威灵仙（去土） 金毛狗脊（去毛） 川乌头各一两（生，去皮脐） 没药半两（另研） 乳香半两（另研） 地龙（去土）一两 骨碎补（去毛）四两 木鳖子（去壳，另研）四两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒送下。

【主治】风气下注，脚膝无力，筋骨痠疼；或上攻，头面肿痛，遍身疼倦，壮热。

02444 牛膝汤

【方源】《外台》卷三十三引《集验方》。

【组成】牛膝四两 滑石八两 当归三两 通草六两 葵子一升 瞿麦四两

【用法】上切。以水九升，煮取三升，分三次服。

【功用】①《摄生众妙方》：滑利水道，使儿易产。②《实用千金方选按》：通经活血，除瘕去瘀。

【主治】①《外台》引《集验方》：产儿胞衣不出。②《局方》：产儿已出，胞衣不下，脐腹坚满，胀急疼痛，及子死腹中不得出者。

【宜忌】忌牛、狗肉。

02445 牛膝汤

【方源】《证治汇补》卷八。

【组成】牛膝 归尾 黄芩加琥珀末少许

【功用】《医略六书》：破瘀通窍。

【主治】血瘀小便不通。

【方论选录】《医略六书》：牛膝化瘀血，以通利二便，归尾破血瘀，以调和经脉，黄芩清瘀热肃金，琥珀散瘀血利水也。水煎温服，使血化气行，则水府廓清，而蓄泄如常，安有小便涩痛不通之患乎。此破瘀通窍之剂，为血瘀溺闭之专方。

【备考】《医略六书》本方用牛膝二钱，归尾三钱，黄芩钱半。水煎、去滓温服。

02446 牛膝酒

【方源】《三因》卷十三引《传信方》。

【异名】海桐皮酒（《普济方》卷一五四）。

【组成】牛膝 川芎 羌活 地骨皮 五加皮

薏苡仁 甘草各一两 海桐皮二两 生地黄十两一法加杜仲一两（炒丝断入）

【用法】 上锉散，帛裹，入无灰酒二斗浸，冬二七日，夏月分数服，旋浸二五宿。每服一杯，日三四杯。长令酒气不绝为佳。

【主治】 ①《三因》引《传信方》：肾伤风毒攻刺，腰痛不可忍。②《医略六书》：湿热腰痛，脉弦数者。

【方论选录】《医略六书》：湿热伤阴，营血不利，不能滋荣经络，故腰府失强，腰痛不止焉。羌活通经透络，米仁渗湿清热，地骨皮退热凉肌肉，五加皮续伤理经络，海桐皮祛风湿、清经隧，杜仲补肾脏、强腰府；小川芎入血海、活血脉以荣经，生地黄入心肾、壮真水以滋阴，淮牛膝壮肝肾以雄筋骨也。酒蒸温服，使阴血内充，则湿热自化，而肾府得强，腰痛有不痊者乎？此壮肾分解之剂，为湿热伤阴腰痛之良方。

02447 牛膝散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】 牛膝一两（去苗） 五加皮半两 丹参半两 木香三分 桂心三分 羌活半两 当归半两（锉，微炒） 防风半两（去芦头） 补骨脂三分（微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 安息香三分（入胡桃内同捣熟） 白芍药半两 石斛三分（去根，锉） 枳实半两（麸炒微黄） 鹿茸四两（去毛，涂酥，炙微黄） 虎胫骨一两（涂酥，炙微黄）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以热酒调下。

【主治】 风虚湿痹，腰间久痛，不任行立。

02448 牛膝散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 牛膝一两（去苗） 独活三分（捣碎） 赤箭一两 当归三分（锉，微炒） 柏子仁三分 鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥） 芎藭三分 附子半分（炮裂，去皮脐） 桂心三分 汉防已半两 羚羊角屑半两 莪蒁三分 仙灵脾一两 乌蛇肉一两（酒拌，炒令黄） 麝香一分（研入）

【用法】 上为细散，入研了药令匀。每服一钱，食前以温酒调下。

【主治】 妇人中风偏枯，口面㖞斜，言语涩滞，精神不守，举动艰难。

02449 牛膝散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】 牛膝一两（去苗） 刘寄奴三分 当归二两（锉，微炒） 芎藭一两 赤芍药半两 桂心半两 红蓝花半两 琥珀半两（研入）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，次入酒一合，更煎三两沸，去滓，不拘时候温服。

【主治】 产后血晕，心腹疞痛，闷绝，恶血涩滞。

02450 牛膝散

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】 桃仁 归尾各五分 牛膝（酒浸）二钱 赤芍 生地各七分 川芎三分 麝香少许 麦麦炒山栀 甘草各五分

【主治】 血淋。

02451 牛髓汤

【方源】《法律》卷五。

【组成】 牛髓一斤（取脊骨中者） 白蜜半斤 杏仁四两（去皮尖，研如泥） 干山药四两（炒） 胡桃仁（去皮，另研）四两

【用法】 上将髓、蜜二味，砂锅内熬沸，以绢滤去滓，盛瓷瓶内，将杏仁等三味入瓶内，以纸密封瓶口，重汤煮一日夜，取出冷定。每早晨服一二匙，白汤化下。

【功用】 润肺。

【主治】 咳嗽。

02452 牛角鰓丸

【方源】《妇科玉尽》卷四。

【组成】 发灰一两 阿胶二两 代赭石 干姜三两 生地四两 马蹄壳（烧）一个 牛角鰓（酥炙）五两

【用法】 炼蜜为丸服。

【主治】 恶血不绝，崩血不可禁，腹中绞痛，气息急。

02453 牛角鰓散

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】 黄牛角鰓（酒炙） 侧柏叶 艾叶（炒） 当归（切，焙） 续断（炒） 地榆（炒） 赤石脂（研） 伏龙肝各一两

【用法】 上为散。每服三钱匕，食前米饮或温酒调下。

【主治】 妇人血伤，兼赤白带下。

02454 牛角鰓散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】 牛角鰓五个 鹿茸 当归 禹余粮 阿胶 干姜 续断各一两 乌贼鱼骨半两 赤小豆一升

【用法】 上为细末。每服一二钱，用酒调下，不

拘时候。

【主治】 外实内虚，带下，四崩。

【备考】 四崩：一曰热病下血；二曰寒热下血；三曰经脉未断，举重停住下血；四曰产后脏关开，经利不断。

02455 牛蒡子丸

【方源】《奇效良方》卷六十一。

【组成】 牛蒡子一两（微炒） 川升麻 黄药子 干浮萍 草玄参 甘草（生用）各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如小弹子大。常含一丸，咽津。

【主治】 咽喉内热毒所攻，生疮肿痛。

02456 牛蒡子汤

【方源】《医方类聚》卷七十四引《济生》。

【异名】 牛蒡子散(《玉机微义》卷二十七引《澹寮》)、牛蒡子饮(《医学六要·治法汇》卷八)。

【组成】 牛蒡子 玄参 升麻 桔梗（去芦） 犀角 木通（去节） 黄芩 甘草各等分

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 风热上壅，咽喉肿痛，或生乳蛾、疮痈、缠喉风。

①《医方类聚》引《济生》：风热上壅，咽喉窒塞，或痛，或不利，或生疮疡，或状如肉脔，疼痛妨闷。②《玉机微义》引《澹寮》：乳蛾。③《医学入门》：咽喉肿痛，牙关紧急，或生疮痈，或愈后复攻胸胁，气促身热，不能坐卧。④《杏苑》：缠喉风痰壅，牙关紧急，汤水难下。

02457 牛蒡子汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 葛根 贯众 甘草 江西豆豉 牛蒡子（半生半熟，研）各二钱

【用法】 水二钟，煎八分，食后服。

【主治】 时毒热甚，肿痛，脉浮数而无力者。

02458 牛蒡子汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】 牛蒡子散(《疡科心得集·补遗》)。

【组成】 陈皮 牛蒡子 山栀 金银花 甘草 瓜蒌仁 黄芩 天花粉 连翘 角针各一钱 柴胡 青皮各五分

【用法】 水二钟，煎八分，加酒一杯和匀，食远服。

【主治】 乳痈、乳疽，结肿疼痛，不论新久，但未成脓。

02459 牛蒡饮子

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】 牛蒡一钱 木通八分 片芩九分 玄参八分 升麻八分 山豆根五分 桔梗八分 甘草五分 犀角末 薄荷七分

【用法】 水煎，分二次服。

【主治】 双乳蛾，心火壅盛者。

【备考】 方中犀角末用量原缺。

02460 牛膝煎丸

【方源】《博济》卷一。

【异名】 乌头煎丸(《圣济总录》卷一八六)。

【组成】 川乌头五两（逐日三度换水，浸令透软，去皮脐，细切，用好酒三升渐渐下，熬成膏，更细研） 木瓜三个（下面剜去，取瓤核，将好艾先熟杵为末，入在木瓜内，填实蒸熟，细研如泥） 海桐皮 牛膝（去芦） 羌活（去芦） 巴戟 苁蓉各一两半 青盐（细研） 青橘皮（去白） 舶上茴香 金毛狗脊（去毛） 萆薢各二两

【用法】 上十味，焙干为末，以前二味膏搅和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、温酒或盐汤送下，勿嚼。

【功用】 补益真阳。

【主治】 下元气虚，冷气流注，脚膝无力，行步不能，状似软风。

02461 牛髓膏子

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】 黄精膏五两 地黄膏三两 天门冬膏一两 牛骨头内油二两

【用法】 上药将黄精膏、地黄膏、天门冬膏与牛骨油一同不住手用银匙搅，令冷定，和匀成膏。每服一匙，空心酒调下。

【功用】 补精髓，壮筋骨，和气，延年益寿。

02462 牛马二宝散

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 西牛黄 马宝各一钱

【用法】 上为细末。每服二分，一日二次，用人参、竹沥饮调下。

【主治】 精神病。神经顿失其常性，遂发似狂非狂之证。

02463 牛皮癣药酒

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 木鳖子六个 土槿皮二两 槟榔七个 防风二钱 麝香三分 冰片三分 土螺蛳（即蜗牛）七个

【用法】 烧酒三斤浸。搽。

【主治】 牛皮癣。

02464 牛黄上清丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 黄连八两 大黄二百五十六两 连翘六十四两 黄芩六十四两 芥穗六十四两 栀子（炒）六十四两 桔梗六十四两 蔓荆子（炒）六十四两 白芷六十四两 薄荷三十二两 防风三十二两 生石膏三十二两 黄柏三十二两 生草三十二两 川芎三十二两 旋覆花十六两 菊花一百二十八两

【用法】 上为细末。每十六两细末兑牛黄五分，冰片二钱，研细，混合均匀后，炼蜜为丸，重二钱，蜡皮封固。每服一至二丸，日服二次，温开水送下。

【功用】 泻热消肿，疏风止痛。

【主治】 头痛眩晕，目赤耳鸣，口燥舌干，齿龈肿痛，大便燥结。

02465 牛黄双解散

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】 肉桂 大黄（炒） 芍药 牵牛（杵，炒） 泽泻 桃仁（去皮尖，炒）各二钱半 炙甘草 干姜各一钱

【用法】 上分二剂。水煎，空心、食前服。

【主治】 便痈内蕴热毒，外挟风邪，或交感强忍精气，以致淫精交错，壅结肿痛，或大小便秘。

02466 牛黄生肌散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 牛黄五分 珍珠 琥珀 人中白 胡黄连 乳香 没药各一钱 儿茶二钱 硼砂各五分 冰片三分

【用法】 上为末。掺患处。

【功用】 牙疳臭烂穿腮。

02467 牛黄白术丸

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】 黑牵牛 大黄各二两 白术一两

【用法】 上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前生姜汤下。如要快利，加至百丸。

【主治】 腰脚湿气疼痛。

02468 牛黄至宝丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 连翘十六两 银花十六两 玄参（去芦）十二两 苦桔梗十二两 黄郁金八两 黄连八两 生栀子八两 黄芩十二两 黄柏八两 薄荷四两 大黄十二两 贝母四两 木香四两 天竺黄二两 甘草十二两

【用法】 上为细末，过罗，每细末十六两兑牛黄五分，冰片四钱，朱砂一两，雄黄一两，研匀，炼蜜为丸，重二钱，蜡皮封固。每服二丸，日服二次，温开水送下。

【功用】 清瘟热，解毒，镇静。

【主治】 瘟毒里热不解，面赤身烧，口干舌燥，目赤耳鸣，头痛眩晕，神昏谵语，大便秘结，小便赤黄。

02469 牛黄承气汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 安宫牛黄丸二丸 生大黄（末）三钱

【用法】 用安宫牛黄丸化开，调生大黄末，先服一半，不知再服。

【主治】 阳明温病，邪闭心包，神昏舌短，内窍不通，饮不解渴者。

02470 牛黄清心丸

【方源】《局方》卷一。

【异名】 大牛黄清心丸（《医统》卷八十八）、牛黄丸（《医便》卷五）

【组成】 白芍药 麦门冬（去心） 黄芩 当归（去苗） 防风（去苗） 白术各一两半 柴胡 桔梗 芎藭 白茯苓（去皮） 杏仁（去皮尖双仁，麸炒黄，别研）各一两二钱半 神曲（研） 蒲黄（炒） 人参（去芦）各二两半 羚羊角（末） 麝香（研） 龙脑（研）各一两 肉桂（去粗皮） 大豆黄卷（碎，炒） 阿胶（碎，炒）各一两七钱半 白蔹 干姜（炮）各七钱半 牛黄（研）一两二钱 犀角（末）二两 雄黄（研，飞）八钱 干山药七两 甘草（锉，炒）五两 金箔一千二百箔（四百箔为衣） 大枣一百枚（蒸熟，去皮核，研成膏）

【用法】 上除枣、杏仁、金箔、二角末及牛黄、雄黄、龙脑、麝香四味外，共为细末，人余药和匀，用炼蜜与枣膏为丸，每两作十丸，金箔为衣。每服一丸，温水化下，食后服；小儿惊痫，酌量多少，竹叶汤温温化下。

【主治】 ①《局方》：诸风缓纵不随，语言蹇涩，心怔健忘，恍惚去来，头目眩冒，胸中烦郁，痰涎壅塞，精神昏愦。又治心气不足，神志不定，惊恐怕怖，悲忧惨戚，虚烦少睡，喜怒无时，或发狂颠，神情昏乱。②《古今医鉴》：小儿五痫天吊，急慢惊风，潮热发搐，头目仰视，或发痘疹，郁结不出，惊过昏迷，一切怪病。

【备考】《续医说》：《和剂局方》皆名医所集，可谓精矣，其间差舛者亦有之，且如牛黄清心丸一方，用药二十九味，药性寒热交错，殊不可晓。昔见老医云，此方止是黄芩、麝香、龙脑、羚羊角、

牛黄、犀角、雄黄、蒲黄、金箔九味而已，自干山药以后二十一味乃《局方》补虚门中山芋丸，当时不知何故，误作一方。以上载周密《癸辛杂志》，余始得此说，甚未以为然，及考诸方书，果信二方之合而为一也。

02471 牛黄清心丸

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【异名】万氏牛黄清心丸(《景岳全书》卷六十二)、万氏牛黄丸(《医方简义》卷三)、牛黄丸(《证治宝鉴》卷五)。

【组成】黄连（生）五钱 黄芩 山栀仁各三钱 郁金二钱 辰砂一钱半 牛黄二分半

【用法】上为细末，腊雪调面糊为丸，如黍米大。每服七八丸，灯心汤送下。

【功用】《中医方剂学讲义》：清热解毒，开窍安神。

【主治】温邪内陷，热入心包，痰涎壅塞，烦热神昏，谵语抽搐。

①《痘疹心法》：痘疹心热神昏。②《痘科类编》：惊搐、口眼㖞斜，手足搐逆，随作随止者。③《成方便读》：温邪内陷，热入心胞，痰涎壅塞，神昏谵语，发厥发晕，牙关紧闭。

【方论选录】①《古方选注》：温热入于心胞络，邪在里矣，草木之香仅能达表，不能透里，必借牛黄幽香物性，乃能内透胞络，与神明相合，然尤在佐使之品配合咸宜。万氏用芩、连、山栀以泻心火，郁金以通心气，辰砂以镇心神，合之牛黄相使之妙。是丸调入犀角、羚羊角、金汁、甘草或入中黄、连翘、薄荷等汤剂中，定建奇功。②《成方便读》：牛黄芳香，气清之品，轻灵之物，直入心胞，辟邪而解秽。然温邪内陷之证，必有粘腻秽浊之气，留恋于膈间，故以郁金芳香辛苦，散气行血，直达病所，为之先声；而后芩、连苦寒性燥者，祛逐上焦之湿热；黑栀清上而导下，以除不尽之邪；辰砂色赤气寒，内含真汞，清心热，护心阴，安神明，镇君主，辟邪解毒，两者兼优。丸以蒸饼者，取其化滞耳。③《中国医学百科全书·方剂学》：方中牛黄清心解毒、豁痰开窍为君；以黄连、黄芩、山栀清热泻火为臣，助牛黄清心解毒；郁金芳香开闭；朱砂寒凉重镇，用以开窍安神，共为佐使。

02472 牛黄琥珀丸

【方源】《医学纲目》卷二十四。

【组成】牛黄琥珀 椒目（沉水者） 葶苈（炒紫色）各三分 昆布（洗，炙） 海藻（洗，炙）各一两一钱 牵牛（炒） 桂各一两

【用法】上七味，为末，另研葶苈如泥，一处拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，米饮送下，一日二次。以小便利为度。

【主治】水肿腹大，气息不通危急者。

02473 牛黄解毒丸

【方源】《保婴撮要》卷十一。

【组成】牛黄三钱 甘草 金银花一两 草紫河车五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。量儿服。

【主治】胎毒疮疖，及一切疮疡。

02474 牛黄解毒丸

【方源】《中国药典》一部。

【组成】牛黄 5 克 雄黄 50 克 石膏 200 克 冰片 25 克 大黄 200 克 黄芩 150 克 桔梗 100 克 甘草 50 克

【用法】以上八味，除牛黄、冰片外，雄黄水飞或为极细末，其余石膏等五味为细末；将牛黄、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀。每 100 克粉末加炼蜜 100～110 克制成大蜜丸，每丸重 3 克。口服一次一丸，一日二至三次。

【功用】清热解毒。

【主治】火热内盛，咽喉肿痛，牙龈肿痛，口舌生疮，目赤肿痛。

【宜忌】孕妇忌用。

02475 牛蒡甘桔汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】牛蒡子 桔梗 陈皮 天花粉 黄连 川芎 赤芍 甘草 苏木各一钱

【用法】水二钟，煎八分，食后服。

【主治】颐毒，表邪已尽，耳项结肿，微热不红疼痛者。

02476 牛蒡解肌汤

【方源】《疡科心得集·方汇》卷上。

【组成】牛蒡子 薄荷 荆芥 连翘 山栀 丹皮 石斛 玄参 夏枯草

【用法】水煎服。

【主治】①《疡科心得集》：头面风热，或颈项痰毒，风热牙痈。②《喉科家训》：烂喉丹痧初起，脉紧弦数，恶寒头胀，肤红肌热，咽喉结痹肿腐，遍身斑疹隐隐。

【备考】方中夏枯草，《喉科家训》作“防风”。

02477 牛膝四物煎

【方源】《金鉴》卷五十五。

【异名】牛膝四物汤。

【组成】牛膝 木通 郁金 甘草梢 瞿麦 当

归 川芎 生地 赤芍药

【用法】 水煎服。

【主治】 尿血。

02478 牛黄小乌犀丸

【方源】《局方》卷一。

【组成】 天麻（去苗）二十两 川乌（炮，去皮脐） 地榆（去苗，洗，焙） 玄参（洗，焙）各十两（上四味为细末，以水少许化蜜，同于石锅内，慢火熬搅成稠膏，放冷） 浮萍草（净洗，焙） 龙脑 薄荷叶（去土） 甜瓜子各十两 生犀 朱砂（研，飞）各五两 龙脑（研） 牛黄（研） 麝香（研）各一两

【用法】 上为细末，与前膏子一处搜和为丸，如鸡头子大。每服一丸，细嚼，荆芥茶下，温酒亦可，不拘时候。

【主治】 诸风筋脉拘急，手足麻痹，语言謇涩，口面㖞斜，心怔恍惚，痰涎壅滞，头目昏眩，肢节烦疼；及中风瘫缓，暗风痫病，肾风上攻，面肿耳鸣，下注腰脚，沉重疼痛；妇人血风，头旋吐逆，皮肤肿痒，遍身疼痛。

02479 升阳汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】 黄耆补胃汤（《兰室秘藏》卷下）。

【组成】 柴胡 益智仁 当归身 橘皮各三分 升麻六分 甘草二钱 黄耆三钱 红花少许

【用法】 上㕮咀，分作二服。每服用水二大盏，煎至一盏，去滓，稍热服。

【主治】 大便一日三四次，溏而不多，有时泄泻，腹中鸣，小便黄。

【方论选录】《脾胃论注释》：升阳汤，即补中益气汤去参、术的守补，重用黄耆，佐以升、柴，使清阳上升；橘皮导滞降浊；甘草和中护胃；加红花助当归以活血。溏泻属大肠有寒，加益智仁温中止泻，泻止则小便自利。

02480 升阳汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 升阳泻湿汤（原书同卷）、升阳泻热汤（《医学正传》卷六）。

【组成】 青皮 槐子各二分 生地黄 熟地黄 黄柏各三分 当归身 甘草梢各四分 苍术五分 升麻七分 黄耆一钱 桃仁十个（另研）

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。都作一服，入桃仁泥，水二大盏，煎至一盏，去滓，食前稍热服。

【主治】 膈咽不通，逆气里急，大便不行。

02481 升阳汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 炙甘草五钱 麻黄（不去节） 防风各八钱 羌活一两五钱

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，空心稍热服之。

【功用】 升阳气。

【主治】 足太阳经寒，恐则气下行，发为阳跷痫疾。

02482 升阳汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】 人参 当归 麦冬 五味子 白术 甘草

【用法】 加生姜，入金首饰，水煎服。

【主治】 伤寒因汗下致虚，大便自利，逆冷，谵语，撮空，循衣摸床，脉小者。

【加减】 泻不止，加猪苓、木通、肉果；身不热，口不渴，泻利，脉沉，足冷者，加姜、附、白术、升麻少许；若身有热，口燥渴者，加柴、芩、知母。

02483 升阳汤

【方源】《证治汇补》卷一。

【组成】 羌活 藿香 苍术 苏叶 厚朴 陈皮 干葛 生姜

【主治】 ①《证治汇补》：夏月感寒证。②《医略六书》：阴暑感寒，身热吐泻，脉弦。

【方论选录】《医略六书》：避暑求凉，风寒外束，抑遏暑邪，故身热，腹痛，吐泻交作焉。羌活散太阳之寒，葛根散阳明之暑，苏叶散肌表之风，苍术燥太阴之湿，厚朴疏利腹中，陈皮调和胃气，甘草缓中，生姜散表，藿香快胃气以散暑邪也。俾风寒外解则暑邪亦散，而身热痛泻有不愈者乎？此升阳疏利之剂，为身痛热泻之专方。

【备考】《医略六书》有甘草六分。其它各药用量：羌活钱半，葛根钱半，苏叶钱半，苍术钱半（炒），厚朴钱半（制），陈皮钱半，藿香三钱，生姜三片。用法：水煎去滓，温服。

02484 升降汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 野台参二钱 生黄耆二钱 白术二钱 广陈皮二钱 川厚朴二钱 生鸡内金（捣细）二钱 知母三钱 生杭芍三钱 桂枝尖一钱 川芎一钱 生姜二钱

【主治】 肝郁脾弱，胸胁胀满，不能饮食。

【方论选录】 此方惟少用桂枝、川芎以舒肝气，其余诸药无非升脾降胃，培养中土，俾中宫气化敦

厚，以听肝气之自理。实窃师《内经》求之阳明，与《金匮》当先实脾之奥旨耳。

【临证举例】 肝郁便秘一媪，年近六旬。资禀素弱，又兼家务劳心，遂致心中怔忡，肝气郁结，胸腹胀满，不能饮食，舌有黑苔，大便燥结，十数日一行。广延医者为治，半载无效，而羸弱支离，病势转增。后愚诊视，脉细如丝，微有弦意，幸至数如常，知犹可治。遂投以升降汤。为舌黑便结，加鲜地骨皮一两，数剂后，舌黑与便结渐愈，而地骨皮亦渐减。至十剂病愈强半，共服百剂，病愈而体转健康。

02485 升降散

【方源】 《伤暑全书》卷下。

【异名】 赔赈散(《伤寒温疫条辨》卷四引《二分晰义》)、温证解毒散(《羊毛瘟症论》卷下)。

【组成】 白僵蚕（酒炒）二钱 全蝉蜕（去土）一钱 川大黄（生）四钱 广姜黄（去皮，不用片姜黄）三分

【用法】 上为细末，合研匀。病轻者分四次服，每服重一钱八分二厘五毫，用冷黄酒一杯，蜂蜜五钱，调匀冷服，中病即止。病重者与三次服，每服重二钱四分三厘三毫，黄酒一杯半，蜜七钱五分，调匀冷服。最重者分二次服，每服重三钱六分五厘，黄酒二杯，蜜一两，调匀冷服。如一二帖未愈，可再服之，热退即止。

【主治】 温热、瘟疫，邪热充斥内外，阻滞气机，清阳不升，浊阴不降，致头面肿大，咽喉肿痛，胸膈满闷，呕吐腹痛，发斑出血，丹毒。

①《伤暑全书》：凡患瘟疫，未曾服他药，或一二日，或七八日，或至月余未愈者。②《伤寒瘟疫条辨》：温病表里三焦大热，其证不可名状者。如头痛眩晕，胸膈胀闷，心腹疼痛，呕哕吐食者；如内烧作渴，上吐下泻，身不发热者；如憎寒壮热，一身骨节疼痛，饮水无度者；如四肢厥冷，身凉如冰，而气喷如火，烦躁不宁者；如身热如火，烦渴引饮，头面卒肿，其大如斗者；如咽喉肿痛，痰涎壅盛，滴水不能下咽者；如遍身红肿，发块如瘤者；如斑疹杂出，有似丹毒风疮者；如胸高胁起胀痛，呕如血汁者；如血从口鼻出，或目出，或牙缝出，毛孔出者；如血从大便出，甚如烂瓜肉、屋漏水者；如小便涩淋如血，滴点作疼不可忍者；如小便不通，大便火泻无度，腹痛肠鸣如雷者；如便清泻白，足重难移者；如肉瞤筋惕者；如舌卷囊缩者；如舌出寸许，绞搅不住，音声不出者；如谵语狂乱，不省人事，如醉如痴者；如头疼如破，腰痛如折，满面红肿，目不能开者；如热盛神昏，狂言醉人，哭笑无常，目不能闭者；如手舞足蹈，见神见鬼，似风癫狂祟者；如误服发汗之药，变为亡阳之证，而发狂叫跳，或昏不识人者。外证不同，受邪则一。③《全国中成药处方集》（吉林方）：温病内热外感，凡一切四时瘟疫之疾，以及天行疠疫，绞肠痧（腹痛），吐泻不出，胸烦膈热，疙疸瘟（红肿成块），大头瘟（头部赤肿），哈蟆瘟（颈项肿大），以及丹毒、麻风。

【宜忌】 服药后半日不可喝茶、抽烟、进饮食。若不能忌，即不效。

【方论选录】 《伤寒瘟疫条辨》：是方以僵蚕为君，蝉蜕为臣，姜黄为佐，大黄为使，米酒为引，蜂蜜为导，六法俱备，而方乃成。僵蚕味辛苦气薄，喜燥恶湿，得天地清化之气，轻浮而升阳中之阳，故能胜风除湿，清热解郁，从治膀胱相火，引清气上朝于口，散逆浊结滞之痰也；蝉蜕气寒无毒，味咸且甘，为清虚之品，能祛风而胜湿，涤热而解毒；姜黄气味辛苦，大寒无毒，祛邪伐恶，行气散郁，能入心脾二经，建功辟疫；大黄味苦，大寒无毒，上下通行，亢盛之阳，非此莫抑；米酒性大热，味辛苦而甘，令饮冷酒，欲其行迟，传化以渐，上行头面，下达足膝，外周毛孔，内通脏腑经络，驱逐邪气，无处不到；蜂蜜甘平无毒，其性大凉，主治丹毒斑疹，腹内留热，呕吐便秘，欲其清热润燥，而自散温毒也。盖取僵蚕、蝉蜕，升阳中之清阳；姜黄、大黄，降阴中之浊阴，一升一降，内外通和，而杂气之流毒顿消矣。

【临证举例】 麻疹 《千家妙方》引赵绍琴医案：孙某某，男，2岁。于1975年3月诊治。患儿发热已4～5天，咳嗽气喘，两目流泪，大便略稀，指纹紫而至气关。两手脉象弦滑而数，舌苔厚，舌质红。夜寐不安，心烦啼哭。此乃风湿蕴热，又与积滞互阻不化，乃营卫合邪，势将发疹。治宜疏卫凉营，清透升降两解之法，选用升降散加减：蝉衣3克、芦根20克、钩藤6克、僵蚕3克、片姜黄3克。水煎，代茶频饮。并嘱其不吃荤腥之味。俾药后热解疹透为安。

【备考】 炼蜜为丸，名太极丸。

02486 升带汤

【方源】 《傅青主男女科》（女科）卷上。

【组成】 白术一两（土炒） 人参三钱 沙参五钱 肉桂一钱（去粗皮，研） 荸荠粉三钱 鳖甲三钱（炒） 茯苓三钱 半夏一钱（制） 神曲一钱（炒）

【用法】 水煎。连服二十剂而任督之气旺，再服三十剂而疝瘕之症除。

【主治】 妇人腰痠背楚，胸满腹胀，倦怠欲卧，疝瘕带下，百计求嗣不能如愿者。

【方论选录】 此方利腰脐之气，正升补任督之气也，任督之气升而疝瘕自有难容之势。况方中有肉桂以散寒，荜茇以祛积，鳖甲之攻坚，茯苓之利湿，有形自化于无形，满腹皆升腾之气矣，何至受精而再坠乎哉。

【备考】 方中鳖甲，《辨证录》作“龟甲”。

02487 升胃散

【方源】 《嵩崖尊生》卷九。

【组成】 黄耆二两 人参 陈皮 炙草各一钱 升麻七分 柴胡 归身 益智各五分

【主治】 泄泻，一日便三四次，溏而不多，小便黄。

02488 升桔汤

【方源】 《外科大成》卷二。

【组成】 升麻 桔梗 昆布 连翘 射干 甘草等分

【用法】 水煎，食远温服。

【主治】 骨槽风，并咽喉、耳内痛。

02489 升陷汤

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 生箭耆六钱 知母三钱 柴胡一钱五分 桔梗一钱五分 升麻一钱

【主治】 胸中大气下陷，气短不足以息，或努力呼吸，有似乎喘；或气息将停，危在顷刻。其兼证，或寒热往来，或咽干作渴，或满闷怔忡，或神昏健忘，其脉象沉迟微弱，关前尤甚。其剧者，或六脉不全，或参伍不调。

【加减】 气分虚极下陷者，酌加人参数钱，或再加山萸肉（去净核）数钱，以收敛气分之耗散，使升者不至复陷更佳；若大气下陷过甚，至少腹下坠，或更作疼者，宜将升麻改用钱半，或倍作二钱。

【方论选录】 升陷汤，以黄耆为主者，因黄耆既善补气，又善升气，且其质轻松，中含氧气，与胸中大气有同气相求之妙用，惟其性稍热，故以知母之凉润者济之；柴胡为少阳之药，能引大气之陷者自左上升；升麻为阳明之药，能引大气之陷者自右上升；桔梗为药中之舟楫，能载诸药之力上达胸中，故用之为向导也。至其气分虚极者，酌加人参，所以培气之本也；或更加萸肉，所以防气之涣也。至若少腹下坠或更作疼，其人之大气直陷至九渊，必需升麻之大力者，以升提之，故又加升麻五分或倍作二钱也。方中之用意如此，至随时活泼加减，尤在临证者之善变通耳。

【临证举例】 ①一氧化碳中毒 有兄弟二人，其兄年近六旬，弟五十余。冬日畏寒，共处一小室中，炽其煤火，复严其户牖。至春初，二人皆觉胸中满闷，呼吸短气。盖因户牖不通外气，屋中氧气全被煤火着尽，胸中大气既乏氧气之助，又兼受碳气之伤，日久必然虚陷，所以呼吸短气也。因自觉满闷，医者不知病因，竟投以开破之药。追开破益觉满闷，转以为药力未到，而益开破之。数剂之后，其兄因误治，竟至不起。其弟服药亦增剧，而犹可支持，遂延愚诊治。其脉微弱而迟，右部尤甚，自言心中发凉，小腹下坠作疼，呼吸甚觉努力。知其胸中大气下陷已剧，遂投以升陷汤，升麻改用二钱，去知母，加干姜三钱。两剂后，少腹即不下坠，呼吸亦顺。将方中升麻、柴胡、桔梗皆改用一钱，连服数剂而愈。②大气下陷 一人，年二十余。动则作喘，时或咳嗽。医治数年，病转增剧。皆以为劳疾不可治。其脉非微细，而指下若不觉其动。知其大气下陷，不能鼓脉外出，以成起伏之势也。投以升陷汤，加人参、天冬各三钱，连服数剂而愈。③失音一人，年四十许。失音半载，渐觉咽喉发紧，且常溃烂，畏风恶寒，冬日所着衣服，至孟夏犹未换。饮食减少，寝成虚劳，多方治疗，病转增剧。诊其脉，两寸微弱，毫无轩起之象，知其胸中大气下陷也。投以升陷汤，加玄参四钱，两剂，咽喉即不发紧。遂减去升麻，又连服十余剂，诸病皆愈。

02490 升麻丸

【方源】 《圣济总录》卷一〇九。

【组成】 升麻 黄芩（去黑心） 车前子 决明子（微炒） 茺蔚子 玄参 龙胆 防风（去叉） 生干地黄（焙） 山栀子仁 甘草（炙，锉） 地肤子各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后温浆水送下，临卧再服。加至三十丸。

【主治】 热毒，目中胬肉生疮翳。

02491 升麻丸

【方源】 《圣济总录》卷一八〇。

【组成】 升麻 防风（去叉） 栀子仁各半两

【用法】 上为末，青羊脑髓为丸，如麻子大。一二岁每服三丸，温熟水研化下，食后、午时、临卧各一次。

【主治】 小儿脑热，鼻干无涕。

02492 升麻汤

【方源】《普济方》卷二九九引《肘后方》。

【组成】 升麻（锉） 黄柏（去粗皮，锉） 大青 各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱，水二盏，煎取一盏，热漱冷吐。

【主治】 卒患口疮。

02493 升麻汤

【方源】《外台》卷二十三引《古今录验》。

【组成】 甘草一两（炙） 升麻 石膏（碎） 牡丹皮各一两

【用法】 上切。以水七升，煮取三升，每服七合，一日三次。

【主治】 咽喉生疮。

【宜忌】 忌海藻、菘菜。

02494 升麻汤

【方源】《保命集》卷下引《局方》。

【异名】 清震汤（《卫生宝鉴》卷九）、升苍荷叶散（《奇效良方》卷二十四）、升麻荷叶散（《增补内经拾遗》卷四）。

【组成】 升麻一两 苍术一两 荷叶一个（全者）

【用法】 上为细末。每服五钱，水一盏，煎七分，食后温服；或烧全荷叶一个，研细调煎药。

【主治】 ①《保命集》引《局方》：雷头风。②《卫生宝鉴》：头面疙瘩肿痛，憎寒发热，四肢拘急，状如伤寒。

02495 升麻汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 升麻 栀子仁 射干 赤茯苓（去黑皮）各三两 芍药四两 白术五两 生地黄汁 蜜 各一升

【用法】 上八味，㕮咀六味如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，煎取一盏，去滓，下地黄汁半合，再煎二沸，次下蜜半匙，共煎取一盏，温服。

【主治】 胃热消谷善饥，不生肌肉，病名食亦。

02496 升麻汤

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】 升麻一两 大青（去根）三分 射干三分 玄参三两 黄柏（去粗皮）一两 山栀子仁半两 蔷薇根（锉）三两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水二盏，加竹叶七片，煎至一盏，去滓，入蜜少许，地黄汁一合，更煎三五沸，徐徐含咽。

【主治】 口舌生疮。

02497 升麻汤

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】 升麻 连翘 玄参 大青 大黄（锉，微炒）各一两 败酱 络石 白蔹各半两 生地黄二两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，加芒消一钱，去滓，空心温服。微利三二行，未利再服。

【主治】 石疽坚硬，皮色深赤，恶寒壮热，一二日未脓者。

02498 升麻汤

【方源】《本事》卷二。

【异名】 牡丹散（《得效》卷十九）。

【组成】 川升麻 桔梗（炒） 薏苡仁 地榆 牡丹皮 芍药 子芩（刮去皮）各半两 甘草三分（炙）

【用法】 上锉为粗末。每服一两，水一升半，煎至五合，去滓，日二三服。

【主治】 肺痈，吐脓血作臭气，胸乳间皆痛。

【方论选录】《本事方释义》：升麻气味苦辛微温，入足太阴、阳明之表药；桔梗气味苦辛平，入手太阴；薏苡仁气味甘微寒，入手足太阴、手少阴；地榆气味苦咸微寒，入手足阳明；子芩气味苦平，入手足少阳、阳明。此肺痈已成脓血，臭气上升，胸乳作痛，以表药提其清阳，以泄肺清热之药，泻其浊阴，戊己二味和中，清既得升，浊亦得降，焉不奏功耶？

02499 升麻汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】 升麻 桔梗 地榆 黄芩 米仁 丹皮 白芍 甘草 金银花

【主治】 肺痈吐脓血。

02500 升麻散

【方源】《外台》卷二十二引《古今录验方》。

【组成】 升麻六分 黄柏

【用法】 上为末。以绵裹含之。

【主治】 口疮。

【备考】 方中黄柏用量原缺。

02501 升麻散

【方源】 方出《外台》卷八引《广利方》，名见《普济方》卷二〇五。

【组成】 吴射干六分 升麻四分 桔梗四分 木通十二分 赤茯苓八分 百合八分 紫菀头二十一枚

【用法】 上切。以水二大升，煎取九合，去滓，食后良久温服，一日三次。

【主治】 因食即噎塞，如炙肉脔在咽喉中不下。

【宜忌】 忌猪肉、酢物。

02502 升麻散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】 升麻 山茱萸各三分 甘菊花 细辛（去苗叶）各半两 蔓荆实（去白皮） 山芋 防风（去叉）各一两

【用法】 上为散。每服三钱匕，温酒调下。

【主治】 风邪客于睑肤，其皮垂缓，下覆睛轮，眼闭难开。

02503 升麻散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】 川升麻 玄参 川芎 生地黄（洗晒） 麦门冬（去心）各半两 大黄 黄连 净黄芩 甘草（焙）各三钱

【用法】 上锉。每服三钱，加生姜、大枣煎，食后服。

【主治】 心脾有热，口舌破裂生疮。

【备考】 本方方名，《医部全录》引作“升麻煎”；《幼科证治大全》引作“升麻汤”。

02504 升麻散

【方源】《普济方》卷三六五。

【组成】 升麻 黄连各半两

【用法】 上为末。干掺之。

【主治】 小儿口疮。

02505 升麻散

【方源】《准绳·类方》卷八。

【组成】 细辛（倍） 黄柏 知母 防己 黄连 升麻 山芷 蔓荆子 牛蒡子 薄荷

【用法】 上为末。薄荷汤调服，及揉牙龈；或煎服亦可。

【主治】 上牙疼。

02506 升麻煎

【方源】《千金》卷六。

【异名】 升麻饮（《圣济总录》卷五十三）。

【组成】 升麻 玄参 蔷薇 根白皮 射干各四两 大青 黄柏各三两 蜜七合

【用法】 上㕮咀。以水七升，煮取一升五合，去滓，下蜜更煎两沸，细细含咽之。

【主治】 膀胱热不已，口舌生疮，咽肿。

【方论选录】《千金方衍义》：升麻性升，散风肿诸毒，疗喉痛口疮；玄参治肾虚真阴失守，膀胱之火僭逆，咽喉肿痛；射干疗喉痹，咽痛不得息，散结气；大青泻肝胆湿热，解毒杀虫；得薇根、柏皮共襄厥功；蜂蜜解毒和中，滋润喉舌，留恋诸药性味，含之尤为得宜。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“升麻散”。

02507 升朝汤

【方源】《宋氏集验方》卷八引《三山曾太丞方》。

【组成】 鹿茸 当归各二两 川乌 白姜各一两 肉桂一两 甘草半两

【用法】 上㕮咀。每服半两，加生姜、大枣同煎，空心服。

【主治】 精血少，神气昏倦，背膊疼痛，脉涩。

02508 升葛汤

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 升麻 葛根各一钱半 羌活 防风 黄柏 南星 川山甲（炒） 半夏各八分 鹿角灰二钱 大黄二钱

【用法】 用黄酒二钟，加葱头三个，煎八分，食远服。

【主治】 乳吹，乳毒，乳痈，乳疽。

【加减】 热甚，加山慈菇；郁，加土贝母；已成，加皂角刺。

02509 升提汤

【方源】《傅青主男女科》（女科）卷上。

【组成】 大熟地一两（九蒸） 巴戟一两（盐水浸） 白术一两（土炒） 人参五钱 黄耆五钱（生用） 山萸肉三钱（蒸） 枸杞二钱 柴胡五分

【用法】 水煎服。服三月而肾气大旺，再服一月未有不能受孕者。

【主治】 妇人肾气不足，久不受孕，伴见饮食少思，胸膈满闷，终日倦怠思睡，一经房事，呻吟不已，气怯力弱。

【方论选录】 此方补气之药多于补精，似乎以补脾胃为主矣。孰知脾胃健而生精自易，是补脾胃之气与血，正所以补肾之精与水也。又益以补精之味，则阴气自足，阳气易升，自尔腾越于上焦矣。阳气不下陷，则无非大地阳春随遇，皆是生化之机，安有不受孕之理欤？

02510 升气实脏丸

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】 黄耆（蜜炙）一两 人参（去芦）一两 白术（土炒）二两 白茯苓（去皮）五钱 山药（炒）一两 莲肉（去心）一两 芡实一两 升麻（酒炒）五钱 柴胡（酒炒）五钱 干姜（炒黑）五钱 肉豆蔻（面裹煨，捶去油净）五钱 粉草

（炙）五钱　椿树根皮（酒炒二次）四两

【用法】 上为细末，阿胶水化开为丸，如黍米大。每服二钱，用糯米半生半炒，煎汤送下。

【主治】 元气下陷，脾胃衰惫，久泻，日夜无度，大肠滑脱，肛门坠下，饮食不思，米谷不化，汤水直过，烦渴引饮，津液枯竭，肌瘦如柴，寒热互作。

02511　升发二陈汤

【方源】 《医学正传》卷二引丹溪方。

【组成】 陈皮（去白）一钱　半夏一钱半　茯苓一钱　甘草五分　抚芎一钱　升麻　防风　柴胡各五分

【用法】 上切细，作一服。加生姜三片，水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】 ①《医学正传》：痰郁，火邪在下焦，大小便不利。②《杂病源流犀烛》：痰郁，动则喘满或嗽，寸脉沉而滑。

02512　升阳四物汤

【方源】 《医略六书》卷三十。

【组成】 熟地五钱　当归三钱（醋炒）　白芍一钱半（炒）　川芎一钱　白芷一钱半（炒黑）　升麻五分（炒黑）　血余三钱（炒炭）

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 产后漏血不止，脉虚弦者。

【方论选录】 产后冲任两亏，清阳下陷，不能摄血，而血漏不止，谓之漏血。熟地补血以滋冲任，当归养血以归经脉；川芎入血海以升阳，白芍敛阴血以止漏；升麻升少阳清气，白芷升阳明清气，二药炒黑，均能止血定漏；血余炭去宿生新，力能止血以定漏血也。水煎温服，使经血内充，则清阳敷布，而冲任脉定，血无妄渗之虞，何漏血之不止哉！

02513　升阳利湿汤

【方源】 《医略六书》卷二十七。

【组成】 南星二钱（制）　苍术一钱半（炒黑）　羌活一钱半（盐水炒黑）　台芎八分　滑石三钱（姜汁炒）　半夏一钱半（姜汁制）　防风一钱半（炒黑）

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 肥人湿闭不孕，脉弦缓者。

【方论选录】 躯脂满溢，闭塞子宫，故天癸不调，不能怀孕焉。苍术燥湿强脾，南星散痰燥湿，羌活疏太阳之府，防风燥冲任之经，台芎行血海之气，滑石开子宫之闭，半夏豁躯内之痰涎也。水煎温服，使湿痰消散则子宫肃清，而冲任融和，何有闭塞经愆不孕之患哉！

02514　升阳补气汤

【方源】 《内外伤辨》卷中。

【组成】 厚朴（姜制）五分　升麻　羌活　白芍药　独活　防风　甘草（炙）　泽泻各一钱　生地黄一钱五分　柴胡二钱五分

【用法】 上为粗末。每服五钱，水二盏，加生姜三片，枣二枚，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】 饮食不时，饥饱劳役，胃气不足，脾气不溜，气短无力，不耐寒热，早饭后转增昏闷，须要眠睡，怠惰，四肢不收，懒倦动作，及五心烦热。

【加减】 如腹胀及窄狭，加厚朴，如腹中似硬，加砂仁三分。

【方论选录】 《医钞类编》：此证皆由阳陷阴中，故以地、芍引诸风药入阴分而升其阳，以泽泻、厚朴而降其浊也。

02515　升阳降浊汤

【方源】 《辨证录》卷九。

【组成】 人参五钱　黄耆五钱　白术五钱　当归五钱　柴胡三分　荆芥五分　麦冬五钱　肉桂一钱　附子一分

【用法】 水煎服。一剂大通。

【主治】 大肠闭结不通，饮食无碍，并无火症之见，亦无后重之机，有至一月不便者。

【方论选录】 此方纯是补阳分之药，只麦冬、当归少益其阴，则阳气胜阴，始有偏旺之势。又得附子、肉桂直入于至阴之中，引柴胡、荆芥升提其阳气也。阳气一升，阴气立降，安能阻塞之哉！

02516　升阳顺气汤

【方源】 《内外伤辨》卷上。

【异名】 强胃汤（《脾胃论》卷下）、顺气汤（《普济方》卷一八四）、升阳益胃汤（《玉案》卷四）。

【组成】 黄耆一两　半夏三钱（汤洗七次）　草豆蔻二钱　神曲一钱五分（炒）　升麻　柴胡　当归身　陈皮各一钱　甘草（炙）　黄柏各五分　人参（去芦）三分

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水二盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】 饮食、劳役、七情所伤，短气，发热，胸胁满闷，不思饮食。

①《内外伤辨》：因饮食不节，劳役所伤，胸胁满闷，短气。遇春则口淡无味，遇夏虽热，犹有恶寒，饥则常如饱，不喜食冷物。②《赤水玄珠》：七情所伤，及劳役，饮食不节，满闷短气，恐则气

下者尤宜。③《便览》：忿怒伤肝，思虑伤脾，悲哀伤肺，以致各经火动有伤元气，发热，不思饮食。

【方论选录】 ①《内外伤辨》：脾胃不足之证，须用升麻、柴胡苦平，味之薄者，阴中之阳，引脾胃中清气行于阳道及诸经，生发阴阳之气，以滋春气之和也；又引黄耆、人参、甘草甘温之气味上行，充实腠理，使阳气得卫外而为固也。凡治脾胃之药，多以升阳补气名之者此也。②《医方考》：清气在下，浊气在上，令人胸膈饱胀，大便溏泻者，此方主之。上件病由于饮食伤其脾气，不能升清降浊故耳。是方也，升、柴辛温升其清，清升则阳气顺矣；柏皮苦寒降其浊，浊降则阴气顺矣；人参、黄耆、当归、甘草补其虚，补虚则正气顺矣；半夏、陈皮利其膈，膈利则痰气顺矣；豆蔻、神曲消其食，食消则谷气顺矣。故曰升阳顺气。

02517 升阳举经汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 升阳除湿汤(《普济方》卷三三二)

【组成】 肉桂（去皮，盛夏勿用，秋、冬用）白芍药 红花各五分 细辛六分 人参（去芦）熟地黄 川芎各一钱 独活根 黑附子（炮制，去皮脐） 炙甘草各一钱五分 羌活 藁本（去土）防风各二钱 白术 当归 黄耆 柴胡各三钱 桃仁十个（汤浸，去皮尖，细研）

【用法】 上㕮咀。每服三钱，若病势顺当，渐加至五钱，每服水三盏，煎至一盏，空心热服。

【功用】 升浮血气，补命门。

【主治】 ①《兰室秘藏》：经水不止，如右尺脉按之空虚，是气血俱脱，大寒之证；轻手其脉数疾，举指弦紧或涩，皆阳脱之证，阴火亦亡；见热证于口鼻眼，或渴，此皆阴躁，阳欲先去也。②《妇科玉尺》：饮食劳倦，暴崩不止，或下水浆，怠惰嗜卧，四肢困倦，及带下脱漏。

【方论选录】 ①《医方考》：血气，人身之阴阳也。阳主升，阴主降，阳根乎阴，阴根乎阳，一动一静，互为其根，则一升一降，循经而行，无崩陷也。若阳有余，则升者胜，血从上窍而出；阳不足，则降者胜，血从下窍而出。是方也，附子、肉桂、人参、黄耆、白术、甘草，壮阳益气之品也；羌活、独活、柴胡、藁本、防风、细辛、川芎，升阳举经之品也；芍药、地黄、红花、当归、桃仁，滋阴人血之品也。壮阳则气不虚，举经则血不陷，滋阴则血不燥。诚如是，则血为气之守，气为血之卫，血营于中，气卫于外，升降上下，一循其经矣，胡然而崩也。②《医林纂要》：东垣制此方，全以右尺空虚，觑见本原之地。然漏下不止，气未有不并消者，生气欲竭，乃至命脉空虚。本大虚寒，而外见火症，皆浮焰耳。补命火（附子）而足其气（参、耆、术、草），乃升其阳（防、藁、二活、细辛皆以升阳）；滋肾水（熟地）而养其血（归、芎、桂、芍），乃举其经（桃仁、红花合之归、芎、地、芍皆以举经），治之自本。实其虚，温其寒，本也；升其阳、举其经，乃有以致其用也。

02518 升阳举经汤

【方源】《医方集解》引东垣方。

【组成】 补中益气汤加白芍黑栀子

【用法】 加生姜三片，大枣三枚，煎服。

【主治】 劳伤崩漏，身热自汗，短气，倦怠懒食。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足太阴阳明药也。补中益气汤以益气升阳，退热收汗，加芍药以和血敛阴，黑栀子以清热止血。②《成方便读》：此为中气不固，经血下陷之证也。故以补中益气汤全方，取虚者补之，下者举之之义。加以白芍入血敛阴，庶有所收摄，不致如江河之日下。黑山栀亦能入血，取红见黑则止，血得寒则不妄行之意。虽治本，而兼治标耳。

02519 升阳除湿汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】 甘草 大麦芽面（如胃寒腹鸣者加）陈皮 猪苓各三分 泽泻 益智仁 半夏 防风 羌活 神曲 柴胡 升麻各五分 苍术一钱

【用法】 上㕮咀。作一服，水三大盏，加生姜三片，大枣二枚，同煎至一盏，去滓，空心服。

【主治】 ①《脾胃论》：脾胃虚弱，不思饮食，肠鸣腹痛，泄泻无度，小便黄，四肢困弱。②《妇科玉尺》：湿盛血崩。

【方论选录】《脾胃论注释》：方中升麻、柴胡助清阳上行，羌、防、苍术祛风以胜湿，猪苓、泽泻利尿以渗湿，陈皮、半夏行气以化湿，六曲、麦芽导滞以和中。泄泻无度，近于滑脱，故用益智仁温中止泻，甘草保护津液，姜、枣和营卫，共奏升阳除湿之功。

【备考】 本方方名，《医方类聚》引作“升麻除湿汤”。

02520 升阳除湿汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 调经升麻除湿汤（原书同卷）、调经升

阳除湿汤(《普济方》卷三二〇)、升阳调经汤(《医学入门》卷四)。

【组成】 当归(酒洗) 独活各五分 蔓荆子七分 防风 炙甘草 升麻 藁本各一钱 柴胡 羌活 苍术 黄耆各一钱五分

【用法】 上锉,如麻豆大,勿令作末。都作一服,以洁净新汲水三大盏,煎至一大盏,去滓,空心热服。待少时以早饭压之,可一服而已。如灸足太阴脾经中血海穴二七壮亦已。

【功用】 除湿去热,益风气上伸。

【主治】 ①《兰室秘藏》:因饮食劳倦,或素有心气不足,致令心火乘脾,症见女子漏下恶血,月事不调,或暴崩不止,多下水浆之物,怠惰嗜卧,四肢不收,困倦乏力,无气以动,气短上气,逆气上冲,其脉缓而弦急,按之洪大。②《医方考》:水疝,肾囊肿大,阴汗不绝。

【方论选录】《医方考》:《内经》曰:下者举之;又曰:风能胜湿。是方也,柴胡、羌活、苍术、防风、升麻、藁本、蔓荆、独活,皆味辛而气清,风药也,亦升药也,故可以胜湿,可以升阳;而黄耆之甘,可使托其陷下之气;甘草之温,可使培其防水之土;当归之润,可使调荣血于风药之队也。

02521 升阳除湿汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 羌活一钱半 独活一钱半 苍术一钱半(炒) 防风一钱半 葛根一钱半 藁本一钱半 升麻八分(醋炒) 白芷一钱半 炙草一钱半

【用法】 水煎,去滓温服。

【主治】 清气下陷,溲泻,经停,脉浮者。

【方论选录】 清气下陷,外邪不能解散,而清阳不升,故泄泻不已,天癸不至焉。羌活散太阳之邪从玄府而泄,独、葛散阳明之邪由肌腠而泄,苍术、白芷散外邪以燥湿强脾,藁本、升麻升清阳以直通巅顶,炙草缓中以和胃气也。水煎温服,使外邪从汗而解,而清阳之气不复下陷,其内侵之湿无不骎骎四布外达,何有泄泻不止,天癸不行之患哉!

02522 升阳除湿汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 羌活一钱半 葛根一钱半 防风一钱半 藁本一钱半 柴胡一钱半 白芷一钱半 苍术一钱半(炒黑) 甘草一钱半 葱白三枚

【用法】 水煎,去滓温服。

【主治】 孕妇泄泻,脉浮缓者。

【方论选录】 妊娠风干胃府,湿渍脾元,而大肠失传送之职,故肠鸣泄泻,胎孕因之不安焉。羌活散太阳之邪,而膀胱得操蓄泄之权;葛根散阳明之邪,而脾胃自雄健运之职;防风疏风于表,生用更能胜湿;苍术燥湿于里,炒黑不损胎元;藁本外透颠顶以疏风;白芷内达阳明以散湿;柴胡升少阳清气,则腠理可密;甘草缓阳明胃气,则中气自调;葱白通一身之阳以安胎气于泄泻之余也。水煎温服,使风邪外散,则湿气在内亦解,而肠鸣泄泻无不止,胎孕不安无不宁矣。

02523 升阳柴胡汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 升阳泄阴羌活柴胡补阳汤(《普济方》卷八十)、升阳泄阴汤(《审视瑶函》卷五)。

【组成】 肉桂五分 柴胡(去苗)一钱五分 知母(酒炒,如大者,加作五钱) 防风 白茯苓 泽泻 陈皮各一钱 生地黄(酒炒) 楮实(酒炒微润) 黄耆 人参 白术各五钱 甘草梢 当归身 羌活 熟地黄 独活 白芍药各一两

【用法】 上锉。每服五钱,水二盏,煎至一盏,去滓,稍热食远服。别合一料,炼蜜为丸,如梧桐子大,每服五十丸,茶清送下。每日与前药各一服,食远,不可饱服。

【主治】 ①《兰室秘藏》:青白翳。②《审视瑶函》:视正反斜。

【加减】 如天气热,加五味子三钱、天门冬(去心)、芍药、楮实各五钱。

【备考】 本方炼蜜为丸,《医学纲目》名"升阳泄阴丸"。据《医学纲目》云:本方与"补阳汤"、"泻阴火丸"(连柏丸)合治一病,空心服补阳汤,临卧服连柏丸,食远服升阳泄阴丸。

02524 升阳益血汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 升阳滋血汤(《医学纲目》卷三十八)。

【组成】 蝎梢二分 神曲末 升麻各三分 当归 厚朴各一钱 桃仁十个

【用法】 上都作一服。水一大盏,煎至半盏,去滓,食远热服。

【功用】 升阳气,滋血,益血,补血,利大便。

【主治】 小儿腹胀,二日大便一度,瘦弱身黄。

02525 升阳益胃汤

【方源】《内外伤辨》卷中。

【异名】 益胃汤(《医级》卷八)。

【组成】 黄耆二两 半夏(洗,此一味脉涩者不宜用) 人参(去芦) 甘草(炙)各一两 独活 防风 白芍药 羌活各五钱 橘皮四钱 茯苓 柴

胡 泽泻 白术各三钱 黄连一钱

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水三盏，加生姜五片，大枣二枚，煎至一盏，去滓，早饭后温服。或加至五钱。

【功用】 升阳益胃。

【主治】 ①《内外伤辨》：脾胃虚则怠惰嗜卧，四肢不收，时值秋燥令行，湿热少退，体重节痛，口干舌干，饮食无味，大便不调，小便频数，不欲食，食不消；兼见肺病，洒淅恶寒，惨惨不乐，面色恶而不和，乃阳气不伸故也。②《医级》：中气不足，不得升降，或胸腹胀闷，或二便失化，下利遗溺，头眩耳鸣。

【宜忌】 若喜食，一二日不可饱食，恐胃再伤，以药力尚少，胃气不得转运升发也，须薄味之食或美食助其药力，益升浮之气而滋其胃气，慎不可淡食以损药力，而助邪气之降沉也。可以小役形体，使胃与药得转运升发；慎勿太劳役，使气复伤，若脾胃得安静尤佳。若胃气稍强，少食果以助谷药之力。

【加减】 服药后如小便涩，而病加增剧，是不宜利小便，当少去茯苓、泽泻。

【方论选录】 ①《法律》：升阳益胃者，因其人阳气遏郁于胃土之中，胃虚不能升举其阳，本《内经》火郁发之之法，益其胃以发其火也。升阳方中，半用人参、黄耆、白术、甘草益胃，半用独活、羌活、防风、柴胡升阳，复以火本宜降，虽从其性而升之，不得不用泽泻、黄连之降，以分杀其势。制方之义若此。②《古方选注》：升阳益胃汤，东垣治所生受病肺经之方也。盖脾胃虚衰，肺先受病，金令不能清肃下行，则湿热易攘，阳气不得升，而为诸病。当以羌活、柴胡、防风升举三阳经气，独活、黄连、白芍泻去三阴郁热，佐以六君子调和脾胃，其分两独重于人参、黄耆、半夏、炙草者，轻于健脾，而重于益胃，其升阳之药，铢数少则易升，仍宜久煎以厚其气，用于早饭午饭之间，藉谷气以助药力，才是升胃中之阳耳。至于茯苓、泽泻，方后注云：小便利不淋勿用，是渗泄主降，非升阳法也。

【临证举例】 ①泄泻 《续名医类案》：光禄杨立之，元气素弱，饮食难化，泄泻不已，小便短少，洒淅恶寒，体重节痛，以为脾肺虚，用升阳益胃汤而痊。②过敏性结肠炎 《中医杂志》（1965；6：7）：曾某某，男，50岁，泄泻三年，日行2～3次，时清时稀，夹有完谷，偶有肠鸣，食欲不振，面色萎黄，形瘦神疲，脉濡小，舌淡苔薄，迭经治疗，效果不显。西医诊断为“过敏性结肠炎”。按：患者由于饮食不调，思虑劳倦，日久损伤脾胃，以致脾阳不足，运化失职而泄泻，治宜升阳益胃。处方：党参四钱，黄耆四钱，白术四钱，甘草五分，羌活五分，炒防风八分，炒柴胡八分，炒白芍一钱五分，茯苓二钱，姜川连三分，陈皮一钱五分，姜夏一钱五分，生姜一片，红枣三枚。服药一周，大便已改为日行一次，粪量较多，食欲略振，续服四十八剂，便解成形，日一次，肠鸣消失。③原因不明发热 《浙江中医杂志》（1983；7：332）：毛某某，男，53岁。洒淅恶寒，尔后发热，热度高达40℃以上，腹胀，大便不畅，胃纳极差，四肢怠惰无力，头目眩晕，小溲不利，已半月余。经实验室检查，诊断为慢性肝炎、早期肝硬化、肝肾综合征，发热待查。先后用和解少阳，清泄胆腑，苦寒清热，通腑泄便等法，并肌注青、链霉素，静脉滴注葡萄糖盐水加庆大霉素等均未收效，转来本院。观其面色萎黄，苔虽微黄而舌质淡，脉细无力。脉舌合参，此热决非邪实，乃由气虚所致。取“甘温除大热”之旨，以升阳益胃汤去黄连，加瓜蒌仁、厚朴花。三剂热退身凉，精神转佳，续予原法调理，药后症状明显改善，三月后已参加轻便劳动。④慢性牙周炎 《浙江中医杂志》（1983；7：333）：王××，女，48岁。三年来牙龈疼痛，遇寒增剧，牙齿松动，刷牙或嚼硬物则齿龈出血，咀嚼无力，咽喉燥痛，面色萎黄，头痛虚浮、神疲乏力，胃纳不佳，大便溏薄，脉缓无力，全口牙龈红肿，诊为弥漫性牙周炎。前医屡用苦寒之药不效。证属脾气下陷，阴火上冲。治宜益气升阳，佐以清火，东垣升阳益胃汤出入。三剂后，牙痛、咽痛均瘥，红肿也减。连诊三次，胃纳转佳，大便实，头痛消失，精神改善，局部红肿疼痛均告痊愈。

02526 升阳调元汤

【方源】 《万氏女科》卷三。

【组成】 人参 黄耆（炙） 甘草（炙） 升麻 益智子（去壳，炒）各一钱五分

【用法】 生姜、大枣为引。水煎，调桑螵蛸散三钱服。

【主治】 产后小便频数，及遗尿不禁。

02527 升阳调经汤

【方源】 《兰室秘藏》卷下。

【异名】 升麻调经汤（《东垣试效方》卷三）。

【组成】 升麻八钱 葛根 草龙胆（酒制） 黄芩（酒制） 广茂术（酒洗，炒） 京三棱（酒洗，炒） 炙甘草 黄连（酒洗） 连翘 桔梗各五钱

生黄芩四钱　当归梢　芍药各三钱　黄柏（酒洗）二钱　知母（酒洗，炒）一两

【用法】　上另秤一半作末，炼蜜为丸，如绿豆大，每服百余丸；一半作㕮咀，每服五钱，若能食，大便硬，可旋加至七八钱，水二盏，先浸半日，煎至一盏，去滓，临卧热服。足高去枕仰卧，噙一口作十次咽之，留一口在后送下丸药，服毕其卧如常。

【主治】　瘰疬绕颈，或至颊车，此皆由足阳明胃经中来；若疮深远，隐曲肉底，是足少阴肾经中来，乃戊脾传于癸肾，是夫传于妻，俱作块子坚硬，大小不等。

【临证举例】　腮腺结石并感染　《千家妙方》引李伟成：何某某，男，36岁，某工程公司工人。患者颌下肿痛已数月，近日来疼痛加重，纳减，倦怠无力，脉缓，苔白腻，大便隔日一次。经某医院检查，右侧颌下可摸及肿块，如拇指大小，质坚硬，能活动，有压痛，经X线照片后，诊断为腮腺结石并感染。此属阳明经，由湿热瘀结而成，治以升阳化痰，软坚散结，用升阳调经汤加减：升麻3克，连翘15克，龙胆草10克，桔梗16克，黄连6克，三棱10克，莪术10克，黄芩10克，粉葛20克，昆布15克，法夏15克，南星片16克，知母10克，甘草3克，水煎服，每日一剂，嘱服10剂。复诊：上方服后，疼痛减轻，右臼齿旁有一小孔排出脓液，量不多，嘱守方再服6剂。再诊：药后排脓不多，如用指压则脓液增多。遂在上方基础上加清热解毒之药：地丁16克，天丁6克，公英15克，金钱草30克，夏枯草30克等，嘱服10剂。上方服完后，脓液排尽，患者偶见右臼齿旁有一块白色如石之物，每次饭后更为明显。一日中午，因咳而突然排出黄豆大小白色结石数块，连续几天均有大小不等的砂石排出，肿块亦随之而消失。后用六君子汤调理脾胃，巩固疗效。时过年余，随访未见复发。

02528　升阳散火汤

【方源】　《内外伤辨》卷中。

【异名】　柴胡升麻汤（《兰室秘藏》卷下）、柴胡升阳汤（《准绳·类方》卷一）。

【组成】　升麻　葛根　独活　羌活　白芍药　人参各五钱　甘草（炙）　柴胡各三钱　防风二钱五分　甘草（生）二钱

【用法】　上㕮咀，如麻豆大。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，大温服，不拘时候。

【主治】　①《内外伤辨》：血虚或胃虚过食冷物，郁遏阳气于脾土之中，致使四肢发困热，肌热，筋骨间热，表热如火燎于肌肤，扪之烙手。②《准绳·类方》：热厥。

【宜忌】　忌寒凉之物。

【方论选录】　①《医方考》：少阳者，三焦与胆也。经曰：少火生气。丹溪曰：天非此火不能生万物，人非此火不能以有生。是少火也，生物之本，扬之则光，遏之则灭，今为饮食填塞至阴，抑遏其上行之气，则生道几于息矣，故宜辛温之剂以举之。升麻、柴胡、羌活、独活、防风、干葛，皆辛温上行之物也，故用之以升少阳之气，清阳既出上窍，则浊阴自归下窍，而食物传化自无抑遏之患；芍药味酸，能泻土中之木；人参味甘，能补中州之气；生甘草能泻郁火于脾，从而炙之，则健脾胃而和中矣。②《医林纂要》：清阳之气，倡阴以行，本于肾命，行于肝胆，蒸于脾胃，达于膈上，布于膻中，而后畅子四表。阳气即火，而畅则无所谓火。阳气一有所遏抑，则愤逆而见为火焉（火郁在中、下二焦，此方所治是也。若酒食酿厚烧爆，则又助火，而火逼中、上焦，乃为凉膈散症矣）。火郁于下，真阴愈灼，苦以发之，拔自肾命之中（柴胡解骨髓中热），宣之脾胃之上（葛根、升麻散脾胃热），达之四表之末（羌活、独活祛四肢热），阳气可不郁矣。参、芍、草、姜、枣，以厚滋脾胃，而和其阴阳，所以固其气血之本也。胃伤冷食，何以不用消导而用和补？曰，此非伤食，乃伤于所食之冷而抑遏阳气耳。胃已虚矣，何可更消？人参、甘草、姜、枣以温之，则冷气消矣。热盛如此，何以不用寒凉？曰，阳气已为阴所抑遏矣，而更用寒凉，是重为抑遏之。凡火盛水亏，则滋其水，阳为阴搏，则畅其阳，火炎于上，可自下夺之，火郁在下，必升以散之。此与凉膈散之治，所以大不相似也。③《医方集解》：此手足少阳药也，柴胡以发少阳之火为君；升、葛以发阳明之火，羌、防以发太阳之火，独活以发少阴之火为臣；此皆味薄气轻，上行之药，所以升举其阳，使三焦畅遂，而火邪皆散矣。人参、甘草益脾土而泻热，芍药泻脾火而敛阴，且酸敛甘缓，散中有收，不致有损阴气为佐使也。

【临证举例】　①五心烦热　《名医类案》：虞恒德治一妇人，年四十余，夜间发热，早晨退，五心烦热，无休止时。半年后，虞诊六脉皆数，伏而且牢，浮取全不应，与东垣升阳散火汤四服，热减大半，胸中觉清快胜前，再与二帖，热悉退。②流感　《中医教育》（1977；3：38）：某机关干部，男性，

46岁。感冒四天，经西医服药打针治疗无效。发热不退，身热如焚（腋温39.2℃），头痛如破，周身骨骼酸痛如折，咳嗽气喘，咳声粗洪，痰难咯出，小便淡黄，脉浮数带弦，舌红苔薄白滑。证属阳邪被遏，不得发越。给“升阳散火汤”去参加杏仁、桔梗二剂。服药一剂，汗出热退，痛苦解除大半。二剂后，除稍有咳嗽外，基本告愈。③慢性扁桃体炎 《中医杂志》（1985；4:308）：笔者运用升阳散火汤治疗慢性扁桃体炎30例，取得了较好疗效。30例患者年龄大多在10岁以下，最小3岁，最大25岁。患病时间平均两年。临床见症为，继急性扁桃体炎反复发作之后，扁桃体肿大Ⅰ至Ⅲ度，微红，咽痛反复发作，阵发性刺激咳嗽，易感冒，纳呆，便溏，舌淡，脉弦细或细数。药物组成为生甘草6克，防风7.5克，炙甘草9克，升麻、葛根、独活、白芍、羌活、党参各15克，柴胡24克。治疗结果：治愈25例，显效4例，好转1例。④鼻渊 《古今医案按》：江应宿治王晓，鼻塞，气不通利，浊涕稠粘，屡药不效，已经三年。宿诊视，两寸浮数，曰，郁火病也。患者曰，昔医皆作脑寒主治，子何悬绝若是耶。经曰，诸气膹郁，皆属于肺。河间云，肺热甚则出涕，故热结郁滞，壅塞而气不通也。投以升阳散火汤十数剂，病如失。

02529 升肝舒郁汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生黄耆六钱 当归三钱 知母三钱 柴胡一钱五分 生明乳香三钱 生明没药三钱 川芎一钱五分

【主治】 妇女阴挺，亦治肝气虚弱，郁结不舒。

【方论选录】 方中黄耆与柴胡、芎劳并用，补肝即以舒肝，而肝气之陷者可升。当归与乳香、没药并用，养肝即以调肝，而肝气之郁者可化。又恐黄耆性热，与肝中所寄之相火不宜，故又加知母之凉润者，以解其热也。

【临证举例】 阴挺 《衷中参西》：一妇人，年三十余，患阴挺，用陈氏《女科要旨》治阴挺方，治之不效。因忆《傅氏女科》有治阴挺之方，其证得之产后，因平时过怒伤肝，产时又努力太过，自产门下坠一片，似筋非筋，似肉非肉，用升补肝气之药，其证可愈。遂师其意，为制此汤服之。数剂即见消，十剂痊愈。

02530 升举大补汤

【方源】《傅青主女科·产后编》上卷。

【组成】 黄耆 白术 陈皮各四分 人参二钱 炙草 升麻各四分 当归 熟地各二钱 麦冬一钱 川芎一钱 白芷四分 黄连三分（炒） 荆芥穗四分（炒黑）

【用法】 加大枣，水煎温服。

【功用】 滋荣益气。

【主治】 产后半月外血崩；年老虚人患崩。

【加减】 汗多，加麻黄根一钱；浮麦（炒）一小撮；大便不通，加肉苁蓉一钱；气滞，磨木香三分；痰，加贝母六分，竹沥姜汁少许；寒嗽，加杏仁十粒，桔梗五分，知母一钱；惊，加枣仁、柏子仁各一钱；伤饭，加神曲、麦芽各一钱；伤肉食，加山楂、砂仁各八分。

【宜忌】 大便不通，禁用大黄；身热，不可加连、柏；伤食怒气，均不可专用耗散无补药。

02531 升麻化毒汤

【方源】《元戎》。

【异名】 升翘六合汤（《医级》卷九）。

【组成】 四物汤四两加升麻 连翘各七钱

【主治】 ①《元戎》：妊娠伤寒，下后过经不愈，温毒发斑如锦纹。②《医级》：妊娠时感，经热郁而不解，咽疼耳聋，咳逆热渴，见疹见斑，及热欲传而表仍在者。

02532 升麻六物汤

【方源】《活人书》卷十九。

【组成】 升麻 栀子仁各二两 大青 杏仁（去皮尖） 黄芩各一两半

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱，水一盏半，加葱白三茎，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 ①《活人书》：妊娠七月伤寒，壮热，赤斑变黑。②《普济方》：口疮赤烂。

【备考】《医学正传》有甘草。

02533 升麻石膏汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 升麻 石膏 防风 荆芥 归尾 赤芍 连翘 桔梗 甘草 薄荷 黄芩 灯心

【主治】 牙龈红肿，面颊俱肿，头面尽痛者。

【加减】 热甚，加酒大黄。

02534 升麻四物汤

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 当归 川芎 赤芍 生地 白芷各一钱 黄芩一钱 升麻五钱 蒲公英五钱

【用法】 用水碗半，煎八分，食远服。

【主治】 血虚牙痛。

02535 升麻发表汤

【方源】《伤寒六书》卷四。

【异名】 升阳发表汤（《鲁府禁方》卷一）。

【组成】 麻黄四分 桂枝 甘草各三分 杏仁（去皮尖） 白芷 防风各八分 升麻五分 羌活 川芎各一钱

【用法】 水二钟，加生姜三片，葱白三茎，豆豉一撮煎之，热服取汗。宜厚被覆首。感寒甚重，服不作汗，宜再服二三剂。

【主治】 冬月正伤寒，头痛发热恶寒，脊强，脉浮紧，无汗，头如斧劈，身如火炽者。

【宜忌】 中病即止，不得多服，多则反加别病。有汗者勿用。

【加减】 发热恶寒，头痛无汗而喘者，加葛根，去升麻；身体痛者，加苍术、芍药，去杏仁，加柴胡、芍药；胸中饱满者，加枳壳、桔梗。

02536 升麻补胃汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 白芍药一钱五分 升麻 羌活 黄耆各一钱 生地黄 熟地黄 独活 牡丹皮 炙甘草 柴胡 防风各五分 当归身 葛根各三分 肉桂少许

【用法】 上锉，如麻豆大。分作二服，每服水二盏，煎至一盏，去滓热服，食前服。

【主治】 湿毒肠澼。宿有阳明血证，因五月间大热吃杏，肠澼下血，唧远散漫如筛，腰沉沉然，腹中不痛，血色紫黑者。

【备考】 本方方名，《医学正传》引作“升阳补胃汤”。

02537 升麻补胃汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 甘草七分 升麻 柴胡 草豆蔻 黄耆各五分 半夏三分 当归身 干姜各二分 红花少许

【用法】 上都作一服。水二盏，煎至一盏，去滓热服，食远服之。

【主治】 因内伤服牵牛、大黄，食药泄泻过多，腹中大痛。

02538 升麻和气饮

【方源】《局方》卷八（续添诸局经验秘方）。

【异名】 和气饮（《证治要诀类方》卷二）。

【组成】 干姜 熟枳壳各半钱 干葛 熟苍术 桔梗 升麻各一两 当归 熟半夏 茯苓 白芷各二钱 陈皮 甘草各一两半 芍药七钱半 大黄（蒸）半两

【用法】 上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜三片，灯心十五茎，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】 疮疥癞风，不时痛痒；及气滞痛经。

①《局方》（续添诸局经验秘方）：疮疥发于四肢，臂髀痛痒不常，甚至憎寒发热，攻刺疼痛，浸淫浮肿；又癞风入脏，阴下湿痒，耳鸣，眼痛。②《景岳全书》：风癣疮疥，热经大便不通。③《医钞类编》：经来腹痛，不来腹亦痛，因气滞者。

【备考】 ①本方方名，《丹溪心法》引作“升麻汤”。②《医方类聚》引《澹寮方》：有官桂、厚朴、荆芥，无葛根。

02539 升麻泄热散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 川升麻一两半 射干一两半 黄柏二两（锉） 大青一两 甘草一两（炙微赤，锉） 玄参二两 黄芩一两 犀角屑三分 黄连一两（去须）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加苦竹叶三七片，煎至五分，去滓，再加生地黄汁一合，蜜半合，搅令匀，食后温服。

【主治】 心脾脏热，口舌生疮破裂，唇赤赤色。

02540 升麻柴胡汤

【方源】《三因》卷十六。

【组成】 柴胡 升麻 芍药 栀子仁 木中一两 黄芩 大青 杏仁（去皮尖）各三分 石膏（煅）二两

【用法】 上锉散。每服四大钱，水一盏，加生姜五片，煎七分，去滓，食后服。

【主治】 心脾虚热上攻，舌上生疮，舌本强，颊两边肿痛。

02541 升麻透斑汤

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】 升麻 枳壳（麸炒）各五分 柴胡钱半 桔梗 前胡各一钱 干葛 川芎 茯苓各七分 陈皮 半夏 甘草各四分

【用法】 上加生姜一片，水一钟，煎五分，作十余次，徐服之。

【主治】 疹疮初见红点一日至三日。

02542 升麻消毒饮

【方源】《金鉴》卷七十四。

【组成】 当归尾 赤芍 金银花 连翘（去心） 牛蒡子（炒） 栀子（生） 羌活 白芷 红花 防风 甘草（生） 升麻 桔梗

【用法】 每味用二钱为大剂，一钱五分为中剂，一钱为小剂。水二钟，煎八分，食远服。

【主治】 黄水疮，形如粟米痒兼痛，破流黄水，浸淫成片。

02543 升麻消毒散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 羌活 防风 升麻 白芷 桔梗 连翘 栀子 芍药 金银花 甘草 牛蒡子

【用法】 用水二钟，煎八分，食远热服，外用杏仁（去皮尖）杵如膏，敷之。

【主治】 面肿生疮。

【加减】 如身有疮，加归尾、红花。

02544 升麻黄芩汤

【方源】《活人书》卷二十。

【组成】 升麻 葛根 黄芩 芍药各三钱 甘草一钱半（炙）

【用法】 上锉，如麻豆大。每服二钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服。

【主治】 小儿伤风有汗，头疼，发热恶寒。

【加减】 若时行疮痘出不快，烦躁不眠者，加木香一钱五分。

02545 升麻黄连丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 白檀二钱 生甘草三钱 生姜（取自然汁） 莲花青皮 升麻各五钱 黄连（去须）一两 黄芩（去腐，酒洗）二两

【用法】 上为极细末，汤浸蒸饼为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，食后白汤送下。

【主治】 多食肉，口臭不欲闻，其秽恶气使左右不得近。

02546 升麻黄耆汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生黄耆五钱 当归四钱 升麻二钱 柴胡二钱

【主治】 转胞，小便滴沥不通。

【临证举例】 产后小便不利 一妇人，产后小便不利，遣人询方。俾用生化汤加白芍，治之不效，复来询方。言有时恶心呕吐，小便可通少许。愚恍悟曰：此必因产时努力太过，或撑挤太甚，以致胞系了戾，是以小便不通。恶心呕吐，则气机上逆，胞系有提转之势，故小便可以稍通也。遂为书此汤，一剂而愈。

02547 升麻散火汤

【方源】《赤水玄珠》卷一。

【组成】 升麻 葛根 羌活 独活各五分 防风三分 柴胡八分 甘草（炙）三分 白芍五分 生甘草二分

【用法】 水煎。稍热服。

【主治】 男子妇人四肢发热，肌热，筋痹热，骨髓中热，发困热如燎，扪之烙手。此多血虚而得之，或胃虚过食冷物，抑遏阳气于脾土之中。

02548 升麻散坚汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 升麻 甘草 莪术 三棱 陈皮 桔梗 黄连 龙胆草 葛根 川芎 白芍 夏枯草 连翘 黄芩 当归各五分

【用法】 水二钟，煎八分，食后热服。再用上药加倍，为末，蜜丸，如绿豆大。每服百丸，临睡黄酒调下。头不枕更妙。

【主治】 瘰疬绕颈或至颊车，属足阳明；核深远隐，隐曲肉底，又属足少阴。俱作肿块，坚硬，大小不一。

【加减】 有痰，加天花粉。

02549 升麻葛根汤

【方源】《局方》卷二。

【异名】 升麻散（《斑疹备急》）、升麻汤（《活人书》卷十六）、四味升麻葛根汤（《小儿痘疹方论》）、玉血饮（《观聚方要补》卷八引《澹寮》）、解肌汤（《普济方》卷三六九）、葛根升麻汤（《玉机微义》卷五十）、葛根汤（《片玉痘疹》卷六）、干葛汤（《症因脉治》卷三）、四味升葛汤（《疡医大全》卷三十三）。

【组成】 升麻 白芍药 甘草（炙）各十两 葛根十五两

【用法】 上为粗末。每服三钱，用水一盏半，煎取一中盏，去滓，稍热服，不拘时候，一日二三次。以病气去，身清凉为度。

【功用】 ①《外科集腋》：升散阳明之邪毒。②《中医大辞典·方剂分册》：辛凉解肌，透疹解毒。

【主治】 伤寒、中风瘟疫，发热恶寒，头疼身重，目痛鼻干；疮疹初发未发；阳明下痢；及牙痛、腮肿、喉痛。

①《局方》：大人、小儿时气温疫，头痛发热，肢体烦疼，及疮疹已发及未发。②《活人书》：寒暄不时，人多疾疫，乍暖脱衣，用暴热之次，忽变阴寒，身体疼痛，头重如石。③《阎氏小儿方论》：伤寒、温疫、风热，壮热头痛体痛，疮疹已发未发。④《观聚方要补》引《澹寮方》：遍身生疮，脓血脊胀，极痛且痒。⑤《赤水玄珠》：脾脏发咳，咳而右胁下痛，痛引肩背，甚则不可以动。⑥《古今名医方论》：阳明表热下利，兼治痘疹初发。⑦《疡科心得集》：牙痛、牙蛀、托腮。⑧《异授眼科》：目上下皮肿而硬者。⑨《外科集腋》：烂喉丹痧初起，头胀恶寒，肌肤红热，喉间结痹，肿痛腐烂，身发斑疹隐隐。

【宜忌】《医方集解》：斑疹已出者勿服，恐重虚

其表也。伤寒未入阳明者勿服，恐反引表邪入阳明也。

【方论选录】 ①《古今名医方论》（柯韵伯）：升麻、葛根提胃脘之阳，散肌肉之浮热；芍药、甘草泻肝胆之火，以解胃腑之实热，有汗则发，无汗则止。葛根禀性甘凉，可以散表实，协升麻以上升，则使清阳达上，而浊阴降下可知。芍药收敛阴精，甘草缓急和里，则下利自止可知。治里仍用表药者，以表实下利，而非里实故也。痘疹自里达表，出于少阴而发于太阳，初起则内外皆热，故亦宜于凉散耳！②《医方集解》：此足阳明药也，阳明多气多血，寒邪伤人，则血气之壅滞，辛能达表，轻可去实，故以升葛辛轻之品，发散阳明表邪。阳邪盛则阴气虚，故用芍药敛阴和血，又用甘草调其卫气也。升麻、甘草升阳解毒，故又治时疫。③《中医大辞典·方剂分册》：葛根清热解肌透疹；升麻升阳透表；芍药和营泄热；甘草调和诸药。合用则解肌透疹，和营解毒。

【临证举例】 ①阳明热毒 《慎柔五书》：丁会成，年四十余。春季右腿正面忽痛麻。诊之，右三部洪数五、六至，问口渴？曰：是也。升麻葛根汤二贴而愈。②头面湿疹 《浙江中医学院学报》（1985：5:10）：曹某某，女，成，脉细弦，舌红有白苔，颜面部发生疣状物甚多，先发于前额，近来向面部扩展，无痛无痒。证属湿邪郁于肌肤不化，拟建脾化湿为治：升麻、白芷、生甘草各5克，煨干葛、地肤子各10克，赤芍6克，苡仁30克，服二剂后基本痊愈。

02550 升麻葛根汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 升麻 干葛 白芍 柴胡 黄芩 山栀 各一钱 木通 甘草各五分

【用法】 水二钟，煎八分。不拘时候，母子同服。

【主治】 丹毒，身体发热，面红气急，啼叫惊搐。

02551 升麻葛根汤

【方源】《金鉴》卷六十七。

【组成】 山栀 升麻 葛根 白芍 柴胡 黄芩 各一钱 黄连 木通 甘草各五分

【用法】 水二钟，煎八分服，不拘时候。

【主治】 酒毒为病而致心痛，巨阙穴隐痛微肿，令人寒热身痛，头面色赤，口渴，随饮随干者。

02552 升麻解毒汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】 升麻 桔梗 荆芥 连翘 防风 羌活 赤芍 甘草 淡竹叶 牛蒡子

【主治】 出疹之时，时寒时暖。

02553 升麻鳖甲汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 阴毒升麻鳖甲汤（《元戎》）、阴毒升麻汤（《准绳·幼科》卷六）。

【组成】 升麻二两 当归一两 蜀椒（炒去汗）一两 甘草二两 鳖甲（手指大）一片（炙） 雄黄半两（研）

【用法】 以水四升，煮取一升，顿服之。老小再服取汗。

【主治】 ①《金匮》：阴毒为病，面赤斑斑如锦纹，咽喉痛，吐脓血。②《证治宝鉴》：烂喉痧。

【加减】 阴毒，面目青，身痛如被杖，去雄黄、蜀椒。

【方论选录】 ①《古方选注》：升麻入阳明、太阴二经，升清逐秽，辟百邪，解百毒，统治温疠阴阳二病。但仅走二经气分，故必佐以当归通络中之血，甘草解络中之毒，微加鳖甲守护营神，俾椒、黄猛烈之品，攻毒透表，不乱其神明。阴毒去椒、黄者，太阴主内，不能透表，恐反助疠毒也。②《证治宝鉴》：以升麻透疠毒，鳖甲泄热守神，当归和调营血，甘草泻火解毒。

02554 升清降浊汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 陈皮9克 清半夏6克 茯苓 薏苡仁 车前子各9克 枳壳 生荷叶各3克

【主治】 视瞻有色，暗影淡黄，神光不舒，头晕胸闷，苔腻脉滑。

【方论选录】 陈皮、清半夏、茯苓祛湿化痰；薏苡仁、车前子清热利湿，引湿热浊邪从小便而出；枳壳宽中下气，行痰湿，消痞满；荷叶引胆中之清阳上升。诸药合用，共有祛湿化痰，升清降浊之功。

【临证举例】 视瞻有色 袁某某，男，40岁，干部。1974年11月15日入院。右目视物不清20余天，眼前有圆形淡黄色暗影，头晕胸闷，口渴不欲饮。检查视力：右眼0.4，左眼1.5，右目神光不舒；眼底黄斑部有3倍乳头大类圆形水肿区，周围有地反射轮，其中有密集的黄白色点状渗出，中心凹反射消失。苔腻，脉滑。此为视瞻有色，为湿痰上蒙清窍，清阳不得上升所致。治以升清降浊汤，服药8剂后检查，右眼视力1.0，眼底黄斑部水肿消失，色调略暗，仍有少量渗出物，中心凹反

光力减暗，胸闷头晕已除，已不口渴，脉转沉细。以上方去半夏、苡仁、茯苓加当归、酒生地各9克、枸杞子12克。于1975年1月29日检查：双眼视力均为1.5，右目视前有一块菜粒大黑影飘动；眼底黄斑部中心凹反射清晰，仅上部留有数点灰白色微小的渗出物。停药出院，观察二年来未见复发。

02555 升葛补中汤

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】升麻 葛根 赤芍 人参 桔梗各二钱 甘草一钱 生姜三片

【用法】水二钟，煎八分，食远服。

【主治】咽喉口舌虚火肿痛生疮。

02556 升麻牛蒡子散

【方源】《证机微义》卷十五引郭氏方。

【组成】升麻 牛蒡子 甘草 桔梗 葛根 玄参 麻黄各一钱 连翘一钱

【用法】上㕮咀。加生姜三片，水二盏，作一服。

【主治】时毒疮疹，发于头面、胸膈之际，脉浮洪在表者。

02557 升麻牛蒡子散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】升麻 赤芍药 干葛 青木香 甘草 防风 白芷 荆芥 牛蒡子 桔梗 金银花 玄参 麻黄 连翘 蓝叶

【用法】加薄荷，水煎服。

【主治】时毒。

02558 升麻加附子汤

【方源】《医方类聚》卷八十一引《卫生宝鉴》。

【异名】升麻附子汤(《丹溪心法》卷三)。

【组成】升麻 葛根各一钱 白芷 黄耆各七分 甘草（炙） 草豆蔻仁 人参各五分 黑附（炮）七分，益智三分

【用法】上㕮咀。作一服，水三盏，加连须葱白，同煎至一盏，去滓温服，数服良愈。

【主治】①《医方类聚》引《卫生宝鉴》：面寒。②《医钞类编》：身体瘦弱，饮食清减。

【临证举例】面寒 真定府维摩院尼长老，六十一岁，身体瘦弱，己酉十月间，病头面不耐寒，气弱而不敢当风行，诸治不效，请予诊之。其脉弦细而微，且病人年高，常食素茶果而已，此阳明之经本虚，《脉经》云：气不足则身以皆前寒栗。此胃气虚经络之气亦虚，不能上达头面，故大恶风寒，先以附子理中丸数服，而温其中气，次以升麻加附子汤，行其经络。

02559 升阳去热和血汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】除湿热和血汤(《东垣试效方》卷七)、升阳除湿和血汤(《医学纲目》卷十七)、升阳和血汤(《玉机微义》卷十七)、除湿和血汤(《外科发挥》卷七)、升麻去湿和血散(《丹溪心法附余》卷十一)、升阳去湿和血汤(《便鉴》卷三)。

【组成】橘皮二分 熟地黄 当归身 苍术 秦艽 肉桂各三分 生地黄 牡丹皮 生甘草各五分 升麻七分 熟甘草 黄耆各一钱 白芍药一钱五分

【用法】上㕮咀，都作一服。水四盏，煎至一盏，去滓，空心稍热服。

【功用】升阳，去湿热，和血脉。

【主治】阳明气冲热毒，肠癖下血，其血唧出有力而远射，四散如筛，肠中血下行，腹中大作痛。

02560 升阳除湿防风汤

【方源】《脾胃论》卷中。

【异名】升阳除湿汤(《嵩崖尊生》卷九)。

【组成】苍术（泔浸，去皮净）四两 防风一钱 白术 白茯苓 白芍药各一钱

【用法】上㕮咀，除苍术另作片子，水一碗半，煮至盏，纳诸药同煎至一大盏，去滓，空心食前热服。

【功用】升举阳气，升清降浊。

【主治】脾胃虚弱，阳气下陷，以致飧泄、濡泻，或后重、便闭，及肠风下血。

①《脾胃论》：大便闭塞或里急后重，数至圊而不能便或少有白脓或少有血。②《内经拾遗》：濡泻。③《明医杂著》：脾胃损伤，阳气下陷，大便泄泻或后重便塞。④《张氏医通》：风湿飧泄及肠风滞下便血。⑤《证治宝鉴》：泻注诸滞药不效者。

【宜忌】慎勿利之，利之则必致病重，反郁结而不通。

【方论选录】此证飧泄不禁，以此药导其湿；如飧泄及泄不止，以风药升阳，苍术益胃去湿；脉实，腹胀闭塞不通，从权以苦多甘少药泄之；如得通，复以升阳汤助其阳，或便以升阳汤中加下泄药。①《医方考》：风能胜湿，故用防风；燥能制湿，故用二术；淡能利湿，故用茯苓；土病木乘，故用芍药。又曰：久风入中，则为肠风飧泄，故用防风；伐肝疏脾，非酸不可，故用芍药。②《医方集解》：此足太阴阳明药也，苍术辛温燥烈，升清阳而开诸郁，故以为君；白术甘温，茯苓甘淡，佐之以健脾利湿；防风辛温胜湿而升阳；白芍酸寒敛

阴而和脾也。

【临证举例】 便秘 《中医杂志》(1983；4:78)：凡经常便秘，虚坐努责，甚或下坠，便中带血，或虚人不任攻伐者，用此方效果亦很满意。药量改为苍术 15 克，防风、茯苓、白术各 10 克，白芍 6 克。老年人大便不通，上述药量需减半，否则往往出现腹泻。此方妙在无攻伐之弊，才年老、体弱、大病后、产后、不宜用攻下方药者，辨证使用升阳除湿防风汤颇效。

【备考】 按：本方方名，《证治汇补》卷八引作"升阳防风汤"。《内经拾遗》有甘草。

02561 升麻鳖甲汤去雄黄蜀椒方

【方源】 《金匮》卷上。

【组成】 升麻二两 当归一两 甘草二两 鳖甲(手指大一片，炙)

【用法】 以水四升，煮取一升，顿服之，老小再服。取汗。

【主治】 阴毒之为病，面目青，身痛如被杖，咽喉痛。

02562 长生丹

【方源】 年氏《集验良方》卷二。

【组成】 地黄八两 山药四两 白茯神四两 何首乌半斤 女贞子六两 甜石斛半斤 枸杞六两 鹿角霜半斤 山茱萸六两 菟丝子半斤 肉苁蓉二两 鹿角胶半斤 川牛膝半斤 宣木瓜 虎胫骨四两 人参一斤 丹皮八两 杜仲一两 胡麻一斤 桑椹子一斤

【用法】 上为末，拌为丸。每服三钱，空心白滚水送下。

【主治】 男子劳损羸瘦，阳事不举，精神短少，须发早白，步履艰难；妇人下元虚冷，久不孕育。

【备考】 方中宣木瓜用量原缺。

02563 长春丹

【方源】 《医便》卷一。

【异名】 仙茅丸。

【组成】 何首乌(用水浸，去粗皮，竹刀切片，赤白各二斤，黑豆拌蒸晒九次，为末，净)二斤 仙茅(竹刀刮去芦，用粳米泔浸去皮，黑豆拌蒸晒九次，净末)二斤 白茯苓(去皮为末，水飞，去筋，取沉底晒干，用粳米铺底，放上蒸三次，研净末)一斤 茅山苍术(米泔水浸，去粗皮，切片，老米拌蒸晒九次。一云：加桑椹汁一斤，拌苍术末尤妙，中年以后服极效) 牛膝(去芦，酒浸一宿，同何首乌蒸三次，净末)各一斤

【用法】 上药各为末，和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心滚白汤送下。

【功用】 补益肝肾，聪耳明目，却病延寿。

【宜忌】 忌牛肉、萝卜、葱、蒜。

02564 长春方

【方源】 年氏《集验良方》卷二。

【异名】 长春丸(《本草纲目拾遗》卷五)。

【组成】 鱼鳔一斤(蛤粉炒成珠，极焦) 棉花子(取净仁)一斤(去油炒，酒蒸) 金钗石斛八两 白莲须八两 金樱子(去子毛，净)一斤 菟丝子四两 沙蒺藜四两 枸杞子六两 五味子四两(炒)

【用法】 上药为末。用鹿角五斤，锯薄片，河水煮三昼夜，去角，取汁熬膏，和药末为丸，如梧桐子大。每服三钱。

【主治】 肾虚精冷。

02565 长春散

【方源】 《普济方》卷五十一。

【组成】 甘松 藁本 藿香 白附子 细辛 广陵香 小陵苓 茅香 白檀 三奈子 川芎 白芷 各二两 白丁香 白及 白蔹各三两 栝楼根 槟实各四两 滑石半斤 韶脑半斤(两) 牵牛四两 皂角二(三)斤半 绿豆一升

【用法】 上为细末，加白面一斤，和匀一处，后入韶脑再和匀用。

【功用】 光泽面皮。

【主治】 风黯粉刺。

02566 长将散

【方源】 《医方类聚》卷一三二引《肘后方》。

【组成】 石韦一两(去毛) 滑石一两 瞿麦一两 王不留行一两 葵子一两

【用法】 上为末，每服方寸匕，一日三次。

【主治】 ①《医方类聚》引《肘后方》：诸淋。②《圣惠》：劳淋，小便恒不利，阴中痛，日夜数起，劳损虚热。

02567 长生保命丹

【方源】 《摄生众妙方》卷二。

【组成】 地骨皮(去梗，酒浸)二两 牛膝(去芦，酒浸)二两 甘菊花二两 枸杞子(酒浸)二两 石菖蒲(竹刀切，晒干)二两 远志(去心，酒浸)二两 生地黄(忌铁器)二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，温酒送下。

【功用】 返老还童。

02568 长肉八宝丹

【方源】 《吉人集验方》下集。

【组成】 煅龙骨一钱　扫盆一钱　煅甘石三钱　赤石脂三钱　上血竭一钱　煅石膏一两五钱

【用法】 上为细末。频掺。

【功用】 长肉生肌。

02569　长春广嗣丹

【方源】《医方考》卷六。

【异名】 长春补药方(《良朋汇集》卷二)。

【组成】 人参（去芦）　天门冬（去心）　当归（酒洗）　泽泻（去毛）　山茱萸（去核）　石菖蒲（炒）　赤石脂　五味子（去梗）　复盆子（去萼）　白茯苓　车前子　广木香　柏子仁各一两　山药（姜汁炒）　川巴戟（去心）　川椒（去目与梗，及闭口者，炒出汗）　川牛膝（去芦，酒洗）　生地黄　熟地黄　地骨皮（去木与土）　杜仲各二两　远志（去芦，甘草汤泡，去心）　肉苁蓉（酒洗，去心膜，晒干）　枸杞子各三两　菟丝子（酒洗，去土，及用酒蒸，捣饼晒干）四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，一日三次。

【主治】 ①《医方考》：男妇艰嗣。②《墨宝斋集验方》：男子劳损羸瘦，中年阳事不举，精神短少，未至五旬，须发早白，步履艰难。妇人下元虚冷，久不孕育者。

【方论选录】 是方也，人参、天门冬、五味子用之补肺；石菖蒲、柏子仁、当归、远志用之养心；白茯苓、怀山药用之养脾；山茱萸、熟地黄、覆盆、杜仲、牛膝、巴戟、苁蓉、枸杞、菟丝用之补肝肾。所以然者，肝肾同一治也；车前、泽泻利其灼阴之邪；生地、骨皮平其五脏之火；石脂之涩，所以固精；木香之窜，所以利六腑；川椒之辛，所以散湿痹也。此则兼五脏六腑而调之，五脏之精实，六腑之气和，夫然后可以媾精而宜子矣！

【备考】《墨宝斋集验方》：每服五十丸，渐加至七八十丸，空心盐汤或酒送下。服十日后，小便杂色，是旧疾出也；又十日，鼻酸声雄，胸中痛，咳嗽唾痰，是肺病出也；一月后，一应七情滞气，沉痼冷积皆出。百日后，容颜光采，须发变黑，齿颊重固，既老而康，目视数里，精神百倍，寿命延长，种子之功，百发百中。

02570　长春至宝丹

【方源】 年氏《集验良方》卷二。

【组成】 鹿茄茸（炙）四两　蚕蛾（炒）四两　鹿角胶（牡蛎粉炒成珠）四两　巨胜子（炒）四两　人参四两　哺退鸡蛋七个（炙黄）　枸杞子（酒蒸）　当归（酒洗）　肉苁蓉（酒洗）　楮实子（去毛）　杜仲（姜汁炒）　牛膝（酒洗）　金樱子（炒）　巴戟（酒浸）　锁阳（酥炙）　葱子　韭子（炒）　故纸（炒）各四两　熟地八两　鸽子蛋五个（蒸熟入药）　何首乌一斤（九次煎蒸，去筋）

【用法】 上为粗末，将鸽蛋捣烂，入药拌匀，晒干为末，蜜和后臼中杵千余下为丸，如梧桐子大。每服三钱。

【功用】 健脾开胃，进食止泻，强筋壮骨，增精补髓，乌须黑发，明目聪耳，活血养筋，助阳种子。

【主治】 命门火衰，阳痿精冷。

02571　长春不老仙丹

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】 仙茅（酒浸，洗）四两　山茱萸（酒蒸，去核）二两　白何首乌（同赤首乌制）四两　川萆薢（酒洗）二两　赤何首乌（米泔浸洗，捶碎如枣核大，入黑豆同蒸三日，极黑）四两　补骨脂（酒炒）二两　黄精（酒蒸）四两　大怀生地黄（酒洗净，掐断晒干）二两　大怀熟地黄（用生地黄酒浸洗，碗盛放砂锅内，蒸一日极黑，掐断晒干）二两　巨胜子二两　怀山药二两　甘枸杞子二两　天门冬（水润，去心）二两　麦门冬（水润，去心）二两　白茯苓（去皮，人乳浸，晒三次）二两　辽五味子二两　小茴香（盐、酒炒）二两　覆盆子二两　拣参二两　嫩鹿茸（酥炙）二两　怀牛膝（去芦，酒洗）二两　柏子仁二两　青盐二两　川杜仲（去皮，酒炒）二两　当归身（酒洗）二两　川巴戟（水泡，去心）一两　菟丝子（酒洗净，入砂锅，酒煮烂，捣成饼晒干）二两　肉苁蓉（酒洗）二两　川椒（去目，微炒）一两　远志（甘草水泡，去心）二两　锁阳（炙酥）三两

【用法】 上药精制，秤和一处，石臼内捣成饼，晒干，为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心酒送下。

【功用】 滋肾水，养心血，添精髓，壮筋骨，扶元阳，润肌肤，聪耳明目，宁心益智，乌须黑发，固齿牢牙，返老还童，延年益寿，壮阳种子，却病轻身，长生不老。

【主治】 诸虚百损，五劳七伤。

【宜忌】 制药忌铁器，服药忌三白。

【加减】 阴虚火动，素有热者，加川黄柏（酒炒）二两、知母（酒炒）二两、紫河车一具（用壮盛妇人首生男胎，先将米泔水洗净，次入长流水中再洗，新瓦上慢火焙干）；如虚甚，用八仙斑龙胶化为丸。

02572 长春真人保命丹

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】 茯苓 天门冬 山药 熟地黄 枸杞子 何首乌各四两 干姜二两 大茴香（炒）一两 青盐少许 鹿角胶四两 莲实半斤（去皮） 破故纸四两（净，香油炒） 没食子十个 胡桃仁半斤（净肉） 新小米一升（同伏冬、牛乳煮粥晒干） 旱莲草（晒干）一斤 麦门冬四两

【用法】 上为细末。空心白汤调匀二三匙，一日二服。不拘男女老少。

【主治】 五劳七伤，虚损无力，四肢困倦，脚手顽麻，血气耗散，面黄肌瘦，阳气不升，虚晕恶心，饮食减少。

02573 乌及散

【方源】《上海中医药杂志》(1958；9:15)。

【组成】 乌贼骨 3 克 生白及 6 克

【用法】 上药各为细末，和匀。每次服 3 克，饭后二小时服，一日三次。

【主治】 胃、十二指肠溃疡病，及合并出血。

02574 乌云煎

【方源】《医统》卷九十八。

【组成】 香油二斤 柏子油二两（另贮） 诃子半两 没食子六钱 百药煎三两 倍子（炒黑）一两 酸石榴皮 旱莲草各半两 猪胆二枚（另贮） 胆矾一钱

【用法】 上为粗末，先将香油锅内熬数沸，然后将药末下入油内熬，少时倾出油入罐内，微冷，人柏子油搅匀渐冷，下后项细料药：甘松、三奈、白芷、藁本、零陵香、藿香各三钱为粗末，绢袋盛之，入油浸，每日搅三次。如此十日后，先一日以灰汤洗发净，次日搽油，不数日，其发黑绀润泽香美，永不惹尘，更不须再洗。

【主治】 女人发黄不润。

02575 乌云膏

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 松香末二两 硫黄末一两

【用法】 和匀，香油拌如糊，摊南青布条上，少半指厚，卷成条线扎之，再用油浸一日，取出，刮去余油，以火点着一头，下以粗碗按之，其布灰陆续剪去，取所滴药油浸冷水内一宿，出火毒。搽用。

【主治】 头癣，脓疥，下部寒湿疮，胎疮，奶癣。

①《外科大成》：头癣并坐板脓疥，及下部寒湿等疮。②《金鉴》：胎癍疮痒甚。③《疡医大全》：奶癣。④《青囊秘传》：一切疮痍，破津脂水作痒。

【备考】 方中松香、硫黄用量原缺，据《医宗金鉴》补。

02576 乌贝散

【方源】《江西中医药》(1955；12:50)。

【组成】 乌贼骨（去壳）85% 象贝母 15%

【用法】 上药各为极细粉，过筛拌匀，喷入芳香剂，如丁香油、桂皮油等，或不加芳香油亦可。每饭前服一钱，一日三次。

【主治】 胃及十二指肠溃疡。

02577 乌石散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】 草乌头 升麻各十文 寒水石十文（银锅内煅通红） 细辛十五文 蔓荆子五文

【用法】 上为细末。揩牙，少时以温盐汤漱之。

【主治】 牙痛。

02578 乌龙丸

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】 九香虫一两（半生半熟） 车前子四钱（微炒） 陈皮四钱 白术五钱 杜仲八钱（酥炙）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一钱五分，盐白汤或盐酒送下。

【功用】 壮元阳，和肝脾；延年。

①《摄生众妙方》：久服延年。②《本草纲目》：壮元阳。③《中药成方配本》：调和肝脾。

【主治】 肝肾亏损，脾胃虚弱及肝脾不调的泄泻，胸脘痞闷胀疼，腹痛溺涩。

①《摄生众妙方》：膈间滞气，肝肾亏损。②《重订通俗伤寒论》：脾肾阳虚，肝郁犯胃，脘胁胀疼，腹痛溺涩。③《饲鹤亭集方》：痰凝气滞，痞闷胀疼。④《中药成方配本》：肝脾不调。⑤《全国中药成药处方集》(上海方)：脾胃虚弱泄泻。

02579 乌龙丹

【方源】《准绳·女科》卷二。

【组成】 禹余粮（炒） 乌贼骨 鹿茸 龙骨 石燕（煅） 阿胶 当归 干姜各等分

【用法】 上为末，酒醋糊为丸。每服五十丸，温酒送下。

【主治】 崩中不止。

02580 乌龙散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 猪牙皂角七条（去皮弦）

【用法】 上为粗末。水一钟，煎五分，加人乳三匙，冷服。即时非吐即泻。

【功用】 开关利膈。

【主治】 咽喉肿痛，痰涎壅盛，喉风，喉痹，乳蛾。

【宜忌】 惟缠喉风、牙关紧闭者不可与，恐痰上出而口不开，壅塞无路；久病咽痛者忌用。

02581 乌龙膏

【方源】《金鉴》卷八十八。

【组成】 白草霜二钱 白及五钱 白蔹三钱 白合五钱 百部三钱 乳香五钱 没药五钱 麝香一分 糯米一两（炒） 陈粉子四两（隔年者佳，炒）

【用法】 上为细末，醋熬为膏。

【主治】 跌打损伤，筋断骨折，肿硬青紫。

02582 乌龙膏

【方源】《理瀹》。

【组成】 陈小粉（炒黑，醋熬） 大黄 黄连 黄柏 朴消 南星 半夏 白芷 白及 白蔹 牙皂 蓖麻仁 榆皮 五倍 龟板各等分（共为末）

【用法】 临用，加猪胆汁、白蜜和匀。留顶敷。无胆，蜜亦效。

【功用】 消肿拔脓，定痛解毒。

【主治】 一切热毒。

02583 乌头丸

【方源】《外台》卷七引《肘后方》。

【组成】 乌头六分（炮） 椒六分（汗） 干姜四分 桂心四分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如大豆大。每服四丸，酒送下。稍稍增之。

【主治】 心痛，不能饮食，头中疼重。

【宜忌】 忌生葱。

02584 乌头丸

【方源】《外台》卷七引《崔氏方》。

【组成】 乌头三两（炮） 附子三两（炮） 赤石脂三两 蜀椒二两（出汗） 桂心二两 干姜二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。痛发时，温清酒服三丸。觉至痛处，痛则止。若不止，加至五六丸，以知为度。若早朝服无所觉，至午时又服三丸。若久心痛，每旦服三丸，稍加至十丸。尽一剂，遂终身不发。

【主治】 ①《外台》引《崔氏方》：心痛与冷气痛。②《普济方》：风冷邪气入乘心络，或脏腑暴感风寒，上乘子心，令人卒然心痛，或引背膂乍甚，经久不愈。

【宜忌】 忌生葱、猪肉。

02585 乌头丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】 乌头（炮裂，去皮脐） 干蝎（去土，炒） 地龙（去土，炒） 踯躅花（去心）各等分

【用法】 上为末，醋糊为丸，如绿豆大。每服五丸，妇人当归酒送下；男子荆芥酒送下。

【主治】 风邪走注疼痛不可忍者。

02586 乌头丸

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】 草乌头半斤（用盐水浸三日，取出洗切，麸炒，麸焦为度，去麸用） 荆芥穗半斤

【用法】 上为细末，别用宣州木瓜二枚，饮熟去皮瓤，入前件药，杵令匀，用酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，食前木瓜汤送下，一日三次。

【主治】 筋急转筋，舒展不能。

02587 乌头丸

【方源】《本事》卷三。

【组成】 草乌头一斤

【用法】 上药入竹笋子内以水浸，用瓦子于笋内就水中泷洗，如打菱角法，直候泷洗去大皮及尖，控起令干。用麻油四两，盐四两，入铫内炒令深黄色，倾出油，只留盐并乌头，再炒令黑色，烟出为度；取一枚劈破，心内如米一点白，恰好也；如白多，再炒；趁热杵罗为末，用醋糊丸，如梧桐子大，干之。每服三十丸，空心、晚食前温酒送下。

【主治】 宿患风癞，遍身黑色，肌体如木，皮肤粗涩，及四肢麻痹。

【方论选录】《本事方释义》：草乌头气味苦辛大热，入足太阳、少阴，能行走经络。宿患风癞，遍身黑色，肌体麻木，皮肤不仁，四肢麻痹，久不能愈者，非此不能透入诸经络。制药用油、盐，和药用醋者，以咸能软坚，酸能约束。只用一味而不用它药者，欲其专攻是疾，无暇治及他处耳。

02588 乌头汤

【方源】《金匮》卷上。

【组成】 麻黄 芍药 黄耆 甘草（炙）各三两 川乌五枚（㕮咀，以蜜二升，煎取一升，即出乌头）

【用法】 上五味，㕮咀四味。以水三升，煮取一升，去滓，纳蜜煎中，更煎之。服七合；不知，尽服之。

【功用】《成方便读》：逐湿，行痹，助阳。

【主治】 历节，痛痹，脚气，雷头风。

①《金匮》：历节不可屈伸，疼痛，及脚气疼痛，不可屈伸。②《保命歌括》：少阴寒湿病。③《增补内经拾遗》：痛痹。④《眼科锦囊》：雷头风。

【方论选录】 ①《金匮要略心典》：此治寒湿历

节之正法也。寒湿之邪，非麻黄、乌头不能去；而病在筋节，又非如皮毛之邪，可一汗而散者。故以黄耆之补、白芍之收、甘草之缓牵制二物，俾得深入而去留邪。如卫瓘监钟、邓入蜀，使其成功而不及于乱，乃制方之要妙也。②《成方切用》：历节病即行痹之属也。乃湿从下受，挟风流注，故或足肿而必发热，且更不可屈伸而疼痛，故以甘、芍和阴，麻黄、黄耆通肌肉之阳气，而借川乌之迅发，以行其痹耆。③《退思集类方歌注》：方中余四味用水煮，乌头用蜜煎，蜜煎则乌头之性出，而乌头之气不散，正取其气味俱全，而雄入之势更壮，非徒以蜜能解乌头之毒之谓也，故以乌头名方。细剖其义，耆、芍、甘草牵制麻黄之表散，白蜜牵制乌头以温经，无非欲使寒湿之邪，从关节徐徐而解耳。

【临证举例】 慢性关节炎 《成都中医学院学报》(1980；2:35)：治疗风湿性关节炎26例，类风湿性关节炎4例，其中属中医风痹7例、寒痹16例、湿痹5例、热痹2例，取得较好疗效。除1例类风湿性关节炎配合西药激素，余均不经选择地用乌头汤（制川乌60克、麻黄30克、白芍30克、黄耆30克、甘草30克）加味治疗。风痹，加羌活、独活、防风；寒痹，加附片、干姜、桂枝；湿痹，加苡仁、苍术、泽泻；热痹，加石膏、黄柏、生地。煎服，日一剂，六日为一疗程。观察1～2个疗程，痊愈（关节疼痛、肿胀、麻木诸症消失，屈伸自如，恢复正常劳动半年以上者）20例；显效（诸症消失，能参加正常劳动，但半年之内有复发倾向，仍需间断服药以巩固疗效者）7例；进步（关节疼痛、肿胀明显减轻，但恢复正常劳动仍有困难者）2例；无效（诸症无明显改善者）1例。其中痊愈、显效均为风湿性关节炎；进步、无效皆为类风湿性关节炎。

02589 乌头汤

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】 乌头（炮裂，去皮脐）二两 桂（去粗皮）一两 细辛（去苗叶）三分

【用法】 上药锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服。

【主治】 寒疝，手足逆冷，身体疼痛，冷汗自出。

02590 乌头汤

【方源】《得效》卷三。

【组成】 大乌头 细辛 川椒 甘草 秦艽 附子 官桂 白芍药各七分 川独活一两二钱半

【用法】 上锉散。每服三钱，水一盏半，大枣二个，同煎至八分，去滓，空心、食前服。

【主治】 寒冷湿痹，流于经络，挛缩不得转侧。

02591 乌头汤

【方源】《医统》卷九。

【组成】 草乌头 麻黄根 地骨皮 朴消各一两

【用法】 上为粗末，用水一桶、椒一合、葱三十根、艾叶一两同煎数十沸，用醋一钟和匀，坐密室中围壅，自用手巾搭四肢，候汤可浴，即浴令汗透，面上如珠出，或坐或卧片时，汗干方可着衣，避风五日再浴。如此三五次，每浴后更服换骨丹。

【主治】 大麻风癞，紫、白癜风。

02592 乌头散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】 川乌头一两（炮裂，去皮脐） 白术三分 赤芍药三分 麻黄（去根节） 桂心 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 当归（锉，微炒） 川椒（去目及闭口者，微炒去汗） 干姜（炮裂，锉）各半两

【用法】 上为粗散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓，不拘时候热服。衣覆取汗，如人行十里未有汗，再服。

【主治】 阴毒伤寒，四肢厥冷，脉候沉细，心腹胀满，腹中疠痛，咽喉不利，遍身疼痛。

02593 乌头散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 川乌头三分（去皮脐，生用）

【用法】 上为细散。以醋调涂于故帛上敷之。须臾痛止。

【主治】 风腰脚冷痹疼痛。

02594 乌头散

【方源】《苏沈良方》卷十。

【异名】 乌头煮散(《圣济总录》卷四十七)。

【组成】 乌头三两（炮，去皮） 川楝子一两半 槟榔 木香各一两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，煎至七分，盐一捻，温服。

【主治】 ①《苏沈良方》：翻胃。②《普济方》：年深膈气翻胃，常有痰涎，时时呕吐，胸中多酸水，吐清水无时，腹中痛楚，或时秘结，或时冷滑。

02595 乌头散

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】 乌头（炮裂，去皮脐） 地龙（炒） 羌活（去芦头） 虎骨（酒炙） 延胡索 当归（切，

焙） 没药（研） 防风（去叉）各一两

【用法】 上为散。每服二钱匕，空心、食前冷酒调下，一日二次。

【主治】 白虎风，走注疼痛。

02596 乌头煎

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 大乌头煎（《金匮》卷上）、大乌头汤（《三因》卷七）。

【组成】 乌头（大者）五枚（熬，去皮，不㕮咀）

【用法】 上以水三升，煮取一升，去滓，纳蜜二升，煎令水气尽，取二升。强人服七合，弱人服五合。不愈，明日更服，不可一日再服。

【主治】 腹痛，脉弦而紧，弦则卫气不行，即恶寒，紧则不欲食，邪正相搏，即为寒疝。寒疝绕脐痛苦，发则白津出，手足厥冷，其脉沉紧者。

【临证举例】 ①疝瘕 《金匮要略今释》引《建殊录》：一男子，年七十余。自壮年患疝瘕，十日、五日必一发；壬午秋大发，腰脚挛急，阴卵偏大，欲入腹，绞痛不可忍，先生诊之，作大乌头煎饮之（原注每帖重八钱），斯须，瞑眩气绝，又顷之，心腹鸣动，吐出水数升。即复故，尔后不复发。②腹痛 《新医药学杂志》（1978；12:16）：沈某，年50余岁，有多年宿恙，为阵发性腹痛。其症，腹痛频作，痛无定处，惟多在绕脐周围一带，喜温可按，痛甚以致汗大出。舌质淡，苔薄腻而滑，脉沉弦。诊系寒气内结，阳气不运，寒则凝泣，热则流通。寒者热之，是为正治。曾投理中汤，药力尚轻，若不胜病，非大乌头煎不可，故先小其量以消息之。乌头用4.5克，以药房蜜煎不便，盖蜜煎者缓其毒也。权以黑豆、甘草以代之。二剂后，腹痛未作，汗亦未出，知药症相符，乌头加至9克。病者月余痊愈出院。

【备考】 本方方名，《千金》引作“二物乌头煎”；《外台》引作“二物大乌头煎”。

02597 乌发丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 当归90克 黑芝麻90克 女贞子60克 旱莲草60克 桑椹子60克 侧柏叶60克

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸重9克。每日早、晚各服一丸，开水送下。

【功用】 凉血清热，滋肝益肾。

【主治】 青少年白发、斑秃。

【方论选录】 当归养血；黑芝麻滋肝肾、乌须发；女贞子、旱莲草、桑椹子、侧柏叶滋肾阴、清血热。用于青少年由于血热所致的白发、斑秃、舌质红绛之证。

02598 乌豆汤

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】 乌豆 黄连 甘草 密蒙花 大黄 朴消

【用法】 用顺取东流水煎服。

【主治】 拳毛倒睫。

02599 乌辛茶

【方源】《备急灸法》。

【组成】 川乌一只（生，去皮） 高丽细辛二钱 茶芽二钱

【用法】 上㕮咀，作三服。每服用水一大盏，加生姜十片，煎至七分，临发后连进。或呕痰即愈。

【主治】 头风。

02600 乌沉丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】 乌药一两 炙草一两 香附（醋炒）四两 沉香五钱

【用法】 上为末。每服二钱，食前淡盐汤送下。

【主治】 气逆攻疼，或便血不止。

02601 乌沉汤

【方源】《局方》卷三。

【组成】 天台乌一百两 沉香五十两 人参三两 甘草（煨）四两半

【用法】 上为末。每服半钱，加生姜二片，盐少许，空心、食前沸汤点服。

【功用】 和一切气，除一切冷，调中补五脏，益精壮阳道，暖腰膝，去邪气。

【主治】 吐泻转筋，癥癖疼痛，风水毒肿，冷风麻痹，中恶心腹痛，蛊毒，疰忤鬼气，宿食不消，天行瘴疫，膀胱、肾间冷气攻冲，背膂俯仰不利，及妇人血气攻击，心腹撮痛。

02602 乌灵丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】 乌头（削去皮脐）一两 五灵脂（炒）二两

【用法】 上为末，以井花水拌和为丸，如弹子大。每服一丸，分作四服，用温生姜、酒磨下。服后盖衣被出汗，隔一日再服，稍愈即止。

【主治】 ①《圣济总录》：瘫痪风。②《卫生宝鉴》：久患风虚麻痛，行步艰难。

【宜忌】《普济方》：忌一切冷物。

02603 乌附膏

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】 绵川乌（生用） 绵附子（生用）各五钱 雄黄二钱

【用法】 上为末，用生葱和根、叶细切烂杵，入药末同煎，作成膏。贴陷处。

【功用】《金鉴》：温中理脾。

【主治】 小儿囟门下陷。

02604 乌鸡丸

【方源】《女科万金方》。

【组成】 柴胡 黄连 人参各二两 黄耆三两 门冬 当归 白芍 地骨 香附（童便炒） 茯苓 秦艽 陈皮 贝母 黄柏（酒炒） 知母 黄芩 五味子各二两 乌鸡一只

【用法】 将鸡去毛、肚杂、头、足，切碎，和药入瓶，并好醋三碗，煮酒四碗，炭火煨干，晒干为末，醋糊为丸。每服一百丸，淡醋汤下。

【主治】 妇人经事不调，日渐潮热，咳嗽有痰。

02605 乌鸡丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】 人参 黄耆 白术 生地黄 当归 白芍药 秦艽 陈皮 软柴胡 银柴胡 前胡 胡黄连 黄芩 地骨皮 麦门冬 贝母 桑白皮 五味子 黄柏 知母各一两

【用法】 上锉细片；用乌骨白鸡（耳有绿色、脑有金色者更佳）重一斤者，麻子喂七日，以索缢杀，去毛并内杂，纳药，用绿豆一斗五升，浸湿，铺入小甑内，三寸厚，又将青蒿衬之，放鸡在上，仍以绿豆盖之，蒸烂熟，将鸡拆碎，同药晒干，磨细，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心米汤送下。

【主治】 童子、室女身发热，吐血痰出，盗汗，少饮食，四肢无力；大人亦治。

02606 乌鸡丸

【方源】《丹溪心法附余》卷二十一。

【异名】 大乌鸡丸（《医学入门》卷八）。

【组成】 白毛乌骨公鸡一只（重二斤半许，闭死，去毛、肠，净洗，用艾四两、青蒿四两锉碎，纳一半在鸡腹内，用酒坛一只，纳鸡并余艾、蒿子内，童便和水灌之，令没鸡二寸许，煮绝干，取出去骨，余俱捣烂如薄饼状，焙干，研为细末） 南香附（去毛净）一斤（分作四份，米泔水、童便、醋、酒各浸一份，春秋二日、夏一日、冬四日，取出晒干） 熟地黄四两 生地黄三两（怀庆者，勿犯铁） 当归（酒浸，洗）三两 川芎三两半 白芍三两 辽人参三两 白术二两 黄耆二两 川牛膝（去芦）二两 柴胡（去芦）二两 黄连（炒）一两 牡丹皮（去心）二两 白茯苓（去皮）二两半 秦艽一两半 鳖甲三两（醋浸，炙黄色） 知母二两 贝母二两 地骨皮一两 干姜一两 延胡索一两

【用法】 上并香附，共为细末，并鸡末、酒、醋糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，渐加至七八十丸，温酒或米饮送下。

【主治】 妇人瘦弱，血虚有热，经水不调，崩漏带下，骨蒸等疾，不能成胎。

【宜忌】 忌煎炒、辛辣之物及苋菜。

02607 乌鸡丸

【方源】《景岳全书》卷六十一引《唐氏经验方》。

【组成】 人参 怀生地 怀熟地 青蒿子（去梗） 香附（四制） 鳖甲各三两 白术 枣仁肉 枸杞 麦冬 云苓 地骨皮（去骨） 丹皮（去骨） 白芍各二两 归身二两半 川芎 甘草各一两

【用法】 上先将诸药备完听用；乃取丝毛乌骨白公鸡一只（约重一斤许者）扑倒，去毛、秽、头、足、肠杂不用，将鸡切作四块；先以鳖甲铺铜锅底，次入杂药，以免焦腐，渐加童便约斗许，煮至极烂，捞起晒干，为末，将鳖甲去裙，并鸡骨俱以原汁蘸炙至干，为末，同前药炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百余丸，空心用清汤送下。

【功用】 种子。

【主治】 妇人羸弱，血虚有热，经水不调，崩漏带下，骨蒸不能成胎。

02608 乌鸡丸

【方源】《景岳全书》卷六十一。

【组成】 熟地 当归 白术 山药 山茱萸 枣肉 柿饼 莲肉各四两 黄耆（蜜炙）三两 鹿角胶 狗脊 杜仲 枸杞 莲须 香附 阿胶 川芎各二两 乌药一两半

【用法】 上药制净，用乌骨鸡一只闷杀之，干去毛、杂，连骨捶碎，同酒、醋各半，同药煮熟，去骨，烘干，共为末，即将余汁少入面打糊为丸。任意用引送下。

【功用】 种子。

【主治】 妇人羸弱，血虚有热，经水不调，崩漏带下，骨蒸不能成胎。

02609 乌鸡丸

【方源】《类证治裁》卷八。

【组成】 乌骨鸡一只（男用雌，女用雄，去皮去秽，留内金，洗肠留肠） 北五味一两 熟地四两 黄耆 于术各三两 茯苓 归身 白芍各二两 人

参三两　丹皮二两　川芎一两　山药末六两

【用法】 将北五味、熟地二味入鸡腹，用陈酒、童便于砂锅中煮，又以黄耆、於术、茯苓、归身、白芍预为末，同鸡肉捣烂焙干，骨用酥炙；研入人参、丹皮、川芎，和前药，以山药末糊丸，如梧桐子大。每服三钱，入参汤送下。

【功用】 调经。

【主治】 ①《类证治裁》：月经不调，薄劳，带下，崩淋。②《全国中药成药处方集》（广州方）：妇女久病体弱，月经不调，经前经后腹痛，产后贫血，头晕目眩。

【加减】 骨蒸，加鳖甲、柴胡、地骨；经闭，加肉桂；崩漏，加阿胶；倒经，加麦冬；痞闷，加香附、沉香；带下，加草薢、香附、蕲艾。

02610　乌鸡煎

【方源】 《三因》卷十八。

【异名】 乌鸡煎丸（《妇人良方》卷二）、小乌鸡煎丸（《得效》卷十五）、小乌鸡丸（《医学入门》卷八）。

【组成】 吴茱萸（醋煮）　良姜　白姜（炮）　当归　赤芍药　延胡索（炒）　破故纸（炒）　川椒（炒）　生干地黄　刘寄奴　蓬莪术　橘皮　青皮　川芎各一两　荷叶灰四两　白熟艾（用糯米饮调饼）二两

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸。月经不通，红花、苏木酒送下；白带，牡蛎粉调酒送下；子宫久冷，白茯苓煎汤送下；赤带，建茶清送下；血崩，豆淋酒调绵灰送下；胎不安，蜜和酒送下；肠风，陈米饮调百草霜送下；心疼，菖蒲煎酒送下；漏阻下血，乌梅温酒送下；耳聋，蜡点茶汤送下；胎死不动，斑蝥二十个煎酒送下；腰脚痛，当归酒送下；胞衣不下，芸薹研水送下；头风，薄荷点茶送下；血风眼，黑豆、甘草汤送下；生疮，地黄汤送下；身体疼痛，黄耆末调酒送下；四肢浮肿，麝香汤送下；咳嗽喘痛，杏仁、桑白皮汤送下；腹痛，芍药调酒送下；产前后痢白者，白姜汤送下；赤者，甘草汤送下，杂者，二宜汤送下；常服，温酒、醋汤任下，并空心、食前服。

【主治】 月经不通，赤白带下，血崩；子宫久冷，胎动不安，漏阻下血，胎死不动，胞衣不下；产前产后下痢赤白，头风，身体疼痛，心腹痛，肠风，四肢浮肿，咳嗽喘痛，血风眼，耳聋，生疮。

02611　乌金丸

【方源】 《成方便读》卷二。

【组成】 香附四两（童便一盏，牛膝一两五钱同炒，去牛膝）　官桂　五灵脂　延胡　当归（醋炒）　桃仁（去皮尖）　乌药各一两　莪术一两　乳香（去油）　没药（去油）　木香各五钱　黑豆一升（煮汁）　红花　苏木各二两　酒五碗

【用法】 将红花、苏木煎四碗，去滓，并豆汁熬成膏，和蜜为丸，每丸重二钱，蜡壳为衣。

【主治】 妇人气滞血结，癥瘕瘀痛，经闭。

【方论选录】 夫妇人血闭之证，皆由气滞不行所致，故方中仍以香附为君，佐之以木香，通行表里上下一切诸气。而再以大队行血破瘀之药继之，自能荡涤无余，不留纤翳。然既结而成积，非汤剂可能速除，故用丸以缓之耳。

02612　乌金散

【方源】 《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。

【组成】 麒麟竭　百草霜　乱发（男子者，烧灰）　松墨（煅，醋淬）　鲤鱼鳞（烧，为末）　延胡索　当归（去芦）　肉桂（去粗皮）　赤芍药各等分

【用法】 上为末。每服二钱，温酒调下。

【主治】 产后血迷、血晕，败血不止，淋沥不断，脐腹疼痛，头目昏眩，无力多汗；及崩中下血，过多不止。

【方论选录】 《济阴纲目》：诸症皆以败血不止来。此方之妙，不在止而在行，行则归经而止矣。治崩者，要得此旨。

【备考】 本方改为丸剂，名“乌金丸”（见《奇方类编》）。

02613　乌金散

【方源】 《张氏医通》卷十五。

【组成】 生姜半斤（捣取自然汁，留滓待用）　生地黄一斤（酒浸一宿，捣汁，留滓待用）　大皂荚（不蛀者）十挺（刮去黑皮，将前二汁和蘸皂荚，文火炙干，再蘸再炙，汁尽为度）

【用法】 上将皂荚同地黄滓，入瓷罐内，煅存性，为末。牙齿初摇，用药擦龈。须发黄赤，以铁器盛药末三钱，汤调，过三日，将药汁蘸擦须发，临卧时用之，次早即黑，三夜一次。其黑如漆，不伤须发。

【功用】 牢牙乌发。

【主治】 牙齿动摇，须发黄赤。

02614　乌金散

【方源】 《女科指掌》卷四。

【组成】 香附（醋炒）　当归　五灵脂　地榆（醋炒）　荆芥穗

【用法】 俱炒黑，为末，每服二钱，米汤调下。

【主治】 血崩不止。

02615 乌金散

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】 当归五钱 百草霜 干面各一两 天麻 木香各二钱半 金墨（煅）二钱

【功用】《全国中药成药处方集》（吉林方）：祛瘀生新，清热止血。

【主治】 ①《妇科玉尺》：产后败血不止，淋沥不断。②《全国中药成药处方集》（吉林方）：产后胎衣不下，晕眩欲绝，恶露不尽，肚腹疼痛，血迷心窍；或产后伤血过多，淋沥不断，势将虚脱，眩晕不醒；并治血热妄行，溢出常络，吐血衄血，或崩或漏。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（吉林方）：忌辛辣等物。

02616 乌荆丸

【方源】《苏沈良方》卷二。

【组成】 川乌一两（炮，去皮） 荆芥穗二两

【用法】 上以醋糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒或熟水送下，有疾，食空时，一日三四服；无疾，早晨一服。

【主治】 ①《苏沈良方》：病风挛抽，颐颔宽弛不收；肠风下血。②《局方》（绍兴续添方）：诸风缓纵，手足不随，口眼㖞斜，言语謇涩，眉目瞤动，头昏脑闷，筋脉拘挛，不得屈伸，遍身麻痹，百节疼痛，皮肤瘙痒，搔成疮疡。又治妇人血风，浑身痛痒，头疼眼晕；及肠风脏毒，下血不止。

【临证举例】 颐颔宽弛不收 少府郭监丞，少病风挛搐，颐颔宽弛不收，手承颔，然后能食，服此六七服即瘥，遂长服之，已五十余年。年七十余，强健，须发无白者。

02617 乌茜汤

【方源】《中医杂志》（1982；6:28）。

【组成】 煅乌贼骨 茜草炭 地榆炭 椿木各15克 蒲黄炭（包）10克 槐米炭 荠菜 马齿苋各50克 生甘草5克

【用法】 每日服一剂。出血量多时，每日二剂。

【主治】 崩漏。

【加减】 气虚者加党参、黄耆各12克；血热者，加生地黄炭20克；血瘀者，加煅花蕊石20克。

【方论选录】 乌贼骨入肝、肾经，有止血、收敛作用；茜草入肾经，炒炭有活血化瘀作用。张锡纯氏认为经血过多，该两药能固涩下焦，为治崩主药，佐以蒲黄、槐米、椿木、地榆、有凉血消瘀之效。据现代医学研究，马齿苋、椿木、荠菜具有加强子宫收缩作用，可增强对崩漏的止血效果。

【临证举例】 崩漏 应用本方治疗子宫出血140例，均已婚，年龄25～68岁，40岁以上共110例，占78.5%。中医辨证分气虚、血热和血瘀型；西医诊断为功能性子宫出血者115例，其它25例为器质性病变，包括子宫肌瘤、子宫内膜息肉、慢性子宫内膜炎、慢性子宫肌炎和子宫内膜腺癌。应用本方治疗，显效（服1～3天，出血停止者）64例；有效（服4～6天，出血停止者）53例，无效（服7天以上仍未止血）23例，总有效率83.6%。

02618 乌药散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 天台乌药 香附子（破，用白者） 高良姜 赤芍药各等分

【用法】 上为末。每服一钱，水一盏同煎六分，温服；如心腹疼痛，入酒煎；水泻，米饮调下，不拘时候。

【功用】《卫生总微》：调和乳汁。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：乳母冷热不和，及心腹时痛，或水泻，或乳不好。②《卫生总微》：乳母冷热不调，败坏乳汁，因以饲儿，致儿心腹疼痛，或时下利。但令乳母服药，调和乳汁哺儿。

02619 乌须丸

【方源】《医学入门》卷五。

【组成】 胎发 青盐各四两（共入罐内封固，火煅三炷香久，冷定取出为末） 何首乌 冬青子（九蒸九晒） 旱莲草 枸杞子 生地 当归 白茯苓各四两 人参一两

【用法】 以水十碗，煮汁五碗，去滓熬膏，将前二味入内搅匀，分作几小罐盛之。每服三五茶匙，空心滚水酒调下。

【功用】《医部全录》：乌须黑发。

【主治】 因下血多而须发易白者。

02620 乌姜散

【方源】 方出《证类本草》卷十引《孙兆口诀》，名见《仙拈集》卷一。

【组成】 川乌头 干姜各等分

【用法】 上为粗散，炒令转色，放冷，再捣为细散。每服一钱，水一盏，盐一撮，煎取半盏，温服。

【主治】 阴毒伤寒，手足逆冷，脉息沉细，头疼腰重；兼治阴毒咳逆。

02621 乌桂汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】 川乌 蜂蜜 肉桂 白芍药 炙甘草 生姜 大枣

【主治】 疝由外寒入腹者。

02622 乌梅丸

【方源】《伤寒论》。

【异名】 乌梅丹(《普济方》卷三九九引《医方妙选》)、乌梅安胃丸(《饲鹤亭集方》)、杀虫乌梅丸(《全国中药成药处方集》兰州方)、安胃丸(《全国中药成药处方集》杭州方)。

【组成】 乌梅三百枚 细辛六两 干姜十两 黄连十六两 当归四两 附子六两(炮,去皮) 蜀椒(出汗)四两 桂枝(去皮)六两 人参六两 黄柏六两

【用法】 上药各为末,合治之,以苦酒渍乌梅一宿,去核,蒸之五斗米下,饭熟,捣成泥,和药令相得,纳臼中,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食前以饮送下,一日三次。稍加至二十丸。

【功用】《医方集解》:温脏安蛔。

【主治】 蛔厥,脘腹阵痛,烦闷呕吐,时发时止,得食则吐,甚则吐蛔,手足厥冷,或久痢不止,胃腑发咳。现用于胆道蛔虫病。

①《伤寒论》:蛔厥者,其人当吐蛔,今病者静而复时烦者,此为脏寒,蛔上人其膈,故烦,须臾复止,得食而呕,又烦者,蛔闻食臭出,其人常自吐蛔。又主久痢。②《圣济总录》:产后冷热痢,久下不止。③《玉机微义》:胃腑发咳,咳而呕,呕甚则长虫出。④《寿世保元》:胃冷,蛔虫上攻,心痛呕吐,四肢冷。⑤《谦斋医学讲稿》:肝脏正气虚弱而寒热错杂之证,久病腹痛、呕吐、下痢、蛔厥。

【宜忌】 ①《伤寒论》:禁生冷、滑物、臭食等。②《谦斋医学讲稿》:性质毕竟偏温,以寒重者为宜。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》:肺欲收,急食酸以收之,乌梅之酸以收肺气;脾欲缓,急食甘以缓之,人参之甘以缓脾气;寒淫於内,以辛润之,当归、桂、椒、细辛之辛以润内寒;寒淫所胜,平以辛热,姜、附之辛热以胜寒;蛔得甘则动,得苦则安,黄连、黄柏之苦以安蛔。②《内台方议》:蛔为阴虫,故知阳微而阴胜,故用乌梅为君,其味酸,能胜蛔;以川椒、细辛为臣,辛以杀虫;以干姜、桂枝、附子为佐,以胜寒气而温其中;以黄连、黄柏之苦以安蛔,以人参、当归之甘而补缓其中,各为使。③《古今名医方论》引柯韵伯:吐蛔,仲景立方皆以辛甘苦味为君,不用酸收之品,而此用之者,以厥阴主风木耳!君乌梅之大酸,是伏其所主也;配黄连泻心而除疼,佐黄柏滋肾以除渴,先其所因也;肾者,肝之母,椒、附以温肾,则火有所归,而肝得所养,是固其本;肝欲散,细辛、干姜辛以散之;肝藏血,桂枝、当归引血归经也;寒热杂用,则气味不和,佐以人参调其中气;以苦酒渍乌梅,同气相求,蒸之米下,资其谷气,加蜜为丸,少与而渐加之,缓则治其本也。故药亦寒热互用,且胸中烦而吐蛔,则连、柏是寒因热用也。蛔得酸则静,得辛则伏,得苦则下,信为化虫佳剂。久痢则虚,调其寒热,酸以收之,下利自止。

【临证举例】 ①蛔厥 《重庆医药》(1980;1:22):龙某某,女,22岁。1961年9月诊治。突发胃脘偏右疼痛四日,呈阵发性,发时痛如刀绞,如顶如钻,坐卧不安,展转躁烦,恶心不止,呕吐苦汁,汗出身冷,四肢厥逆,畏寒发热,白睛微黄,病后在某医院检查:T38.7℃,P100次/分,BP110/80mmHg,血:白细胞13000/mm^3,中性84%,淋巴16%,剑突下偏右压痛,无明显肌紧张及反跳痛,肠鸣音亢进。诊为"胆道蛔虫病"。门诊观察三日,迭经解痉、镇静、利胆、输液,抗感染等治疗,罔效。余诊其脉弦数,舌尖红,苔黄滑。诊为"蛔厥"。拟乌梅丸作汤剂:乌梅15克,黄连9克,黄芩12克(因黄柏缺代之),炒川椒9克,细辛3克,桂枝9克,干姜9克,制附片12克(先熬一小时),南沙参12克,当归9克。二帖尽剂,诸症消失。继以乌梅丸3克,日二次。越五日,体力恢复,劳动如常。②胆道蛔虫病 《福建中医药》(1958;3:9~11):用本方治疗胆道蛔虫病3例。用法为每日3次,第1次9克,然后每次3克。药后第1日症状即减轻,3~4日后症状基本消失。③久痢 《河南中医》(1984;5:32):张某某,男,38岁,已婚。主诉:腹痛,少腹下坠,大便带白色粘冻,八年余。反复发作,久治不愈,每当发病时,腹部下坠有便意,轻微里急后重,大便日行6至8次,粪便色白如涕,不带血,有腥臭味,服西药痢特灵等效果不佳,又多次服中药芩、柏、连和参苓白术散等亦不见显效,病时轻时重。1975年6月来本院就诊时,面色苍白少华,体倦泛力,形体消瘦,口苦口粘,但饮食如常,脉缓滑无力,舌质红,苔薄白稍腻。余深思,患者罹病日久,收涩止痢,健脾止泻等法,前医用之罔效,不宜重蹈覆辙,古人有训:"初痢则泻,久痢则补"、"久病多虚,新病多实"。本证当属寒热错杂,正气

虚急之证。余将乌梅丸变汤剂加减治之，药物：乌梅30克，细辛3克，桂枝9克，党参30克，附子9克，川椒6克，黄柏12克，当归9克，米壳6克，黄连9克，诃子肉15克，炒扁豆30克，干姜炭12克，煅龙牡各30克。水煎服。六剂服后，腹痛下坠除，大便日行减至2至3次，粪便中粘冻物大减，有阳气鼓舞回升之象，按原方续进十剂，第三次来诊，大便粘液止，日行一次，粪便色黄成形。以参苓白术散加减以巩固疗效，随访至今未发。④厥阴消渴证 《四川中医》（1985；2:11）：蒋某，女，51岁。1954年8月5日诊。自述七日前因露天乘凉后即感头痛发热恶寒。经治疗头痛发热已解。近两日来口渴引饮，日进四五壶（每壶约盛8磅）水，亦不解渴。前医用益胃汤罔效，昨日又服人参白虎汤，反渴甚。症见脉细弱，小便清长，四肢厥冷，渴饮不解，三日前，曾吐蛔虫一条。辨证：此吐蛔之后消渴，乃厥阴病上热下寒证也。上热则消渴，下寒则溺清。老年体弱，阳不温煦则脉细弱，肢冷，故断为厥阴消渴证。用乌梅丸全方一帖，水煎服。翌日复诊，口渴大减，但肢冷仍存，守方重用参、附，益气温阳，两剂而愈。

【现代研究】 治疗胆道蛔虫病的作用机制 《福建中医药》（1960；6:29）：实验研究得出如下结论：1. 乌梅丸有麻醉蛔虫的性能，达到了抑制蛔虫蠕动的作用；2. 乌梅丸能作用于肝脏，促进肝脏分泌胆汁量增加；3. 乌梅丸由胆汁排泄，改变胆汁的酸碱度；4. 服乌梅丸后能使Odd氏括约肌弛缓扩张。因此，初步推测乌梅丸作用机制有二：一是服乌梅丸后使蛔虫麻醉，失却固有附着肠壁的能力。由于胆汁分泌增加，冲击这些没有活动性的蛔虫，而退回十二指肠；二是由于服乌梅丸后，改变了胆汁的酸碱度，使胆汁逐渐趋于酸性，蛔虫本来有恶酸好碱的特性，此种改变，使胆道成为不利于蛔虫生存的环境，蛔虫能通过弛缓扩大的Odd氏括约肌退回十二指肠，而使胆道蛔虫病治愈。

02623 乌梅丸

【方源】《医心方》卷十一引《范汪方》。

【组成】 干姜 黄连 黄柏（炙） 黄芩 艾各一两 乌梅二十枚（取肉）

【用法】 上为末，丸如梧桐子大。每服十丸，一日三次。老少减半。

【主治】 各种下痢。

02624 乌梅丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【异名】 梅连丸（《医方类聚》卷一三八引《御医撮要》）。

【组成】 乌梅肉二两（微炒） 黄连二两（去须，微炒） 艾叶二两（微炒） 黄柏一两（锉，微炒） 干姜二两（炮裂，锉） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】 痢下脓血，食不消化。

02625 乌梅丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】 乌梅肉（炒）一两 猪肝一大叶（以醋煮令烂，研如糊） 草豆蔻（去皮） 厚朴（去粗皮、生姜汁炙）各一两 甘草（炙，锉）一分 当归（切，焙） 干姜（炮） 荜茇 肉豆蔻（去壳） 诃黎勒皮（炒）各三分 桂（去粗皮）半两

【用法】 上十一味，捣罗十味为末，用猪肝煎为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下；陈曲汤亦得。

【主治】 气痢不愈，疲劣，变成冷劳痢。

02626 乌梅丸

【方源】《医方类聚》卷八十五引《济生续方》。

【组成】 乌梅三两（烧存性）

【用法】 上为细末，好醋打米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前用米饮送下。

【主治】 大便下血不止。

02627 乌梅汤

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】 乌梅三枚（酒浸） 黄连一钱二分 干姜一钱 犀角二钱 木香八分 雄黄一钱五分 人参二钱 桃仁泥八分

【用法】 水煎，顿服。

【主治】 唇疮。虫食肛，上唇生疮，声必哑；虫食脏，下唇生疮，咽必干。皆因腹内生热而食少者，肠胃空虚，三虫求食之故。

02628 乌梅散

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】 乌梅肉（焙） 樗根皮（炙，锉） 赤石脂 当归（切，焙） 地榆（炙）各半两 黄连（去须，炒） 干姜（炮）各三分 甘草（炙）一分

【用法】 上为散。每服二钱匕，空心、食前以温米饮调下。

【主治】 赤白痢，久不止，腹中疞痛，及下血脱肛。

02629 乌梅粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】 乌梅（捶碎）七个 粟米（淘净）不拘

多少

【用法】 以水八合，浸一宿，去乌梅，取汁煮粥。每日空腹顿食之。

【主治】 肠风下血，烦渴。

02630 乌梅膏

【方源】《中医外科临证手册》。

【组成】 乌梅一两 食糖三钱

【用法】 先将糖溶于15毫升水中，再入乌梅，浸二十四小时，取出，加醋15毫升研和。敷患处。

【功用】 腐蚀鸡眼。

【主治】 鸡眼、胼胝。

02631 乌黄散

【方源】《普济方》卷三〇〇引《直指》。

【组成】 乌贼骨 蒲黄各等分

【用法】 上为末。敷舌上。

【主治】 卒肿舌疮。

02632 乌蛇丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 乌蛇二两（酒浸，去皮骨，炙令微黄） 防风一两（去芦头） 细辛一两 白花蛇二两（酒浸，去皮骨，炙令微黄） 天麻一两 独活一两 肉桂一两（去皱皮） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 苦参一两（锉）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下。

【主治】 身体顽麻风。

02633 乌蛇丸

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 乌蛇尾（酒浸，去皮，焙干，和骨用） 天南星（炮） 天麻 羌活（去芦头） 独活（去芦头） 白附子（炮） 白僵蚕（炒） 乌头（炮裂，去皮脐） 乳香（研）各一两 丹砂（研）半两 龙脑（研） 麝香（研） 牛黄（研）各一分

【用法】 上十三味，八味各捣罗为细末，五味各研，先将乌蛇、丹砂研末，与蜜同熬成膏，和诸药为丸，如梧桐子大。每服七丸至十丸，薄荷酒送下，一日三次。

【主治】 体有偏虚，风客半体，不自收持，痹麻痹痛

02634 乌蛇丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】 独活（去芦头） 防风（去芦头） 吴白芷 人参（去芦头） 桂心 藁本（去土） 麻黄（去根节） 芍药 天麻（去芦头）各一两 川乌头（去皮脐，捣碎，炒黄色） 藿香叶（去土） 乌蛇（酒浸，去皮骨） 全蝎（微炒去毒） 甘草（炙黄） 生犀（镑）各半两 川芎七钱 羌活（去芦头） 白僵蚕（微炒） 远志（去心） 牛黄（研） 天南星（牛胆制，微炒）各三钱 白附子四钱（炮裂） 龙脑（研） 朱砂（为衣）各二钱

【用法】 上为细末，入研药令匀，炼蜜为丸，每一两作十丸，以朱砂为衣。每服一丸，煎荆芥汤化下。或加至二丸，茶、酒化下亦得。

【主治】 诸风疾，无问久新，半身不遂，手足麻木，精神不爽，咽嗌不利，及风虚头痛，目眩欲倒，心忪健忘，恍惚不宁，心气不得下通，脾气滞而不散，筋脉拘急，骨节烦疼。

【宜忌】 重身妇人不宜服之。

02635 乌蛇散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】 乌蛇二两（酒浸，去皮骨，炙令微黄） 赤箭一两 羌活一两 防风一两（去芦头） 桂心一两 海桐皮一两 藁本一两 草薢一两（锉） 独活一两 当归一两 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 麻黄一两（去根节） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 干姜一两（炮裂，锉） 牛蒡根一两（干者，刮去皮）

【用法】 上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 中风偏枯，手足不遂，筋骨疼痛。

【宜忌】 忌生冷、油腻、鸡、猪、犬肉。

02636 乌蛇散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】 乌蛇三两（酒浸，去皮骨，炙微黄） 白僵蚕二两（微炒） 桂心半两 独活二两 天麻一两 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 细辛半两 防风半两（去芦头） 胡麻子二两 枳实半两（麸炒微黄） 蝉壳半两 白附子半两（炮裂） 天南星一分（炮裂）

【用法】 上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 身体顽麻，及生白癜风。

02637 乌蛇散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】 乌蛇三两（酒浸，去皮骨，炙令微黄） 秦艽一两（去苗） 芎藭二两 桂心一两 防风一两（去芦头） 人参一两（去芦头） 栀子仁一两 白鲜皮一两 丹参一两 沙参一两（去芦头） 玄参一两 苦参二两（锉） 川升麻一两 犀角屑一两 通草一两（锉） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）

黄芩一两 白蒺藜一两（炒微黄，去刺） 羌活二两

【用法】 上为细散。每服二钱，食后良久以温酒调下。

【主治】 病疡风，斑驳如白癜。

【宜忌】 忌鸡、猪、鱼、蒜、热面等。

02638 乌蛇散

【方源】 方出《圣惠》卷二十四，名见《圣济总录》卷十八。

【组成】 乌蛇一条（酒浸，去皮骨，炙微黄）

【用法】 上为细散，每服二钱，以热豆淋酒调下，一日三次。

【主治】 病疡风，状似白癜。

02639 乌蛇散

【方源】 《幼幼新书》卷十二引张涣方。

【组成】 乌蛇梢（生）一两 白附子 半夏各一分 天麻 僵蚕 人参 全蝎 羌活 石菖蒲各半两 川附子一枚重半两（炮，去皮脐）

【用法】 上为粗末。每服二钱，水二盏，加生姜十片，薄荷五叶，煎一盏，滤去滓，放温，时时滴口中。

【主治】 风痫，角弓反张，潮搐，及心肺中风。

02640 乌蛇散

【方源】 《卫生总微》卷五。

【组成】 乌蛇肉（酒浸，去皮骨）三钱 赤足蜈蚣二条（去头足，醋浸，炙黄） 全蝎二钱（去毒） 天麻半两 白茯苓半两 黑附子半两（炮裂，去皮脐） 麝香少许 白附子一分（炮）

【用法】 上为细末。每服半钱，用旧断井索煎汤调下，不拘时候，如急用无断井索，煎荆芥汤代之。

【主治】 小儿急慢惊风，搐如弓者。

02641 乌蛇散

【方源】 《医学入门》卷八。

【组成】 乌蛇六钱 麻黄一两 草乌（炮） 干姜 附子（炮） 川芎 白附子 天麻各五钱 蝎梢二钱半

【用法】 上为末。每服一钱，热酒调下，一日三次。

【主治】 破伤风，及洗头风。

02642 乌银丸

【方源】 《御药院方》卷六。

【异名】 巨胜丸、补漏丸。

【组成】 巨胜子（炒）二两（别研） 牛膝（去芦头） 覆盆子 茄澄茄（去枝） 肉桂（去粗皮） 白茯苓（去皮） 吴白芷 甘菊花（拣净） 远志（去心苗） 熟干地黄（焙） 旋覆花 旱莲草（去枝）各一两

【用法】 上除巨胜子外，同为细末，再与巨胜子拌匀，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至六十丸，食前温酒送下。服至七日，觉阳气坚壮是验。

【功用】 久服滋血气，壮元阳，髭发返黑，令人不老，添精补髓，益寿延年。

【主治】 男子筋痿，少腹不利，小便频数，腰背疼闷，不能久立，久立则腿膝麻冷，难以屈伸，心意多忘，耳内蝉鸣。

02643 乌犀丸

【方源】 《局方》卷一。

【异名】 反魂丹（原书卷十）。

【组成】 白术（米泔浸一宿，切，焙干微炒） 白芷 干姜（炮） 枳壳（去瓤，麸炒） 天竺黄（细研） 虎骨（酒、醋涂，炙令黄） 厚朴（去粗皮，姜汁涂，炙令熟） 何首乌（米泔浸一宿，煮过，切，焙） 败龟（酒、醋涂，炙令黄） 桑螵蛸（微炒） 缩砂仁 蔓荆子（去白皮） 丁香 晚蚕蛾（微炒）各三分 草蔻（微炙） 细辛（去苗） 藁本（去土） 槐胶 阿胶（杵碎，炒） 陈皮（去白，微炒） 天南星（浸洗，生姜自然汁煮软，切，焙干炒黄） 羌活（去芦） 麝香（别研） 天麻（酒洗，切，焙） 半夏（汤洗七次，姜汁浸三日，炒） 茯苓（去皮） 独活（去苗） 人参（去芦） 羚羊角（镑） 藿香叶（去土） 槟榔 川乌（烧令通赤，留烟少许，入坑内，以盏复，新土围，食顷出） 肉桂（去粗皮） 沉香 麻黄（去根节） 白僵蚕（去丝嘴，微炒） 白附子（炮） 干蝎（微炙） 防风（去芦） 白花蛇（酒浸一宿，炙熟用肉） 乌蛇（酒浸一宿，炙，去皮骨，令熟，用肉） 木香各一两 石斛（去根） 水银蝉壳（去土，微炒） 川芎 肉豆蔻（去壳，微炮） 硫黄（末，用瓷盏盛，慢火养成汁，入前水银，急炒如青泥，细研） 附子（水浸后炮，去皮脐） 龙脑（别研） 朱砂（研飞） 雄黄（研飞） 牛黄（别研）各半两 狐肝三具（腊月采取，同乌鸦一只，入新瓦罐内，以瓦盆子盖头，用泥固济，用炭火一秤，烧令通赤，待烟尽取出，候冷，研令极细用） 乌鸦一只（腊月采取，去嘴翅足） 腻粉（别研）一分 当归（去芦，酒浸，焙，炒） 乌犀（镑）各二两

【用法】 上药并须如法修事，为细末，炼白蜜合和，入酥，再捣为丸，如梧桐子大。常服一丸，薄荷汤或茶嚼下，不拘时候。丈夫、妇人卒中诸风，

牙关紧急，膈上多痰，或语言謇涩，口眼㖞斜，用薄荷汁与酒各少许，化三丸服之，良久再服。

【主治】 丈夫、妇人卒中诸风，牙关紧急，膈上多痰，或语言謇涩，口眼㖞斜，瘫痪，暗风痫病，手足潮搐，心神不安，遍身烦麻；肠风痔瘘；肾脏风毒，上攻下注；妇人血风，头旋吐逆，皮肤肿痒，遍身疼痛；小儿诸风癫痫，潮发瘛疭，口眼相引，项背强直，牙关紧急，目睛上视；及诸病久虚，变生虚风，多睡昏困，往往不解。

02644 乌犀膏

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】 威灵仙十斤（拣紫色条子用） 真天麻（取细末）二两 生犀（取末）一两 黑附子（须是拣存生正者，去皮脐，取末）二两 龙脑（生者，另研） 一两

【用法】 先将灵仙同河水一石煮至三斗，以生绢滤去滓，只取清汁，更入醇酒一斗，同以银石器内煮至一斗，更清澄去细尘滓，次入天麻、附子末在药汁中，再以文火熬成膏，放令温冷后，入生犀、龙脑一处同搅匀，用瓷盒子内盛之。每服一钱匕，用薄荷汤化下；烦躁者，薄荷自然汁化下。

【主治】 中风手足不随，偏枯瘫痪，脚气攻注，头面浮肿，口眼㖞斜，语涩痰涎，精神恍惚，大便风秘。

02645 乌蝎丸

【方源】《得效》卷十三。

【组成】 乳香 没药（另研） 地龙（去土） 全蝎（去足翅） 草乌各五钱 乌药（炒） 麝香各一两 蜈蚣一条（去足，炒） 川乌二只（生用，去皮尖）

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服七丸至十丸、十五丸，用麝香少许，空心好小酒送下。服至七日略利，至半月或满身发风丹，经月方没，多服其病全安。后常用生川乌、没药浸酒，一日二次，通气驱风汤加乳香、没药、生川乌、麝香少许，酒调服；不饮，木瓜汤送下。

【主治】 手足拳挛，痛不可忍者。

【宜忌】 忌热食一时。

【临证举例】 痹证 《医方类聚》：《良方》云，古安城内李秀才妻，年六十五岁，子辛亥年忽患手足不能屈伸，人以为历节风，壬子年二月，得永新州龙起宗出此方，合一料，服至七日，略溏利；至半月，风丹先从臂片上起，至遍身，七日方没，又服药至四分之一，其病全安，手足可行，至今无恙。

02646 乌头煎丸

【方源】《普济方》卷二二一引《博济》。

【组成】 川乌头一斤（以大豆煮二伏时，以竹刀切作片子，焙干，去大豆不用，杵为末，青盐四两化用成水，相和淋成片，熬成膏，次入下项药） 沉香一两半 破故纸一两 虎骨一两（醋炙） 大麻一两 牛膝一两（炙） 海桐皮一两 肉豆蔻四枚（去壳） 木香半两 羌活 巴戟二两（炒令黄）

【用法】 上为末，入膏为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【功用】 补元脏虚冷，驻颜益气。

【主治】 腰膝无力，行步难，吃食少，筋骨拘急疼痛。

02647 乌鸡煎丸

【方源】《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。

【异名】 大乌鸡丸（《普济方》卷三二七）。

【组成】 乌雄鸡一只 人参（去芦） 白术 石床 牡丹皮 黄耆 乌药各一两 草果 延胡索 熟干地黄（洗，焙） 木香 琥珀 肉豆蔻各半两 陈皮 红花 川乌（炮） 海桐皮 白芍药 附子（炮，去皮脐） 肉桂（去粗皮） 蓬莪术各二两 苍术（米泔浸，切，焙）一两半

【用法】 上锉细，用乌鸡一只，汤捋去毛及肠肚，将上件药，安放鸡肚中，用新瓷罐、好酒一斗，同煮令干，去鸡骨，以油单盛，焙干为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，胎前产后伤寒，蜜糖酒送下；胎前气闷壮热，炒姜酒送下；赤白带下，生姜、地黄煮酒送下；产后败血攻心，童便炒姜酒送下；产后血块攻筑，心腹疼痛，元胡酒送下；胎前呕逆，姜汤送下；催生，炒蜀葵子酒送下；安胎，盐酒送下；室女经脉当通不通，四肢疼痛，煎红花酒送下；血气攻刺，心腹疼痛，煎当归酒送下；血晕，棕榈烧灰酒送下；血邪，研朱砂、麝香酒送下；血闷，煎乌梅汤研朱砂送下；子宫久冷，温酒或枣汤送下，空腹日一服；血风劳，人参酒送下；心腹疞痛，炒茴香盐酒送下；血散四肢，遍身虚浮黄肿，赤小豆酒送下；常服，温酒、醋汤任下，并空心食前服。

【主治】 妇人胎前产后诸般疾患。

02648 乌金饼子

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】 干漆一两（炒烟出，为末） 没药一分 硇砂一钱

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大，作饼子。每服三饼子，食后男子盐汤、女子醋汤送下。

【主治】 坚瘕积块，状如覆杯，腹痛不食；妇人血气刺痛。

02649 乌金煎丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】 羌活 独活 牛膝（去苗） 附子（炮裂，去皮脐） 白蒺藜（微炒，去刺） 芎劳 牛蒡子 海桐皮（锉） 防风（去芦头）各一两

【用法】 上为末，用黑豆七升，净淘，以水三斗，煎取汁二升，去豆，入前药末一半相和，却入银锅内，以文火煎成膏，又入余药末为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】 柔风，四肢缓弱，及言语謇涩。

02650 乌骨鸡丸

【方源】《张氏医通》卷十三引《制药秘旨》。

【组成】 乌骨白丝毛鸡一只（男雌女雄，制法同巽顺丸） 北五味一两（碎） 熟地黄四两（如血热加生地黄二两）

上二味，人鸡腹内，用陈酒酒酿、童便于砂锅中煮，如巽顺丸。

绵黄耆（去皮，蜜、酒拌炙） 子术（饭上蒸九次）各三两 白茯苓（去皮） 当归身（酒洗） 白芍药（酒炒）各二两

上五味，预为粗末，同鸡肉捣烂焙干，骨用酥炙，共为细末，入下项药：

人参二两（虚甚加至六两） 牡丹皮二两（酒洗净，勿炒） 川芎一两（童便浸，切，晒）

上三味，各为细末，和前药中。

【用法】 另用干山药末六两打糊，将前药众手为丸，晒干勿令馊，瓷罐收贮。侵晨人参汤或沸汤送下三钱，卧时醇酒送下二钱。大便实者，炼白蜜为丸亦可。

【主治】 妇人郁结不舒，蒸热咳嗽，月事不调，或久闭不行，或倒经血溢于上，或产后褥劳，或崩淋不止，及带下赤白、白淫；男子斲丧太早，劳嗽吐红，成虚损者。

【加减】 骨蒸寒热，加九肋鳖甲三两，银柴胡、地骨皮各一两五钱；经闭，加肉桂一两；崩漏下血，倍熟地，加真阿胶二两；倒经血溢，加麦门冬二两；郁结痞闷，加童便制香附二两，沉香半两；赤白带下，加真川萆薢二两，四制香附二两，蕲艾一两；白淫，倍用参、耆、苓、术。

02651 乌梅肉丸

【方源】《外台》卷二十五引《延年秘录》。

【组成】 乌梅肉（熬） 熟艾 黄柏 甘草（炙）各八分

【用法】 上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，饮送下，一日三次。

【主治】 冷白脓痢，食不消。

02652 乌蛇浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】 乌蛇六两（酒浸，去皮骨，炙微黄） 防风二两（去芦头） 桂心二两 白蒺藜二两（炒，去刺） 天麻二两 五加皮一两 羌活二两 牛膝二两（去苗） 枳壳三两（麸炒微黄，去瓤） 熟干地黄四两

【用法】 上锉细，以生绢袋盛，以无灰酒二斗，于瓷瓮中浸，密封七日后开。每温饮一小盏，一日三次。

【主治】 紫白癜风。

【宜忌】 忌毒滑物、猪、鸡肉。

02653 乌鲤鱼汤

【方源】《得效》卷九。

【组成】 乌鲤鱼一尾 赤小豆 桑白皮 白术 陈皮各一两 葱白五根

【用法】 上用水三碗同煮，不可入盐。先吃鱼，后服药。

【功用】 消肿。

【主治】 水肿，四肢肿。

02654 乌风决明丸

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 石决明二两 细辛五钱 桔梗 防风 茺蔚子 车前子 茯苓 山药 元参各二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，食前茶清送下。

【主治】 乌风有余证。

02655 乌风补肝散

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 川芎 熟地黄 当归 蒺藜 白芍药 木贼 夏枯草 防风各一钱

【用法】 上为粗末。以水二盏，煎至一盏，去滓食前温服。

【主治】 乌风不足证。

02656 乌头桂枝汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 抵当乌头桂枝汤（原书同卷）、桂枝汤加乌头汤（《医心方》卷六引《小品方》）、乌头汤（《千金》卷八）、桂枝乌头汤（《全生指迷方》卷三）、大乌头桂枝汤（《三因》卷七）。

【组成】 乌头大者五枚（熬，去皮，不㕮咀）

【用法】 以蜜二斤，煎减半，去滓，以桂枝汤五

合解之，令得一升，后初服二合；不知，即服三合；又不知，复加至五合。其知者如醉状，得吐者为中病。

【功用】《医略六书》：逐冷调营。

【主治】①《金匮》：寒疝腹中痛，逆冷，手足不仁，若身疼痛，灸刺诸药不能治。②《千金》：贼风入腹，攻刺五脏，拘急不得转侧，呼叫发作，有时使人阴缩。

【方论选录】①《金匮要略直解》：寒淫于内，则腹中痛，寒胜于外，则手足逆冷，甚则至于不仁而身疼痛，此内外有寒也。乌头煎，热药也，能散腹中寒痛。桂枝汤，表药也，能解外证身疼痛。二方相合，则能达脏腑而利营卫，和气血而播阴阳。其药势翕翕行于肌肉之间，恍如醉状，如此则外之凝寒以行，得吐则内之冷结将去，故为中病。②《医略六书》：寒邪外束，营血不能统运于经府之间，故身腹疼痛，寒疝厥冷不仁焉。乌头祛风逐冷，治疝除痹；白蜜润燥益虚，缓中止痛；加入桂枝、白芍以调和内外。务使寒邪外解则营气内和，而阳得敷于肢体，何患逆冷不仁，身腹疼痛之不除哉。

【临证举例】寒疝 《治验回忆录》：袁素珠，青年农妇，体甚健，经期准。一日，少腹大痛，筋脉拘急而未少安，虽按亦不住，服行经调气药不止，迁延十余日，病益增剧，迎余治之。其脉沉紧，头身痛，肢厥冷，时有汗出，常常有冷气向阴户冲出，痛处喜热敷。此由阴气积于内，寒气博结而不散，脏腑虚弱，风冷邪气相击，则腹痛里急，而成纯阴无阳之寒疝。因处以乌头桂枝汤：制乌头12克，桂枝18克，芍药12克，甘草6克，大枣6枚，生姜3片，水煎兑蜜服。连进两帖，痛减厥回，汗止人安。换方当归四逆加吴茱萸生姜汤以温经通络，清除余寒，病竟愈。

02657 乌头摩风膏

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】乌头 附子（并生用） 当归各二两 羌活 细辛 桂心 防风（去芦头） 白术 川椒 吴茱萸各一两 猪脂一斤（腊月者，若得驼脂尤好，去脂膜煎化，去滓放冷）

【用法】上切细，如大豆大，以头醋微淹之，经一宿，煎猪脂化，去滓纳药，缓火煎之，候附子黄色，即膏成，收瓷盒中。有患者，频取摩之，宜用衣裹。

【主治】风顽痹，腰脚不遂，四肢拘挛，并马坠疼痛不可忍；及白癜诸疮，兼脚气等。

【宜忌】切避风冷。

02658 乌附椒姜汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】制川乌（炒黑） 川附子（炮黑）各三钱 川椒（炒黑）一钱 黑炮姜一钱半

【功用】温阳散寒，止痛。

【主治】寒痹。

02659 乌鸡白凤丸

【方源】《上海市药品标准》。

【组成】乌骨鸡一只（约二斤） 熟地 益母草 党参各180克 黄耆 当归各120克 丹参 茯苓 川断 阿胶 龟版胶 鹿角胶 鹿茸 白芍 川芎 白术 枸杞子各90克 砂仁 芦子各60克 人参 延胡索 香附 黄芩 白薇各45克 甘草30克

【用法】上为末。炼蜜为丸，每丸重9克。每服一丸，化服，一日一至二次。

【功用】补气血，调经。

【主治】妇女体虚，月经不调，经行腹痛。

02660 乌苓通气散

【方源】《回春》卷五。

【异名】乌苓通气汤（《脚气钩要》卷上）。

【组成】乌药 当归 芍药 香附 槟球 陈皮各一钱 茯苓 白术（去芦） 槟榔 玄胡 泽泻各五分 木香 甘草各三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎服。

【主治】①《回春》：一切疝气。②《脚气钩要》：疝家患脚气，腰脚麻痹，或下部带肿气者。

【加减】恶寒，脉沉细，加吴茱萸。

02661 乌药平气汤

【方源】《三因》卷三。

【组成】乌药（去木） 人参 白术 川芎 当归 茯神（去木） 甘草（炙） 白芷 木瓜干 五味子 紫苏子各等分

【用法】上为锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜五片、大枣二个，煎七分，去滓温服；或作细末，汤点下。

【主治】脚气上攻，喘满；及五脏偏胜，诸气不和，喘咳奔冲，坐卧不安，头晕脚弱，上实下虚者。

02662 乌药顺气散

【方源】《三因》卷二。

【异名】乌药顺气汤（《嵩崖尊生》卷七）。

【组成】乌药（去木） 麻黄（去根节） 橘皮各二两 甘草（炙） 川芎 枳壳（麸炒，去瓤） 白僵蚕（去丝嘴，炒） 白芷 桔梗各一两 白姜

（炮）半两

【用法】 上为末。每服二钱匕，水一盏，加生姜三片，薄荷七叶，煎至七分，空心服。治气，去薄荷，用杏子二枚同煎。

【功用】《局方》（续添诸局经验秘方）：疏风顺气。

【主治】 ①《三因》：风气不顺，手脚偏枯，流注经络，并湿毒进袭，腿膝挛痹，筋骨疼痛。②《局方》（续添诸局经验秘方）：男子、妇人一切风气，攻注四肢，骨节疼痛，遍身顽麻，头目旋晕；瘫痪，语言謇涩，筋脉拘挛；脚气，步履艰难，脚膝软弱；妇人血风，老人冷气，上攻胸膈，两胁刺痛，心腹膨胀，吐泻肠鸣。

【宜忌】《局方》（续添诸局经验秘方）：孕妇不可服。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴、足厥阴药也。风盛则火炽，故有痰火冲逆而上，此里气逆也。然中风必由外感风寒而发，内虚而外邪乘之，此表气逆也。麻黄、桔梗，肺家之药，发汗而祛寒；川芎、白芷，头面之药，散风而活血；枳壳利气行痰；僵蚕消化散结；干姜温经通阳；甘草和中泻火；乌药能通行邪滞诸气。此乃先解表气而兼顺里气者，气顺则风散。风邪卒中，当先治标，若气虚病久者，非所宜也。

02663 乌药顺气散

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】 天台 乌药 香附 沉香 砂仁 橘红 半夏

【用法】 上为末。每服二钱，灯心汤调下。

【主治】 胀满痞塞，七情忧思所致者。

02664 乌须明目丸

【方源】《广笔记》卷二。

【组成】 女贞实（酒拌，九蒸九晒，净末）一斤 甘菊花十二两 何首乌（赤白各半，净）二斤（如法蒸晒） 桑叶一斤 牛膝（酒蒸）一斤 怀生地（酒洗净）二斤（如法蒸晒） 甘枸杞（去枯者）一斤 乳拌茯苓酥一斤 麦门冬（去心）一斤半 槐角子十两 苍术（蜜、酒浸，蒸，晒）十二两 人参一斤（人乳拌，烘干） 山茱萸肉（酒蒸）十二两

【用法】 乌饭子之嫩者取汁熬膏，每斤加蜜半斤为丸，如梧桐子大。每日服五钱，白酒送下，一日二次。

【主治】 须发早白，目视昏花者。

【宜忌】 忌白菜服、牛肉、牛乳、蒜、桃、李、雀、蛤。

02665 乌梅山萸汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】 五味一钱 乌梅三钱（肉） 山萸三钱（肉） 甘草二钱 首乌三钱 芍药三钱 龙骨二钱 牡蛎三钱

【用法】 煎半杯，温服。

【主治】 瞳子散大者。

02666 乌梅甘草汤

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】 乌梅肉五个 甘草五钱

【主治】 肝气有余，肝血不足，以致胃气痛者。

02667 乌梅北寒丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 乌梅肉十枚 大黑枣五枚

【用法】 俱去核，共杵如泥，炼蜜为丸，如弹子大。每用一丸，噙化之。

【功用】 补胃，清热，摄涎。

【主治】 病后喜唾，因于胃虚有热者。

02668 乌蛇驱风汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 乌蛇9克 蝉衣6克 荆芥9克 防风9克 羌活9克 白芷6克 黄连6克 黄芩9克 银花9克 连翘9克 甘草6克

【功用】 搜风清热，败毒止痒。

【主治】 慢性荨麻疹，皮肤瘙痒症，泛发性神经性皮炎，扁平苔癣，结节性痒疹。

02669 乌蛇搜风汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 乌蛇6克 羌活 独活各9克 防风6克 炙僵蚕6克 生地15克 丹皮9克 丹参9克 赤芍9克 黄芩9克 银花15克

【功用】 搜风祛邪，凉血清热。

【主治】 慢性荨麻疹。

02670 乌头五灵脂丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】 乌头（生，去皮脐） 五灵脂各五两 附子（炮裂，去皮脐）二两 狼毒（炮）一两 防风（去叉） 地龙（不去土） 桂（去粗皮） 虎骨（沙瓶中盐泥固济，煅存性） 海桐皮（锉） 自然铜（煅，醋淬三五遍）各二两 乳香（研） 没药（研）各一两 麝香（研）三分 龙脑（研）一钱 乱发（烧灰存性） 好墨（煅过）各半两

【用法】 上药各为末，日中晒七日，捣罗为末，以生姜自然汁，和捣熟为丸，如弹子大。每一丸，

分作四服，用温酒入生姜汁少许磨化服；偏正头疼，夹脑风疾，以腊茶清和少姜汁磨下，去枕，卧少时，肿痛处磨一丸涂之；产后诸疾备急，用生姜汁磨化，入童便并酒各半盏，稍热服；血风劳及败血攻四肢，或攻刺腹胁痛，用当归酒送下；撅扑损伤，乳香酒送下，病深者二丸。

【主治】 蛊风，皮肤尽痛，身体若划若刺；中风痰涎壅塞，胸中不利，口眼㖞斜，半身不遂，神昏恍惚及血风走注。

02671 乌蝎六君子汤

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】 六君子汤加川乌 蝎尾 神曲

【用法】 面糊为丸服。

【主治】 小儿慢脾风，内钩。

【备考】 本方方名，据剂型，当作"乌蝎六君子丸"。

02672 乌蝎四君子汤

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】 四君子汤加川乌（生） 全蝎（焙）各少许

【用法】 上为末。每服半钱，加生姜、大枣，水煎服。如再服，即去川乌。

【主治】 小儿慢惊。

02673 匀气散

【方源】《局方》卷三。

【异名】 调气散（《直指》卷五）、生料调气散（《直指》卷十八）、木香匀气散（《医学入门》卷八）、木香调气饮（《金鉴》卷三十九）、木香顺气散（《杂病源流犀烛》卷五）。

【组成】 丁香 檀香 木香 白豆蔻仁各二两 藿香叶 甘草（煨）各八两 缩砂仁四两

【用法】 上为末。每服一钱，加盐末一字，用沸汤点服，不拘时候。

【功用】 调顺脾胃，进美饮食。

【主治】 ①《局方》：气滞不匀，胸膈虚痞，宿冷不消，心腹刺痛，胀满噎塞，呕吐恶心。②《普济方》：气郁生涎，忽然倒晕，不知人事。

【备考】 本方方名，《医方大成》引作"木香调气散"。

02674 匀气散

【方源】《直指》卷十五。

【组成】 连须葱一茎（不得洗，带土） 姜一块 盐一匙 淡豉二十一粒

【用法】 同研烂，捏作饼。烘热，掩脐中，以帛扎定，良久气透自通，不然再换一剂。

【主治】 小便、大便不通。

02675 匀气散

【方源】《金鉴》卷五十。

【组成】 陈皮 桔梗各一钱 炮姜 砂仁 炙甘草各五分 木香三分

【用法】 上为细末。每服五分，红枣煎汤调服。

【主治】 儿母过食寒凉，胎受其气，小儿腹痛多啼，面色青白，不乳。

02676 丹皮汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 丹皮一钱 栝蒌仁一钱 桃仁泥二钱 朴消二钱 大黄五钱

【用法】 水二钟，煎一钟，去滓，入消再煎数滚，不拘时候服。

【主治】 ①《外科大成》：胃痈，肠痈，腹肿痞坚，按之即痛，脉迟而紧者，脓未成也。②《金鉴》：肠痈，腹濡而痛，少腹急胀，时时下脓，毒未解者。

【方论选录】《血证论》：内痈，乃热毒结血而成，毒去其血热亦随去，瓜蒌以解气结，桃仁、丹皮以破血结，消、黄兼下气血之结，结除而痈自去矣。

02677 丹皮散

【方源】《女科切要》卷一。

【组成】 丹皮 肉桂 归尾 玄胡 牛膝 赤芍 三棱 蓬术

【用法】 水煎服。

【功用】 调经。

【主治】 妇人经闭，气不调和，血不流转，气血虚损，外发潮热，头痛昏重，肢体倦怠，五心烦热，心忡面赤，口燥神焦，腰背痠疼，盗汗出者。

02678 丹青饮

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 赭石三钱 麦冬一钱五分（青黛拌） 杭菊二钱 石斛三钱 潼蒺藜三钱 白蒺藜三钱 沙参四钱 桑叶一钱 橘红一钱 贝母二钱 杏仁三钱 旋覆花一钱（绢包扎好）

【主治】 肝经之咳，痰少胁痛，易怒头眩。

02679 丹参丸

【方源】《千金》卷十九。

【异名】 桂姜丸（《圣济总录》卷八十五）。

【组成】 丹参 杜仲 牛膝 续断各三两 桂心 干姜各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，日二夜一。

【主治】 ①《千金》：腰痛并冷痹。②《圣济总录》：肾着；腰脚疼痛，行步艰难。

【方论选录】《千金方衍义》：杜仲、续断治腰痛；干姜、桂心开冷痹；牛膝、丹参通津血也。

02680 丹参汤

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】 丹参四两（锉） 苦参四两（锉） 蛇床子二合（生用）

【用法】 以水一斗五升，煎至七升，去滓，乘热洗之。

【主治】 风热，皮肤生瘙瘙，苦痒成疥。

02681 丹参饮

【方源】《时方歌括》卷下。

【组成】 丹参一两 檀香砂仁各一钱

【用法】 水一杯半，煎至七分服。

【主治】 心痛，胃脘诸痛。

02682 丹参膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】 丹参 芍药各二两 白芷一两

【用法】 上三味，以苦酒渍一夜，猪脂六合，微火煎三上下，膏成敷之。

【功用】《局方》（吴直阁增诸家名方）：通顺经络，宣导壅滞。

【主治】 ①《鬼遗》：妇人乳肿痛。②《局方》（吴直阁增诸家名方）：乳肿，乳痈，毒气焮作赤热，渐成攻刺疼痛；及治乳核结硬不消散。

02683 丹栀饮

【方源】《医级》卷七。

【组成】 丹皮 栀子 丹参 忍冬藤 生草

【主治】 肝火胁痛，经脉热伤。

02684 丹砂丸

【方源】《普济方》卷十八引《博济》。

【组成】 丹砂（研） 乳香（研） 酸枣仁（去皮，研）各半两

【用法】 上为末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，冷水送下，不拘时候。

【主治】 心神恍惚，自语自笑，举止不常。

02685 丹砂丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 丹砂（研） 铅丹（研） 陈橘皮（去白，炒）各半两 半夏（汤洗七遍，去滑，焙） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 麦芽（炒） 陈曲（焙） 代赭（煅）各一两 皂荚（去皮子，炙）半两

【用法】 上为末，和匀，稀糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午、卧时用温酒送下；米饮亦得。

【主治】 反胃吐食，日久不止，大肠结燥。

02686 丹砂丸

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】 丹砂（研） 麝香（研） 牛黄（研）各一分 半夏（汤洗七遍，切，焙） 丁香 白附子 铁粉（研） 天麻 天南星各半两

【用法】 上为末，粳米饭为丸，如麻子大。每服五丸，荆芥汤送下，空心、午后各一次。

【主治】 小儿脐风撮口。

02687 丹砂丸

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】 丹砂（研） 干蝎（去足，微炒） 白僵蚕（微炒） 天南星（炮裂）各半两 白附子一分

【用法】 上五味，捣罗四味为末，入丹砂研令匀，面糊为丸，如绿豆大。一岁儿服一丸，薄荷汤送下。

【主治】 小儿中风，口眼牵急。

02688 丹砂散

【方源】《普济方》卷三五六。

【组成】 葵子 阿胶（炒） 牛膝（酒浸） 当归（切，焙）各三分

【用法】 上为散。每服五钱，温酒调下。

【功用】 令胞烂。

【主治】 胞衣不出。

【备考】 本方名丹砂散，但方中无丹砂，疑脱。

02689 丹黄汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 炒栀子 丹皮各三钱 白芍五钱 甘草 黄芩各一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 肝火大便闭结，胸中饱闷，两胁疼痛，呕酸作吐，不思饮食。

02690 丹参饮子

【方源】《医统》卷五十。

【组成】 丹参 当归（酒洗） 白术（炒） 天门冬（去心） 麦门冬（去心）各一钱半 贝母 陈皮 知母 甘草各一分 石菖蒲一钱 黄连（姜汁炒）五分 五味子九粒

【用法】 以水一盏半，加生姜一片，煎八分，温服，不拘时候。

【主治】 健忘。

02691 丹参蠲痛丹

【方源】《医方简义》卷三。

【组成】 丹参 川连 广木香 川椒各等分

【用法】 炒香为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，酒送下。

【主治】 厥心痛。

02692 丹栀逍遥散

【方源】《方剂学》。

【组成】 逍遥散加丹皮 山栀

【用法】 水煎取汁，分二次服，日服一剂。

【功用】 疏肝解郁，健脾和营，兼清郁热。

【主治】 肝郁化火，潮热颧红，月经不调，少腹胀痛，经行乳胀，崩漏，带下。

02693 丹地乌梅四物汤

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】 白芍二钱（醋炒） 生地三钱 熟地二钱 乌梅五个 丹皮三钱 当归身五钱（生） 地骨皮三钱

【主治】 血虚经乱，先后不定，或血枯经闭，喘嗽骨蒸。

02694 月黄膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 川椒 9 克 藤黄末 25 克 黄蜡 6 克 白蜡 6 克 麻油 30 毫升

【用法】 用麻油入铜锅内熬热，加川椒熬焦去滓，加入黄、白蜡熔化，倒瓷器内，加入月黄末调成膏。剃光头发，肥皂水洗清，用药直接涂上。

【功用】 火菌止痒。

【主治】 头癣。

02695 风引汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 紫石煮散（《千金》卷十四）、紫石汤（《外台》卷十五引《崔氏方》）、引风汤（《御药院方》卷十一）、紫石散（《普济方》卷一〇〇）、癫痫汤（《普济方》卷三七八）。

【组成】 大黄 干姜 龙骨各四两 桂枝三两 甘草 牡蛎各二两 寒水石 滑石 赤石脂 白石脂 紫石英 石膏各六两

【用法】 上为粗末，以韦囊盛之。取三指撮，井花水三升，煮三沸，温服一升。

【功用】 ①《金匮》：除热瘫痫。②《外台》引《崔氏方》：除热镇心。

【主治】《千金》：大人风引，小儿惊痫瘛疭，日数十发，医所不药者。

【宜忌】《外台》引《崔氏方》：海藻、菘菜、生葱。

【方论选录】 ①《千金方衍义》：此方引风内泄，故用大黄兼甘草、桂心、滑石、石膏以化风热；干姜以为反谍，使火无拒格之虞；紫石英、寒水石以润血燥；赤、白石脂、龙骨、牡蛎以补其空，绝风火复来之路。②《成方切用》：风邪内并则火热内生，五脏亢盛，逆归于心，故以桂、甘、龙、牡通阳气，安心肾为君；然厥阴风木与少阳相火同居，火发必风生，风生必挟木势侮其脾土，故脾气不行，聚液成痰，流注四末，因成瘫痪，故用大黄以荡涤风火湿热之邪为臣；随用干姜之止而不行者以补之为反佐；又取滑石、石膏清金以伐其木，赤、白石脂厚土以除其湿，寒水石以助肾之阴，紫石英以补心神之虚为使。③《兰台轨范》：此乃脏腑之热，非草木之品所能散，故以金石重药清其里。

【临证举例】 风痫 《外台》引《崔氏方》：永嘉二年，大人、小儿频行风痫之病，得发例不能言，或发热，半身掣缩，或五六日或七八日死。张思唯经散，所疗皆愈。

【备考】《千金》本方用法有：大人顿服，未百日儿服一合，未能者，绵沾著口中，执者日四五服。

02696 风癣汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 生地 30 克 玄参 12 克 丹参 15 克 当归 9 克 白芍 9 克 茜草 9 克 红花 9 克 黄芩 9 克 苦参 9 克 苍耳子 9 克 白鲜皮 9 克 地肤子 9 克 生甘草 9 克

【功用】 养血和营，消风止痒。

【主治】 血虚风燥，泛发性神经性皮炎，皮肤瘙痒症。证见皮损肥厚浸润，瘙痒剧甚，舌质淡，苔薄布等。

【方论选录】 生地、当归、白芍、丹参养血和营；元参、甘草滋阴润燥；茜草、红花活血；黄芩除湿清热；苦参、苍耳子祛风除湿；白鲜皮，地肤子除湿止痒。

02697 风六合汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 四物汤四两 羌活 防风各一两

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人筋骨痛及头痛，脉弦，憎寒如疟。

02698 风六合汤

【方源】《元戎》。

【异名】 六合汤（《增补内经拾遗》卷三）。

【组成】 四物汤加秦艽 羌活

【主治】 ①《元戎》：风眩晕。②《增补内经拾遗》：风虚眩晕，血虚眩晕，及死血眩晕。

【备考】《增补内经拾遗》：本方用法：水二钟，煎八分，食后温服。

02699 风湿气膏

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】川乌 草乌各一两 当归二两 红花 官桂 白芷 桃仁 防风 赤芍药 补骨脂 穿山甲 羌活各一两

【用法】上锉，用麻油二斤，入前药煎枯，以布绞去渣，取油，另煎至滴水成珠为度，听用；又用松香十斤煎销，以夏布滤下，流于水内，又沸去水，取出松香，又将葱、姜汁各一碗，烧酒一斤，入松香内和匀，略煎过，方入前油，慢火熬成膏，住火，加乳香、没药各一两，阿魏一两，麝香一钱和匀摊用。

【主治】风湿气痛，兼治跌打损伤。

02700 风药圣饼子

【方源】《医学纲目》卷十。

【组成】川乌（生） 草乌 麻黄（去节）各二两 苍术 何首乌 白附子 白僵蚕 川芎各五钱 防风 干姜各二钱半 雄黄四钱六分 藿香 荆芥各二钱半

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大，捏作饼子。嚼碎，食后茶汤送下。

【主治】半身不遂，手足顽麻，口眼㖞斜，痰涎壅盛，及一切风，他药不效者；小儿惊风，大人头风，妇人血风。

02701 风湿续断汤

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】木瓜 续断 防风 羌活 人参 川芎 赤茯苓 川归 牛膝 杜仲 秦艽 甘草 附子

【用法】水二钟，加生姜二片，煎七分，食远服。

【主治】气虚，风湿流注，肢节作痛。

02702 凤衣散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】凤凰衣（煅） 黄连各等分 轻粉 片脑各少许

【用法】上为末。干掺；或鸡子清调敷。

【主治】下疳疮肿痛。

02703 凤衣散

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】凤凰衣（即孵鸡蛋壳凤衣，微火焙黄） 人中白（即溺桶中白垢，煅） 橄榄核（瓦上焙存性） 孩儿茶各三钱

【用法】上为细末。每药一钱，加冰片五厘，吹搽患处。

【主治】口疮口疳，并乳蛾喉癣，喉疳喉痈，肿痛闭塞。

02704 凤雏膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】龙骨3克 没药3克 血竭3克 轻粉1.5克 冰片1.5克

【用法】上为细末，与蛋黄焦油调匀。外敷。

【主治】下腿溃疡。

02705 凤髓丹

【方源】《普济方》卷一一四。

【组成】杜仲一两（生姜汁制） 木瓜一两半 狗脊一两 川乌八两（炮，去皮） 草薢二两 牛膝一两 虎骨五钱（酥制） 鹿茸五钱（酥制） 麝香二钱 芎藭五钱 肉桂五钱（去皮） 全蝎三钱 细辛七钱 乳香五钱 没药五钱 木鳖子三钱（去壳） 海桐皮五钱 五加皮五钱 威灵仙七钱（去皮） 薏苡仁五钱 自然铜七钱（醋淬七次） 地龙二两半 木香五钱 骨碎补一两 朱砂五钱（为衣）

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，好酒温送下。

【主治】肝肾二脏稍有不足，风寒之气侵之，每到中夜后腰背疼痛，转侧不得，不能行步；或右瘫右痪，肢体偏枯，起止不前，阳气衰绝，阴气大胜，久卧床枕，渐渐日深者。

02706 凤髓膏

【方源】《外台》引苏游方（见《本草纲目》卷三十一）。

【组成】松子仁一两 胡桃肉二两

【用法】上研膏，和熟蜜半两收之。每服二钱，食后沸汤点服。

【功用】《杨氏家藏方》：润肺。

【主治】肺燥咳嗽。

【备考】本方原名凤髓汤，与剂型不符，据《卫生鸿宝》改。

02707 凤髓膏

【方源】《异受眼科》。

【组成】上好羊脑炉甘石八两（打如莲子大，一分重为则。用新铜罐盛入童便，浸四十九日，滤去宿童便，更入新童便煮，一柱香久，咬咸酸味，不必再煮，又不可煮老，研为细末，用缸片一大块，将药放在上，用硬炭火煅，一柱香久，甘石渐渐转如松花色，细心谨慎取起，总称匀分，作四分。一分用细辛、荆芥穗、薄荷各一两，煮浓汁大半钟，

亦煮三次）

【用法】 上药研细筛过，另用瓷瓶收贮。点眼。

【主治】 内障，迎风流泪，怕日羞明，昏花；或年久云翳遮睛，不能行路，但见人影，如白衣人行，有血根扳睛者。

【备考】 原书用本方，治内障，迎风冷泪，怕日羞明，昏花者，须兑虎液、羊脑玉、冰片合用；治年久云翳遮睛，有血根扳睛者，先用青龙、羊脑玉点眼，直点至翳开之后，再用本方兑虎液、羊脑玉、冰片、珍珠、琥珀合用。

02708 六一丸

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 蛤粉 黄连 木贼 香附米

【用法】 上为末，面糊为丸。茶送下。

【主治】 热泪。

02709 六一汤

【方源】《传信适用方》卷三。

【组成】 真绵黄耆六两（箭杆者是也，木耆不堪，误入，以刀劈开揭薄，用白沙蜜不酸者一两，微入水少许调解，则易涂蘸，候搓匀，炙之微紫色，候冷锉碎，不碾罗） 横纹甘草（炙，细锉）一两

【用法】 上拌匀。每服抄五钱，水一盏，煎至七分服之，日二服，夜二服。

【主治】 五发：发脑，发鬓，发眉，发颐，发背。

02710 六丁饮

【方源】《洞天奥旨》卷七。

【组成】 紫花丁一两 甘菊花一两 生甘草五钱 牛膝一两 天花粉二钱

【用法】 水煎服。若已破烂，多服为妙。

【主治】 脚趾生疽。

02711 六子丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】 生菟丝子粉 蛇床子 覆盆子 沙苑子 家韭子 五味子

【用法】 鳇鱼胶为丸服。

【主治】 知识太早，精血未满而泄，关键不摄，始而精腐变浊，久则元精滑溢，口咸气胀。

02712 六半汤

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 白芍药六两 甘草半两（炙）

【用法】 上㕮咀。每服二钱半，用水一盏，煎至六分，去滓，入无灰酒少许，再煎数沸，食前热服。

【主治】 ①《魏氏家藏方》：热湿脚气，不能步行。②《普济方》：血虚，腰腿疼痛。

02713 六合汤

【方源】《易简方》。

【异名】 加味四物汤（《玉机微义》卷四十九）。

【组成】《局方》四物汤加莪术 官桂各等分

【主治】 ①《易简方》：经血凝滞，腹内血气作疼。②《济生》：妇人经事不行，腹中结块疼痛，腰痛腿痛。

【备考】《济生》本方用法：上㕮咀。每服四钱，水一盏，煎至七分，去滓，空心温服。

02714 六合散

【方源】《春脚集》卷二。

【组成】 杜仲 肉苁蓉（制） 巴戟（洗） 小茴香 补骨脂 净青盐各一钱

【用法】 上为细末。用羊腰子二个，以竹刀剖开，散药末在内，仍合住，外用熟面包好，微火煨熟，好酒送下，日食一服。

【主治】 腰痛因寒因虚，伛偻不能步履。

02715 六安煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 陈皮一钱半 半夏二三钱 茯苓二钱 甘草一钱 杏仁一钱（去皮尖，切） 白芥子五七分

【用法】 水一钟半，加生姜三五七片，煎七分，食远服。

【主治】 风寒咳嗽，及非风初感，痰滞气逆者。

【加减】 老年气弱者，去白芥子；外感风邪，咳嗽而寒气盛者，多不易散，宜加北细辛七八分或一钱；若冬月严寒邪甚者，加麻黄、桂枝亦可；若风胜而邪不甚者，加防风一钱，或苏叶亦可；若头痛鼻塞者，加川芎、白芷、蔓荆子皆可；若兼寒热者，加柴胡、苏叶；若风邪咳嗽不止而兼肺胃之火者，加黄芩一二钱，甚者，再加知母、石膏，所用生姜止宜一片；寒邪咳嗽，痰不利者，加当归二三钱，老年者尤宜；若气血不足者，当以金水六君煎与此参用；凡非风初感，痰胜而气不顺者，加藿香一钱五分；兼胀满者，加厚朴一钱开痰气。

【宜忌】 若气虚卒倒及气平无痰者，皆不可用此。

02716 六军丸

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 蜈蚣（去头足） 蝉蜕 全蝎 僵蚕（炒去丝） 夜明砂 穿山甲各等分

【用法】 上为细末，神曲糊为丸，如粟米大，朱

砂为衣。每服三分，食远酒送下。

【主治】 瘿瘤已成未溃者，不论年月新久，并宜服之。

【宜忌】 忌大荤、煎炒。

02717 六郁汤

【方源】《医学正传》卷二引丹溪方。

【组成】 陈皮（去白）一钱 半夏（汤泡七次） 苍术（米泔净） 抚芎各一钱 赤茯苓 栀子（炒）各七分 香附二钱 甘草（炙）五分 砂仁（研细）五分

【用法】 上切细，作一服，加生姜三片，水二盏，煎至一盏，温服。

【功用】 解诸郁。

【主治】 郁证。

【加减】 如气郁，加乌药、木香、槟榔、紫苏、干姜，倍香附、砂仁；如湿郁，加白术，倍苍术；如热郁，加黄连，倍栀子；如痰郁，加南星、枳壳、小皂荚；如血郁，加桃仁、红花、牡丹皮；如食郁，加山楂、神曲、麦芽面。

02718 六物汤

【方源】《直指·附遗》卷十五。

【异名】 四物知柏汤、知柏四物汤（《症因脉治》卷二）、既济汤（《证治宝鉴》卷二）。

【组成】 川芎 白芍药（酒炒） 生地黄（酒洗） 当归（酒洗） 黄柏（蜜炒） 知母（酒炒）各等分

【用法】 上㕮咀。用水一钟半，煎至八分，食前温服。

【功用】 滋阴血，降肾火。

【主治】 阴虚火旺，咳喘气逆，血虚腹痛，面色萎黄，妇人崩漏，妊娠胎动，脉细数。

①《直指·附遗》：火证。②《症因脉治》：阴虚喘逆。血热不得卧。肝经血热筋挛。血虚腹痛，偎偎作痛，如细筋牵引，下引少腹，上引肋梢，肢体瘦弱，面色萎黄，腹加痛而不饱闷，痛无定处，阴虚阳旺，脉见细数者。③《伤寒大白》：内伤阴火，内冲头痛。④《医略六书》：胎动脉洪虚数者。⑤《金鉴》：崩血、漏血属热多者。⑥《叶氏女科》：肝肾虚热成淋。

【方论选录】 ①《医略六书》：妊娠冲任血亏，热迫子下，故胎动不安，此胎动因子血热而胎失所养焉。生地滋阴凉血以安胎；当归养血荣经以荣胎；川芎引入血海；白芍收敛任阴；黄柏清热存阴；知母润燥益阴，水煎温服。俾热化血充，则冲任清和而得所养，胎无不安，何胎动之有乎？②《成方便读》：以地、芍壮水，知、柏退阳；有血证，故用当归，引诸血各归其所当归之经；川芎能行血中之气，自然气顺血调，不虚不滞矣。

02719 六物汤

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】 四君子加酸枣仁 生姜

【用法】 水煎服。

【主治】 振悸不得眠。

02720 六和汤

【方源】《局方》卷二（续添诸局经验秘方）。

【异名】 六合汤（《普济方》卷一一七）。

【组成】 缩砂仁 半夏（汤泡七次） 杏仁（去皮尖） 人参 甘草（炙）各一两 赤茯苓（去皮） 藿香叶（拂去尘） 白扁豆（姜汁略炒） 木瓜各二两 香薷 厚朴（姜汁制）各四两

【用法】 上锉。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，枣子一个，煎至八分，去滓，不拘时候服。

【主治】 ①《局方》：心脾不调，气不升降，霍乱转筋，呕吐泄泻，寒热交作，痰喘咳嗽，胸膈痞满，头昏目痛，肢体浮肿，嗜卧倦怠，小便赤涩，伤寒阴阳不分，冒暑伏热烦闷，或成痢疾；中酒烦渴畏食。②《杏苑》：伤食嗳酸臭气，或因暑热，渴饮冷水冷物，致心腹疼痛，或冒暑背寒自汗，四肢厥冷。

02721 六和散

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 海螵蛸 龙齿（水飞） 象皮（煅存性，研极细） 血竭 乳香 轻粉各等分

【用法】 上为细末，收贮。或干掺，或用鸡蛋熬油调拂。

【主治】 疮疡烂孔收小者。

02722 六柱散

【方源】《医方类聚》卷一四二引《济生》。

【异名】 六柱汤（《证治要诀类方》卷一）、六柱饮（《医学六要·治法汇》卷三）。

【组成】 白茯苓（去皮） 附子（炮，去皮脐） 人参 木香（不见火）各一两 肉豆蔻 诃子

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏半，加生姜五片，入盐少许，煎至七分，食前温服。

【主治】 ①《医方类聚》引《济生》：元脏气虚，真阳耗散，两耳常鸣，脐腹冷痛，头旋目晕，四肢怠倦，小便滑数，滑泄不止。②《张氏医通》：泻利完谷。

【备考】 方中肉豆蔻、诃子用量原缺。

02723 六神丸

【方源】《喉科心法》卷下引雷允上方。

【组成】 关丹黄一钱五分 上辰砂一钱五分（须镜面劈炒） 杜蟾酥一分五厘（烧酒化） 粗珍珠一分五厘 当门子一分五厘 百草霜五分

【用法】 上为细末，米浆为丸，如芥菜子大。以百草霜为衣，瓷瓶收贮，勿使泄气。每服五丸、七丸、十丸不等，视病情轻重服之；茶汤不能进者，每用十丸，以开水化开，徐徐咽下。重者再进一服。

【主治】 时邪疠毒，烂喉丹痧，喉风喉痈，双单乳蛾；疔疮对口，痈疽发背，肠痈腹疽，乳痈乳岩，一切无名肿毒；小儿痰急惊风，肺风痰喘，危在顷刻。

02724 六神丸

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 犀黄钱半 濂珠钱半 麝香钱半 杜蟾酥钱半（酒化）

【用法】 上为末，米浆为丸，如芥子大，百草霜为衣。每服五分。

【主治】 一切痈疽痰毒。

02725 六神丹

【方源】《局方》卷十。

【异名】 六神丸(《圣济总录》卷一七三)。

【组成】 丁香 木香 肉豆蔻（去壳）各半两（上三味用面裹，同入慢灰火煨，令面熟为度，取出放冷） 诃子（煨，去核） 使君子仁各半两 芦荟（细研入药）一两

【用法】 上为细末，以枣肉为丸，如麻子大。每服五丸至七丸，乳食前温米饮送下。

【主治】 小儿疳气羸瘦，脏腑怯弱，泄泻虚滑，乳食减少，引饮无度，心腹胀满。

02726 六神汤

【方源】《得效》卷十二。

【异名】 六神散(《奇效良方》卷六十五)。

【组成】 嫩黄耆 白扁豆（炒） 人参 白术 白茯苓 粉草各等分

【用法】 上为末。每服二钱，苏盐汤、正气生姜枣子汤调下。

【功用】 理脾胃虚，止吐泻，进饮食，养气。

【主治】 ①《袖珍》：脾胃虚，吐泻，不进饮食。②《奇效良方》：脾胃虚弱，津液燥少，内虚不食，身发虚热。

【加减】 或加藿香叶亦可。

02727 六神散

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】 皂荚刺 薄荷 昆布（洗去咸） 海藻（洗去咸） 连翘各半两 皂荚子五十枚（烧灰）

【用法】 上为细散，每服三钱匕，食后、临卧茶调下。

【主治】 瘰疬久不愈。

02728 六神散

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】 生地 熟地各三分 当归 黄耆 人参各五分 川芎三分

【用法】 水煎服。

【主治】 诸疮血出过多，心烦不安，不得睡卧。

02729 六真膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 乳香 没药 血竭 三七 儿茶各三钱 樟冰三两

【用法】 猪脂十二两，碗盛，水煮化，入药和匀。摊敷。

【主治】 一切刑伤，各样痈疽。

02730 六磨汤

【方源】《得效》卷六。

【异名】 六磨饮子(《重订通俗伤寒论》)。

【组成】 大槟榔 沉香 木香 乌药 枳壳 大黄各等分

【用法】 上药于擂盆内各磨半盏，和匀温服。

【主治】 气滞腹急，大便秘涩而有热者。

02731 六君子汤

【方源】《医学正传》卷三引《局方》。

【组成】 陈皮一钱 半夏一钱五分 茯苓一钱 甘草一钱 人参一钱 白术一钱五分

【用法】 上切细，作一服。加大枣二个，生姜三片，新汲水煎服。

【功用】 ①《医方发挥》：益气补中，健脾养胃，行气化滞，燥湿除痰。②《古今名方发微》：益气健脾，理气降逆。

【主治】 脾胃虚弱，气逆痰滞。食少便溏，咳嗽有痰，色白清稀，短气痞满，呕恶呃逆，吞酸，面色萎黄，四肢倦怠；以及脾虚膨胀，外疡久溃，食少胃弱者。

①《医学正传》引《局方》：痰挟气虚发呃。②《会约》：痔漏日久，脉数而涩，饮食日减，肢体愈倦，一切不足之证。③《外科发挥》：一切脾胃不健，或胸膈不利，饮食少思，或作呕，或食不化，或膨胀，大便不实，面色萎黄，四肢倦怠。④《口齿类要》：胃气虚热，口舌生疮；或寒凉克伐，食少吐泻。⑤《医方考》：气虚痰喘；气虚，痰气不利；久病胃虚；闻谷气而呕者。⑥《准绳·幼科》：

肝虚惊搐，目眩自汗。⑦《准绳·疡医》：脾胃虚弱，或寒凉克伐，肿痛不消，或不溃敛。⑧《济阴纲目》：胃虚有痰，饮食减少，中气不和，时时带下。

【宜忌】《成方切用》：真阴亏损者忌用。

【方论选录】《医方考》：壮者气行则愈，怯者着而成病。东南之土卑湿，人人有痰，然而不病者，气壮足以行其痰也。若中气一虚，则不足以运痰而痰证见矣。是方也，人参、白术、茯苓、甘草，前之四君子也，所以补气；乃半夏则燥湿以制痰，陈皮则利气以行痰耳。名之曰六君子者，表半夏之无毒，陈皮之弗悍，可以与参、苓、术、草比德云尔！

【临证举例】①泻痢《寿世保元》：一人患痢，后重，自知医，用芍药汤，后重益急，饮食少思，腹寒肢冷。以为脾胃亏损，用六君子汤加木香、炮姜，三剂而愈。②吞酸《寿世保元》：一妇人吞酸嗳腐，呕吐痰涎，面色纯白。用二陈、黄连、枳实之类，加发热作渴，肚腹胀满。予曰：此脾胃亏损，未传寒中。不信，仍作火治，肢体肿胀如盅。余以六君加附子、木香治之，胃气渐醒，饮食渐进，虚火归原，又以补中益气加炮姜、木香、茯苓、半夏兼服，全愈。③眩晕痞闷《张氏医通》：缪某，偶因小愤，遂致眩晕痞闷，三月来服豁痰利气药不应，反觉疲倦，饮食日减，下元乏力。至七月下浣，邀石顽诊之，六脉似觉有余，指下略无冲和之气，气口独滞不调，时大时小，两尺俱濡大少力，此素多痰湿，渐渍于水土二经，复加剥削之剂屡犯中气，疲倦少食，迨所必致。法当先调中气，输运水谷之精微，然后徐图温补下元。为疏六君子汤加当归兼调营血，庶无阳无以化之虞。

【备考】方中人参改为党参，制成丸剂，名六君子丸（见《中药成方配本》）。

02732 六君子汤

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 砂仁 陈皮（一方加半夏）

【用法】加生姜三片，大枣一个，水煎服。

【主治】脾胃不和，不进饮食，上燥下寒，服热药不得者。

02733 六一顺气汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】大黄 枳实 黄芩 厚朴 甘草 柴胡 芒消 芍药

【用法】上先将水二钟，滚三沸后入药，煎至八分，临服时入铁锈水三匙调服。

【主治】伤寒表里有实热，大便秘结，口舌干燥，神昏谵语，胸腹硬满而痛；或阳明失下而呃逆；或下痢赤白，表里俱实者。

①《伤寒六书》：伤寒热邪传里，大便结实，口燥咽干，怕热谵语，揭衣狂妄，扬手掷足，斑黄阳厥，潮热自汗，胸腹硬满，绕脐痛。②《寿世保元》：伤寒阳明内实，失下而作呃逆者。③《诚书》：痢疾，表里有实热，赤白相兼，腹痛，里急后重，壮热口渴。

【加减】结胸证，心下硬痛，手不可近，燥渴谵语，大便实者，去甘草，加甘遂、桔梗；凡伤寒过经，及老弱并血气两虚之人，或妇人产后有下证，或有下后不解，或有表证尚未除，而里证又急，不得不下者，去芒消。

02734 六味平胃散

【方源】《易简方》。

【组成】平胃散加茯苓、丁香各三两

【用法】多加生姜，煎服。

【主治】胃寒呕吐。

02735 六味回阳饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参一二两或数钱 制附子二三钱 炮干姜二三钱 炙甘草一钱 熟地五钱或一两 当归身三钱

【用法】水二钟，武火煎七八分，温服。

【主治】阴阳将脱证。

【加减】肉振汗多者，加炙黄耆四五钱或一两，或冬白术三五钱；如泄泻者，加乌梅二枚，或北五味二十粒亦可；如虚阳上浮者，加茯苓二钱；如肝经郁滞者，加肉桂二三钱，如血动者，去当归，加冬术。

02736 六味异功散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】五君子煎加陈皮一钱

【主治】脾胃虚寒，呕吐泄泻，而兼湿滞者。

02737 六味香薷饮

【方源】《医方集解》。

【组成】五物香薷饮加木瓜

【功用】《医家四要》：祛暑利湿。

【主治】中暑湿盛，呕吐泄泻。

02738 六味清凉汤

【方源】《会约》卷七。

【组成】黄芩 黄柏 大黄（酒炒） 栀子（炒） 胆草 泽泻各等分

【用法】 水煎，热服。

【主治】 体旺，脉洪而滑，二便闭涩，口渴喜冷，热甚腰痛者。

02739 六物附子汤

【方源】《三因》卷三。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 桂心各四两 白术三两 甘草（炙）二两 防己四两 茯苓二两

【用法】 上为散。每服四钱，水二盏，加生姜七片，煎七分，去滓温服。

【主治】 四气流注于足太阴经，骨节烦疼，四肢拘急，自汗短气，小便不利，恶风怯寒，头面手足时时浮肿。

02740 六神全蝎丸

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】 全蝎三两（焙干，去足勾） 白术（炒）二两 半夏一两 白芍四两 茯苓四两 炙甘草五钱

【用法】 上为末，油核桃肉为丸。如绿豆大。每服一钱五分，火酒送下，清晨、晚各一次。看人大小加减。

【主治】 多年瘰疬，百治不愈。

02741 六神通解散

【方源】《伤寒六书》卷三。

【异名】 六神通圣散(《医统》卷十四)。

【组成】 麻黄 甘草 黄芩 石膏 滑石 苍术 川芎 羌活 细辛

【用法】 水二钟，加生姜三片，豆豉一撮，葱白三茎煎之。热服取汗，中病即止。

【主治】 时行三月后，谓之晚发，头痛，身热恶寒，脉洪数。

02742 六味合五子丸

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】 大熟地八两 山药四两 山萸肉四两 茯苓 丹皮 泽泻各三两 枸杞子 菟丝子各四两 五味子 车前子 覆盆子各二两

【用法】 上为末。石斛六两熬膏，和炼蜜为丸。每早服四钱，温开水送下。

【功用】 补天一之水。

【主治】 男子不育，此真水虚，左尺无力，或脉数有热。

02743 六味消风痰散

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】 川郁金三钱 五倍子三钱 土贝母二钱 姜黄一钱五分 生半夏三钱 生南星三钱

【用法】 上为细末。白蜜调匀，加陈酒少许，敷患处。

【主治】 风痰结核。

02744 六味地黄丸加黄柏知母方

【方源】《医方考》卷五。

【异名】 知柏八味丸(《简明医彀》卷四)、滋阴八味丸(《景岳全书》卷五十一)、滋阴地黄丸(《医学正印·男科》)、八味丸(《玉案》卷五)、凉八味丸(《症因脉治》卷二)、知柏地黄丸(《金鉴》卷二十七)。

【组成】 熟地黄八两 山茱萸（去核，炙） 山药各四两 泽泻 牡丹皮（去木） 白茯苓各三两 黄柏（盐炒） 知母（盐炒）各二两

【主治】 肝肾阴虚，虚火上炎，头目昏眩，耳鸣耳聋，虚火牙痛，五心烦热，腰膝痠痛，血淋尿痛，遗精梦泄，骨蒸潮热盗汗，颧红，咽干口燥，舌质红，脉细数。

①《医方考》：肾劳，背难俯仰，小便不利，有余沥，囊湿生疮，小腹里急，便赤黄者；肾气热，则腰脊不举，骨枯而髓减，发为骨痿。②《简明医彀》：阴虚火动，肾水不足，五心烦热，口燥咽干，溺赤。③《玉案》：肾虚淋沥，茎中涩痛，或时作痒。④《景岳全书》：阴虚火盛，下焦湿热。⑤《金鉴》：阴虚火动，午热骨痿，两尺脉旺。

【方论选录】《医方考》：熟地、山萸，味厚者也，味厚为阴中之阴，故足以补肾间之阴血；山药、茯苓，甘淡者也，甘能制湿，淡能渗湿，故足以去肾虚之阴湿；泽泻、丹皮，咸寒者也，咸能润下，寒能胜热，故足以去肾间之湿热；黄柏、知母，苦润者也，润能滋阴，苦能泻火，故足以服龙雷之相火。夫去其灼阴之火，滋其济火之水。则肾间之精血日生矣。王冰曰：壮水之主，以制阳光。此之谓也。

【备考】 按：《简明医彀》：本方用法：上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心淡盐汤送下。

02745 文武膏

【方源】《保命集》卷下。

【异名】 桑椹膏(《外科理例》卷三)。

【组成】 文武实（即桑椹，黑熟者） 二斗

【用法】 上以布袋取汁，银石器中熬成薄膏。每服一匙，白汤点下，一日三次。

【主治】 瘰疬。

02746 文蛤汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 文蛤五两 麻黄 甘草 生姜各三两

石膏五两　杏仁五十个　大枣十二个

【用法】 水六升，煮取二升，温服一升。汗出即愈。

【主治】 吐后渴欲得水而贪饮者；兼主微风，脉紧头痛。

【方论选录】《伤寒附翼》：病发于阳，应以汗解，庸工用水攻之法，热被水劫而不得散，外则肉上粟起，因湿气凝结于玄府也；内则烦热，意欲饮水，是阳邪内郁也。当渴而反不渴者，皮毛之水气入肺也。夫皮肉之水气，非五苓散之可任；而小青龙之温散，又非内烦者之所宜，故制文蛤汤。文蛤生于海中而不畏水，其能制水可知；咸能补心，寒能胜热，其壳能利皮肤之水，其肉能止胸中之烦，故以为君。然阳为阴郁，非汗不解；而湿在皮肤，又不当动其经络；热淫于内，亦不可发以大温，故于麻黄汤去桂枝，而加石膏、姜、枣，此亦大青龙之变局也。

02747　文蛤汤

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 文蛤　小麦　皮消　白矾各一两　葱白十根

【用法】 水煎，熏洗。

【主治】 阴户肿痛。

02748　文蛤散

【方源】《伤寒论》。

【组成】 文蛤五两

【用法】 上为散。每次一方寸匕，以沸汤五合和服。

【主治】 ①《伤寒论》：伤寒病在阳，应以汗解之，反以冷水潠之，若灌之，其热被劫不得去，弥更益烦，肉上粟起，意欲饮水反不渴者；②《金匮》：渴欲饮水不止者。

【方论选录】《金鉴》：渴欲饮水，水入则吐，小便不利者，五苓散证也；渴欲饮水，水入则消，口干舌燥者，白虎人参汤证也。渴欲饮水而不吐水，非水邪盛也；不口干舌燥，非热邪盛也。惟引饮不止，故以文蛤一味，不寒不温，不清不利，专意于生津止渴也。或云：文蛤即今吴人所食花蛤，性寒味咸，利水胜热，然屡试而不效。尝考五倍子亦名文蛤，按法治之名百药煎，大能生津止渴，故尝用之，屡试屡验也。

02749　文蛤散

【方源】《三因》卷十六。

【组成】 五倍子（洗）　白胶香　牡蛎粉各等分

【用法】 上为末。每用少许，掺上。

【主治】 热壅，舌上出血如泉。

02750　文蛤散

【方源】《回春》卷四。

【异名】 文蛤膏（《杏苑》卷五）。

【组成】 五倍子

【用法】 上为末。用津唾调，填满脐中，以绢帛系缚　宿即止。加白枯矾末尤妙。

【主治】 自汗，盗汗。

02751　文蛤散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 文蛤四两　点红川椒二两　轻粉五钱

【用法】 先将文蛤打成细块，锅内炒黄色，次下川椒同炒黑色，烟起为度，入罐内封口存性，次日入轻粉碾为细末，瓷罐收贮。香油调搽。

【主治】 奶癣。

【宜忌】 奶母戒口为妙。

02752　文蛤散

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】 文蛤三五两（打碎，去虫）　葱白十余根

【用法】 水煎，淋洗。

【主治】 肿疡焮痛，不问已溃未溃。

02753　火龙丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 人参五两　白术五两　巴戟天　杜仲　菟丝子　麦冬各五两　肉苁蓉一大枚　破故纸　远志　肉桂各二两　黄耆八两　当归三两　北五味一两

【用法】 上药各为末，炼蜜为丸。每服五钱，酒下。服一月，即阳举可以久战矣。

【主治】 男子五脏阳气虚衰，阳事不坚，精难射远，令人无子。

02754　火龙膏

【方源】《外科发挥》卷三。

【组成】 生姜八两（取汁）　乳香（为末）　没药（为末）各五钱　麝香（为末）一钱　真牛皮胶二两（切碎）

【用法】 先净姜汁并胶溶化，方下乳香、没药调匀，待稍温，下麝香，即成膏矣。摊贴患处。更服五积散。如鹤膝风，须服大防风汤。

【主治】 风寒湿毒所袭，筋挛骨痛，或肢节疼痛；湿痰流注，经络作痛，或不能行步；鹤膝风、历节风疼痛。

【临证举例】 鹤膝风　一妇人膝肿痛，遇寒痛益甚，月余不愈，诸药不应，脉弦紧，此寒邪深伏于

内也。用大防风汤及火龙膏，治之而消。

02755 火郁汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】升麻 葛根 柴胡 白芍药各一两 防风 炙甘草各五钱

【用法】上㕮咀。每服五钱，水二大盏，加连须葱白三寸，煎至一盏，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】①《兰室秘藏》：五心烦热。②《卫指》：手足心发热。

02756 火郁汤

【方源】《证治汇补》卷二。

【组成】连翘 薄荷 黄芩 山栀 干葛 柴胡 升麻 芍药

【用法】水煎服。

【主治】火郁于中，四肢发热，五心烦闷，皮肤尽赤。

02757 火轮丸

【方源】《医方类聚》卷一四二引《济生》。

【异名】斗门丸(《普济方》卷二九五)。

【组成】干姜（炮） 附子（炮，去脐皮） 肉豆蔻（面裹煨）各等分

【用法】上为细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【主治】肠胃虚寒，心腹冷痛，泄泻不止。

02758 火府丹

【方源】《普济方》卷四十三引《旅舍方》。

【异名】火府丸(《圣济总录》卷五十四)、绛宫丸(《鸡峰》卷十八)。

【组成】生子地黄（焙）四两 黄芩（去黑心） 木通（锉）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，食后温米饮送下；大段热燥，新汲水送下。小儿化破服，丸数临时加减。

【功用】引化热气，调顺血脉。

【主治】①《普济方》引《旅舍方》：上焦热结，心肺壅滞，面赤心忪，口干头昏。②《本事方》：心经热，小便涩，及治五淋。

【方论选录】《本事方释义》：生地黄气味苦微甘微寒，入手足少阴；木通气味苦平，入手太阳，能泄丙丁之火；黄芩气味苦平，入手足少阳、阳明。此因火邪内伏，致神识如惊，小便短涩。心与小肠相为表里，小肠为火府，非苦不通，泄其府则腑自安矣。

【临证举例】渴 《本事》：壬戌年一卒病渴，日饮斛水，不食者三月，心中烦闷，时已十月。予谓必心中有伏热，与此丹数服，每服五十丸，温水送下。越二日，渴止，饮食如故。此本治淋，用以治渴，信知用药要在变通也。

02759 火府丹

【方源】《元戎》。

【组成】黄芩一两 黄连一两 生地黄二两 木通二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，临卧温水送下。

【功用】泻丙丁火。

【主治】《普济方》：心惊热，小便涩，及五淋。

02760 火郁越鞠丸

【方源】《医方考》卷四。

【组成】山栀（炒黑） 青黛（飞） 香附（童便浸五日） 抚芎 神曲（炒） 苍术（米泔净七日）

【主治】七情拂郁，吞酸，小便赤，脉来沉数者。

【方论选录】一念动处便是火，故七情拂郁，皆能令人内热吞酸；小便赤为火，脉沉为郁，数为热。是方也，山栀、青黛之苦寒，可以导热；香附、苍术、抚芎之辛芳，可使解郁；神曲之陈腐，可使推陈而致新。

02761 斗门散

【方源】方出《证类本草》卷八引《斗门方》，名见《医方类聚》卷二一三引《瑞竹堂方》。

【异名】喝起散(《医方类聚》卷二一三引《澹寮》)、苍耳散(《校注妇人良方》卷四)。

【组成】喝起草

【用法】取其嫩心，不拘多少，阴干为末，每服一大钱，以常酒下，不拘时候。

【主治】妇人血风攻脑，头旋闷绝，忽死倒地，不知人事。

02762 斗门散

【方源】《局方》卷六（宝庆新增方）。

【组成】干葛（去皮）半两 地榆（去芦） 甘草（炙）各二两 干姜（炮） 当归（去芦）各一两 黑豆（炒，去壳） 罂粟壳（去瓤，蜜炙）各四两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，煎至七分，温服，不拘时候。

【主治】八种毒痢、脏腑撮痛，脓血赤白，或有五色相杂，日夜频并；兼治噤口恶痢，里急后重，大渴不止，酒痢脏毒，全不进食。

02763 心肾丸

【方源】《医方大成》卷四引《究原方》。

【组成】 牛膝（去苗，酒浸） 熟地黄（洗，再蒸） 苁蓉（酒浸）各二两 鹿茸（燎去毛，好酒涂炙） 附子（炮，去皮脐） 五味子（去枝） 人参（去芦） 远志（去苗，甘草水煮，捶去骨） 黄耆（蜜炙） 白茯神（去木） 山药（炒） 当归（去芦，酒浸） 龙骨（煅）各一两 菟丝子（酒浸、蒸，碾成饼）三两

【用法】 上为细末，用浸药酒，煮薄面糊为丸，如梧桐子大。每服五、七十丸，空心，食前枣汤送下。常服。

【功用】 ①《医方类聚》引《究原方》：养心神，补气血，生津液，进饮食，安神定志。②《医方大成》：调阴阳，补心肾。

【主治】 水火不既济，恍惚多忘，心忪盗汗，夜梦惊恐，目暗耳鸣，悲忧不乐，腰膝缓弱，四肢痿疼，小便数而赤浊，精滑梦遗。

02764 心咳汤

【方源】《退思集类方歌注》。

【组成】 北沙参三钱 石膏三钱（同薄荷头研） 牛蒡子钱半 杏仁三钱（去皮尖） 桔梗五分 甘草五分 麦冬三钱（去心） 半夏一钱 茯神三钱 远志五分 小麦五钱

【用法】 水三盏，先煮小麦减一盏，纳诸药，煎至一盏服。

【主治】 心咳，咳则心痛，喉中介介如梗状，甚则咽肿喉痹。

【加减】 痰多，加川贝母；咽喉肿痛，去半夏；汗多，加五味子。

【方论选录】 前人谓生脉散加茯神、远志，能治心咳。余因参入开泄肺经之药，重用小麦煎汤代水，治之乃验。盖小麦甘平，为心之谷，缓心宁气，大有殊功，即从厚朴麻黄汤意化出。

02765 心救汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】 人参五两 附子一个 白术半斤 肉桂一两 菖蒲五分 良姜三钱

【用法】 水煎服。药后倘得大便止而小便不遗，便有生机，再进一剂，则眼开而舌黑可去，身黑身青俱可尽解；苟服药后仍如前大小便不禁，不必再服药。

【主治】 阴寒直中肾经，舌黑眼闭，下身尽黑，上身尽青，大便出，小便自遗。

【方论选录】 此方参、术多用者，恐少则力量不能胜任，以驾驭夫桂、附之热药也，故必多加而后可望其通达上下，以尽祛周身之寒毒。

02766 心痛汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】 生地二钱 当归一钱 白芍八分 丹皮八分 桔梗六分 枣仁一钱 远志八分 元参八分

【主治】 血虚心痛。

02767 心痛汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】 生地二钱 当归一钱 黄芩八分 栀子八分 川楝一钱 黄连八分 木通五分 桔梗六分

【主治】 实热心痛。

02768 心肾交补丸

【方源】《会约》卷七。

【组成】 熟地八两 枣皮四两 淮药四两 茯苓三两 枣仁（炒）三两 杜仲（盐炒）三两 北五味一两半 当归三两 远志二两

【用法】 炼蜜为丸。淡盐水送下；心虚有火，灯心草煎服；心肺热，用麦冬；胆虚心烦，用枣仁炒，研末，竹叶汤送下。

【主治】 心肾两虚，神志恍惚，梦遗膝软，夜卧不宁。

【加减】 右尺脉弱，阴中无阳，加肉桂二三两；精血干涸，加枸杞四两。

02769 双玉散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 寒水石 石膏各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，食后煎人参汤调下。

【主治】 ①《保命集》：痰热而喘，痰涌如泉。②《景岳全书》：热痰咳嗽，喘急，烦渴，头痛。

02770 双合汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 当归 川芎 白芍 生地黄 陈皮 半夏（姜汁炒） 茯苓（去皮）各一钱 桃仁（去皮）八分 红花三分 白芥子一钱 甘草三分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，水煎熟，入竹沥、姜汁同服。

【主治】 ①《回春》：气虚受风湿，遍身麻痹不仁。②《东医宝鉴·外形篇》：湿痰死血作麻木。

02771 双补丸

【方源】《简易方》引《究原方》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】 鹿角霜三两 熟地黄（洗，再蒸） 沉香 菟丝子（酒浸，蒸，研，焙） 覆盆子（去枝蒂） 白茯苓（去皮） 人参（去芦） 宣木瓜 薏苡仁（炒） 黄耆（炙） 苁蓉（洗，酒浸） 五味

子（去枝，炒） 石斛（去根，炒） 当归（去芦，油浸） 泽泻（切块再蒸）各一两 麝香一钱（别研） 朱砂半两（别研，为衣）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心盐汤送下。

【功用】 常服既济水火，益气安神。

【主治】 ①《简易方》引《究原方》，见《医方类聚》：一切虚损，五劳七伤，面色黧黑，唇口干燥，发渴，目暗耳鸣，心忪气短，食少神倦，夜梦惊恐，四肢痠疼，寒热盗汗，小腹拘急，小便滑数、妇人诸疾。②《直指》：肾虚水涸，燥渴劳倦。

02772 双补丸

【方源】《普济方》卷二一七引《济生》。

【组成】 菟丝子（淘净，酒蒸，擂）二两 五味子一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤或酒送下。

【主治】 精气不足，肾水涸燥，咽干多渴，耳鸣头晕，目视昏，面色黧黑，腰膝疼痛，脚膝痠弱，屡服药不得痊者。

02773 双补汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【异名】 脾肾双补汤(《镜京直指》卷二)。

【组成】 人参 山药 茯苓 莲子 芡实 补骨脂 苁蓉 萸肉 五味子 巴戟天 菟丝子 覆盆子

【主治】 ①《温病条辨》：老年久痢，脾阳受伤，食滑便溏，肾阳亦衰。②《镜京直指》：痢久脾肾阳衰，脉象细弱。

【方论选录】 方中以人参、山药、茯苓、莲子、芡实甘温而淡者补脾渗湿，再莲子、芡实水中之谷，补土而不克水者也；以补骨脂、苁蓉、巴戟、菟丝、覆盆、萸肉、五味酸甘微辛者，升补肾脏阴中之阳，而兼能益精气安五脏者也。

02774 双和汤

【方源】《局方》卷五（宝庆新增方）。

【异名】 双和散(《内外伤辨》卷中)。

【组成】 白芍药七两半 当归（洗，酒浸） 黄耆（蜜炙） 川芎 熟地黄（净洗，酒蒸）各三两 甘草（炙） 肉桂（去皮，不见火）各二两 二钱二钱半

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏半，加生姜三片，枣子一个，煎至六分，空心、食前服。

【功用】 调中养气，益血育神，和胃进食，补虚损。

【主治】 男子、妇人五劳、六极、七伤，心肾俱虚，精血气少，遂成虚劳。百骸枯瘁，四肢倦怠，寒热往来，咳嗽咽干，行动喘乏，面色萎黄，略有所触，易成他疾；或伤于冷，则宿食不消，脾疼腹痛，泻痢吐逆；或伤于热，则头旋眼晕，痰涎气促，五心烦热；或因饥饱动作，喜怒惊恐，病随而至，或虚胀而不思食，或多食而不生肌肉，心烦则虚汗盗汗，一切虚劳不敢服燥药者。

【宜忌】 忌生冷、果子等物。

02775 双和汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 熟地黄 白芍（酒炒）各一钱 黄耆（蜜酒炒） 当归各七分 川芎 甘草（炙）各四分 肉桂三分（有热，去之） 生姜一片 红枣一个（去核）

【用法】 水煎，温服。

【主治】 麻后虚羸。

02776 双和散

【方源】《医学发明》卷九。

【组成】 黄耆 熟地黄 当归 川芎各一两 白芍药三两半 官桂 甘草各三分 人参三钱

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二盏，加生姜三片，肥枣一只，同煎至八分，去滓温服。

【功用】 补益血气。

【主治】 虚劳少力。

02777 双治汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 附子一钱 黄连一钱 白芍五钱 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 胃痛，得寒则痛，得热亦痛。

【方论选录】 用黄连以清心火，用附子以祛胃寒。用白芍、甘草为君，使两家有和解之好。盖芍药、甘草，最能入肝平木，肝气既平，自然不去克胃，而又去生心，调和于心胃之间，实有至理，非漫然而用之者也。

02778 双柏散

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】 大黄二斤 薄荷 黄柏 泽兰各一斤 侧柏二斤

【用法】 上为细末。开水、蜜调敷。

【功用】《外伤科学》：活血祛瘀，消肿止痛。

【主治】 ①《中医伤科学讲义》：跌打扭伤，筋肉肿痛，发红。②《新急腹症学》：各期阑尾炎有包块者。

02779 双砂汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 缩砂 草果 威灵仙各等分

【用法】 加砂糖少许，清水煎服。

【功用】 化骨为涎。

【主治】 骨鲠。

02780 双黄丸

【方源】《医林绳墨大全》卷七。

【组成】 大黄 蒲黄 大蓼子（即水红花子） 槟榔 鸡肫皮（焙）各等分

【用法】 上为细末。每服大人五钱，小儿二钱五分，日出时酒调下。

【主治】 痞块。

02781 双解散

【方源】《宣明论》卷六。

【异名】 通气防风散、通解散(《直格》卷下)。

【组成】 益元散七两 防风通圣散七两

【用法】 上二药一处相和，搅匀。每服三钱，水一盏半，加葱白五寸，盐豉五十粒，生姜三片，煎至一盏温服。

【功用】 ①《宣明论》：内外双解，宣通气血。②《玉机微义》：发表攻里。

【主治】 ①《宣明论》：风寒暑湿，饥饱劳役，内外诸邪所伤，无问自汗，汗后杂病，但觉不快，及小儿疮疹。②《直格》：伤寒身热头疼，拘倦强痛，无问自汗无汗，憎寒发热，渴与不渴，伤寒疫疠，汗病两感，风气杂病，一切旧病发作；或里热极甚，腹满实痛，烦渴谵妄，下后未愈，或证未全，或中瘴气、马气、羊气及一切秽毒，并漆毒、酒毒、食一切药毒，及坠堕打扑伤损疼痛，或久新风眩头疼，中风偏枯，破伤风，洗头风，风痫病，或妇人产后诸疾，小儿惊风，积热，疮疡疹痘。

【宜忌】《直格》：孕妇及产后月事经水过多，并泄泻者不宜服。

【方论选录】《伤寒温疫条辨》：防风、麻黄以解表，薄荷、荆芥以清上，大黄、芒消以涤肠胃，滑石、栀子以利水道，桔梗、石膏以清肺胃之邪，而连翘又所以祛诸经之游火。风热为患，肝木主之，芎、归、白芍和肝血以熄风热，而白术、甘草又所以健运脾土，能胜湿热御风火故也。方中倍用六一者，以伏气所蒸之湿热，半从肌表而泄，半从水道而利也。

02782 双解散

【方源】《医方集解》卷五。

【组成】 防风通圣散去大黄 芒消

【用法】 加生姜、葱白，水煎服。

【功用】 表里双解，和血调气。

【方论选录】 麻黄、防风、荆芥、薄荷、川芎以解表，黄芩、栀子、连翘、石膏、滑石以解里，复有当归、芍药以和血，桔梗、甘草、白术以调气，故曰双解。

02783 双解贵金丸

【方源】《外科大成》卷一。

【异名】 双解金桂丸(《疡医大全》卷七)。

【组成】 大黄一斤 白芷十两

【用法】 上为末，水为丸。每服三五钱，五更时用连须葱大者十余根，黄酒一碗，煮葱烂，取酒送下。盖卧出汗，过三二时，行一二次见效。老人虚人，每服一钱，用人参加生姜煎汤送下，过一时，再一服，得睡，上半身得汗则已。

【功用】 宣通攻利。

【主治】 背疽诸毒，大闷坚硬，便秘，脉沉实者。

【方论选录】 此宣通攻利之剂也，济之以葱、酒，力能发汗，故云双解。

02784 双解复生散

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】 荆芥 防风 川芎 白芍 黄芩 麻黄 甘草各五分 薄荷 山栀 当归 连翘 滑石 金银花 羌活 人参 白术各八分 大黄 芒消各二钱

【用法】 水二碗，表症甚者，加生姜三片，葱头二茎，里症甚者，临服加生蜜三匙和服。

【功用】 发表攻里。

【主治】 痈疽发背，诸般肿毒，初起憎寒发热，四肢拘急，内热口干，大小便秘。

02785 双解消毒散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 黄芩 栀子 连翘 薄荷 甘草 大黄 麻黄 羌活 白芷 防风 荆芥 射干 苍术 当归 川芎

【用法】 加生姜三片，水二钟，煎一钟，食远热服。

【主治】 大头风脖子肿。

02786 双解通圣汤

【方源】《金鉴》卷五十三。

【组成】 麻黄 朴消 大黄 当归 赤芍 川芎 白术（土炒） 石膏 滑石 桔梗 栀子 连翘（去心） 黄芩 薄荷 甘草（生） 荆芥 防风

【用法】 生姜、葱白为引，水煎服。

【功用】 表里两解。

【主治】 小儿伤寒热盛，感冒夹热，以及小儿温病等。

02787 双解通圣散

【方源】《金鉴》卷八十五。

【组成】 防风 荆芥 当归 白芍（酒炒） 连翘（去心） 白术（土炒） 川芎 薄荷 麻黄 栀子各五钱 黄芩 石膏（煅） 桔梗各一两 甘草（生）二两 滑石三两

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一钟半，煎八分，澄去滓，温服。外以黄连膏抹之。

【功用】 疏表清里。

【主治】 唇风。初起发痒，色红作肿，日久破裂流水，疼如火燎，又似无皮，如风盛则唇不时瞤动。

02788 引下汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】 当归 白芍 生地 熟地各二钱 川芎一钱 炒大黄三钱 童便一盏

【主治】 逆经吐血。

02789 引气汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】 橘皮半两 细辛（去苗） 白术 桂心各三分 紫苏一两 麻黄（去节，汤洗） 杏仁（麸炒，去皮尖） 半夏（汤洗七次去滑）各一两一分 石膏八两

【用法】 上为散。每服四钱，水两盏，加生姜七片，竹叶五片，煎七分，去滓食后服。

【主治】 肺劳实热，气喘鼻张，面目苦肿。

02790 引火汤

【方源】《辨证录》卷三。

【异名】 增补引火汤（《外科医镜》）。

【组成】 熟地三两 巴戟天一两 茯苓五钱 麦冬一两 北五味二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《辨证录》：阴蛾。少阴肾火上炎，咽喉肿痛，日轻夜重，喉间亦长成蛾，宛如阳症，但不甚痛，而咽喉之际，自觉有一线干燥之至，饮水咽之稍快，至水入腹，而腹又不安，吐涎如水甚多。②《洞天奥旨》：阴症双蛾、单蛾，喉痹。

【方论选录】 方用熟地为君，大补其肾水；麦冬、五味为佐，重滋其肺金；又加入巴戟之温，则水火既济；更增茯苓之前导，则水火同趋，而共安于肾宫。

02791 引交汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】 熟地 麦冬各一两 炒枣仁 山茱萸 沙参各五钱 茯神三钱 玄参五钱 白芍二两 炒栀子三钱 菖蒲 破故纸各五分

【用法】 水煎服。

【主治】 水火两衰，热极不能熟睡，日夜两眼不闭。

02792 引神丹

【方源】《眼科阐微》卷二。

【组成】 谷精草 石菖蒲 枸杞 草决明 黑参 菊花 蝉退 木贼

【用法】 共用河水煎汤，入瓷罐内封固，重汤煮粘为度，入好金墨末一锭、白矾末一分（生用）调匀，晒干再研，广胶水些许作锭。用人乳磨点，一日三四次，或五七次。

【主治】 云翳自根而退，目中神光久闭，须引而方出者。

【方论选录】 方中谷精草、石菖蒲为君；枸杞、黑参、菊花为臣；草决明为佐；蝉退、木贼为使。

02793 引窍汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】 白芍一两 当归五钱 龙齿末（火煅）二钱 菟丝子三钱 巴戟天三钱 麦冬五钱 柏子仁二钱（炒） 枣仁三钱 茯神三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 肝血亏虚有火，神气不安，卧则魂梦飞扬，闻声则惊醒而不寐，通宵不能闭目者。

02794 引气归血汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】 白芍五钱（酒炒） 当归五钱（酒洗） 白术三钱（土炒） 甘草一钱 黑芥穗三钱 丹皮三钱 姜炭五分 香附五分（酒炒） 麦冬三钱（去心） 郁金一钱（醋炒）

【用法】 水煎服。

【主治】 妊妇大怒之后，忽然腹痛吐血，因而堕胎；及堕胎之后，腹痛仍未止者。

02795 引火两安汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 玄参一两 麦冬二两 丹皮五钱 沙参一两 黄连一钱 肉桂一钱

【用法】 水煎服。连服四剂，而火乃定，减黄连、肉桂各三分，再服数剂。

【主治】 心肾不交，阳举不倒，胸中烦躁，两目红肿，口中作渴，饮水不解者。

【方论选录】 此方补阴以退阳，补阴之中，又无腻重之味，得黄连、肉桂同用，以交心肾，心肾合而水气生，水气生而火自解。况玄参、麦冬、沙参又是退火之味，仍是补水之品，所以能退其浮游之火，解其亢阳之祸也。

02796 引精止血汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】 人参五钱 白术一两（土炒） 茯苓三钱（去皮） 熟地一两（九蒸） 山萸肉五钱（蒸） 黑姜一钱 黄柏五分 芥穗三钱 车前子三钱（酒炒）

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人交合则流血不止，终年累月不得愈者。

02797 孔子枕中神效方

【方源】《医心方》卷二十六引《葛氏方》。

【异名】 孔子大圣知枕中方（《千金》卷十四）、孔子枕中散（《千金翼》卷十六）、龟甲散（《圣济总录》卷一八六）、补心汤（《医方类聚》卷一五九引《永类钤方》）、孔子大圣枕中方（《医学纲目》卷十六）、孔子大圣枕中汤（《赤水玄珠》卷十四）、枕中丹（《证治宝鉴》卷六）、大聪明枕中方（《医林绳墨大全》卷四）、孔圣枕中丹（《医方集解》）、大圣枕中方（《医略六书》卷二十二）。

【组成】 龟甲 龙骨 远志 石菖蒲各等分

【用法】 上为末。食后服方寸匕，一日三次。

【功用】 滋阴补肾，养心益智。

①《医心方》引《葛氏方》：益智。②《圣济总录》：开心智，强力益志。③《医方集解》：补心肾

【主治】 ①《千金》：好忘。②《类证治裁》：癫久不愈。

【方论选录】《医方集解》：此手足少阴经药也。龟者介虫之长，阴物之至灵者也；龙者鳞虫之长，阳物之至灵者也；借二物之阴阳，以补我身之阴阳，借二物之灵气，以助我心之灵气也；远志苦泄热而辛散郁，能通肾气，上达子心，强志益智；菖蒲辛散肝而香舒脾，能开心孔而利九窍，去湿除痰；又龟能补肾，龙能镇肝，使痰火散而心肝宁，则聪明开而记忆强矣。

【备考】 本方改为丸剂，名“枕中丸”。（见《全国中药成药处方集》南京方）。

02798 丑宝丸

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】 牛黄五钱 琥珀一钱 辰砂一钱（为衣） 雄黄一钱 胆星一两 礞石五钱（火煅） 沉香一钱五分 犀角一钱五分 黄芩二两（炒） 大黄二两（酒蒸） 天麻五钱（姜炒） 石菖蒲一两 僵蚕七钱（姜炒） 蝉蜕五钱（去足） 猪心二具（用血）

【用法】 上为末，竹沥、猪心血为丸，如绿豆大。每服六七十丸，临卧薄荷汤送下。

【功用】 祛风清火，顺气豁痰，益志除惊，安魂定魄。

【主治】 一切怔忡痫痓，难状之疾。

02799 巴豆丸

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【异名】 通灵丸（《外科精义》卷下）

【组成】 巴豆十粒（去皮心，炒） 松脂半两

【用法】 上药捣烂，撚如枣核。塞耳中。汗出即愈。

【主治】 ①《圣济总录》：耳聋。②《普济方》：耳聋鼻塞，不闻音声香臭者。

02800 巴豆丸

【方源】《普济方》卷五十四。

【组成】 巴豆二枚（去皮，熬） 桃仁（去皮，熬）二枚 松脂 大豆许

【用法】 上药捣为二丸。绵裹塞耳中。

【主治】 耳鸣。

02801 巴豆蒜

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 大蒜一瓣 巴豆一粒（去皮膜，慢火炮极热）

【用法】 将大蒜中挖一孔，纳入巴豆，用新绵包定，塞耳中。三次效。

【主治】 耳聋。

02802 巴附丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】 葫芦巴一两半 附子（炮裂，去皮脐） 硫黄（研）各一两 茴香子（炒）三分 槟榔（锉） 桂（去粗皮）各半两

【用法】 上为末，和匀，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、日午、临卧温酒或盐汤送下。

【主治】 肾脏虚冷，腹胁胀满。

02803 巴黄散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 巴豆（去外壳）15克 雄黄1克

【用法】 上为细末，用三四层纱布包裹。每日涂患部三四次，每次一二分钟，直至痒感减退为止。

【主治】 神经性皮炎。

02804 巴戟丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】巴戟一两 远志一两（去心） 五味子一两 牛膝一两（去苗） 熟干地黄三两 柏子仁一两 桂心一两 肉苁蓉二两（酒浸，削去皱皮，炙干） 鹿茸一两半（去毛，涂酥，炙微黄） 菟丝子一两半（酒浸三日，晒干，别捣为末） 补骨脂一两 干漆一两（捣碎，炒令烟出）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹及晚食前以温酒送下。

【主治】五劳六极七伤，骨髓虚惫，四肢无力。

02805 巴戟丸

【方源】方出《圣惠》卷五十四，名见《普济方》卷一九一。

【组成】巴豆十枚（去皮心，研，纸裹压去油） 大戟半两（锉碎，微炒） 甜葶苈半两（生用） 川大黄（锉碎，微炒）半两 桂心半两 芫花半两（醋拌，炒令干） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸微炒，别研）

【用法】上为末，入巴豆、杏仁研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，空心以温茶送下。如人行五里，以热茶投，利下粘滑物为效。

【主治】十种水气，通身浮肿，食不消化，心腹胀满。

02806 巴戟丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】巴戟天（去心）三分 黄耆（锉）一两 远志（去心） 牛膝（去根，酒浸，焙） 熟干地黄（焙） 山芋各三分 桂（去粗皮） 五味子 附子（炮裂，去皮脐）各半两 猪肾一对（去脂膜，破开，纳蜀椒四十九粒，盐花少许拌匀，湿纸裹，煨熟，去椒，细研如糊，搜诸药）

【用法】上十味，捣罗九味为末，以猪肾为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下。

【主治】骨髓虚惫，腰膝无力。

02807 巴戟丸

【方源】《医学发明》卷九。

【组成】五味子 川巴戟（去心） 肉苁蓉 人参 菟丝子 熟地黄 覆盆子 白术 益智仁（炒） 骨碎补（洗去毛） 白龙骨 茴香 牡蛎各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前米饮送下。

【功用】①《医学发明》：收敛精气，补真戢阳，充越肌肤，进美饮食。②《医方大成》：补精神，止汗。

【主治】①《医学发明》：肝肾俱虚，面色白而不泽。②《杂病源流犀烛》：肝肾两伤，精气衰弱，脉象空虚，悲愁欲哭，面色夭白，为脱精脱神。

02808 巴戟丸

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】良姜六两 紫金藤十六两 巴戟三两 青盐二两 肉桂（去粗皮） 吴茱萸各四两

【用法】上为末，酒糊为丸。每服二十丸，日午、夜卧各一服，暖盐酒送下，盐汤亦得。

【功用】补肾脏，暖丹田，兴阳道，减小便，填精益髓，驻颜润肌。

【主治】元气虚惫，面目黧黑，口干舌涩，梦想虚惊，眼中冷泪，耳作蝉鸣，腰胯沉重，百节痠疼，项筋紧急，背脾劳倦，阴汗盗汗，四肢无力，及妇人子宫久冷，月脉不调，或多或少，赤白带下。

【备考】本方方名，《本草纲目》卷十八引作"紫金藤丸"。

02809 巴戟丸

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】巴戟（去骨） 生地黄（酒焙）各两半 桑螵蛸（切破，炙） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 山药 山茱萸肉 菟丝子（酒煮）各一两 附子（炮） 肉桂（勿见火）各五钱 远志（甘草汤泡，去骨）四钱 石斛（去根）八钱 鹿茸一对（酥炙）

【用法】上为末，炼白蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心、卧时，米饮、温酒任下，羊肾汤亦佳，黄丝汤尤妙。

【主治】胞痹虚寒，脐腹痛，溲数不利，睡则遗尿。

02810 巴戟散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】巴戟三分 五加皮一两 萆薢一两（锉） 牛膝一两（去苗） 石斛一两（去根，锉） 防风一两（去芦头） 白茯苓一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心三分 甘草半两（炙微赤，锉） 当归三分 羌活三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】虚劳，腰脚疼痛，行立不得。

02811 巴戟散

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】巴戟天（去心） 楝实（取肉，麸炒）

木香 茴香子（炒） 附子（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】 上为散。每服一钱匕，空心温酒调下

【主治】 小肠疝气。

02812 巴豆油膏

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 巴豆4克 蛇床子4克 大黄4克 海桐皮4克 羊蹄根4克 胡麻油10毫升 凡士林20克

【用法】 前五味药为细末，再与麻油、凡士林调膏。外用。

【主治】 神经性皮炎。

02813 巴戟天丸

【方源】 《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】 巴戟天半两（穿心者） 破故纸半两（炒） 舶上茴香半两（炒） 黑附子一两（去皮脐，锉，盐炒）

【用法】 上为末，用好酒熬一半成膏，留一半搜拌为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前荆芥盐汤送下。

【主治】 肾脏虚久冷，脐腹疼痛，饮食无味，及腰膝疼痛，少力，精虚梦泄，耳内蝉鸣。

02814 巴戟天汤

【方源】 《张氏医通》卷十四。

【组成】 巴戟天二钱（去心） 附子（炮） 五加皮（酒洗） 石斛 甘草（炙） 茯苓 当归各一钱 牛膝（酒炒） 川萆薢（盐、酒炒）各钱半 肉桂 防风 防己（酒洗）各五分 生姜三片

【用法】 水煎，空心温服。

【主治】 冷痹，脚膝疼痛，行步艰难。

02815 巴菊枸杞丸

【方源】 《异授眼科》。

【组成】 川巴戟（去心）三两 菊花一两 枸杞六两 肉苁蓉（酒洗）四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服五十丸，盐汤送下。

【主治】 肾虚不足，青膜遮盖瞳人，视物不明。

【宜忌】 戒酒色。

02816 水火散

【方源】 《良朋汇集》卷三。

【组成】 黄连二两 干姜一两

【用法】 上为细末。搽于疮上。

【主治】 ①《良朋汇集》：口内生疮。②《理瀹》：心脾蕴热，口舌糜烂。

02817 水龙散

【方源】 《医级》卷八。

【组成】 枯矾 黄丹各五分 麝香一分 水龙骨一钱（即船底老油灰，煅，研）

【用法】 上为细末。以棉梗子搅尽耳内脓水，用药一字，掺灌耳中，一日二次。

【主治】 肾热上冲，耳内生脓肿痛；或因浴水入耳，留湿生脓，名聤耳。

【宜忌】 耳内勿令风入。

02818 水仙膏

【方源】 《温病条辨》卷一。

【组成】 水仙花根不拘多少

【用法】 剥去老赤皮与根须，入石臼捣如膏。敷肿处，中留一孔出热气，干则易之，以肌肤上生黍米大小黄疮为度。

【主治】 温毒外肿，一切痈疮。

【方论选录】 水仙花得金水之精，隆冬开花，味苦微辛，寒滑无毒。苦能升火败毒，辛能散邪热之结，寒能胜热，滑能利痰，其妙用全在汁之胶粘，能拔毒外出，使毒邪不致深入脏腑伤人也。

02819 水芝丸

【方源】 《医学发明》卷七。

【组成】 莲实（去皮）不拘多少

【用法】 用好酒浸一宿，入大猪肚内，用水煮熟，取出焙干，研为极细末。酒糊为丸，如鸡头子大。每服五七十丸，食前温酒送下。

【功用】 ①《医学发明》：补肾益精。②《医学入门》：补五脏诸虚。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：下焦真气虚弱，小便频多，日夜无度。②《增补内经拾遗》：白淫。

【备考】 本方方名，《本草纲目》引作“水芝丹”。

02820 水沉散

【方源】 《杨氏家藏方》卷三。

【异名】 水沉汤（《朱氏集验方》卷一）。

【组成】 香薷叶三两 白茯苓一两（去皮） 厚朴（去粗皮，蘸生姜汁炙令紫色）三两 白扁豆一两 丁香半两 甘草半两（炙）

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏，入好酒半盏，同煎至一盏，水中沉冷服，不拘时候。

【主治】 伏暑伤冷，霍乱转筋，虚烦躁渴，心腹撮痛，吐利交作，四肢逆冷。

02821 水陆丹

【方源】 《证类本草》卷十二引《本草图经》。

【异名】 水陆二仙丹（《洪氏集验方》卷三）、经验水陆二仙丹（《景岳全书》卷五十九）。

【组成】 金樱子 鸡头实

【用法】 煮金樱子作煎，鸡头实捣烂晒干，再治下筛，为丸服之。

【功用】 ①《证类本草》引《本草图经》：益气补真。②《洪氏集验方》：固真元，悦泽颜色。

【主治】 ①《普济方》引《仁存方》：白浊。②《医统》引《录验》：精脱，肾虚梦遗。

【宜忌】 《洪氏集验方》：此药稍闭，当以车前子末解之。

【方论选录】 《医方考》：金樱膏濡润而味涩，故能滋少阴而固其滑泄；芡实粉枯涩而味甘，故能固精浊而防其滑泄。金樱生于陆，芡实生于水，故曰水陆二仙。

【备考】 ①《洪氏集验方》：鸡头去外皮取实，连壳杂捣令碎，晒干为末；复取糖樱子，去外刺并其中子，捣碎，入甑中蒸令熟，却用所蒸汤淋三两过，取所淋糖樱汁入银铫，慢火熬成稀膏，用以和鸡头末为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐汤送下。②《普济方》引《仁存方》：金樱膏同酒糊和芡粉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前酒送下。一方用妇人乳汁为丸妙。

02822 水肿串

【方源】 《串雅补》卷二。

【组成】 芫花（醋炒）五钱 甘遂三钱 大戟一钱 千金霜二钱 莪茇三钱 槟榔三钱 牙皂二钱 黑白丑各二钱

【用法】 上为末。每服一钱，白汤送下；或水泛为丸，白汤送下。

【主治】 水肿。

02823 水调散

【方源】 《普济方》卷三十八引《肘后方》。

【组成】 老山栀子不拘多少（不去皮，研细，如油出成团，即擘开）

【用法】 猛火焙干，手擦细罗取末，瓷器盛贮。临发时新汲水调服。

【主治】 ①《普济方》引《肘后方》：多酒肠风及泻鲜血。②《证类本草》引《梅师方》：热毒下血，或因食物发动。

【备考】 按《证类本草》引《梅师方》用栀子三十枚（擘），水三升，煎取一升，去滓服。

02824 水眼药

【方源】 《银海指南》卷三。

【组成】 硼砂 枯矾各等分

【用法】 上为细末。白蜂蜜为君，拌匀炖透。不时搽抹。

【主治】 眼睑沿烂。

02825 水银膏

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 核桃仁12克 大风子仁12克 蓖麻仁12克 水银3克 黄丹3克 冰片0.6克

【用法】 上药混合，共捣烂如泥，用白布包好，在木炭火上烤热，发现布外有油即止。即将此油涂患处，每日数次。

【主治】 神经性皮炎。

02826 水蛭丸

【方源】 《医统》卷三十二引《直指》。

【组成】 三棱（炮） 莪术（炮） 干漆（炒烟尽） 牛膝（酒洗） 虻虫（糯米炒） 琥珀 肉桂 硇砂 水蛭（石灰炒赤色） 大黄各等分

【用法】 上为末，用生地黄自然汁和米醋调匀为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心温酒或童便送下。

【主治】 血蛊气蛊，腹硬如石。

02827 水蛭饮

【方源】 《圣济总录》卷一五一。

【组成】 水蛭八十枚（糯米同炒，米熟去米） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒）一百枚 虻虫（去翅足，微炒）八十枚 大黄（锉，炒）三两

【用法】 上锉细。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓温服，有顷再服。当下血；如未下，明日再服。

【主治】 室女月水不通，腹满有瘀血。

02828 水晶桃

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 核桃仁一斤 柿霜饼一斤

【用法】 先将核桃仁饭甑蒸熟，再与柿霜饼同装入瓷器内蒸之，融化为一，晾冷。随意服之。

【主治】 肺肾两虚，或咳嗽，或喘逆，或腰膝痠疼，或四肢无力。以治孺子尤佳。

【方论选录】 核桃仁乃果核之最大者，其仁既多脂，味更香美，为食中佳品，性善补肾可知。柿霜色白入肺，而甘凉滑润，其甘亦能益肺气，其凉也能清肺热，其滑也能利肺痰，其润亦能滋肺燥，与核桃同用，肺肾同补，金水相生，虚者必易壮实。

02829 水解散

【方源】 《外台》卷三引《古今录验》。

【组成】 麻黄四两（去节） 大黄三两 黄芩三两 桂心二两 甘草二两（炙） 芍药二两

【用法】 上为散。患者以生熟汤浴讫，每服方寸匕，以暖水下。覆取汗，或利则便愈。丁强人服二方寸匕。

【主治】 时疫初起，头痛壮热，或疮疹出而不快，心胸烦躁，或虽出而仍发热者。

①《外台》引《延年秘录》：天行头痛、壮热二日。②《医方类聚》引《圣惠》：时气烦躁，头痛壮热。③《类证活人书》：疱疮未出，烦躁，或出尚身体发热。④《普济方》：一切热疾，头痛心躁。⑤《奇效良方》：疮疹出不快，烦躁不得眠，或出而身体尚有热者。

【宜忌】 忌海藻、生葱、菘菜、生菜。

【方论选录】《医方集解》：此足太阳、阳明药也。麻黄能开腠发汗，桂心能引血化汗，黄芩以清上中之热，大黄以泻中下之热，甘草、白芍能调胃而和中。盖天行温疫，郁热自内达外，与伤寒由表传里者不同，故虽一二日之浅，可以汗下兼行，不必同于伤寒之治法也。

【备考】《活人书》：此调风实之人，三伏中宜用，若去大黄，即春夏通用。

02830 水澄膏

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】 白及 白蔹各四钱 蔚金一对 大黄 黄柏后 黄药子 榆皮各钱半 乳香 没药 雄黄各半两

【用法】 上为细末，用新汲水一碗，药末不拘多少，澄于水内，药定去水。敷于肿处，上用白纸封之，用鸡翎掠水湿润。

【主治】 风热肿毒，赤红色，攻冲疼痛不止。

02831 水澄膏

【方源】《金鉴》卷六十六。

【组成】 朱砂二钱（水飞） 白及 白蔹 五倍子 郁金各一两 雄黄 乳香各五钱

【用法】 上为细末，米醋调浓。以厚纸摊贴之。

【主治】 舌疳，颔下肿核溃后。

02832 水葫芦丸

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】 百药煎三两 甘草一两 乌梅肉 白梅肉各半两 人参 干葛 麦门冬各一两半 紫苏叶半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。含化一丸，不拘时候。如无百药煎，以余甘子代尤妙。

【功用】《古今医鉴》：解烦渴，生津液。

【主治】 冒暑伏热，欲渴引饮，口干无味。

【备考】《古今医鉴》无"紫苏叶"。

02833 水木华滋汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 生地五钱 当归二钱 白芍一钱五分 丹皮二钱 山栀一钱五分 羚羊角一钱五分 木瓜一钱（酒炒） 党参四钱 茯苓二钱 白术一钱 川断二钱 牛膝二钱 人乳一杯 桑枝一尺

【用法】 水煎服。

【主治】 肝热胆泄，口苦，血不养筋，筋急而挛，发为筋痿。

02834 水火分清饮

【方源】《慎斋遗书》卷九。

【组成】 茯苓 芡实 石莲 益智 萆薢 山药各等分 甘草减半

【用法】 水煎服。

【主治】 沥精白浊。

【加减】 尿色赤，加麦冬、泽泻、黄芩；小便数，加乌药、菖蒲。

02835 水火分清饮

【方源】《回春》卷四。

【组成】 益智 萆薢 石菖蒲 赤茯苓 猪苓 车前子 泽泻 白术（去芦） 陈皮 枳壳（麸炒） 麻黄各一钱 甘草三分

【用法】 上锉一剂。半酒半水煎，空心温服。

【主治】 赤白浊。

【加减】 久病，去麻黄，易升麻。

02836 水沉金丝膏

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】 水溶金丝膏（《普济方》卷三一四）。

【组成】 沥青 白胶各一两

【用法】 春、秋宜用油，夏宜油蜡二钱半，冬宜用油蜡四钱，熔开，下沥青、白胶，用槐枝搅匀，绵纸滤过，入冷水中，扯一千余遍。如疮透了，吃数丸；或填于疮口，或摊纸上贴之，勿令火炙。

【主治】 一切恶疮。

02837 水肿至神汤

【方源】《重订通俗伤寒论》引《随山宇方钞》。

【组成】 浙茯苓二两（切小块） 生於术（黄土炒） 杜赤小豆 车前草各一两 大麦须五钱 小枳实二钱 六神曲四钱

【用法】 大罐浓煎，须一日夜服尽。连服三剂，尿畅肿消。

【主治】 脾虚水肿。

02838 水煮木香丸

【方源】《三因》卷十二。

【组成】 当归（洗） 芍药 甘草（炙） 诃子（去核）各半两 厚朴（去粗皮，切，姜制） 青皮 陈皮各一两 缩砂仁 木香（炮）各一分 罂粟壳（切，醋淹，炒）五两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，一两作五丸。每服一丸，水一盏，煎七分，食前温服。

【主治】 肠胃虚弱，风湿进袭，泄泻水谷，滞下脓血，疼刺疼痛，里急后重，日夜无度。

02839 水煮木香丸

【方源】《局方》卷六（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 陈皮（去白） 甘草（炒） 青皮（去白） 木香各一两一分 白芍药 当归（去芦）各二两 干姜（炮）一两半 诃子皮（去核）二两半 罂粟壳（去蒂盖，蜜炒黄色）八两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两作六丸。每服一丸，水一盏，煎至七分，和滓空心温服；不拘时候亦可。

【主治】 一切赤白痢，脓血相杂，里急后重；或脏腑滑泄，日夜无度；或积寒久冷，脐腹疼痛，不思饮食。

02840 水煮木香丸

【方源】《局方》卷六（宝庆新增方）。

【组成】 当归（洗，去芦） 诃子（炮，去核） 木香（不见火）各六两 青皮（去白） 甘草（煨赤）各二两四钱 罂粟壳（去瓤）二两八钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，水八分盏，煎至六分，空心、食前温服。

【主治】 一切赤白痢，脓血相杂，里急后重；或脏腑滑泄，日夜无度；或积寒久冷，脐腹疼痛，不思饮食。

02841 水煮金花丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 南星 半夏各二两（生用） 天麻五钱 雄黄二钱 白面三两 寒水石一两（烧存性）

【用法】 上为细末，滴水为丸。每服五七十丸至百丸，煎浆水沸，下药，煮令浮为度，滤出，淡浆水浸。另用生姜汤送下。

【主治】 风痰热咳嗽，其脉弦，面青，四肢满闷，便溺秘涩，心多躁怒。

02842 水煮金花丸

【方源】《洁古家珍》。

【组成】 南星一两（生用） 半夏一两（生用） 天麻五钱 雄黄二钱 白面三两

【用法】 上为细末，滴水为丸。每服五十丸至一百丸，先煎浆水沸，下药煮令浮为度，捞出，淡浆水浸，另用生姜汤送下。

【主治】 风痰内蕴，咳嗽，头痛。

①《洁古家珍》：风痰咳嗽，其脉弦面青，四肢满闷，便溺秘涩，心多躁怒。②《玉机微义》：厥阴，太阴风痰头痛，每发时两颊青黄，眩晕，目不欲开，懒于言语，身重，兀兀欲吐。③《张氏医通》：食积痰饮积聚，年久不散者。

【备考】 方中白面，《玉机微义》引作“白术”。

02843 打虫丸

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】 槟榔一两半 木香一两 芜荑三两 雷丸三两 枳实一两半（炒） 青皮（炒）一两半 泽泻一两半 鹤虱二两 史君三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，寒湿生虫，开口花椒汤送下；湿热生虫，东向楝根皮汤送下。

【主治】 虫蠹，脉缓滑者。

02844 打老儿丸

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【异名】 延寿丹（《医统》卷九十三）、还少丹（《一草亭》）。

【组成】 石菖蒲（去须毛，嫩桑枝条拌蒸，晒干，不犯铁器） 干山药（蒸出晒干） 川牛膝（去芦头，用黄精自然汁浸，漉出，酒浸一宿，若无黄精，酒浸三日，漉出，细锉，焙干） 远志（去心，甘草汤浸一宿） 巴戟（去心，枸杞子汤浸一宿，漉出，酒浸一伏时，菊花同焙令黄，去菊花） 续断（去筋，酒浸一伏时，焙干） 五味子（蜜浸蒸，从巳至申。又以浆水浸一宿，焙干） 楮实子（水浸三日，去浮者，晒干，酒浸一伏时，漉出蒸，从巳至亥，焙干） 杜仲（去皮，酥蜜炒去丝） 山茱萸（取肉，暖火焙干） 茯神（去皮心，捣细，子水盆内搅，去浮者） 熟地（瓷锅柳木甑蒸之，摊令气歇，拌酒再蒸，晒干，勿犯铜铁器） 小茴香（酒浸一宿，炒） 肉苁蓉（酒浸一宿，刷去沙土浮甲，劈破中心，去白膜） 枸杞子各等分

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下；或白汤送下亦可。

【功用】 ①《会约》：补精生血，益气力，健筋骨，延寿。②《一草亭》：滋补肾水，温养少火，久服却病延年。

【主治】 五劳七伤，体虚羸弱，尿频阳萎，遗精白浊，久无子嗣。

①《万氏家抄方》：五劳七伤，阳事不举，真气衰弱，精神短少，小便无度，眼目昏花，腰膝疼痛，两脚麻冷，不能行走。②《医方集解》：脾肾虚寒，血气羸乏，不思饮食，发热盗汗，遗精白浊，肌体瘦弱，牙齿浮痛。③《会约》：诸虚百损。④《北京市中药成方选集》：气血两亏，肾寒精冷，

腰疼腿酸、久无子嗣。

【备考】《一草亭》无五味子，用法以枣肉二百枚捣和，加炼蜜为丸。

02845 扑粉

【方源】《医方考》卷一。

【组成】 龙骨 牡蛎 糯米各等分

【用法】 上为末。扑身。

【主治】 服发汗药，出汗过多者。

【方论选录】 汗多有亡阳之戒，故用龙骨、牡蛎之涩以固脱；入糯米者，取其粘腻云尔，乃卫外之兵也。

02846 艾叶汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】 艾叶（炒） 芎劳 当归（炙，锉） 干姜（炮） 白术各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】 妊娠胞中虚冷，致胎萎燥不长。

02847 艾煎丸

【方源】《三因》卷十八。

【组成】 食茱萸（汤洗） 当归各七钱半 熟地黄 白芍药各一两半 石菖蒲（炒） 川芎 人参各一两 熟艾四两（用糯米饮调作饼，焙）

【用法】 上为末，酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，酒、饮任下。

【功用】 常服补营卫、固经脉。

【主治】 ①《三因》：崩伤淋沥，小肠满痛。②《得效》：妇人室女经候不调，脐腹冷痛，腹常胀满，至晚则增。

【备考】《得效》：本方用法：用缩砂、香附汤送下。

02848 艾煎丸

【方源】《普济方》卷三二三引《兰室秘藏》。

【异名】 艾附丸(《医方大成》卷九引《澹寮》)。

【组成】 北艾叶 大当归各二两 香附子四两

【用法】 上醋煮半日，焙干为末，再用醋煮糊为丸。艾醋汤送下。

【主治】 妇人血虚气滞，月经不调，经闭、痛经。

①《普济方》引《兰室秘藏》：妇人诸虚。②《医方大成》引《澹寮》：妇人经候不调，血气刺痛，腹胁胀满，头晕恶心，崩漏带下，便血瘕瘕。③《妇科玉尺》：气滞经不行。

02849 艾叶洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 艾叶 62 克 雄黄 6 克 防风 2 克 花椒 6 克

【用法】 煎水熏洗。

【主治】 慢性湿疹、过敏性皮炎、泛发性神经皮炎。

02850 艾附暖宫丸

【方源】《直指附遗》卷二十六。

【组成】 艾叶（大叶者，去枝梗）二两 香附（去毛）六两（俱要合时采者，用醋五升，以瓦罐煮一昼夜，捣烂为饼，慢火焙干） 吴茱萸（去枝梗） 大川芎（雀脑者） 白芍药（用酒炒） 黄耆（取黄色、白色软者）各二两 川椒（酒洗）三两 续断（去芦）一两五钱 生地黄（生用）一两（酒洗，焙干） 官桂五钱

【用法】 上为细末，上好米醋打糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食前淡醋汤送下。

【功用】《中药制剂手册》：温暖子宫，调经止痛。

【主治】 妇人子宫虚冷，带下白淫，面色萎黄，四肢酸痛，倦怠无力，饮食减少，经脉不调，血无颜色，肚腹时痛，久无子息。

【宜忌】 戒恼怒、生冷。

02851 平木汤

【方源】《医碥》卷七。

【组成】 竹茹 陈皮 苍术 香附 抚芎 神曲 半夏 生姜

【用法】 少用吴萸为向导。

【主治】 津液随上升之气郁积胃上，湿热不宣，郁极则上涌而致吐酸，甚则牙齿酸涩，不能相对。

02852 平气饮

【方源】《三因》卷十二。

【异名】 平气散(《普济方》卷一五七)。

【组成】 人参 白术 川芎 当归 五味子 甘草（炙） 木瓜干 紫苏子（炒） 茯神 乌药（去木） 杏仁（去皮尖，麸炒） 桂心 白芷各等分

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，温服。

【主治】 一切咳嗽，吐痰涎，恶风，不能食。

02853 平气饮

【方源】《易简》。

【组成】 紫苏 桑白皮 麻黄 青皮 五味子 杏仁 甘草各等分

【用法】 加生姜七片，乌梅一个，水煎服。

【主治】 久年咳嗽，暴嗽，气虚喘急。

02854 平火散

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】熟地一两　玄参五钱　麦冬三钱　生地二钱　丹皮二钱　山药三钱　金钗石斛三钱　沙参三钱

【用法】水煎服。

【主治】男子精力甚健，入房甚久，泄精之时，如热汤浇入子宫，妇人受之反不生育者。

02855　平肌散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】炉甘石（烧）一两半　龙骨半两

【用法】上为细末。每用干掺患处，上用膏药贴。

【主治】诸疮久不敛。

02856　平安饼

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】乌梅肉一钱　轻粉五分

【用法】上同研，不见粉亮为度，如硬用津润之，断不可用水，研之成膏，照患口大小作薄饼几个，以贴毒根。外用膏掩，一日换一次，俟毒根不痛，落下乃止。

【主治】痈疡毒根凸起。

02857　平阳汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】玄参三两　山茱萸一两　沙参二两　地骨皮一两　丹皮一两

【用法】水煎服。

【主治】阴衰之极，阳强不倒。终日举阳，绝不肯倒，然一与女合，又立时泄精，精泄之后，随又兴起。

【方论选录】此方纯是补阴之药，更能凉其骨中之髓。又恐过于纯阴，与阳有格格不入之意，复加入山茱萸，阴中有阳也，使其引阴入阳，以制其太刚之气。

02858　平肝饮

【方源】《观聚方要补》卷三。

【组成】柴胡　芍药　香附各一钱三分　青皮　鳖甲　槟榔各一钱　莪术八分　吴茱萸五分　甘草少许

【用法】水煎服。

【主治】左胁下痞满，宗筋努张不快。

【加减】若积热者，加胡黄连；腹满，加枳实、厚朴；大便秘，加大黄。

02859　平肝散

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】白芍　川芎　丹皮　青皮　柴胡　枳壳　薄荷　甘草

【主治】怒伤胁痛。

02860　平补丸

【方源】《直指》卷十七。

【组成】菟丝子（酒浸，研，焙）　山茱萸（酒浸，焙）　当归　益智仁各半两　川楝肉　牛膝　葫芦巴（炒）　厚杜仲（姜制，炒）　巴戟（去心）　苁蓉（酒浸，焙）各三钱半　乳香二钱

【用法】上为末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前枣汤或盐汤送下。

【主治】消肾不渴，肌肉瘦削，小便涩数而沥，如欲渗之状。或虚劳内损遗尿，或下焦虚寒，小便欲出而不禁。

02861　平陈汤

【方源】《医学入门》卷五。

【异名】陈平饮（《灵兰要览》卷上）、陈平汤（《医级》卷七）。

【组成】苍术　半夏各二钱　甘草七分　厚朴　陈皮　赤茯苓各一钱二分半

【用法】上锉一帖。加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【功用】祛邪逐痰。

【主治】①《医学入门》：食疟。②《医级》：风寒风湿所伤，致痰嗽满闷。

02862　平肺汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】人参　五味子　黄耆　桂　杏仁　白茯苓各一两　麻黄二钱

【用法】上锉。每服二钱，水一盏，煎至七分，食后、临卧细细热呷。才温再暖，热呷之尤佳。

【功用】平肺气。

【主治】寒嗽。

02863　平肺汤

【方源】《直指》卷七。

【组成】葶苈（微炒）　桑白皮（炒）　北梗　枳壳（制）　紫苏茎叶　半夏（制）各一两　麻黄（去节）三分　甘草（炒）半两

【用法】上锉散。每用三钱，加生姜五片，水煎服。

【主治】肺与肾皆以至阴积水，喘嚏嗽咳。

02864　平肺散

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】御米壳四两（锉碎，蜜水和，炒黄）　乌梅肉一两半　诃子皮一两　人参一两　贝母（去心）　百合各半两

【用法】 上为末，每服三钱，水一盏，煎至七分，食后、临卧热服。

【主治】 久咳嗽。

02865 平胃丸

【方源】《保命集》卷中。

【异名】 白术和胃丸(《内外伤辨》卷十)、和中丸(《脾胃论》卷下)。

【组成】 厚朴一两 白术一两二钱 陈皮八钱(去白) 木香一钱 生半夏(汤洗)一两 槟榔二钱半 枳实五分 甘草三钱(炙)

【用法】 上为细末，姜汁浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，生姜汤或温水送下。

【功用】 和中，消痰去湿，厚肠胃，进饮食。

【主治】 病久胃气虚弱，厌厌不能食，脏腑或秘或溏。

02866 平胃丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】 半夏曲(焙) 沉香各一两 肉豆蔻(去皮) 槟榔(锉)各二个 青橘皮(汤浸，去白，焙) 木香 丁香各半两 麝香半钱(别研)

【用法】 上为细末，枣肉与糯米粥为丸，如梧桐子大，丹砂为衣，阴干。每服三五丸，生姜汤嚼下。

【功用】 进食消痰。

【主治】 脾胃气虚弱，呕吐不下食。

02867 平胃散

【方源】《博济》卷二。

【异名】 参苓平胃散(《直指附遗》卷六)、加味平胃散(《育婴秘识》卷三)。

【组成】 厚朴(去粗皮，姜汁涂，炙令香，净)二两半 甘草(炙)一两半 苍术(米泔水浸二日，刮去皮)四两 陈皮(去白)二两半 人参一两 茯苓一两

【用法】 上为末，每服一钱，水一盏，加生姜、枣子，同煎七分，去滓，空心温服；或为细末，蜜为丸，如梧桐子大，每服十丸，空心盐汤嚼下。

【功用】 治气利膈，进食平胃。

【主治】 ①《博济》：脾胃气不和，不思饮食。②《御药院方》：心腹胁肋胀满刺痛，口苦无味，胸满短气，呕哕恶心，嗳气吞酸，面色萎黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，体重节痛，常多自利，或发霍乱，及五噎八痞，膈气反胃。

02868 平胃散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】 天下受拜平胃散(《岭南卫生方》卷中)、受拜平胃散(《杂类名方》)、神效平胃散(《保命歌括》卷十九)。

【组成】 苍术四两(去黑皮，捣为粗末，炒黄色) 厚朴二两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟) 陈橘皮二两(洗令净，焙干) 甘草一两(炙黄)

【用法】 上为散。每服二钱，水一中盏，加生姜二片，大枣二枚，同煎至六分，去滓，食前温服。

【功用】 燥湿运脾，行气和胃。

①《简要济众方》：调气进食。②《局方》：暖胃，化宿食，消痰饮，辟风寒冷湿四时不正之气。③《岭南卫生方》：温养脾元，平和胃气，辟岚瘴冷湿，病后进食。④《玉案》：和胃健脾，祛湿消食。⑤《医方论》：化痞，消胀，和中。

【主治】 脾胃不和，湿滞中阻。脘腹胀满，食少口淡，呕哕恶心，嗳气吞酸，大便泄泻，肢体困重。

①《简要济众方》：胃气不和。②《局方》：脾胃不和，不思饮食，心腹胁肋胀满刺痛，口苦无味，胸满短气，呕哕恶心，嗳气吞酸，面色萎黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，体重节重，常多自利，或发霍乱，及五噎八痞，膈气反胃。③《直指》：伤湿泄泻。④《得效》：妊娠两足浮肿，名曰皱脚。⑤《女科撮要》：肠胃寒，受湿下血。⑥《保婴金镜》：小儿乳食过伤，肠鸣呕吐或米谷不化。⑦《济阴纲目》：妊娠饮食停滞，或肚腹作痛。⑧《明医指掌》：山岚瘴雾，令人不服水土而腹胀。⑨《症因脉治》：胃气不平，喘而上逆。⑩《医宗金鉴》：湿淫于内，脾胃不能克制，有积饮痞膈中满者。

【宜忌】《医方考》：惟湿土太过者能用之，脾土不足及老弱、阴虚之人，皆非所宜也。

【方论选录】 ①《医方考》：此湿土太过之证，经曰敦阜是也。苍术味甘而燥，甘则入脾，燥则胜湿；厚朴性温而苦，温则益脾，苦则燥湿，故二物可以平敦阜之土。陈皮能泄气，甘草能健脾，气泄则无湿郁之患，脾强则有制湿之能，一补一泄，又用药之则也。②《景岳全书》：夫所谓平胃者，欲平治其不平也。此为胃强邪实者设，故其性味从辛从燥从苦，而能消能散，惟有滞有湿有积者宜之。今见方家每以此为常服健脾之剂，动辄用之，而不察可否，其误甚矣。③《成方便读》：用苍术辛温燥湿，辟恶强脾，可散可宣者，为化湿之正药；厚朴苦温，除湿而散满；陈皮辛温，理气而行痰，以佐苍术之不及。但物不可太过，过刚则折，当如有制之师，能戡祸乱而致太平，故以甘草中州之药，能补能和者赞辅之，使湿去而土不伤，致于和平

也。

【备考】 方中诸药生用，名“生料平胃散”（见《得效》）。本方改为丸剂，名“平胃丸”。（见《中国医学大辞典》）

02869 平胃散

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】 苍术一钱（米泔水制） 厚朴一钱（姜汁炒） 广皮一钱 甘草三分 山栀一钱（炒） 茵陈二钱 秦艽一钱 茯苓一钱 生地一钱 葛根一钱

【用法】 加灯心、生姜，水煎服。

【主治】 湿郁发黄。

02870 平崇散

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】 黄连末二分 甘草末 冰片各一分 硼砂三分

【用法】 人乳调，点两眼角。

【主治】 眼珠忽然肿胀突出。

02871 平菌丹

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 乌梅肉（煅存性）一钱半 月石一钱半 扫盆五分 冰片三分

【用法】 上为极细末。掺疮口，上盖薄贴。

【主治】 疮痈有腐肉突出者。

02872 平肝饮子

【方源】《医方大成》卷六引《济生》。

【组成】 防风（去芦） 桂枝（不见火） 枳壳（去瓤，麸炒） 赤芍药 桔梗（去芦，炒）各一两 木香（不见火） 人参 槟榔 当归（去芦，酒浸） 川芎 橘红 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 喜怒不节，肝气不平，邪乘脾胃。心腹胀满，连两胁妨闷，头晕呕逆，脉来浮弦。

02873 平胡饮子

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】 柴平汤（《增补内经拾遗》卷三引《宦邸便方》）。

【组成】 平胃散 小柴胡汤

【主治】 ①《医学入门》：疟，寒热相等。②《景岳全书》：湿疟。一身尽痛，手足沉重，寒多热少，脉濡。

02874 平肝上清丸

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 知母肉二两 生石膏一两 黄连八钱 黄芩八钱 石斛五钱 薄荷四钱 茺蔚子一两半 车前子八钱（炒） 蔓荆子六钱 青葙子五钱 夏枯草七钱 甘草三钱

【用法】 上为细末，水打为丸。每服三钱，一日二次。

【主治】 偃月障症。两眼不疼不红，视物昏蒙，风轮上边一条白膜，如弯月然，缓缓下垂。

02875 平肝补脾汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】 当归（土炒）一钱半 白芍（酒炒）一钱 沙参三钱 白术 茯苓各二钱 白豆蔻肉（炒，研）八分 木瓜一钱二分 肉桂一钱半 甘草（炙）一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 木旺侮土，脾虚发泄。

02876 平肝泻火汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 生地四钱 栀子三钱 寸冬三钱 柴胡二钱 青皮二钱 木通二钱 黄芩三钱 胡黄连三钱 银花三钱 滑石三钱 枳壳三钱 甘草一钱 车前子三钱（外包）

【用法】 水煎服。

【主治】 两眼赤酸，怕日羞明，上下眼皮弦紧皮松，倒睫卷毛，刺激眼球，发生白膜，热泪常流。

02877 平肝清火汤

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 车前子 连翘各一钱 枸杞子 柴胡 夏枯草 白芍 生地黄 当归各一钱半

【用法】 上为一剂。水二钟，煎至八分，去滓温服。

【主治】 黑睛胀大，属虚者。

02878 平肝清脑汤

【方源】 方出《中医临证撮要》，名见《古今名方》。

【组成】 羚角粉 2.4 克（冲服） 明天麻 3 克 嫩钩藤 12 克 白蒺藜 12 克 冬桑叶 9 克 天竺黄 4.5 克 鲜竹沥 1 小杯（冲服） 京赤芍 6 克

【功用】 平肝熄风，清脑开窍。

【主治】 产后发痉。新产之后，陡然抽风，神志不清，口眼抽动，牙关紧闭，两手紧握，舌苔薄腻或厚腻，脉细紧，或弦或滑。

02879 平肝潜阳汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 酒生地 15 克 玄参 9 克 五味子 3 克 酒白芍 菊花 石决明 生牡蛎 车前子各 9 克

【功用】 滋阴降火，平肝潜阳。

【主治】 绿风内障，水不涵木，肝火偏盛。头痛眼胀，时轻时重，瞳神时散时收，（后期则不能收），视物模糊，白睛淡赤，按之目珠较硬者。

02880 平补固真丹

【方源】《本草纲目》卷十二引《乾坤生意》。

【组成】 金州苍术（刮净）一斤（分作四分：一分川椒一两炒，一分破故纸一两炒，一分茴香、食盐各一两炒，一分川楝肉一两炒，取净术为末）白茯苓末二两 酒洗当归末二两

【用法】 酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐、酒送下。

【主治】 元脏久虚，遗精白浊；妇人赤白带下，崩漏。

02881 平补枳术丸

【方源】《丹溪心法附余》卷七。

【异名】 平胃枳术丸(《济阳纲目》卷三十七)。

【组成】 白术三两 白芍药一两半（酒浸，炒）陈皮 枳实（去瓤，麸炒） 黄连（酒浸，炒）各一两 人参 木香各半两

【用法】 上为细末，荷叶煮浓汤，打米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，渐加至六七十丸，空腹米汤送下。

【功用】 调中补气血，消痞清热。

【主治】 ①《丹溪心法附余》：痞闷。②《医钞类编》：虚痞，大便利者。

02882 平补萆薢丸

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】 萆薢一两半 杜仲 干木瓜 续断 牛膝各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心盐酒、盐汤任下，一日三次。

【主治】 脚膝冷气冲腰，行履不前。

02883 平补虚弱汤

【方源】《会约》卷二。

【组成】 人参（少者以时下生条参三五钱代之）白术 茯苓 炙草各一钱半 当归二钱 白芍（酒炒）一钱半 杜仲 黄耆（蜜炒）各二钱 甘枸杞 山药各二三钱 五味十五粒 附子一钱或多用

【用法】 生姜、大枣为引。

【主治】 气血两虚，脾肾悉亏，身倦神晕者。

02884 平补镇心丹

【方源】《局方》卷五（宝庆新增方）。

【异名】 镇心丹(《证治要诀类方》卷四)。

【组成】 酸枣仁（去皮，隔纸炒）二钱半 车前子（去土，碾破） 白茯苓（去皮） 五味子（去枝、梗） 肉桂（去粗皮，不见火） 麦门冬（去心） 茯神（去皮）各一两二钱半 天门冬（去心） 龙齿 熟地黄（洗，酒蒸） 山药（姜汁制）各一两半 人参（去芦）半两 朱砂（细研为衣）半两 远志（去心） 甘草（炙） 一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心饭饮送下；温酒亦得，加至五十丸。

【功用】 常服益精髓，养气血，悦色驻颜。

【主治】 ①《局方》丈夫、妇人心气不足，志意不定，神情恍惚，夜多异梦，忪悸烦郁；及肾气伤败，血少气多，四肢倦怠，足胫酸疼，睡卧不稳，梦寐遗精，时有白浊，渐至羸瘦。②《张氏医通》：心血虚少，惊悸颤振，夜卧不宁。

【备考】 本方方名，《张氏医通》引作“平补正心丹”。

02885 平补镇心丹

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】 熟干地黄 生干地黄 干山药 天门冬 麦门冬（去心） 柏子仁 茯神各四两（一本七两）辰砂（别研为衣） 苦梗（炒）各三两 石菖蒲（节密者）十六两 远志（去心，以甘草煮三四沸）七两 当归（去芦）六两 龙骨一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心饭饮吞下，温酒亦得，渐加至五十丸。宜常服。

【功用】 益精髓，养气血，明视听，悦色驻颜。

【主治】 丈夫、妇人心气不足，志意不定，神情恍惚，夜多异梦，忪悸烦郁，及肾气伤败。血少气多，四肢倦怠，足胫酸痛，睡卧不稳，梦寐遗精，时有白浊，渐至羸瘦。

02886 平胃分消饮

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《集略》。

【组成】 半夏 白术 陈皮 厚朴各一钱 黄连 青皮 枳壳各八分 甘草五分

【用法】 上锉作一贴。加生姜五片，水煎服。

【主治】 胃有痰火，吞酸嘈杂。

02887 平胃加消汤

【方源】 方出《得效》卷十四，名见《医林纂要》卷八。

【组成】 平胃散一帖。

【用法】 作两服。每服酒、水各一盏，同煎至一盏，却投朴消半两（研细），再煎三五沸，倾出，候微温服尽。其胎即化血水而下。

【主治】 死胎不下。其证指甲青、舌青，胀闷甚

者，口中极臭。

【方论选录】《医林纂要》：苍术燥湿，补肝，辛烈善行，去恶气，辟不祥，故可下死胎；厚朴降逆气，破宿血，攻坚消滞，本妊娠所忌，此下死胎，宜用之；陈皮，气行不滞，而后死胎可下；甘草，方多峻急，赖此补中而缓之；朴消咸以软坚，能化死胎，而补心滋阴，且在术、朴队中，自无伤于母气也。此方甚平，而下死胎甚效。

02888　平胃地榆汤

【方源】《金鉴》卷五十五。

【组成】苍术（炒）　陈皮　厚朴（姜炒）　甘草　地榆

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】便血。湿盛腹不痛者。

02889　平胃渗湿汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】苍术一钱半（炒）　厚朴一钱半（制）　猪苓一钱半　茯苓三钱　木香一钱半　陈皮一钱半　苍耳三钱（炒）　泽泻一钱半　甘草五分　茵陈三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【功用】调中渗湿。

【主治】湿郁发黄，小便不利，大便泄泻，脉缓涩者。

02890　平胃蒜肚丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】猪肚一具（去脂膜，入大蒜装满，以线缝住，用冷水、热水各七碗，先将水烧滚，入肚，煮至水干为度，取出捣烂）　苍术　陈皮　厚朴各五两　川椒少许

【用法】上药同猪肚再捣至肚无丝，方可为丸，如梧桐子大。每服二钱，白汤送下。

【主治】脾泻水泻，便红下血。

02891　平惊通圣散

【方源】《医统》卷五十。

【组成】当归　人参　黄连　茯神　远志　甘草（炙）各三钱　石菖蒲　朱砂（另研）各二钱

【用法】上为细末。每服二钱，食后、临卧竹叶煎汤调下。

【主治】惊悸，怔忡，健忘。

02892　平肝开郁止血汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【异名】平肝止血汤（《辨证录》卷十一）。

【组成】白芍一两（醋炒）　白术一两（土炒）　当归一两（酒洗）　丹皮三钱　三七根三钱（研末）　生地三钱（酒炒）　甘草二钱　黑芥穗二钱　柴胡一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人怀抱甚郁，口干舌渴，呕吐吞酸，而血下崩者。

【方论选录】方中妙在白芍之平肝，柴胡之开郁，白术利腰脐，则血无积住之虞；荆芥通经络，则血有归还之乐；丹皮又清骨髓之热，生地复清脏腑之炎，当归、三七于补血之中，以行止血之法。自然郁结散而血崩止矣。

02893　平肝顺气保中丸

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】香附米三两（童便浸三日，炒）　川芎二两　陈皮（去白）三两　白术四两（土炒）　厚朴一两　枳实二两（炒）　黄连（姜汁炒）二两　神曲（炒）二两　麦芽（炒）七钱　木香三钱　栀子（姜汁炒）一两　莱菔子（炒）一两　半夏（姜汁炒）一两半　白茯苓一两　砂仁（炒）四钱　干生姜一两　山楂（取肉）二两　青皮六钱（香油炒）　甘草（炙）四钱

【用法】上为末，竹沥打神曲糊为丸，如绿豆大。每服百丸，食后白滚汤送下，一日二次。

【功用】常服顺气和中，健脾开胃，进美饮食，化痰消滞，清火抑肝。

【主治】郁火伤脾，中气不运，胃中伏火，郁积生痰，致令呕吐，吞酸嘈杂，心腹胀闷。

02894　灭虫汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白术一两　槟榔二钱　史君子二十个　人参三钱　楝树根三钱　陈皮五分　神曲三钱　炙甘草二钱　黄连三分　百部一钱

【用法】水煎服。

【主治】寸白虫，蛔虫，虫积不散，腹痛肚疼，面黄肌瘦，盗汗淋漓，气怯身弱。

02895　灭毒丹

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】白花蛇四寸（酥）　金头蜈蚣二条（煅）　全虫四个（酒浸炙后，去头足）　露蜂房一个　龟版一两（醋炙）　雄黄一钱　飞黄丹一钱　辰砂五分　槐花米五分　雨前细茶五分　麝香二分　孩儿茶五分

【用法】上为细末，以黄米饮为丸，如绿豆大，朱砂为衣。成人体壮者，每次五至十粒，白水送下，一日二次。体弱者酌减。

【功用】散风止痒，清血解毒。

【主治】 寻常狼疮（流皮漏），慢性湿疹（顽湿），慢性溃疡（顽疮）。

【宜忌】 孕妇禁服，胃弱者慎用。

02896 灭瘢丹

【方源】《疡医大全》卷十二。

【组成】 轻粉 白附子 黄芩（微火略炒） 白芷 防风各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。于每日洗面之时多擦数次，临睡之时又重洗面擦之。

【功用】 消痕灭瘢。

【主治】 肺风粉刺，瘢。

02897 正元丹

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】 香附一斤（同艾三两，先以醋同浸一宿，然后分开制之，酒、盐、酥、童便各制四两） 阿胶（蛤粉炒）二两 枳壳四两（半生，半麸炒） 怀生地（酒洗） 熟地（酒浸） 当归身（酒洗） 川芎（炒）各四两 白芍药八两（半生，半酒炒）

【用法】 上为末，醋为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心盐汤吞下。

【功用】 调经种子。

【主治】 女子不孕。

【加减】 治带，加白茯苓、琥珀。

02898 正元丹

【方源】《医级》卷八。

【组成】 故纸一两（酒浸） 苁蓉（酒洗） 巴戟 芦巴各一斤 文蛤八两 茯苓六两 龙骨 朱砂各二两

【用法】 上为末，蜜为丸。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】 真气不足，遗精盗汗，目暗耳鸣，吸吸短气，四肢瘦损。

02899 正元散

【方源】《博济》卷一。

【异名】 正元汤（《圣济总录》卷二十一）、正阳散（《东医宝鉴·杂病篇》卷二）。

【组成】 麻黄（去节） 陈皮（去白，炙） 大黄（生） 甘草（炙） 干姜（炮） 茱萸 官桂（去粗皮） 芍药（生） 附子（炮，去皮脐） 半夏（汤洗七遍）

【用法】 上十味，唯麻黄多于众药一倍，余药减用一半，同捣为末。每服一大钱，水一盏，加生姜三片，大枣一枚，煎至七分，热服。如出汗，须候汗干，可去盖覆。

【功用】 解伤寒。

【主治】 ①《博济》：才觉伤寒，四肢头目骨节疼痛；或伤冷伤食，头昏气满，及心腹诸疾。②《圣济总录》：伤寒阴证，脉候沉细。

【加减】 若患阴毒伤寒，更入退阴散半钱同煎。

【方论】《本事方释义》：麻黄气味辛温，入足太阳；陈皮气味苦辛微温，入手足太阴；大黄气味苦寒，入足阳明；甘草气味甘平，入足太阴，能缓诸药之性；干姜气味辛温，入手足太阴；肉桂气味辛甘大热，入足厥阴；白芍气味酸微寒，入足厥阴；附子气味辛咸大热，入手足少阴；吴茱萸气味辛热，入足阳明、厥阴；半夏气味辛温，入足阳明；生姜之辛温入卫；枣之甘平入荣。伤寒如觉风寒吹着，四肢头目骨节疼痛，或伤冷伤食，头昏气满及心腹诸疾，皆宜服之。此表里未清，阳气先伤，故以大辛热之药护其阳，虽有辛温之达表，苦寒之直下，皆不为害矣。

02900 正元散

【方源】《三因》卷十。

【异名】 生料正元饮（《医碥》卷七）。

【组成】 人参 白茯苓 白术各三两 黄耆一两半 甘草（炙） 乌药（去木） 山药（姜汁浸，炒） 附子（炮，去皮脐） 川芎 干葛各一两 桂心 乌头（炮，去皮尖）各半两 红豆（炒） 干姜（炮） 橘皮各三钱

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个，盐少许，煎至七分，食前冷服。

【功用】 助阳消阴，正元气，温脾胃，进饮食。

【主治】 下元气虚，脐腹胀满，心胁刺痛，泄利呕吐，自汗，阳气渐微，手足厥冷；及伤寒阴证，霍乱转筋，久下冷利，少气羸困，一切虚寒。

02901 正元散

【方源】《张氏医通》卷十四引《制药秘旨》。

【异名】 正元汤（《血证论》卷七）。

【组成】 人参三两（用川乌一两，煮汁收入，去川乌） 白术二两（用橘皮五钱，煮汁收入，去橘皮） 茯苓二两（用肉桂六钱，酒煎收入，晒干，勿见火，去桂） 甘草一两五钱（用乌药一两，煎汁收入，去乌药） 黄耆一两五钱（用川芎一两，酒煎收入，去川芎） 薯蓣一两（用干姜三钱，煎汁收入，去干姜）

【用法】 上六味，除茯苓，文火缓缓焙干，勿炒伤药性，杵为散。每服三钱，水一盏，加生姜三片，红枣一枚（擘），煎数沸，入盐一捻，和滓调服。服后饮热酒一杯，以助药力。

【主治】 命门火衰，不能生土，吐利厥冷，有时

阴火上冲，则头面赤热，眩晕恶心，浊气逆满，则胸胁刺痛，脐腹胀急。

【备考】 本方方名，《古今医方集成》引作“正元丹”。

02902 正中丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】 五灵脂 川乌头各半两 没药 胡椒各一分

【用法】 上为细末，醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服五七丸，醋汤送下。

【主治】 心气痛。

02903 正气汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 正气散(《医统》卷五十一)。

【组成】 黄柏（炒）一钱 知母（炒）一钱半 甘草（炙）五分

【用法】 上为粗末，作一服。水二盏，煎一盏，卧时服。

【主治】 盗汗。

【方论选录】《医方考》：阴虚，则阳独活，故令有汗。火益亢，则阴益亏。阴亏，则睡去之时，卫外之阳乘虚而入，卫虚无以固表，故令盗汗。经曰：壮水之主，以制阳光。故用黄柏、知母苦寒质润之品以主之，苦能泻火，寒能胜热，质润能滋阴；佐以甘草者，和其阴阳耳。

02904 正气散

【方源】《局方》卷二（绍兴续添方）。

【组成】 甘草（炒）七钱 陈皮 藿香（去梗）白术各一两 厚朴 半夏各三两（同厚朴为末，生姜四两研烂，同为饼子，微炒）（一方无白术）

【用法】 上为细末。每服二钱，加生姜三片，大枣一枚，水一盏，煎至七分，食前稍热服。治久患疟疾，膈气心痛，日进三服。

【功用】 顺气宽中，正气逐冷，辟除瘟疫。

【主治】 伤寒阴证，憎寒恶风，胸膈噎塞，胁肋膨胀，心下坚痞，吐利，呕逆酸水，咳逆，怠惰嗜卧，不思饮食，久患疟疾，膈气心痛。

02905 正心汤

【方源】《医统》卷四十九。

【组成】 人参 茯神 当归（酒洗） 生地黄（酒洗）各一钱 羚羊角（镑） 甘草（炙） 酸枣仁（炒，研） 远志（去心）各八分

【用法】 上㕮咀。水二盏，加莲子七枚，煎七分，去滓，入羚羊角末，麝香一分和匀，食后、临卧服。

【主治】 ①《医统》：七情五志久逆，心风妄言妄笑，不知所苦。②《证治宝鉴》：七情太过而癫者。

【备考】《证治宝鉴》无麝香，水煎，入铁锈水和服。

02906 正舌散

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【异名】 茯神散(《卫生宝鉴》卷八)、通神散(《普济方》卷九十二)

【组成】 蝎梢（去毒）二钱半 茯神（去木，锉，微炒）一两 薄荷（焙）二两

【用法】 上为末。每服一二钱，温酒调下；或以擦牙颊间亦好。

【主治】 中风舌本强硬，语言不正。

02907 正舌膏

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】 天麻（明大者） 白僵蚕（直者，去丝炒） 大叶薄荷（鄆州者）各半两 上好朱砂（飞研）一分（半入药，半为衣） 麝香一钱（研） 脑子（少许）

【用法】 上除研者外，为末研匀，炼蜜为丸，如榛子大，朱砂为衣。每服一丸，薄荷汤化下，时时服。

【主治】 小儿风病搐搦，机关不利，吃乳难下，至不能发声者。

02908 正阳丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】 鹿茸（去毛，酥炙）二两 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 石南各一两 五味子 胡芦巴（炒）各三分 木香一两半 石斛（去根） 韭子（炒） 牛膝（酒浸，切，焙）各半两 巴戟天（去心） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 白马茎（涂酥炙干）二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒或盐汤送下。

【主治】 阳气虚损，下元冷极，精泄不禁，小便频数，腰脚无力，饮食减少。

02909 正诚丹

【方源】《重庆堂随笔》卷上。

【异名】 正诚露珠丹(《重订通俗伤寒论》)。

【组成】 透明辰砂（研极细，每砂一两用甘草水一两煎汤飞净，去头底，晒干，再研再飞，三次为度） 赭猪心中血（丝绵绞去滓，凡砂一两用心血三个，每次一个，拌砂晒干，再拌再晒，三个用讫，再研极细末）

【用法】 上以糯米糊为丸，每重七分，阴干得五分，瓷瓶密收。每临文应事或卧时，以一丸噙化。

【主治】 殚虑劳神，火升心悸，震惕不寐，遇事善忘。

02910 正经汤

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】 泽泻二钱 当归三钱 焦山栀四钱 阿胶（烊化）三钱 丹皮三钱 茜草一钱五分 益母草三钱 柴胡（醋炒）一钱 琥珀八分 左牡蛎五钱

【用法】 加藕一斤，煎汤代水。

【主治】 倒经。鼻衄，吐血。

02911 正胃散

【方源】《普济方》卷三十六。

【组成】 半夏二两 天南星二两

【用法】 上为末，用水五升，入坛内与药搅匀，浸一宿，去清水，焙干，重研令细。每服二钱，水二盏，加生姜三片，煎至八分，温服。至五服效。

【主治】 胃反。

02912 正笑丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 生枣仁三钱 黄连二钱 犀角屑五分 丹砂末一钱 丹皮三钱 生甘草一钱 麦冬三钱 茯神三钱 丹参二钱 天花粉二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 心包火盛，无端大笑不止，或背人处自笑，异于平素者。

02913 正容汤

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】 羌活 白附子 防风 秦艽 胆星 白僵蚕 半夏（制） 木瓜 甘草 黄松节（即茯神心木）各等分

【用法】 上锉剂。水二钟，加生姜三片，煎至八分，去滓，加酒一杯服之。

【主治】 口眼㖞斜，仪容不正。

02914 正容散

【方源】 方出《本草纲目》卷三十，名见《金鉴》卷六十三。

【组成】 樱桃枝 紫萍 牙皂 白梅肉

【用法】 研和。日用洗面。

【主治】 雀卵斑黯。

【备考】《医宗金鉴》本方用法：兑鹰粪白三钱共研。

02915 正翻散

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】 石膏五钱（煅） 栀子（生） 一两 甘草（生）三钱 防风二两（酒拌，炒） 豨莶草四两（酒润，晒干）

【用法】 上为细末。壮人每服二钱，弱人一钱，小儿六七分，白滚水调下。

【主治】 眼皮外翻，如舌舐唇之状

02916 正凤髓丹

【方源】《元戎》卷十。

【异名】 封髓丹（《古今名医方论》卷四）、凤髓丹（《医钞类编》卷十四）。

【组成】 黄柏（炒）二两 缩砂一两 甘草半两

【用法】 酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，早晨温酒送下。

【功用】 泻相火，益肾水。

【主治】 ①《赤水玄珠》：心火太盛，阳狂不已。②《医钞类编》：火强久旷，梦遗胃弱，不宜苦寒者。

【方论选录】《古今名医方论》：方用黄柏为君以坚肾，肾职得坚，则阴水不虞其泛溢，寒能清肃，则龙火不至于奋扬，水火交摄，精安其位；佐以甘草，以甘能缓急，泻诸火与肝火之内烦，且能使水土合为一家，以妙封藏之固；缩砂以其味辛性温，善能入肾，通三焦，达津液，能纳五脏六腑之精而归于肾，肾家之气纳。肾中之髓自藏矣。此有取于封髓之意也。

【备考】《古今名医方论》本方用法：蜜糊为丸。每服三钱。

02917 正柴胡饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 柴胡一至三钱 防风一钱 陈皮一钱半 芍药二钱 甘草一钱 生姜三五片

【用法】 水一钟半，煎七八分，热服。

【主治】 外感风寒，发热恶寒，头疼身痛，或疟疟初起。

【加减】 头痛者，加川芎一钱；热而兼渴者，加葛根一二钱；呕恶者，加半夏一钱五分；湿甚者，加苍术一钱；胸腹有微滞者，加厚朴一钱；寒气胜而邪不易解者，加麻黄一至三钱（去浮沫）服之，或苏叶亦可。

02918 正气天香散

【方源】《医学纲目》卷四引河间方。

【组成】 乌药二两 香附末八两 陈皮 苏叶 干姜各一两

【用法】 上为细末。调服。

【主治】 ①《医学纲目》：九气。②《玉机微

义》：妇人一切气，气上凑心，心胸攻筑，胁肋刺痛，月水不调。

【方论选录】《医林纂要》：香附理肝脏之郁，行血中之气；乌药苦涩，能坚肾水，补命火，温下焦，而去冲任之沉寒痼冷，破上郁，行肝气；陈皮佐乌药以理气；苏叶辛温表散外浮之风寒燥湿，舒散肝郁，而色紫兼入血分，大能调理经血，但其性过于疏散，此用以佐香附；姜性行，而干姜能守，守者为行之本，此专以补肝理冲任。此调经而专入气分之药，以肝气不郁，则经血自调也。

【备考】本方改为汤剂，名"绀珠正气天香汤"（《玉机微义》）、"正气天香汤"（见《医学正传》）。

02919 正气趋痛散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】肉桂 干姜 蓬术 归尾 川芎 白芷 乌药 元胡索 防风 独活 半夏 红花 白术 青皮

【主治】产后血块筑痛。

02920 正气温中汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】藿香 白术 厚朴 陈皮 半夏 茯苓 白芷 桔梗 大腹皮 苏叶 甘草 干姜 桂心

【用法】水煎服。

【主治】夏月受寒腹痛者。

02921 正骨紫金丹

【方源】《金鉴》卷八十八。

【异名】正骨紫金丸（《中药制剂手册》）。

【组成】丁香 木香 瓜儿血竭 儿茶 熟大黄 红花各一两 当归头 莲肉 白茯苓 白芍各二两 丹皮五钱 生甘草三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服三钱，童便调下；黄酒亦可。

【主治】跌打扑坠闪错损伤，并一切疼痛，瘀血凝聚。

02922 玉女煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生石膏三五钱 熟地三五钱或一两 麦冬二钱 知母 牛膝各一钱半

【用法】水一钟半，煎七分，温服或冷服。

【主治】水亏火盛，六脉浮洪滑大，少阴不足，阳明有余，烦热干渴，头痛牙疼，失血。

【宜忌】大便溏泻者，乃非所宜。

【加减】如火之盛极者，加栀子、地骨皮之属；如多汗、多渴者，加北五味十四粒；如小水不利，或火不能降者，加泽泻一钱五分，或茯苓亦可；如金水俱亏，因精损气者，加人参二三钱尤妙。

【方论选录】①《寒温条辨》：熟地、牛膝补肾水之不足；石膏、知母泻脾土之有余；而金则土之子，水之母也，麦冬甘以补肺，寒以清肺，所谓虚则补其母，实则泻其子也。②《医学举要》：阳明、少阴二经，皆是津液所关；阳明实则火炽而津液涸，少阴虚则水亏而津液亦涸。考两经合治之方，仲景猪苓汤养阴而兼利水；景岳玉女煎养阴而兼清火。盖白虎汤治阳明而不及少阴，六味地黄汤治少阴而不及阳明。是方石膏清胃，佐知母以泻肺气，实则泻其子也；熟地滋肾，佐麦冬以清治节，虚则补其母也；牛膝入络通经，能交和中下，尤为八阵中最上之方。③《成方便读》：人之真阴充足，水火均平，决不致有火盛之病。若肺肾真阴不足，不能濡润于胃，胃汁干枯，一受火邪，则燎原之势而为似白虎之证矣。方中熟地、牛膝以滋肾水，麦冬以保肺金，知母上益肺阴，下滋肾水，能治阳明独胜之火，石膏甘寒质重，独入阳明，清胃中有余之热。虽然，理虽如此，而其中熟地一味，若胃火炽盛者，尤宜斟酌用之，即虚火之证，亦宜改用生地为是，在用方者神而明之，变而通之可也。

【临证举例】①牙痛 《广东医学》（祖国医学版）（1966；1:19）：本方加味治疗胃火牙痛，处方：生石膏五钱（打碎），生地五钱，麦冬三钱，知母三钱，防风二钱，牛膝三钱，竹叶二钱，淮山药五钱。红肿甚者，加重石膏用量；蛀牙，加细辛一钱，乌梅一钱。作者认为，玉女煎原为张景岳治疗吐血冲气上逆之方，清代王士雄用以治疗阴虚胃火炽盛之齿痛，颇具疗效。故守其意，原方加竹叶、防风清散风热之品，则消肿之力更强，加怀山药养阴清火；蛀牙加细辛、乌梅，取其辛通酸敛而止痛。②三叉神经痛 《新医药学杂志》（1978；6:31）：据本方随证化裁治疗六例三叉神经痛，处方：生石膏、熟地、玄参各15克，麦冬、知母、牛膝各9克，白芷、防风各4.5克，细辛1.5克。治疗效果满意。

02923 玉龙丹

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】明矾六分 没药二钱 乳香二钱五分 炉甘石（煅，飞过）一两 珍珠一钱 黄丹（飞净）一两 麝香七分 梅花片三分

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，银朱五分为衣，收贮听用。如用，将井花凉水磨，涂眼皮外。

【主治】一切火眼赤肿。

02924 玉龙膏

【方源】《局方》卷八（续添诸局经验秘方）。

【组成】 瓜蒌大者一个（去皮） 黄蜡一两半 白芷（净拣，锉）半两 麻油（清真者）六两 麝香（研）一钱 松脂（研）一钱半 零香 藿香各一两 杏仁（去皮尖） 升麻 黄耆 赤芍药 白及 白蔹 甘草（净拣，锉）各一分

【用法】 上以油浸七日，却比出油，先炼令香熟，放冷入诸药，慢火煎黄色，用绢滤去滓，入银、石锅内，入蜡并麝香、松脂，熬少时，以瓷盒器盛。每用少许，薄摊绢帛上贴。若头面风癣痒，疮肿疼痛，并涂磨令热，频频用之。如耳鼻中肉铃，用纸拈子每日点之，至一月即愈。如治灸疮及小儿瘤疮，涂之。

【功用】 摩风止痛，消肿化毒，兼灭瘢痕。

【主治】 一切折伤，疮肿。

02925 玉仙散

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】 白矾（枯）一钱 乌梅（去核）四个 杏仁（去皮尖，麸炒）四十个 佛耳草 款冬花 知母 贝母（去心）各一钱半 甘草（炙）三钱

【用法】 上为细末。每服半钱，干掺舌上咽津，不拘时候。

【主治】 一切咳嗽。

02926 玉仙散

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】 干姜（炒）一两 香附（炒）一两 白芍（炒）一两 甘草（生）五钱

【用法】 上为末。每服三钱，空心黄酒送下。

【主治】 赤白带下，属寒者。

02927 玉兰丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】 辰砂一两 鹿茸二两（作片，酥炙） 当归（酒浸，焙） 附子（七钱重者）四个（生，去皮脐，各切下顶，挖空心，中安辰砂在内，以前顶子盖定，用线扎） 木瓜大者两个（去皮瓤，切开顶，入辰砂、附子四个在内，以木瓜原顶子盖之，线扎定，蒸烂讫，取出。附子切作片，焙干，为末；辰砂细研，水飞；木瓜研如膏。宜木瓜为妙） 柏子仁（炒，别研） 沉香（别研） 巴戟（去心） 黄耆（去芦，蜜炙） 肉苁蓉（酒浸） 茯神（去心） 川牛膝（去芦，酒浸） 石斛（去根，酒浸）各一两 杜仲（去粗皮，酒浸） 菟丝子（水淘净，酒浸，焙，别研） 五味子各一两半 远志（去心，炒）二两

【用法】 上为细末，用木瓜膏杵和，入少酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心米饮、温酒、盐汤任下

【功用】 闭精，补益。

【主治】 诸虚不足，膀胱、肾经痼败，阴阳不交，致生膏淋、白浊、遗精之患。

02928 玉芝丸

【方源】《局方》卷四。

【组成】 人参（去芦） 干薄荷叶 白茯苓（去皮） 白矾（枯过） 南星（米泔浸一伏时，焙干）各三十两 半夏（汤洗七次，为末，生姜汁捣和作曲）六十两

【用法】 上为末，用生姜汁煮面糊和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后生姜汤送下。如痰盛燥热，薄荷汤送下。

【主治】 风壅痰实，头目昏眩，咳嗽烦满，咽膈不利，呕吐恶心，神志昏愦，心忪面热，痰唾稠粘。

02929 玉尘散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 寒水石（烧）三两 马牙消（枯）一钱 铅白霜半钱 南硼砂半两

【用法】 上为细末，每用少许干掺口疮上，咽津无妨，不拘时候。

【主治】 大人小儿咽喉肿痛，口舌生疮。

02930 玉竹粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】 玉竹 15～20 克（鲜者 30～60 克） 冰糖少许 粳米二两

【用法】 先将新肥玉竹洗净，去掉根须，切碎并取浓汁后去滓；或用干玉竹煎汤去滓，入粳米，再加水适量煮为稀粥，粥成后放入冰糖，稍煮一二沸即可。

【功用】 滋阴润肺，生津止渴。

【主治】 肺阴受伤，肺燥咳嗽，干咳少痰或无痰，或高热后烦渴，口干舌燥，阴虚低热不退，及各种类型心脏病心功能不全时的辅助疗法。

【宜忌】 胃有痰湿气滞，胃部饱满感，口腻多痰，消化不良，不喜饮水，舌苔厚腻者忌服。

02931 玉华丹

【方源】《一草亭》。

【组成】 炉甘石二两（取白面轻者，如云片，及羊脑髓样） 川黄连一两（去芦，切碎，水一钟，浸半日，隔汤煮汁） 童便一钟（取男半岁无病者，同连汁和作一碗）

【用法】 将甘石置倾银罐内，炭火煅成碧色，取

起，以连汁、童便淬之，如此煅淬七次，加朱砂三钱，同研为末，水飞去脚，候干又研，极细如尘，收贮听用，名曰丹头。另制珍珠，将珠一钱许，置豆腐内，碗盛蒸一时久，研极细，收贮听用。丹头一钱，加珠末一分，旋研冰片三分和匀，入瓷罐封固。凡一切外障眼，以银簪或象牙簪沾药，点两眦内，闭一饭久，仍以簪拨出药屑，每日早饭后点一次，或夜点亦可。

【主治】 眼患外障，红肿羞涩，昏蒙翳膜。

02932 玉华散

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 甜葶苈三两（纸上焙香） 桑白皮半两 天门冬半两（去心） 百部二钱半 马兜铃半两 半夏半两（汤洗七次，姜制） 紫菀（去土）半两 杏仁半两（去皮尖） 贝母半两（炮） 百合半两 甘草二钱半（炒） 人参（去芦头）半两

【用法】 上㕮咀。每服三大钱，水一盏，加大枣五枚，同煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【功用】 调顺肺经，清利咽膈，安和神气。

【主治】 咳嗽气喘。

02933 玉华煎

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 玉竹四钱 五味一钱 麦冬三钱 沙参四钱 党参四钱 茯苓二钱 白术一钱 山药三钱 川断二钱 牛膝二钱

【用法】 元米一撮，煎汤代水。

【主治】 痿证，足膝无力而不能任地。

02934 玉池散

【方源】《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。

【组成】 当归（去芦） 藁本 地骨皮 防风 白芷 槐花（炒） 川芎 甘草（炙） 升麻 细辛（去苗）各等分

【用法】 上为末。每用少许揩牙，痛甚即取二钱，水一盏半，加黑豆半合，生姜三片，煎至一盏，稍温漱口，候冷吐之。

【主治】 风蛀牙痛，肿痒动摇，牙龈溃烂，宣露出血，口气等。

02935 玉关丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 白面（炒熟）四两 枯矾二两 文蛤（醋炒黑）二两 北五味一两（炒） 诃子二两（半生，半炒）

【用法】 上为末，用熟汤为丸，如梧桐子大。以温补脾肾等药随证加减煎汤送下；或人参汤亦可。如血热妄行者，以凉药送下。

【主治】 肠风血脱，崩漏带浊不固，诸药难效，及泻痢滑泄不能止者。

02936 玉红膏

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】 当归二两 白芷五钱 甘草一两二钱 紫草二钱 血竭 轻粉各四钱 白占二两 麻油一斤

【用法】 前四味入油内浸三日，慢火熬至药枯，去滓滤净，次下白占、血竭、轻粉，即成膏矣。

【功用】 ①《伤科汇纂》：收敛。②《经验方》：生肌长肉。

【主治】 ①《伤科汇纂》：金疮棒毒溃烂，肌肉不生。②《中药成方配本》：痈疽溃疡，腐肉已脱。并润肌肤枯燥。

02937 玉灵丹

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 香附 苏子各四两 苏木 萝卜子 桃仁 当归 降香 红花 枳实 青皮各一两 沉香 木香 官桂各五钱 乳香 没药 藿香 陈皮 槟榔 蓬术 白豆蔻各三钱

【用法】 上为末，和匀，用童便、黄酒、黑砂糖各一碗，合一处，煎如膏，和药为丸，如弹子大。每服一丸，黄酒化下，或用赤砂糖汤化下。

【主治】 跌打损伤。

02938 玉灵膏

【方源】《随息居饮食谱》。

【异名】 代参膏（《随息居饮食谱》）、龙眼膏（《医学碎金录》）。

【组成】 好龙眼

【用法】 自剥好龙眼，盛竹筒式瓷碗内，每肉一两，入白洋糖一钱，碗口罩以丝绵一层，日日于饭锅上蒸之，蒸到百次。每以开水瀹服一匙。

【功用】 大补气血。

【主治】 衰羸、老弱，别无痰火、便滑之病者。产妇临盆服之尤效。

02939 玉环丹

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】 龙骨 莲花蕊 芡实（去壳） 黄柏（盐、酒炒） 石菖蒲 牡蛎（左顾者） 五味子各一两

【用法】 上为细末；金樱子竹刀刮去刺，擘开去子，蒸浓汁打糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，盐汤送下。

【功用】 涩精固阳。

【主治】 遗精，白浊。

02940 玉环煎

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】玉竹四钱 羚羊角一钱五分 沙参四钱 麦冬三钱 石斛三钱 贝母二钱 蒌皮三钱 蛤粉四钱 梨汁半杯（冲服）

【主治】肺热而咳，上焦微喘，肌表漫热，口燥咽干。

02941 玉抱肚

【方源】《普济方》卷二五〇引《德生堂方》。

【组成】川乌 川椒 小茴香 破故纸 胡芦巴 官桂 良姜 马蔺花 白芷 甘松 干姜 吴茱萸 川楝子 海藻 青木香 乳香 没药各半两 好艾四两（碾末，先铺在裹肚上，后用药末）。

【用法】上细末，用细绢做夹裹肚一个，腰前襜覆过脐腹，下斜尖如匾，覆护阴囊，别作稍尾，以带抄住子后，不碍小净手。遇大净手，取下后襜，上覆腰与肾、不及肾上裹肚，前后襜各铺绵，用前药末匀渗入绵，微洒以水，薄皮纸盖上绵，缀定住，翻绵在内，如缝人绵衣，常用拴裹腰腹，护囊使药气熏泌。

【功用】温暖丹田，熏蒸肾囊。

【主治】疝气。

02942 玉钥匙

【方源】《三因》卷十六。

【异名】玉匙散（《脉因证治》卷四）、玉锁匙（《痘疹活幼至宝》卷终）。

【组成】焰消一两半 硼砂半两 脑子一字 白僵蚕一分

【用法】上为末，研匀。以竹管吹半钱许入喉中，立愈。

【主治】风热喉痹，及缠喉风。

02943 玉泉丸

【方源】《直指》卷十七。

【组成】麦门冬（去心，晒） 人参 茯苓 黄耆（半生，半蜜炙） 乌梅肉（焙） 甘草各一两 瓜蒌根 干葛各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，温汤嚼下。

【主治】烦渴口干。

02944 玉泉丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】黄连 干葛 天花粉 知母 麦门冬（去心） 人参 五味子 生地汁 莲肉 乌梅肉 当归 甘草各等分 加人乳汁、牛乳汁、甘蔗汁、梨汁、藕汁

【用法】上先将各汁入蜜一斤半，煎熬成膏，后将各药为末，和前膏熬数沸。每服五茶匙，食前清米汤调下。

【主治】消渴。

【宜忌】忌一切辛热之物。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作"五汁玉泉丸"。据剂型，当作"玉泉膏"。

02945 玉泉散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】一六甘露散（原书同卷）、六一甘露散（《会约》卷十二）、玉泉煎、一六甘露饮（《医部全录》卷二三七）。

【组成】石膏六两（生用） 粉甘草一两 加朱砂三钱亦妙

【用法】上为极细末。每服一二三钱，新汲水或热汤、或人参汤调下。

【主治】阳明内热烦渴，头痛，二便秘结，温疫斑黄及热痰喘嗽。

02946 玉屏散

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】黄耆 防风 甘草

【主治】表气虚而恶寒者。

【加减】元气虚，加参、术；阴血虚，加归、芍。

02947 玉真丸

【方源】《本事》卷二。

【组成】硫黄二两 石膏（硬者不煅，研） 半夏（汤浸洗七次）各一两 消石一分（研）

【用法】上为细末，生姜汁糊为丸，如梧桐子大，阴干。每服三十丸，生姜汤或米饮送下。

【主治】①《本事》：肾厥头痛。肾气不足，气逆上行，头痛不可忍，谓之肾厥，脉举之则弦，按之石坚。②《妇人良方》：头痛筋挛，骨重少气，哕噫腹满，时惊，不嗜卧，咳嗽烦冤。

【方论选录】①《古方选注》：硫黄、消石升阳至顶，有迅雷风烈之势；石膏、半夏达阴降逆，有通玄入冥之神。治头痛不以轻清散邪，而用霸术劫夺其邪者，以浊阴上逆，乱其清阳，壅遏经隧，头痛如擘，刻欲昏愦，岂容缓治图功？然欲出补天手，迅扫浊阴，非深入圣域者不能。白沙之后，惟东壁能知之，乃曰硫黄与消石同用，配合二气，调燮阴阳，有升降水火之功。②《本事方释义》：硫黄气味辛大热，入右肾命门；石膏气味辛寒，入足阳明；半夏气味辛温，入足阳明；消石气味咸寒，入足少阴。此因肾厥头痛，以辛热咸寒入肾，和其

阴阳；再以辛寒辛温入胃。佐以姜汁，欲其速入胃也。且胃为肾之关，其关下行，则上逆之气不致窃踞清虚之府，而上下各得其宜矣。

02948 玉真散

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】玉真丹(《证治汇补》卷三)、玉正散(《灵验良方汇编》卷二)、玉贞散(《梅氏验方新编》卷六)、白附散(《经验奇方》卷上)。

【组成】南星 防风 白芷 天麻 羌活 白附子各等分

【用法】上为末。每服二钱，热酒一钟调服，更敷伤处。若牙关紧急，腰背反张者，每服三钱，用热童便调服；虽内有瘀血亦愈。至于昏死，心腹尚温者，连进二服，亦可保全。若治疯犬咬伤，更用漱口水洗净，搽伤处。

【功用】散风解痉，镇痛止血。

①《北京市中药成方选集》：散风止血。②《全国中药成药处方集》：镇痛。生肌。③《中国药典》：解痉。

【主治】①《外科正宗》：破伤风牙关紧急，角弓反张，甚则咬牙缩舌。疯犬咬伤。②《验方新编》：跌打损伤已破口者。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：孕妇忌服。禁忌鱼腥、辛辣、葱蒜诸品；禁忌生冷、油腻等食物。

【方论选录】《中医方剂学讲义》：方中防风、南星二味，有祛风化痰之功；益以白附子祛头面之风，定搐解痉；羌活散太阳之风；白芷散阳明之风；天麻治厥阴之风。如此则祛风之力大为增强，风散搐定，病亦自愈。

【临证举例】①破伤风 《中医杂志》(1956；8：421)：本方治外伤200例，其中约有50例破伤风，除7例因治疗过晚而死亡外，均治愈，未见后遗症。处方：白附子十二两，生南星（姜汁炒）、明天麻、羌活、防风、白芷各一两，蝉衣三两。典型病例：朱某某，男性，32岁。左脚掌被锈钉刺入约四分深，出血不多。第三日忽感咀嚼不便，吞咽困难，痉挛一次；第四天痉挛次数增加，颈部、脊腰均呈强直状态，体温39.6℃，脉搏跳动甚速，伤口呈肿硬状态。即以玉真散厚撒伤部，外用纱布绷带包扎；另给药散，每包重二钱，热黄酒调服，每隔三小时服食一包。次日痉挛次数大减。第三天伤部肿硬已完全软化平复，吞咽自由。计十二天的治疗日程完全回复正常。②外伤性腱鞘炎 《江苏中医》(1960；12：封三)用本方外敷治疗扭挫外伤所致的腱鞘炎，患者一般在3～5天内肿痛消失，功能恢复。方剂组成：白芷、南星、天麻、羌活、防风各一两，生白附子60克。

【备考】①《验方新编》本方用量：明天麻 羌活 防风 生南星（姜汁炒） 白芷各一两 白附子十二两。《经验奇方》：白附子十二个 生南星 白芷 天麻 羌活 防风各一两。②《寿世新编》本方用法：上六味切忌火炒，概宜生用，研极细末，就伤处敷上。倘伤重需内服者，可用黄酒浸服二三钱，但附子、南星须制过，否则恐致麻倒。③《浙江中医杂志》(1964；4：25)报道：内服玉真散过量中毒死亡一例。患者右脚跌伤，自服黄酒调玉真散约三钱，药为本县药店所制，10分钟后出现乌头碱中毒样症状，抢救无效死亡。作者认为，本方各药用量诸书不一，本例患者所用者，生白附用量较其他诸药总量大3倍。民间治跌打损伤每服0.9～1.5克，本例一次服用9克，内含生白附3克多，且系空腹黄酒冲服，故中毒而死。

02949 玉壶丸

【方源】《直指》卷十七。

【异名】天花粉丸(《奇效良方》卷三十三)、天花丸(《医统》卷五十二)。

【组成】人参 瓜蒌根各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，麦门冬煎汤送下。

【主治】消渴，引饮无度。

02950 玉烛汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆五钱 生地黄六钱 玄参四钱 知母四钱 当归三钱 香附三钱（醋炒） 柴胡一钱五分 甘草一钱五分

【主治】妇女寒热往来，或先寒后热，汗出热解，或月事不调，经水短少。

【加减】汗多者，以黄陈易柴胡，再加萸肉数钱；热多者，加生杭芍数钱；寒多者，加生姜数钱；肾经阴虚，日晡发热者，将黄耆减半，地黄改用一两。

【方论选录】黄耆为气分之上药，能补气，更能升气；辅以柴胡之轩举，香附之宣通，阳气之抑遏者，皆畅发矣。然血随气行，气郁则血必瘀，故寒热往来者，其月事恒多不调，经血恒多虚损，用当归以调之，地黄以补之，知母、玄参与甘草甘苦化阴以助之，则经血得其养矣；况地黄、知母诸凉药，与黄耆温热之性相济，又为燮理阴阳，调和寒热之妙品乎。

02951 玉烛散

【方源】《医统》卷六十引《局方》。

【组成】四物汤加大黄 朴消 枳实 厚朴

【用法】水煎服。

【主治】①《医统》引《局方》：血痢。②《儒门事亲》：人头目有疮肿瘰疬，及胸膈胁肢之间或有疮痂，肿核不消及脓水不止。妇人月事不来。

【备考】《儒门事亲》本方用四物汤、承气汤、朴消各等分；《奇效良方》本方用川芎、芍药、当归、熟地黄各一钱，枳实、朴消、厚朴各二钱，大黄三钱。

02952 玉烛散

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】当归 川芎 芍药 生地黄 大黄（蒸）各一钱

【用法】水一盏半，加大枣一枚，葱白二寸，煎七分，空心服。

【主治】妇人血虚，大便秘涩。

02953 玉粉丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】南星 半夏（俱洗）各一两 官桂（去皮）一两

【用法】上为细末，薄糊为丸，如梧桐子大，每服五七十丸，食后生姜汤送下。

【主治】气痰咳嗽，脉涩面白，上喘气促，洒淅恶寒，愁不乐。

【加减】心下痞者，加枳实五钱；身热甚者，加黄连五钱；体重者，加茯苓一两；气上逆者，加苦葶苈五钱；喘促者，加人参、桔梗各五钱；浮肿者，加郁李仁、杏仁各五钱；大便秘者，加大黄五钱。

02954 玉粉散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】寒水石四两（火煅红取出，地上去火毒） 井泉石二两（生用） 脑子半钱

【用法】上为细末。新水调敷；干扑亦得。

【主治】①痤痱。②《普济方》：热汗浸渍成疮，肿痒痛。

02955 玉粉散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】白矾（枯） 定粉各等分

【用法】上为细末。先洗浴净，淹开，掺之。

【主治】阴疮，浸淫不止。

02956 玉容丸

【方源】《医统》卷九十八。

【组成】白及 白附子 石榴皮 冬瓜仁 大枣（去皮核）各一两

【用法】以好酒浸三日。早起洗面毕，洗之如玉。

【功用】润肌白面。

【备考】本方方名，据剂型，当作"玉容酒"。

02957 玉容丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】洗面玉容丸(《饲鹤亭集方》)。

【组成】甘松 山奈 细辛 白芷 白蔹 白及 防风 荆芥 僵蚕 山栀 藁本 天麻 羌活 独活 密陀僧 枯矾 檀香 川椒 菊花各一钱 红枣肉七枚

【用法】上为细末，用去净弦膜肥皂一斤，同捶作丸。早、晚洗之。肌肤自然莹洁如玉，温润细腻。

【功用】《饲鹤亭集方》：润颜悦色。

【主治】①《外科正宗》：男妇雀斑、酒刺，及身体皮肤粗糙。②《饲鹤亭集方》：肌肤瘙痒。

【加减】秋、冬加生蜜五钱；皮肤粗槁，加牛骨髓三钱。

02958 玉容粉

【方源】《集验良方拔萃》卷四。

【组成】绿豆一升 荷花瓣二两（晒干） 白滑石五钱 香白芷五钱 冰片二钱 密陀僧二钱 白附子五钱

【用法】上为细末。早、晚洗面，用一匙擦之。

【主治】雀斑、酒刺，肺风糟鼻，面上一切斑点。

02959 玉容散

【方源】《种福堂方》卷四。

【异名】玉容粉(《集验良方拔萃》卷四)。

【组成】白僵蚕 白附子 白芷 山奈 硼砂各三钱 石膏 滑石各五钱 白丁香一钱 冰片三分

【用法】上为细末。临睡用少许水和，搽面；人乳调搽更妙。

【功用】《集验良方拔萃》：润颜色。

【主治】雀斑。

02960 玉容散

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】绿豆粉 90 克 白菊花 30 克 白附子 30 克 白芷 30 克 食盐 15 克 冰片 1.5 克

【用法】上为细末。用清水调匀外搽，代肥皂洗面，外搽 10 分钟后洗去。

【功用】祛风利湿，消斑润肤。

【主治】 黄褐斑，痤疮，扁平疣等。

02961 玉屑散

【方源】《咽喉脉证通论》。

【异名】 五马破曹。

【组成】 薄荷三两（另研） 官硼三钱五分 雄黄三钱 儿茶一钱 冰片三分

【用法】 上为细末，贮瓷瓶内。临用挑少许置舌上，咀含片刻咽下，日用八九次；如锁喉风、口内干枯、牙关紧闭不能咀含者，以无根水灌下。

【功用】 开关生津。

【主治】 咽喉口舌颈项破烂诸痛。

【宜忌】 脾胃虚弱者不宜多用。

02962 玉屑膏

【方源】《三因》卷九。

【异名】 玉屑散（《兰台轨范》卷五）。

【组成】 黄耆 人参各等分

【用法】 上为末，用萝卜大者，切一指厚，三指大，四五片，蜜淹少时，蘸蜜炙干，复蘸，尽蜜二两为度，勿令焦，炙熟。点黄耆、人参末吃，不拘时候，仍以盐汤送下。

【主治】 尿血并五淋、砂石，疼痛不可忍。

02963 玉黄膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 当归30克 白芷9克 姜黄90克 甘草30克 轻粉6克 冰片6克 蜂白蜡90～125克

【用法】 先将前四种药浸泡麻油内三天，然后炉火上熬至枯黄，离火去滓，加入轻粉、冰片（预先研末），最后加蜂白蜡熔化（夏加125克，冬加90克），细搅至冷成膏。

【功用】 润肌止痒。

【主治】 ①《朱仁康临床经验集》：皮肤皲裂。②《中医皮肤病学简编》：疖。

02964 玉堂丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 莲须（色黄者佳）一斤 石莲肉（净肉）一斤 芡实（净肉）二两 麦冬（去心）四两

【用法】 用公猪肚一个，加入莲肉（带心皮）一斤，入砂锅内，水煮烂去肚，将莲肉晒干，同前药为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心莲须煎汤送下。

【主治】 嗜欲无度，梦遗精滑，日夜长流，百方罔效，病将垂危者。

02965 玉盘散

【方源】《疡医大全》卷十二。

【组成】 白牵牛 甘松 香附 天花粉各一两 藁本 白蔹 白芷 白附子 宫粉 白及 大黄各五钱 肥皂一斤（捶烂）

【用法】 同药和匀。每日擦面。

【主治】 男妇面上雀斑，粉刺。

02966 玉液丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】 软石膏不以多少（又云：火煅红，出火毒）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如绿豆大。服之。

【功用】 泻胃火。

【主治】 食积、痰火。

02967 玉液丹

【方源】《疡医大全》卷十六。

【组成】 五倍子（拣明净者，敲作小块，去净虫网蛀屑。用好六安茶泡汁，待温浸洗，滤去茶汁。再用糟坊白药丸，研筛拌匀，放瓷器内，棉花覆紧，放于暖处，候生白毛为度。用筛盛放风日中，晒令极干，筛净白毛。如筛不尽，可用布将毛拭净。净末）十两 儿茶 生甘草各二两 苏薄荷叶 乌梅肉各一两

【用法】 上为极细末。梨汁为丸，如龙眼核大。凉干收贮。每用一丸，清茶调匀，青绢蘸敷患上。

【主治】 走马牙疳。

02968 玉液汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生山药一两 生黄耆五钱 知母六钱 生鸡内金二钱（捣细） 葛根一钱半 五味子三钱 天花粉三钱

【主治】 消渴。

【宜忌】 忌食甜物。

【方论选录】 消渴之证，多由于元气不升，此方乃升元气以止渴者也。方中以黄耆为主，使葛根能升元气，而又佐以山药、知母、花粉以大滋真阴，使之阳升而阴应，自有云行雨施之妙也；用鸡内金者，因此证尿中皆含有糖质，用之以助脾胃强健，化饮食中糖质为津液也；用五味者，取其酸收之性，大能封固肾关，不使水饮急于下趋也。

【临证举例】 邑人某，年二十余，贸易津门，得消渴证。求津门医者，调治三阅月，更医十余人不效，归家就医于愚。诊其脉甚微细，旋饮水旋即小便，须臾数次。投以玉液汤，加野台参四钱，数剂渴见止，而小便仍数，又加萸肉五钱，连服十剂而愈。

02969 玉液散

【方源】《得效》卷五。

【组成】 瓜蒌根 知母 贝母（去心，炒）各一两 甘草（炙）半两 人参半两

【用法】 上为末。每服二钱，先熔下黄蜡二钱，同入米饮调下，食后服。

【主治】 久近喘嗽，口干作渴。

02970 玉液煎

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 石膏五钱 生地五钱 石斛三钱 麦冬三钱 玉竹四钱 葛根二钱 桔梗一钱 薄荷一钱 白茅根八钱 甘蔗汁半杯（冲服）

【主治】 胃火炽盛，烦渴引饮，牙龈腐烂，或牙宣出血，面赤发热。

02971 玉锁丸

【方源】《奇效良方》卷三十四。

【组成】 败荷叶（晒干，不见火）二两 白茯苓 牡蛎（左顾者，煅过）各一两 龙骨（用五色真者，另研）三钱

【用法】 上为细末，研匀，以败蜡熔和为丸，如梧桐子大。如无败蜡，以蜡糊代之。每服三五十丸，空心用麦门冬汤送下，一日二次。如觉阳道衰微，小便清，梦遗止，即住服。

【功用】 大衰痿阳道，止妄心。

【主治】 梦遗失精，小便白浊。

【宜忌】 忌酒，并热面、动风等物。

【备考】 惟修真养性之士宜服之。如欲阳道如故，即以麝香酒解之。

02972 玉锁丹

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】 鸡头肉末 莲花蕊末 龙骨（别研） 乌梅肉（焙干，取末）各一两

【用法】 煮山药糊为丸，如鸡头子大。每服一丸，空心温酒、盐汤任下。

【功用】《御药院方》：涩精养气壮阳。

【主治】 梦遗漏精。

02973 玉锁匙

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 僵蚕 硼砂（煅） 冰片少许 白芷各等分

【用法】 上为末。每用一指面，指揩牙床上。三次即愈。

【主治】 牙疳。

02974 玉霜丸

【方源】《局方》卷五。

【组成】 天雄十两（长大者，以酒浸七日了，掘一地坑，以半称炭火烧坑通赤，速去炭火令净，以醋二升泼于地坑内候干，乘热便投天雄在内，以盆合十拥之，经宿取出，去皮脐） 磁石（醋淬七次，更多为妙） 朱砂（飞研） 泽泻（洗，酒浸一宿，炙） 牛膝（去苗，酒浸，焙干） 石斛（去根，炙） 从蓉（去皮，酒浸一宿，炙干） 巴戟（穿心者）各二两 茴香（炒） 肉桂（去粗皮）各一两 家韭子（微炒） 菟丝子（酒浸一伏时，蒸过，晒干，杵，罗为末，去轻浮者）各五两 牡蛎（火煅，捣为粉） 紫梢花（如无，以木贼代之）各三两 鹿茸（用麻茸连顶骨者，先燎去毛令净，约三寸以来截断，酒浸一伏时，慢火炙令脆）半两 白龙骨一斤（粘舌者，细研如粉，以水飞过三度，日中晒干，用黑豆一斗，蒸一伏时，以夹绢袋盛，日晒干）

【用法】 上为末，炼酒、蜜各半和丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、晚食前温酒送下。

【功用】 续骨联筋，秘精坚髓，延年保命，却老还童，安魂定魄，换肌秘气，轻身壮阳，益寿住世。常服补真气，壮阳道。

【主治】 真气虚惫，下焦伤竭，脐腹弦急，腰脚软痛，精神困倦，面色枯槁，或亡血盗汗，遗沥失精，大便自利，小便滑数，肌肉消瘦，阳事不举。

02975 玉露丸

【方源】《臞仙活人方》。

【组成】 白龙骨（粘舌者，九蒸，久晒，为末） 菟丝子（酒浸，焙干用，别研） 韭子（新瓦上微炒）各三两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前与金锁丹相间服。

【功用】 助元阳，闭精气，补脑髓，固真不泄。

【主治】 遗精。

【宜忌】 初服忌房事。

02976 玉露饮

【方源】《普济方》卷一一九引《仁存方》。

【组成】 寒水石 石膏 滑石各等分

【用法】 上为极细末，入朱砂，如桃花色。每服一钱匕，食后麦门冬汤调下。

【主治】 心肺上膈壅热，烦躁口干，生疮，小便赤涩。

02977 玉露散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 甘露散（原书同卷）、玉露饮（《活幼新书》卷下）。

【组成】 寒水石（软而微青黑，中有细纹者是）

石膏（坚白而墙壁，手不可折者是好）各半两　甘草（生）一钱

【用法】 上为细末。每服一字或半钱、一钱，食后温汤调下。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：伤热吐泻，黄瘦。②《得效》：暑月出痘疹，烦燥热渴。

【备考】 本方改为丸剂，名"玉露丸"（见《医学入门》卷六）。

02978　玉露散

【方源】 《儒门事亲》卷十二。

【组成】 寒水石　滑石　石膏　瓜蒌根各四两　甘草二两

【用法】 上为细末。每服五钱，新水调下。

【主治】 暑病，饥困伤暑，食饮不进，时时呕吐，口中常流痰水，腹胁作痛；霍乱吐泻不止；妇人产后一二日潮热口干。

02979　玉露散

【方源】 《汉药神效方》。

【组成】 当归　白芍药　桔梗　川芎　白茯苓　天花粉　木通　穿山甲各等分

【用法】 以一钱三分为一服服之。

【主治】 产乳不足。

02980　玉露膏

【方源】 《中医外科学讲义》。

【组成】 芙蓉叶

【用法】 上为极细末，用凡士林调（凡士林 8/10，玉露散 2/10）。敷患处。

【功用】 凉血退肿。

【主治】 ①《中医外科学讲义》：一切阳毒之症。②《朱仁康临床经验集》：一切疮、疖、肿毒、痈未破时，丹毒，带状疱疹。

02981　玉露霜

【方源】 《种福堂方》卷三。

【组成】 白术二两（炒）　陈皮一两五钱　莲肉四两（去心）　薏苡仁四两（炒）　糯米　绿豆　陈米锅焦各一升（俱炒）

【用法】 上为末，收贮。每服二三两，临用时量加糖霜，滚水调服。

【主治】 老人脾泄。

02982　玉竹饮子

【方源】 《张氏医通》卷十五。

【组成】 葳蕤（一名玉竹）三钱　茯苓二钱　甘草一钱　桔梗一钱　橘皮一钱　紫菀二钱　川贝母（去心，研）三钱　生姜（同橘皮蜜煎）四钱

【用法】 长流水煎，入熟白蜜二匕，分二服。

【主治】 痰火痰涎涌盛，咳逆喘满。

【加减】 气虚，加人参二钱；虚火，加肉桂半钱；客邪，加细辛三分，香豉二钱；咽喉不利、唾脓血，加阿胶三钱、藕汁半杯；头额痛，加葱白二茎；便溏，用伏龙肝击碎煎汤，澄清代水煎服；气塞，临服磨沉香汁数匙。

02983　玉米粉粥

【方源】 《长寿药粥谱》引《食物疗法》。

【组成】 玉米粉　粳米

【用法】 先以玉米粉适量，冷水溶和，待粳米粥煮沸后，调入玉米粉同煮为粥。早、晚温热服食。

【功用】 益肺宁心，调中开胃。

【主治】 高血脂症、冠心病、心肌梗塞、动脉硬化等心血管系统疾病，及癌症的防治。

【宜忌】 霉坏变质的玉米粉不宜煮粥食用。

02984　玉钥匙散

【方源】 《良方集腋》卷上。

【组成】 僵蚕一钱五分（炒，研极细）　冰片六分　牙消三钱　硼砂三钱

【用法】 用新顶银罐，先硼后消，屑屑间炼，如枯矾之状，松脆为贵，置冷地出净火气，研细末，再加僵蚕、冰片，以极细无声为度。

【主治】 咽喉肿痛。

【加减】 如咽喉腐烂者，加西黄、熊珠、劈砂各三分，研细并入。

【宜忌】 宜置瓷瓶勿令泄气。

02985　玉屏风散

【方源】 《医方类聚》卷一五〇引《究原方》。

【组成】 防风一两　黄耆（蜜炙）　白术各二两

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏半，加大枣一枚，煎七分，去滓，食后热服。

【功用】 ①《张氏医通》：补脾实卫。②《古今名医方论》柯韵伯：托里固表。

【主治】 表虚自汗，易感风邪。

①《医方类聚》引《究原方》：腠理不密，易于感冒。②《丹溪心法》：自汗。③《济阳纲目》：风雨寒湿伤形，皮肤枯槁。

【方论选录】 ①《医方考》：卫气一亏，则不足以固津液，而自渗泄矣，此自汗之由也。白术、黄耆所以益气，然甘者性缓，不能速达于表，故佐之以防风。东垣有言，黄耆得防风而功愈大，乃相畏相使者也。是自汗也，与伤风自汗不同，伤风自汗责之邪气实；杂证自汗责之正气虚，虚实不同，攻补亦异。②《古今名医方论》柯韵伯：防风遍行周身，称治风之仙药，上清头面七窍，内除骨节疼

痹、四肢挛急，为风药中之润剂，治风独取此味，任重功专矣。然卫气者，所以温分肉而充皮肤，肥腠理而司开阖。惟黄耆能补三焦而实卫，为玄府御风之关键，且无汗能发，有汗能止，功同桂枝，故又能治头目风热、大风癞疾、肠风下血、妇人子脏风，是补剂中之风药也。所以防风得黄耆，其功愈大耳。白术健脾胃，温分肉，培土即以宁风也。夫以防风之善驱风，得黄耆以固表，则外有所卫，得白术以固里，则内有所据，风邪去而不复来，当倚如屏，珍如玉也。③《古方选注》：黄耆畏防风，畏者，受彼之制也。然其气皆柔，皆主乎表，故虽畏而仍可相使。不过黄耆性钝，防风性利，钝者受利者之制耳；惟其受制，乃能随风以周卫于身而固护表气，故曰玉屏风。④《成方便读》：大凡表虚不能卫外者，皆当先建立中气，故以白术之补脾建中者为君，以脾旺则四脏之气皆得受荫，表自固而邪不干；而复以黄耆固表益卫，得防风之善行善走者，相畏相使，其功益彰，则黄耆自不虑其固邪，防风亦不虑其散表，此散中寓补，补内兼疏，顾名思义之妙，实后学所不及耳。

【临证举例】 ①虚伤风 《一得集》：郭绍翁年四十许，经营米业，劳顿实甚，癸酉秋，患伤风咳嗽，就诊于余，脉浮部虚大，寸口涩小，自汗淋沥。余曰：伤风症也，但脉象极虚，寸口脉应大反小，是内伤面微有外感，若服发散之药，汗必漏而不止，虚阳浮越矣，法宜补益，玉屏风散，二剂而瘳。②卫阳不固，反复感冒 《福建中医药》(1984；3：50)：刘某某，女，44岁，医务人员。患者经常感冒，每月1～2次，动则气促易汗，神疲易倦，面色苍白，食欲不佳，舌淡苔薄白，脉细弱。免疫球蛋白检查：IgG60mg%，IgA245mg%，IgM140mg%。证属卫阳不固，腠理虚疏，感受风寒，方取玉屏风散加味。处方：黄耆15克，白术10克，防风、当归各8克，每周六剂，煎服。三个月后复查免疫球蛋白 IgG1225mg%，IgA240mg%，IgM145mg%。③术后自汗恶风《湖北中医杂志》(1981；2：39)：用本方加党参、当归各9克，治疗16例手术后自汗恶风患者，平均服药5剂后痊愈。

【现代研究】 调节机体免疫功能 《上海免疫学杂志》(1983；2：82)：在溶血空斑试验（简称PFC）中，玉屏风散能使SRBC致敏小鼠脾脏PFC基础水平偏低的增高，偏高的降低，而呈双向调节作用。《中西医结合杂志》(1986；4：229)：玉屏风散在对兔用Vassali氏改良法造成的实验性肾炎模型时，对肾炎的病理修复有明显作用。服药组病理好转率达83.33%，而对照组为33.33%，服药组治疗后与对照组相比，病理改善有显著差异($P<0.01$)。同时肾功能方面内生肌酐清除率回升较快。玉屏风散在同时使用免疫抑制剂的情况下，能使各类肾小球肾炎患者的低于正常或高于正常的CH_{50}、C_3、RFC、IgG、IgA、IgM恢复正常。其治疗机理亦与调节机体免疫功能有关。

02986 玉石清胃汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 玉竹三钱 石膏四钱 花粉二钱 石斛三钱 生地五钱 人参一钱 麦冬二钱 蛤粉四钱 山药三钱 茯苓二钱

【用法】 甘蔗汁半杯，冲服。

【主治】 胃受燥热，津液干枯，渴饮杀吞。

02987 玉环来笑丹

【方源】《本草纲目》卷三十一引《皆效方》。

【组成】 荔枝核四十九个 陈皮（连白）九钱 硫黄四钱

【用法】 上为末，盐水打面糊为丸，如绿豆大。遇痛时，空心酒服九丸，良久再服。

【主治】 疝气癫肿，亦治诸气痛。

02988 玉容西施散

【方源】《医部全录》卷一三一引《医林方》。

【异名】 玉容散(《医统》卷六十六)。

【组成】 绿豆粉二两 白附子 白及 白蔹 白僵蚕 白芷 天花粉各一两 甘松 三柰子 茅香各五钱 零陵香 防风 藁本各二钱 肥皂角一挺（去皮弦）

【用法】 上为细末。每洗面用之，面色如玉。

【主治】 面上一切酒刺、风刺、黑黧斑子。

02989 玉屑无忧散

【方源】《局方》卷七。

【异名】 大圣夺命玉雪无忧散(《幼幼新书》卷三十四)、无忧散(《鸡峰》卷二十四)、大圣玉屑无忧散(《卫生总微》卷十七)、夺命无忧散(《普济方》卷六十引《如宜方》)。

【组成】 玄参（去芦） 荆芥穗 滑石（研） 黄连（去毛） 缩砂（去壳） 白茯苓（炒令黄） 贯众（去芦） 甘草（炙） 山豆根各一两 寒水石（研、飞）二两 硼砂二钱

【用法】 上为细末。每服一钱，干掺舌上，后以新水咽下，不拘时候。

【功用】《永乐大典》引《小儿保生要方》：大解百药毒，偏润三焦，消五谷，除九虫，赶瘟疫。

【主治】 ①《局方》：咽喉肿痛，舌颊生疮，风毒壅塞，热盛喉闭；或因误吞硬物，诸骨鲠刺，涎满气急，或至闷乱，不省人事。②《永乐大典》引《小儿保生要方》：小儿一切咽喉塞滞，口内疮；心腹胀满，脾积癥块；喉闭，缠喉风，涎生不止，奶癖；误咽叫子、鱼骨、钱、枣核、毒药硬物和吃巴豆、杏仁、石头、铁札、麦糠、棘针、瓷瓦诸般杀人之药；并蛇蝎诸虫咬，气入腹；但是心腹有疾，诸药不能治者；及湿痰风闭。

【宜忌】《医方论》：此治实火，实痰之重剂，若虚火聚于咽喉，闭结不通者，万不可用。

02990 玉匙开关散

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 牙皂一钱 明矾一钱（入蜒蚰二条拌匀，阴干） 火消一钱半 腰黄三分 硼砂一钱半 僵蚕一钱 山豆根一钱 冰片三分

【用法】 上为细末。吹入。

【主治】 喉风、喉痈、乳蛾。

【加减】 痰多者，加胆矾；热甚者，加朴消；夏令潮湿，加龙骨；腐烂者，加轻粉。

02991 玉液上清丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】 苏州薄荷叶十四两 柿霜五两 桔梗四两半 甘草三两半 川芎二两八钱 川百药煎五钱 防风一两六钱 砂仁四钱半 福建青黛三钱 冰片 元明粉 白硼砂各二钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，噙化，不拘时候。

【功用】 生津液，化痰涎。

【主治】 风痰上壅，头目不清，咽喉肿痛，口舌生疮。

【临证举例】 喉痹 昔宋神宗患喉痹，服此药一丸，立愈。

02992 玉锁固真丹

【方源】《得效》卷七。

【组成】 白龙骨半斤 磁石（醋淬七次） 朱砂各一两 牡蛎（煅）一两 紫梢花一两半 家韭子 菟丝子各二两半 鹿茸（酒浸，炙） 白茯苓 川巴戟 官桂 肉苁蓉（酒浸，炙） 桑螵蛸（酒浸，切，炙） 远志（甘草水煮，取皮，姜汁炒） 当归（去尾） 苍术（切，酒炒） 茴香（炒） 吴茱萸（炒） 川楝子（炒） 桑寄生（真者） 沉香（不见火） 木香（不见火） 黄耆（去芦） 绵附子（熟炮）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒、盐汤任下。

【主治】 心气不足，思虑太过，肾经虚损，真阳不固，旋有遗沥，小便经岁白浊，或淡赤，或如膏，梦寐精泄，甚则身体拘倦，骨节痠疼，饮食不进，面色黧黑，容枯肌瘦，唇口干燥，虚烦盗汗，举动力乏。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“玉锁九真丹”。

02993 玉竹麦门冬汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 玉竹三钱 麦冬三钱 沙参二钱 生甘草一钱

【用法】 水五杯，煮取二杯，分二次服。

【主治】 燥伤胃阴。

【加减】 土虚者，加生扁豆；气虚者，加人参。

02994 古瓦汤

【方源】《三因》卷十。

【组成】 干葛 天花粉 人参 鸡脞胫（净洗，焙干）各等分

【用法】 上为末。每服二大钱，用多年古瓦碓碎煎汤调下，不拘时候服。

【主治】 消肾消中，饮水无度，小便频数。

02995 古庵心肾丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十九。

【组成】 熟地 生芋（俱怀庆者，酒浸，竹刀切） 山药 茯神（去木）各三两 山茱萸肉（酒浸，去核） 枸杞子（甘州者，酒洗） 龟版（去裙，醋炙） 牛膝（去芦）各一两 鹿茸（火去毛，醋炙） 一两 当归（去芦，酒洗） 泽泻（去毛） 黄柏（炒褐色）各一两五钱 辰砂（为衣） 黄连（去毛，酒洗）各一两 生甘草半两 牡丹皮（去心）一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服五十丸，渐加至一百丸。空心温酒或淡盐汤任下。

【功用】 补血生精，宁神降火。

【主治】 ①《丹溪心法附余》：肾水亏乏，心火上炎，发白无子及惊悸征忡，遗精盗汗，目暗耳鸣，腰痛足痿。

【备考】 方中丹皮用量原缺，据《医学入门》补。

02996 去铃丸

【方源】《百一》卷十五引王吉老。

【异名】 资政丸。

【组成】 杜茴香一斤

【用法】 以老生姜汁浸茴香一夜，约姜汁尽入茴香内，以好青盐二两同炒赤，取出焙燥，研罗为末，九灰酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸或五十丸，空心、食前温酒、米饮任下。

【主治】 小肠疝气。

【方论选录】 此药专实脾胃，以其有青盐引入下部，遂大治小肠疝气。寻常治疝气药多是疏导，久而未有不为害者，此药用姜汁专一发散，而无疏导之害。

02997 去铃丸

【方源】《医方类聚》卷九十引《澹寮方》。

【组成】 川乌尖七个（生用） 巴豆七枚（去皮，只去九分油）

【用法】 上为细末，糕糊为丸，如梧桐子大，用朱砂、麝香为衣。每服二丸，同青木香丸三十粒，空心冷盐酒或冷盐水送下，三两日一服，不可多。

【主治】 奔豚疝气，或阴囊肿大。

02998 去斑膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 大枫子仁 杏仁 核桃仁 红粉 樟脑 各30克

【用法】 先将三仁同捣极细，再加红粉、樟脑，一同研细如泥，如太干，加麻油少许调匀。每日揉擦一次（先涂小片，观察有无过敏反应）。

【功用】 润肌消斑。

【主治】 酒皶鼻，粉刺，黄褐斑。

02999 去腐灵药

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】 水银一两 火消二两 食盐三钱 枯矾三钱（三味炒燥） 朱砂八钱 雄黄三钱 白砒三钱 硼砂三钱（一加硇砂三钱）

【用法】 上为末，入泥固罐内，盖盏封口，架三钉上，砌百眼炉，先底火二寸，点香一支，中火一枝，顶火一枝，随以水檐盏勿住，香毕去火，次日取升上者用。

【功用】 去腐。

【加减】 发背未破，加花粉；已破、加乳香、没药；疔疮初起，加蟾酥；肿毒，加鹅管石，醋调敷；烂疮，加黑附子；囊痈烂，加贝母；瘰疬破，加发灰、皂角、白及，水调敷；痔疮，加滑石；鱼口，加皂角；结毒，加光粉、滑石；臁疮，加轻粉、黄丹；跌打，加文蛤、百草霜；乳蛾、走马疳、耳腮等，俱用茶调；蛇咬，加南星、川椒；虫咬，加雄黄。

03000 去翳膜丹

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】 甘石五钱 珍珠六分 熊胆二钱（入在甘石内，晒干） 硼砂五分 朱砂一钱 铜绿七分 石燕五分 石蟹（用清水飞过）五分

【用法】 上为极细末，听用。

【功用】 去翳膜。

03001 去恶清心汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 当归二钱 川芎一钱 桃仁一钱五分 炮姜六分 楂炭三钱 延胡一钱 琥珀一钱 生熟蒲黄各六分 丹参三钱 牛膝二钱 灯心三尺 苏木三分 降香五分

【主治】 新产之后，恶露未行，不耐久坐，平卧太早，瘀血冲心，头眩神昏，不能语言，万分危险。

03002 去湿健脾汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 党参一两 山药五钱 云苓五钱 薏米五钱 牛蒡子三钱（炒） 连翘三钱 陈皮三钱 泽泻三钱 猪苓三钱 车前子三钱（外包） 砂仁壳一钱 甘草一钱

【用法】 水煎服；外以三物化坚汤罨之。

【主治】 胞虚如球（非炎性眼睑水肿）。两眼珠微赤，稍酸不痒，无泪虚胀，不坚硬，皮不变色。

【临证举例】 胞虚如球 昔濮县杨某某，女，37岁。时至中秋，忽觉四肢无力，眼胞沉涩，意为感冒所致，即服以姜葱发汗之物，至晨胞虚如球，不痒，稍觉微酸。六脉虚数，惟太阴为甚。此乃脾土虚热，清气下降，虚火上升。内服本方，外以三物化坚散罨之，二三日即消。

03003 术连丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】 白术（土炒）四两 黄连（吴茱萸汤浸，炒）一两

【用法】 上为末，神曲糊为丸。每服五六十丸，生姜汤送下。

【主治】 肝火侵中，嗳酸嘈杂。

03004 术附汤

【方源】《金匮》卷上（附方）引《近效方》。

【异名】 白术附子汤（《鸡峰》卷五）。

【组成】 白术二两 附子一枚半（炮，去皮） 甘草一两（炙）

【用法】 上锉。每服五钱匕，加生姜五片，大枣一枚，水一盏半，煎七分，去滓温服。

【功用】 暖肌，补中，益精气。

【主治】 风湿痹痛，头眩肢重，及中湿泄泻，小儿慢惊。

①《金匮》（附方引《近效方》）：风虚头重眩苦极，不知食味。②《济生》：中湿脉细，自汗体重。③《医统》：小儿身冷，泄泻慢惊。④《保命歌括》：寒厥暴痛。

【方论选录】《法律》：肾气空虚之人，外风入肾，风挟肾中浊阴之气，厥逆上攻，其头间重眩之苦至极难耐，兼以胃气亦虚，不知食味。故方中全不用风门药，但用附子暖其水脏，白术、甘草暖其土脏，水土一暖，则阴浊之气，尽陷于下，而头苦重眩，及不知食味之证除矣。

03005　术附汤

【方源】《三因》卷六。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 白术各一两　甘草（炙） 茯苓　桂心各半两

【用法】 上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜五片，大枣两枚，煎七分，去滓，食前服。

【主治】 湿疟。寒热身重，骨节烦疼，胀满，濈濈自汗，善呕。

03006　术附汤

【方源】《十便良方》卷十一引《指迷方》。

【组成】 苍术四两　芍药　茯苓各三两　人参甘草各一两　附子一两半

【用法】 上为粗散。每服五钱，水二盏，煎一盏，去滓温服。

【主治】 寒湿之邪客搏经络，阳气不得发泄，蕴于肌肉之间，但寒，头重则眩晕，肌肉瘙疼，牵急不得转侧，濈濈汗出，恶寒，小便不利，大便反快，短气眩晕，足寒，或时咽痛发热，其脉迟而小弦。

03007　术附汤

【方源】《活幼口议》卷十九。

【组成】 附子半个（炮了者） 白术一分　干姜二钱（炮） 甘草一钱（炙）

【用法】 上㕮咀。每服一钱，水一小盏，煎至半盏，去滓与服。手足暖止之。

【主治】 ①《活幼口议》：小儿脏腑虚寒，泄泻洞痢，手足厥冷。②《医统》：湿温，小便不利。

03008　术附汤

【方源】《得效》卷三。

【组成】 白术四两（去芦） 绵附子（炮，去皮脐，薄切片）一两半　甘草（炙）二两

【用法】 上锉散。每服三钱，水一盏，加生姜十片，煎取八分，去滓后调苏合香丸二粒，并进二服。或气短头晕，手足厥逆未退者，可进养心丹三十粒至百粒，不拘时候。

【主治】 中寒、中气之候，四肢厥逆，口噤，牙关紧急，痰涎壅盛，如中风状者。

03009　术附汤

【方源】《校注妇人良方》卷八。

【组成】 白术　生附子（须用好者）

【用法】 上为末。每服五钱，加生姜、大枣，水煎，和滓服。如不应，倍用之。

【主治】 下痢，脾气脱陷，肢体不动，汗出身冷，气短喘急，或呕吐不食者。

03010　术附汤

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷九。

【组成】 白术四两　附子（炮，去皮脐）一两五钱

【用法】 每服三钱，加生姜、大枣，水煎，热服。

【主治】 风湿相搏，腰膝疼痛，中气不足，四肢重着。

03011　术附汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 生茅术五钱　人参二钱　厚朴三钱　生附子三钱　炮姜三钱　广皮三钱

【用法】 水五杯，煮成二杯，先服一杯，约三时，再服一杯。以肛痛愈为度。

【主治】 浊湿久留，下注于肛，气闭肛门坠痛，胃不喜食，舌苔腐白。

【方论选录】 气虚而为寒湿所闭，故以参、附峻补肾中元阳之气；姜、术补脾中健运之气，朴、橘行浊湿之滞气。俾虚者充，闭者通，浊者行，而坠痛自止，胃开进食矣。

03012　术苓汤

【方源】《直指》卷九。

【组成】 黄耆（炙） 防风　白茯苓　白术　麻黄根节各半两　甘草（炙）二钱

【用法】 上锉细。每服三钱，加小麦百粒同煎，临卧服。

【主治】 虚汗，盗汗。

【加减】 或加牡蛎亦得。

03013　术桂汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 麻黄苍术汤。

【组成】 苍术二钱　麻黄　炒神曲　橘皮　白茯苓　泽泻各一钱　桂枝　半夏　草豆蔻仁　猪苓各五分　黄耆三分　炙甘草二分　杏仁十个

【用法】 上都作一服。水二盏，加生姜五片，煎至一盏，去滓，食前热服。

【主治】 寒湿所客，身体沉重，胃脘痛，面色萎黄。

03014 术附姜苓汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 生白术五钱 附子三钱 干姜三钱 茯苓五钱

【用法】 水五杯，煮取二杯，一日服二次。

【主治】 湿久伤阳，痿弱不振，肢体麻痹，痔疮下血。

03015 术附理中丸

【方源】《赤水玄珠》卷二。

【组成】 人参 附子（炮） 炮姜 白术 炙甘草 木香 丁香各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，食前白汤送下。

【主治】 中寒，心腹急痛。

03016 术桂防䓖汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 白术二两 肉桂三钱 防已一钱 䓖茳草五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 露宿于星月之下，寒湿之气入于骨髓之内，腰痛不能转侧者。

03017 世传白花蛇酒

【方源】《本草纲目》卷四十三引《颜湖集简方》。

【组成】 白花蛇一条（温水洗净，头尾各去三寸，酒浸去骨刺，取净肉一两） 全蝎（炒） 当归 防风 羌活各一钱 独活 白芷 天麻 赤芍药 甘草 升麻各五钱

【用法】 上锉碎，以绢袋盛贮，用糯米二斗蒸熟，如常造酒，以袋置缸中，待成，取酒同袋密封，煮熟，置阴地七日出毒。每温饮数杯，常令相续。

【主治】 诸风不论新久，手足缓弱，口眼㖞斜，语言謇涩，或筋脉挛急，肌肉顽痹，皮肤燥痒，骨节疼痛；或生恶疮、疥癞等疾。

03018 甘石散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】 绿炉甘石 乌贼骨各等分

【用法】 上为细末，入脑少许。点目眦，泪自收。二药燥，脑和之。

【主治】 眼风，流泪不止。

03019 甘石散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 炉甘石 31 克 石决明 31 克 煅龙骨 31 克 熟石膏 31 克 松花粉 62 克 枯矾 15 克 冰片 6 克

【用法】 上为极细末。撒布创面，或调油外敷。

【主治】 足跟溃疡。

【备考】 本方加入煅石膏 30 克，冰片 1 克，研末外用，名“冰石散”。

03020 甘松粥

【方源】《药粥疗法》引《饮食辨录》。

【组成】 甘松 5 克 粳米 30～60 克

【用法】 先煎甘松取汁，去滓，再用粳米煮粥，待粥将成时，加入甘松药汁，稍煮一二沸即可。每天两次，空腹温热食用。3～5 天为一疗程。

【功用】 行气止痛，补脾健胃。

【主治】 气闷胸痛，脘腹胀痛，食欲不振，胃寒呕吐。

【宜忌】 发热病人忌用。

03021 甘草丸

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】 甘草一寸（炙赤色） 杏仁二十枚（汤浸去皮、尖、双仁，研） 黄连末一分

【用法】 上为末，和匀。每服如杏仁大。绵裹含化咽津。

【主治】 口糜生疮，痛不得食。

03022 甘草丸

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】 甘草（炙，锉） 人参 乌梅肉（炒） 枣肉（焙） 石膏（碎）各一两 半夏（汤洗去滑，生姜汁制）一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹丸大。每服一丸。含化，不拘时候。

【主治】 口干心热。

03023 甘草汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 温液汤（《千金翼》卷十五）、甘草散（《医方类聚》卷五十四引《神巧万全方》）。

【组成】 甘草二两

【用法】 以水三升，煮取一升半，去滓，温服七合，一日二次。

【功用】 ①《直指小儿》：涌吐痰涎。②《金匮要略论注》：清少阴客热。

【主治】 伤寒少阴病，咽喉干燥，疼痛灼热；肺痿涎唾；小儿撮口；痈疽热毒。

①《伤寒论》：少阴病二三日，咽痛。②《玉函经》：小儿撮口发噤。③《千金》：肺痿涎唾多，心中温温液液者。④《外台》：羸劣老弱，体性少热，因服石散，而寒气盛，药伏胸膈，冷热不调，烦闷短气欲死，药既不行，又不能大便。⑤《圣惠》：中蛊欲死。⑥《圣济总录》：热毒肿，身生瘭浆；舌卒肿起，满口塞喉，气息不通，顷刻杀人。⑦《伤寒总病论》：豌豆疮欲出。⑧《直指》：诸痈疽，大便秘。

【方论选录】 ①《法律》：本方用甘草一味，乃从长桑君以后相传之神方也。历代内府御院莫不珍之。盖和其偏，缓其急，化其毒，卓然奉之为先务，然后以他药匡辅其不逮。②《金匮要略论注》：甘草一味单行，最能和阴而清冲任之热。每见生便痈者，骤煎四两顿服立愈，则其能清少阴客热可知，所以为咽痛专方也。③《伤寒论集注》：案本论汤方，甘草俱炙，炙则助脾土而守中。惟此生用，生则和经脉而流通，学者不可以其近而忽之也。

【临证举例】 ①少阴咽痛 《岳美中医话集》：昔在山东时，曾治一患者，咽喉痛如刀刺，曾用西药未效，细察咽喉，局部不红不肿，诊断为少阴咽痛，病由少阴经气不能舒展所致。予服《伤寒论》甘草汤，生炙甘草并用，以舒其痉挛。饮后二日，其痛若失。②毒蕈中毒 《新中医》(1978；1:36)：苏某某，男，42岁。炒食山上采取野蕈约250克，5小时后出现腹痛，恶心头晕，出冷汗，全身无力，呕吐，子发病后两小时就诊。取甘草1500克，浓煎。第一次药后10分钟呕吐一次；30分钟后服第二次药，2小时后腹痛、恶心逐渐减轻；再服第二煎药液100毫升，2小时后，腹痛消失，但仍感全身乏力，头晕。4小时后腹泻一次，为黄褐色烂便，再服余下的药液100毫升，6小时后诸症消失而痊愈。

【备考】《外台》本方用生甘草四两，切。以水五升，煮去折半，去滓，令顿服之。当大吐，药亦与病俱去，便愈矣。夫散家患心腹痛，服诸药不愈者，服此诸膈即通，大便亦利，甚验。

03024 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 甘草（炙，锉） 侧子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮） 防己 附子（炮裂，去皮脐） 芎藭 人参 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙干） 当归（切，焙） 赤芍药各一两 秦艽（去苗土）三分 茯神（去木）二两 防风（去叉）三分 白术半两 黄芩（去黑心）半两 细辛（去苗叶，微炒）半两 甘菊花（未开者）一两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服六钱匕，以水二盏，加生姜半分（切），煎至一盏，去滓，入竹沥半合，更同煎沸温服，空心、日晚、近夜服。

【主治】 中偏风，积年不愈，手足枯细，口面㖞斜，精神不守，言语倒错。

03025 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】 甘草（炙，锉） 栝楼根各二两 麦门冬（去心，焙）二分 半夏（汤洗去滑七遍，晒干，麸炒）二两半

【用法】 上为粗末。先以水二盏，淘小麦半合，煎至一盏半，去麦，下药末五钱匕，加大枣二枚（擘破）、生地黄半钱、生姜一枣大（拍破），再煎至八分，去滓温服，一日二次。

【主治】 胃热干渴。

03026 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】 甘草（炙）二两 露蜂房一两

【用法】 上锉。以水五升，煎至三升，去滓，以故帛二片浸汤中，更互洗疮上，一日二三次。

【主治】 附骨痈。

03027 甘草汤

【方源】《观聚方要补》卷六引《经验方》。

【组成】 白药煎 白干葛各二钱 乌梅 五味子 天花粉各二钱 甘草半钱

【用法】 水煎服。

【主治】 烦渴口干。

03028 甘草汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十。

【组成】 甘草 白术各二钱半 桂枝二钱 炮附二钱 秦艽二钱

【主治】 痛痹属寒，身痛觉骨节冷。

03029 甘草散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】 甘草一两（炙微黄，锉） 黄芩一两 麦门冬一两（去心，焙）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 骨蒸肺痿，心中烦热。

03030 甘草煎

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】 甘草（炙，为末）半两 猪膏四两 白蜜二两 黄连（去须，为末）一两

【用法】 上药先煎脂令沸，去滓，下蜜并药等，慢火熬成煎。每服一匙头，含咽津。以愈为度。

【主治】 口疮。

03031 甘草膏

【方源】 方出《百一》卷十六，名见《普济方》卷二八六。

【异名】 甘草酒(《杏苑》卷八)。

【组成】 好粉甘草一两

【用法】 四寸截断，以溪涧长流水一碗（井河水不可用），文武火慢慢蘸水炙，约自早炙至午后，炙水令尽，不可急性，擘甘草心觉水润然后为透，细锉；却用无灰酒二小青碗入上件甘草，煎至一碗，温服之。服此药虽不能急消，过二十余日必消尽。投两服亦无害。

【主治】 悬痈。谷道前后生痈，初发如松子大，渐如莲子，数十日后始觉赤肿，如桃李，即破。

【临证举例】 悬痈 林判院康朝尝患此痈，已破，服此药两服，疮即合。

03032 甘桔汤

【方源】 《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 桔梗二两 甘草一两

【用法】 上为粗末。每服二钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】 小儿肺热，手掐眉目鼻面。

【加减】 加荆芥、防风名“如圣汤”；热甚，加羌活、黄芩、升麻。

03033 甘桔汤

【方源】 《古今医鉴》卷九。

【组成】 甘草 防风 荆芥 薄荷 黄芩各一钱 桔梗三钱 玄参一钱

【用法】 上锉一剂。水煎，食后频频噙咽。

【主治】 喉闭。

【加减】 咳逆，加陈皮；咳嗽，加知母、贝母；咳发渴，加五味子；唾脓血，加紫菀；肺痿，加阿胶；面目肿，加茯苓；呕，加半夏、生姜；少气，加人参、麦门冬；肤痛，加黄耆；目赤，加栀子、黄连；咽痛，加鼠粘子、竹茹；声哑，加半夏、桂枝；疫毒头痛，肿，加鼠粘子、大黄、芒消；胸膈不利，加枳壳；心胸痞，加枳实；不得卧，加栀子；发斑，加防风，荆芥；酒毒，加干姜、陈皮之类。

03034 甘桔汤

【方源】 《外科启玄》卷十二。

【异名】 大甘桔汤(《古方汇精》卷二)。

【组成】 桔梗八分 甘草一钱半 射干 牛蒡子（炒）各六分 防风 玄参各四分

【用法】 上㕮咀。水煎服。

【主治】 ①《外科启玄》：咽痛。②《古方汇精》：痰壅声哑。

【备考】 方中防风、玄参用量原缺，据《古方汇精》补。

03035 甘桔汤

【方源】 《张氏医通》卷十五。

【组成】 甘草 桔梗 山豆根 黑参 鼠粘子 荆芥各等分 麦门冬倍用

【用法】 水煎，温服。

【主治】 麻疹咽痛，口舌生疮。

03036 甘桔汤

【方源】 《幼幼集成》卷六。

【组成】 生甘草 芽桔梗 熟石膏 净知母 牛蒡子

【用法】 生薄荷叶五片为引，水煎服。

【主治】 小儿麻疹，胃火炎肺金，咳嗽面浮，应出不出。

03037 甘桔汤

【方源】 《白喉全生集》。

【组成】 甘草三钱 桔梗四钱 银花一钱五分 麦冬（去心） 僵蚕（姜汁炒） 鼠粘各二钱 冬桑叶三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 白喉虚热证。白见于关内，外色稍不润，喉内红肿，下午痛甚，口干不渴，舌苔虽黄而滑，小便略赤而长，饮食稍碍，心烦不眠。

03038 甘菊汤

【方源】 《医统》卷八十三。

【组成】 甘菊苗叶不拘多少

【用法】 捣烂，百沸汤淋汁熏洗。

【主治】 阴户肿。

03039 甘菊汤

【方源】 《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】 决明子 甘菊 当归 川芎 赤芍 甘草 防风 荆芥 蔓荆子

【主治】 目赤烂。

03040 甘甜丸

【方源】 《普济方》卷一九三引《经验良方》。

【组成】 甘遂半两（水煮） 甜葶苈一两（炒） 细辛（去苗） 一两半 川椒二两（炒）

【用法】 上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，朝晨、日午、临卧白汤送下。

【主治】 水肿腹胀。

03041 甘遂丸

【方源】《外台》卷二十引《古今录验》。

【组成】甘遂二两（熬） 葶苈子二两（熬） 杏仁五十枚（熬） 巴豆四十枚（去心皮，熬）

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如大豆大。每服三丸，饮送下。当吐。不知，可至五丸。

【主治】风水黄疸，体大如囊，面目皆合，阴肿如斗，正如霜瓜。

【宜忌】禁野猪肉、芦笋。

03042 甘遂丸

【方源】方出《圣惠》卷五十四，名见《圣济总录》卷八十。

【组成】郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 甘遂一两（煨令微黄） 赤茯苓一两 甜葶苈二两（隔纸炒令紫色） 瞿麦一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心以温水送下。良久，当利三两行；如不利，即加丸再服，以利即效。

【主治】水气遍身浮肿，皮肤欲裂，心腹气急胀大，小便不利。

03043 甘遂丸

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】甘遂一两 细辛（去苗叶）一两半 附子（炮裂，去皮脐） 木通（锉）各一两一分 干姜（炮裂） 吴茱萸（汤浸，焙干，炒） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为末。炼蜜为丸，如枣核大。以绵裹纳鼻中。仰卧即涕出，日三易之，以愈为度。

【主治】鼻多清涕。

【宜忌】避风。

03044 甘遂方

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《普济方》卷一九三。

【组成】猪肾一枚（分为七脔） 甘遂一分（以粉之）

【用法】火炙令熟，剥去皮食之，一日一食。至四五，当觉腹胁鸣，小便利，不尔更进。须尽为佳，不尔再之。

【主治】①《肘后方》：卒身面肿满。②《普济方》：身面背洪肿，大小便涩。

【宜忌】勿食盐。

03045 甘遂汤

【方源】《千金》卷十一。

【组成】甘遂 黄芩 芒消 桂心 细辛各一两 大黄三两

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取二升半，分三服。

【主治】暴坚久痞，腹有坚者。

03046 甘遂散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】甘遂一分（煨令微黄） 槟榔一分 川大黄一分（锉碎，微炒） 牵牛子半两（微炒） 甜葶苈一分（隔纸炒，令紫色）

【用法】上为细散。每服一字，以温水调下。以利为效。

【主治】小儿水气，遍身肿满，大小便难，喘促不得睡卧。

03047 甘遂散

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】甘遂一两（炒） 木香一分

【用法】上为散。每服一钱匕，温蜜酒调下，不拘时候。

【主治】大便不通。

03048 甘遂散

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷二引《入门》。

【组成】甘遂末 葱汁

【用法】和丸。绵裹塞耳中，口含甘草汤。两药须各两处修制妙。

【主治】耳聋。

03049 甘遂散

【方源】《新医学》（1972；11:55）。

【组成】甘遂一两

【用法】研为细末，装瓶备用。用时用甘遂散三钱，面粉适量，麝香少许（无麝香用冰片代），加温水调成糊状，外敷于中极穴处（脐下四寸），方圆约二寸。一般三十分钟即能小便通利。无效时可继续使用或再加热敷，疗效更速。

【主治】小便不通。

【临证举例】小便不通 用甘遂散外敷治疗不同疾病引起的小便不通患者共八例，外敷一次即排尿的五例；外敷二次排尿的二例；外敷二次再热敷一次排尿的一例。

03050 甘缓汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】人参（少者用山药四钱炒黄代之） 白术 茯苓 甘草（炙）各一钱半 升麻五分 陈皮七分 苡仁（炒） 芡实（炒）各二钱 木瓜 白豆蔻曲（炒，研）各一钱 红枣四枚

【用法】水煎，温服。

【主治】 泄泻急而趋下，不能少停，此脾气虚而下陷也。

【加减】 小便清而大便泄，或加肉豆蔻（面包煨）一钱，煨木香四分。

03051 甘蔗粥

【方源】《养老奉亲》。

【组成】 甘蔗汁一升半 青粱米四合（净淘）

【用法】 上以蔗汁煮粥，空心渐食之，每日一二服。

【功用】 ①《养老奉亲》：极润心肺。②《药粥疗法》：清热生津，养阴润燥。

【主治】 ①《养老奉亲》：老人咳嗽虚热，口舌干燥，涕唾浓粘。②《药粥疗法》：热病恢复期，津液不足所致的心烦口渴，肺燥咳嗽，大便燥结。

03052 甘露汤

【方源】《普济方》卷三十六引《澹寮方》。

【异名】 观音应梦散（原书同卷）、甘露饮（《寿亲养老》卷二）。

【组成】 干饧糟六分（头酿者） 生姜四分（和皮）

【用法】 上拌和，研烂作饼子，或焙或晒干，每十两用甘草二两炙，同研为末。每服入盐少许，沸汤调下，不拘时候。

【功用】 快利胸隔，调养脾胃，快进饮食。

【主治】 翻胃呕吐不止，饮食减少。

【临证举例】 翻胃 常传一富人病翻胃，往京口甘露寺，设水陆，泊舟岸下，梦一僧持汤一杯与之。饮罢犹记其香味，便觉胸隔少快。早入寺，知客供汤，乃是梦中所饮者，胸膈尤快。遂求其方，修制数十服后，疾遂愈。

03053 甘露饮

【方源】《普济方》卷二九九引《如宦方》。

【组成】 枇杷叶 石斛 甘草（炙） 生地黄 黄芩 麦门冬（去心）各等分

【用法】 上㕮咀。水煎，食后服。

【主治】 口舌生疮，牙宣心热。

03054 甘露饮

【方源】《疡医大全》卷十四。

【组成】 犀角 生甘草 生地 银柴胡 枳壳 麦门冬 知母 枇杷叶 黄芩 钗石斛 茵陈各一钱

【用法】 用淡竹叶七片，灯心十根为引，水煎服。

【主治】 茧唇。

03055 甘露饮

【方源】《白喉全生集》。

【组成】 生地黄四钱 熟地 麦冬（去心）各三钱 僵蚕二钱（姜汁炒） 银花 天冬各一钱五分 石斛 枳壳 粉草各一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 白喉虚热症。白见于关内外，色稍不润，喉内红肿，下午痛甚，口干不渴，舌苔虽黄而滑，小便略赤而长，饮食稍碍，心烦不眠。

03056 甘露膏

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 兰香饮子。

【组成】 半夏二分（汤洗） 熟甘草 白豆蔻仁 兰香 升麻 连翘 桔梗各五分 生甘草 防风各一钱 酒知母一钱五分 石膏三钱

【用法】 上为极细末，汤浸蒸饼，和匀成剂，捻作薄片子，日中晒半干，擦碎如米大。每服二钱，食后淡生姜汤送下。

【主治】 消渴，饮水极甚，善食而瘦，自汗，大便结燥，小便频数。

03057 甘露膏

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《经验普济加减方》。

【组成】 黄连二两（碎） 黄丹 铜青各七钱 当归四钱（切） 白丁香二钱 白矾三钱 没药一钱（七味用水五升，同熬一升，去滓） 轻粉一钱 鹏砂二钱（研） 水银半钱 龙脑 麝香各少许（研）

【用法】 上为细末，入前膏搅匀。每点三箸至五箸，觉涩便睡十日。

【主治】 一切眼病，昏晕翳膜，赤肿痒痛。

03058 甘菊花汤

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】 甘菊花 地骨皮各一两 升麻一两半 黄连（去须） 茯神（去木皮） 葳蕤 防风（去叉） 木通（锉）各二两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加竹叶十片，同煎至八分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】 风毒冲眼，赤眼。

【备考】 本方方名，原书文瑞楼本作“甘菊汤”。

03059 甘菊花汤

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 菊花 升麻 旋覆花 石决明 川芎 大黄（炒）各五钱 石膏 羌活 地骨皮 木贼（炒） 青葙子 黄芩 防风 栀子仁 草决明 荆

芥 黄连 甘草

【用法】 上为细末。每服五钱，蜜一盏，煎至七分，食后温服。

【主治】 内外障翳，一切眼疾。

03060 甘菊花散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】 甘菊花三分 天麻一两 石膏二两 芎藭三分 独活三分 防风三分（去芦头） 白术三分 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 茯神一两 羚羊角屑三分 杜若三分 黄芩三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 风头旋，忽忽如醉，痰逆，不下饮食。

03061 甘露饮子

【方源】《阎氏小儿方论》。

【异名】 甘露饮〔《局方》卷六（绍兴续添方）〕、大甘露饮（《咽喉经验秘传》）。

【组成】 生干地黄（焙） 熟干地黄（焙） 天门冬 麦门冬（各去心，焙） 枇杷叶（去毛） 黄芩（去心） 石斛（去苗） 枳壳（麸炒，去瓤） 甘草（锉，炒） 山茵陈叶各等分

【用法】 上为粗末。每服二钱，水一盏，煎八分，食后温服；牙齿动摇，牙龈腥热，含漱渫并服。

【功用】 ①《广西中医药》（1985；3:20）：清热利湿，润肺利咽。②《上海中医药杂志》（1985；11:27）：滋阴清热，行气利湿。

【主治】 心胃之热上冲，牙龈、咽喉肿痛，口舌生疮，目赤肿痛；湿热黄疸，阴虚盗汗，胃脘疼痛。

①《阎氏小儿方论》：心胃热，咽痛，口舌生疮，并疮疹已发未发；又治热气上攻，牙龈肿，牙齿动摇。②《局方》（绍兴续添方）：丈夫、妇人、小儿胃中客热，牙宣口气，牙龈肿烂，时出脓血；目睑垂重，常欲合闭，或即饥烦，不欲饮食，及赤目肿痛，不任凉药，疮肿已发未发；又疗脾胃受湿，瘀热在里；或醉饱房劳，湿热相搏，致生疸病，肢体微肿，胸满气短，小便黄涩；或时身热。③《上海中医药杂志》（1985；11:27）：胃脘痛，阴虚盗汗，温热病，咳嗽，消渴，肝郁头痛，衄血，痛经。

【宜忌】《广西中医药》（1985；3:20）：素体阳虚，溃疡日久难愈，肢冷，腰膝酸楚，溲清，舌嫩有齿痕，脉沉细等肾阳不足，阴损及阳，水不济火，虚火上炎之证，不宜用此方。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足阳明少阴药也。烦热多属于虚，二地、二冬、甘草、石斛之甘，治肾胃之虚热，泻而兼补也；茵陈、黄芩之苦寒，折热而去湿；火热上行为患，故又以枳壳、枇杷叶抑而降之也。②《医林纂要》：熟地黄以滋养肾水；生地黄能升肾水以上交于心；麦冬以清肺宁心；天冬能滋肺金以下生肾水；石斛甘微咸，得水石清虚之气，故能补心安神，清金保肺，去胃中之湿热而布膻中之清化；茵陈去胃中沉郁之湿热；黄芩降肺逆；枳壳破郁积，且能敛阴；枇杷叶酸能补肺敛阴，宁心收散，苦能泄逆气，泻火清金；甘草补中而亦能去热。热盛则水涸，二地以滋之；热盛则金流，二冬以保之；清用黄芩、枇杷叶；去湿用茵陈、枳壳，而皆有悠扬清淑之致。不必大为攻下，此所以为甘露。热莫盛于胃，而诸热皆统于心，心化不足，则热妄行，石斛补心以除妄热，所谓热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘，以酸收之，以苦发之也。③《时方歌括》：足阳明胃为燥土，喜润而恶燥，喜降而恶升，故以二冬、二地、石斛，甘草之润以补之；枇杷、枳壳之降以顺之。若用连、柏之苦，则增其燥；若用耆、术之补，则虑其升。即有湿热，用一味黄芩以折之，一味茵陈以渗之，足矣。盖以阳明之治，最重在养“津液”二字。此方二地、二冬等药，即猪苓汤用阿胶以育阴意也；茵陈、黄芩之折热而去湿，即猪苓汤中用滑泽之除垢意也。

【临证举例】 ①口疮 《广西中医药》（1985；3:20）：本方加减治疗口疮31例，方药为：干地黄15克、熟地黄12克、天门冬12克、麦门冬15克、黄芩10克、茵陈9克、枇杷叶9克、枳壳6克、石斛10克、黄连6克、桔梗6克、甘草9克。每日一剂，煎水分三次服完，小儿量酌减。除婴儿外，重症者可用柳花散加减煎汤含漱（青黛10克、冰片9克、黄柏15克、甘草15克。每日一剂）。典型病例：肖某，女，69岁。口舌生疮，灼热疼痛，屡治不愈五年余，且伴口苦咽干，头晕头痛。体温39℃，口喉干涩，吞咽疼痛，纳少，溲黄便结。口腔及舌缘两边有黄白色的溃疡点16个，两侧扁桃体呈Ⅱ度肿大，咽喉部充血，舌质红，苔薄黄，脉弦数。给予甘露饮加减（干地黄15克、熟地黄12克、天门冬12克、麦门冬15克、黄芩15克、茵陈9克、枇杷叶9克、枳壳6克、石斛10克、黄连6克、桔梗6克、甘草9克）。每日一剂，煎水分三次内服。另用柳花散加减煎水含漱。连用二日后，口腔溃疡点由原来16个减少至八个，颜

色变浅，面积也明显缩小，诸恙亦愈。上方加生黄耆15克，继用五剂后治愈。追访一年未见复发。②胃脘痛 《上海中医药杂志》(1985；11:27)：李某某，男，31岁。上腹部于饭后隐隐灼痛反复发作二年余。症见纳差，口干多饮，大便干结。舌质红，少苔，脉弦细。诊断为慢性胃炎。证属胃阴不足，虚热内扰。用甘露饮去茵陈、枇杷叶，加入金铃子9克，延胡索9克，青木香9克，乌梅6克。连服七剂腹痛消失，食饮好转。后又减理气止痛之品，加入太子参18克，淮山药12克，鸡内金9克，连服30余剂，症状消失。③阴虚盗汗 《上海中医药杂志》(1985；11:27)：魏某某，女，4岁，患儿睡后汗出不止二年，尤以夏天为甚。平素体弱，口干喜饮，纳差，大便干结，小便短急，五心烦热。经用多法治疗无效。唇赤舌红，无苔，脉细数。X线胸透，肺部正常。辨证为阴虚内扰，心液不敛。用甘露饮去茵陈、枇杷叶，余各味减量三分之一，再加太子参12克，五味子6克，浮小麦6克。服三剂后好转。后又在此基础上减味，并先后用白芍6克，淮山药9克，生牡蛎12克，连服10余剂，盗汗消失，手足烦热好转，五年未复发。④温热病 《上海中医药杂志》(1985；11:27)：褚某某，男，35岁。因受凉后发烧五天，体温达39.5℃，微恶风寒，伴有头痛，咳嗽，痰少黄稠，口渴唇干，喜冷饮，三天无大便，小便短赤，舌质红，苔薄白，中间微黄，脉滑数，X线胸透，为左侧支气管炎，辨证为外感风热，邪传阳明。用甘露饮去茵陈，枳壳，加石膏30克，大黄9克（后下），银花9克，连翘9克，日服二剂，每日四次。二天后体温下降，大便通畅，头痛减轻，但仍有咳嗽，低烧，周身酸痛，去上方加味之药合麻杏石甘汤及蔓荆子。日服一剂，每日二次，连服五剂，症状消失。

03062 甘露神膏

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷九。

【组成】 甘露（于草木上张布，设法取之）一钟 蜂白蜜大半钟 人乳一钟 人参一二钱至四五钱（随症轻重，煎汁一钟）

【用法】 四汁并作一处，重汤炼浓，温和，日服。

【主治】 一切燥热咳嗽，吐血，干痨。

03063 甘草干姜汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 干姜甘草汤（《外台》卷六引《备急》）、复阳汤（《鸡峰》卷五）。

【组成】 甘草四两（炙） 干姜二两

【用法】 以水三升，煮取一升五合。去滓，分温再服。

【功用】 复阳气。

【主治】 脾胃阳虚，手足不温，口不渴，烦躁吐逆；老年虚弱尿频，下半身常冷，咳唾痰稀，眩晕短气，脉沉无力。现用于胃脘痛、吐酸、肠鸣腹泄、胸背彻痛、眩晕、喘咳、经期腹痛属寒证者。

①《伤寒论》：伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝，欲攻其表，此误也，得之便厥，咽中干，烦躁吐逆者。②《金匮》：肺痿，吐涎沫而不咳者，其人不渴，必遗尿，小便数。所以然者，以上虚不能制下故也。此为肺中冷，必眩，多涎唾。③《外台》引《备急》：吐逆水米不下。④《类聚方广义》：老人小便频数，吐涎，短气眩晕，难以起步者。

【宜忌】《外台》引《备急》：忌海藻、菘菜。

【方论选录】 ①《内台方议》：脉浮，自汗出，恶寒者，为中风。今此又兼小便数者，心烦脚挛急，为阴阳之气虚，不可发汗。反与桂枝汤误汗之，得之便厥，咽中干，烦躁上逆也，此乃不可汗而误攻其表，营卫之气虚伤所致也。故与甘草为君，干姜为臣，二者之辛甘，合之以复阳气也。②《寒温条辨》：此即四逆汤去附也。辛甘合用，专复胸中之阳气，其夹食夹阴，面赤足冷，发热喘嗽，腹痛便滑，内外合邪，难于发散，或寒冷伤胃，不便参术者，并宜服之，真胃虚挟寒之圣剂也。③《伤寒今释》：干姜与附子，俱为纯阳大热之药，俱能振起机能之衰减。惟附子之效，偏于全身；干姜之效，限于局部。其主效在温运消化器官，而兼于肺，故肺寒、胃寒、肠寒者，用干姜；心脏衰弱，细胞之生活力减退者，用附子。吉益氏《药徵》谓附子逐水，干姜主结滞水毒。盖心脏衰弱者，往往引起郁血性水肿，其舌淡胖，如经水浸，用姜、附以强心，则水肿自退，非姜附能逐水也。

【临证举例】 ①伤寒 《名医类案》卷一：吕沧州治一妇伤寒，乃阴间阳，面赤，足踡而下痢，躁扰不得眠。论者有主寒、主温之不一，不能决。吕以紫雪、金匮理中丸进，徐以冰渍甘草干姜汤饮之，愈。且告之曰：下痢足踡，四逆证也，苟用常法，则上焦之热弥甚，今以紫雪折之，徐以甘辛以温里，此热因寒用也。众皆叹服。②寒证 《中医杂志》(1965；11:6)：本方治疗34例寒证（胃脘痛8例，吐酸2例，脘腹胀2例，肠鸣腹泻1例，胸痛2例，眩晕13例，咳嗽2例，经来腹痛4

例），均取效。认为中医所称寒证，实际上包含副交感神经过度兴奋的病理生理现象；认为干姜辛辣，服后刺激口腔粘膜，可能引起反射性交感神经兴奋而起对抗副交感神经作用；甘草则对胃平滑肌有一定解痉作用，因而取效。③眩晕 《新中医》（1983；10:20）：何某某，男，80岁，农民。素患慢性支气管炎，年老体弱，卧床已半年，近出现头晕耳鸣，如坐舟车之中，觉物旋转，耳鸣如潮水，不能起床，不敢张目，同时伴咳嗽气急，咳唾涎沫和胸闷不适感。听诊右中下肺野有散在中小水泡音，曾用四环素、磺胺嘧啶、麻杏止咳糖浆等消炎止咳药无效；又用天麻钩藤饮、百合固金汤等加减方亦无效。眩晕日见加重，咳唾涎沫不止，思热饮，不欲食。面色萎黄，舌苔薄白，脉沉细。拟诊眩晕病，肺中虚冷，水气不化，清阳不升，浊阴不降。处方：炙甘草15克，炮姜12克，三剂。服一剂后，眩晕锐减，咳唾涎沫好转，服完二剂，能起床活动，三剂眩晕除，诸症基本消失，精神大振。④遗尿 《广东中医》（1962；9:13）：刘某，30岁，小学教师。患遗尿证甚久，日则间有遗出，夜则数遗无间，良以为苦。医咸以为肾气虚损。诊其脉，右部寸关皆弱，舌白润无苔，口淡，不咳，唾涎，口纳略减。小便清长而不时遗，夜为甚，大便溏薄，审系肾脾肺三脏之病。但补肾温脾之药，服之屡矣，所未服者唯肺耳。景岳云："小水虽利于肾，而肾上连肺，若肺气无权，则肾水终不能摄，故治水者必先治气，治肾者必先治肺"。本证病缘于肾，因知有温肺化水之治法。又甘草干姜汤证原有治遗尿之说。遂疏方：炙甘草八钱，干姜（炮透）三钱，一日二帖。三日后，尿遗大减，涎沫亦稀，再服五日而诸症尽除。

03064 甘草石膏汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 生地黄 细辛各一分 熟地黄 黄连各三分 甘草五分 石膏六分 柴胡七分 黄柏 知母 当归身 桃仁（炒，去皮尖） 荆芥穗 防风各一钱 升麻一钱五分 红花少许 杏仁六个 小椒二个

【用法】 上锉，如麻豆大。都作一服，水二盏，煎至一盏，食后温服。

【主治】 渴病久愈，又添舌白滑微肿，咽喉咽津觉痛，嗌肿时时有，渴喜冷饮，口中白沫如胶。

03065 甘草归蜡膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 甘草二两 当归 蜂蜡各一两 香油四两

【用法】 涂于纱布上再外敷，或做成油纱条高压灭菌备用。

【功用】 祛脓长肉，和血生肌，收口固皮。

【主治】 疮疡久不敛口。

03066 甘草附子汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 四物附子汤（《外台》卷十九引《深师方》）、附子汤（《外台》卷十九引《古今录验》）、白术附子汤（《外台》卷十五引《近效方》）、桂枝附子汤（《三因》卷五）、桂枝甘草附子汤（《类聚方》）。

【组成】 甘草二两（炙） 附子二枚（炮，去皮，破） 白术二两 桂枝四两（去皮）

【用法】 以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，一日三次。初服得微汗则解，能食汗止；复烦者，将服五合；恐一升多者，宜服六七合为妙。

【功用】《外台》引《近效》：暖肌补中，益精气。

【主治】 ①《伤寒论》：风湿相搏，骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者。②《外台》引《近效方》：风虚头重眩，苦极不知食味。

【宜忌】《外台》引《近效》：忌海藻、菘菜、猪肉、生葱、桃、李、雀肉等。

【方论选录】 ①《内台方议》：风则卫伤，湿流关节，风湿相搏，两邪乱经，故骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧。风胜则卫气不固，汗出短气，恶风不欲去衣，为风在表也。湿胜则水气不行，小便不利，或身微肿，为湿气内搏也。故用附子为君，除湿祛风，温经散寒；桂枝为臣，祛风固卫；白术去湿为使；甘草为佐，而辅诸药。疏风去寒湿之方也。②《医方考》：风湿相搏，故骨节疼烦；伤风则恶风，故不欲去衣；小便不利，而大便燥者，为热；今小便不利而大便反快，则湿可知矣。附子之热，可以散寒湿；桂枝之辛，可去解风湿；甘草健脾，则湿不生；白术燥脾，则湿有制。是方也，以桂、附之辛热而治湿，犹之淖濡之地，得太阳暴之，不终朝而湿去，亦治湿之一道也。③《金匮玉函经二注》周扬俊：汗出短气，恶风不欲去衣，邪风袭入而中，卫之正气俱虚也；小便不利，身微肿者，中外为湿所持，而膀胱之化不行也，安得不以甘、术和中，桂、附去邪耶？然此症较前条更重，且里已受伤，曷为反减去附子耶？此条风湿半入里，入里者妙在缓攻，仲景正恐附子多则性猛且急，骨节之窍未必骤开，风湿之邪岂能托

出？徒使汗大出而邪不尽尔。君甘草者，欲其缓也，和中之力短，恋药之用长也。此仲景所以前条用附子三枚者，分三服，此条止一枚者。初服五合，恐一升为多，宜服六七合，全是不欲尽剂之意。①《古方选注》：甘草附子汤，两表两里之偶方，风淫于表，湿流关节，阳衰阴盛，治宜两顾。白术、附子顾里胜湿，桂枝、甘草顾表化风，独以甘草冠其名者，病深关节，义在缓而行之，徐徐解救也。

【临证举例】 ①风湿痛 《外台》引《古今录验》：骠骑使吴谐，以建元元年八月二十六日始觉如风，至七日，卒起便顿倒，髀及手皆不随，通引腰背疼痛，通身肿，心多满。至九月四日服此汤一剂，通身流汗，即从来所患悉愈。《谢映庐医案》：高汉章、得风湿病，遍身骨节疼痛，手不可触近，近之则痛甚，微汗自出，小水不利。当时初夏，自汉返舟求治，见其身面手足俱有微肿，且天气颇热，尚重裘不脱，脉象颇大，而气不相续。其戚友满座，问是何症？予曰：此风湿为病。渠曰：凡驱风利湿之药，服之多矣，不惟无益，而反增重。答曰：夫风本外邪，当从表治，但尊体表虚，何敢发汗；又湿本内邪，须从里治，而尊体里虚，岂敢利水乎？当遵仲景法处甘草附子汤。一剂如神，服之三剂，诸款悉愈。②寒痹 《上海中医药杂志》(1965；6:26)：单用本方治疗寒痹2例，西医诊断为慢性腰骶关节炎继发坐骨神经痛。其中一例已有十余年病史，均获治愈。作者认为，凡属风湿寒痹，即使没有汗出恶风、短气、小便不利等症，用本方亦可取效。③风湿性心脏病 《河北中医》(1986；6:45)：某女，45岁。素患风湿性心脏病、心悸短气、汗出恶风、关节冷痛、痛有定处、下肢浮肿、小便不利、舌淡苔白，脉沉弦。此为风湿相搏，日久不愈，邪从寒化。治宜温脾化湿散寒为主，佐以强心通阳。炙甘草15克，炮附子10克，白术10克，桂枝5克，茯苓15克。煎服。一个月后，心悸短气较前减轻，关节已不疼痛，下肢浮肿消失，小便正常。

03067 甘草附子汤

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】 甘草（炙）二两 附子（炮，去皮脐）一两

【用法】 上为散。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 风湿，掣痛不得屈伸者。

03068 甘草泻心汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 甘草四两（炙） 黄芩三两 干姜三两 半夏半升（洗） 大枣十二枚（擘） 黄连一两

【用法】 以水一升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，一日三次。

【功用】《方剂学》：益气和胃，消痞止呕。

【主治】 伤寒痞证，胃气虚弱，腹中雷鸣，下利，水谷不化，心下痞硬而满，干呕心烦不得安；狐惑病。常用于急慢性胃肠炎症、白塞氏综合征等。

①《伤寒论》：伤寒中风，医反下之，其人下利日数十行，谷不化，腹中雷鸣。心下痞硬而满，干呕心烦不得安。医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚。此非结热，但以胃中虚，客气上逆，故使硬也。②《金匮》：狐惑之为病，状如伤寒，默默欲眠，目不得闭，卧起不安。蚀于喉为惑，蚀于阴为狐；不欲饮食，恶闻食臭，其面目乍赤、乍黑、乍白，蚀于上部则声嗄。③《方函口诀》：产后口糜，泻。

【方论选录】 ①《古方选注》：甘草泻心，非泻结热，因胃虚不能调剂上下，致水寒上逆，火热不得下降，结为痞。故君以甘草、大枣和胃之阴，干姜、半夏启胃之阳，坐镇下焦客气，使不上逆；仍用芩、连，将已逆为痞之气轻轻泻却，而痞乃成泰矣。②《医宗金鉴》：方以甘草命名者，取和缓之意。用甘草、大枣之甘温，补中缓急，治痞之益甚；半夏之辛，破客逆之上从；芩、连泻阳陷之痞热，干姜散阴凝之痞寒。缓急破逆，泻痞寒热，备乎其治矣。③《金匮要略释义》：湿热肝火生虫而为狐惑证，故宜清湿热，平肝火；由于虫交乱于胃中，又当保胃气，因人以胃气为本，故选用甘草泻心汤。君甘草以保胃气；连、芩泻心火，去湿热。虫疾之来也非一日，其脏必虚，卧起不安，知心神欠宁，故用人参补脏阴，安心神；大枣以和脾胃；用姜、夏者，虫得辛则伏也。

【临证举例】 ①急性胃肠炎 《山东中医杂志》(1986；3:14)：用本方不予加减，只按比例加重其剂量；甘草60克，干姜45克，大枣30克（去核），黄连15克（捣），半夏100克，黄芩45克，共治疗60例急性胃肠炎。其中未经西药治疗者49例，经西医治疗无效者11例；病程最短者4小时，最长者15天。全部用本方治愈。其中服一剂而愈者8例，2剂而愈者23例，3剂而愈者18例，4剂而愈者8例，5剂而愈者6例。②狐惑 《赵锡武医疗经验》：郭某某，女，36岁，口腔及外阴溃疡

半年，在某医院确诊为口、眼、生殖器综合征，曾用激素治疗，效果不好。据其脉症，诊为狐惑病，采用甘草泻心汤加味，方用：生甘草30克，党参18克，生姜6克，干姜3克，半夏12克，黄连6克，黄芩9克，大枣7枚，牛地30克，水煎服十二剂。另用生甘草12克，苦参12克，四剂煎水，外洗阴部。复诊时口腔及外阴溃疡已基本愈合。仍按前方再服十四剂，外洗方四剂，患者未再复诊。③慢性泄泻 《浙江中医药》(1979；8:297)：刘某某，男，36岁。1979年10月23日初诊。四年前因伤食引起腹泻，治后获愈。但遇进食稍多或略进油腻即复发。发时脘腹胀闷，肠鸣漉漉，大便稀溏，挟有不消化物或粘液，日2～3次；并有心悸，失眠，眩晕，脉沉细，舌苔白而微腻，腹平软，脐周轻度压痛。予甘草泻心汤加白术、厚朴。服三剂，大便成形，纳增，睡眠转佳，尚有肠鸣，心悸。原方去厚朴加桂枝，续服六剂，大便正常。23个月后随访，未复发。使用此法治疗22例慢性泄泻，均获较好效果。其病程有自5个月～6年，1～3年为多，计15例。治后18例症状消失未再复发，2例半年后出现反复，2例无效。④胃虚便秘 《北京中医》(1984；1:36)：郭某，女，21岁。主诉：便坚难解，四五日一行，已五六年，每次均需用通便药，大便仍燥结如羊粪；心下痞塞不通，不知饥，不欲食，夜寐欠安，口不渴，小便正常；舌淡红，苔薄白根微黄，脉滑。遂投甘草泻心汤。炙甘草12克，半夏10克，干姜5克，川连3克（冲服），黄芩10克，党参12克，大枣10枚。五剂，水煎服。药后大便畅通，肠鸣增多。再予五剂，大便通畅，纳增，心下痞塞除，诸症悉愈。⑤白塞氏综合征 《中医杂志》(1963；11:9)：作者根据该病以口腔溃疡、前阴或肛门溃疡、发冷发热、皮肤损害等主要症状，认为即是《金匮》狐惑病。用本方治疗60例，均有效。其加减为：不欲食，加佩兰；咽喉溃疡，加升麻、犀角；口渴，去半夏，加花粉；目赤，加赤芍、夜明砂；口鼻气热，加石膏，知母；胸胁满痛，加柴胡；湿偏盛者，加赤苓、木通；热偏盛者，以生姜易干姜；便秘，加酒制大黄；五心烦热，加胡黄连。同时用《金匮》苦参汤外洗，雄黄散烧熏肛门。⑥口腔糜烂 《浙江中医杂志》(1980；11～12:515)：陈某某，男，48岁，农民。口舌糜烂已20余天，尿赤，脉洪数，予导赤散2剂无效，大便三日未解，于原方加凉膈散2剂，大便解，口舌糜烂遂愈。半月后复发，症状较前为剧，舌红绛，边有脓疮，尿黄。先后用二冬甘露饮、六味地黄汤加肉桂均无效。出现满唇白腐，舌脓疮增多，不能食咸味，以食冷粥充饥，口内灼热干痛，喜用冷水漱口。于是因思日人《橘窗书影》所载口糜烂治验二则，认为本证属胃中不和所致，用甘草泻心汤。炙甘草12克，干姜5克，半夏、黄芩、党参各9克，川连6克，大枣6枚，2剂。药后口内灼热糜烂减轻，已不须漱水，仍予原方2剂而愈。

【备考】《金匮》有人参三两。

03069 甘草涂敷方

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】甘草（半生半熟） 矾石灰 人中白 密陀僧各半两

【用法】上为末。入童子小便半盏，以微灰火熬，用竹篦搅成膏。取涂疮上，一日三五次。

【主治】反花疮。

03070 甘草粉蜜汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】甘草二两 粉一两 蜜四两

【用法】上三味，以水三升，先煮甘草，取二升，去滓，纳粉、蜜，搅令匀，煎如薄粥。温服一升，愈即止。

【功用】《金匮要略释义》：安蛔止痛，解毒和胃。

【主治】蛔虫之为病，令人吐涎，心痛，发作有时，毒药不止。

【方论选录】①《金匮要略辑义》：粉，诸注以为铅粉；然古单称粉者，米粉也。而《千金》诸书，藉以治药毒，并不用铅粉。盖本方非杀虫之剂，乃不过用甘平安胃之品而使蛔安，应验之于患者，始知其妙而已。②《成方便读》：吐涎心痛，皆由虫食上膈，故俱作止有时。所谓蛔饱而静则不痛，蛔饥求食，扰乱胃中则痛而吐涎。毒药不止者，用毒药攻杀之品，而虫不去也。大抵虫之所食，亦有喜恶，故用正治之法而不去者，必用其所喜之味以诱之。甘草、白蜜之甘，而搅以白粉善杀虫者，诱之使食，待甘味既尽，毒性便发，虫患乃除，此医药之变诈也。③《金匮要略今释》：若用粉锡，则不当单称粉。且经文云“毒药不止”，示本方为平剂也。用粉锡杀虫，则仍是毒药矣！若用甘草粉，依桃花汤用赤石脂之例，当云甘草三两，二两锉，一两筛末。今直云甘草二两，粉一两，明非甘草粉也。若谓粉即粉草，将谓水即水银、豆即豆蔻乎？强辞甚矣！惟本方改用粉锡，亦可下蛔，改用草粉，亦可缓急迫，故尾台、雉间各以其试效

云尔。

【临证举例】 ①蛔厥 《湖北中医杂志》（1986；3:47）：郭某某，8岁。因右上腹部阵发性绞痛三天，经用中西药物驱虫、止痛无效，其父送我处门诊。见其肢冷，腹痛，呕吐清水，痛时上腹部可摸到不规则包块，痛止时消散，诊为蛔厥证。遂投乌梅丸加减与服，次日其父谓服药后已下蛔虫，但腹痛不止。诊之，肢冷已除，呕吐好转，但腹痛不止而包块已无。说明蛔得驱而腹痛不止，符合《金匮》甘草粉蜜汤之证。遂令买甘草一两煎水，加米粉、白蜜调匀，徐徐饮服。服两小时后，腹痛开始缓解，半天后停止。后用此法治愈多例。②妊娠合并胆道蛔虫症 《新中医》（1984；11:44）：陈某某，27岁。因右上腹钻顶痛，频繁呕吐，吐蛔十余条，收入住院治疗。检查：体温36.8℃，脉搏96次/分，呼吸22次/分，血压90/60mmHg。呈痛苦病容，面部潮红，呻吟，精神差，眼睑下凹，口唇干燥，腹痛隆而软，剑突下压痛，宫底脐上二横指，胎心音140次/分，无宫缩及出血。诊断为：胆道蛔虫合并感染；轻度脱水；七月宫内孕。经中西医服镇痛、驱蛔两法治疗三天后，疼痛仍不止，阵痛频作，每痛则大汗淋漓，唇干喜饮，舌少津，不大便，尿少黄，神疲脉细，属气阴虚乏之症。用生甘草15克，蜂蜜12克，粳米粉10克，以生甘草煎汤，乘温冲粉、蜜顿服。二剂后诸症缓解，住院六天痊愈出院。足月后顺产一男婴。③十二指肠球部溃疡 《浙江中医杂志》（1985；8:352）：郭某，男，40岁。上腹部持续隐痛、烧灼感已年余，多在夜间痛醒，进食后稍减；痛处喜温喜按，伴有泛酸，纳差，便溏，舌淡苔白，脉沉。西医诊断为十二指肠球部溃疡。证属脾胃气虚，治宜益气和胃止痛，用甘草粉蜜汤：炙甘草30克，粳米粉20克，蜂蜜6克，早晚饭前服。3剂后，疼痛及泛酸均减轻。服二月后，钡餐造影示龛影基本消失。

【备考】《成都中医学院学报》（1986；1:18）报道，四川省某县1970年7月发生一起应用甘草粉蜜汤集体驱蛔，因使用铅粉，致使接受该方的74人全部中毒，无一幸免。中毒者在服药时曾觉药有铅臭，数小时后心烦，轻微呕吐，胃中嘈杂不适。2~9天内先后不同程度出现头昏头痛，身软无力，懒言嗜睡，口臭流涎，口腔糜烂，食欲逐渐下降，胸腹胀满，四肢及眼胞浮肿。部分病例在牙龈边缘可见蓝灰色铅线。中毒者初起面色灰白少华，大便秘结；3~5天后部分病人面色发黄，甚至全身发黄；大便由秘结转溏泻，小便深黄量少。舌质：中毒初中期淡红，苔白滑或厚腻；中后期有少数患者出现舌绛少苔；脉象多虚弦、滑数无力或见有濡弱之脉。经用昆布、海藻、金钱草、板蓝根等加减治疗，除1例死亡外，全部治愈。据此，作者认为原方"粉"，应为米粉。

03071 甘草麻黄汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 麻黄汤（《千金翼》卷十九）、麻黄甘草汤（《三因》卷十四）、二物汤（《普济方》卷三八六）、麻甘汤（《医学入门》卷七）、走马通圣散（《金匮要略今释》卷五引《秘传经验方》）。

【组成】 甘草二两 麻黄四两

【用法】 以水五升，先煮麻黄，去上沫，纳甘草，煮取三升，温服一升。重覆汗出，不汗再服。

【主治】 里水，一身面目黄肿，其脉沉，小便不利。

【宜忌】 ①《金匮》：慎风寒。②《外台》：忌海藻、菘菜。

03072 甘草鼠粘汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】 炒甘草二两 桔梗（米泔浸一夜，炒）一两 鼠粘根二两

【用法】 上为末。每服二钱，水一钟半，加阿胶一钱煎服。

【主治】 肺热，咽喉痛。

03073 甘桔牛蒡汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】 桔梗 甘草 牛蒡 连翘 玄参 川连 栀子 豆根 酒芩 射干

【主治】 麻疹咽喉痛，毒火上升，火郁在肺。

03074 甘桔泻肺汤

【方源】《疹科正传》。

【组成】 石膏 知母 麦冬 粘子 橘红 桔梗 甘草 薄荷

【主治】 疹出未透，咳嗽气喘促，面目浮肿，毒火不能外达内熏。

【加减】 气急加苏子、枇杷叶。

03075 甘桔射干汤

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】 桔梗二钱 甘草 射干 连翘 豆根 牛蒡 玄参 荆芥 防风各一钱

【用法】 加竹叶，水煎服。

【主治】 咽痛不肿。

03076 甘菊花饮子

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 甘菊花一分 石膏一两（捣碎） 葛根半两（锉） 薄荷一握（切） 生姜一分（拍碎） 葱白一握（切） 豉一合

【用法】 以水二大盏，煎至一盏，去滓，分温二服，不拘时候

【主治】 妇人头痛目眩，心神烦渴。

03077 甘遂半夏汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 甘遂（大者）三枚 半夏十二枚（以水一升，煮取半升，去滓） 芍药五枚 甘草如指大一枚（炙）

【用法】 以水二升，煮取半升，去滓，以蜜半升和药汁，煎取八合，顿服之。

【功用】《张氏医通》：浚痰逐饮。

【主治】 ①《金匮》：痰饮，病者脉伏，其人欲自利，利反快，虽利心下续坚满，此为留饮欲去故也。②《类聚方广义》：饮家心下满痛，欲呕吐，或胸腹挛痛者。

【方论选录】 ①《金匮要略直解》：留者行之，用甘遂以决水饮；结者散之，用半夏以散痰饮。甘遂之性直达，恐其过于行水，缓以甘草、白蜜之甘，收以芍药之酸，虽甘草、甘遂相反，而实有以相使，此酸收甘缓，约之之法也。《灵枢经》曰：约方犹约囊，其斯之谓欤！②《古方选注》：甘遂反甘草。反者，此欲下而彼欲上也。乃以白芍约之，白蜜润之，则虽反而甘遂仍得下渗。《灵枢》有言：约方约囊是也。甘遂、半夏逐留饮弥漫于肠胃之间，虽利而续坚满，苟非以甘草、白蜜与甘遂大相反者激而行之，焉能去其留着之根。相反为方，全赖芍药酸可胜甘，约以监反，庶不溷乱中焦而为害。③《金匮要略心典》：脉伏者，有留饮也。其人欲自利，利反快者，所留之饮从利而减也。虽利，心下坚满者，未尽之饮，复注心下也。然虽未尽而有欲去之热，故以甘遂、半夏因其势而导之。甘草与甘遂相反，而同用之者，盖欲其一战而留饮尽去，因相激而相成也。芍药、白蜜，不特安中，抑缓药毒耳。

【临证举例】 ①留饮 《续名医类案》：吴孚先治西商王某，气体甚厚，病留饮，得利反快，心下积坚满，鼻色鲜明，脉沉。此留饮欲去而不能尽去也，用甘遂、半夏、白芍，加白蜜五匙顿服，前症悉痊。或问：甘遂与甘草其性相反，用之无害而反奏效，何也？曰：正取其性之相反，使自相攻击，以成疏瀹决排之功。②肺心病腹水 《四川中医》（1984；1：25）：徐某某，女，46岁。患肺原性心脏病伴腹水已年余。用强心利尿剂后，病反加剧，症见胸满腹胀，四肢水肿，喉间痰鸣，心悸而烦不得卧，气短欲绝，面色晦暗，唇周发绀，二便不通，不食不饥，口不渴，舌胖淡，苔润，脉弦而结代。证属脾肾两虚，痰饮内阻，元气欲脱。拟甘遂半夏汤化裁：人参15克，甘草3克煎汤，送服甘遂蜜丸（即本方）3克。服后四小时下大便三次，先下黑粒状，继下浆糊样便，小便亦通，胸满肢肿，痰鸣等症均已见轻，呼吸好转，颜面转微白，唇周淡红，胃纳好转。翌日，投木香12克，人参15克，甘草3克煎汤吞服甘遂蜜丸3克。服后二便畅通，继以八味丸固本，经治月余，诸症消失，至今六年，未复发。③腹壁脂肪增多症 《江西中医药》（1982；3：45）：蒋某某，女，32岁。患者腹部逐渐增大已四月，经中西药治疗无效而转外地某医院。诊时见：腹部膨隆，大如妊娠八个月，按之松软如棉絮，自觉胀闷不舒，沉重乏力，神疲嗜睡，纳减便溏，经闭三月，白带量多，质清稀而有腥味，小便清长，舌淡苔白腻，脉沉滑。证属脾虚失运，痰湿内停。治以健脾涤痰，方用甘遂半夏汤加减。甘遂9克，半夏9克，白芍9克，炙甘草9克，白术12克，茯苓18克。三剂。药后腹胀大为减轻，精神转佳，食纳增加，白带减少，惟大便溏泻反剧，泻下之物粘腻如鱼冻，余无不适。原方继进三剂，腹胀大已减三分之二，余症俱觉好转，大便仍间有粘腻物，脉沉滑，原方再进三剂。两年后，患者至某医院分娩遇见，谓药后健如常人，腹大全消，带止经行，尔后怀孕。

【现代研究】 利尿作用 《经方研究》：李春晌等实验报告，用本方100%水提取液进行家兔利尿作用的实验，每公斤体重给药1毫升，药后30分钟时5分钟内尿液，与药前5分钟内的尿液比较无明显增加，但1小时后五分钟内尿量与药前五分钟内尿量比较，有显著增加。

03078 甘遂通结汤

【方源】《中西医结合治疗急腹症》。

【组成】 甘遂末0.6～1克（冲服） 桃仁 木香 生牛膝各9克 川朴 赤芍各15克 大黄10～24克

【功用】 行气活血，逐水通下。

【主治】 肠梗阻较重，腹胀疼痛，恶心呕吐，大便秘结，肠腔积液较多者。

【宜忌】 本方药性峻烈，非体壮邪实者禁用。

03079 甘遂麻黄散

【方源】 方出《圣惠》卷五十四，名见《普济

方》卷一九三。

【组成】 甘遂一两（煨令微黄） 麻黄一两（去根节） 桑根白皮一两半（锉）

【用法】 上为细散。每服二钱，煮赤小豆汁调下，一日二次以利为度。

【主治】 卒身面浮肿，喘息气促，小便赤涩。

03080 甘露消毒丹

【方源】《医效秘传》卷一。

【异名】 普济解疫丹（《温热经纬》卷五）、普济解毒饮（《续名医类案》卷五）、甘露消毒丸（《中药制剂手册》）。

【组成】 飞滑石十五两 淡芩十两 茵陈十一两 藿香四两 连翘四两 石菖蒲六两 白蔻四两 薄荷四两 木通五两 射干四两 川贝母五两

【用法】 神曲糊为丸。

【功用】《方剂学》：利湿化浊，清热解毒。

【主治】 ①《医效秘传》：时毒疠气，病从湿化，发热目黄，胸满，丹疹，泄泻，其舌或淡白，或舌心干焦，湿邪犹在气分者。②《温热经纬》：湿温疫疠，发热倦怠，胸闷腹胀，肢酸咽肿，斑疹身黄，颐肿口渴，溺赤便秘，吐泻疟痢，淋浊疮疡。并治水土不服诸病。

【方论选录】《方剂学》：本方主治乃湿温、时疫之邪留恋气分，湿热并重之证。湿热交蒸，故身热倦怠，肢体酸楚；湿蔽清阳，阻滞气机，故胸闷腹胀，甚或上吐下泻；热毒上壅，则咽颐肿痛；热为湿遏，郁阻于内，不得发越，故郁而发黄；小便短赤，舌苔黄腻，皆为湿热内蕴之象。治宜利湿化浊，清热解毒。故方中重用滑石、茵陈蒿、黄芩三药，其中滑石清利湿热而解暑；茵陈清热利湿而退黄；黄芩清热解毒而燥湿；余以石菖蒲、白豆蔻、藿香、薄荷芳香化浊，行气悦脾；射干、贝母降肺气，利咽喉；木通助滑石、茵陈清利湿热；连翘协黄芩清热解毒。诸药相伍，重在清解渗利，兼事芳香行气，理肺利咽。如此则湿邪得利，毒热得清，悦脾泄肺，行气化浊，用治湿温时疫，湿热并重者，最为相宜。凡湿温、暑温挟湿、时疫及现代医学之肠伤寒、黄疸型传染性肝炎、胆囊炎、急性胃肠炎等属湿热并重者，皆可以本方加减治之。

【临证举例】 ①小儿急性传染性肝炎 《上海中医杂志》（1965；9:27）：用本方治疗小儿急性传染性肝炎26例。男17例，女9例。年龄最小者2岁，最大者10岁。主要症状为黄疸、食欲不振、肝脾肿大等，结合肝功能试验，确诊为本病。用甘露消毒丹原生药粗末煎服，并口服葡萄糖、维生素B_1、C适量。服药后，黄疸指数1周内降至6单位以下者5例，2周内降至正常者15例；谷丙转氨酶2周内降至正常者15例，3周内降至正常者9例，5周内降至正常者2例；肝肿大消退，于治疗3周后检查，平均缩小1.4厘米。26例无一例死亡，均痊愈出院。②水肿 《福建中医药》（1986；1:20）：郭某，男，5岁。两周前患猩红热，近周来复见肌热，浮肿尿少，血尿明显，如洗肉水样，时见呕吐，头晕，大便稀溏，食欲减退。脸色苍白，呈急性病容，下肢Ⅱ°浮肿，按之不凹陷；心脏听诊，1～2级收缩期杂音，心率：140次/分，窦性心律，肝，剑突下一横指半，无压痛，质软，脾（－），血压130/90mmHg，尿常规：蛋白（卅），红血球10～15个/mm^3，颗粒管型3～4个/mm^3，口唇红，舌质红，苔黄腻垢，脉弦滑数。证属湿热毒邪交阻困脾，脾失健运，肺失宣肺，肾气开阖失司，湿浊上逆，形成水肿。治以清热解毒，宣肺利水，芳香化湿，并佐以凉血。方用甘露消毒丹加白茅根、夏枯草各10克。二剂后，尿量增加，头晕、呕吐好转，体温降至38℃。再二剂，24小时内排尿量达2000～2500毫升，诸症全消，继以原方加减治愈出院。半年后随访，未发。

【备考】《温热经纬》本方用法：生晒研末。每服三钱，开水调下；或神曲糊丸，如弹子大，开水化服。

03081 甘草梢黑豆汤

【方源】《医方考》卷五。

【异名】 甘草黑豆汤（《医方集解》）。

【组成】 生甘草梢二两 黑豆半斤

【用法】 水五倍，煎去半，空心服。

【功用】《医方集解》：解百药毒。

【主治】 筋疝。

【方论选录】 ①《医方考》：筋疝者，茎筋挛痛，挺胀不堪也。子和云：此以邪术得之。邪术者，房术春方之故也。治宜解毒缓急，故用甘草梢、黑豆以主之。②《医方集解》：此足阳明药也。甘草和中以解毒，黑豆散热以解毒。若治筋疝，当用甘草梢，以梢能径达茎中也。

03082 甘草小麦大枣汤

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 甘麦大枣汤（原书同卷）、大枣汤、麦甘大枣汤（《本事》卷十）、小麦汤（《三因》卷十八）、甘草汤（《妇人良方》卷十五引《专治妇人方》）、十枣汤（《万氏女科》卷二）、麦枣汤（《杏苑》卷八）、枣麦甘草汤（《会约》卷十四）、大枣甘草汤

(《一见知医》卷四)。

【组成】 甘草二两 小麦一升 大枣十枚

【用法】 以水六升，煮取三升，分三服温服。

【功用】 ①《血证论》：养胃生津，化血润躁。②《金匮要略讲义》：补益心脾，安神宁心。

【主治】 脏躁。精神恍惚，常悲伤欲哭，不能自主，睡眠不安，甚则言行失常，呵欠频作，舌红少苔。现用于癔病及神经衰弱属心脾两虚肝郁者。

①《金匮》：妇人脏躁，喜悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠伸。②《类聚方广义》：痫症狂症，因平素忧郁无聊，夜夜不眠，发则恶寒发热，战栗错语，心神恍惚，居不安席，酸泣不已者。③《方函口诀》：小儿啼泣不止者。

【方论选录】 ①《金匮要略论注》：小麦能和肝阴之客热而养心液，具有消烦利溲止汗之功，故以为君；甘草泻心火而和胃，故以为臣；大枣调胃，而利其上壅之燥，故以为佐。盖病本于血，心为血主，肝之了也，心火泻而土气和，则胃气下达；肺脏润，肝气调，燥止而病自除也；补脾气者，火为土之母，心得所养，则火能生土也。②《金匮要略心典》：五志生火，动必关心，脏阴既伤，穷必及肾也。小麦为肝之谷，而善养心气；甘草、大枣甘润生阴，所以滋脏器而止其躁也。③《血证论》：三药平和，养胃生津化血；津水血液，下达子宫，则脏不燥，而悲伤太息诸证自去。此与麦门冬汤滋胃阴以达胞宫之法相似，亦与妇人乳少催乳之法相似。乳多即是化血之本，知催乳法，则知此汤生津液润燥之法。

【临证举例】 ①脏躁 《孙氏医案》：表嫂孀居二十年矣。右瘫不能举动，不出门者三年，今则神情恍惚，口乱语，常悲泣。诘其故，答曰：自亦不知为何故也。诊之，两寸脉短涩，以石菖蒲、远志、当归、茯苓、人参、黄耆、白术、大附子、晚蚕沙、陈皮、粉草，服四帖，精神较好于前，但悲泣如旧，夜更泣。予思仲景大枣小麦汤，正与此对。即与服之，两帖而瘳。方用大枣十二枚，小麦一合，大甘草（炙过）三寸，水煎饮之。②妇女更年期症候群 《福建中医药》(1960；10:17)：用本方治疗30例，显效者22例，进步4例，有效4例。方药为：甘草3～6克，小麦30克，大枣10枚。有严重失眠及烦躁不安者，则加酸枣仁或茯神。典型病例：杨某某，48岁，家庭妇女。心慌，呼吸迫促、发喘，发作性颜面发红，发热，有胸部阻塞感，严重时有被窒息样，伴有严重失眠，已断续发作约一年。一年前月经不规则，量时多时少。自此后上述症状依次发生，尤以经期前后更为明显，经医治无效。体型消瘦，颜面潮红，精神高度紧张，呼吸及说话均表现极度不安，迫促非常。心脏，心律、心率正常，肺部（－），腹部正常。血压145/95mmHg。入院诊断：更年期症候群。用苯巴比妥、三溴、卵巢素等无效。后改用中药甘麦大枣汤每日一剂，服至三剂后，症状基本消失，能熟睡6～7小时，并可自理生活，服至十二剂后，症状全消出院。③歇斯底里精神性发作 《中医杂志》(1960，2:32)：本方治疗歇斯底里精神发作25例，主要症状为：神态恍惚，无故悲伤，哭泣叫嚷吵闹，躁扰不宁，夜卧不安等。治疗后均获痊愈。④癫痫小发作 《浙江中医杂志》(1984；3:106)：赵某某，男，4岁。半年来几乎每日频繁发作鬓眼，咀嚼，双手肌肉小抽搐等动作，每次历时几十秒钟，止后如常。诊断为癫痫小发作。用苯妥英钠后无明显好转。症见颈软，精神不振，问答稍迟缓，舌质淡红，苔薄白，脉弦细。经用甘麦大枣汤加味，五剂后，病情基本停止，再以本方合六君子汤调理获愈。

【现代研究】 ①镇静作用 《国外医学、中医中药分册》(1983；3:53)：保田和美报道，本方水提取物对环己烯巴比妥的睡眠时间稍有延长作用。在对大鼠自发运动量的实验中，口饲至第三四天后，可观察到运动量减少。②抑制平滑肌运动 《国外医学·中医中药分册》(1983；3:53)：本方水提取物在5×10^{-3}克/毫升时能够抑制组织胺、乙酰胆碱所致的豚鼠回肠收缩；2×10^{-3}克/毫升时即可抑制大鼠子宫收缩，5×10^{-3}克/毫升浓度时则能完全抑制。

03083 甘桔加阿胶紫菀汤

【方源】 《医学纲目》卷十七。

【组成】 甘草二两 桔梗一两 阿胶 紫菀

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水煎温服。

【主治】 肺痿唾脓血。

03084 甘草干姜茯苓白术汤

【方源】 《金匮》卷中。

【异名】 甘姜苓术汤（原书同卷）、甘草汤(《外台》卷十七引《古今录验》)、肾着汤(《千金》卷十九)、除湿汤(《三因》卷九)、苓姜术甘汤(《类聚方》)、茯苓干姜白术甘草汤(《奇正方》)。

【组成】 甘草 白术各二两 干姜 茯苓各四两

【用法】 以水五升，煮取三升，分温三服。腰中即温。

【功用】 暖土胜湿。

①《金鉴》：补土制水，散寒渗湿。②《血证论》：和脾利水。③《谦斋医学讲稿》：温脾化湿。

【主治】 肾着：寒湿下侵，身重，腰以下冷重而痛，饮食如故，口不渴，小便自利。

①《金匮》：肾着之病，其人身体重，腰中冷，如坐水中，形如水状，反不渴，小便自利，饮食如故。病属下焦，身劳汗出，衣里冷湿，久久得之。腰以下冷痛，腰重如带五千钱。②《圣济总录》：胞痹，小便不利，鼻出清涕者。③《金匮要略讲义》：呕吐腹泻，妊娠下肢浮肿，或老年人小便失禁，男女遗尿，妇女年久腰冷带下等，属脾阳不足而有寒湿者。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜、桃李、雀肉、酢物。

【方论选录】 ①《医方考》：肾着于湿，腰冷如冰，若有物者，此方主之。肾主水，脾主湿，湿胜则流，必归于坎者，势也，故曰肾着。腰为肾之府，湿为阴之气，故令腰冷如冰；若有物者，实邪着之也。干姜、辛热之物，辛得金之燥，热得阳之令，燥能胜湿，阳能曝湿，故象而用之；白术、甘草，甘温之品也，甘得土之味，温得土之气，土胜可以制湿，故用以佐之；白茯苓甘淡之品也，甘则益土以防水，淡则开其窍而利之，此圣师必缺之义也。②《金匮要略心典》：其病不在肾之中脏，而在肾之外府，故其治法不在温肾以散寒，而在燠土以胜水。甘、姜、苓、术，辛温甘淡，本非肾药，名肾着者。原其病也。

【临证举例】 ①肾着 《广东中医》（1962；7：31）：杜某，女，52岁。腰痛，腰部重倦有冷痹感，两侧髋关节痛，行动拘急痛，俯仰困难，四肢倦怠无力已五月余，治疗无效。诊其脉沉迟，此肾着证也，肾虚而寒湿所侵，腰受冷湿着而不去，治宜温通驱寒湿为治，拟用肾着汤。白术一两，云苓一两，干姜一两，炙甘草五钱，一剂，清水三钟，煎至一钟，温服。后以原方加桂枝尖、杜仲，共进八剂而愈。②半身出汗 《陕西中医》（1984；3：26）：本方治疗半身出汗12例，病程最长2.5年，最短半年；有布氏杆菌病史者2例，风心病史1例，非特异性结肠炎病史3例。病者皆有脾阳不足，寒湿内盛的症状，如汗出、身冷、畏寒等。结果治愈9例，好转3例。服药最少2剂，最多12剂。③滑精 《金匮要略今释》引《古方便览》：一士人，年七十三，平生小便频数，腰冷如坐水中，厚衣覆盖而坐，精液时泄不自禁，诸治并无效，如此已十余年矣。余诊之，心下悸，即与此方而痊愈。④带下 《浙江中医杂志》（1985；4：175）：丁某，女，44岁。带下年余，近半月来加重，色白清稀，绵绵不绝，少腹隐痛，头晕乏力，面色苍白，形寒肢冷，腰酸，舌胖苔白，脉小略滑。乃寒湿阻滞胞宫。药用茯苓、白术各30克，干姜、甘草各10克，苍术20克，煎服。四剂后，带下明显减少，腰痛、头晕明显好转。

【现代研究】 对肠管的兴奋作用 《经方研究》：王培忠等报道，甘姜苓术汤的水煎液在小量时对家兔离体肠管有轻微的兴奋作用；加大剂量后，其兴奋作用未见明显加强。认为其水煎液兴奋肠管的作用与剂量关系不大。

03085 东风散

【方源】《痢疾明辨》。

【组成】 黄芩 槟榔 枳壳 山楂 青皮 川朴 当归 白芍 炙草

【主治】 痢疾。

【加减】 肢冷，加肉桂；热甚，加黄连，兼疟，加柴胡；红痢，加桃仁，红花、地榆；白痢，加香附、陈皮。

03086 东流饮

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】 细茶一撮 生芝麻一撮 生桃仁七枚 大黄一钱或二三钱

【用法】 用长流水生擂碎服。

【主治】 大便热结闭塞。

03087 东篱散

【方源】《本草纲目》卷十五引《孙天仁集效方》。

【组成】 野菊花一把（连茎捣烂）

【用法】 酒煎，热服。取汗。取滓以敷之。

【主治】 痈疽疔肿，一切无名肿毒。

03088 东方一号膏

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】 川茅术 黄柏 汉防己 宣木瓜 元胡索 郁金 生地榆各30克 白及60克（切片） 冰片（冷后加） 生石膏 炉甘石各240克（另配，以后煅过，研粉，用100目筛子筛过） 麻油二斤

【用法】 （1）浸渍：将茅术，黄柏、防己、木瓜、元胡、郁金、生地榆、白及浸于麻油内24小时。（2）煎熬：将上述油及药物置盛器内（一般用铜锅，钢精锅亦可），置文火上煎约二小时至二小时半（200毫升），至药材枯黄状，去药滓过滤（可用丝棉或铜筛滤）至除尽药滓为度。（3）炼油：滤净油用火加热约二小时到二小时半，至油滴入水

中能聚集成珠状。(4) 成膏：炼好之油，趁热加入煅石膏，炉甘石细粉（勿使结成块或沉于锅底），边加边搅拌，加完后继续加热保持微沸，此时上面应无浮油或仅极少量浮油，加热约二小时到二小时半，可取出少量放冷，如已成半固体膏状，即可停火。待膏冷却后，再加入冰片搅匀即成。(5) 将东方一号均匀涂布在半透明膏药纸上，剪成小块，贴于创面，外用纱布覆盖，隔日换药一次，以后可二、三天换一次。

【功用】 清热消炎，润肤生肌，止痛。

【主治】 疔疮、痈疽、无名肿毒。

03089 东方甲乙丹

【方源】《千金珍秘方选》。

【异名】 青龙丹。

【组成】 灯草炭五钱 青黛三钱 犀黄一钱二分 硼砂二钱 珠粉（生研）三分 人中白三钱 冰片五厘 儿茶五分 道地紫雪丹五分 风化消二钱

【用法】 上为末，和匀吹入。

【主治】 喉症，口疳，重舌。

【加减】 如喉症初起，并不腐烂，但形红肿，去犀黄、珠粉，加薄荷五分，蒲黄（生用）三分。

03090 布海丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 昆布 海藻各一斤（洗净，入罐炆成膏） 枳实四两 陈皮二两 青皮一两 荜澄茄 青木香各五钱

【用法】 上为末，入前膏为丸。空心沸汤送下。

【主治】 水肿，痰肿、气肿、鼓胀、喘咳，及癥瘕瘿瘤。

【加减】 气盛，加三棱、莪术各二两。

03091 布袋丸

【方源】《袖珍小儿》卷五。

【组成】 夜明砂（拣净） 芜荑（炒，去皮） 使君子（肥白者，微炒，去皮）各二两 白茯苓（去皮） 白术（无油者，去芦） 人参（去芦） 甘草 芦荟（研细）各半两

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如弹子大。每服一丸，以生绢袋盛之；次用精猪肉二两，同药一处煮，候肉熟烂，提取药于当风处悬挂，将所煮肉并汁令小儿食之。所悬之药，第二日仍依前法煮食，药尽为度。

【主治】 ①《袖珍小儿》：诸疳疾，面黄腹大，饮食不润肌肤。②《医述》：小儿丁奚，哺露，无辜疳。

【方论选录】《医灯续焰》：是方以四君补脾运土治其本，芜、使、芦、砂杀蛔清热治其标。食肉不食药者，收药味于肉，并肉并味从类而归脾。若脾疳面黄腹大，饮食不调，肌肉枯瘁，每见蛔者，服之自效，恐诸疳则未必也。

03092 布精起痿汤

【方源】《古今名方》引吴承忠家传验方。

【组成】 肥玉竹 炒薏苡仁各9克 天门冬 麦门冬 怀牛膝 怀山药 蒸白术 白茯苓各4.5克 炙黄柏 炙甘草各2.4克

【功用】 输布津液，濡煦气血。

【主治】 温热病后足蹩不能行，或因温证误服辛温而成痿者。

【加减】 若病深日久，其用量可按此比例酌增。

03093 石子汤

【方源】《三因》卷十八。

【组成】 猪肾一对（去脂膜，四破，无则以羊肾代之） 香豉 葱白 粳米 当归 芍药各二两

【用法】 上为锉散，分两剂。每一剂用水三升，煮取一小碗，去滓，分三服，任意服。

【主治】 ①《三因》：蓐劳。妇人因产理不顺，疲极筋力，忧劳心虑，致虚羸喘乏，寒热如疟，头痛自汗，肢体倦怠，咳嗽痰逆，腹中绞刺者。②《医略六书》：蓐劳脉虚数弦浮者。

【方论选录】《医略六书》：产后经血亏乏，邪乘虚袭，流布经络隧道，故腰痛而寒热不解，势将必致蓐劳。当归养血以荣经络，白芍敛营以和血脉，香豉发越外邪，葱白通彻阳气，猪肾补肾藏精血，粳米养胃家津液也。水煎温服，使血脉内充，则外邪自解而经络融和，何有腰痛寒热之患，其蓐劳可冀免乎。

03094 石韦汤

【方源】《外台》卷三十四引《集验方》。

【组成】 榆白皮五两 石韦（去毛） 黄芩各三两 通草三两 大枣二十枚 葵子一升 白术一两

【用法】 上切。以水八升，煮取二升半，分为三四服。

【主治】 产后卒患淋证。

03095 石韦汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】 石韦（去毛） 瞿麦穗 虎杖 海金沙各半两 滑石一两

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加灯心半握，煎至七分，去滓温服。

【主治】 心与膀胱俱热，小便赤涩不利。

03096 石韦散

【方源】《外台》卷二十七引《集验方》。

【异名】长将散(《鸡峰》卷十八)、石韦饮(《赤水玄珠》卷十五)。

【组成】石韦二两(去毛) 瞿麦一两 滑石五两 车前子三两 葵子二两

【用法】上为散。每服方寸匕。一日三次。

【主治】热淋,沙淋,小便不利,赤涩疼痛。

①《外台》引《集验方》:淋,小便不利,阴痛。②《圣济总录》:热淋,小便热涩。③《医方考》:沙淋痛盛者。

【方论选录】①《医方考》:沙淋者,溺出沙石也,此以火灼膀胱,浊阴凝结,乃煮海为盐之象也。通可以去滞,故用石韦、瞿麦;滑可以去着,故用滑石、车前、冬葵。②《医略六书》:湿热蕴蓄膀胱,其气不得施化而结成沙石,故小便涩痛,淋沥不止焉。石韦通淋、涤小肠之结热;葵子滑窍,利膀胱之壅塞;瞿麦清心通淋闭;滑石通窍化沙石;车前子清热利水以快小便也。为散,白汤调下,使热结顿化,则沙石自消而小便如其常度,安有涩痛胀闷、淋沥不止之患乎?此滑窍通淋之剂,为沙淋胀闷涩痛之专方。

03097 石韦散

【方源】《千金》卷二十一。

【组成】石韦 当归 蒲黄 芍药各等分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕,酒送下,一日三次。

【主治】①《千金》:血淋。②《圣惠》:血淋心烦,水道中涩痛。

【方论选录】《千金方衍义》:石韦治癃闭不通,为归、芍、蒲黄导血之宣使。

03098 石韦散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】石韦(去毛) 滑石 瞿麦穗 王不留行 冬葵子各等分

【用法】上为细散。每服二钱匕,食前葱白汤调下。

【主治】劳淋,日夜数起,小便不利,引阴中痛。

03099 石韦散

【方源】《医学纲目》卷五。

【组成】石韦 木通 滑石 王不留行各二两 甘草梢一两 当归 白术 瞿麦 芍药 葵子各三两 黄耆二两

【用法】上为细末。每服空心煎汤调下。

【主治】膀胱有热,水道淋涩,或尿如豆汁及出沙石。

03100 石灰散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】风化石灰一合 小麦面二合 皂荚灰一合 白蔹一合

【用法】上为细散。以醭浆水和如面糊,涂贴,一日换三四次。

【主治】一切肿及发背、乳痈等。

03101 石灰散

【方源】《济阳纲目》卷八十七。

【组成】风化石灰 嫩韭叶

【用法】上药同捣,入鹅血调和成饼,乘风阴干,为末。敷患处。无鹅血亦得。

【主治】①《济阳纲目》:金疮。②《内外科百病验方大全》:一切疮毒,无论已破未破,及跌打损伤。

03102 石灰膏

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【异名】石杏膏。

【组成】石灰末(炒) 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)各二两 猪膏半斤(切)

【用法】合煎,令杏仁黄,药成,绞去滓。涂疮上,日夜五六次。

【功用】止血、定痛、生肌。

【主治】金疮血不止,疼痛。

03103 石灰膏

【方源】《普济方》卷九十二引《仁存方》。

【组成】石灰一合

【用法】醋炒如泥。斜向右涂左,向左涂右。立正即洗去。一方水和。

【主治】中风口眼㖞斜。

03104 石花汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】白石英(煅,研)三钱 合欢花二钱 鲜百部四钱 沙参四钱 麦冬一钱五分 贝母二钱 桑皮二钱 苏子一钱五分 杏仁三钱 茯苓二钱 苡仁四钱 淡竹叶十张 金丝荷叶二张(去背上白皮)

【主治】肺气壅塞,致成肺痈,咳吐脓痰,气甚腥秽者。

03105 石连散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】黄连(姜炒)一钱 石膏(火煅)二钱

【用法】上为末。滚水下。

【主治】 胃热呕吐。

03106 石珍散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 熟石膏二两 青黛 黄柏各三钱

【用法】 上为细末。香油调敷。

【主治】 一切疮痍破烂，作痛焮赤者。

03107 石柏散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 煅石膏 15 克 黄柏 9 克 蛤壳粉 9 克 白芷 9 克 黄丹 3 克

【用法】 上为细末。调油外敷。

【主治】 带状疱疹。

【加减】 痒，加轻粉、明矾。

03108 石南丸

【方源】《局方》卷五。

【组成】 赤芍药 薏苡仁 赤小豆 当归（去芦） 石南叶 牵牛子 麻黄（去根节） 陈皮（去白） 杏仁（去皮尖双仁，炒） 大腹皮（连子用） 川芎各二两 牛膝（去苗） 五加皮各三两 萆薢 独活（去芦） 杜仲（锉，炒） 木瓜各四两

【用法】 上为细末，以酒浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五、二十丸，木瓜汤送下。早起、日中、临卧各一服。

【功用】 常服补益元气，令人筋骨壮健，耳目聪明。

【主治】 风毒脚弱少力，脚重疼痹，脚肿生疮，脚下隐痛，不能踏地，脚膝筋挛，不能屈伸，项背腰脊拘急不快。风毒上攻，头面浮肿，或生细疮，出黄赤汁，或手臂少力，或口舌生疮，牙龈宣烂，齿摇发落，耳中蝉声，头眩气促，心腹胀闷，小便时涩，大便或难。妇人血气。

【备考】《直指》有川续断二两。

03109 石南丸

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】 石南 白术 牛膝（三味酒同浸一宿，焙干） 防风（去叉） 天麻 枸杞各二两 黄耆（锉）二两 桂（去粗皮） 鹿茸（酥炙，去毛）各一两半

【用法】 上为末。用木瓜一枚（去皮瓤），炊令烂熟，捣作膏，和药末，更用面糊少许同为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心温酒送下；盐汤亦得。

【功用】 去风湿，活血脉，益元气。

【主治】 脚膝挛痹。

03110 石南丸

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】 石南 续断 黄耆 狗脊 木瓜 乌药各半斤 地龙 乌头各四两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心木瓜汤送下。

【主治】 ①《鸡峰》：风湿气，脚重少力，脚膝缓弱，或肿或不肿，痹麻胫冷，脚下隐痛，行履艰难，筋脉挛急，不得屈伸，项背腰脊肿痛。及虚风上攻，头面浮肿，生疮痒痛，脓汁浸渍，手脚少力，牙龈宣烂，齿摇发落，耳内啸鸣。②《普济方》：脚气痛楚，不可履地。

03111 石南散

【方源】《妇产科学》。

【组成】 石南叶五钱 仙灵脾五钱 蛇床子五钱

【用法】 上为细末。每服一钱，一日三次。亦可改为汤剂煎服，如量作一剂。

【功用】 温肾助阳，祛风止痒。

【主治】 肾虚阳衰之外阴白斑。伴经来过少或经闭，面色不华，小腹冷感，腰痠乏力。

【方论选录】 方中石南叶益肾祛风；仙灵脾、蛇床子温肾止痒。

03112 石胆丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 石胆一分（细研） 硇砂一分（细研） 石决明半两（细研，水飞过） 盐绿一分 乌贼鱼骨半两 黄连一两（去须） 秦皮半两（去粗皮） 细辛半两 干姜一分（炮裂，锉） 决明子三分 龙脑一分（细研） 鸡舌香半两 波斯盐一分（细研）

【用法】 上为末，入研了药，更研令匀，炼蜜为丸，如麻子大。每夜临卧，于大眦头各点一丸。

【主治】 眼生翳障，远年不愈，风泪出，痒烂及生息肉。

03113 石胆散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】 胆矾 密陀僧 轻粉各等分

【用法】 上为细末。津唾调擦之。数次除根。

【主治】 腋气。

03114 石胆散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 石胆三钱 胡桐律半两 蟾酥半两 轻粉抄一钱（称重半钱）

【用法】 上为细末。每用半字，食后、临卧敷贴患处。吐津，误咽不妨。

【主治】 齿龈肿痛生疮，或欲成疳，乍愈乍发。

03115 石室丹

【方源】 方出《石室秘录》卷一，名见《医学集成》卷三。

【组成】 元参一两 麦冬九钱 甘菊花三钱 人参一钱 熟地九钱 菟丝子一钱

【用法】 水数碗，煎汤四碗，恣其吞饮。胃火渐平，则两足自然生力。

【主治】 痿证。阳明火盛，终年不能起床，面色光鲜，足弱无力，不能举步者。

03116 石莲丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 石莲肉（去心） 附子（炮裂，去皮脐） 干姜（炮）各一两

【用法】 上为末，粟米粥为丸，如绿豆大。每服十丸，蜀椒汤送下。止勿再服。

【主治】 胃寒哕逆。

03117 石莲汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】 石莲子（炒，取肉） 人参 杵头糠各一分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】 咽喉如有物噎塞，饮食不下。

03118 石莲汤

【方源】《血证论》卷八。

【组成】 人参一钱半 黄芩三钱 黄连二钱 石莲（即莲米有黑壳者）三钱

【主治】 痢疾，噤口不食。

【方论选录】 胃火甚则拒格不纳食，用芩、连以清火，用人参、石莲以补胃，故治噤口不食。

03119 石莲散

【方源】 方出《百一》卷六引孟公实方，名见《医统》卷三十六。

【异名】 进食丹(《瘴疟指南》卷下)。

【组成】 石莲不以多少（不炒，剥去壳）

【用法】 将肉并心研为细末。每服二钱，陈米饮调下。

【主治】 噤口痢。

【备考】《医统》引本方“石莲微炒”。

03120 石莲散

【方源】《妇人良方》卷二十二引《妇人经验方》。

【组成】 石莲肉（炒）一两半 白茯苓一两 丁香半两

【用法】 上为细末。每服三钱，米饮调下，不拘时候。

【主治】 ①《妇人良方》引《妇人经验方》：产后气吃噫，吐逆，心怔目晕，不思饮食。②《济阴纲目》：产后胃寒咳逆，呕吐不食，或腹作胀。

【方论选录】《济阴纲目》：石莲，其味甘，其性降，故能益胃清水而治呕。况加茯苓以下气，丁香以散寒，生姜佐之。

03121 石莲散

【方源】 方出《校注妇人良方》卷十八，名见《医略六书》卷三十。

【组成】 人参 石莲肉（不去心） 石菖蒲各等分。

【用法】 每用五钱，水煎服。

【主治】 ①《校注妇人良方》：产后不语。②《医略六书》：产后气虚挟热，不语，脉沉濡数者。

【方论选录】 产后气虚挟热，心包受病而心窍不通，神机闭遏，故令不语焉。石莲清心气以除热，人参助心气以益虚，石菖蒲开通心窍，以鼓舞神机也。为散水煎，使心气内充，则心热自化，而心窍无不通，何不语之足患哉。

03122 石莲散

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】 莲蕊 石莲肉 芡实 人参 麦门冬 茯神 远志 甘草

【用法】 上锉。水煎，空心服。

【主治】 遗精。

03123 石脂膏

【方源】《良方合璧》卷下。

【组成】 赤石脂 寒水石 大黄各等分

【用法】 上为末。用新汲水调敷患处。

【主治】 烫火伤赤烂，热痛不止。

03124 石粉散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 石膏 轻粉各三钱

【用法】 韭汁调敷，水调亦可。

【主治】 漆疮。

03125 石斛丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 石斛一两（去根，锉） 熟干地黄三分 麦门冬一两半（去心，焙） 五味子半两 牛膝一两（去苗） 泽泻半两 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 防风半两（去芦头） 芎劳三分 独活半两 秦艽二分（去苗） 人参半两（去芦头） 桂心三分 甘草半两（炙微赤，锉） 细辛半两 附子一两（炮裂，去皮脐） 黄耆半两（锉） 石龙

芮半两　白芍药半两　白茯苓三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 虚劳痿痹，四肢挛急，肌体枯瘦。

【宜忌】 忌生冷、猪、鸡、牛、马肉。

03126　石斛丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 石斛一两半（去根，锉）　巴戟二两　杜仲一两半（去粗皮，炙微黄，锉）　牛膝一两（去苗）　桑螵蛸一两（微炒）　鹿茸一两半（去毛，涂酥炙微黄）　补骨脂一两（微炒）　龙骨一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 虚劳肾气衰弱，阴痿失精，腰膝无力。

03127　石斛丸

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】 石斛（去根）　黄耆（锉）　鹿茸（去毛，酒浸一宿，酥炙）　地骨皮　附子（炮裂，去皮脐）各一两　菟丝子（酒浸，别捣）　山茱萸各一两一分　远志（去心）　熟干地黄（焙）　菖蒲（米泔浸一宿，锉，焙）　防风（去叉）各三分　桂（去粗皮）半两　玄参一两

【用法】 上药将十二味捣罗为末，入菟丝子末再罗，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。以愈为度。

【主治】 肾虚耳内作声，或如蝉噪，或如风水声，诊其左手尺脉微而细，右手关脉洪而大。

【加减】 妊娠人去桂、附，加蜀椒三分，丹参半两。

03128　石斛丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】 石斛（去根）一两　牛膝（酒浸一宿，焙干）一两　肉苁蓉（酒浸一宿，焙干）一两　杜仲（去粗皮）一两（姜汁浸，锉，炒）　金毛狗脊七钱半（燎去毛）　萆薢七钱半　木香一两　牡丹皮一两　人参（去芦头）七钱半　黄耆一两　山茱萸七钱半　防风（去芦头）半两　羌活（去芦头）七钱半　川芎半两　槟榔一两半　熟干地黄一两半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒或盐汤送下。

【主治】 风湿客搏经络，筋骨冷疼，四肢重痛。

03129　石斛散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】 石斛（去根，锉）　麻黄（去根节）　丹参　牛膝（去苗）　侧子（炮裂，去皮脐）各一两　桂心　沉香　当归　羌活　枳壳（麸炒微黄，去瓤）　萆薢（锉）各三分　续断半两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 虚劳偏枯，手足不遂，筋脉拘急，骨节疼痛。

03130　石斛散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】 石斛（去根）　仙灵脾（锉）各一两　苍术（米泔浸，切，焙）半两

【用法】 上为散。每服三钱匕，空心米饮调下，一日二次。

【主治】 雀目，昼视精明，暮夜昏暗，视不见物。

03131　石斛散

【方源】《本事》卷二。

【组成】 石斛四钱（去根，净洗，锉细，酒炒）　牛膝（酒浸，水洗，焙干）　柏子仁（去皮，研）　五味子（拣）　远志（去心苗，洗，锉，炒黄色）　木香　杏仁（去皮尖，炒令香熟）　肉苁蓉（酒浸，水洗，焙干）　诃子肉（炮）　青橘皮　柴胡（去苗，净洗）　人参（去芦）　熟地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干）各三钱　茯苓四钱（去皮）　甘草二钱（炙）　干姜一钱半（炮）　神曲（碎，炒）　麦芽各六钱

【用法】 上为细末。每服二钱，食前米饮调下，一日二三次。

【主治】 虚劳，羸瘦乏力，少食倦怠，多惊畏。

【方论选录】《本事方释义》：石斛气味甘平微苦咸，入足厥阴少阴；茯苓气味甘平，淡渗入胃，能引诸药达于至阴之处；柏子仁气味苦辛微温，入足厥阴；牛膝气味酸咸平，入肝；远志气味辛温，入手足少阴；木香气味辛温，入手足太阴；五味子气味酸咸微温，入肾；杏仁气味苦辛微温，入肺；肉苁蓉气味咸温，入肾；诃子气味苦温微涩，入手阳明、手足太阴；陈橘皮气味辛温微苦，入手足太阴；柴胡气味辛平，入足少阳；人参气味甘温，入脾胃；熟地黄气味甘寒微苦，入肾；甘草气味甘平，入脾，能行十二经络；干姜气味辛温，入手足太阴；神曲气味甘温，入脾胃；麦芽气味甘平，入脾胃。此因虚劳不复，神倦多惊，以补足三阴之药固其本，佐以清肺平肝、驱除陈腐之药，则病去而元自复矣。

03132　石斛散

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】 人参 枣仁 茯神 远志 白芍 石斛 麦冬 炙草 五味子

【用法】 桂圆汤下。

【主治】 产后血虚惊悸。

03133 石斛露

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】 石斛

【用法】 蒸，取露。用以代饮。

【功用】 养胃阴，平胃逆，除虚热，安神志。

【主治】 温热痧痘之后，津液伤残，虚火内炽，及真阴素亏，胃热不清者。

03134 石榴汤

【方源】《外台》卷二十六引《广济方》。

【异名】 石榴根汤(《圣济总录》卷九十九)。

【组成】 醋石榴根（东引者）一大握 芜荑三两 牵牛子半两（熬末）

【用法】 以水六升，煮取二升，去滓，别和牵牛子末，分三次服，每服如人行五里更服。尽快利，虫亦尽死出。

【主治】 寸白虫，虫如马蔺叶大，子下部出不尽，令人渐渐羸瘦。

【宜忌】 忌生冷、猪、鱼、牛肉、白酒、葵笋等。

03135 石榴汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】 酸石榴一枚（大者） 黄连（去须）一两 干姜（炮）二两

【用法】 上㕮咀。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓，加阿胶二片令烊，顿服之，不拘时候。

【主治】 冷利洞泄及赤白滞痢。

03136 石榴散

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】 酸石榴皮 陈橘皮（汤浸，去白） 甘草（微炙，锉） 干姜（炮）各等分

【用法】 上药焙干为散。每服二钱匕，陈米饮调下，一日三次。

【主治】 结阴泻血不止。

03137 石碱丸

【方源】《明医指掌》卷四。

【组成】 海粉 三棱 莪术（醋炙） 五灵脂 红花 香附 石碱 瓦龙子（火淬）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。白术汤送下。

【主治】 血瘕。

03138 石膏丸

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】 石膏（研） 菊花 防风（去叉） 葛根（锉）各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，食后、临卧熟水送下。

【主治】 风毒上攻头痛。

03139 石膏丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】 石膏（别研） 白附子（炮） 半夏（汤洗七次） 川芎 天南星（炮） 白僵蚕（炒去丝） 菊花（拣净） 陈皮（去白） 旋覆花 天麻各一两 全蝎（炒）半两

【用法】 上为细末，生姜汁浸，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，渐加至一百丸，食后生姜汤送下。

【主治】 诸风痰涎，头痛目眩，旋晕欲倒，心忪悸动，恍惚不宁，神思昏愦，肢体倦疼，颈项强硬，手足麻痹。常服治偏正头痛。

【宜忌】 忌粘滑、生硬等物。

03140 石膏汤

【方源】《外台》卷一引《深师方》。

【异名】 三黄石膏汤(《伤寒总病论》卷五)。

【组成】 石膏 黄连 黄柏 黄芩各二两 香豉一升（绵裹） 栀子十枚（擘） 麻黄三两（去节）

【用法】 上切。以水一斗，煮取三升，分三次服，一日并服出汗。初服一剂小汗，其后更合一剂，分两日服，常令微汗出，拘挛烦懊即愈。得数行利，心开令语，毒折也。

【主治】 ①《外台》引《深师方》：伤寒病已八九日，邪攻内而表未解，三焦热，其脉滑数，昏愦，身体壮热，沉重拘挛，或时呼呻，体犹沉重拘挛。②《伤寒总病论》：伤寒发汗或下或误吐后，三焦热，脉候洪数，谵语不休，昼夜喘息，鼻中屡衄而疾势不解，身目如发黄，狂躁欲走。

【宜忌】 忌猪肉、冷水。

【方论选录】 ①《外台》引《深师方》：今直用解毒汤，则挛急不愈；直用汗药，则毒因加剧。而方无表里疗者，意思以三黄汤以救其内，有所增加以解其外，故名石膏汤。②《医方集解》：此足太阳、手少阳药也。表里之邪俱盛，欲治内则表不除，欲发表则里又急，故以黄芩泻上焦之火，黄连泻中焦之火，黄柏泻下焦之火，栀子通泻三焦之火，而以麻黄、淡豉发散表邪，石膏泻胃火，能解肌，亦表里分消之药也。

03141 石膏汤

【方源】 方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】 麦门冬一两（去心） 石膏二两 芦根一两（锉）

【用法】 上为散。每服半两。以水一大盏，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 热极渴不止。

03142 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】 石膏（碎） 山栀子（去皮） 赤茯苓（去黑皮） 甘草（炙，锉） 木通（锉）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】 膀胱实热，小便癃闭，舌燥引饮，烦闷。

03143 石膏汤

【方源】 《圣济总录》卷一四六。

【组成】 石膏五两 葛根（锉） 生姜（细切）各三两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕。水二盏，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 饮酒过多，大醉不醒。

03144 石膏散

【方源】 方出《外台》卷十三引《崔氏方》，名见《妇人良方》卷五引《灵苑方》。

【组成】 石膏十两

【用法】 研如乳粉。法水和服方寸匕，一日二次，以体凉为度。

【主治】 ①《外台》引《崔氏方》：虚劳内蒸，外寒内热骨肉自消，食饮无味，或皮燥而无光，四肢渐细，足趺肿起。②《医方考》：热劳，附骨蒸热，四脚微瘦，有汗脉长者。

【宜忌】 ①《准绳·女科》引《灵苑方》：非实，能食，大便实者不可服。②《医方考》：若新产失血、饥困劳倦之病，合禁用之。

【方论选录】《医方集解》：石膏大寒质重，能入里降火；味辛气轻，能透表解肌；虽寒而甘，能缓脾益气。火劳有实热者，非此不为功。

【临证举例】 骨蒸内热 《妇人良方》引《名医录》：睦州杨寺丞有女事郑迪功。女有骨蒸内热之病，时发外寒，寒过内热附骨。蒸盛之时，四肢微瘦，足跗肿者，其病在五脏六腑之中，众医不愈。因遇处州吴医看曰：请为治之。只单用石膏散服之，体微凉如故。

03145 石膏散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】 石膏一两 知母 柴胡（去苗） 麻黄（去根节） 甘草（炙微赤，锉） 黄芩 赤芍药 防风去芦头） 赤茯苓 川升麻 甘菊花各半两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，葱白七寸，豆豉一百粒，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 阳毒伤寒，壮热头痛，肢体烦重，口干心燥。

03146 石膏散

【方源】《圣惠》卷三十七

【组成】 石膏二两 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬二两（去心） 黄芩 川升麻 生干地黄 青竹茹 瓜蒌根 葛根各一两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 心胸烦热，吐血不止，口舌干燥，头疼。

03147 石膏散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】 石膏二两 麦门冬一两（去心） 甘草三分（炙微赤，锉） 白茯苓一两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，豉一百粒，竹叶二七片，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 霍乱，烦渴头痛。

03148 石膏散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】 石膏（火煅，研） 天南星（炮） 白僵蚕（炒）各等分

【用法】 上为散。每服二钱匕，加葱白二寸，腊茶一钱，同煎汤，连葱点顿服，良久再服。

【主治】 脑风邪气留连，头痛不已。

03149 石膏散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】 石膏（研） 芎藭 旋覆花各一两 白附子（炮） 细辛（去苗叶） 甘草（炙）各一分

【用法】 上为散。每服半钱匕，腊茶调下，不拘时候。

【主治】 风壅头痛，眉骨痛。

【备考】《普济方》有防风一两。

03150 石膏散

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】 石膏 赤芍药各一两 川芎三钱

【组成】 人参 枣仁 茯神 远志 白芍 石斛 麦冬 炙草 五味子

【用法】 桂圆汤下。

【主治】 产后血虚惊悸。

03133 石斛露

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】 石斛

【用法】 蒸，取露。用以代饮。

【功用】 养胃阴，平胃逆，除虚热，安神志。

【主治】 温热痧痘之后，津液伤残，虚火内炽，及真阴素亏，胃热不清者。

03134 石榴汤

【方源】《外台》卷二十六引《广济方》。

【异名】 石榴根汤(《圣济总录》卷九十九)。

【组成】 醋石榴根（东引者）一大握 芜荑三两 牵牛子半两（熬末）

【用法】 以水六升，煮取二升，去滓，别和牵牛子末，分三次服，每服如人行五里更服。尽快利，虫亦尽死出。

【主治】 寸白虫，虫如马蔺叶大，子下部出不尽，令人渐渐羸瘦。

【宜忌】 忌生冷、猪、鱼、牛肉、白酒、葵笋等。

03135 石榴汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】 酸石榴一枚（大者） 黄连（去须）一两 干姜（炮）二两

【用法】 上㕮咀。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓，加阿胶二片令烊，顿服之，不拘时候。

【主治】 冷利洞泄及赤白滞痢。

03136 石榴散

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】 酸石榴皮 陈橘皮（汤浸，去白） 甘草（微炙，锉） 干姜（炮）各等分

【用法】 上药焙干为散。每服二钱匕，陈米饮调下，一日三次。

【主治】 结阴泻血不止。

03137 石碱丸

【方源】《明医指掌》卷四。

【组成】 海粉 三棱 莪术（醋炙） 五灵脂 红花 香附 石碱 瓦龙子（火淬）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。白术汤送下。

【主治】 血瘕。

03138 石膏丸

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】 石膏（研） 菊花 防风（去叉） 葛根（锉）各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，食后、临卧熟水送下。

【主治】 风毒上攻头痛。

03139 石膏丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】 石膏（别研） 白附子（炮） 半夏（汤洗七次） 川芎 天南星（炮） 白僵蚕（炒去丝） 菊花（拣净） 陈皮（去白） 旋覆花 天麻各一两 全蝎（炒）半两

【用法】 上为细末，生姜汁浸，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，渐加至一百丸，食后生姜汤送下。

【主治】 诸风痰涎，头痛目眩，旋晕欲倒，心忪悸动，恍惚不宁，神思昏愦，肢体倦疼，颈项强硬，手足麻痹。常服治偏正头痛。

【宜忌】 忌粘滑、生硬等物。

03140 石膏汤

【方源】《外台》卷一引《深师方》。

【异名】 三黄石膏汤(《伤寒总病论》卷五)。

【组成】 石膏 黄连 黄柏 黄芩各二两 香豉一升（绵裹） 栀子十枚（擘） 麻黄三两（去节）

【用法】 上切。以水一斗，煮取三升，分三次服，一日并服出汗。初服一剂小汗，其后更合一剂，分两日服，常令微汗出，拘挛烦懊即愈。得数行利，心开令语，毒折也。

【主治】 ①《外台》引《深师方》：伤寒病已八九日，邪攻内而表未解，三焦热，其脉滑数，昏愦，身体壮热，沉重拘挛，或时呼呻，体犹沉重拘挛。②《伤寒总病论》：伤寒发汗或下或误吐后，三焦热，脉候洪数，谵语不休，昼夜喘息，鼻中屡衄而疾势不解，身目如发黄，狂躁欲走。

【宜忌】 忌猪肉、冷水。

【方论选录】 ①《外台》引《深师方》：今直用解毒汤，则挛急不愈；直用汗药，则毒因加剧。而方无表里疗者，意思以三黄汤以救其内，有所增加以解其外，故名石膏汤。②《医方集解》：此足太阳、手少阳药也。表里之邪俱盛，欲治内则表不除，欲发表则里又急，故以黄芩泻上焦之火，黄连泻中焦之火，黄柏泻下焦之火，栀子通泻三焦之火，而以麻黄、淡豉发散表邪，石膏泻胃火，能解肌，亦表里分消之药也。

致瞳人不正，观东见西，观西见东。

03161 石钟乳丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】石钟乳（依法别研为粉） 菟丝子（酒浸，别捣为末） 五味子（炒） 蛇床子（洗，焙） 黄耆（锉） 续断 萆薢 乌头（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】上为末。酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午、夜卧温酒送下。

【主治】肾脏虚损，骨痿羸瘦，行坐无力，短气不足，腰背相引疼痛。

03162 石莲子散

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】石莲子半两 石菖蒲 人参各二钱

【用法】上为细末，分作三服。不拘时候，陈米饮调下。

【主治】噤口痢。

03163 石菖蒲丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】石菖蒲一两 桂心一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如皂子大。每服一丸，含化。

【主治】肺寒不能发声。兼治心疼。

03164 石菖蒲汤

【方源】方出《一盘珠》卷七引《石室秘录》，名见《卫生鸿宝》卷五。

【组成】柴胡五两 白芍一两 当归五两 桃仁三两 甘草一两 茯神三两 菖蒲一两 元参三两 白芥子五两

【用法】水煎服。如不肯服，用人灌之，一剂即愈。

【功用】平肝祛邪。

【主治】花癫病。妇人情志不遂，致肝木枯槁，内火炽盛，忽然癫痫、寸口脉弦，见男子则抱住不放。

03165 石菖蒲散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】石菖蒲（九节者） 甘草 白茯苓 淡豉 皂角（肥实不蛀者，去皮弦子）各等分

【用法】上为末。临卧先以皂角洗面，拭揩令极干，用鸡子清调涂面上，至来早，将此药如澡豆用之。

【主治】面上黯黯、风刺、疮靥。

03166 石斛浸酒

【方源】方出《圣惠》卷九十五，名见《普济方》卷一五五。

【组成】石斛十两（去根） 牛膝半斤（去苗） 杜仲四两（削去粗皮） 丹参四两 生地黄（切）一升（晒令水气干）

【用法】上锉细，以生绢袋盛，用清酒五斗，于瓮子中密封，浸七日开。每服一中盏，一日二三次。

【功用】利关节，坚筋骨，令人强健悦泽。

【主治】风痹脚弱，腰胯冷疼。

03167 石硫黄膏

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】石硫黄 墨各一两半

【用法】上为细末。先以布揩患处令赤，醋调药成膏涂之。若作疮，愈后再涂。

【主治】白癜风，皮肤斑白，毛发亦变。

03168 石榴皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】酸石榴皮（微炒） 干姜（炮）各一两 黄柏（去粗皮，炙，无黄柏，用黄连亦得） 阿胶（炙令燥）各三分

【用法】上为粗末。每服四钱匕，用水一盏，至四分，去滓，空心温服。

【主治】①《圣济总录》：虚寒客于下焦，肠滑洞泄，困极欲死。②《医方类聚》引《御医撮要》：冷痢泄及白带下。

【宜忌】《医方类聚》引《御医撮要》：忌生冷、猪肉、油腻。

03169 石膏饮子

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】石膏四两（捣碎） 茯神一两 犀角屑一两 川芒消一两 栀子仁一两半 生地黄（切）三大合 甘草半两（炙微赤，锉） 赤小豆一合

【用法】上锉细和匀。每服半两，以水一大盏，煎至五分，去滓，加箬竹沥半合，更煎一沸，不拘时候温服。

【主治】心劳实，好笑，四肢烦热。

03170 石燕子煎

【方源】《鸡峰》卷十八。

【异名】石燕丸（《三因》卷十二）。

【组成】石燕子一两 滑石 石韦 瞿麦穗各等分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前煎瞿麦、灯心汤送下，一日二三次。

【主治】沙石淋，每发不可忍者。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“石燕子丸”。

03171 石韦瞿麦散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 瞿麦 石韦 车前子 滑石 葵菜子各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，同煎至七分，食前空心服。

【主治】 五淋。

03172 石刻安肾丸

【方源】《得效》卷八。

【组成】 苍术四两（一两用茴香一两炒，一两用青盐一两炒，一两用茱萸一两浸，炒，一两用猪苓一两炒，各炒令黄色，取术用） 川乌（炮，去皮脐） 附子（炮，去皮脐） 川楝子（酒去核） 巴戟（去心，炒） 白术（炒） 陈皮（炒） 各一两 肉苁蓉（酒浸，炙） 破故纸（炒）各二两 茯苓一两（炒） 肉豆蔻（面裹煨） 木香（不见火） 当归（火焙干）各一两 杜仲（炒去丝）二两 熟地黄（酒浸，蒸十次，火焙） 菟丝子（酒浸，炒） 茴香 黑牵牛（半生，半炒） 山药（炒）各一两 晚蚕蛾（去头足翅，炒） 葫芦巴（酒浸，炒） 肉桂（不见火） 石斛（炒） 川牛膝（酒浸，炒）各一两

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心盐汤送下。

【功用】 久服壮元阳，益肾气，健筋骨，生血驻颜，扶老资寿。

【主治】 真气虚惫，脚膝缓弱，目暗耳鸣，举动倦怠，夜梦遗精，小便频数，一切虚损。

03173 石首鱼脑汤

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】 诃子 甘草各一钱 荆芥 细辛 人参各五分 桔梗二钱 石首鱼脑骨五钱（煅存性，为末）

【用法】 将上药煎好，去滓，入石首鱼脑骨末，再煎一二沸服。

【主治】 肺气虚寒，鼻流不臭清涕，经年不愈。

03174 石斛清胃散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 石斛 茯苓 橘皮 枳壳 扁豆 藿香 丹皮 赤芍各等分 甘草减半

【用法】 上为散。每服三四钱，加生姜一片，水煎服。

【功用】《千金妙方》：养胃津，益脾气。

【主治】 麻疹后呕吐，胃虚不食，热滞。

03175 石膏大青汤

【方源】 方出《千金》卷二，名见《张氏医通》卷十五。

【组成】 石膏八两 前胡 栀子仁 知母各四两 大青 黄芩各三两 葱白（切）一升

【用法】 上㕮咀。以水七升，煮取二升半，去滓，分五次服。别相去如人行七八里再服。不利。

【功用】《张氏医通》：散邪安胎。

【主治】 妊娠伤寒，头痛壮热，肢节烦疼。

03176 石膏升麻散

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】 石膏 升麻 地骨皮 羊胫骨灰各等分

【用法】 上为末。每用少许，频擦牙齿根上。

【主治】 足阳明经虚，风热所袭，流传牙齿，攻蛀牙龈，致肿结妨闷，甚者与龈间津液相搏，化为脓汁。

【备考】《景岳全书》：“或加麝香少许更妙”。

03177 石膏白及膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 煅石膏 62 克 白及末 31 克 密陀僧 21 克 轻粉 15 克 枯矾 9 克

【用法】 上为极细末，加凡士林 125 克，调成泥膏。外用。

【主治】 阴囊湿疹。

03178 石膏竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】 石膏二两 竹茹（焙） 人参 白茅根 半夏（汤洗七遍，炒）各一两 玄明粉 桔梗（炒） 甘草（炙，锉） 葛根（锉）各半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜五片，同煎至八分，去滓温服。

【主治】 上焦壅热，见食呕吐，头痛目赤。

03179 石膏羌活散

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】 羌活 密蒙花 木贼 香白芷 细辛 干萝卜菜子 麻子 川芎 苍术 甘菊花 荆芥穗 黄芩 石膏 藁本 甘草各等分

【用法】 上为末。每服一钱至二钱，食后临卧用蜜水一盏调下，或茶清、或淘米水第二遍泔亦得，一日三次。服至十日渐明，服至二十日大验。

【主治】 久患双目不睹光明，远年近日内外气障，风昏暗，拳毛倒睫，一切眼疾。

【方论选录】 羌活治脑热头风密花治羞明怕日，木贼退翳障，香白芷清利头目，细辛、萝卜菜子二味起倒睫，麻子起拳毛，川芎治头风，苍术明目暖

水眦，甘菊花、荆芥穗治目中生疮，黄芩、石膏二味洗心退热，藁本治偏正头痛，甘草解诸药毒。

03180 石膏枯矾膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 煅石膏 18 克 枯矾 18 克 雄黄 6 克 冰片 1 克

【用法】 上为极细末，加凡士林 187 克，调成软膏。外用。

【主治】 阴囊湿疹。

03181 石膏神术汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】 石膏 熟苍术 甘草

【主治】 湿温身痛。

【加减】 上部痛，加防风、荆芥、白芷、川芎；下部痛，加防己、秦艽、黄柏。

03182 石膏黄芩汤

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】 石膏 黄芩 甘草 桑白皮 荆芥 鸡苏 桔梗各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 鼻渊。

03183 石膏菊花散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】 石膏（研，飞过）一两 天南星（炮）一两半 白僵蚕一两（炒） 甘菊花一两 甘草（炙，锉）三分

【用法】 上为散。每服二钱匕，食后腊茶调下。

【主治】 脑风头痛难任，时愈时发。

03184 石膏粳米汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生石膏二两（轧细） 生粳米二两半

【用法】 用水三大碗，煎至米烂熟，约可得清汁两大碗。乘热尽量饮之，使周身皆汗出，病无不愈者。若阳明腑热已实，不必乘热顿饮之，徐徐温饮下，以消其热可也。

【主治】 温病初得，其脉浮而有力，身体壮热。并治一切感冒初得，身不恶寒而心中发热者。

【方论选录】 此方妙在将石膏同粳米煎汤，乘热饮之。俾石膏寒凉之性，随热汤发散之力，化为汗液，尽达于外也。且与粳米同煮，其冲和之气，能助胃气之发达，则发汗自易。其稠润之汁，又能逗留石膏，不使其由胃下趋，致寒凉有碍下焦。此方粳米多至二两半，汤成之后，必然汁浆其稠。饮至胃中，又善留蓄热力，以为作汗之助也。

03185 石髓平渊散

【方源】《医级》卷八。

【组成】 僵蚕（去嘴）一钱 石髓（黄鱼头中石，醋煅五七次）

【用法】 上为末，吹入鼻中。外另取丝瓜近根藤数条，烧存性，研末。每服一钱，白汤送下。

【主治】 肝胆风热郁脑成渊，时时流臭黄水，久则如漏，头脑苦痛者。

03186 石膏鼠粘子散

【方源】《奇效良方》卷二十四。

【组成】 石膏 鼠粘子（炒）各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，食后用温酒或茶清调下。

【主治】 偏正头疼，连睛疼。

03187 右归丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 大怀熟地八两 山药（炒）四两 山茱萸（微炒）三两 枸杞（微炒）四两 鹿角胶（炒珠）四两 菟丝子（制）四两 杜仲（姜汤炒）四两 当归三两（便溏勿用） 肉桂二两（渐可加至四两） 制附子二两（渐可加至五六两）

【用法】 上先将熟地蒸烂杵膏，加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百余丸，食前用滚汤或淡盐汤送下。或丸如弹子大，每嚼服二三丸，以滚白汤送下。

【功用】 ①《景岳全书》：益火之原，以培右肾之元阳。②《方剂学》：温补肾阳，填精止遗。

【主治】 ①《景岳全书》：元阳不足，或先天禀衰，或劳伤过度，以致命门火衰不能生土，而为脾胃虚寒，饮食少进；或呕恶膨胀；或翻胃噎膈；或怯寒畏冷；或脐腹多痛；或大便不实，泻痢频作；或小水自遗，虚淋寒疝；或寒侵溪谷，而肢节痹痛；或寒在下焦而水邪浮肿。总之，真阳不足者，必神疲气怯，或心跳不宁，或四肢不收，或眼见邪祟，或阳衰无子等症。③《会约》：阳亏精滑，阳萎精冷。

【加减】 如阳衰气虚，必加人参以为之主，或二三两、或五六两，随人虚实以为增减；如阳虚精滑，或带浊便溏，加补骨脂（酒炒）三两；如飧泄肾泄不止，加北五味子三两、肉豆蔻三两（面炒，去油用）；如饮食减少，或不易化，或呕恶吞酸，皆脾胃虚寒之证，加子姜三四两（炒黄用）；如腹痛不止，加吴茱萸二两（汤泡半日，炒用）；如腰膝酸痛，加胡桃肉（连皮）四两；如阴虚阳萎，加巴戟肉四两、肉苁蓉三两，或加黄狗外肾一二付，以酒煮烂捣入之。

【方论选录】《方剂学》：本方立法，“宜益火之原，以培右肾之元阳”。培补肾中元阳，必须“阴中求阳”。即在培补肾阳中配伍滋阴填精之品，方可具有培补元阳之效。方中桂、附加血肉有情的鹿角胶，均属温补肾阳，填精补髓之类；熟地、山茱萸、山药、菟丝子、枸杞、杜仲，俱为滋阴益肾，养肝补脾而设；更加当归补血养肝。诸药配伍，共具温阳益肾。填精补血，以收培补肾中元阳之效。

【临证举例】 ①白血球减少症 《河南中医》(1984；2:34)：殷某某：男，50岁。患者主诉头昏失眠，全身乏力已十年，多次查白细胞均在4000/立方毫米以下；形体消瘦，面色萎黄，头昏目涩，口干不喜饮，纳谷不馨，食后脘胀，大便时溏，夜寐不实，舌淡，苔薄白，脉沉细，查血白细胞2500/立方毫米，始用归脾汤治疗，腹胀便溏好转，但仍诉头昏乏力，转以肾命火衰，精血不足论治，转方拟右归丸改汤剂煎服。处方：熟地黄20克，菟丝子10克，怀山药10克，枸杞子10克，山萸肉10克，仙灵脾10克，全当归12克，鹿角胶（烊冲）6克，上肉桂4克，熟附片3克，杜仲12克。七付药后，全身感到较前有力，头昏耳鸣减轻，夜寐亦安。唯感口干；时值长夏，故去附子，余药续服，十五剂药以后，二次复查白细胞，先后为3700/立方毫米，4400/立方毫米。症状逐渐改善出院。②遗传性小脑型共济失调 《上海中医药杂志》(1984，2:35)：续某某，女，20岁，患小脑共济失调证已四年，近数月来病情加重。步履蹒跚，左右摇晃，头昏耳鸣，记忆减退，形寒肢冷，腰膝无力。苔薄舌质偏淡，边有齿印，脉细，两尺沉而无力。治以温肾补督，益精养髓，拟景岳右归丸加减：淡附片6克，上肉桂4克，鹿角霜、杜仲、淮山药、怀牛膝、全当归各9克，菟丝子、龟版、杞子、熟地、制首乌各12克。服药二十剂后，患者自觉精神好转，足膝步履较前有力，亦较稳健，惟头晕未已，口渴欲饮，苔薄脉细。前方得手，再加生地12克，服药五十剂后病情显著好转。在家人扶持下，每日在病区走廊内行走90余圈，每圈约50米。单独行走时，步履较前稳健。现随访治疗五个月余，病情稳定，续有进步，已能上下楼梯，单独行走，仍按原意，继续将息调治，以资巩固。③带下 《浙江中医学院学报》(1982；6:27)：陈某某，女，30岁。腰酸脊痛，带下绵绵，色如蛋清，少腹重胀，头昏耳鸣，病经二年未愈，经量少，色淡，无痛经，每日晨起面目浮肿，生育四胎，“人流”两次，舌淡苔白，脉濡细。肾阳不足，阳虚内寒，带脉失约，任脉不固，治拟调补带任二脉，补摄固带为宜。熟地、淮山、菟丝子、覆盆子各15克，杞子、萸肉、鹿角霜、炒杜仲各12克，熟附块、肉桂各3克，当归、炒白术各10克，红枣六枚。服七剂后，带下明显减少，余症减半，苔脉如前，嘱原方续服半月，随访数月未见复发。

【现代研究】 对甲减大鼠胸腺胞浆雌二醇受体的作用 《上海中医学院上海市中医药研究院学报》(1987；1:55)：用他巴唑造成甲减大鼠模型，观察补肾阳方剂右归丸对甲减大鼠胸腺重量、血清雌二醇（E_2）含量及胸腺胞浆E_2受体的影响。结果表明：右归丸明显增高甲减动物胸腺重/体重比值（$P<0.05$）及血清E_2含量（$P<0.01$），并减少胸腺胞浆E_2受体数量。推测其作用机制可能是通过促进下丘脑-垂体-性腺轴的功能；提高甲状腺功能，改善对E_2外周代谢的影响或直接作用于胸腺增强功能。

03188 右归饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 熟地二三钱或加至一二两 山药（炒）二钱 山茱萸一钱 枸杞二钱 甘草（炙）一二钱 杜仲（姜制）二钱 肉桂一二钱 制附子一至三钱

【用法】 水二钟，煎七分，空腹温服。

【功用】《方剂学》：温肾填精。

【主治】 肾阳不足，腰膝痠痛，气怯神疲，大便溏薄，小便频多，手足不温，及阳萎遗精，舌苔淡薄，脉象沉细者。

①《景岳全书》：命门之阳衰阴胜者。②《会约》：阳虚咳嗽。③《医部全录》：产妇虚火不归元而发热者。④《医方简义》：肾虚火衰，睾坠而痛。⑤《方剂学》：肾阳不足，气怯神疲，腹痛腰痠，肢冷，舌淡苔白，脉沉细；或阴盛格阳，真寒假热之证。

【加减】 如气虚血脱，或厥，或昏，或汗，或运，或虚，或短气者，必大加人参、白术，随宜用之；如火衰不能生土，为呕哕吞酸者，加炮干姜二三钱；如阳衰中寒，泄泻腹痛，加人参、肉豆蔻，随宜用之；如小腹多痛者，加吴茱萸五七分；如淋带不止，加破故纸一钱；如血少血滞，腰膝软痛者，加当归二三钱。

【方论选录】《方剂学》：方用熟地为主，甘温滋肾以填精，此本阴阳互根，于阴中求阳之意；附子、肉桂温补肾阳而祛寒，山萸肉、枸杞养肝血，助主药以滋肾养肝，山药、甘草补中养脾，杜仲补肝肾，壮筋骨，以上诸药共为辅佐药。各药合用，

有温肾填精的作用。

【临证举例】 ①肾虚眩晕 《新医药学杂志》(1979；6：24)：鄢某某，女，56岁，小学教师。患高血压（180～190/90～100毫米汞柱）已多年，经常头昏目眩，甚则晕倒，梦多睡差，腰膝痠冷，多尿，大便时溏，脸面时红，经用平肝潜阳等法治之无效，来我科就医。诊得其脉沉细，两尺弱，舌淡而润。脉症合参，此为肾阳不足，治用右归饮加减。处方：萸肉10克，杜仲10克，熟地12克，淮山药10克，枸杞子15克，桂皮4克，附片（先煎）6克，磁石12克，钩藤12克。复诊：服五剂后，眩晕、腰酸等均大减，血压降至140/80毫米汞柱，尿正常，便溏，多梦等如前，脉沉细。肾阳渐复，治守前方除钩藤，加沙苑子15克，菟丝子10克，朱茯苓12克，珍珠母12克，继服六剂，血压稳定正常。②精子缺乏症 《浙江中医杂志》(1983；11：497)：运用右归饮加味治疗精子缺乏症6例，获得满意效果。一般资料：患者年龄为30～35岁，婚后3～6年未育，精液常规检查，精子计数均显著低于正常，最低者500万/ml，精子活动率均低于20%，最低者3%，其中有遗精史1例，早泄2例，举而不坚1例，大便频溏1例，患者面色㿠白或萎黄，或苍黯不华，有不同程度畏寒，舌质淡，苔薄白，脉象沉细而软，呈现一派命门火衰、肾阳不足之象。治疗方法：以补命门之火，兼温肾阳为主，伴大便频溏者，兼顾脾阳。方用右归饮加味；有遗精史及早泄者，加韭菜子、金樱子、龙骨、牡蛎；大便频溏者，加补骨脂、炒白术、党参、干姜；举而不坚者，加怀牛膝、巴戟天、续断。每日1剂，连服3周后，除每晚续服汤剂外，早晨及中午吞服右归丸（鹿角胶改为鹿茸，并加人参），每次9克。治疗效果：除1例服药近3个月，因工作调动结果不详外，其余5例患者的爱人均受孕生育，其中服药2个月及4个月者各1例，3个月者3例。

03189 左归丸

【方源】 《景岳全书》卷五十一。

【组成】 大怀熟地八两 山药（炒）四两 枸杞四两 山茱萸肉四两 川牛膝（酒洗，蒸熟）三两（精滑者不用） 菟丝子（制）四两 鹿胶（敲碎，炒珠）四两 龟胶（切碎，炒珠）四两（无火者不必用）

【用法】 上先将熟地蒸烂杵膏，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百余丸，食前用滚汤、或淡盐汤送下。

【功用】 ①《景岳全书》：壮水之主，培左肾之元阴。②《方剂学》：填补肝肾真阴。

【主治】 真阴肾水不足，不能滋养营卫，渐至衰弱，或虚热往来，自汗盗汗；或神不守舍，血不归原；或虚损伤阴；或遗淋不禁；或气虚昏运；或眼花耳聋；或口燥舌干；或腰酸腿软，凡精髓内亏，津液枯涸之证。

【加减】 如真阴失守，虚火上炎者，宜用纯阴至静之剂，于本方去枸杞、鹿胶，加女贞子三两，麦冬三两；如火烁肺金，干枯多嗽者，加百合三两；如夜热骨蒸，加地骨皮三两；如小水不利、不清，加茯苓三两；如大便燥结，去菟丝，加肉苁蓉三两；如气虚者，加人参三四两；如血虚微滞，加当归四两；如腰膝酸痛，加杜仲三两（盐水炒用）；如脏平无火而肾气不充者，加破故纸三两（去心），莲肉、胡桃肉各四两，龟胶不必用。

【方论选录】 ①《何氏虚劳心传》：以纯补犹嫌不足，若加苓、泽渗利，未免减去补力，奏功为难，故群队补阴药中更加龟、鹿二胶，取其为血气之属，补之效捷耳。②《方剂学》：方中重用熟地滋肾以填真阴；枸杞益精明目；山茱萸涩精敛汗；龟、鹿二胶，为血肉有情之品，鹿胶偏于补阳，龟胶偏于滋肾，两胶合力，沟通任督二脉，益精填髓，有补阴中包涵“阳中求阴”之义。菟丝子配牛膝，强腰膝，健筋骨，山药滋益脾肾。共收滋肾填阴，育阴潜阳之效。

【临证举例】 ①疟疾 《扫叶庄医案》：脉左数搏，是先天真阴难充，则生内热，疟热再伤其阴，与滋养甘药填阴。左归丸去杞子、牛膝，加天冬、女贞。②腰肌劳损 《江苏中医杂志》(1982；1：35)：王某某，男，42岁。患腰肌劳损，腰痛已两载，经用封闭、推拿、针灸等治疗效果不显，患者腰脊酸痛，并伴见头晕、失眠、咽干、遗精等证，诊脉弦细，两尺尤弱，苔薄中裂，舌质较红，良由肾水不足，精髓内亏，治宜育阴补肾为主，拟予左归丸加味：鹿角片12克、熟地12克、炙龟版12克、杞子12克、净萸肉12克、菟丝子12克、淮山药12克、淮牛膝9克、川石斛9克、川杜仲9克、桑寄生9克。服药十三剂，腰痛大减，睡眠转佳，眩晕、咽干等症相继消失。后以青娥丸调治善后。

03190 左归饮

【方源】 《景岳全书》卷五十一。

【组成】 熟地二三钱或加至一二两 山药二钱 枸杞二钱 炙甘草一钱 茯苓一钱半 山茱萸一二

钱（畏酸者少用之）

【用法】 水二钟，煎七分，空腹服。

【功用】 ①《景岳全书》：壮水。②《方剂学》：养阴补肾。

【主治】 真阴不足，腰酸且痛，遗精盗汗，咽燥口渴。

①《景岳全书》：命门之阴衰阳胜者。②《会约》：阴衰阳胜，身热烦渴，脉虚气弱。③《医方简义》：肾虚腰痛，偏坠遗精。④《方剂学》：真阴不足，症见腰酸遗泄，盗汗，口燥咽干，口渴欲饮，舌光红，脉细数。

【加减】 如肺热而烦者，加麦冬二钱；血滞者，加丹皮二钱；心热而躁者，加玄参二钱；脾热易饥者，加芍药二钱；肾热骨蒸多汗者，加地骨皮二钱；血热妄动者，加生地二三钱；阴虚不宁者，加女贞子二钱；上实下虚者，加牛膝二钱以导之；血虚而燥者，加当归二钱。

【方论选录】 ①《成方切用》：按六味乃虚挟湿热而滞者宜之。若纯虚者，无取泽泻之泄，丹皮之凉，也宜以此甘纯之剂平补之。②《血证论》：《难经》谓左肾属水，右肾属火，景岳此方，取其滋水，故名左归，方取枣皮酸以入肝，使之不盗母之气；枸杞赤以入心，使火不为水之仇；使熟地一味，滋肾之水阴；使茯苓一味，利肾之水质；有形之水质不去，无形之水阴亦不生也。然肾水实仰给于胃，故用甘草、山药，从中宫以输水于肾。景岳方多驳杂，此亦未可厚非。③《方剂学》：方中重用熟地为主，甘温滋肾以填真阴；辅以山茱萸、枸杞子养肝血，合主药以加强滋肾阴而养肝血之效；佐以茯苓、炙甘草益气健脾，山药益阴健脾滋肾。合而有滋肾养肝益脾之效。

【临证举例】 ①虚劳 《张聿青医案》：今稍一感触，即觉伤风，表气不固已甚，肺在上主气之出，肾在下主气之纳，肾虚封藏不固，则肾气不能仰吸肺气下行，气少归纳，所以体稍运动，即觉气急，素有之痰饮，为冲阳挟之而上，咽痒咳嗽，甚至见红。特是肾之阴虚，与肾之阳虚，皆令气不收藏，左脉弦大，且有数意，断无命阳不振，寒饮上泛，而脉不沉郁，转见弦大之理，所以脉大而左部为甚，以肝肾之脉，皆居于左，其为肾阴虚不能收摄无疑。况所吐之痰，牵丝不断，并非水饮。饮之所以为痰者，热炼之也。仲景小青龙汤、真武汤为痰饮之要方。汤曰青龙，为其行水也，真武水神名，为其治水也，足见饮即水类，与痰浊绝不相同。下虚如此，断勿存观望之心，而使根蒂日近空乏，用介宾先生左归饮法。紫贝蛤壳、生地炭、怀山药、长牛膝、萸肉、白茯苓、车前子。②眩晕 《湖北中医杂志》（1980；1:22）：某女，40岁，家庭妇女，1953年秋末，在月经期间入河水中洗衣服，从而发病。开始时，恶寒发热，月经亦止而停潮。经治疗未效，三日后其寒热自罢，旋即转为头目眩晕，不能起床，目合不语，时而睁眼暂视周围而遂闭合，目光如常，脉细沉涩。乃正虚血瘀，风木上扰，治宜滋水涵木，以祛瘀息风，方用左归饮加味：熟地15克，山药12克，枣皮12克，茯苓12克，枸杞12克，炙草9克，车前子9克，五味子6克。水煎服。患者服药一剂后即大便下血而诸证遂失，神清人慧，其病告愈，继之服完第二剂，以巩固疗效。

03191 左金丸

【方源】《丹溪心法》卷一。

【异名】 回令丸（原书同卷）、萸连丸（《医学入门》卷七）、朱连丸（《医方集解》）、佐金丸（《张氏医通》卷十六）、二味左金丸（《全国中药成药处方集》天津方）。

【组成】 黄连（一本作芩）六两 吴茱萸一两或半两

【用法】 上为末，水为丸，或蒸饼为丸。每服五十丸，白汤送下。

【功用】 ①《丹溪心法附余》：泻肝火，行湿，开痞结。②《方剂学》：清肝泻火，降逆止呕。

【主治】 肝火犯胃，嗜杂吞酸，呕吐胁痛，筋疝痞结，霍乱转筋。

①《丹溪心法》：肝火胁痛。②《医方集解》：肝火燥盛，左胁作痛，吞酸吐酸，筋疝痞结。③《霍乱论》：霍乱转筋。

【方论选录】 ①《医方考》：左金者，黄连泻去心火，则肺金无畏，得以行令于左以平肝，故曰左金。吴茱萸气臊味辛性热，故用之以为反佐。以方君一臣一，制小其服者，肝邪未盛也。②《医方集解》：此足厥阴药也。肝实则作痛，心者肝之子，实则泻其子，故用黄连泻心清火为君，使火不克金，金能制木，则肝平矣；吴茱萸辛热，能入厥阴肝，行气解郁，又能引热下行，故以为反佐。一寒一热，寒者正治，热者从治。③《古方选注》：经脉循行，左升右降，药用苦辛，肃降行于升道，故曰左金。吴茱萸入肝散气，降下甚捷；川黄连苦燥胃中之湿，寒胜胃中之热，乃损其气以泄降之，七损之法也。当知可以治实，不可以治虚，若误论虚实而用之则误矣。④《金鉴》：胡天锡曰，此泻肝

火之正剂。独用黄连为君，以实则泻子之法，以直折其上炎之势；吴茱萸从类相求，引热下行，并以辛温开其郁结，惩其扞格，故以为佐。然必木气实而土不虚者，庶可相宜。左金者，木从左，而制从金也。③《谦斋医学讲稿》：方中黄连入心，吴茱萸入肝，黄连的用量六倍于吴萸，故方解多作实则泻其子，并以吴茱萸为反佐药。我认为肝火证很少用温药反佐，黄连和吴茱萸归经不同，也很难这样解释。从效果研究，以吞酸嘈杂最为明显，其主要作用应在于胃。黄连本能苦降和胃，吴茱萸亦散胃气郁结，类似泻心汤的辛苦合用。故吞酸而兼有痰湿粘涎的，酌加吴茱萸用量，效果更捷。

【临证举例】 锑剂反应性呕吐 《上海中医药杂志》(1983；3:33)：一卫性男青年，工人，患慢性血吸虫病，在血吸虫病房住院治疗，采用酒石酸锑钾（简称锑剂）二十天疗法。至疗程第七天（注射第7针）时，泛恶呕吐，难以忍受，遂要求中止治疗。当时我建议用中成药左金丸治之，每次3克，一日三次。药后1天，泛恶呕吐缓解。继续注射锑剂，配合服用左金丸，不再发生呕吐，以致疗程顺利结束。与此同时，该病房另有恶心呕吐反应者八人，经服用左金丸，均获得了止呕的效果。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“回金丸”。

03192 左金汤

【方源】《霍乱论》卷下。

【组成】 川连（或生或炒随酌） 吴茱萸（汤泡） 制半夏 茯苓 陈皮 甘草 枳壳 竹茹 藿香

【主治】 霍乱吐泻转筋，手足寒，心烦热渴。

03193 左经丸

【方源】《局方》卷一（续添诸局经验秘方）

【组成】 生黑豆一斤（以斑蝥二十一枚，去头足同煮，候豆胀为度，去斑蝥不用；取豆焙干） 川乌（炮，去皮脐）二两 乳香（研）一两 没药一两半 草乌（炮）四两

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，不拘时候。

【功用】 常服通经络，活血脉，疏风顺气，壮骨轻身。

【主治】 左瘫右痪，手足颤掉，言语謇涩，浑身疼痛，筋脉拘挛，不得屈伸，项背强直，下注脚膝，行履艰难，骨节烦痛，不能转侧；跌扑闪肭，外伤内损。

03194 左经汤

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 羌活 前胡 苍术（米泔水浸一宿，去皮，炒） 人参（去芦） 白茯苓（去皮）各一两 川芎 枳壳（麸炒，去瓤） 桔梗（炒） 甘草各半两（炙） 官桂（去粗皮，不见火） 附子（生，去皮脐） 木瓜 干姜（炮，洗）各一两

【用法】 上㕮咀。每服二钱半，水一盏半，加生姜三片，薄荷两叶，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】 风湿所搏，肢体沉重。

03195 左金加陈米汤

【方源】 方出《医方集解》，名见《退思集类方歌注》。

【组成】 黄连六两（姜汁炒） 吴萸一两（盐水泡） 糯米一撮

【用法】 浓煎服。但得三匙下咽，即不复吐矣。

【主治】 噤口痢，汤药入口即吐。

03196 龙凤丸

【方源】《得效》卷七。

【组成】 鹿茸（火燎去毛）一两（汤浸，炙） 山药 菟丝子（酒浸，炒）各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下，浓煎人参汤亦可。

【主治】 消渴。饮酒多，多积为酷热，熏蒸五脏，津液枯燥，血泣，小便并多，肌肉消烁，专嗜冷物寒浆。

【备考】《普济方》：一方面糊为丸。盐酒汤送下。名“龙肝凤髓丸”。

03197 龙火汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 苁蓉三钱 肉桂五分 党参四钱 茯苓二钱 白术一钱 归身二钱（酒炒） 白芍一钱 木香五分 川断二钱 独活一钱（酒炒） 角霜四钱 蚕沙三钱 红枣十枚 姜三片

【功用】 调养气血，温通经络。

【主治】 痛痹。

03198 龙肝膏

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】 伏龙肝一两 生地汁 麦冬汁 小蓟汁 藕汁各三合 姜汁一合

【用法】 入蜜半匙，慢火熬成膏。每服一匙。

【主治】 吐血不止。

03199 龙齿丸

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】 龙齿一两 人参一两（去芦头） 远志三分（去心） 茯神一两 铁粉一分（细研） 金箔五十片（细研） 防风三分（去芦头） 甘草半两

（炙微赤，锉） 银箔五十片（细研）

【用法】 上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，不拘时候，以粥饮送下。

【主治】 风虚，心惊不定。

03200 龙齿丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】 龙齿 远志（去心） 生干地黄（焙） 白茯苓（去黑皮） 天门冬（去心，焙） 山芋 防风（去叉） 五味子 车前子 麦门冬（去心，焙） 地骨皮（去土） 人参各等分。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日二十丸，空心竹叶汤送下，一日二次。

【主治】 心神狂越，多喜善笑。

03201 龙齿丹

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】 紫苏子一两 龙齿 石菖蒲 远志（去心） 铁粉（别研） 木香 白僵蚕（炒去丝嘴） 橘红 白花蛇（酒浸一宿，取肉，焙干称，炙黄） 朱砂（别研，留少许为衣） 天麻（去苗，酒浸一宿，焙） 麻黄（去根节） 天南星（汤浸，薄切片子，生姜汁制一宿） 人参（去芦头）各半两 全蝎一分（去毒，炒） 龙脑半钱（别研） 麝香一分（别研）

【用法】 上为细末，次入研者药和匀，炼蜜为丸，每一两作一十五丸。每服一丸，食前、空心薄荷汤化下。

【主治】 因惊神志恍惚，久而成痫，时发时止者。

03202 龙齿丹

【方源】《医方类聚》卷一五八引《济生》。

【组成】 龙齿 附子（炮，去皮脐，切片，姜汁浸一宿） 远志（去心，甘草煮） 酸枣仁（炒，去壳，别研） 当归（去芦，酒浸） 官桂（去皮，不见火） 琥珀（别研） 南星（锉，姜汁浸一宿）各一两 木香（不见火） 紫石英（煅，醋淬七遍） 沉香（别研） 熟地黄（酒蒸，焙）各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸，不拘时候，用枣汤送下。

【主治】 心血虚寒。怔忡不已，痰多恍惚。

03203 龙齿汤

【方源】《医方大成》卷《简易方》。

【组成】 官桂二两半 半夏二两（汤泡） 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 甘草（炙） 当归 龙齿（研） 桔梗（炒） 茯神（去皮）各一两 远志（去心） 枳壳（去瓤，麸炒）各一两半 黄耆（蜜炙）一两

【用法】 上为末，每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一枚，粳米百粒，煎服。

【主治】 心下怔忡，常怀忧虑，神思多惊，如堕险地，小便或赤或浊。

03204 龙齿散

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】 龙齿 人参 远志（去心） 白茯苓（去黑皮） 麦门冬（去心，焙）各半两 丹砂（研） 铁粉（研末，飞） 龙脑（研） 牛黄（研） 麝香（研）各一分

【用法】 上为散，再同研匀细。每服半钱匕，食后，夜卧温熟水调下，一日三次。

【主治】 肾虚，热毒乘虚攻耳，致耳内常鸣如蝉声。

03205 龙虎丹

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】 草乌头（锉） 枫香脂（研） 五灵脂 木鳖子（去壳，别研） 地龙（炒）各一两 乳香（别研）半两

【用法】 上为末，并华水拌和为丸，如鸡头子大，以丹砂为衣。每服一丸，临卧以冷酒磨下，乳香酒亦得，仍先嚼胡桃仁半枚服之。药成阴干，勿令见火。

【主治】 腰脚风痛。

03206 龙虎丹

【方源】《百一》卷三。

【异名】 火龙丸。

【组成】 地龙四两（去土） 玄胡索四两（生） 松节二两 核桃肉十五个 乳香三钱 蝼蛄十四个 蜈蚣二条 没药三钱 草乌头四两（生，不去尖） 蝎十四个（蝼蛄、蜈蚣、蝎三味用好酒一升，同煎十数沸，取出焙干）

【用法】 上为细末，用煮肉药酒打糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，左瘫右痪，麝香酒送下。

【主治】 左瘫右痪，口眼㖞斜。五种脚疼。

03207 龙虎丹

【方源】《瑞竹堂方》。

【组成】 龙骨（研） 虎骨（酥炙） 人参 箭头朱砂（研） 远志（甘草水煮，去骨） 酸枣仁（炒，去壳）各一两 大天南星三四枚（泔水洗浸，去皮滑涎，控干，竹刀剜成罐，装朱砂末，以南星盖之） 猪心一个（取新杀殪猪带血热心，纳置南星内，以灯草裹猪心，外用麦门冬草洗净，不拘多少，包之，甑上九蒸九晒，取出南星，于金银器内

盛之，取日精月华之气晒露十昼夜，捣罗为末，后加余药同和匀）

【用法】 上为细末，用无灰酒打面糊，冷定和搜成剂，为丸如梧桐子大，每服五七十丸，空心温酒送下；小儿丸如黄米大，每服三五十丸，煎人参汤送下。病甚者，不过二十服即愈，除根不发。

【主治】 男子妇人，心神恍惚，阳明经大盛，时复惊惧哭泣，口发狂言，不避亲疏，一切风病等。

03208 龙虎丹

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】 草乌 苍术 白芷各一两（碾粗末，水拌发酵盦过，入后药） 乳香 没药各二钱（别研） 当归 牛膝各五钱

【用法】 上为末，酒糊为丸，如弹子大。每服一丸，温酒化下。

【主治】 走注疼痛，或麻木不遂，或半身痛。

03209 龙虎丹

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】 草乌 苍术各八两 穿山甲二两（炒成珠） 补骨脂一两 白芷一两 葱白八两 老姜八两（洗净，捣烂，拌乌、术二味入坛内，于三伏天盦出白毛，有香味，取出晒干）

【用法】 上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至三十丸止，临卧服，间一日再服，不可多用。左瘫右痪，半身不遂，防风汤送下；惊风，薄荷汤送下；手足顽麻、风痒，葱白汤送下；头风，川芎汤送下；跌打损伤，乳香汤送下；元虚畏冷，筋骨疼痛，葱汤送下；肠风痔漏下血，槐花汤送下；遍身痒疥，荆芥汤送下；寒湿气、脚气，木瓜汤送下；胃伤食积，生姜汤送下；皮黄水肿，姜皮汤送下；赤白痢疾，米汤送下；下部疝气，小茴汤送下；小儿肚腹膨胀，史君子汤送下；无名肿毒疮，酒送下；腰腿疼痛，合桃酒送下。

【主治】 左瘫右痪，半身不遂，惊风，手足顽麻、风痒，头风，跌打损伤，元虚畏冷，筋骨疼痛，肠风痔漏下血，遍身痒疥，寒湿气，脚气，胃伤食积，皮黄水肿，赤白痢，下部疝气，小儿肚腹膨胀，五淋，疟疾，无名肿毒疮，腰腿疼痛。

03210 龙虎饮

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 鹿茸（酒浸，酥炙） 附子（炮，去皮脐）各二两 人参（去芦） 萆薢 金钗石斛（酒浸） 杜仲（去皮，锉，姜汁制，炒去丝） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮） 木瓜 当归（去芦，酒浸） 黄耆（蜜水炙）各半两

【用法】 上㕮咀，每服三钱，水一盏半，加生姜三片，枣子一枚，煎七分，去滓，食前服。

【功用】 壮筋益血。

【主治】 虚劳脚弱。

03211 龙虎膏

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】 陈小粉一斤 土木鳖（连壳整炒）二两 川乌 草乌 干姜 白及 花椒各五钱

【用法】 上为细末，凡疮未成者，漫头敷，已成者，中留一孔；已溃烂者，敷于四周，俱以醋调炖温敷上，外用绵纸贴，干则温醋鸡毛扫上。

【主治】 一切无名痈疽大毒。

03212 龙荟丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】 龙胆草 芦荟 当归 黑山栀 广木香 黄连 黄芩 麝香

【用法】 蜜为丸服。

【主治】 肝火盛，目赤涩痛。

03213 龙砂汤

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】 缩砂仁二两一分 甘草 盐各一两半

【用法】 上将甘草同盐炒，候甘草黄熟取出，泻在缩砂上，即以盏碗盖之，候冷，同为细末。汤点二钱。

【功用】 和气。

03214 龙星丹

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】 牛胆南星 朱砂（别研为衣）各三钱 片脑（别研）三字 牛黄（开）三字 麝香（别研）三字 全蝎 防风 薄荷各一钱 黄芩 黄连各二钱 青黛（别研）一钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，噙化。

【主治】 中风风热痰涎壅盛者。

03215 龙骨丸

【方源】《医心方》卷二十一引《经心录》。

【组成】 龙骨 阿胶（炙） 赤石脂 牡蛎 干地黄 当归 甘草各二两 蒲黄三两

【用法】 上为末，为丸如梧桐子大。每服十五丸，一日三次。

【主治】 妇人崩中漏下。

03216 龙骨丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】 牡蛎（煅为粉） 熟干地黄（洗，焙） 菟丝子（酒浸一宿，别捣，焙干） 白茯苓（去皮）

各半两 龙骨（五色者） 肉桂（去粗皮） 白石脂 五味子各二钱半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒或盐汤送下。

【主治】 下虚胞寒，小便白浊，或如米泔，或若凝脂，腰重少力。

03217 龙骨汤

【方源】 方出《肘后方》卷三，名见《圣济总录》卷十四。

【异名】 茯神汤（《鸡峰》卷十一）。

【组成】 龙骨 远志 茯神 防风 牡蛎各二两 甘草七两 大枣七枚

【用法】 以水八升，煮取二升，分二次服，日日作之。

【主治】 惊忧怖迫逐，或惊恐失财，或激激愤惆怅，致志气昏越，心行违僻不得安定者。

03218 龙骨汤

【方源】 《外台》卷十五引《深师方》。

【组成】 龙骨 茯苓 桂心 远志（去心）各一两 麦门冬（去心）二两 牡蛎（熬） 甘草（炙）各三两 生姜四两

【用法】 上㕮咀。以水七升，煮取三升，分为二服。

【主治】 宿惊失志，忽忽喜忘，悲伤不乐，阳气不起者。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、醋、生葱。

03219 龙骨汤

【方源】 《圣济总录》卷十四。

【组成】 龙骨二两半 白茯苓（去黑皮） 远志（去心） 当归（切，焙干） 甘草（炙令微赤，锉） 防风（去叉） 人参各二两 桂（去粗皮）一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水二盏，加生姜三片，大枣二枚，同煎至一盏，去滓，空心、午时、夜卧各一服。

【主治】 风惊恐，恍惚多忘，神气怯弱。

03220 龙骨汤

【方源】 《圣济总录》卷九十二。

【组成】 龙骨（研）五两 人参 白茯苓（去黑皮） 甘草（炙） 牡蛎（煅） 桂（去粗皮） 熟地黄（焙）各二两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，空心、食前服。

【主治】 小便白淫及遗泄，无故自出者。

03221 龙骨散

【方源】 方出《千金》卷四，名见《圣济总录》卷十五二。

【组成】 牡蛎 伏龙肝 赤石脂 白龙骨 桂心 乌贼骨 禹余粮各等分

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，空心酒送下，一日二次。

【主治】 女人漏下，或愈或剧，常漏不止，身体羸瘦，饮食减少，或赤白或白或黄，使人无子者。

【加减】 白多者，加牡蛎、龙骨、乌贼骨；赤多者，加赤石脂、禹余粮；黄多者，加伏龙肝、桂心。

【方论选录】 《千金方衍义》：方中浑是固脱，惟桂心、乌贼散血润枯，亦是固中寓散之法。又须随所见之色而加增剂料，不必更易药味也。

03222 龙骨散

【方源】 方出《外台》卷三十三引《广济方》，名见《妇人良方》卷十三。

【组成】 当归 白龙骨 干地黄各八分 地榆 阿胶 芍药 干姜各六分 熟艾四分 牛角腮（炙令黄）十分 蒲黄五分

【用法】 上为散。每服方寸匕，空腹以饮送下，一日二次。渐加至二匕，愈止。不吐利。

【主治】 妇人因损娠，下血不止。

【宜忌】 忌生冷、油腻、猪、鱼、蒜、芜荑。

03223 龙骨散

【方源】 《圣惠》卷七十三。

【组成】 五色龙骨一两（烧灰） 乌贼鱼骨一两（炙黄） 白芍药三分 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 妇人漏下作五色，连年不愈者。

【备考】 《普济方》本方用法：以赤糙米粥饮调下。

03224 龙骨散

【方源】 方出《圣惠》卷七十八，名见《普济方》卷二五三。

【组成】 龙骨一两 麻黄根一两

【用法】 上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】 产后虚汗不止。

03225 龙骨散

【方源】 《圣惠》卷八十三。

【组成】 白龙骨 牡蛎粉 黄耆（锉） 人参（去芦头） 麻黄根 熟干地黄 甘草（炙微赤，锉）各半两 麦门冬一两（去心，焙）

【用法】 上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎

至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 小儿夜后常有盗汗，黄瘦。

03226 龙骨散

【方源】《普济方》卷二十六。

【组成】 龙骨 桑螵蛸 瓜蒌根 黄连

【用法】 上为散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】 小便数而多。

03227 龙骨散

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】 龙骨（煅） 当归 香附子（炒）各一两 棕毛灰五钱

【用法】 上为细末。每服四钱，空心米汤调下。

【主治】 妇人血崩不止。

【宜忌】 忌腻、鸡鱼、煿炙物。

03228 龙骨散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】 龙骨（煅） 枯矾少许

【用法】 掺之；油调敷亦可。

【主治】 ①《杂病源流犀烛》：脐疮。②《中医儿科学》：脐湿。

03229 龙骨散

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 龙骨三两 牡蛎三两 海螵蛸三两 黄柏十六两 雄黄三两 滑石粉一两

【用法】 直接扑上；或油调外用。

【功用】 解毒收敛。

【主治】 湿疹（湿疡），接触性皮炎（湿毒疡），脂溢性皮炎，趾间足癣（臭田螺）。

【宜忌】 化脓性陈久肉芽疮面禁用。

03230 龙香散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】 地龙（去土，炒，为末） 乳香（研）各等分

【用法】 上为末，掺在纸上，作纸捻。于灯上烧令烟出，即迎烟熏鼻，随患左右用之。

【主治】 偏头痛不可忍。

03231 龙胆丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】 龙胆 山栀子仁 白薇 茯神（去木） 大黄（锉，炒）各二两 麦门冬（去心，焙）三两 人参 甘草（炙，锉）各一两半 玄参 羚羊角（镑）各二两半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后煎大枣汤送下。

【主治】 心实热，惊悸善笑。

03232 龙胆丸

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】 龙胆（去芦头，炙） 一两 昆布（洗去咸，炙） 海藻（洗去咸，炙）各二两 马刀（研） 海蛤（研） 香草各半两 大黄（炒，锉）一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。绵裹一丸，朝暮含咽之。

【主治】 气瘤。

03233 龙胆丸

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 苦参 龙胆草 牛蒡子各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后米泔送下。

【主治】 眼两胞粘睛，赤烂成疮。

03234 龙胆汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 龙胆 黄连（去须） 木通（锉） 柴胡（去苗） 麦门冬（去心，焙） 人参各一两 陈橘皮（去白，焙） 黄芩（去黑心）各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎取七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】 胃热，善食而瘦。

03235 龙胆汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】 黄连 黄芩 栀子 当归 陈皮 胆星各一钱 龙胆草 香附各八分 玄参七分 青黛 木香各五分 干姜（炒黑）二分

【用法】 上锉一剂，生姜三片，水煎至七分，加玄明粉三分，痰盛加至五分，食后服。如作丸药，加芦荟五分、麝香二分为末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，淡姜汤送下。

【主治】 忿怒动胆火，致左耳聋者。

03236 龙胆饮

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 黄芩 犀角 木通 车前 黄连 黑参各一钱 栀子（炒黑） 大黄 芒消各一钱半 龙胆草 淡竹叶各八分 黄柏（酒炒黑）

【用法】 水煎。食后分二次热服。

【主治】 肝经湿热，目赤肿痛。

【备考】《盘珠集》有知母。

03237 龙胆散

【方源】《直指》卷二十。

【异名】 龙胆饮（《奇效良方》卷五十七）。

【组成】 龙胆草 栀子仁各二钱 防风 川芎 玄参 荆芥 山茵陈 甘菊（去萼） 楮实 甘草

各 钱

【用法】 上为末。每服一钱半，食后茶清调下。

【主治】 肝热，乌睛浮肿，赤晕昏疼。

03238 龙胆煎

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】 龙胆 黄连（去须） 黄柏（去皮，蜜炙） 升麻（去土） 苦竹叶（切） 槐白皮 大青 各一两 白蜜半合 酥半合

【用法】 上药细锉七味如麻豆大，以水三升半，煮取七合，绞去滓，纳蜜及酥，再煎五六沸。每服一匙头，含化咽津，一日五六次。

【主治】 喉中疮，并口疮。

03239 龙珠散

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】 珍珠末 冰片各等分

【用法】 敷之。

【主治】 热甚舌出不收。

03240 龙珠膏

【方源】《四圣心源》卷六。

【组成】 川椒五钱 附子五钱 乌头五钱 巴豆三钱（研去油） 桂枝五钱 茯苓八钱 牡蛎五钱 鳖甲五钱

【用法】 芝麻油、黄丹熬膏，加麝香、阿魏研细，布摊贴病块。

【主治】 奔豚已结气块，坚硬。

03241 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】 龙脑一分（细研） 雄黄一分（细研） 麝香一分（细研） 朱砂半两（细研，水飞过） 牛黄一分（细研） 乳香半两（细研） 川乌头一两（去皮脐，生用） 干蝎半两（微炒） 白僵蚕半两（微炒） 天麻一两 天南星一分（炮裂） 羌活一两 踯躅花一分（酒拌，炒干） 白附子三分（炮裂） 附子一两（去皮脐，生用） 白花蛇一两（酒浸，去皮骨，炙令微黄） 麻黄五两（去根节，捣碎，以酒五升，煎取一升，去滓，熬成膏） 安息香半两

【用法】 上为末，研入前六味令匀，用麻黄膏为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以温酒送下。

【主治】 中风，偏枯不遂，肢节疼痛，行步艰难。

【宜忌】 忌生冷、羊血、油腻、毒滑、鱼肉。

03242 龙脑丸

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】 龙脑（研） 升麻 甘草 马牙消（研） 各一分 玄明粉（研）二分 麝香（研） 石膏（碎） 大黄（锉） 黄耆（锉）各一分 生地黄二两（绞取汁）

【用法】 上药除地黄汁外，捣罗为末，以地黄汁和，如干，更入炼蜜少许，为丸如小弹子大。用绵裹，含化咽津，一日四五次，不拘时候。

【主治】 咽喉连颊颔肿，日数深远，咽津液热，发渴疼痛。

03243 龙脑丸

【方源】《续本事》卷二。

【组成】 龙脑薄荷五两 真蒲黄一两 麦门冬二两 阿胶一两 甘草一两半 人参一两 川当归一两 黄耆一两半 木通一两 生干地黄三两 柴胡半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸。病上焦，饭后用熟水吞下，微嚼破更好；病下焦，空心服。小儿加减与之。

【主治】 胸中郁热，肺热咳嗽，口臭喉腥，脾痟口甘，丈夫吐血，妇人血崩。

【备考】 方中生干地黄用量原缺，据《普济方》补。

03244 龙脑丸

【方源】《宣明论》卷四（千顷堂本）。

【异名】 当归龙荟丸（《丹溪心法》卷四）、龙荟丸（《医方类聚》卷一九七引《新效方》）。

【组成】 当归（焙） 龙胆草 大栀子 黄连 黄柏 黄芩各一两 大黄 芦荟 青黛各半两 木香一分 麝香半钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大，小儿如麻子大。每服二十丸，生姜汤送下，兼服防风通圣散。

【功用】 ①《宣明论》：常服宣通血气，调顺阴阳。②《中国药典》：泻火通便。

【主治】 肝胆实火，头痛而赤，目赤晕眩，胸胁疼痛，惊悸抽搐，甚则躁扰狂越，便秘尿赤，或肝火犯肺之咳嗽。现用于慢性粒细胞性白血病，及胆道蛔虫病。

①《宣明论》：肾水阴虚，风热蕴积，时发惊悸，筋惕搐弱，神志不宁，荣卫壅滞，头目昏眩，肌肉瞤瘛，胸高痞塞，咽嗌不利，肠胃燥涩，小便溺团，筋脉拘奇；肢体痿弱，暗风痫病；小儿急慢惊风。②《医方考》：肝移热于肺，咳嗽而两肋痛，多怒脉弦者。③《景岳全书》：肝经实火，大便秘结，小便涩滞，或胸膈作痛，阴囊肿胀。及一切躁扰狂越，惊悸不宁等证。

【宜忌】 ①《宣明论》：忌发热诸物。②《医方集解》：非实火者不可轻投。

【方论选录】 ①《医方考》：《经》曰：狂言为失志；又曰：肾藏志。如斯言之，则肾亦火矣。此一水不胜五火之谓也。故用黄连以泻心，用黄芩以泻肺，青黛、龙胆、芦荟以泻肝，大黄以泻脾，黄柏以泻肾。所以亟亟以泻五脏之火者，几于无水，故泻火以存水耳！用当归者，养五脏之阴于亢火之时；用木香、麝香者，利五脏之气于克伐之际也。咳嗽而两胁痛，多怒，脉弦者，病原于肝也。肝者将军之官，气常有余，气有余便是火，故宜泻之。是方也，芩、连、栀、柏、草龙、青黛、大黄、皆能泻火，而未必入肝；肝气臊，诸药得芦荟、麝香之臊，同气相求，可以入肝而平肝矣。然肝木为生火之本，而诸脏之火不无相扇，诸药虽因芦荟、麝香之引而入肝，然其性各有所属，则能兼五火而治之矣。用当归为君者，以其能和五脏之阴，以木香为佐者，以其能行诸药之滞也。②《医方集解》：此足厥阴、手足少阳药也。肝木为生火之本，肝火盛则诸经之火相因而起，为病不止一端矣。故以龙胆、青黛直入本经而折之；而以大黄、芩、连、栀、柏通平上下三焦之火也。芦荟大苦大寒，气臊入肝，能引诸药同入厥阴，先平其甚者，而诸经之火无不渐平矣。诸药苦寒已甚，当归辛温，能入厥阴，和血而补阴，故以为君。少加木香、麝香者，取其行气通窍也。

【临证举例】 ①慢性粒细胞型白血病 《四川中草药通讯》(1972；3:25)：报告以本方治疗慢性粒细胞型白血病31例，其中20例既往未曾用过化疗，其余11例为化疗后复发病例。治疗结果：缓解者17例，进步8例；无效6例。多数患者服药后至开始发挥疗效的时间约需1个月。17例缓解病例缓解期为1个月～1年以上，平均5.6月。作者认为本病当属实证，实则泻之，故用泻肝法。本方常见副作用为腹痛、腹泻、恶心，但无一例发生血小板下降及骨髓抑制。②癫狂 《中医教育》(1977；4:51)：以本方改为汤剂，并用石菖蒲代替方中麝香，治疗狂症四例。其中男性2例，女性2例。结果均获治愈。作者指出：本方治实证之狂病有釜底抽薪之妙，见效甚捷，但方中均为峻猛寒药，非实热者不可妄用。临床当以脉象洪实、舌红、苔黄、大便秘结为应用指征。③胆道蛔虫病《浙江中医杂志》(1965；7:20)：以本方加牙皂二钱，改为汤剂煎服（其中麝香半分另调服）。治疗胆道蛔虫病15例，结果全部治愈。追踪观察3～8个月，无1例复发。作者认为本方具有清热燥湿，通关利窍，行气止痛，利胆杀虫，并具有促进虫体排出之作用。

【备考】 本方方名，原书（四库本）作"当归龙胆丸"。

03245 龙脑散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】 龙脑一分 石膏二两（细研，水飞） 滑石半两 朱砂一分 硼砂一分

【用法】 上为细散。每服半钱，不拘时候，以新汲水调下。绵裹含咽津亦得。

【主治】 咽喉闭塞疼痛。

03246 龙脑散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】 龙脑（研） 马牙消各半钱 绿豆粉一钱

【用法】 上为极细末。用灯心粘药点眼，一日四五次。

【主治】 睛漏疮，目大眦出脓汁，有窍。

03247 龙脑散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 硼砂 脑子 朱砂各一分 滑石（细末）半两 石膏（水飞）二两 甘草（生取末，炒）半钱

【用法】 上为细末。每服半钱，用新汲水调下；或干掺，咽津亦得。

【主治】 咽喉肿痛。因风热在于脾肺，邪毒壅滞，胸膈不利，故发疼痛及急喉痹，闭塞肿痛，粥饮难咽。

03248 龙脑膏

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】 龙脑半分（细研） 马牙消一分（细研）

【用法】 以羊胆一枚，纳入龙脑等，浸二复时，于瓷盒内摘破，研匀成膏。点眼，每日三次。

【主治】 风毒攻眼，昏暗赤热肿痛。

03249 龙脑膏

【方源】《医部全录》卷一六二引《局方》。

【组成】 缩砂五粒 薄荷叶一斤 甘草三两 防风 川芎 桔梗各二两 焰消一两 片脑一钱 白豆蔻三十粒

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。噙化咽下。

【主治】 喉痹肿痛。

03250 龙脑膏

【方源】《卫生宝鉴》卷十

【组成】 龙脑一钱二分（研） 椒目半两 杏仁二钱半（浸，去皮尖双仁）

【用法】 上为末，研杏仁膏，和如枣核大。绵裹塞耳中，一日换二次。

【主治】 卒聋。

03251 龙眼汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】 龙眼 丹参 人参 远志 麦冬 茯神 黄耆 甘草 升麻 柴胡

【主治】 健忘，上虚下盛者。

03252 龙蛇散

【方源】《元戎》卷十。

【组成】 白花蛇（去骨，焙） 乌梢蛇（去骨，炒） 草薢 天麻 金毛狗脊 自然铜 黄耆 骨碎补 枫香（研） 地龙（去土） 草乌头（盐水浸）各一两 乳香 没药各三钱 麝香二钱

【用法】 上为细末，酒调送下。亦可酒糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后酒送下，名龙蛇丸。

【主治】 风虚顽麻，遍身白癜紫癜，风瘾痒痛者。

03253 龙尾神针

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 麝香 肉桂 乳香（炙） 没药（炙） 朱砂 雄黄 白蒺藜 川乌 草乌 川芎 良姜 苍术 独活 威灵仙 白芷 天麻 羌活 细辛 藁本 白花蛇各等分

【用法】 上为末。将纸一张，艾绒铺遍，将药铺艾上，卷紧如管大，外用乌金纸贴好，以火燃着，隔布熨于患处。

【主治】 寒湿气痛。

03254 龙骨饼子

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】 龙骨 乌贼鱼骨（去甲）各等分

【用法】 上为末。每服一钱匕，加鸡子清一枚，用白面同和，捏作饼子三枚，煨火内煨熟，空心食前细嚼，用温米饮送下。

【主治】 脏毒，便血不止。

03255 龙胆饮子

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 龙脑饮子（《卫生宝鉴》卷十）、升麻龙胆草饮子（《原机启微》卷下）、消翳散（《医学纲目》卷十三）。

【组成】 谷精草 川郁金 蛇退皮 炙甘草各五分 麻黄一钱五分 升麻二钱 青蛤粉 草龙胆 黄芩（炒） 羌活各三钱

【用法】 上为细末。每服二钱，食后温茶清调下。

【主治】 湿热为病，疳眼流脓，生疳翳。

【备考】 方中蛇退皮，《医学纲目》作“蝉退”。

03256 龙胆草丸

【方源】《直指小儿》卷三。

【异名】 龙胆丸（《局方》卷十续添诸局经验秘方）。

【组成】 龙胆草 黄连 使君子肉 青皮等分

【用法】 上为末，猪胆汁为丸，如麻子大。每服十丸，食后熟水送下。

【主治】 疳热。

03257 龙脑饮子

【方源】《局方》卷六。

【组成】 缩砂仁 瓜蒌根各三两 藿香叶二两四钱 石膏四两 甘草（蜜炒）十六两 大栀子仁（微炒）十二两

【用法】 上为末。每服一钱至二钱，用新水入蜜调下。又治伤寒余毒，潮热虚汗，用药二钱，水一盏，加竹叶五六片，煎至七分，食后温服。

【主治】 大人、小儿蕴积邪热，咽喉肿痛，赤眼口疮，心烦鼻衄，咽干多渴，睡卧不宁，及痰热咳嗽，中暑烦躁，一切风壅。或伤寒余毒，潮热虚汗。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典》引作“龙脑饮”。

03258 龙眼肉粥

【方源】《药粥疗法》引《老老恒言》。

【组成】 龙眼肉 15 克 红枣 3～5 枚 粳米二两

【用法】 一同煮粥，如爱好食甜病者，可加白糖少许。

【功用】 养心安神，健脾补血。

【主治】 心血不足之心悸、心慌、失眠、健忘、贫血，脾虚腹泻，浮肿，体质虚羸，以及神经衰弱，自汗盗汗。

【宜忌】 龙眼粥每次用量不宜过大，根据各人食量，每天早晚可各服一二饭碗，并须热服，量过了会引起中满气壅。凡风寒感冒，恶寒发热，或舌苔厚腻者忌用。

03259 龙马自来丹

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】 马钱子八两 地龙八条（去土，焙干为末） 香油一斤。

【用法】 将香油入锅内熬滚，入马钱子炸之，待

马钱子微有响爆之声，拿一个用刀切两半，看其内以紫红色为度，研为细末；再入前地龙末和匀，面糊为丸，如绿豆大。每服二四分，临卧以盐水送下。若五六岁小儿，服二分，红糖水送下。如不为丸，面子亦可服。治痫症，每晚先服黄耆赤风汤一服，临卧服丸药一服，吃一月后，不必服汤药，净吃丸药，久而自愈，愈后将丸药再吃一二年。

【主治】 痫证。

【加减】 如吃斋人，去地龙亦可。

03260 龙牡复脉汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 吉林参一钱 陈阿胶一钱半 鸡子黄一枚（包煎） 生龟版 生牡蛎各八钱 花龙骨二钱 生鳖甲四钱 真玳瑁一钱半 生白芍三钱 麦冬三钱 大生地四钱 炙甘草一钱半 大坎炁一条（酒洗）

【用法】 水两碗，煎至半碗服。若痰塞喉间，欲吐无力，药不能下者，用真猴枣末四分煎鲜石菖蒲汤先服。

【功用】 固扶元气，敛阴益液，摄纳真阴，镇潜虚阳。

【主治】 阴虚人，病伤寒温热，误用刚燥汗下药过量，缠绵日久，以致真阴虚极于下，致无根之火仓猝飞腾，气壅痰升，上蒙清窍，忽然痉厥，舌红短，面青，目合口开，手不握固，音嘶气促，甚则冷汗淋漓，手足逆冷，二便自遗，气息俱微，脉沉伏不见，或微弱无神，或不应指者。

【加减】 若肢冷脉伏，自汗头汗，汗出如油者，则阴亡而阳亦随亡，吉林参易别直参二钱，加淡附片一钱半。

03261 龙牡蒐韭丸

【方源】 方出《种福堂方》卷二，名见《医学实在易》卷七。

【组成】 生龙骨（水飞） 生牡蛎（水飞） 生蒐丝粉 生韭菜子粉各等分

【用法】 不见火，研末，生干面、冷水调浆为丸。每服一钱，或至三钱，晚上陈酒下，清晨服亦可。

【主治】 色欲过度，精浊白浊，小水长而不痛者，并治妇人虚寒，淋、带、崩漏。

03262 龙齿壮胆汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】 人参 竹茹各三钱 五味子 远志各一钱 生枣仁一两 白芍八钱 当归五钱 龙齿（醋淬，研末）五分

【用法】 水煎调服。二剂即安。

【主治】 胆气怯弱，怔仲，心常怦怦不安，常若有官事未了，人欲来捕之状。

03263 龙齿安神丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】 人参 麦冬各一两 黄连二钱 柏子仁三钱 龙齿（火煅，醋淬，为末） 一钱 炒枣仁三钱 甘草五分 北五味子一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 用心太过，思虑终宵，以至精神恍惚，语言倦怠，忽忽若有所失，腰脚沉重，肢体困惫。

03264 龙齿补心汤

【方源】《直指》卷十。

【组成】 龙齿（煅，别研） 人参 当归（酒浸一宿，焙） 熟地黄（洗，焙） 北梗（焙） 酸枣仁（炒） 白茯苓 白茯神（去木） 远志（水浸，取肉，晒，姜汁淹，焙） 枳壳（去瓤，麸炒） 麦门冬（去心） 半夏曲 白术 甘草（炙）各半两 肉桂二钱半 绵黄耆七钱半（蜜炙）

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜五片，粳米一小撮，同煎，不时服，临卧服。

【主治】 诸虚不足，虚热潮来，心神惊惕，睡卧不安，小便浊涩。

03265 龙齿清魂散

【方源】《女科万金方》。

【异名】 龙牙清魂散（《一盘珠》卷七）。

【组成】 龙齿 远志 官桂 人参 当归 茯苓 细辛 门冬 甘草 玄胡

【用法】 加生姜五片，大枣三枚，入金银器内煎百沸汤，加麝香一匙，不拘时候服。

【主治】 妇人败血冲心，或歌舞、谈笑、怒骂，坐卧苦者，逾垣上屋，口咬打拳，神名佛号，无有不能，似祸祟之状。

03266 龙齿镇心丹

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】 龙齿（水飞） 远志（去心，炒） 天门冬（去心） 熟地黄 山药各六两（炒） 茯神 麦门冬（去心） 车前子（炒） 白茯苓 桂心 地骨皮 五味子各五两

【用法】 上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心温酒、米汤任下。

【功用】《普济方》：益精髓，养血气，明视听，悦色驻颜。

【主治】 心肾气不足，惊悸健忘，梦寐不安，遗精，面少色，足胫酸疼。

03267 龙虎交加散

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】 南木香（锉碎，用纸垫锅，焙干，研为细末） 罂粟壳（去顶瓤筋，锉，焙干，为细末） 甘草（用湿纸裹煨，焙干，为细末） 吴白芷（面裹煨，去面，焙干，为细末） 川芎（湿纸裹煨，焙干，为细末）

【用法】 上为末，各另包收。看疮加减用之：若疮势红肿热大，先服如神托里散一帖，卧盖取微汗；如红晕大，肿高，疮头有似碎米大白脓点者，可进交加散一帖，用木香四分、罂粟壳二钱二分、甘草六分、白芷一钱四分、川芎一钱半，共为一帖，用水七分，生白酒三分，共一碗，用银器煎八分，如无银器，新瓷器亦好，不用铜铁旧器，于炭火边先滚五七滚，用细绢将水湿扭干，滤去滓，食后服，以干盐菜压之，滓敷疮，四围用裹绢帕包之；如恶心呕吐，即服护心散一帖止呕，次服前药；若胸腹膨满，或大小便闭涩，可服当归连翘散一帖，行五七次，用温米粥汤补止；如疮已成，溃脓不寒不热，止是烂开疼痛，木香三分、甘草六钱、川芎一钱半、白芷一钱四分、粟壳二钱，水五分，酒五分，合煎八分服；如红晕不退，每日于晚进药一帖，吃交加散四五帖，可服当归连翘散一帖，要行，加大黄，只有热，腹不胀，不用大黄；如疮患要将好，腐肉不脱，可用针刺破皮，令随脓出，将水红花根煎汤洗之，用生肌散掺上，每日洗一次。

【主治】 发背，痈疽，发脑，发鬓，发髭；又治脑虚头晕，风湿之症。

【宜忌】 忌酸辣、酱面、发气并生冷之物。

03268 龙虎寿生丹

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】 全蝎（去毒，炒）十四个 天麻（煨）二钱 僵蚕（去嘴，炒） 辰砂（水飞） 胆南星 白附子（炮） 白花蛇肉（酒浸，去骨）各一钱 防风二钱 代赭石（醋煅七次） 铁华粉各半钱 龙脑一字 麝香一字

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如芡实大，金箔为衣。用薄荷煎汤研化，不拘时候服。

【主治】 小儿急慢惊风。

03269 龙虎济阴丹

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 黄柏半斤 知母三两 龟版四两 熟地 陈皮 白芍各二两 锁阳一两半 虎骨一两 龙骨五钱

【用法】 上为末，蜜和猪脊髓为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心盐汤送下，干物压之。

【主治】 遗精。

【加减】 冬，加干姜五钱。

03270 龙骨远志丸

【方源】《金鉴》卷四十一。

【组成】 龙骨 朱砂 远志 茯神 茯苓 石菖蒲 人参

【主治】 心肾虚弱，不梦而遗。

【备考】《医学集成》本方用法：蜜为丸，朱砂为衣。

03271 龙胆芦荟丸

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 芦荟 胡黄连（炒） 龙胆草各一两 川芎 芜荑各六钱 当归身 白芍药各一两半 木香八钱 甘草（炙）五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。每服匀作十丸，用白滚汤化下。

【主治】 三焦及肝胆二经积染风热，以致目生云翳，或结瘰疬，耳内生疮，发寒作痛，或虚火内烧，肌体羸瘦，发热作渴，饮食少进，肚腹不调，皮干，腹膨胀，口内有疮，牙龈溃烂，或牙齿蚀落，腮颊腐烂，下部生疮者。

【方论选录】 是方以白芍药和血补脾胃，当归养血脉为君；芦荟去疳清热，胡黄连疗骨蒸劳热为臣；龙胆草治诸目疾，芜荑杀疳虫，逐五内邪气，川芎提清气上升为佐；木香调气，甘草和诸药为使。

03272 龙胆苦参丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】 龙胆草一两 苦参三两

【用法】 牛胆汁为丸，如梧桐子大。每服五丸，食前以生大麦苗汁，或麦饮送下，一日三次，不减稍增。

【主治】 谷疸，劳疸。

【加减】 劳疸，加龙胆一两，山栀子三七枚。

03273 龙胆泻肝丸

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】 龙胆草二两 柴胡四钱 当归八钱 泽泻八钱 木通六钱 蝉蜕三钱 车前子五钱 栀子七钱 黄芩七钱 生地一两 甘草四钱

【用法】 水为丸。每服三钱。

【主治】 蟹睛症（虹膜凸出）、鱼子石榴症（滤泡性结膜炎）。

03274 龙胆泻肝汤

【方源】《医方集解》引《局方》。

【异名】 泻肝汤(《类证治裁》卷四)。

【组成】 龙胆草（酒炒） 黄芩（炒） 栀子（酒炒） 泽泻 木通 车前子 当归（酒洗） 生地黄（酒炒） 柴胡 甘草（生用）

【功用】《方剂学》：泻肝胆实火，清下焦湿热。

【主治】 肝胆火盛之胁痛，口苦目赤，耳肿耳聋；肝胆湿热下注之阴肿阴痒，小便淋浊，尿血，带下等。

①《医方集解》引《局方》：肝胆经实火、湿热，胁痛耳聋，胆溢口苦，筋痿阴汗，阴肿阴痛，白浊溲血。②《疡科心得集》：鱼口下疳，囊痈。③《中风斠诠》：阴湿热痒，疮疡，溲血，脉弦劲者。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足厥阴、少阳药也。龙胆泻厥阴之热，柴胡平少阳之热，黄芩、栀子清肺与三焦之热以佐之，泽泻泻肾经之湿，木通、车前泻小肠、膀胱之湿以佐之，然皆苦寒下泻之药，故用归、地以养血而补肝，用甘草以缓中而不伤肠胃，为臣使也。②《重订通俗伤寒论》：肝为风木之脏，内寄胆府相火，凡肝气有余，发生胆火者，症多口苦胁痛，耳聋耳肿，阴湿阴痒，尿血赤淋，甚则筋痿阴痛。故以胆、通、栀、芩纯苦泻肝为君；然火旺者阴必虚，故又臣以鲜地、生甘，甘凉润燥，救肝阴以缓肝急；妙在佐以柴胡轻清疏气，归须辛润舒络；使以泽泻、车前咸润达下，引肝胆实火从小便而去。此为凉肝泻火，导赤救阴之良方。然惟肝胆实火炽盛，阴液未涸，脉弦数，舌紫赤，苔黄腻者，始为恰合。③《金鉴》：胁痛口苦，耳聋耳肿，乃胆经之为病也；筋痿阴湿，热痒阴肿，白浊溲血，乃肝经之为病也。故用龙胆草泻肝胆之火，以柴胡为肝使，以甘草缓肝急，佐以芩、栀、通、泽、车前辈大利前阴，使诸湿热有所从出也。然皆泻肝之品，若使病尽去，恐肝亦伤矣，故又加当归、生地补血以养肝。盖肝为藏血之脏，补血即所以补肝也。而妙在泻肝之剂，反作补肝之药，寓有战胜抚绥之义矣。④《成方便读》：夫相火寄于肝胆，其性易动，动则猖狂莫制，挟身中素有之湿浊，扰攘下焦，则为种种诸证。或其人肝阴不足，相火素强，正值六淫湿火司令之时，内外相引，其气并居，则肝胆所过之经界，所主之筋脉，亦皆为患矣。故以龙胆草大苦大寒，大泻肝胆之湿火；肝胆属木，木喜条达，邪火抑郁，则木不舒，故以柴胡疏肝胆之气，更以黄芩清上，山栀导下，佐之以木通、车前、泽泻，引邪热从小肠、膀胱而出；古人治病，泻邪必兼顾正，否则邪去正伤，恐犯药过病所之弊，故以归、地养肝血，甘草缓中气，且协和各药，使苦寒之性不伤胃气耳。⑤《谦斋医学讲稿》：本方以龙胆为君，配合黄芩、山栀泻肝胆实火；木通、车前、泽泻清热利湿，用生地、当归防其火盛伤阴，再用甘草和中解毒，柴胡引经疏气，总的功能是苦寒直折，泻肝火而清利下焦湿热。故治胁痛、口苦、目赤、耳聋等肝火上逆，亦治小便淋沥，阴肿阴痒等湿热下注之证。

【临证举例】 ①腿缝肿痛 《得心集医案》：胡墉生，初起寒热交作，次日右胯腿缝肿胀，状如腰子，痛闷难忍，自疑痈毒，延外科治。疡医云：外须用药烂开，内服解毒之剂。墉生母子惶惑，不敢用伊敷药，惟服其败毒之方，是夜彻痛非常。次早邀视，余晓以横痃之疾，乃酒醉入房，忍精不泄之因，以致精血凝结，挟有肝经郁火而成，决非毒也。授以龙胆泻肝汤，加山甲、桃仁、肉桂，连服数剂乃消。此症若淹缠日久，用药外敷，不为解散，内结必成鱼口便毒矣。②肝炎 《新医药学杂志》(1978；10:529)：用本方去当归、生地，加田基黄为基本方加减，治疗32例肝炎病，临床治愈27例，显效4例，无效1例。其中31例有效病例经3个月～6年的随访，27例已正常工作，4例因过劳或感冒复发。加减法：胁痛甚加川楝子、元胡，腹胀加枳壳、陈皮、川朴、佛手，呕逆加法夏、陈皮、竹茹、藿香，腹泻加白术、茯苓、湿重于热者加蔻仁、草果、藿香、茵陈、滑石、苡仁，有血瘀症者加丹参、红花、桃仁等。每日一剂，水煎分二次服，1个月为一疗程。③多囊卵巢综合征《上海中医药杂志》(1982；12:16)：以本方治疗20例，8例基本痊愈，12例好转。处方：龙胆草6～9克，炒黄芩9克，焦山栀9克，泽泻9克，木通3克，车前子9克，当归9克，柴胡6克，生甘草1.5～3克，生地黄6～12克，每日一帖。或用龙胆泻肝丸，每日9克，分二次吞服。大便秘结加大黄、芒消，或改用当归龙荟丸，经期停服，连续治疗三个月以上。④脂溢性皮炎 《中医杂志》(1985；4:266)：以本方治疗50例，治愈10例，显效21例，有效10例，无效9例，总有效率82%。加减法：红斑较盛者加防风、荆芥，继发感染加银花、菊花，痒剧加苦参、白鲜皮，皮损局限于下半身加牛膝、黄柏。每日1剂，3剂为一疗程，有效病例共服药1～4个疗程。有效患者经1年余随访，治愈者无一例复发，显效者未见皮损加重情况。

【现代研究】《中成药研究》(1984；2:21)：龙

胆泻肝汤能增加幼鼠胸腺重量，产生不同类型的T细胞，从而释放巨噬细胞活化因子，并使巨噬细胞吞噬功能显著加强，致使激活的巨噬细胞又可释放淋巴激活因子，刺激淋巴细胞转化后调节抗体产生，这样有利于疾病的治愈。

【备考】 本方改为丸剂，名“龙胆泻肝丸”（见《北京市中药成方选集》）。

03275 龙胆泻肝汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 七味龙胆泻肝汤（《景岳全书》卷五十七）、龙胆汤（《幼幼集成》卷四）。

【组成】 柴胡梢 泽泻各一钱 车前子 木通各五分 生地黄 当归梢 草龙胆各三分

【用法】 上锉，如麻豆大，都作一服。用水三盏，煎至一盏，去滓，空心稍热服，便以美膳压之。

【主治】 肝经湿热，阴痒肿痛，小便赤涩，遗精白浊。

①《兰室秘藏》：阴部时复热痒及臊臭。②《景岳全书》：肝火内炙，上为喉口热疮，下为小便涩痛者。③《济阳纲目》：阴囊肿痛，或溃烂作痛，或睾丸悬挂，及一切湿痒臊臭者。④《医碥》：肝经湿热，甚者茎中作痛，或挺纵不收，白物如精，随尿而下，此筋疝也。

【方论选录】 此药柴胡入肝为引；用泽泻、车前子、木通淡渗之味利小便，亦除臊气，是病在下者，引而竭之；生地黄、草龙胆之苦寒泻酒湿热，更兼车前子之类以撤肝中邪气；肝主血，用当归以滋肝中血不足也。

03276 龙胆泻肝汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十二。

【异名】 龙胆汤（《奇效良方》卷六十）、龙胆清肝汤（《明医杂著》卷六）、龙胆草汤（《证治宝鉴》卷十）。

【组成】 黄芩七分 柴胡一钱 甘草（生） 人参 天门冬 黄连 知母 龙胆草 山栀子 麦门冬各五分 五味子十个

【用法】 上㕮咀，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，空腹温服。

【主治】 肝经湿热，口苦生疮，筋痿爪枯，小便赤涩。

①《卫生宝鉴》：因怒或热盛，胆汁上溢，口苦，名曰胆瘅。②《明医杂著》：肝经湿热，小便赤涩，或寒热，胁胀，痰咳等，凡肝经有余之症。③《医方考》：肝气热，色青爪枯口苦，筋膜干而挛急者，名曰筋痿。

【宜忌】 忌辛热物。

【方论选录】《医方考》：肝主谋虑，胆主决断，谋虑则火起于肝，不决则火起于胆。柴胡性温味苦而气薄，故入厥阴、少阳；黄芩、黄连、龙胆草、山栀子得柴胡以君之，则入肝胆而平之矣；制肝者惟金，故用天、麦门冬、五味、知母以益肺；畏肝者惟土，故用人参、甘草以益脾。肝者，东方木也；色青者，肝病而色自见也；肝主筋，爪者筋之余，肝热故令爪枯也；口苦者，胆为肝之府，咽为之使，胆热则汁上溢于咽，故令口苦也；肝主筋膜，筋膜干则燥而挛急，挛急则手足不用，故曰筋痿。是方也，黄芩、黄连、山栀、胆草，皆足以泻肝火；君之以柴胡，则能条达乎肝胆矣；木盛而兼燥金之化，故令挛急，天麦门冬、知母、五味，味厚而润者也，故足以养筋而润燥；若生甘草、人参者，所以养乎阳气也，《经》曰：阳气者，精则养神，柔则养筋，是故用之。

03277 龙胆泻肝汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 龙胆草 连翘 生地黄 泽泻各一钱 车前子 木通 归尾 山栀 甘草 黄连 黄芩各五分

【用法】 水二钟，煎八分，食前服。

【主治】 ①《外科正宗》：肝经湿热，玉茎患疮，或便毒、悬痈，小便赤涩，或久溃烂不愈；又治阴囊肿痛，红热甚者。②《金鉴》：肝心二经风火，缠腰火丹，色红赤，形如云片，上起风粟，作痒发热。

【加减】 便秘，加大黄二钱。

03278 龙胆泻肝汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】 龙胆草 柴胡 黄芩 川黄连 麦门冬 陈胆星 知母 甘草 真青黛 山栀

【主治】 肝胆有火，目不能合；胆涎沃心，目不得瞑。

03279 龙胆泻肝汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 龙胆草 归尾各二钱 银花 花粉 连翘 黄芩各一钱半 丹皮 防风 木通 知母 甘草各一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 马培之注：泻肝火，解毒。

【主治】 ①《外科全生集》：牙痈。②《外科证治全书》：肝经湿热，小便赤涩，或囊痈下疳，便

毒杨梅。

03280 龙胆泻肝汤

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】 龙胆草一钱 软柴胡五分 小青皮一钱半（炒） 怀生地五钱 车前子三钱（炒） 全当归二钱 黑山栀一钱半（炒） 鲜生姜一片

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 肝胆火逆，面肿连颐，脉数者。

【方论选录】 恼怒伤肝，肝胆火逆，而湿热不消，循经彻络，故面肿漫连两颐焉。生地滋阴以降胆火，胆草直折以平肝火，青皮破气平逆，柴胡泄热疏肝，山栀降屈曲之火，车前子利湿热之气，当归活血养肝，生姜散郁退肿焉。水煎温服，使火降气平，则湿热自化，而面肿连颐无不退矣。此清热利水之剂，为肝胆火逆颐肿之专方。

03281 龙胆泻肝汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】 龙胆草（酒炒） 天冬 麦冬 甘草 黄连各一钱 黄芩一钱半 柴胡一钱半 山栀 知母各一钱 五味三分

【用法】 水煎，热服。

【主治】 肝经湿热阴挺；肾本不虚，而肝经湿热，火旺筋缩，茎中或痛或痒，或挺纵不收，白物如精，随尿而下者，此筋疝也。

03282 龙胆草擦剂

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 胆草十斤

【用法】 水煎，第一次加水 20 升，开锅后煮 1 小时；第二次加水 10 升，开锅后煮 40 分钟。两次药液合并，过滤，浓缩为 9600 毫升，装瓶。涂于患处。

【功用】 清热解毒，止痒止痛。

【主治】 急性亚急性湿疹，过敏性皮炎，日光性皮炎，小儿痱子，丘疹性荨麻疹，急性荨麻疹，毛囊炎等。

03283 龙莲芡实丸

【方源】 方出《种福堂方》卷二，名见《医学实在易》卷七。

【组成】 龙骨 莲须 芡实 乌梅肉各等分

【用法】 上为末，用山药为丸，如小豆大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】 精气虚，滑遗不禁。

03284 龙蛭理痰汤

【方源】《衷中参西录》上册。

【组成】 清半夏四钱 生龙骨六钱（捣细） 生牡蛎六钱（捣细） 生赭石三钱（轧细） 朴消二钱 黑芝麻三钱（炒，捣） 柏子仁三钱（炒，捣） 生杭芍三钱 陈皮二钱 茯苓二钱

【主治】 因思虑生痰，因痰生热，神志不宁。

【方论选录】 此方，即理痰汤以龙骨、牡蛎代芡实，又加赭石、朴消也。其所以如此加减者，因此方所主之痰，乃虚而兼实之痰。实痰宜开，礞石滚痰丸之用消、黄者是也；虚痰宜补，肾虚泛作痰，当用肾气丸以逐之者是也。至虚而兼实之痰，则必一药之中，能开痰亦能补虚，其药乃为对证，若此方之龙骨、牡蛎是也。盖人之心肾，原相助为理。肾虚则水精不能上输以镇心，而心易生热，是由肾而病及心也；心因思虑过度生热，必暗吸肾之真阴以自救，则肾易亏耗，是由心而病及肾也。于是心肾交病，思虑愈多，热炽液凝，痰涎壅滞矣。惟龙骨、牡蛎能宁心固肾，安神清热，而二药并用，陈修园又称为治痰之神品，诚为见到之言，故方中用之以代芡实，而犹恐痰涎过盛，消之不能尽消，故又加赭石、朴消以引之下行也。

03285 龙脑天麻煎

【方源】《局方》卷一。

【组成】 甜瓜子（汤洗令净） 浮萍草（拣，洗净） 川乌（炮，去皮脐） 地榆（去苗，刮削令净） 黑参（洗净，焙）各五十两 天麻（去苗）一百两（上六味为细末，用雪水、白沙蜜各一十五斤零一十两同化开，用绢袋子滤过，银、石器内慢火熬成稠膏） 生龙脑（研）八两 麝香（研）四两

【用法】 上为细末，除龙、麝外，用天麻乌头膏和搜令匀，放冷，入龙、麝再搜令匀，入臼内捣，搓为挺子。每服一皂荚子大，与薄荷同嚼，茶、酒任下，不拘时候。治瘫缓风，并服见效；如破伤风，黑豆淋酒送下；要发汗，用煨葱、热酒并服三服，常服亦得。

【主治】 一切风及瘫缓风，半身不随，口眼㖞斜，语涩涎盛，精神昏愦；或筋脉拘挛，遍身麻痹，百节疼痛，手足颤掉；及肾脏风毒上攻，头面虚肿，耳鸣重听，鼻塞口干，痰涎不利，下注腰腿，脚膝缓弱，肿痛生疮，又治妇人血风攻注，身体疼痛，面浮肌瘦，口苦舌干，头旋目眩，昏睡多睡；或皮肤瘙痒，瘾疹生疮；暗风、夹脑风、偏正头痛。

03286 龙脑鸡苏丸

【方源】《元戎》卷五。

【组成】 鸡苏叶（龙脑薄荷是也） 黄耆二两

麦门冬（去心）四两　甘草一两半　黄连一两　干地黄六两（为末）　人参二两　木通二两　新蒲黄二两　阿胶（炒焦）二两　柴胡（银州鼠尾红色者）二两（锉，同木通沸汤半升，浸一日夜，绞取汁）

【用法】 上为细末，用西路好蜜二斤余，先炼一二沸，然后下生地黄末，不住手搅，时时入绞下者木通、柴胡汁，慢火熬成膏，勿令火紧，焦了；然后将余药末为丸，如豌豆大。每服二十丸，白汤送下。虚劳烦热，栀子汤送下；肺热，黄芩汤送下；心热悸动恍惚，人参汤送下；唾咯衄血，去心麦门冬汤送下；脾胃热，赤芍药、生甘草汤送下；肝热，防风汤送下；肾热，黄柏汤送下。以上诸证，并食后、临卧服。治五淋及妇人血崩漏下，车前子汤送下；茎中痛，蒲黄、滑石各一钱，温水调下；室女虚劳，寒热潮作，煎柴胡、人参汤送下；痰嗽者，生姜汤送下；气逆者，橘皮汤送下。

【功用】 除劳解热，下气散郁，清神爽气，润肺开心，益志滋肝，补肾，令人身强体轻，耳目聪明，利膈，化热痰，去膀胱中积热。

【主治】 肺热咳血，心热惊悸，脾胃热口甘吐血，肝胆热气出口苦，肾热神志不定，上而酒毒、膈热、消渴，下而血痢、五淋、血崩。

【备考】《兰台轨范》有黄芩，无黄耆。

03287　龙鲤宣痹丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 干地龙（酒炒）一两　蜣螂　全蝎　川甲（俱用酒炒）各五钱　露蜂房（炒）　制川乌各三钱　明乳香二钱　麝香三分

【用法】 用酒煮黑大豆汁泛为丸。每服一钱，陈酒送下。

【主治】 周痹。

03288　龙胆羚羊角汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】 龙胆草三钱　黄芩二钱　干地黄三钱　羚羊角（磨汁冲服）一钱　茯神三钱　丹参一钱　前仁二钱

【用法】 水煎，微温服。

【功用】 清热平肝，养血息风。

【主治】 子痫偏于风热者，未发之前，头痛甚剧，面色发红，头昏眼花，脘腹疼痛，大便秘结，或有呕吐；病发后抽搐神昏，舌质红，脉弦滑而数。

【加减】 痰涎壅盛，加竹沥三十滴，亦可加天竺黄二钱。

03289　戊己丸

【方源】《续本事》卷一。

【组成】 茴香三两（拣净）　甘草一两（炙）　胡椒五两（拣净）　人参一两　白术二两　朱砂半两　白茯苓三两　香附子半两

【用法】 上为细末，生姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心白汤送下，一日二次。

【功用】《续本事》：护脾开胃，进饮食，长肌肉，生气血，化精益髓，全胃气，丹田不竭，肾经不虚。

【主治】 ①《续本事》：丈夫、妇人禀赋怯弱，饮食无味，气血衰败，肌肉不生，项背拘紧，腰脚无力，胸膈膨胀，多睡少寤，终日昏蒙，夜多异梦，及积年脾蛊时下，恶心嗳酸吐水，小儿吐乳，大人翻胃。②《济阴纲目》：新婚男子女人，素禀虚寒滑泄。

03290　戊己丸

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】 真吴茱萸（川中者，汤洗三两次）　黄连（去须，好酒浸）各等分

【用法】 米糊为丸。每次三十丸，空心服。赤痢，当归、黄连、甘草汤送下；白痢，茱萸、生姜汤送下。

【主治】 赤白痢。

03291　戊己汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【异名】 黄连戊己汤（原书卷四）。

【组成】 白芍药　甘草　川黄连

【用法】 煎汤服。

【功用】 清肝脾血分之火。

【主治】 脾家有热，不能分清降浊，水液偏渗大肠，泄泻不止，水谷不分，腹中漉漉有声，或痛或不痛，小水全无，及脾热身肿者。

【备考】 方中药物用量原缺，黄连戊己汤用川连一钱，白芍药五钱，甘草一钱。

03292　可保立苏汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】 黄耆一两五钱（生）　党参三钱　白术二钱　甘草二钱　当归二钱　白芍二钱　枣仁三钱（炒）　山萸一钱　枸杞子二钱　故纸一钱　核桃一个（连皮打碎）

【用法】 水煎服。

【主治】 小儿因伤寒、瘟疫，或痘疹、吐泻等症，病久气虚，四肢抽搐，项背后反，两目天吊，口流涎沫，昏沉不省人事。

【备考】 此方分两，指四岁小儿而言。若两岁，分两可以减半；若一岁，分两可用三分之一；若两三个月，分两可用四分之一，又不必拘于付数。

03293 归元散

【方源】《回春》卷四。

【组成】 人参（去芦） 白术（去芦） 茯苓（去皮） 远志（去心） 酸枣仁（炒） 麦门冬（去心） 黄柏（童便炒） 知母（童便炒） 芡实 莲花须 枸杞子 陈皮 川芎各等分 升麻减半 甘草减半

【用法】 上锉一剂。加莲肉三个，枣子一枚，水煎，空心服。

【功用】 升提肾气以归原。

【主治】 梦遗日久，气下陷者。

03294 归气饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 熟地三五钱 茯苓二钱 扁豆二钱 干姜（炮） 丁香 陈皮各一钱 藿香一钱五分 炙甘草八分

【用法】 水一钟半，煎七分，食远温服。

【主治】 气逆不顺，呃逆呕吐；或寒中脾肾。

【加减】 中气寒甚者，加制附子；肝肾寒者，加吴茱萸、肉桂，或加当归。

03295 归芍汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】 当归二钱 白芍钱半 黄芩 黄连 陈皮各一钱 广香三分

【用法】 水煎，空心服。

【主治】 妊娠腹痛下痢，里急后重，脉洪有力，证属热者。

【加减】 如痛甚则下，加大黄一钱半。

03296 归芍汤

【方源】《新急腹症学》。

【组成】 当归八钱 大黄三钱 川朴八钱 枳壳四钱 槟榔三钱 芒消三钱 黄芩三钱 黄连二钱 丹皮三钱 公英五钱 没药三钱

【主治】 麻痹性动力性肠梗阻。

03297 归芍汤

【方源】《急腹症方药新解》。

【组成】 当归25克 白芍25克 柴胡6克 川朴6克 枳壳6克 槟榔6克 芒消10克 丹皮10克 黄芩6克 川连6克 公英18克 没药6克 阿胶10克 三仙各10克

【用法】 水煎服，每日一至二剂，口服或胃管注入。

【功用】 理气消胀，清热通便，凉血消肿。

【主治】 腹腔感染所致的麻痹性肠梗阻，腹部手术后肠麻痹。

【加减】 腹胀重，大便秘结，加大黄，重用芒消；腹腔感染重，发烧者，加金银花、连翘、白花蛇舌草。

【方论选录】 当归润肠通便，芒消软坚通便，柴胡、川朴、枳壳、槟榔理气消胀，黄芩、黄连、丹皮、公英凉血消肿，三仙助消导，阿胶滋阴补血，没药、白芍活血养血止痛。

03298 归花汤

【方源】《眼科全书》卷三。

【异名】 归杞汤。

【组成】 当归 密蒙花 黄连 熟地 楮实子 覆盆子 枸杞子 玄参 连翘 防风 石斛草 陈皮 白芍

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 惊振内障者，或因被人打着，或撞着，或从高处跌下低处，致眼昏暗二三年者，一时内障形状，阴看能大，阳看能小，不辨三光；或后生人患云翳小小，阴看不大，阳看不小，不见三光；五风变五色，不离头痛，或因酒色过度，内伤肾气而致青风内障，不痒不痛，渐失其明，眼目俱不伤损，故无所见，日积月累，瞳仁开大，渐渐变青色。

03299 归连丸

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】 黄连四分 黄柏 当归 黄芩各二两 阿胶二两（炙） 熟艾一两

【用法】 上为散。以醇醋二升。煮胶烊，下药煮；为丸，如大豆大。每服七八分，饮送下，日二夜一服。

【功用】《医略六书》：清热养阴。

【主治】 ①《普济方》：痢，无问冷热；及五色痢。②《医略六书》：阴虚五色痢；孕妇赤痢，腹痛，胎下堕，脉虚数者。

【加减】 若产妇痢，加蒲黄一两，蜜和为丸。

【方论选录】《医略六书》：当归养血脉以养胎，阿胶养阴血以止痢，黄连清心脾之火，黄芩清肺肠之火，黄柏清肾火，存五液也；佐以艾炭，温经止痛定痢；复以苦酒收之，米饮和之，使经腑肃清，则脏损复完，而胃气自能输化，五液各有所归。

03300 归肠汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 玄参一两 石膏三钱 熟地一两 丹皮三钱 当归三钱 地榆三钱 槐花二钱 荆芥（炒

黑）三钱

【用法】 水煎服。

【功用】 胃肾同治，清大肠之火。

【主治】 大肠之火奔迫而出，不大便而脱肛，疼痛非常。

03301 归灵汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】 归灵内托散（《外科大成》卷四）、归灵散（《验方新编》卷七）。

【组成】 川芎 当归 白芍 熟地 米仁 木瓜 防己 天花粉 金银花 白鲜皮 人参 白术各一钱 甘草五分 威灵仙六分 牛膝（下部加）五分 土茯苓二两

【用法】 水三钟，煎二钟，量病上下，分二次食前后服之，滓再煎八分服。

【主治】 杨梅疮不论新久，但元气虚弱者。

03302 归肾丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 熟地八两 山药四两 山茱萸肉四两 茯苓四两 当归三两 枸杞四两 杜仲（盐水炒）四两 菟丝子（制）四两

【用法】 炼蜜同熟地膏为丸，如梧桐子大。每服百余丸，饥时或滚水，或淡盐汤送下。

【主治】 肾水真阴不足，精衰血少，腰酸脚软，形容憔悴，遗泄阳衰。

03303 归荆汤

【方源】《普济方》卷五十九引《指南方》。

【组成】 当归（或以川芎代） 荆芥穗各等分

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，酒少许，煎七分，灌下；如牙关紧，用铜匙斡开，以鸡羽蘸药入口；或用童尿调下。

【主治】 风痉昏迷，吐沫抽掣，背脊强直；产后中痉。

03304 归荆散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】 当归 荆芥穗 川升麻 川郁金 细辛 白芷 荜茇各等分

【用法】 上为末。每用半钱，揩痛处，良久盐汤漱漱。

【主治】 齿痛。

03305 归茸丸

【方源】《医方大成》卷四引《澹寮方》。

【组成】 当归（酒洗） 鹿茸（盐酒炙） 北黄耆（盐水炙） 沉香 灵砂三两 北五味子（炒） 远志肉 酸枣仁 吴茱萸 茴香（炒） 破故纸（炒） 牡蛎（煅） 熟地黄 人参 龙骨（煅） 附子（炮） 巴戟各一两

【用法】 上煅制如法，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【功用】 补诸虚。

【主治】《医方类聚》：便浊。

【临证举例】 白浊 《医方类聚》：曾省斋白浊耳鸣，以茯苓末下震灵丹之类，如石投水，服分清饮，虽暂觉小便清，而未免又浊，竟取效此药。

03306 归茸丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 鹿茸（酒蒸） 当归（酒浸）各等分

【用法】 上为细末，用乌梅水煮去核，和前末捣匀为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，空心米饮送下。

【主治】 精血枯竭，面色黧黑，耳聋目暗，口干多渴，腰痛脚弱，小便白浊，上燥下寒，不受峻补。

03307 归须汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十九。

【组成】 生杜仲一两 归须 穿山甲各二钱 干地龙 小茴各一钱 北细辛三分

【主治】 腿骨麻疼，邪留于阴，痛在右腿，深入筋骨，肌肉不肿，夜分惊笃。

03308 归姜汤

【方源】《医学心悟》卷五。

【异名】 归姜枣汤（《产科心法》卷下）。

【组成】 当归三钱 黑姜七分 枣仁（炒）一钱五分 大枣五枚（去核）

【用法】 水煎服。

【主治】 产后心慌自汗。

【加减】 若服后自汗仍多，心慌无主，恐其晕脱，加入参二钱、熟附子一钱。

03309 归神丹

【方源】《百一》卷一。

【异名】 归神丸（《袖珍方》卷三）。

【组成】 颗块朱砂二两 猪猪心二个 灯心三两

【用法】 上将猪心切开，入朱砂、灯心在内，麻线系合，于银石器内煮一伏时，取出，不用猪心及灯心，只将朱砂研极细，用真茯神末二两，酒煮薄糊，和朱砂为丸，如梧桐子大。每服九丸至十五丸，加至二十一丸，用去心麦门冬煎汤送下；癫痫至甚者，乳香、人参汤送下；夜寝不安或多乱梦，炒酸枣仁汤送下。

【功用】《慈禧光绪医方选义》：养心安神。

【主治】 一切惊忧思虑，或夜寝不安，梦思恍惚，作事多忘；心气不足，癫痫狂乱。

【方论选录】《慈禧光绪医方选义》：朱砂质重性寒，寒可清热，重可镇怯，功能安神定惊，可治心悸怔忡，失眠惊痫；灯心可清心热；茯神养心安神，诸药合用，养心安神之力甚强。用猪心者，取中医以脏补脏之法。

【临证举例】 惊悸 《慈禧光绪医方选义》：光绪帝亲政之后，劳心惊忧，耗气伤神。御医们进呈此补心镇静之药，甚当。

03310 归神丹

【方源】《医方类聚》卷八十九引《经验秘方》。

【组成】 丹参 人参（去芦） 石菖蒲各五钱 远志（去心，焙） 酸枣仁（炒）各六钱 柏子仁六钱半 天门冬（去心，焙） 麦门冬（去心，焙）各一两 熟地黄（焙） 干山药各三钱 生地黄三钱半 当归（酒洗，焙）四钱半 茯神 粉草各七钱 辰砂 地骨皮 五味子（焙）各五钱 白茯苓七钱半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如龙眼肉大。每服一二丸，临卧嚼化。

【主治】 一切惊忧思虑，作事多忘，怔忡恐怖；一切心气不足。

【加减】 加金箔五片尤佳。

03311 归耆饮

【方源】《张氏医通》卷十五。

【异名】 四神汤（《疡医大全》卷二十三）、回毒金银花汤（《医林纂要》卷十）、四仙饮（《成方切用》卷十一）。

【组成】 当归八钱 绵黄耆（生） 金银花（净）各五钱 甘草（生）三钱

【用法】 水、酒各一碗半，煎至二碗，分三次热服，一日令尽。

【主治】 ①《张氏医通》：脑疽背痈，毒盛焮肿；及虚人肛门发毒。②《医林纂要》：疮疡作痛隐隐，气虚不能焮发，而色变紫黑者。

【加减】 在上者，加升麻三分；在下者，加牛膝三钱。

【备考】《成方切用》无酒。

03312 归圆酒

【方源】《医林纂要》卷八。

【组成】 当归二两 圆眼（即龙眼）一斤（剥取肉）

【用法】 浸酒十斤。临卧随意随量温服数杯。

【功用】 补暖下元，滋养气血，温暖子宫。

【主治】 男妇血气衰弱者。

【备考】 妇人服此尤易受胎。

03313 归葛饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 归葛煎（《医级》卷七）。

【组成】 当归三五钱 干葛二三钱

【用法】 水二钟，煎一钟，以冷水浸凉，徐徐服之。得汗即解。

【主治】 阳明温暑时证，大热大渴，津液枯涸，阴虚不能作汗。

03314 归葵汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 连翘饮子（原书同卷）、连翘饮（《内科摘要》卷下）。

【组成】 柴胡二分 生甘草 蔓荆子 连翘 生地黄 当归身 红葵花 人参各三分 黄耆 酒黄芩 防风 羌活各五分 升麻一钱

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 目中溜火，恶日与火，隐涩难开，小角紧，视物昏花，迎风有泪。

03315 归脾汤

【方源】《济生》卷四。

【组成】 白术 茯苓（去木） 黄耆（去芦） 龙眼肉 酸枣仁（炒，去壳）各一两 人参 木香（不见火）各半两 甘草（炙）二钱半

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】《便览》：解郁，养脾阴。

【主治】 思虑伤脾。健忘怔忡，吐血下血。

①《济生》：思虑过度，劳伤心脾，健忘怔忡。②《得效》：思虑伤脾，心多健忘，为脾不能统摄血，以致妄行，或吐血下血。③《杂病源流犀烛》：思虑伤脾而成劳淋。

【方论选录】《医碥》：脾气虚寒，不能运血归经，故用参、耆、术、草以补脾，又用木香引之；气虚则易散，故用枣仁以敛肝；血不归经则心失所养而不宁，故用圆眼肉、茯神以补心。

03316 归脾汤

【方源】《正体类要》卷下。

【异名】 归脾散（《古今医鉴》卷八）、加味归脾汤（《古今医鉴》卷十一）、归脾饮（《痘学真传》卷七）、归脾养营汤（《疡科心得集》卷上）。

【组成】 白术 当归 白茯苓 黄耆（炒） 龙

眼肉　远志　酸枣仁（炒）各一钱　木香五分　甘草（炙）各三分　人参一钱

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【功用】 养血安神，补心益脾，调经。

①《兰台轨范》：心脾同治，生血调经。②《古今医彻》：益心神，调荣血。③《医镜》：养血安神。

【主治】 思虑伤脾，发热体倦，失眠少食，怔忡惊悸，自汗盗汗，吐血下血，妇女月经不调，赤白带下，以及虚劳、中风、厥逆、癫狂、眩晕等见有心脾血虚者。现代临床常用于血小板减少性紫癜、神经衰弱、脑外伤综合征、子宫功能性出血等属于心脾血虚者。

①《口齿类要》：思虑伤脾，血耗唇皱；及气郁生疮，咽喉不利，发热便血，盗汗睡热。②《正体类要》：跌扑等症，气血损伤；或思虑伤脾，血虚火动，痛而不痒；或心脾作痛，怠惰嗜卧，怔忡惊悸，自汗，大便不调；或血上下妄行。③《内科摘要》：思虑伤脾，健忘少食，肢体重痛，月经不调，赤白带下，疟痢。④《疡疡机要》：忧思伤脾，身发赤痕，或搔破成疮，咳吐痰血。⑤《医方考》：饮食太饱伤脾，脾伤则面黄善卧。⑥《证治汇补》：喜恐惊劳，气散于内，房劳后着气，厥逆不省，少顷复醒，而脉虚细者。⑦《金鉴》：虚劳烦热，时时恍惚。忧思伤脾，脾不摄血，经断复来。痘色灰白陷下而便血者。乳房结核坚硬，大者如梅，小者如李，按之不移，推之不动，时时隐痛，皮色如常。⑧《杂症会心录》：中风，脾肾大败。湿饮不行，则痰起于脾，头重眼花，脑转眩冒，食饮不甘，脉象缓者。⑨《兰台轨范》：乳母脾经气郁，致儿为患。⑩《杂病源流犀烛》：因思虑过度，而致癫狂。虚损劳瘵，而见泄泻。疟痢。⑪《会约》：思虑伤脾，不思饮食；或少食即胀；或火不生土，而时食时吐，脾虚生痰，其痰易来，或满口痰水，或夜间更甚。思虑惊恐而阳萎者。

【方论选录】 ①《医方考》：《内经》曰：五味入口，甘先入脾。参、耆、苓、术、甘草，皆甘物也，故用之以补脾；虚则补其母，龙眼肉、酸枣仁、远志，所以养心而补母；脾气喜快，故用木香；脾苦亡血，故用当归。②《古今名医方论》罗东逸：方中龙眼、枣仁、当归，所以补心也；参、耆、术、苓、草，所以补脾也。立斋加入远志，又以肾药之通乎心者补之，是两经兼肾合治矣。其药一滋心阴，一养脾阳，取乎健者，以壮子益母；然恐脾郁之久，伤之特甚，故有取木香之辛且散者，以阖气醒脾，使能急通脾气，以上行心阴，脾之所归，正在斯耳。③《古方选注》：归脾者，调四脏之神志魂魄，皆归向于脾也。参、术、神、草四君子汤以健脾胃，佐以木香醒脾气，桂圆和脾血，先为调剂中州；复以黄耆走肺固魄，枣仁走心敛神，安固膈上二脏；当归入肝，芳以悦其魂；远志入肾，辛以通其志，通调膈下二脏，四脏安和，其神志魂魄自然归向于脾，而脾亦能受水谷之气，灌溉四旁，荣养气血矣。独是药性各走一脏，足经方杂用手经药者，以黄耆与当归、枣仁与远志有相须之理，且黄耆味入脾而气走肺，枣仁味人肝而色走心，故借用不悖。四君子汤用茯苓，改用茯神者，以苓为死气，而神得松之生气耳。④《医林纂要》：此方主于滋血，故以人参为君，参、耆、甘、术，皆补脾为滋血之主，脾厚而不生湿则生血矣；龙眼甘补滋润，所以为生血之佐；木香、远志则又能升肾水，以由肝而达之心脾；当归以厚肝之脏；枣仁以节心之用，茯神以止心之妄。⑤《续名医类案》：归脾汤兼补心脾，而意专治脾，观其于甘温补养药中加木香醒脾行气可以见矣。龙眼、远志虽曰补火，实以培土，盖欲使心火下通脾土，而脾益治，五脏受气以其所生也，故曰归脾。⑥《会约》：凡治血症，须按三经用药，以心主血，脾统血，肝藏血。此方三经之主也。远志、枣仁，补肝以生心火；茯神、龙眼，补心以生脾土；参、耆、术、草，补脾以固肺气。土患燥，当归以润之；土患滞，广香以疏之，总欲使血归于脾也。⑦《成方便读》：夫心为生血之脏而藏神，劳即气散，阳气外张，而神不宁，故用枣仁之酸以收之，茯神之静以宁之，远志泄心热而宁心神，思则脾气结，故用木香行气滞、舒脾郁，流利上中二焦，清宫除道，然后参、耆、术、草、龙眼等大队补益心脾之品以成厥功，继之以当归，引诸血各归其所当归之经也。

【临证举例】 ①心悸怔忡　《南雅堂医案》：用心过度，阴血必受损耗，怔忡健忘，皆心血不足之故，生血者心，统血者脾，当握要以图之。归脾汤。《续名医类案》：马元仪治一人患心悸症，肢体倦怠，或以阴虚治之不效。诊其脉浮虚无力，盖得之焦劳思虑伤心也。心之下脾位，脾受心病，郁而生涎，精液不生，清阳不布，故四肢无气以动而倦怠也。法宜大补心脾，乃与归脾汤二十剂，即以此方作丸，服之痊愈。②心痛　《南雅堂医案》：诊得脉细小，右寸涩，心下悸，痛甚喜按，得食少愈，大小便俱见清利，系虚痛之候，用归脾汤加石菖蒲治之。《脉诀汇辨》：邑宰章生公，南都应试，时八

月初五日，心脾痛甚，食饮皆废。诊其两寸，涩而无力，与大剂归脾汤加人参三钱、官桂二钱，煎服之。不逾时痛减，续进一剂，痛竟止。③失眠《中医杂志》(1955；2:30)：患者是四十一岁男子，曾患肺结核及肋膜炎。现因工作繁重，思虑过度以致失眠，最近日益严重，有时夜间只能睡一二小时，身体疲倦，记忆力减退，食欲不佳，经常头痛眩晕。查体格中等，稍羸瘦，颜色苍白，脉搏稍弱。投与归脾汤，重用酸枣仁四钱，连服三剂，诸症好转。《内蒙古中医药》(1984；1:44)：刘某，女，五十一岁。平素多忧多虑，起初入睡困难，多梦易醒，反复发作，遂致彻夜不能入睡，随之月经失调，淋漓不断已二年。近日面浮，午后潮热，双下肢浮肿，面色白黄无华，舌体胖，苔白中厚，脉象双寸关大而无力，尺脉沉弱。此证系劳伤心脾，气血生化之源不足，脾虚血失统摄，治当健脾益气，养心宁神，归脾汤去当归，加真珠母15克，白芍12克，水煎，服6剂。服药后自觉症状稍有减轻，继用上方加味，后服归脾丸调养而愈。④痿证《山东中医学院学报》(1977；4:62)：于某，男，17岁。因下肢肌肉活动无力，双手指不能伸握20天就诊。症见面色无华，神疲乏力，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力。给予归脾汤加伸筋草一两、活血藤一两治疗。服六剂后，双手指已能握伸，下肢活动明显有力，又服三剂。再诊手指及下肢活动已恢复正常，又给归脾丸一盒以巩固疗效。⑤便血《清代名医医案大全·曹仁伯医案》：便血之前，先见盗汗，盗汗之来，由于寒热，寒热虽已，而盗汗便血之证不除，脉小而数，气阴两虚之病也。归脾汤去桂圆，加丹皮、山栀、地榆、桑叶。⑥紫癜《北京中医》(1953；5:13)：朱敏珍，女，23岁。素无其他疾患，惟月经有时不调。1950年秋即觉心动悸，胃纳不佳，关节酸痛，精神疲倦，下肢皮肤时常出血，有紫斑点，乃住院，以西药治疗四个月病况无甚转变。现面色苍白，萎靡倦怠，月经不调，食欲不佳，声低微，心动悸，四肢无力，睡眠不佳，关节酸痛，下肢有紫斑点如环状，大小不一，躯干及上肢较少。乃处以归脾汤作煎剂，每日一服，诸症减轻。继续进剂至三星期，诸症若失，已照常工作。⑦项疽《得心集医案》：黄荣青，项外结喉之间，忽生硬疽。延医调治，与疏风化痰之剂，疽形渐长，按之坚而不痛，不寒不热，不痒不疼。由于思虑郁结，营卫留滞，以致气结不行，当进益气和营之药，不治而治也。连服归脾数十余剂，其核疽自化而消。⑧崩漏《清代名医医案精华》：产后百脉空虚，气血俱伤，冲任不振，半月血来甚涌，所谓冲伤血崩是也。寒热，乳房作胀，五心烦热，诸虚迭见，日以益甚，脉来弦数无神，先从太阴阳明主治，冀其胃开进食，诸虚可复。归脾汤去木香，加枸杞子。《江西中医药》(1959；3:14)：治疗崩漏20例，其中11例属脾虚型，用本方治疗，皆获痊愈。一般服药3～9剂出血全部停止，兼症逐步消失。有1例出血已三个月之久，用本方3剂后症状减轻，出血减少，服至12剂后获愈。⑨带下《山东中医学院学报》(1977；4:60)：马某，女，33岁。近一年来白带多，蹲下时白带滴流而下，质清稀，无臭味。就诊时面色无华，全身无力，背寒肢麻，舌质淡，苔薄白，脉细弱。诊断为脾气虚弱，寒湿带下，方用归脾汤治疗，三剂后，白带即止。⑩脑外伤后综合症《新医药学杂志》(1977；9:21)：用本方加减治脑外伤后遗综合症88例，均为脑震荡、脑挫伤等闭合性颅脑损伤，治疗后仍有头痛、头晕、昏胀、健忘、失眠、耳鸣、注意力不集中、疲乏无力、食欲不振、苔白脉细等症状者。以本方加减，辅以西药谷维素、r-氨酪酸等。效果：痊愈41例(45.5%)、显效30例(34%)、好转17例(20.5%)。多数病例服药在30剂以下。

【备考】《口齿类要》无姜、枣。改为丸剂，名"归脾丸"(见《丸散膏丹集成》)、"人参归脾丸"(见《北京市中药成方选集》)、"白归脾丸"(见《全国中药成药处方集》福州方)。

03317 归脾汤

【方源】《胎产指南》卷七。

【组成】 橘红 胆星 茯神 杏仁 人参 当归 甘草 半夏 枳实 川芎 柏子仁 五味子 白术 圆眼

【主治】 产后身热感风，痰结胸膈，心经蓄热，以致遍身麻痹，手足牵搐，口喝痰嗽，言语无伦。

03318 归脾汤

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】 人参 石斛(盐水炒) 远志肉(甘草汤浸，焙) 茯神 枣仁(炒熟，研) 白术(土炒)各一钱 炮姜 木香 石菖蒲各五分 柴胡 炙甘草各三分 当归身七分 桂圆肉五枚

【用法】 水煎服。

【主治】 中气不足，思虑过度，饥饱失时，劳役不节，而致中脘痛。

【加减】 脾疼者，脉见软弱，中气已虚，去当归、耆、术，少加柴胡。

03319 归术保产汤

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归（酒洗）一钱五分 川芎一钱 白芍（酒洗）一钱 熟地黄（酒蒸）一钱 白术（去芦，炒）一钱 甘草（炙）三分 白茯苓（去皮）一钱 陈皮八分 干姜（炒黑）八分 香附米（童便炒）一钱

【用法】上锉一剂。加生姜三片，大枣一枚，水煎，温服。

【功用】大补气血。

【主治】产后气血虚损，脾胃怯弱，或恶露不行，或去血过多，或饮食失节，或怒气相冲，以致发热恶寒，自汗口干，心烦喘急，心腹疼痛，头眩眼黑，耳鸣，及不语昏愦，不省人事。

【加减】气虚，加人参七分；去血过多，倍芎、归、干姜；胸膈胀满，加枳实（麸炒）、砂仁、厚朴（姜炒）、山楂肉；两胁肋痛，加青皮、上肉桂；小腹阵疼，加元胡索、桃仁、红花、苏木，甚者加三棱、莪术（俱煨醋炒）；有汗，加黄耆（蜜水炒）、酸枣仁（炒）；口干苦，加麦门冬（去心）；身不发热，小腹痛不可忍，用桃仁（去皮捣烂）五钱、韭菜汁和酒送下；恶露不行、加益母、牡丹皮、桃仁，入童便同酒服；吐痰，加半夏、贝母；咳嗽不止，加北五味、桑白皮；气恼，加乌药；昏愦，口噤不语，加荆芥穗。

03320 归术破癥汤

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【异名】归术破癥汤（《寿世保元》卷七）。

【组成】归尾（酒洗）一钱 赤芍一钱 白芍一钱 青皮一钱 乌药七分 香附（醋炒）一钱半 三棱一钱 莪术（醋煮）一钱 官桂五分 苏木五分 红花五分

【用法】上锉一剂。水煎，入酒一钟，空心服。

【主治】妇人经水不通，腹中积块疼痛。

03321 归地滋阴汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】当归 熟地各三五钱 白芍（酒炒）一钱半 川芎一钱 干姜（炒透）六七分 甘草（炙）一钱 荆芥穗六分

【用法】水煎服。

【主治】产后阴虚阳燥，头痛不止。

03322 归芍红花散

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】当归 大黄 栀子仁 黄芩 红花（以上俱酒洗，微炒） 赤芍药 甘草 白芷 防风 生地黄 连翘各等分

【用法】上为末。每服三钱，水煎，食远服。

【主治】眼胞肿硬，内生疙瘩。

03323 归血凉荣汤

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】丹皮 地黄 芍药（炒） 麦冬（去心） 蒲黄 甘草 黄芩（炒） 茅根

【用法】水二钟，煎七分服；滓再煎服。

【主治】吐血、衄血、咯血、郁血。

03324 归附地黄丸

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归（酒洗）三两 川芎一两 白芍（酒炒）二两 熟地黄（酒蒸）一两 香附子（童便浸，炒）二两 陈皮一两半 黄柏（去皮，童便浸三日，晒干）一两半 知母（去毛）一两半（酒浸，晒干） 五味子一两半 苍术（米泔浸，炒）二两 牡蛎（煅）五钱 椿根皮（酒炒）二两半（一方有白葵花；一方有山茱萸，酒蒸，去核，无五味）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心淡盐汤下，后用干物压之。

【主治】妇女赤白带下。

【加减】入虚，加人参、白术。

【宜忌】忌葱白、萝卜、胡椒、煎炒、发热之物。

03325 归养心肾丸

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】生地 熟地 黄耆 白术 山药 芡实 茯神 枣仁 归身 萸肉 五味 甘草

【用法】炼蜜为丸。每服三钱，空心白汤送下。

【主治】虚劳。

【加减】气虚，加人参；久遗，加杞子、金樱；漏滑，加莲须、芡实；心火盛，加石莲；寒精自出，加苁蓉、鹿茸、沙苑、菟丝；泄泻，加泽泻、莲肉；腰膝软弱，艰于步履，加牛膝、杜仲、龟鹿胶。

【方论选录】二地滋阴，当归养血，茯神、枣仁补心，耆、术、药、草调气补中，五味、芡实固精滋肾。

03326 归养心脾汤

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】人参 黄耆 白术 芡实 北五味 甘草 生地 枣仁 茯神 当归身 山药

【主治】梦遗滑精。

【加减】遗甚，加萸肉、莲须；思虑过度，加莲

肉；不禁，加石莲、金樱膏；足痿，加牛膝、杜仲、龟版胶。

【方论选录】 参固气，气固则精有摄而不遗；生地滋阴，阴滋则火有制而不浮越；当归养血；芡实固肾；茯神、枣仁安神宁志；耆、术、药、草补气调中。气旺神昌，则精固而病自愈。

03327 归神定志丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 川归七分 茯神一两 人参五钱 远志一两（去心） 酸枣仁五钱 龙齿五钱 辰砂三钱 琥珀三钱 金银箔各十张 真珠三钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大，金银箔为衣。每服一丸，麦冬汤化下，不拘时候。

【主治】 男妇癫痫；或用心过度，神驰出舍，怔忡失志。

03328 归桂化逆汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 当归二钱 白芍一钱五分（酒炒） 肉桂五分 胄皮一钱 茯苓二钱 蒺藜四钱 郁金二钱 合欢花二钱 木香五分 牛膝二钱 玫瑰花五分 红枣五枚 降香五分

【功用】 解郁和中。

【主治】 ①《医醇剩义》：肝气犯胃，食入作吐。②《谦斋医学讲稿》：血虚，肝气郁结成膈。

03329 归脾养荣汤

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】 当归 川芎 白芍 生地 茯苓 陈皮 甘草 麦冬 升麻 山栀 桔梗 黄耆 白术 防风 黄连 黄柏 知母 牡丹皮 小柴胡

【主治】 茧唇久不愈者。

【加减】 妇人，加泽兰、香附、玄胡索。

03330 归芍六君子汤

【方源】《笔花医镜》卷二。

【异名】 归芍六君汤（《成方便读》卷一）。

【组成】 归身 白芍各二钱 人参 白术 茯苓各一钱五分 陈皮 半夏各一钱 炙草五分

【功用】《饲鹤亭集方》：补气血。

【主治】 脾胃不健，气血两亏所致之咳嗽，纳少，神疲，膨胀腹满，呕吐，下血，妊娠痢疾及妇人经水不调。

①《笔花医镜》：脾阴虚弱下血。②《古方汇精》：妊娠痢疾，服祛邪化滞煎未止者。③《饲鹤亭集方》：脾胃虚弱。饮食不思，膨胀腹满，呕吐痰水，气郁困倦。④《中药成方配本》：脾胃不健，气血两亏，咳嗽痰多，纳少神疲。⑤《成方便读》：妇人经水不调，色淡而晦，由脾虚湿盛所致。

【方论选录】《成方便读》：以六君子为君，加当归和其血，使瘀者去而新者得有所归；白芍通补奇经，护营敛液，有安脾御木之能，且可济半夏、陈皮之燥性耳。

【备考】 本方改为丸剂，名"归芍六君丸"（见《饲鹤亭集方》），"归芍六君子丸"（见《中药成方配本》）。

03331 北枣散

【方源】《医方大成》卷十引《幼幼方》。

【组成】 北枣一枚（去核，入鸭嘴胆矾一片在内，纸裹火煅通红，出火毒）。

【用法】 上为细末。敷牙左右。

【主治】 小儿走马疳。

03332 北亭丸

【方源】《局方》卷五。

【组成】 缩砂仁 胡椒 肉桂（去粗皮） 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 附子（炮，去皮脐） 川芎 当归（去芦、锉碎） 陈皮（去白） 干姜（炮） 甘草（炙）各四两 青盐（别研） 北亭（即硇砂，醋淘去砂石，别研）各二两 白术（别研）三两 五味子（拣）一两半 阿魏（醋化，去砂石）半两

【用法】 上为末，用银、石锅，纳入好酒、醋五升，白沙蜜十两，先下北亭、阿魏、青盐三味，并好头面一升，同煎稠粘，便下药末半斤以来，更煎如稀面糊，渐渐入药末煎得所，离火取出，更以干药末和搜成剂为丸，如梧桐子大。每服十五丸，微嚼破，空心生姜盐汤送下；温酒亦得。

【主治】 脾元气弱，久积阴冷，心腹胁肋胀满刺痛，面色青黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，食少多伤，噫气吞酸，哕逆恶心，腹中虚鸣，大便泄利，胸膈痞塞，饮食不下，呕哕霍乱，体冷转筋，及五膈五噎，痃癖痕聚，翻胃吐食，久痛久痢。

【宜忌】 忌羊血、豉汁。

03333 北平太守八味散

【方源】《千金》卷十四。

【组成】 天门冬六分 干地黄四分 桂心 茯苓各一两 菖蒲 五味子 远志 石韦各三分

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，食后酒、水任服。服三十日力倍，六十日气力强，志意足。

【功用】《普济方》：养命，开心益智。

【主治】 好忘。

03334 卢同散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】 款冬花 井泉石 鹅管石 钟乳石 官

桂　甘草　白矾　佛耳草各等分

【用法】 上为末。每服一钱，竹筒子吸吃，一日三次。

【主治】 男子妇人一切咳嗽喘急。

03335　卢氏异方感应丸

【方源】《局方》卷三（新添诸局经验秘方）。

【异名】 卢氏感应丸（《得效》卷四）、如神木香丸（《得效》卷四）。

【组成】 黄蜡（真者）十两　巴豆一百粒（去皮，研为粉，用纸数重裹捶，油透再易纸，至油尽成白霜为妙）　乳香（锉，研）三钱　杏仁七十枚（去皮尖，研细，依巴豆法去油）　丁香（怀干）　木香（湿纸裹，煨）　干姜（炮）　肉豆蔻（面裹，煨）　草澄茄　槟榔　青皮（汤洗，去瓤，炒）　百草霜（筛细）　片子姜黄各一两

【用法】 上除巴豆粉、百草霜、杏仁、乳香外，余并为细末，却同前四味拌和研匀，先将上项黄蜡十两，于银、石器内熔化作汁，用重绵滤去滓，以无灰好酒一升，于银、石器内煮蜡熔，数滚取起，候冷，其蜡自浮子酒上，去酒不用，春夏修合，用清麻油一两，秋冬用油一两半，于大银器内熬令香熟，次下酒煮蜡，同化作汁，乘热拌和前项药末，十分均匀了，候稍凝，分作剂子，用罐子盛之，半月后方可服。如服，旋丸如萝卜子大，任意服之，二三十丸至五十丸，临睡时常服之；若欲治病，不拘时候。

【功用】 健脾进食，消磨积滞。

【主治】 ①《局方》（新添诸局经验秘方）：寒热泻痢，酒食醉饱。②《得效》：虚弱人久积。

03336　田季散

【方源】《苏沈良方》卷十。

【异名】 二气散（《小儿药证直诀》卷下）、二圣散（《扁鹊心书·神方》）。

【组成】 好硫黄半两（细研）　水银一分（与硫黄再研无星）

【用法】 同研如黑煤色。每服三钱，生姜四两取汁，酒一盏，同姜汁煎熟调药，空心服。衣被盖覆，当自足指间汗出，遍遍遍身，汗出即愈。治小儿诸吐亦用此药，量儿长少，服一钱至一字，冷水调下。吐立定。此散极浮难调，须先滴少水，以至缓缓研杀，稍稍增汤，使令调和，若顿入汤酒，尽浮泛，不可服。

【主治】 久患翻胃，及小儿惊吐，诸吐。

【临证举例】 反胃　有人病反胃，食辄吐出，午后即发，经三年不愈，国医如孙兆辈，皆治疗百端无验，消羸殆尽，枯黑骨立。有守库卒季吉者见之曰：此易治也，一服药可愈，如法服之，汗出皆如胶，腥秽不可近，当日更不复叶，遂愈。

03337　田螺水

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 大田螺一枚

【用法】 用冰片五厘研末，以针挑起螺盖，将冰片入内，平放片时，待螺渗出浆水。用鸡毛蘸搽患处，勤勤扫之。其肿痛自然消散。

【主治】 痔疮坚硬作痛，及脱肛肿泛不收者。

03338　田螺饮

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】 田螺（活者）一升

【用法】 以水一斗，煮至二升，不问食前后，稍稍饮汁。一方用螺五升，水一斗半，浸之经宿，渴即饮浸螺汁，每日一度易水并螺。

【主治】 卒患消渴，小便利数。

03339　田螺膏

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷四引《种杏仙方》。

【组成】 好大田螺八九个。

【用法】 针破顶盖，入白矾末少许，置地上，尖底埋土中，其顶盖仰天。经一宿，次日取盖上水汁，以鸡羽涂痔上。五七日即消。

【主治】 痔疮肿痛，坐卧不得，诸药不效。

03340　田螺解胀敷脐方

【方源】《寿世新编》。

【组成】 大田螺一个　雄黄一钱　甘遂末一钱　麝香一分

【用法】 先将药末和田螺捣如泥，以麝置脐，放药脐上，以物覆之束好。待小便大通去之。重者再用一料，小便大通，病即除矣。

【主治】 一切臌胀，肚饱发胀，小便不通。

03341　田螺解胀敷脐方

【方源】《寿世新编》。

【组成】 大田螺四个　大蒜五个（去皮）　车前子三钱（为末）

【用法】 共研为饼。以一饼贴入脐中，用手帕缚之。贴药后少顷，水从小便出，一二饼即愈。

【主治】 一切臌胀，肚饱发胀，小便不通。

03342　甲乙饼

【方源】《三因》卷十二。

【组成】 青黛一分　牡蛎粉二钱七　杏仁七粒（去皮尖，研）

【用法】 上为末，入黄蜡一两，熔搜为丸，如弹

子大，压扁如饼。每用中日柿一个（去核），入药在内，湿纸裹煨，约药熔，方取出，去火毒，细嚼，糯米饮送下。

【主治】 ①《三因》：咳出血片，兼涎内有血条，不问年久月深，但声在。②《寿亲养老》：痰喘咳嗽。

03343 甲乙化土汤

【方源】《血证论》卷七。

【组成】 白芍五钱 甘草三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 出血后，脾阴虚，脉数身热，咽痛声哑等。

03344 甲乙归藏汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】 真珠母八钱 龙齿二钱 柴胡一钱（醋炒） 薄荷一钱 生地六钱 归身二钱 白芍一钱五分（酒炒） 丹参二钱 柏子仁二钱 夜合花二钱 沉香五分 红枣十枚 夜交藤四钱（切）

【主治】 身无他苦，饮食如常，惟彻夜不寐，间日轻重，如发疟然，起伏而又延久不愈，左关独弦数，余部平平者。

03345 四七汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【异名】 四七气汤（《喉科枕秘》）。

【组成】 苏叶 半夏 厚朴 赤茯苓 陈皮 枳实 南星 砂仁 神曲各一钱 青皮七分 蔻仁六分 槟榔 益智仁各三分

【用法】 加生姜五片，水煎服。

【主治】 梅核气。

03346 四川丸

【方源】《得效》卷十。

【异名】 鹤顶丹。

【组成】 大川乌一个（生，去皮脐） 川白芷 川细辛（去叶） 大川芎各一两

【用法】 上为末，韭叶自然汁为丸，黄丹为衣。每服一丸，细嚼，葱白、淡茶清送下。

【主治】 头痛如破。

03347 四仁汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 叭嗒杏仁 火麻仁 松子仁 柏子仁各二钱（各研末）

【用法】 滚水冲，盖，俟温，当茶饮。

【主治】 ①《外科全生集》：大便燥结。②《仙拈集》：老年大便秘结，或患痈毒。

【加减】 若热重，加甘蔗汁半酒杯。

03348 四斤丸

【方源】《局方》卷一（绍兴续添方）。

【异名】 虎骨四斤丸（《准绳·类方》卷四）、虎骨木瓜丸（《重订通俗伤寒论》）。

【组成】 宣州木瓜（去瓤） 牛膝（去芦，锉） 天麻（去芦，细锉） 苁蓉（洗净，切，各焙干，秤）各一斤

上药用无灰酒五升浸，春、秋各五日，夏三日，冬十日足，取出焙干。再入：附子（炮，去皮脐） 虎骨（涂酥炙）各二两

【用法】 上为细末，用浸前药酒打面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心煎木瓜酒送下；或盐汤吞下亦得。

【功用】 补虚除湿，大壮筋骨。

【主治】 ①《局方》（绍兴续添方）：肾经不足，下攻腰脚，腿膝肿痒，不能屈伸，脚弱少力，不能踏地，脚心隐痛，行步喘乏，筋脉拘挛，腰膝不利，及风寒湿痹，脚气缓弱。②《金匮翼》：风寒湿毒，与气相搏，筋骨缓弱，四肢酸疼痒痹。

03349 四斤丸

【方源】《正体类要》卷下。

【组成】 肉苁蓉（酒浸） 牛膝（酒洗） 天麻 干木瓜 鹿茸（炙） 熟地黄（生者自制） 菟丝子（酒浸煮，杵） 五味子各等分

【用法】 上为末，用地黄膏为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心温酒送下。

【主治】 肝肾精血不足，筋无所养，挛缩不能步履，或邪淫于内，筋骨痿软。

03350 四乌汤

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】 四物汤加乌药、香附、甘草

【主治】 血中气滞，小腹急痛。

【方论选录】《成方便读》：以四物汤之养血活血能补能宣者以之为君；而以乌药、香附通行十二经之气，上下表里，无所不到，引领四物，为之先声；用甘草者，缓其急而和其中，使气血各复其常也。

03351 四仙丸

【方源】《普济方》卷三十九。

【组成】 桃仁（去皮尖） 当归 大黄（醋浸，炙） 水蛭（石灰炒）各一两

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心醋汤送下。瘀血去后，与鹤顶丸。

【主治】 崩中，内有瘀血，小腹急满痛者。

03352 四仙散

【方源】《回春》卷六。

【组成】 苍术一两（酒浸，去黑皮，炒干） 白芷 川芎 大附子（面包煨，去皮脐）各五钱

【用法】 上为末。每服五分，空心好酒调下。

【主治】 ①《回春》：妇人白带。②《郑氏家传女科万金方》：经水过期而白带者。

03353 四生丸

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】 草乌头半两 白僵蚕 苦参 黑牵牛各一两（并生用）

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，温酒送下，一日三次。

【主治】 皮肤风痒，疮癣，痹麻冷痹，热毒痈疖。

03354 四生丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】 草薢 防风（去叉） 狗脊（去毛） 乌头（去皮脐，生用）各等分

【用法】 先以河水浸乌头七日七夜，切作片，每乌头一两，即用盐半两同炒黄，次与诸药同为细末，用米醋面糊为丸，如梧桐子大。每日服十丸，渐加至三十丸，空心温酒或盐汤送下。

【功用】 壮元气。

【主治】 一切筋骨疼痛。

03355 四生丸

【方源】《妇人良方》卷四。

【组成】 白僵蚕（炒去丝） 地龙（去土） 白附子（生） 五灵脂 草乌（去皮尖）各等分

【用法】 上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，茶、酒任下；或作末，酒调半钱亦可。

【功用】《金鉴》：活血祛风，通络止痛。

【主治】 血风骨节疼痛，抬举臂不起，行履不得，并浑身麻痹。

03356 四生散

【方源】《苏沈良方》卷二。

【组成】 白附子（下注脚生疮，用黑附子） 肾形沙苑蒺藜 羌活 黄耆各等分

【用法】 上药生为末。每服二钱，空腹盐酒调下；猪肾中煨服尤善。

【主治】 肝肾风毒，上攻下注，目赤痒痛，羞明多泪，鼻赤口疮，脚膝生疮，遍身风癣。

①《苏沈良方》：肾脏风，眼病，癣。②《局方》（绍兴续添方）：男子妇人肝肾风毒上攻，眼赤痒痛，不时羞明多泪；下注脚膝生疮，及遍身风癣，服药不验，尿常多，觉两耳中痒。③《卫生总微》：恶疮。④《三因》：癞风上攻下注，耳鸣目痒，鼻赤齿浮，或作口疮，下注阴湿，四肢瘙痒，遍体生疮，及妇女血风疮。

【临证举例】 ①目赤 《苏沈良方》：予为河北察访使时，病赤目四十余日，黑睛旁黯赤成疮，昼夜痛楚，百疗不瘥。郎官邱革相见，问予病目如此，曾耳中痒否？若耳中痒，即是肾家风。有四生散疗肾风，每作二三服即愈，闾里号为圣散子。予传其方，合服之，午时一服，临卧一服，目反大痛；至二鼓时，乃能眠；及觉，目赤稍散，不复痛矣。更进三四服，遂平安如常。《续名医类案》：薛立斋治一男子，眼赤痒痛，时或羞明下泪，耳内作痒，服诸药不效，气血日虚，饮食日减，而痒亦盛，此脾肾风热上攻也。以四生散，酒调四服而愈。②癣《苏沈良方》：予之门人徐某，构病癣，久不愈，服四生散，数日都除。

03357 四白丹

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 白术半两 白芷一两 白茯苓半两 白檀一两半 人参半两 知母三钱 缩砂仁半两 羌活二钱半 薄荷三钱半 独活二钱半 防风 川芎各五钱 细辛二钱 甘草五钱 甜竹叶一两 香附子五钱（炒） 龙脑半钱（另研） 麝香一字（另研） 牛黄半钱 藿香一钱半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每两作十丸。临卧服一丸，分五七次嚼之。

【功用】 上清肺气，养魄，下强骨髓。

【主治】 中风昏冒，气不清利。

【方论选录】《法律》：此方颇能清肺养魄。方中牛黄可用，而脑、麝在所不取，以其耗散真气，治虚风大非所宜。然本方以四君子汤作主，用之不为大害。今更定牛黄仍用五分，龙脑、麝香各用二分，取其所长，节其所短，庶几可也。

03358 四白汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 白术 白芍 白茯 扁豆 人参 黄耆各一钱 甘草五分

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 ①《医学入门》：色疸。②《杏苑》：色疸，房事过伤，发黄，小腹连脐下痛，神思倦怠，头目昏重，自汗。

03359 四白散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 糯米三百五十粒 巴豆（取肉）五个

【用法】 用夏布包之扎之，取石灰鹅卵大一块，

冲滚水一碗泡化，以水煮米包成饭，取出，乘热加硇砂末一钱，杵匀，仍加灰水，研如糊，瓷罐收之，听用。

【功用】 点痣去斑。

03360 四汁膏

【方源】 方出《丹溪心法》卷二，名见《医统》卷五十二。

【异名】 乳汁膏(《杏苑》卷五)、藕汁膏(《东医宝鉴·杂病篇》卷六)、人乳膏(《明医指掌》卷七)、连花乳散(《医林纂要》卷四)。

【组成】 黄连末 天花粉末 人乳汁（又云牛乳） 藕汁 生地黄汁

【用法】 以后二味汁为膏，入前三味搜和，佐以姜汁和蜜为膏。徐徐留舌上，以白汤少许送下。

【功用】 养肺降火生血。

【主治】 三消。

【加减】 能食者，加软石膏、瓜蒌根。

【方论选录】《医林纂要》：天花粉甘酸微苦，补肺敛气，泄逆宁心，此治上焦气分之热；黄连苦以泻火，此治中焦心脾血分之热；黄连亦入血分，且能厚肠胃；生地黄汁苦寒而浊，以治下焦肾命之火，清其本也；藕汁甘咸涩，敛阴散热，交心肾，济水火；牛乳甘咸，润肠胃，解热结，滋阴血，而引之上行；蜂蜜润燥去热，通利三焦，加姜汁为反佐，以行之。

【备考】《医林纂要》本方用法：研黄连、天花粉为末，以二汁及乳调之，加姜汁、蜂蜜少许和服。

03361 四圣串

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】 槟榔四两 雷丸二两 芜荑二两 黑丑头末三两 生大黄二两

【用法】 上为末。每服大人二钱，小儿一钱半，沙糖汤送下。重者二三次即止。

【功用】 追虫打积。

【主治】 九种心痛。

03362 四圣散

【方源】《直指》卷二十三。

【异名】 神效瓜蒌散(《普济方》卷二八六)、四圣汤(《赤水玄珠》卷二十五)、神效四圣散(《医钞类编》卷二十一)。

【组成】 生黄瓜蒌一枚（去皮。干瓜蒌则用两枚） 粉草末四钱 没药末三钱 乳香末一钱

【用法】 好红酒二大碗，慢火煎至一碗，分作两服，两日服尽。大便顺导恶物妙。

【主治】 肠痈，痈疽，便毒。

03363 四圣散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】 灯心 黄连 秦皮 木贼 枣子（和核）各半两

【用法】 上㕮咀。每服二钱，水一盏，煎七分，澄清去滓，无时频洗，两目自开。

【功用】《金鉴》：清热解毒。

【主治】 ①《活幼心书》：婴孩胎受热毒，生下两目不开。②《金鉴》：孕母受惊，传袭子胎，婴儿新生之后，周岁以上忽两眼胞红晕，面色青黯，烦热夜啼，或面如胭脂，此属伏热在内，散发于面，状如水痘，根脚微红，时出时隐，延及颈项，继发丹毒。

03364 四圣散

【方源】《医方类聚》卷九十一引《急救仙方》。

【组成】 茴香（炒） 川山甲（炒） 全蝎（炒） 南木香各等分

【用法】 上为末。每服二钱，酒调服。一服痛住。

【主治】 疝气，外肾肿胀。

03365 四圣散

【方源】《普济方》卷六十引《德生堂方》。

【组成】 荆芥穗 牛蒡子（炒，碾细） 紫河车各三钱 大黄六钱半

【用法】 上药治下筛。每服五钱，水一盏，煎八分，食后临卧时，先漱后咽。

【主治】 咽喉口齿，喉闭，乳蛾。

【加减】 大实者，大黄再加用。

03366 四圣散

【方源】《医统》卷八十五。

【异名】 四圣汤(《叶氏女科》卷二)。

【组成】 条芩 白术 砂仁 阿胶各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，艾汤调下。

【主治】 ①《医统》：漏胎下血。②《竹林女科》：胎动属脾虚而血热者。

03367 四圣散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 生白矾一两 蓖麻子七粒 乌梅五个 麝香少许

【用法】 上为末。丝绵裹，塞鼻内。息肉自消。

【主治】 鼻痔。

03368 四圣散

【方源】《纲目拾遗》卷四引《王安采药方》。

【组成】 山海螺（一名白河车） 紫河车 红石

膏 白石膏

【主治】 肠痈、便毒、脏毒、乳痈疽。

03369 四圣散

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】 草乌 白芷 山奈 当归各等分

【用法】 上为末。每服量人强弱，或八分，或一钱，酒调下。

【主治】 跌打疼痛。

【宜忌】 慎毋多服。

03370 四合汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 熟地五钱 人参一钱半 白术一钱半（炒） 茯苓一钱半 当归三钱 白芍一钱半（酒炒） 黄耆三钱（蜜炙） 川芎八分 柴胡八分 半夏一钱半（蜜炙） 黄芩一钱半（酒炒） 炙草五分

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 产后发热，脉数软弦者。

【方论选录】 产后气血两亏，湿热不化，而抑遏于中，正气不足以拒之，故发热不止焉。人参扶元补气，足御虚邪之不解；熟地补阴滋血，能资经脉之有亏；黄耆补气，益卫阳；当归养营，益血脉；白术健脾燥湿；茯苓渗湿和中；川芎入血海，专调营血；白芍敛营阴，兼退虚热；柴胡解表疏邪；黄芩清里泻热；半夏醒脾燥湿以化痰；炙草益胃缓中，以和脾也。水煎温服，使气血内充，则湿热自化而邪无不解，何发热不止之有哉？

03371 四色散

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】 黄连 黄柏各三两 赤小豆 绿豆粉各一两 紫草 寒水石 漏芦各七钱

【用法】 上为末。香油调搽，一日三次。

【主治】 热疮，遍身发，出脓血，赤烂，或火丹，或如火烧。

03372 四阴煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 生地二三钱 麦冬二钱 白芍药二钱 百合二钱 沙参二钱 生甘草一钱 茯苓一钱半

【用法】 水二钟，煎七分，食远服。

【功用】 保肺清金。

【主治】 阴虚劳损，相火炽盛，津枯烦渴，咳嗽，吐衄，多热。

【加减】 如夜热盗汗，加地骨皮一二钱；如痰多气盛，加贝母二三钱，阿胶一二钱，天花粉亦可；如金水不能相滋而干燥喘嗽者，加熟地三五钱；如多汗不眠，神魂不宁，加枣仁二钱；如多汗兼渴，加北五味十四粒；如热甚者，加黄柏一二钱（盐水炒用），或玄参亦可，但分上下用之；如血燥经迟，枯涩不至者，加牛膝二钱；如血热吐衄，加茜草根二钱；如多火便燥，或肺干咳咯者，加天门冬二钱，或加童便亦可；如火载血上者，去甘草，加炒栀子一二钱。

【方论选录】《成方便读》：生地滋肾水；参、麦养肺阴；白芍之色白微酸，能入肺而助其收敛；百合之甘寒且苦，能益金而兼可清神；茯苓以降其浊痰；甘草以散其虚热。名曰四阴者，取其地四生金也。

03373 四红丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 当归 阿胶各四两 蒲黄 血余各二两

【用法】 阿胶烊化，为丸服。

【功用】《中药成方配本》：和血，止血。

【主治】 崩漏下血不止，血败带淋，面黄肌瘦，饮食不思，骨节痠痛，及诸血证。

03374 四灵散

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】 生地二钱 朴消一两 没药五分

【用法】 上为末。酒调下。

【主治】 血灌瞳人。

03375 四妙丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】 肉豆蔻一两（用盐酒浸，破故纸同炒干燥，不用故纸） 山药一两（酒浸，北五味子同炒干燥，不用五味子） 厚朴二两（去粗皮，青盐一两同炒，青盐不见烟为度，不用盐） 大半夏一两（每个切作两块，木猪苓亦作片，水浸，炒燥，不用猪苓）

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大，辰砂一分，沉香一分，作二次上为衣，阴干。每服五七十丸，空心盐酒或米饮或盐汤送下。

【功用】 实脾土，下痰顺气。

【主治】 脾胃虚弱，脾土不能化，痰成窠斗，停于胸膈，饮食既少复迟。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“四炒丸”。

03376 四妙丸

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】 苍术二两 白芍 龟板（好酒炙酥）各二两五钱 黄柏五钱（盐、酒拌炒）

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，当归汤送下；酒亦可。

【主治】 鹤膝风。

【加减】 严寒，加附子二钱。

03377 四妙丸

【方源】《玉案》卷五。

【组成】 非菜子（炒） 菟丝子各四两 牡蛎（煅，入乳浮） 龙骨（煅）各二两

【用法】 上为末，荷叶煎汤为丸，每服二钱，空心盐汤送下。

【主治】 精不固。

03378 四妙丸

【方源】《成方便读》卷三。

【组成】 二妙丸加牛膝 苡仁

【主治】 痿证。

【方论选录】 二妙丸治湿热盛于下焦而成痿证者 加牛膝，为三妙丸，牛膝补肝肾强筋骨，领苍术、黄柏入下焦而祛湿热也；再加苡仁，为四妙丸，因《内经》有云：治痿独取阳明。阳明者主润宗筋，宗筋主束筋骨而利机关也。苡仁独入阳明，祛湿热而利筋络。故四味合而用之，为治痿之妙药也。

03379 四妙散

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】 威灵仙（酒浸）五钱 羊角灰三钱 白芥子一钱 苍耳一钱半（一云苍术）

【用法】 上为末。每服一钱，加生姜一大片，擂汁入汤调服。又，二妙散同调服。

【主治】 痛风走注。

03380 四苓汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】 白术（炒） 赤茯苓 泽泻 猪苓 白芍药（酒炒） 酒芩 酒连

【用法】 水煎服。

【主治】 热泻，小水短少，腹中作疼。

03381 四苓散

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】 四苓汤（《金鉴》卷五十二）。

【组成】 白术 猪苓 茯苓各一两半 泽泻二两半

【功用】 ①《痘疹金镜录》：利小便。②《全国中药成药处方集》：健脾止泻，利水除湿。

【主治】 脾虚湿胜，水泻，小便不利；小儿阴囊肿痛。

①《丹溪心法》：泄泻。②《痘疹金镜录》：痘内热。③《医方考》：湿生于内，水泻，小便不利。④《寿世保元》：麻疹已出，泄泻不止。⑤《证治汇补》：湿气在中，清浊混乱，小便短少，大便溏泻。⑥《张氏医通》：小便赤涩胀痛，及温热时行烦渴。⑦《文堂集验方》：小儿阴囊忽肿痛。⑧《杂病源流犀烛》：伏暑浊病。⑨《幼科释谜》：风寒湿邪不解，烦渴欲饮者。⑩《笔花医镜》：伏暑小便不通。

【加减】 湿，加苍术，甚者，苍、白二术同加（炒用）；火，加木通、黄芩。

【方论选录】《医方考》：湿胜则濡泻。故湿生于内者，令人水泻；湿并于大肠，故小便不利。白术燥而淡，燥则能健脾，淡则能利湿；茯苓甘而淡，甘则能补中，而淡亦渗湿矣；猪苓苦而淡，泽泻咸而淡，苦者有渗利而无补益，咸者直能润下而兼渗利。丹溪曰：治湿不利小便，非其治也。

【临证举例】 腹痛泄泻 《临证指南医案》：薛某，腹满下至少腹，三阴都已受伤，而周身疥疮，数年不断，脉络中必有湿热，就腹痛泄泻，腑阳不通，不独偏热偏寒之治，常用四苓散，猪苓三钱，茯苓三钱，泽泻一钱半，生于术一钱，椒目五分。

【备考】 本方改为丸剂，名“四苓丸”（见《全国中药成药处方集》）。《痘疹金镜录》以本方加木通，东流水煎服；或为末，白汤调下。《寿世保元》：水煎服。《文堂集验方》：灯心汤调服。

03382 四虎散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】 天南星 草乌头 半夏（牛） 狼毒各等分

【用法】 上为细末。醋蜜调敷，留头出毒气。

【主治】 发疽肿硬，厚如牛皮，按之方痛。

【备考】《外科正宗》本方用猪脑同捣，遍敷疮上，留正顶出气。

03383 四味丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【异名】 四生丸（《普济方》卷一八八引《十便良方》）。

【组成】 荷叶 艾叶 柏叶 生地黄各等分

【用法】 捣烂为丸，如鸡子大。每服一丸，水二盏，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【功用】《饲鹤亭集方》：补阴凉血，散瘀理气。

【主治】 阴虚内热，血热妄行所致之吐血、衄血、呕血、便血及妇人崩漏，产后出血。

①《杨氏家藏方》：吐血。②《普济方》：阳乘于阴，血热妄行，呕血、吐血、衄血。③《饲鹤亭集方》：便血。

【方论选录】 ①《古今名医方论》引柯琴：心肾不交，则五脏齐损；阴虚而阳无所附，则火炎上

焦；阳盛则阳络伤，故血上溢于口鼻也。凡草木之性，生者凉，而熟之则温；熟者补，而生者泻。四味皆清寒之品，尽取其生者，而捣烂为丸，所以全其水气，不经火煮，更远于火令矣。生地多膏，清心肾而通血脉之源；柏叶西指，清肺金而调营卫之气；艾叶芳香，入脾胃而和生血之司；荷叶法震，入肝家而和藏血之室。五脏安堵，则水火不相射，阴平阳秘，而血归经矣。是方也，可暂用以遏妄行之热血，如多用则伤营，盖血得寒，则瘀血不散，而新血不生也。设但知清火凉血，而不用归脾、养营等剂以善其后，鲜有不绵连岁月而毙者。非立法之不善，妄用者之过耳。②《成方便读》：凡吐血一证，热伤阳络者，当清其火；劳伤阳络者，当理其虚。有热伏阴分，用寒凉直折其热，而热仍不解者，则必以辛温芳香之品，从血分以宣发其邪，使热自阴出阳。然后清之泄之，乃为得当。如艾叶、荷叶，虽所入脏腑主治各有不同，而性味气质，大都相似，芳香入血，辛苦而温，且其叶皆有解散之机，从此阴中伏热，涣散不留，而以侧柏、生地直清其血，况侧柏之凉，仍寓香燥之意，恐留不尽之邪，生地之凉，乃有安抚之功，防有虚羸之失，皆用汁者，取其新鲜力专之意。

【临证举例】 呕血 《妇人大全良方》：陈日华云：先公绍兴初游福清灵石寺，主僧留饮食。将竟，侍者赴堂，斋罢来侍立，见桌子不稳，急罄折极之，举首即呕血。盖食饱拗破肺也。明年再到寺，因问去年呕血者无恙否？其主僧答云：得四生丸服之遂愈。自得此方，屡救人有效。

【备考】 本方改为汤剂，名“止血四生汤”（见《外科正宗》）。

03384 四物汤

【方源】《理伤续断方》。

【异名】 地髓汤（《圣济总录》卷一六四）、大川芎汤（《鸡峰》卷十六）。

【组成】 白芍药 川当归 熟地黄 川芎各等分

【用法】 每服三钱，水一盏半，煎至七分，空心热服。

【功用】 ①《局方》：调益营卫，滋养气血。②《普济方》：活血。

【主治】 血虚，面色萎黄，眩晕失眠，唇淡，舌淡脉弱；妇女营血虚滞，月经不调，痛经，闭经，崩漏；妊娠胎动不安，产后恶露不下；以及各科疾病属于血虚或血行不畅者。

①《理伤续断方》：伤重，肠内有瘀血者。②《局方》：冲任虚损，月水不调，脐腹疞痛，崩中漏下，血瘕块硬，发歇疼痛；妊娠宿冷，将理失宜，胎动不安，血下不止；及产后乘虚，风寒内搏，恶露不下，结生瘕聚，少腹坚痛，时作寒热。③《圣济总录》：产后亡阴，血虚汗出不止。④《鸡峰》：妊娠至产前腹痛不可堪忍，及月事或多或少或前或后疼痛。⑤《传信适用方》：赤眼。⑥《朱氏集验方》：休息痢。⑦《得效》：产后血干，痞闷心烦；产育艰难，或一岁一产。⑧《丹溪心法》：荣中有热，及肺壅鼻衄生疮，一切丹毒。⑨《普济方》：禀气不足，齿久不生；小儿时行疮痘发热，已出未出，或出不快，及疮斑余毒。⑩《玉机微义》：头痛。⑪《明医杂著》：血虚发热，或寒热往来，或日晡发热，头目不清，或烦躁不寐，胸膈作胀，或胁作痛。⑫《口齿类要》：血虚发热，口舌生疮，或牙龈肿溃，或日晡发热，烦躁不安，或因怒而致。⑬《医方考》：痘根淡，血弱者。⑭《寿世保元》：麻疹前后有潮热不退等症，并为血虚血热者；妊娠不语。麻疹既出，三日不能没，属内有虚热者。⑮《简明医彀》：失血发厥。⑯《医方集解》：一切血虚，及妇人经痛。⑰《证治汇补》：血虚，风中血脉，及偏枯在左者；阴虚血弱耳聋；血虚火动咽痛。⑱《金鉴》：一切血虚，血热、血燥诸证。伤损出血。⑲《叶氏女科》：妊娠血少无以养胎，遍身酸懒，面色青黄，不思饮食，精神困倦，形容枯槁。⑳《文堂集验方》：子宫不收。㉑《杂病源流犀烛》：近视，血虚疟，筋惕，皮痒。㉒《会约》：伤寒左手脉弱，面白唇淡，口干舌燥，血虚躁扰如狂者。

【宜忌】 ①《医方考》：若上下失血太多，气息几微之际，则四物禁勿与之。②《张氏医通》：肥盛多湿痰，及呕逆、少食、便溏者，禁用。

【方论选录】 ①《元戎》：熟地黄补血，如脐下痛，非此不能除，乃通于肾经之药也；川芎治风，泄肝木也，如血虚头痛，非此不能除，乃通肝经之药也；芍药和血理脾，如腹中虚痛，非此不能除，乃通脾经之药也；当归和血，如血刺痛，非此不能除，乃通肾经之药也。②《医方集解》引《玉机微义》：川芎，血中之气药也，通肝经，性味辛散，能行血滞于气也；地黄，血中血药也，通肾经，性味甘寒，能生真阴之虚也；当归，血中主药也，通肝经，性味辛温，分三治，全用活血，各归其经也；芍药，阴分药也，通脾经，性味酸寒，能和血，治血虚腹痛也。此特血病而求血药之属者也。③《医方考》：气、血，人身之二仪也。天地之道，阳常有余，阴常不足。人与天地相似，故阴血难成

而易亏。是方也，当归、芍药、地黄，味厚者也，味厚为阴中之阴，故能生血；川芎味薄而气清，为阴中之阳，故能行血中之气。然草木无情，何以便能生血？所以谓其生血者，以当归、芍药、地黄能养五脏之阴，川芎能调营中之气，五脏和而血自生耳。若曰四物便能生血，则末也。当归辛温能活血，芍药酸寒能敛血，熟地甘滋能补血。又曰：当归入心脾，芍药入肝，熟地入肾，乃川芎者，彻上彻下而行血中之气者也。此四物汤所以为妇人之要药，而调月者必以之为主也。④《审视瑶函》：是方治血分之圣药也。用当归引血归肝经，川芎引血归肺经，芍药引血归脾经，地黄引血归肾经。惟心生血，肝纳血，脾统血，肺行血，肾藏血，男子化而为精，女子化而为月水。血有形之物，属于阴，故名曰四物汤。⑤《古今名医方论》柯韵伯：是方乃肝经调血之专剂，非心经生血之主方也。当归甘温和血，川芎辛温活血，芍药酸寒敛血，地黄甘平补血。四物具生长收藏之用，故能使营气安行经隧也。若血虚加参、耆，血结加桃仁、红花；血闭加大黄、芒消，血寒加桂、附，血热加芩、连；欲行血去芎，欲止血去芎，随所利而行之，则又不必拘泥于四矣。若妇人数脱其血，故用以调经种子。如遇血崩、血晕等症，四物不能骤补，而反助其滑脱，则又当补气生血，助阳生阴长之理。盖此方能补有形之血于平时，不能生无形之血于仓卒；能调阴中之血，而不能培真阴之本。为血分立法，不专为女科套剂也。⑥《医方集解》：此手少阴、足太阴、厥阴药也。心生血，脾统血，肝藏血。当归辛苦甘温入心脾生血为君，生地甘寒入心肾滋血为臣，芍药酸寒入肝脾敛阴为佐，芎藭辛温通上下而行血中之气为使也。⑦《古方选注》：四物汤，物，类也。四者相类而仍各具一性，各建一功，并行不悖。芎、归入少阳主升，芍、地入厥阴主降。芎藭郁者达之，当归虚者补之，芍药实者泻之，地黄急者缓之。能使肝胆血调，阴阳气畅，故为妇人专剂。⑧《成方便读》：补血者，当求之肝肾。地黄入肾，壮水补阴；白芍入肝，敛阴益血，二味为补血之正药。然血虚多滞，经脉隧道，不能滑利通畅，又恐地、芍纯阴之性，无温养流动之机，故必加以当归、川芎辛香温润，能养血而行血中之气者，以流动之。总之，此方乃调理一切血证，是其所长，若纯属阴虚血少，宜静不宜动者，则归、芎之走窜行散，又非所宜也。⑨《谦斋医学讲稿》：这是补血、和血的通用方，不限于肝病。因为肝主藏血，比较多用，成为补肝的主方。本方的配合，熟地、白芍是血中的血药，当归、川芎是血中的气药，阴阳动静相配，故能补血，又能和血。

【临证举例】 ①痛经 《江苏中医》（1956；2:40）：作者用本方治疗痛经，疗效较佳。寒型痛经：症见月经错后、经行少腹作痛，或呈痉挛性发作，舌苔薄白或质淡无苔，脉细涩或细弱，用本方加川楝子、吴茱萸。热型痛经：症见月经超前，经量较多，色鲜红，有小血块，少腹隐痛，腰腿酸胀，舌净，脉细弱者，用本方加丹皮、地骨皮。②血管神经性水肿 《上海中医药杂志》（1964；2:26）：数年遇慢性血管性水肿5例，经其他疗法治疗均未见效，用四物汤治疗后，疗效满意。随访多年，未见再发。一例，男，32岁，反复发作5年，时伴发荨麻疹，严重时有偏头痛、上腹痛。双侧扁桃体肿大，皮肤划痕试验阳性，实验室查嗜酸球直接检查计数661/立方毫米。曾试用10%葡萄糖酸钙静注、奴佛卡因静脉封闭、自血疗法、口服苯海拉明、冬眠灵、利血平及组织疗法、针灸疗法，并转五官科做扁桃体切除，均无效。患者已失信心，又经反复发作一年后，因一次严重发作伴剧烈头痛就诊，给予四物汤治疗，经服2剂后，疼痛显著好转，6剂后停止再发。随访4年，未见复发。③荨麻疹《上海中医药杂志》（1965；8:28）：运用四物汤（熟地改为生地），治疗各种荨麻疹51例，一般服药3剂见效，连服10剂无效者改用其他方法治疗。其中慢性荨麻疹42例，显效23例，进步5例，有效3例，无效10例，加重1例；急性荨麻疹3例，均服药2～4剂后消退；固定性荨麻疹2例，服药3～4剂后均消退；人工荨麻疹4例，进步2例，有效1例，无效1例。

【现代研究】 ①抗贫血作用 《中医研究通讯》（1963；8:3）：本方能促进急性贫血时动物血细胞的再生，主要表现为网织红细胞的转变成熟。《陕西中医学院学报》（1986；2:40）：对放血所致的小鼠急性失血性贫血，给以本方后，经粒细胞、红细胞比例、有核细胞百分率的骨髓象观察及骨髓染色形态和数量的观察，发现本方可使骨髓造血机能改善，从而促进贫血的恢复。②对免疫机能的作用《江苏中医杂志》（1980；2:32）：通过对入外周血淋巴细胞转化及活性花瓣的体外实验，发现本方有显著的促进作用，提示既能增多淋巴细胞的数目，又能促进其功能，对细胞免疫有促进作用。《中医药研究参考》（1957；1:24）：本方可显著抑制特异性体液免疫。实验发现，本方对羊红细胞致敏之小鼠脾脏之溶血空斑数，即抗体形成细胞数以及血凝

素的效价，能显著降低。③抗放射线损伤作用《国外医学·中医中药分册》（1984；5:305）：对于全身软X线2000拉德（rad）照射小鼠30天生存率的实验表明，以四物汤甲醇提取物2g/kg在照射前5分钟给药，可以显著延长动物的生存时间，水提物0.25g/kg也有显著效果。拆方单味药实验表明，除川芎有以上显著效果外，余之药均无此作用。④对子宫的作用　日本《东洋医学会志》（1972；1:66）：四物汤加紫草能使子宫呈高度兴奋状态；加芸苔子可迅速使子宫收缩，以至呈痉挛状态。

【备考】《妇人良方》：此药不知起于何代，或云始自魏·华佗。今《产宝方》乃末梁时节度巡官咎殷所撰，其中有四物散，国朝太平兴国中修入《圣惠方》者数方。自后医者易散为汤，虽无杰特之功，但善用者若驭良马，以意驱策之，则随意无所不至，自可珍也。自皇朝以来，名医于此四物中增损品味，随意虚实寒燠，无不得其效者，然亦非止妇人之疾可用而已。本方改为丸剂，名"四物丸"（见《饲鹤亭集方》）。

03385　四物汤

【方源】《丹溪心法》卷二引《保命集》。

【组成】川芎　当归　白芍　生地　槐花　黄连　御米壳各等分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】下痢纯血。

03386　四和汤

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】白面一斤（炒）　芝麻一斤（炒）　茴香二两（炒）　盐一两（炒）

【用法】上为末。空心白汤点服。

【主治】腹内冷痛，脾胃不和。

03387　四炒丸

【方源】《医方大成》卷七引《简易方》。

【异名】四炒枳壳丸（《得效》卷六）、四制枳壳丸（《医统》卷四十一）。

【组成】枳壳四两（去瓤，切作两指面大块，分四处。一两用苍术一两同炒黄，去苍术；一两用萝卜子一两炒黄，去萝卜子；一两用干漆一两炒黄，去干漆；一两用茴香一两同炒，去茴香）

【用法】只用枳壳为细末，同水二碗，煎至一碗，去滓，煮面糊丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后米饮送下。

【功用】《医方类聚》引《臞仙活人方》：宽中快气，消导进食。

【主治】气血凝滞，腹内胀。

03388　四宝丸

【方源】《普济方》卷一六二引《仁存方》。

【组成】知母　贝母　款冬花　白矾（枯）各等分

【用法】上为末，以稀糊为丸，如梧桐子大，甑上蒸过。每服二十丸，食后姜汤送下。

【功用】化痰。

【主治】喘嗽。

03389　四宝丹

【方源】《疡医大全》卷十四引《汤氏方》。

【组成】雄黄三钱　硼砂二钱　甘草　钱　冰片三分五厘

【用法】上为末。蜜水调涂，或干掺。

【主治】鹅口疮。

03390　四宝丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】黄柏　赤石脂　大贝母　青黛各等分

【用法】上为细末。掺之。

【主治】臁疮。

03391　四柱散

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】天台乌药（好酒浸两宿）　高良姜（炒）　青皮（去瓤，炒）　舶上茴香（炒）各等分

【用法】上为末。每服二钱，炒生姜、童子小便调下；或炒生姜酒亦得；妇人血气甚者，煎当归酒调下，不拘时候。

【主治】伏气筑塞，小肠气、肾气、膀胱肿大、疝气等疾。

03392　四香散

【方源】《寿世新编》卷下。

【组成】茴香四分　广木香五分　沉香五分　香附（制）四钱

【用法】上为末。滚水酒冲服。

【主治】一切气痛及孕妇惯气痛者。

03393　四逆汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】甘草二两（炙）　干姜一两半　附子一枚（生用，去皮，破八片）

【用法】以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。强人可大附子一枚，干姜三两。

【功用】温中祛寒，回阳救逆。

①《伤寒明理论》：发阳气，散阴寒，温经暖肌。②《伤寒溯源集》：散下焦寒邪，助清阳升发。③《金鉴》：逐阴回阳。

【主治】 伤寒太阳病误汗伤阳，及阳明、太阴、少阴、厥阴病、霍乱病等症见四肢厥逆，恶寒蹐卧，呕吐不渴，腹痛下利，神衰欲寐，舌苔白滑，脉微欲绝者，以及瘟疫、疟疾、厥证、脱证、痛证见有上述症状，属阴证者。现常用于心肌梗塞、心衰、急慢性胃肠炎吐泻过多，各种高热大汗所致之虚脱，各种因素所致的休克等属于阳衰阴盛者。

①《伤寒论》：伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝欲攻其表，此误也，得之则厥，若重发汗，复加烧针者；伤寒医下之，续得下利清谷不止，身疼痛者；太阳病，发热头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛；阳明病，脉浮而迟，表热里寒，下利清谷；少阴病，脉沉者；少阴病，饮食入口则吐，心中温温欲吐，复不能吐，始得之，手足寒，脉弦迟，若膈上有寒饮，干呕者；厥阴病，大汗出，热不去，内拘急，四肢疼，下利，厥逆而恶寒者；霍乱病，既吐且利，小便复利，而大汗出，下利清谷，内寒外热，脉微欲绝。②《金匮》：呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者。③《肘后》：霍乱心腹胀痛，烦满短气，未得吐下。④《圣惠》：两感伤寒，阴阳二毒交并，身体手足厥逆，心中热闷，强语，三部脉微细。⑤《济生》：五脏中寒，口噤，四肢强直，失音不语，或卒然晕闷，手足厥冷。⑥《此事难知》：肝疟，令人色苍苍然，太息，其状若死者。⑦《得效》：冷证呕吐，胃中虚，四肢厥冷，食即呕吐，或因冷食伤胃，或累经汗下致虚胃气，但脉弱，小便多得利，身有微热见厥者。⑧《卫生宝鉴》：伤寒自利不渴，呕哕不止，或吐利俱发，小便或涩或利，或汗出过多，脉微欲绝，腹痛胀满，手足逆冷及一切虚寒逆冷。⑨《医林集要》：伤寒阴证，唇青面黑，身背强痛，四肢厥冷及诸虚伤寒。⑩《回春》：伤寒太阴病自利不渴，及三阴证脉微欲绝，手足厥冷；阴证，身静而重，语言无声，气少难以喘息，目睛不了了，口鼻气冷，水浆不下，大小便不禁，面上恶寒有如刀刮者。⑪《伤寒大白》：阴症呃逆，四肢厥冷。⑫《杂病源流犀烛》：湿病浊邪。⑬《会约》：瘟疫，胃寒呃逆。

【宜忌】《中药方剂近代研究及临床应用》：血虚寒滞之厥逆非本方所宜，热厥禁用。

【方论选录】 ①《伤寒明理论》：此汤申发阳气，却散阴寒，温经暖肌，是以四逆名之。甘草味甘平，《内经》曰：寒淫于内，治以甘热。却阴扶阳，必以甘为主，是以甘草为君；干姜味辛热，《内经》曰：寒淫所胜，平以辛热。逐寒正气，必先辛热，是以干姜为臣；附子味辛大热，《内经》曰：辛以润之。开发腠理，致津液通气也。暖肌温经，必凭大热，是以附子为使，此奇制之大剂也。四逆属少阴，少阴者，肾也，肾肝位远，非大剂则不能达，《内经》曰：远而奇偶，制大其服。此之谓也。②《伤寒论集注》张志聪：夫元气发原于下，从中上而达于四肢。脉沉乃生气不能从下而中，故用下焦之附子配中焦之炙草、干姜；若中焦为病而生原无恙者，止用理中丸而不必附子矣。后人有附子无干姜则不热，得甘草则性缓之说。此撰不经之语而贻误后昆者也。如当急用附子而先以桂试之者，亦误事匪浅。③《医方集解》：此足少阴药也。寒淫于内，治以甘热，故以姜、附大热之剂，伸发阳气，表散寒邪（附子生用亦能发表）。甘草亦补中散寒之品，又以缓姜、附之上僭也（甘草为君，干姜为臣，附子为使）。必冷服者，寒盛于中，热饮则格拒不纳，经所谓热因寒用，又曰治寒以热，凉而行之是也。④《千金方衍义》：四肢为诸阳之本，故能运动不息，今因阳气乖离，所以四肢厥冷。用熙附子温补下焦之真阳，干姜温散中焦之寒逆，甘草温养三焦之元气，为直中阴寒之专药。⑤《古方选注》：以生附子、生干姜彻上彻下，开辟群阴，迎阳归舍，交接于十二经。反复以炙草监之者，亡阳不至于大汗，则阳未必尽亡，故可缓制留中，而为外召阳气之良法。⑥《金鉴》：方名四逆者，主治少阴中外皆寒，四肢厥逆也。君以炙草之甘温，温养阳气；臣以姜、附之辛温，助阳胜寒；甘草得姜、附，鼓肾阳，温中寒，有水中暖土之功；姜、附得甘草，通关节，走四肢，有逐阴回阳之力。肾阳鼓，寒阴消，则阳气外达而脉升，手足温矣。⑦《寒温条辨》：此方通治三阴脉沉，恶寒，手足厥逆之证，故用附子之生者，上行头顶，外彻肌表，以温经散寒；干姜亦用生者，以内温脏腑；甘草独用炙者，以外温荣卫，内补中焦也。⑧《衷中参西》：干姜为温暖脾胃之主药，伍以甘草，能化其猛烈之性使之和平，更能留其温暖之力使之常久也。然脾胃之温暖，恒赖相火之壮旺，附子色黑入肾，其非常之热力，实能补助肾中之相火，以厚脾胃温暖之本源也。方名四逆者，诚以脾主四肢，脾胃虚寒者，其四肢常觉逆冷，服此药后，而四肢之厥逆可回也。

【临证举例】 ①少阴病 《南雅堂医案》：少阴为病，内寒外热，腹痛下利清谷，四肢厥冷，恶寒不渴，拟用四逆汤主治。附子一枚（生用）、干姜一钱五分、炙甘草三钱。《伤寒论汇要分析》：苏某

妻，30余岁。月经期间不慎冲水，夜间或发寒战，继即沉沉而睡，人事不省，脉微细欲绝，手足厥逆。当即刺人中、十宣出血，一度苏醒，但不久仍呼呼入睡。此乃阴寒太盛，阳气大衰，气血凝滞之故，拟大剂四逆汤：炮附子25克，北干姜12克，炙甘草12克，水煎，分四次温服，每半小时灌服一次。此为重药缓服办法，如一剂顿服，恐有"脉暴击"之变。服全剂未完，四肢转温，脉回，清醒如初。②虚寒下利 《全国名医验案类编》（续编）：强陆氏，年廿余岁，因夏秋伏阴在内，复纳凉食冷，致寒热伤脾而致腹痛下痢，经旬不愈，有时痛欲汗出，恶寒拘急，四肢厥冷，脉微弦而迟，此寒伤三阴，宜遵仲师温脏散寒法，以四逆汤加味。淡附子一钱、炮姜六分、清炒甘草六分、桂枝六分，一服即效，二服痊愈。对症发药，虽仅数味，功效立见，用药如用兵，贵精不贵多，信然。《浙江中医》（1964；8:14）：徐某某，男，7个月。1963年8月7日初诊。因母乳不足，每日喂米糊3次，两月前喂米糊过饱，腹胀吐泻，发高烧。西医治疗后，热退，腹泻昼夜达10多次，继续服用西药6天无效，改中医治疗8天，腹泻减至每日4～5次，因小儿服药不便而停药。两天前因受凉腹泻加重，每日7～8次，粪稀薄如蛋花汤，精神萎靡，夜间啼哭不宁，来门诊治疗。当时舌苔白而少津，四肢逆冷。断为脾肾虚寒，邪热留连胃肠。予以本方煎剂（先将制附子1.5克、干姜、甘草各9克，加水350毫升，微火煎至150毫升，再加入黄连9克，仍用微火煎至80毫升，过滤后，加入砂糖适量，煮沸后备用），每次8毫升，4小时1次。次日复诊：精神好转，大便次数减至4～5次，四肢已温，续服3天而愈。最近患儿感冒来所治疗，据家长告知：前次腹泻愈后，迄今未患过泄泻。③心肌梗死《伤寒论汤证论治》：赵某某，男，58岁，农民。胸闷气短年余，服冠心苏合丸可缓解。突然心痛难忍，心神不安，冷汗出，四肢冰冷，神昏欲睡，面色赤，唇紫甲青，四肢逆冷，冷汗不止，下利，臭味不浓，舌质淡，脉微欲绝。西医诊为急性心肌梗塞伴休克，中医诊为少阴病，当即针刺人中、内关，神渐有爽。急以回阳救逆：制附子18克，干姜10克，炙甘草25克，肉桂3克，急煎，冷服。良久，四肢渐温，冷汗消，面色已复常态，口语已利，脉复渐有神。《天津医药通讯》（1972；11:1）：在治疗的105例急性心肌梗塞患者中，有23例并发休克，经治无一例死亡。其中亡阳型用四逆汤治疗，认为本方有升压、强心作用，如与生脉散等合用，可解决较长时间用升压药以后停药血压下降的问题。④休克 《中医资料选编》（四川省军区后勤部）：李某某，女，69岁。因患肺心病、肺炎、中毒性休克、脱水而住院。神志清，颜面苍白，肺部有湿性罗音，心率92次/分，血压80/50毫米汞柱。经静脉注射四逆注射液2毫升，2分钟后上升至90/60毫米汞柱。20分钟后血压上升至100/60毫米汞柱。6小时后血压仍维持在90/50毫米汞柱，并持续2～3小时。在升压同时心跳强有力。《上海中医药杂志》（1960；1:14）：抢救麻疹严重病例136例，均属重、逆、险、凶、危、弱之证，西医属于感染性休克，用本方治疗后，仅死亡7例，大大提高了治愈率。⑤胃下垂 《云南医学杂志》（1964；3:44）：用本方加减，治疗胃下垂7例，服药日数从14～43日不等，患者腹痛、腹胀、嗳气等主要症状均显著减轻或消失，腹部压痛及X线所见之胃张力和胃大弯位置亦有部分改善。加减法：腹痛，加肉桂、樟木子、吴茱萸；腹胀，加枳实、本香、厚朴；嗳气，加山楂、麦芽；恶心，加砂仁，法半夏。⑥高血压 《广西中医药》（1980；1:30）：刘某，女，55岁，高血压病十余年，服滋潜清降药反剧。精神萎靡，步态蹒跚，面赤颧红，彻夜难寐，口干不渴，身着棉衣，四肢逆冷，大汗淋漓，舌质淡，苔薄白，脉沉细欲绝。血压20.0/14.7kPa。证属阴盛格阳。拟四逆汤加味：熟附子9克，干姜6克，炙甘草6克，党参12克，龙骨12克。一剂后手足转温，仍心烦难寐。上方加黄连3克，服3剂，诸症悉除，渐能入睡，血压18.7/12.0kPa。⑦便秘 《上海中医药杂志》（1964；6:41）：郝某，男，35岁。患便闭10月多，初因头目眩晕，曾多次服用黄连、川军等泻火药，眩晕未愈，渐至食少便难，形衰体羸，每隔十数日大便一次，燥矢停滞，便时十分困难，便后气促神疲，辗转疼痛，半日始安。又经多种通便治疗，愈通愈涩。用四逆汤三剂，感觉大便稍松，服至10剂，食多神健，眩晕亦愈。后以金匮肾气丸善后。

【现代研究】 ①升压、强心、抗休克作用 《中成药研究》（1983；2:26）：以麻醉家兔的低血压状态为模型，观察四逆汤及其各单味成分所具有的效应。结果：单味附子虽有一定的强心升压效应，但其作用不如四逆汤，且可致异位性心律失常；单味甘草不能增加心脏收缩幅度，但有升压效应；单味干姜未能显示任何有意义的生理效应。由三药合方的四逆汤，其强心升压效果优于各单味药物组，且

能减慢窦性心率，避免单味附子所产生的异位心律失常，提示该复方组方的合理性，也体现了中医"附子无干姜不热，得甘草则性缓"之说的科学性。《新医药学杂志》（1974；3:21）：经观察，四逆汤注射液肌肉或静脉注射有以下作用：1. 改善休克状态。当心源性休克收缩压在80～60毫米汞柱时，经注射后1～20分钟，血压即上升至90～110/60～90毫米汞柱，其特点是作用温和，当血压恢复正常后就不再上升；严重休克血压降至零，可先用西药升压，继以四逆汤维持之。2. 改善微循环。对四肢厥冷，唇部及皮肤灰白或青紫的患者，药后先是四肢转暖，预示可能系内脏血流灌注在质量上和动力学上得到改善。心率一般不减少，但力量加强，心音有力，脉搏有力。3. 预防休克发生。四逆汤注射液实践证明有此作用，强心效应明显。总之，认为四逆汤注射液的作用不是单纯的升压问题，还能改善微循环，具有强心和镇静作用。《中成药研究》（1985；9:24）：本方对动物失血性休克、纯缺氧性休克、橄榄油引起的栓塞性休克，冠状动脉结扎所造成的心源性休克，皆有显著的对抗作用。并还有显著的强心作用，能增加冠脉流量，对缺氧所致的异常心电图有一定的改善作用。还能兴奋垂体-肾上腺皮质功能，又有中枢性镇痛、镇静作用，并且该方毒性不大。《中医杂志》（1982；11:73）：用四逆汤煎剂进行肠道灌注，对原发性小肠缺血损伤的肠系膜上动脉闭塞性休克和继发性小肠缺血损伤的晚期失血性休克的家兔有治疗作用。②毒性研究 《药学学报》（1966；5:35）：研究表明，甘草、干姜和熟附子同煮，降低了附子的毒性。单味熟附子的鼠腹腔注射的半数致死量为3.56±0.409克/kg，口服为17.42±10.24克/kg，而按传统比例组成四逆汤，其半数致死量的附子量分别为5.821±0.599克/kg和71.78±6.84克/kg，差异显著。单味附子中毒心电图的改变与乌头碱中毒相似，而同剂量的附子组成四逆汤时，心电图则无异常改变。又以离体蟾蜍心脏进行研究，表明附子毒性效应在四逆汤中降低了30倍。③制菌作用《中医杂志》（1962；10:18）：实验证明，四逆汤不仅无制菌作用，反能促进菌簇的生长。但是，用本方加黄耆、党参等配合输血、输液等措施治疗属阳虚型的金黄色葡萄球菌败血症，却取得良好效果。为此，强调治病必先"辨证"。

03394 四逆汤

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】 干姜（炮裂，锉） 附子（炮裂，去皮脐） 桂心 甘草（炙微赤，锉） 白术 当归（锉，微炒）各半两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，稍热频服之，不拘时候。

【主治】 阴毒伤寒，脉候沉细，四肢逆冷，烦躁头痛。

03395 四逆散

【方源】《伤寒论》。

【组成】 甘草（炙） 枳实（破，水渍，炙干） 柴胡 芍药各十分

【用法】 上为末。每服方寸匕，白饮和服，一日三次。

【功用】 透解郁热，疏肝理脾。

①《注解伤寒论》：散传阴之热。②《伤寒大白》：疏通肝胆血脉，调和胃家中气，清热。③《伤寒贯珠集》：辅正逐邪，和解表里。④《谦斋医学讲稿》：疏肝理脾，调气去滞。

【主治】 少阴病，寒邪变热传里，腹中痛，小便不利，泄利下重，四肢厥逆；及肝脾不和，胸腹疼痛，泄利下重等。现常用于急慢性肝炎、急慢性胆囊炎、胆石症、胆道蛔虫症、慢性胃炎、胃溃疡、胃肠神经官能症、胰腺炎、阑尾炎、肋间神经痛及妇女月经不调、痛经、盆腔炎等属于肝郁气滞，肝脾失调者。

①《伤寒论》：少阴病，四逆，其人或咳、或悸、或小便不利、或腹中痛、或泄利下重。②《玉机微义》：寒邪变热传里，小便不利，腹中痛或泄利。③《明医指掌》：阳邪传里腹痛。阳厥轻者。④《景岳全书》：阳气亢极，四肢厥逆，在臂、胫之下。⑤《证治汇补》：热郁腹痛。⑥《类聚方广义》：痢疾累日，下利不止，胸胁苦满，心下痞塞，腹中结实而痛，里急后重者。

【宜忌】 ①《景岳全书》：阴证厥逆上过于肘，下过于膝，乃不当用。②《福建中医药》（1983；4:15）：如属寒厥的四肢不温不宜用，肝阴虚或中气虚寒者亦不宜用。

【加减】 悸者，加桂枝五分；腹中痛者，加附子一枚（炮令坼）；泄利下重者，先以水五升，煮薤白三升，煮取三升，去滓，以散三方寸匕，纳汤中，煮取一升半，分温再服。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：四逆散以散传阴之热也。《内经》曰：热淫于内，佐以甘苦，以酸收之，以苦发之。枳实、甘草之甘苦，以泄里热；芍药之酸，以收阴气；柴胡之苦，以发表热。②《金镜内台方议》：四逆为传经之邪，自阳热已

退，邪气不散，将若传阴而未入也。此只属阳，故与凉剂以治之。用甘草为君，以和其中，而行其四末；以枳实为臣，而行结滞；以芍药为佐，而行荣气；以柴胡为使，而通散表里之邪也。③《医学入门》：以邪渐入深，则手足渐冷，是以枳实之苦，佐甘草以泻里热；芍药之酸，以收阴气；柴胡之苦，以发表热。经曰：热淫之内，以酸收之，以苦发之是也。如咳者，肺寒气逆，下痢者，肺与大肠为表里，加五味子以收逆气，干姜以散肺寒；悸者，气虚而不能通行，心下筑筑然悸动，加桂枝以通阳气；小便不利，加茯苓以淡渗之；里虚腹痛，加附子以补虚；泄利后重，下焦气滞也，加薤白以泄气滞。④《医方考》：此阳邪传至少阴，里有结热，则阳气不能交接于四末，故四逆而不温。用枳实，所以破结气而除里热；用柴胡，所以升发真阳而回四逆；甘草和其不调之气；芍药收其失位之阴。⑤《张氏医通》：柴胡为来路之引经，亦藉以为去路之向导；用枳实者，扫除中道，以修整正气复回之路也。夫阴为阳扰，阳被阴埋，舍和别无良法，故又需芍药以和其营，甘草以和其胃，胃气和而真阳敷布，假证愈而厥逆自除。⑥《伤寒论三注》周扬俊：少阴至于四逆，热深而厥亦深矣。热邪内入，欲其散，非苦寒如柴胡不足以升散也；欲其泄，非苦降如枳实不足以下泄也。且阳邪入则必至于劫阴，故欲其收，非酸寒如白芍不足以收之也；合甘草以和中。仍是二味祛邪，二味辅正，无偏多偏少于其间者，邪正各为治也。⑦《伤寒大白》：本是阳症，因热邪内传阴经而厥冷，故以柴胡、白芍药疏通肝胆，伸阳气外达，则肝主四末而四肢自暖。又以枳实、甘草疏通阳明里气，伸胃阳外布，则胃主手足面手足自温。⑧《成方便读》：以柴胡自阴而达阳，邪自表而里者，仍自里而出表，使无形之邪，以此解散。然邪既自表而里，未免有形之痰食留恋。其邪结不开，邪终不能尽彻。故以枳实破结除痰，与柴胡一表一里，各得其宜。而以芍药甘草，护阴和中，相需相济，自然邪散厥回耳。

【临证举例】 ①热厥 《医学入门》：祝某，始周身骨节疼，胸腹胀满，目闭肢厥，爪甲青紫，医以伤寒治之，七日昏沉弗效。此得之怒火与痰相搏，予四逆散加芩、连泻三焦火而愈。《伤寒论译释》：诊得六脉举之有似沉细，按之数大有力，察其面青肢冷，爪甲鲜红，此火极似水，真阳证也。暂拟四逆散一服，继以大剂寒凉为合法也。春柴胡三钱，赤芍一钱五分，麸炒枳实一钱，甘草一钱。《广东医学》（1965；2:25）：龚某某，女，83岁。发热5天，头昏痛，口干苦，渴饮，大便3天未行，小便色红而短，昏眩不能起床，四肢冰冷，体温38.3℃，苔白厚，脉弦有力。属热厥。年事虽高，仍须解郁泄热，使邪去正复，厥逆自回。方用四逆散加味：柴胡二钱，白芍二钱，枳实二钱，甘草二钱，甘菊花四钱，黄芩三钱。翌晨来诊，体温已正常（36.8℃）。②热厥腹痛 《广西中医药》（1984；4:33）：梁某，女，22岁。1965年6月20日初诊：腹痛急暴，喜按，面色青，手足欠温，怕冷，脘腹胀满，嗳气、矢气则痛减，肠鸣，便溏，小便清利，舌苔薄白，脉沉细略弦。此为肝气不疏，气滞则血凝，气血不行，故面青、肢冷；气机不畅，则脘腹胀满，暴痛；因无食滞痞块，故喜按。治宜疏肝理气。处方：柴胡4.5克，白芍12克、枳实9克、炙甘草4.5克、木香（后下）3克、砂仁4.5克。连服二剂，腹痛消除。③慢性阑尾炎 《伤寒论临床研究》：果某某，女性，44岁，家庭妇女，1962年9月19日初诊。自二月前发现右下腹髂窝处作痛，每于过劳或紧张时疼痛发作，曾于某某医院诊为“慢性阑尾炎”。此次疼痛发作两天，呈交替性胀痛与牵引疼，已两天未能缓解，但无恶心呕吐。食欲睡眠二便均可，既往无其他病史。舌质正常，苔白，脉沉弦。心肺无异常。下腹回盲部明显压痛，但无抵抗紧张。证属肝气郁结，阳郁于里，不能宣达，拟舒肝和胃为治，用四逆散倍芍药。柴胡12克、枳壳6克、芍药18克、甘草6克。服下首剂之后，于右髂窝处有痛热感，翌日疼痛减轻大半，服药二剂疼痛消失，劳动亦未再发，惟偶尔稍有似痛非痛之感，服药三剂后，疼痛消失未发，脉象弦消失转弱，嘱将前方隔日服一剂，服用七剂，以巩固疗效。至10月4日复查，诸自觉症状消失未复发，脉沉而缓和，遂将前方七剂共为细末，早、晚各服10克，为善后处理。④胆道蛔虫症《福建中医药》（1962；2:37）：用本方加乌梅、川楝治疗胆道蛔虫51例，全部治愈出院。作者指出，本方用于木郁土壅之四肢厥逆，咳、悸、小便不利，腹中痛，泄利下重的少阴证，取柴胡升阳达表，疏肝利胆，冀其奥狄氏括约肌松弛；得芍药之酸甘能柔肝缓急而止痛；更配梅、楝之酸苦驱退蛔虫；又助枳实宽中下气，使蛔虫从大便排出。⑤咳嗽 《福建医药杂志》（1979；2:57）：王某某，女，25岁，工人，于1978年8月20日就诊。患者咳嗽一个月未愈，呈阵咳无痰，伴心烦少寐，时有欲呕、吐酸水，纳食正常，小溲亦，舌质红，苔薄

黄，脉左弦。此乃肝失疏达，郁而化火，上逆于肺（木火刑金），肺失清肃，胃失和降所致。宜疏肝解郁，佐以清肺止咳。毛柴胡5克、白芍9克、绿枳壳5克、郁金9克、枯黄芩9克、胆南星5克、粉甘草5克。上方服一剂诸症锐减，续服二剂痊愈。⑥慢性胆囊炎 《山东中医杂志》（1985；4:19）：栾某，女，50岁。反复发作性右胁下疼痛1年余，某医院诊断为“慢性胆囊炎”。两天前因恼怒而引发，右胁胀痛，寒热往来，嗳气泛恶，咽干口苦，痛处拒按，舌质红，苔薄黄，脉弦数。证属肝胃不和。治宜疏肝理气，和胃止痛。处方：柴胡9克，白芍9克，枳实6克，黄芩6克，半夏9克，生甘草6克。三剂后胁痛减轻，寒热消失。原方去黄芩继服三剂，疼痛缓解，饮食正常。⑦肠神经官能症《新医药学杂志》（1975；7:43）：王某，女，30岁。大便溏泻已数年，腹胀肠鸣，里急后重，常因心情不畅而加重，多次大便培养阴性，无痢疾史。医诊为肠神经官能症。慢性病容，舌偏红，苔微黄，脉弦滑，为热阻气滞证，方用四逆散加薤白。柴胡6克、白芍6克、枳实4.5克、薤白3克、甘草3克，两剂好转，共服八剂愈。《河南中医》（1983；1:83）：周某某，男，35岁，农民。右上腹疼痛，反复发作年余，发时发热畏冷，恶心欲吐，痛势牵及胸胁，医院诊为胆囊炎、胆结石。刻下右上腹胀痛不舒，食后更甚，便结尿黄，巩膜无黄染，脉弦数，舌苔薄白，边稍黄。肝木不条，郁而化火。治宜疏肝清热。柴胡9克，炒枳实6克、赤芍9克、甘草3克、川楝子6克、玄胡索6克、左金丸6克（吞）、蒲公英12克。十剂后胀痛已解，续用原方加减，服至三十余剂。迄今八个月，未见复发。⑧慢性肝炎 《福建中医药》（1983；4:14）：王某某，男，25岁。1975年5月10日诊。患者于1970年在建瓯县插队时，传染得肝炎，回榕治疗。经某某医院检查，诊为慢性肝炎，服药两个多月，肝区仍不时作痛，转氨酶仍未降低，食纳不佳，舌苔薄白，脉象弦细。法用疏肝理脾为主，以四逆散加味治之。毛柴胡6克，白芍药9克，绿枳壳6克，生甘草3克，麦谷芽各20克，板蓝根9克，鸡内金6克，川楝子9克，广郁金6克。水煎服。并以玉米须、糯稻根各15克，水煎，代茶饮。上方连服十余剂后，肝区痛除，转氨酶恢复正常，食量渐增。⑨胃溃疡 《和汉医药学会志》（日文）（1986；3:344）：用四逆散提取剂治疗胃溃疡28例。8周后显效9例（32%）；有效11例（39%）。有效率为71%。其中17例活动期胃溃疡呈瘢痕化，疼痛的改善度为93%，100%自觉症状减轻。此外发现，转氨酶呈有意义的降低，嗜酸性白细胞增加。⑩乳痈 《广西中医药》（1978；4:34）：本方加味（柴胡9克，枳实9克，青皮9克，白芍9克，炙甘草6克）治疗乳痈15例，全部获愈。其中一天治愈者4例，两天治愈者10例，三天治愈者1例。⑪阳萎 《湖北中医杂志》（1986；3:21）：本方加味治疗阳萎25例。年龄最小者25岁，最大者47岁；病程3个月至2年。结果：痊愈18例，显效4例，无效3例。处方：柴胡9～12克，枳实6～9克，白芍15～30克，炙甘草9～12克，蜈蚣3条。加减：两胁胀痛加川楝子12克；口苦咽干加栀子9克，丹皮12克；失眠多梦加炒枣仁12克，熟地黄15克，远志9克，夜交藤12克；四肢厥冷，少腹冷痛，腰膝酸软加枸杞20克，益智仁30克，紫河车粉10克（冲服），巴戟天12克；胸闷烦躁易怒加瓜蒌15克，生枣仁30克；头晕胀痛加白菊花、天麻各9克。

【现代研究】 ①对心脏功能的影响 《仲景学说研究与临床》（1985；1:35）：本方对麻醉猫有显著的升压作用，对心脏泵功能的影响，主要是通过增加心室舒张时心肌纤维收缩成份延长的最大速度和增加后负荷来实现的，与去甲肾上腺素作用类似，但强度较弱，作用持续时间较长。《仲景学说研究与临床》（1985；1:40）：四逆散水醇沉液的抗心律失常作用及其对心电图的影响：小鼠静注1.5克/千克，可明显延长P—R间期；2.0克/千克使心率减慢，并能对抗乌头碱诱发的大鼠心律失常；4.0克/千克引起Ⅰ°房室传导阻滞；4.5克/千克可致T波高耸显著（$P<0.05$）。腹腔注射四逆散水醇沉液15克/千克，也能降低氯仿诱发的小鼠室颤率。②对免疫功能的影响 《仲景学说研究与临床》（1985；1:52）：本方水醇沉液对小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬机能有较明显的促进作用。认为其所以能治疗阑尾脓肿和急性胆囊炎，可能与其增加机体防御机能有关。③解痉作用 《仲景学说研究与临床》（1985；1:52）：本方水醇沉液对离体兔肠呈抑制作用，临床用于治疗急腹症及消化道疾病，可能与其解痉作用有关。此外，还有对抗乙酰胆碱及氯化钡所致的肠痉挛作用。④毒性试验《辽宁中医杂志》（1986；7:41）：静脉连续注射四逆散水醇沉液，研究对实验动物心脏的毒性作用。在低浓度时抗休克、升压和抗心律失常作用均显著，对心、肝、肾、脾、肺皆无毒性作用。但随浓度的升高（7.0克/千克），家兔不仅出现房室传导阻滞，同时心率

减慢，S—T段下移。认为对伴有传导阻滞的休克病人应慎用，并密切观察心电图的改变。

03396 四神丸

【方源】《外台》卷六引《必效方》。

【异名】 备急四神丸(《圣济总录》卷五十七)。

【组成】 干姜一两 桂心一两 附子一两（炮） 巴豆六十枚（制）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大。饮服二丸。取快下；不下，又服一丸。

【主治】 ①《外台》引《必效》：霍乱，冷实不除，及痰饮百病。②《圣济总录》：腹满，胁肋痛不可忍。

【宜忌】 忌生葱、野猪肉、芦笋。

03397 四神丸

【方源】《赤水玄珠》卷八引东坡方。

【组成】 肉豆蔻（生）二两 破故纸（炒）四两 木香半两 茴香（炒）一两

【用法】 上为细末，生姜煮枣肉为丸，如梧桐子大。盐汤送下。

【主治】 ①《赤水玄珠》引东坡方：肾泄，下元虚。②《永类钤方》引《澹寮》：肾泄、脾泄。

03398 四神丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】 当归（切，焙）半两 乌梅七枚（去核） 黄连（去须，微炒）一两 龙骨半两

【用法】 上为细末，以薤白细研为丸，如梧桐子大。每日十五丸至二十丸，空心以温浆水送下。

【主治】 多年休息痢疾。

03399 四神丸

【方源】《直指》卷十八。

【组成】 吴茱萸（拣净）一两（一半用老酒浸一宿，一半用米醋浸一宿，各焙干） 大香附（杵净）一两 荜澄茄 青木香各半两

【用法】 上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食前盐汤送下；或乳香、葱白煎汤送下。

【主治】 肾冷，疝气胀痛。

03400 四神丸

【方源】《得效》卷十三。

【异名】 四神丹(《医学入门》卷七)。

【组成】 大天麻 天南星（各汤洗净） 防风（去芦）各一两 薄荷叶半两

【用法】 上为末，酒煮薄面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，荆芥、生姜煎汤送下。

【主治】 手足顽麻，痰涎壅盛，头目昏眩，肩背拘急。

03401 四神丸

【方源】《内科摘要》卷下。

【异名】 久泻丸(《全国中药成药处方集》（昆明方）、故纸四神丸(《全国中药成药处方集》（吉林，哈尔滨方）。

【组成】 肉豆蔻 补骨脂 五味子 吴茱萸

【用法】 上为末，用水一碗，煮生姜四两，红枣五十枚，水干，取枣肉为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心、食前服。

【功用】 温肾暖脾，涩肠止泻。

①《医方集解》：大补下焦元阳。②《古今名医方论》引程郊倩：暖肾温中。③《古方选注》：通癸水，保戊土，散虚寒，固真阴。

【主治】 命门火衰，脾肾虚寒，纳差便溏，五更泄泻，肚腹作痛。

①《内科摘要》：脾胃虚弱，大便不实，饮食不思。②《准绳·幼科》：脾虚胃弱，大便不实，饮食不思，或泄痢腹痛。③《准绳·疡医》：小腹作痛或产后泄泻，肚腹作痛。④《济阴纲目》：五更作泄。⑤《金鉴》：脾胃双虚，子后作泻，不思食，不化食；泄泻日久，肠滑不禁。⑥《胎产心法》：肾虚肝气逆，不能消克，腹胀泄泻。⑦《叶氏女科》：妊娠五更泄泻属脾肾虚弱者。

【方论选录】 ①《古今名医方论》引程郊倩：命门无火，不能为中宫腐熟水谷，脏寒在肾，谁复司其闭藏？故木气才萌，不疏泄而亦疏泄，虽是木邪行土，实肾之脾胃虚也。此际补脾不如补肾。补骨脂有温中暖下之能，五味子有酸收固涩之性，吴茱萸散邪补土，肉豆蔻涩滑益脾。暖肾而使气蒸，破滞而使气壮，补肾乃是补脾矣。②《古方名医方论》引柯琴：夫鸡鸣至平旦，天之阴，阴中之阳也。因阳气当至而不至，虚邪得以留而不去，故作泻子黎明，其由有四：一为脾虚不能制水，一为肾虚不能行水，故二神丸君补骨脂之辛燥者，入肾以制水；佐肉豆蔻之辛温者，入脾以暖土；丸以枣肉，又辛甘发散为阳也。一为命门火衰不能生土，一为少阳气虚无以发陈，故五味子散君五味子之酸温以收坎宫耗散之火，少火生气以培土也；佐吴萸之辛温，以顺肝木欲散之势，为水气开滋生之路，以奉春生也。此四者病因虽异而见证则同，皆水亢为害。二神丸是承制之剂，五味散是化生之剂也。二方理不同而用则同，故可互用以助效，亦可合用以建功。合为四神丸，是制生之剂也，制生则化，久泻自瘳矣。称曰四神丸，比理中、八味二丸较速欤！③《医方集解》：此足少阴药也，破故纸辛苦

大温，能补相火以通君火，火旺乃能生土，故以为君；肉蔻辛温能行气消食，暖胃固肠；五味咸能补肾，酸能涩精；吴萸辛热除湿燥脾，能入少阴、厥阴气分而补火；生姜暖胃，大枣补土。所以防水，盖久泻皆由肾命火衰，不能专责脾胃，故大补下焦元阳，使火旺土强，则能制水而不复妄行矣。④《古方选注》：四神者，四种之药，治肾泄有神功也。补骨脂通癸水之真阳，肉豆蔻保戊土之真气，俾戊癸化火以运谷气；吴茱萸远肝邪而散虚寒；五味子摄肾气而固真阴；姜、枣和营卫，辛酸相辅，助阳强阴，则肾关自健固矣。

【临证举例】 ①五更泻 《南雅堂医案》：脾肾虚寒，饮食不思，五更必作泻，法宜温补肾元，用四神丸加减治之。吴茱萸一两（盐汤浸炒），五味子二两（炒），破故纸四两（酒浸炒），白茯苓三两，人参一两五钱，炒白术三两，罂粟壳一两，干姜八钱，生姜八两，红枣百枚，先将姜、枣煮熟，去姜，取枣肉和药捣丸，如梧桐子，临卧用米汤或姜汤送下四钱。②过敏性结肠炎 《上海中医药杂志》：（1965；10:13）：患者9年多经常腹泻，大便溏薄不成形，每日泻3～5次，无脓血便及里急后重症，曾经中西药治疗未效。实验检查：大便有脓球少许。X线钡剂灌肠透视和摄片所见：结肠充盈良好，但结肠外形较细，结肠袋较浅，尤以乙状结肠、降结肠和横结肠为明显。诊为过敏性结肠炎。入院后先用参苓白术散治疗，虽有一定效果，但不巩固；后考虑到久病入肾，可能为肾泻，故改用四神丸，每天三次，每次6克。药后泄泻即渐减少，服药20天后，大便已成形，每天1～2次；又续服10天，大便正常，腹痛已止。停药观察一个月，疗效巩固。③积瘕 《南雅堂医案》：阳气式微，清晨泄泻，病在肾经，小腹积瘕有年，亦是阴邪痼冷之疾，宜温补下焦元阳为本原之治法。破故纸四两（酒浸炒），五味子三两（炒），肉豆蔻二两（面裹煨），生姜八两（切片），吴茱萸一两（盐汤泡），大枣百枚，先以姜、枣同煎候烂，去姜，取枣肉和诸药捣丸，每服二钱，临卧盐汤送下。④遗尿 《中医杂志》（1984；5:80）：患者赵某某，男，16岁，学生，自幼遗尿，每夜至少2次，常因天寒、劳累加重，经多方医治效果不佳。查其舌淡，苔薄白，六脉沉迟，此乃肾阳不足，膀胱气化不利，以四神丸加味施治。补骨脂9克，吴茱萸6克，五味子9克，肉豆蔻7克，益智仁9克，肉桂2克，石菖蒲6克，乌药9克，猪脬一个。将以上中药装入猪脬内，并将其口扎好，用粗针头将猪脬刺数孔，放入盆内，加水1.5公斤，煮沸后1小时左右，去渣及汤液，取猪脬切片食之。1次食完，两剂告愈，随访半年未发。

【现代研究】 对小肠运动的影响 《中成药研究》（1981；9:31）：四神丸及其组成二神丸、五味子散和单味药物五味子、吴茱萸，对家兔离体小肠的自发活动有明显抑制作用，并能对抗乙酰胆碱引起的痉挛；亦能对抗氯化钡引起的肠痉挛。四神丸与肾上腺素抑制肠管作用的比较表明，本方的抑制作用并非通过OC—受体而起作用。

【备考】 《小儿痘疹方论》薛己附方四神丸用肉豆蔻二两，补骨脂四两，五味子二两，吴茱萸（浸，炒）一两，生姜八两，红枣五十枚。

03402 四神丸

【方源】 《古今医鉴》卷十一。

【组成】 香附米八两（酒、醋、童便各浸二两，浸三日，炒） 砂仁二两（炒） 苍术二两（米泔水浸，牡蛎粉炒） 椿根白皮二两（蜜水炒）

【用法】 上为末，黄米煮饭为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心黄酒送下。

【主治】 白带。

【方论选录】 《医略六书》：湿袭冲任，经气滞涩，故带脉不能收引，带下淫溢焉。苍术燥湿强肝，香附调气解郁，砂仁醒脾化气，椿皮涩脱以固带下也。饭以丸之，酒以下之。务使肝胃调和，则湿化气行，而冲任完复，带脉收引，何带下淫溢不已哉！

03403 四神丸

【方源】 《古方选注》卷中。

【组成】 甘枸杞子（拣红润者，煮酒一杯，清水一杯和匀，以杞子浸三时，漉出，晒干，分成四份。以二两用川椒三钱拌，焙燥，拣去川椒；以二两用小茴香三钱拌，焙燥，拣去茴香；以二两同黑芝麻四钱拌，焙燥，不拣去芝麻；以二两同方解青盐研末四钱，同焙燥，不拣去青盐。焙法：以绳挂铜盆，悬火三四寸，不住手将铜盆浴转，焙至燥，要枸杞子仍是大红，焙焦则不灵。各研细） 黄甘菊（去蒂，晒）一两五钱 当归头（酒拌，晒）九钱 熟地（白水制）一两五钱 茯苓九钱 女贞子（淘漂蒸至极黑，酒浸六时，布袋擦去皮）九钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，开水送下。

【主治】 目昏云翳。

【加减】 目有赤脉者，加白蒺藜。

【方论选录】 四神丸，奇方也。本草言：枸杞子

味甘气平，退虚热，补精髓，治目昏云翳。按孙思邈、王焘、西河女子所载服食之法，惟服枸杞子经岁不辍，能延年耐老，岂非奇用而有此神效乎？今名之曰四神者，借椒、茴之香以和阳，芝、盐之润以和阴，得乎四者，制法之神耳。服之精髓生则火自退，阴液充则目自明，若服两经之药，分杀其势，则力有所不专，推原记者之心，惟恐泄真方之秘，故为溷乱以炫人耳！然独用一味，后贤必以此为不全之方，余因删去背谬之药，复以相须相使之品，减其钱数，俾枸杞得行专政，以建奇功，惟后贤临用，斟酌去就可也。

03404 四神丹

【方源】《局方》卷五（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 雄黄 雌黄 硫黄 朱砂各五两

【用法】 上为细末，入瓷盒内，将马鞭草为末，盐泥固济，慢火四围烧煅，一日一夜取出，再研细末，以糯米粽研为糊，丸如豆大。每服一粒，绝早空心新汲水吞下。

【功用】 活血实髓，安魂定魄，悦泽颜色，轻身保寿。治百病，补五脏，远疫疠，却岚瘴，除尸疰蛊毒，辟鬼魅邪气。

【主治】 男子妇人真元虚损，精髓耗伤，形羸气乏，中满下虚，致水火不交，及阴阳失序，精神困倦，面色枯槁，亡血盗汗，遗沥失精，大便自利，小便滑数，梦寐惊恐，阳事不举，腰腿沉重，筋脉拘挛；及一切沉寒痼冷，痃癖疝瘕，脐腹绞痛，久泻久痢，伤寒阴证，脉候沉微，身凉自汗，四肢厥冷；妇人百病，胎脏久冷，绝孕无子，赤白带下，月候不调，服诸药久不瘥。

【宜忌】 妊妇不可服。忌羊血、葵菜。

03405 四神汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】 麻黄（去根节，汤浸去沫）一两 杏仁（去皮尖双仁，麸炒）二十五枚 甘草（炙）半两 五味子一两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓温服。仰卧片时。

【主治】 肺喘。

03406 四神散

【方源】《苏沈良方》卷五引《灵苑方》。

【异名】 当归散（《医方类聚》卷二一八引《吴氏集验方》）、四神汤（《元戎》）、芎归散（《普济方》卷三十四）、当归汤（《普济方》卷三五一）、四顺散（《奇效良方》卷六十三）。

【组成】 当归 芍药 川芎各一两 干姜半两（炮）

【用法】 每服二钱，暖酒调下。

【主治】 妇人血虚心腹痛，产后瘀血腹痛。

①《苏沈良方》：妇人血气心腹痛。②《局方》（续添诸局经验秘方）：产后留血不消，积聚作块，急切疼痛，犹如遁尸，及心腹绞痛下利。③《元戎》：妇人血虚，心腹疠痛不可忍者。④《症因脉治》：血分有寒。⑤《医钞类编》：胞血，血从委中出。⑥《不居集》：血出不止，及妇人产后血虚。

【方论选录】 ①《胎产心法》：予谓白芍治血虚腹痛则可，若治瘀血作痛未必然也。今炒透而与炮姜合用，故血虚瘀痛兼治之。②《医林纂要》：辛以补肝而主气分，盖当归补肝血之虚，川芎以行血中之气，芍药以敛津液而萃之，而干姜则亦能随三物以去血中所挟之寒耳。谓干姜能引血药入血分，则亦非也。此治血分之挟寒者，以挟寒故去生地而易用干姜，然虚寒亦可通治。四神之名，则未知所谓。

03407 四神散

【方源】《苏沈良方》卷八。

【异名】 四等散（《鸡峰》卷十四）、胜金散（《医方类聚》卷一三九引《简易》）。

【组成】 干姜 黄连 当归 黄柏（皆炒）各等分

【用法】 上为末。每服二大钱，加乌梅一个煎汤调下。

【主治】 痢疾。

【加减】 水泻，各等分；赤痢，加黄柏；白痢，加姜；后重肠痛，加黄连；腹中痛，加当归，并空心食前服。

【宜忌】 宜食酸苦，忌甘咸。

03408 四神散

【方源】《妇人良方》卷四引《九龠卫生方》。

【组成】 菊花 当归 旋覆花 荆芥穗各等分

【用法】 上为细末。每服一钱，水一盏，加葱白三寸，茶末一钱，煎至七分，通口服。良久，去枕仰卧少时。

【主治】 妇人血风，眩晕头痛。

03409 四神散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】 白芍药 良姜（煨） 甘草（炙）各一两 香附子一两半（炒）

【用法】 上为末。每服二钱，酒调服，煎亦好。水泻，紫苏、生姜煎；赤白痢，米饮调下。

【主治】 男子、妇人一切气痛不可忍者，及水

泻，赤白痢。

03410 四神散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】当归三两 血竭三两 没药三两 延胡一两半（酒炒）

【用法】上为散。每服三钱，童便煎，去滓温服。

【主治】产后血晕，脉濡涩滞者。

【方论选录】产后血亏，瘀滞上犯心包，故昏晕不醒，不知人事焉。当归养血以荣经，延胡活血以调经，没药散瘀降血，血竭去瘀生新。为散，童便煎，使瘀血去，而新血生，则心包清肃，神明有主，安有昏晕之患乎！

03411 四退散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】蝉退 蛇退（醋煮） 猪蹄退（炒） 蚕退 荆芥各二钱半 川乌（炮） 穿山甲（烧） 粉草各半两 （又方加防风、石决明、草决明各五钱）

【用法】上为末。每服一钱，淡盐汤调下。

【主治】倒睫卷毛。

03412 四倍丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】杜仲四两（瓦器内炒黄色，去丝） 破故纸四两（瓦器内炒黄色） 甘草四两 胡桃仁四两（去皮油）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心用甘草末调汤送下。

【主治】腰膝疼痛。

03413 四倍汤

【方源】《普济方》卷三二一。

【组成】人参 牡蛎半两（盐泥煅） 赤石脂一两（醋浸七次） 菖蒲三两

【用法】上为细末。每服一钱，食前姜汤调下。

【主治】小便频数。

【备考】方中人参用量原缺。

03414 四倍散

【方源】《博济》卷二。

【组成】诃子一两（煨） 人参二两 白茯苓四两（去皮） 白术半斤

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜、大枣，同煎至六分，去滓，空心、食前温服。如早晨常服，有大功效。

【功用】补虚健脾。

①《博济》：大补虚损。②《局方》（绍兴续添方）：补虚进食。③《鸡峰》：大补脾肾。

【主治】①《博济》：脾元气不和。②《普济方》胃气不和，干呕恶心。

03415 四消丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】牙皂 香附 五灵脂 黑白丑各等分

【用法】为丸服。

【功用】《全国中药成药处方集》（北京方）：消积理气，行水止痛。

【主治】气、血、痰、食积滞，胸腹胀闷疼痛，呕吐。

①《饲鹤亭集方》：一切气积、血积、食积、痰积致成胸腹满闷，呕吐疼痛。②《丸散膏丹集成》：饱闷胀满，呕吐，憎寒壮热。③《全国中药成药处方集》（北京方）：气滞停水，胃脘作痛，胸腹胀满，便秘瘀阻，咽喉肿痛，风虫牙痛及风痛。

03416 四黄丸

【方源】《婴童类萃》卷下。

【组成】黄连 黄芩 大黄（酒煨） 胡连 山栀 银柴胡各五钱 青黛 甘草 香附（醋炒）各三钱

【用法】上为末，猪胆汁为丸，如菜子大。每服一百丸，姜汤送下，一日三次。

【主治】肺热龟胸。

03417 四黄散

【方源】《普济方》卷二七七引《卫生家宝》。

【组成】大黄 黄连 黄柏 黄芩 白及各等分

【用法】上为末，水调成膏。用鸡翎涂疮上。

【主治】汤泼火烧，热疮肿痛。

03418 四黄散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】雄黄 雌黄 石硫黄 白附子 川槿皮各等分

【用法】上为细末。生姜蘸搽。

【主治】紫白癜风作痒。

03419 四黄散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄连 31 克 黄柏 31 克 黄芩 31 克 大黄 31 克 寒水石 31 克 生地榆 31 克

【用法】上为细末，以香油（炸开后放冷再用）调和成泥膏；或以 40% 药粉配 60% 麻油，调成糊状。先以 1% 冰片液（冰片 0.3 克，冷开水加至 100 毫升）浸渍创面三至五分钟后，涂药膏。暴露创面。

【主治】烫火伤。

03420 四黄散

【方源】《中医外科学》。

【组成】黄连 黄柏 黄芩 大黄 乳香 没药各等分

【用法】上为细末；或加凡士林调为膏。散剂以水或银花露调敷患处，膏剂将油膏摊纱布上敷患处。

【功用】清热解毒，活血消肿。

【主治】阳证疮疡。

03421 四虚丹

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】鸿光（云母粉） 千秋（卷柏） 万岁（泽泻） 慈墨实（菟丝子）

【用法】上为末，以白松脂为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【功用】延年益寿

【备考】本方方名，《医方类聚》引作"四灵丹"。

03422 四兽饮

【方源】《三因》卷六。

【异名】四兽汤（《易简方》）、白术汤（《嵩崖尊生》卷九）。

【组成】半夏（汤去滑） 茯苓 人参 草果 陈皮 甘草 乌梅肉 白术 生姜 大枣各等分

【用法】上锉散，加盐少许，淹食顷，厚皮纸裹，水淹入，慢火煨香熟，焙干。每服半两，水二盏，煎至七分，去滓，未发前，并进三服。

【功用】和胃消痰，温中舒郁。

①《易简方》：和胃消痰。②《婴童百问》：温中快膈。③《杏苑》：补中气，舒郁豁痰。

【主治】气虚致疟及久疟气虚，面黄肌瘦；以及生冷不节，饱食伤胃而成下利。

①《三因》：五脏气虚，喜怒不节，劳逸兼并，致阴阳相胜，结聚涎饮，与卫气相得，发为疟疾；兼泊瘴疠。②《易简方》：食疟、诸疟。③《杏苑》：中气亏败，津液郁聚成痰，阻塞经隧，以至荣卫不清而成疟；以及疟疾未止，因生冷不节，饱食伤胃，变成下痢。④《慈航集》：久疟气虚，面黄肌瘦，缠绵不止。

【方论选录】①《杏苑》：人参、白术、茯苓、甘草、大枣诸甘温以补中益气，橘红、生姜、草果仁等诸辛温之剂以疏豁郁滞，助乌梅、半夏以豁痰。②《医林纂要》：人参、白术、茯苓、甘草、半夏达阳于阴中而通其阻滞；陈皮行肝气之郁滞，破肺淫之阻塞；草果补肝泻肺，暖胃和脾，去积行痰，比常山为和顺；乌梅补肺泻肝，敛阴和胃，去瘀消湿，平内外上下之争；生姜以协半夏驱外闭之邪；大枣助四君子以和中气。此治疟之乘于内伤者，故四君子君人参以补中也，半夏以消之，陈皮以宣之。虽有七情之郁，亦可使通而无滞。二陈以除痰，痰因气阻，加乌梅、草果而谓之四兽。助以姜、枣，所以大畅其阳，使由中而达外也。③《成方便读》：草果入脾，助阳散寒；乌梅入肝，存阴敛液；加于六君中，助正气而和阴阳。因虚久疟，岂有不愈者哉！

03423 四维散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参一两 制附子二钱 干姜（炒黄）二钱 炙甘草一二钱 乌梅五分或一钱（酌其味之微甚，随病人之意而用之）

【用法】上为末，和匀，用水拌湿，蒸一饭顷，取起烘干，再为末。每服一二钱，温汤调下。

【主治】脾肾虚寒滑脱之甚，或泄痢不能止，或气虚下陷，二阴血脱不能禁者。

【方论选录】《退思集类方歌注》：参、附、姜、甘，温补脾肾，加乌梅酸收，以固滑脱也。

03424 四温散

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【异名】四温汤（《普济方》卷一八七）。

【组成】附子（炮裂，去皮脐） 蓬莪术（煨，锉）各一两 胡椒 枳实（麸炒）各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，热酒调下。

【主治】寒气客在胸中，郁而不散，坚满痞急，病名胸痹。

03425 四蜕散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】乌鸡子壳（已抱出鸡儿者） 蛇蜕各半两（烧灰） 乌贼鱼骨（去硬皮）一两 龙骨一分

【用法】上为细末。每用入腻粉少许，湿即干掺，干即油调敷之。

【主治】臁疮。

03426 四精丸

【方源】《医统》卷七十二引《济生》。

【组成】鹿茸（制） 肉苁蓉（制） 山药 白茯苓各等分

【用法】上为细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，大枣汤送下。

【主治】白浊烦渴。

03427 四精丸

【方源】《医方大成》卷四引《经验方》。

【组成】茯苓 秋石各四两 莲肉（去壳皮心）

水鸡头（粉红花在上结子垂下）各二两

【用法】 上为末，以蒸枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，盐酒、盐汤送下。

【功用】《医方类聚》引《经验良方》：补益精髓，驻颜悦色。

【主治】 ①《医方大成》引《经验方》：思虑色欲过多，损伤心气，遗精，小便频数。②《万氏家抄方》：肾虚盗汗腰痛。

03428 四磨汤

【方源】《济生》卷二。

【异名】 四磨饮(《证治要诀类方》卷二)。

【组成】 人参 槟榔 沉香 天台乌药

【用法】 上各浓磨水，和作七分盏，煎三五沸，放温服。或下养正丹尤佳。

【功用】 ①《中医方剂学讲义》：破滞降逆，兼以扶正。②《医方发挥》：顺气降逆，宽中补虚。

【主治】 七情郁滞，痰气交阻，上气喘急，胸膈痞闷。

①《济生》：七情伤感，上气喘息，妨闷不食。②《普济方》：七情郁滞，痰气上壅，喘急声促。③《杏苑》：水肿。④《张氏医通》：一切气塞，痞闷不舒，不时暴发。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手太阴药也。气上宜降之，故用槟榔、沉香，槟榔性如针石，沉香入水独沉，故皆能下气；气逆宜顺之，故用乌药；加人参者，降中有升，泻中带补，恐伤其气也。②《金鉴》：七情随所感皆能为病，然壮者气行而愈，弱者气著为病。愚者不察，一遇上气喘息，满闷不食，谓是实者宜泻，辄投破耗等药，得药非不暂快，初投之而应，投之久而不应矣。若正气既衰，即欲消坚破滞，则邪气难伏，法当用人参先补正气，沉香纳之于肾，而后以槟榔、乌药从而导之，所谓实必顾虚，泻必先补也。四品气味俱厚，磨则取其气味俱足，煎则取其气味纯和，气味齐到，效如桴鼓也。③《成方便读》：以槟榔、沉香之破气快膈峻利之品，可升可降者，以之为君；而以乌药之宣行十二经气分者助之；其所以致气之逆者，虚也。若元气充足，经脉流行，何有前证？故以人参辅其不逮，否则气暂降而郁暂开，不久又闭矣，是以古人每相需而行也。若纯实无虚者，即可去参加枳壳。④《历代名医良方注释》：此方乃醒气、散气、降气、纳气，而又维护正气之方也。气喘分两大纲，一在上为实，乃肺气不通调；一在下为虚，乃肾气不归根。本方证治，兼而有之。盖七情感伤，郁滞郁结，气喘而急，上而不下，留滞膈间空膜之地，形成气膈。方制槟榔以开之，乌药以导之，沉香以降之纳之。又用人参之大有力者，主持其间，俾气有统摄，不致散漫耗蚀，上下循环，营周不休，以归复于生理正常。尤妙在四药皆磨，既取其气味之全，又取其缓缓斡旋，不过攻过补，致令转变气损气滞反应之嫌。一本磨上三药，倍人参煎汤，入盐调下，对于虚甚不能运药，又求人参补力之早达，未为不可。然煎则补住气痰，恐诸气药反难以奏功。观喻嘉言《寓意草》，治痰喘夹虚，用人参切则效，人参用煎则不效，其意殊耐深思。要之须恰符病窍病机，斯可耳。

【临证举例】 ①胃脘痛《新中医》（1983；7：11）：许某，男，39岁，教师。罹患胃脘疼痛反复发作已三年之久。自感胃部胀痛满闷，按之则舒，攻冲季胁，嗳气频作，纳呆，舌质正常，苔薄白，脉沉弦。经钡餐造影诊断为“浅表性胃炎”，证属肝疏失调，横犯中州之木侮土。拟降逆解郁，益举中气，处方：乌药、沉香（另冲）、炒槟榔、党参、枳壳各10克，炒赤芍、软柴胡各6克，四剂，水煎日服二次。服药后痛胀略减，冲气已平，嗳气仍作，继以原方减槟榔、柴胡消导升疏之品，加半夏降逆醒脾。连进四剂，诸证均减。原方改散剂续进两料善后，未再复发。②梅核气《新中医》（1983；7：12）：郭某，女，44岁，干部。患者咽喉似有异物感，已有年余，咽之不下，吐之不出，如物梗咽，但进食吞咽正常，曾经多方治疗不显，患者疑为恶变，情绪紧张，精神淡漠，不思饮食，胸中不适，夜不成寐，舌尖红，苔薄白，脉弦细。良由七情郁结，气机不畅，津液失于输布以致痰气交阻而成梅核气证，法宜开郁散结，调理气机为主。方用：乌药、沉香、海藻、槟榔、生甘草、浙贝母各10克，参须4.5克，石斛15克，生麦芽30克。四剂后咽部稍感舒适，饮食猛增，夜已入睡，效不更法，连进13剂，患者喜告病已衰其大半，其效之速，出余所料，后改为丸剂，并嘱其注意饮食起居，经远期追访未再发。

03429 四磨饮

【方源】《医统》卷四十一引《易简方》。

【异名】 四磨汤(《症因脉治》卷二)。

【组成】 沉香 乌药 枳实 槟榔各等分。

【用法】 白汤磨服。

【功用】《医略六书》：导滞降逆。

【主治】 气滞喘逆。

①《医统》引《易简方》：诸气。②《症因脉治》：伤损喘逆。③《医略六书》：气结于中，滞逆

不降，脉沉。

【方论选录】《医略六书》：怒逆于中，气结不降，此肝胃受病，故胀满气喘不止。槟榔导逆气，枳壳泻滞气，乌药、沉香下气以平喘胀也，俾滞化气行，则结伏自解，而逆气无不平，何喘胀之有？虚人去枳壳加人参，非专补气，乃使槟榔、沉香、乌药得人参之力，则下气更速耳。

【临证举例】痰喘《续名医类案》：柴屿青治程别驾尊人，高年忽患痰喘，不进饮食，诊其脉有根，决无意外事。用四磨汤内加人参一两，一服而愈。

03430 四君子汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】白术 人参 黄耆 茯苓各等分

【用法】上为粗末。每服五六钱七钱，水一盏，煎至七分，去滓，食远温服。

【功用】益气。

【主治】真气虚弱，肺损气短，或吐泻转筋，脉长而弱。

①《保命集》：肺损而皮聚毛落。②《奇效良方》：吐泻转筋，身热脉长。③《准绳·类方》：真气虚弱，短气脉弱。

03431 四君子汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】人参（去芦） 白术（去芦） 茯苓（去皮） 黄耆（蜜炒） 川芎 陈皮 半夏（姜制） 天麻 桔梗（去芦） 白芷 当归各等分 甘草减半

【用法】上锉一剂。加生姜一片，大枣一枚，水煎，温服。

【主治】气虚湿痰头眩。

03432 四七调气汤

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】紫苏一钱五分 厚朴（姜汁炒）一钱五分 茯苓一钱五分 半夏一钱五分 枳实（炒）一钱半 砂仁一钱五分 苏子（炒）一钱五分 陈皮一钱五分 甘草五分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】七情四气，以致膈噎翻胃。

03433 四子明目散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】黑豆半斤 冬瓜子四两 蒺藜子五两 菠菜子二两

【用法】俱用盐炒，为末。每服三钱，一日二次。

【功用】明目。

【主治】瞳孔缩小症。两眼瞳孔小如粟米，不疼不痒，视物昏蒙。

【备考】初期本方有效，久则无效。

03434 四圣朝元丹

【方源】《济阳纲目》卷六十四。

【组成】人参 熟地（砂仁炒） 肉桂各一两 川椒（去目炒） 小茴香（炒）各四两 茯苓 何首乌（黑豆蒸） 牛膝（酒浸） 干山药 杜仲（酥炙） 枸杞子 当归（酒洗）各一两 沉香 木香（不见火）各五钱 苍术一斤（酒、醋、盐、水各浸四两，春五、夏三、秋七、冬十日，焙干）

【用法】上各为细末，用好酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下；如不饮酒，淡盐汤送下。

【功用】益精神，补元阳，清耳目，去下焦湿。

【主治】诸虚不足，下元亏损，腿脚无力，脾胃虚弱，头目昏眩，四肢倦怠。

03435 四色断痫丸

【方源】《幼科发挥》卷一。

【组成】黄连五钱 飞朱砂二钱五分 胆星一钱 白甘遂三分

【用法】上为末，猪心血杵匀，粟米糊为丸，如芡实大。每服一丸，灯草煎汤化下，夜服三次，日服一次。

【主治】小儿痫证初期发搐，或一月一发，或一月再发。

03436 四君归芍汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参 白术（蜜炙） 茯苓 炙甘草 当归 白芍（炒）各一钱

【用法】加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】妊娠血少，不能养胎，腹痛喜按，脉无力。

03437 四君芎归汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参 白术（蜜炙） 茯苓 当归 川芎 砂仁 炙甘草各一钱

【用法】加生姜三片，葱白三茎，水煎服。

【主治】妊娠四五月，胎气不和，逆上心胸，胀满疼痛，名子悬，脾虚而不安者。

03438 四妙勇安汤

【方源】方出《验方新编》卷二，名见《中医杂志》（1956；8:409）。

【组成】金银花 元参各三两 当归二两 甘草

一两

【用法】 水煎服。一连十剂，永无后患。药味不可减少，减则不效。

【功用】 《方剂学》：清热解毒，活血止痛。

【主治】 脱骨疽。此症生手足各指，或云生手足第四指者是。或生指头，或生指节指缝，初生或白色痛极，或如粟米起一黄泡，其皮或如煮熟红枣，黑色不退，久则溃烂，节节脱落，延至手足背腐烂黑陷，痛不可忍。

【方论选录】 ①《方剂学》：银花甘寒入心，善于清热解毒，故重用为主药，当归活血散瘀，玄参泻火解毒，甘草清解百毒，配银花以加强清热解毒之力，用量亦不轻，共为辅佐。四药合用，既能清热解毒，又能活血散瘀，是治疗脱疽的良方。②《中医方剂临床手册》：本方重用银花清热解毒为主药；玄参滋阴清热为辅药；当归和血和营为佐药；甘草和中解毒为使药。本方特点，药味少，效用专。治疗脱疽溃烂，热毒正盛，而阴血耗伤者，甚为合适。

【临证举例】 ①血栓闭塞性脉管炎 《中医杂志》(1956；8:409)：沧县专区第一人民医院老中医释宝山，自1955年7月至10月，用本方治疗动脉栓塞性坏疽症34例，一般服药5～20剂即大体痊愈。如：患者杨瑞芬，1954年3月患病，曾经20多位医师治疗，未见好转。1955年10月来诊治时，左脚已成青紫色，脚趾开始溃烂，瘙痒钻心，疼痛，已决定截肢。服本方4剂后，疼痛即止；服10剂后，脚趾开始脱落，不久伤口长出新肉而愈。《天津医药杂志》(1960；1:1)：用四妙勇安汤治疗血栓闭塞性脉管炎30例。其中部分有明显皮冷、苍白的患者，加用附子二钱、赤芍五钱、桂枝钱半、牛膝三钱。结果除2例在服药半月及1个月仍未收效又行肾上腺切除及交感神经切除术外，其余均收到近期满意疗效，治疗后患肢疼痛及凉麻感觉均减轻或消失。短者服药5剂，长者服药30剂。②静脉炎 《吉林中医药》(1986；4:18)：支某，女，31岁，因宫外孕大出血休克，行下肢静脉剖开自体输血及输液，7日后腹部切口愈合拆线，左下肢静脉剖开及大隐静脉所经处红肿硬痛，腹股沟淋巴结肿大。行局部湿敷、理疗，肌注青，链霉素，口服消炎药治疗二周无效，体温39℃，白细胞15000/mm³，精神不振，食欲减退，下肢活动受限。拟清热通经，活血散瘀，方用四妙勇安汤：金银花100克、玄参100克、当归60克、甘草30克，水煎服。三剂后，热退，局部疼痛及浮肿明显减轻，食纳倍增。原方药量各减半，继服三剂，诸症俱除。一周后痊愈出院。③下肢溃疡 《福建医大学报》(1973；2:45)：本方加减治疗2例下肢慢性溃疡，获得良好效果。举例：男性，56岁。小腿慢性溃疡已30年，经各种抗菌素及换药等治疗均无效。右小腿外下方及左小腿中前方各有一鸡蛋大小的慢性溃疡，周围皮肤伴有色素沉着及轻度浮肿。入院后溃疡面用雷夫奴尔溶液清洁换药，内服本方，经治月余而愈。④坐骨神经痛 《湖北中医杂志》(1982；3:19)：用四妙勇安汤加味治疗坐骨神经痛30例。基本方：玄参、当归、银花各30克，甘草15克，灵仙，牛膝各10克，五加皮、川牛膝各12克。每日一剂。湿热偏重者，加黄柏、地龙；寒湿偏重者，加附子、细辛；气虚者，加党参、黄耆；兼血瘀者，加桃仁、红花、土鳖；腰痛者加杜仲、寄生；筋脉拘挛者及肌肉萎缩者，加白芍、玉竹、伸筋草；剧痛者倍用玄参、当归、银花。结果治愈21人，显效8人，无效1人。有4例复发后再经治疗，同样收到显效。治疗后疼痛消失，最短1天，最长45天。⑤红斑性肢痛症 《中医杂志》(1979；12:34)：本方加紫花地丁、连翘治疗红斑性肢痛症4例，均获痊愈。典型病例：证见两足自踝关节以下均呈弥漫性肿胀，剧痛，痛时两足焮红而热，遇热则甚，得凉则安，苔黄舌红，口干渴。用上方并配合乳香、没药、红花、当归泡洗患肢，共治两月余，病情稳定，痊愈出院。作者认为，红斑性肢痛与血栓闭塞性脉管炎蕴热期同属"热痛"范畴，本方加紫衣地丁、连翘两味则效果更好。增加中药泡洗患足，活血通络，通则不痛，能提高疗效。

【现代研究】 对血栓闭塞性脉管炎血液流变学特性的观察 《山东中医学院学报》(1979；4:38)：用本方对血栓闭塞性脉管炎湿热型和血瘀型病人治疗前后的血液流变学特性进行观察，认为本病患者血浆粘度比正常人高，红细胞电泳时间延长，血沉快，血液处于粘度高、易聚的状态。用本法治疗后，湿热型病人血浆粘度降低，红细胞电泳时间变快；血瘀型病人治疗前血粘度比正常人高，治疗后则下降，红细胞和血小板电泳变快。此结果与本病患者不正常之血液流变学特征相对应，提示了活血化瘀治疗可使血液粘聚状态好转或消除，临床症状得以改善。

03439 四苓五皮汤

【方源】 《东医宝鉴·杂病篇》卷六引《辨疑》。

【组成】 桑白皮 陈皮 地骨皮 茯苓皮 生姜

皮 大腹皮 苍术 白术 泽泻 猪苓 青皮 车前子（炒）各一两

【用法】 上锉，作一贴。水煎服。

【主治】 浮肿。

03440 四味乌沉汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 乌药 香附 砂仁 沉香各等分

【用法】 加生姜；水煎服。

【主治】 心脾刺痛。

03441 四味补心丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】 当归（酒洗，焙干）二两 朱砂一两（别研） 肉苁蓉（酒浸一宿，焙干）二两 杏仁一百五十枚（汤泡，去皮尖，研成膏）

【用法】 上为细末，以杏仁膏同和，如干，以浸药酒煮薄糊添和，杵千余下为丸，如绿豆大。每服三十丸，用米饮或温酒送下，不拘时候。

【功用】 益血补心，安神定志。

【主治】 怔忪惊悸，恍惚健忘。

03442 四味枳实散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 枳实一两 人参 川芎 芍药各五钱

【用法】 上为末。每服二钱，生姜，大枣汤调服。

【主治】 肝气不足，两胁疼。

03443 四味茴香散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 乌药（酒浸一宿，焙） 良姜 小茴 青皮各一两

【用法】 上为末。每服二钱，发时热酒调服。

【主治】 风寒伤肝，囊茎抽痛，俗名小肠气，痛不可忍。

03444 四味香连丸

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】 四味连香丸(《玉案》卷三)。

【组成】 黄连（炒）十两 大黄（酒煨）四两 木香二两 槟榔一两

【用法】 上为末，糊为丸，如绿豆大。每服七十丸，空心米饮送下，一日二次；如下痢色黑用大黄，色紫用地榆，色红用黄芩，色淡用生姜，色白用肉桂，色黄用山楂，水泄用粟壳，痛甚用木香、山栀，各煎汤送下。

【主治】 痢初起，不问赤白。

03445 四味黄连丸

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】 四味茱连丸(《医钞类编》卷十)。

【组成】 黄连一两 吴萸一钱 桃仁二十四枚 陈皮五钱 半夏一两半

【用法】 上为末，神曲糊丸，如绿豆大。每服一百丸，生姜汤送下。

【主治】 痰火挟瘀，吞酸。

03446 四物五子丸

【方源】《普济方》卷七十二引《澹寮》。

【组成】 菟丝子（制） 地肤子 枸杞子（酒蒸） 覆盆子（酒浸） 车前子（酒浸） 酸枣仁（去壳） 薏苡仁（炒） 柏子仁（炒） 鹿茸 苁蓉 当归 熟地黄 沉香 茯苓 川芎 白芍药各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸。空心温酒送下。

【主治】 肝肾不足，体弱眼昏，内障生花，不计远近。

03447 四物龙胆汤

【方源】《元戎》。

【异名】 龙胆汤(《赤水玄珠》卷三)。

【组成】 四物汤各半两 羌活 防风各三钱 草龙胆 防己各二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《元戎》：目赤暴发作云翳，疼痛不可忍。②《杂病源流犀烛》：肝火盛，目赤涩痛。

03448 四物白通汤

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】 生地四钱 当归五钱（酒洗） 川芎三钱 赤芍二钱 白芷一钱 生香附二钱

【用法】 加葱管三茎，水、酒各半煎服。或加通草三钱。

【主治】 乳汁不通。

03449 四物瓜藤散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】 当归 川芎 白芍 生地 木瓜 钩藤 川断 丹皮 防风

【功用】 养血温经，祛风舒络。

【主治】 产后气血虚，风寒客于皮肤，入于经络，致颈痹不仁，甚则拘挛，筋节不能自如。

【方论选录】 产后元气虚，胃气未复，饮食未充，新血不能骤长，筋脉拘挛故其常也。医不知峻补阴血而以祛风发表为主，是虚其虚矣。是方以四物养血为主，而佐以钩，瓜、川断，舒筋祛风，通周身关节，丹皮祛血中游风伏火，防风通行十二经，处方之平易近入也。

03450 四物加味汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 四物汤一两 人参二钱 吴茱萸五分（醋泡，炒黑） 赤石脂二钱（醋炒） 炮姜五分

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 崩漏，脉虚者。

【方论选录】 血室虚寒，阳气不能统运，故蓄泄无权，腹痛崩漏焉。四物汤以滋培血室，吴茱萸、炮姜以温中逐冷，更用人参扶元补气，石脂涩脱定崩漏也。水煮温服，俾血室既充，则寒邪无不化，而冲任蓄泄有权，经行自然如度，何患腹痛不退，崩漏不除乎！

03451 四物当归汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】 当归（切，焙）一两 桂（去粗皮） 甘草（炙，锉） 干姜（炮裂）各一两半

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至六分，去滓温服，空心、日午、临卧各一。

【主治】 寒中腹痛。

03452 四物安神汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 当归（酒洗） 白芍（酒洗） 生地黄（酒洗） 熟地黄 人参（去芦） 白术（去芦） 茯神（去皮木） 酸枣仁（炒） 黄连（姜炒） 栀子（炒） 麦门冬（去心） 竹茹 乌梅一个 辰砂（研末，临服调入）

【用法】 上锉一剂。加大枣二枚，炒米一撮，水煎，食远服。兼服辰砂安神丸。

【主治】 心中无血养，怔忡。

03453 四物导痰汤

【方源】《女科指南》。

【组成】 当归 川芎 地黄 芍药 甘草 半夏 杏仁 瓜蒌仁 橘红 茯苓 南星 黑枳实 黄芩 黄连 香附

【用法】 水煎服。

【主治】 痰火怔忡，及心胃嘈杂，眩晕。

03454 四物坎离丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 生地一两半 熟地三两（同酒浸，捣膏） 当归二两 芍药一两半（同酒炒） 知母一两 黄柏二两（同酒浸，炒） 侧柏叶 槐子各一两（同炒） 连翘六钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，用瓷盘盛之，以绵纸糊口，凉地下放七八日，去火毒，晒干收之。每服三四十丸至五六十丸，白汤或酒送下。

【功用】 善乌须发。

【主治】 ①《医学入门》：肠风。②《医部全录》：脾湿下流于肾，与相火合为湿热，迫经下漏，紫黑臭腐。

03455 四物补心汤

【方源】《医略六书》卷三十一。

【组成】 生地五钱 白芍一钱半（炒） 川芎一钱 当归三钱 白术一钱半（炒） 枣仁二钱（炒） 远志一钱半 半夏一钱半（制） 茯神二钱（去木） 炙草六分

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 产后恍惚颠倒，脉虚弦者。

【方论选录】 产后血亏痰滞，迷惑心窍，故心神恍惚，语言颠倒。生地壮水以滋心血，枣仁养心以宁心，白芍敛阴和心脉，当归养血荣心经，川芎行血海，白术健脾元，半夏化痰燥湿，远志通肾交心，茯神安神定心，炙草缓中益胃。水煎温服，使脾胃调和，则痰湿自化，而心血内充，心神得养，安有语言颠倒神情恍惚之患乎？

03456 四物补肝散

【方源】《审视瑶函》。

【异名】 四物补血汤（《眼科阐微》卷三）、四物补肝汤（《金鉴》卷七十八）。

【组成】 熟地黄（焙干）二两 香附子（酒制） 川芎 白芍（酒洗，炒） 当归身（酒洗，炒） 夏枯草各八钱 甘草四分

【用法】 上为细末。每服二三钱，食后滚白汤送下。

【主治】 ①《审视瑶函》：妇人产后，午后至夜昏花不明。②《疡医大全》：雀目初起，头旋，常见五色不定，目中困倦，时暗时明。

【方论选录】 以熟地黄补血、当归养血为君；夏枯草入厥阴，补养血脉为臣；甘草益元气补脾胃，白芍补脾和血为佐；川芎助清阳之气上升，香附理气血，故为使耳。

03457 四物补经汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】 当归 白术 香附 川芎 熟地 黄耆 陈皮 白茯苓各三钱 人参 阿胶 沉香（另磨） 小茴香 茱萸各二钱 粉草一钱

【用法】 分八帖。加生姜三片，水煎服。兼乌鸡丸调理。

【主治】 妇人二十五、六岁，血气虚冷，经脉不调，或乍痛，或下白带如血脑髓，或似米泔，不分信期，每来淋沥不止，面色萎黄，四肢无力，头昏目眩。

03458 四物绛覆汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 细生地四钱（酒洗） 生白芍钱半（酒炒） 真新绛钱半 广橘络一钱 全当归二钱（酒洗） 川芎五分（蜜炙） 旋覆花三钱（包煎） 青葱管三寸（切，冲）

【功用】 滋阴濡络。

【主治】 血虚脉络郁涩，血郁化火，致郁结伤中，脘胁串痛，甚则络松血溢，色多紫暗。

【加减】 痛甚者，加桃仁七粒，蜜炙延胡一钱半，活血止痛；挟火者，加川楝子一钱半，丹皮一钱半，苦辛泄热。

【方论选录】 以生地、归、芍养血滋阴为君；臣以绛、覆、川芎辛润通络；佐以橘络舒络中之气；使以葱管通络中之瘀。此为轻清滋阴，辛润活络之良方。

03459 四物逍遥散

【方源】《疡科心得集》卷上。

【组成】 柴胡 当归 白芍 茯苓 白术 炙甘草 川芎 生地 生姜 薄荷

【主治】 妇人患茧唇，阴血衰少者。

03460 四物益母丸

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】 川当归（酒洗） 熟地黄（制）各四两 川芎 白芍药（炒）各二两 益母草（不犯铁器，为末）半斤 香附子（制）半斤 吴茱萸（汤泡）二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心酒化下。如不喜化，只作小丸吞服亦可。

【主治】 妇人经水不调，小腹有块，时痛。

03461 四物消风饮

【方源】《金鉴》卷七十三。

【异名】 四物消风散（《医钞类编》卷二十二）。

【组成】 生地三钱 当归二钱 荆芥 防风各一钱五分 赤芍 川芎 白鲜皮 蝉蜕 薄荷各一钱 独活 柴胡各七分

【用法】 加红枣肉二枚，水二钟，煎八分，去滓服。

【功用】 调荣滋血消风。

【主治】 赤白游风，滞于血分发赤色者。

03462 四物麻仁丸

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】 熟地五两 当归三两 白芍两半（酒炒） 川芎一两 麻仁三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，每服三五钱，百沸汤送下。

【主治】 大便秘结，脉涩者。

【方论选录】 中风解后，津液不足，无以下润肠胃，故大便燥结，便秘不通矣。熟地补阴滋血，当归养血荣经，川芎活血中之气，白芍敛血中之阴，麻仁润燥以通虚闭也。蜜丸以缓之，沸汤以下之，使阴血内充，则津液自润，而肠胃触和，大便无燥结之患矣。

03463 四制香附丸

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 香附子（杵，去皮毛，净子）八两（分作四份，酒、醋、童便、盐水煮，晒，炒） 黄柏（酒炒） 熟地黄各一两（酒水煮烂捣膏） 泽兰叶（净叶） 川芎（酒洗，炒） 白芍药（酒洗，炒） 当归（炒）各一两半 益母草四两（勿犯铁器）

【用法】 除地黄膏另入，余共为细末，铺地一宿，去其火性，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三钱，空心滚白汤送下；或食远亦可。

【主治】 妇人产后崩漏，亡血过多，致睛珠疼痛，经水不调。

03464 四制香附丸

【方源】《成方便读》卷四。

【组成】 香附四两 当归三两 广艾绒二两 白芍 黄芩 丹参各二两 生地四两 川芎一两五钱 甘草 广皮 砂仁各一两

【主治】 妇人经水不调，赤白带下，气血凝滞，腹痛经闭，或气块血块，两胁胀满，及呕吐恶心，胎前产后一切等证。

【方论选录】 妇人之病，首重调经，经调则诸病易愈。即胎前产后，亦当观其气血之盛衰寒热而调之，调之之法固不同，而总不外乎先理其气，使气顺则血调之意。此方以丹参四物和血调经，必假香附之善行气分者，为之先道，故以为君。然所以资生血气者，又在于脾，若脾虚气滞，则经血亦为之不调，故以甘草、陈、砂补脾疏滞。于是观其病之偏于寒者，则用广艾绒以温之；偏于热者，则用黄芩以清之。是以医不执方，加减在乎人用耳。

03465 四制鲮鲤丸

【方源】《种福堂方》卷三。

【组成】 归尾五钱 大黄 荆芥 桔梗 乳香（炙） 没药（炙）各二钱 黄芩 连翘各三钱 防风 羌活各二钱半 全蝎一钱 蝉蜕二十个（去头） 僵蚕二十五个 牛皮胶一两（土炒） 雄黄七分 金头蜈蚣四条（去头足，分作四样法制：一条

用姜汁搽，焙干；一条用香油搽，焙干；一条用醋搽，焙干；一条用酥搽，炙） 穿山甲四两（亦作四制：一两用红花五钱煎汤煮，焙干；一两用牙皂五钱煎汤煮，焙干；一两用紫草节五钱煎汤煮，焙干；一两用苏木五钱煎汤煮，焙干）

【用法】 上为细末，真米醋打糊为丸，每丸重一钱二分，朱砂一钱五分共为衣，瓷瓶收贮，瓶内放麝香五分以养之。每服一丸，滚酒送下。

【主治】 一切无名肿毒，瘰疬。

03466 四治黄连丸

【方源】 《本草纲目》卷十二引《韩氏医通》。

【组成】 连珠黄连一斤（分作四份：一份用酒浸炒，一份用自然姜汁炒，一份用吴茱萸汤浸炒，一份用益智仁同炒，去益智，研末） 白芍药（酒煮，切，焙）四两 使君子仁（焙）四两 广木香二两

【用法】 上为末，蒸饼为丸，如绿豆大。每服三十丸，食前米饮送下，一日三次。

【主治】 五疳八痢。

【宜忌】 忌猪肉、冷水。

03467 四炭阿胶汤

【方源】 方出《时病论》卷三，名见《湿温时疫治疗法》。

【组成】 银花 生地 白芍 黄芩（四者均炒为炭） 阿胶（炒珠） 山药（炒黄） 陈皮 石莲

【主治】 阴虚之体患五色痢。

【临证举例】 五色痢 鄂渚余某之甥，患痢两月余矣，憔悴不堪，夜不成寐，渴饮不食，脉数苔无，取视所下之痢，五色杂见。丰曰：此五色痢也，乃凶症耳。石顽有云：痢下五色，脓血稠粘，滑泄无度，多属阴虚。今此证分明久痢伤肾，下焦不摄，即先哲所谓阴虚痢是也。斯时即有湿证所彰，亦不能投之渗利。当用本方，连尝三四服，遂中肯矣。登圊略减数遭，惟口渴寐少，脉转小数，欠力欠神，此气血津液，皆亏损也。照前方除去枯芩，加入东参、炙草、夜交藤，服数剂更为合拍。后用六味合四君为主，调治月余，始得痊可。

【备考】 《湿温时疫治疗法》本方用银花炭、条芩炭、白芍炭各一钱半，生地炭三钱，真阿胶一钱半，炒黄淮药三钱，广陈皮、甜石莲各一钱半。

03468 四顺附子汤

【方源】 《妇人良方》卷八。

【组成】 生附子（去皮脐） 白姜（炮） 甘草 人参各一两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水二盏，煎至七分，去滓，空心服。

【功用】 峻补。

【主治】 ①《妇人良方》：下痢纯白，状如鱼脑，脐腹冷痛，日夜无度，手足逆冷；或有呕逆，全不入食，饮食欲温而恶冷，六脉微细；其者，四肢厥冷，六脉沉绝。②《奇效良方》：吐泻过多，手足逆冷，六脉沉细，气少无语；及霍乱转筋，肉冷汗出，呕哕。

【宜忌】 凡痢疾虽体寒，手足逆冷，冷汗自出，六脉沉伏，不宜轻用附子。

【加减】 吐泻、腹痛，加桂半两；小便不利者，加茯苓半两。

03469 四顺清凉散

【方源】 《异授眼科》。

【组成】 大黄（酒炒） 川芎 山栀 赤芍 没药（制去油） 归身 枳壳 香附（醋炒） 生地 甘草各等分

【用法】 上为末。米汤下。

【主治】 白膜遮睛。

03470 四逆茱萸汤

【方源】 《会约》卷四。

【组成】 甘草（炙）二钱 干姜（炮）三钱 附子三钱（或生用） 吴茱萸二钱（开水泡，一次用） 生姜一钱半 大枣四枚

【用法】 水煎，冷服。

【主治】 阴证厥逆，脉弱囊缩者。

【加减】 加人参更妙；如腹痛，加白芍二钱。

03471 四海舒郁丸

【方源】 《疡医大全》卷十八。

【组成】 青木香五钱 陈皮 海蛤粉各三钱 海带 海藻 昆布 海螵蛸各二两（俱用滚水泡去盐）

【用法】 上为细末。每服三钱，不拘酒、水，一日三次；滓沉在碗底内者，敷气颈上。

【主治】 因七情抑郁不伸，肝脾气郁不舒致气颈，结喉之间，气结如胞，随喜怒消长，甚则饮食嗌碍。

【临证举例】 气颈（甲状腺肿大） 《江苏中医》(1958；9:29)：曾治疗4例女性患者，肿大的甲状腺均渐变软、变小，其他伴随症状减轻或消失。作者认为：气颈多属气郁痰阻所致，治用四海舒郁丸理气化痰，软坚散结，一般在服药1～1.5个月后，颈间肿大之甲状腺都能变软、变小，连服2～3个月，可以消散。所有眼突、心悸、失眠、手颤等现象，亦能逐渐消失。

【备考】 愈后用黄药子四两，生酒二大壶，煮二

炷香，窨一七去火毒，早、晚任饮数杯。本方方名，据剂型，当作“四海舒郁散”。

03472 四蒸木瓜丸

【方源】《三因》卷四。

【异名】四蒸丸(《魏氏家藏方》卷八)。

【组成】威灵仙（苦葶苈同入） 黄耆（续断同入） 苍术（橘皮同入） 乌药（去木，与黄松节同入）各半两

【用法】以大木瓜四个切盖去瓤，入前件药，仍用盖簪定，酒洒蒸熟，三蒸三晒，取药出，焙干为末，研瓜为膏，搜和捣千杵为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。

【主治】①《三因》：肝肾脾三经气虚，为风寒湿搏着，流注经络，竭日旷岁，治疗不痊，凡遇六气更变，七情不宁，必至发动，或肿满，或顽痹，憎寒壮热，呕吐自汗。②《魏氏家藏方》：新旧脚气，不论干湿。

03473 四加减正气散

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】藿香梗三钱 厚朴二钱 茯苓三钱 广皮一钱五分 草果一钱 楂肉（炒）五钱 神曲二钱

【用法】水五杯，煮取二杯，渣再煮一杯，三次服。

【主治】秽湿着里，邪阻气分，舌白滑，脉右缓。

03474 四苓合芩芍汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】苍术二钱 猪苓二钱 茯苓二钱 泽泻二钱 白芍二钱 黄芩二钱 广皮一钱五分 厚朴二钱 木香一钱

【用法】水五杯，煮取二杯，分二次温服。

【主治】自利不爽，欲作滞下，腹中拘急，小便短者。

【宜忌】久痢不宜用之。

【方论选录】四苓散分阖门，通膀胱，开支河，使邪不直注大肠；合芩芍法宣气分，清积滞，预夺其滞下之路也。此乃初起之方。久痢阴伤，不可分利，故方后云：久利不宜用之。

03475 四物龙胆草汤

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】当归 川芎 白芍 生地各一钱 防己 防风 胆草 羌活各七分

【用法】水煎，食后温服。

【主治】目痛，暴作云翳，痛不可忍。

03476 四物加人参汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】人参 归身 川芎 白芍 生地 香附（童便炒） 炙草各一钱

【用法】生姜、大枣为引。

【主治】瘦人血虚少而经水来少。

03477 四物加地榆汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】生地炭五钱 小川芎一钱 白芍一钱半（醋炒） 当归身三钱（醋炒） 地榆炭三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】产后血崩，脉涩数者。

【加减】脾虚，加焦术；气虚，加人参。

【方论选录】产后血室空虚，冲任失守，不能操蓄泄之权，而经血妄行，故血崩不止焉。生地凉血止血，地榆涩血定崩，小川芎行血海以升阳，白芍药敛阴血以固下，当归身养血以引血归经也。水煎温服，使经血内充，则冲任融和，而蓄泄有权，血无妄行之患，安有血崩之不止乎！脾虚加白术，气虚加人参，是因病制方，无不各有绳墨。

03478 四物加芩连汤

【方源】方出《保命集》卷下，名见《万氏女科》卷一。

【异名】芩连四物汤(《医统》卷八十八)、四物芩连汤(《赤水玄珠》卷二十一)、四物加黄芩黄连汤(《准绳·女科》卷一)、四物解毒汤(《痘疹会通》卷四)。

【组成】四物汤加黄芩 黄连各一两

【主治】血热而月经先期，经水色黑；及痘疹血虚。

①《保命集》：经水如黑豆汁。②《万氏女科》：形瘦素无他疾，月经不及期而经先行，由于血热者。③《痘疹会通》：痘疹血虚，红赤顶陷，不成浆，只生清水。

【备考】《万氏女科》本方用四物（用赤芍）、芩、连（俱炒）各一钱，生草五分。水煎，食前服。《赤水玄珠》本方用法：为末，醋糊为丸服。

03479 四物加柴胡汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】归身 川芎 白芍 生地 柴胡 人参 条芩 生草 黄连

【用法】水煎服。

【主治】性急多怒伤肝，以动冲任之脉，一月而经再行者。

03480 四物加葵花汤

【方源】 方出《元戎》，名见《济阴纲目》卷一。

【组成】 当归 川芎 白芍药 熟地黄 葵花（一方加红花 血见愁）

【用法】 水煎服。

【主治】 经水涩少。

03481 四物黄连薄贴

【方源】《外台》卷二十四引《删繁方》。

【组成】 黄连 黄柏 地榆 白芷各一两

【用法】 上药治下筛，鸡子白和涂布。薄痈上，对疮口，穿布出痈气，令疏气。

【主治】 痈肿已溃。

03482 四顺清凉饮子

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 当归身 龙胆草（酒洗，炒） 黄芩 桑皮（蜜制） 车前子 生地黄 赤芍 枳壳各八分 炙甘草三分 熟大黄 防风 川芎 川黄连（炒） 木贼草 羌活 柴胡各六分

【用法】 上锉一剂。水二钟，煎至八分，去滓，食远服。

【主治】 凝脂翳症。

03483 四逆加人参汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 四顺汤（《肘后方》卷二）、人参四顺汤（《鸡峰》卷五）、四顺饮（《易简方》）、回阳饮（《医学集成》卷一）、人参四逆汤（《古方选注》卷上）、四味回阳饮（《伤寒温疫条辨》卷四）。

【组成】 甘草二两（炙） 附子一枚（生，去皮，破八片） 干姜一两半 人参一两

【用法】 以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。

【主治】 阳虚血脱。吐利之后，汗多恶寒，四肢厥逆，脉微；或吐利未止，见上述诸证者。

①《伤寒论》：霍乱，恶寒，脉微而复利，利止，亡血也。②《肘后方》：霍乱吐下，腹痛干呕，手足冷不止。③《千金》：霍乱转筋，肉冷，汗出，呕吻者。④《鸡峰》：表里俱虚，伤冒寒冷，腹胁胀满，呕逆痰涎；及邪中阴经，手足厥冷，既吐且利，小便频数，里寒，身体疼痛，脉细微，下利清谷，头痛恶寒，亡阳自汗。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜、猪肉，

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：恶寒脉微而利者，阳虚阴胜也。与四逆汤温经助阳，加人参生津液益血。②《伤寒绪论》：亡血本不宜用姜，附以损阴，阴虚又不当用归、芎以助阳。此以利后恶寒不止，阳气下脱已甚，故用四逆以复阳为急也。其所以用人参者，不特护持津液，兼阳药得之，愈加得力耳。设误用阴药，必腹满不食，或重加泄利呕逆，转成下脱矣。③《千金方衍义》：直中阴寒用姜、附，温经而救四肢逆冷，因病以立名也；霍乱加人参，助姜、附回阳而使四肢温顺，勒名以彰实也。与当归四逆加生姜吴茱萸助力回阳一义，④《古方选注》：四逆加人参，治亡阴利止之方。盖阴亡则阳气亦与之俱去，故不当独治其阴，而以干姜、附子温经助阳，人参、甘草生津和阴。

【临证举例】 ①伤寒虚阳外浮 《寓意草》：徐国桢伤寒六七日，身热目赤，索水到前，复置不饮，异常大躁，将门牖洞启，身卧地上，辗转不快，更求人井。一医汹汹，急以承气与服。余诊其脉，洪大无伦，重按无力。谓曰：此用人参、附子、干姜之证，奈何以为下证耶？于是以附子、干姜各五钱，人参三钱，甘草二钱，煎成冷服。服后寒战。戛齿有声，以重绵和头覆之，缩手不肯与诊，阳微之状如著，再与前药一剂，微汗热退而安。②心动过缓 《伤寒解惑论》：张某某，女，中年。胸中满闷，手足发凉，脉沉迟。西医诊为心动过缓症。为处四逆加人参汤方，五六剂痊愈，后未再发。③急性胃肠炎 《伤寒论临床实验录》：裴某，男，58岁。夏令因饮食不节，患急性胃肠炎。初起发热恶寒，头痛脘闷，继则吐利交作，腹疼，烦躁不安；曾服导滞分利止呕药两剂，而吐利不止，渐至四肢厥逆，心烦身出冷汗，口干舌燥，饮食不思，脉象微细欲绝。此乃吐利之后中气大伤，心阳衰竭，阴气不继之证。治疗时扶阳救逆固属重要，而补中气生津血，又属刻不容缓。吉林参6克，干姜10克，炮附子10克，甘草18克。服药一剂后，四肢回暖，吐利不作，心不躁烦，能安然入寐。三剂后症状消失，精神安静，食欲渐展，脉象虚缓，后以和胃化滞之剂调理而愈。④吐血 《江西中医药》（1959；5：30）：黄某某，男，64岁，骤患吐血盈盆，气息奄奄，闭目不语，汗出如珠。诊其脉沉微，肢冷如冰，危在顷刻。此证气随血脱，惟有大剂益气回阳，摄血归经。处方：参须三钱，炙北耆一两，熟附片四钱，炮干姜二钱，炙甘草二钱。翌日复诊，肢温汗敛血止，惟精神疲惫，声音低微，脉息较起，但仍甚微弱。虽有转机，尚未脱险，原方加白术三钱，白芍三钱而愈。

03484 四逆加茯苓散

【方源】 方出《伤寒论》，名见《圣济总录》卷二十六。

【组成】 甘草（炙） 枳实（去瓤，麸炒） 柴胡

（去苗） 芍药各一两 赤茯苓（去黑皮）半两

【用法】 上为细散。每服二钱匕，米饮调下，一日三次。

【主治】 伤寒少阴证，小便不利。

03485 四味调经止痛散

【方源】 《古今医鉴》卷十一。

【组成】 当归 玄胡索 没药 红花各等分

【用法】 上为末。每服二钱，醇酒送下。

【主治】 妇人月水将来或将尽，前后数日腹痛。

03486 四物汤倍芎归汤

【方源】 方出《保命集》卷下，名见《保命歌括》卷三十。

【组成】 四物汤四两（倍当归、川芎）加鬼箭红花 玄胡索各一两（同为末）

【用法】 水煎，调没药散服之。

【主治】 产后血运、血结，血聚于胸中，或偏于小腹，或连于胁胁。

03487 四物苍术各半汤

【方源】 《元戎》。

【组成】 四物汤一份 苍术一份

【用法】 上为粗末。水煎服。

【主治】 妊娠四肢肿痛，不能举重。

03488 四乌鲗骨一藘茹丸

【方源】 《素问》卷十一。

【异名】 乌贼鱼骨丸（《圣济总录》卷一五三）、乌鱼骨丸（《宣明论》卷一）、枯骨丸（《普济方》卷二八九引《指南方》）、乌贼丸（《医学入门》卷八）、乌贼藘茹丸（《杏苑》卷八）、乌鲗骨丸（《古方选注》卷下）、女科乌贼丸（《全国中药成药处方集》（福州方））、四乌贼一藘茹二妙丸〔《全国中药成药处方集》（杭州方）〕。

【组成】 乌鲗骨四份 藘茹一份

【用法】 二物并合，以雀卵为丸，如小豆大。每服五丸，饭前以鲍鱼汁送下。

【功用】 ①《类经》：通血脉，补肝。②《全国中药成药处方集》（福州方）：补奇经八脉。

【主治】 女子血枯经闭、赤白带下，男子阴痿精伤。

①《素问》：年少时大脱血致血枯，胸胁支满，妨于食，病至则先闻腥臊臭，出清液，先唾血，四肢清，目眩，时时前后血；或醉入房中，气竭伤肝，月事衰少不来。②《医学入门》：男子精竭，阳事痿弱，面无精彩。③《全国中药成药处方集》（福州方）：妇人气血虚弱，赤白带下，肢体羸瘦，恐成痨瘵。

【宜忌】 《张氏医通》：惟金水二脏，阴虚阳扰，喘嗽失血，强中滑精者，禁用；以其专主温散，而无涵养真阴之泽也。

【方论选录】 ①《素问》王冰注：饭后药先，谓之后饭。按古《本草经》云：乌鲗鱼骨、藘茹等并不治血枯，然经法用之，是攻其所生所起尔。夫醉劳力以入房，则肾中精气耗竭；月事衰少不至，则中有恶血淹留；精气耗竭，则阴萎不起而无精；恶血淹留，则血痹着中而不散，故先兹四药，用入房焉。古《本草经》曰：乌鲗鱼骨味咸，冷平无毒，主治女子血闭；藘茹味辛，寒平有小毒，主散恶血；雀卵味甘，温平无毒，主治男子阴萎不起，强之令热，多精有子；鲍鱼味辛臭，温平无毒，主治瘀血血痹在四肢不散者。寻文会意，方义如此而处治之也。②《类经》：乌鲗，即乌贼也。骨名海螵蛸，其气味咸温下行，故主女子赤白漏下及血闭血枯，其性涩，故亦能令人有子。藘茹，亦名茹藘，即茜草也。气味甘寒无毒，能止血治崩，又能益精气，活血通经脉。雀，即麻雀也。雀卵气味甘温，能补益精血，主男子阴萎不起，故可使多精有子，及女子带下，便溺不利。鲍鱼，即今之淡干鱼也。诸鱼皆可为之，惟石首、鲫鱼者为胜，其气味辛温无毒。鱼本水中之物，故其性能入水脏，通血脉，益阴气，煮汁服之，能同诸药通女子血闭也。以上四药皆通血脉，血主于肝，故凡病伤肝者，亦皆可用之。③《张氏医通》：《内经》之方不多见，仅仅数方，世都弃置不讲。尝考本草，乌鲗骨、藘茹并皆走血，故《内经》以之治气竭伤肝，血枯经闭等证；丸以雀卵，饮以鲍鱼汁者，取异类有情，以暖肾调肝，则虚中留结之干血，渐化黄水而下矣；后饭者，先药后饭，使药力下行也。又问：雀卵以时而生，急需未必可得，奈何？答曰：大匠在乎绳墨，不拘物料，皆可成器，雀卵功专暖肾，如无，雀肉煮捣可代；鸡卵及肝亦可代。鸡属巽而肝主血也。活法在人，可执一哉？④《古方选注》：乌鲗骨丸，皆血肉之品。盖血枯气去，苟非有情之物，焉能留恋气血，而使之生长？乌鲗鱼骨咸温下行，性涩去脱，久服令人有子，可知其固气益精之功矣；茹藘咸酸入肝，活血通经，疏气行伤；丸以雀卵，壮阳益血；药后即饭，复饮鲍鱼汁，压其药性下行，利肠续绝。每用五丸者，经言：脱血入房肝伤，由子中气竭，故欲其留顿中宫，仍从脾胃转输于下也。

03489 四时加减柴胡饮子

【方源】 《金匮》卷下。

【异名】 四时加减柴胡汤(《兰台轨范》卷三)。

【组成】 柴胡八分 白术八分 大腹槟榔四枚(并皮子用) 陈皮五分 生姜五分 桔梗七分

【用法】 冬三月，加柴胡八分；春三月，加枳实，减白术；夏三月，加生姜三分，枳实五分，甘草三分；秋三月，加陈皮三分，各㕮咀。分为三贴，一贴以水一升，煮取二升，分温三服，如人行四五里进一服。

【主治】 五脏虚热。

【加减】 如四体壅，添甘草少许，每贴分作三小贴，每小贴以水一升，煮取七合，温服；再合滓为一服，重煮，都成四服。

03490 四苓加厚朴秦皮汤

【方源】 《温病条辨》卷二。

【组成】 茅术三钱 厚朴三钱 茯苓块五钱 猪苓四钱 秦皮二钱 泽泻四钱

【用法】 水八杯，煮成三杯，分三次服。

【主治】 足太阴寒湿，腹胀，小便不利，大便溏而不爽，若欲滞下者。

【方论选录】 四苓辛淡渗湿，使膀胱开而出邪，以厚朴泻胀，以秦皮洗肝也。

03491 四物加香附黄连汤

【方源】 《万氏女科》卷一。

【组成】 归尾 川芎 赤芍 香附 生地 黄连 生草 丹皮各一钱

【主治】 经水色紫，属于热者。

03492 四君子加姜附厚朴汤

【方源】 《此事难知》。

【组成】 四君子四味各一两 生姜 附子 厚朴(炮制)各三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 吐泻霍乱，四肢拘急，脉沉而迟者。

03493 四物汤加芩连姜夏方

【方源】 《医方考》卷六。

【异名】 四物加芩连姜夏汤(《大生要旨》)。

【组成】 当归 川芎 芍药 熟地黄 黄芩 黄连 半夏 生姜

【主治】 妊娠子痫，属阴虚火亢，痰气厥逆者。

【方论选录】 四物可以养血，芩、连可以降火，姜、夏可以破逆。

【备考】 《大生要旨》本方用当归一钱、川芎五分、熟地三钱、白芍一钱半(酒炒)、黄芩一钱(酒炒)、黄连五分(酒炒)、半夏(姜汁炒)一钱、生姜一片。本方方名，《救急选方》引作“芩连四物汤”。

03494 四君子加芍药高良姜汤

【方源】 《此事难知》。

【异名】 四君子加白芍药高良姜汤(《准绳·类方》卷三)。

【组成】 四君子四味各一两 芍药 良姜各五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 吐泻转筋，腹中痛，体重，脉沉而细者。

03495 四君子汤加竹沥姜汁方

【方源】 方出《丹溪心法》卷一，名见《医方考》卷一。

【异名】 四君子加竹沥姜汁方(《明医指掌》卷二)、四君子加姜汁竹沥方(《成方切用》卷十二下)。

【组成】 四君子汤加竹沥 姜汁

【主治】 半身不遂在右者，属痰有热并气虚。

【方论选录】 《医方考》：经曰：左右者，阴阳之道路也。故左属血，而右属气。气虚者，补之以甘，故用人参、白术、茯苓、甘草四件，称其为君子者，谓其甘平，有冲和之德，而无克伐之性也。其加竹沥，谓其行痰；其加姜汁，所以行竹沥之滞，而共成夫伐痰之功耳。

03496 四苓加木瓜厚朴草果汤

【方源】 《温病条辨》卷二。

【组成】 生於白术三钱 猪苓一钱五分 泽泻一钱五分 赤苓块五钱 木瓜一钱 厚朴一钱 草果八分 半夏三钱

【用法】 水八杯，煮取八分三杯，分三次服。

【主治】 足太阴寒湿，四肢乍冷，自利，目黄，舌白滑，甚则灰，神倦不语，邪阻脾窍，舌蹇语重。

【加减】 阳素虚者，加附子二钱。

【方论选录】 湿以下行为顺，故以四苓散驱湿下行；加木瓜以平木，治其所不胜也；厚朴以温中行滞；草果温太阴独胜之寒，芳香而达窍，补火以生土，驱浊以生清也。

03497 四逆散加五味子干姜汤

【方源】 方出《伤寒论》，名见《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【异名】 四逆散加五味干姜汤(《医统》卷十四)。

【组成】 甘草(炙) 枳实(破，水渍，炙干) 柴胡 芍药各十分 五味子 干姜各五分

【主治】 少阴病，四逆，咳或下利。

03498 四物汤加黄芩黄柏槐花方

【方源】 《医方考》卷六。

【组成】 当归 芍药 川芎 生地黄 酒黄芩 酒黄柏 炒槐花

【主治】 内热痔漏下血。

【方论选录】 痔漏，广肠之毒也。一有病根，则劳思便作，饮酒便作，所以然者，内热而血妄行也。是方也，生地、槐花、黄芩、黄柏，清其热也；当归、芍药、川芎，调其血也。

03499 四物汤加桃仁红花竹沥姜汁方

【方源】 方出《丹溪心法》卷一，名见《医方考》卷一。

【异名】 四物加桃仁红花竹沥姜汁方(《明医指掌》卷二)、四物加竹沥汤(《医林纂要》卷五)。

【组成】 四物汤加桃仁 红花 竹沥 姜汁

【主治】 半身不遂在左属死血瘀血者。

【方论选录】 《医方考》：芎、归、芍、地，生血药也，新血生，则瘀血滑而易去；桃仁、红花，消瘀药也，瘀血去，则新血清而易生；然亦加夫竹沥、姜汁者，以痰之为物，靡所不之，盖无分于左右而为患也。

【备考】 《医林纂要》本方用当归（酒洗）四钱、川芎二钱、生地三钱、芍药二钱、桃仁七粒、红花一钱、竹沥半杯、姜汁三匙，水煎服。

03500 史国公万病无忧药酒

【方源】 《万氏家抄方》卷一。

【异名】 史国公百病无忧药酒(《医便》卷五)、史国公浸酒良方(《古今医鉴》卷二)、史国公药酒(《医方考》卷一)、史国公酒(《何氏济生论》卷一)、万病无忧酒(《集验良方》卷二)。

【组成】 防风（去芦）二两 秦艽（去芦）二两 当归三两 草薢三两（酥炙） 羌活三两 鳖甲二两 川牛膝（去芦）二两 虎胫骨二两（酥炙） 白术（去芦）二两 油松节二两（捶碎） 杜仲三两（姜汁拌，炒去丝） 晚蚕沙三两（炒黄色） 苍耳子四两（捶碎） 枸杞子五两（炒） 干茄根八两（饭上蒸熟）

【用法】 上㕮咀，盛布袋中，入大坛内，下好酒三十五斤，封口，浸十四日满，将坛入锅，悬煮一时取起，入土内埋三日去火毒。每日清晨、午后各服五七钟。

【功用】 补益。

【主治】 ①《万氏家抄方》：风疾，半身偏枯，手足拘挛，不堪行步。②《张氏医通》：风湿疼。

【方论选录】 《医方考》：是方也，干茄根、苍耳子、羌活、秦艽、防风、松节、草薢、蚕沙，可以去风，亦可以去湿，风去则蹇涩、拘挛之证除，湿去则不遂、不仁之患愈；当归、牛膝、杜仲、枸杞，所以养血，亦所以润燥，养血则手得血而能摄，足得血而能步，润燥则筋得血而能舒矣；若虎骨者，用之以驱入骨之风；白术者，用之以致冲和之气；风痹之久，血必留居，鳖甲之用，所以治风邪之固血也。

03501 代刀散

【方源】 《疮疡经验全书》卷三。

【组成】 穿山甲 僵蚕 枳壳 姜黄 牵牛 赤石脂 大黄 白芷 贝母各等分

【用法】 上为细末。每服五钱，早晨空心用酒调下。行利十余次，用薄粥补之。其脓血从大便中出。

【主治】 穿裆发，已成脓者。

03502 代刀散

【方源】 《杏苑》卷六。

【组成】 草乌头 荜拨各一钱五分 川椒 细辛各二钱

【用法】 生为末。用少许，揩患牙处内外。其牙自落。

【主治】 牙疼。

03503 代刀散

【方源】 《外科全生集》卷四。

【组成】 皂角刺 炒黄耆各一两（炒） 生甘草 乳香各五钱

【用法】 上各为细末。每服三钱，陈酒送下。

【功用】 立穿一切外症。

03504 代杖汤

【方源】 《外科大成》卷四。

【组成】 土鳖 苏木 乳香 没药各二钱 木耳 川山甲 丹皮 枳壳 蒲黄 归尾 木通 甘草各一钱

【用法】 酒、水煎服，临刑时先服。

【主治】 杖伤。

03505 代针散

【方源】 《疡医大全》卷八。

【组成】 木鳖子 川乌

【用法】 水磨。以鹅翎扫刷疮上，留豆大一处出脓。如药水干，再刷上。不过一时即穿。

【主治】 恶疮肿毒，日久不出头。

03506 代谷丸

【方源】 《御药院方》卷六。

【组成】 精羊肉（去筋膜，薄批切）二斤 陈皮三分 小椒二分 葱十根（先以水高肉二指已来，同煮水尽，去陈皮等，只取肉，慢火焙干） 人参

（去芦头） 神曲（炒） 大麦芽（炒）各二两

【用法】 上为细末，用生姜面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，不拘时候，温酒或米饮送下。

【主治】 脾胃久虚，全不思食。

03507 代灸膏

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 大附子（炮） 木香 吴茱萸（炒） 马蔺子 桂 蛇床子各等分

【用法】 上为细末，每用药半匙，白面半匙，以生姜汁同煎成膏，以方圆三寸纸花子上摊。贴在脐下，油纸隔之，绵衣裹。自晚至明，一敷胜百壮。如腰痛，腰上贴之。

【主治】 ①《御药院方》：腰痛。②《普济方》：风湿痹。

03508 代参膏

【方源】《本草纲目拾遗》卷三引《杨春涯验方》。

【组成】 于术十斤（白米泔水浸三昼夜，洗净浮皮，蒸晒十次，有脂沾手为度）

【用法】 切片熬膏，一火收成，滴纸不化；用白茯苓十斤，春末，水飞去浮，只取沉者，蒸晒十次，沾手如胶，与术膏搅匀。每服两许，米汤送下。

【功用】 补益。

03509 代参膏

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】 潞党参 绵黄耆 于潜术 桂圆肉各等分

【用法】 熬成膏子，加白冰糖收贮。滚水调服。

【功用】 补中气，生津液，润肺健脾，开胃进食；常服补诸虚，除百病。

【主治】《中药成方配本》：心脾两亏，气血衰弱，心悸神疲，畏寒自汗。

03510 代茶饮

【方源】《治疹全书》卷下引《摄生方》。

【组成】 枸杞子 五味子

【用法】 上为细末，滚水泡封三日。代茶饮之。

【主治】 注夏虚病。

03511 代匙散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 月石 石膏各一钱 脑荷五分 胆矾五分 粉草三分 僵蚕（炒）五分 冰片一分 皂角（炙烟尽）五分

【用法】 上为细末。用竹管频吹喉中。加牛黄五分更佳。

【主治】 喉痹。

03512 代赭丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】 代赭二两 黄柏二两（涂蜜，炙微赤） 黄耆一两半（锉） 龙骨一两 赤石脂一两（烧赤，投醋中，滤出） 艾叶一两 狗头骨灰一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，不拘时候，以粥饮送下。

【主治】 久赤白痢，日夜无数，腹痛不可忍。

03513 代赭丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】 代赭（煅赤） 干姜（炮） 龙骨各一两 附子（炮裂，去皮脐）三分

【用法】 上为末，研软饭为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下，日午再服。

【主治】 水泻肠鸣，脐腹撮痛。

03514 代赭散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】 代赭一两（烧，醋淬三遍） 附子三分（炮裂，去皮脐） 赤石脂一两 蒲黄半分 鹿茸二两（去毛，涂酥，炙微黄） 当归一两（锉，微炒） 干姜三分（炮裂，锉） 芎藭半分 熟干地黄一两

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 妇人漏下，久虚体弱。

03515 代抵当丸

【方源】《准绳·类方》卷三。

【异名】 代抵当汤丸（《张氏医通》卷十六）。

【组成】 大黄（川产如锦纹者，去皮及黑心）四两 芒消一两（如欲稳，以玄明粉代） 桃仁（麸炒黄，去皮尖，另研如泥）六十枚 当归尾 生地黄 穿山甲（蛤粉炒）各一两 桂三钱或五钱

【用法】 上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。畜血在上焦，丸如芥子大，临卧去枕仰卧以津咽之，令停留喉下搜逐膈上；中焦食远，下焦空心，俱梧桐子大，以百劳水煎汤下之。

【功用】 行瘀血。

【主治】 蓄血。

【加减】 如血老成积，此药攻之不动，宜去归、地，加广茂（醋浸透，焙干）一两，肉桂七钱。

【方论选录】 用归、地者，欲下血而不损血耳，且引诸药至血分也；诸药皆犷悍，而欲以和济之也。

03516 代抵当丸

【方源】《寒温条辨》卷四。

【组成】 大黄（酒洗）四两 芒消 穿山甲（蛤粉炒） 夜明砂（淘，焙） 莪术（醋煨） 肉桂（去粗皮） 当归尾（酒蒸）各一两 红花（酒炒）七钱 桃仁（不去皮尖，生用另研）七十粒

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，生姜汤送下。

【主治】 太阳表证仍在，随经瘀热在里，脉微而沉，反不结胸，其人发狂，以热在下焦，小腹当硬满，小便自利者。

【方论选录】 代抵当汤丸，方出《准绳》。盖瘀蓄之血，攻之为难，仲景直用水蛭、䗪虫有毒之物，惟恐药不峻利，亦何待攻之不动而后加减乎？后人不敢用此毒物，故作此方以代之。原方生地黄用之无理，归尾必不可减，故于本方中减去生地一味，倍肉桂，加莪术、红花、夜明砂，用之殊觉有效。若温病蓄血，用此方去肉桂，加牡丹皮一两，牛膝一两，或止加干漆五钱。

03517 代抵当汤

【方源】 《血证论》卷八。

【组成】 大黄一钱（酒炒） 莪术一钱 山甲珠二斤 红花一钱 桃仁三钱 丹皮三钱 当归三钱 牛膝二钱 夜明砂三钱

【主治】 蓄血。

【方论选录】 山甲攻血，夜明砂能去死血，余药破下，务使瘀血不留。

03518 代赭石散

【方源】 年氏《集验良方》卷一。

【组成】 旋覆花不拘多少 代赭石（为细末）一钱

【用法】 调服。

【主治】 一切呕吐不止。

03519 仙酒

【方源】 《医学入门》卷八。

【组成】 苍术二两 枸杞 当归 川芎 白芍 陈皮 天麻各一两 晚蚕沙 五加皮 杜仲 枳壳 半夏 肉桂 防己 牛膝 桔梗 木瓜 白芷各五钱

【用法】 酒浸服。

【主治】 虚寒筋骨酸痛，腰脚无力。

03520 仙人饭

【方源】 《摄生众妙方》卷二。

【组成】 黄精

【用法】 将瓮去底，釜上安顿，盛黄精令满，密盖蒸之，候气溜，取出晒干，如此九蒸九晒，凡生时有一石，熟有三四斗方好。蒸之不熟，则刺人咽喉，既熟晒干，食之甘美。

【功用】 补中益气，安五脏，润心肺，轻身延年。

03521 仙人散

【方源】 《儒门事亲》卷十五。

【组成】 地骨皮二两（酒浸二宿） 青盐一两 黍粘子一两半（炒） 细辛一两（酒浸）

【用法】 上为细末，入麝香少许。每用一字，临卧擦牙，茶、酒漱，良久吐出。

【主治】 牙痛。

03522 仙人粥

【方源】 《摄生众妙方》卷二。

【异名】 首乌粥（《大众医学》）、何首乌粥（《长寿药粥谱》）。

【组成】 何首乌一二斤

【用法】 以竹刀刮去皮，不可用铁器，切成细细如棋子面大，每日五钱，用砂锅以白水滚烂，放白米三合，洗净，入内煮粥。每日空心服。

【功用】 《长寿药粥谱》：益肾抗老，养肝补血。

【主治】 气血两虚，身体羸瘦，面色黄肿，手足疼痛，头昏耳鸣，头发早白，大便干燥。

①《摄生众妙方》：气血不足，面色黄肿，手足疼痛软弱，行履不便，身体羸瘦。②《大众医学》：老年性高血脂，血管硬化，大便干燥。③《长寿药粥谱》：老年人肝肾不足，阴血亏损，头昏耳鸣，头发早白，贫血，神经衰弱。

【备考】 《长寿药粥谱》：何首乌粥：先用何首乌30～60克，入砂锅煎取浓汁，去滓，与粳米100克，大枣二三枚，冰糖适量，同煮为粥。

03523 仙人粮

【方源】 《本草纲目》卷十八引《臞仙神隐》。

【组成】 干天门冬十斤 杏仁一斤

【用法】 上为末，蜜渍。每服方寸匕。

【功用】 久服补中益气。

【主治】 虚劳绝伤，年老衰损，偏枯不随，风湿不仁，冷痹恶疮，痈疽。

03524 仙子散

【方源】 《古今医鉴》卷十五。

【组成】 苦参 威灵仙 蔓荆子 何首乌 荆芥 各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，食前酒调服，日二三服。

【主治】 遍身疮疥，经年举发者。

【宜忌】 忌发风物。

03525 仙术饮

【方源】《直指》卷二十。

【异名】仙术散(《准绳·类方》卷七)。

【组成】苍术(童尿换浸二宿，洗净，晒干)一两一分　木贼(去节，童尿浸一宿，晒干)　蝉壳(去足)　白蛇皮(皂角水洗，焙)　白蒺藜(炒，去刺)　谷精草　防风　羌活　川芎　杏仁(去皮)　甘草(生，焙)各一分

【用法】上为末。食后每服一钱，蜜汤调下。

【主治】眼中翳膜。

03526　仙饭丸

【方源】《济阳纲目》卷六十八。

【组成】上党胡麻三升(拣净)

【用法】以新白布缝袋，将胡麻盛在内，放清水中浸一时，用手揉袋，去尽油沫，纯是清水为度。取出甑蒸，令气遍，晒干，如此九蒸九晒。蒸之不熟，令人发落。蒸晒去皮，炒香为末，炼蜜或枣膏为丸，如弹子大。每服一丸，空心用淡酒化下，一日三次。常服为佳。

【功用】服至一月之后，痰火尽去，精气充溢；服至百日，能除一切痼疾，一年身面光泽，不饥，二年白发返黑，三年齿落更生；久服长生。

【宜忌】初服一月内戒房事。

03527　仙灵丸

【方源】《普济方》卷一五四引《余居士选奇方》。

【组成】威灵仙　没药　乳香　玄胡索　黑牵牛　破故纸(炒黄)各一分　陈皮　巴豆(去壳，入蒜内，纸包慢火煨熟，去巴豆用蒜)一粒

【用法】上为末，酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，五更初茶清送下。

【主治】远年近日腰痛。

【备考】方中陈皮用量原缺。

03528　仙茅丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】仙茅(米泔浸去赤汁，焙)　威灵仙(去土)　羌活(去芦头)　青橘皮(汤浸，去白，焙)　白牵牛(炒)　白茯苓(去黑皮)各一两　姜黄　白术　苍术(米泔浸一宿，竹刀切作片子，焙)各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十丸，空心盐汤送下。

【主治】风气滞凝，身体疼痛，四肢拘急，腰脚沉重。

03529　仙茅酒

【方源】《回春》卷四。

【组成】仙茅(出四川，用米泔水浸去赤水尽，日晒)　淫羊藿(洗尽)四两　南五加皮四两(酒洗净)

【用法】上锉，用黄绢袋盛，悬入无灰酒一中坛内，二七日后取。早、晚饮一二杯。

【主治】男子虚损，阳痿不举。

03530　仙露汤

【方源】《四圣心源》卷四。

【组成】麦冬三钱　五味一钱　贝母二钱　半夏三钱　柏叶三钱　甘草二钱　芍药三钱　杏仁三钱

【用法】煎大半杯，温服。

【主治】火泄金刑之衄血。

【加减】若上热非盛，而衄证时作，则全因中下湿寒，当加干姜、茯苓温燥之药；若大衄之后，气泄阳亡，厥逆寒冷，宜加参、耆、姜、附以续微阳，清润之药切不可用。

【方论】气伤血沸，宜清金敛肺，以回逆流，而必并降胃气，降胃必用半夏，近世误以血证为阴虚，半夏性燥，不宜血家，非通人之论也。

03531　仙露汤

【方源】《医学衷中》上册。

【组成】生石膏(捣细)二两　玄参一两　连翘三钱　粳米五钱

【用法】上药用水五钟，煎至米熟，其汤即成，约可得清汁三钟，先温服一钟。若服完一剂，病犹在者，可仍煎一剂，服之如前。使药力昼夜相继，以病愈为度。然每次临服药，必详细问询病人。若腹中微觉凉，或欲大便者，即停药勿服。候两三点钟，若仍发热未大便者，可少少与服之。若已大便，即非溏泻而热犹在者，亦可少少与服。

【主治】寒温阳明证，表里俱热，心中热，嗜凉水，而不至燥渴，脉象洪滑，而不至甚实，舌苔白厚，或白而微黄，或有时背微恶寒者。

03532　仙人肢丸

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】人参　沙参　玄参　紫团参　丹参　白术　牡蛎　知母　甘草各二钱　蛤蚧一对(头尾全用，河水洗净，文武火炙黄色)

【用法】上为末，用麻黄十五斤，去根枸杞子三斤，熬成膏，为丸如弹子大，瓷盒子内盛。临卧服一丸，煎生姜自然汁化下。

【主治】远年劳嗽，不问寒热，痰涎喘满。

【备考】先服松花膏，下过，多服此药。

03533　仙灵脾丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】 仙灵脾一两 牛膝一两（去苗） 芎藭一两 牛黄一分（细研） 麻黄一两（去根节） 乌蛇肉二两（酒浸，炙微黄） 天麻一两 白附子一两（炮裂） 天雄半两（炮裂，去皮脐） 防风一两 独活一两 当归一两（锉，微炒） 桂心一两 细辛半两 白僵蚕一两（微炒） 莽草一两（微炒） 朱砂半两（细研） 麝香一分（细研）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以豆淋酒送下。

【主治】 风痹曳，手足麻痹，屈伸不得。

【宜忌】 忌毒滑、鱼肉、羊肉等。

03534 仙灵脾散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 仙灵脾一两 威灵仙一两 芎藭一两 桂心一两 苍耳子一两

【用法】 上为细散。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 风走注疼痛，来往不定。

03535 仙灵脾散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 仙灵脾一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 当归一两（锉，微炒） 萆薢一两（锉） 杜仲一两（去粗皮，炙令黄） 木香一两

【用法】 上为细散，每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 风腰脚疼痛冷痹，及四肢缓弱。

03536 仙灵脾散

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】 仙灵脾 防风（去叉） 蔓荆子 枳壳（去瓤，麸炒） 何首乌（去黑皮）各一两 苦参半两 荆芥穗二两

【用法】 上为散。每服二钱匕，温酒或腊茶清调下。

【主治】 肺风。皮肤瘙痒，生瘖瘂。

03537 仙鹤草膏

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 鲜仙鹤草一百斤

【用法】 鲜仙鹤草一百斤（如无鲜者，用干者三十斤），同枣子三斤，一次煎汁，鸡一宿，次日取出，榨净去滓，滤清，加白蜜十斤，炼透，滤过收膏，约成膏七斤。每日三次，每次三钱，开水冲服。

【功用】 止血。

【主治】 吐血、咯血、衄血。

03538 仙人杖浸酒

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】 仙人杖根一斤四两（刮，洗去土，皮锉，枸杞根白皮是也）

【用法】 上一味，用生绢囊贮，以酒二斗，浸七日。每日温饮一盏至二盏，不拘时。酒欲尽，再入五升，依前浸服。

【主治】 柔风，脚膝痿弱；久积风毒上冲，肩膊胸背疼痛；妇人产后中风；及一切热毒风。

03539 仙方地黄散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 猪牙皂角 干生姜 升麻 槐角子 生干地黄 木律 华细辛 旱莲 香白芷 干荷叶各二两 青盐（另研）一两

【用法】 上锉，于锅子内烧，有青烟存性为度，用纱罗子重罗，别研青盐末和匀，同入药内。每用少许刷牙。蘸药刷牙，合口少时，有涎即吐，然后用温水漱口，早晨、临卧用。

【功用】 令牙齿莹白，涤除腐气，牙齿坚牢，龈槽固密，黑髭鬓。

【主治】 牙齿黄色不白。

03540 仙方隔纸膏

【方源】《秘传外科方》。

【异名】 神应膏。

【组成】 黄连 何首乌（去皮） 草乌（去皮） 当归尾 白芷各半两 川乌（去皮）二分半 黄丹（夏用）二两 乳香 没药各半两 血竭半两

【用法】 前六味，总为㕮咀，用清油五两，同药一处入于铫子内，以文武火熬，待药黑色，用布滤去滓，仍将药油入铫内，下黄丹，用桃柳枝一把，不住手搅之，又黑色，即将血竭、乳、没细末入内，搅匀略煎，滴在水中，成珠不散，却用瓦碗盛之，沉在冷水中，浸一昼夜出火毒。贴患处。

【主治】 发背，痈疽，外臁，下蛀，诸般恶毒疮疖。

03541 仙传午时茶

【方源】《经验奇方》卷上。

【组成】 茯苓片八两 柴胡六两 泽泻片 枳壳片 苏叶 防风 扁豆 赤小豆各五两 忍冬藤 枯黄芩 鲜竹茹 花粉各四两 藿香 生甘草 香薷 麦冬各三两 双钩藤二百一十只 鲜荷叶三十片（切碎） 陈茶叶一百两（均用库平）

【用法】 先将荷叶放大铁锅内，加水煎汁去滓；再将茯苓等十七味一并下锅，煎至汁水较浓，滤汁储缸；仍将原药加水再煎多时，滤汁储缸；再加水煎至第三次，滤汁去渣，连同前汁，并入锅内再煎

至约汁小半锅为度；再将条叶放入，随放随拌，将汁渗干，取起摊晒极燥，每服二钱，分装纸袋封口，储大洋铁筒，勿令泄气受蒸。每服一袋，清水煎服。暖睡出汗。重则二剂同煎，小儿减半。

【主治】 伤风头痛，胃暑发痧，吐泻。

03542 仙传生牙丹

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 鼠骨四两（人乳浸一日，阴干为末） 柏子仁（去油） 枸杞 山萸（酒蒸） 血余（少壮者佳，皂角水洗净，入罐，煅成灰） 鹿角霜各八两 远志（甘草水泡，去骨） 菖蒲 灵砂（人乳煮过）各四两

【用法】 上为末，鹿角胶四两为丸，如梧桐子大。每服百丸，子时酒送下。

【功用】 牙落重生。

03543 仙传黑虎丹

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】 苍术（米泔水浸二宿，去皮，切作片） 草乌（洗净，去皮，切作片） 生姜（洗净，擂碎） 各一片 葱（连须叶白，捣碎）半斤

【用法】 上药和一处，拌匀熟之，春五日，夏三日，秋七日，冬十日，每日一番拌匀，候日数足晒干。另用五灵脂（洗净）、乳香（研）、没药（研）各五钱，穿山甲（火煅存性）二两，自然铜（火煅醋淬七次）一两，同前药为末，用好醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心热酒送下，间日服尤妙；妇人血海虚冷，肚腹疼痛，临卧醋汤下。只服二三十丸，不可多服，但觉麻木为效。

【主治】 男子妇人虚弱，血气衰败，筋骨寒冷，外感风湿，传于经络，手足麻木，腰腿疼痛，久则偏枯，左瘫右痪，口眼㖞斜，诸中风气，不能行履者。

【宜忌】 服后不可饮冷水冷物。孕妇不可服。

03544 仙灵脾浸酒

【方源】《圣惠》卷二十一。

【异名】 仙灵脾酒（《医统》卷八）、仙灵酒（《寿世保元》卷二）。

【组成】 仙灵脾一斤（好者）

【用法】 上细锉，以生绢袋盛，于不津器中，用无灰酒二斗浸之，以厚纸重重密封，不得通气，春、夏三日，秋、冬五日后，旋开取。每日随性暖饮之，常令醺醺，不得大醉。若酒尽，再合服之。

【功用】《寿世保元》：补腰膝，强心力。

【主治】 ①《圣惠》：偏风手足不遂，皮肤不仁。②《寿世保元》：一切冷风劳气，丈夫绝阳不起，女子绝阴无子，老人昏耄健忘。

【宜忌】 合时切忌鸡、犬见。

【备考】《证类本草》引《食医心镜》：淫羊藿一斤，酒一斗，浸经三日，饮之佳。益丈夫，兴阳，理腿膝冷。

03545 仙灵脾煎丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 仙灵脾五两 威灵仙五两 牛膝五两（去苗） 黑豆一升 桑根白皮五两（以上五味，细锉，以水二斗，煮至一斗，滤去渣，再煎至五升，入后药末） 天雄二两（炮裂，去皮脐） 天麻二两 肉桂三两（去皱皮） 酸枣仁二两（微炒） 当归二两 虎胫骨三两（涂酥，炙令黄） 安息香二两

【用法】 上为末，入前煎汁中，以慢火熬令稠，以柳木篦不住手搅，候可丸，即丸如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】 风，脚膝软缓，不能履步，骨节无力，时有疼痛。

【宜忌】 忌生冷、油腻、猪、鸡肉。

03546 仙传史国公浸酒

【方源】《医统》卷十一。

【组成】 当归 虎胫骨（酥油炙） 川羌活 川萆薢 防风各二两 秦艽四两 鳖甲一两（醋炙） 川牛膝（酒浸） 松节 晚蚕沙（炒）各二两 枸杞子五两 干茄根八两（饭上蒸熟） 苍耳子四两（炒，捶碎）（一方加白花蛇一条；一方加寻风藤二两）

【用法】 上药用无灰酒一大坛，将绢袋盛药，悬于酒内密封固，候十四日后开坛取酒，取时不可面对坛口，恐药气冲入面目。每饮一盏，毋令药力断绝，饮尽病痊。将药滓晒为末，米糊丸梧桐子大。每服八十丸，空心温酒下。

【主治】 诸风五痹，左瘫右痪，口眼㖞斜，四肢疼痛，七十二般风，二十四般气。

【宜忌】 忌食动风、辛热之物。

03547 仙传神效梅花丸

【方源】《寿世新编》卷下。

【组成】 绿萼梅蕊三两（欲开未开时即宜摘下，或烘干，或晒干） 飞滑石五两 丹皮三两 制香附二两（有四制、七制者尤佳） 甘松 蓬莪术各五钱 茯苓四钱 结洋参（饭上蒸透，湿米拌炒，去米不用） 嫩黄耆 全当归 西砂仁 益智仁各三钱 远志肉二钱五分 山药 木香（煨，不见火） 玄胡索 川楝子（去核，虫蛀者不用）各二钱 光桃仁（去皮尖，炒） 芽桔梗各一钱五分

制乳香（去净油） 高良姜 粉甘草各一钱

【用法】 上为细末，炼上白蜜十二两，捣丸如桂圆肉大，白蜡封固。每服一丸，开水调下。

【主治】 心腹肝胃久痛，诸药罔效，或腹有癥瘕，久结不散。

【宜忌】 孕妇忌用。

03548 外灸方

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 良姜 防己各等分

【用法】 上为末，捣大蒜和为饼。安痛处，铺艾灸之。以痛至不痛，不痛至痛为度。

【主治】 风寒湿气，腰脚疼痛。

03549 外消散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】 大黄 牡蛎（用熟黄泥包裹，火煅透，出地上候冷用）各半两 朴消二钱

【用法】 上前二味锉焙为末，仍入朴消，乳钵内同杵匀。抄一钱或二钱，取田螺三枚净洗，再以水半碗活过一宿，去螺用水，调涂肿处。即消。

【主治】 婴孩初出，旬日外脐突，或痛或不痛，痛则啼声不已；小儿感温热相搏，致阴器肤囊浮肿。

【备考】 治阴器肤囊肿，车前子煎汤调上药敷患处。

03550 外消膏

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】 伏龙肝半两 大黄（锉）半两 生姜一分（洗，切，研细）

【用法】 上药除姜外，为细末，和匀，用醋调作膏。看大小摊贴病上，早、晚易之。

【主治】 产后乳结核，疼痛或肿，欲成痈。

03551 外痹汤

【方源】 方出《医门法律》卷三，名见《医钞类编》卷四

【组成】 沙参 羚角 麻黄 杏仁 白蒺藜 丹参 五味 菖蒲 石膏 甘草各等分

【用法】 加干姜，水煎服。

【主治】 皮痹。皮中状如虫走，腹胁胀满，大肠不利，语言不出。

03552 外敷神膏

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 川大黄 朴消各四两 麝香一钱

【用法】 上为末，每二两，和大蒜捣成膏。敷患处。

【主治】 男妇积聚胀满，血蛊。

03553 外敷麻药

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】 川乌尖五钱 草乌尖五钱 蟾酥四钱 胡椒一两 生南星五钱 生半夏五钱（一方加草拨五钱，一方加细辛一两）

【用法】 上为末。用烧酒调敷。

【功用】 敷于毒上，麻木，任割不痛。

03554 外痔神消散

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】 红栀子（捣碎） 黄柏 胡黄连各一两

【用法】 水二宫碗，煎一碗，二煎、三煎俱煎一碗，共三碗，去滓；入皮消一斤炖化，撇去泥脚，取上清消汁，以文火慢炼成消。大田螺十六个，每个入冰片一厘，待螺化成水，将水拌入消内，再加熊胆、儿茶各五钱，研细和入消内拌匀听用。每用，头一次用苦参一两，水三大碗煎成二碗，去滓；入制消末一两，煎二三滚，倾盆内，先熏后洗，每日洗三次；第二日仍用洗剩药水，再加苦参一两，加水一大碗煎成，加制消末五钱，如上熏洗；第三日照第二日洗法；第四日旧药水俱不用，照第一日换新水煎苦参制消洗之。以三日又换一次，其痔自消，永不再发。

【主治】 外痔。

03555 外敷接骨散

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】 骨碎补 血竭 硼砂 当归 乳香 没药 川断 自然铜 大黄 地鳖虫各等分

【用法】 上为细末。饴糖、蜜糖或凡士林调敷。

【主治】 骨折、骨碎及筋络扭伤。

03556 冬瓜丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】 大冬瓜一枚（先于头边切一盖子，取去中间瓤不用。以赤小豆水洗净，倾满冬瓜中，再用盖子合了，用竹签签定，以麻绵系，纸筋、黄泥通身固济，窨干。用糯谷破取糠片两大箩，埋冬瓜在内，以火着糠内煨之，候火尽取出。去泥刮冬瓜令净，薄切作片子，并豆一处焙干）

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，煎冬瓜子汤送下，不拘时候。小便利为验。

【主治】 十种水气，浮肿喘满。

03557 冬瓜汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】 冬瓜一个（煎水十碗） 白术二两 车前子五钱 肉桂二钱

【用法】 上药用冬瓜水煎汤二碗，先用一碗，少倾又一碗。其水从大便而出。

【主治】 臌胀。

03558 冬瓜饮

【方源】 方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七八。

【组成】 大冬瓜一枚（割开头，去子） 黄连一斤（去须） 炙甘草一两（炙微赤，锉） 童子小便一升 地黄汁五合 蜜五合

【用法】 上药捣甘草、黄连，罗为末，都入冬瓜内，即以头却盖之。又以黄土泥封裹，可厚一寸，候干，即以糠火烧之一日，待冷去泥，置於露下一宿，取瓜烂研，生布绞汁。每于食后以清粥饮调下一合。

【主治】 消渴烦躁，饮水不止，或成骨蒸之状。

03559 冬瓜粥

【方源】 《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】 新鲜连皮冬瓜 80～100 克（或冬瓜子干的 10～15 克，新鲜的 30 克） 粳米适量

【用法】 先将冬瓜洗净，切成小块，同粳米适量一并煮为稀粥，随意服食。或用冬瓜子煎水，去渣，同米煮粥。

【功效】 利小便，消水肿，消热毒，止烦渴。

【主治】 水肿胀满，小便不利，包括急慢性肾炎，水肿，肝硬化腹水，脚气浮肿，肥胖症，暑热烦闷，口干作渴，肺热咳嗽，痰喘。

03560 冬瓜羹

【方源】 《养老奉亲》。

【异名】 冬瓜粥（《医统》卷八十七）。

【组成】 冬瓜半斤（去皮） 豉心二合（绵裹） 葱白半握

【用法】 上以和煮作羹，下五味调和，空心食之。常作粥佳。

【主治】 老人消渴烦热，心神狂乱，躁闷不安。

【备考】 《医学入门》本方用法：和米粉煮羹，入盐味，空心食。

03561 冬花散

【方源】 《宁坤秘籍》卷上

【组成】 冬花蕊 粟壳（蜜炙） 桔梗 枳壳 苏子 紫菀 知母各八分 桑皮（炒） 石膏 杏仁各二钱

【用法】 水煎服。

【功用】 止嗽下气

【主治】 经水从口鼻出，咳嗽气紧。

03562 冬荣散

【方源】 《医学纲目》卷十七。

【组成】 夏枯草（烧灰存性）

【用法】 上为末。米饮或凉水调下。

【主治】 小便出血，及肠风下血。

03563 冬葵散

【方源】 《肘后方》卷六。

【异名】 冬葵子散（《普济方》卷五十一）。

【组成】 冬葵子 柏子仁 茯苓 瓜瓣各一两

【用法】 上为散。每服方寸匕，一日三次，食后酒送下。

【功用】 《普济方》：令面光白。

【主治】 ①《肘后方》：面生皰疮，②《普济方》：少年血气甚，面生皯皰。

03564 冬瓜子散

【方源】 《圣惠》卷三十三。

【组成】 冬瓜子一两 青葙子 牡荆子 地肤子 蔓青子 决明子 车前子 茺蔚子 白蒺藜（微炒，去刺） 松子仁 桂心 蕤蕤根 蕤仁（汤浸，去赤皮） 菟丝子（酒浸三日，曝干，别捣为末） 细辛各三分

【用法】 上为细散。每服一钱，以温水调下，不拘时候。

【主治】 眼昏暗，漠漠不明。

03565 冬瓜子散

【方源】 《圣惠》卷四十。

【组成】 冬瓜子仁一两（微炒） 柏子仁一两 白茯苓一两 葵子一两（微炒） 梔子仁二两 枳实一两（麸炒微黄）

【用法】 上为细散。每服二钱，食后以粥饮调下。

【主治】 鼻面酒皶，如麻豆及疼痛，搔之黄水出。

【备考】 本方方名，《医方类聚》引作“冬瓜子仁散”。

03566 冬葵子汤

【方源】 方出《千金》卷十五，名见《圣济总录》卷九十五。

【组成】 冬葵子汁 乳汁等分

【用法】 和服。

【主治】 ①《千金》：大便难。②《圣济总录》：大小便不通。

【备考】 《圣济总录》本方用：冬葵子（微炒）一两。粗捣筛，用水二盏，煎至一盏，去滓，入乳汁半合，和匀，空腹顿服。

03567 冬葵子汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】冬葵子二两（微炒） 大黄一两（锉，炒）

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠大小便不通。

03568 冬葵子汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】冬葵子三钱 条芩钱半 草梢钱半 车前子二钱 山栀钱半 赤苓钱半

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】孕妇淋沥涩痛，脉沉数者。

【方论选录】妊娠胎热内壅，不得施化，故溺窍闭塞，小便涩痛，而淋沥不已。冬葵子滑溺窍以通淋，条黄芩清内热以安胎，赤苓利营渗水，山栀清热降火，车前子清肝以利小便，生草梢泻火以除涩痛也。水煎温服，使内热施化，则溺窍自通，而小便清利，何有涩痛淋沥之患，胎孕无不自安矣。

03569 冬葵子散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【异名】冬葵子汤（《医方考》卷六）。

【组成】冬葵子（炒） 柴胡（去苗） 桑根白皮（锉） 赤茯苓各一两 赤芍药三分 当归三分（锉，微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，葱白七寸，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】妊娠胎不安，小便淋涩，小腹疼痛。

【方论选录】《医方考》：滑可以去着，故用冬葵子；清升则浊自降，故用柴胡；气化则能出，故用桑皮；辛利则能润窍，故用当归。而赤苓、赤芍者，取其入血而利丙丁也。

03570 冬葵子散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【异名】蒲黄散（《普济方》卷三八八）。

【组成】冬葵子（锉） 蒲黄各半两

【用法】上药以水一大盏，入生地黄半两，煎至六分，去滓，不计时候，量儿大小，分减服之。

【主治】小儿血淋不止，水道涩痛。

03571 冬葵子散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【异名】冬葵散（《寿世保元》卷十六）。

【组成】木通 栀子 冬葵子 滑石各五钱

【用法】上锉一剂。水一钟半，煎至一钟，空心温服。

【主治】孕妇转胞，小便不通。

【备考】此药滑胎，临月可用，六七个月以前不可用。

03572 冬瓜洗面药

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】冬瓜一个（以竹刀子刮去青皮，切作片子）

【用法】酒一升半，水一升，同煮烂，用竹绵擦去滓，再以布滤过，熬成膏，入蜜一斤，再熬稀稠得所，以新绵再滤过，于瓷器内盛，用取栗子大，用津液调涂面上，用手擦。

【主治】颜面不洁，苍黑无色。

【备考】熬药时，用柴二秤，炭一秤，布一丈。

03573 冬地三黄汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】麦冬八钱 黄连一钱 芦根汁半酒杯（冲） 元参四钱 黄柏一钱 银花露半酒杯（冲） 细生地四钱 黄芩一钱 生甘草三钱

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次服。以小便得利为度。

【主治】阳明温病，无汗，实证未剧，不可下，小便不利者。

03574 冬虫夏草酒

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】冬虫夏草二两 白酒八两

【用法】冬虫夏草浸酒内七昼夜。用牙刷沾酒外戳1～3分钟，早、晚各一次。

【功用】补气血，助生发，乌须黑发。

【主治】圆形脱发，脂溢性脱发，神经性脱发，小儿头发生长迟缓。

03575 冬葵草蔺散

【方源】《千家妙方》上册引梁济荣方。

【组成】冬葵子150克 草蔺120克 白糖80克

【用法】将前两味药焙干为末，后加入白糖拌匀装瓶备用。每日早、晚各一次，每次3～5克，温开水送服。

【功用】清热利湿。

【主治】血丝虫乳糜尿。

03576 失心丸

【方源】《续名家方选》。

【组成】郁金 大黄各五钱 黄连 干漆各一钱

【用法】上为细末，糊为丸，如梧桐子大。

【主治】失心癫、痫、狂症。

03577 失笑丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 枳实消痞丸。

【组成】 干生姜　炙甘草　麦芽面　白茯苓　白术各二钱　半夏曲　人参各二钱　厚朴四钱（炙）　枳实　黄连各五钱

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，白汤送下，食远服。

【功用】 开胃进饮食。

【主治】 右关脉弦，心下虚痞，恶食懒倦。

【方论选录】《成方便读》：夫满而不痛者为痞，痞属无形之邪，自外而入，客于胸胃之间，未经有形之痰血饮食互结，仅与正气搏聚一处为患。故以黄连、干姜并用，一辛一苦，一散一降，则无论寒热之邪，皆可开泄，二味实为治痞之主药。然痞结于中，则气壅湿聚，必渐至痰食交阻，故以枳实破气、厚朴散湿、麦芽化食、半夏行痰，自无胶固难愈之势。但邪之所凑，其气必虚，故必以四君子坐镇中州，祛邪扶正，并驾齐驱。故此方无论虚实之痞，皆可治之。用蒸饼糊丸者，以谷气助脾胃之蒸化耳。

03578　失笑散

【方源】《证类本草》卷二十二引《近效方》。

【异名】 断弓弦散（《苏沈良方》卷八）、失笑膏（《中藏经·附录》）、经验失笑散（《金匮翼》卷六）。

【组成】 五灵脂　蒲黄各二钱

【用法】 上药先用醋一合，熬药成膏，以水一小盏，煎至七分，热呷。

【功用】 ①《医学心悟》：散血消胀，下衣。②《方剂学》：活血行瘀，散结止痛。

【主治】 瘀血停滞，心腹剧痛，或产后恶露不行，或胞衣不下，或月经不调，少腹急痛。

①《苏沈良方》：疗妇人血气。②《妇人良方》：产后恶露不快，腰痛，小腹如刺，时作寒热，头痛，不思饮食；亦治久有瘀血，月水不调，黄瘦不思饮食，并能治之；亦可疗心痛。③《外科枢要》：治跌仆、产后心腹绞痛，或不知人事，或经行瘀血，作痛作痈。④《医学入门》：食积瘀血。⑤《痧胀玉衡》：治痧后毒气退尽，尚留瘀血在胸膈间，积血作痛。⑥《辨证录》：产后仓皇惊扰，用力过多，以致肓膜有伤，垂出肉线一条，约长一二尺，牵引心腹，痛不可忍，以手微动之，则痛苦欲绝。⑦《医学心悟》：或血入衣中，胀而不能下，以致心腹胀痛喘急。⑧《女科切要》：胃脘痛。⑨《验方新编》：男妇老少心腹胸肋瘀血作痛，小腹疝气、脚气及胎前产后血崩、血晕，一切气痛。

【方论选录】①《古今名医方论》：吴于宣曰：是方用灵脂之甘温走肝，生用则行血；蒲黄甘平入肝，生用则破血；佐酒煎以行其力，庶可直抉厥阴之滞，而有其推陈致新之功。甘不伤脾，辛能逐瘀，不觉诸证悉除，直可以一笑而置之矣。②《医方集解》：此手足厥阴药也，生蒲黄性滑而行血，五灵脂气臊而散血，皆能入厥阴而活血止痛，故治血痛如神。③《血证论》：蒲生水中，花香行水，水即气也，水行则气行，气止则血止，故蒲黄能止刀伤之血；灵脂气味温，行以行血，二者合用大能行血也。

【临证举例】 心腹痛《苏沈良方》：曾有妇人病心腹欲死，十余日百药不验，服此顿愈。

【现代研究】 药理研究①《简明中医辞典》：本方能提高机体对减压缺氧的耐受力；对垂体后叶素引起的大白鼠急性心肌缺血有对抗作用；有降低血压的作用。②《上海中医药杂志》（1963；9:1）：本方既能收缩子宫而有利于子宫复旧及恶露排出，又能缓解平滑肌痉挛而有助于痛经、产后腹痛及胸腔疼痛的缓解。

【备考】 本方改为丸剂，名“紫金丸”（见《妇人良方》）、“失笑丸”（见《医学心悟》）。《会约》：此方用以止痛，蒲黄宜减半；若用以止血，则宜等分，蒲黄炒黑，或五灵脂减半亦可。

03579　失笑散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】 细辛（去土叶）　良姜　香白芷　荜茇各等分

【用法】 上为细末。左边牙疼，口含水搐左鼻；右边牙疼，搐右鼻；如擦牙亦得。

【主治】 牙疼，不问久新。

03580　失笑散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】 荜茇　地龙（去土）　天南星　川乌头　胡椒各等分

【用法】 上为细末。先用刷牙，灌漱牙净，用药于敷痛处。

【主治】 牙疼。

03581　失笑散

【方源】《直指》卷十八。

【组成】 川五灵脂　蒲黄（隔纸微炒）　延胡索各等分

【用法】 上为末。每服二钱，酒半盏，煎七分，食前服。血痛，临熟入米醋少许。

【主治】 小肠气痛及诸血痛。

03582 生化汤

【方源】《景岳全书》卷六十一引钱氏方。

【组成】当归五钱 川芎二钱 甘草（炙）五分 焦姜二分 桃仁十粒（去皮尖双仁） 熟地三钱（一方无熟地）

【用法】上㕮咀。水二钟，加大枣二枚，煎八分，温服。

【功用】《回生集》：逐瘀生新。

【主治】产后恶露不行，小腹冷痛。现用于产后子宫复旧不良，产后子宫收缩痛，小产后胎盘残留，人工流产后出血不止，子宫肌瘤，子宫肥大症，宫外孕等。

①《景岳全书》引钱氏方：妇人胎前产后皆宜此药；胎衣不下，或血冷气闭，血枯气弱者。②《外科大成》：产后患痈。③《傅青主女科》：胎前素弱妇人，见危症热症坠胎；产后血块；分娩之后，眼见黑花，头眩昏黑，不省人事；新产后，荣卫俱虚，易发寒热，身痛腹痛。④《幼幼集成》：孕妇出痘，适逢正产，产后腹痛，恶露未尽。⑤《医林纂要》：恶露不行及儿枕作痛。⑥《外科真诠》：产后恶血未尽，脐腹刺痛，或注于股内肿痛如锥，此由冷热不调，血瘀经络而然。⑦《增订胎产心法》：胎漏小产，腹痛成块有形，属血虚气逆者。

【宜忌】①《医原》：生化汤活血化瘀，儿枕作痛尚宜。其有肝虚血燥体质，平时常有肝阳上冒见证，生化汤辛温走窜，又不宜服。尝有服此成痉厥者，不可不知。②《福建中医药》（1982；6:40）：脾胃虚弱所致的大便溏滑，心火素亢所致的心悸怔忡，肝阳横逆所致的眩晕胁痛，阴虚内热所致的口燥咽干，冲任固摄无权所致的时下血块，以及产妇感受一切温暑时邪、表里邪热未解的，都是本方的禁忌症。

【加减】凡血晕虚晕，加荆芥穗六七分；凡产妇气虚气脱，倦怠无力，加人参、黄耆；凡阳虚厥逆，加附子、肉桂。脉虚烦渴，加麦冬、五味；气壅有痰，加陈皮、竹沥；血虚血燥便结，加麻仁、杏仁、苁蓉；多汗不眠，加茯神、枣仁、黄耆；上体多汗，加麻黄根，下体多汗，加汉防己；烦热，加丹皮、地骨皮；口噤如风，反张瘛疭者，加荆芥、防风各三四分；恶露未尽，身发寒热，头痛胁胀，其小腹必然胀痛，加红花、丹皮、肉桂各三四分，玄胡一钱；内伤饮食，加山楂、陈皮、砂仁，或神曲、麦芽；外伤寒湿，加苍术、白术；血积食积，胃有燥粪，脐腹胀痛，加大黄二钱；产后下血不止，或如屋漏水，沉黑不红，或断或来，或如水，或有块，淋沥不休，此气血大虚之候，不可误用寒凉，其脉浮脱者，可加附子辈诸阳分药，否则无救矣。

【方论选录】①《医林纂要》：妇人产子，血既大破矣，而用力已劳，气亦耗泄，故产后多属虚寒。其有恶露不行，儿枕作痛诸病，皆气不足以行之故，故治此宜用温以行之。当归以滋养其新血，川芎以行血中之气，干姜以温之，炙草温中补气，而微用桃仁以行之。治余血作痛之方，宜莫良于此矣。②《成方便读》：夫产后血气大虚，固当培补，然有败血不去，则新血亦无由而生，故见腹中疼痛等证，又不可不以去瘀为首务也。方中当归养血，甘草补中，川芎理血中之气，桃仁行血中之瘀；炮姜色黑入营，助归、草以生新，佐芎、桃而化旧，生化之妙，神乎其神；用童便者，可以益阴除热，引败血下行故道也。

【临证举例】①产后调理 《江西中医药》（1960；6:25）：给60名产妇服用生化汤原方，每天一剂，于产后即连服三剂，并与对照组（未服生化汤）进行对比观察。结果，服药组在产褥期发生的不利于产后恢复或不舒服的情况比对照组减少16.6%，其中对照组的病变率为28.33%，服药组为10%。认为生化汤的产后调理作用，主要表现在预防产褥感染（服药组与对照组之比为1:3）与促进泌乳机能方面（服药组与对照组乳汁分泌不足之比为1:4）。此外，服药组产后宫缩痛增加，说明生化汤有加强子宫的收缩作用，这对防止产褥期的病变也是有利的。②小产后胎盘残留 《广东中医》（1962；9:17）：用生化汤去甘草，加益母草、熟地、丹皮、红花、艾叶，治疗小产后胎盘残留22例，其中有3例曾住院做过刮宫手术二次以上，但未见效果。少者服药二剂，多者服药六剂，即排下残留胎盘，出血及腹痛消除，22例全部治愈，且追踪半年无临床症状。③人工流产后出血不止《广西卫生》（1975；2:50）：对3例人流后阴道流血不止患者，经用各种止血药与子宫收缩药无效，后改用生化汤去炙草加丹参、益母草、牛膝，水煎服，每日一剂，服药一至三剂，阴道流血即停止。3例均治愈。④产后子宫复旧不良与产后子宫收缩痛 《新中医》（1977；2:38）：选择产后子宫复旧不良59例，产后子宫收缩痛41例，给予煎服生化汤加红花治疗，并同时期用麦角新碱治疗产后子宫复旧不良50例进行比较。结果，甲．产后子宫复旧不良：中药治疗组，治疗前24小时宫底平均下降0.59厘米，服药后24小时宫底平均下降3.28

厘米，治疗后比治疗前要快五倍多。西药治疗组，用药后24小时宫底平均下降1.40厘米。中药组较西药组宫底下降速度快一倍多。乙、产后子宫收缩痛：服生化汤加红花治疗的41例中，疗效显著者35例，效果不明显者3例，记录不详者3例。丙、服生化汤加红花的两组病人共100例，其中47例服药后阴道有血块排出，部分患者服药后有子宫收缩感。认为生化汤加红花的作用可使子宫收缩呈节律性加强，进而促进产后子宫的复旧及产后子宫收缩痛的消失。⑤子宫肌瘤及子宫肥大症 《山西医药杂志》(1980；6:21)：以加味生化汤（生化汤加益母草、炒荆芥穗）为主方，水煎服，一日一剂，30剂为一疗程，治疗子宫肌瘤与子宫肥大症共70例。其中，子宫肌瘤24例，治愈8例，有效13例，无效3例；子宫肥大症46例，治愈25例，有效18例，无效3例。最少服药10剂；最多84剂，以30至60剂为多，占75%。⑥宫外孕 《新中医》(1984；11:33)：基于宫外孕的病机属于少腹瘀实又兼虚证，治疗虽当活血化瘀，但又不可攻逐太过的特点，因此选用祛瘀生新的生化汤加减（当归、川芎、桃仁、桂枝、云茯苓、赤芍、丹皮）为主治疗21例宫外孕，另有10例休克型和2例不稳定型宫外孕即行手术治疗。结果，生化汤加减治疗的21例宫外孕，全部治愈，住院天数最短7天，最长75天，平均48天。

【现代研究】《山西医药杂志》(1980；3:7)：为了探讨临床运用加味生化汤（生化汤加益母草、炒荆芥穗）治疗子宫肌瘤与子宫肥大症的机理，以乙烯雌酚造成小白鼠子宫肥大模型，观察口服加味生化汤对正常与去卵巢之小鼠子宫重量与组织形态的影响。结果显示加味生化汤在正常育龄小白鼠，可对抗雌激素使子宫充血水肿、增生肥厚的作用，而致子宫重量减轻，初步证实了临床治疗子宫肥大症的疗效。另外，对少数子宫作了组织化学的染色观察，发现用药组糖元与脱氧核糖核酸含量都有减少。去卵巢小白鼠排除了卵巢激素之影响，便于观察加味生化汤对外源性雌激素在子宫之作用。但是实验结果与原设想相反，不仅没有象正常小鼠之作用，反而促进子宫增重。组织切片所见，本方用子去卵巢小鼠可使雌激素所致的炎症反应明显消退。这可能就是机体不同功能状态下中药所发挥的双向调整作用，即在子宫异常增大时，加味生化汤可使其固缩与减重；当卵巢功能低下时，加味生化汤又能代偿部分卵巢功能，以防止子宫萎缩。

【备考】《傅青主女科·产后篇》无熟地、大枣，以黄酒、童便各半煎服。

03583 生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】 全当归一两 川芎二钱 白术一钱 香附一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 产后气虚，胞衣不下，腹必胀痛。

【加减】 加人参三钱更妙。

03584 生气汤

【方源】《局方》卷三。

【组成】 盐（炒）二两半 丁香皮一两 胡椒二钱半 丁香 檀香各一两半 干姜（炮） 甘草（炙）各二两

【用法】 上药同捣碎，用慢火焙令香熟，乘热入瓷器内盖覆，候冷碾罗作细散，密盛贮，勿令泄气味。每服半钱至一钱，用沸汤点服，不计时候。

【功用】 常服除邪冷，生胃气。

【主治】 男子、妇人一切冷气攻心腹胁肋胀满刺痛，噫醋吞酸，痰逆呕吐，胸膈痞闷，饮食不美；又治五膈五噎，一切气疾。

03585 生气散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】 丁香三字 白术 青皮各二钱 甘草（微炙） 木香 人参各一钱

【用法】 上为末。每服半钱，沸汤点服。

【功用】 调气。

【主治】《保婴撮要》：脾胃气虚，吐泻，肚腹膨胀，饮食不化，腹痛不止。

03586 生发方

【方源】《外台》卷三十二引《深师方》。

【组成】 大黄六分 蔓荆子一升 白芷 防风 附子 芎劳 莽草 辛夷 细辛 椒 当归 黄芩 各一两 马鬃膏五合 猪膏三升

【用法】 上药煎至白芷色黄，先洗后敷。

【主治】 发落。

03587 生发酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 侧柏叶15克 芝麻根31克 杨柳梗31克 墨旱莲15克

【用法】 上为粗末。以60%酒精浸后外用。

【主治】 脂溢性脱发。

03588 生地散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 生地五两 当归三两 生姜一两（炮黑）

【用法】 上为散。每用三五钱，童便煎，去滓服。

【主治】 产后血露去多，腹中疞痛，脉数虚者。

【方论选录】 产后去血过多，腹中疞痛，是血虚不能滋荣血室，故腹痛不止焉。生地凉血以滋血室；当归养血以荣经脉；生姜炮黑，暖胃气以摄下行之血也。为散，童便调下，使血不妄行，则经脉完复，而腹中疞痛自止，何患血露之去多不止哉。

03589 生血丹

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 鹿角胶 白茯苓（去皮） 干山药各一两半 柏子（别研） 牡丹皮 菟丝子（洗净，酒浸三日，研烂成饼） 枸杞子 五味子 人参（去芦） 牛膝（去芦，酒浸三日） 远志（去心）各一两 当归（去芦，酒浸） 肉苁蓉（酒浸三日）各一两一分 生干地黄（洗） 熟干地黄（洗）各四两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心、食前温酒、盐汤任下。

【主治】 血少气涩，肌肉不荣，脚膝无力，眼目多昏等疾。

03590 生血汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】 归身 熟地各三钱 川芎 白芍各一钱 红花 泽兰各八分 木香三分

【用法】 水煎服。

【主治】 血虚经水少。

03591 生肌丸

【方源】《玉案》卷六。

【组成】 黄蜡一斤 乳香（研细） 没药（研细） 血竭各二两（研细） 象牙末四两

【用法】 先用蜡熔化，再入乳、没等药和匀，投入水中，众手为丸，如绿豆大。每服百丸，一日二服。

【功用】 长肉收功。

【主治】 一切发背疽毒；悬痈不能收口。

03592 生肌药

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 珍珠 象牙 龙骨 儿茶 花蕊石 血竭各一钱 轻粉 白芷 白蔹 朱砂各五分 冰片三分

【用法】 上为末。饭为条，阴干收用。不可加减

【功用】 收口。

【主治】 漏疮。

03593 生肌散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】 黄连生肌散（《医林纂要》卷十）。

【组成】 黄连三钱 密陀僧半两 干胭脂二钱 雄黄一钱 绿豆粉二钱 轻粉一钱

【用法】 上为细末。以温浆水洗净，用无垢软帛揾净，药贴之。

【主治】 ①《儒门事亲》：犬咬蛇伤，经导泻后，疮口痛减肿消者。②《医方集解》：疮口不敛。

【宜忌】《医方集解》：疮初起者禁之。

【临证举例】 麻先生兄村行为犬所啮，舁至家，胫肿如罐，坚若铁石，毒气入里，呕不下食，头痛而重。往问戴人，女僮曰：痛随利减。以槟榔丸下之，见两行，不瘥。适戴人自舞阳回，谓麻曰：胫肿如此，足之三阴三阳可行乎？麻曰：俱不可行。如是，何不大下之？乃命夜临卧服舟车丸百五十粒，通经散三四钱，比至夜半，去十四行，肿立消，作胡桃纹，反细于不伤之胫。戴人曰：慎勿贴膏纸，当令毒气出，流脓血水常行。又一日，戴人恐毒气未尽，又服舟车丸百余粒，浚川散三四钱，见六行。病人曰：十四行易，当六行反难，何也？戴人曰：病盛则胜药，病衰则不胜其药也。六日其脓水尽。戴人曰：脓水行时不畏风，尽后畏风也。乃以愈风饼子，日三服之。又二日方与生肌散，一敷之而成痂。

03594 生肌散

【方源】《活幼口议》卷二十。

【异名】 敛肌散（《医学入门》卷六）。

【组成】 真地骨皮 五倍子 甘草（各生） 黄柏（炙） 黄连（炒）

【用法】 上为细末。干掺疮上，以粗末用沸汤泡，蘸洗干处，津液调敷。

【功用】《医学入门》：收水凉肌解毒。

【主治】 疮疡已溃，热毒未清，疮口不敛，脓血不止者。

①《活幼口议》：小儿脚肿生疮及诸疮口不合者。②《疮疡经验全书》：疳蚀不敛并痘后脓血等疮。③《医学入门》：痘后肥疮，疳疮，癣疥。④《疡医大全》：疥痘，口疮臭烂。

【备考】《慈幼新书》有五味子、枯矾。

03595 生肌散

【方源】《痈疽验方》。

【异名】 神效生肌散（《梅氏验方新编》卷六）。

【组成】 木香二钱 黄丹 枯矾各五钱 轻粉二钱

【用法】 上药各为细末。用猪胆汁拌匀，晒干，再研细，掺患处。

【功用】 解毒，去腐，搜脓。

【主治】 ①《痈疽验方》：疮口不合。②《杂病源流犀烛》：伤寒狐惑，上唇生疮或下唇生疮；内痔疮脓出者。

【方论选录】 薛已按：此方乃解毒去腐搜脓之剂，非竟自生肌药也，盖毒尽则肉自生。常见患者往往用龙骨、血竭之类以求生肌，殊不知余毒未尽，肌肉何以得生，反增溃烂耳。若此方诚有见也。

03596 生肌散

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】 赤石脂 海螵蛸 龙骨各一钱 乳香 没药 血竭各二钱 轻粉一钱 朱砂 郁金 黄丹（飞过） 黄连 白芷各五钱

【用法】 上为细末。掺疮口上，用灯心数茎，却用膏药贴之。

【功用】 敛口生肉。

【主治】 ①《丹溪心法附余》：痈疽疮毒。②《使览》：一切痈疽恶疮溃后。

03597 生肌散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 石膏 轻粉 赤石脂各一两 黄丹（飞）二钱 龙骨 血竭 乳香 潮脑各三钱

【用法】 上为细末。先用甘草、当归、白芷各一钱煎汤，洗净患上，用此干掺，软油纸盖扎，二日一洗一换。

【功用】《中成药研究》：解毒定痛，生肌敛疮。

【主治】 ①《外科正宗》：腐骨脱出，肌肉生迟，不能收敛者。②《中成药研究》：一般痈疽疮疡溃后，腐肉已脱，脓水将尽；乳房疾患：如内外吹乳痈、乳发、乳疽、乳痰溃后，脓水将尽，乳漏；肛门疾患：如肛周脓肿溃后脓尽，肛裂；冻疮脓腐将尽，以及某些外科疾患术后，伤口愈合迟缓者。

【方论选录】《中成药研究》（1986；2:31）：本方石膏可清凉防腐，生肌敛疮。药理实验表明，石膏局部涂敷，可减少分泌物渗出，防止感染，促进愈合；轻粉外用有明显杀菌作用；赤石脂善收湿排脓，敛疮长肉。三者为主，可使余毒得解，脓尽腐脱，肌肉生长，则疮口愈合。又黄丹是疡科常用的解毒生肌定痛药，与轻粉合用，解毒去腐生新之力尤著。龙骨与石膏、赤石脂相伍，生肌敛疮之力倍增。血竭可散瘀定痛，生肌长肉。乳香是活血定痛追毒之良药，与血竭相合，使血行流畅，则疼痛可止，血活肉长，则疮口可敛。至于樟脑，性走而不守，能杀虫防腐，通窍止痛。现代药理研究表明，樟脑具有某些镇痛止痒和温和的防腐作用。因本方生肌收口而不敛邪，防腐行血有利生肌，所以为外科常用的生肌收口药。

【临证举例】 一女人，左口上牙根突肿如栗，坚硬如石，不痛，此多骨疽也，药亦不效。后三年始痛，破流臭脓，后出多骨，形如小鳖，肿仍不退，此骨未尽，稍久又出小骨二块，枯色棱瓣，其肿方退。以四君子汤加升麻、陈皮，外以甘草煎汤漱口，生肌散日搽三次而收敛。

03598 生肌散

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】 人参 龙骨 赤石脂 乳香 没药 血竭 轻粉各二钱 贝母三钱 珍珠一钱 冰片一钱（一加白蜡二钱）

【用法】 上为末，罐收听用。

【功用】 生肌。

【主治】 跌扑、肿毒、瘰疬等症已破腐尽者。

03599 生肌散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 炉甘石一两（煅，入三黄汤内七次） 本香 降香 乳香 没药 血竭 儿茶 黄柏 黄连 白芷 白蔹各五钱 龙骨三钱 冰片一钱 麝香三分 赤石脂一两（煅） 黄丹一两（飞七次） 海螵蛸（汤泡，去皮）五钱

【用法】 上为末用。

【功用】 长肉收口。

03600 生肌散

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】 人参一钱 三七根末三钱 轻粉五分 麒麟血竭三钱 象皮一钱 乳香（去油）一钱 没药一钱 千年石灰三钱 广木香末一钱 冰片三分 儿茶二钱

【用法】 上药各为极细末，研至无声为度。外敷。

【功用】《串雅内编选注》：解毒防腐，行气活血，散瘀止痛，止血生肌。

【主治】 瘿瘤手术后疮口未合，溃疡久不收口。

①《石室秘录》：物瘤已用刀破者；顽癣已用刀削去其皮者。②《华佗神医秘传》：瘿病已用小刀割破，略出白水者；粉瘤已切开挤尽其粉浆者；发瘤用针刺破，已挤尽粉发者。③《中医外科常用外用方选》：溃疡久不收口，兼治术后创面。

【方论选录】《串雅内编选注》：人参益气，木香

行气，二药合用皆可止痛，促进创口早期愈合；三七根为血中之圣药，既行瘀止血，又能消肿定痛；轻粉、石灰除热消毒，去瘀生新；象皮、儿茶收湿泻热，生肌长肉；乳香、没药、血竭行气活血，散瘀止痛。诸药合用，有解毒防腐，行气活血，散瘀止痛，止血生肌之效。

【备考】《中医外科常用外用方选》：方中象皮应经过炮制后研末；千年石灰系指石灰之陈久者，而新出窑石灰性太燥烈，不宜用。

03601 生肌散

【方源】《种福堂方》卷四。

【异名】 海龙粉。

【组成】 龙骨 血竭 红粉霜 乳香 没药 海螵蛸 赤石脂各一分 煅石膏二分

【用法】 上为细末。敷上。

【功用】《串雅内编选注》：去腐生肌，防腐止痛。

【主治】 ①《种福堂方》：下疳。②《串雅内编选注》：一切痈疽肿毒，疮疡溃久不易收口之症。

【加减】 若要去腐肉，每生肌散一两，配入（白）粉霜三分或五分；如治下疳等，每两配入一二分。

【方论选录】《串雅内编选注》：本方以龙骨、石膏、海螵蛸、赤石脂收湿敛疮，生肌长肉为主。但"腐不尽，不可以言生肌"，所以在生肌群药之中，加入红粉霜去腐，佐以血竭、乳香、没药散瘀止痛。共成去腐生肌、防腐止痛之方。

03602 生肌散

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】 赤石脂 海螵蛸 龙骨各一两 乳香 没药（炙） 枯矾 文蛤（炙）各五分 白芷 轻粉 血竭 朱砂 象皮（炙）各一钱（如无象皮，用真象牙屑二钱代之）

【用法】 上为细末。临用时加麝香、冰片少许吹之。

【功用】 去腐生新收口。

【主治】 缠喉风、骨槽风、单双乳蛾、喉疳、重舌等日久有脓已溃，疮口不收者。

【宜忌】 忌牛、羊肉及一切发物。

【加减】 如疮口破烂艰于完密者，加珍珠一钱，紫金藤二钱。

03603 生肌散

【方源】《外伤科学》。

【组成】 制炉甘石五钱 滴乳石三钱 滑石一两 琥珀三钱 朱砂一钱 冰片一分

【用法】 上为极细末，掺疮面，外盖膏药或油膏。

【功用】 生肌收口。

【主治】 痈疽溃后，脓水将尽者。

【备考】《中医伤科学》：亦可用凡士林适量调煮成油膏外敷。其中冰片亦可待用时掺撒在膏的表面方敷。

03604 生肌散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 轻粉30克 血竭末9克 龙骨末9克 炙乳香3克 煅石膏末30克 赤石脂末30克

【用法】 以上各药依次加入，研成细末，装瓶备用。用少许直接撒在疮面，外盖玉红膏纱条，再盖敷料。

【功用】 生肌长肉。

【主治】 溃疡疮面，腐肉已清，新肌已露。

03605 生肌膏

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】 鸡蛋油三钱（取鸡蛋十余个，煮熟用黄，铜杓内熬油，倾入盏内） 轻粉末一钱 乳香 血竭 龙骨各五分

【用法】 上为末，和匀。每日早、午、晚鸡翎蘸搽患处，膏盖避风。半月完口。

【主治】 痔漏。

【加减】 虚弱者，兼服养血健脾汤。

03606 生肌膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 制乳香15克 制没药15克 儿茶15克 血竭15克 青花蛇蜕（煅）15克 碎琥珀15克 合欢皮15克 净轻粉12克 净红粉3克 川蜈蚣（焙焦）10条 冰片6克

【用法】 用凡士林156克、白蜡15克、黄蜡15克，入锅内熔化后，离火待温，将药末加入搅和即成。外用。

【主治】 下肢溃疡。

03607 生附汤

【方源】《直指》卷十八。

【组成】 附子（生）一分 苍术（炒） 杜仲（姜制炒）各半两 生干姜 白术 茯苓 牛膝（酒浸，焙） 厚朴（制） 甘草（炙）各一分

【用法】 上锉。每服三钱，加生姜四片，大枣二枚，食前煎服。

【主治】 受湿腰痛。

03608 生韭饮

【方源】《医统》卷二十六引朱丹溪方。

【组成】 生韭（捣自然汁一盏，温加酒一二杯同服）

【用法】 上先以桃仁连皮细嚼数十枚后，以韭汁送下。

【功用】 升提气血。

【主治】 食郁久则胃脘有瘀血作痛。

03609 生胃丸

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】 良姜 白姜各四两（并油炒） 丁香 胡椒

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服百十丸，米饮陈皮汤下。

【主治】 酒食所伤，胸膈不快，不思饮食。

【备考】 方中丁香、胡椒用量原缺。

03610 生胃丹

【方源】《医方大成》卷三引《济生》。

【异名】 生胃丸（《瑞竹堂方》卷二）。

【组成】 大天南星四两（用真黄土半斤，将生姜汁作黄土成面剂包裹南星，慢火煨香透去土不用，将南星切碎焙干和后药研） 丁香（不见火）一两 粟米一升（用生姜二斤和皮擂取自然汁浸蒸焙） 木香（不见火） 厚朴（去皮姜汁制炒） 神曲（炒） 麦芽（炒） 橘红 防风（去芦） 白术 谷芽（炒） 缩砂仁 白豆蔻 青皮（去白）各一两半 夏曲二两 人参 沉香（不见火） 甘草（炙）各半两

【用法】 上为细末，为丸如绿豆大。每服七十丸，不拘时候，淡姜汤送下。

【主治】 脾胃不足，痰多呕逆，不思饮食。

【方论选录】 此药以南星、粟米、黄土为主，盖南星醒脾，粟米养胃，黄土以土养土也。

03611 生香散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 白松香四两（用葱汁煮干）

【用法】 上为末，加生猪板油二两捣成膏，贴之。次用红粉生肌。

【主治】 臁疮，血风。

03612 生香膏

【方源】《三因》卷十六。

【组成】 甜瓜子（去壳）

【用法】 上为细末，蜜熬少许，调成膏。食后含化；或敷在齿间。一方用香附子炒去毛，为末。每早晚揩少许牙上。

【主治】 口气热臭。

03613 生脉散

【方源】《医学启源》卷下。

【异名】 生脉汤（《丹溪心法》卷一）、参麦散（《遵生八笺》卷四）、生脉饮（《兰台轨范》引《医录》）、人参生脉散（《症因脉治》卷二）、定肺汤（《医林绳墨大全》卷二）、参麦五味饮（《胎产心法》卷下）。

【组成】 麦冬 人参 五味子

【功用】 益气养阴，敛汗生脉。

①《医学启源》：补肺中元气不足。②《医便》：止渴生津。③《回春》：清心润肺。④《景岳全书》：止渴消烦，定咳嗽喘促。⑤《嵩崖尊生》：清暑益气，生脉补虚。

【主治】 气阴两伤，肢体倦怠，气短懒言，口干作渴，汗多脉虚；久咳伤肺，气阴两亏，干咳少痰，食少消瘦，虚热喘促，气短自汗，口干舌燥，脉微细弱；或疮疡溃后，脓水出多，气阴俱虚，口干喘促，烦躁不安，睡卧不宁。

①《丹溪心法》：注夏属阴虚，元气不足，夏初春末，头痛脚软，食少体热。②《正体类要》：金疮、杖疮，发热体倦，气短，或汗多作渴，或溃后睡卧不宁，阳气下陷，发热烦躁。③《内科摘要》：热伤元气，肢体倦怠，短气懒言，口干作渴，汗出不止。④《外科枢要》：胃气亏损，阴火上冲，口干喘促，或肢体倦怠，肌肉消瘦，面色萎黄，汲汲短气，汗出不止，食少作渴；或脓水出多，气血俱虚，烦躁不安，睡卧不宁。⑤《医方考》：气极者，正气少，邪气多，多喘少言。⑥《赤水玄珠》：肺气大虚，气促上喘，汗出而息不续，命在须臾。⑦《回春》：中暑，暑伤于气，脉虚弦细芤迟，属元气虚脱者。

【方论选录】 ①《内外伤辨》：圣人立法，夏月宜补者，补天真元气，非补热火也，夏食寒者是也。故以人参之甘补气，麦门冬苦寒泻热，补水之源，五味子之酸，清肃燥金，名曰生脉散。孙真人云：五月常服五味子，以补五脏之气，亦此意也。②《医方考》：肺主气，正气少故少言，邪气多故多喘。此小人道长，君子道消之象。人参补肺气，麦冬清肺气，五味子敛肺气，一补一清一敛，养气之道毕矣。名曰生脉者，以脉得气则充，失气则弱，故名之。东垣云：夏月服生脉散，加黄耆、甘草，令人气力涌出。若东垣者，可以医气极矣。③《古今名医方论》引柯韵伯：麦冬甘寒，清权衡治节之司；人参甘温，补后天营卫之本；五味酸温，收先天天癸之原。三气通而三才立，水升火降，而合既济之理矣。④《医方集解》：人参甘温，大补

肺气为君；麦冬止汗、润肺滋水，清心泻热为臣，五味酸温，敛肺生津，收耗散之气为佐。盖心主脉，肺朝百脉，补肺清心，则元气充而脉复，故曰生脉也。夏月炎暑，火旺克金，当以保肺为主，清晨服此，能益气而祛暑也。⑤《成方便读》：方中但以人参保肺气，麦冬保肺阴，五味以敛其耗散。不治暑而单治其正，以暑为无形之邪，若暑中无湿，则不致留恋之患，毕竟又无大热，则清之亦无可清，故保肺一法，即所以祛暑耳。此又治邪少虚多，热伤元气之一法也。在夏月肺虚者，可服之。⑥《温病条辨》：汗多而脉散大，其为阳气发泄太甚，内虚不可留恋可知。生脉散酸甘化阴，守阴所以留阳，阳留，汗自止也。以人参为君，所以补肺中元气也。⑦《血证论》：人参生肺津，麦冬清肺火，五味敛肺气，合之甘酸化阴，以清润肺金，是清燥救肺汤之先声。

【临证举例】 ①中暑 《续名医类案》：陆祖愚治陈元甫，七月间因构讼事，忍饥，食冷粥数碗，少顷即吐出。自此茶饮皆吐，头痛身热，咽喉不利，昏冒，口中常流痰液。医知为中暑，用冷香薷饮投之，随吐；又以井水调益元散投之，亦吐，昏沉益甚。脉之，阳部洪数无伦，阴部沉微无力。此邪在上焦，在上者因而越之，此宜涌吐者也。盖饥饿之时，胃中空虚，暑热之气，乘虚而入于胃，胃热极而以寒冷之水饮投之，冷热相反，所以水入即吐；即生口中流涎，亦胃热上溢之故也。因用沸汤人盐少许，蘸汁数匙，乘热灌之，至二三碗不吐，至一时许方大吐，水饮与痰涎同出，约盆许。即以生脉散投之，人事清爽，诸症顿减。②脱症 《成都中医学院学报》(1979；1:48)：周某，女，75岁。患高血压及慢性支气管炎多年。平素血压在190～170/110～100mmHg之间，并有头晕失眠，咳嗽胸闷等。诊前约10分钟，因过劳突感呼吸困难，心悸，头汗如珠，口噤不语，脉形隐伏，息缓而结，至数不清，每分钟约36次/分。证属脱证。急取红参2支（切片），麦冬15克、五味子12克，开水浸泡，白糖为引，徐徐灌入口中，药尽服，病人始能呻吟，手足扰动。再服即时苏醒，脉形始现，50次/分，仍无力而结，3～5至一止。此元气复而未盛，原方浓煎作饮，2小时内尽服生脉散二剂，神识清楚，转危为安。次日再诊，觉头昏疲乏心跳，六脉弦缓，5～8至一止。血压140/100mmHg，已进食。仍按原方再进三剂，素食调养，脉形整齐，恢复常态。③低血压 《四川医学》 (1981；2:100)：口服生脉散加味（粉剂）：党参6克、黄耆6克、五味子2克、麦冬2克，共18克为一人一日量，共研末，每次服6克，每日三次，连服四周为一疗程，选择血压低于90/60mmHg，排除器质性及营养不良者作为观察对象，共观察10例（男女各5人），经给药一疗程后，收缩压平均升高14mmHg，舒张压平均升高6.7mmHg。④心肌炎 《上海中医药杂志》(1979；6:25)：治疗心肌炎20例（其中15例经多种西药多疗程治疗无效而改用本法），显效6例，有效10例，无效4例。⑤休克 《新医药杂志》(1974；3:21)：收治急性心肌梗塞并发心源性休克20例，其中3例单用西药治疗，死亡1例（33%），而另17例用生脉散注射液治疗，死亡1例（5.8%），16例血压全部回升恢复正常，升压作用温和是其特点。《江苏中医》(1980；3:59)：以本方治疗休克114例，包括感染性休克98例，用药5分钟至1小时后开始升压，显效率为71.8%，血压稳定时间平均为17.3小时。⑥心衰 《中医杂志》(1980；12:30)：生脉液治疗小儿肺炎合并心衰17例，其中1～3天内症状消失者10例（58.8%），3天以上消失者7例（41.1%），平均消失时间3.81±0.39天，而12例对照组中，3天以上消失者7例（58.3%），1～3天以内消失者5例（41.7%），平均消失时间6.08±1.19天，P>0.05。⑦心律失常 《中级医刊》 (1959；9:26)：患者女性，73岁，支气管扩张合并支气管肺炎，继发心力衰竭，采用毛地黄叶粉末内服。治疗过程中，突然发生恶心呕吐，心率38次/分，律齐，血压降至90/0mmHg，患者疲乏，嗜睡。经中西医会诊，诊断为毛地黄中毒所致心房室传导阻滞。用人参9克、麦冬9克、五味子3克；连服5剂，心律恢复至56次/分，诸症逐步缓解。《天津医药》(1978；2:64)：用本方配合安他心0.1克每日四次，治疗室性、房性早搏5例，4例全愈，1例好转。 《成都中医学院学报》 (1981；2:52)：治疗心率缓慢型心律失常21人次（15人），其中病态窦房结综合征18人次，伴有二度二型或三度房室传导阻滞的双束枝传导阻滞3人次。结果1人次显效，17人次好转，治疗有效率为18/21（85.7%）。⑧冠心病、心绞痛 《中医杂志》(1981；12:67) 观察54例冠心病心气虚患者应用生脉散前后的左心功能改变，用药前后比较结果具有显著性差异。《安徽中医学院学报》 (1984；3:40)：严氏用生脉液治疗心血管疾病23例，其中冠心13例，高心6例，肺心3例，心肌炎1例，总有效率为70.1%。其中对改善心电图异常的总有

效率为69.6%，缓解心功能障碍症状总有效率为70.4%。⑨肺结核 《中医杂志》（1959；9:36～37）：根据中医辨证施治原则治疗肺结核22例，其中心肺型（即心痨与肺痨混合型）用生脉散熬膏治疗。经四个月后，全部有效，大多数恢复健康。

【现代研究】 ①镇静作用 《新医药学杂志》（1974；3:21）：生脉散有镇静作用，能延长小白鼠或苯巴比妥钠睡眠时间。给药组平均睡眠时间136.6±21.6分钟，对照组平均睡眠时间为100.3±35.2分钟（P<0.01）。②提高耐缺氧能力 《新医药学杂志》（1974；3:21）：生脉散可增加小白鼠对低压缺氧的耐受能力，给药组存活率为63.3%，对照组存活率为37.7%，两组差别显著（P<0.05）。说明本方能提高心肌对缺氧的耐受性，节约心肌对氧的消耗。③抗冠心病作用 《北京医学院学报》（1975；2:118）：家兔经结扎冠状动脉前降支，造成实验性心源性休克，生脉散注射液具有一定的治疗作用，但升压作用缓慢，给药组与对照组疗效有明显差异。《中医杂志》（1981；6:24）：观察54例有心气虚表现的冠心病心绞痛患者的心肌收缩时相（STT）及心尖搏动图，表明该病心气虚的实质与不同程度心功能不全有关。应用生脉散注射液后，可以改善左心室功能。其正性肌力作用与西地兰对心脏作用相类似。④抑制豚鼠心肌细胞膜三磷酸腺苷酶活性 《新医药学杂志》（1973；10:27）：生脉散可抑制豚鼠心肌细胞膜三磷酸腺苷酶的活性，抑制强度与剂量成正比。其中人参、五味子单味药亦有抑制作用，而麦冬则无抑制作用。认为生脉散由于抑制心肌细胞三磷酸腺苷酶的活性，是改善心脏生理功能的途径之一。⑤对2,3-二磷酸甘油酸的双向调节作用 《全国中西医结合虚证研究与防治老年病会议资料选编》（1982年）：观察静脉注射生脉散前及24小时后正常人及冠心病患者细胞2,3-二磷酸甘油酸的含量变化，结果表明本方对此可能具有双向调节作用。动物实验结果还表明本方还可以提高缺氧动物的PO_2、SO_2，设想可能是生脉散使缺氧机体的摄氧、带氧能力提高，并将此看成是生脉散益气作用机理之一。⑥抗微循环障碍作用 《辽宁中医杂志》（1984；12:36）：生脉散注射液对大分子右旋糖酐所致微循环障碍和弥漫性血管内凝血的病理变化，有一定的对抗和保护作用。不仅可以改善微循环障碍，还可以阻止血管内DIC产生。⑦强心机理 《安徽中医学院学报》（1983；3:56）：生脉散是通过多种途径作用而增强心肌收缩、改善心功能的。其作用途径至少有四个方面：1. 抑制心肌细胞膜Na-K-ATP酶活性。2. 改善心衰心肌的能量代谢。3. 改善心衰心肌蛋白的代谢。4. 兴奋垂体-肾上腺功能。⑧抗休克作用 《天津医药通讯》（1972；11:44）：生脉注射液可使在体兔心收缩力加强，对狗急性失血性休克具有升压作用，并使休克动物趋于安静。《新医药学杂志》（1974；3:21）：心源性休克：用耳缘静脉注射橄榄油的方法，造成家兔心源性休克，对照组存活率为12.5%，预防给生脉散组存活率为75%，两组差别显著（P<0.05）。本方主要作用可能是加强心肌收缩力，改善冠状动脉循环。中毒性休克：生脉散能延长家兔阻断肠系膜上动脉后所致休克的存活时间，给药组平均存活时间为488.8分，对照组为344.4分，两组比较，差别非常显著（P<0.01）。⑨毒性研究 《中成药研究》（1980；2:41）：生脉散注射液给狗静滴17～20毫升/公斤，滴速60滴/分，心电图及血压无明显变化，快速注入（180滴/分），心电图出现ST段下降；静脉注射未有溶血现象；小鼠尾静脉给药，LD_{50} 34.94±3.51克/公斤。临床一次静滴400毫升，未发现任何副作用，仅偶有静脉炎发生。

【备考】《观聚方要补》引《内外伤辨》本方用人参、麦冬各三钱，五味子十五粒。水煎服。

03614 生津饮

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 人参一钱半 麦冬三钱（去心） 知母一钱半（去毛） 天冬三钱（去心） 草梢一钱半 车前子二钱

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 孕妇淋沥涩痛，脉软数。

【方论选录】 妊娠气亏，湿热伤津液，而不能上敷下达，故口燥心烦，小便涩痛淋沥不已焉。人参扶元气以通津液，天冬润肺以资水源，麦冬生津润燥，知母清热除烦，草梢泻火以缓涩痛，车前子清肝以利小便也。水煎温服，使元气内充，则湿热自化，而津液四溢，无不上输心肺，而烦躁宁，下达膀胱肾而涩痛解，何小便淋沥之不痊者，胎孕无不自安矣。

03615 生姜汤

【方源】《医心方》卷九引《深师方》。

【组成】 生姜五两 茯苓四两 半夏一升 橘皮一两 甘草二两

【用法】 以水九升，煮取三升七合，分三服。

【主治】 食已呕逆。

03616 生姜散

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】生姜（切，炒）二两　蓬莪术（锉炒）一两　陈橘皮（汤浸去白，炒）　甘草（锉，炒）各二两

【用法】上为散。每服一钱匕，入盐少许，沸汤点服。

【主治】胃反，吐逆不止，心膈不利，饮食减少。

03617　生姜散

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】草豆蔻二两（去皮，白面裹煨令熟，去面）　甘草四两（炙锉）

【用法】上为粗末，以生姜去皮半斤细切，与药末同入木臼内捣成饼子，焙干，再捣罗为散。每服一钱匕，入盐点服，不拘时候。

【主治】胃中有寒，气逆呕哕。

03618　生姜粥

【方源】《证类本草》卷八引《兵部手集方》。

【组成】母生姜二斤（捣烂）

【用法】绞取汁，作拨粥服。

【功用】《长寿药粥谱》：暖脾胃，散风寒。

【主治】①《证类本草》引《兵部手集方》：反胃羸弱，不欲动。②《长寿药粥谱》：中老年人脾胃虚寒，呕吐清水，腹痛泄泻，感受风寒，头痛鼻塞，以及慢性气管炎肺寒喘咳。

【备考】《长寿药粥谱》有大枣。若用于风寒感冒，去大枣，加葱白同煮粥。

03619　生姜粥

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】生姜（去皮细切研）一两　枇杷叶七片（拭去毛，炙，为末）

【用法】以水二升，煎至一升，去滓，用白粳米一合煮粥，更入盐、酱汁、五味等，空心温食之。

【主治】反胃呕吐，不下食。

03620　生姜煎

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】生姜（取汁）一盏　白沙蜜三两

【用法】同煎十余沸，用瓷器盛。时时以热水调一匙头，含咽之。

【主治】口疮疼痛。

03621　生犀丸

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】荆芥穗　大黄各一两　甘草　川芎各半两　薄荷叶七钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作十丸。每服一丸，食后细嚼，温水送下。

【主治】目赤肿痛隐涩，眵泪生疮。

03622　生犀饮

【方源】《普济方》卷六十三引《杨氏家藏方》。

【组成】大黄　盆消各二两　荆芥　薄荷　甘草各一两

【用法】上为粗末。水煎，食后服；或为末，蜜水调下。

【主治】脾肺积热，脏腑积滞，咽喉肿痛，痰嗽不利。

03623　生犀饮

【方源】《温疫论》卷二。

【异名】生犀散（《医学集成》卷二）。

【组成】犀角二钱（镑）　苍术（泔浸油炒）　川连各一钱　黄土五钱　界茶叶一大撮　金汁半盏

【用法】水煎，去滓，入金汁搅和。日三夜二服。

【主治】瓜瓤瘟。胸高胁起，呕血如汁。

【加减】虚，加盐水炒人参；大便结，加大黄；渴，加栝楼根；表热，去苍术、黄土，加桂枝、川连；便脓血，去苍术，倍黄土，加黄柏；便滑，以人中黄代金汁。

【备考】《医学集成》有花粉，无茶叶，金汁作"人中黄"，用法为散服。

03624　生犀饮

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】生犀角二钱　羚羊角一钱　防风一钱　黄芩一钱　桔梗一钱五分　知母一钱　茯苓一钱　人参一钱

【用法】上为粗末。以水二盏，煎至一盏，食后去滓温服。

【功用】清热。

【主治】伤寒病后患目疾，因余热未清，过食辛热，两热合邪，以致瞳仁散大，时见黑花，隐涩泪多，红肿疼痛。

03625　生犀散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】生犀汤（《普济方》卷四〇〇）。

【组成】生犀二钱（锉末）　地骨皮（自采佳）　赤芍药　柴胡根　干葛（锉）各一两　甘草（炙）五钱

【用法】上为粗末。每服一二钱，水一盏，煎至七分，食后温服。

【功用】《古方新解》：镇肝，除心热，

【主治】小儿阴虚，血分有热，或兼感外邪，日

晡潮热，夜有盗汗，五心烦热，形体羸瘦，口干颊赤者。

①《小儿药证直诀》：目淡红，心虚热。②《保婴集》：虚热潮作，亦治伤寒壮热及余热。③《卫生宝鉴》：小儿骨蒸，肌热瘦悴，颊赤口干，日晚潮热，夜有盗汗，五心烦热。④《普济方》：小儿痨瘵。⑤《幼科发挥》：风热。

【方论选录】《小儿药证直诀释义》：此方以犀角为主，凉血清心；地骨皮退其虚热；赤芍柔肝敛阴；又加干葛、柴胡散外来之邪；甘草和中解毒。对血分热毒兼有阴虚而又夹外邪者颇为适宜。

03626 生犀散

【方源】《医方类聚》卷一五七引《施圆端效方》。

【组成】升麻二两 郁金半两 大黄 甘草各一两

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏半，煎至七分，和滓温服，不拘时候。

【主治】一切积毒伏热，吐血衄血，呕咳咯血，伤寒杂病下血。

03627 生犀散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生犀角一两 麻黄一两 石膏三两 羌活一两 当归二两 人参一两 甘草五钱 葛根一两 赤芍一两

【用法】上为散。每服五钱，水煎去滓，入姜汁一匙，温服。

【主治】孕妇卒中风不语，脉浮数者。

【方论选录】妊娠风热，闭遏经气不通，故卒然仆倒，不能言语，胎孕其何以能安？生犀角清心胃之火；石膏清阳明之火；麻黄开发肌表以散邪；羌活疏通经络以逐邪；人参扶元补气，善通血脉；当归养血益营，能荣经脉，葛根升阳散热；赤芍泻火利营；甘草缓中以泻火也。为散，水煎入姜汁，以散豁痰涎，务使风火两除，则经气清和而神机开发，痰涎自化，胎孕必得所养，何忧卒中风之不能言语哉！

03628 生髓汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】熟地一两 山茱萸四钱 远志二钱 生枣仁五钱 柏子仁（去油）五钱 茯神三钱 人参三钱 菖蒲五分 白芥子二钱

【用法】水煎服。连服一月，自然不忘矣。

【主治】心肾不足，老年健忘，近事多不记忆，虽人述其前事，犹若茫然。

【备考】此方心肾兼补，上下互资，实治健忘之圣药。苟能日用一剂，不特却忘，并有延龄之庆矣。

03629 生石斛酒

【方源】《外台》卷十七引《延年秘录》。

【组成】生石斛二斤（捶碎） 牛膝一斤 杜仲八两 丹参八两 生地黄（切）三升（晒令干）

【用法】上切，以绢袋盛，以上清酒二斗，入器中渍七日。每食前温服三合，日三夜一服。加至六七合至一升。

【功用】利关节，坚筋骨，令强健悦泽。

【主治】风痹脚弱，腰胯疼冷。

【宜忌】忌芜荑。

03630 生发软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】雄黄 15 克 硫黄 15 克 凤凰衣 15 克 穿山甲（炮制）9 克 滑石粉 31 克 生猪板油 31 克 鲜猪苦胆一个

【用法】以上前五味中药，共研为细末，用猪板油、猪苦胆汁调和药末，捣如泥即成。用时纱布包好，轻轻用力搽抹患处，每日二至三次。

【主治】斑秃。

03631 生地制散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地三两 熟地三两 黄耆三两（蜜炙） 麦冬三两（去心） 白芍二两（炒） 条芩两半 地骨皮二两 甘草五钱 枸杞三两

【用法】上为散。水煎六钱，去滓温服。

【主治】孕妇吐血、衄血，脉软数者。

【方论选录】妊娠血气两亏，挟热而络脉暗伤，营行失度，故吐血、衄血不止焉。生地滋阴壮水以凉血，黄耆补气生血以摄血，熟地补阴滋血，麦冬润肺清心，条芩清热安胎，白芍敛阴止血，地骨皮清肌退浮热，枸杞子补肾填精血，甘草缓中以泻火热也。水煎温服，使血气内充，则虚火自退，而经府肃清，何有吐血、衄血之患，胎孕无不自安矣。

03632 生地黄丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】生地 黄耆各两半 防风 鹿茸 茯神 远志 瓜蒌仁 黄芩各一两 人参一两二钱半 当归五钱 赤芍 蒲黄 戎盐各七钱半 炙草七钱 车前子 滑石末各二两

【用法】蜜为丸服。

【主治】肾虚劳淋。

03633 生地黄汤

【方源】《千金》卷六。

【异名】地黄汤(《圣济总录》卷一四四)、生干地黄散(《普济方》卷二一九)

【组成】生地黄八两　黄芩一两　阿胶二两　柏叶一把　甘草二两

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取三升，去滓纳胶，煎取二升半，分三服。

【主治】①《千金》：衄血。②《圣济总录》：因坠堕内损，大小便下血，经久不尽；打扑损伤肺气，或咳嗽有血，或吐血。

03634　生地黄汤

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】生地黄（研，取汁）　竹沥　荆沥各一升　羌活（去芦头）　防风（去叉）各三两　附子一枚重者（炮，去皮脐，别破之）

【用法】上药除前三味外，余三味锉如麻豆。每服三钱匕，水一盏半，地黄汁、竹沥、荆沥各少许，同煎数沸，去滓，取一盏，温服，不拘时候。

【主治】热痹。

03635　生地黄汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】生地黄半两　甘草（炙）一分　地榆三分

【用法】上㕮咀，如麻豆大。水二盏，煎至一盏，去滓，分温二服，空心，日晚再服。

【主治】①《圣济总录》：热痢不止。②《景岳全书》：热痢便血，崩淋不止。

03636　生地黄汤

【方源】《医方大成》卷十引汤氏方。

【异名】胎热地黄汤(《幼科证治大全》)。

【组成】生干地黄　赤芍药　川芎　当归　天花粉各等分

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏，煎服。乳母服用，并略与儿服之。

【主治】①《医方大成》引汤氏方：小儿生下，遍体皆黄，状如金色，身上壮热，大小便不通，乳食不进，啼叫不止。此胎黄之候，皆因母受热而传于胎也。②《准绳·幼科》：小儿在胎时，因母有热或恣飨酒面热毒之物，传于胎中，令儿生下面赤眼闭，身体壮热，哭声不止，口热如汤，乃胎热之候也。

03637　生地黄汤

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】生地黄二两（洗净）　阿胶（炒酥）一两　川芎　北梗　蒲黄　甘草（生）各半两

【用法】上锉。每服二钱，水煎熟，入生姜汁二匙，温服。

【主治】上热衄血。

03638　生地黄汤

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】生地黄（干者）　决明子　黄芩（去心）　竹叶各二两　川黄连　芍药各半两

【用法】上为粗末。大人用十钱匕，水三盏，煎五七沸，绵滤去滓，乘热洗眼，冷即止，再暖再洗，日二三次。只用一日，次日换药。小儿约量岁数。

【主治】大人、小儿暴赤眼，涩隐肿痛不开。

03639　生地黄汤

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】生地黄三钱　川芎一钱　枯芩一钱　桔梗一钱　栀子一钱　蒲黄一钱　阿胶（炒）一钱　侧柏三钱　牡丹皮一钱　茅根三钱　甘草三分　白芍一钱

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】衄血。

03640　生地黄汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】生地三钱　牛膝　丹皮　黑山栀各一钱　丹参　元参　麦冬　白芍各一钱五分　郁金　广三七　荷叶各七分

【用法】水煎，加陈墨汁、清童便各半杯，和服。

【主治】吐血。

03641　生地黄汤

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】生地黄　赤芍药　川芎　当归　天花粉　赤茯苓　泽泻　猪苓　甘草（生）　茵陈蒿

【用法】引用灯心，水煎，食前服。

【功用】渗湿清热。

【主治】胎黄轻证。乃孕妇湿热太盛，小儿在胎受母热毒，以致生则遍体面目皆黄，其色如金。

03642　生地黄饮

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】生地黄四两　黄芩（去黑心）　赤芍药　竹茹各三两　蒲黄三大合　地骨皮五两

【用法】上除蒲黄外，㕮咀如麻豆。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，食后去滓温服，一日二次。

【主治】大衄。口鼻出血，血上心胸，气急劳热。

03643 生地黄饮

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】生地 黄芩（炒） 阿胶（炒） 柏叶（炒）

【用法】水煎服。

【主治】血热，小便出血。

03644 生地黄鸡

【方源】方出《肘后方》卷四，名见《圣济总录》卷一八九。

【异名】乌鸡汤(《内外科百病验方大全》)。

【组成】乌雌鸡一头 生地黄一斤（切） 饴糖二升

【用法】乌雌鸡治如食法，以地黄、饴糖纳腹内，急缚，铜器贮甑中，蒸五升米久，须臾取出，食肉、饮汁，三月三度作之。

【主治】①《肘后方》：因积劳虚损，或大病后不复，常若四体沉滞，骨肉疼酸、吸吸少气，行动喘惙；或小腹拘急，腰背强痛，心中虚悸，咽干唇燥，面体少色；或饮食无味，阴阳废弱，悲忧惨戚，多卧少起，久者积年，轻者才百日，渐至瘦削，五脏气竭。②《内外科百病验方大全》：男妇虚弱，或病后，或产后，或疮毒久不收口，脾胃不健，一切诸损。

【宜忌】勿啖盐。

03645 生地黄酒

【方源】《普济方》卷二四四。

【组成】生地黄（干）一斤 杉木节五两 牛蒡子一斤（去皮） 丹参二两 牛膝五两（去苗） 大麻仁半斤 防风三两（去叉） 独活 地骨皮各三两

【用法】上锉。用生绢袋盛，以酒三斗，浸六七日，每于食前随性饮之。

【主治】脚气肿满，烦疼少力。

03646 生地黄散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】生干地黄一两 茯神三分 葳蕤三分 知母三分 栝楼一两 黄耆一两（锉） 地骨皮一两 石膏一两 人参一两（去芦头） 麦门冬一两（去心） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳烦热，口热，颊赤，多渴。

【备考】本方方名，《普济方》引作“地黄散”。

03647 生地黄散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【异名】地黄膏(《圣济总录》卷一二〇)。

【组成】生地黄汁五合 当归 白芷 细辛 盐花各一分

【用法】上为细散，相和令匀，于银器中煎成膏。临用时以药厚涂于牙龈上，有津即咽之，日三夜二。

【主治】热毒风攻头面，齿龈肿痛不可忍。

03648 生地黄散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】生干地黄二两 黄芩 赤芍药 黄连（去须） 蒲黄 地骨皮各一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入竹茹一鸡子大，煎至五分，去滓，频温服之。

【主治】心肺积热，流注大肠，大便下血。

03649 生地黄散

【方源】《保命集》卷下。

【异名】生地黄汤、生地黄饮子(《洁古家珍》)。

【组成】生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮 天门冬 黄耆 芍药 甘草 黄芩各等分

【用法】上锉。每服一两，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】衄血、下血、吐血、溺血，皆属于热。但血家证，皆宜服此药。

【加减】脉微，身凉恶风，每服加桂半钱，吐血者多有此证。

【方论选录】《证因方论集要》：二地并用，熟以益阴，生以凉血；黄耆、甘草补气，所谓有形之血不能速生，无形之气所当急固也；天冬清上，白芍敛肝，枸杞、地骨退热除蒸；黄芩平诸热，盖血得热则妄行也。

【备考】《丹溪心法》引本方有柴胡、黄连。治郁热衄血，或咯、吐血。若下血，加地榆。《玉机微义》亦载此方，组成与《丹溪心法》相同，治“妇人经漏下血，脉虚洪，经水紫黑”。

03650 生地黄散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】生地黄 升麻 川芎 华阴细辛（择净） 露蜂窝（炒焦） 防风各一两 大皂角二钱（去黑皮，炙焦）

【用法】上为粗末。每服三四钱，水一大盏，入荆芥数穗，同煎至八分，去滓，微热漱，冷吐，食后或临卧时漱三二次。

【主治】牙齿疼痛。

03651 生地黄散

【方源】《血证论》卷七。

【组成】 生地五钱 川芎钱半 黄芩三钱 侧柏叶三钱 桔梗三钱 栀子三钱 蒲黄三钱 阿胶二钱 白茅根三钱 丹皮三钱 白芍三钱 甘草钱半 童便一杯 莱菔汁一杯

【主治】 吐血，衄血。

【方论选录】 此方以治肝为主，以肝主血故也。而亦兼用心肺之药者，以心主火，治火必先治心；肺主气，降气必先清肺。为凉血止血之通剂，方义虽浅而易效。

03652 生地黄粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】 生地黄汁三合 蜜二合 米三合 车前叶（取汁）三合

【用法】 先以水一大盏半，煮米成粥，次入诸药汁及蜜，更煎三两沸，分为二服。

【主治】 小便出血，疼痛。

03653 生地黄粥

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】 生地黄汁一合 酸枣仁二两（水绞取汁二盏）

【用法】 上药水煮同熬数沸，次下米三合煮粥，空腹食之。

【主治】 虚弱骨蒸，四肢无力，渐渐羸瘦，心烦不得睡卧。

03654 生地黄粥

【方源】《药粥疗法》引《二如亭群芳谱》。

【组成】 生地黄汁约 50 毫升（或用干地黄 60 克） 粳米 60 克 生姜 2 片

【用法】 先用粳米加水煮粥，煮沸后加入地黄汁和生姜，煮成稀粥食用。

【功用】 清热生津，凉血止血。

【主治】 热病后期，阴液耗伤，低热不退，劳热骨蒸，或高热心烦，口干作渴，口鼻出血。

03655 生地黄煎

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 生地黄汁半升 生天门冬汁半升 萎蕤二两 细辛一两 甘草一两（生，锉） 芎藭一两 白术一两 生麦门冬二两（去心） 黄耆一两半

【用法】 上锉细，绵裹，酒浸一宿，以猪脂二斤，煎令药焦黄，绵滤去滓，纳锅中，后下地黄、天门冬汁，熬令稠，瓷器中盛。每服不拘时候，含咽半匙。

【主治】 脾热，唇焦枯，无润泽。

03656 生地黄煎

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】 生地黄半斤（取汁） 刺蓟半斤（取汁） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄，别研） 阿胶半两（捣研，炒令黄燥，为末） 蜜一合

【用法】 上药都入银锅中，以慢火熬为膏。每服一钱，用新汲水调下，不拘时候。

【主治】 小儿鼻衄不止。

03657 生地黄煎

【方源】《医统》卷五十一。

【组成】 生地黄 当归 黄耆（炙） 黄连 黄芩 甘草（炙） 麻黄根 黄柏 浮小麦各一钱

【用法】 水二盏，煎八分，温服。

【主治】 阴火盗汗。

03658 生地黄膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】 生地黄四两 黄连四两 大黄三两 黄柏 甘草（炙） 白蔹 升麻各二两

【用法】 上㕮咀，以猪脂二升半，微火合煎，膏成绞去滓。候凝可敷之。

【主治】 热疮。

03659 生地黄膏

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】 生地黄 蓝青叶各等分

【用法】 上入蜜杵细。每服半两，井水煎，食后服。

【主治】 口舌疮肿。

03660 生地黄膏

【方源】《医统》卷四十二。

【组成】 生地黄汁 小蓟汁 沙糖（熬膏约一大碗） 阿胶一两 侧柏叶（为末） 地榆（为末）各一两

【用法】 上用四味汁熬成膏，方入柏叶、地榆末和匀。每服三匙许，空心米饮调下。

【主治】 结阴便血。

03661 生舌仙丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】 人参一两一钱 龙齿末三分 麦冬末一钱 血竭三分 冰片二分 土狗一个 地虱十个

【用法】 除人参一两煎汤外，余药各焙为末，放地上一刻，出火气备用。用时先将参汤含漱半日，然后将药末用舌蘸之使令遍，不可将舌即缩入口中，放在外面半刻，至不能忍时然后缩入。三次则舌伸长矣。

【主治】 舌断。

03662 生肌药丁

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 珍珠 象牙 龙骨 儿茶 花蕊石 血竭各一钱 轻粉 白芷 白蔹 朱砂各五分 冰片三分

【用法】 上为末，饭为条，阴干收用。

【功用】 生肌收口。

【主治】 漏疮硬管已出，尚未收口。

03663 生兰根散

【方源】 《圣惠》卷七十五。

【组成】 生兰根一两半（锉） 阿胶一两半（捣碎，炒令黄燥） 黄芩三分 赤芍药三分 当归一两（锉，微炒）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加大枣三枚，同煎至六分，去滓，不拘时候稍热服。

【主治】 妊娠胎动，腹内疼痛，心神烦热，饮食少。

03664 生附子汤

【方源】 《杏苑》卷七。

【异名】 生附子散(《张氏医通》卷十四)。

【组成】 黑附子（生）八分 滑石 瞿麦 木通各一钱 半夏七分 蜜少许 灯心二十茎

【用法】 上㕮咀。用生姜五片，水煎，空心服。

【主治】 冷淋，或因饮水过多，或因寒湿，或因心虚志耗。小便闭涩，数起不通，窍中苦痛，憎寒凛凛。

03665 生铁落饮

【方源】 《素问·病能论》。

【异名】 铁落饮(《圣济总录》卷六十七)、指迷铁落饮(《观聚方要补》卷五引《十便良方》)。

【组成】 生铁落

【功用】 《圣济总录》：除烦下气。

【主治】 ①《素问·病能论》：阳厥怒狂。②《观聚方要补》引《十便良方》：阳厥，由心有所欲，因暴折而难决，阳气当动，令气郁，而致人多怒，一发则莫知所为，其后欲闭户而处，恶闻人声。

【方论选录】 《古方选注》：盖铁之生者，气寒味辛，其性直行内降，下气疾速，用其捶出之花，庶得外走经络，开结于木火之中，则狂怒自已。

03666 生铁落饮

【方源】 《准绳·类方》卷五。

【异名】 生铁落汤(《杂病源流犀烛》卷十六)。

【组成】 生铁四十斤（入火烧赤沸，砧上煅之，有花出如兰如蛾纷纷坠地者，是名铁落，用水二斗，煮取一斗，入后药） 石膏三两 龙齿（研） 白茯苓（去皮） 防风（去芦）各一两半 玄参 秦艽各一两

【用法】 上为粗散，入铁汁中煮取五升，去滓，入竹沥一升，和匀。温服二合，不拘时候，一日五服。

【功用】 《金匮翼》：坠痰镇心。

【主治】 狂证。

①《准绳·类方》：狂。②《金匮翼》：痰火热狂。③《杂病源流犀烛》：风气发涌所生白沫潮痰。

03667 生铁落饮

【方源】 《医学心悟》卷四。

【组成】 天冬（去心） 麦冬（去心） 贝母各三钱 胆星 橘红 远志肉 石菖蒲 连翘 茯苓 茯神各一钱 元参 钩藤 丹参各一钱五分 辰砂三分

【用法】 用生铁落煎熬三炷线香，取此水煎药，内服。

【主治】 ①《医学心悟》：狂症。发作则暴，骂詈不避亲疏，甚则登高而歌，弃衣而走，逾垣上屋，此痰火结聚所致。②《笔花医镜》：心热癫痫。

【加减】 若大便闭结，或先用滚痰丸下之。

【备考】 服后安神静睡，不可惊骇叫醒，犯之则病复作，难乎为力。凡狂症，服此药二十余剂而愈者多矣。

03668 生铁落饮

【方源】 《医略六书》卷二十二。

【组成】 生铁落一斤（砧上铁花，入水二斗，煮至一斗） 生石膏五钱 生地黄一两 羚羊角钱半 青防风钱半 白茯神二钱（去木） 白龙齿三钱（煅） 黑元参三钱 真金箔一帖

【用法】 上为末，入铁落饮中煮至二升，去滓，冲竹沥一升，分温三服。

【主治】 狂妄，脉洪数弦急者。

03669 生萝卜粥

【方源】 《普济方》卷二五八。

【组成】 萝卜五枚

【用法】 捣捩取汁一大盏，搅粥作饮，频吃。

【主治】 消渴，发动无时，饮水不足。

03670 生蒲黄汤

【方源】 《眼科六经法要》。

【组成】 生蒲黄 旱莲草各 24 克 丹参 郁金各 15 克 丹皮 生地 荆芥炭各 12 克 川芎 6 克

【功用】 凉血散瘀，活血止血。

【主治】 血分有热，眼底出血，视物不清，视力减退。

03671 生嘉禾散

【方源】《医学六要·治法汇》卷二。

【组成】白茯苓（去皮） 缩砂（去皮） 薏苡仁（炒） 枇杷叶（去毛，姜汁炙香） 人参（去芦）各一两 白术（炒）二两 桑白皮（炒） 槟榔（炒） 白豆蔻（炒，去皮） 青皮 谷蘖（炒） 五味子（炒）各半两 沉香 杜仲（去皮，姜汁酒涂炙） 丁香 藿香 随风子 石斛（酒和，炒） 半夏（姜汁搀和作饼，炙黄色） 大腹子（炒） 木香各七钱五分 甘草（炙）两半 陈皮（去白） 神曲（炒）各一钱五分

【用法】每服三钱，水一盏，加生姜三片，大枣二枚，煎七分，不拘时温服。

【主治】脾胃不和，胸膈痞闷，气逆生痰，不进饮食，或五噎五膈。

【加减】五噎，加干柿一枚；膈气吐逆，加薤白三寸，大枣五枚。

03672 生熟地汤

【方源】《产孕集·补遗》。

【组成】生地（酒炒） 大熟地各三钱 人参 当归 白芍各二钱（炒） 阿胶（蒲黄炒） 枣仁各三钱（炒） 艾八分 川断一钱五分 桑寄生五钱（酒炒） 棕榈皮一钱（炙） 杜仲三钱（姜汁炒断丝）

【用法】黄酒一杯，和服。

【主治】妊娠，因劳碌胎动血崩者。

03673 生干地黄丸

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】干地黄丸《准绳·幼科》卷二。

【组成】生干地黄半两 郁李仁半两（汤浸，去皮尖，微炒） 牛膝（去苗） 防风（去芦头） 桂心 海桐皮 羌活 白茯苓 薏苡仁各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服七丸，乳食前以温酒送下。

【主治】小儿脚趾拳缩。

03674 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】生干地黄一两 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬半两（去心） 赤茯苓一两 半夏三分（汤洗七遍去滑） 麻黄三分（去根节） 紫菀三分（洗去苗土） 五味子二分 柴胡一两（去苗） 射干半两 黄芩三分 桑根白皮三分（锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺痿咳嗽，吐脓血，胸胁胀满，短气羸瘦，不思饮食。

03675 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】生干地黄一两 蒲黄二分 犀角屑二分 黄连二分（去须） 黄芩一两 玄参一两 川升麻一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】肝心积热，血灌瞳人，肿痛。

【宜忌】忌炙煿热面。

03676 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【异名】干地黄散（《普济方》卷六十二）。

【组成】生干地黄一两半 鸡苏苗一两 赤茯苓一两 麦门冬一两半（去心，焙） 玄参一两 甘草半两（生，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加竹茹一分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咽喉内生疮唾血，不下食。

03677 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】生干地黄二两 芎藭二两 黄芩二两 赤芍药 茅根 车前 人参（去芦头） 甘草（生用）各一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一中盏，加青竹茹一鸡子大，煎至五分，去滓，温温空腹服之。

【主治】心脏积邪，毒流于小肠，小便出血。

03678 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】生干地黄二两 柏叶一两（微炙） 黄芩半两 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，每于食前温服。

【主治】①《圣惠》：妇人尿血不止。②《景岳全书》：血热小便出血。

03679 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】生干地黄半两 苦楝根一分（锉） 鹤虱半两 槟榔半两 酸石榴根半两（锉）

【用法】上为细散。三四岁儿，空心以热茶调下半钱，午后再服。取虫下为度。量儿大小，以意加减。

【主治】小儿蛔虫咬心痛。

03680 生化益气汤

【方源】《产宝》。

【组成】川芎一钱　当归二钱　干姜（炙黑）二分　人参二钱　黄耆（生）二钱　枣仁（炒）二钱　甘草（炙）四分　麻黄根五分　桃仁（去皮尖，研）九粒　浮小麦二钱

【用法】用水一盏半，煎七分，热服。

【主治】产后气短，似喘非喘，气不相续，或兼痰兼热，或头痛发热恶寒，有似外感。

【加减】有痰，加竹沥一匙，姜汁半匙；咳嗽，加苦杏仁十一个，姜制半夏八分；口渴，加麦冬一钱，五味子七粒。

03681　生气养胃丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】大附子一只（炮，去皮脐，切块，姜汁半盏煮干）　厚朴一两（去皮，姜制）　苍术一两（米泔水浸一宿，刮去皮）　陈皮一两（去白）　白茯苓一两（去皮）　甘草半两（炙）

【用法】上为细末，用大北枣五十个（煮熟，去皮核，取肉），大蒜五枚（煨熟，去皮膜），研烂为丸，如小梧桐子大。每服五十丸，渐加至百丸，米饮吞下。

【主治】脾虚冷涎，翻胃，药食不纳者。

03682　生气救脱汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参三两　附子一钱　黄耆三两　熟地一两　麦冬一两　北五味一钱

【用法】水煎服。

【功用】补气，生元阳，长真水。

【主治】阴阳脱症。男女贪欢，尽情纵欲，以致精脱而气亦甚微者。

03683　生发一号丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生熟地各 90 克　当归 90 克　白芍 60 克　女贞子 30 克　菟丝子 30 克　羌活 30 克　木瓜 30 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重 9 克。

【功用】养血消风。

【主治】脂溢性脱发。

03684　生发二号丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】干地黄 60 克　山药 60 克　枸杞子 60 克　女贞子 60 克　桑椹子 60 克　神曲 30 克　蚕砂 30 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重 9 克。

【功用】滋肝益肾，凉血消风。

【主治】斑秃。

03685　生地八物汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【异名】生地八味汤（《医钞类编》卷八）。

【组成】生地三钱　山药一钱五分　知母一钱五分　麦冬三钱　黄芩一钱　黄连一钱　黄柏一钱　丹皮一钱五分　荷叶二钱

【用法】水煎服。

【主治】中消。

【方论选录】《证因方论集要》：生地、丹皮以凉心火，麦冬、知母以清肺热，山药以养肺阴，三黄大苦大寒，所谓以苦泄之，以甘缓之也。

03686　生地化毒汤

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】生地黄　金银花　白蒺藜（炒，去刺）　连翘　玄参　胡麻仁　白附子（乌豆水煮透）　何首乌（乌豆水煮，俟干）　威灵仙　黄连　木通　薄荷叶　荆芥穗　甘草梢

【用法】干红浮萍为引，水煎服。

【主治】麻毒未尽，生疮不已。

03687　生地冬芩汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】麦冬　生地各二两　黄芩三钱

【用法】水煎服。

【主治】心热之极，火刑肺金，鼻中出黑血不止。

03688　生地玄参汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生地 15 克　玄参 15 克　甘草 31 克　板兰根 31 克　银花 15 克　石斛 31 克　北沙参 31 克　紫草 31 克　莲子心 9 克　当归 15 克　丹参 31 克　桃仁 15 克　山萸肉 15 克　山甲 9 克　全虫 9 克　蜈蚣二条　大白花蛇 6 克　秦艽 15 克

【用法】水煎，内服。

【主治】系统性红斑狼疮。

03689　生地芩连汤

【方源】《伤寒六书》卷六。

【异名】生地黄连汤（《赤水玄珠》卷十八）。

【组成】黄芩　山栀　桔梗　甘草　生地黄　黄连　柴胡　川芎　芍药　犀角（如无，以升麻代之）

【用法】水二钟，加大枣二枚，煎至八分，临服入茅根捣汁，磨京墨调饮，如无茅根以藕捣汁亦可。

【主治】鼻衄成流，久不止者；或热毒入深，吐

血不止者。

03690 生地芩连汤

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】生地黄 黄连 黄芩 连翘 红花 防风 粉葛 栀仁 玄参 木通 石膏 当归 牡丹皮 白芍药

【用法】加灯心为引，水煎服。

【主治】麻疹毒火炽甚，其色紫红，干燥晦暗。

【备考】如大便三四日不通，合河间凉膈散利之。

03691 生地败毒散

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】生地黄一钱五分 丹皮 黄芩（酒炒） 柴胡各七分 牛蒡子（炒） 连翘 天花粉 玄参 金银花 桔梗各八分 薄荷叶 黄柏 赤芍各五分 生甘草（去皮）三分 熟石膏 淡竹叶各一钱

【用法】加灯心五十寸为引，水煎，另以犀角磨汁兑服。

【主治】麻疹后口臭、口疮、唇烂，兼咽喉疼痛者。

03692 生地黄汁散

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷五十四。

【组成】生地黄汁二升 生天门冬汁 白蜜各三升 羊肾一具（炙） 白术 麦曲各一斤 甘草 干姜 地骨皮各八两 桂心 杜仲 黄耆各四两 当归 五味子各三两

【用法】上为末，纳盆中。取煎三物汁和研，微火上暖盆取热，更研，日晒干，常研，令离盆。每服方寸匕，酒下，每日一次。

【主治】肾气虚寒，腰脊苦痛，阴阳微弱，耳鸣焦枯。

03693 生地黄饮子

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】生地黄汁二合 生益母草汁二合 生藕汁二合 鸡子白二枚 童便一合

【用法】上药相和，微煎三两沸，下鸡子白，搅令散，分温三服。

【主治】产后血运，心烦闷乱，恍惚如见鬼神。

03694 生地黄饮子

【方源】《证治汇补》卷二。

【组成】生地 熟地 天门冬 麦门冬 黄耆 甘草 银柴胡 黄芩 地骨皮 白芍药

【用法】水煎服。

【功用】《医略六书》：扶元退热。

【主治】①《证治汇补》：虚热血证。②《医略六书》：气虚血热，潮热，吐衄，脉弦数者。

【方论选录】《医略六书》：气虚血热，不能摄火，而经气疏泄，血不得归经，故吐血、衄血，潮热不止焉。生地滋阴壮水以凉血，熟地补血益阴以济火，麦冬清心润燥，天冬润燥益阴，黄耆补既伤之气，蜜炙能禁疏泄之血，黄芩清燥热之火，炒黑能止吐衄之血，地骨皮除蒸热，炙甘草缓虚阳，银柴胡解阴分之热，白芍药敛热伤之阴。俾热退阴藏则潮热自解，而经气清和，吐衄无不止矣。此扶元退热之剂，为气不摄火吐衄之专方。

03695 生地黄饮子

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地五钱 阿胶三钱（蒲黄灰炒） 白芍一钱半（炒） 麦冬三钱（去心） 地榆三钱（炒黑） 茯神二钱（去木） 小蓟根三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】孕妇尿血，脉虚数者。

【方论选录】胎热伤阴，经血暗渗，故尿血不止，胎孕不安焉。生地滋阴凉血以资血室，阿胶补阴益血以护胎元，麦冬清心润肺，白芍敛阴止血，茯神安神定志，地榆凉血涩血，小蓟散瘀凉血以止溺血也。水煎，温服，使阴血内充，则胎热自化而经气完复，经血无妄行之患，何溺血之有不止者？胎孕无不自安矣。

03696 生地清肺饮

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】桑皮（炒） 生地黄 天冬 前胡 桔梗 苏叶 防风 黄芩 生甘草 当归 连翘（去心） 赤苓

【用法】加生姜、红枣为引，水煎服。

【主治】肺痨。面白，气逆咳嗽，毛发枯焦，皮上生粟，肌肤干燥，憎寒发热，常流清涕，鼻颊生疮。

03697 生血止崩汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】川芎一钱 当归四钱 黑姜四分 炙草五分 桃仁十粒 荆芥五分（炒黑） 乌梅五分（煅灰） 蒲黄五分（炒）

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】产后血崩。

【宜忌】忌姜、椒、热物、生冷。

03698 生血起废汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】藏菱二两 山茱萸四钱 熟地一两 当

归一两　茯苓五钱　白芥子五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 血虚不能养筋脉，身未颤仆，左手半边不仁，语言謇涩，口角流涎。

03699　生血润肤饮

【方源】《医学正传》卷二。

【异名】 生血润燥饮(《医学六要》卷四)。

【组成】 川归身（酒洗）　生地黄　熟地黄（酒洗）　黄耆（蜜炙）各一钱　天门冬一钱五分　麦门冬（去心）一钱　五味子九粒　片芩（去朽，酒洗）五分　栝楼仁五分　桃仁泥五分　酒红花一分　升麻二分

【用法】 上细切，作一服。水二盏，煎至一盏，温服。

【主治】 燥症。

【加减】 如大便结燥，加麻仁、郁李仁各一钱。

【临证举例】 予仲兄怀德处士，年四十五，平生体瘦弱血少，值庚子年岁金太过，至秋深燥金用事，久晴不雨，得燥证：皮肤折裂，手足枯燥，搔之屑起，血出痛楚，十指甲厚，服此方数十贴，其病如脱。后治十数人皆验。

03700　生肌八宝丹

【方源】《医方易简》卷五。

【组成】 珠母（拾取露天蚌壳，左顾者）半斤（须括去背后黑衣，安火上煅，研细）　血竭三钱（另研）　芦甘石三两（以黄连二钱煎出汁，煅淬，研细末）　儿茶一两　煨石膏二两　赤石脂二两（火煅）　陈年丝吐渣一两（煅，不可过性）　梅片（临用时将药末五钱，加入冰片）一分

【用法】 上为细末，研如香灰色，瓷瓶盛贮，听用。掺上。

【功用】 生肌长肉，平口收功。

【主治】 疮毒脓腐已尽者。

03701　生肌凤雏膏

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 鸡蛋　轻粉　乳香　血竭　龙骨末

【用法】 用鸡蛋煮熟去白，用黄十余个，铜勺内熬油，倾入盏内，约油三钱，加轻粉（为末）、乳香、血竭、龙骨末各五分，共入油内和匀。每日早、午、晚鸡翎蘸涂患孔内。膏盖避风。深者半月完口。

【主治】 痔疮。

03702　生肌玉红膏

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】 玉红膏(《慈幼新书》卷六)、生肌膏(《外伤科学》)。

【组成】 白芷五钱　甘草一两二钱　归身二两　瓜儿血竭　轻粉各四钱　白占二两　紫草二钱　麻油一斤

【用法】 先将当归、甘草、紫草、白芷四味，入油内浸三日，大勺内慢火熬，药微枯色，细绢滤清，将油复入勺内煎滚，下整血竭化尽，次下白占，微火亦化；先用茶钟四只预顿水中，将膏分作四处，倾入钟内，候片时方下研极细轻粉，每钟内投和一钱搅匀，候至一伏时取起，不得加减，致取不效。用于已溃流脓时，先用甘草汤，甚者用猪蹄药汤，淋洗患上，软绢挹净，用抿脚挑膏于掌中捺化，遍搽新腐肉上，外以太乙膏盖之。大疮早、晚洗换二次，内兼服大补脾胃暖药。

【功用】 去腐肉，生新肉，敛疮口。

【主治】 痈疽发背，诸般溃烂，棒毒等疮。

03703　生肌定痛散

【方源】《外科大成》卷一。

【异名】 生肌散(《性病》)、化腐生肌散(《全国中药成药处方集》沈阳方)。

【组成】 生石膏（为末，用甘草汤飞五七次）一两　硼砂五钱　辰砂三钱　冰片二分

【用法】 上为末。掺之。

【功用】 化腐，定痛生肌。

【主治】 溃烂红热肿痛有腐者。

03704　生阴开结汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】 熟地二两　玄参一两　当归一两　生地五钱　牛膝五钱　麦冬五钱　山茱萸五钱　山药三钱　肉苁蓉五钱

【用法】 水煎，温服。

【主治】 干燥火炽，大肠阴尽，遂至粪如羊屎，名为肠结。

03705　生阴壮髓丹

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】 玄参二两　麦冬二两　熟地三两　山茱萸二两

【用法】 水煎服。

【主治】 肾水不足，阳明火旺，骨髓空虚，痿废不立。

03706　生麦益阴煎

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】 生地炭　麦门炭　北沙参　元参炭　元武版　人中黄　熟石膏　黑料豆

【主治】 虚火，口舌牙根破烂。

03707 生附白术汤

【方源】《三因》卷二。

【组成】附子（生，去皮脐） 干姜各半两 白术一两 甘草一分（炙）

【用法】上锉散。每服四钱。水盏半，煎七分，去滓，食前服。

【主治】中风湿，昏闷恍惚，胀满身重，手足缓纵，漐漐自汗，失音不语，便利不禁。

03708 生附除湿汤

【方源】《直指》卷三。

【组成】附子（生）一两 苍术（制）一两半 白术 厚朴（制）半两 宣木瓜 甘草（炙）各三钱半

【用法】上锉。每服四钱，水二盏，加生姜十厚片，煎一盏，食前微温服。

【主治】寒湿交攻，身体冷痛。

【备考】方中白术用量原缺。

03709 生枸杞子酒

【方源】《外台》卷十七引《延年秘录》。

【异名】枸杞酒（《医心方》卷二十六引《大清经》）、枸杞子酒（《附广肘后方》卷四）。

【组成】枸杞子二升

【用法】以上清酒二升捣碎，更添酒浸七日，漉去滓，任情饮之。

【功用】补虚，长肌肉，益颜色，肥健人。

【主治】《准绳·类方》：肝虚当风流泪。

03710 生脉地黄汤

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】六味地黄汤加生脉饮

【主治】虚劳，火盛刑金者。

03711 生脉补精汤

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】人参 麦门冬 五味子 熟地 当归 鹿茸

【主治】类中风。内伤气虚之人，房劳过度，清气不升，忽然昏冒，属虚中者。

03712 生脉保元汤

【方源】《中国医学大辞典·补遗》。

【组成】生脉散加黄耆 甘草

【用法】清水煎服。

【功用】夏月服之，令人气力充足。

【临证举例】产妇郁冒 《上海中医药杂志》（1983；10:25）：以生脉散和保元汤加减（太子参15克 麦冬10克 五味子10克 黄耆15克 甘草10克 肉桂2克 炒白芍15克），治新产妇（包括人流或引产者）产后郁冒90例，症见阵热，热冒于上、头晕，自汗、盗汗，汗出冒解等。如下红逾半日不尽者，加茜根炭15克；失眠者，加柏、枣仁各10克；心惊，筋脉拘挛者，加煅龙骨15克；便闭者，加全瓜蒌15克；食差，苔白腻者，加炒白术10克；病程较长，贫血重者，加黄精15克，当归10克。疗效：痊愈62例，有效24例，无效4例，总有效率95.36%。

03713 生津四物汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】白归身 大生地 杭白芍 净知母 大麦冬 人参各一钱 正川芎 正雅连 天花粉 川黄柏 炙甘草各五分 肥乌梅一粒 灯心十茎

【用法】水煎，热服。

【主治】上消，渴饮茶水，饮之又渴。

03714 生津代茶饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】青果五个（研） 金石斛二钱 甘菊二钱 荸荠五个（去皮） 麦冬三钱 鲜芦根二支（切碎） 桑叶三钱 竹茹二钱 鲜藕十片 黄梨二个（去皮）

【用法】水煎，代茶。

【功用】生津润燥。

【主治】温病热盛，灼伤肺胃阴津，口中燥渴，咳唾白沫，枯滞不爽者。

【备考】不喜甚凉者，可重汤炖温服。

03715 生津补血汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】当归 白芍（炒） 熟地黄 生地黄 茯苓（去皮）各一钱 枳实（麸炒） 陈皮 黄连（炒） 苏子 贝母（去心）各七分 砂仁 沉香各五分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，大枣一枚，水煎，竹沥磨沉香同服。

【主治】年少胃脘血燥，噎膈翻胃。

03716 生津养血汤

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】当归一钱 川芎八分 白芍（煨）一钱 生地黄（酒洗）一钱 知母五分 黄柏（蜜水炙）五分 麦门冬一钱 石莲肉五分 天花粉七分 黄连八分 乌梅五分 薄荷五分 甘草（炙）五分

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】上消，火盛制金，烦渴引饮。

03717 生津润肺丸

【方源】《喉科秘诀》卷上。

【组成】 硼砂三钱（生、煅各半） 寒水石二钱 山豆根一钱 五味子一钱 甘草二钱 桔梗二钱 乌梅一钱 薄荷三钱 上冰片二分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。含化咽下。

【功用】 生津降火。

【主治】 虚热喉，初起其势不急，微微缓缓，咽津觉得干燥，吞气些碍，无鹅无肿，满喉或红或紫。

【宜忌】 不宜针、吊、吹药。

03718 生津益液汤

【方源】 《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】 人参 麦冬（去心） 茯苓各一两 大枣 竹叶 浮小麦 炙草 栝楼根

【主治】 产妇血少多汗，内烦，不生津液，虚弱，口渴气少。

【加减】 大渴不止，加芦根。

【备考】 方中大枣以后五味用量原缺。《胎产心法》本方用：人参随宜，麦冬一钱二分，茯苓、瓜蒌根各一钱，甘草八分，小麦一撮，竹叶十片，枣二枚。

03719 生姜半夏汤

【方源】 《金匮》卷中。

【异名】 小半夏汤（《普济方》卷一三八引《活人书》）。

【组成】 半夏半升 生姜汁一升

【用法】 以水三升，煮半夏取二升，纳生姜汁，煮取一升半，小冷分四服，日三夜一服。止，停后服。

【主治】 ①《金匮》：病人胸中似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，彻胸中愦愦然无奈者。②《医学正传》：风痰上攻，头旋眼花，痰壅作嗽，面目浮肿，咳逆欲死。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：此方与小半夏汤相同，而取意少别。小半夏汤宣阳明之气上达，故用半夏为君，生姜为佐；半夏汤通阳明之经，故用姜汁为君，半夏为佐，取其行于经络，故用汁也。②《医宗金鉴》：彻心中愦愦然无奈者，总形容似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，心中愦乱无奈，懊侬欲吐之情状也，故以半夏降逆，生姜安胃也。③《医宗金鉴》引李彣：生姜、半夏，辛温之气，足以散水饮而舒阳气。然待小冷服者，恐寒饮固结于中，拒热药而不纳，反致呕逆。今热药冷饮下嚥之后，冷体既消，热性便发，情且不违，而致大益，此《内经》之旨也。此方与前半夏干姜汤略同，但前温中气，故用干姜，此散停饮，故用生姜；前因呕吐上逆，顿服之则药力猛峻，足以止逆降气，呕吐立除；此心中无奈，寒饮内结，难以猝消，故分四服，使胸中邪气徐徐散也。④《金匮要略心典》：生姜半夏汤，即小半夏汤而生姜用汁，则降逆之力少而散结之力多，乃正治饮气相搏，欲出不出者之良法也。⑤《高注金匮要略》：门人问曰：胃寒而上沁下吸，温之降之，固为正治。其温胃而不用甘草者何也？答曰：生姜辛温而性善走，取汁用之，则过喉即发，是所以温上焦之似喘似呕也；配半夏以降之，则辛温之性渐渐下沉，是温胃之外，尤欲以辛胜肝，而并治其下焦之欲哕。故于甘草之守中者无取焉。

【备考】 本方方名，《外台》引作"生姜汁半夏汤"。

03720 生姜泻心汤

【方源】 《伤寒论》。

【组成】 生姜四两（切） 甘草三两（炙） 人参三两 干姜一两 黄芩三两 半夏半升（洗） 黄连一两 大枣十二枚（擘）

【用法】 以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，每日三次。

【功用】 《伤寒论讲义》：和胃降逆，散水消痞。

【主治】 伤寒汗后，胃阳虚弱，水饮内停，心下痞硬，肠鸣下利；妊娠恶阻，噤口痢。现用于胃下垂、胃扩张、慢性胃炎等属胃阳虚弱，水饮内停者。

①《伤寒论》：伤寒汗出，解之后，胃中不和，心下痞硬，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣下利者。②《产科发蒙》：妊娠恶阻，呕而腹中雷鸣下利者。③《伤寒论类方汇参》：噤口痢。

【方论选录】 ①《伤寒大白》：泻心汤五方，三方皆用干姜、半夏、黄连、黄芩，两热两寒，豁痰清热。此方因汗出表解，胃阳虚，不能敷布水饮，腹中雷鸣而下利，故用生姜佐干姜和胃阳，此以痰热方中化出逐寒饮之法。②《伤寒论本义》：雷鸣下利，亦是中气运行不健之故，鸣则为虚，利则为实；痞硬少气为虚，干噫食臭为热。虚热二字，合成此证。此生姜泻心以苦治热，以甘补虚，以辛散痞，为对证之剂也。③《古方选注》：泻心汤有五，总不离乎开结、导热、益胃，然其或虚或实，有邪无邪，处方之变，则各有微妙。先就是方胃阳虚不能行津液而致痞者，惟生姜辛而气薄，能升胃之津液，故以名汤。干姜、半夏破阴以导阳，黄芩、黄连泻阳以交阴，人参、甘草益胃安中，培植水谷化

生之主宰，仍以大枣佐生姜发生津液，不使其再化阴邪。通方破滞宣阳，是亦泻心之义也。④《医宗金鉴》：名生姜泻心汤者，其义重在散水气之痞也。生姜、半夏散胁下之水气，人参、大枣补中州之土虚，干姜、甘草以温里寒，黄芩、黄连以泻痞热。备乎虚、水、寒、热之治，胃中不和下利之痞，未有不愈者也。

【临证举例】 ①胃脘痛 《伤寒论汇要分析》：杨某，女，十七岁，始见胃脘疼痛，继则呕腐吐酸，发作无常，已四年余。今春以来，胃不受纳，进食即吐，面色苍白，神倦腰痛，四肢酸楚，舌苔薄白而滑，右脉强，左脉沉细。诊断为肝胃不和，治以本方和胃降逆。②胃下垂 《汉方诊疗三十年》：某女，消瘦，胃下垂，喜饮酒，不断嗳气，予生姜泻心汤五剂，嗳气消失。③胃扩张 《古方之临床运用》：某人，年约四十余，宿嗜酒，初则晨起吐清水，嗳气显之，继则胃中有振水声，肠鸣下利，偶食不消化物或荤腻，则下利频繁，致消瘦无力，诸治无效。某医院诊断为胃扩张、肠弛缓。脉滑数，苔反腻，心下痞硬。乃用生姜泻心汤，连服十剂而愈。④慢性胃炎 《岳美中医案集》：胡某某，男。患慢性胃炎，自觉心下有膨闷感，经年累月，饱食后嗳生食气，腹中常有走注之雷鸣声，形体瘦削，面少光泽。符合仲景生姜泻心汤证。疏方：生姜12克，炙甘草9克，党参9克，干姜3克，黄芩9克，黄连3克（忌用大量），半夏9克 大枣4枚（擘），以水八钟，煎至四钟，去滓再煎，取二钟，分二次温服。一周后所有症状基本消失，唯食欲不振，投以加味六君子汤，胃纳见佳。

03721 生料健脾丸

【方源】《普济方》卷三十六引《澹寮》。

【组成】 厚朴（去粗皮，生铿）二两五钱 半夏（生） 白豆蔻仁 草果仁 甘草 缩砂仁各二两

【用法】 上㕮咀，用生姜一斤四两，细切捣碎，滓汁并用，同药一处为丸，如鸡子黄大，晒干。每服一丸，水一盏半，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 呕吐反胃，脾泻白痢，肠滑冷痢，一切脾胃病。

03722 生熟三黄汤

【方源】《金鉴》卷六十九。

【组成】 生地 熟地各一钱五分 黄连 黄柏 黄芩 人参 苍术（米泔水浸，炒） 白术（土炒） 厚朴（姜炙） 当归身 陈皮各一钱 地榆 防风 泽泻 甘草（生）各六分 乌梅二个

【用法】 水二钟，煎八分，食前服。

【主治】 血箭痔。生肛门或里或外，堵塞坠肿，每逢大便用力则鲜血急流如箭；不论粪前粪后，由肠胃风热而兼暴怒成之。

03723 生熟地黄丸

【方源】《证治要诀类方》卷四引《局方》。

【组成】 生地 熟地各五两 甘菊花三两 杏仁二两 石斛 枳壳（麸炒）各一两半 羌活 防风 牛膝各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后盐汤下。

【主治】 ①《证治要诀类方》引《局方》：眼眶骨痛。②《准绳·类方》卷七引《局方》：肝虚目暗，膜入水轮，眼见黑花如豆，累累数十；或见如飞虫，诸治不愈，或视物不明，混睛冷泪，翳膜遮障，内外障眼。

【备考】《审视瑶函》本方用法：每服三十丸，以黑豆三升，炒令烟尽为度，淬好酒六升，每用半盏，食前送下；或蒺藜汤亦可。

03724 生熟地黄丸

【方源】《丹溪心法》卷四。

【异名】 熟地黄丸（《明医指掌》卷六）、地黄丸（《疡医大全》卷十一）。

【组成】 生地黄 熟地黄 玄参 金钗石斛各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸服。

【主治】 ①《丹溪心法》：眉骨痛不可忍。②《丹溪心法附余》：血虚阴虚，眼目昏花。

【备考】《丹溪心法附余》本方用法：炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心服。

03725 生熟地黄丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 生地 熟地各五钱 川芎 赤茯 枳壳 杏仁 黄连 半夏曲 天麻 地骨皮 甘草各二钱半 黑豆四十五粒

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心临卧白汤送下。

【主治】 肾虚血少神劳，眼目昏黑、瞳人散大，视物昏花，或卒然见非常异处，偏头肿闷；小儿疳，眼闭合不开，内有朦雾。

03726 生熟地黄丸

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】 生地 熟地 天麻 川芎 茯苓 当归 白芍 黑豆 石斛 玄参 地骨皮

【用法】 炼蜜为丸服。

【功用】《医略六书》：滋肾养肝。

【主治】 ①《证治汇补》：肝虚头痛；②《重订通俗伤寒论》：伤寒夹痨，肝肾俱虚者。

【方论选录】《医略六书》：肾水不足，无以滋养肝木，故肝虚生风，清阳不振而头痛。生地滋肾水以荣木，当归养经血以涵肝，熟地补肝阴，白芍敛肝血，川芎行血中之气，元参清浮游之火，茯苓渗湿，天麻去风，地骨皮清肌退热，金石斛平热益阴，黑豆补肾脏以养肝，蜜丸汤下，使肾水顿充，则肝阴自足，而虚风无不熄矣，何患头痛之不瘳哉！此滋肾养肝之剂，为肝虚头痛之专方。

【备考】《医略六书》本方用生地、熟地各五两，天麻一两半（煨），川芎一两，茯苓一两半，当归二两，白芍一两半，黑豆三两，石斛二两，玄参、地骨皮各一两半，炼蜜为丸。每服三钱，白汤化下。

03727 生熟地黄丸

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 生地五两 熟地五两 天冬三两（去心） 麦冬三两（去心） 当归三两 白芍一两半（炒） 茯神一两半（去木） 白术一两半（炒） 知母一两半（炒） 牡蛎三两（生）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服五钱，米饮送下。

【主治】 胎动，脉虚数者。

【方论选录】 妊娠肝肾两虚，阴血不足，冲任为虚热内迫，而胎失所养，故胎动不安。是胎动因于血虚有热焉。生地滋阴壮水，熟地补血滋阴，天冬清心润肺以益肾水，麦冬润肺清心以生津液，当归养血荣冲脉，白芍敛阴固冲脉，茯神渗湿安神，白术健脾生血，知母清热润燥以安胎，牡蛎潜热益阴以固胎也。炼蜜以丸之，米饮以下之，俾阴血内充，则虚热潜藏，而冲任完固，何胎动之有哉。

03728 生熟地黄汤

【方源】《会约》卷六。

【组成】 生地 熟地各一钱半 甘菊 枳壳各一钱 杏仁（去皮）八分 淮牛膝二钱 石斛二钱 黑豆（炒）二十粒

【用法】 水煎服；或加分量，炼蜜为丸，用黑豆炒，淬酒，送丸三钱。

【主治】 肝虚，眼眶痛，见火更痛甚者。

03729 生熟地黄汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】 熟地三钱 生地二钱 天冬 麦冬（去心） 归身 花粉各一钱五分 沙参二钱 元参一钱

【用法】 加蔗汁一酒杯冲服；或藕汁，梨汁均可。

【主治】 燥症，鼻干口渴，咽痛舌燥，目火便秘，干热。惟秋冬时久晴乃有此病；而吸鸦片者，更易犯。

03730 生熟地黄汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 生地 9 克 熟地 15 克 山萸肉 6 克 麦门冬 茯苓各 9 克 桑椹子 12 克 炙甘草 6 克

【功用】 壮水制火，滋肾宁心。

【主治】 赤脉传睛。肾水不足，水不制火，大眦肉浮胀，赤脉色淡，并兼耳鸣咽干，梦遗腰酸者。

【方论选录】 方中熟地、山萸肉、桑椹子大补肾水，以制阳光；生地、麦门冬、炙甘草补心血，养阴液以降虚火，茯苓养心安神且能除湿，以防诸药腻膈伤脾。此方补中有泻，寓泻于补，补泻合用，是为滋水降火之良剂。

03731 生蟹足敷方

【方源】《千金》卷五。

【组成】 生蟹足 白蔹各半两

【用法】 上为末。以乳汁和敷颅上。

【主治】 小儿解颅。

【方论选录】《千金方衍义》：生蟹足散血续筋，白蔹散结解毒。

03732 生髓育麟丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 人参六两 山茱萸十两 熟地一斤 桑椹（干者）一斤 鹿茸一对 龟胶八两 鱼鳔四两 菟丝子四两 山药十两 当归五两 麦冬六两 北五味三两 肉苁蓉六两 人胞二个 柏子仁二两 枸杞子八两

【用法】 上药各为细末，炼蜜为丸。每日早、晚时用白滚水送下五钱。服三月，精多且阳亦坚。

【功用】 填精益髓。

【主治】 男子精少，泄精之时，只有一二点，不能生子。

03733 生地黄汁饮子

【方源】《圣惠》卷十九。

【异名】 地黄汤（《圣济总录》卷七）。

【组成】 生地黄汁一合 独活二两（锉） 附子一枚（炮裂，去皮脐） 淡竹沥一合

【用法】 先以水三大盏煮独活、附子，取汁一盏半，去滓，纳生地黄汁及竹沥，更煎一两沸，温服半中盏，不拘时候。

【主治】 中风不语，舌根强硬。

03734 生地黄黄连汤

【方源】《元戎》。

【异名】生地芩连汤(《医学入门》卷四)、生地黄连汤(《准绳·幼科》卷三)。

【组成】川芎 生地黄 当归各七钱 赤芍药 栀子 黄连 黄芩各三钱 防风一两

【用法】上为粗末。每服三钱，水二盏，煎至七分，取清饮，不拘时候，徐徐与之。

【主治】妇人血风症，因大脱血，崩漏或前后血，因而枯燥，其热不除，循衣，撮空，摸床，闭目不省，掷手扬视，摇动不宁，错语失神，脉弦浮而虚，内燥热之极也；气粗鼻干而不润，上下通燥，此为难治。

【加减】若脉实者，加大黄下之。

03735 生芦根五味饮

【方源】《外台》卷六引《许仁则方》。

【组成】生芦根（切）一升 生麦门冬一升（去心） 青竹茹一升 生姜汁五合 茯苓五两

【用法】上切。以水八升，煮取二升半，去滓，加竹沥六大合，搅调，分三服，相去如人行十里久始服一剂。

【主治】积热在胃，呕逆不下食。

【宜忌】忌醋物。

03736 生津甘露饮子

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】藿香二分 柴胡 黄连 木香各三分 白葵花 麦门冬 当归身 兰香各五分 荜澄茄 生甘草 山栀子 白豆蔻仁 白芷 连翘 姜黄各一钱 石膏一钱二分 杏仁（去皮） 酒黄柏各一钱五分 炙甘草 酒知母 升麻 人参各二钱 桔梗三钱 全蝎二个（去毒）

【用法】上为细末，汤浸蒸饼和匀成剂，捻作片子，日中晒半干，擦碎如黄米大。每服二钱，津唾下，或白汤送下，食远服。

【主治】消渴，上下齿皆麻，舌根强硬肿痛，食不能下，时有腹胀，或泻黄如糜，名曰飧泄；浑身色黄，目睛黄甚，四肢痿弱；前阴如冰，尻臀腰背寒，面生黧色，胁下急痛，善嚏喜怒，健忘。

【备考】本方方名，《脉因证治》引作“生津甘露饮”。

03737 生精种子奇方

【方源】《医学正印》卷上。

【异名】生精种子丸。

【组成】沙苑蒺藜八两（微焙，四两为末入药，四两为膏入蜜） 川续断（酒蒸）二两 菟丝子三两（酒煮见丝） 山茱萸（生用） 芡实粉（生用） 莲须（生用）各四两 覆盆子（生用） 甘枸杞子各二两

【用法】上为末，以蒺藜膏同炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五钱，空腹淡盐汤送下。

【主治】梦遗滑泄，真精亏损，以致无子。

【宜忌】有火者相宜。

03738 生血地黄百花丸

【方源】《普济方》卷一九〇引《卫生家宝》。

【组成】生地黄十斤（洗，臼中捣取汁） 生姜半斤 藕四斤（捣取汁） 白沙蜜四两 无灰酒一升上五味，用银器或砂锅内熬取二碗许，渐成膏，一半瓷器收之，一半入干山药末三两，再熬一二十沸，次入后药：

川当归（焙） 熟地黄（焙） 肉苁蓉（酒浸，焙） 破故纸 阿胶（蛤炒） 黄耆（蜜炙） 石斛（去根，焙） 覆盆子 白茯苓 远志（取皮） 麦门冬（去心，焙） 枸杞子各二两

【用法】上为末，入山药膏子为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心食前用温酒调地黄膏子送下，每日三次。

【主治】诸虚不足，下血、咯血、衄血、肠癖、内痔，虚劳寒热，肌肉枯瘦。

03739 生脉散加香薷方

【方源】《医方考》卷六。

【组成】人参 麦冬 五味子 香薷

【主治】人本阴虚，复遇暑途，饥困劳倦，暴仆昏绝者。

【方论选录】暴仆昏绝者，一则阴虚而孤阳欲脱，一则暑邪乘虚而犯神明之府也。故用人参益元而固脱，香薷辟邪而却暑；麦冬之清，所以扶其不胜之肺；五味之酸，所以敛其欲脱之真。

03740 生津止渴益水饮

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】人参 麦冬 当归 生地各三钱 黄耆一钱 葛根一钱 升麻 炙草各四分 茯苓八分 五味子十五粒

【功用】助脾益肺，升举气血。

【主治】产后烦躁，咽干而渴，兼小便不利。

【加减】汗多，加麻黄根一钱，浮小麦一大撮；大便燥，加肉苁蓉一钱五分；渴甚，加生脉散。

03741 白散

【方源】《伤寒论》。

【异名】三物小白散(《金匮玉函经》卷三)、三物白散(《活人书》卷十五)。

【组成】 桔梗三分 巴豆一分（去皮心，熬黑，研如脂） 贝母三分

【用法】 上为散，纳巴豆，更于臼中杵之。以白饮和服，强人半钱匕，羸者减之。病在膈上必吐，在膈下必利。不利，进热粥一杯；利过不止，进冷粥一杯。

【功用】 ①《伤寒论讲义》（二版）：除痰开结，攻寒逐水。②《中医大辞典·方剂分册》：涌吐实痰，泻下寒积。

【主治】 寒实结胸，肺痈，喉痹，白喉。

①《伤寒论》：寒实结胸，无热证者。②《外台》：肺痈，咳，胸中满而振寒，脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如梗米粥者。③《伤寒论今释》：喉痹。④《伤寒论译释》：白喉，喉头白腐，呼吸困难；冷痰肺喘；或痫证。

【宜忌】 《外台》：忌猪肉、芦笋等。

【加减】 假令汗出已，腹中痛，与白芍三两如上法。

【方论选录】 ①《医方考》：此证或由表解里热之时，过食冷物，故令寒实结胸，然必无热证者为是。桔梗、贝母之苦，用之以下气；巴豆之辛，用之以去实。又曰：病在膈上则吐，病在膈下则利，此桔、贝主上，巴豆主下之意。服后不行者，益以温汤；行之过多者，止以凉粥。②《伤寒来苏集》：三物白散，贝母主疗心胸郁结，桔梗能开提血气，利膈宽胸，然非巴豆之辛热斩关而入，何以胜消、黄之苦寒，使阴气流行而成阳也？白饮和服者，甘以缓之，取其留恋于胸，不使速下耳。散者，散其结塞，比汤以荡之更精。③《古方选注》：巴豆散水寒，开胸结，法用熬黑者，熟则性缓，欲其入胃，缓缓劫寒破结。④《金鉴》：是方也，治寒实水结胸证，极峻之药也。君以巴豆，极辛极烈，攻寒逐水，斩关夺门，所到之处，无不破也；佐以贝母，开胸之结；使以桔梗，为之舟楫，载巴豆搜逐胸邪，悉尽无余。然唯知任毒以攻邪，不量强羸，鲜能善其后也，故羸者减之。⑤《伤寒论今释》：桔梗排脓，贝母除痰解结，二者皆治胸咽上焦之药，巴豆吐下最迅烈，合三味以治胸咽闭塞之实证也。

【临证举例】 ①咽痛 《伤寒论今释》引《成绩录》：巽屋之家人，卒然咽痛，自申及酉，四肢厥冷，口不能言，如存如亡（按：犹言气息仅属耳），众医以为必死，举家颇骚扰。及戌时，迎先生请治，脉微欲绝，一身尽冷，呼吸不绝如缕，急取桔梗白散二钱，调白汤灌之，下利五六行，咽痛始减，厥复气爽。乃与五物桂枝桔梗加大黄汤（桂枝、地黄、黄芩、桔梗、石膏、大黄），须臾大下黑血，咽痛尽除，数日而平复。②寒实结胸 《江苏中医》（1961；8:40）：郑某某素嗜酒，并有慢性气管炎，咳嗽痰多，其人痰湿恒盛。时在初春某日，大吃酒肉饭后，即入床眠睡。翌日不起，至晚出现迷糊，询之瞠目不知答。因其不发热、不气急，第三天始邀余诊，两手脉滑大有力，满口痰涎粘连，舌苔厚腻垢浊，呼之不应，问之不答，两目呆瞪直视，瞳孔反应正常，按压其胸腹部则患者皱眉，大便不行，小便自遗。因作寒实结胸论治，用桔梗白散1.5克，嘱服三回，以温开水调和，缓缓灌服。二次灌药后，呕吐粘腻胶痰样物甚多，旋即发出叹息呻吟声。三次灌药后，腹中鸣响，得泻下两次，患者始觉胸痛、发热、口渴欲索饮。继以小陷胸汤，两剂而愈。③肺脓肿 《新中医》（1981；4:45）：刘某，男，18岁，学生。1975年10月30日来诊：二十天前发冷发热，三天后右胸痛，咳嗽，咯黄色脓痰，无血丝。右肺中下野叩之音浊，听诊可闻密集水泡音；胸透：肺右下角有大片状阴影，其中有一圆形影，内有液平面。上午九时半，服三物白散一剂，十分钟后，患者自觉从喉至胸骨后、胃部有麻辣灼热感；二小时后，首次排出黄色稀便，以后每十分钟一次，共五次，量多，有泡沫，至十五时半，共排十余次。翌晨起，咯黄色脓痰，痰中带血，患者精神转佳，听诊右胸水泡音明显减少，胸透右下呈点片状影，未见空洞。第三天痰中带血较多，水泡音几乎听不到。后拟服中药桔梗、冬瓜仁、银花、蒲公英、败酱草、鱼腥草，经一月治疗痊愈。④癃闭危候（急性肾功能衰竭）《浙江中医杂志》（1984；1:29）：谢某某，男，17岁，农民。五天前，食野蘑菇后，头痛，腰痛，尿少，嗜睡，腹胀，肾区叩击痛，膀胱无充盈，体温35.8℃，血压110/60mmHg。实验室检查：白细胞19600mm³，中性89%，非蛋白氮160毫克，肌酐5.1毫克，二氧化碳结合力24.4Ea/L，血钾6.8mEq/L。入院后诊断为急性肾功能衰竭，经抗生素、激素、速尿、胰岛素等治疗，六小时仍无尿，并出现神志不清，呼吸急促，呕恶，腹膨大，而膀胱充盈，大便1周未行，舌质红，苔黄腻，脉滑数。症属癃闭危候，治拟开通三焦，急投三物白散：巴豆（去油）、桔梗、象贝各0.5克，共研细末。冲服一半后，三小时内解干便一次，量少，呕出咖啡样物100毫升，但无尿；再冲服一半，开始滴尿（导尿管），三小时内滴出550毫升，过五小

时又滴出550毫升，解干便一次，神志转清，知饥，呼吸平稳。14小时内共排尿3150毫升，解大便五次，约500克。第二三天平均尿量4000毫升，已进入多尿期。十三天后复查，血液正常；二十天后，症状消失出院。

【备考】 本方方名，《外台》引作"桔梗白散"。

03742 白丸子

【方源】《正体类要》卷下。

【组成】 半夏七两（生用） 南星二两（生用） 川乌（去皮脐，生用）五钱

【用法】 上为末，用生姜汁调糊为丸，如梧桐子大。每服一二十丸，生姜汤送下。

【主治】 一切风痰壅盛，手足顽痹，或牙关紧急，口眼歪斜，半身不遂。

03743 白丸散

【方源】《得效》卷十。

【组成】 生硫黄 乳香 生白矾

【用法】 上为末。每用手微抓动患处，以药擦之。

【主治】 肺风酒渣。

03744 白及丸

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 白及末

【用法】 酒糊为丸。每服三钱，黄酒送下。半月愈。

【主治】 鼻渊。

03745 白及肺

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】 白叶猪肺一具 白及片一两

【用法】 猪肺挑去血筋血膜，洗净，同白及入瓦罐，加酒淡煮熟，食肺饮汤；或稍用盐亦可，或将肺蘸白及末食更好。

【主治】 肺痿肺烂。

03746 白及散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】 白及一分 细辛一分 防风一分（去芦头） 柏子仁一分

【用法】 上为细散。以乳汁调涂儿颅骨上，一日二次。

【主治】 ①《圣惠》：小儿颅骨开。②《局方》（吴直阁增诸家名方）：小儿肾气不成，脑髓不足，小儿年大，骨应合而不合，头缝开者。

03747 白及散

【方源】 方出《朱氏集验方》卷七，名见《普济方》卷一九〇。

【组成】 白及

【用法】 上为末。粥饮调服。

【主治】 肺痿吐血、咯血。

①《朱氏集验方》：吐血、咯血不止。②《普济方》：肺损或食饱负重而得咯血、呕血。③《医学入门》：久嗽成痿，咯血红痰。

【备考】《赤水玄珠》本方用法：井花水调服，每服二钱。

03748 白及散

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】 白及一两 藕节五钱

【用法】 上为细末。每服一钱，白汤调下。

【主治】 咯血。

03749 白及散

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】 款冬花 紫菀 白及 阿胶各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 肺痿。多年咳嗽，肺痿咳唾脓血，及肺破不愈。

03750 白及散

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】 白及一钱 枇杷叶 藕节各五分 莲须 柏叶 沙参各六分 阿胶八分

【用法】 水煎服。另以生地汁磨好墨服。

【主治】 劳瘵，因饱屈伸伤肺，吐、咯血。

03751 白及膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 白及面一两 煅石膏面一两 凡士林八两

【用法】 以上药物，调匀成膏。外敷患处的清洁疮面。

【功用】 收敛生肌。

【主治】 烧、烫伤，下肢溃疡，臁疮。

03752 白王丹

【方源】《幼幼新书》卷十三引张焕方。

【组成】 天南星 半夏（并生） 僵蚕（炒） 桂心 石菖蒲各一两 腻粉 龙脑各一分

【用法】 上为细末，姜汁为丸，如黍米大。每服十丸，人参汤送下。

【主治】 中风涎潮。

03753 白牙散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 白芷七分 升麻一钱 石膏一钱五分 羊胫骨灰二钱 麝香少许

【用法】 上为细末，先以温水漱口，擦之。

【主治】 ①《杏苑》：一切牙痛。②《医部全录》：牙黄黑色。

【方论选录】《杏苑》：用白芷以疏阳明经风，升麻、石膏以清阳明经热，用羊胫骨补齿虚，麝香辛窜，引诸药以通行关窍。

03754 白牙散

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】 细辛 荜茇 防风 白芷 茯苓 川芎 升麻 甘松 香附子 石膏二倍于上药

【功用】 令牙白。

【备考】《奇效良方》本方用法：上为细末，研匀。常用揩牙。

03755 白凤丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】 白毛乌骨雄鸡一只（须白丝毛、乌骨、高冠者，另养一处，以黄耆炒末饲之，不可近雌鸡，闭死，去毛肠，净） 香附（四制）一斤 熟地黄四两 生地黄 当归 白芍药 黄耆 牛膝 柴胡 牡丹皮 知母 川贝母（去心）各二两 黄连 地骨皮 干姜 延胡索各一两 茯苓二两五钱 秦艽一两五钱 艾叶 青蒿各四两

【用法】 先将艾、蒿一半入鸡腹内，余置鸡外，同入坛内，以童便和水，浸过二寸许，煮烂，取出去骨，焙干，再将各药及鸡共研为末，用鸡汁打糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸至七八十丸，温酒或米饮送下。

【主治】 妇人羸瘦，血虚有热，经水不调，崩漏带下，不能成胎，骨蒸。

【宜忌】 忌食煎炒苋菜。

03756 白凤丹

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】 嫩黄耆（蜜水炒） 人参（去芦） 川芎 白茯苓（去皮） 当归（酒洗） 干姜（炒） 大附子（面裹炒，去皮脐） 小茴香（盐酒炒） 白芍（酒炒） 肉桂 白术（去芦，微炒） 胡椒 艾叶（醋炒） 破故纸（盐酒炒） 乌药各二两 甘草（炙）一两 香附米（醋炒）六两 苍术（米泔浸，炒）四两 吴茱萸（炒）一两

【用法】 上锉；用白毛乌肉鸡一只重二斤，吊死，水泡，去毛屎并头足不用，入铁锅内，将药片盖上，入好酒，煮烂为度，取去骨，同药在锅焙干，为末，将鸡酒汁打稀米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心好酒送下。治后症先宜服五积散加香附、吴茱萸、小茴，减麻黄，入米糖一块煎服；后服此丸药。

【主治】 妇人经水不调，肚腹冷痛，赤白带下，子宫虚冷，久无子息。

03757 白凤膏

【方源】《修月鲁班经后录》引《劳证十药神书》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】 黑嘴白鸭一只 大京枣二升 参苓平胃散一升 陈煮酒一大瓶

【用法】 上先将鸭扎缚其脚，却量患人饮酒多少，随量倾酒在器中，烫温，却将刀于鸭项上割开，沥血于酒内，搅匀，一气饮之。又将鸭干捋去毛，就胁下开一孔，取出肠杂，以纸拭干，将枣子去核，每介实填参苓平胃散末，以麻布扎定，填于鸭肚中，用砂糖甏一个，放鸭在内，四遭炭火慢煨，一瓶煮酒作三次添入，直至熬酒干为度，取起。次第食之，尽此一鸭。愈后，即服十珍丸。

【功用】 复其真元。

【主治】 ①《修月鲁班经后录》引《劳证十药神书》：一切劳，大怯及虚甚急，火乘金位，嗽吐痰咯血、发热者。②《张氏医通》：少年禀气不足，因饮食饥饱所伤，致成虚损，形体羸弱，日晡潮热、腹胀气急，脉来弦数者。

【方论选录】《十药神书》陈修园按：怯而日久，虚极而急，而且咳嗽不已，则肺日因嗽而动扰矣。吐痰不已，则肺因痰而壅滞矣。咯血发热，壮火食气，不特肌肉消瘦，而且气衰言微矣。此为极症，恐非无情之草木所能治。故用黑嘴白鸭一只为君，盖以毛白者味较清而入肺，嘴黑者骨亦黑而入肾，取金水相生之义，亦资异类有情之物以补之也。最妙入京枣二升，取其甘温以补胃；平胃散一升，取其消导以转胃。胃为五脏六腑之本，胃安则脏腑俱安，与保真汤佐以厚朴同义。

【备考】 其血酒直入肺经，滋补其肺，宁止其嗽。

03758 白丑散

【方源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】 白丑钱半（半生半炒） 桑皮（蜜炙） 甘草（炙） 陈皮各一钱 白术（土炒） 木通各二钱

【用法】 水煎，频频服。

【主治】 囊肿便秘，及四肢俱肿。

03759 白玉膏

【方源】《三因》卷十四。

【异名】 收晕白玉膏（《传信适用方》卷三）。

【组成】 杏仁二十一粒（去皮尖，别研） 川椒四十九粒（去目，出汗，为末） 清油一两 酒蜡

半两

【用法】 文武火熬，用柳青枝打紫黑色，绵滤过，再熬，滴水成珠，收净器内。看疮大小，作新月样纸花团圆贴，候晕收，更促小疮头聚，用槟连散敷。

【功用】 收缩痈疽，令不蔓衍。

【主治】 痈疽疮疡。

【宜忌】 ①《三因》：切忌用冷药外贴，逼毒气入里杀人。②《普济方》：凡贴大恶疮，毒气方盛，不可以药当上贴，恐遏散毒气，疮益大。

03760 白玉膏

【方源】《医宗说约》卷六。

【组成】 乳香 没药各五钱 轻粉四钱 密陀僧二两 象皮五钱 铅粉二钱 黄蜡二两 白蜡五钱

【用法】 以上除蜡，俱为极细末；先用真桐油一斤，放锅内火上滚透，去沫油清，先入陀僧末，搅匀，取起，入二蜡熔尽，搅匀，待油稍温，方入细药，搅三百余遍，以大绵纸摊上，阴干。随疮大小圆长剪贴。初贴时，疮中毒水流出，膏药变黑，方换新者贴之。

【主治】 久远臁疮。

03761 白玉膏

【方源】《疡医大全》卷二十五。

【组成】 轻粉三钱 冰片二钱 潮脑六钱 白蜡二两 猪板油四两

【用法】 将蜡、油熔化，滤清，入潮脑研匀，冷定，加轻粉、冰片和匀。抿脚挑涂，油纸盖上。

【主治】 多年顽臁；兼治大毒、刀疮久不收口。

03762 白玉膏

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】 白龙骨 煅石膏 制甘石 铅粉各等分

【用法】 猪油成膏。

【主治】 臁疮。

03763 白术丸

【方源】《外台》卷八引《延年秘录》。

【组成】 白术 干姜 人参 厚朴（炙） 桂心各六分 细辛 茯苓 当归 茯神 枳实（炙） 五味子 附子各六分（炮） 吴茱萸六分 远志五分（去心） 旋覆花四分 泽泻五分

【用法】 上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，一日二次。加至三十五丸。

【主治】 恶心，数吐水不多，能食，少心力者。

【宜忌】 忌桃、李、雀肉、大酢、生菜、生葱、猪肉、冷水。

03764 白术丸

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】 神曲白术丸（《鸡峰》卷十二）。

【组成】 白术二两 神曲一两（微炒令黄） 人参一两（去芦头） 干姜一分（炮裂，锉） 陈橘皮二两（汤浸，去白瓤，焙） 荜茇一两

【用法】 上为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 脾胃气虚弱，不能饮食，肌肤瘦瘁，面色萎黄。

03765 白术丸

【方源】《全生指迷方》卷四。

【异名】 丁香半夏丸（《济生》卷二）。

【组成】 白术三两 半夏（汤洗七遍）二两 橘皮（洗） 干姜各二两 丁香一两

【用法】 上为细末，姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前姜汤送下。

【主治】 宿寒在胃，心中温温常欲呕，闻食吐酸，其关弦，脉小而短。

03766 白术丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】 陈皮一两 泽泻半两 甘草 防己 葶苈 木香各一分（一方有白术、茯苓）

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】 支饮，上气不得卧，身体肿满，小便不利。

03767 白术丸

【方源】《普济方》卷二〇六引《卫生家宝》。

【组成】 白术一两 缩砂仁二两（不见火） 干姜一两 丁香半两（不见火） 白豆蔻半两（去壳、不见火） 甘草一两（炙） 香附子一两（去毛皮）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，分六丸。每服一丸，米饮、姜汤送下。

【主治】 冷气呕吐，心腹疼痛。

03768 白术丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 南星 半夏（俱汤洗）各一两 白术一两半

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，生姜汤送下。

【主治】 痰湿咳嗽，脉缓，面黄，肢体沉重，嗜卧不收，腹胀，食不消化。

03769 白术丸

【方源】《内外伤辨》卷下。

【组成】 枳实（炒黄）一两一钱 白术 半夏

（汤浸） 神曲（炒黄）各一两 橘皮（去瓤）七钱 黄芩五钱 白矾（枯）二分

【用法】 上为极细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆一倍大。每服五十丸，白汤送下，量所伤加减服。素食多用干姜，故加黄芩以泻之。

【主治】 伤豆粉、湿面、油腻之物。

03770 白术丸

【方源】《妇人良方》卷十三。

【异名】 长胎白术丸（《医学入门》卷八）。

【组成】 白术 川芎 阿胶（炒） 地黄（炒令六分焦） 当归（去尾，炒）各一两 牡蛎（煅为粉）二分 川椒三分（如常制）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心米饮送下；酒、醋汤亦可。

【功用】 调补冲任，扶养胎气，常服益血，保护胎脏。

【主治】 妊娠宿有风冷，胎萎不长，或失于将理，伤动胎气，多致损堕妊孕。

03771 白术丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】 白术一两 芍药半两

【用法】 上为末，粥为丸。泄者，炒丸服。

【主治】 脾虚泄泻。

【加减】 冬月不用芍药，加肉豆蔻。

03772 白术丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 白术 茯苓 陈皮各二两 砂仁 神曲各一两五钱 五谷虫四两

【用法】 用荷叶、老米煎水，送为丸。每服三钱，开水送下。

【主治】 气虚中满。

03773 白术丸

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】 白术四两（炒） 炮姜二两 肉桂二两

【用法】 上为末，粥为丸。每服三钱，米饮送下。

【主治】 虚痰，脉细者。

【方论选录】 脾胃虚寒，不能运化，故生痰积饮，为患不已焉。白术培脾土以燥痰湿，炮姜暖胃气以除寒饮，肉桂温经暖血，祛散血分之寒湿，使无羁留之患。粥丸饮下，俾脾胃调和，则中气温暖而寒湿自散，痰饮自消。此不治痰而痰自消之一法也。

03774 白术丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 白术一斤（土炒，研末） 生地半斤（饭上蒸熟）

【用法】 捣和，下剂少入酒为丸。每服十五丸，米饮送下，一日三次。

【主治】 痔漏，脱肛，泻血，面色萎黄，积年不愈者。

03775 白术汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】 白术 防己各三两 附子（炮裂，去皮脐） 半两 桂（去粗皮） 人参各三两 甘草（炙，锉）二两半 当归（焙） 芍药各一两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服四钱匕，水一盏半，加生姜三片，煎至一盏，入醋少许，更煎三四沸，去滓温服。当觉体中热痹；未觉，加药末并醋，如前煎服。

【主治】 历节风，四肢疼痛不可忍。

【宜忌】《普济方》：忌一切发物。

03776 白术汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】 白术 人参 草澄茄各一两 诃黎勒（煨，去核）二两 丁香 草豆蔻（去皮） 黄耆 附子（炮裂，去皮脐） 白茯苓 麦芽（微炒） 沉香 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 木香各三分 枳实（去瓤，麸炒） 甘草（炙）各半两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜五片，大枣二个（擘破），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脾痹，心腹胀满，不欲饮食，食则气滞体重，四肢无力。

03777 白术汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 白术（锉） 甘草（炙，锉） 莎草根（炒去毛）各一两 草豆蔻五枚（大者，去皮，炒） 干姜（炮） 陈曲（炒） 麦芽（炒）各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣二个（擘破），同煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】 胃气受冷，气逆奔冲，呕哕不定。

03778 白术汤

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】 白术 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 当归（切，焙） 龙骨各一两 熟艾（炒）半两

【用法】 上为粗末。每服四钱匕，水一盏，加生姜二片，同煎至七分，去滓，空心，日晚温服。

【功用】《证因方论集要》：温固升清。

【主治】 风冷入中，飧泄不止，日夜数行，口干腹痛，脉虚而细。

【方论选录】《古方选注》：经言，热气生清，清气在下则生飧泄，是清浊交错矣。白术健脾消谷；厚朴平胃散结，即《伤寒论》下焦利从胃主治之义；龙骨止下利，固大肠之脱；艾叶，震亨谓其入药，服则气上行，时珍曰，转肃杀之气为融和，能回垂绝之元阳；当归，病因热而转生清者，血分必伤，用以调血也。

03779 白术汤

【方源】《圣济总录》卷八十。

【异名】 四君子汤(《局方》卷三新添诸局经验秘方)、白术散(《朱氏集验方》卷二)、四圣汤(《活幼口议》卷二十)、人参散(《普济方》卷三九四)、温中汤(《医部全录》卷四三六)、四君汤(《文堂集验方》卷四)

【组成】 白术 赤茯苓（去黑皮） 人参 甘草（炙）各等分

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水二盏，煎一盏半，去滓温服。

【功用】 益气补中，健脾和胃。

①《局方》(新添诸局经验秘方)：温和脾胃，进益饮食，辟寒邪瘴雾气。②《医方类聚》引《澹寮》：平调脏腑，通顺三焦，育神养气，暖胃消谷。③《普济方》：补五脏，生津液，调气血，解虚烦，益肌体。④《医统》：调理脾胃，进乳食，止泄泻。⑤《医学入门》：扶胃降火，补虚固本。⑥《古今医鉴》：大补阳气。⑦《简明医彀》：补元气，养脾胃。

【主治】 脾胃虚弱，元气不足，面色萎黄，身体瘦弱，倦怠嗜卧，气短懒言，四肢无力，心腹胀满，不思饮食，呕哕吐逆，肠鸣泄泻，脉虚弱。

①《圣济总录》：水气渴，腹胁胀满。②《局方》(新添诸局经验秘方)：荣卫气虚，脏腑怯弱，心腹胀满，全不思食，肠鸣泄泻，呕哕吐逆。③《医方类聚》引《澹寮》：脾胃不和，形气怯弱，肢体倦怠，腹胁膨胀，饮食减少，嗜卧乏力，及病后羸弱，食不复常。④《普济方》：小儿脾胃虚弱，哕逆不止，心神烦闷，吐泻，气虚烦渴。⑤《玉机微义》：肺损，皮聚而毛落。⑥《内科摘要》：脾胃虚弱，饮食少进；或肢体肿胀，肚腹作痛；或大便不实，体瘦而黄；或胸膈虚痞，痰嗽吞酸。⑦《古今医鉴》：气虚脾泻不止。⑧《医方考》：面色萎白，言语轻微，四肢无力，脉来虚弱。年高气弱，痔血不止。或误服攻痔之药，致血大下而虚脱。⑨《赤水玄珠》：真气虚弱，及短气脉弱。⑩《回春》：气虚痰湿头眩。⑪《会约》：胃中有痰，心中欲吐不吐，欲呕不呕。⑫《证治汇补》：气虚卒中自汗，及偏枯在右；气症脾胃虚而食少泻多，脉虚濡；气虚火动咽痛；胃虚气弱；水气上乘作喘。

【方论选录】 ①《丹溪心法附余》：四君子汤用白术、人参、茯苓、甘草者，白术则健脾燥湿，人参则补肺扶脾，茯苓则降气渗湿，甘草则补胃和中，譬如宽厚和平之君子，而不为奸险卒暴之行也。《和剂》之等分，愚以为药为君臣，剂之大小，又人之所处何如也。②《医方考》：人参甘温质润，能补五脏之元气；白术甘温健脾，能补五脏之母气；茯苓甘温而洁，能致五脏之清气；甘草甘温而平，能调五脏愆和之气。四药皆甘温，甘得中之味，温得中之气，犹之不偏不倚之君子也，故曰“四君子”。③《医灯续焰》：白术强土健运，茯苓渗湿燥脾，甘草守气于中宫，人参益气于五脏，皆主脾胃者，以人身真气即水谷之气也。四药冲和平淡而能补气维阳，诚君子哉。④《医方集解》：此手足太阴足阳明药也。人参甘温，大补元气为君；白术苦温，燥脾补气为臣；茯苓甘淡，渗湿泄热为佐；甘草甘平，和中益土为使也。气足脾运，饮食倍进，则余脏受荫，而色泽身强矣。⑤《伤寒绪论》：气虚者，补之以甘、参、术、苓、草，甘温益胃，有健运之功，具冲和之德，故为“君子”。盖人之一身，以胃气为本，胃气旺则五脏受荫，胃气伤则百病丛生。故凡病久不愈，诸药不效者，惟有益胃，补肾两途。故用四君子，随证加减，无论寒热补泻，先培中土，使药引津气四迄，则周身之机运流通，水谷之精微敷布，何患其药之不效哉！是知四君子为司命之本也。⑥《古方选注》：汤以君子名，功专健脾和胃，以受水谷之精气，而输布于四脏，一如君子有成人之德也。入太阴、阳明二经，然其主治在脾，故药品分两皆为偶数。白术健脾阳，复人参保脾阴，炙草和胃阴，复茯苓通胃阳，大枣悦脾，生姜通胃。理运阴阳，刚柔相济，诚为生化良方。

【临证举例】 ①虚寒泄泻 《静香楼医案》：中气虚寒，得冷则泻，而又火生齿衄。古人所谓胸中聚集之残火，腹内久积之沉寒也。此当温补中气，脾土厚则火自敛，四君子汤加益智仁、干姜。②溃疡病 《中医杂志》(1980；12:947)：将溃疡病合并出血分虚寒与实热两型，前者共153例，用本方辨证加灶心土、白及、山药等治疗，有效率为92.8%。③胃脘痛 《广西中医药》(1983；6:49)：

用四君子汤加味治疗以脾胃虚寒为主证的胃脘痛38例，临床表现：食欲不振，胃脘胀痛，饥饿时或夜间疼痛加重，常因饮食生冷而发病，疼痛时进食可缓解，经常泛吐清水，反酸，呃逆或欲呕，形困倦，喜按喜热饮，或大便稀烂，胃脘部有压痛，舌质淡，舌苔薄白或白腻，脉沉细而弱。38例中，急性胃炎2例；胃、十二指肠球部溃疡17例；慢性胃炎12例；胃、十二指肠球部溃疡合并慢性胃炎6例；胃下垂1例。病程最短半天，最长达30年。皆以四君子汤为主方，气虚甚者加黄芪；血虚甚者加当归；偏寒者加干姜、高良姜或吴茱萸；湿重者加半夏；泛酸者加海螵蛸、煅瓦楞子；气滞者加陈皮、木香；腹痛甚者加延胡索。每日一剂，水煎服。共治愈26例，有效12例。平均住院58天。④慢性肝炎 《中医杂志（1983；8:592)：慢性活动性肝炎40例，其中肝郁脾虚型15例，肝肾阴虚型12例，脾肾阳虚型6例，气阴两虚型7例，均以本方加黄耆为基本方，治疗4～5月，均获痊愈；HBsAg转阴28例（70%），HBsAg滴度下降6例；免疫学指标、肝功能及生化指标均恢复正常。⑤妊娠恶阻 《黑龙江中医药》（1989；1:4)：马某某，女，25岁，妊娠二月，食欲不振，恶心欲吐，因症状加重而入院，西药治疗四天未见疗效，频频呕吐，不能进食，食入加剧，吐黄绿苦水，脘闷，倦怠乏力，思睡，舌淡苔薄，脉滑无力，以四君子汤加陈皮20克，竹茹15克，厚朴10克，一剂即觉脘内舒适，恶心减轻，呕吐未作，能进食。服第4剂药的午后，恶心微作，持续约一小时，但终未吐出，而后恶心消失，食欲增进。⑥小儿疳疾 《浙江中医杂志》(1964；2:16)：恒以本方为主，因证加入一二味药，治小儿疳疾，效果甚佳。附病例三则：例一，因母乳不足，多进甘肥厚味，脾胃受损，大便泄泻无度近一年。方用四君子丸9克，滚开水泡，连滓分二三次服。服十五贴后诸症大减，大便正常。但多食后仍有便溏。续服一月，体渐肥胖。例二，大便秘结，粪如算盘珠样，数日不解，排便啼哭，便中挟血丝。方用四君合剂（党参、茯苓各9克，冬术4.5克，炙甘草3克）加女贞子6克，煎服。服八帖而愈。例三，禀赋素弱，麻疹后饮食不节，杂食生冷，致大便经常溏薄，日解6—7次，量多色白，肌肉消削，咳嗽盗汗，治以培土滋阴，方用四君合剂加枸杞子，女贞子各6克，十贴愈。⑦小儿低热 《四川中医》（1984；1:44)：华某某，男，6岁，平素脾胃虚弱，经常大便溏薄，纳食不香。一月前因中毒性消化不良住院治疗，吐泻止后，低热长期不退，经多种化验检查，诊断为“功能性低热”。就诊时所见：面色㿠白，肢倦乏力，语声低微，不思饮食，时觉口干喜热饮，额角及两手心发热，舌质胖润，苔薄白，脉细缓无力，体温37.5℃—38.5℃之间。病属吐后脾胃虚弱，元气受损，虚阳外浮之发热，治宜四君子汤补气健脾，加山药、花粉滋养脾胃之阴，以期阴平阳秘。五贴后热退病愈。

【现代研究】 ①对消化道运动的影响 《新中医》(1978；5:53)：本方可消除胃纳不佳，脘腹满闷及完谷不化，腹泻和肠道充气症状；对肠道运动的影响与抗副交感药物阿托品相似；对家兔离体十二指肠及回肠的自发活动呈抑制性影响，使紧张性下降，收缩幅度减小，有显著的解痉作用；对乙酰胆碱及氯化钡所致兔回肠强直性收缩的抑制率分别为83%及26%，对组织胺、氯化钡所致豚鼠回肠痉挛的抑制率分别为65%和27%；其对乙酰胆碱痉挛的解除主要表现为紧张性的明显下降，而收缩幅度仍保持原有水平乃至增加，对于肾上腺素所致十二指肠或回肠的抑制，则反可使收缩幅度加大。上述结果表明本方对肠道运动的影响主要是与其抗乙酰胆碱及组织胺有关，而直接作用则较弱。②对胰腺功能的影响 《中国中西医结合研究会第二届学术讨论会论文摘要汇编》（1985年)：四君子汤对金地鼠脾虚模型的作用，可见到胰腺合成消化酶能力加强，恢复分泌消化酶的能力。不论是生化检测结果，还是对胰腺细胞超微结构的观察，均可证实这些结论。③对糖代谢的影响 《广东中医》(1962；3:4)：四君子汤具有增加肝糖元作用。将本方制剂连续口饲小鼠，一周后给药小鼠肝细胞中糖元颗粒聚集成较大团块，含量比对照组显著增多。推测本方益气补脾的作用可能包括糖代谢的改善，以及相应的能量供应增加。④对免疫功能的影响 《中西医结合杂志》(1984；6:363)：四君子汤能明显提高小白鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能，单味药实验，党参、白术、茯苓都能明显提高小白鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能，其中尤以党参显著，白术次之，茯苓稍差，炙甘草未见有提高作用。在四君子汤配伍中，炙甘草浓度含1/3时，可明显拮抗党参、白术、茯苓提高巨噬细胞吞噬功能的作用；炙甘草浓度含1/5，1/7时，拮抗作用不明显。《辽宁中医杂志》(1989；3:43)：四君子汤能够促进萎缩的胸腺恢复，其作用不是通过促进食欲，增加进食量实现，而是相对特异地作用于胸腺，促进皮质细胞的增殖和分化。对正常小鼠胸腺结构则无明显影

响。《中华微生物学和免疫学杂志》（1987；3：189）；四君子汤对^{60}Co放射性损伤大鼠的细胞免疫和非特异性免疫功能具有明显的保护作用，给药组的迟发超敏反应程度（足垫肿胀）较对照组明显为高，血清总补体活性和血清溶菌酶含量，给药组也均较对照组有显著的提高。

【备考】 本方改为丸剂，名“四君子丸”，（见《丸散膏丹集成》）。

03780 白术汤

【方源】《三因》卷十二。

【异名】 白术散（《得效》卷五）。

【组成】 白术二两 五味子 茯苓各一两 甘草一分 半夏四个（洗去滑，切作十六片）

【用法】 上为散，分作十六服。水一盏半，加生姜五片，半夏一片，煎七分，空腹服。

【主治】 五脏伤湿，咳嗽痰涎，憎寒发热，上气喘急。

03781 白术汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】 白术散（《医统》卷三十五）、小白术散（《赤水玄珠》卷八）。

【组成】 白术 芍药各二钱 干姜半两（炮） 甘草二钱（炙）

【用法】 上为粗末。每服半两，水一盏，煎至七分，去滓取清，宜温服之。

【主治】 大肠经动，下痢为鹜溏。大肠不能禁固，卒然而下成水泄，青色，其中或有硬物，欲起而又下，欲了而不了，小便多清，得之秋冬者。

【加减】 甚则去干姜，加附子三钱。

03782 白术汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 白术 白茯苓 半夏各等分

【用法】 上为末。每服半两，病大者一两，水二盏，加生姜七片，煎至一盏，取清，调神曲末二钱，顿服之。

【主治】 ①《保命集》：痰潮上如涌泉，久不可治者。②《济阳纲目》：形肥脉缓，体重嗜卧，痰滑。

【加减】 病甚者，下玉壶丸一百丸。

03783 白术汤

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】 三物汤（《济阴纲目》卷九）、痢下白术汤（《医略六书》卷二十八）。

【组成】 白术 黄芩 当归各等分

【用法】 上为末。每服二二钱，水煎，食前服。

【主治】 ①《儒门事亲》：孕妇痢呕吐血。②《医略六书》：孕妇下痢，脉虚数者。

【方论选录】《医略六书》：妊娠胎热内炽，脾弱不能健运，血得偏渗肠间，故下痢赤白，胎孕因之不安。黄芩清热安胎，白术健脾止痢，当归养血以引血归经。使脾气健旺，则胎热自化，而胃气清和，血无不归，何有下痢赤白，胎孕不安乎！

03784 白术汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 茯苓半夏汤（《东垣试效方》卷三）。

【组成】 炒神曲二钱 陈皮 天麻各二钱 白术 白茯苓 麦芽面（炒黄色） 半夏各五钱

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二盏，加生姜五片，同煎至一盏，去滓，稍热服之。

【功用】《杏苑》：驱风导痰，祛宿食。

【主治】 风邪羁绊于脾胃之间，胃气虚弱，身重有痰，恶心欲吐。

【方论选录】《杏苑》：脾胃虚弱，羁风挟痰，宿食不化而作恶者，法当治中为本，驱风导痰，祛宿食为标。是以用白术补中气，神曲、麦芽消宿食，天麻驱风，茯苓、半夏豁痰，用橘红、生姜散逆气以止呕吐。

03785 白术汤

【方源】《阴证略例》。

【组成】 白术二两 防风二两 甘草一两（炙）

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候，一日只一二服。

【主治】 ①《阴证略例》：内伤冷物，外感风邪有汗者。②《普济方》：风湿恶风，脉缓。

03786 白术汤

【方源】《奇效良方》卷一。

【组成】 白术二钱 厚朴（姜制）二钱 防风（去芦）二钱 附子（炮，去皮脐） 橘红 白鲜皮 五加皮各一钱

【用法】 水二钟，加生姜五片，煎至一钟，不拘时候服。

【主治】 ①《奇效良方》：脾经受病，多汗恶风，身体怠惰，四肢不动，不能饮食，口角两边黄。②《校注妇人良方》：脾脏中风，腹满身黄，呕吐酸水。

03787 白术汤

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【组成】 白术一钱半 陈皮 白茯苓 五味子 半夏 杏仁各一钱 甘草五分

【用法】 水一盏半，加生姜三片，煎六分，分二服。

【主治】 咳嗽气喘，呕吐痰涎。

03788 白术汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 白术 茯苓各9克 橘络 甘草各3克 荆芥1.5克

【功用】 健脾除湿，疏风散邪。

【主治】 粟疮。脾虚有湿，外受风邪，症状轻微，颗粒稀少，形体瘦弱者。

【方论选录】 方中白术、茯苓、甘草健脾除湿。橘络理气健脾，通络脉以除胞睑之湿滞。荆芥疏散风邪。五味合用，具有健脾除湿，疏风散邪之功。

03789 白术饮

【方源】《济生》卷一。

【异名】 白术散(《医学六要·治法汇》卷二)。

【组成】 白术 人参 草果仁 干姜（炮） 厚朴（姜制，炒） 肉豆蔻（面裹，煨） 橘皮（去白） 木香（不见火） 麦芽（炒）各一两 甘草（炙）半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一个，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 脾劳虚寒，呕吐不食，腹痛泄泻，胸满喜嚏，多卧少起，情思不乐，肠鸣体倦。

【备考】 本方方名，《金匮翼》引作“白术汤”。

03790 白术酒

【方源】 方出《千金》卷八，名见《三因》卷二。

【异名】 白术饮(《普济方》卷九十二)、一味白术酒(《时方歌括》卷下)。

【组成】 白术四两

【用法】 以酒三升，煮取一升，顿服之。

【主治】 中风或中湿所致口噤不知人，骨节疼痛，遍身疼痛不能转侧。

①《千金》：中风，口噤不知人。②《三因》：中湿，口噤不知人。③《医方大成》：中湿，骨节疼痛。④《寿世保元》：中湿，遍身疼痛不能转侧，及皮肉痛难忍者。⑤《济阳纲目》：破伤湿。⑥《不居集》（下集）：感湿咳嗽，身体重痛。

【宜忌】 忌桃、李、雀肉。

【方论选录】《法律》：此方专一理脾，不分功于利小便。盖以脾能健运，自湿不留而从水道出耳。然则胃中津液不充，不敢利其小便者，得此非圣药乎！

03791 白术散

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 芎䓖散(《圣济总录》卷一五五)、芎椒白术散(《鸡峰》卷十六)、安胎白术散(《卫生宝鉴》卷十八)。

【组成】 白术 芎䓖 蜀椒二分（去汗） 牡蛎

【用法】 上为散。每服一钱匕，酒下，日三次，夜一次。若呕，以醋浆水服之；复不解者，小麦汁服之；已后渴者，大麦粥服之。病虽愈，服之勿置。

【功用】 ①《金匮》：养胎。②《局方》：调补冲任，扶养胎气，壮气益血，保护胎脏。

【主治】 妊娠脾虚，寒湿中阻，脐腹时痛，呕吐清涎，不思饮食，胎动不安，胎萎不长；室女带下。

①《局方》：妊娠宿有风冷；胎萎不长；或失于将理，动伤胎气，多致损堕。②《三因》：室女带下诸疾。③《金匮要略讲义》：妊娠脾虚寒湿中阻，每见脐腹时痛，呕吐清涎，不思饮食，白带下，甚至胎动不安。

【宜忌】《外台》引《古今录验》：忌桃、李、雀肉等。

【加减】 但苦痛，加芍药。心下毒痛，倍加芎䓖。心烦、吐、痛，不能食饮，加细辛一两；半夏（大者）二十枚，服之后，更以醋浆水服之

【方论选录】 ①《金匮要略直解》：白术主安胎为君，川芎主养胎为臣，蜀椒主温胎为佐，牡蛎主固胎为使。按瘦而多火者，宜用当归散；肥而有寒者，宜用白术散，不可混施也。芍药能缓中，故若痛者加之。川芎能温中，故毒痛者倍之。痰饮在胸膈，故令心烦吐痛，不能食饮，加细辛破痰下水，半夏消痰去水，更服浆水以调中。若呕者，复用浆水服药以止呕。呕不止，再易小麦汁以和胃。呕止而胃无津液作渴者，食大麦粥以生津液。病愈服之勿置者，以大麦粥能调中补脾，故可常服，非指上药可常服也。②《金匮要略心典》：妊娠伤胎，有因湿热者，亦有因湿寒者，随人脏气之阴阳而各异也。当归散正治湿热之剂；白术散白术、牡蛎燥湿，川芎温血，蜀椒去寒，则正治寒湿之剂也。仲景并列此，其所以诏示后人者深矣。

【备考】 方中白术、芎䓖、牡蛎用量原缺。《外台》引《古今录验》本方用白术、芎䓖各四分，蜀椒三分，牡蛎二分。

03792 白术散

【方源】《千金》卷十五。

【组成】 白术 厚朴 人参 吴茱萸 茯苓 麦

芽曲　芎藭各三两（一方加大腹、橘皮）

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，食后酒下，一日三次。

【主治】 ①《千金》：脾胃俱虚冷。②《普济方》：脾虚腹胀，不能饮食。

03793　白术散

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】 白术八分　茯苓八分　吴茱萸四分　橘皮六分　荜茇四分　厚朴八分（炙）　槟榔十分　人参六分　大黄十分

【用法】 上为散。每服方寸匕，空腹煮姜、枣汤下，一日二次。渐加至二匕半，觉热即少饮食三两口压之。

【主治】 呕吐酸水，结气筑心。

【宜忌】 忌酢物，桃、李、雀肉。

03794　白术散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 白术一两　人参三分（去芦头）　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　桂心三分　陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙）　厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）　诃黎勒一两（煨，用皮）　白豆蔻一两（去皮）

【用法】 上为粗散。每服三钱，水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 脾胃气虚弱，呕吐不能食，四肢少力，心腹妨闷。

03795　白术散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】 白术三分　陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）　人参三分（去芦头）　麦芽一两（微炒）　附子一两（炮裂，去皮脐）　芎藭三分　桂心三分　厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）　诃黎勒一两（煨，用皮）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】 虚劳，脾胃虚冷，食不消化，渐加无力。

03796　白术散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】 白术一两　丁香三分　诃黎勒三分（煨，用皮）　桂心三分　细辛三分　附子三分（炮裂，去皮脐）　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】 上为散。每服一钱，食后以温水调下。

【主治】 肺脏虚寒，心膈壅滞，头目不利，鼻流清涕，日久不止。

03797　白术散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】 白术三分　半夏三分（汤浸七遍去滑）　槟榔半两　桂心半两　陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）　丁香一分　高良姜　半两（锉）　木香一分

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 心痛，痰饮多唾，腹胀不能下食。

03798　白术散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】 白术　赤茯苓　当归（锉，微炒）　桂心　桔梗（去芦头）　陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙）　吴茱萸（汤浸七遍，焙干，微炒）　人参（去芦头）各一两　甘草一分（炙微赤，锉）　细辛半两　厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 腹胀肠鸣切痛，发作有时。

03799　白术散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】 白术一两　藿香一两　人参一两（去芦头）　枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄）　高良姜半两（锉）　草豆蔻半两（去皮）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 霍乱胃气虚，干呕不止。

03800　白术散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 白术半两　半夏一两（汤洗七遍去滑）　青橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）赤茯苓一两　大腹皮一两（锉）　人参半两（去芦头）　枇杷叶一两（拭去毛，炙微黄）　木香半两　前胡二两（去芦头）　槟榔一两　厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 膈气不散，胸中噎塞，不下食，时时妨闷。

03801　白术散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】白术三分　木香半两　诃黎勒皮三分　桂心三分　甘草一分（炙微赤，锉）　丁香半两　人参半两（去芦头）　厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）　陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）　草豆蔻一两（去皮）

【用法】上为细散。每服一钱，煎生姜、木瓜汤调下，不拘时候。

【主治】气膈，心腹痞满，四肢拘急，体重。

03802　白术散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】白术一两　吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒）　高良姜一两（锉）　桂心一两　人参一两（去芦头）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】食讫醋咽多嚏，食不下，脾胃虚冷。

03803　白术散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】白术一两　陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）　丁香半两　赤茯苓半两　半夏半两（汤洗七遍去滑）　附子半两（炮裂，去皮脐）　桂心半两　前胡一两（去芦头）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胸膈留饮，腹中虚满气逆，不下饮食。

03804　白术散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】白术三分　草豆蔻一两（去皮）　当归一两（锉，微炒）　甘草半两（炙微赤，锉）　干姜半两（炮裂，锉）　芎藭半两　厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣二个，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】妊娠腹中冷，胎动不安。

03805　白术散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】白术三分　熟干地黄一两　白茯苓三分　甘草半两（炙微赤，锉）　阿胶一两（捣碎，炒令黄燥）　当归一两（锉，微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠胎动，腹痛，及腰疼不止。

03806　白术散

【方源】《活人书》卷十六。

【组成】白术一两　细辛一两　附子一两（炮，去皮脐用）　桔梗一两（去芦头）　干姜半两（炮裂，锉）　川乌头一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为细末。每服二钱，以水一中盏，煎至六分，稍热和滓顿服，不拘时候。

【主治】阴毒伤寒，心间烦躁，四肢厥冷。

03807　白术散

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】白术（锉，炒）　缩砂仁　诃黎勒皮各三分　肉豆蔻三枚（去壳）　甘草（炙，锉）半分　木香一分　人参　丁香　干姜（炮）各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，米饮调下。

【主治】脏腑寒，泄泻，不思食。

03808　白术散

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】白术二两（米泔浸一宿，炒）　芍药　厚朴（去粗皮，姜汁炙）　吴茱萸（汤洗，焙，炒）　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　细辛（去苗叶）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，入盐沸汤点服。

【主治】元脏虚冷，腹内雷鸣，夜多小便。

03809　白术散

【方源】《全生指迷方》卷四。

【异名】白术汤（《普济方》卷一九二）、全生白术散（《女科撮要》卷下）。

【组成】橘皮（洗）　大腹皮　茯苓　生姜各半两　白术一两

【用法】上为末。每服方寸匕，食前饮调下。

【主治】①《全生指迷方》：妊娠面目肿如水状。②《普济方》：久下痢之后，脾肺虚，不能渐运诸气，肌肉空疏，气无所归，卒然身体足胫面目浮肿，小便反快，脉虚。

【方论选录】《医方集解》：此足太阳、太阴药也。水病常令上下分清，姜皮、橘皮辛而能散，使水从毛窍出；腹皮、茯苓皮淡而能泄，使水从溺窍出；水盛由于土衰，故用白术之甘温以扶脾土而堤防之，不致泛溢也。

03810　白术散

【方源】《广嗣纪要》卷九引《全生》。

【组成】白术一钱　生姜皮　大腹皮　白茯苓皮　陈皮　桑白皮各五钱

【用法】上㕮咀。浓磨木香汁半盏，同煎八分，去滓温服。

【主治】 ①《广嗣纪要》：妊娠面目虚浮，四肢肿如水气。②《医略六书》：子肿，脉浮濡数者。

【方论选录】《医略六书》：妊娠脾亏气滞，肺不通调，致湿流四肢，渍于皮肤，溢于头面，故肢腹上下浮肿，谓之子肿。白术健脾以运动其气；桑皮肃金以通其湿；茯苓渗湿气，清治节；陈皮利中气，除痰涎；大腹绒泻滞宽胀；生姜皮散湿退肿也。为散米饮下，使脾气健运，则肺气通调而湿流气化，浮肿无不退，胎气无不安矣。

【备考】《医略六书》本方用法：为散，米饮下。

03811 白术散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 白术汤(《卫生总微》卷十)、钱氏白术散(《局方》卷十吴直阁增诸家名方)人参白术散(《小儿痘疹方论》)、七味人参白术散(《永类钤方》卷二十一)、清宁散(《得效》卷十二)、七味白术散(《校注妇人良方》卷二十一)、参苓白术散(《片玉痘疹》卷六)、干葛参苓白术散(《痘疹全书》卷上)、七味白术汤(《景岳全书》卷六十四)。

【组成】 人参二钱五分 白茯苓五钱 白术五钱(炒) 藿香叶五钱 木香二钱 甘草一钱 葛根五钱

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水煎服。

【功用】 健脾养胃，益气升清，生津止渴。

①《小儿痘疹方论》：清神生津，除烦止渴。②《古今医鉴》：和胃生津，止泻痢。③《幼科释谜》：助脾和胃，调中益气。④《小儿药证直诀类证释义》：健脾养胃升清。

【主治】 脾胃虚弱，运化失司，津液耗伤，虚热内炽，呕吐，泄泻，霍乱，痢疾，烦渴饮水，羸困少力。

①《小儿药证直诀》：小儿脾胃久虚，呕吐泄泻，频作不止，精液枯竭，烦渴躁，但欲饮水，乳食不进，羸瘦困劣；及失治后变成惊痫，不论阴阳虚实者。②《宣明论》：伤寒杂病，一切吐泻烦渴霍乱，虚损气弱，及酒积呕哕。③《小儿痘疹方论》：小儿痘疮已靥，身热不退。④《御药院方》：小儿吐泻之后，腹中疼痛，气不和，烦渴，引饮不止；及伤寒泻后，胃中虚热。⑤《得效》：小儿痟渴，烦躁引水，乳食不进，夜则渴甚者。⑥《保婴金镜》：积痛。⑦《医学六要》：消中，消谷善饥。⑧《寿世保元》：小儿胃虚寒所致的冬月吐蛔症。⑨《医略六书》：妊娠口干不渴，脉浮缓者；孕妇泄泻，脉浮软者。

【加减】 热甚发渴，去木香；渴者，葛根加至一两。

【方论选录】 ①《育婴秘诀》：本方治阳明经本虚，阴阳不和，吐泻亡津液，烦热口干。以人参、白术、甘草甘温补胃和里；木香、藿香辛温以助脾；白茯苓甘平，分阴阳，利水湿；葛根甘平，倍于众药，其气轻浮，鼓舞胃气，上行津液，又解肌热，治脾胃虚弱泄泻之圣药也。不问泄痢，但久不止者，并服之。②《医略六书》：妊娠脾胃两亏，清阳下陷，津液不能上敷四达，故泄泻烦渴不解，胎因不安焉。人参扶元气以通血脉，白术健脾土以生血脉，茯苓渗湿和脾，炙草缓中益胃，葛根升清气，最除烦渴，藿香开胃气，兼止泄泻，木香调气以醒脾胃也。为散水煎，使脾胃调和，则清阳上奉而津液四布，泄泻无不止，烦渴无不除，何胎孕之不安哉！③《小儿药证直诀类证释义》：小儿体质娇嫩，气血未充，而气血津液又是生机之本，必须时时顾护珍惜。基于这样的治疗思想，针对胃有虚热，津液亏耗，中气下陷等证，钱氏创立了著名的白术散，此方健脾养胃，又能升清，应用于因运化失司而复津液耗竭，虚热内炽，口渴不止者。方以四君补中，木香、藿香芳香悦脾而健胃，葛根升清止泻，又能解渴，实为临床治疗渴泻之圣药，痟证初起之妙剂，惟多服则佳。

03812 白术散

【方源】《本事》卷四。

【异名】 白术茯苓泽泻汤(《医方考》卷六)。

【组成】 泽泻 白术 茯苓(去皮)各等分

【用法】 上为细末。每服一钱，汤调温下。

【主治】 脾气不足，水湿内停，食后多吐；或痘如水泡，大便泄泻。

①《本事》：食后多吐，欲作反胃。②《医方考》：痘而水泡。③《痘学真传》：痘家作泻，则液内竭而色干；疮湿则液外走而便结，如泄泻疮湿并见者，此脾胃多湿而不健运也。

【方论选录】 ①《医方考》：痘疹中有实热，膈有停水、湿热外行，初则痘色晶亮，顷则痘皆水泡矣。此乃水不能润下，灶底燃薪，釜中发泡之义。是方也，白术甘而燥，能益土以防水；茯苓甘而淡，能益土以决防；泽泻咸而润，能润下而利水。水利湿消，泡自愈矣。②《本事方释义》：泽泻气味咸微寒，入足太阳；白术气味甘温，入足太阴；茯苓气味甘平淡渗，入足阳明，能引诸药达于至阴之处。此治食后多吐，将成反胃之痟，其人必是酒客，中宫气馁，饮浊上干，三味最能达阴泄浊，又能和中养正，所以确中病情也。

03813 白术散

【方源】《本事》卷十。

【组成】白术 人参各二钱 半夏曲二钱 茯苓 干姜 甘草各一钱

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣三个（擘，去核），煎至七分，去滓温服，一日二三次。

【功用】《本事方释义》：温养中宫，通调营卫。

【主治】小儿呕吐，脉迟细，有寒。

【方论选录】《本事方释义》：白术气味甘温微苦，入足太阴；人参气味甘温，入足阳明；半夏曲气味辛微温，入足阳明；茯苓气味甘平淡渗，入足阳明；干姜辛温，入手足太阴；甘草气味甘平，入足太阴；姜、枣之辛温甘，和营卫。小儿挟寒呕吐，脉迟细者，恐延成慢惊，故必温养中宫，通调营卫，则正气旺而呕吐除，病何由入乎！

03814 白术散

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】牡蛎（煅）三钱 白术一两二钱半 防风二两半

【用法】上为末。每服一钱，温水调下，不拘时候。

【主治】虚风多汗，食则汗出如洗，少气痿劣，久不治必为消渴证。

【加减】如恶风，倍防风、白术；如多汗面肿，倍牡蛎。

03815 白术散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】白术 泽泻各半两

【用法】上为细末。每服三钱，煎茯苓汤调下。或丸亦可，服三十丸。

【主治】水肿觉胀下者。

【宜忌】《洁古家珍》：忌房室、鱼、酒等物。

【备考】本方改为丸剂，名“白术丸”（见《洁古家珍》）。

03816 白术散

【方源】《洁古家珍》。

【组成】白术 芍药 茯苓各等分

【用法】上为末。水煎服。

【主治】泻痢证。四肢懒倦，小便不利，大便走，沉困，饮食减少。

【加减】如发热或恶热，或腹不痛而脉疾，加黄芩为主；如未见脓血而恶寒，乃太阴而传少阴，加黄连为主，桂枝佐之；如腹痛甚者，加当归，倍芍药；如见白脓，加黄芩为主；如见血，加黄连为主，桂枝、当归佐之。

03817 白术散

【方源】《普济方》卷三三七引《卜便良方》。

【异名】白术汤（《校注妇人良方》卷十二）、四味白术汤（《景岳全书》卷六十一）。

【组成】白术一两 人参半两 丁香二钱半 甘草一钱

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生姜五片，煎至七分，温服。

【主治】①《普济方》：引《十便良方》：妊娠恶阻，吐清水，甚则十余日粥浆不入者。②《医略六书》：恶阻，脉虚弦者。

【方论选录】《医略六书》：妊娠胃气暴虚，寒伏中脘，故呕吐清涎。是恶阻，因于胃虚挟焉。人参扶元以补胃之虚，白术健脾以壮胃之弱，丁香温中散寒滞，甘草缓中和胃气，稍佐生姜以止呕也。为末姜煎，使虚回寒散，则胃气调和而恶阻无不退矣。

03818 白术散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】白术 川乌 桔梗 细辛 干姜 羌活 防风 肉桂 甘草

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】阴痉。

【加减】自汗，加黄耆。

03819 白术散

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】白术 白茯苓各二钱 神曲 天麻各一钱 橘皮（去白） 麦芽 半夏各一钱五分 生姜五片

【用法】上㕮咀。水煎，食前温服。

【主治】脾胃虚弱，身重有痰，恶心欲吐者。

03820 白术散

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】白术三钱（微炒） 云苓二钱 薏苡仁五钱（炒） 鲜石斛四钱 葛根二钱 木瓜五分 生甘草五分

【用法】加石莲肉二十枚，水煎，温服。

【主治】脾家湿热，唇沈湿烂。

03821 白术膏

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【异名】白术助胃丹（《医便》卷四）。

【组成】上好片术（全无一些苍色者）。

【用法】切开，入瓷锅，水浮于药一手背，文武火煎干一半，倾置一瓶盛之。又将滓煎，又如前并

之于瓶，凡煎三次，验术滓嚼无味乃止，去滓，却将三次所煎之汁，仍入瓷锅内文武火慢慢熬成膏。

【功用】 健脾祛湿，温中止泻，益气固表。

①《摄生众妙方》：补养。②《本草纲目》引《千金良方》：止久泄痢。③《寿世保元》：善补脾胃，进饮食，生肌肉，除湿化痰，止泄泻。④《冯氏锦囊·痘疹》：补中气，固自汗。⑤《北京市中药成方选集》：理脾和胃，温中止泄。⑥《赵炳南临床经验集》：健脾祛湿。

【主治】 ①《古今医鉴》：脾胃大虚，自汗乏力，四肢怠倦，饮食不思，或食而不化，呕吐泄痢，泻下完谷、白沫。②《赵炳南临床经验集》：慢性湿疹（顽湿），下肢慢性溃疡（臁疮），手足汗疱疹。

【备考】《本草纲目》引《千金良方》本方用法：每服二三匙，蜜汤调下。《痘疹全集》：虚极者，人参汤调服。

03822 白龙丸

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】 石膏半斤（火煅过，如面，分为三停，留一停为衣） 川乌头（去皮） 甘草 天南星各四两（各生用） 肉桂 甘菊花各二两 防风 白僵蚕 京芎各一两半 牛膝 海桐皮（去皮，水浸） 麻黄（去节用） 甘松（洗） 川白芷 藁本（洗）各一两

【用法】 上为散，研和令匀，用糯米拣择净煮粥研烂，旋旋入药和匀，杵为剂，丸如大鸡头子大，微干上衣。每服一丸，空心，夜卧用煨葱暖酒嚼下。如中急风，用两丸，薄荷自然汁半盏，酒半盏，磨化灌下，衣被盖出汗；妇人血风，当归酒送下，伤寒头痛，葱酒送下；常服，茶、酒任下；小儿急慢惊风，量大小，金银汤磨下。

【主治】 头风，并诸般风疾。

03823 白龙丸

【方源】《局方》卷一（绍兴续添方）。

【组成】 藁本（去土） 细辛 白芷 川芎 甘草各等分

【用法】 上为细末，用药四两，加石膏末一斤（系煅了者），水搜为丸，每两八丸。每服一丸，食后薄荷茶嚼下；风蛀牙，一丸分作三服，干揩后用盐汤漱之，更用葱茶嚼下。

【主治】 ①《局方》（绍兴续添方）：男子、妇人一切风，遍身疮癣，手足顽麻，偏正头疼，鼻塞脑闷，及伤寒头风。②《丹溪心法》：酒渣鼻。

【备考】《丹溪心法》治酒渣鼻，以白龙丸末，逐日洗面，如澡豆法，更罨少时，方以汤洗去，食后常服龙虎丹一贴。

03824 白龙丸

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】 鹿角霜二两 龙骨（生用） 一两 牡蛎（火煅） 二两

【用法】 上为细末，酒打面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心盐汤或酒送下。

【功用】 固精壮阳。

【主治】 虚劳肾损，梦中遗精，白淫滑泄，盗汗。

03825 白龙丹

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】 川芎 防风各十二两 滑石一斤 草乌十两（生用） 两头尖 甘草各八两 川乌 桔梗 寒水石各四两 何首乌二两四钱 茴香一两七钱 广木香一两半 地骨皮一两七钱 白及一两四钱 藁本 甘松 白芷 香附子 良姜 薄荷 当归 白芍药 羌活 川椒（去子，炒） 广零陵香 藿香叶 全蝎（不炒） 细辛 荆芥穗 甘菊花 麻黄（去根）各一两 人参 升麻 天麻 僵蚕（炒断丝） 干葛各七钱 蕲州白花蛇一条（去头尾，酒浸三日，去骨皮，将肉焙干，为末） 乌梢蛇一条（同上制） 豆粉四两（为糊） 麝香一钱（同滑石为衣） 白面半斤（蛇酒为糊）

【用法】 上为末，打糊，蛇酒为丸，如弹子大，滑石为衣，晒干收用。每服一丸，临卧茶清或酒化下。

【主治】 男子妇人诸般风证，左瘫右痪，半身不遂，口眼㖞斜，腰胸疼痛，手足顽麻，语言謇涩，行步艰难，遍身疮疥上攻头目、耳内蝉鸣，痰涎不利，皮肤瘙痒，偏正头痛，一切诸风。

03826 白龙丹

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 炉甘石一钱 玄明粉五分 硼砂三分 片脑一分

【用法】 上为细末。点眼。

【主治】 一切火热眼及翳膜胬肉。

03827 白龙汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 桂枝 白芍（酒炒） 龙骨（煅） 牡蛎（煅）各三钱 甘草（炙） 二钱

【用法】 上锉一剂。加大枣两个，水煎服。

【主治】 男子失精，女子梦交，自汗盗汗。

03828 白龙散

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】 天浆子（有虫者）一枚　白僵蚕（直者，炒）一枚

【用法】 上为散，加腻粉少许，以薄荷自然汁调灌之，取下毒物；量儿大小，分作二服，亦得。

【主治】 小儿脐风。

03829　白龙散

【方源】《中藏经·附录》卷七。

【组成】 寒水石（生）　甘草（半生半炙）　葛粉各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，浓煎麦门冬苗汤调下。

【主治】 消渴。

03830　白龙散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 枯矾七钱　乳香三钱

【用法】 上为末。敷二时。

【主治】 缺唇、自刎，血流如注者。

【备考】 本方为原书“二龙散”之第一方。

03831　白归汤

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷六。

【组成】 川芎　当归　白芍　（一方加甘菊，去心蒂）

【用法】 水煎服。

【主治】 血虚头痛。

03832　白瓜丸

【方源】《普济方》卷五十一。

【组成】 白瓜子仁三两　陈橘皮三分　白芷　藁本　远志　杜衡　车前子　当归　云母粉　白石脂各一两　天门冬　细辛　柏子仁　栝楼根　黄丹各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒送下，不拘时候。

【功用】 令色光白。

【主治】 面黯黯。

03833　白芍汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】 白芍　枣仁　乌梅

【主治】 肝虚自汗。

03834　白灰散

【方源】 方出《本草纲目》卷九引《简便方》。名见《古今医鉴》卷九。

【组成】 石灰

【用法】 醋调，敷肿处。

【主治】 痄腮肿痛。

【备考】《古今医鉴》本方用石灰不拘多少（炒七次，地下窖七次），醋调，敷肿处。

03835　白豆散

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】 白蔹　赤小豆　天南星　淡豆豉各等分

【用法】 上为末。芭蕉叶捣烂绞汁调敷，一日一次。如脐小白色即愈。

【主治】 脐突虚肿，按之有声，软而不痛者。

03836　白芷丸

【方源】《寿亲养老》卷四。

【组成】 白芷　石斛　干姜各一两半　细辛　五味子　厚朴　肉桂　防风　茯苓　甘草　陈皮各一两　白术一两一分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不饥不饱时清米饮送下。

【主治】 老人气虚头晕。

【方论选录】《本事方释义》：白芷气味辛温，入手足阳明，引经之药；石斛气味甘平微咸，入肝脾肾三经；干姜气味辛温，入手足太阴；细辛气味辛温，入足少阴；五味子气味酸咸温，入肾；厚朴气味辛温，入足太阴阳明；肉桂气味辛甘热，入肝；防风气味辛甘平，入手足太阳；茯苓气味甘平，淡渗入胃，能引诸药入于至阴之处；甘草气味甘平，入脾，通行十二经络，能缓诸药之性；陈皮气味辛平微温，入脾胃；白术气味甘温，入手足太阴。此治气虚头晕之方也。诸经络皆有赖于中土，故守中之药居多，中宫气旺，则辛热之品得各行其志，而病情中矣。

03837　白芷汤

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】 白芷　鹿茸（去毛，酥炙）　诃黎勒（煨，去核）　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）　牡丹皮　地榆　黄耆（锉，炒）各一两半　肉豆蔻（去皮）一枚　白术　黄连（去须）　附子（炮裂，去皮脐）　代赭（碎）　桂（去粗皮）各一两　黄芩（去黑心）半两　龙骨（去土）二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，煎取七分，去滓，食前温服。

【主治】 妇人血海虚冷，经行太过。

03838　白芷汤

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】 白芷散（《济阳纲目》卷一〇七）。

【组成】 防风　荆芥　连翘　白芷　薄荷　赤芍　石膏

【用法】 上锉。水煎，温服。

【主治】 阳明虚热有风，下牙疼。

03839 白芷散

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】白芷末一钱，铜绿一钱 白僵蚕四枚 干胭脂半钱

【用法】上为末。每用少许，以鸡翎子扫疮。有涎吐之，不得咽津。

【主治】口舌生疮，久不愈。

03840 白芷散

【方源】《妇人良方》卷一。

【组成】白芷一两 海螵蛸二个（烧） 胎发一团（煅）

【用法】上为细末。每服二钱，空心温酒调下。

【主治】①《妇人良方》：妇人赤白带下。②《景岳全书》：下元虚弱，赤白带下，或经行不止。

【方论选录】《成方便读》：如带下无虚寒等证，即可于此方求之。白芷独入阳明，芳香辛苦，其温燥之性，为祛风逐湿之专药，以阳明为五脏六腑之海，水谷之所藏，湿浊之所聚，故以为君；女子以肝用事，海螵蛸入肝经血分，其性燥而兼涩，可固可宣，为带下崩中之要药，故以为臣；胎发得血之余气，益阴之中，又有去瘀之力，使瘀者去而新者生，以复妇人之常道。不特赤白带下可痊，而一切瘀浊，亦可愈耳。

03841 白芷散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】郁金散。

【组成】郁金一钱 香白芷 石膏各二钱 薄荷叶 芒消各三钱

【用法】上为极细末。口含水，鼻内搐之。

【主治】头痛。

03842 白芷散

【方源】方出《直指》卷二十一，名见《普济方》卷五十七。

【组成】杏仁（水浸，去皮，焙） 细辛 白芷各一钱 全蝎两个（焙）

【用法】上为末。麻油调敷。

【主治】鼻痛。

03843 白芷散

【方源】《普济方》卷四十四引《朱氏集验方》。

【组成】白芷四钱 生乌头一钱

【用法】上为末。每服一字，茶调下。有人患眼睛痛者，先含水，次用此药搐入鼻中，其效更速。

【主治】头痛及目睛痛。

03844 白芷散

【方源】《普济方》卷三〇七。

【组成】雄黄 香白芷

【用法】上为末。掺之。先用妇人扎髻绳扎定疮处。如无头绳，麻油绳亦可用。用新汲水调末服之，或热酒送下皆良。

【主治】毒蛇咬伤。

03845 白芷散

【方源】《准绳·类方》卷八。

【组成】白芷 防风 连翘 石膏（煅） 荆芥 赤芍药 升麻（焙） 薄荷

【用法】上为细末。薄荷汤调服及搽牙龈；或煎服亦可。

【主治】下牙疼。

03846 白芷散

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】开结散（《外科证治全书》卷三）。

【组成】乳香 没药（各去油） 白芷 浙贝 归身各等分

【用法】上为末。每服五钱，陈酒调下。醉盖取汗。

【主治】乳痈乳疖。

03847 白芷散

【方源】《医级》卷九。

【组成】白芷 乌贼骨 白术 米仁 赤苓 芡实各一两

【用法】上为末。每服五钱，米饮下。

【主治】带下日久，清腥如水。

03848 白芷膏

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】白芷半两 防风半两（去芦头） 附子半两（去皮脐） 白芍药半两 当归半两 川椒半两（去目） 羌活半两 独活半两 藁本半两 川乌头半两（去皮脐） 细辛半两 生姜五两 白僵蚕半两 黄蜡五两 猪脂二斤半（水浸二宿，逐日一换）

【用法】上锉细。先煎猪脂，去滓，入诸药，煎白芷色焦赤，以绵滤去滓，澄清，拭铛令净，慢火熬，入蜡消为度，用瓷盒盛。每取少许于火畔熔手摩之。

【主治】风毒流注，骨节疼痛，筋脉挛急。

03849 白芷膏

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】白芷 细辛 木通 当归各半两

【用法】上锉细，以羊髓四两，与药同入铫子内，慢火上熬，候白芷赤黄色，膏成，绞去滓，贮于瓷器内。敷儿囟上及鼻中，一日三四次。

【主治】 小儿囟气虚肿，鼻塞不通。

03850 白芷膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】 白芷 白蔹各二两 白术三两半 白附子（炮） 一两半 白茯苓（去黑皮） 一两半 白及 细辛（去苗叶）各三两

【用法】 上为末，用鸡子白搜和匀，为丸如弹子大，瓷合中盛。每卧时先洗面，后取一丸，以浆水研化涂面，明旦井花水洗之。

【主治】 面皯疱。

【备考】 本方方名，据剂型当作"白芷丸"。

03851 白花膏

【方源】《济生》卷二。

【组成】 款冬花 百合（蒸，焙）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，食后，临卧细嚼姜汤咽下，噙化尤佳。

【主治】 喘嗽不已，或痰中有血。

【备考】 本方方名，《医方类聚》引《严氏济生续方》引作"百花膏"。

03852 白花膏

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 香油一斤 青槐枝百段 黄蜡一两半 定粉一两半 净乳香 儿茶 没药 白花蛇各三钱 潮脑一两 麝香一钱

【用法】 青槐枝入油熬枯，去枝，至滴水不散，入黄蜡、定粉，离火，温时再下净乳香、儿茶、没药、白花蛇、潮脑、麝香，同油搅匀成膏，浸水内一宿。摊贴。

【主治】 痈疡痒极见骨者，臁疮孔内发痒者。

03853 白芥丸

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】 消积丸（《东医宝鉴·杂病篇》卷六）、连罗丸（《杂病源流犀烛》卷十四）。

【组成】 白芥子 萝卜子各一两半 山栀 川芎 三棱 莪术 桃仁 香附 山楂 神曲各一两 青皮五钱 黄连一两半（一半用吴萸水炒，一半用益智仁水炒）

【用法】 上为末，蒸饼为丸服。

【主治】 男妇食积死血，痰积成块在两胁，动作腹鸣，嘈杂眩晕，身热时作时止。

03854 白连散

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】 白矾（枯） 乌贼鱼骨 黄连 龙骨各一两

【用法】 上为末。以绵裹枣核大塞耳中，一日换三次。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：聍耳，出脓汁。②《青囊秘传》：浸淫疮。

【备考】《青囊秘传》：外用。

03855 白疔散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 海螵蛸21克 滑石9克 寒水石9克 煅石膏9克 青黛3克 冰片1克

【用法】 上为细末，外用。

【主治】 湿疹。

03856 白疕丸

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 苍术二两 白附子二两 桂枝二两 当归二两 西秦艽二两 草乌二两 追地风二两 千年健二两 威灵仙二两 川芎二两 钩藤二两 菟丝子二两 川牛膝二两 何首乌二两 川乌二两 知母二两 栀子二两 红花二两 白花蛇二两 苦参四两 刺蒺藜四两 防风四两 小胡麻四两 苍耳子四两 黄柏四两 桃仁四两 紫草四两 全虫四两 丹皮四两 荆芥六两 白鲜皮六两

【用法】 上为细末，水泛为丸，如绿豆大。每服一至二钱，温开水送下，一日二次。

【功用】 驱风攻毒，除湿止痒。

【主治】 牛皮癣（白疕风），神经性皮炎（顽癣），慢性湿疹（顽湿疮）。

03857 白灵药

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 水银二两（用铅一两化开，投入水银听用） 火消二两 绿矾二两 明矾二两

【用法】 上为末，投入锅内化开，炒干，同水银碾细，入泥护阳城罐内，上用铁盏盖之，以铁梁铁兜左右，用烧熟软铁线上下扎紧，用紫土盐泥如法固口，要烘十分干燥为要，架三钉上，砌百眼炉，先加底火二寸，点香一枝，中火点香一枝，顶火点香一枝；随用小罐安滚汤在傍，以笔蘸汤搽擦盏内，常湿勿干。候三香已毕，去火罐，待次日取起，开出药来，如粉凝结盏底上，刮下灵药，收藏听用。凡疮久不收口，用此研细，掺上少许，其口易完。若入于一概收敛药中，用之其功甚捷。

【主治】 疮久不收口。

03858 白灵药

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】 芦甘石一两 黄连一钱 黄柏 黄芩各二钱

【用法】 将三黄煎浓汁，将甘石放在银罐内，烧

极红收汁，约九次，以甘石酥为度，晒干研细，加冰片五分。治口碎，点眼甚妙。加珍珠少许，治下疳，可生肌长肉。凡有热毒，配三白头升药，人乳调敷。

【功用】 生肌长肉。

【主治】 口碎，下疳。

03859 白附丹

【方源】《医方类聚》卷八十二引《瑞竹堂方》

【组成】 白附子二两 白及 白蔹 白茯苓 密陀僧（研） 白石脂（研） 定粉各等分（研）

【用法】 上为细末，先用洗面药洗净，临睡用人乳汁，如无用牛乳或鸡子清调，如合就，用乳将药末丸如龙眼大，窨干。逐旋用温浆水磨开敷之。

【主治】 男子妇人，面生黑斑点。

03860 白驳片

【方名】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 紫草 降香 重楼 白药子 白薇 红花 桃仁 生首乌 刺蒺藜各 50 克 海螵蛸 30 克 甘草 35 克 龙胆草 20 克 苍术 20 克

【用法】 上为细末，制片，每片重 1 克。每服 10 片，一日三次。

【功用】 祛风活血。

【主治】 白癜风。

03861 白茅汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 白茅根五钱 瞿麦 白茯苓各三钱半 葵子 人参各一钱一分半 蒲黄 桃胶 滑石 半夏各七钱半 甘草五分 紫贝一个（煅） 石首鱼脑砂二个（煅）

【用法】 分二贴，加生姜三片，灯心二十根，水煎服。或为末，每服二钱，木通煎汤下；如气壅，木通、橘皮煎汤下。

【主治】 产后诸淋，无问冷、热、膏、石、气等淋。

03862 白茅煎

【方源】《医统》卷七十一。

【组成】 白茅根（切）四斤

【用法】 水一斗五升，煮取五升，每服一升，日三次，夜二次。尽剂而愈。

【主治】 热淋痛。

03863 白矾酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 白矾粉 10 克 酒精 90 毫升

【用法】 混合外用。

【主治】 癣。

03864 白矾散

【方源】 方出《肘后方》卷三，名见《圣惠》卷三十六。

【异名】 矾石散（《圣济总录》卷一一九）

【组成】 矾石 桂

【用法】 上为末。绵裹如枣，纳舌下，有唾出之。

【主治】 ①《肘后方》：中风，卒失声，声嘻不出。②《圣惠》：舌强不能语。

【备考】《圣惠》本方用矾石一分（烧灰），桂一分。

03865 白矾散

【方源】 方出《千金》卷六，名见《医部全录》卷一三一。

【组成】 白矾 石硫黄 白附子各六铢

【用法】 上为末。以酢一盏，渍之三日，夜净洗面敷之。

【主治】 ①《千金》：面鼾黯。②《回春》：面上粉刺。

【宜忌】 莫见风日。

03866 白矾散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】 白矾半两 甘草半两（分）（生用） 川大黄一分（生）

【用法】 上为细散。取枣许大，绵裹纳阴中，一日换三次。

【主治】 妇人阴肿坚痛。

【方论选录】《医略六书》：湿伤水府，热遏阴中，故阴肿疼痛，坚实不移焉。大黄荡坚泻热，白矾却湿解毒，生甘草以缓中和药也。绢包纳阴中，使湿热并解，则血气调和而坚实自消，其阴中肿痛无不除矣。

03867 白矾散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】 龙黄散（《医学纲目》卷三十九引汤氏方）、白龙散（《普济方》卷五十三引《经验良方》）。

【组成】 白矾灰半两 龙骨末半两 黄丹半两（微炒） 麝香一分

【用法】 上为细末。先用绵杖子展却耳中脓水，用散半字，分为两处，掺在耳内，一日三次。

【主治】 小儿聤耳，汁出不止。

【宜忌】 勿令风入。

03868 白矾散

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》

【组成】 独茎羊蹄根（锉，捣） 白矾（为末）

【用法】 上药一处以极酸米醋调匀，抓破涂药，觉痒极至痛即止，隔日再搽，不过三次即愈。又治癞风，以芝麻刮热，以药擦之。三四度绝根。

【主治】 遍身生癣，日久不愈，上至头面，及癞风。

03869 白矾散

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】 矾石（烧灰） 龙骨各一分

【用法】 上为细末。敷脐中。取愈为度。

【主治】 小儿脐不干。

03870 白矾散

【方源】《医方类聚》卷二四二引《经验良方》。

【组成】 白矾（枯） 蛇床子各一两 黄连半两

【用法】 上为细末。干掺疮口上；水调涂亦得。

【主治】 风湿搏于血气之月蚀疮，疮生子两耳鼻口间，时愈时发者。

03871 白矾散

【方源】《普济方》卷三六五引《傅氏方》。

【组成】 白矾 硼砂各一钱 朱砂半钱

【用法】 上为末。灯心蘸，点舌上下。

【主治】 鹅口疮。

03872 白矾散

【方源】《奇效良方》卷五十九。

【组成】 白矾（生用） 硫黄（生用） 乳香各等分

【用法】 上为细末。每用手微抓动患处，以药擦之。

【主治】 肺风酒渣鼻。

03873 白矾散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 白矾（煅枯）二钱 硇砂五分

【用法】 上为细末。每用少许，点鼻。

【主治】 鼻痔。

03874 白矾煎

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 白矾三分（烧灰） 黄柏（末）三分 黄连（末）一分 雄黄一分 熊胆一钱 朱砂一分

【用法】 上为细末。以水二大盏，调令匀，纳瓷瓶中，以重汤煮一日，药成待冷，用绵滤过。每以铜箸取少许，点眦头。

【主治】 眼脓漏久不止。

03875 白矾煎

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】 白矾一分（烧为灰） 黄连半两（去须） 青钱十文 防风三分（去芦头） 朴消三分 地黄汁一合 白蜜二分

【用法】 上为细散，用绵裹，纳一青竹筒中，入地黄汁及蜜，以绢油罩盖紧，系筒口。于炊饭内蒸之，候饭熟即泻出。以绵滤过，取少许涂之，一日三四次。

【主治】 小儿缘目及眦烂作疮肿痛。

03876 白虎丸

【方源】《普济方》卷九十三。

【组成】 川乌五两 草乌六两 两头尖 全蝎 细辛 香白芷 川芎 乳香 没药 白术 苍术 五灵脂 天麻 人参 防风 菊花 薄荷各三两 独活 白僵蚕 羌活 石膏 雄黄 藁本 茯苓 青皮 大风子 陈皮 桔梗 荆芥 甘草 官桂 芍药 寒水石各二两 白花蛇 乌梢蛇 自然铜以上各一两

【用法】 上为细末，梨汤水为丸。麝香少许，滑石为衣，每两作十丸。每服一丸，食后细嚼，热酒送下；头风，茶清送下；牙疼，入盐一捻擦之；浑身疼痛，温酒送下，不拘时候。

【主治】 中风身体不遂。

03877 白虎汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 知母六两 石膏一斤（碎） 甘草二两（炙） 粳米六合

【用法】 以水一斗，煮米熟，汤成去滓，温服一升，一日三次。

【功用】 清热生津。

①《阎氏小儿方论》：解暑毒。②《注解伤寒论》：解内外之热。③《麻科活人》：清肺金，泻胃火实热。

【主治】 阳明气分盛热。壮热面赤，烦渴引饮，大汗出，脉洪大有力或滑数。

①《伤寒论》：伤寒，脉浮滑，此以表有热，里有寒；三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁面垢，谵语遗尿，发汗则谵语，下之则额上生汗，手足逆冷，若自汗出者；伤寒，脉滑而厥者，里有热。②《局方》：伤寒大汗出后，表证已解，心中大烦，渴欲饮水，及吐或下后七八日，邪毒不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者；夏月中暑毒，汗出恶寒，身热而渴。③《医学入门》：一切时气，瘟疫杂病，胃热咳嗽、发斑，小儿疮疱隐疹伏热。④《痧证汇要》：温病身热，自汗口干，脉来洪大，霍乱，伤暑发痧。

【宜忌】 ①《伤寒论》：伤寒脉浮，发热无汗，

其表不解者，不可与。②《温病条辨》：脉浮弦而细者，不可与也；脉沉者，不可与也；不渴者，不可与也；汗不出者不可与也。

【方论选录】 ①《伤寒明理论》：白虎，西方金神也，应秋而归肺；夏热秋凉，暑暍之气，得秋而止。秋之令曰处暑，是汤以白虎名之，谓能止热也。知母味苦寒，《内经》曰：热淫所胜，佐以苦甘。又曰：热淫于内，以苦发之。欲彻表寒，必以苦为主，故以知母为君。石膏味甘微寒，热则伤气，寒以胜之，甘以缓之，欲除其热，必以甘寒为助，是以石膏甘寒为臣。甘草味甘平，粳米味甘平，脾欲缓，急食甘以缓之，热气内蕴，消灼津液，则脾气燥，必以甘平之物缓其中，故以甘草、粳米为之使。是太阳中暍，得此汤则顿除之，即热见白虎而尽矣。②《医方考》：石膏大寒，用之以清胃；知母味厚，用之以生津；大寒之性行，恐伤胃气，故用甘草、粳米以养胃。是方也，惟伤寒内有实热者可用之。若血虚身热，证象白虎，误服白虎者死无救，又东垣之所以垂戒矣。③《伤寒来苏集》：石膏大寒，寒能胜热，味甘归脾，质刚而主降，备中土生金之体；色白通肺，质重而含脂，具金能生水之用，故以为君。知母气寒主降，苦以泄肺火，辛以润肺燥，内肥白而外皮毛，肺金之象，生水之源也，故以为臣。甘草皮赤中黄，能土中泻火，为中宫舟楫，寒药得之缓其寒，用此为佐，沉降之性，亦得留连于脾胃之间矣。粳米稼穑作甘，气味温和，禀容平之德，为后天养命之资，得此为佐，阴寒之物，则无伤损脾胃之虑也。煮汤入胃，输脾归肺，水精四布，大烦大渴可除矣。④《医方集解》：烦出于肺，躁出于肾，石膏清肺而泻胃火，知母清肺而泻肾火，甘草和中而泻心脾之火，或泻其子，或泻其母，不专治阳明气分热也。

【临证举例】 ①温热 《岳美中医案集》：汪某某，男，54岁。患感冒发热，入某某医院，在治疗中身热逐步上升，曾屡进西药退热剂，旋退旋起，8天后仍持续发热达38.8℃，口渴，汗出，咽微痛，脉象浮大，舌苔薄黄。此为温热已入阳明，内外虽俱大热，但尚在气分，以白虎汤加味以治，处方：生石膏60克，知母12克，粳米12克，炙甘草9克，鲜茅根30克（后下），鲜芦根30克，连翘12克。水煎，米熟汤成，温服。下午及夜间连进两剂，热势下降，体温38℃，次日原方续进2剂，热即下降到37.4℃，后将石膏量减至45克，二剂后体温已正常。②中暑 《生生堂治验》：某儿，八岁，中暑，身灼热烦渴，四肢懈惰，一医与白虎汤，二旬余日，犹不效，先生曰：某医之治，非不当，然其所不效者，以剂轻故也，即倍前药与之（贴重十钱），须臾发汗如流，至明日善食，不日复故。③三阳合病 《天津医药》（1979；8：357）：某男，70余岁。秋患伤寒证，不治，久而化热，便难溲赤，头常晕，渐加剧，不能起坐，坐则房屋旋转。发热间或恶寒，继则昏瞀，发则口木舌强不能言，手足亦不能动，耳聋，呼之如无所闻，目灼灼直视，约需1小时始复常态，时谵语。曾数就医，均以老年体虚，治当滋补，服药无效，病反日进。其中有认为病有热象，当用清凉者，投之小效。迁延至春不愈，后来我处诊治。脉六部洪滑，舌苔黄厚，口渴引饮。与三阳合病相近，治当用白虎汤。处方：鲜茅根120克，生石膏60克，知母、花粉各15克，粳米9克，甘草6克。服药后病人顿觉清爽，眩晕大减，是日昏瞀仅发二次，但脉之洪滑不减，知其蕴热尚炽，原方加量，先煎茅根，取汤去滓，再入余药，煎取清汤三碗，每小时一碗，日尽一剂。两天后身即不重，耳不聋，转侧自如，昏瞀已不发。又服六七剂，口亦不渴，舌苔渐薄，大便亦通，更进五剂，头晕始去。④热厥证 《中医杂志》（1964；11：22）：史某某，女性，38岁，农民。急诊时病人已陷入昏迷三小时。发热已二日，急性热性病容，体质营养良好，全身多汗，皮肤湿润，体温40.5℃，手足微冷，心跳急速，口腔干燥，白色薄苔，脉滑而有力，腹诊腹壁紧张度良好，无抵抗，压痛。来院后静脉注射25%葡萄糖100毫升，为处白虎汤原方。六小时后病人诉口渴，给饮凉开水少量，次日神志清楚，诉头痛乏力，体温38.5℃，续服前方，病情续有好转，第三日恢复常温，又五日痊愈。

【现代研究】 抗乙脑作用 《中华医学杂志》（1964；7：456）：用本方煎剂于实验性小白鼠流行性乙型脑炎病毒感染的治疗中，与大青叶提取物、竹叶石膏汤、安宫牛黄散等对照组相比较，本方能提高小白鼠存活率，经统计学处理，有显著性差异。

03878 白虎汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 石膏五钱 知母二钱 粳米一勺 甘草七分 人参一钱 五味子十粒 麦门冬（去心） 山栀各一钱

【用法】 上锉一剂。水煎，温服。

【主治】 阳明经汗后脉洪大而渴，或身热有汗不解。

【宜忌】 无汗脉浮，表未解而阴气盛，虽渴不可用白虎汤；里有热者方可用。

【加减】 秋感热之疫疠，或阳明下后，大便不固，热不退者，或湿温证热不退而大便溏者，依本方加苍术；若伤寒汗下后，自汗虚热不退，加苍术、人参。

03879 白果汤

【方源】《证治汇补》卷五。

【组成】 半夏 麻黄 款冬花 桑皮 甘草各三钱 白果二十一个 黄芩 杏仁各一钱五分 苏子二钱 御米壳一钱

【用法】 水煎，分二服。

【主治】 哮喘痰盛。

03880 白金丸

【方源】《医方考》卷五引《本事》。

【异名】 郁金丸（《普济方》卷十八引《海上方》）、郁矾丸（《得效》卷八）、金蝉丸（《普济方》卷一〇〇）、蔚金丸（《医统》卷四十九）、矾郁丸（《金鉴》卷四十一）、金矾丸（《仙拈集》卷二）、截癫丸（《串雅内编》卷一）、定心化痰丸（《外科传薪集》）、白玉化痰丸（《全国中药成药处方集》沈阳方）。

【组成】 白矾三两 郁金七两（须四川蝉腹者为真）

【用法】 上为末，米糊为丸。每服五十丸，水送下。

【功能】 去郁痰。

【主治】 忧郁气结，痰涎上壅，癫痫痰多，口吐涎沫；并治喉风乳蛾。

①《医方考》引《本事》：忧郁日久，痰涎阻塞包络、心窍所致癫狂证。②《普济方》：一切痫病，久不愈。③《外科全生集·新增马氏试验秘方》：喉风乳蛾。

【宜忌】《北京市中药成方选集》：忌辛辣食物。

【方论选录】 白矾咸寒，可以软顽痰，郁金苦辛，可以开结气。

【临证举例】 昔有一妇人，癫狂失心，数年不愈，后遇至人授此方，初服觉心胸有物脱去，神衰洒然，再服顿愈。

【备考】《普济方》引《海上方》本方用法：以薄荷糊为丸，如梧桐子大，每服六十丸。《外科全生集·新增马氏试验秘方》：以白矾、郁金等分和匀，皂角汁为丸。本方改为散剂，名"郁矾散"（见《疾略存真》）。

03881 白金散

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】 白僵蚕（去丝嘴，直好者）半两（汤洗，焙黄，为末） 天竺黄一分（细研） 真牛黄一钱（别研） 麝香（研） 龙脑（研）各半钱

【用法】 上为细末。每服半钱，生姜自然汁调灌，不拘时候。

【主治】 诸痫，渐发不省者。

03882 白金散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】 桂府滑石不拘多少

【用法】 上为细末。先用虎杖、甘草、豌豆各等分，约半两许，水二碗，煎上项药至一碗，去滓，微热，淋洗疮。水冷拭干，上掺滑石末，便睡至明。

【主治】 风攻注毒，遍身及手足生热疮疼痛，有黄水出。

03883 白金散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】 黄柏 猪胆 轻粉 香油

【用法】 黄柏分作手指大小条，慢火炙热，淬猪胆汁中，用二枚，每炙每淬，汁尽为度，研细，入轻粉钱余。香油调敷患处。

【主治】 下疳疮。

03884 白油膏

【方源】《寿世新编》卷中。

【组成】 真桐油三两 防风 白芷各一钱五分

【用法】 放油内泡一夜，入铁器内，慢火熬枯，去药沥净滓，将油再熬，俟欲开时，用鸡蛋一个去壳放油内炸至深黄色，去蛋不用，再将油用火慢熬，俟油色极明，能照见人须眉，入白蜡六分，黄蜡四分溶化，赶紧用竹纸十余张，乘热浸入油内，一张放，一张起，令透火气，须张张隔开，日前吹透，若放一处，虽数日火气难退，贴上毒气内逼，难以收功，视疮大小裁纸贴之，顷刻脓粘满纸，弃去再换，一日数十余次，数日脓尽，肉满生肌，脓尽后不贴亦可生肌。脓多者黄蜡六分，白蜡五分，不得稍为增减。

【主治】 臁疮数十年不愈者。并治秃头疮。

03885 白降丹

【方源】《金鉴》卷六十二。

【异名】 白灵药、夺命丹。

【组成】 朱砂 雄黄各二钱 水银一两 硼砂五钱 火消 食盐 白矾 皂矾各一两五钱

【用法】 先将朱、雄、硼三味研细，入盐、矾、消、皂、水银共研匀，以水银不见星为度。用阳城

罐一个，放微炭火上徐徐起药入罐化尽，微火逼令干，取起。如火大，太干则汞走，如不干则药倒下无用，其难处在此。再用一阳城罐合上，用棉纸裁半寸宽，将罐子泥、草鞋灰、光粉三样研细，以盐滴卤汁调极湿，一层泥一层纸糊合口四五重，及糊有药罐上二三重，地下挖一小潭，用饭碗盛水放潭底，将无药罐放于碗内，以瓦挨潭口四边齐地，恐炭灰落碗内也。有药罐上以生炭火盖之，不可有空处，约三炷香去火，冷定开看约一两外药矣。炼时罐上如有绿烟起，急用笔蘸罐子盐泥固之。此丹疮大者用五六厘，疮小者用一二厘，水调敷疮头上。初起者立刻起疱消散，成脓者即溃，腐者即脱，消肿。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：拔毒消肿，化腐生肌。

【主治】 痈疽发背，一切疔毒。

03886 白降丹

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】 水银 净火消 白矾 皂矾 炒白盐各五钱

【用法】 将上药共研至不见水银星，盛于新大顿银罐内，以微火熔化，火急则水银上升走炉，须用烊炭为妙；熬至罐内无白烟起，再以竹木枝拨之，无药屑拨起为度，则药吸于罐底，谓之结胎；胎成用大木盆一个盛水，水盆内置净铁火盆一个，以木盆内水及铁盆之半腰为度。然后将前就之胎连罐覆于铁盆内之居中，以盐水和黄土封固罐口，勿令出气，出气即走炉；再用净灰铺于铁盆内，灰及罐腰，将火按平，不可摇动药罐，恐伤封口，即要走炉；铺灰毕，取烧红栗炭，攒固罐底，用扇微扇，炼一柱香，谓之文火，再略重扇，炼一柱香，谓之武火；炭随少随添，勿令间断而见罐底；再炼一柱香，即退火；待次日盆灰冷定，用帚扫去盆灰，并将封口土去净开看，铁盆内所有白霜，即谓之丹。将瓷瓶收贮待用，愈陈愈妙。其罐内胎，研掺癣疮神效。若恐胎结不老，罐覆盆内，一遇火炼，胎落铁盆，便无丹降，亦为走炉。法用铁丝作一三脚小架，顶炉内撑住丹胎再为稳要。此丹如遇痈疽、发背、疔毒，一切恶毒，用一厘许，以津唾调点毒顶上，以膏盖之，次日毒根尽拔于毒顶上，顶上结成黑肉一块，三四日即脱落，再用升药数次即收功。此丹用蒸粉糕，以水少润，共和极匀为细条，晒干收竹筒内，名为锭子。凡毒成管，即药量管之深浅，插入锭子，上盖膏药，次日挤脓，如此一二次，其管即化为脓，管尽再上升药数次，即收功矣。此丹比升丹，功速十倍，但性最烈，点毒甚痛，法用生半夏对掺，再加冰片少许，名夏冰对配丹，能令肉麻不痛。

【主治】 痈疽，发背，疔毒，一切恶毒。

【宜忌】《串雅内编》：降丹乃治顽疮恶毒死肌之物，万万不可多用、乱用，务宜慎之。

03887 白降丹

【方源】《许订外科正宗》卷二。

【组成】 水银一两四钱 净火消一两四钱（夏天加三钱） 白矾一两（另研） 朱砂五钱三分（另研） 雄精二钱三分（另研） 硼砂四钱（另研） 皂矾一两七钱 白砒二钱（另研） 食盐三钱

【用法】 上药研至不见水银星为度，盛于阳城罐内，用烊炭微火熔化，火急则水银上升走炉，熬至罐内无白烟起，以竹枝拨之，无药屑拨起，用木杵捶实，则药吸于罐底而结胎，胎成，将空罐合上，用绵纸条润以墨水，置于缝间，盐泥封固烤干，如有裂缝，添盐泥密固之，再用宜兴罐头盛水，上放大黄砂盆，中开一孔，将有药之罐在上，空罐在下，入砂盆孔中，水平罐底，然后盆内铺以净灰，轻轻按平，不可摇动，恐伤封口。铺毕，取烧红栗炭，用扇微扇，文火炼一炷香，再略重扇，武火炼一炷香，炭随少随添，勿令间断而见炉底，再炼一柱香，即退火，俟盆灰冷定，去灰及封口七，开看下罐内所有白霜，即谓之丹，瓷瓶收贮听用。治肿疡脓成不穿，用津唾调少许点毒顶，以膏盖之即穿，或用面糊以竹片拌和为条，切作芝麻大，放膏中对肿头贴之，不可用手指拌，因新降甚烈，恐沾指疼痛起泡；如治溃疡毒根坚硬如石，用以消化；如用作点药，病者怕疼，可用生半夏对掺、再加冰片少许，能令肉麻不痛，名夏冰对配丹；或用蟾酥少许掺入，亦可不痛。用新丹性烈，寻常之症，只用九一丹为妥，如腐肉厚韧，不化不脱，或对掺，或三七，或一九斟酌用之。年久烈性已退，方可专用，然四围好肉，亦须用生肌之药护之。

【主治】 肿疡脓成不穿，溃疡毒根坚硬如石。

【宜忌】 对于肌薄骨露无肉之处，及经脉交会之所，神气之所注，气血之所聚，溃后元气有伤，不能收敛，须藉温补涩敛收功者，此丹不可施。

03888 白药丸

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】 白药 黄药 玄参 射干 甘草 桔梗（去芦头）各半两

【用法】 上为末，炼砂糖为丸，如弹子大。以绵裹一丸，常含咽津。

【主治】 ①《圣惠》：咽喉中生疮肿痛。②《圣济总录》：咳嗽。

03889 白药散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】 白药二两半 生地黄汁三合 生藕汁一合 生姜汁少许

【用法】 上四味，捣白药为末。先煎三物汁令沸，每以半盏，入熟水一合，白药末二钱匕，搅匀，食后温饮之。

【主治】 衄血，汗血。

03890 白带丸

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】 乌梅炭二两 棕灰二两 椿根皮二两 五味炭一两 熟地炭三两 杜仲二两 山药二两 白芍二两 生耆三两 党参三两 当归二两 菟丝子二两 煅龙骨二两 桑螵蛸二两 五倍子二两（去毛） 煅明矾三两 牡蛎粉二两 金樱子二两（去毛） 川断一两 料豆三两 乌贼骨二两 莲须二两 赤石脂八钱 禹余粮二两（煅）

【用法】 上为末，以芡实粉四两打糊为丸。每服三钱，淡盐汤送下。

【主治】 妇人赤白带。

03891 白带丸

【方源】《中国药典》。

【组成】 黄柏（酒炒）150克 椿皮300克 白芍100克 当归100克 香附（醋制）50克

【用法】 以上五味，除椿皮外，其余黄柏等四味，粉碎为细末，过筛，混匀。椿皮加水蒸煮二次，合并蒸液，滤过，滤液浓缩至适量（酌留部分包衣），与适量的水泛丸，用浓缩液包衣，干燥，打光即得。每服6克，一日二次。

【功用】 清湿热，止带下。

【主治】 湿热下注，赤白带下。

03892 白带丹

【方源】《准绳·女科》卷一。

【组成】 苍术三钱 萸肉（去核） 白芍药各二钱半 黄芩（炒） 白芷各二钱 樗根皮（炒） 黄连（炒） 黄柏（炒）各一钱半

【用法】 上为末，面糊为丸。每服五十丸，空心温酒送下。

【主治】 妊娠白带。

03893 白垩丸

【方源】《济生》卷六。

【组成】 白垩（火煅） 禹余粮（煅，醋淬七次） 鳖甲（醋炙） 乌贼骨（醋炙） 当归（去芦，酒浸） 鹊巢灰 干姜（炮） 紫石英（火煅，醋炙七次） 附子（炮，去皮脐） 金毛狗脊（燎去毛） 川芎各一两 艾叶灰半两 鹿茸（燎去毛，切片，醋炙） 一两

【用法】 上为细末，醋煮米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心温酒、米饮任下。

【主治】 妇人白带，久而不止，面色黯黯，绕脐疼痛，腰膝冷痛，日渐虚困。产后白带。

【备考】《普济方》引本方有香附子（醋煮）二两。

03894 白前汤

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】 白前二两 紫菀 半夏（洗）各三两 大戟（切）七合

【用法】 上切。以水一斗，渍之一宿，明旦煮取三升，分三服。

【主治】 久咳逆上气，身体浮肿，短气胀满，昼夜倚壁不得卧，喉常作水鸡鸣。

【宜忌】 忌羊肉、饧。

【方论选录】《千金方衍义》：咳逆上气而见肢体浮肿，作水鸡声，乃水饮溢子肺胃，流入百骸。故用白前以疏肺气，紫菀以散血气，半夏以涤痰气，大戟以利水气，皆从《金匮》泽漆汤中采出。大戟之利水与泽漆不殊。

03895 白前汤

【方源】《外台》卷二十引《深师方》。

【异名】 大白前汤（《圣济总录》卷八十）。

【组成】 白前三两 紫菀四两 半夏一升 生泽漆根一升（切，凡四味，水一斗七升，煮取一斗汁，纳人后药） 桂心三两 人参六分 大枣二十个（擘） 白术五两 生姜八两 茯苓四两 吴茱萸五两 杏仁三两（去两仁皮尖，碎） 葶苈二两 栝楼五合

【用法】 上药纳前汁中，煮取三升，分四服。当得微下，利小便，气即下肿减。

【主治】 水咳逆上气，通身洪肿，短气胀满，昼夜倚壁不得卧，喉中水鸡鸣，大小便不通，不下食而不甚渴。

【宜忌】 忌羊肉、饧、生葱、桃、李、雀肉、酢物。

03896 白前汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】 白前 木通（锉）各二两 防己 麻黄（去根节）各一两半 白茯苓（去黑皮） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙紫色） 桑根白皮（锉、炒）各三

两 紫菀头五十枚

【用法】 上锉细。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，食后良久温服，一日三次。胸中有脓者，当得吐出。

【主治】 肺痿咳嗽日久，喘急，仰卧不安。

03897 白前汤

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】 白前 昆布（洗去咸，炙干） 厚朴（去粗皮、生姜汁炙） 陈橘皮（汤浸，去白，切，炒） 附子（炮裂，去皮脐） 海藻（洗去咸，炙干） 半夏（汤洗七遍） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 甘草（炙，锉）各一两 小麦（醋浸，晒干）三合

【用法】 上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（拍碎），煎至八分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】 气瘿初作。

03898 白前汤

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】 白前 细辛（去苗） 川芎 五味子各一两 麻黄（去根节） 芍药 桂（取心）各半两

【用法】 上为散。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 肾咳，咳则腰背相引痛，恶风，脉浮。

03899 白姜散

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】 白姜 木香 官桂 陈皮 槟榔 甘草各等分

【用法】 水煎，量儿大小，以绵蘸灌之。

【主治】 婴儿胎寒，生后身冷，口气亦冷，肠鸣，泻利青黑，盘肠内钓，心腹绞痛不乳者。

【加减】 呕吐，加木瓜、丁香；面青肢冷，去槟榔，加川芎、当归。

03900 白霜丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 海藻 僵蚕各等分

【用法】 上为末。取白梅肉汤泡，捣为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，临卧米饮送下，一日五六次。毒当从大便泄去。

【主治】 蛇盘疬，生于头项上交接处。

【宜忌】 忌豆、心、鸡、羊、酒、面。

03901 白莲散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 花碱二钱 桑柴灰（炒）一钱 风化石灰半钱 糯米三钱

【用法】 上药一处，盛在小瓷罐儿内，上用瓦盖口，用黄泥固济，以文武火焙定半时，取出药，用乳钵研为极细末。每用先用针尖拨过黑子，用药少许于贴。

【功用】《普济方》：去黑子诸般瘤瘢。

【主治】 瘢黑或彰青。

【宜忌】 忌油腻物及当风行立。

03902 白胶汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 嫩白及四钱（研末） 陈阿胶二钱

【用法】 冲汤调服。

【主治】 肺叶痿败，喘咳夹红者。

03903 白胶散

【方源】《普济方》卷一八八引《澹寮》。

【组成】 地黄汁一升二合 白胶香二两

【用法】 上以瓷器盛，入甑蒸，候胶消服。

【主治】 吐血。

03904 白酒煎

【方源】《原病式》卷下。

【组成】 绿矾四两 五倍子 百草霜一两 木香二钱

【用法】 上为细末，用酒煎飞面为丸，如梧桐子大。每服五丸，空心酒送下，一日二三次。

【主治】 黄肿。

03905 白通汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 葱白四茎 干姜一两 附子一枚（生，去皮，破八片）

【用法】 以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。

【功用】 ①《注解伤寒论》：温里散寒。②《成方切用》：复阳通脉。

【主治】 少阴病，下利脉微者。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：少阴主水，少阴客寒，不能制水，故自利也。白通汤，温里散寒。内经曰：肾苦燥，急食辛以润之，葱白之辛，以通阳气，姜、附之辛，以散阴寒。②《医方考》：少阴属肾，水脏也，得天地闭藏之令，主禁固二便，寒邪居之，则病而失体矣，故下利。葱白，所以通阳气也；姜、附，所以散阴寒也。是方也，能散阴而通阳，故即葱白而名曰白通。③《金鉴》：少阴病，但欲寐，脉微细，已属阳为阴困矣。更加以下利，恐阴降极，阳下脱也。故君以葱白大通其阳而上升，佐以姜、附急胜其阴而缓降，则未脱之阳可复矣。

【临证举例】 寒厥 《哈尔滨中医》（1960；2：22）：赵某，男，30岁。患者于1951年在成都读书时，突感双脚冰冷，至1955年更见厉害，冬天不能离火，热天也一点不能沾凉风，既往有遗精史，从1949年起常患腹泻便溏，至今仍时发时止。西医诊断为雷诺氏病，经治年余未效。于1956年11月6日来我院医治，院内医师诊断为严重的寒厥证。给服白通汤，并加重其剂量，共服13剂基本改善，后又继服14剂，病即痊愈。

03906 白梅丸

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】 白僵蚕不拘多少（直者，炒令黄色）

【用法】 上为末，用陈白梅肉捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，熟水送下，空心、午后各一次。

【主治】 风毒、气毒瘰疬。

03907 白梅丸

【方源】《普济方》卷三十六。

【组成】 生硫黄 白梅

【用法】 共研成膏，为丸如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下。

【主治】 反胃。

03908 白黄散

【方源】《医统》卷六十二引《易简》。

【组成】 白矾 雄黄 细辛 瓜蒂各一钱

【用法】 上为细末。以雄大胆汁为剂，如枣核。塞鼻中。

【主治】 鼻齄，瘜肉，鼻痔。

03909 白黄散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 白矾15克 甘草1.5克 大黄31克

【用法】 上为细末。外用。

【主治】 女阴溃疡。

03910 白雪丸

【方源】《苏沈良方》卷五。

【组成】 天南星（炮） 乌头（炮，去皮） 白附子（生） 半夏（洗）各一两 滑石（研） 石膏 龙脑 麝香（研）各一分

【用法】 上为末，稀面糊为丸，如绿豆大。每服三十丸，姜腊茶或薄荷茶送下。

【主治】 痰壅胸膈，嘈逆及头目昏眩困倦，头目胀痛。

【宜忌】 食后服为佳。

【临证举例】 头目昏眩 予每遇头目昏困，精神懵冒，胸中痰逆，懊憹如中酒，则服此药，良久间如拿一重裘，豁然清爽，顿觉夷畅。

【备考】《御药院方》无乌头。

03911 白雪糕

【方源】《古今医鉴》卷四引单孟齐方。

【组成】 大米一升 糯米一升 山药四两 芡实四两 莲肉（去皮心）四两

【用法】 上为细末，加白沙糖一斤半，搅和令匀，入笼蒸糕。任意食之。

【功用】 ①《古今医鉴》引单孟齐方：调脾健胃，固本还元。②《证治汇补》：养元气，生肌肉，润皮肤，益血秘精，安神定智，壮筋力，养精神，进饮食。

【主治】 ①《古今医鉴》引单孟齐方：内伤。②《回春》：虚劳泄泻。

【备考】 方中糯米，《回春》作“粳米”。《证治汇补》作“白茯苓”。

03912 白眼药

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 月石一两 荸荠粉三钱 梅片五分 麝香五厘

【用法】 上药先以净月石为极细末，以荸粉飞净，再研，以后梅片、麝香和入。

【主治】 一切老眼糊涂，迎风流泪，外内翳障。

03913 白绿丹

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】 人中白一钱（煅） 铜绿三分 麝香一分 蚯蚓二条（葱白汁浸，火炙，为末）

【用法】 上药各为细末。敷之。

【主治】 走马牙疳。

03914 白斑散

【方源】《古今名方》。

【组成】 细辛6克 白芷 雄黄各3克

【用法】 上为细末。用醋调匀，外搽。

【功用】 祛风。

【主治】 白癜风。

03915 白散子

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】 牡蛎三两（煅，研） 寒水石一两半（煅，研） 天南星（炮） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 龙骨各一分

【用法】 上为细末。掺疮上。

【功用】 止疼痛，生肌肉，灭瘢痕。

【主治】 破伤风。

【宜忌】 避风将息，勿令着水。

03916 白葱散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 川芎 当归 生地 白芍 枳壳 厚朴 莪术 三棱 茯苓 官桂 干姜 人参 川楝肉 神曲 麦芽 青皮 茴香 木香各等分

【用法】 加葱白、食盐，水煎服。

【主治】 一切冷气入膀胱，疝痛；胎前产后腹痛，胎动不安，或血刺痛，兼血脏宿冷，百节倦痛，肌体怯弱，劳伤带癖。

【加减】 如大便利，用诃子；大便闭，去盐，加大黄。

03917 白蔹丸

【方源】 方出《圣惠》卷七十三，名见《济生》卷六。

【组成】 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙令黄） 白蔹三分 狗脊半两（去毛）

【用法】 上为末，以醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】 ①《圣惠》：妇人漏下白色不绝。②《济生》：室女冲任虚寒，带下纯白。

【方论选录】 《医略六书》：鹿茸扶阳御寒，以壮督脉；狗脊补肾填精，以益肾元；白蔹专祛久遏之湿热，以清经脉也；醋煮艾汁丸之，温酒下，使湿热顿化，则寒郁自解，而督肾内充，带脉无不完复，何白带之淫溢不已哉！

【备考】 《济生》本方用法：用艾煎醋汁，打糯米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空温酒送下。

03918 白蔹散

【方源】 方出《圣惠》卷三十六，名见《圣济总录》卷一一五。

【组成】 白蔹 黄连（去须） 龙骨 乌贼鱼骨 赤石脂各一分

【用法】 上为细散。每用一钱，绵裹塞耳中。

【主治】 聤耳，出脓血不止。

03919 白蔹散

【方源】 《圣惠》卷九十一。

【异名】 白蔹汤（《普济方》卷四〇七）。

【组成】 白蔹（末）三分 白及（末）半两 生油麻二合（生捣）

【用法】 上为末。更用蒸萝卜一个，烂研一处，以酒调似稀膏。先以童便洗，后便涂之。

【主治】 ①《圣惠》小儿冻手，皲裂成疮。②《普济方》：冻疮，偏发耳上及手足，令焮肿生疮。

03920 白蔹膏

【方源】 《圣济总录》卷一〇一。

【组成】 白蔹 白石脂 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，研）各半两

【用法】 上为末，更研极细，以鸡子白调和，稀稠得所，瓷盒盛。每临卧涂面上，明旦以井花水洗之。

【主治】 面粉渣。

03921 白蔹膏

【方源】 《赵炳南临床经验集》。

【组成】 白蔹面二两 祛湿药膏（或凡士林）八两

【用法】 调匀成膏。外敷患处。

【功用】 收敛除湿，解毒止痒。

【主治】 一切渗出性皮肤病。

03922 白蔹薄

【方源】 《鬼遗》卷四。

【组成】 白蔹 大黄 黄芩各等分

【用法】 上药治下筛，和鸡子白。涂布上，薄痈上，干燥辄易之。亦可以三指撮药末，置三升水中煮三沸，绵注汁，拭肿上数十过，以寒水石末涂肿上，纸覆之，燥，复易，一易，辄以煮汁拭之，昼夜二十易之。

【主治】 痈疽。

03923 白鲜汤

【方源】 《嵩崖尊生》卷六。

【组成】 白鲜皮 麦冬 茯苓 杏仁 细辛 白芷各七分 桑白皮 石膏各一钱

【用法】 用黑豆水煎服。

【主治】 鼻干痛。

03924 白膏药

【方源】 《普济方》卷二八四。

【组成】 蓖麻子（去皮，研为泥）

【用法】 旋摊膏药贴之。

【功用】 消肿散毒。

【主治】 痈疽，恶疮，发背，附骨痈。

03925 白蜜膏

【方源】 《鸡峰》卷十一。

【组成】 紫苏子三两 生姜汁一合 白蜜一中盏 鹿角胶 杏仁各三两 生地黄汁一盏

【用法】 上药捣熟，入生姜、地黄、蜜相和，以慢火熬成膏，于不津器中密收之。每服半匙，以温粥饮调下，一日三次。

【主治】 久新咳嗽上气，心胸烦热，唾脓血。

03926 白敷药

【方源】 《疡医大全》卷八引吴近宸方。

【组成】 陈小粉 白蔹 生半夏 白芷 生南星 白及 五倍子 三奈 人中白各三两

【用法】 上为细末，瓷瓶密贮。火痰用黄蜜调；流痰、湿痰用鸡蛋清调；瘰疬、腮痈、腋痈、喉痰用米醋调；唯乳证用活鲫鱼一尾，捣烂去骨，和药末捣敷。

【主治】 一切流痰、湿痰、寒痰、喉痰、腮痈、腋痈、妇人乳痈、乳疽、乳吹、瘰疬。

03927 白薇丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【异名】 小白薇丸(《局方》卷九)。

【组成】 白薇一两 车前子半两 当归半两（锉碎，微炒） 芎藭半两 蛇床子半两 藁本三分 卷柏三分 白芷三分 覆盆子三分 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 麦门冬二两半（去心，焙） 人参三分（去芦头） 桂心三分 菖蒲三分 细辛半两 干姜半两（炮裂，锉） 熟干地黄一两 川椒一两（去目及闭口者，微炒出汗） 白茯苓三分 远志二分（去心） 白龙骨一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【功用】 ①《局方》：壮筋骨，益血气，暖下脏，防风冷，令人有子。②《济阴纲目》：补气行血。

【主治】 ①《圣惠》：妇人无子或断绪，上热下冷。②《局方》：妇人冲任虚损，子脏受寒，多无子息，断续不产，或月水崩下，带漏五色，腰腹疼重，面黄肌瘦，月水不匀，饮食减少，夜多盗汗，面生黯黯，齿摇发落，脚膝疼重，举动少力。

03928 白薇丸

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】 白薇（拣）一两 赤芍药 乌贼鱼骨（去甲）各半两

【用法】 上为末，炼醋一盏熬成膏，为丸如梧桐子大。每服二十丸，食前以熟水送下，一日二次。

【主治】 妇人白带不止。

03929 白薇丸

【方源】《妇人良方》卷一。

【组成】 白薇 柏子仁 白芍药 当归 桂心 附子 萆薢 白术 吴茱萸 本香 细辛 川芎 槟榔各半两 熟地黄二两 牡丹皮一两 紫石英一两 人参三分 石斛 白茯苓 泽兰叶 川牛膝各三分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，晚食前空心温酒送下。

【主治】 妇人月水不利，四肢羸瘦，吃食减少，渐觉虚乏，无子。

03930 白薇汤

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】 白薇 当归各一两 人参半两 甘草（炙） 一分

【用法】 上为散。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 ①《全生指迷方》：郁冒血厥，居常无苦，忽然如死，身不动，默默不知人，目闭不能开，口噤不能语，又或似有知而恶闻人声，或但如眩冒，移时乃寤。②《医学入门》：产后胃弱不食，脉微多汗。

【方论选录】《本事方释义》：白薇气味苦咸微寒，入足阳明；当归气味辛甘微温，入手少阴、足厥阴；人参气味甘温，入足阳明；甘草气味甘平，入足太阴，通行十二经络。以咸苦微寒及辛甘微温之药和其阴阳，以甘温甘平之药扶其正气，则病自然愈也。

03931 白薇汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 白薇二钱 麦冬三钱 款冬花 桔梗各三分 百部二分 贝母五分 生地三钱 甘草三分

【用法】 水煎汤，漱口服，日服一剂。服十日虫死。后用漱喉汤三十剂。

【主治】 喉癣。喉咙必先作痒，面红耳热不可忍，其后咽唾之时，时觉干燥，必再加咽唾而后快，久而作痛，变为杨梅红瘰，或痛或痒。

03932 白薇散

【方源】《鬼遗》卷二。

【组成】 白薇 瓜蒌 枳实（炒） 辛荑（去毛） 甘草（炙） 石膏各一两 厚朴二分（炙） 酸枣二分（炙）

【用法】 上为末。每服方寸匕，调温酒下，日三次，夜一次。

【主治】 金疮烦满疼痛，不得眠睡。

03933 白马茎丸

【方源】《千金》卷二十。

【组成】 白马茎 赤石脂 石韦 天雄 远志 山茱萸 菖蒲 蛇床子 薯蓣 杜仲 肉苁蓉 柏子仁 石斛 续断 牛膝 栝楼根 细辛 防风各八分

【用法】 上为末，白蜜为丸，如梧桐子大。每服四丸，酒送下，一日二次。七日知，加至二十丸，一月百病愈。

【主治】 空房独怒，见敌不兴，口干汗出，失精，囊下湿痒，尿有余沥，卵偏大引疼，膝冷胫酸，目中眩眩，少腹急，腰脊强。

03934 白凤饮子

【方源】《疫喉浅论·新补会厌论》。

【组成】乌嘴白雄鸭（取头颈骨连喉管，以及嗓嗉，均莫刺破，不落水） 玄参四钱 生地五钱 蜗牛二个 地龙二条 古文钱四枚 白盐梅三个 枇杷叶三钱（绢包）

【用法】春，加蚕食过桑叶（孔多者）三钱；夏，加荷花蒂（连须）七个；秋，加荸荠苗梢九枝（各寸许）；冬，加青果汁一小酒杯（冲服），或青果五枚（去两头尖，捣烂入煎）亦可。上药共和一处，用新取急流河水三大碗，扬三百六十五遍，炊以芦薪，煎至八分，去油。临饮时，每一钟加柿霜一钱，和匀，缓缓饮之。

【主治】疫喉白腐，会厌腐溃，口出臭气。

03935 白玉神膏

【方源】《寿世新编》卷中。

【组成】芦甘石四两（先以黄芩、黄连、黄柏，用童便煮汁候冷，方将甘石倾银罐内煅红，淬入童便汁内许久，再研细，水飞） 龙骨一两五钱（煅透，水飞） 真乳香一两五钱 真没药一两五钱 轻粉一两 血竭一两五钱 赤石脂一两五钱 生甘末一两二钱 正川连一两五钱 枯矾一两 银朱二两 大梅片八钱

【用法】上药各为极细末，过绢筛听用。先以猪板油四斤去膜，干净铁锅熬化，细布滤净滓，仍熬滚，方加黄、白蜡各四两，再熬化，离火，再将各药末放入油内，搅至极匀。十日后用棉纸摊贴患处。

【功用】去毒生肌。

【主治】手足溃烂，并久疮不收口及下疳。

03936 白石英丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【异名】阳起石丸（《圣济总录》卷一八七）。

【组成】白石英二两（细研，水飞过） 磁石二两（烧，醋淬七遍，捣碎细研，水飞过） 阳起石三两（细研，水飞过） 熟干地黄三两 石斛二两（去根，锉） 五味子一两 肉苁蓉二两（酒浸一宿，去皱皮，炙干） 石南一两 菟丝子一两（酒浸三宿，晒干，别捣为末） 五加皮一两 胡麻一两 巴戟一两 桂心一两 人参一两（去芦头） 蛇床子半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹及晚食前以温酒送下。

【功用】助阳气，补不足。

【主治】虚损乏力。

03937 白石英汤

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】白石英 人参 藿香叶 白术 芎藭 紫石英各一分 甘草一钱半 细辛（去苗叶）一钱 石斛（去根） 菖蒲 续断各一分

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎取七分，去滓，空心温服。

【主治】心气虚，精神不足，健忘，阴痿不起，懒语多惊，稍思虑即小便白浊。

03938 白石英汤

【方源】《济生》卷二。

【组成】白石英 细辛（洗去土） 五味子 陈皮（去白） 钟乳粉 阿胶（锉，蛤粉炒） 桂心（不见火） 人参 甘草（炙）各半两 紫菀（洗）一两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺气虚弱，恶寒咳嗽，鼻流清涕。喘息气微。

03939 白石英散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】白石英一两（细研如粉） 钟乳粉一两 款冬花二两 桂心一两 天门冬一两（去心） 桑根白皮一两（锉） 紫菀一两（洗去苗土） 人参一两半（去芦头） 五味子二两 白茯苓一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，糯米五十粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺气不足，烦满喘嗽，气逆上冲，唾血；或自惊恐，皮毛自起；或呕逆歌哭，心烦不定，耳中虚鸣如风雨，面色常白。

03940 白石英散

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】白石英（研） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 泽泻 韭子（炒）各一两 白粳米（淘）五合

【用法】上为散。每服二钱匕，食前米饮调下，一日三次。

【主治】小便白淫。

03941 白石脂丸

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】白石脂 芎藭 大蓟 伏龙肝各六两 熟干地黄十二两（焙） 阿胶（炒令燥）三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，空心、晚食前各一次。

【主治】妇人经血五色杂下，或独赤独白，日久

不止。

03942 白龙骨丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】白龙骨一两 韭子（炒）半两 补骨脂（炒） 肉苁蓉（酒浸，切、焙）各一两 菟丝子（酒浸，别捣）半两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前温酒送下。

【主治】虚劳，元气虚弱，精滑不禁，腰脊疼痛。

03943 白龙骨丸

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】白龙骨 牡蛎（大白者，火煅赤）各等分

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十五至二十丸，赤茯苓汤送下。

【主治】小便白浊。

03944 白瓜子丸

【方源】《千金》卷六。

【组成】白瓜子二两 藁本 远志 杜蘅各一两 天门冬三两 白芷 当归 车前子 云母粉各一两 柏子仁 细辛 橘皮 栝蒌仁 铅丹 白石脂各半两

【用法】上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。空腹服二十丸，一日三次。

【功用】令色白。

【主治】面黯黧。

【方论选录】《千金方衍义》：铅丹除热下气，而镇摄阴邪从大便出；云母粉治身皮死肌；白石脂敛固肺气，肺气固则色白也；白瓜子即冬瓜仁，令人悦泽颜色；杜蘅、藁本、细辛、白芷、天冬、栝楼佐之，以祛在经风气之滞，乃内服正治法也。

03945 白头翁丸

【方源】方出《外台》卷二十三引《必效方》，名见《圣济总录》卷一二五。

【组成】白头翁半两 昆布十分 海藻七分 通草七分 玄参 连翘（微炒）各八分 白蔹六分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，若冷，用酒送下。

【主治】气瘤。

【宜忌】忌蒜、面、生葱、猪、鱼。

03946 白头翁汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】白头翁二两 黄柏三两 黄连三两 秦皮二两

【用法】以水七升，煮取二升，去滓，温服一升，不愈更服一升。

【功用】①《注解伤寒论》：散热厚肠。②《中医方剂学》：清热解毒，凉血止痢。

【主治】热痢。痢疾腹痛，里急后重，肛门灼热，便下脓血，赤多白少，渴欲饮水，及噤口痢。现用于细菌性痢疾，阿米巴痢疾，阿米巴性肝脓肿。

①《伤寒论》：热利下重，欲饮水者。②《金鉴》：厥阴下利，属于热者，下重，便脓血。③《伤寒今释》引《类聚方广义》：眼目郁热，赤肿阵痛，风泪不止。④《温病条辨》：噤口痢，热气上冲，肠中逆阻似闭，腹痛在下尤甚。⑤《中西医结合治疗急腹症》：阿米巴性肝脓肿。

【宜忌】《千金翼》：忌猪肉、冷水。

【方论选录】①《伤寒来苏集》：四味皆苦寒除湿胜热之品也。白头翁临风偏静，长于驱风，盖脏腑之火，静则治，动则病，动则生风，风生热也。故取其静以镇之，秦皮木小而高，得清阳之气，佐白头翁以升阳，协连、柏而清火，此热利下重之宜剂。②《医方集解》：此足阳明、少阴、厥阴药也。白头翁苦寒，能入阳明血分而凉血止滞；秦皮苦寒性涩，能凉肝益肾而固下焦；黄连凉心清肝；黄柏泻火补水，并能燥湿止利而厚肠，取其寒能胜热，苦能坚肾，涩能断下也。③《金鉴》：厥阴下利，属于寒者，厥而不渴，下利清谷；属于热者，消渴下利，下利便脓血也。此热利下重，乃火郁湿蒸，秽气奔逼广肠，魄门重滞而难出，即《内经》所云：暴注下迫者是也。君白头翁，寒而苦辛；臣秦皮，寒而苦涩，寒能胜热，苦能燥湿，辛以散火之郁，涩以收下重之利也；佐黄连清上焦之火，则渴可止；使黄柏泻下焦之热，则利自除也。

【临证举例】①急性菌痢 《新中医药》（1957；9:7）：用白头翁汤治疗急性菌痢40例，痊愈37例，占92.5%，平均退热天数为1.5天，大便次数恢复正常为5.5天，大便性状恢复正常为5.8天，大便细菌培养转阴为4.3天。治疗过程中未发现任何副作用。②阿米巴痢疾 《千家妙方》：用本方煎服，每日一剂，治疗14例阿米巴痢疾，10例完全治愈（症状完全消失，连查大便2～3次，未再发现阿米巴滋养体或包囊）；4例好转（症状减轻，查大便阿米巴滋养体或包囊仍为阳性）。③急性结膜炎 《新中医》（1973；4:23）：陈某，男，11岁。眼睑肿胀，目睛赤痛，眵泪多。西医诊为急性结膜炎。曾用中西药治疗未效，病已10多天，

眼睑高度红肿，形如荔枝，球结膜极度充血，视物模糊，大便不畅，小便短赤，舌赤红，苔黄，脉弦数。证属肝肺之火俱盛，予白头翁30克，黄连5克，黄柏6克，秦皮10克以泻火解毒，服三剂，肿痛随即消除而愈。

【现代研究】 抗菌作用 《四川中医》(1986；8：4)：用打孔法进行抗菌试验，本方中的各药白头翁、黄连、黄柏、秦皮均有抗菌作用。其中以黄连、秦皮抗菌作用最强，黄柏次之，白头翁最弱。方中如增大黄连用量，抑菌效力明显增大。白头翁对溶组织阿米巴原虫有抑制作用，因而认为治疗阿米巴痢疾应加大白头翁的用量，才能收到较好的疗效。

【备考】《伤寒今释》引《类聚方广义》本方用法：治目赤肿痛，为洗蒸剂亦效。

03947 白头翁汤

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】 白头翁二两 黄连 柏皮 榕皮各三两

【用法】 上锉为散。每服四大钱，水一盏，煎七分，去滓服。

【主治】 热痢滞下，下血连月不愈。

03948 白头翁酒

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 白头翁156克 白酒1升

【用法】 将白头翁根洗净，剪成寸段，放入盛白酒坛内，用厚布密封坛口，隔水放入锅内煮数沸，捞出白头翁根渣，将药酒装瓶收贮。每服一二钟，一日两次，历一二月。

【功用】《千家妙方》：解毒散结，排脓敛疮。

【主治】 淋巴腺结核。

【临证举例】 淋巴结结核《千家妙方》：郭某某，男，22岁，未婚，美术工作者。患者自幼体弱，16岁时左侧颈部发现瘰核，经外科手术切除已愈。19岁时，右侧颈部又发现瘰核，自溃后逐渐愈合。隔两年，整个颈部又发，时好时犯，残遗疤痕五处。今年初，右耳下颈部锁骨中央偏上见核桃大肿胀一处，市某医院诊断为淋巴结结核，注射链霉素，内服雷米封，仍未消散，破溃后时流清稀脓液，同时右腋窝里亦有瘰核溃破，并沿连上臂内侧面二寸许，形成皮下瘘管，脓液时流时蓄，经外科开刀引流又转皮肤科会诊，诊断"皮肤腺病"，配合理疗，经治二月余，未能收口。全身倦怠无力，午后有微热，食纳尚可，二便正常，困倦喜睡。缺盆疮面为长方径寸，边缘整齐，无红肿，腐肉灰白色，有稀薄豆渣样脓汁，邻近有豆粒大之疙瘩二个，酸胀不痛。腋窝及上臂处疮面宽约一寸，长二寸，粉紫色肉芽组织凹凸不平，脓液浸润，有特腥气，舌苔薄白，脉沉而无力。属瘰疬重症，服白头翁酒百日，全部疮面结疤痊愈。

03949 白头翁散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】 白头翁半两 黄连二两半（去须，微炒） 酸石榴皮一两（微炙，锉）

【用法】 上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不拘时候服。

【主治】 小儿热毒下痢如鱼脑。

03950 白头翁煎

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】 白头翁二两 牛膝三分（去苗） 附子三分（炮裂，去皮脐） 桂心三分 羌活三分 赤芍药三分 赤茯苓半两 人参半两（去芦头） 防风三分（去芦头） 虎胫骨一两（涂酥，炙微黄） 牡丹半两 当归二分 酥生姜汁

【用法】 上为细散，用好酒五升，都煎如饧。每服一茶匙，以温酒调下，不拘时候。服药后仍须炒蚕砂熨之为妙。

【主治】 四肢疼痛，至夜转甚不可忍者。

03951 白芍药散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】 白芍药一两 牡蛎一两（烧为粉） 熟干地黄一两半 白芷三分 干姜三分（炮裂，锉） 桂心一两 乌贼鱼骨一两（炙黄） 黄耆三分（锉） 五色 龙骨一两半

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 妇人漏下五色不止，淋沥连年，黄瘦萎悴。

03952 白朱砂散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 朱砂 雄黄 象皮（煅） 硼砂各一钱 蟾酥五分 白朱砂（煅）二钱

【用法】 上为细末。用真生桐油调搽患处，以火烘之，痒止为度。遍身顽癣如癞者，烧猪粪熏之烘之；鹅掌风，烧鸽粪熏之烘之。

【主治】 顽癣，鹅掌风。

03953 白华玉丹

【方源】《不居集》（上集）卷十九。

【组成】 钟乳粉一两（炼） 白石脂五钱（煅红，水飞） 阳起石五钱（煅，酒淬，干） 牡蛎七钱（韭汁盐泥固济，火烧，取白）

【用法】 上为极细末，和作一处，研一二日，以糯米粉煮粥为丸，如芡实大，入地坑出火毒一宿。每服一丸，空心人参汤送下。

【功用】 清上实下，助养本元。

【主治】 遗精，白浊。

03954 白羊心汤

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】 白羊心一枚（细切，以水六中盏，煎取三盏，去心） 熟干地黄三分 防风（去芦头） 牡蛎（捣碎，炒令微黄） 人参（去芦头） 远志（去心） 独活 白芍药 黄芪（锉） 茯苓 甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】 上为散。每服三钱，以羊心汁一中盏，煎至六分，去滓温服，一日三次，不拘时候。

【主治】 产后内虚，风邪所攻，心神惊悸，志意不定。

03955 白羊肾羹

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】 白羊肾一对（去脂膜，切）肉苁蓉（酒浸，细切）一两

【用法】 上药相和，加葱白、盐、酱、椒，如常法，煮作羹。空腹食。

【主治】 久积虚损，阳道虚弱，腰脚无力。

03956 白羊肾羹

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】 白羊肾二具（切作片） 肉苁蓉一两（酒浸，切） 羊脂四两（切作片） 胡椒二钱 陈皮一钱（去白） 荜茇二钱 草果二钱

【用法】 上药相和，加葱白、盐、酱煮作汤，入面棋子，如常作羹食之。

【主治】 虚劳，阳道衰败，腰膝无力。

03957 白杨皮散

【方源】 方出《肘后方》卷六，名见《千金》卷六。

【组成】 白瓜子仁五分 白杨皮二分 桃花四分

【用法】 上为末。食后服方寸匕，一日三次。三十日面白，五十日手足俱白。

【功用】 令皮肤白。

【主治】《千金》面与手足黑。

【加减】 欲白，加瓜子；欲赤，加桃花。

03958 白花蛇丸

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】 白花蛇一两（酒浸，炙微黄，去皮骨） 干蝎一两（微炒） 仙灵脾一两 茵芋半两 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 天南星半两（炮裂） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 天麻一两 桂心一两 麻黄一两（去根节） 鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥） 草薢一两（锉） 桑螵蛸半两（微炒） 雄黄一分（细研） 麝香一分（研）

【用法】 上为散，都研令匀，用天麻二两，捣罗为末，以无灰酒一大盏，慢火熬成膏，用和药末，更捣为丸，如梧桐子大。每服二十丸，用薄荷酒送下，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：风湿痹，皮肤不仁，肢节疼痛。②《圣济总录》：风不仁，皮肤痹厚，搔之如隔衣；寒湿着痹。

03959 白花蛇丸

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】 白花蛇（酒浸，去皮骨，炙）半两 羌活（去芦头）半两 白附子（炮）一分 麻黄（去节，煎，掠去沫，焙）半两 桂（去粗皮）半两 芎藭半两 干蝎（去土，酒炒）一分 防己半两 附子（炮裂，去皮脐）半两 干姜（炮）一分 蜀椒（去目并闭口，炒出汗） 乌头（炮裂，去皮脐）各一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，空心温酒送下。如要出汗，先浴后服药，热酒或葱酒送下。汗出避风。

【主治】 肾中风，腰膝骨髓疼痛，转动不得，及一切风病。

03960 白花蛇丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 白花蛇一条（酒浸） 当归二两 川芎 白芍 生地 防风 荆芥 酒芩 连翘 胡麻子 何首乌 升麻 羌活 桔梗各一两

【用法】 上为末，将浸蛇酒和水打糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，茶清送下。

【主治】 头面手足白屑疮痒，皮肤皱燥。

03961 白花蛇酒

【方源】《本草纲目》卷四十三引《濒湖集简方》。

【组成】 白花蛇（一条，温水洗净，头尾各去三寸，酒浸，去骨刺，取净肉）一两 全蝎（炒） 当归 防风 羌活各一钱 独活 白芷 天麻 赤芍药 甘草 升麻各五钱

【用法】 上锉，以绢袋盛贮。用糯米二斗蒸熟，如常造酒，以袋置缸中，待成，取酒同袋密封，煮熟，置阴地七日出毒。每温饮数杯，常令相续。

【主治】 诸风无新久，手足缓弱，口眼㖞斜，语言謇涩；或筋时挛急，肌肉顽痹，皮肤燥痒，骨节

疼痛；或生恶疮、疥、癞。

03962 白花蛇散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】白花蛇二两（酒浸，去皮骨，炙微黄）天麻一两 槐子一两（微炒） 羌活一两 防风一两（去芦头） 晚蚕沙一两（微炒） 蔓荆子一两 白鲜皮一两 威灵仙一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：肺脏风毒，遍身生疮，或生白癜，或生斑点，及皮肤皲裂。②《圣济总录》：白癞，语声嘶嗄，目视不明，四肢痹痹，关节热痛，身体隐疹，鼻生息肉。

03963 白花蛇散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】白花蛇二两（汤或酒浸，炙微黄，去皮骨） 白附子一两（炮裂） 磁石一两（烧，酒淬七遍，细研） 天麻半两 狗脊半两（去毛） 侧子半两（炮裂，去皮脐） 萆薢半两（锉） 白僵蚕半两（微炒） 细辛半两 防风半两（去芦头） 白术半两 芎藭半两 白鲜皮半两 羌活半两 蔓荆子半两

【用法】上为细散，入磁石同研令匀。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】风痹，关节不利，手足顽麻。

03964 白花蛇散

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】白花蛇（用头项肉，酒浸，去骨，慢火炙令焦） 藁本（去苗土） 五加皮（锉） 牛膝（酒浸，切，焙） 萆薢 桂（去粗皮） 熟干地黄（焙） 木香 芸薹子（炒） 当归（切，焙）各半两 甘草（炙）一两 威灵仙（去苗土） 白附子（炮） 甘菊花各半两 蔓荆实（去白皮）一两 郁李仁（去皮）半两 羌活（去芦头） 虎骨（酥炙）一两 干蝎（微炒）半两 白芷 防风（去叉）各一两

【用法】上为散，每服二钱匕，空心温酒调下，不拘时候亦得。

【主治】柔风。血气俱虚，邪中内外，皮肤缓纵，腹里拘急。

【备考】方中羌活用量原缺。

03965 白花蛇散

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】白花蛇（酒浸，去皮骨，炙） 天南星（炮） 天雄（炮裂，去皮脐） 白僵蚕（炒） 干蝎（去土，炒） 麻黄（去根节，汤煮掠去沫，焙）各两 蜂子 甘草（炙） 干姜（炮）各半两

【用法】上为散，研匀。每服二钱匕，温酒调下。

【主治】筋络拘急，挛缩疼痛。

03966 白花蛇膏

【方源】《本草纲目》卷四十三引《鸡峰备急方》。

【组成】白花蛇（酒煮，去皮骨，瓦焙，取肉）一两 天麻 狗脊各二两

【用法】上为细末，以银盂盛无灰酒一升浸之，重汤煮稠如膏，银匙搅之，入生姜汁半杯同熬匀，瓶收。每服半匙头，用好酒或白汤化下，一日二次。

【主治】营卫不和，阳少阴多，手足举动不快。

03967 白芥子散

【方源】《妇人良方》卷三。

【组成】真白芥子 木鳖子各二两（麸炒） 没药（别研） 桂心 木香各半两

【用法】上为细末，入研药令匀。每服一钱，温酒调下。

【主治】荣卫之气循行失度，痰滞经络，与正气相搏，以致臂痛外连肌肉，牵引背脾，时发时止，发则有似瘫痪。

03968 白豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】白豆蔻三分（去皮） 黄耆半两（锉） 赤茯苓半两 干姜半两（炮裂，锉） 桂心半两 白术半两 当归半两（锉，微炒） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 人参三分（去芦头） 附子半两（炮裂，去皮脐） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，煮枣肉，和捣为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】脾胃冷热气不和，心腹疞痛，呕逆，不欲食，四肢少力。

【宜忌】忌生冷、油腻、饴糖。

03969 白豆蔻丸

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】白豆蔻仁（炒） 缩砂仁（炒） 人参 白术 茯苓（去皮） 丁香 白姜（炮） 粉草 麦芽各一两（炒） 良姜半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一二丸，食前煎人参、大枣汤嚼下。

【主治】 脾胃气弱，饱则胸间虚满。

03970 白豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】 白豆蔻（去皮） 人参 白术各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙透，锉）二两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）半两 芎藭 白茯苓（去黑皮） 干姜（炮）各一两 丁香半两 甘草（炙，锉）三分 白檀香（锉） 一分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣二个（擘破），煎至七分，去滓稍热服。

【主治】 脾胃气弱，呕吐不下食。

03971 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】 白豆蔻三分（去皮） 诃黎勒一两（煨，用皮） 白术三分 当归三分（锉，微炒） 木香半两 干姜三分（炮裂，锉） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 腹痛下利，四肢不和。

03972 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】 白豆蔻半两（去皮） 枇杷叶一两（拭去毛，炙微黄） 诃黎勒皮三分 前胡一两（去芦头） 人参三分（去芦头） 槟榔一两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 白术三分

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 反胃。胸膈不利，食即呕吐。

03973 白豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】 白豆蔻仁 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉） 白术 沉香（锉） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 甘草（炙）各等分

【用法】 上为散。每服二钱匕，入盐少许，食前沸汤点服。

【主治】 脾胃气弱，不进饮食。

03974 白豆蔻散

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】 沉香三分 缩砂仁（微炒） 白豆蔻仁（微炒） 干生姜各一两 木香 人参（去芦头） 白术 白茯苓（去皮） 丁香各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，入盐一捻，加生姜三片，煎至七分，食前热服；或用盐汤点亦得。

【主治】 脾胃不和，中脘痞闷，气不升降，痰逆恶心，不思饮食。

03975 白豆蔻散

【方源】《直指》卷五。

【组成】 白豆蔻仁 缩砂 荜澄茄 丁香 木香 甘草（炒）各一分 青皮 陈皮 辣桂各二分 厚朴（制） 香附（炒）各三分

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，盐一捻，煎七分，不拘时候服。

【主治】 七气所伤，滞于胸膈，窒于咽喉，胀痛于心下，噫气吞酸，不能饮食。

03976 白沉香散

【方源】《局方》卷三（淳祐新添方）。

【组成】 川白姜（炒） 半夏曲 白茯苓 附子（炮熟，去皮） 诃子肉 干山药 沉香 白术（煨） 木香 人参（去芦）各一两半 丁香半两 甘草（炙）六钱

【用法】 上为细末。每服二大钱，水一中盏，加生姜三片，大枣三个，木瓜一片，煎七分，食前服。

【功用】 常服坠气，和脾胃。

【主治】 一切冷气攻冲心腹，胁肋胀满，嗜醋吞酸，胸膈噎塞，饮食减少。

03977 白附子丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】 白附子三钱 龙脑（研）一钱 麝香（研）一钱 蝎梢（微炒）七枚 天南星（炮）一两 白僵蚕（微炒）一钱 凝水石（煅过，研）一两半

【用法】 上药，除凝水石外，捣研为末，再同和匀，入白蜜不拘多少，研令如稀饧状，入白面糊半匙头许，然后将凝水石末旋入，以干可为丸，如鸡头子大，于凝水石末中，留少许为衣，慢火焙干。每服一丸，细嚼，食后用薄荷熟水送下；茶清亦得。

【主治】 脑风。鼻息不通，时流清涕，多嚏不已。

03978 白附子丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】 半夏（汤洗七遍，生姜汁制） 天南星（炮） 寒水石（煅） 细辛（去叶土） 白茯苓（去皮） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 肉桂（去粗皮） 白

附子（炮） 川芎各三分 香白芷一分 麝香一分（别研）

【用法】 上为细末，生姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后用温热水送下。

【主治】 风搏阳络，胸膈涎盛，眉痛头旋。

03979 白附子丸

【方源】《直指》卷十一。

【组成】 白附子（炮） 南星（炮） 半夏（汤七次） 旋覆花 甘菊 天麻 川芎 橘红 僵蚕（炒，去丝嘴） 干姜（生）各一两 全蝎半两（焙）

【用法】 上为末，用生姜半斤，取汁打面糊为小丸。每服五十丸，食后荆芥汤送下。

【主治】 风痰上厥，眩运头疼。

03980 白附子散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【异名】 白附散（《准绳·类方》卷四引《本事》）。

【组成】 麻黄（不去节） 乌头 天南星各半两 干姜一分 蝎五个 白附子一两 朱砂一分（研） 麝香一分（研）

【用法】 上为细末。每服一字，酒调服讫，去枕卧少时，又灸曲鬓穴七壮，左痛灸左，右痛灸右。

【主治】 ①《鸡峰》：风寒留于骨髓，脑逆，头痛连齿，时发时止，连年不已。②《本事》：风寒客于头中，偏痛无时，久久牵引两目，遂至失眠。

【方论选录】《本事方释义》：白附子气味辛甘大热，入足阳明；麻黄气味辛温，入足太阳；川乌气味苦辛大热，入足太阳、少阴；南星气味苦辛温，直入手、足太阴；全蝎气味甘平，入足厥阴，最能行走入络；干姜气味辛温，入手足太阴；朱砂气味苦温，入心；麝香气味辛香，入手足少阴，能引药入络。此因客邪入于头中，偏痛无时，以致失明，非辛香温热能行之药不能搜逐其邪，非温散之药不能送邪达外；外内清平，其病焉有不去者乎？

03981 白茅根汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】 白茅根（锉）三两 秦艽（去苗土） 茵陈蒿 犀角（镑） 黄芩（去黑心）各一两半 朴消（研） 赤芍药各二两 大黄一两 麦门冬（去心，生用）二两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，空腹服，日二夜一。

【主治】 心脾热壅，小便赤涩，皮肉发黄，目黄色。

03982 白茅根汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【异名】 茅根汤（原书卷一八四）。

【组成】 白茅根（细锉）五两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 热淋，小便赤涩不通。

03983 白茅根散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】 白茅根一两（锉） 犀角屑三分 刺蓟根一两半 黄芩一两 桑根白皮二两（锉） 紫菀一两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入竹茹一分，煎至五分，去滓，入生地黄汁一合，更煎三两沸，每于食后温服之。

【主治】 心、肺脏热壅致唾血。

03984 白茅根散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【异名】 白茅根汤（《鸡峰》卷十八）。

【组成】 白茅根一两（锉） 赤芍药三分 滑石一两 木通三分（锉） 子芩三分 葵子一两 车前子三分 乱发灰一分

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服。如人行十里再服，以愈为度。

【主治】 血淋，小便中痛不可忍。

【备考】 方中赤芍药，《鸡峰》作“白芍药”。

03985 白矾灰散

【方源】 方出《圣惠》卷三十六，名见《普济方》卷五十五。

【组成】 白矾灰一分 白龙脑三分 乌贼鱼骨一分 蒲黄半两

【用法】 上为细散。每以半钱，绵裹塞耳，日三易之。

【主治】 聤耳出脓水，久不绝。

03986 白矾灰散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】 白矾灰 黄柏（锉） 乌贼鱼骨 龙骨各半两

【用法】 上为细散。以绵缠柳杖，展去脓血尽，干掺药末于耳内，一日二三次。

【主治】 小儿聤耳有脓血，疼痛不止。

03987 白果蛋方

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】 头生鸡子五个 生白果肉十枚

【用法】 将鸡子开一小孔，每一鸡子内入白果肉二枚，放饭上蒸熟，每日吃一个，连四五次即愈。

【主治】 白浊。

03988 白降雪散

【方源】《金鉴》卷六十六。

【异名】 白降雪丹(《疡医大全》卷十七)。

【组成】 石膏（煅）一钱五分 硼砂一钱 焰消 胆矾各五分 元明粉三分 冰片二分

【用法】 上为极细末。以笔管吹入喉内。

【主治】 喉风肿痛，声音难出。

03989 白茯苓丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 白茯苓一两 覆盆子一两 黄连一两（去须） 人参一两（去芦头） 栝蒌根一两 熟干地黄一两 鸡肶胵五十枚（微炒） 萆薢一两（锉） 玄参一两 石斛三分（去根，锉） 蛇床子三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前煎磁石汤送下。

【主治】 因消中之后，胃热入肾，消烁肾脂，令肾枯燥，遂致消肾，即两腿渐细，腰脚无力。

【方论选录】《医方集解》：此足少阴药也。茯苓降心火而交肾，黄连清脾火而泻心，石斛平胃热而涩肾，熟地、玄参生肾水，覆盆、蛇床固肾精，人参补气，花粉生津，萆薢清热利湿，肶胵能消水谷，通小肠、膀胱而止便数，善治膈消，磁石色黑入肾，补肾益精，故假之为使也。

03990 白茯苓丸

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】 白茯苓一两 熟干地黄一两 人参（去芦头） 琥珀 桂心 远志（去心） 菖蒲 柏子仁各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 产后心虚惊悸，神不安定。

03991 白茯苓汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 白茯苓 泽泻各二两 郁李仁二钱

【用法】 上㕮咀。作一服，水一碗，煎至一半，不拘时候常服，从少至多服。或煎得澄，加生姜自然汁在内，和面或做粥饭，顿食。五七日后，觉胀下，再加以白术散。

【主治】 ①《保命集》：蛊胀。②《普济方》：水肿。

03992 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 白茯苓一两 远志三分（去心） 甘草二分（炙微赤，锉） 桂心一两 人参一两（去芦头） 白芍药三分 防风三分（去芦头） 熟干地黄一两 铁粉二两 黄耆三分（锉） 麦门冬三分（去心）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 安定神志。

【主治】 心脏风虚，惊悸好忘，恍惚。

03993 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】 白茯苓 鳖甲（涂醋，炙令黄，去裙襕） 黄芩 萆薢（锉） 麦门冬（去心） 酸枣仁（微炒） 甘草（炙微赤，锉） 生干地黄 人参（去芦头） 黄耆（锉） 柴胡（去苗）各一两 白芍药半两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加秫米一百粒，生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 虚劳烦热，不得睡卧，四肢疼痛。

03994 白茯苓散

【方源】《普济方》卷二一六引《十便良方》。

【异名】 茯苓散(《普济方》卷三十三)。

【组成】 白茯苓 龙骨 甘草（炙，锉细） 干姜 桂心 续断 附子各一两 熟干地黄 桑螵蛸（微炒）

【用法】 上为散。每服四钱，水一钟，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】 小便不禁，日夜不止；白浊，甚至下血。

03995 白茯神散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 熟地五两 人参两半 黄耆三两（酒炙） 枣仁三两 当归三两 白芍两半（酒炒） 远志两半 麦冬三两（去心） 肉桂五钱（去皮） 辰砂一两 茯神二两（去木） 炙草五钱

【用法】 上为散。每服三钱，水煎，去滓温服。

【主治】 产后惊病，脉软数者。

【方论选录】 产后血气大虚，心包失养，无以振发神明，而触事易惊焉。人参扶元补气以充血脉，黄耆补气固中以壮胃阳，当归养血营经脉，枣仁养心安神志，白芍敛阴和血脉，麦冬润肺清心火，远志通肾交心，肉桂平肝暖血，茯神安神定志，辰砂镇心定惊，炙草缓中和胃也。为散水煎，使胃气一壮，则心胆俱雄而心包得养，神志自强，安有触事易惊之患乎？

03996 白药子散

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】川升麻 白药 前胡 石膏各一两 羚羊角屑 甘草（炙）半两 玄参三分 麦门冬一两半 川朴消二两

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盏，加竹茹一分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病咽喉肿塞连舌根疼痛，及干呕头疼不下食。

03997 白牵牛散

【方源】《圣济总录》卷八十引《膜外气方》。

【组成】白牵牛子（炒） 青橘皮（去白，焙，炒） 木通（锉）各一两

【用法】上为散。每服一钱匕，煎商陆汤调下。大便下黄水为度。

【主治】膜外水气。

【宜忌】忌盐一百日。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作"白牵牛子散"。

03998 白牵牛散

【方源】《金鉴》卷十六。

【组成】白牵牛（半生半熟） 甘草（炙） 橘红 白术（土炒） 桑白皮 木通各一钱

【用法】水煎服。

【主治】膀胱蕴热，风热相乘，小儿阴囊肿兼四肢肿，二便不利者。

03999 白扁豆粥

【方源】《长寿药粥谱》引《延年秘旨》。

【组成】白扁豆 粳米

【制法】每次取炒白扁豆 60 克，或鲜白扁豆 120 克，粳米 60 克，同煮为粥，至扁豆烂熟，夏秋季可供早晚餐服食。

【功用】健脾养胃，清暑止泻。

【主治】脾胃虚弱，食少呕逆，慢性久泻，暑湿泻痢，夏季烦渴。

04000 白荷花露

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】鲜白荷花瓣

【功用】清暑，凉脾，消瘀，止血，安胎。

【主治】喘嗽，烦渴，瘀血。

【备考】《中药成方配本》本方用法：用蒸气蒸溜法，每斤吊成露三斤。每用四两，隔水温服。小儿酌减。

04001 白菊花酒

【方源】《证类本草》卷六引《本草图经》。

【组成】菊花（秋八月合花收，晒干，切）二大斤

【用法】以生绢袋盛，贮三大斗酒中，经七日。日服三次。常令酒气相续为佳。

【主治】丈夫、妇人久患头风眩闷，头发干落，胸中痰结，每发即头旋眼昏，不觉欲倒者。

04002 白蛇浸酒

【方源】《永乐大典》卷一三八七九引《可用方》。

【组成】白花蛇一条（半斤重者） 虎胫骨一条 当归 川芎各一两半 附子 桂心 熟地黄 山茱萸 萆薢 石斛 细辛 黄耆 天麻各二两 独活三两 枳壳一两 肉苁蓉二两半

【用法】上锉细，以生绢袋盛，好酒三斗于瓷瓮子内密封，浸七日后开。随性暖饮，常令醺醺，勿令大醉。其酒旋添，酒味薄即换药。

【主治】风痹，骨髓及腰脚疼痛，行步稍难；兼风毒走注，皮肤痒痛不知。

04003 白银锭子

【方源】《回春》卷四。

【组成】白芷三两 白矾一两

【用法】上为细末，铁勺熔成饼，再入炭火，煅令烟尽取出，去火毒，为末，用面糊和为锭子成条。插入漏内，直透里痛处为止。每日上三次，至七日为止，至九日疮结痂而愈。

【主治】痔漏。

04004 白蓝脂方

【方源】《外台》卷三十二引《古今录验》。

【组成】白蓝（即白蔹）一分 白矾一分（烧） 石脂一分 杏仁半分（去尖皮）

【用法】上药治下筛。鸡子和，夜涂面，明旦以井花水洗之。

【主治】面黑似土，皮子面包。

04005 白蒺藜丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】白蒺藜一两（微炒，去刺） 茵芋一两 羌活一两 木香一两 羚羊角屑一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 白花蛇肉二两（酒浸，炙微黄） 白附子一两（炮裂） 当归一两（锉，微炒） 干蝎一两（微炒） 薏苡仁三分 槟榔半两 牛膝一两（去苗） 芎藭一两 牛黄一分（细研） 麝香一分（细研） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，别研如膏） 防风三分（去芦头） 酸枣仁一两（微炒）

【用法】上为末，入杏仁膏，相和令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下，不拘

时候。

【主治】 刺风。遍身如针刺，肩背四肢拘急，筋骨疼痛。

【宜忌】 忌生冷、油腻、毒滑、鱼肉。

04006 白蒺藜丸

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】 白蒺藜一两（微炒，去刺） 黄耆三分（锉） 独活三分 白芷半两 防风半两（去芦头） 薯蓣三分 枳实一两（麸炒微黄，去瓤） 人参三两（去芦头） 黄连一两（去须） 藏蕊半两 地骨皮半两 桂心半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】 风毒上冲，头面瘙痒如虫行，身上时有风疹，心神烦闷。

04007 白蒺藜汤

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 白蒺藜 防风 道人头 蛇床子 卷柏 黄耆 漏芦各一两半 羊蹄根二两 蒴藋根三两

【用法】 上锉细。以水一斗，煎至五升，去滓，看冷暖，于避风处洗之。

【主治】 妇人血风，皮肤瘙痒，不可禁止。

04008 白蒺藜散

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】 白蒺藜一两（微炒，去刺） 白鲜皮一两 防风一两（去芦头） 子芩一两 玄参一两 赤芍药一两 栀子仁一两 桔梗一两（去芦头） 川大黄一两（锉碎，微炒） 麦门冬一两半（去心，焙） 前胡一两（去芦头） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】 上为细散。每服二钱，食后煎薄荷汤调下。

【主治】 热毒疮瘙痒，心神躁躁。

04009 白蒺藜散

【方源】《三因》。

【组成】 白蒺藜（炒，去角） 防风 甘草（生） 僵蚕（去丝嘴）各一两（直者） 南星一两半（黑豆二合，青盐半两，水煮透，取出焙，不用盐豆） 甘菊花三两（生）

【用法】 上为末。每服二钱，食后煎甘草汤送下。

【主治】 肾脏风毒上攻，眼目赤肿，热泪昏涩，胬肉攀睛。

【宜忌】 忌炙煿。

04010 白蒺藜散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 白蒺藜 菊花 蔓荆子 草决明 甘草（炙） 连翘 青葙子各等分

【用法】 水煎，食后温服。

【主治】 ①《银海精微》：肝风目暗疼痛。②《张氏医通》：肝肾虚热生风，目赤涩多泪。

04011 白鲜皮汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 白鲜皮 海风藤各三两 金银花 白茯苓 肥皂子肉 苦参各二两 五加皮 汉防已 鸭脚花根 蝉退各一两 猪牙皂角 皂角刺 苡仁各一两五钱 土茯苓四两

【用法】 上分十剂。水三钟，煎一钟服。每日空心食雄猪肉三四两。

【主治】 杨梅疯癞及鹅掌风。

【宜忌】 忌发物。

04012 白鲜皮汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】 白鲜皮 茵陈蒿各等分

【用法】 水二钟，煎服，一日二次。

【主治】 病黄如金，好眠吐涎。

04013 白鲜皮汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 白鲜皮 15 克 粉丹皮 9 克 怀山药 9 克 薏仁米 15 克 木通 9 克 大豆黄卷 9 克 龙胆草 9 克

【用法】 水煎内服。

【主治】 女阴溃疡。

【加减】 局部灼痛，分泌物多者，重用银花、连翘；口腔溃烂不愈，重用大黄、豆卷、扁豆、金果榄；苔白而滑，加厚朴、陈皮、白术。

04014 白鲜皮酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 白鲜皮 15 克 鲜生地 31 克 高粱酒 150 毫升

【用法】 浸泡五日后，外涂。

【主治】 脂溢性皮炎。

04015 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷十九。

【异名】 白鲜皮汤（《圣济总录》卷九）。

【组成】 白鲜皮一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 麻黄一两（去根节） 白芷一两 白术一两 防风二两（去芦头） 葛根一两（锉） 独活一两 汉防已一两 人参一两（去芦头） 茯神一两 甘草一两（炙微赤，锉） 当归一两（锉，微炒） 石

膏三两　桂心一两　杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半两，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 风痱，四肢缓弱，心神烦闷，不能言。

04016　白僵蚕丸

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 白僵蚕（炒）半两　天南星（炮裂，汤洗）半两　附子（炮裂，去皮脐）一两　白附子（炮裂，汤洗）一两　干姜（炮裂，切）一分　腻粉半两　麝香一分（与腻粉同研为细末）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸至五丸，空心温酒送下。

【主治】 肉苛。荣虚卫实，肌肉不仁。

04017　白僵蚕丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】 白僵蚕（炒）　菊花　石膏（研）各四两

【用法】 上为末，用葱白细研，绞取汁一大盏同拌和，入少面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，荆芥茶或温酒送下。

【主治】 首风。每遇风时，即发头痛。

04018　白螺壳丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷四，名见《医学正传》卷四。

【组成】 螺蛳壳（墙上年久者，烧）　滑石（炒）　苍术　山栀　香附　南星各二两　枳壳　青皮　木香　半夏　砂仁各半两

【用法】 上为末，生姜汁浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服三四十丸，生姜汤送下。春加川芎，夏加黄连，秋、冬加吴茱萸半两。有痰者，用明矾熔开，就丸如鸡头子大。每服一丸，热姜汤送下。

【主治】 痰积胃脘作痛。

【备考】《医学正传》有莪术一两；《准绳·类方》有桃仁。

04019　白藕汁膏

【方源】《丹溪治法心要》卷三。

【组成】 黄连末　生地汁　牛乳汁　自然藕汁各一斤

【用法】 上将诸汁慢火熬膏，入连末为丸。每服二三十丸，温水送下，日服数次。

【主治】 消渴。

04020　白癜风酒

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】 苦参五斤　露蜂房五两　刺猬皮一个

【用法】 上㕮咀。以水三斗，煮一斗，去滓用汁，细酒曲五斤，炊黍米三斗，作饭拌曲，同药汁，如酿酒法，酒成榨去糟。食前温服一二杯。

【主治】 紫白癜风。

04021　白及枇杷丸

【方源】《准绳·类方》卷三引戴氏方。

【组成】 白及一两　枇杷叶（去毛，蜜炙）藕节各五钱

【用法】 上为细末，另以阿胶五钱锉如豆大，蛤粉（炒成珠）、生地黄自然汁调之，火上炖化，入前药为丸，如龙眼大。每服一丸，噙化。

【主治】 咯血。

04022　白及莲须散

【方源】《准绳·类方》卷三引戴氏方。

【组成】 白及一两　莲花须（金色者佳）　侧柏叶　沙参各五钱

【用法】 上为极细末。入藕节汁、地黄汁，磨京墨令黑，调药二钱，如稀糊嚥服。

【主治】 咯血。

04023　白云换肺丸

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】 款冬花一两　半夏　明矾　寒水石各二两

【用法】 上为细末，生姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，姜汤送下。

【主治】 远年近日，喘嗽不止。

04024　白术八味散

【方源】《外台》卷八引《删繁方》。

【组成】 白术　厚朴（炙）　人参　吴茱萸　麦芽（炒）　茯苓　芎藭　橘皮各三两

【用法】 上为散。每服方寸匕，食前暖酒送下，随性服。

【主治】 胃虚苦饥寒痛。

【宜忌】 忌桃、李、雀肉、大酢。

04025　白术木香散

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】 白术　木猪苓（去皮）　赤茯苓　甘草　泽泻各半两　木香　槟榔各三钱　陈皮二两（去白）　官桂二钱　滑石三两

【用法】 上为末。每服五钱，水一盏，加生姜三片，同煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 喘嗽肿满，欲变成水病者，不能卧，不能食，小便闭。

04026　白术四逆汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】 白术三钱　附子三钱　干姜一钱　人参二钱　茯苓二钱　甘草五分　大枣三枚

【用法】 水三钟，煎一钟，微温服。

【主治】 厥心痛。手足厥逆，身冷汗出，便溺清利，甚则朝发夕死者。

04027　白术半夏汤

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 白术一两　丁香一两　赤茯苓（去皮）一两　半夏二两（汤洗七次，焙干）　肉桂（去粗皮）半两　陈橘皮（去白）一两半

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二盏，加生姜十片，同煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 胃虚停饮，痰逆恶心，中满痞刺，胁肋疼痛，头目昏运，肢节倦怠，全不思食。

04028　白术圣散子

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】 御米壳二两（蜜炒）　当归　肉豆蔻　缩砂　石榴皮　诃子　干姜（炮）　陈皮　白术　甘草　芍药各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，水一大盏，入乳香少许，同煎和滓服。

【主治】 一切泻痢久不愈，并妇人产后痢。

04029　白术芍药汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 白术一两　芍药一两　甘草五钱

【用法】 上锉。每服一两，水二盏，煎至一盏，滤清温服。

【主治】 太阴脾经受湿，水泄注下，体微重微满，困弱无力，不欲饮食，暴泄无数，水谷不化。

04030　白术安胃散

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】 五味子　乌梅（取肉，炒干）各五钱　车前子　茯苓　白术各二两　米壳三两（去顶蒂穰，醋煮一宿，炒干）

【用法】 上为末。每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，空心温服。

【主治】 一切泻痢，无问脓血相杂，里急窘痛，日夜无度；男子小肠气痛；妇人脐下虚冷，并产后儿枕块痛；亦治产后虚弱，寒热不止者。

04031　白术防风汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】 白术黄耆汤（《准绳·类方》卷五）。

【组成】 白术一两　防风二两　黄耆一两

【用法】 上㕮咀。每服五七钱，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 破伤风，服羌活防风汤后，脏腑和而有自汗者。

04032　白术附子汤

【方源】《医学发明》卷五。

【组成】 白术　附子（炮，去皮脐）　苍术　陈皮　厚朴（姜制）　半夏（汤洗七次）　茯苓　泽泻各二两　猪苓（去皮）半两　肉桂四钱

【用法】 上锉，如麻豆大。每服半两，水三盏，加生姜三片，煎至半盏，去滓，食前温服。

【主治】 寒中。阴盛生内寒，厥气上逆，寒气积于胸中，作中满腹胀，作涎，作清涕，或多溺，足下痛不能任身履地，骨乏无力，喜睡，两丸多冷，时作隐隐而痛，或妄见鬼状，梦亡人，腰、背、胛、眼、腰、脊皆痛，而不渴不泻，脉盛大以涩。

04033　白术和中汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】 当归（酒洗）二钱五分　白芍（土炒）一钱　白术（去芦，土炒）　白茯苓（去皮）各二钱　陈皮一钱　黄芩（炒）一钱　黄连（炒）八分（有红者多加）　甘草五分　木香少许

【用法】 上锉。水煎，食前服。

【主治】 下痢白多，不拘新久者。

04034　白术和中汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 生晒术一钱半　新会皮一钱半（炒）　焦六曲三钱　佛手花五分　浙茯苓四钱　春砂仁一钱（杵）　五谷虫三钱（漂净）　陈仓米三钱（荷叶包）

【功用】 温和脾胃，条畅气机。

【主治】 气虚中满，湿证夹食，腹中胀满，中空无物，按之不坚，亦不痛，或时胀时减。

【加减】 若寒气盛，加炒干姜八分，淡吴萸五分，紫瑶桂三分；若湿热盛，加川连六分，川朴一钱；兼大便闭结者，吞服枳实导滞丸三钱；若兼络瘀，加新绛一钱半，旋覆花三钱（包煎），青葱管五寸（冲）。

【方论选录】 此证用药最难，纯补则胀满愈甚，分消则中气愈虚。故以苓、术培中化湿为君；臣以陈皮、砂仁运中，神曲、谷虫导滞；佐以佛手花疏气宽胀；使以荷叶包陈仓米，升清气以和胃。补而不滞，疏而不削。此为温和脾胃，条畅气机之良方。

04035　白术泽泻散

【方源】《医统》卷三十一引《医林方》。

【组成】 白术　泽泻　陈皮（去白）　木香　槟

榔 茯苓各等分

【用法】 上㕮咀。每服七钱，水二盏，加生姜三片，煎至八分，食前服。

【主治】 痰病化为水气，传变水鼓，不能食。

【加减】 痞，加枳实；肿，加牵牛。

04036 白术枳壳丸

【方源】 《医方类聚》卷二二七引《医林方》。

【组成】 白术 枳壳各等分

【用法】 上为细末，烧饭为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，温水送下。服药后，怀孕妇人其胎瘦小易生也，生下之后三两月，其子即长大。

【主治】 妇人胎前，胎在胸腹痞闷。

04037 白术茯苓汤

【方源】 《外台》卷八引《范汪方》。

【组成】 白术五两 茯苓三两 橘皮 当归 附子（炮）各二两 生姜 半夏各四两（切） 桂四两 细辛四两（一作人参）

【用法】 上切。以水一斗，煮取三升，分三次服。服三剂良。

【主治】 胸中结，痰饮澼结，脐下弦满，呕逆不得食；亦主风水。

【宜忌】 忌羊肉、饧、桃、李、雀肉、猪肉、冷水、生葱、生菜、醋物。

04038 白术茯苓汤

【方源】 《鸡峰》卷十八。

【异名】 白术汤（《医略六书》卷二十五）。

【组成】 白术四两 茯苓 甘草各二两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓，稍热服，不拘时候。

【功用】 逐支饮，通利小便。

【主治】 ①《鸡峰》：饮积胸痞，痰停膈上，头痛目眩，噫酸吞酸，嘈烦松悸，喘咳呕逆，体重胁痛，腹痛肠鸣，倚息短气，身形如肿。及时行若吐若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，振振身摇。②《医略六书》：脾虚泄泻，脉缓者。

【方论选录】 《医略六书》：泻由乎湿，脾土虚弱，不能制御于中，故偏渗大肠，泄泻不止焉。白术崇土燥湿，茯苓渗湿和脾，炙草缓中益胃，兼益中州之气也。水煎温服，使湿去土强，则脾能健运而敷化有权，泄泻无不自止矣。此健脾渗湿之剂，为脾亏泄泻之专方。

04039 白术茯苓汤

【方源】 《兰室秘藏》卷中。

【异名】 白术汤（《普济方》卷二十五）。

【组成】 白术 白茯苓 半夏各一两 炒曲二钱 麦蘖面五分（炒）

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二大盏，加生姜五片，煎至一盏，去滓，不拘时候。

【功用】 实脾胃。

【主治】 胃气弱，风邪羁绊，于脾胃之间，身重有痰，恶心呕吐。

04040 白术厚朴汤

【方源】 《三因》卷五。

【组成】 白术 厚朴（姜炒） 半夏（汤洗） 桂心 藿香 青皮各三两 干姜（炮） 甘草（炙）各半两

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一枚，煎七分，去滓，食前服。

【主治】 脾虚风冷所伤，心腹胀满疼痛，四肢筋骨重弱，肌肉瞤动瘦瘠，善怒，霍乱吐泻；或胸胁暴痛，下引小腹，善太息，食少失味。

04041 白术除湿汤

【方源】 《兰室秘藏》卷下。

【组成】 白术一两 生地黄（炒） 地骨皮 泽泻 知母各七钱 赤茯苓 人参 炙甘草 柴胡各五钱

【用法】 上为粗末。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，食远温服。

【主治】 午后发热，背恶风，四肢沉重，小便或多或少、黄色；又治汗后发热。

【加减】 如小便快利，减茯苓、泽泻一半；如有刺痛，一料药中加当归身（酒洗）七钱。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足太阴、少阴、少阳药也。阳陷阴中，热在血分，故以生地滋其少阴，而以知母、地骨泻血中之伏火也。柴胡升阳以解其肌；苓、泽利湿兼清其热，参、术、甘草益气助脾，气足阳升，虚热自退，脾运而湿亦除矣。方名除湿，而治在退热，欲热从湿中而下降也。②《医林纂要》：午后发热，热在阳明经也；四肢沉困，太阴脾湿也，小便黄，湿兼热也；然而背恶风，则阳不足，汗后而仍发热，亦阳之不足；阳不足者，其湿热在阴，湿热在阴者，太阴脾主血分，其人血热而湿凑之。湿盛而阴之郁热转盛，阳不能拔，则反虚也。其过在湿，湿责之脾，热以湿深，故君白术；生地黄滋阴生血，且以胜热而能化湿为血；地骨皮甘淡补肺清金，而下生肾水；知母辛苦，泻肺逆即以生肾水，坚肾水亦转生肝血，此三味皆以泻血中之伏热也。泽泻泻肾之邪水，使由膀胱而出之；赤茯苓泻心下之水，使由小肠而出，此二味去湿而兼以清热。人参、甘草以补脾土，脾土

厚则能胜湿，而血亦日滋，不生热矣。柴胡升阳气于至阴之下而达之膜中，布散经络以解沉阴郁热，东垣最长于用柴胡，此方妙亦在柴胡也。此以治湿热之在血分者。在血分则主于脾肾。凡治三焦者主行湿，湿行而热自消。此方名除湿，而治在去热，热平而湿自除。要尤在补脾胃而升阳，土厚阳升，则湿热皆息也。

04042　白术消肿散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】白术三两（炒黑）　枳实一两半（炒黑）

【用法】上为散。每服三钱，紫苏汤下。

【主治】产后浮肿，脉弦滞涩者。

【方论选录】产后气食伤脾，脾气不化，清阳不能上奉，而风邪乘之，故遍身浮肿，心下痞闷焉。白术炭健脾气以燥湿除满；焦枳实泻滞气以散闷消痞；为散，紫苏汤下，理血气以散风邪也。使风邪外散则滞气内消，而脾胃调和，经络通畅，安有心下痞闷，遍身浮肿之患乎。

04043　白术调中丸

【方源】《普济方》卷二〇七引《瑞竹堂方》。

【组成】神曲四两（炒）　白术半两　人参（去芦）　白茯苓（去皮）　猪苓（去黑皮）　泽泻各三钱　木香二钱　官桂（去粗皮）一钱半　甘草（去皮，炙）一两　干姜（炮）一两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心淡姜汤送下。

【主治】脾胃不和，心下坚痞，两胁胀满，脐腹疼痛，嗳宿腐气，霍乱吐泻，米谷不消，久痢赤白，脓血相杂，多日羸瘦，不思饮食。

04044　白术黄耆散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】白术　黄耆　当归　黄芩（去皮）　芍药各半两　石膏　甘草各二两　茯苓　寒水石各一两　官桂一分　人参　川芎各三分

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，煎至六分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】五心烦热，自汗，四肢痿劣，饮食减少，肌瘦昏昧。

04045　白术猪肚粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】白术二两　槟榔一枚　生姜（切，炒）一两半

【用法】上为粗末，以猪肚一枚，治如食法，去涎骨，纳药于肚中缝口，以水七升，煮肚令熟，取汁入粳米及五味同煮粥。空腹食之。

【功用】《药粥疗法》：补中益气，健脾和胃。

【主治】①《圣济总录》：妇人腹胁血癖气痛，冲头面燥燥，呕吐酸水，四肢烦热腹胀。②《药粥疗法》：脾胃气弱，消化不良，不思饮食，倦怠少气，腹部虚胀，大便泄泻不爽。

04046　白芷升麻汤

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】白芷　升麻　黄连　木通　当归　川芎　白术　茯苓

【用法】水煎服。更用塌肿汤浴洗之。

【主治】妇人阴内脓水淋漓，或痒或痛。

04047　白芷胃风汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【组成】白芷二钱五分　升麻二钱五分　葛根　苍术（米泔炒）各八分　炙草　当归各一钱五分　草豆蔻　柴胡　黄柏（炒）　藁本　羌活各四分　蔓荆子　白僵蚕各三分　麻黄（去节）七分

【用法】水煎服。

【主治】手足阳明经气虚风热，面目麻木，或牙关紧急，眼目瞤动。

04048　白芷暖宫丸

【方源】《妇人良方》卷一。

【组成】禹余粮（制）一两　白姜（炮）　芍药　白芷　川椒（制）　阿胶（粉炒）　艾叶（制）　川芎各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，米饮送下；或温酒、醋汤亦得。

【功用】暖血海，实冲任；常服温补胞室，和养血气，光泽颜色，消散风冷，退除百病，自成孕育。

【主治】子宫虚弱，风寒客滞，因而断绪不成孕育。及数尝堕胎，或带下赤色，漏下五色，头目虚晕，吸吸少气，胸腹苦满，心下烦悸，脐腹刺痛，连引腰背，下血过多，两胁牵急，呕吐不食，面色青黄，肌肤瘦瘁，寝常自汗。

04049　白芷螵蛸丸

【方源】《宋氏女科》。

【组成】白芷（炒黑）一两　海螵蛸三个（煅）　胎发一团（煅）

【用法】上为末。每服三钱，空心酒送下。

【主治】白带。

【备考】本方方名，据剂型，当作“白芷螵蛸散”。

04050　白疕一号方

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 生地30克 生槐花30克 山豆根9克 白鲜皮15克 草河车15克 大青叶15克 紫草15克 黄药子12克

【功用】 凉血清热，解毒治疮。

【主治】 牛皮癣进行期。

【方论选录】 生地、生槐花、紫草凉血清热；山豆根、草河车、大青叶清热解毒；白鲜皮消风止痒；黄药子凉血解毒。用于牛皮癣进行期，血热风燥之证。

04051 白疕二号方

【方源】 《朱仁康临床经验集》。

【组成】 土茯苓30克 忍冬藤9克 生甘草6克 板蓝根15克 威灵仙15克 山豆根9克 草河车15克 白鲜皮15克

【功用】 清热解毒，祛风除湿。

【主治】 牛皮癣早期。

【方论选录】 土茯苓、白鲜皮、威灵仙祛风除湿；板蓝根、山豆根、草河车、忍冬藤、生甘草清热解毒。

04052 白虎承气汤

【方源】 《重订通俗伤寒论》。

【组成】 生石膏八钱（细研） 生锦纹三钱 生甘草八分 白知母四钱 元明粉二钱 陈仓米三钱（荷叶包）

【功用】 清下胃腑结热。

【主治】 邪火壅闭，堵其神明出入之窍，昏不识人，谵语发狂，大热大烦，大渴大汗，大便燥结，小便赤涩。

【方论选录】 是方白虎合调胃承气，一清胃经之燥热；一泻胃腑之实火。此为胃火炽盛，液燥便闭之良方。

04053 白虎续命汤

【方源】 《保命集》卷中。

【组成】 小续命汤一料加石膏、知母各二两，甘草一两。

【主治】 中风无汗，身热不恶寒。

04054 白虎葛根汤

【方源】 《伤寒大白》卷一。

【组成】 知母 石膏 葛根 白芷

【主治】 阳明里热头痛，有汗发热，脉洪而数，烦渴引水。

【加减】 若带太阳表邪，加羌活、防风、川芎；症兼少阳者，加柴胡、川芎；小便黄赤，加木通、滑石；大便不通，有下症者，加酒煮大黄。

04055 白虎解毒汤

【方源】 《寿世保元》卷八。

【组成】 石膏 知母 黄连 黄芩 黄柏 栀子 甘草

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 麻疹已出，谵语烦躁，作渴者。

04056 白敬宇眼药

【方源】 《北京市中药成方选集》。

【异名】 白氏眼药（《中药制剂手册》）。

【组成】 珍珠（豆腐炙）五钱 麝香二钱五分 熊胆二两 冰片十六两二钱 硇砂一钱 甘石（煅）十六两五钱 石决明（煅）十两 海螵蛸（去壳）九两四钱五分

【用法】 上为极细末，过罗，混合均匀，装瓶重一分三厘。膏剂：加凡士林油六百四十两、液体石蜡六十四两，混合均匀后，装瓶管，每管重四分。用玻璃针沾冷开水点在大眼角内，然后再沾药粉少许（如米粒大），点入大眼角内，每日二至三次；膏剂挤出少许，点入大眼角内。

【功用】 明目消肿，散风止痒。

【主治】 暴发火眼，角膜赤红，眼边刺痒，溃烂肿痛。

04057 白蔹薏苡汤

【方源】 《千金》卷八。

【组成】 白蔹 薏苡仁 芍药 桂心 牛膝 酸枣仁 干姜 甘草各一升 附子三枚

【用法】 上㕮咀。以醇酒二斗渍一宿，微火煎三沸。每服一升，不耐酒服五合，一日三次。扶杖起行。

【主治】 风拘挛，不可屈伸。

【方论选录】 《千金方衍义》：拘挛不可屈伸，首取白蔹以除风热，散结气；薏苡、牛膝，《本经》皆主拘挛，枣仁治心腹邪气，疼酸湿痹；桂心、芍药专和营气；四逆汤三味开下焦痹着之邪，酒煎以行血脉之气。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“薏苡仁汤”。

04058 白附子化痰丸

【方源】 《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 半夏（汤洗七次，生姜自然汁制） 天南星（炮） 石膏 细辛（去叶土） 白茯苓（去皮） 肉桂（去粗皮） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 白附子（炮） 川芎各等分 香白芷一分 麝香一钱（别研）

【用法】 上为细末，同麝香研匀，取生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后熟水送

下。

【主治】 风痰积于胸膈，头疼目运。

04059 白虎加人参汤

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 白虎人参汤(《金匮》卷上)、人参石膏汤(《袖珍》卷三引《圣惠》)、人参白虎汤(《玉机微义》卷九引《局方》)、白虎化斑汤(《卫生总微》卷八)、化斑汤(《丹溪心法》卷二)、人参化斑汤(《回春》卷三)。

【组成】 知母六两 石膏一斤（碎，绵裹） 甘草（炙）二两 粳米六合 人参三两

【用法】 以水一斗，煮米熟，汤成去滓，温服一升，每日三次。

【功用】 清热、益气、生津。

①《注解伤寒论》：生津止渴，和表散热。②《金鉴》：清热生津。③《伤寒论方解》：清热生津，兼益气阴。

【主治】 伤寒、温病、暑病气分热盛，津气两伤，身热而渴，汗出恶寒，脉虚大无力；火热迫肺，上消多饮者。

①《伤寒论》：服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者；伤寒若吐若下后，七、八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者；伤寒无大热，口燥渴、心烦，背微恶寒者；渴欲饮水，无表证者。②《金匮》：太阳中热者，暍是也；汗出恶寒，身热而渴。③《袖珍》引《圣惠》：膈消，上焦燥渴，不欲多食。④《卫生总微》：小儿疮疹赤黑，出不快，毒盛烦躁者。⑤《得效》：太阳中暍，其脉弦细芤迟，小便已，洒然毛耸，口开，前板齿燥者。⑥《丹溪心法》：伤寒汗吐下后，斑发脉虚。⑦《回春》：斑已出，如脉洪数，热甚烦渴者。⑧《景岳全书》：暑热脉虚者。⑨《温病条辨》：太阴温病，脉浮大而芤，汗大出，微喘，甚至鼻孔扇者。

【宜忌】 ①《伤寒论》：此方立夏后立秋前乃可服。立秋后不可服；正月、二月、三月尚凛冷，亦不可与服之，与之则呕利而腹痛；诸亡血虚家，亦不可与，得之则腹痛而利。②《外台》引《千金翼》：忌海藻、菘菜。

【方论选录】 ：①《金匮方衍义》：《内经》曰：心移热于肺，传为膈消。膈消则渴也，皆相火伤肺之所致，此可知其要在救肺也。石膏虽能除三焦火热、然仲景名白虎者，为石膏功独多于清肺，退肺中之火，是用为君；知母亦就肺中泻心火，滋水之源，人参生津，益所伤之气而为臣；粳米、甘草补土，以资金为佐也。②《伤寒贯珠集》：阳明者，两阳之交、而津液之府也。邪气入之，足以增热气而耗津液，是以大烦渴不解。方用石膏辛甘大寒，一直清胃热为君；而以知母之咸寒佐之；人参、甘草、粳米之甘，则以之救津液之虚，抑以制石膏之悍也。曰白虎者，盖取金气彻热之义云耳。③《古方选注》：阳明热病化燥，用白虎加人参者，何也？石膏辛寒，仅能散表热；知母甘苦仅能降里热；甘草、粳米仅能载药留于中焦。若胃经热久伤气，气虚不能生津者，必须人参养正回津，而后白虎汤乃能清化除燥。④《衷中参西》：白虎汤中加人参、不但能生津液，且能补助气分以助津液上潮，是以能立见其功也。白虎加人参汤所主之证，或渴，或烦，或舌干，固由内陷之热邪所伤，实亦由其人真阴亏损也。人参补气之药非滋阴之药，而加于白虎汤中，实能于邪火炽盛之时立复其阴，此中盖有化合之妙也。凡遇其人脉数或弦硬，或年过五旬，或在劳心劳力之余，或其人身形素羸弱，即非在汗吐下后，渴而心烦者，当用白虎汤时，皆宜加人参、此立脚于不败之地，战则必胜之师也。

【临证举例】 ①伤寒发热 《伤寒九十论》：从军王武经病，始呕吐，俄为医者下之，已八九日，而内外发热。予诊之曰：当行白虎加人参汤。或云：既吐复下，是里虚矣，白虎可行乎？予曰仲景云：若下后七八日不解，热结在里，表里俱热者，白虎加人参汤。证相当也。盖吐者为其热在胃脘，而脉致令虚大，三投而愈。②消渴 《生生堂治验》：草庐先生年七旬，病消渴引饮无度，小便白浊，周殚百治，而瘁疲日加焉。举家以为不愈，先生亦弟嘱后事，会先生诊之，脉浮滑，舌燥裂，心下硬。曰：可治矣。乃与白虎加人参汤，百余贴全愈。③风温 《衷中参西》：赵印龙，年近三旬，于孟秋得风温病。胃热气逆，服药多呕吐，因此屡次延医服药，旬余无效。及愚诊视，见其周身壮热，心中亦甚觉热，五六日间饮食分毫不进，大便数日未行。问何不少进饮食？自言有时亦思饮食，然一切食物闻之皆臭恶异常。强食之即呕吐，所以不能食也。诊其脉弦长有力，右部微有洪象，一息五至。证脉相参，知其阳明腑热已实，又挟冲气上冲，所以不能进食，服药亦多呕也。欲治此证当以清胃之药为主，而以降冲之药辅之，则冲气不上冲，胃气亦必随之下降，而呕吐能止，即可以受药进食矣。生石膏三两（捣细），生赭石一两（轧细），知母八钱，潞党参四钱，粳米三钱，甘草二钱。共煎汤一大碗，分三次温服。将药三次服完，呕吐即止，次日

减去赭石，又服一剂，大便通下，热退强半。至第三日减去石膏一两，加玄参六钱，服一剂，脉静身凉。

04060 白虎加苍术汤

【方源】《活人书》卷十八。

【异名】苍术白虎汤（《宣明论》卷六）、白虎苍术汤（《保婴撮要》卷十八）、白虎加苍汤（《医学入门》卷四）。

【组成】知母六两 甘草（炙）二两 石膏一斤 苍术三两 粳米三两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，水一盏半，煎至八九分，去滓，取六分清汁温服。

【功用】《成方便读》：清温燥湿。

【主治】湿温病。身热胸痞，汗多，舌红，苔白腻者。

①《活人书》：湿温，两胫逆冷，胸腹满，多汗，头目痛，苦妄言，其脉阳濡而弱，阴小而急。②《宣明论》：伤寒发汗不解，脉浮者。③《医方考》：湿温憎寒壮热，口渴，一身尽痛，脉沉细者。④《温热经纬》：湿热证，壮热口渴，自汗身重，胸痞，脉洪大而长者。⑤《治疹全书》：疹毒烦热渴泻者。

【方论选录】①《医方考》：温毒藏于肌肤，更遇于湿，名曰湿温。湿为阴邪，故憎寒；温为阳邪，故壮热；温热入里，故口渴；湿流百节，故一身尽痛；湿为阴，故脉沉细。石膏、知母、甘草、粳米，白虎汤也，所以解温热；加苍术者，取其辛燥能治湿也。②《本事方释义》：知母气味苦寒，入足阳明；甘草气味甘平，入足太阴；石膏气味辛寒，入手太阴、足阳明；苍术气味苦辛温，入足太阴；白粳米气味甘平，入手足太阴。此治暑湿相搏而为湿温病者。以苦寒、辛寒之药清其暑；以辛温雄烈之药燥其湿，而以甘平之药缓其中，则贼邪，正邪皆却，病自安矣。

【临证举例】湿温《本事》：癸丑年，故人王彦龙作昆陵仓官，季夏得疾，胸项多汗，两足逆冷，谵语。医者不晓，杂进药已经旬日。予诊之，其脉关前濡，关后数。予曰：当作湿温治。盖先受暑后受湿，暑湿相搏，是名湿温。先以白虎加人参汤，次以白虎加苍术汤，头痛渐退，足渐温，汗渐止，三日愈。

04061 白虎加栀子汤

【方源】《此事难知》。

【组成】白虎汤加栀子一钱半

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，米熟为度，去滓温服。

【主治】老、幼、虚人伤寒五六日，昏冒谵语，小便或淋或涩，或烦而不得眠。

04062 白虎加桂枝汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】白虎加桂汤（《千金》卷十）、知母汤（《圣济总录》卷三十四）、加减桂枝汤（《得效》卷二）。

【组成】知母六两 甘草二两（炙） 石膏一斤 粳米二合 桂（去皮）三两

【用法】上锉。每服五钱，水一盏半，煎至八分，去滓温服，汗出愈。

【主治】温疟。其脉如平，身无寒但热，骨节疼烦，时呕。

【方论选录】①《千金方衍义》：白虎以治阳邪，加桂以通营卫，则阴阳和，血脉通，得汗而愈矣。②《古方选注》：本方方义原在心营肺卫，白虎汤清营分热邪，加桂枝引领石膏、知母上行至肺，从卫分泄热，使邪之郁于表者，顷刻致和而疟已。

【临床举例】活动性风湿性关节炎（热痹）《江西医药》（1965；7:907）：12例活动性风湿性关节炎患者，临床表现为关节疼痛，局部灼热红肿，痛不可近，关节不能活动，遇寒则舒，得热痛加，常为迁移性痛，并兼有发热、口渴、烦闷不安等全身症状，生化检查：白血球计数增高，血沉加快。根据辨证，均属热痹，以白虎加桂枝汤为主进行治疗，并随患者体质及病情辨证加减用药；如热重则选用黄柏、黄芩、山栀等；湿重则选用苡仁、茯苓、六一散、蚕砂等；阴虚则酌加生地、石斛、麦冬；气虚则酌加黄耆、党参；祛风镇痛药用防风、桑枝、威灵仙、乳没；活血通络用当归尾、杭芍、丹皮、木瓜、络石藤等，12例均获得临床痊愈，一般均在服药二剂后；体温开始下降，关节疼痛减轻；服至6～10剂后体温正常，关节红肿疼痛显著减轻，其他症状也逐渐消失，平均治疗时间11天。

04063 白虎合解毒汤

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【异名】白虎解毒汤（《麻科活人》卷二）。

【组成】石膏（研粗末）四钱 知母 天花粉 黄芩 黄连 山栀仁各一钱 生地黄 麦门冬各二钱

【用法】入淡竹叶十片，水二钟煎一钟，更磨入犀角汁，素汤水则与之。

【主治】①《准绳·幼科》：麻疹出而胃热渴甚者。②《中国医学大辞典》：温热及痘疹后余热，

欲成牙疳。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典》引作"白虎合黄连解毒汤"。

04064 白鲜皮七味汤

【方源】《外台》卷四引《许仁则方》。

【组成】 白鲜皮三两 干葛五两 黄芩三两 郁金三两 豉五两 栀子十枚 芒消六两

【用法】 上切。以水八升，煮取二升半，去滓纳芒消，分三次温服。相去如人行二十里久，更服此汤，当得利，利后将息一二日，则合后黄连丸服之。

【主治】 黄疸初得，稍觉心中烦热，外状与平常无别，但举体正黄，甚者眼色如柏，涕、涎、小便及汗悉如柏汁，食消多于平常，稍觉瘦悴乏力者。

04065 白术茯苓干姜汤

【方源】《三因》卷五。

【组成】 白术 干姜 茯苓 细辛 桂心 干葛 甘草（炙） 陈皮 乌梅 豆豉各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，白汤点下。

【主治】 伏暑中风湿，烦渴引饮，心腹疼躁闷，口干面垢，洒洒恶寒、淅淅恶风，微汗，饥不能食。

04066 白芷细辛吹鼻散

【方源】 方出《种福堂方》卷二，名见《医学从众录》卷四。

【组成】 白芷 细辛 石膏 乳香（去油） 没药（去油）各等分

【用法】 上为末。吹入鼻中、左痛吹右，右痛吹左。

【主治】 半边头痛，因风寒而起者。

04067 白虎桂枝柴胡汤

【方源】《四圣心源》卷七。

【组成】 石膏三钱 知母三钱 甘草二钱 粳米半杯 桂枝三钱 柴胡三钱

【用法】 煎大半杯，热服。覆衣。

【主治】 温疟先热后寒，热多寒少，或但热不寒者。

【方论选录】《医学金针》：柴、桂散肝胆之邪；膏、知泄肺胃之热；甘草、粳米生津利水。洵属良方。

04068 白通加猪胆汁汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 白通加人尿猪胆汁汤（《医方考》卷一）。

【组成】 葱白四茎 干姜一两 附子一枚（生、去皮、破）八片 人尿五合 猪胆汁一合

【用法】 以水三升，煮取一升，去滓，纳胆汁、人尿，和令相得，分二次温服。若无胆亦可用。

【主治】 少阴病，阴盛格阳，下利不止，厥逆无脉，面赤干呕而烦躁；及寒湿腰痛。

①《伤寒论》：少阴病，下利利不止，厥逆无脉，干呕烦者。②《医方考》：久坐湿地伤肾，肾伤则短气腰痛，厥逆下冷，阴脉微者。③《医学心悟》：少阴中寒，阴盛格阳，热药相拒不入。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：《内经》曰，若调寒热之逆，令热必行，则热物冷服，下嚥之后，冷体既消，热性便发，由是病气随愈，呕、烦皆除，情且不违，而致大益。此和人尿、猪胆汁咸苦寒物于白通汤热剂中，要其气相从，则可以去格拒之寒也。②《医方考》：干姜、附子，热物也，可以回阳燥湿。师曰：太阳中天，则寒者温，湿者燥。故姜、附可以治寒湿；葱白辛温，可使通肾气；人尿、猪胆，性寒而质阴，用之者，一可以制姜、附之热而不使其燥烈于上焦无病之分，一可以同寒湿之性而引姜、附直达下焦受病之区。此佐以所利，和以所宜，乃兵家之向导也。③《医方集解》：此足少阴药也。葱白之辛以通阳气，姜、附之热以散阴寒。此白通汤也。服而不应者，乃阴盛格拒阳药，不能达于少阴，故加人尿、猪胆汁为引，取其与阴同类，苦入心而通脉，寒补肝而和阴。下咽之后，冷体既消，热性便发，性且不违，而致大益。《经》曰：逆而从之，从而逆之，正者正治，反者反治，此之谓也。

04069 白头翁加甘草阿胶汤

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 白头翁汤（《千金》卷三）、甘草汤（《千金翼》卷七）。

【组成】 白头翁 甘草 阿胶各二两 秦皮 黄连 柏皮各三两

【用法】 以水七升，煮取二升半，纳胶令消尽，分三次温服。

【主治】 ①《金匮》：妇人产后下利虚极。②《金匮要略集注》引东洞吉益：热利下重，大便血，心烦不得眠者。

【方论选录】 ①《金匮要略论注》：虚极不可无补，但非他味参、术所宜，恶其壅而燥也。亦非苓、泽淡渗可治，恐伤液也。唯甘草之甘凉，清中即所以补中；阿胶之滞润，去风即所以和血。以此治病即以此为大补，方知凡痢者湿热非苦寒不除，故类聚四味之苦寒不为过。若和血安中，只一味甘草及阿胶而有余。治痢好用参、术者，政由未悉此

理耳。②《金匮玉函经二注》：伤寒厥阴证下利重者，白头翁汤，四味尽苦寒以治热，苦以坚肠胃。此产后气血两虚，因加阿胶补气血而止利，甘草缓中通血脉。然下利，血沸也，夫人之血行则利自止，甘草尤为要药。此方岂独治产后哉。

【临证举例】 痢疾 《中医杂志》(1980；2:58)：患者女，60余岁。痢下赤白，日数十遍，里急后重。曾服呋喃西林二日，效果不显，发热不高，口干，尚不作渴，舌质淡红，舌边呈细小赤点，干而无津，脉象细数。认为老年津血不足，又患热痢，津血更易耗损。拟白头翁加甘草阿胶汤：白头翁12克，黄连6克，川黄柏6克，秦皮9克，阿胶9克（烊），甘草6克，煎至200毫升，分二次服。上午服第一剂，至晚大便已变粪，续进一剂病愈。

04070 白虎加人参以山药代粳米汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生石膏（捣细）三两 知母一两 入参六钱 生山药六钱 粉甘草三钱

【用法】 用水五钟，煎取清汁三钟，先温服一钟，病愈者，停后服；若未全愈者，过两小时，再服一钟

【主治】 寒温实热已入阳明之府，燥渴嗜饮凉水，脉象细数者。

【方论选录】 愚自临证以来，遇阳明热炽，而其人素有内伤，或元气素弱，其脉或虚数，或细微者，皆投以白虎加人参汤。实验既久，知以生山药代粳米，则其方愈稳妥、见效亦愈速。盖粳米不过调和胃气，而山药兼能固摄下焦元气，使元气素虚者，不至因服石膏、知母而作滑泻。且山药多含有蛋白之汁，最善滋阴，白虎汤得此，既祛实火又清虚热，内伤外感，须臾同愈。

【临证举例】 伤寒 一臾，年近六旬，素羸弱劳嗽，得伤寒证三日，昏愦不知人，诊其脉甚虚数，而肌肤烙手，确有实热。知其脉虚证实，邪火横恣，元气又不能支持。故传经犹未深入，而即昏愦若斯也。踌躇再四，乃放胆投以此汤。将药煎成，乘热徐徐灌之。一次只灌下两茶匙。阅三点钟，灌药两钟，豁然顿醒。再尽其余，而病愈矣。

04071 瓜子散

【方源】《千金》卷六。

【异名】 十子散。

【组成】 冬瓜子 青葙子 茺蔚子 枸杞子 牡荆子 蒺藜子 菟丝子 芜菁子 决明子 地肤子 柏子仁各二合 牡桂二两 薏仁一合 细辛半两 蘘荷根二两 车前子一两

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，食后以酒调下，一日二次。

【功用】 补肝。

【主治】 眼漠漠不明。

【方论选录】《千金方衍义》：瓜子益气，令人悦泽好颜色；青葙子入肝明目；茺蔚子益精明目；枸杞子治肾虚目暗；牡荆子除风湿，开经络，导痰涎，行血气；蒺藜子行恶血，破积聚，明目轻身；菟丝子去风明目，入肝肾气分；芜菁治热毒风肿，子专明目；决明子治青盲，目淫，肤赤，白膜眼赤泪出；地肤子久服耳目聪明；柏子仁除风湿，安五脏，令人耳目聪明；牡桂利关节，通神明；蘘荷根即木通，去热翳，赤白障；薏仁治心腹邪热结气，目赤肿痛，眦烂泪出；车前子专治水轮不清；细辛明目利九窍。总取补肝明目之用，肝血清而肾水受荫矣。

04072 瓜子散

【方源】《千金翼》卷五。

【异名】 甜瓜子散(《圣惠》卷四十一)。

【组成】 瓜子一升 白芷（去皮） 当归 芎劳 甘草（炙）各二两 （一方有松子二两）

【用法】 上为散。每服方寸匕，食后用酒浆或汤饮调下，一日三次。

【主治】 头发早白，虚劳。脑髓空竭，胃气不和，诸脏虚绝，血气不足，故令人发早白，少而筭发及忧愁早白。远视眩眩，风泪出，手足烦热，恍惚忘误，连年下痢。

04073 瓜石汤

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】 栝石汤(《金鉴》卷七十五)。

【组成】 瓜蒌仁九钱 滑石一钱半 南星 苍术 赤芍 陈皮各一钱 黄连 黄柏 黄芩 白芷各五分 甘草二分

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 破伤风，发热。

04074 瓜石汤

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】 瓜蒌五钱 石斛四钱 玄参三钱 麦冬三钱 生地四钱 藿麦四钱 车前子三钱 益母草四钱 马尾连二钱 牛膝四钱

【功用】 滋阴清热，宽胸和胃，活血通经。

【主治】 阴虚胃热所引起的月经稀发后错或血涸经闭。

【方论选录】 本方以瓜蒌、石斛为主药，瓜蒌甘寒润燥，宽胸利气；石斛甘淡微寒，益胃生津，滋

阴除热；合用共奏宽胸润肠，利气和胃之效。另加玄参、麦冬滋阴增液；用生地滋阴生血；瞿麦、车前子活血通经；益母草偏寒，通经活血之中又能生津液；马尾连（或栀子）清胃热，热去则津液能以自生；牛膝引血下行，以期经行血至之目的。总之，全方以滋液清热，宽胸和胃之力而达到活血通经的目的。

04075　瓜蒂汤

【方源】《外台》卷四引《延年秘录》。

【组成】瓜蒂一两　赤小豆四十九枚　丁香二七枚

【用法】上为末。以水一升，煮取四合，澄清，分为两度，滴入两鼻中。

【主治】①《外台》引《延年秘录》：诸黄。②《普济方》：身面四肢浮肿，有虫，鼻中息肉，阴黄、黄疸及暴急黄。

04076　瓜蒂散

【方源】《伤寒论》。

【组成】瓜蒂一分（熬黄）　赤小豆一分

【用法】上二味，各别捣筛，为散已，合治之。取一钱匕，以香豉一合，用热汤七合，煮作稀糜，去滓，取汁合散，温，顿服之。不吐者，少少加；得快吐，乃止。

【功用】涌吐。

【主治】痰涎宿食，壅塞上脘，胸中痞硬，烦懊不安，气上冲咽喉不得息，舌苔厚腻，寸脉浮，按之紧者。

①《伤寒论》：病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲咽喉不得息者，此为胸中有寒，当吐之；病人手足厥冷，脉乍紧者；邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者。②《金匮》宿食在上脘。③《肘后方》：胸中多痰，头痛不欲食。④《得效》：胸有寒痰。⑤《伤寒指掌图》：脉大，胸满，多痰涎，病头痛。⑥《保命歌括》：痰饮在膈上。⑦《张氏医通》：寒痰结于膈上及湿热头重鼻塞。

【宜忌】诸亡血、虚家，不可与。

【方论选录】①《注解伤寒论》：《千金》曰：气浮上部，填塞心胸，胸中满者，吐之则愈。与瓜蒂散，以吐胸中之邪。其高者越之，越以瓜蒂，豆豉之苦；在上者涌之以赤小豆之酸。《内经》曰：酸苦涌泄为阴。②《伤寒来苏集》：瓜为甘果，由熟于长夏，清胃热者也；其蒂，瓜之生气所系也，色青味苦，象东方甲木之化，得春升生发之机，故能提胃中之气，除胸中实邪，为吐剂中第一品药，故必用谷气以和之。赤小豆甘酸，下行而止吐，取为反佐，制其太过也。香豉本性沉重，糜熟而使轻浮，苦甘相济，引阳气以上升，驱阴邪而外出。作为稀糜，调二散，虽快吐而不伤神，仲景制方之精义，赤豆为心谷而主降，香豉为肾谷而反升，既济之理也。③《千金方衍义》：瓜蒂之苦寒，以吐胸中寒实，兼赤小豆之甘酸，以清利心包余热，所谓酸苦涌泄为阴也。④《金鉴》：瓜蒂极苦，赤豆味酸，相须相益，能疏胸中实邪，为吐剂中第一品也。而佐香豉汁合服者，藉谷气以保胃气也。服之不吐，少少加服，得快吐即止者，恐伤胸中元气也。此方奏功之捷，胜于汗下。诸亡血虚家，胸中气液已亏，不可轻与也。

【临证举例】①胸胁痞满　《伤寒论今释》引《生生堂治验》：一男子，胸膈痞满，恶闻食气，动作甚懒，好坐卧暗所，百方不验者半岁。先生诊之，心下石硬，脉沉而数，即以瓜蒂散吐二升余，乃痊。②狂证　《伤寒论临床实验录》：张某，男，五十九岁。因平素性情暴躁，更加思考过度，经常失眠，后遂自言自语，出现精神失常状态，有时咆哮狂叫，有时摔砸杂物，喜笑怒骂变幻无常。如此情况延续月余，渐至见人殴打，百般医疗均无效果。遂疏瓜蒂散与之，瓜蒂10克、豆豉10克、赤小豆10克，煎汤顿服，连进两剂，共呕吐粘涎三次，毫不见效，竟将邻人殴伤并将所有杂物尽行砸碎。遂与大剂瓜蒂散，苦瓜蒂21克、赤小豆31克，煎汤顿服，服后隔半小时便开始作呕，连续两昼夜共呕二十余次，尽属粘涎，自呕吐开始便不思饮食，一天后现周身困顿不欲活动，困睡到第三天忽然清醒，后以豁痰通窍安神之剂，调理而愈。③痰厥　《广东中医》：某女。素无病，或一日气上冲，痰塞喉中，不能言语，此饮邪横塞胸中。当吐之，投以瓜蒂散，得吐后即愈。④笑证　《伤寒论今释》引《生生堂治验》：绵屋弥三郎之妻，善笑，凡视听所及，悉成笑料，笑必捧腹绝倒，甚则胁腹吊痛，为之不得息。常自以为患，请师治之，即与瓜蒂散，吐二升余，遂不再发。⑤性交疼痛，阴道出血　《伤寒论今释》引《生生堂治验》：一妇人，年三十余。每于交接则小腹急痛，甚则阴门出血，而月事无常，腹诊脉象亦无他异。医药万方，一不见效。先生曰：所谓病在下者，当吐之于上。乃与瓜蒂散六分，吐粘痰升许迄，更与大柴胡汤缓缓下之，后全愈。

04077　瓜蒂散

【方源】《外台》卷四引《救急方》。

【组成】 丁香 瓜蒂 赤小豆各十枚

【用法】 上为细末。取暖水一鸡子许，和服。

【主治】 诸黄。暗黄，眼暗及大角赤黑黄，先掷手足；内黄，患渴，疸黄，眼赤黄；肾黄，小便不通，气急心闷；五色黄。

04078 瓜蒌丸

【方源】《丹溪心法心要》卷二。

【异名】 瓜蒌实丸(《杏苑》卷四)。

【组成】 瓜蒌仁 半夏 山楂 神曲各等分

【用法】 上为末，以瓜蒌水为丸。姜汤入竹沥，送下二十丸。

【主治】 食积，痰壅滞喘。

04079 瓜蒌丸

【方源】《济阳纲目》卷三十三。

【组成】 瓜蒌根（薄切，用人乳汁拌蒸，竹沥拌晒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大，噙化；或丸如绿豆大，每服一百丸，米饮下。

【主治】 三消。

04080 瓜蒌丸

【方源】《医林纂要》卷七。

【组成】 瓜蒌一枚（用面包裹煨熟，去面用） 百部四两 麻黄二两 黄芩一两 杏仁一两

【用法】 上为末，捣瓜蒌为丸，清晨服。

【主治】 积年哮喘，偶触清寒即发。此有寒痰宿积于肺而胃气方实盛，故和缓则相安，更遇外寒触之，则阳气郁而忿争，积寒并发，气促而喘矣，此病小儿多有之者，不时喘咳，身有微热。

【方论选录】 瓜蒌甘寒滑润，性质轻浮，人肺能荡肺中之积热沉寒，此用面裹煨之者，杀其寒而资其润，且麦本金谷，亦能补肺而润燥也；百部苦甘温，功专入肺，以去沉寒宿冷；麻黄以祛肺寒，非此不彻；黄芩以泄肺火，清膈热；杏仁破结痰，润心肺，降逆气。

04081 瓜蒌汤

【方源】《传信适用方》卷三引周子明方。

【异名】 栝楼汤(《普济方》卷二八八)。

【组成】 瓜蒌一个（去皮，将瓤与子锉碎） 没药一钱（研） 甘草半两（生，锉）

【用法】 上药用无灰酒三升，煎至一升。分三服，温饵。

【主治】 五发：发脑、发须、发眉、发颐、发背；痈疽；瘰、瘤、癌。

04082 瓜蒌汤

【方源】《妇人良方》卷五。

【异名】 栝楼汤(《普济方》卷一八七)。

【组成】 枳壳四个 厚朴 薤白各一两 瓜蒌一个 桂枝一两（有热除此一味）

【用法】 上㕮咀。水七升，煎取四升，去滓温服。

【主治】 ①《妇人良方》胸痹。②《普济方》胸痹疼痛，痰迷，心膈不利。

【备考】《普济方》有生姜半两。

04083 瓜蒌散

【方源】《鸡峰》卷十六。

【异名】 栝楼散(《卫济宝书》)、乳香散(《医方类聚》卷二三六引《徐氏胎产方》)、瓜蒌乳香散(《医医偶录》卷一)。

【组成】 瓜蒌末一两 乳香一钱

【用法】 上为末。温酒调二钱，不以时服。

【主治】 ①《鸡峰》：产后骨节、肌肤热痛。②《卫济宝书》乳痈。③《妇人良方》产后吹奶。

04084 瓜蒌散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 瓜蒌仁 青皮各一钱 石膏二钱 甘草节 没药 归尾 皂刺 金银花各五分 青橘叶（取汁）二匙

【用法】 水、酒各半盏煎。空心服。

【主治】 乳痈未溃者。

【加减】 如已溃者，去石膏、没药、皂刺、金银花，用当归身，加人参、黄耆、川芎、白芍，煎服。

【方论选录】 瓜蒌仁消毒，青皮疏肝，石膏清胃，甘草节行瘀，没药止痛，归尾破血，青橘叶解毒。

04085 瓜蒌散

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】 瓜蒌一个（半生半炒） 粉草一寸（半生半炙） 生姜一块（半生半煨）

【用法】 上锉。用酒二碗煎服。少顷，痛不可忍，即搜去败乳，临卧再一服，顺所患处乳侧，卧于床上，令其药行故也。无生姜，用麦芽。

【功用】 令败乳自退。

【主治】 乳初结胀不消。

04086 瓜蒌散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 大瓜蒌（连皮捣烂）一枚 粉甘草二钱 红花七分

【用法】 水煎服。

【主治】 肝气燥急而胁痛，或发水泡。

【方论选录】 瓜蒌为物，甘缓而润，于郁不逆，又如油之洗物，滑而不滞，此其所以奏功也。

04087 瓜蒌煎

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】 瓜蒌二两 茯神 石斛 人参 肉苁蓉各一两 甘草 黄连 当归 五味子 丹参各半两 知母 胡麻各一两 地骨皮 葳蕤各二两 蜜五合 生地黄汁一升 牛髓一合 淡竹叶五十片 生麦门冬汁五合 生姜汁一合

【用法】 以水三升，煮地骨皮，葳蕤、胡麻、淡竹叶四味，去滓取汁一升，和地黄汁、麦门冬汁、牛髓、蜜、姜汁等，入前药末，搅令匀，又煎成膏，入于铜器中。每服不拘时候，以粥饮调下半匙。

【主治】 虚劳燥渴，四体虚乏，羸瘦。

04088 瓜子仁汁

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】 瓜子仁三合（与水六合同研，绞取汁） 当归（切，焙）一两（捣末） 蛇蜕一条（烧灰，研）

【用法】 上将当归、蛇蜕研末和匀，分作二服，空心、日午用瓜子汁调下。下脓血即愈。

【主治】 肠痈。壮热恶寒，微汗气急，少腹痛，小便涩，或大便如刀锥刺痛，或腹中已成脓。

04089 瓜子眼药

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 炉甘石（煅）十七两 梅片四钱三分 硼砂四钱 牛黄二分 琥珀八钱 珍珠（豆腐炙）二分 熊胆一钱 麝香二分 黄连二两（熬汁浸炉甘石）

【用法】 上为极细末，过箩，炼老蜜和匀，制成瓜子型锭剂，重一分。用药沾凉开水少许，点于大眼角内，每日四五次。

【功用】 明目退翳，消肿止痒。

【主治】 风火目疾，老眼昏花，暴发火眼，红肿赤烂。

04090 瓜蒌子散

【方源】《奇效良方》卷五十四。

【组成】 瓜蒌子（微炒） 连翘 何首乌 皂荚子仁（微炒） 牛蒡子（微炒） 大黄（微炒） 白螺壳 栀子仁 漏芦 牵牛（微炒） 甘草（生）各一两

【用法】 上为细末。每服二钱匕，食后温酒调下。

【主治】 瘰疬初肿，疼痛寒热，四肢不宁。

04091 瓜蒌仁汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】 桔梗二两 枳壳一两 瓜蒌仁四两（另研） 半夏五钱

【用法】 上为末，以姜汁糊为丸。每服五七十丸，用蜜糖汤送下，一日三次。

【主治】 七情气郁成痰，气噎痞痛，喘闷。

【方论选录】 法宜和气豁痰为要，故用桔梗利气，瓜蒌、半夏豁痰。

04092 瓜蒌实丸

【方源】《医方类聚》卷一〇六引《济生》。

【组成】 瓜蒌实（别研） 枳壳（去瓤，麸炒） 半夏（汤泡七次） 桔梗（炒）各一两

【用法】 上为细末，姜汁打糊为丸，如梧桐子大，每服五十丸，食后用淡姜汤送下。

【主治】 噎膈。胸痞，胸中痛彻背，喘急妨闷。

【方论选录】 ①《丹溪心法附余》：此方瓜蒌仁润肺降痰，枳壳破滞气，半夏豁痰燥湿，桔梗开膈载药，可谓善治痞闷喘急矣。痰因火动，加黄连尤妙，丹溪云：胸中痞，须用枳实炒黄连是也。②《医方考》：痰随气上，亦随气下，故瓜蒌、枳壳、桔梗皆下气药也；痰以湿生，必以燥去，故半夏者，燥湿之品也。或问桔梗为诸药之舟楫，浮而不沉者也，何以下气？余曰：甘者恋膈，苦者下气，轻者上浮，苦者下降，此药之性也。桔梗甘而苦，为阳中之少阴，故初则恋膈，久则下气矣。

04093 瓜蒌根汤

【方源】《妇人良方》卷二十一引《集验》。

【组成】 瓜蒌根四两 麦门冬 人参各三两 生干地黄 甘草各二两 土瓜根五两 大枣二十枚

【用法】 上㕮咀。以水八升，煮取二升半，分三服。

【主治】 产后血渴。

04094 瓜蒌内托散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 瓜蒌一个（半生半炒） 人参 归尾 没药各五钱 甘草一钱

【用法】 黄酒二碗，煎一碗，食前服。

【功用】 活血消毒。

【主治】 痈发于腿外侧者。

04095 瓜蒌必效散

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】 瓜蒌一个（捣烂） 金银花 当归 生甘草各五钱 乳香（去油） 没药（去油）各一钱（一方有白芷、青皮各一钱）

【用法】 水煎服。

【主治】 乳痈。初起肿痛发于肌表，肉色焮赤，其人表热或憎寒壮热，头痛烦渴。

04096 瓜蒌托里散

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】 黄瓜蒌一个（杵碎） 忍冬藤 乳香各一两 苏木五钱 没药三钱 甘草一钱

【用法】 用酒三碗，煎二碗，空心、日午、临睡分三服。或以此为末，酒糊丸，弹子大，朱砂为衣。细嚼，用当归酒送下。

【功用】 疮疡未成易消，已成易溃，既溃则生肌。

【主治】 疮疡毒盛，打扑损伤。

04097 瓜蒌竹茹汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】 瓜蒌根 青竹茹

【用法】 用水煎，调烧犀散在内服。

【主治】 阴阳易。热气上冲，胸中烦闷，手足挛拳，搐搦如风状。

04098 瓜蒌枳实汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 瓜蒌（去壳） 枳实（麸炒） 桔梗（去芦） 茯苓（去皮） 贝母（去心） 陈皮 片芩（去朽） 山栀各一钱 当归六分 砂仁 木香各五分 甘草三分

【用法】 上锉一剂，生姜煎，入竹沥、姜汁少许，同服。外用姜渣揉擦痛处。

【主治】 痰结咯吐不出，胸膈作痛、不能转侧，或痰结胸膈满闷作寒热气急，并痰迷心窍不能言语者。

【加减】 痰迷心窍，不能言语，加石菖蒲，去木香；气喘，加桑白皮、苏子。

04099 用效润肠丸

【方源】《方症会要》卷一。

【组成】 麻仁二两 郁李仁一两 陈皮三钱 当归梢一两五钱 枳壳三钱

【用法】 炼蜜为丸服。

【主治】 老人及虚弱人便结。

04100 乐令黄耆汤

【方源】《千金》卷十九。

【异名】 乐令建中汤（《局方》卷五）、黄耆汤（《普济方》卷二三一）。

【组成】 黄耆 人参 橘皮 当归 桂心 细辛 前胡 芍药 甘草 茯苓 麦门冬各一两 生姜五两 半夏二两半 大枣二十枚

【用法】 上㕮咀。以水二斗，煮取四升，一服五合，日三夜一服。

【功用】 ①《千金》：补诸不足。②《医方集解》：退虚热，生气血。

【主治】 ①《千金》：虚劳少气，胸心痰冷，时惊惕，心中悸动，手脚逆冷，体常自汗，五脏六腑虚损，肠鸣，风湿荣卫不调百病。又治风里急。②《岭南卫生方》：岭南瘴毒，发热烦躁，引饮，大便不通，小便赤涩，或狂言内热，神昏不省人事。

【加减】 加蜀椒一两、乌头五枚，名“乐令大黄耆汤”。

04101 汉椒散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 汉椒一两（去目及闭口者，微炒去汗） 桂心三分 侧子一两（炮裂，去皮脐） 麻黄三分（去根节） 当归三分 木香三分

【用法】 上为细散。每服半钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 风走注疼痛，及白虎历节风。

04102 汉防己丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【异名】 防己丸（《圣济总录》卷五十九）。

【组成】 汉防己三分 猪苓三分（去黑皮） 栝楼根一两 赤茯苓一两 桑根白皮一两半（锉） 白术半两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 郁李仁一两半（汤浸，去皮，微炒） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色）

【用法】 上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，于食前以温水送下。

【主治】 消渴。已觉津液耗竭，身体浮气如水病者。

04103 汉防己散

【方源】《圣惠》卷三十。

【异名】 防己汤（《圣济总录》卷三十二）。

【组成】 汉防己三分 猪苓三分（去黑皮） 海蛤一两 陈橘皮一两（汤浸去白瓤，焙） 木香半两 白术半两 桑根白皮三分（锉） 赤茯苓三分 槟榔一两 紫苏茎叶一两 木通一两（锉）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：虚劳，四肢浮肿，喘息促，小便不利，坐卧不安。②《圣济总录》：伤寒或病疾后，身体浮肿，喘息促急，小便不利，坐卧不安。

04104 汉防己散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】汉防己三分 桑根白皮一两（锉） 木通一两（锉） 赤茯苓一两 泽漆半两 百合一两 甜葶苈三分（隔纸炒令紫色） 郁李仁三分（汤浸，去皮，微炒）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺脏气壅，闭隔不通，致令面目浮肿，咳嗽喘急，坐卧不安。

04105 汉防己散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【异名】防己散（《准绳·类方》卷二）。

【组成】汉防己一两 黄耆一两（锉） 桂心一两 赤茯苓二两 甘草半两（炙微赤，锉） 桑根白皮一两（锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，一日三次。

【主治】皮水肿。如裹水在皮肤中，四肢习习然动。

04106 汉防己煮散

【方源】《千金》卷二十一引褚澄方。

【异名】防己煮散（《外台》卷二十引《古今录验》）。

【组成】汉防己 泽漆叶 石苇 泽泻各三两 白术 丹参 赤茯苓 橘皮 桑根白皮 通草各三两 郁李仁五合 生姜十两

【用法】上为粗散。以水一升半，煮散三方寸匕，取八合，去滓顿服，一日三次。取小便利为度。

【主治】水肿上气。

【备考】本方方名，《普济方》引作"汉防己散"。

04107 立圣散

【方源】方出《幼幼新书》卷五引《吉氏家传》，名见《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】金头蜈蚣一个 青州蝎梢四个 白僵蚕七个 罂麦二字

【用法】上为末。用一字许吹鼻内，嚏时可医，更用薄荷水下一字在口。

【主治】小儿脐风锁口。

04108 立行饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】官桂三钱 干姜 广木香 玄胡索各一钱 牛膝 蓬术 归尾 山楂各一钱五分

【用法】酒煎，空心热服。

【主治】闭经，因食生冷所致。

04109 立安丸

【方源】《三因》卷十三。

【组成】破故纸（生） 续断 木瓜干 牛膝（酒浸） 杜仲（去皮，锉，姜制，炒丝断）各一两 萆薢二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐汤、盐酒任下。

【功用】温肾填精，强健腰脚。

①《三因》：补肾，强腰脚。②《证治汇补》：暖肾添精。③《全国中药成药处方集》（沈阳方）：健腰温肾，舒筋壮骨。

【主治】①《三因》：五种腰痛。脚气。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：腰腿疼痛，足膝无力，肾囊湿痒、四肢拘急，精神不振，形容憔悴，筋骨疼痛，腰肾虚寒。

04110 立安丸

【方源】《明医指掌》卷六。

【组成】牛膝（去芦）四两 杜仲（盐炒）四两 破故纸（炒）四两 黄柏二两（酒炒） 大茴香（炒）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸。淡盐汤送下。

【功用】补肾，止腰疼。

【主治】①《明医指掌》：腰痛。②《类证治裁》：老人虚人肾亏腰痛，不能转侧。肾虚湿着，足心及踝骨热痛者。

04111 立安散

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】麻黄九两（去根不去节，炒焦黄） 石膏一两半（生用） 罂粟壳一两（蜜炒） 苦葶苈半两（微炒） 藿香半两 人参（去芦头）一分

【用法】上为细末。每服二钱，食后、临卧白沸汤调下。

【主治】一切咳嗽喘急，坐卧不宁。

04112 立应丸

【方源】《百一》卷十。

【组成】白僵蚕 白矾各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸。含化。

【主治】缠喉风，急喉痹。

04113 立应汤

【方源】《外科百效》卷五。

【组成】蔓荆子 防风 荆芥 苦参 苍耳 黄荆子 牛蒡子 胡麻仁 甘枸杞 余粮石 白芷梢 苍术 连翘 土茯苓 羌活 独活各三钱

【用法】水煎，早空心服。

【主治】 白癜癣并梅癣。

04114 立应散

【方源】《百一》卷八。

【组成】 高良姜一分 五灵脂半两

【用法】 上为细末。每用一钱半，以醋一茶脚调匀，用百沸汤投半盏，连滓急服。

【主治】 急心痛。

04115 立应散

【方源】 方出《百一》卷八，名见《医方类聚》卷九十二引《济生续方》。

【组成】 玄胡索不拘多少（新瓦上炒微黄，不可焦）

【用法】 上为细末。每服三钱，酒一盏，煎至七分服。不能饮者，以陈米饮调下，不拘时候；以酒调亦得。

【主治】 妇人血刺心痛。

04116 立应膏

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】 生柏叶（焙干）二两 糯米（焙干）三两

【用法】 上为细末，冷水调如糊。涂肿处。频换即愈。

【主治】 汤火所伤，皮肉已破烂者。

04117 立金汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】 杜仲五钱 故纸四钱 萆薢三钱半 当归一钱半 续断二钱 牛膝二钱 狗脊一钱 木瓜一钱半 炙草五分 胡桃肉一钱

【用法】 酒二碗煎，加盐下，连二服。

【主治】 腰痛。

【宜忌】 戒房事。

04118 立胜散

【方源】《三因》卷十六。

【异名】 立胜煎(《中医眼科学讲义》)。

【组成】 黄连 黄柏 秦皮（去粗皮） 甘草等分

【用法】 上为锉散。每服四钱，水一盏，加大枣一枚，灯心七茎，煎数沸，去滓。以新羊毫笔蘸刷眼，候温，即用手沃之。

【主治】 ①《三因》：风毒攻眼，及时眼隐涩羞明肿痛。②《中医眼科学讲义》：风牵偏视。

【备考】《中医眼科学讲义》本方用法：加水300毫升，煎30分钟后，过滤浓缩到150毫升，再加缓冲溶液，以消除刺激性。

04119 立效丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】 豆豉四两（焙干） 川乌头二两（生，去皮脐尖） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 石膏（生）各一两 地龙（去土，炒） 葱子（生）各半两

【用法】 上件为细末，葱汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后生葱、茶清送下。

【主治】 头疼不可忍者。

04120 立效丹

【方源】《霍乱论》卷下。

【组成】 朱砂三两 明雄黄 硼砂各一两八钱 梅冰 当门子各九钱 火消六钱 荜茇 牛黄各三钱

【用法】 上为细末，瓷瓶紧收，勿令泄气。每用分许，芦管吹入鼻内。若卒倒气闭重证，则七窍及脐中均可放置。凡暑月入城市，抹少许于鼻孔，可杜秽恶诸气。

【主治】 诸痧中恶，霍乱五绝，诸般卒倒急暴之证。

04121 立效饮

【方源】《普济方》卷三八八。

【异名】 立效散(《婴童百问》卷八)。

【组成】 木通 甘草 王不留行 竹胡荽 滑石 海金沙 山栀子 槟榔各等分

【用法】 上㕮咀。每服一钱，水半盏，煎三分，去滓服。

【主治】 小儿诸淋不通，茎中疼痛。

04122 立效饮

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】 黄连二钱（一半生用，一半酒炒） 黄芩二钱 芒消一钱 薄荷叶三钱 大黄三钱（一半生用，一半酒炒） 连翘一钱 栀子二钱 甘草五分

【用法】 水煎，食后温服。

【主治】 时行赤眼症。一切实热，里急后重，肛毒下血，酒毒，膈热，肚疼。

04123 立效散

【方源】《局方》卷八。

【异名】 立效汤(《圣济总录》卷九十七)。

【组成】 山栀子（去皮，炒）半两 瞿麦穗一两 甘草（炙）三分

【用法】 上为末。每服五钱至七钱，水一碗，入连须葱根七茎、灯心五十茎、生姜五七片，同煎至七分，时时温服，不拘时候。

【主治】 下焦结热，小便黄赤，淋闭疼痛，或有血出，及大小便俱出血者。

04124 立效散

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】乳香一钱 灯花七枚

【用法】上为散。每服半字，涂奶母乳头上令服。

【主治】小儿夜啼。

04125 立效散

【方源】《中藏经·附录》

【组成】玄胡索 当归 官桂各等分

【用法】上为细末。每服二钱匕，酒调下。

【主治】腰痛。

04126 立效散

【方源】《续本事》卷三。

【组成】川芎 川楝子 青皮 舶上茴香 桃仁 黑牵牛各一两（焙）

【用法】上焙干，为细末。每服二钱，无灰酒一盏，煎至八分盏，温服。

【主治】①《续本事》：疝气。②《医统》：膀胱湿热相乘，阴囊肿胀，大小便不利。

04127 立效散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】细辛二分 炙甘草三分 升麻七分 防风一钱 草龙胆（酒洗）四钱

【用法】上㕮咀。都作一服，水一盏，煎至七分，去滓，以匙抄在口中，煤痛处，待少时则止。

【主治】牙齿痛不可忍，连及头脑项背，微恶寒饮，大恶热饮。

【方论选录】《杏苑》：阳明湿热壅盛牙疼，法当疏湿清热为主。经云风能胜湿，寒可胜热。故用细辛、防风以胜湿，胆草、升麻以解热，佐甘草和药泻火。

04128 立效散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】当归 莲花心 白绵子 红花 茅花各一两

【用法】上锉如豆大，白纸裹定泥固，炭火烧灰存性，为细末。如干血气，研血竭为引，好温酒调服，加轻粉一钱；如血崩不止，加麝香为引，好温酒调服。

【主治】①《兰室秘藏》：妇人血崩不止。②《医略六书》：血崩不止脉涩者。

【方论选录】《医略六书》：久郁伤肝，不能藏血，故血不归经，崩下不止焉。棉花子散滞气，力能解郁开结；莲花心凉心气，性善涩血固经；红花生新去宿，当归养血归经，茅花轻扬止血以定崩下也。为散，水煎，务使肝郁解散，则经脉调和而经气完复，血不妄行，何崩下之不除乎。

【备考】《医略六书》本方用法：为散煎服。

04129 立效散

【方源】《普济方》卷二〇八。

【组成】乌梅肉 御米壳 白矾 甘草（炙）夜叉头各等分

【用法】上为末。每服二钱半，空心米饮汤调下。

【主治】泻。

04130 立效散

【方源】《医方类聚》卷二一八引《仙传济阴方》。

【组成】青皮 陈皮 乌药 干姜 香附子 莪术三棱

【用法】上醋煮，焙干为末。空心陈皮汤调下。

【主治】妇人经年积血，腹中常痛，日夜呻吟不得眠。

04131 立效散

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】牙消一厘 雄黄半厘 麝香半厘

【用法】上为极细末。以少许点入眼中，令人扶患者周围行数次，腰疼如失。如未效，再点，再行，疼止为度。

【主治】闪挫腰疼，不能屈伸者。

04132 立效散

【方源】《准绳·类方》卷六。

【组成】山楂一钱五分（醋炒） 青皮一钱二分（醋炒） 小茴香（盐水炒） 枳实（麸炒） 苍术（米泔浸一宿炒） 香附 吴茱萸 山栀（炒黑） 川楝肉各一钱

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，食前服。

【主治】疝，因食积作痛。

04133 立效散

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷四引《资生》。

【组成】全蝎七个 缩砂三七枚 茴香一钱

【用法】上为末。分三贴，空心热酒调下。

【主治】①《东医宝鉴·外形篇》引《资生》小肠气。②《杂病源流犀烛》：小肠气，有茎囊抽痛，不可忍耐者。

04134 立效散

【方源】《济阴纲目》卷二。

【组成】香附（炒）二两 当归一两 赤芍药 良姜 五灵脂各半两

【用法】 上为细末。每服三钱，酒一盏，童便少许，同煎服。

【主治】 妇人血崩，脐腹痛。

04135 立效散

【方源】《疡医大全》卷十三。

【组成】 蛇退（火烧存性）（一方加冰片）

【用法】 上为末。鹅管吹入耳内。

【主治】 耳内忽作大痛，如有虫在内奔走，殊痛，或出血，或出水，或干痛，不可忍者。

04136 立效散

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】 当归二钱 通草一钱 桃仁二钱 穿山甲二钱 怀牛膝一钱五分 制大黄二钱五分 中青皮一钱 骨碎补（去毛净）二钱 乳香二钱 没药二钱 白芷一钱五分 苏子一钱 红花一钱五分 杜仲二钱 降香一钱 甘草一钱 血竭三钱 三七一钱五分 地鳖虫二钱（米店内多有） 石南枝头三钱

【用法】 共煎汤，加童便一酒钟、老酒一酒钟温服。极重者二服即愈。今改为末子药，如遇病不重者，只需每服吃末子五钱，外加童便一杯、老酒一杯送下，轻者三服，重者仍照方煎服。

【主治】 跌打内伤，并闪挫风气，疼痛。

04137 立效散

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】 良姜 草乌 细辛 荆芥穗各等分

【用法】 上为末。用少许擦牙。有涎则吐之。

【主治】 风虫牙痛。

04138 立消丸

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 槟榔 草果（炒） 山楂肉 莱菔子（炒）各二两 阿魏（酒炖化）一两 三棱 莪术（醋煮） 广木香 青皮（醋炒） 香附各一两五钱

【用法】 上为末，神曲六两，打糊为丸。每服三钱，姜汤送下。

【主治】 饮食积聚成块。

04139 立消汤

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【组成】 蒲公英一两 金银花四两 当归二两 玄参一两

【用法】 水煎，饥服。

【功用】 托脓清毒。

【主治】 痈疽发背，或生头项，或生手足臂腿腰脐之间、前阴粪门之际，以及肺痈、肠痈。

04140 立消汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 银花 15～31 克 当归 9 克 蒲公英 9～15 克 玄参 9 克 苡仁 12 克 茯苓 12 克

【用法】 水煎，内服。

【主治】 下肢溃疡。

04141 立消散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】 白硼砂 灯心灰（以灯心塞入罐内固济，煅之罐红为度） 风化消 黄柏 青黛 冰片各等分

【用法】 上为极细末。以芦管吹入喉中。

【主治】 喉痹。

04142 立消散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 草乌一两 白及 甘遂各一两 小良姜三钱 甘草三钱 麝香一钱

【用法】 上为末。用苍术捣汁，加醋调匀，鸡翎蘸扫肿处。

【主治】 大头风，头面虚肿如泡。

04143 立消散

【方源】《疡医大全》卷八。

【异名】 立消膏（《中医皮肤病学简编》）。

【组成】 雄黄二钱二分 川山甲三钱 生大黄（锦纹者良） 芙蓉叶 倍子（炒）各五钱

【用法】 上为极细末。滴醋调敷，中留一孔透气，如干又搽。

【主治】 ①《疡医大全》：痈疽。②《中医皮肤病学简编》：带状疱疹。

04144 立消散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 赤小豆 15 克 风化消 15 克 赤芍 15 克 枳壳 15 克

【用法】 上为细末服。

【主治】 女阴溃疡。

04145 立消膏

【方源】《直指》卷二十。

【异名】 至妙立消膏（《活幼口议》卷二十）、立消散（《医学入门》卷七）、立消丹（《眼科全书》卷六）。

【组成】 雪白盐（净器中生研）少许

【用法】 上以大灯草蘸盐，轻手指定浮翳就点，凡三次。不疼痛，勿惊恐。

【主治】 ①《直指》：浮翳、粟翳，雾膜遮睛。②《活幼口议》：小儿眼患，初作粟翳、浮翳，或来或去，渐发差大，侵睛减明。

04146 立患丹

【方源】《回春》卷五。

【组成】 艾叶二两 葱头一根（捣烂） 生姜一两五钱（捣烂）

【用法】 上用布共为一包，蘸极热烧酒擦患处。以痛止为度。

【主治】 湿气两腿作痛。

04147 立效饼子

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】 良姜 草乌 川芎 荜茇 胡椒各等分

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大，捻作饼子。每用一饼，咬在患处。有涎出立愈。

【主治】 一切风牙虫牙，疼痛不可忍。

04148 立马回疔丹

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 回疔丹（《全国中药成药处方集》（上海方）。

【组成】 蟾酥（酒化） 硇砂 轻粉 白丁香各一钱 蜈蚣一条（炙） 雄黄 朱砂各二钱 乳香六分 麝香一字 金顶砒五分（用铅一斤，小罐内炭火煨化，投白砒二两于化烊铅上炼，烟尽为度，取出冷定打开，金顶砒结在铅面上，取下听用）

【用法】 上为细末，糊成麦子大。凡遇疔疮，针破，用此一粒插入孔内，膏盖之。追出脓血疔根为效。

【功用】《中药制剂手册》：消毒止痛。

【主治】 疔疮。

①《外科正宗》：疔疮初起，失治误治，以致疔毒走散不住，走黄险恶症。②《慈幼新书》：痘疔初生紫点。③《药奁启秘》：疔疮初起，顶不高突，根脚不收者。④《中药制剂手册》：疔毒扩散内攻引起面甲青紫，呕吐神昏，麻痛烦闷。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（上海方）：忌猪肉荤腥食物。

【备考】《全国中药成药处方集》（上海方）：原方有白丁香，今已不用。

04149 立止吐血膏

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 鲜生地一斤 生绵纹三两 桑叶 丹皮 血见愁 杜牛膝各二两 土三七 苏子 降香各一两

【用法】 用冰糖四两收膏。每服八钱至一两，犀地清络饮去桃仁、姜、蒲二汁冲下。

【功用】 引血下行，止血逐瘀。

【主治】 伤寒夹血，呕血吐血，表邪虽解，血尚不止者。

04150 立止咳血膏

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 剪草一斤 地锦二斤 野百合 黑木耳 白及 没石子各一两 鲜藕节二两 鲜枇杷叶（去毛筋，净） 鲜刮淡竹茹 鲜茭白根各八两

【用法】 先煎，去滓滤净，加净白蜜一斤、奎冰糖八两，煎浓成膏。寻常咳血妄行，每服一小匙，日二夜一，空心服。如久病损肺咳血，五更服此，上下午服琼玉膏。

【功用】 降气泻火，补络填窍。

【主治】 咳血妄行，或久病损肺咳血。

04151 立应绀珠丹

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】 茅术八两 全蝎 石斛 明天麻 当归 甘草（炙） 川芎 羌活 荆芥 防风 麻黄 北细辛 川乌（汤泡，去皮） 草乌（汤泡，去皮尖） 何首乌各一两 明雄黄六钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每药一两分作四丸、一两作六丸、一两作九丸三等，做下以备年岁老壮、病势缓急取用，预用朱砂六钱，研细为衣，瓷罐收贮。诸疾有表证相兼者，用连须大葱白九支煎汤一茶钟，将药一丸乘热化开，通口服尽。盖被出汗为效。如服后汗迟，再用葱白汤催之，后必汗如淋洗，渐渐退下覆盖衣物，其汗自收自敛，患者自然爽快，其病如失。但病未成者，随即消去；已成者，随即高肿溃脓。如诸疾无表证相兼，不必发散者，只用热酒化服。

【功用】 发散疮毒，截解风寒，顺气搜风，通行经络。

【主治】 恶疮初起二三日之间，或痈疽已成至十朝前后，但未出脓者，状若伤寒头痛，烦渴拘急，恶寒，肢体疼痛，恶心呕吐，四肢沉重，恍惚闷乱，坐卧不宁，皮肤壮热；寒伤四时感冒，传变疫症，但恶寒身热，表证未尽者；痈疽疔毒，对口发颐，风湿风温，湿痰流注，附骨阴疽，鹤膝风症；左瘫右痪，口眼喎斜，半身不遂，气血凝滞，遍身走痛，步履艰辛，偏坠疝气，偏正头痛，破伤风牙关紧闭。

【宜忌】 服后避风，当食稀粥。忌冷物、房事。孕妇勿服。

【方论选录】 详观此方，治肿疡甚效者何也？凡疮皆起于营卫不调，气血凝滞，乃生痈肿，观此药性专发散，又能顺气搜风，通行经络，所谓结者开之，况疮毒乃又日积月累，结聚所发，苟非甘温辛

热发泄以汗疏通，安能得效。所谓发散不远热，正合此方之意。

04152 立命开阳汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 干河车二钱（切） 破故纸一钱五分（合桃肉拌炒） 益智仁一钱五分 附子片八分 当归一钱五分 茯苓二钱 白术一钱 小茴香一钱 木香六分 乌药一钱 煨姜三片

【主治】 肾气虚寒，腹痛下利，完谷不化，手足俱冷者。

04153 立消疔疮外治神效方

【方源】《种福堂方·附录》。

【异名】 疔疮膏（《经验方》卷上）。

【组成】 松香二十两 没药三两（研极细末） 白蜡二两（切，为粗末） 铜绿五两（研细，过绢筛，再研至无声为度） 黄蜡十两（刮取粗片） 百草霜五两（研细，过绢筛，再研至无声为度） 明乳香三两（研极细末） 麻油六两

【用法】 用桑柴火先将麻油入锅煎滚，次下松香候稍滚，三下白蜡候稍滚，四下黄蜡候稍滚，五下乳香候稍滚，六下没药候稍滚，七下铜绿候稍滚，八下百草霜，滚过数次，于锅内冷透，搓成条子为丸，如龙眼核大，藏净瓷器内。临用时以一丸呵软捻扁贴患处。顷刻止痛，次日肿消即愈，已走黄者贴之，亦无不霍然。

【主治】 疔疮。

【宜忌】 贴后忌食荤腥辛辣、沸汤大热食、生冷发物、面食、豆腐、茄子、黄瓜、酒，忌水洗，忌恼怒忧闷，大忌房事。

【备考】 ①制松香法：用桑柴灰煎汁澄清，入松香煮烂，取出入冷水中，少时再入灰水中煮，以色白如玉为度。②取百草霜法：先须刮净锅底，专烧茅柴百草，取烟煤用。如以别种柴烟煤用入，则不验。

04154 玄及膏

【方源】《摄生秘剖》卷四。

【组成】 北五味子一斤（水浸一宿，去核） 白蜜三斤

【用法】 五味子入砂锅，加河水煎之取汁，又将滓再煎，以无味为度，入蜜微火熬成膏，空心白汤下二三匙。

【功用】 强阴壮阳。

【主治】 火嗽，梦遗精滑。

【方论选录】 北方之令主闭藏、神气虚怯则不能收固。五味子味酸，酸者束而收敛，能固耗散之精，有金水相生之妙，况酸味正入厥阴，厥阴偏善疏泄，乃围魏救赵之法也。一物单行，功专力锐，更无监制，故为效神速。

04155 玄妙散

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 玄参一钱五分 丹参三钱 沙参四钱 茯神二钱 柏仁二钱 麦冬一钱五分（朱砂拌） 桔梗一钱 贝母二钱 杏仁三钱 夜合花二钱 淡竹叶十张 灯心三尺

【主治】 心经之咳，痰少心烦，夜不成寐。

04156 玄明散

【方源】《医方类聚》卷六十九引《王氏集验方》。

【组成】 蕤仁（去油）三钱 硼砂（明者）五钱 乌贼鱼骨（去骨） 玄明粉各五钱 朱砂（去石）二钱

【用法】 上为极细末，入脑、麝各少许，再擂，用瓷盒盛。每用银箸点之。

【主治】 眼目翳障。

04157 玄参丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 玄参 羚羊角屑 川升麻 汉防己 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 沙参（去芦头） 车前子 桑根白皮（锉） 栀子仁各一两 大麻仁一两半 川大黄一两半（锉碎，微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后以温水送下，夜临卧时再服。

【主治】 肺脏积热，白睛肿胀，遮盖瞳人，开张不得，赤涩疼痛。

【备考】 本方改为饮剂，名玄参饮（见《审视瑶函》）。

04158 玄参丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 玄参 决明子 黄耆（锉） 黄连（去须） 青葙子 露蜂房（微炒） 漏芦 羚羊角屑各一两 蕤仁一两半（汤浸，去赤皮） 珍珠粉 雄黄（细研） 朱砂（细研）各半两

【用法】 上为末，入研了药，一时研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后以温浆水送下，临卧再服之。

【主治】 眼脓漏，眦头赤痒，日夜出脓水不止。

04159 玄参丸

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【异名】 玄门丹（《寿世保元》卷六）。

【组成】 玄参天门冬（去心，焙） 麦门冬（去

心，焙）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每用一丸，绵裹含化咽津。

【主治】 ①《圣济总录》：口疮。②《寿世保元》：虚火口疮，连年不愈。

04160 玄参散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】 玄参一两 川升麻半两 射干半两 川大黄半两（锉碎，微炒） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，放温，时时含咽。

【主治】 悬壅肿痛，不下饮食。

【方论选录】《本事方释义》：玄参气味咸苦，入手足少阴；升麻气味辛温，入足阳明；射干气味苦平，入手足厥阴；大黄气味苦寒，入足阳明；甘草气味甘平，入足太阴。治悬痈痛咽阻不能下食者，以苦降之品，少佐辛温，再少使以甘平，则上逆之热缓缓下行，病自减矣。

04161 玄参散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 玄参三分 川升麻三分 川大黄三分（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉） 犀角屑三分

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 心脾壅热，生木舌肿胀。

【方论选录】《本事方释义》：玄参气味咸苦，入手足少阴；升麻气味辛温，入足阳明；大黄气味苦寒，入足阳明；犀角气味苦酸咸，微寒，入手足厥阴；甘草气味甘平，入足太阴，能缓诸药之性。因心脾气壅痹不宣，非下行不能杀其势，速下犹恐热不尽，故以甘平之品缓其下行之势，则壅热去而无不尽矣。

04162 玄参散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】 玄参一两 黄耆二两（锉） 露蜂房一两（微炒） 地榆三两（锉） 白蔹一两 赤芍药二两 黄芩三两 川升麻一两 漏芦一两 桑根白皮二两（锉） 栀子仁一两 川大黄二两（锉碎，微炒） 川朴消三两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 发背溃后，脓血不止，渐渐疮大，疼痛，身体壮热。

04163 玄参散

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】 玄参 大黄（锉，炒）各二两半 决明子（炒） 菊花 车前子 升麻 黄连（去须） 枳壳（去瓤，麸炒）各二两 栀子仁（炒） 防风（去叉）各一两半 苦参（锉）半两

【用法】 上为散。每服三钱匕，食后、临卧蜜水调下，一日三次。

【主治】 上膈壅滞，风邪毒气攻目，令目睛疼痛；目赤痛，胬肉满急。

04164 玄胡丸

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】 玄胡索 青皮（去白） 陈皮（去白） 当归 木香 雄黄（别研） 荆三棱 生姜各一两

【用法】 上为末，酒面糊为丸，如小豆大。每服五七丸，生姜汤送下。

【功用】 解中外诸邪所伤。

【主治】 积聚癥瘕。

04165 玄胡饼

【方源】《医统》卷五十三。

【组成】 玄胡索十枚 猪牙皂角（肥实者）二枚 青黛二钱

【用法】 上为末，水和成小饼子，如杏仁大。用时令患人仰卧，以水化开，用竹管送入鼻中，男左女右，觉药至，喉小酸，令患人坐，却令咬定铜钱一个于当门齿，当见涎出，成盆便愈。

【主治】 头痛不可忍。

04166 玄胡散

【方源】 方出《圣惠》卷八十，名见《医方类聚》卷一九二引《施圆端效方》。

【异名】 玄胡酒（《医方考》卷五）。

【组成】 玄胡索末

【用法】 以温酒调下一钱

【主治】 妇人血气痛，产后恶露不尽。疮肿。

①《圣惠》：产后恶露不尽，腹内痛。②《医方类聚》引《施圆端效方》：疮肿无头，闷痛。③《医方考》：妇人攻刺疼痛，连于胁膈者。

【方论选录】《医方考》：玄胡索，味苦辛，苦能降气，辛能散血，淬之以酒，则能达手经脉矣。

04167 玄胡散

【方源】《葛崖尊生》卷十四。

【组成】 玄胡三钱 归身一钱 乳香五分 甘草一钱

【用法】 加盐卤一滴服。少顷愈。

【主治】 妊娠心痛。

04168 玄桂丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷四，名见《直指附遗》卷六。

【异名】 玄胡索丸(《医学入门》卷七)。

【组成】 玄胡 一两半 桂 滑石 红花 红曲各五钱 桃仁三十个

【用法】 上为末，汤浸蒸饼为丸服。

【主治】 死血留胃脘作痛者。

【备考】《直指附遗》本方用法：为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服四十丸，姜汤送下。

04169 玄菟丹

【方源】《三因》卷十。

【异名】 玄菟煎(《易简方》)、茯菟丹(《直指》卷十七)、茯菟丸(《丹溪心法》卷三)。

【组成】 菟丝子（酒浸通软，乘湿研，焙干，别取末）十两 白茯苓 干莲肉各三两 五味子（酒浸，别为末）七两

【用法】 上为末，别碾干山药末六两，将所浸酒余者，添酒煮糊，搜和得所，捣数千杵，丸如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前米汤送下。

【功用】 常服禁精，止白浊，延年。

【主治】 消渴、遗精、白浊。

①（三因）：三消渴利，白浊。②《医方大成》：肾水枯竭，心火上炎，津液不生，消渴诸证。③《济阳纲目》：肾气虚损，目眩耳鸣，四肢倦怠，遗精尿血，心腹胀满，脚膝酸痿，股内湿痒，小便滑数，水道涩痛，时有遗沥等证。④《证治宝鉴》：下焦虚而不能摄水，以致小便多而有降无升。

【宜忌】《易简方》：须是戒酒，并火上炙煿之物。

04170 玄精丹

【方源】《准绳·类方》卷八。

【异名】 元精丹(《医部全录》卷一六四)。

【组成】 血余（自己发及父子一本者，及少壮男女发，拣去黄白色者，用灰汤洗二三次，再以大皂角四两捶碎，煮水洗净，务期无油气为佳，将发扯碎晒干，每净发一斤用川椒四两，拣去梗核，于大锅内发一层，椒一层和匀，以中锅盖之，盐泥固济，勿令泄气，桑柴慢火煅三炷香，退火待冷取出，于无风处研为细末）四两 何首乌（用黑豆九蒸九晒，拣去豆，取净末）一斤 黑脂麻（九蒸九晒，取净末）八两 破故纸（炒，取净末）四两 生地黄（怀庆沉水者，酒浸杵膏）八两 熟地黄（酒浸杵膏）八两 桑椹（取净汁熬膏）四两 女贞实四两 旱莲草（取净汁熬膏）四两 胡桃肉（研膏）二两 胶枣肉（研膏）二两 槐角子（入牛胆内百日）四两

【用法】 上以药末入诸膏和匀，加炼蜜一斤成剂，入石臼内舂千余下，如梧桐子大。每服六十丸，空心用何首乌酿酒每温二三杯送下，一日二次。

【功用】 乌须发。

【主治】《医级》：肝肾不足，精血枯涸，凡虚损在真阴水火者。

04171 玄霜膏

【方源】《医便》卷三。

【组成】 乌梅（煎浓汁）四两 姜汁一两 萝卜汁四两 梨汁四两 柿霜四两 款冬花 紫菀各二两（俱为末，已上药制下听用）

【用法】 另用白茯苓十两，取净末半斤，用人乳三斤，将茯苓末浸人，取出晒干，又浸又晒，乳尽为度，却将前冬花、紫菀末、柿霜、白糖并各汁，再加蜜糖四两和匀，入砂锅内，慢火煎熬成膏，丸如弹子大。每服一丸，临卧时噙化，薄荷汤漱口。半月即效而愈。

【主治】 吐血虚嗽。

04172 玄明粉散

【方源】《痘疹金镜录》卷四。

【组成】 玄明粉三钱

【用法】 当归尾五钱煎汤，冷调服。

【主治】 血热便秘。

【方论选录】《医方考》：玄明粉咸寒，取其软坚；当归尾辛利，取其破血。此攻下之剂也，宜量人之虚实而用之。

【备考】 方中当归尾用量原缺，据《医方考》补。

04173 玄胡索散

【方源】《普济方》卷二一五引《活人书》。

【异名】 延胡散(《医统》卷十四)、玄胡散(《赤水玄珠》卷九)。

【组成】 玄胡索一两 朴消三分

【用法】 上为末。每服四钱，水二盏，煎至八分，温服。

【主治】 热人下焦尿血。

①《普济方》引《活人书》：溺血。②《医方考》：阳邪陷入下焦，令人尿血。③《赤水玄珠》：尿血作痛。

【方论选录】《医方考》：阳邪者，热病、伤寒之毒也。下焦者，阴血所居，阳邪入之，故令尿血。玄胡索味苦而辛，苦，故能胜热；辛，故能理血。佐以朴消，取其咸寒，利于就下而已。

04174 玄胡索散

【方源】《鸡峰》卷二十。

【异名】元胡索散(《朱氏集验方》卷十)。

【组成】蓬莪术半两(油煎,乘热切片子) 玄胡索一分

【用法】上为细末。每服半钱,食前淡醋汤调下。

【主治】妇人血气攻心,痛不可忍,并走注。

04175 玄胡索散

【方源】《普济方》卷一五六引《海上方》。

【组成】玄胡索 牛膝 当归 破故纸各等分

【用法】上为末。每服三钱,空心温醋汤调下。

【主治】腰腿疼痛。

04176 玄胡索散

【方源】《得效》卷四。

【组成】玄胡索一两 甘草二钱

【用法】上为散。水一碗,煎至半碗,顿服。如吐逆,分作三五次服。

【主治】卒心痛。

04177 玄胡索散

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】玄胡索 当归 川芎 桂心 木香 赤芍药 枳壳 桃仁各一钱 熟地黄三钱

【用法】上㕮咀。水二钟,加生姜三片,煎一钟,不拘时候服。

【主治】血气攻注,心腹疼痛。

04178 玄胡索散

【方源】《济阴纲目》卷一一。

【组成】当归(酒浸) 赤芍药(炒) 玄胡索 蒲黄(隔纸炒) 桂皮 乳香(水研) 没药各一钱

【用法】上为细末。每服三钱,空心温酒调服。

【主治】经行血气攻刺疼痛,及新旧虚实腹痛;产后恶血攻刺腹痛。

04179 玄精石散

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】太阴玄精石不拘多少(锅子内大火煅,纸衬子地坑内,出火毒一宿)

【用法】上为细末。每看多少,用冷水调,鸡翎扫之。疼痛立止。

【主治】汤火伤,疼痛不可忍。

04180 玄丹麦冬汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】玄参 丹参 麦冬各一两

【用法】水煎服。

【主治】相火妄动,口舌红肿,不能言语,胃中又觉饥渴之甚。

04181 玄麦地黄汤

【方源】《中国医学大辞典·补遗》。

【组成】玄参 麦门冬(去心)各二钱 熟地黄八钱 白茯苓 牡丹皮 泽泻各三钱 山药 山茱萸各四钱

【用法】水煎服。

【功用】降火益水。

【主治】阴虚,心火狂躁,肾水不足。

04182 玄参升麻汤

【方源】《活人书》卷十八。

【异名】阳毒玄参升麻汤(《元戎》)、玄参汤(《幼科类萃》卷十一)、玄参甘草汤(《杏苑》卷三)。

【组成】玄参 升麻 甘草(炙)各半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,以水一盏半,煎至七分,去滓服。

【功用】《医方集解》:清咽散斑。

【主治】热毒发斑,咽喉肿痛。

①《活人书》:伤寒发汗吐下后,毒气不散,表虚里实,热发子外,身斑如锦文,甚则烦躁谵语。喉闭肿痛。②《准绳·幼科》:痘疹后,余毒咽喉肿痛。③《杏苑》:冬时瘟疫应寒而大温抑之,身热,头疼,咽痛。④《简明医彀》:温毒发斑。

【方论选录】①《医方考》:升麻能散斑,甘草、玄参能清咽。散斑者,取其辛温,谓辛能散而温不滞也;清咽者,取其甘苦,谓甘能缓而苦能降也。②《医方集解》:此足阳明少阴药也。发斑者,阳明胃热也;咽痛者,少阴相火也。升麻能入阳明,升阳而解毒;玄参能入少阴,壮水以制火;甘草甘平,能散能和。故上可以利咽,而内可以散斑也。③《医方论》:玄参清上焦浮游之火,升麻升阳而解毒,甘草清热而解毒。药只三味,简而能到。

04183 玄参升麻汤

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】升麻 黄连各五分 黄芩(炒)四分 连翘 桔梗各三分 鼠粘子 玄参 甘草 白僵蚕各二分 防风一分

【用法】上㕮咀,作一服。水二盏,煎至七分,去滓,稍热噙漱,时时咽之。

【主治】①《卫生宝鉴》:中风后咽喉中妨闷,会厌后肿,舌赤,早晨语言快利,午后微涩。②《古方选注》:喉痹。

【方论选录】《古方选注》:咽喉诸证,历考汤方,皆辛散咸软,去风痰,解热毒,每用噙化咽津法,急于治标而缓于治本,即喉痹之急证亦然。牛

劳散时行风热，消咽喉壅肿；升麻散至高之风，解火郁之喉肿；白僵蚕得清化之气，散浊结之痰；玄参清上焦氤氲之热，连翘散结热消壅肿，防风泻肺经之风邪，芩、连清上中之热毒，甘、桔载引诸药上行清道。

04184 玄参升麻汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】玄参 升麻 甘草各二钱 石膏 知母各二钱五分

【用法】水煎服。

【主治】热毒发痘，咽痛，烦躁谵语者。

04185 玄参清肺饮

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】玄参八分 银柴胡 陈皮 桔梗 茯苓 地骨皮 麦门冬各一钱 薏苡仁二钱 人参 甘草各五分 槟榔三分

【用法】水二钟，加生姜二片，煎八分，临入童便一杯，食后服。

【主治】肺痈，咳吐脓痰，胸膈胀满，上气喘急，发热者。

04186 玄参解毒汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】玄参 山栀 甘草 黄芩 桔梗 葛根 生地 荆芥各一钱

【用法】水二钟，加淡竹叶、灯心各二十件，煎八分，食后服。

【主治】咽喉肿痛，已经吐下，饮食不利，及余肿不消。

04187 玄参解毒散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】玄参 栀炭 酒芩 尖生桔梗 甘草 荆芥 知母 竹叶 麦冬

【主治】麻症，肺胃实热，黑晦毒盛，衄血，邪火入里。

【加减】加茅根、京墨，无血不加。

04188 玄胡四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【异名】延胡四物汤(《金鉴》卷四十六)。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地各七钱半 玄胡索（酒煮）二两

【用法】上为细末。每服三钱，酒调下。

【功用】《金鉴》：定痛保胎。

【主治】①《济阴纲目》：血癖腹痛，及血刺腰痛。②《金鉴》：胎动下血。

04189 玄胡苦楝汤

【方源】《普济方》卷二二八引《卫生家宝》。

【异名】延胡苦楝汤(《兰室秘藏》卷中)、玄胡索苦楝汤(《医学纲目》卷十四)、玄胡索汤(《产科发蒙·附录)。

【组成】肉桂三分 附子三分 熟地黄一钱 炙甘草五分 玄胡二分 黄柏二分（为引用） 苦楝子二分

【用法】上㕮咀，都作一服，水四盏，煎至一盏，去滓，空心、食前稍热服。

【主治】①《普济方》引《卫生家宝》：妇人脐下冷撮痛，阴冷大寒。②《兰室秘藏》：白带下。

【备考】本方改为丸剂，名“延胡苦楝丸”（见《妇科大略》）。

04190 玄霜雪梨膏

【方源】《古今医鉴》卷七。

【异名】元霜雪梨膏(《杂病源流犀烛》卷十七)、元霜紫雪膏(《类证治裁》卷二)、玄霜紫雪膏(《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】雪梨（六十个，酸者不用，去心皮，取汁）三十钟 藕汁十钟 新鲜生地黄（捣取汁）十钟 麦门冬（捣烂，煎汁）五钟 萝卜汁五钟 茅根汁十钟

【用法】上药，再重滤去滓，将清汁再入火煎炼，加蜜一斤、饴糖半斤、柿霜半斤、姜汁一盏，入火再熬如稀糊，则成膏。

【功用】①《古今医鉴》：生津止渴，消痰止嗽，清血归经。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：滋润肺燥，清热止血，滋阴养肺，清胃热。

【主治】肺燥津伤，咳嗽，咯血，吐血。

①《古今医鉴》：咯血吐血，及劳心动火，劳嗽久不愈。②《类证治裁》：劳心动火，口津干，能食，脉洪数。③《全国中药成药处方集》（沈阳方）：吐血咳痰，肺痿干咳，便秘便血，赤淋溺血。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌五辛发物。

【加减】如血不止，咳嗽，加侧柏叶捣汁一钟、韭白汁半钟、茜根汁半钟，俱去滓，入煎汁内，煎成膏服之。

【备考】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：每服三匙，一日三次。

04191 兰草汤

【方源】《素问》卷十三。

【组成】兰草

【主治】脾瘅。内热口甘，中满。

【备考】《增补内经拾遗》：方虚谷言，古之兰

草，即今之千金草，俗呼为孩儿菊。其说可据。丹溪以为幽兰，谬孰甚焉。黄山谷一枝一花为兰，一枝数花为蕙。盖不识兰蕙而强生分别，不是兰草是孩儿菊，蕙草是零陵香。《乐府》有云，兰蕙蓬蒿，算来都是草。《经》曰，治之以兰，除陈气也，正此兰草耳。《圣济总录》本方用兰草一两（切），以水三盏，煎取一盏半，去滓，分温三服，不拘时候。

04192　宁中膏

【方源】《普济方》卷三四九引《如宜方》。

【组成】人参　酸枣仁各一两　辰砂半钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷汤化下。又宜研琥珀、麝香、灯心汤送下。

【主治】产后心志不宁，心血耗散，狂乱见鬼。

04193　宁气汤

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】御米壳二两半（蜜水淹一宿，炒黄）甘草（炙）　杏仁（去皮尖，麸炒）　紫菀（去土）桔梗各七钱半　五味子　甜葶苈（隔纸炒）　人参半夏（生姜制）　桑白皮（锉，炒）　紫苏叶　陈橘皮（去瓤）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水一大盏，加生姜七片，煎至六分，去滓，食后稍热服。

【主治】肺气不利，咳嗽声重，咽嗌干燥，痰唾稠粘，少得睡眠。

04194　宁心膏

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】白茯神（去木）　白茯苓　白术（土蒸）各二两　山药二两　枣仁二两（炒）　寒水石（煅，研末）二两　远志　甘草（炙）各一两五钱　辰砂一两　人参五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。临卧灯心汤化下。

【主治】通宵不寐者。

04195　宁血汤

【方源】《中医眼科学》。

【组成】仙鹤草　旱莲草　生地黄　栀子炭　白芍　白及　白蔹　侧柏叶　阿胶　白茅根

【主治】云雾移睛。

04196　宁志丸

【方源】《百一》卷一。

【组成】好辰砂一两　人参　白茯苓　当归（去芦，洗去土）　石菖蒲　乳香（别研）　酸枣仁各半两（用酸枣仁五两汤浸去皮，可剥半两净仁，炒令赤，香熟为度）

【用法】好辰砂一两，将熟绢一小片包裹，以线扎定，猪猪心一枚，以竹刀子切破，不得犯铁，用纸拭去血，入朱砂包子在猪心内，却用麻线缚合猪心，又以甜笋壳再裹了，麻皮扎定，无灰酒二升，入砂罐子或银器内，煮令酒尽为度，去线并笋壳，取辰砂别研，将猪心以竹刀细切，砂盆内研令烂，却入后药末并辰砂、枣肉为丸，如梧桐子大，留少辰砂为衣；药末须隔日先碾下，枣肉于煮猪心日绝早煮熟，剥去皮核，取肉四两用。每服五十丸，人参汤送下，不拘时候。

【主治】①《百一》：心气、心风。②《景岳全书》：心风癫痫。

【临床举例】心风濮十太尉之子六将使传，乃女至尝患心风，服此一料，病减十之八矣。

04197　宁志丸

【方源】《直指》卷十一。

【异名】宁神定志丸（《北京市中药成方选集》）。

【组成】人参　白茯苓　茯神　柏子仁　琥珀　当归　酸枣仁（温酒浸半日，去壳，隔纸炒香）远志（酒浸半日，新布裹，捶取肉、焙）各半两　乳香　朱砂（别研）　石菖蒲各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后枣汤送下。

【功用】《北京市中药成方选集》：滋阴补气，益智宁神。

【主治】心虚血少、惊悸怔忡，癫痫。

①《直指》：心虚血虚，多惊。②《景岳全书》：心虚血少，神志不宁而惊悸者；怔忡，癫痫。③《北京市中药成方选集》：气血虚弱，神志不宁，心虚多梦，烦躁盗汗。

【备考】《北京市中药成方选集》无茯神。

04198　宁志丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】枣仁五两　人参一两　黄耆一两　白术三两　茯神三两　当归身三两五钱　莲须二两　远志二两　朱砂一两　益智仁一两　甘草一两　乳香五钱

【用法】炼蜜为丸。每服二三钱，早、晚空腹灯心汤送下；无睡，用陈酒送下。

【主治】性情抑郁，志气不扬，精神虚惫，形容枯萎，昼则贪眠，夜反不寐，虽寐而惊悸易醒，或谋虑不遂，劳烦过度，气逆膻中，而怔忡痞闷，彻夜无睡，及睡而神昏气惰，甚至饮食不思，肢体懈怠，盗汗怯寒，梦遗滑泄。

04199 宁志膏

【方源】《本事》卷二。

【组成】人参（去芦）一两 酸枣仁（微炒，去皮，研）一两 辰砂（水飞）半两 乳香一分（以乳钵坐水盆中研）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷汤化下。

【功用】《普济方》：宁神定志，安眠止痛。

【主治】惊恐失志，心气虚耗，健忘，失眠，癫狂，赤白浊。

①《本事》：失心。②《局方》（淳祐新添方）：心脏亏虚，神志不守，恐怖惊惕，常多恍惚，易于健忘，睡卧不宁，梦涉危险，一切心疾。③《直指》：因惊失心。④《普济方》：心气虚耗，赤白浊甚。⑤《寿世保元》：癫狂失心不寐。

【方论选录】①《寿世保元》：此方朱砂能镇心安神；酸可使收引，故枣仁能敛神归心；香可使利窍，故乳香能豁痰达心志；许学士加人参，亦谓人参能宁心耳。②《本事方释义》：人参气味甘温，入脾胃；枣仁气味苦平，入心；辰砂气味苦温，入心；乳香气味辛微温，入手足少阴。以薄荷汤送药，乃手太阴之引经药也；甘温护持中土，佐以苦味入心，辛香开窍，使以轻扬为引，表里皆得安妥矣。

【临证举例】失心予族弟妇缘兵火失心，制此方与之，服二十粒愈。

【备考】本方方名，据剂型，当作"宁志丸"。

04200 宁肺汤

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】人参（去芦头） 白术 当归（去芦头，洗，焙） 熟干地黄 芎藭 白芍药 甘草（炙） 麦门冬（去心） 五味子 桑白皮 白茯苓（去皮） 各半两 阿胶一两（蚌粉炒）

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏半，加生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】①《杨氏家藏方》：安肺消痰，定喘止嗽。②《历代名医良方注释》：养阴培元，止咳化痰。

【主治】①《杨氏家藏方》：荣卫俱虚，发热自汗，气短怔忡。②《普济方》：肺气喘急，咳嗽痰唾。

04201 宁肺汤

【方源】《传信适用方》卷上。

【组成】罂房半两（去枝梗、铿，蜜炒黄脆） 五味子（去枝梗）半两 乌梅（去核）四两

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，同煎至七分，去滓食服。

【主治】咳嗽喘急，不问久新。

04202 宁肺散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】御米（蜜炒，去瓤） 甘草 干姜 当归 白矾 陈皮各一两

【用法】上为末。每服三钱，煎荠汁调下。

【主治】寒嗽。

【加减】贫乏之人，多感风冷寒湿咳嗽，加白术之类。

04203 宁沸汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】麦冬三两 山茱萸三两 茯苓一两

【用法】水煎服。一剂渴少止，再剂渴又止，饮半月痊愈。

【功用】纯补其水。

【主治】肾火上沸之消渴，口干舌燥，吐痰如蟹涎白沫，气喘不能卧，但不甚大渴，渴时必须饮水，饮之后，即化为白沫。

【方论选录】此方用山茱萸三两，以大补肾水，尽人知之。更加入麦冬三两者，岂滋肺以生肾乎！不知久渴之后，日吐白沫，则熬干肺液。使但补肾水，火虽得水而下降，而肺中干燥无津，能保肺之不告急呼！肺痿、肺痈之成，未必不始于此。故补其肾而随滋其肺，不特子母相生，且防祸患于未形者也。加入茯苓者，因饮水过多，膀胱之间必有积水，今骤用麦冬、山萸至六两之多，不分消之于下，则必因补而留滞，得茯苓利水之药以疏通之，则补阴而无腻膈之忧，水下趋而火不上沸，水火既济，消渴自除矣。

04204 宁尊丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生地 300 克 当归 90 克 荆芥 90 克 蝉衣 60 克 苦参 90 克 白蒺藜 90 克 知母 90 克 生石膏 150 克 紫草 90 克 桃仁 90 克 生甘草 60 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重 9 克。每服二丸，一日二次。

【功用】凉血活血，消风止痒。

【主治】急慢性荨麻疹、玫瑰糠疹、脂溢性皮炎。

04205 宁尊丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生黄耆 310 克 防风 250 克 炒白术

250克 桂枝310克 白芍310克 生姜150克 甘草150克 大枣310克

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸重9克。每服二丸，一日二次。

【功用】 固卫御风。

【主治】 慢性荨麻疹，遇风冷即起。

04206 宁胃汤

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】 牛膝五钱 当归二钱 山栀 侧柏叶 降香 青荷叶各一钱

【用法】 童便一盏，磨好墨和服。

【主治】 血溢胃脘，呕吐成盆。

04207 宁神丹

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】 天麻 人参 陈皮 白术 归身 茯神 荆芥 僵蚕 独活 远志（去心） 犀角 麦门冬（去心） 酸枣仁（炒） 辰砂各半两（另研） 半夏 南星 石膏各一两 甘草（炙） 白附子 川芎 郁金 牛黄各三钱 珍珠三钱 生地黄 黄连各半两 金箔三十片

【用法】 上为末，酒糊为丸。每服五十丸，空心白汤送下。

【功用】 清热养气血。

【主治】 痫症，不时潮作者。

04208 宁神丹

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】 天麻 人参 陈皮 白术 茯神 荆芥 僵蚕 独活 远志 防风 麦冬 黄连 枣仁各五钱 归身 南星 石膏 生地各一两 琥珀 珍珠 牛黄 黄芩 川芎 白附子 甘草各三钱 辰砂五钱（另研） 金箔三十片

【用法】 酒糊为丸。每服五十丸，空心白汤送下。

【功用】 清热养气血。

【主治】 痫，不时潮作者。

04209 宁神散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】 御米囊一斤（生醋炒） 乌梅四两

【用法】 上为末。每服二三钱，食后沸汤点下，一日三次，常服。

【主治】 ①《宣明论》：一切痰嗽不已。②《玉机微义》：咳嗽多年不已，常自汗，服药不效者。

04210 宁静汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】 人参一两 白术三钱 白芍一两 熟地一两 玄参一两 生枣仁五钱 白芥子三钱 麦冬五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 怔忡之症，扰扰不宁，心神恍惚，惊悸不已者。

【方论选录】 此肝肾之虚，而心气之弱也，若作痰治往往杀人。盖肾虚以致心气不交，心虚以致肝气益耗。故方用一派补心、肝、肾之药，三经同治，则阴阳之气自交，上下相资，怔忡自定，而惊悸恍惚之症亦尽除矣。

04211 宁嗽汤

【方源】《直指》卷八。

【组成】 桑白皮（炒） 紫苏 细辛 北五味子 橘皮 半夏（制） 茯苓 杏仁（去皮） 缩砂仁 枳壳（制） 北梗 甘草（炒）各等分

【用法】 上锉散。每服三钱，加生姜四片，乌梅半个，水煎，食后服。

【主治】 诸嗽。

04212 宁嗽汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】 桔梗 半夏 枳壳 陈皮 前胡 葛根 桑皮 茯苓 苏叶 杏仁 甘草

【用法】 加生姜、葱。服此方后，再用加味二陈汤一剂。

【主治】 表病嗽。

【加减】 冬，加麻黄取汗。

04213 宁嗽膏

【方源】《古今医鉴》卷七。

【异名】 如神宁嗽膏（《寿世保元》卷四）。

【组成】 天冬（去心）半斤 杏仁（去皮）四两 贝母（去心）四两 百部四两 百合四两 款冬花五两 紫菀三两 白术四两

【用法】 上锉，用长流水二十碗煎五碗，滤滓再煎，如是者三次，共得药汁十五碗，入饴糖半斤，蜜一斤再熬，又加阿胶四两、白茯苓细末四两，和匀如膏。每服三五匙。

【功用】 ①《古今医鉴》：敛肺。②《仙拈集》：止咳化痰。

【主治】 ①《古今医鉴》：阴虚咳嗽，火动咯血。②《回春》：阴虚火动发热，咯血吐血。

【备考】《寿世保元》无白术。

04214 宁心益志丸

【方源】 方出《丹溪心法》，名见《丹溪治法心要》卷四。

【异名】 人参丸（《景岳全书》卷五十三）。

【组成】 人参 茯苓 茯神 牡蛎 酸枣仁 远志 益智各半两 辰砂二钱半

【用法】 上为末，枣肉为丸服。

【功用】 宁心益智。

【备考】《丹溪治法心要》无茯苓。

04215 宁志化痰汤

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】 胆星一钱 半夏（制）一钱 陈皮一钱 茯苓一钱 天麻一钱 人参一钱 黄连（姜汁炒）一钱 酸枣仁一钱 石菖蒲一钱

【用法】 上锉一剂。加生姜五片，水煎服。再服养血清心汤。

【主治】 癫狂，心虚痰盛之症。

04216 宁坤至宝丹

【方源】《卫生鸿宝》卷五。

【组成】 嫩黄耆（蜜炙）三两 白术（陈壁土炒） 枣仁（炒香） 归身（酒炒） 香附（杵，米酒制） 川断（酒炒） 条芩（酒炒） 甘枸杞 血余（煅不见火） 阿胶（蛤粉炒） 杜仲（盐水炒）各二两 茯苓（乳制） 白芍（酒炒） 丹参（酒炒）各一两半 北五味（焙）六钱 甘草（蜜炙） 朱砂（飞为衣）各一两 大生地（酒煨）四两

【用法】 上药各为细末，和匀，炼蜜为丸，每重二钱。按症照引调服：凡久不坐孕，经脉不调，腹痛酸胀，或赤淋白带，腰痛胃痛，夜热心烦，食少，日服一丸，莲子汤送下；胎气失调，恶心呕吐，虚烦阻食，浮肿气急，腰腹酸痛，胎漏下血，或伤胎见红，每服一丸，莲子汤送下；甚者服数丸，人参汤送下；临产疼阵作时，服一丸，白汤送下，胎自顺下；如有横逆异产，每服数丸，汤和童便送下，保全母子；或难产者，冬葵子三钱，煎汤调下；产后下血过多，汤和童便送下；恶露不行，腹痛块瘀，山楂三钱，红花一钱，煎汤调下；或寒热往来，有外感者，荆芥穗一钱，煎汤调下；兼虚汗者，人参汤送下；虚烦狂躁，腹满气急，俱白汤送下；无论老少妇女，血崩尿血，或因血虚，周身筋骨疼痛者，白汤送下。

【主治】 妇人经脉不调，带下，崩淋，虚劳，胎前产后百病。

04217 宁神安卧丸

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】 人参五两 远志二两 枣仁（炒）二两 熟地八两 山茱萸四两 茯神三两 柏子仁一两 麦冬三两 陈皮五钱

【用法】 上药各为末，炼蜜为丸。每日服一两，白滚水送下。五日即安。

【主治】 卧不安枕。

04218 宁嗽化痰丸

【方源】《医方类聚》卷一一七引《修月鲁般经后录》。

【组成】 半夏五钱 陈皮（去白）二钱半 人参 薄荷各一两 麦门冬（去心）三钱 桑白皮（蜜炙）半两 贝母（去心）三钱 黄芩（片子者）半两 甘草（炙）七钱 青黛三钱 五味子二钱 干姜（炮）二钱

【用法】 上为末，水糊为丸，如梧桐子大。每服二十至三十丸，食少远以白汤送下。

【主治】 肺经有热，咳嗽喘急，痰涎壅盛。

04219 宁嗽化痰汤

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】 桔梗 枳壳（麸炒） 半夏（姜汤泡七次） 陈皮 前胡 干葛 茯苓各一钱 紫苏一钱二分 麻黄一钱（冬月加，夏月减） 杏仁（炒，去皮尖） 桑皮各一钱 甘草四分

【用法】 水二钟，加生姜三片，煎八分，食远热服。

【主治】 感冒风寒、咳嗽鼻塞。

04220 永和公主药澡豆

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】 白芷二两 白蔹三两 白及三两 白附子二两 白茯苓三两 白术三两 桃仁半升（汤浸，去皮） 杏仁半升（汤浸，去皮） 沉香一两 鹿角胶三两 麝香半两（细研） 大豆面五升 糯米二升皂荚五挺

【用法】 先煎好浆水三大盏，消胶为清，即取糯米净淘，和胶清煮作粥，薄摊，晒之令干，和药一时，捣细罗为散。取大豆面重和之，令匀，又用酒半盏，白蜜二两，火上熔之，令蜜消，即一时倾入澡豆内，拌之令匀，晒干。常用洗手面佳。

【主治】 面黑不净。

04221 必孕汤

【方源】《仙拈集》卷三引《全生》。

【组成】 续断 沙参 杜仲 当归 香附 益母各二钱 川芎 橘皮各二钱 砂仁五分

【用法】 水煎服。服四剂，下期再服四剂，必无不孕者。

【主治】 经期准面不孕。

04222 必胜丸

【方源】《三因》卷十五。

【组成】 鲫鱼一个（去肠肚并子，入雄黄一粒鸡

子大、硇砂一钱，在腹内，仰安鱼于炭火上烧烟尽，取出以全蜈蚣一条、蓬术半两、栀子五个、皂角二挺并烧、麻子五个去皮，灯上烧，更用黄明胶三文、皂角二挺去皮，酥炙）

【用法】 上为末。别用皂角二挺，去皮，捶碎，以水三碗，揉汁去滓，煮精羊肉四两烂软，入轻粉五厘，男子乳汁半两，同研成膏，和药末，丸如绿豆大，朱砂为衣。每服十丸，侵晨温酒送下，一日一次。至晚，下肉疙瘩子。若项有五个，则以五服药取之，视其所生多少，以为服数，既可更进数服。如热毒疮疖未有头脑者，一服亦须消散。

【主治】 瘰疬，不以年深日近，及脑后两边有小结，连后数个，兼痨瘵腹内有块。

04223 必胜散

【方源】《局方》卷八。

【组成】 熟干地黄 小蓟（并根用） 人参 蒲黄（微炒） 当归（去芦） 苓蒡 乌梅（去核）各一两

【用法】 上为粗散。每服五钱，水一盏半，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《局方》：男子妇人血妄流溢，吐血、衄血、呕血、咯血。②《普济方》：妇人下血过多，致发虚热。

04224 必胜散

【方源】《医方类聚》卷二十四引《烟霞圣效方》。

【组成】 雄黄 川芎各等分

【用法】 上药各为细末。含水漱之。立效。

【主治】 偏正头痛，夹脑风。

04225 必效散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【异名】 立应散（《医方类聚》卷一六六引《吴氏集验方》）。

【组成】 槟榔（鸡心者）不拘多少

【用法】 上为细末。每服二钱，用东引石榴根煎汤调下。子平旦盥漱讫，先食炙肥肉数片，然后服药。若于上旬服药尤佳，盖虫头向上故也。

【主治】 久下寸白虫，日渐羸瘦。

【宜忌】 忌食牛肉、白酒。

04226 必效散

【方源】《直指》卷十六。

【组成】 葶苈子（隔纸炒） 龙胆草 山栀仁 山茵陈 黄芩各等分

【用法】 上为粗末。每服三钱，新水煎服。

【主治】 黄疸。

04227 必效散

【方源】《回春》卷四。

【组成】 当归 生地黄（酒洗） 赤茯苓（去皮） 滑石 牛膝（去芦） 山栀 麦门冬（去心） 枳壳 黄柏（酒炒） 知母（酒炒） 扁蓄 木通各等分 甘草减（半）

【用法】 上锉一剂，灯草一团，水煎，空心服。

【主治】 淋症。

【加减】 血淋，加菖蒲、茅根汁；膏淋，加萆薢；气淋，加青皮；劳淋，加人参；热淋，加黄连；肉淋，加连翘；石淋，加石韦；尿淋，加车前；死血淋，加桃仁、牡丹皮、玄胡索、琥珀、黄柏、知母；老人气虚作淋，加人参、黄耆、升麻少许，去黄柏、知母、滑石、扁蓄。

04228 必效散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 麦冬三两（去心，糯米拌蒸） 乌梅肉五两

【用法】 上为散。每服五钱，米饮下。

【主治】 痢后后渴，脉虚数者。

【方论选录】 产妇痢后亡阴，津液枯涸不能上敷而大渴引饮，难以稍忍焉。麦冬生津润液燥，以滋金水之上流，乌梅敛液收津，以固津液之下亡。为散，米饮下，务使胃气调和，则津液上敷而大渴自解，何引饮不已之有哉。

04229 必效煎

【方源】《仙拈集》卷一引《斗门方》。

【组成】 干姜四钱 粟壳（蜜炙）八钱 地榆 甘草各三钱 白芍（炒）三钱 黑豆（炒）一两半

【用法】 分四剂，水一钟半，煎七分，食远服。

【主治】 痢疾，脓血日夜不息，里急后重，及噤口恶痢，百药不效者。

04230 必捷散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】 白花蛇（酒浸三宿，去皮骨，炙）二两 蒺藜子（炒，去角） 蔓荆实（酒浸一宿，焙）各一两 白附子五枚（酒浸一宿，切作片子，炒干） 荜澄茄二十枚

【用法】 上为散。每服一钱匕，食后用薄荷自然汁和酒半盏调下。

【主治】 脑风头痛甚者。

【宜忌】《奇效良方》：忌发风之物。

04231 必效四物汤

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】 四物汤加蒲黄

【用法】 水煎服。

【主治】 产后衄血。

04232 头风摩散

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 头风散(《千金》卷十三)。

【组成】 大附子一枚（泡） 盐各等分

【用法】 上为散。沐了，以方寸匕，已摩疢上，令药力行。

【主治】 ①《金匮》：中风历节病。②《张氏医通》：大寒犯脑，头痛。

04233 半贝丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 生半夏 生川贝各三钱

【用法】 上为细末，姜汁捣匀为丸。每服二厘至五厘，生熟汤送下。

【主治】 ①《重订通俗伤寒论》：疟疾。②《饲鹤亭集方》：风痰暑湿疟疾，咳嗽多痰，饮食无味，痛眩。

04234 半瓜丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 半夏 瓜蒌仁各五两 贝母 桔梗各二两 枳壳一两半 知母一两

【用法】 上为末，生姜汁浸，蒸饼糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，生姜汤送下。

【主治】 痰嗽。

04235 半字散

【方源】《医方类聚》卷八十二引《吴氏集验方》。

【组成】 川乌一个（炮去皮尖） 草乌七个（炮去皮尖） 川芎半两 石膏一两（煅） 荆芥一两

【用法】 上为末。每服半钱，好茶点下。

【主治】 头痛。

【宜忌】 忌鲇鱼。

04236 半附汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 生附子 半夏各二钱半 生姜十片

【用法】 水煎，空心服。

【主治】 胃冷生痰，呕吐。

【备考】 或加木香少许尤妙。

04237 半苓汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 半夏五钱 茯苓块五钱 川连一钱 厚朴三钱 通草八钱（煎汤煮前药）

【用法】 水十二杯，煮通草成八杯，再入余药煮成三杯，分三次服。

【主治】 足太阴寒湿，痞结胸满，不饥不食。

【方论选录】 半夏、茯苓培阳土，以吸阴土之湿；厚朴苦温以泻湿满；黄连苦以渗湿；重用通草以利水道，使邪有出路也。

04238 半夏丸

【方源】 方出《外台》卷八引《古今录验》，名见《普济方》卷二〇四。

【组成】 半夏一分（削去皮，熬） 甘草（炙） 远志（去心）各四两 干姜 桂心 细辛 椒（去目，炒出汗） 附子（炮）各二分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，先饮酒，用粳米饮送下，一日三次。稍增至十丸。

【主治】 胸痛达背，膈中烦满，结气忧愁，饮食不下。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、羊肉、饧、猪肉、冷水、生葱、生菜。

04239 半夏丸

【方源】《医方类聚》卷一〇三引《简要济众方》。

【组成】 半夏二两（汤浸去滑，焙干） 丁香半两 干姜一分（炮裂）

【用法】 上为末，以生姜自然汁煮面糊为丸，梧桐子大。每服十五丸，煎木瓜盐汤送下，不拘时候。

【主治】 ①《医方类聚》引《简要济众方》：上焦冷气，吞酸吐沫，呕逆。②《圣济总录》：不思饮食。

04240 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】 半夏（汤洗去滑，生为末）五两 白矾（生为末）二两 丹砂（研） 铅丹（研）各一两

【用法】 上为末，以粟米饭为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后生姜汤送下。

【主治】 风痫痰盛瘛疭，口吐涎沫。

04241 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】 半夏（汤洗七遍去滑） 桔梗各二两 桂（去粗皮）一两半 木香 枳壳（去瓤，麸炒）各一两

【用法】 上为末，生姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，木瓜汤送下。

【主治】 心胸噫膈壅闷，食不下。

04242 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】 半夏（汤浸去滑，生姜汁制，切，焙） 紫菀（去苗土） 桑根白皮（锉）各一两 款冬花 射干 陈橘皮（汤浸去白，焙） 百部 五味子各三分 细辛（去苗叶）半两 赤茯苓（去黑皮） 贝母（炒，去心）各三分 皂荚（酥炙黄，去皮子）三分 杏仁（汤浸，去皮尖双仁）一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后煎灯心、生姜、枣汤送下，一日三次。

【主治】 上气咳嗽，喉中作声，坐卧不得。

04243 半夏丸

【方源】 《济生》卷二。

【组成】 瓜蒌子（去壳别研） 半夏（汤泡七次，焙，取末）各一两

【用法】 上为末，和匀，生姜自然汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后用生姜汤送下。

【主治】 肺脏蕴热，痰嗽，胸膈塞满。

【备考】 本方方名，《医统》引作“瓜蒌半夏丸”。

04244 半夏丸

【方源】 《仙拈集》卷三。

【组成】 生半夏一个

【用法】 上为末，葱白半寸，捣和为丸。绵裹塞鼻，左乳病，塞右鼻；右乳病，塞左鼻。一夜即愈。

【主治】 乳痈初起。

04245 半夏汤

【方源】 《灵枢》卷十。

【组成】 秫米一升 治半夏五合

【用法】 以流水千里以外者八升，扬之万遍，取其清五升，煮之，炊以苇薪火，沸，置秫米一升，治半夏五合，徐炊令竭为一升半，去其滓，饮汁一小杯，一日三次。稍益，以知为度。病新发者，覆杯则卧，汗出则已矣；久者，三饮而已矣。

【主治】 痰湿内阻，胃气不和之失眠。

①《灵枢》：厥气客于五脏六腑，卫气不得入于阴，阴虚，目不瞑。②《张氏医通》：痰饮客于胆府，自汗不得眠。③《温病条辨》：温病愈后，嗽稀痰而不咳，彻夜不寐。

【方论选录】 ①《温病条辨》：半夏逐痰饮和胃，秫米秉燥金之气而成，故能补阳明燥气之不及，而渗其饮，饮退则胃和，寐可立至。②《古方选注》：今厥气客于脏腑，卫气独行于阳，阳跷气盛不得入于阴，阴虚目不瞑。用秫米汤者，以药石不能直入阳跷，故治胃以泄卫气也。半夏辛温，入胃经气分。秫，糯也，北地之膏粱茹粟也，甘酸入胃经血分。千里水扬之万遍，与甘澜水同义，取其轻扬，不助阴邪。炊以苇薪，武火也。火沸入药，仍徐炊令减，寓升降之法，升以半夏，从阳分通卫泄邪，降以秫米，入阴分通营补虚，阴阳通，卧立至，汗自出，故曰汗出则已矣。

【临证举例】 不寐 《新中医》（1983，11:22）：笔者以半夏秫米汤加味治疗失眠收到满意效果。因药房不备秫米，遵吴鞠通意，用薏苡仁代之。方药组成：法半夏、苡仁各60克。加减：心脾亏虚加党参，心阴不足加麦芽，痰热扰心加黄连，胃不和加神曲。

【备考】 本方方名，《景岳全书》引作“秫米半夏汤”、《兰台轨范》引作“半夏秫米汤”。

04246 半夏汤

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 半夏桂枝甘草汤（《活人书》卷十七）、半夏桂甘汤（《直指》卷二十一）。

【组成】 半夏（洗） 桂枝（去皮） 甘草（炙）各等分

【用法】 以水一升，煎七沸，纳散两方寸匕，更煮三沸，下火令小冷，少少咽之。

【功用】 《伤寒论讲义》：散寒通阳，涤痰开结。

【主治】 少阴客寒咽痛，伏气咽痛。

①《伤寒论》：少阴病，咽中痛。②《活人书》：伏气之病，谓非时有暴寒中人，伏气于少阴经，始不觉病，旬日乃发，脉微弱，法先咽痛，似伤寒，非喉痹之病，次必下利者。③《伤寒经注》：少阴病，为寒邪所客，痰涎壅塞，其人但咽痛而无燥渴、心烦、咽疮、不眠诸热证。

【方论选注】 ①《古方选注》：少阴之邪，逆于经脉，不得由枢而出，用半夏入阴散郁热，桂枝、甘草达肌表，则少阴之邪，则经脉而出肌表，悉从太阳开发，半夏治咽痛，可无劫液之虞。②《伤寒经注》：方中半夏辛温涤痰，桂枝辛热散寒，甘草甘平缓痛。

【临证举例】 咽痛 《广东中医》（1962，7:36）：郑某某，女。身体素弱，有痰嗽宿疾，因娶媳期届，心力俱劳，引起恶寒、发热、头痛等证，咽喉疼痛尤剧，卧床不起，吞咽困难，脉象两寸浮缓，咽部颜色不变。治以《伤寒论》半夏汤原方，嘱徐徐咽下，服二剂；寒热、痰嗽、咽痛等顿消，继以扶正而愈。

04247 半夏汤

【方源】《千金》卷十六。

【异名】小茯苓汤。

【组成】半夏一升 生姜一斤 茯苓 桂心各五两

【用法】上㕮咀，以水八升，煮取二升半，分三服。

【主治】逆气，心中烦闷，气满呕吐，气上。

【加减】少气，加甘草三两。

【方论选录】《千金方衍义》：《金匮》小半夏加茯苓汤治心下痞，膈间有水气，眩悸。《千金》祖《胡洽方》加桂一味，上摄虚阳，下导水逆，岂但呕吐而已哉。

【备考】本方方名，《普济方》引作"小半夏茯苓汤"。

04248 半夏汤

【方源】《千金》卷十八。

【组成】半夏 吴茱萸各三两 生姜六两 附子一枚

【用法】上㕮咀。以水五升，煮取二升半，分三服。老少各半，一日三次。

【主治】痰饮，辟气，吞酸。

【方论选录】《千金方衍义》：此以曲直作酸，故用吴萸通达肝气以佐半夏、附子，仍用生姜开豁痰澼也。

04249 半夏汤

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】半夏一升（洗） 生姜五两 茯苓 厚朴各四两

【用法】上㕮咀。以水六升，煮取三升，分三服。

【主治】妇人胸满，心下坚，咽中贴贴如有炙腐，咽之不下，吐之不出。

04250 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】半夏（汤洗七遍，晒干） 干姜（炮）各三分 槟榔（半生半炮，锉） 桂（去粗皮） 旋覆花（微炒） 高良姜各半两 丁香 木香各一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一分（拍碎），同煎至八分，去滓温服。

【主治】痰饮在心，久不散，痛不可忍。

04251 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】半夏（汤洗七遍，焙）半两 赤茯苓（去黑皮） 人参 前胡（去苗）各三两 甘草（炙，锉）一分 桂（去粗皮）三分 柴胡（去苗）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盏，加生姜五片，大枣三个（擘破），用煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】胸痹短气。

04252 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】半夏（汤洗七遍）五两 白术三两 赤茯苓（去黑皮） 人参 桂（去粗皮） 甘草（炙）附子（炮裂，去皮脐）各二两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜半分（切），同煎取一盏，去滓温服，一日二次。

【主治】留饮不除，胸中痰冷。冷痰癖饮，胸膈痞满，呕逆不止。

04253 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】半夏（汤洗七遍，焙干） 桑根白皮（炙，锉） 细辛（去苗叶） 前胡（去芦头）各一两半 桔梗（炒） 甘草（炙，锉） 贝母（去心） 柴胡（去苗） 人参 诃黎勒（微煨，去核） 白术各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加大枣三个（擘破），生姜半分（拍碎），煎至七分，去滓温服，食后、夜卧各一次。

【主治】肺积，息贲咳嗽。

04254 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】半夏（汤洗去滑，切，焙）一升 槟榔仁七枚

【用法】上㕮咀，如麻豆大，以水七升，煮取二升，去滓，分温三服，如人行四五里一服。

【主治】脚气冲心，烦闷气急，坐卧不安。

04255 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】半夏（汤洗去滑，焙） 桔梗（锉）各三分 槟榔二枚（煨，锉） 桑根白皮（炙，锉） 百部（焙） 贝母（去心，炒） 甘草（炙，锉） 款冬花 吴茱萸（水浸一宿，焙干，炒） 紫菀（去苗土）各半两 泽漆叶 旋覆花各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分（拍碎），大枣二个（擘），煎至七分，去滓，空腹温服，日午、夜卧再服。

【主治】虚劳上气咳嗽，兼肺劳涕唾稠粘，及有脓血，皮肤干焦，作则寒热，饮食不下，喘息不

调，口渐瘦悴，坐卧不得。

04256 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】半夏（汤洗去滑，焙干）三两 芎藭 细辛（去苗叶） 附子（炮裂，去皮脐） 干姜（炮） 人参 当归（切，焙）各一两半 桂（去粗皮） 甘草（炙，锉） 白茯苓（去黑皮）各一两 杏仁三十枚（汤浸，去皮尖双仁，生研）

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（拍碎），煎至一盏，去滓，分温二服，早、晚、食后各一次。

【功用】止痛益气。

【主治】脉极虚寒，咳嗽心痛，喉中介介如梗，甚则咽肿喉痹。

04257 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】半夏（汤洗去滑，焙）三两 白术 赤茯苓（去黑皮） 人参 甘草（炙，锉） 附子（炮裂，去皮脐） 陈橘皮（去白，焙）各一两 桂（去粗皮）一两半

【用法】上为粗末。每用五钱匕，水一盏半，加生姜半分（拍碎），煎至一盏，去滓，分温二服。

【主治】肉极虚寒，脾咳右胁下痛，阴阴引肩背痛，不可以动，动则咳，脾胀满，留饮痰癖，大小便不利，少腹切痛，膈上寒。

04258 半夏汤

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生》。

【组成】半夏（汤泡七次） 白术 茯苓（去皮） 人参 橘皮（去白） 附子（炮，去皮脐） 木香（不见火） 桂心（不见火） 大腹皮 甘草（炙）各等分

【用法】㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肉虚极，体重，胁引肩背不可以动，动则咳嗽，胀满，留饮痰癖，大便不利。

04259 半夏汤

【方源】《朱氏集验方》卷五引罗监税方。

【组成】南星 半夏各四两 生姜半斤 皂角二挺

【用法】上以白水淹过得药一寸许，同煮干，仍用温水浴过，锉片，晒干为末，加广香、缩砂各半两，甘草一两半，再入熟粟米粉半升，空心，沸汤点服。

【主治】痰饮。

04260 半夏汤

【方源】《普济方》卷一八七。

【组成】半夏（汤洗七次，切，焙）二两半 栝楼实一枚

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，水二盏，加生姜一分（拍碎），煎至一盏，去滓温服，一日三次。

【主治】胸痹，心下坚痞，急痛彻背，短气烦闷，自汗出。

04261 半夏汤

【方源】《校注妇人良方》卷三。

【组成】半夏一钱五分 黄芩一钱 远志一钱 生地黄二钱 秫米一合 酸枣仁（炒）三钱 缩砂一钱五分

【用法】长流水煎服。

【主治】胆腑实热，精神恍惚，寒热泄泻，或寝汗憎风，善太息。

04262 半夏汤

【方源】《古今医彻》卷四。

【组成】半夏一钱 茯苓一钱 厚朴五分 炙甘草三分 广皮一钱

【用法】加竹茹一团，生姜三片，熟砂仁末七分，水煎服。

【主治】妊娠阻恶不食。

【加减】内热，加条芩一钱；胃寒，加藿香一钱；虚，加人参一钱。

04263 半夏饮

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】半夏（为末，生姜汁制饼，晒干） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各二两 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 人参 白术各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，加生姜五片，大枣二个（擘），同煎至八分，去滓温服。

【主治】脾胃虚弱，不能饮食，干呕恶心，或水谷不化。

04264 半夏饮

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】半夏（生姜汁炒黄） 干姜（炮）各一两 枣肉（焙） 附子（炮裂，去皮脐） 青橘皮（汤浸，去白，焙）各半两 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 红豆蔻（去皮）各一分 木香半分 草豆蔻（去皮）二枚

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水一盏，加蜜半匙，煎至七分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】脾胃不和，不能饮食，见食吐逆。

04265 半夏散

【方源】《伤寒论》。

【组成】 半夏（洗） 桂枝（去皮） 甘草（炙） 各等分

【用法】 上三味，各别捣筛已，合治之。每服方寸匕，白饮调下，一日三次。

【主治】 少阴病，咽中痛。

【方论选录】《伤寒集注》：方有执曰，此以风邪热甚，痰上壅而痹痛者言也。故主之以桂枝祛风也，佐之以半夏消痰也，和之以甘草除热也。

04266 半夏散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】 半夏半两（汤洗七遍去滑） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 甘草半两（炙微赤，锉） 人参半两（去芦头） 葛根半两（锉） 麦门冬三分（去心） 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄）

【用法】 上为散。每服二钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒干呕，不纳饮食，心神虚烦。

04267 半夏散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】 半夏一两半（汤洗七遍去滑） 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁炙香熟） 赤茯苓一两 紫苏叶一两 诃黎勒皮一两半 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 咽喉中如有炙脔。

04268 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】 半夏二两（汤洗七遍去滑） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 桂心一两 人参一两（去芦头） 白术一两 当归一两 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 枳实半两（麸炒微黄）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 气上奔，胸中逆满，喘息短气，不得安卧，腹中冷气，肠鸣相逐。

04269 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】 半夏一两（汤洗七遍去滑） 前胡一两（去芦头） 射干一两 白术一两 桂心一两 人参一两（去芦头） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，煎至五分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 胸痹喘塞，心下烦满。

04270 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】 半夏一两半（汤洗七遍去滑） 川大黄一两（锉碎，微炒） 桂心一两 前胡一两（去芦头） 京三棱一两（炮，锉） 当归一两（锉，微炒） 青橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 鳖甲一两半（涂醋炙令黄，去裙襕） 槟榔一两 诃黎勒皮一两 木香一两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 伏梁气，心下硬急满闷，不能食，胸背疼痛。

04271 半夏散

【方源】 方出《圣惠》卷五十一，名见《普济方》卷一六七。

【组成】 半夏一两（汤洗七次去滑） 干姜一两（炮） 丁香一两

【用法】 上为散。每服一钱，以姜汤、粥饮调下，不拘时候。

【主治】 冷痰饮，胸膈气满吐逆，不思饮食。

04272 半夏散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】 半夏半两（汤洗七遍去滑） 芎藭三分 人参半两（去芦头） 草豆蔻半两（去皮） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 白术半两 高良姜半两（锉） 艾叶半两（微炒） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 妊娠伤冷，心腹痛，或痰逆，不纳饮食。

04273 半夏散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】 半夏（汤洗七遍去滑） 海藻（洗去咸味） 龙胆（去芦头） 昆布（洗去咸味） 土瓜根 射干 小麦面各一分

【用法】 上为细散。每服半钱，以生姜酒调下，一日三四次。

【主治】 小儿瘿气，心胸烦闷。

04274 半夏散

【方源】《博济》卷二。

【组成】半夏半两（姜汁浸一宿，焙干） 厚朴半两（去皮，姜汁炒） 枇杷叶（炙去毛）半两 肉豆蔻一个（去壳） 母丁香二十五枚 青木香一块，枣大

【用法】上为细末。每服一钱，水八分，煎六分，和滓热服；酒后服，尤妙。

【主治】五膈气噎，心胸不利，涕唾稠粘，饮食进退。

04275 半夏散

【方源】《本事》卷十。

【异名】破棺散（《得效》卷十）、散生散（《医部全录》卷三二八）。

【组成】半夏

【用法】上为末，每用如豆大许，以竹管吹入鼻中，立醒。

【主治】①《本事》：妇人血晕血迷，败血冲心，昏闷不省人事。②《三因》：魇寐卒死，及为墙壁、竹木所压，水溺、金疮，卒致闷绝，产妇恶血冲心，诸暴绝证。

【方论选录】《本事方释义》：半夏气味辛温，入足阳明。妇人产后瘀浊内闭，致神识如绝，吹入鼻中而醒，以其辛能开窍也。

04276 半夏散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】半夏一两（锉） 桂一字 草乌头一字

【用法】上同煎一盏水，作二服。

【主治】少阴口疮，若声绝不出者，是风寒遏绝，阳气不伸也。

04277 半夏散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】半夏 南星 白僵蚕（直者）各一钱

【用法】用巴豆七粒（去皮油），合上药为细末。用少许生姜自然汁调涂外面肿处。

【主治】痄腮。

04278 半夏散

【方源】《普济方》卷一六七。

【组成】半夏（汤浸去滑，焙干为末，姜汁和做曲，焙干） 杏仁（去皮尖双仁，麸炒，研）各二两 本香半两 桂心（去粗皮）一两 陈橘皮一两（汤洗净） 甘草（炙，锉）一两 干姜（炮）三分

【用法】上药治下筛。每服三钱，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓温服。

【功用】消食，温胃止逆。

【主治】冷痰。

04279 半钱散

【方源】《普济方》卷二一八。

【组成】大川芎二枚（锉作四块） 大附子一个（和皮生捣为细末）

【用法】上以水和附子末如面剂，裹芎作四处。如附子末少入面，裹毕以针穿数孔子，用真脑、麝熏有穴处内香，再捏合穴内，如穴内未觉有香，再熏一住，细罗灰，用罐子内热炭炮熟，为细末。每服半钱，葱茶调下，不拘时候。

【主治】气虚头痛。

04280 半黄丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】黄芩一两半 南星 半夏各一两

【用法】姜汁打糊为丸。姜汤下三五十丸。

【主治】热痰嗽。热痰留滞于内，咳嗽成赤，胸满、胸腹胁常热，惟足乍有时冷，其脉洪滑者。

04281 半硫丸

【方源】《局方》卷六。

【异名】半桃丸（《三因》卷十二）、硫半丸（《良朋汇集》卷二）。

【组成】半夏（汤浸七次，焙干，为细末） 硫黄（明净好者，研令极细，用柳木槌子杀过）各等分

【用法】以生姜自然汁同煎，加干蒸饼末入臼内杵为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心温酒或生姜汤送下；妇人醋汤送下。

【功用】温肾逐寒，通阳开秘，泄浊祛痰，温胃进食，止泻。

①《局方》：除积冷，暖元脏，温脾胃，进饮食。②《圣济总录》：温胃去痰。③《普济方》引《仁存方》：止泄泻。④《良朋汇集》：润大肠。

【主治】肾阳衰微，阴寒内结，命门火衰，阳气不运所致虚人、老人虚冷便秘或阳虚久泻；脾胃气弱，津津停积，湿久浊凝，痰浊咳嗽吐逆；或湿阻三焦，二便不通。

①《局方》：心腹一切痃癖冷气，及年高风秘冷秘，或泄泻。②《圣济总录》：痃癖冷气吐逆。③《普济方》：小儿泄泻注下，或手足冷者，亦治咳嗽。④《温病条辨》：湿凝气阻，三焦俱闭，二便不通。

【方论选录】①《温病条辨》：湿阻无形之气，气既伤而且阻，非温补真阳不可，硫黄热而不燥，能疏利大肠，半夏能入阴。燥胜湿，辛下气，温开郁，三焦通而二便利矣。②《成方便读》：此为命门衰微，胃浊不降而致，故以半夏和胃通阴阳，硫

黄益火消阴，润肠滑便，然后胃与大肠皆得复其常，所谓六腑皆以通为用也。

【临证举例】 虚风便秘 《临证指南医案》：吴，二气自虚，长夏天气发泄，肝风鸱张，见症类中，投剂以来诸恙皆减，所嫌旬日犹未更衣，仍是老人风秘。半硫丸一钱，开水送下，二服。

04282 半解汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 白芍一钱 柴胡二钱 当归三钱 川芎五钱 甘草一钱 蔓荆子一钱 半夏一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 郁气不宣，又加风邪袭于少阳之经，遂至半边头痛，时重时轻，遇顺境则痛减，遇逆境则痛重，遇拂抑之事，而更加之风寒之天，则大痛不能出户，痛至岁久，眼必缩小。

04283 半枝莲饮

【方源】《纲目拾遗》卷五引《百草镜》。

【组成】 鼠牙半枝莲一两

【用法】 捣汁，陈酒和服。渣敷留头，取汗而愈。

【主治】 大毒，发背，对口、冬瓜、骑马等痈。初起者消，已成者溃，出脓亦少。

04284 半夏饮子

【方源】《外台》卷八引《万全方》。

【组成】 制半夏八分 厚朴（炙） 人参 白术 生姜（切） 枣各六分 粳米二合 橘皮四分

【用法】 上切细。以水二大升，煎取一升，去滓，分温四服，空肚腹二服。

【主治】 胃反，饮食吐逆，水谷不化。

【宜忌】 忌羊肉、饧。

04285 半夏拨刀

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】 半夏（以汤洗七遍后以生姜汁半盏煮半夏，令汁尽再炒干）一两 人参半两

【用法】 上为末，加小麦面六两，以水搜作团，切如拨刀，以新生鸡子二枚（去壳），汤内煮，旋以箸剔破，加葱、薤白各三五茎，擘破，以盐酱调和，候汤沸，下拨刀煮令熟，任意分三次热食之。

【主治】 初妊娠恶阻，择食痰逆，服诸汤药并皆无效。

04286 半夏熨方

【方源】《千金》卷五。

【组成】 半夏 生姜 芎劳 各一升 细辛三两 桂心一尺 乌头十枚

【用法】 上㕮咀。以淳苦酒五升渍之，晬时，煮二沸，绞去滓，以绵一片浸药中，适寒温以熨囟上，冷更温之，复熨如前，朝暮各三四熨乃止，二十日愈。

【主治】 小儿脑长，解颅不合，羸瘦色黄，至四五岁不能行。

04287 半附理中汤

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】 半夏（上） 附子 人参 白术 干姜（各中） 甘草（下）

【用法】 以水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】 胃中虚冷，呕吐不止。

04288 半夏干姜散

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 半夏 干姜各等分

【用法】 上为散。每服方寸匕，浆水一升半，煎取七合，顿服之。

【主治】 干呕吐逆，吐涎沫。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：赵以德：干呕吐涎沫者，由客邪逆於肺，肺主收引，津液不布，遂聚为涎沫也。用半夏、干姜之辛热，温中燥湿；浆水之寒，收而行之，以下其逆，则其病自愈矣。②《金匮要略心典》：干呕吐逆，胃中气逆也；吐涎沫者，上焦有寒，其口多涎也。此是阳明寒气逆气不下而已。故以半夏止逆消涎；干姜温中和胃；浆水甘酸，调中引气止呕哕也。

04289 半夏左经汤

【方源】《三因》卷三。

【组成】 半夏（汤去滑） 干葛 细辛 白术 茯苓 桂心（不见火） 防风 干姜（炮） 黄芩 小草 甘草（炙） 柴胡 麦门冬（去心）各三分

【用法】 上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，煎七分，去滓，空腹服。

【主治】 足少阳经为风寒暑湿流注，发热，腰胁痛，头疼，眩晕，呕吐宿汁，耳聋，惊悸，热闷心烦，气上喘满肩息，腿痹，缓纵不随。

【加减】 热闷，加竹沥，每服半合；满，加杏仁、桑白皮。

04290 半夏白术丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 白术二两 半夏 干姜 枳实 赤茯苓 各一两

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】 酒癖留滞，胁肋坚痛，胸腹满闷，饮食进退及呕逆恶心。

04291 半夏曲芽汤

【方源】《医统》卷二十四。

【组成】半夏 陈皮 茯苓 枳壳 槟榔 神曲 麦芽 甘草各等分

【用法】加生姜五片，大枣一个，水煎服。

【主治】饮食积滞，痰涎壅盛，呕吐不已。

04292 半夏曲芽汤

【方源】《简明医彀》卷三。

【组成】半夏 陈皮 茯苓 枳壳 槟榔 神曲 麦芽 香附 厚朴 苍术各一钱 甘草三分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】饮食积滞，痰涎壅盛，呕吐不已。

04293 半夏利膈丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】白术 人参 白茯苓（去皮） 白矾（生） 滑石 贝母各一两 天南星（生用）一两半 白附子（生）二两 半夏（汤洗）三两

【用法】上为细末，水面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后生姜汤送下。

【功用】止嗽化痰。

【主治】风痰郁甚，头疼目眩，咽膈不利，涕唾稠粘，胸中烦满，酒癖停饮，呕逆恶心，胁下急痛，腹中水声，神思昏愦，心忪面热。

04294 半夏芩术汤

【方源】方出《丹溪心法》卷四，名见《东医宝鉴·外形篇》卷四。

【组成】苍术二钱 白术一钱半 半夏 南星 酒黄芩 香附各一钱 陈皮 赤茯苓各五分 威灵仙三分 甘草二分

【用法】上㕮咀。加生姜三片，水煎服。

【主治】①《丹溪心法》：臂痛。②《东医宝鉴·外形篇》：痰饮臂痛不能举。

04295 半夏泻心汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】泻心汤（《千金》卷十）。

【组成】半夏半升（洗） 黄芩 干姜 人参 甘草（炙）各三两 黄连一两 大枣十二个（擘）

【用法】以水一斗，煮取六升，去滓，再煮取三升，温服一升，一日三次。

【功用】和胃降逆，开结除痞。

①《金鉴》：补虚降逆，祛寒泻热。②《金匮玉函经二注》：赵以德注：分阴阳，升水降火。③《金匮要略心典》：交阴阳，通上下。

【主治】伤寒痞证。胃气素虚，或吐下伤正，肠胃不和，升降失序，心下痞满，按之柔软而不痛，干呕，肠鸣下利，舌苔薄黄而腻，脉弦数。现用于急慢性胃炎、肠炎，消化道溃疡，胃功能失调等属肠胃不和，升降失调者。①《伤寒论》：伤寒五六日，呕而发热，柴胡汤证具，而以他药下之，心下但满而不痛者，此为痞。②《金匮》：呕而肠鸣，心下痞者。③《外台》引《删繁方》：上焦虚寒，肠鸣下利，肠中雷鸣，心下痞满，干呕不安。④《三因》：心实热，心下痞满，身黄发热，干呕不安，溺溲不利，水谷不消，欲吐不出，烦闷喘息。⑤《类聚方广义》：痢疾腹痛，呕而心下痞硬；或便脓血，及饮汤药后，下腹部每漉漉有声而转泄者；癥瘕积聚，痛侵心胸，心下痞硬，恶心呕吐，肠鸣下利者。

【方论选录】①《金匮玉函经二注》赵以德注：自今观之，是证由阴阳不分，塞而不通，留结心下为痞，于是胃中空虚，客气上逆为呕，下走则为肠鸣，故用是汤分阴阳，水升火降，而留者去，虚者实。成注是方：连、芩之苦寒人心，以降阳而升阴也；半夏、干姜之辛热，以走气而分阴行阳也；甘草、参、枣之甘温，补中而交阴阳，通上下也。②《伤寒来苏集》：伤寒五六日，未经下而胸胁苦满者，则柴胡汤解之；伤寒五六日，误下后，心下满而胸胁不满者，则去柴胡、生姜，加黄连、干姜以和之。此又治少阳半表半里之一法也。然倍半夏而去生姜，稍变柴胡半表之治，推重少阳半里之意耳。君火以明，相火以位，故仍名曰泻心，亦以佐柴胡之所不及。③《医方集解》：苦先入心，泻心者，必以苦，故以黄连为君，黄芩为臣，以降阳而升阴也；辛走气，散痞者必以辛，故以半夏、干姜为佐，以分阴而行阳也；欲通上下交阴阳者，必和其中，故以人参、甘草、大枣为使，以补脾而和中。④《金匮要略心典》：是虽三焦俱病，而中气为上下之枢，故不必治其上下，而但治其中。黄连、黄芩苦以降阳，半夏、干姜辛以升阴，阴升阳降，痞将自解；人参、甘草则补养中气，以为交阴阳，通上下之用也。⑤《成方便读》：所谓彼坚之处，必有伏阳，故以芩、连之苦以降之，寒以清之，且二味之性皆燥，凡湿热为病者，皆可用之。但湿浊粘腻之气，与外来之邪，既相混合，又非苦降直泄之药所能去，故必以干姜之大辛大热以开散之。一升一降，一苦一辛。而以半夏通阴阳行湿浊，散邪和胃，得建治痞之功。用甘草、人参、大枣者，病因里虚，又恐苦辛而泄之药过当，故当助其正气，协之使化耳。

【临证举例】①痞证 《伤寒论通俗讲话》：张某

某，男，36岁。素有酒癖，因病心下痞闷，时发呕吐，大便不成形，日三四行，多方治疗，不见功效，脉弦滑，舌苔白。拟方：半夏12克，干姜6克，黄连6克，党参9克，炙甘草9克，大枣7个。服一剂，大便泻出白色粘涎甚多，呕吐遂减十分之七，再服一剂，痞、利俱减，又服二剂，病则痊愈。②不寐 《伤寒论解惑论》：李某某，女性，年约六旬。失眠症复发，屡治不愈，日渐严重，竟至烦躁不食，昼夜不眠，服安眠药片才能勉强睡一时。就诊时，按其脉涩而不流利。舌苔黄厚粘腻，胃脘满闷，大便数日未行，但腹无胀痛。处方：半夏泻心汤原方加枳实。傍晚服下，当晚就酣睡了一整夜，满闷烦躁，都大见好转，又服几剂，大便畅行，一切基本正常。③痛证 《伤寒今释》引《成绩录》：一人年十八，患痛，发则郁冒，默默不言，但能微笑，恶与人应接，故用屏风，重蚊帐，避人蒙被卧。汗之，心下痞硬，腹中雷鸣，服半夏泻心汤，痛减七八。④腹泻 《广东中医》（1959；6：226）：余某，女，26岁。热病五天，发热，口苦，渴而引饮，自取"狗干菜"煎服，热渴口苦虽减，惟不饮食。翌日晚，食干饭钟余，胃脘不舒，夜半忽腹泻，完谷不化，延医服药二剂，无效，而后下利频数，日十余行，肠鸣漉漉，脉小数，诊断：肛热肠寒，宜半夏泻心汤，一剂而愈。《浙江中医杂志》（1985；4：15）：本方治急性肠炎100例，其中日泻25次以下28例，10次以下24例，5次以上48例；发热低于38℃者38例，高于38℃者23例；腹痛者70例；恶心呕吐者44例；大便镜检：白细胞0～2者70例，红细胞0～2者33例。治疗三日后，痊愈者78例，好转14例，无效8例。⑤胃及十二指肠溃疡出血 《上海中医药杂志》（1984；2：23）：笔者对48例经西医诊断为胃及十二指肠溃疡出血和慢性胃炎等病人治以半夏泻心汤，均取得满意效果。临床症状为脘腹疼痛，隐痛，吐血色鲜，或紫暗色血水，杂有食物残渣，或排大便如墨，舌红，苔黄腻，脉滑数。其加减法：呕血者以炮姜炭易干姜，加小蓟根10克；大便隐血试验阳性者加阿胶10克；呕血兼便血者，加小蓟根10克，阿胶10克；脘腹隐痛者，加延胡索10克。每日一剂，服3剂后止血者31例，服5剂后止血者15例，服10剂后止血者2例。⑥口腔粘膜溃疡 《浙江中医杂志》（1980；11、12合刊：55）：笔者用半夏泻心汤原方对口腔溃疡病久，舌质偏红，兼有热象，溃疡部位呈灰白色，属心火与脾湿搏结者20例进行治疗，取得满意效果。

04296 半夏枳术丸

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】半夏（汤泡七次，焙干） 枳实（麸炒黄色） 白术各二两

【用法】上为极细末，荷叶裹饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，添服不妨，无定法。如热汤浸饼蒸为丸亦可。

【主治】因伤食内伤。

【加减】如食伤寒热不调，每服加上三黄丸十丸，白汤送下；小便淋者，加泽泻一两为丸服。

04297 半夏茯苓汤

【方源】《外台》卷七引《小品方》。

【组成】半夏五两（洗） 生姜五两 茯苓三两 旋覆花一两 陈橘皮 人参 桔梗 芍药 甘草（炙）各二两 桂心一两

【用法】上切。以水九升，煮取三升，分三服。

【主治】胸膈心腹中痰水冷气，心下汪洋，嘈烦，或水鸣多唾，口清水自出，胁肋急胀，痛不欲食，其脉喜沉弦细迟。

【宜忌】忌羊肉、饧、酢物、生葱、狸肉、海藻、菘菜。

【加减】欲得利者，加大黄；须微调者，用干地黄；病有先时喜水下者，加白术三两，除旋覆花；若大便不调，宜加大黄及干地黄，并用三两。

04298 半夏茯苓汤

【方源】《千金》卷二。

【异名】半夏散（《圣惠》卷七十五）、半夏汤（《圣济总录》卷一五四）。

【组成】半夏三十铢 茯苓 干地黄各十八铢 橘皮 细辛 人参 芍药 旋覆花 芎藭 桔梗 甘草各十二铢 生姜三十铢

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】妊娠阻病，心中愦闷，空烦吐逆，恶闻食气，头眩重，四肢百节疼烦沉重，多卧少起，恶寒汗出，疲极黄瘦。

【宜忌】忌生冷、醋滑、油腻、菘菜、海藻。

【加减】若病阻，积月日不得治，及服药冷热失候，病变客热烦渴，口生疮者，去橘皮、细辛，加前胡、知母各十二铢；若变冷下痢者，去干地黄，入桂心十二铢；若食少胃中虚，生热，大便闭塞，小便赤少者，宜加大黄八十铢，去地黄，加黄芩六铢。

【方论选录】①《医方考》：是方半夏、生姜能开胃而醒脾；地黄、芍药、芎藭能养阴而益血；人

参、茯苓，甘草能和中而益气；及橘皮、桔梗、旋覆、细辛皆辛甘调气之品，可以平恶逆之气而进饮食者也。或问半夏为妊娠所忌，奈何用之？余曰：昔人恐久用而燥阴液，故云忌尔；若有恶阻之证，则在所必用也，故孙真人方之圣者也，其养胎之剂，用半夏者盖五方焉。②《千金方衍义》：方用人参鼓舞二陈之制，以运痰止呕，兼旋覆、桔梗以升散结气，芎、芍、地黄以保护荣血，用细辛者协济芎、地以升血分经脉窍隧之邪也。倘后烦热下痢或二便闭塞，是必兼理客气，其加桂心、加大黄，当效前大黄丸及后方茯苓丸之制，庞安常言桂不伤胎，且熬令黑，则专散气而无壮火食气之患，大黄熬黑，但能泄热，而无苦寒伤中之虑。世俗每谓半夏辛散，胎未形成时，为之切禁。若妊娠肥盛多痰者，不去其痰，则胎不安。癃瘠多火者，不清其火，则胎不稳。时师咸谓黄芩、白术为安胎专药，孰知半夏、大黄、桂心有安胎妙用乎！历观《千金》诸方，每以大黄同姜、桂任补益之用，人参协消、黄佐克敌之功，不由《千金》之门，何以求应变之策耶？

【备考】 ①方中桔梗，《医心方》卷二十二引《产经》作“泽泻”。《圣济总录》有大枣。②本方方名，《玉机微义》引作“茯苓半夏汤”。

04299 半夏茯苓汤

【方源】《妇人良方》卷十二引张氏方。

【异名】 茯苓半夏汤（《赤水玄珠》卷二十一）。

【组成】 半夏（泡洗七次，炒黄） 陈皮各二两半 白茯苓二两 缩砂仁一两 甘草四两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水二盏，加生姜十片，大枣一个，乌梅半个，煎至七分，食前温服。

【主治】 ①《妇人良方》：妊娠痰逆不思食。②《永类钤方》：妊娠恶阻，恶闻食气，胸膈痰逆，呕吐恶心。

04300 半夏茯神散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 半夏 茯神各一两二钱 天麻（煨） 胆星 远志肉 枣仁（炒） 广皮 乌药 木香 磁石（煅）各八钱

【用法】 上为散。每服三钱，水一盏，煎数沸，加生姜汁数匙，空心和滓服。

【主治】 癫妄，因思虑不遂，妄言妄见，神不守舍，初病神气未衰者。

04301 半夏茯神散

【方源】《医略六书》卷二十二。

【组成】 半夏二两（制） 茯神一两半（去木） 枣仁三两 远志一两半 胆星二两 天麻二两（煨） 陈皮一两半 木香一两 磁石三两 乌梅三两

【用法】 上为散，水一盏，煎数沸，加姜汁一匙，调服三钱。

【主治】 癫妄，脉弦滑者。

【方论选录】 心虚，痰扰神明，不能安于神舍，故癫妄失伦，语言无绪焉。枣仁养心宁神，茯神安神定志，半夏燥湿痰醒脾，胆星清热痰快膈，远志通肾交心，磁石镇虚坠热，天麻祛风化痰，木香调和气化，陈皮利中气以化痰也，更以生姜散豁痰涎，乌梅收敛耗散之气而安神明也。为散煎服，使痰化气清，则神志得养而癫无不宁，语言无不清矣。

04302 半夏厚朴汤

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 厚朴汤（《圣济总录》卷一二四）、大七气汤（《三因》卷八）、四七汤、厚朴半夏汤（《易简方》）、七气汤（《直指》卷五）、四七饮（《杏苑》卷四）。

【组成】 半夏一升 厚朴三两 茯苓四两 生姜五两 干苏叶二两

【用法】 以水七升，煮取四升，分温四服，日三夜一服。

【功用】《中医方剂学讲义》：行气开郁，降逆化痰。

【主治】 ①《金匮》：妇人咽中如有炙脔。②《易简方》：喜、怒、悲、思、忧、恐、惊之气结成痰涎，状如破絮，或如梅核，在咽喉之间，咯不出，咽不下，此七气所为也。或中脘痞满，气不舒快，或痰涎壅盛，上气喘急，或因痰饮中结，呕逆恶心。

【方论选录】 ①《金匮》：此病得于七情郁气，凝涎而生，故用半夏、厚朴、生姜辛以散结，苦以降逆，茯苓佐半夏，以利饮行涎，紫苏芳香，以宣通郁气，俾气舒涎去，病自愈矣。②《金匮方歌括》：方中半夏降逆气，厚朴解结气，茯苓消痰；尤妙以生姜通神明，助正祛邪；以紫苏之辛香，散其郁气。郁散气行，而凝结焉有不化哉。

【临证举例】 ①梅核气 《临证偶拾》：张某，女，52岁，半年来咽部似有所塞，犹如梅核，如絮如膜。咽不下，咯不出，腹部作胀，有气攻冲，大便秘结，得矢气则舒，苔薄腻，脉沉弦。气机失畅，痰凝气滞，化痰导滞为主，半夏厚朴汤加枳实9克、姜竹茹9克、莱菔子9克、全瓜蒌12克、生

甘草1.5克，二剂后咽部阻塞感消失，精神好转。②胃脘痛 《江苏中医》（1964；10：18）：谢某，男，21岁，脘痛牵引两胁，胸闷嗳气频频，纳谷乏味，口渗清涎，脉象弦滑，舌苔薄腻。病起肝郁气滞，痰湿内阻，胃失和降，拟半夏厚朴汤损益：姜半夏一钱半，制厚朴六分，云茯苓四钱，苏叶一钱半，大麦芽四钱，炒枳壳一钱半，新会皮一钱半，粉甘草八分。服上方二剂后，脘痛大减，惟负重力屏气后又致胸闷且痛，原方加竹茹三钱，红枣四枚，二剂后愈。③眩晕 《江苏中医杂志》（1980；6：23）：徐某，男，46岁，头晕，目眩，耳鸣，作泛呕吐两天，视物旋转，头不能转侧，动则眩晕更甚，不思食，食入作泛呕吐。西医诊断为美尼尔氏综合征。中医会诊，除上述症状外，观形体稍胖，闭目怕睁，时有干呕，苔白薄，舌质稍胖淡，脉弦滑。拟下气消痰，降逆和胃，佐平肝熄风。取半夏厚朴汤加减：制半夏10克，川厚朴10克，云茯苓10克，老苏梗10克，珍珠母（先煎）30克，双钩藤（后入）15克，代赭石（先煎）15克，广皮5克，炒苍术10克，建泽泻10克，五剂。服三剂后，自觉眩晕好转，能进些饮食，五剂毕，行动自如。

04303 半夏厚朴汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 红花 苏木各五厘 吴茱萸 干生姜 黄连各一分 木香 青皮各二分 肉桂 苍术 白茯苓 泽泻 柴胡 陈皮 生黄芩 草豆蔻仁 生甘草各三分 京三棱 当归梢 猪苓 升麻各四分 神曲六分 厚朴八分 半夏一钱 桃仁七个 昆布少许

【用法】 上㕮咀，作一服。水三盏，煎至一盏，去滓，稍热服。

【功用】《济阳纲目》：消胀化积。

【主治】 中满腹胀，内有积聚，坚硬如石，其形如盘，令人不能坐卧，大小便涩滞，上喘气促，面色萎黄，通身虚肿。

【加减】 渴，加葛根三分。

【备考】 服广茂溃坚汤二服之后，中满减半，止有积不消，再服此药。

04304 半夏厚朴汤

【方源】《直指附遗》。

【组成】 半夏（汤泡七次） 厚朴（姜汁制） 山栀（去皮，炒黑） 川黄连（姜汁炒）各一钱 广陈皮（去白）八分 茯苓（去粗皮）八分 甘草（生用）三分 黑枳实（麸炒）一钱 苍术（泔浸，炒）八分 泽泻 香附子 青皮各五分 当归 白豆蔻各六分

【用法】 上㕮咀。用水一钟半，加生姜三片，煎八分，不拘时候服。

【主治】 翻胃吐痰，胸满胁痛，嘈杂吐涎。

04305 半夏神曲汤

【方源】《医便》卷二。

【组成】 陈皮一钱 白术一钱五分 半夏一钱二分 干姜（炒）八分 神曲（炒）一钱 三棱（醋炒） 莪术（醋炒） 白茯苓（去皮） 山楂（去核） 枳实（炒）各一钱 砂仁七分（炒） 麦芽（炒）八分

【用法】 加生姜三片，水煎，热服，不拘时候。

【主治】 过食寒冷硬物及生瓜果，致伤太阴、厥阴、或呕吐、痞闷、肠癖，或腹痛恶食。

04306 半夏栝楼丸

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】 半夏（生姜制） 栝楼 杏仁（去皮尖） 麻黄 白矾（枯称） 款冬花各等分

【用法】 上为末，生姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎生姜汤送下，不拘时候。

【主治】 远年痰嗽，烦喘不止者。

04307 半夏麻黄丸

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 半夏 麻黄各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服三丸，饮送下，一日三次。

【主治】 心下悸。

【方论选录】 ①《伤寒补正》：《伤寒论》心下悸用桂枝以宣心阳，用茯苓以利水邪。此用半夏、麻黄非故岐而二之也。盖水气凌心则心下悸，用桂枝者，助心中之火以敌水也；用麻黄者，通太阳之气以泄水也。彼用茯苓，是从脾利水以渗入膀胱，此用半夏，是从胃降水抑其冲气，冲降则水随而降，方意各别。②《伤寒论注》：徐彬曰，阴邪者，痰饮也，故以半夏主之，而合麻黄，老痰非麻黄不去也。

【临证举例】 心悸 《上海中医药杂志》（1984；12：21）：余治顾男，58岁，入冬以来，自觉心窝部跳动，曾作心电图无异常，平时除有老慢支及血压略偏低外，无他病，脉滑苔白。予以姜半夏、生麻黄各30克，研末和匀，装入胶囊。每日三次，每次二丸，服后心下悸即痊愈。

04308 半夏温肺汤

【方源】《医学发明》卷九。

【组成】 细辛 橘皮 桂心 人参 旋覆花 甘草 桔梗 芍药 半夏各半两 赤茯苓二分

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】 胃气虚冷，心腹中脘痰水冷气，心下汪洋，嘈杂肠鸣，多唾，口中清水自出，胁肋急胀痛，不饮食，脉沉弦细迟。

04309 半夏藿香汤

【方源】 《瘟疫论》卷上。

【组成】 半夏一钱五分 真藿香一钱 干姜（炒）一钱 甘草五分 白茯苓一钱 广陈皮一钱 白术一钱（炒）

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 ①《瘟疫论》：痰邪留于胸膈，胃口热甚，皆令呕不止，下之呕当去，今反呕者，此属胃气虚寒，少进饮粥，便欲吞酸者。②《会约》：瘟疫下后，脉静身凉，不渴不燥，胃寒呕逆。

04310 半温半热汤

【方源】 《医学正传》卷六引《活人》。

【异名】 半湿半热汤（《济阳纲目》卷三十四）。

【组成】 半夏 茯苓 白术各七分 前胡 枳壳（麸炒黄色） 甘草（炙） 大戟各五分 黄芩 茵陈 当归各三分

【用法】 上切细，作一服。加生姜三片，水二盏，煎至一盏，温服。

【主治】 酒疸，身黄无热，靖言了了，腹满欲呕，心烦足热，或有癥瘕，心中懊侬，其脉沉弦坚细。

04311 半夏千里流水汤

【方源】 《千金》十二。

【异名】 半夏东流水汤（《圣济总录》卷四十二）、半夏汤（《玉机微义》卷九）。

【组成】 半夏 宿姜各三两 生地黄五两 酸枣仁五合 黄芩一两 远志 茯苓各二两 秫米一升

【用法】 上㕮咀。以长流水五斗煮秫米，令蟹目沸，扬之三千遍，澄清，取九升煮药，取三升半，分三服。

【功用】 泻热。

【主治】 ①《千金》：胆腑实热，精神不守。②《圣济总录》：胆实生热，腹中气满，饮食不下，咽干头重，洒洒恶寒，两胁胀痛。

【方论选录】 《千金方衍义》：实则邪气之凑，热则阳气之并。《千金》半夏千里流水汤本乎《灵枢》治阳气盛满不得入于阴、阴虚则目不瞑，故用半夏涤除痰涎，秫米滋培气化，加宿姜、茯苓佐上二味洁净胆腑，生地黄滋水制阳，枣仁敛津化热，黄芩外疏风木，远志内通壮火，逐流水以下趋，是可无借苇薪之炊矣。

04312 半夏白术天麻汤

【方源】 《脾胃论》（人民本）卷下。

【异名】 半夏茯苓天麻汤（《卫生宝鉴》卷九）、白术半夏天麻汤（《扶寿精方》）、半夏天麻汤（《杏苑》卷四）、半术天麻汤（《简明医彀》）。

【组成】 黄柏二分 干姜三分 天麻 苍术 白茯苓 黄耆 泽泻 人参各五分 白术 炒曲各一钱 半夏（汤洗七次） 大麦芽面 橘皮各一钱五分

【用法】 上㕮咀。每服半两，水二盏，煎至一盏，去滓，食前带热服。

【功用】 ①《脾胃论》：温凉并济，补泻兼施。②《中医方剂学讲义》：补脾燥湿，化痰息风。

【主治】 痰厥头痛，咳痰稠粘，头眩烦闷，恶心吐逆，身重肢冷，不得安卧，舌苔白腻，脉弦滑。现用于美尼尔综合征见有上述症状者。

【方论选录】 ①《脾胃论》：此头痛苦甚，谓之足太阴痰厥头痛，非半夏不能疗；眼黑头旋，风虚内作，非天麻不能除，其苗为定风草，独不为风所动也；黄耆甘温，泻火补元气；人参甘温，泻火补中益气；二术俱苦温甘，除湿补中益气；泽、苓利小便导湿；橘皮苦温，益气调中升阳；曲消食，荡胃中滞气；大麦芽面，宽中助胃气；干姜辛热，以涤中寒；黄柏苦大寒，酒洗以主冬天少火在泉发燥也。②《医略六书》：脾气大亏，痰食滞逆，不能统运于中，故厥逆头痛眩晕不已焉。苍术燥痰湿以强脾；白术健脾元以燥湿；人参扶元补气，黄耆补气固中，天麻祛风湿以豁痰；泽泻泻浊阴以却湿；神曲消食积开胃，麦芽化湿和中；茯苓渗脾湿；半夏燥湿痰；橘红利气和胃；生姜快膈散痰；黄柏清湿热，干姜温中气也，使气健脾强，则自能为胃行其津液，而痰厥自平，食远温服，俾痰化气行，则胃气融和而清阳上奉，头痛眩晕无不保矣。此温凉并济，补泻兼施之剂，为气虚痰厥头痛眩晕之专方。

【临证举例】 ①痰厥头痛 《脾胃论》：范天骕之内，素有脾胃之证，时显烦躁，胸中不利，大便不通，初冬出外而晚归，为寒气拂郁，闷乱大作，火不得伸故也。医疑有热，治以疏风丸，大便行而病不减，又疑药力小，复加七八十丸，下两行，前证仍不减，复添吐逆，食不能停，痰唾稠粘，涌出不止，眼黑头旋，恶心烦闷，气短促上喘，无力不欲

言，心神颠倒，兀兀不止，目不敢开，如在风云中，头苦如裂，身重如山，四肢厥冷，不得安卧。余谓前证乃属已损，复下两次，则重虚其胃而痰厥头痛作矣，制半夏白术天麻汤主之而愈。②不寐《吉林中医药》（1986；6:20）：丁某某，46岁。失眠已三月余，精神恍惚，头晕乏力，心悸气短，胸闷脘胀，嗳气泛恶，纳谷无味，大便不爽，舌质红，苔腻微黄，脉滑数。治拟和胃宁心，用半夏白术天麻汤加减：天麻10克，清半夏、白术、枳壳、黄连、橘皮各7.5克，茯苓、远志、麦芽、瓜蒌、枣仁、竹茹各15克，水煎服。共进24剂，能正常入睡，追访至今，未见复发。③美尼尔综合征《安徽中医学院学报》（1985；1:17）：张某某，女，70岁。冬月冒寒，头昏头痛，视物旋转十天。西医诊为"美尼尔综合征"，服药罔效。刻下眩未减，泛恶干呕吐涎沫，心悸气短，胸痞纳差，口中粘腻，舌尖发麻，屡次更衣，大便量少而细软，形体丰腴，舌苔白腻，六脉濡弱，诊为风痰上犯，中气素匮。处方：法半夏、天麻、陈皮各10克，白术12克，茯苓、党参、山楂各15克，吴茱萸5克，生姜6克，炙甘草3克。服药三剂，诸症大减，已不泛恶，继服三剂而愈。

【备考】 ①本方方名，《济生拔萃》本作"制半夏白术天麻汤"，《医方集解》引作"半夏天麻白术汤"。②改为丸剂，名"半夏天麻丸"（见《北京市中药成方选集》）。

04313 半夏白术天麻汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 半夏一钱五分　白术　天麻　陈皮　茯苓各一钱　甘草（炙）五分　生姜二片　大枣三个　蔓荆子一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 痰厥头痛者，胸膈多痰，动则眩晕。

【加减】 虚者，加人参。

04314 半夏黄连解毒汤

【方源】《直格》卷下。

【组成】 黄连（去须）　黄柏　黄芩　大栀子各半两　半夏三枚　厚朴三钱（锉）　茯苓（去皮，锉）

【用法】 水一盏半，加生姜三片，煎至半盏，绞汁温服。

【主治】 火热狂躁，喘满，或腹满呕吐，或欲作利者。

04315 加干散

【方源】《医方类聚》卷二一三引《仙传济阴方》。

【组成】 没药　当归　北芍药各二钱　桂二钱　麝香一分　川乌　茴香各三钱

【用法】 上为末。酒调下。次服立效散。

【主治】 妇人肌肉如针刺，或时呕吐者，因月经伤冷血痛。

04316 加皮酒

【方源】《医级》卷八。

【组成】 加皮八两　当归　牛膝　白芍　川断各二两　木瓜　远志各一两

【用法】 用酒十斤，和药纳瓷瓶内，重汤煮三炷香，日服之。

【主治】 劳伤血风，男妇脚气及骨节皮肤疼痛。

04317 加味二冬汤

【方源】《证治汇补》卷五。

【组成】 天冬　麦冬各一钱半　生地　熟地各二钱　款冬　桔梗　贝母　紫菀　茯苓　甘草　沙参　瓜蒌霜各一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 火盛水亏之咳嗽，痰涎腥秽，将成痈痿者。

【方论选录】《医略六书》：麦冬清心润肺燥，天冬润肺燥益阴，生地滋阴壮水以制火，熟地补阴益肾以填精，沙参泻热补肺，川贝清肺化痰，蒌霜搜涤燥痰，桔梗清利咽膈，紫菀泄肺以肃金，款冬润肺以散结，茯苓清肺和脾，生草泻火缓中也。俾水旺火平，则肺金自润，而肺气宣通，无不痰消咳止。

04318 加味二陈汤

【方源】《医部全录》卷二四〇引《直指》。

【组成】 陈皮　半夏　茯苓　甘草　姜黄　枳壳各少许

【用法】 用水二盏，加生姜五片，大枣二枚，煎八分。食远服。

【主治】 酒面积热成疾，手臂痛，并痰攻眼肿，身麻痹。

04319 加味二陈汤

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】 半夏　陈皮各五两　白茯苓三两　甘草（炙）一两半　砂仁一两　丁香五钱　生姜三两

【用法】 水煎服。

【主治】 停痰结气而呕。

04320 加味二陈汤

【方源】《医学正传》卷三引丹溪方。

【组成】 陈皮（去白）一钱　半夏一钱五分

（炮） 茯苓一钱 甘草（炙）三分 栀子（炒） 一钱 黄连（姜汁拌炒）一钱五分 川芎一钱 白术一钱 干姜（炒）五分 苍术一钱 香附一钱 牡荆子（炒另研）一钱半

【用法】 上切细，作一服。水二盏，加生姜三片，煎至一盏，稍热服。

【主治】 胃中有伏火，膈上有稠痰，时常胃口作痛，及恶心吐清水不快。

【加减】 如胃口疼甚，加生姜自然汁一合；挟虚者，加人参一钱。

04321 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷十八引丹溪方。

【组成】 陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄连（姜汁炒） 栀子（炒） 苍术 川芎 香附 砂仁 神曲（炒） 山楂 木香少许

【用法】 上锉。加生姜，水煎服。

【主治】 胃中有火，膈上有痰，令人时常恶心，呕吐清水，作嗳气吞酸等证。

【加减】 久病虚者，加人参、白术；胃寒者，加益智、草豆蔻、干姜、桂心之类，去黄连、栀子，又甚者加丁香、附子；如胁痛，或脾痛，右关脉弦，呕吐不已，此木来侮土，加人参、白术、升麻、柴胡、青皮、芍药、川芎、砂仁、神曲之类；如时常吐清水，或口干，不喜食，冷涎自下而涌上者，此脾热所致，加白术、芍药、升麻、土炒芩连、栀子、神曲、麦芽、干生姜；如时常恶心，吐清水，心胃作痛，得食则暂止，饥则甚者，此胃中有蛔也，加苦楝根、使君子煎服即愈，或用黑锡灰、槟榔各等分，米饮调下。

04322 加味二陈汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】 茯苓 半夏 陈皮 枳实 甘草 桔梗 杏仁 贝母 瓜蒌仁 黄连

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 痰实结胸。喘咳，胸胁满痛，作寒热，脉洪滑，心烦口渴者。

【加减】 胸腹痛，加砂仁，去甘草；痰渴，去半夏，加知母、天花粉；嗽，加五味；喘，加桑皮、苏子；胁满痛，加青皮、白芥子、木香；有热痰结，加柴、芩、竹沥、姜汁少许，去半夏；有寒痰结，加干姜、姜汁，去贝母、黄连；风痰结，加南星、竹沥、姜汁；火痰，加山栀、黄芩、竹沥、姜汁少许，去半夏。

04323 加味二陈汤

【方源】《广嗣纪要》卷十二。

【组成】 陈皮一钱半 白茯苓 半夏（炒）各一钱 甘草三分 黄连（姜汁炒） 吴萸（炮，去皮）三分

【用法】 水一钟半，加生姜五片，煎服。

【主治】 吐酸水同食物出者，热也。

04324 加味二陈汤

【方源】《医统》卷五十三。

【组成】 陈皮 半夏 人参 茯苓 黄芩 川芎各一钱 甘草 木香各五分（磨汁）

【用法】 用水二盏，加生姜三片，煎七分，食后服。

【主治】 气郁痰火眩运。

04325 加味二陈汤

【方源】《医方考》卷五。

【组成】 半夏 陈皮 茯苓 黄芩（酒炒） 甘草 川芎 细辛 黄连（酒炒） 薄荷 苍耳子 胆南星

【主治】 头风，偏头风。

【方论选录】 是方也，半夏、陈皮、茯苓、甘草，治痰之二陈汤也；加南星之燥，皆所以治痰耳；而黄芩、黄连者，用其苦寒以治热也；若川芎、细辛、薄荷、苍耳，皆治风之品也。高巅之上，惟风可到，是故用之。

【备考】《济阳纲目》本方用法：上锉。加生姜，水煎服。

04326 加味二陈汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】 陈皮二钱 半夏（姜炒）二钱 枳实（麸炒）一钱 黄连（姜汁）六分 山楂（去子）二钱 木香八分 青皮（去瓤）二钱 白茯苓（去皮）三钱 砂仁八分 甘草八分

【用法】 上锉。加生姜，水煎服。

【主治】 痰气郁结，或饮食停滞而为痞满，按之，无块者。

04327 加味二陈汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄芩各八分 黄连 薄荷各五分

【用法】 水二钟，加生姜三片，煎八分，食前服。

【主治】 痰饮流注舌下，发肿作痛，针刺已破者。

04328 加味二陈汤

【方源】《济阴纲目》卷七十五。

【组成】 南星（姜制） 半夏（姜制）各一钱半

苍术（米泔浸炒） 黄柏（煨） 陈皮各一钱 茯苓八分 甘草五分（一方二陈汤加南星、香附、乌药、枳壳）

【用法】 上锉。水煎，空心服。

【主治】 痰积腰痛，脉滑者。

04329 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷八十二。

【组成】 陈皮 半夏 茯苓 甘草 苍术 白术 桃仁 红花各一钱 附子少许

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 十指麻木，属胃中有湿痰死血者。

04330 加味二陈汤

【方源】《医学正印》。

【组成】 当归（酒洗）一两 茯苓二两 川芎七钱五分 白芍药 白术 半夏（汤洗） 香附米 陈皮各一两 甘草五钱

【用法】 上作十帖。每帖加生姜三片，水煎服。

【主治】 妇人肥盛不能孕育者。

04331 加味二陈汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 白茯苓 陈皮 半夏各一钱 厚朴 桔梗 枳实 黄芩 贝母（去心） 苏子各一钱二分 甘草 肉桂各二分

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 梅核气。六郁七情神思所伤，结成痰核，介介喉中，咯之不出，咽之不下。

04332 加味二陈汤

【方源】《会约》卷六。

【组成】 陈皮（去白）一钱半 半夏二钱 茯苓二钱 甘草一钱 川芎八分 蔓荆子一钱 北细辛二分

【用法】 姜汁为引。

【主治】 痰厥头痛；或呕恶咳嗽，寸关脉滑者。

【加减】 如兼虚者，加白术一钱半，山药（炒黄）二钱；如兼火者，加黄芩、花粉各一钱半，石膏二钱。

04333 加味二陈汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】 陈皮二钱 法夏一钱半 茯苓三钱 甘草五分 茅术一钱 枳壳二钱 生姜一片

【用法】 水煎服。

【功用】 燥湿化痰，兼能止呕。

【主治】 妊娠恶阻属于痰湿者。症见胸脘胀闷，不欲食，食则呕吐涎沫，恶油腻，舌质淡，脉濡而滑。

【加减】 气虚及曾经有过流产的，去枳壳，加续断三钱，泡参三钱，蕲艾三钱，砂仁一钱。

04334 加味二妙丸

【方源】《简明医彀》卷二。

【组成】 苍术四两 黄柏（酒炒）二两 牛膝 防己 当归（俱酒浸） 川萆薢 龟版（酥、酒炙） 熟地（捣）各一两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大，每服一百丸，空心盐酒送下。

【主治】 两足感湿热，肿痛如火，渐至胯腹，或脚气常发。

04335 加味二妙汤

【方源】《金鉴》卷七十。

【组成】 黄柏（生） 苍术（米泔浸，炒） 牛膝各三钱 槟榔 泽泻 木瓜 乌药各二钱 当归尾一钱五分

【用法】 用黑豆四十九粒，生姜三片，水三钟，煎一钟；再煎滓，水二钟半，煎八分服。

【主治】 青腿牙疳，两腿起紫黑云片，牙龈腐烂如疳，行步艰难。

04336 加味二妙散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 黄柏七分 苍术 归尾 赤芍 桃仁 南星 牛膝 胆草各一钱 黄芩 连翘 羌活各五分 红花 木通 甘草各三分 金银花二钱

【用法】 用水一钟，煎八分，加姜汁二匙，食前服。

【主治】 膝肿初起者。

04337 加味二妙散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 苍术一两（炒） 黄柏二两（盐水炒） 龟版二两（盐水炒） 萆薢二两 知母二两（盐水炒）

【用法】 上为散。每服三钱，人中白煎汤调下。

【主治】 阴内生疮，脉和者。

【方论选录】 湿热内甚，浸淫不化而下注阴中，故阴内生疮焉。苍术燥湿强脾以治疮，黄柏清热燥湿以存阴，知母清热壮水，萆薢利湿分清，龟版滋阴壮水，以清湿热下注之源也。人中白汤调下，使小便清利，则湿热自化，而经府清和，何阴内生疮之患哉？

04338 加味二妙散

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】 苍术 黄柏 土茯苓各三钱 白芷 蛇床子各二钱 银花四钱

【用法】 水煎，食远服。

【功用】 清理下焦湿热，兼可杀虫。

【主治】 湿热下注，阴内或外阴部瘙痒异常，时时出水，甚或疼痛，坐卧不宁，小便黄赤短涩，淋漓不断，或便时疼痛，食欲减少，咽干口苦心烦，睡眠不安，舌苔黄腻，脉弦滑而数。

【加减】 白带色黄量多者，加莲须、贯仲各三钱。

04339 加味十全汤

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】 人参 黄耆（盐水炒） 熟地黄（自制） 当归身（酒洗） 茯苓各一钱 川芎七分 粉草五分 桂心三分 橘红一钱 乌药五分 白芍药一钱 白术（炒）一钱五分 五味子五分

【用法】 水煎服。

【功用】 补气血，进饮食。

【主治】 痈疽溃后，气血虚弱者。

04340 加味七子丸

【方源】《医学正印》。

【组成】 菟丝子（淘洗，酒蒸） 川牛膝（去芦，酒蒸） 麦门冬（去心，酒蒸） 山茱萸（取肉） 原蚕蛾 五味子各一两三钱 蛇床子（酒蒸）一两六钱 车前子（淘洗）一两七钱 大甘草（炙）一两 沙苑蒺藜子（马乳浸蒸） 覆盆子各二两二钱 补骨脂子二两二钱（淘洗，炒） 肉苁蓉二两五钱（酒浸，去鳞膜）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸或四十丸，淡盐汤送下，早、晚皆服。

【主治】 肾虚无子。

04341 加味七气汤

【方源】《济生》卷二。

【组成】 半夏（汤泡七次）三两 桂心（不见火） 玄胡索（炒去皮）各一两 人参 甘草（炙）各半两 乳香三钱

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，大枣一枚，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七气为病，发则心腹刺痛不可忍，时发时止，发则欲死；或外感风寒湿气作痛。

【加减】 妇人血痛，加当归。

【备考】 本方方名，《观聚方要补》引作“加味四七汤”。

04342 加味七气汤

【方源】《准绳·类方》卷四引《医学统旨》。

【组成】 蓬术 青皮 香附（俱米醋炒）各一钱半 延胡索一钱 姜黄一钱 草豆蔻仁八分 三棱（炮）七分 桂心五分 益智仁七分 陈皮八分 藿香七分 炙甘草四分

【用法】 水二钟煎八分，食前服。

【主治】 七情郁结心腹痛，或因气而攻痛。

【加减】 死血胃脘痛加桃仁、红花各一钱。

04343 加味七神丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 肉豆蔻（面裹煨） 吴茱萸（去梗，汤泡七次） 广木香各一两 补骨脂（盐酒炒）二两 白术（陈土炒）四两 茯苓（蒸）二两 车前子（去壳，蒸）二两

【用法】 大枣煎汤送为丸。每服三钱，开水送下。

【主治】 肾泻。

【方论选录】《证因方论集要》：此足少阴太阴药也。补骨脂辛苦大温，能补相火以通君火，火旺乃能生土，故以为君；肉豆蔻辛温，能行走消食，暖胃固肠；吴萸辛热，除湿燥脾，能人少阴厥阴气分而补火；白术、茯苓苦甘补土，所以防水；木香辛苦，功专调气散滞；车前子味甘渗湿治泻。盖久泻皆由肾命火衰，不能专责脾胃，故大补下焦元阳，使火旺土强，则能制水而不复妄行矣。

04344 加味七福饮

【方源】《会约》卷十一。

【组成】 人参随便 熟地 当归各二三钱 白术 枸杞各一钱半 甘草（炙） 肉桂 附子 枣皮各一钱 枣仁二钱 远志六分

【用法】 空心温服。

【主治】 阳痿，忧思恐惧太过者。

【加减】 如梦遗虚滑，加牡蛎、莲须、龙骨之属。

04345 加味八仙汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 当归（酒浸）七分 川芎七分 白芍八分 熟地（酒浸）七分 人参六分 白术（酒浸）四钱 茯苓（去皮）一钱 陈皮八分 半夏（姜制）七分 桂枝三分 柴胡四分 羌活五分 防风五分 秦艽六分 牛膝六分 炙甘草四分

【功用】 上锉一剂。加生姜、大枣，水煎，食远服。

【主治】 手足麻木。

04346 加味八味丸

【方源】《冯氏锦囊·药按》卷二十。

【组成】 熟地黄一斤（用八两，水煎汁，去渣，

将八两入汁内煮烂，捣烂入药） 淮山药四两（炒微黄色） 牡丹皮四两（焙） 白茯苓三两（入乳拌透，晒干，焙） 山朱萸（去核）四两（酒拌蒸，晒干，焙） 泽泻二两（淡盐水拌，晒干，炒） 五味子二两（每个铜刀切作两片，蜜酒拌蒸，晒干，焙燥） 牛膝三两（淡盐酒拌炒） 肉桂（取近里一层有油而滋润甜极者）一两五钱（即入药，勿出气，不见火） 制附子一两五钱（切薄片，微火焙）

【用法】 上为末，用熟地捣烂入药，加炼蜜杵好，集群手丸，晒干，藏瓷器瓶中。每早空心服四钱，淡盐汤送下，随后进服煎剂。

【主治】 痫证，脉洪弦有力，尺弱者。

【临证举例】 痫证 一金姓儿，年十四而患痫病，群医不效，针灸继之，消痰镇坠之品，备尝尽矣。其发更频而更甚。诊其脉洪弦有力，惟两尺则弱。此阴道亏极，孤阳无敛，火性上炎，僵仆诸候乃发，理所然也。若用消痰镇坠之饵，不儿更耗阴分乎？乃令空心淡盐汤吞加味八味丸四五钱，以使其真阳藏纳。随以重浊大料壮水一剂继之，以助主蛰封藏之势。用大熟地一两，丹参一钱五分，麦冬（去心）三钱，生白芍二钱，茯苓一钱五分，丹皮一钱五分，远志肉（甘草煮透）一钱二分，牛膝三钱，五味子六分，水二盏，灯心十根，莲子十粒（去心衣），煎八分，温和服。下午乃服调补气血养心清肺和肝之膏滋一丸。方用酸枣仁四两（炒熟捣碎），当归身三两（酒拌炒），怀熟地八两，金石斛二两，白芍药三两（蜜水拌晒干炒），制麦冬三两（拌黄米同炒，炒燥去米），牛膝二两（水洗），制远志肉二两（用甘草浓汁煮透晒干焙）。先以建莲肉一斤（去心衣），煎取浓汁三十余碗，去滓入前药在内，煎取头汁、二汁去滓，熬成极浓膏滋，再入拣人参三两（研极细），白茯神四两（研极细），白茯苓三两（研极细），丸成大丸，每枚重四钱。下午食远白汤化下。如是调理两月，精神倍长，痫证不治而愈。

04347 加味八珍汤

【方源】《医统》卷八十二引《集验方》。

【组成】 人参 白术 茯苓 炙甘草各四分 当归 生地黄各一钱 黄耆 川芎 白芍药 软柴胡各五分 牡丹皮 香附米（制）各八分

【用法】 用水一盏半，大枣一枚，煎七分，食前服。

【主治】 妇人思虑过伤，饮食日减，气血两虚，月经不调，夜梦交感，或出盗汗，寝成痨瘵。

04348 加味八珍汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 人参 白术 茯苓 甘草 当归 川芎 白芍 生地 防风 白芷 僵蚕 白鲜皮 桂枝（少用） 麻黄（少用）

【用法】 加葱白三根，生姜二片，水二钟，煎至分服。有虫者，兼服蜡矾丸。

【主治】 风癣痒如虫行。

04349 加味八珍汤

【方源】《金鉴》卷四十七。

【组成】 八珍汤加钩藤 菖蒲 远志

【主治】 产后不语，属气血两虚而郁冒神昏者。

04350 加味三生饮

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 人参 白术各一两 附子 南星 半夏 菖蒲 远志各一钱 生枣仁三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 身忽猝倒，两目紧闭，昏晕不识人。

04351 加味三妙丸

【方源】《医学正传》卷四。

【异名】 经验加味二妙丸（《医学六要·治法汇》卷五）、加味二妙丸（《寿世保元》卷五）。

【组成】 苍术四两（米泔浸） 黄柏二两（酒浸，晒干） 川牛膝一两（去芦） 当归尾一两（酒洗） 川萆薢一两 防己一两 龟版（酥炙）一两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心姜盐汤送下。

【主治】 两足湿痹疼痛，或如火燎，从足跗热起，渐至腰胯，或麻痹痿软。

04352 加味三黄丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【异名】 加味三补丸（《方症会要》卷二）。

【组成】 黄芩二两（去朽，酒炒） 黄连六钱（去毛，姜炒） 黄柏一两五钱（去皮，童便炒） 香附二两（米醋浸透，炒） 苍术一两五钱（米泔浸透，搓去黑皮，切片，炒）

【用法】 上为细末，打稀糊为丸，如绿豆大。每服七八十丸，卧时清茶送下。

【主治】 嘈杂属郁火者。

04353 加味大造汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】 人参一两 当归一两 麦冬八分 石斛八分（酒蒸） 柴胡六钱 生地二两 胡连五钱 山药一两 枸杞一两 黄柏七分（炒）

【用法】 先将麦冬、地黄捣烂，后入诸药同捣为丸，加蒸紫河车另捣，焙干为末，炼蜜为丸。

【主治】 产后骨蒸劳热。

【备考】 若服清骨散、梅连丸不效，服此方。

04354 加味小胃丹

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】 南星 半夏各二两五钱（用白矾、皂角刺及姜汁水煮十五次） 桃仁 杏仁（用白矾、皂角水泡） 红花 陈皮 枳实（用白矾水泡半月，炒） 白术 白芥子 苍术各二两（用米泔、白矾、皂角水浸一宿，炒）

【用法】 上为末，姜汁、竹沥煮神曲为丸服，中风痰、痞积、眩晕、喉痹，淡姜汤送下；瘫痪不语，浓姜汤送下；惟痞块、头风、头痛宜临卧、食后服。

【主治】 痰核生在下体，兼湿热者。

【宜忌】 属火燥证者，断不可用。

04355 加味天水散

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生山药一两 滑石六钱 粉甘草三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 暑日泄泻不止，肌肤烧热，心中烦渴，小便不利，或兼喘促。

【方论选录】 此久下亡阴，又兼暑热之证也。故方中用天水散以清溽暑之热。而甘草分量，三倍原方（原方滑石六，甘草一，故亦名六一散），其至浓之味，与滑石之至淡者相济，又能清阴虚之热。又重用山药之大滋真阴，大固元气者以参赞之。真阴足则小便自利，元气固则泄泻自止。且其汁浆稠粘，与甘草之甘缓者同用，又能逗留滑石，不至速于淡渗。俾其清凉之性，由胃输脾，由脾达肺，水精四布，下通膀胱，则周身之热，与上焦之燥渴喘促，有不倏然顿除乎！

【临证举例】 泄泻 一孺子，泄泻月余，身热燥渴，嗜饮凉水，强与饮食即恶心呕吐，多方调治不愈。投以此汤，一剂，烦渴与泄泻即愈其半；又服一剂，能进饮食，诸病皆愈。

04356 加味五皮汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】 大腹皮 生姜皮 桑白皮 白茯苓皮 白术 紫苏（茎叶等分）各一钱

【用法】 大枣为引，水煎，木香磨浓汁三匙，入内同服。

【主治】 孕妇面目四肢浮肿者，谓之子肿。

04357 加味五苓散

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】 白术一两半（炒） 厚朴一两半（制） 干姜一两半 猪苓一两半 茯苓一两 泽泻一两半 肉桂一两半（去皮）

【用法】 上为散。用茵陈一钱半，水煎二钱，去滓温服。

【主治】 寒湿发黄，腹满疼痛，脉紧细者。

【方论选录】 寒湿内滞，脾弱不能健运，而郁遏成黄，故腹中满闷，疼痛不已焉。白术健脾元以燥湿，厚朴散腹满以除闷，干姜温中气散寒，肉桂暖营血散寒，猪苓通利三焦，茯苓渗利脾肺，泽泻通利膀胱以退黄也。使湿化寒消，则小便清利，而腹满无不退，疼痛无不除，何阴黄之足虑哉？复用茵陈汁清湿热退黄疸，且以防姜、桂之僭上也。此温中渗湿之剂，为寒邪郁湿发黄之专方。

04358 加味五苓散

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】 金铃子 白术（土炒） 泽泻 木通 茴香（炒） 赤茯苓 橘核仁 肉桂 槟榔 猪苓

【用法】 引用生姜、灯心，水煎服。

【主治】 阴肿。心热移于小肠，外肾肤囊肿痛光亮。

04359 加味五积散

【方源】《宋氏女科》。

【组成】 陈皮 干姜 肉桂 当归 枳壳 白茯苓 麻黄 甘草 厚朴 半夏 桔梗 白芷 芍药 苍术 川芎

【用法】 加生姜、葱，水煎服。

【主治】 触经感冒。经行身体麻痹，寒热头痛者。

【备考】 原书治触经感冒，用本方去干姜，加羌活、独活、牛膝。

04360 加味五淋散

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】 黑栀 赤茯苓 当归 白芍 黄芩 甘草 生地 泽泻 车前子 滑石 木通

【功用】 清热利水。

【主治】 子淋。孕妇小便频数窘涩，点滴疼痛。

04361 加味五痹汤

【方源】《赤水玄珠》卷十二。

【异名】 五痹汤（《医宗必读》卷十）、五痹散（《杂病源流犀烛》卷五）。

【组成】 人参 茯苓 当归（酒洗） 白芍药（煨） 川芎各一钱（肝、心、肾痹倍之） 五味子十五粒 白术一钱（脾痹倍之） 细辛七分 甘草五分

【用法】 水二钟，加生姜一片，煎八分，食远

服。

【主治】 ①《赤水玄珠》：五脏痹证。②《杂病源流犀烛》：风寒湿气，客留肌体，手足缓弱，麻痹。

【加减】 肝痹，加酸枣仁、柴胡；心痹，加远志、茯神、麦门冬、犀角；脾痹，加厚朴、枳实、砂仁、神曲；肺痹，加半夏、紫菀、杏仁、麻黄；肾痹，加独活、官桂、杜仲、牛膝、黄耆、萆薢。

【备考】《杂病源流犀烛》：壮实人而患鼓症，不妨攻之，宜先服五痹散二剂，再按法服石干散。

04362 加味太一膏

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】 肉桂 白芷 当归 玄参 赤芍 生地 大黄 土木鳖各二两 真阿魏三钱 轻粉四钱 槐枝 柳枝各一百段 血余一两 东丹四十两 乳香末五钱 没药末三钱

【用法】 上药前十味并槐柳枝，用真麻油足称五斤，将药浸入油内，春五、夏三、秋七、冬十，候日数已毕，入洁净大锅内，慢火熬至药枯浮起为度，住火片时，用布袋滤净药渣，将油称准足数，将锅展净，复用细旧绢，将油又滤入锅内，要清净为美，将血余投下，慢火熬至血余浮起，以柳棒挑看似膏溶化之象，方算熬熟。净油一斤，将飞过黄丹六两五钱徐徐投入，火加大些，夏、秋亢热，每油一斤，加丹五钱，不住手搅，候锅内先发青烟，后至白烟，叠叠旋起，气味香馥者，其膏已成，即便住火，将膏滴入水中，试软硬得中，如老，加熟油，若稀，亦加炒丹，每各少许，渐渐加火，务要冬、夏老嫩得所为佳，候烟尽，端下锅来，方下阿魏，切成薄片，散于膏而上化尽，次下乳、没、轻粉搅匀，倾入水内，以柳棍搂成一块，再换冷水浸片时，乘温每膏半斤，扯拔百转成块，又换冷水投浸。随用时每取一块，铜杓内复化，随便摊贴至妙。

【主治】 发背痈疽及一切恶疮，跌扑伤损，湿痰流毒，风湿风温，遍身筋骨走注作痛，内伤风郁，心腹胸背攻刺作疼，腿脚酸软，腰膝无力，汤泼火烧，刀伤棒毒，五损内痈，七伤外症（俱贴患处）；男子遗精，妇人白带（俱贴脐下）；脏毒肠痈（亦可丸服）；诸般疮疖血气癞痒，诸药不止痛痒者。

04363 加味化肾汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】 熟地二两 山茱萸一两 肉桂三钱 巴戟天五钱

【用法】 水煎服。二剂吐轻，十剂痊愈。

【主治】 肾中无火，朝食暮吐，或暮食朝吐，或食之一日至三日而尽情吐出者。

04364 加味升麻汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 升麻 葛根 赤芍 甘草各一钱 石膏二钱 薄荷三分

【用法】 加灯心二十节，水煎服。

【主治】 头痛属胃火上冲者，其脉洪大，口渴饮冷，头筋扛起。

04365 加味升葛汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】 升麻一钱半 葛根 白芍 甘草 黄芩 栀子各一钱

【用法】 水煎服。加犀角汁更妙。

【主治】 伤寒阳毒发斑。

【加减】 如咽痛，加元参一钱半。

04366 加味乌沉汤

【方源】《得效》卷四。

【组成】 人参 当归（大者，去芦） 白术（炒）各一两 沉香半两 天台乌药 白茯苓（去皮） 附子（煨，去皮脐）各一两 肉桂（去粗皮）半两

【用法】 上锉散。每服三钱，水一盏，加生姜五片，大枣一枚，水煎，空心服。

【功用】 生气补血。

【主治】 心肾虚损之心痛。

04367 加味乌荆丸

【方源】《三因》卷十六。

【组成】 川乌（汤洗，浸三五次，去皮尖，焙干秤） 荆芥穗各半斤 杜当归（水浸三日，洗，焙干秤）一斤 薄荷五两

【用法】 上为细末，好醋煮米粉糊丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒茶清送下。

【主治】 瘾疹，上攻头面，赤肿瘙痒，搔之皮便脱落作疮，作痒或痛，淫液走注，有如虫行。

04368 加味丹栀汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 丹皮二钱 山栀一钱 赤芍一钱 龙胆草一钱 夏枯草一钱五分 当归一钱五分 生地四钱 柴胡一钱 木通一钱 车前二钱

【用法】 加灯心三尺，水煎服。

【主治】 肝胆火盛，胁痛耳聋，口苦筋痿，阴痛，或淋浊溺血。

04369 加味六子丸

【方源】《便览》卷三。

【组成】 菟丝子（酒蒸）一两五钱 五味子五钱

枸杞（甘州产）二两　白蒺藜（炒去刺）二两　黄耆（蜜炒）一两　覆盆子一两五钱　破故纸（青盐炒）二两　麦冬（去心）二两　苁蓉（酒洗，去甲）二两三钱　大甘草五钱　牛膝（去苗）二两　山茱萸（去核）一两　杜仲（炒去丝）一两五钱　熟地黄（酒洗）一两　牡蛎（盐泥固煅）一两

【用法】 上为细末，捣饭为丸，如梧桐子大。空心盐汤送下，午间、临卧温酒送下。

【主治】 男子阳痿，及妇人久不孕育。

【加减】 夏，加黄柏（炒）二两；冬，加干姜（炒）五钱。

04370　加味六君汤

【方源】 《医略六书》卷十八。

【组成】 熟人参八分　冬白术一钱半（炒）　法半夏一钱半　白茯苓一钱半　全当归一钱半　小川芎八分　新会皮一钱半　广木香八分　炙甘草五分　纯钩藤三钱（迟入）　生姜汁三匙（冲）　甜竹沥三匙（冲）

【用法】 水煎去滓，冲二汁服。

【主治】 虚风，手足指麻，脉弦虚浮者。

【方论选录】 气虚血涩，不能运行于经络，且挟痰涎凝滞，故手足麻木不随焉。参、术补脾益气，苓、夏渗湿化痰，会皮、炙草缓中理气，木香、当归调气和营，川芎、钩藤舒筋活血，竹沥、姜汁豁痰通经。洵为虚风挟痰，手足指麻之专方。

04371　加味玉烛散

【方源】 《会约》卷四。

【组成】 当归一钱三分　川芎一钱　白芍一钱　生地黄一钱半　大黄一二钱　桃仁（去皮）一钱　红花一钱　甘草一钱　牛膝一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 伤寒蓄血。血分有滞，小腹胀痛，热蓄下焦。

【加减】 血不下，加芒消三钱，化溶服，并重加大黄。

【备考】 老弱妇人血虚者皆可服，以代仲景抵当汤。

04372　加味甘桔汤

【方源】 《景岳全书》卷六十三。

【组成】 桔梗八分　甘草一钱二分　牛蒡子　射干各六分　防风　玄参各四分

【用法】 水一钟煎服。或加生姜一片。

【主治】 咽喉肿痛。

【加减】 热甚者，加黄芩，去防风。

04373　加味甘桔汤

【方源】 《医学心悟》卷四。

【组成】 甘草（炙）二钱　桔梗　荆芥　牛蒡子（炒）　贝母各一钱五分　薄荷三分

【用法】 水煎服。

【主治】 外感风热，咽喉肿痛，或生悬痈、口菌及大头天行。

①《医学心悟》：喉痹，君相二火冲击，咽喉痹痛；缠喉风，咽喉肿痛胀塞，红丝缠绕，口吐涎沫，食物难入，甚则肿达于外，头如蛇缠；走马喉风，又名飞疡，喉舌之间，暴发暴肿，转肿转大；缠舌喉风，硬舌根而两旁烂；悬痈，脾经蕴热所致，生于上腭，形如紫李；虾蟆瘟，颏下漫肿无头；大头天行，头面尽肿。②《外科证治全书》：口菌，由火盛血热气滞而生，多生在牙龈肉上，隆起形如菌，或如木耳，紫黑色。③《证因方论集要》：风火郁热初起之咳嗽。

【加减】 若内热甚，或饮食到口即吐，加黄连一钱；若口渴，唇焦舌燥，便闭溺赤，更加黄柏、黄芩、山栀、黄连；若有肿处，加金银花五钱。

【方论选录】 《证因方论集要》：方中荆芥、薄荷消风，牛蒡、土贝散热，甘、桔清火，治风热咳嗽最稳。

04374　加味甘桔汤

【方源】 《重订通俗伤寒论》。

【组成】 生甘草五分　苦桔梗　嫩苏梗　紫菀　白前　橘红　制香附　旋覆花各一钱半

【功用】 散结活痰。

【主治】 梅核气，咳逆无痰，喉间如含炙脔，咯之不出，咽之不下，燥痰粘结喉头。

04375　加味甘露饮

【方源】 《引经证医》卷四。

【组成】 生地黄　玉竹　五味子　白蜜　沙参　鲜石斛　麦冬　甘蔗汁

【主治】 消渴，脾胃热，阴虚者。

04376　加味左经汤

【方源】 《医醇剩义》卷四。

【组成】 黄连五分　吴萸二分　瓦楞子三分（煅，研）　草澄茄一钱　蒺藜三分　郁金二钱　青皮一钱　柴胡一钱（醋炒）　延胡索一钱　木香五分　广皮一钱　砂仁一钱　佛手五分

【主治】 肝气郁结，气火俱升，上犯胃经，痛连胁肋。

04377　加味归脾汤

【方源】 《医宗必读》卷八。

【组成】 人参　炙黄耆　白术　当归　茯苓　酸

枣仁各一钱半　远志肉八分　木香　甘草（炙）各五分　龙眼肉二钱　大枣二枚　煨姜三片　菖蒲八分　桂心五分

【用法】 水二钟，煎一钟，食后服。

【主治】 虚寒心悸而痛。

04378　加味四七汤

【方源】《直指》卷十一。

【组成】 半夏（制）二两半　白茯苓　厚朴（制）各一两半　茯神　紫苏叶各一两　远志（姜汁蘸湿，取肉，焙）　甘草（炙）各半两

【用法】 上锉。每服四钱，加生姜七片，石菖蒲半寸，大枣二枚，水煎服。

【功用】 豁痰散惊。

【主治】 ①《直指》：心气郁滞，惊悸。②《杂病源流犀烛》：心悸痛，劳役则头面赤而下重，自烦发热，脉弦，脐上跳。

04379　加味四七汤

【方源】《准绳·类方》卷一。

【组成】 半夏（汤洗七次）一两　厚朴（姜汁制）　赤茯苓　香附子（炒）各五钱　紫苏　甘草各二钱

【用法】 上㕮咀，分四帖。每服水二钟，加生姜五片，煎八分，去滓，加琥珀末一钱，调服。

【主治】 ①《准绳·类方》：妇女小便不顺，甚者阴户疼痛。②《女科指掌》：思虑伤脾，导致白浊白淫，胸痞虚浮，面色黄，多眠少食。

【方论选录】《济阴纲目》：此方治四气七情，故以为名。然以半夏为君，则知内外二因，皆能令气郁而生湿生痰也，香附治内，紫苏治外，其余又兼内外，以佐其成功，然不有琥珀为之通窍燥湿，则亦不能为效也。

04380　加味四斤丸

【方源】《三因》卷九。

【异名】 加减四斤丸（《准绳·类方》卷四）。

【组成】 苁蓉（酒浸）　牛膝（酒浸）　天麻　木瓜干　鹿茸（燎去毛，切，酥炙）　熟地黄　菟丝子（酒浸通软，别研细）　五味子（酒浸）各等分（一法不用五味子，有杜仲）

【用法】 上为末，为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒或米汤送下。

【主治】 肝肾脏虚，热淫于内，致筋骨痿弱，不自胜持，起居须人，足不任地，惊恐战掉，潮热时作，饮食无味，不生气力，诸虚不足。

【备考】《普济方》引鲍氏方有当归身。

04381　加味四圣膏

【方源】《医学碎金录》。

【组成】 紫河车八两　龟版胶八两　麋角胶八两　茯苓八两　天麦冬共十六两　生熟地共十六两　地骨皮八两

【用法】 先熬二地、二冬、茯苓、地骨三次，河车焙干研末，将三次汁再熬，入二种胶、河车末收膏。

【功用】 峻补精血。

【主治】 消耗性慢性疾病及贫血患者（如肺结核等）。

04382　加味四君汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】 人参　白术（蜜炙）　茯苓各一钱五分　炙甘草　香附（制）各一钱　砂仁五分（炒）

【用法】 加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】 妊娠五月，禀赋虚弱，胎萎不长，由于气虚者。

04383　加味四苓汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 茯苓三钱　白术一钱半（炒黑）　猪苓一钱半　柴胡梢五分　泽泻一钱半　青皮一钱半（炒）　陈皮一钱半　橘核三钱（炒）

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 女子前阴漫肿，脉弦者。

【方论选录】 脾土虚衰，不能制湿而肝气滞于厥阴，故前阴两拗漫肿焉。方中白术专培脾土以制湿，茯苓渗利湿邪以安中，猪苓利三焦之湿，泽泻利膀胱之湿，青皮破滞气以平肝，陈皮利中气以和胃，柴胡梢达下以升阳散滞，广橘核入肝以散结消肿也。水煎温服，使土强制湿则湿化气调而肝脾无滞结之患，何阴肿之不退哉！

04384　加味四苓散

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】 白术一钱五分　白茯苓（去皮）二钱　猪苓二钱　泽泻二钱　木通二钱　栀子三钱　黄芩二钱　白芍三钱　甘草八分

【用法】 上锉。加灯心十茎，水煎，空心服。

【主治】 泄泻属火证者，腹痛，泻水如热汤，痛一阵，泄一阵。

04385　加味四苓散

【方源】《证治汇补》卷八。

【组成】 茯苓　白术　猪苓　泽泻各等分　加山栀　麦冬　木通　黄芩

【用法】 水煎服。

【主治】 湿热不清便浊。

【方论选录】《医略六书》：湿热内伏，气化不清，不能分泌渗道，故溲溺浑浊，淋痛不已焉。方中生术利湿以清中道，泽泻通窍以利膀胱，猪苓利三焦之湿，山栀清三焦之热，茯苓渗脾肺之湿，黄芩清脾肺之热，麦冬清心润肺以滋水源，木通清心降热以利小水也。使湿热分化，则水府清和，而小便自长，何淋痛便浊不痊哉！此清利之剂，为湿热白浊之专方。

04386　加味四物汤

【方源】《玉机微义》卷二十一引《元戎》。

【异名】桃红四物汤（《金鉴》卷四十四）、四物加桃仁红花汤（《方症会要》卷二）。

【组成】四物汤加桃仁　红花

【主治】瘀血所致腰痛麻木，月经不调，吐衄屎黑，及血肿，下利脓血。

①《玉机微义》引《元戎》：瘀血腰痛。②《医级》引《元戎》：血滞经闭，或吐衄屎黑，喜忘，瘀痛及下利脓血。③《济阳纲目》：麻木，纯属死血者。④《金鉴》：妇人内有瘀血，月经血多有块，色紫稠粘。⑤《方症会要》：血肿。

【备考】①本方方名，《医级》作"红桃四物汤"。②《医部全录》本方用法：水煎，空心热服。

04387　加味四物汤

【方源】《医学正传》卷四引丹溪方。

【异名】加味四味汤（《杏苑》卷七）。

【组成】四物汤加桃仁（煮数次，去皮尖）　牛膝（酒浸）　陈皮　茯苓　甘草　白芷　龙胆草各等分

【用法】上切细，作一服。水二钟，煎至一钟，去滓，温服。

【主治】白虎历节风证。

【加减】如痛在上者属风，加羌活、桂枝、威灵仙；在下者属湿，加牛膝、防己、木通、黄柏；气虚者，加人参、白术、龟版；有痰者，加南星、半夏、生姜；血虚者，倍当归、川芎，佐以桃仁、红花。

04388　加味四物汤

【方源】《医学正传》卷四引丹溪方。

【组成】当归身一钱　熟地黄三钱　白芍药　川芎各七分半　五味子九枚　麦门冬一钱　人参五分　黄柏一钱　黄连五分　知母三分　杜仲七分半　牛膝三分　苍术一钱

【用法】上细切，作一服。水二盏，煎至一盏，空心温服；亦可酒糊为丸服。

【主治】①《医学正传》引丹溪方：诸痿，四肢软弱，不能举动。②《医钞类编》：瘀痫，肝血虚者。

【加减】足不软者，去牛膝。

【备考】方中熟地黄，《医钞类编》作生地。

04389　加味四物汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】归身　人参　川芎　赤芍　生地　桔梗　甘草　麦冬　白芷各一钱

【用法】水煎，食后服。更煮猪蹄汤食之，则乳汁自通。猪蹄一对，洗尽煮烂，入葱调和，并汁食之。要是入香油炒过穿山甲共煮，去甲食之，更效。

【主治】初产之妇，乳方长，乳脉未行；或产多之妇，气血虚弱，乳汁短少。

【加减】如因乳汁不行，身体壮热，胸膈胀闷，头目昏眩者，加木通、滑石各一钱。

04390　加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷一。

【组成】当归（酒洗）　川芎各一钱半　芍药（炒）　熟地黄　玄胡索　蓬术（醋煮）　香附（醋煮）各一钱　砂仁八分　桃仁（去皮尖）七分　红花（酒炒）五分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】经水将来，作疼不止。

【方论选录】《医略六书》：血亏挟滞，不能统营气于经，故脐腹疼痛，然后经行。方中熟地补血以滋冲任，白芍敛阴以益肾肝，川芎行血海以调经，当归养血脉以荣经，蓬术破气中之血，香附理血中之气，桃仁破瘀血以通经，延胡活滞血以止痛，红花活血生新，砂仁醒脾行气。水煎温服，使滞化气行，则经血调和而脐腹疼痛无不退，天癸循环无不自如。

04391　加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷四。

【组成】当归　白芍药（炒）　川芎　生地　地骨皮　牡丹皮各等分　（一方加白术）

【用法】上㕮咀。每服六钱，水煎服。

【主治】妇人骨蒸。

【方论选录】《济阴纲目》汪淇箋：此方以四物生四脏之阴，以地骨、牡丹解骨蒸之热。其加白术者，以上为万物之母也。

04392　加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷七。

【组成】当归　川芎　芍药　生地黄　柴胡　山栀子　牡丹皮　龙胆草

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 妇人阴户肿痛。

04393 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】 当归 川芎 白芍药（酒炒） 地黄 木通 王不留行 天花粉各等分

【用法】 上锉一剂。同猪蹄旁肉四两，煎汤二钟，入药同服。先将葱汤频洗乳房。

【主治】 产后气血虚，乳汁不通。

04394 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷三十一。

【组成】 当归 川芎 生地（姜、酒炒）各一钱 芍药倍用 人参五分 五味子五分

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 血虚，阳无所依附，上奔而喘。

04395 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷三十六。

【组成】 当归 川芎 芍药（酒炒） 生地黄 牡丹皮 韭汁

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 血虚生火，致患嗌膈。

【加减】 大便闭，加桃仁、红花。

04396 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷九十五。

【组成】 当归 芍药 川芎 生地（酒洗） 黄芩（酒洗） 黄柏（酒洗） 槐花（炒）各一钱

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 内热痔漏下血。

04397 加味四物汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】 大熟地一两（九蒸） 白芍五钱（酒炒） 当归五钱（酒洗） 川芎三钱（酒洗） 白术五钱（土炒） 粉丹皮三钱 元胡一钱（酒炒） 甘草一钱 柴胡一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 补肝之血，通郁散风。

【主治】 妇人经水忽来忽断，时疼时止，寒热往来者。

【方论选录】 此方用四物以滋脾胃之阴血，用柴胡、白芍、丹皮以宣肝经之风郁；用甘草、白术、元胡以利腰脐而和腹疼。入于表里之间，通乎经络之内，用之得宜，自然奏功如响也。

04398 加味四物汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】 川芎 白芍 知母 瓜蒌仁各一钱 生地 当归各二钱 诃子二钱 冬花六分 桔梗四分 甘草四分 兜铃四分 生姜一大片

【主治】 生产半月后，干嗽有声，痰少者。

04399 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷四十五。

【组成】 四物汤加川附子 炮姜 官桂

【主治】 寒湿带下，胞中冷痛。

【加减】 日久滑脱者，加升麻、柴胡举之，龙骨、牡蛎、赤石脂涩之。

04400 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】 四物汤加花粉 麦冬

【主治】 产后血虚而渴者。

04401 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】 四物汤加蒲黄 瞿麦 桃仁 牛膝 滑石 甘草梢 木香 木通

【主治】 产后热邪挟瘀血流渗胞中，小便淋闭，腹胀痛。

04402 加味四物汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】 熟地黄 当归 白芍 川芎 黄芩 黄连 黄柏（酒炒）各一钱 甘草五分

【用法】 水煎，空心服。

【主治】 水亏血少，形瘦多热，月经不调。

04403 加味四物汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】 熟地黄 当归各一钱五分 川芎 白芍 香附（制）各一钱 砂仁五分（炒）

【用法】 生姜三片，大枣一枚，水煎服。

【主治】 妊娠五月，禀赋虚弱，血虚胎瘦不长。

04404 加味四物汤

【方源】 方出《金匮翼》卷五，名见《杂病证治新义》。

【组成】 生地二钱 当归一钱 蔓荆五分 黄芩一钱（炒） 白芍一钱（酒炒） 炙草三分 甘菊七分 川芎五分

【功用】《杂病证治新义》：养血熄风。

【主治】 血虚脉空，自鱼尾上攻头痛者。

【方论选录】《杂病证治新义》：本方以四物汤补血为主，而其中当归、川芎并有活血舒痛之功，益以白芍之敛和黄芩之清、菊花之轻以平其肝，蔓荆以祛风，甘草合白芍并可缓痛，实为血虚头风痛之良方。如结合现代药理体会，实即具有补血、弛缓神经、缓解头痛之效，为用于贫血性头痛之良剂。

【备考】《杂病证治新义》本方用法：水煎服。

04405 加味四物汤

【方源】《会约》卷六。

【组成】当归二钱（血虚有寒者可多用，血虚有热者宜少用） 川芎一钱三分 熟地二钱 白芍一钱 羌活八分 川独活一钱 蔓荆子一钱 川乌（制）八分 荆芥穗 菊花各七分 北细辛三分 甘草八分

【用法】速进一二三服。外用生萝卜捣汁，仰卧注鼻，不用枕头睡一刻，三次即愈。又用蓖麻子仁、乳香各二三钱，捣为饼，左右贴太阳穴。妇人解发出气，否则害目。无萝卜之时，用旱莲草汁代之亦可。

【主治】偏头风，血虚暴痛，将来害目。

【加减】有热症者，加生地三钱。

04406 加味四物汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】生地 当归 白芍 鲜菊叶 丹皮 生石决明 天麻

【主治】产后血虚，肝阳上升，头痛耳鸣，昼轻夜重，确非外感者。

04407 加味四逆汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】附子二三钱 甘草（炙）一钱半 干姜（炒）一钱半 木香三四分（煨用） 白术二三钱 乌梅二个 肉豆蔻（面煨）一钱半

【用法】水煎服。如上焦热格者，冰冷服之。

【主治】伤寒阴寒自利，外热而不恶热，口渴而不喜冷，四肢厥冷，脉虽数而无力，此阳脱凶候。

04408 加味四神丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】补骨脂（酒炒）六两 吴茱萸（盐炒）三两 五味子（炒）四两 肉豆蔻（面裹，煨）四两 花椒（微焙）一两 生硫黄六钱 大枣八十一枚 生姜（切片）六两

【用法】先煮生姜十余沸，入大枣同煮至烂熟，去姜，余药为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。

【主治】黎明腹痛泄泻。

【方论选录】方中用补骨脂以补命门，吴茱萸以补肝胆，此培火之基也。然泻者关乎下焦，实又关乎中焦，故又用肉豆蔻之辛温者，以暖补脾胃，且其味辛而涩，协同五味之酸收者，又能固涩大肠，摄下焦气化。且姜、枣同煎，而丸以枣肉，使辛甘化合，自能引下焦之阳，以达于中焦也，然此药病轻者可愈，病重者服之，间或不愈，以其补火之力犹微也，故又加花椒、硫黄之大补元阳者以助之，而后药力始能胜病也。

04409 加味生化汤

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷二十。

【组成】当归（去芦）三钱 川芎一钱 桃仁十三粒（不去皮尖，捣） 干姜一钱（炒） 牛膝二钱 炙甘草六分 红花三分（酒洗） 肉桂（去皮）六分

【用法】加枣一枚，水煎服。

【功用】催生，去恶露。

【主治】产后腹痛甚而恶露不行者。

【加减】产前催生，虚人加人参三钱，产后去恶露，减人参。

04410 加味生化汤

【方源】《产宝》。

【组成】川芎一钱五分 当归（炒）二钱 干姜（炙黑）四分 人参二钱 於术（生）二钱 茯苓一钱五分 陈皮五分 泽泻八分 肉果霜五分 甘草（炙）五分 莲子九粒

【主治】产后泄泻，块痛已除者。

【加减】因寒作泻，倍用黑姜；腹痛泄水，饮食不化，加砂仁八分，炒山楂二钱，炒麦芽二钱；久泻不止，加升麻一钱。

04411 加味生化汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】生化汤加连翘 金银花 甘草节 乳香 没药

【主治】产后气血两虚，荣气不从，逆于肉理，或败血留内，结成痈疽者。

04412 加味生脉散

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】人参 麦冬（去心） 归身 生地 炙草 石菖蒲各一钱 五味子十三粒（捶碎）

【用法】猪心一个，劈开，水二盏，煎至一盏半，去心，人药煎七分，食后服。

【主治】产后去血太多，心血虚弱，不能上荣于舌，语言不清，含糊霉涩；或怔忡。

04413 加味白虎汤

【方源】《简明医彀》卷四。

【组成】石膏三钱 知母一钱半 人参一钱 甘草五分 黄芩 杏仁 栀子各一钱 麦冬二钱 五味十五粒（打）

【用法】加粳米一撮，水煎服。

【主治】上焦消渴热甚。

04414 加味白虎汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 生石膏 12 克 连翘 9 克 知母 6 克 黄连 3 克 黄柏 6 克 元参 9 克 蝉蜕 6 克

【用法】 水煎服。

【主治】 漆性皮炎。

【加减】 便秘者，加大黄、枳实；有表证者，加荆芥、防风、藿香。

04415 加味宁志丸

【方源】《扶寿精方》。

【异名】 加味安志丸(《济阳纲目》卷五十五)。

【组成】 白茯苓（去皮） 人参 远志（甘草煎汤，浸软去木） 菖蒲（寸九节者，米泔浸） 黄连（去毛） 酸枣仁（水浸，去红皮） 柏子仁（如法去壳）一两 当归（酒洗） 生地黄（酒洗）各八钱 木香四钱（不用火） 朱砂（研，水飞）一两二钱（半入药，半为衣）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五六十丸，饥时用麦门冬（去心）煎汤送下。

【主治】 虚惫精神恍惚，心思昏懵，气不足，健忘怔忡。

04416 加味地黄丸

【方源】《医统》卷九十。

【组成】 熟地黄（煮烂，捣）四两 山茱萸肉 山药各二两 泽泻一两 牡丹皮 白茯苓各半两 鹿茸（酥炙） 牛膝各二钱

【用法】 上为末，面糊为丸，如黍米大。三岁以上儿服十五丸。

【主治】 小儿禀受不足，肾虚精髓内耗，气血不充，致肌肉瘦薄，骨节呈露，状如鹤膝，成鹤膝节者。

04417 加味地黄丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 怀生地黄（酒）四两 怀山药二两 牡丹皮一两五钱 白茯苓一两 山茱萸（酒蒸，去核） 破故纸（炒）二两 益智仁一两 人参一两 肉桂五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心盐汤送下。

【主治】 肾与膀胱俱虚，冷气乘之，不能约制，致遗尿不禁，或睡中尿自出。

04418 加味地黄丸

【方源】《会约》卷七。

【组成】 熟地八两 山药四两 枣皮（酒蒸） 茯苓各四两 泽泻一两 丹皮一两半 枸杞三两（酒蒸） 菟丝子（淘去泥沙，酒蒸）四两 补骨脂（盐炒）二两 骨碎补二两

【用法】 炼蜜为丸。每服七八钱，空心盐汤送下。

【主治】 真阴不足，以致齿疏动摇，壮年脱落者。

【加减】 如命门火衰，真阳不足者，加肉桂三两，附子四两，或安肾丸亦妙。

04419 加味地黄汤

【方源】《程松崖先生眼科》。

【组成】 熟地二钱（切片） 山萸一钱 丹皮八分 川芎八分 山药一钱 泽泻八分 归身一钱 枸杞一钱 菟丝子一钱 菊花一钱 茯苓八分

【用法】 水煎服。为丸亦可。若为丸，则用熟地八两，山药、山萸、归身、枸杞各四两，丹皮、云苓、泽泻、川芎各三两，菟丝子三两（酒蒸），菊花二两，共研细末，炼蜜为丸。空心每服四钱。

【主治】 肝肾亏虚，眼睛不红，不肿痛，眼胞不下坠，但视物不明，及病后眼睛看物不清楚，云翳退后不明，夜见灯有丝球者。

04420 加味芎归汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】 人参二钱 黄耆一钱 当归二钱 升麻八分 川芎一钱 炙草四分 五味子十五粒

【主治】 产后子宫不收，产门不闭。

【加减】 再不收，加半夏八分，白芍八分（酒炒）。

04421 加味芎归饮

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】 川芎二钱 当归五钱 人参一钱 吴茱萸五分 阿胶三钱 蕲艾八分 甘草（炙）五分

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 胞阻。孕妇胞中之血受寒致少腹作痛者。

04422 加味芎藭汤

【方源】《三因》卷九。

【异名】 加味芎归汤(《正体类要》卷下)、芎归汤(《慎斋遗书》卷五)。

【组成】 川芎 当归 白芍药 百合（水浸半日） 荆芥穗各等分

【用法】 上为散。每服四钱，水一盏，酒半盏，同煎七分，去滓，不拘时候服。

【主治】 打扑伤损，败血流入胃脘，呕吐黑血，或如豆酱汁。

04423 加味百花丸

【方源】《医方集解》。

【组成】 百合 款冬花 紫菀 百部 乌梅

【用法】 炼蜜为丸，如龙眼大，食后、临卧姜汤下或噙化；煎服亦可。

【主治】 ①《医方集解》：喘嗽不已，或痰中有血，虚人尤宜。②《全国中药成药处方集》：七情内伤，酒色无节，虚热上炎，咳嗽喘急，口干声哑，痰中带血，阴虚肺伤，午后潮热。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：禁房事；忌食发物、热物。

【方论选录】《医林纂要》：百合甘苦涩，为敛肺主药；款冬花味辛以舒其敛闭之余邪，且能散肺热而除痰定喘；乌梅酸咸，酸以补肺而敛阴，咸以补心而散血，曾经火气熏蒸而色变黑，则肺居心上，不畏火之烁，此亦补肺主药；百部苦甘，功专入肺，甘补苦泄，主治哮喘；紫菀辛苦，舒郁热而行痰止血；蜜能润肺，止嗽生津，甘则能补。此取百合、款冬花而名百花，又蜜亦百花之英。临卧服者，卧则气归于肺，使药亦随之以入。此为肺惫而虚，兼有外邪客入，久而不散，正不能胜邪者设，又补正之一法。

【备考】 本方原名“加味百花膏”，与剂型不符，据《全国中药成药处方集》改。

04424 加味百花膏

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 紫菀 款冬花各一两 百部五钱

【用法】 上为末。每服三钱，加生姜三片，乌梅一个，煎汤调，食后、临卧各一服；或炼蜜为丸服亦好。

【主治】 久嗽不愈。

04425 加味当归散

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】 当归一钱五分 吴茱萸三分 青化桂 正川芎各五分 黑姜炭五钱 南木香五分 小茴香一钱 炙甘草五分

【用法】 水煎，临服加盐七分，空心服。

【主治】 小儿受寒湿之气，小腹绞痛，外肾红肿，并腹痛啼哭。

04426 加味当归膏

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 当归 生地各一两 紫草 木鳖子肉（去壳） 麻黄 大风子肉（去壳，研） 防风 黄柏 元参各五钱 麻油八两 黄蜡二两

【用法】 先将前九味入油熬枯，滤去渣，再将油复入锅内，熬至滴水成珠，再下黄蜡，试水中不散为度，倾盖碗内，坐水中出火三日，听搽。

【主治】 一切疮疹，并痈肿及疠风。

04427 加味竹叶汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 白茯苓一钱半 麦门冬（去心）二钱半 黄芩一钱 人参一钱 竹叶五片 粳米一撮

【用法】 水煎，空腹热服。

【主治】 妊娠心烦不解。

【加减】 肥人，加半夏、生姜。

04428 加味竹茹汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】 橘皮 半夏 茯苓 甘草 竹茹 黄连 干葛

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 伤寒哕而有郁热在胃中者，及胃病痰热呕哕者。

【加减】 心下满，加枳实；胸腹满，加枳壳、桔梗；胁满，加青皮；外有热，加柴胡；有痰嗽，加杏仁、五味。

【备考】《伤寒广要》本方用桔红二钱，半夏二钱，茯苓二钱，甘草五钱，竹茹一团，黄连（姜炒）一钱，葛根一钱半。

04429 加味交加散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 生地二斤（取汁） 生姜二斤（取汁） 白芍一斤（炒） 蒲黄一斤（隔纸炒） 当归一斤 桂心六两 延胡一斤（醋炒） 红花六两 没药八两

【用法】 地黄汁收炒姜渣肉，生姜汁收炒地黄渣肉，同诸药焙脆为散。每服三钱，温酒调下。

【主治】 营卫不调，经衍腹痛，脉弦涩滞者。

【方论选录】 血亏挟瘀，不与营卫和谐，邪得侵入而冲任闭塞，故腹痛寒热，经候衍期也。生地滋血脉，生姜散表邪，二汁互收，各炒为散，酒调，使交通表里，调和营卫，更加当归养血脉，白芍敛营阴，蒲黄破瘀通经，桂心温经暖血，延胡化血滞以调经，红花活血脉以荣经，没药散瘀血以通调经脉也。为散以散之，酒调以行之，俾邪从外解，则营卫自和，而冲任无不调，腹痛无不退，寒热无不除，何月经衍期之不愈哉！

04430 加味羊肝丸

【方源】《异授眼科》。

【组成】 羊肝一具（去筋膜，瓦焙干） 细辛一两 熟地一两五钱 羌活一两 五倍子一两 白菊一两 防风一两 杏仁（去皮）一两 菟丝子一两 茯苓一两 草决明（炒）一两 枸杞一两 青葙子

一两　地肤子一两　茺蔚子一两　石决明（煅）一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服五十丸，盐汤或酒送下，一日三次。

【主治】 心肾虚耗，水火不交，目有如转辘轳，渐生内障者。

04431　加味导赤汤

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】 人参　生地　条芩　木通　甘草梢　麦冬（去心）　赤芍各一钱　淡竹叶十五片

【用法】 加灯心四十九寸，水煎，空心服。

【主治】 子淋。孕妇小便少；溺血。

04432　加味导痰汤

【方源】《济阴纲目》卷二。

【组成】 半夏　陈皮　白茯苓　甘草　枳实　黄连　川芎

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 躯脂经闭。

【方论选录】《医略六书》：躯脂壅遏，阻塞胞门，气上迫肺，故心气不得下通，而月事不来焉。枳、连、芎、半导痰清火，力能入血海以化滞通经；陈、草、姜、苓和中化气，功专入气海以浚壅通闭也。水煎温服，使躯脂默运，则气不上迫而心气无不下通，经血自当顺流而下，何月事之不来足患哉。

04433　加味导痰汤

【方源】《济阳纲目》卷四十五。

【组成】 南星（姜汤泡）　半夏（姜汤泡）各二钱　枳实（麸炒）　黄芩　橘红　茯苓各一钱　天麻　全蝎　黄连各七分　甘草四分

【用法】 上锉，水煎，加竹沥汤二匙，姜汁半酒盏，食远服。

【主治】 痰迷心窍，发痫。

04434　加味阴阳散

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】 黄连　干姜　青黛　孩儿茶各等分

【用法】 上为末。每用少许搽患处。

【主治】 口舌生疮。

04435　加味防风汤

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】 防风一钱　片芩（酒炒）一钱五分　人参　白及各一钱　麦门冬（去心）二钱　生甘草五分　知母一钱　炒白芍一钱　怀生地（酒洗）一钱　黄柏（酒炒）一钱　黄耆一钱　黄连（酒炒）一钱　当归头　百合各一钱

【用法】 上锉。水煎，食远温服。

【主治】 因元阳亏损，外寒内热，致鼻流涕，久而不愈，甚则有滴下腥臭之恶，而成脑漏者。

04436　加味如神散

【方源】《寿世新编》。

【组成】 元明粉六钱　大梅片一分　硼砂二钱五分　飞朱砂一钱　飞青黛八分　上儿茶五分　苏薄荷一钱　荆芥穗一钱　北细辛五分　麝香三厘　官白芷一钱　生石膏八分

【用法】 上为极细末，瓷瓶收贮，塞紧，勿泄气。用时蘸少许擦之，流去热涎自愈。

【主治】 风火牙痛，红肿而热，或口气臭秽者。

【宜忌】 孕妇忌之。

04437　加味妇沉汤

【方源】《家庭治病新书》。

【组成】 乌药一钱五分　缩砂　木香各八分　延胡索　香附各三钱　甘草一钱

【用法】 大枣为引，水煎服。

【主治】 经水欲来，小腹疼痛者。

04438　加味麦冬汤

【方源】《医钞类编》卷十七。

【组成】 人参　麦冬（去心）　归身　生地　石菖蒲　炙草各一钱　五味子十二粒

【用法】 猪心一个，劈开，水二盏，煎至盏半，去猪心，入药煎服。

【主治】 产后语言不清，含糊蹇涩，并治怔忡。

04439　加味寿星丸

【方源】《得效》卷十三。

【组成】 天南星二两　母真珠一钱　真琥珀五钱　圆白半夏五两　枯矾五钱　大朱砂一两（细研，为衣）

【用法】 上为末，生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十五丸，淡姜汤送下；气不顺，人参汤送下；惊悸，金银器、灶心土汤送下；上热烦躁，淡竹叶、麦门冬汤送下；宁心定志，石菖蒲汤送下；痰盛喘急，桑白皮汤送下；小儿急惊，麦门冬、青竹叶汤送下；慢惊，冬瓜仁、木香汤送下。

【主治】 因事惊忧，涎留心包，精神不守，事多健忘，谵言妄语，如有所见，不得安卧；或风痰潮作，手足抽掣；或心虚烦躁。

【加减】 心气狂甚，加铁腻粉一两。

04440　加味苍术膏

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 苍术十斤（捣如泥，入大锅内，用水二桶，以文武火煮至十余碗，取出绢滤，入瓷罐内）

人参 生地 熟地 黄柏 远志 杜仲 川芎 胡桃肉 川椒 故纸 当归 姜汁各四两 青盐二两 朱砂一两 旱莲草汁二碗 白蜜二斤

【用法】 上为末，共入膏内封固，大锅水煮，官香二炷为度，取出埋土中七日。每空心酒、汤任下。

【功用】 通达诸身关节，流注遍体毛窍，养精养气养神，久服精满气盈，暖丹田，减相火，发白转黑，齿落更生。

【主治】 男子精冷绝阳，妇人胞冷不孕。

04441 加味苍柏散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 苍术一钱 白术八分 知母 黄柏 黄芩各五分 当归 芍药 生地各四分 木瓜 槟榔 羌活 独活 木通 防己 牛膝各三分 甘草一分

【用法】 加生姜水煎，温服。

【主治】 湿热脚气。

【加减】 有痰，加竹沥、姜汁；大便实，加桃仁；小便涩，倍牛膝。

【方论选录】 苍术、白术去湿；知母、黄柏、黄芩去热；当归、芍药、生地调血；木瓜、槟榔行气；羌活、独活利关节，散风湿；木通、防己、牛膝引药下行及消肿湿；甘草和药。

04442 加味扶桑饮

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 熟地五钱 当归二钱 白芍一钱五分 川芎八分 木瓜一钱（酒炒） 枣仁二钱（炒，研） 牡蛎四钱（煅，研） 茯苓二钱 广皮一钱 甘草五分 金毛脊二钱（去毛，切片） 续断二钱

【用法】 上药以嫩桑枝二两，煎汤代水煎药。

【主治】 肝劳，阳气拂逆，阴气亏损，身热胁痛，头眩耳鸣，筋节弛纵。

04443 加味连理汤

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】 白术（土炒）二钱 人参 白茯苓 黄连 干姜各一钱 甘草（炙）五分

【用法】 水煎，热服。

【主治】 口糜，口臭，泄泻。

04444 加味佛手散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】 当归 川芎 荆芥各等分

【用法】 上锉一剂。水煎，入童便，温服。

【主治】 产后晕倒，不省人事，眼黑耳鸣等；并治中风不省人事，口吐涎沫，手足瘛疭。

04445 加味佛手散

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】 当归二钱 川芎一钱 人参三五钱（去血过多加至一两）

【用法】 临服入童便半盏，续续进之。

【主治】 产妇交骨不开。

【加减】 质壮气实者，但加童便，人参不用可也。

04446 加味辛夷散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 辛夷 黄耆 人参 当归 白芍 川芎 白芷 细辛 黄芩各一钱 甘草六分

【用法】 灯心三十根，水煎，食远服。

【主治】 鼻中流出臭脓，名曰脑漏。

04447 加味羌活散

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】 羌活 前胡 薄荷叶 防风 川芎 枳壳（麸炒） 桔梗 蝉蜕 连翘（去心） 生甘草 赤芩

【用法】 引用生姜，水煎服。

【功用】 疏风散湿。

【主治】 瘾疹。心火灼于肺金，又兼外受风湿，发必多痒，色则红赤，隐隐于皮肤之中。

04448 加味补血汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】 黄耆一两 当归五钱 香附灰 莲蓬灰 粟壳灰 贯仲灰 藕节灰 陈棕灰、地榆灰各三钱

【主治】 久崩不止。

04449 加味补血汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生煎耆一两 当归五钱 龙眼肉五钱 真鹿角胶三钱（另炖同服） 丹参三钱 明乳香三钱 明没药三药 甘松二钱

【主治】 身形软弱，肢体渐觉不遂，或头重目眩，或神昏健忘，或觉脑际紧缩作疼，甚或昏仆，移时苏醒，致成偏枯，或全身瘫废，脉象迟弱，内中风证之偏虚寒者。

【加减】 服之觉热者，酌加天花粉、天冬各数钱；觉发闷者，加生鸡内金一钱半或二钱。服数剂后，若不甚见效，可用所煎药汤送服麝香二厘（取其香能通窍），或真冰片半分亦可；若服后仍无甚效，可用药汤送制好马钱子二分。

【方论选录】 古方有补血汤，其方黄耆、当归同用，而黄耆之分量，竟四倍于当归，诚以阴阳互为之根，人之气壮旺者，其血分自易充长，是以此方不以当归为主药，而以黄耆为主药也。用龙眼肉

者，因其味甘色赤，多含津液，最能助当归以生血也。用鹿角胶者，因鹿之角原生于头顶督脉之上，督脉为脑髓之来源，故鹿角胶之性善补脑髓。凡脑中血虚者，其脑髓亦必虚，用之以补脑髓，实可与补血之药相助为理也。用丹参、乳香、没药者，因气血虚者，其经络多瘀滞，此于偏枯痿废亦颇有关系，加此通气活血之品，以化其经络之瘀滞，则偏枯痿废者自易愈也。用甘松者，为其能助心房运动有力，以多输血于脑，且又为调养神经之要品，能引诸药至脑以调养其神经也。

【临证举例】 内风 高某，年过六旬，渐觉两腿乏力，寝至时欲眩仆，神昏健忘，恐成痿废，求为诊治。其脉微弱无力。为制此方服之，连进十剂，两腿较前有力，健忘亦见愈，而仍有眩晕之时。再诊其脉，虽有起色，而仍不任重按，遂于方中加野台参、天门冬各五钱，威灵仙一钱，连服二十余剂始愈。

04450 加味虎潜丸

【方源】《医学正传》卷三引丹溪方。

【组成】 人参 黄耆 芍药（煨） 黄柏（盐酒炒） 当归（酒洗） 山药各一两 锁阳（酥炙） 枸杞子 虎胫骨（酥炙） 菟丝子（盐酒浸三宿，细研，焙干，入诸药再研） 龟版（酥炙） 破故纸（炒） 杜仲（姜汁拌炒丝断） 五味子各七钱五分 牛膝（去芦，酒洗）二两 熟地黄四两

【用法】 上为细末，炼蜜和猪脊髓为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，温酒或姜盐汤送下。

【功用】《医统》：壮元阳，滋肾水。

【主治】 ①《医学正传》引丹溪方：虚损。②《医统》：诸虚不足，腰腿疼痛，行步无力。

【备考】《医统》有知母、茯苓，无芍药、五味子。

04451 加味肾气丸

【方源】《济生》卷四。

【异名】 金匮加减肾气丸（《保婴撮要》卷五）、加味八味丸（《医学入门》卷七）、金匮肾气丸（《冯氏锦囊》卷十一）、济生肾气丸（《张氏医通》卷十六）、资生肾气丸（《金鉴》卷二十七）。

【组成】 附子（炮）二个 白茯苓 泽泻 山茱萸（取肉） 山药（炒） 车前子（酒蒸） 牡丹皮各一两（去木） 官桂（不见火） 川牛膝（去芦，酒浸） 熟地黄各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心米饮送下。

【功用】《中国药典》一部：温肾化气，利水消肿。

【主治】 ①《济生》：肾虚腰重，脚肿，小便不利。②《医学集解》：蛊证，脾肾大虚，肚腹胀大，四肢浮肿，喘急痰盛，小便不利，大便溏黄；亦治消渴，饮一溲一。

【方论选录】《医方集解》：此足太阴、少阴药也。桂附八味丸滋真阴而能行水，补命火因以强脾，加车前利小便而不走气，加牛膝益肝肾借以下行，故使水道通而肿胀已，又无损于真元也。

【临证举例】 慢性肾炎 《新中医药》（1957；9：30）：用本方（熟地四钱，山药、山萸、泽泻、丹皮、肉桂、车前子、淮牛膝各一钱，茯苓三钱，附子五分）治疗慢性肾炎6例。临床观察结果：本方能使浮肿逐渐减退或减轻，尿量逐渐增多，尿蛋白消失或减少，肾功能改善，患者食欲增加，体力增强，血压降低。治疗过程中未发现副作用。

【备考】 本方改为汤剂，名“金匮肾气汤”（见《证因方论集要》卷二）、“肾气汤”（见《医林纂要》）、“加减金匮肾气汤”（见《医门八法》）。

04452 加味肾热汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 磁石四钱 牡蛎四钱 生地四钱 白术一钱 白芍一钱 人参一钱 元参二钱 甘草五分

【用法】 猪肾二枚，煎汤代水。

【主治】 肾火飞腾于上，口燥咽干，面红目赤，耳流脓血，不闻人声。

04453 加味败毒散

【方源】《三因》卷三。

【组成】 羌活 独活 前胡 柴胡 枳壳（麸炒，去瓤） 桔梗 甘草（炙） 人参 茯苓 川芎 大黄（蒸） 苍术（米泔浸）各等分

【用法】 上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜三片，薄荷一头，煎七分，去滓热服。

【主治】 三阳经脚气流注，脚踝上焮热赤肿，寒热如疟，自汗恶风，或无汗恶寒。

【加减】 皮肤瘙痒赤疹，加蝉蜕。

【备考】《外科理例》本方用法：分二剂，水一钟，加生姜三片，煎八分，不拘时服。

04454 加味固本丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 天麦二门冬 诃子 阿胶 知母各五钱 生地 熟地 当归 茯苓 黄柏各一两 人参三钱 乌梅十五个 人乳 牛乳 梨汁各一碗

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如黄豆大。每服八九丸，诃子煎汤或萝卜煎汤送下。

【主治】 男妇声音不清。

04455 加味固阴煎

【方源】《女科证治约旨》卷二。

【组成】 生地炭 白芍 阿胶 生龙骨 生牡蛎 茯神 淮山药 秋石 知母 黄柏

【主治】 黑带。因命火太旺，肾水受煎，下焦所郁之湿热，欲济肾水而不得，反得肾气而化黑，形如豆汁，气则腥臭，直流阴部。

04456 加味泻白散

【方源】《金鉴》卷五十三。

【组成】 桑皮（蜜炙） 地骨皮 甘草（生） 川贝母（去心，研） 麦冬（去心） 知母（生） 桔梗 黄芩 薄荷

【用法】 水煎服。

【主治】 火嗽，面赤咽干燥，痰黄气秽带粘稠，便软。

04457 加味泻白散

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】 桑白皮（生） 地骨皮各三钱 生甘草八分 桔梗 辛夷各二钱 黄芩 陈皮 木通各一钱五分（一方加山栀仁（生研）一钱）

【用法】 水煎，食远服。

【主治】 鼻痔。生鼻孔内，如肉赘下垂，色紫微硬，撑塞鼻孔，气息不通，香臭莫辨，或臭不可近，痛不可摇。

04458 加味泻肝汤

【方源】《外科经验方》。

【组成】 龙胆草（酒拌炒） 当归梢 车前子（炒） 泽泻 生地黄 芍药（炒） 黄连（炒） 黄柏（酒拌炒） 知母（酒拌炒） 防风各一钱 甘草梢五分

【用法】 上锉一剂。水二钟，煎八分，食前服。外敷乌金散。

【主治】 肝经湿热不利，阴囊肿痛，或溃烂皮脱，睾丸悬挂，或便毒及下疳肿痛，或溃烂者。

04459 加味泻黄散

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 防风一钱 葛根二钱 石膏四钱 石斛三钱 山栀一钱五分 茯苓三钱 甘草四分

【用法】 用荷叶一角，粳米一撮，煎汤代水。

【主治】 脾有伏火，口燥唇干，烦渴易饥，热在肌肉。

04460 加味治中汤

【方源】《济生》卷五。

【组成】 干姜（炮） 白术 青皮（去白） 陈皮（去白） 缩砂仁各一两 人参（去芦） 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，枣子一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。或兼进感应丸。

【主治】 脾胃不足，饮食不节，过食生冷，肠鸣腹痛，泄泻注下。

04461 加味定风珠

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 生石膏一两 生白芍六钱 生牡蛎四钱 生地六钱 贡胶三钱 麻仁三钱 生龟版四钱 生龙骨四钱 西滑石五钱 甘草三钱 生鸡子黄三个

【用法】 水煎，冲鸡子黄服。

【主治】 辘轳转关症。二目不赤不疼，不肿不痒，眼球流转不定，亦不自觉。

04462 加味定志丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十。

【组成】 远志二两 人参一两 菖蒲二两 白茯苓三两 琥珀 郁金

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，米汤送下。

【主治】 痰迷心膈，惊悸怔忡。

【备考】 方中琥珀、郁金用量原缺。

04463 加味定志丸

【方源】《医学六要》卷七。

【组成】 远志一两 人参一两 白茯苓三两 菖蒲二两 琥珀 天花粉 郁金各一两 贝母 瓜蒌

【用法】 上为末，姜汁、竹沥为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服二钱。

【主治】 肥人痰迷心膈，寻常怔忡。

【加减】 火盛者，加炒黄连一两。

04464 加味定志丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 人参三两 白茯神（去皮木）二两 远志（甘草水泡，去心） 石菖蒲各二两 酸枣仁（炒）二两 柏子仁（炒，去壳）二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂、乳香为衣。每服五十丸，临卧枣汤送下。

【功用】 安神定志。

【主治】 心气不足，恍惚多忘，或劳心胆冷，夜卧不睡。

04465 加味定志丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 大远志（甘草汤泡，去骨） 石菖蒲各二两 人参四两 茯苓二两 黄耆（蜜酒炙）四两

肉桂一两

【用法】 炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心米汤、温酒任下。

【主治】 目能近视，不能远视。

04466 加味建中汤

【方源】《直指》卷九。

【组成】 白术 黄耆各一钱（蜜炙） 白芍药二钱 肉桂（去粗皮）一钱 甘草七分 当归（酒洗）一钱

【用法】 上㕮咀。用水一盏半，加炒浮小麦一撮，煎八分，去滓，入饴少许，再煎温服。

【主治】 诸虚自汗。

04467 加味参术汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 人参 天花粉 生地各五钱 白术 麦冬各一两

【用法】 水煎服。

【主治】 脏躁，无故自悲，涕泣不止。

04468 加味参苏散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 附子一两半（炮） 人参一两半 苏木一两半

【用法】 上为散。水煎，去滓温服。

【主治】 产后虚寒夹瘀，吐血，脉细涩者。

【方论选录】 产后气阳两虚，瘀血滞逆膈间，上出于口，谓之虚寒夹瘀吐血焉。附子补火扶阳，炮黑可以吸血归原；苏木破瘀通经，生用力更峻于利血；人参扶元补气以统血归经也。为散水煎，使气阳内充则瘀血自化，而好血无不归经，何虚寒瘀逆吐血之不痊哉？

04469 加味参附汤

【方源】《妇人良方》卷八。

【异名】 加减参附汤（《校注妇人良方》卷八）。

【组成】 大附子二两半（炮） 大人参一两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水二盏，加生姜十片，丁香十五粒，米一撮，煎至七分，空心温服。

【主治】 ①《妇人良方》：妇人滞下，脏腑虚冷，四肢逆冷，六脉沉绝。②《校注妇人良方》：寒痢阳气脱陷，呕吐不食，手足俱冷。

04470 加味枳术丸

【方源】《准绳·伤寒》卷七。

【组成】 枳实（炒） 神曲（炒） 大麦芽（炒） 棠球子 陈皮各一两 人参 白术各二两

【用法】 上为末，荷叶烧饭和丸，如梧桐子大。每服七八十丸，白汤送下。

【功用】 进饮食，强胃气。

【主治】 病后胃弱，食少。

【加减】 如夏有热，加姜炒黄连七钱，如冬月天寒，加砂仁一两；如气郁不舒畅，加香附一两；如痰多，加橘红一两，去陈皮，更加半夏曲一两。

04471 加味枳术汤

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 白术二钱 枳实 陈皮 麦芽 山楂 茯苓 神曲 连翘各一钱 茵陈 荷叶各一钱五分 泽泻五分

【用法】 水煎服。

【主治】 谷疸，胸膈满闷，嗳腐吞酸。

【加减】 如兼伤酒，加葛根一钱；若便闭，去白术，加卜子、黄芩。

【方论选录】《证因方论集要》：白术除胃中湿热；枳实消胃中停滞；荷叶取之以升发胃中生气，此东垣原法也。佐以麦芽、山楂、神曲，大和中焦；茯苓、陈皮以和脾土；连翘、茵陈以散湿热；泽泻功专利湿行水。此治谷疸者。

04472 加味胡麻散

【方源】《济阳纲目》卷八十四。

【组成】 胡麻一两二钱 苦参 荆芥穗 何首乌（不见铁）各八钱 威灵仙 防风 石菖蒲 牛蒡子（炒） 甘菊花 蔓荆子 白蒺藜 甘草（炒）各六钱

【用法】 上为末。每服三钱，酒调服。

【主治】 风热瘾疹，瘙痒，或兼赤晕，寒热，形病俱实者。

04473 加味茶调散

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】 荆芥穗 薄荷 黄芩 青茶叶 石膏（生） 白芷 川芎

【用法】 引用生姜，水煎服。

【主治】 胃热头痛，鼻干目痛，齿颊疼痛。

【加减】 便秘者，加川大黄。

04474 加味胃苓汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 陈皮 茯苓 白术 白芍各一钱 藿香 人参 厚朴 山楂 泽泻 半夏各五分 甘草 猪苓各三分 香附（女人加）一钱

【用法】 加生姜三片，灯心二十根，水二钟，煎八分，食前服。

【主治】 脾胃受伤，胸膈不宽，两胁膨胀，小水不利，面目四肢浮肿者。

04475 加味香苏饮

【方源】《内科摘录》卷一。

【组成】苏叶一钱半　陈皮　香附各一钱二分　防风　荆芥　蔓荆子各一钱　川芎　甘草各七分　生姜三片

【用法】水一钟半煎服。覆似汗。

【主治】时邪感冒，伤风伤寒，发热，头痛项强，鼻塞声重。

04476　加味香苏散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】香附一两半　苏叶一两半　藿香三两　陈皮半两　甘草六钱　砂仁一两（炒）

【用法】上为散。每服三钱，水煎，去滓温服。

【主治】孕妇感冒，吐泻，脉浮者。

【加减】转筋，加木瓜；胎动，加白术；挟热，加黄连、白术；挟寒，加白术、炮姜。

【方论选录】妊娠先伤于暑，复感于风，风暑合邪，肝胃受病，故吐泻不已，胎因不安焉。香附调气解郁，苏叶理血疏风，藿香快胃祛暑，陈皮利气和中，砂仁醒脾安胎气，甘草缓中和胃气也。为散水煎，使风暑并解，则肝胃调和而吐泻无不止，胎孕无不安矣。

04477　加味香连丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】黄连四两（用吴萸水炒过）　木香一两　阿芙蓉二钱

【用法】上为末，陈米糊为丸，如绿豆大。每服二三十丸。急将莲肉煎汤送下。被盖取睡。

【主治】便泄不收，诸方不效，临危者。

04478　加味香附丸

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】香附一斤（四两老酒浸两宿，炒，捣碎，再焙干，磨为末；四两米醋浸同上；四两童便浸同上；四两用山栀四两煎浓汁，去渣，入香附浸同上）　泽兰（净叶）六两（酒洗）　海螵蛸六两（捣稍碎，炒）　当归四两（酒洗）　川芎三两　白芍药四两（酒炒）　怀熟地八两（捣膏，焙干）

【用法】上药各为末，用浮小麦粉、酒、醋、水打糊为丸，如绿豆大。每日早、晚服两次。

【功用】种子。

【主治】《张氏医通》：倒经，自汗，胎漏下血。

【宜忌】忌食菜蔬及牛肉、生冷。

04479　加味香薷饮

【方源】《济生》卷一。

【组成】香薷半斤　扁豆四两　厚朴（姜制炒）六两　槟榔二两　川黄连（去须）二两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏，用酒半盏，煎至八分，去滓，沉冷服，不拘时候。

【主治】伏暑伤冷，霍乱转筋，烦渴，心腹撮痛，吐利交作，四肢厥冷；及伏暑成疟，烦闷多渴，微微振寒，寒罢大热，小便黄赤，背寒面垢。

04480　加味修肝散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】羌活　防风　桑螵蛸　栀子　薄荷　当归　赤芍药　甘草　麻黄　连翘　菊花　木贼　白蒺藜　川芎　大黄　黄芩　荆芥各一两

【用法】上为末，等分，水煎，入酒温服。

【主治】肝经热毒入脑，眼生花翳白陷。目中忽然肿痛赤涩，泪出不明，眼中生翳如萝卜花，或鱼鳞子，入陷如碎米者。

04481　加味保和丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】白术（去芦，炒）五两　枳实（麸炒）一两　陈皮（去白）三两　半夏（泡，姜炒）二两　白茯苓（去皮）三两　苍术（米泔浸，炒）一两　川厚朴（姜炒）二两　香附（酒炒）一两　神曲（炒）三两　连翘二两　黄连（酒炒）一两　黄芩（酒炒）一两　山楂肉三两　麦芽（炒）一两　萝卜子二两　木香五钱　三棱（醋炒）一两　莪术（醋炒）一两

【用法】上为细末，姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至七八十丸。食后白滚汤送下。

【功用】消痰利气，扶脾助胃，开胸快膈，消痞除胀，清热消食。

【主治】虚弱之人，腹内积聚癖块，胀满疼痛，面黄肿瘦，肚大青筋，不思饮食。

04482　加味胜湿汤

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】羌活　独活　藁本　防风　蔓荆子　川芎　苍术（泔浸，炒）　黄柏（酒炒）　荆芥　甘草（炙）

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】项颈强痛。

【加减】发热恶寒有外邪者，加麻黄、桂枝；腰痛沉沉者，加熟附、防己；虚极者，去黄柏，加人参。

04483　加味养荣丸

【方源】《摄生众妙方》卷十一。

【组成】当归（酒浸）二两　芍药（煨）一两五钱　熟地黄（酒浸）二两　白术二两　川芎一两五钱　茯苓一两　人参一两　甘草（炙）五钱　黄芩

(炒) 一两五钱　香附（炒）一两五钱　麦门冬（去心）一两　阿胶（炒）七钱　贝母一两　陈皮（去白）一两　黑豆（大者，炒，去皮）四十九粒

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，食前空心盐汤，温酒任下。

【主治】 ①《摄生众妙方》：女人不孕。②《医学入门》：经脉参前，外潮内烦，咳嗽，饮食减少，头晕目眩，带下，血风血气，久无嗣息，一切痰火不受峻补，又治胎前胎动胎漏。

【宜忌】 忌食诸血。

04484　加味神术汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】 白术一钱　茅术一钱　当归一钱五分　茯苓二钱　苡仁四钱　厚朴一钱　砂仁一钱　半夏曲三钱（炒）　佩兰叶一钱　川牛膝一钱五分　荷叶一角　生姜二片

【主治】 伤湿，四肢倦怠，食少胸痞。

04485　加味桂枝汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】 桂枝八分　白芍一钱五分　甘草五分　怀牛膝二钱　川牛膝一钱五分　当归二钱　蚕砂四钱　秦艽一钱　防风一钱　红枣五枚　生姜三片

【主治】 中络。风人肌表，肌肉不仁，或手指、足趾麻木。

04486　加味桔梗汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组或】 桔梗（去芦）　白及　橘红　甜葶苈（微炒）各八分　甘草节　贝母各一钱五分　苡仁　金银花各五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 肺痈。

【加减】 初起，加荆芥、防风各一钱；溃后，加人参、黄耆各一钱。

04487　加味柴胡汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 人参　半夏　柴胡　黄芩　百合　知母　甘草

【用法】 上锉一剂。加青竹茹一团，粳米炒食盐一撮，入姜汁少许，水煎服。

【主治】 百合病，百无是处，又非寒又非热，欲食不食，欲行不行，欲坐不坐，服药即吐，小便赤。

04488　加味柴胡汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】 柴胡　人参各二钱　黄芩　山栀仁（炒）　生地黄　半夏（姜制）各一钱　甘草五分

【用法】 加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】 妊娠肝经怒火而致吐血衄血者。

04489　加味逍遥散

【方源】《内科摘要》卷下。

【异名】 八味逍遥散（《医学入门》卷八）、加味逍遥散（《审视瑶函》卷五）、丹栀逍遥散（《方剂学》）。

【组成】 当归　芍药　茯苓　白术（炒）　柴胡各一钱　牡丹皮　山栀（炒）　甘草（炙）各五分

【用法】 水煎服。

【功用】《赵炳南临床经验集》：疏肝清热，解郁和营。

【主治】 肝脾血虚，内有郁热，潮热晡热，自汗盗汗，腹胁作痛，头昏目暗，怔忡不宁，颊赤口干；妇人月经不调，发热咳嗽；或阴中作痛，或阴门肿胀；小儿口舌生疮，胸乳膨胀；外证遍身瘙痒，或虚热生疮。

①《内科摘要》：肝脾血虚发热，或潮热晡热，或自汗盗汗，或头痛目涩，或怔忡不宁，或颊赤口干，或月经不调，或肚腹作痛，或小腹重坠，水道涩痛，或肿痛出脓，内热作渴。②《校注妇人良方》：遍身瘙痒，或口燥咽干，食少嗜卧，小便涩滞，及瘰疬流注，虚热等疮。③《女科撮要》：妇人初产，阴门肿胀，或焮痛而不闭；血虚火燥，产后大便不通。④《保婴撮要》：小儿肝脾血虚内热，胁腹作痛，头目昏黑，或食少不寐，或口舌生疮，或胸乳膨胀；或女子患前症，经候不调，发热咳嗽，寒热往来。伤损血虚，内热发热；或肢体作痛，或耳内作痛。乳母肝脾血虚发热；致儿患疮，或儿肝脾有热，致疮不愈。⑤《济阴纲目》：妇人湿热注下部，阴内溃烂痒痛。⑦《济阳纲目》：大怒逆气伤肝，肝伤血少目暗。⑧《金鉴》：妇人郁热伤损肝脾，湿热下注而致阴中作痛，痛极往往手足不能伸舒；及风湿血燥痒或痛，搔之则成疮。⑨《杂病源流犀烛》：郁证；或血燥肝气虚弱，风寒客子经络，肩臂痛而筋挛，遇寒则剧，脉紧细。⑩《伤科汇纂》：血虚肝燥，骨蒸劳热。⑪《全国中药成药处方集》：肝经郁热过甚，烦热口苦，耳鸣头眩。

【宜忌】《北京市中药成方选集》：忌气恼、劳碌。

【方论选录】 ①《医方考》：方中柴胡能升，所以达其逆也；芍药能收，所以损其过也；丹、栀能泻，所以伐其实也；木盛则土衰，白术、甘草，扶

其所不胜也；肝伤则血病，当归所养其血也；木实则火燥，茯神所以宁其心也。②《成方便读》：本方以丹皮之能入肝胆血分者，以清泄其火邪；黑山栀亦入营分，能引上焦心肺之热，屈曲下行；合于逍遥散中，自能解郁散火，火退则诸病皆愈耳。

【临证举例】 ①产后阴门不闭 《女科撮要》：一产妇阴门不闭，小便淋沥，腹内一物，攻动胁下，或胀或痛，用加味逍遥散加车前子而愈。②咳嗽《内科摘要》：一妇人因怒吐痰甚多，狂言热炽，胸胁胀痛，手按稍止，脉洪大无伦，按之微细，此属脾肝二经血虚，以加味逍遥散加熟地、川芎二剂，脉症顿退，再用十全大补而安。③恶寒发热 《柳选四家医案》：寒热无期，中脘少腹剧痛，此肝脏之郁也，郁极则发为寒热，头不痛，非外感也。以加味逍遥散主之。

【备考】 ①本方改为丸剂，名“加味逍遥丸”（见《北京市中药成方选集》）、“丹栀逍遥丸”（见《全国中药成处方集》南京方）。②《医学心悟》有薄荷。

04490 加味逍遥散

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】 软柴胡五分 白芍药一钱半（酒炒） 冬白术一钱半（炒） 当归身二钱 白茯苓二钱（去木） 粉甘草五分 钩藤钩五钱 忍冬藤三钱 山栀 丹皮

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 女子血虚火旺，经闭潮热；男子阴虚木旺，脉弦虚数者。

04491 加味逍遥散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 柴胡六钱（盐水炒） 白芍二两（炒） 白术一两半（制） 当归三两 茯苓一两 炙草四钱 山栀二两（炒） 丹皮一两半 蛤壳三两（生研）

【用法】 上为散。白雷丸三钱，煎汤调下三钱。

【主治】 阴痒，脉弦虚数。

【方论选录】 蛤壳生研，利少阴之湿热；柴胡盐制，解肝胆之虚阳；当归养血荣经；白芍敛阴和血；白术培土制湿；茯苓渗湿和脾；丹皮凉血以清相火；山栀降热以清湿火；炙甘草以缓中和胃也。白雷丸汤调下，取其清热杀虫，使热化虫消湿亦得泄而津血四布，肝脾无不皆受其荫，岂有湿热下注以成阴痒之疴哉！

04492 加味逍遥散

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】 白芍 白术各一钱二分 地骨皮 知母 当归各一钱 茯苓 麦冬 生地各八分 山栀 黄柏各五分 桔梗 甘草各三分

【用法】 水煎服。

【主治】 血病，女子不月；妇人痛证；胁连胸腹胀痛；妇人阴缩，阴户急，痛引入小腹；阴冷而内热寒热，经候不调；妇人便毒，于两拗肿痛，腹内有块，不时上攻，小便不利。

04493 加味逍遥散

【方源】《外科证治全书》卷三。

【组成】 柴胡二钱 白芍五钱 当归三钱 陈皮五钱 甘草一钱 白术三钱 茯神三钱 人参一钱 川芎一钱 瓜蒌三钱 半夏三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 乳悬，肝气不舒，痰气郁结，乳房忽大如桃，不觉痛痒，色亦不赤，身体发热，形渐瘦损。

04494 加味铁落饮

【方源】《重订通俗伤寒论》引胡在兹方。

【组成】 生石膏三两 青龙齿 辰茯神 青防风各一两五钱 元参 秦艽各一两 鲜生地四两

【用法】 先用铁落八两，长流水一斗，煮取五升，并以上七味加竹沥半升，羚角五钱，入铁汁中，煮取二升，去滓，和入竹沥。温分五服，一日服尽。

【功用】 泄肝阳。

【主治】 狂病，忿郁暴怒上逆，狂躁笑哭，面色清皎，大便通调者。

04495 加味脏连丸

【方源】《医便》卷三。

【组成】 雄猪大脏一副（去两头各七寸） 黄连（去毛，净末）一斤 槐花（净末）四两

【用法】 将后二味装入脏内令满，用绳扎两头口上，用小麦数十粒，放甑上蒸三时，以脏黑取看小麦极烂为度，入石臼捣如泥为丸，如绿豆大。每服一百丸，空心薄酒送下。

【主治】 饮酒食炙，热毒下坠，为肠风脏毒，痔漏下血。

04496 加味消毒饮

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷一引《医林》。

【异名】 加味消毒饮子（《普济方》卷二七八）、驱风解毒散（《古今医鉴》卷九）。

【组成】 荆芥 防风 恶实 甘草 连翘 羌活各一钱

【用法】 上锉作一贴。水煎服。

【主治】 ①《东医宝鉴》引《医林》：搭腮肿。②《古今医鉴》：疟腮肿痛。

04497 加味益气汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 黄耆（蜜炒） 人参 白术（去芦） 陈皮 当归各一钱 升麻 柴胡 木香各五分 香附 青皮（去瓤） 川芎各八分 桂枝少许 甘草三分

【用法】 上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 气虚，浑身发麻。

04498 加味益气汤

【方源】《会约》卷六。

【组成】 人参（无参者，以淮山药三钱代之，或以时下生条参三钱代之） 当归 甘草（炙）各一钱 白术一钱半 陈皮八分 川芎六分 黄耆（蜜炙）二钱 升麻（蜜炒） 柴胡（酒炒）各三分 石菖蒲六分

【用法】 生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】 劳苦太过，气虚耳聋，或耳鸣眩运，倦怠。

04499 加味陷胸汤

【方源】《医统》卷二十九引《医林集要》。

【组成】 枳壳（麸炒） 桔梗各四钱 半夏（泡） 黄芩 瓜蒌子 黄连各二钱 麦门冬（去心）二钱

【用法】 上㕮咀，作二服。每服加生姜五片，水二盏，煎八分，食远服。利下即安。

【主治】 热壅痞满，胸膈痛或两胁痛，及疟、利后发热留滞胸膈，或饮酒过度，胸满结痛。

04500 加味通心散

【方源】《医宗必读》卷八。

【组成】 瞿麦穗 木通（去皮） 栀子（去壳） 黄芩 连翘 甘草 枳壳（去瓤） 川楝子（去核） 归尾 桃仁（去皮尖，炒） 山楂各等分

【用法】 上为末。每服三钱，灯心、车前草煎汤，空心调下。

【主治】 癃癃疝，内有脓血，小便不通。

04501 加味通心散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 瞿麦穗一两 木通 栀子仁（酒炒黑） 黄芩 连翘 甘草梢 川楝肉 车前各五钱 肉桂二钱

【用法】 上为散。每服五钱加灯心二十茎，竹叶十片，水煎服。

【主治】 小肠疝痛，水道不通。

04502 加味通圣散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 防风 川芎 当归 白芍 白术 甘草 连翘 薄荷 栀子 桔梗 麻黄 石膏 滑石 荆芥 黄芩 朴消 大黄 蝉退 枳壳

【用法】 水二钟，煎八分，热服。

【主治】 风饼风丹作痒。

04503 加味理中汤

【方源】《三因》卷九。

【组成】 人参 白术 甘草（炙） 干姜（炮） 干葛 川芎各等分

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏，煎七分，去滓温服。

【主治】 饮酒过多，及啖炙煿热食动血，发为鼻衄。

04504 加味理中汤

【方源】《直指》卷八。

【组成】 人参 白术 干姜（不炒） 甘草（炙） 半夏（制） 茯苓 橘红 细辛 北五味子各等分。

【用法】 上锉细。每服二钱半，加生姜、大枣，水煎，食前服。

【功用】《金匮翼》：温养脾肺。

【主治】 脾肺虚寒，咳嗽不已；中寒口噤，身体强直。

①《直指》：肺胃俱寒，咳嗽。②《外科发挥》：肺胃俱寒，发热不已。③《景岳全书》：脾肺俱虚，咳嗽不已。④《文堂集验方》：中寒，身体僵直，口噤不语，四肢战掉，洒洒恶寒，脉洪紧，无汗。⑤《杂病证治新义》：虚寒咳嗽。

【临证举例】 肺痈咳嗽 《外科发挥》：一男子年前病肺痈，后又患咳嗽，头眩唾涎，饮食少思，小便频数。服解散化痰药，不应。诊之，脾肺二脉虚甚。余谓：眩晕唾涎，属脾气不能上升，小便无度，乃肺气不得下制，尚未成痈耳。投以加味理中汤四剂，诸证已退大半，更用钟乳粉汤而安。

04505 加味理中汤

【方源】《伤寒六书》卷四。

【异名】 加味理中饮（《赤水玄珠》卷十八）。

【组成】 干姜 肉桂各四分 白术一钱 人参 陈皮 茯苓各八分 甘草三分

【用法】 水二钟，加生姜一片，大枣二枚，水煎，临服捶法入炒陈壁土一匙调服。

【主治】 足太阴脾经受症，脏寒，自利不渴，手足温，身无热，脉来沉而无力。

【加减】 厥阴消渴，气上冲心，饥不欲食，食即吐蛔，腹痛大便实者，加大黄、蜜少许利之；腹濡满时减者，去甘草；呕吐，入半夏、姜汁；蹉卧沉

重，利不止，少加附子；利后身体痛者，急温之，加附子；自利腹痛，入木香（磨）、姜汁，调和服之。

04506 加味理中汤

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】人参三钱 白术一钱五分 干姜一钱（炮） 甘草八分 肉桂八分 陈皮一钱五分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，临服加木香（磨）一匙，姜汁少许同服。

【主治】伤寒，直中阴经，腹痛，怕寒厥冷，或下利呕吐不渴，脉沉迟无力。

04507 加味理中汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】人参（少者，用山药三钱炒黄代之）白术一钱半 干姜（炒）一钱 甘草（炙）一钱 附子五分 丁香三分 木香三分 半夏一钱 草豆蔻（煨）八分 生姜一钱

【用法】水煎服。

【主治】胃寒呃逆。

04508 加味理建汤

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】干姜 吴术 人参 黄耆 白芍 肉桂 甘草 牡蛎 浮麦 当归

【用法】上件㕮咀。每服水二盏，加生姜五片，大枣一枚，煎八分，食前热服，滓再煎。

【主治】男子、妇人夜多盗汗，并便浊者。

04509 加味黄芩汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】黄芩二钱半 白芍一钱半 甘草一钱半夏一钱半 生姜二钱

【用法】水煎服。

【主治】胃热作呕，烦躁不宁，脉洪实者。

【加减】热甚，加石膏，或加黄连；大便燥结，加酒炒大黄。

04510 加味黄耆汤

【方源】《医学入门》卷四。

【异名】保元汤。

【组成】黄耆一钱 人参 甘草各一钱 白术五分 肉桂五分

【主治】阳虚背恶寒。

【加减】病甚者，加附子。

【备考】方中肉桂用量原缺，据《济阴纲目》补。

04511 加味控涎丸

【方源】《得效》卷五。

【组成】大戟 芫花 甘遂 甜葶苈 巴豆（去壳）各一两 黑牵牛三两（炒，取头末） 白芥子（炒）二两

【用法】上为末，米糊为丸，如粟米大。每服三七粒，茶清吞下；或温水亦可。得利则效。

【功用】消浮退肿，下水。

【主治】风热上壅，或中脘停留水饮，喘急，四肢浮肿，脚气入腹，平常腹中痰热，诸气结聚。

【宜忌】服后未可服甘草药及热水。

04512 加味救肺饮

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】当归 白芍 麦冬 五味子 人参 黄耆 炙草 百合 款冬花 紫菀 马兜铃

【主治】金被火刑，肺损嗽血。

04513 加味麻仁丸

【方源】《准绳·类方》卷三引《体仁汇编》。

【组成】大黄一两 白芍药 厚朴（姜汁炒） 当归 杏仁（去皮尖） 麻仁 槟榔 南木香 枳壳各五钱 麝香少许

【用法】上为末，炼蜜为丸。熟水送下。

【主治】关格，大小便不通。

04514 加味清心饮

【方源】《得效》卷七。

【组成】石莲肉 白茯苓各一两 益智仁 麦门冬 远志（水浸取肉，姜制炒） 人参各半两 石菖蒲 车前子 白术 泽泻 甘草（微炙）各二分

【用法】上锉散。每服三钱，加灯心二十茎，水煎服。

【主治】心中客热烦躁，便下赤浊肥脂。

【加减】有热，加薄荷少许。

04515 加味清胃散

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【异名】秘本加味清胃散（《麻科活人》卷四）、加味清胃汤（《一盘珠》卷六）。

【组成】黄连（炒） 一钱五分 生地黄 牡丹皮 当归各一钱 升麻二钱 犀角 连翘 甘草

【用法】水煎服。

【主治】脾胃有热，口舌生疮，齿龈腐烂疼痛，或吐血。

①《校注妇人良方》：醇酒厚味，唇齿作痛，或齿龈溃烂，或连头面颈项作痛。②《女科撮要》：脾胃有热，口内生疮。③《赤水玄珠》：妊娠吐衄。④《嵩崖尊生》：牙疼出血口臭。⑤《一盘珠》：胃火吐血。

【临证举例】唇内热 一妇人唇裂内热二年，每

作服寒凉之剂，时出血水，益增他症。此胃火伤血，而药伤元气也。余用加味清胃散而愈。

04516 加味清胃散

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】当归尾二钱 生地黄三钱 牡丹皮三钱 升麻四分 黄连六分 防风一钱五分 荆芥一钱 软石膏三钱

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】①《寿世保元》：胃经火盛，致牙齿肿痛，上下牙痛，牵引头脑而热，其齿喜冷恶热者。②《麻科活人书》：胃中蕴热，中脘作痛，痛后火气发泄，必作寒热乃止；及齿龈肿痛出血。

【加减】若牙颧额半边痛者，加防风、羌活、白芷、细辛；若牙龈脱出而出血者，加扁柏叶、黄芩、荆芥、栀子；若虚损人牙痛者，加黄柏、知母、人参、甘草；若满口浮而痛，不能力嚼者，加连翘、元参、芍药；小儿牙疳者，乳母服，加天花粉、元参、白芷；醇酒厚味，唇齿作痛，或牙龈溃烂，连头面颈项作痛者，并加犀角、连翘、甘草；胃气齿痛，加草豆蔻、细辛、防风、羊胫骨灰，去牡丹皮。

04517 加味清震汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】升麻一钱 苍术一钱 青荷叶一个（全用） 甘草（炙） 陈皮各八分 蔓荆子 荆芥各一钱五分 薄荷五分

【用法】水煎服。

【主治】雷头风，痰火所致头痛，起核块，或头中雷鸣。

04518 加味绿矾丸

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】皂矾八两（用面一斤和作饼，入皂矾在内，火煨焦为度） 苍术（米泔水浸，炒） 厚朴（姜汁炒） 陈皮 甘草各八分 川椒十两（去目，炒去汗）

【用法】上为末，用红大枣三斤（煮熟去皮核），胡桃三斤（去壳），同捣成膏，和药为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，酒服。初服时觉此药甘美，服至病将愈，便觉药臭矣。

【主治】黄病。

04519 加味紫菀汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】紫菀（炒）一钱 阿胶（蛤粉炒成珠）一钱 知母一钱 贝母一钱 桔梗五分 生甘草五分 人参五分 茯苓五分 五味子十二粒 牛蒡子五分 金银花五分

【主治】肺痿，久而气极，劳热自汗，皮毛枯悴，气息奄奄，咳嗽稠痰，喉间腥臭，且或吐血，痿而变痈，肺气虚极而邪火愈盛。

【方论选录】方中紫菀辛苦温，升灭阳气，以解胸膈之郁热，理上焦血，散逐痰涎，去肺间郁积；阿胶补润肺金，固气理血，散热滋阴；知母清肺金而滋肾水，以济妄火；贝母去热痰，开郁结，清热解毒；二母皆能金以生水，水济火则还以保肺；桔梗散肺邪，降肺逆；生甘草补土生金，且能解毒；气虚者，必人参以补之；茯苓亦补土生金，而能渗膈间邪湿；五味子补肺敛气，久嗽肺伤，肺叶焦痿，此当必用；牛蒡子功专治肺，利咽膈，止嗽除痰；金银花解百毒。肺痈邪实宜急治，肺痿正虚缓养，且已虚则不容更破，而外邪未尽祛，则未可峻补，此方最为适宜也。

04520 加味遗粮汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎 当归 防风 薏苡仁 木瓜 金银花 木通 白鲜皮 苍术 威灵仙各一钱 甘草五分 皂荚子五个（切片，微炒） 仙遗粮二两

【主治】杨梅疮初起，筋骨疼痛，及已成数月，延绵不已；并杨梅风毒，误服轻粉，瘫痪骨疼不能动履者。

【宜忌】忌牛肉、烧酒、海腥、煎炒。

【加减】疮久气虚者，加人参；腿脚之下，加牛膝一钱。

【备考】预服不发梅疮。

04521 加味温胆汤

【方源】《准绳·伤寒》卷五。

【组成】人参二钱半 橘红 茯苓 黄连（酒炒） 软苗柴胡 当归身 川芎 白芍药 生地黄 酸枣仁各一钱 半夏七分 甘草五分 竹茹一团 生姜三片

【用法】水二钟，煎至一钟，去滓温服。

【主治】虚烦身振不得眠。

04522 加味温胆汤

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】陈皮 半夏（制） 茯苓各一钱 甘草（炙）五分 枳实 竹茹 黄芩各一钱 黄连八分 麦冬二钱 芦根一钱

【用法】上锉。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】①《金鉴》：妊娠恶阻因于胃热者，呕吐，心中烦热愦闷，喜饮凉浆。②《叶氏女科》：体瘦恶阻多火者。

04523 加味滋阴丸

【方源】《医学正印》。

【组成】 熟地黄八两（如法制） 山茱萸肉四两 干山药四两 白茯苓三两 牡丹皮三两 泽泻三两 黄柏三两（盐、酒、蜜炒三次，黑色） 知母三两（盐、酒炒三次，茶合色） 麦门冬三两（去心） 辽五味子一两五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，空心淡盐汤送下。

【主治】 阴虚痰火无子。

04524 加味滋肾丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 肉桂三分 黄连一钱 姜黄一钱五 苦参三钱 苦葶苈（酒洗，炒） 石膏 黄柏（酒炒） 知母（酒炒）各五钱

【用法】 上为极细末，打薄面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心白汤送下，以食压之。

【主治】 眼内障。

【宜忌】 肚冷者，勿用石膏。

04525 加味槐角丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十一。

【组成】 槐角二两 生地二两 当归身 黄耆各二两 川芎 阿胶各半两 黄连 条芩 枳壳 秦艽 防风 连翘 地榆 升麻各一两 白芷半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，或酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，渐加至七八十丸、百丸，空心温酒或米汤送下。

【主治】 痔漏，及肠风下血。

【方论选录】 本方以槐角、生地生血凉血为君；当归、川芎、黄耆、阿胶补虚为臣；以诸药为佐使。盖黄连泻心火，条芩凉大肠，枳壳宽大肠，秦艽去大肠风，防风为血证上使，连翘为血证中使，地榆为血证下使，而连翘又能散经络中火邪，地榆又能凉血，升麻升散火邪，又与白芷引诸药入大肠经络，夫痔漏，经络之病也。

04526 加味蜈蚣散

【方源】《证治宝鉴》卷一。

【组成】 川芎 羌活 蜈蚣 全蝎 鱼鳔 黄芩 马前 雄黄 蚯蚓（焙干） 川乌头

【用法】 上为末。酒调下。

【主治】 破伤风，角弓反张，口噤咬牙甚者。

04527 加味解毒汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】 黄芩二钱 黄连六分 黄柏一钱五分 栀子三钱 柴胡八分 茵陈二钱 龙胆草二钱 木通二钱 滑石三钱 升麻五分 甘草八分

【用法】 上锉。加灯心，水煎服。

【主治】 发黄症，身、口俱发如金色，小便如浓煮柏汁者。

【加减】 大便实，加大黄二钱；目睛黄，倍龙胆草。

04528 加味解毒散

【方源】《保婴撮要》卷十二。

【异名】 加味解毒饮（《准绳·幼科》卷三）。

【组成】 玄参 连翘 升麻 芍药 当归 羌活 生地黄 牛蒡子（炒）各三钱 茯苓 甘草各三钱 金银花 漏芦各五钱

【用法】 每服一二钱，水煎服；或炼蜜为丸服。

【主治】 天泡疮，发热作痛。

04529 加味磁朱丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 磁石二两（能吸铁者，研极细水飞出，切忌火煅） 赭石二两 清半夏二两 朱砂一两

【用法】 上药各为细末，再加酒曲半斤，轧细过罗，可得细曲四两，炒熟二两，与生者二两，共和药为丸，如梧桐子大。每服二钱，铁锈水煎汤送下，一日二次。

【主治】 痫风。

【方论选录】 方中磁石中含铁质，且能吸铁，故能伏藏电气，即兼能伏藏与电气同类之相火也。又相火之发动，恒因君火之潜通，有朱砂之宁静心火，则相火愈不妄动矣。又电气入土则不能发声，故喻嘉言谓，伏制阴分之火，当以培养脾土为主。盖以土能制电，即能制水中之火，有神曲以温补脾胃，则相火愈深潜藏矣。加赭石、半夏者，诚以痫风之证，莫不气机上逆，痰涎上涌，二药并用，既善理痰，又善镇气降气也。送以铁锈汤者，以相火生于命门，寄于肝胆，相火之暴动实于肝胆有关。此肝胆为木脏，即为风脏，内风之煽动，亦莫不于肝胆发轫；铁锈乃金之余气，故取金能制木之理，镇肝胆以熄内风；又取铁能引电之理，借其重坠之性，以引相火下行也。

04530 加味藿香散

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 加味藿香饮（《嵩崖尊生》卷六）。

【组成】 藿香 甘草 桔梗 青皮 陈皮 柴胡 紫苏 半夏 白术 茯苓 白芷 厚朴 川芎 香附 夏枯草各等分

【用法】 加生姜三片，大枣二枚，水二钟，煎八分，食远服。

【主治】 气毒瘰疬，外受风邪，内伤气郁，以致颈项作肿，肩膊强痛，四肢不舒，寒热如疟，及胸膈不利。

04531 加剂除湿汤

【方源】《直指》卷三。

【组成】 苍术（炒） 白术 甘草（炙）各一两 干姜（炮） 茯苓各二两 橘红 辣桂 厚朴（制）各半两

【用法】 上锉。每服三钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 气虚伤湿，身重腰疼，四肢微冷，或呕逆，或溏泄。

04532 加减一阴煎

【方源】《景岳全书》卷上一。

【组成】 生地 芍药 麦冬各二钱 熟地三五钱 炙甘草五七分 知母 地骨皮各一钱

【用法】 水二钟，煎服。

【功用】《中医妇科治疗学》：养阴清热。

【主治】 阴虚火旺，吐血、咯血、衄血，怔忡惊悸，上消；热病后伤阴水亏，烦渴不止，潮热不退；妇女阴虚血热，月经后期，色紫红，时作潮热，口中干燥，五心发热者。

①《景岳全书》：上消，水亏于下，火炎于上，有不得不清者；肾水真阴虚损，脉证多阳，虚火发热，及阴虚动血，或疟疾、伤寒屡散之后，取汗既多，伤阴水亏而脉虚气弱，烦渴不止，潮热不退，火之甚者。②《证治宝鉴》：虚劳，阴虚而兼微火者。③《竹林女科》：肝经怒火上冲，产后乳胀而溢；产后阴虚火盛而大热。④《类证治裁》：水亏火炽，烦躁热渴而为怔忡、惊悸者。⑤《医门八法》：阴虚血亏，虚火易动，头痛，遇热痛甚，烦热内热；耳聋。⑥《中医妇科治疗学》：阴虚血热，月经后期，经量正常，色紫红，腹不胀痛，时作潮热，口干燥，手足心发热，脉虚数。

【加减】 躁烦热甚便结者，加石膏二三钱；小水热涩者，加栀子一二钱；火浮于上者，加泽泻一二钱，或黄芩一钱；血燥血少者，加当归一二钱。

04533 加减八味丸

【方源】《集验背疽方》。

【异名】 加味八味丸（《直指》卷二十二）、加减八味地黄丸（《准绳·疡医》卷三）。

【组成】 干熟地黄（焙，锉）二两 真山药（锉细，微炒） 山茱萸（去核取肉，焙干）各一两 肉桂（削去粗皮，锉，不见火）一两（别研，取半两净末，和入众药，余粗滓仍勿用） 泽泻（水洗，锉作块，无灰酒浸，瓦器盛盖，甑上蒸五次，锉，焙） 牡丹皮（去心枝杖，锉，炒） 白茯苓（去黑皮，锉，焙）各八钱 北真五味子（拣去枝杖，慢火炒至透，不得伤火） 一两半（别研罗，和入众药。最要真者）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心无灰酒或盐汤任下。

【功用】 补肾水，降心火，止燥渴。

①《集验背疽方》：降心火，生肾水，止渴；增益气血，生长肌肉，强健精神。②《医方类聚》引《澹寮》：免生痈疽。③《寿世保元》：久服必肥健而多子；晚年服此，不生痈疽诸毒，不患消渴。

【主治】 肾水不足，心火上炎，津液亏损，心烦燥渴，易生痈疽，寝汗发热，形体消瘦，口舌生疮，牙龈溃烂，咽喉作痛，或肾消小便频数，或肾虚火不归元，烘热咳嗽。

①《集验背疽方》：痈疽之后，转作渴疾，或未发疽人，先有渴症者。②《小儿痘疹方论》：小儿禀赋肾阴不足，或吐泻久病，津液亏损，或口舌生疮，两足发热，或痰气上涌，或手足厥冷。③《医方类聚》引《澹寮》：肾虚津乏，心烦燥渴。④《得效》：肾消，小便频数，白浊，阴痿弱，饮食不多，肌肤渐渐如削，或腿肿脚先瘦小。⑤《普济方》：或先患痈疽而才觉作渴，或有痈疽而无渴。⑥《外科理例》：疮痍后口干渴，甚则舌或黄，及口舌生疮不绝。⑦《准绳·类方》：肾水不足，虚火上炎，发热作渴，口舌生疮，或牙龈溃烂，咽喉作痛，或形体瘦悴，寝汗发热，五脏齐损。⑧《张氏医通》：肾虚火不归元，烘热咳嗽。

【方论选录】 内真北五味子，最为得力，此一味独能生肾水、平补、降心火，大有功效。

【临证举例】 ①发热 《内科摘要》：大尹沈用之不时发热，日饮冰水数碗。寒药二剂，热渴益甚，形体日瘦，尺脉洪大而数，时或无力。王太仆曰：热之不热，责其无火；寒之不寒，责其无水。又云：倏热往来，是无火也；时作时止，是无水也。法当补肾，用加减八味丸，不月而愈。②发热 《内科摘要》：州同韩用之年四十有六，时仲夏色欲过度，烦热作渴，饮水不绝，小便淋沥，大便秘结，唾痰如涌，面目俱赤，满舌生刺，两唇燥裂，遍身发热，或时如芒刺而无定处，两足心如烙，以冰折之作痛，脉洪而无伦。此肾阴虚阳无所附，而发于外，非火也。盖大热而甚，寒之不寒，是无水也，当峻补其阴。遂以加减八味丸料一斤内肉桂一两，以水顿煎六碗，水冷与饮，半饷已用大半，睡

觉而食温粥一碗，复睡至晚，乃以前药温饮一碗，乃睡至晓，食热粥二碗，诸症悉退。翌日畏寒，足冷至膝，诸症仍至，或以为伤寒。余曰：非也，大寒而甚，热之不热，是无火也，阳气亦虚矣。急以八味丸一剂服之稍缓，四剂诸症复退。大便至十三日不通，以猪胆导之，诸症复作，急以十全大补汤数剂方应。③痈疽作渴 《集验背疽方》：有一贵人病疽疾，未安而渴作，一日饮水数升，愚献此方，诸医失笑云：此药若能止渴，我辈当不复业医矣。诸医尽用木瓜、紫苏、乌梅、参、苓、百药煎等生津液、止渴之药，服多而渴愈甚。数日之后，茫无功效，不得已而用此药服之，三日渴止。今医多用醒脾、生津、止渴之药，误矣！而其疾本起于肾水枯竭，不能上润，是以心火上炎，不能既济，煎熬而生渴。今服八味丸，降其心火，生其肾水，则渴自止矣。④口舌生疮 《续名医类案》：薛立斋治一男子口舌糜烂，津液短少，眼目赤，小便数，痰涎壅盛，脚膝无力，或冷，或午后脚热，劳而愈盛，数年不愈。服加减八味丸而痊。

【备考】 本方改为汤剂，名“加减八味汤”（见《医学心悟》）。

04534 加减八味丸

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 熟地五两 附子三两（炮） 肉桂三两（去皮） 萸肉三两 泽泻一两半 当归三两 吴茱萸一两半（醋泡，炒） 阳起石三两（煅） 干姜一两半（炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，川椒汤送下。

【主治】 阴内冰冷，不孕，脉细者。

【方论选录】 熟地补先天之血，附子补真阳之火，萸肉涩精秘气，肉桂暖血温经，当归养血脉以荣经脉，泽泻泻浊阴以清子宫，吴茱温肝逐冷，干姜暖胃祛寒，阳起石以壮阳暖子脏也。白蜜丸之，椒汤下之，使火壮阳回则寒冷消散而子宫温暖，何有阴冷之疴，以致不孕之愆哉！

04535 加减四物汤

【方源】《济生》卷四。

【组成】 侧柏叶 生地黄（洗） 当归（去芦，酒浸） 川芎各一两 枳壳（去瓤，炒） 荆芥穗 槐花（炒） 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，生姜三片，乌梅少许，煎至七分，空心、食前去滓温服。

【主治】 肠风下血不止。

04536 加减四物汤

【方源】《医钞类编》卷八。

【组成】 生地 白芍 当归 枸杞 牛膝 杜仲 黄柏 酸枣仁

【用法】 水煎服。

【主治】 阳旺阴衰，强中不收。

04537 加减白术散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 葛根二钱 人参 白术 茯苓各一钱 木香 知母 黄柏 甘草各五分 五味子九粒

【主治】 中消，饮食多，不甚渴，小便数，肌肉瘦；或消谷善饥者。

04538 加减白通汤

【方源】《医学启源》卷中。

【组成】 附子一两（去皮脐） 干姜一两（炮） 官桂五钱 白术五钱 草豆蔻（煨） 甘草 人参 半夏（炮）各五钱

【用法】 上㕮咀。每服一两，水二盏半，加生姜五片、葱白五茎，煎至一盏二分，去滓，空心服。

【主治】 形寒饮冷，大便自利，完谷不化，脐腹冷痛，足胫寒逆。

【方论选录】 以附子大辛热，助阳退阴，温经散寒，故以为君；干姜、官桂辛甘大热，亦除寒湿，白术、半夏苦辛温胃燥脾湿，故为臣；草豆蔻、炙甘草、人参甘辛大温，温中益气；生姜辛大温，能除湿之邪；葱白辛温，以通上焦阳气，故以为佐。

04539 加减瓜蒌散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 大瓜蒌一个（子多者佳，少者用二个，杵烂） 当归三钱 没药二钱 乳香一钱、甘草三钱 金银花五钱 生姜五钱

【用法】 用无灰酒二碗，煎一碗服。

【主治】 内痈，脑疽，背腋诸毒，瘰疬，便毒，乳痈，乳岩。

【加减】 将溃者，加皂角刺五钱；乳痈、脑痈，加蒲公英、土贝母各五钱。

【备考】 未成者即消，已成者速溃。溃后用参、耆补之。

04540 加减地仙丹

【方源】《济生》卷三。

【组成】 地龙（炒，去土） 五灵脂（去石） 乌药 白胶香（别研） 椒红（炒去汗） 威灵仙 木瓜（去瓤） 赤小豆（炒） 黑豆（炒，去皮） 天仙藤 川乌（炮，去皮） 五加皮 苍术（泔水浸，去黑皮，炒） 木鳖子（去壳油）各等分

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心用盐酒、盐汤送下。

【主治】 风冷湿邪，留滞下焦，足膝拘挛，肿满疼痛，不能步履。

04541 加减地芝丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 生地黄四两 天门冬（烘热，去心，另焙） 枸杞子各三两 甘菊二两 熟地黄四两 麦门冬（去心） 山茱萸肉各三两 当归身二两 五味子一两

【用法】 炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，沸汤、温酒任下。

【主治】 目能远视，不能近视。

04542 加减地黄丸

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】 生地（干者）一斤 熟地（干者）一斤 石斛（去苗） 防风（去芦） 枳壳（炒） 牛膝（酒洗） 杏仁（泡，去皮尖，麸炒黄，入瓦器研去油）各四两

【用法】 上为细末，除杏霜另入，勿犯铁器，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心以豆淋酒送下；或饭饮及青盐汤亦可。

【功用】 补肝益肾，驱风明目。

【主治】 男妇肝藏积热，肝虚目暗，膜入水轮，漏睛眵泪，眼见黑花，视物不明，混睛冷泪，翳膜遮障；及肾藏虚惫，肝受虚热；及远年近日，暴热赤眼，风毒气眼；兼治十湿脚气，消中消渴，及诸风气等疾。

【宜忌】 忌一切动风毒等物。

04543 加减辛夷散

【方源】《得效》卷十。

【组成】 茶调散加辛夷仁 藁本 苍耳子 木通各一两

【用法】 上为末。淡茶清调下。

【主治】 风热上壅，鼻流浊涕，或腥臭头昏，眉棱骨痛。

04544 加减补筋丸

【方源】《金鉴》卷八十九。

【组成】 当归一两 熟地黄 白芍药各二两 红花 乳香 白云苓 骨碎补各一两 广陈皮二两 没药三钱 丁香五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每丸重三钱。用好无灰酒送下。

【主治】 髌骨跌伤，手屈向后，骨缝裂开，不能抬举，时肿如椎者。

04545 加减肾气丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】 山茱萸（取肉） 白茯苓（去皮） 牡丹皮（去木） 熟地黄（酒蒸） 五味子 泽泻 鹿角（镑） 山药（锉，炒）各一两 沉香（不见火） 官桂（不见火）各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十粒，盐汤、米饮任下。

【主治】 ①《济生》：劳伤肾经，肾水不足，心火自炎，口舌焦干，多渴而利，精神恍惚，面赤心烦，腰痛脚弱，肢体羸瘦，不能起止。②《证治要诀类方》：三消。

【加减】 弱甚者，加附子一两，兼进黄耆汤。

【备考】 ①本方方名，《证治要诀类方》引作"肾气丸"。②方中鹿角，《冯氏锦囊·杂症》作鹿茸。

04546 加减固本丸

【方源】《类证治裁》卷四。

【组成】 熟地 天冬各一两半 麦冬 炙草 茯苓各一两 人参 菖蒲 远志 朱砂各五钱

【用法】 蜜为丸服。

【主治】 年老神衰健忘。

04547 加减泻心汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 川连 黄芩 干姜 银花 查炭 白芍 木香汁

【主治】 噤口痢。左脉细数，右手脉弦，干呕，腹痛，里急后重，积下不爽。

04548 加减泻白散

【方源】《医学发明》卷四。

【组成】 桑白皮一两 地骨皮七钱 甘草 陈皮 青皮（去白） 五味子 人参（去芦）各半两 白茯苓三钱

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，入粳米十粒，同煎至一盏，去滓，食后大温服。

【主治】 阴气在下，阳气在上，咳嗽呕吐喘促。

04549 加减泻黄散

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【异名】 泻黄散、加减黄连散（《普济方》卷三八六）。

【组成】 黄连 茵陈各五分 黄柏 黄芩各四分 茯苓 栀子各三分 泽泻二分

【用法】 上㕮咀。都作一服，水一大盏，煎至六分，去滓，稍热服。后一服减半，待五日再服。

【功用】 退脾土，复肾水，降心火。

【主治】 小儿季夏身热痿黄。身体蒸热，胸膈烦满，皮肤如渍橘之黄，眼中白睛亦黄，筋骨痿弱，不能行立。

【方论选录】《内经》云：上位之主，其泻以苦。又云：脾苦湿，急食苦以燥之，故用黄连、茵陈之苦寒，除湿热为君；肾欲坚，急食苦以坚之，故以黄柏之苦辛寒强筋骨为臣；湿热成烦，以苦泻之，故以黄芩、栀子之苦寒止烦除满为佐；湿淫于内，以淡泄之，故以茯苓、泽泻之甘淡利小便，导湿热为使也。

04550 加减茯苓丸

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】 陈皮（盐水炒）二两 半夏二两（用白矾、牙皂、生姜各一两煎汤，浸七日） 白茯苓（去皮）一两五钱 风化消一两三钱 海桐皮（酒洗）一两 片子姜黄一两 木瓜一两 薄桂（去皮）五钱 甘草（炙）四钱 白芍（酒炒）二两 黄耆（盐水炒）二两

【用法】 上为细末，姜汁、竹沥为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心白汤送下。

【主治】 湿痰壅滞，经络不通，两臂作痛，不能梳洗，及治手足疼痛麻痹，行步艰难。

04551 加减胃苓汤

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】 苍术（米泔制）一钱半 陈皮（去白）一钱 厚朴（姜炒）八分 甘草（炙）三分 猪苓八分 泽泻一钱 白术（去芦）一钱 赤茯苓（去皮）一钱 神曲（炒）八分 山楂（去核）七分 砂仁（炒）七分 香附（姜汁炒）六分 槟榔八分 木瓜一钱 大腹皮六分 藿香 半夏 萝卜子 三棱 莪术 青皮各七分

【用法】 上锉一剂。水煎服。

【主治】 黄胖，饮食无味，四肢无力，行步倦怠，脉涩而濡。

04552 加减思食丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】 神曲二两（炒黄） 大麦芽二两（炒黄） 乌梅四两 干木瓜半两（切） 白茯苓（去皮） 拣甘草（细锉，炒）各二钱半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，细嚼，白汤送下，不拘时候。如渴时噙化一丸。

【功用】 生津液，进饮食。

【主治】 脾胃俱虚，不能消化水谷，胸膈痞闷，腹胁时胀，连年累月，食减嗜卧，口苦无味，虚羸少气；又治胸中有寒，饮食不下，反胃翻心，霍乱呕吐，及病后新虚不胜谷气，或因病气衰，食不复常。

04553 加减复脉汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【异名】 复脉汤。

【组成】 炙甘草六钱 干地黄六钱 生白芍六钱 麦冬五钱（不去心） 阿胶三钱 麻仁三钱

【用法】 水八杯，煮取三杯，分三次服。剧者，加甘草至一两，地黄、白芍八钱，麦冬七钱。日三，夜一服。

【主治】 温病邪在阳明久羁，或已下，或未下，身热面赤，口干舌燥，甚则齿黑唇裂，脉虚大，手足心热甚于手足背者；或温病已汗而不得汗，已下而热不退，六七日以外，脉尚躁盛者；或温病误用升散，脉结代，甚者脉两至者；或汗下后，口燥咽干，神倦欲眠，舌赤苔老者。

【方论选录】 在仲景当日，立炙甘草汤（即复脉汤）治伤于寒者之结代，自有取于参、桂、姜、枣，复脉中之阳。今治伤于温者之阳亢阴竭，不得再补其阳也。乃于该方去参、桂、姜、枣之补阳，加白芍收三阴之阴，故云加减复脉汤。此用古法而不拘于古方，医者之化裁也。

04554 加减洗心散

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 黄连3克 炒栀子6克 黄芩9克 酒大黄 桔梗各6克 知母9克 元参6克 赤芍9克 归尾6克 荆芥1.5克

【功用】 清心泻火，宣肺活瘀。

【主治】 心中郁火乘肺，上攻气轮，而为火疳，初起颗粒从白睛深层向外隆起，形圆如榴子，或椭圆如扁豆，色暗红或呈紫红，按之则痛。继则颗粒渐大，色赤而痛，羞明流泪，视物不清。若病变侵及风轮，就会引起青睛疾患，重者波及水轮，导致视物昏蒙，甚至失明。

【加减】 若颗粒增大，色赤而痛者，可加牡丹皮9克凉血活瘀退赤，加夏枯草9克清火散结止痛；若病变侵及风轮，引起风轮生翳者，可加秦皮3克，密蒙花6克以清肝退翳；若兼瞳神细小，神光昏暗，视物昏蒙者，可加青葙子3克，酒生地12克，滋阴清肝。青葙子且有扩大瞳神之功。

【方论选录】 方中黄连、炒栀子清心泻火；黄芩、知母清泻肺火，且有知母之润，以免火邪伤阴；酒大黄清泻大肠，实为脏病腑取，意在泻肺；桔梗宣肺散结，使邪火得以疏散；元参滋肾养阴，

以免火邪伤及神水；赤芍、归尾活瘀通络，引血下行；荆芥一则助桔梗宣肺散结，二则助赤芍、归尾活瘀通络。

【临证举例】 火疳 袁某，女，34岁。1971年3月5日初诊：左目赤痛3月余，曾在当地医院诊断为巩膜炎症，经用青链霉素肌肉注射，局部滴用可的松，药后症减，停药即发，自觉羞明、流泪、胀痛、视物不清。检查，左眼白睛内侧有一暗红色隆起，风轮内侧边缘有云翳一片。此为火疳合并青睛生翳。给加减洗心散加秦皮3克，密蒙花9克，增元参3克，服药15剂。复诊：白睛颗粒见小，风轮云翳减退，但仍胀痛，以前方加夏枯草9克，又服21剂，左目白睛内侧颗粒全消，色呈灰白，风轮边缘仍留有薄翳。嘱其停药，观察18个月未再复发。

04555 加减退赤散

【方源】《张皆春眼科证治》

【组成】 酒黄芩12克 秦皮3克 赤芍 牡丹皮 生地各9克 木通3克 炒栀子6克 青黛0.3克

【功用】 清心凉肝退翳，活血祛瘀通脉。

【主治】 赤膜下垂初起，非薄翳膜，从白睛上部发起，其上有赤丝牵绊，逐渐变厚增大，下侵风轮，甚至掩及瞳神，影响视力，障边赤脉尽处常起星翳数点，色黄或白，肥而厚，似凝脂之微。常伴有头痛目昏，酸涩难睁等症。此症初起也有单发赤脉者，自气轮下贯青睛，然后翳膜旁丝脉而生，互相连缀，形成一片赤膜，发展迅速，若不急治，赤膜遮蔽整个风轮，即成血翳包睛，难以见物，甚至导致失明。

【加减】 心火偏盛者，可加川黄连1.5克，肝火偏盛者，可加龙胆草3克。

【方论选录】 方中酒黄芩、秦皮、青黛清肝中郁火，秦皮且能退翳；生地、木通、炒栀子清心中邪热，木通且能通脉；赤药、牡丹皮活血凉血祛瘀以退目赤。

【临证举例】 赤膜下垂 赵某，女，48岁。左目沙涩不适5、6个月，时轻时重，近十几天来症状忽然加重，目珠涩痛，流泪羞明，视物不清。检查，左眼上睑睑内椒粒密集，疙瘩不平，赤膜从白睛上方垂下，已近瞳神边缘，赤脉密集，此为赤膜下垂。投以加减退赤散加川黄连1.5克。外用海螵蛸棒擦法，治疗睑内椒粒，服药6剂，摩擦1次。复诊：睑内椒粒见疏，赤膜稍退，又行擦法1次，服上药6剂。睑内椒粒大部已平，留有少量疤痕，眦帷部尚有少数椒粒，赤膜已去大半，已不羞明流泪，视物较前清晰，又服上方21剂而愈。

04556 加减秦艽汤

【方源】 方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】 黄耆一两 黄精五钱 鸡血藤一两 秦艽一两 乌梢蛇二钱 丹参一两 莲子心四钱 玉竹三钱 白人参二钱 白芍五钱 当归五钱 女贞子一两 熟地一两 川连二钱。

【功用】 养阴补血，凉血解毒。

【主治】 系统性红斑性狼疮。

【临证举例】 系统性红斑性狼疮 王某，女，45岁，患者自1971年12月份开始不断发烧，时高时低，一直不退，一个多月后在面部发现红斑，后在某医院检查，血中找到狼疮细胞，确诊为系统性红斑性狼疮。给强的松治疗稍为控制，但药不能减量，稍减症状即加重。目前虽然每日服用强的松30毫克，仍有低烧，自觉全身泛力，手足心发热，自汗，关节酸痛，头晕。检查：体温37.5℃，面部有典型蝶形红斑，肝脾（—），心脏(—)，白细胞计数4800/mm^3，血沉24mm/小时。脉象沉细无力，舌质淡，苔白腻。此为阴血虚亏，毒热未清。治当养阴补血，凉血解毒。投以加减秦艽汤。服药一个月后，（其间方中曾加减冬虫夏草、漏芦、枸杞子、山萸肉等药物）。关节疼痛渐止，低热渐退，自汗已止，唯自觉仍有头晕。在上方基础之上，又加用茺蔚子三钱，钩藤九钱，川芎三钱，服药七剂，头晕亦明显减轻。于1973年1月25日检查白细胞为6500/mm^3，血沉14mm/小时。又连续以上方为主加减服药三个月，强的松减量每日仅用5毫克，病情稳定，转门诊观察。患者于1974年已恢复半日工作。

04557 加减真武汤

【方源】《实用中医儿科手册》。

【组成】 熟附子1～1.5克 茯苓 红花 黄耆2～3克 白术 人参1.5～3克 赤芍 当归 川芎各1～2克 地锦草5～9克

【功用】 温阳利水，活血化瘀。

【主治】 新生儿硬肿症，属脾肾阳虚，气滞血瘀型。症见身冷皮硬，四肢少动，哭声低微，吮乳无力，尿少浮肿；严重者不哭、不吃、不动、体温不升，肢厥僵硬，肌肤紫红，甚则鼻窍出血，舌质紫红偏黯，舌苔白，指纹滞。

【宜忌】 对体重太低的（如2公斤以下）新生儿应酌情减量。

04558 加减逍遥散

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】 茯苓五钱 白芍（酒炒）五钱 甘草（生用）五钱 柴胡一钱 茵陈三钱 陈皮一钱 栀子三钱（炒）

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人青带。带下色青，甚则如绿豆汁，稠粘不断，其气腥臭。

04559 加减凉膈散

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】 薄荷叶 生栀子 元参 连翘（去心）生甘草 苦桔梗 麦冬（去心） 牛蒡子（炒，研）黄芩

【用法】 水煎服。

【主治】 疹已发而失音者。

04560 加减益气汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 黄耆（蜜炒） 人参 白术（去芦） 陈皮 当归各一钱 升麻 柴胡 木香各五分 香附 青皮（去瓤） 川芎各七分 桂枝 甘草各三分

【用法】 上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 气虚麻木。

04561 加减黄耆汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 黄耆 9 克 党参 1.5 克 炒白术 9 克 甘草 6 克 陈皮 1.5 克 蔓荆子 3 克

【功用】 补中益气，健脾除湿。

【主治】 胞虚如球。初起不痛不痒，不热不红，胞睑浮肿如悬球状，举睑无力，稍有下垂，按之绵软，没有硬结之处，有的可兼发痒，日久渐渐发红，或觉胞睑稍有胀痛，白睛淡赤，结膜稀薄。

【加减】 若兼风邪，胞睑微痒者，可加防风 3 克，以祛风除湿；若为虚热上浮，胞睑微红微痛者，可加茅根 15 克导湿热下行；若母病及子，白睛稍赤，而结膜稀薄者，当加骨皮 6 克，以除肺中之虚热。

【方论选录】 方中黄耆、党参、炒白术、甘草培补中气，炒白术且能行于肌肉之间以除其湿，陈皮理气以助湿行，蔓荆子轻飘上浮，辛散走表，引诸药直达病所，且能祛湿。

【临证举例】 目胞虚胀如球 管某，男，64 岁。双眼上胞浮肿 2 月余，不痛不痒，有重垂感，且兼四肢乏力，食少便溏。检查，双眼上胞虚浮如球，不红不硬，按之绵软，稍有下垂，脉虚弱，舌质淡，此为胞虚如球。给加减黄耆汤加车前子、茯苓各 9 克，增陈皮 3 克，服药 3 剂。复诊：胞肿稍轻，饮食增加，便溏已愈。又服上方 23 剂，诸症皆去。

04562 加减麻黄汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】 麻黄 桂枝 荆芥 防风 羌活 大力沙参 川芎 赤芍 桔梗 甘草 生姜

【主治】 麻疹初起，时令大寒。

04563 加减续命汤

【方源】《得效》卷十三。

【组成】 麻黄（去根） 人参 黄芩 白芍药 川芎 甘草 杏仁（去皮，麸炒） 防己 桂各二两 防风一两半 附子（炮，去皮脐，有热者用白附子）

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，大枣二枚，水煎服，不拘时候，温服取汗。随人虚实与所中轻重也。

【主治】 中风不省人事，渐觉半身不遂，口眼㖞斜，手足颤掉，语言蹇涩，肢体痿痹，神情昏乱，头目眩重，筋脉拘挛，不能屈伸，骨节烦疼，不得转侧；亦治脚气缓弱，久服之愈。有病风人常服，以防瘖哑。

【加减】 筋急拘挛，语迟，脉弦，加薏苡仁；筋急，加人参、黄芩、芍药以避中寒，服后稍轻，再加当归全愈；脚气痹弱，不能转侧，心神恍惚，加茯神、远志；骨节烦疼，有热者，去附子，倍加秦艽；烦躁，大便涩，去附子，倍芍药，加竹沥，脏寒大便自利，去黄芩，加白术、附子；骨肉冷痛者，加肉桂、附子；烦躁多惊者，加犀角；呕逆腹胀，加人参、半夏；自汗，去麻黄；语言蹇涩，手足颤掉，加石菖蒲、竹沥；大便秘，胸中不快，加枳壳、大黄；气塞不通，加沉香；有痰，加南星数片；发渴，加麦门冬、干葛、瓜蒌根；身疼，加秦艽；上气浮肿喘急，加防风、桑白皮，以上所加各一两；小儿慢惊，煎取药汁一盏，入生姜汁再煎一二沸，日三服，夜二服；夏间又有热者，减桂一半，春加麻黄一两，夏加黄芩一两，秋加当归四两，冬加附子半两；风虚，加川芎一两。一方加木香、缩砂、独活各一两，川乌炮三分亦效。牙关紧，用南星末半钱，龙脑一字，频擦牙上令热，即自开。

04564 加减续命汤

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】 麻黄 防风 细辛 桂心 附子 芍药 防己 党参 川芎 甘草

【用法】 水煎服。

【主治】 寒痹作痛。

【方论选录】 本方用麻黄、细辛、防风以发表风寒，桂心、附子以温里除寒，川芎、芍药以活血缓痛，防己利湿缓痛，党参、甘草以补气血扶正气，故为用于寒痹作痛之温寒定痛利痹之剂也。若用于慢性肌肉风湿之症，有发汗活血镇痛之作用。

04565 加减葳蕤汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 生葳蕤二钱至三钱 生葱白二枚至三枚 桔梗一钱至钱半 东白薇五分至一钱 淡豆豉三钱至四钱 苏薄荷一钱至钱半 炙草五分 红枣两枚

【功用】 滋阴发汗。

【主治】 阴虚之体，感冒风温，及冬温咳嗽，咽喉痰结者。

【方论选录】 何秀山按：方以生玉竹滋阴润燥为君；臣以葱、豉、薄、桔疏风散热；佐以白薇苦咸降泄；使以甘草、红枣甘润增液，以助玉竹之滋阴润燥。为阴虚体感冒风温，及冬温咳嗽，咽干痰结之良剂。

04566 加减葛根汤

【方源】《疫痧草》。

【组成】 葛根 牛子 香豉 桔梗 枳壳 薄荷 马勃 蝉衣 荆芥 防风 连翘 栀子 赤芍 甘草

【主治】 烂喉疫痧，邪尚在表，火不内炽，无汗痧隐，舌白脉郁，喉烂不甚者。

04567 加减痞气丸

【方源】《东垣试效方》卷二。

【组成】 黄芩（酒制）三分 黄连（酒制）三分 厚朴一钱 半夏半钱 益智三分 吴茱萸二分 红花半分 青皮二分 当归尾二分 茯苓二分 泽泻二分 神曲（炒）二分 广茂二分 昆布二分 橘皮（去白）二分 熟地黄二分 人参二分 附子二分 葛根二分 甘草（炙）二分 巴豆霜二分

【用法】 上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大。初服二丸，一日加一丸，二日加二丸，渐加至大便溏，再从二丸加服，食前煎淡甘草汤送下。

【主治】 脾积痞气。

04568 加减温胆汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 茯神（去皮木）一钱 半夏（姜汁制）一钱 陈皮一钱 枳实（麸炒）一钱 当归八分 酸枣仁（炒）八分 山栀（炒）一钱 竹茹八分 人参六分 白术（去芦）一钱 麦门冬 辰砂五分（为末，临服调入） 黄连（姜汁炒）一钱 竹沥半盏（临服加入） 甘草三分

【用法】 上锉。加生姜、大枣，乌梅，水煎，调辰砂末温服。

【主治】 痰躁（痰火作热烦躁）、痰话（痰火作热惊惕不安、错语失神），惊惕失志、神不守舍。

【备考】 方中麦冬用量原缺。

04569 加减磁石散

【方源】《古今医鉴》卷十二引昆山郑氏秘方。

【组成】 磁石 归尾 白芷 蛇床子 赤芍药 丹皮 发灰 荆芥穗 川芎 生地 陈皮 甘草。

【用法】 水煎，空心服。

【主治】 产后用力过度，子宫不收者。

【加减】 七日后，去白芷、赤芍、归梢，加熟地、当归、白芍、人参、黄耆。

04570 加减镇阴煎

【方源】《喉科种福》卷五。

【组成】 附片六钱 牛膝一钱半 黑铅五钱 洋参一钱 炙草一钱半 熟地三四钱。

【主治】 虚阳上浮而致喉中形如松子鱼鳞，喉内不阻塞者。

04571 加诃子四柱散

【方源】《百一》卷六。

【组成】 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 附子（炮，去皮脐）各一两 木香（纸包煨过） 诃子半两（湿纸包炮，取皮用）

【用法】 上为细末。每服二钱，加大枣一个，生姜二片，煎至六分服。

【主治】 脏腑虚怯，本气衰弱，脾胃不快，不进饮食，时加泄利，昼夜不息。

04572 加味大承气汤

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】 大黄 枳壳各二钱 芒消 甘草 陈皮 红花 当归 苏木 木通各一钱 厚朴五分

【用法】 上㕮咀。作二服。每服水盏半，煎五七沸，温服，不拘时候。

【功用】 通下瘀血。

【主治】 伤重在内，瘀血不散，腹胀，二便不通，心腹闷乱欲死者。

【宜忌】 服此药俟大小便通，方服损药。小儿孕妇勿服。

04573 加味小建中汤

【方源】《三因》卷九。

【组成】 桂心三分 甘草（炙）半两 白芍药一两半 远志（去心）半两

【用法】 上为锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎七分，去滓，入饴糖一块如皂荚子大，煎令溶，食前温服。

【主治】 心腹切痛不可忍，按轻却痛，按重则愈，皆虚寒证，服热药并针灸不愈者。

04574 加味小柴胡汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】 柴胡 人参 黄芩 半夏 甘草 黄连 升麻 芍药 元参

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 发斑，往来寒热，或潮热，口苦咽干而渴，耳聋胁痛，胸满心烦而呕，喘嗽等。

【加减】 口干，去半夏，加天花粉；咽痛，加桔梗、荆芥；若呕，加陈皮、干姜，去甘草；斑毒，加犀角、大青；胸中满闷不利，加瓜蒌、枳壳；痰火上喘，加知母、瓜蒌、桑皮；喘渴脉数大，加石膏；胸胁满痛，加枳壳、桔梗；心下痞硬，加枳实、黄连。

04575 加味小柴胡汤

【方源】《外科发挥》卷二。

【组成】 柴胡二钱五分 黄芩 人参 生地黄 甘草各一钱 半夏六分

【用法】 上作一剂。水一钟半，加生姜三片，煎八分，食远服。

【主治】 ①《外科发挥》：妇女热入血室，致寒热如疟，昼则安静，夜则发热妄语。②《内科摘要》：血虚大劳大怒，火动热入血室，或妇女经行，感冒发热，寒热如疟，夜间热甚或谵语。

04576 加味小柴胡汤

【方源】《金鉴》卷四十九。

【组成】 小柴胡汤加当归 生地 丹皮

【主治】 妇人中风，邪热未尽，适值经来，邪热乘虚入于血室，经水断而续来寒热，发作有时，如疟状者。

【方论选录】 血室肝主之，肝与胆为表里，胆因肝受邪而病寒热，故用小柴胡汤主之也。加当归、生地、丹皮者，所以清血分之热也。

04577 加味小续命汤

【方源】《医统》卷十二。

【组成】 小续命汤去生姜，加萆薢、川楝子、独活、干木瓜。

【用法】 水煎，碗底洗，放麝香少许，将药冲入和匀服。数十帖后，加五积散同煎服愈。

【主治】 鹤膝风，行履不得者。

04578 加味六君子汤

【方源】《疡医大全》卷三十六引《集验方》。

【组成】 人参 白术 白茯苓 半夏各一钱五分 天麻（火煨） 陈皮各一钱 僵蚕（酒炒，去丝） 当归各二钱 附子（滚汤泡去皮脐）六分 川芎八分 甘草三分

【用法】 加灯心四十根，生姜三片，水煎服。

【主治】 下颏脱落。

04579 加味六君子汤

【方源】《法律》卷三。

【组成】 人参 白术 茯苓 甘草 陈橘皮 半夏各一钱 竹沥半小盏 麦冬三钱

【用法】 用水二盏，加生姜三片，大枣二枚，煎六分，温服。

【主治】 四肢不举，属于脾土虚衰者。

【加减】 口渴，去半夏，加藏蕊、石膏；虚甚不热者，加附子。

04580 加味六君子汤

【方源】《济阳纲目》卷三十六。

【组成】 人参 白术 白茯苓 甘草 陈皮 半夏 干姜 白豆蔻 黄连（姜汁炒） 吴茱萸（制）

【用法】 上锉。加生姜，水煎服。

【主治】 翻胃，气虚有寒。

04581 加味玉屏风散

【方源】《裘中参西》上册。

【组成】 生箭耆一两 白术八钱 当归六钱 桂枝尖一钱半 防风一钱半 黄蜡三钱 生白矾一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 破伤后，预防中风，或已中风而瘛疭，或因伤后房事不戒以致中风。

【加减】 若已中风抽掣者，宜加全蜈蚣两条；若更因房事不戒以致中风抽风者，宜再加真鹿角胶三钱（另煎兑服）、独活一钱半；若脉象有热者，用此汤时，知母、天冬皆可酌加。

【方论选录】 此方原为预防中风之药，故用黄耆以固皮毛，白术以实肌肉，黄蜡、白矾以护膜原。犹恐破伤时微有感冒，故又用当归、防风、桂枝以活血散风。其防风、桂枝之分量特轻者，诚以此方原为预防中风而设，故不欲重用发汗之药以开腠理也。

04582 加味四君子汤

【方源】《三因》卷十五。

【异名】 加味四君汤（《景岳全书》卷五十三）。

【组成】 人参 茯苓 白术 甘草（炙） 黄耆 白扁豆（蒸）各等分

【用法】 上为末。每服二钱匕，汤点服。

【主治】 ①《三因》：五痔下血，面色萎黄，心忪，耳鸣，脚弱，气乏，口淡，食不知味。②《外科发挥》：中气虚，不能摄血，致便血不禁。

04583 加味四君子汤

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】 人参 漂白术 白云苓 当归身 杭白芍 炙甘草各一钱

【用法】 加生姜三片，大枣三枚。水煎，温服。

【主治】 小儿先痢而变泻者。

04584 加味四君子汤

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】 人参 漂白术 黑炮姜 西砂仁 白豆蔻各一钱 白云苓一钱五分 上青桂八分 公丁香三分 炙甘草五分

【用法】 加大枣三枚，水煎，半饥温服。以愈为度。

【主治】 小儿气虚、脾败胃伤，浑身浮肿，四肢冷，不渴，小便清长，大便滑泄，不思饮食。

04585 加味白头翁汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 白头翁三钱 秦皮二钱 黄连二钱 黄柏二钱 白芍二钱 黄芩三钱

【用法】 水八杯，煮取三杯，分三次服。

【主治】 内虚下陷，热利下重腹痛，脉左小右大者。

04586 加味地骨皮饮

【方源】《金鉴》卷四十四。

【组成】 生地 当归 白芍各二钱 川芎八分 牡丹皮 地骨皮各三钱 胡连一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 妇女经来内热。

04587 加味麦门冬汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 干寸冬（带心）五钱 野台参四钱 清半夏三钱 生山药四钱（以代粳米） 生杭芍三钱 丹参三钱 甘草二钱 生桃仁二钱（带皮尖，捣） 大枣三枚（擘开）

【主治】 妇女倒经。

04588 加味青州白丸

【方源】《普济方》卷九十四引《经验良方》。

【组成】 白附子 天南星 半夏 川姜各二（一）两 白僵蚕 天麻 干蝎各一（二）两 川乌头（去皮尖）半两

【用法】 上并生为细末，白面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，生姜汤送下，不拘时候。如瘫风，温酒送下；小儿惊风，薄荷汤吞下五丸。一方以前八味一料为末，加真料苏合香丸二两，姜汁糊丸，如梧桐子大，薄荷汤送下；小儿偶患惊风，生姜、薄荷汤磨下三五丸，灌之立定。

【功用】 常服去风痰，利壅膈、安神定志。

【主治】 中风，半身不遂，口眼㖞斜，痰涎闭塞、咳嗽咯血，胸膈满闷，小儿惊风，妇人血风；大人洗头风，并宜服之。

【宜忌】 孕妇忌服。

04589 加脑子收阳粉

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 麻黄根 藁本 白芷 牡蛎（烧） 龙骨各半两 米粉二两 脑子半钱

【用法】 上为细末，研匀。以沙帛包药于汗处扑傅之。汗止为度。

【主治】 一切虚汗、盗汗、自汗及漏风等诸证，汗泄不禁，服诸药不能止者。

04590 加减三五七散

【方源】《局方》卷一（绍兴续添方）。

【异名】 大三五七散（原书同卷）、三五七散《丹溪心法》卷四。

【组成】 山茱萸 干姜（炮） 茯苓（去皮）各三斤 附子（炮，去皮脐）三十五个 细辛一斤八两 防风（去芦）四斤

【用法】 上为细末。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】 八风五痹，瘫痪䠶曳，口眼㖞斜，眉角牵引，项背拘强，牙关紧急，心中愦闷，神色如醉，遍身发热，骨节烦痛，肌肉麻木，腰膝不仁，皮肤瞤动或如虫行；又治阳虚头痛，风寒入脑，目旋运转，有似舟船之上，耳内蝉鸣，或如风雨之声。应风寒湿痹，脚气缓弱等疾。

04591 加减大建中汤

【方源】《施圆端效方》引《局方》（见《医方类聚》卷一五三）。

【组成】 黄耆 芍药各四钱 人参 当归（切，焙） 甘草（炙）各二钱 桂六钱 半夏（洗七次）半两 熟附子一钱（老衰久冷，加至二钱半）。

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水二盏，加生姜二钱三字，大枣半枚，慢火同煎至一盏，去滓。食前温服，每日二三次。

【功用】 补中益气血。

【主治】 内虚极冷，手足厥逆，小腹挛痛，不堪劳苦，食减喘乏，梦寐精泄。

04592 加减小续命汤

【方源】《妇人良方》卷三。

【组成】 麻黄（去根节） 防己 人参（去芦） 黄芩 桂心 甘草 白芍药 川芎 杏仁各一两 附子（炮）半两 防风一两半

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水一盏半，加生姜七片，大枣两个，煎至七分，去滓，不拘时候服。取汗，随人虚实与所中轻重。有人脚弱，服此六七剂得愈。

【主治】 卒暴中风，不省人事，渐觉半身不遂，口眼㖞斜，手足战掉，语言謇涩，肢体麻痹，神情昏乱，头目眩重，痰涎并多，筋脉拘挛，不能屈伸，骨节烦疼，不得转侧，及诸风，脚气缓弱。久病风人，每遇天色阴晦，节候变更，宜预服之，以防喑哑。

【加减】 精神恍惚，加茯神、远志；骨节烦痛有热者，去附子，倍芍药；心烦多惊者，加犀角半两；骨节冷痛者，倍用桂、附；呕逆腹胀者，倍人参，加半夏一两；躁闷、大便涩者，去附子，倍芍药，入竹沥一合煎服；脏寒下利者，去防己、黄芩，倍附子一两，加白术一两；便利、产后失血并老人、小儿，用麻黄、桂心、甘草各二两；脚弱，加牛膝、石斛各一两；身疼痛，加秦艽一两；腰疼，加桃仁、杜仲各半两；失音，加杏仁一两；春，加麻黄一两；夏，加黄芩三分；秋，加当归四两；冬，加附子半两。

04593 加减小续命汤

【方源】 《外科理例·附方》。

【组成】 麻黄（去节） 人参 黄芩 芍药 杏仁（去皮尖，麸炒） 甘草 防己 肉桂各一两半 附子（炮，去皮脐）五钱

【用法】 每服一两，加生姜，水煎服。

【主治】 风湿流注，手臂结核如栗，延至颈项，状似瘰疬。

04594 加减木防己汤

【方源】 《温病条辨》卷二。

【组成】 防己六钱 桂枝三钱 石膏六钱 杏仁四钱 滑石四钱 白通草二钱 薏仁三钱

【用法】 水八杯，煮取三杯，分三次温服。见小效不即退者，加重服，日三夜一。

【主治】 暑湿痹证。

【加减】 风胜则引，引者加桂枝、桑叶；湿胜则肿，肿者加滑石、萆薢、苍术；寒胜则痛，痛者加防己、桂枝、姜黄、海桐皮；面赤口涎自出者，重加石膏、知母；绝无汗者，加羌活、苍术；汗多者，加黄耆、炙甘草；兼痰饮者，加半夏、厚朴、广皮。

04595 加减玉竹饮子

【方源】 《重订通俗伤寒论》。

【组成】 生玉竹 川贝母各二钱 西洋参 浙苓 紫菀各二钱 蜜炙橘红 桔梗 炙草各八分

【功用】 气液双补，兼理余痰。

【主治】 秋燥状暑，津气两伤，液郁为痰，经治痰少咳减者。

04596 加减四味饮子

【方源】 《圣惠》卷八十八。

【异名】 清凉饮子（《局方》卷十）、四顺散（《活人书》卷二十）、当归汤（《圣济总录》卷一四三）、四顺饮子（《鸡峰》卷十三）、四顺清凉饮子（《卫生总微》卷三）、四顺饮（《易简》）、清凉饮（《直指》卷二十三）、四顺清凉饮（《得效》卷八）、清凉散（《普济方》卷二九五）、四味大黄饮子（《普济方》卷四〇五）、四配清中饮（《疡医大全》卷三十三）。

【组成】 当归（孩子体骨多热多惊，则倍于分数用之） 川大黄（先蒸二炊饭久，薄切焙干，或孩子小便赤少，大便多热则倍用） 赤芍药（细锉炒，孩子四肢多热，多惊，大便多泻青黄色，直倍用之） 甘草（孩子热即生用，孩子寒多泻多即炙倍用）

【用法】 上件药，平常用即等分，各细锉和匀。每服一分，以水一中盏，煎至五分，去滓，温服半合，每日三四次。

【主治】 脏腑实热，或风热毒气与血脉壅滞，心烦口渴，睡卧不宁，惊痫抽掣，及目赤咽痛，口舌生疮，头面疮疖，皮肤疹毒，瘰疬结核，痔疮肿痛，大便秘结等。

①《局方》：小儿血脉壅实，腑脏生热，颊赤多渴，五心烦躁，睡卧不宁，四肢惊掣；及因乳哺不时，寒温失度，令儿血气不理，肠胃不调，或温壮连滞，欲成伏热，或壮热不歇，欲发惊痫；又治风热结核，头面疮疖，目赤咽痛，疮疹余毒，一切壅滞。②《圣济总录》：痔瘘。③《鸡峰》：大便不通，面目身热，口舌生疮，上焦冒闷，时欲得冷，三阳气壅，热并大肠，其脉洪大。④《直指》：诸痔热证，大便秘结。⑤《普济方》：风热毒气与血相搏，结成核，生于腋下颈上，遇风寒所折，不消，结成瘰疬，久而溃脓成疮。⑥《痘疹会通》：实热便闭腹胀。

04597 加减何首乌散

【方源】 《卫生宝鉴》卷九。

【组成】 何首乌 蔓荆子 石菖蒲 荆芥穗 甘菊花 枸杞子 威灵仙 苦参各半两

【用法】 上为末。每服三钱，蜜茶调下，不拘时候。

【主治】 紫白癜风，筋骨疼痛，四肢少力，眼断白人，鼻梁崩塌，皮肤疮疥及手足皲裂，睡卧不稳，步履艰辛。

【备考】 本方方名，《准绳·疡医》引作"何首乌散"。

04598 加减桑螵蛸散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 桑螵蛸三十枚（酥炙） 鹿茸一双（酥炙） 黄耆三两（蜜、酒炙） 麦门冬（去心）二两半 五味子半两 补骨脂（盐酒炒） 人参 厚杜仲（盐酒炒）各三两

【用法】 上为散。每服三钱，空心羊肾煎汤调服，并用红酒细嚼羊肾；或羊肾汤泛为丸，每服三钱，空心以酒送下。

【主治】 阳气虚弱，小便频数，或遗溺。

【备考】《医略六书》有附子，无桑螵蛸。

04599 加减黑逍遥散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 生地五两 柴胡五钱（盐水炒） 白芍一两半（醋炒） 丹皮一两半（炒黑） 山药三两（炒） 茯苓一两半（入乳拌蒸） 阿胶三两（蒲灰炒） 荆芥灰一两半 地榆三两（炒炭）

【用法】 上为散。每服三钱，童便调下。

【主治】 小便溺血，脉弦数濡涩者。

【方论选录】 热郁伤阴，冲任不摄，而血不能藏，故渗入膀胱溺出纯血焉。地黄滋阴壮水，生用最能止血；柴胡解热升清，盐炒引之达下；阿胶补阴益血，蒲灰炒珠更能散血定血；白芍敛阴益血，醇醋炒黄，引入肝脾敛血；茯苓渗利溺窍，乳拌不耗阴血；山药补益脾阴，炒黄兼能摄血；丹皮凉血止血；荆芥和血理血；地榆凉血涩血以止溺血也。为散童便调下，使小便清利，则热从溺泄而冲任完复，血室宁静，血无不归，岂有溺血之患乎。

04600 加味十全大补汤

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】 黄耆（蜜水炒） 人参（去芦） 白术（去油芦，炒） 白茯苓（去皮） 甘草（炙）各五分 当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 熟地黄各八分 大附子（面裹煨，去皮脐） 沉香 木香各三分 乌药 牛膝（去芦，酒炒） 杜仲（去皮，酒炒） 木瓜 防风（去芦） 羌活 独活 薏苡仁各五分 肉桂三分

【用法】 上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 左瘫右痪，年久不愈。

04601 加味三才封髓丹

【方源】 方出《柳选四家医案》，名见《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 天冬 生地 党参 黄柏 炙草 砂仁 龙胆草 山栀 柴胡

【主治】 肝经湿热下流阴器，疏泄失常，封藏不固，以致遗精、早泄，胫酸，耳鸣，口苦，心烦，尿黄，便干，苔黄，脉浮大弦数者。

04602 加味三仁薏豉汤

【方源】 方出《蒲辅周医疗经验》，名见《千家妙方》卷上。

【组成】 鲜藿香二钱 杏仁二钱 苡仁四钱 白蔻一钱 厚朴二钱 法半夏二钱 白蒺藜三钱 菊花二钱 僵蚕二钱 豆豉三钱 葱白（后下）三寸 六一散（包煎）五钱 竹叶一钱半

【功用】 祛风利湿，调和三焦。

【主治】 风暑湿合病（乙型脑炎）。

【临证举例】 乙型脑炎 陈某某，女，4岁。1964年8月15日诊。发热八天，住院五天，诊为乙脑。头痛剧烈，烦躁，昏睡，汗出时体温即降，小便少，大便干，舌淡苔黄腻，脉浮滑数。由风暑湿合病，治宜祛风利湿，调和三焦。投以上方。8月17日复诊，周身有微汗，体温正常，头痛已除，大便尚干，前方去葱白、豆豉，加神曲一钱半、槟榔一钱半，调治而愈。

04603 加味五子明目丸

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 楮实子二两 菟丝子一两半 车前子一两 五味子一两 枸杞子一两半 决明子一两 大熟地一两 知母八钱 黄柏五钱 菊花六钱 甘草一钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。一日两次，每服三钱。

【主治】 神水将枯（结膜干燥）症。两眼黑白尚分，气轮有皱襞，不红不疼；风轮灰白弥漫；惟水轮略带凹陷；眼泪不能润其表面，甚者无眵泪。

04604 加味化瘀消坚汤

【方源】 方出《朱仁康临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】 生地30克 丹皮9克 赤芍9克 公英15克 蚤休9克 夏枯草9克 昆布9克 海藻9克 炒三棱9克 炒莪术9克

【功用】 凉血清热，消痰软坚。

【主治】 囊肿性痤疮。脾胃积热，重蒸子肺，日

久痰瘀积聚成疮。

【临证举例】 囊肿性痤疮刘某某，男，21岁。1973年1月20日。三年来脸面经常出现痤疮，开始起黑头粉刺，面部油多发亮，并起脓疱及囊肿，痒疼相兼，挤出脓后形成疤痕疙瘩，时轻时重，缠绵不断。脉弦滑，舌质红绛。诊为囊肿性痤疮。治以凉血清热，消痰软坚。投以上方二十一剂，病情逐渐趋轻，囊肿较平，不起脓疱。后改成丸剂调服。

04605 加味六味地黄丸

【方源】《金鉴》卷五十五。

【组成】 熟地黄一两 山萸肉一两 怀山药（炒） 茯苓各八钱 泽泻 牡丹皮各五钱 鹿茸（炙）三钱 五加皮五钱 麝香五分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。大儿每服二钱，小儿一钱五分，盐汤送下。

【主治】 小儿五迟证，多因父母气血虚弱，先天有亏，致儿生下筋骨软弱，行步艰难，齿不速长，坐不能稳，皆肾气不足之故。

04606 加味甘麦大枣汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 炙甘草 麦门冬各9克 人参3克 小麦30克 大枣5枚 白芍9克

【主治】 气血不足，阴阳失调，眼睛赤痛，发止不定，发时白睛淡红，疼痛不重，寒热交作，或有头痛，心烦意乱，脉细数无力，舌淡苔白，舌心粉红；止时不药而愈，状若常人，反复发作，一年数次。

【方论选录】 方中人参、小麦、大枣、炙甘草甘温补中以助生化之源，使气血充裕，阴平阳秘，寒热无由生；白芍既有养血之功，合甘草又有敛阴和营，缓急止痛之能；更兼麦门冬清心润肺，白睛赤痛自然消除。

【临证举例】 白睛赤痛如祟 赵某某，女，35岁。1971年3月12日初诊。二目赤痛3月余，时发时止，越发越频，虽痛不重，但心中烦乱，时寒时热，其状如祟。患者消瘦面黄，疲倦少神，白睛淡赤，脉细无力。服加味甘麦大枣汤5剂，发少痛轻，继服15剂而愈。

04607 加味甘草泻心汤

【方源】 方出《赵锡武医疗经验》，名见《古今名方》卷二。

【组成】 生甘草30克 党参18克 生姜6克 干姜3克 半夏12克 黄连6克 黄芩9克 大枣7枚

【用法】 水煎服。另配生甘草12克，苦参12克，四剂煎水，外洗阴部。

【主治】 狐惑病（口、眼、生殖器综合症）。

04608 加味龙胆泻肝汤

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】 柴胡一钱 黄芩七分 生甘草 人参 黄连 天门冬 胆草 山栀各五分 五味子七枚 麦冬 知母各五分

【用法】 水煎服。

【主治】 胆痹口苦。

【宜忌】 忌辛热物。

04609 加味四物二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷三十一。

【组成】 当归 川芎 生地（酒炒） 白芍药 陈皮 半夏 茯苓 甘草 知母 黄柏 枳壳 黄芩

【用法】 上锉。加生姜三片，水煎服。

【功用】 降心火，补真阴。

【主治】 阴虚，自小腹下火起，冲上而喘者。

04610 加味当归建中汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】 当归二钱 蜜煮钱半 桂枝 炙草 生姜各钱半 白芍三钱 胶饴两半 人参

【用法】 生姜、大枣为引。

【主治】 内生之风，肝虚掉眩，血海干者。

【备考】 方中人参用量原缺。

04611 加味当归活血汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 当归八钱 川芎四钱 赤芍三钱 桃仁四钱 红花三钱 防风三钱 菊花四钱 荒蔚子四钱 薄荷二钱 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 抱轮红症。两眼气轮赤丝纵横，风轮周围充血，酸疼流泪，视物昏花。

04612 加味补中益气汤

【方源】《济阳纲目》卷八十二。

【组成】 黄耆（蜜炙） 人参 白术 陈皮 当归各一钱 升麻 柴胡 木香各五分 香附 青皮（去瓤） 川芎各八分 甘草三分 桂枝少许

【用法】 上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 浑身麻，属气虚者。

04613 加味补中益气汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 人参三钱 当归身二钱 柴胡二钱 黄耆八钱 升麻一钱半 熟地五钱 玉竹三钱 枸杞

四钱　白术二钱　云苓三钱　石斛三钱　甘草一钱　大枣三个　生姜一片

【用法】 水煎服。

【主治】 高风障症。二目不赤，不疼，不肿，常觉眩晕，每至日落星出，而无所见。

04614　加味补养心肾方

【方源】 方出《刘惠民医案》，名见《千家妙方》卷上。

【组成】 酸枣仁（生熟各半，捣）24克　炒柏子仁9克　茯神9克　钩藤9克　生龙齿9克　天竺黄9克　菟丝子12克　胆南星3克　白术9克　白豆蔻6克　橘络9克　人参6克　淡豆豉9克　生鸡内金12克　山栀4.5克　灯心1.5克

【用法】 水煎两遍，混合后分两次温服。服药三天，停服一日。

【功用】 补养心肾，清热豁痰，健脾益气。

【主治】 心肾不足，痰热内阻所致的夜游症。

04615　加味补益养血汤

【方源】 方出《刘惠民医案》，名见《千家妙方》卷上。

【组成】 生黄耆15克　党参15克　山药31克　白术15克　茯苓12克　砂仁12克　远志12克　柏子仁15克　炒酸枣仁25克　狗脊（去毛）15克　枸杞子12克　菟丝子25克　当归15克　丹参18克

【用法】 水煎两次，混合，分两次温服。

【功用】 健脾益气，养血和血，补肾。

【主治】 白细胞减少证。

【临证举例】 白细胞减少症　尹某，女，42岁。于1975年1月28日初诊。患者一年前感到头昏，疲惫，两腿沉重，乏力、腰酸，食欲不振，半年前发现白血球减少，为3000/mm³，最低时仅为1000/mm³，服用各种升白细胞药无效，伴肢体麻木、失眠多梦，面色暗黄乏泽，舌淡红，苔薄白，脉沉细无力，投以加味补益养血汤，服药10余剂后，症状逐渐减轻，白细胞已升至6500～7500/mm³。稳定在5000/mm³以上，恢复工作。

04616　加味附子理中汤

【方源】 《眼科临症笔记》。

【组成】 人参二钱　干姜一钱　白术一钱　细辛五分　甘草一钱　葱白一寸　大枣一枚

【用法】 水煎服。另用牙皂、镜砂、明矾各等分，为末，随前药水冲服。

【主治】 瞑目症。二目不疼不肿，紧闭难睁，头晕神昏。

04617　加味苓桂术甘汤

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 于术三钱　桂枝尖二钱　茯苓片二钱　甘草一钱　干姜三钱　人参三钱　乌附子二钱　威灵仙一钱五分

【用法】 上药煎服数剂后，小便微利，其脉沉迟如故者，用此汤送服生硫黄末四五厘。若不觉温暖，体验渐渐加多，以服后移时觉温暖为度。

【主治】 水肿，小便不利，其脉沉迟无力，自觉寒凉者。

【方论选录】 方用苓桂术甘汤，以助上焦之阳；用甘草协同人参、干姜以助中焦之阳；又用人参、附子（参附汤）协同桂枝更能助下焦之阳。三焦阳气宣通，水饮亦随之宣通，而不复停滞为患也。至人参与灵仙并用，治气虚小便不利甚效，而灵仙通利之性，又能运化术、草之补力，俾胀满者服之，毫无滞碍，故加之以为佐使也。

04618　加味明目流气饮

【方源】 《便览》卷一。

【组成】 大黄（炮）　牛蒡子（炒）　川芎　菊花　白蒺藜（炒）　细辛　防风　元参　山栀　黄芩　甘草（炙）　蔓荆子　荆芥　木贼各五分　草决明七分半　苍术一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 肝经不足，内受风热，上攻眼目，视物不明，常见黑花，当风多泪，瘾涩难开，或生障翳，妇人血风时行，暴赤，一切眼疾并皆治之。

【加减】 如久服，去大黄，加桑白皮、知母、黄柏。

04619　加味育阴润燥饮

【方源】 《千家妙方》卷下引王渭川方。

【组成】 鲜生地60克　旱莲草24克　女贞子24克　红藤24克　蒲公英24克　板蓝根24克　黄甘菊9克　川贝9克　大青叶9克　枸杞12克　石斛12克　琥珀末6克

【用法】 水煎服，每日一剂。

【功用】 育阴、清火、润燥。

【主治】 暑湿伏火，伤阴化燥而致舌体干裂。

【临证举例】 舌体干裂症　徐某，女，60岁。患者中气素虚，常见齿龈干燥出血。因夏季受暑，至秋燥来临，即口苦咽干，舌面干裂，吞咽困难，神志不宁，左脉虚涩，右脉弦数，舌质深红，光亮无苔。证系暑湿伏火，伤阴化燥。治以育阴、清火、润燥。投以加味育阴润燥饮，同时配用青黛6克、黄柏6克，两牛黄0.3克，琥珀末1.5克，共

为细粉，香油调和，涂搽舌体。服药4剂后，舌质转淡，裂痕渐浅，能进稀粥。仍觉咽干喉痛，原方加减，又进4剂而愈。

04620 加味参苓白术散

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】人参二钱 白术一钱五分（炒焦） 茯苓一钱五分 扁豆二钱（炒） 薏仁一钱五分 桔梗一钱 砂仁七分（炒） 炮姜一钱 肉豆蔻一钱 炙甘草五分

【用法】上为细末。每服一钱五分，香粳米汤调服，一日二次。

【主治】噤口痢，呕恶不饥，积少痛缓，形衰脉弦，舌白不渴。

【方论选录】参苓白术散兼治脾胃，而以胃为主，其功但止土虚无邪之泄泻而已。此方则通宣三焦，提上焦，涩下焦，而以醒中焦为要者也。方中以四君两补脾胃；加扁豆、薏仁以补肺胃之体；炮姜以补脾肾之用，桔梗从上焦开提清气；砂仁、肉蔻从下焦固涩浊气，二物皆芳香，能涩滑脱，而又能通下焦之郁滞，兼醒脾胃；引以粳米芳香悦土，以胃所喜为补也。

04621 加味种子四物汤

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】熟地五钱 当归三钱 白术钱半 川芎一钱 白芍钱半（炒） 茯苓钱半 阿胶三钱（面炒） 香附二钱（酒炒） 续断三钱（酒炒） 炙草五分

【用法】水煎去滓，冲炒黄砂仁末五分，温服。

【主治】冲任两虚，不孕，脉虚涩者。

【方论选录】冲任两虚，不能交媾水火，是胞中血少气涩，故无以孕精而娠焉。熟地补阴滋血，当归养血荣经，川芎活冲脉之血，白芍敛任脉之阴，白术健脾生血，阿胶补血益阴，香附调气解郁，炙草缓中益胃，茯苓渗湿以清子室，续断续筋以雄经脉也。水煎温服，稍佐砂仁调胃醒脾，使脾胃调和，则血室充足，而气无滞涩之患，何有冲任不调，媾精不孕哉。

04622 加味养血生发汤

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】生地五钱 熟地五钱 鸡血藤五钱 首乌藤五钱 生黄耆一两 川芎三钱 白芍五钱 明天麻二钱 冬虫夏草二钱 旱莲草三钱 桑椹五钱 木瓜二钱

【功用】滋补肝肾，养血生发。

【主治】肝肾不足，血虚脱发。

04623 加味养血凉血汤

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】全当归五钱 赤白芍各三钱 干生地五钱 川芎钱半 黄柏五钱 鸡血藤四钱 丝瓜络二钱 橘络二钱 木瓜二钱 川牛膝三钱

【功用】养血凉血，活血化斑。

【主治】血虚有热，热伤血络所引起的紫癜性色素性苔癣样皮炎。

04624 加味理中地黄汤

【方源】《福幼篇》。

【组成】熟地五钱 当归三钱 萸肉一钱 枸杞二钱 白术三钱 炮姜一钱 党参二钱 炙草一钱 枣仁二钱（炒，研） 肉桂一钱 破故纸二钱 炙耆二钱

【用法】生姜三片、红枣三枚、胡桃二个为引，用灶心土二两煮水煎药，取浓汁一茶杯，另加附子五分或二三分，煎水掺入，量儿大小，分数次灌之。

【功用】助气补血，却病回阳。

【主治】小儿精神已亏，气血大坏，形状狼狈，瘦弱至极者。

【加减】咳嗽不止者，加粟壳一钱，金樱子二钱；如大热不退，加白芍一钱；泄泻不止，加丁香五分，只服一剂，即去附子，只用丁香七粒，隔二三日，再用附子一二分。

04625 加味黄耆五物汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生箭耆一两 于术五钱 当归五钱 桂枝尖三钱 秦艽三钱 广陈皮三钱 生杭芍五钱 生姜五片

【主治】历节风证，周身关节皆痛，或但四肢作疼，足不能行步，手不能持物。

【加减】热者，加知母；凉者，加附子；脉滑有痰者，加半夏。

【方论选录】《金匮》黄耆五物汤治风痹；加白术健脾补气，即以逐痹；当归以生其血，血活自能散风；秦艽为散风之润药，性甚和平，祛风而不伤血；陈皮为黄耆之佐使，引肌肉经络之风达于皮肤而外出。

04626 加味清肝开窍汤

【方源】《千家妙方》卷上引关幼波方。

【组成】生耆15克 当归10克 赤芍15克 白芍15克 何首乌藤30克 茵陈15克 藿香10

克 佩兰10克 杏仁10克 橘红10克 郁金10克 远志10克 菖蒲10克 川连4.5克 琥珀粉1.2克（冲服） 羚羊粉0.6克（冲服）

【用法】 水煎服，每日一剂。

【功用】 调补气血，芳化痰湿，清肝开窍。

【主治】 气血两虚，肝胆余热未清，湿痰蒙窍引起的慢性肝昏迷。

【临证举例】 慢性肝昏迷刘某，男，37岁。于1975年5月30日初诊。患者因肝硬化于1972年行脾切除术，术后逐渐失眠，甚至通宵不寐，渐至夜间发作性舌謇，上唇麻木，两臂不能抬高，有时出现无意识动作，说胡话，白天头晕头痛，记忆力极差，缺乏思考能力，急躁易怒，鼻衄，视物不清，大便干硬难解，曾经中西医多方治疗未效。来诊时，血液检查：谷丙转氨酶180单位，血氨0.18毫克%，舌苔黄，脉沉弦，投以加味清肝开窍汤，加枣仁15克，百合12克，合欢皮12克，服药百剂左右，睡眠日渐好转，头痛头晕，急躁易怒等症状基本消失，视物清楚，记忆力和思考力有所恢复，舌苔薄白，脉转沉滑、谷丙转氨酶正常、血氨降至0.1毫克%，追访半年未再发作。

04627 加味葛根芩连汤

【方源】 《赵锡武医疗经验》。

【组成】 生石膏18克 葛根12克 甘草9克 金银花12克 杭白芍12克 川黄连4.5克 黄芩9克 全蝎3克 蜈蚣3克

【用法】 加水600毫升，先煮石膏15分钟，再入其余诸药煎至120～150毫升，分3次温服。

【主治】 小儿麻痹症，急性期。

04628 加味葵子茯苓散

【方源】 《张氏医通》卷十四。

【异名】 加味葵子茯苓汤（《医略六书》卷二十五）、加味葵子散（《类证治裁》卷七）。

【组成】 葵子三两 茯苓 滑石各一两 芒消半两 甘草（生） 肉桂各二钱半

【用法】 上为散。饮服方寸匕，一日三次。

【主治】 石淋，水道涩痛。

04629 加味疏风祛疹汤

【方源】 方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】 赤白芍各四钱 当归三钱 茜草根三钱 白茅根一两 蝉衣二钱 浮萍一钱 白鲜皮一两 刺蒺藜五钱 金银花五钱 生枳壳三钱 生甘草三钱

【功用】 凉血疏风，清热解毒。

【主治】 血分有热，外受风毒引起的玫瑰糠疹。

04630 加味疏风凉血饮

【方源】 方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】 生地四钱 丹皮三钱 紫草四钱 黄芩四钱 防风三钱 秦艽三钱 白鲜皮五钱 白术四钱 云苓四钱

【功用】 健脾祛湿，疏风凉血。

【主治】 脾肺湿化热，发于肌肤，形成多型性红斑。

04631 加减龙胆泻肝汤

【方源】 《外科发挥》。

【异名】 加味龙胆汤（《外科枢要》卷四）、龙胆泻肝汤（《校注妇人良方》卷二十四）。

【组成】 龙胆草（酒拌炒黄） 泽泻各一钱 车前子（炒） 木通 生地黄（细拌） 当归尾（酒拌） 山栀（炒） 黄芩 甘草各五分

【用法】 上作一剂。水二钟，煎八分，食前服。

【主治】 肝经湿热，阴部生疮，阴囊肿痛，小便赤涩，便毒悬痈，妇人阴挺。

①《外科发挥》：肝经湿热，玉茎患疮，或便毒悬痈肿痛，小便赤涩，或溃烂不愈；又治阴囊肿痛，或溃烂作痛，小便涩滞，或睾丸悬挂。②《校注妇人良方》肝经湿热，两拗肿痛，或小便涩滞。③《女科撮要》：肝经湿热，下部肿焮作痛，小便涩滞，阴挺如菌，或出物如虫。④《医统》：气郁热腋气，及腋下多汗。

【方论选录】 《济阴纲目》：泻肝而兼导赤，泻其子也；泻肝而用利水，肝主疏泄也。龙胆、山栀，假以降火；当归、生地，以滋肝阴；生甘草缓肝之急；炒黄芩助肝之气。

【备考】 本方方名，《景岳全书》引作“加味龙胆泻肝汤。”

04632 加减龙胆泻肝汤

【方源】 《赵炳南临床经验集》。

【组成】 龙胆草三钱 青连翘五钱 干生地五钱 车前子四钱 淡黄芩三钱 生栀子三钱 粉丹皮三钱 泽泻二钱 苦木通三钱 生甘草三钱

【功用】 泄肝胆火，清利湿热。

【主治】 急性湿疹，带状疱疹（缠腰火丹），亚急性湿疹，传染性湿疹样皮炎，接触性皮炎，脂溢皮炎等。

【加减】 若热盛，伴有高烧香，加生玳瑁二至四钱，或加羚羊、犀角一至二分，或用生石膏二至三两煎水煮药；皮肤潮红明显者，加大黄一至二钱；

痒明显者，加白鲜皮一两；若内有湿滞、食滞者，加枳壳二钱。

【方论选录】 方中胆草、黄芩泻肝胆火；连翘、栀子清热解毒；生地、丹皮凉血解毒；泽泻、木通、车前子、生甘草清热通利除湿。

04633 加减归芍地黄汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 生地五钱 萸肉三钱 山药三钱（炒） 茯苓一钱半 当归三钱 丹皮一钱半 白芍一钱半（炒） 麦冬三钱（去心） 五味一钱半

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 交接出血，脉濡数者。

【方论选录】 阴虚阳浮，经气不固，而经血易动，故交接出血。生地滋阴壮水，萸肉秘气涩精，山药补脾阴，茯苓和脾气，当归养血以资血室，白芍敛阴以固冲任，丹皮平相火以凉血，麦冬润心肺以交肾，五味敛津液以固经脉也。水煎温服，使阴平阳秘，则经气完固，而经血无妄泄之患，何致交接出血而成阴蚀哉。

04634 加减当归补血汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】 当归一两（酒洗） 黄耆一两（生用） 三七根末二钱 桑叶十四片

【用法】 水煎服。

【主治】 年老血崩。

【宜忌】 宜断色欲。

【加减】 孀妇年老血崩，系气冲血室，加杭芍炭二钱，贯众炭三钱。

【方论选录】 补血汤乃气血两补之冲剂，三七根为止血之圣药，加桑叶，既可滋肾之阴，又有收敛之妙。

【备考】 老妇阴精既亏，用此方以止暂时之漏，实有奇功，而不可责其永远之绩者，以补精之味尚少也。服此四剂后，再增入白术五钱，熟地一两，山药四钱，麦冬三钱，北五味一钱，服百剂，则崩漏之根可除。

04635 加减导赤泻白散

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 生地9克 木通 瞿麦各6克 桑皮9克 桔梗6克 酒黄芩 赤芍各9克 归尾6克 蝉蜕3克

【主治】 心肺火盛，胬肉攀睛。胬肉肥厚，色赤，头嫩白而尖厚，雍塞刺痛，结眵粘稠者。

【加减】 若胬肉黄厚者，加薏苡仁9克以除脾经湿热；若胬肉赤紫者，加郁金6克以解心中郁火。

【方论选录】 方中生地、木通、瞿麦清心泻火，木通且能导滞下行兼通血脉，瞿麦又能利小肠，导湿热更兼破瘀退翳；桑皮泻肺利水，能除白睛之赤肿；桔梗宣肺散结，能祛肺中之滞气；酒黄芩除上、中二焦之湿热；赤芍活血凉血以退赤；归尾活血通络以引血下行；蝉蜕轻浮宣散以退翳。

04636 加减补阴益气汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 生地五钱 人参一钱半 黄耆三钱（蜜炙） 柴胡五分（盐醋炒黑） 白芍一钱半（醋炒） 升麻三分（盐醋炒） 阿胶三钱（蒲黄灰炒） 山药三钱（炒） 血余三钱（炒灰） 赤石脂三钱（醋炒）

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 交接出血，脉软数者。

【方论选录】 阴不藏精，虚阳不能固密，而经气漏泄，经血易动，故交接出血，生地滋阴壮水以资血室，人参补气扶元以固虚阳，山药补脾益阴，黄耆补中固气，阿胶补阴益血以填任脉，白芍敛血益阴以固冲脉，升麻升阳明清气，柴胡升少阳清气，血余灰去瘀生新，最能止血，赤石脂涩血镇怯善固经气。水煎温服，使气阴内充，则虚阳自敛，而经气完固，经血自无漏泄之虞。

04637 加减金匮肾气丸

【方源】《明医指掌》卷六。

【异名】 一济生肾气丸（《内科摘要》卷下）。

【组成】 白茯苓三两 附子五钱 川牛膝 桂 泽泻 车前子 山茱萸 山药 牡丹皮各一两 熟地黄四两（掐碎，酒拌杵膏）

【用法】 上为末，和地黄、炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心米饮送下。

【主治】 脾肾虚，腰重脚肿，小便不利；或肚腹肿胀，四肢浮肿；或喘急痰盛，已成虚症。

04638 加减金锁固精汤

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】 紫蔻二钱 金樱子三钱 海金砂三钱 焦术四钱 龙骨三钱 牡蛎三钱 罂粟壳四钱 五倍子二钱 竹叶一钱

【用法】 水煎，温服。

【主治】 遗精，脉象微细而数。

【方论选录】 此方只用金锁固精汤中龙骨、牡蛎二味，其余皆系固肾涩精之品，用紫蔻、焦术健脾助胃，用竹叶下行，稍缓其收敛之力，服之而精固矣。

04639 加减散花去癥汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 生白芍一两 当归 麦冬各五钱 焦栀 元参 辰茯神 杜牛膝各二钱 川柴胡二钱 生甘草 白芥子 鲜石菖蒲各一钱 当门子五厘（冲）

【主治】 情欲狂。妇女思慕男子不得，忽然发狂，见男子抱住不放，以为情人，不识羞耻，甚至裸体奔走，脉必弦出寸口，此名花癫，俗称发花呆。

04640 加减普济消毒饮

【方源】《重订广温热论》卷二。

【组成】 青连翘钱半 苏薄荷一钱 炒牛蒡一钱半 马勃四分 荆芥穗一钱 白僵蚕一钱 大青叶一钱半 玄参一钱 新银花一钱半 苦桔梗一钱 生甘草八分

【用法】 用活水芦根二两煎汤代水，煎服。

【主治】 温毒痄腮及发颐。初起咽痛喉肿，耳前后肿，颊肿，面正赤；或喉不痛，但外肿；甚则耳聋，口噤难开。

04641 加减代赭旋覆花汤

【方源】《镜京直指》。

【组成】 旋覆花三钱（包） 代赭石四钱 浮海石三钱 姜半夏二钱 白茯苓三钱 炒苏子一钱五 炙甘草五分 炙白前二钱 化橘红一钱 老姜三片（去皮）

【主治】 伏饮内停，年有喘吼者。

04642 加减定血黑逍遥散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 生地八两（捣汁） 柴胡五两（鳖血炒） 白芍一两半（炒） 当归三两 白术一两半 山栀二两（炒） 茯神一两半（去木） 丹皮一两半 麦冬二两（去心）

【用法】 上为散。水煎五钱，去滓，冲地黄汁服。

【主治】 孕妇吐血唾血，脉弦虚数者。

【方论选录】 妊娠郁怒伤肝，肝血虚而肝火旺，以致虚阳上逆，营血妄行，故吐血呕血，潮热不止。生地滋阴壮水，以凉血室，捣汁力能散血生血；柴胡解郁升阳以疏肝胆，鳖血炒以引入血分；白芍敛阴收血溢；当归养血归经脉；白术健脾生血；茯神定志安神；山栀清三焦之火以定血；丹皮平相火之逆以止血；麦冬清心润肺以滋水之上源也。为散水煎，使肝血内充，则肝火自降，而郁解怒伸，血无妄行之患。

04643 加味益气养血救脱汤

【方源】 方出《刘惠民医案》，名见《千家妙方》卷上。

【组成】 酸枣仁（炒）36 克 制何首乌 9 克 玉竹 9 克 熟附子 12 克 生菟丝子 24 克 炙黄耆 12 克 炒白术 15 克 归身 9 克 丹参 12 克 柏子仁 12 克 砂仁 9 克 益智仁 9 克 覆盆子 12 克 鸡血藤 9 克 竹茹 9 克 红花 6 克

【用法】 水煎两次，得药液约 250 毫升。分两次温服。另用人参 2 克，琥珀 0.9 克，共为极细末，分两次冲服。服药三付，休药一天，有效再服。

【功用】 养气养血，温肾助阳。

【主治】 营养不良性干瘦病，属脾气久亏，气血虚极，元阳欲脱者。

04644 对姜丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 半夏 天南星各半斤 干姜一斤

【用法】 上为细末，生姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】 膈有寒痰，呕逆眩运。

04645 驭中汤

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】 黄耆 人参 白术各五钱 茯苓 当归各三钱 炙甘草一钱 陈皮一钱 薏苡一两 肉桂一钱 生姜三钱 大枣十二枚

【用法】 作一服。

【主治】 产后浮肿。

04646 圣力散

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】 草乌头 白及 白蔹 木鳖子（去皮） 地龙 金毛狗脊各二钱半 麝香三钱 黄丹少许

【用法】 上为细末。用针针到生肉痛者用药。黄水出为度。

【主治】 诸疔疮肿。

04647 圣功丹

【方源】《玉钥续编》。

【组成】 青果炭一钱 凤凰衣一钱 儿茶一钱 川贝母（去心）一钱 黄柏八分 薄荷叶八分 冰片五厘

【用法】 上药各为细末，绢罗筛过，再为和匀，加入冰片同研收固，勿使泄气。每吹少许。

【主治】 咽痛白腐糜烂，口舌生疮，口糜，唇疮，舌烂，舌根白疮。

【加减】 腐烂重者，加人中白二钱。

04648 圣功散

【方源】《传信适用方》卷三。

【异名】 圣效方（《医统》卷七十八）。

【组成】 南木香 槟榔各等分

【用法】 上为细末。浓米饮调二钱许，黎明空心，先熟嚼炙猪肉之属，只咽汁，吐去滓，便服药。辰巳间虫下，其疾永除。

【主治】 寸白虫，不拘久近。

04649 圣术煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 白术（用冬术味甘佳者，炒）五六七八钱或一二两 干姜（炒） 肉桂各一二钱 陈皮（酌用或不用）

【用法】 水一钟半，煎七分，温热服。若痛胀觉甚者，即以此煎送神香散。

【主治】 饮食偶伤，或吐或泻，肺膈痞闷，或胁肋疼痛，或过用克伐等药，致伤脏气，有同前证，而脉息无力，气怯神倦者。亦治寒湿泻痢呕吐。

【加减】 若治虚寒泻痢、呕吐等证任意加用人参、炙甘草之类。若治中虚感寒，任意加麻黄、柴胡。

【备考】《会约》有甘草。

04650 圣灵丸

【方源】《医方类聚》卷一二九引《吴氏集验方》。

【组成】 木猪苓（去乌皮） 京三棱（去皮） 青皮（去瓤） 白茯苓（以） 白术 麦芽各一两 川白姜三钱 黑牵牛半两（炒黄色） 泽泻一两

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。如早晨面上并眼胞上有气，巳时四肢皆肿，煎桑白皮汤，卧送下十五丸；如头面脚手不肿，只腹肿，当分二气证候，腹带黑色，名脾胃气蛊，若腹黄色，肚上青筋见，名蛊气，煎用木通汤，食后送下二十丸。

【功用】 消水气。

【主治】 水肿。

【宜忌】 忌盐、酱、面、糯米、虾蟹、无鳞鱼、花鸡、鸭、牛、羊、猪。

04651 圣灵丹

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】 川乌（生，去皮脐，切片） 草乌（去皮尖，切片，盐炒香熟，去盐）各半两 麻黄（去根节，微炒去汗） 生地黄（洗，去苗，锉碎，酒浸一宿，焙酥黄色） 自然铜（醋淬七次，研）各一两 五灵脂（拣去砂石，微炒不得过） 虎胫骨（醋浸炙酥黄色） 广木香二钱半 乳香（另研） 没药（炙研）各钱半 干酸木瓜（生者）八两 甜瓜子（炒黄色）一两 沉香五钱（镑） 败龟版（卜卦者，醋炙黄酥）七钱半

【用法】 上为细末，炼白沙蜜冷定，和药成剂，每一两分为十二丸。每服二丸，隔夜以生姜汁自然汁入瓷盏同浸，至天明化开，空心温酒调服，再饮半盏热酒送下，日进二服。唇吻微麻无妨。

【主治】 男子妇人，风湿相搏，气痹传于手足，麻肿疼痛，久则偏枯，及脚气不能行履，风湿瘫痪。

04652 圣灵丹

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】 人参（去芦） 木香 汉防己 茯苓（寒食面煨） 槟榔 木通各二钱（炒） 苦葶苈半两（炒）

【用法】 上为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前煎桑白皮汤送下。

【主治】 脾肺有湿，喘满肿盛，小便赤涩。

04653 圣灵丹

【方源】《重订通俗伤寒论》引叶天士方。

【组成】 炒苦葶苈四两 炒防己 广木香 茯苓 木通 人参各二钱五分

【用法】 上为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，桑皮汤送下。

【主治】 湿伤筋络，脚跟骨脱落，动之则痛，艰于行步。

04654 圣金丹

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《经验普济加减方》。

【组成】 蔓菁子四两 蛇退皮 蝉壳 羌活 川芎 木贼 甘草（炙） 石决明 密蒙花 青葙子 石膏 青皮 枸杞子 白蒺藜 防风各一两 苍术（泔浸，切焙）二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，茶、酒送下，一日三服。

【主治】 眼中翳膜，昏晕黑花，发赤肿痛。

【宜忌】 忌房事、热物。

04655 圣金散

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】 黄药子一两 青黛一分

【用法】 上为细散。每服一钱匕，食后新汲水调下，一日二次。

【主治】 舌上忽然血出不止。

04656 圣草散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】 覆盆子叶不以多少

【用法】 上洗净，研自然汁，以皂纱帛蒙在眼

上，以笔蘸药汁于上下眼眶，当有细虫出于纱上。或研细著药于纱上便睡亦可。若治青盲眼暗，可捣取自然汁澄，阴干，入饮男子乳化开，点入目中，即仰卧，更入少许脑子尤好，三四日间视物如年少。

【主治】 烂弦风，虫痒，及青盲眼暗不见物，冷泪浸淫不止。

04657 圣饼子

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】 川芎四两 香附子三两 藁本茸 甘草（炙） 小椒（出汗）各二两（去目） 苍术一斤（米泔浸，切，炒干末） 薄荷叶四钱 蝉壳一两 蛇退皮一两

【用法】 上为散，炼蜜和匀，杵一千下，丸如弹子，捻作饼。每服一饼，芝麻一捻，同细嚼，茶、酒送下，一日三服。一月必效。

【主治】 肝肾久虚，积热风毒，攻注两眼内，恶翳遮睛，睑赤痒痛，风泪隐涩难开。

04658 圣饼子

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 川乌头 天南星 干姜各一两 甘草（以上并生） 川芎各二两 防风一分 天麻半两

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如芡实大，荫一夕，来日晒干。每服三两饼子，先嚼三两荆芥穗，方嚼药，茶清送下，不拘时候。

【主治】 偏正头痛。

04659 圣饼子

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 天南星（汤泡七次） 半夏（汤泡七次） 防风（去芦） 干姜（泡洗） 甘草（炙） 细辛 白附子（生） 朴消（别研） 太阴石（别研） 川芎 白僵蚕（直者，炒去丝） 陈皮（去白） 川乌头（生，去皮脐） 薄荷叶各一两

【用法】 上为细末，生姜自然汁拌和，打成饼子，如钱大。每服一饼，食后细嚼，茶汤送下。

【主治】 头风。

04660 圣神汤

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】 人参一两 生黄耆一两 当归一两 金银花二两 白芥子三钱 肉桂一钱 白术（炒）一两

【用法】 水煎服。

【主治】 阴症对口，或生于偏旁，无数小疮，先痒后痛，随至溃烂，肿不甚高突，色必黑暗，身体沉重，困倦欲卧，呻吟无力。

04661 圣效散

【方源】《幼幼新书》卷二十九引张涣方。

【组成】 赤石脂（烧赤） 白龙骨 阿胶（炙）各一两 诃梨勒皮 木香 干姜（炮） 黄连 甘草（炙）各半两

【用法】 上为细末。每服半钱，食前煎粟米饮调下。

【主治】 血痢久不愈。

04662 圣效散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】 炉甘石一两（火煅） 黄连半两 海螵蛸四两（水浸七日，每日换水） 青盐（别研） 白矾（枯） 硇丹（水飞） 轻粉各一两

【用法】 上为极细末。每用一字，汤泡洗眼；点亦得。

【主治】 目赤，目翳。

04663 圣效散

【方源】《外科精要》卷中。

【组成】 黄柏（炒黑） 川山甲（炒黑）一两 槟榔 木香 鸡内金二个

【用法】 上为末。每用少许，搽疮口内，日五七次。

【功用】《赤水玄珠》：收敛疮口。

【主治】 溃疡。

【备考】 方中黄柏、槟榔、木香用量原缺。《普济方》用黄柏三两，槟榔、木香各半两，鸡内金七个生用。为细末，候大脓出净，方干掺疮上。

04664 圣散子

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐，取中心者用） 伏龙肝 牡蛎（烧）各等分

【用法】 上为散。用三岁乌鸡冠血调半钱匕，如口㖞向左边，即涂药在右口角；若㖞向右边，即涂药在左口角，才见口正，当即急洗去药，迟洗即牵过口角，慎之。

【主治】 中风口㖞。

04665 圣散子

【方源】《普济方》卷九十四引《经验方》。

【组成】 草乌头（皮小皱有芦头者可用，削去皮尖，凡无芦头者不可用）四两 川芎 当归 藁本 防风 桂（不见火） 天南星（生） 雄黄（研入）各半两 白芷 干姜（生）各一两

【用法】 上为末。每服一定，空腹、食前用煨葱白、麝香、酒调下；病甚者可服半钱。逾时方可进饮食。

【主治】 偏风半身不遂，一切风麻痹疼痛，及破伤急风等。

04666 圣愈汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 生地黄 熟地黄 川芎 人参各三分 当归身 黄耆各五分

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。都作一服，水二大盏，煎至一盏，去滓，稍热服，不拘时候。

【功用】《东医宝鉴·杂病篇》：托里，补气血。

【主治】 ①《兰室秘藏》：诸恶疮，血出多而心安不安，不得睡眠。②《准绳·类方》：一切失血；或血虚烦渴、躁热，睡卧不宁；或疮疖脓水出多，五心烦热，作渴等。

04667 圣愈汤

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】 四物汤加参、耆

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《脉因证治》：出血太多。②《删补名医方论》：一切失血过多，阴亏气弱，烦热作渴，睡卧不宁。

【方论选录】《删补名医方论》引何琴：此方取参、耆配四物，以治阴虚血脱等证。盖阴阳互为其根，阴虚则阳无所附，所以烦热燥渴；气血相为表里，血脱则气无所归，所以睡卧不宁。然阴虚无骤补之法，计在培阴以藏阳，血脱有生血之机，必先补气，此阳生阴长，血随气行之理也。

04668 圣僧丸

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《眼科诀髓》。

【组成】 羌活 川芎 防风 木贼 甘草 苍术 青皮 菊花 石膏 蒺藜各一两 枸杞子 蛇退 石决明各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服半丸，食后冷水送下。

【功用】 退翳明目。

【宜忌】 忌毒物。

04669 丝瓜酒

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】 丝瓜根五六根

【用法】 捣烂，水一碗，煎八分，黄酒冲服。

【主治】 黄疸，眼与周身黄如金色者。

04670 丝瓜散

【方源】《普济方》卷三十八。

【组成】 丝瓜一个（一名天萝，烧灰存性） 槐花各等分（如气弱减分）

【用法】 上为末。每服二钱，饭饮调服。

【主治】 下血甚，不可救者。

04671 丝瓜散

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】 芜荑 蛇床子 硫黄 潮脑 枯矾 川椒各等分

【用法】 上为细末，用鲜丝瓜（刮去皮）一段，将药末厚涂丝瓜上，推入阴户之内。

【主治】 阴蜃。

04672 皮炎膏

【方源】《外伤科学》。

【组成】 炉甘石 5 克 黄连末 5 克 冰片 1.5 克

【用法】 用凡士林 88.5 克，调上药末，冰片最后调入，密贮备用。外涂皮损处，每日 2～3 次。

【功用】 消炎、止痒、润肤。

【主治】 亚急性皮炎，湿疹。

04673 皮枯膏

【方源】《中医外科学》。

【组成】 青黛 6 克 黄柏 6 克 煅石膏 60 克 烟膏 60 克（即土法烟熏烘消牛皮后烟汁结存的残留物质） 枯明矾 110 克

【用法】 上为细末，和匀，以药末 60 克，加凡士林 240 克，调匀成膏。涂搽患处。

【功用】 清热杀虫止痒。

【主治】 湿疹、肛门瘙痒。

04674 皮脂散

【方源】《中国医学大辞典》引冯氏方。

【组成】 青黛（飞） 黄柏各二钱 熟石膏二两 烟膏二两四钱

【用法】 上为细末。麻油调敷。

【主治】 浸淫疮，黄水湿毒，蔓延成片，久而不愈。

04675 皮癣水

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 土槿皮 620 克 紫荆皮 310 克 苦参 310 克 苦楝根皮 150 克 生地榆 150 克 千金子 50 粒 斑蝥 100 只（布包） 蜈蚣 30 条 樟脑 310 克

【用法】 将前五味药打碎成粗粒，装大瓶内，加入 75% 酒精 5 升，并将斑蝥（布包）、千金子等加入密封浸泡 1～2 周，滤去药滓，再加入樟脑溶化，备用。用毛笔刷子涂于皮损上。

【功用】 灭菌止痒。

【主治】 银屑病，体癣，神经性皮炎。

04676 皮癣汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生地30克 当归9克 赤芍9克 黄芩9克 苦参9克 苍耳子9克 白鲜皮9克 地肤子9克 生甘草6克

【功用】凉血润燥，祛风止痒。

【主治】泛发性神经性皮炎，皮肤瘙痒症，丘疹性湿疹。

【方论选录】生地、当归、赤芍凉血润燥；黄芩、甘草清热解毒；苍耳子、苦参、白鲜皮、地肤子祛风除湿，清热止痒。此方适用于血热风燥之证，起红色丘疹，瘙痒极甚，舌质红，苔薄白或薄黄等。

04677 皮癣膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】黄柏 白芷 轻粉各25克 煅石膏 蛤粉 五倍子各30克 硫黄 雄黄 铜绿 章丹各15克 枯矾 胆矾各6克

【用法】上药各取净末，研和极匀，加凡士林500克调和成膏。外擦患处，每日一、二次

【功用】润肌止痒。

【主治】神经性皮炎、脂溢性皮炎。

04678 发灰丸

【方源】《医学正传》卷五。

【组成】小儿胎发（如无，以壮年无病人头发，剪下者为上，自落者次之。烧灰）

【用法】上为末，别用新取侧柏叶捣汁，调糯米粉，打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心白汤送下；或煎四物汤下尤妙。

【主治】小便溺血。

04679 发灰散

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】乱发不以多少（烧灰）

【用法】入麝香少许，每服用米醋泡汤调下。

【主治】血淋；小便出血。

04680 发灰散

【方源】《金鉴》卷五十五。

【组成】头发（取壮实人者）

【用法】将头发放在阴阳瓦上煅成灰，放在地上，去火性，为细末，吹入鼻中。

【主治】衄血。

04681 发灰散

【方源】《金匮翼》卷二。

【组成】发灰一钱 人中白（炙，研）五分 麝香（研）一分

【用法】取少许吹鼻中。

【主治】鼻衄。

04682 发动汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参一钱 茯苓三钱 黄耆五钱 防风一钱 半夏一钱 羌活一钱

【用法】水煎服。

【主治】手足麻木。

04683 发声散

【方源】《赤水玄珠》卷三引《三因》。

【组成】瓜蒌一枚 白僵蚕（微炒）五分 桔梗七钱半 甘草（炒）三钱

【用法】上为末。少许干掺。

【主治】咽痛烦闷，咽物即痛，不宜寒凉药过泄之者。

【加减】咽喉肿痛，左右有红，或只一边紫，长大，水米难下，用此一钱，朴消一钱，和匀掺喉中，咽津；如喉中生赤肿，或有小白头疮，用前散一钱匕，白矾（细研）五分，干掺。

04684 发声散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】瓜蒌皮（细锉，慢火炒赤黄） 白僵蚕（去头，微炒黄） 甘草（锉，炒黄色）

【用法】上为极细末。每服一二钱，用温酒调下，或浓生姜汤调服。更用半钱裹，含化咽津亦得，不拘时候，每日两三次。

【主治】咽喉语声不出。

04685 发际散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】五倍子末310克 雄黄末30克 枯矾末30克

【用法】先将雄黄及枯矾研细，后加五倍子末研和。毛囊炎用香油或醋调敷疮上，脓疱疮或湿疹感染时与湿疹粉用香油调搽。

【功用】灭菌止痒，收湿化毒。

【主治】毛囊炎，脓疱疮或湿疹感染者。

04686 发蒙丸

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】黄连 神曲各五钱 阿魏 胡黄连各三钱 鸡肝十具 芦荟二钱半

【用法】上蒸熟为丸，如梧桐子大。每服三分。

【主治】小儿疳眼盲瞎者。

04687 发背膏药

【方源】《串雅内编》卷二。

【组成】滴乳香四两（箬包烧红，用砖压出油）

净没药四两（照前式去油） 鲜油血竭四两 白色儿茶四两 上好银朱四两 杭州定粉四两 上好黄丹四两 上铜绿三钱

【用法】 上药各另碾至无声为度，筛极细末，拌匀，临时照所患大小，用夹连泗油纸一块，以针多刺小孔，每张用药末五钱，用真麻油调摊纸上，再用油纸盖上，周围用线缝好，贴患处，用软绢扎紧，过三日将膏揭开，浓煎葱汤将患处洗净，软绢拭干，再将膏药翻过，照前法贴之。

【功用】 止痛，化腐生新。

【主治】 发背。

【宜忌】 此方破溃后用之最效，未溃未出大脓非所宜也。

【备考】 本方方名，《青囊秘传》引作“发背膏”。

04688 发汗麻黄汤

【方源】《外台》卷三引《广济方》。

【组成】 麻黄五两（去节） 葛根四两 梔子二十枚（擘） 葱（切）一升，香豉一升（绵裹）

【用法】 上㕮咀。以水八升，先煮麻黄、葛根三两沸，去沫，纳诸药，煎取二升五合，绞去滓，分为三服。服别相去如人行五六里，更进一服。不利，复取汗，后以粉粉身。

【主治】 天行壮热烦闷。

【宜忌】 忌风及诸热食。

04689 司肾丸

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】 鹿茸 菟丝子 葫芦巴 杜仲 肉桂 知母 黄柏 熟地黄 地骨皮 赤石脂 山药 龙骨

【用法】 上为细末，以醋打糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心升麻煎汤送下。

【功用】 滋阴补肾，退热止滑。

【主治】 肾虚生热，以致小便不禁。

04690 母鸡汤

【方源】《景岳全书》卷六十一。

【组成】 人参 黄耆 白术 白茯苓 麻黄根 牡蛎（煅）各三钱

【用法】 上用母鸡一只，去毛杂净，水六七碗，同药煮至三碗。任意服之。

【主治】 产后褥劳，虚汗不止。

04691 母丁香膏

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】 五灵脂一两 丁香十四个 母丁香七个

【用法】 上为细末，用犬胆和为丸，如豌豆大，捏扁阴干。每服一饼子，倒流水送下。

【主治】 吐逆不止。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“母丁香饼”。

04692 母猪蹄汤

【方源】《三因》卷十八。

【组成】 母猪蹄一只（制如食法） 通草四两

【用法】 以水一斗浸，煮熟，得四五升，取汁饮，不下更作。

【主治】 乳妇气少血衰，脉涩不行，乳汁绝少。

04693 戎盐汤

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】 戎盐一分 地骨皮一两 细辛（去苗叶）半两 生地黄（切，焙）一两

【用法】 上为粗末，每服五钱匕，水一盏，煎十余沸，去滓热漱，每日三次。

【主治】 肾虚齿痛。

04694 巩堤丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 熟地二两 菟丝子（酒煮）二两 白术（炒）二两 北五味 益智仁（酒炒） 故纸（酒炒） 附子（制） 茯苓 家韭子（炒）各一两

【用法】 上为末，山药糊为丸，如梧桐子大。每服百余丸，空心滚汤或温酒送下。

【主治】 膀胱不藏，水泉不止，命门火衰，小水不禁。

【加减】 如兼气虚必加人参一二两更妙。

【方论选录】《成方便读》：方中熟地、菟丝、骨脂、韭子，大补肾脏。然所以约束肾中之气者，又在于脾，故以白术、山药大补脾土；益智辛香温暖，独入脾家，且能于固摄之中，仍寓流动之意；附子助其火；茯苓去其邪水；而以五味子一味，固其关巩其堤也。

04695 地丁汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 地丁 31 克 连翘 12 克 蒲公英 31 克 黄柏 9 克 黄芩 9 克 生苡仁 12 克 苍术 12 克

【用法】 水煎服。

【主治】 脓疱疮。

04696 地丁饮

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】 紫花地丁一两 白矾 甘草各三钱 银花三两

【用法】 水煎服。

【主治】 疔疮。

04697 地丁饮

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】地丁9克　野菊花9克　银花9克　连翘9克　黑山栀9克　半枝莲9克　蒲公英15克　草河车9克　生甘草6克

【功用】清热解毒，消肿止痛。

【主治】疔疮。

04698　地丁膏

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】黄花地丁（即蒲公英）　紫花地丁各八两

【用法】以长流水洗净，用水熬汁，去滓，又熬成膏，摊贴。

【主治】乳吹，并一切毒。

04699　地六汤

【方源】《虚损启微》卷下。

【组成】熟地六钱　苁蓉三钱（漂淡）　麦冬三钱　白芍一钱　生地三钱　柏子仁二钱

【用法】水二钟，煎七分，温服。或加砂仁五六分。

【主治】水亏液涸，大便秘结。

04700　地龙丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】地龙（炒）一分　甜瓜子（炒）半两　自然铜（烧，醋淬，研）二两　乳香（研）一钱　骨碎补　赤芍药　五灵脂　当归（切，炒）各半两　没药（研）一分

【用法】上除研者外，为细末，再和匀，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心、临卧温酒送下。

【主治】风邪外袭，身体疼痛。

04701　地龙散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】地龙末一两（微炒）　好茶末一两　白僵蚕一两（微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】白虎风，疼痛不可忍。

04702　地龙散

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】地龙三钱（去土）　谷精草二钱　乳香（锉）一钱

【用法】上为细散。每服半钱，于烧香饼子上取烟，用纸筒子罩熏鼻中，偏痛随左右用之。

【主治】眼眉骨及头脑俱痛。

04703　地龙散

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】地龙（炒）　郁金　棕榈（烧令存性）　柏叶　地黄汁　胎发（泥裹烧过，去泥）各等分

【用法】上为散。每服三钱匕，温地黄汁酒调下，不拘时候。

【主治】妇人冲任气虚，经血暴下，兼带下。

04704　地龙散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】当归梢一分　中桂　地龙各四分　麻黄五分　苏木六分　独活　黄柏　甘草各一钱　羌活二钱　桃仁六个

【用法】上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，空腹温服。

【主治】腰脊痛，或打扑损伤，从高坠下，恶血在太阳经中，令人腰脊痛，或胫腨臂股中痛不可忍，鼻塞不通。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作"地龙汤"。改为丸剂，名"地龙丸"（见《医统》）。

04705　地龙散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】甘草　地龙末

【用法】用甘草煎汁，调地龙末涂之。

【主治】阴囊肿大。

04706　地龙膏

【方源】《养老奉亲》。

【组成】白项地龙　茴香用时看多少

【用法】上杵汁，倾于脐内。自然便通。

【主治】老人小便不通。

04707　地仙丹

【方源】方出《圣惠》卷四十一，名见《普济方》卷五十。

【组成】远志一升（去心）　白茯苓一斤　熟干地黄一斤　地骨皮一斤　麦门冬一斤半（去心，焙）　苣胜一斤（蒸，晒干，去皮）

【用法】上为末，以枣肉为丸，如梧桐子大。每服四十丸，以温酒送下，晚食前再服。

【功用】令发黑，延年，久服貌如童子，齿落重生，行如奔马，夜视有光。

【宜忌】忌生葱、大蒜、萝卜等。

04708　地仙丹

【方源】《本草纲目》卷三十六引《保寿堂方》。

【异名】秘传地仙丹（《良朋汇集》卷三）。

【组成】天精草（春采枸杞叶）　长生草（夏采枸杞花）　枸杞子（秋采）　地骨皮（冬采枸杞根）

【用法】并阴干，用无灰酒浸一夜，晒露四十九

昼夜，取日精月华气，待干为末，炼蜜为丸，如弹子大。每早、晚各用一丸细嚼，以隔夜百沸汤下。

【功用】 常服除邪热，明目，轻身。

04709 地仙散

【方源】《本事》卷四。

【组成】 地骨皮（洗，去心） 防风（去钗股）各一两 甘草（炙） 一分

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，竹叶七片，煎至七分服。

【功用】 解一切虚烦躁，生津液。

【主治】 ①《本事》：骨蒸肌热。②《得效》：伤寒、伏暑后烦热不安。

【方论选录】《本事方释义》：地骨皮气味苦甘寒，入手太阴、足厥阴，能治有汗之骨蒸；防风气味辛甘微温，入足太阳；甘草气味甘平，入足太阴。此治骨蒸内热，阴虚烦躁，津液欲伤者，再以生姜之辛温而散，竹叶之辛凉而清，使内外和平，则病魔焉有不去者乎。

04710 地芝丸

【方源】《东垣试效方》卷五。

【异名】 万寿地芝丸（《御药院方》卷六）、地黄丸（《脉因证治》卷下）。

【组成】 生地黄（焙干）四两 天门冬（去心）四两 枳壳（去瓤，麸炒）二两 甘菊花（去枝）二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，食后茶清送下；温酒亦可。

【功用】 ①《御药院方》：和颜色，利血气，调百节，黑发坚齿，逐风散气，愈百疾。②《脉因证治》：大除风热。

【主治】 目不能远视，能近视，或亦妨近视，及大病风成癞。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足少阴药也。生地凉血生血，天冬润肺滋肾，枳壳宽肠去滞，甘菊降火除风。②《成方便读》：王海藏云：目能远视，责其有火，不能近视，责其无水，法当补肾。夫火之力刚，故能远照，水之力柔，故能近视。人之一身百病千端，亦不过一阴阳水火而已。然肾为主水之脏，肺为生水之源，故以生地大补肾水，天冬润养肺金，使之金水相生，则肝得所养；菊花得金水之精，专入肝经，能祛风于外；枳壳具苦降之性，单行气分，为破滞之需。庶几风尽去而滞无留，则补药得力而病易愈耳。用茶者，欲火热之下降；用酒者，欲药力之上行也。

【备考】《此事难知》本方用法：如能饮食，茶清汤下；不能饮食，温酒下。

04711 地芝丸

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】 二地各四两 二冬 枸杞 枣皮各三两 当归一两 知母七钱 胆草二钱

【用法】 蜜为丸服。

【主治】 瞳人枯小。

04712 地血散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】 茜草 当归 白芍 乌梅 柴胡 知母各一钱

【用法】 加生姜三片，水煎，温服。

【主治】 妇人心血间有热，饮食不减，起居如常，但发烦热。

04713 地肤丸

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】 地肤子（炒） 白蒺藜（炒去刺） 青葙子 茺蔚子 菟丝子（酒浸一宿，生用） 草决明 车前（酒浸，炒）各二两 大黄（炒） 萤虫（去足） 细辛 黄连各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下。

【主治】 青盲不见物。

04714 地肤饮

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】 地肤子三两 知母（焙） 猪苓（去黑皮） 瞿麦（去梗） 黄芩（去黑心） 升麻 木通（锉）各二两 冬葵子一两半 海藻（洗去咸，焙）一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 卒淋，小便不通，秘涩疼痛。

04715 地骨散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】 地骨皮 生地黄 黑参 甘草 木通 黄芩各等分

【用法】 上为粗末。水煎服。

【主治】 心经受热，眼赤或生翳膜。

04716 地黄丸

【方源】 方出《千金》卷六，名见《普济方》卷二八九。

【组成】 干地黄 栀子 甘草各等分

【用法】 上为末。每服方寸匕，酒送下，一日三次。鼻有风热者，以葱涕为丸，如梧桐子大，每服五丸。

【主治】 鼻出血不止。

【加减】 鼻疼者，加豉一合。

04717 地黄丸

【方源】《千金》卷二十一。

【异名】 地黄煎丸(《圣济总录》卷五十八)、生地黄丸(《鸡峰》卷十九)。

【组成】 生地黄汁 生栝楼根汁各二升 牛羊脂三升 白蜜四升 黄连一斤（为末）

【用法】 上合煎令可丸，即丸如梧桐子大。每服五丸，饮送下，加至二十丸，一日二次。

【功用】 除热，止渴，补养。

【主治】 消渴面黄，手足黄，咽中干燥，短气，脉如连珠。

【方论选录】《千金方衍义》：脉如连珠，心脾结热可知，故用黄连专泻二经之积热，地黄滋血，栝楼根滋津，牛羊脂、蜂蜜滋肠胃之枯燥也。

04718 地黄丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 补肾地黄丸(《幼幼新书》卷六引《集验方》)、补肝肾地黄丸(《奇效良方》卷六十四)、六味地黄丸(《正体类要》卷下)、六味丸(《校注妇人良方》卷二十四)。

【组成】 熟地黄八钱 山萸肉 干山药各四钱 泽泻 牡丹皮 白茯苓（去皮）各三钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，空心温水化下。

【功用】 滋补肝肾。

①《小儿药证直诀》：补肾，补肝。②《校注妇人良方》：壮水制火。③《保婴撮要》：滋肾水，生肝木。④《东医宝鉴·内景篇》：专补肾水，能生精补精，滋阴。

【主治】 肝肾阴虚，头晕目眩，耳聋耳鸣，腰膝痿软，遗精盗汗，骨蒸潮热，五心烦热，失血失音，消渴淋浊；妇女肾虚，血枯闭经；小儿囟开不合，五迟五软。

①《小儿药证直诀》：肾怯失音，囟开不合，神不足，目中白睛多，面色㿠白。②《校注妇人良方》：肾虚发热作渴，小便淋秘，痰壅失音，咳嗽吐血，头目眩晕，眼花耳聋，咽喉燥痛，口舌疮裂，齿不坚固，腰腿痿软，五脏亏损，自汗盗汗，便尿诸血。③《万氏女科》：女子冲任损伤，及肾虚血枯，血少血闭之症。④《寿世保元》：小儿肝疳，白膜遮睛，肝经虚热，血燥，或风客淫气，而患瘰疬结核，或四肢发搐，眼目忽抽动，痰涎上壅；又治肾疳脑热，消瘦，手足如冰，寒热往来，滑泄肚胀，口臭干渴，齿龈溃烂，爪黑面黧，遍身、两耳生疮，或耳内出水，或发热，自汗盗汗，或小便淋闭，咳嗽吐血，或咽喉燥痛，口舌疮裂，或禀赋不足，肢体瘦弱，解颅鹤节，五迟五软，或畏明下窜，或早近女色，精血亏耗，五脏齐损等肝肾诸虚不足之症。⑤《医方集解》：肝肾不足，真阴亏损，精血枯竭，憔悴羸弱，腰痛足软，自汗盗汗，水泛为痰，发热咳嗽，头晕目眩，耳鸣耳聋，遗精便血，消渴淋沥，失血失音，舌燥喉痛，虚火牙痛，足跟作痛，下部疮疡。

【宜忌】 ①《审视瑶函》：忌萝卜。②《寿世保元》：忌铁器，忌三白。③《医方发挥》：本方熟地滋腻滞脾，有碍消化，故脾虚食少及便溏者慎用。④《中医方剂选讲》：阴盛阳衰，手足厥冷，感冒头痛，高热，寒热往来者不宜用。又南方夏季暑热湿气较盛时，宜少服用。

【方论选录】 ①《医方考》：肾非独水也，命门之火并焉。肾不虚，则水足以制火，虚则火无所制，而热证生矣，名之曰阴虚火动。河间氏所谓肾虚则热是也。今人足心热，阴股热，腰脊痛，率是此证。老人得之为顺，少年得之为逆，乃咳血之渐也。熟地黄、山茱萸、味厚者也，经曰：味厚为阴中之阴，故能滋少阴，补肾水；泽泻味甘咸寒，甘从湿化，咸从水化，寒从阴化，故能入水脏而泻水中之火；丹皮气寒味苦辛，寒能胜热，苦能入血，辛能生水，故能益少阴，平虚热；山药、茯苓，味甘者也，甘从土化，土能防水，故用之以制水脏之邪，且益脾胃而培万物之母也。②《红炉点雪》：六味丸，古人制以统治痰火诸证。痰火之作，始于水亏火炽金伤，绝其生化之源乃尔。观方中君地黄，佐山药、山茱，使以茯苓、牡丹皮、泽泻者，则主益水、清金、敦土之意可知矣。盖地黄一味，为补肾之专品，益水之主味，孰胜乎此？夫所谓益水者，即所以清金也。惟水足则火自平而金自清，有子令母实之义也。所谓清金者，即所以敦土也。惟金气清肃，则木有所畏而土自实，有子受母荫之义也。而山药者，则补脾之要品，以脾气实则能运化水谷之精微，输转肾脏而充精气，故有补土益水之功也。而其山茱、茯苓、丹皮，皆肾经之药，助地黄之能。其泽泻一味，虽曰接引诸品归肾，然方意实非此也。盖茯苓、泽泻，皆取其泻膀胱之邪。古人用补药，必兼泻邪，邪去则补药得力。一辟一闔，此乃玄妙。后世不知此理，专一于补，所以久服必致偏胜之害。③《审视瑶函》：肾者，水脏也。水衰则龙雷之火无畏而亢上，故王启玄曰：壮水之

主，以制阳光，也即《经》所谓求其属而衰之。地黄味厚，为阴中之阴，专主补肾填精，故以为君药；山茱萸味酸归肝，乙癸同治之义，且肾主闭藏，而酸敛之性，正与之宜也；山药味甘归脾，安水之仇，故用二味为臣；丹皮亦入肝，其用主宣通，所以佐茱萸之涩也；茯苓亦入脾，其用主通利，所以佐山药之滞也，且色白属金，能培肺部，又有虚则补其母之义；至于泽泻有三功：一曰利小便以泄相火，二曰行地黄之滞，引诸药速达肾经，三曰有补有泻，诸药无畏恶增气之虞，故用之为使。此丸为益肾之圣药，而昧者薄其功缓，乃用药者有四失也：一则地黄非怀庆则力浅；一则地黄非自制则不工，且有犯铁之弊；一则疑地黄之滞而减之，则君主力弱；一则恶泽泻之渗而减之，则使力微。自蹈四失，而反咎药之无功，毋乃冤乎。④《古今名医方论》柯韵伯曰：肾虚不能藏精，坎宫之火无所附而妄行，下无以奉春生之令，上绝肺金之化源。地黄禀甘寒之性，制熟味更厚，是精不足者补之以味也，用以大滋肾阴，填精补髓，壮水之主。以泽泻为使，世或恶其泻肾而去之，不知一阴一阳者，天地之道，一开一阖者，动静之机。精者，属癸，阴水也，静而不走，为肾之体；溺者，属壬，阳水也，动而不居，为肾之用。是以肾主五液，若阴水不守，则真水不足，阳水不流，则邪水逆行。故君地黄以护封蛰之本，即佐泽泻以疏水道之滞也。然肾虚不补其母，不导其上源，亦无以固封蛰之用。山药凉补，以培癸水之上源。茯苓淡渗，以导壬水之上源，加茱萸之酸温，藉以收少阳之火，以滋厥阴之液。丹皮辛寒，以清少阴之火，还以奉少阳之气也。滋化源，奉生气，天癸居其所矣。壮水制火，特其一端耳。⑤《医方集解》：此足少阴、厥阴药也。熟地滋阴补肾，生血生精；山茱温肝逐风，涩精秘气；牡丹泻君相之伏火，凉血退蒸；山药清虚热于肺脾，补脾固肾；茯苓渗脾中湿热，而通肾交心；泽泻泻膀胱水邪，而聪耳明目。六经备治，而功专肾肝，寒燥不偏，而补兼气血。苟能常服，其功未易殚述也。⑥《医方论》：此方非但治肝肾不足，实三阴并治之剂。有熟地之腻补肾水，即有泽泻之宣泄肾浊以济之；有萸肉之温涩肝经，即有丹皮之清泻肝火以佐之；有山药收摄脾经，即有茯苓之淡渗脾湿以和之。药止六味，而大开大合，三阴并治，洵补方之正鹄也。⑦《实用方剂学》：本方是补阴的代表方剂，其组成特点，是补中寓泻，而以补阴为主。方中以熟地滋阴补肾，填精益髓而生血；山茱萸温补肝肾，收敛精气；山药健脾，兼固精缩尿；是本方的“三补”，用以治本。但以熟地补肾为主，山茱萸的补肝和山药的补脾为辅，故熟地的用量是山茱萸和山药的一倍。由于肝肾阴虚，常可导致虚火上炎，故又以泽泻泻肾火，丹皮泻肝火，茯苓渗脾湿，是本方的“三泻”，用以治标。但本方是以补为主，所以这三种泻药的用量较轻。这样把补虚与祛邪结合起来，就形成甘淡平和，不温不燥，补而不滞的平补之剂。因此，本方滋补而非峻补，故虚不受补者亦可用。

【临证举例】 ①慢惊后不语 《小儿药证直诀》：东都王氏子，吐泻，诸医药下之，至虚，变慢惊。后又不语，诸医作失音治之。钱曰：既失音，开目不能饮食，又牙不紧，而口不紧也，诸医不能晓。钱以地黄丸补肾。治之半月而能言，一月而痊也。②血痢 《明医杂著》薛己注：祠部李宜散，患血痢，胸腹膨胀，大便欲去不去，肢体殊倦。余以为脾气虚弱，不能摄血归原，用补中益气汤加茯苓、半夏，治之渐愈。后因怒，前症复作，左关脉弦浮，按之微弱，此肝气虚不能藏血，用六味丸治之而愈。③糖尿病 《中华医学杂志》（1956；6：549）：用六味地黄丸改汤剂治疗糖尿病2例。例1入院时昏迷，经胰岛素治疗后，神志清醒。通过饮食治疗，尿糖始终无法控制。经服六味地黄汤4天后，不仅多饮、多食、多尿及消瘦等临床症状好转，尿糖亦告消失，同时血糖亦逐渐恢复正常，体重日增。例2进院时极度消瘦，合并肺结核，咳嗽严重，影响睡眠，体力十分衰弱，自服六味地黄丸后，咳嗽很快停止，精神好转，多饮、多食、多尿等症状显著改善，夜间仅解小便一次，一周后体重增加4千克，尿糖已逐渐消失，惟血糖未恢复正常。④病理性室性早搏 《河南中医》（1987；3：24）：以六味地黄汤加苦参，每日一剂，早、晚各服一次，治疗病理性室性早搏12例。12例经心脏听诊，其中7例经心电图复查，均无室早发现，且无自觉症状。⑤防治食管癌 《中医杂志》（1983；6:71）：先后在湖北、河北两地食管癌高发人群中用六味地黄汤治疗食管上皮重度增生患者92例，1年后，病理脱落细胞复查，癌变2例，稳定8例，好转和正常者82例，而在湖北当地作对照的未服药患者89例中，8个月后随访，癌变11例，稳定23例，好转55例。两者相较，差异显著（$P<0.001$）。对湖北的57例患者作了5年以上的随访，并和相应的47例未服药患者作了对比观察，服药组的癌变率明显低于对照组（$P<0.05$）。

【现代研究】 ①降血脂作用 《中成药研究》(1986；12:41)：以本方片剂对实验性高血脂家兔进行研究，给药组的血清胆固醇和甘油三酯分别低于对照组，效果显著（P<0.01），而对正常大鼠无明显影响；给药组肝、脾、肾上腺重量均比对照组明显下降（P<0.05）；解剖时肉眼观察，对照组肝脏等脏器都呈现较明显的脂肪沉积，而给药组色泽均较正常；对实验性高血脂大鼠 HDL—C 能明显增高（P<0.01）。②降血糖作用 《国外医学·中医中药分册》(1986；4:11)：用本方水提物口饲糖尿病大鼠，3 天后能降低血糖、尿素氮和甘油三酯，5 天后能降低血钾、提高血钠和血蛋白，降低尿中酮体水平。③防治肿瘤 《中医杂志》(1983；6:71)：本方能抑制 N—亚硝基氨酸乙脂和氨基甲酸乙脂的诱瘤作用，有助于荷瘤体的单核吞噬系统的吞噬功能，促进骨髓干细胞和淋巴组织增生，在一定程度上维持荷瘤小鼠甲状腺功能，降低蛋白分解代谢，从而对肿瘤的形成和荷瘤体的生存具有某些作用。④保护肾功能作用 《中成药研究》(1982；12:23)：用本方对大鼠 Masugi 型肾炎的实验治疗，治疗组血清尿素明显低于对照组，而停药后尿素量又明显增高，说明本方能促进肾脏对体内代谢产物——尿素的排泄，从而保护肾功能。⑤对实验性肾虚动物牙周组织的影响 《中西医结合杂志》(1990；5:295)：本方对牙周病阴虚模型动物的牙周组织有保护作用，具有修复牙周组织损害的作用，并且动物体重和活力增加。在一定程度上可以纠正由甲状腺素引起的代谢紊乱，对由甲状腺素所致肾虚模型动物的牙组织有保护作用。⑥滋补强壮作用 《中成药研究》(1986；4:26)：本方与人参有类似的抗低温、抗疲劳、耐缺氧及促皮质激素样作用，对氢化考的松引起的小鼠肾上腺、胸腺萎缩有一定的对抗作用，并能抑制小鼠棉球肉芽肿增生。

【备考】《医方集解》本方用法：盐汤下；冬，酒下。改为汤剂，名“六味地黄汤”（见《景岳全书》）、“地黄汤”（见《证治宝鉴》）、“六味汤”（见《医学心悟》卷六）。

04719 地黄丸

【方源】《医方大成》卷十引钱氏方。

【组成】 熟干地黄八钱（洗，焙干） 泽泻（洗）二钱 牡丹皮（去心） 牛膝 山茱萸 白茯苓（去心）各三钱 鹿茸（酥炙） 干山药各四钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。三岁以下每服二三丸，空心温水化下。

【主治】 小儿禀赋不足，肾虚不生骨髓，头囟不合，并体瘦骨露，有如鹤膝者。

04720 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】 生干地黄（焙） 菟丝子（酒浸一宿，晒，别捣） 白芷 牡荆实（去萼） 冬葵子（炒） 当归（切，焙） 芎劳 赤茯苓（去黑皮） 败酱 蒲黄各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎粟米饮送下，一日三次。

【主治】 小便出血。

04721 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】 熟干地黄（焙）三分 黄耆（锉，焙） 山茱萸 桑根白皮各二两 黄连（去须） 羚羊角（屑） 桂（去粗皮） 当归（切，焙） 代赭各一两 芎劳 天雄（炮裂，去皮脐）各一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】 肾虚耳鸣。

04722 地黄丸

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】 生干地黄（焙） 当归（切，焙） 阿胶（炙令燥） 黄耆（锉）各一两 艾叶（炙）三分 生姜一分（切，炒）

【用法】 上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒或米饮送下，不拘时候。

【主治】 产后血露不断。

04723 地黄丸

【方源】《本事》卷五。

【异名】 菊花丸(《普济方》卷七十一)。

【组成】 熟干地黄（酒洗，九蒸九晒，焙干称）一两半 黄连一两（去须） 决明子一两 没药（别研） 甘菊花 防风（去叉股） 羌活（去芦） 桂心（不见火） 光明朱砂（水飞）各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后熟水送下，一日三次。

【功用】 益血镇肝明目。

【主治】 ①《本事》：勤读书伤肝，风热上凑，目昏疼痛。②《普济方》：肝虚血不足，肢节拘急，筋脉挛痛。及用力劳心，肝虚风热攻眼，赤肿羞明，渐生翳障，兼肝肾风毒热气上冲目痛。

【方论选录】《本事方释义》：熟干地黄气味甘苦微寒，入足少阴；黄连气味苦寒，入手少阴；草决明子气味咸苦平，入足厥阴；没药气味苦平，入足

阳明，能通瘀活络；甘菊花气味辛凉，入手太阴、足厥阴、少阳；防风气味辛甘微温，羌活气味辛甘平，皆入足太阳，乃引经之风药；桂心气味辛甘大热，入足厥阴；光明朱砂气味苦温，入手少阴。此肝虚风动，热气上升，致目不明，攻补皆在难投，故用一味壮水之药，佐以苦辛诸品，则升降得宜而奏功矣。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“熟地黄丸”、《丹溪心法附余》引作“黄连丸”。

04724 地黄丸

【方源】《本事》卷十。

【异名】 赤芍地黄丸(《医学入门》卷八)、抑阴丸(《古今医鉴》卷十一)、断欲丸(《寿世保元》卷七)。

【组成】 生干地黄二两 柴胡（去苗，净洗） 秦艽（净洗，去芦） 黄芩各半两 赤芍药一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，乌梅汤送下，一日三次，不拘时候。

【主治】 尼师寡妇，独阴无阳，欲男子而不可得，以致恶风体倦，乍寒乍热，面赤心烦，或时自汗，厥阴脉弦长而上出鱼际。

【方论选录】《本事方释义》：生干地黄气味甘苦微寒，入手足少阴、厥阴；柴胡气味辛甘平，入足少阳；秦艽气味苦平，入手足阳明，兼入肝胆；黄芩气味苦寒，入手太阴、少阳；赤芍药气味苦平，入足厥阴，能行血中之滞；乌梅汤送药，亦取其泄肝也。师尼寡妇，独阴无阳，情欲未遂，以致阴阳交争，乍寒乍热，将欲成劳者，非此不能治。

【备考】 本方方名，《妇人良方》引作“生地黄丸”；《准绳·类方》引作“抑阴地黄丸”。

04725 地黄丸

【方源】《普济方》卷七十八引《卫生家宝》。

【组成】 熟地黄二两（酒蒸二次，焙） 生地黄二两 川当归一两半（去芦） 川牛膝一两 金钗石斛一两（切，酒浸，焙） 菟丝子一两（酒浸，炒，别研） 车前子一两 防风一两 枳壳（略洗，去瓤，麸炒）一两 杏仁（麸炒，先用汤泡过，去皮尖，别研）一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下，一日一次。先服此方半月，次服羌活丸五日，然后用立应散搐鼻。

【功用】 平补，壮气血，悦精神。

【主治】 内外障及眼见飞花。

04726 地黄丸

【方源】《直指》卷二十一。

【异名】 补骨脂丸(《医学入门》卷七)。

【组成】 大熟地黄（洗，焙） 当归 川芎 辣桂 菟丝子（酒浸三日，晒干，捣末） 大川椒（出汗） 故纸（炒） 白蒺藜（炒，杵去刺） 葫芦巴（炒） 杜仲（姜制，炒去丝） 白芷 石菖蒲各一分 磁石（火烧醋淬七次，研细，水飞）一分半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，以葱白温酒空心送下，晚饭前再服。

【主治】 劳损耳聋。

【备考】《医统》有芍药三钱。

04727 地黄丸

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】 熟地黄（九蒸）十两 菟丝子（淘洗，酒浸，蒸） 鹿角霜各五两 茯苓 柏子仁各三两 附子一两

【用法】 上为末，鹿角胶煮酒为丸。每服百十丸，盐酒任下。

【主治】 ①《朱氏集验方》：白浊。②《得效》：白浊。心肾水火不济，或因酒色，遂至已甚，谓之土淫，盖脾有虚热而肾不足，故土邪干水。

04728 地黄丸

【方源】《普济方》卷二三一引《经验良方》。

【组成】 生干地黄 杏仁 甘草 贝母 麻黄（去节）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，噙化。

【功用】 润肺出声。

【主治】 劳嗽声不出。

04729 地黄丸

【方源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】 人参二钱 怀熟地黄四钱 鹿茸（酒炙） 怀山药 茯苓 丹皮 山茱萸肉各三钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每用一丸，人参汤化下。

【主治】 小儿肾元不充，颅解不合。

04730 地黄丸

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】 熟地二两 当归 赤芍 石斛 藁本 夏枯草 楮实子 青葙子 蔓荆子 草决明 龙胆草 白芍 黄芩各一两 远志（去心） 黄耆各五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每次三十丸，食后服，一日三次。

【主治】 黑风内障。初发时，头旋脑痛，眼涩生花，往来昏黑。

04731 地黄丸

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】熟地 蒺藜各五钱 川芎 人参各三钱 当归一两

【用法】上为末，炼蜜为丸。茶送下。

【主治】拳毛倒睫。

04732 地黄丸

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】熟地八两 当归 山药 枣皮 枸杞 巴戟 麦冬 菊花各四两 五味二两

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】瞳人散大。

04733 地黄汤

【方源】方出《圣惠》卷四，名见《圣济总录》卷四十三。

【组成】生地黄一两 葱白五茎 白茅根一两

【用法】上切细。以水一大盏半，煎至八分，去滓，食前分二次温服。

【主治】小肠实热，心中烦闷，小便出血。

04734 地黄汤

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【异名】生地黄汤(《此事难知》)。

【组成】生地黄（自然汁）一升（或末二两重）生藕（自然汁，如无，用小蓟汁）半升（再无，用小蓟末一两） 虻虫二十个（去足翅，麸炒黄） 桃仁半两 蓝叶一握（切，令干作末） 水蛭十个（麸炒） 干漆半两（炒烟尽） 大黄一两（锉如骰子大）

【用法】入水三升半，慢火熬及二升，放冷，分二服。投一服至半日许，血未下再投之。

【主治】年老及年少气虚弱者患伤寒蓄血。伤寒七八日以后，两手脉沉迟细微，肤冷，脐下满，或喜或妄，或狂躁，大便实而色黑，小便自利者。

【备考】方中干漆用量原缺，据《普济方》补。

04735 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】熟干地黄（焙）一两一分 芍药 甘草（炙，锉） 麻黄（去根节）各半两 桂（去粗皮） 栝楼实 葛根（锉） 独活（去芦头） 防风（去叉）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风湿腰痛。

04736 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】熟干地黄（切，焙） 人参 石韦（去毛）各一两 滑石三分 王不留行 冬葵子（炒） 车前子 桂（去粗皮） 甘遂（炒） 木通各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】劳淋结涩不通。

04737 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】生干地黄（焙）二两 黄芩（去黑心） 当归（切，焙） 柏叶各一分半 艾叶半分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，加蒲黄一钱匕，空心、食前服。

【主治】冲任气虚，经血虚损，月水不断，绵绵不止。

04738 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】生地黄（切，焙）五两 艾叶 黄芩（去黑心） 当归（切，焙）各二两 地榆四两 伏龙肝 柏叶 生姜（切，焙） 蒲黄各三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，日二夜一。

【主治】妇人气血虚损，月水不断，绵绵不已。及妇人经血不止，颜色不定。

04739 地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】熟干地黄四两 当归（切，焙） 艾叶各二两 芎藭 阿胶（炒令燥） 杜仲（去粗皮，锉，炒） 五加皮各三两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，空心、食前温服。

【主治】妊娠气血衰微，胞脏挟冷，数堕胎。

04740 地黄汤

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】生干地黄一两一分 芍药 牡丹皮各四分 玄参三分

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盏，煎至六分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】衄血。

【加减】伏热者，以犀角代玄参。

04741 地黄汤

【方源】《本事》卷五。

【组成】生干地黄二两半 桑白皮（洗净，蜜炙黄）一两 磁石（捣碎，水淘二三十次，去尽赤汁为度）二两 枳壳（去瓤，细切，麸炒黄） 羌活（去芦） 防风（去叉股） 黄芩（去皮） 木通（去

粗皮） 甘草（炙）各半两

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏半，煎至七分，去滓，一日二三次，不拘时候。

【主治】 ①《本事》：男子二十岁，因疮毒后肾经热，右耳听事不真，每心中不快则觉转重，虚鸣疼痛。②《医方类聚》引《经验良方》：耳内出脓。

【方论选录】 《本事方释义》：生干地黄气味甘寒微苦，入手足少阴；桑白皮气味苦辛平，入手太阴；磁石气味辛温，入足少阴；枳壳气味苦寒，入足太阴；羌活气味苦辛甘平，入足太阳；防风气味辛甘微温，入足太阳；黄芩气味苦寒，入足少阳、阳明；木通气味苦平，入手太阳，能泄丙丁之火；甘草气味甘平，入足太阴。此因男子少壮发疮毒后，肾经留热，右耳听事不真，心中常怏怏不快，转觉重虚，耳鸣或疼痛，故以重镇之药，苦降之品，佐以辛散升腾，则升降和平，病自减矣。

04742 地黄汤

【方源】 《三因》卷八。

【组成】 麦门冬（去心） 生地黄（干）各五两 人参 茯苓 芍药各三两 萎蕤四两 石膏六两 远志（去心）十两 甘草三两 白术三两

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，煎七分，去滓，不拘时服。

【主治】 脉实极。气衰血焦，发落，好怒，唇舌赤，甚则言语不快，色不泽，饮食不为肌肤。

04743 地黄汤

【方源】 《普济方》卷三六一。

【异名】 地黄茵陈汤（《幼幼发挥·附方》）。

【组成】 赤芍药 川芎 当归 天花粉 猪苓 赤茯苓 泽泻 甘草 山茵陈各等分

【用法】 上㕮咀。加生地黄水煎，子母同服。

【主治】 胎受母热毒，生下遍身面目俱黄，身热，大便秘，小便黄色，多啼不乳。

【备考】 《片玉心书》有木通。

04744 地黄汤

【方源】 《准绳·类方》卷五。

【异名】 地黄散（《景岳全书》卷五十六）。

【组成】 干地黄 甘草（炙） 麻黄（去节）各一两

【用法】 上㕮咀。用酒三升，水七升，煎至四升，去滓，分作八服，每日二次，不拘时候。

【主治】 中风四肢拘挛。

04745 地黄汤

【方源】 《不知医必要》卷二。

【组成】 熟地四钱 淮山药（炒） 杞子 茯苓 各二钱 萸肉一钱五分 丝饼三钱

【主治】 肾虚耳聋。

【加减】 肾有火邪，去杞子、丝饼，加泽泻一钱五分，黄芩、知母各一钱。

04746 地黄饮

【方源】 《圣济总录》卷五十一。

【异名】 地黄饮子（《宣明论》卷二）。

【组成】 熟干地黄（焙） 巴戟天（去心） 山茱萸（炒） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 石斛（去根） 五味子（炒） 桂（去粗皮） 白茯苓（去黑皮）各一两 麦门冬（去心，焙） 远志（去心） 菖蒲各半两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣二枚（擘破），同煎七分，去滓，食前温服。

【主治】 瘖痱证。舌强不能言，足废不能用；及产后麻昏。

①《圣济总录》：肾气虚厥，语声不出，足废不用。②《证治宝鉴》：中风肾虚者。③《胎产心法》：产后麻昏。

【宜忌】 《兰台轨范》：风气甚而有火多痰者忌服。

【方论选录】 ①《法律》：肾气厥，不至舌下，乃脏真之气不上荣于舌本耳。至其浊阴之气必横格于喉舌之间，吞咯维艰，昏迷特甚，又非如不言之证，可以缓调。方中所用附、桂、巴、苁，原为驱逐浊阴而设，用方者不可执已见而轻去之也。②《医方集解》：此手足少阴、太阴、足厥阴药也。熟地以滋根本之阴；巴戟、苁蓉、官桂、附子以返真元之火；石斛安脾而秘气；山茱温肝而固精；菖蒲、远志、茯苓补心而通肾脏；麦冬、五味保肺以滋水源，使水火相交，精气渐旺而风火自息矣。

【临证举例】 ①瘖 《校注妇人良方》：一妇人忽然不语半年矣，诸药不应，两尺浮数，先用六味丸料加肉桂，数剂稍愈。乃以地黄饮子三十余剂而痊。②痱 《洄溪医案》：新郭沈又高续娶少艾，未免不节，忽患气喘，厥逆、语涩、神昏，手足不举。医者以中风法治之，病益甚。余诊之曰：此《内经》所谓痱证也。少阴虚而精气不续，与大概偏中风、中风、痰厥、风厥等病绝不相类。刘河间所立地黄饮子，正为此而设，何医者反忌之耶？一剂而喘逆定，神气清，声音出，四肢瘛动。三剂而病除八九，调以养精益气之品而愈。③神经衰弱《浙江中医杂志》（1982；3:125）：沈某，男，45岁。由于思想长期紧张，致心悸不宁，头晕，腰

痿，失眠，每晚需服安眠药。后病情加重，精神恍惚，记忆力衰退，耳鸣，心烦，畏冷，夜尿频清，面热，舌质红、苔薄，脉细弱稍数，此为肾阴亏虚，阴损及阳，阴阳失衡，心肾失交之症。处方：生熟地各15克，苁蓉15克，山萸肉、石斛、麦冬、巴戟天、柏子仁各10克，五味子8克，肉桂粉3克（吞），制附子、炙远志、石菖蒲各5克，白茯苓30克，龙眼肉3枚。5剂后好转，加减续投，共50剂而愈。④风痹（晚期梅毒脊髓痨）《新中医》（1985；6:16）：用地黄饮子原方去姜、枣、薄荷，治疗晚期梅毒脊髓痨，均服7剂，复诊时大部分病者都见好转。西医对比，证明有效率80%以上。

【备考】 本方改为丸剂，名“地黄丸”（见《饲鹤亭集方》）。《宣明论》地黄饮子加薄荷同煎，不拘时候服。

04747 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【异名】 地黄煎（《直指》卷二十六）。

【组成】 生地黄八两（研取汁） 鹿角胶一两（炙燥，碾为末）

【用法】 上先以童便五合，于铜器中煎，次下地黄汁及胶末，搅令匀，煎令熔，十沸后，分作三次服。当止。

【主治】 肺损吐血不止。

【备考】《直指》本方用法：加姜汁少许调下。

04748 地黄饮

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】 生地黄汁 生麦门冬汁 蜜各二合 竹沥一合 石膏二两半（研） 人参 芎藭 黄芩（去黑心）各一两半 当归（切，焙）桂（去粗皮）各二两 麻黄（去根节）一两 甘草（炙，锉）一两半

【用法】 上除地黄、麦门冬、竹沥、蜜外，并为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，下地黄等汁各半合，再煎一二沸，去滓，分二次服，空腹、食后各一次。

【主治】 精极。脏腑俱损，遍身虚热，骨节烦疼。

04749 地黄饮

【方源】《金鉴》卷七十四。

【组成】 生地 熟地 何首乌（生） 各三钱 当归二钱 丹皮 黑参 白蒺藜（炒去刺） 僵蚕（炒）各一钱五分 红花 甘草（生）各五分

【用法】 水煎，早、晚服。

【主治】 血风疮，血燥痒盛不眠。

【备考】 方中丹皮，《医钞类编》作“丹参”。

04750 地黄酒

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】 生地黄汁半小盏 益母草汁半小盏

【用法】 加酒一小盏相和，煎三五沸，分为三服，频频服之。

【主治】 产后崩中，下血不止，心神烦乱。

04751 地黄酒

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】 生地黄一石（洗，切）

【用法】 上捣取自然汁，绞去滓，用酒二斗和匀，同于瓷石器中，煎熟为度，瓷器盛贮。每温饮一盏，不拘时候。

【主治】 骨髓虚冷痛。

04752 地黄酒

【方源】《本事》卷一。

【组成】 熟干地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干）四两 附子（炮，去皮脐） 茵芋（去梗，锉，炒用） 羌活（去芦） 防风（去叉股） 芎藭各一两 石斛（洗，去根）二两 丹参二两半 牛蒡根二两半 牛膝（酒浸，水洗，焙） 杜仲（去皮，锉如豆，炒令黑） 桂枝（不见火）各一两半 大麻子（去皮）一升

【用法】 上锉细，入绢袋盛，宽贮之，用无灰酒一斗五升，封渍七日。逾日空心、食前饮一盏。常醺勿令吐。

【主治】 风在肝脾，语謇脚弱，大便多秘。

04753 地黄酒

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 生地二两 黄柏 苦参 丹参 草薢 菊花 银花 丹皮 赤芍 当归 枸杞子 蔓荆子 赤茯苓各一两 秦艽 独活 威灵仙各五钱 桑枝一两五钱 乌梢蛇（去头尾）一具

【用法】 上用好头生酒五十斤煮，退火七日用。

【功用】 清湿热，祛风邪。

【主治】 疠风。

04754 地黄散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】 生干地黄一两 黄芩一两 白芍药一两 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥） 当归一两 伏龙肝二两

【用法】 上为细散。每服二钱，以糯米粥饮调下，不拘时候。

【主治】 虚劳吐血不止。

04755 地黄散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】 生干地黄半两 赤芍药三分 柏叶一两 阿胶半两（杵碎，炒令黄燥） 当归半两 赤茯苓三分

【用法】 上为细散。每服二钱，煎黄耆汤调下。

【主治】 鼻衄日夜不止，面无颜色，昏闷。

04756 地黄散

【方源】 方出《圣惠》卷三十七，名见《圣济总录》卷六十九。

【组成】 生干地黄三两 鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】 上为细散。每服二钱，食后以糯米粥饮调下。

【主治】 舌上忽出血如簪孔者。

04757 地黄散

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】 地黄 麦门冬各二两 地骨皮 黄芩 茯神各一两 酸枣仁（生用） 白鲜皮 沙参半两 甘草（炙） 羚羊角屑各半两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 胆热，神思不爽，昏闷如醉，多睡少起。

【备考】 方中酸枣仁、白鲜皮用量原缺。

04758 地黄散

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】 地黄 黄耆 阿胶（麸炒焦） 贝母 桑白皮 蒲黄各一两 人参 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 甘草（生用） 赤芍药 当归（炒）各半两

【用法】 上为散。每服一钱，以粥饮调下。

【主治】 肺壅热，气逆吐血。

04759 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】 生干地黄（焙） 大黄（锉，炒） 朴消（研）各二两 没药（研）半两

【用法】 上为散。每服一钱匕，食后、临卧温水调下。

【主治】 飞血赤脉，及血灌瞳人疼痛。

04760 地黄散

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】 生干地黄（焙） 牛膝（酒浸，切，焙） 蒲黄（炒） 芎藭 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 刘寄奴 延胡索 芍药 乌头（炮裂，去皮脐） 蓬莪术（煨，锉）各一两

【用法】 上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】 妇人血风，走注气冷，月候不调，四肢烦热，头面虚肿麻木。

04761 地黄散

【方源】《阎氏小儿方论》。

【组成】 生干地黄（切，焙） 熟干地黄（切，焙） 当归（去芦头，切，焙）各一分 黄连（去须）一钱 木通一钱半 玄参半钱 甘草一钱半（锉，炒） 防风（去芦头，焙） 羌活 生犀末 蝉壳（去土） 木贼 谷精草 白蒺藜（去尖） 沙苑蒺藜各一钱 大黄（去皮取实者，锉，略炒）一钱

【用法】 上为细末。每服一字或半钱，煎羊肝汤食后调下，日三次，夜一次。

【主治】 ①《闫氏小儿方论》：大人、小儿心肝壅热，目赤肿痛，生赤脉，或白膜遮睛，甚则失明；及疮疹入眼。②《眼科阐微》：痘后翳膜遮睛。

【宜忌】 忌口将息。

【方论选录】《眼科阐微》：此方凉血之药居多，邪热蕴于血分中者，用此清之。

04762 地黄散

【方源】《幼幼新书》卷三十引《吉氏家传》。

【组成】 绿豆粉 滑石各一两 生干地黄二两 甘草半两（炙）

【用法】 上为末。每服二钱，小儿八岁以下每服半钱，新汲水调下，二服止。

【主治】 小儿心脏、脾脏、肝脏积热，下传小肠，尿血。

【宜忌】 忌热食、酸、咸。

04763 地黄散

【方源】《幼幼新书》卷二十引《张氏家传》。

【组成】 熟地黄（去土，洗） 当归 地骨皮（各洗） 枳壳（去瓤，麸炒） 柴胡 秦艽（各去芦） 知母 鳖甲（去黑皮尽，醋炙黄）各等分

【用法】 上为末。每服一钱半，水一盏，加乌梅半个，煎七分，和梅热服。

【主治】 小儿骨蒸体热，成劳倦。

04764 地黄散

【方源】《普济方》卷二九九引《海上方》。

【组成】 黄柏二两 升麻三两 生地黄五两 蔷薇根皮四两（一方用芦根，无蔷薇根皮）

【用法】 上㕮咀。以水七升，煮取三升，去滓含之，稍冷吐却，更含至愈。

【主治】 口疮。

04765 地黄散

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】 生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮各等分

【用法】 上焙干为末。每服二钱，蜜汤调下，一日三次，不拘时候。

【主治】 衄血往来久不愈。

【备考】 本方方名，《丹溪心法附余》引作"地黄饮"。改为膏剂，名"地黄膏"（见《不知医必要》）。

04766 地黄散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】 生地黄一两 芍药 土当归 甘草各半两

【用法】 上为散。每服三钱，水一盏半煎，食后温服。

【主治】 混睛外障，因毒风积热，白睛先赤而后痒痛，迎风有泪，闭涩难开，或时无事，不久又发，年深则睛变成碧色，满目如凝脂，横赤如丝。

04767 地黄散

【方源】《普济方》卷二三四。

【组成】 熟地黄一两 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁） 防风三分（去芦头） 羌活三分 黄耆一两（锉） 白芍药 木通（锉） 桂心各三分 人参一两（去芦头）

【用法】 上为末。每服用羊肾一对（切去脂膜），以水一大盏半，煎至一盏，去肾，入药末五钱，煎至六分，去滓，空心及晚食前分二次温服。

【主治】 虚劳耳聋及虚鸣。

04768 地黄散

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 生地黄 当归 熟地黄（焙干） 大黄各七钱 谷精草 黄连（酒炒） 白蒺藜（炒去刺） 木通 乌犀角（锉细末） 玄参 木贼草 羌活 炙甘草各五钱

【用法】 上为细末。每服二钱，煮猪肝或羊肝汁，食远调下。

【主治】 混睛障症。

04769 地黄散

【方源】《重楼玉钥》卷上。

【异名】 内消散。

【组成】 小生地二钱 京赤芍八分 苏薄荷六分 牡丹皮八分 牙桔梗八分 生甘草六分 净茜草（又名地苏木）一钱

【用法】 上以灯心二十节，红内消一钱（即茜草藤，五月五日采取，阴干）为引，开水泡药蒸服。每次须与紫正散合用勿离。

【主治】 喉风。

【加减】 孕妇，去丹皮，加四物汤；热盛者，加连翘、犀角；头痛闭塞，加开关散；烦渴，加银锁匙；潮热者，加柴胡、黄芩；咳嗽，加麦冬、知母；大便秘结，小便赤涩者，加木通；数日不大便者，加元明粉；热壅肺闭致气喘促者，加麻黄五分，先滚去沫，再入药内同蒸；痰稠，加贝母；阴虚者，合四物汤。

04770 地黄粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】 生地黄粥（《圣济总录》卷一九〇）、生地粥（《病机沙篆》）。

【组成】 生地黄汁三合 糯米三合

【用法】 上煮糯米作粥，临熟下地黄汁，搅调令匀，空腹食之。

【主治】 ①《圣惠》：妊娠漏胎，胞干胎死。②《饮膳正要》：虚劳瘦弱，骨蒸，寒热往来，咳嗽唾血。

04771 地黄粥

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】 生地不拘多少。

【用法】 上捣自然汁，浸粳米渗透，晒极干，再浸再晒三次。每用瓷器煎汤一升令沸，入前米一合熬成稀粥，空腹服。

【功用】 降心火，凉肝血。

【主治】 血热入肝，睡起目赤肿，良久无事者。

04772 地黄煎

【方源】《外台》卷三十一引《近效方》。

【组成】 生地黄汁二升 麦门冬汁五升 生姜汁五合 紫菀三两 贝母 款冬花 甘草（炙）各三两（一方有人参三两）

【用法】 上切。以水七升，煮取三大升，去滓，却入锅中，下地黄汁、麦门冬、姜汁等，煎三十沸，下蜜一升，煎如饧，盛不津器中放冷。含如枣许，渐增之。

【功用】 补心肺，令髭发不白。

【主治】 肺气咳嗽。

04773 地黄煎

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】 生地黄汁一中盏 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，研） 黄牛髓六两 阿胶三两（捣研，炒令黄燥，为末） 生姜汁一合 薯蓣

二两（末） 酥四两 蜜四两

【用法】 上用石锅子纳一处，以慢火熬成膏，收于瓷器中。每服一茶匙，以温粥饮调下，不拘时候。

【主治】 骨蒸肺痿，咳嗽，咽喉胸膈干痛。

04774 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】 生地黄汁五两 蜜 生姜汁各三合 沙糖一两半 升麻（细锉，绵裹同煎） 杏仁（去皮尖双仁，研成膏）各二两 人参（为末）三两

【用法】 上先将六味于铜器中微火煎，频搅，以地黄等汁尽为度，乃去升麻，下人参末搅匀，候冷，收置瓷盒中密盖。每服一枣大，含化，日夜各三次。

【主治】 肺虚声嘶气乏。

04775 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】 生地黄汁 生栝楼汁各二升半 牛脂三升 蜜半升 黄连（去须）一斤（为细末）

【用法】 上合煎，取五升，不津器收贮。每服一大匙，热汤化，通口服，一日三次。

【功用】 除热。

【主治】 膈消。

04776 地黄煎

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】 生地黄汁一升 生麦门冬（去心） 生天门冬（去心） 萎蕤各四两 细辛（去苗叶） 甘草（炙） 芎藭 白术各二两 黄耆 升麻各三两

【用法】 上除地黄汁外，并锉细，以绵裹，苦酒浸一宿，取出，更用猪膏三升煎，滤过，下地黄汁，并绵裹者药同煎，以膏鸣、水脉尽为度，去滓盛贮。每以少许，细细含化，缓咽之。

【主治】 脾胃风热，唇生核。

04777 地黄煎

【方源】《妇人良方》卷五引《经验方》。

【组成】 生干地黄 熟干地黄各等分

【用法】 上为细末，用生姜自然汁入水相和，打糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后用地黄汤送下；或只茶、酒、醋汤送下亦可，一日三次。觉脏腑虚冷，早晨先服八味丸一次。

【功用】《丸散膏丹集成》：补阴益血，退热。

【主治】 ①《妇人良方》引《经验方》：妇人血风劳，心忪，发热不退。②《校注妇人良方》：肝脾血虚发热，内热晡热，盗汗作渴，体倦，筋骨疼痛，筋脉拘挛，血虚发躁，虚热生痰咳嗽。

04778 地黄煎

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【异名】 地黄膏（《摄生众妙方》卷二）。

【组成】 生地黄不拘多少（取汁熬成煎） 生麦冬不拘多少（取汁熬成煎）

【用法】 上二煎合入一处，滤过，入砂锅内同熬一时四分，入蜜一分，再熬一时，取出，纳瓷罐内收之。每日用黄酒纳药一二匙搅匀饮之；不用酒者以白汤下，一日二三次。

【功用】 ①《丹溪心法附余》：驻容颜。②《寿世保元》：补肾水真阴，填精固精，生血乌发。

【主治】 男妇血虚。

04779 地黄煎

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】 生地一斤（擂绞净汁） 麦冬八两（擂绞净汁） 川芎一两（擂绞净汁） 生姜一两（擂绞净汁）

【用法】 盐花少许，煎膏噙化。

【功用】 壮水散滞。

【主治】 阴虚血滞鼻痛，脉虚微数者。

【方论选录】 阴虚血滞，清肃之令不行，无以分布营气以上荣于鼻，故鼻准作痛特甚。生地滋阴以大壮其水，川芎活血以上荣于鼻，麦冬之凉润能清心火，佐川芎以除肺燥，生姜之温行善开肺气，率地黄以止鼻痛也。绞汁取其味之清，煎膏得其力之醇，盐花润下，噙而化之，俾阴精上奉，则血滞顿行，而肺燥自润，安有鼻准作痛特甚之患乎。

04780 地黄膏

【方源】《幼幼新书》卷五引《惠眼观证》。

【组成】 郁金（皂荚水煮干，切细，焙干用） 豆粉各半两 甘草一分（炙） 马牙消（研）一钱

【用法】 上用生地黄汁及蜂蜜对合，入盏内约二分许，熬成膏，和成药。每服两皂子大，香熟水含化；或鹅翎扫涂口内亦得。

【主治】 ①《幼幼新书》引《惠眼观证》：初生儿鹅口、重舌、重腭。②《幼科释谜》：婴孩胎受热毒或生下两目不开。

04781 地黄膏

【方源】 方出《本事》卷六，名见《得效》卷十八。

【组成】 生地黄（研如泥，成膏） 木香（为细末）

【用法】 以地黄膏随肿大小摊于纸上，掺木香末一层，又再摊地黄贴肿上。不过三五次即愈。

【功用】 内消痈肿。

【主治】 ①《本事》：打扑伤损，及一切痈肿未破。②《得效》：臂臼脱出。

【方论选录】《本事方释义》：生地黄气味甘苦微寒，入手足少阴厥阴，能凉血；木香气味辛温，入足太阴，能疏滞，打伤扑损、痈肿未破者，皆能内消。大凡损伤痈肿，必因气血不宣畅，今既气得疏，血亦流行，肿岂有不消者哉。

04782 地黄膏

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】 山栀仁 绿豆粉各一两半 粉草六钱

【用法】 上药或晒或焙为末，用生地黄烂杵，取汁一两半，好蜜一两半，以薄瓦器盛，在铜铁铛中水煮成膏，如稀糊相似，候冷停分，入前药末，同在乳钵再杵匀，为丸如芡实大。每以一丸至二丸，麦门冬煎水化下，不拘时候。儿大者每用一丸，纳口内含化，或以新汲水调点舌上。

【主治】 ①《活幼心书》：小儿口内舌上，生疮作痛，饮食难进，昼夜烦啼。②《保婴易知录》：婴儿胎热，生后旬日之间多虚痰，气急喘满，眼闭，目胞浮肿，神困，呵欠吸吸作声，遍身壮热，小便赤，大便闭，时惊烦者。

04783 地黄膏

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】 鲜地黄不拘多少（捣汁，以十斤为则，和众药汁同熬） 当归身一斤 芍药半斤 甘杞子半斤 天门冬六两 川芎二两 麦门冬六两 莲肉四两 丹皮二两 知母 地骨皮各三两 人参 甘草各一两

【用法】 上将众药用水二斗，煎一斗，去滓净，用生地黄汁同熬成膏。

【功用】 滋阴降火，养血清肝。

【主治】 痨瘵。

04784 地黄膏

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 大黄 黄柏 黄连 黄芩 赤芍药 当归 绿豆粉 芙蓉叶 薄荷各等分

【用法】 上为末，用生地黄汁、鸡子清、蜜同调匀。贴太阳穴及眼胞上。

【主治】 赤肿疼痛，外障等眼疾。

04785 地黄膏

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】 生地二两 黄连一两 黄柏 寒水石各五钱 归尾 红花各二钱

【用法】 先将地黄酒浸，捣烂如泥，和药成饼，摊油纸上，贴目上下。

【功用】 行血凉血，去热毒。

【主治】 撞损瞳人，瘀血疼痛，或风热赤目泪出等眼疾。

04786 地黄醴

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 大怀熟地（取味极甘者，烘晒干以去水气）八两 沉香一钱（或白檀三分亦可） 枸杞（用极肥者，亦烘晒以去润气）四两

【用法】 上约每药一斤，可用高烧酒十斤浸之，不必煮，但浸十日之外，即可用矣。服完又加酒六七斤再浸半月仍可用。宜常服之。

【主治】 男妇精血不足，营卫不充。

【宜忌】 服此者不得过饮。

04787 地榆丸

【方源】《外台》卷二十五引《延年秘录》。

【组成】 地榆六两（炙） 赤石脂七分 厚朴六分 白术五分 干姜六两 龙骨七分 黄连十分 当归五分 熟艾五分 乌梅肉六分 甘草四分（炙）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至二十五丸，饮送下，一日二次。

【主治】 冷痢。不消食，腹中胀痛，气满不能食。

04788 地榆丸

【方源】《普济方》卷二〇七。

【组成】 地榆（微炒） 当归（微炒） 阿胶（糯米炒） 黄连（去须） 诃子肉（炒，取肉称） 木香（晒干） 乌梅肉（去核，净称）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，陈米饮吞下。

【主治】 泻痢或血痢。

【临证举例】 痢疾 先公昔在括苍，病痢踰月，得此方而愈。余在蜀上，士人苏子病此为甚，其妇翁孙亿来告急。录此方以与，旋即痊安。

【备考】 本方原名地榆散，与剂型不符，据《准绳·类方》改。

04789 地榆水

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 地榆 31 克

【用法】 加水两碗，煎成半碗，用纱布浸药液，湿敷

【主治】 急性湿疹，湿润糜烂，流水淋漓。

04790 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 地榆（锉） 柏叶（去枝） 蒲黄 酸石

榴皮（锉） 甘草（炙） 生熟地黄（焙）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】 室女月水不断。

04791 地榆汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】 地榆 当归（切，焙） 阿胶（炙燥） 黄耆（锉）各一两半 艾叶三分 龙骨（碎）二两

【用法】 上㕮咀如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 妇人经血暴下，兼带下积久不愈，面目萎黄，困倦羸瘦。

04792 地榆饮

【方源】 方出《回生集》卷下，名见《卫生鸿宝》卷二。

【组成】 地榆一斤 甘草二两 银花一两

【用法】 先将地榆用水十碗，煎三碗，再将甘草、银花煎一碗，空心腹。一服即消。

【主治】 大小肠痈。

【宜忌】 忌荤、腥、房事。

04793 地榆散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】 地榆半两（锉） 柏叶三分 甘草半两（锉，生用） 吴蓝三分 黄芩三分 刺蓟一两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加青竹茹一分，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 心肺热盛，吐血不止。

04794 地榆散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】 地榆（锉） 黄耆（锉） 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 槟榔 当归（锉，微炒） 黄芩 赤芍药各一两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 痔疾生疮肿痛，下血不止。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“地榆汤”。

04795 地榆散

【方源】《局方》卷六（宝庆新增方）。

【组成】 石榴皮 莲蓬（去茎） 甘草（炒） 罂粟壳（去瓤，蜜涂炙）各等分

【用法】 上为细末。每服二大钱，水一盏半，加生姜三片，煎至一盏，通口服，不拘时候。

【主治】 肠胃气虚，冷热不调，泄泻不止，或下鲜血，或如豆汁，或如豚肝，或脓血相杂，赤多白少，腹痛后重，遍数频并，全不入食。

【备考】 本方名“地榆散”，但方中无地榆，疑脱。

04796 地榆散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 熟地五两 黄耆三两（蜜炙） 白术一两半（炒黑） 当归三两 白芍一两半（炒黑） 炮姜五钱 地榆三两（炒炭） 茯苓一两半 炙草五钱

【用法】 上为散。每服三五钱，饮下。

【主治】 崩久不止，脉软者。

【方论选录】 气血两亏，冲任失守，而寒从中生，故腹痛频频，崩漏久不止焉。熟地补阴滋血以安冲任，黄耆补气举陷以奠生阳，白术健脾燥湿，当归养血归经，白芍敛阴止崩下，茯苓渗湿清治节，炮姜温中逐冷，地榆涩血止血，甘草以缓中益胃也。为散以散之，米饮以下之，使气血内充则中寒自化，而经脉完固，何腹痛不退，崩久不止乎。

04797 地榆膏

【方源】《赤水玄珠》卷二十。

【组成】 地榆一斤

【用法】 用水三升，煎至一半，去滓再煎如稠饧，空心服三合，一日二次。

【功用】 涩血。

【主治】 赤白带下骨立者。

【方论选录】《简明中医妇科学》：地榆凉血涩血，血自归经，安有赤白注溢之患哉。

04798 地髓汤

【方源】 方出《证类本草》卷六引《肘后方》，名见《普济方》卷二一四。

【异名】 牛膝膏、苦杖散（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】 牛膝（并叶）一大把

【用法】 上不以多少，酒煮饮之。

【主治】 小便不利，茎中痛欲死；兼治妇人血结腹坚痛。

04799 地龙饼子

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】 地龙（炒） 海蛤 硫黄（研） 乌头（炮裂，去皮脐）各半两 鲮鲤甲（炙）一两

【用法】 上为末，醋煮面糊为丸，如鸡头子大，捏作饼子，晒干。每用一饼，以葱白裹安在手足节上，以手帛系住，搁在一杉木桶上，用热汤淋之，候觉骨中热极，方解去帛子。手足未得舒展时，再用热汤淋之。每一饼可用三次。每用药毕，当着衣服盖之，不得透风。

【主治】 中风，手足筋急，拘挛疼痛。

04800 地龙浸液

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 活蚯蚓。

【用法】 洗净，放入白糖内，即化为液体。外涂。

【主治】 带状疱疹。

04801 地肤子丸

【方源】 《外台》卷二十一引《广济方》。

【组成】 地肤子五两 决明子一升

【用法】 上为末，米饮和丸。每服二十丸至三十丸，食后以饮送下。

【主治】 雀目。

04802 地肤子汤

【方源】 《外台》卷三十六引《小品方》。

【组成】 地肤子一分 瞿麦 冬葵子各三分 知母 黄芩 猪苓 海藻 橘皮 升麻 通草各一分半 大黄八分

【用法】 上切。以水二升，煮取一升，量儿大小与服。

【主治】 ①《外台》引《小品方》：小儿小便不通。②《千金》：小儿热毒入膀胱中，忽患小便不通，欲小便则涩痛不出，出少如血，须臾复出。

【备考】 《千金》有枳实三分。

04803 地肤子汤

【方源】 《医学正传》卷七引《录验》。

【组成】 地肤草 车前子各一钱 知母（去毛，炒） 黄芩 赤茯苓 白芍药 枳壳（麸炒黄色）各七分 升麻 通草 甘草各三分

【用法】 上切细，作一服。水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】 妊娠子淋，小便涩数。

04804 地骨皮丸

【方源】 《圣济总录》卷九十三。

【组成】 地骨皮 龙胆 枳壳（去瓤，麸炒） 黄芩（去黑心） 甘草（炙，锉） 山栀子（去皮）各一两 鳖甲（醋浸，炙黄）一两半 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后米饮送下，一日二次。

【主治】 骨蒸羸瘦，经久不愈，邪热留连。

04805 地骨皮丸

【方源】 《奇效良方》卷六十。

【组成】 地骨皮 黄耆 桑白皮 山栀子 马兜铃各等分

【用法】 上为细末，甘草膏为丸，如芡实大。每服一丸，食后噙化。

【主治】 肺热口臭，口中如胶，舌干发渴，小便多。

04806 地骨皮汤

【方源】 《圣济总录》卷四十二。

【组成】 地骨皮 生干地黄各五两（锉细） 前胡（去芦头）二两半 茯神（去木）二两 麦门冬（去心，焙） 知母各二两半 人参 甘草（炙，锉）各二两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加豉及粟米各少许，同煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 谋虑伤胆，胆气上溢，膈脘虚烦，常觉口苦。

04807 地骨皮汤

【方源】 《圣济总录》卷四十八。

【组成】 地骨皮五两 白前二两 石膏（研）六两 杏仁（去皮尖双仁，炒）三两 桑根白皮（锉）四两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服六钱匕，水二盏，加竹叶十片，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 肺实热，喘逆胸满，仰息气急。

04808 地骨皮汤

【方源】 《圣济总录》卷五十九。

【组成】 地骨皮 栝楼根 黄连（去须） 麦门冬（去心，焙） 黄芩（去黑心）各一两 茯神（去木） 远志（去心）各三分 甘草（炙，锉）半两 石膏（碎）二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 心脾虚热，暴渴不已。

04809 地骨皮汤

【方源】 《圣济总录》卷九十三。

【组成】 地骨皮 白茯苓（去黑皮） 麦门冬（去心，焙） 柴胡（去苗）各一两半 赤芍药 甘草（炙令赤）各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，用水一盏半，煎至一盏，去滓，食后分二次温服。

【主治】 虚劳五蒸。

04810 地骨皮汤

【方源】 《圣济总录》卷一一九。

【组成】 地骨皮一两 细辛（去苗叶）半两 生干地黄（切）一两 戎盐（研）二分

【用法】 上为粗末。每用五钱匕，以水二盏，煎

三五沸，去滓，热漱冷吐。以愈为度。

【主治】 牙齿疼痛，吃物不得。

04811 地骨皮汤

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】 地骨皮半斤 当归四两 盐二两 白矾末一两

【用法】 上锉细。每用药五两，水九升，煎取二升，去滓，再煎至一升，收瓷器中，用绵蘸拭患处五七次愈。

【主治】 风瘾疹。

04812 地骨皮汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】 生地 麦冬 黄耆 山药 五味子 地骨皮 淡竹叶

【主治】 赤浊，因思虑过度，心虚有热者。

04813 地骨皮饮

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】 地骨皮（锉） 土瓜根（锉） 栝楼根（锉） 芦根（锉）各一两半 麦门冬（去心，焙）二两 枣七枚（去核）

【用法】 上锉，如麻豆大。每服四钱匕，水一盏，煎取八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 消渴，日夜饮水不止，小便利。

04814 地骨皮饮

【方源】 方出《元戎》，名见《金鉴》卷六十二。

【组成】 四物汤加丹皮 地骨皮

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《元戎》：妇人骨蒸。②《金鉴》：痈疽溃后，但热不寒。

04815 地骨皮散

【方源】 方出《圣惠》卷四，名见《普济方》卷十七。

【组成】 地骨皮一两 葳蕤一两 玄参一两 黄耆一两（锉） 子芩一两 麦门冬一两（去心） 川升麻一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服三钱，用水一中盏，加竹叶七片，煎至五分，去滓，加生地黄汁、蜜各半合，更煎一两沸，不拘时候温服。

【主治】 ①《圣惠》：心气盛实，气血壅涩，阴阳不通，荣卫隔塞，上焦壅滞，心胸烦热。②《普济方》：心胸中久积烦热，口干颊赤。

04816 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】 地骨皮二分 赤芍药一两 桑根白皮一两 茅根一两（锉） 甘草一两（炙微赤，锉） 柴胡二两（去苗）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 骨蒸，羸瘦少力，燥热，背膊疼痛，小便赤黄，口舌干燥烦渴。

04817 地骨皮散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 地骨皮二两 栝楼根一两 石膏一两 黄连一两（去须） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 消中。虚羸，烦热口干，眠卧不安。

04818 地骨皮散

【方源】《博济》卷一。

【异名】 地骨皮汤（《圣济总录》卷一七九）、地骨皮枳壳散（《元戎》卷五）。

【组成】 地骨皮（水洗） 秦艽（水洗净） 柴胡（去芦） 枳壳（去白，麸炒香熟用） 知母（生用） 当归（去芦） 鳖甲（去裙襕，醋炙令黄色）各等分

【用法】 上为末。每服二大钱，水一大盏，加桃、柳枝头各七个，生姜三片，乌梅一个，同煎至七分，去滓温服，每日空心、临卧各一服。

【主治】 骨蒸壮热，肌肉减瘦，多困少力，夜多盗汗。

04819 地骨皮散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】 地骨皮一分 荆芥穗二两 石膏（研，飞过）二两 白花蛇（酒浸，炙，去皮骨） 天南星（浆水煮软，切，焙）各一两

【用法】 上为散。每服一钱匕，加腊茶一钱，食后、临卧汤点服。

【主治】 脑风，头痛时作，及偏头疼。

【备考】 本方方名，《本草纲目》引作“白花蛇散”。

04820 地骨皮散

【方源】 方出《圣济总录》卷一一四，名见《普济方》卷五十五。

【组成】 地骨皮半两 五倍子一分

【用法】 上为细末。每用少许，掺入耳中。

【主治】 耳聋，流脓水不止。

04821 地骨皮散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 地骨皮（自采佳） 知母 银州柴胡（去芦） 甘草（炙） 半夏（汤洗七次，切，焙）

人参（切去顶，焙） 赤茯苓各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，加生姜五片，水一盏，煎至八分，食后温服。

【主治】 小儿虚热潮作；亦治伤寒壮热及余热。

【备考】 本方加秦艽，名“秦艽饮子”（《见《婴童百问》引《全婴方》），又名“秦艽饮”（见《婴童百问》）。

04822 地骨皮散

【方源】《活幼口议》卷十八。

【组成】 生干地黄半两 真地骨皮 细辛各一分 五倍子（炒令黑）二钱

【用法】 上为细末。每用少许敷之。

【主治】 小儿肾疳，龈腭、牙齿肉烂腐臭，鲜血常出。

04823 地骨皮散

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】 人参 地骨皮 柴胡 黄耆 生地黄各一两半 白茯苓半两 知母一两 石膏二两

【用法】 上㕮咀。每服一两，水二盏，加生姜七片，煎至七分，去滓，细细温服。

【主治】 肺痈，疮疡，气虚内热者。

①《云岐子脉诀》：脏中积冷，荣中有热，脉举之有余，按之不足，阳有余阴不足者。②《外科发挥》：肺痈。骨蒸潮热，自汗，咳吐腥秽稠痰。③《景岳全书》：疮疡，气虚内热，烦渴不宁。

04824 地骨皮散

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】 地骨皮 茯苓各半两 柴胡 黄芩 生地黄 知母各一两 石膏二两

【用法】 上㕮咀。加生姜，水煎服。

【主治】 阳毒浑身壮热，自汗。

【加减】 如自汗已，多加知母。

04825 地骨皮露

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 地骨皮一斤

【用法】 用蒸气蒸馏法，每斤吊成露五斤。每用四两，隔水温热饮服。小儿酌减。

【功用】 清热解烦。

【主治】 骨蒸内热。

04826 地黄饮子

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】 生地黄汁六合 芦根一握 生麦门冬一升（去心） 人参八分 白蜜三合 橘皮六分 生姜八分（一方云生姜汁一合）

【用法】 上切。以水六升，煮取二升，去滓，下地黄汁，分三次温服，如人行四五里更进一服。

【主治】 虚热，呕逆不下食，食则烦闷。

【宜忌】 忌芜荑、生冷面、炙肉、荞麦、猪肉、蒜、粘食。

【备考】 本方方名，《医心方》引作“地黄饮”。

04827 地黄饮子

【方源】《简易方》引《家宝方》（见《医方类聚》卷一二五）。

【异名】 生地黄饮子（《得效》卷七）、生津地黄饮子（《证治宝鉴》卷四）、地黄饮（《医林纂要》卷四）。

【组成】 人参（去芦） 生干地黄（洗） 熟干地黄（洗） 黄耆（蜜炙） 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 枳壳（去瓤，麸炒） 石斛（去根，炒） 枇杷叶（去毛，炒） 泽泻 甘草（炙）各等分。

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏，煎至六分，去滓，食后、临卧温服。

【功用】《中国医学大辞典》：滋补气血。

【主治】 ①《简易方》引《家宝方》（见《医方类聚》）：消渴咽干，面赤烦躁。②《医钞类编》：消渴，阴虚火炎，阳明死热。

【方论选录】 ①《简易方》引《家宝方》（见《医方类聚》）：此方乃全用二黄丸、甘露饮料生精补血润燥止渴；佐以泽泻、枳壳疏导二腑，使心火下行，则小腑清利；肺经润泽，则大腑流畅，宿热既消，其渴自止。②《医林纂要》：此方意在滋阴血以济亢阳，故麦冬、枇杷叶所以佐天冬而清肺；黄耆、甘草所以佐人参而和脾胃；生地、泽泻所以佐熟地而滋肾；引肾水以上荣，而亢阳不能害，则于石斛取之。固其本根达其条枝，荣其枝叶，破其上逆之势，而泻其余邪。三焦之气顺，心包之血滋，火散而气清，润泽荣华，无烦躁咽干之病。

04828 地黄饮子

【方源】《准绳·幼科》卷一。

【组成】 生地黄 赤芍药各二钱 羌活（去芦） 当归（去芦） 甘草各一钱

【用法】 上为极细末。用灯心煎汤，食前服。乳母宜服。

【主治】 小儿生下，满身面目皆黄，状如金色；或面赤身热，眼闭不开，大便不通，小便如栀子汁，满身生疮。

【宜忌】 忌酒、面、五辛之物。

【备考】 本方方名，《丸散膏丹集成》引作“地黄饮”。

04829 地黄饮子

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】生地　丹皮　天门冬　黄芩　地骨皮　白芍

【主治】肝肾精竭，血燥劳瘵，及血分有火之鼻衄

【加减】若尺脉大，加黄柏、知母。

04830　地黄煎丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】生地黄八斤（净洗晾干，捣绞取汁）　大麻仁半斤（以水研滤取汁）　牛髓一斤　白蜜二斤　无灰酒五升　大枣五十枚（煮取肉，烂研）　生天门冬一斤（捣绞取汁）（上七味，同于银锅中熬成膏，入后药末）　鹿角胶五两（捣碎，炒令黄燥）　石斛一两（去根，锉）　覆盆子二两　酸枣仁一两（微炒）　肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）　人参二两（去芦头）　附子二两（炮裂，去皮脐）　牛膝一两（去苗）　白茯苓二两　五味子二两　熟干地黄三两　补骨脂二两（微炒）　干漆二两（捣碎，炒令烟出）　肉桂二两（去皱皮）　杜仲二两（去粗皮，炙令黄，锉）　菟丝子三两（酒浸一宿，晒干，别捣罗为末）

【用法】上为末，入前地黄煎汁，以慢火熬，候可丸，即丸如弹子大。每服一丸，空心、午前、晚饭后以温酒化下。若丸如梧桐子大，每次服二十丸。其药腊月合弥佳。

【功用】填骨髓。

【主治】骨极，肾脏劳伤，少气不足，羸瘦无力，肢节痠疼，腰脚多痛，不能久立。

04831　地黄煎丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】生地黄五斤（捣取汁）　无灰酒一斗（银石器盛，入地黄汁，用文武火熬成膏，后入诸药）　肉苁蓉（酒浸，切，焙）二两　巴戟天（去心）　鹿茸（酒炙，去毛）　桑螵蛸（炒）　附子（炮裂，去皮脐）　黄耆（锉）　肉豆蔻（去壳）各一两　五味子（炒）　蛇床子（炒）　石斛（去根）　补骨脂（炒）　牛膝（酒浸，切，焙）　青木香　陈橘皮（汤浸，去白，焙）各三分　枳壳（去瓤，麸炒）　荜澄茄　沉香各半两（锉）

【用法】上为末，以地黄煎搜和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至四十丸，空心、食前温酒送下。

【功用】益气养神，驻颜色，调血脉。

【主治】精极，脏腑虚羸，骨节烦疼，精泄不止。

04832　地黄煎丸

【方源】《外科精义》卷下

【组成】生地黄（新者）十两（洗，水浸研如泥）　黄连五两　黄芩（去腐）二两　枳壳（炒，去瓤）　大黄各二两五钱　人参二两

【用法】上除地黄煎外，共为细末，再和地黄煎，炼蜜为丸，如豌豆大。每服五七十丸，食后温水送下。

【功用】清利胸膈，明目。

【主治】脏腑有热，胸膈痰实，气血不和，经络秘涩，多生疮肿；或已患恶疮毒肿，大小便结涩。

04833　地榆合剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】地榆33克　黄连33克　黄柏33克

【用法】上为末，再加冰片1克，调菜油100毫升，搽患处。

【主治】烫火伤。

04834　地榆油膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】地榆粉31克　冰片2克　麻油60毫升

【用法】调膏。外用。

【主治】胎火丹毒。

04835　地肤大黄汤

【方源】《外台》卷二十三引《小品方》。

【异名】大黄散（《圣惠》卷七十四）。

【组成】地肤草　大黄各二两　知母　黄芩　茯苓（一作猪苓）　芍药　枳实（炙）　升麻　通草　甘草（炙）各二两

【用法】上切。以水八升，煮取三升，分三次服。得下后，淋不愈，还饮地肤蒌根汁。

【主治】实热子淋。

①《外台》引《小品方》：子淋。②《圣惠》：妊娠小便淋涩，脐腹妨闷。③《济阴纲目》汪淇笺释：实热而淋者。

【宜忌】忌海藻、菘菜、酢物。

【方论选录】①《济阴纲目》：此治实热而淋者，大便通则小便自利。②《医略六书》：妊娠胎肥火盛，热壅胃肠，而膀胱之气亦不能化，故小便涩痛，淋沥不已。大黄泻热通幽，水道亦得以快；枳壳泻滞化气，火热亦从下泄；地肤子利水道以通淋；猪苓利溺道以通闭；条芩清热安胎；白芍敛阴护胎；知母清热存阴以润燥；甘草泻火缓中以除痛；更以升麻升举清阳，而浊阴自降。水煎温服，使热降清升，则气得施化，而小便清长，何淋沥涩痛之有？胎孕无不安矣。

04836 地肤子洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 地肤子 12 克 防风 10 克 独活 10 克 荆芥 10 克 白芷 10 克 赤芍 10 克 川椒 10 克 桑白皮 10 克 苦参 10 克

【用法】 用水 1.5 升煎沸，洗浴。

【主治】 皮肤瘙痒症，荨麻疹。

04837 地肤子煎剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 地肤子 15 克 蛇床子 15 克

【用法】 水煎洗。

【主治】 毛囊炎。

04838 地骨皮饮子

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 地骨皮二两 生干地黄一两 人参一两（去芦头） 麦门冬二两（去心） 白龙骨一两 黄耆一两（锉）

【用法】 上锉细。每服半钱，以水一大盏，加生姜半分，小麦半合，煎至五分，去滓，每于食前温服。

【主治】 肾中虚热，虽能食，小便数多，渐加瘦弱。

04839 地黄大补丸

【方源】《痈疽神秘验方》。

【组成】 龟版（酒炙）一两半 黄柏（酒炒）五钱 知母五钱（去皮，酒拌，捣膏） 人参二两 生地黄一两半（酒拌，铜器蒸半日，捣膏）

【用法】 上为细末，入二膏，炼蜜或酒糊丸，梧桐子大。每服七八十丸，空心温酒送下，盐汤亦可。

【主治】 痈疽愈后作渴。

04840 地黄门冬酒

【方源】 方出《千金》卷十四，名见《千金方衍义》卷十四。

【组成】 天门冬十斤 地黄三十斤

【用法】 上捣取汁，作煎服。

【主治】 ①《千金》：风癫。②《千金方衍义》：阴虚痫妄。

【方论选录】《千金方衍义》：《千金》治癫都用祛风破结，此独养正除邪，盖生地黄有逐血除痹之功，天门冬有暴风湿痹、强骨髓、去伏尸之治。至于酿酒为煎，补益多端，岂止治风癫恶疾而已哉。

04841 地黄竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】 生地黄（切，焙） 一斤 青竹茹五两 黄芩（去黑心） 当归（焙） 甘草（炙） 芍药 芎藭各三两 桂（去粗皮）一两 釜月下焦黄土一块如鸡子大。

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【功用】 消热结。

【主治】 衄血，血汗。

04842 地黄余粮汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 熟地黄 禹余粮 五味子

【主治】 久痢，阴伤气陷，肛坠尻痠。

【方论选录】 肛门坠而尻脉痠，肾虚而津液消亡之象，故以熟地、五味补肾而酸甘化阴，余粮固涩下焦，而痠可除，坠可止，痢可愈也。

04843 地黄青娥汤

【方源】 方出《岳美中医案集》，名见《古今名方》。

【组成】 熟地黄 12 克 山茱萸 6 克 怀山药 6 克 建泽泻 4.5 克 粉丹皮 4.5 克 云茯苓 4.5 克 枸杞果 6 克 甘菊花 3 克 五味子 4.5 克 麦门冬 4.5 克 补骨脂 3 克 胡桃肉 3 克

【用法】 水煎服。

【功用】 滋养肝肾。

【主治】 颤抖症，手颤动不休，平举更甚，腿痿软，头晕，视物模糊，大便溏泻，日行二至三次，舌红无苔，脉弦细。

04844 地黄紫苏煎

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】 生地黄三两 生姜二两（与地黄和研，绞取汁） 生玄参一斤 生天门冬（去心）半斤 生麦门冬（去心）一斤 紫苏子（炒、研）二两 生牛蒡四两（细切，与玄参至紫苏子四味烂研，以水少许拌匀，布绞取汁） 杏仁（去皮尖双仁）三两（研，别入）

【用法】 上将两等药汁并杏仁和匀，于银石器中慢火煎令稍稠，停火，加白蜜五两，真酥二两和匀，子饭甑上蒸少时，候冷，以净器盛。每服一小匙，含化，一日三次，不拘时候。

【主治】 肺痿喘嗽，涕唾稠粘，咽膈不利。

04845 地榆芍药汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 苍术八两 地榆三两 卷柏三两 芍药三两

【用法】 上㕮咀。每服一两，水一大盏半，煎至一半，去滓温服。

【主治】 泻痢脓血，乃至脱肛。

04846 地榆防风散

【方源】《保命集》卷中。

【异名】 地榆防风汤(《何氏济生论》卷三)

【组成】 地榆 防风 地丁香 马齿苋各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，温米饮调下。

【主治】 破伤中风、半在表、半在里、头微汗、身无汗。

【备考】 方中地丁香，《医钞类编》作"紫花地丁"。

04847 地榆败毒散

【方源】《外科医镜》引沈雨苍方。

【组成】 西党参三钱 羌活三钱 独活三钱 柴胡三钱 前胡三钱 甘草三钱 茯苓三钱 枳壳二钱（炒用） 抚芎二钱 桔梗二钱 生地榆一两 紫竹根一把 生姜三片

【用法】 水煎服。

【主治】 中狂犬毒，症见卒病心腹痛，神志不清，痛极无聊，自咬肌肉，甚者嚼瓷器衣服，闻声及风则战慄惊惕不安。

【临证举例】 狂犬病 道光丙午路经湘潭，见米船伙卒病心腹剜痛，烦躁欲死，医不识何疾。同舟醴陵客大呼曰：殆哉，此癫犬略发，乃死证也。速用地榆败毒散大剂浓煎，一剂神识清。再剂其病若失。

04848 地榆槐角丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】 当归（酒洗）二两 川芎一两 白芍（酒炒）一两 生地黄二两 黄连（酒炒）一两 条芩（酒洗）一两 黄柏（酒炒）一两 栀子（炒）一两 连翘一两 地榆二两 槐角一两半 防风一两 荆芥五钱 枳壳（去瓤）二两 茜根五钱 侧柏叶五钱 茯神五钱 陈皮五钱

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心白滚水送下，或加细茶亦可。

【主治】 便血。

04849 地黄龙牡榴梅散

【方源】《医学从众录》卷八。

【组成】 大生地一两（炒） 龙骨（煅，研末） 牡蛎（煅）各四钱 石榴皮（炒） 乌梅肉（炒） 陈棕皮 百草霜各三钱 阿胶六钱（蒲黄拌炒） 陈京墨二钱（炒）

【用法】 上为极细末，用淮山药五钱研末，醋、水打糊为丸，分作七日服。内加人参三钱尤效，或用人参汤下。

【主治】 血崩。

【备考】 本方方名，据剂型当作"地黄龙牡榴梅丸"。

04850 朽木汤

【方源】《医方考》卷四。

【组成】 朽木（方寸者）三十枚

【用法】 水煎服。

【主治】 消渴。

【方论选录】 朽木年深而质腐，腐者水之气。水足以制火，故腐足以胜焦，热中、消中皆焦证也，故此物主之。

04851 朴附丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两 附子（炮裂，去皮脐）半两 甘草（炙）一两 干姜（炮裂）一两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温米饮送下。

【主治】 大肠虚冷，便利滑泄，不思饮食，肠鸣腹痛。

04852 朴附丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五引李学渝方。

【组成】 川厚朴（去粗皮，锉作骰子块） 附子（去皮脐，切骰子块）各二两 大肉枣五十个 生姜五两（以上四味，用水一大碗煮干，拣出枣子，将三味药焙干） 肉豆蔻（面裹煨） 诃子（煨，取肉） 川白姜（炮，洗）各一两 人参半两（去芦）

【用法】 上为细末，将前枣肉为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至百丸，米饮送下。

【功用】《普济方》：补益脾气，止心腹撮痛，温胃进食。

【主治】 脾胃久虚，谷肠滑泄，脐腹绞痛，肠鸣泄泻，肢体无力。

04853 朴附丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】 厚朴二十二两（去皮，锉。用生姜二斤，切片，水一斗，于砂石器内煮。自晓至暮，水干添汤，候干取出，去姜） 干姜四两（炮、洗） 甘草二两（炙。以上三味同煮如前法，取出焙干） 补骨脂（炒） 舶上茴香（炒） 附子（炮，去皮脐）各五两 肉豆蔻四两（面裹煨）

【用法】 上为细末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前米饮或温酒送下。

【主治】 泄泻。

04854 朴栀散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】 栀子（炒黑） 朴消各等分

【用法】 上为末。每服一二匙，滚水下。

【主治】 胃热呕吐，手足心皆热者。

04855 朴消散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 川朴消半两（炒熟） 朱砂一分（细研，水飞过） 龙脑半钱（细研） 乌贼鱼骨半两（细研） 黄柏一两 黄连一两（去须）

【用法】 上件药，先取黄柏、黄连杵碎，以三盏水，煎取浓汁一盏，去滓，于日中煎令干，然后以诸药相和，细研如面。每以铜箸取如绿豆大点之。

【主治】 眼生花翳。

04856 朴消散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 川朴消二两 硼砂半分（通明者） 白矾半两（通明者）

【用法】 上为末，将小瓷瓶子，以慢火炙令热，然后抄药末，徐徐入在瓶内，旋以柳枝子搅拨，不令着瓶子四边，又入药末，续续添火，候药尽。良久，断烟，以干瓦子盖口，更以大火，烧经一炊久，去火，候瓶冷，其药如雪轻肥便成。即埋在湿土内七日，出火毒讫，取出细研。每以铜箸取少许点之，一日四五次。

【主治】 眼久积顽翳，盖覆瞳仁。

04857 朴消散

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【异名】 白花散（《卫生宝鉴》卷十七）。

【组成】 朴消不拘多少

【用法】 上为细散。每服二钱匕，温茴香酒调下，不拘时候。如热燥，以蜜水调服。

【主治】 膀胱热，小便不通。

04858 朴消散

【方源】《袖珍小儿》卷七。

【组成】 朴消二分 紫雪二分 白盐半分

【用法】 上为末。每用五分，以竹沥井水调敷舌上下。

【主治】 肿舌。

04859 朴消散

【方源】《幼科释谜》卷五。

【组成】 大黄 牡蛎各五钱 朴消二钱

【用法】 每末一钱，或二钱，用田螺一枚，洗净浸一宿，水调涂。

【主治】 ①《幼科释谜》：小儿脐突，或痛或不痛；及感湿热，阴及囊肿。②《梅氏验方新编》：小儿脐疮。

04860 朴麝散

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】 朴消（研）五两 麝香（研）一分 甘草（炙）一分 淡竹叶一握 黄芩（去黑）半两 芦根（锉）一两 山栀子（去皮）一两

【用法】 上七味，锉五味如麻豆大，入研者二味，以新汲水二升，将药入铛中煎约半升，去滓澄清，取瓷瓶一个，倾药汁在内，以物盖定瓶口，用盐泥固济，慢火煅一复时，去火放冷却，将瓶安在水中，无令水至瓶口，浸经一宿，至明日打破瓶子，取药如金色，研为细散。每服半钱匕，冷水调服，绵裹咽津亦得。

【主治】 重舌，及大行阴黄，丹石发动，一切热毒。

04861 朴附二陈汤

【方源】《医林绳墨大全》卷三。

【组成】 二陈汤加厚朴 香附

【功用】 开郁行气，清痰降火。

【主治】 脾胃虚弱，不能健运。膈有郁火，胃有稠痰，积滞蕴蓄，冲逆于心而嗳气嘈杂。

04862 朴果四皮饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 川朴 广皮 猪苓各一钱五分 浙苓皮 大腹皮各三钱 草果仁 青皮各一钱

【用法】 用冬瓜皮子各一两，煎汤代水。

【功用】 清热导湿。

【主治】 湿热郁积于中而成胀满。

04863 朴实六合汤

【方源】《医方集解》。

【组成】 四物四两加厚朴 枳实（麸炒）各五钱

【主治】 妊娠伤寒后，虚痞胀满，阳明本虚者。

04864 朴消荡胞汤

【方源】《千金》卷二。

【异名】 荡胞散（《圣惠》卷七十）、大荡胞汤（《医学正印》卷下）。

【组成】 朴消 牡丹 当归 大黄 桃仁（生用）各三钱 细辛 厚朴 桔梗 赤芍药 人参 茯苓 桂心 甘草 牛膝 橘皮各一铢 虻虫十枚 水蛭十枚 附子六铢

【用法】 上㕮咀，以清酒五升，水五升合煮，取三升，分四服，日三夜一。每服相去二时，更服如常。覆被取少汗，汗不出，冬日着火笼之，必下积血及冷赤脓如赤小豆汁。若斟酌下尽，气力弱、大困，不堪更服，亦可二三服即止。如大闷不堪，可

食酢饭冷浆一口即止。然恐去恶物不尽，不大得药力，若能忍服尽大好，一日后仍着导药。

【主治】 妇人立身以来全不产，及断绪久不产三十年者。

【方论选录】《千金方衍义》：土中有石则草不生，渠中有阜则水积阻，妇人立身不产，断绪不孕，皆子脏有瑕之故。方中消、黄、虻虫决渠之捶着也，桂心、附子钮荒之力士也；人参、茯苓开疆之粮饷也；桔梗、厚朴药中宣使，病在下，取之上也；其余牡丹、赤芍等味皆供驱役之流。此方专涤胞门积血，故以抵当为主而兼下瘀血、桃仁承气之制，其力专矣，犹恐积垢难动，又需参、附之大力直捣长驱，何惮坚垒不破耶？服后覆取微汗，不独迅扫诸内，并以开发元府，宣通中外。但药力过峻，须防瞑眩，乃预拟酸收之法，可无仓卒之虞。然必天阴脐下疼痛，方为瘀血之确徵。

04865 芋粥

【方源】《药粥疗法》引《食物本草》。

【异名】 芋艿粥(《饮食治疗指南》)。

【组成】 芋头 60～90 克 粳米 60～90 克 沙糖适量

【用法】 将新鲜芋头洗净去皮，切成小块，与粳米煮粥，粥成后加入沙糖稍煮一二沸即可。

【功用】 消瘰疬，补脾胃。

【主治】 小儿瘰疬，虚疬，慢性淋巴结炎，淋巴结核，淋巴腺肿。

04866 芍甘汤

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】 白芍三钱 甘草一钱

【用法】 加生姜五片，水煎服。

【主治】 诸腹痛。

【加减】 热痛，加黄芩。

04867 芍药丸

【方源】《医心方》卷十二引《经心录》。

【异名】 芒消丸(《千金》卷十五)。

【组成】 芍药六分 芒消六分 黄芩五分 大黄八分 杏仁八分

【用法】 上为丸，如梧桐子大。每服十五丸，一日三次。

【主治】 胀满，大便不通。

【备考】 本方原名芍药汤，与剂型不符，据《圣济总录》改。

04868 芍药丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】 芍药 桔梗（去芦头，炒） 细辛（去苗叶） 蜀椒（去目并闭口者，炒出汗） 桂（去粗皮） 干姜（炮）各三分 附子（炮裂，去皮脐）半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒或米饮送下，不拘时候。

【主治】 心疝。心胁痛及绕脐痛。

04869 芍药丸

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】 芍药（炒） 白鸡冠花（炒） 陈槐花各等分

【用法】 取青蒿根汁煮丸。米饮送下。

【主治】 酒毒下血。

04870 芍药汤

【方源】《伤寒微旨》卷上。

【组成】 芍药 荆芥穗各一两 石膏三两 甘草（炙）半两

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，加生姜一块（擘破），同煎至七分，去滓热服。如三五服后，犹恶风，再加生姜一块，大枣二个，煎法如前。

【主治】 伤寒无汗恶风，脉浮数，或紧或缓，三部俱有力者。

04871 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 芍药 防风（去叉） 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙干）各三分 葛根（锉）一两 黄芩（去黑心） 防己 桂（去粗皮）各半两 干姜（炮裂）一两 白术 人参 独活（去芦头） 芎藭 竹沥（旋入） 升麻 牛膝（去苗，锉，微炒） 石膏（碎） 陈橘皮（汤去白，焙） 羚羊角（镑屑） 五加皮（炙）各半两

【用法】 上除竹沥外，㕮咀如麻豆大。每用药十二钱匕，以水四盏，煎取二盏，去滓，加竹沥一合，更煎三沸，分三次温服，空心、午时、夜卧各一服。

【主治】 中风半身不随。

04872 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】 芍药 熟干地黄（焙） 当归（切，焙）各二两 防风（去叉） 秦艽（去苗土） 羌活（去芦头） 防己 芎藭 白术各一两 桂（去粗皮） 甘草（炙）各三分

【用法】 上为粗末，每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓温服，一日二次。

【主治】 脉痹。营卫不通，四肢疼痹。

04873 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】 芍药 当归（切，焙） 黄芩（去黑心） 黄连（去须，锉，炒）各三两 伏龙肝一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 伤寒后血痢，腹痛不可忍者。

04874 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】 赤芍药 车前子叶 木通各一两

【用法】 上锉细。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 胞转，小便不利。

04875 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】 芍药 地骨皮各三分 柴胡（去苗）一两 甘草（炙，锉）半两 石膏（碎）一两 当归（切，焙）三分 鳖甲（醋浸，炙黄）一两 白术一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓。分二次温服，空心、食后各一次。

【主治】 骨蒸羸瘦，背髆烦疼，头痛寒热，不能下食。

04876 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】 芍药 芎劳 黄芩（去黑心） 大黄（锉，炒熟） 甘草（微炙，锉）各半两 黄连（去须）一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，食后、临卧温服。

【功用】 利心肺。

【主治】 目小眦赤脉。

04877 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 芍药 柏叶（炙）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水、酒各半盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】 ①《圣济总录》：妇人月水久不断。②《普济方》：崩中下血不止，小腹痛。

04878 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】 赤芍药一分 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，别研） 枳壳（去瓤，麸炒） 百合 当归（锉，微炒） 赤茯苓（去黑皮） 牵牛子（微炒） 槟榔各一两（锉）

【用法】 上为粗末。每服四钱匕，以水一盏半，加生姜半分（切），同煎至八分，去滓，空心温服。逐日以利为效，未利再服。

【主治】 妇人血分有病，头面浮肿，腹胁妨闷，四肢烦疼。

04879 芍药汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】 赤芍药（锉，炒） 桑根白皮（锉）各三分 木通（锉）一两 百合三分 大腹（碎）五枚 郁李仁（汤浸去皮，炒）三分 甘遂半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空心、日午、临卧服。水通即止。

【主治】 妇人水分，面目身体浮肿，胸满短气，小便不利。

04880 芍药汤

【方源】《产乳备要》。

【组成】 当归一两半（切，焙） 人参 肉桂 生姜（后入） 甘草（炙）各一两 芍药一两

【用法】 上为末。每服三钱，水二盏，加大枣二枚，煎至一盏，去滓温服，一日三次。

【功用】 补虚治气。

【主治】 产后虚乏，不思饮食，四肢昏倦，心腹阵痛。

【备考】《普济方》有“生地黄”。

04881 芍药汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】 黄芩芍药汤（《明医指掌》卷九）、白芍药汤（《医家心法》）、当归芍药汤（《金鉴》卷五十三）。

【组成】 芍药一两 当归 黄连各半两 槟榔二钱 木香二钱 甘草二钱（炙） 大黄三钱 黄芩半两 官桂二钱半

【用法】 上㕮咀。每服半两，水二盏，煎至一盏，食后温服。

【功用】 活血调气，清热解毒。

①《保命集》：下血调气。②《杏苑》：清热行滞活血。③《成方便读》：理气行瘀。④《方剂学》：调和气血，清热解毒。

【主治】 湿热痢。腹痛便脓血，赤白相兼，里急后重，肛门灼热，小便短赤。

①《保命集》：泻痢。②《杏苑》：湿热壅郁，气血不得宣通，下痢脓血者。③《明医指掌》：妊娠痢疾，腹痛口渴，后重里急之证。④《金鉴》：湿热凝结于肠胃，以致腹中窘痛，频频下痢，尿短色红，舌赤唇焦，喜饮冷水。⑤《成方便读》：下痢脓血稠粘，腹痛后重，邪滞交结者。

【宜忌】 ①《景岳全书》：此方惟真有实热者可用，若假热假实者误服则死。②《中医方剂与治法》：痢疾初起有表证，久痢属虚寒者，不宜使用本方。

【加减】 血痢，渐加大黄；汗后脏毒，加黄柏半两。

【方论选录】 ①《保命集》：《经》曰：溲而便脓血。气行而血止，行血则便脓自愈，调气则后重自除。②《杏苑》：本方以芩、连之苦寒以清湿热；木香、槟榔之辛温以行滞气；白芍、归尾活血养血；大黄下湿热之郁积；桂心通和营卫；甘草缓中和药。③《医方集解》：此足太阴、手足阳明药也。芍药酸寒，泻肝火，敛阴气，和营卫，故以为君；大黄、归尾破积而行血；木香、槟榔通滞而行气；黄芩、黄连燥湿而清热。盖下痢由湿热郁积于肠胃不得宣通，故大便重急，小便赤涩也。辛以散之，苦以燥之，寒以清之，甘以调之。加肉桂者，假其辛热以为反佐也。④《成方便读》：此方用大黄之荡涤邪滞；木香、槟榔之理气；当归、肉桂之行血；病多因湿热而起，故用芩、连之苦寒，以燥湿清热；用芍药、甘草者，缓其急而和脾。⑤《方剂学》：本方治法，是以调和气血为主，兼以清热解毒，方中重用芍药，配当归调和营血，配甘草缓急止痛；黄连、黄芩苦寒燥湿以解肠中热毒。在本方中，大黄配芩、连则清中有泻，导热下行；配木香、槟榔能行气导滞；皆属“通因通用”之法。方中肉桂，配在苦寒药中是为“反佐”，能防止苦寒伤阳，冰伏湿热之邪；配和血药则有加强行血之功。

【临证举例】 ①杆菌性痢疾 《中华医学杂志》（1954；11:860～861）用芍药汤去大黄，制成芍药合剂，治疗杆菌性痢疾54例，全部治愈出院。制法与服法：将方中挥发性药物如当归、肉桂及广木香用蒸气蒸馏，其它非挥发性药物采用20%乙醇渗滤，按照《药典》规定，以1:1制成流浸膏。成人每次20毫升，日服4次，连服一周。儿童酌减。54例中1日内退烧者22例（40.75%），3日内退烧者13例，5日内退烧者4例，其余病例在入院初体温即正常。排便次数在服药3日内正常者22例，4日内正常者8例，一周内正常者14例，1周后正常者10例。腹痛及里急后重大多数病例在5日内消失，而严重的毒血症现象，均在3日内消失，狂躁不安、四肢痉挛都在1日后消失。大便镜检多数在一周内恢复正常。少数在二周内转为正常。芍药合剂与磺胺类药物治疗杆菌性痢疾之疗效作对照，并无逊色。其中有4例急性菌痢和1例慢性菌痢曾用磺胺类药物治疗无效，改用本方而收效。芍药合剂对肠炎疗效亦佳，在应用中无任何副作用。②痔疮胀痛 《江西中医药》（1984；5:31）刘某某，女，48岁。混合痔伴静脉及血栓形成，舌质红，苔黄，脉滑。以芍药汤加枳壳、银花，服4剂后胀痛消除。

【现代研究】 芍药汤配伍槟榔作用的实验研究《中成药研究》（1987；11:45）芍药汤由芍药、当归、黄连、大黄、肉桂、槟榔、木香、炙甘草九味药组成。就芍药汤、去槟榔芍药汤的药理作用，进行动物实验的比较研究。结果显示：①急性毒性试验，芍药汤组小鼠死亡为11/12只；去槟榔组无死亡。二组差异 $P<0.001$。②测验对兔离体肠管活动的影响。在剂量在 4×10^{-2}、2×10^{-2}、1×10^{-2} 时，芍药汤组能使肠管出现急剧而振幅上升，进而消失的抑制现象。③杀菌作用测试。芍药汤组在1:5，1:10时有杀菌作用，1:20无作用；去槟榔组在1:5有杀菌作用，1:10:20均无作用。④对痢疾杆菌感染的预防治疗作用测试。芍药汤组小鼠存活为6/10只，去槟榔组无一存活，两组差异 $P<0.02$，实验认为槟榔在芍药汤中尚有加强清热解毒作用。

04882 芍药汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 芍药一斤 黄芩 茯苓各六两

【用法】 上为粗末。每服半两，水煎，去滓温服。

【功用】 养阴去热。

【主治】 ①《保命集》：产后诸积不可攻者。②《医略六书》：产后热积，脉数弦虚微涩者。

【方论选录】《医略六书》：产后热积伤阴，不能涵养肝木而肝气不化，故胸膈不利，刺痛不止焉。黄芩清积热以凉胸膈，赤苓渗湿热以利营气，白芍敛阴和肝，青皮汁制调和肝气，以除热积伤阴之痛也。水煎温服，使热化气行，则积结自散而营阴暗复，经络清和，何胸膈刺痛之不已哉。

04883 芍药汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 芍药 栀子 黄连 石膏 连翘 薄荷各一钱 甘草三分

【用法】 上锉。水煎，食后服。

【主治】 脾火，或消谷易饥，或胃热口燥烦渴，或唇生疮，右关脉洪数者。

04884 芍药汤

【方源】《幼科指掌》卷二。

【组成】白芍药　木香　薄桂　泽泻　甘草

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】小儿胎寒，腹痛肠鸣，粪清下利，或时发寒慄，握拳曲足，失治而成盘肠溏泄，口噤慢惊者。

04885　芍药汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】白芍六钱　郁金三钱　降真香　花蕊石　炙草各二钱　侧柏叶（炒）

【主治】阴虚吐血。

【备考】方中侧柏叶用量原缺。

04886　芍药汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】生地　白芍　元参　麦冬　槐花　地榆　木耳　甘草

【主治】因火便血。

04887　芍药散

【方源】《外台》卷三十四引《删繁方》。

【组成】芍药四分　牡蛎（熬）　干地黄　白术　干姜　乌贼鱼骨　附子（炮）　桂心　黄耆　龙骨各八分（研）

【用法】上为散。每服方寸匕，酒送下。

【主治】①《外台》引《删繁方》：妇人崩中，泄血不断，淋沥连年不绝，黄瘦伤损。②《圣济总录》：妇人经血不止，兼五色不定。

04888　芍药散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【异名】当归散（《普济方》卷二一一）。

【组成】赤芍药一两　当归一两（锉，微炒）　续断一两　白芷一两　生干地黄一两　黄芩一两　甘草一两（炙微赤，锉）　牛膝一两（去苗）　蒲黄一两

【用法】上为细散。每服二钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】扑损筋骨，恶血不散，迷闷疼痛，小便下血。

04889　芍药散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】芍药汤（《圣济总录》卷一八一）。

【组成】赤芍药一两　黄耆三分（锉）　犀角屑半两　槟榔半两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿心气不足，舌本无力，令儿语迟。

04890　芍药散

【方源】《苏沈良方》卷八。

【组成】茱萸（炒）半两　黄连（炒）　赤芍药各一两

【用法】水煎服。

【主治】痢疾。

04891　芍药散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】赤芍药　牛膝（焙，酒制）半两　桂（去粗皮）　当归（焙）各三分　木香　牡丹皮　延胡索　人参　甘草（炙）　芎藭各半两　桃仁（麸炒）一两

【用法】上为散。每服二钱匕，早、晚温酒调下。

【主治】室女月水不通。

【备考】方中赤芍药用量原缺。

04892　芍药散

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】白芍药一两　牡蛎（煅）半两　熟干地黄（焙）半两　木贼（锉，炒）一两　乌贼鱼骨（去甲）　干姜（炮）各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，食前米饮或温酒调下。

【主治】妊娠胎动，下血不止，脐腹疞痛，迷闷昏塞。

04893　芍药散

【方源】《朱氏集验方》卷十（宛委别藏本）。

【组成】香附子四两（黄子醋两碗，盐一两，煮干为度）　肉桂　延胡索（炒）　白芍药

【用法】上为细末。每服二钱，沸汤调下，不拘时候。

【主治】①《朱氏集验方》：妇人胁痛，凡药不进。②《景岳全书》：妇人血滞，腰胁痛。

【备考】本方方名，原书（人卫本）作“芍药汤”。方中肉桂、延胡索、白芍药用量原缺。

04894　芍药干姜汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】芍药　干姜　白术　桂枝各半两

【用法】上锉细。每服五钱，加生姜，水煎服。

【主治】伤寒汗下后，腹中时痛，小便清者。

04895　芍药木香汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】白芍（酒炒）七钱　木香（湿纸包，煨）　炮姜各一钱　蕲艾（操去灰泥）一钱五分　炙草一钱　吴萸（黄连拌炒，去黄连）七分

【主治】 虚寒人痢疾。

04896 芍药六合汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 四物汤内倍加芍药

【主治】 妇人气充经脉，月事频并，脐下痛。

04897 芍药甘草汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 戊己汤（《症因脉治》卷四）、芍药汤（《蒿崖尊生》卷七）。

【组成】 芍药 甘草（炙）各四两

【用法】 以水三升，煮取一升五合，去滓，分二次温服。

【功用】 ①《杂症会心录》：温养脾土而生阴血。②《伤寒论讲义》：酸甘化阴，缓急止痛。

【主治】 阴血不足，血行不畅，腿脚挛急或腹中疼痛。

①《伤寒论》：伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦微恶寒，脚挛急，足温者。②《玉机微义》：小肠腑发咳，咳而失气。③《医统》：四时伤寒腹痛；小儿热腹痛，小便不通；痘疹肚痛。④《张氏医通》：营血受伤，热不止。⑤《类聚方广义》：小儿夜啼不止，腹中挛急甚者。⑥《伤寒温疫条辨》：妇人伤寒，汗解表除，热入血室，经水过多，无实满者；及杂病木克脾土，阴阳血气不和而腹痛。⑦《杂症会心录》：产后腹痛。

【宜忌】《辽宁中医杂志》（1981，4:25）：使用本方宜辨虚实，虚热者可用，虚寒者不宜用。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：芍药白补而赤泻，白收而赤散也。酸以收之，甘以缓之，酸甘相合，用补阴血。②《医方集解》：此足太阴、阳明药也，气血不和，故腹痛。白芍酸收而苦涩，能行营气；炙甘草温散而甘缓，能和逆气；又痛为木盛克土，白芍能泻肝，甘草能缓肝和脾也。

【临证举例】 ①足肿痛 《经方实验录》：四嫂，足遇多行走时则肿痛而色紫，始则右足，继乃痛及左足，天寒不可向火，见火则痛剧，故虽甚恶寒，必得耐冷，然天气过冷，则又痛，晨起而肿痛止，至夜则痛如故。按历节痛足亦肿，但肿常不退，今时有退者，非历节也，惟痛甚时筋挛。用芍药甘草汤以舒筋。赤、白芍各一两，生甘草八钱，二剂愈。②转筋 《浙江中医杂志》（1982；4:181）：贾某某，男，53岁，左腓经常转筋，多在夜晚发作，发时腿肚聚起一包，腿不能伸直，患侧拇趾也向足心抽挛，疼痛难忍，脉弦细直，舌红绛少苔。此为肝血不足，血不养筋，筋脉绌急所致。用白芍24克，炙甘草12克，四剂愈。③舞蹈症 《山东中医杂志》（1983；6:4）：覃某某，女，11岁，手足不断舞动，行走摇摆不稳，双手持物不牢，面部呈鬼脸样动作，舌不断伸缩，头部摇晃，烦躁不安，舌淡苔白，脉弦细，有膝关节疼痛史，诊为小儿舞蹈症。系肝血不足，筋脉失养所致。治宜滋阴养血，缓急解痉。拟芍药甘草汤：芍药30克，甘草30克，水煎服，七剂愈。④胃扭转 《上海中医药杂志》（1981；4:29）：孙某某，女，38岁，胃脘胀痛20多年，后10年伴发频繁呃逆，大声嗳气，每年复发2～3个月，近一年加重，呈持续状态，不能右侧卧，查上消化道未见器质性病变，胃呈扭曲状，诊为胃扭转。用芍药20克，甘草20克，日一剂，浓煎取汁，日服三次。服药后第一天，诸症减，续服20余剂痊愈，查胃形态恢复正常。⑤过敏性肠炎 《辽宁中医杂志》（1981；4:25）：范某某，男，成人，腹痛，腹泻绵绵不愈，诊为过敏性肠炎。神疲倦怠，舌质淡，苔薄白，脉小弦，腹痛，按之则舒。此乃肝脾不和，脾气滞结，脉络不行，治宜调肝和脾。方用芍药甘草汤：生白芍30克，生甘草15克，服4剂痊愈。⑥顽咳 《湖南中医杂志》（1986；1:44）：李某某，男，55岁，咳嗽少痰，郁郁微烦一年余，食纳一般，二便调，舌边尖红赤，少苔，脉沉弦细稍数，曾服二陈汤、止嗽散、九仙散等无效。据其证见郁郁微烦等，试以肝火犯肺论治。方用芍药甘草汤：白芍30克，甘草20克，日服一剂，水煎取汁200毫升，一日三次，服5剂愈。

【现代研究】 镇痉作用 《国外医学·中医中药分册》（1981；5:46）：芍药甘草汤水煎剂对雄鼠回肠进行实验研究，结果表明：本方对外因性乙酰胆碱作用于回肠引起的收缩有抑制作用；对经肠壁的低频电刺激引起的牵拉反应，有轻度持续性抑制作用。《上海中医药杂志》（1957；10:21）：大量的芍药甘草汤对病变性的异常兴奋起显著的抑制、镇静作用；而小量的芍药甘草汤，对胃肠运动机能，反而呈现了兴奋的，促进的作用。

04898 芍药甘草汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】 芍药 甘草 石膏 荆芥

【功用】 调和阴血。

【主治】 伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，咽干烦躁。

【方论选录】 此方妙在石膏、荆芥辛凉上焦，润其咽干烦躁，又藉其辛凉入血，助芍药、甘草下缓

肝急，使其脚伸。

04899 芍药地黄汤

【方源】《外台》卷二引《小品方》。

【异名】 犀角地黄汤(《千金》卷十二)、地黄汤(《伤寒总病论》卷三)、解毒汤(《卫生总微》卷八)、解毒散(《杨氏家藏方》卷十九)。

【组成】 芍药三分 地黄半斤 丹皮一两 犀角屑一两

【用法】 上切。以水一斗，煮取四升，去滓，温服一升，一日二三次。

【功用】 ①《外台》引《小品方》：消化瘀血。②《方剂学》：清热解毒，凉血散瘀。

【主治】 热扰心营，神昏谵语，斑色紫黑，舌绛起刺；热入血分，吐血，衄血，尿血，便血；蓄血发狂，漱水不欲咽，胸中烦痛，自觉腹满，大便色黑。

①《外台》引《小品方》：伤寒及温病，应发汗而不发之，内瘀有蓄血，其人脉大来迟，腹不满，自言满者；及鼻衄吐血不尽，内余瘀血，而黄，大便黑者。②《景岳全书》引《局方》：劳心动火，热入血室，吐血衄血，发狂发黄，小儿疮痘血热。③《卫生总微》：小儿脏腑蕴热，积毒发泻，斑疮稠密，脓血大盛，狂躁发渴，咽嗌不利，遍身溃烂，苦无全肤，不能转侧，疼痛不任。④《杨氏家藏方》：小儿疮疱出足，壅盛喘急，浸淫成片。⑤《朱氏集验方》：小肠淋沥出血，疼痛难忍，心血妄行，衄血。⑥《此事难知》：蓄血证实者，当汗不汗，热入于里，血在上，呕血吐血，胸中手不可近。⑦《永类钤方》：温毒发斑；伤寒热病十日以上，汗吐利后热不除，身斑出。⑧《医方考》：劳心动火，吐血，衄血者；心移热于肺而咳嗽出血者；诸见血、失血，血热者。⑨《金鉴》：跌打损伤坠堕之证，恶血留内，胁肋少腹疼痛。⑩《温病条辨》：时欲漱口，不欲咽，大便黑而易者。

【宜忌】 ①《普济方》：体衰弱不宜用。②《医贯》：若阴虚火动吐血与咳咯者，可以借用成功；若阴虚劳力及脾胃虚者，俱不宜。

【加减】 有热如狂者，加黄芩二两。

【方论选录】 ①《医方考》：心主血，生地黄所以凉心血；肝纳血，白芍药所以和肝血；火能载血，牡丹皮所以去血中伏火；热能行血，生犀角所以解诸经之热。②《医方集解》：此足阳明、太阴药也。血属阴，本静，因诸经火逼，遂不安其位而妄行。犀角大寒，解胃热而清心火；芍药酸寒，和阴血而泻肝火；丹皮苦寒，泻血中之伏火；生地大寒，凉血而滋水，以共平诸经之僭逆也。③《千金方衍义》：血得辛温则散，得苦寒则凝。此方另开寒冷散血之门，特创清热解毒之法，全是犀角通利阳明，以解地黄之滞；犹赖赤芍、牡丹下气散血，允为犀角、地黄之良佐。④《金鉴》：吐血之因有三：曰劳伤，曰努伤，曰热伤。劳伤以理损为主，努伤以去瘀为主，热伤以清热为主。热伤阳络则吐衄，热伤阴络则下血。是汤治热伤也，故用犀角清心去火之本，生地凉血以生新血，白芍敛血止血妄行，丹皮破血以逐瘀。此方虽曰清火，而实滋阴；虽曰止血，而实去瘀。瘀去新生，阴滋火熄，可为探本穷源之法也。

【临证举例】 ①胃出血 《中医杂志》(1958；5:339)：谢某某，男，36岁。有胃痛史，忽然大痛，吐紫血块，大便亦下血块，头汗淋漓，心慌头晕，吐下不止，脉洪大，诊为胃出血。投犀角地黄汤，四剂愈。方用：乌犀角一钱，生地黄五钱，丹皮二钱，杭白芍三钱。犀角别研极细末，另三味药以水1.2升，煎至800毫升，分四次兑犀角末服。②咯血 《中医杂志》(1958；5:339)：胡某某，男，42岁。咯痰带血一月余，右胸痛连后背，口中腥臭，继之吐血，脉细数，头晕眼花，心烦气短，咳嗽胸痛，诊为肺出血。投犀角地黄汤，加阿胶、枇杷叶。三服后止血，后用千金苇茎汤三剂愈。③崩漏《中医杂志》(1958；5:339)：冯某某，女，31岁。突然血崩，时下时止，缠绵三月余，消瘦，贫血，头晕气喘，手足心午后发烧，脉细数，投犀角地黄汤，一剂崩止，三剂愈。④血小板减少性紫癜《中医杂志》(1963；11:12～15)：以犀角地黄汤为主，治疗11例原发性血小板减少性紫癜。患者均有不同部位，不同程度的出血症状，并均有发热及不同程度的头昏眼花，心悸无力等贫血症状，其中2例因大量失血而发生昏迷。血小板6万/mm^3以下者5例，其余均在6万至8万之间。鉴于病情急性发作者均有口干思饮，烦躁不安，面红，溲黄，舌红有薄苔不润，脉象滑数而躁动不宁等一派内热炽盛之象，故采用清热凉血解毒法为主。服用此汤后，多见出血症状首先停止，出血时间缩短，血小板数上升，血块收缩随之改善。据此，本方可能是首先改善毛细血管壁之通透性，继而使血小板数逐渐恢复。加减法：热盛者，配合紫雪丹或羚羊角；出血较多，加参三七粉、云南白药及十灰散等；后期出现出血减少，舌红少苔，脉细数无力等阴虚内热症状者，酌加龟版、阿胶、旱莲草、女贞子、麦冬等。

04900 芍药地榆汤

【方源】《医方集解》引河间方。

【组成】苍术地榆汤加芍药 阿胶 卷柏

【主治】泄痢脓血，乃至脱肛。

【方论选录】《医林纂要》：芍药，治痢君药；苍术以燥湿，且舒郁热而升达阳气；卷柏辛咸平，生于水石，得清洁之气，而色青紫入肝，能除血分之浊热，去瘀软坚，炙用能止崩漏、脱肛，肠风血痢；阿胶滋阴养血，兼能补肺宁心。此亦热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘，酸收，苦发之道。但痢至脱肛，则似宜加以升提温补，而后为无弊也。

04901 芍药补气汤

【方源】《东垣试效方》卷九引张洁古方。

【异名】补气汤(《兰室秘藏》卷下)。

【组成】黄耆一两 白芍药一两半 橘皮（不去白）一两 泽泻半两 甘草（炙）一两

【用法】上㕮咀。每服半两，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】肺气不行，皮肤间麻木。

04902 芍药知母汤

【方源】《三因》卷三。

【组成】桂心 知母 防风各四两 芍药 甘草（炙） 麻黄（去节） 附子（炮，去皮脐）各三两（一法有白术、川芎、杏仁、半夏）

【用法】上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓，空腹服。

【主治】诸肢节疼痛，身体尪羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐。

04903 芍药枳术丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白术二两（面炒） 赤芍药二两（酒炒） 枳实一两（面炒） 陈皮一两

【用法】上以荷叶汤煮黄老米粥为丸，如梧桐子大。每服百余丸，米饮或滚白汤任下。

【主治】食积痞满及小儿腹大胀满，时常疼痛，脾胃不和。

【加减】如脏寒，加干姜（炒黄者）五钱或一二两；脾胃气虚，加人参一二两。

04904 芍药柏皮丸

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】芍药 黄柏各一两 当归 黄连各半两

【用法】上为末，水为丸，如小豆大。每服三四十丸，温水送下，不拘时候，兼夜五六服。

【主治】一切湿热恶痢，频并窘痛，无问脓血。

【宜忌】忌油腻脂肥、发热等物。

04905 芍药柏皮丸

【方源】《保命集》卷中。

【组成】芍药 黄柏各等分

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸至二百丸，食前温水送下。

【主治】溲而便脓血。

04906 芍药栀豉汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】芍药 当归 栀子各五钱 香豉半合

【用法】上锉细。每服一两，水煎服。

【主治】产后虚烦不得眠。

04907 芍药润燥丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白芍 山药各一两 炒栀子三钱 芡实一两

【用法】水煎服。

【主治】怒气伤肝，忽然梦遗，久而不止，凡增烦恼，泻精更多，其症两胁多闷，火易上升于头目，饮食倦怠，发躁发胀。

04908 芍药黄连汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】芍药 当归 黄连各半两 大黄一钱 桂（淡味）半钱 甘草一钱（炙）

【用法】上㕮咀。每服半两，水一盏，煎至七分，食后温服。

【主治】大便后下血，腹中痛者，为热毒下血。

【加减】痛甚者，调木香、槟榔末一钱服之。

04909 芍药黄耆汤

【方源】《全生指迷方》卷二。

【异名】芍药散(《普济方》卷一五三)。

【组成】芍药三钱 黄耆 甘草（炙） 青蒿（阴干）各一两

【用法】上为散。每服五钱，水二大盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】①《全生指迷方》：阴气亏少，少水不能制盛火，发热从背，或从手足渐渐遍身，或昼发而夜宁，或夜发而至旦即消。口舌干燥，欲饮水而不能，其脉虚疾而小。②《普济方》：阴虚发热。

04910 芍药黄耆汤

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】芍药二两 黄耆三两 川芎二两 乌头（炮，去皮）半两

【用法】上为散。每服五钱，水二盏，加生姜三片，大枣一个，同煎至一盏，去滓温服。

【主治】劳风。眩晕，但欲上视，目瞑不能开，

开而眩，唾出若涕，恶风振寒。

04911 芍药黄耆汤

【方源】《赤水玄珠》卷十一。

【组成】 黄耆二两 白芍药 白术各一两半 甘草一两

【用法】 每服五钱，加煨姜三片，大枣一枚，水煎服。

【主治】 虚劳自汗不止。

04912 芍药清肝散

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 白术 川芎 防风各三分 甘草（炙）荆芥各二分半 桔梗 羌活各三分 芍药二分半 柴胡二分 前胡 薄荷 黄芩各二分半 山栀 知母各二分 滑石 石膏各三分 大黄四分 芒消三分半

【用法】 上㕮咀，都作一服。水二钟，煎至一钟，食后热服。

【主治】 眵多眊矇，紧涩羞明，赤脉贯睛，脏腑秘结。

【方论选录】 上方为治淫热反克而作也。风热不制之病，热甚大便硬者，从权用之。盖苦寒之药也，苦寒败胃。故先以白术之甘温、甘草之甘平，主胃气为君；次以川芎、防风、荆芥、桔梗、羌活之辛温，升散清利为臣；又以芍药、前胡、柴胡之微苦，薄荷、黄芩、山栀之微苦寒，且导且攻为佐，终以知母、滑石、石膏之苦寒、大黄、芒消之大苦寒、祛逐淫热为使，此逆则攻之治法也。大热服者，反治也。

04913 芍药蒺藜煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 龙胆草 栀子 黄芩 木通 泽泻各一钱半 芍药 生地各二钱 白蒺藜（连刺，捶碎）五钱（甚者一两）

【用法】 水二钟，煎至八分，食远服。外以蠡蛸散敷之。

【主治】 通身湿热疮疹，及下部红肿热痛诸疮。

【加减】 如火不甚者，宜去龙胆、栀子、加当归、茯苓、薏仁之属；如湿毒甚者，加土茯苓五钱至一二两。

04914 芍药甘草附子汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 芍药附子甘草汤（《医方类聚》卷五十七引《伤寒指掌图》）。

【组成】 芍药 甘草（炙）各三两 附子一枚（炮去皮，破八片）

【用法】 以水八升，煮取一升五合，去滓，分三次温服。

【功用】《伤寒论教学参考资料》：扶阳益阴。

【主治】 伤寒发汗后阴阳俱虚，反恶寒；疮家发汗成痉。

①《伤寒论》：发汗病不解，反恶寒，虚故也。②《云岐子保命集》：发汗病不解，小便清，大便依度，腹痛。③《张氏医通》：疮家发汗成痉。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：芍药之酸，收敛津液而益荣；附子之辛温，固阳气而补卫，甘草之甘，调和辛酸而安正气。②《伤寒来苏集》：发汗后反恶寒，里虚也。表虽不解，急当救里，若反与桂枝攻表，此误也。故于桂枝汤去桂、姜、枣，加附子以温经散寒，助芍药、甘草以和中耳。脚挛急与芍药甘草汤，本治阴虚，此阴阳俱虚，故加附子，皆仲景治里不治表之义。

04915 芍药四物解肌汤

【方源】《千金》卷五。

【异名】 四物汤（《圣济总录》卷一七四）、芍药解肌汤、四物解肌汤（《普济方》卷三六九）。

【组成】 芍药 黄芩 升麻 葛根各半两

【用法】 上㕮咀。以水三升，煮取九合，去滓分服。一岁以上分二服。

【主治】 ①《千金》：少小伤寒。②《普济方》：小儿伤寒，烦热头体痛。

【方论选录】《千金方衍义》：此升麻汤兼黄芩汤之制。以升麻汤专行阳明，黄芩汤专走少阳，此则兼解二经风热也。

04916 芍药芩连葛根汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】 甘草 芍药 黄芩 黄连 葛根

【主治】 火泻。

04917 芍药枣仁柴胡汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】 芍药三钱 甘草三钱 首乌三钱 枣仁三钱（生研） 柴胡三钱 丹皮三钱

【用法】 煎半杯，热服。

【主治】 目珠突出者。

04918 芒消散

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】 芒消（别研）半两 赤茯苓（去黑皮，为末）一两

【用法】 上为末。每服二钱匕，蜜熟水调下。心烦躁热者，以冷蜜水调下。

【主治】 膀胱结热不通。

04919 芎乌散

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】川芎三两 乌药二两

【用法】上为散。薤白汤煎三钱，去滓温服。

【主治】产后气滞头痛，脉沉涩者。

【方论选录】产后怒郁伤肝，肝气滞逆经络，不能通畅，故头角作痛不休焉。川芎入血海，能行血中之气以升阳；乌药入气海，能疏滞逆之气以降浊。为散以疏其逆气，薤白以通其滞气，务使滞气消化，则经络通畅，而逆气和平，清阳得位，安有头角作痛之患哉！

04920 芎术丹

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】川芎 枳壳 甘草 白茯苓 桔梗各二钱 乌药 苍术 威灵仙 陈皮 羌活 白芷 当归 黄芩 苍耳子 秦艽 白术 杜仲 熟地 香附 海风藤 牛膝 木瓜 防风 红花 苡仁 荆芥各五钱 川乌 草乌各一钱 白花蛇一寸

【用法】上药用麻袋盛好，放酒坛内封固，隔汤煮半日许，候透埋土中一日夜出火毒。每日饮一茶杯，不拘时候。服尽即好，不用加减。

【主治】痛风，半肢软瘫，泥壁疯，遍身疯气，及冻风，起身不得。

04921 芎术汤

【方源】《三因》卷十六。

【组成】川芎半两 白术半两 附子（生，去皮尖）半两 甘草 桂心一分

【用法】上为散。每服四大钱，水二盏，加生姜七片，大枣一个，煎七分，去滓，食前服。

【功用】暖肌，补中，益精气。

【主治】着湿，头重眩晕，苦极不知食味。

【备考】方中甘草用量原缺。

04922 芎术散

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】芎劳 白术 天麻各一两 防风（去叉） 荆芥穗各半两 细辛（去苗叶）一钱 甘草（炙，锉）一分

【用法】上为散。每服二钱匕，沸汤点服。

【主治】头面多汗，恶风头痛，身热烦闷。

04923 芎归丸

【方源】《直指》卷二十三。

【异名】川归丸（《疡科选粹》卷五）。

【组成】川芎 当归 黄耆 神曲（炒） 地榆 槐花（微炒）各半两 阿胶（炒酥） 荆芥穗 木贼 头发（烧存性）各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米饮送下。

【主治】痔下血不止。

【备考】本方方名，《普济方》引作"当归丸"。

04924 芎归汤

【方源】《普济方》卷二四五引《通真子秘方》。

【异名】立效散。

【组成】川芎 当归各二斤（一方加缩砂）

【用法】上将芎、归各半斤㕮咀，于瓦器内用水浓煎，不拘时候多少温服。余芎、归各一斤半，锉作大块，用香炉慢火逐旋烧烟，安在病人面桌子下，要烟气直上不绝，令病人低头伏桌子上，将口鼻及病乳常吸烟气，直候用此一料药尽，看病证如何，或未全安，或略缩减，再用一料，如前法煎服及烧烟熏吸必安。如此二料已尽，虽两乳略缩上而不能复旧者，用冷水磨蓖麻子一粒，于头顶心上涂，片时即洗去，则全安矣。

【主治】乳悬，妇人产后忽两乳伸长，细小如肠，垂坠直过小肚下，痛不可忍，危在须臾。兼治产后恶露不下，腹痛；或下血太多，眩晕不能支吾；奸娠胎动，腹痛下血。

【加减】腹中刺痛，加芍药；口干烦渴，加乌梅、麦门冬；寒加干姜、白芍药；水停心下，微有呕逆，加茯苓、生姜；虚烦不得眠，加人参、竹叶；大便秘涩，加熟地黄、橘皮、杏仁；小便不利，加车前子；腹胁膨胀，加厚朴；血崩不止，加香附子；咳嗽痰多，加紫菀、半夏、生姜；腰痛脚痛，加牛膝；心下疼痛，加延胡索；恶血不下，腰腹重痛，加牡丹皮煎。

04925 芎归汤

【方源】《宋氏女科》。

【组成】当归五钱 川芎四钱 白芍（酒炒）二钱 续断三钱 荆芥穗（炒黑）三钱（或加人参二钱）

【用法】水一钟，酒半钟，煎服。立止。

【主治】血崩，以致寒所晕倒者。

04926 芎归汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎 当归 白芷 甘草 胆草各等分

【用法】每服五钱，煎汤浴洗患上，随后搽药。

【主治】妇人阴中突出如蛇，或似鸡冠、菌样，阴痒者。

04927 芎归饮

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】川芎 当归 华阴细辛各半两 辣桂

石菖蒲　白芷各三钱

【用法】 上锉细。每服三钱，加紫苏、生姜、大枣，水煎服。

【主治】 耳鸣。

【加减】 如虚冷甚者，酌量加生附子。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“芎归汤”。

04928　芎归散

【方源】 《回春》卷七。

【异名】 芎蒡散(《寿世保元》卷八)。

【组成】 川芎　干山药　当归　白芍（炒）　甘草（炙）各二钱半

【用法】 上为细末。每服二钱，食后以白汤调下，并将此干药末擦牙龈即生。

【主治】 小儿齿迟。

04929　芎仙丸

【方源】 《杨氏家藏方》卷四。

【组成】 川芎十两　白芍药五两　威灵仙三两

【用法】 上为细末。用萝卜自然汁少许打面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、临睡用萝卜自然汁同温酒半盏送下。

【主治】 久新脚气，腿膝肿痛，或攻注生疮。

【宜忌】 忌茶。

04930　芎皮散

【方源】 《外科大成》卷三。

【组成】 川芎　青皮（减半）

【用法】 上为末。每服二钱，煎细茶、菊花汤调下。外以枯矾末、鸡子清调敷。睡者用南星末同生地黄捣膏贴太阳穴而肿自消。

【主治】 针眼。

04931　芎芷散

【方源】 《直指》卷十九。

【组成】 川芎　白芷　荆芥穗　软石膏（煅）各等分

【用法】 上为末。每服一钱，食后沸汤调下。

【主治】 头风风壅。

04932　芎芷散

【方源】 《直指》卷二十一。

【异名】 芷芎散(《得效》卷十)。

【组成】 白芷　石菖蒲（炒）　苍术　陈皮　细辛　厚朴（制）　半夏（制）　辣桂　木通　紫苏茎叶　甘草（炙）各一分　川芎二分

【用法】 上为散。每服三钱，加生姜五片，葱白二片，水煎，食后、临卧服。

【主治】 风邪入耳、入脑所致的耳鸣、耳聋、头痛。

①《直指》：风入耳虚鸣。②《明医指掌》：风邪入于头脑作疼痛。③《杂病源流犀烛》：暴聋。

04933　芎芷散

【方源】 《古今医鉴》卷九。

【组成】 川芎三钱　白芷三钱

【用法】 上为末，黄牛脑子一个，擦药在上，瓷器内加酒炖熟，乘热和酒食之，尽量一醉，睡后酒醒，其疾如失。

【主治】 远年近日偏正头风，疼痛难忍，诸药不效者。

04934　芎苏饮

【方源】 《医略六书》卷十八。

【组成】 小川芎一钱　紫苏叶一钱五分　江枳壳（炒）一钱五分　甜桔梗一钱　嫩前胡一钱五分　法半夏一钱半　白云苓一钱五分　广木香一钱　广陈皮一钱五分

【用法】 水煎，温服。

【主治】 感冒风邪，头疼胸满，壮热憎寒，脉浮缓者。

【方论选录】 感冒风邪，抑遏清阳之气，故头痛胸满，憎寒壮热焉。脉浮缓是感冒风寒之象，川芎专疏血分之风，苏叶兼散气分之风，俾气血清和，则头痛自解。前胡疏邪清咽，香、枳泻滞调中，使邪解气调，则胸满亦快。苓、陈渗湿利气，半夏燥湿化痰，盖痰化气行，则营血统运而风邪无不外解，安有寒热之患哉！

04935　芎苏散

【方源】 《增补内经拾遗》卷三引《局方》。

【异名】 十味芎苏散（原书同卷）、芎芷香苏散(《准绳·伤寒》卷二引《澹寮》)、芎苏饮(《郑氏家传女科万金方》卷四)。

【组成】 川芎二钱　苏叶　枳壳（麸炒）　桔梗　柴胡　半夏（汤泡七次）　广陈皮　白茯苓（去皮）各一钱　干葛一钱半　甘草（炙）五分

【主治】 感冒风寒，发热恶寒，头疼身痛；瘴疟脚气。

①《增补内经拾遗》引《局方》：非时感冒，发热恶寒，头疼身痛。②《岭南卫生方》：瘴疟，壮热头痛，其脉弦紧，按之不绝。③《准绳·杂病》引《得效》：脚气。④《医方考》：感冒外有头痛、发热、恶寒；内有咳嗽、吐痰、气泡者。⑤《郑氏家传女科万金方》：产后伤风，恶露已净。⑥《幼科铁镜》：小儿感冒，面色寒滞，两颊或似水红桃花，鼻流清涕，恶风痰壅。

【方论选录】 ①《医方考》：川芎、苏叶、干葛、

柴胡、解表药也，表解则头痛、发热、恶寒自愈；桔梗、半夏、陈皮、枳壳、茯苓、甘草，和里药也，里和则咳嗽、吐痰、气泌自除。②《中国医学大辞典》：此方为治非时感冒之首剂。方中芎、苏、紫、葛为通治三阳经外感药，而独以芎苏名方者，盖重在于邪伤血分也。更合以二陈治内伤饮食，加枳壳宽膈利痰，诚为总司内外之良方，而无引贼破家之患。

【备考】《岭南卫生方》本方用法：上㕮咀。每服二钱，加生姜三片，大枣一个，水煎服。方中干葛，《伤寒图歌活人指掌》作干姜。

04936 芎苏散

【方源】《济生》卷七。

【组成】紫苏叶 川芎 白芍药 白术 麦门冬（去心） 陈皮（去白） 干葛各一两 甘草（炙）半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，葱白二寸，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【功用】发散表邪。

【主治】妊娠外感风寒，浑身壮热，眼晕头旋者。

【备考】方中干葛，《审视瑶函》作干姜。

04937 芎连散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】芎藭 连翘 羌活（去芦头） 柴胡（去苗） 防风（去叉） 黄芩（去黑心） 木贼（去节） 荆芥穗 甘菊花 旋覆花各半两 地骨皮一两 甘草（炙，锉） 石膏（捣研）各二两

【用法】上为散。每服二钱匕，食后、临卧淡竹叶汤调下，一日三次。

【主治】脑风，鼻息不通，时出清涕，项背拘急，久成眩晕。

04938 芎辛丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】川芎（洗） 防风（去叉股） 僵蚕（去丝嘴，炒） 独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙）各一两 天麻四两 桔梗（炒）三两 细辛（去叶） 白附子（炒） 羌活（洗，去芦） 甘草（炙）各半两 薄荷 荆芥穗各一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后茶、酒嚼下。

【主治】头痛面赤，烦闷咽干，上膈风痰，头目晕昏，百节疼痛，背项拘急。

【方论选录】《本事方释义》：川芎气味辛温，入足少阳、厥阴；防风气味辛甘微温，入足太阳；僵蚕气味辛咸，入手阳明，能引药入络；独活气味苦辛甘平，入足少阴、厥阴；桔梗气味苦辛平，入手太阴，为诸药之舟楫；天麻气味辛平，入足阳明、厥阴，能泄肝风，止头晕；细辛气味辛温，入足少阴；白附子气味辛甘大温，入足阳明；羌活气味苦辛甘平，入足太阳；甘草气味甘平，入手太阴；薄荷气味辛凉，入手太阴、足厥阴；荆芥气味辛温，入足太阳、少阴。清茶送，取其降也；温酒送，取其散也。此症非群剂风药不能散，兼以甘桔清咽利膈，则病自然少减矣。

04939 芎辛汤

【方源】《三因》卷十五。

【异名】大芎辛汤（《得效》卷十）。

【组成】附子（生，去皮脐） 乌头（生，去皮尖） 天南星 干姜 甘草（炙） 川芎 细辛各等分

【用法】上为散，每服四大钱，水二盏，加生姜五片，茶芽少许，煎七分，去滓，食后服。

【功用】《易简方》：扶阳散寒。

【主治】①《三因》：伤风寒生冷及气虚、痰厥，头痛如破，兼眩晕欲倒，呕吐不定。②《易简方》：一切头疼、痰厥、饮厥、肾厥、气厥等证，偏正头疼难忍者。

【宜忌】《易简方》：但发热者不宜服。

【方论选录】《医略六书》：真阳内虚，寒邪得以深入，元气不能外敷上奉，故厥逆而头痛眩晕焉。川乌、生附扶真阳以御寒，南星、细辛通关窍以豁痰，干姜温中散寒，生姜散寒快膈，川芎活经中之血，炙草缓中州之气，芽茶化热以清头目也。此扶阳散寒之剂，为阳虚寒厥痛晕之专方。

【备考】本方方名，《医学正传》引作“芎辛散”。

04940 芎辛汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】细辛二分 芎藭 蔓荆子各五分 甘草 白芷各一钱 防风一钱五分

【用法】上㕮咀，都作一服。水二盏，煎至一盏，临卧温服。

【主治】两眼昼夜隐涩难开，羞明恶日，视物昏暗，赤肿而痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作“芎藭汤”、《景岳全书》引作“芎辛散”。

04941 芎辛汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 川芎一两 细辛二钱 防风一两 当归一两 石膏三两（煅） 白芷一两 羌活一两 苍术一两（炒） 香附一两半（酒炒） 甘草四钱（炙）

【用法】 上为散，水煎三钱，去滓温服。

【主治】 产后头额作痛，脉数涩大者。

【方论选录】 产后风邪外束，热郁阳明，致清阳不能上奉于头，故头额作痛不已。川芎入血海以升阳，细辛入少阴以散邪，羌活散太阳之邪，白芷散阳明之邪，苍术燥湿强脾，石膏泻火清胃，当归养血荣经脉，防风散郁热，香附调气解郁，炙草缓中益胃也。为散水煎，使风邪解，则热郁自化，而经络融和，清阳上奉，何有头额作痛之患哉！

04942 芎辛散

【方源】 《证治汇补》卷四。

【异名】 芎辛汤（《医略六书》卷二十一）。

【组成】 川芎 细辛各一钱半 苍术 甘草 干姜各一钱

【主治】 ①《证治汇补》：寒湿头痛。②《医略六书》：寒湿头痛，脉细者。

【方论选录】 《医略六书》：寒湿袭经，抑遏不散，故清阳之气不伸，不能分布，故头痛不止焉。川芎活血以上荣头角，细辛散寒以旁达肌表，苍术燥湿强脾兼主升阳，干姜温中散冷兼能补火，甘草缓中以和诸药也。使寒湿解散，则清阳得伸而经气清和，头痛无不愈矣。此辛燥散寒之剂，为寒湿头痛之专方。

【备考】 《医略六书》本方用法：水煎，去滓温服。

04943 芎羌散

【方源】 《本事》（扫叶山房刊本）卷十。

【异名】 芎归散（《永类钤方》卷十六）、旋覆花汤（《准绳·女科》卷二）。

【组成】 川芎一两（洗） 当归三分（洗，去芦，薄切，焙干） 羌活（洗，去芦） 旋覆花 细辛（华阴者，去叶） 蔓荆子（拣） 石膏（生） 藁本（去苗，净洗） 荆芥穗 半夏曲（炒） 防风（去钗股） 熟地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干） 甘草各半两（炙）

【用法】 上为末。每服二钱，水一大盏，加生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇人血虚，肝有风邪患头风症，每发必掉眩，如在车上。

【方论选录】 《本事方释义》：川芎气味辛温，入足少阳、厥阴；当归气味辛甘微温，入手少阴、足厥阴；羌活气味辛甘平，入足太阳；旋覆花气味咸温，入手太阴、阳明；蔓荆子气味辛温，入足太阳；细辛气味辛温，入足少阴、太阳；石膏气味辛寒，入足阳明；藁本气味辛温，入足太阳；荆芥气味辛温，入足厥阴；半夏曲气味辛温，入足阳明；防风气味辛甘温，入足太阳；熟地黄气味甘苦微寒，入足少阴；甘草气味甘平，入足太阴，通行十二经络，能缓诸药之性。妇人患头风者颇多，皆因血虚有风邪乘之，此方风药居多，辛温、辛凉之味，恐其升腾太过，以地黄之甘苦微寒、甘草之甘平和缓以调之，则经络不致受伤，而肝家之风邪自息耳。

【备考】 本方方名，原书（上科本）作“芎羌汤”。《医学纲目》引作“芎劳散”。

04944 芎附饮

【方源】 《丹溪心法》卷三。

【异名】 芎香散（《普济方》卷四十四引《鲍氏方》）、莎芎散（《医学入门》卷七）、芎附散（《赤水玄珠》卷九）。

【组成】 川芎二两 香附四两

【用法】 上为末。每服二钱，茶汤调下。

【功用】 《赤水玄珠》：调气止血。

【主治】 气血不和，衄血，吐血，气厥头痛及产后头痛。

①《丹溪心法》：衄血。②《普济方》引《鲍氏方》：男子气厥头痛，妇女气盛头疼及产后头痛。③《赤水玄珠》：吐血不归经。

【方论选录】 《医学入门》：香附开郁行气，使邪火散于经络；川芎和血通肝，使血归于肝脏。血归火散，其血立止。

04945 芎附散

【方源】 《本事》卷三。

【异名】 芎附汤（《简明医彀》卷三）。

【组成】 小川芎 附子（炮，去皮脐） 黄耆（蜜炙） 白术 防风（去钗股） 当归（洗，去芦，薄切，焙干） 熟干地黄（酒洒，九蒸九晒，焙） 桂心（不见火） 柴胡（去苗，净洗） 甘草（炙）各等分

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，同煎至七分，去滓，食前服，每日三次。

【功用】 常服不生壅热，兼消积冷。

【主治】 脾胃虚弱，卫气不温分肉，为风寒湿邪所着而致的五种痹证，腿并臂间发作不定。

【方论选录】 《本事方释义》：小川芎气味辛温，

入肝胆；附子气味辛咸大热，入手足少阴；黄耆气味甘平，入手足太阴；白术气味甘温，入手足太阴；防风气味辛甘平，入足太阳；熟地黄气味甘寒微苦，入肾；当归气味辛甘温，入肝；桂心气味辛甘热，入肝；柴胡气味辛平，入足少阳；甘草气味甘平，能行十二经络，缓诸药之性。此卫气不温分肉间，为三气所乘，致邪留着不去，故发作无定。以补血养气之药护持正气，以风药及辛热之药搜逐留着之邪，则卫气坚固，无隙可乘，亦何从入哉！

04946　芎附散

【方源】《妇人良方》卷二十二引徐明仲方。

【组成】　大附子一枚（酽醋一碗，用火四畔炙透，醋醋令尽，去皮脐）　川芎一两

【用法】　上为细末。每服二钱，茶清调下。

【主治】　①《妇人良方》引徐明仲方：产后败血作梗，头痛，诸药不效者。②《医略六书》：产后阳虚头痛，脉沉细者。

【方论选录】《医略六书》：产后真阳内虚，其清阳之气亦不能上奉于头，故头脑作痛不休焉。附子补真阳以上奉，川芎入血海以升阳。为散，清茶煎，使真阳内充，则上奉之阳自然敷布，而气行血活，岂有头脑作痛之患乎！

04947　芎荆散

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】　川芎五钱　蔓荆子二钱

【用法】　水煎服。

【主治】　头痛。

【方论选录】　盖川芎补血，蔓荆子去风也。

04948　芎活散

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】　芎活汤（《济阴纲目》卷九）。

【组成】　川芎　羌活各等分

【用法】　水煎，入酒少许温服。

【功用】　胎前安胎，产后逐恶血、下胞衣。

【主治】　①《济阴纲目》：子痫。②《医略六书》：孕妇风痉，脉浮细涩者。

【方论选录】《医略六书》：妊娠中风伤筋脉，而发为风痉，故角弓反张，奄忽不知人焉。芎劳入血海以升阳，羌活通经络以散风。为散，水煎入酒下，使风邪外解，则经气清和，而筋脉得养，何角弓反张，奄忽不知人之有，而胎无不安矣。

04949　芎桂散

【方源】《三因》卷二。

【组成】　川乌头二两（切作片，水浸一宿，切作算子条，更以米泔浸一宿，不洗，晒干，麸炒微赤为度）　川芎一两半　桂心一两　甘草（炙）　干姜（炮）各一分

【用法】　上为末。每服二钱，温盐酒调下，一日三次。

【主治】　中风，四肢疼痛，及两足俱软，行履不便。

04950　芎劳丸

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】　芎劳二两　白芷　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　黄连（去须）各半两

【用法】　上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，甘草汤送下，不拘时候。

【主治】　口吻疮。

04951　芎劳丸

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】　芎劳　菊花　荆芥　薄荷　甘草各一两　苍术二两（泔浸）

【用法】　上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸至六七十丸，食后茶清送下，一日一二次。

【功用】　增明目力。

【主治】　远视不明，常见黑花。

04952　芎劳汤

【方源】《外台》卷二十二引《古今录验》。

【组成】　细辛一两　芎劳二两　附子一两（炮）

【用法】　上切。以水六升，煮取二升，去滓，含之少许，冷即吐却，每日三四次。勿咽汁。

【主治】　齿中风，疼痛，龈肿。

04953　芎劳汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】　芎劳　甘草各二两　蒲黄　女萎各一两半　芍药　大黄各三十铢　当归十八铢　桂心　桃仁　黄耆　前胡各一两　生地黄一升

【用法】　上㕮咀。以水一斗，酒三升，合煮取二升，去滓，分四服，日三次，夜一次。

【主治】　产后腹痛。

【备考】　按：方中黄耆，《千金翼》作"黄芩"。

04954　芎劳汤

【方源】　方出《千金》卷四，名见《局方》卷九。

【异名】　当归汤（《圣济总录》卷一一五九）、立效散（《保命集》卷下）、芎归汤、君臣散（《易简方》）、一奇散（《妇人良方》卷二十二）、佛手散（《医方类聚》卷二二九引《胎产救急方》）、芎劳散（《普济方》卷二〇二）、川芎汤（《普济方》卷二四八）、二

奇散(《普济方》卷二五一)、川芎当归汤(《金匮翼》卷五)。

【组成】 当归 川芎各三两

【用法】 以水四升，煮取二升，去滓，分二服即定。展转次合诸汤治之。

【功用】 《医略六书》：养荣活血。

【主治】 失血过多所致的眩晕、头痛，及难产。

①《千金》：妇人产乳去血多，伤胎去血多、崩中去血多、金疮去血多、拔牙齿去血多未止，心中悬虚，心闷眩冒，头重目暗，耳聋满、举头便闷欲倒。②《圣济总录》：难产，疑胎毙腹中。③《保命集》：产前证，胎不动，如重物下坠，腹冷如冰。④《妇人良方》：产后头痛。⑤《医方类聚》引《胎产救急方》：产时将至，浆破血下，腹中作阵数疼痛，渐至腰痛极甚，儿身已转，眼如出火，谷道挺进。⑥《朱氏集验方》：妇人头晕痛，诸脉平和，惟肝脉独弱，预见崩疾来。

【方论选录】 ①《医方类聚》引《胎产救急方》：大凡难产，皆因产时未至，浆破血下过多，以致产道干涩。此方将产则先固其血，令儿易转动；临产进此以行血，令儿随血出，决无留难。处方之巧，无以逾此。②《医略六书》：血不配气，阴不维阳，不能荣经络以上牵于头，故头痛不止焉。当归身养血脉，滋血室，而经络可充，清阳得位；小川芎活血气，运营血，而上行头角，下行血海，使血盛气行，则清阳分布而经脉融和，安有头痛之患乎。此养荣活血之剂，为血不配气头痛之专方。

04955 芎劳汤

【方源】 方出《经效产宝》卷上，名见《圣济总录》卷一五五。

【组成】 芎劳 当归各四两 艾叶二两 甘草一两 阿胶二两（炙）

【用法】 以水五升，煮取二升，分温三服。

【主治】 妊娠三二月及七八月，胎动不安，或腰肚痛，有血下。

04956 芎劳汤

【方源】 《圣济总录》卷十五。

【组成】 芎劳二两 细辛（去苗叶） 黄芩（去黑心）各一两 荆芥穗二两 甘草（炙，锉）半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入薄荷七叶，同煎至七分，去滓温服。

【主治】 脑风，鼻息不通，或流清涕，多嚏。

04957 芎劳汤

【方源】 《圣济总录》卷一〇八。

【组成】 芎劳 羌活（去芦头） 蔓荆实 甘菊花 黄芩（去黑心） 防风（去叉）各一两 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙）各半两 石膏二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎取七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】 目痛，上连头脑。

【备考】 《普济方》有旋覆花。

04958 芎劳汤

【方源】 《圣济总录》卷一二一。

【组成】 芎劳（锉）一两半 防风（去叉）一两 薏苡仁一两 细辛（去苗叶）半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，以水三盏，煎二十沸，去滓，热含冷吐，咽津无妨。

【主治】 风冲牙齿摇动。

04959 芎劳汤

【方源】 《普济方》卷四十四。

【组成】 芎劳五两 细辛（去苗叶）二两半 人参一两半 甘草（炙）三分 半夏曲一分（用生姜和半夏末作曲用）

【用法】 上锉，如麻豆大。每服三钱，水一盏，加生姜三片，薄荷五叶，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 清气。

【主治】 头疼痛。

04960 芎劳汤

【方源】 《医略六书》卷二十六。

【组成】 生地十两（取汁） 芎劳一两

【用法】 芎劳煎汁，冲地黄汁，分三次温服。

【主治】 血崩气陷，不时举发，脉弦数者。

【方论选录】 血室空虚，生气不振，故常觉气陷于下，而血崩不时举发焉。生地专滋血室之空虚，芎劳特举生气之下陷，二味成方，味同力锐，能使血室滋荣，生气振发，则冲任无不完固，而血自归经，何至不时举发血崩哉。

04961 芎劳饮

【方源】 《圣济总录》卷八十五。

【组成】 芎劳 丹参 当归（锉，焙） 细辛（去苗叶） 桂（去粗皮） 牡丹皮（锉） 桃仁（去皮尖双仁，炒）各一两 大黄（锉，炒）

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，空心、日午、临卧各一次。

【主治】 肾虚劳役，腰卒痛。

04962 芎劳酒

【方源】 方出《医心方》卷二十一引《医门方》，名见《云岐子保命集》卷下。

【组成】 芎劳八分 生地黄汁一升

【用法】 上以酒五升，煮取二升，去滓，下地黄汁煎一沸，分二服，相去八九里。不耐酒者，随多少数数服即止，但此二味可单用服之。

【主治】 久崩中，昼夜不止。

【方论选录】《济阴纲目》：此方以酒煎芎藭配生地汁，自有妙用，甚奇甚奇。用酒之意，便是升法。

04963 芎藭散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】 芎藭三分 防风一两（去芦头） 桂心半两 赤芍药半两 羌活三分 当归三分（锉，微炒） 羚羊角屑三分 牛蒡子一两（微炒） 酸枣仁三分（微炒）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后中风，四肢筋脉挛急疼痛，背项强直。

【方论选录】《医略六书》：产后风中于经，热遏于络，而筋脉失养，故项背强急，手足拘挛掣痛焉。西羌活散太阳之邪，羚羊角清厥阴之火；芎藭活血行气，当归养血荣筋；防风疏风于表，乳香活血止痛；牛蒡疏风散热，枣仁养心益营；桂心温营暖血以平肝木也。水煎温服，使风邪外解，则遏热自化，而经络清和，筋得所养，安有项背强急，拘挛掣痛之患哉。

【备考】《医略六书》有乳香。

04964 芎藭散

【方源】《幼幼新书》卷三十二引《神巧万全方》。

【组成】 芎藭半两 甘菊花 白术 防风 人参 细辛 白茯苓 甘草（炙）各一分

【用法】 上为散。每服一钱，以水一盏，加生姜少许，煎至五分，去滓温服。

【主治】 小儿脑户伤于风冷，鼻内多涕，精神昏闷。

04965 芎藭散

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】 芎藭 辛夷各一两 细辛（去苗叶）三分 木通（锉）半两

【用法】 上为散。每用少许绵裹塞鼻中，湿即易之。五七日愈。

【主治】 鼻塞不闻香臭。

04966 芎藭散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】 芎藭 槟榔 麻黄（去节） 肉桂 防己 木通 细辛 白芷 石菖蒲各一分 木香 川椒 甘草（焙）各半分

【用法】 上锉。每服三钱，加生姜、紫苏煎服。

【主治】 鼻塞为齆。

【备考】《证治宝鉴》有葛根，无甘草。

04967 芎藭膏

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】 芎藭 当归 细辛（去苗叶） 白芷各一分

【用法】 上为细末，以雄鱼脑六合，和于银器中，煎成膏，去滓，倾入盒中澄凝。以枣核大，绵裹塞耳中。

【主治】 耳鸣，耳聋。

04968 芎藭膏

【方源】《济生》卷五。

【异名】 芎芷膏（《得效》卷十七）。

【组成】 香白芷 芎藭各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。食后临卧噙化。

【主治】 口气热臭。

【备考】 本方方名，据剂型当作“芎藭丸”或“芎芷丸”。

04969 芎黄汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 川芎一两 黄芩六钱 甘草二钱

【用法】 上㕮咀，每服五七钱，水一盏半，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。三服即止。后用大芎黄汤下之。

【主治】 破伤风。脏腑秘，小便赤，自汗不止，因服热药，汗出不休者。

【备考】 本方方名，《医学正传》引作“小芎黄汤”。

04970 芎黄散

【方源】《得效》卷十二。

【组成】 川芎 干地黄 当归 山药 白芍药各一两 沉香半两 粉草二钱

【用法】 上为末。每服半钱，温盐汤调下，用少许揩齿脚亦佳。

【主治】 小儿齿不生。

04971 芎麻汤

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】 川芎 天麻

【用法】 以此方送下青州白丸子。

【主治】 风痰头痛，眩晕欲吐。

04972 芎葛汤

【方源】《本事》卷七。

【组成】 川芎（洗） 干葛 桂枝（去皮，不见火） 细辛（去叶） 枳壳（去瓤，麸炒黄） 人参（去芦） 芍药 麻黄（去节） 防风（去钗股）各半两 甘草一分（炙）

【用法】 上为粗末。每服五钱，水二盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓温服，一日三次。有汗避风。

【主治】 胁下疼痛不可忍；兼治脚弱。

【方论选录】《本事方释义》：川芎气味辛温，入足少阳、厥阴；葛根气味辛甘平，入足阳明；桂枝气味辛温，入足太阳；细辛气味辛温，入足少阴；枳壳气味苦寒，入足太阴；人参气味甘温，入足阳明；白芍气味酸微寒，入足厥阴；麻黄气味辛温，入足太阳；防风气味辛甘微温，入足太阳；甘草气味甘平，入足太阴，通行十二经络，能缓诸药之性；使以姜之辛通达表。胁下疼痛不可忍，兼有足弱不堪行走者，乃膀胱之气逆而不降，故以甘温护其中，以酸甘平缓其势，诸辛温苦平之品，得各行其性，鲜有气不行而疼不减者矣。

04973 芎犀丸

【方源】《得效》卷十。

【组成】 石膏（细研）四两 生龙脑（别研） 朱砂（研，飞）四两（留一两为衣） 生犀角一两 人参（去芦）二两 茯苓（去皮）二两 川芎四两 阿胶（碎，炒）一两半 细辛（去苗）二两 麦门冬（去心）三两 甘草（炙）二两 山栀子（去皮）一两

【用法】 上除别研药后入，并为末，炼蜜为丸。每服一至二丸，食后细嚼、茶、酒任下。服此不十数次，或作嚏，突出一铤稠脓，即愈。

【主治】 偏头疼，一边鼻塞不闻香臭，常流清涕，或作臭气一阵，加芎、蝎等遍服无效者。

【方论选录】《金匮翼》：此方兼祛风清热之长，而得参、胶等安定气血，虽虚人亦可用之，安内攘外，并行不悖也。

【备考】 本方改为散剂，名“芎犀散”（见《中国医学大辞典》）。

04974 芎术香苏散

【方源】《卫生宝鉴·补遗》。

【组成】 川芎 香附 紫苏各四两 甘草一两（炙） 苍术 陈皮各二两

【用法】 上锉。每服三五钱，水煎，去滓热服，一日三次，不拘时候，四时俱可用。

【主治】 头疼发热，或鼻塞声重。

04975 芎归二陈汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】 川芎二钱 当归 半夏各三钱 陈皮 茯苓各一钱半 甘草六分

【用法】 水煎，温服。

【功用】 化痰行气和血。

【主治】 痰阻夹湿，经来量少，色淡稠粘，痰多呕恶，胸中不适，脘胀，口淡腻，脉滑。

04976 芎归百草饮

【方源】《产科发蒙》卷一。

【组成】 当归 川芎 人参 甘草 干姜（炒） 百草霜

【用法】 水煎，温服。

【主治】 妊娠鼻血不止。

04977 芎归安心汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】 当归 川芎 生地 人参 丹皮 生蒲黄 干荷叶一片

【用法】 水煎服。

【功用】 大补心中之血，分清离经之瘀。

【主治】 正产败血攻心，发热，恶露不行，狂言呼叫，甚则奔走登高。

04978 芎归补中汤

【方源】《校注妇人良方》卷十三。

【组成】 艾叶（代姜） 阿胶（炒） 川芎 五味子（杵，炒） 黄耆（炙） 当归 白术（炒） 芍药（炒） 人参 杜仲（炒）各一钱 甘草（炙）五分

【用法】 每服五钱，水煎服。

【主治】 ①《校注妇人良方》：妊娠未足月，气血虚而欲产。②《慈幼新书》：小产血崩，腹痛晕厥。

04979 芎归补血汤

【方源】《审视瑶函》卷二。

【组成】 生地黄 天门冬各四分 川芎 牛膝 白芍药 炙甘草 白术 防风各五分 熟地黄 当归身各六分

【用法】 上锉。水二钟，煎至一钟，去滓温服。

【主治】 男子衄血、便血，妇人产后崩漏，亡血过多，致睛珠疼痛，不能视物，羞明瘦涩，眼睫无力，眉骨、太阳俱疼者。

【加减】 恶心不进食者，加生姜，水煎服。

【方论选录】 上方专补血，故以当归、熟地黄为君，川芎、牛膝、白芍药为臣，以其祛风续绝定痛而通补血也；甘草、白术大和胃气，用以为佐；防

风升发，生地黄补肾，天门冬治血热，血亡必生风燥，故以为使。

04980 芎归明目丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】 川芎 当归 白芍 地黄 牛膝 甘草 杞子 天冬 甘菊

【主治】 由亡血过多，及久痛伤血，或年老血少，必羞明酸痛，不能视物，隐涩泪出。

【加减】 外障，加木贼；内障，加珍珠。

04981 芎归养荣汤

【方源】《赤水玄珠》卷十六。

【组成】 当归 川芎 白芍药 熟地黄 黄柏 知母 人参 枸杞子 麦门冬 甘草

【用法】 水煎服。

【主治】 血厥。吐、衄不知人而厥者。

04982 芎归养荣汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】 川芎 白芍药 熟地黄 当归 蔓荆子 各一钱 细辛七分 人参一钱五分

【用法】 上㕮咀。水煎熟，食远温服。

【主治】 血虚头疼，兼治血虚头风。

04983 芎归养荣汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 当归身二钱 人参 黄耆 白术 川芎 白芍 熟地各一钱 五味子 麦门冬 远志 甘草 茯苓各五分 牡丹皮 砂仁各三分

【用法】 水二钟，加生姜三片、大枣二个，煎八分，食远服。

【主治】 瘰疬，流注，及一切不足之症，不作脓，或不溃，或已溃不敛，或身体发热恶寒，肌肉消瘦，饮食少思，睡卧不宁，盗汗自汗，惊悸恍惚。

04984 芎归桂朴汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 川芎八分 当归二钱 桂枝八分 厚朴一钱 枳实一钱 广皮一钱 半夏一钱五分 茯苓三钱 天麻六分 菊花二钱 生姜三片

【主治】 留饮。心下痞满，作哕头眩。

04985 芎归胶艾汤

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 胶艾汤（《金匮》卷下）、当归散（《普济方》卷三四二）、胶艾四物汤（《医学入门》卷八、阿胶蕲艾汤（《明医指掌》卷九）、艾叶地黄汤（《产孕集》卷上）。

【组成】 芎藭 阿胶 甘草各二两 艾叶 当归各三两 芍药四两 干地黄四两

【用法】 以水五升，清酒三升，合煮取三升，去滓，纳胶令消尽，温服一升，一日三次。不愈更作。

【功用】 ①《普济方》：保血安胎。②《中医方剂学》：补血调经，安胎止痛。

【主治】 妇人冲任虚损，崩中漏下，月水过多，淋沥不止，或半产后下血不绝，或妊娠下血，腹中疼痛者。

①《金匮》：妇人有漏下者，有半产后因续下血都不绝者，有妊娠下血者，假令妊娠腹中痛，为胞阻。②《千金》：妊娠二三月至七八月，其人顿仆失踞，胎动不安，伤损，腰腹痛欲死，若有所见，及胎奔上抢心，短气。③《局方》：劳伤血气，冲任虚损，月水过多，淋沥漏下，连日不断，脐腹疼痛；及妊娠将摄失宜，胎动不安，腹痛下堕；或劳伤胞络，胞阻漏血，腰痛闷乱；或因损动，胎上抢心，奔动短气；及因产乳，冲任气虚，不能约制，经血淋沥不断，延引日月，渐成羸瘦。

【方论选录】 ①《金匮要略心典》：妇人经水淋漓，及胎产前后下血不止者，皆冲任脉虚，而阴气不能守也。是惟胶艾汤为能补而固之。中有芎、归，能于血中行气；艾叶利阴气，止痛安胎，故亦治妊娠胞阻。胞阻者，胞脉阻滞，血少而气不行也。②《医方集解》：此足太阴、厥阴药，四物以养其血，阿胶以益其阴。艾叶以补其阳，和以甘草，行以酒势，使血能循经养胎，则无漏下之患矣。

【临证举例】 胎漏 （《中医医案医话集锦》）：杨某某，女，31岁，工人，1976年8月5日初诊。自述妊娠四月，无故下血，量不多，腹不痛，脉滑无力，此因劳累伤脾，致使肝不藏血，脾不统血而胎漏。治宜清热安胎，养血止血，方用加味阿胶四物汤。处方：阿胶9克（烊化），艾叶9克，生地15克，杭白芍9克，当归9克，川芎3克，续断9克，焦杜仲9克，人参9克，黄芩6克，甘草6克。8月9日二诊：服药三剂后下血减少，仍以原方续服五剂，血止病愈。

【备考】 方中干地黄用量原缺，据《千金》补。

04986 芎归益母丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】 益母草四两 当归一两 川芎五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。妊娠七八个月用，每服五六十丸。胎前加砂仁一钱，空心温酒或滚白汤送下；产后不用砂仁，用童便送

下。

【主治】 胎动不安。

【宜忌】 忌铁器。

04987 芎归疏肝汤

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】 川芎二钱 当归四钱 制香附二钱 炒青皮一钱 王不留行三钱 延胡三钱 蒲公英二钱 鹿角霜二钱 麦芽三钱（炒） 柴胡二钱 瀉芦一钱 夏枯草二钱 路路通四个 枇杷叶五片（去毛）

【用法】 水煎，入酒少许冲服。

【主治】 乳痈，乳岩。

【宜忌】 凡胎前不宜。

04988 芎当泻心汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【异名】 芎归泻心汤（《胎产心法》卷下）。

【组成】 归尾 川芎 延胡索 蒲黄 牡丹皮各一钱 桂心七分

【用法】 水煎，另研五灵脂末一钱，食后调服。

【主治】 产后败血停积，上干于心，心下胀闷，烦躁昏乱，狂言妄语，如见鬼神者。

04989 芎芷石膏汤

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】 川芎 白芷 石膏 菊花 羌活 藁本

【主治】 头痛眩晕，头风盛时发作，日久不愈。

【加减】 苦痛者，加细辛；风盛目昏，加防风、荆芥穗；热盛，加栀子、连翘、黄芩、薄荷、甘草；大便秘，小便赤，加消、黄攻之，自愈也。

04990 芎芷香苏散

【方源】《医方类聚》卷五十六引《管见良方》。

【组成】 香附子（炒去毛） 紫苏各三两 陈皮（去白） 川芎 白芷各二两 甘草（炙）一两

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一大盏，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】 四时瘟疫、伤寒，发热，头痛项强，百节酸疼；又疗伤风咳嗽，声重，鼻流清涕，腰背拘急。

04991 芎芷香苏散

【方源】《医便》卷二。

【组成】 川芎 白芷 苏叶（紫者，去梗） 香附各一钱 陈皮 防风 羌活各八分 甘草五分

【用法】 加生姜三片，葱白三寸，水一钟半，煎八分，食后热服。

【主治】 春月伤风，鼻塞声重，或流清涕，咳嗽痰壅气逆，人迎脉浮缓。

【加减】 有痰，加半夏一钱；咳嗽，加杏仁、桑白皮各八分，五味子十粒。

04992 芎辛导痰汤

【方源】《奇效良方》卷二十四。

【组成】 川芎 细辛 南星 陈皮（去白） 茯苓各一钱半 半夏二钱 枳实（麸炒） 甘草各一钱

【用法】 上作一服。水二钟，加生姜七片，煎至一钟，食后服。

【主治】 ①《奇效良方》：痰厥头痛。②《杂病源流犀烛》：由风痰而致眉棱骨痛，连于目不可开，昼静夜剧者。

04993 芎辛菊花散

【方源】《保命歌括》卷十五。

【组成】 川芎 羌活 白芷 防风 荆芥 薄荷各一两 细辛 甘草 菊花各五钱

【用法】 上为细末。每服二钱，清茶调，食远服。

【主治】 风热头痛，发作无时。

04994 芎蓼天麻丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】 芎蓼二两 天麻半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两半作二十丸。每服一丸，食后细嚼，茶、酒任下。

【功用】 清利头目，消风化痰，宽胃利膈。

【主治】 心忪烦闷，旋运欲倒，颈项紧急，肩背拘倦，神昏多睡，肢体烦痛，皮肤瘙痒，偏正头痛，鼻塞声重，面目浮肿。

04995 芎蓼补中汤

【方源】《济生》引《校正时贤胎前十八论治》（见《医方类聚》卷二二四）。

【异名】 芎归补中汤（《证治准绳》卷六）、芎归补血汤（《叶氏女科》）。

【组成】 干姜（炮） 阿胶（锉，蛤粉炒） 芎蓼五味子各一两 黄耆（去芦，蜜水炙） 当归（去芦，酒浸） 白术 赤芍药各一两 木香（不见火） 人参 杜仲（去皮，锉，炒） 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，不拘时候通口服。

【功用】 产后用之，养新血，去瘀血，补虚扶危。

【主治】 ①《奇效良方》：怀孕血气虚弱，不能卫养，以致数月而堕，名曰半产。②《叶氏女科》：劳役感寒，以致气虚下坠者。

04996 芎蕖补血汤

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】川芎 白术 阿胶 白芍 杜仲 人参 黄耆 木香 五味各一钱 甘草八分 生姜一片 大枣二个

【主治】妊娠月未足，由气血虚弱，脏腑皆虚，加以病患相感，情欲相扰，以致精血攻冲，侵损荣卫而胎无所养，而半产胎未堕，血行腰痛者。

04997 芎归六君子汤

【方源】《医方集解》。

【组成】当归 芎蕖 人参 白术 茯苓 甘草 橘红 半夏

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】妇人体肥气虚，痰滞经络，经水后期，其来涩少。

【方论选录】此足太阴、厥阴药也。二陈治其痰滞；参、术补其气虚，气行则痰行；芎、归活其经血。

04998 芎术萎栀二陈汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】川芎一钱 干姜（炮）一钱 苍术（米泔制）一钱 栀子（炒）一钱 陈皮（去白）二钱二分 半夏（姜汁炒）一钱 茯苓（去皮）一钱 甘草五分

【用法】上锉一剂。加生姜五片，水煎，正痛时温服。痛止，待半日方可饮食。

【主治】素有痰火，胃脘急痛不可忍者，食不能消。

04999 芎蕖当归加芍药汤

【方源】《三因》卷十七。

【异名】芎蕖汤加芍药方（《妇人良方》卷二十二）、芎归加芍药汤（《医学纲目》卷三十五）、芎归汤（《万氏家抄方》卷一）、芎蕖汤（《校注妇人良方》卷二十二）、芎蕖加芍药汤（《中国医学大辞典》）。

【组成】川芎 当归 芍药各等分

【主治】①《三因》：产后忧惊恚怒，脏气不平，或服断血药早，致恶血不消，郁满作坚，而成崩中。②《医学纲目》：产后血崩眩晕。

【备考】《妇人良方》本方用法：上㕮咀，每服四钱，水一盏半，煮取七分，出滓热服，不拘时候。

05000 吉利散

【方源】《伤科大成》。

【组成】当归 川芎 枳壳 陈皮 香附 厚朴 木香 苏木末 刘寄奴 落得打 三七 乳香 没药 蓄蓄各等分

【用法】上为末。每服三钱，温酒调下。

【功用】行气活血止痛。

【主治】跌打损伤，红肿不消，阵阵作痛。

05001 吉祥丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】大熟地八两 鹿角霜 白芍药 党参 当归 杜仲 茯苓 菟丝子各四两 甘草（炙） 官桂 川芎 川椒各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五钱，淡盐汤送下。

【主治】妇人子宫寒冷，瘀积胞门，任脉不荣，冲脉少藏，经事不调，积年不孕。

05002 老龙丸

【方源】《普济方》卷二一九引崔磨方。

【异名】苍龙丸（原书同卷）、老奴丸（《奇效良方》卷二十一）。

【组成】母丁香 紫霄花 肉苁蓉（酒浸） 菟丝子（酒浸） 蛇床子 巴戟 仙灵脾 白茯苓（去皮） 远志（去心） 八角茴香各二两 灯草二钱 毕澄茄 胡桃肉 车前子 草薢 马蔺花（酒浸） 牡蛎（火烧炒六次） 韭子种 木通（酒浸） 各一两 干漆（炒去烟）三两 山茱萸 破故纸（酒浸） 全蝎 桑螵蛸（酒浸） 龙骨各一两半 熟地黄五两 当归五钱 沉香五钱 木香五钱 大蜘蛛七个（一方无桑螵蛸、当归、乳香）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【功用】①《普济方》：添精补肾虚，去冷除风湿，扶经更起阳。②《饲鹤亭集方》：兴元阳，种子嗣。

【主治】①《普济方》：年高气衰虚耗，风湿脚疼痛。②《饲鹤亭集方》：下元虚损，精虚无子，及五劳七伤，腰膝痠痛，小肠疝气。

【临证举例】无子 《普济方》：褚氏无子，得此药修合未服，夫主有老奴七十之上，腰脚疼痛，曲背而行，褚氏以此药服之，其老奴语褚氏曰，自服此药，深有灵验，诸疾悉痊，房事如少壮之人。于是与褚氏通，因后有孕。一日，褚氏服药，其家母视之，切究其由，得其实，因打死此老奴，并折其腿，骨髓皆满，皆此药之效也。

05003 老军散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】大黄（半生半煨） 甘草各等分

【用法】上为细末。每用一匙，空心温酒调服一

二服。疏利为度。

【主治】 发背痈疽，疔疮恶毒，一切无名肿毒，燃热初起未溃者。

05004 老疟丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 常山 草果各二两

【用法】 上药用酒、醋各一碗，入砂锅内浸一宿，再入青皮、陈皮、半夏、乌梅、三棱、莪术、砂仁、槟榔各一两，同浸半日，煮干，晒，为末，半酒半醋打糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白汤送下。

【主治】 久疟不愈，腹痛有母。凡积聚及行瘴湿地方尤宜。

05005 老疟饮

【方源】《三因》卷六。

【异名】 痎疟饮(《古今医鉴》卷五)。

【组成】 苍术（泔浸） 草果（去皮） 桔梗 青皮 陈皮 良姜各半两 白芷 茯苓 半夏（汤洗去滑） 枳壳（麸炒，去瓤） 甘草（炙） 桂心 干姜（炮）各三钱 紫苏叶 川芎各二钱

【用法】 上锉散。每服四大钱，水二盏，盐少许，煎七分，去滓，空心服，日三夜一。仍吞下红丸子。

【主治】 久疟，结成癥瘕癖在腹胁，诸药不去者。

05006 老痰丸

【方源】《医统》卷四十三引王节斋方。

【组成】 天门冬（去心） 黄芩（酒炒） 海粉（另研） 橘红（去白）各一两 连翘半两 桔梗 香附子（淡盐水浸，炒）各半两 青黛（另研）一钱 芒消（另研）二钱 瓜蒌仁（另研）一两

【用法】 上为细末，炼蜜（入姜汁少许）为丸，如龙眼大。噙嚼一丸，细咽之，清汤送下；或丸如绿豆大，淡姜汤送下五六十丸。

【功用】 润燥开郁，降火消痰。

【主治】 火邪炎上，凝滞于心肺之分，肺气不清，老痰郁痰结成粘块，凝滞喉间，吐咯难出。

【方论选录】 此方天冬、黄芩泻肺火，海粉、芒消咸以软坚，瓜蒌润肺消痰，香附、连翘开郁降火，青黛去郁火，故不用辛燥之药。

05007 老膜散

【方源】《异授眼科》。

【组成】 珍珠二分 熊胆一分五厘 辰砂一分五厘 陀僧一分五厘 蕤仁一分五厘 白丁香一分五厘 荜茇粉二分 硇砂（升过）一分

【用法】 上为细末。点之。

【主治】 翳膜极重者。

05008 老柏皮散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 老柏白皮二两（锉） 乌梅肉一两（微炒） 细辛二两 地肤子二两

【用法】 上为细散。每服二钱，食后以温水调下。

【主治】 眼雀目，至暮无所见。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“白皮散”。

05009 老鹳草膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 老鹳草四百八十两

【用法】 将老鹳草洗净泥土，水煎三次，每次过滤去滓，合并滤液，用文火煎熬，浓缩收膏，以不渗纸为度。每一两清膏，兑炼蜜二两，装瓶重二两。每服二至五钱，温开水冲下。

【功用】 ①《北京市中药成方选集》：舒筋活络，祛风除湿。②《中药制剂手册》：活血止痛。

【主治】 风湿麻木，筋骨不舒，手足疼痛，皮肉作痒。

05010 老年白带方

【方源】《妇科玉尺》卷五。

【组成】 黄柏 五味 杜仲各四钱 萸肉五钱 补骨脂 牡蛎（煅）各三钱 醋香附八钱 砂仁 川椒 川芎 茯苓 车前子各二钱 醋炒艾叶一钱 醋化阿胶五钱 白芍六钱

【用法】 鹿角胶为丸。盐汤送下。

【主治】 年老人久带。

05011 老君益寿散

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】 天门冬五两（去心，焙） 白术四两 防风一两（去芦头） 干姜一两半（炮裂，锉） 熟干地黄二两 细辛一分 桔梗一两（去芦头） 天雄半两（炮裂，去皮脐） 远志（去心） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮） 泽泻各一两 石斛（去根，锉） 桂心 柏实 云母粉 石韦（去毛） 杜仲（去粗皮，锉） 牛膝（去苗） 白茯苓 菖蒲 五味子 蛇床子 甘菊花 山茱萸各半两 附子一两半（炮裂，去皮）

【用法】 上为散。每服三钱，平旦酒下。冬月日三服，夏平旦一服，春秋平旦，日暮各一服。

【功用】 驻颜益寿。

05012 西瓜霜

【方源】《疡医大全》卷十七。

【异名】 咽喉独圣散(《疡科纲要》卷下)。

【组成】 西瓜一个

【用法】 用大黄泥钵一个，将西瓜一个照钵大小松松装入钵内，将瓜切盖，以皮消装满瓜内，仍以瓜盖盖，竹签扦定，再以一样大的黄泥钵一个合上，外用皮纸条和泥将缝封固，放阴处过数日，钵外即吐白霜，以鹅毛扫下收好，仍将钵存阴处，再吐再扫，以钵外无霜为度。收好。每用少许吹之。

【功用】 《全国中药成药处方集》(吉林方)：止痛、防腐、消肿。

【主治】 ①《疡医大全》：咽喉、口齿、双蛾喉痹，命在须臾。②《王氏医存》：喉疼、火眼、火疮、肿毒、口烂、牙疼、外痔等一切热患。

【宜忌】 《全国中药成药处方集》(吉林方)：忌食辛辣食物；白喉忌用。

05013 西瓜霜

【方源】 《经验方》卷下。

【组成】 秋季老西瓜一个

【用法】 切开一片作盖，挖去内肉，取蜒蚰一大碗入瓜中，再入元明粉盛满，仍将切下之盖盖上，用竹钉钉上，夏布袋装之，挂于有风无雨处，下接瓷盆，以接滴下之水，此水能成白霜，候干透，研细末。临用时，加冰片少许。

【主治】 喉风、乳蛾。

05014 西清汤

【方源】 《医醇剩义》卷三。

【组成】 桂枝五分 栀子一钱五分(姜汁炒) 苏子一钱五分 桑皮二钱 杏仁二钱 橘红一钱 半夏一钱 茯苓二钱 蒺藜三钱 郁金二钱 生姜三片

【主治】 胆咳，咳呕胆汁。

05015 西洋参酒

【方源】 《丸散膏丹集成》。

【组成】 西洋参

【用法】 浸酒服用。

【功用】 滋肺胃，养血气，生津止渴。

【主治】 肺虚咳嗽，胃枯食少，及上中二焦阴虚液少诸证。

05016 西州续命汤

【方源】 《外台》卷十四引《肘后方》。

【异名】 大续命汤(《千金》卷八引《胡洽方》)。

【组成】 麻黄六两(去节) 石膏四两(碎，绵裹) 桂心 当归 甘草(炙)各二两 芎藭 干姜 黄芩各一两 杏仁四十枚(去皮尖两仁)

【用法】 上切。以水一斗九升，先煮麻黄再沸，吹去沫，后下诸药，煮取四升，初服一升，汗出即愈。汗后稍稍五合一服，饮食如常。

【主治】 中风痱，身体不自收，口不能语，冒昧不识人，不知痛处，但拘急，中外皆痛，不得转侧。

【宜忌】 忌生葱、海藻、菘菜。

05017 西州续命汤

【方源】 《外台》卷十四引《古今录验》。

【组成】 麻黄(去节) 干姜各二两 附子一两(炮) 防风 桂心 白术 人参 芎藭 当归 甘草(炙)各一两 杏仁四十枚(去皮尖及两仁，碎)

【用法】 上切。以水九升，煮取三升，未食分再服。覆令汗出。

【主治】 卒中风，身体直，角弓反张，口噤。

05018 西州续命汤

【方源】 《千金》卷十五。

【组成】 麻黄 生姜各三两 当归 石膏各二两 芎藭 桂心 甘草 黄芩 防风 芍药各一两 杏仁四十枚

【用法】 上㕮咀。以水九升，先煮麻黄，去沫，下诸药，煮取三升，去滓，分四服，一日二次。

【主治】 肉极。虚热，肌痹淫淫，如鼠走身上，津液开泄，或痹不仁，四肢急痛。

【方论选录】 《千金方衍义》：续命为风痱身体不能自收、正虚风中之首药，乃《古今录验》方中除去人参，加入黄芩，谓之西州续命。更添小续命中芍药、防风二味，并以生姜易干姜，即小续命中除去附子、防己，专力开发风痹。以无脾虚喘乏，故无取于人参；以无肾虚逆冷，故无取于附子；以无下体疼重，故无取于防己也。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“续命汤”。

05019 西洋十宝散

【方源】 《外科全生集·新增马氏试验秘方》。

【组成】 真血竭一钱六分 明雄黄四钱 上红花四钱 净儿茶二分四厘 辰州砂一钱二分 净乳香一钱二分 当归尾一两 净没药一钱四分 当门子三厘 梅片一分二厘

【用法】 上为细末，入乳钵研至无声，收入瓷瓶，黄蜡封口，勿令泄气。刃伤并各器械伤，皮破出血者，以末药掺上包固，不可见风；跌打损伤，皮肉青肿，未破者，用陈醋调敷患处；内伤骨碎，或骨已断折，先将骨节凑准，用陈醋调敷患处，以纸包裹，外加老棉絮包好，再用薄板夹护，将绳慢慢系紧，不可移动，药性到骨自接，须静百日，勿

犯房事，犯则必成残疾；刀伤深重，未致透膜者，先用桑皮纸线缝好，多掺药末于上，以活鸡皮急急调护如前骨损养法即愈；跌打昏迷不醒，急用一钱，同陈酒冲服。

【主治】 跌打损伤，金疮。

05020 西黄化毒丹

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】 西黄一分 真珠二分 血珀五分 胆星三分 辰砂三分

【用法】 上为细末。均作二服，灯心汤调下。

【主治】 疔疽火毒内陷，神识模糊，不醒人事。

05021 西黄化毒丹

【方源】《朱仁康临床经验集》引章氏方。

【组成】 牛黄 1.5 克 琥珀末 30 克

【用法】 先将牛黄研细，再将琥珀研细装瓶内。量儿大小，每日服 0.15 克至 0.3 克，蜂蜜少许调下。

【功用】 清化解毒。

【主治】 胎瘢疮（婴儿湿疹），大便不成形者。

【宜忌】 服药期间，忌食鸡蛋、鱼腥、发物。

05022 西王母四童散

【方源】《医心方》卷二十六引《大清经》。

【异名】 王母四童散（《圣惠》卷九十四）、龟台王母四童散（《遵生八笺》卷四）。

【组成】 胡麻（熬） 天门冬 茯苓 山术 干黄精 桃核中仁（去赤皮）各等分。

【用法】 六物精治，合捣三方杵，旦以酒服三方寸匕，一日二次；亦可水服。

【功用】 返老还童。

【备考】《遵生八笺》有辰砂。

05023 西川石刻安肾丸

【方源】《玉机微义》卷十九引《局方》。

【异名】 西蜀石刻安肾丸（《医统》卷四十八）。

【组成】 青盐四两 鹿茸（炙） 柏子仁（净） 石斛 附子 川乌（炮） 巴戟（去心） 肉桂 菟丝子 苁蓉 韭子 葫芦巴 杜仲 破故纸（炒） 石枣 远志 赤石脂 茯苓 茯神 茴香（炒）各一两 苍术 川楝子 川椒 山药各四两

【用法】 上为末，山药酒糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心盐汤送下。

【主治】 真气虚惫，脚膝弱缓，夜梦遗精，小便滑数而清。

05024 西川罗赤脚仙还少丹

【方源】《洪氏集验方》卷一引陈晦叔方。

【异名】 还少丸（《杨氏家藏方》卷九）、还少丹（《卫生宝鉴》卷六）、滋阴大补丸（《医学正传》卷三）、真人还少丹（《中国医学大辞典》）。

【组成】 干山药 牛膝（酒浸一宿，焙干）各一两半 山朱萸 白茯苓（去皮） 五味子 肉苁蓉（酒浸一宿，焙干） 石菖蒲 巴戟（去心） 远志（去心） 杜仲（去粗皮，用生姜汁并酒合和，涂炙令熟） 楮实 船上茴香各一两 枸杞子 熟干地黄各半两

【用法】 上为末，炼蜜入枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒、盐汤送下，一日三次。至五日觉有力，十日精神爽健，半月气力稍盛，二十日目明，一月夜思饮食，冬月手足常暖，久服无毒。

【功用】 大补心肾脾胃，常服令人身体轻健，筋骨壮盛，怡悦难老，齿牢，永无瘴疟；妇人服之，姿容光悦，去一切病。

【主治】 ①《洪氏集验方》引陈晦叔方：一切虚损，神志俱耗，精力不爽，腰脚沉重，肢体倦怠，气血羸乏，小便浑浊，子宫久冷。②《杨氏家藏方》：脾胃怯弱，心忪恍惚，精神昏愦，气血凝滞，饮食无味，肌瘦体倦，目暗耳聋。

【加减】 如身热，加山栀子二两；心气不宁，加麦门冬一两；少精神，加五味子二两；阳弱，加续断一两。

05025 再生丹

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】 桔梗一分 硼砂一分 山豆根一分 生甘草二分 牛黄一分 荆芥一分

【用法】 上为极细末。用鹅翎插药五厘吹入蛾处，一日六次。痰涎出尽即愈。

【主治】 双蛾、单蛾初起久患，喉痹。

05026 再生散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 土鳖四十九个（煅存性） 山豆根 人中白（煅） 辰砂（飞）各二钱

【用法】 上为细末，用时先割净腐肉，次用麻油通口噙漱，觉无油气吐之，如式六七次，次以百沸汤入盐、醋，漱吐三四次，再次以绵胭脂拭干，掺之。

【主治】 走马牙疳，牙落鼻崩，久不愈者。

05027 再造丸

【方源】《医述》卷十二。

【组成】 人参一两 白术八钱 茯苓一两 甘草一两 熟地一两二钱 当归一两 川芎一两 赤芍八钱 黄耆一两二钱 首乌一两 肉桂一两二钱

附子八钱　麻黄一两　防风一两　灵仙一两　白芷一两　细辛一两　羌活一两　葛根一两　桑寄生一两　天麻一两　僵蚕一两　乳香一两　没药一两　丁香一两　藿香一两　海南香一两　香附八钱　青皮八钱　乌药八钱　松香六钱　草蔻仁一两　白蔻仁八钱　萆薢八钱　骨碎补一两　玄参八钱　川连一两　大黄一两　天竺黄一两　红花八钱　姜黄一两　朱砂一两　琥珀一两　血竭八钱　胆星一两　蕲蛇四两　龟版一两　虎膝一对　犀角八钱　穿山甲四两　雄鼠矢一两　牛黄三钱　全蝎一两半　地龙八钱　冰片二钱　麝香八钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，每粒重一钱二分，金箔为衣，阴干，蜡壳封好。

【主治】 痹证。

05028　再造丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 蕲蛇肉（酒制）二十两　母丁香十两　玄参（去芦）二十两　熟地二十两　青皮（醋炒）十两　何首乌（酒炙）二十两　黄耆二十两　竹节香附二十两　大黄二十两　骨碎补十两　红曲五两　细辛十两　香附（醋炒）十两　三七五两　豆蔻仁十两　川芎二十两　甘草二十两　黄连二十两　葛根十五两　麻黄二十两　檀香五两　天竺黄十两　地龙肉五两　乳香（醋炒）十两　防风二十两　片姜黄二两五钱　茯苓十两　桑寄生二十两　藿香二十两　赤芍十两　全蝎十五两　川附子十两　萆薢二十两　沉香十两　天麻二十两　草豆蔻二十两　没药（醋炒）十两　当归十两　建神曲四十两　虎骨（油炙）十两　穿山甲（醋炙）十两　白术（炒）十两　肉桂（去粗皮）二十两　白芷二十两　羌活二十两　人参（去芦）二十两　毛橘红四十两　僵蚕（炒）十两　龟版（醋炙）十两　子术八两　血竭七两五钱　威灵仙十五两　乌药十两　油松节十两

【用法】 上为细末，每三百二十两细末兑牛黄一两、犀角粉三两、麝香二两、朱砂粉四两、冰片一两，研细和匀，炼蜜为丸，每丸重三钱，金箔为满衣，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下。一日二次。

【功用】 祛风散寒，化痰活络，镇静安神。

【主治】 中风半身不遂，左瘫右痪，口眼㖞斜，腰腿不利，四肢麻木，言语不清，筋骨疼痛。

05029　再造丹

【方源】《顾松园医镜》卷九。

【组成】 川黄连二两（先饲金银各二两，煎浓汁三碗）　大田螺五十个（仰摆盘内，以黄连汁挑点螺眼上，顷刻化成水，将绢滤收，同黄连、金银器煎至碗半，入萝卜子汁半碗煎至碗半，入韭菜汁半碗，煎至碗半，入侧柏叶汁半碗，煎至碗半，入梨汁一碗，煎至碗半，入竹沥一碗，煎至碗半，入童便一碗，煎至碗半，取出金银器，入人乳二碗，煎至一碗；入羊乳二碗，煎至一碗；入牛乳二碗，微火煎至成膏）

【用法】 取膏入瓷罐内，封口埋土内一夜，以去火气。每用一酒杯，白汤下。极重者三服全愈。如汤水不能进者，将膏挑至舌上，随津咽下，遂能饮食。只可食糜粥，一月后方可用饭。

【主治】 膈病。

05030　再造散

【方源】《伤寒六书》卷三。

【异名】 再造饮（《赤水玄珠》卷十八。）

【组成】 黄耆　人参　桂枝　甘草　熟附子　细辛　羌活　防风　川芎　煨生姜

【用法】 水二钟，加大枣二个，煎一钟。捶法再加炒白芍一撮，煎三沸温服。

【主治】 伤寒头痛发热，项脊强，恶寒无汗，用发汗药二三剂而汗不出，脉无力者，此阳虚不能作汗，名曰无阳证。

【加减】 夏月热盛，加黄芩、石膏。

【方论选录】 ①《伤寒六书》：此足太阳药也。《经》曰，阳之汗，以天之雨名之。太阳病汗之无汗，是邪盛而真阳虚也，故以参、耆、甘草、姜、桂、附子大补其阳，而以羌、防、芎、细发其表邪。加芍药者，于阳中敛阴，散中有收也。人第知参、耆能止汗，而不知能发汗。以在表药队中，则助表药而能解散也。东垣、丹溪治虚人感冒，多用补中益气加表药，即同此意也。②《医方论》：此方但可施于常时之不能作汗者。若在冬月，而脉见浮紧，便是太阳之寒伤营，此方断不可用。注中又引东垣、丹溪治虚人感冒多用补中益气加表药，予不以为然，盖亲见喜用升、柴者杀人无数，故不得不加意慎重，非偏执己见，不喜升、柴，实不敢泥纸上之成方，误目前之人命也。

【临证举例】 荨麻疹　《中医杂志》（1985；7：542）：笔者从1979年11月至1983年3月，应用再造散无选择地治疗100例寒冷性荨麻疹患者。其中，男性56例，女性44例，年龄大多在15至50岁之间。病程最长者10年，最短者一星期，都曾不同程度的接受过中、西药物治疗。再造散方药：淡附片10克，北细辛3克，川桂枝10克，白芍10

克，生姜10克，大枣5个，炙甘草5克，生黄耆15克，潞党参10克，大川芎5克，羌活10克，青防风30克。开始以汤剂控制发作，待症状消失后，再按上方比例制成散剂，每天服二次，每次10克，连服一月，以资巩固。通过治疗观察，最短者服一剂即中止发作，最长者服十三剂始部分控制，服散剂半月后才完全中止发作。当年治愈84例，次年追访复发13例。

05031 再造至宝丹

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】大风肉 白蒺藜 防风 苦参各二斤 荆芥 胡麻 当归各一斤 天麻十两 黄连 乌药 棕灰 雄黄各五钱 海风藤 人参各八两 官桂 甘草各七两 天竺黄 檀香根各二钱 麝香一两

【用法】上为末，米糊为丸。酒送下。

【主治】大麻疯。

【加减】肺经毒盛，眉毛先落，加零陵香、皂角刺各二两；肝经毒盛，面起紫泡，加何首乌五两；肾经毒盛，脚底先穿，加血竭二两；心经毒盛，先损其目，加珠屑一两；脾经毒盛，遍身疮癣，加苍术八两；麻木不仁者，冷风也，加天麻蒂一两；肉死割切不痛，加露蜂二两；血死则溃烂成脓，加归尾八两；筋死则手足脱落，加白僵蚕三两；骨死则鼻梁崩塌，加骨碎补三两。

05032 耳疖散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】老生姜5克 雄黄5克

【用法】将老生姜挖一洞，然后装进雄黄粉末，再用挖出的生姜封紧洞口，放在陈瓦上，用炭火慢慢焙干，约七八小时成金黄色，研粉，过八十洞筛子，将粉装瓶备用。用75%酒精清洁外耳道，3%双氧水清除干痂，用棉签涂药入外耳道，每天一次。

【主治】耳疖。

05033 耳底油

【方源】《全国中药成药处方集》（北京方）。

【异名】治耳油（《全国中药成药处方集》沈阳方）。

【组成】核桃仁油二钱（炼） 冰片二分 麝香一分

【用法】先将冰片、麝香研极细，与核桃油和匀。先将耳内脓水洗净擦干，再行滴入二三滴。

【功用】①《全国中药成药处方集》（北京方）：消炎止痛。②（天津方）：除湿解毒。

【主治】耳内生疮，流脓流水，肿痛作痒。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌辛腥食物。

05034 耳炎散

【方源】《中药知识手册》。

【组成】猪胆膏 枯矾 黄连粉 樟脑

【用法】上为散，以棉裹塞耳孔内。

【功用】清火解毒，收敛燥湿。

【主治】耳内肿痛，流出脓水。

05035 耳脓散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】水龙骨（煅） 一钱 海螵蛸 一钱 飞青黛一钱 枯矾三分 五倍子（炒黄）一钱 煅黄鱼齿五分 细薄荷五分 梅片三分 川雅连三分 蛀竹屑二分 石榴花瓣（炙脆） 一钱

【用法】上为极细末。

【主治】耳疳脓水不止。

05036 耳疳散

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】五倍子 黄连 黄丹 枯矾 龙骨 海螵蛸各等分

【用法】上药加麝香、冰片少许，共为细末。将药粉吹入耳窍内，每日二至三次。在第二次吹药时，用棉签将药卷净。

【功用】解毒收敛。

【主治】慢性耳脓。

05037 耳脓独龙丹

【方源】《古人集验方》。

【组成】生川乌（去皮脐）

【用法】上为细末，吹入耳中。数次即愈。

【主治】耳中脓血常流不息。

05038 耳聋左慈丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【异名】耳鸣丸（《全国中药成药处方集》（南京方）、柴磁地黄丸《全国中药成药处方集》武汉方）。

【组成】熟地四两 山萸肉（炙）二两 茯苓一两五钱 山药二两 丹皮一两五钱 泽泻一两五钱 磁石三两 柴胡一两一钱

【用法】炼蜜为丸。每服三钱，淡盐汤送下。

【功用】《北京市中药成方选集》：滋阴清热，益气平肝。

【主治】肾水不足，虚火上升，头眩目晕，耳聋耳鸣。

05039 耳聋烧肾散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 磁石一两（烧醋淬七遍，细研，水飞过） 附子一两（炮裂，去皮脐） 巴戟一两 川椒一两（去目及闭口者，微炒去汗）

【用法】 上为细散。每服用猪肾一只（去筋膜，细切），葱白、薤白各一分（细切），入散药一钱，盐花一字，和搅令匀，以十重湿纸裹，于塘灰火内烧熟，空腹细嚼，酒解薄粥下之。十日效。

【主治】 耳聋。

05040 耳聋开窍神效丹

【方源】《吉人集验方》。

【组成】 真灵磁石（小豆大）一粒 川山甲（烧研）二分

【用法】 用棉裹塞入耳中，口含生铁一块，耳中如风雨声即通。

【主治】 耳聋。

05041 夺天丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 龙骨二两（酒浸三日，然后用醋浸三日，火烧七次，用前酒、醋汁七次淬之） 驴肾内外各一具（酒煮三炷香，将龙骨研末拌入驴肾内，再煮三炷香） 人参三两 当归三两 白芍三两 补骨脂二两 菟丝子二两 杜仲三两 白术五两 鹿茸一具（酒浸透，切片，又切小块） 山药末炒五味子一两 熟地三两 山茱萸三两 黄耆五两 附子一两 茯苓二两 柏子仁一两 砂仁五钱 地龙十条

【用法】 上药各为细末，将驴肾汁同捣，如汁干，可加蜜同捣为丸。每服五钱，早、晚用热酒送下。

【主治】 男子天生阳物细小而不得子者。

【宜忌】 坚忍房事者两月，少亦必七七日。

05042 夺命丹

【方源】《产育宝庆》。

【组成】 附子半两（炮，去皮脐） 牡丹皮一两 干漆一分（捣碎，炒烟尽）

【用法】 上为末，醋一升，大黄末一两同熬成膏，和药为丸，如梧桐子大。每服五七丸，温酒送下，不拘时候。

【功用】 速去衣中之血。

【主治】 ①《产育宝庆》：胎衣不下。②《医略六书》：脉数涩滞者。

【方论选录】《医略六书》：产后瘀血入胞，胞满腹胀，兼之少火不振，不能逐胞下出，势甚危急，遂成逆症。黑附子振少火以推胞下出，干漆灰破瘀血以逐胞下行，牡丹皮凉血降瘀以防血晕也。大黄膏为丸，醋煮以收之，酒下以行之，务使少火鼓舞，则瘀化气行，而胞衣自下，腹胀自退，何危迫之有哉！

【备考】 本方方名，《济阴纲目》引作“夺命丸”。

05043 夺命丹

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】 川乌（酒煮） 苍术（米泔浸）各四两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。空心服十五丸。忌见风，暖盖出汗。

【主治】 中风，左瘫右痪，半身不遂，口眼㖞斜，言语謇涩。

05044 夺命丹

【方源】《局方》卷八（吴直阁增诸家名方）。

【异名】 星斗丸（《本草纲目》卷三十二引《如宜方》）、四制茱萸丸（《医学入门》卷七）。

【组成】 吴茱萸一斤（去枝梗，四两用酒浸，四两用醋浸，四两用汤洗，四两用童便浸，各浸一宿，同焙干） 泽泻（去灰土）二两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前盐汤或酒送下。

【主治】 远年日近小肠疝气，偏坠搐疼，脐下撮痛，以致闷乱；及外肾肿硬，日渐滋长，阴间湿痒抓成疮。

【临证举例】 疝气 《续名医类案》：冯仲柔云，顷年，某仓使家传，将前方令药局中合卖，绍熙壬子冬，予亲曾得效，时苦奔豚寒气攻冲，小肠疝气，腹内引痛，神思闷乱四日，只一服，脐脐微动，痛若失去，遂安。

05045 夺命丹

【方源】《施园端效方》引《药德全方》（见《医方类聚》卷一七九）。

【组成】 川大黄一两 白僵蚕半两

【用法】 上为细末，生姜汁为丸，如弹子大，阴干。生姜汁磨化下。

【主治】 时气疙瘩，肿塞咽喉，水米不下。

05046 夺命丹

【方源】 方出《云岐子保命集》卷下，名见《准绳·女科》卷五。

【组成】 干荷叶 生地黄 牡丹皮各等分

【用法】 上浓煎汤，调蒲黄末二钱匕。一服即定。

【主治】 产后败血冲心，发热，狂言奔走，脉虚大者。

05047 夺命丹

【方源】《普济方》卷二五〇。

【组成】 吴茱萸半斤（分作四份，酒、醋、小便、米泔四处浸三宿，取出晒干）

【用法】 上为末，加海带、海藻、海螵蛸、泽泻共四味同为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，食前酒送下。

【主治】 癫疝。

05048 夺命丹

【方源】《奇效良方》卷五十四。

【异名】 蟾蜍丸(《外科理例》)、飞龙夺命丹(《保婴撮要》卷十八)。

【组成】 蟾酥（干者，酒化） 轻粉各半钱 白矾（枯） 寒水石 铜绿 乳香 没药 麝香各一钱 朱砂三钱 蜗牛二十个（另研）

【用法】 上为细末，将蜗牛别碾烂，入药末同捣匀为丸，如绿豆大，如丸不就，入酒糊些少。每服一丸，生葱白三五寸，病者自嚼烂，吐于手心，男左女右，包丸药在内，热酒和葱送下，如重车行五七里，汗出为效，重者再服一二丸。

【主治】 ①《奇效良方》：诸般肿毒，疔癣恶疮。②《口齿类要》：喉闭。

05049 夺命丹

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】 裘一个（即蜣螂所滚之裘丸，凡粪土下俱有，用裘中有白虫者，将裘少破一点仍盖住，火煅黄色存性，勿令焦） 麝香一分 孩儿茶二分 金丝黄矾三分 朱砂（春二分、夏四分、秋六分、冬八分）

【用法】 上为细末，空心烧酒调服。如觉饥，大小米煮，渐渐少用，一日二三次，不可多吃。

【主治】 翻胃噎食。

【宜忌】 忌生冷、酱炒厚味、葱蒜、酒面、炙煿等物，及气恼。

05050 夺命丹

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】 川乌（火煨，去黑皮）一两 雄黄一钱

【用法】 上为末，葱汁为丸，如莲子大。每服一丸，用葱叶一片将药裹内，火微烧，嚼烂，黄酒送下，衣盖汗出面愈。

【主治】 破伤风。

05051 夺命丹

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】 归尾三两 桃仁三两 血竭五钱 地鳖虫一两五钱 儿茶五钱 乳香一两 没药一两 自然铜二两 红花五钱 大黄三两 朱砂五钱 骨碎补一两（去毛） 麝香五分

【用法】 上为细末，用黄明胶热化为丸，朱砂为衣。每服一丸，陈酒磨冲下。

【功用】 通关窍。

【主治】 一切重伤险症，脏腑蓄瘀危急之候。

【宜忌】《浙江中医杂志》：孕妇禁用。

【临证举例】 外伤致瘀头痛 《浙江中医杂志》(1986；1:15)：以夺命丹为主方治疗本病105例，男性70例，女性35例，年龄11个月至70岁，病程0.5小时至4个月，其中脑震荡39例，头皮血胀16例，颅骨骨折3例，头皮创伤16例，头皮挫伤31例，全部病例均有不同程度头痛，时轻时重，心烦易怒，抑郁不乐，神昏欲呕，病程长者可见舌质紫黯，边有瘀血斑点，脉弦涩等。经治后，94例痊愈（头痛与临床症状消失），9例好转（头痛减轻，临床症状明显改善），2例无效（头痛与临床症状无明显改善）。

05052 夺命汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 银花 草河车 赤芍 细辛 蝉蜕 黄连 僵蚕 防风 泽兰 羌活 独活 青皮 甘草各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 红丝疔。

05053 夺命汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】 吴萸 肉桂 泽泻 白茯苓

【主治】 冲疝、厥疝痛上攻，脐悸，奔豚气上行。

05054 夺命散

【方源】《百一》卷十五引《既效方》。

【异名】 全蝎延胡散(《直指》卷十八)。

【组成】 元胡索不拘多少（盐炒过） 干蝎减半。

【用法】 上为细末。每服半钱或一钱，温酒调下；若心痛，醋汤调下。

【主治】 小肠气。

05055 夺命散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】 牛黄夺命散(《保婴集》)、牛黄散(《幼科发挥》卷二)、无价散(《万方类纂》卷五)。

【组成】 槟榔 大黄 黑牵牛 白牵牛各等分（皆各半生半熟用之）

【用法】 上为细末。蜜水调服。

【主治】 小儿胸膈喘满，两胁扇动，痰涎潮塞及急惊风搐。

①《儒门事亲》：小儿胸膈喘满。②《卫生宝鉴》引《杨氏极济方》：肺胀喘满，胸高气急，两胁扇动，陷下作坑，两鼻窍张，闷乱嗽渴，声嗄不鸣，痰涎潮塞。③《普济方》：小儿急惊风搐。

【宜忌】《普济方》：切忌不得于胸腹上灸之。

05056 夺命散

【方源】《医方类聚》卷一四一引《烟霞圣效》。

【组成】 精明乳香五钱 没药半两

【用法】 上为粗末。每服抄一钱半，水一盏，煎三四沸，和滓稍热服，不拘时候。

【主治】 脓血泻利遍数频多，腹痛欲绝者。

05057 夺命散

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】 白矾（枯） 僵蚕（炒去丝） 硼砂 皂角（末）各等分

【用法】 上为末。少许吹喉中。痰出愈。

【主治】 急喉风。

05058 夺命散

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【异名】 定命散。

【组成】 朱砂 寒水石 麝香各等分

【用法】 上为末。每服五分，新汲水调下。

【主治】 血汗。汗出污衣，甚如苏木水渍染。

05059 夺真丹

【方源】《施圆端效方》引王子敬方（见《医方类聚》卷八十九）。

【组成】 半夏（姜制）一两 丁香一钱 槟榔 木香各二钱 藿香三钱 附子（炮，去皮）半两 缩砂仁 胡椒各二钱半 草豆蔻半两

【用法】 上为细末，姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】 营卫气虚，内受湿寒，传于胸膜，心腹痞闷，胁肋刺痛。

05060 夺命方丹

【方源】《普济方》卷一九四。

【组成】 麝香一钱半 大黄（生用）五钱 黑牵牛半两 甘遂二钱 泽泻半两 香附子二钱

【用法】 上为细末。每服一钱，用白樟柳根汁半盏，无灰酒半盏，调药末顿热空心服之。年龄在六十岁以上与十五岁以下者，只可服半贴。大便取下恶物为效。

【主治】 气蛊、劳蛊、血蛊、筋蛊、水蛊。

【宜忌】 服此药后三日内，不可食鱼腥、盐、酱、湿面发气等物。

05061 夺命回生散

【方源】《永类钤方》卷十二。

【组成】 拣丁香 川芎 白姜（洗泡） 神曲 木香 肉桂 罗参各半两 大草果二个（炮，取仁） 诃子七枚（取肉） 砂仁二十一粒 莪术（炮）七钱半 粉草（炙）七钱半 巴豆十四粒（去壳膜，不去油，冷水浸一宿，另研为膏，留钵中）

【用法】 上为末，入钵内和匀，巴豆膏再筛过，入瓦盒内，以油纸盖盒口，却用黄蜡和松脂溶，如法封固；每以十二月，于高爽地上埋土中三尺，至次年六月中伏节取出，向风处摊去湿气，以不漏瓦瓶收贮密封。壮实人，每服半钱，临睡百沸汤调半盏，顿服，仰卧片时，徐以温白粥压下。若羸弱，只服一字。

【功用】 进饮食，止呕吐。

【主治】 五噎五膈，翻胃呕吐不食。

【宜忌】 忌生冷、鱼腥、粘腻并硬物一二月。孕妇不可服。

05062 夺命抽刀散

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）。

【组成】 干姜（锉，入巴豆半两，同炒至黑色，即去巴豆） 良姜（入斑蝥一百个同炒，即去斑蝥）各二十两 糯米（炒）二十五两 石菖蒲（不见火）二十二两

【用法】 上为细末。每服二钱，用盐少许，空心、食前沸汤点下，或温酒调尤佳，不拘时候。

【功用】 醒脾胃，进饮食，解酒毒。

【主治】 男子、妇人脾胃积冷，中焦不和，心下虚痞，腹中疼痛，胸胁逆满，噎塞不通，呕吐冷痰，饮食不下，嗳气吞酸，口苦无味，不思饮食，妇人久患血气刺痛，不可忍者。

【备考】 本方方名，《医统》引作“抽刀散”。

05063 夺命神蛇散

【方源】《秘传大麻风方》。

【组成】 白花蛇 黑梢蛇各一条（俱用酒浸一宿，去头尾皮骨听用） 蕲艾 地龙三钱（去土） 川芎 当归 天麻 蔓荆子 银花 细辛 沙参 甘菊 甘草 胡麻 草乌 木笔子 菖蒲各三钱

【用法】 上为末。每服三钱，温酒送下。须在静室中，无风处服之，上用被盖汗出为度，切忌临风。

【主治】 大麻风，眉落鼻崩。

05064 压惊丸

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】 紫石英 代赭石 蛇黄（各烧红、米醋

淬）铁粉（筛过净者）各二钱 朱砂 龙齿 白附（焙） 远志肉（姜汁浸，炒）各一钱

【用法】 上为极细末，稀面糊为丸，如梧桐子大。每服一丸，金银煎汤调下。

【功用】 定心镇痰。

【主治】 诸惊虚惕。

05065 压掌散

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】 麻黄（去节）二钱半 甘草（炙）二钱 银杏四五个（捶破）

【用法】 水一钟半，煎至七分，临卧时温服。

【主治】 男女哮喘痰嗽。

【备考】 本方方名，《本草纲目》引作“鸭掌散”。

05066 压热神白膏

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】 大黄 白蔹 黄柏（生用） 南星 赤小豆 黑蛤粉各一两

【用法】 上为末。用芭蕉汁调涂，如干仍以汁润之。

【主治】 痈疽。

05067 厌生方

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】 血管鹅毛（烧存性，为细末）三钱

【用法】 产后，酒送下。一服永不受孕。

【功用】 绝孕。

05068 灰米膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 白川米 灰碱水

【用法】 用成块火灰碱水调稠，将白川米插入灰内，留半米在外，片时许，候米熟，针挑损痣上，用米点痣上。可落矣。

【主治】 黑痣浮浅者。

【宜忌】 忌酱、醋。

05069 灰浆膏

【方源】《疡医大全》卷十八引胡公弼方。

【组成】 天南星 半夏各一两 草乌（煅存性）五钱

【用法】 上煎浓汁，去滓，入木莲蓬蒂上白浆一二两，采时以蛤蜊壳在蒂上刮取，搅匀，再用石灰以竹片拨炒，俟竹片焦黑成炭为度，徐徐投下，调成不稀不厚膏子，入瓷瓶收贮，黄蜡封口。用时如干，以唾津润开，敷瘤上；或木莲蓬浆润敷尤妙。二三日即愈。

【功用】 消瘤。

05070 存阴汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】 熟地二两 茯苓 山药各一两 车前子五钱 白术二两 甘草 泽泻各二钱

【用法】 水煎服。

【功用】 急救肾阴。

【主治】 口渴饮水，忽然大泻，一日或十余行，或数十行，昼夜之间，泻至数百次，完谷不化，直下无留。

05071 存命汤

【方源】《千家妙方》卷下。

【组成】 羌活9克 防风9克 川芎9克 大黄9克 法夏9克 川乌9克 草乌9克 全虫9克 僵蚕9克 蜈蚣9克 蝉衣9克 南星9克 天麻9克 白芷9克 白附子9克 甘草9克 琥珀粉3克 朱砂3克

【用法】 日用一剂。水煎浓缩为180毫升，分三次服。

【功用】 祛风定痉。

【主治】 破伤风初期。风邪侵袭经络，渐传入里，内外相引，肝风妄动。

05072 存注丹

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】 白芍 白术 生地各二钱 麦冬 柏子仁各五钱 菖蒲 甘草各一钱 柴胡 花粉各二钱 青皮三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 气郁不舒，忽忽如有所失，目前之事，竟不记忆，一如老人之善忘者。

05073 达生散

【方源】《丹溪心法》卷五。

【异名】 束胎散（原书同卷）、束胎饮（《丹溪治法心要》卷七）、缩胎饮（《同寿录》卷三）、紫苏饮（《女科切要》卷五）。

【组成】 大腹皮三钱 人参 陈皮各半钱 白术 芍药各一钱 紫苏（茎叶）半钱 甘草（炙）二钱 归身尾一钱

【用法】 上作一服。加青葱五叶，黄杨树叶梢七个，或加枳壳、砂仁以水煎，食后服。于妊娠八九个月，服十数帖。

【功用】 补益气血，顺气安胎，催产。

①《丹溪心法》：固胎。②《医统》：宣扶正气，散滞气。③《女科切要》：补中行滞，下死胎。

【主治】 气血虚弱，胎产不顺。

①《万氏女科》：胎气怯，欲防难产者。②《增

补内经拾遗》：妊妇九个月及气虚者。③《产孕集》：将产体实而旺者

【加减】 夏月，加黄芩（冬不必加）；春，加川芎；气虚，加参、术；气实，倍香附、陈皮；血虚，倍当归，加地黄；形实，倍紫苏；性急，加黄连；有热，加黄芩；湿痰，加滑石、半夏；食积，加山楂；食后易饥，倍黄杨树叶梢；有痰，加半夏；腹痛，加木香、桂。

【方论选录】 ①《医方考》：《诗》云，诞弥厥月，先生如达。朱子曰：先生，首生也。达，小羊也。羊子易生而无留难，故昔医以此方名之。然产难之故，多是气血虚弱，营卫涩滞使然。是方也，人参、白术、甘草养其气；当归、芍药养其血；紫苏、腹皮、陈皮流其滞。气血不虚不滞，则其产也犹之达也。②《医方集解》：此足太阴、厥阴药也。当归、芍药以益其血；人参、白术以益其气；腹皮、陈皮、紫苏、葱叶以疏其壅。气血不虚不滞，则临产自无留难之患矣。

05074 达生散

【方源】《摄生秘剖》卷三。

【组成】 人参五钱 白术（土炒） 甘草（炙） 当归 白芍药 紫苏 陈皮各一两 大腹皮三两（黑豆汁洗净，晒干用）

【用法】 上为散。每服一两，水煎服。

【功用】 临月服之令人易生。

【方论选录】 产难之故，多是气血虚弱，营卫涩滞使然。是散用参、术、甘草益其气，当归、芍药益其血，苏、陈、腹皮流其滞，气血不虚不滞，则其产也，犹之达矣。

【备考】《郑氏家传女科万金方》有生姜三片，大枣一枚。

05075 达郁汤

【方源】《四圣心源》卷四。

【组成】 桂枝三钱 鳖甲二钱（醋炙焦，研） 甘草二钱 茯苓三钱 干姜三钱 砂仁一钱

【用法】 水煎大半杯，温服。

【主治】 积在脐腹、左胁者。

05076 达郁汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】 升麻 柴胡 川芎 香附 桑皮 橘叶 白蒺藜

【主治】 木郁呕酸，及阴痿不起者。

05077 达原饮

【方源】《温疫论》卷上。

【组成】 槟榔二钱 厚朴一钱 草果仁五分 知母一钱 芍药一钱 黄芩一钱 甘草五分

【用法】 用水二钟，煎八分，午后温服。

【功用】 ①《全国中药成药处方集》（吉林方）：避瘟去暑，解热，止呕利便。②《方剂学》：开达膜原，辟秽化浊。

【主治】 ①《瘟疫论》：瘟疫初起，先憎寒而后发热，日后但热而不憎寒。初得之二三日，其脉不浮不沉而数，昼夜发热，日晡益甚，头疼身痛，其时邪在伏脊之前、肠胃之后，舌上白苔，甚则如积粉满布无隙。②《方剂学》：瘟疫初起，邪伏膜原，憎寒壮热，或昼夜发热，头疼身痛，胸闷泛恶，脉弦数，苔白腻者。

【加减】 胁痛耳聋，寒热，呕而口苦，加柴胡一钱；腰背项痛，加羌活一钱；目痛，眉棱骨痛，眼眶痛，鼻干不眠，加干葛一钱。

【方论选录】 槟榔能消能磨，除伏邪，为疏利之药，又除岭南瘴气；厚朴破戾气所结；草果辛烈气雄，除伏邪盘踞，三味协力直达其巢穴，使邪气溃败，速离膜原，是以为达原也。热伤津液，加知母以滋阴；热伤荣气，加白芍以和血；黄芩清燥热之余；甘草为和中之用。以后四味不过调和之剂耳。

【临证举例】 ①病毒感染性发热 《中医杂志》（1981；5:33）：16例患者均发热，舌苔厚腻为主症，兼有头晕口苦，身体倦怠，胸闷纳呆，脉弦滑。体征有肝脾肿大，淋巴结肿大，体温在37.8℃～40℃。用达原饮加柴胡、葛根、大黄煎服，每日二剂，每煎300毫升，每隔六小时服150毫升。结果：仅二例6天热退，其余为2～3天热退。肝、脾、淋巴结均随体温下降而恢复正常。②水痘 《河南中医》（1982；2:27）：梁某某，男，10个月。患水痘，用达原饮改为散剂治疗，共服3.6克，分六次服用而获痊愈。③小儿食积 《湖南中医杂志》（1985；2:21）：周某某，男，6岁。伤食便溏，日行5～6次，不思饮食，腹胀大时痛，舌红苔腻，以达原饮加山楂、神曲，服一剂后，腹胀消失，食饮如故。

【备考】 本方方名，《杂症会心录》引作“达原散”。改为丸剂，名“达原丸”、“至圣达原丸”（见《全国中药成药处方集》吉林方）。

05078 百二散

【方源】《仙传外科集验方》。

【异名】 护心散（原书）、不二散（《赤水玄珠》卷二十九）。

【组成】 甘草节 绿豆粉 朱砂各等分

【用法】 上为细末。水调服之。

【主治】 ①《仙传外科集验方》：发疔疮烦躁，手足不住发狂者。②《赤水玄珠》：痈疽毒气冲心呕吐。

05079 百中散

【方源】《百一》卷六引魏不伐方

【组成】 罂粟壳（去上下蒂顶萼，锉成片子，蜜炒令赤色） 厚朴各三斤（去粗皮，用生姜汁淹一宿，炙令姜汁尽为度）

【用法】 上为细末。每服二三钱，米饮调下。只一服便疏，再二三服即愈。

【主治】 一切痢，不问赤白，或一日之间一二百行。

【宜忌】 忌生冷、油腻、鱼鲜、毒物三日。

【备考】 本方方名，《普济方》引作"百水散"。

05080 百合丸

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】 百合 百药煎 杏仁（去皮尖） 诃子 薏苡仁各等分

【用法】 上为末，鸡子清为丸，如弹子大。临卧噙化一丸。

【主治】 ①《医统》：失声不语。②《景岳全书》：肺燥失声不语。

05081 百合丹

【方源】《幼幼新书》卷六引张涣方。

【异名】 百合丸(《卫生总微》卷十九)。

【组成】 桑根白皮 木通 川朴消 杏仁（汤浸，去皮尖） 川大黄 天门冬（去心）各半两 百合一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如黍米大。每服十丸，米饮送下。

【主治】 小儿龟胸。

05082 百合汤

【方源】《内经拾遗》。

【组成】 百合

【用法】 水二钟，煎八分，不拘时候服。

【主治】 肾虚解㑊。

05083 百合汤

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】 贝母一钱 瓜蒌仁 枳壳 桑白皮各八分 百合五分

【用法】 水煎服。

【主治】 肺痈，咳嗽脓血。

05084 百合汤

【方源】《疡医大全》卷二十一。

【组成】 枣仁 怀生地 当归 黄耆 汉防己 苏子 瓜蒌仁 桑白皮 川贝母 百合 薏苡仁 牡丹皮 甘草 桔梗

【用法】 水煎服。

【主治】 肺痈。

【加减】 有嗽，加款冬花。

05085 百合汤

【方源】《时方歌括》卷下。

【组成】 百合一两 乌药三钱

【用法】 水二杯，煎七分服。

【主治】 心口痛，服诸热药不效者，亦属气痛。

【临证举例】 胃脘痛 《中医杂志》（1982；8：16）：陈某某，男，44岁，脘痛而胀，按之痛减，嘈杂，嗳气，泛酸，知饥纳少，舌苔微黄，质淡红，脉弦细。曾服理气止痛诸方，初尚有效，继则复痛如故。因思此证痛而兼胀，必属气痛；嘈杂泛酸，知饥纳少，服辛温行气药不效，其病偏热无疑，故用百合汤，服三剂之后，痛胀减轻大半，继服数剂而愈。

05086 百合散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】 百合一两 栝楼根一两 牡蛎三分（烧为粉） 栀子仁三分 麦门冬三分（去心，焙） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一中盏，加生姜半分，竹叶二七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒百合病，一月不解，变如渴疾。

05087 百合散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】 百合一两 紫苏子三分（微炒） 桑根白皮一两（锉） 紫菀三分（去苗土） 甘草半两（炙微赤，锉） 款冬花三分 汉防己三分 贝母三分（焙微黄） 杏仁半两（汤浸，去皮尖仁，麸炒微黄） 人参三分（去芦头） 赤茯苓一两 麻黄一两（去根节） 桔梗半两（去芦头）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 久咳嗽，胸中气不利。

05088 百合散

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】 川芎 赤芍药 当归 百合 生地黄 侧柏叶 荆芥 犀角 牡丹皮 黄芩 黄连 栀子 郁金 大黄

【用法】 水煎，加童便和服。

【主治】 打扑伤损，败血流入胃脘，呕黑血汁。

【加减】 大便利者，去大黄。

05089 百合散

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】 百合二钱 桑皮七分 前胡八分 桔梗七分 芍药一钱 赤苓八分 贝母一钱 橘红一钱 甘草五分（或加紫菀 款冬）

【用法】 生姜为引，水煎服。

【主治】 子嗽。风壅相攻，胸满久嗽。

05090 百合煎

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 白花百合

【用法】 或煮或蒸，频食即愈，拌蜜蒸更好。

【主治】 肺痈。

05091 百花丸

【方源】《济生》卷二。

【组成】 款冬花 百合（蒸、焙）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，食后、临卧细嚼，姜汤咽下；噙化尤佳。

【主治】 七情内伤，酒色无节，虚火妄动，午后潮热，咳嗽喘急，痰中带血，津少声哑。①《济生》：喘嗽不已，或痰中有血。②《丸散膏丹集成》：七情内伤，酒色无节，虚火妄动，午后虚潮，口干声哑，诸虚百损。③《全国中药成药处方集》（武汉方）：津少咽干，虚烦潮热。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴药也。款冬泻热下气，清血除痰；百合润肺宁心、补中益气，并为理嗽要药。

【备考】 本方原名百花膏，与剂型不符，据《症因脉治》改。改为膏剂，名“润肺百花膏”（见《全国中药成药处方集》武汉方）。

05092 百劳丸

【方源】 陈大夫引张仲景方（见《医学纲目》卷五）。

【异名】 仲景百劳丸（《慎柔五书》卷四）。

【组成】 当归（炒） 乳香 没药各一钱 人参一钱 大黄四钱 虻虫十四枚（去翅足） 水蛭十四枚（制）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。都作一服，可百丸，五更百劳水送下。取恶物为度，服白粥十日。百劳水者，勺扬百遍，即甘澜水。

【主治】 一切劳瘵积滞，疾不经药坏症者。

【备考】《慎柔五书》有桃仁。《张氏医通》有栀子。

05093 百劳散

【方源】 方出贾同知引康少尹方（见《宣明论》卷九），名见《本草纲目》卷二十三。

【组成】 罂粟壳二两半（醋炒，取一两） 乌梅半两

【用法】 上为末。每服二三钱，沸汤点，食后服，一日三次。

【主治】 ①贾同知方引康少尹方：咳嗽。②《本草纲目》：咳嗽多年，自汗。

05094 百劳散

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】 天仙藤 当归 川芎 芍药 茯苓 人参 黄耆 知母 贝母 黄芩 五味子 地骨皮 柴胡 甘草 白芷 桔梗各等分（一方有秦艽、前胡）

【用法】 每服一两，水二盏，加生姜三片，煎八分，食后服。

【主治】 骨蒸劳热。

【备考】《济阳纲目》有半夏，无川芎。

05095 百补汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】 阿胶 地榆 陈皮 川芎 当归 白芍 熟地

【用法】 水煎，食前服。

【主治】 妇人血淋白浊。

05096 百灵汤

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】 罂粟壳 陈皮 木通 乌梅 甘草 黄连各等分

【用法】 上锉如麻豆大。每服三大钱，水一盏，加生姜三片，枣子二个（劈破），沙罐内慢火煎至八分，去滓，放瓷器碗内，上面封口，用湿纸两重盖覆，不可令灰入腹。药后且忌口。

【主治】 赤白痢。

【临证举例】 血痢 温入郑元升云：近日患痢，血痢之间数十次，窘不可言，有客惠药两服而止。

05097 百枝膏

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】 人参（去芦头） 防风（去芦头） 天麻各一两 麦门冬（汤浸，去心，焙干） 白附子（炮） 白僵蚕（炒去丝嘴） 羌活（去芦头） 石菖蒲各半两 朱砂二钱（别研） 麝香一钱（别研）

【用法】 除朱、麝外，同为细末，后入朱、麝研匀，炼蜜为丸，每一两分作四十丸。每服一丸，食后、临卧煎荆芥汤放温化下。

【功用】 常服安心神，镇惊悸。

【主治】 小儿禀赋怯弱，易感惊邪，心神恍惚，睡眠不安。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“百枝丸”。

05098 百杯丸

【方源】《洁古家珍》。

【组成】 生姜一斤（去皮，切作片子，盐二两淹一宿，焙干） 红皮（去白）二两 广茂（炮）三分 干姜三两 益智仁二十个 丁香五十个 甘草二分（炙） 京三棱（炮）三分 缩砂仁三十个 木香 茴香（炒）各一分 白豆蔻仁三十个

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两作五丸，朱砂为衣。细嚼，生姜汤送下，不拘时候。如饮酒者先服此药，百杯不醉，亦无诸痰。

【主治】 酒停腹中，膈气痞满，面色黄黑，将成癖疾，饮食不进，日渐肌瘦。

05099 百沸汤

【方源】 方出《袖珍》卷三引《经验方》，名见《古今医鉴》卷五。

【组成】 吴茱萸 木瓜 食盐各五钱（同炒焦）

【用法】 瓷瓶盛水三升，煮令百沸，却入上药同煎至二升以下，每服一盏，随病人意冷暖服之。药入即醒。

【主治】 霍乱吐泻，因饮冷或冒寒，或失饥，或大怒，或乘舟车，伤动胃气，令人吐利交作，目眩头旋，手足转筋，四肢厥冷。

05100 百草膏

【方源】《袖秘喉书》卷下。

【组成】 薄荷八分 玉丹五分 川贝一钱 灯草灰五厘 柿霜八分 甘草一分五厘 天花粉一钱 冰片二分 百草霜一分

【用法】 上为末，用白蜜调膏。频咽噙之。若症重，兼服煎剂，并用吹丹。

【主治】 喉癣及喉菌。

【宜忌】 如治喉刺，玉丹、薄荷忌用；如见劳病已重，津竭火炎之候，亦不宜用。

05101 百点膏

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 蕤仁（去皮尖）三分 当归身 甘草各六分 防风八分 净黄连二钱（锉如麻豆大，水一大碗，煎至一半入药）

【用法】 上锉，如麻豆大，蕤仁别研如泥，同熬，滴在水中不散，入去沫蜜少许，再熬少时为度。令病人心静点之，至日中微痛，一日五七次，临卧点尤效。名之曰百点膏，但欲多点为妙，使药力相继也。

【主治】 病翳多年，以至遮瞳仁，视物不明，有云气之状。

05102 百顺丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 川大黄（锦纹者）一斤 牙皂角（炒微黄）一两六钱

【用法】 上为末，用汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服五分，或一钱，或二三钱，酌宜用引送下。或炼蜜为丸亦可。

【主治】 一切阳邪积滞，气积、血积、虫积、食积、伤寒实热秘结等症。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（武汉方）：孕妇忌服。

【备考】 本方方名，《春脚集》引作“宣化丸”。

05103 百部丸

【方源】《局方》卷四。

【组成】 天门冬（去心）一斤 杏仁（去皮尖，炒） 黄蓍 百部根各六两 瓜蒌根十六两 紫苏 紫菀（去苗，洗） 马兜铃各二十二两 黑参八两 肉桂（去粗皮）四两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后煎乌梅、甘草汤温下。

【主治】 肺气不调，咳嗽喘急，胸膈烦闷，唇干口燥，面目浮肿，咽嗌不利，积久不愈，及咯唾脓血者。

05104 百部丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 百部（焙干，炒）三分 麻黄（去节）三分 杏仁四十个（去皮尖，微炒，煮三五沸，焙干）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如皂子大。每服二十丸，热水化下。加松子仁肉五十粒，糖丸之，含化尤妙。

【主治】 小儿肺寒壅嗽，微喘。

05105 百部汤

【方源】《外台》卷九引《古今录验》。

【组成】 百部半两 生姜半斤 细辛三两 贝母三两 甘草二两（炙） 杏仁四两（去皮尖双仁者） 紫菀三两 桂心二两 白术二两 麻黄六两（去节） 五倍子二两

【用法】 上切。以水一斗二升，煮取三升，分三服。

【主治】 咳，昼夜不得眠，两眼突出。

【宜忌】 忌桃、李、雀肉、海藻、菘菜、生菜。

05106 百部汤

【方源】《本草汇言》卷六。

【组成】百部 薏苡仁 百合 麦门冬各三钱 桑白皮 白茯苓 沙参 黄耆 地骨皮各一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】久嗽不已，咳吐痰涎，重亡津液，渐成肺痿，下午发热，鼻塞项强，胸胁胀满，卧则偏左其嗽少止，偏右嗽必连发，甚则喘急。

05107 百部酒

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【异名】百部酊(《中医皮肤病学简编》)。

【组成】百部六两 75%酒精十二两

【用法】将百部碾碎置酒精内，浸泡七昼夜，过滤去滓备用。以棉棒或毛刷蘸涂。

【主治】①《赵炳南临床经验集》：荨麻疹（瘙痒），神经性皮炎（干癣）等瘙痒性皮肤病。②《中医皮肤病学简编》：疥癣，虱病。

【备考】《中医皮肤病学简编》本方用百部20克，浸入酒精或烧酒内。一天后，用药水或搽洗头部或阴部。

05108 百部散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】百部一两 细辛一两 贝母一两（煨微黄） 甘草一两（炙微赤，锉） 紫菀一两半（去苗土） 桂心一两 白术一两 麻黄三两（去根节） 杏仁二两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 五味子一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，昼夜不得睡卧，胸中不利。

05109 百部散

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】款冬花 百部各一两 知母 贝母（去心，炒）各半两

【用法】上为细末。每服三四钱，食后用暖盏汁送下。

【主治】咳嗽无问新久，冷热并宜。

05110 百部膏

【方源】《外科十法》。

【组成】百部 白鲜皮 蓖麻子（去壳） 鹤虱 黄柏 当归 生地各一两 黄蜡二两 明雄黄末五钱 麻油八两

【用法】先将百部等七味，入油熬枯，滤去滓，复将油熬至滴水成珠，再用黄蜡，试水中不散为度，端起锅来，将雄黄末和入，候稍冷，便入瓷盆中收贮，退火听用。以膏搽之。

【主治】湿热凝聚，虫行皮中，顽厚坚硬之顽癣，俗称牛皮癣。

05111 百粉丸

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】黄柏（童便炒） 知母（童便炒） 蛤粉（略炒） 牡蛎（火煅） 山药（酒炒）

【用法】上为末，捣烂饭为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心盐汤、温酒任下。

【主治】肾虚火动遗精。

05112 百粒丸

【方源】《百一》卷十九引钱季华方。

【组成】川黄连 厚朴 吴茱萸各一两（用生姜一两擦碎，同淹一宿，炒令香熟）

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大，小儿即小丸如黍米大。每服一百丸，陈米饮送下；粟米饮送下尤妙。

【主治】泻痢。

【加减】如泻甚者，加肉豆蔻一个，没石子二个。

05113 百解散

【方源】《鸡峰》卷五。

【异名】败毒散。

【组成】柴胡 前胡 羌活 独活 桔梗 枳壳 人参 茯苓 甘草 川芎 陈皮 杏仁各一两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，煎至五分，去滓温服。加薄荷三叶煎为佳。

【主治】风寒咳嗽，鼻塞声重，风痰头痛，呕逆寒热。

05114 百发神针

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】乳香 没药 生川附子 血竭 川乌 草乌 檀香末 降香末 大贝母 麝香各三钱 母丁香四十九粒 净蕲艾绵一两（或二两）

【用法】作针。各按穴针之。

【主治】偏正头风，漏肩，鹤膝，寒湿气，半身不遂，手足瘫痪，痞块，腰痛，小肠疝气；痈疽发背，对口痰核，初起不破烂者。

05115 百合饮子

【方源】方出《外台》卷二十七引《广济方》，名见《金匮翼》卷八。

【组成】桑白皮六分 通草 百合各八分 白茅根一分

【用法】上锉细。以水四升，煮取二升，去滓，温下前散药。口干渴，含之亦得也。

【功用】《金匮翼》：泻肺火，清肺金，而滋水之

化源。

【主治】 诸淋。

【备考】 本方用法中前散药：滑石、冬葵子各八分，瞿麦、石韦各五分（去毛），蒲黄六分，陈橘皮四分，芍药、茯苓、芒消各六分，子芩六分。捣为散。每服方寸匕，一日二次。

05116 百合洗方

【方源】 《金匮》卷上。

【组成】 百合一升

【用法】 以水一斗，渍之一宿，以洗身。洗已，食煮饼，勿以盐豉。

【主治】 百合病一月不解，变成渴者。

【宜忌】 宜淡食。

【方论选录】 ①《千金方衍义》：病无经络可分，百脉一宗致病，故名百合。其病虽有上、中、下三焦之别，皆由伤寒虚劳大病后，虚火扰其血脉所致。治法咸用百合为君，以安心补神，能去血中之热，利大小便，导涤痰积，然必鲜者方克有济。其经月不解，百脉内壅，津液外泄而成渴者，则用百合洗之，一身之脉皆得通畅，而津液行，渴自止。勿食盐豉者，以味咸能凝血也。②《退思集类方歌注》：皮毛为肺之合，外洗皮毛，亦可内除其渴。洗已，食煮饼，勿啖咸豉，恐咸味耗水而增渴也。

05117 百草霜方

【方源】 《圣济总录》卷一一九。

【异名】 百草霜散（《医方类聚》卷七十七引《济生续方》）。

【组成】 百草霜 好盐各半两

【用法】 上为末。表里涂之。

【主治】 舌忽紧硬，逡巡能塞杀人。

05118 百部洗方

【方源】 《赵炳南临床经验集》。

【组成】 百部四两 苦参四两 蛇床子二两 雄黄五钱 狼毒二两五钱

【用法】 上为粗末。装纱布袋内，同水五六斤煮沸30分钟。用软毛巾涮洗，或涮洗后再加热水浸浴。

【功用】 疏风止痒，祛湿杀虫。

【主治】 皮肤瘙痒症（隐疹）、神经性皮炎、阴囊湿疹（绣球风）、荨麻疹（瘖瘤）。

【宜忌】 有抓破疮面慎用。

05119 百部根汤

【方源】 《千金》卷十八。

【异名】 百部饮（《玉机微义》卷五十）。

【组成】 百部根 生姜各半斤 细辛 甘草各三两 贝母 白术 五味子各一两 桂心四两 麻黄六两

【用法】 上㕮咀。以水一斗二升，煮取三升，去滓，分三服。

【主治】 ①《千金》：咳嗽日夜不得卧，两眼突出。②《玉机微义》：小儿喘嗽。

【方论选录】 《千金方衍义》：嗽不得卧，两眼突出，明是寒郁热邪为患，故首取百部之温散肺气，麻、桂、姜、辛之开发肺邪，贝母助百部消寒，术、甘助麻、桂透表，五味收麻、辛之散也。

05120 百子建中丸

【方源】 《宋氏女科》。

【组成】 香附一斤（分作四份：一份童便浸七日，一份酒浸七日，一份泔浸七日，一份盐水浸七日，各炒香） 大艾叶四两（米泔浸七日，将米泔慢火煮半日，焙干为末） 砂仁五钱 淮熟地（酒浸）三两 白芍药三两 玄胡索一两五钱 五味子五钱 杜仲（酒炒）一两 阿胶（炒）一两五钱 白术一两（麸炒）

【用法】 上为末，用壬子日好米泔打糊米面糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心用淡酢汤送下。服至半月必有孕矣。

【功用】 温中暖脐，调经，开郁开胃。

【主治】 妇人久冷，赤白带下，肚腹疼痛，经水不调，四肢无力，久鲜子息。

【加减】 如妇人肥胖者，加陈皮、半夏各一两。

05121 百合二母汤

【方源】 《济阳纲目》卷二十八。

【组成】 百合 知母 贝母（去心） 麦冬各一钱 白茯苓 天花粉 前胡各八分 陈皮（炒） 白术 黄芩 桔梗各七分 五味子九个 生地（酒炒） 甘草各五分

【用法】 上锉。加生姜，水煎，空心、食远各一服。

【主治】 上热血虚咳嗽。

05122 百合地黄汤

【方源】 《金匮》卷上。

【异名】 百合汤（《伤寒全生集》卷四）。

【组成】 百合七枚（擘） 生地黄汁一升

【用法】 以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓，纳地黄汁，煎取一升五合，分温再服。中病，勿更服。大便当如漆。

【主治】 百合病，不经吐、下、发汗，病形如初者。

【方论选录】 ①《千金方衍义》：百合病若不经发汗、吐、下，而血热自汗，用百合为君，安心补神，能去中热，利大小便，导涤痰积；但佐生地黄汁以凉血，血凉则热毒解而蕴结自行，故大便当去恶沫也。②《金匮要略心典》：百合色白入肺，而清气中之热，地黄色黑入肾，而除血中之热，气血即治，百脉俱清，虽有邪气，亦必自下；服后大便如漆，则热除之验也。

【备考】 本方方名，《外台》引作“百合生地黄汤”。

05123 百合鸡子汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 鸡子汤(《活人书》卷十八)。

【组成】 百合七枚（擘） 鸡子黄一枚

【用法】 先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓，纳鸡子黄，搅匀，煎五分，温服。

【主治】 百合病，吐之后者。

【方论选录】 ①《古方选注》：君以百合，甘凉清肺；佐以鸡子黄救厥阴之阴，安胃气，救厥阴即所以奠阳明，救肺之母气，亦阳病救阴之法也。②《金匮方歌括》元犀按：吐后伤中者，病在阴也，阴伤，故用鸡子黄养心胃之阴，百合滋肺气下润其燥，胃为肺母，胃安则肺气和而令行，此亦用阴和阳，无犯攻阳之戒。

【备考】 本方方名，《兰台轨范》引作“百合鸡子黄汤”。

05124 百合茅根汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 苏百合 生桑皮 通草各一钱 鲜茅根五十支

【功用】 清肺气以滋化源。

【主治】 阳水肿，已用宣上发汗，通利小便，水肿已退者。

05125 百合固金汤

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】 熟地 生地 归身各二钱 白芍 甘草各一钱 桔梗 玄参各八分 贝母 麦冬 百合各一钱半

【功用】 滋肾保肺，止咳化痰。

①《医方集解》：助肾滋水，保肺安神，清热润燥，除痰养血，平肝清金。②《成方切用》：利咽降火，培元清本。③《成方便读》：利咽宣上。④《全国中药成药处方集》（沈阳方）：补肺清火，化痰镇咳。

【主治】 肾水不足，虚火上炎，肺阴受伤，喘嗽痰血，头眩耳鸣，午后潮热，口干溲赤，舌红少苔，脉细数。现用于肺结核病。

①《慎斋遗书》：手太阴肺病，因悲哀伤肺，背心、前胸、肺募间热，咳嗽咽痛，咯血恶寒，手大拇指循白肉际间上肩臂至胸前如火烙。②《医方集解》：肺伤咽痛，喘嗽痰血。③《全国中药成药处方集》（杭州方）：阴虚肺伤，头眩耳鸣，午后潮热，口干溲赤。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（济南方）：忌食生冷、辛辣、油腻等物。

【加减】 如咳嗽，初一二服，加五味子二十粒。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手太阴、足少阴药也。金不生水，火炎水干，故以二地助肾滋水退热为君；百合保肺安神；麦冬清热润燥；玄参助二地以生水；贝母散肺郁而除痰；归、芍养血兼以平肝；甘、桔清金，成功上部。皆以甘寒培元清本，不欲以苦寒伤生发之气也。②《医方考》：此方金水相生，又兼养血，治肺伤咽痛失血者最宜。李士材谓，清金之后宜顾母，识解尤卓。予谓咽痛，一定即当培土生金也。③《成方便读》：百合色白，其形象肺，故能独入金家，为保肺宁神，清金润燥之品。又肺肾为子母之脏，《医贯》所谓母藏子宫，子隐母胎，故水虚则金受火刑。地黄、玄参，壮水之主；麦冬、贝母，清肺之烦；白芍平肝以保肺；当归引血以归经；甘、桔本为成方，可以利咽喉而宣上部之结热也。

【临证举例】 ①肺癌 《黑龙江中医药》（1982；4:25）：用本方加鱼腥草、半枝莲、白花蛇舌草，治疗中、晚期肺癌属阴虚内热型者38例。若兼感冒发热、咳嗽，则合麻杏石甘汤；痰血，加白茅根、藕节、白及、三七粉或云南白药；肾虚，加女贞子、旱莲草；肝风内动，加天麻、钩藤、石决明、全蝎、蜈蚣；胸痛，加丹参、赤芍、三棱、莪术；胸水，加葶苈子、大枣、龙葵；上腔静脉综合症，加商陆、车前子。治疗结果：22例获得症状改善、病灶稳定。②肺结核咯血 《浙江中医杂志》（1986；1:31）：黄某某，女，34岁。患结核病多年，形体羸瘦。近因寒温不调而发咳嗽，咯血，频频而吐，大便秘结，舌质红，苔薄黄，脉沉细数。经用庆大霉素，青、链霉素及安络血等治疗，病情未能控制。中医有作肺火不宁，痰热扰络治者，有作木火刑金，络伤血溢治者，俱无效果。改从肺肾阴虚，虚火上炎，以清金保肺，养阴滋肾法，予百合固金汤加味：百合、熟地、生地、玄

参、麦冬、炒白芍各12克，川贝10克，当归6克，桔梗8克，甘草2克，生大黄5克。服三剂，咯血稍止，咳嗽未平，余症均有好转。续进二剂，咯血全止。

【备考】 按：《金鉴》有天门冬。用法：水煎服。改为丸剂，名"百合固金丸"（见《医钞类编》）、"固金丸"（见《中成药处方配本》）。

05126 百合知母汤

【方源】《金匮》卷上。

【组成】 百合七枚（擘） 知母三两（切）

【用法】 先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓；别以泉水二升煎知母，取一升，去滓；后合和，煎取一升五合，分温再服。

【主治】 百合病，发汗后者。

【方论选录】 ①《古方选注》：君以百合，甘凉清肺；佐以知母，救肺之阴，使膀胱水脏知有母气，救肺即所以救膀胱，是阳病救阴之法也。②《金匮方歌括》元犀按：百脉俱朝于肺。百脉俱病，病形错杂，不能悉治，只于肺治之。肺主气，气之为病，非实而不顺，即虚而不足。百合能治邪气之实，而补正气之虚；知母入肺金，益其水源，下通膀胱，使天水之气合，而所伤之阴转，则其邪从小便出矣。若误汗伤阴者，汗为阴液，阴液伤故以此汤维其阳，即所以救阴也。

05127 百合滑石散

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 滑石散（《活人书》卷十八）。

【组成】 百合一两（炙） 滑石三两

【用法】 上为散。每服方寸匕，饮下，一日三次。当微利者，止服，热自除。

【主治】 ①《金匮》：百合病变发热者。②《千金》：百合病小便赤涩，脐下坚急。

【方论选录】 ①《千金方衍义》：百合病若变发热，乃血脉郁而成热，佐滑石以通利之。②《金匮方歌括》元犀按：百合病原无偏热之证，变发热者，内热充满，淫于肌肤，非如热之比。主以百合滑石散者，百合清金泻火，降逆气，从高源以导之；滑石退表里之热，利小便。二味合为散者，取散以散之之义，散调络脉于周身，引内外之热气，悉从小便出矣。

05128 百补构精丸

【方源】《中藏经》引葛玄真人方。

【组成】 熟地黄四两 山药二两 五味子六两 苁蓉三两（酒浸一宿） 牛膝二两（酒浸） 山茱萸一两 泽泻一两 茯苓一两（去皮） 远志一两（去心） 巴戟天一两（去心） 赤石脂一两 石膏一两 柏子仁一两（炒） 杜仲三两（去皮，锉碎，慢火炒令丝断）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心调酒送下。男子、妇人皆可服。

【主治】《奇效良方》：梦泄，精滑不禁。

【备考】 本方方名，《奇效良方》引作"百补交精丸"。

05129 百部紫菀丸

【方源】《普济方》卷一五七。

【组成】 百部（新瓦上炒） 紫菀（去苗土） 款冬花（择洗）各一两半 桔梗（炒） 贝母（去心，炒）各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧煎甘草、乌梅汤送下。

【主治】 咳嗽。

05130 百合桔梗鸡子汤

【方源】《四圣心源》卷九。

【组成】 百合三钱 桔梗二钱 五味一钱 鸡子白一枚

【用法】 煎半杯，去滓，入鸡子清，热服。

【主治】 失声，音哑。

05131 百草血余棕灰散

【方源】《医学从众录》卷八。

【组成】 陈棕灰 百草霜 头发灰各一两

【用法】 上为细末。每服一钱，陈酒下。

【主治】 血崩。

05132 夹纸膏

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】 乳香三钱 血竭二钱半 没药四钱 郁金五钱 麝香一钱半 牡蛎半两 黄连 黄柏各二两 大黄 黄丹各一两 轻粉三十贴

【用法】 上为细末，清油调匀。摊油纸上贴疮，每一个贴三日。每日以冷水洗三次，膏药亦翻转三次，两层夹纸，以线缝四边，针刺眼透药气。其药末同和一处收，要用旋调。

【主治】 臁疮久不愈。

05133 夹纸膏

【方源】《古今医鉴》卷十五引张会山方。

【组成】 松香 黄丹 蓖麻子（去壳）各等分

【用法】 上为末，用香油调，隔油纸摊药，夹纸中。贴患处。

【主治】 臁疮、顽疮。

05134 夹纸膏

【方源】《金鉴》卷七十一。

【组成】黄丹（炒） 轻粉 儿茶 没药 雄黄 血竭 五倍子（炒） 银朱 枯矾各等分

【用法】上为末。量疮大小，剪油纸两张，夹药于内，纸周围用面糊粘住，纸上用针刺孔，先将疮口用葱、椒煎汤洗净拭干，然后贴上，以帛缚之。三日一洗，再换新药贴之。

【功用】①《金鉴》：祛腐。②《中医方剂临床手册》：止痛。

【主治】臁疮溃腐。

05135 夹纸膏

【方源】《验方新编》卷八。

【组成】樟脑三钱 铜绿一钱

【用法】用猪板油和药捣烂，以油纸夹之，贴患处。一二日翻转贴，三四日脓尽而愈。如四日后脓尚未净，再换一纸。

【主治】臁疮。

05136 夹纸膏

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】乳香 没药各六钱 洋樟四钱 炉甘石（制）二钱 当归一两 轻粉五钱 白占六两 黄占五两 猪油四斤

【用法】上为细末，将猪油，二占同烊化后，和入前药末搅匀，用白皮纸拖之，阴干。将膏以针刺密孔扎之，一日一换。

【功用】《中药制剂手册》：去湿解毒，活血止痛。

【主治】①《中国医学大辞典》：臁疮腐烂臭秽，痛痒不时。②《中药制剂手册》：顽疮，结毒溃烂，久不收口。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：不可水洗，不可入口。

05137 托里散

【方源】《普济方》卷三二四引《卫生家宝》。

【组成】甘草一两 当归一两 天罗一个（炒，丝瓜是也） 栝楼一个（炒紫色） 皂角刺四十九个（炒）

【用法】上为细末。每服二钱，酒调下。

【主治】乳痈。

05138 托里散

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】黄瓜蒌一个 忍冬草 乳香各一两 苏木五钱 没药三钱 甘草二钱

【用法】每服用酒三碗，煎二碗，空心、日午、临睡分三服。滓为细末，酒糊为丸，如弹子大，朱砂为衣，细嚼，当归酒送下。

【功用】消肿，溃脓，生肌。

【主治】痈疽，打扑伤损。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作"塞里散"。

05139 托里散

【方源】《玉机微义》卷十五。

【异名】托里护心散（《明医指掌》卷八）。

【组成】大黄 牡蛎 瓜蒌根 皂角针 朴消 连翘各三钱 当归 金银花各一两 赤芍 黄芩各二钱

【用法】上为粗末。每服半两，水、酒各半煎服。三服消尽。

【主治】一切恶疮发背，疔疽，便毒始发，脉洪弦实数，肿甚欲作脓者。

【方论选录】《医方集解》：此足阳明、厥阴药也。金银花清热解毒，疮痈主药；当归、赤芍调营血；大黄、芒消荡胃热；黄芩清肺火；牡蛎软坚痰；连翘、花粉散结排脓；角刺锋锐，直达病所而溃散之也。

05140 托里散

【方源】《外科发挥》卷一。

【组成】人参 黄耆（盐水拌炒） 当归（酒拌） 川芎 白术（炒） 茯苓 芍药各一钱 厚朴（姜制） 白芷 甘草各五分

【用法】作一剂。水二钟，煎八分服。

【主治】疮疡饮食少思，或不腐，不收敛；溃疡作痛、发背、脑疽、鬓疽、时毒、臂疽、伤损。

05141 托里散

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】生黄耆三分 当归二分 白芍二钱 续断三钱 云苓二钱 香附子一钱 枸杞子一钱五分 甲珠一片 银花一钱 甘草七分

【用法】福元十枚为引。

【主治】无论毒之阴阳，溃后气血虚者。

【备考】《中医大辞典·方剂分册》本方用法：水煎服。

05142 托胎丸

【方源】《李氏医鉴》卷八。

【组成】杜仲八两（糯米汤煎，浸透，炒断丝） 续断二两（酒拌，焙） 山药六两

【用法】上为末，面糊为丸；或枣肉为丸。米饮送下。

【功用】补肾气，托胎元。

【主治】受孕一二月，惯堕胎者

05143 托里内补散

【方源】《疮疡经验全书》卷九。

【组成】人参 当归 官桂五分 川芎 防风 白芷 桔梗 黄耆 炙草 厚朴 木香 白芍药各一钱

【用法】上为末。每服六钱，酒调下。

【功用】消痈，止痛。

【主治】痈疽。

05144 托里内补散

【方源】《赤水玄珠》卷二十九。

【组成】人参 川归 川芎 白芍 甘草 白芷 防风 白术 茯苓 官桂 黄耆 金银花各等分

【用法】水煎服。

【主治】一切恶疮，溃烂出脓以后。

05145 托里当归汤

【方源】《外科精义》卷下引何君五方。

【组成】当归 黄耆 人参 熟地 川芎 芍药 甘草（炙） 柴胡各等分

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】痈疽、瘰疬、流注、乳痈、下疳，诸疮气血俱虚，毒气入腹者，及妇人诸疮，经候不调。

①《外科精义》：诸疮毒气入腹。②《外科发挥》：溃疡气血俱虚发热，及瘰疬、流注、乳痈，不问肿溃。③《外科枢要》：妇人诸疮，经候不调，小便频数，大便不实。④《杏苑》：下疳注干，脓水交流，寒热头疼。⑤《杂病源流犀烛》：腹痈。

05146 托里败毒散

【方源】《广笔记》卷三。

【组成】绵黄耆（盐水炒）三钱（或五钱，或八钱，或一两） 甘草节（水炙）二钱（可加至四五钱） 赤芍药二钱 金银花三钱 茜草（江西出，细如灯芯者佳）三钱 何首乌（鲜者）五钱 真白僵蚕（炙，研）六分 白及二钱五分 皂角刺一钱 贝母（去心）二钱 栝楼根三钱 穿山甲（土炒，研）一钱 鼠粘子（炒，研）一钱 蝉蜕（去翅爪）一钱

【用法】先用夏枯草五两，河水五大碗，煎三碗，入前药同煎至一碗，不拘时候服。

【主治】肿毒。

【加减】阴症去后五味，加人参三钱、麦门冬五钱。

05147 托里定痛散

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】托里定痛汤（《金鉴》卷六十二）。

【组成】归身 熟地 乳香 没药 川芎 白芍 肉桂各一钱 粟壳（泡去筋膜，蜜炒）二钱

【用法】水二钟，煎八分，随病上下，食前后服之。

【主治】痈疽溃后，血虚疼痛不可忍者。

05148 托里建中汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】人参 白术 茯苓各二钱 半夏 炮姜各一钱 甘草五分 熟附子八分

【用法】水二钟，加煨姜三片，大枣二个，煎八分，不拘时候服。

【功用】建中气。

【主治】痈疽元气素虚，或因寒凉伤脾损胃，饮食少思，凡食无味或作呕、泄泻。

05149 托里茯苓汤

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】防风 桔梗 芍药 五味子 川芎 甘草 麦门冬（去心） 桂（去皮） 熟地黄各一两 当归 黄耆 茯苓各一两五钱

【用法】上为末。每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】①《外科精义》：下疳，大便软。②《东医宝鉴·杂病篇》：痈疽溃后，脓多出内虚。

05150 托里养荣汤

【方源】《痈疽神验秘方》。

【组成】人参 黄耆（炙） 当归（酒拌） 芍药（炒） 川芎 白术（炒）各一钱 五味子（研，炒） 麦门冬（去心） 甘草（炙）各五分 熟地黄（用生者，酒拌，铜锅内蒸半日） 生姜三片 大枣二个

【用法】上作一剂。用水二钟，煎至八分，食远服。

【主治】①《痈疽神验秘方》：痈疽气血俱虚，或脓血大泄，作渴，或兼发热者。②《外科发挥》：瘰疬、流注，及一切不足之证。不作脓，或不溃，或溃后发热，或恶寒，肌肉消瘦，饮食少思，睡眠不宁，盗汗不止。

05151 托里举斑汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】白芍 当归各一钱 升麻五分 白芷 柴胡各七分 川山甲二钱（炙黄）

【用法】生姜为引，水煎服。

【功用】《瘟疫论评注》：扶正达邪，宣透斑疹。

【主治】瘟疫发斑复大下，中气不振，斑毒内陷。

【加减】 循衣摸床，撮空理线，脉渐微者，加人参一钱。

【方论选录】《医钞类编》松峰按：此方系专为下陷中气不振，斑毒内陷者设，故用归、芍托里；升、柴、白芷以举斑；山甲以走窜经络，则卫气疏畅，而斑可渐出矣。

05152 托里透脓汤

【方源】《金鉴》卷六十三。

【组成】 人参 白术（土炒） 穿山甲（炒，研） 白芷各一钱 升麻 甘草节各五分 当归二钱 生黄耆三钱 皂角刺一钱五分 青皮（炒）五分

【用法】 水三钟，煎至一钟，病在上部，先饮煮酒一钟，后热服此药；病在下部，先服药，后饮酒；疮在中部，药内兑酒半钟热服。

【主治】 侵脑疽，红肿高起，焮热疼痛，脓色如苍蜡，而将溃时。

05153 托里消毒散

【方源】《陈氏小儿痘疹方论》。

【异名】 消毒托里散（《医学六要》卷四）、托里消毒饮（《东医宝鉴·杂病篇》卷七）。

【组成】 人参 黄耆（炒） 当归（酒洗） 川芎 芍药（炒） 白术（炒） 陈皮 茯苓各一钱 金银花 连翘 白芷各七分 甘草五分

【用法】 每服三五钱，水煎服。

【功用】《外科枢要》：消肿，溃脓，生肌。

【主治】 痘疹、痈疽、疮疡、时毒、大头瘟之气血虚弱者。

①《陈氏小儿痘疹方论》：痘毒气血虚弱，不能起发、腐溃、收敛，或发寒热，肌肉不生。②《外科枢要》：疮疡胃气虚弱，或因克伐不能溃散。③《医学入门》：痈疽肿痛俱慢，色不甚赤。④《医统》：时毒表里俱解，肿肉不消，欲其作脓。⑤《济阴纲目》：大头瘟。

【方论选录】《删补名医方论》：参、耆、术、苓、草以益气分；归、芎、芍以滋血分；银花、白芷、连翘以解毒。

05154 托里消毒散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】 黄耆 白芷 连翘 羌活 川芎 当归尾 赤芍药 防风 桔梗 柴胡 皂角 金银花 甘草

【用法】 水煎服。

【主治】 伤寒发颐，有脓不消，已破或未破。

05155 托里消毒散

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】 保元汤加当归 芍药 茯苓 白术 忍冬 白芷 连翘

【主治】 痈疽，痘疹，毒盛不能起发。

05156 托里益中汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】 托里和中汤（《医学入门》卷八）、托里益黄汤（《杂病源流犀烛》卷二十八）。

【组成】 人参 白术 陈皮 半夏 茯苓 炮姜各一钱 木香 炙草各五分

【用法】 生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】 疮疡中气虚弱，饮食少思，或疮不消散，或溃而不敛。

05157 托里益气汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 白术二钱 人参 茯苓 贝母 陈皮 香附 芍药 当归 熟地各一钱 桔梗 甘草各五分

【用法】 水煎服。

【主治】 痈肿硬，肉色不变，或睡热，或溃而不敛，并一切血气内症。

【加减】 如口干，加五味子、麦门冬；寒热往来，加柴胡、地骨皮；脓清，加黄耆；脓多，加川芎；肌肉迟生，加白蔹、肉桂。

05158 托里黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】 绵黄耆（去芦，蜜炙）十两 甘草一两（炙）

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎五七沸，去滓，温热随意服，不拘时候。

【主治】 ①《圣济总录》：诸疮肿发渴。②《玉机微义》：诸疮脉虚。

05159 托里黄耆汤

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】 黄耆（炒）六钱 甘草（炙） 栝楼根各一钱

【用法】 水二钟，煎至八分，频服之。加入参一钱尤妙。

【主治】 痈疽大渴，发热，或泻，或小便如淋。

05160 托里清中汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】 人参 白术 桔梗 陈皮 半夏 茯苓各一钱 麦门冬 五味子 甘草各五分

【用法】 水二钟，加生姜三片，大枣二个，煎八分，食远服。

【主治】 痈疽脾胃虚弱，咳嗽，痰气不清，饮食

少思。

05161 托里越鞠汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【组成】人参 白术各二钱 陈皮 半夏各一钱 山栀 川芎 香附 苍术各七分 炙草五分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】痈疽六郁所伤，脾胃虚弱，及木侮土，或呕或泄；小儿疮疡。

①《外科枢要》：疮疡六郁所伤，脾胃虚弱，饮食少思。②《保婴撮要》：乳母郁怒，肝脾内热，致儿患疮疡。③《医学入门》：痈疽脾胃虚寒，木侮土，或呕或泄。

【备考】《保婴撮要》本方用法：婴儿、乳母并服。

05162 托里温中汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【异名】托里温中散(《医林纂要》卷十)。

【组成】沉香 丁香 益智仁 茴香 陈皮各一钱 木香一钱半 甘草（炙）二钱 羌活 干姜（炮）二钱 黑附子（炮，去皮脐）四钱 生姜五片

【用法】上㕮咀，作一服。水三盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】①《卫生宝鉴》：疮为寒变而内陷者，脓出清稀，皮肤凉，心下痞满，肠鸣切痛，大便微溏，食则呕逆，气短促，呃逆不绝，不得安卧，时发昏愦。②《外科枢要》：疮疡脓溃，元气虚寒，或因克伐胃气脱陷。

【宜忌】忌一切冷物。

【方论选录】《内经》云：寒淫于内，治以辛热，佐以苦温。故以附子、干姜大辛热，温中外，发阳气，自里之表，故以为君；羌活味苦辛温，透关节；炙甘草甘温，补脾胃，行经络，通血脉；胃寒则呕吐，呃逆不下食，益智仁、丁香、沉香大辛热，以散寒为佐；疮气内攻，气聚而为满，木香、茴香、陈皮苦辛温，治痞散满为使也。

05163 托里温中汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】白术 茯苓 木香 丁香各五分 半夏 陈皮 羌活 益智 干姜（炮） 人参 白蔻 甘草各一钱 附子二钱 生姜三片 大枣一个

【用法】水二钟，煎至八分，不拘时候服。

【主治】痈疽阳弱阴寒，脉虚身冷；或疮为寒变，反致不疼；或脓水清稀，心下痞满，肠鸣腹痛，大便微溏，食则气短，呕逆不得安卧，时发昏愦者。

【备考】《疡医大全》有半夏。

05164 托里温经汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】人参（去芦） 苍术各一钱 白芍药 甘草（炙）各一钱半 白芷 当归身 麻黄（去根节）各二钱 防风（去芦） 葛根各三钱 新升麻四钱

【用法】上㕮咀。每服一两重，水三盏，先煎麻黄令沸，去沫，再下余药同煎至一盏，去滓，大温服讫，卧于暖处，以绵衣覆之，得汗而散。

【主治】①《卫生宝鉴》：寒覆皮毛，郁遏经络，不得伸越，热伏荣中，聚而为赤肿，痛不可忍，恶寒发热，或相引肢体疼痛。②《疡科选粹》：痈疽脉浮紧，按之洪缓，牙关紧急，涕唾稠粘，饮食难下。

【方论选录】麻黄苦温，发之者也，故以为君；防风辛温，散之者也，升麻苦辛，葛根甘平，解肌出汗，专治阳明经中之邪，故以为臣；香白芷，当归身辛温，以和血散滞，苍术苦甘温，体轻浮，力雄壮，能泄肤腠间湿热，人参、甘草甘温，白芍药酸微寒，调中益气，使托其里，故以为佐。

05165 扫风丸

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】大风子 1.75 千克 苡仁 240 克 荆芥 240 克 苦参 白蒺藜 小胡麻 苍耳子 防风各 120 克 白花蛇 30 克 苍术 白附子 桂枝 当归 秦艽 白芷 草乌 威灵仙 川芎 钩藤 木瓜 菟丝子 肉桂 天麻 川牛膝 何首乌 千年健 青礞石（制） 川乌 知母 栀子各 60 克

【用法】上为细末，水为小丸，干燥后待用。成人初用 6 克，一日二次。三天后如无呕吐、恶心等反应，可每次加 1.5 克，至第八天后，一日服三次。

【功用】祛风，利湿，杀虫。

【主治】初期轻型麻风。

05166 扫虫煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】青皮一钱 小茴香（炒）一钱 槟榔 乌药各一钱半 细槟肉三钱（敲碎） 吴茱萸一钱 乌梅二个 甘草八分 朱砂 雄黄各五分

【用法】上药各为极细末，将前八味，用水一钟半，煎八分，去滓，随入后二味，再煎三四沸，搅匀，徐徐服之。

【主治】①《景岳全书》：诸虫上攻，胸腹作痛，

②《古方汇精》：目无精光，面色灰白，肌肤消瘦，烦时火辛，胸胁作痛，肚腹搅胀，饮食易饿，饿时痛甚，得食稍止，唇焦口燥，上腭有白点。

05167 扫疥散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】大黄 蛇床子 黄连 金毛狗脊 黄柏 苦参各五钱（同为极细末） 硫黄 水银（茶末杀之）各四钱 雄黄 黄丹各三钱五分 轻粉一钱 大风子（去壳） 木鳖子（去壳）各五钱

【用法】上为细散。用生猪脂调，洗浴后搽疮上。此药宜晒合之，不见火。

【主治】诸疥疮，热疮，遍身疮疖。

05168 扫雪散

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】扫虫散（《外科证治全书》卷一）。

【组成】独核肥皂（分开，去核，以洋糖填入） 巴豆仁（每片加二粒半）

【用法】将皂仍旧合好，扎紧泥裹，入火煅，取出，去泥，研细，加入轻粉、槟榔末各八分，再研，剃头后，以滚灰汤洗，以香油调敷，至愈乃止。

【主治】①《外科全生集》：腊梨疮。②《外科证治全书》：秃疮。初起小者如豆，大者如钱，其痒难堪，挠破出水，结白脓痂，日久蔓延成片，发尽根绝，此症多系胎毒。

05169 扫云开光散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】炉甘石二两（水漂净，火煅，童便浸五次） 海螵蛸（去粗壳） 明硼砂 乳香 没药（箬焙，去油） 麝香 东丹各六钱 血竭三钱 朱砂二钱 珍珠二两

【用法】上药各为极细末。以人乳点大小眼眦。

【主治】一切翳障，并时气热眼。

05170 过气丸

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】大蒜五枚（剥去皮，碎） 附子一枚（去脐，切作块） 赤小豆（拣）五两（上三味，同于砂锅内，用水五升，煮干为度，只取附子为末，余不用，却入后药）白花商陆根半两 沉香二钱 木香三钱 车前子三钱半

【用法】上药同苡仁末煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心薏苡仁汤送下，一日三次。

【主治】脾胃气虚，肾水流溢，四肢作肿。

05171 过期饮

【方源】《准绳·女科》卷一。

【组成】熟地黄 白芍药 当归 香附各二钱 川芎一钱 红花七分 桃仁泥六分 蓬莪术 木通各五分 甘草 肉桂各四分

【用法】水二钟，煎一钟，食前温服。

【功用】补血行气。

【主治】血虚气滞之经水过期不行。

【备考】《金鉴》有木香。

05172 过街笑

【方源】《问春》卷五。

【组成】木香一钱 麝香三厘

【用法】上为末。吹鼻，右边吹左鼻，左边吹右鼻。令病人手上下和之。

【主治】闪腰痛。

05173 至仁丹

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】人参一两 白术一两 黄耆一两 茯苓二钱 半夏三钱 肉桂二钱 薏仁三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】中气。身未猝倒，而右手不仁，言语謇涩，口中流沫。

【方论选录】此证是气虚，可不急补其气乎！补气而右手不仁随补而随效也。气虚者，未有不脾胃寒也。脾胃既寒，难以立化水谷，不变精而变痰矣。故气虚者痰盛，痰即欺气之虚而作祟，上达心而旁及手足，故身欲仆而手足不仁，口吐涎沫耳。乃用参、耆以补气，复用苓、术以健土，治湿则痰无可藏之经；更加半夏、薏仁以逐其已成之痰，则未成之痰涎，又安能再化哉？犹恐脾胃久寒，一时难以建功，增入肉桂，以补其命门之火，则火自生土。土旺而气自郁蒸，气有根蒂，脏腑无非生气，而经络皮肉，何至有不通之患哉！

05174 至圣丹

【方源】《纲目拾遗》卷五。

【组成】鸦胆子

【用法】用小铁锤轻敲其壳，壳破肉出，其大如米，敲碎者不用，专取全仁用之。三五岁儿二十余粒，十余岁者三十多粒，大人则四十九粒，取大圆肉包之，小儿一包三粒，大人一包七粒，紧包，空腹吞下，以饭食压之，使其下行。

【主治】冷痢久泻，百方无验者。

【宜忌】服时忌荤酒三日，戒鸭肉一月。

【方论选录】虚人冷积致痢，其积日久，渐至下坠，竟至大肠下口直肠上口交界之处，有小曲折隐匿于此，为肠秽最深之处，药所不到之地。证则乍轻乍重，或愈或发，便则乍红乍白，或硬或溏，总

无一定，任是神丹，分毫无济，盖积不在腹内，而在大肠之下，诸药至此，性力已过，尽成米比糠，安能去此沉匿之积？所以冷痢，有至三五年十数年不愈者，由此故也。古方用巴豆为丸下之者，第恐久病人虚，未敢轻用；今以至捷至稳鸦胆子一味治之，更藉此圆肉包裹，可以直至大肠之下也。

05175 至圣散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】枇杷叶（净刷去叶后毛，锉碎）二两半夏（咬咀净者）四两

【用法】上用生姜四两重，切作绿豆大，拌匀，酿一宿，慢火炒令微焦色，以皮纸盛，于地上候冷。每服二钱，水一盏，煎七分，去滓，空心少与缓投；或入诸药内同煎服，亦效。

【主治】老幼暴吐，服药不止者。

05176 至圣膏

【方源】《外科精要》卷下。

【异名】汤火至圣膏（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】鸡子黄

【用法】置银石器内熬油，调胡粉敷之。

【主治】汤火疮。

05177 至灵散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【异名】透顶散（《杨氏家藏方》卷二）、细辛散（《朱氏集验方》卷九）。

【组成】雄黄（研） 细辛（去苗叶，为末）各等分。

【用法】上为末。每服一字，左边疼搐入右鼻，右边痛搐入左鼻。

【主治】偏头痛。

【备考】《杨氏家藏方》本方用细辛一两，雄黄半两。

05178 至明膏

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】黄连一两（锉） 当归二钱（锉） 蕤仁（去皮）一钱 龙脑一钱 南硼砂一钱 青盐一字

【用法】将前三味用水一大碗，漫一时辰，慢火熬至半碗，澄滤去滓，入白蜜半两，再重汤煮成膏，重绵滤过，出火毒。后三味，研极细，与前药一处同研令匀。每用黄米粒大，或一绿豆许，每日点一次，两眼各点一筋。

【主治】眼暴赤疼痛，泪出眵多，热气上攻，视物昏花。

05179 至宝丹

【方源】《灵苑方》引郑感方（见《苏沈良方》卷五）。

【异名】至宝膏（《幼幼新书》卷八）。

【组成】生乌犀 生玳瑁 琥珀 朱砂 雄黄各一两 牛黄一分 龙脑一分 麝香一分 安息香一两半（酒浸，重汤煮令化，滤去滓，约取一两净） 金银箔各五十片

【用法】上为丸，如皂角子大。每服一丸，人参汤送下，小儿量减；血病，生姜、小便化下。

【功用】《方剂学》：清热开窍，化浊解毒。

【主治】①《灵苑方》引郑感方：心热血凝，心胆虚弱，喜惊多涎，眠中惊魇，小儿惊热，女子忧劳，血滞血厥，产后心虚怔忪。②《局方》：卒中急风不语，中恶气绝，中诸物毒暗风，中热疫毒，阴阳二毒，山岚瘴气毒，盘毒水毒，产后血晕，口鼻血出，恶血攻心，烦躁气喘，吐逆，难产闷乱，死胎不下。又疗心肺积热，伏热呕吐，邪气攻心，大肠风秘，神魂恍惚，头目昏眩，睡眠不安，唇口干燥，伤寒狂语。又疗小儿诸痫，急惊心热，卒中客忤，不得眠睡，烦躁风涎搐搦。

【方论选录】①《古方选注》：至宝丹，治心肝神昏，从表透里之方也。犀角、牛黄、玳瑁、琥珀以有灵之品，内通心窍；朱砂、雄黄、金银箔以重坠之药，安镇心神；佐以龙脑、麝香、安息香搜剔幽隐诸窍。李杲曰：牛黄、脑、麝入骨髓，透肌肤。故热入心包络，舌绛神昏者，以此丹入寒凉汤药中用之，能祛阴起阳，立展神明，有非他药之可及。若病起头痛，而后神昏不语者，此肝虚魂升于顶，当用牡蛎救逆以降之，又非至宝丹所能苏也。

②《阎氏小儿方论笺正》：此方清热镇怯，定魄安神，凡肝胆火炎，冲击犯脑，非此不可，洄溪所云必备之药。方下所谓诸痫急惊，卒中客忤，烦躁不眠，及伤寒狂语等症，方后所谓卒中不语云云，无一非脑神经之病，投以是丸，皆有捷效，名以至宝，允无惭色。

【临证举例】高热神昏 《浙江中医药》（1979，7:259）：一患者，高热40℃，突陷昏迷，头汗如淋，四肢瘛疭，呼吸喘促，两目对光反射迟钝，瞳孔散大，角膜混浊，舌苔黄燥，质淡红，脉细数。辨证为暑热挟秽浊之邪蒙蔽心包，肺失清肃，肝风煽动，拟清暑宣肺之剂：用至宝丹一粒合鲜竹沥60克，石菖蒲、六一散各9克，郁金、川贝、麦门冬各6克，扁豆花12克，远志4.5克，鲜芦根30克，金银花18克，浓煎鼻饲，三天后改为至宝丹2粒，同时应用抗菌素、脱水剂等西药治疗，至第六天后神识转清，身热减轻。

【备考】 本方改为散剂，犀角改用水牛角浓缩粉，不用金银箔，名“局方至宝散”（见《中国药典》）。《局方》本方用法：将生犀、玳瑁为细末，入余药研匀，将安息香膏重汤煮凝成后，入诸药中和搜成剂，盛不津器中，并旋丸如梧桐子大。每用三丸至五丸，疗小儿诸痫急惊心热，每二岁儿服二丸，均用人参汤化下。

05180 至宝丹

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】 辰砂 生犀 玳瑁 雄黄 琥珀 人参各五两 牛黄二两半 麝香 龙脑各一两二钱半 天南星二两半（水煮软，切片） 银箔二百五十片（入药） 金箔二百五十片（半入药，半为衣） 安息香五两（用酒半升，熬成膏） 龙齿二两（水飞）

【用法】 上为末，用安息香膏，重汤煮炀搜剂，旋丸如梧桐子大。每服三丸至五丸，小儿一两丸，人参汤送下。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：风中脏。②《普济方》：卒中风，急不语，中恶气、卒中诸物毒，暗风，卒中热疫毒，阴阳二毒、岚瘴毒，误中水毒，产后血晕，口鼻血出，恶血攻心，若烦躁、心肺积热，霍乱吐利，风注转筋，大肠风涩，神魂恍惚，头目昏眩，眠睡不安，唇口焦干，伤寒狂语，小儿急惊风，热卒中，皮瘙痒客忤不得眠睡，烦躁惊风搐搦。

05181 至宝丹

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】 麻黄 防风 荆芥 薄荷 当归 赤芍 大黄 芒消 川芎 黄芩 桔梗 连翘（去心） 白术（土炒） 栀子 石膏（煅） 甘草（生） 滑石 全蝎（去毒） 细辛 天麻 白附子 羌活 僵蚕（炒） 川连 独活 黄柏各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸重五分。量儿大小与之，生姜汤化下。

【主治】 急惊风属火郁生风者。

05182 至宝丹

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 犀角（镑）一两 朱砂（飞） 琥珀（研）一两 玳瑁（镑）一两 牛黄五钱 麝香五钱

【用法】 以安息重汤炖化，和诸药为丸一百丸，蜡护。

【主治】 太阴温病，发汗过多，神昏谵语者。

【方论选录】 此方会萃各种灵异，皆能补心体，通心用，除邪秽，解热结，共成拨乱反正之功。大抵安宫牛黄丸最凉，紫雪次之，至宝又次之，主治略同，而各有所长，临用对证斟酌可也。

05183 至真散

【方源】《理伤续断方》。

【异名】 夺命散（原书）、玉真散（《本事方》卷六）、防风散（《三因方》卷七）、神助散（《杨氏家藏方》卷十四）、定风散（《卫生宝鉴》卷二十）、胡氏夺命散（《永类钤方》卷二十二）、夺命丹（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】 天南星（泡七次） 防风（去芦叉）各等分

【用法】 上为末。凡破伤风病，以药敷贴疮口，即以温酒调一钱服之。如牙关紧急，以童便调二钱服，垂死心头微温，童便调二钱，并进三服。

【主治】 破伤风，狂犬病。

①《理伤续断方》：打破伤损破脑伤风头疼，角弓反张；②《卫生宝鉴》：疯狗咬破；③《杨氏家藏方》：金疮。

05184 至圣来复丹

【方源】《幼幼新书》卷九引《养生必用》。

【异名】 来复丹、正一丹（《局方》卷五吴直阁增诸家名方引铁甕城八角杜先生方）、养正丹、黑锡丹（《医宗必读》卷六）、二和丹（《杂病源流犀烛》卷四）、来复丸（《饲鹤亭集方》）。

【组成】 灵脂 青皮 硫黄 消石（于瓷器内，文武火消，令匀，勿令太过，研细，慢火炒黄色） 陈皮（不去白）各二两 太阴玄精石一两

【用法】 上为末，水煮面糊为丸，如梧桐子大；小儿如麻子，看大小加减服之。每服二十粒，病甚者三十粒，轻者十五粒；童稚十粒，婴儿三五粒，新生一二粒，化破，早晨粥饮送下。

【功用】《局方》（吴直阁增诸家名方）：补损扶虚，救阴助阳，常服和阴阳，益精神，散腰肾阴湿，止腹肋冷疼。

【主治】 上盛下虚，里寒外热，身热烦躁，心腹冷痛，伏暑霍乱吐泻，冷热泻痢。

①《幼幼新书》引《养生必用》：阴阳不调，冷热相制，荣卫差错，心肾不升降，水火不交养，凡丈夫，女人、老寿、稚婴危急证候，胃气尚在者。如邪热炎上烦躁；冷气攻注疼痛；脐痞寒热不可忍；肾邪攻胁注痛，不可转动；诸霍乱吐泻，水谷汤药不住；大段吐逆，手足逆冷，脚转筋；着热烦躁，昏塞旋倒，不省人事；泻痢不问赤白冷热；非时吐逆气痞，食饮不下；小儿因惊成痫，发渴多日，变成虚风，作慢惊者。②《局方》（吴直阁增

诸家名方)：荣卫不交养，心肾不升降，上实下虚，气闭痰厥，心腹冷痛、脏腑虚滑，不问男女老幼危急之证，但有胃气者。③《饲鹤亭集方》：上盛下虚，里寒外热，伏暑霍乱泄泻，中脘痞结，腹痛疝气及小儿惊风。

【备考】《局方》(吴直阁增诸家名方)：上用五灵脂、二橘皮为细末，次入玄精石末及前二气末拌匀，以好滴醋打糊为丸，如豌豆大。每服三十粒，空心粥饮吞下。甚者五十粒，小儿三五粒，新生婴儿一粒。小儿慢惊风或吐利不止变成虚风搐搦者，非风也，胃气欲绝故也。用五粒研碎，米饮送下。老人伏暑迷闷，紫苏汤送下。妇人产后血逆上抢闷绝，并恶露不止，及赤白带下，并用醋汤送下。应诸疾不辨阴阳证者，并宜服之。

05185 至圣保命丹

【方源】《幼科发挥》卷二。

【异名】紫金锭子。

【组成】胆星 僵蚕 白附子各一钱 全蝎十四枚 天麻 防风各一钱 辰砂(水飞)一钱半 麝香一字 珍珠五分 琥珀三分 金箔二十片

【用法】上为末，粟米为丸，分为二十锭，金箔为衣。每一锭薄荷叶煎汤磨服。

【主治】小儿惊风、客忤。

05186 至效独乌膏

【方源】《外科启玄》卷十一。

【组成】独活 草乌 南星 肉桂各等分

【用法】上为细末，用好米醋调敷患处，留头，纸盖，干则醋润之。

【主治】背痈疽发毒肿硬痛。

05187 夷则丸

【方源】《家塾方》。

【异名】海浮石丸。

【组成】海浮石 大黄 桃仁各等分

【用法】上三味，杵筛为末，糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白汤送下。不知，稍加之。

【主治】腹不满，其人言我满者。

05188 贞元饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】正元饮(《证治宝鉴》卷十引《会心录》)。

【组成】熟地黄七八钱，甚者一二两 炙甘草一二三钱 当归二三钱

【用法】水二钟，煎八分，温服。

【主治】肝肾亏损，气短似喘，呼吸急促，提不能升，咽不能降，气道喧塞，势剧垂危，脉象微细无神，若微而兼紧，尤为可畏。

【加减】如气虚脉微至极者，急加人参；如肝肾阴虚，手足厥冷，加肉桂一钱。

05189 当归丸

【方源】《千金》卷四。

【组成】当归 芎藭各四两 虻虫 乌头 丹参 干漆各一两 人参 牡蛎 王瓜根 水蛭各二两 桃仁五十个

【用法】上为末，白蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，以酒送下，一日三次。

【主治】妇人腰腹痛，月水不通利。

05190 当归丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【异名】神效丸(《袖珍》卷一)。

【组成】当归(锉，炒) 黄连(去须) 乌梅(去核，焙)各一两

【用法】上为粗末，以生蒜汁和，众手丸如梧桐子大，焙干。每服三十丸，空心煎厚朴汤下。加至五十丸。

【主治】休息痢。

05191 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【异名】当归没药丸(《妇人良方》卷四)、当归灵没丸(《医级》卷九)。

【组成】当归(切，焙)一两 没药(研)半两 五灵脂(锉)一两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至二十丸，温酒或生姜汤送下，空心、食前服。

【主治】①《圣济总录》：妇人血风血气，腹胁刺痛，不思饮食，筋挛骨痹，手足麻木，皮肤瘙痒。②《医级》：妇人血瘀腹痛、胁痛。

05192 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归(切，焙)一两 干漆(炒烟出) 芎藭各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下。

【主治】室女月水不通。

05193 当归丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】当归(切，焙)二两 槟榔(生锉) 赤芍药 牡丹皮 延胡索各一两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心温酒送下，日晚再服。

【主治】 室女气血不和，月水欲来，先攻少腹刺痛。

05194 当归丸

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】 当归三两（锉碎） 水蛭（好者，炒）三十个 桃仁（去皮尖）三十个（炒，研）

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十粒，以酒送下。未知，加至三十粒。

【主治】 留血滞于腰间，致血沥腰痛，痛如锥刀所刺，大便黑色，小便赤黑，脉涩者。

05195 当归丸

【方源】《普济方》卷二八〇。

【组成】 何首乌八两 草乌四两 苦参八两 赤芍三钱半 荆芥四两

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，温酒送下。

【主治】 诸般疮疥。

【备考】 本方名当归丸，但方中无当归，疑脱。

05196 当归丸

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】 当归 15 克 川芎 7.5 克 白芍 9 克 生地 3 克 熟地 9 克 防风 6 克 白芥子 6 克 荆芥 6 克 首乌 12 克 玉竹 12 克 黄耆 15 克 甘草 3 克

【用法】 上为末。炼蜜为丸，每丸 9 克。早、晚各服一丸。

【功用】 养血润燥，益气祛风。

【主治】 慢性荨麻疹，银屑病，瘙痒症，皮肤干裂，皮肤痿缩等，属于血燥，症见皮肤干燥，鳞屑，皲裂或萎缩，瘙痒，无热象，脉细，舌淡红者。

05197 当归汤

【方源】《千金》卷十三注文引《小品方》。

【组成】 当归 芍药 厚朴 半夏各二两 桂心 甘草 黄耆 人参各三两 干姜四两 蜀椒一两

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升二合，分四服，羸劣人分六服。

【主治】 心腹绞痛，诸虚冷气满痛。

【加减】 大冷，加附子一个。

05198 当归汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】 当归二两 生姜五两 芍药二两 羊肉一斤

【用法】 上㕮咀。以水八升，煮羊肉熟，取汁煎药得三升，适寒温，服七合，一日三次。

【主治】 ①《千金》：妇人寒疝，虚劳不足，产后腹中绞痛。②《普济方》：卒疝，腹痛里急。

05199 当归汤

【方源】《千金》卷十二。

【组成】 当归 干姜 芍药 阿胶各二两 黄芩三两

【用法】 上㕮咀。以水六升，煮取二升，分三次服。

【主治】 ①《千金》：衄血吐血。②《普济方》：引《圣惠》：衄血吐血不止，心胸疼痛。

【方论选录】《千金方衍义》：阿胶主心腹内崩，归、芍归诸经之血，干姜、黄芩以和标本之寒热也。

05200 当归汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】 当归 桂心各三两 干姜四两 附子五两

【用法】 上㕮咀。以水八升，煮取二升，分三服，一日三次。

【主治】 久寒宿疾，胸腹中痛，短气，时滞下痢。

05201 当归汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 当归（切焙） 白芷 防风（去叉） 白鲜皮 白术 芎藭 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 甘草（炙，锉） 甘菊花 天雄（炮裂，去皮脐）各一两 人参半两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水二盏，加生姜半分（切），煎至一盏，去滓，与食相间温服，日三夜一。

【主治】 中风手足偏枯，口面㖞斜疼痛，一目不能合。

05202 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】 当归（切，焙）四两 大黄（生，锉）二两 生干地黄（焙）五两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓温服，不拘时候。微利为效。

【主治】 从高坠堕，伤损肢体，发热疼痛。

05203 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】 当归（切，焙） 甘草（炙，锉） 干姜（炮） 芎藭各一两 白术二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，入大枣三个（擘破），同煎至七分，去滓，空心温服。

【主治】 妊娠胞中虚，胎不荣长，致令萎燥。

05204 当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【异名】 桂枝加芍药当归汤(《云岐子保命集》卷下)、当归散(《普济方》卷三五七)、桂枝芍药当归汤(《准绳·伤寒》卷七)。

【组成】 当归（切，焙） 芍药（锉） 桂（去粗皮）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《圣济总录》：产后胞衣不下。②《云岐子保命集》：妇人有孕伤寒，脉浮头重、自利，腹中切痛。

05205 当归汤

【方源】《洁古家珍》。

【异名】 保命当归汤(《原机启微》附录)。

【组成】 当归身二钱 黄连（酒洗） 黄芩各二钱 生地黄三钱（酒洗，阴干） 炙甘草三钱 柴胡一两 白芍药二钱

【用法】 上㕮咀。水煎，临卧服。

【功用】 补益肾水。

【主治】 肝肾阴虚，风热上攻，瞳子散大，眼黑，或生翳膜。

①《洁古家珍》：瞳子散。②《原机启微》附录：风热上攻，瞳子散大。③《普济方》：肾虚，眼黑，瞳子散。④《准绳·类方》：翳及瞳子散大。

【备考】《原机启微》附录生地黄作熟地黄。

05206 当归汤

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】 当归二钱（酒洗） 赤芍药（煨）一钱半 独活 防风 赤茯苓 黄芩 秦艽各一钱 杏仁八分（去皮尖） 甘草六分 桂心三分

【用法】 水二钟，加生姜三片，煎八分，不拘时候温服。

【主治】 血痹、风痹等痹证。

①《准绳·类方》：痹证。②《证治宝鉴》：血痹，体常如风吹，汗出，卧则不能，摇动。③《证治汇补》：血痹者，邪入阴分，若被风吹，骨弱劳疲，汗出，卧则摇动。④《医级》：风痹血脉，筋瘘热痛。

05207 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 当归（切，炒） 桂（去粗皮） 干漆（捣，炒令烟出）各一两 虻虫（去翅足，炒） 水蛭（糯米同炒米熟，去米） 芍药 细辛（去苗叶） 黄芩（去黑心） 蓼蕤 甘草各一两 大黄三两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，清酒一大盏，煎至六分，去滓，下芒消二钱，烊尽，再煎令沸，食后温服。

【主治】 妇人寒气内搏，月水不通，腹中气满，结块寒热。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“当归散”。

05208 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】 当归（切，焙） 一两 芎藭 阿胶（炙炮）各三分 白术二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，每日三次。

【主治】 妊娠胎萎燥。

05209 当归饮

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】 当归（切，焙） 败酱 续断各一两 芍药一两一分 生干地黄（焙）一两半 竹茹 芎藭各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，每日三次。

【主治】 产后七八日，恶露下不绝。

05210 当归饮

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】 当归（去芦，微炒） 熟地（净洗，酒蒸，焙干） 川芎 白芍 黄芩 白术各等分

【用法】 上为粗末。每服三钱，水盏半，煎至八分，食前热服。

【功用】 抑阳助阴，调理经脉。

【主治】 阳气胜阴，月假多者。

05211 当归饮

【方源】《得效》卷五。

【异名】 当归散(《赤水玄珠》卷七)。

【组成】 苏木 生地黄 当归 大黄 赤芍药

【用法】 上为末。酒调服，得利去瘀血即止，服养荣汤调理。

【主治】 男子因打损负重，女子因劳苦用力而伤肺经，遇风寒则为咳嗽，或咳血，或至紫黑。

【备考】《赤水玄珠》本方用苏木、生地黄、当归、大黄、芍药各等分，为末，每服四钱，或水、酒煎服亦可。又原书治上症并配合灸肺俞穴。

05212 当归饮

【方源】《回春》卷二。

【组成】 当归一钱二分 芍药一钱 川芎五分 生地黄一钱 牡丹皮一钱 黄连（酒炒）七分 麦

门冬（去心）二钱　地骨皮七分　酒黄芩七分　炒栀子六分　柴胡六分　生甘草三分

【用法】 上锉一剂。水煎，食远热服。

【主治】 劳心生热，鼻少见血，五心烦热。

05213　当归饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】 牛膝　蒲黄　当归　黄连　生地各二钱　麦冬（去心）　木通　扁柏叶（微炒）　山栀仁各一钱

【用法】 加灯心三十茎，水煎，食前服。

【主治】 血淋。

05214　当归饮

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】 当归　黄连　生地　熟地　郁金　杏仁　栀子　黄柏　赤芍

【用法】 上分作两服，水煎，乘热洗眼。

【主治】 目涩痛痒，羞明怕日。

05215　当归饮

【方源】《女科指掌》卷一。

【组成】 四物汤加白术　黄芩　地榆　阿胶

【主治】 阳气乘阴，经血过多。

05216　当归饮

【方源】《眼科菁华录》卷上。

【组成】 当归　白芍　人参　甘草　滑石　柴胡　黄芩　川锦纹　生薏

【用法】 水煎服。

【主治】 热泪为患。

05217　当归散

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 芍药汤(《永类钤方》卷十八)。

【组成】 当归　黄芩　芍药　芎藭各一斤　白术半斤

【用法】 上为散，每服方寸匕，酒饮调下，一日二次。

【功用】 养血清热安胎。

①《鸡峰》：快利恶露。②《回春》：养血清热。③《成方便读》：安胎清热。

【主治】 孕妇血少有热，胎动不安，素有堕胎之患；月经不调，腰腹疼痛。

①《金匮》：妇人妊娠常服，即易产，胎无苦疾；及产后百病。②《鸡峰》：产后气血俱虚。③《永类钤方》：妊娠伤寒，五个月以前者。④《普济方》：腹痛。⑤《回春》：瘦人血少有热，胎动不安，素惯半产者。⑥《叶氏女科》：天癸已过，经行不匀，三四月不行，或一月再至而腰腹疼痛者。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足太阴，厥阴，冲任药也。冲任血盛，则能养胎而胎安。芎、归、芍药能养血而益冲任；又怀妊宜清热凉血，血不妄行则胎安；黄芩养阴退阳，能除胃热，白术补脾燥湿，亦除胃热；脾胃健则能运化精微，取汁为血以养胎，自无恶阻呕逆之患矣。②《金匮要略心典》：妊娠之后，最虑湿热伤动胎气，故于芎、归、芍药养血之中，用白术除湿，黄芩除热。丹溪称黄芩、白术为安胎之圣药。夫芩、术非能安胎者，去其湿热而胎自安耳。③《金匮要略方义》：本方用药，具安胎之常法。方中以当归、白芍养血益阴；配以川芎，又可调肝和血，使肝血充盈，肝气条达；复以黄芩清热，白术去湿，使湿去热清、血气调和，则胎元自安，母体无恙；且胎系于脾，白术更有健脾益胃之功，既实脾气以固胎，又助后天以培本，俾胎得其养。孕妇体壮，非但胎前安然，即产后亦少生诸疾。

【临证举例】 堕胎　《古今医案按》：一妇年三十余，或经住，或成形未具，其胎必堕。察其性急多怒，色黑气实，此相火太盛，不能生气化胎，反食气伤精故也。因令住经第二月，用黄芩、白术、当归、甘草，服至三月尽，止药，后生一子。

【备考】 本方改为丸剂，名“安胎丸”（见《回春》）、“五味安胎丸”（见《东医宝鉴·杂病篇》）。《鸡峰》本方用法：用温童便或酒调下二钱。

05218　当归散

【方源】《千金》卷三。

【异名】 五味当归散(《景岳全书》卷六十四)。

【组成】 当归　黄芩各二两　芍药一两六铢　蝟皮半两　牡蛎二两半

【用法】 上为散。酒服方寸匕，每日三次。

【主治】 妇人阴脱。

【宜忌】 ①《千金》：禁举重。②《普济方》：忌登高。

05219　当归散

【方源】《千金》卷二十五注文引《救急方》

【异名】 补损当归散(《局方》卷八，续添诸局经验秘方)。

【组成】 当归　桂心　蜀椒　附子各二分　泽兰一分　芎藭六分　甘草五分

【用法】 上并熬令香，为末。酒服方寸匕，每日三次。凡是伤损，皆服之十日愈，小儿亦同。

【主治】 落马堕车，诸伤腕折臂，脚痛不止。

【宜忌】《局方》(续添诸局经验秘方)：忌海藻、菘菜、生葱、猪肉、冷水。

05220 当归散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】当归一两（锉，微炒） 细辛一两 防风一两（去芦头） 桂心一两 独活二两 麻黄二两（去根节） 附子一两（炮裂，去皮脐） 芎藭一两 薏苡仁一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水、酒各半中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风痉，摇头口噤，身体强直。

05221 当归散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【异名】地龙散(《圣济总录》卷十)。

【组成】当归一两 桂心一两 地龙一两（微炒） 白僵蚕一两（微炒） 威灵仙一两 漏芦一两 芎藭一两 白芷一两

【用法】上为细散。每服二钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：白虎风，疼痛不止。②《圣济总录》：白虎风疼痛，游走无定。

05222 当归散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】当归二两（锉，微炒） 麻黄四两（去根节） 桂心二两 芎藭一两 海桐皮一两（锉） 干姜一两（炮裂，锉） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 独活二两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风，四肢不仁，及不能语，但拘挛背痛，不得转侧。

05223 当归散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】当归一两（锉，微炒） 干姜一两（炮裂，锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 赤芍药一两 黄耆一两（锉） 川椒一两（去目及闭口者，微炒去汗） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 半夏一两（汤洗七遍，去滑） 人参一两（去芦头） 桂心半两 青橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半斤，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】寒疝心痛，及诸虚冷气满闷。

05224 当归散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】当归一两（锉，微炒） 桂心一两 败蒲一两（烧灰） 没药一两半 赤芍药一两 骨碎补一两半 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，日三四服。

【主治】伤折疼痛，青肿滞血。

05225 当归散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【异名】玄胡当归散、延胡索散(《景岳全书》卷六十一)、玄归散(《医级》卷九)。

【组成】当归半两（锉，微炒） 赤芍药半两 刘寄奴半两 没药 枳壳各半两（麸炒微黄，去瓤） 延胡索半两

【用法】上为细散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】妇人血瘀成积，小腹疠刺疼痛，四肢无力，不能饮食，或气逆腹胀，月经不行。

①《圣惠》：妇人久积血气，小腹疠刺疼痛，四肢无力，不能饮食。②《景岳全书》：气逆，月经不行。③《医级》：血瘀成积，小腹块硬疼痛，或气阻腹胀，切痛之极者。

【备考】方中没药用量原缺，据《普济方》补。

05226 当归散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【异名】保安散(《产乳备要》)、当归汤(《妇人良方》卷十二)、保全散(《女科指掌》卷三)。

【组成】当归一两（锉，微炒） 甘草一两（炙微赤，锉） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 人参一两（去芦头）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入葱白七寸，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】《卫生家宝产科备要》：安胎。

【主治】妊娠血气不调，胎上逼心，烦闷疲劳；或心腹疼痛，胎动不安。

①《圣惠》：胎上逼心，烦闷委顿。②《卫生家宝产科备要》：妊娠胎气不安，心腹疼痛，胎动。③《妇人良方》：妊娠胎动，荡心闷绝，烦躁口干，横生倒产，上冲下筑，迷闷，唇口青黑，手足厥冷。

05227 当归散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】当归半两（锉，微炒） 生干地黄三分 石韦半两（去毛） 栀子仁半两 赤芍药半两 赤茯苓三分 王不留行半两 瞿麦三分 麦门冬三分

（去心） 木香三分

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，每日三四次。

【主治】 产后卒淋涩，小腹疼痛。

05228 当归散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【异名】 当归汤(《三因》卷十八)。

【组成】 当归一两（锉，微炒） 鬼箭羽一两 红兰花一两

【用法】 上为散。每服三钱，以酒一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：产后败血不散，结聚成块，俗呼儿枕，疼痛发歇不可忍。②《三因》：新产风寒乘虚内搏，恶露不快，脐腹坚胀。

05229 当归散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 当归（切，焙） 牡丹皮 芍药 延胡索 芎劳各一两 桂（去粗皮） 黄芩（去黑心） 生干地黄（焙） 甘草（炙） 水蛭（糯米同炒米熟，去米） 紫葳各半两

【用法】 上为散。每服二钱匕，空心温酒调下。

【主治】 室女月水不利，少腹刺痛。

05230 当归散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】 当归（锉，炒） 桂（去粗皮） 白龙骨 白术 鹿角胶（炙燥）各一两 附子（炮裂，去皮脐）二两

【用法】 上为散。每服二钱匕，食前粥饮调下。

【主治】 妇人白带不止，面黄体瘦，绕脐冷痛。

05231 当归散

【方源】《本事》卷十。

【组成】 当归（洗，去芦，薄切，焙干） 川芎（洗） 白芍药 黄芩（锉，炒）各一两 白术半两 山茱萸一两半（连核用）

【用法】 上为细末。每服二钱，空心、食前酒调下，一日三次。

【主治】 ①《本事》：妇人天癸已过期，经候不匀，或三四月不行，或一月再至，腰腹疼痛。②《景岳全书》：经水妄行不止，及产后气血虚弱，恶露内停，憎寒发热。

【加减】 如冷，去黄芩，加桂一两。

05232 当归散

【方源】《三因》卷十四。

【组成】 当归（洗） 木香（煨） 赤茯苓 桂心 槟榔 赤芍药 牡丹皮 陈皮 木通 白术（各锉，焙干）各等分

【用法】 上为末。脚膝头面肿，大小便不快，每服二钱，水一盏，紫苏二叶，淡木瓜一片如指大，同煎八分温服，一日三次；如已愈，常服，早晚二次。觉气下，或小便快，是效。

【主治】 水肿，喘息奔急，皮肤溢满，足胫尤甚，两目下肿，腿股间冷，口苦舌干，心腹坚胀，不能正偃，偃则咳嗽，小便不通，梦中虚惊，不能安卧。

【加减】 脏寒，去槟榔；脐已凸，加大腹皮、木猪苓各一两。

【宜忌】 忌乌鸡肉，咸酸海味物。

05233 当归散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】 当归头散(《杏苑》卷八)。

【组成】 当归一两 龙骨二两（炒赤） 香附子三钱（炒） 棕毛灰五钱

【用法】 上为末。每服三四钱，空心米饮送下。

【主治】 血崩。

【宜忌】《普济方》：忌油腻、鸡、猪、鱼、兔等物。

05234 当归散

【方源】《妇人良方》卷一。

【组成】 当归 川山甲（灰炒） 蒲黄各半两（炒） 辰砂一钱 麝香少许

【用法】 上为细末，研停。每服二钱，热酒调下；如不吃酒，薄荷、醋汤亦可。

【功用】《景岳全书》：通经络，行血滞。

【主治】 妇人血脉不通。

05235 当归散

【方源】《直指》卷九。

【异名】 团参汤(《直指小儿》卷四)、参归汤(《杏苑》卷五)、团参散(《景岳全书》卷六十二)。

【组成】 人参 当归各一分

【用法】 上为粗末。分两服，以雄猪心一个，新水煮熟取汁两次，煎药，空心、临卧服。

【主治】 ①《直指》：虚汗，盗汗。②《竹林女科》：小儿惊啼。

05236 当归散

【方源】《医方类聚》卷六十九引《王氏集验方》。

【组成】 黄连（去须） 当归（去芦） 赤芍药 杏仁（去皮尖）各等分

【用法】 上同煮，绢帛滤过，乘热洗，冷即再温，勤洗立效。

【主治】 暴赤眼。

05237 当归散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】 当归（炒） 黄耆（蜜炙） 北细辛（去土叶） 肉桂（去皮） 陈皮（去白） 白姜（炮） 缩砂仁 甘草（炙）各等分

【用法】 上锉碎。每服五钱，水一钟，加生姜三片，糯米五十粒，煎至六分，空心服。

【主治】 小儿胎寒腹痛，面唇青，身温肢冷，多啼。

05238 当归散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 当归 生地黄 赤芍药 川芎 甘草 菊花 木贼 黄芩 大黄 白蒺藜 木通 栀子各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 眼睑停瘀血者。

05239 当归散

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】 当归三钱 赤芍二钱 生地黄三钱 黄连六分 红花八分 石膏二钱

【用法】 上锉一剂。水煎服。

【主治】 血分有热发斑者。

05240 当归散

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】 人参 桔梗 白茯 玄参 黄芩 大黄 羚羊角

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 大眦赤脉穿睛外障。

05241 当归散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 当归二两（锉，微炒） 赤芍药一两半 刘寄奴二两 延胡索一两半（炒） 牛膝二两 没药二两

【用法】 上为散。每服三钱，葱管汤煎服。

【主治】 血积小腹，小便刺痛，经愆，脉涩滞者。

【方论选录】 血积阻塞，窍道不利，故小便刺痛，月经不调焉。当归养血脉以荣经脉，赤芍泻肝火以行滞血，延胡活血调经，没药散瘀止痛，寄奴破血以通经脉，牛膝通经以利小便。为散以散之，葱管以通之，使血积消散，则窍道自通，而小便无刺痛之患，月经无不调之愆矣。

05242 当归煎

【方源】《济生》卷六。

【组成】 当归（去芦，酒浸） 赤芍药 牡蛎（火煅，取粉） 熟地黄（酒蒸，焙） 阿胶（锉，蛤粉炒成珠子） 白芍药 续断（酒浸）各一两 地榆半两

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【主治】 妇人室女，赤白不止，腹内疼痛，四肢烦疼，不欲饮食，日渐羸瘦。

【方论选录】《医略六书》：血亏挟滞，冲任不调，故腹痛而赤白带下，淫溢不已焉。熟地补血，以滋任脉；当归养血，以荣冲脉；赤芍活血化滞，地榆凉血涩血，续断续筋脉，牡蛎涩带下也。醋丸以收之，饮下以和之，使血气调和，则腹痛自退，而赤白带下无不自除矣。

【备考】 本方方名，《玉机微义》引作“当归煎丸”。

05243 当归膏

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】 当归（洗，切，焙） 续断（锉） 细辛（去苗叶） 木通（锉） 白芷（切） 芎藭（锉） 甘草（锉） 蜀椒（去目及闭口者） 牛膝（去苗） 附子（去皮脐，生切）各一两

【用法】 上为粗散，用猪脂半斤，先煎取油，次下诸药，煎如膏，以绢绞去滓，瓷盒盛。每用少许，抹损处，热手摩之。

【主治】 骨出臼，蹉跌不复，疼痛。

05244 当归膏

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】 神效当归膏（《校注妇人良方》卷二十四）、百花膏（《治痘全书》卷十四）。

【组成】 川当归一两 麻油（真正者）四两 淮庆生地一两 黄蜡一两

【用法】 上先将当归、地黄入油煎黑，去滓，入蜡溶化，候温搅匀，即成膏矣。用涂患处，将纸盖之。肉未坏者，用之自愈；肉已死，而用之自溃，新肉易生，亦不结痂，又免皴揭之痛。

【功用】 去腐肉，生新肉。

【主治】 发背痈疽汤火诸症，不论肉未坏或已死者。

05245 当归膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 当归 1000 克 香油 500 克（一方加生地）

【用法】 先将香油烧热后，将当归放入，烧至呈焦状，过滤，投入黄蜡适量，成油脂状即可。外

用。

【主治】 烫火伤。

05246 当归饮子

【方源】《济生》卷六。

【组成】 当归（去芦） 白芍药 川芎各一两 生地黄（洗） 白蒺藜（炒，去尖） 防风 荆芥穗各一两 何首乌 黄耆（去芦） 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 心血凝滞，内蕴风热，皮肤遍身疮疥，或肿或痒，或浓水浸淫，或发赤疹瘙瘤。

05247 当归饮子

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 当归 大黄 柴胡 人参 黄芩 甘草 芍药各一两 滑石半两

【用法】 上锉细。每服二钱至五钱，水一盏，加生姜三片，同煎七分，去滓温服。

【主治】 目泪不止。

05248 当归须散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 归尾一钱半 红花八分 桃仁七分 甘草五分 赤芍 乌药 香附 苏木各一钱 官桂六分

【用法】 水、酒各半煎，空心腹。

【主治】 ①《医学入门》：打扑，以致气凝血结，胸腹胁痛，或寒热。②《杏苑》：月经适来，被气凝聚，或产后恶露不尽，腹痛。

【加减】 如挫闪气血不顺，腰胁痛者，加青皮、木香；胁痛，加柴胡、川芎。

05249 当归二黄汤

【方源】 方出《妇人良方》卷十九，名见《济阴纲目》卷十三。

【异名】 当归二黄散（《医略六书》卷三十）。

【组成】 当归 黄耆各一两 麻黄根二两

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】 产后虚汗不止。

05250 当归干姜汤

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】 当归（切，焙） 干姜（炮） 附子（炮裂，去皮脐） 人参 甘草（炙，锉） 细辛（去苗叶） 芍药各一两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 厥疝，腹中冷痛。

05251 当归川芎散

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】 当归 川芎各半两 甘草二两 黄芩四两 薄荷一两 缩砂仁一分

【用法】 上为末。每服一钱，食后温水调下，渐加至二钱，一日三次。

【功用】 保护胎气，调和营卫。

【主治】 风壅头目，昏眩痛闷，筋脉拘倦，肢体麻痹。

05252 当归川芎散

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】 当归 川芎 柴胡 白术（炒） 芍药（炒）各一钱 牡丹皮 茯苓各八分 蔓荆子 甘草各五分 山栀（炒） 一钱二分

【用法】 水煎服。

【主治】 手足少阳经血虚疮证，或风热耳内痒痛，生疮出水，或头目不清，寒热少食，或妇女经水不调，胸膈不利，腹胁痞痛，小便不调。

【加减】 若肝气不平，寒热往来，加柴胡、地骨皮；肝气实热，加柴胡、黄芩；肝脾气血虚热，加参、耆、熟地；脾虚饮食少思，倍加白术、茯苓；脾虚胸膈不利，加人参、黄耆；脾虚痰滞，胸膈不利，加半夏；肝气不顺，胸膈不利，加木香；肝虚小腹痞满，或时作痛，加熟地；脾血不足，小腹作痛，加肉桂；日晡发热，加熟地。

05253 当归元参饮

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 当归身9克 酒白芍6克 酒生地15克 玄参9克 牡丹皮6克 车前子9克 酒茺蔚子3克

【功用】 滋补肝肾之阴，以清余邪。

【主治】 花翳白陷、凝脂翳转变而来，白睛淡赤，干涩不适，视物不真、青睛出现凹陷者。

【方论选录】 方中当归身、酒白芍、酒生地、玄参、车前子滋补肝肾之阴；玄参且能降胃中浮游之火；生地甘寒滋阴，能使阴生而热退，牡丹皮清芬透达，能使热退而阴生，二味相须为用，其效更雄；酒茺蔚子祛瘀生新，能使低陷平起。

05254 当归木香汤

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】 京楂核 全当归 正川芎 川木通 小茴香 川楝肉 杭青皮 结猪苓 宣泽泻各 钱 南木香 黑栀仁各五分

【用法】 用净水浓煎，空心热服。

【主治】 小儿久疝不愈。

05255 当归止血汤

【方源】《古今医彻》卷二。

【组成】 当归一钱 香附一钱（便制） 生地一钱 白芍药一钱（酒炒） 牡丹皮一钱 苏子一钱 炙甘草三分 广陈皮一钱

【用法】 加焙扁柏叶一钱，水煎服。

【主治】 血症脉弦，胁痛气逆者。

05256 当归化毒汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】 升麻 当归 麻仁 枳壳 红花 生地 桃仁 槟榔

【用法】 水煎服。

【主治】 燥屎不解而腹结痛者。

05257 当归六黄汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 六黄汤（《周慎斋遗书》卷五）。

【组成】 当归 生地黄 熟地黄 黄柏 黄芩 黄连各等分 黄耆加一倍

【用法】 上为粗末。每服五钱，水二盏，煎至一盏，食前服。小儿减半。

【功用】《中医方剂学讲义》：滋阴清热，固表止汗。

【主治】 阴虚有火，盗汗发热，面赤口干，唇燥心烦，大便干结，小便黄赤，舌红脉数。

①《兰室秘藏》：盗汗。②《麻科活人》：自汗，盗汗。③《兰台轨范》：阴虚有火，盗汗发热；或血虚不足，虚火内动，盗汗不止。

【宜忌】《中医方剂学讲义》：气虚挟寒者慎用。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手足少阴药也。盗汗由于阴虚，当归、二地所以滋阴；汗由火扰，黄芩、柏、连所以泻火；汗由腠理不固，倍用黄耆，所以固表。②《金鉴》：用当归以养液，二地以滋阴，令阴液得其养也。用黄芩泻上焦火，黄连泻中焦火，黄柏泻下焦火，令三火得其平也。又于诸寒药中加黄耆，庸者不知，以为赘品，且谓阳盛者不宜，抑知其妙义正在于斯耶！盖阳争于阴，汗出营虚，则卫亦随之而虚，故倍加黄耆者，一以完已虚之表，一以固未定之阴。

【临证举例】 盗汗《新医学》（1974；8：431）：以本方治疗25例盗汗患者，发病最短者3天，最长者一年。经辨证认为本组病例是阴虚热扰，心液不能收敛所致。根据虚则补之，热者寒之的治则，以养阴清热，固表敛汗为治。基本方用当归9克，生熟地各12克，黄连3克，黄芩9克，黄柏9克，黄耆9克，麻黄根6克。结果：痊愈24例，好转1例。服药最少者1剂即效，最多者9剂汗止，平均服药3剂。

05258 当归龙荟丸

【方源】《外科发挥》卷五。

【组成】 当归（酒拌） 龙胆草（酒拌炒） 栀子仁（炒） 黄连 青皮 黄芩各一两 大黄（酒拌炒） 芦荟 青黛 柴胡各五钱 木香二钱五分 麝香五分（另研）

【用法】 上为末，炒曲糊为丸。每服二三十丸，生姜汤送下。

【主治】 瘰疬肿痛，或胁下作痛，似有积块，及下疳便痈，小便涩，大便秘，或瘀血凝滞，小腹作痛。

05259 当归龙荟丸

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】 当归三两 大黄三两 龙胆草三两 芦荟三两 黄连一两半 青黛三两 黄芩一两半 木香一两 黄柏一两半 栀子一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，竹叶汤送下。

【主治】 肝火内壅，胃气不化，胁腹疼胀，大便闭结，脉数大者。

【方论选录】 方中当归养血荣肝胆，大黄泄热通大肠，龙胆草清肝火、泻湿热，芦荟清胃火除积热，栀子清利三焦，青黛清解郁热，黄柏清下焦湿热，黄芩清上焦燥火，木香调诸气之逆，当归和诸血之滞，白蜜为丸以润其燥，竹叶汤下以清其热，使大便一通，则火热自降，而肝胆肃清，胃气自化，安有胁腹疼胀之患，洵为通闭泻热之专方。

05260 当归龙荟丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 当归 龙胆草 芦荟 甘草 甘菊花 黄芩 荆芥 生地 赤芍

【主治】 耳病左聋。

【加减】 有痰，加姜制半夏。

05261 当归龙骨丸

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】 当归 芍药 黄连 梁槐子 艾叶（炒）各半两 龙骨 黄柏各一两 茯苓半两 木香一分

【用法】 上为末，滴水为丸，如小豆大。每服三四十丸，食前温水饮送下，一日三四次。

【主治】 月事失常，经水过多；及带下淋沥，无问久新赤白诸症；并产后恶物不止，或孕妇恶露，

胎痛动不安，及大小儿痢泻。

05262 当归龙胆汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】羌活退翳散(《审视瑶函》卷二)。

【组成】防风 石膏各一钱五分 柴胡 羌活 五味子 升麻各二钱 甘草 酒黄连 黄耆各三钱 酒黄芩（炒） 酒黄柏（炒） 当归身（酒洗） 草龙胆（酒洗） 芍药各五钱

【用法】上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，入酒少许，临卧热服。

【主治】眼中白翳。

【备考】本方方名，《保婴撮要》引作“羌活退翳汤”。

05263 当归四逆汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】当归三两 桂枝三两（去皮） 芍药三两 细辛三两 甘草二两（炙） 通草二两 大枣二十五个（擘，一法十二个）

【用法】以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，一日三次。

【功用】①《成方便读》：发表温中。②《中医方剂学讲义》：温经散寒，养血通脉。

【主治】血虚受寒，手足厥寒，舌淡苔白，脉沉细或沉细欲绝者；并治寒入经络，以致腰股、腿、足疼痛或麻木。现于早期雷诺氏病及冻伤。

①《伤寒论》：伤寒厥阴病，手足厥寒，脉细欲绝者。②《伤寒论今释》引清川玄道：冻疮。③《汉方处方解说》：雷诺氏病。

【宜忌】《医方发挥》：本方只适用于血虚寒凝之四肢逆冷，其它原因之肢厥不宜使用。

【方论选录】①《金镜内台方议》：阴血内虚，则不能荣于脉，阳气外虚，则不能温于四末，故手足厥寒，脉细欲绝也。故用当归为君，以补血，以芍药为臣，辅之而养营气；以桂枝、细辛之苦，以散寒湿气为佐；以大枣、甘草之甘为使，而益其中，补其不足；以通草之淡而通行其脉道与厥也。②《古方选注》：当归四逆不用姜、附者，阴血虚微，恐重劫其阴也，且四逆虽寒，而不至于冷，亦惟有调和厥阴，温经复营而已，故用酸甘以缓中，辛甘以温表，寓治肝四法，桂枝之辛以温肝阳，细辛之辛以通肝阴，当归之辛以补肝，甘、枣之甘以缓肝，白芍之酸以泻肝，复以通草利阴阳之气，开厥阴之络。③《医宗金鉴》：此方取桂枝汤君以当归者，厥阴主肝为血室也；佐细辛味极辛，能达三阴，外温经而内温脏；通草其性极通，善开关节，内通窍而外通营；倍加大枣，即建中加饴用甘之法；减去生姜，恐辛过其而迅散也。

【临证举例】①血痹《新中医》(1979；2:45)：患者周某，女，25岁。夜睡醒来，两手发麻，似蚁走感，手指活动不利，持针不便，但握力尚存。手微冷，触觉痛觉无异变，脉沉细而稍弦紧，舌淡苔白。此寒邪凝滞，经脉受阻，血行不运，肢端络脉失养之候，治以本方加川芎、黄耆、麻黄。两剂后症状减轻，再服三剂而愈。②早期雷诺氏病《江苏中医》(1963；6:15)：此病病机属阳气虚弱不能温养四末，寒邪外袭，血脉凝滞所致。当用温阳活血，祛寒通散之法，当归四逆汤颇为适合。用本方治疗两例，1例用原方加艾叶、红花，服30余剂痊愈；1例服18剂痊愈。均经随访未见复发。③血栓闭塞性脉管炎《上海中医药杂志》(1965；8:19)：本组10例。症见下肢厥冷，剧烈疼痛，脉细涩，病程分别为2月～3年。以本方合耆附汤、四妙勇安汤治疗。结果：9例痊愈，1例好转。④冻伤《岳美中医案集》：赵某，男，30余岁。风雪交加，冻仆于地，爬行数里，偃卧于地而待毙，邻人发现后抬回，手足厥逆，卧难转侧。此冻伤，投本方，以厥回肢温为度。四剂后身起紫泡如核桃，转为冻疮。数日后即能转动，月余而愈。

05264 当归四逆汤

【方源】《医略六书》卷二十四。

【组成】附子一钱半（炮） 官桂一钱半 白芍一钱半（酒炒） 柴胡五分 当归三钱 吴茱一钱（醋炒） 楝子二钱（酒炒） 小茴三钱（醋炒） 泽泻一钱半

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】阳虚寒疝，脉紧细者。

【方论选录】阳虚于下，寒束于经，虚阳不能布敷而经气被遏，故虚疝时时发作焉。附子补火扶阳，官桂温经散寒，当归养血荣经，白芍敛阴柔筋，柴胡升清阳以除邪，吴茱降逆气以下达，泽泻泻浊阴清肾府，小茴温经气却疝疾，川楝子泻湿热以平虚疝也。

05265 当归白术汤

【方源】《三因》卷十。

【异名】当归茵陈汤(《杏苑》)。

【组成】白术 茯苓各三两 当归 黄芩 茵陈各一两 前胡 枳实（麸炒，去瓤） 甘草（炙） 杏仁（麸炒，去皮尖）各二两 半夏（汤洗七次）二两半

【用法】上锉散。每服四大钱，水二盏，加生姜

七片，煎七分，去滓，食前服。

【主治】 酒疸发黄，结饮癖在心胸间，心下纵横坚满，骨肉沉重，逆害饮食，小便赤黄，脉弦涩，此由本虚，饮食生冷，与脾胃痰结所致。

【备考】《直指》有葛根；《东医宝鉴·杂病篇》有葛根，无白术。

05266 当归立效散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】 当归 大黄各一两 乳香一钱

【用法】 上锉碎，分作三服。每服七钱，水二盏，煎至一盏半，去滓，食后、临卧温服。

【功用】 凉血定痛。

【主治】 眼睛疼痛。

05267 当归地黄丸

【方源】《产育宝庆》卷下。

【组成】 当归 熟地黄 川芎 白芍药各二两 牡丹皮 延胡索各一两 人参 黄耆各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下，一日二次。

【功用】 常服平养气血。

【主治】 妇人血气不和，月事不匀，腰腿疼痛。

【方论选录】《济阴纲目》汪箕箋：禀弱者，先天之气弱也。血生于气，气生于下，故用熟地为君，人参佐之，以生下焦之气，使阴气旺而生血也；臣以乌梅以生液，而敛血入肝。夫既生矣，敛矣，而不为流行之，则血凝而不通，故以芎、归为使。其或瘀也，以赤芍破之；其或溃也，以炒蒲黄涩之，庶乎生而不壅，止而不塞，降中有升，温之不热。细玩铢锱之多寡，便知立方之妙用。

05268 当归地黄饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 当归二三钱 熟地三五钱 山药二钱 杜仲二钱 牛膝一钱半 山茱萸一钱 炙甘草八分

【用法】 水二钟，煎八分，空腹服。

【主治】 肾虚，腰膝疼痛等证。

【加减】 如下部虚寒，加肉桂一二钱，甚者仍加附子；如多带浊，去牛膝，加金樱子二钱，或加故纸二钱；如气虚者，加人参一二钱，枸杞二三钱。

05269 当归芍药汤

【方源】《医学正传》卷七引《局方》。

【组成】 白芍药一钱 当归 白茯苓 泽泻 白术 条芩各半钱 甘草 黄连 木香 槟榔各三分

【用法】 上切细，作一服。水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】 妊娠下痢赤白，腹中疼痛。

【加减】 如白痢腹痛甚，有寒者，去芩、连，加干姜三分。

05270 当归芍药汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 柴胡二分 炙甘草 生地黄各三分 橘皮（不去白） 熟地黄各五分 黄耆一钱五分 苍术（泔浸，去皮） 当归身 白芍药 白术各二钱

【用法】 上㕮咀，如麻豆大，分作二服。水二盏半，煎至一盏，去滓，稍热空心服。

【主治】 妇人经脉漏下不止，其色鲜红，时值七月处暑之间，先因劳役，脾胃虚弱，气短气逆，自汗不止，身热闷乱，恶见饮食，沉懒困倦，四肢无力，大便肘泄，后再因心气不足，经脉再下不止，惟觉气下脱，其元气逆上全无，惟觉心腹中气下行，气短少，无力以言。

【临证举例】 崩漏 《济阳纲目》：予族一妇，因劳役下血，每来两旬不止，医者拘血热之说，用四物加芩、连，累治不愈。一日血大下，昏迷不醒，急以问予，予用此药一剂，少顷顿醒，过两小时血遂止，后常用此药，其病遂不发作。

05271 当归芍药汤

【方源】《云岐子脉诀》卷四。

【组成】 当归 白芍药 熟地黄各一两 干姜半两

【用法】 上㕮咀。每服一两，水煎，食前服。

【功用】 养血补虚。

【主治】 崩中白带。

05272 当归芍药汤

【方源】《中医耳鼻喉科学》。

【组成】 当归 白术 赤芍 茯苓 泽泻 黄芩 辛夷花 白菊花 干地龙 甘草 薄荷 川芎

【功用】 调和气血，行滞化瘀。

【主治】 慢性鼻炎，鼻甲肿实色暗，呈桑椹样，鼻塞无歇，涕多或黄稠或粘白，嗅觉迟钝，语言不畅，咳嗽多痰，耳鸣不聪，舌质红或有瘀点，脉弦细。

【加减】 头痛者，加白芷、藁本；咳嗽痰多者，加桔梗、杏仁。

05273 当归芍药散

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 当归芍药汤（《济生》卷九）、当归茯苓散（《普济方》卷三三九）。

【组成】 当归三两 芍药一斤 茯苓四两 白术四两 泽泻半斤 芎藭半斤（一作三两）

【用法】 上为散。每服方寸匕，酒和服，一日三

次。

【功用】《金匮要略方义》：养血调肝，健脾利湿。

【主治】妇人妊娠或经期，肝脾两虚，腹中拘急、绵绵作痛，头晕心悸，或下肢浮肿，小便不利，舌质淡、苔白腻者。现用于纠正胎位。

①《金匮》：妇人怀妊，腹中疠痛；妇人腹中诸疾痛。②《三因》：产后血晕，内虚气乏，崩中，久痢。③《金匮要略今释》引汤本氏：眩冒心悸，或心下悸，肉瞤筋惕。

【方论选录】①《金匮玉函经二注》：此与胞阻痛不同，因脾土为木邪所克，谷气不举，浊淫下流，以塞搏阴血而痛也。用芍药多他药数倍以泻肝木，利阴塞，以与芎、归补血止痛；又佐茯苓渗湿以降于小便也；白术益脾燥湿，茯、泽行其所积，从小便出。盖内伤六淫，皆能伤胎成痛，不但湿而已也。②《金匮要略论注》：疠痛者，绵绵而痛，不若寒疝之绞痛，血气之刺痛也。正气乃不足，使阴得乘阳，而水气胜土，脾郁不伸，郁而求伸，土气不调，则痛绵绵矣。故以归、芎养血，苓、术扶脾，泽泻泻其余之蓄水，芎劳畅其欲遂之血气。不用黄芩，疠痛因虚，则稍挟寒也。然不用热药，原非大寒，正气充则微寒自去耳。

【临证举例】①纠正胎位 《新医药通讯》(1972；5:49)：用当归芍药散纠正妊娠七个月以上胎位不正者100例，复查87例，胎位转正者78例，未转正者9例。对63例（其余尚未分娩）追踪观察结果，分娩时头位56例，足位3例，臀位2例，横位2例。说明对妊娠七个月以上胎位异常者，本方能促进胎位转为正常。但在分娩时，发现少数产妇又转为异常胎位，提示胎位还会反复变动。②经后腹痛 《新医学杂志》(1979；3:45)：郑某，女，30岁。患经后腹痛已半年，近月加剧，前来诊治。体矮小、羸弱，年幼多疾，初潮后月经不调，经期尚准，经后下腹拘急胀痛，时痛时止，时喜按，时按之反剧。舌苔薄腻，脉小弦。此肝肾不足，气滞湿阻之腹痛。治以当归芍药散合枳实芍药散加味。处方：茯苓、全当归各12克，白芍、白术、川芎各9克，枳实6克，菟丝子、丹参各18克，川断、桑寄生各15克。服五剂后，腹痛已除，精神亦振，并嘱下次月经后再服此方。隔二月后随访，经后下腹已无痛感。

【备考】本方改为丸剂，名“六气经纬丸”（见《元和纪用经》）。改为片剂，名“当归芍药片”（见《重庆市中药成方制剂标准》）。

05274 当归羊肉汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】羊肉一两（水煮烂如稀糊） 当归末（酒炒）三两 山药末二两 白术末（土炒）三两 砂仁末一两 杜仲末（盐水炒）二两 白糯米一升

【用法】同煮如食粥法，日三服，夜一服。若嫌味苦，或暑天味变，捣成饼，晒干再磨，炼蜜为丸。每服一钱，日二夜一服。

【主治】妊娠阴吹之病，子室内聒聒有声，如矢气状，或赤白带，或先有浊气臭液出流阴户，然后有声。此系足少阴、厥阴二经血虚所致。失久不治，必致漏而半产。

【方论选录】是方羊肉补形，人参补气，主治虽异，功用则同。羊肉甘温能补阴血，配当归、白术之苦温，和营健脾；山药、杜仲之苦涩固肾益精，砂仁之辛温，糯米之甘凉和中益胃。

05275 当归羊肉汤

【方源】《医方集成》引《济生》（见《医方类聚》卷二三八）。

【异名】羊肉汤(《普济方》卷三四九)。

【组成】当归（去芦，酒浸） 人参各七钱 黄耆（去芦）一两 生姜半两

【用法】上㕮咀。用羊肉一斤，煮清汁五大盏，去肉，入前药煎四盏，去滓，作六七服，早、晚三四服。

【功用】收汗，止痛。

【主治】产后劳发热，自汗，肢体痛。

【方论选录】《医方集解》：此手足太阴，厥阴药也。参、耆补气而固卫；当归养血而调荣；生姜辛温，引气药入气分而生新血；羊肉甘热，用气血之属以补虚劳，热退而汗收矣。

05276 当归导滞汤

【方源】《血证论》卷八。

【组成】大黄一钱 当归三钱 麝香少许 丹皮三钱 桃仁三钱 红花一钱 白芍三钱 乳香三钱 没药三钱 生地三钱 桂枝三钱 柴胡二钱 黄芩三钱 枳壳一钱 甘草一钱

【主治】跌打损伤，内外瘀血。

【方论选录】此方综合通窍活血、桃仁承气、小柴胡、小调经诸方之义。

05277 当归导滞散

【方源】《医学发明》卷三。

【异名】当归导气散(《张氏医通》卷十四)。

【组成】川大黄一两 川当归一分 麝香少许

【用法】上除麝香另研外，为极细末，研匀。每

服三钱，食前热酒一盏调下。

【主治】 ①《医学发明》：落马坠车，打扑损伤瘀血，大便不通，红肿青黯，疼痛昏闷，蓄血内壅欲死。②《张氏医通》：跌扑瘀血内壅，喘急便秘。

05278 当归连翘汤

【方源】《普济方》卷八十三引《卫生家宝》。

【组成】 当归三分 黄连五分 甘草三分 连翘四分 南黄柏五分

【用法】 上作一服，水二盏，煎一盏，去滓，热洗之。

【主治】 眼白睛红，隐涩难开。

05279 当归连翘饮

【方源】《回春》卷五。

【组成】 当归 生地黄 川芎 连翘 防风 荆芥 白芷 羌活 黄芩 山栀 枳壳 甘草各等分 细辛减半

【用法】 上锉一剂。水煎，食远服。

【主治】 牙齿病，开口呷风则痛甚者，胃肠中有风邪也；开口则臭不可闻者，胃肠中有积热也。

05280 当归补血汤

【方源】《内外伤辩》卷中。

【异名】 黄耆当归汤（《兰室秘藏》卷上）、补血汤（《脉因症治》卷上）、耆归汤（《周慎斋遗书》卷五）、黄耆补血汤（《产科心法》下集）。

【组成】 黄耆一两 当归（酒洗）二钱

【用法】 上㕮咀，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，空心、食前温服。

【功用】《中医方剂学讲义》：补气生血。

【主治】 劳倦内伤，气血虚弱，阳浮于外，肌肤燥热，而红目赤，烦渴引饮，脉洪大而虚，以及妇人经行、产后血虚发热头痛；或疮疡溃后久不愈合者。

①《内外伤辨》：肌热，燥热，困渴引饮，目赤而红，昼夜不息，其脉洪大而虚，重按全无。此病得之于饥困劳役。②《兰室秘藏》：热上攻头目，沿身胸背发热。③《口齿类要》：口舌生疮，血气俱虚，热渴引饮，目赤面热，脉大而虚，重按全无。④《准绳·疡医》：疮疡溃后，气血俱虚而见上证者。⑤《寿世保元》：妇人素禀怯弱，血气虚耗，产后无乳。⑥《济阴纲目》：产后血脱，烦燥引饮，昼夜不息，脉洪大而虚，重按全无者。⑦《傅青主女科》：产妇气血两脱，子方下地，即昏晕不语。

【宜忌】《医方发挥》：阴虚潮热者慎用。

【方论选录】 ①《医方考》：血实则身凉，血虚则身热。或以饥困劳役虚其阴血，则阳独治，故令肌热、目赤、面红、烦渴引饮。此证纯象伤寒家白虎汤之证，但脉大而虚，非大而长，为可辨耳。《内经》所谓脉虚血虚是也。当归味厚，为阴中之阴，故能养血，而黄耆则味甘补气者也。今黄耆多于当归数倍，而曰补血汤者，有形之血不能自生，生于无形之气故也。《内经》曰：阳生阴长，是之谓尔。②《成方便读》：如果大脱血之后，而见此等脉证，不特阴血告匮，而阳气亦欲散亡。斯时也，有形之血不能速生，无形之气所当急固。故以黄耆大补肺脾元气而能固外者为君。盖此时阳气已去里而越表，恐一时固里不及，不得不从卫外以挽留之。当归益血和营，二味合之，便能阳生阴长，使伤残之血，亦各归其经以自固耳。非区区补血滋腻之药，所可同日语也。

【临证举例】 ①血虚发燥 《正体类要》：有一患者，扑伤之后，烦燥面赤，口干作渴，脉洪大，按之如无。余曰：此血虚发燥也。遂以当归补血汤，二剂即止。②虚劳发热 《寿世保元》：一人虚劳发热，自汗。诸药不能退其热者，服当归补血汤一剂如神。

【现代研究】 当归补血汤及其单味药对鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能的影响 《新医药学杂志》（1979；3:56）：从当归补血汤及单味药黄耆、当归对巨噬细胞吞噬功能的影响的实验中可以看出：黄耆水煎剂组能明显增强巨噬细胞的吞噬功能；当归补血汤水煎剂组稍逊于黄耆水煎剂组，而当归水煎剂组与对照组比较未见到明显差异。当归补血汤水煎剂组的作用稍逊于黄耆水煎剂组，并非由于当归存在拮抗作用，因为当归水煎剂组没有抑制巨噬细胞吞噬功能现象，而可能是由于复方中黄耆的浓度较低的关系，当归补血汤水煎剂中黄耆含83%，而单味黄耆水煎剂中含100%。

05281 当归补血汤

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 熟地黄 当归各六分 川芎 牛膝 白芍药 炙草 白术 防风各五分 生地黄 天门冬各四分

【用法】 作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，稍热服。

【主治】 男子衄血、便血，妇人产后、崩漏，亡血过多，致睛珠疼痛，不能视物，羞明痠涩，眼睫无力，眉骨太阳俱各痠痛。

【加减】 恶心不进食者，加生姜。

【方论选录】 上方专补血，故以当归、熟地黄为君，川芎、牛膝、白芍药为臣，以其祛风续绝定痛

而通补血也。甘草白术，大和胃气，用以为佐。防风升发，生地黄补骨，天门冬治血热，谓血亡生风燥，故以为使。

05282 当归补血汤

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】当归 生地黄 川芎 白芍各一钱 防风五分 荆芥四分 藁本四分 黄芩一钱（酒炒） 柴胡五分 蔓荆子五分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】血虚头痛。

05283 当归补血汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】当归 芍药 生地黄 熟地黄各三钱 人参五分 白术（去芦） 茯苓（去皮） 麦门冬（去心） 山栀仁（炒） 陈皮各八分 甘草三分 辰砂（研末，临服入）二分 乌梅一个（去核） 炒米一百粒

【用法】上锉一剂。加大枣二个，水煎温服

【主治】心血少而嘈，兼治惊悸怔忡。

05284 当归补血汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】黄耆五钱 当归一两 熟地五钱

【用法】水煎服。

【主治】男子血少，面色痿黄，不能生子者。

【方论选录】方中用当归为君，用黄耆为臣，佐之熟地之滋阴，是重在补血，轻在补气，自然气以生血，而非血以助气，气血两旺，无子者易子得子，根深本固，宁至有夭殇之叹哉。

05285 当归补血汤

【方源】《金匮翼》卷三。

【组成】黄耆一两 当归二钱 生地黄五钱 生草一钱

【用法】上作一服。水煎，食前温服。

【主治】血虚发热。

05286 当归补血汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】荆芥穗 当归 生地 熟地 川芎 赤芍 黄耆 陈皮

【用法】加大枣二个，乌梅一个，水煎服。

【主治】虚损劳瘵，吐血泻血，女人产后，或崩漏，或诸血失道妄行，眼花头晕，渐至吐血不止，或干血痨。

05287 当归阿胶汤

【方源】《会约》卷十二。

【组成】当归二钱 白芍一钱半 熟地三钱 茯苓二钱 阿胶三钱（制） 麦冬一钱半 栝楼仁（去油）一钱 甘草一钱

【用法】加大枣三枚，水煎，空腹服。

【主治】一切干燥，口渴便焦，津涸血枯。

【加减】如渴甚，加花粉二钱；如大便干焦，加肉苁蓉二三钱、藏蕤七钱；或再加火麻仁、郁李仁各二钱；血燥，加桃仁捣膏调服、红花五分；如大便风秘，加秦艽三钱、防风一钱半。

05288 当归附子汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】当归二分 炒盐三分 蝎梢 升麻各五分 甘草六分 柴胡七分 黄柏少许（为引用） 附子一钱 干姜 良姜各一钱

【用法】上为粗末，每服五钱，水五盏，煎至一盏，去滓，稍热服；或为细末，酒、面糊为丸，亦可。

【主治】妇人脐下冷痛，赤白带下。

05289 当归拈痛汤

【方源】《医学启源》卷下。

【异名】拈痛汤（《兰室秘藏》卷中）、当归止痛汤（《便览》卷一）。

【组成】羌活半两 防风三钱 升麻一钱 葛根二钱 白术一钱 苍术三钱 当归身三钱 人参二钱 甘草五钱 苦参（酒浸）二钱 黄芩一钱（炒） 知母三钱（酒洗） 茵陈五钱（酒炒） 猪苓三钱 泽泻三钱

【用法】上锉，如麻豆大。每服一两，水二盏半，先以水拌湿，候少时，煎至一盏，去滓温服。待少时，美膳压之。

【主治】湿热为病，肢节烦痛，肩背沉重，胸膈不利，遍身疼，下注于胫，肿痛不可忍。

【方论选录】《经》云：湿淫于内，治以苦温。羌活苦辛，透关利节而胜湿；防风甘辛，温散经络中留湿，故以为君。水性润下，升麻、葛根苦辛平，味之薄者，阳中之阳，引而上行，以苦发之也。白术苦甘温，和中除湿；苍术体轻浮，气力雄壮，能去皮肤腠理之湿，故以为臣。血壅而不流则痛，当归身辛温以散之，使气血各有所归。人参、甘草甘温，补脾养正气，使苦药不能伤胃。仲景云：湿热相合，肢节烦痛，苦参、黄芩、知母、茵陈者，乃苦以泄之也。凡酒制药，以为因用。治湿不利小便，非其治也，猪苓甘温平，泽泻咸平，淡以渗之，又能导其留饮，故以为佐。气味相合，上下分消，其湿气得以宣通矣。

【备考】《便览》有茯苓。

05290 当归和血散

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】槐花散(《兰室秘藏》卷下)、当归和血汤(《济阳纲目》卷六十三)。

【组成】川芎四分 青皮 槐花 荆芥穗 熟地黄 白术各六分 当归身 升麻各一钱

【用法】上为细末。每服二三钱，清米饮汤调下，食前服。

【主治】肠澼下血，湿毒下血。

05291 当归泽兰丸

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】香附子（去衣，分作四处，童便四两、酒四两、醋四两、米泔四两各浸一宿）一斤 当归（去须，酒浸）二两 白芍药（炒）二两 熟地黄（酒制）二两 生地黄二两 泽兰叶 艾叶 白术各一两五钱 黄芩一两 川芎二两

【用法】上为末，醋糊为丸，如赤豆大。每服六十丸，空心白汤或酒送下。

【主治】妇人经脉不调，赤白带下，久无子者。

【方论选录】《医略六书》：血亏气滞，天癸愆期，而带脉不能收引，故赤白带下，经久不能生子焉。熟地补阴滋血，生地凉血滋阴，当归养血脉以荣经，白芍敛营阴以和血，川芎行血中之气，艾叶暖子宫之血，泽兰去宿生新，白术健脾燥湿，黄芩清肺气以肃生水之源，香附解郁结以调冲任之气。醋以丸之，汤以下之，使经脉有资，则血气调和，而天癸无不如度，带脉约束有权，何赤白带下之不除哉？自此带愈经调，天下应无不孕之妇矣。

【备考】方中香附子用量原缺，据《济阴纲目》补。

05292 当归泽兰汤

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】当归 泽兰 白芍（酒炒） 川芎 大熟地（九制）各一钱五分 延胡索（酒炒） 红花 香附 丹皮各五分 桃仁（去皮尖及双仁者，炒，研）七粒

【用法】水煎，人童便、热酒各半盏，热服。

【功用】祛瘀生新。

【主治】半产后因瘀血而腹痛拒按者。

05293 当归承气汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】当归 大黄各一两 甘草半两 芒消九钱

【用法】上锉，如麻豆大。每服二两，水一大碗，入生姜五片，大枣1枚，同煎至半碗，去滓热服。

【主治】①《保命集》：阳狂奔走，骂詈不避亲疏。②《景岳全书》：燥热里热，火郁为病，或皮肤枯燥，或咽干鼻干，或便溺结闭。

【方论选录】阳狂奔走，骂詈不避亲疏，此是阳有余阴不足。大黄、芒消去胃中实热，当归补血益阴，甘草缓中，加生姜枣，胃属土，此引至于胃中也。经所谓微者逆之，甚者从之，此之谓也。

05294 当归承气汤

【方源】《内经拾遗》卷二。

【组成】当归尾一两 大黄（酒洗） 芒消 枳实各五钱 甘草（蜜炙）三钱 厚朴五钱

【用法】水二钟，先煎枳、朴、草、归至九分，次下大黄，煎三五沸，末下芒消，随即就起，去滓服。

【主治】内有实热，致发阳厥、癫狂或溺血。

①《内经拾遗》：阳厥善怒。②《增补内经拾遗方论》：亦治男子妇人痰迷心窍，逾墙越壁，胡言乱走。③《丹溪心法》：溺血属实热者。

【方论选录】胃气为湿热所伤，必泻其上实，而元气乃得上下同流，此承气所由名也。三一承气汤外加当归，故名。

05295 当归厚朴汤

【方源】《直指》卷十三。

【组成】当归（炒） 厚朴（制）各二两 官桂三两 良姜五两

【用法】上锉散。每三钱，食前服。

【主治】肝经受寒，面色青惨，厥而泄利。

05296 当归活血丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】当归三两 赤芍一两半（酒炒） 桂心一两半 延胡一两半 秦艽一两半 丹皮一两半 乳香二两 牛膝一两半（酒炒）

【用法】为末，酒丸。白茄根三钱，煎汤送下。

【主治】产后腰脚疼痛，脉弦涩滞者。

【方论选录】产后血瘀经络，挟湿热而流布下注，故腰脚红肿，疼痛不止焉。全当归养血以营运乎经脉；赤芍药破血以运行其血滞；桂心温经暖血，秦艽活血疏经；丹皮凉血散瘀，乳香活血散血；延胡索破血滞以通经，杜牛膝降瘀血以下行也。酒糊为丸，以行其经血，茄根汤下，以疏其经气。使瘀化血行，则经络通畅而湿热自化，红肿无不退，何腰脚疼痛之不痊乎？

05297 当归活血汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】 当归八分 赤芍药三分 甘草三分 红花三分 桂心三分 干姜三分 枳壳三分 生地黄一钱 人参八分 柴胡八分 桃仁泥三分

【用法】 水二钟，加生姜一片，煎之。趁法入酒三匙调服。

【主治】 伤寒挟血，无头痛、无恶寒，止身热发渴，小便利，大便黑，语言无伦，神志昏沉，如见鬼祟。

【加减】 服三贴后，去桃仁、红花、干姜、桂，加白术、茯苓。

【备考】 方中诸药用量原缺，据《伤寒六书纂要辨疑》补。《张氏医通》有茯苓，无人参。

05298 当归活血汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 当归 芍药 抚芎 桃仁（去皮尖）各一钱 红花五分 牡丹皮 香附 乌药 枳壳（去瓤） 青皮各三分 官桂 干姜（炒黑） 甘草各三分

【用法】 上锉一剂。加生姜一片，水煎服。

【主治】 血郁证。能食，便红，或暴吐紫血，痛不移处，脉数涩者。

【加减】 血结硬痛加大黄。

05299 当归活血汤

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】 归尾 黄耆 没药 川芎 苍术 熟地 生地 赤芍 蒺藜 红花 香附 牛膝各等分

【用法】 上为末，水煎，食后温服。

【主治】 惊振内障，或后生人患云翳小小，阴看不大，阳看不小，不见三光者。

05300 当归活血汤

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】 当归 赤芍 川芎 牛膝 紫苏 生地 乌豆 蒲黄 桂心 乳香 没药

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 被物撞破外障，撞久血滞不散，无疼痛。

05301 当归活血汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 当归四钱 川芎二钱 白鲜皮二钱 银花三钱 白芍三钱 蒺藜三钱（炒） 防风二钱 大贝三钱 荆芥穗二钱（炒） 白芷三钱 青皮二钱 甘草一钱 地肤子三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 眼睑瘙痒，犹如虫行，不红不疼，痒无定时，两眼胞带黑暗色，视力稍减。

【临证举例】 贾某某，男。素日身体衰弱，头晕耳鸣，忽觉两目痒极难当，针药罔效。经余诊治：六脉短涩，惟少阴为甚，面带黑色，精神恍惚，此阴阳将脱之证。以本方加黄耆一两，党参八钱，枣仁三钱，连服四剂，痒虽愈而黑色不退。隔数日又痒，再服前方无效。后闻此人不数日而亡。书之以为后车之戒。

05302 当归活血饮

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 苍术（制） 当归身 川芎 苏薄荷 黄耆 熟地黄 防风 川羌活 甘草（减半） 白芍药各等分

【用法】 上锉剂。水二钟，煎至八分，去滓，食后服。

【主治】 肝脾血虚而气不和顺，睥轮振跳，即目睥不待人之开合，而自率拽振跳。

05303 当归活血散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】 当归和血散（《医方类聚》卷一九二引《神效良方》）、当归和血饮（《疡科选粹》卷三）。

【组成】 当归二钱 没药一钱半 乳香半钱 白芍药三钱

【用法】 上为细末。每服一钱，水一中盏，煎至七分，和滓温服，日二服。妇人酒煎。

【主治】 疮疡未发出，内痛不可忍，及妇人产前后腹痛。

【宜忌】 疮既发，不须用。

【加减】 疮疡者，加人参、木香；妇人，加赤芍药。

05304 当归活血散

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】 赤芍药 生地黄 当归须（酒洗）各一钱半 桃仁（去皮尖，炒） 红花（酒洗） 香附（童便浸）各一钱 川芎 牡丹皮 玄胡索 蓬术各八分（炮） 三棱（炮） 青皮各七分

【用法】 水二钟，煎七分，空心服。

【主治】 瘀蓄死血而胀，腹皮上见青紫筋，小水反利，脉芤涩，属虚人不可下者。

05305 当归养血丸

【方源】《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。

【异名】 当归活血丸（《女科指掌》卷五）。

【组成】 当归 牡丹皮 赤芍药 延胡索（炒）各二两 肉桂一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒、米饮送下；痛甚，细嚼咽

下。

【主治】 产后恶血不散，发歇疼痛，及恶露不快，脐腹坚胀，兼室女经候不匀，赤白带下，心腹腰脚疼痛。

05306 当归养血汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】 当归 白芍（炒） 熟地黄 茯苓（去皮）各一钱 贝母（去心） 瓜蒌（去壳） 枳实（麸炒） 陈皮 厚朴（姜汁炒） 香附 抚芎 苏子（炒）各七分 沉香五分 黄连（用吴茱萸同炒，去茱萸，用连）八分

【用法】 上锉一剂。加生姜一片，大枣一个，水煎，竹沥磨沉香调服。

【主治】 年老之人，阴血枯槁，痰火气结，升而不降，饮食不下，乃成膈噎之病。

05307 当归养荣汤

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 防风 白芷各七分半 白芍药 熟地黄 当归 川芎各一钱 羌活七分半

【用法】 上作一服。水二盏，煎至一盏，去滓。食后热服。

【主治】 睛珠痛甚不可忍；又治红赤羞明，泪多眵少。

【方论选录】 以七情五贼劳役饥饱重伤脾胃，生意已不升发，又复血虚不能养睛，故睛痛甚不可忍。以防风升发生意，白芷解利，引入胃经为君；白芍药止痛益气，通血承接上下为臣；熟地黄补肾水真阴为佐；当归、川芎，行血补血，羌活除风引入少阴经为使。血为邪胜，睛珠痛者，及亡血过多之病，俱宜服也。

05308 当归桂枝汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 当归三钱 桂枝八分 白芍一钱半（酒炒） 甘草六分 煨姜二片 大枣三枚

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 孕妇寒多热少，脉弦浮涩者。

【方论选录】 妊娠营气大虚，寒邪得以逗留经中，故寒多热少，不烦不渴焉。当归益营气之虚，白芍敛营中之血，桂枝温经散寒，炙草缓中益胃，煨姜温胃以散寒邪，大枣缓中以益脾元也。水煎温服，使营气内充，则寒邪不复留恋，而寒热之往来顿解，胎孕无不自安矣。

05309 当归桃仁汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】 当归 桃仁 红花 丹皮 山楂 泽兰叶

【主治】 血蓄上焦发狂者，如狂喜忘，漱水在口，不能下咽，寸脉见芤者。

【加减】 倘不应，再加枳壳、大黄，直达大肠。

05310 当归润燥汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 止渴润燥汤（《普济方》卷一七八引鲍氏方）、润燥汤（《东垣试效方》卷三）。

【组成】 细辛一分 生甘草 炙甘草 熟地黄各三分 柴胡七分 黄柏 知母 石膏 桃仁（泥子） 当归身 麻子仁 防风 荆芥穗各一钱 升麻一钱五分 红花少许 杏仁六个 小椒三个

【用法】 上㕮咀，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，食远热服。

【主治】 消渴。大便闭涩，干燥结硬，兼喜温饮，阴头退缩，舌燥口干，眼涩难开，及于黑处见浮云。

【宜忌】 忌辛热物。

05311 当归润燥汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】 当归 芍药 川芎 桃仁 熟地 生地 麻仁

【用法】 水煎服。

【主治】 肠胃燥，大便不通。

05312 当归润燥汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 归身二钱 白芍一钱五分 红花五分 木瓜一钱 秦艽一钱 丹参二钱 牛膝二钱 川断二钱 独活一钱 橘饼四钱 红枣十个。

【主治】 肝受燥凉，血涩不行，筋短胁痛。

05313 当归黄耆饮

【方源】《医学正传》卷七引《产宝》。

【异名】 当归黄耆散（《济阴纲目》卷十四）。

【组成】 当归 白芍 黄耆 人参各二钱 升麻半钱

【用法】 上切细，作一服。水煎温服，未收再服。

【主治】 产后阴脱。

【备考】《济阴纲目》治上症，并外用五倍子泡汤洗，又用末敷之。又《杂病源流犀烛》有甘草，无芍药。

05314 当归温疝汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】 当归 白芍 附子 肉桂 延胡索 小茴香 川楝子 泽泻 吴茱萸 白茯苓

【主治】 中寒冷疝。

05315 当归蒲延散

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】 当归八分 桂心 芍药（炒） 血竭 蒲黄（炒）各六分 延胡索（炒）四分

【用法】 上为末。每服二钱，空心酒调下。

【主治】 产后血瘕作痛，脐下胀满，或月经不行，发热体倦。

【方论选论】《医略六书》：产后冲任不调，瘀血乘虚留结而成血瘕，故小腹胀满疼痛不已焉。当归养血荣经脉，蒲黄破瘀消瘕积，白芍敛阴和血，血竭去瘀生新，桂心温经暖血以开结，延胡破血活血以消瘕。为散酒煎，使瘀血消化，则新血自生，而冲任融和，安有血瘕痛胀之患乎？

05316 当归郁李仁汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 郁李仁汤（《医级》卷七）。

【组成】 郁李仁 皂角仁各一钱 枳实七分 秦艽 麻仁 当归梢 生地黄 苍术各五分 大黄（煨） 泽泻各三分

【用法】 上锉，如麻豆大。除皂角仁别为末，水三盏，煎至一盏，去滓，入皂角仁末调，空心、食前服之。

【主治】 ①《兰室秘藏》：痔漏大便硬，努出大肠头下血，苦痛不能忍。②《医级》：结热肠燥不便。

【宜忌】 避风寒，忌房事、酒湿面、大辛热物。

【临证举例】 痔漏 《外科发挥》：一男子，素不慎酒色，患痔焮肿，肛门坠痛，兼下血，大便干燥，脉洪大，按之则涩，以当归郁李仁汤加桃仁，四剂少愈；更以四物汤加红花、条芩、槐花，数剂而愈。

05317 当归贝母苦参丸

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 苦参丸（《三因》卷十七）。

【组成】 当归 贝母 苦参各四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服三丸，加至十丸。

【主治】 ①《金匮》：妊娠小便难，饮食如故。②《金匮要略方义》：妇人妊娠，小便淋沥不爽，或溲时涩痛，尿色黄赤，心胸烦闷。亦治孕妇大便干燥，以及痔疮便秘，属大肠燥热者。

【加减】 男子加滑石。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：小便难者，膀胱热郁，气结成燥，病在下焦，不在中焦，所以饮食如故。用当归和血润燥。《本草》贝母治热淋，乃治肺金燥郁之剂，肺是肾水之母，水之燥郁，由母气不化也。贝母非治热，郁解则热散，非淡渗利水也，其结通则水行。苦参长于治热，利窍逐水，佐贝母入行膀胱以除热结也。②《金匮要略心典》：小便难而饮食如故，则病不由中焦出，而又无腹满身重等证，则更非水气不行，知其血虚热郁，而津液涩少也。《本草》当归补女子诸不足，苦参入阴利窍除伏热，贝母能疗郁结，兼清水液之源也。③《金匮要略简释》：小便难而饮食照常的用当归、贝母、苦参来治，很难理解，古今注家多望文生训，理论脱离实际。金华沈介业中医师指正"小便难"，当作"大便难"，经他祖父五十年的经验和他自己试用，效验非凡。孕妇患习惯性便闭，有时因便闭而呈轻微燥咳，用当归四份，贝母、苦参各三份，研粉，白蜜为丸，服后大便润下，且能保持一天一次的正常性，其燥咳亦止。

【临证举例】 热淋 《治验回忆录》：樊氏，青年农妇。1944年夏伤于湿热，饮食如常而小便不利，有涩痛感。某医先以湿热服五苓散去桂加滑石不应，继服八正散亦不应。迁延半月，饮食减退，肢倦无力，不能再事劳作。余切其脉象细滑，观其面色惨淡，气促不续，口干微咳，少腹胀痛，大便黄燥，小便不利而痛。此下焦湿热郁滞与上焦肺气不宣，上下失调，故尿道不通，如仅着重下焦湿热，徒利无益。因师古人上通下利之旨，用宣肺开窍诸品，佐渗利清热药为引导，当可收桴鼓之效。拟用当归贝母苦参丸（改汤）加桔梗、白蔻、鸡苏散等。果二剂而小便通利，不咳，尿黄而多，此湿热下降之征兆。更以猪苓汤加海金砂、瞿麦滋阴利水，清除积热，数剂小便清，饮食进，略为清补即安。

【备考】 本方方名，《医方类聚》引作"归母苦参丸"。

05318 当归生姜羊肉汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 小羊肉汤（《千金》卷三（注文）引《胡洽方》）、当归汤（《圣济总录》卷九十四）。

【组成】 当归三两 生姜五两 羊肉一斤

【用法】 以水八升，煮取三升，温服七合，日三服。如加生姜等者，亦加水五升，煮取三升二合服之。

【功用】《医方发挥》：温中补血，祛寒止痛。

【主治】 寒疝腹中痛及胁痛里急者；产后腹中疞痛，腹中寒疝，虚劳不足。

【加减】 若寒多者，加生姜成一斤；痛多而呕者，加橘皮二两，白术一两。

【方论选录】 ①《金匮要略论注》：寒疝至腹痛胁亦痛，是腹胁皆寒气所主，无复界限，更加里急，是内之荣血不足，致阴气不能相荣，而敛急不舒，故以当归、羊肉兼补兼温，而以生姜宣散其寒。然不用参而用羊肉，所谓"精不足者，补之以味"也。②《金匮要略心典》：此治寒多而血虚者之法，血虚则脉不荣，寒多则脉绌急，故腹胁痛而里急也。当归、生姜温血散寒，羊肉补虚益血也。③《古方选注》：寒疝为沉寒在下，由阴虚得之，阴虚则不得用辛热燥烈之药重劫其阴，故仲景另立一法，以当归、羊肉辛甘重浊、温暖下元而不伤阴，佐以生姜五两，加至一斤，随血肉有情之品引入下焦，温散沉寒。若痛多而呕，加陈皮、白术奠安中气，以御寒逆。本方三味，非但治疝气逆冲，移至产后下焦虚寒，亦称神剂。

【临证举例】 ①寒疝 《本草衍义》：一妇人产当寒月，寒气入于产门，脐下胀满，手不敢犯，此寒疝也。医将治之以抵当汤，谓其瘀血。予教之曰：非其治也，可服张仲景羊肉汤，二服而愈。②产后腹痛 《得心集医案》：冬月产后，少腹绞痛，诸医谓为儿枕之患，去瘀之药，屡投愈重，乃至手不可触，痛甚则呕，二便紧急，欲解不畅，且更牵引腰胁俱痛、势颇迫切。急延二医相商，咸议当用峻攻，庶几通则不痛。余曰：形羸气馁，何胜攻击，乃临产胎下，寒入阴中，攻触作痛，故亦拒按，与中寒腹痛无异。然表里俱虚，脉象浮大，法当托里散邪。但气短不续，表药既不可用，而腹痛拒按，补剂亦难遽投。仿仲景寒疝例，与当归生姜羊肉汤，因兼呕吐、略加陈皮、葱白，一服微汗而愈。

【备考】 本方方名，《东医宝鉴·外形篇》引作"羊肉汤"。

05319 当归保命承气汤

【方源】 《慈航集》卷上。

【组成】 当归一两 大黄五钱 元明粉三钱 生甘草一钱五分 枳实三钱（炒） 厚朴二钱（炒）

【用法】 水煎服。

【主治】 结胸之证，大便干燥，脉沉弦有力者。

【加减】 如手按胸腹，痛而坚硬恙久者，此有死血热结，加桃仁五钱，酒洗红花三钱，必下黑粪而愈。

05320 当归补血加葱白汤

【方源】 《济阴纲目》卷十四。

【组成】 当归二钱 黄耆一两 葱白十根

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 产后无乳。

【方论选录】 《医方考》：乳者，气血之所成也。故气血充盛之妇，未尝无乳，凡见无乳者，皆气体怯弱之妇也。是方也，用当归、黄耆大补其气血，此养乳汁之源也；葱白辛温，直走阳明，阳明达于乳房，故用之为使，此通乳汁之渠也。如依古方用猪悬蹄、漏芦辈亦可。

05321 当归四逆加吴茱萸生姜汤

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 四逆汤（《千金》卷二十）、吴茱萸散（《圣惠》卷四十七）、四逆茱萸汤、吴茱萸汤（《圣济总录》卷三十八）、四逆加吴茱萸生姜汤（《注解伤寒论》卷十）、四逆萸姜汤（《杏苑》卷七）。

【组成】 当归三两 芍药三两 甘草二两（炙） 通草二两 桂枝三两（去皮） 细辛三两 生姜半斤（切） 吴茱萸二升 大枣二十五枚（劈）

【用法】 以水六升，清酒六升和，煮取五升，去滓，温分五服。一方酒、水各四升。

【功用】 《伤寒方苑荟萃》：散寒涤饮，降逆温中，养血通脉。

【主治】 ①《伤寒论》：手足厥寒，脉细欲绝，内有久寒者。②《伤寒方苑荟萃》：现用于血栓闭塞性脉管炎、雷诺氏病、慢性荨麻疹、冻疮等；亦可用于慢性消化道疾病而疼痛呕吐较剧者、头痛、溃疡病、慢性风湿性关节炎、风湿性肌炎、痛经、闭经等。

【方论选录】 ①《千金方衍义》：阳邪传入厥阴而厥寒，脉沉细欲厥与直中阴寒之治截然两途。直中阴寒用姜附四逆以回阳，惟恐药之不力而变虚阳发露，陷阴之邪用当归四逆以通阳，仍须桂枝汤，但去生姜加当归助芍药以和营，细辛、通草助桂枝提出阳分，使阳邪仍以阳解。其去生姜者，恐其性暴，不待气味入阴，便从太阳开发也。在霍乱则不然，专取生姜、吴茱萸速破逆上之厥气，则阳通脉复。盖回阳用干姜、通阳用生姜，一定不易之法。②《古方选注》：厥阴四逆，证有属络虚不能贯于四末而为厥者，当用归、芍以和营血。若久有内寒者，无阳化阴，不用姜、附者，恐燥劫阴气，变出涸津亡液之证，只加吴茱萸从上达下，生姜从内发表，再以清酒和之，何患阴阳不和，四肢不温也耶？③《伤寒贯珠集》：手足厥寒，脉微欲绝者，阳之虚也，宜四逆辈。脉细欲绝者，血虚不能温于四末，并不能荣于脉中也。夫脉为血之府，而阳为阴之先，故欲续其脉，必益其血，欲益其血，必温

其经。方用当归、芍药之润以滋之；甘草、大枣之甘以养之；桂枝、细辛之温以行之；而尤藉通草之入经通脉，以续其绝而止其厥。若其人内有久寒者，必加吴茱萸、生姜之辛以散之，而尤藉清酒之滑经浚脉，以散其久伏之寒也。④《伤寒方论》：手足厥寒，脉细欲绝，是经络无所不寒，气血俱虚之至，故当归四逆允为合剂也。更察内有久寒，是一阳不足以为开泰之本，而经络之虚，乃相因以至，故以吴茱萸、细辛通逆而润燥，通草为引，复以桂枝全汤而君以当归，血由气生，寒从阳化也；并可通于杂证之血虚极寒者矣。

【临证举例】 ①血虚寒厥证 《天津医药》(1978；5:215)：吴某某，男，38岁。1970年冬季，外出检查线路，下班后自觉四肢寒冷，并有麻木疼痛，以后每逢外出，两手及面部出现青紫，尤以手指鼻尖耳廓最明显，回室内温暖后，青紫逐渐消失。诊其两手逆冷至腕，手足均呈青紫，脉沉细，舌质胖嫩，舌苔白。属阳气虚弱，不能温营四肢，寒邪外袭，致血脉凝涩，经脉不通。治拟温经通络，活血祛寒。当归、白芍各9克，桂枝、吴茱萸各6克，细辛、甘草、通草各3克，生姜三片，大枣5枚。药后病情好转，续诊两次而愈。②痛经《新医药学杂志》(1978；3:7)：万某某，女，22岁，学生。患者经来腹痛已有五年之久，曾服温经汤及调经诸药，收效甚微。自述平时身冷，恶寒，四肢瘦软无力，小腹常觉不温，月经愆期，白带多而清稀，每逢经期，小腹剧痛，痛时手足冰冷，口不渴，时吐清涎，小便量多。查其舌质淡暗，苔薄，脉沉迟细弱，证属虚寒逆经，拟用当归四逆加吴茱萸生姜汤治之。当归15克，桂枝12克，白芍(酒炒)15克，细辛6克，大枣18克，木通9克，炙草6克，官桂6克，台乌6克，艾叶(炒)6克，吴茱萸9克，生姜9克，加白酒一杯同煎。嘱在经前服本方三剂，下月经期前再服三剂。后六剂而愈。③缩阴证 《治验回忆录》：刘妇，年四旬余，邮亭圩北村人。体素虚弱，某日农作过劳，傍晚归途遇雨，衣履尽湿，归仅更衣，不甚介意。晚间又经房事，而风雨之夜，寒气砭骨，夜半时起人厕，未久，睡感寒甚，数被不温，少腹拘急绞痛，次第加剧，待至天将明时，阴户遽现紧缩，自觉向腹中牵引，冷汗阵出，手足厥冷，头晕神困，不能起立，服药鲜效。脉象微细，舌润不温，其夫且曰："内子阴户收缩，成一杯大空洞形，时流清液，令人见而生畏"。此乃阴寒证也，与当归四逆加吴茱萸生姜汤，嘱一日服完两大剂，并用艾灸气海、关元十余壮，又锡壶盛开水时熨脐下。次日即笑逐颜开，操作厨下，惟身觉略倦而已。④子宫下垂《新中医》(1983；2:33)：戴某某，女，49岁。农民，自诉近三年来劳动增强，缺乏休养和调补，身体渐差。夜睡不宁，有时醒来烦热汗出，头痛，小腹牵痛，小便频数，或夜间遗尿。休息几天即好转，如仍持续劳动则觉小便有物垂出，疼痛不安。月经二、三月一来，量少，色鲜红。每年此时恒发疟疾。其脉沉细难触，手足较常人为冷。舌质淡润无苔，面色萎黄。断为当归四逆加吴茱萸生姜汤证。处方：当归12克、木通、细辛、桂枝、吴茱萸、枳壳、白芍、炙甘草各9克，生姜18克，红枣25枚，赤豆脂30克(一半包煎，一半研末，分二次冲服)、水煎，加白酒半两，冲服。二诊：药后睡安，汗止，少腹不痛，尿不频数，下身下垂刺痛好转。手足依然冰冷。照原方续服二剂，各症均愈，惟手足仍冷。第二个月中旬来月经，又服三剂。以后每月服三剂。至年底患者来告，谓此后未复发，月经亦未再行。⑤产后胃冷如冰 《中医杂志》(1984；8:25)：青年女工傅某某，1981年夏初生难产，入产房两天两夜，胎儿未能娩出，周身大汗淋漓，神疲力竭。当时产床置于电风扇下，凉风直吹，及至胎儿娩出后，始觉凉意。因腹中饥饿，急食冷鸡汤两碗，即感胃脘痞塞不畅，胃中发冷，犹如冰块阻塞一般，且全身关节痠痛、曾服温胃散寒之方药，诸如香砂六君子汤、附子理中汤等，未获缓解，半年后来诊。其时患者面色㿠白，唇甲少华，两手欠温。自述周身关节在气候突变时发痠发痛。胃冷如冰逐渐加重，并时感胸闷恶心。诊见舌淡苔白，脉象沉细。乃胃有久寒，阴血虚亏所致。其分娩时正当血脉空虚，外受寒邪之袭，内伤鸡汤之冷，胃阳大伤，安得不病之理。处方：全当归10克，川桂枝10克，杭白芍10克，北细辛5克，炙甘草3克，小木通6克，肥大枣4枚，淡吴萸12克，鲜生姜12克。酒水各半，煎后温服。每日一剂，未及半月，胃中已无冷感，诸恙尽失。⑥乳房窜痛 《新中医》(1984；12:41)：潘某某，女，29岁，医务人员。患者近年来右侧乳房周围窜痛。呈阶段性、阵发性、伴憋胀感，用手扪之，右侧乳房外上象限内有桃核大区域皮肤温度明显低于周围，但未扪及肿块或囊状物。自贴伤湿止痛膏无效，又曾经用理气通络止痛之剂亦无效。别无所苦，月经正常。乳头属肝经，乳房属胃经，局部冷痛，总属脉络凝滞。试投当归四逆加吴茱萸生姜汤以暖肝温胃，通络止痛。处方：当归、白芍各12

克，桂枝、吴茱萸、通草各6克，细辛、甘草各3克，生姜三片，大枣三枚。水煎，连服二剂后，乳房窜痛发冷消失，随访一年，未见复发。

05322 光明丸

【方源】《寿世保元》卷六引李中山方。

【组成】生地黄 白芷 羌活 独活 甘草 薄荷 防风 荆芥 木贼 甘菊花 草决明 黄连 黄芩 黄柏 大黄 连翘 桔梗各五钱 归尾 川芎各三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三五十丸，白滚汤送下，早、晚各进一服。

【主治】眼疾暴发，新久肿痛，痛不可忍者，皆缘心家火起所致，并治障翳。

05323 光明丹

【方源】《准绳·类方》卷七。

【异名】光明散(《经验奇方》卷上)。

【组成】制炉甘石三钱 朱砂 硇砂各一钱 麝香一分 片脑三分

【用法】上药各为细末。点眼。

【主治】①《准绳·类方》：一切眼目翳膜、胬肉、烂弦、赤眼、眵矇、紧涩、羞明恶日。②《经验奇方》：时眼红肿，疼痛多眵，流泪羞明。

【备考】《济阳纲目》有轻粉五分，无冰片。

05324 光明散

【方源】《普济方》卷八十三引《卫生家宝》。

【组成】夜明砂（炒） 蚌粉（炒） 苍术（米泔浸、炒） 海螵蛸各等分 黄丹

【用法】上为细末。用羊肝作片子，安药在中，用水一盏，煮干，细嚼，用白汤送下。

【主治】雀目不见路。

【备考】方中黄丹用量原缺。

05325 光明散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】秦皮（去粗皮） 黄柏（去粗皮） 黄连（去须） 甘草（生用） 五倍子各等分

【用法】上㕮咀，每用一大匙，水一中碗，入沙糖一弹子大，同煎至八分，绵滤令净，乘热洗至冷，觉口中苦为度，药冷再暖，两次洗。

【功用】截赤眼，定疼痛。

【主治】肝经风热，目赤睛痛，隐涩难开，经久不愈。

05326 光明散

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】炉甘石（用上好的）四两 珍珠四钱

【用法】上药用竹纸包定，将新倾银紫泥罐为饼，包石珠在内为丸，外用熊胆一钱，硼砂二钱，火消三钱，研末为衣，再用紫泥罐包裹、晒干，用炭灰煅炼，以七根线香为度，炼四炷香，用童便淬之；浸黑色为妙，又炼一根半香，以好醋淬之；再炼一根半香，歇火听用。前炼过末药一钱，加熊胆一分、火消一分，为极细末。点眼。

【主治】两目翳障，烂弦风热，昏矇色眼。

05327 光明眼药

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】熊胆一钱 片脑一钱 胆矾一钱 脑砂一钱 枯矾二钱 五灵脂三分（水飞过） 老鸦翅十根（去绒，新瓦上烧灰）

【用法】上为细末，分一半用乳汁调于碗内，将碗覆入无油铁锅底，用面固济碗口锅下用炭火烧底，待碗热取药和不煎半生药细研为末，用童便为丸，如麦子大。用时以乳汁调开，点眼极效。

【主治】眼目疾。

05328 光明夜灵散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】石决明（煅复煮） 夜明砂（另研）各二钱 猪肝一两（生用，如不食猪，以白羯羊肝代之亦可）

【用法】上药和匀，以竹刀切肝作二片，以药铺一片，以一片合之，用皮纸包住，又用麻皮缠定，勿令药出，淘米泔水一大碗贮瓷罐内，不犯铁器，入肝药于中煮至小半碗。临卧连肝药并汁脂尽。

【主治】目至夜便昏，虽有灯月，亦不能视。

05329 光明洗眼方

【方源】《医方考》卷五。

【组成】古青钱十文 黄连一钱 杏仁七枚（去皮） 艾叶三片

【用法】用水一钟，煎去其半，澄清一宿，次日频频洗之。

【主治】风热眼眶红烂者。

【方论选录】铜性清肃，可以胜热明目；黄连苦燥，可以泻热坚肤；艾叶辛温，可使驱风胜湿；杏仁辛润，可使利气泽皮。

05330 吐血丹

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】真阿胶（蛤粉炒）五钱 天冬（去心）一两 川贝（去心）五钱 茯苓五钱 杏仁（去皮尖）五钱（或加生甘草五钱尤妙）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼核大。每服一丸。不拘时候。

【主治】吐血。

05331 吐血散

【方源】 方出年氏《集验良方》卷三，名见《吉人集验方》。

【组成】 藕节（为末） 炒蒲黄 血余灰各等分

【用法】 水调服。

【主治】 吐血。

05332 吐血神效方

【方源】《良方集腋》卷上。

【组成】 鲜生地一两 参三七八分（开水磨冲） 鲜白芦根一两 陈金墨二分（开水磨冲） 鲜茅柴根一两（去心） 紫苏叶三分 飞净青黛二分（冲服） 川贝母三钱（去心） 油秋水梨汁一两（冲） 生枳壳四分 青皮甘蔗汁一两（冲） 鲜藕节六钱

【用法】 将苏叶、生地、枳壳、川贝、茅柴根、芦根、藕节七味同煎浓汁，然后再取前五汁冲和服之。

【主治】 男妇吐血。

【宜忌】 忌食酸辣等物。

05333 吃力伽丸

【方源】《外台》卷十三引《广济方》。

【异名】 安息香丸（《中藏经》卷下）、苏合香丸（《苏沈良方》卷五）、乞力伽丸（《普济方》卷二三七）、苏合丸（《赤水玄珠》卷四）。

【组成】 吃力伽（即白术） 光明砂（研） 麝香（当门子） 诃梨勒皮 香附子（中白） 沉香（重者） 青木香 丁子香 安息香 白檀香 荜茇（上者） 犀角各一两 薰陆香 苏合香 龙脑香各半两

【用法】 上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。腊月合之，藏于密器中，勿令泄气。每朝用四丸，取井花水于净器中研破服。老小每碎一丸服之，另取一丸如弹丸，蜡纸裹，绯袋盛，当心带之，冷水暖水，临时斟量。

【功用】 芳香开窍，行气止痛。

①《得效》：散疫气。②《奇效良方》：顺气化痰。③《中医方剂学》：解郁开窍。

【主治】 中风、中气，猝然昏倒，不省人事，牙关紧急，或中寒气闭，心腹猝痛，甚则昏厥；或痰壅气闭，突然昏迷，以及时疫霍乱，腹痛胸痞，欲吐泻不得，其则昏闭者。

①《外台》卷十三引《广济方》：传尸骨蒸，殗殪肺痿，注忤鬼气，卒心痛，霍乱吐痢，时气鬼魅，瘴疟，赤白暴痢，瘀血月闭，痃癖疗肿，惊痫，鬼忤中人，吐乳狐魅。②《普济方》：从高坠下，拔惊悸，血气错乱，昏迷不醒。③《玉案》：厥证。④《会约》：梦与鬼交，脉息乍大乍小，乍有乍无，或绵绵不知度数，时常悲笑，其状不欲见人。

【宜忌】 忌生血肉、桃、李、雀肉、青鱼、酢等。

【方论选录】 ①《医方考》：病人初中风，喉中痰塞，水饮难通，非香窜不能开窍，故集诸香以利窍；非辛热不能通塞，故用诸辛为佐使。犀角虽凉，凉而不滞；诃黎虽涩，涩而生津。世人用此方于初中之时，每每取效。丹溪谓辛香走散真气，又谓脑、麝能引风入骨，如油入面，不可解也。医者但可用之以救急，慎毋令人多服也。②《成方便读》：此为本实先拨，故景岳有非风之名；若一辨其脱证，无论其为有邪无邪，急以人参、桂、附之品，回阳固本，治之尚且不暇，何可再以开泄之药，耗散真气乎？须待其根本渐固，正气渐回，然后再察其六淫七情，或内或外，而缓调之，则庶乎可也。此方汇集诸香以开其闭，而以犀角解其毒，白术、白蜜匡其正，朱砂辟其邪，性偏于香，似乎治邪中气闭者为宜耳。

【临证举例】 ①中风 《名医类案》：邱信，年四十三岁，患中风，肚甚疼，口眼㖞斜，苏合香丸服之就愈。后加姜汁、竹沥全愈。②血卟啉病（腹痛、胁痛）《辽宁中医杂志》（1988；1:31）：冯某，女，48岁。右胁痛如锥刺，痛处固定不移，拒按，伴全腹剧烈胀痛，昼轻夜重，间歇发作，达13年之久。兼见面色黧黑，夜寐不安，恶梦纷纭，口苦口涩，口渴但不欲多饮，纳差，舌紫暗胖嫩边有齿印，苔白而厚，脉沉涩，每次发作，剧痛难忍，疼痛持续2～3小时不等，之后即缓解，但余痛不息（其母亦患此证早亡）。近来病情加重，肝大肋下3～4cm，质硬中等；腹部膨隆，鼓之如鼓，但无青筋暴起。化验室检查：尿卟胆原试验阳性；尿液新鲜时呈深黄色，经日晒或加酸后转为红色。开始用酚噻嗪类、氯丙嗪、麦啶等药治疗，剧痛未减。急投苏合香丸一粒，令病者嚼碎，以温开水吞服。服后2分钟，疼痛大减，3分钟后，疼痛立止。其后每3天服1粒，共服用4粒，另外加服疏肝理气止痛的中药50余剂，病愈出院。追访2年未见复发。③阴缩 《辽宁中医杂志》（1988；1:31）：马某，男，46岁。小便频数，日10余次，色白而短，淋沥不尽年余，伴见精神萎靡，面色黧黑，少腹冷痛，舌淡苔白，脉沉细。前医用补肾法治疗，月余未见好转。3月25日下午3时许，突感阴部抽吸样疼痛，逐渐加重，呼痛声不绝，精神

恐慌，面色苍白，额头冷汗渗出，手足冰凉。其妻一手握住患者阴茎，一手握住阴囊，用力往外拉扯。舌淡苔白，脉沉伏不现。笔者令其妻松开手，见患者阴茎短小，仅寸许，阴囊团缩，小如鸡卵，阴茎和阴囊呈阵发性向腹中收宿，每收缩1次，病人即呼痛1次。证为"阴缩"。嘱服苏合香丸2粒，先以1粒，令病人嚼碎吞服，5分钟后，少腹转温，阴部抽搐停止，疼痛亦止，随即阴囊皮肤松弛，阴茎外挺，恢复原状。次日上午复诊，病人阴部无不适感。嘱其将剩余1粒照服，以巩固疗效。④木薯中毒 《广东医学》（1966；1:15）：刘某之子，一为7岁，一为10岁，二孩乘家长外出，共煮未去毒的木薯同食。饱食后，至黄昏时，突觉发冷、头晕、胸闷、呕吐，其家长收工回家，始发觉是木薯中毒。当天晚上即邀我们医生二人前往抢救。一因呕吐较多，中毒较浅，当时除给予盐汤探吐，使之继续吐出一些清涎外，复磨服苏合香丸二枚，即安然无事。另一病孩因食木薯较多，中毒较重，当时已肢冷，脉伏，手足微抽，面青、唇绀，鼻扇，气促，呈半昏迷状态，情况十分严重。当即注射可拉明一支急救。注射后，情况未见好转。复以针刺人中穴，反复行针数次，虽有功效，但是未脱离危险。因山区交通不便，离城市较远，购药较难。后来细辨其表现症状，属痰厥气闭的寒证，根据中医辨证施治的原则，即用温开水磨苏合香丸一枚灌服，边磨边灌。服一丸后，其气即顺，效果十分显著，迅即温回脉复，神态安和，语言亦甚清楚，再无中毒证状。为着确保病孩安全，使再服苏合香丸一枚，送韶关市人民医院治疗。在送院途中（约3～4小时）病孩精神安和无异，翌晨回家一切如常人。⑤吐血 《上海中医药杂志》（1986；7:26）：一病人，素有咳嗽宿疾、性情忧郁寡欢，一日暴怒后咳呛吐红，胸闷胁痛，治以清肺宁嗽，凉血止红，但咳不止，血不宁。因思吐红乃木郁化火、气逆动血而致。木郁不达，气火不平，血何以归经？郁甚者，仅以疏肝，力怯难畅，必投香窜，气雄易通，故投以苏合香丸一粒，辛香宣达，解郁疏气，再配以肃肺降气之品，药后竟获良效。此法古有记载或可佐证，如《世医得效方》失血门即有以"苏合香丸治因气作衄，或吐呕血"的载述；《苏沈良方》有谢执方一案，"呕血甚久，遂奄奄而绝，羸败已久，手足都冷，鼻息皆绝"，"研苏合香丸灌之，尽半两遂安"。⑥胆道蛔虫 《陕西中医》（1985；7:322）：用苏合香丸治疗胆道蛔虫病9例，获得满意疗效。每服一丸，一日2至3次，温水送下，服药间隔时间为4至5小时。服药后剧痛30至60分钟内症状消失或缓解者，一般用药不超过3丸为疗效好。显效：服药1至2丸后，症状与体征消失，两天以上不复发者6例，占66.7%；有效：服药3丸后，症状与体征基本消失，两天内有复发者2例，占22.3%；无效：服药后，症状体征稍有好转，一日内复发三次以上者。总有效率89%。⑦过敏性鼻炎 《吉林中医药》（1986；6:17）：王某某，男，45岁，工人，1985年11月26日就诊。两年前曾在某医院五官科确诊为过敏性鼻炎。每遇寒冷气候时则出现鼻塞流涕、喷嚏、头痛流泪、反复发作，近日因气候变化症状加重，经西药对症治疗，效果不显而转中医诊治。证见鼻塞声重，喷嚏流涕，头痛，舌苔薄白，脉浮紧。诊为：鼻渊（寒闭型），治宜辛温芳香开窍，药用苏合香丸，嘱其早、午、晚各服一丸，经服40丸病愈，一年后追访未见复发。

05334 吕祖奇灵膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】 巴豆肉 血余 蓖麻仁 葱白 苍耳子 穿山甲（炒）各四两 天南星 半夏 大川乌 当归 肥草 乌生地 番木鳖 金银花各二两 老生姜十六片 蜈蚣二十条 全蝎四十九个 干蟾一个 大鲫鱼一斤（去肠，切碎） 肉桂一两

【用法】 用真麻油五斤，浸七日，熬至滴水成珠，去滓，入炒铅粉，收成膏。摊贴。

【功用】 生肌收口。

【主治】 一切痈疽肿毒，诸般疼痛，臁疮顽癣，血疯外证；瘤。

05335 吕祖发背灵宝膏

【方源】《良方集腋》卷下。

【组成】 瓜蒌五枚（取子去壳） 乳香五块如枣大者

【用法】 上为细末，以白蜜一斤同熬成膏。每服三钱，温黄酒化下。

【主治】 痈疽发背。

【临证举例】 发背 桐庐一人，因母患发背百治不全，用此方得痊，以传于世。

05336 吕祖紫金夺命膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】 川黄连 全蝎 穿山甲 黄芩 川黄柏 当归 香白芷各二两 赤芍 番木鳖（切片） 生地各一两 官桂 海藻各四两

【用法】 用水煎汁去滓，用麻油二十二两，将药汁入内熬尽水气，滴水成珠，方下炒过飞净血丹十

一两，搅匀成膏，再下黄蜡七钱，又下阿魏六钱（切片），掺膏药上，令其自化，候微冷，又下乳香（去油）、没药（去油）、轻粉各六钱，麝香、血竭、朱砂、雄黄各二钱，雄鼠粪一两五钱，燕窝当底泥一两，俱乳细末，入膏搅匀，收贮摊贴。

【主治】 一切多年久不收口恶疮结毒，瘰疬，冷瘤，痞块，跌打骨断两截者。

05337 吕洞宾仙传化毒汤

【方源】《回春》卷八。

【组成】 防风 甘草节 白芷 茯苓 贝母 黄芩 连翘 白芍各一钱 天花粉 金银花各一钱二分 半夏七分 乳香 没药各五分

【用法】 上锉。好酒煎。胸前，饭前服；背上，饭后服；下部，空心服；上部，食后服。俱要出汗为度。如无汗，用木香熏脚膝腕内，被盖汗出而愈。

【主治】 痈疽、发背、乳痈、一切无名肿毒初起，已成已溃。

【备考】 本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作"仙传化毒汤"。

05338 吕洞宾仙传芦吸散

【方源】《回春》卷二。

【组成】 款冬花蕊五钱 鹅管石二钱五分 陈皮二钱五分

【用法】 上为细末，分作七帖，作七日服。每服一帖，夜仰卧将药一帖作三次入竹筒内，病者口噙竹筒，近咽喉用力一吸，将白温水一口送下。

【主治】 新久咳嗽，百药无功。

【加减】 年老人及虚者，加人参五分；冬月，加肉桂一钱五分。

【宜忌】 上忌铁器，不可多吃水；忌诸般油腻盐一七日，药服完之后，亦少用些油盐，至半月后不忌。

05339 吊肾丹

【方源】《医林绳墨大全》卷五。

【组成】 大黄 小茴香 黑牵牛（去头末） 破故纸（去皮） 牛蒡子（去壳）各等分

【用法】 上为末。每服二钱五分，空心热酒调下。至巳时行下黄痰涎水、脓血。

【主治】 双肾肿疼及坠。

【宜忌】 服后不可洗手，恐解药力；忌生冷、鸭、粉、面、白酒之物。

05340 同气散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 五谷虫（洗净，焙干）三钱 人中白三钱 黄连（去须） 薄荷叶 细辛 硼砂各一钱 青黛二钱 冰片二分

【用法】 上为细末，掺齿缝中。

【主治】 走马牙疳，牙间红肿，渐变紫黑臭秽。

05341 同春丸

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【异名】 八味茴香丸（《医学入门》卷七）、茴香丸、同春丸（《便览》卷三）。

【组成】 茯苓一两 白术一两 山楂子一两（炒） 枳实八钱 八角茴香一两（炒） 茱萸一两（炒） 橘核三两（炒） 荔枝核一两

【用法】 上为极细末，炼蜜为丸，每丸重一钱五分。每服一丸，空心细嚼，生姜汤送下。

【主治】 疝气。

05342 团鱼丸

【方源】《普济方》卷二三六引《经效良方》。

【组成】 贝母 前胡 知母 杏仁 柴胡各等分 团鱼二斤

【用法】 上药同团鱼煮，候鱼熟提起团鱼，除去鱼头不用，取肉连汁食之，却将前药焙干为末，就用团鱼裙甲及骨更煮一盏，和药为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎黄耆汤空心送下。病安，仍服《局方》黄耆益损汤补理；须用市店中自死团鱼。

【功用】 《血证论》：调肝利肺，金木交和。

【主治】 ①《普济方》引《经效良方》：骨蒸潮热，咳嗽。②《医学心悟》：久咳不止，恐成劳瘵。

【方论选录】 《血证论》：团鱼乃甲虫之长，能破肝之癥结，肉亦带酸，入肝养阴，合清利痰火，疏理凝滞之品，凡肝经血郁、气郁、火郁、痰郁，以致骨蒸咳嗽者，此丸力能治之。盖此丸以调肝者利肺，金木交和，则血气清宁，痨瘵不作。

05343 团参丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 人参 黄耆 麦冬各二两

【用法】 炼蜜为丸。每服四钱，开水送下。

【主治】 肺虚咳嗽，吐血不止，阴虚内热。

05344 团参汤

【方源】《永类钤方》卷二十一。

【组成】 罗参 白术 白茯苓 黄耆 当归 甘草各等分 生姜三片

【用法】 上㕮咀。加麦麸，水煎服。

【功用】 收敛心血。

【主治】 盗汗。

05345 团参散

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【异名】 团参饮子(《证治汇补》)。

【组成】 人参（去芦头） 款冬花 紫菀（洗去土）各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，乌梅一枚，同煎至七分，食后温服。

【主治】 ①《杨氏家藏方》：肺气不利，咳嗽上喘。②《小居集》：久嗽肺虚成痈痿。

05346 团参散

【方源】《济生》卷二。

【组成】 人参一两 黄耆一两（蜜水炙） 百合（蒸）半两 飞罗粉一两

【用法】 上为细末。每服二钱，食后用白茅根煎汤调下；茅花煎汤亦可。

【主治】 唾血咳嗽，服凉药不得者。

【备考】 本方改为丸剂，名“团参丸”（见《袖珍》）。

05347 团参饮子

【方源】《济生》卷二。

【组成】 人参 紫菀茸（洗） 阿胶（蛤粉炒） 百合（蒸） 细辛（洗去叶土） 款冬花 杏仁（去皮尖，炒） 天门冬（汤浸，去心） 半夏（汤泡七次） 经霜桑叶 五味子各一两 甘草（炙）半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五大片，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】 病因抑郁忧思喜怒、饥饱失宜，致脏气不平，咳嗽脓血，渐成肺痿，憎寒壮热，羸瘦困顿，将成劳瘵。

【加减】 因气而咳者，加木香；咳而唾血有热者，加生地黄；咳而唾血有寒者，加钟乳粉；疲极而咳嗽者，加黄耆；因咳损而唾血者，加没药、藕节；咳而呕逆、腹满、不食者，加白术，仍倍加生姜；咳而小便多者，加益智仁；咳而大便溏者，去杏仁，加钟乳粉；咳而面浮气逆者，加沉香、橘皮煎。

【备考】 方中天门冬，《杏苑》引作麦门冬。

05348 团参黄耆散

【方源】《鸡峰》卷十一。

【异名】 团参汤(《永类钤方》卷二十一)。

【组成】 人参 黄耆各等分 甘草减半

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，煎至六分，加生姜三片，大枣二个同煎，去滓温服，不拘时候。

【功用】《永类钤方》：收敛心血。

【主治】 ①《鸡峰》：肺虚热，咳嗽气急，胸中烦悸，肢体倦疼，口燥咽干，情思不乐，多唾涎沫，或有恶物，肢瘦发热，减食嗜卧。②《永类钤方》：盗汗。

05349 回元汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】 黄耆（蜜炒）一两 当归二钱半 益母草三钱 黑干姜五七分

【用法】 水煎就，冲热童便服。即用补虚生荣汤亦可。

【功用】 回元气。

【主治】 产后血晕。

05350 回令丸

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 川楝子五两（酒炒） 小茴三两（盐水炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，淡盐水送下。

【主治】 孕妇小腹疼痛，脉弦紧数。

【方论选录】 妊娠湿热内蕴，寒邪外束，故小腹疼痛，胎因不安焉。川楝子泻内蕴之湿热，小茴香温外束之寒邪，炼蜜以丸之，盐水以下之，使寒邪外散，则湿热自化而经气清和，小腹疼痛无不退，胎孕有不安者乎？

05351 回生丹

【方源】《玉钥》卷上。

【异名】 冰硼散（原书同卷）、吹喉回生丹(《喉科枕秘》)。

【组成】 大梅片六厘 麝香四厘 硼砂一钱 提牙消三分（用萝卜同煮透，再滤入清水内，露一夜，沉结成马牙者佳）

【用法】 上为细末，以洁净为妙，入瓷瓶封固。临用挑少许，吹患处。

【主治】 一切喉证。

【加减】 开关后，次日并体虚头晕者，去麝香（名品雪丹）；毒肿渐平，并用刀破后者，再去牙消（麝、消双去者，名吕雪丹），加青黛（名青雪丹）。

05352 回生酒

【方源】《古今医鉴》卷十六引周梅江方。

【组成】 扛板归不拘多少（其草四五月生，九月见霜，即败叶青，如犁头尖，藤上有小茨子，圆黑味酸，用藤叶）

【用法】 上药研烂用汁，与生酒调服，随量饮之，用滓贴患处。

【主治】 毒蛇所伤致死。

05353 回生散

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】 急性子一两 硇砂三分（二味用水二钟，煮干听用） 朱砂五钱 雄黄五钱 硼砂三钱 沉香三钱 木香五钱 丁香三钱 麝香一钱

【用法】 上为细末。每服三分，火酒送下。

【主治】 隔食隔气。

05354 回生膏

【方源】《集验良方》卷八。

【组成】 川贝母八两 猫儿眼睛草一斤 夏枯草一斤 芝麻油二十斤

【用法】 将药入油内浸，冬五日，夏三日，春、秋四日，放铜锅内用桑柴火先文后武，以药熬枯为度，去滓再将黄丹一斤八两炒紫色，水飞入油内，总以二油一丹用桃、柳、槐、杏、桑五枝手不住搅匀，以滴水成珠为度。熬此膏，最要洁净。治发背、痈疽、瘰疬、乳岩、痰核，一切疮毒，贴上，毒水即出，每日换三贴，未破者即消，已破者即收口痊愈。

【主治】 一切疮毒，疔毒，发背，痈疽，瘰疬，乳岩，痰核。

05355 回阳丹

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 羌活 全蝎 升麻根 甘松各二分 草乌头 水蛭（炒）各三分 大椒 三柰子 荜茇 枯矾各五分 柴胡 川乌各七分 炒黄盐（为必用之药，去之则不效） 破故纸 蒜各一钱 虻虫三个（去翅足，炒）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，绵裹留系在外，入丸药阴户内，一日一换。脐下觉暖为效。

【主治】 ①《兰室秘藏》：带下。②《准绳·女科》：下焦虚冷，脐腹疼痛，带下五色，月水崩漏，淋沥不绝。

05356 回阳丹

【方源】《简易方》引桃溪方（见《医方类聚》卷二十）。

【组成】 川乌（洗） 草乌各三两（洗） 地龙（洗） 灵脂（洗） 南星（洗）各一两 脑子 麝香各少许

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。初服半丸，渐加小丸至大丸，生姜汁磨化，先嚼薄荷，日午、夜卧温酒送下。瘫痪不能行，服三十丸必愈；如中风不软，只口眼喎斜，服二三丸效。

【主治】 卒暴风中气中瘫痪，手足不遂，语言謇涩，口眼喎斜，筋脉挛急，半身不举，不省人事。

05357 回阳汤

【方源】《百一》卷三。

【组成】 干姜（炮） 益智仁 大川乌（炮，去皮脐）各一两 青皮半两 附子一只七八钱重者（生用，去皮脐）

【用法】 上㕮咀。每服半两，水二大盏，加生姜十片，大枣一个，入盐少许，同煎七分，去滓，空心、食前温服，并滓再煎。

【主治】 ①《百一》：丈夫妇人无问老幼，卒暴风中气中，左瘫右痪，手足不遂，语言謇涩，口眼喎斜，筋脉挛缩，半身不举，不省人事。②《普济方》引《澹寮》：中寒脉弱，大段虚怯。

05358 回阳汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】 大附子三钱 人参二钱 白术 干姜各一钱 广木香一钱五分

【用法】 水煎，热服。

【主治】 脱阳。

05359 回阳汤

【方源】《会约》卷十一。

【组成】 当归三钱（泄泻者去之） 白术三四钱 附子（制）二三钱 干姜（炮）二三钱 熟地五钱 黄耆（蜜炙）三四钱或加倍 乌梅三个

【用法】 水煎服。加入参二钱更效。若血再不止者，加醋炒五倍子一钱半。

【主治】 阴阳将脱，便血大下。

05360 回阳散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 益智子半两 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 桂心半两 麻黄一两（去根节） 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。衣覆取汗，如入行十里未有汗，再服。

【主治】 阴毒伤寒。

05361 回阳散

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】 硫黄四分 胡椒六分

【用法】 上为细末。每服三分，烧酒调下。

【主治】 阴症，腹痛身冷。

05362 回阳膏

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 生香附一钱八分（或用吴茱萸亦可） 公丁香一钱二分 上桂心八分 倭硫黄五分 当门子四分

【用法】 上为极细末。每用二三分，安入脐中，

外以膏药封之。

【主治】 中寒阴痧。

【宜忌】 ①《重订通俗伤寒论》：惟口渴苔黄，二便俱热者，虽见肢冷脉伏，亦勿妄贴此膏。②《随息居霍乱论》：孕妇忌帖。

05363 回乳汤

【方源】《外科大成》。

【组成】 麦芽（炒）二两 归尾 赤芍 红花 牛膝各二钱。

【用法】 水煎服。外以脚布束紧两乳，以手按揉之。

【主治】 无儿吃乳，致乳汁胀痛者。

05364 回春丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】 茯苓 白术 山楂（炒） 大茴香 吴茱萸各一两 荔枝核（炒）一两 枳实八分 橘子核（炒）三两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸一钱五分重。每服一丸，空心细嚼，姜汤送下。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：舒肝顺气，温中散寒。

【主治】 疝气。

05365 回春丹

【方源】《谢利恒家用良方》。

【异名】 小儿万病回春丹（《丸散膏丹集成》）、万病回春 丹（《全国中药成药处方集》福州方）、小儿回春丹（《上海市中药成药制剂规范》）。

【组成】 川贝母一两 制白附子三钱 雄黄三钱 天竺黄一两 防风三钱 羌活三钱 天麻三钱 陈胆星二两 制僵蚕三钱 全蝎三钱（酒洗） 蛇含石八钱（煅） 朱砂三钱 冰片 麝香各一钱五分 西牛黄一钱

【用法】 上为细末，以甘草一两，钩藤二两，煎浓汤，炼蜜为丸，如花椒大，外用蜡壳封固，每匣五粒。小儿一岁一粒，二岁二粒，三四岁三粒，打碎，钩藤麦芽汤化下；乳汁及开水亦可。或研碎搽乳头令儿吮之，腹痛者，打碎一粒，贴脐中。

【主治】 小儿急惊、慢惊，发搐瘛疭，内外天钓，伤寒邪热，斑疹烦躁，痰喘气急，五痫痰厥，大便不通，小便溺血，及一切昏闷之症。

05366 回春散

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】 白矾一钱 黄丹八分 胡椒二分 焰消一分

【用法】 上为细末，醋调，推于手内，合阴处。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：温肾散寒，暖子宫。

【主治】 ①《古今医鉴》：阴冷。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：房事之后感风寒，饮食生冷，小腹疼痛，阴部收缩，四肢冰冷，呼吸无力，阴寒危症。

05367 回首散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】 回头散（《金匮翼》卷五）。

【组成】 乌药顺气散加羌活 独活 木瓜

【主治】 头项强急，筋痛，或挫枕，转项不得者。

05368 回稍散

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】 白芷 茯苓 半夏各六分 当归 川芎 甘草 肉桂 白芍各六分 枳壳 麻黄 陈皮各一钱 桔梗四分 厚朴 干姜各八分 苍术四分 姜黄五分

【主治】 坐卧伤湿，或睡时手在被外受寒，致手臂疼痛。

05369 回燕膏

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】 穿山甲 全蝎 白芷 黄连 黄柏 黄芩 当归各二两 生地 赤芍药各一两 官桂 海藻各四两 番木鳖一两

以麻油一斤四两，共熬枯黑，去滓，下飞丹十两，黄蜡七钱，白占三钱，粉心二两，收成膏药，投入水浸，加细药：

乳香 没药 阿魏 轻粉各六钱 麝香二钱 血竭四两 燕窝泥一两 雄黄 朱砂各二钱 雄鼠屎一两五钱

【用法】 上为极细末，筛过，将膏药取起溶化，离火下细药搅匀。依病大贴之，三日即消。此药又能贴诸般恶毒。

【主治】 瘰疬痰核。

05370 回声饮子

【方源】《养老奉亲》。

【组成】 皂角一挺（刮去黑皮并子） 萝卜三个（切作片）

【用法】 以水二碗，同煎至半碗以下服之。不过三服便语，吃却萝卜更妙。

【主治】 失音。

05371 回疮锭子

【方源】《外科精义》卷下。

【异名】 回疮锭（《中国医学大辞典》）。

【组成】 草乌头一两 蟾酥七钱 巴豆七分（去皮） 麝香一字

【用法】 上为细末，面糊和，搓作锭子。如有恶疮透顶不痛无血者，用针深刺到痛处有血，用此锭子纤之，上用膏贴之，疔疮四畔纤之。其疮三二日自然拔出。此药最当紧用。

【主治】 疔疮。

【备考】 本方方名《丹溪心法附余》引作"回生锭子"。

05372 回天大补膏

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】 人参六两 白术四两 白茯苓三两 当归四两 白芍四两 川芎二两 生熟地各一斤 二冬各五两 知母三两 八制香附八两 红花一两 山药二两 自制龟胶四两 清阿胶四两 鳖胶四两 玄参二两 丹皮三两 柴胡三两 人乳二碗 牛乳半斤 羊乳半斤 梨汁一碗 柿霜三两

【主治】 虚损痨瘵之血枯。血枯则月水断绝，其外症畏寒发热，肌肉消瘦，皮肤干涩，爪甲青而不润，饮食减少，大便溏泄，小便痛而数，口干，咽燥，渐成劳瘵。脉候左寸、左右尺必微而涩，右关必沉弦，左关必虚细。

【方论选录】 是方参、苓、术、草四君子汤也；归、芎、芍、生熟地四物汤也；二冬、知母、玄参补肺金以培生化之源；丹皮、龟鳖甲煎胶以制浮游之火；人乳、牛乳、羊乳燥者润之；梨汁、柿霜热者清之；银柴胡以退肌热；香附以开气郁；红花以通血滞；山药以达腰膝营卫，生津液，健脾和胃，真有回天之功。

05373 回生续命丹

【方源】《跌损妙方》。

【组成】 川乌 草乌 自然铜各二两 地龙 乌药 青皮 禹余粮（醋淬）各四钱

【用法】 上为细末。每用二钱。

【主治】 筋骨断折，疼痛不止。

05374 回阳三建汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】 附子 人参 黄耆 当归 川芎 茯苓 枸杞 陈皮 萸肉各一钱 木香 甘草 紫草 厚朴 苍术 红花 独活各五分

【用法】 加煨姜三片，皂角树根上白皮二钱，水二碗，煎八分，入酒一杯，随病上下，食前后服之。用绵帛盖暖疮上，预不得大开疮孔走泄元气为要。

【主治】 阴疽发背，初起不疼不肿，不热不红，硬若牛皮，坚如顽石，十日外脉细身凉，肢体倦怠，皮如鳖甲，色似土朱，粟顶多生孔，孔流血，根脚平散，软陷无脓，又皮不作腐，手足身凉者，俱急服之。

【方论选录】 凡背疽属阴者，皆由脏腑先坏而内毒不得发越于外也。旧有用鸡冠剪血滴于疽上者，有醋煮雄艾敷用者，猪脑热药敷围者，神灯火气灼照者。此数法皆阴疽之用，予虽常用，未见其实，但阴疽不起者，如树木之根坏，强力培植枝叶，而终无发生之理。予常据理用药，固有得其生者，十中三四。譬如先要疏其嫁土，通其地脉，助其根本，回其阳气，此四者缺一不可。用苍术、厚朴、茯苓、陈皮疏其土；川芎、当归、紫草、红花通其脉；人参、黄耆、枸杞、山萸助其本；附子、木香、甘草、独活回其阳。如此用之，但根本内有一脉未绝之气，服之俱可得其生。又验其手足温暖，疮便发热，渐作焮肿，复生疼痛，色暗得活，坚硬得腐，胃气得回，此是药之效验。必在三服中应之为吉，外兼照法，接助回阳，此通治阴疽之大法也。

05375 回阳升陷汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生黄耆八钱 干姜六钱 当归身四钱 桂枝尖三钱 甘草一钱

【主治】 心肺阳虚，大气又下陷者，其人心冷、背紧、恶寒，常觉短气。

【临证举例】 ①心肺阳虚 一童子，年十三四，心身俱感寒凉，饮食不化，常常短气，无论服何热药，皆分毫不觉热。其脉微弱而迟，右部兼沉。知其心肺阳分虚损，大气又下陷也。为制此汤，服五剂，短气已愈，身心亦不若从前之寒凉。遂减桂枝之半，又服数剂全愈。俾停药，日服生硫黄分许，以善其后。②大气下陷 一人年五十余，大怒之后，下痢月余始愈。自此胸中常觉满闷，饮食不能消化，数次延医服药，不外通利气分之品，即间有温补脾胃者，亦必杂以破气之药，愈服病愈增重。后愚诊视，其脉沉细微弱，至数甚迟。询其心中，常有觉凉之时。知其胸中大气下陷，兼上焦阳分虚损也。遂投以此汤，十剂全愈。后因怒病又反复，医者即愚方加厚朴二钱，服后少腹下坠作疼，彻夜不能寐，复求为诊治，仍投以原方而愈。③大气下陷兼寒饮结胸 赵姓媪，年近五旬，忽然昏倒不语，呼吸之气大有滞碍，几不能息，其脉微弱而迟。询其生平，身体羸弱，其畏寒凉，恒觉胸中满闷，且时常短气。即其数日资禀及现时病状以互戡

病情，其为大气下陷兼寒饮结胸无疑。然此时形势将成痰厥，住在乡村取药无及，遂急用胡椒二钱捣碎煎二三沸，澄清汤灌下。须臾胸中作响，呼吸顿形顺利。继用干姜八钱煎汤一中，此时已自然饮下，须臾气息益顺，精神亦略清爽，而仍不能言，且时作呵欠，大余呼吸之倾必发太息，知其寒饮虽开，大气之陷者犹未复也。遂投以拙拟回阳升陷汤。服数剂，呵欠与太息皆愈矣，渐能言语。

05376 回阳玉龙膏

【方源】《仙传外科集验方》。

【异名】回阳玉龙丹(《疡科选粹》卷二)、玉龙膏(《理瀹》)。

【组成】草乌三两（炒） 南星一两（煨） 军姜二两（煨） 白芷一两（不见火） 赤芍药一两（煨） 肉桂半两（不见火）

【用法】上为末，用热酒调敷。发背发于阴，又为冷药所误，又或发于阳而误于药冷，阳变为阴，满背黑烂，四周好肉上用洪宝丹，把住中间，以此药敷之。流注冷证多附骨，内硬不消，骨寒而痛，筋缩不伸，若轻用刀针，并无脓血，若只有乳汁清流，或有瘀血，宜用此药敷之。鼓椎风起于中湿，或伤寒余毒，又或起于流注之坏证，或起于风湿虚痹。未破则肌肉尚未死，急以此药，热酒调敷膝肱骨上腿处，以住骨痛，回阳气。又以冲和涂下肢冷处，引其血气，使流动而下通贯血脉。又以此方敷胫骨交处，以接所引之血脉，以散所积之阴气。内则用追风丸，倍加乳香以伸筋，如法服之，无不愈者。男子妇人久患冷痹血风，手足顽麻，或不能举动，可用绵子夹袋此药在中心，却以长布缠在痛处，用绢袋系定，此药能除骨痛附在肉上，觉皮肤如蚁缘，即其功也；如痹，可加丁皮、吴茱萸、没药、大草乌等分，然后全在追风丸，表里交攻，去病如神。风脚痛不可忍，内用追风丸，外用此方加生面，姜汁调热敷，欲得立止，可依法加乳香、没药化开，酒调为妙。久损入骨者，以致死血在所患之处，遇风寒雨湿，其病即发，宜此方热酒调敷；内则用搜损寻痛丸，表里交攻为妙。虽然血气虚弱之人，病在胸胁腰背之间者，谓之脱垢，不除变为血结劳，不论老少，年远近岁，大而遍身，小而一拳半肘，医之则一，此等乃根蒂之病，此非一剂可愈，磨以岁月，亦可安。治石痈，用此方热酒调敷，外却用洪宝箍住四周，待成脓后破。妇人乳痈，或经候不调，逆行失道；又有邪气内郁，而后结成痈肿，如初发之时，宜于此方中用南星、姜汁、酒二停调匀热敷，即可内消。欲急则又佐以草乌，此药味性烈，能破恶块，逐寒热，遇冷即消，遇热即溃。宿痰失道，痈肿无脓者，可用此药点头，病必旁出，再作为佳，不然，则元阳虚耗，此为败症，元阳虚耗败证者，急用全体玉龙敷之，拔出成脓。服药则通顺散加桔梗、半夏、当归、肉桂等药。肚痈证，初觉腰痛，且以手按之痛苦，走闪移动，则为气块。若根不动，外面微有红肿，则为内痈，急以此方拔出毒气，作成外痈，然后收功冲和，内则用通顺散加忍藤，治法如前。

【主治】发背，流注，鼓椎风，久损痛，冷痹，血风，风脚痛，石痈，妇人乳痈，痈肿无脓，肚痈。

【方论选录】此方有军姜、肉桂足以为热血生血，然既生既热而不能散，又反为害，故有草乌、南星足以破恶气，驱风毒，活死肌，除骨痛，消结块，唤阳气。又有赤芍、白芷足以散滞血，住痛苦，生肌肉。加以酒行药性，散气血，虽十分冷证，未有不愈。端如发寒灰之焰，回枯木之春。大抵病冷则肌肉阴烂，不知痛痒。其有痛者又多，附骨之痛不除，则寒根透髓，非寻常之药所能及。惟此药大能逐去阴毒，迎回阳气，住骨中痛，且止肌肉皮肤之病，从可知矣。但当斟酌用之，不可太过，则为全美。

05377 回阳生肌散

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】人参五钱 鹿茸五钱 雄黄五分 乳香一两 琥珀二钱五分 京红粉一钱

【用法】薄撒于疮面上或制药捻用。

【功用】回阳生肌，止痛收敛。

【主治】鼠疮，慢性顽固性溃疡及属于阴疮久不收口者。

【宜忌】火毒疮疖属阳症脓毒未净者及汞过敏者禁用。

05378 回阳返本汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】熟附子 干姜 甘草 人参 麦门冬 五味子 腊茶 陈皮

【用法】面戴阳者，下虚，加葱七茎、黄连少许，用澄清泥浆水一钟煎之，临服入蜜五匙，顿冷服之。取汗为效。

【主治】①《伤寒六书》：阴盛格阳，阴极发燥，微渴面赤，欲坐卧于水井中，脉来无力，或脉全无欲绝。②《会约》：阴极发燥而厥，阴盛格阳，腹痛，吐泻不渴，畏寒肢冷，脉弱。

05379 回阳固精丸

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】人参 黄耆 肉桂 巴戟 锁阳各二两 山药 故纸 小茴香各四两 菟丝八两 川芎 杜仲各一两 附子一个

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，白汤送下。

【主治】阳萎不举，心肾不交。

05380 回阳救急汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【异名】回阳急救汤(《寿世保元》卷二)、回阳返本汤(《镜京直指》)。

【组成】熟附子 干姜 人参各五分 甘草 白术各一钱 肉桂 陈皮 五味子 茯苓 半夏

【用法】水二钟，加生姜三片，煎后，临卧人麝香三厘调服。中病以手足温和即止，不得多服，多服则加别病。如止后，可用加味理中饮加减治之。

【主治】寒邪直中阴经真寒证。初病起无身热，无头疼，只恶寒，四肢冷厥，战慄腹疼，吐泻不渴，引衣自盖，蹑卧沉重；或手指甲唇青；或口吐涎沫；或至无脉；或脉来沉迟无力。

【加减】呕吐涎沫，或小腹痛，加盐炒吴萸；无脉者，加猪胆汁一匙；泄泻不止，加升麻、黄耆；呕吐不止，加姜汁。

【方论选录】①《医方集解》：此足三阴药也。寒中三阴，阴盛则阳微，故以附子、姜、桂辛热之药祛其阴寒，而以六君子温补之药助其阳气；五味合人参可以生脉；加麝香者，通其窍也。②《重订通俗伤寒论》何秀山按：少阴病下利脉微，甚则利不止，脉厥无脉，干呕心烦者，经方用白通加猪胆汁汤主之。然不及此方而面顾到。故俞氏每用之奏功。揣其方义，虽仍以四逆汤加桂温补回阳为君；而以《千金》生脉散为臣者，以参能益气生脉，麦冬能续胃络脉绝，五味能引阳归根也；佐以白术、二陈健脾和胃，上止干呕，下止泻痢；妙在使以些许麝香，斩关直入，助参、术、附、桂、麦、味等温补收敛药用，但显其助气之功，而无散气之弊矣。此为回阳固脱，益气生脉之第一良方。廉勘：此节庵老名医得心应手之方。凡治少阴中寒及夹阴伤寒，阳气津液并亏，及温热病凉泻太过，克伐之阳，而阳虚神散者多效。妙在参、术、附、桂与麝香同用。世俗皆知麝香为散气通窍之药，而不知麝食各种香药，含蕊咀华，蕴酿香精而藏子丹田之间。配合于温补回阳之中，殊有卓识。吴鞠通辄诋其谬，亦未免所见不广，信口雌黄者矣。以余所验，服此方后，脉渐渐缓出者生，不出者死，暴出者亦死，手足不温者亦死。若舌卷囊缩，额汗如珠不流，两目直视者速死。

【备考】方中肉桂、陈皮、五味子、茯苓、半夏用量原缺。《寿世保元》本方用大附子（制）八分，干姜八分，人参二钱，肉桂五分，半夏二钱，五味子四分，白茯苓三钱，甘草（炙）八分，陈皮钱半。方中白术，《寿世保元》作白米（炒）一撮。

05381 回乳四物汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎 当归 白芍 熟地各二钱 麦芽二两（炒，为粗末）

【用法】水二钟，煎八分，食远服。用脚布束紧两乳，以手按揉其肿，自然消散，甚者再用一服。

【主治】产妇无儿吃乳，致乳汁肿胀，坚硬疼痛难忍。

05382 回阳生肌药捻

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】人参五钱 鹿茸五钱 雄精五分 乳香一钱 琥珀二钱五分 京红粉一钱二分五厘

【功用】回阳生肌，补血定痛。

【主治】阴症窦道、瘘管、脓疡久不收口者。

【宜忌】对汞剂过敏者禁用。

05383 回疮金银花汤

【方源】《保命集》卷下。

【异名】回疮金银花散(《活法机要》、金银花汤《脉因证治》卷下、回毒银花散(《外科正宗》卷二)、回疮银花汤(《观聚方要补》卷八)。

【组成】金银花（连衣）二两 黄耆四两 甘草一两

【用法】上锉细，酒一升，入瓶内，闭口，重汤内煮三二时辰，取出去滓温服。

【主治】疮疡痛，色变紫黑者。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“回毒金银花汤”。

05384 回生保命玉咽丹

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】真犀黄一钱 飞青黛（以青鱼胆汁减半拌透）五钱 硼砂一钱 儿茶一钱 梅片五分 天竺黄一钱五分 珠粉（豆腐内煮过）一钱 制甘石一钱（制炉甘石法，每以甘石煅过五钱，用川黄连、黄柏、黄芩各一钱，煎浓汁同甘石再制，将汁尽收入甘石内为度） 煅中白四钱

【用法】上为细末。吹之。

【主治】咽喉各证，兼口疳、口内腐烂，并口中无端大痛出血。

【加减】 若治咽喉，需去甘石，加生蒲黄一钱；如喉中已烂，用珠粉；倘不腐，加薄荷一钱。

05385 曲术丸

【方源】《本事》卷二。

【异名】 椒曲丸(《普济方》卷二十三引《医方集成》)。

【组成】 神曲十两（微炒） 白术五两 干姜（炮） 官桂（去粗皮，不见火）各三两 吴茱萸（汤浸七次，焙） 川椒（去目并合口，微炒地上出汗）各二两

【用法】 上为细末，薄糊丸，如梧桐子大。每服二五十丸，生姜汤下，食前稍空腹。

【主治】 ①《本事》：脾元久虚，不进饮食，停饮胁痛。②《普济方》引《医方集成》：腹胀满，脏腑虚滑，止而复作，痼冷积伤久不愈。

【加减】 有饮，加半夏曲二两。

05386 曲术丸

【方源】《三因》卷十一。

【组成】 神曲（炒）三两 苍术（泔浸三宿，洗净晒干，炒）一两半 陈皮一两

【用法】 上为末，生姜汁别煮神曲末糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，姜汤送下，不拘时候。

【主治】 中脘有宿食留饮，酸蜇心痛，口吐清水，嗳宿腐气。

05387 曲术丸

【方源】《局方》卷六（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 神曲（炒） 苍术（米泔浸一宿，焙干）各等分（为末）

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，不拘时候。

【功能】 壮脾温胃，进美饮食。

【主治】 时暑暴泻，饮食所伤，胸膈痞闷。

05388 曲术散

【方源】《三因》卷七。

【组成】 神曲二两（炒） 白术三两

【用法】 上为末。每服二钱，生姜煎汤调下，或以酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，汤饮任下。

【主治】 冒湿头眩晕，经久不愈，呕吐涎沫，饮食无味。

05389 曲直汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 萸肉一两（去净核） 知母六钱 生明乳香三钱 生明没药三钱 当归三钱 丹参三钱

【主治】 肝虚腿疼，左部脉微弱者。

【加减】 服药数剂后，左脉仍不起者，可加续断三钱，或更加生黄耆三钱，以助气分亦可；觉凉者，可减知母。

【临证举例】 ①腿疼 一人，年三十许，当大怒之后，渐觉腿疼，日甚一日，两月后，卧床不能转侧。医者因其得之恼怒之余，皆用舒肝理气之药，病转加剧。后愚诊视，其左脉甚微弱，自言凡疼甚之处皆热。为制此汤，以萸肉补肝，以知母泻热，更以当归、乳香诸流通血气之药佐之，连服十剂，热愈疼止，步履如常。②臂热 安东友人刘某，年五十许，其左臂常觉发热，且有酸软之意。医者屡次投以凉剂，发热如故，转觉脾胃消化力减少。后愚诊之，右脉和平如常，左脉微弱，较差于右脉一倍。询其心中，不觉凉热。遂治以曲直汤，加生黄耆八钱，佐萸肉以壮旺肝气，赤芍药三钱，佐当归、丹参诸药以流通经络，服二剂，左脉即见起，又服十剂全愈。

05390 曲麦二陈汤

【方源】《金鉴》卷五十三。

【组成】 陈皮 半夏（姜制） 茯苓 甘草（生） 黄连（姜制） 山楂 麦芽（炒） 神曲（炒） 栝楼仁 枳实（麸炒）

【用法】 生姜、红枣为引，水煎服。

【主治】 食积咳嗽、便溏。

05391 曲芽枳术丸

【方源】《内外伤辨》卷下。

【组成】 枳实（麸炒，去瓤） 大麦芽（面炒） 神曲（炒）各一两 白术二两

【用法】 上为细末，荷叶烧饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食远，温水送下。

【主治】 ①《内外伤辨》：为人所勉劝强食之，致心腹满闷不快。②《济阳纲目》：食积泻。

05392 曲麦山楂地骨知母汤

【方源】《温热经解》。

【组成】 神曲二钱 山楂二钱 麦芽二钱 知母三钱 地骨皮三钱

【功用】 消食降火。

【主治】 外邪已解，五更咳嗽，胃中有积食。

05393 虫心痛汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】 黄耆一钱 白术一钱 半夏一钱 芜荑一钱 苍术一钱 乌梅三钱 槟榔一钱 丹皮一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 虫心痛。

05394 肉果饮

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】厚朴（姜制）二两　肉豆蔻一枚（面裹煨）

【用法】上㕮咀。每服五钱，加生姜三片，水煎服。

【主治】妊娠脏气本虚，脾胃衰弱，脏腑虚滑，脐腹疼痛，日夜无度。

05395　肉桂丸

【方源】方出《本草纲目》卷三十四，名见《仙拈集》卷一。

【组成】肉桂（去粗皮）

【用法】研末，饮和丸，如绿豆大。每服五六丸，白滚水送下，未消再服。

【主治】食瓜果生冷所伤。

05396　肉桂散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】肉桂二两（去皱皮）　麻黄一两（去根节）　海桐皮一两（锉）　川乌头一两（炮裂，去皮脐）　黑豆二两（炒熟）　五加皮一两　防风一两（去芦头）　牛膝一两（去苗）　附子二两（炮裂，去皮脐）　松节一两（锉）　道人头一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】历节风，四肢疼痛，筋脉不利。

【备考】本方方名，《普济方》引作"桂心散"。

05397　肉桂散

【方源】《苏沈良方》卷十引《灵苑方》。

【异名】乌金散（《产乳备要》）、黑神散、八味黑神散（《卫生家宝产科备要》卷七）。

【组成】黑豆二两（炒熟，去皮）　肉桂　当归（酒浸）　芍药　干姜（炮）　干地黄　甘草　蒲黄（纸包，炒）各一两

【用法】上为末。每服二钱，温酒调下，一日三次。疾甚者三次，无疾二次，七日止。

【功用】《医方集解》：行血下胎。

【主治】妇人产后，寒瘀肉停，恶露不下，心胸痞满，腹部胀痛，以及血晕神昏者。

①《苏沈良方》引《灵苑方》：产后众疾，气血崩运，胀满发狂，泻痢寒热。唯吐而泻者难愈。②《经效产宝续编》：热病胎死腹中。③《局方·绍兴续添方》：妇人产后恶露不尽，胞衣不下，攻冲心胸，痞满或脐腹坚胀撮痛，及血晕神昏，眼黑口噤，产后瘀血。

【方论选录】此足太阴厥药也。前证皆因血瘀不行，熟地，归，芍之润以滋血，蒲黄，黑豆之滑以行血，桂心，干姜之热以破血；用甘草者，缓其正气；用童便者，散其瘀逆；加酒者，引入血分以助药力也。

【备考】《局方》（绍兴续添方）本方用法：上为细末，每服二钱，酒半盏，童便半盏，同煎调下；急患不拘时候，连进二服。

05398　肉桂膏

【方源】《疡科心得集》（家用膏丹丸散方）。

【组成】川乌　草乌　海藻　当归　甘草　白及　甘遂　白芷　细辛　芫花　半夏　肉桂　红花　大戟　虎骨各七钱五分　麻黄一两　五倍子一两

【用法】麻油二斤、青油一斤五两，入药煎枯，去滓；下净东丹（炒）一斤，收成膏；再下乳香（去油、研）、没药（去油、研）各一两，寸香（研）五钱，百草霜一两，搅匀、用红布摊帖。

【主治】一切寒湿痹痛，乳痰、乳癖、瘰疬。

05399　肉豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】肉豆蔻一两（去壳）　附子二两（炮裂，去皮脐）　白石脂二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每干食前，以热酒下三十丸。

【主治】妇人白带下，腹内冷痛。

05400　肉豆蔻丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】肉豆蔻一两（去皮）　桂心三分（去粗皮）　干姜三分（微炮）　诃黎勒皮三分

【用法】上为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温米饮送下。

【主治】胃气虚冷，胸膈痞闷，腹中疼痛，呕吐痰饮。

05401　肉豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【异名】肉附丸（《百一》卷六引高瑞朝方）。

【组成】肉豆蔻（去壳）五两　附子（炮裂去皮脐）五枚

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至二十丸。空心食前温米饮送下。

【主治】脾藏久冷，滑泄不止。

05402　肉豆蔻丸

【方源】《幼幼新书》卷二十七引相湾方。

【组成】肉豆蔻（面裹，煨令香熟为度，去面不用）半两　丁香一钱

【用法】上为末，水煮白面糊为丸，如芥子大。每服三五丸，浓煎藿香柿蒂汤送下便止。如大小患

吐，加丸数，亦如此汤使服之。如渴，以所煎汤作熟水饮之。

【主治】 小儿胃冷呕吐不止。

05403 肉豆蔻丸

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】 肉豆蔻 槟榔 轻粉各一分 黑牵牛一两半（取头末）

【用法】 上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服十丸至二十丸，食后，煎连翘汤送下，日三服。

【主治】 水湿胀如鼓，不食者病可下。

05404 肉豆蔻丸

【方源】《洁古家珍》卷八。

【组成】 破故纸 肉豆蔻（面裹煨）各等分

【用法】 上为末，枣肉为丸，如梧桐子大。空心米饮送下。

【主治】 肾泄久不愈，脉沉细无力者。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“肉蔻丸”。

05405 肉豆蔻丸

【方源】《小儿痘疹方论》。

【异名】 七味肉豆蔻丸。

【组成】 木香半两 缩砂仁二钱 白龙骨半两 诃子肉半两 赤石脂七钱半 枯白矾七钱半 肉豆蔻半两

【用法】 上为细末，稠面糊为丸，如黍米大。一周岁儿，每服三五十丸；三岁儿服一百丸，温米饮送下。泻甚者，煎木香散或异功散送下。泻止住服，不止多服。

【主治】 ①《小儿痘疹方论》：泻水谷，或白或淡黄，不能止者。②《普济方》：痘疮已出，泄泻发渴，水谷不化，或泻或涩，或泻淡黄色，致令疮痘难出难靥。非特痘疮一证，其余脏寒泄痢，尤宜服之。

【方论选录】 ①《小儿痘疹方论》：薛己已校注：本方治阳气虚寒，肠滑泄泻之涩剂。盖肾主大便，若因肾气不固而致前症者，宜用木香散送四神丸，如不应，急煎六君子汤送四神丸补之。豆蔻丸涩滞之功多，补益之功少也。②《医方考》：痘至七八日，灌脓起胀之时也；若大泻而虚其中，则痘必陷下而不可为矣。然有湿有泻，有滑有泻，有积有泻。湿而泻者，宜燥之，枯矾、石脂是也；滑而泻者，宜涩之，龙骨、诃子是也；积而泻者，宜消之，豆蔻、砂仁是也。乃木香者，调其滞气，和其腹中而已。

【备考】 方中木香用量原缺，据《普济方》补。

05406 肉豆蔻饮

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 肉豆蔻（炮去壳）四枚 高良姜 白芷 人参 赤茯苓（去黑皮） 槟榔（锉）各一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，薤白三寸，切，煎至一盏，去滓，空腹温服，如人行五里再服。

【主治】 反胃，饮食入口即吐。

05407 肉豆蔻散

【方源】 方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷三十六。

【组成】 肉豆蔻五钱（去壳） 胡椒 荜茇各一两 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】 上为细散。每服一钱，水一中盏，煎五分，加羊乳半合，不拘时候温服。

【主治】 反胃，呕哕吐食。

05408 肉豆蔻散

【方源】《局方》卷六（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 苍术（米泔浸一宿，去皮，焙）八两 茴香（炒） 肉桂（去粗皮） 川乌（炮，去皮脐） 诃子皮各二两 干姜（炮） 厚朴（去粗皮，姜炒） 陈皮（去白） 肉豆蔻（面裹煨） 甘草（火炙）各四两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜二片，枣子一个，煎七分，温服。

【主治】 脾胃气虚，腹胁胀满，水谷不消，脏腑滑泻，腹内虚鸣，困倦少力，口苦舌干，不思饮食，日渐瘦弱。

【备考】 本方改为丸剂，名“肉豆蔻丸”见《景岳全书》。

05409 肉苁蓉丸

【方源】《医心方》卷二十八（《范汪方》。

【组成】 肉苁蓉 菟丝子 蛇床子 五味子 远志 续断 杜仲各四分

【用法】 上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。平旦服五丸，一日二次。

【功用】 补精，益气力，令人好颜色。

【主治】 男子五劳七伤，阳痿不起，积有十年痒湿，小便淋沥，溺时赤时黄。

【加减】 阴弱，加蛇床子；不怒，加远志；少精，加五味子；欲令洪大，加苁蓉；腰痛，加杜仲；欲长，加续断；所加者倍之。

05410 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 肉苁蓉三两（酒浸一宿，刮去皱皮炙

下） 赤石脂三分 石韦三分（拭去毛） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 远志三分（去心） 石菖蒲三分 薯蓣二两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 山茱萸一两 白马茎一两（炙黄） 石斛一两（去根，锉） 柏子仁三分 续断一两 牛膝一两（去苗） 蛇床子三分 石南一两 细辛三分 防风三分（去芦头） 菟丝子一两半（酒浸三宿，别捣为末） 熟干地黄一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹及晚食前以温酒送下。

【主治】 五劳六极七伤，阴萎内虚，口干汗出，失精，阴下湿痒，小便赤黄，阴中疼痛，卵偏大，小腹里急，腰脊俯仰苦难，胫骨痠疼，目视眩眩，腹胁胀满，膀胱久冷，致生百疾。

05411 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮炙令干） 熟干地黄二两钟 钟乳粉一两 五味子三分 龙骨三分 山茱萸三分 车前子一两 桂心三分 人参三分（去芦头） 牛膝一两（去苗） 枸杞子三分 远志三分（去苗） 白茯苓一两 黄耆三分（锉） 杜仲一两半（去粗皮，微炙，锉） 防风三分（去芦头） 薯蓣三分 石菖蒲三分 附子一两（炮裂，去皮脐） 石斛一两（去根，锉） 菟丝子二两（酒浸三日，焙干，别捣为末）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】 虚劳，肾气不足，梦交，心多忪悸，头目昏闷，四肢少力，不欲饮食。

05412 肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【异名】 苁蓉丸（《鸡峰》卷十九）。

【组成】 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 熟干地黄一两半 麦门冬二两（去心，焙） 泽泻半两 五味子半两 桂心半两 巴戟半两 地骨皮三分 当归半两 磁石一两（烧醋淬七遍，捣碎，研如粉） 黄耆一两（锉） 人参一两（去芦头） 鸡肶胵一两（微炒） 赤石脂半两 韭子半两 白龙骨半两 甘草半两（炙微赤，锉） 禹余粮三分（烧醋淬三遍，研如粉） 牡丹半两 桑螵蛸一两半（微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以清粥饮送下。

【主治】 痛肾，小便滑数，四肢羸瘦，脚膝乏力。

05413 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 石斛（去根） 磁石（火煅，醋淬二七遍） 鹿茸（酥炙） 桂（去粗皮） 巴戟天（去心） 杜仲（锉，炒尽丝） 木香 覆盆子（去萼）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，温酒送下，盐汤亦得，空心、日午、临卧各一次

【主治】 肾气虚损，羸瘦，饮食不为肌肤，骨痿无力，腰脚痠痛。

05414 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】 肉苁蓉（去皱皮，酒炙） 附子（炮裂，去脐皮） 白蒺藜（炒去角） 桑螵蛸（炒）各二两 五味子（炒） 龙骨（研）各一两 黄耆（锉，炒） 菟丝粉 石斛（去根）各一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以盐汤送下。

【主治】 痛肾，肾脏虚损，小便多，髀胫无力，日渐羸瘦。

05415 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 熟干地黄（焙） 山芋 石斛（去根） 牛膝（酒浸，切，焙） 桂（去粗皮）各半两 黄耆（锉） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 黄连（去须）三分 甘草（炙） 细辛（去苗叶）各一分 槟榔（锉）五枚

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，盐酒送下，不拘时候。

【主治】 冷淋。

05416 肉苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 石斛（去根） 白术 五味子 桂（去粗皮） 巴戟天（去心） 防风（去叉） 人参各二两 白茯苓（去黑皮） 泽泻 山茱萸各三两 熟干地黄（焙） 磁石（煅，醋淬七遍）各四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心，食前温酒送下。

【主治】 男子患耳内虚鸣，腰肾疼痛，髀膝风冷，食饮无味。

05417 肉苁蓉丸

【方源】《奇效良方》卷三十五。

【异名】 四神丸（《医统》卷七十三引《医林集

要》)、四味肉苁蓉丸(《景岳全书》卷五十九)、苁蓉丸(《证治宝鉴》卷四)。

【组成】 肉苁蓉八两 熟地黄六两 五味子四两 菟丝(捣饼) 二两

【用法】 上为细末，酒煮山药糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心用盐酒送下。

【主治】 禀赋虚弱，小便数，亦不禁。

05418 肉苁蓉汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 肉苁蓉一两(泡淡) 附子二钱 人参二钱 干姜炭二钱 当归二钱 白芍三钱(肉桂汤浸，炒)

【用法】 水八杯，煮取三杯，分三次缓缓服，胃稍开，再作服。

【主治】 噤口痢，胃关不开，由于肾关不开者。

【方论选录】 方之重用苁蓉者，以苁蓉感马精而生，精血所生之草，而有肉者也。马为火畜，精为水阴，禀少阴水火之气，而归于太阴坤土之药，其性温润平和，有从容之意，故得从容之名。补下焦阳中之阴有殊功。《本经》称其强阴益精，消癥瘕。强阴者，火气也；益精者，水气也。癥瘕乃气血积聚有形之邪，水火既济，中土气盛，积聚自消。兹有噤口痢阴阳俱损，水土两伤，而又滞下之积聚未清，苁蓉乃确当之品也。佐以附子，补阴中之阳，人参、干姜补土，当归、白芍补肝肾。芍用桂制者，恐其呆滞，且束入少阴血分也。

05419 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 肉苁蓉二两(酒浸一日，刮去皱皮，炙干) 菟丝子一两半(酒浸三宿，晒干，别捣) 钟乳粉二两 蛇床子一两 远志一两(去心) 续断一两 天雄一两(炮裂，去皮脐) 鹿茸二两(去毛，涂酥炙微黄) 石龙芮一两

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 肾脏虚损，精气衰竭，阳道萎弱。

05420 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】 肉苁蓉一两(酒浸一宿，刮去粗皮，炙令干) 黄耆一两(锉) 五加皮三分 牡蛎粉 熟干地黄一两 枸杞子一两 白茯苓一两 石斛一两(去根) 五味子半两 当归一两 白术一两 牛膝一两(去苗)

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前服。

【主治】 虚劳盗汗，四肢无力，腰脚冷疼。

05421 肉苁蓉散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】 肉苁蓉一两(酒浸一宿，刮去皱皮，炙) 石斛三分(去根，锉) 枸杞子一两 远志半两(去心) 续断三分 原蚕蛾三分(微炒) 菟丝子二两(酒浸三日，晒干，别研为末) 天雄一两(炮裂，去皮脐) 熟干地黄一两

【用法】 上为细散。每服二钱，食前用温酒调下。

【主治】 虚劳羸损，阴痿，精气乏弱。

05422 肉苁蓉粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】 肉苁蓉二两(酒浸一宿，刮去皱皮，细切) 粳米三合 鹿角胶半两(捣碎，炒令黄燥，为末) 羊肉四两(细切)

【用法】 上药，煮羊肉、苁蓉、粳米作粥，临熟，下鹿角胶末，用盐、酱、味末调和，作两顿食之。

【主治】 五劳七伤，久积虚冷，阳事都绝。

05423 肉果理中汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 人参一两半 白术三两(炒) 干姜一两半(炒) 肉果一两半(面包煨) 炙草八钱

【用法】 上为散。每服三钱，乌梅汤煎下。

【主治】 泄泻，脉虚缓者。

【方论选录】 产后脾胃阳虚，寒邪袭入，而胃气不固，失纳化蓄泄之权，故泻利不禁焉。人参扶元以补胃气；白术扶土以健脾气；干姜温中补火，力主散寒；肉果涩阳固胃，功专止泻；炙草缓中以益胃气也；乌梅汤煎，使脾能健运，则胃阳自强，而寒邪消散，中气完固，安有泻痢不禁之患乎。

05424 竹叶汤

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 竹叶防风汤(《活人书》卷十九)。

【组成】 竹叶一把 葛根三两 防风 桔梗 桂枝 人参 甘草各一两 附子一枚(炮) 大枣十五个 生姜五两

【用法】 以水一斗，煮取二升半，分三次温服。温覆使汗出。

【功用】《金匮发微》：清太阳、阳明风热，温脾脏之虚寒。

【主治】 产后中风，发热面正赤，喘而头痛。

【加减】 颈项强，用大附子一枚(破之如豆大)，煎药物去沫；呕者，加半夏半升(洗)

【方论选录】①《金匮要略心典》：此产后表有邪而里适虚之证，若攻其表，则气浮易脱；若补其里，则表多不服。竹叶汤用竹叶、葛根、桂枝、防风、桔梗解外之风热，人参、附子固里之脱，甘草、姜、枣以调阴阳之气而使其平，乃表里兼济之法。②《金鉴》：产后汗多，表虚而中风邪病痉者，主之竹叶汤，发散太阳、阳明两经风邪。用竹叶为君者，以发热、面正赤，有热也；用人参为臣者，以产后而喘，不足也；颈项强急，风邪之甚，故佐附子。③《金匮发微》：竹叶、葛根以清胃热，防风、桔梗以散风而定喘，余则仍从阳旦汤意，去芍药而加人参，所以去芍药加人参者，则以阴虚不任苦泄而急于营养之故。

05425　竹叶汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】竹叶（切）一升　麦门冬（去心）　小麦　生地黄（切）各一升　生姜六两　干枣十枚（擘，去核）　麻黄三两（去节）　甘草一两（炙）

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，去滓，分为三服。

【主治】气极。伤热气喘，甚则唾血，气短乏，不欲食，口燥咽干。

【宜忌】忌海藻、菘菜、芜荑。

【方论选录】《千金方衍义》：气极伤肺而致喘乏、唾血，用越婢全方以治旺气，惟恐津血愈伤，故加竹叶以清喘乏，冬、地以滋津血，小麦以除脏躁，然小麦入于越婢方中，则与厚朴麻黄汤中匡佐麻黄、石膏发越内动肝风无异。

05426　竹叶汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】竹叶三升　甘草　茯苓　人参各一两　小麦五合　生姜三两　大枣十四个　半夏三两　麦门冬五两

【用法】上㕮咀。以水九升煮竹叶、小麦，取七升，去滓，纳诸药更煎，取二升半，每服五合，日三次夜一次。

【主治】产后虚渴，少气力。

05427　竹叶汤

【方源】《千金》卷十六。

【组成】竹叶　小麦各一升　知母　石膏各三两　黄芩　麦门冬各二两　人参一两半　生姜五两　甘草　栝楼根　半夏各一两　茯苓二两

【用法】上㕮咀。以水一斗二升，煮竹叶、小麦，取八升，去滓，纳药，煮取三升，分三服，老小五服。

【主治】五心热，手足烦疼，口干唇燥，胸中热。

【方论选录】《千金方衍义》：竹叶石膏汤本治大病后虚羸烦渴。《千金》乃于方中除去粳米之益胃，易入小麦以清肝，加栝楼根以佐麦冬，茯苓以佐人参，黄芩以佐石膏，生姜以佐半夏，仍用白虎汤中知母以佐竹叶，以治胃气暴虚之烦渴，固为合剂。

05428　竹叶汤

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】竹叶（切）五升　小麦一升　麦门冬一升（去心）　知母　茯苓各三两　石膏四两（碎）　芍药　栝楼　泽泻　人参　甘草（炙）各二两

【用法】上㕮咀。以水二斗，煮竹叶、小麦，取一斗，去滓，纳药，煮取四升，分四服。

【主治】胃虚，阳气外蒸，泄津液，口干苦渴，气喘呕逆，涎沫相连。

05429　竹叶汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】竹叶一握　麦门冬（去心，焙）　白茯苓（去黑皮）　栝楼实（炒）　地骨皮　生姜各二两　甘草（炙）三两　大枣五两　小麦（淘）六合

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】膈消烦渴，津液燥少。

05430　竹叶汤

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】青竹叶（锉碎）　白茯苓（去黑皮）　地骨皮（锉）　栝楼根各一两　桂（去粗皮）　甘草（炙，锉）各半两　麦门冬（去心，焙）二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏，入小麦一撮，煎至八分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】积年消渴，好食冷物。

05431　竹叶汤

【方源】《三因》卷十七。

【异名】麦门冬汤（《明医指掌》卷九）、竹叶麦冬汤（《顾氏医径》卷四）。

【组成】防风（去叉）　黄芩　麦门冬（去心）各三两　白茯苓四两

【用法】上锉散。每服四大钱，水一盏半，加竹叶十数片煎，去滓温服。

【主治】子烦。妊娠心惊胆寒，多好烦闷。

05432　竹叶汤

【方源】《女科撮要》卷下。

【组成】白茯苓　麦门冬　黄芩各三两

【用法】 每服四钱，加竹叶五片，水煎服。

【主治】 子烦。妊娠心惊胆怯，烦闷不安。

【加减】 若因血虚烦热，宜兼用四物；若因中气虚弱，宜兼四君。

05433 竹叶汤

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 淡竹叶 黄芩 升麻 木通 车前子 黄连 玄参 芒消 栀子 大黄（炒）

【用法】 食后服。

【主治】 肝脏实热，眼赤肿痛。

05434 竹叶汤

【方源】《医方集解》。

【组成】 麦冬一钱半 茯苓 黄芩一钱 人参五分 淡竹叶十片

【功用】《医方论》：清心解烦，养正补虚。

【主治】 子烦。妊娠心惊胆怯，终日烦闷。

【方论选录】 此手太阴、少阴药也。竹叶清烦，黄芩消热，麦冬凉肺，茯苓宁心，人参补虚，妊娠心烦，固多虚也。

【备考】 方中茯苓用量原缺。

05435 竹叶汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】 人参一钱 白术 当归各二钱 川芎七分 甘草四分 陈皮三分 黄芩八分 枣仁 麦冬各一钱 远志八分 生地五分 竹叶十个

【主治】 妊娠心惊胆怯，烦闷不安。

【加减】 渴，加竹茹七分。

05436 竹叶汤

【方源】《医林纂要》卷八。

【组成】 麦门冬一钱五分 茯苓 黄连各一钱 人参五分 淡竹叶十片

【主治】 子烦。妊娠心虚而心惊胆怯，终日烦闷。

【加减】 相火重，加知母；有痰，加竹沥。

【方论选录】 麦门冬甘淡微苦，以补心泻火，且以清金保肺；茯苓宁心安神，且去胸膈积湿；黄连降泄心火，兼能泻肝胆火。妊娠之火，虚火也，火必伤肺，伤肺则气不足，人参、麦冬以补之。淡竹叶升肝胆之阳子膈上而舒散之。故能治惊怯，解心烦。

05437 竹叶粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】 苦竹叶粥（《圣济总录》卷一九〇）。

【组成】 竹叶五十片（洗净） 石膏三两 沙糖一两 折粳米二两

【用法】 以水二大盏，煎石膏等二味，取二盏，去滓澄清，用米煮粥，粥熟，入沙糖食之。

【功用】《药粥疗法》：清心火，除烦热。

【主治】 风热目赤头痛；温病口渴心烦，口舌生疮，小便黄赤；痈疽肿毒。

①《圣惠》：膈上风热，头目赤痛，目视眩眩。②《圣济总录》：发背痈疽，诸热毒肿。③《饮食疗法》引《老老恒言》：内热目赤头痛；时邪发热。④《饮食疗法》：温热病口渴多饮，心烦，目赤，口舌生疮糜烂，小便黄赤短少，或淋痛，以及小儿高热惊风，中暑。

【宜忌】《饮食疗法》：凡胃寒病人或阴虚发热者不宜选用。在发热期间，竹叶粥宜煮稀薄，不要稠厚。

05438 竹皮汤

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】 竹皮 甘草（炙）各一两 人参 赤茯苓（去黑皮） 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙） 桂（去粗皮） 五味子 木通（锉）各三分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分（拍破），煎至六分，去滓温服，一日三次，不拘时候。

【主治】 喉中如有物噎塞，声气不出。

05439 竹皮汤

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】 青竹皮 甘草（炙） 芎藭 黄芩 当归（洗）各六分 芍药 白术 人参 桂心各一两

【用法】 上为散。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 血证，由怒气伤肝胆，血随呕出，胸中痞闷，呕毕则目睛痛而气急。

05440 竹沥汤

【方源】《证类本草》卷十三引《梅师方》。

【组成】 茯苓三两 竹沥一升

【用法】 用水四升，合竹沥煎取二升，分三服，不愈重作，亦时时服竹沥。

【主治】 子烦，妊娠恒苦烦闷。

05441 竹沥汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】 麻黄 防风各一两半 芎藭 防己 附子 人参 芍药 黄芩 甘草 桂心各一两 生姜四两 石膏六两 杏仁四十枚 竹沥一升 羚羊角二两，生葛汁五合

【用法】 上㕮咀。以水七升煮减半，加沥煮取二升五合，分三服取汗，间五日更服一剂，频与三

剂。

【主治】 风痱。四肢不收，心神恍惚，不知人，不能言。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、冷水、海藻、菘菜、生葱。

【方论选录】《医略六书》：人参补气以生阴血，附子扶阳以振生气，黄芩、石膏清热于内，防风、麻黄疏风于外，防己泻血分湿热，杏仁降胸中逆气，芎藭活血脉，芍药敛营阴，羚羊清肝火，甘草缓中州，桂心温血于营，姜汁行气于卫，竹沥、葛汁解燥热以滋液豁痰，俾痰化液充，则筋脉得养，何患瘫风之不愈哉。

【备考】 服讫，渐觉少损，仍进后方。本方方名，《张氏医通》引作"竹沥饮子"。

05442 竹沥汤

【方源】《妇人良方》卷三引《必效方》。

【异名】 小竹沥汤(《三因》卷二)。

【组成】 秦艽 防风 独活 附子各一分

【用法】 上㕮咀。以水四盏，煎至二盏，加生地黄汁、淡竹沥各半盏，再煎四五沸，去滓，分作四服，不拘时候，温服。病势去，以他药扶持，未愈再作。

【主治】 中风涎潮，谵语昏塞，四肢缓纵。

05443 竹沥汤

【方源】《本事》卷一。

【组成】 威灵仙（去苗，洗） 附子（炮裂，去皮脐） 桔梗（炒） 防风（去叉股） 蔓荆子（拣） 枳壳（去瓤，细切，麸炒黄） 川芎（洗） 当归（洗，去芦，薄切，焙）各等分

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏，竹沥半盏，加生姜三片，同煎至八分，去滓温服，一日三四次。

【主治】 中风入脾肝，经年四肢不遂，舌强语蹇。

【宜忌】 忌茗。

【方论选录】《本事方释义》：威灵仙气味苦平微辛咸，去风利水，通十二经脉；附子气味辛咸大热，入手足少阴；桔梗气味苦辛平，入手太阴及足少阴，能利咽喉；防风气味苦辛甘温，入手足太阳；蔓荆子气味苦微温，入足太阳，上行而散；枳壳气味苦寒，入足太阴；川芎气味辛温，入足少阳、厥阴，能行头目；当归气味苦辛甘温，入心脾。此治风邪入肝脾，久不能愈者，诸药之升降搜逐，藉竹沥之甘寒滑润，兼能利窍，生姜之辛温达表，邪不能容留经络，其疾自当去矣。

05444 竹沥汤

【方源】《医略六书》卷二十四。

【组成】 竹沥一升 麻黄八分 附子一钱半（炒） 防己三钱 干姜一钱半（炒） 白术一钱半（炒） 葛根一钱半 甘草五分 防风一钱半 桂心一钱半

【用法】 水九升，合竹沥煮三升，分三次温服。

【主治】 脚气痹弱，脉浮细数者。

【方论选录】 阳虚津气不足，风寒湿得以袭入经中，故足胫痹弱，脚气疼痛，不能行焉，然邪盛则实，既用附子补火扶阳以御寒，即用麻黄发表逐邪以开痹，桂心温经暖血，葛根解肌生津，防风疏腠理以散风，干姜暖中和气以逐温，甘草缓中和药，白术燥湿健脾，防己走血分热泻湿气以防温药，竹沥滋津液养筋脉以起痹弱也。水煎温服，使外邪解散，则经气清和而津液内充，痹弱可健，何脚气疼软之不痊哉。此温散生津之剂，为阳虚邪袭脚气疼软之专方。

05445 竹沥饮

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【异名】 竹沥汤(《医部全录》卷四二一)、竹沥水(《全国中药成药处方集》天津方)。

【组成】 竹沥三升

【用法】 上药先温暖，分作五六服。发口灌之。

【功用】《全国中药成药处方集》（天津方）：清肺热，化痰。

【主治】 中风不语，颈项强直，身体拘急，痰热咳嗽，瘟疫烦躁，小儿惊痫。

①《圣济总录》：伤折不能慎避，令人中风，发痉口噤，若已觉中风颈项强直，身中拘急者。②《卫生总微》：小儿惊热如火，温壮。③《松峰说疫》：瘟疫烦躁。④《全国中药成药处方集》（天津方）：痰热咳嗽，湿热头眩。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（天津方）：虚寒性咳嗽忌服。

05446 竹沥饮

【方源】《医统》卷八十五。

【异名】 防己汤。

【组成】 防己 防风 桑寄生 人参 当归 川芎 独活 竹沥 茯苓 甘草

【用法】 水煎服。

【主治】 妊娠子痫。

05447 竹沥粥

【方源】《医方类聚》卷二二七引《食医心鉴》。

【组成】 粟米三合。

【用法】 上煮粥，临熟下淡竹沥三合，搅令匀，空心食之。

【功用】 《长寿药粥谱》：清热、化痰、开窍。

【主治】 ①《医方类聚》引《食医心鉴》：子烦，妊娠恒苦烦闷。②《长寿药粥谱》：中风昏迷，喉间痰鸣，高热烦渴，肺热咳嗽，气喘胸闷。

05448 竹沥膏

【方源】 《医学入门》卷七。

【组成】 竹沥

【用法】 用水白竹截长二尺许，每段劈作四片，以砖二块排定，将竹片仰架砖上，两头露一二寸，下以烈火逼之，两头以盆盛沥。每六分中加生姜汁一分服之。痰热甚者，只可加半分耳。

【功用】 养血清热。

【主治】 痰厥不省人事，几死者。

05449 竹茹汤

【方源】 方出《外台》卷三十三引《集验方》，名见《医心方》卷二十二引《产经》。

【异名】 青竹茹汤(《摄生众妙方》卷十一)。

【组成】 青竹茹三两　生姜四两　半夏五两　茯苓四两　橘皮三两

【用法】 上切。以水六升，煮取二升半，分三服。

【功用】 《摄生众妙方》：清痰止呕。

【主治】 ①《医心方》引《集验方》：妊娠二三月，恶阻呕吐不下食。②《产科发蒙》引《产经》：痰热恶阻。

【宜忌】 ①《摄生众妙方》：忌羊肉、饧、鲊等物。②《医统》：忌鸡、鱼、面食。

【备考】 《景岳全书》有粳米。

05450 竹茹汤

【方源】 《千金》卷三。

【异名】 竹皮汤(《千金翼》卷七)。

【组成】 竹茹二升　干地黄四两　人参　芍药　桔梗　芎藭　当归　甘草　桂心各一两

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】 妇人汗血、吐血、尿血、下血。

【方论选录】 《千金方衍义》：竹茹为亡血发渴专药，芎藭、芍、地为滋血专药，人参、甘草为扶胃专药，桂心专行四物之滞，桔梗专助人参之力。

05451 竹茹汤

【方源】 《东医宝鉴·杂病篇》卷十引《圣惠》。

【异名】 竹茹麦冬汤(《盘珠集》卷下)。

【组成】 青竹茹　麦冬各三钱　前胡二钱　橘皮一钱　芦根半握

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 ①《东医宝鉴·杂病篇》引《圣惠》：恶阻。②《盘珠集》：妊娠肝火冲胃，心中烦懊热闷，呕逆不止。

05452 竹茹汤

【方源】 《本事》卷四引《孙兆方》。

【异名】 葛根竹茹汤(《医学入门》卷七)。

【组成】 干葛三两　甘草三分（炙）　半夏三分（姜汁半盏、浆水一升煮耗半）

【用法】 上为粗末。每服五钱，水二盏，加生姜三片，竹茹一弹子大，大枣一个，同煎至一盏，去滓温服。

【主治】 胃热呕吐，饮酒过多而呕。

①《本事》：胃热呕吐。②《普济方》引《济生》：胃受邪热，心烦喜冷，呕吐不止。③《医方考》：伤寒正汗后，余热留于阳明、少阳，必令作呕。④《医学六要》：因饮酒过度而呕。

【方论选录】 ①《医方考》：阳明，胃也；少阳，胆也。有辨焉，口渴者热在胃，口苦者热在胆也；兼而有之，则二经均有留热矣。是方也，干葛清胃，竹茹清胆，半夏破逆，甘草调阳。②《本事方释义》：干葛气味辛微温，能解酒毒，入足阳明；甘草气味甘平，入足太阴；半夏气味辛温，入足阳明；竹茹气味甘寒，入足阳明；姜、枣以和荣卫。胃热呕吐不止，亦必因胃中酒气蕴热，故以微辛温之药令其入胃，引入甘寒之品，则酒热稍解，气得下降，胃气安而病自已也。

【临症举例】 胃热呕吐　《本事》：政和中一宗人病伤寒，得汗身凉，数日忽呕吐，药与饮食俱不下，医者皆进丁香、藿香、滑石等药，下咽即吐。予曰，此正汗后余热留胃脘，孙兆竹茹汤正相当尔。治药与之，即时愈。

05453 竹茹汤

【方源】 《圣济总录》卷二十五。

【组成】 淡竹茹半两　人参一两　前胡（去芦头）三分　甘草半两（炙）　芦根一两　葛根三分　半夏半两（汤洗七遍，切，焙干）

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一分（拍碎），同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒胃气虚热，干呕不止。

05454 竹茹汤

【方源】 《圣济总录》卷二十九。

【组成】 青竹茹　黄芩（去黑心）各一两　蒲黄

伏龙肝各半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，下藕汁一合，搅匀，食后温服。

【主治】 伤寒鼻衄不止。

05455 竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】 生竹茹 生地黄（切，焙） 黄芩（去黑心）各二两 蒲黄 芍药 麦门冬（去心皮）各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】 热盛所致衄血、汗血。

05456 竹茹汤

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】 竹茹 橘皮 甘草 半夏 赤茯苓 麦冬 人参 枇杷叶

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 胃受邪热气浊，阴阳浑乱，心下烦，不喜热物，得热即呕，喜渴，其脉虚数，或细而疾。

【加减】 胃寒，去竹茹、麦冬，加丁香；实火，去人参。

05457 竹茹汤

【方源】《普济方》卷三四一。

【组成】 生芦根一两 青竹茹 橘皮 前胡各四钱 生姜五片 大腹皮 槟榔各二两

【用法】 每服四钱，水一盏，煎至六分，空心温服。

【主治】 妊娠孕三四月，呕吐不食。

05458 竹茹饮

【方源】《圣惠》卷十八。

【异名】 竹茹散（《鸡峰》卷五）。

【组成】 青竹茹一两 子芩一两 蒲黄二钱 伏龙肝二钱（末） 生藕汁二合

【用法】 上药，先以水一大盏半，煎竹茹、子芩至一盏，去滓，下蒲黄等三味，搅令匀，分为三服，不拘时候。

【主治】 热病吐血，兼鼻衄不止。

05459 竹茹散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】 竹茹半两 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 人参半两（去芦头） 麦门冬半两（去心） 甘草半两（炙微赤，锉） 芦根半两（锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒后，烦热干呕。

05460 竹茹散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】 苦竹茹一两 生干地黄一两 茜根半两 百合半合 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 黄耆一两半 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 肺痈烦闷，咳嗽脓血。

05461 竹叶饮子

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 竹叶五十片 麦门冬半两（去心） 小麦半合 生地黄半两 地骨皮半两 黄耆一两（锉） 麻黄半两（去根节） 甘草二分（炙微赤，锉） 石膏一两（捣碎）

【用法】 上锉细和匀。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣二个，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】 气极。伤热则气喘，急甚则唾血，乏力，不欲饮食，口燥咽干。

05462 竹皮大丸

【方源】《金匮》卷下。

【组成】 生竹茹二分 石膏二分 桂枝一分 甘草七分 白薇一分

【用法】 上为末，枣肉为丸，如弹子大。每服一丸，以饮送下，日三次夜二次。

【功用】 安中益气。

【主治】 妇人乳中虚，烦乱呕逆。

【加减】 有热者，倍白薇；烦喘者，加柏实一分。

【方论选录】 ①《济阴纲目》：中虚症不可用石膏，烦乱症不可用桂枝，而此方以甘草七分，配众药六分，又以枣肉为丸，仍以一丸饮下，可想见其立方之微，用药之难，审虚实之不易也。仍饮服者，尤虑夫虚虚之祸耳。用是方者，亦当深省。②《金匮要略论注》：病本全由中虚然，而药只用竹茹、桂、甘、石膏、白薇者，盖中虚而至为呕为烦，则胆腑受邪，烦呕为主病，故以竹茹之除烦止呕者为君；胸中阳气不用，故以桂、甘扶阳而化其逆气者为臣；以石膏凉上焦气分之虚热为佐；以白薇去表间之浮热为使。要知烦乱呕逆而无腹痛、下利等证，虽虚无寒可疑也，妙在加桂于凉剂中，尤妙在生甘草独多，意谓散蕴蓄之邪，复清阳之气，中即自安，气即自益，故无一补剂而反注其立汤之本意曰安中益气，竹皮大丸神哉。③《金匮要略心典》：妇人乳中虚，烦乱呕逆者，乳子之时，气虚

火旺，内乱而上逆也。竹茹、石膏甘寒清里，桂枝、甘草辛甘化气，白薇性寒入阳明，治狂惑邪气，故曰安中益气。④《金匮歌括》：血者，中之所生也；乳者，血之所变也，血虽生于中焦，尤藉厥、少之气传变而为乳。乳中虚者，谓乳子去汁过多而致虚也。中虚无血奉心则烦，心神不安则乱，阳气上升则呕，逆者，呕之甚也。以竹茹降逆止呕，白薇除热退烦，石膏通乳定乱，重用甘草、大枣定安中焦以生津液，血无阳气不运，妙以桂枝一味，运气血奉心通乳。⑤《金匮发微》：竹茹、石膏以清胆胃之逆，三倍甘草以和中气，减半桂枝、白薇以略扶中阳而清里热，更用枣和丸以扶脾而建中，但令胃热除而谷食增，则生血之源既富，胆胃之上逆自平矣。

【临证举例】 ①癔病 孙某某，女，40岁。1972年2月23日诊。患者于前年因惊恐、受气，出现精神恍惚，时悲时喜，悲时哭泣不止，喜时大笑不已。同时伴有默默不欲饮食，心烦喜呕，喜居暗处，夜里失眠、多梦，面色青，舌质略红、苔薄白，脉弦数。此属肝火灼阴，神明被扰。治予清热舒肝，调和胃气，用竹皮大丸3剂则病愈。②失眠 李某某，女，24岁。1973年5月10日诊。近一月来夜不能寐，精神欠佳，面色少华，自觉心跳、心慌、心中懊侬、头晕，腰腿疼痛，舌淡苔白，脉沉数无力。患者素体血虚，病前又受精神刺激，良由阴虚火旺，肝横气滞，从而神不守舍，经络郁滞。用竹皮大丸5剂病即减半，再服3剂则病愈。③阳萎 吴某某，男，28岁。1981年6月20日诊。3～4年之前即患阳痿，逐渐加重。前妻因此离婚，续妻也因此要求离婚。先后曾服三肾丸、参茸丸等，毫无起色。现自觉头晕，身热，小溲黄赤，大便燥结，梦多，舌红苔黄，脉弦数有力。此由过用峻补，郁热内蕴，宗筋弛缓，不能作强，用竹皮大丸连服120余剂，1982年春病愈，其爱人已怀孕。④男性不育 郭某某，男，26岁。1977年8月10日诊。婚后二年无子，经某医院检查精子成活率为30～40%，身体健壮，性生活正常，惟自觉有时发热、头晕，舌淡红、苔略黄，脉滑数。此为过服温燥峻补之品，造成精室蕴热，精子被灼，致使精子成活率大降。治用竹皮大丸，连服9剂而获麟。（以上四案均出自《中医杂志》1986，6:43）

05463 竹沥饮子

【方源】《圣惠》卷七十四。

【异名】 竹沥汤（《圣济总录》卷七）。

【组成】 竹沥五合 人乳二合 陈酱油半两

【用法】 上药相和，分二次温服，拗开口灌之。

【主治】 ①《圣惠》：妊娠中风痉，口噤烦闷。②《圣济总录》：中风，舌强不得语，心神烦闷。

05464 竹茹饮子

【方源】《圣惠》卷十。

【异名】 竹茹汤（《圣济总录》卷二十三）、青竹茹汤（《圣济总录》卷三十九）。

【组成】 青竹茹一鸡子大 人参半两（去芦头） 乌梅肉二两

【用法】 上锉细。以水一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候频频温服。

【主治】 ①《圣惠》：伤寒吐利后，烦渴不止。②《圣济总录》：霍乱，津液少，渴甚。

05465 竹茹饮子

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】 竹茹 人参（去芦头） 芦根 黄芩 栀子仁各半两

【用法】 上锉细和匀。每服半两，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 时气五日，头痛壮热，食则呕逆。

05466 竹茹饮子

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】 竹茹一两 人参一两（去芦头） 白茯苓一两 黄耆一两（锉） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上锉细和匀。每服半两，以水一大盏，加大枣三个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后内虚，烦闷短气。

05467 竹叶石膏汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 人参竹叶汤（《三因》卷五）、石膏竹叶汤（《易简》）。

【组成】 竹叶二把 石膏一升 半夏半斤（洗） 麦门冬一升（去心） 人参二两 甘草二两（炙） 粳米半升

【用法】 以水一斗，煮取六升，去滓，纳粳米，煮米熟，汤成去米，温服，每服一升，一日三次。

【功用】 清热生津，益气和胃。

①《古方选注》：补胃泻肺。②《伤寒论类方》：滋养肺胃之阴气，以复津液。③《伤寒论章句》：滋养肺胃，清火降逆。④《古本伤寒心解》：滋阴养液，补虚清热。⑤《成方便读》：清热，养阴，益气。

【主治】 伤寒、温病、暑病之后，余热未清，气津两伤，虚羸少气，身热多汗，呕逆烦渴，唇干口

燥，或虚烦不寐，舌红少苔，脉虚数。现用于中暑、糖尿病、小儿夏季热等出现气阴两伤证候者。

⑪《伤寒论》：伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐。②《外台》引《张文仲方》：天行表里虚烦。③《局方》：伤寒时气，表里俱虚，遍身发热，心胸烦满；诸虚烦热，与伤寒相似，但不恶寒，身不疼痛，头亦不痛，脉不紧数。④《直指》：伏暑内外热炽，烦躁大渴。⑤《普济方》：中暑，渴烦吐逆，脉数者。⑥《奇效良方》：小儿虚羸少气，气逆欲吐，四体烦热。⑦《医统》：阳明汗多而渴，甚而渴欲饮水，水入即吐，病愈后渴。⑧《医方集解》：肺胃虚热；伤暑发渴脉虚。⑨《西塘感症》：烦躁，起卧不安，睡不稳。⑩《叶氏女科》：妊娠燥渴，胃经实火。⑪《杂病源流犀烛》：暑风；夏热病并小便不利；唇病大渴。⑫《奇正方》引《经验方》：小儿伤寒久不除，愈后复剧，瘦瘠骨立者；骨蒸唇干，口燥欲得饮水者。⑬《中医皮肤病学简编》：痱子。

【宜忌】《外台》引《张文仲方》：忌海藻、羊肉、菘菜、饧。

【方论选录】①《注解伤寒论》：辛甘发散而除热，竹叶、石膏、甘草之甘辛以发散余热；甘缓脾而益气，麦门冬、人参，粳米之甘以补不足；辛者，散也，气逆者，欲其散，半夏之辛，以散逆气。②《医方集解》：此手太阴、足阳明药也。竹叶、石膏之辛寒，以散余热；人参、甘草、麦冬、粳米之甘平，以益肺安胃，补虚生津；半夏之辛温，以豁痰止呕。故去热而不损其真，导逆而能益其气也。③《伤寒溯源集》：竹叶性寒而止烦热，石膏入阳明而清胃热，半夏蠲饮而止呕吐，人参补病后之虚，间麦冬而大添胃中之津液，又恐寒凉损胃，故用甘草和之，而又以粳米助其胃气也。④《古方选注》：竹叶石膏汤分走手足二经，而不悖于理者，以胃居中焦，分行津液于各脏，补胃泻肺，有补母泻子之义也。竹叶、石膏、麦冬泻肺之热，人参、半夏、炙草平胃之逆，复以粳米缓于中，使诸药得成清化之功，是亦白虎、越婢、麦冬三汤变方也。⑤《金鉴》：是方也，即白虎汤去知母，加人参、麦冬、半夏、竹叶也。以大寒之剂，易为清补之方，此仲景白虎变方也。《经》曰：形不足者，温之以气；精不足者，补之以味。故用人参、粳米，补形气也；佐竹叶、石膏、清胃热也；加麦冬生津，半夏降逆，更逐痰饮，甘草补中，且以调和诸药也。⑥《血证论》：方取竹叶、石膏、麦冬以清热，人参、甘草、粳米以生津。妙在半夏之降逆，俾热气随之而伏；妙在生姜之升散，俾津液随之而布，此二药在口渴者，本属忌药，而在此方中，则能止渴，非二药之功，乃善用二药之功也。⑦《成方便读》：方中以竹叶、石膏清肺胃之热，然热则生痰，恐留恋于中，痰不去热终不除，故以半夏辛温体滑之品，化痰逐湿，而通阴阳，且其性善散逆气，故又为止呕之圣药，况生姜之辛散，以助半夏之不及，一散一清，邪自不能留恋。人参、甘草、粳米以养胃，麦冬以保肺，此方虽云清热，而却不用苦寒，虽养阴又仍能益气，不伤中和之意耳。

【临症举例】①阳明暑疟《王氏医案》：己亥夏，予舅母患疟，服柴胡药二三帖后，汗出昏厥，妄语遗溺，或谓其体质素虚，虑有脱变，劝服独参汤，幸表弟寿者，不敢遽进，乃邀孟英商焉，切其脉洪大滑数，曰阳明暑疟也，与伤寒三阳合病同符，处竹叶石膏汤，清热兼益气，两剂而瘳。②消渴《经方应用》：一女性患者，56岁，农民。患糖尿病多年，近来自觉神疲乏力，口渴引饮，溲多，诊得脉细数，舌红少津，身形消瘦。凭症参脉，系胃热内盛，气津俱损，宜清胃热，益气阴，方用竹叶石膏汤加味，竹叶12克，生石膏30克、麦冬12克、法半夏6克、甘草3克、北沙参12克、天花粉12克、淮山药18克、粳米一撮。三剂后，口渴显著减轻，续服原方三剂，后未再复诊。③余热未净，气阴两伤《古方新用》：王某，女，6岁，1978年12月初诊。患儿三天前发烧38.5℃，伴有咳嗽，少痰、头痛、纳差、X线胸透未见异常。先用四环素、甘草片、克感敏等药物治疗，因无效而改用静脉点滴红霉素两天，体温仍在38℃以上，故邀中医诊治，乏力懒动，舌尖红苔薄黄、中心略厚，脉弦细。辨证为余热未净、气阴两伤，用本方治疗，党参3克、半夏9克、粳米12克、麦冬24克、竹叶9克、生石膏48克、甘草6克，水煎，分三次服。服上药二剂后，热退症消，体温降至36℃。停药观察三日，再未见发热，饮食渐增，开始下地玩耍。④流行性出血热《河南中医》(1983；3:33)：竹叶石膏汤加减治疗流行性出血热32例，男28例，女4例，年龄20～40岁，病程1～2天者25例，3天以上者7例。根据病程分为发热期、低血压期、少尿期、多尿期、恢复期等，以本方适当加减，疗程7～18天，全部治愈，其中18例随访3～12个月，未见复发。

【备考】本方方名，《张文仲方》引作“竹叶汤”(见《外台》)。《活人书》有生姜，《医学入门》有

生姜汁。本方加生姜，名“竹叶加生姜汤”（见《圣济总录》）。

05468 竹叶石膏汤

【方源】《正体类要》卷下。

【异名】 八味竹叶石膏汤（《景岳全书》卷五十七）。

【组成】 淡竹叶 石膏（煅） 桔梗 木通 薄荷 甘草各一钱

【用法】 加生姜为引，水煎服。

【主治】 胃实火盛，口渴唇干，口舌生疮，小便赤。

①《正体类要》：胃火盛而作渴者。②《症因脉治》：燥火身肿，喘促气急，两胁刺痛，身面浮肿，烦躁不得卧，唇口干燥，小便赤涩。③《杂病源流犀烛》：一切痈疽兼烦渴；伤（跌扑闪挫）家作渴，或因胃火上炽。④《会约》：胃火口舌生疮，口渴便结；感冒暑热火盛，烦躁恶心。

【方论选录】《医方集解》：李士才曰，阳明外实则用柴葛以解肌，阳明内实则用承气以攻下，此云胃实，非有停滞，但阳焰胜耳。火旺则金困，故以竹叶泻火，以桔梗救金，薄荷升火于上，木通泄火于下，甘草、石膏直入戊土而清其中。三焦火平则炎蒸退，而津液生矣。

05469 竹叶石膏汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】 竹叶五片 石膏三钱（煅）

【用法】 水煎服。兼服六一散或抱龙丸。

【主治】 胃热呕吐，或三焦受热，或伤热物，或受热药，夏月受暑气，呕吐黄痰，或干哕，或烦躁，唇红面赤作渴，大便不利。

05470 竹叶石膏汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】 煅石膏 连翘 黄芩 花粉 甘草梢 薄荷 柴胡

【用法】 竹叶五片为引。

【主治】 肺热鼻流紫血者。

05471 竹叶石膏汤

【方源】《痧疹辑要》卷二。

【组成】 竹叶三片 红花三分 生地二钱 煅石膏三钱 花粉八分 陈皮五分 甘草五分 黄连五分（微炒） 僵蚕五条 连翘六分 玄参一钱 牛蒡子六分 桑皮一钱

【主治】 痧疹见形二三日，肉色红，出不透快。

【加减】 如大便不解，加生大黄二钱；再不通，即加玄明粉二钱，惟热毒重盛者方可。如泻红水，或作烦渴，亦加大黄。

05472 竹叶归耆汤

【方源】《校注妇人良方》卷二十一。

【异名】 竹叶黄耆汤（《医钞类编》卷十七）。

【组成】 竹叶一钱半 当归一钱 黄耆二钱 白术 人参各一钱 甘草（炒）五分 麦门冬（去心）七分

【用法】 水煎服。

【主治】 产后胃气虚热，口干作渴，恶冷饮食者。

05473 竹叶泻经汤

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】 竹叶泻肝汤（《医统》卷六十一）、竹叶泻肝散（《眼科全书》卷五）。

【组成】 柴胡 栀子 羌活 升麻 炙草各五分 赤芍药 草决明 茯苓 车前子各四分 黄芩六分 黄连 大黄各五分 青竹叶十片 泽泻四分

【用法】 上作一服。水二盏，煎至一盏，食后稍热服。

【主治】 眼目隐涩，稍觉眊矇，视物微昏，内眦开窍如针，目痛，按之浸浸脓出。

【方论选录】 上方，逆攻者也。先以行足厥阴肝、足太阳膀胱之药为君，柴胡、羌活是也；二经生意，皆总于脾胃，以调足太阴、足阳明之药为臣，升麻、甘草是也；肝经多血，以通顺血脉，除肝邪之药，膀胱经多湿，以利小便，除膀胱湿之药为佐，赤芍药、草决明、泽泻、茯苓、车前子是也；总破其积热者，必攻必开、必利必除之药为使，栀子、黄芩、黄连、大黄、竹叶是也。

05474 竹叶黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】 淡竹叶一握 黄耆（锉，炒） 甘草（炙，锉） 黄芩（去黑心） 麦门冬（去心，焙） 芍药各三两 当归（切，焙） 人参 石膏（椎碎） 芎藭 半夏（汤洗七遍去滑，焙）各二两 生地黄（切，焙）八两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜一分（拍碎）、大枣五个（擘破）、竹叶七片，煎取八分，去滓温服，日三夜一。

【主治】 ①《圣济总录》：痈疽、发背兼渴。②《外科精义》：一切恶疮发大渴者。

【方论选录】 ①《古今名医方论》：柯韵伯曰，气血皆虚，胃火独盛，善治者补泻兼施，寒之而不致亡阳，温之而不至于助火，扶正而邪却矣。四君子气药也，加黄耆而去苓、术，恐火就燥也。四物

汤血药也，地黄止用生者，正取其寒也。人参、黄耆、甘草治烦热之圣药，是补中有泻矣。且地黄之甘寒，泻心肾之火，竹叶助芍药清肝胆之火，石膏佐芍药清脾胃之火，麦冬同黄芩清肺肠之火，则胃火不得独盛，而气血之得补可知。惟半夏一味，温中辛散，用之大寒剂中，欲其能阴阳之路也。岐伯治阴虚而目不瞑者，饮以半夏汤、覆杯则卧。今人以为燥而渴者禁用，是不明阴阳之理耳！②《古方选注》：四方互复，独以竹叶、黄耆标而出之者，明其方专治肺经热消，非概治二阳结之消渴者也。竹叶石膏汤为轻清之剂，复以生地、黄芩浊阴之品，清肺与大肠之火；四物汤为浊阴之剂，复以竹叶、石膏清燥之品，清肝胆之火；补中益气汤人参、黄耆、甘草除烦热之圣药，复以石膏、白芍清脾胃之火；黄芩汤治后天太阴之剂，复以生地、麦冬壮水之品，清肾中之火。竹叶石膏汤不去半夏，藉以通气分之窍；四物汤不去川芎，藉以通血分之窍。统论全方，补泻兼施，寒之不致亡阳，补之不致助火，养正却邪，诚为良剂。

05475　竹叶黄耆汤

【方源】《痈疽神秘验方》。

【组成】生地黄　黄耆各二钱　当归（酒拌）　淡竹叶　川芎　甘草（炙）　黄芩（炒）　白芍药（炒）　人参　半夏　石膏（煅）各一钱

【用法】上作一剂。水二钟，加生姜三片，煎八分，食远服。

【主治】①《痈疽神秘验方》：痈疽大渴发热，或泻，或小便如淋。②《杂病源流犀烛》：伤（跌扑闪挫）家作渴，或因胃热伤津液。

【备考】《准绳·疡医》引《痈疽神秘验方》有栝楼根一钱、麦门冬（去心）二钱。

05476　竹叶常山汤

【方源】《外台》卷五引《小品方》。

【异名】竹叶恒山汤（《普济方》卷一九八）、备急竹叶常山汤（《金匮翼》卷三）。

【组成】常山三两（切）　淡竹叶一握　小麦一升

【用法】以水五升，渍一宿，明旦煮取二升，分三次温服。

【主治】温疟，壮热微寒，或瘅疟依时手足冷，少时便壮热，或手足烦热干呕者；疒皆疟先大寒后大热者。

【宜忌】忌生菜、生葱。

05477　竹叶清心汤

【方源】《准绳·伤寒》卷五。

【组成】淡竹叶二十片　黄芩一钱　栀子一钱半　甘草五分　川黄连五分（姜炒）　薄荷一钱　连翘一钱半　石菖八分

【用法】水二钟，煎服。

【主治】伤寒火热入心，躁烦振慄。

05478　竹皮逍遥散

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】青竹皮（卵缩腹痛倍之）　人参　知母　黄连　甘草　滑石　生地黄　韭白　柴胡　犀角

【用法】加生姜三片，大枣二个，水煎，临服入烧裩裆末一钱半调服。微汗，未汗再服，得小便利，阴头肿即愈。

【主治】劳复及易病。

【备考】《东医宝鉴·杂病篇》引本方用量为各一钱。

05479　竹沥二陈汤

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】陈皮　半夏　茯苓　甘草　白术　人参　竹沥　姜汁

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，通口服。

【主治】半身不遂，在右属气虚挟痰者。

【加减】若气实能食者，用荆沥。

05480　竹沥石膏汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】竹沥（旋入）　石膏一两半　赤茯苓（去黑皮）　栀子仁　升麻　玄参　生地黄　知母（焙）各二分

【用法】上除竹沥外，锉如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜五片，同煎至一盏，去滓，入竹沥半合，再煎三沸，食后、临卧温服，一日三次。

【主治】阳厥多怒，狂躁不安，上攻头颈。

05481　竹沥四物汤

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】川芎　当归　芍药　熟地（俱用姜汁炒）　竹沥

【用法】水二钟，煎八分，通口服。

【主治】半身不遂，在左属血虚者。

05482　竹沥达痰丸

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【异名】竹沥运痰丸（《杂病源流犀烛》卷十四）、竹沥丸（《医学金针》卷三）。

【组成】半夏二两（汤泡洗七次，再用生姜汁浸透，晒干切片，瓦上微火炒熟用之）　人参一两

（去芦） 白茯苓一两（去皮） 陈皮一两（去白） 甘草一两（炙） 白术三两（微火炒过） 大黄三两（酒浸透熟，晒干后用） 黄芩二两（酒炒） 沉香五钱（用最高者） 礞石一两（捣碎，用焰消一两和匀，放入铫银锅内，上用瓦片盖之，用盐泥固济晒干，以炭煅过，如金黄色者可用）。

【用法】 上为细末，用竹沥一大碗半，又生姜自然汁二钟和匀，入锅内火熬一刻许令热，却将前药末和捣如稀酱，以瓷器盛之，晒干，仍以竹沥、姜汁如前法捣匀，再晒干，如此三次，仍将竹沥为丸，如小豆大。每服百丸，食远白米汤送下。

【功用】 ①《摄生众妙方》：能运痰于大肠从大便出，不损元气，又能达痰。②《玉案》：清气化痰。

【主治】 痰饮积聚，发为痰积、痰核、咳嗽、目眩，惊风痰多而体弱者。

①《摄生众妙方》：痰嗽。②《医学入门》：肠胃痰积，及小儿食积、痰惊风而体弱者。③《杂病源流犀烛》：痰积、痰涎凝聚成积，结在胸膈，吐咯不出，咽门至胃脘窄狭如线疼痛，目眩头旋，腹中累累有块；颈项痰核。④《成方便读》：顽痰胶痼经络，不得解化，正气又虚，不能胜滚痰丸之峻剂者。⑤《丸散膏丹集成》：痰火喘急，昏迷不省，厥逆惊痫。

【方论选录】 ①《成方便读》：夫痰者，皆津液所化，而胶痼之痰，又为火灼所致。故治痰者必先降火，而降火者又必先理气。方中黄芩清上，大黄导下，沉香升降诸气，而后礞石得成其消痰散结之功，半夏、陈皮以匡礞石之不逮，人参、甘草以助正气之运行，竹沥行经入络，用其化皮里膜外之痰，姜汁豁痰和胃，又解竹沥之寒，互相为用耳。②《辽宁中医杂志》（1980；2:12）：方中以王隐君之礞石滚痰丸为基础，加陈橘红、陈半夏、茯苓、人参、甘草、竹沥、姜汁诸药，其意在橘红、半夏两味皆用其陈者，盖因其药贵在陈久；则无过燥之弊，使其专达消痞散结、顺气化痰之功；茯苓、甘草健脾和中，以消除成痰之途；竹沥清化热痰，姜汁豁痰开胃，两药性味相制，其驱痰之功效更胜；更以人参扶正养津，兼制礞石滚痰丸峻厉之性。其主以清热逐痰，佐以扶正养津，功专理正气虚衰、顽痰热结之证。此攻中有补，泻不损正，实先人制方用药之妙。

05483 竹沥达痰丸

【方源】《医方集解》。

【组成】 青礞石一两 沉香五钱 大黄（酒蒸） 黄芩 橘红 半夏各二两 甘草一两

【用法】 先将礞石打碎，用朴消一两，同入瓦罐，盐泥固济，晒干火煅，石色如金为度，研末，和诸药，竹沥、姜汁为丸，姜汤送下。

【功用】 ①《重订通俗伤寒论》：苦辛咸降，荡涤痰涎。②《古今名方》：清热逐痰。

【主治】 实热老痰，咳嗽痰稠，或癫狂，或惊痫，或神昏，大便秘结，舌苔黄厚而腻。

①《医方集解》：实热老痰，怪证百病。②《饲鹤亭集方》：痰火上逆，喘急昏迷，如痴如狂，惊痫厥逆，无论老幼，痰多怪病，变幻百出之症。③《重订通俗伤寒论》：痰火蕴结胃肠，恶心呕吐，胸膈壅塞，嘈杂脘满，便溏腹泄，或肠中辘辘有声之重者。④《全国中药成药处方集》（上海方）：痰多喘急。⑤《古今名方》：咳喘痰稠，大便秘结，舌苔黄厚而腻；以及痰热蕴结，神志昏迷，癫狂惊痫。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（上海方）：孕妇忌服。

05484 竹沥枳术丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 半夏 南星（用白矾、皂角、生姜煮半日） 枳实 条芩 陈皮 苍术 山楂 芥子 白茯苓各一两 黄连 当归各五钱

【用法】 上为末，加神曲六两，用姜汁、竹沥各一盏煮糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，白汤送下；有痰，姜汤送下。

【功用】 化痰清火，健脾理气，消食止呕。

①《医学入门》：化痰清火，健脾消食。却癖。②《古今医鉴》：理胃调脾。肥白气虚之人服此药，预防倒仆之患。③《北京市中药成方选集》：顺气除湿，化痰止呕。

【主治】《北京市中药成方选集》：脾胃虚弱，饮食不化，呕吐痰涎，胸膨闷。

【备考】《古今医鉴》有白术。

05485 竹沥涤痰汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 川贝二钱 天竺黄六分 羚羊角一钱五分 桑皮二钱 瓜蒌仁四钱 石决明八钱 杏仁三钱 旋覆花一钱（绢包）

【用法】 加淡竹沥半杯，生姜汁两滴，同冲服。

【主治】 痰气结胸，当分燥湿，痰随火升，壅于中脘。

05486 竹茹二陈汤

【方源】《医统》卷二十四。

【组成】 竹茹二钱 陈皮半夏 白茯苓各一钱 甘草（炙）五分

【用法】 水二盏，加生姜七片，煎八分服。

【主治】 胃中有热，膈上有痰，呕吐不已。

05487 竹茹地黄汤

【方源】 方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一九〇。

【组成】 青竹茹半两 生地黄一两（细切） 蒲黄半两

【用法】 以水一大盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 九窍、四肢指歧间出血。

05488 竹茹温胆汤

【方源】《扶寿精方》。

【组成】 柴胡二钱 枳实（麸炒）一钱 半夏一钱 竹茹一钱 陈皮一钱 茯苓一钱 桔梗一钱 香附八分 甘草三分 人参五分 麦门冬（去心）三分 黄连一钱五分

【用法】 上㕮咀。加生姜三片，大枣一个，煎八分，不拘时候服。

【主治】 伤寒日数过多，其热不退，梦寐不宁，心惊恍惚，烦躁多痰。

05489 竹茹麦门冬汤

【方源】《医统》卷四十七。

【异名】 竹茹麦冬汤（《赤水玄珠》卷十四）。

【组成】 淡竹茹 麦门冬各等分

【用法】 上㕮咀。每服七钱，水二钟，煎八分，不拘时候。

【主治】 大病后，表里俱虚，内无津液，烦渴心躁，及诸虚烦热，不恶寒，身不痛。

05490 舌化丹

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】 辰砂 血竭 硼砂 乳香（去油） 没药（去油） 雄黄 蟾酥（人乳浸化） 轻粉 冰片 麝香各等分

【用法】 上为细末，用头生乳捣和为丸，如小麦大。每用三丸，含舌下噙化，咽下；出汗自消；如无汗，以热酒催之。

【主治】 疔疮，无名肿毒。

05491 舌恬散

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】 真玄明粉一钱二分 贝母二钱（先用糯米洗湿，入贝母同炒干，后去米不用） 陈皮（去白）五钱（用海粉一钱五分化水，煮干为末） 海粉（仍用）二钱五分

【用法】 上为末。每饭后以舌恬少许，咽下。少睡片时取效。

【主治】 梅核气，因积热生痰，痰结如核，在喉中吞之则下，不吞则在喉，但可以进水，不可以进饮食。

05492 先期丸

【方源】 方出《广笔记》卷二，名见《医学正印》。

【组成】 枇杷叶一斤（蜜炙） 白芍药半斤（酒浸，切片，半生半炒） 怀生地黄六两（酒洗） 熟怀地黄四两 青蒿子五两（童便浸） 五味子四两（蜜蒸） 生甘草（去皮）一两 山茱萸肉四两 黄柏四两（去皮，切片，蜜拌炒） 川续断（酒洗，炒）四两 阿胶五两（蛤粉炒，无真者，鹿角胶代之，重汤酒化） 杜仲（去皮，酥炙）三两

【用法】 上为细末，怀山药粉四两打糊，同炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五钱，空心淡醋汤吞，饥时更进一服。

【主治】 妇人血热，经行先期。

【宜忌】 忌白萝卜。

05493 先期汤

【方源】《准绳·女科》卷一。

【组成】 生地黄 川当归 白芍药各二钱 黄柏 知母各一钱 条芩 黄连 川芎 阿胶（炒）各八分 艾叶 香附 炙甘草各七分

【用法】 水二钟，煎一钟，食前温服。

【功用】 凉血固经。

【主治】 经水先期而来。

05494 先天大造丸

【方源】《胎产指南》卷一。

【组成】 紫河车一具（壮盛头胎者佳。如新鲜者，挑去血筋，和酒浆煮烂，入药搅匀） 山药一两 人参一两五钱 归身二两五钱 麦冬一两 五味子五钱 黄柏八分（久患泻人不可用） 天冬一两 怀生地二两

【用法】 先将地黄、麦冬蒸捣如泥，次下诸药末，又捣千余下为丸，如绿豆大。每服一百丸，空心清汤送下。

【功用】 安胎，补母，寿子。

【加减】 脾胃虚弱常泻人，减地黄，用白术一两。

【宜忌】 忌食萝卜。

05495 先天大造丸

【方源】《徐评外科正宗》卷七。

【组成】 紫河车一具（酒煮，捣膏） 熟地黄四

两（酒煮，捣膏） 归身 茯苓 人参 枸杞 菟丝子 肉苁蓉（酒洗，捣膏） 黄精 白术 何首乌（去皮，用黑豆同煮，捣膏） 川牛膝 骨碎补（去毛，微炒） 仙茅（浸去赤汁，蒸熟，去皮，捣膏）各二两 川巴戟（去骨） 破故纸（炒） 远志（去心，炒）各一两 木香 青盐各五钱 丁香三钱 黑枣肉二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心温酒送下。

【主治】 风寒湿毒袭于经络，初起皮色不变，漫肿无头；或阴虚外寒侵入，初起筋骨疼痛，日久遂肿，溃后脓水清稀，久而不愈，渐成漏症；一切气血虚羸，劳伤内损，及男妇久无嗣息。

05496 先天归一汤

【方源】《古今医鉴》卷十一引王兵宪方。

【组成】 人参八钱 白术一两（麸炒） 白茯苓（去皮）一两 甘草四钱 川芎一两 当归一两二钱 生地（酒洗）一两 白芍八钱 砂仁七钱（炒） 香附七钱 陈皮六钱 牛膝八钱（酒炒） 半夏七钱（汤泡） 丹皮七钱（去骨）

【用法】 均作十剂。加生姜三片，水二钟煎，空心服；滓再煎，临卧时服。经未行，先服五剂，后服五剂，此药尽即效。如无他病，只照本方服之；如有他病，宜照后加减服之，经脉调和，即当妊孕。

【功用】 求嗣。

【加减】 妇人子宫久冷不孕，加干姜、肉桂各五钱，如冷甚，炙丹田七壮；子宫太热，加黄柏、知母、柴胡各六钱；白带、白淫、白浊时下，加白芷一两，升麻五钱，或倍半夏；气不流通者，加木香三钱；平素虚劳盗汗，或恶寒发热，加黄耆、肉桂；咳嗽，加阿胶、贝母各四钱；劳热、血枯，加柴胡、鳖甲；劳甚，腰背疼痛者，炙膏肓七壮；饮食减少，倍白术、陈皮，加厚朴、神曲（炒）各五钱；肥人痰盛，迷塞子宫，加南星、三棱各六钱；经水将行，小腹作痛者，加桃仁、红花各四钱，未效去人参，加五灵脂六钱（半炒、半生用），乳香三钱；腰腿痛者，加杜仲一两二钱，羌活三钱，桃仁四钱；经行后作疼者，加熟地黄六钱、当归八钱，五味子三钱；腹下有痞者，去牛膝，加三棱、莪术各六钱，桃仁、枳实各五钱，前五剂加槟榔五钱；腹有鬼胎者，状如怀胎，非真胎，宜用桃仁、干漆、肉桂、麝香、水银之类丸药以去之，再服本汤，以候经调；经水前期而至者，加黄芩五钱，炒蒲黄五钱；经水过期而至，加干姜、牡丹皮各五钱；经水崩漏不止，加莲蓬壳灰五钱，白芷八钱，猪骨头灰六钱，熟艾三钱，黄芩五钱；平日有风寒湿气疼痛，加秦艽三钱，羌活七钱，乳香、没药各五钱，或加苍术；有热疼痛，加黄柏；心腹疼痛者，加大腹皮、木香各二钱，槟榔五钱；小便涩少不通，加猪苓、泽泻，亦不宜多服，恐泄肾气；室女经脉涩滞不通者，加刘寄奴六钱，不应，加卫矛三钱（即鬼箭羽）。

05497 先天青龙散

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】 灯草炭 粉儿茶各五钱 梅片 紫雪丹各一钱 薄荷 蒲黄各五钱 风化消五钱 硼砂二钱 青黛 人中白各三钱

【用法】 上为极细末。吹于患处，一日三次。

【主治】 咽喉初起，肿红焮痛，并不腐烂。

05498 年大将军洗痛方

【方源】《温氏经验良方》。

【组成】 威灵仙五钱 荆芥二钱半 防风二钱半 木香一钱 全当归三钱 乌药二钱 木瓜三钱 桂枝五钱 红花三钱半 川续断二钱半

【用法】 用黄酒五大碗煎滚，先熏后洗。

【功用】 止痛。

【主治】 跌打损伤。

05499 朱沉煎

【方源】《保婴集》。

【组成】 朱砂二钱（水飞） 沉香二钱 藿香叶三钱 滑石半两 丁香十四个

【用法】 上为细末。每服半钱，用新汲水一盏，芝麻油点成花子，抄药在上，须臾坠，滤去水，却用别水空心送下。

【主治】 小儿呕吐不止。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“朱沉丹”。

05500 朱附丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 附子一个（七钱重者） 朱砂三钱 巴豆七粒

【用法】 附子去脐，下剜一窍，入朱砂在内，再将取出附子屑填满，外用饼面裹厚两小钱许，可用巴豆去壳，分作十四片贴在面上，再用白面裹，仍用湿纸裹三五重，以文武火煨令面香，取出放冷，去面、巴豆，将附子去皮脐切片焙干为末，朱砂别研，二味和调，滴水为丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心食前浓煎桂花汤送下，每日一次，病重再服。

【主治】 干膈五噎。

05501 朱附丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 附子二两（炮，去皮脐，蒸） 酸枣仁半两（去皮炒，别研） 朱砂（好者，酒浸一伏时，别研） 茯神（去木）各一两

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒或盐汤送下。

【主治】 心虚，睡而汗出。

【备考】 本方加钟乳粉名"朱附钟乳丸"。

05502 朱珀散

【方源】《幼科证治大全》。

【组成】 滑石 朱砂 琥珀 甘草

【用法】 上为末。每服一钱，灯心汤调下。

【主治】 小儿尿血。

05503 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】 朱砂一分（细研） 麝香半分（细研） 干蝎二七枚（微炒） 白僵蚕一分（微炒） 胡黄连一分 熊胆一分 牛黄半分（细研）

【用法】 上为末，以粟米饭为丸，如绿豆大。每服三丸，以金银汤送下，不拘时候。

【主治】 小儿天钩，心神烦乱，抽搐不定。

05504 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】 朱砂一两（细研，水飞过） 铅霜一两 铁粉一两 马牙消一两

【用法】 上为细末，以枣肉为丸，如绿豆大。每服三丸，食后以熟水送下。

【主治】 小儿癫痫，发歇不定。

05505 朱砂丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】 朱砂（细研） 麝香（细研） 熊胆（细研） 芦荟（细研） 蜗牛（炒令微黄） 使君子 五灵脂 胡黄连各一分

【用法】 上为末，以烧饭为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下。

【功用】 益颜色，长肌肉，消积滞，杀疳虫。

【主治】 小儿气疳。

05506 朱砂丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷四，名见《准绳·幼科》卷二。

【组成】 朱砂 归身 白芍 侧柏叶（炒）各五钱 川芎 陈皮 甘草各二钱 黄连（炒）一钱半

【用法】 上为末，猪心血为丸服。

【主治】 劳役心跳，大虚证。

【备考】《准绳·幼科》本方用法：猪心血为丸，如粟米大。每服一百丸，龙眼汤送下。

05507 朱砂散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 朱砂一两（细研如粉） 牛黄一分（细研） 龙脑一分（细研） 麝香一分（细研） 茯神一两 人参一两（去芦头） 犀角屑一两 防风一两（去芦头） 铅霜一分（细研） 麦门冬一两（去心，焙） 真珠末一两 羚羊角屑一两 子芩一两 玄参一两 天竺黄一两（细研） 甘菊花一两 川升麻一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为细散，入研了药，都研令匀。每服一钱，煎金银汤调下，不拘时候。

【主治】 心风。烦躁狂言，胸膈壅滞，神思不安。

05508 朱砂散

【方源】 方出《证类本草》卷三引《简要济众方》，名见《医方类聚》卷十。

【组成】 白石英一两 朱砂一两

【用法】 上为散。每服半钱，食后、夜卧金银汤调下。

【功用】《医方类聚》：化痰安神。

【主治】 心脏不安，惊悸善忘，上膈风热。

【备考】《医方类聚》引《神巧万全方》有马牙消三分。

05509 朱砂散

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】 朴消 寒水石 朱砂 甘草各等分

【用法】 上为细末。贴少许。

【主治】 口疮。

05510 朱砂煎

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 朱砂一分（细研） 马牙消半两（细研） 黄连末半两 杏仁一两（汤浸去皮） 青盐一分

【用法】 上为末，以绵裹，用雪水二合，浸之一宿，更以绵滤过，于瓷盒中。每以铜箸取少许点之。

【主治】 眼白睛肿起，赤涩疼痛。

05511 朱砂煎

【方源】《中医眼科学讲义》。

【组成】 黄连 黄柏 秦皮 细辛 白芷各五钱 乳香一钱 朱砂（飞过） 分 冰片一分 蜂蜜二两

【用法】 先将前五味加水500毫升煎，煎至250

毫升，过滤，然后加乳香、蜂蜜、朱砂，再加热微煎，最后入冰片，略煎后过滤，净得药水250毫升。每隔2小时，滴眼一次。

【功用】 清热退翳。

【主治】 白膜侵睛。

05512 朱砂膏

【方源】《得效》卷十五。

【组成】 朱砂 硼砂 焰消各一钱半 金、银箔各五片 寒水石五钱 脑子一字 石膏五钱 粉草三钱

【用法】 上为末。每服二钱，麦门冬二十粒去心煎汤送下。

【主治】 心脏惊热至甚，不省人事。

05513 朱砂膏

【方源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】 枣仁 人参 赤苓各一两 西珀二钱半 朱砂 乳香各五钱

【用法】 上为末。每服一钱，灯心、大枣汤送下；或炼蜜为丸，薄荷汤送下亦可。

【主治】 癫痫。

05514 朱雀丸

【方源】《百一》卷一引苏韬光方。

【组成】 茯神二两（去皮） 沉香半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如小豆大。每服三十丸，食后入参汤送下。

【功用】 ①《百一》：消阴火，全心气。②《本草纲目》：养心安神。

【主治】 心肾不交，心悸怔忡，健忘。

①《百一》：心神不定，恍惚不乐，火不下降，时有振跳。②《丹溪心法》：心病，怔忡不止。③《医灯续焰》：心肾不交，心神不定，事多健忘。

【方论选录】《医方考》：因惊而得者，名曰惊气怔忡。《内经》曰：惊则气乱。宜其怔怔忡忡，如物之扑也。是方也，茯神之甘平，可以宁心；沉香之坚实，可使下气，气下则怔忡瘥矣。

【备考】《证治宝鉴》引本方有朱砂。

05515 朱雀汤

【方源】《外台》卷八引《深师方》。

【组成】 甘遂 芫花各一分 大戟三分

【用法】 上为散，以大枣十二枚（擘破），水六升，先煎枣，取二升；纳药三方寸匕，更煎取一升一合，分再服。以吐下为知，未知重服，甚良无比。

【主治】 久病癖饮，停痰不消，在胸膈上液液，时头眩痛，苦拳，眼睛、身体、手足、十指甲尽黄；亦疗胁下支满饮，辄引胁下痛。

05516 朱麝丹

【方源】《永乐大典》卷九七八引《卫生家宝》。

【组成】 朱砂一钱 全蝎一钱 蜈蚣一条（全者） 麝香 当门子半钱

【用法】 上为末，枣肉为丸，捏如钱眼大。每服半饼或一饼，麝香酒化下。

【主治】 小儿急慢惊风。

05517 朱砂安神丸

【方源】《内外伤辨》卷中。

【异名】 安神丸（《兰室秘藏》卷下）、朱砂丸（《普济方》卷十六）、黄连安神丸（《保婴撮要》卷十三）、安寝丸（《胎产指南》卷八）。

【组成】 朱砂五钱（另研，水飞为衣） 甘草五钱五分 黄连（去须净，酒洗）六钱 当归（去芦）二钱五分 生地黄一钱五分

【用法】 上药除朱砂外，四味共为细末，汤浸蒸饼为丸，如黍米大，以朱砂为衣。每服十五丸或二十丸，食后津唾咽下；或温水、凉水少许送下亦得。

【功用】 镇心安神，清热养血。

①《兰室秘藏》：镇阴火之浮行，以养上焦之原气。②《玉机微义》：宁心清神，凉血。③《明医指掌》：安胎孕，除烦热。④《景岳全书》：清心火，养血安神。⑤《全国中药成药处方集》（南京方）：镇静安眠。⑥《全国中药成药处方集》（西安方）：强壮、补血、镇静中枢神经。

【主治】 心火上炎，灼伤阴血，心神烦乱，怔忡，失眠多梦。

①《内外伤辨》：气浮心乱。②《兰室秘藏》：心神烦乱，怔忡，兀兀欲吐，胸中气乱而有热，有似懊侬之状，皆膈上血中伏火，蒸蒸然不安。③《丹溪心法》：血虚惊悸。④《医统》：夜卧不安。⑤《准绳·女科》：心经血虚头晕，惊悸。⑥《明医指掌》：痰痫。⑦《胎产指南》：忧愁思虑，伤心不食。⑧《医学心悟》：惊、悸、恐。⑨《叶氏女科》：妊娠五六月，平素火盛，或值天时炎热，内外之火相亢而心惊胆怯，烦躁不安，左寸微弱者。⑩《全国中药成药处方集》（杭州方）：血虚肝旺，心神烦乱，惊悸健忘，夜不安床，懊侬时作，怪梦频多。⑪《全国中药成药处方集》（西安方）：轻性贫血，脑贫血，神经过敏，精神不安，心悸亢进，心神烦乱不安，苦闷不眠。

【宜忌】 ①《全国中药成药处方集》（南昌方）：忌食辛辣、烟、酒。②《全国中药成药处方集》

（西安方）：因消化不良，胃部嘈杂，有似烦闷而怔忡不安，或不眠等症忌服。③《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌油腻。④《医方发挥》：不宜多服或久服，以防造成汞中毒。

【方论选录】 ①《内外伤辨》：《内经》曰：热淫所胜，治以甘寒，以苦泻之。以黄连之苦寒去心烦，除湿热为君；以甘草、生地黄之甘寒泻火补气，滋生阴血为臣；以当归补其血不足；朱砂纳浮溜之火，而安神明也。②《医方考》：梦中惊悸，心神不安者，此方主之。梦中惊悸者，心血虚而火袭之也。是方也，朱砂之重，可使安神；黄连之苦，可使泻火；生地之凉，可使清热；当归之辛，可使养血；乃甘草者，一可缓其炎炎之焰，一可以养气而生神也。③《杏苑》：以黄连、生甘草泻火热，川归、生地益心血，佐朱砂以安心神。④《张氏医通》：凡言心经药，都属心胞，惟朱砂外禀离明，内含真汞，故能交合水火，直入心脏。但其性徐缓，无迅扫阳焰之速效，是以更需黄连之苦寒以直折其势，甘草之甘缓以款启其微，俾膈上实火虚火，悉从小肠而降泄之。允为劳心伤神，动作伤气，扰乱虚阳之的方。岂特治热伤心包而已哉！然其奥又在当归之辛温走血，地黄之濡润滋阴，以杜火气复炽之路。其动静之机，多寡之制，各有至理，良工调剂之苦心，其可忽诸。⑤《古今名医方论》：叶仲坚：经云：神气舍心，精神毕具。又曰：心者，生之本，神之舍也。且心为君主之官，主不明则精气乱，神太劳则魂魄散，所以寤寐不安，淫邪发梦，轻则惊悸怔忡，重则痴妄癫狂也。朱砂具光明之体，色赤通心，重能镇怯，寒能胜热，甘以生津，抑阴火之浮游，以养上焦之元气，为安神之第一品；心若热，配黄连之苦寒，泻心热也；更佐甘草之甘以泻之；心主血，用当归之甘温，归心血也；更佐地黄之寒以补之。心血足则肝得所藏，而魂自安，心热解则肺得其职，而魂自宁也。⑥《时方歌括》：东垣之方多杂乱无纪，惟此方用朱砂之重以镇怯，黄连之苦以清热，当归之卒以嘘血，更取甘草之甘以制黄连之太过，地黄之润以助当归所不及。方意颇纯，亦堪节取。

【临证举例】 夜游症《中医杂志》（1981：11；62）：龙某某，男，14岁，学生。每于睡梦中惊起，启门而出，跌仆子田野荒丘，仍然沉睡。诊时见患儿神态如常，自觉心烦耳鸣，夜卧而出并不知觉，唯多梦易惊而已。舌红苔黄，脉弦数。今火扰心而心烦；火升木亢而耳鸣；火热扰于心肝，则神失守而魂飘荡，于是梦寐恍惚，变幻游行。治当清心泻火安神，镇肝定魂。予朱砂安神丸合磁朱丸。处方生地60克，黄连18克，当归30克，甘草15克，煅磁石30克，建曲18克。研末和蜜为丸，如黄豆大，外以朱砂9克为衣。早晚各服一次，每服30丸。服完二料丸剂，其病竟瘳。

05518 朱砂安神丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 黄连安神丸（《东垣试效方》卷一）。

【组成】 朱砂四钱 黄连五钱 生甘草二钱五分

【用法】 上为末，汤浸蒸饼为丸，如黍米大。每服十丸，食后津唾咽下。

【主治】 心烦懊侬，心乱怔忡，上热胸中气乱，心下痞闷，食入反出。

05519 朱砂安神丸

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】 黄连 白茯神 麦门冬 生地 枣仁

【主治】 心火旺，心血虚，不得卧者。

05520 朱砂红丸子

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】 朱砂（细研） 白术 白蔹 白附子 吴白芷 白僵蚕 木香各半两 白及 白茯苓 密陀僧各一钱半 钟乳粉二两

【用法】 上为细末，用阿胶半两熬成膏子，入上项药末为丸，如梧桐子大。用温水、蜜少许，磨化开，调涂面上，次日早晨用温水洗之。

【主治】 面色不莹净，及黯黯面黑皱。

05521 朱砂凉膈丸

【方源】《内外伤辨》卷中。

【组成】 黄连 山栀子各一两 人参 茯苓各五钱 朱砂三钱（别研） 脑子五分（别研）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五七丸，食后熟水送下，一日三次。

【主治】 上焦虚热，肺脘咽膈有气，如烟抢上。

05522 朱砂凉膈丸

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】 川黄连 黄柏 黄芩 大黄 天花粉 滑石 薄荷各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸。

【主治】 三焦积热，肠胃燥结，热应睛红。

05523 朱砂黄连丸

【方源】《普济方》卷一七六引《医方集成》。

【组成】 朱砂一两（另研） 宣连二两 生地黄三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服

五十丸，灯心枣汤送下。

【主治】 心虚蕴热，或因饮酒过多，发为消渴。

05524 朱砂鹿茸丸

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】 龙齿七钱 鹿茸一两半（酒浸，炙） 鹿角胶一两（蠃粉炒）

【用法】 上为细末。用石菖蒲、远志锉碎，酒浸，煮山药糊为丸，以朱砂为衣，如梧桐子大。每服三十丸，用木香匀气散送下；如无白浊，平补只用盐汤、温酒空心服。

【主治】 小便白浊。

05525 朱砂滚涎丸

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】 朱砂滚痰丸(《松崖医径》卷上)。

【组成】 朱砂（水飞） 白矾（生用） 赤石脂 硝石各等分

【用法】 上为细末，研蒜膏为丸，如绿豆大。每服三十丸，食后荆芥汤送下。

【主治】 五痫。

【备考】 本方原名朱砂滚涎散，与剂型不符，据《增补内经拾遗方论》改。

05526 朱砂滚痰丸

【方源】《济阳纲目》卷四十六。

【异名】 朱衣滚痰丸(《金鉴》卷五十一)。

【组成】 大黄（酒蒸） 片黄芩各八两 沉香半两 礞石（煅）一两 朱砂二两（另研为衣）

【用法】 上为细末，水为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，临卧、食后茶清、温水任下。

【主治】 痰热攻心，癫狂唱哭。

05527 朱僧热鹞方

【方源】《直指》卷二十。

【组成】 蝉壳（洗，晒）半两 蒺藜（炒，捣去刺）半两 防风 羌活 木贼（去芦，童便浸一宿，晒） 川芎 细辛 秦皮 枳实 荆芥 藁本 干菊 甘草各二钱半

【用法】 上为末。每服一钱，薄茶调下。

【主治】 眼热生翳。

05528 朱砂金银饰物汤

【方源】《千家妙方》卷下。

【组成】 党参6克 当归6克 枣仁9克 柏子仁6克 茯神6克 远志6克 石菖蒲6克 半夏6克 龙齿6克 牡蛎6克 朱砂6克 金银饰物各一件（同煎）

【用法】 水煎，日服一剂。

【功用】 安神镇惊。

【主治】 偶尔受凉，扰及心神。

【临证举例】 患者某某，童孩，一日自楼梯处倒仆墙隅。虽无直落地面，饱受惊恐。自是神气痴呆，不言不动，家人初以为偶然。次日视之，一仍前状，早餐已备，意不思食，强饲之则咽。与水亦饮，百计逗其言笑，惟张目呆视而已。其姑始惧，急来就诊。面色㿠白，唇舌如常，身无寒热，脉无异征。嘱服用朱砂金银饰物汤3剂。服后，嬉戏如常。

05529 休疟饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 人参 白术（炒） 当归各三四钱 何首乌（制）五钱 炙甘草八分

【用法】 水一钟半，煎七分，食远服，滓再煎；或用阴阳水各一钟，煎一钟，滓亦如之，俱露一宿，次早温服一钟，饭后食远再服一钟。如气血多滞者，或用酒、水各一钟煎服；或服药后饮酒数杯亦可。

【功用】 止疟。

【主治】 疟疾。

【加减】 如阳虚多寒，宜温中散寒者，加干姜、肉桂之类，甚者或加制附子；如阴虚多热，烦渴喜冷，宜滋阴清火者，加麦冬、生地、芍药；甚者加知母，或加黄芩；如肾阴不足，水不制火，虚烦虚惫，腰痠脚软，或脾虚痞闷者，加熟地、枸杞、山药、杜仲之类，以滋脾肾之真阴；如邪有未尽而留连难愈者，于此方加柴胡、麻黄、细辛、紫苏之属，自无不可。

05530 伏虎丹

【方源】《局方》卷一（续添诸局经验秘方）。

【组成】 生干地黄 蔓荆子（去白） 白僵蚕（炒去丝）各一分 五灵脂（去皮）半两 牵牛花（炒） 天南星 白胶香 草乌头（炮）各一两

【用法】 上为细末。酒煮半夏末糊为丸，如龙眼大。每一丸分作四服，酒送下，一日二次。

【主治】 左瘫右痪。

【临证举例】 风疾 昔建康府乌衣巷，有一老人姓钟，平生好道，朝夕瞻仰茅山，缘多酒，偶患风疾，百治无效。一日忽有一道人至，言其困酒太过，教服此药，道人遂不见，服之果验。

05531 伏梁丸

【方源】《外科精义》卷下引《养生必用》。

【组成】 厚朴（生姜汁制） 茯苓 枳壳（麸炒，去瓤） 白术 荆三棱（炮） 半夏（汤洗七次） 人参各一两

【主治】 ①《外科精义》引《养生必用》：环脐肿痛，肠胃疮疽。②《三因》：心之积，起于脐下，上至心，大如臂，久久不已，病烦心，身体髀股皆肿，环脐而痛，其脉沉而芤。

【备考】《三因》本方用法：上为末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前米饮送下，一日二次；或作散，酒调服。

05532 伏龙肝汤

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】 伏龙肝五合 甘草二两（炙） 干姜二两 黄柏五两 黄芩二两 牛膝根二两 榉二两（炙） 烧头发屑二合 阿胶二两

【用法】 上切。以水七升，煮取三升，去滓，下阿胶更煎，取胶烊，下发屑，分三服。

【主治】 下焦虚寒损，或先见血后便转，此为近血，或利不利。

【宜忌】 忌海藻、菘菜。

05533 伏龙肝汤

【方源】 方出《千金》卷十二，名见《千金翼》卷十八。

【异名】 伏龙肝散(《大全良方》卷七)。

【组成】 伏龙肝（如鸡子）一枚 生竹茹一升 芍药 当归 黄芩 芎劳 甘草各二两 生地黄一斤

【用法】 上㕮咀。以水一斗三升，先煮竹茹，减三升，下药，取三升，分三服。

【主治】 五脏热结，吐血、衄血。

【备考】《千金翼》有桂心。

05534 伏龙肝汤

【方源】《千金》卷二十。

【异名】 伏龙肝散(《圣惠》卷四十七)。

【组成】 伏龙肝五合（末） 干地黄五两（一方用黄柏） 阿胶三两 发灰二合 甘草 干姜 黄芩 地榆 牛膝各三两（一作牛劳根）

【用法】 上㕮咀。以水九升，煮取三升，去滓下胶煮消，下发灰，分为三服。

【主治】 下焦虚寒损，或先见血后便转，此为近血，或利不利。

【宜忌】《普济方》：忌海藻、菘菜、芜荑。

【方论选录】《千金方衍义》：黄土汤于中除术、附，加干姜、牛膝、地榆、发灰以散血中之滞；缘其人荣血既伤，下焦虽有虚寒，但需干姜之温散，不胜术附之燥烈也。可见治血但取归经，不必究其先后远近耳。

【备考】《外台》引《崔氏方》有生榉皮，无地榆。

05535 伏龙肝汤

【方源】《千金翼》卷十八

【组成】 伏龙肝半升 干地黄 干姜 牛膝各二两 阿胶（炙） 甘草（炙）各三两

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升，去滓，纳胶，分三服。

【主治】 吐血，衄血。

05536 伏龙肝饮

【方源】《普济方》卷二一五引《十便良方》。

【组成】 甘草 川芎 伏龙肝 黄芩各一两 赤芍药一两

【用法】 上为粗末。用水一升，药半两，煎至七分，去滓，分作三服，温服之。

【主治】 血淋。

05537 伏龙肝散

【方源】 方出《圣惠》卷七十，名见《普济方》卷三一九。

【组成】 生地黄汁六合 刺蓟汁六合 生麦门冬汁六合 伏龙肝（末）

【用法】 上件药，暖三味汁，调下伏龙肝末一钱。

【主治】 妇人鼻衄。

05538 伏龙肝散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】 伏龙肝一两 赤石脂一两 龙骨一两 牡蛎一两（烧为粉） 乌贼鱼骨一两（烧灰） 禹余粮一两（烧，醋淬七遍） 桂心一两 白术一两 黄牛角鰓一两（烧灰）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 妇人漏下，或愈或剧，身体羸瘦，饮食减少，四肢无力。

05539 伏龙肝散

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】 芎劳一两 生地黄一分 阿胶八钱（炙） 当归一两 续断一分 地榆 刺蓟根一两 伏龙肝七钱 青竹茹八钱

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏半，煎至一盏，温服，一日五次，不拘时候。后服补药。

【主治】 妇人血崩不止，或结作片者。

05540 伏龙肝散

【方源】《三因》卷十六。

【组成】 伏龙肝不拘多少

【用法】 上为末。以鸡子白和敷之，一日三次。

【主治】 少小诸种丹毒。

05541 伏龙肝散

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】 伏龙肝 赤石脂 余粮 当归 熟地 川断 附子 艾炭 侧柏叶

【主治】 崩中。因气血劳伤，冲任脉虚，脐腹疼痛，遂成五色杂下之候者。

05542 伐木丸

【方源】《本草纲目》卷十一引《张三丰仙传方》。

【异名】 阴鹭丸(《医学入门》卷七引周益公方)、三丰伐木丸(《中国医学大辞典》)。

【组成】 苍术二斤（米泔水浸二宿，同黄酒面曲四两炒赤色） 皂矾一斤（醋拌晒干，入瓶，火煅）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，好酒、米汤任下，一日二三次。

【功用】 助土益元。

【主治】 ①《本草纲目》引《张三丰仙传方》：脾土衰弱，肝木气盛，木来克土，病心腹中满，或黄肿如土色。②《医学入门》引周益公方：黄肿，水肿腹胀，溏泻。

05543 伐毛丹

【方源】《串雅内编》卷四。

【组成】 乳香（灯草拌炒） 硇砂各一两

【用法】 上为末，饭为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心、临卧滚水送下。自然退落。

【主治】 鼻毛粗长异常，痛不可忍。

05544 任督两滋汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】 白术一两 人参五钱 肉桂一钱 茯苓三钱 白果十个 黑豆一大把 杜仲五钱 巴戟天五钱

【用法】 水煎服。

【功用】 摄精受孕。

【主治】 妇人无子。腰痠背楚，胸中胀闷，腹内生瘕，日日思寝，朝朝欲卧，百计求子，不能如愿。

05545 伤心汤

【方源】《千金》卷十四。

【组成】 茯神 黄芩 远志 干地黄各三两 甘草 阿胶 糖各一两 半夏 附子 桂心 生姜各二两 石膏 麦门冬各四两 大枣三十枚

【用法】 上㕮咀。以水一斗，取煮三升，去滓，纳糖、阿胶更煎，取二升二合，分三服。

【主治】 心气不足，腹背相引痛，不能俯仰。

【方论选录】《千金方衍义》：地黄、阿胶滋培阴血，桂心、附子、茯神、远志开通经窍，黄芩、石膏、麦门冬清理肌表旺气，半夏、姜、枣涤除隔上顽痰，甘草、饴糖和脾缓急，以和腹背相引之痛。

05546 伤药膏

【方源】《中医伤科学》。

【组成】 乳香 10 份 没药 10 份 血竭 10 份 羌活 10 份 独活 10 份 续断 10 份 甲珠 10 份 香附 10 份 木瓜 10 份 川芎 10 份 自然铜 10 份 川乌 6 份 草乌 6 份 南星 6 份 荆芥皮 8 份 白芷 8 份 泽兰 8 份 小茴 8 份 上桂 8 份 麝香 1 份

【用法】 上为细末。蜜或水、酒各半调敷。

【功用】 活血祛瘀，消肿止痛。

【主治】 各类骨折，脱位，伤筋。

05547 伤筋药水

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】 生草乌 生川乌 羌活 独活 生半夏 生栀子 生大黄 生木瓜 路路通各四两 生蒲黄 樟脑 苏木各三两 赤芍 红花 生南星各二两 白酒二十斤 米醋五斤

【用法】 上药在酒、醋中浸泡七天，严密盖闭，装入瓶中备用。患处热敷或熏洗后，用棉花蘸本品在患处轻擦三五次。

【主治】 筋络挛缩，筋骨痠痛，风湿麻木。

05548 伤后清脑汤

【方源】《千家妙方》上册引关幼波方。

【组成】 何首乌 15 克 钩藤 15 克 滁菊花 12 克 生石膏 15 克 全蝎 15 克 旋覆花 10 克（包煎） 赭石 10 克（包煎） 生地 15 克 白芍 15 克 当归 12 克 川芎 4.5 克 川石斛 15 克 磁石 15 克 香附 15 克

【用法】 水煎服，每日一剂。

【功用】 养血和血，平肝潜阳，熄风化痰。

【主治】 脑震荡后遗症。

【临证举例】 脑震荡后遗症 方某某，男，38 岁。于 1968 年 7 月 1 日来诊。患者于 1967 年 12 月 28 日被汽车撞倒，昏迷达 3 小时多，经某医院抢救脱险。此后感觉严重头晕，不敢翻身，时时恶心欲吐，一直卧床约 20 余天。住院达二月余，出院时头晕虽有减轻，能够起床活动，但头部仍不能左右旋转，也不敢前倾后仰，稍稍振动，则感头晕加重。记忆力明显减退，睡眠不宁，胃脘不舒，大便溏薄。舌苔白，脉弦滑。投以“伤后清脑汤”，连服10剂后，头晕明显减轻，转动头部已无明显

不适之感，临床症状得以改善。

05549 伤科十宝丹

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】 大梅片一钱二分 麝香一钱二分 乳香三钱（去油） 没药三钱（去油） 结子红花五钱 血竭二钱五分 辰砂三钱 雄黄五钱 儿茶二钱五分 归尾二两

【用法】 上为细末，瓷瓶收藏，口用黄蜡封固，勿令泄气，如泄气则发霉无效。每服五分，好黄酒随量下，重者两服。

【主治】 一切金刀跌打损伤，木石折伤。

05550 伤湿止痛膏

【方源】《中药制剂手册》引上海中药制药三厂方。

【组成】 骨碎补六十四两 生川乌三十二两 生草乌三十二两 山柰九十六两 老鹳草六十四两 马钱子三十二两 白芷九十六两 干姜九十六两 肉桂六十四两 荆芥六十四两 五加皮六十四两 乳香三十二两 没药三十二两 落得打三十四两 防风六十四两 颠茄浸膏四十八两 冬青油四十八两 樟脑六十四两 薄荷脑三十二两 芸香膏四十两 冰片三十二两

辅料：橡胶五一二两 汽油一四四〇两 羊毛脂一二八两 氧化锌六四〇两 松香五一二两 椰子油三十二两 凡士林六十四两

【用法】 按处方将上药炮制合格，称量配齐。颠茄浸膏至冰片和辅料单放；取骨碎补至防风等十六味，共轧为3号粗末，橡胶轧为薄片，松香轧为细粉；取骨碎补等十六味粗末，用五倍量95%乙醇按渗漉法提取；收集滤液，回收乙醇，浓缩为稠膏药二五〇两；将橡胶薄片置汽油内浸泡，随时搅拌，至橡胶全部膨胀，软化；密闭24小时，取上项胶浆置打胶桶内搅拌3小时，加入凡士林，羊毛脂，冬青油，搅拌1小时，加入氧化锌，继续搅拌，1小时后，加入松香，再搅拌2小时，加入薄荷脑、樟脑、冰片、颠茄浸膏、芸香膏和骨碎补等浓缩膏，将所有药料加完后，继续搅拌2小时，至全部溶解均匀为止，用60～80目筛网过筛，装入桶内密闭，静置五至六天；取混合胶浆置涂胶机上涂胶，在涂胶前1小时，开放送热设备，待烘道全部热透，再开始涂胶；每涂20公尺落机（剪下）一次。将落机的整卷胶布切段，每段7公分，并将两段胶面相对，夹一层硬质纱布（或塑料薄膜），再切成5公分长的小段。将患处洗净揩干，撕去纱布，贴于患处。浴后贴用更好。

【功用】 祛风除湿，化瘀止痛。

【主治】 风湿痛、腰腿、筋骨、关节痛及跌打损伤等症。

【宜忌】 孕妇忌用。

05551 伤湿止痛膏

【方源】《中国药典》。

【组成】 伤湿止痛流浸膏（生草乌、生川乌、乳香、没药、生马钱子、丁香各1份，肉桂、荆芥、防风、老鹳草、香加皮、积雪草、骨碎补各2份，白芷、山柰、干姜各三份，粉碎成粗份，用90%乙醇制成相对密度约为1.05的流浸膏）50克 水杨酸甲酯15克 薄荷脑10克 冰片10克 樟脑20克 芸香浸膏12.5克 颠茄流浸膏30克

【用法】 按处方量称取各药，另加3.7～4.0倍重量由橡胶，松香等制成的基质，制成涂料。进行涂膏，切段，盖衬，切成小块即得。密闭，避热。贴患处。

【功用】 祛风湿，活血止痛。

【主治】 风湿关节、肌肉痛，扭伤。

【宜忌】 孕妇慎用。

05552 伤科回生第一仙丹

【方源】《集成良方三百种》卷下引彭竹楼方。

【组成】 大土鳖虫（活大而公者。去足，放瓦上，木炭微火焙黄，研细）五钱 自然铜（研细）三钱（放瓦上，木炭火烧红，入好醋内淬半刻，取出，再烧再淬，连制九次） 真乳香（研细）二钱（每一钱，用灯草一分五厘，在砂锅内同炒枯，与灯草灰同研，吹去灯草灰，再别研细） 真陈血竭（研细，飞净）二钱 真辰砂（研细，飞净）二钱 全当归（研细）一两（用陈醋泡透，砂锅炒干，研细） 真正当门麝（研细）一钱

【用法】 如法炮制，称准分两，为极细末，用小瓶盛入，每瓶一分五厘为一服，用蜡封口，切勿泄气。遇受伤人，即用一饼，以好黄酒冲服；能饮酒者，多饮尤好，使瘀血下行，小儿减半。伤重者，三五服，伤轻者一二服。立效。倘致命重伤，酌以数瓶敷之，其效尤速，伤非致命，即不用敷。

【主治】 跌伤、压伤、打伤、刀伤、割喉，吊死，冻死，溺死，雷震死；火器伤，木器伤遍体鳞伤，骨折筋断，肠出脑漏。

【宜忌】 冻死者放暖室中，不可近火，多垫稻草，棉被褥；溺水死者，须令将水吐出；割喉者，将头扶正，合住刀口，用生松香、生半夏等分，共研极细末，在伤口周围厚厚敷紧，外用膏药，周围连好肉一并裹住，再用布条围裹，用线缝好，一月

平复如故；肠出者，用好醋一盆煎热，不可太热，尤不可凉，托肠入盆洗之，随洗随收，用寻常膏药，加此丹贴伤口；溺水死，及吊死者，不可令泄气 以上均即速服药一瓶，活后以及伤愈，切宜避风尤宜避房事、气恼。

【加减】 如伤后心腹疼痛，乃瘀血未净，用上白砂糖一二两，水冲时时代茶饮之，如受伤牙关紧闭，须用生乌梅擦牙即开，用生半夏擦两腮亦开；倘气已绝，必须打落一齿灌之。

05553 华佗散

【方源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】 炙乳没各一钱 生南星一钱 刘寄奴一钱 肉桂二钱 细辛一钱五分 牙皂一钱 丁香一钱 急性子二钱 大茴香一钱 三奈一钱 羌独活各一钱 归尾二钱 川续一钱 广皮一钱 落得打一钱

【用法】 上为细末。掺膏药上贴之，五日一换。

【功用】 定痛，接骨舒筋。

【主治】 骨断筋缩，骨节脱臼，不得转动。

05554 华盖散

【方源】《博济》卷二。

【异名】 华盖汤(《圣济总录》卷四十八)。

【组成】 紫苏子（炒） 麻黄（去根节） 杏仁（以尖） 陈皮（去白） 甘草半两（炙） 桑白皮 赤茯苓（去皮）各一两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，煎至六分，食后温服。

【功用】《方剂学》：宣肺解表，祛痰止咳。

【主治】 ①《博济》：肺感寒气，有痰咳嗽，久疗不愈。②《局方》：肺感寒邪，咳嗽上气，胸膈烦满，项背拘急，声重鼻塞，头昏目眩，痰气不利，呀呷有声。

【备考】 方中杏仁，《校注妇人良方》作生姜。

05555 华盖散

【方源】《博济》卷三。

【组成】 麻黄三两（不去节） 甘草一两 杏仁二两（汤浸，去皮尖）

【用法】 上三味，先以前二味为粗末，后入杏仁，研细，同拌令匀。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓服，一日三次。

【功用】 解表，滋润皮肤。

【主治】 咳嗽。

05556 华盖散

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】 赤茯苓（赤皮） 甜葶苈（隔纸炒） 桑根白皮（锉）各一两 大黄半两（湿纸裹，煨熟）

【用法】 上为散。每服二钱匕，生姜汤调下，食后临卧服。

【主治】 肺痈。上喘咳嗽，胸膈满闷，口干烦热及吐血。

05557 华盖散

【方源】《三因》卷十二。

【组成】 甜葶苈半两 苦葶苈半两（并用纸隔炒） 茯苓 人参 细辛 干姜（炮） 桔梗（锉，炒） 杏仁（去皮尖，麸炒） 紫菀 款冬花 甘草（炙） 陈皮各一分

【用法】 上为细末，用羊肺一个心血不透者，切细研烂，旋旋入药掺肺内，再研匀，药尽为度，泥土墙上，以湿纸七重盖覆，每日去纸一重，七日药就，候干刮下，再研，罗为细末。每服二钱，空心温酒盐汤调下，米饮亦得，一日二次。

【主治】 肺虚，或感风寒暑湿，及劳逸、抑郁、忧思、喜怒、饮食饥饱，致脏气不平，咳唾脓血，渐成肺痿，憎寒发热，羸瘦困顿，皮肤甲错，将成劳瘵。

05558 华盖散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 糯米

【用法】 用糯米煮烂饭，捣如膏，随将秃疮剃净，将米膏厚罨之。其虫尽入米膏中，俟膏自脱，发自生矣。

【主治】 秃疮。

05559 华盖煮散

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】 款冬花（去梗） 知母（焙） 贝母（去心，炒）各一两 紫菀（去苗土） 桔梗（炒）各三分 木香 甜葶苈（微炒）各半两 杏仁（去皮尖双仁，炒） 三分 防己半两 蝉壳一两

【用法】 上为散。每服三钱匕，水一盏，入酥少许，煎至七分，食后温服。

【主治】 咳嗽上气。

05560 华佗累效散

【方源】《金鉴》卷七十一。

【组成】 乳香 硇砂各一钱 轻粉五分 橄榄核（烧，存性）三枚 黄丹三分

【用法】 上为细末。香油调敷患处。

【主治】 甲疽。

05561 华佗救脱阳方

【方源】《景岳全书》卷五十八。

【组成】 葱白一握 附子一个（重一两，切八

片） 白术 干姜各五钱 木香二钱

【用法】 先用葱白一握微捣碎，炒热用布包，熨脐下，以二包更替熨之，甚者仍灸气海、关元二三十壮，脉渐出，手足渐温，乃可生也；次用附子一个（重一两），切八片，白术、干姜、木香，同用水二钟煎一钟。候冷灌眼，须臾又进一眼，或煎服回阳等汤。

【主治】 寒中三阳，口噤失音，四肢强直，挛急疼痛，似乎中风及厥逆，唇青囊缩，无脉或卒倒，尸厥脱阳等证。

05562 延年丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【异名】 枸杞子丸（《圣济总录》卷一八六）。

【组成】 菟丝子（酒浸七日，炒黄）三两 枸杞子（去梗） 覆盆子（去萼） 车前子（酒浸） 巴戟天（去心） 远志（去心） 生干地黄 细辛（去苗叶） 白术（炒） 菖蒲（锉） 何首乌（去黑皮） 地骨皮 牛膝（酒浸一宿） 续断 菊花（去梗萼）各一两半

【用法】 上药除菊花外，以温水和酒少许洗过，焙干，杵罗为丸，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心常服；丈夫盐汤、妇人醋汤送下，午食前更一服。服至十服，其人病却有发时，是药动病本，功应过。

【功用】 平补五脏，治百病；育神气，强力益志，美颜色，变髭发。

05563 延寿丸

【方源】《袖珍方》卷二。

【组成】 鹿茸三两（切片，撩毛，酥炙） 沉香 苁蓉（酒浸） 菟丝子（酒蒸） 杜仲（炒） 当归（酒浸，焙） 胡芦巴（炒） 补骨脂（炒） 枳实（去瓤） 石莲（猪肉煮） 续断（炒） 枸杞子 五味子 川巴戟（去心）各二两 胡桃肉十四个

【用法】 上为末，黄犬肉或羊肉二斤（切），用无灰酒并葱、椒、青盐、桂花、茴香同煮烂，入石臼杵成膏子，却入山药糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至一百丸，空心盐酒送下。

【主治】 元阳虚惫，诸虚不足，行履无力，肢体瘦痛。

05564 延寿丹

【方源】《医学正传》卷三引《千金》。

【组成】 五味子 菟丝子（煮烂另研） 川牛膝 杜仲（姜汁拌，炒丝断） 川归（酒浸） 山药 天门冬 麦门冬（去心） 生地黄 熟地黄各一两 肉苁蓉二两 人参 白茯苓 大茴香 泽泻 地骨皮 鹿茸 菖蒲（九节者） 花椒 巴戟（去心） 远志（去心） 覆盆子（炒去汗） 枸杞子 柏子仁各五钱

【用法】 上为细末。勿犯铁器，蒸捣，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心温酒或生姜盐汤送下。

【功用】 却痰延年。

【主治】 诸虚百损，怯弱欲成痨瘵及大病后虚损不复。

【宜忌】 忌萝卜菜。

【加减】 如大便溏，小便不利，加车前子二两；如精滑或梦遗，加赤石脂、山茱萸肉各五钱。

05565 延寿丹

【方源】《普济方》卷二二六引《伤寒直格》。

【组成】 牛膝（去芦，酒浸一宿） 菟丝子（酒浸一宿） 远志（去心） 地骨皮 石菖蒲 甘菊花 熟干地黄各等分

【用法】 上为细末。用浸药酒熬面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至二十丸，空心临卧温酒送下，一日三次。

【功用】 清心益志，和血驻颜，延年益寿。

【主治】 元脏虚冷，筋骨缓弱，肝肾不足，精神困乏。

05566 延寿丹

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】 天门冬（去心） 远志（去心） 山药 巴戟各二两 赤石脂 车前子 菖蒲 柏子仁 泽泻 川椒（去目，炒） 熟地 生地 枸杞 茯苓 覆盆子各一两 牛膝（酒浸） 杜仲（炒） 菟丝子（酒浸） 苁蓉各四两 当归（酒洗） 地骨 人参 五味子各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸。

【功用】 延寿。

05567 延寿丹

【方源】《扶寿精方》。

【组成】 赤、白何首乌（鲜者，竹刀刮去皮，切片。如无鲜者，用干者，米泔浸一宿，以瓷片刮皮，舂作弹子大）各一斤 牛膝（去芦）半斤（用黑豆三升，同二乌木甑同处，蒸一日，取牛膝去心，共成泥，晒干为末） 菟丝子半斤（酒浸蒸熟，舂去皮，晒干，扬净，复舂为米） 白茯苓（去皮，舂作弹子大）一斤（用人乳五升浸透，蒸透熟） 破故纸半斤（炒香为末，外加） 生地黄二斤（一斤酒浸，九蒸九晒；一斤只酒浸透用） 赤茯苓

（去皮）一斤（用牛乳同前制）

【用法】 上为极细末。皆勿犯铁，炼蜜为丸（炼蜜滴水成珠，取俟三日火毒退方合用），每一丸重一钱二分。每服一丸，一日三次，空心酒送下；午间姜汤，临睡淡盐汤送下。必如此引，不可错乱。久服渐渐加大。初服三四日，小便多或杂色，是五脏中杂病出；一七日唇红生津液，再不夜起；若微有腹痛，勿惧，是搜病；三七日，身体轻便，两乳红润；一月鼻觉辛酸，是诸风百病皆出。

【功用】 补血生精，泻火益水，强筋骨，黑须发。

05568 延寿丹

【方源】《遵生八笺》卷十七引罗真人方。

【组成】 干山药一两（去皮） 人参一两（去芦） 白茯苓一两（去皮） 川牛膝一两（酒浸） 杜仲一两（姜制去丝） 龙骨一两 川续断一两（去芦） 鹿茸一两 当归一两（酒浸洗） 山药苗一两 北五味一两 熟地黄一两（酒浸） 石菖蒲一两 楮实子一两（去瓤） 破故纸一两（炒） 麦门冬一两（去心） 辽枸杞五钱

【用法】 上为极细末，以酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸或六七十丸，淡盐汤送下，一日二次。服至五日，体自轻健；至十日，精神倍爽；半月之后，气力壮勇；二十四日后，眼目清朗，语言响亮；一月之余，饮食大进，颜色红润，步履轻健，冬月手足常暖。此药不热不燥，老幼皆可服。

【功用】 常服此药，阴阳升降无偏，充实肌肤，填精补髓，精神倍长，强壮筋骨，悦颜色，固真气，和百脉，正三焦，乌须发，坚齿牙，聪耳明目，老能轻健。

【主治】 男子五劳七伤，诸虚不足，阳痿气弱无力，心肾不交，精神欠爽，小便频数，腰膝疼痛。妇人赤白带下，起居倦怠，脚冷麻痹，不能久立，肾气不和，脐腹疼痛，经水愆期，无孕。

【加减】 如下元虚冷，加鹿茸五钱，附子五钱。

05569 延寿丹

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】 白术（土炒） 青皮 生地 厚朴（姜汁炒） 杜仲（姜汁炒） 故纸（微炒） 广皮（去净白） 川椒 青盐 黑豆二升 巴戟肉（去心） 白茯苓 小茴香 肉苁蓉（竹刀剖净鳞，黄酒洗，晒干）各一两

【用法】 制好，入铜锅，或砂锅亦可，用水二十小碗，桑柴文武火，煎至十小碗，将水盛出；复煎药滓，用水十小碗，煎至五小碗，去滓不用，惟用二次药水十五碗，将黑豆放锅内，用火缓缓煎至水干，盛起候冷，入瓷罐装贮。每早空心服三钱，开水送下，不可间断。

【功用】 添精补髓，健脾养胃，乌须延寿，轻身健壮，返老还童，中阳复兴，少阳复起，调妇人经水，暖下安胎。

【主治】 痔漏疮毒，赤白带下。

【宜忌】 妇人受胎之后，不可再服，恐受双胎。忌食牛、马肉。

05570 延附汤

【方源】《济生》卷三。

【组成】 延胡索（炒，去皮） 附子（炮去皮脐）各一两 木香（不见火）半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，生姜七片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 七疝。心腹冷痛，肠鸣气走，身寒自汗，大肠闭。

【备考】 本方方名，《医方类聚》引作“玄附汤”。

05571 延胡散

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】 延胡索 胡椒各等分

【用法】 上为末。每服二钱，食前温酒调服。

【主治】 冷气心疼及疝气腹痛。

05572 延息汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】 人参 百合各五钱 甘草一钱 熟地一两 山茱萸四钱 牛膝二钱 北五味五分 茯苓三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 终朝咳嗽，吐痰气喘，少若行动则气不足以息。

05573 延龄丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】 牛膝（酒浸二宿） 苁蓉（酒浸二宿） 金铃子（去皮） 补骨脂（炒） 川茴香（炒）各七钱半 鹿茸（去毛） 益智仁 檀香 晚蚕蛾（炒） 没药（研） 丁香 青盐 川山甲各半两（炙） 沉香 香附子（炒） 姜黄 薯蓣 木香、巴戟（去心） 甘草（炙）各一两 乳香（研） 白术 青皮 苍术三两

【用法】 上为细末。酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心温酒送下；或煎茴香汤送下。

【功用】 补五脏，养真阳，和血脉，壮筋骨。

【主治】 脾肾不足，真气伤惫，肢节困倦，举动乏力，怠惰嗜卧，面无润泽，不思饮食，气不宣畅，少腹里急，脐下疞痛，及奔豚、盲肠气攻充脐腹，发歇无时。

05574 延胡索丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【异名】 炼阴丹(《普济方》卷二四九)。

【组成】 延胡索 青橘皮（汤浸去白，焙） 胡芦巴 海藻（酒洗去咸，焙干） 昆布（酒洗去咸，焙干） 马蔺花 茴香子（炒） 楝实肉（炒）各一两 木香半两 巴戟（酒浸，切，焙）一分

【用法】 上为末，入硇砂，阿魏，安息香三味各一分，以醋二升化开，去泥土以重汤煮令成膏，为丸，如绿豆大。每服二十丸，烧绵灰酒送下，空心、食前服。

【主治】 小肠受寒，控睾，少腹坚硬，疼痛不可忍。

05575 延胡索汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】 延胡索 当归（切，炒） 芍药 芎劳桂（去粗皮） 甘草（炙）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 半产后气血不快，恶露断续。

05576 延胡索汤

【方源】《济生》卷六。

【组成】 当归（去芦，酒浸，锉炒） 延胡索（炒去皮） 蒲黄（炒） 赤芍药 官桂（不见火）各半两 片子姜黄（洗） 乳香 没药 木香（不见火）各三两 甘草（炙）二钱半

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 妇人室女，七情伤感，遂使血与气并，心腹作痛，或连腰胁，或引背膂，上下攻刺，甚至搐搦，经候不调，一切血气疼痛。

【加减】 吐逆加半夏、橘红各半两。

【备考】 本方方名，《得效》引作“玄胡索汤”；《东医宝鉴·外形篇》引作“玄胡索散”；方中片子姜黄，《妇科玉尺》作“姜汁炒黄连”。

05577 延胡索散

【方源】《普济方》卷三四五引《产经》。

【异名】 元胡索散(《济阴纲目》卷十一)。

【组成】 当归（酒浸） 延胡索 赤芍药 蒲黄（纸隔炒） 桂（不见火，去皮） 乳香（水研） 没药各五钱

【用法】 上为细末。每服三钱，空心酒调下。

【主治】 ①《普济方》引《产经》：产后血气攻刺，腹痛不止，及新旧虚实痛不止。②《医略六书》：月经不调，脉弦滞涩者。

【方论选录】《医略六书》：当归养血脉以荣经，蒲黄破瘀血以通经，赤芍化滞血，延胡调经脉，乳香和血于经，没药散血于络，桂皮温散以行经络也。为散酒煮，使血滞既化则经寒亦散，而经行如度，何有攻刺疼痛之患乎！

05578 延胡索散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【异名】 延胡索饮(《圣济总录》卷一四四)。

【组成】 延胡索一两半 桂心一两半 没药一两半 黄耆一两半（锉） 当归一两（锉，微炒） 白蔹一两 桑寄生一两 熟干地黄一两半

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓温服，一日三四次。

【主治】 伤折疼痛，筋骨未合，肌肉未生。

05579 延胡索散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】 延胡索三分 当归三分（锉，微炒） 芎劳三分 木香半两 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 赤芍药半两 桂心一分 熟干地黄一两 枳实半（麸炒微黄）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 妇人血气攻心腹疼痛。

05580 延胡索散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】 延胡索一两 当归一两（锉，微炒） 桂心一两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以童便、酒各半盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后儿枕攻上下，心腹疼痛。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“延胡散”。

05581 延胡索散

【方源】《妇人良方》卷二十引《经验妇人方》。

【异名】 延胡散(《济阴纲目》卷十一)。

【组成】 延胡索 当归各一两 真琥珀 蒲黄（炒）各一分 赤芍药半两 桂心三分 红蓝花二钱

【用法】 上为细末。每服三钱，以童便合温温调下，食前服。

【主治】 ①《妇人良方》引《经验妇人方》：产

后儿枕腹痛。②《医中一得》：产后房劳。

05582 延胡索散

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】 肉桂 延胡各等分

【用法】 上为细末，听用。每服以生化汤加入延胡索散，再加入熟地二钱。

【主治】 ①《胎产心法》：产后小腹痛，可按而止者。②《产宝》：产后血晕，血块痛。

05583 延年益嗣丹

【方源】《叶氏女科》卷四。

【组成】 人参三两 天冬（酒浸，去心）三两 麦冬（酒去心）三两 熟地黄（酒蒸捣） 生地黄各二两 茯苓（酒浸，晒干）五两 地骨皮（酒浸）五两

【用法】 上加何首乌半斤，米泔浸透，竹刀刮去皮，切片，置砂锅内，入黑羊肉一斤，黑豆三合，量著水，上用甑算，算上铺放何首乌，密盖，勿令泄气，蒸一二时，以肉烂为度，取出晒干，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心温酒下。

【主治】 男子阳极艰嗣，相火炽盛，灼伤真阴，以致阳极，阳则亢；或过于强固，强固则胜败不洽，是以无子。

05584 延年断汗汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 黄耆（蜜炙） 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 芍药（白者） 肉桂（去粗皮，不见火） 甘草（炙） 牡蛎粉各等分

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，枣子一枚，乌梅一枚，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 自汗。

05585 延寿获嗣酒

【方源】《惠直堂方》卷一引青诚霍氏家传方。

【组成】 生地十二两（酒浸一宿，切片，用益智仁二两同蒸一炷香，去益智仁） 覆盆子（酒浸一宿，炒） 山药（炒） 芡实（炒） 茯神（去木） 柏子仁（去油） 沙苑（酒浸） 萸肉（酒浸） 肉苁蓉（去甲） 麦冬（去心） 牛膝各四两 鹿茸一对（酥炙）

【用法】 上药用烧酒五十斤，无灰酒二十斤，白酒十，龙眼肉半斤，核桃肉半斤，同入缸内，重汤煮七柱香，埋土七日，取起勿令泄气。每晚男女各饮四五杯，勿令醉。至百日后，健旺无比。

【功用】 补真阴，添精益髓，乌须明目，聪耳延年。

【主治】 素性弱，不耐风寒劳役，或思虑太过，致耗气血，或半身不遂，手足痿痹；或精元虚冷，久而不孕，及孕而多女，或频堕胎。

【宜忌】 忌房事月余。

【加减】 有力者，加人参四两更妙。

05586 延胡丁香丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 丁香疝气丸。

【组成】 羌活三钱 当归 茴香各二钱 延胡索 麻黄根节 肉桂各一钱 丁香 木香 甘草 川乌头各五分 防己三分 蝎十三个

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如鸡头子大。每服五十丸，空心盐白汤服。

【主治】 脐下撮急疼痛，并周身皆急痛，小便数，及五脉急，独肾脉按之不急，皆虚无力，名曰肾疝。

05587 延龄广嗣丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 杞子四两 线鱼胶四两 菟丝子六两 制首乌一两 茯苓一两 楮实子一两

【用法】 水为丸。每服四钱，淡盐汤送下。

【功用】 培养固本，益髓添精，兴阳种子，长春广嗣。

【主治】 男子下元虚损，久无子嗣，阳痿不兴，兴而不固。肾寒精冷，先天禀受不足，少年斫丧过度。

05588 延龄护宝丸

【方源】《产乳备要》。

【组成】 禹余粮石二两（烧，醋淬七遍） 龙骨 人参 桂 赤石脂 紫石英（研） 熟地黄 杜仲（去粗皮，锉碎） 桑寄生 续断 香白芷 芎藭 当归（锉，炒） 远志（去心） 金钗石斛（去根，锉，炒） 白茯苓（去皮） 阿胶（炒） 牡蛎 五味子 艾叶各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心、食前温粥饮送下。

【主治】 妇人血脏虚损，经候过多，每行时暴下不可禁止，因成崩中，连日不断，致五脏空虚，失色黄瘦，崩竭暂止，日少复发，不耐动摇，小劳辄极剧。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“延龄护宝丹”。

05589 延龄固本丹

【方源】《回春》卷四。

【异名】 延龄固本丸(《仙拈集》卷三)。

【组成】 天门冬（水泡，去心） 麦门冬（水泡，去心） 生地黄（酒洗） 熟地黄（酒蒸） 山药 牛膝（去芦，酒洗） 杜仲（去皮，姜酒炒） 巴戟（酒浸，去心） 五味子 枸杞子 山茱萸（酒蒸，去核） 白茯苓（去皮） 人参 木香 柏子仁各二两 老川椒 石菖蒲 远志（甘草水泡，去心） 泽泻各一两 肉苁蓉（酒洗）四两 覆盆子 车前子 菟丝子（酒炒烂，捣成饼，焙干） 地骨皮各一两半

【用法】 上为细末，好酒打稀面糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心温酒送下。服至半月，阳事雄壮，至一月颜如童子，目视十里，小便清滑；服至三月，白发返黑；久服神气不衰，身体轻健。

【功用】 延龄固本，壮阳事，驻颜色，乌须发，强健身体。

【主治】 五劳七伤，诸虚百损，颜色衰朽，形体羸瘦；中年阳事不举，精神短少；未至五旬，须发先白；并左瘫右痪，步履艰辛，脚膝疼痛，小肠疝气；妇人久无子息，下元虚冷。

【加减】 妇人加当归（酒洗），赤石脂（煨）各一两。

05590 延龄育子丸

【方源】《医便》卷一。

【异名】 延龄育子方(《医方考》卷六)。

【组成】 天门冬（去心）五两 麦门冬（去心）五两 怀生地黄 怀熟地黄（肥大沉水者）各五两 人参（去芦）五两 甘州枸杞子（去梗） 菟丝子（洗净，酒蒸捣饼，晒干）五两 川巴戟（去心）五两 川牛膝（去芦，酒洗）五两 白术（陈土炒）五两 白茯苓（去皮，牛乳浸，晒）五两 白茯神（去皮心，入乳浸，晒）五两 鹿角胶（真者）五两 鹿角霜五两 柏子仁（炒，去壳）五两 山药（姜汁炒）五两 山茱萸（去核）五两 肉苁蓉（去内心膜）五两 莲蕊（开者不用）五两 沙苑蒺藜（炒）五两 酸枣仁（炒）二两 北五味子（去梗）二两 石斛（去根）二两 远志（去芦，甘草灯心汤泡，去心）二两

【用法】 上各为末，将鹿角胶以酒化开，和炼蜜为丸，如梧桐子大。每服男人九十丸，妇人八十丸，空心滚白汤送下。

【主治】 少年斫丧，中年无子，妇人血虚，不能孕育。

【宜忌】 忌煎、炙、葱、蒜、萝卜。此方南人服效。

【方论选录】《医方考》：男女媾精，乃能有孕。然精者，五脏之所生，而藏之肾者也，故欲藏精于肾者，必调五脏，五脏盛而精生矣。是方也，人参、五味，天麦门冬补肺药也；伏神、远志、柏仁、枣仁、生地补心药也；白术、茯苓、山药、石斛补脾胃也；熟地、枸杞、菟丝、巴戟、牛膝、茱萸、苁蓉、沙苑蒺藜补肝肾也；鹿角胶，血气之属，用之所以生精；角霜、莲须收涩之品，用之所以固脱。如是五脏皆有养而精日生，乃能交媾而宜子矣。

【备考】 上药二十四味，合二十四气；一百单八两，合一年气候之成数，为生生不息之妙。

05591 延龄育子方

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【异名】 延龄育子丸、腽肭脐真方(《何氏济生论》卷七)。

【组成】 腽肭脐（用桑白皮一两，楮实子一两，山楂、麦芽、神曲、补骨脂各一两，黑芝麻、黑豆各一合，以上八味用酒水各一半煎水；外用酒洗腽肭脐，入前酒水内，浸以软为度。后用竹刀切碎，去膜，用瓦一块，荷叶衬瓦上，上用瓦一块盖之，慢火烘干，碾细为末，听用） 巨胜子五两（酒洗净，分为四份：芝麻、萝卜子、糯米、白芥子各炒一份） 甘枸杞子（去梗蒂）四两 生地黄（肥大沉水者，酒洗净）五两 熟地黄（肥大沉水者，酒洗净）五两 麦门冬（去心）五两 白术五两（上炒一份，麸炒一份，神曲炒一份，枳壳炒一份） 白茯苓（去皮心膜，乳浸，晒干）五两 菟丝子（酒洗净，浸一昼夜，蒸，捣饼，晒干）四两 人参（去芦）五两 柏子仁（炒，去壳）五两 山药（姜汁浸，炒干）四两 山茱萸（去核）五两 肉苁蓉（去甲膜，酒浸，晒干）五两 远志（去芦，甘草灯心汤泡，去核）二两 何首乌（黑豆汁蒸一份，盐水蒸一份，米泔水浸一份，醋浸一份）八两 鹿角霜五分 川巴戟（酒洗，去心）四两 石菖蒲（去芦，微炒）二两 当归（酒洗，去芦梢）二两 五味子（去梗）二两 川牛膝（去芦梢，酒洗，晒干）四两 沙苑蒺藜（炒）五两 川黄连（去须，吴茱萸汤浸一份，木香汤泡一份，姜汁泡一份，酒浸一份，晒干）三两 酸枣仁（去壳皮，炒）二两

【用法】 上药各为末。春加姜汁、竹沥；夏加香薷、木瓜、薏仁；秋加姜、茶、茱萸、木香；冬加紫苏、薄荷、苍术、厚朴煎汁，用蜜炼为丸。每服九十丸，滚白汤送下。

【功用】《何氏济生论》：轻身延年，润养平和，

延龄育子。

【主治】《何氏济生论》：男子肾气虚弱，逢阴而痿，未媾先遗等症。

05592 延龄益寿丹

【方源】《摄生众妙方》卷二引季全真方。

【组成】何首乌四两（竹刀刮去皮，切片，用黑豆九蒸九晒，后用入乳拌一次） 当归一两（酒洗净） 知母二两（酒炒去毛） 川芎一两 杜仲（去粗皮，姜汁炒去丝）二两 白茯苓一两（去皮） 青盐一两 茯神一两（去皮心） 远志一两（去芦心，甘草煎水浸半日） 川椒一两（去目，出汗，留红皮，去白肉） 牛膝（酒洗） 朱砂一两（研碎，打零炒） 蜜一斤（炼过镜光止） 姜汁二两 黄柏二两（去皮，酒浸，日晒夜浸） 破故纸（酒洗） 小茴香（去土，盐水洗，炒黄） 天门冬（去心）一两 麦门冬（去心）一两 核桃肉四两（去油，炒黄） 旱莲四两（水煎五滚） 石菖蒲（盐洗，炒）一两 生地黄（酒洗）一两 熟地黄（酒洗）一两 石乳（去油）一两 川巴戟（酒洗）一两 山精（用米泔水三两碗，浸半日，竹刀刮去粗皮四两，烂者不要，要选好的切碎，捣烂放砂锅内，水三碗，煎至锅内汁干，取出，砂锅内浸要换米泔水一二次，然后酒煎成膏，同旱芝莲汁，姜汁拌诸药末）

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，早晚盐汤任下；不饮酒，白汤送下。一月见效。

【功用】存精固气，通达二十四经脉，三百六十骨节，满注一身毛窍，使肾水满而养精，精能养气，气能满而养神，神能满而养身。服之半月，精满气盈，元气壮胜，武火下降，相火自灭，阳消阴长，滋益肾水。能补丹田，滑泽皮肤，百战百胜，男人精冷绝阳而补兴，妇人胎寒绝阴而补孕。服之一月，白发返黑，面如童颜。

05593 延龄广嗣仙方

【方源】《纲目拾遗》卷八。

【异名】延龄广嗣丸（《中国医学大辞典》）。

【组成】怀生地（酒制） 何首乌（酒煮） 旱莲草 鹿衍草（真者绝少，用仙灵脾代之）各三两 干山药（乳拌 白茯苓（乳拌 当归身（酒炒） 真青盐各一两 石菖蒲 菟丝子 肉苁蓉（酒浸，去膜） 补骨脂 五加皮 骨碎补 淮牛膝 白甘菊 原杜仲（酒炒丝断） 枸杞子 蛇床子 槐角子 金樱子 覆盆子 川黄连 建泽泻各五钱

【用法】上除去青盐外，锅内煎汁至半，沥滓；再将滓煎过半，沥青，冲和煎浓，入马料豆三升七合，女贞子一升七合，煮数十滚；将青盐研细，倾入同煎，以汁尽为度，取豆晒干，收贮瓷瓶。每服四钱，清晨滚汤送下。

【功用】令人须发再黑，齿落更生，耳目聪明，手足便利，壮阳补肾，固本还元，多育子息，多增年寿。

【主治】肾虚目暗，上盛下虚者。

【备考】上二十四味，俱合二十四气。

05594 延年益寿不老丹

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】何首乌 赤白各一斤（竹刀刮去粗皮，米泔水浸一宿，用黑豆三升，水泡涨，每豆一层，何首乌一层，重重铺毕，用砂锅竹甑蒸之，以豆熟，取首乌晒干；又如法蒸晒九次听用） 赤茯苓一斤（用竹刀刮去粗皮，为末，用盘盛水，将末倾入水内，其筋膜浮在水面者不用，沉水底者留用；湿团为块，用黑牛乳五碗，放砂锅内慢火煮之，候乳尽茯苓内为度，仍碾为末听用） 白茯苓一斤（制法同赤茯苓，亦湿团为块，用人乳五碗，放砂锅内照前赤茯苓，仍碾为末，听用） 怀山药（姜汁炒，为末）四两 川牛膝（去芦，酒浸一宿，晒干，为末）八两 甘枸杞子（去梗，晒干，为末）四两 杜仲（去皮，姜汁炒断丝，为末）八两 破故纸（用黑脂麻同炒熟，去麻不用，破故纸碾为末）四两 菟丝子（去砂土净，酒浸生芽，捣为饼，晒干，为末）八两

【用法】上药不犯铁器，称足和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤或酒送下。

【功用】乌须黑发，延年益寿，填精补髓。

【主治】阴虚阳弱无子者。

【宜忌】忌黄白萝卜、牛肉。

05595 自汗汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】黄耆一钱 白术一钱 山药八分 熟地二钱 枣仁一钱 五味五分 牡蛎一钱 玉竹二钱

【主治】自汗。

05596 自然铜散

【方源】《普济方》卷三〇九引《圣惠》。

【组成】乳香 没药 苏木 降真香 川乌（去皮尖） 松明节各一两 地龙（去土，清油炒）半两 真血竭三钱 龙骨（生用）半两 自然铜（火煅，米醋淬）一两 土狗十枚（油浸，焙干为末）（一方加水蛭半两，油炒）

【用法】上为末。每服五钱，用无灰酒送下，如病在上，食后服；病在下，空心服。

【主治】 打扑，折骨损断。

05597 自然铜散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 自然铜（煅通红，醋淬七次，放湿土上月余用） 乳香 没药 当归身 羌活各等分

【用法】 上为散。每服二钱，醇酒调下，一日二次。骨伤，用骨碎补半两，酒浸，捣绞取汁冲服。

【主治】 跌扑骨断。

05598 自然铜膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 自然铜（煅，末）31克 硼砂末15克 凡士林156克

【用法】 调软膏。外用。

【主治】 神经性皮炎。

05599 自拟降压汤

【方源】《古今名方》引《郑侨医案选》。

【组成】 菊花12克 白芍 玄参 怀牛膝各15克 炒黄芩9克 石决明30克 甘草6克

【功用】 平肝镇静，滋阴潜阳。

【主治】 肝阳上扰之眩晕头痛，高血压病。

【加减】 若血压过高，加代赭石、生地；头痛甚，加蔓荆子、白蒺藜；胃脘烦闷，加竹茹；目赤痛，加龙胆草、草决明；鼻衄，加藕节。

05600 自制经验大枣汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】 麦冬一钱 石菖蒲六分 浮小麦六合 枣仁一钱半 茯神一钱 天冬一钱 柏子仁三钱 大枣十枚 甘草六分 白芍一钱 玄参五钱 黄芩一钱 竹茹一钱 当归一钱

【主治】 妊娠脏躁。

05601 血余丸

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】 血余八两 阿胶一斤（面炒成珠）

【用法】 上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，清汤送下。

【主治】 便血并一切血症。

05602 血余散

【方源】 方出《圣惠》卷三十五，名见《圣济总录》卷一二四。

【组成】 乱发（烧灰）

【用法】 上为细末。每服一钱，粥饮调下。

【主治】 吐血，衄血，妇人崩漏，产后尿血，头发鲠喉。

①《圣惠》：食中发咽不下。②《直指》：吐血、衄血。③《济阴纲目》：产后小便出血。④《青囊秘传》：崩漏下血不止。

【备考】《直指》：衄者，更以少许吹入鼻。

05603 血余散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】 乱发 猪脂

【用法】 以乱发烧灰研细，和猪脂敷之。

【主治】 燕口疮，生口吻两角。

05604 血余散

【方源】《直指》卷十六。

【组成】 头发（烧存性）

【用法】 上为细末。每服二钱，白茅花、灯心各一握煎汤调下。

【主治】 诸血下。

【加减】 血淋者，妇人发更好，加海金沙佐之。

【宜忌】 切不可用百草霜、莲蓬止涩之剂。

05605 血余散

【方源】《普济方》卷三十八。

【组成】 血余半两（烧灰） 鸡冠花根 柏叶各一两

【用法】 上为末。临卧温酒调下二钱，来晨酒一杯投之。

【主治】 泻血，脏毒。

05606 血余散

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】 发灰二钱 生蒲黄 生地黄 赤茯苓 甘草各一钱

【用法】 水煎，调发灰，空心服。

【主治】 血淋。

05607 血余散

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】 真血余炭一钱 真坎炁一条（漂净，焙炭，研） 血珀五分 腰黄二钱 花龙骨二钱 上梅片四分

【用法】 上药各为细末，和匀，吹之。

【主治】 阴虚喉癣。

05608 血余膏

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】 壮人头发 猪毛 羊毛 鸡毛 鹅毛（各洗净，晒干，鸡毛、鹅毛须去中心硬梗）各净四两 猪板油（去膜，净）二两 桐油二两 麻油二十两 白川占二两 龙脑香 麝香各一钱

【用法】 先以三种油，入龟版五两，爆二十分钟，再入诸毛灼焦枯，离火片刻，细绢滤净滓，文火再煮，入川占、脑、麝，以飞净黄丹六两调成膏，油纸摊贴。可再加三灵丹掺药。此油炼成，亦

可少加锌养粉同调，用西法棉花棉纱摊贴。

【主治】 恶疮久不收口，及臁疮多年不收，瘰疬久溃，疮口多水无脓者。

05609 血郁汤

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】 桃仁（去皮） 红花 青黛 川芎（抚芎亦可） 香附

【主治】 ①《丹溪心法》：血郁。②《赤水玄珠》：金疮出血。

【备考】 本方为原书“六郁汤”之一。本方方名，《玉机微义》引作“越鞠丸”。方中青黛，《保命歌括》作“山栀”。

05610 血郁汤

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】 香附（童便制）二钱 牡丹皮 赤曲 川通草 穿山甲 降真香 苏木 山楂肉 大麦芽（炒，研）各一钱 红花七分

【用法】 水、酒各一半煎，去滓，入桃仁（去皮）泥七分，韭汁半盏和匀，通口服。

【主治】 七情郁结，盛怒叫呼，或起居失宜，或挫闷致瘀，一应饥饱劳役，皆能致血郁，其脉沉涩而扎，其体胸胁常有痛如针刺者。

05611 血痹汤

【方源】《成方切用》卷五。

【组成】 人参 黄耆 肉桂 当归 川芎 代赭石 羌活

【主治】 血痹多凉，筋脉挛急。

【方论选录】 厥阴肝脏，所主者血也，所藏者魂也；血痹不行，其魂自乱。今不通其血，而但治其惊，此不得之数也。故用人参以开血为君；黄耆、肉桂、当归、川芎为臣；以代赭石之专通肝血者，佐参、耆之不逮，少加羌活为使。盖气者，血之天也，气壮则血行；然必以肉桂、当归大温其血，预解其凝泣之势；乃以代赭石之重坠，直入厥阴血分者，开通其瘀壅；而以羌活引入风痹之所，缘厥阴主风，风去则寒湿自不存尔。

05612 血瘀散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 乱发一斤（洗净，烧灰）

【用法】 上为散。生地黄汁调下三钱。

【主治】 产后溺血，脉涩者。

【方论选录】 产后热伤冲任，血不归经，故血从前阴而出，全无疼痛，与溲溺自分，谓之溺血。发生头颅，乃血之余气，故血余，专走血分，烧灰存性，力能去瘀生新，以治血溢妄行之溺血；为散，生地汁调下，足以壮水凉血而制湿，俾血无热忧，则血室清宁，而血无妄行之患，安有溺血之不痊乎？

05613 血竭丸

【方源】《医方类聚》卷九十五引《经验秘方》

【组成】 没药 当归 乳香 血竭各一两 甜瓜子四两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十至九十丸，空心温酒送下。

【主治】 男女风湿、酒湿，腰腿疼痛。

05614 血竭散

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【异名】 五味血竭散（《便览》卷一）。

【组成】 寒水石（烧熟，细研）四两 龙骨一两 蒲黄二两 血竭五钱 枯矾一两

【用法】 上为末。每用少许，贴在疮口上，纸封。

【主治】 ①《丹溪心法附余》：牙疳并恶疮。②《便览》：满口生疮，牙肿，两夹腮内肿，及臊疳疮。

05615 血竭散

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】 蛤蚧一对（蜜炙） 诃子三钱 血竭一钱

【用法】 上为末。以生姜汁与蜜等分熬膏，入前末，调三五分服。

【主治】 劳嗽见血，诸治不效。

05616 血癥丸

【方源】《内外验方秘传》卷下。

【组成】 血竭一两 干漆一两 没药一两 琥珀屑一两 三棱一两 莪术一两 水红子一两 鸡内金一两 阿魏一两 归尾二两 蠐螬二两 槟榔一两 泽兰一两五钱 硇砂六钱 桃仁二两 生卷柏一两

【用法】 上为末。以大黄一两五钱，醋煮汁为丸。温酒送下。

【主治】 男妇血痞块。

【备考】 贫者去琥珀、硇砂。

05617 血府逐瘀汤

【方源】《医林改错》卷上。

【组成】 当归 生地各三钱 桃仁四钱 红花三钱 枳壳 赤芍各二钱 柴胡一钱 甘草二钱 桔梗一钱半 川芎一钱半 牛膝三钱

【用法】 水煎服。

【功用】《方剂学》：活血祛瘀，行气止痛。

【主治】 ①《医林改错》：头痛，无表症，无里

症，无气虚、痰饮等症，忽犯忽好，百方不愈者；忽然胸疼，诸方皆不应者；胸不任物；胸任重物；天亮出汗，用补气、固表、滋阴、降火，服之不效，而反加重者；血府有瘀血，将胃管挤靠于右，食入咽从胸右边咽下者；身外凉，心里热，名灯笼病者；瞀闷，即小事不能开展者；平素和平，有病急躁者；夜睡梦多；呃逆；饮水即呛；不眠，夜不能睡，用安神养血药治之不效者；小儿夜啼，心跳心忙，用归脾、安神等方不效者；夜不安，将卧则起，坐未稳又欲睡，一夜无宁刻，重者满床乱滚者；无故爱生气，俗言肝气病者；干呕，无他症者；每晚内热，兼皮肤热一时者。②《方剂学》：胸中血瘀，血行不畅。胸痛、头痛日久不愈，痛时如针刺而有定处，或呃逆日久不止，或饮水即呛，干呕，或内热瞀闷，或心悸怔忡，或夜不能睡，或夜寐不安，或急躁善怒，或入暮潮热，或舌质黯红，舌边有瘀斑；或舌面有瘀点，唇暗或两目黯黑，脉涩或弦紧。现用于冠状动脉硬化性心脏病的心绞痛，风湿性心脏病、胸部挫伤与肋软骨炎之胸痛，以及脑震荡后遗症之头痛头晕，精神抑郁等证，确有瘀血在内者。

【方论选录】 ①《医林改错注释》：血府逐瘀汤用桃仁、红花、川芎、赤芍活血祛瘀，配合当归、生地活血养血，使瘀血去而又不伤血。柴胡、枳壳疏肝理气，使气行则血行；牛膝破瘀通经，引瘀血下行。桔梗入肺经，载药上行，使药力发挥于胸（血府），又能开胸膈滞气，宣通气血，有助于血府瘀血的化与行，与枳壳、柴胡同用，尤善开胸散结，牛膝引瘀血下行，一升一降，使气血更易运行；甘草缓急，通百脉以调和诸药。②《方剂学》：本方是王清任用以治疗“胸中血府血瘀”所致诸证，由桃红四物汤合四逆散加桔梗、牛膝而成。胸胁为肝经循行之处，瘀血在胸中，气机阻滞，则肝郁不舒，故胸胁刺痛，日久不愈，急躁易怒。瘀久化热，气郁化火，故内热瞀闷，或心悸失眠，或入暮潮热；上扰清窍，则为头痛；横犯胃府，胃失和降，则干呕呃逆，甚则饮水则呛。至于唇、目、舌、脉所见，皆为瘀血之征。故治当活血化瘀，兼以行气解郁。方中桃红四物汤活血化瘀而养血，四逆散行气和血而舒肝，桔梗开肺气，载药上行，合枳壳则升降上焦之气而宽胸，尤以牛膝通利血脉，引血下行，互相配合，使血活气行，瘀化热消而肝郁亦解，诸症自愈。

【临证举例】 ①胸不任物 《医林改错》：江西巡抚阿霖公，年七十四，夜卧露胸可睡，盖一层布压则不能睡，已经七年，召余诊之，此方五付痊愈。②胸任重物 《医林改错》：一女二十二岁，夜卧令仆妇坐于胸方睡，已经二年，余亦用此方，三付而愈。③脑动脉硬化性头痛眩晕 《湖北中医杂志》（1983；5:17）：自1976年至1982年间，收治32例患者，均经脑血流图、眼底检查、血脂测定，并结合病史，排除其他病因的头痛眩晕。本组男25例，女7例。年龄35～39者4例，40以上者28例。症状以头痛眩晕为主，伴有失眠健忘，四肢麻木。其中显效12例（头痛眩晕消失，其他症状骤减或消失，脑血流图检查有明显改善或正常）；有效17例（头痛基本控制，眩晕偶发且微，其他症状减轻，脑血流图亦有改善）；无效3例。④顽固性失眠 《新医药学杂志》（1977；11:32）：患者男性，42岁，顽固失眠2年余，伴头晕且痛，下肢常麻木。曾用氯丙嗪、异丙嗪、巴氏合剂等多种镇静安神剂治疗，初虽有效，久则无效。中药已用过归脾，交泰、温胆之类亦无效。患者面色黧黑无华，神痿，皮肤甲错，胸背有汗斑，舌质略紫，舌苔黄腻，脉弦细有力。治用本方加磁石。服1剂后患者精神反而兴奋，难以入眠，第2剂始见效，7剂后头晕头痛明显好转，原方去磁石续服14剂。每日能安眠，其他症状亦渐消失。后以补心丹调理。⑤呃逆 《浙江医学》（1963；2:3）：女，24岁，农民。1962年2月15日门诊。当时呃逆阵作，频频不绝，声响可达户外。自诉四月前因劳动时，突然胸闷气逆刺痛，翌日即发此病，曾经当地中西医诊治无效。患者呃逆虽久，体力尚未衰惫，脉弦面有力，二便通调，惟呃逆时，气逆上冲，胸胁刺痛痞闷，难以抑制而已。断为：血瘀气滞。即处血府逐瘀汤全方加旋覆花、代赭石，连服三剂。至2月20日复诊，据述服该方一剂后，即觉胸部舒畅，无刺痛气冲之苦，呃逆亦顿减十之七八；二剂后，呃逆停止，三剂遂愈。后以他药善后。⑥原发性痛经 《浙江中医杂志》（1984；6:270）：于1981年4～8日，应用本方治疗原发性痛经70例。年龄17～37岁，以21～30岁为最多。病程6个月至14年。已婚18例，均未孕；未婚52例。经治后，34例痊愈（腹痛消失，伴有症状亦随之消失；未孕者已孕）；31例好转（腹痛减轻，时间缩短，伴有症状缓解）；五例无效。⑦乳腺增生病 《天津中医》（1986；5:18）：用本方治疗乳腺增生病104例，年龄17～51岁。其中20～40岁85例，占81.7%；病程1个月～7年，其中一年之内者59例，占56.7%，1⁺～5年31例占29.8%，5年以

上 14 例，占 13.5%。双侧发病者 43 例，单侧 61 例。经前乳胀痛者，59 例；与月经无关者 45 例。本组服药为 12～45 剂，多为 20～30 剂。治愈（乳块消失）68 例，占 65.4%；好转（乳块缩小 1/2 以上）27 例，占 26%；无效 9 例，占 8.6%，总有效率为 91.4%。⑧小儿瘀血发热 《新中医》(1976；5:55)：例一，作者之子 2 岁时不慎碰伤头部，两天后突然发热，微咳，体温 38.6℃，有时升至 39.1℃，苔薄白，夜间惊悸不安，指纹隐隐不显，服用西药无效。即予本方，晚上果然热退，睡眠正常。原方再服一剂，痊愈。例二：高某某，女，12 岁。因玩秋千碰伤额部，两天后发热不退，夜间加重，用退热药无效。体温 38.7℃。拟用本方，一剂后热退病愈。

【现代研究】 ①抗凝血作用 《中华内科杂志》(1977；2:79)：本方因具有理气活血功效，故用于各种病因的感染、休克、创伤、大面积烧伤、外科大手术后、输血反应、子痫、死胎、胎盘滞留等并发的急性血管内弥漫性凝血（DIC）。实验证明，本方不能延长血液复钙时间，也不能延长凝血酶原时间和凝血酶凝固时间，但能抑制 ADP 所致血小板聚集，并能促进血小板解聚，因此有助于血瘀患者血液学异常的改善。此外，对于由门静脉注入二氧化钍封闭肝脏网状内皮系统的家兔，其吞噬廓清凝血酶的能力，本方（静脉注入）有显著的保护作用。经测定肝静脉上方的腔静脉血中的纤维蛋白原含量，实验动物无明显变化，而对照动物则锐减。表明本方可能使被封闭的肝脏巨噬细胞复苏而显示对肝脏网状内皮系统的激活，提示本方能加速 DIC 时血液中的促凝血物质及被激发的凝血因子等的清除，全部或部分消除了形成急性 DIC 的触发因子，从而抑制 DIC。②对免疫功能的影响 《中药药理与临床》(1985；创刊号:14)：实验证明，本方有显著增强小鼠巨噬细胞吞噬功能的效果，能提高实验动物对鸡红细胞的吞噬清除。但水煎剂与醇提剂在作用时间上有所不同，水煎剂的促进作用可保持 8 小时以上，醇提剂至 8 小时时已无效，但 20 及 24 小时后重又呈显著促进作用，而此时水煎剂已无效。

【备考】 本方改为丸剂，名“血府逐瘀丸”（见《全国中药成药处方集》沈阳方）。

05618 血崩神效方

【方源】 《便览》卷四。

【组成】 地榆 甘草 川芎 茯苓 地黄 白术 当归 白芍 黄芩 阿胶 麦冬各等分

【用法】 水煎，露一夜，空心服。

【主治】 崩漏。

【宜忌】 忌煎炒、酒、面。

05619 血竭冰硼散

【方源】 《喉症指南》卷四。

【组成】 净硼砂一两 真血竭（磨指甲上，经透指甲者为真，有腥气者，是海母血，勿用） 真儿茶 甘草各三钱（去皮） 明雄黄二钱（鲜红大块者良，有臭气者勿用） 玄胡粉钱半 直僵蚕 大梅片各一钱 上麝香四分

【用法】 上药各为极细末。称准，入乳钵内合研，再入血竭末拌匀。

【主治】 时疫白喉，及紧喉、缠喉、蛾风、火喉等证。

【宜忌】 孕妇慎之。

【加减】 孕妇，去麝香，加冰片。

05620 血鹜泻心汤

【方源】 《眼科菁华录》卷上。

【组成】 大黄 薄荷 车前子 黄连 黄芩 赤芍 连翘 荆芥 菊花

【用法】 水煎服。

【主治】 两眼赤肿，涩痛，热泪羞明，渐有赤脉贯睛，时发不清。

05621 血余固本九阳丹

【方源】 《广嗣纪要》卷四。

【组成】 血余（选黑者，不拘男女，用皂荚煎汤洗净，清水漂过，入口无油垢气为度，晒干，置大锅内，用红川椒去梗目，与发层铺上，用小锅盖定，盐泥秘塞上，锅底上用重石压之，先用武火煅炼一柱香，后用文火半柱香，以青烟去尽，无气息为度。冷定取出，研末，双绢筛过）一斤 何首乌（先用米泔水浸，竹刀刮去皮）赤者、白者各八两 淮山药（共何首乌去皮，竹刀切成片，用黑豆二升，上下铺盖，蒸熟晒干）八两 赤茯苓（去皮，牛乳浸一日夜）八两 白茯苓（人乳浸一日夜）四两 破故纸（酒拌，沙锅炒以香为度）四两 菟丝子（人乳一碗，酒半碗，浸一夕，饭锅上隔布蒸熟，晒干，微炒，研为末）四两 枸杞子（去蒂梗，酒拌蒸熟）四两 生地黄（酒蒸）半斤 苍术（去皮，为末）半斤 熟地黄（酒蒸）半斤 龟版（酥油炙）半斤 当归（去尾，酒浸）四两 牛膝（酒浸，黑豆蒸）四两

【用法】 上药各为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，药酒送下（药酒方：当归、生地黄、五加皮、川芎、芍药、枸杞子各二两，核桃肉

一斤，砂仁五钱　黄柏一两　小红枣二百个，用无灰白酒三十六斤，内分五斤，入药装坛内密封，隔汤煮之，冷定去滓，入前酒密封用）。

【功用】 调元固本，种子。

【备考】 本方方名，《景岳全书》引作“铁笛丸”。

05622　向荣汤

【方源】 《辨证录》卷二。

【组成】 当归　白芍　生地各一两　麦冬五钱　白芥子　茯苓各三钱　贝母一钱　柴胡五分

【用法】 水煎服。

【主治】 目病后，眼前常见禽鸟昆虫等物。

05623　向胜破笛丸

【方源】 《医统》卷四十六引《医林》。

【异名】 响圣破笛丸（《直指附遗》卷八）、响声破笛丸（《回春》卷五）。

【组成】 连翘　桔梗　甘草各二两半　薄荷叶四两　诃子（煨）　砂仁　大黄（酒蒸）各一两　川芎一两半　百药煎二两

【用法】 上为细末，鸡子清为丸，如弹子大。每服一丸，临卧噙化。

【主治】 讴歌动火，失音不语。

【备考】 本方方名，《景岳全书》引作“铁笛丸”。

05624　行气散

【方源】 《古今医鉴》卷九。

【异名】 行气香苏饮（《喉科紫珍集》卷上）。

【组成】 紫苏　陈皮　香附　乌药　枳壳　桔梗　厚朴　半夏　大黄（酒炒）　甘草

【用法】 上锉。加灯心十根，水煎服。

【主治】 梅核气。咽喉气胀，上攻胸膈痛。

【备考】 《喉科紫珍集》本方用香附、陈皮、厚朴各五分，紫苏、桔梗各七分，乌药三分，桔梗、半夏各一钱，大黄一钱五分，甘草六分。

05625　行军散

【方源】 《霍乱论》卷下。

【异名】 武侯行军散（《感证辑要》卷四）、诸葛行军散（《方剂学》）。

【组成】 西牛黄　当门子　真珠　梅片　硼砂各一钱　明雄黄（飞净）八钱　火消三分　飞金二十页

【用法】 上药各为极细末，再合研匀，瓷瓶密收，以蜡封之。每服三五分，凉开水调下。

【功用】 《方剂学》：开窍，辟秽，解毒。

【主治】 ①《霍乱论》：霍乱痧胀，山岚瘴疠，及暑热秽恶诸邪，直干包络，头目昏晕，不省人事，危急等证。并治口疮喉痛；点目，去风热障翳；搐鼻，辟时疫之气。②《方剂学》：暑热痧胀，吐泻腹痛，烦闷欲绝，头目昏晕，不省人事。

【宜忌】 《方剂学》：本方辛香走窜，孕妇慎服。

【方论选录】 《方剂学》：暑月痧胀，是因感受秽浊之气所致。由于中焦气机逆乱，清浊相干，升降功能失常，故见吐泻腹痛，甚则烦闷欲绝；包络神明被蒙，则头目昏晕，不省人事。治宜开窍行气，辟秽解毒。方中麝香、冰片芳香开窍，行气辟秽，并善于止痛，针对吐泻腹痛，窍闭神昏而设，是为君药。牛黄清心解毒，用为臣药。消石泻热破结；硼砂清热解毒；雄黄用量独重，辟秽解毒；珍珠重镇安神，以上俱为佐药。从本方组成分析，亦属清热开窍为主，配伍辟秽、解毒、安神，以加强清热开窍的功效。方中牛黄、冰片、硼砂、珍珠等药具有清热解毒，防腐消翳之功，故能治口疮咽痛，风热障翳等证。

【备考】 《方剂学》：本方原用飞金，取其重镇安神之效，上海、南京等成方配本均改用“姜粉”。《中国药典》1977年版亦去飞金加姜粉，如此则具有降逆和中作用，增加辟秽解毒之功。但姜粉性味辛热，因此对口疮咽痛，风热障翳者，不宜使用。又《北京市中药成方选集》有干姜粉一钱，薄荷冰一分。

05626　行健汤

【方源】 《医醇剩义》卷二。

【组成】 黄耆二钱　人参二钱　茯苓二钱　白术一钱　甘草五分　当归二钱　白芍一钱（酒洗）　青蒿梗一钱五分　广皮一钱　砂仁一钱　料豆三钱　木香五分　大枣二枚　姜三片

【主治】 脾劳。或饮食不调，或行役劳倦，积久脾败，四肢倦怠，食少身热。

05627　行气开痹饮

【方源】 《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】 羌活　川芎　防风　苍术　秦艽　红花　肉桂　细辛　续断

【主治】 风寒湿三气集合成痹。

【加减】 风胜，倍风药；寒湿偏胜，酌倍之；在上加片姜黄、桂枝、威灵仙；在下加牛膝、防己、萆薢、本通。又有五痹：筋屈不伸，为筋痹，加木瓜、柴胡；血凝不流，为脉痹，加菖蒲、茯神、当归；肌多不仁，为肉痹，加白茯苓、陈皮、木香、砂仁；遇寒皮急，遇热皮纵，为皮痹，加紫菀、杏仁、麻黄；重滞不举，为骨痹，加独活、泽泻。

05628　行气香苏散

【方源】 《古今医鉴》卷四引三山陈氏方。

【异名】 行气香苏饮（原书卷十）。

【组成】 紫苏一钱 柴胡八分 陈皮八分 香附（醋炒）一钱 乌药八分 川芎八分 羌活八分 枳壳八分 苍术八分 麻黄一钱 甘草三分

【用法】 上锉。加生姜三片，水煎，温服。

【主治】 内伤生冷厚味坚硬之物，胸腹胀满疼痛，及外感风寒湿气，发热恶寒，遍身酸痛，七情气逆，呕吐泄泻，饮食不下。

【加减】 外感风寒，加葱白三根；内伤饮食，加神曲、山楂各一钱；偏坠气初起疼痛，憎寒壮热，加小茴香、木香、三棱、莪术、木通。

05629 行经红花汤

【方源】《济阴纲目》卷二。

【异名】 红花汤（《叶氏女科》卷一）。

【组成】 当归尾 赤芍药 紫葳 刘寄奴 牛膝 玄胡索 红花 苏木 桃仁（炒）各一钱 青皮 香附各八分 桂心五分

【用法】 水煎，空心作一服。

【主治】 妇人室女经候不行，时作胀痛。

05630 行湿补气养血汤

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】 人参 白术 白茯苓 当归 川芎 苏梗 白芍药 陈皮 厚朴 大腹皮 木通 莱菔子 木香 海金沙 甘草

【用法】 上锉散。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 气血虚弱，单鼓腹胀浮肿。

【加减】 气虚，倍参、术、茯苓；血虚，倍芎、归、白芍；小便短少，加猪苓、泽泻、滑石；服后肿胀俱退，惟面目不消，此阳明经气虚，倍用白术、茯苓。

05631 行湿滋筋养血汤

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】 当归（酒洗）一两 川芎七分 白芍（酒洗）二两 生地黄一钱（姜汁炒） 人参六分 白术一钱二分 白茯苓（去皮）一钱 威灵仙（酒洗）六分 防己（酒洗）六分 红花七分 牛膝（酒洗）七分 黄连（酒炒）六分 黄柏（盐炒）一钱 知母（盐酒炒）一钱 甘草四分 苍术（米泔制）一钱

【用法】 上锉一剂。加生姜、大枣、水煎服。

【主治】 遍身行痛，乃气血两虚，有火有湿。

05632 后辛汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 柴胡一钱 郁金二钱 广皮一钱 当归二钱 茯苓二钱 栀子皮一钱（姜汁炒） 蒺藜四钱 枳壳一钱 合欢花二钱 佛手五分

【功用】 轻扬和解。

【主治】 胆胀。胁下痛胀，口中苦，善太息。

05633 舟车丸

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【异名】 舟车神祐丸（《医学纲目》卷四引河间方）、净腑丸（《金鉴》卷三十）、神祐丸（《女科切要》卷二）。

【组成】 大黄二两 甘遂（面裹，煮） 大戟（醋炒） 芫花（醋炒）各一两 青皮（去白） 槟榔 陈皮（去白） 木香各五钱 牵牛头末四两 轻粉一钱（张子和方无轻粉）

【用法】 上为末，水为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，临卧温水送下。以利为度。

【功用】 行气破滞，逐水消肿。

①《医学纲目》：泄水湿。②《东医宝鉴·杂病篇》：疏导二便。③《济阳纲目》：湿胜气实者，以此宣通之。

【主治】 水湿痰饮热毒内郁、气血壅滞所致积聚肿胀，二便秘涩，潮热口渴，喘咳面赤，脉沉数有力。

①《袖珍》：积聚。②《丹溪心法》：湿胜气实。③《普济方》：潮热有时，胃气不和，遍身肿满，足肿腹胀，大便不通。④《景岳全书》：气血壅满，不得宣通，风热郁痹，走注疼痛及妇人血逆气滞等证。⑤《济阳纲目》：咳嗽淋闷。⑥《杂病源流犀烛》：痰毒。⑦《医钞类编》：水胀口渴，面赤气粗，腹坚。

【宜忌】 ①《济阳纲目》：气虚者慎之。②《古方新解》：甚者忌食盐酱百日。③《全国中药成药处方集》（吉林、哈尔滨方）：勿与甘草同用，孕妇勿服。

【加减】 一方取盘，加芫荑半两。

【方论选录】 ①《医方考》：通可以去塞，牵牛、大黄、甘遂、芫花、大戟，皆通剂之厉者也；辛可以行滞，陈皮、青皮、木香，皆行滞之要药也。此方能下十二经之水，下咽之后，上下左右，无所不至，故曰舟车。②《医方集解》：此足太阳药也。牵牛、大黄、大戟、芫花、甘遂，皆行水之厉剂也，能通行十二经之水。然肿属于脾，胀属于肝。水之不行，由于脾之不运；脾之不运，由于木盛而来侮之，是以不能防水而洋溢也。青皮、木香，疏肝泄肺而健脾，与陈皮均为导气燥湿之品，使气行则水行，脾运则肿消也。轻粉无窍不入，能去积痰，故少加之。然非实证，不可轻投。③《成方便

读》：此方用牵牛泻气分，大黄泻血分，协同大戟、甘遂、芫花三味大剂攻水者，水陆并行；再以青皮、陈皮、木香，通理诸气，为之先导；而以轻粉之无窍不入者助之。故无坚不破，无水不行，宜乎有"舟车"之名。④《中医大辞典·方剂分册》：方中甘遂、芫花、大戟，攻逐脘腹经坠之水，为主药；大黄、牵牛子，荡涤泻下为辅，主辅相配，使水热实邪从二便分消下泄；再以青皮破气散结，陈皮理气燥湿，木香调气导滞，使气畅水行，共为佐使。诸药合用，共成行气破滞、峻下逐水之方。

【临证举例】 虫积经闭 《浙江中医杂志》(1964；11:17)：高某某，女，23岁，已婚，1962年5月23日入院。患者月经一向正常，结婚三年未育。1960年初，曾患浮肿，继则腹胀经闭，以为妊娠；但腹胀善饥，便溏尿少，喜食盐粒，时吐涎沫，四肢沉重，周身乏力。诊时经闭已两年，面容虚胖少华，舌淡胖而大，苔白腻，脉弦滑，唇色白，内见丘疹甚夥，周身浮肿，下肢按之可容枣大之深陷，腹大而满，按之坚无压痛，脐周围可触到条状、索状结块，肝、脾均肿大，无压痛；腹泻日二三次，多为未消化之软便。诊为虫积经闭。根据病情辨证，属大实有羸状，用舟车丸峻剂逐水，以治标急之实。5月28日晨八时，空腹服舟车丸五分，二小时后呕恶，腹绞痛；三小时后排出水及虫体一大盆，数得活蛔虫334条，腹消大半。5月29日晨八时再服舟车丸五分，又大便三次，排出蛔虫269条，腹膨消失近常人。月经于入院第十八天来潮。

【备考】《丹溪心法》无轻粉。

05634 全生饮

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】 藕汁（磨墨）一寸 梨汁 茅根汁 韭汁 生地黄汁各一两 刺刺菜汁 萝卜汁 白蜜 竹沥 生姜汁 童便各半盏

【用法】 上合一处，频频冷服。

【主治】 吐血、衄血、嗽血、咯血、唾血。

05635 全虫方

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 全虫（打）二钱 皂刺四钱 猪牙皂角二钱 刺蒺藜五钱至一两 炒槐花五钱至一两 威灵仙四钱至一两 苦参二钱 白鲜皮五钱 黄柏五钱

【功用】 祛风止痒，除湿解毒。

【主治】 慢性湿疹，慢性阴囊湿疹，神经性皮炎，结节性痒疹等慢性顽固瘙痒性皮肤病。

【宜忌】 本方对于慢性顽固的搔痒性皮肤病偏于实证者最为相宜，而对于血虚受风而引起的隐疹（如皮肤瘙痒症）不宜用。服此方时，禁食荤腥海味、辛辣动风的食物。孕妇慎用。

【加减】 如限局性或泛发的慢性湿疹、阴囊湿疹、神经性皮炎、结节性痒疹等，如用之不应，可加乌梢蛇；如搔痒甚烈，皮损增厚，明显色素沉着或伴有大便干燥者，可加川军三钱至五钱。

【方论选录】 本方是以大败毒汤（五虎下西川）为借鉴而化裁的经验方。是以全虫、皂刺、猪牙皂角为主要药，其中全虫性辛平入肝经，走而不守，能熄内外表里之风；皂刺辛散温通，功能消肿托毒，治风杀虫；猪牙皂角能通肺及大肠气，涤清胃肠湿滞，消风止痒散毒。盖热性散，毒性聚，若欲祛其湿毒，非攻发内托辛扬不得消散，而全虫、皂刺、猪牙皂角三者同伍，既能熄风止痒，又能托毒攻伐，对于顽固蕴久深在之湿毒作痒，用之最为相宜。白鲜皮气寒善行，味苦性燥，清热散风，燥湿止痒，协同苦参以助全虫祛除表浅外风蕴湿而止痒；刺蒺藜辛苦温，祛风"治诸风病疡"、"身体风痒"，有较好的止痒作用；刺蒺藜协同驱风除湿通络的威灵仙，能够辅助全虫祛除深在之风毒蕴湿而治顽固性的搔痒。另外，脾胃气滞则蕴湿，湿蕴日久则生毒，顽湿聚毒客于皮肤则搔痒无度，故方中佐以炒枳壳、黄柏、炒槐花，旨在行气，清胃肠之结热，以期调理胃肠，清除湿热蕴积之根源。川军一般都惧其通下太过，岂不知川军能活血破瘀，少用则泻下，多用反而厚肠胃，与诸药相配合，不但止痒功效增强，而且可以促进肥厚皮损的消退。

【临证举例】 泛发性神经性皮炎 侯某某，男，67岁。初诊日期：1972年8月14日。主诉周身散发片状肥厚粗糙之皮损，奇痒，已十几年。现病史：患者十几年前四肢、躯干、颜面、臀部均有粗糙、肥厚之皮损，奇痒，曾经某某医院诊断为"泛发性神经性皮炎"，多次治疗不效。今年四月外用西药水剂后，局部皮损发生糜烂，痒感加重，曾注射"葡萄糖酸钙"、抗生素，外用西药膏，均不能控制。检查：患者颜面、耳廓有轻度糜烂皮损，渗出液不多，作痒，躯干及尾骶部皮损肥厚，上复少量血性痂皮，有明显抓痕，脉象弦，苔薄白。西医诊断：神经性皮炎。中医辨证：血虚风燥，肌肤失养。立法：疏风止痒，养血润肤。方药：全虫三钱，威灵仙六钱，白鲜皮一两，丹参五钱，地肤子一两，干生地五钱，黄柏三钱，刺蒺藜一两，生槐花五钱，猪苓三钱，金银花六钱。外用普连软膏、

珍珠散。服上方七剂后，皮损糜烂平复，渗出液减少，痒感已减轻，可以入睡。继服前方，局部只存留原粗糙之皮损，较正常皮肤稍厚。

05636 全虫散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 全蝎 15 克 白矾 62 克 冰片 3 克

【用法】 将白矾入锅内化开后，加入全蝎煅枯，待冷后，与冰片共为细末即成。用于小面积奇痒不止，撒播，外敷藤黄软膏。

【主治】 慢性湿疹。

05637 全羊丸

【方源】 年氏《集验良方》卷二。

【组成】 羊羔一只（养带胎母羊一只，每日常食黑豆八两，拌小茴、羊藿、菟丝喂养，足月产羊一对，捡一雄羔听用；养小羊足月，以好酒饮之满腹，取血听用；滚水退去毛，五脏洗净，将故纸、肉苁蓉、青盐、小茴各四两装入腔内，用线缝固，荷叶包裹，蒸三炷香，取出炙干听用） 白茯苓八两（用羊乳浸蒸，晒干） 枸杞子六两（小羊血拌蒸，焙干） 牛膝四两（酒浸，蒸） 大地黄八两（砂仁酒蒸五炷香） 山萸（去核，酒浸）四两 沙蒺藜四两（酒浸） 山药（炒）四两 归身四两（酒洗） 杜仲四两（去粗皮，姜汁盐水炒去丝） 巴戟四两（酒浸） 虎胫骨一对（酥炙） 故纸四两（羊乳汁蒸一次，黑芝麻油炒） 小茴四两（小羊血拌炒） 肉苁蓉四两（酒洗，去鳞甲） 青盐四两（净小羊血拌炒）

【用法】 上为细末，入前全羊四味，再研极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三钱，滚水送下。

【功用】 壮筋骨，补气血。

【主治】 一切虚损劳疾。

05638 全阳方

【方源】《洞天奥旨》卷十六。

【异名】 全阳汤（《中医皮肤病学简编》）。

【组成】 金银花半斤 黄柏一两 肉桂二钱 当归三两 熟地二两 山茱萸三钱 北五味一钱 土茯苓四两

【用法】 水五大碗，同浸干为末。每服一两，滚水调服。

【主治】 ①《洞天奥旨》：前阴烂落。②《中医皮肤病学简编》：女阴溃疡。

05639 全身饮

【方源】《辨证录》卷二。

【异名】 全身汤（《医学集成》卷二）。

【组成】 人参 黄耆 巴戟天各一两 半夏三钱 附子一片

【用法】 水煎服。

【主治】 猝倒之后致半身不遂。

05640 全趾饮

【方源】《外科医镜》。

【组成】 淮牛膝三钱 鲜石斛三钱 金银花一两 元参五钱 甘菊花五钱 当归五钱 茯苓三钱 生甘草二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 足趾疔毒。

05641 全鹿丸

【方源】《医统》卷四十八。

【异名】 百补全鹿丸（《饲鹤亭集方》）、大补全鹿丸（《全国中药成药处方集》杭州方）。

【组成】 中鹿一只（不拘牝牡，缚死，去毛，肚杂洗净；鹿肉煮熟，横切片，焙干为末；取皮同杂入原汤煮膏，和药末为丸；骨用酥炙，为末，和肉末、药末一处，和膏捣；不成丸，加炼蜜） 人参 黄耆 白术 茯苓 当归 川芎 生地黄 熟地黄 天门冬 麦门冬 陈皮 炙甘草 破故纸 川续断 杜仲 川牛膝 枸杞子 巴戟天 胡芦巴 干山药 芡实子 菟丝子 五味子 覆盆子 楮实子 锁阳 肉苁蓉 秋石各一斤 川椒 小茴香 青盐 沉香各半斤

【用法】 上各精制为末，称分两和匀一处，候鹿制膏成，就和为丸，梧桐子大，焙干；用生黄绢作小袋五十条，每条约盛一斤，悬置透风处。用尽一袋，又取一袋。霉伏天须要火烘一二次为妙。每服八九十丸，空心临卧时，姜汤、盐汤、沸汤任下，冬月温酒送下。

【功用】 ①《鲁府禁方》：还精填髓，补益元阳，滋生血脉，壮健脾胃，安五脏，和六脉，添智慧，驻容颜。②《中国医学大辞典》：通脉和血，利节健步，壮阳种子，延年益寿。

【主治】 诸虚、痨瘵、神疲面黄，头眩腰痠，形寒阳痿，瘕疝脱肛，蒸热盗汗，带下崩中。

①《医统》：诸虚百损，五劳七伤。②《鲁府禁方》：精血不足，元气虚弱，久无子嗣，并四肢无力，精神欠爽。③《中国医学大辞典》：头眩耳聋，脊背痠软，瘕疝腹痛、精寒阳痿，肌肤甲错，筋挛骨痿，步履艰难，妇女虚羸痨瘵，骨蒸发热，阴寒腹痛，崩漏经阻，赤白带下，大肠脱肛。④《全国中药成药处方集》：面色萎黄，形寒畏冷。遗精盗汗。宫寒不孕。

【宜忌】 ①《时方歌括》：肥厚痰多之人，内蕴湿热者，若服此丸，即犯膏粱无厌，发痈疽之戒也。②《全国中药成药处方集》：体实而发炎者忌服。风寒感冒忌服。忌生冷食物。

【备考】《北京市中药成方选集》。本方用鹿角胶八两、青毛鹿茸（去毛）四两、鹿肾三两、鲜鹿肉（带骨）三百二十两、鹿尾一条（约二两）。以生地、芡实、枸杞子、补骨脂、山药、续断、川芎、於术、沉香九味研粗末铺晒槽；余者下罐，加黄酒四百八十两蒸三昼夜，同铺槽之群药拌匀晒干，共研为细粉，过罗，炼蜜为丸，重三钱，蜡皮封固。

05642 全鹿丸

【方源】《增补内经拾遗》卷四。

【组成】 雄鹿（最小）一只 秋石二斤 五味子三斤（酒洗，晒干，净末一斤） 车前子二斤（水淘，晒干，净末一斤） 金樱子三斤（酒洗，晒干，净末一斤） 菟丝子七斤（酒浸，晒干，如七次后取末五斤） 黄柏七斤（去粗皮，牛乳浸透，晒干，取净末五斤）

【用法】 黄柏并四子各为细末，和合一处，却将雄鹿取血，拌药如弹子，晒干，复为末；将鹿去毛秽，其角煮膏，枯骨为霜，其骨煮粉，皮、肉、五脏俱熬膏，然后以秋石化开，和前药末为膏，少加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心淡盐汤送下；温酒亦可。

【功用】 益血气，补劳伤，固精髓，壮筋骨。

【方论选录】 飞霞子曰：鹿则全体大补是也。壶隐子曰：黄柏二制，米泔水浸，生姜汁炒，则治上焦；单制蜜炙则治中焦，不制则治下焦也。独此又用牛乳，亦走下焦。

05643 全鹿丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】 当归身 知母（去尾净） 天门冬（去心、皮净） 怀熟地各四两 人参（去芦）四两 白茯苓（去皮）四两 金樱子（去粗皮、刺净）四两 芡实肉六两 牛膝（去芦）六两 莲肉（去心）四两 山药四两 黄柏（去皮）四两 怀生地四两 白芍二两（炒） 麦门冬（去心）四两 枸杞子（去蒂）八两 茯神（去皮心）四两 杜仲（酥炙，去丝）四两 白术（东壁土炒）四两 莲须四两 山茱萸（净肉）八两 女贞实八两 覆盆子四两 柏子仁六两 肉苁蓉四两（酒洗） 黄耆（蜜炙净）四两 骨碎补四两 五味子二两（净） 桑椹子四两（净） 陈皮四两 菟丝子（酒煮捣烂，晒干，净）二两

【用法】 用雄鹿一只，取精肉一二斤，用血、髓、肾、肝、心、全角切作片，用无灰酒二十五斤煮熟，将前药再入酒肉内煮干为度，如未全熟，再加酒五斤，取出晒干，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空心温酒、淡盐汤或白滚汤送下。

【功用】 补肾种子。

05644 全蝎丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 全蝎四十九个（去毒，用生姜钱四十九片，于新瓦上先铺姜片，次铺全蝎，就姜钱上用文武火炙，翻转再炙燥） 胡椒四十九粒 木香二钱（不见火） 狼毒 当归各半两（去芦） 茴香（淘去沙）三钱（炒） 槟榔一个

【用法】 上为细末，米醋糊为丸。每服七粒，温酒送下，不拘时候。

【主治】 小肠疝气。

05645 全蝎丸

【方源】《普济方》卷五十四。

【组成】 全蝎 川椒 巴豆（去皮） 菖蒲 松脂各等分

【用法】 上为细末，熔蜡和丸。简子塞耳中，一日一易。

【主治】 肾气虚，耳中如风水鸣，或如钟磬声，卒暴聋。

05646 全蝎散

【方源】《阎氏小儿方论》。

【组成】 全蝎（去毒，炒） 僵蚕（直者，炒） 甘草 赤芍药 桂枝（不见火） 麻黄（去节） 川芎 黄芩（去心）各三钱 天麻六钱 大天南星（汤浸七次，去皮脐，切，焙）三钱

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜七片，煎七分，温服无时，量大小与之，一日三四次。

【主治】 小儿惊风；中风口眼㖞斜，语不正，手足偏废不举。

【宜忌】 忌羊肉。

05647 全蝎散

【方源】《普济方》卷六十六引《卫生家宝》。

【组成】 蜈蚣一条 全蝎三个 消半两 良姜 乳香一钱 麝香一字

【用法】 上为末。每用少许搐鼻。

【主治】 一切牙痛。

【备考】 方中良姜用量原缺。

05648 全蝎散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】 全蝎二枚（去毒，醋炙） 赤足蜈蚣一条（醋炙） 麝香一字（别研） 辰砂一钱（别研）

【用法】 上为细末，同研匀。每服一字，食后、临睡温酒调下。

【主治】 头风攻注，口眼不正。

05649 全蝎散

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 全蝎二十四个（炒） 川楝子（炮，去核） 茴香（淘去沙，炒） 桃仁（去皮尖）各半两 青橘皮（去瓤）二分（炒）

【用法】 上为细末。每服二钱，水八分盏，入盐少许，葱白五寸，煎六分，食前热服。

【主治】 小肠气痛极，不食，下泄。

05650 全蝎散

【方源】《医方类聚》卷二十三引《王氏集验方》。

【组成】 川乌（炮） 草乌（炮）各半两 麻黄一两半 川芎 防风 羌活各一两 地龙（去土） 雄黄各三钱 全蝎十个（一方加苍术、细辛尤妙）

【用法】 上为极细末。每服半钱重，食后、睡时茶清调下；仍以少许贴太阳穴。

【主治】 偏正头疼，一切头风，两太阳穴疼不可忍者。

05651 全蝎散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】 全蝎（炒） 川芎 黄芩 僵蚕（炒，去丝嘴） 赤芍药 甘草 朱砂 南星（汤泡，去皮脐，焙） 天麻各三钱

【用法】 上为细末。每服一钱，用生姜汤调服，不拘时候。

【主治】 小儿口眼㖞斜，语言不清。

05652 全蝎散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 蝎梢七个

【用法】 上为末，热酒调服。

【功用】 开关定搐。

【主治】 破伤风。

05653 全蝎散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 活蝎一个（麻油一盏浸三日，取起晒干）

【用法】 上为末。以鹅毛蘸油搽疮上。

【主治】 瘰疬。

05654 全蝎膏

【方源】《普济方》卷四十六引《德生堂方》。

【异名】 全蝎散（《杂病源流犀烛》卷二十五）。

【组成】 全蝎二十一个 土狗三个 五倍子五钱 地龙六条（去土）

【用法】 上为细末，好酒调成膏子。摊在纸上，贴放太阳穴上。

【主治】 偏正头风，气上攻不可忍。

05655 全鳖丸

【方源】《直指》卷九。

【组成】 知母 贝母 杏仁（浸去皮）各三分 柴胡二两 川芎一两 当归 明阿胶（炒酥）各半两

【用法】 上粗截，入厚瓷器中，用中等活鳖一个生宰，于头上去鳖病，以鳖肉并血并药，用醇酒五升同浸一宿，密纸封，次早慢火同煮，俟熟取鳖，令病者随意食之。只留鳖甲并骨，并药焙干，为末，以浸药酒汁调米粉糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】 劳瘵虚热嗽喘。

05656 全鳖丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】 当归 生地 熟地 丹皮 杜仲 益母草 地骨皮各三两 天冬（去心） 白芍 麦门冬（去心） 贝母（去心） 牛膝 白茯苓 续断 陈皮各二两 甘草一两五钱 五味子一两

【用法】 上药都拌匀，分为两处，以一半置大砂锅内，用水八碗，煎至四五碗，将滓滤出，再入水五碗，煎二三碗滤出，将滓晒干，同未煎一半药，共研为末听用；再用甲鱼一个重一斤者，如多少俱不可用，将甲鱼后足吊起，过一日候渴极，放入药汁内一时许，用砂锅煮之，陆续添药汁，须剩一碗许听用；其鳖煮烂，剔出骨甲，醋炙黄脆为末，入前药末内和匀，以鳖肉捣烂，并汁和药为丸，如梧桐子大，阴干，瓷器收贮。每服三钱，空心清汤送下。

【主治】 一切骨蒸，虚损劳热。

05657 全鳖丸

【方源】《医级》卷九。

【组成】 生地 熟地 知母 贝母 杏仁 款冬 沙参 丹皮 紫菀各一两 青蒿 前胡 柴胡各五钱

【用法】 用团鱼一个，斤外者佳，清水漾七日，将麻扎其头足，和药纳坛内，用水三碗，将箬扎坛，隔水煮一日，取起鱼，剔去甲骨，炙燥；鱼肉捣烂如泥；所存之药，另置砂锅煮干，炒和骨甲为末，外用米仁、莲肉粉各四两，以糯米糊为丸，如

梧桐子大。每服三钱，黄耆麦冬汤送下。

【主治】 肝肾阴虚，骨蒸劳嗽。

05658 全生止遗汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】 麦冬 焦栀 茯神 枣仁 黄芩 百合 茯苓 石菖蒲 香附 广皮 白芍 生地 天冬 辰砂 竹叶

【功用】 安神养血。

【主治】 妊娠忽遇死丧大故，悲哀太盛，以致胎气逆上，内热口干，梦寐不宁，烦躁不卧。

【方论选录】 是方二神、苓、二冬、枣仁，安神定志；芩、芍、地、栀，清热凉血；附、广，和气止逆；竹叶清肺金；百合润肺燥；辰砂镇怯；菖蒲开窍。立方之意深矣。

05659 全生活血汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 生地五钱 当归三钱 白芍一钱半（酒炒） 川芎一钱 熟地五钱 独活一钱半（盐水炒） 炙草一钱 防风一钱半（盐水炒黑） 人参一钱半

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 产后中风盗汗，脉浮虚。

【方论选录】 产后血气两虚，风乘虚袭，而邪不受制，营气暗泄，故睡中汗出为盗汗焉。熟地补阴滋血，以资血海；人参补气扶元，以雄气海；白芍敛阴和血脉；当归养血荣经脉；生地凉血室滋血；川芎入血海行气；独活开经气；防风泄风邪，并盐水炒黑引领参、地以分解虚邪；炙草缓中益胃。水煎温服，使血气内充，则风邪外解，而经脉清和，津液完固，安有盗汗不止之患乎。

05660 全真一气汤

【方源】《冯氏锦囊·药按》卷二十。

【组成】 熟地八钱（如大便不实，焙干用；如阴虚甚者，加倍用） 制麦门冬（去心，恐寒胃气，拌炒米炒黄色，去米用）三钱（肺虚脾弱者少减之） 鸡腿白术（炒深黄色，置地上一宿，出火气，不用土炒。如阴虚而脾不甚虚者，人乳拌透，晒干，炒黄）三钱（如脾虚甚者，用至四五钱） 牛膝（去芦）由二钱加至三钱 五味子由八分至一钱五分 制附子由一钱加至二钱余

【用法】 水煎，冲参汤服。人参由二三钱加至四五钱，虚极者一二两，随症任用，另煎冲入前药。如肺脉洪大，元气未虚，竟用前药，不必冲参。

【功用】 滋阴救火。

【主治】 阴虚火旺，上热下寒之斑疹、痘麻逆症，躁热吐血，喘泻昏沉及中风、虚劳。

①《冯氏锦囊》：阴分焦燥，上实下虚，上热下寒，阴竭于内，阳越于外，斑疹热极烦躁，上喘下泻。中风大病阴虚发热，吐血喘咳，一切虚劳重症。②《会约》：麻疹头面不起，壮热不食，喘促昏沉。③《时方歌括》：痘科之逆症。

【宜忌】 ①《冯氏锦囊》：以上六味必先煎好，另煎人参浓汁冲服，则参药虽和，而参力自倍，方能驾驱药力，克成大功。若入剂内同煎，则渗人群药，反增他药之长，而减人参自己之力。②《中医杂志》（1963；4:40）：腹痛不大便，即使见高热、神气困倦、唇舌焦燥，亦不宜本方。脾气衰虚，熟地、麦冬少用或不用。治疗麻疹，一般用于麻疹收没期，或麻疹早回者。

【加减】 燥涸，则熟地倍之；肺热，则麦冬多用；脾虚，则白术重投；阳虚，则附子多加；元气大虚，则人参大进；气浮气散，则牛膝、五味略多；倘有假阳在上者，去参用之。

【方论选录】 ①《冯氏锦囊》：或疑五味子酸敛，有碍麻疹，是尚泥子麻疹为有迹之毒，而未达乎气血无形之所化也；况有附子之大力通经达络，何虑五味子酸收小技哉？若不借此少敛，则五脏浮散之残阳，何因藏纳而为发生之根本乎？况附用阴药为君，则唯有回阴制火之力，尚何存辛热强阳之性哉？此方阴阳具备，燥润合宜，驱邪扶正，达络通经，药虽七味，五脏均滋，滋阴而不滞，补脾而不燥，清肺而不寒，壮火而不热，火降而心宁，荣养而肝润。或疑其地黄多而泥膈，殊不知重可坠下，浊可补阴，正取其重浊濡润下趋；况兼白术，其剂则燥者不能为燥，滞者不能为滞矣。或嫌其杂，奈小病、暴病，或在一经；大病、久病，必兼五脏，五脏既已互虚，若不合众脏所欲以调之，难免又增偏胜、偏害之祸；况土金水，一气化源，独不观古方中五脏兼调者乎？或嫌其白术多用而滞，殊不知犹参力多则宣通，少则壅滞，岂不闻塞因塞用，而有白术膏者乎？或嫌其热而燥，殊不知附子随引异功，可阴可阳，可散可补，用补气药可追失散之元阳；同养血药可扶不足之真阴；有发散药则逐在表之风邪；引温暖药则祛在里之寒湿，况独不念附子理中汤，更为纯阳之剂耶？故用此以便火降水土健运如常，精气一复，百邪外御，俾火生土，土生金，一气化源，全此一点真阴真阳，镇纳丹田，以为保生之计而已，即名之曰全真一气汤。熟地、白术，专补脾肾，乃先天、后天，首以重之。但一润一燥，何能逐坠？水土忌克，难成一家，用炒麦冬和之，俾土生金，金生水，水生沫化，源有自，既

相克所以相成，复相生所以相继，再入牛膝、五味，则更得纳气藏源，澄清降浊，但诸药和缓，大功难建，虽调营卫，经络难通，更入乌附，既助药力，复可行经，且使真阳能复交于下，真阴自布于上，既济之象一得，燥涸偏枯之势自和，复入人参以驾驱药力，补助真元，火与元气，势不两立，元气生而火自息矣。②《时方歌括》：方以熟地滋肾水之干；麦冬、五味润肺金之燥；人参、白术补中宫土气，俾上能散津于肺，下能输精于肾；附子性温以补火，牛膝引火气下行，不为食气之壮火，而为生气之少火，从桂附地黄丸套来，与景岳镇阴煎同意。

【临证举例】 ①麻疹 余治洪姓郎，未及一周，时当暑月，壮热多日，神气困倦，唇舌焦燥，饮乳作呕，五心身热如烙，脉洪数而弦。问其前服之药，乃发散消导数剂，复疑麻疹，更为托表。余曰：久热伤阴，阴已竭矣，复加托表，阳外越矣，若不急为敛纳，何以续阴阳于垂绝哉？乃用熟地四钱，炒燥麦冬一钱五分，牛膝一钱二分，五味子二分，制附子四分，煎服一剂而热退，次日更加炒黄白术一钱六分，另煎人参冲服而愈。②小儿手足瘫软 齐化门外张宅令郎未及一周，卧于低炕，睡中坠下，幸炕低而毫无伤损，嘻笑如故，似无痛苦也。但自后右手足瘫软不举，手不能握，足不能立，脉则洪大，久按无力，乃知先天不足，复为睡中惊触，气血不周行之故也。乃以熟地四钱，炒麦冬一钱五分，炒白术二钱四分，牛膝二钱，五味子四分，制附子五分，煎小半钟；另用人参二钱煎浓汁二三分冲药，每早空心服之。六剂而手足轻强，精神更倍。

【备考】 本方方名，《时方歌括》引作“全真益气汤”。

05661 全蝎生皮散

【方源】 《洞天奥旨》卷十。

【异名】 全蝎散(《外科真诠》卷下)。

【组成】 全蝎一两 生黄耆四两 金银花八两 生甘草一两 麦冬四两

【用法】 上药各为末，炼蜜为丸。每日服五钱，子服三丸。

【主治】 父母生疮，因产胎湯皮疮之子者。

【备考】 本方方名，据剂型当作“全蝎生皮丸”。《外科真诠》本方用法：每日母服一两，子服一钱。其病重者，母子必须同服。外用白及散敷之。

05662 全蝎观音散

【方源】 《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】 石莲肉（炒，去心） 白扁豆（炒） 人参各二两半 神曲（炒）二两 全蝎 羌活 天麻（去苗） 防风（去苗） 木香（炮） 白芷 甘草（炙） 黄耆（捶扁，蜜刷炙）各一两 茯苓（去皮）一两半

【用法】 上为细末。婴儿一字，二三岁半钱，四五岁一钱，用水一盏或半盏，枣子半个或一个，同煎至七分，去滓服，不拘时候。

【功用】 温养脾胃，进美饮食。

【主治】 ①《局方》：小儿外感风冷，内伤脾胃，呕逆吐泻，不进乳食，久则渐渐羸弱。②《幼科折衷》：小儿脾虚自汗，多出额上，沾粘人手。

05663 全蝎乳香散

【方源】 《普济方》卷一八五引《德生堂方》。

【组成】 川乌头（生，去皮、脐） 马蔺子各一两 全蝎 川山甲（炮） 乳香各五钱 苍术一两

【用法】 上为细末。用白芥子三两研烂如膏，和前药末，以纸摊药膏，敷贴痛处；热甚，即去药，再贴上。

【功用】 住痛。

【主治】 诸风湿，遍身骨节疼痛不可忍。

05664 全蝎星香散

【方源】 《万氏家抄方》卷二。

【组成】 南星八钱 木香一钱 全蝎三个

【用法】 作二服。水一钟，加生姜十片，煎服。

【主治】 五痫。马痫，张口摇头，马鸣；牛痫，目正直视，腹胀；鸡痫，摇头反折，喜惊；羊痫，喜扬目吐舌；猪痫，喜吐沫。

05665 全胶散

【方源】 《外科大成》卷四。

【组成】 黄耆 归尾 川山甲（炒） 大黄各一两 白芷六钱 蜂房一个（重六七钱者，酒浸、瓦焙六次） 连翘二钱 蜈蚣（大者） 七条（酒浸、瓦焙二次）

【用法】 上为末。每服三五钱，无灰酒调服；再多饮，以助药力。

【主治】 肚痈，内痈。

【加减】 如背疽，加羌活；胁痈，加柴胡；乳症，加升麻。各随经络加引经药五七分，酒煎服药尤佳。

05666 全厌逐痰汤

【方源】 《医林改错》卷下。

【组成】 桃仁五钱（炒） 红花五钱 甘草三钱 桔梗三钱 生地四钱 当归二钱 玄参一钱 柴胡一钱 枳壳二钱 赤芍二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《医林改错》：瘀五六天后，饮水即呛。②《医学集成》：瘀血凝滞之呃逆。

【方论选录】《江苏中医杂志》（1984；6:28）：本方由《伤寒论》四逆散以枳壳易枳实，合桃红四物汤去川芎加玄参、桔梗而成。四逆散能调气血，利升降；桃红四物汤为养血活血方。去川芎者，因其辛温性燥，恐伤阴津；增入玄参，意在助生地以滋养柔润；桔梗乃利咽圣药，能升降肺气，并佐柴胡、枳壳升降气机，引活血祛瘀药上达病所。

【临证举例】 ①声带小结 《江西中医药》（1983；6:20）：王某某，男性，35岁，1982年9月11日初诊。诉咽部干燥不适，声音嘶哑已二个月，被宜春地区人民医院耳鼻喉科诊断为"声带小结"。经用四环素、喉片、北豆根片及清热利咽中药治疗近月，效果不佳。证见形体壮实，口干咽燥，声音嘶哑，大便干结，脉缓，舌苔薄黄，舌质稍红，辨证为阴虚喉痹，瘀血内阻。治以养阴清热，活血化瘀之会厌逐瘀汤加味：桃仁10克，红花10克，当归10克，生地10克，赤芍12克，桔梗12克，甘草5克，玄参21克，麦冬15克，柴胡10克，枳壳10克。每日一剂，水煎两次分服。十五剂后，咽干声嘶明显好转，经耳鼻喉科检查声带小结已见缩小。方已中病，嘱续服十五剂，经间接喉镜检查：声带小结已消失，回校任教。②慢性咽炎 《江苏中医杂志》（1984；6:28）：杨某某，男，53岁。有慢性咽炎史二年。近一月余，咽喉干痛较甚，有梗塞感，咽部慢性充血，苔薄，舌下筋脉色紫。此属气滞瘀阻，津液耗伤。拟会厌逐瘀汤主之。药用：生地、桃仁各12克，红花、玄参、赤芍、胖大海各9克，柴胡、枳壳各4.5克，当归6克，桔梗5克，生甘草3克每日一剂，治疗三周而愈。

05667 合囟散

【方源】 方出《千金》卷五，名见《圣济总录》卷一六七。

【组成】 防风一两半 柏子仁 白及各一两

【用法】 上为末。以乳和敷囟上，一日一次。十日知，二十日愈。

【主治】 小儿囟开不合。

05668 合欢丸

【方源】《叶氏女科》卷四。

【组成】 当归 熟地黄各三两 茯苓 白芍各一两五钱 酸枣仁（炒） 远志肉（制）各一两 香附（酒炒） 炙甘草各八分

【用法】 上为末，炼蜜为丸。白汤送下。

【主治】 妇人气郁不孕。

【加减】 气虚，加人参一两。

05669 合欢饮

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【异名】 合欢皮散（《灵验良方汇编》卷二）。

【组成】 合欢皮 白蔹

【用法】 同煎服。

【主治】 肺痈久不敛口。

05670 合明散

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】 蛤粉 石决明 甘草各等分

【用法】 上为末。每服半钱，煮猪肝汁调下。食后服。

【主治】 小儿雀目，至夜不见物。

【备考】《医统》有夜明砂。

05671 合明散

【方源】《原机启微·附录》。

【组成】 楮实子 覆盆子（酒浸） 车前子（酒蒸） 石斛各一两 沉香（另研） 青盐（别研）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】 小儿雀目，至夜不见物。

【备考】 本方方名，据剂型当作"合明丸"。

05672 合香丸

【方源】《医统》卷六十三。

【组成】 鸡舌香 芎藭各一两 藿香 甘松 当归 桂花 桂心 白芷各半两 零陵香 木香各三分 肉豆蔻 白檳榔各五枚 丁香 麝香少许

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。常含一丸，津咽下。

【功用】 去热毒气，调和脏腑。

【主治】 口臭。

【备考】 方中丁香用量原缺。

05673 合掌散

【方源】《外科全生集》。

【组成】 硫黄一两 铁锈一钱 红砒六分

【用法】 上为极细末，以葱汁调和，涂入大碗内，勿使厚薄，以碗覆于瓦上，取艾置碗下熏药；药得熏干，敲药碗声同空碗无异为度，取药再研极细。每遇满身癞疥及肾囊痒，用药一钱可敷数次痊愈。临用以右手中指罗纹粘满香油，再在包内粘药，涂入左手心，合掌数磨，止有药气，不见药形，将两掌擦疮，每日早、晚擦两次，三日扫光；

再擦三四日不发。

【主治】 满身癞疥及肾囊痒。

05674 合魂丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 人参五钱 茯神三钱 炒枣仁一两 熟地二两 莲子心五钱 巴戟天一两

【用法】 水煎服。

【主治】 心肾不交，觉自己之身分而为两，他人不见而己独见之。

05675 合口收功散

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】 血竭一钱 乳香 没药 轻粉 龙骨各一钱五分 赤石脂二钱 朱砂 海螵蛸各五分

【用法】 上为细末。散在疮口上。

【功用】 生肌。

【主治】 痈疽发背溃烂，不生肌肉。

【宜忌】 此方用之不可太早。

05676 合欢保元膏

【方源】《冯氏锦囊·杂证》卷十四。

【组成】 人参一两 当归身一两二钱 白术一两五钱 枸杞子一两 大附子半只 川椒三钱

【用法】 水煎成膏，入麝二分，藏锡盒中。津化用之。

【主治】 阳痿。

05677 杀虫丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】 鹤虱 雷丸 芜荑 槟榔 乌梅 苦楝根 使君子肉

【主治】 虫痛。不吐不泻，心腹懊侬，往来上下，痛有休止；或腹中块起，按之不见，五更心嘈，牙关强硬，恶心，吐涎沫或清水，腹热善渴，食厚味或饱则止，面色青白赤不定，蛔虫攻咬，面必黄。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（济南方）：孕妇忌服。

05678 多子锭

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 党参（去芦）二两 杜仲（炭）二两 苁蓉（炙）二两 盐知母二两 黄柏二两 远志（炙，去心）二两 盐泽泻一两 黄耆一两 龟板（炙）一两 牛膝一两 蛇床子一两 甘草（炙）一两 首乌（炙）四两 山药四两（上为细末）熟地四两 生地四两 天冬四两 山萸肉（炙）二两 朱寸冬二两 大茴香二两 五味子（炙）一两 枸杞子一两（共熬膏）

【用法】 将前药粉和膏合成药饼，每盒装四十八粒。每服十二丸，一日二次，温开水送下。

【功用】 滋阴补气，壮阳种子。

【主治】 肾虚气弱，久无子嗣，精神萎靡，腰膝痠痛。

05679 多皮饮

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 地骨皮三钱 五加皮三钱 桑白皮五钱 干姜皮二钱 大腹皮三钱 白鲜皮五钱 粉丹皮三钱 赤苓皮五钱 冬瓜皮五钱 扁豆皮五钱 川槿皮三钱

【功用】 健脾除湿，疏风和血。

【主治】 亚急性、慢性荨麻疹。

【宜忌】 多皮饮主要是针对顽固性慢性荨麻疹，经常复发，而发作时以皮疹为主，而且湿重于热，用过麻黄方不效的患者为宜。

【加减】 若患者遇冷而复发，则重用干姜皮；遇热而发作，则去干姜皮，另加干生地五钱至一两。

【方论选录】 本方是根据《六科准绳》中五皮饮化裁而来。方中赤苓皮、冬瓜皮、扁豆皮、大腹皮健脾利湿，涤清胃肠的积滞；原方五皮饮中的生姜皮改为干姜皮，取其辛温和胃，固表守而不走；白鲜皮、川槿皮驱风止痒；丹皮凉血和血化斑；地骨皮、桑白皮泄肺而清皮毛。

【临证举例】 慢性荨麻疹 李某敏，女，41岁。初诊：1971年2月10日。主诉十余年来全身不断发生红疙瘩，痒甚。现病史：患者十余年来，不断在四肢、躯干发生大片红色疙瘩，剧烈瘙痒，时起时落，每早晚发疹较重，无一定部位，特别是冬季晚上入寝后更重，夏日亦不间断，曾经多方面治疗不效。检查：四肢有散在指盖大或铜元大、不整形之大片扁平隆起，淡红色，脉象沉缓，舌苔白，舌质淡。西医诊断：慢性荨麻疹。中医辨证：先有蕴湿兼感风寒之邪化热，风寒湿热交杂，缠绵不去，发于皮肤。立法：调和阴阳气血，兼以清热散寒，疏风祛湿。方药：五加皮三钱，桑白皮三钱，地骨皮三钱，丹皮三钱，干姜皮三钱，陈皮三钱，扁豆皮三钱，茯苓皮三钱，白鲜皮三钱，大腹皮三钱，当归三钱，浮萍三钱。2月17日进服上方七剂，皮疹明显减少，只是早上外出后有少数皮疹，晚上也基本不发。2月26日复诊，又继服四剂后，皮疹即完全不发。又服三剂，临床治愈。

05680 刘寄奴散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】 刘寄奴一两 当归一两（锉） 桂心一

两 芎藭一两 牛膝一两 琥珀一两

【用法】 上为散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 妇人血气，小腹疠痛。

05681 刘寄奴散

【方源】 《圣惠》卷八十。

【组成】 刘寄奴一两 麝香一分（细研） 当归（锉，微炒） 芎藭 桂心 牛膝（去苗） 益母草 羌活 生干地黄 延胡索各三分

【用法】 上为散，研入麝香令匀。每服二钱，以温生姜汤、童便调下，不拘时候。

【主治】 产后恶血冲心，闷绝不语。

05682 刘寄奴散

【方源】 《本事》卷六。

【组成】 刘寄奴

【用法】 上为末。掺金疮口，裹。

【功用】 ①《本事》：敛金疮口，止疼痛。②《济阳纲目》：止血生肌。

【主治】 ①《本事》：金疮。②《医学纲目》：汤火疮。

【方论选录】 《本事方释义》：刘寄奴气味苦温，入足厥阴，能行血止疼，去癥瘕，治金疮极有效验，并治汤火疮尤妙。此虽一味草药，性能行走，使气血不致凝滞，则所伤之处自然止痛生肌耳。

【备考】 《本事》引《经验方》：刘寄奴为末，先以糯米浆用鸡翎扫伤着处，后掺药末在上。并不痛，亦无痕。大凡伤着，急用盐末掺之，护肉不坏，然后药敷之。

05683 充髓丹

【方源】 《辨证录》卷八。

【组成】 熟地二两 山茱萸一两 金钗 石斛五钱 地骨皮三钱 沙参五钱 牛膝三钱 五味子一钱 茯苓三钱

【用法】 水煎服。

【功用】 补真阴。

【主治】 久立腿无力，面黄肌瘦，口臭肢热，盗汗骨蒸。

05684 充髓汤

【方源】 《辨证录》卷六。

【组成】 熟地三两 玄参二两 金钗 石斛 牛膝各五钱 女贞子五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 素常贪色，加之行疫劳瘁，伤骨动火，复又行房鼓勇大战，遂至两足痿弱，立则腿颤，行则膝痛，卧床不起，然颇能健饭易消。

05685 交加丸

【方源】 《鸡峰》卷十五。

【组成】 生地黄一斤（研烂取汁，滓别置器中） 生姜一斤（同上法。以上将生地黄汁炒生姜滓，生姜汁炒地黄滓，令干，入药如后） 白芍药 人参 当归 麦门冬 琥珀 阿胶 蒲黄各一两（一方用白术、石斛各一两，无蒲黄，用麦门冬，治虚劳百疾）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心米饮送下。每服药后，以故旧纱帛一片，包龙脑薄荷二两，以鼻闻其气。

【功用】 滋益荣卫，补益冲任。

【主治】 妇人诸血妄行。

05686 交加散

【方源】 方出《本草纲目》卷十四引《圣惠》，名见《准绳·类方》卷五。

【异名】 定风散（《医级》卷九）。

【组成】 当归 荆芥穗各等分

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，酒少许，童便少许，煎七分，灌之。

【主治】 产后中风，不省人事，口吐涎沫，手足瘛疭。

05687 交加散

【方源】 《本事》卷十。

【组成】 生地黄五两（研取汁） 生姜五两（研取汁）

【用法】 上交互用汁浸一夕，各炒黄，渍，汁尽为度，末之。寻常腹痛酒调下三钱，产后尤不可缺。

【主治】 妇人荣卫不通，经脉不调，腹中撮痛，气多血少，结聚为瘕，产后中风。

【方论选录】 《本事方释义》：生地黄气味甘苦微寒，入手足少阴厥阴；生姜气味辛温，入手足太阴。各捣汁，互相浸渍、炒黄，欲其气味之和也。此妇人产后中风，荣卫不通，经脉不调，欲结癥瘕者宜服之。用此二味，只取乎调气血耳。

05688 交加散

【方源】 《妇人良方》卷二。

【组成】 生姜十二两 生地黄一斤（二味研取自然汁，将地黄汁炒生姜滓，姜汁炒地黄滓，各稍干） 白芍药 延胡索（醋纸裹煨令熟，用布揉去皮） 当归 桂心各一两 红花（炒，无恶血不用） 没药（别研）各半两 蒲黄一两（隔纸炒）

【用法】 上为细末。每服二钱，温酒调下；如月经不依常，苏木煎酒调下；若腰疼，用糖球子煎酒

调下；不拘时候。

【功用】 滋养血络，逐散恶血。

【主治】 荣卫不和，月经湛浊，脐腹撮痛，腰腿重坠，血经诸疾。

05689 交合汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】 人参五钱 熟地二两 黄连三分 肉桂五分

【用法】 水煎服。

【主治】 怔忡。

05690 交泰丸

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】 干姜（炮制）三分 巴豆霜五分 人参（去芦） 肉桂（去皮）各一钱 柴胡（去苗） 小椒（炒，去汗并闭目，去子） 白术各一钱五分 厚朴（去皮，锉，炒；秋冬加七钱） 酒煮苦楝 白茯苓 砂仁各三钱 川乌头（炮，去皮脐）四钱五分 知母四钱（一半炒，一半酒洗。此一味春夏所宜，秋冬去之） 吴茱萸（汤洗七次）五钱 黄连（去须）六钱（秋冬减一钱半） 皂角（水洗，煨，去皮弦） 紫菀（去苗）各六钱

【用法】 上除巴豆霜另入外，同为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，温水送下。虚实加减。

【功用】 升阳气，泻阴火，调营气，进饮食，助精神，宽腹中。

【主治】 怠惰嗜卧，四肢不收，沉困懒倦。

05691 交泰丸

【方源】 方出《韩氏医通》卷下，名见《四科简效方》甲集。

【组成】 川黄连五钱 肉桂心五分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，空心淡盐汤送下。

【主治】 心肾不交，怔忡无寐。

【临证举例】 失眠《北京医学院学报》(1975；3：162)：应用本方治疗神经官能症失眠50例，显效17例，有效21例，总有效率为76%，无一例恶化。其方法是将黄连、肉桂各等分，或黄连三份、肉桂二份研末和匀装胶囊，每囊重0.3克，每服四粒，睡前半小时服用。一般热象不著者用黄连、肉桂各等量所做成的胶囊；热象较著心火亢盛用3:2所构成的胶囊。典型病例：陈某某，男，35岁，技术员。五、六年来早醒不眠，夜寐不实，一夜之间醒达十余次，仅能睡眠四小时左右，脉弦细尺弱，苔根黄。服本丸后当晚夜眠即较酣，一夜仅醒3～4次，继续服药，睡眠时数延长至7～9小时。

05692 交泰散

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】 大南星

【用法】 以醋磨涂涌泉穴。

【主治】 咽喉肿痛。

05693 交感丹

【方源】《洪氏集验方》卷一引铁瓮申先生方。

【异名】 七情交感丹(《不居集》上集卷十八)。

【组成】 茯神四两 香附子一斤（去毛，用新水浸一夕，炒令黄色）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，侵晨以降气汤嚼下。

【主治】 ①《洪氏集验方》引铁瓮申先生方：中年精耗神衰，中焦隔绝，荣卫不和，上则心多惊悸，中则寒痞饮食减少，下则虚冷遗泄，甚至于阴痿不与，脏气滑泄。②《鲁府禁方》：一切公私拂情，名利失志，抑郁烦恼，七情所伤，不思饮食，面黄形羸，胸膈痞闷，疼痛。

05694 交感丹

【方源】《本草纲目》卷十二引申先生方。

【组成】 茅山苍术一斤（刮净，分作四份，用酒、醋、米泔、盐汤各浸七日，晒，研） 川椒红 小茴香各四两

【用法】 上为末，陈米糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心温酒送下。

【功用】 补虚损，固精气，乌髭发；久服令人有子。

05695 交加地黄丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】 生地一斤 老生姜一斤 玄胡索 当归 川芎 白芍各二两 没药 木香各一两 桃仁（去皮尖） 人参各一两半 香附子半斤

【用法】 上先将地黄、生姜各捣汁，以生姜汁浸地黄滓，地黄汁浸生姜滓，皆以汁尽为度，次将余药为末，共作一处，晒干，同为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心姜汤下。

【主治】 经水不调，血块气痞，肚腹疼痛。

【方论选录】《医略六书》：月经不调，盖由血瘀结块而成痞胀疼痛，乃旧血不去，则新血不生，故经候愆期焉。生地滓收入老姜汁，以生新散瘀；老姜滓收入生地汁，以散瘀生新；当归养血脉，白芍敛阴血，延胡化血滞以归经，川芎行血海以荣经，桃仁破瘀血以通经，人参扶元气以通脉，木香调气和中，善开痞结，香附调气解郁能除疼痛，乳香活血脉以通经也。醋糊以丸之，姜汤以下之，使瘀血

消化，则新血自生，而月经无不调，血块无不退，何疼胀之不除哉！

【备考】 方中没药，《济阴纲目》作“明乳香”。

05696 交感地黄煎丸

【方源】《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。

【异名】 交感地黄丸（《女科百问》卷下）。

【组成】 生地黄（洗净，研，以布裂汁留滓，以生姜汁炒地黄滓，以地黄汁炒生姜滓，各至干，堪为末为度） 生姜（净洗，研烂，以布裂汁留滓）各二斤 延胡索（拌糯米，炒赤，去米） 当归（去苗） 琥珀（别研）各一两 蒲黄（炒香）四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。食前当归汤化下。

【主治】 妇人产前产后，眼见黑花；或即发狂，如见鬼状；胞衣不下；失音不语，心腹胀满，水谷不化，口干烦渴，寒热往来，口内生疮，咽中肿痛，心虚惊悸，夜不得眠；产后中风，角弓反张，面赤，牙关紧急；崩中下血，如豚肝状，脐腹疠痛，血多血少，结为癥瘕，恍惚昏迷，四肢肿满；产前胎不安；产后血刺痛。

【备考】《女科百问》有小茴香四两。

05697 产宝汤

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】 桂心 姜黄各等分

【用法】 上为细末。每服方寸匕，酒调下。

【主治】 产后血余作痛，兼块者。

05698 庆云散

【方源】《千金》卷二。

【组成】 覆盆子 五味子各一升 天雄一两 石斛 白术各三两 桑寄生四两 天门冬九两 菟丝子一升 紫石英二两

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，先食，酒调下，一日三次。

【主治】 丈夫阳气不足，不能施化，施化无成。

【加减】 素不耐冷者，去寄生，加细辛四两；阳气不少而无子者，去石斛，加槟榔十五枚。

【方论选录】《千金方衍义》：庆云者，庆云龙之征兆。紫石英专温荣血，天雄峻暖精气，佐以覆盆、五味、菟丝温补下元，寄生主治腰痛，天冬能强肾气，石斛强阴益精，白术固津气而利腰脐间血；恐英、雄二味之性过烈，乃以天冬、石斛、寄生濡之，覆盆、五味、菟丝辅之，白术培土以发育万物；扶阳施化之功尽矣。若素不耐寒，则去寄生而加细辛，以鼓生阳之气；阳本不衰，当退石解而进槟榔，以祛浊湿之垢。其法之可重端在乎此。

【备考】 方中天门冬，《妇人良方》作“麦门冬”。

05699 闭白丸

【方源】《经验女科方》。

【组成】 龙骨（煅） 螵蛸 牡蛎（煅） 赤石脂（煅）

【用法】 上为末，米糊为丸。每服一百丸，以酒送下。

【主治】 妇女胎前白带。

05700 闭血汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】 人参 白术各一两 三七根末三钱 北五味子二钱

【用法】 水煎服。一剂后减人参五钱，加熟地一两，山茱萸五钱，麦冬五钱，再服四剂。

【功用】 补气生血，止血同冲。

【主治】 老妇因虚，不慎房帏，以致血崩，目暗晕地，愈止愈多。

05701 闭真丸

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】 龙骨（另研）一两 诃子五枚 缩砂仁半两 朱砂一两（另研，一半为衣）

【用法】 上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服一丸，空心以温酒送下。

【主治】 白淫不止，及有余沥。兼治梦遗。

05702 闭管丸

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】 胡连一两 槐花（微炒） 穿山甲（麻油内煮黄色） 石决明（煅）各五钱

【用法】 炼蜜为丸，如麻子大。每服一钱，空心以清米汤送下，早晚日进二服。

【主治】 痔漏。

【加减】 如漏四边有硬肉突起者，加蚕茧二十个炒研，和入药中。

05703 闭精丸

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】 牡蛎 菟丝子 龙骨（生） 五味子 白茯苓 韭子 白石脂 桑螵蛸各等分

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以盐酒送下。

【主治】 下虚，白浊如米泔或若凝脂。

05704 闭精散

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】 黄耆 远志 人参 当归各一钱 泽泻 白芍药 甘草（炙） 龙骨各七分

【用法】 上咬咀。水煎，空心温服。

【主治】 小腹急痛，便溺失精，溲出白液。

05705 闭关止渴汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】 石膏五钱 玄参二两 麦冬二两 熟地二两 青蒿五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 消渴，大渴恣饮，一饮数十碗，始觉胃中少快，否则胸中嘈杂如虫上钻，易于饥饿，得食渴减，不食渴尤甚，属胃消者。

【方论选录】 此方少用石膏、青蒿以止胃火，多用玄参、熟地以填肾水，重用麦冬以益肺气，未尝闭胃之关门也。然而胃火之开，由于肾水之开；肾水之开，由于肾火之动也；而肾火之动，又由于肾水之乏也。今补其肾水，则水旺而肾火无飞动之机，火静而肾水无沸腾之患。肾水既安于肾宅，而胃火何能独开于胃关哉。此不闭之闭，真神于闭也。

05706 灯花丸

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】 灯花二十个 乳香（皂子大）两块

【用法】 上为末，粟米饮为丸，如芥子大。每服七丸，以桃心汤送下，不拘时候。

【主治】 小儿惊啼，夜啼。

05707 冲关散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 赤茯苓（去皮） 人参 陈皮（去白） 木通 槟榔各一两 青皮一分 甘草（炙）半两

【用法】 上为粗散。每服五钱，水一盏半，煎至七分，去滓，食前温服。以小便通利为度。

【主治】 关格不利，上焦有热，胸中痞闷，小便涩少或不通。

05708 冲和汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】 中和汤（《准绳·疡医》卷一）、冲元汤（《顾氏医径》卷六）。

【组成】 人参二钱 黄耆 白术 当归 白芷各一钱半 茯苓 川芎 皂角刺（炒） 乳香 没药各一钱 金银花一钱 陈皮二钱 甘草节一钱

【用法】 水、酒各半煎服。

【主治】 元气虚弱，失于补托，疮属半阴半阳，似溃非溃，似肿非肿。

05709 冲和汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 山萸肉二钱 枣仁二钱（炒，研） 当归二钱 白芍一钱五分（酒炒） 人参二钱 茯神二钱 甘草五分 沙苑蒺藜三钱 红枣五枚 橘饼四钱

【主治】 怒甚则胁痛，郁极则火生，心烦意躁，筋节不利，入夜不寐。

05710 冲和膏

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】 赤芍二两 白芷 防风各一两 独活三两 龙脑三钱 石菖蒲一两五钱

【用法】 各取净末，以瓷瓶收贮，不可泄气。临用时姜汁、滴醋调敷，一日一换。

【主治】 外症初起，坚肿色淡。

05711 冲和仙膏

【方源】《仙传外科集验方》。

【异名】 黄云膏、仙膏（原书）、冲和膏（《外科理例》）、阴阳散（《外科枢要》卷四）、冲和赶毒散（《大生要旨》）、冲和散（《古方汇精》卷二）、赶毒散（《验方新编》卷十一）。

【组成】 川紫荆皮五两（炒） 独活三两（炒，不用节） 赤芍药二两（炒） 白芷一两（不见火） 木蜡（又名望见消、阳春雪，即石菖蒲）随证加减

【用法】 上为细末。热酒或葱汤调敷。凡敷药皆须热敷，干则又以元汤湿透之。

【功用】 ①《金鉴》：行气疏风，活血定痛，散瘀消肿，祛冷软坚。②《古方汇精》：祛寒逐湿。

【主治】 痈疽、发背、疮疖、流注、发颐等诸肿毒初起，红肿硬痛，或漫肿无头，积日不消，冷热不明；以及偏正头痛，眼痛。

①《仙传外科集验方》：流注属半阴半阳者。②《外科理例》：一切疮肿不甚热，积日不消。③《本草纲目》：一切痈疽、发背、流注、诸肿毒，冷热不明者。④《赤水玄珠》：偏正头风肿痛，眼痛。⑤《青囊秘传》：一切外症之凝滞皮肤间者。

【宜忌】 ①《仙传外科集验方》：如病热势大盛，切不可用酒调，但可用葱泡汤调此药热敷上，如病稍减，又须用酒调。疮面有血泡成小疮，不可用木蜡，恐性粘，起药时生受，宜用四味先敷，后用木蜡盖在上面，覆过四周。②《北京市中药成方选集》：不可内服。

【加减】 如病极热，倍加紫荆皮、木蜡，少用三品；如病极冷，微加赤芍药、独活；如用本方四面黑晕不退，疮口皆无血色者，加肉桂、当归；如用本方痛不住，可取酒化乳香、没药于火上使溶，然后将此酒调药热涂；流注筋不伸者，加乳香；如疮口有赤肉突出者，少加南星，用姜汁酒调；若病势

热盛者，加对停洪宝丹，用葱汤调涂贴之；小儿软疖，加军姜酒调服。

【方论选录】 夫痈疽流注杂病，莫非气血凝滞所成，遇温即生，遇凉即死，生则散，死则凝。此药是温平，紫荆皮木之精，能破气逐血消肿；独活土之精，能止风动血引气，拔骨中毒，去痹湿气，更能与木蜡破石肿坚硬；赤芍药火之精，微能生血，住痛去风；木蜡水之精，能生血，住痛消肿，破风散血；白芷金之精，能去风生肌止痛。盖血生则不死，血动则流通，肌生则不烂，痛止则不作，风去则血自散，气破则硬可消，毒自散。五者交攻，病安有不愈者乎。

05712 冲脉饮子

【方源】 《寿世保元》卷七。

【组成】 黄耆（每一两用桂一钱煎汤，将碗盛饭上蒸熟）一钱 人参一钱五分 白术一钱 生地黄（酒浸）一钱 茯苓一钱 当归身二钱 白芍（酒炒）一钱 川芎一钱 柴胡五分 青皮五分 宣木瓜四分 皂角子二钱 甘草二分

【用法】 上锉一剂。水煎，频服。

【主治】 妇人年五十外，乳痈初已，而又致穿破，不得收功者。

【加减】 大便不通润，加火麻仁（炒）二钱、黄连（酒炒）二钱。

05713 冲和灵宝饮

【方源】 《伤寒六书》卷三。

【组成】 羌活 防风 川芎 生地黄 细辛 黄芩 柴胡 甘草 干葛 白芷 石膏

【用法】 水二钟，加煨生姜三片，大枣二枚，入黑豆一撮煎之，温服取微汗。

【主治】 两感伤寒，头痛恶寒发热，口燥咽干。

【备考】 《医方简义》本方用生甘草一钱，防风一钱五分，生地四钱，柴胡一钱五分，细辛四分，白芷八分，川芎、葛根各一钱，石膏三钱，黄芩一钱。

05714 冲和顺气汤

【方源】 《卫生宝鉴》卷九。

【异名】 升麻白芷汤（《古今医鉴》卷九）。

【组成】 葛根一钱半 升麻 防风 白芷各一钱 黄耆八分 人参七分 甘草四分 芍药 苍术各三分

【用法】 上㕮咀，作一服。水二盏，加生姜三片，大枣两个，煎至一盏，去滓，早饭后、午前温服。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：忧思不已，饮食失节，脾胃有伤，面色黧黑不泽，环唇尤甚，心悬如饥状，饥不欲食，气短而促。②《张氏医通》：内伤脾气，恶寒发热，食少便溏。

【方论选录】 《上古天真论》云：阳明脉衰于上，面始焦。始知阳明之气不足，故用本方助阳明生发之剂，以复其色。《内经》曰：上气不足，推而扬之。以升麻苦平，葛根甘温，自地升天，通行阳明之气为君；人之气以天地之疾风名之，气留而不行者，以辛取之，防风辛温，白芷甘辛温，以散滞气，用以为臣；苍术苦辛，蠲除阳明经之寒湿，白芍药之酸，安太阴经之怯弱。《十剂》云：补可去弱。人参、黄耆、甘草，甘温益正气以为佐；《至真要大论》云：辛甘发散为阳。生姜辛热，大枣甘温，和营卫，开腠理，致津液，以复其阳气，故以为使也。

05715 决水汤

【方源】 《辨证录》卷五。

【组成】 车前子一两 茯苓二两 王不留行五钱 肉桂三分 赤小豆三钱

【用法】 水煎服。

【功用】 利水。

【主治】 水肿既久，遍身手足俱胀，面目亦浮，口不渴而皮毛出水，手按其肤如泥。

【宜忌】 禁用食盐一月。

【方论选录】 此方利水从小便而出，利其膀胱也。凡水必从膀胱之气化，而后由阴器以出，土气不宣，则膀胱之口闭，用王不留行之迅药以开其口，加入肉桂，引车前、茯苓、赤小豆直入膀胱而利导之。茯苓、车前虽利水而不耗气，而茯苓且是健土之药，水决而土又不崩，此夺法之善也。

05716 决明丸

【方源】 《圣济总录》卷一〇二。

【组成】 决明子 青葙子 茺蔚子 车前子 地肤子 五味子（炒） 枸杞子（去茎蒂） 细辛（去苗叶） 麦门冬（去心，焙） 生干地黄（焙） 赤茯苓（去黑皮） 桂（去粗皮） 泽泻 甜葶苈（纸上炒紫色） 防风（去叉） 芎藭各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后良久米饮送下，一日三次。

【主治】 肝虚膈热，眼目昏暗，渐成障蔽，或见黑花，不能远视。

05717 决明丸

【方源】 《圣济总录》卷一〇六。

【组成】 石决明 车前子 黄连（去须）各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服

十五丸，食后以米饮送下，一日二次。

【主治】 目暴肿疼痛。

05718 决明丸

【方源】《得效》卷十六。

【组成】 青葙子（炒） 防风 枳壳各一两 茺蔚子 细辛各半两 枸杞子 泽泻 生干地黄 石决明（烧）各半两 土当归（酒浸）二两 宣连半两（去须） 车前子（炒） 麦门冬（去心）各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后麦门冬煎汤送下。

【主治】 诸般眼患，因热病后毒气攻目，生翳膜遮障。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“决明子丸”。

05719 决明丸

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 石决明一两 车前子一两 五味子半两 细辛半两 大黄一两 茯苓一两 知母一两 茺蔚子一两 黑参一两 防风一两 黄芩一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，食前茶清送下。

【功用】 下行实热。

【主治】 滑翳内障。瞳心内一点如水银珠子之状，微含黄色，不痒不疼，无泪而遮蔽瞳神，渐渐失明，后则左右相牵俱损。

05720 决明汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】 石决明 人参 芎藭 细辛（去苗叶） 五味子各一两 赤茯苓（去黑皮）二两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】 血灌瞳仁。

05721 决明散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 石决明（捣细，研，水飞过） 车前子 人参（去芦头） 甘菊花 槐子 熟干地黄各一两 茺蔚子二两 防风二两（去芦头）

【用法】 上为散。每服二钱，食后以粥饮调下，夜临卧再服。

【主治】 眼内障翳。

05722 决明散

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】 石决明（刮洗） 细辛（去苗叶） 防风（去皮） 车前子 人参 白茯苓（去黑皮） 大黄（锉，炒） 茺蔚子各一两 桔梗（炒）半两

【用法】 上为散。每服二钱匕，食后、临卧服。

【主治】 内障浮翳，或如枣花，或若银钉浮浅透外。

05723 决明散

【方源】《直指附遗》卷二十。

【组成】 桔梗 羚羊角 大黄 紫决明 当归 川芎 瞿麦（用花） 生地黄 木贼 羌活 防风 赤芍药 石决明（火煅） 青葙子 车前子 蝉退 白芷 细辛 蔓荆子 蒺藜（炒） 香附子 玄参各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一钟半，煎至一钟，通口服。

【主治】 眼青盲内障。

05724 决明散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【组成】 石决明 人参 茯苓 大黄 车前子 细辛各一两 防风二两 茺蔚子二两 桔梗一两半

【用法】 上为末。每服一钱，食后米饮汤调下。

【主治】 浮翳内障。因脑中热风冲入眼内，脑脂流下，凝结作翳，如银针之色，虽不见人物，尤见三光。初患之时无痒痛，从一眼先患，后乃相牵俱损。

05725 决明散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 决明子 甘菊花各一两 防风（去芦） 车前子 芎藭 细辛 梔子仁 玄参 蔓荆子 白茯苓 山茱萸各一两半 生地黄三两

【用法】 上为末。每服二钱，食后以盐汤调下。

【主治】 眼见黑花不散。

05726 决明散

【方源】《医统》卷五十三。

【组成】 决明子

【用法】 上为末。水调贴太阳穴。

【主治】 头痛。

05727 决明散

【方源】《医级》卷八。

【组成】 石决明（取九孔者，煅，研，水飞净）一钱 冰片一分

【用法】 上为细末。点眼角中。

【主治】 赤翳攀睛。

05728 决津煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 决阴煎（《叶氏女科》卷三）。

【组成】 当归三五钱或一两 泽泻一钱半 牛膝二钱 肉桂一二三钱 熟地二三钱或五七钱（或不

用亦可） 乌药一钱（气虚者不用亦可）

【用法】 水二钟，煎七八分，食前服。

【主治】 ①《景岳全书》：妇人血虚经滞，不能流畅而痛极。②《叶氏女科》：妇人虚弱或邪思蓄注，邪随气结而不散，或冲任滞逆，脉道壅瘀而不行，致成鬼胎；或产后败血不散，流入阴中，而作寒热。

【加减】 呕恶者，加焦姜一二钱；阴滞不行者，非加附子不可；气滞而痛胀者，加香附一二钱或木香七八分；血滞血涩者，加酒炒红花一二钱；小腹不暖而痛极者，加吴茱萸七八分；大便结涩者，加肉苁蓉一二三钱，微者以山楂代之。

【备考】《会约》无熟地，有香附。

05729 决流汤

【方源】《傅青主男女科》。

【组成】 黑丑二钱 甘遂二钱 肉桂一两 车前子一两

【用法】 水煎服。一剂而水流斗余，二剂而痊愈，断不可与三剂。二剂之后，须用五苓散调理二剂，再以六君子汤补脾。

【主治】 水臌，满身皆肿，按之如泥。

【宜忌】 忌食盐三月，犯之则不救。

【方论选录】 牵牛、甘遂，最善利水，又加之肉桂、车前子，引水以入膀胱，利水而不走气，不使牛、遂之过猛也。

05730 决明子散

【方源】《济生》卷五。

【组成】 黄芩 甘菊花（去枝梗） 木贼 决明子 石膏 赤芍药 川芎 川羌活（去芦） 石决明一两 甘草 蔓荆子各一两

【用法】 上为细末。每服三钱，水一中盏，生姜五片，煎至六发，食后服。

【主治】 风热毒气上攻，眼目肿痛，或卒生翳膜，或眦出胬肉，或痒或涩，羞明多泪，或始则昏花，渐成内障，及一切暴风风客热。

05731 决明子粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】 炒决明子 10～15 克 粳米 60 克 冰糖少许 或加白菊花 10 克

【用法】 先把决明子放入锅内炒，至微有香气取出，待冷后煎汁，或与白菊花同煎取汁，去滓，放入粳米煮粥。

【功用】 清肝，明目，通便。

【主治】 目赤肿痛，怕光多泪，头痛头晕，高血压病，高血脂症，肝炎，习惯性大便秘结。

05732 决明鸡肝散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 决明子（晒燥，为极细末，勿见火） 骟鸡肝（生者，不落水）

【用法】 将鸡肝捣烂，和决明丸。小儿一钱，大者二钱，研匀，同酒酿一杯，饭上蒸服。

【主治】 小儿疳结害眼，及一切童雅翳障。

【加减】 目昏无翳，腹胀如鼓，加芜荑末一钱，同鸡肝酒酿顿服；翳障腹胀，用鸡内金、芜荑、决明末同鸡肝酒酿顿服；风热翳障，加白蒺藜一钱。

05733 决明夜灵散

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】 决明夜光散（《明医杂著》）。

【组成】 石决明（别研） 夜明砂（别研）各二钱 猪肝一两（生用，不食猪者以白羯羊肝代）

【用法】 二药末和匀，以竹刀切肝作两片，以药铺于一片肝上，以一片合之，用麻皮缠定，勿令药得泄出。淘米泔水一大碗，贮砂罐内，不犯铁器，入肝药于中，煮至小半碗，临卧连肝药汁服之。

【主治】 ①《原机启微》：雀盲，目至夜则昏，虽有灯月，亦不能视。②《张氏医通》：高风内障，至夜则昏。

【方论选录】 上方以决明镇经益精为君，夜明砂升阳主夜明为臣，米泔水主脾胃为佐，肝与肝合，引入肝经为使。

05734 决明洗眼方

【方源】 方出《千金》卷六，名见《千金翼》卷十一。

【组成】 蕤仁 秦皮 黄连各十八铢 萤火虫七枚 决明子一合

【用法】 上㕮咀，以水八合，微火煎取三合，净以绵注洗目，每日三次。

【主治】 眼漠漠无所见。

【方论选录】《千金方衍义》：方中蕤仁、川连、决明、萤火四味，皆出前治五脏客热上冲眼内外受风冷目痛不明方中，但参入秦皮一味以治目中青翳白膜，专取苦降达肝之意。

05735 决明益阴丸

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 羌活 独活各五钱 黄连（酒制）一两 防风五钱 黄芩一两 归尾（酒制） 五味子各五钱 石决明 甘草（炙）五钱 黄柏 知母各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至百丸，茶汤送下。

【主治】 眼目畏日恶火，沙涩难开，眵泪俱多，

久病不痊。

【方论选录】 上方以羌活，独活升清阳为君；黄连去热毒，当归尾行血，五味收敛为臣；石决明明目磨障，草决明益肾疗盲，防风散滞祛风，黄芩去目中赤肿为佐；甘草协和诸药，黄柏助肾水，知母泻相火为使。此盖益水抑火之药也，内急外弛之病并皆服之。

05736 决壅顺流汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 大黄三钱 木通三钱 瓜蒌实一个 厚朴一钱 青皮一钱 枳实一钱 瞿麦二钱 车前子二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 水结胸，心下至少腹硬痛满，不可近，或潮热，或无大热，但头微汗出，脉沉。

05737 冰片散

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】 冰片一钱 硼砂五钱 雄黄二钱 蜜炙柏（细末）二钱 钞三张（煅灰） 鹿角霜一两 枯矾一钱 甘草末一钱 靛花二钱 黄连末二钱 玄明粉二钱 鸡内金（烧存性）一钱

【用法】 上为细末。吹之。

【主治】 弄舌风。

【加减】 口中气臭，加人中白（煅）三钱、铜青（煅）不宜过五分。

05738 冰片散

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】 牛脑二分 孩儿茶一钱二分

【用法】 上为细末。掺入患处。

【主治】 伤手疮。

05739 冰片散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 冰片一钱 硼砂五钱 明雄黄二钱 黄柏（蜜炙）三钱 靛花二钱 甘草（炙）二钱 鸡内金（烧存性）一钱 人中白（煅）五钱 川黄连二钱 元明粉二钱 铜青（煅）五分 蒲黄（炒）三钱 （一方加牛黄、熊胆、珍珠各一钱，儿茶八分，麝香三分）

【用法】 上为极细末。吹患处。

【主治】 缠喉风，走马喉风，缠舌喉风，双单乳蛾，喉疔，木舌、重舌、莲花舌，悬痈，兜腮痈，喉疮，牙痈。

05740 冰片散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 冰片 1.5 克 煅明矾 6 克 黄柏 6 克 小麦面（烧灰）10 克

【用法】 上为细末。吹入小儿口腔。

【主治】 口炎。

05741 冰心散

【方源】《喉科种福》卷五。

【组成】 冰片三分 黄柏五分 白矾七分 灯草一钱（烧存性）

【用法】 上为末。吹。

【主治】 少阴水亏，不能上济君火，致阴火沸腾，顺喉生疮，声音不出。

05742 冰玉散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 生石膏一两 月石七钱 冰片三分 僵蚕一钱

【用法】 上为极细末，小瓷瓶盛贮。敷之，吹之。

【主治】 牙疳，牙痛，口疮，齿衄，喉痹。

05743 冰白散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 人中白倍用之 冰片少许 铜绿（用醋制者） 杏仁各等分

【用法】 上为细末。敷患处。

【主治】 口舌糜烂，及走马牙疳等证。

05744 冰苋散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 冰片 苋菜根（煅灰） 薄荷 黄柏各一钱 月石 儿茶各一钱五分 人中白 山豆根 胡黄连各二钱 枯矾 青黛 龙骨 乌梅肉各五分

【用法】 上药各为一。和匀。吹用。

【主治】 喉癣。

【加减】 杨梅喉癣，加轻粉一钱，柿霜一钱，白砒五厘（枣肉去核煨熟用）。

05745 冰柏丸

【方源】《医方大成》卷八引《澹寮方》。

【组成】 硼砂（研） 黄柏（晒干） 薄荷叶各等分

【用法】 上为末，生蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，津液噙化。

【主治】 ①《医方大成》引《澹寮方》：口疮。②《灵验良方汇编》：舌疮。

【加减】 疮甚者，加脑子（研）。

05746 冰梅丸

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】 大南星二十五个（鲜者，切片） 大半夏五十个（切片，鲜者最佳） 皂角四两（去弦净

数） 白矾四两 盐四两 桔梗二两 防风四两 朴消四两

【用法】 拣七分熟大梅子一百个，先将消、盐水浸一周时，然后将各药碾碎入水拌匀，方将梅子置于水中，其水过梅子三指为度，浸七日取出晒干，又入水中，浸透晒干，俟药水干为度，方将梅子入瓷器封之，如藉衣起愈妙。要用时，薄棉裹之，噙在口内，令津注徐徐咽下，痰出即愈。

【主治】 ①《摄生众妙方》：十八种喉痹。②《全国中药成药处方集》：风热上攻，咽喉肿痛，痰涎壅盛，喉风喉癣，喉痹乳蛾，咽喉百病。

【方论选录】《串雅内编选注》：多种喉痹，症见痰涎壅盛，咽喉气急不通，应先开关窍，使痰涎吐出，喉松气通之后，可以继进相应方药。方中南星、半夏辛烈开窍，散风除痰，皆可鲜用，取其峻而行速，以开关通塞；皂角、白矾二药配伍名稀涎散，功散涌吐风痰；防风祛风止痉，桔梗开音利咽，并有载药上行之力。消和盐水浸梅子以增强生津液，润喉咙，消肿瘤的作用。用时棉裹口含徐徐咽津，使药力集中发挥于咽喉，以收消肿止痛，化痰开音的功效。

【备考】《喉科紫珍集》无大半夏，有山豆根四两。

05747 冰黄散

【方源】《尤氏喉科秘书》。

【异名】 冰王散《杂病源流犀烛》卷二十四)。

【组成】 冰片三分 人中白一钱 蒲黄二钱 黄柏二钱 甘草五分 青黛五分 川连二 薄荷二钱 月石五分 朴硝五分 枯矾少许。

【用法】 上为末。吹之。

【主治】 口疳，小儿丹毒。

05748 冰黄散

【方源】《医学心悟》卷四。

【异名】 止痛散(《疡医大全》卷十六)。

【组成】 牙消三钱 硼砂三钱 明雄黄二钱 冰片一分五厘 麝香五厘

【用法】 上为末。每用少许擦牙。

【主治】 牙痛。

05749 冰黄膏

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】 黄连二两 冰片三分 麝香二分 轻粉五分 硫黄末一钱

【用法】 水二碗，文武火煎黄连至一碗，滤去渣，再重汤慢火煎至一酒杯；将四味俱研末，调和。用鹅毛涂阴内。

【主治】 妇人阴蚀疮。

05750 冰硫散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 硫黄一两 樟冰 川椒 生矾各二钱

【用法】 上为末，先用白萝卜一个，抠空其内，将药填满，复将原皮盖之，湿纸包三四层，灰火内煨半小时许，待冷取开，用药同熟猪油调稠，搽患上。

【主治】 风湿凝聚而生钮扣风，久则瘙痒如癣。

05751 冰蟒散

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 冰螺散(《崇崖尊生》卷六)、冰螺捻(《金鉴》卷六十六)。

【组成】 大田螺五枚（去壳，日中线穿晒干）白砒一钱二分（面裹煨熟） 冰片一分 硇砂二分

【用法】 用晒干螺肉切片，同煨熟；白砒为细末，加硇砂、冰片再碾，小罐密收。凡用时先用艾柱灸核上七壮，次后灸疮起泡，以小针挑破，将前药一二厘唾调成饼，贴灸顶上；用棉纸以厚糊封贴核上，勿动泄气，七日后四边裂缝，再七日其核自落，换搽玉红膏，内服补药兼助完口。

【主治】 ①《外科正宗》：瘰疬日久，坚核不消，及眼消药不效，瘰瘤患大带小及诸般高突，异形难状者。②《医钞类编》：乳岩。

【宜忌】 马刀根大面小及失荣等症忌用。

05752 冰硼散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 冰片五分 朱砂六分 玄明粉 硼砂各五钱

【用法】 上为极细末。吹搽患上，甚者日搽五六次。

【功用】《中国药典》：清热解毒，消肿止痛。

【主治】 ①咽喉疼痛，牙龈肿痛，口舌生疮，舌肿木硬，重舌，小儿鹅口白斑。

①《外科正宗》：咽喉口齿新久肿痛，及久嗽痰火咽哑作痛。②《外科大成》：舌胀痰包，重舌木舌。③《金鉴》：口疮，白点满口。④《药奁启秘》：小儿鹅口白斑，肿因喉，及一切喉痛，乳喉。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：忌食辣、荤、面等物。

05753 冰霜散

【方源】《活法机要》。

【组成】 寒水石（生） 牡蛎（烧） 朴消 青黛各一两 轻粉一钱

【用法】 上为细末。新水或油调涂。

【主治】 ①《活法机要》：火烧皮烂大痛。②《普济方》：漆热毒伤皮烂，肉大痛。

05754 冰麝散

【方源】《中医喉科学讲义》。

【组成】 黄柏 黄连 玄明粉各一钱 鹿角霜五钱 甘草 明矾各五分 炒硼砂二钱五分 冰片四分 麝香一分

【用法】 上为细末。每次少许，吹入患处。

【功用】《古今名方》：清热凉血，消肿止痛。

【主治】 ①《中医喉科学讲义》：风热喉痹，红肿痛甚者。②《古今名方》：鹅口疮，咽喉、牙龈、口腔粘膜溃疡肿痛等症。

05755 冰片鸡蛋油

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【异名】 蛋黄油。

【组成】 鸡蛋黄油 冰片

【用法】 取鸡蛋十个（或更多）煮熟去蛋白，用蛋黄干炸油，每鸡蛋油一两加入冰片五分至一钱，密闭储存备用。外搽皮损疮面，或滴入瘘管内。

【功用】 消肿止痛，固皮生肌。

【主治】 慢性溃疡，烫伤疮面，各部位之瘘管。

【宜忌】 化脓性疮面有腐败组织疮面勿用。

05756 冰翳还睛丸

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 人参一两 五味子半两 防风二两 知母二两 细辛半两 黄芩一两 桔梗一两 车前子二两 黑参一两 生地黄二两 茺蔚子二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心以茶清送下。

【主治】 肝热肺风合邪，上攻入目，面致冰翳内障，瞳色坚实，白亮如冰之状。无论阴处及日中视之，皆一般无二。其睛内有白色隐隐出于外。

05757 汗斑粉

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】 密陀僧五钱 雄黄 硫黄 蛇床子各一两 轻粉二钱

【用法】 上为极细末，玻璃瓶收贮。醋调搽或用黄瓜蒂蘸搽。

【功用】 清血，化斑痣。

【主治】 ①《全国中药成药处方集》：汗斑面痣，紫白癜风，面部粉刺。②《中药制剂手册》：黑白斑痕，雀斑。

【宜忌】 按摩时勿入目内。

【备考】 本方方名，《中药制剂手册》引作“汗斑散”。

05758 汗斑散

【方源】《仙拈集》卷四引《顾体集》。

【组成】 密陀僧五钱 硫黄一两

【用法】 上为末。醋调姜擦。

【主治】 汗斑。

05759 江鳔丸

【方源】《保命集》卷中。

【异名】 左龙丸（《金鉴》卷三十九）。

【组成】 江鳔半两（锉，炒） 野鸽粪半两（炒） 雄黄一钱 白僵蚕半两 蜈蚣一对 天麻一两

【用法】 上为细末，又将药末作二份用，一份烧饼为丸，如梧桐子大，朱砂为衣；后一份入巴豆霜一钱同和，亦以烧饼为丸，如梧桐子大，不用朱砂为衣。了朱砂为衣者二十丸，入巴豆霜者一丸，第二服二丸，加至利为度，再服朱砂为衣药，病愈止。

【主治】 破伤风，病在里，惊而发搐，脏腑秘涩。

【备考】 本方改为散剂，名“江鳔散”（见《中国医学大辞典》）。

05760 汤泡饮

【方源】《回春》卷三。

【组成】 粟壳（蜜水炒）三钱 乌梅一个（去核） 甘草三分 蜜三匙

【用法】 上锉。用滚水一钟，泡浸一时，去滓，分三次服之。

【主治】 ①《回春》：久痢不愈，无分赤白。②《良朋汇集》：大人小儿红白痢疾，里急后重，疼痛难忍，日夜无度已久者。

【宜忌】《良朋汇集》：初起者不可服。

05761 汤泡散

【方源】《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。

【异名】 金莲子散（《普济方》卷八十六引《医方集成》）。

【组成】 赤芍药 当归（洗，焙干） 黄连（去须）各等分

【用法】 上为细末。每用二钱，极滚汤泡，乘热熏洗，冷即再温洗，每日洗三五次，以愈为度。

【主治】 肝经不足，受客热风壅上攻，眼目赤涩，睛疼睑烂，怕日羞明，放卧多泪，时行暴赤，两太阳穴疼，头旋昏眩，视物不明，渐生翳膜。

【宜忌】 忌腌藏、毒物。

05762 汤火止痛散

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】 大黄末（微炒） 当归末各等分

【用法】 上用麻油搽或干掺亦可。

【功用】 止痛生肌。

【主治】 汤火伤。

05763 汝言化痰丸

【方源】《证治汇补》卷二。

【组成】 瓜蒌 杏仁 海粉 桔梗 连翘 五倍子 香附 蛤粉 瓦楞子 风化消

【用法】 以姜汁少许，和竹沥捣入药，加蜜为丸，噙化；或作小丸，清茶送下。

【功用】《医略六书》：泻热软坚。

【主治】 肺家老痰在于喉中，咯之不出，咽之不下。

【方论选录】《医略六书》：瓜蒌泻热润燥以涤痰，桔梗清咽利膈以开结，瓦楞子消痰积、血积，风化硝化积热、结痰，五倍软坚豁痰，海粉泻热豁痰，连翘调血气，杏仁降气豁痰涎，蛤粉益阴利湿热，姜汁散痰，竹沥润液。和蜜捣丸，清茶化下，使湿化热降，则肺胃清润而老痰软，咯咽如常，安有咽喉窒塞之患？此泻热软坚之剂，为痰热固结之专方。

05764 壮元丸

【方源】《赤水玄珠》卷十一。

【组成】 山茱萸肉 杜仲（盐水炒）各四两 破故纸（盐水炒） 龟版（酒炙）各三两 鹿茸（酒炙） 菟丝子（酒浸透，研，炒） 远志（去芦，甘草煮） 头二蚕沙（炒） 人参各二两 茯苓一两半 大附子（童便煮，而煨）七钱

【用法】 俱制净药，以干山药粉四两，打糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心以淡盐汤或酒送下，下午再服。

【主治】 下元阳气大虚，及脾有寒湿，足膝痿弱，大便不实，湿动生痰，面色黄白，恶风懒语，一切倦弱及阴痿不起，饮食不思，虚弱等症。

【宜忌】 上方服后须痛断房事，以培其根。勿恃此药壮阳，而助其春兴，自取其惫也，叮之，戒之。

【临证举例】 痿证 昔在吴下，治行人公孙质庵老先生，患痿不出户者三年，用此收功。

【备考】 此方得遂州仙茅或汉中仙茅为君，妙不可言。

05765 壮元丹

【方源】《普济方》卷二二四。

【组成】 牛膝（酒浸三日） 苁蓉（酒浸一日） 熟地黄 川芎 覆盆子各二两 石斛一两半（去根） 菟丝子一两（酒浸三日） 当归 续断 巴戟 白茯苓 山茱萸肉 枸杞子 肉桂 五味子 防风 杜仲（炒）各一两半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前以盐汤酒送下。

【功用】 耐寒暑，进饮食，黑髭发，润肌肤，壮筋骨。

【主治】 肝肾虚，精血不足，眼昏黑花，迎风有泪，头晕耳鸣；或肾风一痉，腰脚沉重，筋骨痠疼，步履无力，阴汗盗汗，湿痒生疮。

05766 壮火丹

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 人参五两 巴戟天八两 白术（炒） 熟地各一斤 山茱萸八两 肉苁蓉 枸杞各八两 附子一个（用甘草三钱煎汁泡过，切片，炒熟） 肉桂三两 破故纸（炒） 茯苓各四两 北五味一两 炒枣仁三两 柏子仁二两 山药 芡实各五两 龙骨（醋淬，为末）一两

【用法】 上各为末，炼蜜为丸。服二月，坚而且久。

【主治】 命门火微，无风而寒，未秋而冷，遇严冬冰雪，虽披重裘，其身不温，一遇交感，数合之后，即望门而流。

05767 壮本丹

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】 杜仲（酒炒）一两 肉苁蓉（酒洗）五钱 巴戟（酒浸去骨）五钱 破故纸（盐水炒）一两 茴香一两 青盐五钱

【用法】 上为末，将猪腰子分开，入药在内，缝在纸包煨熟。每次服一个，用黄酒送下。

【功用】 壮筋骨，补元气，利大小便，养丹田。

【主治】 肾虚腰痛，久则寒冷。

05768 壮阳丸

【方源】《女科切要》卷三。

【组成】 肉苁蓉 仙茅 蛇床子 山药 五味子 补骨脂 茯神 紫梢花 杜仲 韭菜子 雄鸡肝 鳖肝 海狗肾（如无，以黄狗肾代之）

【用法】 上为末，先将鸡肝、鳖肝用盐、酒、椒蒸熟，捣烂，和前药晒干；再将前末药磨细，用酒拌山药末醋调糊为丸。每服一百丸，空心淡盐汤送下。

【主治】 阳萎，气馁不振，及老年无子。

【加减】 如阳萎精冷，加肉桂、附子、石燕各一两。

05769 壮阳丹

【方源】《广嗣纪要》卷四。

【组成】 熟地黄四两 巴戟（去心） 破故纸（炒）各二两 仙灵脾一两 桑螵蛸（真者，盐焙） 阳起石（煅，别研，水飞）各半两

【用法】 上六味，合阴之数，研末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】 男子阴萎无子。

【宜忌】 不可恃此自恣也。

05770 壮阳丹

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 仙茅 蛇床子 五味子 白茯苓 苁蓉 山药 杜仲各一两 韭子 故纸 巴戟 熟地 山茱萸 菟丝子各二两 海狗肾一枚 紫梢花一两

【用法】 用雄鸡肝二副，捣成一块，阴干，为末；用雄鸡肝肾、雄鳖肝肾各一副，以盐、酒、花椒末蒸熟捣烂，和入前药，再用酒煮山药糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心以盐汤送下。

【功用】 壮阳补肾。

【加减】 阴痿精冷者，加桂、附、石燕。

05771 壮阳汤

【方源】《叶氏女科》卷四。

【组成】 蛇床子 地骨皮各等分

【用法】 煎汤熏洗，并用手擦，但洗时必令其举。一日熏洗数次。若手重擦破，不必惊骇，过一二日即可复旧。

【主治】 鸡精。男子玉茎包皮柔嫩，少一挨即痒不可当，每次交合，阳精已泄，阴精未流。

05772 壮肾散

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 仙灵脾（酒浸）五两 远志（去心）四两 巴戟（去心）六两 杜仲（酒炒）五两 破故纸（酒炒）五两 肉苁蓉（酒浸）六两 青盐八两 大茴香五两 小茴香（炒）五两

【用法】 上为末。每服二钱，用猪腰切开，掺药末在内，纸裹火煨熟，细嚼，以酒送下。

【主治】 肾经虚损，腰腿遍身疼痛。

05773 壮原汤

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【异名】 壮元汤（《风劳臌膈》）。

【组成】 人参 白术各二钱 茯苓 破故纸各一钱 桂心 大附子 干姜 砂仁各五分 陈皮七分

【用法】 水煎，食远服。

【主治】 下焦虚寒，中满肿胀，小水不利，上气喘急，阴囊两腿皆肿，或面有浮气。

【加减】 有痰，加半夏一钱；喉中痰声，加桑白皮一钱，咳嗽亦加；脚趺面肿，加薏苡仁二钱；中气不转动，不知饿，加厚朴、木香；气郁不舒，加沉香、乌药，临服磨入；气虚甚者，人参加作五钱，大附子加作一钱半；汗多者，再加桂枝五分、白芍药（酒炒）过八分；若夏月喘乏无力，或汗多者，加麦门冬一钱、五味子十一粒；夜梦不安者，加远志一钱；两胁气硬，加白芥子八分；若面浮肿，胁下气硬，加白芥子、紫苏子五分；若身重不能转动，加苍术一钱、泽泻七分；湿盛，加桑白皮、赤小豆。

05774 壮脾丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】 丁香 附子（重六钱以上者，炮，去皮脐） 诃子肉 荜茇 白术 白茯苓（去皮） 肉豆蔻（面裹煨）各一两 人参（去芦头） 干姜（炮） 荜澄茄 乌药 陈橘皮（去白，焙） 沉香 厚朴（去粗皮，细切，以生姜一两研烂，淹半日，炒干用） 神曲（炒）各七钱 熟艾六钱（研，糯米稀糊拌匀、炒干，乘热入碾末之） 缩砂仁半两 甘草六钱（炙）

【用法】 上为细末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前米饮吞下。

【主治】 脾胃久弱，中焦停饮，腹内虚鸣，或多泄利，心腹胀满，饮食不入，精神怠惰，睡卧不安。

05775 壮脾丸

【方源】《医方类聚》卷十引《济生》。

【组成】 豬猪肚一枚（洗净，用造酒大曲四两，同锉厚朴二两，茴香一两，入在肚内，以线缝定，外用葱椒酒煮烂，取大曲、茴香、厚朴焙干和后药） 肉豆蔻（面裹煨） 禹余粮（煅，研极细） 缩砂仁 麦芽（炒） 神曲（锉，炒） 橘红 附子（炮，去皮脐） 白术各一两 木香（不见火） 丁香各半两

【用法】 上为细末，用猪肚杵和千百下，为丸，如梧桐子大。每服五十丸，以米饮送下，不拘时候。

【主治】 脾胃虚寒，饮食不进，心腹胀满，四肢无力，吐逆食不消，或手足浮肿，脏腑溏泻。

05776 壮火温脾汤

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】 白术三钱（土炒） 炙甘草一钱 山药二钱 陈皮八分 芡实二钱 制附子八分 茯苓一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 肾火衰微，中土虚寒，脾元不运而胀。

【方论选录】《证因方论集要》：少阴火衰，则太阴脾土未有不虚者，以苓、术、山药、芡实温补脾阳，附子以温肾阳，陈皮、炙草和中调气。

05777 壮水明目丸

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】熟地黄一两二钱 泽泻八钱 山茱萸（酒蒸取肉）一两三钱 茯苓（去皮）一两 川芎二钱 牡丹皮八钱 当归（酒洗）一两 山药一两二钱 生地黄五钱 蔓荆子一两 甘菊花五钱 黄连五钱 柴胡三钱 五味子五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，用好酒调服。

【功用】壮水之主，以制阳光。

【主治】肾水枯竭，神光不足，眼目皆暗。

05778 壮阳种子丹

【方源】《医学正印》卷上。

【异名】壮阳种子丸（《回生集》卷上）。

【组成】熟地 枸杞子各一两半 牛膝（俱酒洗） 远志肉（甘草汤煮） 怀山药（炒） 山茱萸肉 巴戟（去骨，酒蒸） 白茯苓 五味子 石菖蒲 楮实子 肉苁蓉（酒洗，去鳞甲，去心中白膜） 杜仲（盐酒炒） 茴香（盐水炒）

【用法】上为末，炼蜜和丸肉为丸，空心温酒、淡盐汤任下。

【主治】尺脉微弱，阳萎不举，虚寒无火者。

【加减】冬，加肉桂五钱（童便拌晒三次）。

05779 壮骨去湿丹

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】薏仁一两 芡实半两 茯苓三钱 肉桂一钱 牛膝二钱 萆薢一钱

【用法】水煎服。

【主治】湿气入于骨中，两腿酸痛。

【方论选录】此方妙在薏仁能入骨而去水，加芡实健脾以去湿，不使湿以增湿；而牛膝、萆薢又是最利双足之品；又加肉桂，引经直入于骨中，湿有不去，酸疼有止者乎？但脚中之病，乃人身之下游，一有病，不易去之。况湿气在骨，如陆地低洼之处，久已成潭，如何能即干，必多用人功，面后可以告竭。故此方必须多服久服，正是此意。

05780 壮筋补骨丹

【方源】《实用正骨学》。

【组成】当归二两 川芎一两 白芍一两 炒熟地四两 无名异一两 杜仲一两 川续断一两五钱 五加皮一两五钱 骨碎补三两 桂枝一两 田三七一两 龙骨一两 刘寄奴二两 土元三两 自然铜一两 黄耆三两 虎骨一两 破故纸二两 菟丝饼二两 党参二两 木瓜一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，每丸重二钱。成人每日早、晚各服一丸，小儿酌量，以黄酒为引。

【功用】能使伤骨新生，并能使陈旧性骨折愈合。

05781 壮精固本丸

【方源】《医学六要·治法汇》卷六。

【组成】枸杞子二两 地黄四两 砂仁五钱（酒蒸九次） 锁阳 人参各二两 白茯苓一两半 菟丝子二两 沙苑蒺藜二两 归身一两 鹿角胶一两半 天门冬 麦门冬各一两 山药二两 五味子一两半 山茱萸二两 泽泻一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心以白汤送下。

【功用】《医部全录》：填精起萎。

【主治】阳萎。

05782 壮阳暖下药饼

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】附子一两（炮，去皮脐） 神曲三两 干姜三两（炮） 大枣三十枚（去皮核） 桂心 五味子 菟丝子（酒浸一宿，晒干，为末） 肉苁蓉各一两（浸一宿，刮去粗皮，炙干） 蜀椒半两（去目及合者，微炒黄色） 羊髓三两 酥二两 蜜四两 黄牛乳一升半 白面一升（一方入酵醋）

【用法】上为细末，入面，用酥、髓、蜜、乳相和，入大枣，熟，搜于盆中盖覆，勿令通风，半日顷即取出，再搜令熟，擀作胡饼，面上以箸琢，入炉镬中，上下以火煻熟。每日空腹食一次。

【主治】五劳七伤，遗精数溺。

05783 壮阳固本地黄丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十一。

【组成】熟地黄二斤（酒煮，去滓，熬浓膏十二两） 山茱萸（去核）六两（酒拌蒸，晒干，炒） 山药六两（炒黄） 白茯苓四两（人乳拌透，晒干，焙） 泽泻三两（淡盐酒拌炒） 鹿茸（去毛骨，酥酒炙黄）三两 补骨脂四两（盐酒浸一宿，炒香） 五味子二两（蜜酒拌蒸，炒） 枸杞八两（另熬膏四两） 紫河车一具（用银针挑破血筋，用长流水洗净，可酒浸、酒煨，捣烂） 鹿角胶四两（用酒溶化） 肉桂（临磨刮去粗皮）一两五钱（不见火） 制附子一两五钱（切片，焙）

【用法】上为末，用熟地、河车、枸杞、鹿角四膏入药杵好为丸。每服四五钱，空心以参汤送下；临晚食前服三四钱，以温酒送下。

【主治】 元阳虚惫已极。

05784 壮神益志保孕汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十一。

【组成】 茯神 当归 酸枣仁 人参 远志 山药 黄耆 鹿角胶各一钱 白术二钱 砂仁三分 甘草四分 龙眼肉五枚 大枣二枚

【用法】 水煎服。

【主治】 畸形胎。

【临证举例】 畸胎 昔在西吴，有张氏妇年二十三，孕适三月，迎予诊之，其脉两尺皆涩，左手短弱，右关不充。据脉涩不当有妊，而其夫云：向已受胎者二，俱弥月而产，体皆不完，始无舌，次无水火门尺，产下随死而无生气。今第三孕矣，心忧之。以翁治法多奇思，幸投剂而保全之也。予以脉参之，多为神志不足。因处一方，曰壮神益志保孕汤。即语之曰：是方每月可服十帖，过八月则为必服矣。彼欣然从而服之，足月产一女，形全而气壮。及再有妊，未服药，虽生一女，完矣而头面为白膜遮蔽，隐隐仅见耳目口鼻，而亦随死也。后又孕，适予归省，其妇心忧失措，夫谕之曰：无恐，前保孕方在，向以未服，乃致乖舛，今可急服也。照方服如前，至期生一子而无恙。举方以此方为神，录而置之香火堂中尸祝之。此亦愚见之偶中者，人以旋服旋效而遂神之也。

05785 守中丸

【方源】《圣济总录》卷十六。

【异名】 五芝地仙金髓丸。

【组成】 白茯苓（去黑皮）十两 麦门冬（去心，焙）三两 白术 人参 甘菊花（择去梗） 山芋 枸杞子各二两 生地黄二十斤（绞去汁）

【用法】 前七味为末，先用生地黄汁子银器内入酥三两、白蜜三两同煎，逐旋掠取汁上金花令尽，得五斤荣昌盛许，于银石器内拌炒前七味药，渐渐令尽，候干入白蜜同捣为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心或食后以清酒送下。

【主治】 风头眩，脑转目系急，忽然倒仆。

05786 守宫丸

【方源】 方出《圣惠》卷二十一，名见《普济方》卷一一三。

【组成】 辟宫子七枚（微炙） 天南星一两（炮裂） 腻粉一两 白附子一两（炮裂）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服七丸，以温酒研下，不拘时候。以汗出为效，未汗再服。

【主治】 破伤身如角弓反张，筋脉拘急，口噤。

05787 守效丸

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】 苍术 南星 白芷（散水） 山楂各一两 川芎 枳核（又云枳实炒） 半夏

【用法】 上为末，神曲糊为丸服。

【功用】《会约》：治湿理气。

【主治】 瘾疝不痛者。

【加减】 秋、冬，加吴茱萸；加热，加山栀一两；坚硬，加朴消半两，又或加青皮、荔枝核。

【备考】《医统》本方用法：姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，以盐汤送下。

05788 守瘕丸

【方源】《宣明论方》卷十五。

【组成】 通草二两 杏仁一大合（去皮尖，研） 牛蒡子一合（出油） 吴射干 昆布（去咸） 诃黎勒 海藻各四两（去咸）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。含化，咽津下，每日三次。

【主治】 瘕瘤结硬。

05789 守中金丸

【方源】《局方》卷三（吴直阁诸家名方）。

【组成】 干姜（炮） 甘草（炙） 苍术（米泔浸） 桔梗（去芦）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食前嚼服，以沸汤送下。

【功用】 温脾暖胃，消痰逐饮，顺三焦，进美饮食，辟风寒湿冷。

【主治】 中焦不和，脾胃积冷，心下虚痞，腹中疼痛，或饮酒过多，胸胁逆满，噎塞不通，咳嗽无时，呕吐冷痰，饮食不下，嗜酸吞酸，口苦失味，怠惰嗜卧，不思饮食；及伤寒时气，里寒外热，霍乱吐利，心腹绞痛，手足不和，身热不渴，及肠鸣自利，米谷不化；及脾有留湿，体重节痛，面色萎黄，肌肉消瘦。

【备考】 本方改为汤剂，名“守中汤”（见《活幼心书》）。

05790 守阳碧云膏

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】 铅粉 铜绿各一两 乳香 没药各一钱 冰片一分

【用法】 上为细末，大黄熬膏作锭子，晒干，以井水磨下，新笔涂眼四围。

【主治】 倒睫及肿烂弦风。

【宜忌】 不得入目。

05791 宅中汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 天冬二钱 紫滞车二钱（切） 人参二钱 茯神二钱 黄耆二钱 当归二钱 白芍一钱 丹参二钱 柏仁二钱 远志五分（甘草水炒） 莲子二十粒（去心）

【功用】 调补营卫，安养心神。

【主治】 心劳。营血日亏，心烦神倦，口燥咽干。

05792 安土汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 白芍一两 白术一两 柴胡一钱 茯苓三钱 甘草一钱 苍术二钱 神曲二钱 炮姜一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 肝气旺盛，肝木克脾土，土气不能伸，而肠中自鸣，终日不已，嗳气吞酸，无有休歇。

【方论选录】 此方脾肝同治之法，肝平而脾气得养矣，脾安而肠气得通矣。不必止鸣而鸣自止者，妙在行肝气之郁居多，所以奏功特神耳。

05793 安中散

【方源】《三因》卷八。

【异名】 安中汤（《奇效良方》卷三十四）。

【组成】 熟地黄 巴戟天（去心） 龙骨各二两半 远志（去心，炒） 茯苓各三两 天雄（炮，去皮脐） 五味子 山药各三两半 苁蓉（酒浸） 续断各四两 蛇床子（略炒） 菟丝子（酒浸）各四两半

【用法】 上为细末。每服二钱匕，以温酒调下。

【主治】 醉饱心虚而合阴阳，累于心脾肾三经，而致三焦虚寒，短气不续，腹不安食，随即洞下，小便赤浊，精泄不禁，脚胫酸疼，小腹胀满。

05794 安中散

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）。

【组成】 玄胡索（去皮） 良姜（炒） 干姜（炮） 茴香（炒） 肉桂各五两 牡蛎（煅） 四两 甘草（炒）十两

【用法】 上为细末。每服二钱，热酒调下；妇人淡醋汤调服；如不饮酒，用盐点下；并不拘时候。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：散寒止痛。

【主治】 远年近日脾疼翻胃，口吐酸水，寒邪之气留滞于内，停积不消，胸膈胀满，攻刺腹胁，恶心呕逆，面黄肌瘦，四肢倦怠；及妇人血气刺痛，小腹连腰攻疰重痛。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：实热者忌服。

05795 安心汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】 远志 甘草各二两 人参 茯神 当归 芍药各三两 麦门冬一升 大枣三十枚

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，每日三次。

【主治】 产后心虚，心冲悸不定，恍恍惚惚，不自知觉，言语错误，虚烦短气，志意不定。

【加减】 若苦虚烦短气者，加淡竹叶二升；若胸中少气者，益甘草为三两。

05796 安老汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【异名】 安老丹（《辨证录》卷十一）。

【组成】 人参一两 黄耆一两（生用） 大熟地一两（九蒸） 白术五钱（土炒） 当归五钱（酒洗） 山萸五钱（蒸） 阿胶一钱（蛤粉炒） 黑芥穗一钱 甘草一钱 香附五分（酒炒） 木耳炭一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 大补肝脾气血。

【主治】 妇人肝不藏、脾不统而血崩，年五十外或六七十岁忽然行经，或下紫血块，或如红血淋。

05797 安虫丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】 莪术（醋煨） 木香 黄连 青皮 槟榔 使君子 白芜荑仁 白雷丸 苦楝根皮（白者可用，赤者有毒）各等分

【用法】 上为末，醋糊为丸，如麻子大。以白汤送下。

【主治】 小儿体弱而虫痛发作无时，随痛随止，发则面色㿠白，口吐涎沫，腹中痛作疙瘩，脉洪大，目直视似痫。

05798 安虫饮

【方源】《观聚方要补》卷三引《幼科百效》。

【组成】 黄连 乌梅 炮姜 山楂 厚朴 芍药 使君子肉 枳实 陈皮 川楝子

【用法】 水煎服。

【主治】 蛔虫动，口吐精涎。

05799 安虫散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 胡粉（炒黄） 槟榔 川楝子（去皮核） 鹤虱（炒）各二两 白矾（铁器熬）一分 干漆（炒烟尽）二分 雄黄一分 巴豆霜一分

【用法】 上为细末。每服一字，大者半钱，以温米饮调下，痛时服。

【主治】 小儿虫痛。

【备考】 原书周学海按：聚珍本无干漆、雄黄、巴豆霜。

05800 安冲汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 白术六钱（炒） 生黄耆六钱 生龙骨六钱（捣细） 生牡蛎六钱（捣细） 大生地六钱 生杭芍三钱 海螵蛸四钱（捣细） 茜草三钱 川续断四钱

【主治】 妇女经水行时多而且久，过期不止，或不时漏下。

【临证举例】 ①经漏 友人刘某某其长子妇，经水行时，多而且久，淋漓八九日始断，数日又复如故。医治月余，初稍见轻，继又不愈。延愚诊视，观所服方，即此安冲汤，去茜草、螵蛸。遂仍将二药加入，一剂即愈。又服一剂，永不反复。刘某某疑而问曰：茜草、螵蛸，经证如此效验，前医何为去之？答曰：彼但知茜草、螵蛸能通经血，而未见《内经》用此二药雀卵为丸，鲍鱼汤送下，治伤肝之病，时时前后血也。故于经血过多之证，即不敢用。不知二药大能固涩下焦，为治崩之主药也。②崩漏 一妇人，年三十余。夫妻反目，恼怒之余，经行不止，且又甚多。医者用十灰散加减，连服四剂不效。后愚诊视，其右脉弱而且濡。询其饮食多寡，言分毫不敢多食，多即泄泻。遂投以此汤，去黄耆，将白术改用一两。一剂而止，而泻亦愈。又服一剂，以善其后。

05801 安志丸

【方源】《济阳纲目》卷五十四。

【组成】 人参 白茯苓 白茯神 酸枣仁（酒浸，隔纸炒） 当归 远志 柏子仁 琥珀各半两 乳香 石菖蒲 朱砂各二钱半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每次三十丸，食后以白汤送下。

【主治】 气血虚，梦中多惊。

05802 安肾丸

【方源】《局方》卷五（绍兴续添方）。

【组成】 肉桂（去粗皮，不见火） 川乌（炮，去皮脐）各十六两 桃仁（麸炒） 白蒺藜（炒去刺） 巴戟（去心） 山药 茯苓（去皮） 肉苁蓉（酒炙） 石斛（去根，炙） 萆薢 白术 破故纸各四十八两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前以温酒或盐汤送下；小肠气，炒茴香盐酒下。

【功用】 补元阳，益肾气。

【主治】 肾阳不足，下元衰惫，精神不爽，面无光泽，皮肤干燥，腰腹疼痛，梦遗，虚喘，咳逆，水疝，脚气，大便溏泄，小便滑数。

①《局方》（绍兴续添方）：肾经久积阴寒，膀胱虚冷，下元虚惫，耳重唇焦，腰腿肿疼，脐腹撮痛，两胁刺胀，小腹坚疼，下部湿痒，夜梦遗精，恍惚多惊，皮肤干燥，面无光泽，口淡无味，不思饮食，大便溏泄，小便滑数，精神不爽，事多健忘。②《证治要诀类方》：牙宣。③《保命歌括》：肾虚寒湿脚气，及肾虚不足，膀胱虚冷，致成水疝。④《医宗必读》：肾虚咳逆烦冤。⑤《证治汇补》：肾虚水涸，气孤阳浮致喘者。

05803 安肾丸

【方源】《三因》卷十三。

【组成】 补骨脂（炒） 葫芦巴（炒） 茴香（炒） 川楝（炒） 续断（炒）各二两 桃仁（麸炒，以尖，别研） 杏仁（如上法） 山药（炒，切） 茯苓各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心以盐汤送下。

【主治】 肾虚牙痛，耳鸣口干，面色黧黑，耳轮焦枯，腰痛，膝骨痛，囊汗，阳事不举。

①《三因》：肾虚，腰痛，阳事不举，膝骨痛，耳鸣，口干，面色黧黑，耳轮焦枯。②《口齿类要》：肾虚牙疼。③《杂病源流犀烛》：囊汗。

05804 安肾丸

【方源】《济生》卷五。

【组成】 肉苁蓉（酒浸，焙） 石斛（去根） 桃仁（麸炒） 破故纸（炒） 白术 干山药（锉，炒） 白蒺藜（炒去刺） 川乌（炮，去皮脐） 川萆薢 川巴戟（去心）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以盐汤送下。

【主治】 虚热，牙齿浮肿疼痛。

【方论选录】《古方选注》：肉苁蓉、巴戟、川乌安肾之阳，萆薢坚肾之阴，石斛清肾中浮游之火，桃仁、蒺藜补肝以安相火，白术、山药健脾以镇浊阴。

05805 安肾丸

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】 青盐（炒） 补骨脂（盐水炒） 山药 石斛 白茯苓 菟丝子（酒炒） 巴戟（去心） 杜仲（姜汁炒）各一两 肉苁蓉（酒浸） 白蒺藜各二两

【用法】 炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十

丸，空心淡盐汤送下。

【功用】 固精补阳。

【主治】 肾虚牙齿豁落，隐痛。

05806 安肾丸

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】 肉桂 川乌头（炮）各一两五钱 白蒺藜（炒，去刺） 巴戟天（去骨） 薯蓣（姜汁炒） 茯苓 石斛（酒炒） 川萆薢（炒） 白术 肉苁蓉（酒浸去腐） 补骨脂（炒）各四两八钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空腹以盐汤送下，临卧以温酒送下。

【主治】 肾虚风袭，下体痿弱疼痛，不能起立。

【方论选录】 肾脏为风寒所袭，所以不安，故用乌头、蒺藜祛风散寒之剂，风去则肾自安，原无事于温补也；其他桂、苓、术、萆、脂、戟、苁、斛，虽日兼理脾肾，而实从事乎祛湿利水，只缘醉饱入房，汗随风蔽，所以肢体沉重，非藉疏通沟洫，病必不除，因仿佛地黄饮子而为制剂，彼用地黄、菖、志，冬、味、萸、附，以交心肾之气；此用蒺藜、术、薯蓣、骨脂、乌头，以祛坎陷之风，与崔氏八味丸迥乎不同也。

05807 安肾丸

【方源】《马培之医案》。

【组成】 鹿角霜三钱 焦白术一钱半 肉桂三分 当归二钱 川续断一钱半 独活八分 怀牛膝五钱 大生地三钱 菟丝子五钱 巴戟肉一钱半 红枣三个 桑枝三钱

【主治】 肾虚脊驼，足痿疼痛。

05808 安肾汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 鹿茸三钱 葫芦巴三钱 补骨脂三钱 韭子一钱 大茴香二钱 附子二钱 茅术二钱 茯苓三钱 菟丝子三钱

【用法】 水八杯，煮取三杯，分三次服。久病恶汤者，可用二十分作丸。

【主治】 湿久脾阳消乏，肾阳亦惫者。

【加减】 大便溏者，加赤石脂。

【方论选录】 凡肾阳惫者，必补督脉，故以鹿茸为君，附子、韭子等补肾中真阳；但以苓术二味，渗湿而补脾阳，釜底培薪法也。其曰安肾者，肾以阳为体，体立而用安矣。

【备考】 本方改为丸剂，名“安肾丸”（见原书同卷）。

05809 安肺散

【方源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】 麻黄（不去节） 二两 甘草（炒） 一两 御米壳四两（去须，炒黄）

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，乌梅一个，煎至七分，去滓，临卧温服。

【主治】 咳嗽无问新久。

05810 安经汤

【方源】《医学正传》卷七。

【组成】 归身一钱半 川芎半钱 白芍药八分 生地黄一钱 阿胶珠半钱 艾叶半钱 条芩一钱 甘草半钱 香附一钱 黄柏半钱 知母半钱 黄连（姜汁拌炒）八分

【用法】 上切，作一服。水煎，空心服。

【主治】 月经先期而来。

05811 安荣散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】 麦冬 滑石 当归 灯心 人参 赤芩 白芍 甘草梢 黄芩 知母 香附 木通 黄柏 川芎

【主治】 妊娠子淋，便后点滴，淋沥不止，欲便则涩而不利，似数非数，已便则时时淋沥，以致胎动不安。

【方论选录】 是方参、归、芎、芍、麦、知、柏、芩凉血安荣以滋天一之源，滑、通、苓、草、灯心利水清膀胱之热。养血滋阴则肾不虚，利水清热膀胱不为虚热所阻，加以香附行气，则小便清利而淋自止矣。

05812 安荣散

【方源】《医方类聚》卷二二四引《济生》。

【异名】 安荣汤（《宋氏女科》）。

【组成】 麦门冬（去心） 通草 滑石各一钱 当归（去芦，酒浸） 灯心 甘草（炙）各半两 人参 细辛（洗）各一钱

【用法】 上为细末。每服三钱，煎麦门冬汤调服，不拘时候。

【功用】 通利小便。

【主治】 妊娠子淋。本因调摄失宜，子脏气虚，盖缘酒色过度，伤其血气，致水脏闭涩，遂成淋沥。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴足太阳少阴药也。陈来章曰：虚热宜补，故用人参、甘草之甘；淋闷宜通，故用木通、灯草之渗，滑石之滑；肺燥则天气不降，而麦冬能清之；肾燥则地气不升，而细辛能润之；血燥则沟渎不濡，而当归能滋之也。

【备考】 本方改为丸剂，名“安荣丸”（见《中

国医学大辞典》)。

05813 安胃丸

【方源】《吴鞠通医案》卷二。

【组成】 姜半夏八钱 川椒炭六钱 广皮五钱 云苓块六钱 乌梅肉四钱 生姜五钱

【用法】 甘澜水八茶杯，煮成三杯。分三次服。

【主治】 呕吐不食已久，六脉弦细而弱。

05814 安胃汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】 黄连（净）半钱 五味子（去子） 乌梅（去核） 生甘草各半钱 熟甘草三分 升麻梢三分

【用法】 上㕮咀。分作两服，每服水二盏，煎至一盏，食远去滓温服。

【功用】《医略六书》：清热敛津。

【主治】 ①《脾胃论》：饮食汗出日久，心中虚风虚邪，令人半身不遂，见偏风痿痹之证。②《医略六书》：胃虚热炽，自汗脉数。

【宜忌】 忌湿面、酒、五辛、大料物之类。

【方论选录】 ①《医略六书》：生甘草缓中泻火，炙草益胃缓中，黄连清内迫之热，升麻举下陷之气，五味敛耗散之气，乌梅收热迫之津，使热化津回，则清阳布护而营卫调和，腠理致密，自汗无不止，此清热敛津之剂，为胃虚热迫自汗之专方。②《脾胃论注释》：用黄连苦寒以清胃火，合生甘草以缓阳明之急；五味子、乌梅酸收敛汗，合熟甘草以复耗散之津；用升麻引药入足阳明经，在和缓收敛药中加一味升散之品，煎成于半空腹时服，便于药物的吸收。湿面、酒及五辛、大料，以其不利于出汗之证，故反复叮咛忌食。

05815 安胃汤

【方源】《便览》卷三。

【组成】 五味子 生甘草 炙甘草 乌梅 黑枣

【用法】 水煎服。

【主治】 胃热，食后复助其火，汗出如雨。

05816 安胃汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】 人参五分 白术三分 茯苓（去皮） 山药（炒） 当归 陈皮 半夏（姜汁炒） 莲肉各八分 甘草三分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，大枣一枚，乌梅一个，水煎温服。

【主治】 翻胃。

05817 安胃汤

【方源】《古方选注》卷中。

【组成】 川椒五分（炒去汗） 安吉乌梅一钱（去核） 川黄连一钱 人参二钱 枳实一钱五分 生淡干姜一钱五分

【用法】 上为末。每服三钱，水一钟，煎八分，温服。

【主治】 肝气犯胃，饥不欲食。

【方论选录】 川椒之辛，佐乌梅之酸行阴以泻肝，枳实、干姜助人参行阳道以益气，黄连于脾胃中泻心火之亢，清脾胃生化之源。统论全方，辛酸同用，以化肝气，酸甘相辅，以和胃气，肝化胃和，自能进谷。

05818 安胃饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 安胃散(《医学从众录》卷三)。

【组成】 陈皮 山楂 麦芽 木通 泽泻 黄芩 石斛

【用法】 水一钟半，煎七分，食远服。

【主治】 ①《景岳全书》：胃火上冲，呃逆不止。②《会约》：胃火上冲呃逆，脉实胸滞，便结口渴。

【加减】 如胃火热甚，脉滑实者，加石膏。

05819 安胃饮

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】 藿香三钱 苏梗二钱 川厚朴二钱 砂仁二钱 竹茹三钱 半夏三钱 陈皮三钱 茯苓三钱 生姜汁二十滴（兑服）

【功用】 和胃降逆止呕。

【主治】 胃虚气失和降所引起的妊娠恶阻。

05820 安胃散

【方源】《医统》卷二十四引《发明》。

【组成】 人参二钱 藿香 丁香各一钱 陈皮八分

【用法】 上为细末。每服二钱，以生姜煎汤调服。

【主治】 脾胃虚弱，不进饮食，呕吐酸水。

05821 安胃散

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】 丁香五分 茱萸 草蔻 参各一钱 炙甘草五分 耆一钱 柴胡五分 升麻七分 柏三钱 陈皮五分 归一钱五分 苍术一钱

【用法】 水煎，温服。

【主治】 胃寒所致呕吐哕。

【加减】 痰饮为患，呕吐痰涎者，加半夏、茯苓、陈皮。

05822 安胎丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷五，名见《丹溪治

法心要》卷七。

【组成】 白术 黄芩 炒曲

【用法】 上为末，粥为丸服。

【功用】 安胎。

【主治】 《明医指掌》：妊娠四五月，内热甚而致常堕不安。

【备考】 《医学入门》本方用黄芩、白术各等分，为末，粥为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

05823 安胎饮

【方源】 《局方》卷九（宝庆新增方）。

【组成】 地榆 甘草（微炙赤） 茯苓（去皮） 熟干地黄（洗，酒洒蒸，焙） 当归（去芦洗，酒浸） 川芎 白术 半夏（汤洗七次） 阿胶（捣碎，蛤炒） 黄耆（去苗） 白芍药各等分（一方无半夏、地榆，有人参、桑寄生；一方无白术、黄耆、半夏、地榆，有艾叶，并各等分）

【用法】 上为粗散。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妊娠三月、四月至九个月恶阻病者，心中愦闷，头重目眩，四肢沉重，懈怠不欲执作，恶闻食气，欲啖咸酸，多睡少起，呕逆不食，或胎动不安，非时转动，腰腹疼痛，或时下血，及妊娠一切疾病。

【宜忌】 如或恶食，但以所思之物任意与之必愈。按妊娠禁忌，勿食鸡鸭子、鲤鱼脍、兔、犬、驴、骡、山羊、肉、鱼子、鳖卵、雉雀、桑椹。

05824 安胎饮

【方源】 《丹溪治法心要》卷七。

【组成】 白术一钱 人参半钱 当归一钱 白芍药一钱 熟地黄一钱 川芎五分 陈皮五分 甘草三分 缩砂二分 紫苏三分 条芩五分

【用法】 上作一帖，加生姜一片，水煎，食前服。

【主治】 ①《丹溪治法心要》：孕成之后，胎气不安，或腹微痛，或腰间作疼，或饮食不甘美。②《幼幼集成》：孕妇痘已出现。

【加减】 孕七八个月服此药，或加大腹皮、黄杨头七枚。

【备考】 《妇科玉尺》有香附，无熟地黄。《幼幼集成》有红枣三枚，无条芩。

05825 安胎饮

【方源】 《医便》卷四。

【组成】 白术一钱 条芩一钱 陈皮（去白）八分 真阿胶（炒珠）一钱 桑寄生（真者）一钱 甘草四分 蕲艾五分 当归头六分 陈枳壳五分 砂仁（炒）六分 川独活五分 白芍药（酒炒）一钱二分

【用法】 加生姜一片，大枣一枚，糯米百余粒，水煎，空心服。

【主治】 胎动不安，胎漏。

05826 安胎饮

【方源】 《医学心悟》卷五。

【组成】 当归 川芎 白芍药（酒炒） 大熟地（九制） 茯苓 阿胶各一钱 甘草（炙） 艾叶各三分 白术二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《医学心悟》：妊娠因起居不慎，或饮食触犯禁忌，或风寒搏其冲任之脉，或跌仆伤损，或怒动肝火，或脾气虚弱而致胎动不安。②《产科心法》：孕妇胎动不安，腰痛发热，不食不眠。

【加减】 若起居不慎，加人参、黄耆、杜仲、续断；若饮食触犯，加人参，倍加白术；若风寒相搏，当按经络以祛风寒；若跌仆伤损，另用佛手散，加青木香、益母草；若怒动肝火，加柴胡、山栀；若脾气虚弱，去熟地，加人参、扁豆、陈皮。

05827 安胎饮

【方源】 《医略六书》卷二十八。

【组成】 生地五钱 苏梗三钱 白术一钱半（炒） 条芩一钱半（酒炒） 当归二钱 山栀一钱半 木香一钱 香附一钱半（酒炒） 茯苓一钱半 杜仲一钱半（酒炒）

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 怀孕九月，脉洪滑疾，两关弦涩者。

【方论选录】 阴阳久踞，胎壅，脾弱挟热而血气不调，故腰腹疼痛而胀满不已焉，宜健中清热以养之。生地凉血热以养胎，苏梗顺胎气以安胎，白术健脾壮气，当归养血和血，山栀降火凉血，条芩清热安胎，香附调气解郁以除痛，木香开胃醒脾以除满，茯苓清肺气以行治节，杜仲壮肾气以强腰府。水煎温服，使脾土健而血气和，胎热降而胎气顺，其疼痛胀满无有不退者乎。

05828 安胎散

【方源】 《女科万金方》。

【组成】 川芎 当归 白芍 茯苓 甘草 黄耆 白术 阿胶 地榆 艾

【用法】 加生姜三片，水二钟，煎服。

【主治】 胎动不安，或见血水，或纯鲜血，腰腹痛。

05829 安胎散

【方源】《济阴纲目》卷八。

【组成】白术 当归各一钱 黄芩一钱五分 甘草（炙）三分

【用法】上锉。水煎服。

【功用】安胎。

【主治】《医略六书》：妊娠胎动，脉微数者。

【加减】如腹胀，加神曲、麦芽各二分半；气虚泄泻，加人参三分、陈皮二分；潮热，加柴胡一钱；气上逆，加枳壳三分。

【方论选录】《医略六书》：白术健脾生血，当归养血荣胎，甘草泻火缓急，条芩清热安胎。为散水煮，俾热化血荣，则冲任完固，而胎得所养，胎无不安，何胎动之有？

05830 安神丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归（酒洗） 人参（去芦） 茯苓（去皮） 酸枣仁（炒） 生地黄（酒洗） 黄连（酒炒） 陈皮（去白） 南星（姜制）各一两 天竺黄五钱 牛黄二钱 珍珠二钱 琥珀二钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂五钱为衣。每服五十丸，清米汤送下。

【功用】《金匮翼》：镇心安神。

【主治】①《回春》：痫病，卒时晕倒，身软，咬牙，吐涎沫，不省人事，随后醒者。②《金匮翼》：癫痫惊狂属痰火者。

【宜忌】忌母猪肉，牛、羊、犬、马等肉，胡椒、葱、蒜。

【备考】《金匮翼》有雄黄。

05831 安神汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】生甘草 炙甘草各二钱 防风二钱五分 柴胡 升麻 酒生地黄 酒知母各五钱 酒黄柏 羌活各一两 黄耆二两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二大盏半，煎至一盏半，加蔓荆子五分、川芎三分，再煎至一盏，去滓，临卧热服。

【主治】头痛，头旋眼黑。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“安神散”。

05832 安神散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】御米壳（蜜炒）一两 人参 陈皮（去白） 甘草（炙）各一两

【用法】上为末。每服一钱，临卧煎乌梅汤调下。

【主治】远年近日喘嗽不已。

05833 安神散

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】人参 黄连（姜汁炒）各一钱半 甘草五分

【用法】上锉。加竹叶二十片，生姜一片，水煎服。

【主治】小儿心经有热有虚，夜啼不止。

05834 安神散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】茯神二两（去木） 生地五两 枣仁三两（炒） 远志一两半 当归三两 白芍一两半（炒） 人参一两半 麦冬三两 炙草一两 辰砂一两

【用法】上为散。每服三五钱，猪心汤送下。

【主治】产后恍惚心乱，脉虚微数。

【方论选录】产后心血不足，心神失养，而神明失其主宰，故语言错乱，恍惚如有所见焉。茯苓安神以清心气，生地壮水以滋心血，枣仁养心神，远志交心肾当归养血以荣心，白芍敛阴以和血，人参扶元补心气，麦冬润肺清心神，辰砂镇心宁神，炙草缓中益胃也。为散，猪心汤下，使心血内充，则心神得养而神明有主，岂有神思错乱，妄见妄言之患乎！

05835 安眠散

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】款冬花 乌梅肉 佛耳草 麦门冬（去心）各二钱半 陈皮（去白）半两 甘草（炙）三钱半 御米壳七钱半（酥炒）

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，入黄蜡如枣核许，同煎至八分，去滓，大温，临卧服。

【主治】上喘咳嗽，久而不愈。

05836 安眠散

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】佛耳草 知母 贝母 款冬花 桔梗 陈皮（汤浸，去白） 白茯苓（去皮）各一两 汉防己 猪牙皂角（去皮，酥炙）各二两半

【用法】上为细末。每服三钱，水一大盏，入黄蜡、乌梅各少许，同煎至五分，去乌梅，和滓温服。

【功用】调肺止嗽，消痰顺气。

【主治】咳嗽不得息。

05837 安眠散

【方源】《普济方》卷一六二。

【组成】 罂粟壳（去蒂瓤） 杏仁 乌梅 甘草各等分

【用法】 上㕮咀。每服半两，水煎，卧服。

【主治】 一切咳嗽，夜不得卧眠。

05838 安脏汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 参芦鞭二两 瓜蒂七个 甘草一两 荆芥二钱

【用法】 水煎三大碗，顿服之，即用鹅翎扫喉中。必大吐，吐后而肝叶必顺。

【主治】 肝叶倒置所致两目无恙，而视物皆倒置。

05839 安脐散

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】 白石脂末（焙，出火气）

【用法】 敷之。每日三次。

【主治】 小儿脐中汁出，或赤肿。

05840 安脐散

【方源】《保婴撮要》卷一。

【组成】 羚羊角一钱（略炒） 乱发一团（烧令存性） 蜈蚣一条（赤足者，炙）

【用法】 上为末。断脐后即敷之，以绢帕紧束。

【主治】 小儿脐风。

05841 安营散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 生地五两 通草一两半 人参一两半 紫菀二两 灯心一两半 当归三两 车前子三两 麦冬三两（去心）

【用法】 上为散。水煎三钱，去滓温服。

【主治】 子淋涩痛，脉微数者。

【方论选录】 妊娠湿热伤阴，气不施方，故小便涩痛，淋沥不已焉。生地滋阴壮水；木通利水通淋；麦冬清心润肺，以资水之上源；人参扶元补气，以助脾之气化；当归养血荣经脉；紫菀润肺，达州都；车前子清肺火，善利水道；白灯心降心火，兼利小便；为散水煮，俾湿热并解，则气化有权，而小便清利，何涩痛淋沥之不已，胎孕无不安矣。

05842 安豚丹

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 人参五钱 白术五钱 肉桂一钱 山药一两 巴戟天五钱 蛇床子三钱 附子五分 茯苓三钱 远志一钱 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 补心肾之虚，温命门、心包之火，去脾经之湿。

【主治】 心包、命门二经之火衰，外感寒邪，而发奔豚，如一裹之气从心而下，直至于阴囊之间，其势甚急，不可止遏，痛不可忍。

05843 安惊丸

【方源】《直指小儿》卷一引建阳刘参议方。

【组成】 远志肉（姜汁浸，焙） 净铁粉 朱砂 人参 茯神各半两 全蝎二十一个（焙） 南星（中者）一个（姜汁浸一宿，切细，焙） 白附子（略炮）二钱半 花蛇头（酒浸肉，焙） 麝半钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，菖蒲、灯心煎汤调下。

【主治】 诸惊风痫，或大声异物，惊怍打坠，不省人事。

05844 安蛔汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 人参七分 白术 茯苓各一钱 干姜（炒黑）五分 乌梅二个 花椒（去目）三分

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 伤寒吐蛔。

05845 安蛔散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 乌梅肉三钱 黄连 蜀椒 藿香 槟榔各一分 胡粉 白矾各半钱

【用法】 上为散。每服三四钱，水煎如糊，空腹服。

【主治】 吐蛔热证，色赤成团而活。

【备考】 本方改为丸剂，名“安蛔丸”（见《中国医学大辞典》）。

05846 安脾散

【方源】《百一》卷二。

【组成】 高良姜一两（以百年壁上土三二合敲碎，用水二碗煮干，薄切成片） 南木香 草果（面裹煨，去壳） 胡椒 白茯苓 白术 丁香（怀干） 人参（去芦） 陈橘皮（汤浸，去瓤）各半两 甘草（炙）一两半

【用法】 上为细末。每服二大钱，空心、食前米饮入盐点服；盐酒亦得。

【主治】 翻胃吐食，及吃食咽酸，口吐黄水，曾经诸方不愈者。

【临证举例】 翻胃甲申之春，以事至临安，寓止朱家桥詹翁店，詹翁年六十余，苦翻胃，危殆，已治棺在床侧，适予有宣司之辟，往别而去，其詹翁已不能言。及十一月自淮上归，过其门，意此翁已不存，为之惨然，方访问间，而此翁已出迎揖，见

其颜色极红润，甚惊异之，问其所以，乃云：官人此日离去，即有一州官来歇，得药数服，遂无事。其后授得此方，昨以此在建康医朱机宜新妇，及近日医圆通观维那，皆作效。

05847 安痛散

【方源】《丹溪心法附余》卷十五。

【组成】 五灵脂（去砂石） 延胡索（炒，去皮） 苍术（煨） 良姜（炒） 当归（去芦洗）各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，热酒、醋汤调下，不拘时候。

【主治】 心胃痛。

05848 安魂汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 龙眼肉六钱 酸枣仁（炒，捣）四钱 生龙骨（捣末）五钱 生牡蛎（捣末）五钱 清半夏三钱 茯苓片三钱 生赭石（轧细）四钱

【用法】 水煎服。

【主治】 心中气血虚损，兼心下停有痰饮，致惊悸不眠。

【方论选录】 方中用龙眼肉以补心血，酸枣仁以敛心气，龙骨、牡蛎以安魂魄，半夏、茯苓以清痰饮，赭石以导引心阳下潜，使之归藏于阴，以成睡睡之功也。

【临证举例】 失眠一媪，年五十余，累月不能眠，屡次服药无效。诊其脉有滑象，且其身形甚丰腴，知其心下停痰也。为制此汤，服两剂而愈。

05849 安睡丹

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】 白芍 生地 当归各五钱 甘草一钱 熟地一两 山茱萸 枸杞各二钱 甘菊花三钱

【用法】 水煎服。

【功用】 补肝血，益肾水。

【主治】 肝气太燥，忧愁之后，终日困倦，至夜而双目不闭，欲求一闭目而不得。

05850 安嗜汤

【方源】《医钞类编》卷十。

【组成】 栀仁 川连（炒） 苍术 陈皮 法半夏 香附 甘草

【用法】 水煎服。

【主治】 痰因火动，嗜杂不宁。

【加减】 若久不愈，加当归、山药。

05851 安石榴汤

【方源】《外台》卷二十五引廪丘公方。

【组成】 干姜二两（生姜倍之） 黄柏一两（细切） 石榴一枚（小者二枚） 阿胶二两（别研，渍之）

【用法】 上切。以水三升，煮取一升二合，去滓，纳胶令烊，顿服，不愈复作。人羸者稍稍服之，不必顿尽，须臾复服。

【主治】 大痢痢及白滞，困笃欲死，肠已滑者。

05852 安胎饮子

【方源】《古方选注》卷下。

【异名】 安胎饮（《验方新编》卷九）。

【组成】 建莲子（去心）三钱 台州青竺三钱（洗去胶） 白糯米三钱

【用法】 上用水一钟，煎五分，每日清晨服。自怀妊两月服起，至六个月。

【主治】 妊娠房劳，伤损足三阴所致小产。

【方论选录】 建莲子清君相之火，而能固涩真气；台州青竺利小便而通子户，清淫欲之瘀热；糯米补益脾阴，能实阳明空窍，使肝气不妄动，而胎气自安。以五谷果实为方，诚为王道之剂。

05853 安息香丸

【方源】《局方》卷二。

【组成】 肉桂（去粗皮）二两半 诃子（炮，取皮）二两 阿魏（细研，白面少许搜和作饼子，炙令香熟）一分 茯苓 当归（汤洗，切片，焙干） 干姜（炮，去皮） 肉豆蔻（去壳） 川芎 丁香皮 缩砂仁 五味子（微炒） 巴戟（去心，面炒） 益智子（去皮） 白豆蔻（去皮）各一两半 硇砂（酒半盏化，去砂，入蜜） 香附（去毛） 茴香（微炒）各一两半 胡椒 高良姜 木香 沉香 乳香（别研） 丁香各一两

【用法】 除安息香、硇砂外，为细末，用蜜三十两，入安息香、硇砂于蜜中炼熟，与上药为丸，如鸡头子大。每服一丸，细嚼，以温酒送下；浓煎生姜汤下亦得，食前服。

【主治】 一切冷气，心腹疼痛，胸膈噎塞，胁肋膨胀，心下坚痞，腹中虚鸣，哕逆恶心，嗳气吞酸，胃中冷逆，呕吐不止，宿饮不消，胸膈刺痛，时吐清水，不思饮食。

05854 安息香丸

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 安息香（研）一两 乳香（研）一两 麻黄（去根节）二两 胡桃仁（汤浸，去皮，研）一两半 干浮萍草（去土）一两半

【用法】 上药先捣麻黄、浮萍草为末，与研药拌匀，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，以温酒化下。以汗出为效。

【主治】 偏风，半体不仁，纵缓不收，或痹痛。

05855 安息香丸

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】安息香（研） 乳香（研）各一分 白胶香（研） 地龙（去土，炒，捣为末）各半两 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，研）二七枚 没药（研）一分 胡桃仁（研）三枚

【用法】上为细末，酒煎为丸，如弹子大。每服一丸，以温酒化下。

【主治】一切风注痛。

05856 安中调气丸

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】广皮二两 半夏（姜制）一两 白茯神一两 白术（土炒）二两 枳实（麸炒）一两 苏子（炒）六钱 川芎五钱 当归（酒洗）五钱 白芍药（盐酒洗，炒）八钱 木香一钱 甘草（炙）三钱 香附三两（长流水浸三日，洗净，炒黄色） 神曲（炒）一两 黄连（姜汁浸，晒干，猪胆汁拌炒）一两 白豆蔻五钱 萝卜子（炒）五钱

【用法】上为细末，竹沥、姜汁、神曲打糊为丸，如绿豆大。每服八十丸，以白汤送下；清米汤亦可。不拘时候。

【主治】一切翻胃痰膈之症。

05857 安心绝梦汤

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】人参一钱五分 麦冬二钱 茯神 白术 菟丝子各一钱五分 熟地五钱 玄参五钱 芡实 山药各二钱五分 五味五分 丹参 莲子心 枣仁 沙参 归身各一钱五分 陈皮二分

【用法】水煎服。

【主治】劳心过度而梦遗者。

05858 安枕无忧散

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】陈皮 半夏（制） 白茯苓 枳实（炒） 竹茹 麦冬（去心） 圆眼肉 石膏各一两五分 人参五钱 甘草一钱

【用法】水二钟，煎八分，温服，滓再煎服。

【主治】心胆虚怯，昼夜不得眠。

05859 安卧如神汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【异名】安睡如神汤（《医学集成》卷三）。

【组成】茯苓 茯神 白术 山药 寒水石（煅） 枣仁各一钱 远志 炙草各七分 朱砂五分 人参四分

【主治】通宵不寐。

05860 安肺宁嗽丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】嫩桑叶一两 儿茶一两 硼砂一两 苏子一两（炒，捣） 粉甘草一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，三钱重。早、晚各服一丸，开水送下。

【主治】肺郁痰火及肺虚热作嗽；兼治肺结核。

【方论选录】肺脏具辟之机，治肺之药，过于散则有碍于阖，过于敛则有碍于辟。桑得土之精气而生，故长于理肺家之病，以土生金之义也；至其叶凉而宣通，最解肺中风热，其能散可知；又善固气化，治崩带脱肛，其能敛可知，敛而且散之妙用，于肺脏阖辟之机尤投合也。蓬砂之性凉而滑，能通利肺窍；儿茶之性凉而涩，能安敛肺叶，二药并用，与肺之阖辟亦甚投合。又佐以苏子之降气定喘，甘草之益土生金，蜂蜜之润肺清燥，所以治嗽甚效也。蓬砂、儿茶，医者多认为疮家专药，不知其理痰宁嗽，皆为要品。且二药外用，能解毒化腐生肌，故内服亦治肺结核，或肺中损烂，亦甚有效验。

05861 安胃定胎散

【方源】《产科心法》卷上。

【组成】白术一钱 陈皮七分 砂仁五分 茯苓一钱 当归身八分 藿香三分

【用法】加老姜一片，炒米二钱，水煎服。

【功用】养血安胎。

【主治】妇人见食不喜食，或恶心而吐，或体倦欲卧，虽体质平常，孕脉不现，此是人病脉不病，服本方数剂，孕脉自现矣。

【加减】如恶心而吐痰者，加制半夏五分。

05862 安胎四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 熟地黄各一钱 地榆 续断 木香 前胡 丹参 紫苏 阿胶（炒） 砂仁 艾叶（醋炒）各五分

【用法】上锉。加葱白二根，水煎，空心服。

【主治】胎气不安，腹疼重坠。

05863 安胎当归汤

【方源】《外台》卷三十三引《小品方》。

【组成】当归 阿胶（炙） 芎藭 人参各一两 大枣十二枚（擘） 艾一虎口

【用法】上切。以酒水各三升合煮，取三升，去滓，内胶令烊，分三服。

【主治】妊娠五月日，举动惊愕，胎动不安，下在小腹，痛引腰胳，小便疼，下血。

05864 安胎扶元饮

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】枳壳（麸炒） 制香附 川续断 白术各一钱 丹参 前胡 黄芩各八分 阿胶一钱半（蛤粉炒） 苏梗一钱 广皮五分 砂仁末六分

【功用】安胎扶元。

【主治】子悬。

05865 安胎和气饮

【方源】《女科万金方》。

【组成】陈皮 苍术 厚朴 甘草 桔梗 枳壳 香附 木香 当归 熟地 白术 黄芩

【用法】加生姜三片，砂仁五粒，水煎服。

【主治】胎感寒气，饮食少进，乏力寒热。

05866 安胎和气散

【方源】《女科百问》卷下。

【异名】安胎和气饮（《奇效良方》卷六十三）、安胎利气饮（《宋氏女科》）、安和饮（《医钞类编》卷十七）。

【组成】诃子（煨） 白术各一两 陈皮 良姜（炒） 木香（煨） 白芍药 陈米（炒） 甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胎冷，腹胀虚痛，两胁虚鸣，脐下冷疼欲泄，小便频数，大便虚滑。

【宜忌】忌生冷。

05867 安胎神应丸

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【异名】加味神应丸。

【组成】补骨脂（盐水炒）二两 肉果（面裹，煨）七钱 山茱萸三两（去核） 扁豆（炒，去壳）二两 大熟地（砂仁酒煮）四两 当归（酒洗）三两 白术（土炒）四两 木香五钱 山药（炒）三两 杜仲（盐水炒）三两 生姜四两（切片） 大枣八十枚（去皮核，同姜片煮一昼夜，去姜） 神曲（炒）四两

【用法】神曲磨筛极细，同蜜炼，入前药，并枣肉为丸。每服七十丸，白天二次，夜间一次，米饮或酒送下。

【功用】益火之源，以消阴翳，大补脾胃。

【主治】妊娠每日五更之时必起泄一、二次者，命门火衰不能运化水谷所致。

【方论选录】是方骨脂、肉果补命门之火为君；归、地、甘苦温以养血，术、药苦温平涩以健脾为臣；茱、仲酸盐以固肾，木香辛温以运气，扁豆甘淡以利水，姜、枣一辛一甘以和荣卫佐成已以成功；神曲糊丸消谷运脾以为使。则火旺而土强，饮食进而血长胎安而泄止矣。

05868 安胎寄生汤

【方源】《外台》卷三十三注文引《小品方》。

【组成】桑上寄生五分 白术五分 茯苓四分 甘草十分（炙）

【用法】上切。以水五升，煮取二升半，分三服。

【主治】①《外台》引《张文仲方》：妊娠流下。②《景岳全书》：妊娠下血，或胎不安，或腰腹作痛。

【宜忌】忌海藻、菘菜、酢物、桃、李、雀肉。

【加减】若人壮者，可加芍药八分；若胎动不安，腹痛端然有所见，加干姜四分。

05869 安宫牛黄丸

【方源】《温病条辨》卷一。

【异名】新定牛黄清心丸（《重订通俗伤寒论》）、安宫丸（《全国中药成药处方集》吉林方）。

【组成】牛黄一两 郁金一两 犀角一两 黄连一两 朱砂一两 梅片二钱五分 麝香二钱五分 真珠五钱 山栀一两 雄黄一两 金箔衣 黄芩一两

【用法】上为极细末，炼老蜜为丸，每丸一钱，金箔为衣，蜡护。脉虚者，人参汤送下；脉实者，银花、薄荷汤送下。每服一丸，大人病重体实者，每日二次，甚至每日三次，小儿服半丸，不知，再服半丸。

【功用】①《温病条辨》：芳香化浊而利诸窍，咸寒保肾水而安心体，苦寒通火腑而泻心。②《全国中药成药处方集》（北京方）：解热去毒，通窍镇静。

【主治】①《温病条辨》：太阴温病。发汗而汗出过多，神昏谵语；飞尸卒厥，五痫中恶，大人小儿痉厥因于热者；手厥阴暑温，身热不恶寒，精神不了了，时时谵语；邪入心包，舌蹇肢厥；阳明温病，斑疹、温痘、温疮、温毒，发黄，神昏谵语，脉不实。②《全国中药成药处方集》（北京方）：瘟毒热盛，神昏谵语，狂躁不安，浊痰内闭，痉厥抽动，不省人事，瘟毒斑疹，口渴目赤，言语不清。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（北京方）：孕妇忌服。

【方论选录】①《温病条辨》：牛黄得日月之精，通心主之神；犀角主治百毒、邪鬼、瘴气；真珠得太阴之精，而通神明，合犀角补水救火；郁金草之香，梅片木之香，雄黄石之香，麝香乃枯血之香，

合四香以为用，使闭固之邪热温毒深在厥阴之分者，一齐从内透出，而邪秽自消，神明可复也；黄连泻心火，栀子泻心与三焦之火，黄芩泻胆、肺之火，使邪火随诸香一齐俱散也；朱砂补心体，泻心用，合金箔坠痰而镇固，再合真珠、犀角为督战之主帅也。②《成方便读》：热邪内陷，不传阳明胃腑，则传入心包。若邪入心包，则见神昏谵语诸证，其势最虑内闭。牛黄芳香气清之品，轻灵之物，直入心包，僻邪而解秽；然温邪内陷之证，必有粘腻秽浊之气留恋于膈间，故以郁金芳香辛苦，散气行血，直达病所，为之先声，而后芩连苦寒性燥者，祛逐上焦之湿热；黑栀清上而导下，以除不尽之邪；辰砂色赤气寒，内含真汞，清心热，护心阴，安神明，镇君主，僻邪解毒。

【临证举例】 ①急性肝昏迷 《江西中医药》(1960；12:31)：钟某某，男，5岁。前二天脸上略现黄色，四肢软弱，精神困倦，略有冷热，当时检查指纹色紫，舌苔黄腻，全身黄色，面无表情，体温38.5℃，小便红赤。曾用茵陈等清热利湿退黄中药及青霉素、肝精注射二天无效，反而进入昏迷状态。患者欲转县人民医院治疗，行至中途，牙关紧闭，手足抽搐，认为绝望，转来治疗。经会诊采用安宫牛黄丸一颗，分二次化服。次日复诊，诸症大减，续用此丸半颗，另用中药清热利湿退黄，并注射肝精、葡萄糖，每日一次，连治三天痊愈。②流行性乙型脑炎 《福建中医药》(1957；2:5)：治疗乙脑83例，死亡13例。死亡率为15.66%，有后遗症者2例。作者认为，对于完全昏迷的患者，需持续应用足量的安宫牛黄丸为主，至3～4日之久。再加针刺十宣、曲池、合谷、涌泉等才能收效。③急性脑出血昏迷 《中华内科杂志》(1959；1:11)：用针刺配合本方治疗急性脑出血昏迷16例，9例生命获得挽救，其中3例完全恢复健康，疗效为56.3%，死亡率降低至43.7%。方法：用轻而短的手法针刺人中等穴的同时，内服本方（不能吞咽者鼻饲），每日1～4丸，随证增减。④副鼻窦炎 《浙江中医杂志》(1985；8:376)：治疗副鼻窦炎24例，其中病程半年以内者4例，半年～1年者8例，1年以上者12例。均有头痛头晕，鼻塞或流浊涕，嗅觉减退，口干红，舌质粗红，苔黄，脉滑数等症状，急性发作时头痛剧烈，痛处灼热拒按，佐寒发热。选用安宫牛黄丸内服，并用纱布或药棉外裹少许塞入患侧鼻孔，5～7天为一疗程，一般用1～2个疗程。治后18例症状消失，随访半年以上未复发；6例症状显减，或症状消失但半年内又有轻度发作。

【现代研究】 剂型改革 《新医药学杂志》(1975；8:12)：作者通过对原方分析，将其药物分为清热解毒，镇静安神和芳香化浊，辟秽开窍两类。在清热镇静类药物中，去药源稀少的牛黄，代之以牛黄有效成份牛胆酸和猪胆酸；去价格昂贵的犀角、珍珠，代之以有效成分基本相同的水牛角、珍珠母；去抑菌作用因受氨基酸拮抗而削弱的黄连，另加板蓝根以增强清热解毒功用，并去汞化合物朱砂和基本无药效金箔，依法配制成复方针剂，定名为清开灵（Ⅰ）注射液。在芳香开窍类药物中，以价廉的麝香皮代替麝香，去辛温有毒的雄黄，加行气化湿，芳香开郁的藿香，配制成复方酯剂，定名为清开灵（Ⅱ）滴鼻液。分别供肌肉注射和滴鼻用。经临床验证，效果良好。

【备考】 按：《全国中药成药处方集》（北京方）将本方改为散剂，名“安宫牛黄散”。

05870 安神生化汤

【方源】 《傅青主女科·产后篇》卷上。

【组成】 川芎一钱 柏子仁一钱 人参一二钱 当归二三钱 茯神二钱 桃仁十二粒 黑姜四分 炙草四分 益智八分（炒） 陈皮三分

【用法】 加大枣，水煎服。

【主治】 产后块痛未止，妄言妄见。

05871 安神补心汤

【方源】 《古今医鉴》卷八。

【组成】 当归一钱二分 川芎七分 白芍一钱（炒） 生地黄一钱二分 白术一钱 茯神一钱二分 远志（甘草水泡，去心）八分 酸枣仁（炒）八分 麦门冬（去心）二钱 黄芩一钱二分 玄参五分 甘草三分（一方无远志、麦门冬、黄芩、玄参，加陈皮、柏子仁酒炒黄连）

【主治】 怔忡惊悸。

05872 安神定志丸

【方源】 《活人心统》卷下。

【组成】 人参七钱 远志（去心）一两 伏神（去木） 龙齿七钱 枣仁一两 当归一两 琥珀三钱 朱砂七钱 麦冬（去心）五钱 金箔十张 银箔十张 甘草五分 天竺黄五钱 生地（酒洗） 一钱五分（焙干）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如龙眼大，金银箔为衣。每服三丸，灯心汤化下。

【主治】 阴虚血少，神不守舍，恍惚怔忡，健忘。

05873 安神定志丸

【方源】《医便》卷一。

【组成】人参一两五钱 白茯苓（去皮） 白茯神（去心） 远志（去心） 白术（炒） 石菖蒲（去毛，忌铁） 酸枣仁（去壳，炒） 麦门冬（去心）各一两 牛黄一钱（另研） 辰砂二钱五分（水飞，另研，为衣）

【用法】上为末，龙眼肉四两熬膏，和炼蜜三四两为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，清米汤送下，每日三次，不拘时候。

【功用】①《医便》：清心肺，补脾肾，安神定志，消痰去热。②《寿世保元》：宁心保神，益血固精，壮力强志，清三焦，化痰涎，育养心神，大补元气。

【主治】①《寿世保元》：咽干，惊悸，怔忡。②《医碥》：健忘。

05874 安神定志丸

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】茯苓 茯神 人参 远志各一两 石菖蒲 龙齿各五钱

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服二钱，开水送下。

【主治】①《医学心悟》：惊恐不安卧，其人梦中惊跳怵惕。②《医钞类编》：癫证心中愦乱。

05875 安神定智汤

【方源】《点点经》卷一。

【组成】益智 远志 当归 白芍 黄耆 天冬 龙骨（煅，炙） 芡实 泽泻各一钱半 茯神 金钗各一钱 甘草三分

【用法】莲肉、粳米、大枣为引，水煎服。

【主治】酒伤心脾，传染膀胱，火熏精漏，神气不爽，饮食少进，赤白二浊。

05876 安神滚痰丸

【方源】《明医指掌》卷七。

【组成】礞石一两（煅） 风化消一两 朱砂一两 沉香五钱 珍珠五钱

【用法】上为末，煎天麻膏为丸，如芡实大。每服三丸，姜汁、竹沥调下。

【功用】①《明医指掌》：利肺安心。②《重订通俗伤寒论》：逐痰醒神。

【主治】①《明医指掌》：痰升致癫。②《重订通俗伤寒论》：痰壅气逆，胸闷呕吐，静则迷蒙昏厥，躁则狂妄舞蹈，舌苔黄厚而滑。

【方论选录】《医略六书》：青礞石善化顽痰之固结；风化消专泻热结之壅痰；沉香顺气以降逆；朱砂镇心以安神；珍珠乃水精之所结，力能壮水制火，以安神定志；天麻煎膏糊丸，豁痰散结；姜汁、竹沥乃润液散痰，使痰化热降，则心包肃清，神明有主，癫妄自退。此安神下痰之剂，为痰热病癫之专方。

05877 安神镇心丸

【方源】《赤水玄珠》卷六。

【组成】石菖蒲 远志 人参 茯神 川芎 山药 麦门冬 铁粉 天麻 半夏 南星 茯苓各一两 细辛 辰砂各五钱

【用法】上为末，生姜五两取汁，入水煮糊为丸，如绿豆大，另以朱砂为衣。每服二十五丸，夜卧生姜汤送下，小儿减半。

【功用】消风痰。

【主治】惊悸。

05878 安神醒心丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】南星末五两 川连末一两五钱（先以姜汁拌浸半日，入南星末调，和匀成饼，于饭甑内蒸半日） 人参末一两五钱 制远志末一两五钱 飞过辰砂（研）七钱五分 琥珀七钱五分 酸枣仁（炒，研末）一两

【用法】上用雄猪心血三个，入竹沥，面糊为丸，如梧桐子大，金箔为衣。每服五十丸，食远白汤送下，小者二三十丸。

【主治】①《寿世保元》：小儿大小被惊，神不守舍，痰迷心窍，恍惚健忘，诸痫痴风心风等症。②《医学集成》：痰迷心窍所致惊悸。

05879 安息活血丹

【方源】《局方》卷九。

【组成】吴茱萸（汤浸七遍，焙干，微炒） 安息香（捣碎，入好酒研，澄去滓，银器内慢火熬成膏） 柏子仁（炒） 山茱萸（去核） 延胡索 桃仁（去皮尖，麸炒微黄色） 虎杖 当归 杜仲（去粗皮，锉，炒） 附子（炮，去皮脐） 木香各二十两 泽兰叶 干姜（炮） 肉桂（去粗皮） 艾叶（微炒） 黄耆（去芦） 牡丹皮各二斤半 肉苁蓉（酒浸，焙） 厚朴（去粗皮，姜汁炙令熟）各五斤

【用法】上为细末，以前安息香膏入白面同煮作糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下；醋汤亦得。

【主治】冲任不足，下焦久寒，脐腹疞痛，月事不匀，或来多不断，或过期不来，或崩中去血，或带下不止，面色萎黄，肌肉瘦瘁，肌体沉重，胸胁胀满，气力衰乏，饮食减少；一切血气虚寒。

05880 安喘至圣丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参量须稍大　牛膝三钱　熟地五钱　山茱萸四钱　枸杞子一钱　麦冬五钱　北五味一钱　胡桃三个　生姜五片

【用法】水煎服。

【主治】气虚所致气喘而上者。

05881　安蛔理中汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】人参　白术　干姜　茯苓各一钱半　乌梅三个

【用法】水煎，温服。

【主治】蛔厥。

【加减】如大便闭，加大黄人蜜以利之；口渴，加瓜蒌根。

05882　安奠二天汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参一两（去芦）　熟地一两（九蒸）　白术一两（土炒）　山药五钱（炒）　炙草一钱　山萸五钱（蒸，去核）　杜仲三钱（炒黑）　枸杞二钱　扁豆五钱（炒，去皮）

【用法】水煎服。

【功用】补脾肾，固胞胎。

【主治】妊娠脾肾亏损，带脉无力，小腹作疼，胎动不安，如有下堕之状。

【临证举例】先兆流产《湖北中医杂志》(1987；1:13)：本方加减治疗先兆流产50例，基本方：党参、白术各24克，熟地15克，山药20克，炒杜仲、续断、扁豆各10克，菟丝子15克，旱莲草30克，炙甘草6克。腹痛较甚者，加白芍30克；血热者，加黄芩10克；出血较多者，加地榆炭15～30克，阿胶10克（烊）；大便干结者，加熟大黄6克；纳差腹胀者，去熟地，加砂仁6克；恶心呕吐者，加法半夏10克，陈皮6克。少数病例适当配合西药治疗。结果：治愈45例，无效5例。

05883　安神熟地黄散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】熟地五两　人参一两五钱　黄耆（蜜炙）三钱　龙齿（煅）三钱　远志一两五钱　桂心一两五钱　茯神二两（去木）　炙草一两　当归三两

【用法】上为散。水煎五钱，去滓温服。

【主治】悸病脉弦涩者。

【方论选录】熟地补肾水以上交乎心，人参补心气以下交乎肾，黄耆补气实卫，当归养血益荣，龙齿安魂定魄，远志通肾交心，桂心温营暖血以平肝，茯神定志安神以宁悸，炙甘草缓中以益胃。为散水煎，使心肾交滋，则血气充足，而经脏得养，神志自雄，安有惕然心悸之患。

05884　安胎万全神应散

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【异名】安胎万全汤(《仙拈集》卷三)、安胎万全神应汤(《产科心法》下集)。

【组成】当归（酒浸）一钱　川芎六分　白芍（炒）七分　熟地（姜汁浸）八分　白术一钱　黄芩一钱　黄耆（蜜炒）七分　杜仲七分　砂仁五分　阿胶六七粒　茯苓七分　甘草三分

【用法】酒、水各一钟，煎八分，空肚服。如痛急，将铜锅煎一钟即服。

【主治】孕妇三月前后，或经恼怒，或行走失跌，损伤胎气，腹痛腰胀。

【加减】胸前作胀，加紫苏、陈皮各六分；白带或红，多加阿胶，地榆一钱、艾叶七分；见红，加川续断一钱，糯米一百粒。

【备考】见血一二日，未离宫者，加一剂自安。倘先三四五月内已经半产者，将及前月分略觉腰骨痠胀，忙服一剂安之，过此必安；不可加减，百发百中。

05885　并提汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【异名】兼提汤(《辨证录》卷十一)。

【组成】大熟地一两（九蒸）　巴戟一两（盐水浸）　白术一两（土炒）　人参五钱　黄耆五钱（生用）　山萸肉三钱（蒸）　枸杞二钱　柴胡五分

【用法】水煎服。

【功用】补肾气，兼补脾胃。

【主治】妇人肾气不足，不孕，饮食少思，胸膈满闷，终日倦怠思睡，一经房事，呻吟不已。

05886　关节炎汤1号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】赤芍　白芍各9克　桂枝3克　生地熟地各9克　细辛1.5克　当归9克　秦艽9克　片姜黄9克　独活9克　桑寄生30克　桑枝30克　防风6克　薏苡仁20克

【功用】祛风湿，活血通络。

【主治】风湿性关节炎风湿型，关节肿疼，遇风或受潮湿加重，舌苔白腻，脉濡缓。

【方论选录】方中独活、秦艽祛风湿，通痹止痛；桂枝、细辛、防风通经脉散风寒；当归、赤芍、白芍、姜黄促进血液循环，活血止痛；白芍、熟地养血；桑枝通络走四肢；薏苡仁利湿。其中赤

芍、白芍、桂枝为一组药，常用于四肢疼痛；细辛、生地、熟地为一组药，一辛一散一滋补，细辛去熟地之腻，可补真阴，填骨髓，止腰痛；桑枝，桑寄生为一组药，能强腰膝、通络止痛，治风湿所致腰膝酸痛，屈伸不利。

05887 关节炎汤2号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】黄耆24克 党参15克 白术9克 制附片6克 白芍9克 桂枝9克 生地 熟地各9克 细辛2克 独活9克 桑寄生30克 十大功劳叶12克 牛膝9克

【功用】补气益肾，散寒通络。

【主治】风湿性关节炎虚寒型，关节疼痛，有凉感，遇寒及劳累痛甚，舌苔白，脉沉紧。

【方论选录】方中补气用党参、黄耆、白术，党参用于各种气虚不足的病症，对神经系统有兴奋作用，能增强机体抵抗力；桂枝、细辛、独活散寒止痛；制附片、寄生、十大功劳叶、熟地益肾；生地、白芍滋阴养血；牛膝引药下行。上药合成共达补气益肾、散寒通络之目的，治虚寒型关节炎为宜。

05888 羊心汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】羊心一枚（以水五盏，煎取三盏汁用）甘草（炙）一两 远志（去心）半两 防风（去叉）一两 生干地黄（焙）一两半 芍药（锉）牡蛎（熬）各一两 人参一两半 羚羊角（镑屑）半两

【用法】上九味，将八味为粗末。每服三钱匕，以煮羊心汁一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血气惊悸，神志不宁。

05889 羊肉丸

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】川楝子（炒） 续断（炒，去丝） 茯苓茴香 补骨脂（炒） 附子（炮，去皮脐） 葫芦巴（微炒）各三两 山药（炒） 桃仁（麸炒，去皮尖，别研） 杏仁（麸炒，去皮尖，别研）各二两

【用法】上为末，精羊肉四两，酒煮烂，研极细，面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心以盐汤、温酒任下。

【功用】固真补气，益精驻颜。

【主治】真阳耗竭，下元伤惫，耳轮焦枯，面色黧黑，腰重脚弱，元气衰微。

05890 羊肉汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】肥羊肉三斤（去脂） 当归一两 桂心二两 芍药四两 甘草二两 生姜四两 芎藭三两 干地黄五两

【用法】上㕮咀。以水一斗半，先煮肉，取七升，去肉，纳余药，煮取三升，去滓，分三服，不愈重作。

【主治】①《千金》：产后虚羸喘乏，自汗出，腹中绞痛。②《产孕集》：产后虚劳，摄养不善，内伤七情，阳陷阴逆，升降倒置，脏腑交病，表里均亏，乍起乍卧，饮食不化，时作嗽咳，目昏头痛，口渴盗汗，寒热往来，喘乏自汗，少气惊悸。

【方论选录】《千金方衍义》：《金匮》当归生姜羊肉汤为产后腹中疠痛之圣药，即寒疝、小腹结痛亦得用之，况合四物以调其血，加桂以通其滞，用甘草者，以缓姜、桂之急也。缓急得宜，攻补兼济，非深入《金匮》之奥，何以及此。

【备考】《千金翼》有葱白一斤。

05891 羊肉汤

【方源】《外台》卷三十四引《广济方》。

【组成】肥羊肉一斤 当归 甘草（炙） 芍药各一分

【用法】上切。以水一斗煮羊肉，取七升煮药，取二升分服。

【主治】产后内虚，寒入腹，腹中绞痛下赤，烦毒谵语见鬼。

05892 羊肉汤

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【组成】当归 牡蛎 芍药各一两 龙骨半两 桂枝（去皮）二分 黑附子二个（每个五钱重，炮，去皮脐）

【用法】上为粗末。每服用末二两半，羊脊肉四两，生姜二两，葱白五寸，同锉烂，以水五升，同煮至二升半以来，净绞去滓，分作三盏服。

【功用】《医方论》：敛阴生阳，补虚固脱。

【主治】①《伤寒微旨论》：伤寒八九日后，服汗下药太过，两手脉沉细而无力，女子踡足卧多，恶明与人声，身有粟起，时时发战，一如疟证。②《阴证略例》：产后血虚。

【方论选录】①《医方集解》：此足少阴药也，当归、芍药以补其阴；附子、姜、桂以复其阳；龙骨、牡蛎以收其脱，羊肉大补以生其气血。②《医林纂要》：羊肉甘辛，补命门之火，补命门所以生肝木，又血气之味，以补血气，故以此为君；生姜辛温，为补肝主药，生用欲乘其生气，且与归、附

同行，则皆守于肝部；附子辛润命门，补肝而回欲尽之阳；当归甘辛，滋润补肝，以萃忘归之血；白芍药酸以敛阴，使散者不至于尽；牡蛎咸涩，咸软以行枯竭之血，涩收以敛游散之魂；龙骨咸涩，龙固鳞虫，肝之类也，本飞跃不测，而用其骨，则散者就收，亦所以敛欲脱之阳也；桂枝甘辛，生姜、桂枝皆发汗者，而与归、附而敛之，使与同类皆归，则翻然归矣；用葱白亦反本之意。参、耆和缓，虽补气亦能生血，而未必能遽达下焦，补土以培其根，不若直补其根，使元阳得以相续也。而用羊肉、附子、当归、姜、桂，使生气复于下，而津液亦相滋。又剂之以芍药、牡蛎、龙骨，以收其将脱之阳，使来复于下。

05893 羊肉汤

【方源】《三因》卷十八。

【组成】当归三钱 生姜一两一分 精羊肉四两 橘皮半两

【用法】上锉散。水三碗，酒少许，煎至一碗，去滓，分二服，或少加葱盐亦佳。

【主治】①《三因》：产后腹中疼痛，虚劳不足，里急胁痛及寒疝。②《普济方》：寒月中产，寒入产门，脐下胀闷，手不可犯，此寒疝也。

05894 羊肉饼

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】羊肉四两 白面六两 生姜汁二合

【用法】上以姜汁搜面，入豉汁煮和，以五味以肉作馨。一日一食。

【主治】虚损。

05895 羊肉羹

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】羊肉半斤（细切） 萝卜一个（切作片） 草果一钱 陈皮一钱（去白） 良姜一钱 荜茇一钱 胡椒一钱 葱白三茎

【用法】上药水熬成汁，入盐酱熬汤，下面棋子作羹食之；将汤澄清作粥食之亦可。

【主治】肾衰虚弱，腰脚无力。

05896 羊肉臛

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《圣惠》卷九十五。

【组成】章陆根一斤（刮去皮，薄切） 羊肉一斤

【用法】煮章陆根令烂，去滓，纳羊肉，下葱、豉、盐如食法，随意食之，肿愈后亦宜作此。亦可常捣章陆与米中拌蒸作饼子食之。

【主治】①《肘后方》：卒肿满，身面皆洪大。②《圣惠》：水气洪肿。

05897 羊花散

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】生南星 生半夏各二钱 闹羊花三钱 生川乌 生草乌各一钱

【用法】用麻黄根、芋艿叶拌上药末，或加蟾酥五分，雄黄少许。

【主治】跌扑损伤。

【宜忌】本方为"外麻药"，仅供外用，不宜内服

05898 羊肝丸

【方源】《本草图经》引《传信方》（见《证类本草》卷七）。

【异名】秘传羊肝丸（《局方》卷七（续添诸局经验秘方））、黄连羊肝丸（《原机启微》卷下）。

【组成】黄连末一大两 白羊子肝一具（去膜）

【用法】上同于砂盆内研令极细，为丸如梧桐子大。每食二七枚，以暖浆水送下。连作五剂愈。

【功用】《明医指掌》：补肝明目。

【主治】肝经不足，风毒上攻，眼目昏暗，羞明泪出，隐涩难开，翳障青盲，攀睛胬肉。

①《本草图经》引《传信方》：诸眼目疾，及障翳青盲。②《局方》（续添诸局经验秘方）：丈夫、妇人肝经不足，风毒上攻，眼目昏暗泪出，羞明怕日，隐涩难开，或痒或痛；远年日近内外障眼，攀睛胬肉，针刮不能治。③《保婴撮要》：痘疮入目不能开。④《医学入门》：拳毛倒睫。

【宜忌】禁食猪肉及冷水。

【方论选录】①《医方考》：眼者，肝之窍，肝木自实则病眼，邪害空窍也。越人云：实则泻其子。故用黄连以泻心；能泻其心，则子食气于母，而肝弗实矣，目也岂不莹然而明乎？然必剂以羊肝者，取其为血气之属，同类相从，用之补肝，非若草本之性，偏一而失冲和也。②《医方集解》：用羊肝引黄连等药入肝，解肝中诸郁，盖肝主目，肝郁解则目之玄府通利而明矣。黄连之类解热郁也。③《本事方释义》：黄连气味苦寒，入手少阴，白羊肝气味苦寒，入足厥阴，此治目疾之方，因操持谋虑，用心太过，厥阳上升，肝阴必致内耗，每每伤目者多。故一味泻心火，兼以血肉之养肝，宜其效验之捷耳。

【临证举例】内障 崔承元为内障所苦，丧明逾年，依此方合服，不数月眼复明，因传此方子世。

05899 羊肝丸

【方源】《本事》卷五。

【组成】 羯羊肝一具（新瓦盆中煨干，更焙之。肝若大只用一半） 甘菊花（去萼梗） 柏子仁（研） 羌活（去芦） 细辛（去叶） 官桂（不见火） 白术 五味子（拣）各半两 黄连三分（去须）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心、食前温水送下。

【功用】 镇肝明目。

【主治】 ①《准绳·类方》：眼目昏花。②《审视瑶函》：青盲症。

05900 羊肝丸

【方源】《本事》卷五。

【异名】 活命羊肝丸(《医学入门》卷七)。

【组成】 白羯羊肝（只用子肝一片薄切，新瓦上煨干） 熟地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干称）一两半 车前子 麦门冬（水浸，去心） 菟丝子（酒浸，晒干，用纸条子同碾为末） 蕤仁 决明子 泽泻 地肤子（去壳） 防风（去钗股） 黄芩（刮净） 白茯苓（去皮） 五味子（拣） 枸杞子 茺蔚子 杏仁（大者，去皮尖，炒） 细辛（华阴者，去叶） 苦葶苈（炒令香） 桂心（不见火） 青葙子各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，温水送下，一日三次，不拘时候。

【功用】 ①《本事》：镇肝明目。②《全国中药成药处方集》（吉林方）：养肝助肾，清头明目。

【主治】 ①《医学入门》：肝经蕴热，毒气上攻，眼目赤肿，多泪昏暗，及年久丧明内障。②《全国中药成药处方集》（吉林方）：瞳仁散大，羞明，视物不清，雀目青盲，眼边赤痒，流泪。

【临证举例】 ①眼目昏暗 张台卿尝苦目暗，京师医者令灸肝俞，遂转不见物，因得此方服之，遂明。②内障 一男子内障，医治无效，因以余剂遗之。一夕灯下语其家曰：适偶有所见，如隔门缝见火者。及旦视之，眼中翳膜且裂如线。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典》引作“内障丸”。

05901 羊肝丸

【方源】《医说》卷四引《类说》。

【异名】 观音梦授方(《得效》卷十六)、罗汉应梦丸(《普济方》卷七十九引《经验良方》)、神授羊肝丸(《济阳纲目》卷一〇一)、观音梦授丸(《杂病源流犀烛》卷二十二)。

【组成】 净洗夜明砂一两 当归一两 蝉壳一两 木贼（去节）一两

【用法】 上为末，羊肝四两水煮烂，捣如泥，入前药拌和为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后温熟水送下。

【功用】《全国中药成药处方集》（上海方）：平肝养血，散热退翳。

【主治】 内障，赤膜，雀盲，眼目昏花，视物模糊。

①《医说》引《类说》：赤眼成内障。②《医林纂要》：有经热而兼风郁，或血涩而多赤膜及障翳之目疾内障。③《疡医大全》：雀盲眼，一切昏花老眼。④《全国中药成药处方集》（上海方）：视物模糊，眼涩不舒。

【方论选录】 ①《医方考》：夜明砂能攻目中恶血，当归身能生目中新血，蝉退能去目中翳障，木贼能散目中翳热，乃羊肝者，同类相从，能引四物入肝而利其窍也。②《成方便读》：当归芳香辛苦，能润养肝血，而又兼行血分，以复其肝之本性；夜明砂系蝙蝠矢，食蚊而化，但其眼不化，蚊又为食血之虫，故能入肝破血，为散结行滞之需；蝉退、木贼，一则取其善脱，一则取其善摩，二味皆轻扬治上，为退翳除障之专药；用羊肝者，以羊食百草，其精华皆聚子肝，以为导引耳。

【临证举例】 内障 明州定海人徐道亨，因患赤眼而食蟹，遂成内障，凡历五年。乃服羊肝丸，百日复旧。

【备考】 本方方名，《疡医大全》引作“退翳羊肝丸”。

05902 羊肝丸

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】 白蒺藜（炒去刺） 菊花（去根叶） 石决明（煅） 生地各一两 楮实子 槐角（炒） 五味子 黄连 当归尾各五钱 防风 荆芥穗各二钱半 甘草一钱 川芎三钱 蕤仁（去壳油，净）七钱

【用法】 上为细末，用雄羊肝一具，滚水沸过，共前药捣为丸。每服五六十丸，空心薄荷汤送下。

【主治】 肥人酒色太过，红筋侵目，毒气伤肝，白膜伤睛。

【宜忌】 忌椒、生姜、辛辣、烧酒等物。

05903 羊肝丸

【方源】《异授眼科》。

【组成】 羊肝一具（洗，去筋膜） 黄连三两 当归一两 蕤仁（去油）一两

【用法】 先将羊肝入砂锅内煮烂，后入黄连等末，为丸如梧桐子大。每服五十丸，米汤送下。

【主治】 目有内障，如云掩。

05904 羊肝散

【方源】《奇效良方》卷十三。

【组成】 缩砂一两（去皮） 肉豆蔻半两（去壳）

【用法】 上为细末，用羊肝半具，细切拌药，以湿纸三五重裹上，更以面裹，用慢火烧令熟，去面并纸，入软饭捣和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】 休息痢羸瘦。

05905 羊肝散

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】 青羊肝（去筋膜，切韭叶厚片）一具 人参 羌活 白术（土炒） 蛤粉各等分

【用法】 上为细末，令匀听用。将药置荷叶上，如钱厚一层，铺肝一层包固，外以新青布包裹蒸熟，任儿食之。如不食者，及夏月恐腐坏，则晒干为末，早、晚白汤调服。服完再合，以好为度。

【主治】 小儿疳热上攻于眼，故发时痒涩赤烂，眼胞肿疼，白睛生翳，渐渐遮满，不时流泪，羞明闭目，日久不愈。

【加减】 若热者，减人参。

05906 羊肝煎

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【异名】 羊肝羹（《医统》卷八十七）。

【组成】 羊肝（细切）一具 羊脊膏肉（细切）一条 陈曲末二两 枸杞根五两（切，以水一斗二升，煮取九升，去滓）

【用法】 上四味，先以枸杞根汁重煎令沸，次入肝肉、曲末，并葱豉汁调和，渐渐煎如稠糖，分作三服，空腹、日午、夜卧食之。

【主治】 ①《圣济总录》：虚劳。②《医统》：老人虚损。

05907 羊角散

【方源】 方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一八八。

【组成】 桂心一两 羊角二枚（炙令黄焦）

【用法】 上为末。每服二钱，以糯米粥饮调下，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：卒吐血。②《普济方》：吐血，咳喘上气。

05908 羊肾丸

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】 羊肾二对（去脂膜，切碎，焙干） 人参（去芦头） 白茯苓 白术各一两 桂心 熟干地黄各二两 肉苁蓉（汤浸一宿，刮去皱皮，炙干） 当归 蛇床子各二分 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 薯蓣 黄耆 泽泻 山茱萸 白芍药 吴茱萸（汤浸七遍，焙干微炒） 菟丝子（酒浸三日，晒干，别捣为末） 鹿茸（去毛，涂酥，炙微黄） 远志（去心） 附子（炮裂，去皮脐） 牡丹 石斛（去根，锉） 牛膝（去苗） 诃黎勒（煨，用皮）各一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日三十丸，空腹以暖酒送下，晚食前再服。

【功用】 补益骨髓，悦泽肌肤。

【主治】 虚劳羸瘦。

05909 羊肾丸

【方源】《济生》卷一一。

【组成】 熟地黄（酒蒸，焙） 杜仲（去皮，锉，炒断丝） 石斛（去根） 菟丝子（淘净，酒浸焙干，别研） 黄耆（去芦） 川续断（酒浸） 桂心（不见火） 磁石（煅，醋淬） 川牛膝（去芦，酒浸） 沉香（别研） 五加皮（洗） 山药（锉，炒）各一两

【用法】 上为细末，雄羊肾两对，以葱、椒、酒煮烂，再加少酒，和药为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】 肾劳虚寒，面肿垢黑，腰脊痛，不能久立，屈伸不利，梦寐惊悸，上气，小腹急，痛引腰脊，四肢苦寒，小便白浊。

05910 羊肾丸

【方源】《普济方》卷一八〇引《郑氏家传渴浊方》。

【组成】 大鸡头二两一分 家韭子 牡蛎（煅）各二两 半夏 木猪苓（赤者，同半夏炒）各三两

【用法】 上为末，烂煮羊肾去膜，同药末为丸，如梧桐子大。入麝香一钱或朱砂为衣，瓦器盛之，每服二十丸，煎猪苓汤送下。

【主治】 白浊。

05911 羊肾丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】 鹿茸 菟丝子各一两 茴香五钱

【用法】 上为末，以羊肾二对，入酒煮烂，为丸，阴干。每服三十五丸，酒送下，一日三次。

【主治】 肾虚腰痛，不能反侧。

05912 羊肾汤

【方源】《外台》卷十七引《经心录》。

【组成】 羊肾一具 芎藭一两 茯苓二两 人参三两 附子一两（炮） 桂心二两 牡丹皮一两 磁石二两 当归二两 干地黄三两 大枣五枚

（擘） 牡荆子一两（碎）

【用法】 上切。以水一斗七升，煮药、肾取一斗，去肾，煮取四升，分四服，昼三夜一。

【主治】 肾气不足，耳无所闻。

【宜忌】 忌猪肉、冷水、生葱、胡荽、芜荑、酢物。

05913 羊肾汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】 磁石三两（煅，醋淬） 桂（去粗皮） 甘草（炙，锉）各一两 五味子 白茯苓（去黑皮）各二两 牛膝（酒浸，切焙）一两半

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水二盏，先取羊肾一只，细切，煎三五沸，次下药，煎至一盏，去滓，空腹温服，良久再服。

【主治】 虚劳肾气不足，腰痛无力，手脚痿痛，状似骨蒸。

05914 羊肾羹

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 黄耆半两（锉） 羊肾一只（去脂膜，切） 杜仲半两（去粗皮，炙微黄，锉） 磁石五两（捣碎，水淘去赤汁，绵裹悬煎，不得到锅底） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）

【用法】 以水三大盏，先煮磁石，取汁二大盏；去磁石，下黄耆等，文煎，取一盏半；去滓，入羊肾、粳米一合，葱白、生姜、椒、盐、醋一如作羹法。空心服之，磁石重重用之无妨。

【主治】 风虚耳聋。

05915 羊肾羹

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】 羊肾（去筋膜，细切）一对 生山芋（去皮）四两 葱白一握（擘碎） 生姜（细切）一分

【用法】 作羹如常法。空腹食。

【主治】 耳聋耳鸣。

05916 羊乳丸

【方源】《准绳·女科》卷二。

【组成】 秦艽 柴胡 地骨皮 山茱萸肉 黄耆（蜜炙） 地黄（酒浸蒸过）各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，不拘时候，煎人参汤送下，一日三次。

【主治】 虚劳羸瘦。

【方论选录】《济阴纲目》：此方以黄耆补上焦元气，而配以地骨之苦寒，是补气不补火；以熟地补下焦之水，而配以山茱之温涩，是补水而又生肝；柴胡散结热之气，秦艽利一身之机；方以羊乳名者，以参、耆有羊肉之功也。

05917 羊肺汤

【方源】《外台》卷九引太医史脱方。

【组成】 款冬花一两 紫菀 干姜 细辛各一两 桂心 甘草（炙）各半两 五味子半斤 白前 食茱萸各半两 羊肺一枚（细切）

【用法】 上切。以水八升合煮，取三升，去滓，一服三合，每日三次。

【主治】 咳嗽。

【宜忌】 禁食盐、蒜、生菜、海藻、菘菜、生葱。

05918 羊肺汤

【方源】《外台》卷九引《古今录验》。

【组成】 钟乳五两 牡蛎（熬） 桂心各六两 射干 桃仁（去尖皮） 贝母 橘皮 百部根 五味子各三两 生姜六两 白石英 半夏（洗）各五两 款冬花 甘草（炙） 厚朴（炙）各二两 羊肺一具

【用法】 上切。先以水二斗三升，煮羊肺，取一斗，去肺，纳诸药，煮取三升，分四服，日三夜一。

【主治】 咳嗽昼夜无闲，息气欲绝，肺伤唾血。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、羊肉、饧、生葱。

05919 羊肺羹

【方源】《医方类聚》卷一三六引《食医心鉴》。

【组成】 羊肺一具

【用法】 上细切。葱白一握，于豉汁中煮食之。

【主治】 小便多数，瘦损无力。

05920 羊胃汤

【方源】《外台》卷二十引《张文仲方》。

【组成】 羊胃一枚（切） 白术一升（切）

【用法】 上以水一斗，煮取九升，服一升，每日三次，三日尽，更作两剂。

【主治】 久病羸瘦，不生肌肉，水气在胁下，不能食，四肢烦热。

【宜忌】 忌桃、李、雀肉等。

05921 羊骨汤

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】 羊脊骨一具（连喉者） 豉 白粟米各一升 薤白（切）一把

【用法】 上药各分作两度煮，每度用水六升，煮至三升，去滓，渴即温汁量意饮之，以愈为度。

【主治】 消渴。

05922 羊骨饮

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】 羊脊骨一具（捶碎） 磁石二两半（碎） 白术一两半 黄耆 干姜（炮） 白茯苓（去黑皮） 桂（去皮）各半两

【用法】 上药除羊骨外，锉如麻豆大。先以水五升，煮骨取二升，去骨纳药，煎取一升，去滓，空腹分温三服。

【主治】 肾虚寒，耳鸣多唾。

05923 羊胆丸

【方源】《中国药典》一部。

【组成】 羊胆干膏 53 克 百部 150 克 白及 200 克 浙贝母 100 克 甘草 60 克

【用法】 以上五味，甘草、白及各为细末，其余羊胆干膏等三味为细末，过筛，混匀。取部分羊胆干膏等粉末起模，剩余的粉末与白及粉末混匀，用水为丸，再用甘草粉末包衣，干燥。口服，一次 3 克，每日三次。

【功用】 止咳化痰，止血。

【主治】 咳嗽，痰中带血；百日咳。

05924 羊胆膏

【方源】《外台》卷三十二引《古今录验》。

【组成】 羊胆一枚 猪脂一合 细辛一分

【用法】 上以羊胆煎，三上三下膏成。夜涂敷，早起以浆水洗去。

【主治】 面皯皰，及产妇黑皯如雀卵色。

05925 羊胆膏

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】 羊胆一枚 片脑末一分

【用法】 腊月取羊胆，入片脑末，置风处挂干。用时以凉水化开，频敷患处，内服槐子酒或加味泻肝汤，若得熊胆更佳。如眼痛者，点眼。

【主治】 痔漏，下疳疮；眼痛。

05926 羊脊粥

【方源】《养老奉亲》。

【异名】 羊脊髓粥（《医便》卷四）。

【组成】 大羊脊骨一具（肥者，捶碎） 青粱米四合（净淘）

【用法】 以水五升，煎取二升汁，下米煮作粥，空心食之。可下五味常服。

【主治】 老人脾胃气弱，劳损不下食。

05927 羊脂汤

【方源】《千金翼》卷七。

【组成】 羊脂五两 当归 干姜 黄柏 黄连各三两

【用法】 上㕮咀。以水九升，煮取三升，去滓，纳脂令烊，分三服。

【主治】 产后下痢。

05928 羊脂粥

【方源】《寿世青编》卷八。

【组成】 羊脂 粳米 葱白 生姜 椒 豉

【用法】 煮粥。日食一具羊脂。

【主治】 半身不遂，中风。

05929 羊脏羹

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】 羊肝 羊肚 羊肾 羊心 羊肺各一具（汤洗净） 牛酥一两 胡椒一两 荜茇一两 豉一合 陈皮二钱（去白） 良姜二钱 草果一两个 葱五茎

【用法】 先将羊肝等慢火煮令熟，将汁滤净，和羊肝等并药一同入羊肚内缝合，令绢袋盛之，再煮熟，入五味，旋旋任意食之。

【主治】 肾虚劳损，骨髓伤败。

05930 羊蹄散

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】 白矾半两 羊蹄根四两（制）

【用法】 上为末。入米醋小半盏同擦，不住擦之。后觉癣极痒，至痛即止。隔日洗去再擦。

【主治】 小儿顽癣久不愈。

05931 羊髓煎

【方源】《千金翼》卷十九。

【异名】 甘草汤（《普济方》卷一七八）。

【组成】 羊髓二合（无即以酥代之） 白蜜二合 甘草一两（炙，切）

【用法】 以水三升，煮甘草取一升，去滓，纳蜜、髓，煎令如饴。含之尽，复含。

【功用】 濡咽。

【主治】 消渴口干。

05932 羊髓膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】 羖羊胫骨髓二两 丹砂（研）半两 鸡子白二枚

【用法】 先将髓并丹砂入乳钵中为末，以鸡子白调和令匀，入盒中盛。每用时，先以浆水洗面，后涂之。

【功用】 润泽面容。

【主治】 面䵟黯。

05933 羊肉索饼

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】 羊肉四两（炒作臠） 白面半斤 陈橘皮一分（汤浸，去白瓤，焙） 生姜汁一合

【用法】 上以橘皮末及生姜汁和面，作索饼，子

豉汁中煮熟。入臛食之。

【主治】 五噎，胸膈妨塞，饮食不下，瘦弱无力。

05934 羊胫灰丸

【方源】《济生》卷四。

【异名】 理脾丸(《得效》卷七)。

【组成】 厚朴（去皮取肉，姜汁炒）二两 羊胫（炭火煅过通红，存性） 一两

【用法】 上为细末，白水面糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心米饮送下。

【主治】 思虑伤脾，脾不摄精，遂致白浊。

【备考】 本方方名，《医方类聚》引作“羊胫炭丸”。

05935 羊脊骨汤

【方源】 方出《证类本草》卷十七引《食医心镜》，名见《普济方》卷三十一。

【组成】 羊脊骨一具（嫩者）

【用法】 捶碎，烂煮，和蒜齑空腹食之，兼饮酒少许。

【主治】 肾脏虚冷，腰脊转动不得。

05936 羊蹄根酒

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 羊蹄根六两 75%酒精十二两

【用法】 将羊蹄根碾碎置酒精内，浸泡七昼夜，过滤去滓备用。用棉棒或毛刷蘸药水涂于患部。

【功用】 杀虫止痒。

【主治】 手癣（鹅掌风），甲癣（鹅爪风），落屑性脚癣（脚蚬症），体癣（钱癣），神经性皮炎（干癣）。

【宜忌】 慎勿入目。

05937 羊蹄根酒

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 羊蹄根（土大黄）180 克 土槿皮 180 克 制川乌 槟榔 百部 海桐皮 白蘚皮 苦参各 30 克 蛇床子 千金子 地肤子 番木鳖 蛇衣 大枫子各 15 克 蜈蚣末 9 克 白信 6 克 斑蝥 6 克（布包）

【用法】 以上各药加入高粱酒 2500 毫升，密封大口瓶内，浸半月至一月后，去药滓备用。用毛笔蘸药水外涂。

【功用】 灭菌止痒。

【主治】 体癣，股癣，神经性皮炎。

05938 羊肉当归汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】 当归四分 干姜 橘皮 黄耆 芍药 芎藭 桂心 独活 防风各一分 人参 吴茱萸 甘草 干地黄 茯苓各一分 生姜六分 大枣三十枚 羊肉半斤

【用法】 上㕮咀。以水一斗半煮肉，取一斗二升，出肉，纳诸药，煮取三升，分三服，每日三次。覆取温暖。

【主治】 腹冷绞痛。

【方论选录】《千金方衍义》：《金匮》当归生姜羊肉汤专主产后腹中疠痛及寒疝腹胁急痛，《千金》本之以治腹中绞痛。盖绞痛与疠痛虽有冲击结滞之不同，而和营散结之治则一。如本方合小建中、黄耆建中以治虚劳里急诸不足，合理中、八珍以治气血虚寒诸不足，合吴茱萸汤、三物大建中以治胃虚呕逆诸不足；建中方中除去胶饴之粘滞，理中、八珍方中除去白术之壅闭，大建中方中除去蜀椒之耗气，更加独活、防风，佐黄耆以御外内合邪，橘皮佐姜、桂以涤涎饮下滞气也。

05939 羊肉杜仲汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】 羊肉四斤 杜仲 紫菀各三两 五味子 细辛 款冬花 人参 厚朴 芎藭 附子 草薢 甘草 黄耆各二两 当归 桂心 白术各三两 生姜八两 大枣三十枚

【用法】 上㕮咀，以水二斗半煮肉，取汁一斗五升，去肉纳药，煎取三升半，去滓，分五服，日三夜二。

【主治】 产后腰痛咳嗽。

【方论选录】《千金方衍义》：羊肉杜仲汤合耆而用参附、耆术附、桂附、姜附，兼附子理中汤、甘草附子汤等方之制，峻用辛温以开下著之痹；细辛、甘草以散上浮之咳；姜、桂辛散，五味收之；耆、术气壅，厚朴泄之；草薢、杜仲，湿著腰痛之向导；紫菀、款冬，风淫咳喘之专司。种种主治，仍借当归生姜羊肉汤鼓舞之力。

05940 羊肉扶羸丸

【方源】《三因》卷十一。

【组成】 精羊肉一斤半（微断血脉，焙干取末）四两 白姜（炮）一两 川椒（去目，炒出汗）肉豆蔻（煨）各一两 木香一分 附子（炮，去皮脐） 神曲（炒）半两

【用法】 上为末，煮粟米饮为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米汤送下。

【主治】 脾胃不和，不进饮食，脏腑虚滑。

【备考】 老人虚人尤宜服之。

05941 羊肉黄耆汤

【方源】《千金》卷二。

【组成】羊肉三斤　黄耆三两　大枣三十枚　茯苓　甘草　当归　桂心　芍药　麦门冬　干地黄各一两

【用法】上㕮咀。以水二斗煮羊肉，取一升，去肉纳诸药，煎取三升，去滓，分三服，每日三次。

【功用】补益。

【主治】产后虚乏。

【方论选录】《千金方衍义》：前羊肉汤以有腹中绞痛，故用姜、芎之辛以散之；此无腹中绞痛，专宜补虚，故用黄耆、茯苓、门冬、大枣，滋养营气，可无藉于辛散也。

05942　羊肝明目丸

【方源】《医级》卷八。

【异名】羊肝丸(《饲鹤亭集方》)。

【组成】黄连三两　甘菊　龙胆　石决（煅）　人参　当归　熟地　枸杞　麦冬　牛膝　青盐　黄柏　柴胡　防风　羌活各八钱　肉桂四钱　羯羊肝一具（蒸捣）

【用法】上为末，炼蜜和肝为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，白汤送下。

【主治】①《医级》：肝虚风热，冷泪赤涩，内外障眼。②《饲鹤亭集方》：肝虚风热，目赤肿痛，内障青盲，昏如云雾，怕火羞明。

05943　羊肝退翳丸

【方源】《疡医大全》卷十一。

【组成】怀生地　熟地黄　白茯神（人乳拌，蒸晒）　怀山药（炒）各三两　甘枸杞　夜明砂（淘净）各四两　木贼草（蜜水拌炒）　蜜蒙花（蜜拌炒）　青葙子各二两　草决明二两五钱（捶碎，用水浸拌炒）　川黄连八钱（白酒浸一宿，微炒）　黑羊肝一具（去外膜，蒸熟）

【用法】上为粗末，同羊肝捣匀，再烘晒令干，再为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三钱，空心淡盐汤送下。

【主治】雀盲眼，一切昏花老眼。

【宜忌】忌萝卜、胡椒、鸡鸭蛋。

05944　羊肝猪胆丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】羊肝一具（切片晒干，冬日可用慢火焙干）

【用法】上为细末，用猪胆汁和为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服二钱，开水送下，一日二次。

【主治】有热而益甚，目瞳散大昏耗，视物乏力。

【备考】此方若用熊胆为丸更佳。

05945　羊角补中汤

【方源】《医级》卷八。

【组成】补中益气汤加木香　茴香　羯羊角

【主治】中虚兼疝，偏坠胀疼。

【加减】左偏胀者，加右角；右偏胀者，加左角。

05946　羊肾苁蓉羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊肾一对（去脂膜，细切）　肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，细切）

【用法】上药相和作羹，著葱白、盐、五味末等，一如常法，空腹食之。

【主治】五劳七伤，阳气衰弱，腰脚无力。

05947　羊肾补肾汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】羊肾汤(《圣济总录》卷八十六)。

【组成】羊肾一具（细切）　磁石（碎绵裹）　白术各八两　黄耆　茯苓　干姜各四两　桂心三两

【用法】上切。以水三斗，煮取七升，绞去滓，分服一升，昼四服，夜三服，燥器贮之，六月减水。

【主治】肾虚寒损，耳鸣好唾，欠呿委顿。

【宜忌】忌生葱、桃李、雀肉、酢等物。

05948　羊肾附子丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】附子一两半（炮裂，去皮脐）　磁石一两（烧令赤，醋淬七遍，捣碎研，水飞过）　牛膝一两（去苗）　菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末）　肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）　远志一两（去心）

【用法】上为末。用羊肾五对，去脂膜，细切烂研，入酒三升，于银铛中，微火煎如膏，入药末为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下，盐汤送下亦得。

【主治】劳聋。

05949　羊骨补肾汤

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】羊胫骨五两（炙黄，锉）　磁石（火煅，醋淬二七遍）　白术各二两　黄耆（锉）　干姜（炮）　白茯苓（去黑皮）各一两　桂（去粗皮）三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，分温二服，空腹，夜卧各一服。

【主治】肾虚寒，耳鸣好睡，日渐痿损。

05950 羊蹄根涂方

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】羊蹄根（捣绞自然汁）半合　生姜（研绞自然汁）半合　石硫黄四钱（研如粉）

【用法】上将二汁与硫黄末同研，令粘。涂患处。一日不得洗。

【主治】紫癜风。

05951 米饮

【方源】《食鉴本草》。

【组成】杵头糠（炒）一两

【用法】煮米饮调匀，空心服。

【主治】咽中作梗，下食则塞，反胃不止。

05952 米莲散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】糯米五钱　莲子心七枚

【用法】上为末。酒服；或以墨汁作丸服之。

【主治】吐血。

05953 米黄散

【方源】《济阳纲目》卷三十四。

【组成】白术一钱半　苍术一钱三分　陈皮　白芍药　神曲　麦芽　山楂　茯苓　石膏各一钱　厚朴七分　藿香五分　甘草三分

【用法】水煎，临服入砂糖一匙调服。

【主治】黄病，爱吃生米。

05954 米糖膏

【方源】方出《景岳全书》卷六十四，名见《仙拈集》卷四。

【组成】米糖（即胶饴）

【用法】以碗盛，于饭锅内蒸化，先用花椒、荆芥、防风等药煎汤洗疮净，乃将胶饴薄摊疮上，外以软竹箅盖定，用绢缚之。

【主治】烂腿疮久不愈。

05955 军持露

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】没药　乳香　儿茶　轻粉各等分

【用法】上为末。每用三至五钱，水煎黄色洗之，或猪蹄汤煎洗尤佳。

【功用】生肌。

【主治】溃疡腐尽，见新肉珠时。

05956 军门一笑膏

【方源】《疡医大全》卷七引《邵氏秘书》。

【组成】白芷　川萆薢　防风　罂粟壳　甘松　川羌活　三奈　川独活　藁本　高良姜　官桂　大茴香　秦艽　小茴香　麻黄　威灵仙　川椒各二两　真附子　草乌　天南星　干姜　穿山甲　大黄　闹杨花（火酒拌炒）　半夏各四两　老葱　老姜各二斤　制松香四斤　土硫黄　密陀僧各一斤　广木香五钱　乳香（去油）　没药（去油）各三钱　潮脑一两　麝香三钱

【用法】老姜以上各药用麻油三斤、桐油半斤浸，熬枯去滓，复入净锅内，熬至滴水成珠；入制松香、土硫黄、密陀僧，为细末，收成膏冷定；再下广木香、乳香、没药，为细末，搅匀；再下潮脑、麝香，和匀，收贮。任摊用。

【主治】寒湿诸疯疼痛，贴骨痈疽。

05957 军门立效散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】皂角刺三钱（炒热入）　乳香五七分（炒香化再入）　天花粉三钱　甘草节（一寸长）九个　川椒三十粒

【用法】黄酒二钟，煎一钟，温服。

【主治】①《外科大成》：痈疽诸毒，对口附骨疽。②《疡医大全》：乳痨。

【宜忌】已溃者不宜服。

05958 军中一捻金

【方源】《回春》卷八。

【组成】矿石灰（不拘多少，炒研）　生韭菜（连根）

【用法】同捣作饼，阴干为末。掺上。要端午日制。

【功用】止血生肌。

【主治】金疮伤破出血并狗咬。

05959 异功散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】五味异功散（《疠疡机要》卷下）。

【组成】人参（切去顶）　茯苓（去皮）　白术　陈皮（锉）　甘草各等分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜五片，大枣两个，同煎至七分，食前温服，量多少与之。

【功用】益气补中，理气健脾。

①《小儿药证直诀》：温中和气。②《保婴撮要》：温补脾胃，调补元气。③《杂病源流犀烛》：调气益气。

【主治】脾虚气滞。饮食减少，胸脘痞闷，食入作胀，大便溏薄，神疲气短，身体羸瘦，或面部浮肿者。

①《小儿药证直诀》：小儿虚冷吐泻，不思乳食。②《女科撮要》：脾胃虚寒，饮食少思；或久患咳嗽；或腹满不食，面浮气逆。③《疠疡机要》：食

而难化，大便不实。④《保婴撮要》：脾胃虚弱，惊搐痰盛，睡而露睛，手足指冷，肺痿喘咳短气；或胃气虚寒，面色㿠白，目无睛光，口中气冷，不食吐水，肌瘦腹痛；或禀赋虚弱，肌肉消薄，荣卫不足而患疮疡，不能收口；或虚热上攻，口舌生疮。⑤《明医指掌》：小儿未断乳，母腹有胎儿，饮其乳而患鼓病，羸瘦骨立，发黄壮热，大便不调。

【方论选录】《医略六书》：人参扶元气以补肺，白术燥湿气以健脾，茯苓渗湿清治节，橘红利气化痰涎，炙甘草以益胃气，姜汤煎服，使脾气鼓运，则痰涎自化而肺络清和。

【临证举例】①咳嗽《校注妇人良方》：一产妇咳而胸满不食，涕唾，面肿气逆，此病在胃而关于肺，用异功散而愈。②喘《保婴撮要》：一小儿外感风邪，服表散之剂，汗出作喘，此邪气去而脾肺虚也。用异功散而汗喘止，再剂而乳食进。③泄泻《保婴撮要》：一小儿患泻，乳食不化，手足指冷，服消乳丸，食乳即泻，余用五味异功散加木香，母子服之而愈。④发热《保婴撮要》：一小儿发热，饮食少思，大便不实，常服芦荟等丸，视其鼻赤，此寒冷之剂复伤脾土而虚热也，用五味异功散，数剂而愈。

05960 异功散

【方源】《幼幼新书》卷二十四引《张氏家传》。

【组成】 盆消一两 甘草（炙）六钱 诃子肉 白僵蚕 贯众 马勃 蛇蜕（点油醋，慢火炒黄）各半两 硼砂 玄精石各一两

【用法】 上为细末。每服一字，以芦管吹喉内；缠喉风，每服半钱，以磨刀水调下；寻常置舌根下。

【主治】 缠喉风，痄腮，喉闭，及咽喉一切患。

05961 异功散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】 浮小麦不以多少（拣净，炒令焦，薄纸衬于地上放冷）

【用法】 上为细末。每服三钱，用煮软猪嘴薄切数片，临睡捏药吃；不食荤者，用白汤点服。

【主治】 盗汗不止。

05962 异功散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【异名】 正气散。

【组成】 人参 白术 茯苓 甘草（炙） 白扁豆 薯蓣各等分

【用法】 上为末。每服二钱，用水六分，加生姜二片，红枣一枚，煎至四分服，不拘时候。

【功用】 温中和气。

【主治】 小儿吐泻思食，及小儿虚冷病。

【加减】 虚冷泄泻，加附子；风证，加天麻；病，加罂粟壳。

05963 异功散

【方源】《中国医学大辞典》引《疫痧草》。

【异名】 拔疔散、咽喉异功散（《疡科纲要》卷下）。

【组成】 斑猫（去翅足，糯米炒黄，去米）四钱 血竭 没药 乳香 全蝎 玄参各六分 麝香三分

【用法】 共为细末，瓷瓶收藏，封口，切勿走气。用寻常膏药一张，取此散如黄豆大，贴项间；患左贴左，患右贴右，患中贴中。三四时起泡，用银针挑破即愈。凡阴证起泡更速。

【功用】《中药成方配本》：吊泡拔毒。

【主治】 烂喉风，喉闭，双单喉蛾。

【备考】 本方方名，《中药成方配本》引作“贴喉异功散”；《疡科纲要》有冰片。

05964 异香散

【方源】《局方》卷三（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 石莲肉（去皮）一两 莲蕊术（煨） 京三棱（炮） 益智仁（炮） 甘草（煨）各六两 青皮（去白） 陈皮（去白）各三两 厚朴（去粗皮，姜汁炙）二两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，生姜三片，大枣一个，盐一捻，煎至七分，通口服，不拘时候；盐汤点或盐酒调，皆可服。

【功用】 破癥瘕结聚，消宿冷沉积，调五脏三焦，和胃进食。

【主治】 ①《局方》（吴直阁增诸家名方）：肾气不和，腹胁膨胀，痞闷噎塞，喘满不快，饮食难化，噫气吞酸；一切气痞，腹中刺痛。②《得效》：忧郁气滞不散，腹中膨满刺痛，下痢不止。

05965 异效散

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】 京三棱（锉，汤浸一宿，焙干） 白术各三两 甘草（炙，锉）二两 麦芽（微炒） 陈曲（微炒）各一两 高良姜半两 肉豆蔻二枚（去核） 青橘皮（汤浸，去白，焙） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各一两 草豆蔻三枚（去皮）

【用法】 上为细散。每服二钱匕，入盐少许，空心、食前沸汤点服。

【主治】 脾气虚弱，饮食不美，心胸膨胀，胁肋痞满，噫气不通，满闷噎塞，积滞不消，结聚癖

瘕。

05966 异方油煎散

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】川乌头（炮，去皮） 白芍药 五加皮 牡丹皮 海桐皮各等分

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，油浸开通钱一文，煎至六分，去滓温服，每日三次，不拘时候；如常服，用油浸五七文钱，煎药用。

【主治】妇人血风劳气攻注，四肢腰背疼痛，呕吐恶心，不思饮食，日渐瘦弱，面色萎黄，手脚麻痹，血海冷败。

05967 异香四神散

【方源】《医方类聚》卷二一二引《仙传济阴方》。

【异名】四神汤。

【组成】香附子（去毛，炒）半斤 乌药（炒）四两 甘草（炙）一两

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，去滓，空心温服；或用葱白三寸同煎。

【功用】调血顺气安肠。

【主治】妇人室女血气不调，及胎前产后诸疾。

【加减】妇人气血不顺，心胸痞满，加紫苏叶；惊忧闷气，喜怒伤神，心满腹痛，面目虚浮，及一切气疾，加石菖蒲；血脉不调，血膈翻胃，呕吐饮食，及脾胃感冷，加老姜一块（炒令黑，切作五片）、盐少许；血积、血晕闷、血癥、血刺痛，煎熟加好醋一呷；经血行时，被风雨或惊忧相并，经候不时，而成搐脉，腹痛紧张，腰腿疼痛，加炒茴香一撮；血气不顺，喘满气急，面目浮肿，加生姜、紫苏叶；唾血，咯红痰，喉中腥气，加黄桑叶三四皮，花桑尤佳；血涩气秘，大便结滞不通，加枳壳数片或去白青皮；经络感热，经水沸溢，血脉妄行，而成热崩，加生地黄；败血攻冲脾胃，血噎，气血嗽逆，加生姜三片、柿蒂五个；血气皆闷，心腹刺痛，加良姜、赤芍药，以水、酒各半盏同煎；胎娠伤食，胸膈不快，噎气食臭，心腹紧满，加南木香或缩砂仁；子悬，加姜片、紫苏；寒疝，加炒吴茱萸；癫病，先用此汤，兼以槲树根（或枝梗）同葱白以花椒煎汤，熏洗子肠。

【备考】《东医宝鉴·杂病篇》引本方有陈皮三钱。

05968 异类有情丸

【方源】《韩氏医通》卷下。

【组成】鹿角霜（以角之新者，寸截，囊置长流水中七日，瓦缶水煮，每角一斤，入黄蜡半斤，缶口用露酒一壶掩之，别沸流水旋添，勿令下竭，桑柴火足十二时，其角软矣，竹刀切去黑皮，取白者，舂细为霜）三两六钱 鹿茸（新如紫茄者，熏干，酒洗数过，酥油涂，炭火炙令透，为细末）二两四钱 龟版（八字文具者，醇酒浸七日，酥炙透黄）三两六钱 虎胫骨（新而真者，长流水浸七日，蜜酥和，炙透）二两四钱

【用法】上为极细末，用水火炼白蜜，入猪脊骨髓九条，同舂剂为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心盐汤送下。

【主治】丈夫中年觉衰。

【加减】如厚味兽饮之人，加猪胆汁一二合。

05969 导散

【方源】《外台》卷三十四引《素女经》。

【组成】皂荚（炙，去子皮） 吴茱萸 当归各一两 蜀椒（汗）各二两 细辛（熬） 矾石（烧）五味子各三分 大黄 戎盐各二两 干姜二两

【用法】上为散。以轻绢袋如指大，长三寸，盛药令满，纳阴中，坐卧随意，勿行走，小便时去之，别换新者。

【主治】妇人脂瘕，腹中有块，致绝不复生；及未曾生。

05970 导气丸

【方源】《医方大成》卷六引《澹寮方》。

【组成】青皮（水蛭炒赤，去蛭） 莪术（虻虫炒，去虻） 三棱（干漆炒，去漆） 槟榔（斑蝥炒，去蝥） 干姜（硇砂炒，去砂） 茱萸（牵牛炒，去牛） 附子（盐炒，去盐） 赤芍（川椒炒，去椒） 胡椒（茴香炒，去茴香） 石菖蒲（桃仁炒，去仁）

【用法】上各锉，与所注药炒熟，去水蛭等并不用，只以青皮等为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五丸至七丸，空心紫苏汤送下。

【主治】诸痞气塞，关格不通，腹胀如鼓，大便虚秘；又治肾气、小肠气等。

【方论选录】《医方考》：青皮、莪术、三棱、菖蒲，气积药也，炒以水蛭、虻虫、干漆、桃仁，则逐败血矣；干姜、附子、胡椒、茱萸，温中药也，炒以硇砂、食盐、茴香、牵牛，则软坚而疏利矣；槟榔炒以斑蝥，下气者得破气者而益悍；赤芍药炒以川椒，泻肝者得疏肝者而益利。制度之工如此，以之而治气实有余之证，斯其选矣。

05971 导气丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 木香 槟榔 火麻仁 枳壳

【用法】 上将枳壳每个切作四片，用不蛀皂角三寸、生姜五片、巴豆三枚（略捶碎，不去壳油），用水一盏，将枳壳同煎熟，滤去三味，不用，只将枳壳锉细，焙干为末，入前三味末，炼蜜为丸。以蜜汤送下，不拘时候。

【主治】 大便秘结。

05972 导气丸

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】 槟榔一两（斑蝥炒） 厚朴一两（干姜炒） 三棱一两半（干漆炒） 蓬术一两半（虻虫炒） 吴茱一两（牵牛炒） 青皮一两（水蛭炒） 黄芩一两（大黄炒） 赤芍一两（川椒炒） 楂肉二两（草果炒） 菖蒲一两（桃仁炒）

【用法】 炒熟，拣去拌药，为末，红酒为丸。每服一二钱，以紫苏汤送下。

【功用】 攻坚破结。

【主治】 积结于中，日久不能消化，腹胀坚塞，便闭形实，脉实者。

【方论选录】 槟榔破结气，斑蝥拌炒，以攻发坚垒；赤芍破血结，川椒拌炒，以驱逐寒积；厚朴散窒塞，干姜拌炒，以开发寒滞；青皮破肝气，水蛭拌炒，以消磨血积；楂肉消肉积，草果拌炒，以扫荡食积；吴茱平逆气，牵牛拌炒，以通利饮积；三棱攻坚积，干漆拌炒，以迅扫瘀结；蓬术破积坚，虻虫拌炒，以蠹动血结；黄芩清郁热，大黄拌炒，以推荡积热；菖蒲通窍门，桃仁拌炒，以润燥开结；酒丸紫苏汤下，使结散积消，则气化调和而诸结自解，大便无不通，腹胀坚塞无不退矣。此攻坚破结之剂，为腹胀坚塞之专方。

05973 导气汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 芍药一两 当归五钱 大黄 黄芩各一钱半 黄连 木香各一钱 槟榔一钱

【用法】 上为末。每服三五钱，水一盏，煎至七分，去滓温服；如未止，再煎服，不后重则止。

【主治】 下痢脓血，里急后重，日夜无度。

05974 导气汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 导气散（《傅青主男女科·男科》卷下）。

【组成】 黄耆八钱 甘草六钱 青皮四钱 升麻 柴胡 当归梢 泽泻各二钱 橘皮一钱 红花少许 五味子一百二十个

【用法】 上㕮咀，分作四服。每服水二大盏，煎至一盏，去滓，食前热服。

【主治】 两腿麻木沉重。

【备考】 本方方名，《医学纲目》卷十二引作"除湿补气汤"。

05975 导气汤

【方源】《医方集解》。

【组成】 川楝子四钱 木香三钱 茴香二钱 吴茱萸一钱（汤泡）

【用法】 长流水煎服。

【主治】 ①《医方集解》：寒疝疼痛。②《医方简义》：偏坠、小肠疝痛之证。

【方论选录】 此足厥阴、少阴药也。川楝苦寒，能入肝舒筋，使无挛急之苦，又能导小肠、膀胱之热从小水下行，为治疝之主药；木香升降诸气，通利三焦，疏肝而和脾；茴香能入肾与膀胱，暖丹田而祛冷气；吴茱萸入肝肾气分，燥湿而除寒。三者皆辛温之品，用以宣通其气，使小便小利，则寒去而湿除也。

05976 导气饮

【方源】《袖珍方》卷二引《仁存方》。

【组成】 羌活 独活 木瓜 薏苡仁 青皮 陈皮 桑白皮 大腹皮 枳壳 槟榔 青木香 紫苏 甘草 大腹子 木通 赤茯苓各等分

【用法】 上㕮咀。每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。

【主治】 寒湿脚气，肿赤疼痛，心腹膨胀，头面手足浮肿，身体腰背疼痛。

【加减】 热，加大黄；寒，加苍术。

05977 导水散

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 当归二钱 瞿麦三钱 车前子二钱 滑石三钱 赤茯苓三钱 泽泻二钱 猪苓二钱 木通二钱 石莲子（去壳）一钱 山栀子三钱 黄连六分 黄柏一钱五分（酒炒） 知母一钱五分 甘草八分

【用法】 上锉。灯心煎，空心温服。

【主治】 膀胱有热，小便闭而不通。

05978 导水散

【方源】《辨证录》卷九。

【异名】 导水汤（《医学集成》卷三）。

【组成】 王不留行五钱 泽泻三钱 白术三钱

【用法】 水煎服。

【功用】 逐水，利膀胱。

【主治】 膀胱火旺，小肠不通，眼睛突出，面红耳热，口渴引饮，烦躁不宁。

05979 导赤丸

【方源】《局方》卷六（续添诸局经验秘方）。

【组成】赤芍药　茯苓（去皮）　滑石各四两　生干地黄（焙）　木通（去节）各半斤　大黄（炒）十五两　山栀子仁（炒）十二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食后用温热水吞下。

【功用】排脓，内消肿毒，疏导心经邪热。

【主治】心肾凝滞，膀胱有热，小便不通，风热相搏，淋沥不宣；或服补药过多，水道壅涩，出少起数，脐腹急痛，攻注阴间；或心肺壅热，面赤心忪，口干烦渴；及痈肿发背，血脉瘀闭；内蕴风热，五般淋疾。

05980　导赤汤

【方源】《同春》卷四。

【组成】木通　滑石　甘草梢　黄柏　茯苓　生地黄　枳壳　白术　栀子

【用法】水煎，空心服。

【主治】溺如米泔色。

05981　导赤散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】导赤汤（《外科证治全书》卷五）。

【组成】生地黄　甘草（生）　木通各等分（一本不用甘草，用黄芩）

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，入竹叶同煎至五分，食后温服。

【功用】《方剂学》：清热利水。

【主治】心经有热或心移热于小肠。口渴面赤，心胸烦热，渴欲冷饮，口舌生疮；小便赤涩，尿时刺痛。

①《小儿药证直诀》：心热目内赤，目直视而搐，目连眨而搐；视其睡，口中气温，或合面睡，及上窜咬牙。②《局方》（淳祐新添方）：大人小儿心经内虚，邪热相乘，烦躁闷乱；传流下经，小便赤涩淋涩，脐下满痛。③《保婴撮要》：心经有热盗汗，小肠实热生疮，作渴发热，小便秘赤。④《幼科发挥》：心热夜啼，急惊。⑤《寿世保元》：麻疹已出，谵语，小便闭塞。⑥《证治汇补》：痈证咬牙者。⑦《金鉴》：热气熏蒸胃口，以致满口糜烂，甚于口疮，色红作痛，甚则连及咽喉，不能饮食；心火刑金，火热喘急；孕妇因膀胱水病热甚尿涩而少腹作疼。

【方论选录】①《医方考》：是方也，生地黄可以凉心，甘草梢可以泻热；佐之以木通，则直走小肠、膀胱矣。名曰导赤者，导其丙丁之赤，由溺而泄也。②《古今名医方论》：钱氏制此方，意在制丙丁之火，必先合乙癸之治。生地黄凉而能补，直入下焦，培肾水之不足，肾水足，则心火自降；佐以甘草梢，下行缓木之急，即以泻心火之实，且治茎中痛；更用木通盗小肠之滞，即以通心火之郁，是一治两得者也。此方凉而能补，较之用苦寒伐胃，伤其生气者远矣。③《医方集解》：此手少阴、太阳药也。生地凉心血，竹叶清心气，木通降心火入小肠，草梢达茎中而止痛。④《古方选注》：生地入胃而能下利小肠；甘草和胃而下疗茎中痛；木通、淡竹叶皆轻清入腑之品，同生地、甘草，则能从黄肠导有形之热邪入于赤肠，其浊中清者，复导引渗入黑肠而令气化，故曰导赤。⑤《小儿药证直诀笺正》：方以泄导小水为主，虽曰清心，必小溲黄赤短涩者可用。一本有黄芩，则清肺热，所以宣通水道之上源也。

【临证举例】①淋证　《广西中医杂志》（1965；2:17）：本方治疗小便淋证15例，其中砂淋5例，气淋7例，血淋3例，均见小便短涩，痛引脐中，甚则腰痛、腰胀，脉弦数或细数，苔白腻或薄黄等。以本方为基础，砂淋加海金砂、扁蓄、金钱草；血淋加白茅根、生侧柏、小蓟；气淋加川朴、香附。治疗结果：痊愈9例，好转6例。②血淋《南雅堂医案》：小溲血淋，茎中作痛，系热入膀胱，止血非其所宜，拟用钱氏导赤散加味治之。生地黄三钱，木通二钱、肥知母一钱五分，川黄柏一钱五分（炒），淡竹叶三钱，甘草梢八分，水同煎服。③产后尿闭　《江西中医药》（1959；8:28）：作者用本方治愈产后尿闭多例。本方列举两例典型病案，在使用本方前曾用过补中益气汤、生化汤、四物汤等，但疗效不显，改用本方后痊愈，且无再度复发现象。④梦遗　《金匮翼》：娄全善云，一壮年梦遗白浊，与涩精药益甚，改用导赤散大剂服之，遗浊皆止。⑤结膜充血　《上海中医药杂志》1982；（11:10）：张某某，男，25岁。主诉：两眼发红生眵将近一月，用过多种眼药水无效。检查：两眼睑结膜弥漫性充血，球结膜接近二眦部充血明显，舌赤，脉数。症由心火，治当清降。处方：导赤散加黄芩。5剂后复诊，充血减退，眼眵已无。再予原方5剂而愈。

05982　导赤散

【方源】《普济方》卷十六。

【组成】黄连（去须）　麦门冬（去心）　半夏（汤泡七次）　地骨皮（去木）　茯神（去木）　赤芍药　木通（去节）　生地黄（洗）　黄芩各一两　甘草（炙）半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎八分，去滓服，不拘时候。

【主治】 心脏实热，口干烦渴；或口舌生疮，惊怖不安。

05983 导赤散

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】 茯苓 猪苓 泽泻 桂枝 白术 甘草 滑石 山栀

【用法】 水二钟，生姜一片，灯心二十茎，入盐二字调服。

【功用】 利小便。

【主治】 伤寒小水不利，小腹满；或下焦蓄热，或引饮过多，或小水短赤而渴，或得病时无热，谵语烦躁不安，精采不与人相当，脉沉数者。

【宜忌】 汗后亡津液与阳明汗多者不宜服。

【加减】 中湿身目黄者，加茵陈；水结胸证，加木通、灯心。

【备考】《寿世保元》本方用茯苓三钱、猪苓二钱、泽泻二钱、桂枝八分、白术一钱五分、甘草八分、滑石三钱、山栀三钱。

05984 导经汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】 香附一钱 乌药一钱五分 当归一钱 木香（不见火） 甘草各五分

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人月候不调，气滞腹痛，及血海疼痛。

05985 导热散

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【组成】 侧柏叶 山栀 车前子 灯心 黄芩 滑石 乌梅 竹叶 大黄（炒） 猪苓 泽泻 蒲黄 赤茯苓 甘草

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 血淋，便血。

05986 导滞汤

【方源】《医方集解》。

【异名】 导气汤。

【组成】 芍药汤去桂、甘草，加枳壳。

【主治】 下痢脓血稠粘，腹痛后重而兼渴者。

05987 导滞汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】 香附（酒炒）二钱 玄胡（炒）一钱五分 归尾二三钱 木香四分 泽泻一钱半 红花（炒黄）一钱 淮牛膝（酒炒） 桃仁（去皮）各一钱五分 苏木一二钱

【用法】 水煎，加酒服。

【主治】 妇人经期，血因气滞而停，瘀积作痛，拒按属实者。

【宜忌】 以上诸证，必实见其有滞无虚，方可用之；若或兼虚，勿行克伐，以伤脾肾；血通瘀下，停药，勿得过服。

【加减】 火盛内热，血燥切痛者，加炒栀子二钱；微热者，加白芍一钱半；瘀极而大便燥结者，加大黄二三钱，不应，加芒消、蓬术；寒凝作痛，加肉桂一二钱，或吴茱萸一钱。

05988 导滞散

【方源】 方出《圣惠》卷六十七，名见《局方》卷八（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 当归三分（锉，微炒） 川大黄三分（锉碎，微炒）

【用法】 上为散。每服二钱，不拘时候以温酒调下。

【主治】 ①《圣惠》：从高坠下，大便下血不止。②《局方》（吴直阁增诸家名方）：重物压迮，或从高坠下，作热五内，吐血、下血，出不禁止；或瘀血在内，胸腹胀满、喘粗气短。

05989 导痰汤

【方源】《传信适用方》卷一引皇甫坦方。

【组成】 半夏四两（汤洗七次） 天南星一两（细切，姜汁浸） 枳实（去瓤）一两 橘红 赤茯苓一两

【用法】 上为粗末。每服三大钱，水两盏，生姜十片，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 痰凝气滞，胸膈痞塞，胁肋胀满，头痛吐逆，痰嗽喘急，不思饮食，以及头晕，不寐，短气，谵语，中风，痰厥，痰呃。

①《传信适用方》：痰厥，头昏晕。②《普济方》引《济生》：一切痰涎壅盛，或胸膈留饮，痞塞不通。③《普济方》：胁肋胀满，头痛吐逆，喘急痰嗽，涕唾稠粘，坐卧不安，饮食不思。④《玉案》：痰凝气滞。⑤《医林绳墨大全》：痰阻短气。⑥《伤寒大白》：心胃有痰火攻冲包络而谵语，口不渴，舌苔滑。⑦《杂病源流犀烛》：痰盛中风语涩，痰结痞逆而为痰呃。⑧《会约》：日夜不寐。

05990 导痰汤

【方源】《脉因症治》卷二。

【组成】 台芎二两 香附八两 陈皮 苏叶 干姜一两

【主治】 痰注胁痛。

05991 导痰汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】 陈皮二钱 半夏（姜炒）二钱 白茯苓（去皮）三钱 白术一钱五分（去芦） 香附二钱 青皮（去瓤） 二钱 黄芩（炒） 二钱 瓜蒌仁三钱 砂仁八分 黄连（姜炒） 二钱 甘草八分

【用法】 上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】 嗳气声闻于外，胸膈闷，舌黑，因气有痰者。

05992 导痰汤

【方源】《崇崖尊生》卷七。

【组成】 半夏二钱 南星 枳实 赤苓 橘红各一钱 炙草五分 白芥一钱

【主治】 痰饮胁痛，走注有声。

05993 导瘕囊

【方源】《重庆堂随笔》卷上。

【组成】 川椒 皂角各一两 细辛一两五钱

【用法】 上为末。以三角囊大如指者，长二寸，盛药纳入阴户内，欲便则出之，便已再纳。瘕化恶血而下，以温汤洗之。

【主治】 妇人血因寒阻，凝结成瘕。

【宜忌】 三日勿近男子。

05994 导气枳壳丸

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】 枳壳（去瓤，麸炒） 木通（锉，炒） 青皮（去白） 陈皮（去白） 桑白皮（锉，炒） 萝卜子（微炒） 白牵牛（炒） 黑牵牛（炒） 莪术（煨） 茴香（炒） 荆三棱（煨）各等分

【用法】 上为末，生姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎橘皮汤送下，不拘时候。

【功用】 分气逐风。

【主治】 气结不散，心胸痞痛，气逆上攻。

05995 导气枳实丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】 枳实（麸炒）四两 荆三棱 蓬莪术（煨） 青皮（去白） 陈皮（去白） 神曲（炒） 麦芽（炒）各一两 沉香 槟榔各半两

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至六十丸，食后生姜汤送下。

【功用】 理顺三焦，和调脾胃。

【主治】 胀满及痞噎不通。

05996 导气除燥汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 茯苓（去皮） 滑石（炒黄）各二钱 知母（细锉，酒洗） 泽泻各三钱 黄柏（去皮，酒洗）四钱

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水三盏，煎至一盏，去滓，稍热空心服；如急闭，不拘时候。

【主治】 血涩至气不通而致小便闭塞不通。

【方论选录】《脾胃论注释》：方中黄柏、知母滋肾阴、润肾燥，清其源则流自洁；茯苓、泽泻甘淡，与咸寒为伍，有利尿降热的作用；滑石为石药中的润药，利六腑之涩结，下达膀胱，润滑肠道。本方并无调气药物，而冠以“导气”二字，在于黄柏、知母经过酒洗，酒性散发起先升后降的作用，滑石炒黄借火性以行润滑之药，故曰导气。

05997 导气槟榔散

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】 槟榔（锉）一两 木香 木通（锉） 桑根白皮（炙，锉）各半两 牵牛子二两（一半生，一半熟，同捣，取末一两） 郁李仁（麸炒，去皮） 一两（别研如膏） 大黄半两（湿纸裹，煨）

【用法】 上除研膏外，为散，入研膏和匀。每服二钱匕，入牛黄、龙脑少许，空心以温蜜汤调下。

【主治】 风秘，肠胃痞塞不通。

05998 导水茯苓汤

【方源】《普济方》卷一九一引《德生堂方》。

【异名】 茯苓导水汤（《金鉴》卷五十四）。

【组成】 泽泻 赤茯苓 白术 麦门冬（去心）各三两 紫苏 木瓜 槟榔各一两 陈皮 砂仁 木香 大腹皮各七钱半

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二盏，加灯心二十五根，煎八分，去滓，空心服；服此药时，要如熬阿剌吉酒相似，水一斗，止取药一钱，服后小水行时，即渐添多，直至小便变清白色，方为痊愈。如病重者，前药可均作三大服，每服再加去心麦门冬二两，灯草一大把，均半两重，水一斗于砂锅内，下药五两，熬一大碗，再下小铫内煎至一大盏，五更空心服，滓再煎服，连进三服。

【功用】 利小便。

【主治】 水肿，头面手足遍身肿如烂瓜之状，手按而塌陷，手起随手而高突，喘满倚坐不得息，不能转侧，不能着床而睡，饮食不下，小便秘涩，溺出如割，便绝少，虽有而如黑豆汁，煮服喘嗽气逆诸药不效。

05999 导水消肾丸

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 茅山苍术一斤（米泔水浸，切片，炒黄） 木通半斤 肉桂一两（刮去粗皮） 牵牛二两（微炒） 木香一两

【用法】 上为细末，陈米粉糊为丸，如梧桐子

大。每服一百丸，空心白滚汤、清米汤任下。

【功用】 引导水气。

【主治】 囊痈。内伤生冷，外受风寒，以致寒湿侵入囊中，小者如升，大者若斗，皮肤顽厚，阳物短缩，小水不利，不痛多冷。

【宜忌】 忌生冷、面食。

【备考】 此囊虽夏月炎天，亦以衣被盖覆之为妙。

06000 导赤地榆汤

【方源】《东医宝鉴·内景篇》卷四引《医方集略》。

【组成】 地榆 当归身（酒洗）各一钱半 赤芍药（炒） 黄连（酒炒） 黄芩（酒炒） 槐花（炒）各一钱 阿胶珠 荆芥穗各八分 甘草（炙）五分

【用法】 上锉一剂。水煎，空心服。

【主治】 赤痢及血痢。

06001 导赤各半汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【异名】 导赤泻心汤（《张氏医通》卷十三）、导赤泻心各半汤（《寒温条辨》卷五）。

【组成】 黄连 黄芩 甘草 犀角 麦冬 滑石 山栀 茯神 知母 人参

【用法】 水二钟，加生姜、大枣煎之，加灯心一握，煎沸热服。

【主治】 伤寒经证，心下不硬，腹中不满，大小便如常，身无寒热，热传手少阴心，心火上而逼肺，渐变神昏不语，或睡中独语一二句，目唇赤焦，舌干不饮水，稀粥与之则咽，不与则不思，形如醉人。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手少阴、太阴、太阳药也。陈来章曰：热入心经，凉之以黄连、犀角、栀子；心移热于小肠，泄之以滑石、甘草、灯心；心热上逼于肺，清之以黄芩、栀子、麦冬。然邪之越经而传于心者，以心神本不足也，故又加人参、茯神以辅之。②《张氏医通》：取《金匮》泻心汤为主，以其热在上而不在下，病在气而不在血，故于本方裁去大黄，易入山栀以清心包之热，知母、犀角以解肺胃之烦，人参、麦冬、甘草、茯神以安君主之神，滑石为导赤之向导，姜、枣为散火之间使；用犀角者，即导赤散中之地黄；用滑石者，即导赤散中之木通，虽无导赤散中药味，而导赤散之功效备其中矣。

06002 导赤承气汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 赤芍三钱 细生地五钱 生大黄三钱 黄连二钱 黄柏二钱 芒消一钱

【用法】 水五杯，煮取二杯，先服一杯；不下再服。

【主治】 阳明温病，下之不通，左尺牢坚，小便赤痛，时烦渴甚。

06003 导赤清心汤

【方源】《重订通俗伤寒论》

【组成】 鲜生地六钱 辰茯神二钱 细木通五分 原麦冬一钱（辰砂染） 粉丹皮二钱 益元散三钱（包煎） 淡竹叶一钱半 莲子心三十支（冲） 辰砂染灯心二十支 莹白童便一杯（冲）

【功用】 清降虚热，导火。

【主治】 包络心经虚热，舌赤神昏，小便短涩赤热。

【加减】 服后二三时许，神识仍昏者，调入西黄一分。

【方论选录】 热陷心经，内蒸包络，血虚热盛，故以鲜生地凉心血以泻心火，丹皮清络血以泄络热为君；然必使其热有出路，而包络心经之热乃能清降，故又臣以茯神、益元、木通、竹叶，引其热从小便而泄；佐以麦冬、灯心，均用朱染者，一滋胃液以清养心阴，一通小便以直清神识；妙在使以童便、莲心咸苦达下，交济心肾，以速降其热，是以小便清通者，包络心经之热，悉从下降，神气即清矣。

06004 导滞通经汤

【方源】《医学发明》卷六。

【异名】 导气通经汤（《杏苑》卷六）。

【组成】 陈皮 桑白皮 白术 木香 茯苓（去皮）各一两

【用法】 上㕮咀。每服半两，水二盏，煎至一盏，食前去滓温服。

【主治】 脾湿有余，及气不宣通，面目手足浮肿。

【加减】 霖雨时加泽泻半两。

【方论选录】《卫生宝鉴》：《内经》曰，湿淫所胜，平以苦热，以苦燥之，以淡泄之。陈皮苦温，理肺气，去气滞，故以为主；桑白皮甘寒，去肺中水气，水肿胪胀，利水道，故以为佐；木香苦辛温，除肺中滞气；白术苦甘温，能除湿和中，以苦燥之；以茯苓甘平，能止渴除湿，利小便，以淡泄之，故以为使也。

06005 导痰小胃丹

【方源】《古今医鉴》卷四。

【异名】 竹沥化痰丸（《回春》卷二）。

【组成】 天南星 半夏（二味用白矾、皂荚、姜汁水煮透熟）各二两半 陈皮 枳实（二味用白矾、皂荚水泡半日，去白矾，晒干，炒）各一两 白术（炒）一两 苍术（米泔、白矾、皂荚水浸一宿，去黑皮，晒干，炒）一两 桃仁 杏仁（二味同白矾、皂荚水泡，去皮尖）各一两 红花（酒蒸）一两 大戟（长流水煮一时，晒干）一两 白芥子（炒）一两 芫花（醋拌一宿，炒黑）一两 甘遂（面裹煨）一两 黄柏（炒褐色）一两 大黄（酒蒸，纸裹煨，焙干，再以酒炒）一两半

【用法】 上为细末，姜汁、竹沥煮蒸饼糊为丸，如绿豆大。每服二三十丸；极甚者五七十丸。量虚实加减，再不可太多，恐损胃气也。痰饮，卧时白汤下，一日一次；中风不语，瘫痪初起，每服三十五丸，浓姜汤送下；风头痛，多是湿痰上攻，每服二十一丸，临卧姜汤送下；眩晕多属痰火，每服二十五丸，食后姜汤送下，然后二陈汤、四物汤加柴胡、黄芩、苍术、白芷，倍川芎，热多，加知母、石膏；痰痞积块，每服三十丸，临卧白汤送下，一日一次；哮吼，乃痰火在膈上，每服二十五丸，临睡姜汤送下，每服一次；喉痹肿痛，食后白汤送下。

【功用】 上取胸膈之顽痰，下利胃肠之坚结。

【主治】 中风，眩晕，喉痹，头风，哮吼等症。

06006 寻痛丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】 杜仲（去粗皮，姜汁炒）二两 当归（去芦，酒浸） 玄胡索各半两（炒）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，以盐酒嚼下，不拘时候。

【主治】 腰背并骨节因扑损疼痛发作。

06007 寻痛丸

【方源】《得效》卷十八。

【组成】 草乌（去皮尖，生用） 乳香（火熨） 没药（火熨） 五灵脂各三两 生麝香少许

【用法】 上为末，酒糊为丸，如指头大，朱砂五钱（研）为衣。每服一丸，薄荷、生姜研汁磨化。

【功用】 止痛清心，行气活血。

【主治】《梅氏验方新编》：损伤疼痛难禁者。

06008 寻痛丸

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 五灵脂 草乌（炮） 杏仁各一两 沉香 木香各五钱 麝香一钱

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温黄酒送下。

【主治】 遍身走注疼痛，并一切肿毒疼痛。

【加减】 肿毒，去杏仁、沉香、木香，加桃仁、乳香、没药各等分，烧酒下。

06009 寻痛住痛散

【方源】《救伤秘旨续刻》。

【组成】 乳香 没药 淮乌 川乌 川芎 山甲 木香 虎骨 自然铜 赤芍 紫荆皮各二钱 当归一钱五分 小茴 大茴 沉香 白术 桔梗 牛膝 乌药各一钱 枳壳八分 甘草 香附 降香节各五分

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 头颈从高坠下缩者。

06010 寻痛舒筋丸

【方源】《普济方》卷一八五。

【组成】 五灵脂 两头尖各半两 草乌头 乳香 没药各三分

【用法】 上为细末，葱汁为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食后、临卧以温酒送下；盐汤亦可。

【主治】 诸痹。

【宜忌】 忌热物。

06011 阳旦汤

【方源】《外台》卷二引《古今录验》。

【异名】 阳旦散（《普济方》卷一三一）。

【组成】 大枣十二枚（擘） 桂枝三两 芍药三两 生姜三两 甘草三两（炙） 黄芩二两

【用法】 上㕮咀。以泉水六升，煮取四升，分四服，每日三次。

【主治】 中风伤寒，脉浮，发热往来，汗出恶风，项颈强，鼻鸣干呕。

【宜忌】 若脉浮紧，发热者，不可与也。忌海藻、菘菜、生葱等物。

【加减】 渴者，去桂，加栝楼三两；利者，去芍药、桂，加干姜三两、附子一枚（炮）；心下悸者，去芍药，加茯苓四两；虚劳里急者，加胶饴半升。

06012 阳和丸

【方源】《外科全生集》。

【组成】 肉桂一两 麻黄五钱 炮姜炭五钱

【用法】 上为细末，酒、水为丸服。

【功用】 温散。

【主治】 阴疽恶核，风寒头痛。

①《外科全生集》：恶核。②《青囊秘传》：风寒入络头痛。③《全国中药成药处方集》（南京方）：阴疽漫肿平塌，皮色如常，久不溃散。

06013 阳和丸

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 肉桂四钱 白芥子一两 附子四钱 麻黄二钱 干姜四钱

【用法】 每服一至二丸，每日二次，温开水或温黄酒送下。

【功用】 温经回阳，活血通络，散寒燥湿。

【主治】 淋巴腺结核。

06014 阳和汤

【方源】 《外科全生集》卷四。

【组成】 熟地一两 肉桂一钱（去皮，研粉） 麻黄五分 鹿角胶三钱 白芥子二钱 姜炭五分 生甘草一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 《方剂学》：温阳补血，散寒通滞。

【主治】 ①《外科全生集》：鹤膝风、贴骨疽，及一切阴疽。②《方剂学》：阴疽属于阳虚寒凝证。贴骨疽、脱疽、流注、痰核、鹤膝风等。患处漫肿无头，痛而无热，皮色不变，口中不渴，舌苔淡白，脉沉细等。

【宜忌】 ①《马评外科全生集》：乳岩万不可用，阴虚有热及破溃日久者，不可沾唇。②《中国医学大辞典》：半阴半阳之证忌用。

【加减】 如治乳癖、乳岩、加土贝五钱。

【方论选录】 ①《成方便读》：以熟地大补阴血之药为君；恐草木无情，力难充足，又以鹿角胶有形精血之属以赞助之；但既虚且寒，又非平补之性可收速效，再以炮姜之温中散寒、能入血分者引领熟地、鹿胶直入其地，以成其功；白芥子能去皮里膜外之痰；桂枝入营，麻黄达卫，共成解散之勋，以宣熟地、鹿角胶之滞；甘草不特协和诸药，且赖其为九土之精英，百毒遇土则化耳。③《中国医学大辞典》：此方用熟地、姜、桂、鹿角以为温补之品，用麻黄以开腠理，用白芥子以消皮里膜外之痰；且熟地得麻黄则补血不腻膈，麻黄得熟地则通络而不发表，用治诸疽白陷，如日光一照，使寒凝悉解，故有阳和之名。③《方剂学》：方中重用熟地温补营血为主；鹿角胶性温，为血肉有情之品，生精补髓，养血助阳，强壮筋骨为辅；姜炭、肉桂破阴和阳，温经通脉；麻黄、白芥子通阳散滞而消痰结，合用能使血气宣通，且又使熟地、鹿角胶补而不腻，于是补养之用，寓有温通之火，均为佐药；甘草生用者，解脓毒而调诸药。

【临证举例】 ①脑疽 《经方实验录》：友人周慕莲君患脑疽初起，察其属阴性，法当与阳和汤，顾大便五日未行，疑其有热结，为之踌躇者再，谁知服汤后，次早项背转动便易，大便畅下，乃悟其大便之闭，亦属寒性故也。②骨与关节结核 《中医杂志》（1958；11:731）：用本方汤剂或丸剂配合外治法，治疗74例骨与关节结核，结果有效率达81%。作者认为该疗法有良好的止痛，消肿作用，能促进溃疡及瘘管愈合，改善全身症状。且该法不用石膏固定，患肢可较早活动，避免关节强直，防止部分并发症的发生。《中华外科杂志》（1959；5:458）：本方配合犀黄丸内外同治，治疗骨结核60例，阳虚者肉桂、炮姜可增加1～2倍，或加附子；疗程5个月左右。结果：X线证实骨质完全愈合、临床症状消失者19例；骨质破坏停止，部分吸收好转，临床症状减轻者8例；临床症状减轻，但未经X线复查者33例。患者服药1月后，体重增加，精神好转，疼痛消失，食欲增加。有寒性脓肿者，服药后脓肿停止发展或缩小；有窦道者，创口分泌物于30～40天左右明显减少；血沉逐渐恢复正常。③骨瘤 《贵阳中医学院学报》（1983；4:32）：肖某某，男，十七岁，未婚，石阡县龙硐公社人。一九八〇年十月就诊。数月前左颈部长包块一个约鸡蛋大，不痛，推之不移，压之不痛，面色无华，精神萎顿，形寒肢冷，舌质胖嫩，脉象沉细无力，诊为骨瘤，证属正气虚衰，阴寒凝滞，宜用温阳散寒、扶正通瘀法治疗。以阳和汤加附片10克，每日一剂，水煎，服3次。连服50余剂后，包块全消，诸症皆愈，仅患处皮肤留有较深色素。④乳核 《岳美中医话集》：姚某某，女性，十八岁，未婚。初时乳部长一硬疙瘩，继之渐次增大，疼痛异常，求诊于余。检视乳房并无破溃，脉缓，舌淡，属乳核阴症，为拟阳和汤全方加贝母四钱，四剂而愈。⑤乳腺小叶增生症 《新医药学杂志》（1973；11:23）：本证中医称“乳癖”。用本方加香附、青陈皮、郁金，治疗属虚寒型者10例。服药6～8剂后，肿块及症状逐渐消失，随访1年以上未见复发。⑥坐骨神经炎 《湖南医药杂志》（1974；4:47）：本方加味治疗30例，结果：临床治愈（疼痛消失，行走自如）25例，好转（尚有轻微疼痛）4例，无效1例。有效病例疗程一般为10～20天，一般服药1～2剂后自觉发热汗出，疼痛即有缓解，服药5～8剂后，疼痛明显减轻。对于病程短而疼痛剧烈者，疗效高，疗程也短；反之则疗程较长而疗效亦差。服药期间未见不良反应。

【现代研究】 对结核菌的抑制作用 《中成药研究》（1981；11:41）：据对5例顽固性结核病例的痰培养进行抑菌试验，证实本方确有抑制结核菌作用。但方中七种药物单用则无作用或作用不明显。

【备考】 本方改为丸剂，名“阳和丸”（见《中药制剂手册》）。

06015 阳春酒

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 人参（切片） 白术 熟地各五钱 当归身（切片） 天门冬 枸杞各三钱 柏子仁 远志各二钱五分

【用法】 上药用绢袋宽贮，以无灰好酒五斤瓷罐内浸至一伏时。每早、午、晚各饮一杯热服；如夏月天炎易坏，不堪久服，将药分作五份，每次用酒一斤随便浸服亦效；如酒将完，药尚有味，再添酒浸；饮之一次以后，药淡无味，不必再浸用之。

【功用】 生长肌肉，强健脾胃，美悦颜色，滋润皮肤，却病延寿。

【主治】 脑疽、诸发已溃，流脓尽时，脾胃虚弱，肌肉生迟；或气血原不足，以致肉色淡白，不能生长收敛。

06016 阳消散

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 乳没各五分 白芷五分 僵蚕五分 方八一钱 青黛五分 冰片二分 银朱二分 大黄一钱

【用法】 上为极细末。掺膏药内贴。

【主治】 一切痈疽，红肿焮痛。

06017 阳起石丸

【方源】《普济方》卷二二四引《孟氏诜诜方》。

【组成】 远志（洗，取肉）半两 阳起石（煅） 沉香（不见火） 北五味 嫩鹿茸 酸枣仁（出皮） 桑螵蛸（微炒） 白龙骨 白茯苓 钟乳粉各一两 天雄一两（姜汁制，去脐） 菟丝子二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸至五十丸，炒茴香、白茯苓煎汤吞下。

【功用】 助阴壮阳。

【主治】 丈夫阴阳衰微，阳事不举，才交即泄，寒精自流，胸中短气，阴汗盗汗，冷痛或痒而生疮，出黄浓水。

【加减】 若强壮人服，觉火热，去天雄，加肉苁蓉。

06018 阳起石丸

【方源】《局方》卷九。

【组成】 阳起石（酒浸半日，细研） 二两 吴茱萸（汤洗七遍，焙，微炒） 三分 熟地黄一两 牛膝（去苗，酒浸，焙） 干姜（炮） 白术各三分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心食前温酒或温米饮任下，每日二次。若觉有妊，即住服。

【功用】 益子宫，消积冷。

【主治】 妇人子脏虚冷，劳伤过度，风寒搏结，久不受胎，遂致绝子不产。

06019 阳起石丸

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】 阳起石（飞过） 一两 远志（去心） 山芋 巴戟天（去心） 附子（炮裂，去皮脐）各二两 龙骨（研） 一两 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 四两 蛇床子三两 牛膝（酒浸，切，焙） 杜仲（去粗皮，炙） 赤石脂 牡蛎（煨）各二两 石斛（去根） 黄耆（锉） 续断 五味子 菟丝子（酒浸，别捣） 地骨皮 五加皮（锉） 萆薢 卷柏各二两半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前以温酒送下。

【主治】 肾劳虚损，腰脚酸疼，少腹急痛，小便滑数，面色黧黑。

06020 阳起石丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】 阳起石（煅） 韭子（炒） 肉苁蓉（酒蒸） 青盐（别研） 鹿茸（酒蒸） 钟乳粉 菟丝子（水淘净，酒蒸，焙，别研） 沉香（别研，不见火） 原蚕蛾（酒浸） 山茱萸（取肉）各半两 桑螵蛸（酒浸） 山药（锉，炒）各半两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤任下。

【主治】 肾脏虚损，阳气全乏。

06021 阳起石丸

【方源】《济生》卷六。

【组成】 阳起石（火煅红，别研令极细） 二两 鹿茸（去毛，醋炙） 一两

【用法】 上为细末，醋煎艾汁打糯米糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，食前、空心米饮送下。

【主治】 冲任不交，虚寒之极，崩中不止，变生他证。

06022 阳起石丸

【方源】《济生》卷七。

【组成】 阳起石（火煅红，研极细） 鹿茸（酒蒸，焙） 韭子（炒） 菟丝子（水淘净，酒浸，蒸，焙，别研细末） 天雄（炮，去皮） 肉苁蓉（酒浸）各一两 覆盆子（酒浸） 石斛（去根） 桑寄生 沉香（别研） 原蚕蛾（酒炙） 五味子各半两

【用法】 上为细末，酒煮糯米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤、盐酒任下。

【主治】 丈夫真精气不浓，不能施化而无子。

06023 阳起石丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】 阳起石（煅） 钟乳粉各等分

【用法】 酒煮附了末、面糊为丸。每服五十丸，空心米饮送下。以愈为度。

【主治】 元气虚寒，精滑不禁，大腑溏泄，手足厥冷。

06024 阳起石汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】 阳起石二两（别捣） 白茯苓（去黑皮） 人参 甘草（炙，锉） 赤石脂 龙骨各三两 伏龙肝五两 生地黄（细切，焙）一升 附子（炮裂，去皮脐）一两 续断三两

【用法】 上㕮咀。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，早晨、日午、晚后各一次。

【主治】 妇人血海冷败，脱血带下，诸虚冷疾。

06025 阳燧锭子

【方源】《外科大成》卷一。

【异名】 阳燧锭（《金鉴》卷六十一）。

【组成】 蟾酥 朱砂 川乌 草乌各五分 直僵蚕一条

【用法】 上药各为末，和匀，用石硫黄一两五钱，置碗内微火炖化，入前蟾酥等末搅匀，离火，再入当门子麝香二分、冰片一分搅匀，即倾入湿瓷盘内，速盥转成片，俟冷，取收瓷罐内。用时取甜瓜子大一块，要上尖下平，先用红枣肉擦灸处，粘药于上，用油灯草火点之，灸五壮或七壮、九壮毕，即饮米醋半酒钟，随用小膏药贴之，出黄水些须，其毒即消。如风气痛者，用箸子于骨缝箸中揿之痠痛处，子墨记灸之；如腿痛膝痛，放鬼眼穴灸之；再肩担成疮，于肿处各灸一壮。

【主治】 痈疽发背，一切诸毒，瘰疬，便毒，蛇引疔，瘕块，及风寒湿气疼痛。

06026 阳和二陈汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】 半夏三钱（九制） 广橘红三分 白芥子二钱 茯苓二钱 甘草一钱（生） 上猫桂一钱 炮姜五分 净麻黄三分

【用法】 水煎服。

【主治】 湿痰流注，耳后阴疽，骨槽风，乳疽，及少腹缓疽。

【加减】 骨槽风，去白芥子，加僵蚕。

06027 阳和化癌汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】 鹿角胶五钱 土贝二钱 白芥子二钱 甘草一钱 上猫桂一钱 炮姜炭五分 麻黄三钱 胡桃肉二个

【用法】 酒、水煎服。

【主治】 妇人乳癌。

【备考】 乳癌破则不治。

06028 阳和解凝膏

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】 阳和膏（《经验方》卷上）。

【组成】 鲜大力子（根叶梗）三斤 活白凤仙（梗）四两

上二味，入香油十斤煎枯去滓，次日入下药：

川附 桂枝 大黄 当归 肉桂 官桂 草乌 川乌 地龙 僵蚕 赤芍 白芷 白蔹 白及各二两 川芎四两 续断 防风 荆芥 五灵脂 木香 香橼 陈皮各一两

再煎，药枯沥滓，隔宿油冷，见过斤两。每油一斤，加炒透黄丹七两搅和，文火漫熬，熬至滴水成珠，不粘指为度，即以湿粗纸罨火，以油锅移放冷灶上。

乳香 没药（末）各二两 苏合油四两 麝香一两

【用法】 上为细末，入膏搅和，半月后摊贴。疟疾贴背心。

【功用】 ①《北京市中药成方选集》：散凝化结。②《中国药典》：温阳化湿，消肿散结。

【主治】 阴疽溃烂，瘰疬结核，冻疮乳疮，寒湿痹痛，及疟疾。

①《外科全生集》：一应烂溃阴疽，冻疮，疟疾。②《北京市中药成方选集》：一切阴疽乳疮，瘰疬结核，及溃后流水，久不收敛。③《中国药典》：寒湿痹痛。

06029 阳毒升麻汤

【方源】《活人书》卷十六。

【异名】 升麻汤（《圣济总录》卷二十七）。

【组成】 升麻二分 犀角屑一分 射干一分 黄芩一分 人参一分 甘草一分

【用法】 上锉，如麻豆大。以水三升，煎取一升半，去滓，饮一汤盏，食顷再服，温覆。手足出汗，汗出则解，不解重作。

【主治】 ①《活人书》：伤寒一二日，或服药吐下之后变成阳毒，腰背痛，烦闷不安，面赤狂言，或走，或见鬼，或下利，脉浮大数，面赤斑斑如锦纹，喉咽痛，下脓血。②《景岳全书》：阳毒吐脓血。

【方论选录】《医方考》：吐下后中气必虚，故用人参、甘草以补中；升麻、犀角寒而不滞，故为散斑之要药；佐以麝香，利气窍也；佐以黄芩，清阳毒也。

【备考】本方方名，《普济方》引作"升麻散"。

06030 阳春白雪膏

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】白茯苓（去皮） 怀山药 芡实仁 莲肉（去心皮）各四两（共为细末） 陈仓米半升 糯米半升 白砂糖一斤半

【用法】上先将药、米二味用麻布袋盛放甑内，蒸极熟取出，放簸箕内，却入白沙糖同搅极匀，揉作一块，用小木印印作饼子，晒干收贮。男妇小儿，任意取食。

【功用】养元气，健脾胃，生肌肉，润肌肤，益血秘精，安神定志，壮筋力，养精神，进饮食。

【主治】虚劳瘦怯，泄泻腹胀，肿满喘嗽。

06031 阴旦汤

【方源】《千金》卷九。

【组成】芍药 甘草各二两 干姜 黄芩各三两 桂心四两 大枣十五枚

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取五升，去滓，温服一升，日三夜再，覆令小汗。

【主治】①《千金》：伤寒肢节疼痛，内寒外热，虚烦。②《张氏医通》：冬温，中寒夹食。

【方论选录】《张氏医通》：阴霾四塞，非平旦之气，无以开启阳和，桂枝汤原名阳旦，开启阳邪之药也，《千金》于中加入黄芩之苦寒性轻，以治冬温在表之邪热，加干姜之辛温散结，以治中土之停滞。

06032 阴阳散

【方源】《回春》卷二。

【组成】麻黄一两六钱 绿豆粉二钱 川芎 白芷 石膏 甘草 苏叶各一钱

【用法】上为细末。每服一钱，凉水调服，吃水二三次，待汗出来方止水。盖被出汗足，以身凉为度。

【主治】伤寒三五日，或近期，或初觉无汗。

【宜忌】二三日勿出门见风。食淡饭。

06033 阴痫方

【方源】《三因》卷十八。

【异名】阴痫散（《直指小儿》卷二）、阴痫附子散（《普济方》卷三七六）。

【组成】黑附子（生，去皮脐） 生天南星 半夏各二钱 白附子一钱半

【用法】上为细末，井花水浸七日，每日换水，浸讫控干，入朱砂二钱，麝香一钱拌匀。每服一字，薄荷汤调下。

【功用】《直指小儿》：祛风豁痰，回阳正胃。

【主治】①《三因》：小儿发痫阴证。因吐泻或只吐不泻，日渐困，面色白，脾虚；或冷而发惊，不甚搐搦，微微目上视，手足微动者。②《普济方》：唇青面黑，四肢逆冷。

06034 阴铁箍散

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】降香末半升 大黄三斤 乳香四两 赤小豆三升 没药四两 黄芩八两 方八一斤 生南星四两 山慈菇四两 陈小粉（炒黑，研）十斤

【用法】用窨醋调敷四围。

【主治】痈疽阳证。

06035 阴阳二气丹

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】天门冬（捣膏） 麦门冬（捣膏） 五味子（炒，研） 黄柏 人中白（小儿溺者，生用，研） 玄参（汤泡，去粗皮，捣膏）各一两 青黛（色娇嫩者） 甘草 枯矾 辰砂（为衣） 泽泻各三钱 冰片一钱

【用法】上各为细末，同玄参、二冬膏子，加炼蜜少许为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空心用童便、乳汁各一钟送下，安睡一时。

【主治】脱疽。久服丹石补药，致亏肾水，孤阳独旺，口燥咽干，饮冰雪不知其冷。

06036 阴阳两救汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】熟地八钱 附子三钱 人参二钱 菟丝子八钱（盐水炒） 枸杞四钱 茯神二钱 远志一钱（甘草水炒） 干河车三钱（切） 炮姜炭一钱

【用法】水煎浓汁，时时饮之。

【主治】中脏虚症，四肢懈散，昏不知人，遗尿鼾睡。

06037 阴阳兼培丸

【方源】《会约》卷十四。

【组成】熟地八两 枣皮 淮药 茯苓各四两 鹿角胶六两（蛤粉炒成珠，或酒蒸溶合，炼蜜为丸） 附子三两 杜仲（淡盐水炒）三两 枸杞四两（酒蒸） 淮牛膝三两（酒蒸） 北五味一两半（微炒） 当归三两（酒蒸） 白芍二两（煨，酒炒） 菟丝子（淘净泥沙，酒蒸，晒干）四两（或加肉桂三两）

【用法】先将地黄、枣皮、枸杞、当归捣如膏，

后入药末、鹿胶，量加炼蜜为丸。每服七八钱，早用淡盐水送下。

【主治】 先天不足，精亏阳萎，后天不足，食少体倦，一切不足之证。

【加减】 阳萎，加补骨脂（盐炒）三两，巴戟三两，胡桃肉四两；下焦虚滑，去淮牛膝。

06038 阴蚀黄连膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 乳香粉一两 青黛面一两 黄连膏八两

【用法】 上药调匀成膏。外敷患处。

【功用】 清热解毒，生肌止痛。

【主治】 女阴溃疡（阴蚀），过敏性阴茎部溃疡。

06039 阴虚生内热方

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【异名】 阴虚生内热汤（《杂病源流犀烛》卷十七）。

【组成】 当归八分 白芍（煨，锉，或酒浸，姜汁浸）六分 川芎八分 白术七分 苍术八分 黄柏三分 陈皮八分 玄参五分 甘草二分 沙参七分 麦门冬七分（夏月多用） 天花粉六分半 栀子（炒焦）六分（或以山药代参、术）

【用法】 水二碗，加生姜三片，煎至七分，食前热服。

【主治】 ①《丹溪心法附余》：阴虚内热。②《杂病源流犀烛》：火病虚损。

【加减】 久服，去川芎；冬月，加破故纸。

06040 防己丸

【方源】《圣济总录》卷十四。

【异名】 人参丸（《普济方》卷一〇二）。

【组成】 防己（锉） 白蔹（锉） 桔梗（去芦头，炒） 干姜（炮裂） 白茯苓（去黑皮） 防风（去叉） 大黄（锉，醋炒）各一两 牛膝（去苗） 远志（去心）各一两一分 银箔二十片（研入） 桂（去粗皮） 人参各二两

【用法】 上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后米饮送下，一日二次。

【主治】 风惊恐，恍惚善忘；或风邪上冲，胸胁胀满，不思饮食。

06041 防己丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】 防己 海蛤（研）各一两 葶苈一升（蒸熟） 杏仁六十枚（汤浸，去皮尖，炒，别捣） 甘遂（微炒）一分

【用法】 上先将葶苈、杏仁一处拌和，后以三味为末，再研匀，加枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至二十五丸，米饮送下。以微利为度。

【主治】 水肿，眠卧不得。

06042 防己丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】 防己 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 大戟（炒） 苦葶苈（纸上炒）各半两

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温熟水送下，不拘时候。

【功用】 定喘急。

【主治】 十水喘急。

06043 防己汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】 防己 茯苓 白术 桂心 生姜各四两 乌头七枚 人参二两 甘草三两

【用法】 上㕮咀。以苦酒一升，水一斗，煮取三升半，每服八合，日三夜一。当觉焦热，痹忽忽然，慎勿怪也。若不觉，复令服，以觉乃止。

【主治】 风历节，四肢疼痛如锤锻，不可忍者。

【宜忌】 凡用乌头，皆去皮熬令黑，乃堪用，不然至毒人，宜慎之。

【方论选录】《千金方衍义》：《金匮》防己黄耆汤本治风湿关节疼痛，腰下疼重，自汗恶风，取二味合用，以司开合而祛湿耆。《千金》又恐黄耆之助卫，乃摒去不用；易入乌头，专开痹耆；桂心、茯苓二味，又于防己茯苓汤中采入；加人参者，助防己逐痹之力也。煎用苦酒，取辟恶毒之气耳。

06044 防己汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 防己 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）附子（炮裂，去皮脐） 芎藭 桂（去粗皮） 黄芩（去黑心） 芍药 人参 甘草（炙，锉） 防风（去叉）各一两 杏仁（去皮尖双仁，炒）四十枚

【用法】 上锉，如麻豆大。每用十钱匕，以水三盏，加生姜十片，煮取二盏，去滓，分温三服，日二夜一。

【主治】 偏风，半身不随，口眼㖞斜，不能言语，筋脉拘急，不得转侧。

06045 防己汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 防己（锉）一两 竹沥（旋入） 防风（去叉，锉）一两 升麻一两 桂（去粗皮）一两 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙干）一两半 芎藭一两 羚羊角（镑）一两

【用法】 上先将七味为粗末。每用药十二钱匕，以水四盏，煎至二盏，去滓，入竹沥二合，更煎三沸，分三次温服，空心、午时、夜深各一服。

【主治】 中风，半身不随，口面㖞斜，语不得转。

【加减】 常服，加独活一两半；若手足逆冷，加干姜一两（炮裂）。若不即除，更服麻黄防风汤。

06046 防己汤

【方源】 《全生指迷方》卷三。

【组成】 防己二两 人参四两 桂心二两 茯苓四两

【用法】 上为散。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 皮水，由肺气久虚，为风邪所客，气不得运，百脉闭塞，气结阴聚成水。腹满，按之没指，随手而起，余与正水皆同，但四肢聂聂动，其脉亦浮。

06047 防己饮

【方源】 《圣济总录》卷一五三。

【组成】 防己一两 葶苈（隔纸炒） 赤茯苓（去黑皮）各半两 陈橘皮（汤浸去白，焙） 玄参 黄芩（去黑心） 泽漆（炒）各一两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 猪苓（去黑皮） 白术（锉） 大豆（炒）各一两半 桑根白皮（锉）二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空心、日午、临卧各一服。

【主治】 妇人因经水断绝，水病浮肿，名曰水分。

06048 防己饮

【方源】 《丹溪心法》卷三。

【组成】 白术 木通 防己 槟榔 川芎 甘草梢 犀角 苍术（盐炒） 黄柏（酒炒） 生地黄（酒炒）

【主治】 ①《丹溪心法》：脚气。②《医方集解》：湿热脚气，足胫肿痛，憎寒壮热。

【加减】 大便实，加桃仁；小便涩，加杜牛膝；有热，加黄芩、黄连；大热及时令热，加石膏；有痰，加竹沥、姜汁。

【方论选录】 ①《医方考》：是方也，木通、防己、槟榔，通剂也，可以去塞；犀角、黄柏、生地黄、甘草梢，寒剂也，可以去热；苍、白二术，燥剂也，可以去湿。然川芎能散血中之气，犀角能利气中之血，先痛而后肿者，气伤血也，重用川芎；先肿而后痛者，血伤气也，重用犀角。②《医方集解》：此足太阳药也。防己行水疗风，泻下焦之湿热；槟榔攻坚利水，坠诸药使下行；木通降心火，由小便出；草梢泄脾火，径达肾茎；黄柏、生地滋肾阴，而凉血解热；苍、白二术燥脾湿，而运动中枢；肿由血郁，川芎行血中之气；痛由肝实，犀角凉心而清肝。合之以清热利湿，消肿止痛也。③《退思集类方歌注》：防己、苍术、白术、川芎行血燥湿，生地、黄柏、草梢、犀角凉血清热，木通通关节、利湿热，槟榔下行疾速，坠诸药入下焦，消肿痛也。脚气无不由湿热而成，其证憎寒发热，状类伤寒，但足胫肿痛为异耳。

【备考】 《医学正传》：有黄连。用量及用法：黄柏、苍术、白术、防己各七分，生地黄、槟榔、川芎各五分，犀角屑、甘草节、木通、黄连各三分。上细切，作一服，水一盏半，煎至一盏，去滓，食前温服。

06049 防己散

【方源】 方出《证类本草》卷九引《初虞世方》，名见《普济方》卷二十七引《仁存方》。

【组成】 汉防己 黄葶苈各等分

【用法】 上为末。每服一钱，糯米饮调下。

【主治】 肺痿，咯血多痰。

06050 防己散

【方源】 《圣济总录》卷九十五。

【组成】 防己一两 海蛤 滑石 木香各半两

【用法】 上为散。每服二钱匕，浓煎木通汤调下。

【主治】 膀胱积热，小便不通。

06051 防己散

【方源】 方出《妇人良方》卷十四，名见《准绳·女科》卷四。

【组成】 防风 羌活 防己各一两 麻黄（去节）半两 黄松木节一两 桂心 荆芥穗 羚羊角屑 桑寄生 甘草 薏苡仁各半两

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服。

【主治】 妊娠中风，口眼不正，手足顽痹。

06052 防己散

【方源】 《医略六书》卷二十八。

【组成】 防己一两 羌活一两 当归二两 防风一两 白芍一两（酒炒） 川芎一两 米仁四两（炒） 甘草六钱 羚羊角一两

【用法】 上为散。每服五钱，水煎去滓，加竹沥一杯，姜汁一匙，温服。

【主治】 孕妇中风，口眼歪斜，脉浮者。

【方论选录】 妊娠血虚风中，遇热于经，而络脉

受病，故口眼歪斜，胎孕为之不安焉。防已泻血分湿热以清血室，羌活散太阳风邪以宁经腑，当归养血荣经脉，白芍敛阴和血脉，川芎入血海以活血行气，米仁健脾气以泻湿舒筋，防风为风药之使，羚羊清厥阴之火，甘草缓中以和胃也。为散水煎，更入竹沥、姜汁散痰养液，务使血液内充，则风热外解，而经脉融和，胎得所养，何口眼歪斜之不即端正哉！

06053　防风丸

【方源】《局方》卷一。

【异名】天麻丸(《普济方》卷一〇五)。

【组成】防风（洗）　川芎　天麻（去苗，酒浸一宿）　甘草（炙）各二两　朱砂（研为衣）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，每两作十丸，以朱砂为衣。每服一丸，荆芥汤化服，茶酒嚼下亦得，不拘时候。

【主治】一切风，及痰热上攻，头痛恶心，项背拘急，目眩旋运，心怔烦闷，手足无力，骨节疼痹，言语謇涩，口眼瞤动，神思恍惚，痰涎壅滞，昏懵健忘，虚烦少睡。

06054　防风丸

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】防风（去叉）　蝉壳　猪牙皂荚（酥炙，去皮子）各一两半　天麻二两

【用法】上为细末，用精羊肉煮熟捣烂，以酒熬为膏，丸如绿豆大。每服三十丸，荆芥酒或茶汤送下。

【主治】一切风疮疥癣，皮肤瘙痒，搔成瘾疹。

06055　防风丸

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】防风（去叉）　苍耳（炒）　苦参　蒺藜子（炒）各二两　枳壳（去瓤，麸炒）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，荆芥茶送下亦得，不拘时候。

【主治】妇人血风，皮肤瘾疹痒痛，或有细疮。

06056　防风汤

【方源】《千金》卷十四引《徐嗣伯方》。

【组成】防风　赤石脂　石膏　人参　生姜　白石脂　寒水　石龙骨　茯苓各三分　桂心二分　紫石一分

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取三升，分三服。

【主治】风眩，服薯蓣汤后，四体尚不凉冷，头目眩动者。

【方论选录】《千金方衍义》：服薯蓣汤，四肢热尚未除，头目转觉眩晕，虚阳不能即敛故取风引汤中四石、龙骨、桂心，加参、苓以镇固之，生姜开发中气，防风开发表气，风引汤专取大黄引风热下行，此以人参助防风上泄，仍取江水煮取，乃薯蓣汤之成法，半夏汤之变法也。

【备考】此汤大都宜长将服，但药中小小消息之，随冷暖耳。

06057　防风汤

【方源】《外台》卷十四引《古今录验》。

【组成】防风　桂心　知母各四两　白术　生姜各五两　芍药　甘草各三两（炙）　附子二枚（炮）

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，分为三服。

【主治】历节风。身体四肢节解疼痛如坠脱，肿按之皮急，头眩短气，温温闷乱如欲吐。

【宜忌】忌生葱、猪肉、海藻、菘菜、桃、李、雀肉等。

06058　防风汤

【方源】《外台》卷十五引《古今录验》。

【组成】防风　白术　防已　干姜　甘草（炙）各一两　附子（炮）　桂心各半两　蜀椒一百枚（汗）

【用法】上切。以水四升，煮取一升半，分为三服。

【主治】风眩呕逆，水浆不下，食辄呕，起即眩倒，发作有时，手足厥。

【宜忌】忌猪肉、冷水、生葱、海藻、菘菜、桃、李、雀肉等。

06059　防风汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】防风　白术　知母各四两　生姜　半夏各五两　芍药　杏仁　甘草　芎䓖各三两　桂心四两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一。

【主治】身体四肢节解如堕脱肿，按之皮陷，头眩短气，温温闷乱欲吐者。

【方论选录】《千金方衍义》：详本方见证，不独毒风外贼，兼有痰热内蕴，故于《金匮》桂枝芍药知母汤中退麻黄、附子之悍烈，进杏、半、芎䓖之和平，以桂心、芎、芍内护营虚，防风、杏仁外泄卫实，白术、姜、半中启脾湿，妙在知母一味，滋桂心、姜、半之辛燥，甘草一味，和桂心、知母之刚柔，较《古今录验》尤为稳当。

06060　防风汤

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】 防风（去叉）一两半　羌活（去芦头）一两　黄耆（炙，锉）二两半　五加皮（锉）一两半　牛膝（去苗，酒浸，切，焙）一两半　丹参一两一分　酸枣仁（炒）一合　桂（去粗皮）一两半　赤芍药一两　半麻黄（去节，煎掠去沫，焙）一两一分　槟榔（煨，锉）一两　当归（切，焙）一两　木通（锉）一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓，空心温服，及晚食前再服。

【主治】 肾中风，腰脚痹痹不仁，骨髓瘦疼，不能久立，渐觉消瘦。

06061　防风汤

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】 防风（去叉）　防己　升麻　桂（去粗皮）　麻黄（去根节，煎掠去沫，焙干）　芎藭各一两　羚羊角（镑）一两半

【用法】 上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏，煎取六分，去滓，加竹沥半合，更煎三两沸，空心热服，日午及临卧各一服。

【主治】 中风，口面㖞斜，泪出失音。

06062　防风汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 防风（去叉，锉）　独活（去芦头）　防己　秦艽（去苗土）　黄耆　芍药　白术　芎藭　远志（去心）各二两　石膏（碎）三两　升麻二两　石斛（去根，锉）三两　牛膝（去苗，酒浸，切，焙）二两　丹参二两　陈橘皮（汤浸，去白，焙）一两半　甘草（炙，锉）二两　厚朴（去粗皮，生姜汁炙五遍）二两　天门冬（去心，焙）二两　薏苡仁（炒）二两半　羚羊角（镑屑）二两　五加皮二两　熟干地黄（焙干）一两半　麻黄（去节，先煎，掠去沫，焙干）一两半　地骨皮二两　人参二两　茯神（去木）二两

【用法】 上㕮咀。每以六钱匕，水三盏，煎至一盏半，去滓，分温二服，空心、夜卧服之。

【主治】 风痺，四肢不收，言语謇涩。

【加减】 若觉心中烦热，每煎将熟，别入竹沥一合，更煎三沸温服。

06063　防风汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】 防风（去叉）二两　白术一两　白鲜皮二两　桂（去粗皮）一两三分　黄耆（锉）二两　薏苡仁（炒）三两

【用法】 上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，加生姜三片，煎至一盏，去滓温服，日三夜一。

【主治】 历节风，周身百节疼痛，腰脚痿弱。

06064　防风汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】 防风（去叉）　麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）　石韦（去毛）　络石　桑根白皮　大腹皮　芎藭　生干地黄各一两半　附子（炮裂，去皮脐）二两　白术　桂（去粗皮）　羌活（去芦头）　牡丹皮　射干各一两　草豆蔻（去皮）四枚　桃仁二十枚（去皮尖双仁，炒）

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜五片，同煎取八分，去滓温服。

【主治】 风湿脚膝肿痛。

06065　防风汤

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】 防风（去叉）　五加皮（锉）　附子（炮裂，去皮脐）　萆薢　薏苡仁　桂（去粗皮）各一两　牛膝（酒浸，切、焙）　独活（去芦头）　赤茯苓（去黑皮）　当归（切，焙）　杜仲（去粗皮，炙）　海桐皮各一两半　木香　枳壳（去瓤，麸炒）　仙灵脾各半两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（拍碎），同煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 风腿腿，肌肉虚满，四肢不收，骨节疼痛。

06066　防风汤

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】 防风（去叉）　益母草　苦参各三两　蒺藜子（炒）五两　荆芥穗二两　蔓荆实二两　枳壳（去瓤，麸炒）二两

【用法】 上为粗末。每用三两，水一斗，煎至八升，乘热淋洗患处。

【主治】 风瘙痒如虫行，或痹痹不仁。

06067　防风汤

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】 防风（去叉）　地骨皮　王不留行　山栀子仁（微炒）　荆芥穗　恶实（炒）各一两　甘草（炙）三分　人参　生干地黄（焙）各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入恶实根二寸，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 风热熏蒸，皮肤白癜。

06068　防风汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【异名】 防风散（《杏苑》卷五）。

【组成】 防风（去叉） 甘草（炙，锉）各一两 黄芩（去黑心）三分 当归（切，焙） 赤茯苓（去黑皮）各一两 秦艽（去苗土） 葛根（锉）各三分 桂（去粗皮） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各一两 麻黄（去根节，煎掠去沫，焙）半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，酒一盏，水一盏，加大枣三枚（擘破），生姜五片，同煎至一盏，去滓温服，日二夜一。

【主治】 行痹，痛风，伤风寒热。

①《圣济总录》：行痹，行走无定。②《赤水玄珠》：痛风。③《医钞类编》：伤风寒热。

06069 防风汤

【方源】《圣济总录》卷二十。

【异名】 防风饮。

【组成】 防风（去叉） 麻黄（去节，先煎，掠去沫，焙）各三两 石膏 黄芩（去黑心） 芎藭 当归（切，焙）各一两 杏仁（去双仁皮尖，熬）四十枚 桂（去粗皮） 熟干地黄（焙） 甘草（炙，锉）各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，空心温服，一日二次。

【主治】 风冷痹，身体不随，四肢痹麻，不觉痛痒、不能言语。

06070 防风汤

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】 防风（去叉） 薏苡仁各二两 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙干）四两 白术 芎藭 细辛（去苗叶） 羌活（去芦头） 茵芋（去粗茎） 牛膝（去苗，酒浸，切，焙） 狗脊（去毛） 萆薢 侧子（炮裂，去皮脐） 杏仁（去皮尖双仁，炒微黄） 赤箭桂（去粗皮）各一两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服四钱匕，水一盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 风寒湿痹，筋脉挛急，身体手足不随。

06071 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】 防风（去叉）一两半 远志（去心） 黄芩（去黑心） 人参 桔梗（锉，炒） 细辛（去苗叶） 芍药各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食后、临卧温服。

【功用】 泻肝补胆。

【主治】 蠲目疼痛。

06072 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】 防风（去叉） 甘菊花各三分 芎藭 赤芍药各半两 黄芩（去黑心）一两 羚羊角（镑）半两 细辛（去苗叶）三分 枳壳（去瓤，麸炒）半两 黄连（去须）三分 甘草（炙）半两 石膏（碎）一两 人参半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食后、临卧温服。

【主治】 风热眼赤，痛痒不定。

06073 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】 防风（去叉）三分 甘菊花 羌活（去芦头） 藁本（去苗土）各一两 石膏二两 旋覆花 蔓荆实 甘草（炙）各半两

【用法】 上为粗末。每服四钱匕，以水一盏，加生姜一枣大（切），煎取七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】 风热上攻，眼眉骨连头疼痛。

06074 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】 防风（去叉）二两 地骨皮 远志（去心） 人参 黄耆（锉） 白茯苓（去黑皮）各一两 知母 大黄（锉碎，炒）各二两

【用法】 上为粗末。每服一钱匕，水一盏，煎至五分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】 眼漏睛脓出。

06075 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】 防风（去叉） 芜荑子 五味子 知母（焙） 桔梗（炒） 玄参 车前子 大黄（锉，焙） 细辛（去苗叶） 黄芩（去黑心）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食后、临卧温服，一日二次。

【主治】 内障圆翳，及涩翳。

06076 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】 防风（去叉）半两 菊花一两 升麻 独活（去芦头） 知母（焙） 黄芩（去黑心） 玄参 藁本（去苗土） 大黄（锉，炒） 栀子（去皮） 前胡（去芦头） 桔梗（锉，炒） 甘草（炙，锉） 麦门冬（去心，焙） 生干地黄（焙）各半两

【用法】 上为粗末。每用三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食后服，一日三次。

【主治】 脾胃蕴结热气，复为风冷相搏，唇边生核，结硬疼痛。

06077 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】防风（去叉） 当归（切，焙） 芎藭 细辛（去苗叶）各一两 附子（炮裂）半两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每用药五钱匕，以水一盏，加生姜五片，煎十余沸，去滓，热嗽冷吐。

【主治】牙齿疼痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作"防风散"。

06078 防风汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】防风（去叉） 人参 远志（去心） 桂（去粗皮） 独活（去芦头） 甘草（炙）各一两 茯神（去木）一两半 细辛（去苗叶） 干姜（炮） 白术（锉，炒） 酸枣仁（炒）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，日二夜一。

【功用】安神定志，解风邪。

【主治】妇人惊悸。

06079 防风汤

【方源】《本事》卷一。

【组成】石斛（洗，去根）一两半 熟干地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干） 杜仲（去皮，锉如豆，炒令黑） 丹参各一两一分 防风（去叉股） 川芎（洗） 麦门冬（用水浸，去心） 桂枝（不见火） 川独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水一大盏半，加大枣二枚，同煎八分，去滓温服。

【主治】中风内虚，脚弱，语謇。

【方论选录】《本事方释义》：石斛气味甘平微苦咸，入足太阴、少阴；干地黄气味甘寒微苦，入足少阴；杜仲气味辛平微温，入足少阴、厥阴；丹参气味苦微寒，入心；防风气味苦辛甘温，入手、足太阳；川芎气味辛温，入足少阳、厥阴；麦门冬气味甘凉微苦，入手太阳、少阴；桂心气味辛甘大热，入足少阴、厥阴；独活气味苦辛甘平，入足少阴、厥阴之风药。因内虚中风，语謇脚弱，表平温经之品，得风药之引入经络，祛邪扶正，其功岂不伟哉！

06080 防风汤

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】防风 麻黄 独活 秦艽（去芦） 黄芩 石膏 当归 白术各半两

【用法】上为粗末，加半夏片子搅匀。每服四钱，水二中盏，加生姜七片，煎至一盏，去滓，取清汁六分，加麝香少许，带热食后服。

【主治】①《儒门事亲》：风寒湿痹，腰脚沉重浮肿，夜则痛甚，两足恶寒，饮食转减，肢体瘦乏。②《普济方》：诸风疾。

06081 防风汤

【方源】《妇人良方》卷五。

【异名】黄耆散（《普济方》卷二二二）。

【组成】黄耆一两 白芍药 防风各三分 甘草半两 当归生干地黄各三分

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】劳气，此病因失血，荣卫损也。食后身疼倦，夜间盗汗。

06082 防风汤

【方源】《医方大成》卷五引《济生》。

【组成】防风（去芦）二两 川独活（去芦，洗） 川当归（去芦，洗） 赤茯苓（去皮） 秦艽（去芦，洗） 赤芍药 黄芩各一两 桂心（不见火） 杏仁（去皮尖） 甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七片，去滓温服，不拘时候。

【主治】血痹，肌痹，皮痹。

①《济生方》：血痹，皮肤不仁。②《内经拾遗》：肉苛，肌肉痹重，痛痒不知。③《医学入门》：肌痹、皮痹。

06083 防风汤

【方源】《医统》卷十一。

【组成】防风一钱半 独活 当归 川芎 秦艽 赤芍药 黄芩各七分 甘草（炙）五分 细辛 杏仁各一钱

【用法】水二盏，加生姜五片，煎服。

【主治】血痹皮肤不仁。

06084 防风汤

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】防风 川芎 黄芩 桔梗 甘草 大力子

【主治】①《证治汇补》：统治鼻病在标者。②《医略六书》：外感鼻赤，脉浮微数者。

【方论选录】《医略六书》：防风解散风邪于外，黄芩清降肺热于内，川芎活血调营，桔梗开提清肝，大力子疏风解热，生甘草泻火缓中也。水煎温服，使风火并解，则肺气肃清而鼻赤无不退矣。此疏风解热之剂，为邪郁鼻赤之专方。

【备考】《医略六书》本方用法：水煎，去滓温服。

06085 防风汤

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】防风 荆芥 羌活 桂枝 薄荷 甘草

【主治】自汗畏风，虽炎天必须棉衣。

06086 防风汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】防风一钱半 羌活一钱半 桂枝一钱 当归二两 川芎一钱 赤芩一钱半 秦艽一钱半 甘草五钱

【用法】水、酒各半煎，去滓温服。

【主治】风痹，行走掣痛，脉浮者。

【方论选录】防风行气于肌表而邪自散，羌活除痛于百节而痹自舒，桂枝温营散邪，秦艽活络祛风，当归养营却痹，川芎活血定疼，赤芩渗湿，营气清和，甘草缓中。风邪解散，俾行痹外解，则血脉融和，而掣痛无不自平矣。此祛风活血之剂，为行痹掣痛之专方。

06087 防风汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】防风一钱半（砂糖炒） 独活一钱半（盐水炒） 白芍一钱半（酒炒） 川芎一钱 人参一钱半 当归三钱 甘草一钱半（炙）

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】产后中风，项背强急，脉浮濡涩者。

【方论选录】产后血虚受风，不能养筋脉，故项背强急，转动不便焉。方中防风祛头项之风，砂糖炒以引入血分，独活祛脊背之风，盐水炒以直入少阴，川芎行血中之气，白芍敛经脉之阴，人参扶元气以内托，当归养血脉以荣筋，炙草缓中和胃也。水煎温服，务使经血充润，则风邪外解而筋脉得养，项背柔和，安有强急之患乎？

06088 防风汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】防风一钱半 当归三钱 麻黄一钱（炒） 石膏三钱 川芎一钱 白芍一钱半（酒炒） 秦艽一钱半 羚羊角一钱 黄芩一钱半（酒炒） 甘草一钱半

【用法】水煎，去滓，冲竹沥三匙，姜汁一匙，温服。

【主治】产后瘛疭，脉浮数大者。

【方论选录】产后血燥风淫，风火内炽，伤厥阴而筋脉失养，故瘛疭不已。方中麻黄开表逐风，石膏清里泻火，防风疏风于外，黄芩清热于腑，当归养血以润经脉，白芍敛阴以和血脉，小川芎活血行血中之气，羚羊角泻火熄外淫之风，秦艽祛风活血，甘草泻火缓中也。水煎，入竹沥以润液，姜汁以散痰，使火化风消，则痰行液润而筋脉柔和，何瘛疭之不痊哉？

06089 防风汤

【方源】《医级》卷七。

【组成】羌活 独活 荆芥 防风 芍药 甘草

【主治】太阳中风，身热头痛，自汗。

06090 防风饮

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】防风（去叉） 白术 芎藭 白芷 牛膝（切，酒浸，焙） 狗脊（去毛） 萆薢 葛根（锉） 人参 羌活（去芦头） 薏苡仁各一两 杏仁（去皮尖双仁，炒）二两 麻黄（去节，先煮去上沫，焙） 石膏 桂（去粗皮）各三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜半分（切），煎取八分，去滓，空腹温服。

【主治】偏风，半身不随，筋脉抽牵，行履不得。

06091 防风饮

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】防风（去叉）一两 龙骨（去土）二两 升麻 赤芍药 黄芩（去黑心）各一两 葛根（锉） 石膏（碎）各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，加堇竹沥半合，更煎一二沸，去滓，空心、日午、夜卧温服。

【主治】首风，脑项掣痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作"防风散"。

06092 防风饮

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】人参 当归 黄耆 甘草各八分 防风 黄柏各五分 蔓荆子 细辛各三分

【用法】水煎，食后温服。

【主治】拳毛倒睫外障。

【宜忌】须避风忌口。

06093 防风酒

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】防风（去叉）二两 白术一两半 山茱萸（并子用）一两 半山芋（干者）一两半 附子（炮裂，去皮脐）一两半 天雄（炮裂，去皮脐）一两半 细辛（去须叶，轻炒）一两半 独活（去芦头）一两半 秦艽（去土）一两半 茵芋（去粗茎）一两半 杏仁（汤浸，退去皮尖双仁，炒）一两半 紫巴戟（去心）二两 桂（去粗皮）二两 麻黄（去节，先煎去沫，焙干用）二两 生姜

（切，焙）二两　磁石（生，捶碎如大豆粒，浸去赤汁）半斤　薏苡仁（炒）三两　生地黄（净洗，细切，焙）二两半

【用法】 上锉，如麻豆大，生绢囊盛，以无灰清酒三斗，浸六七日。空心温饮四合至五合，以知为度。

【主治】 肉苛。荣虚卫实，肌肉不仁。

06094　防风散

【方源】 方出《千金》卷五，名见《圣惠》卷八十二。

【组成】 防风一两半　柏子仁　白及各一两

【用法】 上为末。以乳和敷肉上，每日一次。

【主治】 小儿囟开不合。

06095　防风散

【方源】 《千金》卷十三。

【组成】 防风二两　泽泻　细辛　附子　薯蓣　茯苓　天雄各一两　白术二两半　桂心一两半　干姜半两

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，酒送下，当令酒气相接，则脱巾帽，解发梳头百过，复投一升酒，便洗手足，须臾自热，解发以粉粉之，快然，便熟眠愈。亦可洗头面汗出。

【主治】 风头眩，恶风，吐冷水，心闷。

【方论选录】 《千金方衍义》：风眩恶风，吐水心闷，此阳虚水停心下。故用五苓散中之四并雄、附、姜、辛以散水逆，薯蓣以疗虚风，防风以祛风湿也。至于方后服法，岂非宿有成验而为详述如此。

【备考】 方中泽泻，《千金翼》作泽兰，天雄作人参。

06096　防风散

【方源】 方出《经效产宝》卷中，名见《圣惠》卷七十四。

【异名】 防风汤（《普济方》卷三五〇）。

【组成】 防风　葛根　芎藭　干地黄各八分　麻黄（去节）　甘草　桂心　独活　汉防己各六两　杏仁五个（去尖）

【用法】 以水八升，煮麻黄去沫后，下诸药，煎取三升，分温三服。

【主治】 产后中风，腰背强直，时时反张。名曰风痓。

【宜忌】 《普济方》：有汗者，不可服。

06097　防风散

【方源】 《圣惠》卷十九。

【异名】 防风汤（《圣济总录》卷六）。

【组成】 防风一两（去芦头）　麻黄二两（去根节）　白术一两　黄芩一两　赤芍药一两　桂心一两　汉防己一两　芎藭一两　人参一两（去芦头）　甘草一两（炙微赤，锉）　附子一两（炮裂，去皮脐）　杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 风瘛。舌强不能言，四肢拘急，迷闷不识人。

【宜忌】 服后有汗，宜避风为妙。

06098　防风散

【方源】 《圣惠》卷二十。

【组成】 防风三分（去芦头）　当归三分（锉，微炒）　麻黄一两（去根节）　泽泻一两　天门冬一两（去心）　附子一两（炮裂，去皮脐）　生地黄一两　白术一两　山茱萸一两　黄芩一两　甘草半两（炙微赤，锉）　桂心一两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不拘时候稍热服。

【主治】 卒中瘫痪风，手足不遂，身体拘急，神思昏沉。

06099　防风散

【方源】 《圣惠》卷二十。

【组成】 防风半两（去芦头）　茯神一两　羚羊角屑半两　芎藭半两　人参三分（去芦头）　细辛半两　桂心半两　枳实半两（麸炒微黄）　半夏半两（汤洗七遍去滑）　天麻三分　山茱萸三分　龙齿一两　甘菊花半两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 风虚恍惚，多痰晕闷，不欲饮食。

【宜忌】 忌羊肉、饴糖。

06100　防风散

【方源】 《圣惠》卷二十。

【组成】 防风一两（去芦头）　川升麻一两　黄芩一两　赤芍药一两　蔓荆子一两　石膏一两　葛根一两（锉）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，加淡竹沥半合，更煎一二沸，不拘时候温服。

【主治】 风头痛掣动。

06101　防风散

【方源】 《圣惠》卷二十一。

【组成】 防风三分（去芦头）　白术三分　芎藭三分　白芷三分　牛膝三分（去苗）　狗脊三分

萆薢三分（锉） 薏苡仁三分 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 侧子一两（炮裂，去皮脐） 当归三分（锉，微炒） 羌活三分 麻黄三分（去根节） 石膏三分 桂心三分

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 偏风。手足不遂，肌体不仁，筋脉拘急，时有疼痛。

【宜忌】 忌生冷，油腻，猪、鸡、犬肉。

06102 防风散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 防风三分（去芦头） 当归一两（锉，微炒） 羌活半两 川椒半两（去目及闭口者，微炒，去汗） 天雄半两（炮裂，去皮脐） 赤箭半两 白术三分 干姜半两（炮裂，锉） 细辛半两 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 前胡一两（去芦头） 白芷半两 莽草三分 麻黄一两（去根节） 山茱萸半两 丹参三分 人参三分（去芦头）

【用法】 上为细散。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 偏风顽痹，心神冒闷，身体疼痛。

06103 防风散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 防风三分（去芦头） 薏苡仁一两 羌活三分 细辛半两 当归三分 仙灵脾一两 芎藭三分 肉桂三分（去皱皮） 附子一两（炮裂，去皮脐） 牛膝一两（去苗） 骨碎补一两 枳实半两（麸炒微黄）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至八分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 风身体疼痛，转侧不得。

06104 防风散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】 防风一两（去芦头） 赤茯苓一两 芎藭一两 白蒺藜一两（微炒，去刺） 麻黄一两（去根节） 桂心一两 海桐皮一两（锉） 当归一两 人参一两（去芦头） 白术一两半 独活一两 细辛一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】 腰退风，肌肉虚满、肢节缓弱，皮肤不仁，骨节疼痛。

06105 防风散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 防风一两（去芦头） 五加皮一两 萆薢一两（锉） 薏苡仁一两 杜仲一两半（去粗皮，炙微黄） 牛膝一两半（去苗） 海桐皮一两（锉） 桂心一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 赤芍药一两 续断三分 鼠粘子三分 黄耆一两（锉） 熟干地黄一两 羚羊角屑三分

【用法】 上为细散。每服二钱，以温酒调下，一日三四次。

【主治】 虚劳，筋脉拘挛，腰膝疼痛。

【宜忌】 忌生冷、油腻、毒滑鱼肉。

06106 防风散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】 防风一两（去芦头） 甘菊花一两 牛蒡子一两（微炒） 白附子一两（炮裂） 前胡一两（去芦头） 石膏二两（细研，水飞过）

【用法】 上为细散。每服二钱，食后以生姜茶清调下。

【主治】 痰厥头痛。

06107 防风散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】 防风一两（去芦头） 猪苓一两（去黑皮） 泽泻一两 赤茯苓一两 麻黄一两（去根节） 泽漆一两 白术一两半 大戟一两（锉碎，微炒） 黄耆一两（锉） 独活二两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，入煮赤小豆汁一合，煎至五分，去滓，每日早晨温服。良久，当小便极利；不利，晚再服之。

【功用】 利小便。

【主治】 风水，通身肿，皮肤欲裂。

06108 防风散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 防风一两（去芦头） 酸枣仁半两 芎藭半两 当归半两（锉，微炒） 牛膝一两（去苗） 狗脊一两（去毛） 萆薢一两（锉） 薏苡仁二两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 人参半两（去芦头） 葛根半两（锉） 羌活二两 麻黄一两（去根节） 石膏二两 桂心一两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 妇人中风，半身枯细，筋脉抽掣，心神烦闷，行立不得。

06109 防风散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【异名】 防风茯神散(《校注妇人良方》卷三)。

【组成】 防风一两（去芦头） 茯神一两 独活一两 远志一两（去心） 人参一两（去芦头） 龙齿一两 秦艽半两 菖蒲一两 石膏一两 牡蛎一两 禹余粮半两 蛇蜕皮一尺（烧灰） 桂心半两 甘草二分（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 妇人风邪癫狂，或啼泣不止，或歌笑无度，或心神恐惧，或言语失常。

06110 防风散

【方源】《普济方》卷一〇五引《指南方》。

【异名】 防风汤(《妇人良方》卷三)。

【组成】 防风一两 羌活半两 甘草一分

【用法】 上为粗末。每服五钱，水二盏，煎一盏，去滓，加麝香一字，温服。

【主治】 ①《普济方》引《指南方》：贼风口㖞。②《妇人良方》：卒然口㖞斜，言语牵急，四肢如故，别无所苦。

06111 防风散

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】 防风（去叉） 杏仁（去皮尖双仁，炒黄色） 白僵蚕（炒）各二两 甘草（炙，锉）一分

【用法】 上为散。每服三钱匕，空心蜜酒调下。

【主治】 风毒，面生痤瘡，遍体瘙痒。

06112 防风散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】 防风（去叉） 羌活（去芦头） 甘菊花（择去梗） 白附子（炮） 山芋 藁本（洗，切，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 蒺藜子（炒，去角）各半两 麝香（研）一分

【用法】 上为细散。每服一钱匕，食后茶清调下。或炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，茶、酒任下。

【主治】 风头眩，目昏痛。

06113 防风散

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】 防风（去叉）二两 菊花四两 蒺藜子（炒，去角） 恶实各一两（炒）

【用法】 上为散。每服三钱匕，食后以熟水调下。

【主治】 肝风，目睛不正，视物偏斜。

06114 防风散

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】 防风（去叉）一两 龙胆一两 生地黄（切，焙）二两 沉香（锉）半两 升麻半两

【用法】 上为散。每用二钱匕，加盐少许，沸汤调匀，揩齿含咽便睡。

【主治】 口舌生疮。

06115 防风散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】 防风 防己 葛根 秦艽 当归 川芎 乌药 甘草 羌活 独活 白术 杏仁 黄芩 白芍 前胡 川断 菊花 天虫

【主治】 妊娠中风。

【方论选录】 中风一症，男妇老少皆有之，重者中脏，轻者中腑，又次中经络。治妇人独难，以妊娠耳。二防、二活、秦、芎、根皆治风药也；风必生热，故用黄芩、白芍、甘菊以凉之；风必多痰，故用前胡、杏仁、天虫以豁之；风盛则气必喘急，故用乌药以顺之，甘草以缓之；而当归、白术、川断配以川芎，佐以黄芩、白芍，皆可以安胎也。但此方风药太多，风能胜湿，且有防己、独活直达下焦，恐伤胎气，用者审之。

06116 防风散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】 北防风 川当归 赤芍药 牛蒡子各一两（炒） 荆芥穗一两二钱 蝉壳七钱半（去土） 生地黄 香白芷 甘草 白附子 白僵蚕（去丝） 何首乌 乌蛇肉（酒浸，去皮骨，焙干）各半两 紫参七钱半

【用法】 上为细末。每服三大钱，加至四五钱，温酒调下。如不饮酒，以蜜汤调下，终不若酒之有功。

【主治】 妇人经脉不匀，气血壅滞，肺有风热，遂令遍身瘾疹，红紫成片，肌肉顽痹，皮肤粗涩，或时瘙痒。

06117 防风散

【方源】《得效》卷十。

【组成】 防风（去芦） 羌活（去芦） 薄荷（去粗梗） 当归（去尾） 大黄 栀子（去须） 川芎各一两 蝉退二十个（去足白） 粉草五钱

【用法】 上为散。每服四钱，水一盏半，加灯心二十茎，苦竹叶十片煎，食后服。

【主治】 积热上冲，头热如火，痛入顶中。

06118 防风散

【方源】《眼科龙木论》卷一。

【异名】 圆翳防风散(《金鉴》卷七十七)。

【组成】 茺蔚子 防风 桔梗 五味子 知母各

二两 黑参 川大黄 细辛 芒消 车前子 黄芩各一两

【用法】 上为末。每用一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食后温服。

【功用】 《金鉴》：泄其热邪。

【主治】 圆翳内障。脑脂流下，肝风上冲，玉翳青白，瞳仁端正，阳看则小，阴看则大。

06119 防风散

【方源】 《普济方》卷五十一。

【组成】 防风 轻粉 荆芥各二分 密陀僧 乳香各一钱

【用法】 上为细末。每夜遇晚，用药一钱涂面上，以乳汁调敷之，次日空心，再用盐、荆芥汤洗之。

【主治】 面上风刺、粉刺。

06120 防风散

【方源】 《普济方》卷五十二。

【组成】 防风 荆芥穗 吴白芷 白茯苓 蔓荆子 威灵仙 何首乌 川芎各三两 苦参 白牵牛各半斤

【用法】 上为粗末。每用药末三两，好浆水三升，煎五七沸，去滓，洗面，每日早晚二次

【主治】 一切风毒，头面生疮。

06121 防风散

【方源】 《普济方》卷六十五。

【组成】 川乌头 防风（去芦） 白芷各一两 川芎一两半 草乌头半两 细辛（去苗土）七钱半 苍术二两（去皮实者）

【用法】 上先用盐揉，后方用药末揉上。

【主治】 牙痛。

06122 防风散

【方源】 《普济方》卷一〇二。

【组成】 防风（去叉） 龙骨 远志 铁精（别研）各一两 紫石英（别研） 丹砂（别研）各二两 熟干地黄（洗，切，焙）二两 人参二两半 干姜（炮） 细辛（去苗叶） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 白茯苓（去黑皮）二两

【用法】 上除别研外，为末，再和匀。每服一钱许，加至二钱，煮取枣汤调下。

【功用】 定心。

【主治】 中风惊悸，心虚恍惚，言语失常，或瞋或怒，志意不乐。

【加减】 如风热盛者，去干姜，加玄参一两。

06123 防风散

【方源】 《医钞类编》卷十一。

【组成】 防风 荆芥 黄芩 石膏 栀仁 薄荷 赤芍 连翘 生地黄 甘草

【用法】 水煎服。

【主治】 眼泡内生毒如菌。

06124 防眩汤

【方源】 《医学集成》卷三。

【组成】 熟地 当归 白芍 焦术各一两 川芎 枣皮 半夏各五钱 人参三钱 天麻一钱 陈皮五分

【主治】 眩晕。

06125 防葵散

【方源】 《圣惠》卷二十二。

【组成】 防葵一两 代赭一两（细研） 人参一两（去芦头） 铅丹一两半 钩藤一两 茯神一两 雷丸一两 虎头骨一两半（涂酥炙令黄） 远志一两（去心） 白僵蚕一两（微炒） 生猪齿一两 防风一两（去芦头） 卷柏一两 川升麻一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 虎掌三分（汤洗七遍，生姜汁拌炒令黄） 朱砂一两（细研） 牡丹一两 牛黄半两（细研） 龙齿二两 蚱蝉十四枚（微炒） 蛇蜕皮一条（烧为灰） 白蔹一两 白马眼睛一对（炙令微黄）

【用法】 上为散，入研了药令匀。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 风癫，精神错乱，发作无时。

06126 防犀饮

【方源】 《玉案》卷六。

【组成】 防己三钱 朴消 犀角 黄芩 黄耆 升麻各八分

【用法】 淡竹叶十五片煎服。

【主治】 丹疹遍身如洒珠者。

06127 防风饮子

【方源】 《兰室秘藏》卷上。

【组成】 细辛 蔓荆子各三分 葛根 防风各五分 当归身七分半 炙甘草 黄连 人参各一钱

【用法】 上锉，如麻豆大，都作一服。水二盏，煎至一盏，食远服。避风寒。

【功用】 《医方集解》：去内热火邪。

【主治】 ①《兰室秘藏》：倒睫拳毛。②《医钞类编》：白眼痛。

【方论选录】 《医方集解》：此足太阴、阳明药也。参、甘以补其气，归身以濡其血，黄连以清其火，防、葛以散风热，细辛人少阴而润肾，蔓荆走头面而升阳。

【备考】 《原机启微》有黄耆，无黄连。

06128 防风根汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十六。

【组成】防风根 于术 当归 姜黄 生黄芪 桑枝

【主治】络虚而致之肩膊疼痛连臂，渐下入环跳，髀膝。

06129 防己地黄汤

【方源】《金匮》卷上。

【组成】防己一分 桂枝三分 防风三分 甘草一分

【用法】上四味，以酒一杯，渍之一宿，绞取汁，生地黄二斤㕮咀，蒸之如斗米饭久，以铜器盛其汁，更绞地黄汁和。分二次服。

【主治】癫狂病，痹证。

①《金匮》：病如狂状妄行，独语不休，无寒热，其脉浮。②《千金》：语狂错，眼目霍霍，或言见鬼，精神昏乱。③《张氏医通》：癫痫语言错乱，神气昏惑。

【方论选录】①《金匮玉函经二注》：此狂者，谓五脏阴血虚乏，魂魄不清，昏动而然也。桂枝、防风、防己、甘草酒浸绞汁，用是轻清归之于阳，以散其邪；用生地黄之凉血补阴，熟蒸以归五脏，益精养神也。盖药生则散表，熟则补衰，此煎煮法也，又降阴法也。②《千金方衍义》：此皆惊痰堵塞于心包，乱其神识所致，故以防己逐其痰气，防风泻其木邪，桂心通其关窍，地黄安其本神，甘草专和桂心、地黄寒热之性也。③《成方切用》：此亦风之进入于心者也。风升必气涌，气涌必滞涎，涎滞则流湿，湿留壅火，邪聚于心，故以二防、桂、甘去其邪，而以生地最多，清心火，凉血热，谓如狂妄行独语不休，皆心火炽盛之证也。况无寒热，则知病不在表，不在表而脉浮，其为火盛血虚无疑尔。后人地黄饮子、犀角地黄汤等，实祖于此。

【临证举例】①癫狂 《黑龙江中医药》（1985；4:30）：一张姓男孩，18岁，精神失常。半年前因与邻里吵闹，遂精神失常，心神不定，常坐室内独语不休，入夜不寐，或信步外游，时喊头痛，多忧善虑，曾延医诊治，屡施导痰、涌吐、攻下三法治之罔效，诊见舌红少津，脉浮大如弦。方用：生地90克，防己9克，防风9克，桂枝10克，生甘草10克。煎服3剂后，心神稍定，夜能入眠，未见出走。后又以此方在剂量上略加变通，并加生赭石40克，生龙、牡各30克，桃仁15克。煎服10剂后，病患遂爽然若失，精神转佳，如常人，并能参加劳动。②痹证 （《新中医》1981；2:36）：刘氏以防己地黄汤加味治疗急性风湿性关节炎50例，所选病例均有明显的游走性关节疼痛，血沉明显增速，最高达162mm/h（魏氏法），部分病人伴低热或中等度发热，自汗，少数病例皮肤出现环形红斑。50例中，风湿活动首次发作者12例，有反复发作史1～20余年者38例。本证乃风寒湿三气杂至与气血相搏，营气不通，郁而化热所致，治以祛风胜湿，活血通络，清热凉血为法，方用防己地黄汤（木防己15克、生地15克、防风9克、桂枝9克、甘草9克）为主，加入蒲公英30克（或野菊花30克），以助控制风湿活动，治疗期间停用任何西药，嘱患者充分休息。结果50例中，显效25例（关节疼痛消失，血沉在2～3周内降至正常范围）有效18例（关节疼痛消失或减轻，血沉在4周内降至正常范围，或2～3周内明显下降，但未达到正常水平），无效7例（关节疼痛及血沉变化不大）。

06130 防己苡仁汤

【方源】《重订通俗伤寒论》引胡在兹方。

【组成】酒炒木防己 杜赤豆 川萆薢 大豆卷 绵茵陈各三钱 晚蚕沙四钱（包） 制苍术 宣木瓜各八分 川柏五分 木通一钱

【用法】先用生苡仁、酒炒桑枝各一两，煎汤代水，以本方送服桃仁控涎丹。

【主治】着痹。湿郁化热，留滞关节肢络。

06131 防己茯苓汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】木防己汤（《外台》卷二十引《深师方》）、防己汤（《圣济总录》卷三十二）、茯苓汤（《鸡峰》卷十九）、防己加茯苓汤（《赤水玄珠》卷五）。

【组成】防己三两 黄耆三两 桂枝三两 茯苓六两 甘草二两

【用法】以水六升，煮取二升，分温三服。

【主治】①《金匮》：皮水为病，四肢肿，水气在皮肤中，四肢聂聂动者。②《圣济总录》：伤寒病后气虚，津液不通，皮肤虚满。

【宜忌】《外台》引《深师方》：忌海藻、松菜、生葱、酢物。

【方论选录】①《医方集解》：防己行经络，茯苓善渗泄，黄耆达皮肤，桂枝走肢节。②《金匮要略心典》：皮中水气，浸淫四末而壅遏正气，气水相逐，则四肢聂聂动也。防己、茯苓善驱水气，桂枝得茯苓，则不发表而反行水，且合黄耆、甘草助

表中之气，以行防己、茯苓之力也。③《退思集类方歌注》：水在皮肤，卫阳必虚而泪没，故用桂枝宣卫阳以解肌；君茯苓，泄皮中水气；黄耆益卫气，生用亦能达表，治风注肤痛；汉防己大辛苦寒，通行十二经，开腠理，泄湿热，此治皮水之主方也。里无水气，故不须白术以固里。

06132 防己黄耆汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 木防己汤（《外台》卷二十引《深师方》）、汉防己汤（《活人书》卷十七）、防己汤（《圣济总录》卷七十九）、逐湿汤（《永乐大典》卷一一三八七九引《风科集验方》）、白术煎（《仙拈集》卷一）、黄耆防己汤（《杂病源流犀烛》卷五）。

【组成】 防己一两 甘草半两（炒） 白术七钱半 黄耆一两一分（去芦）

【用法】 上锉，如麻豆大。每抄五钱匕，加生姜四片，大枣一枚，水一盏半，煎至八分，去滓温服，良久再服。服后当如虫行皮中，从腰下如冰，后坐被上，又以一被绕腰下，温令微汗，愈。

【功用】《医碥》：固表以散风水。

【主治】 肌表气虚，风湿外客，一身尽重，关节烦疼，或腿足浮肿，汗出恶风，脉浮者。

①《金匮》：风湿或风水脉浮身重，汗出恶风者。②《局方》：风湿相搏，客在皮肤，一身尽重，四肢少力，关节烦疼，时自汗出，洒淅恶风，不欲去衣；及风水客搏，腿脚浮肿，上轻下重，不能屈伸。③《医方集解》：诸风诸湿，麻木身痛。④《治疫全书》：风温误汗，恐致亡阳者。

【加减】 喘者，加麻黄半两；胃中不和，加芍药三分；气上冲者，加桂枝三分；下有陈寒者，加细辛三分。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：以黄耆实卫，甘草佐之；防己去湿，白术佐之。然则风湿二邪，独无散风之药何耶？盖汗多知其风已不留，以表虚而风出入乎其间，因之恶风尔。惟实其卫，正气壮，则风自退，此不治而治者也。②《医方集解》：此足太阳、太阴药也。防己大辛苦寒，通行十二经，开窍泻湿，为治风肿、水肿之主药；黄耆生用达表，治风注肤痛，温分肉，实腠理；白术健脾燥湿，与黄耆并能止汗为臣；防己性险而捷，故用甘草甘平以缓之，又能补土制水为佐；姜、枣辛甘发散，调和荣卫为使也。③《成方便读》：防风、防己二物，皆走表行散之药，但一主风而一主湿，用各不同，故方中不用防风之散风，而以防己之行湿。然病因表虚而来，若不振其卫阳，则虽用防己亦不能使邪迳去而病愈。故用黄耆助卫气于外，白术、甘草补土德于中，佐以姜、枣通行营卫，使防己大彰厥效。服后如虫行皮中，上部之湿欲解也。或从腰以下如冰，用被绕之，令微汗出愈，下部之湿仍从下解。虽下部而邪仍在表，仍当以汗而解耳。④《中国医学大辞典》：何以不用桂枝、麻黄以发表祛风，而用防己、黄芪以补虚行水乎？盖以汗出为腠理之虚，身重为土虚湿胜，故用黄耆以走表塞空，枣、草、白术以补土胜湿，生姜辛以去风，温以行水，重用防己之走而不守者，领诸药环转于周身，使上行下出，外通内达，迅扫而无余矣。

【临证举例】 ①功能性水肿 《陕西中医》（1987；1:27）：赵某，女，46岁。半年前出现水肿，经检查肝、肾功能正常，心脏听诊及尿常规检查亦属正常，诊为功能性水肿。曾服西药利尿剂，水肿消，但不能巩固，且出现乏力。诊见下肢浮肿，按之没指，晨轻暮重，乏力肢麻，白带多，大便溏薄，舌苔白薄而腻，脉濡。用防己黄耆汤加味：生黄耆、防己各15克，生炒白术各10克，生姜3片，大枣5枚，赤小豆，玉米须各30克。煎服7剂后肿消，半个月后浮肿又起，仍投上药，再服7剂，病即痊愈。随访半年，未复发。②更年期综合征 《陕西中医》（1987；1:27）：王某，女，47岁。常自汗出，手足发麻，小便量少，下肢浮肿，舌质淡胖，月经错乱，舌苔薄白，脉濡。曾在内分泌科检查，未发现明显阳性指征，诊为更年期综合征。用生黄耆15克，白术、防己各12克，生姜3片，大枣3枚。煎服14剂，水肿消退。③狐臭 《贵阳中医学院学报》（1985；3:34）：以防己黄耆汤治疗狐臭12例，其中男3例，女9例，年龄最大48岁，最小14岁，病程1～25年不等。处方：防己、黄耆各30克，炒白术15克，甘草6克，生姜9克，大枣20克。若水湿甚者，加茅术、车前子（草）；脾虚明显者，加茯苓皮、泽泻；肥胖者，加茵陈、焦山楂各20克。结果12例全部治愈，平均疗程3.5月。

06133 防己葶苈丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】 防己一两 葶苈（隔纸炒）三分 杏仁（去皮尖双仁，炒，研如脂）一分

【用法】 上药先捣前二味为细末，与杏仁同研令匀，取枣肉和丸，如梧桐子大。每日三次，每服二十丸，空腹煎桑白皮汤送下。

【主治】 肺痈。

06134 防己葶苈丸

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】汉防己 木通 贝母各一两 苦葶苈（炒） 杏仁

【用法】上为末，枣肉膏为丸，如梧桐子大。桑白皮汤送下。

【主治】水气凌肺，喘嗽，面目浮肿，小便赤涩，喘促不得卧。

【备考】方中葶苈、杏仁用量原缺。

06135 防风一字散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】川乌五钱 川芎 荆芥各三钱 羌活 防风各二钱半

【用法】上为末。每服二钱，薄荷煎汤送下。

【主治】胆受风热，瞳仁连眦头痒极，不能收睑。

06136 防风天麻散

【方源】《宣明论》卷三。

【异名】防风天麻汤（《医学六要》卷五）。

【组成】防风 川芎 天麻 羌活 香白芷 草乌头 白附子 荆芥穗 当归（焙） 甘草各半两 滑石二两

【用法】上为末。热酒化蜜少许，调半钱，加至一钱，觉药力运行微麻为度。或炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸或半丸，热酒化下；细嚼，白汤化下亦得。

【功用】散郁结，宣通气血，解昏眩。

【主治】风湿麻痹走注，肢节疼痛，中风偏枯，或暴喑不语，内外风热壅滞昏眩。

【宜忌】《普济方》：热势太甚及目疾口疮、咽喉肿痛者，不宜服之。

【备考】本方改为丸剂，名“防风天麻丸”（见《杂病源流犀烛》）。《证治宝鉴》有独活。

06137 防风牛蒡汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十六。

【组成】防风 山栀 石膏 黄芩 苍术 木通 甘草 牛蒡子

【主治】手足忽如火燃，起紫白黄泡，血热之极者。

06138 防风升麻汤

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】升麻 防风 山栀仁 甘草 麦冬（去心） 荆芥穗 木通 葛根 薄荷叶 玄参 连翘 牛蒡子

【用法】水煎服。

【功用】解毒发表。

【主治】小儿十种丹毒。

【加减】便秘者，加大黄。

【备考】《幼幼集成》有灯心，无连翘。

06139 防风升麻汤

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】防风 升麻各八分 青皮 生地黄 牡丹皮 当归 细辛各五分

【用法】水二钟，煎至八分，食远温漱口服，滓再煎。

【主治】牙疼。

【加减】上门牙疼属心火，加黄连、麦冬各五分；下门牙疼属肾火，加知母、黄柏各七分；上左边牙疼属胆火，加羌活、龙胆草各八分；下左边牙疼属肝火，加柴胡、栀子各八分；上右边牙疼属大肠火，加大黄、枳壳各八分；下右边牙疼属肺火，加黄芩、桔梗各八分；上两边牙疼属胃火，加川芎、白芷各七分；下两边牙疼属脾火，加白芍、白术各八分。

06140 防风归芎汤

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】川芎 当归 防风 荆芥 羌活 白芷 细辛 蔓荆子 丹参 乳香 没药 桃仁 苏木 泽兰叶

【用法】水煎，温服。

【功用】化瘀宣散。

【主治】头部跌打损伤，青紫肿胀。

06141 防风四物汤

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤加防风，倍川芎

【主治】妇女春季月水不调，脐腹疼痛，脉弦头痛。

06142 防风必效散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】防风 防己 荆芥 白鲜皮 连翘 槐花 苍术 皂角针 风藤 木通 白芷 天花粉 木瓜 金银花 翻白草各一钱 甘草五分 土茯苓四两 大黄（初起）三钱

【用法】水三碗，煎至二碗，分二次服；滓再煎一碗，服后饮酒一大杯，即静睡一时许更妙。

【主治】杨梅疮，湿热太盛，疮高稠密，元气素实者。

06143 防风当归汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】防风 当归各一钱五分 赤茯苓 独活

秦艽　赤芍药　黄芩各一钱　杏仁　甘草五分　桂心四分　生姜五片

【用法】 上㕮咀。水二钟，煎至一钟，食前温服。

【主治】 血痹，皮肤不仁。

【备考】 方中杏仁用量原缺。

06144　防风当归散

【方源】 《此事难知》。

【异名】 防风当归汤（《医学正传》卷五）、防风当归饮（《证治汇补》卷三）。

【组成】 防风　当归　川芎　地黄各一两

【用法】 上锉。每服一两，水三盏，煮至二盏，去滓温服。

【功用】 祛风养血。

【主治】 ①《此事难知》：发汗过多，发热头面摇，卒口噤，背反张者，太阳兼阳明也。②《妇科玉尺》：产后痉。

06145　防风羊角汤

【方源】 《济阴纲目》卷十二。

【异名】 防风羚羊角汤（《医略六书》卷三十）。

【组成】 防风一两　赤芍（炒）　桂心各半两　羚羊角　川芎　羌活　当归　酸枣仁（炒）　牛蒡子（炒）各二钱

【用法】 上锉。每服四钱，水煎服。

【主治】 ①《济阴纲目》：产后气血不足，风邪所袭，肢体挛痛，背项强直。②《医略六书》：产后血亏寒滞，热郁于经，中风挛痛，强直，脉浮数者。

【方论选录】 《医略六书》：防风疏风邪之外客，羚羊清郁热之炽热，羌活除肢体之痛，牛蒡除项背之强，当归养血脉以荣经，川芎行血气以活络，赤芍泻血中之滞，桂心温血室之寒，枣仁养心润燥以资营血也。水煎温服，使滞化血荣，则热郁自泄而风寒解散，经络清和，肢体项背无不皆受其荫，安有挛急疼痛、牵强挺直之患乎？

06146　防风如神散

【方源】 《妇人良方》卷八。

【组成】 防风　枳壳各等分

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓，空心服。

【主治】 ①《妇人良方》：妇人风虚，大便后时时下血。②《校注妇人良方》：风热气滞，粪后下血。

06147　防风赤芍汤

【方源】 《医略六书》卷三十。

【组成】 汉防己二两　木防己三两　赤芍药一两半　秦艽肉二两　苡米仁五两　宣木瓜三两　川续断三两（酒炒）　杜牛膝三两（酒炒）

【用法】 上为散。每服三钱，水煎，去滓温服。

【主治】 产后瘀血内滞，湿热不化，下注而致脚气，足胫红肿疼痛不止，脉数涩大者。

【方论选录】 汉防己泻血分湿热，木防己散血分风邪，赤芍破瘀血以通经，米仁渗湿热以除痹，秦艽通肌活血，木瓜醒脾舒筋，续断续经脉，牛膝利血脉也。为散水煎，使瘀血消散，则湿热自化而经脉清和，何红肿疼痛之不退哉。

06148　防风羌活汤

【方源】 《眼科全书》卷六。

【组成】 防风　羌活　细辛　黄芩（酒洗）　白芷　南星　半夏　白术　藁本　甘草各等分

【用法】 上为末。每服四钱，水煎，温服。

【主治】 ①《眼科全书》：风寒痰湿，眉棱骨痛。②《眼科阐微》：痰胜入于经络，壅塞通明孔窍，清气不得上升，渐生云翳。

【备考】 按：《审视瑶函》有川芎，无白芷、藁本。

06149　防风羌活汤

【方源】 《伤寒大白》卷一。

【组成】 羌活　防风　荆芥　柴胡　干葛　甘草

【主治】 太阳病，项背强几几，无汗恶寒。

【加减】 冬令，加生姜；夏令，加石膏；里有积热，加川连；胸前饱闷，加枳壳、厚朴。

06150　防风泻肝散

【方源】 《准绳·类方》卷七。

【组成】 防风　远志　桔梗　羚羊角　甘草　赤芍药　细辛　人参　黄芩各等分

【用法】 上为细末。温水调服。

【主治】 蠕眼睛疼。

【备考】 《审视瑶函》本方用法：每服一钱半或二钱，食远沸汤调服。《医钞类编》有元参，无人参。

06151　防风荆芥散

【方源】 《圣济总录》卷一〇一。

【组成】 荆芥穗　莎草根（去毛）各半斤　甘草（炙，锉）三两半　甘菊花（拣）半两　芎藭　白芷　羌活（去芦头）　防风（去叉）各三两

【用法】 上为细末，炼蜜和匀，每一两分作三十饼。每服一饼，细嚼，茶、酒任下，不拘时候。

【主治】 诸风及沐发未干，致头皮肿痒，多生白屑。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“防风荆芥饼”。《普济方》本方用法：上为细散，每服一钱匕，茶、酒任调下，不拘时候。

06152 防风神术汤

【方源】 《伤寒大白》卷一。

【组成】 防风 苍术 甘草 石膏

【主治】 风湿热三气头痛。

【加减】 风气胜者，倍防风，加羌活；湿气胜者，倍苍术，加白芷；热气胜者，倍石膏，加黄柏；太阳见症，加藁本；阳明见症，加升麻；少阳见症，加柴胡。通加川芎少许，上行头角。

06153 防风秦艽汤

【方源】 《外科正宗》卷三。

【组成】 防风 秦艽 当归 川芎 生地 白芍 赤茯苓 连翘各一钱 槟榔 甘草 栀子 地榆 枳壳 槐角 白芷 苍术各六分

【用法】 水二钟，煎至八分，食前服。

【主治】 ①《外科正宗》：痔疮不论新久，肛门便血，坠重作疼者。②《金鉴》：肠风下血，粪前点滴而出者。

【加减】 便秘者，加大黄二钱。

06154 防风消毒饮

【方源】 《麻疹备要方论》

【组成】 荆芥 防风 牛蒡子 甘草 枳壳 桔梗 石膏 苏叶 百部 马兜铃 葶苈 桑皮

【用法】 水煎服。

【主治】 麻毒内攻，喘促胸突，肚急目闭者，九死一生之症。

【备考】 《治疹全书》有苏子、麦冬，无苏叶。

06155 防风通圣散

【方源】 《宣明论》卷三。

【异名】 通圣散(《伤寒标本》卷下)。

【组成】 防风 川芎 当归 芍药 大黄 薄荷叶 麻黄 连翘 芒消各半两 石膏 黄芩 桔梗各一两 滑石三两 甘草二两 荆芥 白术 栀子各一分

【用法】 上为末。每服二钱，水一大盏，生姜三片，煎至六分，温服。

【功用】 疏风退热，泻火通便。

①《宣明论》：解酒，退热毒，兼解利诸邪所伤。②《医方类聚》引《修月鲁般经》：消风退热，散郁闭，开结滞，宣通气血。③《不居集》下集：疏风解热，利水泻火，扶脾燥湿，上下分消，表里交治。

【主治】 风热壅盛，表里三焦俱实之证。身热烦躁，头痛昏眩，口苦而渴，咽喉不利，胸膈痞闷，腹部胀痛，谵妄惊狂，手足瘛疭，大便秘结，小便短赤；小儿诸疳积热，诸疮，丹斑瘾疹，风肿火眼，舌苔黄腻，脉洪数或弦滑。

①《宣明论》：风热怫郁，筋脉拘倦，肢体焦萎，头目昏眩，腰脊强痛，耳鸣鼻塞，口苦舌干，咽嗌不利，胸膈痞闷，咳呕喘满，涕唾稠粘，肠胃燥热结，便溺淋闭；或夜卧寝汗，咬牙睡语，筋惕惊悸；或肠胃怫郁结，水液不能浸润于周身，而但为小便多出者；或湿热内郁，而时有汗泄者；或因亡液而成燥淋闭者；或因肠胃燥郁，水液不能宣行于外，反以停湿而泄；或燥湿往来，而时结时泄者；或表之，阳中正气与邪热相合，并入于里，阳极似阴而战，烦渴者；或虚气久不已者。或风热走注，疼痛麻痹者；或肾水真阴衰虚，心火邪热暴甚而僵仆，或卒中久不语，或一切暴喑而不语，语不出声，或喑风痼者，或洗头风，或破伤，或中风诸潮搐，并小儿诸疳积热，或惊风积热，伤寒疫疠而能辨者；或热甚怫结而反出不快者，或热黑陷将死；或大人、小儿风热疮疥及久不愈者，或头生屑，遍身黑黧，紫白斑驳，或面鼻生紫赤风刺瘾疹，俗呼为肺风者，或成风疠，世传为大风疾者；或肠风痔漏，及伤寒未发汗，头项身体疼痛者，并两感诸症。兼治产后血液损虚，以致阴气衰残，阳气郁甚，为诸热症，腹满涩痛，烦渴喘闷，谵妄惊狂，或热极生风而热燥郁，舌强口噤，筋惕肉瞤，一切风热燥症，郁而恶物不下，腹满撮痛而昏者。兼消除大小疮及恶毒，兼治堕马打扑伤损疼痛，或因而热结，大小便涩滞不通，或腰腹急痛，腹满喘闷者。②《医学正传》：痢后鹤膝风。③《片玉心书》：冻耳成疮者。④《寿世保元》：风热实盛发狂，及杨梅疮。⑤《眼科全书》：时行暴热，风肿火眼，肿痛难开，或头面俱肿。⑥《金鉴》：胃经积热生疮而致之秃疮。

【宜忌】 《准绳·疡医》：若时毒饥馑之后胃气亏损者，须当审察，非大满大实不用。

【加减】 涎嗽，加半夏半两（姜制）。

【方论选录】 ①《医方考》：防风、麻黄解表药也，风热之在皮肤者，得之由汗而泄；荆芥、薄荷清上药也，风热之在巅顶者，得之由鼻而泄；大黄、芒硝通利药也，风热之在肠胃者，得之由后而泄；滑石、栀子水道药也，风热之在决渎者，得之由溺而泄。风淫于膈，肺胃受邪，石膏、桔梗清肺胃也，而连翘、黄芩又所以祛诸经之游火；风之为患，肝木主之，川芎、归、芍和肝血也，而甘草、

白术又所以和胃气而健脾。诸痛疡疮痒，皆属心火，故表有疥疮，必里有实热。是方也，用防风、麻黄泄热于皮毛；用石膏、黄芩、连翘、桔梗泄热于肺胃；用荆芥、薄荷、川芎泄热于七窍；用大黄、芒消、滑石、栀子泄热于二阴；所以各道分消其势也。乃当归、白芍者，用之于和血；而白术、甘草者，用之以调中尔。②《医方集解》：此足太阳、阳明表里血气药也。防风、荆芥、薄荷、麻黄轻浮升散，解表散寒，使风热从汗出而散之于上。大黄、芒硝破结通幽；栀子、滑石降火利水，使风热从便出而泄之于下。风淫于内，肺胃受邪，桔梗、石膏清肺泻胃；风之为患，肝木受之，川芎、归、芍和血补肝；黄芩清中上之火；连翘散气聚血凝；甘草缓峻而和中（重用甘草、滑石，亦犹六一利水泻火之意）；白术健脾而燥湿。上下分消，表里交治，由于散泻之中，犹寓温养之意，所以汗不伤表，下不伤里也。

【临证举例】 ①头痛 《天津医药》（1977；2：82）：将防风通圣散改为汤剂治疗顽固性头痛27例，疗效显著。患者均表现为持续性或反复发作性头痛，病程3个月以上，经多种治疗效果不佳，并排除颅内占位性病变及颅内炎症所致之头痛。其中偏头痛及类偏头痛型血管性头痛6例；非偏头痛型血管性头痛8例，肌收缩性头痛7例，神经官能性头痛3例，鼻副鼻窦炎伴发头痛1例，高血压所致头痛2例。治疗以防风通圣散作为基本方，无大便秘结，去大黄、芒消；无小便黄赤，去山栀、滑石；头昏眼花者，加菊花。结果，治愈19例，显效5例，有效2例，无效1例，未见副作用。作者认为：本方药味太多，应加筛选，可以防风、荆芥、薄荷、麻黄发汗解表，川芎、当归、白芍活血和营作为主药，随证加减。②咽喉肿痛 《齐氏医案》：一患者咽喉肿痛，作渴引饮，大便秘结，按之六脉俱实，乃与防风通圣散。因其自汗，去麻黄、加桂枝；因涎嗽，加姜制半夏；重用消、黄下之而愈。

【备考】 本方去芒消，名“贾同知通圣散”；去麻黄、芒消，加缩砂仁，名“崔宣武通圣散”；去芒消，加缩砂仁，名“刘庭瑞通圣散”（见原书同卷）。本方改为丸剂，名“防风通圣丸”（见《全国中药成药处方集》北京方），又名“通圣丸”（见《全国中药成药处方集》哈尔滨方）。

06156 防风通圣散

【方源】《医学启源》卷中。

【组成】 防风二钱半 川芎五钱 石膏一钱 滑石二钱 当归一两 赤芍五钱 甘草二钱半（炙） 大黄五钱 荆芥穗二钱半 薄荷叶二两 麻黄五钱（去根节） 白术五钱 山栀子二钱 连翘五钱 黄芩五钱 桔梗五钱 牛蒡（酒浸）五钱 人参五钱 半夏（姜制）五钱

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏，加生姜三片，煎至六分，去滓温服，不拘时候，每日三次。病甚者，五七钱至一两；极甚者，可下之，多服二两或三两，得利后，却当服三五钱，以意加减。病愈，更宜常服，则无所损，不能再作。

【主治】 一切风热郁结，气血蕴滞，筋脉拘挛，手足麻痹，肢体焦痿，头痛昏眩，腰脊强痛，耳鸣鼻塞，口苦舌干，咽嗌不利，胸膈痞闷，咳呕喘满，涕唾稠粘，肠胃燥热结，便溺淋闭，或肠胃蕴热郁结，水液不能浸润于周身而为小便多出者；或湿热内甚，而时有汗泄者；或表之正气与邪热并甚于里，阳极似阴，而寒战烦渴者；或热甚变为疟疾，久不已者；或风热走注，疼痛麻痹者；或肾水阴虚，心火阳热暴甚而中风；或暴喑不语，及暗风痫者；或破伤中风，时发潮热搐搦，并小儿热甚惊风，或斑疹反出不快者；或热极黑陷，将欲死者；或风热疮疥久不愈者；并解耽酒热毒，及调理伤寒，发汗不解，头项肢体疼痛，并宜服之。

【备考】《御药院方》有牛膝，无牛蒡。

06157 防风黄芩丸

【方源】《校注妇人良方》卷十二。

【异名】 防风于芩丸（《医略六书》卷二十八）、防风丸（《盘珠集》卷下）。

【组成】 条芩（炒焦） 防风各等分

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食远或食前米饮或温酒送下。

【主治】 妇人肝经风热所致的吐血，衄血，便血，尿血，血崩，漏胎。

①《校注妇人良方》：肝经有风热致血崩、便血、尿血。②《医略六书》：漏胎，脉浮数者。③《叶氏女科》：肝经风热，妊娠吐衄。

【方论选录】《医略六书》：妊娠风热，干于血室，胎孕为之不安，致经血妄行，漏胎下血不止焉。子芩清热于里，防风疏风于外，二味成方，丸以粥糊，下以米饮，使风热两除，则经脉清和而经血无不固，胎孕无不安，何漏胎之不愈哉？

06158 防风黄连汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】 黄连 大黄 防风 远志 茯神各半两

【用法】 上锉细。每服一两，水二盏，煎服。

【主治】 伤寒后，心风狂妄者。

06159 防风黄耆汤

【方源】《古今名医方论》卷二引柯韵伯方。

【组成】 防风 黄耆等分

【用法】 水煎服。

【主治】 中风不能言，脉沉而弱者。

【方论选录】 用防风以驱逐表邪；邪之所凑，其气必虚，故用黄耆以鼓舞正气，黄耆得防风，其功愈大，一攻一补，相须相得之义也。

06160 防风散结汤

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】 防风散结散(《医钞类编》卷十一)。

【组成】 防风 羌活 白芍药 归尾各五分 红花 苏木各少许 茯苓 苍术 独活 前胡 黄芩各五分 炙草 防己各六分

【用法】 上作一服。水二盏，煎至一盏，用手法除病后热服，滓再煎。

【主治】 目上下睫隐起肉疣。

【加减】 病在上睫者，加黄连、柴胡，以其手少阴、足厥阴受邪也；病在下睫者，加藁木、蔓荆子，以其手太阳受邪也。

【方论选录】 以防风、羌活升发阳气为君；白芍药、当归尾、红花、苏木破凝行血为臣；茯苓泻邪气，苍术去上湿，前胡利五脏，独活除风邪，黄芩疗热滋化为佐；甘草和诸药，防己行十二经为使。

06161 防风散结汤

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 玄参一钱 前胡 赤芍药 黄芩 桔梗 防风 土贝母 苍术 白芷 陈皮 天花粉各八分

【用法】 上锉。水二钟，煎至八分，去滓，食后热服。

【功用】《金鉴》：化痰散热。

【主治】 痰火结滞，睑生痰核。睑外皮内，生颗如豆，坚而不疼。

06162 防风葛根汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】 防风 葛根 川芎 生地黄各二两 杏仁(制) 麻黄(去节)各一两半 桂心 独活 甘草 防己各一两

【用法】 上㕮咀。每次四钱，水煎服。

【主治】 妊娠中风，腰背强直，时复反张。

06163 防风葛根汤

【方源】《医学纲目》卷十一。

【组成】 葛根四两 麻黄三两 芍药 防风各二两 桂枝一两

【用法】 上锉细。每用一两，先煮麻黄，去上沫，入后药，同煎数沸，温服。

【主治】 胎前痉，由风寒湿邪乘虚而感，口噤，角弓反张，太阳无汗者。

06164 防风煮肝散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】 防风(去叉) 黄连(去须) 谷精草 黄芩(去黑心) 甘草(炙，锉) 天南星(炮)各一两 蛤粉半分

【用法】 上为细散。每服一钱匕，用羊子肝一片，铜竹刀批开，掺药在内，以麻缕缠定，研粟米饭一大盏，银石锅内煮熟，放温，临卧嚼服。病甚者，不过再服。

【主治】 雀目。

【宜忌】 不得犯铁器。

06165 防风解毒汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 防风 荆芥 桔梗 牛蒡子 连翘 甘草 石膏 薄荷 枳壳 川芎 苍术 知母各一钱

【用法】 水二钟，入灯心二十根，煎至八分，食后服。

【主治】 风毒瘰疬。寒暑不调，劳伤凑袭，多致手、足少阳分耳项结肿；或外寒内热，痰凝气滞者。

06166 防风解毒汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】 防风 连翘 薄荷 前胡 木通 荆芥 力子 江枳壳 甘草

【主治】 时温初期，斑疹未明发者。

06167 防独神术汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】 白术 黄柏 防风 独活

【主治】 湿热腰痛，内热烦热，自汗口渴，二便赤涩，痿痛沉重，右关细数者。

06168 防葛石膏汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】 防风 葛根 石膏 知母 广皮 甘草

【功用】 和解。

【主治】 阳明证口渴消水，表里俱见。

06169 防风当归饮子

【方源】《宣明论》卷十二。

【异名】 防风当归饮(《医学入门》卷七)。

【组成】 防风 当归 大黄 柴胡 人参 黄芩 甘草(炙) 芍药各一两 滑石六两

【用法】 上锉。每服三钱至五钱，水一大盏，加

生姜三片，同煎至七分，去滓温服。

【功用】 ①《宣明论》：宣通气血，调顺饮食。②《丹溪心法附余》：泻心肝之阳，补脾肾之阴。

【主治】 脾肾真阴损虚，肝心风热郁甚，阳胜阴衰，邪气上逆，上实下虚，怯弱不耐；或表热而身热恶寒；或里热而燥热烦渴；或邪热半在表，半在里，进退出入不已，而为寒热往来；或表多则恶寒，里多则发热；或表之阳分正气与邪相助，并甚于里，蓄热极深而外无阳气，里热极甚，阳极似阴而寒战，腹满，烦渴者；或里之阴分正气反助邪气并甚于表，则燥热烦渴而汗出也；或邪热壅塞者；或烦热痛者；或热结极甚，阳气不通而反觉冷痛；或中外热郁烦躁甚，喜凉畏热者；或热极闭寒不得宣通，阳极似阴，中外喜热而反畏寒者；或燥热烦渴者；或湿热极甚而腹满不渴者；或一切风热壅滞，头目昏眩，暗风眼黑，偏正头痛，口干鼻塞，耳鸣耳聋，咽嗌不利；或目赤肿痛，口疮舌痹；或上气痰嗽，心胁郁痞，肠胃燥涩，便溺淋秘；或是皮肤瘙痒，手足麻痹；又或筋脉拘急，肢体倦怠；或浑身肌肉跳动，心悸惊悸；或口眼㖞斜，语言謇涩；或狂妄昏惑，健忘失志；及或肠胃燥热，怫郁而饥，不欲食，或湿热内余而消谷善饥，然能食而反瘦弱；或误服燥热毒药，及妄食热物过多而耗损脾肾，则风热郁甚而多有如此，不必全见也。

【方论选录】《丹溪心法附余》：大黄泻阳明之湿热从大便出，滑石降三焦之妄火从小便出，黄芩以凉膈，柴胡以解肌，防风以清头目，人参、甘草以补气，当归、芍药以补血，无半味辛香燥热之谬药也。

【备考】 方中“防风”原脱，据《袖珍方》补。《杂病源流犀烛》有赤芩，无黄芩。

06170 防风蔓荆子丸

【方源】《外台》卷三十二引《近效方》。

【组成】 防风 黄连 干地黄各十六分 蔓荆子二十分 甘皮六分 萎蕤十分 甘草八分（炙） 茯神十二分 大黄八分（锦文者）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。饮下二十丸。稍稍加之，以大肠畅为度，尽更合服。

【功用】 令眼目明。

【主治】 眼中黑花。

06171 防己椒目葶苈大黄丸

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 己椒苈黄丸（《金匮》卷中）、椒目丸（《千金》卷十八）、防己丸（《圣济总录》卷七十九）。

【组成】 防己 椒目 葶苈（熬） 大黄各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。先食饮服一丸，每日三次。稍增，口中有津液。

【主治】 肠间有水气，腹满，口舌干燥。

【加减】 渴者，加芒消半两。

【方论选录】 ①《退思集类方歌注》：肺与大肠为表里，肠间水气不行于下，以致肺气膈郁于上而燥热之甚。用防己疗水气，椒目治腹满，葶苈泻气闭，大黄泻血闭，急决大肠之水以救肺金之膈郁，不治上而治下，故用丸剂也。②《中国医学大辞典》：此方以防己、椒目导饮于前，大黄、葶苈推饮于后，前后分消，则腹满减而水饮行，脾气转而津液生矣。

【备考】 本方方名，《准绳·类方》引作“防己椒苈丸”、“防椒苈黄丸”。本方改为汤剂，名“防椒苈黄汤”（见《证治宝鉴》）、“防己椒苈汤”（见《中国医学大辞典》）。

06172 收火汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 熟地三两 山茱萸一两 茯苓五钱 肉桂三钱

【用法】 水煎，冷服。

【功用】 大补肾水，引火归脏。

【主治】 少阴肾火上炎咽喉之阴蛾。咽喉肿痛，日轻夜重，喉间亦长成蛾，自觉一线干燥之至，饮水咽之少快，至水入腹，而腹又不安，吐涎如水甚多，将涎投入清水中，即时散化为水，亦有勺水不能下咽者。

06173 收舌散

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】 黄连三钱 人参三钱 菖蒲一钱 白芍三钱

【用法】 先以冰片少许，点之即收；后用本方水煎服，二剂可也。

【主治】 阳火盛强，舌吐出不肯收进。

06174 收血汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】 二地 当归 黄耆各一两 焦术 炮姜 侧柏（炒） 山漆各三分

【主治】 鼻衄属虚火，饮热恶冷者。

06175 收汗丹

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】 人参二两 当归二两 黄耆二两 桑叶三十片 北五味一钱 麦冬五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 产妇产半月，忽然大汗如雨，口渴舌干，发热而躁，口虽渴而不欲饮，舌虽干而苔又滑，其心躁而不至发狂。

【方论选录】 参、归、黄耆大补其气血；麦冬、五味清中有涩；佐桑叶止汗。盖此等虚汗，非补不止，而非涩亦不收也。

06176 收汗丹

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】 玄参三钱 生地三钱 荆芥一钱 五味子三分 桑叶十片 白芍五钱 苏子一钱 白芥子一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 滋阴止汗，消痰降气。

【主治】 胃气盛，饮食之时，头项至面与颈额之间，大汗淋漓。

06177 收汗丹

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】 人参 黄耆 麦冬 熟地各一两 枣仁五钱 五味子三钱 当归五钱 甘草一钱

【功用】 实卫。

【主治】 大汗亡阳，津脱。

06178 收阳粉

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 藁本 麻黄根 白芷各半两 米粉一两半

【用法】 上为细末，搅和匀，纱帛包。扑敷汗出、腿痛处。

【主治】 一切虚汗、盗汗、自汗及漏风。

06179 收阴散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【异名】 收胎散(《女科旨要》卷三)。

【组成】 当归 白芍 川芎 熟地 人参 白术 枳壳 升麻 陈皮各三钱 沉香 肉桂（另研） 柴萸 甘草各一钱

【用法】 上作四贴。水煎服。

【主治】 产后因劳伤过度，兼举重物，致伤脏腑之血，气弱血冷，因而膀胱坠出不收。

【加减】 夜睡不安转动，将于脐下四寸半灸七壮。

【备考】《女科旨要》本方用法：加生姜三片，水煎，空心热服。

06180 收束散

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】 山药 莲须 益智仁各一钱

【用法】 上为末。汤调服。

【主治】 小便数而多。

06181 收肛散

【方源】《医方考》卷二。

【异名】 收肠散(《证治宝鉴》卷八)。

【组成】 熊胆五分 孩儿茶三分 冰片一分

【用法】 上为细末。乳调，涂肛上。

【主治】 ①《医方考》：热泻脱肛。②《济阳纲目》：痔疮。

【方论选录】 热则肛门涩，涩则便不易出，不易出则令人努责，努责之久，则令脱肛。此与寒脱不同者，此则肛门涩，寒脱则洞泄而不涩也。苦可以胜热，故用熊胆；涩可以固脱，故用儿茶；辛可以拔邪，故用冰片。

06182 收肛散

【方源】《外科大成》卷五。

【组成】 陈皮三两 枳壳一两

【用法】 水二钟，煎一钟服。

【主治】 痔漏。

06183 收肛散

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】 五倍子 浮萍草（炒）三钱 诃子肉（炒）三钱 龙骨三钱 木贼三钱

【用法】 干搽或麻油调敷。

【功用】 收缩肛肠。

【备考】 方中五倍子用量原缺。

06184 收泪散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】 绿芦甘石一钱 海螵蛸五分 冰片少许

【用法】 上为极细末。点大眦角。

【主治】 风泪不止。

【方论选录】 二药以燥，片脑辛散之。

06185 收泪散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 煅甘石三钱（水飞） 海螵蛸五分 煅龙骨三分 荜茇粉一钱 硼砂五分 蕤仁七分（去油） 梅片三分

【用法】 上为细末。点眼。

【主治】 迎风热泪症。

06186 收珠散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】 血竭二钱 冰片二分 乳香四钱（去油） 没药四钱（去油）

【用法】 上为极细末，瓷瓶收贮。点之。

【主治】 目受外伤，眼珠落出。

【备考】《外科集腋》有龙骨。《外科集腋》本方

用法：上为末，井花水调稠，以银针蘸药点之。或用银针蘸井花水拔去血筋，将收珠散敷之，随用青绢挪上。先用还魂汤，次服明目生血饮。

06187 收痔丸

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】透明阿胶（炒酥） 黄连（净） 贯众各半两 盈尺皂角（去弦核，醋炙焦） 猬皮（炙焦） 蜂房（炒焦） 蛇皮（略炒） 皂角刺（略炒） 穿山甲（插入热火灰中令焦） 猪后蹄垂甲（烧，以上各存性） 当归 川芎 槐花各二钱半

【用法】上为末，米醋煮面糊丸，如桐子大。每服七十丸，调气用枳壳散下；消血热荆芥煎汤下，食前服。

【主治】诸痔。

【备考】本方方名，《普济方》引作“治痔丸”。

06188 收湿粉

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】铅粉 310 克 松香末 310 克 枯矾 310 克 五倍子末 150 克

【用法】上为细末，调和。用药末直接掺于皮损上，或用麻油调敷疮面。

【功用】收湿止痒。

【主治】湿疹渗水多时。

06189 收膜汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【异名】收脂汤（《辨证录》卷十二）。

【组成】生黄耆一两 人参五钱 白术五钱（土炒） 白芍五钱（酒炒焦） 当归三钱（酒洗） 升麻一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人产前劳役过伤，又触动恼怒，以致肝不藏血，血亡过多，产后阴户中垂下一物，其形如帕，或有角，或二岐，往往出产门外者，至六七寸许，且有粘席下落一片，如手掌大者。

【宜忌】收垂下之物全赖白芍之功，不可用炭。

【方论选录】或疑产后禁用白芍，恐伐生气之源，何以频用之而奏功也。是未读仲景之书者。嗟乎！白芍之在产后不可频用者，恐其收敛乎瘀也，而谓伐生气之源，则误矣。况病之在肝者，尤不可以不用，且用之于大补气血之中，在芍药亦忘其为酸收矣，又何能少有作祟者乎？知下坠之物，正借酸收之力，助升麻以提升气血，所以奏功之捷也。大补其气与血，而少加升提之品，则肝气旺而易生，肝血旺而易养，肝得生养之力，而垂下之物自收。

06190 收膜散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】乌梅一两（去核） 五倍子五钱 绿矾三钱

【用法】上为末。醋调敷上。

【主治】目受外伤，油膜突出。

06191 收口掺药

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】龙骨一钱（煅熟） 厚象皮二钱（煅） 熟石膏五钱 儿茶 轻粉 乳香（去油） 没药（去油） 琥珀各五分 白螺蛳壳（煅末）二钱

【用法】上为细末。掺患处。

【功用】长肉收口。

06192 收口八宝散

【方源】《理瀹》。

【组成】珍珠 牛黄 冰片 象牙 枯矾 铜绿 银朱 轻粉 枯盐 鸡金 金箔

【用法】泔水洗净，敷药。

【主治】心脾热毒之舌肿。

06193 收功万全汤

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】黄耆（蜜水炒）二钱五分 人参一钱 白术（去芦，炒）一钱 白茯苓（去皮）一钱 当归身一钱五分 川芎七分 白芍（酒炒）七分 怀熟地黄一钱 官桂三分 白芷三分 陈皮五分 甘草三分 防风五分

【用法】上锉。加生姜一片，水煎，温服。

【主治】痈疽、发背、诸疮毒溃脓后，毒气已尽，气血虚弱，不长肌肉，不合口，脓清欲作余症。

【加减】如渴，加麦门冬、五味子；烦躁，加生地黄，麦门冬；有痰，加姜制半夏；泄泻，加厚朴（姜炒）；小便不利，加泽泻；怔忡不寐，加远志、酸枣仁（炒）；胸膈不宽，加厚朴（姜炒）、楂肉。

06194 收功尽根丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】枯矾 雄黄 文蛤（炒） 乌梅肉（炒）各三钱 冰片一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，分五服。每日一服，空心白滚汤送下。

【主治】痔漏。

06195 收血双解散

【方源】《点点经》卷二。

【组成】柴胡二钱 苏葵（去甲）一钱 山栀 天冬 麦冬 黄芩 胆草 羌活 故纸各一钱半

香附 黄柏各一钱 甘草四分

【用法】 葱白三茎、荷叶烧灰为引。

【主治】 牙缝流血如泉，不拘身热身凉，及衄血不止。

06196 收带六合丸

【方源】《回春》卷六。

【异名】 益气固肠丸（原书同卷）、收带丸（《简明医彀》卷七）。

【组成】 白术（米泔浸，焙） 苍术（米泔浸，焙） 白茯苓（去皮） 陈皮（盐水洗，去白） 当归（酒洗） 白芍（酒炒）各二两 熟地黄（酒洗） 半夏（姜制）各一两半 椿根白皮（洗，炒） 牡丹皮 黄柏（酒炒）各一两二钱 防风九钱 甘草（炙） 一两 升麻八钱（一方加香附、枳壳）

【用法】 上为末，酒糊丸，如梧桐子大。每服百丸，空心米汤下；盐汤亦可。

【功用】 和脾胃，燥中宫之湿，提下陷之气，化痰清火。

【主治】 赤白带下，肚腹疼痛。

06197 收肠养血和气丸

【方源】《活人心统》卷三。

【异名】 收肠丸（《嵩崖尊生》卷十三）。

【组成】 白术 当归 白芍各一两 川芎 槐角（炒） 山药各八钱 莲肉一两 人参七钱 龙骨（煅） 五倍（子） 赤石脂各五钱

【用法】 米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，米饮送下。

【主治】 肠虚，脱肛日久。

【备考】 本方改为汤剂，名“收肠养血和气汤”（见《中国医学大辞典》）。

06198 如玉散

【方源】《古今医鉴》卷九引宗橘泉方。

【异名】 红玉散（《东医宝鉴·外形篇》卷一）。

【组成】 白芷 藿香 牙皂（去皮子）各一钱 甘松 三奈 水泽 白丁香（另研）各一钱 天花粉 白茯苓各一钱半 杏仁（去皮，另研） 细辛 密陀僧各一钱 樟脑五分（另研） 白及少许

【用法】 上为末。临卧用津唾调，或乳汁调，敷面上，明早温水洗去，其面如玉。

【主治】 面上一切酒刺、风刺，黑皯斑子。

06199 如圣丸

【方源】《普济方》卷六十引《博济》。

【组成】 大黄末一分 蜗牛二七枚 白矾末 陈白梅皮 马勃各一分

【用法】 上于五月五日午时，用白梅皮，蜗牛同研，和丸如楝实大。如患者开口不得，即以水磨，用竹管子吹下入喉中，立愈；如轻者，以绵裹含化一丸。

【主治】 缠喉风及喉痹。

06200 如圣丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】 干姜（炮） 高良姜 胡椒 蜀椒（去目并闭口，炒出汗）各等分

【用法】 上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，早晨空心食前粥饮送下。

【主治】 水泻滑肠，气虚久冷。

06201 如圣丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 胡黄连 白芜荑（去扇，炒） 川黄连各二两 使君子一两（去壳） 麝香（别研）五分 干虾蟆五枚（锉，酒熬膏）

【用法】 上为末，用膏为丸，如麻子大。每服人参汤送下，二三岁者五七丸，以上者十丸至十五丸，不拘时候。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：冷热疳泻。②《张氏医通》：热疳善食腹大。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：此方为治疳杀虫之剂。积久必热，故用二连清积热，合使君子以加强杀虫之力，芜荑燥湿杀虫，虾蟆为疳积腹膨主药，又佐以芳香开窍之麝香，故疳泻可愈。

06202 如圣丸

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】 黄柏 黄芩 黄连 防风各半两 白僵蚕一两 全蝎三分 轻粉半钱

【用法】 上为细末，羊蹄根汁浸，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，嚼羊蹄根汁送下。随病人上下，分食前后。又以羊蹄根涂癣。

【主治】 癣疮。

06203 如圣丸

【方源】《外科理例·附方》。

【异名】 如圣丹（《寿世保元》卷九）。

【组成】 全蝎（酒洗） 连翘 天麻 防风各一两半 荆芥 川芎 白芷 当归（酒洗） 黄柏 羌活 桔梗 大黄（煨） 滑石 石膏（煅） 白术 麻黄 苦参 僵蚕（炒） 蝉蜕 芍药 山栀 枳壳 细辛 皂角刺 大风子肉各一两 独活 人参 郁金 芒消 黄连各五钱

【用法】 上为细末，用红米糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，用六安茶煎汤送下，每日三次，半年全愈。小便尿如靛水黑色，此病久深者，

只用此药二料。

【主治】 癞风。

【宜忌】 如眉毛须发脱落日渐生者，切不可食羊肉、鹅、鸡、猪头、蹄、鲤鱼、生冷，如肯食淡，百日全愈。

【加减】 如疮破裂，只用大风子壳煎汤洗，春夏滑石、石膏依方用，秋、冬二味减半，过春分、秋分服防风通圣散一帖，空心服，利三四次，以粥补之。

06204 如圣汤

【方源】《普济方》卷六十引《旅舍》。

【异名】 如圣麦门冬散(《杨氏家藏方》卷十九)、如圣饮子(《痰论萃英》)、如圣饮(《治痘全书》卷十四)。

【组成】 桔梗一两 甘草（生）一两 牛蒡子（炒）一两 麦门冬半两

【用法】 上为细末。沸汤调下，细细服。入竹叶煎，尤妙。

【功用】 治痰祛热，利咽喉。

【主治】 咽中有疮，咽物不下，及咳嗽咯血，肺痿痰唾气促，并小儿疮疹毒，攻咽喉肿痛。

06205 如圣汤

【方源】《医方类聚》卷七十五引《施园端效方》。

【组成】 桔梗二两 甘草（炒） 陈皮 半夏（姜制）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜七片，同煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】 咽喉噎塞，咳脓血者。

06206 如圣汤

【方源】《医级》卷七。

【组成】 荆芥 防风 桔梗 甘草 连翘

【用法】 水煎服。

【主治】 时感风寒，头疼身热，及咽痛等症。

06207 如圣饮

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】 麻黄（去根不去节，寸截，沸汤掠去沫，晒干）六两 甘草（炙） 一两 桂（去粗皮）半两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁）四十九枚

【用法】 上锉，如麻豆大。以水五盏，银石器内慢火煎取三盏，澄清放温，每服半盏。服罢去枕仰卧，其喘立止，余药以净瓶盛，外以温汤养之，旋旋服。

【主治】 肺气上喘，不以久新。

06208 如圣饮

【方源】《百一》卷六。

【异名】 如圣散(《奇效良方》卷十三)。

【组成】 当归 地榆 缩砂仁 赤石脂 陈皮 石榴皮 诃子肉 甘草 罂粟壳 干姜各等分

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，入陈霜梅一个，煎至七分，去滓，赤痢冷服；白痢热服；赤白痢温服。年高、娠妇、小儿皆可服。

【主治】 一切痢疾，无问久新，或赤、或白，或赤白相杂，日夜无度。

【宜忌】 忌生冷、肥腻物。

06209 如圣散

【方源】 方出《圣惠》卷六十五，名见《局方》卷八（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 水银一分（并胡粉点少许水，研令星尽） 胡粉一两 蛇床子半两（捣为末） 黄连三分（去须，捣为末）

【用法】 上件药，都以生麻油和如稀膏。每用药时先以盐浆水洗疮令净，后以药涂之，干即更换。不过三五度愈。

【功用】《局方》（吴直阁增诸家名方）：活血脉，润皮肤，散风邪，止瘙痒。

【主治】 ①《圣惠》：干疥久不愈，皮肤瘙痒。②《局方》：（吴直阁增诸家名方）：肺脏风毒，攻发皮肤，血气凝涩，变生疥疮，瘙痒，搔之皮起作痂，增展侵引，连滞不愈。

06210 如圣散

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【组成】 苍术六两 川乌头（炮，去皮）四两 草乌头（炮，去皮）二两半 两头尖（炮，去皮）四两 白术 川芎 白芷各一两半 防风 细辛各二两半 蝎梢（微炒） 雄黄各五钱

【用法】 上为末。每服一钱，酒调下，不拘时候。

【功用】 止血定疼。

【主治】 ①《袖珍》引《圣惠》：破伤风。②《普济方》：一切金刃伤，及诸般伤损、中风搐倒，牙关紧闭。

【加减】 如损骨，加乳香五钱。

【备考】《医方类聚》引《袖珍》有天麻一两，无白术、蝎梢。《普济方》本方用法：金刃箭伤，先以药末一钱重，干贴伤口，后用温酒调一二钱服之。

06211 如圣散

【方源】《证类本草》卷八引《孙尚药方》。

【组成】 草薢（细锉） 贯众（去土）各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，温酒调下，空心食前服。

【主治】 肠风痔漏。

06212 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】 蛤粉 青葙子 石决明各半两

【用法】 上为细散。用牛肝二两批开掺药三钱匕在内，麻缕札定，用米泔水煮熟为度，细嚼米饮下，临卧服。觉时便见物。若用鸡、兔肝煮药皆可。

【主治】 肝虚雀目，夜不见物。

06213 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】 白僵蚕（直者，炒） 天南星（炮）各半两

【用法】 上为散。每服一字，以生姜自然汁调下，如咽喉大段不通，即以小竹筒灌之。涎出后，用生姜一片，略炙，含化咽津。

【主治】 喉痹。

06214 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【异名】 宽咽救生散（《普济方》卷六十一引《仁存方》）、僵蚕散（《普济方》卷六十三）。

【组成】 白僵蚕不拘多少（直者，新瓦上炒）

【用法】 上为末，用生姜自然汁为丸，如鸡头子大。含化。急者生姜汁调药末一大钱，以竹筒子灌入喉中。

【主治】 缠喉风，一切喉痹危急。

【临证举例】 喉痹《普济方》：葛彦恢提举阁中，曾患喉痹，五八主簿，用此治之即安。

【备考】 本方改为丸剂，名“如圣丸”、“如神丸”（见《普济方》）。

06215 如圣散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【异名】 如胜散（《朱氏集验方》卷十）、如神散（《仙拈集》卷三）。

【组成】 棕榈一两（烧黑灰） 乌梅一两 干姜一两（并烧过，存伍分性）

【用法】 上为散。每服一钱匕，乌梅汤调下，食前服。久患甚者不过三服。

【功用】《医方集解》：止崩漏。

【主治】 ①《圣济总录》：经血不止。②《普济方》：经血不调，兼治血崩。

【方论选录】《医方集解》：此足厥阴药也，涩能止血，故用棕榈；酸能收敛，故用乌梅；温能守中，故用干姜；黑能止血，故并煅用。

06216 如圣散

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】 赤小豆一升 川乌头一两（炮） 乳香半两 芸台子一两

【用法】 上为细末。每用一钱，入白面一钱，疮肿用水调稀，煮一二沸放温摊纸花上，贴患处；伤折用醋调；骨损用黄米粥调，依患处大小贴之，上用帛子缠系，或以杉木篾夹，五日一换，六十日当愈。

【功用】 消毒，接骨定痛，活养血脉。

【主治】 一切无异色疮肿，并内胸折伤。

【宜忌】 已破者不可用。

06217 如圣散

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】 焰消二钱 青黛一分 郁金 薄荷叶 川芎各二钱 硼砂一字

【用法】 上为末。鼻内搐之。

【主治】 风毒上攻，头目偏痛。

06218 如圣散

【方源】《卫生总微》卷十六。

【组成】 海金沙（炒） 滑石各等分

【用法】 上为细末。每服一字或半钱，乳前食煎灯心汤调下。

【主治】 小儿小便涩滞，滴沥不得通快。

06219 如圣散

【方源】《普济方》卷九十三引《卫生家宝》。

【组成】 蓬莪术（醋煮）半两 天台乌药 白术各一两

【用法】 上为末。每服二钱，温葱酒调下，每日三服至五服，不拘时候。服药三日后，用淋渫药逐邪气。

【主治】 初中风，瘫痪，不经针灸者。

【宜忌】 实人可用。

06220 如圣散

【方源】《妇人良方》卷五。

【组成】 北柴胡 白茯苓 甘草 熟地黄 人参 当归各一两 鳖甲 胡黄连 沉香 知母各半两 桑寄生 干葛各三分

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，加乌梅一个，大枣二个，麦门冬数粒，煎至八分，不拘时候。

【主治】 妇人所禀气血不足，不耐寒暑，易感疾伤，月水不调，久而心虚，状若心劳，四肢易倦，筋骨少力，盗汗易惊，或时不宁，五心烦热，肌肤

不长，间作头昏，饮食无味，胸膈不利，或产前、产后受病。

06221 如圣散

【方源】《医方类聚》卷七十引《施圆端效方》。

【组成】青黛一两 盆消 牙消各七钱 井盐半两 片脑少许

【用法】上为末。鼻内搐少许。

【主治】睛痛不止。

06222 如圣散

【方源】《医方类聚》卷七十七引《经验秘方》。

【组成】川芎 桔梗 薄荷叶 甘草 盆消各等分

【用法】上为细末。每用一钱，干掺。

【主治】舌肿喉痹。

06223 如圣散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】蚕沙一升

【用法】上用水二斗，煎至一斗，滤去滓，夜卧避风处淋洗，水冷即拭干，便睡。

【主治】浑身瘙痒，抓之成疮，及癞疹之类。

06224 如圣散

【方源】《普济方》卷四〇八。

【组成】生白矾一两 沥青末一两 轻粉二钱半

【用法】上为末。先用葱白、槐枝熬汤，洗疮净，绢帛拭干，掺药上，再用小油调搽三五上，发自然生出。

【主治】小儿秃疮，白痂，痒不可忍。

06225 如圣散

【方源】《杂病治例》。

【组成】仙术四两 川芎 防风 白芷各二两 细辛一两 川芎半两 草乌一两 天麻半两 雄黄半两

【用法】上为末。每服一钱，温酒调下。

【主治】风客肢体，如痹疼痛。

06226 如圣散

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】川草乌二两（用豆腐煮过，取出用）苍术（切片，用泔水浸二宿，炒）四两 葱汁十三两 黄柏（去皮）四两 生姜四两

【用法】上为末。入生姜、葱汁捣匀作饼，晒干研末。每服五分，温酒调下。

【主治】风气走注，历节麻痹，左瘫右痪，手足疼痛麻木，风痹。

06227 如圣散

【方源】《赤水玄珠》卷七引钱氏方。

【组成】桔梗 甘草 阿胶（炒白）

【用法】煎甘、桔取清，纳胶化服。

【主治】肺痈。

06228 如圣膏

【方源】《得效》卷十三。

【组成】附子 硫黄

【用法】姜汁调匀。先以布擦洗其疮令损，却以茄蒂蘸药擦。

【主治】白紫癜风。

06229 如圣膏

【方源】《普济方》卷八十四引《德生堂方》。

【组成】寒水石 防风 细辛 薄荷 川芎 白芷 独活 黄芩 蓖麻子（去壳，别研）各等分

【用法】上为末。冬用蜜水调，春、夏、秋月用井花水和，涂太阳穴。

【主治】风眼头痛。

06230 如神丸

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】蜗牛二七枚 白矾（末） 马勃（末） 陈白梅肉 大黄（末）各一分

【用法】上于端午日午时同研为丸，如苦楝子大。每遇患开口不得者，取一丸，以水磨，用竹管子吹下，入喉中即愈；轻可只以绵裹含化一丸。

【主治】喉中忽然结塞不通。

06231 如神丹

【方源】《医学正传》卷七。

【组成】巴豆三枚 蓖麻子七枚

【用法】上药各去壳，研，入麝香少许，揑作饼子，贴脐。

【功用】《东医宝鉴·杂病篇》：催生。

【主治】难产。

06232 如神汤

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】罂粟壳（大者，去顶蒂瓤净，锉，蜜拌湿，炒干） 当归（去芦） 丁香（不见火） 白术各一两（炒） 乳香半两（别研）

【用法】上㕮咀。病轻者每服三钱，水一盏，煎七分，去滓，通口服；甚者每服半两，水一盏半，煎至八分，去滓服。只一二服见效。

【主治】新久泻痢，或赤或白，或水泻。

06233 如神汤

【方源】《医学纲目》卷二十八。

【异名】如神散（《伤科汇纂》卷七）。

【组成】玄胡索 当归 桂心 杜仲各等分

【用法】上为末。每服三钱，温酒调下。甚者不

过数服。

【主治】 ①《医学纲目》：腰痛。②《仙拈集》：闪挫腹痛，妇人产后腰痛。

06234 如神散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 独头 干姜 草乌头各等分 香白芷少许。

【用法】 上为细末。先令痛者嚼水一口，鼻内搐药一字，不移刻便止。

【主治】 夹脑风，及一切头痛不可忍。

06235 如神散

【方源】《医方类聚》卷七十七引《济生续方》。

【异名】 缩舌膏(《普济方》卷五十九引《仁存方》)。

【组成】 梅花片脑不拘多少

【用法】 上为细末。以一字掺于舌上，未知，再掺则愈。

【主治】 伤寒热毒攻心，舌出过寸。

06236 如神散

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【异名】 如圣散(《普济方》卷三〇〇引《德生堂方》)。

【组成】 川大黄

【用法】 上为末。新汲水调，搽冻破疮上。

【主治】 冻疮皮肤破烂，痛不可忍。

06237 如神散

【方源】《医方类聚》卷一三三引《经验良方》。

【组成】 阿胶（蛤粉炒）二两 栀子 车前子 黄芩 甘草各三钱半

【用法】 上为细末。每服半钱，加至一钱，井花水调下，日三服。

【主治】 心脏有热，乘于血分，血渗小肠，尿血。

【备考】 本方改为丸剂，名"如神丸"（见《证治宝鉴》）。《金匮翼》本方用法：合犀角地黄汤用之良。

06238 如神散

【方源】《外科发挥》卷五。

【组成】 松香末一两 白矾三钱

【用法】 上为末。香油调搽；干搽亦可。

【主治】 瘰疬已溃，腐肉不去，疮口不合。

06239 如神散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】 细辛 白芷 川乌 草乌 川芎 白术 当归各一两 苍术 牛膝 天麻 鳔胶 川山甲 白花蛇（酒浸，微炒）各五钱 朱砂 雄黄各三钱

【用法】 上为细末。每服一钱半，夜卧时热黄酒送下。盖暖出微汗，避风寒，三四服即见效，以愈为度。

【主治】 半身不遂。

【宜忌】 忌发物。

06240 如神膏

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】 阿魏 朴消 硫黄 甘草 甘遂各一钱 麝香三分 青皮三钱

【用法】 上为末，独蒜一个，葱头七个捣烂，入前药末捣匀，摊布上。隔布贴患处。

【主治】 痞积。

06241 如意丸

【方源】《济生》卷四。

【组成】 枳壳（去瓤） 槟榔 橘红 半夏（汤炮七次） 蓬术 京三棱 干姜（炮） 黄连（去须）各二两 巴豆三七粒（连壳用）

【用法】 上除巴豆外，锉如豆大，用好醋合巴豆煮干，去巴豆，余药焙为细末，薄糊为丸，如绿豆大。每服十丸，加至十五丸，食后临卧清茶、姜汤任下。

【主治】 中虚积冷，气弱有伤，不能传化，心中坚痞，两胁胀满，心腹疼痛，噫宿腐气；及霍乱吐泻，米谷不消；久痢赤白，脓血相杂，久病黄色羸瘦；及腹中一切食癥之疾。

【宜忌】 孕妇不宜服。

06242 如意丸

【方源】《直指》卷五。

【组成】 沉香 木香 大丁香 荜澄茄 使君子 辣桂 川白姜（炒） 桃仁（炒） 五灵脂（炒） 硇砂（醋浸半日） 雄黄 没药 大戟 牵牛（炒，取末） 巴豆（去油）各一两 荆三棱 蓬莪术 肉豆蔻（炮）各半两

【用法】 上为末，水煮面糊为丸，如麻子大。每服二丸，加至三丸止，温酒送下。

【主治】 积聚块痛，疝瘕癥癖。

06243 如意丹

【方源】《本草纲目》卷三十四引《颐真堂经验方》。

【组成】 母丁香三十六粒 滴乳香三钱六分

【用法】 上为末，同活兔胆和杵千下，丸作三十六丸。每服一丸，好酒化下。

【主治】 妇人产难。

06244 如意汤

【方源】《普济方》卷六十九。

【组成】荆芥穗　防风　薄荷叶　白芷　黄柏　黄连　地骨皮　贯众各等分

【用法】上为粗末。水煎，温漱；外洗金疮。

【主治】骨槽风，走马牙疳，及金疮。

06245　如意散

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】百合　黄耆（蜜炙）　当归（去芦）　茯神（去木）　人参（去芦）　五味子　甘草（炙）　柏子仁　白茯苓（去皮）各等分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，生姜三片，乌梅一枚，煎至七分，不拘时候服。

【主治】忧思过度，心血不足，倦乏瘦悴，或夜发寒热。

06246　如圣饮子

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】人参（去芦头）一两　款冬花一两　罂粟壳（去瓤）二两（炙）　乌梅一两（捶碎）

【用法】上㕮咀。每服五钱，用水二盏，煎至一盏，去滓，食后临卧热服。

【主治】肺气虚寒，咳嗽喘急。

06247　如圣饼子

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【组成】防风　天麻　半夏（生）各半两　天南星（洗）　干姜　川乌（去皮尖）各一两　川芎　甘草（炙）各二两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如鸡头子大，捻作饼子晒干。每服五饼，同荆芥三五穗细嚼，茶、酒任下，熟水亦得，不拘时候。

【功用】清头目，消风化痰，暖胃。

【主治】男子妇人气厥，上盛下虚，痰饮风寒伏留阳经，偏正头疼，痛连脑巅，吐逆恶心，目瞑耳聋。

06248　如圣饼子

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】沉香二钱半　安息香　木香各一钱半（不见火）　丁香（不见火）　藿香叶（去土）　乳香各三钱（别研）　半夏（汤泡七次）　桂心（去粗皮）各二两

【用法】上用天南星一两半，炮紫色为末，半两用生姜自然汁煮糊，别用硫黄三钱（研细）、水银二钱，同前药用南星糊为剂，分作四十九饼。每服半饼，用生姜汁化开，空心白汤送下。

【主治】膈气反胃。

06249　如圣饼子

【方源】《内经拾遗》卷二。

【组成】苍术（泔浸）四两　川芎　白芷各二两　草乌一两（姜汁炒）

【用法】上为细末，酒糊为饼，如小围棋子大。每服七饼，用细茶一撮，嚼烂，早晨茶清送下。服后一日不可见风。

【主治】头痛、头风因寒者。

06250　如圣金刀散

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】金刀散（年氏《集验良方》卷一）。

【组成】松香末七两　枯矾　生矾各一两五钱

【用法】上为极细末，罐密收贮。掺伤处，纸盖绢扎；血止三四日后，必焮痛作脓，换掺生肌散，三日三次，其疼即止；以后日用葱汤洗之，换搽玉红膏长肉生肌。避风为要。

【功用】①年氏《集验良方》：脱腐生新，收敛。②《伤科补要》：止血燥湿。

【主治】①《外科正宗》：刀刃所伤，皮破筋断，飞血不止。②年氏《集验良方》：痈疽发背，诸般溃烂，棒毒金疮。

06251　如圣胜金锭

【方源】《局方》卷七（宝庆新增方）。

【组成】硫黄（细研）　川芎　腊茶　薄荷（去枝梗）　川乌（炮）　消石（研）　生地黄各二两

【用法】上为细末，绞生葱自然汁搜和为锭。每服先用新汲水灌漱吐出，次嚼生薄荷五七叶微烂，用药一锭同嚼极烂，以井水咽下，甚者连进三服即愈；重舌腮肿，先服一锭，次以一锭安患处，其病随药便消；治冒暑伏热，不省人事，用生薄荷水调研一锭，灌下即苏；如行路常含一锭，即无伏热之患；口舌生疮，不能合口及食热物，如上法服讫，用水灌漱，嚼薄荷十叶，如泥吐出，再水灌漱，嚼药一锭含口内聚涎裹之，觉涎满方吐出，如此服三锭，便能食酒醋；遇食咸、酸、酢脯、炙煿，喉中生泡，须掐破吐血，方与薄荷数叶，以一锭同嚼，井水吞下；砂淋、热淋，小便出血，同车前草七叶、生姜小块研烂，水调去滓，嚼药一锭，以水送下。此药常常随身备急。小儿只服半锭。

【功用】分阴阳，去风热，化血为涎，化涎为水。

【主治】急喉闭，缠喉风，飞痧，单双乳蛾，结喉，重舌木舌，腮颔肿痛，不能吞水粥。及冒暑伏热，不省人事，砂淋、热淋，小便出血。

【备考】本方方名，《玉机微义》引作“如圣胜金锭子”。

06252 如圣胜金锭

【方源】《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。

【组成】 朴消四两 川芎一两 硫黄（细研）一两半 贯众二两 薄荷叶 荆芥穗 嫩茶各半两

【用法】 上件为末，绞生葱自然汁搜和为锭。每服先用新汲水，漱漱吐出，次嚼生薄荷五七叶微烂，用药一锭，同嚼极烂，以井水咽下，甚者连进二服即愈；重舌腮肿，先服一锭，次以一锭安患处，其病随药便消；治冒暑伏热，不省人事，用生薄荷水调研一锭，灌下即苏；如行路常含一锭，即无伏热之患；口舌生疮，不能合口并食热物，如上法服讫，用水灌漱，嚼薄荷十叶，如泥吐出，再水灌漱，嚼药一锭，含口内聚涎裹之，觉涎满方吐出，如此服三锭，便能食酒醋；遇食咸酸酢脯、炙煿，喉中生泡，须掐破吐血，方与薄荷数叶，以一锭同嚼，井水吞下；砂淋、热淋，小便出血，同车前草七叶、生姜小块研烂，水调去滓，嚼药一锭，以水送下。此药常常随身备急。小儿只服半锭。

【功用】 分阴阳，去风热，化血为涎，化涎为水。

【主治】 急喉闭，缠喉风，单双乳蛾，结喉，重舌木舌，腮颔肿痛，不能吞水粥。及冒暑伏热，不省人事，砂淋、热淋，小便出血。

06253 如圣黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】 黄耆（锉） 乌梅（去核） 知母（焙） 甘草（炙，锉） 款冬花 秦艽（去苗土） 贝母（去心，炒） 半夏（汤洗七遍，焙）各一两 糯米桑根白皮（锉）各一分 桃仁（去皮尖，麸炒） 鳖甲（去裙襕，醋炙黄）各半两 人参一两半 柴胡（去苗）二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，加生姜三片，桃枝、柳枝、葱白、薤白各少许，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 虚劳，心肺俱伤，咳唾脓血。

06254 如金解毒散

【方源】《痈疽神秘验方》。

【异名】 如金解毒汤（《医钞类编》卷六）。

【组成】 桔梗一钱 甘草一钱半 黄连（炒） 黄芩（炒） 黄柏（炒） 山栀（炒）各七分

【用法】 水二钟，煎至八分，作十余次呷之，不可急服。

【功用】 降火解毒。

【主治】 肺痈。发热烦渴，脉洪大。

06255 如神开骨膏

【方源】《妇人良方》卷十七引《海上方》。

【组成】 乳香 朱砂各等分

【用法】 上为末。麝香酒调下。

【功用】 催生。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“如神开骨散”。

06256 如神木香丸

【方源】《三因》卷十一。

【组成】 本香 硇砂（滴淋控干） 蓬术（炮） 胡椒 半夏（浆水煮） 干漆（炒大烟尽）各半两 缩砂仁 桂心 青皮各三两 附子（炮，去皮脐） 三棱（醋煮一宿）各一两 白姜（炮）一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心生姜橘皮汤送下。

【主治】 谷气结聚癥瘕，胸胁闷痛，或吐酸水，食后噫作生熟气，腹胀泄泻及四肢浮肿。

06257 如神白虎汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】 石膏 知母 甘草 人参 山栀 麦门冬 五味子

【用法】 水二钟，加大枣一枚，生姜一片，淡竹叶十片，水煎，热服。

【主治】 ①《伤寒六书》：伤寒身热，渴而有汗不解，或经汗过而渴不解，脉来微洪。②《简明医彀》：中暑。

【宜忌】 无渴不可服。

【加减】 心烦者，加竹茹一团；大渴心烦，背恶寒者，去山栀，加天花粉。

06258 如神救苦散

【方源】《医学正传》卷一。

【组成】 御米壳（蜜炒）一钱 陈皮五钱 壁虎（炙黄，即蝘蜓） 乳香 没药 甘草各二钱五分

【用法】 上为末。每服三钱，水煎服。

【主治】 瘫痪，手足走痛不止。

【宜忌】 非痛勿用。

06259 如神断痫丸

【方源】《幼科发挥》卷二。

【组成】 黄连五钱 白茯神 石菖蒲各三钱 胆星 珍珠 铁花粉各一钱 朱砂（飞）三钱 甘遂五分

【用法】 上为细末，粟米粉煮糊，入猪猪心血三枚同杵匀为丸，如弹子大。每一丸，取猪猪心一枚，切开两片，入药在内，线扎定，水煮熟，分三服，本汤送下。

【主治】 急惊风后，急痰停聚，迷其心窍，变成

痈疾。或一月一发，或半年一发、或一年一发，发过如常。

06260 如意金黄散

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】金黄散(《嵩崖尊生》卷十二)、神效金黄散(《良朋汇集》卷五)、金黄如意散(《奇方类编》卷下)。

【组成】天花粉（上白）十斤 黄柏（色重者）大黄 姜黄 白芷各五斤 紫厚朴 陈皮 甘草 苍术 天南星各二斤

【用法】上㕮咀，晒极干燥，用大驴磨连磨三次，方用蜜绢罗厨筛出，瓷器收贮，勿令泄气。凡遇红赤肿痛，发热未成脓者，及夏月火令时，俱用茶汤同蜜调敷；如微热微肿，及大疮已成，欲作脓者，俱用葱汤同蜜调敷；如漫肿无头，皮色不变，湿痰流毒，附骨痈疽，鹤膝风等症，俱用葱酒煎调；如风热恶毒所生疾患，必皮肤亢热，红色光亮，形状游走不定，俱用蜜水调敷；如天泡、火丹、赤游丹、黄水漆疮，恶血攻注等症，俱用大兰根叶捣汁调敷，加蜜亦可；汤泼火烧，皮肤破烂，麻油调敷。

【功用】《外科十三方考》：清热、解毒、消肿、定痛。

【主治】外科一切痈疡属阳证者，及跌打损伤，虫蛇咬伤。

①《外科正宗》：痈疽发背，诸般疔肿，跌扑损伤，湿痰流毒，大头时肿，漆疮，火丹，风热天泡，肌肤赤肿，干湿脚气，妇女乳痈，小儿丹毒，凡外科一切顽恶肿毒。②《金鉴》：小儿玉烂疮，脏热内蒸，湿气外乘，身热皮红，能食米面者。③《全国中药成药处方集》（沈阳方）：蛇虫咬伤，蜂蝎螫毒，癣疥湿癞，皮肤瘙痒，冻疮痒痛。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（南昌方）：皮色不红者忌敷，并忌入口。

06261 如意铁箍散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】大黄四两 陈皮二两 南星二两 白及二两 姜黄四两 白芷三两 毛菇二两 厚朴四两 花粉四两 甘草一两 血竭二两 芙蓉叶四两 五倍子（炒）半斤 陈小粉（炒黑）一斤

【用法】上为细末。鸡子清或醋调敷。

【主治】一切痈疽，红白相兼之症。

06262 如意通圣散

【方源】《准绳·类方》卷四引《集验方》。

【异名】如意通圣汤(《嵩崖尊生》卷十)。

【组成】当归（去芦） 陈皮（去白） 麻黄（去节） 甘草（炙） 川芎 御米壳（去顶膈） 丁香 各等分

【用法】上用慢火炒令黄色。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】行痹，走注疼痛。

【加减】如腰脚走注疼痛，加虎骨、没药、乳香；如心痛，加乳香、良姜；如赤眼，加草龙胆、黄连。

【方论选录】《金匮翼》：麻黄之猛，而得粟壳之涩，则内行经络，不复外发皮毛，故得治痹痛之疾；芎、归所以行血，陈皮、丁香所以行气，气血以行，邪气以去；炙草则和药缓急之用耳。慢火同炒者，欲令气味和合，使不相悖而相就也。

【备考】《嵩崖尊生》有枳壳，无御米壳。

06263 妇宝丸

【方源】方出《女科万金方》，名见《墨宝斋集验方》卷上。

【异名】四制香附丸(《墨宝斋集验方》)。

【组成】香附不拘斤两（分作四份，一份盐水浸煮，焙干；一份童便浸煮，焙干；一份与山栀四两同炒，去山栀；一份醋浸煮，焙干）

【用法】上为末，醋糊为丸。空心服五六十丸，醋汤或盐汤、米饮、酒皆可送下。

【主治】妇人经候不调。

【宜忌】《墨宝斋集验方》：忌萝卜、豆腐、葱白。

【备考】《墨宝斋集验方》本方用法：蒸饼为丸，如梧桐子大，每服百丸，日进三服。

06264 妇宝丹

【方源】《医方集解》。

【异名】妇科妇宝丹(《全国中药成药处方集》沈阳方)。

【组成】艾附暖宫丸加阿胶

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：调经养血。

【主治】①《医方集解》：虚寒，经水不调。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：带下淋浊，腰腿痛，四肢倦怠，崩中漏血，气促头眩，手足冰冷，气血两亏。

【备考】《医林纂要》本方用当归四两（酒洗）、生地黄三两（酒润）、白芍药二两（炒）、川芎二两、艾叶二两、香附二两（童便、盐水、酒、醋各浸三日）、阿胶二两。《全国中药成药处方集》（沈阳方）本方用法：上为细末，阿胶化烊，炼蜜为

丸，二钱重，每服一丸，白开水送下。

06265 妇人归附丸

【方源】《济阴纲目》卷六。

【组成】香附子（大者，砂罐内醋煮极熟，水洗，焙干为末）一斤 当归（大者，去芦梢，用身，洒洗，切片，焙干为末）十两 鹿角（大者，刮去粗皮，镑末二三两，绵纸垫铁锅内，文火炒，为细末）二两

【用法】上药和匀，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，早起、临睡各一服，白滚汤送下。一月，经后入房即孕，且无小产、产后诸证。

【功用】种子。

06266 妇女乌发丹

【方源】《文堂集验方》卷三。

【组成】侧柏叶一握 核桃一个 榧子三个

【用法】上药捣烂，用滚水泡。待凉搽发，频年不断。

【功用】乌发，头发至老黑而不秃

06267 妇女紫金丹

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】砂仁 枳壳（炒焦） 天台乌药各一两五钱 广木香 陈皮 延胡索 红豆蔻 蓬莪术 京三棱各一两 槟榔一两三钱

【用法】上为细末，赤米汤泛为丸，如梧桐子大。每服三钱，熟汤送下。

【主治】妇女气郁血凝寒滞，经水不通，或乱经痛经，不能受孕，及肝血气块作痛。

06268 妇女痛经丸

【方源】《北京市中成药规范》第二册。

【组成】延胡索 93.75 千克 蒲黄炭 93.75 千克 五灵脂 93.75 千克 丹参 93.75 千克

【用法】丹参煮提两次，时间为 2.5 小时、1.5 小时；五灵脂 31.25 千克，沸腾后立即关气，保持（80℃）左右，温浸二次，时间分别为 2.5 小时、1.5 小时；合并以上药液过滤沉淀，减压浓缩至比重 1.35，温度 50℃ 的稠膏；延胡索、蒲黄炭、五灵脂各 62.5 千克粉碎为细粉，过一百孔罗，混匀；取原粉及稠膏按比例制丸，低温烘干，包绿色衣，每 50 千克干丸药用滑石粉 15.74 千克、白沙糖 16.6 千克、食品用色素柠檬黄 3 克、靛蓝 0.8 克为衣闯亮，每百粒包衣前干重 12 克。口服，每次五十粒，每日二次，温开水送下。

【功用】调经止痛。

【主治】气血凝滞，小腹胀疼，经期腹痛。

06269 妇宝宁坤丸

【方源】《全国中药成药处方集》（杭州方）。

【组成】吉林人参二钱 大熟地五钱 制香附五钱 紫苏叶二钱五分 大生地五钱 驴皮胶二钱五分 全当归五钱 广橘红五钱 川牛膝二钱 于术五钱 沉香一钱 川芎五钱 台乌药五钱 西砂仁一钱五分 炒黄芩五钱 西琥珀二钱五分 白茯苓五钱 广木香二钱五分 炙甘草一钱五分 东白芍五钱 益母草三两

【用法】各取净粉，用柏子仁一两，煎汤去滓，和炼白蜜为丸，每重三钱，蜡壳封固。每服一丸，开水化服。

【功用】调经种子，养血安胎。

【主治】妇人气血两亏，月经不调，崩漏带下，诸虚百损，久不受孕，一切胎前产后诸病。

06270 妇宝胜金丹

【方源】《何鹤亭集方》。

【组成】人参 白术 茯苓 炙草 当归 白芍 熟地 川芎 白薇 肉桂 藁本 白芷 丹皮 没药 元胡 赤石脂各一两 香附十五两（一次稻叶，二次童便，三次米醋）

【用法】上药蜜丸。每服一丸，温酒化下。

【主治】妇人经水不调，色淡色瘀，行经腹痛，赤白带下，子宫虚冷，久不受孕，癥瘕癖瘕，胎前产后一切之患，及半身不遂，中风瘫痪。

06271 妇宝调经汤

【方源】《简明医彀》卷七。

【组成】当归二钱 熟地黄 白芍药 川芎各一钱半 香附一钱二分 大腹皮 吴萸 紫金皮 肉苁蓉（洗净） 条芩各一钱 甘草五分

【用法】加生姜、大枣，水煎，经时服。

【主治】经期不准，或前或后，紫淡不同，多少不等。

06272 好槐枝汤

【方源】《普济方》卷七十四。

【组成】槐枝（锉）二两 秦皮 黄连（去须） 蕤仁（去皮） 马牙消 黄柏（去粗皮） 山栀子各半两 古字钱十四文 淡竹叶一握（细切） 食盐一分

【用法】上为粗末。每用五钱，水二盏，入钱，煎至一盏半，滤去滓，放温洗眼，冷再暖洗。

【主治】赤目昏痛，泪出隐闷。

06273 观音丸

【方源】《直指》卷二十。

【组成】血竭 熊胆（研）各二钱 人参 蛇蜕（皂角水洗，新瓦焙）各半两 木贼（去节，童便

浸，晒） 苍术（童便浸二宿，晒） 威灵仙 鹰爪黄连（去须） 地骨皮（洗，晒） 蔓荆子 茺蔚子 车前子 川芎 当归 羌活 蝉蜕（洗，晒） 石决明（煅，存半生）各一两 蚕蜕纸二十幅（炒焦）

【用法】 上为细末，用羯羊肝一具，去筋膜，慢火煮至半生熟，带血性和药同捣，以粟米粉用肝汁煮，糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，温米泔送下或石菖蒲煎汤送下，食后常服。

【主治】 内外障失明，或欲结青光内障，或赤脉疼痛。

06274 观音灸

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】 硫黄一两 全蝎一钱（水泡一宿） 蝉酥二分 矾红土五分 火消一钱 飞黄丹一钱 潮脑五分

【用法】 上为细末，先将硫黄化开，再入诸药，候温又入麝香三分，搅匀，摊在青石上半钱厚。用时只一米粒，先将饭箸寻穴痛处，点上，用粗香头燃着，后用青布一块包中指蘸水揉患处。

【主治】 风湿疼痛。

06275 观音散

【方源】《得效》卷十一。

【组成】 人参 白术（纸裹，煨） 扁豆（炒）各二钱半 白茯苓 冬瓜子仁 酸枣仁（去皮，蚌粉炒） 甘草（炙）各半两 藿香 枳壳（去瓤）各二钱半 紫苏叶少许 木香（不见火） 石莲肉（去心） 嫩黄耆各半两

【用法】 上为末。每服一钱，乌梅汤、冬瓜子仁汤或陈米汤调皆可。

【主治】 小儿慢惊；或胃气不和，脾困，下泻过多，不思饮食，乳食不化，精神昏慢，四肢困冷。

06276 观音散

【方源】《幼科发挥》卷二。

【组成】 全蝎（去毒，炒）十个 天麻（煨） 防风 白芷 黄耆 甘草 白茯苓各二钱五分 人参二钱 扁豆（姜汁炒）一钱五分

【用法】 上为末。枣汤调下。

【主治】 慢惊风。

06277 观音全蝎散

【方源】《活幼口议》卷十四引东汉王氏方。

【异名】 观音散（《活幼口议》卷十四）、全蝎散（《永乐大典》卷九八一引《如宜方》）、全蝎观音散（《医统》卷八十九）。

【组成】 黄耆一两 人参一分 木香一两 炙草 石莲肉（炒） 扁豆（炒） 白茯苓各一两 白芷 全蝎 防风 羌活各一两 天麻二两

【用法】 上为末。每服半钱或一钱，用大枣半个，水一小盏，煎至半盏，不拘时候服。

【功用】 清神固气，补虚益脉，开胃止吐，生胃气，截风定痫。

【主治】 ①《活幼口议》：小儿因吐而传为慢惊风者。②《金鉴》：频吐清涎，身体发热，心神烦躁，睡卧不宁。

【备考】《医统》本方用法：上为末，每服二钱，用生姜、大枣汤调服或煎服。

06278 观音救生散

【方源】《医方类聚》卷二二九引《琐碎录》。

【组成】 桂心不拘多少（不见火）

【用法】 上为细末。每服一大钱，痛阵密时，暖童便调下。

【主治】 ①《医方类聚》引《琐碎录》：妇人生产不利，或横生倒生，至三四日不生者。②《本草纲目》：死胎不下。

06279 观音救苦散

【方源】《医方类聚》卷一一七引《修月鲁般经》。

【组成】 人参 当归 滑石 甘草 粟壳（蜜炙）

【用法】 上㕮咀。用乌梅一枚，水二钟，临睡煎服。

【主治】 嗽。

06280 观音人参胡桃汤

【方源】《百一》卷五引《夷坚·已志》卷三。

【异名】 人参胡桃汤（《济生》卷二）、观音散（《普济方》卷一五八引《经验良方》）、参桃汤（《古今医鉴》卷四）、神授汤（《医林绳墨大全》卷二）、参胡汤（《证治汇补》卷五）、观音应梦饮（《冯氏锦囊·杂症》卷十二）。

【组成】 新罗人参一寸许 胡桃肉一个（去壳，不剥皮）

【用法】 煎汤服。

【功用】《医宗必读》：定嗽止喘。

【主治】 肺肾虚衰喘嗽。

①《百一》引《夷坚·已志》：痰喘。②《直指》：肺虚发喘，气乏。③《证治宝鉴》：肾虚而气不归原，冲脉之火上冲清道，气喘。④《兰台轨范》：老人虚嗽。

【方论选录】 ①《百一》引《夷坚·已志》：人参定喘，带皮胡桃敛肺。②《古方选注》：胡桃可解

膈内之痰饮，膈间痰化而嗽止声清；连皮能收肺经耗散之气，连隔能通命门之火。

【临证举例】 痰喘《本草纲目》引《夷坚·已志》：溧阳洪辑幼子病痰喘将危，凡五昼夜不乳食，用此方煎汤一蚬壳，灌之，喘即定。

【备考】 本方方名：《永类钤方》引《澹寮》引作"观音梦感参桃汤"；《证治要诀类方》引作"观音应梦散"。《永类钤方》引《澹寮》本方用法：切碎，用生姜五片，大枣二枚，食后、临卧水煎服。《证治宝鉴》有白蜜。

06281 观音救苦甘露饮

【方源】《霍乱吐泻方论》。

【组成】 观音柳一枝（五钱） 滑石 炒谷芽 焦神曲各三两 苍术（泔水浸） 云茯苓各二两 柴胡一两五钱 川厚朴（姜汁炒） 黄芩 枳壳 葛根 苏叶 姜半夏 陈皮（盐水炒） 芍药 楂肉 乌药各一两 香附 木香 甘草各五钱 陈茶叶二斤（安化茶或六安茶之陈者佳）

【用法】 上为细末，每次三钱，用阴阳水煎服。

【功用】 避邪逐恶，祛风清热，疏滞和中。

【主治】 感冒时邪，瘟疫疟疾，伏暑停食，霍乱吐泻，头痛腹胀，口渴心烦，脾胃不调，吞酸嗳腐，一切不服水土。

06282 羽白散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 白矾（半生半熟）

【用法】 上为末。黄酒调化，以鹅翎蘸扫患处。

【主治】 面上吹花癣，并钱癣。

【加减】 甚者，枯矾末二两，朝脑一钱，为末。醋调敷。

06283 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】 枯矾末

【用法】 吹耳。

【主治】 耳聋疼痛或出水。

06284 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】 枯矾 血余灰各等分

【用法】 上为末，青鱼胆拌成饼，阴干，研细，吹鼻中。

【主治】 脑漏、鼻流脓涕。

06285 羽泽散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】 枯矾末

【用法】 敷脐中。

【主治】 小儿脐中汗出。

06286 孙武散

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】 荜茇 生半夏 南星 肉桂 乳香 没药 胡椒各一钱 川乌 三七 蟾酥 草乌各二钱 丁香八分 麝香少许 花蕊石二钱 半风茄子三钱

【用法】 上为细末，入瓷瓶内。临用敷之。

【功用】 令外科动刀针不痛。

06287 孙真人五汁膏

【方源】《灵验良方汇编·续编》。

【组成】 蔗汁 梨汁 藕汁 萝卜汁各一碗 姜汁半碗

【用法】 上药共煎成膏。加白蜜三两再煎片时，加川贝母一两、薄荷叶三钱，俱研为极细末，拌入膏中，瓷器收藏，勿令出气。服时用白沸汤调下。

【主治】 老年痰火。

【加减】 火重者，姜汁减半；畏寒者，姜汁增至一碗。

06288 驯龙汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】 龙齿二钱 真珠母八钱 羚羊角一钱五分 杭菊二钱 生地六钱 当归二钱 白芍一钱 薄荷一钱 沉香五分 续断二钱 独活一钱 红枣十枚 钩藤钩四钱（后入）

【主治】 五心烦扰，自头至腰，时时作颤，坐卧不安。

06289 驯龙驭虎汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】 龙齿二钱 琥珀一钱 真珠母八钱 生地六钱 玉竹四钱 瓜蒌皮三钱 石斛三钱 柏子霜二钱 白芍一钱五分 薄荷一钱 莲子二十粒（打碎，勿去心） 沉香四分（人乳磨，冲）

【主治】 惊悸气促，喉舌作痛。

06290 红油

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】 红油膏（《中医皮肤病学简编》）。

【组成】 红砒一钱

【用法】 敲细如粟，以麻油一两，煎至砒枯烟绝为度，去砒留油。每日以烘油擦患处二三次。

【主治】 鹅掌风及一切疯症。

06291 红粉

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】 水银 白矾 火消各一两一钱 朱砂二钱三分

【用法】 以锅煨热取起，入白矾，一沸；见清，

入消，一沸；见清，入朱砂，一沸，见定，则取出研末，入锅内，下水银，盖碗，封打如法。下疳，嚼细茶罨三次，次掺之即愈；杨梅痘子，点之即愈；杨梅喉疳，用新笔蘸粉点之即愈；杨梅粉毒，用麻油四两、黄蜡一两融化成膏，离火候温，入红粉一钱搅匀，绵纸摊贴，一日一换。

【主治】 一切顽疮，杨梅粉毒，喉疳，下疳，痘子。

【备考】 粉霜必以朱砂色为度，如红黄为嫩，上疮必疼，须再封打一香。先用朱砂末、急性子各一钱五分，于锅内炒烟尽，去药拭净，入消、汞，升打如法，为之净锅。用煅石膏、赤石脂各二两为末，盐水调之封口，次以香炉灰盖之更佳。初打出红粉，用绵纸包好，入小南青布袋内，用绿豆水或槐花八两、甘草一两煎汤，悬胎煮一、二百沸，取袋埋黄土内一日夜，去火毒及消、矾之气。

06292 红膏

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】 朱砂一两 麝香半两 牛黄半分 雄黄三分

【用法】 上为细末，令匀，以面脂和为膏。匀敷面上。经宿粉刺自落。

【主治】 面上粉刺。

【宜忌】 避风。

06293 红丸子

【方源】《理伤续断方》。

【组成】 牛膝（酒浸一宿） 川乌（炮） 南星（醋煮三次） 细辛（去苗，洗净） 何首乌（用水煮熟） 桔梗（去芦） 山桂（去粗皮） 当归 自然铜（煅，醋淬七次，别研） 白蔹 赤芍药 骨碎补（去毛） 没药（别研） 羌活（去芦） 赤小豆（不见火）

【用法】 上除研药外，余并打和，炒干为末，酒煮面糊为丸。每服五十丸，随病上下服之。

【功用】 补损，坚筋固骨，滋血生力。

【主治】 打扑伤损，骨碎筋断，疼痛痹冷，内外俱损，瘀血留滞，外肿内痛，肢节疼倦，应诸伤损，不问年月日久，并宜服之。

【宜忌】 孕妇勿服。

06294 红丸子

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【组成】 荆三棱（浸软，切片） 蓬莪术 青橘皮 陈皮（去白）各五斤 干姜（炮） 胡椒各三斤

【用法】 上为细末，用醋面糊为丸，如梧桐子大，矾红为衣。每服三十丸，食后生姜汤送下。小儿临时加减与服。

【功用】 ①《医方大成》：壮脾胃，消宿食，治冷疟，去膨胀。②《赤水玄珠》：温脾胃，消寒冷食积。

【主治】 脾胃寒凝气滞，胸闷腹胀，食欲不振，腹有癖块；妇女气滞血瘀，致成癥瘕；小儿食积，面黄体瘦，腹胀食少。

①《局方》：脾积气滞，胸膈满闷，面黄腹胀，四肢无力，酒积不食，干呕不止，背胛连心胸及两乳痛；妇女脾血积气，诸般血癥气块；小儿食积，骨瘦面黄，肚胀气急，不嗜饮食，渐成脾劳。②《直指》：食疟，食积，气滞腹胀；谷疸，腹满眩晕，怫郁怔忡；酒疸。③《得效》：妇女妊娠恶阻；经水不调，腹中癖聚成块，流走作痛，肌肤消瘦，胀满不敢食。④《医方考》：伤寒冷之物，腹痛成积。

【方论选录】《医方考》：三棱、莪术，攻坚药也，故可以去积；干姜、胡椒，辛热物也，故可以去寒；青皮、陈皮，快气药也，故可以去痛。而必以醋糊为丸者，经曰：酸胜甘，故用之以疗肥甘之滞；必以矾红为衣者，取其咸能软坚，枯能着癖也。

【备考】 ①《直指》本方用法：治食疟、食积，以二陈汤或四兽汤送下；治谷疸、酒疸，以二陈汤加缩砂仁煎汤送下。②《得效》治经水不调，以乌梅浓煎汤，入盐少许服之。③《医方类聚》引《王氏集验方》有良姜，名“胡椒红丸子”；去胡椒，加良姜、阿魏，名“阿魏红丸子”。

06295 红丸子

【方源】《三因》卷六。

【组成】 蓬莪术 京三棱各二两（醋煮一伏时） 胡椒一两 青皮三两（炒香） 阿魏一分（醋化）

【用法】 上为末，别研仓米末，用阿魏醋煮米糊为丸，如梧桐子大，炒土朱为衣。治食疟，每服五十至一百丸，以老疟饮下；治霍乱，丸以矾朱为衣，每服一百至二百丸，生姜、甘草煎汤送下。

【主治】 ①《三因》：食疟；因饮食饥饱伤及胃气，或诸疟饮食不节而成，病者寒热，善饥而不能食，食已支满，腹急疼痛，病以日作；脾胃虚冷，饮食不节，宿食留饮，聚癖肠胃；或因气不调，冲冒寒湿，忽作霍乱，吐利并，作心腹绞痛，肠胃缠刺，疲苶不胜。②《玉机微义》：谷疸发黄。

【方论选录】《医方考》：食疟者，食积成疟也。《内经》曰：留者攻之，故用蓬术、三棱、阿魏以攻积；积之为患，气快则行，气滞则止，得热则

行，得寒则结，故用青皮之辛以快气，胡椒之温以散结；复用矾红为衣者，假其土性以培脾胃云尔。

06296 红升丹

【方源】《医宗说约》卷六。

【异名】 大红丹(《疡科遗编》卷上)。

【组成】 水银一两 朱砂 雄黄各五钱 皂矾六钱 白矾一两 火消一两

【用法】 先将二矾、火消研碎，入大勺内，加火酒一小杯炖化，一干即起，研细；另将水银、朱、雄研细，待水银不见星，方入消、矾研匀，将羊城罐用纸筋泥搪一指厚，阴干，常轻轻扑之，不致生裂，如有裂，以罐子泥补之，极干再晒，无裂方入前药于内。罐内以铁油盏盖定，加铁梁，盏上下用铁襻铁丝系紧，用绵纸捻条蘸蜜，塞罐口缝间，外用熟石膏细末，醋调封固盏上，加炭火二块，使盏热，罐口封固易干也。又用铁钉三根，钉地下，将罐子放钉上，罐底下置大炭火一块，外砌百眼炉，升三炷香，第一炷香，用底上火，如火大则水银先飞上；第二炷香，用大半罐火，以笔蘸水擦盏上；第三炷香，火平罐口，用扇搧之，频频擦盏不可令干，干则水银先飞，预用盐滴卤调罐子泥极湿，将铁丝系笔头在管上，如罐上有绿烟起，即水银走也，急用笔蘸罐子泥固之，上三香完，去火冷定，开罐，方气足，盏上约有丹六七钱，刮下研细，瓷罐盛之。用时，鸡翎蘸丹少许，外扫疮口。

【功用】 拔毒，祛腐，生新。

【主治】 一切疮疡溃后，疮口坚硬，肉暗紫黑。

【临证举例】 ①慢性不愈合伤口及淋巴结结核溃疡 《中华外科杂志》(1957；12:999)：以凡士林纱布条粘满红升丹，填入创口、溃疡内，治疗化脓后久治不愈的创口23例、淋巴结结核溃疡19例，除2例结核性溃疡未继续门诊治疗而疗效不详外，全部治愈。作者体会：红升丹治疗慢性长期不愈的创口及结核性溃疡，确有显效，对不良的肉芽组织有腐蚀作用，可使异物（如线头等）早日脱出，从而促进愈合。②瘘管 《新中医》(1986；8:32)：用红升丹治疗58例瘘管，其中病位在颈项者15例（瘰疬10例，脓肿术后5例），躯干者26例（乳痈术后7例，阑尾炎术后切口感染11例，臀部脓肿术后5例，肾输尿管术后切口感染3例），四肢17例（慢性骨髓炎12例，脓肿切开5例）。结果，58例全部治愈，其中疗程在一个月者44例，二个月者14例。

【备考】《串雅内编》：升丹为外科要药，不能不用，然总宜陈至五、七年者方可用，且须少用为妙。如系背疮及胸腹诸处疮之溃大者，更须慎用，往往有疮未愈而升药热毒攻入腹内，以致口干喉破者，人多不知也。

06297 红玉散

【方源】《局方》卷八（淳祐新添方）。

【组成】 寒水石（炭火烧通赤，候冷细研）二两 黄丹半两

【用法】 上为细末。干掺在疮口内，后用万金膏贴，每日一上，再上尤妙。

【功用】 敛疮口，生肌肉，止疼痛，去恶水。

06298 红玉散

【方源】《鲁府禁方》。

【组成】 官粉二钱 黄丹五分 拔过松香五钱

【用法】 上为极细末。干掺患处；如疮结痂，则用香油调敷。

【主治】 头面黄水，到处生疮。

06299 红玉散

【方源】《医级·杂医类方》卷八。

【组成】 枯矾 黄丹各五分 水龙骨（即船底老油灰）一钱（煅，研） 海螵蛸

【用法】 上为细末。以棉梃子搅尽耳内脓水，用药一字，掺灌耳中，每日二次。勿令风入。

【主治】 聤耳流脓。

【备考】 方中海螵蛸用量原缺。

06300 红玉膏

【方源】《疡医大全》卷七引《济生》。

【组成】 乳香（另研） 没药（另研）各二两 蓖麻仁四百粒 木鳖子（去壳）二两四钱 当归四两 血余五钱 儿茶 血竭 白蜡 黄蜡各一钱 嫩杨 柳枝一两（打碎） 黄丹（飞）四两 真麻油八两 芸香（白嫩者）一斤四两

【用法】 先将麻油同杨柳枝、血余、当归熬数滚，绞去滓；再将油同芸香、蓖麻、木鳖子熬熟，绞去滓；入黄、白蜡，将成膏时入黄丹，离火，下乳、没、儿、竭末，搅匀成膏。外贴。

【主治】 痈疽，瘰疬，乳痈。

06301 红玉膏

【方源】 年氏《集验良方》卷六。

【组成】 麻油二两五钱 柏油二两五钱 管仲三钱 象皮（切片）五分 血余一大团 朱砂五分 儿茶五分 轻粉 没药（去油） 川椒 樟脑各五分 乳香（去油）三钱五分 血竭一钱五分（朱砂以下共为末）

【用法】 前五味药同煎至发枯，去发，再煎至滴水成珠，下炒飞黄丹五钱，再下朱砂以下药末，搅

匀，离火候半冷，下黄蜡二钱五分、杭粉一两五钱，如法熬成膏。摊贴患处，一日一换。

【主治】 湿烂臁疮，足上恶疮，诸般疮毒风湿，臭气难闻，杨梅结毒，及一切顽疮不收口者。

06302 红末子

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】 独活 何首乌 南星（制） 白芷 羌活 当归 骨碎补 苏木 牛膝 赤芍药 红花 川芎各二两 细辛 川乌（制） 桔梗 降真香 枫香 血竭 乳香 没药各一两

【用法】 上为末。酒调下。

【主治】 打扑伤损，折骨碎筋，瘀血肿痛，瘫痪顽痹，四肢疼痛，一切痛风。

【加减】 骨折欲好之际，加自然铜（制）一两。

06303 红白散

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【异名】 红绵散(《本事》卷五)。

【组成】 白矾（熬令汁枯） 染胭脂各等分

【用法】 上为细末。先以绵杖子缠去脓，用药半钱匕掺之。三两次即愈。

【主治】 小儿耳聋，脓出久不愈者。

06304 红曲酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】 红曲

【用法】 浸酒煮，饮。

【主治】 腹中及产后瘀血。

06305 红豆丸

【方源】《医方类聚》卷一〇五引《施园端效方》。

【组成】 丁香 胡椒 缩砂各二十一个 红豆十一粒

【用法】 上为末，生姜汁为丸，如皂角子大。每服一丸，用大枣一个，去核，填药，面裹，慢火烧熟，空心细嚼，白汤送下，每日三次。

【主治】 诸呕逆，膈气翻胃，吐食不止。

06306 红豆丸

【方源】《瑞竹堂方》。

【组成】 麦芽（炒） 半夏（汤泡七次） 砂仁 神曲（炒）各一两半 硇砂（醋化） 甘草 青皮（去瓤） 陈皮（去白） 郁金 红豆 藿香 棠球 莲术各一两（煨） 良姜 荜茇各二两 丁香半两（不见火）

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心米饮或随物送下。病甚者日进二服。

【主治】 飧泄。

06307 红豆散

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 麻黄根（炒）五钱 苦丁香五分 羌活（炒） 连翘（炒）各三分 红豆十个

【用法】 上为细末。搐鼻。

【主治】 湿气在头，头重如山。

06308 红花汤

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】 红花 琥珀 白芍 麝香 没药 当归 桂枝 桃仁 苏木

【主治】 经行过期及不月。

06309 红花酊

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 藏红花一两75% 酒精十两

【用法】 红花浸酒内七昼夜，去滓备用。外涂或用纱布蘸药罨包。

【功用】 活血祛瘀，消肿止痛。

【主治】 扭伤血肿，大面积灼伤，瘢痕。

06310 红花酒

【方源】《医方考》卷六。

【组成】 红花一两（炒）

【用法】 清酒五爵，沃之温服。

【主治】 产妇胞衣不下。

【方论选录】 胞衣不下者，气弱而瘀血盈子胞也。故用清酒壮其气，红花败其瘀。

06311 红花散

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】 红花 荷叶 姜黄各等分

【用法】 上为末。加炒生姜，小便调下二钱。

【主治】 伤寒产后，血晕欲绝。

06312 红花散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 干荷叶 牡丹皮 当归 红花 蒲黄（炒）各等分

【用法】 上为细末。每服半两，酒煎和滓温服。如胞衣不下，另用榆白皮研末煎汤，调服半两。

【主治】 妇人产后血晕，胞衣不下，血崩，月事不调，及远年干血气。

06313 红花散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】 好红花（细擘） 苏枋木（捶碎） 当归各等分

【用法】 上㕮咀。每用一两，以水一升半，先煎花、木，然后入酒一盏，并当归再煎至半升，空

心、食前分两次温服。二十服效。

【主治】 妇人血膈，经脉不通。

06314 红花散

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】 生耆三钱 当归三钱 红花三钱 生地三钱 荆芥叶一钱 五分 贝母一钱 茯苓二钱 黄柏二钱 菊花根三钱

【用法】 内服。外用酒蜜捣菊花叶、芙蓉叶敷之。

【主治】 足丫发及手丫发。

06315 红花膏

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】 水红花科一捆（熬膏一碗） 麝香三钱 阿魏三钱 血竭三钱 没药五钱 赤芍一两 当归一两

【用法】 上为细末，入膏内搅匀，以青布摊。贴患处。

【主治】 癖疾。

06316 红吹散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 朱砂 2.5 克 月石 9 克 元明粉 9 克 乌贼骨 8 克 煅石膏 1.5 克 西瓜霜 3 克 冰片 1.5 克

【用法】 以上各药逐次入乳钵内研成细末，装瓶，勿泄气。用吹药管吹入患处。

【功用】 祛腐生新，利咽消肿。

【主治】 口糜，口疳，舌碎，牙疳，咽喉病。

06317 红灵丹

【方源】《齐氏医案》卷六。

【异名】 八宝红灵丹（《痧证汇要》卷一）、绛雪（《霍乱论》）、八宝红灵散（《慈禧光绪医方选议》）、红灵散（《中国药典》一部）。

【组成】 明雄 朱砂 硇石 火消 月石各六钱 麝香 洋片各二分 佛金四十张

【用法】 各制合研极细末，瓷瓶收贮，勿令泄气，轻重量用；或烧酒、冷水为丸，如梧桐子大。治感冒伤风，伤寒伤暑，用温茶送五丸；慢紧痧胀，稍冷茶下；中恶中毒，暴病五绝，将此丹水擦牙，下咽即活，重者三五丸，勿过，过服冷水解；九种心疼、腹痛、哮喘、痰嗽，温茶送下；牙痛，碎一丸放痛处；小儿急惊，五疳诸积，食伤饱胀，霍乱吐泻，用三丸或二丸，放舌尖上，和津嚼之，见麻，冷水吞，寒症用温茶；时症瘟疫，沿门传染，用银簪点大眼角中，男左女右；治一切痈疽疔毒，阴阳疮疖，痰核痰疱，以及蜂螫虫咬，初起未陷，用葱头酒煎加蜜开擦，阳疮加猪胆汁擦，吞下三五丸即消；妇女月经，或前或后，俱用黄酒送下五丸、七丸，取汗立效；佩之在身，不染瘟疫。

【主治】 感冒伤风，伤寒伤暑，痧胀，中恶中毒，心疼腹痛，哮喘痰嗽，牙痛，小儿急惊，五疳诸积，食伤饱胀，霍乱吐泻，时症瘟疫，痈疽疔毒疮疖，痰核痰疱，蜂螫虫咬，妇女月经不调

【宜忌】 孕妇忌用。

06318 红灵酒

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】 生当归二两 红花一两 花椒一两 肉桂二两 樟脑五钱 细辛五钱 干姜一两

【用法】 上药用 95% 酒精二市斤浸七天。用时以棉花球蘸药频擦。脱疽则涂擦患处以上的皮肤，每日二至三次，每次擦 20 分钟。

【功用】 活血，通络，止痛。

【主治】 冻疮未溃，脱疽腐烂者。

06319 红灵散

【方源】《急求痧症全集》卷下。

【组成】 辰砂一两 冰片二钱 明雄黄一两半，麝香二钱 蟾酥三钱

【用法】 上为细末，瓷瓶封固。临症茶调服一二分；亦可吹鼻。

【主治】 一切痧发，胀痛呕泻。

06320 红枣散

【方源】《验方新编》卷一。

【组成】 红四两（去核，烧枯） 明雄七钱五分（勿经火） 枯矾 真犀牛黄 牙色梅花冰片 铜绿（煅） 真麝香各一分

【用法】 上为细末，收入瓷瓶，勿令出气。用时以红纸卷管吹入喉中，仰卧少时，吐出浓痰以多为妙；若烂喉痧，吹入过夜即安。

【主治】 喉风烂喉痧。

06321 红雨丹

【方源】《四圣悬枢》卷一。

【组成】 柴胡四钱 黄芩 石膏 甘草 丹皮 生姜 元参 芍药各三钱

【用法】 水煎，热服。覆前，饮热稀粥，取微汗。

【主治】 三日少阳温病，胸胁疼痛，耳聋，舌，咽干作渴者。

06322 红矾丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 红矾（青矾半斤用纸包定，装入旧蒲鞋内，又以一只上下合住，缚定，于炭火内煅通红为

度，候冷取出即成） 香附各四两 猪苓 泽泻各二两 艾线一两（用醋一碗，罐内煮，取焙为末）

【用法】 上药用陈米饭为丸，如梧桐子大，以四物汤料各一两，加木香三钱，研末为衣。每服五十丸，加至八九十丸，酒送下。

【主治】 妇人黄肿。

06323 红矾散

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】 大红枣（去核）五枚 明矾

【用法】 将明矾纳入枣内，瓦上煅存性，研末。开水泡，炖热，时时润之。

【主治】 烂眼弦，眼癣。

06324 红油膏

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】 凡士林十两 九一丹一两 东丹钱半

【用法】 先将凡士林烊化，然后徐徐将两丹调入，和匀成膏。用时将药膏匀涂纱布上，贴患处。

【功用】 防腐生肌。

【主治】 溃疡不敛。

06325 红香粉

【方源】《中医皮肤学简编》。

【组成】 红粉 5 克 冰片 4 克 薄荷脑 37 克 香脂 100 克

【用法】 将红粉分为两等分，分别加入冰片及薄荷脑中，研细；把冰片、红粉加入香脂后，再加入薄荷脑、红粉，搅匀即成。外用。

【主治】 酒渣鼻。

06326 红铅散

【方源】《普济方》卷三八一引《卫生家宝》。

【异名】 香矾散（原书同卷）、红矾散（原书卷六十七）。

【组成】 绿矾不拘多少

【用法】 上相矾色鲜明者入坩锅，用炭烧赤倾出，以好酒拌匀，再入锅，如此数遍，令色红，研作细末，入麝香少许。先以温浆止漱净。用指蘸药，有疳处擦之。

【主治】 走马牙疳。

06327 红绵丹

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】 蝎梢（炙黄） 辰砂各二钱半 牛黄一钱（另研） 赤足蜈蚣一条（酒浸，炙黄） 天南星（姜汁浸泡） 冰片 麝香各二分半，蛇含石（火煅，醋淬）半两

【用法】 上为末，米糊为丸，如鸡头子大，金箔为衣。量儿大小，一岁半粒，薄荷汤磨化服，不拘时候。

【主治】 小儿急、慢惊风手足抽掣，目直涎壅，壮热气粗，及胎痫中风。

06328 红绵散

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【异名】 红棉散（《医门八法》卷三）。

【组成】 海螵蛸 枯矾各一钱 麝香一字 干胭脂五分

【用法】 上为末。用管吹入耳中。

【主治】 聤耳有脓及黄水。

06329 红棉散

【方源】《寿世保元》卷六。

【异名】 通耳红棉散（《全国中药成药处方集》兰州方）。

【组成】 枯白矾五分 干胭脂粉二分半 麝香少许 片脑一分 熟炉甘石五分（一方以蛀竹粉易矾甘石）

【用法】 上为末。先以棉杖子搌干脓水，另癣鹅翎管子送药入耳底。

【功用】《全国中药成药处方集》：止痒，止痛。

【主治】 ①《寿世保元》：耳生脓并黄水。②《全国中药成药处方集》：耳聋，流脓，疼痛，红肿，流黄水。

06330 红煅膏

【方源】《理瀹》。

【组成】 川椒三两 韭子 蛇床子 附子 肉桂各一两 独蒜一斤

【用法】 真香油二斤浸药熬，黄丹收膏。再用倭硫黄六钱、母丁香五钱、麝香一钱、独蒜丸如豆大，朱砂为衣；或用硫黄、丁香、胡椒、杏仁、麝，枣肉为丸；或用胡椒、硫黄，黄蜡为丸，每用一丸纳脐眼，外贴本膏。

【主治】 男子精寒，萎弱，白浊，遗精；女子子宫虚冷，赤白带下。亦治寒泻。

06331 红膏药

【方源】《济生》卷八。

【异名】 红膏（《普济方》卷三一四）。

【组成】 沥青 白胶香各二两 黄蜡三钱

【用法】 上药于铫内煎化，量用麻油三钱许煎，滤于水盆中，揉成剂收之。每用于水内捻作饼子，随疮大小贴之，上敷以纸。

【主治】 软痈及恶疮，风湿所搏，浑身疼痛。

【加减】 加当归一两子内，煎令黄色，滤去滓，于水盆内取出药揉成剂，再加乳香末二钱，和为乳香膏尤佳；其加青黛者，即名青金膏；其加黄丹

者，即名紫金膏。

【备考】 方中黄蜡用量原缺，据《医方类聚》补。

06332 红膏药

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 黄蜡一两 香油三钱 黄丹五钱

【用法】 先将黄蜡融化，次下香油、黄丹，搅匀，再熬成膏，瓷器收贮。外贴。

【主治】 诸疮毒及汤火金疮等伤。

06333 红膏药

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】 银朱（水飞，晒干） 一钱 蓖麻仁二钱 嫩松香五钱 黄丹（水飞，晒干） 一钱 轻粉五分

【用法】 共捣如泥。治疔疮，以银针将疔疮头挑破，用此药用一小丸，如黄豆大，安膏药上，当中贴之，疔即拔出；或畏疼者，不必挑破，即以此膏摊开，如钱大贴之亦可；凡无名肿毒已破未破，不必挑动，均照拔之法用之；铜铁等物入疮入肉，亦用此红药一小丸，如别膏药上贴之自出。瘰疬未破者，用此药一小丸，加别膏药贴在最大之瘰疬上，或贴初起之瘰疬上亦可，贴后痒而微疼，至第三日启去，另换此药丸与膏药贴上。换至数次后，皮自微破，用瘦猪肉煮汤洗之（不用盐），或用金银花煎水洗亦可，再换此药，丸与膏药贴之，每二日一洗一换，贴至数日，瘰疬之根即粘在膏药上（根浅者易出，根深者功缓），出后仍用肉汤洗之，其余邻近未破之瘰疬仍用此药丸与别膏药贴在已破之瘰疬原口，照前治之，可以一一后此而出，如未破瘰疬相隔尚远，或有筋膜隔住，即在未破之处贴之，候各瘰疬拔尽，另用生肌膏药贴紧数日，则口而愈。

【功用】 拔毒收功。

【主治】 疔疮瘰疬及一切无名肿毒，并铜铁竹木瓦石入疮入肉。

【备考】 此药初贴稍觉作痛，烦躁，亦属无妨。

06334 红膏药

【方源】《外科传薪集》。

【组成】 蓖麻子（去壳）二斤 老松香一斤 绛丹五钱 麝香二钱

【用法】 先将蓖麻子研烂，加松香打和；再加麝香，再打；看老嫩，老加蓖麻子，嫩者加松香。外用。

【主治】《青囊秘传》：汗毛疽及一切疖肿。

【备考】《青囊秘传》本方用法，隔滚水炖烊，摊小膏药贴之。

06335 红薯粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】 新鲜红薯半斤 粳米二至三两 白糖适量

【用法】 将红薯（以红紫皮黄心者为最好）洗净，连皮切成小块，加水与粳米同煮稀粥，待粥将成时，加入白糖适量，再煮二三沸即可。趁热服食。

【功用】 健脾养胃，益气通乳。

【主治】 维生素A缺乏症，夜盲症，大便带血，便秘，湿热黄疸。

【宜忌】 糖尿病患者忌食；平素不能吃甜食的胃病患者，不宜多食。

06336 红藤煎

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】 红藤二钱 地丁草一两 乳香三钱 没药三钱 连翘四钱 大黄一钱半 玄胡二钱 丹皮二钱 甘草一钱 银花四钱

【用法】 水煎服。

【功用】 通腑清热，行瘀止痛。

【主治】 肠痈初起未化脓者。

06337 红内消散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】 红何首乌半两 远志（水浸，取肉，蘸姜汁焙） 赤茯苓 川芎 北梗 苦参 赤小豆 赤芍药 蔓荆子 威灵仙各三钱 生甘草半两

【用法】 上为末。每服二钱，加麦门冬十四粒煎汤调下。

【主治】 痈疽内蕴热，外发热者。

06338 红内消散

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】 红内消 当归 茄片（或茄蒂） 甘草 羌活 黄芩各五钱 麝香五分

【用法】 上为末。每服二钱，生地黄煎汤调服。

【主治】 丹毒，毒气入里，腹胀欲死。

06339 红水眼药

【方源】《普济方》卷八十二。

【组成】 胡椒 荜茇 干姜 回回黑呵子 诃子皮 银朱各五钱 海螵蛸 牡丹皮 丁香各四钱 芦荟 硼砂各一钱

【用法】 上为细末。每用少许点眼。

【功用】 止泪，去瘀肉。

【主治】 息肉淫肤。睑眦息肉，胀起攀丝白睛，隐涩妨闷。

06340 红芍药散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】红芍药一两　川大黄半两　甘草半两　地黄一两（干者）

【用法】上为每服二钱，水一中盏，煎至六分，食后临卧温服。

【主治】脾脏热，脣焦口气，引饮不止。

06341　红衣大炮

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】莪术　槟榔　锅灰　鹤虱各一两　雷丸　使君子肉各一两　广木香五钱　黑白丑头末八两

【用法】上为细末。每服五钱，广木香汤送下。

【主治】远年近日积痞虫痕。

06342　红豆蔻散

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】红豆蔻汤(《圣济总录》卷四十六)。

【组成】红豆蔻三分（去皮）　白术三分　桂心三分　厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）　人参一两（去芦头）　陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）　诃黎勒三分（煨，用皮）　黄耆三分（锉）　当归三分（锉，微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣二枚，煎至六分，去滓，不拘时候，稍热服。

【主治】脾胃气虚弱，不能饮食，食即妨闷，四肢少力，疼痛。

【宜忌】忌生冷、油腻、湿面。

06343　红蓝花汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【异名】红蓝花散(《鸡峰》卷十六)。

【组成】红蓝花　木通（锉）　牡丹皮各一两　当归（切，炒）　土瓜根各半两　甘草（炙）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入葱白一寸，同煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】妇人经月不通，小便赤涩，身体疼痛。

06344　红蓝花酒

【方源】《金匮》卷下。

【组成】红蓝花一两

【用法】以酒一大升，煎减半，顿服一半；未止，再服。

【功用】《金匮玉函经二注》：破血通经。

【主治】①《金匮》：妇人六十二种风及腹中血气刺痛。②《中国医学大辞典》：痃症。

【方论选录】《金匮要略心典》：妇人经尽产后，风邪最易袭入腹中，与血气相搏而作刺痛。红花花苦辛温，活血止痛，得酒尤良，不更用风药者，血行而风自去耳。

06345　红蓝花散

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一九〇。

【组成】红蓝花二两　伏龙肝一合　甘草半两（生用）

【用法】上为细末。每服二钱，食后煎竹茹汤调下。

【主治】心肺热极，吐血不止。

06346　红蓝花散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】红蓝花一分　当归半两（锉，微炒）　琥珀一分　没药半两　桂心三分　蒲黄一分

【用法】上为细散。每服一钱，不拘时候，以热酒调下。

【主治】产后血不散，小腹疼痛。

06347　红花四物汤

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】四物汤加红花。

【用法】水煎服。

【主治】妇人臂疼，又如瘫痪。

06348　红花当归汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【异名】红花当归散(《女科秘要》卷三)。

【组成】红花　当归　牛膝　苏木各一钱　川芎五分　枳壳六分（麸炒）　莪术　赤芍　三棱　芫花各八分

【用法】水煎，临卧服。

【功用】破瘀血。

【主治】经来未尽腹痛。经来一半，余血未尽，腹中作痛，或发热，或不发热，乃气血俱实也。

06349　红花当归饮

【方源】《女科万金方》。

【异名】红花当归散(《局方》卷九续添诸局经验秘方)、凌霄花散(《玉机微义》卷四十九)、红花归尾散(《医统》卷八十四)、调经活血汤(《郑氏家传女科万金方》卷一)。

【组成】红花　当归　赤芍　牛膝　紫葳　官桂　甘草　白芷　苏木　寄奴

【用法】水酒各半煎，食后服。

【功用】逐瘀血，通经。

【主治】《局方》（续添诸局经验秘方）：妇人血脏虚竭，或积瘀血，经候不行；或断续不定，时作腹痛，腰胯疼重，攻刺小腹紧硬，及室女月经不通。

【宜忌】《局方》（续添诸局经验秘方）：有孕不可服。

【备考】《局方》（续添诸局经验秘方）本方用：刘寄奴草五两，当归（去芦）、牛膝（酒浸）、甘草（炙）、紫葳、红花、苏木（一本作莪术）各二两，赤芍药九两，肉桂（去粗皮）、白芷各一两半。各为细末。每服三钱，热酒调下，空心、临卧各一服。若血久不行，浓煎红花酒调下。

06350 红花当归散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归（酒洗）八分 川芎 赤芍药 熟地黄 香附各六分 枳壳五分 玄胡索五分 厚朴（姜炒） 小茴香（酒炒） 柴胡 陈皮 三棱（醋炒）各四分 莪术（醋煨）四分 牛膝（去芦）四分 红花三分 甘草二分

【用法】上锉。生姜水煎，空心热服。兼用八物汤。

【主治】妇人三十一二岁，年年生育，败血过多，血虚胃热，以致经水不匀，不时腹中疼痛结块，饮食少进，困倦目眩，潮热往来，五心烦躁。

06351 红花桃仁汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄柏一钱五分 生地黄一钱 泽泻八分 苍术六分 当归梢 汉防己 防风梢 猪苓各五分 麻黄二分 红花半分 桃仁十个

【用法】上锉，如麻子大。水三盏，煎至一盏，去滓，稍热、食前服之。

【功用】补北方，泻中央。

【主治】痔漏经年。因而饱食，筋脉横解，肠澼为痔。

【备考】《医学正传》有麻仁，无麻黄。

06352 红花桃仁汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】红花 桃仁 赤芍药 当归身

【功用】行血活血。

【主治】蓄血。

【加减】加山楂、香附，以散凝结；加山栀，以散热结；加韭汁，以散寒结。

06353 红花桃仁煎

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】红花 当归 桃仁 香附 延胡索 赤芍 川芎 乳香 丹参 青皮 生地

【功用】行血顺气。

【主治】妇人月水不通，瘀血凝滞。日久不治，则成癥瘕，有热结下焦而经闭者，有寒袭胞门而经闭者，此症必时时作痛，或少腹板急。

【加减】热，加酒炒大黄；寒，加肉桂、熟艾。

【方论选录】是方红花、桃仁、青皮、延胡索、乳香皆行血；而四物养血，改生地、赤芍皆凉血；而四物养血，改生地、赤芍凉血破血；丹参去旧血生新血，必用香附佐之者，以行三焦也。

06354 红花散瘀汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】当归尾 皂角针 红花 苏木 僵蚕 连翘 石决明 穿山甲 乳香 贝母各一钱 大黄三钱 牵牛二钱

【用法】水、酒各一碗，煎八分，空心服。行五六次，方吃稀粥补之。

【主治】鱼口便毒。因入房忍精，强固不泄，以致瘀精浊血凝结两胯或小腹之旁，结成肿痛，小水涩滞者。

06355 红铅造化丹

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】红铅二钱 人参 茯苓 山药各一两 甘草（炙） 枯矾各五钱 辰砂 寒食面各七五分 麝香八分 冰片六分 乳粉二钱（用头生男乳，每人用一小钟，晒干，共收用之）

【用法】上各研精细，方为一处共再细研；用白蜜二两，再同头生男乳一大杯，慢火重汤内用瓷碗顿蜜，滴水不散为度；候稍温和入前药，软硬得宜，为丸如龙眼大，金箔为衣，瓷罐收用，或以蜡固亦妙。每用一丸，用好酒一杯化药，食远服之。用厚绵帛复暖患上，其热如蒸，疮必复起作痛，乃此丹之效也。大率心经之病石菖蒲，肝经之病用远志，脾经之病用生姜，肺经之病麦门冬，肾经之病五味子，各随五经之症，用五引煎汤化服。

【主治】痈疽元气不足，软隐不起发，或已发复被风寒内外所侵，以致疮毒下陷，变为阴塌不痛者，急宜服此；亦可转阴为阳，返出毒气，返出毒气，复肿为吉；诸症呕吐、怔忡、泻痢，屡药不愈，异症并效。

06356 红绵龙骨散

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】枯矾五分 龙骨五分 麝香五分 红绵灰三分（如无红绵，即用干胭脂灰）

【用法】上为末。先用绵球搅去脓秽，以药吹之。

【主治】耳溃。

06357 红花白芷防风饮

【方源】《医学从众录》卷七。

【组成】 红花 白芷 防风各五钱 威灵仙三钱

【用法】 酒煎服。取汗，一服全愈。

【主治】 历节，四肢疼痛。

06358 约阴丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 当归 白术（炒） 芍药（酒炒） 生地 茯苓 地榆 黄芩 白石脂（醋煅，淬） 北五味 丹参 川续断各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸服。

【功用】《会约》：清热止血。

【主治】 ①《景岳全书》：妇人血海有热，经脉先期或过多者；或兼肾火而带浊不止；男、妇大肠血热便红等证。②《会约》：酒毒，湿热下血。

【加减】 火甚者，倍用黄芩；兼肝肾之火甚者，仍加知母、黄柏各等分；大肠血热便红者，加黄连、防风各等分

【备考】 本方改为煎剂，名"约荣煎"（见《会约》）。

06359 约营煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 生地 芍药 甘草 续断 地榆 黄芩 槐花 荆芥穗（炒焦） 乌梅二个

【用法】 水一钟半，煎七分，食前服。

【主治】 血热便血。无论脾胃、小肠、大肠、膀胱等证，皆宜用此。

【加减】 如下焦火盛者，可加栀子、黄连、龙胆草之属；如气虚者，可加人参、白术；如气陷者，加升麻、防风。

06360 约营煎

【方源】《会约》卷十一。

【组成】 苍术 白芍 甘草 续断 地榆 黄芩 槐花 荆芥各一钱 升麻八分 乌梅二个

【主治】 湿热下坠，疼痛肛脱。

【加减】 如血热而燥者，去苍术，加生地。

06361 约精丸

【方源】《直指》卷十。

【组成】 白龙骨二两（研细） 新韭子（冬霜后采者）一斤（好酒浸一宿，次日捣细）

【用法】 上为末，酒调糯米糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【主治】 小便中泄精不止。

06362 弄舌散

【方源】《永乐大典》卷九七五引《保生论》。

【组成】 蛇皮一分（炙） 牛黄 朱砂各一钱 麝香 一字

【用法】 上为末。每服一字，薄荷汤调下。

【主治】 小儿急惊弄舌。

06363 麦天汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 麦门冬一钱二分 天麻 一钱 白术 茯苓 半夏 神曲 陈皮各八分

【用法】 加生姜，水煎，温服。

【功用】 实脾消导。

【主治】 风邪羁绊脾胃，身重有痰，恶心欲吐。

06364 麦斗金

【方源】《疮疡经验全书》卷五。

【组成】 古老钱二十个（背上有字者佳好） 朱砂一钱 自然铜五分 乳香三分 没药三分

【用法】 先将古老钱烧红，擂为极细末，以后药为细末和匀。用甜瓜子（炒，去壳，擂细），先服药末一麦斗，良久不见响声，再服甜瓜子一麦斗，酒下催之，不可多服。

【功用】 接骨。

【主治】 损伤骨折。

【备考】 一麦斗，即今之一茶匙。

06365 麦斗金

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】 土鳖一个 生半夏一个 巴豆一个（去油） 朱砂（明亮） 滴乳香 没药各二钱

【用法】 上为末。每服一字，好热酒送下，觉浑身麻木，即是功。伤在上，食后服；在下，食前服。不过二服即愈。

【功用】 接骨。

【主治】 跌打损伤。

06366 麦冬丸

【方源】《回生集》卷下。

【组成】 杭州麦冬（去心）六斤（熬成膏） 何首乌半斤（黑豆拌，九蒸九晒，为末，人乳浸不计遍数，要晒得一斤重） 大怀熟地四两 红花五钱（酒洗） 当归四两（酒洗） 鹿茸五钱（酥炙）

【用法】 上为末，和匀，入麦冬膏内，再加炼蜜少许为丸，如梧桐子大。每服三钱，渐加至五钱，黄酒、滚水任下。

【主治】 女子经闭，形容枯槁。

06367 麦冬汤

【方源】《伤寒全生集》卷四引《千金》。

【组成】 麦冬 甘草 竹叶 粳米 人参 黄耆 当归 柴胡 知母

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 伤寒愈后劳复，虚热不止。

06368 麦冬散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】麦冬 淡竹叶 黄芩 柴胡 知母 芍药 川断 茯苓 术 参 甘草 陈皮 黄连 防风 大枣

【功用】除烦安胎。

【主治】妊娠子烦。

【方论选录】芩、连、知、芍、竹叶皆以清热除烦；参、苓、术、草以保护元气；川断、大枣以固肾安胎。微嫌方中柴胡、黄芩清客热足矣；防风、川芎恐引火邪上行横溢，不可用也。

06369 麦汤散

【方源】《幼幼新书》卷十四引《刘氏家传》。

【组成】麻黄（去根节，姜汁浸一宿） 知母 石膏（煅） 葶苈（隔纸炒） 地骨皮 杏仁 滑石 各等分

【用法】上为末。每服半钱，小麦汤调下。

【主治】小儿伤风伤寒，壮热，咳嗽痰盛。

06370 麦芽煎

【方源】方出《校注妇人良方》卷二十三，名见《金鉴》卷四十九。

【组成】麦芽二三两（炒熟）

【用法】水煎服。

【主治】妇人血气方盛，乳房作胀，或无儿饮，胀痛，憎寒壮热。

06371 麦钱散

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】麦硫散（《嵩崖尊生》卷六）。

【组成】小麦一升 硫黄四两 白矾一两 烟胶半斤 川椒三两 生枯矾各二两

【用法】小麦炒枯黄色，乘热入钵内，和硫黄、白矾为细末，搅匀，待冷取起，加烟胶，与川椒、生枯矾共碾细末。临用葱汤洗净，用麻油调搽，油纸盖扎，三日一换。三次愈。

【主治】秃疮，头毛脱落，白斑如癣，疮痂垒垒叠起，痒甚犹若虫行。小儿痘风作痒，叠叠成片，甚则顽麻不知痛。

【宜忌】忌诸发物。

06372 麦兜散

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】半两钱（煅，醋淬七次） 自然铜（煅，醋淬七次） 地鳖虫（焙干）各等分

【用法】每服一分，酒调下。

【功用】接骨。

【主治】跌打伤骨。

【宜忌】不可多服，多则骨高起矣。

06373 麦煎汤

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】黄耆 白术 牡蛎 麻黄节

【用法】加炒浮小麦，煎服。

【主治】小儿自汗。

06374 麦煎饮

【方源】《女科万金方》。

【组成】黄耆 白术 甘草 牡蛎 麻黄根 软柴胡 芍药 地骨皮 茯苓 浮麦

【用法】不拘时服。

【主治】产后寒热，盗汗如雨。胎前并男子亦可用。

06375 麦煎散

【方源】《普济方》卷三一九引《圣惠》。

【异名】麦煎汤（《鸡峰》卷十五）。

【组成】赤茯苓 当归 干漆（炒令烟尽） 鳖甲（醋炙） 常山 大黄（煨） 北柴胡 白术 生干地黄 石膏各一两 甘草五钱

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加小麦五十粒，煎至八分，食后、临卧时温服。

【功用】《准绳·女科》：破血积瘀。

【主治】①《普济方》引《圣惠》：少男室女骨蒸，妇人血风攻注四肢，心胸烦壅。②《苏沈良方》：骨热。黄瘦口臭，肌热盗汗。

【加减】有虚汗，加麻黄根一两。

【方论选录】①《医方考》：血，阴也，阻而塞之，则积阴为疰，故令四肢攻注；曰风血攻注四肢者，风血内搏，四肢无力，而倦怠浮肿也。鳖甲、干漆，攻坚削积之品也，所以治精血之留结；柴胡、石膏，解肌清热之药也，所以去骨蒸之内热；思则火结于心包，故用常山以开其结；郁则气留于六府，故用大黄以推其陈；当归、生地，生新血也；白术、甘草，致新气也；赤茯苓所以导丙丁之邪；浮小麦所以止骨蒸之汗；而麻黄根之加，乃以其形中闭，为止汗之最。②《法律》：此方治肝、肺、脾、胃火盛，灼干荣血，乃致口臭肌热可验。故用润血行瘀之法，以小麦煎之，引入胃中，盖胃之血干，热炽大肠必然枯燥，服此固可无疑，然更加人参助胃真气，庶可多服取效也。

06376 麦煎散

【方源】《传家秘宝》卷下。

【组成】鳖甲（九肋者，童便浸，炙黄，去裙襕称一两半，取末）一两 人参一两半 白茯苓 玄参 干葛各一两 干姜（炮） 川乌头（生）各半

两 秦艽（去芦头） 柴胡（去芦头）各一两

【用法】 上为细末。每服一大钱，用小麦汤七分，煎至五分，和滓温服，一日三五次。

【功用】 止嗽定喘，止汗，进饮食。

【主治】 虚劳身热，骨节疼痛，烦痹。

06377 麦煎散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】 知母 乌梅肉 地骨皮 柴胡各二钱 大麦一撮

【用法】 上锉片成一剂。水煎，温服；缓下。

【主治】 幼年心络为暑所伤，每至暑时，即畏热，困倦减食。

06378 麦煎散

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】 知母 贝母 麻黄（去节） 人参 石膏 甜葶苈 茯苓 地骨皮 杏仁 滑石 柴胡 甘草 桔梗 大黄（蒸） 干葛各等分

【用法】 上㕮咀。每服加葱白、薄荷、小麦子二十粒，煎服。

【主治】 小儿伤寒咳嗽，气急鼻塞。

06379 麦蘖丸

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】 麦芽（炒）二两 人参 枳壳（去瓤，麸炒） 白术 厚朴（去粗皮，姜汁炙）各一两半 干姜（炮裂）半两 桂（去粗皮） 陈曲（炒） 甘草（炙，锉） 食茱萸各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前酒送下，一日二次。

【功用】 温中下气，令人能食。

【主治】 虚劳。脾胃虚冷，不能饮食，食即胀满。

06380 麦门冬丸

【方源】 方出《千金》卷二十一，名见《外台》卷十一。

【组成】 麦门冬 茯苓 黄连 石膏 萎蕤各八分 人参 龙胆 黄芩各六分 升麻四分 枳实五分 枸杞子 栝楼根 生姜（屑）各十分 茅根（切）一升 粟米三合

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。用茅根、粟米，以水六升，煮取米熟，以其汁送下前药十丸，一日二次。若渴，则与此饮，至足大麻亦得。

【功用】 除肠胃热实。

【主治】 消渴。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、酢物。

【备考】 方中枸杞子，《外台》作地骨皮。

06381 麦门冬丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】 麦门冬一两（去心，焙） 人参半两（去芦头） 黄耆半两（锉，微炒） 黄连半两（去须） 青蒿子半两 桑根白皮半两（锉） 柴胡三分（去苗） 地骨皮半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以熟水研下，不拘时候。

【主治】 小儿虚食，不着肌肤，羸瘦骨热，小便赤黄。

06382 麦门冬丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】 麦门冬（去心，焙）栝楼根 大麻仁（研） 大黄（蒸二度，切，炒） 苦参粉 铁粉各三两 鸡腿胫黄皮（炙）七枚 黄芩（去黑心） 泽泻各一两半 龙齿（研） 土瓜根 知母（焙） 石膏（研）各二两 银箔二百片（和龙齿、石膏研入）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，食后煎生地黄汤送下，一日二次。

【主治】 消渴，饮水过多。

06383 麦门冬丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】 麦门冬（去心，焙） 土瓜根（锉） 山茱萸 鹿茸（酒浸，炙，去毛） 牛膝（去苗，锉） 狗脊（碎，锉，去毛） 茯神（去木） 人参各一两 黄连（去须） 菟丝子（酒浸一宿，晒干，别捣为末）各一两半 龙骨（烧） 牡蛎（煅）各三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煮小麦饮送下，加至三十丸。不拘时候。

【主治】 消渴。口干喜饮水，小便数，心烦闷，健忘怔忡。

06384 麦门冬丸

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】 麦门冬（去心，烂研成膏） 瓜蒌根 黄连（去须）

【用法】 上为末，入麦门冬内，捣匀为丸。每服三十丸，早、晚食后煎麦门冬汤送下。

【主治】 消渴。

06385 麦门冬丸

【方源】《得效》卷十六。

【组成】 熟地黄 麦门冬 车前子各等分

【用法】 上药旋焙旋研，炼蜜为丸。每服二三十

丸，用酒送下。

【主治】 ①《得效》：内障眼。②《永乐大典》引《经验普济加减方》：一切病眼翳晕，昏涩痒痛。

06386 麦门冬汤

【方源】 《金匮》卷上。

【异名】 麦冬汤(《兰台轨范》卷五)。

【组成】 麦门冬七升 半夏一升 人参二两 甘草二两 粳米三合 大枣十二枚

【用法】 以水一斗二升，煮取六升，温服一升，日三夜一服。

【功用】 滋养肺胃，降逆和中。

①《金匮》：止逆下气。②《医方集解》：降火利咽。③《古方选注》：生津救燥。④《血证论》：润利肺胃。⑤《成方便读》：养胃除烦，平逆气。

【主治】 肺阴不足，咳逆上气，咯痰不爽，或咳吐涎沫，口干咽燥，手足心热，舌红少苔，脉虚数；胃阴不足、气逆呕吐，口渴咽干。

①《金匮》：火逆上气，咽喉不利。②《三因》：呕逆，喘急。②《圣济总录》：肺胃气壅，风热客搏，咽喉烦闷。④《法律》：胃中津液干枯，虚火上炎之证。⑤《血证论》：燥痰咳嗽。膈食。及冲气上逆，夹痰血而干肺者。⑥《霍乱论》：霍乱后，余热未清，神倦不饥，无苔而渴，或火升气逆，干咳无痰。⑦《金匮要略本义》：肺虚而有热之痿。

【宜忌】 《医方发挥》：肺痿属于虚寒者不能用本方。

【方论选录】 ①《法律》：此胃中津液干枯，虚火上炎之证，治本之良法也。夫用降火之药，而火反升；用寒凉之药，而热转炽者，徒知与火热相争，未思及必不可得之数，不惟无益，而反害之。凡肺病有胃气则生，无胃气则死。胃气者，肺之母气也。孰知仲景有此妙法，于麦冬、人参、甘草、粳米、大枣大补中气，大生津液，此中增入半夏之辛温一味，其利咽下气，非半夏之功，实善用半夏之功，擅古今未有之奇矣。②《千金方衍义》：于竹叶石膏汤中偏除方名二味，而加麦门冬数倍为君，人参、甘草、粳米以滋肺母，使水谷之精皆得以上注于肺，自然沃泽无虞。当知火逆上气，皆是胃中痰气不清，上溢肺隧，占据津液流行之道而然，是以倍用半夏，更用大枣通津涤饮为先，奥义全在乎此。若浊饮不除，津液不致，虽日用润肺生津之剂，乌能建止逆下气之绩哉？俗以半夏性燥不用，殊失立方之旨。③《金匮要略心典》：火热挟饮致逆，为上气，为咽喉不利，与表寒挟饮上逆者悬殊矣。故以麦冬之寒治火逆，半夏之辛治饮气，人参、甘草之甘以补益中气。盖从外来者，其气多实，故以攻发为急；从内生者，其气多虚，则以补养为主也。④《古方选注》：麦门冬汤，从胃生津救燥，治虚火上气之方。用人参、麦门冬、甘草、粳米、大枣大生胃津，救金之母气，以化两经之燥，独复一味半夏之辛温，利咽止逆，通达三焦，则上气下气皆得宁谧，彻上绸缪，诚为扼要之法。⑤《血证论》：参、米、甘、枣四味，大建中气，大生津液，胃津上输于肺，肺清而火自平，肺调而气自顺，然未逆未上之火气，此固足以安之，而已逆已上之火气，又不可任其迟留也，故君麦冬以清火，佐半夏以利气，火气降则津液生，津液生而火气自降，又并行而不悖也。用治燥痰咳嗽，最为对症，以其润利肺胃，故亦治膈食。又有冲气上逆，挟痰血而干肺者，皆能治之。

【临证举例】 ①咳嗽 《扫叶庄医案》：右脉虚大，色夺形瘦，肌燥疮痍，咳嗽经年，曾经失血，是津亏气馁，由精劳内损，但理胃阴，不必治咳。《金匮》麦门冬汤去半夏。②咳血 《南雅堂医案》：咳甚血来，是属动象，阴阳失司，阳乃腾越，阳明络空，随阳气自为升降，拟以柔剂填养胃阴，师《金匮》法，用麦门冬汤加减治之：麦门冬四钱，黄耆二钱（酒炒），人参一钱，生甘草八分，粳米半盏，大枣三枚，水同煎服。③脑膜炎后遗症《古方新用》：某女，十四岁。患脑膜炎，经西医治愈后，经常口吐涎沫不止，吃东西时尤著，且伴有性情烦躁，易怒，舌淡红，苔薄白，脉平不数。给理中丸、苓桂术甘汤治之，效果不显，故用麦门冬汤治之。方药：麦冬 12 克，党参 9 克，半夏 9 克，炙甘草 6 克，大枣 4 枚，粳米 9 克，水煎，分二次服。服三剂后，初见疗效，口吐涎沫有所减少，在上方逐渐加重半夏、麦门冬之药量，半夏加至 24 克，麦门冬加至 60 克，每日一剂，连服 20 余剂，病愈涎止。

06387 麦门冬汤

【方源】 《千金》卷十。

【异名】 麦冬汤(《疫疹一得》卷下)。

【组成】 麦门冬一两 京枣二十枚 竹叶（切）一升 甘草二两

【用法】 上㕮咀。以水七升，煮粳米一升令熟，去米纳药，煎取三升，分三次服。不能服者，绵滴汤口中。

【主治】 ①《千金》：劳复，气欲绝。②《医学入门》：劳复发热。

【方论选录】 《千金方衍义》：劳复气欲绝，胃虚

火乘肺也，方用麦冬滋肺，竹叶清心，甘草和中，京枣以培脾气之耗也。

06388 麦门冬汤

【方源】《千金》卷十二。

【组成】麦门冬 白术各四两 甘草一两 牡蛎芍药 阿胶各三两 大枣二十枚

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取二升，分二次服。

【主治】下血虚极。

【方论选录】《千金方衍义》：下血虚极不用参、耆，而用牡蛎以固下焦之虚脱，并用白术以培中气之内陷，胶、芍养血，麦门冬滋津，甘草、大枣、白术之匡佐耳。

06389 麦门冬汤

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】生麦门冬三两（去心） 青竹茹三两 茅根五两 甘草一两（炙） 生姜五两 人参一两

【用法】上切。以水七升，煮取二升五合，去滓，分三次温服，如人行六七里，进一服。不吐利。

【主治】①《外台》引《广济方》：烦热，呕逆不下食，食则吐出。②《圣济总录》：霍乱逆满，烦躁，眠卧不安。

【宜忌】忌海藻，菘菜。

06390 麦门冬汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【异名】千金麦门冬汤（《玉机微义》卷十）、麦冬汤（《寓崖尊生》卷八）。

【组成】麦门冬（去心，焙） 桑根白皮（炙，锉） 生干地黄各一两 半夏（汤洗七遍，焙干） 紫菀（去苗土） 桔梗（炒） 淡竹茹 麻黄（去根节）各三分 五味子 甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一分（拍碎），大枣三枚（劈破），同煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】①《圣济总录》：伤寒后伤肺。咳唾有血，胸胁胀满，上气羸瘦。②《玉机微义》：诸病后火热乘肺，咳嗽有血，胸胁胀满，上气羸瘦，五心烦热，渴而烦闷。

【方论选录】《医钞类编》：麦冬甘微苦寒，清心润肺，泻热除烦，火退金清，痰嗽自止；桑皮甘辛而寒，下气行水，泻肺中火邪，火退气宁，喘满自除；生地泻丙火，清燥金，血热妄行宜凉之；麻黄肺家专药，去荣中寒邪，风中风热；半夏行水润肾，亦能散血，火炎痰升，非此不除；紫菀专治血痰，为血劳圣药；桔梗开提气血，载药上浮，入肺泻药，痰壅喘促，宜辛苦开之，竹叶甘寒，能除上焦风邪，烦热咳逆喘促；五味敛肺，除热宁嗽定喘，火热咳嗽必用之药；甘草入凉剂则泻邪热，火热甚者以此缓之也。

06391 麦门冬汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】麦门冬（去心，焙） 石膏 地骨皮各二两 栀子仁 甘草（炙，锉） 各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加小麦五十粒，竹叶七片，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】心脏实热，烦躁喘急，欲吐不出，头目昏眩。

06392 麦门冬汤

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】麦门冬（去心，焙）二两 桔梗（去芦头）五两 甘草（炙，锉）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加青蒿心叶十片，同煎至七分，去滓温服。稍轻者，粥饮调下亦得，不拘时候。

【主治】肺痈涕唾涎沫，吐脓如粥。

06393 麦门冬汤

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】生麦门冬（去心）一两半 栝楼根三两 茅根 竹茹各五两 小麦三合 乌梅（去核）七枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】消渴，舌干引饮。

06394 麦门冬汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】麦门冬（去心，焙） 黄连（去须） 冬瓜（干者）各二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】消渴。日夜饮水不止，饮下小便即利。

06395 麦门冬汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】麦门冬（去心，焙） 桂（去粗皮） 干姜（炮裂）各半两 甘草（炙，锉） 阿胶（炙令燥） 人参各三分 生干地黄（焙）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，空心温服，日午、夜卧各一服。

【主治】虚劳不足，内伤呕血吐血。

06396 麦门冬汤

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】麦门冬（去心，焙）二两　淡竹叶（洗，切）一握　半夏（汤洗七遍，焙）二两　甘草（炙，锉）一两一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（切碎），大枣二枚（擘破），粳米半合，同煎取一盏，去滓温服。

【主治】虚劳烦热，口干舌燥，欲得饮水。

06397　麦门冬汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【异名】泻肝散（《得效》卷十六）、麦门冬散（《银海精微》卷下）、玄参泻肝散（《准绳·类方》卷七）、麦冬汤（《眼科全书》卷四）。

【组成】麦门冬（去心，焙）　大黄（锉，炒）　黄芩（去黑心）　桔梗（锉，炒）　玄参各一两　细辛（去苗叶）半两　芒消（研）半两

【用法】上药除芒消外，为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎取七分，去滓，下芒消末少许，食后、临卧温服。

【主治】①《圣济总录》：血灌瞳人，昏涩疼痛。②《普济方》引《龙木论》：辘轳转关外障。

06398　麦门冬汤

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】麦门冬（去心，焙）　栝楼根各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】口舌干燥，心热。

06399　麦门冬汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】麦门冬（去心，焙）二两　白茯苓（去黑皮）一两半　赤芍药　当归（切，焙）　人参　甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后心虚，言语谬误，恍惚不安。

06400　麦门冬汤

【方源】《三因》卷十一。

【异名】麦冬汤（《赤水玄珠》卷十六）。

【组成】麦门冬（去心）　生芦根　竹茹　白术各五两　甘草（炙）　茯苓各二两　橘皮　人参　萎蕤各三两

【用法】上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜五片，陈米一撮，煎七分，去滓热服。

【主治】上焦伏热，腹满不欲食，食入胃未定，汗出，身背皆热，或食入先吐而后下，名曰漏气。

06401　麦门冬汤

【方源】《济生》卷七。

【异名】竹叶汤（《普济方》卷三三八）、麦冬汤（《玉案》卷五）。

【组成】麦冬（去心）　防风　茯苓（去皮）各一两　人参半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，淡竹叶十片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】子烦。

【备考】本方方名，《丹溪心法附余》引作"麦门冬散"。

06402　麦门冬汤

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生》。

【组成】麦门冬（去心）　远志（去心，甘草煮）　人参　黄芩　生地黄（洗）　茯神（去木）　石膏（煅）各一两　甘草（炙）半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脉实极。气衰血焦发落，好怒。唇口赤甚，言语不快，色不泽，饮食不为肌肤。

06403　麦门冬汤

【方源】《医学正传》卷二。

【组成】麦门冬（去心）　桑白皮（蜜炒）　生地黄各七分　紫菀茸　桔梗　淡竹叶各五分　五味子　甘草各三分　贝母六分　天门冬七分

【用法】上细切，作一服。加生姜三片，水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】①《医学正传》：诸病后，火热乘肺，咳唾有血，胸胁胀满，上气喘急，羸瘦，五心烦热，渴而烦闷。②《会约》：上焦热甚而声瘖者。

【方论选录】《证因方论集要》：天冬、麦冬能清肺热，桑皮、紫菀能泻肺火，生地、贝母能润肺燥，五味能收肺气，淡竹叶功专清心，甘、桔除热利膈，火清而闭开矣。

【备考】方中贝母、天门冬用量原缺，据《景岳全书》补。

06404　麦门冬汤

【方源】《景岳全书》卷六十三引万氏方。

【组成】麦门冬　葛根（去皮）各一钱　升麻（去须）四分　赤芍药（酒炒）　茯苓各六分　炙甘草四分　石膏（煅）一钱半

【用法】水煎服。

【主治】①《景岳全书》：表邪内热，咳嗽甚者。②《麻科活人》：麻疹咳嗽。

06405 麦门冬汤

【方源】《简明医彀》卷二。

【组成】麦冬 天门冬 远志 当归 白芍药 生地黄 人参 黄芪 牡丹皮 阿胶 藕节 炙草 各一钱

【用法】上作一服。用水二钟，加生姜一片，煎一钟，不拘时服。

【主治】思虑伤心，吐血衄血。

06406 麦门冬汤

【方源】《慈幼新书》卷首。

【组成】麦冬 黄芩 茯苓 淡竹叶

【主治】妊娠子烦，心常惊悸。

06407 麦门冬汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】麦冬三钱（去心） 人参一钱半 生地五钱 阿胶三钱（糯粉炒） 条芩一钱半（酒炒） 白芍一钱半（酒炒） 地骨皮三钱 甘草八分 大枣三枚

【用法】水一斗，煮药取三升，纳清酒一升，并胶烊尽，煎取一升，温服。

【主治】怀妊六月，脉大滑疾者。

【加减】脾虚，加白术。

【方论选录】阴阳凝结，胎渐长成，宜清热补阴以培养其母气，麦门冬清心肺以滋津液，人参扶元气以固胎元，生地滋阴壮水以资冲任，阿胶补阴益血以宁胎息，条芩清热安胎，白芍敛阴和血，地骨清肌退热，生草泻火缓中，大枣以益脾元也。肝虚亦用鸡汁煮药，并佐以清酒，而母气无伤，胎元无不日安日长矣。

06408 麦门冬饮

【方源】《医心方》卷十三引《玄感传尸方》。

【异名】麦门冬汤（《圣济总录》卷九十三）、生麦门冬汤（《普济方》卷一七八）。

【组成】麦门冬三升（去心，生者） 地骨白皮三升 小麦一升

【用法】以水一斗三升，先煮小麦取一斗，去麦纳二味，更煮取三升，绞去滓，分三次温服，相去四五里。

【主治】①《医心方》引《玄感传尸方》：骨蒸肺痿，四肢烦热，不能食，口干。②《圣惠》：消渴，口舌干燥，骨节烦热。

06409 麦门冬饮

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】麦门冬（去心，焙）一两 龙齿三分 山栀子仁 玄参（坚者）各半两 芍药三分 木通（锉）一两 人参 茅根各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分（拍碎），同煎至七分，去滓，下生藕、生地黄汁各一合，搅匀，食后分二次温服。

【主治】伤寒后心忪惊悸，烦热口干。

06410 麦门冬饮

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【异名】麦门冬饮子（《宣明论》卷一）、门冬饮子（《医学纲目》卷二十一）、生津麦冬汤（《杏苑》卷五）、麦冬饮子（《医略六书》卷二十二）。

【组成】麦门冬（去心）二两 栝楼根 知母（焙） 甘草（炙） 五味子 生干地黄（焙） 人参 葛根 茯神（去木）各一两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，加竹叶数片，煎至一盏，去滓温服，日二夜一。

【主治】①《圣济总录》：膈消。胸中烦满，津液燥少，短气多消。②《医略六书》：上消属虚热，脉虚浮数者。

【方论选录】《医略六书》：虚阳内郁，灼烁肺金，不能生肾水以上朝，故消渴不止矣。人参扶元补肺虚，生地壮水滋真阴，花粉清热润燥，知母滋肾退热，五味收肺气之虚耗，茯神安心神之虚烦，干葛升清阳以解郁，竹叶疗膈热以凉心，炙草缓中和胃也。水煎温服，使金水相生，则津液上奉，而肺气自雄，水精四布，何患上消之不瘳哉。此保肺生津之剂，为虚阳内郁上消之专方。

06411 麦门冬饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】麦门冬（去心，焙） 人参 甘草（炙，锉） 阿胶（炙燥） 黄芩（去黑心） 熟干地黄（焙） 乌梅（去核，炒）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜三片，大枣二枚（擘），煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠五六月，胎动不安，寒热往来，身体惊战，卒有所下，腹痛如欲产。

06412 麦门冬饮

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】麦门冬（去心，焙）一两 紫菀（去土） 杏仁（去皮尖双仁，炒） 桑根白皮（锉）各半两 桔梗（炒）三分 甘草（炙）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，加竹茹如鸡子大，水一盏半，煎减半，加蜜少许，打转去滓，温服，一日三次。

【主治】 妊娠咳嗽不止。

06413 麦门冬饮

【方源】《医统》卷七十一。

【组成】 麦门冬（去心） 木通 赤芍药 葵子 滑石各一两 芒消一两半

【用法】 上每服四钱，水一盏，加生姜一片，葱白二茎，煎六分，食前服。

【主治】 心热气滞成淋，脐下妨闷。

06414 麦门冬饮

【方源】《医统》卷八十五。

【组成】 麦门冬二钱 人参一钱 生地黄一钱 茯神一钱 黄芩一钱 甘草四分 犀角屑一钱

【用法】 用水一钟半，加莲子五个，煎七分，不拘时候。

【主治】 妊娠子烦。

06415 麦门冬散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 麦门冬三两（去心） 赤茯苓一两 半夏一两（汤浸洗七遍去滑） 人参一两（去芦头） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 茅根二两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 枇杷叶一两（拭去毛，炙微黄） 前胡半两（去芦头）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脾胃壅热，呕哕不下食，纵食，良久即吐。

06416 麦门冬散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】 麦门冬（去心） 五味子 人参（去芦头） 葛根（锉） 甘草（炙微赤，锉） 石膏 芎藭 桑根白皮（锉）各一两

【用法】 上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒下后，上气，烦渴不止。

06417 麦门冬散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】 麦门冬二两（去心，焙） 赤芍药一两 黄芩一两 石膏三两 栀子仁半两 犀角屑一两 川朴消二两 地骨皮半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 热病五日，头痛身疼，皮肉如火，心膈烦躁。

06418 麦门冬散

【方源】 方出《圣惠》卷二十七，名见《普济方》卷二三三。

【组成】 麦门冬（去心） 人参（去芦头） 白茯苓 酸枣仁（微炒） 前胡（去芦头） 甘草（炙微赤，锉） 地骨皮各一两 生干地黄三两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加粟米一百粒，豉五粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 虚劳，心烦不得睡卧。

06419 麦门冬散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】 麦门冬一两半（去心，焙） 当归三分 黄芩三分 黄耆一两（锉） 熟干地黄一两 蒲黄半两 人参三分（去芦头） 白芍药三分 阿胶一两（锉碎，炒令黄燥）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加淡竹茹一分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 虚劳小便出血，心神烦热。

06420 麦门冬散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】 麦门冬一两半（去心，焙） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 川升麻三分 赤芍药三分 黄芩三分 知母三分 赤茯苓三分 柴胡一两（去苗） 甘草一两（炙微赤，锉） 栀子仁三分 桑根白皮一两（锉） 地骨皮三分

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 骨蒸虚烦，翕翕发热，骨节痠疼。

06421 麦门冬散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 麦门冬一两半（去心，焙） 川大黄一两（微炒） 黄芩一两 地骨皮一两 玄参 葳蕤各一两 犀角屑半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，加马牙消半钱，食后温服。

【主治】 眼血灌瞳人，昏涩赤痛。

06422 麦门冬散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】 麦门冬半两（去心） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 白茯苓三分 甘草一分（炙微赤，锉） 枇杷叶二分（拭去毛，炙微黄） 人参三分（去芦头）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 反胃，呕哕吐食，烦热。

06423 麦门冬散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 麦门冬一两（去心） 地骨皮三分 栝楼根三分 人参半两（去芦头） 芦根一两（锉） 黄耆三分（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 黄芩三分 茅根一两（锉） 石膏二两

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，竹茹半分，小麦半合，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 消渴。口舌干燥，心神烦热。

06424 麦门冬散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 麦门冬一两（去心） 栝楼根一两 知母一两 黄耆一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 牡蛎一两半（烧为粉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 消渴，日夜饮水，过多不足，口干燥，小便数。

06425 麦门冬散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】 麦门冬二两（去心） 甘草半两（炙） 石膏二两（研） 地骨皮二两 栀子仁半两

【用法】 上为散。每服二钱，水一中盏，加小麦五十粒已来，竹叶十片，同煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】 心脏实热，烦躁喘急，欲吐不出，头目昏眩。

06426 麦门冬散

【方源】《本事》卷十。

【组成】 麦门冬（用水浸，去心，焙） 半夏曲（炙） 人参（去芦） 茯苓（去皮）各三钱 甘草（炙）一分

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，煎五分，去滓温服，一日二三次。

【主治】 小儿呕吐，脉数有热。

【方论选录】《本事方释义》：麦门冬气味甘寒微苦，入手太阴少阴；半夏曲气味辛微温，入足阳明；人参气味甘温，入足阳明；茯苓气味甘平淡渗，入足阳明，能引药达下；甘草气味甘平，入足阳明通行十二经络，能缓诸药之性；生姜气味辛温，入手足太阴。凡小儿中虚呕吐，脉数有热，久延惟恐成惊，故以甘寒之药清其热，而以甘温缓中之药护其中，佐以辛温之达表，表里既和，病自灭矣。

06427 麦门冬散

【方源】《医统》卷四十二。

【组成】 麦门冬（去心） 生地黄各一钱 白芍药 蒲黄各二钱

【用法】 水一盏，加生姜五片，煎八分，食后温服。

【主治】 鼻衄。

06428 麦门冬粥

【方源】《长寿药粥谱》引《活人书》。

【组成】 麦门冬 20～30 克（取汤取汁） 粳米 100 克

【用法】 以粳米煮粥，待粥半熟，加入麦门冬汁和冰糖适量，同煮为粥。供点心或早点服食。

【功用】 润肺，养胃，清心。

【主治】 肺痿肺燥，咳嗽咯血，虚劳烦热，胃阴不足，纳少反胃，以及老人热病津伤。

【宜忌】 老人风寒感冒，咳嗽痰多时忌服。

06429 麦门冬饮子

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】 生麦门冬汁五合、生刺蓟汁五合 生地黄汁五合

【用法】 上药汁相合，于银锅中略暖过。每服一小盏，调伏龙肝末一钱服之。

【主治】 吐血、衄血，至一斗不止。

06430 麦门冬饮子

【方源】《保命集》卷下。

【异名】 门冬饮子（《洁古家珍》）、麦冬饮（《赤水玄珠》卷九引《济生》）、麦门冬饮（《重订严氏济生方》）、麦地煎（《仙拈集》卷二）、二神汤（《疡医大全》卷十二）。

【组成】 麦门冬 生地黄各等分

【用法】 上锉。每服一两，煎服。

【主治】 衄血不止。

06431 麦门冬饮子

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 清肺饮子（《卫生宝鉴》卷十）、门冬饮子（《医略六书》卷二十二）、麦门冬饮（《痘疹一贯》卷六）。

【组成】 黄耆一钱 麦门冬 当归身 生地黄 人参各五分 五味子十个

【用法】 上为粗末，都作一服。水二盏，煎至一盏，去滓热服，不拘时候。以二棱针于气街出血，立愈。

【主治】 吐血久不愈。

【备考】 本方方名,《普济方》引作"麦门冬散",有牡丹皮半钱。

06432 麦冬平肺饮

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 麦冬清肺饮(《杂病源流犀烛》卷二)。

【组成】 人参 麦门冬 赤芍 槟榔 赤茯苓 陈皮 桔梗各一钱 甘草五分

【用法】 水二钟,煎八分,空腹服。

【主治】 ①《外科正宗》:肺痈初起,咳嗽气急,胸中隐痛,呕吐脓痰者。②《杂病源流犀烛》:麻疹后毒归于肺,肺焦叶举,咳嗽,气喘息高,连声不止,甚至咳血,或呛出饮食。

06433 麦冬甘露饮

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】 麦冬 黄芩 元参 花粉 甘草 薏仁 竹叶

【主治】 麻疹肝胃热盛,口渴发疮。

06434 麦冬养荣汤

【方源】《血证论》卷八。

【组成】 人参三钱 麦冬三钱 五味一钱 当归三钱 白芍三钱 知母二钱 陈皮三钱 黄耆三钱 甘草一钱。

【功用】 清胃火以宁血。

【主治】 唾血,脉细数,证属脾经阴虚,津液枯,血不宁者。

06435 麦冬清肺汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】 麦冬 知母 贝母 黄芩 杏仁 天花粉 枳壳 陈皮 丹皮 楂肉 桔梗

【用法】 水煎服

【主治】 麻疹热毒乘肺,咳嗽吐血。

【备考】 原书治上证,以本方去楂肉、桔梗,加生地黄。

06436 麦门冬人参汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】 麦门冬(去心,焙) 人参 甘草(炙) 栝楼根 生干地黄(焙) 王瓜根各一两

【用法】 上为末。每服二钱匕,水一盏半,煎至一盏半,去滓,食后温服。

【主治】 产后虚渴引饮。

06437 麦门冬理中汤

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【异名】 麦门冬汤(《圣济总录》卷五十四)。

【组成】 生麦门冬一升 生姜四两 白术五两 甘草二两(炙) 人参三两 茯苓二两 橘皮三两 竹茹一升 生芦根一升 纯心五合 萎蕤三两 粟米一升

【用法】 上切。以水一斗五升,煮取三升,分三服。

【主治】 上焦热,腹满而不欲食,或食先吐而后下,肘胁挛痛。

【宜忌】 忌海藻、松菜、大醋、桃李、雀肉等。

【方论选录】《千金方衍义》:此方治腹满不欲食,故用术、橘、仓米助胃除满,病在下取诸上也;麦冬、萎蕤、芦根、竹茹为胃热上逆,先吐后下而设。

06438 寿星丸

【方源】《局方》卷一(淳祐新添方)。

【异名】 琥珀寿星丸(《卫生宝鉴》卷九)、琥珀丸(《普济方》卷一〇一)。

【组成】 天南星一斤(先用炭火三十斤,烧一地坑通红,去炭,以酒五升倾坑内,候渗酒尽,下南星在坑内,以盆覆坑,周围用灰拥定,勿令走气,次日取出为末) 朱砂(别研)二两 琥珀(别研)一两

【用法】 上为末,生姜汁煮面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,加至五十丸,食后、临卧煎石菖蒲、人参汤送下。

【主治】 心腹因惊,神不守舍,风涎潮作,手足抽掣,事多健忘,举止失常,神情昏塞。

06439 寿星丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】 姜远志 人参 黄耆 白术 甘草 当归 生地 白芍 茯苓 陈皮 肉桂 胆星 琥珀 朱砂 五味子

【用法】 猪心血、姜汁糊为丸。导痰汤送下。

【主治】 痰迷心窍,言语如痴而多忘。

06440 寿胎丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 菟丝子四两(炒熟) 桑寄生二两 川续断二两 真阿胶二两

【用法】 上药将前三味轧细,水化阿胶和为丸,每丸一分重(干足)。每服二十丸,开水送下,一日二次。

【主治】 滑胎。

【加减】 气虚者,加人参二两;大气陷者,加生黄耆三两;食少者,加炒白术二两;凉者,加炒补骨脂二两;热者,加生地二两。

【方论选录】 胎在母腹,若果善吸其母之气化,自无下坠之虞。且男女生育,皆赖肾脏作强。菟丝

大能补肾，肾旺自能荫胎也；寄生能养血，强筋骨，大能使胎气强壮，故《本经》载其能安胎；续断亦补肾之药；阿胶系驴皮所熬，最善伏藏血脉，滋阴补肾，故《本经》亦载其安胎也。

06441 戒烟丸

【方源】《外科传薪集》。

【组成】 党参二钱 玉竹二钱 粟壳二钱 橘红一钱二分 沉香五分 黄耆（炙）二钱 茯苓二钱 炮姜二钱 杜仲一钱二分 肉桂五分 枣仁一钱二分 制半夏一钱五分 益智仁一钱二分 覆花一钱二分 红枣二两

【用法】 上药同煎，用布沥汁，再入烟灰三钱，赤砂糖二两，同煎，加姜汁和在一处，熬五日为丸。此平淡之方，看体质用，烟瘾重者，加烟。

【功用】 戒烟。

06442 戒烟膏

【方源】《中国医学大辞典》引林文忠公方。

【组成】 明党参 云茯苓 黄耆（炙） 潞党参 玉竹（炙）炮姜炭 罂粟壳 杜仲（炒） 橘红 枸杞各四钱 旋覆花（绢包） 甘草（炙） 法半夏 益智仁各二钱四分 枣仁二钱

【用法】 加红枣四钱，赤砂糖二两，清水煎取浓汁，去渣收成膏，称见若干，加清烟膏一成，搅入和匀。烟瘾一钱，膏亦一钱，每日吸烟几次，服膏亦几次，瘾前服，服七日，减去一成，逐次减去，以减尽为度。体丰阳虚者，服此方极佳。

【加减】 肚腹下坠者，加沉香二钱。

【备考】 本方改为丸剂，名“戒烟丸”（见原书）。

06443 戒鸦片烟瘾方

【方源】《种福堂方·附录》。

【组成】 潞党参一两 金樱子一两 粟壳四钱 莱菔子一两 韭菜子一两 半夏一两 阳春砂仁五钱 广陈皮五钱 陈酒五斤 倭芙蓉灰五钱

【用法】 将各味煎好，滤去渣滓，和入陈酒内再煎一沸，置盖钵中勿令泄气。于瘾至之前先饮一钟，瘾可不至，更将淡酒一杯冲入其内，每饮一钟，即冲入一钟，药性冀其渐减而烟瘾庶可全消。

【功用】 消烟瘾。

06444 进食丸

【方源】《普济方》卷二十二引《卫生家宝》。

【组成】 肉豆蔻仁一钱 厚朴五钱（去粗皮） 丁香一钱 木香一钱 荜澄茄一钱 良姜五钱（微炒） 五味子一钱 生姜三两（去皮，切作小块子）

【用法】 上药五味子以前药味碾为粗末，入切生姜再同拌碾，或杵成膏，取出，入密器内罨一宿，次日取出焙干，碾为细末，煮粟稠粥为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，早、晚食前煎生姜、橘皮汤，或米饮送下，一日三次。

【主治】 脾胃久虚，饮食减少，肠滑或痢，肢体乏力，精神疲劣。

06445 进食散

【方源】《苏沈良方》卷四引李潜方。

【异名】 理脾散（《普济方》卷二十二引《如宜方》）。

【组成】 青皮 陈皮（去瓤）各一分 草豆蔻二个 甘草一分（炙） 诃子（去核，煨）五个 高良姜（薄切，炒）一分 川乌头一个（炮，去皮脐） 肉桂一分（去外皮）

【用法】 每服一钱，水一中盏，加生姜三片，煎至七分，空腹时服。

【主治】 脾胃虚冷，不思食，及久病入脾虚，全不食者。

【临证举例】 脾虚不食 李潜在真州治贾使君女子，已五十余日，病脾多呕，都不进食，医绝无验。潜投此药一服，遂食蒸饼半枚，明日百味皆思。潜云：此药进食极神速。予疑此药太热，潜云不然，用之三十年，无不效者。

【备考】 方中草豆蔻，《局方》（淳祐新添方）作“草果肉”。

06446 进食散

【方源】《医方大成》卷三引《济生》。

【异名】 进食汤（《普济方》卷二十五）。

【组成】 半夏曲 肉豆蔻（面裹煨） 草果仁 高良姜（炒） 麦芽（炒） 附子（炮，去皮尖） 丁香 厚朴（去皮，姜炒） 陈皮（去白）各一两 人参（去芦） 青皮（去白） 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏，加生姜五片，大枣一枚煎，不拘时候温服。

【主治】 脾胃虚寒，或为生冷所伤，或七情所扰，胸膈痞塞，不思饮食，痰逆恶心，大便溏泄。

06447 进退四物汤

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】 熟地五钱 当归三钱 酒炒白芍一钱五分 川芎一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 调经。

【加减】 血热先期者，加丹参、丹皮、益母草各二钱；血寒后期者，加肉桂五分、牛膝、香附各二钱；先腹痛而经至，小腹疞痛者，加青皮（炒）一

钱、泽兰、香附、延胡索各二钱，青木香四分，减去熟地一味，倍加川芎一钱；经净而腹痛者，加人参二钱，桂枝五分，香附、延胡各二钱，减熟地一半，加炒白芍一钱五分；带下，加鹿角霜二钱，煅龙骨二钱，左牡蛎四钱，仙居白术二钱，砂仁五分，去熟地、川芎二味；白淫多者，加茯苓、白术、东洋参各一钱五分，进白芍一半，退熟地一半；白淋多者，加琥珀一钱五分，乌贼骨一钱，滑石、淡竹叶各三钱；经水色黄而淡者，加肉桂五分，茺蔚子三钱，党参三钱，柴胡（醋炒）八分；心神摇漾，加茯神三钱，远志肉（炒）一钱，琥珀八分，灯草一扎；风虚眩晕者，加煅天麻一钱，姜半夏一钱，倍川芎一钱；如呕者，加姜三片，川连八分，姜半夏一钱五分，淡吴萸八分，减熟地一半；肢逆冷者，加桂枝七分，竹茹一丸半，姜三片

06448 进退黄连汤

【方源】《法律》卷五。

【组成】 黄连（姜汁炒） 干姜（炮） 人参（人乳拌蒸）一钱五分 桂枝一钱 半夏（姜制）一钱五分 大枣二枚

【用法】 进法用本方七味，俱不制，水二茶盏，煎一半，温服；退法不用桂枝，黄连减半，或加肉桂五分，如上逐味制熟，煎服法同，但空朝服崔氏八味丸三钱，半饥服煎剂耳。

【功用】《成方便读》：握运中枢透达。

【主治】 关格。

【方论选录】 ①《古方选注》：黄连汤，仲景治胃有邪，胸有热，腹有寒。喻嘉言旁通其旨，加进退之法，以治关格，独超千古，藉其冲和王道之方，从中调治，使胃气自为敷布以渐通于上下。如格则吐逆，则进桂枝和卫通阳，俾阴气由中渐透于上，药以生用而升；如关则不得小便，则退桂枝、减黄连，俾阳气由中渐透于下，药以熟用而降；如关而且格者，阴阳由中而渐透于上下，卫气先通则加意通卫，营气先通则加意通营，不以才通而变法，斯得治关格之旨矣。②《成方便读》：喻氏治关格证，上则呕吐不纳，下则二便不通，用此方或进或退，犹握枢而运，使之透达于上下。盖关则不得小便，格则吐逆，如《伤寒论》之胸中有热、胃中有寒之意。故其治格之盛者，当进而从阳，本方俱不用制，水煎温服。如关之盛者，即退而从阴，方中黄连减半，或加肉桂五分，其意以人参、大枣，坐镇中枢，半夏能和胃而通阴阳，于是饮入胃中，听胃气之敷布，或协黄连以除其上热，或借姜、桂以温其下寒。然此法止可治有邪之关格，若由噎膈反胃，阴枯液涸而成关格者，又非此方可治也。

06449 进退大承气汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 大承气汤

【用法】 太阴证不能食，当先补而后泻，乃进药法也。先煎厚朴半两，俱依本方加制，水一盏半，煎至一半服之。若三两服后未已，谓有宿食不消，又加枳实二钱同煎服。三两服泄又未已，如稍加食，尚有热毒，又加大黄三钱，推过泄止住药。如泄未止，谓肠胃有久尘垢滑粘，加芒消半合，宿垢去尽则愈矣。阳明证，能食是也，当先泻而后补，谓退药法也。先用大承气汤五钱，水一盏，依前法煎至七分，稍热服。如泄未止，去芒消，后稍热退，减大黄一半两服。如热气虽已，其人心腹满，又减去大黄，枳实厚朴汤又煎三两服。如是腹胀满退，泄亦自愈。后服厚朴汤数服则已。

【主治】 大瘕泄，有太阴、阳明二经证者。

【备考】《保命集》：泄有虚实寒热，虚则无力粘衣，不便已泄出，谓不能禁固也。实则数至圊而不能便，俗云虚坐努责故也，里急后重，进退大承气汤主之。

06450 远邪汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】 人参一钱 苍术三钱 茯苓三钱 柴胡一钱 苏叶五分 生甘草一钱 玄参一两 荆芥三钱 黄芩一钱 白菊五钱 天花粉二钱

【用法】 水煎服。一剂头痛止，二剂身热解，三剂斑散，狂躁皆安，四剂痊愈。

【功用】 补正退邪。

【主治】 春温，头痛身热，口渴呼饮，四肢发斑，似狂非狂，似躁非躁，沿门阖室，彼此传染。

06451 远志丸

【方源】《外台》卷十七引《备急方》。

【组成】 续断二两 薯蓣二两 远志二两（去心） 蛇床子二两 肉苁蓉二两

【用法】 上为末，以雀卵为丸，如小豆大。每服七丸至十丸，以酒送下。百日知之。

【主治】 男子萎弱。

06452 远志丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 远志一两（去心） 麦门冬一两（去心，焙） 赤石脂一两 熟干地黄一两 人参一两（去芦头） 茯神一两 甘草半两（炙微赤，锉） 白术

一分 薯蓣一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以清粥饮送下。

【主治】 心气不足，惊悸多忘。

06453 远志丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】 远志（去心） 山芋 柏子仁 巴戟天（去心） 续断 杜仲（去粗皮，炙，锉）各二两 菟丝子（酒浸，焙干，别捣） 荆实 山茱萸 五味子各二两半 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 牛膝（酒浸，切，焙）各四两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。服之月余，气壮精倍。

【功用】 补血益气，强力益志。

【主治】 真元衰惫，耳焦面黑，精神不爽。

【加减】 若体涩，加柏子仁；精冷，加五味子；阳衰，加续断，各一倍。

06454 远志丸

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】 远志二两 茯神 石菖蒲 黄耆 熟干地黄 人参各一两

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】 虚劳惊悸，神气不宁。

06455 远志丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】 远志 菖蒲 龙齿 茯神 黄耆 人参 赤石脂各一两 干地黄二两 麦门冬半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，米饮送下。

【主治】 心中恍惚不宁。

06456 远志丸

【方源】《本事》卷二。

【组成】 远志（去心，洗，锉，炒令黄色） 南星 白附子（炮微黄） 白茯苓（去皮） 人参（去芦） 酸枣仁（微炒，去皮，研）各半两 金箔五片 朱砂（水飞）半两（入麝香少许同研）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，食后、临卧薄荷汤送下。

【主治】 因惊语言颠错。

06457 远志丸

【方源】《三因》卷十。

【组成】 人参 白茯苓 川姜（炮）各半两 牡蛎（煅取粉） 远志（去心，姜汁制炒）各一两

【用法】 上为末，用苁蓉一两，酒熬成膏为丸，如梧桐子大。每服五十丸，糯米汤送下。

【主治】 心肾虚，烦渴引饮，胸间短气，小便白利，白浊泄遗。

06458 远志丸

【方源】《三因》卷十三。

【组成】 远志（去心，炒） 山药（炒） 熟地黄 天门冬（去心） 龙齿（水飞）各六两 麦门冬（去心） 五味子 车前子（炒） 白茯苓 茯神（去木） 地骨皮 桂心各五两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心温酒、米汤任下。

【主治】 心肾气不足，惊悸健忘，梦寐不安，遗精，面少色，足胫痠疼。

06459 远志丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 酸枣仁（炒，别研） 远志（去心） 白附子（炮） 人参（去芦） 石菖蒲 白茯苓（去皮） 天南星（炮） 龙骨（煅） 麦门冬（去心） 天麻 半夏曲 铁粉各一两 辰砂半两（别研）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，温酒或人参汤送下，不拘时候。

【功用】 安魂定魄，去风涎，镇惊气。

【主治】 心气不宁。

06460 远志丸

【方源】《医方大成》卷五引《济生》。

【组成】 远志（去心，姜汁淹） 石菖蒲各二两 茯神（去木） 白茯苓（去皮） 人参 龙齿各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服七十丸，食后、临卧热汤送下。

【主治】 因事有惊，心神不定，夜梦惊堕，小便白浊。

06461 远志丸

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】 远志（去心，姜汁炒） 牡蛎（煅，取粉）各二两 白茯苓（去皮） 人参 干姜（炮） 辰砂（别研）各一两 肉苁蓉（净洗，切片，焙干）四两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前煎灯心、盐汤送下；温酒亦可。

【功用】 补益心肾，聪明耳目，定志安神，滋养气血。

【主治】 丈夫、妇人心气不足，肾经虚损，思虑太过，精神恍惚，健忘多惊，睡卧不宁，气血耗

败，遗沥泄精，小便白浊，虚汗盗汗，耳或聋鸣。

06462 远志丸

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】远志一两半 人参一两半 熟地五两 黄耆三两（蜜炙） 当归三两 白术一两半（炒） 阿胶三两（麸炒） 柏子仁三两（炒） 萸肉一两半 麦冬三两（去心）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三五钱，金箔汤送下。

【主治】产后惊悸，脉浮虚软者。

【方论选录】产后气血两虚，心神失养，而心气虚馁，胆气亦怯，故善惊数悸焉。远志通肾交心，人参扶元壮胆，熟地补真阴以滋心血，黄耆补中气以雄胆气，当归养血脉荣心，白术健脾元生血，阿胶珠补阴益血，柏子仁养心安神，麦冬润肺气以清心，萸肉密肾气以涩精也。蜜丸金箔汤下，使阴平阳秘，则血气内充，而心神得养，胆气亦壮，何有善惊数悸之患哉。

06463 远志丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】麦冬 石菖蒲 甘菊 远志各五钱 杞子 熟地各四钱

【用法】炼蜜为丸。空腹临卧服。

【主治】心肾两虚，近视，不能远视者。

【备考】原书治上证，本方加密蒙花。

06464 远志汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】远志（去心）一两 赤茯苓（去黑皮）三分 犀角屑一两 人参半两 知母（焙）半两 芍药一两 黄芩（去黑心）三分 前胡（去芦头）三分 麦门冬（去心，焙）一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水一盏半，煎至一盏，去滓，食后分二次温服。如人行三五里再服。

【主治】心劳，多烦躁，背膊妨闷，面色数变，乍赤乍黑，或笑或歌。

06465 远志酒

【方源】《三因》卷十四。

【组成】远志不以多少（汤洗去泥，捶，去心）

【用法】上为末，酒一盏，调末三钱，迟顷澄清饮之。以滓敷病处。有死血阴毒在中则不痛，敷之即痛；有忧怒等气积而内攻则痛不可忍，敷之即不痛；或蕴热在内，热逼人，手不可近，敷之即清凉；或气虚血冷，溃而不敛，敷之即敛。

【主治】一切痈疽发背、疖毒，恶疾浸大。

06466 远志散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】远志半两（去心） 菖蒲半两 铁精半两 桂心二分 黄耆一两（锉） 防风三分（去芦头） 当归三分（锉，微炒） 人参半两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 熟干地黄三分 芎藭半两 茯神三分 独活半两 紫石英一两（细研如粉） 五味子半两 麦门冬三分（去心） 半夏半两（汤洗七遍去滑）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加入生姜半分，大枣二枚，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】心气虚，惊悸喜忘，不思饮食。

【备考】《医方类聚》引《神巧万全方》有秦艽，无当归。

06467 远志散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】远志一两（去心） 防风一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬（去心） 羚羊角屑 酸枣仁（微炒） 桑寄生 独活 桂心 当归（锉，微炒） 茯神各三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风，心神恍惚，言语错误，烦闷，睡卧不安。

【方论选录】《医略六书》：产后心虚风中，不能营养心包，而遇热伤经，故烦悸，心乱不宁。远志通肾交心，茯神安神定志，独活开泄经气，防风疏散风邪，羚羊清遏热伤经，麦冬润外淫风燥，桂心温经平肝木，枣仁养心宁心神，当归养血荣心，炙草缓中益胃。为散水煎，则心气内充，风湿外解，而经脉清和，何烦悸不退，心乱不宁乎！

06468 远志散

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】远志（去心） 黄连（去须）各二两 白茯苓（去黑皮）二两半 菖蒲（切，焙）三两 人参一两半

【用法】上为散。每服一钱匕，食后温酒调下。

【功用】补心气，强力益志。

【主治】健忘。

06469 远志散

【方源】方出《妇人良方》卷八，名见《医统》卷八十二。

【组成】远志二分 干姜（生） 莲花各二分 蛇床子 五味子各四分

【用法】 上为细末。先以兔尿涂阴中，次以绵裹一钱纳阴中。热即为效。

【主治】 妇人阴冷痒。

06470 远志散

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】 五倍子半两 远志（去心）半两

【用法】 上为粗末，用纱罗隔过。掺少许于舌上。

【主治】 口疮。

06471 远志膏

【方源】《古今医鉴》卷二。

【组成】 远志不拘多少

【用法】 上用甘草水泡，不去骨，为末，鸡子清调敷天突、咽喉、前心三处。

【主治】 中风，舌不能言。

06472 远彻膏

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】 穿山甲（尾足上者佳，烧透）二钱 五灵脂（净者）二钱

【用法】 上为细末，次以巴豆二钱（去壳研碎）和前药末，仍用大蒜四钱，去上粗皮三五层，于砂钵内烂杵如泥。作一饼纳脐中，以绢帕系之。外以掌心火上烘热，熨至八九次，闻腹中微响即通。

【主治】 大小府秘涩，投诸药无验，不拘老幼。

06473 远桔汤

【方源】《诚书》卷十二。

【组成】 远志（去心） 石菖蒲 枣仁（炒） 桔梗 荆芥 蝉蜕 贝母 玄参各一钱 甘草三分

【用法】 加龙眼，水煎服。

【主治】 小儿心肺俱虚，语迟。

06474 远志饮子

【方源】《济生》卷一。

【异名】 远志引子(《金匮翼》卷三)。

【组成】 远志（去心，甘草煮干） 茯神（去木） 桂心（不见火） 人参 酸枣仁（炒，去壳） 黄耆（去芦） 当归（去芦，酒浸）各一两 甘草（炙）半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 心劳虚寒，惊悸恍惚，多忘不安，梦寐惊魇。

06475 远志饮子

【方源】《己任编》卷七。

【组成】 远志 枣仁 茯神 人参 黄耆 当归 麦冬 石斛 甘草

【用法】 生姜为引。

【主治】 虚烦而无痰饮者。

【加减】 若烦甚，加竹叶、知母。

06476 攻火汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】 大黄二钱 石膏五钱 炒栀子三钱 当归一两 厚朴一钱 甘草一钱 白芍三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 火郁于脏腑，欲出而不得出，满身皮窍如刺之钻，又复疼痛于骨节之内外，以冷水拍之少止。

【方论选录】 此方直泻脾胃，又不损脾胃之气，兼舒其肝木之郁，则火尤易消，乃扼要争奇，治火实有秘奥，何必腑腑而清之，脏脏而发之哉。

06477 攻坚散

【方源】《山东中医学术经验交流文选》。

【组成】 夏枯草 玄参 生牡蛎各30克 昆布15克 姜半夏 海藻各12克 青皮 陈皮各9克 三棱 莪术各6克

【用法】 水煎服；或研末，开水送服。

【功用】 滋阴清热，化痰散结，行气导滞，破瘀攻坚。

【主治】 筛窦囊肿，鼻腔肿瘤，颈淋巴结核，慢性颌下腺炎，甲状腺肿大，甲状腺瘤，乳腺小叶增生，乳腺纤维瘤，乳房异常发育等肿块性疾病。

06478 攻积丸

【方源】《理瀹》。

【组成】 川乌 吴萸 官桂 干姜各一两 黄连 橘红 槟榔 茯苓 枳实 菖蒲 桔梗 延胡 半夏各八钱 巴仁 皂角各五钱

【用法】 熬膏敷贴。

【主治】 积聚及老人虚寒便秘。

06479 攻痹汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 车前子三钱 茯苓三钱 薏仁一两 肉桂五分 木通二钱 白术五钱 王不留行一钱

【用法】 水煎服。一连数剂而似淋者不淋，似疝者不疝。再服数剂，而痛如失也。

【主治】 小肠痹。风寒湿人于小肠之间而成痹，小便艰涩，道涩如淋，而下身生疼，时而升上有如疝气。

06480 攻坚败毒膏

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【异名】 乾坤一炁膏。

【组成】 当归 熟地 生地 白芍药 赤芍药

南星 半夏 三棱 蓬术 木鳖 两头尖 川山甲 巴豆仁 肉桂 五灵脂 桃仁 续断 玄参 玄胡索 草麻子仁 白芷 羌活 独活 大黄 红花 川乌 草乌 苏木 川芎 防风 杏仁各一两

【用法】 用麻油四十两，浸诸药三日，桑柴火煎成丹，收后下细药：乳香（制）、没药（制）各一两，真阿魏一两半，麝香三钱。

【主治】 痞块、疮毒、痔漏。

【备考】 上方于细药中加芦荟、木香各一两，蟾酥三钱，即名"消痞大成膏"。

06481 坎中丹

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】 硫黄（纯黄者）一两 赤石脂一两

【用法】 上为细末和匀。每服五分，食前服，一日二次。不知则渐渐加多，以服后移时微觉温暖为度。

【主治】 下焦寒凉泄泻及五更泻。

【加减】 治女子血海虚寒不孕者，加炒熟小茴香末二钱。

06482 坎炁丹

【方源】《古方选注》卷下。

【组成】 坎炁二十四两（男者良） 人乳粉二两四钱 熟地八两（砂仁一两五钱，陈煮酒八两制，久晒者良） 人参二两 枸杞子四两

【用法】 上法制，烘燥，入磨为末，用酒酿四两，白蜜四两同炼为丸。每服五钱，清米饮汤送下。

【主治】 ①《古方选注》：少阴男人，耳薄鼻尖，毛悴精寒，难以种子。②《医级》：阴阳两虚，精神气血皆伤，虚危之疾。

06483 坎离丸

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】 酸枣仁（炒） 菟丝子（淘净，酒浸，研成饼） 柏子仁（炒，别研） 五味子（去枝） 薏苡仁（炒） 覆盆子 人参（去芦） 枸杞子 鹿茸（燎去毛，锉成片，酒浸，炙） 牛膝（去芦，酒浸） 肉苁蓉（酒浸） 当归（去芦，酒浸） 杜仲（姜制，炒去丝） 远志（去心） 地黄（洗） 茯神（去木）各一两 沉香（不见火） 附子（炮，去皮脐） 龙骨（煅）各半两 朱砂三钱（别研） 麝香一钱（别研）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒或人参汤送下。

【功用】 平补五脏，升降心肾。

【主治】 小便白浊，腰腿无力，心神不宁，下焦虚寒，阴冷遗沥。

06484 坎离丸

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【异名】 滋阴降火丸（《便览》卷三）。

【组成】 全当归（用好酒浸洗二日，晒干，锉碎） 白芍（温水洗，锉碎，用好酒浸一日，晒干，炒赤） 川芎（大者，小者不用，清水洗净，锉碎）各四两 厚黄柏（去皮）八两（二两酒浸，二两盐水浸，二两人乳浸，二两蜜浸，俱晒干，炒赤） 知母（去毛，四制与黄柏同） 熟地黄八两（淮庆者佳，四两用砂仁，四两用白茯苓同入绢袋，用好酒二壶煮干，去砂仁、茯苓二味，只用地黄）

【用法】 上药和匀，平铺三四分厚，夜露日晒三日三夜，以收天地之精，日月之华，为细末；用正冬蜜一斤八两，加水半碗，共炼至滴水成珠；再加水一碗，煎滚，和前药为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，空心盐汤送下；冬月温酒送下。

【功用】 生精益血，升水降火。

【主治】 ①《摄生众妙方》：虚损。②《证治宝鉴》：阴虚咳嗽。

06485 坎离丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 黄柏 知母各等分（用童便九蒸九晒九露）

【用法】 上为末，以地黄煎膏为丸；脾弱者山药糊丸服。

【主治】 阴火遗精，盗汗，潮热，咳嗽。

06486 坎离丸

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】 龙骨（火煅）五钱 远志（甘草水泡，去骨）一两 白茯神（去皮末）一两 石菖蒲（去毛）五钱 龟甲（炙酥）五钱 酸枣仁（炒）一两 当归身（酒洗）一两 人参五钱 麦门冬（水洗，去心用）一两 天门冬（水净，去心）一两 生地黄（酒洗）二两 熟地黄（酒蒸）二两 山茱萸（酒蒸，去核）一两 川黄柏（去皮，酒炒）一两 五味子一两 柏子仁一两 山药一两 甘枸杞子一两 知母（去毛，酒炒）一两

【用法】 上药石臼内捣成饼，晒干，为细末，炼蜜滴水成珠，每用蜜一斤，加水一碗，调和前药为丸，如梧桐子大。每服三钱，清晨空心盐汤送下，或酒亦可。

【功用】 补髓添精，调荣养卫，聪耳明目，定神安志，滋阴降火。

【主治】 思虑过度，心血耗散，房欲失节，肾水

枯瘁，肾水一虚，心火即炽，酿成劳瘵，精神昏倦，健忘者。

【宜忌】 忌房欲三月。

06487 坎离砂

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 乳香二钱 没药二钱 麻黄二钱 马钱子二钱 肉桂二钱 丁香二钱 川乌二钱 草乌二钱 小茴香二钱

【用法】 上为细末，过罗。用铁砂一百六十两入铁锅内煅红为度，取出用米醋四十两淬之。容其干后，兑入细粉和匀，袋装重八两。用时先将一袋药末倒在碗内，以米醋一羹匙（约五钱），将药拌匀，装袋内，用棉被盖二小时，药热后敷于患处。

【功用】 散寒止痛。

【主治】 风寒腰腿疼痛，阴寒腹痛，男子肾寒，妇女血寒。

06488 坎离膏

【方源】《回春》卷四。

【组成】 黄柏 知母各四两 生地黄 熟地黄 天门冬（去心） 麦门冬（去心）各二两 杏仁（去皮）七钱 胡桃仁（去皮尖，净仁）四两 蜂蜜四两

【用法】 先将黄柏、知母，放入童便三碗，侧柏叶一把，煎至四碗，去滓；又将天、麦门冬，生、熟地黄入汁内，添水二碗，煎汁去滓；再捣烂如泥。另用水一二碗熬熟，绞汁入前汁，将杏仁、桃仁，用水捣烂，再滤，勿留渣，同蜜入前汁内，用文武火熬成膏。瓷罐收贮封固，入水内去火毒。每服三五匙，侧柏叶煎汤调，空心服。忌铜、铁器。

【主治】 劳瘵发热，阴虚火动，咳嗽吐血、唾血、咯血、咳血、鼻血，心慌喘急，盗汗。

06489 坎粒砂

【方源】《中药制剂手册》。

【异名】 坎离砂。

【组成】 防风八两 透骨草八两 川芎八两 当归六两 生铁屑一千六百两 米醋九十六两

【用法】 生铁屑、米醋单放。将防风等四味碎断，置锅内，用方中米醋加适量清水，煎煮二次，每次约二小时，取出煎液，去滓。将二次煎出液合并过滤，浓缩，待用。将生铁屑筛选均匀，置锅内用武火烧煅，以红透为度。趁热倾入药汁，用铁铲不停搅拌至药液吸尽为度。待自然冷却后装入袋中。每用一袋，置大碗内，用米醋二羹匙（约重五钱）迅速拌匀，装入布袋内，等药物发热后，熨敷患处，避风。

【功用】 散寒止痛。

【主治】 由感受风寒引起的四肢麻木，腰腿作痛，筋骨疼痛及小肠疝气，阴寒腹痛。

06490 坎宫锭子

【方源】《金鉴》卷六十二。

【异名】 坎宫锭（《疡科捷径》卷下）。

【组成】 京墨一两 胡黄连二钱 熊胆三钱 麝香五分 儿茶二钱 冰片七分 牛黄二分

【用法】 上为末，用猪胆汁为君，加生姜汁、大黄水浸取汁、醋各少许，和药成锭。用凉水磨浓，以笔蘸涂之。

【主治】 热毒肿痛，焮赤诸疮，痔疮。

06491 坎气潜龙汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 净坎气一条（切寸） 青龙齿三钱 珍珠母六钱（杵） 生白芍三钱 大生地四钱 左牡蛎六钱（杵） 磁朱丸四钱（包煎） 东白薇三钱

【用法】 先用大熟地八钱切丝，用开水泡，取清汁，代水煎药。

【功用】 滋阴潜阳。

【主治】 热病。肾经阴虚，则阳无所附而上越，任阴不足，则冲气失纳而上冲，舌绛心悸，自汗虚烦，手足躁扰，时时欲厥，右脉浮大，左脉细数。

【方论选录】 何秀山：方中坎气、二地为君，坎气即初生儿脐带，一名命蒂，以其前通神阙，后通命门，最得先天之祖气；二地质重味厚，填精益髓，滋养后天之真阴，庶几阴平阳秘，龙雷之火，不致上升。况又臣以龙、牡、珠母滋潜龙雷，佐以磁、朱交济心肾，阳得所附，火安其位矣。妙在使以芍、薇，一为敛肝和阴所必要，一为纳冲滋任之要药，君佐合度，臣使咸宜，此为补肾滋任，镇肝纳冲之良方。

06492 坎离互根汤

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】 生石膏三两（细末） 玄参一两 生淮山药八钱 甘草三钱 野台参四钱 鲜白茅根六两（洗净，切碎） 生鸡子黄三枚

【用法】 先将茅根煎三四沸，去滓，纳余五味，煎汤三钟，分三次温服。每服一次调入鸡子黄一枚。

【主治】 伤寒，或其肾经素有蕴热，因有伏气之热激发之，则其热益甚，以致心肾皆热，其壮热充实于上下。

【方论选录】 方中石膏、人参并用，不但能解少阴之实热，并能于邪热炽盛之时立复真阴，辅以茅

根更能助肾气上升与心火相济也。至于玄参，性凉多液，其质轻松，原善清浮游之热，而心之烦躁可除，其色黑入肾，又能协同鸡子黄以滋肾补阴，俾少阴之气化壮旺，自能逐邪外出也。

06493 坎离既济丸

【方源】《回春》卷四。

【异名】坎离丸(《类证治裁》卷三)。

【组成】当归（酒洗）六两 南川芎一两 白芍（酒炒）二两 熟地黄（酒蒸） 生地黄（酒洗） 天门冬（去心） 麦门冬（去心）各四两 五味子二两 山药二两 山茱萸（酒蒸，去核）四两 牛膝（去芦，酒洗）四两 黄柏（去粗皮）九两（酒炒三两，蜜水炒三两，盐水炒三两） 知母（去毛）四两（酒浸二两，盐水浸二两） 龟版（去边，酥炙脆，微黄色）三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心盐汤送下。

【主治】阴虚火动，劳瘵之疾。

【宜忌】忌铁器。

06494 坎离既济丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】肉苁蓉 生地 麦冬 山萸 杞子 五味 川柏 归身 白芍 天冬 熟地 远志 茯苓 茯神 丹皮 枣仁 人参 泽泻

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】热痨。口干咽痛，舌疮，涕唾稠粘，手足心热，大便燥，小便赤，咽疮失音，或尪羸，阳不举，脉细无根，脉数不伦。

06495 均气八仙汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】麻黄二钱 杏仁二钱 石膏三钱 桔梗一钱 片茶二钱 贝母一钱（用北细辛三分煎汤，拌炒三次，为末） 生甘草一钱 知母二钱

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】哮喘气急而不息者。

06496 杜仲丸

【方源】《千金》卷十九。

【组成】杜仲二两 石斛二分 干地黄 干姜各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，一日二次。

【功用】补肾

【主治】肾虚腰痛。

【方论选录】《千金方衍义》：干姜行地黄之滞，则补而不壅；石斛助杜仲之强，则健而益壮。

06497 杜仲丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【异名】青娥丸(《直指》卷十八)、青蛾丸(《普济方》卷一五四)、肾气丸(《仙拈集》卷二)。

【组成】杜仲（去粗皮，炙，为末） 补骨脂（炒香熟，为末） 胡桃仁（汤浸去皮，研）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【功用】①《圣济总录》：补下元，乌髭鬓，壮脚膝，进饮食，悦颜色。②《直指》：益精助阳，乌须，壮脚。

【主治】①《圣济总录》：腰疼。②《医略六书》：肾虚衰，不能上荣肝木，而肝乏生生之源，精血无以内荣二海，腰痛牵引于胁，脉虚者。

【方论选录】《医略六书》：肾虚衰，不能上荣肝木，而肝乏生生之源，精血无以内荣二海，故腰痛牵引于胁焉。核桃肉补肾养肝，以滋血海之不足；补骨脂补火荣木，以资精海之空虚；厚杜仲补肾强腰。兼培肝络也。丸以青盐之补肾，下以食盐之坚肾，使肾脏紧固，则真火发育，而肝得养生之令，精血内荣，宁有腰痛连胁之患乎？此补肾养肝之剂，为腰痛连胁之专方。

06498 杜仲丸

【方源】《济生》卷七。

【异名】千金保孕丸(《医统》卷八十五)、杜续丸(《医学入门》卷八)、保孕丸(《医钞类编》卷十七)、续杜丸(《产孕集》卷上)。

【组成】杜仲（去皮，锉，姜汁浸，炒去丝） 川续断（酒浸）各一两

【用法】上为细末，枣肉煮烂为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心米饮送下，一日二次。

【功用】养胎。

【主治】①《济生》：妊娠三两月，胎动不安。②《校注妇人良方》：妊娠腰背痛。

06499 杜仲丸

【方源】《普济方》卷三四三。

【组成】杜仲（去粗皮，炙，锉） 防风（去叉） 附子（炮裂，去皮脐） 石菖蒲 桔梗（炒） 秦艽（去苗土） 细辛 肉桂（去粗皮） 厚朴（去粗皮，生姜汁炒） 半夏（汤浸二七次，焙）各三钱 沙参 熟地黄（焙） 蜀椒（去目并闭口者，炒出汗） 干姜（炮）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，渐加至二十丸，空心温酒送下。一月见效。

【主治】 子宫久冷，妊娠数堕胎。

06500 杜仲丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 杜仲 龟版 黄柏 知母 枸杞子 五味子 当归 芍药 黄耆 故纸各一两

【用法】 上为末，炼蜜同猪脊髓为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心盐汤送下。

【主治】 肾虚腰痛，动止软弱，脉大虚，疼不已。

06501 杜仲汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】 杜仲（去粗皮，锉，炒）二两 人参一两 阿胶（炙令燥）一两 芎藭一两 当归（微炙）二两 艾叶一把（焙）

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，酒一盏，加大枣三枚（擘），同煎至七分，去滓温服，相次三服，腹中当暖即血止。

【主治】 妊娠卒然下血不定，令胎不安，小腹疼痛。

06502 杜仲汤

【方源】《伤科补要》卷四。

【组成】 肉桂 乌药 杜仲 生地 赤芍 丹皮 归尾 胡索 桃仁 川断各一钱

【用法】 加童便、酒，煎服。

【主治】 腰脊伤痛。

06503 杜仲酒

【方源】《外台》卷十七引《集验方》。

【组成】 杜仲半斤 丹参半斤 芎藭五两 桂心四两 细辛二两

【用法】 上切，以酒一斗浸五宿。随多少饮之。

【主治】 卒然腰痛。

【宜忌】 忌生葱、生菜。

【备考】《经心录》无桂心。改为散剂，名“杜仲散”（见《圣惠》）。

06504 杜仲酒

【方源】《医心方》卷六引《千金》。

【组成】 桑寄生 杜仲 鹿茸 桂心各等分

【用法】 上为末。每服方寸匕，一日三次。

【主治】 五种腰痛。

【备考】《千金》治肾脉逆，小于寸口，膀胱虚寒，腰痛，胸中动之杜仲酒之又方，用桑寄生、牡丹皮、鹿茸、桂心各等分，治下筛，酒服方寸匕，日三。

06505 杜仲酒

【方源】《千金翼》卷十六。

【异名】 杜仲浸酒（《圣惠》卷二十五）。

【组成】 杜仲（炙） 蛇床各八两 当归 芎藭 干姜 附子（去皮） 秦艽 石斛 桂心各三两 蜀椒（去目及闭口者，汗） 细辛 茵芋 天雄（去皮）各二两 独活 防风各五两（一方加紫石英五两）

【用法】 上切，以酒三斗渍五宿。每服三合，一日三次。

【主治】 风劳虚冷，腰脚疼屈弱。

06506 杜仲散

【方源】 方出《肘后方》卷二，名见《医方类聚》卷五十四引《神巧万全方》。

【组成】 杜仲 牡蛎各等分

【用法】 每服五匕，暮卧水调下，不止更作。

【主治】 病后体虚多汗。

①《肘后方》：大病愈后，多虚汗及眼中流汗。②《圣惠》：伤寒湿温，汗出遍体如水。③《圣济总录》：伤寒后未平复合，阴阳相易，力劣汗出，及鼻衄头疼。

06507 杜仲散

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】 杜仲（去粗皮，炙，锉）二两 黄耆（锉） 牡蛎（煅赤）各三两 麻黄根五两

【用法】 上为细散。每服二钱匕，食后煎败扇汤调下，一日二次。

【主治】 风虚多汗，夜卧尤甚。

06508 杜仲散

【方源】《伤科方书》。

【组成】 肉桂一钱 乌药一钱 杜仲一钱二分 赤芍一钱 当归一钱 丹皮一钱 桃仁一钱 续断一钱 玄延索一钱

【用法】 童便煎服。

【主治】 中部腰痛伤。

06509 杜痔丸

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 地骨皮 生地各三两 黄芩 丹皮各一两半 槐花 焦苍术各一两 焦黄柏 甘草各五钱

【用法】 上为细末，白蜜为丸。每服五钱，早、晚白汤送下。

【主治】 外痔。

06510 杜牛膝丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 杜牛膝三两 甜肉桂一两半 瞿麦穗三两 当归尾三两 白通草一两半 冬葵子三两 飞滑石三两

【用法】 上为末，蜜为丸。每服三钱，童便煎，去滓温服。

【主治】 产后胞阻溺闭，脉沉者。

【方论选录】 产后胞满气壅，阻塞膀胱窍道，故不能化气，而小便不通，胀急，危迫莫甚，牛膝去瘀血以利便，桂心暖瘀血以通闭，瞿麦穗降气通小便，当归尾破血下瘀结，通草利小便，滑石通利膀胱，冬葵子滑利窍道以下出胞衣也，蜜丸以润之，童便以降之，使气化溺通则胞门无阻而胞衣自出，何患胀急不退，危迫不安乎。

06511 极效膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】 川乌 草乌 玄参 大黄 生地 杏仁 当归 赤芍 金银花 白芷各一两一钱

【用法】 麻油一斤四两浸药，慢火熬，加桃枝、柳枝、槐枝、桑枝、榆枝各十寸，熬枯去滓，复熬至滴水成珠为度。再加银朱一两，铜绿八钱，水粉四两，入油搅匀熬黑，再加黄蜡、白蜡各一两，化匀，再加松香收膏，老嫩得宜，入水扯，拔出火毒，摊贴患处。

【主治】 痈疽。

06512 杞苓丸

【方源】《医方大成》卷七引曾帅干方。

【组成】 白茯苓八两（去皮） 真枸杞四两（酒浸蒸） 当归二两（酒洗） 青盐一两（别研） 菟丝子二两（酒浸蒸）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食前汤送下。

【主治】 男子肾脏虚耗，水不上升，眼目昏暗，远视不明，渐成内障。

06513 杞实粥

【方源】《眼科秘诀》卷二。

【组成】 芡实七钱（选净硬皮，滚水淘泡四五次，又极滚水泡透听用） 枸杞子三钱（选肥大赤色者，只用水淘一次，滚水泡透听用） 粳米（晚熟者）大半茶钟（滚水淘洗四五次听用）

【用法】 上三味，今日如法制完，明日五更用砂锅一口，先将水烧滚，下芡实煮四五沸；次下枸杞子煮三四沸；又下大米，共煮至浓烂香甜。煮粥的水多加，勿添冷水。空腹食之，以养胃气。四十日皮肤润泽，一百日步履壮健，一年筋骨牢固。或为细末，滚水服亦可。

【功用】 聪耳明目，延年益寿。

06514 杞圆膏

【方源】《摄生秘剖》卷四

【组成】 枸杞子（去蒂）五斤 圆眼肉五斤

【用法】 上药用新汲长流水五十斤，以砂锅桑柴火慢慢熬之，渐渐加水，煮至杞圆无味方去滓，再慢火熬成膏，取起，瓷罐收贮。不拘时候频服二三匙。

【主治】 血不足。

【方论选录】 心主血，脾统血，肝藏血，思虑勤劳则血受伤因而不足，血不足则虚火炽而煎燥，肾水日见衰竭矣。兹取圆眼肉甘温濡润之品，甘温可以补脾，濡润可以养心；枸杞子味厚气平之品，味厚可以滋阴，气平可以益阳，此太极之妙，阴生于阳也。阴阳和，水火济，心肾时交，则阴血自生而常足矣。

06515 杞菊丸

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】 甘菊花（拣净） 枸杞各二两 川芎 薄荷叶各一两 苍术六两（米泔浸三日，一日一换水，去皮晒干）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后细嚼，茶清下，一日二次。

【主治】 内外障，眼有翳晕，或无翳，视物不明。

06516 杞菊六味丸

【方源】《麻疹全书》。

【异名】 杞菊地黄丸（《医级》卷八）。

【组成】 熟地八两 丹皮三两 白菊三两 茯苓三两 萸肉四两 杞子三两 淮药四两 泽泻三两

【用法】 上药各为末，炼蜜为丸服。

【功用】 ①《麻疹全书》：清肝肺，明耳目。②《医家四要》：补肾水以涵肝木。

【主治】 ①《医级》：肝肾不足，目生花歧视，或干涩眼痛。②《医家四要》：肝血虚，目耗散而不明。

【备考】 本方改为汤剂，名“杞菊六味汤”（见《医家四要》）。

06517 杨花散

【方源】《伤科补要》卷四。

【组成】 南星二钱 草乌一钱（姜汁炒） 闹杨花三钱 半夏二钱

【用法】 上为末，黄麻根、蓖麻子根、芋艿叶三味打汁拌南星四味，晒干，再研极细末听用。割开肉上敷之。

【功用】 割开肉上敷之麻木。

06518 杨梅一剂散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 麻黄一两 大黄七钱 威灵仙八钱 金银花 羌活 白芷 蝉蜕 皂角刺 川山甲各五钱 防风三钱

【用法】 共一剂。用山羊肉斤许，河水煮熟；取清汤二碗，黄酒一碗，将药煎至一碗。令患者空心，先将热羊肉同酒淡食之令饱，随后服药。盖卧出汗，避风。

【主治】 杨梅疮，元气壮者

06519 却忿散

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 柴胡 半夏 甘草 薄荷 黄芩 神曲各一钱 当归 茯苓各三钱 白芍四钱 炒栀子二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 动多气恼，大声骂詈，觉饮食坐卧居处胥接，无非可怒之场，身热胸满，两胁作胀。

06520 却痛散

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】 五灵脂（去砂石） 蒲黄（炒赤色）各一两半 当归（洗，焙） 肉桂（去粗皮） 石菖蒲 木香 胡椒各一两 川乌头（炮，去皮脐）三两

【用法】 上为末。每服二钱，加醋一盏，盐半盏，同煎至五分，不拘时候热服。

【主治】 冷气攻心，痛不可忍。

06521 却老苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】 肉苁蓉（酒浸，切，焙）二两 山芋 五味子（炒）各一两一分 菟丝子（酒浸三日，焙干，别取末） 赤石脂（研） 白茯苓（去黑皮） 泽泻 熟干地黄（焙） 山茱萸（焙） 巴戟天（去心） 覆盆子（去梗） 石斛（去根）各一两

【用法】 上为细末，酒煮面糊，入蜜少许为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心食前温酒送下；粟米饮亦得。

【功用】 补真脏气，调顺阴阳，和胃气，进饮食。

【主治】 肾脏虚损，丹田风冷。

06522 却老乌须健阳丹

【方源】《医部全录》卷三三一引《体仁汇编》。

【组成】 赤茯苓（牛乳拌） 白茯苓（人乳拌，各浸一宿，晒干） 白首乌（竹刀去皮，打碎） 赤首乌（制同上）各一斤 牛膝（同何首乌用黑豆五升砂锅内蒸三次） 枸杞（酒浸洗，晒干） 当归（酒浸一宿） 茯神 菟丝子各半斤（酒浸三日，晒干） 破故纸五两（炒黄）

【用法】 上药各不犯铁器，为末，炼蜜为丸如弹子大。日进三丸：早一丸，空心酒送下；午后一丸，姜汤送下；临睡一丸，盐汤送下。初服三日，小便杂色，是去五脏杂病；二七日唇红，口生津液，再不夜起；四七日身体轻健，两乳红润；至一月后，鼻头辛酸，诸风百病皆出；四十九日，目视光明，两手火热，精通，白发反黑，齿落更生，阴事强健，丹田如火，行走如飞，气力倍加。

【功用】 颐养补益。

06523 却老乌须健阳丹

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 赤白何首乌各一斤 牛膝半斤（用黑豆汁蒸三次） 赤茯苓（用牛乳五升，以文武火煮干） 白茯苓（用人乳汁五升以文武火煮干）各一斤 菟丝子 故纸各半斤

【用法】 上为末，忌铁，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，一日二次。

【主治】 六八以后，须发焦槁，阳虚者。

06524 劫劳散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【异名】 劫劳汤（《景岳全书》卷六十一）。

【组成】 白芍药六两 黄耆 甘草 人参 当归 半夏（洗） 白茯苓 熟地黄 五味子 阿胶（炒）各二两

【用法】 上㕮咀。每服三大钱，水一盏半，生姜十二片，大枣三个，煎至九分。温服，每日三次。

【主治】 肺痿。心肾俱虚，劳嗽，唾中有红丝，发热，盗汗。

06525 劫嗽丸

【方源】《医方考》卷二。

【组成】 诃子仁 百药煎 荆芥穗各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸。噙化。

【主治】 久咳失气。

【宜忌】 新咳者不宜用。

【方论选录】《内经》曰："薄之劫之"。薄者，雷风相薄之薄，药病摩荡之名也；劫者，曹沫劫盟之劫，取之不以正也。久咳失气，不用补剂，而用诃子、药煎之涩，肺有火邪，不用润剂，而用荆芥穗之辛，故曰劫也。

06526 豆麦粥

【方源】《寿世青编》卷下。

【组成】 绿豆 糯米 小麦各一升

【用法】 上炒熟为末。每用末一升，滚水调服。

【主治】 饮食不住口，仍易饥饿，近似中消。

06527 豆附丸

【方源】《济生》卷四。

【组成】肉豆蔻（面裹煨） 附子（炮，去皮脐） 良姜（锉，炒） 诃子（面裹煨） 干姜（炮） 赤石脂（火煅） 阳起石（火煅） 龙骨（生用） 白矾（枯）各一两 白茯苓（去皮） 桂心（不见火） 细辛（洗）各一两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前米饮送下。

【主治】久虚下寒，泄泻不止，肠滑不禁，日夜无度，全不进食；一切虚寒泄泻困乏。

【备考】本方白矾以上药物用量原缺"各"字，据《医方大成》补。

06528 豆附散

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】大肉豆蔻三个（面裹煨） 附子八钱（重者三个，炮，去皮）

【用法】上㕮咀，分作三服。水一盏半，加生姜五片，煎八分，去滓，空心温服。

【主治】脾弱，泄泻不止。

06529 豆卷散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】大黄豆卷散（《幼科发挥》卷三）。

【组成】大豆黄卷（水浸黑豆生芽，晒干） 板兰根 贯中 甘草（炙）各一两

【用法】上为细末。每服半钱至一钱，水煎去滓服；甚者三钱，浆水内入油数点煎服，不拘时候。

【主治】小儿慢惊，用性太温及热药治之，惊未退而别生热症者；或病愈而致热症者；或反为急惊者；又治吐虫。

06530 豆蔻丸

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】木香 赤石脂 干姜 砂仁 厚朴 肉豆蔻各等分

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空心米汤送下。

【主治】脾胃虚弱，脏腑频滑，下痢赤白。

06531 豆蔻丸

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】草豆蔻 吴茱萸 益智仁 青皮 姜黄 麦芽 神曲 半夏 甘草

【主治】内伤积冷，胃脘作痛。

06532 豆蔻汤

【方源】《局方》卷十。

【组成】丁香枝杖七斤 甘草（炒）十一斤 白面（炒）八斤 肉豆蔻仁（面裹煨）八斤

【用法】上炒盐十三斤同为末。每服一钱，食前沸汤点服。

【主治】一切冷气，心腹胀满，胸膈痞滞，哕逆呕吐，泄泻虚滑，水谷不消，困倦少力，不思饮食。

06533 豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】草豆蔻（去皮）一两半 桂（去粗皮） 生姜（去皮，切） 附子（炮裂，去脐皮）各三分 甘草（炙，锉） 丁香各半两

【用法】上细锉。每服五钱匕，水一盏半，大枣一枚（劈破），同煎至八分，去滓温服。

【主治】胃虚冷呕逆。

06534 豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】白豆蔻（去皮） 桂（去粗皮） 木香 人参各半两 陈曲 京三棱（煨，锉）各一两 陈橘皮（汤浸，去瓤，焙） 大麦芽（炒）各三分 干姜（炮） 甘草（炙，锉）各一分

【用法】上为粗末，每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，盐少许，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】胸痹，心下坚痞。

06535 豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】肉豆蔻（去壳） 赤茯苓（去黑皮） 高良姜 附子（炮裂，去皮脐） 草豆蔻（去皮） 藿香 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各一分 人参一两 桂（去粗皮）半两 槟榔一枚

【用法】上锉，如麻豆大。每服二钱匕，水一盏半，加大枣五枚（劈），生姜一分（切碎），煎至八分，去滓热服。

【主治】脾积痞气，攻注腰背痛。

06536 豆蔻饮

【方源】《得效》卷五。

【组成】陈米一两 肉豆蔻（面裹煨） 五味子 赤石脂（研）各半两

【用法】上为末，每服二钱，粟米汤饮调下，日进三服。

【主治】滑泄。

06537 豆蔻散

【方源】《养老奉亲》。

【组成】草豆蔻四两（以姜四两炒，香黄为度，和姜用） 大麦芽子十两（炒黄） 神曲四两（炒黄） 杏仁四两（去尖，炒熟） 甘草四两（炙） 干姜二两（炮制）

【用法】 上为末。每服一钱，如茶点之，不拘时候服。

【主治】 老人夏多冷气发动，胸膈气滞噎塞，脾胃不和，不思饮食。

06538 豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】 肉豆蔻（去壳） 红豆蔻（去皮） 草豆蔻（去皮） 白豆蔻（去皮）各半两 细辛（去苗叶） 一分 丁香半两 桂（去粗皮）一两 甘草（炙，锉） 人参 赤茯苓（去黑皮）各半两

【用法】 上为散。每服一钱匕，熟水调下，一日三次，不拘时候。

【主治】 口臭。

【备考】 将本方改为丸剂，名“豆蔻丸”（见《普济方》）。

06539 豆蔻散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 豆蔻 丁香各半分 舶上硫黄一分 桂府白滑石三分

【用法】 上为细末。每服一字至半钱，米饮送下，不拘时候。

【主治】 小儿吐泻，烦渴，腹胀，小便少。

06540 豆蔻散

【方源】《百一》卷六。

【组成】 陈粟米一两 肉豆蔻（面裹煨） 五味子 赤石脂（研）各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，粟米汤饮调下，日进三服。

【主治】 滑泄。

06541 豆蔻散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】 肉果（煨） 龙骨（煅） 木香 砂仁各五钱 山楂 五倍子 赤石脂 藿香 白术各三钱 人参一钱（一方有枯矾二钱）

【用法】 上为末。每服一钱或五分，看儿大小，吐用姜汤，泻用米汤调下。

【主治】 脾虚呕吐及泄泻不止。

06542 豆蔻粥

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】 肉豆蔻一枚（去壳，别作末） 粳米（净洗）二合

【用法】 上二味，先将粳米如常煮作稀粥，熟后下肉豆蔻末，搅匀顿服。

【主治】 伤寒后，脾胃虚冷，呕逆不下食。

06543 豆青软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 巴豆油 4 毫升 白降丹 3 克 青黛 10 克

【用法】 上药加凡士林 100 克，调匀。外用。

【主治】 银屑病。

06544 豆卷腹皮汤

【方源】《引经证医》卷四。

【组成】 大豆黄卷 枳实 白术 茯苓 白蔻仁 厚朴 姜渣 大腹皮 橘皮白 木香

【用法】 水煎服。

【主治】 脾虚湿着，腹膨足肿，纳谷大减，脉来沉弦带涩者。

06545 豆蔻分气饮

【方源】《三因》卷十一。

【组成】 藿香叶 草豆蔻仁 青皮各四两 甘草（炙） 丁香各半两 肉豆蔻（炮）十两 乌梅五十个（去仁）

【用法】 上锉散。每服四钱，水二盏，糯米一撮，煎七分，去滓，空腹服。

【主治】 脏腑虚寒，泄泻瘦极，及妇人产后洞泄危笃者。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“豆蔻分气散”。

06546 豆蔻平胃散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 苍术 陈皮 厚朴 甘草 白豆蔻 人参 茯苓各等分

【用法】 加生姜，水煎，温服。

【主治】 胃寒而饮不消者。

06547 豆蔻白术丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】 白术二两 附子 肉豆蔻各一两

【用法】 上为细末，蒸枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【主治】 洞泄，形瘦腹大膨胀，食毕即下者。

06548 豆蔻香连丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 豆蔻木香丸(《普济方》卷三九六)。

【组成】 黄连（炒）三分 肉豆蔻 南木香各一分

【用法】 上为细末，粟米饭为丸，如米粒大。每服十至二三十丸，食前米饮汤送下，日夜各四五服。

【主治】 泄泻，不拘寒热赤白，阴阳不调，腹痛，肠鸣切痛。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：此方用黄连苦降以清热，木香芳烈以行滞，肉豆蔻温涩以止泻。寒热并投，通涩兼施，故能统治一切泄利，尤适宜于里热气滞而兼久利滑脱之证。若湿热瘀积而见里急后重之滞下，应通而不应涩，此方肉果温涩，不宜早投。

06549 豆蔻理中丸

【方源】《丹溪心法附余》卷二十一。

【组成】人参一两 白术二两 干姜 甘草（炙）各五分 肉豆蔻七钱（面裹煨）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心米汤送下；酒煮面糊为丸亦可。

【主治】产后元气虚弱，脐腹疼痛，泄泻不止；又治男子脾胃虚弱，久泄不止。

06550 丽泽通气汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】丽泽通气散（《医学六要》卷八）。

【组成】黄耆四钱 苍术 羌活 独活 防风 升麻 葛根各三钱 炙甘草二钱 麻黄（不去节，冬月加） 川椒 白芷各一钱

【用法】上㕮咀。每服五钱，加生姜三片，大枣二枚，葱白三寸，同煎至一盏，去滓，食远温服。

【主治】鼻不闻香臭。

【宜忌】忌一切冷物，及风寒凉处坐卧行立。

06551 丽泽通气散

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】川羌活 川独活 漂白术 北防风 绿升麻 荆芥穗 粉干葛 香白芷 正川芎 淮木通 各一钱 净麻黄 北细辛 炙甘草各五分

【用法】加生姜三片，大枣三枚，水煎，食后服。

【主治】小儿鼻塞、鼻涕、鼻痈。

06552 克银癣软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】红粉5克 秦皮乙醇流浸膏15克 川槿皮乙醇流浸膏10克 补骨脂乙醇流浸膏10克 加亲水性软膏基质60克

【用法】调膏外用。

【主治】银屑病。

06553 芙蓉丸

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】哑芙蓉 乳香 没药 孩儿茶 鹿茸（去毛，酒蒸） 官桂 玄胡索（酒浸，微炒） 乌药（炙） 陈皮 五加皮 粉草（炙）各等分

【用法】上为末，面糊为丸。每服二钱，酒煎葛根汤送下。临卧出微汗。

【主治】脚腿疼痛。

06554 芙蓉丹

【方源】《普济方》卷二二四引《济生》。

【组成】附子一两（炮） 朱砂半两

【用法】上为末，煮糊为丸。每服五十丸。空心盐汤送下。

【主治】心肾不足，气不升降，用心过度，惊悸多忘。

06555 芙蓉膏

【方源】《回春》卷八。

【组成】芙蓉叶（或皮或根亦可） 黄荆子各等分

【用法】入石臼内捣极烂，用鸡子清调。搽于疮上，留顶。

【主治】①《回春》：痈疽发背诸毒。②《寿世保元》：痈疽发背，肿痛如锥刺，不可忍者。

06556 芙蓉膏

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】紫荆皮 南星各一两 芙蓉叶二两 独活 白芷 赤芍药各五钱

【用法】上为末，生姜汁、茶清调。加温贴敷。

【主治】打扑伤损，肿痛紫黑，色久不退者。

【加减】伤损紫黑色久不退者，加肉桂五钱。

06557 芙蓉膏

【方源】《医学心悟》卷六。

【异名】芙蓉菊花膏（《疡医大全》卷八）。

【组成】赤小豆四两 芙蓉叶四两 香附四两 菊花叶四两 白及四两

【用法】上为细末，每末一两，加麝香一分，米醋调。涂住根脚。鸡子清调亦可。

【主治】发背，肿势蔓延。

06558 芙蓉膏

【方源】《中西医结合治疗急腹症》。

【组成】芙蓉叶 大黄 泽兰叶 黄柏各八两 黄芩 黄连各六两 冰片二钱

【用法】上为细末，按七份凡士林三份药的比例调成膏。外敷。

【功用】清热解毒消肿。

【主治】①《中西医结合治疗急腹症》：急腹症手术后并发腮腺炎，软组织感染初期，有红肿热痛而脓未形成者。②《赵炳南临床经验集》：丹毒、蜂窝织炎、疖、痈、乳腺炎初起。

06559 芙蓉内托散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 芙蓉花二钱 人参 当归 川芎 白芷 穿山甲 杏仁 连翘 木鳖子各一钱

【用法】 加生姜三片，酒、水各一钟煎，空腹服。

【主治】 便毒已成，元气弱者。

06560 芙蓉海马丹

【方源】《医级》卷九。

【组成】 熟地三两（煮，捣） 山药（炒） 枸杞（炒）各一两半 萸肉（炒）二两 茴香（炒） 巴戟（酒炒） 苁蓉（洗，蒸） 淫羊藿（焙） 茯神（人乳拌，蒸） 续断（酒炒） 杜仲（盐水炒） 故纸（炒）各一两 胡桃肉二两 桂心（研）五钱 海马一对（切，焙） 阿芙蓉三钱（须去泥，清膏） 蛤蚧一对（去头足，清水浸五宿，逐日换水，拭去浮鳞，炙黄）

【用法】 上为末，先将熟地、苁蓉、胡桃三味捣膏令匀，然后用鹿胶八两溶化，入诸末，捣为丸，如梧桐子大。每日早、晚各服三钱，用开水送下。

【主治】 阳萎精衰，不能生育，或精滑不摄，不能交接。

【宜忌】 服药静养，不妄作强劳，待时交接，再迟速得宜。妇有病者，宜先调理之。

06561 芫花丸

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 芫花一两 大戟一两 甘遂一两 川大黄一两 青橘皮一两半（汤浸，去白瓤）

【用法】 上锉细，以米醋一中盏，旋酒药于铫子内，慢火炒令醋尽，为细末，以面糊为丸，如梧桐子大。每服七丸，食前以温酒送下。

【主治】 妇人血分，四肢浮肿，心腹气滞，不思饮食。

06562 芫花丸

【方源】《本事》卷三。

【组成】 芫花（醋制干）一两 干漆（炒令烟尽） 狼牙根 桔梗（炒黄） 藜芦（炒） 槟榔各半两 巴豆十个（炒微黑黄）

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如赤豆大。每服二三丸，加至五七丸，食前姜汤送下。

【功用】 常服化痰，消坚，杀虫。

【主治】 积聚停饮，痰水生虫，久则成反胃，及变为胃痈。

【宜忌】 禁酒即易治，不禁无益也。

【方论选录】《本事方释义》：芫花气味咸辛温，入手、足太阳，善能行水；干漆气味辛温，入足厥阴，降而行血；狼牙根气味苦辛寒，入足少阳、厥阴，善能杀虫；桔梗气味苦辛平，入手太阴，为诸药之舟楫；藜芦气味辛温，入手阳明，能行积滞；槟榔气味辛温，入足太阴、太阳，能下气消积；巴豆气味辛热，有毒，入手足阳明、足太阴，此积聚痰饮，久而不去，甚至生虫、反胃，胃变为痈，非有毒、行血下气、攻坚消积之药不能扫除沉痼也。

【备考】 方中干漆，《准绳·类方》作牛膝。

06563 芫花散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】 芫花一分（醋拌，炒令干） 泽泻一分 郁李仁一分（汤浸，去皮，微炒） 牵牛子一分（微炒） 甜葶苈一分（隔纸炒令紫色） 滑石三分 汉防己一分 海蛤半两（细研） 甘遂半两（煨令微黄） 罂麦半两 槟榔半两 大戟三分（锉碎，微炒）

【用法】 上为细散。每服一钱，空心以橘皮汤调下。当先泻碧绿水，后下如烂羊脂即愈。如未愈，隔日再服之。

【主治】 十种水气，证候极恶。

06564 芫花散

【方源】《得效》卷十七。

【组成】 陈芫花一握 甘草节五钱

【用法】 上锉细，各煎。先用芫花汤噙，唾去；次用甘草水噙，少时效。

【主治】 牙疼。

06565 芫花饼子

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】 芫花 桑白皮 陈橘皮 吴茱萸各一两 马兜铃二两 白牵牛半两

【用法】 上为末，以寒食面三两，以水一处和匀，樱桃大，捻作饼子。每服一饼子，煻灰火中炮熟，细嚼，马兜铃汤下。

【主治】 喘嗽上气。

06566 芫根白皮丸

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】 芫花根白皮（锉碎，炒干） 半夏（汤洗五遍，炒干） 射干 百部 五味子（拣净）各一两一分 干姜（炮裂） 紫菀（去苗土） 款冬花（去萼） 白茯苓（去黑皮） 皂荚（酥炙，去皮子） 细辛（去苗叶） 贝母（去心，微炒）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，空腹以粥饮送下，渐加至五丸，以知为度。如泻多，用防风甘草汤解之。

【主治】 久患呷嗽，喉中作声。

06567 芫黄丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】黄连（去须，微炒） 黄柏（去粗皮） 甘草（微炒） 青橘皮（去白） 龙胆草（去芦头） 各半两 干蟾一个（酥炙） 胡黄连 白芜荑仁（炒）各一分 使君子十四个（炮，去壳） 青黛一钱 麝香半钱（别研）

【用法】上为细末，研匀，用嫩猪胆汁和得所，分药入猪胆内，各令七分满，以线系定，于银、石器中用浆水煮五七沸，当风挂一宿后剥去猪胆不用，只取药，再和令匀为丸，如黍米大。每服二十丸，温米饮送下，不拘时候。

【主治】小儿五疳骨热，面黄肌瘦，饮食虽多，不长肌肤，牙齿宣露，或有盗汗，疳疮湿痒，小便白浊。

06568 芜荑汤

【方源】《类证治裁》卷三。

【组成】芜荑（炒）不拘分两

【用法】煎水代茶。

【主治】蠕瘦。

06569 芜荑散

【方源】方出《续本事》卷十，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷八。

【组成】白芜荑一两 槟榔 吴茱萸各半两 硫黄二钱（别研）

【用法】上为末。麻油调，抓破搽。

【主治】疥癣，不以新久。

06570 芜荑散

【方源】《直指》卷二十五。

【组成】鸡心槟榔三钱 芜荑二钱 木香一钱

【用法】上为末，为一服。当晚先煎酸石榴根汤，至五更，吃炙肉一片，嚼细，引虫上至喉，以石榴根汤暖温调药服。虫自软而下。

【主治】①《直指》：诸虫。②《幼科指掌》：腹中虫作痛，口吐涎者。

06571 芜荑消疳汤

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】雄黄 芜荑 生大黄 芦荟 川黄连 胡黄连 黄芩

【用法】用累攻法：今日攻之，明日又攻之，以肿硬消，黑色变，臭气止为度；若不能食，或隔一日，或隔二三日攻之。攻之后渐能食，不必忌口，任其所食。虽大便溏，仍量其轻重攻之。

【主治】①《金鉴》：牙疳。②《医碥》：牙槽风溃后肿硬不消，出臭血而不出脓，臭秽难近。

06572 苇叶汤

【方源】方出《外台》卷十（注文）引《伤寒论》，名见《圣济总录》卷五十。

【组成】苇叶（细切）二升 桃仁五十个（去皮尖双仁，炒，研） 瓜子 薏苡仁各半升

【用法】以水一斗，先煮苇叶得五升，去滓，纳诸药，煮取二升，再去滓，分二次温服。

【主治】①《圣济总录》：肺痈，恶寒，口干，胸中隐隐作痛，咳而胸满，时出腥唾，久则吐脓如米粥，脉数而实。②《东医宝鉴·杂病篇》：肺痈，心胸甲错，咳喘，烦热。

06573 苇茎汤

【方源】《外台》卷十引《古今录验》。

【异名】千金苇茎汤（《金匮》卷上附方）。

【组成】锉苇一升 薏苡仁半升 桃仁五十个（去皮尖两仁者） 瓜瓣半升

【用法】上㕮咀。以水一斗，先煮苇令得五升，去滓，悉纳诸药，煮取二升，分二次服。

【功用】①《成方便读》：散结通瘀，化痰除热。②《医方发挥》：清肺化痰，逐瘀排脓。

【主治】肺痈，咳吐腥臭黄痰脓血，胸中隐隐作痛，皮肤甲错，舌红苔黄腻，脉数实。现用于肺脓疡，化脓性气管炎、肺炎等。

①《外台》引《古今录验》：肺痈，吐如脓。②《千金》：肺痈，咳有微热，烦满，胸心甲错，咳唾脓血，胸中隐隐痛，或口干喘满，时时振寒发热，舌上苔滑，其脉数实。③《圣惠》：肺痈，咳，其声破嗄，胸前皮甲错。

【宜忌】《医方发挥》：本方药物多为滑利之品，并有活血去瘀作用，故孕妇慎用。

【方论选录】①《成方便读》：痈者，壅也，犹土地之壅而不通也。是以肺痈之证，皆由痰血火邪，互结肺中，久而成脓所致。桃仁、甜瓜子皆润燥之品，一则行其瘀，一则化其浊；苇茎退热而清上，苡仁除湿而下行。方虽平淡，其散结通瘀、化痰除热之力实无所遗。以病在上焦，不欲以重浊之药重伤其下也。②《金匮要略论注》：此治肺痈之阳剂也。盖咳而有微热，是在阳分也；烦满，则挟湿矣；至胸中甲错，是内之形体为病，故甲错独见于胸中，乃胸上之气血两病也。故以苇茎之轻浮而甘寒者，解阳分之气热；桃仁泻血分之结热；薏苡下肺中之湿；瓜瓣清结热而叶其败浊，所谓在上者越之耳。

【临证举例】①化脓性支气管炎 《上海中医药杂志》（1959；2:15）：用苇茎汤治疗化脓性支气管炎3例，均获显著疗效。一患者为双侧慢性化脓性

支气管炎，发热不规则，咳吐脓痰，每日100～400毫升，经用抗菌素治疗虽见改善，但停药即复发。用苇茎汤治疗后，一周内热退，咳嗽显减，脓痰减少。观察一月，未见复发。②病毒性肺炎《安医学报》（1959；4:371）：用千金苇茎汤治疗24例病毒性肺炎，且均为病变较广泛者。服用苇茎汤后，咳嗽，咯痰显著减轻。7例发热者，4例于1日内退至正常，平均2～7日退热。24例中20例病变完全吸收，3例部分吸收，1例无改变。肺炎好转率为95.8%。有效病例中，肺炎吸收时间4～30日不等，平均11.6日，1周内吸收者占45%。③大叶性肺炎《浙江中医杂志》1964；10:16)：以千金苇茎汤为主方随症加减，治疗大叶性肺炎45例，结果全部治愈。半数病例服药后在48小时内逐渐退热，体温降至正常。咳嗽、咯痰、胸痛等症一般在4～6日后减轻或消失。平均住院日数为8.05日。④肺脓疡《中药通报》(1958；12:427)：根据中医治疗肺痈的方法，治疗肺脓疡15例，方用千金苇茎汤加重苇茎和冬瓜子的剂量。结果，14例治愈。15例中，部分病人曾用抗菌素和磺胺类药物医治无效，始改用中药；部分病人因手术治疗有困难，或本人不愿动手术，而改服中药者。⑤眼科疾病《浙江中医杂志》(1964；3:15)：苇茎汤在眼科上的适应范围很广，凡因火邪上逆而引起之眼疾均可适用，如天行赤眼、金疡玉粒、白珠俱青、花翳白陷等。诸证皆以外障为眼部主要症状，舌赤少苔，或苔黄而燥，脉滑数或洪大有力，及面红鼻干，口燥喜饮，咳嗽声嗄少痰等。根据不同兼症，佐用其它药物，如口渴烦热加知母、花粉；大便不畅加杏仁、麻仁；便秘加郁李仁，或加大黄、芒消；干咳或吐痰加杏仁、贝母；咳嗽声嗄，且壮热加桑叶、枇杷叶；眼病而兼鼻衄加荷蒂。

【备考】 方中锉苇，《千金》作苇茎，《古方选注》作苇根。方中瓜瓣，《圣惠》作甜瓜子，《古方选注》作丝瓜瓣，《温热经纬》作冬瓜子。

06574 芸苔散

【方源】《妇人良方》卷二十引《杨氏产乳》。

【组成】 芸苔子（隔纸炒） 当归 桂心 赤芍药各等分

【用法】 上为细末。每服二平钱，温酒调下。赶下恶物，产后三日不可无此。

【主治】 ①《妇人良方》：产后恶露不下，血结不散，冲心刺痛，并产后心腹诸疾。②《普济方》：妇人产后血晕及九窍内出血，烦渴不止，欲死者。

06575 芸苔散

【方源】《医方类聚》卷二一八引《经验良方》。

【组成】 芸苔子 红花 五灵脂 延胡索各半两 三棱 莪术各一两

【用法】 上为末。每服二钱，热酒调下。

【主治】 妇人血气疼痛不可忍。

06576 芸苔子散

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】 芸苔子 天南星 草乌头（并生用）各一两

【用法】 上为散。每用五钱匕，量入生面，以醋醋、生姜汁、生油各少许，调成膏，摊纸上，厚一分，贴痛处。

【主治】 风毒走注，疼痛如虎啮。

06577 芣苡汤

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】 车前子 麦门冬 当归 川芎 木通 滑石各五分 细辛 甘草各三分

【用法】 用灯心一弹，水煎服。

【主治】 子淋，小便短涩。

06578 芷贝散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 白芷 贝母各等分

【用法】 上为末。每服一钱，酒调频服。若无乳行者，加漏芦煎酒调服。外用起酵生面，如蜂窝发过，上有青色无妨，焙干为末，井水调敷，如干，以水时润之；甚者加白芷、贝母、乳香、没药少许。

【功用】《慈禧光绪医方选议》：祛风消肿，清热散结。

【主治】 ①《医学入门》：孕妇及产后乳结核。②《杂病源流犀烛》：一切乳症。

【方论选录】《慈禧光绪医方选议》：方中白芷辛温，能表散风寒，散肿通窍；贝母除化痰止咳外，尚可清热散结，用黄酒调服，在于酒有活血通络之作用。

06579 芷苓散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】 白芷 酒黄芩各等分

【用法】 上为末。每服二钱，茶清送下。

【主治】 风热挟痰而致眉棱骨痛。

06580 芷梅汤

【方源】《医学纲目》卷二十一。

【组成】 乌梅肉 甘草各三分 百药煎一两 白芷半两 白檀三钱

【用法】 上为细末。汤点服。

【主治】 上消，渴而多饮。

06581 苋茶散

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】 苋菜（阴干，烧灰）三钱 铜青二钱 枯矾二钱 轻粉一钱 雄黄一钱 鸡内金二钱 麝香二分 孩儿茶二钱

【用法】 上为细末。麻油调搽，明日再用甘草煎汤洗净，再烙，以平为度。后用生肌散。先用烙铁艾火内燃烧通红，烫患处五六次，烫毕随药搽之，不再生，除根。

【主治】 唇茧。

06582 花丁散

【方源】 方出《准绳·疡医》卷二，名见《洞天奥旨》卷十五。

【组成】 紫花地丁 蝉蜕 贯众各一两 丁香 乳香各二钱

【用法】 上为细末。每服二钱，空心温酒下。

【主治】 疔疮毒气入腹，昏闷不食。

06583 花龙丸

【方源】《解围元薮》卷三。

【异名】 混元丹。

【组成】 苍术四两 黄柏（酒浸，炒） 灵壳（酥炙） 牛膝 当归 蓖麻 防己 茄根皮各一两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，姜盐汤送下。

【主治】 风湿，腰背以下腿股瘫痪，寸步不能，日夜抽掣，伏床不起。

06584 花叶丸

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】 枇杷叶 款冬花 紫菀 杏仁 鹿茸 桑白 木通（少加） 大黄

【用法】 上为末，炼蜜为丸。含化。

【主治】 酒色、饥饱劳吐血。

06585 花草膏

【方源】《直指》卷二十。

【组成】 羯羊胆一枚（饭上蒸熟）

【用法】 上药以冬蜜研和，入朱砂末少许，频研成膏。食后、临卧匙抄少许含咽，亦可点目。

【主治】 ①《直指》：患眼肿痛涩痒，昏泪羞明。②《医学入门》：火眼烂弦，风眼痛痒羞明，及眼胞皮肉有似胶凝，肿如桃李，时出热泪。

06586 花粉散

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】 生地 麦冬（去心） 干葛 花粉各二钱 北味六分 甘草七分 粳米 百粒

【用法】 水煎服。

【主治】 上消。

06587 花蛇酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【异名】 一品花蛇酒（《增补内经拾遗》卷三）。

【组成】 白花蛇肉一条

【用法】 白花蛇袋盛，同曲置于缸底，糯饭盖之。三七日，取酒饮。

【主治】 诸风，顽痹瘫缓，挛急疼痛，恶疮疥癞。

06588 花叶洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 野菊花 1500 克 千里光 1000 克 土荆芥 500 克 食盐 30 克

【用法】 水加至药面，煎出 1/2～1/3 药液，用作湿敷。

【主治】 湿润糜烂性皮肤病。

06589 花乳石散

【方源】《普济方》卷七十八引《卫生家宝》。

【组成】 花乳石一两（细研，水澄为粉，焙干） 防风一两（去芦头） 川芎一两 甘菊一两 甘草半两（炙） 牛蒡子半两（拣去灰土称，炒） 白附子一两

【用法】 上为细末。每服二大钱，腊茶调下，不拘时候。

【主治】 多年内外障。

06590 花蕊石散

【方源】《修月鲁般经后录》引《劳证十药神书》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【异名】 花蕊散（《杂病源流犀烛》卷十七）。

【组成】 花蕊石（煅过，研如粉）

【用法】 每服三钱，极甚者五钱，用童便一盏煎温调，食后服。如男子病，则和酒一半；女人病，则和醋一半，一处调药。立止，其瘀血化为黄水。服此药后，患人必疏解其体，以独参汤补之。

【主治】 劳证五脏崩损，涌叶血出，成升斗者。

【方论选录】《血证论》：此药独得一气之偏，神于化血。他药行血，皆能伤气，此独能使血自化，而气不伤，真去瘀妙品。

06591 花蕊石散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 乳香 没药 羌活 紫苏 细辛 草乌 蛇含石（便煅三次） 厚朴 白芷 降香 当归 苏木 檀香 龙骨 南星 轻粉各二钱 麝香三分

花蕊石（童便煅七次）五钱

【用法】 上为极细末，罐收听用。葱汤洗净，用此掺之，软绵纸盖扎，一日一换。此药一时未备，可用多骨疽门生肌散代之暂用，亦可取效危急也。

【主治】 ①《外科正宗》：跌扑伤损及金疮、刀、箭、兵刃所伤，断筋损骨，疼痛不止，新肉不生者。②《卫生鸿宝》：金刃伤，肚破肠出者。

06592 花蛇续命汤

【方源】《医学启源》卷中。

【组成】 白花蛇（酒浸，去皮骨，焙干） 全蝎（炒） 独活（去土） 天麻 附子 人参 防风 肉桂 白术 藁本 白附子（炮） 赤箭 川芎 细辛（去叶） 甘草（炙） 白僵蚕（去丝，灰炒） 半夏（汤浸，切） 白茯苓（去皮） 麻黄（去节，水煮三沸，去沫，细切）各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一盏，加生姜五片，煎至七分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 卒中风，牙关紧急，精神昏愦，口眼㖞斜，不知人事，痰涎不利，喉中作声。

06593 花斑癣特灵

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 雌黄（雄黄代亦可）9克 石硫黄9克 煅明矾4克 蜜陀僧6～15克 红砒石2克 轻粉3克 蛇床子6克 海浮石4克

【用法】 上为细末，分五至七次外用。用时药末以煤油调匀，以鸭毛沾药液外涂，患部先热敷，次用老生姜搓皮肤呈红色，自觉有热感，使毛孔开窍后，依上法涂药，六小时后用热水洗掉。

【主治】 花斑癣。

【宜忌】 忌用生水，禁入口内。

06594 芹菜粥

【方源】《长寿药粥谱》。

【组成】 芹菜（连根）120克（洗净，切碎） 粳米半斤

【用法】 同煮粥，早晚餐温热服食。

【功用】 清肝热，降血压。

【主治】 高血压病，肝火头痛，眩晕目赤。

06595 芥子散

【方源】《方症会要》卷一。

【组成】 白芥子五钱 橘红 胆星 香附各二钱五分 枯芩 青黛 麻黄各二钱 杏仁三钱 苏梗 桑皮 贝母各一钱五分 萝卜子三钱五分

【用法】 朱砂为衣。

【主治】 小儿咳嗽。

06596 芥菜卤

【方源】 方出《广笔记》卷三，名见《仙拈集》卷四。

【组成】 百年芥菜卤（久窖地中者）

【用法】 每服数匙。

【主治】 ①《广笔记》：肺痈。②《仙拈集》：肺痿。

06597 苁蓉丸

【方源】《简易方》引《孟氏诜诜方》（见《医方类聚》卷一四九）。

【组成】 熟地黄（净洗，酒浸，蒸二次，焙干）二两 菟丝子（淘去沙土，蒸二次，研烂，焙） 川当归（洗，焙）各一两半 穿心紫巴戟 肉苁蓉（洗，切，焙） 北五味 人参（去芦） 嫩鹿茸（酥炙） 坚白茯苓 龙齿 嫩黄耆（蜜炙） 石莲肉各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒、米饮任下。

【功用】 和阳助阴。

【主治】 丈夫禀受气血有偏胜者，气胜血则阳盛阴微，精气易流。

06598 苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 肉苁蓉二两（汤浸一宿，刮去皱皮，炙干） 山茱萸二分 石斛三分（去根，锉） 磁石二两（烧，醋淬七遍，捣碎，细研，水飞过） 石龙芮三分 杜仲三分（去粗皮，炙微黄，锉） 附子三分（炮裂，去皮脐） 菟丝子三分（酒浸三日，晒干，别捣为末） 巴戟三分 鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 熟干地黄一两 菖蒲三分 天麻三分 干蝎三分（微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心酒送下。

【主治】 风虚耳聋，由肾脏不足，风邪入于经络，致四肢羸瘦，腰背强直，耳无所闻。

06599 苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】 肉苁蓉（去皱皮，酒浸，切，焙） 天雄（炮裂，去皮脐） 石斛（锉） 当归（切，焙） 桂（去粗皮）各一两 蜀椒（去目及闭口，炒出汗） 牛膝（锉，酒浸，焙） 陈橘皮（汤浸，去白） 干姜（炮裂）各一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹、食前温酒送下，一日三次。

【主治】 阳虚阴盛，痹气，身寒如从水中出。

06600 苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【异名】木瓜丸(《传信适用方》卷上)、肉苁蓉丸(《金匮翼》卷六)。

【组成】肉苁蓉（酒浸，切，焙） 牛膝（酒浸，切，焙） 天麻 何首乌（米泔浸一宿，竹刀刮去皮） 黄耆（锉） 木瓜（去皮，作片）各十两（六味以好酒五升浸，候药泣酒干，取出与后三味同焙） 狗脊（去毛，锉） 续断（锉） 萆薢（锉）各二两

【用法】上为末，用木瓜三枚，去皮，剜作瓮子，入青盐一两在内，闭口，饭上蒸令烂熟，捣成膏，入上件药末，和为丸。如木瓜膏少，即入酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，盐汤或酒任下，不拘时候。

【主治】风湿脚气，客搏筋脉，痹挛不仁。

06601 苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】肉苁蓉（酒浸一宿，切作片子，焙干）二两 磁石三两（烧醋淬七遍，研） 鹿茸（酥炙，去毛） 桂（去粗皮） 熟干地黄（焙） 巴戟天（去心）各一两 附子（炮裂，去皮脐） 远志（去心） 地骨皮各半两 黄耆（锉）一两 牛膝（酒浸一宿，切，焙）二两 五味子（炒） 白茯苓（去黑皮）各一两 晚蚕蛾（炒）半两

【用法】上药除磁石外，为细末，同研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心食前温酒送下。

【主治】虚劳肾气不足，腹内拘急，目暗耳鸣，四肢困倦，行步乏力，脚如石沉，肌瘦羸弱，面色萎黄，脐下紧痛，心忪盗汗，小便滑数。

06602 苁蓉丸

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】肉苁蓉（净刷，去皱皮，酒浸二宿，薄切，焙干）二两半 黄耆（细锉）三两 桂（去粗皮）二两 杜仲（去粗皮）二两半（炙紫色，横锉） 牛膝（去苗，酒浸，切，焙）二两 山茱萸二两 韭子（水淘去浮者，焙干，炒）三两

【用法】上为细末，炼蜜和剂，更臼内涂酥，杵令匀熟，为丸如梧桐子大。每服三十丸，空腹黄耆汤送下，至晚再服。

【主治】肾脏虚冷，腰膝无力，小便不禁，或溺白色。

06603 苁蓉丸

【方源】《三因》卷十。

【组成】苁蓉（酒浸） 磁石（煅碎） 熟地黄 山茱萸 桂心 山药（炒） 牛膝（酒浸） 茯苓 黄耆（盐汤浸） 泽泻 鹿茸（去毛，切，醋炙） 远志（去心，炒） 石斛 覆盆子 五味子 萆薢 破故纸（炒） 巴戟（酒浸） 龙骨 菟丝子（酒浸） 杜仲（去皮，锉，姜汁制，炒丝断）各半两 附子（炮，去脐）一个重六钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空腹米饮送下。服真珠丸后次服本丸。

【功用】补心肾。

【主治】消渴，心虚烦闷，或外伤暑热，内积愁烦，酣饮过多，口干舌燥，引饮无度，小便或利或不利。

06604 苁蓉丸

【方源】《济生》卷五。

【组成】肉苁蓉（酒浸，切片，焙） 山茱萸（去核） 石龙芮 石菖蒲 菟丝子（淘净，酒浸，蒸，焙） 川羌活（去芦） 鹿茸（燎去毛，切片，酒浸，蒸） 磁石（火炼、醋淬七次，水飞） 石斛（去根） 附子（炮，去皮脐）各一两 全蝎（去毒）二七个 麝香一字（旋入）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，加至一百丸，空心盐酒、盐汤任下。

【主治】肾虚耳聋，或风邪入子经络，耳内虚鸣。

06605 苁蓉汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】肉苁蓉（酒浸，切，焙） 菟丝子（酒浸一宿，焙干，别捣） 人参 黄耆（锉） 木香 附子（炮裂，去皮脐） 补骨脂（炒）各一分

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】骨髓虚冷疲疼。

06606 苁蓉饮

【方源】《证治宝鉴》卷七。

【组成】苁蓉 当归 地黄 桃仁 陈皮 麻仁 郁李仁 柏子仁

【用法】兼服紫苏粥。

【主治】肾阴不足，两尺脉弱，大便秘。

06607 苁蓉散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】肉苁蓉 白术 巴戟 麦门冬 茯苓 甘草 牛膝 五味子 杜仲各八钱 车前子 干姜各五钱 生地半斤

【用法】上为末。每服二钱，食前酒调下，一日三次。

【主治】 肾气虚寒阴痿，腰脊痛，身重胫弱，言音混浊，阳气顿绝。

06608 苁蓉粥

【方源】《史载之方》卷上。

【组成】 肉苁蓉一分 米一掬

【用法】 先洗苁蓉令净，切令极细，同米用水二碗以上，煮作稀粥，既熟，入少许葱，并薄入盐、酱调和，空心投三四盏。

【主治】 元气虚弱，肾水空虚，胃无津液，大府涩迟，六脉微而虚。

06609 苁蓉牛膝丸

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 牛膝（酒浸一宿，切，焙） 补骨脂（酒浸一宿，炒） 巴戟天（去心） 羌活（去芦头） 附子（炮裂，去皮脐） 蜀椒（去目并闭口，炒出汗）各一两

【用法】 上为末，用豬猪肾一只，去筋膜，细切，研烂，取浸牛膝酒，同面煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、临睡温酒送下。

【功用】 补益下元，壮强真气。

【主治】 膀胱虚冷，小便频数。

06610 苁蓉羊肉粥

【方源】 方出《证类本草》卷七引《药性论》，名见《药粥疗法》。

【组成】 肉苁蓉四两（水煮令烂，薄切，细研） 精羊肉（分为四度）

【用法】 上药以米煮粥，入五味。空心服之。

【功用】《药粥疗法》：补肾助阳，健脾养胃，润肠通便。

【主治】 ①《证类本草》引《药性论》：精败面黑，劳伤。②《药粥疗法》：肾阳虚衰所致的阳萎、遗精、早泄，女子不孕，腰膝冷痛，小便频数，夜间多尿、遗尿，以及平素体质羸弱，劳倦内伤，恶寒怕冷，四肢欠温，脾胃虚寒，脘腹隐痛，老人阳虚便秘。

【宜忌】《药粥疗法》：苁蓉羊肉粥属温热性药粥方，适用于冬季服食，以5至7天为一疗程，夏季不宜服食。凡大便溏薄，性机能亢进的人，也不宜选用。

06611 苁蓉杏仁汤

【方源】《四圣心源》。

【组成】 甘草二钱 杏仁二钱 白蜜一两 肉苁蓉二钱

【用法】 煎大半杯，入白蜜温服。

【主治】 津亏木燥，大便艰难。

06612 苁蓉独活散

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，切，焙）二两 独活（去芦头） 附子（炮裂，去皮脐） 蜀椒（去目并闭口者，炒出汗）各一两半 泽泻 黄耆（细锉）各二两 五味子 蒺藜（炒去角） 防风（去叉） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒黄） 木香 干姜（炮） 牡蛎（熬） 赤石脂 黄芩（去黑心） 甘草（炙，锉） 桂（去粗皮） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒黄） 细辛（去苗叶） 续断各一两

【用法】 上为细散。每服三钱匕，空心酒调下，一日二次。

【主治】 肾脏虚冷，腰胯膀胱间忽冷如人吹，及手足膝盖冷如水，或茎中痛，小便无节。

06613 苁蓉琐阳粥

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】 肉苁蓉 琐阳

【用法】 煮粥服。

【主治】 老人阴血不足，大便燥结。

06614 苁蓉菟丝丸

【方源】《济阴纲目》卷三。

【异名】 苁蓉菟丝子丸(《医学正印》卷下)。

【组成】 肉苁蓉（酒浸） 菟丝子（酒蒸） 覆盆子 蛇床子各一两二钱 当归（酒洗） 白芍药（炒） 川芎各一两 牡蛎（火煅） 乌贼骨各八钱 五味子 防风各六钱 黄芩五钱 艾叶三钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，盐汤送下，早、晚各进一服。

【功用】 助阴生子。

【主治】 赤白带下。

06615 芩术汤

【方源】 方出《丹溪心法》卷五，名见《医学入门》卷八。

【异名】 安胎饮(《大生要旨》卷二)。

【组成】 条芩一二两

【用法】 上为末。每服一钱或半钱，白术五七钱浓煎汤调下。

【功用】 ①《丹溪心法》：安胎。②《医学入门》：清热安胎。

【主治】《医学入门》：妊娠四五月，常堕不安，为热甚故。

【备考】《医学入门》本方用子芩一两，白术五钱，水煎服。

06616 芩芍汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】 黄芩 白芍 白术（蜜炙）各一钱 肉桂五分

【用法】 水煎，食前温服。

【主治】 ①《叶氏女科》：妊娠腹痛，热痛脉数。②《妇科玉尺》：胎动因热者。

06617 芩芷散

【方源】《明医指掌》卷六。

【组成】 黄芩（酒炒）一两 白芷一两

【用法】 上为末。每服二钱，茶清调下。

【主治】 风热上盛，眉眶疼痛，目不能视物者。

06618 芩术四物汤

【方源】《金鉴》卷四十四。

【组成】 四物汤加黄芩 白术

【主治】 ①《金鉴》：经水先期，血多因热者。②《医林纂要》：肝木乘土，热而挟湿，经血过多。

06619 芩术安胎饮

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】 白术（米泔水浸一宿，去芦，切片，晒干，黄土炒香。如脾脉虚弱细软，缓大无力，外证饮食少进，恶心、呕吐、泄泻，用一钱五分或二钱，若气体强壮，或气郁壅滞，胸腹膨闷胀满作痛，或素有奔豚积聚上攻者，忌用） 条芩（如脉洪盛有力，素多内热，用一钱五分或二钱，如气体虚寒，脾肺脉弱，呕哕泄泻者，忌用） 当归身（酒洗）一钱五分或二钱（如嗽，有痰喘呕哕泄泻者，忌用；如只有泄泻而无别证，以黄土炒用） 带壳砂仁（微炒）五分或七分（内热者，三四分） 生知母一钱（素多内热者，或用一钱五分或二钱；如气体虚寒，呕哕泄泻者，忌用） 炙甘草三分或四分

【用法】 水煎，食远服。

【功用】 安胎。

【主治】 胎动不安。

【加减】 如脉弱虚细，或缓大无力，饮食减少，口不知味，溏薄泄泻者，加入参一钱或一钱五分，炒白术一钱或一钱二分，或二钱，白茯苓一钱，广皮七八分，炒条芩一钱，去知母；如血虚内热，肝肾脉洪数无力，腰疼，腿膝痿软无力者，加熟地三五钱或七八钱，生地二三钱，酒洗芍药一钱或一钱五分，炒杜仲，酒洗当归一钱或一钱五分，炒续断一钱；如肝肾脉虚细濡弱，腰疼，腿膝麻木冷痛，加熟地三五钱或七八钱，川芎八分，制续断肉一钱，盐水炒杜仲一钱五分，酒洗归身一钱五分或二钱，去知母；如胸腹胀闷，加麸炒枳壳七分，制大腹皮八分，醋制香附米七分；如素多郁怒，加苏梗八分或一钱，醋制香附米八分或一钱，小柴胡七八分，酒洗抚芎七分；如呕哕，加藿香八分或一钱，竹茹六七分，制透半夏八分，陈皮八分，带壳砂仁四五分，煨姜三片，去知母；胃寒呕哕，去条芩、知母、竹茹，加制去黄水吴茱萸三分；如虚烦，加去心麦冬一钱，竹茹七分；咳嗽，加去心麦冬一钱，蜜炙桑白皮八分或一钱，去皮尖杏仁八分，前胡一钱，麸炒枳壳八分；如小便淋沥不通，加车前子一钱，赤苓一钱，木通七分，甚者，加滑石一钱五分或二钱；如胎动下血，倍加生知母，纹银一小锭，忌铁器。

06620 芩术樗皮丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 黄芩 白术各三钱 樗皮 白芍 山茱萸各二钱半 白芷 黄连各二钱 黄柏一钱半

【用法】 上为末，酒糊为丸。温酒送下。

【主治】 孕妇白带。

06621 芩连二母丸

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 黄连 黄芩 知母 贝母 川芎 当归 白芍 生地 熟地 蒲黄 羚羊角 地骨皮各等分 甘草减半

【用法】 上为末，侧柏叶煎汤，打寒食面为丸，如梧桐子大。每服七十丸，灯心汤送下或作煎剂服之。

【主治】 心火妄动，逼血沸腾，外受寒凉，结为血瘤，其患微紫微红，软硬间杂，皮肤隐隐，缠如红丝，皮肤血流禁之不住者。

06622 芩连二陈汤

【方源】《便览》卷二。

【组成】 二陈汤加砂仁 栀子 黄芩 黄连（俱姜制炒）

【用法】 水一钟半，加生姜五片，煎服。

【主治】 胃口有热，膈上有痰，时作呕哕。

06623 芩连二陈汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 黄芩 黄连 陈皮 茯苓 半夏 甘草 桔梗 连翘 牛蒡子 花粉各一钱 木香三分 夏枯草二钱

【用法】 加生姜三片，水二钟，煎八分，食后服；滓再煎，临睡服。

【主治】 马刀。瘰疬生于少阳部分，项侧结核，外皮漫肿，色红微热，或至缺盆高骨上下发肿，形长坚硬作痛。

06624 芩连二陈汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】青子芩二钱　仙半夏一钱半　淡竹茹二钱　赤苓二钱　川连八分　新会皮一钱半　小枳实一钱半　碧玉散三钱（包煎）　生姜汁二滴　淡竹沥二瓢（和匀同冲。）

【功用】清肝和胃，蠲痰泄饮。

【方论选录】肝阳犯胃，症多火动痰升，或吐粘涎，或呕酸汁，或吐苦水，或饥不欲食，食则胃满不舒，甚则胀痛，或嘈杂心烦，故以芩、连、橘、半苦降辛通，调和肝胃为君；臣以竹茹、枳实通络降气；佐以赤苓、碧玉，使胃中之浊饮从小便而泄；使以姜、沥二汁，辛润涤痰，以复其条畅之性。此为清肝和胃，蠲痰泄饮之良方。

06625　芩连平胃汤

【方源】《金鉴》卷六十三。

【组成】黄芩一钱五分　黄连一钱　厚朴（姜炒）一钱　苍术（炒）二钱　甘草（生）五分　陈皮一钱

【用法】水二钟，加生姜一片，煎八分，食后服。外搽碧玉散。

【主治】燕窝疮。在下颏生，如攒粟豆，痒热疼，形类黄水疮破烂。

06626　芩连平胃散

【方源】《外科证治全书》卷三。

【组成】黄连二钱　陈皮三钱　苍术一两（炒）　生甘草三钱　茯苓一两　厚朴三钱

【用法】上为细末。每服三钱，白滚汤调下。外撒三妙散。

【主治】肠胃积湿，脐中不痛不肿甚痒，时流黄水，或浸淫成片。

【宜忌】忌酒、面、生冷、果菜。

【加减】无热，当去黄连，加防风三五钱。

【备考】本方名芩连平胃散，但方中无黄芩，疑脱。

06627　芩连四苓散

【方源】《医学六要·治法汇》卷三。

【组成】条芩　黄连　泽泻　赤茯　苍术　陈皮　白术

【用法】加灯心三十根，煎八分，空心服。

【主治】火泻。

【加减】腹胀，加木通、厚朴。

06628　芩连四物汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】当归　白芍　生地各一钱半　川芎八分　黄芩二钱　黄连一钱　升麻五七分　丹皮一钱半

【用法】水煎，加童便服。

【主治】赤带，脉洪数而实者。

06629　芩连四物汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】熟地黄　当归　白芍　川芎　柴胡　黄芩（酒炒）　黄连（酒炒）　香附（童便制）各等分

【用法】水煎，空心服。

【主治】经闭不通，性急多怒而妒，气血俱热，必有郁症。

06630　芩连芍药汤

【方源】方出《明医杂著》卷二，名见《医统》卷三十六。

【组成】黄芩（炒）　黄连（炒）各五分　白芍药（炒）二钱　枳壳（炒）　木香各五分　槟榔一钱　甘草（炙）三分

【用法】加生姜，水煎服。

【功用】泻肠胃之湿热，开郁结之气，消化积滞，通因通用。

【主治】痢疾。

【加减】腹痛，加当归一钱五分，砂仁各一钱，再加木香、芍药各五分；后重，加滑石（炒）五分，枳壳、槟榔、芍药、条芩各五分；白痢，加白术、白茯苓、滑石（炒）、陈皮各一钱，初欲下之，再加大黄五钱；红痢，加川芎、当归、桃仁各一钱五分，初欲下之，再加大黄五钱；红白相杂，加川芎、当归、桃仁各一钱五分以理血，滑石、苍术、陈皮各一钱五分以理气；食积，加山楂、枳实以消导；白痢久，胃弱气虚，或下后未愈，去槟榔、枳壳，减芩、连、芍药各七分，加白术一钱五分，黄耆、陈皮、茯苓各一钱，缩砂、干姜（炙）各五分；红痢久，胃弱血虚，或下后未愈，减黄芩、黄连各五分，加当归、川芎、熟地、阿胶、木香、陈皮各一钱，白术一钱五分；赤黑相杂，此湿胜也，及小便赤涩短少，加木通、泽泻、茯苓各一钱，山栀仁（炒）五分，以分利之。血痢，加当归、川芎、生地黄、桃仁、槐花（炒）各一钱，久不愈，减芩、连各七分，去槟榔、枳壳，再加阿胶珠、侧柏叶、白术各一钱五分，干姜（炒黑）、陈皮各一钱；痢已久，而后重不去，此大肠坠下，去槟榔、枳壳，用条芩，加升麻一钱以升提之；呕吐食不得下，加软石膏一钱五分，陈皮一钱，山栀仁（炒）五分，生姜六分，缓呷之，以泻胃口之热；得痢而误服温热止涩之药，则虽稍久，亦宜用前法以下之，下后方调之。

【备考】《医统》本方用黄芩（炒）、黄连（炒）

各一钱，白芍药一钱半，枳壳二钱，木香、槟榔各一钱，甘草五分；水一盏半，加灯心、大枣，煎八分，食前服。

06631 芩连败毒散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】防风 荆芥 黄连 黄芩 连翘 羌活 独活 柴胡 前胡 川芎 桔梗 蓝叶 玄参 牛蒡子 升麻 赤芍药 金银花 白芷 甘草 干葛 青木香

【用法】加生姜、薄荷，水煎服。

【主治】时毒肿痛，发热，左脉浮数者。

【加减】发热无汗，加麻黄。

06632 芩连消毒汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】黄芩 柴胡各一钱 桔梗 川芎 防风 羌活 枳壳各八分 甘草三分 连翘 射干 白芷 黄连各七分 荆芥

【用法】水二钟，加生姜三片，煎至一钟，加鼠粘子一撮，再煎一沸，入竹沥、姜汁调服。先服加大黄，利一二次后去大黄，加入参、当归。

【主治】天行大头病，发热恶寒，头项肿痛，脉来洪，喉痹痰热。

【备考】方中荆芥用量原缺。

06633 芩连消毒饮

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】防风 荆芥 连翘 柴胡 黄芩 川芎 羌活 桔梗 蓝叶 射干 白芷 牛蒡子 黄连 甘草 青木香 金银花

【用法】加薄荷，水煎服。

【主治】时毒，发热恶寒，头项肿痛，脉洪数。

06634 芩连清心丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】黄芩 黄连 麦门冬 天花粉 茯神 丹参 牛黄 菖蒲 远志

【主治】心热癫狂。

【备考】本方改为汤剂，名"芩连清心汤"（见《类证治裁》）。

06635 芩柏樗皮丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】黄芩 黄柏 樗皮 滑石 川芎 海石 青黛 当归 芍药各等分

【用法】醋糊为丸服。

【主治】瘦人带下多热。

06636 芩连橘半枳术丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】黄芩二两 黄连一两 神曲二两 麦芽粉二两 半夏二两 橘红二两 陈皮四两 枳实四两 白术八两

【用法】水叠丸。每服一二钱，午前后姜汤送下。

【功用】疏肝健脾，营运水谷，清火清痰，杜郁。

【主治】肝脾之气不和，气郁化火，火郁生痰，三者结滞于胸膈而不开，渐至痞满倒饱，嘈杂嗳气，吞酸，泄泻。

06637 苍术丸

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】苍术（米泔浸） 知母 黄芩（去黑心） 玄参 甘草 人参 细辛（去苗叶） 芎藭 白茯苓（去黑皮） 木香 贝母（去心） 石决明（刮、洗净） 芜荑子各一两

【用法】上锉细，焙过，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温水送下，临卧再服。

【主治】青盲眼，瞳子分明，亦无翳膜，不痛不痒，内障不见物。

06638 苍术丸

【方源】《本事》卷三。

【异名】神术丸(《直指》卷七)。

【组成】苍术一斤（去皮，切）

【用法】上为末，用生油麻半两，水二盏，研滤取汁，大枣十五个（烂煮，去皮核），研以麻汁，匀研成稀膏，搜和入白熟杵，丸如梧桐子大，干之。每日五十丸，空腹用盐汤送下，增至一百丸、二百丸。初服时必膈微燥，且以茅术制之，觉燥甚，进山楂散一服，久之不燥矣。

【主治】膈中停饮。

06639 苍术丸

【方源】《妇人良方》卷四。

【组成】乳香 没药各二钱（别研） 川牛膝 青盐各半两（研） 熟艾四钱 川乌三钱 全蝎一钱（炒）

【用法】上除研药，为细末，入研药令匀。以木瓜一个，大者，切一头留作盖，去瓤，入上件药于木瓜内，将盖签定，安木瓜子黑豆中蒸令极烂，取出去皮，连药研成膏；却入生苍术末拌令得所，丸如梧桐子大。每服五十丸，空心木瓜汤送下，或温盐酒亦得，一日三次。

【主治】干湿脚气，筋脉拘挛，疼痛不能行履。

【宜忌】忌血与蒜。

【临证举例】脚气 乙巳年，罗安人病，发热自

汗，心烦，身体骨立，足痛拘挛，不能屈伸，饮食不进，虽老医亦不能疗，召仆治之，六脉弦弱。仆曰：虽脉似劳，实非劳也。似脚气，而非正脚气。但当调脾生血，其热必退；然后攻足，则可望安。遍寻诸方，皆无对证之药，遂处四白散子与服，不半剂，热退能食。又处苍术丸继之，筋脉伸、足能行而愈。

06640　苍术丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】苍术一斤（用泔浸，去皮，切作片，用生葱白一斤切碎，加盐二两同炒，苍术黄色为度，去葱不用）　川椒（微炒）　白茯苓（去皮）　小茴香（微炒）各四两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心温酒送下。

【功用】明目，暖水脏，补益。

【主治】腰腿疼痛，小肠疝气。

06641　苍术丸

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】苍术（米泔浸一日，为末）

【用法】蒸饼糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下，一日三次。

【主治】胃中有虫，吃生米。

06642　苍术丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】云苓四两　白芍药（炒黄）四两　炙甘草一两　川椒（去闭口者，炒出汗）　小茴香（炒）各一两　厚朴三两（姜汁炒）　真茅山苍术八两（米泔浸一宿，切，炒，如无即以好白术代之）　破故纸（酒浸二日，晒干炒香）四两

【用法】上为末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，食远清汤送下。

【主治】寒湿在脾，泄泻久不能愈者。

06643　苍术汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】防风　黄柏各一钱　柴胡二钱　苍术三钱

【用法】用水二大盏，煎至一盏，去滓，空心服。

【主治】湿热腰腿疼痛。

06644　苍术汤

【方源】《丹溪治法心要》卷三。

【组成】苍术　黄柏　柴胡　防风　附子　杜仲　川芎　肉桂

【用法】作汤服。

【主治】湿热腰腿疼痛，两胁搐急，露卧湿地，不能转侧。

【加减】若寒食气客，身体沉重，肿痛，面色萎黄，加麻黄。

06645　苍术汤

【方源】《异授眼科》。

【组成】苍术（米泔浸，炒）一钱二分　藁本一钱　白芷一钱　羌活一钱　川芎一钱　甘草一钱

【用法】加葱、生姜，水煎服。

【主治】脾虚视物不真。

06646　苍术散

【方源】《得效》卷九。

【异名】二神汤（《医统》卷五十九引《医林集要》）、二炒苍柏散（《医学入门》卷七）、苍柏散（《疡科选粹》卷五）、二妙苍柏散（《杂病源流犀烛》卷二十九）。

【组成】苍术（米泔浸一日夜，盐炒）　黄柏（去粗皮，酒浸一日夜，炙焦）各四两

【用法】上锉散。每服四钱，水一盏，煎七分，温服，一日三四次。

【主治】一切风寒湿热，令足膝痛，或赤肿，脚骨间作热痛，虽一点，能令步履艰苦，及腰膝臀髀大骨疼痛，令人瘘蹙，一切脚气。

06647　苍术散

【方源】方出《保婴撮要》卷四，名见《医部全录》卷四一三。

【组成】苍术四两（米泔浸，切片，焙）

【用法】上为末。猪肝二两，批开掺药在内，用麻系定，粟米一合，水一碗，砂锅内煮熟，熏眼。每服三钱，临卧温服。

【主治】雀目。

06648　苍术膏

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】苍术十斤（米泔浸一宿，削去皮，碓舂如泥，大锅内文武火煮水二桶，约有十余碗，取出冷定，绢滤去滓，入瓷罐内，加众药）　人参　生地黄　熟地黄　黄柏　远志各四两　杜仲（炒）　川芎　核桃肉　川椒　破故纸各四两　碎青盐二两　碎朱砂一两　当归四两　旱莲草（取汁）二碗　蜂蜜二斤　姜汁四两

【用法】上药共入前苍术膏，瓷罐内封固，大锅水煮，香二炷为度，取出埋地七日。每服一盏，空心酒一盏或白汤服下。

【功用】存精固气，补丹田，减相火，发白返黑，齿落更生，颜面如童。

【主治】 男子精冷绝阳，妇人胎冷不孕。

06649 苍术膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 苍术1千克 当归90克 白鲜皮60克

【用法】 上药加水连熬三次，取汁，慢火煎成浓膏，加蜂蜜250克，调成膏。每服一匙，开水冲化下，一日二次。

【功用】 养血润燥。

【主治】 毛发红糠疹，毛孔性苔癣，掌跖角化，鱼鳞癣。

06650 苍龙丸

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】 苍耳草虫（立秋后捉）一两 土贝母四两 轻粉二钱二分五厘 血竭三钱 射干四分五厘 冰片三分 雄黄二钱二分五厘 蟾酥四钱（人乳化）

【用法】 上为细末，为丸如梧桐子大，辰砂为衣，阴干。每服一丸，强壮者两丸，陈酒送下，再以酒尽量饮之。取汗为度。

【主治】 疔肿。

06651 苍地丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 苍术 陈皮各三两 黄柏 黄连各一两五钱 连翘 黄芩各一两

【用法】 上为末，生地六两捣膏为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，白汤送下。

【主治】 热毒下血。

06652 苍耳丸

【方源】《圣惠》卷六十九。

【异名】 苍耳子丸(《普济方》卷三一七)。

【组成】 苍耳子二两 苦参二两 白蒺藜二两（微炒去刺） 蝉壳一两（微炒）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】 妇人风瘙，皮肤生隐疹，痒痛，或有细疮。

06653 苍耳饮

【方源】 方出《证类本草》卷八引《食医心镜》，名见《圣济总录》卷二十。

【异名】 苍耳散(《得效》卷三)、苍耳汤(《赤水玄珠》卷十二)。

【组成】 苍耳三两

【用法】 上为末，水一升半，煎取七合，去滓呷。

【主治】 风寒湿痹，四肢拘挛。

06654 苍耳酒

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】 苍耳子（蒸） 晚蚕沙（炒） 五加皮（蒸） 大茄根（蒸）各四两 归身 虎骨（炙） 羌活 枸杞子 荆芥 油松节 杜仲（姜汁炒） 牛膝 萆薢 防风 秦艽各二两 白术 黄柏 苍术各一两 木香五钱

【用法】 用酒二坛，小袋盛药，浸七日服。

【主治】 紫白癜风。

06655 苍耳散

【方源】《济生》卷五。

【异名】 芷冀散(《医学入门》卷七)、芷辛散(《古方选注》卷下)、辛夷散(《仙拈集》卷二)、苍耳草散(《便览》卷一)、苍耳子散(《良方集腋》卷上)。

【组成】 辛夷仁半两 苍耳子二钱半 香白芷一两 薄荷叶半钱

【用法】 上晒干，为细末。每服二钱，食后用葱、茶清调下。

【主治】 鼻渊，鼻流浊涕不止。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴、足阳明药也。凡头面之疾，皆由清阳不升，浊阴逆上所致。白芷主手足阳明，上行头面，通窍表汗，除湿散风；辛夷通九窍，散风热，能助胃中清阳上行头脑；苍耳疏风散湿，上通脑顶，外达皮肤；薄荷泄肺疏肝，清利头目；葱白升阳通气；茶清苦寒下行，使清升浊降，风热散而脑液自固矣。

【备考】 本方改为丸剂，名“苍耳丸”（见《医便》卷三）。

06656 苍连汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】 苍术（米泔制） 黄连（姜汁炒） 陈皮 半夏（姜汁炒） 茯苓（去皮） 神曲（炒）各一钱 吴茱萸（炒） 砂仁各五分 甘草三分

【用法】 上锉，加生姜三片，水煎，温服。

【主治】 吐酸。

06657 苍龟丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 苍术 龟版 白芍各二两半 黄柏五钱（一方加黄芩五钱）

【用法】 上为末，粥为丸。四物汤加陈皮、甘草煎汤送下。

【主治】 ①《医学入门》：痢后脚弱渐小。②《医钞类编》：痢后风，痢后脚弱渐不能行步。

06658 苍柏饮

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】苍术皮6克　黄柏6克　蒲公英15克　茵陈15克　山栀9克　苦参片12克　茯苓皮12克　地肤子12克　生甘草3克

【用法】水煎服。

【主治】皮肤瘙痒证。

06659　苍柏散

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】苍术　黄柏　牛膝　杜仲　防己　木瓜　川芎

【主治】腰痛，湿热注足。

06660　苍莎丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】苍附丸(《万氏女科》卷一)、苍莎导痰丸(《医钞类编》卷十六)。

【组成】苍术　香附各四两　黄芩二两

【用法】上为末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后姜汤送下。

【功用】调中散邪。

【主治】《万氏女科》：妇人性躁多怒，而过期经行者。

06661　苍耳叶羹

【方源】《养老奉亲》。

【异名】苍耳羹(《医统》卷八十七)。

【组成】苍耳叶五两（切好嫩者）　豉心二合（别煎）

【用法】和煮作羹，下五味、椒等调和，空心食之尤佳。

【主治】老人中风，四肢不仁，筋骨顽强。

06662　苍耳草膏

【方源】《中国麻风病学》。

【组成】鲜苍耳草五斤

【用法】将苍耳草去根须切断，约二寸长，晒干后，放大锅内，水十五斤，由早晨七时，熬至午后，将汁滤净，再将汁熬至晚七时，成为膏后，不加糖质。每服一小匙至二小匙，开水冲下，患在上部，三餐后服；患在下部，三餐前服。

【功用】《中医外伤科学》：杀虫祛风。

【主治】①《中国麻风病学》：麻风及一切风湿之病。②《中医外伤科学》：麻风，不论初起病重，眉毛脱落，皮肤紫斑，麻木，肌肉痛痹。

06663　苍矾洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】苍耳子31克　明矾15克　苦参15克　蛇床子15克　黄柏15克

【用法】水煎洗。

【主治】足癣。

06664　苍玉潜龙汤

【方源】《内科概要》。

【组成】生地　龟版　石膏　石斛　花粉　丹皮　知母

【主治】胃火炽盛，血热上壅，鼻血，连及齿牙而出血者，脉洪大，甚则面红目赤，烦扰不安。

06665　苍术石膏汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】苍术半两　石膏五钱　知母（锉）一钱半　甘草一钱

【用法】上药同和匀，都作一服，水两盏，煎至一盏，温服。

【主治】湿温，身多微凉，微微自汗，四肢沉重。

【方论选录】《古方选注》：苍术、石膏刚剂燥之，又得石膏、知母辛咸降之，以甘草佐苍术，知母佐石膏，刚柔相配，不伤脏腑之正气，可谓详审精密矣。虽与白虎汤相似，其义各有微妙。

06666　苍术半夏丸

【方源】《医统》卷六十引《医学集成》。

【组成】苍术　半夏　南星　黄柏（炒）　山楂　白芷　神曲　昆布　滑石　吴茱萸各等分

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】湿热疝痛。

06667　苍术地榆汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】苍术二两　地榆一两

【用法】上锉。每服一两，水煎服。

【主治】①《保命集》：泻利，先血后便者。②《法律》：脾经受湿，下血痢。

【加减】如心下痞，加枳实一钱；如小便不利，加茯苓一二钱。腹痛渐已，泻下微少，宜诃子散止之。

【方论选录】①《医林纂要》：苍术燥湿开郁，地榆酸寒色紫，以专去下焦大肠血分之热，泻肝敛气，用其酸以收，以断下也。②《医方集解》：此足太阴阳明药也，苍术燥湿强脾，升阳而开郁；地榆清热凉血，酸收能断下，为治血痢肠风之平剂。③《医方论》：一燥湿，一凉血，亦治下利之正法。然止此二味，尚未足以扶土和荣也。

06668　苍术芍药汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 苍术二两 芍药一两 黄芩半两

【用法】 上锉。每服一两，加淡味桂半钱，水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】 ①《保命集》：太阴脾经受湿，水泄注下，体微重微满，困弱无力，不欲饮食，暴泄无数，水谷不化，腹痛甚者。②《活法机要》：痢疾痛甚者。

06669 苍术防风汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】 苍防汤(《医学入门》卷七)、苍防二妙汤(《症因脉治》卷三)。

【组成】 苍术 防风各二两

【用法】 上锉。每服一两，水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】 ①《保命集》：泻痢脉弦，头微痛者。②《症因脉治》：风湿攻走，痹痛。

【方论选录】《伤寒大白》：风湿疫邪，散表为捷，防风胜湿，苍术燥湿。

06670 苍术灵仙散

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】 苍术二钱五分 半夏 南星 白术 黄芩（酒炒） 香附子各一钱 陈皮 茯苓各五分 甘草三分 威灵仙一钱五分

【用法】 上㕮咀。加生姜三片，水煎熟，食后温服。

【主治】 臂痛因痰湿而作者。

06671 苍术复煎散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 红花一分 黄柏三分 柴胡 藁本 泽泻 白术 升麻各五分 羌活一钱 苍术四两

【用法】 上㕮咀。水二碗，先煎苍术汤二大盏，复煎前项药至一大盏。稍热空心服。取微汗为效。

【主治】 ①《兰室秘藏》：寒湿相合，脑右痛，恶寒。项筋脊骨强，肩背胛眼痛，膝膑痛，无力，行步沉重。②《东医宝鉴·杂病篇》：风湿热痛。

【宜忌】 忌酒、湿面。

06672 苍术难名丹

【方源】《直指》卷十。

【异名】 茯苓苍术难名丹(《得效》卷七)、苍术丸(《金匮翼》卷八)。

【组成】 苍术（杵，去粗皮）一斤（米泔水浸一日夜，焙干） 舶上茴香（炒） 川楝子（蒸，去皮取肉，焙干）各三两 川乌（炮，去皮脐） 故纸（炒） 白茯苓 龙骨（别研）各二两

【用法】 上为末，酒面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸，空心缩砂煎汤送下；或粳米汤送下。

【主治】 元阳气衰，脾精不禁，漏浊淋沥，腰疼力疲。

06673 苍术黄柏丸

【方源】《医统》卷二十六引丹溪方。

【组成】 苍术 龟版（酒炙） 白芍药各等分 黄柏（酒炒）半两

【用法】 上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前以四物、陈皮、甘草汤下。

【主治】 痢后脚弱渐细者。

06674 苍术猪肝散

【方源】《异授眼科》。

【组成】 苍术（米泔浸，炒）八两 谷精草一两

【用法】 上为末，用猪肝一具煮烂，同前药为末。食后米饮下，或酒下。

【主治】 雀盲，临卧不见物。

06675 苍曲樗皮丸

【方源】《济阴纲目》卷三。

【组成】 椿根皮二两 芍药一两半 苍术 神曲（炒） 麦皮曲（炒） 黄柏（炒）各一两 滑石 枳壳各半两

【用法】 上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【主治】 带下。

06676 苍附五苓散

【方源】《金鉴》卷三十八。

【组成】 五苓散加附子 苍术

【主治】 水停内寒。

06677 苍附六君汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】 人参 白术 茯苓 甘草（炙） 半夏 陈皮 苍术（米泔浸） 香附（童便制） 条芩（酒炒） 川芎 当归 枳壳（麸炒）

【用法】 水煎，食前服。

【主治】 形盛多痰，气虚，至数月而经始行。

06678 苍附导痰丸

【方源】《广嗣纪要》卷四。

【组成】 苍术（制）二两 香附（童便浸）二两 陈皮（去白）一两半 南星（炮，另制） 枳壳（麸炒） 半夏各一两 川芎一两 滑石（飞）四两 白茯一两半 神曲（炒）一两

【用法】 上为末，姜汁浸蒸饼为丸，如梧桐子大。淡姜汤送下。

【主治】 肥盛女人无子者。

06679 苍苓白虎汤

【方源】《时病论》卷六。

【组成】 苍术 茯苓 石膏 知母 生甘草

【用法】 加粳米，水煎服。

【主治】 湿温身重，胸满头疼，妄言多汗，两胫逆冷。

【备考】 原书云，三仁汤治湿温之轻者，苍苓白虎汤治湿温之重者，当别见证而分治之。

06680 苍柏辛芎散

【方源】 方出《丹溪心法》卷五，名见《医学入门》卷八。

【组成】 南星 滑石 半夏 苍术 柏皮（炒） 川芎 辛夷 牡蛎粉（炒） 酒芩

【用法】 上㕮咀。水煎，去滓，食前服。

【主治】 妇人上有头风鼻涕，下有白带。

06681 苍柏樗皮丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 黄柏 樗皮 海石 半夏 南星 川芎 香附 苍术 干姜各等分

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，白汤送下。

【主治】 肥人湿痰所致白带。

【加减】 如暑月，去干姜，加滑石。

06682 苍桂五苓散

【方源】《医方集解》。

【异名】 二术五苓散（《成方切用》卷七）、苍术五苓散（《银海指南》卷三）。

【组成】 五苓散加苍术

【主治】 ①《医方集成》：寒湿。②《金鉴》：肠痹。

06683 苍梧道士陈元膏

【方源】《千金》卷七。

【异名】 陈元膏（《鸡峰》卷四）。

【组成】 当归 细辛各一两 桂心五寸 天雄三十枚 生地黄三斤 白芷一两半 川芎一两 丹砂二两 干姜十累 乌头三两 松脂八两 猪肪十斤

【用法】 上㕮咀。以地黄汁渍药一宿，煎猪肪去滓，纳药煎十五沸去滓，纳丹砂末熟搅。用火炙手摩病上，日千遍愈。

【主治】 一切风湿骨肉疼痹。

06684 芡实丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】 芡实（蒸，去壳） 莲花须各二两 茯神（去木） 山茱萸（取肉） 龙骨 五味子 枸杞子 熟地黄（酒蒸，焙） 韭子（炒） 肉苁蓉（酒浸） 川牛膝（去芦，酒浸，焙） 紫石英（煅七次）各一两

【用法】 上为细末，酒煮山药糊为丸，如梧桐子大，每服七十丸，空心盐酒、盐汤任下。

【主治】 思虑伤心，疲劳伤肾，心肾不交，精元不固，面少颜色，惊悸健忘，梦寐不安，小便赤涩，遗精白浊，足胫痠疼，耳聋目昏，口干脚弱。

06685 芡实丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 鸡头肉五百个 莲花须一两 山萸肉一两 白蒺藜五两 五花龙骨五钱 覆盆子二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六十丸，莲子去心，煎汤送下。

【主治】 梦泄及阳虚未交先泄者。

06686 芡实粥

【方源】《简明医彀》卷七。

【组成】 芡实一升（净） 白粱米三合 莲肉（泡，去皮心） 薏苡仁（鲜者） 山药末各一合

【用法】 上为末，和白糖四两研匀。每早调数盏服，以代早粥。

【功用】 健脾土，生万物，精气神皆盛，多子，老服愈健。

06687 芡实茯苓牛角散

【方源】《医学从众录》卷八。

【组成】 芡实粉二两 白茯苓二两 赤石脂一两（煅） 牡蛎一两（醋煅） 禹余粮一两（煅） 牛角腮一两（炙黄）

【用法】 上为末，好米醋一杯拌前药，晒干，再研末，打糊为丸。每服三钱。

【主治】 女子带下虚脱证。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“芡实茯苓牛角丸”。

06688 芳香散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】 香白芷一两半 龙骨一两 荆芥叶半两

【用法】 上为细末。每服二钱，食前温酒调下；米饮汤调亦得。

【主治】 崩漏不止。

06689 芳香化湿汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 藿香9克 佩兰9克 苍术9克 陈皮9克 茯苓9克 泽泻9克 白鲜皮9克 地肤子9克

【功用】 芳香化浊，健脾理湿。

【主治】 亚急性湿疹，钱币形湿疹，慢性湿疹之

胃纳不馨、消化不良、大便溏薄者。

【方论选录】 藿香、佩兰芳香化浊，理气和中；苍术、陈皮健脾燥湿；茯苓、泽泻利水渗湿；白鲜皮、地肤子除湿止痒。

06690 芒根汤

【方源】《外台》卷三十三引《小品方》。

【组成】 芒根 干地黄各二两 当归 芍药 阿胶（炙） 甘草（炙）各一两

【用法】 上切。以水六升，煮取二升，去滓，入胶烊，分三服。

【主治】 劳损动胎，腹痛去血，胎动向下。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、芜荑。

06691 芒麻粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】 生芒麻根 一两（净洗，煮取汁二合） 白糯米二合 大麦面一合 陈橘皮（浸，去白，炒）半两（末）

【用法】 以水煮似常式粥，稀稠得所，熟后方入盐花少许，平分作二服。空腹热食之。

【主治】 妊娠胎不安，腹中疼痛。

【宜忌】 宜常食。

06692 芦巴丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】 芦巴一斤 川乌（泡，去皮） 巴戟各六两 川楝十八两 茴香二十两 吴茱萸十两（汤浸七次，炒）

【用法】 炒磨为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心酒送下。

【主治】 小肠气，蟠肠气，奔豚疝气，偏坠阴肿，小腹有形如卵，上下来去，痛不可忍。或流结攻刺，吐呕。

06693 芦吸散

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】 款冬花 川贝母（去心） 肉桂 甘草（炙）各三钱 鹅管石五钱（煅）

【用法】 上为极细末。以芦管吸少许，噙化咽之，一日五七次。

【主治】 冷哮寒嗽，喘促痰清。

【宜忌】 肺热者禁用。

【方论选录】 此即《宣明论》焚香透膈散之变法，彼用雄黄、佛耳，此用桂心、贝母、甘草；彼取无形之气，以散肺中之伏寒，此用有形之散，以搜肺络之伏饮。药虽相类，而用法悬殊，总取钟乳、款冬之温肺利窍也。

06694 芦荟丸

【方源】《局方》卷十。

【组成】 大皂角 干虾蟆（各等分，同烧存性，为末）一两 青黛（研）一分 芦荟（研） 朱砂（研，飞） 麝香（研）各一钱

【用法】 上合研匀，用汤浸蒸饼为丸，如麻子大。三岁儿，每服二十丸，温米饮送下，不拘时候。

【功用】 常服长肌退黄，杀疳虫，进乳食。

【主治】 ①《局方》：小儿疳气羸瘦，面色萎黄，腹胁胀满，头发作穗，揉鼻咬甲，好吃泥土，利色无定，寒热往来，目涩口臭，齿龈烂黑。②《张氏医通》：肝疳，口舌生疮，牙龈腐烂，遍体生疮，及妇人热结经闭作块，上冲梗痛。

06695 芦荟丸

【方源】《伤寒标本》卷下。

【组成】 芦荟 麦芽 胡黄连各一两 黄连五钱 芜荑 肉豆蔻 木香 龙胆草各四钱 川楝子五十个（取肉） 三棱 莪术各六钱 槟榔八钱 使君子六十个 陈皮 青皮各八钱 麝香一钱 神曲一两半 干虾蟆

【用法】 上为细末，薄荷、猪胆汁为丸，如粟米大。每服一钱，空心米汤送下。

【主治】 小儿痞疾疳劳，肚大腹胀，面黄肌瘦，脾胃不和，惊积食积。

【备考】 方中干虾蟆用量原缺。

06696 芦荟丸

【方源】《医方大成》引汤氏方（见《医方类聚》卷二五五）。

【异名】 胆连丸（《普济方》卷三八〇引《傅氏活婴方》）。

【组成】 龙胆草 黄连（去须） 芜荑各一两（去皮，先炒黄色，次入前药，一处炒赤色）

【用法】 上为末，别入芦荟末一分，和匀，饭饮为丸，如黍米大。随大小加减，空心米汤送下。

【主治】 ①《医方大成》引汤氏方：脾胃积热，遂成疳疾。②《准绳·幼科》：小儿疳积，其状渐黄瘦，拍背如鼓鸣，脊骨如锯，乃积而生热成疳也。

06697 芦荟丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】 芦荟 蟾酥 麝香 朱砂 黄连 槟榔 鹤虱 使君子 肉豆蔻各等分。

【用法】 上为末，糊为丸，如绿豆大。每服三十丸，空心、食前温水送下。

【主治】 小儿脾疳瘦弱，面色萎黄。

06698 芦荟丸

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】芦荟五钱　胡黄连　当归　芍药（炒）龙胆草（酒浸，炒焦）　川芎　芜荑各一两　木香　甘草（炒）各三钱

【用法】上为末，用米糊为丸，如麻子大。每服五十丸，滚汤送下。

【主治】肝气不和，克侮脾胃而患诸证，或三焦肝胆经风热，目生云翳，或疳热瘰疬，耳内生疮，寒热作痛，肌体消瘦，发热作渴，饮食少思，肚腹不调，或牙龈蚀落，颊腮腐烂，下部生疮。

06699　芦荟丸

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】胡黄连　雷丸　芦荟　芜荑　木香　青黛　鹤虱　黄连各一两　蝉退二十个　麝香一钱

【用法】上为末，猪胆汁浸糕为丸，如麻子大。每服二十丸，米饮送下。

【功用】消疳杀虫，和胃止泻。

【主治】诸疳。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作"十味芦荟丸"。

06700　芦荟丸

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】芦荟　当归　白芍　川芎　胡连　芜荑　木香　甘草

【用法】上为末，糊为丸。每服一钱半，开水送下。外用桃叶、白果捣烂，绵裹，纳阴中，一日三换。

【主治】阴痒生虫。

06701　芦荟散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】芦荟半两　甘草半两

【用法】上为末。先用浆水洗癣上讫，用帛吧干，便以药敷之。三五日愈。

【主治】湿癣，搔之有黄汁者。

06702　芦荟散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】芦荟一分　黄柏末一分　青黛半分　雄黄半分

【用法】上为细散。以少许敷疮上，一日三次。

【主治】小儿鼻疳，虫蚀鼻，痒痛不止。

06703　芦根汤

【方源】方出《千金》卷二，名见《活人书》卷十九。

【组成】生芦根一升　知母四两　青竹茹三两　粳米五合

【用法】上㕮咀。以水五升，煮取二升半，稍稍饮之。尽更作，愈止。

【主治】妊娠头痛壮热，心烦呕吐，不下食。

06704　芦根汤

【方源】方出《本草纲目》卷十五引《千金》，名见《霍乱燃犀说》卷下。

【组成】芦根二钱　麦门冬一钱

【用法】水煎服。

【主治】霍乱烦闷。

06705　芦根汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】芦根半升　生姜二两　橘皮　枇杷叶各一把

【用法】上㕮咀。水三升，煮一升半，每服一盏，去滓温饮。

【主治】天行愈后，劳复发热，呕吐，食不下。

【加减】心烦躁，加石膏二两，加水一升，煮二升。

06706　芦根汤

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】芦根一斤　黄耆（锉）　栝楼根　牡蛎（煅）各二两　知母三两　生麦门冬（去心）六两

【用法】上㕮咀。每服三钱匕，水一盏，煎取七分，去滓、食后乘渴细服。

【主治】消渴，心脾中热，烦躁不止，下焦虚冷，小便多，羸瘦。

06707　芦根汤

【方源】《幼幼新书》卷十五引张涣方。

【组成】芦根一两　茵陈　山栀子　黄芩　甘草（炙）各半两

【用法】上为细末。每服一钱，以水八分，加薄荷三叶，煎五分，去滓温服。

【主治】黄病，伤寒时气，热入于胃，与谷气相搏，蒸发肌肉，使面目皮肤悉黄。

06708　芦根汤

【方源】《济阴纲目》卷八。

【组成】生芦根七分　橘红四分　生姜六分　槟榔二分　枇杷叶三分

【用法】上切。以水二盏，煎七分，空心热服。

【主治】妊娠呕吐不食，兼吐痰水。

06709　芦根汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】芦根汁一杯　槟榔一钱　橘红一钱　生姜二片　水梨汁一杯　枇杷叶二钱（刷净毛）

【用法】先煎四味，去滓，冲二汁顿服。

【主治】 妊娠恶阻，气逆，脉滞沉数者。

【方论选录】 胎热气逆，胃火上冲，故呕吐涎水，是恶阻因于气逆火亢焉。芦根汁清胃火之升，尖槟榔降胃气之逆，橘红利痰气，生姜散涎水，枇杷叶清肺以平肝安胃，水梨汁清火以滋阴降逆也，水煎冲服，务使火降气平，则胃汁下润，而胎得所荫，何呕吐涎水之不已哉？

06710 芦根饮

【方源】 方出《经效产宝》卷中，名见《圣济总录》卷一六三。

【异名】 芦根散(《普济方》卷三五三)。

【组成】 芦根（切）一升 栝楼三两 人参 甘草 茯苓各三两 生麦门冬四两

【用法】 水九升，煎取三升，顿服。

【主治】 产后大渴不止。

06711 芦根散

【方源】 《圣惠》卷十五。

【组成】 芦根二两（锉） 麦门冬一两（去心） 黄芩一两 甘草半两（炙微赤，锉） 栝楼根一两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加竹茹一分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 时气口干。

06712 芦根散

【方源】 《圣惠》卷三十一。

【组成】 芦根二两（锉） 赤茯苓二两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 麦门冬一两（去心） 子芩三分 地骨皮一两 甘草半两（炙微赤，锉） 桑根白皮三分（锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 骨蒸肺痿，手足烦热，多渴，或不能食。

06713 芦根散

【方源】 《圣惠》卷七十五。

【组成】 芦根一两半（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 人参一两（去芦头） 麦门冬一两半（去心） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，淡竹叶二七片，小麦一百粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妊娠呕逆，烦闷不下食。

06714 芦筒散

【方源】 《宣明论》卷九。

【组成】 冬花 井泉石 鹅管石 钟乳石 官桂 甘草 白矾 佛耳草各等分

【用法】 上为末。每服一钱，竹筒子吸吃，一日三次。立效。

【主治】 男子妇人，一切嗽喘急。

06715 芦连消疳丸

【方源】 《回春》卷七。

【组成】 芦荟 胡黄连 宣黄连（酒炒）各五钱 白术（米泔浸，焙） 白茯苓（去皮） 当归（全身，用酒洗）各一两 白芍（酒炒）八钱 人参 神曲（炒）各六钱 使君子（去壳，晒干） 山楂肉各七钱 芜荑（炒） 槟榔各五钱 大甘草节（去粗皮）四两

【用法】 上为细末，汤泡蒸饼，打糊为丸，如绿豆大。每服五六十丸，临晚米汤送下；或炼蜜为丸，如龙眼大。每晚噙化一丸，或米汤送下，或酒亦可。

【功用】 壮脾胃，消饮食，消肝火，磨积块。

【主治】 小儿生疳，痞块发热，肚胀。

06716 芦柏地黄丸

【方源】 《疡医大全》卷三十八。

【组成】 熟地八两 丹皮 白茯苓各三钱 山萸肉 怀山药各四两 泽泻三两 黄柏一两 芦荟五钱

【用法】 炼蜜为丸。每服三钱，白汤送下。

【主治】 八角虱，又名阴虱疮，瘙痒难忍，抓破色红，中含紫点。

06717 芦荟肥儿丸

【方源】 《金鉴》卷五十二。

【组成】 五谷虫（炒）二两 芦荟（生） 胡黄连（炒） 川黄连（姜炒）各一两 银柴胡（炒）一两二钱 扁豆（炒） 山药（炒）各二两 南山楂二两半 虾蟆（煅）四个 肉豆蔻（煨）七钱 槟榔五钱 使君子（炒）二两半 神曲（炒）二两 麦芽（炒）一两六钱 鹤虱（炒）八钱 芜荑（炒）一两 朱砂（飞）二钱 麝香二钱

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如黍米大。每服一钱，米饮送下。

【主治】 肝疳，面目爪甲皆青，眼生眵泪，隐涩难睁，摇头揉目，合面睡卧，耳疮流脓水，腹大青筋，身体羸瘦，燥湿烦急，粪青如苔。

06718 芦荟肥儿丸

【方源】 《成方便读》卷四。

【组成】 苍术 白术 胡黄连 陈皮 厚朴 麦芽（乳炒） 谷芽 使君子肉各二两 砂仁 三棱 甘草 芦荟 莪术 枳壳 槟榔各一两 神曲 银柴胡 茯苓 山楂 川连各一两五钱 木香四两

干蟾五只

【用法】 薄荷叶煎水为丸服。

【主治】 小儿骨蒸发热，面黄肌瘦，肚腹膨胀，积聚作痛，五疳目翳。

【方论选录】 方中以木香为君，砂仁、陈皮、厚朴、枳壳、槟榔，均佐之以行气者也。苍术燥其湿，黄连清其热，银柴胡、胡黄连为治疳热之方，使君子乃杀疳虫之剂，三棱、莪术之峻攻，楂、曲、二芽之消导，干蟾、茯苓之导水，芦荟之润下，皆所以开下行之路也。然治病之法，去邪必当顾正，否则恐邪去而正亦伤，故以白术、甘草固脾之元气，用薄荷叶煎水泛丸者，取辛香之气，清上透表，快膈宣中，使各病随药力以施行之意。

06719 芦荟消疳饮

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 芦荟 银柴胡 胡黄连 川黄连 牛蒡子 玄参 桔梗 山栀 石膏 薄荷 羚羊角各五分 甘草 升麻各三分

【用法】 水二钟，加淡竹叶十片，煎六分，食后服。

【主治】 小儿走马牙疳，身热气粗，牙龈腐烂，气味作臭，以及穿腮破唇。

06720 芦根白酒汤

【方源】《医学实在易》卷七。

【组成】 新鲜芦根一把

【用法】 白酒浆煎服。

【主治】 白浊。

06721 苏子汤

【方源】《外台》卷十引《古今录验》。

【组成】 苏子一升 五味子五合 麻黄（去节） 细辛 紫菀 黄芩 甘草（炙）各二两 人参 桂心 当归各一两 半夏三两（洗） 生姜五两

【用法】 上切。以水九升，煮取三升，分二服。

【主治】 上气兼咳。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、羊肉、饧、生葱、生菜。

06722 苏子散

【方源】《普济方》卷二四四引《卫生家宝方》。

【组成】 槟榔 子苏 紫苏子 大黄 厚朴各等分（生用）

【用法】 上为散。每服四钱，水一盏半，煎至七分，温服。以利为度，未利再服。

【主治】 脚气肿疼。

06723 苏子粥

【方源】 方出《证类本草》卷二十八引《药性论》，名见《医统》卷八十七。

【组成】 苏子

【用法】 上研汁，煮粥。

【功用】 养胃、下气、润肠。

①《证类本草》引《药性论》：长服令人肥白身香。②《寿世青编》：下气利膈。③《长寿药粥谱》：止咳平喘，养胃润肠。

【主治】 ①《医统》：老人上气喘逆，脚气不能履。②《长寿药粥谱》：咳嗽多痰，胸闷气喘，以及老人大便干结难解等症。

【宜忌】《长寿药粥谱》：大便稀薄的老人忌服。

【备考】《医统》：本方用紫苏子一两、粳白米四合。煮作粥，临熟时下苏子汁调之，空心服。

06724 苏木汤

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】 苏木 人参 麦冬

【主治】 产后气喘。

06725 苏气汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】 人参一两 陈皮一钱 枳壳三分 菖蒲五分

【用法】 水煎服。一剂轻，二剂更轻，连服数剂痊愈。

【主治】 气虚之极之厥证。忽然之间，如人将冷水浇背，陡然一惊，手足厥冷，遂不知人，已而发热，则渐渐苏省，一日三四次如此，脉必微而无力，而舌必滑润也。

【方论选录】 此方重用人参以补气，益之陈皮、枳壳宽中消痰，则人参苏气更为有神；益之菖蒲者，引三味直入心中，则气不能散于心外也。

06726 苏叶汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】 苏叶 防风 川芎各一钱五分 陈皮一钱 甘草六分

【用法】 加生姜二片，水煎服。

【主治】 伤风发热。

06727 苏羌饮

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】 紫苏三钱 羌活二钱 防风一钱 陈皮一钱 淡豉二钱 葱白数段

【用法】 水煎服，不应再服。初觉，速服必愈，迟则生变。

【主治】 四时寒疫，头痛身痛，身热脊强，恶寒拘急，无汗，或则往来寒热，气壅痰喘，咳嗽胸痛，鼻塞声重，涕唾稠粘，咽痛齿痛。

【加减】 如兼阳明症者，加白芷一钱；兼食积者，加炒麦芽、神曲各一钱；肉积者，加山楂一钱；风痰气壅，涕唾稠粘，加前胡一二钱；咳嗽喘急，加杏仁一钱（泡，去皮尖，研）；心腹膨胀，加姜炒厚朴一钱；胸膈闷塞，加炒枳壳五六分；呕逆恶心，酌加藿香、制半夏、生姜一钱；年高者、虚怯者，加人参一钱；阴虚血虚者，加熟地二钱，当归一钱；脾虚者、中气不足者，加参、术各一钱。

【方论选录】 此足太阳药也。紫苏温中达表，解散风寒；羌活直入本经，治太阳诸症；淡豉解肌发汗，兼治疫瘴；防风能防御外风，随所引而至；陈皮利气而寒郁易解；姜可驱邪，葱能发汗，辅佐诸药，以成厥功。四时风寒，皆能治疗，甚毋以药味平浅而忽之，惟不治瘟疫。

【备考】 本方组成，据原书方论当有生姜。

06728 苏葛汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】 紫苏 香附 陈皮 甘草 干葛 赤芍 升麻各等分

【用法】 加生姜、葱，水煎，热服。

【主治】 风寒两感，及时行温疫，头疼寒热无汗。

06729 苏葛汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】 紫苏 葛根 甘草 赤芍 陈皮 砂仁 前胡 枳壳 生姜 葱白

【主治】 麻疹初起，未出两三日前，即憎寒壮热，鼻流清涕，身体疼痛，呕吐泄泻，咳嗽气急，腮红眼赤，干呕恶心，目泪嚏喷。

06730 苏解散

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【异名】 疏解散（《医部全录》卷四九三）。

【组成】 紫苏 葛根 防风 荆芥 白芷 蝉蜕 紫草 升麻 牛子 木通 甘草各等分

【用法】 加灯心、葱白各七根，水煎，热服。

【功用】《全国中药成药处方集》（吉林方）：解表、透汗、退热、发痘疹。

【主治】 ①《赤水玄珠》：痘初壮热，头疼，腰疼，腹疼作胀，一切热毒甚者。②《全国中药成药处方集》（吉林方）：感冒寒凉，发热畏冷，头痛体痛，泛恶干呕。

【宜忌】 孕妇忌服。忌食鱼。

【备考】 本方改为丸剂，名“苏解丸”（见《全国中药成药处方集》吉林方）。

06731 苏木饮子

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】 苏木（锉） 当归 赤芍药 桂 陈皮各一两 香附子 甘草各一分

【用法】 上为粗末。每服二钱，水、小便各半盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后血运迷闷，面色青黑，或恶物冲心，痛不可忍，时发寒热，呕逆，不思饮食。

06732 苏方木散

【方源】《医学正传》卷六引《疮疡集》

【异名】 苏方散（《准绳·疡医》卷四）。

【组成】 木鳖子（去壳） 当归尾（酒浸） 芍药 白芷 粉甘草 川芎 射干 忍冬藤（即金银花） 大黄（锉碎，酒浸湿纸包裹） 川山甲（糠火煨炒黄脆） 没药（另研） 苏方木各六钱

【用法】 上切细，作一服。水煎，食前服。

【主治】 便毒。

06733 苏合香丸

【方源】《张氏医通》卷十三。

【异名】 苏合丸（《伤科补要》卷三）。

【组成】 苏合香（另研，白色者佳） 安息香（无灰酒熬，飞去砂土）各二两 熏陆香（另研） 龙脑（另研） 丁香 麝香（别研，勿经火）各一两 青木香 白术 沉香（另研极细） 香附（炒） 乌犀角（镑屑，另研极细）

【用法】 上为末，逐一配匀，炼蜜为丸，分作五十丸，另以朱砂一两水飞为衣，蜡护。每服一丸，临用剖开，井花水、生姜汤、温酒化下。

【功用】《伤科补要》：通关辟邪解毒。

【主治】 ①《张氏医通》：传尸殗殢，心腹卒痛，僵仆不省，一切气闭属寒证。②《伤科补要》：一切恶毒之气中人，关窍不通者。

【方论选录】《古方选注》：苏合香能通十二经络、三百六十五窍，故君之以名其方，与安息香相须，能内通脏腑。龙脑辛散轻浮，走窜经络，与麝香相须，能内入骨髓。犀角入心，沉香入肾，木香入脾，香附入肝，熏陆香入肺，复以丁香入胃者，以胃亦为一脏也。用白术健脾者，欲令诸香留顿于脾，使脾转输于各脏也。诸脏皆用辛香阳药以通之，独心经用朱砂寒以通之者，以心为火脏，不受辛热散气之品，当反佐之，以治其寒阻关窍，乃寒因寒用也。

06734 苏子六安散

【方源】《医门八法》卷二。

【组成】 陈皮二钱 法夏二钱（研） 茯苓二钱

甘草一钱　苏子二钱（炒，研）　杏仁泥二钱　白芥子二钱（炒，研）

【用法】 加生姜三片为引。

【主治】 喘促因寒者。

06735　苏子定喘丸

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】 苏子一两（炒）　杏仁（去皮尖，炒）一两　枯矾五分　半夏一两　枳壳七分（炒）　桑白皮一两　甘草二分

【用法】 上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服五十丸，淡姜汤或紫苏汤送下。

【主治】 咳喘。

06736　苏子降气汤

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】 紫苏子（炒）　半夏（汤泡）各二钱半　前胡（去芦）　甘草（炙）　厚朴（去皮，姜制炒）　陈皮（去白）各一钱　川当归（去芦）一钱半　沉香七分

【用法】 水二钟，加生姜三片，煎至一钟，不拘时候服。

【主治】 上盛下虚，气滞痰壅，咳嗽，喘急，头痛，胃脘痛。

①《准绳·类方》：虚阳上攻，气不升降，上盛下虚，痰涎壅盛，胸膈噎塞，并久年肺气。②《症因脉治》：内伤胃脘痛，气滞而痛者，脉沉。③《嵩崖尊生》：怒气头痛。④《杂病源流犀烛》：气嗽，七气积伤成咳，上气喘急，痰涎凝结，或如败絮，或如梅核，其脉浮洪滑数。气厥，暴怒伤阴，四肢冰冷，卒然而仆，口出冷气，其脉必浮。气秘。气滞痢。⑤《医醇剩义》：呕血。⑥《医学金针》：吐泻。

【加减】 虚冷人加桂五分、黄耆一钱。

【方论选录】《血证论》：气即水也，水凝则为痰，水泛则为饮，痰饮留滞，则气阻而为喘咳。苏子、生姜、半夏、前胡、陈皮宜除痰饮，痰饮去而气自顺矣。然气以血为家，喘则流荡而忘返，故用当归以补血；喘则气急，故用甘草以缓其急；出气者肺也，纳气者肾也，故用沉香之纳气入肾，或肉桂之引火归元为引导。

06737　苏叶黄连汤

【方源】 方出《温热经纬》卷四，名见《中医妇科学》。

【组成】 川连三四分　苏叶二三分

【用法】 水煎服，呷下即止。

【主治】 ①《温热经纬》：湿热证，肺胃不和，胃热移肺，肺不受邪，呕恶不止，昼夜不愈，欲死者。②《中医妇科学》：妊娠恶阻。

【方论选录】《温热经纬》：肺胃不和，最易致呕，盖胃热移肺，肺不受邪，还归子胃，必用川连以清湿热，苏叶以通肺胃。投之立愈者，以肺胃之气非苏叶不能通也。分数轻者，以轻剂恰治上焦病耳。

06738　苏红洗肝散

【方源】《眼科菁华》卷上。

【组成】 生地　芍药　当归　川芎　羌活　薄荷　防风　紫苏　红花　蒺藜　蝉衣　甘草　菊花

【用法】 上为粗末。每服一两，水煎服。

【主治】 肝虚火旺，火烁血络，膏液蒸伤，目珠生细条如丝，或细颗如星，四散而生，初小后大，长大牵连混合，凝脂四起，风轮变成白膏样。

06739　苏羌达表汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 苏叶一钱半至三钱　防风一钱至一钱半　光杏仁二钱至三钱　羌活一钱至一钱半　白芷一钱至一钱半　广橘红八分至一钱（极重一钱半）　鲜生姜八分至一钱　浙苓皮二钱至三钱

【功用】 辛温发汗。

【主治】 伤寒挟湿。

【加减】 如风重于寒者，通称伤风，咳嗽痰多，去羌活、生姜，加仙半夏三钱，前胡二钱，苦桔梗一钱半。

【方论选录】 浙绍卑湿，凡伤寒恒多挟湿，故予于辛温中佐以淡渗者，防其停湿也；湖南高燥，凡伤寒最易化燥，仲景于辛温中佐以甘润者，防其化燥也，辛温发汗法虽同，而佐使之法则异。方以苏叶为君，专为辛散经络之风寒而设；臣以羌活辛散筋骨之风寒，防风、白芷辛散肌肉之风寒；佐以杏、橘轻苦微辛，引领筋骨肌肉之风寒，俾其从皮毛而出；使以姜、苓辛淡发散为阳，深恐其发汗不彻，停水为患也。立法周到，故列为发汗之首剂。

06740　苏陈九宝汤

【方源】《扶寿精方》。

【组成】 紫苏叶五钱　陈皮四钱　桔梗三钱　川芎三钱　白芷三钱　杏仁三钱（去皮尖）　麦门冬三钱　麻黄五钱　茯苓二钱

【用法】 加生姜五片，葱七根，水煎，温服。发遍身大汗即止。

【主治】 伤风咳嗽。

06741　苏葛二陈汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】 陈皮 甘草各一钱 半夏 茯苓各一钱半 黄连（姜水炒） 栀子（炒）各八分 苏叶六分 干姜二钱

【用法】 水煎，热服。

【主治】 酒伤作呕，面赤口渴，烦躁恶心，连日不宁。

06742 苏葶定喘丸

【方源】《金鉴》卷三十。

【异名】 苏葶丸（原书卷五十三）。

【组成】 苦葶苈子（研泥） 南苏子（研泥）各等分

【用法】 合均，用枣肉为小丸，阴干，瓷罐盛之，恐渗去油性，减去药力。每服三钱，于夜三更时白汤送下，以利四五次为度，利多则减服之，利少则加服之。次日身软，则隔一日，或隔二日服之。形气弱者，先减半服之，俟可渐加。

【功用】 泻饮降逆。

【主治】 饮停上焦攻肺，喘满不得卧，面身水肿，小便不利者。

【宜忌】 戒一切咸物。

06743 苏葶滚痰丸

【方源】《金鉴》卷五十三。

【组成】 苏子（炒）一两 苦葶苈（微炒）一两 大黄（酒蒸一次）四两 沉香五钱 黄芩四两 青礞石（火煅如金为度）五钱

【用法】 上为末，水为丸。量儿虚实服之，生姜汤送下。

【主治】 小儿食积咳嗽，便秘者；小儿痰饮喘急，其音如潮响，声如拽锯者；小儿燥痰，痰多燥粘，气逆喘咳，夜卧不宁，面赤口干，小便黄赤。

06744 苏子导痰降气汤

【方源】《东医宝鉴》卷五引《必用》。

【组成】 苏子二钱 半夏 当归各一钱半 南星 陈皮各一钱 前胡 厚朴 枳实 赤茯苓各七分 甘草五分

【用法】 上锉。加生姜三片，大枣二个，水煎服。

【主治】 ①《东医宝鉴·杂病篇》引《必用》：痰喘上气。②《便览》：寒痰气结，痞闷不通。

06745 苡仁丸

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】 秦艽 当归 苡仁 枣仁 防风 羌活 各等分

【用法】 炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，荆芥汤研化，入麝一厘服。

【主治】 小儿行迟，禀受肝气怯弱，致两足挛缩，两手伸展无力。

06746 苡仁汤

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】 熟地 麦冬 苡仁 山萸 桑皮 贝母 生地 甘草

【用法】 更入肉桂数分。服二剂，不再发。

【主治】 喉癣。风火郁滞喉间，蒸湿生虫，或疼或痒，干燥枯涸，甚至面红耳热而不可忍。

06747 苡仁散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十三。

【异名】 苡仁汤（《类证治裁》卷五）。

【组成】 苡仁 川芎 当归 干姜 肉桂 川乌 羌活 独活 麻黄 防风 白术 甘草

【主治】 ①《杂病源流犀烛》：痹证，有湿伤肾，肾不生肝，肝风挟湿，走注四肢肩髀者。②《类证治裁》：寒湿痹痛。

06748 劳淋汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生山药一两 生芡实三钱 知母三钱 真阿胶（不用炒）三钱 生杭芍三钱

【主治】 劳淋。

【方论选录】 劳淋之证，因劳而成。其人或劳力过度，或劳心过度，或房劳过度，皆能暗生内热，耗散真阴。阴亏热炽，熏蒸膀胱，久而成淋，小便不能少忍，便后仍复欲便，常常作疼。故用滋补真阴之药为主，而少以补气之药佐之，又少加利小便之药作向导。

06749 劳痛饮

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 黄耆五钱 杜仲 故纸各一钱 核桃肉八个 红花五分

【用法】 酒煎服。

【主治】 劳伤腰痛。

06750 走马散

【方源】《普济方》卷三四六引《海上方》。

【组成】 当归一两 红花二钱半 苏木二钱半 没药二钱半 官桂（去皮）二钱半

【用法】 上为末。每服三钱，好酒一大盏，煎三五沸，食前和滓温服。

【主治】 产后恶露不散，脐下疼，若刀搅几死者。

06751 走马夺命散

【方源】《永乐大典》卷九七八引《张氏家传》。

【组成】 白附子 黑附子 天南星 半夏

【用法】 上为末，并生使。大人每服半钱，小儿半字，葱茶调下。

【主治】 小儿急慢惊风及破伤风，大人中风不语。

06752 走马回疔丹

【方源】《医宗说约》卷六。

【组成】 蟾酥（酒化） 硇砂 轻粉 白丁香各一钱 金顶砒五分 蜈蚣一条（炙） 雄黄 朱砂各二钱 乳香六分 麝香五分

【用法】 上为细末。糊成麦干大，插疮内，初起针破，用此一粒插入孔内，膏盖之。次后退出脓血疔根。

【主治】 疔疮初起。

06753 走马牙疳敷药方

【方源】《医方考》卷六。

【组成】 黄连一两 雄黄一钱 胆矾三分 冰片五厘

【用法】 上为末。掺之。

【主治】 牙疳蜃蚀。

【方论选录】 黄连之苦，能坚厚肌肉；雄、矾之悍，能杀蜃虫；冰片之辛，能利肌腠。

06754 赤丸

【方源】《金匮》卷上。

【组成】 茯苓四两 半夏四两（洗，一方用桂） 乌头二两（炮） 细辛一两

【用法】 上为末，纳真朱为色，炼蜜为丸，如麻子大。每服三丸，先食酒饮送下，日二次，夜一次。不知稍增之，以知为度。

【主治】 寒气厥逆。

【方论选录】 ①《张氏医通》：此方乌头与半夏同剂，用相反以攻坚积沉寒，非妙达先圣至理，不能领略其奥，与胡洽治膈上积用十枣汤加甘草、大戟同一妙义。而《普济方》仅用乌头、半夏二味，易白凤仙子、杏仁，黄丹为衣，服七丸至谷道见血而止。其瞑眩之性可知。盖药之相反相恶，不过两毒相激，原非立能伤人，后世以为相反之味，必不可用，陋哉。②《金匮方歌括》元犀按：寒气而至厥逆，阴邪盛也。方中乌头、细辛以温散独盛之寒；茯苓、半夏以降泄其逆上之气，人所共知也；而以朱砂为色，其玄妙不可明言，盖以此品具天地纯阳之正色，阳能胜阴，正能胜邪，且以镇寒气之浮，而保护心主，心主之令行，则逆者亦感化而效顺矣。

06755 赤玉散

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】 冰片二分 硼砂五分 朱砂三分 儿茶一钱 赤石脂七分 寒水石二钱 珍珠三分 煅龙骨一钱 枯矾二分

【用法】 上为末。入瓷器收贮，将竹管吹少许于痛处，一日二次。

【主治】 咽喉肿痛，双单乳蛾。

06756 赤龙丸

【方源】《元和纪用经》。

【组成】 赤芍 地龙（去土，微炒） 当归 防风 五加皮各一两 麝香二钱半 乳香 没药各一分

【用法】 上为末，酒煮稀面糊为丸，如梧桐子大。每服十五或二十丸，温酒送下。

【主治】 风毒走注疼痛。

【加减】 有热，加大黄半两；有寒，加川乌头（炮，去皮脐）半两；患人体壮腠理实，加去节麻黄一两。

06757 赤龙丸

【方源】《经验秘方》引江大丞方（见《医方类聚》卷二十三）。

【组成】 荆芥 草乌 破故纸（炒）各二两半 羌活 白芷 乌豆 川牛膝各一两 黑牵牛（炒） 茴香（炒） 紫金皮 川萆薢各半两 川芎七钱半 木瓜三钱 独活一两半

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大，上朱为衣。每服二十丸，诸般风瘫痪，黑豆汤送下；偏正头风，川芎茶送下；风眼牙痛，薄荷汤送下；气滞腰痛，茴香汤送下；腿脚肿痛，木瓜酒送下；风湿脚气，木瓜酒送下；走注风，防风酒送下；鸡爪风，麝香酒送下；皮肤燥痒，火麻子研酒送下；风疮下疰，赤豆酒送下；破伤风，乳香酒送下；瘰疬，荆芥茶送下；胎前、产后诸风，当归酒送下；痈疽肿痛，生姜酒送下；气血凝滞，生地黄研酒送下；肾经湿痒，飞过盐沸酒送下；筋骨拘挛，松节酒送下；肠风痔漏，槐花酒送下；风痰喘嗽，生姜半夏汤送下；口眼㖞斜，木香、前胡酒送下；诸痛，朱砂、麝香酒送下；小儿惊风，朱砂、薄荷酒送下。

【主治】 诸般风瘫，偏正头风，风眼牙痛，气滞腰痛，腿脚肿痛，风湿脚气，走注风，鸡爪风，皮肤燥痒，风疮下疰，破伤风，瘰疬，胎前产后诸风，痈疽肿痛，气血凝滞，肾经湿痒，筋骨拘挛，肠风痔漏，风痰喘嗽，口眼㖞斜，诸痛，小儿惊风。

06758 赤龙丹

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】 禹余粮（煅） 乌贼骨 鹿茸（酒炙） 龙骨 干姜 当归 石燕子（煅） 阿胶（炒）各等分

【用法】 上为末，酒醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸。温酒送下，艾醋汤亦得。

【主治】 崩漏不止，余血作痛。

06759 赤龙散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】 赤土二两半 防风（去芦头） 赤芍药 地骨皮 何首乌 当归（洗，焙） 山栀子仁各二两 甘草一两（炙）

【用法】 上为细末。每服二钱，食后温酒调下，茶清亦得。

【功用】 凉血消风。

【主治】 鼻生渣疱。

06760 赤龙散

【方源】《医方类聚》卷七十九引《经验良方》。

【组成】 龙脑半钱（研） 瓜蒂十四枚 黄连三大茎 赤小豆三十粒

【用法】 上为细末。临卧以绿豆许，吹入鼻中。水出愈。

【主治】 鼻齆。

06761 赤白散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 白附 硫黄各等分

【用法】 上为末。姜汁调稀，茄蒂蘸擦。

【主治】 赤白汗斑。

06762 赤苓汤

【方源】《金匮翼》卷六。

【组成】 赤茯苓 防己 桑白皮 陈皮一两半 旋覆五钱 杏仁 麻黄（去根节） 白术 紫苏一两

【用法】 水煮黑豆汁一钟半，煎药五钱，生姜半分服。

【主治】 脚气肿满。

06763 赤苓汤

【方源】《竹林女科》卷二。

【组成】 厚朴（姜制） 陈皮（去白）各八分 苍术（米泔浸，炒）一钱 炙甘草五分 赤茯苓 桑白皮各一钱半

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 子气。妊娠三月之后，两足浮肿，甚则自脚面肿至腿膝，饮食不甘，小便流利者，属湿气为病。

06764 赤金豆

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 八仙丹。

【组成】 巴霜（去皮膜，略去油）一钱半 生附子（切，略炒燥）二钱 皂角（炒微焦）二钱 轻粉一钱 丁香 木香 天竺黄各三钱 朱砂二钱（为衣）

【用法】 上为末，醋浸蒸饼为丸，如萝卜子大，朱砂为衣。欲渐去者，每服五七丸；欲骤行者，每服一二十丸，用滚水或煎药，或姜、醋、茶、蜜、茴香、使君煎汤为引送下；若利多不止，可饮冷水一二口即止，盖此药得热则行，得冷则止也；如治气湿实滞膨胀，先用红枣煮熟取肉一钱许，随用七八丸，甚者一二十丸，同枣肉研烂，以热烧酒加白糖少许送下；如治虫痛，亦用枣肉加服，只用清汤送下。

【主治】 诸积不行，凡血凝气滞，疼痛肿胀，虫积，结聚癥坚。

【方论选录】 ①《景岳全书》：此丸去病捷速，较之消、黄、棱、莪之类过伤脏器者，大为胜之。②《医略六书》：寒凝坚积，癥结于中，故痛急肿胀，厥逆不已。生附略炒，补火之功用稍峻；巴豆炼霜，荡涤之勇猛可除；丁香温中散滞；木香调气宽中；轻粉劫涎透经络；皂角豁痰通窍门；朱砂镇心养液，竺黄凉心宁神，二物并能保护心主，使悍烈之药勿上僭。盖火旺土温则寒邪外散，而坚积自消，癥结无不化，疼胀亦无不退矣。此扶阳涤结之剂，为癥坚疼急肿胀之专方。

06765 赤参汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 当归15克 蝉蜕15克 赤芍9克 苍术9克 乌蛇6克 防风9克 红花9克 黄柏9克 丹参31克 公英15克 地丁15克 金钱草31克 甘草6克

【用法】 水煎，内服。

【主治】 银屑病。

06766 赤荆汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 川连 甘草各一钱 苏梗 牛蒡 玄参 赤芍 荆芥 连翘 黄芩 花粉 射干 防风各一钱五分

【用法】 水煎服。

【主治】 缠喉风，并一切喉证。

06767 赤脂丹

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】 赤石脂 干姜（炮） 肉豆蔻各一两（面裹煨香，去面用）

【用法】 上为细末，面糊为丸，如黍米大。每服十丸，米饮送下。

【主治】 赤白滞利，日久不愈。

06768 赤淋丸

【方源】《妇科玉尺》卷五。

【组成】 茯苓 生地 知母 黄柏 续断 杜仲 丹参 甘草 白芍

【主治】 赤淋。

06769 赤箭丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】 赤箭一两 茯神一两 五加皮一两 鹿茸二两（去毛，涂酥，炙令黄） 防风一两（去芦头） 牛膝一两半（去苗） 桂心一两 独活一两 蛇床子一两 菟丝子三两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 酸枣仁一两（微炒） 山茱萸一两 巴戟一两 附子二两（炮裂，去皮脐） 仙灵脾一两 萆薢一两（锉） 石斛二两（去根） 熟干地黄一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 肝肾久虚，外中风毒，半身不遂，肢节挛急，腰间痠痛，渐觉羸瘦。

06770 赤箭丸

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 赤箭半两 天南星半两（炮裂） 白附子半两（炮裂） 干蝎半两（微炒） 白僵蚕半两（微炒） 芎劳半两 腻粉一钱 没药半两 地龙半两（微炒）

【用法】 上为末，以糯米饭为丸，如绿豆大。每服五丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】 妇人血风走疰，疼痛不定。

06771 赤箭丸

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 赤箭二两 防风一两 当归二两 川芎一两 阿胶二两（粳米炒） 熟地四两 防己一两 米仁四两（炒） 丹参二两 秦艽一两半

【用法】 上为散，炼蜜为丸。每服三五钱，黑豆淋酒送下。

【主治】 孕妇顽痹，脉浮者。

【方论选录】 妊娠血亏风中，营气不能统运于肌肤，故顽痹不仁，不知痛痒焉。赤箭祛风解毒，防风燥湿疏风，当归养血以荣筋脉，川芎活血以行血气，阿胶补阴益血，丹参祛宿生新，熟地补营阴以滋血，米仁渗湿热以舒筋脉，防己泻血分湿热，秦艽活营血祛风。炼蜜丸之以润其燥，豆淋酒下以荣其肤，使营血内充，则风毒外解，而经气清和，营血灌注，何有顽痹不仁之患，胎孕无不日长矣。

06772 赤箭汤

【方源】《元和纪用经》。

【组成】 赤箭 麻黄（去根节） 黑附子（炮） 人参 前胡 防风（无叉枝者） 羌活 白术各二两 当归三两

【用法】 上为末，如麦豆状。每服半两，水三升，宿浸，密封于器，且起文武火煎，三分减一，加生姜一分，煎五六沸，去滓，入酒半合，同煎三上下，分二服，一日三次，不拘时候。

【主治】 偏风，手足不随，痛痹疼痛，心神昏冒。

06773 赤箭散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】 赤箭半两 黄松节（锉）一两 牛膝（去苗，酒浸一宿，焙干） 补骨脂（炒） 骨碎补 芍药 细辛（去苗叶） 藿香叶 自然铜（烧醋淬七遍） 没药（研） 地龙（去土） 木鳖子（去壳） 白花蛇（酒浸一宿，去皮骨，焙干） 虎骨（涂酥炙）各半两 乌头（炮裂，去皮脐）一分 羌活（去芦头）一两 桂（去粗皮）半两

【用法】 上为细散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】 中风，口喎僻，言语不正，目不能平视。

06774 赤霜散

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】 枣信丹、金枣丹（《全国中药成药处方集》南京方）。

【组成】 红枣一枚（去核） 红砒（如黄豆大）一粒

【用法】 红枣去核，入红砒扎好，放瓦上炭炙，烟尽为度，闷熄冷透，研细，加入冰片一分，再研。吹之。久烂之孔，生肌亦速。

【主治】 走马牙疳，延肿穿腮，不堪危险。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：不可咽下。

06775 赤小豆汤

【方源】 方出《证类本草》卷二十五引《本草图经》，名见《方剂辞典》。

【组成】 赤小豆五合 大蒜一头 生姜一分 商陆根一条

【用法】 赤小豆、大蒜、生姜并碎破，商陆根切，同水煮，豆烂汤成，适寒温，去大蒜等，细嚼

豆，空腹食之，旋旋啜汁令尽。肿立消便止。

【主治】 水气脚气。

06776 赤小豆汤

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】 赤小豆（微炒）一斤 桑白皮（炙，锉）一两 泽漆茎叶（切，炒）三分

【用法】 上药将二味绵裹，用水九升，与小豆三味煮令熟，去绵裹者药，只留小豆，饥则食小豆，渴则饮汁，以利为度。

【主治】 水肿遍身，小便涩，胀满。

06777 赤小豆汤

【方源】《名家方选》。

【组成】 赤小豆一合 商陆三钱 木通 桂枝各七分五厘 茯苓一钱五分

【用法】 以水三合，煮取二合服。

【主治】 毒气内攻，水肿气急。

06778 赤小豆散

【方源】《普济方》卷一九二。

【组成】 赤小豆一升 桑根白皮三两（锉） 白术三两 生姜三两（切） 鲤鱼二斤（去鳞肠肚） 陈橘皮三两（汤浸去瓤）

【用法】 上锉细。水一斗，都煮令熟，出鱼，量力食之，兼食小豆，勿着盐，便以任性食之。

【主治】 风水，腹脐俱肿，腰不得转动。

06779 赤小豆粥

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】 赤小豆 粳米

【用法】 煮粥服。

【功用】 利小便，消水肿脚气，辟邪疠。

06780 赤石脂丸

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 乌头赤石脂丸（原书同卷）、乌头丸（《千金》卷十三）。

【组成】 蜀椒一两（一法二分） 乌头一分（炮） 附子半两（炮。一法一分） 干姜一两（一法一分） 赤石脂一两（一法二分）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每食前服一丸，一日三次。不知稍加服。

【主治】 心痛彻背，背痛彻心。

【方论选录】 ①《金鉴》：李彣曰，心痛在内而彻背，则内而达于外矣；背痛在外而彻心，则外而入于内矣。故既有附子之温，而复用乌头之迅，佐干姜行阳，大散其寒，佐蜀椒下气，大开其郁，恐过于大散大开，故复佐赤石脂入心，以固涩而收阳气也。②《医钞类编》：蜀椒、乌头一派辛辣以温散其阴邪，然恐胸背既乱之气难安，而即于温药队中取用干姜之泥，赤石脂之涩，以填塞所横冲之新隧，俾胸之气自行于胸，背之气自行于背，各不相犯，其患乃除，此炼石补天之精义也。

06781 赤石脂丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】 赤石脂一两 桂心一两 白矾二两（烧令汁尽） 干姜一两（炮裂，锉） 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 水谷痢，积久不愈，下肠垢。

06782 赤石脂丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】 赤石脂三两 龙骨二两 艾叶一两（微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 肉豆蔻一两（去壳） 缩砂一两（去皮） 高良姜一两（锉） 干姜一两（炮裂，锉） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】 上为末，以醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 水泻，心腹疼痛，四肢逆冷，不纳饮食。

06783 赤石脂丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】 赤石脂一两半 干姜（炮）二两 乌头（炮裂，去皮尖）三分 人参一两 细辛（去苗叶）一两 桂（去粗皮）三分 蜀椒（去目并闭口，炒出汗）半两

【用法】 上为粗末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，食前米饮送下，一日二次。未效渐加丸数，以知为度。

【主治】 心中寒，心背彻痛。

06784 赤石脂丸

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】 赤石脂 人参各一两 干姜（炮）半两 龙骨三分

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【主治】 产后久泻不止。

06785 赤石脂散

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】 赤石脂三斤

【用法】 上为散。每服方寸匕，稍稍渐加至三匕，酒、饮并可下之，一日三次。服尽三斤，则终

身不叶水，又不下利。

【功用】 补五脏，令肥健。

【主治】 胃气羸，不能消于食饮，食饮入胃，皆变成冷水，反吐不停者。

06786 赤石脂散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】 赤石脂半两（细研） 黄柏半两（末） 白面二两 蜡面茶半两（末） 龙脑半分（细研）

【用法】 上为细散。每使用时绵扑之。

【功用】 止痛生肌。

【主治】 痱子磨破成疮。

06787 赤石脂散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】 赤石脂一两 艾叶三分（微炒） 干姜三分（炮裂，锉） 慎火草一两 当归一两（锉，微炒） 鹿茸一两（去毛，涂酥炙令微黄） 龙骨一两 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 妇人漏下不止，腹内冷痛。

06788 赤石脂散

【方源】《局方》卷六。

【组成】 赤石脂（煅） 甘草（炙）各五两 缙砂仁二十两 肉豆蔻（面裹煨熟）四十两

【用法】 上为末。每服二钱，食前、空心温粟米饮调下。

【主治】 肠胃虚弱，水谷不化，泄泻注下，腹中雷鸣，及冷热不调，下痢赤白，肠滑腹痛，遍数频多，胁肋虚满，胸膈痞闷，肢体困倦，饮食减少。

06789 赤石脂散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】 赤石脂（煅赤） 侧柏（微炙） 乌贼鱼骨（去甲，烧灰）各一两

【用法】 上为散。每服二钱匕，温米饮调下，一日二次。

【主治】 妇人漏下，淋沥不止

06790 赤石脂散

【方源】《医方大成》卷八。

【组成】 赤石脂 寒水石 大黄各等分

【用法】 上为末。以新汲水调涂伤处。

【主治】 汤火所伤，赤烂热痛。

06791 赤芍药丸

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】 赤芍药一两半 苦参三两 黄芩（去黑心） 山栀仁 车前子（微炒） 瞿麦穗各一两 冬葵子（炒令香） 一两半 大黄（炒） 一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温水送下，夜卧再服。

【主治】 心脏劳热，久积毒气，小肠气癃结，少腹急，小便淋沥，白浊疼痛。

06792 赤芍药汤

【方源】《济生》卷二。

【组成】 赤芍药二两 半夏（汤泡七次） 一两半 橘红一两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 血呕。瘀血蓄胃，心下满，食入即呕血。

06793 赤芍药散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【异名】 瞿麦汤（《圣济总录》卷一七九）。

【组成】 赤芍药 瞿麦 陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 牵牛子（微炒） 木通（锉） 冬葵子各一分

【用法】 上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加葱白一茎，煎至五分，去滓，不拘时候服。

【主治】 小儿小便不通，心闷。

06794 赤芍药散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】 赤芍药 当归（切，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 黄芩（去黑心） 白术 甘草（炙，锉）各一两 阿胶（炙燥）二两 生干地黄（焙干）四两

【用法】 上为散。每服三钱匕，空腹温酒调下，一日三次。

【主治】 吐血，唾血。

06795 赤芍药散

【方源】《活法机要》。

【异名】 赤芍药汤（《明医指掌》卷八）。

【组成】 金银花 赤芍药各半两 大黄七钱半 瓜蒌大者一枚 当归 枳实各三钱 甘草三钱

【用法】 上为粗末。水、酒各半煎服。

【主治】 一切疔疮痈疽，初觉憎寒疼痛。

06796 赤茯苓丸

【方源】 方出《圣惠》卷五十五，名见《普济方》卷一九六。

【组成】 赤茯苓一两 茵陈一两 枳实一两（麸炒微黄） 甘草三分（炙微赤，锉） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 白术一两 半夏三分（汤洗七遍去滑） 前胡一两（去芦头） 川大黄

一两（锉碎，微炒） 当归三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下。

【主治】 酒疸，心下坚而小便赤涩。

06797 赤茯苓丸

【方源】《医方类聚》卷一一七引《神巧万全方》。

【组成】 赤茯苓 旋覆花 汉防己 甜葶苈（隔纸炒令紫色） 桂心 前胡 槟榔各一两 枳壳（去白，炒令黄）半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以桑根皮汤送下。

【主治】 支饮，心胸壅滞，喘息短气，皮肤如肿。

06798 赤茯苓丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】 赤茯苓（去黑皮）一两 猪苓（去黑皮）一两半 泽泻一两 小海蛤一两半 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 桂（去粗皮）各三分 防己 泽漆（微炒）各一两 木通（炙，锉）一分 赤芍药一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎桑白皮汤送下，一日三次。

【主治】 妇人水气在皮肤浮肿，经水不通。

06799 赤茯苓丸

【方源】《医学发明》卷六。

【组成】 葶苈四两 防己二两 赤茯苓一两 木香半两

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前煎桑白皮汤送下。

【主治】 脾湿太过，四肢肿满，腹胀喘逆，气不宣通，小便赤涩。

06800 赤茯苓汤

【方源】 方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】 赤茯苓半两 人参半两（去芦头） 赤芍药半两 白术三分 前胡三分（去芦头） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 槟榔三分 厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 桂心三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服四钱，水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 消渴，饮水太过，胃气不和，腹胀，不思饮食。

06801 赤茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】 赤茯苓（去黑皮）一两 细辛（去苗叶）一两 橘皮（汤浸，去白，焙）三分 枳壳（去瓤，麸炒）一两 栝楼实（去皮）一枚 桂（去粗皮）三分

【用法】 上为粗散。每服三钱匕，水一盏半，加生姜一分（拍破），同煎至七分，去滓空心服，如人行五六里再服。

【主治】 胸痹连心气闷，喉中塞满。

06802 赤茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【异名】 羚羊角汤（《宣明论》卷二）。

【组成】 赤茯苓（去黑皮）一两 人参 羚羊角（镑）各二两 远志（去心） 大黄（锉，炒）各半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】 上为粗散。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 阳气厥逆，多怒而狂，颈脉复动。

06803 赤茯苓汤

【方源】《济生》卷四。

【组成】 木通（去节） 赤茯苓（去皮） 槟榔 生地黄（洗） 黄芩 赤芍药 甘草（炙） 麦门冬（去心）各等分

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 小肠实热，面赤多汗，小便不通。

06804 赤茯苓汤

【方源】《朱氏集验方》卷五。

【组成】 赤茯苓（去皮） 半夏（炮） 茯神（去木） 陈皮 麦子各一两 沉香 甘草 槟榔各半两

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏，加生姜五片，煎七分，空心服。

【主治】 停饮于胃，怔忡不已。

06805 赤茯苓散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 赤茯苓一两 麦门冬一两（去心） 木通三分（锉） 川升麻三分 葳蕤三分 甘草半两（炙微赤，锉） 紫菀三分（去苗土） 川大黄三分（锉碎，微炒） 子芩一两

【用法】 上为细散。每服三钱，以水一中盏，加淡竹茹一分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 心气实热，烦闷不安。

06806 赤茯苓散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】 赤茯苓一两半 牡蛎一两（烧为粉） 龙骨一两半 黄芩一两

【用法】 上为散。先以水二大盏，加羊心一枚，煮令熟，去羊心，次入药五钱，生姜半分，同煎至七分，去滓，分二次温服，不拘时候。

【主治】 伤寒，心脏虚热，谵语恍惚不定。

06807 赤茯苓散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】 赤茯苓二两 甘草（炙微赤，锉） 泽泻 桂心 葛根（锉）各一两 石膏二两

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 时气头痛，虽自时时有汗，烦渴不止。

06808 赤茯苓散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】 赤茯苓半两 前胡三分（去芦头） 白鲜皮一两 瞿麦一两 子芩半两 栀子仁半两 滑石二两 川升麻三分 木通一两半（锉）

【用法】 上为散。每服三钱，水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 时气，有时寒热，四肢沉重，口不知味，胸中哕塞，小便不通。

06809 赤茯苓散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】 赤茯苓一两 赤芍药一两 葵子一两 瞿麦一两 木通一两（锉） 川芒消一两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加葱白二茎，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 热病，小便不通，心神烦躁，小腹满闷。

06810 赤茯苓散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【异名】 七气汤（《普济方》卷一七一）。

【组成】 赤茯苓二两半 大腹皮半两（锉） 槟榔半两 桂心一两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 高良姜半两（锉） 诃黎勒皮一两 牵牛子一两（微炒）

【用法】 上为散。每服三钱，水一中盏，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 奔豚气，从小腹起，上至心下，妨胀壅闷，胸中短气，坐卧不安。

06811 赤茯苓散

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】 赤茯苓一两 栝楼根一两 黄芩一两 麦门冬一两（去心） 生干地黄一两 知母一两

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，小麦半合，淡竹叶二七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脾胃中热，引饮水浆，烦渴不止。

06812 赤茯苓散

【方源】 方出《圣惠》卷五十四，名见《普济方》卷一九三。

【组成】 赤茯苓一两 汉防己一两 川大黄二两（锉碎，微炒） 槟榔一两 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 桑根白皮一两（锉） 木通一两（锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒）

【用法】 上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，食前温服。以大小便通利为效。

【主治】 水气遍身浮肿，按之没指，心腹气胀，大小便涩。

06813 赤茯苓散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【异名】 茯苓汤（《圣济总录》卷九十八）。

【组成】 赤茯苓一两 滑石二两 石韦一两（去毛） 瞿麦一两 蒲黄一两 葵子一两 榆白皮一两（锉）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 小便卒淋，水道中涩痛。

06814 赤茯苓散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 赤茯苓一两 汉防己一两 桑根白皮半两（锉） 猪苓一两（去黑皮） 泽漆一两 木通一两（锉） 槟榔一两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服，以利为效。

【主治】 妇人水气，身体浮肿，喘息微促，小便不利。

06815 赤茯苓散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 赤茯苓 葵根 桂心 石韦（去毛） 赤芍药 琥珀 木通（锉）各一两 青橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，葱白二茎，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 妇人气淋、冷淋，小便涩。

06816 赤茯苓散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】 赤茯苓半两 桑根白皮半两（锉） 川升麻一分 甜草芳一分（隔纸炒令紫色） 杏仁一分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 桔梗一分（去芦头） 贝母半两（煨令微黄）

【用法】 上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，一日三四次。

【主治】 小儿水气肿满，喘咳不止。

06817 赤茯苓散

【方源】 《普济方》卷二八五引《圣惠》。

【组成】 赤茯苓一两 甜瓜子二两 川大黄二两（锉碎，微炒） 川芒消半两 桃仁一两（浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 牡丹一两半

【用法】 上为粗散。每服四钱，水一中盏，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】 肠痈，小腹牢强，按之痛，小便不利，时有汗出，恶寒脉迟，未成脓。

06818 赤茯苓散

【方源】 《普济方》卷三十三引《医方大成》。

【组成】 人参 白术 赤茯苓 香薷 泽泻 猪苓 莲肉 麦门冬（去心）各等分

【用法】 上为散。每服四钱，水一盏煎服。

【主治】 心经伏暑，小便赤浊。

06819 赤蜈蚣散

【方源】 《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】 赤脚蜈蚣一条（炙）

【用法】 上为散。酒服。

【主治】 蛇瘕。误食菜中蛇精，或食蛇肉，致成蛇瘕，腹内常饥，食物即吐。

06820 赤芍连翘散

【方源】 《医醇剩义》卷一。

【组成】 赤芍一钱五分 连翘二钱 葛根二钱 花粉三钱 豆豉三钱 防风一钱 薄荷一钱 独活一钱 甘草四分 经霜桑叶二十张

【主治】 刚痉。风热盛，热伤营血，筋脉暴缩，风入经络，肢节拘挛，头痛项强，手足搐搦，甚则角弓反张，发热无汗。

06821 赤小豆当归散

【方源】 《金匮》卷上。

【异名】 赤小豆散（《医心方》卷十二引《小品方》）、当归赤小豆散（《三因》卷九）、赤小豆汤（《嵩崖尊生》卷八）、赤豆当归汤（《中国医学大辞典》）。

【组成】 赤小豆三升（浸令芽出，晒干） 当归三两

【用法】 上为散。每服方寸匕，浆水下，一日三次。

【功用】 《金匮要略心典》：排脓血，除湿热。

【主治】 伤寒狐惑；下血，先血后便；肠痈便脓。

①《金匮》：伤寒狐惑，脉数，无热微烦，默默但欲卧，汗出，初得之三四日，目赤如鸠眼，七八日目四眦黄黑，能食，脓已成；下血，先血后便，此近血也。②《张氏医通》：小肠热毒，流于大肠，先便后血，及狐惑蓄血，肠痈便脓。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：凡脉数则发热而烦。此热在血，不在荣卫，故不发热，但微烦尔。汗出者，以血病不与卫和，血病则恶烦，故欲默，卫不和则阳陷，故欲卧；腠理因开而津液泄也。三四日目赤如鸠眼者，热血循脉炎上，注见于目也；七八日目四眦黑者，其血凝蓄，则色变成黑也。若能食脓已成者，湿热之邪散漫，则毒血流，伤其中和之气不清，故不能食；若能食，可知其毒血已结成脓，胃气无扰，故能食也。用赤豆、当归治者，其赤小豆能消热毒，散恶血，除烦排脓，补血脉，用之为君；当归补血、生新去陈为佐；浆水味酸，解热疗烦，入血为辅使也。②《沈注金匮要略》：用赤小豆去湿清热，而解毒排脓；当归活血养正，以驱血中之风；浆水属阴，引归、豆入阴，驱邪为使。斯治风湿流于肠胃而设，非狐惑之方也。③《千金方衍义》：方以赤小豆清热利水，且浸令芽出，以发越蕴积之毒，佐当归司经血之权，使不致于散漫也。至于先便后血亦主，此方以清小肠流入大肠热毒之源，见证虽异，而主治则同也。

【现代研究】 赤小豆当归散治疗近血 《中国肛肠病杂志》（1987；7:43）用赤小豆当归散治疗因内痔、肛裂、息肉而便后出血32例，有效率为96%。

【备考】 本方方名，《玉机微义》引作“赤豆当归散”。方中当归用量原缺，据《千金》补。

06822 赤豆薏苡仁汤

【方源】 《外科大成》卷四。

【异名】 赤豆苡仁汤（《疡医大全》卷二十一）、赤豆薏苡汤（《血证论》卷八）。

【组成】 赤小豆 薏苡仁（炒） 防己 甘草各等分

【用法】 水二钟，煎八分，食远服。

【功用】 排脓。

【主治】 ①《外科大成》：胃痈，脉洪数者，脓已成也。②《疡科捷径》：大小肠痈，湿热气滞瘀凝所致者。

【方论选录】《血证论》：脓者，血化为水也，故排脓之法，不外乎破血利水。赤豆芽入血分，以疏利之，助其腐化，薏仁、防己即从水分排逐其脓，甘草调和诸药，使得各奏其效。

06823 赤石脂禹余粮汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】赤石脂一斤（碎） 太乙禹余粮一斤（碎）

【用法】以水六升，煮取二升，去滓，分三次温服。

【功用】《普济方》引《直指》：固其下焦。

【主治】①《伤寒论》：伤寒，服汤药，下利不止，心下痞硬。服泻心汤已，复以他药下之，利不止。医以理中与之，利益甚，此利在下焦。②《证治准绳·类方》：大肠脏发咳，咳而遗矢。

【方论选录】①《医方考》：下之利不止者，下之虚其里，邪热乘其虚，故利；虚而不能禁固，故不止；更无中焦之证，故曰病在下焦。涩可固脱，故用赤石脂；重可以镇固，故用禹余粮。然惟病在下焦可以用之。②《寓意草》：禹余粮甘平，消痞硬，而镇定其脏腑；赤石脂甘温，固肠虚而收其滑脱也。③《伤寒来苏集》：利在下焦，水气为患也。唯土能制水，石者，土之刚也。石脂、禹粮，皆土之精气所结；石脂色赤，入丙，助火以生土；余粮色黄，入戊，实胃而涩肠，虽理下焦，实中宫之剂也，且二味皆甘，甘先入脾，能坚固堤防而平水气之亢，故功胜于甘、术耳。

06824 赤眼神效八宝丹

【方源】《异授眼科》。

【组成】当归一两 防风一两 川连一两 朴消二两 杏仁（去皮尖）二十粒 铜青二钱 白矾五钱 郁李仁（去皮）四十九粒。

【用法】上药以生绢包之，如梅子大，放碗内，倾水泡一时，再隔水炖热，熏洗，一日五次。

【主治】目有障膜，形如垂帘。

06825 孝感丸

【方源】《一草亭》。

【组成】夜明砂（洗净） 当归（酒洗） 木贼（去节） 蝉蜕（去足）各一两

【用法】上为末，用黑羊肝四两，水煮烂，捣如泥，入药拌和，捣为丸，如梧桐子大，每服五十丸，食后滚水送下。

【主治】内障。

06826 杏子汤

【方源】《圣济总录》卷四十九

【异名】杏仁汤（《普济方》卷二十七）。

【组成】杏仁（去皮尖双仁，炒） 升麻各一分 桔梗（锉，炒） 紫苏茎叶三分 马兜铃一钱半 五味子（炒） 麻黄（去根节） 芍药各半两

【用法】上锉细。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓温服，一日二次。

【主治】肺痿，四肢烦热，涕唾稠粘。

06827 杏子汤

【方源】《易简方》。

【异名】杏仁汤（《医统》卷四十四）。

【组成】人参 半夏 茯苓 细辛 干姜 芍药 甘草 官桂 五味子各等分 杏仁（去皮尖，锉）五枚

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，煎至六分，去滓，食前服。

【主治】咳嗽，不问外感风寒，内伤生冷，及虚劳咯血，痰饮停积。

【宜忌】①《局方》（续添诸局经验方）：有汗人不宜服。②《得效》：此药最宜冷嗽，热嗽非所宜。

【加减】若感冒，加麻黄等分；若脾胃素实者，加罂粟壳（去筋膜，锉碎，以醋淹，炒）等分，每贴加乌梅一枚煎服，若呕逆恶心者不可加此。

06828 杏子汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】杏子三钱（去皮） 麻黄一钱半 炙草八分

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】风水浮肿，气喘脉浮者。

【方论选录】风伤皮腠，水积络中，而肺气不清，不能通调水道，故浮肿气喘焉。杏子降气以疏络脉，麻黄开表以通皮腠，炙草缓中益胃气也。水煎温服，使风水分消，则肺气清肃而经络宣通，安有浮肿不退，气喘不平乎？此疏风降气之剂，为风水肿喘之专方。

06829 杏仁丸

【方源】《医心方》卷九引《承祖方》。

【组成】杏仁一升（熬） 干姜二两 细辛二两 紫菀二两 桂心二两

【用法】上药治下筛，杏仁别研如脂，炼蜜为丸，如枣核大，每服一丸，一日三次。

【主治】上气咳嗽。

06830 杏仁丸

【方源】方出《千金》卷六，名见《圣惠》卷三十六。

【异名】甘疮煎（《普济方》卷六十二）、甘连散

（《普济方》卷二九九）。

【组成】 杏仁二十枚 甘草一寸 黄连六铢

【用法】 上为末，合和，绵裹，如杏仁大。含之，勿咽，日三次，夜一次。

【主治】 ①《千金》：口中疮烂，痛不得食。②《普济方》：咽喉及舌生疮烂。

06831 杏仁丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】 杏仁（去皮尖双仁，麸炒，研入） 甜葶苈（隔纸炒） 皂荚（刮去黑皮，蜜炙）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至二十丸，食后、临卧生姜蜜汤送下。

【主治】 肺痈喘急。

06832 杏仁丸

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】 杏仁一升（去皮尖双仁，炒黄） 生姜一斤（去皮，切片，晒干） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）五两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】 冷嗽。呼吸气寒，呕吐冷沫，胸中急痛。

06833 杏仁丸

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】 杏仁（去皮尖双仁，炒令黄） 连翘各一两半 海藻（洗去咸，焙） 一两一分 昆布（洗去咸，焙） 木香各二两 蔓荆实（揉去皮） 羊靥（炙）各一两 诃黎勒（煨，去核）二两半 槟榔（锉） 陈橘皮（去白，焙）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下，仍常含化一丸。

【主治】 气结颈项，蓄聚不散成瘿。

06834 杏仁汤

【方源】《普济方》卷一六〇引《指南方》。

【异名】 杏子汤（《全生指迷方》卷四）。

【组成】 杏仁（炮，去皮尖） 干姜 细辛 甘草 五味子各一两 桂半两

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，枣子一个，煎至七分，去滓，食后服。

【主治】 肺寒咳嗽，恶寒脉紧。

【加减】 痰多，加半夏半两。

06835 杏仁汤

【方源】《朱氏集验方》卷五。

【组成】 阿胶（蚌粉炒） 罂粟壳（蜜炙） 白矾（飞过） 杏仁（去皮尖）各等分

【用法】 上为粗末。每用三大钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个，葱白三寸，煎六分，临卧时，卧少倾，唤醒，始服此药。

【主治】 积年嗽。

06836 杏仁汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 杏仁三钱 黄芩一钱五分 连翘一钱五分 滑石三钱 桑叶一钱五分 茯苓三钱 白蔻皮八分 梨皮二钱

【用法】 水三杯，煮取二杯，一日服二次。

【主治】 肺疟，舌白渴饮，咳嗽频仍，寒从背起，伏暑所致。

【方论选录】《成方便读》：此为伏暑留于肺络而发也，故以一派轻宣肺气，清肃上焦之品，治之自愈。白蔻宣肺滞；杏仁降肺气，使肺金复其清肃之令；桑叶轻扬入络，散之于外；黄芩苦寒清金，降之于里；连翘散上焦之血凝气聚；梨皮利肺部之热蕴邪留；滑石、茯苓皆入肺引邪下导耳。

06837 杏仁饮

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】 马兜铃一两 杏仁一两（去皮尖，炒）

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后服之。

【主治】 喘。

06838 杏仁散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草半两（炙微赤，锉） 紫苏子一两（微炒） 麻黄一两（去根节） 天门冬一两（去心） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 五味子三分

【用法】 上为散。每服三钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 上气喘急，不得睡卧。

06839 杏仁散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 五味子二两 甘草半两（炙微赤，锉） 麻黄一两（去根节） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 款冬花三分 紫菀三分（去苗土） 厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 干姜三分（炮裂，锉） 桂心三分

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，加大枣三个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 咳嗽上气，肺寒，鼻中不利。

06840 杏仁粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】杏仁二十一枚（汤浸，去皮尖双仁，研，以三合黄牛乳投，绞取汁） 大枣七枚（去核） 粳米二合 桑根白皮一两（锉） 生姜一分（切）

【用法】以水三大盏，先煎桑根白皮、大枣、生姜等，取汁二盏，将米煮粥，候临熟，入杏仁汁，更煮五七沸，粥成，食之，不拘时候。

【主治】肺气虚羸，喘息促急，咳嗽。

06841 杏仁粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，水研取汁） 生地黄三两（研取汁） 生姜一分（研取汁） 蜜半匙 粳米三合 酥半两

【用法】先将米煮作粥，次入杏仁等汁及蜜，更煮令熟，食之，不拘时候。

【主治】骨蒸烦热，咳嗽。

06842 杏仁粥

【方源】《寿亲养老》卷四。

【组成】杏仁二两（去皮尖，研） 猪肺一具（去管，和研，令烂如糊）

【用法】用瓦瓶煮粥令熟，却将瓷碗放火上炙令热，以猪肺糊在碗内，便泻粥盖之，更以热汤抵令热后服之。

【功用】补肺气。

06843 杏仁煎

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【异名】杏仁煎丸（《圣济总录》卷一七六）。

【组成】杏仁五两 五味子三合 甘草四两（炙） 麻黄一斤（去节） 款冬花三合 紫菀 干姜各三两 桂心四两

【用法】上切，以水一斗，煮麻黄减二升，掠去沫，乃纳诸药，煮取四升，绞去滓，又纳胶饴半斤，白蜜一斤，合纳汁中，搅令相得，汤中煎如饴成。食前服如半枣大，一日三次。不知稍加之。

【主治】咳上气，中寒冷，鼻中不利。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱。

【方论选录】《千金方衍义》：肺气通于鼻，肺为客邪所遏，以故鼻息不通，喘嗽痰清，非麻黄汤不能开发肺气，加干姜以温肾气，款冬、紫菀以温肺经，五味以收麻、杏之散耳。

06844 杏仁煎

【方源】《外台》卷十引《古今录验》。

【组成】杏仁一升 石斛 干姜各四两 桂心 甘草（炙） 麻黄（去节）各五两 五味子 款冬花 紫菀各三两

【用法】上药捣八味下筛，以水一斗，先煮麻黄取八升，去滓，纳药末，入胶饴半斤，蜜一升，搅令相得。食前服如枣大一枚，一日三次。

【主治】咳逆上气。

【宜忌】忌生葱、海藻、菘菜。

06845 杏仁煎

【方源】《外台》卷九引《延年秘录》。

【组成】好杏仁一升（去皮尖两仁，酥熬） 糖一合 蜜五合 酥一合 生姜汁一合 贝母八合（别筛末） 苏子汁一升（以七小合苏子研，水合，滤取汁）

【用法】上药先捣杏仁如泥，纳后六味药，合煎如稠糖。取如枣大，含咽之，一日三次，但嗽发，细细含之。

【主治】①《外台》引《延年》：气嗽。②《金匮翼》：燥咳。

【宜忌】忌猪肉。

06846 杏仁煎

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】杏仁（去皮尖双仁，炒）一升（研） 紫菀（去苗土） 五味子 贝母（去心）各一两 生姜汁 饴糖各一升 木通四两 桑根白皮五两

【用法】上药先将五味㕮咀，分作三剂，每剂以水四盏，煎取一盏半，去滓，入研杏仁、姜汁、饴糖各三分之一，更煎成煎。每服一匙，含化。

【主治】咳嗽失声，语不出。

06847 杏仁煎

【方源】《济生》卷二。

【异名】杏仁煎丸（《瑞竹堂方·补遗》）、杏仁丸（《景岳全书》卷五十四）、杏仁膏（《灵验良方汇编》卷一）。

【组成】杏仁（去皮尖） 胡桃肉各等分。

【用法】研为膏，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸或二丸，食后及临卧细嚼，用姜汤咽下。

【主治】久患肺喘，咳嗽不已，睡卧不得。

06848 杏仁煎

【方源】《直指》卷八。

【组成】杏仁（水浸，去皮，研膏） 冬蜜 沙糖 姜汁各一盏 桑白皮（去赤，炒） 木通 贝母（去心）各一两半 北五味子 紫菀茸各一两 石菖蒲半两 款冬花蕊

【用法】上药后六味锉，以水五升煎半，去滓，入杏、姜、糖、蜜，夹和，微火煎，取一升半。每服三合，两日夜服之。

【主治】 咳嗽暴重，声音不出。

06849 杏仁膏

【方源】 方出《证类本草》卷二十三引《食疗本草》，名见《普济方》卷五十一。

【组成】 杏仁（取仁去皮） 鸡子白

【用法】 上药捣，和鸡子白，夜卧涂面，明旦以暖清酒洗之。

【主治】 ①《食疗本草》：面皯。②《普济方》：面黑皴皱、黧黑、皯黯、皱疱、粉刺、疵痣，黄黑不白光净。

06850 杏仁膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】 杏仁（汤浸，去皮尖双仁）一两半 雄黄一两 瓜子一两 白芷一两 零陵香半两 白蜡三两

【用法】 上药除白蜡外，并入乳钵中，研令细，加油半升，并药纳锅中，以文火煎之，候稠凝，即入白蜡，又煎，搅匀，纳瓷盒中。每日先涂药，后敷粉。

【功用】 令面光白润泽。

【主治】 面皯黯。

06851 杏仁膏

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】 杏仁三升（汤浸，去皮尖双仁）

【用法】 每一升以面裹，于煻灰火中炮熟，去面，研杏仁压取油，又取铜绿一钱，与杏油同研。以铜箸点眼。

【主治】 眼疾翳膜遮障，但瞳子不破者。

06852 杏仁膏

【方源】《普济方》卷三二六。

【组成】 羊脂一斤 当归 杏仁（去皮尖，研） 白芷 芎藭各一两

【用法】 上切细，羊脂和，置甑中蒸之，药成。取如大豆一枚，绵裹纳阴中，一日换一次。

【主治】 妇人阴中痛，生疮。

06853 杏仁膏

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】 杏仁（烧存性） 麝香少许

【用法】 上为末，用旧帛裹之，缚定，火上炙热。纳阴中。

【主治】 妇人阴痒不可忍。

06854 杏仁露

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 苦杏仁六两 苏叶一两五钱 桑叶一两五钱 前胡一两 桔梗四钱 紫菀一两 象贝一两 薄荷二钱 百部一两 甘草五钱

【用法】 用蒸气蒸馏法，每料吊成露四斤。每服二两，隔水炖温服，一日二次。小儿减半。

【功用】 疏风化痰。

【主治】 感冒风邪，咳嗽痰多。

06855 杏叶煎

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】 杏叶（切）五升 萌藿根（切）一斤（升）

【用法】 以水一斗半，煮取二升，去滓。用绵浸药汁揩拭所患处，一日三两次。

【主治】 风隐疹，顽痒。

06856 杏灰散

【方源】《医级》卷九。

【组成】 苦杏（烧灰）

【用法】 麻油调搽。

【主治】 阴疮。

06857 杏苏饮

【方源】《直指》卷八。

【组成】 紫苏叶二两 五味子 大腹皮 乌梅肉 杏仁（去皮尖）各一两半 陈皮 北梗 麻黄（去节） 桑白皮（炒） 阿胶（炒）各三分 紫菀 甘草（炒）各一两

【用法】 上㕮咀。每服三钱，加生姜五片，水煎服。

【主治】 上气喘嗽，浮肿。

06858 杏苏饮

【方源】《金鉴》卷五十八。

【异名】 杏苏散（《医钞类编》卷十九）。

【组成】 苏叶 枳壳（麸炒） 桔梗 葛根 前胡 陈皮 甘草（生） 半夏（姜炒） 杏仁（炒，去皮尖） 茯苓

【用法】 生姜为引，水煎服。

【主治】 风寒客肺作喘。

06859 杏苏散

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 苏叶 半夏 茯苓 前胡 苦桔梗 枳壳 甘草 生姜 大枣（去核） 橘皮 杏仁

【主治】 燥伤本脏，头微痛，恶寒，咳嗽稀痰，鼻塞喘塞，脉弦无汗。

【加减】 无汗，脉弦甚或紧，加羌活；微透汗，汗后咳不止，去苏叶、羌活，加苏梗；兼泄泻腹满者，加苍术、厚朴；头痛兼眉棱骨痛者，加白芷；热甚，加黄芩，泄泻腹满者不用。

【方论选录】 此苦温甘辛法也，外感燥凉，故以

苏叶、前胡辛温之轻者达表；无汗脉紧，故加羌活辛温之重者，微发其汗；甘、桔从上开，枳、杏、前、苓从下降，则嗌塞鼻塞宣通而咳可止，橘、半、茯苓逐饮而补肺胃之阳，以白芷易原方之白术者，白术中焦脾药也，白芷肺胃本经之药也，且能温肌肉而达皮毛，姜、枣为调和荣卫之用，若表凉退而里邪未除，咳不止者，则去走表之苏叶，加降里之苏梗，泄泻腹满，金气大实之里证也，故去黄芩之苦寒，加术、朴之苦辛温也。

06860　杏连散

【方源】《济生》卷五。

【组成】黄连（去须）一钱（捶碎）　杏仁七粒（捶碎）

【用法】用水半盏，二药浸之，饭上蒸一时久，澄清放温，洗了，用纸盖覆，安顿汤瓶上，频频洗之。

【主治】风热上攻，目羞明涩痛。

06861　杏矾汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】杏仁15克　白矾15克　蛇床子10克　五倍子10克　黄连10克

【用法】水煎，熏洗。

【主治】阴部瘙痒。

06862　杏参散

【方源】《局方》卷四（续添诸局经验秘方）。

【组成】桃仁（去皮尖，麸炒）　人参（去芦）　杏仁（去皮尖，麸炒）　桑白皮（蜜炒微赤，再泔浸一宿，焙）各等分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，温服，不拘时候。

【功用】除痰下气。

【主治】胸胁胀满，上气喘急，倚息不得睡卧，神思昏愦。

【备考】本方方名，《普济方》引作"杏参汤"。

06863　杏酥散

【方源】《本事》卷六。

【组成】杏仁（去皮尖）　款冬花　前胡　半夏（汤浸七次，薄切，焙）　五味子（拣）　麻黄（去根节）　柴胡（去苗，洗）　桑白皮（蜜炙黄）　人参（去芦）　桔梗（炒）各等分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏半，加生姜五片，同煎七分，通口服。

【主治】咳嗽。

【方论选录】《本事方释义》：杏仁气味苦辛微温，入手太阴；款冬花气味辛甘温，入手太阴；前胡气味苦辛微寒，入手足太阴、阳明，其功长于下气；半夏气味苦辛温，入足阳明，能除痰降逆；五味子气味酸苦微温，入足少阴；麻黄气味辛温发散，入手太阴、足太阳；柴胡气味辛甘微温，入足少阳；桑白皮气味苦辛平，入手太阴；人参气味甘温，入足阳明；桔梗气味苦辛平，入手太阴，为诸药之舟楫；再以生姜之辛温达表。此方主治咳嗽久不止者，肺为娇脏，冷热皆能致病，故辛温辛凉之药，必佐以甘温护中，培土生金之意也。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作"杏参饮"。

06864　杏酥膏

【方源】《金鉴》卷四十一。

【组成】杏仁霜　奶酥油　炼白蜜

【用法】溶化，合膏服。

【主治】肺痿干嗽，不虚而燥。

06865　杏蜜汤

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】半夏三两（汤洗净，再用汤一碗，入白矾末一钱，同半夏浸一宿，焙干）　杏仁六两（汤浸，去皮尖，炒令黄）　甘草四两（炙）　白矾六两（炒）　诃子八两（煨，去核）　生姜一斤四两（煨，去皮，切作片子，焙干）

【用法】上为细末，加盐和匀。每用二钱，加蜜半匙，沸汤点下。

【功用】开胃思食，醒酒快膈。

【主治】停饮咳嗽。

06866　杏霜丹

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】杏仁（去皮尖，纸压去油，取霜）五钱　轻粉五分　黄柏（炒末）一钱

【用法】将猪脊髓捶和匀。先将黄柏数钱煎水，洗疮口干净，然后将药敷上，外以绢包之。三四日疮即愈。

【主治】臁疮，经年累月不愈者。

06867　杏霜汤

【方源】《局方》卷十。

【组成】粟米（炒）一斗六升　甘草（炒）十斤半　盐（炒）十六斤　杏仁（去皮尖，麸炒，别研）十斤

【用法】上为末。每服一钱，沸汤点下，不拘时候。

【功用】调肺气，利胸膈，常服悦泽颜色，光润皮肤。

【主治】①《局方》：咳嗽痰逆。②《医方类聚》引《御医撮要》：肺感寒邪，胸膈不利，咽喉肿痛。

06868 杏仁煮散

【方源】《圣济总录》卷一二。

【组成】杏仁（汤浸，去皮尖双仁） 细辛（去苗叶） 地骨皮各半两 胡椒一分

【用法】上为散。量牙齿患处长短，作绢袋子，盛药缝合，用浆水二盏，煎三五沸，取药袋子，乘热咬之，冷即易去。

【主治】牙齿根挺出，动摇疼痛。

06869 杏仁石膏汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】杏仁五钱 石膏八钱 半夏五钱 山栀三钱 黄柏三钱 枳实汁（每次三茶匙冲） 姜汁（每次三茶匙冲）

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次服。

【主治】黄疸脉沉，中痞恶心，便结溺赤，病属三焦里证。

【方论选录】杏仁、石膏开上焦，姜、半开中焦，枳实则由中驱下矣，山栀通行三焦，黄柏直清下焦。凡通宣三焦之方，皆扼重上焦，以上焦为病之始入，且为气化之先，虽统宣三焦之方，而汤则名杏仁石膏也。

06870 杏仁半夏丸

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒） 半夏（汤洗七遍去滑）各一两 椒目半两 贝母（去心，炒） 防己各一两 苦葶苈二两（隔纸微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧煎桑根白皮汤送下。

【主治】水气肿满，咳嗽喘痞，痰涎不利，眠睡不安。

06871 杏仁半夏汤

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】杏仁（去皮） 半夏 桔梗 陈皮（去白） 茯苓（去皮） 汉防己 白矾 桑白皮各三钱 薄荷一钱 甘草二钱 猪牙皂角一钱

【用法】上为末，作三服，水二盏，加生姜三片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肺痿，涎喘不定，咳嗽不已，及甚者，往来寒暑。

【备考】方中半夏原脱，据《奇效良方》补。

06872 杏仁麻黄汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）一两 麻黄（去根节，先煮，掠去沫）半两 甘草（炙，锉） 五味子（炒）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜一枣大（拍碎），煎至七分，去滓温服。

【主治】肺冷多涕。

06873 杏仁紫菀丸

【方源】方出《外台》卷十引《崔氏方》，名见《鸡峰》卷十一。

【组成】葶苈子二十分（熬） 贝母六分 杏仁十二分（炮） 紫菀六分 茯苓 五味子各六分 人参 桑白皮各八两

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，渐渐加至二三十丸，煮枣汁送下，一日二次，甚者夜一次。

【主治】肺热而咳，上气喘急，不得坐卧，身面肿，不下食，腥气盛者。

【宜忌】忌酢物。

06874 杏仁滑石汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】杏仁三钱 滑石三钱 黄芩二钱 橘红一钱五分 黄连一钱 郁金二钱 通草一钱 厚朴二钱 半夏三钱

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次服。

【主治】暑温伏暑，三焦均受，舌灰白，胸痞闷，潮热，呕恶，烦渴，自利，汗出溺短者。

【方论选录】热处湿中，湿蕴生热，湿热交混，非偏寒偏热可治，故以杏仁、滑石、通草先宣肺气，由肺而达膀胱以利湿；厚朴苦温而泻湿满；芩、连清里而止湿热之利；郁金芳香走窍而开闭结；橘、半强胃而宣湿化痰，以止呕恶，俾三焦湿处之邪，各得分解矣。

06875 杏仁薏苡汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】杏仁三钱 薏苡仁三钱 桂枝五分 生姜七分 厚朴一钱 半夏一钱五分 防己一钱五分 白蒺藜二钱

【用法】水五杯，煮三杯，滓再煮一杯，分三次温服。

【主治】风暑寒湿，杂感混淆，气不主宣，咳嗽头胀，不饥，舌白，肢体若废。

06876 杏术续命汤

【方源】《医方类聚》卷九十八引《施圆端效方》。

【组成】附子（炮，去皮脐） 防己 川芎 白术 人参各一两 防风 芍药 麻黄（去节） 甘草（炙） 桂 黄芩各半两

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盏半，加生

姜五片，同煎至七分，去滓温服，日三次，夜一次，不拘时候。病人坐卧热坑暖处，衣被厚覆腰脚，长令濈濈汗出，病去。

【主治】 风寒湿气合为脚痹，大痛，着床不能转侧，或肿或细，痛重筋挛。

【加减】 冬减黄芩，夏减桂、附一半。

06877 杏仁萝卜子丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷二，名见《景岳全书》卷五十四。

【异名】 萝卜子丸(《不知医必要》卷一)。

【组成】 杏仁（去皮尖） 萝卜子各半两

【用法】 上为末，粥为丸服。

【主治】 气壅痰盛咳嗽。

【备考】 《景岳全书》本方用法：上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

06878 杏仁龙胆草泡散

【方源】 《原机启微》卷下。

【组成】 龙胆草 当归尾 黄连 滑石（另研取末） 杏仁（去皮尖） 赤芍药各一钱

【用法】 以白沸汤泡，蘸洗，冷热任意，不拘时候。

【主治】 风上攻，眦躁赤痒。

【方论选录】 本方以龙胆草、黄连苦寒去热毒为君；当归尾行血、杏仁润燥为佐；滑石甘寒泄气，赤芍药苦酸除痒为使。惟风痒者可用。

06879 李仁丸

【方源】 《济阳纲目》卷三十八。

【组成】 葶苈（隔纸炒） 杏仁（去皮尖） 防己 郁李仁（炒） 真苏子 陈皮 赤茯苓各五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，食后紫苏汤送下。

【主治】 水气乘肺，动痰作喘，身体微肿。

06880 李根皮汤

【方源】 《圣济总录》卷七十一。

【组成】 李根白皮（锉，焙）八两 半夏（汤洗七遍，焙）七两 干姜（炮） 桂（去粗皮）各四两 赤茯苓（去黑皮）三两 人参 甘草（炙）各二两 附子（炮裂，去皮脐）一两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】 奔豚气冲心，吸吸短气，发作有时。

06881 李氏天仙藤散

【方源】 《冯氏锦囊·杂症》卷十七。

【组成】 天仙藤（洗，略炒） 香附子（炒） 陈皮 甘草 乌药各等分

【用法】 上为末。每服三钱，加生姜三片，紫苏三叶，木瓜三片，同煎，空心、食前服，一日三次。肿消止药。

【主治】 子气。妊娠三月之后，两足渐肿，行步艰难，饮食不美，状似水气。

06882 李氏家传快气汤

【方源】 《普济方》卷三三七引《产经》。

【组成】 枳壳五两 缩砂 香附子 甘草各二两

【用法】 上各净称，同炒，为末，汤调服。

【功用】 宽中快气，抑阳辅阴，入月滑胎易产。

【主治】 妊娠恶阻。

06883 两仪膏

【方源】 《景岳全书》卷五十一。

【组成】 人参半斤或四两 大熟地一斤

【用法】 上药，用好甜水或长流水十五碗，浸一宿，以桑柴文武火煎取浓汁。若味有未尽，再用水数碗，煎滓取汁，并熬稍浓，乃入瓷罐重汤熬成膏，入真白蜜四两或半斤，收之。每以白汤点服。

【功用】 ①《景岳全书》：调元。②《杂病源流犀烛》：扶虚。

【主治】 精气大亏，诸药不应，或以克伐太过，耗损真阴，虚在阴分而精不化气者，或未至大病而素觉阴虚者。

【加减】 若劳损咳嗽多痰，加贝母四两。

06884 两地汤

【方源】 《傅青主女科》卷上。

【组成】 大生地一两（酒炒） 玄参一两 白芍药五钱（酒炒） 麦冬肉五钱 地骨皮三钱 阿胶三钱

【用法】 水煎服。四剂而经调。

【主治】 先期经来只一二点者。

【方论选录】 此方之用地骨、生地，能清骨中之热。骨中之热，由于肾经之热，清其骨髓，则肾气自清，而又不损伤胃气，此治之巧也。况所用诸药，又纯是补水之味，水盛而火自平理也。

06885 两收汤

【方源】 《傅青主女科》卷下。

【异名】 两收丹(《辨证录》卷十二)。

【组成】 人参一两 白术二两（土炒） 川芎三钱（酒洗） 九蒸熟地二两 山药一两（炒） 山萸四钱（蒸） 芡实五钱（炒） 扁豆五钱（炒） 巴戟三钱（盐水浸） 杜仲五钱（炒黑） 白果十枚（捣碎）

【用法】 水煎服。服一剂而收半，二剂而全收

矣。

【主治】 妇人产后亡血过多，无血以养任督，而带脉崩坠，力难升举，水道中出肉线一条，长二三尺，动之则疼痛欲绝。

【方论选录】 此方补任督而仍补腰脐者，盖以任督连于腰脐也。补任督而不补腰脐，则任督无助，而带脉何以升举？惟两补之，则任督得腰脐之助，带脉亦得任督之力收矣。

06886 两静汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】 人参一两 生枣仁二两 菖蒲一钱 白芥子三钱 丹砂三钱 巴戟天一两

【用法】 水煎服。连服四剂，惊者不惊，而悸者亦不悸也。

【主治】 惊悸。

【方论选录】 此方多用生枣仁以安其心，用人参、巴戟天以通心肾，心肾两交，则心气通于肾，而夜能安，肾气通于心，而日亦安也。心肾交而昼夜安，即可久之道也。

06887 两感夺命汤

【方源】《怡堂散记》。

【组成】 麻黄 桂枝 杏仁 附子 细辛 甘草

【用法】 水煎服。

【主治】 两感伤寒。

【加减】 二日，加葛根，黄连；泄，加干姜、白术、茯苓；谵言，加石膏；三日，加柴胡、黄芩、囊缩而厥，加吴萸。

06888 束带汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】 鸡冠花一两（鲜鸡冠花三两） 白术一两

【用法】 水煎服。二剂即愈。

【主治】 白带，妇人终年累月下流白物，如涕如唾，不能禁止，甚则臭秽。

06889 束胎丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 白术 枳壳（去瓤，炒）各等分

【用法】 上为末，烧饭为丸，如梧桐子大。八月一日，食前服三五十丸，温热水下，胎瘦易生也，服至产则已。

【功用】 胎瘦易生。

06890 束胎丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【异名】 八月束胎丸（《女科指掌》卷四）。

【组成】 炒黄芩夏一两，春、秋七钱半，冬半两 白术一两（不见火） 茯苓七钱半（不见火） 陈皮二两（忌火）

【用法】 上为末，粥为丸服。

【功用】 ①《丹溪心法》：妊娠八月束胎。②《摄生众妙方》：扶助母气，紧束儿胎。

【主治】《摄生众妙方》：妊娠七八个月，恐胎气展大难产。

【方论选录】《医方考》：凡患产难者，多由内热灼其胞液，以致临产之际，干涩而难；或脾气怯弱，不能运化精微，而令胞液不足，亦产难之道也。故用白术、茯苓益其脾土而培万物之母；用黄芩清其胎热，泻火而存胞液；用陈皮者，取其辛利，能流动中气，化其肥甘，使胎气不滞，儿身勿肥耳。此束胎之义也。

【备考】 本方方名，《准绳·女科》引作“缩胎丸”。《玉机微义》本方用法：上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心、白汤送下。

06891 束胎丸

【方源】《医方类聚》卷二二七引《新效方》。

【异名】 缩胎丸（《准绳·女科》卷四）。

【组成】 黄芩 白术各一两 枳壳 滑石各七钱半

【用法】 上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，温水送下。

【功用】 妊娠九月束胎。

【加减】 禀气怯弱之人，黄芩减半；若临月十日前，小水多时，减去滑石。

【宜忌】 孕妇宜热药，不宜凉药，元气亏损者勿服。

06892 束睛丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 熟地 白芍 麦冬各一两 人参五钱 炒栀子 川芎各三钱 北五味一钱

【用法】 水煎服。十剂全愈。

【主治】 气血两虚，目痛，二瞳子大于黄睛；视物无准，以小为大。

06893 束毒金箍散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 郁金（蝉肚者） 白及 白蔹 白芷 大黄各四两 黄柏二两 轻粉五钱 绿豆粉一两

【用法】 上为细末，酸米浆调箍四边。夏热甚者，蜜水调。

【主治】 疔疮针刺之后，余毒走散作肿。

06894 更生丸

【方源】《外台》卷十七引《素女经》。

【异名】 白茯苓丸(《圣惠》卷二十六)。

【组成】 茯苓四分（若不消食，三分加一） 菖蒲四分（若耳聋，三分加一） 山茱萸四分（若身痒，三分加一） 栝楼根四分（若热渴，三分加一） 菟丝子四分（若痿泄，三分加一） 牛膝四分（若机关不利，加一倍） 赤石脂四分（若内伤，三分加一） 干地黄七分（若烦热，三分加一） 细辛四分（若目茫茫，三分加一） 防风四分（若风邪，三分加一） 薯蓣四分（若阴湿痒，三分加一） 续断四分（若有痔，加一倍） 蛇床子四分（若少气，三分加一） 柏实四分（若少力，加一倍） 巴戟天四分（若痿弱，三分加一） 天雄四分（炮，若有风，三分加一） 远志皮四分（惊恐不安，三分加一） 石斛四分（若体疼，加一倍） 杜仲四分（若绝阳腰痛，三分加一） 苁蓉四分（若冷痿，加一倍）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，食前，一日三次。不知渐增，以知为度。亦可散服，以清粥饮服方寸匕，七日知，十日愈，三十日余气平，长服老而更少。

【主治】 男子五劳七伤，阴衰消小，囊小生疮，腰背疼痛，不得俯仰，两膝膑冷，时时热痒，或时浮肿，难以行步，目风泪出，远视茫茫，咳逆上气，身体痿黄，绕脐弦急，痛及膀胱，小便尿血，茎痛损伤，时有遗泄，汗衣赤黄，或梦惊恐，口干舌强，渴欲饮水，得食不常，或气力不足，时时气逆，坐犯七忌，以成劳伤。

06895 更衣丸

【方源】 方出《广笔记》卷一，名见《古今名医方论》卷四。

【异名】 朱砂芦荟丸(《证治汇补》卷一)。

【组成】 朱砂（研如飞面）五钱 真芦荟（研细）七钱

【用法】 滴好酒少许为丸。每服一钱二分，好酒送下，朝服暮通，暮服朝通，须天晴时修合为妙。

【主治】 大便不通。

【方论选录】 《古今名医方论》：柯韵伯曰：胃为后天之本，不及固病，太过亦病。然太过复有阳盛、阴虚之别焉。两阳合明而胃家实，仲景制三承气下之；水火不交而津液亡，前贤又制更衣丸以润之。古人入厕必更衣，故为此丸立名。用药之义，以重坠下达而奏功。朱砂色赤属火，体重象金，味甘归土，性寒类水，为丹祖汞母，能输坎以填离，生水以济火，是肾家之心药也；配以芦荟，黑色通肾，苦味入心，滋润之质可转燥胃燥，大寒之性能下开胃关，此阴中之阴，洵为肾家主剂矣。合以为丸，有水火既济之理，水土合和之义，两者相须，得效甚宏，奏功甚捷，真匪夷所思者。

06896 更衣丸

【方源】 《成方便读》卷一。

【组成】 真上好芦荟二两 麦冬一两（捣罗） 朱砂一两（为衣）

【用法】 上为丸，朱砂为衣服。

【主治】 燥火有余，津枯便闭之证。

【方论选录】 芦荟，木之脂也，味苦性寒，阳明、厥阴药也，专能泄热降火，润燥通肠，而以麦冬之寒滑多脂者助之，其便有不立通者乎？用朱砂为衣者，镇其浮游之火，而复其离内之阴耳。

06897 还元丹

【方源】 《臞仙活人心方》卷下。

【组成】 黄犍牛肉不拘多少（去筋膜，切作棋子大片，用河水洗数遍令血味尽，仍浸一宿，次日再洗一二遍，水清为度。用无灰好酒入瓷器坛内，重泥封固，用桑柴文武火煮一昼夜，取出焙干为末，其至如黄沙为佳，焦黑无用。每用末半斤，入后药一斤为则） 山药四两（重用葱、盐炒，去葱、盐，为末） 白茯苓四两（用坚实者，为末） 莲肉四两（去心，葱、盐炒） 小茴香四两（去枝梗，微炒香，末）

【用法】 上为末，用红枣二十个，蒸烂，皮肉相离捞起，剥去皮核，研为膏，加好酒入药和剂为丸（切勿用面糊、米饮之类），如梧桐子大，晒干透心。每服五十丸，空心温酒送下，初服每日三次，服久后每日一次。

【功用】 安五脏，消百病，能令瘦者肥，补虚损，实精髓，固元气。

【备考】 本方方名，《医方类聚》引作“补养还元丹”。

06898 还元丹

【方源】 《扶寿精方》。

【异名】 不老丹(《医部全录》卷三三一引《体仁汇编》)、延年益寿不老丹(《摄生众妙方》卷二)、延年益嗣丹(《摄生众妙方》卷十一)、延寿不老丹(《医学入门》卷七)、延年益寿丹(《饲鹤亭集方》)。

【组成】 何首乌一斤（鲜者，只用竹刀刮去皮；干者，米泔水浸软刮皮。四制，忌铁，砂锅或瓦器盛酒，生脂麻蒸一次，晒干；羊肉一斤蒸一次，晒干；酒拌蒸一次，晒干；黑豆蒸一次，晒干。一方黑羊肉一斤、黑豆三合，量用水，上加竹炊箅置药，盖蒸熟透，晒干） 生地黄 熟地黄各三两

（酒浸，焙干，各取末一两） 天门冬 麦门冬各四两（米泔水浸，去心，各取末一两） 人参一两（取末五钱） 白茯苓（去皮）三两（打成块，酒浸，晒干） 地骨皮三两（童便浸，晒干，各取末一两，忌铁）

【用法】 上取首生男孩乳汁六两，白蜜十两，炼同一器中，合前末为膏，瓷器贮，勿泄气。每服一二匙，沸汤温漱，不拘时候。如首生乳难得，但凡人乳皆可。

【功用】 ①《扶寿精方》：干益百补。②《医部全录》引《体仁汇编》：延年益寿。

【主治】 诸虚。

【宜忌】 《景岳全书》：此方为阴虚血热者宜之，诸阳虚者不可用。

06899 还元丹

【方源】 《医统》卷八十五。

【组成】 紫河车一具（即产妇胞衣，用米泔洗涤污浊，以新瓦二片合定，上下用文武火炕干，为末听用。妇性嫌恶，勿与知之，密将药于别室中修合，与服亦不要言，致生疑惑） 人参（上拣）一两半 黄耆（蜜炙） 当归（酒洗）各一两 白术（土炒） 芍药 川芎 熟地黄 白茯苓 牡丹皮各八钱 肉桂 炙甘草各五钱

【用法】 上将熟地黄另捣外，余药为细末，和捣为丸，如梧桐子大；不成，加老米烂饭捣之。每服六七十丸，酒或汤任下。未产之先备制各药，为末，候产后便合为妙。

【功用】 补气补血，还元返本。

【主治】 产后大虚，及一切虚劳。

06900 还元丹

【方源】 《医便》卷一。

【组成】 山药（姜汁炒） 白茯苓（去皮） 小茴香 薏苡仁（炒） 莲肉（去皮心） 砂仁（炒） 神曲半斤 粉草半斤（二味共炒一时，不可焦）

【用法】 上为末，用黄牛胎盘一条，一斤以下者佳，熬膏，入糯米粉四两，和成硬糊样，为丸如弹子大。每服大人二丸，小儿一丸，饥时饮汤嚼下。

【功用】 养脾补肾。

【主治】 脾泄、肾泄。

【宜忌】 老人尤宜常服。

【备考】 方中除神曲、粉草外，余药用量原缺。

06901 还少丹

【方源】 《直指》卷九。

【组成】 山药（炮） 牛膝（酒浸，焙） 白茯苓 山茱萸 舶上茴香（炒）各一两半 续断 菟丝子（洗，酒浸，烂研，焙） 杜仲（去粗皮，姜汁涂炙，截，炒） 巴戟（去心） 苁蓉（酒浸，焙） 北五味子 枳实 远志（姜汁腌，取肉，焙） 熟地黄各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，盐汤送下。

【功用】 补虚劳，益心肾，生精血。

【主治】 心虚肾冷，漏精白浊，梦遗。

06902 还少丹

【方源】 《扶寿精方》。

【组成】 何首乌半斤（黑豆一碗，水三碗同煮，去豆） 牛膝（酒浸，炒） 生地黄（酒浸，九蒸九晒） 肉苁蓉（酒浸，刮去浮甲心膜，酒拌蒸，酥炙）各六两 黄柏（去皮，炒褐色，先用酒浸） 补骨脂（酒浸一宿，东流水洗，蒸半日） 车前子（微炒） 柏子仁（微炒） 麦门冬（水润，去心，微炒）各四两 天门冬（去心，酒拌蒸）二两

【用法】 上为细末，用煮熟红枣去皮核，同炼蜜共为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、午前酒送下。至百日，逢火日摘去白发，生出黑发。

【功用】 发白返黑，益精补髓，壮元阳，却病延年。

【宜忌】 忌莱菔、猪血、羊肉。

06903 还少丹

【方源】 《外科大成》卷二。

【组成】 熟地黄 山药（微炒） 山茱萸 白茯苓 枸杞 巴戟天（酒浸） 牛膝（酒浸） 五味子 肉苁蓉（酒浸，去鳞，焙干，酥炙） 杜仲（酒、姜拌炒） 远志（甘草水浸汤下） 楮实子（酒浸） 石菖蒲（去毛，忌铁） 小茴香（盐、酒炒） 续断（酒浸） 菟丝子（酒蒸）各等分

【用法】 上为末，煮红枣肉加蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，黄酒、盐汤任下，空心、食前各一次。

【功用】 补肝肾，进饮食。

【主治】 鹤膝风。

06904 还阳汤

【方源】 《眼科临症笔记》。

【组成】 川椒三钱 桂子七个 艾叶七个

【用法】 煎水熏。

【主治】 迎风冷泪症，两目不疼不红，或微红，自觉羞明怕风，迎风冷泪不止，但在室内却如无病。

06905 还阳散

【方源】《本事》卷九。

【组成】硫黄

【用法】上为末。新汲水调下二钱，良久，或寒一起，或热一起，更看紧慢再服，汗出愈。

【主治】伤寒阴毒，面色青，四肢逆冷，心躁腹痛。

【方论选录】《本事方释义》：硫黄气味辛大热，入命门，新汲水调下，欲药性之速也。此阴毒为病，面色青，四肢逆冷，心躁腹痛，非大辛大热之药不能挽回阳气于无何有之乡也。

06906 还神汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】生耆五钱 潞参五钱 熟地炭五分 姜炭五分 茯神一钱半 归身五钱

【用法】童便、水、黄酒煎服。

【主治】妇女一切生产血晕，不省人事，乃气血虚极。

06907 还童丹

【方源】《普济方》卷二二四引《德生堂方》。

【异名】保灵丹、延寿丹、阴阳丹。

【组成】沉香 白茯苓 木通 熟地黄 晚蚕蛾 桑螵蛸 巴戟（酒浸，去心） 安息香（研） 益智仁 牛膝（酒浸） 胡芦巴（酒浸）各一两 本香一两半 红花 没药（研） 莲心 莲肉（净） 细墨（烧烟） 五色龙骨（煅） 朱砂各五钱 菟丝子（酒浸）七钱半 苁蓉一两二钱（酒浸） 破故纸七钱（酒浸） 青盐三钱 麝香一钱 海马一对（微酥炙炒） 母丁香七钱

【用法】上为细末，酒糊为丸。每服三十丸，加至五十丸，空心酒送下。此药不湿不燥，老少可服，大通气血，驻颜生精，服之七日见效。夏月茶清下妙，干物压之。

【功用】壮气血筋力、助脾胃，进饮食，益颜色，添精髓，固元阳。

06908 还童丹

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】熟地黄（酒拌蒸，临时杵成膏，忌铁）五两 牛膝（去芦，酒洗）四两 黄耆（破开，蜜水拌透炙）四两 五味子（去核）二两 覆盆子四两 地骨皮（去骨） 白茯苓（去皮） 白蒺藜（另杵，净，炒） 桃仁（去皮尖）各四两 胡桃仁（温水浸，去皮）五两 菟丝子五两（先用水洗净，次用好酒拌，浸透半湿时杵成饼，焙干，为末）

【用法】上除胡桃仁、桃仁、熟地黄捣成膏，余药同为细末，和入前药，再入炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，晨、晚好酒送下，或间用盐汤送下。

【功用】固精壮阳。

【主治】肾水不足，髭须苍白，眼目昏花，腰腿疼痛。

【宜忌】忌葱、蒜、萝卜。

【加减】若五十以前人服，可减胡桃仁二两，恐其太滑；大便燥，不必减也。

06909 还童酒

【方源】《回生集》卷上。

【组成】熟地三两 生地四两 全当归四两 川萆薢二两 羌活一两 独活一两 淮牛膝二两 秦艽三两 苍术二两 块广皮二两 川断二两 麦冬三两 枸杞二两 川桂皮五钱 小茴香一两 乌药一两 丹皮二两 宣木瓜二两 五加皮四两

【用法】上绢袋盛贮，用陈酒五十斤，好烧酒亦可，汤煮三炷香，埋土中七日。早、晚饮三五杯。

【功用】久饮能添精补髓，强壮筋骨，驱风活经络，大补气血。

【加减】如加蕲蛇、虎骨更妙。

06910 还魂汤

【方源】《金匮》卷下。

【异名】追魂汤（《三因》卷七）。

【组成】麻黄三两（去节） 杏仁（去皮尖）七十个 甘草一两（炙）

【用法】以水八升，煮取三升，去滓，分令咽之。

【主治】①《金匮》：卒死、客忤死，诸感忤。②《三因》：卒厥暴死，及客忤、鬼击、飞尸，奄忽气绝，不觉口噤。

06911 还魂汤

【方源】《千金》卷二十五。

【异名】还魂散（《圣惠》卷五十六）、追魂汤（《普济方》卷二三七引范氏方）。

【组成】麻黄三两 桂心二两 甘草一两 杏仁七十粒

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取三升，分三服。口噤不开，去齿下汤，汤入口不下者，分病人发左右捉踏肩引之药下，复增，取尽一升，须臾立苏。

【主治】卒感忤，鬼击飞尸，诸奄忽气绝，无复觉，或已死咬口，口噤不开。

【方论选录】《千金方衍义》：此即《伤寒论》"太阳例"中麻黄汤，以桂心易桂枝入肝以招其魂；麻黄入肺以通其魄；杏仁入络以降其逆；甘草入脾

以缓其暴，暴逆散而魂魄安矣。

06912 还魂汤

【方源】《医统》卷三十九。

【组成】当归（酒洗） 川芎 肉桂 干姜（炮） 赤芍药 甘草 黑豆（炒，去壳） 紫苏各等分

【用法】用水一盏半，煎服。或为细末，每服二钱，酒调灌下。

【主治】血逆卒厥，并产后血厥昏晕，目闭口噤。

06913 还睛丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 真珠三分（细研） 远志半两（去心） 防风半两（去芦头） 蔓荆子半两 车前子半两 石斛一两（去根，锉） 白茯苓一两 玄参半两 人参半两（去芦头） 木香半两 决明子半两 地肤子半两 蕤仁半两（汤浸，去赤皮） 芎藭半两 羌活半两 羚羊角屑半两 熟干地黄一两 枸杞子半两 牛膝一两（去苗） 薯蓣半两 甘菊花半两 黄耆半两（锉） 地骨皮半两 覆盆子三分 兔肝二两（炙微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下；清粥饮送下亦得。

【主治】虚劳目暗。

【宜忌】忌热面、荤辛、生冷。

06914 还睛丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】槐子一两（微炒） 人参一两（去芦头） 细辛一两 石决明二两（捣细，研，水飞过） 白茯苓一两 防风一两（去芦头） 覆盆子二两 甘菊花一两 柏子仁一两 芎藭一两 茺蔚子二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及晚食前以温水送下。

【主治】高风雀目，渐成内障。

06915 还睛丸

【方源】《直指》卷二十。

【组成】蝉蜕（洗，晒） 苍术（童尿换浸二宿，焙） 熟地黄（洗，焙） 川芎 白蒺藜（炒，杵去刺）各一两 茺蔚子 羌活 防风 木贼（去节，童尿浸一宿，晒） 甘菊 荆芥 蔓荆子 杏仁（浸，去皮，焙） 菟丝子（研，酒浸） 石决明（煅存半生） 蛇皮（酒浸，洗净，焙）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后细嚼，茶送下。

【主治】眼目昏翳。

06916 还睛丸

【方源】《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。

【异名】明目还睛丸（《全国中药成药处方集》杭州方）。

【组成】白术（生用） 菟丝子（酒浸，别研） 青葙子（去土） 防风（去芦） 甘草（炙） 羌活（去苗） 白蒺藜（炒，去尖） 密蒙花 木贼（去节）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心、食前细嚼，白汤送下，一日三次。

【主治】男子、女人风毒上攻，眼目赤肿，怕日羞明，多饶眵泪，隐涩难开，眶痒赤痛，睑眦红烂，瘀肉侵睛；或患暴赤眼，睛疼不可忍者；偏正头痛，一切头风，头目眩运。

06917 还睛丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【组成】人参 黑参 石决明 车前子 五味子 黄芩各一两 防风 细辛 干地黄各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心茶送下。

【主治】横翳内障，因五脏虚劳，风毒冲上，脑脂流下，令眼失明。

【备考】宜先用金针拨之。

06918 还睛丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】远志 茺蔚子 防风 人参 干山药 五味子 茯苓 细辛各一两 车前子一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心茶送下。

【主治】突起眼高外障，初患之时，皆因疼痛发歇作时，盖是五脏毒风所致，令眼突出。

06919 还睛丸

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】拣人参一两半 天门冬（泡，去心）三两 麦门冬（泡，去心）三两 生地黄（酒洗）三两 熟地黄一两（酒蒸） 当归（酒洗）一两 川芎七钱 白茯苓（去皮）一两 山药一两（蒸） 菟丝子（酒饮烂捣饼，焙干）一两 甘枸杞一两半 肉苁蓉（酒浸）一两半 川牛膝（去芦）一两半 川杜仲（酒炒）一两半 石斛一两半 五味子七钱 川黄连七钱 川黄柏一两（酒炒） 知母二两（酒炒） 杏仁（泡，去皮）一两半 枳壳（面炒）一两 防风八钱（去芦） 菊花（酒洗）一两 青葙子一两 草决明一两 白蒺藜（炒）一两 羚羊角一两（镑） 乌犀角八钱 甘草七钱（炙）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心盐汤送下。

【功用】 ①《古今医鉴》：降火升水，夜能读细字。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：养血安神，搜风明目。

【主治】 远年近日一切目疾，内外翳障，攀睛弩肉，烂眩风眼，及老年虚弱，目昏多眵，迎风冷泪，视物昏花，久成内障。

06920 还睛丸

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 川芎 白蒺藜 白术 木贼 羌活 菟丝子 熟地黄 甘草各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。空心熟汤嚼下。

【主治】 旋螺尖起。

06921 还睛散

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】 独活（去芦头） 麻黄（去根节） 白茯苓（去黑皮） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 五味子 蒺藜子（炒，去角） 槐子 枸杞子 菥蓂子 麦门冬（去心，焙） 人参 细辛（去苗叶） 白芷 决明子 车前子 茺蔚子 覆盆子 地肤子 丹参 芎藭 防风（去叉） 黄芩（去黑心） 升麻 黄连（去须）各一两一分 远志（去心） 木通（锉） 柏子仁各二两

【用法】 上为散。每服方寸匕，食后以米饮调服，一日二次。

【主治】 眼见黑花昏暗。或因饮热酒食五辛，致黑风入眼，或因重病后昏暗，或因赤眼不见物，或因虚损视物不明，但瞳子不破者。

06922 还睛散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【组成】 桔梗 五味子 茺蔚子 黑参 黄芩各一两 防风 知母各二两 车前子 细茶各二两半

【用法】 上为末。每服一钱，以水一盏。煎至五分，去滓，食后温服。金针针之，然后服本方。

【主治】 涩翳内障，初患之时，朦胧如轻烟薄雾，渐渐失明，不睹人物，犹辨三光。翳如凝脂色，瞳人端正。

06923 还睛散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【组成】 人参 茯苓 车前子 黑参 防风 茺蔚子 知母各二两 黄芩一两半（去皮）

【用法】 上为末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓温服。此状宜令针治诸穴脉，然后宜服本方。

【主治】 枣花翳内障，初患之时，微有头旋眼涩，渐渐昏暗，时时痒痛，脑热有花，黄黑不定。

06924 还睛散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷二。

【组成】 人参 车前子 桔梗各一两 茺蔚子 芎藭各一两 防风 细辛各一两半

【用法】 上为末，每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食前温服。不宜针拨，更一只牵损之眼，却待翳成，依法针之立效，然后服本方即愈。

【主治】 惊振内障。初患之时，忽因五脏虚劳受疾，亦由肝气不足，热毒冲入脑中，或因打筑，脑中恶血流下，渐入眼内，后经二三年间变成白翳，一如内障形状。

06925 还睛散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷二。

【组成】 人参 车前子 地骨皮 茯苓 细辛 防风 芎藭 羌活各等分

【用法】 上为末，以水一盏，散一钱，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】 青风内障，初患之时，微有痛涩，头旋脑痛，或眼先见有花无花，瞳人不开不大，渐渐昏暗，或因劳倦，渐加昏重，皆因五脏虚劳所作。

【宜忌】 初患之时，或因劳倦，渐加昏重，宜令将息，便须服药，恐久结为内障，不宜针拨。

06926 还睛散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷五。

【组成】 防风 车前子 黑参 石决明 五味子 细辛各一两 知母五钱

【用法】 上为末。每服一钱，食后米汤调下。切宜镰洗出瘀血，火针针阳白、太阳二穴，后服本方。

【主治】 眼痒极难忍外障，初患之时，忽然痒极难忍，此乃肝脏有风，胆家壅热冲上所使。

06927 还睛散

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 龙胆草（酒洗，炒） 川芎 甘草 草决明 川花椒（去目，炒） 菊花 木贼 石决明（煅） 野麻子 荆芥 茯苓 猪实子 白蒺藜（杵，去刺）各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，食后茶清调下，一日三次。

【主治】 眼生翳膜，昏涩泪出，瘀血胬肉攀睛。

【宜忌】 忌一切鸡鱼厚味及荞麦面。

06928 还元明目汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】大熟地八钱　生地三钱　黄肉三钱　远志三钱　枣仁三钱（炒）　黄耆五钱　菟丝子四钱　川芎二钱　蔓荆子三钱　蒺藜三钱（炒）　知母三钱　甘草一钱　生磁石三钱

【用法】水煎服。

【主治】云雾移睛症，两眼黑白稍分，不疼不红，惟瞳孔微大，常见黑花浮游移荡。

【临证举例】云雾移睛症　晁某之母，五十三岁，素性暴躁，因怒气伤肝，肝火上冲于脑，自觉头摇目眩，视如黑花乱动，屡治不愈，后又令余治疗。按其脉，六脉虚数，惟少阴为甚，是知心血耗散，肾水不足，而邪火挟虚上升，搅乱于脑，以致视力不稳，满目如蝇飞、旗展之状。处方：针刺上星、承泣；内服还元明目汤十余剂，黑花减少，而昏花如故。又以益智安神汤隔日晚服，半年余移睛之弊而愈。

06929　还元保真汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】当归　川芎　白芍　熟地　白术　茯苓　人参　黄耆各一钱　牡丹皮　枸杞子各八分　甘草（炙）　熟附子各五分　肉桂　泽泻各三分

【用法】水二钟，加煨姜三片，大枣二个，煎八分，食前服。

【主治】悬痈已溃，疮口开张，脓水淋漓，不能收敛者。

06930　还少乳乌丸

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】何首乌（先用柳甑砂锅，黑豆、红枣相间蒸熟，晒干如半斤，用人乳浸过，晒干，再浸，再晒，一斤制成约有半斤方可入药用）二两　枸杞子一两　牛膝一两（酒浸）　茯苓一两　黄精一两　甘桑椹　天门冬一两（去心）　麦门冬一两（去心）　生地黄四两（酒浸，晒干）　熟地黄一两（酒浸）

【用法】上各味俱不犯铁器，共为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，温水或盐汤送下，一日三次。

【功用】补养。

【备考】方中甘桑椹用量原缺。

06931　还阴解毒汤

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】川芎　当归（酒洗）　生地黄　金银花（去叶）　连翘　黄芩（酒炒）　土茯苓　细甘草减半　黄连（酒炒）　苦参　麦门冬（去心）　白芍药（酒洗）　玄参各等分

【用法】上锉剂。白水二钟，煎至八分，去滓温服。

【主治】梅疮余毒未清，移害于肝肾，以致蒸灼，神水窄小，兼赤丝，黑白混浊不清，看物昏眊不明。

06932　还神至圣汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参一两　白术二两　茯神　生枣仁各五钱　广木香　天南星　荆芥各三钱　甘草　良姜　附子　枳壳各一钱　菖蒲五分

【用法】水煎灌之，听其自卧，醒来前症如失。

【主治】呆病。终日不言不语，不饮不食，忽笑忽歌，忽愁忽哭，与之美馔则不受，与之粪秽则无辞，与之衣不服，与之草木之叶则反喜，其起子肝气之郁，终子胃气之衰。

06933　还睛补肾丸

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】人参　白术　茯苓　蒺藜　羌活　木贼　菊花　防风　甘草　川芎　山药　肉苁蓉　密蒙花　青葙子　牛膝　菟丝子各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，或煎服亦妙。

【主治】肾虚目暗生花，不能久视；肾虚内障，两目黄昏不见。

06934　还睛神明酒

【方源】《苏沈良方》卷七。

【组成】黄连五两　石决明　草决明　生姜　石膏　蕤仁　黄消石　山茱萸　当归　黄芩　沙参　车前子　淡竹叶　朴消　甘草　芍药　柏子仁　川乌头　泽泻　桂心　荠子　地肤子　桃仁（去皮尖双仁者）　防风　辛夷　人参　川芎　白芷　细辛　瞿麦各三两　龙脑三钱　丁香半两　珠子（生）二十五颗　秦皮三两

【用法】上㕮咀，绢囊盛，用好酒五斗，瓮中浸之，春、秋十四日，夏七日，冬二十一日。食后服半合。勿使醉吐，稍稍增之。百日后，目明如旧。

【主治】目盲，瞳子俱损，翳如云，赤白肤肉如乳头。

【宜忌】忌热面、鲊、葵、秽臭五辛，鸡、鱼、猪、马、驴肉、生冷粘滑、入房、恚怒、大忧愁、大劳、大寒热悉慎之。

【临证举例】失明　晋大夫于公失明经十二余年，不辨明夜，两目俱损，无瞳子，时年七十，服此酒一百日，万病除，两目明，见物益明。

06935　还睛紫金丹

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 白沙蜜二十两 甘石十两（烧七遍，碎，连水浸拌之） 黄丹六两（水飞） 拣连三两（小便浸，碎为末） 南乳香 当归各三钱 乌鱼骨二钱 硇砂（小盏内放于瓶口上熏干） 麝香各一钱 白丁香（直者）五分 轻粉一字

【用法】 上将白沙蜜于沙石器内，慢火去沫，下甘石，次下丹，以柳枝搅，次下余药，以粘手为度，为丸如鸡头大。每用一丸，温水化开洗。

【主治】 目眶岁久赤烂。眼生倒睫拳毛，两目紧盖，内伏火热而攻阴气。

【备考】 治目眶岁久赤烂，当以三棱针刺目眶外，以泻湿热；如眼生倒睫拳毛，法当去其热内火邪，眼皮缓则毛立出，翳膜亦退，用手法攀出，内睑向外，以针刺之出血。

06936 辰砂丸

【方源】《博济》卷三。

【异名】 辰砂化痰丸（《局方》卷四）。

【组成】 辰砂半两 天南星半两 白矾半两 半夏三两（姜汁搗，作饼，炙令黄）

【用法】 上为末，用生姜自然汁合和为丸，如绿豆大。每服十丸，食后以姜汤送下。

【功用】《局方》：治风化痰，安神定志，利咽膈，清头目，止咳嗽，除烦闷。

【主治】 上膈风壅有痰，结实如梅核及稠浊者。

06937 辰砂丸

【方源】《局方》卷一。

【组成】 硼砂（研） 牛黄（研）各一钱 白附子（炮） 白僵蚕（去丝嘴，燔） 天南星（炮裂，研） 蝎梢（燔）各一分 辰砂（研）半两 半夏（汤洗七遍） 一两

【用法】 上为细末，同研令匀，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，用生姜、荆芥汤送下，不拘时候。

【主治】 诸风痰盛，头痛恶心，精神昏愦，目眩心忪，呕吐痰涎，胸膈烦闷。

06938 辰砂丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 辰砂丹（《普济方》卷三七四）。

【组成】 辰砂（别研） 水银砂子各一分 天麻 牛黄各五分 脑 麝（别研）各五分 生犀末 白僵蚕（酒炒） 蝉壳（去足） 干蝎（去毒，炒） 麻黄（去节） 天南星（汤浸七次，焙，切）各一分

【用法】 上为末，再研匀，炼蜜为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服一二丸，或五七丸，食后薄荷汤送下。

【主治】 小儿惊风，涎盛潮作，及胃热吐逆不止。

06939 辰砂丹

【方源】《普济方》卷一〇〇引《卫生宝鉴》。

【组成】 雄猪心一个

【用法】 将猪心破作两片，去心内血，用好辰砂塞满为度，以布线缝合，外合灯心包裹，以麻线纵横缠定，以漆砂罐一个，入井水一半，河水一半，令十分满，用文武火煮一复时，出去猪心，将朱砂细枣肉为丸，如绿豆大。入茯苓二两半（焙干），甘草半两（炒令赤色，为细末）。每用一大钱，沸汤点咽，一日二次

【主治】 心经热痫邪。

06940 辰砂散

【方源】《苏沈良方》卷二。

【异名】 朱砂酸枣仁乳香散（《医方考》）、灵苑辰砂散（《准绳·类方》卷五）、灵苑丹（《类证治裁》卷四）。

【组成】 辰砂一两（须光明有墙壁者） 酸枣仁（微炒） 乳香（光莹者）各半两

【用法】 量所患人饮酒几何，先令恣饮沉醉，但勿令至吐，静室中服药讫，便安置床令睡，以前药都为一服，温酒一盏调之，顿服令尽；如素饮酒少人，但随量取醉；病浅人一两日，深者三五日，睡不觉，令家人潜伺之，觉即神魂定矣；慎不可惊触使觉，及他物惊动，一为惊寤，更不可治。

【功用】《医方论》：化痰定惊。

【主治】 风邪诸痫，狂言妄走，精神恍惚，思虑迷乱，乍歌乍哭，饮食失常，疾发仆地，吐沫戴目，魂魄不守，医禁无验。

【方论选录】《医方集解》：此手少阴药也，辰砂镇心泻火，乳香入心散瘀血，枣仁补肝胆而宁心。

【临证举例】 心病 上枢正肃吴公，少时病心，服一剂，三日方寤，遂愈。

06941 辰砂散

【方源】《卫生总微》卷五引《保生》。

【异名】 附子散（《卫生总微》卷五）。

【组成】 大附子一枚（重九钱，上者，生用，去皮脐） 天南星二钱（生用） 半夏（沸汤洗七次）二钱 白附子一钱半 朱砂二钱（研，水飞） 麝香一钱（研）

【用法】 上为末。每服一字，薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】 小儿慢惊风，身冷，瘛疭昏困。

06942 辰砂散

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】 滑石一两 寒水石一两 甘草一两 辰砂五分

【用法】 上为末。每服二钱，井花水或童便调下。

【主治】 伤寒内热不解，心烦恍惚，小便赤色，烦渴。

06943 辰砂一粒丹

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 附子 郁金 橘红各等分

【用法】 上为末，醋糊为丸，如枣核大，辰砂为衣。每服一丸，男，酒送下；女，醋汤送下。

【主治】 气郁心疼，及小肠膀胱疝气，痛不可止。

06944 辰砂天麻丸

【方源】《局方》卷一。

【组成】 川芎二两半 麝香（研） 白芷各一两一分 辰砂（研，飞，一半入药，一半为衣） 白附子（炮）各五两 天麻（去苗）十两 天南星（童汁浸，切，焙干）二十两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温荆芥汤送下，不拘时候。

【功用】 除风化痰，清神思，利头目。

【主治】 诸风痰盛，头痛目眩，眩晕欲倒，呕哕恶心，恍惚健忘，神思昏愦，肢体疼倦，颈项拘急，头面肿痒，手足麻痹。

【备考】 方中川芎，《普济方》作“川乌”。

06945 辰砂五苓散

【方源】《局方》卷二（宝庆新增方）。

【异名】 苓砂散(《卫生总微》卷七)。

【组成】 辰砂（研） 白术（去芦） 木猪苓（去黑皮） 泽泻（洗，锉） 赤茯苓（去皮）各十二两 肉桂（去粗皮）八两

【用法】 上为细末。每服二钱，沸汤点下，不拘时候。如中暑发渴，小便赤涩，用新汲水调下；小儿五心烦热，焦躁多哭，咬牙上窜，欲为惊状，每服半钱，温熟水调下。

【功用】《永类钤方》：清导小便。

【主治】 ①《局方》：伤寒表里未解，头痛发热，心胸郁闷，唇口干焦，神思昏沉，狂言谵语，如见鬼神，及瘴疟烦闷未省者；中暑发渴，小便赤涩，五心烦热，焦躁多哭，咬牙上窜，欲为惊状。②《永类钤方》：小儿邪热在心之夜啼证。

【备考】 本方方名，《永类钤方》引作“朱砂五苓散”。

06946 辰砂五香丸

【方源】《纲目拾遗》卷七引《张氏秘效方》。

【组成】 血竭 乳香 没药 辰砂各一钱五分 元胡一钱 化州橘红一钱

【用法】 上为末。每服三分，酒送下。

【主治】 翻胃、喑膈、呕吐。

06947 辰砂宁志丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】 辰砂二两（用无灰酒三升煮，酒将尽留二盏用之） 远志（去心） 石菖蒲（去毛） 酸枣仁（炒） 乳香（炙） 当归身（酒洗）各七钱 人参五分 白茯神（去皮木）七钱 白茯苓（去皮）七钱

【用法】 上为细末，用猪心一个研如泥，入前药末，并煮辰砂酒搅匀为丸，如绿豆大。每服六七十丸，临卧以大枣汤送下。

【主治】 劳神过度，致伤心血，惊悸怔忡，梦寐不宁，若有人来捕捉，渐成心疾，甚至癫狂者。

06948 辰砂半夏丸

【方源】《局方》卷十。

【异名】 半夏丸(《圣济总录》卷一七五)、杏医丸(《普济方》卷三八七)。

【组成】 五灵脂（微炒，用酒研飞，去砂土） 朱砂（研，飞）各一两 荸荠（水淘净，晒干，别杵成膏） 杏仁（汤浸，去皮尖及双仁，麸炒，别杵成膏） 半夏（汤浸七次去滑，焙干）各半两

【用法】 上为末，入研药匀，以生姜汁煮面糊为丸，如小麻子大。每服五丸至七丸，食后淡生姜汤送下。

【主治】 小儿肺壅痰实，咳嗽喘急，胸膈痞满，心忪烦闷，痰涎不利，呀呷有声。

06949 辰砂远志丸

【方源】《本事》卷二。

【组成】 石菖蒲（去须，洗） 远志（去心，洗，锉，炒令黄色） 人参（去芦） 茯神（去木） 川芎 山芋 铁粉 麦门冬（水浸，去心） 天麻 半夏曲 南星（锉骰子大，麸炒黄） 白附子（生）各一两 细辛（去叶） 辰砂（水飞）各半两

【用法】 上为细末，生姜五两取汁，入水煮糊为丸，如绿豆大，别以朱砂为衣，干之。每服三五十丸，夜卧生姜汤送下；小儿减丸服。

【功用】 ①《本事》：安神镇心，消风痰，止头眩。②《御药院方》：补肾益志。

【主治】 ①《本事》：惊悸。②《校注妇人良

方）；产后中风惊狂，起卧不安，或痰涎上涌。

【方论选录】《本事方释义》：石菖蒲气味辛温，入手少阴、足厥阴；远志气味辛微温，入心肾；人参气味甘温，入脾胃；茯神气味甘平，入心；川芎气味辛温，入肝胆；山芋气味辛平，入足阳明；铁粉气味咸平，入足厥阴，能安神强志；麦冬气味甘凉、微苦，入手太阴、少阴；天麻气味辛平，入足阳明、厥阴；半夏曲气味辛微温，入胃；天南星气味辛温，入手足太阴；白附子气味辛甘温，入胃；细辛气味辛温，入肾；辰砂气味苦温，入心。因惊悸致病，故必镇心安神，兼以扶持正气，以姜为引，虽有微毒之味，只能搜病，并不有伤正气也。

06950 辰砂抱龙丸

【方源】《痘疹金镜录》卷一。

【组成】天竺黄四钱（需要嫩白者） 牛胆星一两 朱砂四钱（一半为衣） 天麻五钱 雄黄（秋冬三钱、春减半、夏二钱） 麝香三分（痘疹中不用） 防风三钱 甘草三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大，雪水糊丸尤佳，姜汤或薄荷汤磨服。

【功用】利惊疏风，豁痰清热。

【主治】伤寒伤风，咳嗽生痰，喘急，昏沉，发热，鼻流清涕，或吐泻、风暑十种热症，睡中惊掣，痧疹痴疮；胎风、胎惊、胎热。急慢惊风，慢脾风。

【加减】痘疹时行，加天花粉四钱。

06951 辰砂定痛散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】软石膏（煅）一两 胡黄连（末）二分 辰砂（末）五分 冰片二分

【用法】上为末，收罐内。如口内则掺之，喉内则吹之，每日五七次，咽之。

【主治】①《外科大成》：口舌生疮，咽喉肿痛；②《金鉴》：鼻疮。

06952 辰砂茯神膏

【方源】《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】酸枣仁（净，去壳） 代赭石（烧，醋淬，研） 乳香（炙，别研）各一两 茯神（去木）一两半 朱砂（研，飞）半两 麝香（研）一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，用金银薄荷汤送下。

【功用】常服镇心、安神、定志。

【主治】小儿急慢惊风，潮涎搐搦，手足抽掣，心膈烦躁，及惊啼，睡不宁贴，腹中疞痛。

06953 辰砂既济丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】人参 当归（酒洗） 黄耆（盐水洗，炒） 白山药 牡蛎（酒浸一宿，煅） 锁阳 甘枸杞（蜜拌） 熟地黄（酒洗）四两 知母（去毛，酒洗，略炒） 败龟版（酒浸一宿，酥炙）各二两 牛膝（酒洗）一两半 破故纸一两二钱 黄柏（酒炒）六钱

【用法】上为末，用白术八两，水八碗，煎至一半，取滓再益水煎，漉净，合煎至二碗成膏为丸，如梧桐子大，辰砂研细为衣。每服七十丸，空心淡盐汤或酒送下，干物压之。

【功用】《回春》：大补元气，涩精固阳。

【主治】①《扶寿精方》：梦遗。②《回春》：元阳虚惫，精气不固，夜梦遗精。

【备考】方中人参、当归、黄耆、白山药、牡蛎、锁阳、甘枸杞用量原缺。

06954 辰砂秘真丹

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】辰砂半两（研细，水飞过） 代赭石（煅，醋淬七次，别研） 新罗参（去芦） 茯神（去木）各一两 赤石脂（煅，别研） 莲子心各半两

【用法】上为细末，用糯米粽为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎人参汤送下，空心常服。

【功用】《杂病广要》：补心调肝。

【主治】心气不足。

06955 辰砂益原散

【方源】《奇效良方》卷五。

【异名】辰砂益元散（《丹溪心法附余》卷二十二）、朱砂益元散（《景岳全书》卷五十九）、益元散（《医方集解》）、辰砂六一散（《张氏医通》卷十六）、天水散（《金鉴》卷二十八）、益元凉肌散（《痘疹会通》卷五）。

【组成】辰砂三钱 滑石六两 甘草一两

【用法】上为细末。每服三钱，白汤送下，不拘时候。

【功用】镇心安神，清热利湿，催生下乳。

①《医学传灯》：利湿解热。②《金鉴》：催生下乳。③《成方切用》：镇心神而泻丙丁之邪热。

【主治】中暑、伤寒热不退，烦渴引饮，小便涩痛而黄，心神恍惚，谵语惊悸；积聚水蓄，里急后重，暴注下迫。

①《奇效良方》：伏暑烦渴引饮，小便不利，心神恍惚。②《医方考》：痘疹三四日，里热，小便黄赤，神气不清者。③《东医宝鉴·杂病篇》：伤寒

热不退，狂言谵语。④《济阳纲目》：暑乘肺咳则口燥心烦，声嘶吐沫。⑤《张氏医通》：暑月惊悸多汗，小便涩痛。⑥《医学传灯》：疰夏。⑦《金鉴》：积聚水蓄，里急后重，暴注下迫者。

【宜忌】《麻科活人》：老人、虚人，及病后伤津，而小便不利者，不宜用。

【方论选录】①《医方考》：滑石清利六腑，甘草解热调中，辰砂安神去怯。②《医学传灯》：六一散有辰砂，能引甘、滑之凉，先入心经，使热与湿俱解，无朱砂者，但能利湿，不能解热，以其无向导之兵也。

06956 辰砂僵蚕散

【方源】《丹溪心法附余》卷二十二。

【组成】辰砂 僵蚕（直者，去丝嘴，炒）一钱 蛇蜕皮一钱（炒） 麝香半分（别研）

【用法】上为细末。用蜜少许调敷唇口。

【主治】小儿脐风撮口。

【备考】方中辰砂用量原缺。

06957 辰砂石菖蒲散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】石菖蒲五分 当归一钱五分 生地（炒）二钱 茯神一钱 远志一钱 白芍（酒炒）一钱 枣仁（炒）一钱 丹参二钱 蒲黄（黑）一钱 熟地二钱 川芎一钱 辰砂一分 姜汁 竹沥 龙眼肉

【功用】补血安神。

【主治】产后血虚发狂，心神失守。

【备考】方中姜汁、竹沥、龙眼肉用量原缺。

06958 来苏汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】天冬二钱 麦冬二钱 生地三钱 熟地三钱 南沙参三钱 北沙参三钱 白芍一钱 赤芍一钱 沙苑三钱 贝母二钱 磁石四钱 杜仲三钱 茜草根二钱 牛膝二钱 杏仁三钱 莲子十粒（去心）

【用法】水煎服。

【主治】肾劳者，真阴久亏，或房室太过，水竭子下，火炎于上，身热腰疼，咽干口燥，甚则咳嗽、吐血。

06959 来苏散

【方源】《医方类聚》卷二二九引《济生》。

【组成】木香（不见火） 神曲（锉，炒） 陈皮（去白） 麦芽（炒） 黄耆（去芦） 生姜（切，炒黑） 阿胶（锉，蛤粉炒） 白芍药各一钱 糯米一合半 芦根（洗净）三钱 甘草（炙）三钱

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏，煎至八分，去滓，斡开口灌，连接煎，再灌，知人事。

【主治】妇人欲产忽然气血晕闷，不省人事，因用力太过，脉理衰微，精神困倦，心胸痞闷，眼晕口噤，面青发直。

06960 来苏散

【方源】《医略六书》卷二十九。

【组成】黄耆三两（酒炒） 阿胶三两（粉炒） 白芍一两半（酒炒） 神曲二两（炒炭） 炙草一两 麦芽二两（炒炭） 木香一两 糯米一合 生姜三片

【用法】上为散。每服四钱，水煎，去滓温服

【主治】临产胃虚挟滞，困乏，脉软涩者。

【方论选录】临产坐草过劳，胃虚元气困乏，挟食滞而胸腹疼痛，无力送胎以分娩焉，黄耆补胃气之困乏，阿胶补阴血之虚衰，白芍敛阴和血脉，木香调气醒脾胃，神曲以消其食，麦芽以化其滞，糯米养脾益胃，炙草益胃缓中，稍佐生姜以温胃气也。为散水煎，使食滞消化，则胃气完复，而胸腹融和，安有疼痛之患？气力自然涌出，临产应无不顺之虞矣。

06961 来痛饮

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】当归 元胡 红花 没药各等分

【用法】上为末。每服二钱，黄酒送下。

【主治】妇人经水欲来作痛者。

06962 扶元汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】人参 白术各二钱 石斛 白茯苓各一钱五分 肉桂一钱 升麻一钱 山茱萸 黄连各一钱二分

【用法】加大枣二个，水煎，食前服。

【主治】脾胃久虚，泄泻不止，神思倦怠，饮食少进，四肢痿软。

06963 扶中汤

【方源】《袁中参西》上册。

【组成】于术（炒）一两 生山药一两 龙眼肉一两

【主治】泄泻久不止，气血俱虚，身体羸弱，将成劳瘵之候。

【加减】小便不利者，加椒目（炒、捣）三钱。

【临证举例】久泻不止 一妇人，年四十许，初因心中发热，气分不舒，医者投以清火理气之剂，遂泄泻不止。更延他医，投以温补之剂，初服稍轻，久服则泻仍不止，一日夜四五次，迁延半年，

以为无药可治。后愚为诊视，脉虽濡弱，而无弦数之象，知犹可治。但泻久身弱，虚汗淋漓，心中怔忡，饮食减少。踌躇久之，为拟此方，补脾兼补心肾。数剂泻止，而汗则加多，遂于方中加龙骨、牡蛎（皆不用煅）各六钱，两剂汗止，又变为漫肿。盖从前泻时，小便短少，泻止后，小便仍少，水气下无出路，故蒸为汗，汗止又为漫肿也。斯非分利小便，使水下有出路不可。特其平素常觉腰际凉甚，利小便之药，凉者断不可用。遂用此方加椒目三钱，连服十剂痊愈。

06964　扶危散

【方源】 方出《医学入门》卷八，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷九。

【组成】 防风五钱　牵牛　大黄各三钱　斑蝥一钱　麝香三分　雄黄二钱半

【用法】 上为末。每服三钱，遇伤时滚水调下。利下恶物，从小便而出。

【主治】 疯犬咬。

06965　扶弱汤

【方源】 《辨证录》卷八。

【组成】 熟地一两　石斛　麦冬各五钱　北五味子一钱　巴戟天　菟丝子各三钱　山茱萸五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 人房纵欲，不知葆涩，以致损精而成痨症，形体瘦削，面色萎黄，两足乏力，膝细腿摇，皮聚毛落，不能任劳，难起床席，盗汗淋漓。

06966　扶脾丸

【方源】 《兰室秘藏》卷上。

【组成】 干生姜　肉桂各五分　干姜　藿香　红豆各一钱　白术　茯苓　橘皮　半夏　诃子皮　炙甘草　乌梅肉各二钱　大麦芽（炒）　神曲（炒）各四钱

【用法】 上为细末，荷叶裹，烧饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前白汤送下。

【主治】 ①《兰室秘藏》：脾胃虚寒，腹中痛，溏泻无度，饮食不化。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：胃脘胀痛，肠寒泄泻，消化不良，气逆打嗝，呕吐吞酸，面黄肌瘦，午后潮热，倦怠少食，精神衰弱。

06967　扶气止啼汤

【方源】 《傅青主女科》卷下。

【组成】 人参一两　黄耆一两（生用）　麦冬一两（去心）　当归五钱（酒洗）　橘红五分　甘草一钱　花粉一钱

【用法】 水煎服。一剂而啼即止，二剂不再啼。

【功用】 补气。

【主治】 妊娠气虚子鸣，怀胎至七八个月，忽然儿啼腹中，腰间隐隐作痛。

【方论选录】 此方用人参、黄耆、麦冬以补肺气，使肺气旺，则胞胎之气亦旺；胞胎之气旺，则胞中之子气有不随母之气以为呼吸者，未之有也。

06968　扶正消毒饮

【方源】 《中西医结合皮肤病学》。

【组成】 黄耆 15 克　当归 9 克　野菊花 9 克　银花 15 克　蒲公英 15 克　紫花地丁 15 克　连翘 15 克

【功用】 养血益气，清热解毒。

【主治】 慢性疖肿、慢性毛囊炎、囊肿性痤疮、穿凿性脓肿性毛囊周围炎、脓疱性酒渣痤疮等属正虚毒热证者。

【方论选录】 消毒饮之药加补气升提之黄耆，养血调血之当归，以扶正气，助清热解毒药之作用。

06969　扶正散邪汤

【方源】 《傅青主男科》卷上。

【组成】 人参　半夏　甘草各一钱　白术　茯苓　柴胡各三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 正气虚而邪气入，头痛发热，右寸脉大于左寸者。

06970　扶老理中散

【方源】 《外台》卷六引《小品方》。

【异名】 理中汤（《圣济总录》卷三十八）。

【组成】 人参五两　干姜六两　白术五两　麦门冬三两（去心）　附子三两（炮）　茯苓三两　甘草五两（炙）

【用法】 上为散。临病煮取三合，白汤饮和方寸匕，一服不效又服。作丸长服亦得，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，酒送下。

【主治】 羸老冷气恶心，食饮不化，腹虚满，拘急短气，及霍乱呕逆，四肢厥冷，心烦气闷流汗。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、猪肉、桃、李、雀肉、大醋。

【备考】 本方方名，《医心方》引作“扶老理中汤”。

06971　扶阳助胃汤

【方源】 《卫生宝鉴》卷十三。

【异名】 扶阳益胃汤（《金匮翼》卷六）。

【组成】 干姜（炮）一钱半　拣参　草豆蔻仁　甘草（炙）　官桂　白芍药各一钱　陈皮　白术　吴茱萸各五分　黑附子（炮，去皮）二钱　益智仁

五分

【用法】 上㕮咀，作一服，水三盏，加生姜三片，大枣两个，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】 客寒犯胃，胃脘当心而痛。

【方论选录】 ①《卫生宝鉴》：《内经》曰，寒淫于内，治以辛热，佐以苦温。附子、干姜大辛热，温中散寒，故以为君；草豆蔻仁、益智仁辛甘大热，治客寒犯胃为佐；脾不足者以甘补之，炙甘草甘温，白术、橘皮苦温，补脾养气；水挟木势，亦来侮土，故作急痛，桂辛热以退寒水，芍药味酸以泻木克土，吴茱萸苦热，泄厥气上逆于胸中，以为使也。②《医方考》：附子、干姜、官桂、吴茱萸、草豆蔻、益智仁，辛热之品也，用之所以扶阳；邪之所凑，其气必虚，故用人参、白术、甘草甘温之品以助胃；用芍药者，取其味酸，能泻土中之木；用陈皮者，取其辛香，能利腹中之气。

【临证举例】 胃脘痛 两浙江淮都漕运使崔君长男云卿，年二十有五，体本丰肥，奉养膏粱，时有热证。友人劝食寒凉物，及服寒凉药，于至元庚辰秋，病疟久不除，医以砒霜等物治之，新汲水送下，禁食热物，疟病不除，反添吐泻，脾胃复伤，中气愈虚，腹痛肠鸣，时复胃脘当心而痛，不任其苦。屡易医药，未尝有效，至冬还家，百般治疗而不愈，延至四月间，因劳役烦恼过度，前证大作，请予治之，具说其由。诊得脉弦细而微，手足稍冷，面色青黄而不泽，情思不乐，恶人烦冗，饮食减少，微饱则心下痞闷，呕吐酸水，发作疼痛，冷汗时出，气促闷乱不安，须人额相抵而坐，少时易之。予思《内经》云，中气不足，溲便为之变，肠为之苦鸣。下气不足，则为痿厥心冤。又曰，寒气客于肠胃之间，则卒然而痛，得炅则已。炅者，热也，非甘辛大热之剂，则不能愈，遂制此方。三服大势皆去，痛减过半。至秋先灸中脘三七壮，以助胃气；次灸气海百余壮，生发元气，滋荣百脉。以还少丹服之，则喜饮食，添肌肉，润皮肤。明年春，灸三里二七壮，乃胃之合穴也，亦助胃气，又引气下行。春以芳香助脾，复以育气汤加白檀香平治之。戒以惩忿窒欲，慎言语，节饮食，一年而平复。

06972 扶劳四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】 当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 熟地黄 黄耆（蜜炙） 麦门冬（去心）各一钱 柴胡 地骨皮 秦艽 丹参 天花粉各七分 陈皮 香附 砂仁 枳壳（麸炒） 前胡各七分

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 妇人血虚成劳，遍身骨节痠痛，五心烦热，盗汗，不进饮食。

06973 扶命生火丹

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 人参六两 巴戟天一斤 山茱萸一斤 熟地二斤 附子二个 肉桂六两 黄耆二斤 鹿茸二个 龙骨（醋淬）一两 生枣仁三两 白术一斤 北五味四两 肉苁蓉八两 杜仲六两

【用法】 上药各为细末，炼蜜为丸。每日早、晚各服五钱。服三月，自然坚而且久。

【功用】 补命门之火。

【主治】 阴痿。人有天分最薄，无风而寒，未秋而冷，遇严冬冰雪，虽披重裘，其身不温，一遇交感，数合之后，即望门而流，此命门之火太微也。

【方论选录】 此方填精者，补水以补火也。何加入气分之药？不知气旺而精始生，使但补火而不补气，则无根之火，止能博旦夕之欢，不能邀久长之乐。惟气旺则精更旺，精旺则火既有根，自能生生于不已。况气乃无形之象，以无形之气补无形之火，则更为相宜，所以精又易生，火亦易长耳。

06974 扶桑至宝丹

【方源】《寿世保元》卷四引胡僧方。

【异名】 扶桑丸（《医方集解》）、桑麻丸（《医级》卷八）。

【组成】 嫩桑叶（采数十斤，择家园中嫩而存树者，长流水洗，摘去蒂，晒干） 巨胜子

【用法】 炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，白开水送下，每日二次。三月之后，体生轸粟；此为药力所行，慎勿惊畏，旋则遍体光洁如凝脂然，服至半年之后，精力转生，诸病不作，久服不已，自登上寿。

【功用】 ①《寿世保元》引胡僧方：步健眼明，须白返黑。消痰生津，补髓添精。②《医方集解》：除风湿，润五脏。

【主治】《全国中药成药处方集》（南京方）：眼目昏花，咳久不愈，肢麻便燥。

【方论选录】《医方集解》：此足少阴、手足阳明药也。桑乃箕星之精，其木利关节、养津液，其叶甘寒，入手足阳明，凉血燥湿而除风；巨胜甘平色黑，益肾补肝，润脏腑，填精髓。夫风湿去，则筋骨强；精髓充，则容颜泽，却病乌髭，不亦宜乎。

【备考】《医方集解》本方用嫩桑叶（晒干）一斤，巨胜子四两，白蜜一斤。

06975 扶脾生脉散

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】黄耆补血汤。

【组成】人参 当归 白芍各一钱 紫菀 黄耆各二钱 麦门冬 五味 甘草各五分

【用法】水煎，食后温服。

【主治】衄血，吐血不止，脾胃虚弱，气喘，精神短少。

06976 扶脾逐水丸

【方源】《玉案》卷五。

【组成】白茯苓 云白术 山药 苦葶苈 花椒目 巴戟各五钱 黄连 黑丑各八钱 北五味二钱 海金沙 泽泻各一两

【用法】上为末，荷叶煎汤为丸。每服三钱，空心白滚汤送下。

【主治】通身水肿，气往上逆，小便竟无，日不能食，夜不能卧。

06977 扶桑延年至宝丹

【方源】《集验良方》卷二。

【组成】巨胜子一斤 枸杞子一斤 何首乌一斤 冬青八两 破故纸八两 山萸肉一斤 巴戟四两 桑叶十斤 柏子仁一斤 蛇床子一斤 川椒半斤

【用法】上为极细末，同金樱子膏十五斤、白蜜二十斤，同炼至滴水成珠，和群药为丸，如梧桐子大。每日清晨淡盐汤送服三钱，晚上临睡时再服三钱。

【功用】养心血，健脾胃，理气和中，宽胸益志，添精补髓，明目乌须，壮阳固齿，通五脏，杀九虫，益元神，却百病，延年益寿，种子。

06978 拒风丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【异名】拒风丹(《朱氏集验方》卷一)。

【组成】天南星 半夏（汤洗七次，切，焙）各二两 藁本（去土） 细辛（去叶土） 川芎 防风（去芦头） 羌活（去芦头） 独活（去芦头）各一两

【用法】上为细末，生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后生姜汤送下。

【主治】风虚痰厥，头疼旋运，如在舟车之上。

06979 拒风丹

【方源】《本事》卷一。

【组成】川芎四两 防风（去叉股者）一两半 天麻（去芦）一两 甘草一两（炙） 细辛（去叶）三钱半 荜茇半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作十丸。每服一丸，细嚼，荆芥汤或温酒送下。

【主治】一切风；伤风，头痛鼻塞，项强筋急。

【方论选录】《本事方释义》：川芎气味辛温上行头目，入足少阳、厥阴，引经之风药；天麻气味辛平，入足阳明、厥阴，能熄肝风、止头晕；甘草气味甘平，通和诸经络；防风气味辛甘温，入手、足太阳之风药；荜茇气味辛温，入足太阴，能通中宫之阳；细辛气味辛温，入足少阴。此乃偶因气郁伤风，头痛项强，鼻塞，痰逆如厥，辛散诸品佐以甘缓，则外邪去而正不伤，以之为丹丸者，亦缓治之法也。

06980 折郁汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】白术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂 丁香 木通 白蔻仁

【主治】水郁。

06981 抑上丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】白术 黄芩 黄连各一两 石膏二两 青黛五钱

【用法】上为末，蒸饼为丸服。

【主治】痰因火动，胸膈痞满，头目昏眩。

06982 抑气丸

【方源】方出《丹溪心法》卷五，名见《赤水玄珠》卷二十。

【组成】四物汤加陈皮 玄胡索 牡丹 甘草

【用法】痛甚者，豆淋酒送下；痛缓者，加童便煮莎，入炒条芩，研末为丸服。

【主治】临经来时肚痛者。

06983 抑气散

【方源】《济生》卷六。

【组成】香附子（炒净）四两 茯神（去木）一两 橘红二两 甘草（炙）一两

【用法】上为末。每服二钱，食前用沸汤调服。

【主治】①《济生》：妇人气盛于血，变生诸证，头晕膈满。②《一盘珠》：气盛血衰，月经前后不如期，不孕。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴少阳药也。经曰：高者抑之。香附能散郁气，陈皮能调诸气，茯神能安心气，甘草能缓逆气，气得其平，则无亢害之患矣。

【备考】本方改为汤剂，名“抑气汤”（见《中国医学大辞典》）。

06984 抑气散

【方源】《医级》卷八。

【组成】乌药二两 紫苏 广皮 槟榔 枳壳

砂仁各一两　沉香五钱　香附半斤

【用法】 上为末，每服一钱，白汤调服。

【主治】 气道壅滞，不得升降，脉盛气粗，或胸膈痰饮窒碍，或胁肋肝邪逆滞等气实诸痛者。

06985　抑火汤

【方源】 《医学集成》卷二。

【组成】 石膏　黄芩　桑皮　地骨皮　天冬　麦冬　知母　贝母　花粉　桔梗　甘草

【主治】 火郁肺金为喘。

06986　抑火汤

【方源】 《外科医镜》。

【组成】 熟地一两　山萸肉五钱　麦冬五钱　北五味二钱　山药五钱　茯苓五钱　紫石英三钱　上瑞桂一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 阴火喉痹。

06987　抑阴散

【方源】 《保婴撮要》卷十五。

【异名】 回阳玉龙膏。

【组成】 草乌（炒）二两　南星　白芷各一两　肉桂五钱　赤芍药（炒）一两

【用法】 上药各为末，葱汤调涂；热酒亦可。内服托里回阳汤，以回阳气。

【功用】 助阳行阴。

【主治】 小儿疮疡，元气虚寒，不能消散，或腹痛泄泻，呕吐不食，手足或冷，或不溃敛，筋挛骨痛，属纯阴之症者；小儿跌扑损伤，因敷凉药，肿坚不散；痈肿肉色不变，一切冷症。

06988　抑扶煎

【方源】 《景岳全书》卷五十一。

【组成】 厚朴　陈皮　乌药各一钱五分　猪苓二钱　泽泻二钱　炙甘草一钱　干姜（炮）一二钱　吴茱萸（制）五七分

【用法】 水一钟半，煎七分，食远温服。

【主治】 气冷阴寒或暴伤生冷，致成泻痢，初起血气未衰，脾肾未败，或胀痛，或呕恶，寒湿伤脏，霍乱邪实者。

【加减】 如气滞痛甚者，加木香五七分，或砂仁亦可；如血虚多痛者，加当归二钱；如寒湿胜者，加苍术一钱半。

【方论选录】 《证因方论集要》：陈、朴燥脾去湿，猪、泽分消水邪，乌药、甘草和中快胃，黑姜、吴萸暖中温寒。

06989　抑肝散

【方源】 《医便》卷四。

【异名】 抑肝开郁汤（《便览》卷二）。

【组成】 柴胡二钱半　赤芍药　牡丹皮（去心）各一钱半　青皮（炒）二钱　当归五分　生地黄五分　地骨皮一钱　香附（童便炒）一钱　川芎七分　连翘五分　山栀仁（炒）一钱　甘草二分　神曲（炒）八分

【用法】 水煎，空心服；滓再煎，下午服。夜服交感丹一丸。

【主治】 寡居独阴妇人，恶寒发热，全类疟者，久不愈，即成瘵疾者。

06990　抑青丸

【方源】 《丹溪心法》卷四。

【组成】 黄连半斤

【用法】 上为末，蒸饼糊为丸服。

【功用】 ①《丹溪心法》：泻肝火。②《医学纲目》：伐心经之火。

【主治】 ①《丹溪心法》：胁痛，属肝火者。②《宋氏女科》：怀妊三月，恶阻不止，饮食不进。

【备考】 《医方类聚》引《新效方》本方用黄连（锉碎，姜汁拌炒），为末，粥为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，温水送下。

06991　抑青丸

【方源】 《医方考》。

【组成】 黄连（吴茱汤润一宿）

【用法】 晒干为末，为丸服。

【功用】 《医方集解》：泻肝火。

【主治】 肝火胁痛，肝厥头痛。

①《医方考》：左胁作痛。②《张氏医通》：肝火胁下急痛。③《金匮翼》：肝火厥逆，上攻头脑，致肝厥头痛，痛在巅顶者。

【备考】 《张氏医通》本方用川黄连、吴茱萸各等分。用水同煎至水干，拣去吴茱萸，取黄连焙燥，一味为末，滴水为丸。每服四五十丸，空心临卧、沸汤陈酒送下。

06992　抑金散

【方源】 《简易方》引利伯善方（见《医方类聚》卷七十九）。

【组成】 细辛　白芷　防风　羌活　川归　半夏　川芎　桔梗　陈皮　茯苓各等分

【用法】 上㕮咀。每服二钱，加薄荷，生姜，水煎服。

【主治】 肺热，鼻塞，涕浊。

06993　抑痰丸

【方源】 《丹溪心法》卷二。

【组成】 瓜蒌仁一两　半夏二钱　贝母三钱

【用法】 上为末，蒸饼为丸，如麻子大。每服一百丸，生姜煎汤送下。

【主治】 ①《丹溪心法》：痰症。②《证治汇补》：痰结胸喉。

【方论选录】《医略六书》：湿热内结，窒塞咽喉，故胸膈不利，咽物亦不能遽下焉。蒌仁泻热化燥痰，贝母解郁清热痰，半夏化痰功专燥湿，使湿热消化，则结痰自开，而胸喉无不爽然，何有咽物不能遽下之患？蒸饼以消之，姜汤以开之，洵为化痰润燥开结之剂，乃痰结胸喉不顺之专方。

06994 抑木和中汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】 蒺藜四钱 郁金二钱 青皮一钱 广皮一钱 茅术一钱（炒） 厚朴一钱 当归二钱 茯苓二钱 白术一钱 木香五分 砂仁一钱 佛手五分 白檀香五分

【主治】 肝气太强，脾胃受制，中脘不舒，饮食减少，脉左关甚弦，右部略沉细。

【临证举例】 脘痞 无锡顾左，患中脘不舒，饮食减少，诊其脉左关甚弦，右部略沉细。前医与承气汤重药轻投，未效。予为制抑木和中汤三剂而愈。

06995 抑阳酒连散

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 生地黄 独活 黄柏 防风 知母各三分 蔓荆子 前胡 羌活 白芷 生草各四分 黄芩（酒制） 寒水石 栀子 黄连（酒制）各五分 防己三分

【用法】 作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，大热服。

【功用】 抑阳缓阴。

【主治】 神水紧小，渐如菜子许，及神水外围相类虫蚀者，然皆能睹物不昏，微有眊矇羞涩之证。

【方论选录】 此方以生地黄补肾水真阴为君；独活，黄柏、知母俱益肾水为臣；蔓荆子、羌活、防风、白芷群队升阳之药为佐者，谓既抑之，令其分而更不相犯也；生甘草、黄芩、栀子、寒水石、防己、黄连不走之药为使者，惟欲抑之，不欲祛除也；诸用酒制者，为引导也。

06996 抑肝导赤汤

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】 柴胡 钩藤 当归 川芎 羌活 防风 白术 茯苓 栀子（炒） 生地 木通 生草 炙草

【主治】 一切手搐病，素弱者。

06997 抑肝扶脾汤

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】 人参 白术（土炒） 黄连（姜炒） 柴胡（酒炒） 茯苓 青皮（醋炒） 陈皮 白芥子 龙胆草 山楂 神曲（炒） 炙甘草

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 小儿肝疳，病势稍退者。

06998 抑肝消毒散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 山栀 柴胡 黄芩 连翘 防风 荆芥 甘草 赤芍 归尾 灯心 金银花

【主治】 肝风郁滞，耳内生疮有脓者。

【加减】 渴，加天花粉。

06999 抑肝清气饮

【方源】《内经拾遗》卷一。

【组成】 香附（便制）一钱 苍术（泔浸）八分 抚芎七分 神曲（炒）八分 白茯苓（去皮）七分 栀子（姜汁炒黑）七分 黄连（姜汁炒）七分 枳实（麸炒）七分 甘草三分 沉香（磨水）二分 山楂七分

【用法】 上水二钟，加生姜三片，煎八分，食后服。

【主治】 怒气伤肝而致煎厥，郁结痞闷。

【加减】 如脾胃虚弱，暂减栀子，加土炒白术、白芍、陈皮各八分；膈上胀闷，加桔梗、槟榔各五分；有痰，加贝母八分。

07000 投杯汤

【方源】《医心方》卷九引《范汪方》。

【组成】 款冬花四十个 细辛一两 紫菀二两 甘草二两 五味子半斤 杏仁四十个 半夏半升（洗） 桂心二两 麻黄（㕮咀）二两 干姜二两

【用法】 上㕮咀。以水八升，煮取二升，分再服。温卧汗出。

【主治】 久嗽上气，胸中寒冷，不能得食饮，卧不安席，牵绳而起，咽中如水鸡声。

【宜忌】《外台》引《古今录验》：忌海藻、菘菜、生菜、羊肉、饧。

07001 投杯汤

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【异名】 麻黄石膏汤（《千金》卷十八）。

【组成】 小麦一升 麻黄四两（去节） 厚朴五两 石膏如鸡子大 杏仁五合

【用法】 以水一斗，煮取小麦熟，去麦纳药，煮取三升，分三服。

【主治】 久逆上气胸满，喉中如水鸡鸣。

【加减】 咳嗽甚者，加五味子、半夏（洗）各半升，干姜二累。

【备考】 本方方名，《千金》（注文）引作“小投杯汤”。

07002 护元丹

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】 防风 白鲜皮 麻黄 大枫肉（去油） 当归 牡丹皮 山药 菟丝子 牛膝 川续断 黄柏 黄蓍各二两 泽泻 白茯苓 黄芩 广桂枝 乳香 紫荆皮 没药 知母 白芷 荆芥各一两 熟地四两 胡麻四合

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。先用愈风汤洗浴，切要避风。每服一百丸，食后暖酒送下。即睡取汗。隔五日取汗一次，三次即愈。

【主治】 干疯，白癜风。

07003 护从丸

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 川椒五钱 雄黄五钱 杏仁一百粒（去皮尖）

【用法】 上为末。烧酒打飞罗面糊为丸，如梧桐子大。杨梅疮发疮时，令侍从人服之。每服十余丸，空心白滚汤送下。

【功用】 预防杨梅疮传染。

07004 护心散

【方源】《本草纲目》卷二十四引《李嗣立外科方》。

【异名】 内托散、乳香万全散。

【组成】 真绿豆粉一两 乳香半两

【用法】 加灯心同研和匀，每服一钱，以生甘草浓煎汤调下，时时呷之。若毒气冲心，有呕逆之证，大宜服此。服至一两，则香彻疮孔中。凡有疽疾，一日至三日之内，宜连进十余服，方免变证，使毒气外出。服之稍迟，毒气内攻，渐生呕吐，或鼻生疮菌，不食即危矣。四五日后，亦宜间服之。

【功用】 出毒气，预防毒气内攻。

【主治】 疽疾初期，及毒气冲心，呕逆者。

【方论选录】 绿豆压热，下气消肿解毒；乳香消诸痈肿毒。服之一两，则香彻疮孔中。

07005 护心散

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】 远志肉（去心，甘草水泡，炒）一两五钱 绿豆粉二两 甘草（炒）五钱 明乳香（箬上炒）二两 辰砂（研细，水飞）二钱

【用法】 上为细末。每服三钱，开水送下。

【主治】 井口疽、胁痈、肚痈、穿骨疽、鱼口、臀痈。

07006 护舌丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 丹皮三钱 麦冬三钱 桔梗三钱 甘草一钱 玄参五钱 人参一钱 熟地一两 五味子一钱 黄连三分 肉桂一分

【用法】 水煎服。一剂而舌之血即止，连服四剂，而舌之烂亦愈。

【功用】 大补心肾，交济心肾。

【主治】 心火太炎，肾中之水，不来相济，致舌上出血不止者，舌必红烂，其裂纹之中，有红痕发现，血从痕中流出，虽不能一时杀人，然而日加顿困，久亦不可救援。

07007 护命散

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 枯矾一钱 五倍子五钱 龙骨（煅过）一钱五分

【用法】 上为细末。以津唾调，塞满脐中，外用绢条扎定，过夜即止。

【主治】 盗汗，自汗。

07008 护胎饮

【方源】《古方汇精》卷三。

【组成】 川芎六分 归身 炒白芍 云苓各一钱 上党参（蜜炙） 大生地（炙）各三钱 焦白术 制杜仲 川续断各一钱五分 炙草五分 丹皮八分 淮药二钱 姜皮一分 南枣二枚

【功用】 固气安胎。

【主治】 经虚胎漏，怀孕二三月，忽然腹痛下血，欲小产者，及已小产者。

07009 护膜散

【方源】《金鉴》卷六十七。

【组成】 白蜡 白及各等分

【用法】 上为细末。轻剂一钱，中剂二钱，大剂三钱，黄酒调服；米汤亦可。

【功用】 防止痈疽透内膜。

【主治】 渊疽，及凡肋、胸、胁、腰、腹空软之处发痈疽，当在将溃未溃之际者。

07010 护心夺命丹

【方源】《广笔记》卷一。

【组成】 肉豆蔻一两五钱 白芍药（酒炒）六两 炙甘草一两 广橘红三两 白扁豆（炒）三两 滑石六两 赤曲（炒，研）四两 莲肉（去心，炒焦黄）五两 绿色升麻（醋炒）二两五钱 川黄连（切片，拌好酒，同吴茱萸浸二宿，瓦上炒干，分开连、萸各贮，用净黄连）三两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三钱，白汤送下。如噤口痢并虚弱人，即以前方中去豆蔻，另以人参三钱煎浓汤送下。

【主治】 虚弱人患痢及痢久脾虚者。

【加减】 白痢，加茱萸一两。

07011 护阳和阴汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 白芍五钱 炙甘草二钱 人参二钱 麦冬（连心炒）二钱 干地黄（炒）三钱

【用法】 水五杯，煮取二杯，分二次温服。

【主治】 温病热入血室，医与两清气血，邪去其半，脉数，余邪不解者。

【方论选录】 大凡体质素虚之人，驱邪及半，必兼护养元气，佐以清邪。故以参、甘护元阳，白芍、麦冬、生地和阴清邪也。

07012 护胃承气汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 生大黄三钱 元参三钱 细生地三钱 丹皮二钱 知母二钱 麦冬（连心）三钱

【用法】 水五杯，煮取二杯，先服一杯，得结粪，止后服；不便，再服。

【主治】 温病下后数日，热不退，或退不尽，口燥咽干，舌苔干黑，或金黄色，脉沉而有力者。

07013 护眉神应散

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 炉甘石一两（煅透，童便淬七次） 珍珠二颗（大如绿豆以上者，纳通草中煅之，珠爆即速取出） 血琥珀三分 真梅片二分 半两钱 五铢钱（俗名马镫钱） 开元钱各一个（皆煅红，醋淬七次）

【用法】 上为细末。乳调涂眉上，一日二三次。

【主治】 一切眼疾，无论气蒙、火蒙、内螺、云翳，或瞳仁反背，未过十年者。

【加减】 若加薄荷冰二分更效。

【临证举例】 目生云翳 一室女，病目年余，医治无效，渐生云翳，愚为出方，服之见轻，停药后仍然反复。后得此方，如法制好，涂数次即见轻，未尽剂而愈。

07014 报恩丸

【方源】《一草亭》。

【组成】 川黄连一两 白羊肝一具（去筋膜，忌铁器）

【用法】 以黄连末和肝于砂盆内，研令极细，丸如梧桐子大。每服三十丸，以滚水送下，连作五剂。

【主治】 眼目内障等一切目疾。

【宜忌】 忌猪肉、冷水、雄鸡。

07015 拟金丸

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 草乌头（生，去皮脐）二两半 骨碎补（去毛）一两半 狗脊（去毛）一两 五灵脂一两 马蔺花一两半 地龙（去土）半两 乳香（研）一两 枫香脂（研）一两 萆薢 一两半

【用法】 上九味，将七味为末，入研者二味和匀，醋煮面糊为丸，如小豆大。每服三丸至五丸，空心、临卧各一服，荆芥汤送下。

【主治】 偏风半身不随，不知痛痒。

07016 连归丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 全当归 酒黄连各四两 防风 枳壳各二两

【用法】 上为末，用前浸黄连酒打糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，米饮送下。

【主治】 痔漏及脱肛便血。

【宜忌】 忌羊、鱼、鸡、鹅、煎炒热物。

07017 连朴饮

【方源】《霍乱论》卷四。

【组成】 制厚朴二钱 川连（姜汁炒） 石菖蒲 制半夏各一钱 香豉（炒） 焦栀各三钱 芦根二两

【用法】 水煎，温服。

【功用】 行食涤痰。

【主治】 湿热蕴伏而成霍乱。

【方论选录】《温病学讲义》：本方以川连苦寒清热化湿，厚朴苦温理气化湿，半夏降逆和胃，菖蒲芳香化浊，栀子、豆豉清宣郁热，芦根清利湿热，生津止渴。

【备考】 本方方名，《温病学讲义》引作“王氏连朴饮”。

07018 连壳丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 黄连 枳壳各二两（锉）

【用法】 上用槐花四两同炒，去槐花，为末，蒸饼为丸服。

【功用】 解络脉之结。

【主治】 内伤经络便血。

【备考】 方中槐花用量原缺，据《杂病源流犀烛》补。

07019 连茱丸

【方源】《医统》卷五十六。

【组成】 黄连（炒） 山栀（炒） 滑石 吴茱萸（泡）各五钱 荔枝核（烧存性）三钱

【用法】 上为末，姜汁为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】 热乘心痛。

07020 连理汤

【方源】《证治要诀类方》卷一。

【组成】 理中汤加茯苓 黄连

【用法】 上为末。每服二钱，沸汤点服，不拘时候。如中暑作渴，小便赤涩，每服半钱，温热水调服。

【主治】 脾胃虚寒，内蕴湿热，泻痢烦渴，吞酸腹胀，小便赤涩者。

①《证治要诀类方》：中暑作渴，小便赤涩；脾寒少气，或盛暑又复内伤生冷，泄痢，饮食不入，烦躁，渴甚引饮，所饮少而常喜温，脉细者。②《张氏医通》：胃虚挟食，痞满发热。③《证治汇补》：脾虚肝郁，吞酸腹胀。

【备考】 本方改作丸剂，名"连理丸"（见《中国医学大辞典》）。

07021 连梅汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 云连二钱 乌梅（去核）三钱 麦冬（连心）三钱 生地三钱 阿胶二钱

【用法】 以水五杯，煮取二杯，分二次服。心热烦躁神迷甚者，先与紫雪丹，再与连梅汤。

【主治】 暑邪深入少阴消渴者，入厥阴麻痹者，及心热烦躁神迷甚者。

【加减】 脉虚大而芤者，加人参。

【方论选录】 肾主五液而恶燥，暑先入心，助心火独亢于上，肾液不供，故消渴也。再心与肾均为少阴，主火，暑为火邪，以火从火，二火相搏，水难为济，不消渴得乎？以黄连泻壮火，使不烁津，以乌梅之酸以生津，合黄连酸苦为阴；以色黑沉降之阿胶救肾水，麦冬、生地合乌梅酸甘化阴，庶消渴可止也。肝主筋而受液于肾，热邪伤阴，筋经无所秉受，故麻痹也。再包络与肝均为厥阴，主风木，暑先入心，包络代受，风火相搏，不麻痹得乎？以黄连泻克水之火，以乌梅得木气之先，补肝之正，阿胶增液而熄肝风，冬、地补水以柔木，庶麻痹可止也。心热烦躁神迷者，先与紫雪丹者，开暑邪之出路，俾梅、连有入路也。

07022 连萝丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 黄连一两半（用吴萸、益智各炒过一半，去萸、智） 萝卜子一两半 香附 山楂各一两 川芎 山栀 三棱 莪术 神曲 桃仁各五钱

【用法】 上为末，蒸饼为丸服。

【主治】 妇人死血、食积、痰饮成块在两胁，动作雷鸣，嘈杂眩晕，身热时作时止。

07023 连翘丸

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】 连翘 玄参 木香 升麻各一两半 大黄（蒸）半两 昆布（洗去咸，焙） 大麻子（微炒，别捣研）各二两 枳壳（去瓤，麸炒） 一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至二十丸，食前米饮送下。

【主治】 瘰疬寒热结核，在颈腋之下，坚痛。

07024 连翘丸

【方源】《济生》卷八。

【组成】 薄荷（新者）二斤（裂取汁） 好皂角一挺（水浸去皮，裂取汁，以上二味同于银石器内熬成膏） 青皮一两 连翘半两 陈皮一两（不去白） 皂角子（慢火炮去皮，取皂子仁，捣罗为末）一两半 黑牵牛一两半（半生半炒）

【用法】 上为末，用前膏子为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后煎连翘汤送下。

【主治】 瘰疬结核，破或未破者。

07025 连翘汤

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 黄芩 黄连 当归 赤芍各一钱五分 连翘一钱 天花粉 玄参各七分 枳壳五分

【用法】 水二钟，煎八分，食远服。

【主治】 一切牙痛。

【加减】 火胜则痛，必牵扯腮颧，加石膏；风胜则肿，加防风；气胜则长，加栀子；气郁则胀，亦加栀子；痰胜则木，加贝母，外以醋漱之，去其痰涎，泻其风热；瘀凝则黑，加使君子肉；虫蚀则蛀，加槟榔，外以五灵脂汤化漱之，以杀其虫。

07026 连翘饮

【方源】《活人书》卷二十。

【异名】 连翘散（《痘论萃英》）、防风散（《普济方》卷三六九）、上清连翘散（《丹溪心法附余》卷十）。

【组成】 连翘 防风 甘草（炙） 山栀子各等分

【用法】 上为末。每服二钱，水一中盏，煎七分，去滓温服。

【主治】 小儿伤寒、疮疡等一切热证。

①《活人书》：小儿伤寒，一切热。②《痘论萃

英》：小儿一切热及疮疹。③《外科精义》：疮疡疖肿，一切恶疮，疼痛烦渴，大便溏泄，虚热不宁。④《普济方》：疮痘入目生翳。

07027 连翘饮

【方源】《白喉全生集》。

【组成】连翘 桔梗 牛蒡各三钱 僵蚕（姜汁炒） 银花各二钱 黄芩 人中黄各一钱 粉葛 赤芍各一钱五分 薄荷八分 皂刺三针

【用法】水煎服。

【主治】白喉热证尚轻，热邪尚在表者，初起白见于外关，或薄或小，淡红微肿，略痛，声音响亮，牙关饮食稍碍，口干头闷目胀，舌苔与小便微黄。

07028 连翘饮

【方源】《喉证指南》卷四。

【组成】连翘 葛根 牛蒡子 玄参 黄芩 桔梗各二钱 赤芍 栀仁 淡竹叶 甘草 木通各一钱 升麻六分

【用法】水煎服。

【主治】肺胃邪热，咽喉疼痛。

07029 连翘散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【异名】射干连翘汤（《圣济总录》卷一二六）、射干连翘散（《外科发挥》卷五）。

【组成】连翘一两 射干三分 玄参三分 赤芍药半两 木香半两 川芒消一两 川升麻二分 栀子仁半两 前胡半两（去芦头） 当归三分 甘草半两（炙微赤，锉） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，每日三四次。

【主治】瘰疬结肿疼痛，时发寒热。

07030 连翘散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】连翘 鬼箭羽 瞿麦 甘草（炙）各等分

【用法】上为细末。每服二钱，临卧米泔水调下。

【主治】瘰疬结核不消。

07031 连翘散

【方源】《医方类聚》卷七十引《烟霞圣效方》。

【组成】连翘 川椒 青葙子 木贼（去节） 甘菊 甘草各等分

【用法】上为细末。每服二钱，清米泔调，食后服。

【主治】眼目昏暗，不睹光明。

07032 连翘散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】连翘 川芎 白芷 黄连 苦参 荆芥 贝母 甘草 桑白皮 山栀子

【用法】上锉。水煎，食后、临卧服。

【主治】面生谷嘴疮，俗名粉刺。

07033 连翘散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】连翘 葛根 黄芩 赤芍 山栀 桔梗 升麻 麦门冬 牛蒡子 甘草 木通各八分

【用法】水二钟，加竹叶二十片，煎至八分，食远服。

【主治】积饮停痰，蕴热膈上，以致咽喉肿痛，胸膈不利，咳吐痰涎，舌干口燥，无表里症相兼者。

07034 连翘煎

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【组成】连翘 白及 白头翁 牡丹 防风 黄柏 羌活 桂 秦艽 蔹各四两 海藻二两

【用法】上为细末，炼蜜和丸，如大豆大。三岁儿每服五粒至十粒，五岁以意加之，米饮送下。

【主治】小儿无寒热，强健如故，身体结核瘰疬，及心胁腹背里有坚核不消，名为结风气肿。

07035 连蛤散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】黄连 文蛤 黄柏 白芷各等分

【用法】上为末，用水调，摊于碗内，覆于砖上，烧艾熏之，以黑干为度，再研为末。清油调敷。

【主治】头瘙头疮。

07036 连蛤散

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】黄连一钱 蛤粉一钱 枯矾五分 明雄一钱 海螵蛸一钱 黄柏一钱 上片一分 青黛一钱

【用法】上为末。用烛油调刷。

【主治】①《外科真诠》：小儿月蚀疮并黄水疮毒。②《中医皮肤病学简编》：婴儿外耳湿疹。

07037 连蒲散

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】黄连 蒲黄（炒）各一钱二分 黄芩 当归 生地黄 枳壳（麸皮炒） 槐角 芍药 川芎各一钱 甘草五分

【用法】水二钟，煎一钟，食前服。

【主治】①《赤水玄珠》：便血属血热者。②

《济阳纲目》：饮酒过多及食辛辣炙煿，以致蕴热入于肠胃，下血色鲜。

【加减】 如酒毒，加青皮、干葛，去枳壳；湿毒，加苍术、白术。

07038 连翘饮子

【方源】《玉机微义》卷十五。

【异名】 连翘橘叶汤（《疡科选粹》卷四）、连翘饮（《中国医学大辞典》）。

【组成】 青皮 瓜蒌仁 桃仁 橘叶 川芎 连翘 甘草节 皂角针各等分

【用法】 上㕮咀。每服七八钱，水煎，食后细细呷之。

【主治】 乳痈、乳内结核及瘰疬。

①《玉机微义》：乳痈。②《女科撮要》：乳内结核。③《赤水玄珠》：肝胆经气滞，瘰疬结核。

【加减】 已破者，加参、耆、当归；未破者，加柴胡。

07039 连子衢衢方

【方源】《景岳全书》卷六十。

【组成】 白芷 甘菊花各三钱（去梗） 白果二十个 红枣十五个 珠儿粉五钱 猪胰一个

【用法】 上将珠粉研细，余俱捣烂拌匀，外以蜜拌酒酿顿化，入前药蒸过。每晚搽面，早洗去。

【主治】 面鼻雀斑。

07040 连芩茱萸丸

【方源】《医统》卷二十四。

【组成】 黄连一两（炒） 黄芩（炒） 吴茱萸（汤泡）各五钱 苍术（泔水浸）七钱 陈皮一钱

【用法】 上为末，神曲糊为丸，如绿豆大。津送下。

【主治】 湿热吐酸。

07041 连附四物汤

【方源】 方出《丹溪心法》卷五，名见《医方集解》。

【组成】 四物汤加香附 黄连

【主治】 经水过期，作痛，紫黑有块，血热者。

【方论选录】《医方集解》：四物以益阴养血，加黄连以清血热，香附以行气郁。

07042 连柏湿疹膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 黄连 31 克 黄柏 31 克 白芷 31 克 轻粉 3 克 冰片 3 克

【用法】 前三味药，共研为细末，再加后二味研匀，最后加蛋黄油调成油膏。外用。

【主治】 慢性湿疹。

07043 连梅安蛔汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 胡连一钱 炒川椒十粒 白雷丸三钱 乌梅肉两枚 生川柏八分 尖槟榔二个（磨汁，冲）

【功用】 清肝安蛔，止痛定厥。

【主治】 蛔厥。肝火入胃，胃热如沸，饥不欲食，食则吐蛔，甚则蛔动不安，脘痛烦躁，昏乱欲死者。

【方论选录】 方中连、柏、椒、梅之苦辛酸法，泻肝救胃为君；佐以雷丸、槟榔专治蛔厥，使蛔静伏而不敢蠕动，或竟使蛔从大便泻出。

07044 连翘赤豆饮

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 连翘二钱 山栀一钱 通草一钱 赤豆二钱 花粉一钱 香豆豉一钱

【用法】 煎，送保和丸三钱。

【主治】 素积劳倦，再感湿温，误用发表，身面俱黄，不饥溺赤。

07045 连翘败毒散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】 连翘 山栀 羌活 元参 薄荷 防风 柴胡 桔梗 升麻 川芎 当归 黄芩 芍药 牛蒡子

【用法】 加红花，水煎服。

【主治】 发颐。因伤寒汗下不彻，余热之毒不除，致邪结在耳后一寸二三分，或两耳下俱硬肿者。

【加减】 渴，加天花粉；面肿，加白芷；项肿，加威灵仙；大便实，加大黄，穿山甲；虚，加人参。

07046 连翘败毒散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【异名】 连翘散毒散（《杏苑》卷八）、败毒散（《杂病源流犀烛》卷十五）。

【组成】 柴胡 羌活 桔梗 金银花 连翘 防风 荆芥 薄荷叶 川芎 独活 前胡 白茯苓 甘草 枳壳

【用法】 上锉。加生姜，水煎，如疮在上，食后服；在下，食前服。一日至四五日者，二三剂以解其毒，轻者则内自消散。若至六七日不消，宜服真人活命饮，后服托里消毒散调理。

【主治】 ①《古今医鉴》：痈疽，发有疔疮，乳痈，一切无名肿毒，初起憎寒壮热，甚者头痛拘急，状似伤寒。②《杂病源流犀烛》：暑疡。夏月

头面外项赤肿，或咽喉肿痛，或腿足焮肿，长之数寸，不能步履，头痛内燥，日夜发热不止者。

【加减】 如热甚并痛甚，加黄连、黄芩；大便不通，加大黄、芒消下之。

07047 连翘金贝煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 金银花 贝母（土者更佳） 蒲公英 夏枯草各三钱 红藤七八钱 连翘一两或五七钱

【用法】 用好酒二碗，煎一碗服。服后暖卧片时。若阳毒内热或在头顶之间者，用水煎亦可。甚者连用数服。

【功用】《中医方剂临床手册》：清热解毒，消肿排脓。

【主治】 阳分痈毒，或在脏腑肺膈胸乳之间者。

【加减】 火盛烦渴乳肿者，加天花粉。

07048 连翘消毒饮

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 连翘 陈皮 桔梗 玄参 黄芩 赤芍 当归 山栀 葛根 射干 天花粉 红花各一钱 甘草五分 大黄（初起便燥者加之）

【用法】 水二钟，煎八分，食后服。

【主治】 ①《外科正宗》：热毒瘰疬，过食炙煿、醇酒膏粱，以致蕴热腮项成核，或天行亢热，湿痰作肿，不能转侧者。②《金鉴》：过饮药酒，更兼厚味积毒所致之酒毒发初起，生于脊背，皮色不变，累累如弹如拳，坚硬如石，时麻时木，痛彻五内，二便涩滞，周身拘急。

【加减】 有痰者，加竹茹一钱。

07049 连翘消毒饮

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 连翘 川芎 当归 赤芍药 牛蒡子 薄荷 黄芩 天花粉 甘草 枳壳 桔梗各一钱 升麻五分

【用法】 水二钟，煎八分，食后服。

【主治】 时毒表里二症俱罢，余肿不消，疼痛不退者。

【加减】 便燥者，加酒炒大黄。

07050 连翘野菊散

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】 连翘五钱 野菊三钱 栝楼二钱 石膏三钱 地榆三钱 当归五钱 甘草二钱 玄参一两 金银花二两

【用法】 水煎服。

【主治】 发颐生痈初起。

07051 连翘散坚汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 连翘溃坚汤（《玉机微义》卷十五）。

【组成】 柴胡一两二钱 草龙胆（酒洗四次） 土瓜根（酒制）各一两 黄芩（酒炒二次）七钱 当归梢 生黄芩 广茂 京三棱（同广茂酒炒） 连翘 芍药各五钱 炙甘草三钱 黄连（酒炒二次） 苍术各二钱

【用法】 上另秤一半为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服百余丸；一半咬咀。每服五钱，水二盏，先浸多半日，煎至一盏，去滓，临卧热服，去枕仰卧，每口作十次咽之，留一口送下丸药。服毕卧如常，更以龙泉散涂之。

【主治】 马刀。从手足少阳经中来，耳下或至缺盆、或肩上生疮，坚硬如石，动之无根，或生两胁，或已流脓，作疮未破。

【备考】《杏苑》无土瓜根，有天花粉。

07052 连翘橘叶汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】 川芎 连翘 角刺 金银花 橘叶 青皮 桃仁 甘草节各一钱

【功用】 清肝解毒。

【主治】 吹乳初起，肿焮痛甚者。

【备考】 原书用本方治上证，加柴胡。

07053 医痈无双丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 南星一两 半夏一两（二味用白矾、皂角、生姜煎汤浸一日夜透，切片，随汤煮干，去矾、皂、姜不用） 川芎三钱 归身（酒洗） 软石膏各一两 天麻七钱 僵蚕五分 生地黄（酒炒）一两 荆芥穗五钱 辰砂五钱 川独活五钱 乌犀角五钱 白茯苓（去皮） 拣参各一两 远志（甘草水泡，去心） 麦冬（去心） 白术（去芦油） 陈皮（去白）各五钱 酸枣仁（炒）五钱 黄芩三钱 川黄连（去毛）五钱 白附子（煨） 珍珠 甘草各三钱 金箔三十片

【用法】 上为细末，好酒打稀糊为丸，如梧桐子大，金箔为衣。每服五十丸，空心白汤送下。轻者半料奏效，重者全料。

【功用】 祛风化痰，降火补益，养血理脾，宁心定志。

【主治】 痈证。

【临证举例】 一儿十五岁，御女后，复劳役，考试失意，患痈症三年，遇劳则发。用十全大补汤、加味归脾汤之类，更以紫河车生研如膏，入蒸糯米饭为丸，如梧桐子大，每服百丸，一日三四服而

愈。后患遗精，盗汗，发热，仍用本方及六味丸而愈。

【备考】 此方治痫，不拘老幼皆效。

07054 步莲散

【方源】《医方类聚》卷二一一引《琐碎录》。

【组成】 牡蛎（火煅） 白矾（火枯干） 黄丹 密陀僧各等分

【用法】 上为细末。掺脚趾缝中。

【功用】 辟脚汗，除秽气。

07055 坚软汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】 熟地一两 山茱萸四钱 北五味一钱 麦冬三钱 白芍三钱 当归二钱 白术三钱 茯苓一钱 陈皮一钱 生枣仁二钱 芡实三钱

【功用】 竣补肾水。

【用法】 水煎服。

【主治】 疰夏。其人夏月无阴，三伏之时，全无气力，悠悠忽忽，惟思睡眠，懒于言语，或梦遗不已，或夜热不休。

07056 坚齿散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【异名】 坚牙散（《医统》卷六十四引《大典》）。

【组成】 熟铜（末细研）二两半 当归（切，焙）三分 地骨皮 细辛（去苗叶） 防风（去叉）各半两

【用法】 上各为细末，再同研如粉。齿才落时，热粘齿槽中，贴药齿上，五日即定，一月内不得咬硬物。

【主治】 牙齿摇落，复安令着。

07057 吹口丹

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【异名】 吹口散（《准绳·幼科》卷六）。

【组成】 黄连 青黛 孩儿茶 冰片各等分

【用法】 上为末，吹之。

【主治】 口疳。

【备考】《景岳全书》本方用黄连、青黛、儿茶、片脑各等分，为末吹之。

07058 吹云膏

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 细辛一分 升麻 蕤仁各三分 青皮 连翘 防风各四分 柴胡五分 生甘草 当归身各六分 荆芥穗一钱（微取浓汁） 生地黄一钱五分 拣黄连三钱

【用法】 上㕮咀。除连翘外，用澄清净水二碗，先熬余药至半碗，入连翘同熬至一大盏许，去滓，入银石器内，文武火熬至滴水成珠，不散为度，加熟蜜少许，熬匀。点之。

【主治】 ①《兰室秘藏》：目中泪下，及迎风寒泣，羞明怕日，常欲闭目，喜在暗室，塞其户牖，翳膜岁久遮睛。②《东垣试效方》：视物睛困无力，隐涩难开，睡觉多眵。

07059 吹耳散

【方源】《回春》卷五。

【组成】 干胭脂 海螵蛸 龙骨 枯矾 冰片 密陀僧（煅） 胆矾 青黛 硼砂 黄连 赤石脂 减半 麝香少许

【用法】 上为细末。先用绵纸条拭干脓水后，吹入末药。

【主治】 两耳出脓。

07060 吹耳散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】 水龙骨（煅）一钱 海螵蛸一钱 飞青黛一钱 枯矾三分 五倍子（炒黄，一钱） 黄鱼齿（煅）五分 细薄荷五分 梅片三分 川雅连三分 蛀竹屑三分 石榴花瓣（炙脆）一钱

【用法】 上为细末。

【主治】 耳疳脓水不止。

07061 吹喉药

【方源】《疡医大全》卷十七。

【组成】 硼砂二钱五分 雄黄三钱 儿茶一钱 冰片三分 苏薄荷三两（另研）

【用法】 和匀密贮，不可泄气。用芦管吹入少许，或用茶匙挑入舌上噙一刻咽下，每日八、九次。若锁喉风口内干枯者，以井水调灌。

【功用】 开关生津。

【主治】 喉风。

【宜忌】 若脾泄胃弱者，不宜多用。

07062 吹喉散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】 硼砂 龙脑 青黛各一钱 马牙消 白矾 生胆矾各一钱半 消石三钱 白僵蚕二十一个（别研）

【用法】 上各为细末，拌和。每用笔管抄少许，吹在咽喉内。

【主治】 大人、小儿喉闭肿塞，不下水浆。

07063 吹喉散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】 诃子一两（醋浸一宿，去核晒干） 黄芩（酒浸一宿晒干） 胆矾一钱 明矾一钱半 牛蒡子 甘草（生） 薄荷各五钱（一方有百药煎）

【用法】 上为末。先用好生姜擦舌上，每用药一钱，芦管吹入喉中，吐出涎痰，便用热茶吃下，再吹第二次，便用热粥，三次再吹，用热茶或热粥乘热食之，加朴消末少许；如口舌生疮，用药吹之，口中刮去痰涎为妙。

【主治】 咽喉肿痛，急慢喉闭，悬痈，乳蛾，咽物不下。

【备考】 方中黄芩用量原缺。

07064 吹喉散

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【组成】 黄柏（蜜炙）三钱 硼砂（煅过）二钱半 孩儿茶一钱 朱砂八分 寒水石七分 冰片一分

【用法】 上为极细末。先用大黄、防风、羌活、薄荷、黄柏煎汤漱过，再吹入。

【主治】 喉疮生脓不收口者。

【加减】 有虫者，加雄黄一钱。

07065 吹喉散

【方源】《回春》卷五。

【组成】 胆矾 白矾 朴消 片脑 山豆根 辰砂 鸡内金（焙燥）

【用法】 上为极细末。用鹅毛管吹药入喉。

【主治】 一切咽喉肿痛，并喉舌垂下肿痛者。

07066 吹鼻散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】 茅花十茎 乱发一小团

【用法】 上烧为末，研匀。每以少许吹鼻内。

【主治】 鼻衄血不止。

07067 吹鼻散

【方源】 方出《续本事》卷五，名见《普济方》卷五十六。

【组成】 苦丁香（即瓜蒂）十四个 赤小豆 丁香各十四个

【用法】 上药慢火焙干为末，入脑子少许。口内先含水，次将小竹管吹药入鼻中，半盏茶末多人尽为度，候头疼痛时取下。

【主治】 ①《续本事》：鼻痔。②《普济方》：鼻中息肉，及黄疸或暴得黄疾。

07068 吹鼻散

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】 山栀仁 乱头发（烧灰）

【用法】 共为末。吹入鼻中。

【主治】 五脏积热所致之鼻衄。

【备考】 原书治上症，内服加减地黄汤，外用本方吹鼻。

07069 吹翳散

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 白丁香一钱 白及 白牵牛各三钱

【用法】 上药研细腻无声，放舌上试过，无滓方收贮。每日点三次。重者不出一月痊愈；轻者朝点暮好。

【主治】 胬肉攀睛，星翳外障。

07070 吹耳麝陈散

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 陈皮（煅存性） 麝香一分

【用法】 研末和匀。吹入耳中。

【主治】 耳聋，流水不止，或耳中流脓。

07071 吹喉七宝散

【方源】《金鉴》卷四十三。

【异名】 七宝散（《医家四要》卷三）。

【组成】 火消 牙皂 全蝎 雄黄 硼砂 白矾 胆矾

【用法】 上为细末。吹患处。

【主治】 咽喉肿痛，单双乳蛾，喉痹，缠喉。

07072 吹喉朴消散

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【异名】 朴消散（《普济方》卷二九九）。

【组成】 朴消 消石 胆矾 白矾 芒消（五味皆枯干） 寒水石（烧） 白僵蚕（直者，炒） 甘草（炙，锉） 青黛（研）各等分

【用法】 上为细散，和匀。每用少许，掺疮上；遇喉闭，用笔管吹一字在喉中。

【主治】 口疮及喉闭。

07073 吹喉珠黄散

【方源】《喉科家训》卷四。

【组成】 真犀黄 飞朱砂 净珍珠 上滴乳石 西月石 真原寸 飞雄精 粉儿茶 煅中白 大梅片

【用法】 上为细末。吹之。

【主治】 喉痧。

07074 吹鼻六神散

【方源】《景岳全书》卷六十。

【组成】 焰消（提净）五钱 白芷 雄黄 乳香（制） 没药（制） 脑荷叶各一钱

【用法】 上为细末，瓷罐收贮。左吹左，右吹右。先令病人口含水吹之，头痛吹法亦然，或两鼻皆吹之。

【主治】 眼目暴发赤肿，热泪昏涩，及头脑疼痛。

【宜忌】 若久患眼疾者不可吹。

07075 吹鼻桂辛散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】桂（去粗皮） 荜拨 细辛（去苗叶）各等分

【用法】上为散。每用一字，先满含温水一口，即搐药于鼻中；偏头痛随左右用之。

【主治】脑风头痛。

07076 吹喉珍珠生肌散

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】好龙骨三钱 真象皮三钱 赤石脂三钱 真珍珠一钱

【用法】上为极细末，至无声为度，收贮听用。

【功用】生肌长肉，平口收功。

【主治】一切喉症，腐去孔深，及不生新肌等症。

【宜忌】此散不能独用，只能辅用，吹此散专主生肌，而无拔毒之功也。

【备考】用此丹，加入吹喉千金不换散，自然生肌长肉，平口收功。应加多少，量烂斑之大小深浅为定。如烂斑深大，则生肌散六分、千金散四分；如兼拔毒收功，千金散七，生肌散三。

07077 时毒药

【方源】《御药院方》卷七。

【组成】大黄（生用） 寒水石（生用） 当归各等分

【用法】上为细末。每服二三钱至五钱，食后用无根水调下。临时觀虚实加减服之。

【主治】时疾生热疙瘩，在咽喉间，憎寒壮热，头痛，头面赤肿，状若雷头。

07078 时珍正容散

【方源】《金鉴》卷六十三。

【组成】猪牙皂角 紫背浮萍 白梅肉 甜樱桃枝各一两

【用法】上焙干，兑鹰粪白三钱，共研为末。每早、晚用少许，在手心内，水调匀，搽面上，良久，以温水洗面。

【主治】雀斑。

07079 助仙丹

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】白茯苓五钱 陈皮五钱 白术三钱（土炒） 白芍三钱（酒炒） 山药三钱（炒） 菟丝子二钱（酒炒） 杜仲一钱（炒黑） 甘草一钱

【用法】河水煎服。

【功用】健脾益肾，解郁清痰。

【主治】妇人气血不亏，经水数月一行。

【宜忌】四剂而仍如其旧，不可再服。

07080 助老汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】熟地一两 山茱萸一两 益智一钱 肉桂二钱 远志一钱 炒枣仁五钱 人参三钱 北五味二钱

【用法】水煎服。

【主治】老年遗尿。夜卧而遗，或日间不睡而自遗。

07081 助阳丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙） 菟丝子（酒浸，别捣） 原蚕蛾（炒） 钟乳粉 附子（炮裂，去皮脐） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，切，焙） 黄耆（锉，炒） 人参各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒或盐汤送下。

【主治】肾脏虚损，阳气痿弱，肢体无力，志意不爽，小便滑数。

07082 助阳丹

【方源】《济生》卷一。

【组成】牡蛎（烧） 川小椒（炒）各二两 硫黄一两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。食前每服十五丸，好酒送下。

【功用】久服明目，暖五脏，健阳事，去冷病。

【主治】肾气虚损，四肢少力，面色萎黄，脐腹冷痛。

07083 助阳汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】升阳燥湿汤（原书同卷）、补真润肠汤（《医学纲目》卷三十四）。

【组成】生黄芩 橘皮各五分 防风 高良姜 干姜 郁李仁 甘草各一钱 柴胡一钱三分 白葵花七朵

【用法】上锉，如麻豆大，分作二服。每服水二大盏，煎至一盏，去滓，食前稍热服。

【主治】白带下，阴户中痛，控心而急痛，身黄皮缓，身重如山，阴中如冰。

【方论选录】《济阴纲目》汪淇笺释：此治重在阴中如冰，痛控于心。故用良姜为君，干姜为佐，不用参、术者，痛无补也。柴、防足以胜湿升阳，葵、李可以润枯湿燥，甘、陈和中，生芩凉气分之热。

07084 助阴汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 玄参 当归 生地各五钱 知母一钱 牛膝三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 大便秘结，口干唇裂，食不能消，腹痛难忍，按之益痛，小便短涩。

07085 助胃膏

【方源】《局方》卷十（淳祐新添方）。

【组成】 白豆蔻仁 肉豆蔻（煨） 丁香 人参 木香各一两 白茯苓（去皮） 官桂（去粗皮） 白术 藿香叶 缩砂仁 甘草（炙）各二两 橘红（去白） 山药各四两

【用法】 上为细末，炼蜜和成膏。每服如鸡头实大一丸，量儿大小加减，米饮化下，不拘时候。

【主治】 小儿胃气虚弱，乳食不进，腹胁胀满，肠鸣泄泻，吮乳便青，或时夜啼，胎寒腹痛。

【备考】 按：《诚书》有沉香二钱。

07086 助胃膏

【方源】《直指》卷六。

【组成】 人参 白术 白茯苓 橘红 缩砂仁各一分 木香 丁香 肉豆蔻（微煨） 草果仁各一两半 白豆蔻仁一钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，生姜三片煎汤送下。

【主治】 呕吐不食。

【备考】 按：本方方名，据剂型，当作“助胃丸”。

07087 助思汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】 人参五钱 熟地一两 生地五钱 麦冬五钱 北五味一钱 黄连一钱 肉桂三分 茯苓二钱 菟丝子二钱 丹皮二钱 丹砂一钱（不可经火） 柏子仁三钱 炒枣仁二钱 莲子心一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 思虑过多，心虚而无血养心，心头有汗，一身手足无汗者。

07088 助脾丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】 川椒 香豉 干姜 神曲 大麦芽各三分

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜汤送下。以知为度。

【主治】 脾胃久虚，饮食难化，腹胁胀满，脐腹疼痛，嗜闻食臭，肌体羸瘦。

07089 助脾散

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】 干姜 草豆蔻 神曲 大麦芽 陈橘皮各二两 甘草一两

【用法】 上为细末。每服一钱，空心、食前白汤调下。

【主治】 脾胃虚弱，饮食减少。

07090 助气仙丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 人参五钱 黄芪一两 当归三钱 茯苓二钱 白术一两 破故纸三钱 杜仲五钱 山药三钱

【用法】 水煎服。

【功用】 补气壮阳。

【主治】 阳气大虚，男子交感而先痿，阳事不坚，精难射远。

【方论选录】 此方补气，绝不补阴，以病成于阳衰，则阴气必旺；若兼去滋阴，则阳气无偏胜之快矣。方又不去助火，盖气盛则火自生；若兼去补火，则阳过于胜，而火炎复恐有亢烈之忧，反不种子矣，此立方之所以妙也。

07091 助气补漏汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】 人参一两 白芍五钱（酒炒） 黄芩三钱（酒炒黑） 生地三钱（酒炒黑） 益母草一钱 续断二钱 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 补气泄火。

【主治】 气虚不能摄血，妊娠胎漏。

【方论选录】 此方用人参以补阳气，用黄芩以泄阴火，火泄则血不热而无欲动之机，气旺则血有依而无可漏之窍，气血俱旺而和协，自然归经而各安其所矣，又安有漏泄之患哉！

07092 助气解麻汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 人参三钱 白术 黄耆 麦冬各五钱 当归 荆芥各二钱 乌药八分 附子一分 柴胡八分 半夏一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 气虚不能运血，两手麻木，而面亦麻者。

07093 助血调肠汤

【方源】《女科秘要》卷七。

【组成】 川芎八钱 当归四钱 桃仁十粒 炙甘草五分 陈皮四分 麻仁（炒，研） 一钱五分

【用法】 水煎，食前稍热服。如大便燥结，十日

以上者，肛门必有燥粪，用蜜枣纳入肛门，其粪自化；或用麻油，竹管吹入肛门；或用猪胆汁亦可。

【主治】 产后血少肠燥，大便不通。

【加减】 如血块痛，加肉桂、玄胡索各五分；气虚汗，加人参、黄耆各一钱；汗多而渴，加人参、麦冬各一钱五分，五味子八粒。

07094 助阴孕子丸

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】 山茱萸（酒浸，去核取肉）二两五钱 当归（酒洗）一两 熟地（酒蒸）二两 蛇床子（炒，去壳取净肉）二两五钱 川芎（酒洗）一两 白芍（酒炒）一两 子实黄芩（酒炒）二两五钱 丹参（酒洗）一两 白术（炒）一两五钱 真阿胶（蛤粉炒成珠）五钱 小茴（炒）一两 陈皮（炒）一两 缩砂仁（去壳，炒）五钱 香附米（童便浸，炒干微黑）四两 桑寄生（真者）五钱 玄胡索（炒）七钱

【用法】 上为末，酒煮山药粉糊为丸。每服一百丸，空心酒下或清米汤送下。

【功用】 抑气滋荣，生血理脾。种子，增寿。

【主治】 妇人无子。

【加减】 如素有热，加软柴胡、地骨皮、芩、连（酒炒）各七钱；白带，加苍术（米泔浸，去皮，盐水炒）一两五钱，柴胡（酒炒）五钱；肥盛妇人，乃脂满子宫，加半夏、南星（姜汁、矾水煮）各一两。

07095 助肝益脑汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 白芍二两 当归一两 人参三钱 郁李仁二钱 柴胡五分 天花粉二钱 细辛五分 川芎三钱 甘菊花五钱 薄荷八分 生地五钱 天门冬三钱 甘草一钱 白芷三分

【用法】 水煎服。

【功用】 大补肝气。

【主治】 肝气大虚，视物为二。

【方论选录】 此方全是益肝之药，非益脑之品也。不知补脑必须添精，而添精必须滋肾。然而滋肾以补脑，而肝之气不能遽补，不若直补其肝，而佐之祛邪之药为当。盖脑气不足，而邪得以居之，不祛邪而单补其精，于脑气正无益也，治肝正所以益脑也。

07096 吴仙丹

【方源】《百一》卷五引常子正方。

【异名】 茱苓丸（《得效》卷四）。

【组成】 白茯苓 吴茱萸（汤泡去沫）各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，熟水吞下，酒饮亦可，不拘时候。

【主治】 痰饮上气，不思饮食，小便不利，头重昏眩，或头疼背寒，呕吐酸汁。

【临证举例】 头痛 中丞苦痰饮，每啖冷食饱，或晴阴节变即发头疼背寒，呕吐酸汁，数日伏枕不食，而《千金》大五饮丸之类皆不效。宣和初，为顺昌司录，于太守蔡公安持达道席上得此方，服之遂不再作。每遇饮啖过多，腹满，服五七十丸，不三二时便已旋，作茱萸气，酒饮随小水而去。前后痰药甚众，无及此者。

07097 吴蓝饮

【方源】《圣济总录》卷六十。

【异名】 吴蓝汤（《医学实在易》卷五）。

【组成】 吴蓝 芍药 麦门冬（去心，焙） 桑根白皮（锉） 防己 白鲜皮 栀子仁各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 黄疸，身肿发热，汗出而渴，汗出著衣正黄。

07098 吴茱萸丸

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】 吴茱萸一两（汤浸七遍，焙干微炒） 干姜一两（炮裂，锉） 桂心一两 干漆一两（捣碎，炒令烟出） 槟榔一两 青橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 木香一两 白术一两 当归一两（锉，微炒） 桔梗一两（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以热酒送下，不拘时候。

【主治】 卒心痛，气闷欲绝，面色青，四肢逆冷。

07099 吴茱萸丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干微炒） 赤茯苓半两 干姜半两（炮裂，锉） 白术二两 甘草半两（炙微赤，锉） 桂心一两 半夏一两（汤浸七遍去滑） 赤芍药一两 前胡一两（去芦头） 川椒一两（去目及闭口者，微炒去汗） 当归一两（锉，微炒） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 附子一两（炮裂，去皮脐） 人参一两（去芦头） 木香一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜汤送下，一日四五次。

【主治】 寒疝，心腹痛，面目青黄，不下饮食，

纵食呕逆，肌体羸瘦。

07100 吴茱萸丸

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】 吴茱萸（汤浸七遍，炒） 桂（去粗皮）各一两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）三分 槟榔（锉）半两

【用法】 上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】 脾胃冷气攻心腹，胀痛，宿食不消。

07101 吴茱萸丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【异名】 茱萸矾石丸(《普济方》卷三十六引《卫生家宝》)。

【组成】 吴茱萸（瓦上炒）三分 胡椒 人参 当归（锉，焙）各半两 甘草半两（一半生用，一半纸裹五七重，醋浸令透，火内慢煨干，又浸，如此七遍） 半夏一两（用生姜四两研汁，入沙罐子内，姜汁并水煮，候擘破看存二分白心，取半夏细研为膏） 白矾（烧存性）半两

【用法】 上为细末，以半夏膏和丸，如稍硬，添姜汁为丸，如梧桐子大。每服七丸，桑、柳枝各二十一茎，银器内煎汤吞下，一日三次。

【主治】 年深膈气翻胃，饮食之物至晚皆吐出，悉皆生存不化，膈上常有痰涎，时时呕血，胸中多酸水，吐清水无时，夜吐辄至晓，日渐羸瘦，腹中痛楚，时复冷滑，或即闭结。

【宜忌】 忌诸毒物，惟可食油煎猪胆脾软饭。

07102 吴茱萸丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 吴茱萸（汤浸七遍，焙干）三分 当归（微炙） 桃仁（去皮尖双仁，麸炒黄）各一两一分 大黄（锉碎，微炒） 朴消 桂（去粗皮） 牛膝（去苗，酒浸，切，焙） 芎藭 黄耆（锉） 人参 各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至四十丸，空心以酒送下，一日三次。或为散子，每服一钱匕，温酒调下。

【主治】 妇人月事欲下，脐腹撮痛不可忍。

07103 吴茱萸丸

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】 吴茱萸（汤洗十遍，焙） 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）各三两 高良姜 附子（炮裂，去皮脐）各一两 青橘皮（汤浸，去白，麸炒黄）一两半 白术二两

【用法】 上为末，用干柿二十个，以好酒浸令软，研膏为丸，如梧桐子大。每服十丸，至十五丸，空心、临卧温熟水送下。

【主治】 妇人子宫久冷，妊娠数堕胎。

07104 吴茱萸丸

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 木香利膈丸。

【组成】 木香 青皮各二分 白僵蚕 姜黄 泽泻 柴胡各四分 当归身 炙甘草各六分 益智仁 人参 橘皮 升麻 黄耆各八分 半夏一钱 草豆蔻仁 吴茱萸各一钱二分 麦芽面一钱五分

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服二三十丸，温水送下，细嚼亦得。

【功用】《普济方》：大理脾胃，调中顺气，外助阳气，内消阴火。

【主治】 ①《兰室秘藏》：寒在膈上，噎塞咽膈不通。②《普济方》：胸膈不通，善嚏，鼻流清涕，寒甚出浊涕，嚏不止，比常人大恶风寒，小便数而欠，或上饮下便，色清而多，大便不调，夜寒无寐，甚则为痰咳，为呕为哕，为吐为唾白沫，以至口开目瞪，气不交通欲绝者。

【宜忌】 勿多饮汤，恐速下。

07105 吴茱萸丸

【方源】《医方类聚》卷一二九引《经验良方》。

【组成】 吴茱萸四两 甜葶苈二两（炒） 甘遂一两（水煮）

【用法】 上焙干，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，晨、午、临卧米饮送下。

【主治】 水肿腹胀。

07106 吴茱萸丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】 大麦芽（炒）五钱 肉桂五钱 吴茱萸一两（盐水洗） 苍术一两（米泔浸） 陈皮五钱（去白） 炒神曲五钱

【用法】 上为细末，稀粥为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，米饮送下。

【主治】 妇人心酸，痰饮积在胸胃脾间，时时酸心，或吐水。

07107 吴茱萸汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 茱萸汤(《金匮》卷中)、茱萸人参汤(《三因》卷十一)、三味参萸汤(《医学入门》卷四)、参萸汤(《医学入门》卷七)、四神煎(《仙拈集》卷一)、吴萸汤(《方症会要》卷三)。

【组成】 吴茱萸一升（洗） 人参三两 生姜六两（切） 大枣十二枚（擘）

【用法】 以水七升，煮取二升，去滓，温服七合，一日三次。

【功用】 ①《普济方》：温里助阳散寒。②《中医方剂学讲义》：温中补虚，降逆散寒。

【主治】 胃中虚寒，干呕，胸满，吐涎沫；厥阴头痛；少阴吐利，手足逆冷；吞酸。现用于神经性呕吐、偏头痛、神经性头痛、美尼尔氏综合征等属肝胃虚寒者。

①《伤寒论》：阳明病，食谷欲呕者。少阴病，吐利，手足逆冷，烦躁欲死者。厥阴病，干呕，吐涎沫，头痛者。②《金匮》：呕而胸满者。③《肘后方》：食毕噫醋及醋心。④《张氏医通》：胃气虚寒。

【方论选录】 ①《内台方议》：干呕，吐涎沫，头痛，厥阴之寒气上攻也；吐利，手足逆冷者，寒气内甚也，烦躁欲死者，阳气内争也；食谷欲吐者，胃寒不受食也。此以三者之症，共用此方者，以吴茱萸能下三阴之逆气为君；生姜能散气为臣；人参、大枣之甘缓，能和调诸气者也，故用之为佐使，以安其中也。②《医方考》：方中吴茱萸辛热而味厚，《经》曰味为阴，味厚为阴中之阴，故走下焦而温少阴、厥阴；佐以生姜，散其寒也；佐以人参、大枣，补中虚也。③《医方集解》：此足厥阴少阴阳明药也。治阳明食谷欲呕者，吴茱萸、生姜之辛以温胃散寒下气；人参、大枣之甘以缓脾益气和中；若少阴证吐利厥逆，甚至于烦躁欲死、胃中阴气上逆，将成危候，故用吴茱萸散寒下逆，人参、姜、枣助阳补土，使阴寒不得上干，温经而兼温中也，吴茱萸为厥阴本药，故又治肝气上逆，呕涎头痛。

【临证举例】 ①头痛 《皇汉医学》：一人初患头痛，次日腹痛而呕，手足厥冷，大汗如流，正气昏冒，时或上攻，气急息迫，不能语言，予吴茱萸汤，诸证顿除。②厌食 《伤寒解惑论》：一男性，壮年，每日只能勉强进食一二两，不知饥饱，予健脾消导药不效，胸闷，脉弦迟，舌质正常，舌苔薄白粘腻。当是胃寒挟浊。予吴茱萸汤加神曲试治，重用吴茱萸15克。次日食欲大振。③呕吐 《浙江医学》（1960；5，6:261）：一男性，30岁，起病三年余，呈规律性呕吐涎沫，先后曾用多种药物治疗无效，经胃肠造影诊断为瀑布状胃。方用吴茱萸24克，党参30克，生姜30克，红枣五个，半夏12克。服一剂呕止，原方再服二十余剂，观察二月余未见再发。④呃逆 《伤寒论方古今临床》：姚某，男，43岁。呃逆每发于食后，吐物皆为积食痰涎，历两月余，面色苍黄，精神萎靡，形体消瘦，食不甘味，脉来细迟，舌苔白润，舌质淡胖，治宜温中化饮，降逆止呕，用吴茱萸9克，党参15克，生姜15克，大枣5个，半夏6克，茯苓9克。服三剂呕逆渐平，再服四剂获愈。⑤眩晕《中医杂志》（1983；9:43）：一女，67岁，患美尼尔氏综合征两年，近加重，头晕目眩，旋转不定，如立舟中，耳如蝉鸣，呕吐清涎，畏寒肢冷，舌质淡，苔白厚腻，脉弦细。证属肝寒犯胃，浊阴上扰。治宜温肝暖胃，升清降浊。方用吴茱萸24克、人参9克、生姜30克、大枣3个。煎服一剂，呕吐，呻吟渐止，安然入睡，原方再进一剂后，能坐起进食。以上方加减，用吴茱萸9克，党参12克，半夏9克，白术12克，陈皮6克，砂仁6克，生姜12克，大枣3个，续服五剂，诸证悉除。观察12年，未见复发。⑥痢疾 《中医杂志》（1983；9:45）：一男，32岁，患细菌性痢疾反复发作二年，缠绵不愈。近来发作10余天，下痢稀薄，红白相兼，日行5～10余次不等，少腹隐痛，喜温喜按，食少神疲，手足欠温，舌质淡，苔白腻，脉细弱。病属脾胃虚寒，寒湿内蕴。治拟温中散寒，燥湿健脾，佐以涩肠固脱。方用人参12克，吴茱萸9克，炮姜9克，赤石脂24克，艾叶炭12克，苍、白术各15克，罂粟壳9克，大枣5个。水煎服，2剂后痢止，5剂痊愈。改服参苓白术散以善后，随访3年未发。

07108 吴茱萸汤

【方源】《外台》卷十九引许仁则方。

【组成】 吴茱萸二两 生姜五两 橘皮三两 桂心二两 大槟榔十个

【用法】 上切。以水七升，煮取二升半，去滓，分三次温服，服相去如人行七八里久。一服觉诸状可，欲重合服亦佳。服汤后，将息经三四日，即服桑根白皮等六味丸。

【主治】 脚气病，但觉脚肿疼闷沉重，有时缓弱，乍冲心腹满闷，小腹下不仁，有时急痛。

【宜忌】 忌生葱。

07109 吴茱萸汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】 吴茱萸（汤淘三遍，焙干炒） 当归（切，焙） 芍药各一两 甘草（炙）三分 干姜（炮裂）半两 桂（去粗皮）一两 细辛（去苗叶）三分

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏，酒半盏，大枣三个（劈破），同煎至八分，去滓温服。

【主治】 伤寒手足厥冷，脉细欲绝者。

07110 吴茱萸汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】 吴茱萸（汤浸，焙炒） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 桂（去粗皮） 干姜（炮）各二两 白术 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 人参各一两 蜀椒（去目并闭口者，炒出汗）半两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服四钱匕，以水一盏半，入生姜三片，煎至七分，去滓温服， 日三次

【主治】 阴盛生寒，腹满膨胀。

07111 吴茱萸汤

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】 吴茱萸（汤洗七遍，焙炒） 半夏（汤洗七遍，焙） 附子（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏半，加生姜五片，煎取七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 冷痰，吞酸吐水，胸中不快。

07112 吴茱萸汤

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【异名】 吴茱萸加减汤（《宣明论》卷一）。

【组成】 吴茱萸（汤浸，焙干炒）二两 乌头（炮裂，去皮脐） 细辛（去苗叶）各三分 高良姜（锉，炒） 当归（切，焙） 干姜（炮） 桂（去粗皮）各一两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水二盏，煎取一盏，去滓温服，一日二次。

【主治】 ①《圣济总录》：厥疝，腹中阴冷痛，积气上逆。②《济阳纲目》：阴冷囊寒。

07113 吴茱萸汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 吴茱萸（汤洗，焙干，炒）一升 生姜（切，炒） 桂（去粗皮）各五两 大枣（去核，炒）十个 人参 牛膝（酒浸，切，焙） 芍药各一两 甘草（炙，锉）半两 小麦 牡丹皮各一两半 半夏（汤洗七遍）二两半 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）二十个

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水半盏，酒半盏，煎至七分，去滓温服，良久再服；如不饮酒，只以水煎。

【主治】 妇人月水不调，或多或少，腹中冷痛。

07114 吴茱萸汤

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】 黄连四两 吴茱萸 当归各三分 石榴皮三两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 积冷，赤白痢下不断，变成赤黑汁，形如烂鱼腹肠，疼痛，不能饮食。

07115 吴茱萸汤

【方源】《宣明论》卷一。

【组成】 吴茱萸（汤淘） 厚朴（生姜制） 官桂（去皮） 干姜（炮）各一两二钱 白术 陈皮（去白） 蜀椒（出子）各半两

【用法】 上为末。每服三钱，水一大盏，加生姜三片，同煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】 阴盛生寒，腹满膨胀，且常常如饱，不欲饮食，进之无味。

07116 吴茱萸汤

【方源】《普济方》卷三四三引《便产须知》。

【异名】 实胎散。

【组成】 甘草（炙） 黄耆 人参 川芎 白术 熟地黄（洗，蒸） 吴茱萸各等分

【用法】 上为末。每服二钱，空心温酒调下。

【主治】 妊娠怀胎，数落而不结实。

【宜忌】 忌菘菜、桃、李、雀肉、醋物。

07117 吴茱萸汤

【方源】《医统》卷八十三引《集验方》。

【组成】 吴茱萸（汤泡） 玄胡索各一钱 官桂 木香各五分

【用法】 上为细末。每服一钱，空心或食前滚汤一杯调冲，酒二杯调服；未痊再服。

【主治】 妇人、室女内外着寒，小腹痛不可忍。

07118 吴茱萸汤

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 半夏（姜制） 吴茱萸 川芎 炙甘草 人参 白茯苓 白芷 广陈皮各等分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，白水二钟，煎至八分，食后服。

【主治】 厥阴经头风头痛，四肢厥，呕吐痰沫。

07119 吴茱萸汤

【方源】《金鉴》卷四十四。

【组成】 当归 肉桂 吴茱萸 丹皮 半夏（制） 麦冬各二钱 防风 细辛 藁本 干姜 茯苓 木香 炙甘草各一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人胞中不虚，惟受风寒为病，经行腹痛。

07120 吴茱萸饮

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】 吴茱萸（汤洗，焙干） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁）各一分 黑豆半两

【用法】 上药同炒，以黑豆熟为度。用童子小便一升，浸少顷，煎至六分，去滓分三服，空心、日午、夜卧各一次。

【主治】 肾脏久积成奔豚，气注小腹急痛，发即不识人。

07121 吴茱萸散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒） 厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 芎藭一两 干姜半两（炮裂，锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 附子三分（炮裂，去皮脐）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：小肠虚冷，小腹如刀刺，或绕脐结痛，冷汗出。②《圣济总录》：小肠虚冷气痞。

07122 吴茱萸散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微煨，或炒） 当归三分（锉，微炒） 干姜三分（炮裂，锉） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 桂心半两 枳实半两（麸炒微黄） 人参三分（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 麦芽一两（微炒）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三枚，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】 脾胃虚冷，水谷不化，心腹疼痛，四肢无力，少思饮食。

07123 吴茱萸散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 高良姜半两（锉） 桂心三分 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 当归半两（锉，微炒） 木香半两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 脾脏冷气攻心腹，疼痛不可忍。

07124 吴茱萸散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 吴茱萸三分（汤浸七遍，焙干，微炒） 当归一两 桂心一两 白芍药一两 细辛三分 木通一两 甘草半两（炙微赤，锉） 白术一两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】 虚劳四肢逆冷，脉厥绝，面无颜色。

07125 吴茱萸散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 桂心半两 高良姜半两（锉） 赤茯苓一两 当归一两（锉，微炒） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 槟榔二两

【用法】 上为细散。每服二钱，以热酒调下，一日三四次。

【主治】 胸痹，心痛背痛，腹胀气满，不下食饮。

07126 吴茱萸散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 槟榔一两 人参一两（去芦头） 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 肉桂一两（去皱皮） 当归一两（锉，微炒）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 冷气攻心，背彻痛。

07127 吴茱萸散

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 鳖甲三两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 川大黄一两（锉碎，微炒） 当归三分（锉，微炒） 京三棱一两（微炮，锉） 槟榔一两

【用法】 上为细散。每服一钱，食前以暖酒调下。

【主治】 痃癖气不消。

07128 吴茱萸散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 当归一两（锉，微炒） 人参一两（去芦头） 青橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 荜茇三分 高良姜三分（锉） 槟榔三分 胡椒半两

【用法】 上为细散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】 膈气，不能饮食，食即呕逆。

07129 吴茱萸散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 白术三分 白石脂一两 木香半两 当归一两

（锉，微炒） 黄连半两（去须，锉，微炒） 干姜三分（炮裂，锉） 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】 上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】 久冷痢不止，心腹疼痛，饮食不消，四肢乏力。

07130 吴茱萸散

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】 吴茱萸（汤洗，焙干，炒）半两 肉豆蔻仁 干姜（炮） 甘草（炙）各半两 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 高良姜各二两 缩砂仁 陈曲（炒） 白术各一两

【用法】 上为散。每服一钱匕，食前粥饮调下。

【主治】 ①《圣济总录》：肠痹寒湿内搏，腹满气急，大便飧泄。②《普济方》：大肠虚冷，肠鸣腹痛，食不消化。

07131 吴茱萸散

【方源】《医方类聚》卷一九七引《医林方》。

【组成】 吴茱萸 槟榔 木瓜各等分

【用法】 上为细末。每服五钱，生姜汤调下。

【主治】 奔豚气上至，心烦乱，不省人事，上至心下，从少腹起，上至咽喉，闷绝不能言语，或吐或汗出。

07132 吴茱萸粥

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】 吴茱萸半两（水洗，去涎，焙干，炒，为末）

【用法】 上以米三合，一同作粥，空腹食之。

【主治】 ①《饮膳正要》：心腹冷气冲胁肋痛。②《食鉴本草》：冷气心痛不止，腹胁胀满，坐卧不安。

07133 吴茱萸煎

【方源】 方出《丹溪心法》卷四，名见《医统》卷六十。

【组成】 吴茱萸半两 寒水石二钱 黄柏二钱 樟脑半两 蛇床子半两 轻粉一钱 白矾三钱 硫黄二钱 槟榔三钱 白芷三钱

【用法】 上为末。先用吴茱萸煎汤洗，麻油调搽。

【主治】 肾囊湿疮。

07134 吴茱萸四逆汤

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】 吴茱萸一钱半（醋泡） 人参一钱半 干姜一钱半（炒） 甘草一钱半（炙） 附子一钱半（炮）

【用法】 水煎，去滓温服。

【功用】 温中逐寒，补火崇土。

【主治】 寒中厥阴，吐利厥冷，舌卷囊缩，脉迟微者。

【加减】 腹痛，加白术；转筋，加木瓜。

【方论选录】 寒中厥阴，中土受病，而生阳不振，筋络不舒，故舌卷囊缩，吐利厥冷焉。吴茱萸温厥阴之寒，散逆气，以除厥冷；人参补太阴之气，除中虚，以托寒邪；附子补火御寒，干姜温中逐冷，甘草崇土御邪，使木不克土，则吐利自止，而厥阴气顺，无不厥愈阳回，舌卷囊缩自舒矣。

07135 吴萸天水散

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】 滑石六两 吴萸七钱 甘草一两

【用法】 上为末。每服二钱。

【主治】 湿热吞酸。

07136 吴茱萸加附子汤

【方源】《医方考》卷五。

【组成】 吴茱萸 生姜各三钱 人参一钱 大枣二个 附子二钱

【用法】 水煎，凉服。

【主治】 寒疝腰痛，牵引睾丸，屈而不伸，尺内脉来沉迟者。

【方论选录】 寒气自外入内，束其少火，郁其肝气，致得寒疝。方中用吴茱萸、附子之辛热以温其寒；用生姜、大枣之辛温，以和其气；邪伤之后，正气必虚，人参补之，以去其虚。

07137 足麻贴药

【方源】《疮疡经验全书》卷五。

【组成】 芥子 苍术各等分

【用法】 上为末。每两加麝香三分，姜葱汁调捣成膏，加白及少许，临睡时贴上，早晨去之，将睡再贴。

【主治】 足麻。

07138 旱莲丸

【方源】 方出《种福堂方》卷二，名见《医学实在易》卷七。

【组成】 旱莲草（阴干）

【用法】 上为末，以槐花煎汤，调炒米粉糊为丸，如梧桐子大。每服五钱，以人参五分煎汤送下，二服即愈。

【主治】 大便下血，身体虚弱者。

07139 旱莲膏

【方源】《古今医鉴》卷九引马翰林方。

【组成】 旱莲草十六斤（在六月下半月，七月上半月采，不用水洗）

【用法】 上药捣干取汁，对日晒过五日，不住手搅一午时，方加真生姜汁一斤、蜜一斤，和汁同前晒，搅至数日。似稀糖成膏、瓷碗收藏。每日空心用无灰好酒一钟、药一匙服，午后又一服。至二十一日，将白须发拔去，即长出黑须发。

【功用】 乌须黑发。

07140 围药

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】 乳香 没药 大黄 连翘 黄芩 黄连 黄柏 南星 半夏 防风 羌活 瓜蒌 阿胶 皂角刺

【用法】 上为细末，好醋煎黑色成膏。外敷。寒者热用，热者寒用。

【功用】 消散。

【主治】 诸般痈疽。

【备考】《丹溪心法附余》本方用量：乳香，没药各二钱，余药各五钱。

07141 围毒散

【方源】《简明医彀》卷八。

【组成】 川乌 草乌 苍术 细辛 白芷 薄荷 防风 甘草各等分

【用法】 上为末。鸡子清调敷，留头。

【主治】 疔痈诸毒。

07142 围药铁井栏

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】 贝母 南星各七钱 连翘 五倍子 经霜芙蓉叶各一两

【用法】 上为细末。用水调敷四周肿处，只留中间一窍出毒气。

【主治】 痈疽。

07143 牡丹丸

【方源】《千金》卷四。

【组成】 牡丹三两 芍药 玄参 桃仁 当归 桂心各二两 虻虫 水蛭各五十枚 蛴螬二十枚 䴷麦 芎藭 海藻各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至二十丸，以酒送下。血盛者作散，服方寸匕。腹中当转如沸，血自化成水去。

【主治】 妇人女子诸病后，月经闭绝不通，及从小来不通，并新产后瘀血不消，服诸汤利血后，余疾未平者。

【加减】 如小便赤少，除桂心，用地肤子一两。

【方论选录】《千金方衍义》：此以黄芩牡丹汤小变其法。汤以急荡，故用大黄；丸以缓攻，故用桂心，总藉虻、蛭、蛴螬之力也。血盛者作散服，服后血化成水而下。小便赤少，即除桂心而用地肤清热利水，水即血之所化，无限活法，惟在详见证之缓急耳。

07144 牡丹丸

【方源】《三因》卷七。

【异名】 消坚丸（《百一》卷十五）。

【组成】 川乌头（炮令焦黑去皮尖） 牡丹皮四两 桂心五两 桃仁（炒，去皮尖） 五两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒送下；妇人醋汤送下。

【主治】 寒疝，心腹刺痛，休作无时，及治妇人月病，血刺疼痛。

【备考】《医统》引《医方集成》：有青皮。

07145 牡丹汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 牡丹（去心） 芎藭 甘草（炙，锉） 黄芩（去黑心） 人参 桂（去粗皮） 干姜（炮裂） 吴茱萸（汤浸三遍，焙干微炒）各一两半 桃仁八十个（汤浸去皮尖、双仁，麸炒黄色） 白茯苓（去黑皮） 当归（切，焙） 芍药各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇人月水来不利，攻脐腹痛不可忍。

07146 牡丹汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【异名】 牡丹散（《鸡峰》卷十七）、牡丹皮散（《杨氏家藏方》卷十六）。

【组成】 牡丹皮 当归（切，焙） 芎藭 白芷 紫葳 延胡索 红蓝花 赤芍药 桂（去粗皮） 刘寄奴各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入生姜一枣大（拍碎），煎至六分，入酒三分，重煎取沸，去滓空心服。

【功用】 破血行经止痛。

【主治】 ①《圣济总录》：室女月水不通，虚胀如鼓，不嗜饮食。②《杨氏家藏方》：妇人月候久闭，心腹胀满，身体疼痛，瘦悴食少，发热自汗。

07147 牡丹汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 牡丹皮 当归（切，焙） 黄芩（去黑心） 芎藭 甘草（炙） 芍药 细辛（去苗叶） 桂（去粗皮） 人参各一两 生干地黄（炒）一两半 大黄（锉炒）二两 水蛭（炒）二十五个 干

姜（炮）半两　桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒）二十五个　虻虫（去翅足，炒）二十五个　黄雌鸡一只（去肠肚，以水八盏，煮取四盏，澄清）

【用法】 上除鸡外，为粗末。每服三钱匕，取鸡汁一盏，同煎至七分，去滓下消石末半钱匕，更煎一沸，食前温服，每日一次。

【主治】 室女月水不通，或天癸过期素未通者。

07148　牡丹饮

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】 牡丹皮一两　大黄（锉，炒）一两　桂（去粗皮）一两　桃仁（汤浸，去皮尖，炒令黄色）四十个

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空腹温服。

【主治】 产后腹中恶血不除，苦身强痛。

07149　牡丹散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】 牡丹二分　川大黄二两（锉，微炒）木香　桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）三分　川消一两　赤芍药三分　败酱　甜瓜子各三分

【用法】 上为散。每服四钱，水一中盏，煎至六分，去滓，食前服。以利下脓血为度。

【主治】 肠痈未成脓，腹中痛不可忍。

【备考】 本方组成、用法原缺，据《普济方》补。

07150　牡丹散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 牡丹一两　赤茯苓三分　木香半两　赤芍药三分　当归三分（锉，微炒）　生干地黄三分　桂心三分　白术三分　石韦半两（去毛）　桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　川大黄一两（锉，微炒）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至五分，去滓，每于食前稍热服之。

【主治】 妇人月水不利，脐腹疼痛，不欲饮食。

07151　牡丹散

【方源】《直指》卷二十三。

【异名】 牡丹皮散(《外科发挥》卷四)。

【组成】 人参　牡丹皮　白茯苓　天麻　黄耆　木香　当归　川芎　辣桂各三分　白芷　薏苡仁　甘草（炙）各二分　桃仁（浸去皮，炒）三分

【用法】 上为末。每服三钱，井水煎，食前服。

【主治】 肠痈冷证，腹满而痛，时时利脓。

【备考】 本方改为汤剂，名“牡丹汤”（见《校注妇人良方》）。

07152　牡丹散

【方源】《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。

【组成】 干漆（炒）　苏木　鬼箭　蓬莪术（炮）各一分　甘草（半盐汤炙、半生）　当归　桂心　牡丹皮　芍药　陈皮（去白）　红花　延胡索（炒）　没药（别研令细）　乌药各一两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，煎至七分，不拘时候。

【主治】 血虚劳倦，五心烦热，肢体疼痛，头目昏重，心忪颊赤，口燥咽干，发热盗汗，减食嗜卧；及血热相搏，月水不利，脐腹胀痛，寒热如疟；室女血弱阴虚，荣卫不和，痰嗽潮热，肌体羸瘦，渐成骨蒸。

07153　牡蛎丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 牡蛎二两（烧为粉）　附子一两（炮裂，去皮脐）　狗脊一两　白龙骨二两（烧过）　椒红一两（微炒）　泽泻一两　韭子一两（微炒）　鹿茸二两（去毛，涂酥炙微黄）　肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 膀胱虚冷，肾气衰微，小便滑数，白浊。

07154　牡蛎丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 牡蛎一两（烧为粉）　鹿茸二两（去毛涂酥，炙令微黄）　黄耆一两半（锉）　土瓜根一两　人参一两（去芦头）　桂心半两　白茯苓一两半　熟干地黄一两　龙骨一两　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以清粥饮送下。

【主治】 消肾，小便滑数，虚极羸瘦。

07155　牡蛎丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 牡蛎粉一两　阿胶三分（捣碎，炒令黄燥）　当归三分（锉，微炒）　芎藭三分　续断三分　鹿茸三分（去毛，涂酥炙令微黄）　干姜三分（炮裂，锉）　代赭一两　赤石脂一两　甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 妇人血海虚损，月水不断。

07156　牡蛎丸

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】牡蛎三两（白者，盛瓷合子内，更用盐末一两盖头铺底，以炭火约五斤烧半日，取出，研如粉） 赤石脂三两（捣碎醋拌匀湿，于生铁铫子内，慢火炒令干，研如粉）

【用法】上二味，再同研匀，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心盐汤送下。

【主治】小便失禁。

07157 牡蛎丸

【方源】《直指》卷十。

【组成】圆白半夏一两（荡洗十次，每个作两片，以木猪苓去皮二两为粗末，同半夏慢火炒黄，放地出火毒一宿，不用木猪苓） 煅过厚牡蛎粉一两

【用法】同为末，以山药糊为丸，如梧桐子大。留木猪苓养药，瓷器密收。每服三十丸，茯苓煎汤送下。

【主治】精气不禁，白浊，梦遗。

07158 牡蛎汤

【方源】《外台》卷五引《伤寒论》。

【组成】牡蛎四两（熬） 麻黄四两（去节） 甘草三两（炙） 蜀漆三两（若无用常山代之）

【用法】上四味，以水先洗蜀漆三遍去腥，㕮咀，以水八升，煮蜀漆及麻黄去沫，取六升，纳二味，更煎取二升，去滓，温服一升，即吐，勿更服。

【主治】牝疟多寒者。

【宜忌】忌海藻、菘菜。

【方论选录】①《千金方衍义》：此方中牡蛎即蜀漆散中龙骨之意，蜀漆得云母专升阳邪陷阴，故以纯阳之龙骨为佐；此方中麻黄即蜀漆散中云母之意，蜀漆得麻黄专开阴邪之固闭，故以纯阴之牡蛎为辅；甘草调和药性之阴阳也。②《医门法律》：牡蛎汤一方，同治牡疟者，初感病时，风寒未清，传变为疟，结伏心下，故方中用麻黄以散风寒，并借之以通阳气耳。

07159 牡蛎汤

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】乌贼鱼骨 牡蛎 桂心各一两 干姜 黄耆 白芷各三分 五色龙骨 熟干地黄各一两半

【用法】上为细末。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】妇人漏下五色不止，淋沥连年，黄瘦萎瘁。

07160 牡蛎粉

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】牡蛎粉二两 麻黄根 赤石脂 糯米粉各一两

【用法】上为细末，入龙脑末一钱拌之。每用一匙头，新绵包扑有汗之处。

【功用】止盗汗最佳。

【主治】诸汗。

07161 牡蛎散

【方源】《医心方》卷七引《效验方》。

【组成】牡蛎三分 干姜三分

【用法】上为末，以粉敷之，一日二次。

【主治】男子阴下痒湿。

07162 牡蛎散

【方源】《千金》卷十。

【组成】牡蛎 白术 防风各三两

【用法】上为末，每服方寸匕，一日二次，酒调下。

【功用】止汗。

【主治】卧即盗汗，风虚头痛。

【备考】止汗之验，无出于此方，一切泄汗服之，三日皆愈，神验。

07163 牡蛎散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】牡蛎一两（烧为粉） 龙骨一两半 黄连一两（去须，微炒） 乌梅肉三分（微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】伤寒壮热，下痢烦渴。

07164 牡蛎散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】牡蛎粉一两 麻黄根一两 杜仲一两（去粗皮，微炙，锉） 黄耆二两（锉） 白茯苓 败蒲扇灰一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳盗汗。

【备考】方中茯苓，用量原缺。

07165 牡蛎散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】牡蛎三分（烧为粉） 朱砂半两（细研） 龙齿三分 芦荟三分 黄连一两（去须） 铁粉一两（细研） 泽泻半两 甘草半两（炙微赤，锉） 黄丹一分 栝楼根一两 鸡胞胫三分（炙令黄色） 桑螵蛸半两（微炒） 胡粉一分 赤石脂二两

【用法】上为细散。每服一钱，煎大麦仁汤调下，不拘时候。

【主治】 消中。心神烦热，肌肉干瘦，小便赤黄，脚膝无力，吃食不成肌肤。

07166 牡蛎散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 牡蛎二两（烧为粉） 龙骨一两 鸡脬胵十个（微炙） 附子一两（炮裂，去皮脐） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干微炒） 鹿角屑一两（微黄）

【用法】 上为细散。每服一钱，食前以温酒调下。

【主治】 妇人脏腑久冷，小便滑数。

07167 牡蛎散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】 牡蛎一两（烧为粉） 熟干地黄一两 龙骨一两 蒲黄一两 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 干姜一两（炮裂，锉）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以艾叶汤调下。

【主治】 妇人白崩不止，面色黄瘦，脐下冷痛。

07168 牡蛎散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】 牡蛎粉三分 龙骨三分 麦门冬半两（去心，焙） 黄耆半两（锉） 鸡肠草半两 白茯苓半两 桑螵蛸三分（微炒） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加生姜少许，大枣二个，煎至六分，去滓，量儿大小，分减温服。

【主治】 小儿遗尿，体瘦心烦，不欲食。

07169 牡蛎散

【方源】《局方》卷八。

【异名】 麦煎汤（《医学正传》卷五引东垣方）、麦煎散（《卫生宝鉴》卷五）、黄耆散（《普济方》卷二二六引《德生堂方》）、牡蛎饮（《不知医必要》卷一）。

【组成】 黄耆（去苗土） 麻黄根（洗） 牡蛎（米泔浸，刷去土，火烧通赤）各一两

【用法】 上为粗散。每服三钱，水一盏半，小麦百余粒，同煎至八分，去滓热服，一日二次，不拘时候。

【功用】《中医方剂学讲义》：敛汗固表。

【主治】 虚劳不足，自汗盗汗，心悸遗精。

①《局方》：诸虚不足，及新病暴虚，津液不固，体常自汗，夜卧即甚，久而不止，羸瘠枯瘦，心忪惊惕，短气烦倦。②《本事》：虚劳盗汗不止。③《普济方》：梦遗精淋沥。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手太阴少阴药也。陈来章曰：汗为心之液，心有火则汗不止，牡蛎、浮小麦之咸凉，去烦热而止汗，阳为阴之卫，阳气虚则卫不固，黄耆、麻黄根之甘温，走肌表而固卫。②《成方便读》：黄耆固卫益气，以麻黄根领之达表而止汗；牡蛎咸寒，潜其虚阳，敛其津液；麦为心谷，其麸则凉，用以入心，退其虚热耳。此治卫阳不固，心有虚热之自汗也。

07170 牡蛎散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】 牡蛎 胆矾各半两

【用法】 上生用为散。醋醋调摩患处。

【主治】 紫癜风。

07171 牡蛎散

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】 厚朴（去皮，姜制） 牡蛎 白术各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，一日二三次，空心米饮调下。

【主治】 小便白浊。

07172 牡蛎散

【方源】《直指》卷九。

【组成】 左顾牡蛎（米泔浸洗，煅透） 麻黄根 黄耆（蜜炙）各一两 白术半两 甘草（炙）一分

【用法】 上锉。每服三钱，小麦百余粒同煎服。

【主治】 诸虚体常自汗，惊惕不宁。

07173 牡蛎散

【方源】《医方类聚》卷一九二引《施园端效方》。

【组成】 牡蛎（烧） 蛇床子 川乌 良姜 菟丝子各半两

【用法】 上为细末。用药三钱，白面一钱，酒、醋热调匀，渍洗浴之，或涂外肾，帛包尤妙。

【主治】 男女阴汗，湿冷痒疾。

07174 牡蛎散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【异名】 牡矾丹（《医学入门》卷八）。

【组成】 枯白矾四两 黄丹（炒）二两 牡蛎粉二两

【用法】 上为细末。遇夜睡，手捏药于痒处痛擦之，不一时又擦之，三四次后顿减，次夜再擦，虽大减又擦，后日自然平复。如液汗亦有顿擦方可；脚汗先擦大减，又擦后装药于靴，或靴底上脚板上涂药，缠脚裹之亦可。

【主治】 阴囊两傍生疮，或阴湿水出，甚痒甚苦，夜则抓之无足，后必自痛，或两腋及脚心常汗湿者。

【临证举例】 阴囊湿痒：一患者，得此症，受苦数十年，得此方随用二三日，如法搽之，二十余年不发。

07175 牡蛎散

【方源】《医统》卷六十。

【组成】 醋牡蛎一两 枯矾 硫黄各二钱 雄黄一钱 苦参二钱 蛇床子二钱

【用法】 上为细末，先用苍术、椒盐水煎汤洗过后，用此药掺上。

【主治】 阴囊湿痒，搔之则汁水流珠。

07176 牡蛎散

【方源】《产宝》。

【组成】 牡蛎二钱 人参二钱 黄耆（生）二钱 当归三钱 熟地三钱 麻黄根（麻黄发汗，根止汗，宜用根）一钱 小麦麸皮（炒黄）二钱

【用法】 上为末。每服三钱，生化汤调服。

【主治】 妇人产后，阴虚盗汗，睡中汗出，觉则止者。

07177 牡蛎散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 牡蛎三两（煅） 人参一两半 当归三两 五味一两半 熟地五两 川芎一两 艾叶一两（炒炭） 地榆三两（炒炭） 龙骨三两（煅） 续断三两（炒炭）

【用法】 上为散。每服三钱，米饮煎，去滓温服。

【主治】 恶露淋漓不断，脉软涩者。

【方论选录】 产后经血已虚，经气失守，不能统摄其血，故恶露淋漓不断焉。熟地补阴滋血以资经脉；人参补气扶元以固漏下，当归养血归经，艾灰温经止血，川芎行血海以升阳，续断续经脉以止血，五味收耗散之气，牡蛎涩经气之脱，白龙骨涩虚滑，地榆灰止漏血。为散米饮煎，使血气内充，则经脉完固，而血无妄行之患，何致恶露淋漓经久不断乎？

07178 牡丹皮汤

【方源】《回春》卷六。

【组成】 牡丹皮一钱半 当归一钱半 川芎八分 白芍 生地黄 陈皮 白术 香附各一钱 柴胡 黄芩各一钱 甘草四分

【用法】 上锉一剂。水煎服。

【主治】 室女经闭，咳嗽发热。

07179 牡丹皮汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】 丹皮二钱 赤芍一钱 木通一钱 萆薢二钱 花粉二钱 瞿麦二钱 泽泻一钱五分 车前二钱 甘草四分

【用法】 苡仁二两，煎汤代水。

【主治】 湿热内蕴，移于下焦，小溲混浊作痛。

07180 牡丹皮散

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】 牡丹皮 当归 骨碎补 红花（酒浸） 续断 乳香 没药 桃仁 川芎 赤芍药 生地黄

【用法】 水、酒煎服，却用秫米饭热髱缚，冷又蒸热，换缚。

【主治】 跌扑闪挫伤损，滞血疼痛。

07181 牡丹煎丸

【方源】《局方》卷九。

【组成】 延胡索 缩砂仁各半两 赤芍药 牡丹皮各一两 山茱萸 干姜（炮）各半两 龙骨（细研，水飞） 熟干地黄（酒浸） 槟榔 羌活各二两 藁本（去土） 五味子 人参 白芷 当归（去芦，酒浸） 干山药 泽泻 续断（细者） 肉桂（去粗皮） 白茯苓 白术 附子（去皮脐） 木香 牛膝（去苗，酒浸一宿，焙） 萆薢（炮，为末，炒熟）各一两 石斛（去根，酒浸）三两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前以温酒或醋汤送下，一日二次。

【主治】 妇人冲任本虚，少腹挟寒，或因产劳损，子脏风寒，搏于血气，结生瘕聚，块硬发歇，脐腹刺痛，胁肋紧张，腰膝疼重，拘挛肿满，背项强急，手足麻痹，或月水不调，或瘀滞涩闭，或崩漏带下，少腹冷疼，寒热盗汗，四肢瘦痛，面色萎黄，多生黯黯，羸乏少力，心多惊悸，不欲饮食。

【宜忌】 妊娠不宜服。

07182 牡蛎粉散

【方源】《医方类聚》卷五十四引《神巧万全方》。

【组成】 牡蛎粉一两 麻黄根一两 杜仲一两（炙） 黄耆一两

【用法】 上为细散。每服二钱，煎蛤粉调下，不拘时候。

【主治】 伤寒汗不止。

07183 牡黄二子煎

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 煅牡蛎 31 克 大黄 31 克 地肤子 31

克 蛇床子31克

【用法】 加水2升，煎至1升，浸洗再湿敷。

【主治】 足癣。

07184 牡蛎泽泻散

【方源】《伤寒论》。

【异名】 牡蛎散(《永类钤方》卷二十一)。

【组成】 牡蛎（熬） 泽泻 蜀漆（暖水洗去腥） 葶苈子（熬） 商陆根（熬） 海藻（洗去咸） 栝楼根各等分。

【用法】 上为散。每服方寸匕，白饮和服，一日三次。小便利，止后服。

【主治】 大病瘥后，从腰以下有水气者。

【方论选录】 ①《金镜内台方议》：大病瘥后，脾胃气虚，不能制约肾水，水溢下焦，腰以下为肿也，故当利其小便。以牡蛎为君，泽泻、海藻为臣，三味之咸，能入肾而泄水气；以葶苈、商陆为佐，以苦坚之；以栝楼根之苦寒，蜀漆之酸寒为使，酸苦以泄其下而降湿肿也。②《古方新解》：治腰以下水气不行，必先使商陆、葶苈从肺及肾开其来源之壅，而后牡蛎、水藻之软坚，蜀漆、泽泻之开泄，方能得力，用栝楼根者，恐行水之气过驶，有伤上焦之阴，仍使之从脾及阴，还归于上，如常山之蛇，击其首则尾应，击其尾则首应者不殊也。③《医宗金鉴》：此方施之于形气实者，其肿可随愈也。若病后土虚不能制水，肾虚不能行水，则又当别论，慎不可服也。④《伤寒方苑荟萃》：本方为排决逐水之剂。方中牡蛎软坚行水；泽泻渗湿利水；蜀漆祛痰逐水；葶苈子宣肺泄水，商陆、海藻润下行水，以使水邪从小便排出。瓜蒌根生津止渴，为本方之反佐，可使水去而津不伤。

07185 针砂丸

【方源】《医学正传》卷六引《集验方》。

【组成】 针砂半斤（醋炒红） 苍术四两（米泔浸） 香附四两（童便浸） 神曲（炒微黄） 茵陈（姜汁炒） 麦芽（麸炒）各二两 芍药 当归（酒洗，去头） 生地黄 川芎 青皮（去瓤，炒）各一两五钱 陈皮（去白） 莪术（醋煮） 三棱（醋煮）各二两 栀子（去壳，炒） 姜黄 升麻 干漆各五钱（炒烟尽）

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，生姜汤送下。

【主治】 谷疸，酒疸，湿热发黄。

07186 针砂丸

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】 猪苓一两半 白术一两半（炒） 茯苓二两 苍术一两半（炒） 厚朴一两半（制） 草果一两 泽泻一两半 三棱一两半（醋炒） 蓬术一两半（醋炒） 针砂一两（醋炒） 茵陈二两

【用法】 上为末，面糊为丸，每服二钱，红花子三钱（炒，研）煎汤送下。

【主治】 疸久成积，块垒不消，脉沉者。

【方论选录】 疸久不消，湿热郁滞，血气不得流通而成坚积，故腹中垒块不平焉。白术健脾气以燥湿化积；苍术升阳气以燥湿强脾；厚朴散满宽中气；草果涤寒消积滞；三棱之峻攻坚破垒；蓬术之猛消块化积；针砂锋锐，力能磨积，直透其壁垒；猪苓降下，性专利湿，通走其三焦；茯苓渗脾肺之湿；泽泻利膀胱之湿；茵陈泻湿热以治黄也。以小麦曲糊为丸化其滞，以红花子汤散其结而活其血气耳。俾血气调和则积化块消，而无湿热积滞之患，安有疸久不全，块垒不平乎？此攻积破坚之剂，为疸久块垒不消之专方。

07187 针砂汤

【方源】《名家方选》。

【组成】 桂枝 茯苓 白术 甘草各一钱 针砂七分或一钱 人参 牡蛎各八分

【用法】 以水二合，煮取一合温服。

【主治】 黄胖病，心下痞或满，行步则短气动悸甚者。

07188 针砂五果丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】 针砂一两（用水提净） 绿矾二两（醋炒七次） 杏仁 桂圆肉 胡桃肉 莲肉 芡实各二两 大枣四两（蒸，去皮核）

【用法】 上共捣为丸。每晨、晚服三钱，白汤送下。

【主治】 黄胖肿浮，颈脉动，小便不利，将成水肿。

07189 针砂平胃散

【方源】 方出《本草纲目》卷八引《摘玄方》，名见《观聚方要补》卷三。

【组成】 针砂四两（醋炒七次） 干漆（烧存性）三钱 香附三钱 平胃散五钱

【用法】 上为末，蒸饼为丸，如梧桐子大。任汤使下。

【主治】 脾劳黄病。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“针砂平胃丸”。

07190 钉胎丸

【方源】《直指秘传》。

【组成】 杜仲（糯米汁浸炒）八两　续断（酒浸炒）二两　山药六两

【用法】 上为末作丸，每服五六十丸。孕后二月即服之。

【主治】 频惯堕胎，三四月即坠者。

07191　利气丸

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】 大黄（生用）六两　黑丑（头末）四两　香附米（炒）　木香　槟榔　枳壳（麸炒）　青皮（去瓤）　陈皮　莪术（煨）　黄连各二两　黄柏三两（一方加黄芩、当归各一两）

【用法】 上为细末，水为丸，如梧桐子大。每服五十丸或一百丸，临卧时淡姜汤送下。以大便通利为度。如不利，再加丸数。

【功用】 流湿润燥，推陈致新，滋阴抑阳，散郁破结，活血通经。

【主治】 一切气滞，心腹胀闷疼痛，胁肋膨胀，呕吐酸水、痰涎不利，头目眩晕，并食积酒毒，及米谷不化，或下痢脓血，大小便结滞不快，气壅积热，口苦，烦燥，涕唾稠粘。

07192　利气散

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】 绵黄耆　陈皮　甘草各等分

【用法】 上为末。水煎服。自然通。

【主治】 老人小便秘涩不通。

07193　利气散

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】 木通三两　枳壳一两半（炒）　陈皮一两半　草梢一两半

【用法】 上为散。每服三钱，砂仁汤送下。

【主治】 膀胱气滞，小便不通，小腹满，脉沉涩者。

【方论选录】 方中江枳壳破滞气以化气，广陈皮和胃气以利气，童木通通闭利小便，生草梢和药达茎中。为散、砂仁汤下，使滞化气调则膀胱之气自化而水腑蓄泄有权，安有小便不通之患乎？此泻气通闭之剂，为气滞小便不利之专方。

07194　利胆丸

【方源】《新急腹症学》引中医研究院方。

【组成】 茵陈四钱　龙胆草　郁金　木香　枳壳各三钱

【用法】 共研细末，加鲜猪胆汁或牛胆汁一斤，先将胆汁熬浓至半斤，拌入药末中，并加适量蜂蜜为丸，每丸三钱。早、晚各服一丸。

【主治】 胆囊炎、胆石症。

07195　利胆汤

【方源】《新急腹症学》引青岛台西医院方。

【组成】 柴胡　茵陈　郁金　黄芩　白芍　大黄（后下）各五钱　金银花　大青叶　金钱草各一两　芒消（冲服）三钱　木香四钱

【功用】 清热利胆。

【主治】 胆道蛔虫病恢复期。

07196　利济汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 泽泻一钱五分　沉香五分　枳壳一钱　青皮一钱　赤苓二钱　当归二钱　赤芍一钱　广皮一钱　牛膝二钱　车前二钱　小蓟根五钱

【主治】 胞痹。少腹膀胱按之内痛，若沃以汤，涩于小便，上为清涕。

07197　利膈丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】 大利膈丸（《卫生宝鉴》卷十二）。

【组成】 牵牛四两（生）　槐角子一两（炒）　木香一两　青皮一两　皂角（去皮，酥炙）　半夏（洗）各二两

【用法】 上为细末，生姜面糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，水送下。

【主治】 ①《儒门事亲》：上喘中满，醋心腹胀，时时作声，否气上下，不能宣畅。②《卫生宝鉴》：风热痰实，咳嗽喘满，风气上攻。

07198　利膈丸

【方源】《医学发明》卷一。

【异名】 人参利膈丸（《卫生宝鉴》卷十三）、开关利膈丸（《张氏医通》卷十四）。

【组成】 木香七钱　槟榔七钱半　厚朴（姜制）二两　人参　藿香叶　当归　炙甘草　枳实（麸炒）各一两　大黄（酒浸，焙）二两

【用法】 上为细末，滴水为丸，或少用蒸饼亦可，如梧桐子大。每服三五十丸，食后诸饮送下。

【功用】《卫生宝鉴》：利脾胃壅滞，调大便秘利，推陈致新，消饮进食。

【主治】 ①《医学发明》：胸中不利，痰嗽喘促，脾胃壅滞。②《张氏医通》：肠胃壅滞，噎膈不通，大便燥结。

【方论选录】《医略六书》：方中大黄荡涤热壅之结，枳实消化痞满之气，厚朴散满宽中，槟榔破滞攻实，藿香开胃气，木香调中气，人参扶元鼓胃气，当归养血荣胃口，甘草缓中和诸药也。水、酒为丸，米饮送下，使脾胃输化有权，则热实壅结自开而津气四汔，大便无不通，膈塞无不垫矣。此推

荡之剂，为热实塞膈之专方。

【备考】 本方方名，《袖珍》引作“大利膈丸”。《医略六书》本方用法：水、酒为丸。每服三钱，米饮送下。

07199 利膈汤

【方源】《本事》卷四引都君子方。

【异名】 利膈散(《医统》卷二十一)。

【组成】 鸡苏叶 荆芥穗 桔梗（炒） 防风（去杈股） 牛蒡子（隔纸炒） 甘草各一两（炙） 人参半两（去芦）

【用法】 上为细末。每服一钱，沸汤点服。

【功用】 轻清解散。

【主治】 ①《本事》：虚烦上盛，脾肺有热，咽喉生疮。②《郑氏家传女科万金方》：腹痛脐中出脓，失护进风，角弓反张。

【加减】 如咽痛口疮甚者，加僵蚕一两。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴、少阴药也。咽痛咽疮，由于火郁，桔梗、甘草，甘桔汤也，辛苦散寒，甘平除热，为清膈利咽之要药；加薄荷、荆芥、防风以散火除风；加牛蒡子以润肠解毒，火者元气之贼，正气虚则邪火炽，故又加人参以补虚退热。

07200 利膈汤

【方源】《济生》卷五。

【组成】 防风 鸡苏叶 桔梗 牛蒡子 荆芥穗各一两 川升麻 人参 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 上膈壅热，口苦咽干，痰唾稠粘，心烦喜冷，咽喉生疮疼痛，一切上壅之证。

07201 利气泄火汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】 人参三钱 白术一两（土炒） 甘草一钱 熟地五钱（九蒸） 当归三钱（酒洗） 白芍五钱（酒炒） 芡实三钱（炒） 黄芩二钱（酒炒）

【用法】 水煎服。服六十剂而胎不坠矣。

【功用】 平其肝中之火，利其腰脐之气，使气生夫血而血清其火。

【主治】 妊娠多怒堕胎。

【方论选录】 此方名虽利气而实补气也。然补气而不加以泄火之品，则气旺而火不能平，必反害其气也。故加黄芩于补气之中以泄火，又有熟地、归、芍以滋肝而壮水之主，则血不燥而气得和，怒气息而火自平，不必利气而气无不利，即无往而不利矣。

07202 利水调经汤

【方源】《镜京直指》卷二。

【组成】 制茅术三钱 姜川朴一钱 带皮苓五钱 冬瓜皮四钱 车前子二钱 急性子三钱 大腹皮三钱 丝通草一钱五分 建泽泻三钱 蝼蛄虫五只（研，吞） 官桂五分

【功用】 利水消肿。

【主治】 妇女脾虚湿阻，先身肿而后经停。

07203 利水渗湿汤

【方源】《会约》卷九。

【组成】 苍术二钱 黄柏一钱半 川牛膝二钱 赤茯苓 淮木通 建泽泻 汉防已各一钱二分 车前子（去壳）一钱 猪苓一钱半

【用法】 水煎服。

【主治】 水肿从脚而上，六脉细而迟，小便短少，脚膝疼痛。

【加减】 如服此而小便不清不长，加萆薢五钱。

【临证举例】 水肿 一人水肿皮破，用此一服，夜间小便遂多，以宿水从小便出也，来日肿消一半，再服四剂痊愈。

07204 利血通经丸

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 大黄一两 当归二两 肉桂一两（皮去） 白芍一两（炒） 水蛭六钱（烧黑透） 虻虫六钱 干漆六钱（烧烟尽） 木香一两 广茂一两（醋炒） 桃仁二两（去皮尖） 灵脂一两

【用法】 上为末，醋为丸。每服一二钱，酒送下。

【主治】 经闭结块，脉牢者。

【方论选录】 血结坚凝，阻遏冲任而结块不消，故经气闭塞，月信不来也。大黄推荡积血以开闭结，广茂消化结块以攻坚垒，水蛭吮血于脏，虻虫啮血于经，干漆消陈久之积瘀，灵脂降浊污之阴凝，桃仁破血润燥，肉桂温经暖血，木香调气化以调经，当归养营血以荣经。白芍敛阴和冲任而生新血也。醋以丸之，酒以行之，无不瘀散结开，则坚凝顿释，结块自消，何患经闭不通，月信不来乎！

07205 利肝分水饮

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】 龙胆草二钱 茵陈三钱 茯苓一两 猪苓二钱 柴胡一钱 车前子三钱 白蒺藜三钱 甘菊花五钱

【用法】 水煎服。

【功用】 开肝气之郁，兼以分湿散热。

【主治】 肝疸。两目尽黄，身体四肢亦现黄色，

但不如眼黄之甚，气逆，手足发冷，腰以上汗出不止，腰以下无汗。

07206 利肝解湿汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】白芍二两 伏苓一两 干鸡冠花五钱 炒栀子三钱

【用法】水煎服。

【功用】解肝中之火，利膀胱之水。

【主治】妇人肝经湿热，带下色青，甚则色绿，如绿豆汁，稠粘不断，其气亦腥。

07207 利胆排石片

【方源】《中国药典》。

【组成】金钱草 250g 茵陈 250g 黄芩 75g 木香 75g 郁金 75g 大黄 125g 槟榔 125g 枳实（麸炒）50g 芒消（精制）25g 厚朴（姜制）50g

【制剂】以上十味，木香、大黄、芒硝粉碎成细粉；其余金钱草等七味经煎煮，提取，浓缩成稠膏状，加入上述细粉制粒，压制成 1000 片，包糖衣，即得。

【用法】口服，排石：一次 6～10 片，一日 2 次；炎症：一次 4～6 片，一日 2 次。

【功用】清热利湿，利胆排石。

【主治】用于胆道结石，胆道感染，胆囊炎。

【宜忌】体弱，肝功能不良者慎用；孕妇禁用。

07208 利窍聪耳方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】穿山甲二钱（生） 蝉蜕二钱（去足） 石菖蒲二钱 木笔花二钱 蓖麻仁一钱五分（去净油） 干蝎四个（去毒） 鲤鱼胆三钱（后兑） 麝香一钱（后兑）

【用法】上为极细末，兑鲤鱼胆，麝香合匀，用黄蜡溶化，晾温，老嫩合宜，做成药捻，约一寸有余，外有黄绢裹之，纳于耳中，以通窍道。

【主治】耳聋耳闭。

【方论选录】方中山甲活血通络，全蝎、蝉蜕祛风止痛，麝香、石菖蒲芳香开窍，鲤鱼胆清热去火，蓖麻仁润燥而通便，木笔花解毒清热兼平肝。

07209 利湿通经汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】威灵仙一钱 桑枝三钱 当归二钱 秦艽五钱 蚕沙三钱 稀莶草一钱半 甘草节八分 苦参一钱 苍术一钱 苡仁三钱 大胡麻一钱 五加皮一钱半 川牛膝一钱半 川续断一钱半

【主治】四肢麻木，指节拘掣。

07210 利膈化痰丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】南星 蛤粉（研细） 一两 半夏 瓜蒌仁 贝母（去心） 香附半两（童便浸）

【用法】上为末，用猪牙皂角十四梃敲碎，水一碗半，煮杏仁（去皮尖）一两，煮水将干，去皂角，擂杏仁如泥，入前药搜和，再入姜汁泡，蒸饼为丸，如绿豆大，青黛为衣。每服五十丸，姜汤送下。

【功用】①《丹溪心法》：利膈化痰。②《杏苑》：豁痰疏郁，泄火散热，降逆气，润肺止嗽。

【主治】①《杏苑》：一切痰涎壅塞，郁火热于胸膈之间，痰喘不利。②《济阳纲目》：痰火大盛，胸膈迷闷，呕吐烦躁，头眩咳嗽。

【备考】方中南星、半夏、瓜蒌仁、贝母用量原缺。《杏苑》本方用：南星二两、半夏一两五钱、贝母二两、蛤粉一两、瓜蒌仁（另研）、香附各二两、牙皂、青黛各一两、杏仁（另研泥）一两五钱。

07211 利膈豁痰汤

【方源】《观聚方要补》卷四引《证治大还》。

【组成】半夏 橘红 枳实 槟榔 沉香 桔梗 瓜蒌 黄连 栀子 香附 细茶 白芥子 石膏

【用法】水煎，初服二三贴，再加苏叶、麻黄。

【主治】气结痰壅，膈噎饮食不下。

07212 乱发散

【方源】方出《圣惠》卷七十二，名见《普济方》卷四十二。

【组成】滑石二两 乱发灰一两

【用法】上为细散。取桃白皮一斤，熟捣，以水三大盏，绞取汁，温半盏，调下二钱，不拘时候。

【主治】妇人忍小便，不得时起，致令脬转，经过五日，困顿欲死。

07213 乱发灰散

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】乱发灰 黄连（去须） 故絮灰各一两 干姜（炮）半两

【用法】上为散。再研匀。不拘多少，敷疮上，每日三五次，以愈为度。

【主治】①《圣济总录》：口吻生疮。②《普济方》：口吻生疮，及口旁恶疮。

07214 秃鸡丸

【方源】《便览》卷三。

【组成】菟丝子（酒煮）一两 蛇床子（酒洗）二两 五味子一两 肉苁蓉（酒浸，焙）二两 莲蕊（金色者）二两 山药（酒浸，焙）二两 远志

（甘草水浸，去心）一两　真沉香五钱　广木香五钱　益智仁一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下，以干物压之。

【功用】 男子补精壮阳。

07215　秃鸡丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】 河车一具（酒洗净，银针挑去血丝，焙干）　肉苁蓉（酒洗）　菟丝子（酒洗）　蛇床子（酒浸）　五味子　沉香　莲蕊　远志肉　山药　木香各五钱　益智仁一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【功用】 种子。

【主治】 男子色欲过度，下元虚损。

07216　秃鸡散

【方源】《千金》卷二十。

【组成】 蛇床子　菟丝子　远志　防风　巴戟　五味子　杜仲　苁蓉各二两

【用法】 上为末。酒下方寸匕，每日二次。常服勿绝。

【功用】 轻身益气强骨，补髓不足，强盛阴气。

【宜忌】 无室勿服。

07217　秃疮膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 紫草 60 克　百部 125 克　麻油 370 毫升　朴消 50 克　硫黄末 15 克　樟脑 6 克　黄腊 60 克

【用法】 先将香油入铜锅内，加入百部、紫草熬半枯去渣，离火，逐渐加入朴消（起泡沫时应慢慢加），后加入硫黄、樟脑调搅，最后加入黄腊熔化调和成膏。先剃光头，头癣处涂药一遍，每日一次，几天后头发长上时，再剃光，再上药，直至治愈。

【功用】 杀虫灭菌。

【主治】 头癣（黄癣、白癣）。

07218　体气散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 石绿三钱　轻粉一钱

【用法】 上为末。醋调涂。

【主治】 狐臭体气。

07219　何人饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 何首乌自三钱以至一两随轻重用之　当归二三钱　人参三五钱或一两随宜　陈皮二三钱（大虚者不必用）　煨生姜三片（多寒者用三五钱）

【用法】 水二钟，煎八分，于发前二三时温服之；若善饮者，以酒一钟浸一宿，次早加水一钟煎服亦妙，再煎不必用酒。

【功用】 截疟

【主治】 ①《景岳全书》气血俱虚，久疟不止，或急欲取效者。②《痢疟纂要》：疟痢兼症，或痢减而疟甚。

【方论选录】 ①《成方便读》：方中首乌补肝肾之阴，人参助脾肺之阳，当归和其营，陈皮理其气，以为补药之助，生姜生则散表，熟则温中而益其阳气耳。②《历代名医良方注释》：方中何首乌既滋补，又截疟，为君药；人参、当归补气补血，扶正祛邪，是为臣药；陈皮、生姜芳香辛散，理气和中，共为佐使。

07220　何首乌丸

【方源】《宣明论》卷十二。

【组成】 何首乌半斤　肉苁蓉六两　牛膝四两

【用法】 上将何首乌半斤，用枣一层，与何首乌甑内蒸枣软用，切，焙，同为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服五七丸，嚼马蔺子服，食前酒送下，一服加一丸，每日三次，至四十丸即止，却减至数。

【功用】 ①《宣明论》：乌发，填精。②《普济方》：填精补髓。

【主治】 男子元脏虚损。

【宜忌】《济阳纲目》：修合不犯铁器。

07221　何首乌丸

【方源】 方出《得效》卷十，名见《普济方》卷五十七。

【组成】 何首乌一两半　防风　黑豆（去皮）　荆芥穗　地骨皮（净洗）各一两　桑白皮　天仙藤　苦参　赤土各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，食后茶清送下。兼服大风油。

【主治】 肺风面赤鼻赤。

07222　何首乌汤

【方源】《疡医大全》卷三十五。

【组成】 何首乌　防风　金银花　荆芥　苍术　白鲜皮　甘草　苦参　连翘　木通

【用法】 上以灯心为引，水煎服；或为细末，水泛为丸。每服三钱，淡酒送下。

【主治】 湿热风毒，遍身脓窠，黄水淋漓，肌肉破烂。

【加减】 溏泄，加泽泻；夏热，加栀子、黄芩；

痒，加白蒺藜；脾胃弱，去苦参，加赤茯苓。

07223 何首乌酒

【方源】《金鉴》卷七十三。

【组成】何首乌四两 当归身 当归尾 穿山甲（炙） 生地黄 熟地黄 虾蟆各一两 侧柏叶 松针 五加皮 川乌（汤泡，去皮） 草乌（汤泡，去皮）各四钱

【用法】将药入夏布袋内，扎口，用黄酒二十斤，同药袋入坛内封固，重汤煮三柱香，埋窖七日。开坛口取酒，时时饮之。令醺醺然，作汗避风。

【主治】大麻风，稍露虚象者。

07224 何首乌散

【方源】《苏沈良方》卷五引《灵苑方》。

【组成】何首乌（水浸一日，切，厚半寸，黑豆水拌匀令湿，与何首乌重重相间，蒸豆烂，去豆，阴干） 仙灵脾叶 牛膝（以上各酒浸一宿） 乌头（水浸七日，入盐二两半，炒黄色）各半斤

【用法】上药每服二钱，空心、食前酒送下；或粥饮调下，每日三次。久患者半月效。

【主治】脚气流注，头目昏重，肢节痛，手足冷，重热拘挛，浮肿麻痹，目生黑花。

【临证举例】手足挛痛，先君同官王绰有女子病足挛痛二年，得此方，半月愈。予老姨亦病手足骨髓中痛，不能堪，久治不愈，亦得此愈。

07225 何首乌散

【方源】《局方》卷八。

【组成】荆芥穗 蔓荆子（去白皮） 蚵蛎草（去土） 威灵仙（净洗） 何首乌 防风（去芦叉） 甘草（炙）各五斤

【用法】上为末。每服一钱，食后温酒调下，沸汤亦得。

【主治】脾肺风毒攻冲，遍身癣疥瘙痒，或生瘾疹，搔之成疮，肩背拘倦，肌肉顽痹，手足皲裂，或风气上攻，头面生疮，及紫癜、白癜、顽麻等风。

07226 何仙姑庆世丹

【方源】《普济方》卷二二三引《卫生家宝》。

【异名】四神丹、还精丹、护命丹、延灵丹。

【组成】枸杞子 菊花（去萼用） 远志（须用硬物捶破，去心） 车前子 巴戟 生地黄（用干者，去芦头） 覆盆子 白术 苁蓉（用有肉者，酒浸七日） 菖蒲（细小九节者） 牛膝（去芦头，酒浸七日） 地骨皮 菟丝子（酒浸七日，昼夜晒干，炒令黄色为度） 续断 细辛（去苗用） 何首乌（上各用本上所生者）各等分

【用法】上逐药择洗，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前温酒下。

【功用】还精定魂，安五脏，和六腑，添智慧，去邪，乌发黑髭，驻颜色，长肌肤，聪耳明目，强健四体，延年益智，服一至二年返老还童。

【主治】一切危疾，及瘫痪痛楚，久在床褥，或五脏不安，四肢少力，口干气虚，神乱，骨节疼痛，毛发焦枯，或有恶疾，居体不安，行履艰难，饮食不进，或寝寐不安，或痛连筋骨。

07227 佐关煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】左关煎（《医部全录》卷二五五）。

【组成】厚朴（炒） 一钱 陈皮（炒） 一钱 山药（炒）二钱 扁豆（炒）二钱 炙甘草七分 猪苓二钱 泽泻二钱 干姜（炒）一二钱 肉桂一二钱

【用法】用水一钟半，煎服。

【功用】去寒湿，安脾胃。

【主治】生冷伤脾，泻痢未久，肾气未损者。

【加减】如腹痛甚者，加木香三五分，或吴茱萸亦可；如泻甚不止者，加破故纸，或肉豆蔻。

07228 佐金丸

【方源】《医学纲目》卷五。

【组成】片芩六两 吴茱萸一两

【用法】上为末，蒸饼为丸。

【功用】佐肺金以伐肝木之邪。

【主治】《准绳·类方》：肝火，胁肋刺痛，往来寒热，头目作痛，泄泻淋闭。

【备考】《准绳·类方》本方用法：上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，白术、陈皮汤送下。

07229 佐脾丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】山楂三两 半夏 茯苓各一两 连翘 陈皮 萝卜子各半两

【用法】上为末，粥为丸服。

【主治】积聚。

07230 伸筋膏

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】马钱子 透骨草 生山甲 汉防己 乳香 没药 生姜 王不留行 细辛 五加皮 豨莶草 独活 生草乌 五倍子 肉桂 枳实 牛蒡子 血余各三钱 地龙 红娘 全蝎 灵仙 生军 泽兰叶 丝瓜络 麻黄 土鳖虫 防风各四钱 归尾

五钱　功劳叶一两　蜈蚣四条

【用法】 以香油四斤炸枯去滓，炼油滴水成珠，下章丹二斤即成。局部敷贴。

【功用】 舒筋活血，散瘀止疼，祛瘀生新。

【主治】 一切软组织损伤。

07231　伸腰散

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】 白术两许

【用法】 酒一碗，水二碗，煎汤饮之。

【主治】 腰痛不能俯仰。

07232　伸筋草洗方

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 伸筋草一两　透骨草五钱　祁艾一两　刘寄奴五钱　桑枝一两　官桂五钱　苏木三钱　穿山甲五钱　草红花三钱

【用法】 将上药碾碎，装纱布袋内，用桑枝架水锅上蒸后热烫，或煮水浸泡，隔日一次。

【功用】 活血通络，温经软坚。

【主治】 硬皮病，下肢静脉曲张，象皮肿等。

【宜忌】 急性炎症及破溃成疮者勿用。

07233　佝偻汤

【方源】 方出《中医临证撮要》，名见《古今名方》。

【组成】 怀山药 15 克　怀牛膝 9 克　制首乌 12 克　山萸肉 6 克　生白术 6 克　大熟地 9 克　益智仁 3 克　西党参 6 克　云茯苓 9 克　全当归 6 克　左牡蛎 15 克　生龟板 15 克　大红枣 3 枚　黑芝麻 15 克

【用法】 上为细末，和匀。每早、晚开水冲调 4.5 克，同时服用炙黄耆 9 克，大红枣五个，浓煎，连汤带枣一次服完，每日一次。

【功用】 补肝肾、调脾胃。

【主治】 佝偻病，头项软弱，口软唇弛，咀嚼无力，手足握举站立行走均弛缓，智力低下，有时抽筋，口唇舌淡而白，脉气软弱。

07234　住痛散

【方源】《外科百效全书》卷一。

【组成】 乳香　没药各三钱　寒水石（煅过）五钱　滑石五钱　冰片一分

【用法】 上为极细末。掺之。

【主治】 恶毒，恶疮，作热作痛者。

07235　佛手散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【异名】 无忧散。

【组成】 龙脑薄荷　百药煎　硼砂　牙消各二钱　甘草　青黛各四钱　马勃　朴消各半两　桔梗一两　白僵蚕半两（端直，瓦焙）

【用法】 上为细末。每用干掺之。一日三五次。

【主治】 咽喉肿痛，赤口疮。

07236　佛手散

【方源】《百一》卷十。

【组成】 盆消一两（研）　白僵蚕半两（去丝）　青黛一钱（研）　甘草二钱半（生）

【用法】 上为细末。以少许掺喉中，如闭甚，以竹管吹入，寻常咽喉间不快亦可用。

【主治】 缠喉风。

07237　佛手散

【方源】《妇人良方》卷二十一。

【组成】 当归　川芎　黄耆各一两　北柴胡　前胡各一分

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一大盏，桃、柳枝各三寸，枣子、乌梅各一个，生姜三片，煎至六分，去滓温服。

【主治】 产后血虚劳倦，盗汗，多困少力，咳嗽有痰。

【加减】 如有痰，去乌梅。

07238　佛手散

【方源】《丹溪心法附余》卷十。

【组成】 薄荷二两　盆消一两　甘草七钱　桔梗五钱　蒲黄五钱　青黛三钱

【用法】 上为细末。每用少许，干掺，又用竹管吹咽喉内噙化，时时用之。

【主治】 咽喉肿痛生疮，风热喉痹肿塞。

07239　佛手膏

【方源】《中藏经》卷八。

【组成】 乳香（真者，研）半字　硇砂半字（研）　麝香一字（研）　当归半钱（锉细）　黄连一钱（去须称，锉细）　白矾半字（飞过，研细）　白砂蜜四两（须白砂者佳）　青盐一字（光明者，研）

【用法】 上除蜜，先将上七味于乳钵内研烂，同蜜一处拌匀，入新竹筒内，用油纸两三重，以线系扎定口，勿致水入，放净锅内，添水煮竹筒，自早至午时，破竹筒，倾药；以新绵或重绢滤过，入药于瓷瓶内牢封，埋地坑内，经宿取出。用铜柱点，每点了，合眼少顷，复以温净水洗之。翳膜嫩者，是近年生者，当五七次随药退下；翳老者，频点旬日，退下即效；胬肉瘀肉，不过两三日，随药以铜柱刮落，胬肉自然绽断。

【主治】 眼生翳膜并胬肉，赤脉攀睛，翳晕，冷热泪下，及眼眶赤烂。

07240 佛手膏

【方源】《普济方》卷八十二。

【组成】 硼砂

【用法】 用硼砂放在盒子内一日，纸封定，至午刻取出硼砂，以冷水浮洗过，研为粉，以筋头点入眼中。浮膜立退。凡点时，先将温水洗眼，然后点，又洗再点，不过二四次立验。

【主治】 眼内瘀肉，浮膜侵睛。

07241 佛手柑粥

【方源】《长寿药粥谱》引《宦游日札》。

【组成】 佛手柑 10～15 克

【用法】 上药煎汤去渣，再入粳米 50～100 克，冰糖少许，同煮为粥。

【功用】 健脾养胃，理气止痛。

【主治】 年老胃弱，胸闷气滞，消化不良，食欲不振，嗳气呕吐等症。

【方论选录】 佛手柑味辛酸，性温无毒，入肝、胃经，是理气止痛，开胃进食之佳品。对于中老年人体虚胃弱，消化力差所引起的食欲不振，胃痛胁胀，嗳气吐逆，胸胞气闷，以及患有慢性胃炎时，常常吃些佛手柑粥，均有较好的效果。

07242 皂子丸

【方源】《济生》卷八。

【异名】 皂角子丸(《医统》卷八十)。

【组成】 好皂角子一升　元参　连翘仁各一两

【用法】 上用水五升，砂锅内慢火煎，水尽为度。每服拣取好皂角子软者三粒，食后临卧时细嚼咽下；硬者捣烂，炼蜜为丸，如榛子大，含化。

【主治】 瘰疬满项，不破，及结核肿痛者。

【宜忌】 忌酒、面、热毒物。

07243 皂角丸

【方源】《局方》卷一。

【组成】 皂角（捶碎，以水十八两六钱揉汁，用蜜一斤，同熬成膏）　干薄荷叶　槐角（煨）各五两　青橘皮（去瓤）　知母　贝母（去心，炒黄）　半夏（汤洗七次）　威灵仙（洗）　白矾（枯过）　甘菊（去枝）各一两　牵牛子（煨）二两

【用法】 上为末，以皂角膏搜和为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后生姜汤送下；痰实咳嗽，用蛤粉面汁送下；手足麻痹，用生姜薄荷汤送下；语涩涎盛，用荆芥汤送下；偏正头痛、夹脑风，用薄荷汤送下。

【主治】 风气攻注，头面肿痒，遍身拘急，痰涎壅滞，胸膈烦闷，头痛目眩，鼻塞口干，皮肤瘙痒，腰脚重痛，大便风秘，小便赤涩，及咳嗽喘满，痰吐稠浊，语涩涎多，手足麻痹，暗风痫病，偏正头痛，夹脑风；妇人血风攻注，遍身疼痛，心怔烦躁，瘾疹瘙痒。

07244 皂角丸

【方源】 方出《续本事方》卷二，名见《普济方》卷一六。

【组成】 皂角三茎（刮去黑皮并子，一茎酒浸，一茎烧留性，一茎炙黄）　薄荷三两　黑牵牛三两　何首乌十二两

【用法】 上先将皂角为末，入水得其中，熬成膏，却入后二味，捣一二千杵为丸，如梧桐子大。每服二十丸，茶、酒任下。

【主治】 一切中风，左瘫右痪，口眼㖞斜，及一切风疾。

07245 皂角丸

【方源】《得效》卷六。

【组成】 猪牙皂角　厚枳壳（去瓤）　羌活　桑白皮　槟榔　杏仁（去皮尖，别研）　麻仁（别研）　防风　川白芷　陈皮（去白）各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十五丸，温水吞下；蜜汤亦可。

【主治】 有风人，脏腑秘涩。

07246 皂角丸

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 龙退七条　蝉退　玄精石（生）　穿山甲（炒）　当归　白术　白茯苓　谷精草　木贼各一两　白菊花　刺猬皮（蛤粉炒）　龙胆草　赤芍药　连翘各一两五钱　猬猪爪三十个（蛤粉炒）　人参　川芎各半两

【用法】 上为末，一半入猪牙皂角二梃，烧灰和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前杏仁汤送下；一半入仙灵脾一两，为末和匀，每服用猪肝夹药煮熟细嚼，用原汁送下，每日三次。如十六般内障，同生熟地黄丸用之。

【功用】 消膜退翳。

【主治】 内外一切障膜。

07247 皂角散

【方源】《得效》卷十九。

【组成】 皂角（不蛀者）不以多少

【用法】 将皂角每三十条作一束，以棕榈裹之，缚定，于瓮缸内浸一月，取出，却于长流水内再浸一月，取出晒干，捣罗为末。每一两入麝香半钱，全蝎七个，研细拌匀。每服一二钱，温酒或汤饮调下。一两服愈。

【主治】 瘰疬。

【宜忌】 死水不能浣洗，不得焙。

07248 皂角散

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】 皂角一条（烧灰） 蛤粉三钱 乳香一钱

【用法】 上为末。酒调下。以手揉乳令散，外用金箍散敷之。

【主治】 乳痈及乳疼。

07249 皂角膏

【方源】 方出《千金》卷八，名见《普济方》卷九十二。

【异名】 皂荚摩膏（《圣济总录》卷六）、皂荚膏（《普济方》卷九十一）

【组成】 大皂角一两（去皮子）

【用法】 下筛，以三年米酢和。左㖞涂右，右㖞涂左，干更涂之。

【主治】 ①《千金》：卒中风，口㖞。②《普济方》：居处不便，因卧而孔风入耳，客于阳明之径致中风，口㖞不正，语则牵急四肢。

【备考】《圣济总录》本方用法：皂荚炙黄，为末，以酽醋调和如膏。左㖞摩右，右㖞摩左。

07250 皂刺散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】 皂角刺（紫黑色者） 连皮瓜蒌各等分 北五灵脂减半

【用法】 上锉细。每服四钱，酒二大盏，煎六分，入乳香少许温服。

【功用】 宣毒排脓。

【主治】 痈疽。

07251 皂矾散

【方源】《医级》卷八。

【组成】 皂矾（醋炒红色）

【用法】 上为末，将竹范纸剪寸许纸条，每条裹药半分卷好。每用二三分，和饭吞服。

【主治】 黄疸肿满。

07252 皂荚丸

【方源】《金匮》卷上。

【组成】 皂荚八两（刮去皮，用酥炙）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，以枣膏和汤送下，日三夜一服。

【主治】 咳逆上气，时时吐浊，但坐不得眠。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：皂荚性能驱浊，其刺又能攻坚，且得直达患处，用意神巧。②《金匮要略释义》：方中皂荚以涤痰去垢，佐以蜜丸枣膏兼顾脾胃，使痰除而不过伤正气。

【临证举例】 哮喘《浙江中医杂志》（1985：1：18）：患者薛××，女，50岁，1976年10月6日初诊。患支气管哮喘40余年，入冬即发，咳嗽气急，咯痰色白粘稠，咳不畅，夜不能平卧，听诊两肺哮鸣音密布，脉细滑，舌苔白腻，用红枣500克隔水蒸熟，去皮，核捣成泥，炙皂荚90克研细末，和入作丸绿豆大，焙干。日服三次，每次3克，温开水送服。一周后哮喘渐平，咳痰均减，3个月服完2料后诸症皆除。随访2年未复发。

【备考】 本方方名，《医方集解》引作“皂角丸”。

07253 皂荚丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】 皂荚十梃（去黑皮，涂酥，炙令黄，去子） 羌活二两 防风三两（去芦头） 桂心三两 附子二两 干薄荷四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒或薄荷酒送下，一日三次。常于患处有汗为效。

【主治】 中风，偏枯不遂，行立艰难。

07254 皂荚丸

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】 皂荚四梃（去黑皮及子） 栝楼一个 猬皮二两 白矾二两

【用法】 上都锉碎，入瓷瓶子内，烧令烟尽，冷了研为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温水送下。

【主治】 痔疾，肛边有结核，寒热疼痛，日夜不歇。

07255 皂荚丸

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】 大皂荚二斤（不蛀者，酥炙过，银器中入水揉碎，煎成膏，入后药） 羌活（去芦头）三两 木香 萆薢各二两 附子（炮裂，去皮脐）半两 白牵牛（麸炒） 郁李仁（去皮尖，研） 独活（去芦头） 槟榔（用鸡心者，煨） 大黄（锉，炒） 青橘皮（去白，焙） 何首乌（去黑皮）各二两

【用法】 上后十一味为末，入皂荚膏搜和匀，捣二千杵，丸如梧桐子大，晒干。常服二十丸，加至三十丸，以生姜汤送下。病甚者稍增之。

【主治】 大风，眉须堕落。

07256 皂荚丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】 皂荚十梃（去皮并子，酥炙黄） 苦参 晚蚕沙 干薄荷叶各一两

【用法】 上为末，别用皂荚五梃捶碎，以汤二升浸，揉滤取汁，银石器内熬减半；杏仁四两，汤去皮尖双仁，研烂，入水滤取汁一盏，与皂荚汁同药末熬和丸，如梧桐子大。每服二十丸，一日三次，食后温浆水送下。并用硫黄膏涂疮。

【主治】 肺风成面疮，鼻头赤烂。

07257 皂荚丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】 皂荚三梃（不蛀者，酥炙，去皮子，锉） 桂（去粗皮） 干姜（炮） 贝母（去心）各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至二十丸，空心、日午用生姜汤送下。

【主治】 肺积息贲，上气。

07258 皂荚丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】 皂荚（去皮子弦，蜜炙）二钱 明矾 杏仁 白丑（头末）各一钱 紫菀 炙甘草 桑皮 石菖蒲 半夏各二钱 胆星一钱半

【用法】 百部一两二钱煎膏，丸前药。

【主治】 久嗽。

07259 皂荚散

【方源】《外台》卷二十二引《古今录验》。

【异名】 塞鼻菖蒲散（《圣惠》卷三十七）、菖蒲散（《圣济总录》卷一一六）、皂角散（《普济方》卷五十六）。

【组成】 皂荚（去皮子，炙） 菖蒲各等分

【用法】 上为末。暮卧之时，以绵裹塞鼻中甚良。

【主治】 鼻窒塞，不得喘息。

07260 皂荚散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】 皂荚（猪牙者，烧灰）七梃 乌头一个（炮裂，去皮脐） 沙草根七枚（生）

【用法】 上为散。每服一钱匕，腊茶调下，并三两服。

【主治】 风头痛。

07261 皂萝散

【方源】 方出《医方类聚》卷一三六引《寿域神方》，名见《仙拈集》卷二。

【组成】 萝卜子一合（擂） 皂角灰末二钱

【用法】 冷水调服。立通。

【主治】 大肠风秘，壅热结涩。

【备考】《仙拈集》本方用法：炒末和匀，酒下立通。

07262 皂棘散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】 川芎半两 甘草（生）一两 乳香一分 皂荚刺（烧，带生存性）四两

【用法】 上为末。每服二钱，温酒调下。

【功用】 托毒排脓。

【主治】 痈疽。

07263 皂角煎丸

【方源】《赤水玄珠》卷三十。

【组成】 皂角（不蛀者）三十条（内十条泡黑，十条酥炙，十条水煮软，揉汁熬膏） 何首乌 玄参 薄荷叶各四两

【用法】 上为末，与前膏同炼蜜为丸，如豌豆大。每服三四十丸，食后白汤送下。

【主治】 风毒瘰疬。

07264 皂荚针散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【异名】 皂荚刺散（原书卷九十）。

【组成】 皂荚针一斗（不生子者） 牛蒡子半斤

【用法】 上取皂荚针于盆中烧，候火盛时，撒牛蒡子于火中，候烟欲尽，以盆合之，冷定，为末。每服三钱，空心以井花水调下。良久利下恶物，如胶糖，永断根本。利于补治，三五日只可吃软粥饮。小儿每服一钱，日三服。

【主治】 风毒瘰疬。小儿瘰疬肿硬。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“皂针散”。

07265 皂角化痰丸

【方源】《内外伤辨》卷中。

【组成】 皂角（木白皮，酥炙） 白附子（炮） 半夏（汤洗七次） 天南星（炮） 白矾（枯） 赤茯苓（去皮） 人参各一两 枳壳（炒）二两

【用法】 上为细末，生姜汁面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温水送下。

【主治】 劳风。心脾壅滞，痰涎盛多，喉中不利，涕唾稠粘，嗌塞吐逆，不思饮食，时或昏愦。

07266 皂角苦参丸

【方源】《金鉴》卷七十三。

【组成】 苦参一斤 荆芥十二两 白芷 大风子肉 防风各六两 大皂角 川芎 当归 何首乌（生） 大胡麻 枸杞子 牛蒡子（炒） 威灵仙 全蝎 白附子 蒺藜（炒，去刺） 独活 川牛膝 各五两 草乌（汤泡，去皮） 苍术（米泔水浸，炒） 连翘（去心） 天麻 蔓荆子 羌风 青风藤 甘草 杜仲（酥炙）各三两 白花蛇（切片，酥油炙黄） 缩砂仁（炒）各二两 人参一两

【用法】 上为细末，醋打老米糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，饮食前后温酒送下。

【主治】 粟疮作痒，年久肤如蛇皮者。

【宜忌】 避风，忌口。

07267 皂莢膏摩方

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 皂莢（肥者）五梗 川乌头一两 乌蛇肉二两 硫黄三分（细研）

【用法】 上以酒三升，浸皂莢三宿，揉取汁，入锅中，同乌头、乌蛇等煎至一升，滤去滓，更熬令稠，离火，入硫黄末搅令匀。旋取摩顽处即效。

【主治】 身体手足有顽麻风。

07268 身痛逐瘀汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】 秦艽一钱 川芎二钱 桃仁三钱 红花三钱 甘草二钱 羌活一钱 没药二钱 当归三钱 灵脂二钱（炒） 香附一钱 牛膝三钱 地龙二钱（去土）

【功用】《医林改错注释》：活血祛瘀，通经止痛，祛风除湿。

【主治】 痹症有瘀血者。

【加减】 若微热，加苍术、黄柏；若虚弱，量加黄耆一二两。

【方论选录】《医林改错注释》：方中秦艽、羌活祛风除湿，桃仁、红花、当归、川芎活血祛瘀，没药、灵脂、香附行气血，止疼痛，牛膝、地龙疏通经络以利关节，甘草调和诸药。

【临证举例】 ①腰腿痛 《湖南中医杂志》(1987；1:12)：刘氏用本方随证加减治疗腰腿痛67例，其中男性51例，女16例，单纯性腰痛14例，腿痛18例，混合型35例。结果治愈53例，好转9例，无效5例，总有效率为92.5%。认为腰腿痛缠绵难治，用他法无效，痛有定处或痛如锥刺，身体关节屈伸不利，舌质紫暗或有瘀点，脉弦或涩，或有外伤史，病理属风湿入络，瘀血痹阻者，为本方之运用要点。②急性腰扭伤 《广西中医药》(1987;2:47)：金氏以本方治疗急性腰扭伤15例，其中男9例，女6例，年老体弱者或正气不足者，加党参、黄耆；疼痛较剧者，加延胡索、七叶莲，水煎服，药滓加入适量醋及水，煮沸待温后熏洗伤处。结果治愈8例，显效3例，好转3例，无效1例。

07269 彻清膏

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 彻清煎(《松崖医径》卷上)。

【组成】 蔓荆子 细辛各一分 薄荷叶 川芎各三分 生甘草 熟甘草各五分 藁本一钱

【用法】 上为细末。每服二钱，食后茶清调下。

【主治】 偏正头痛，年深不愈者；及风湿热上壅损目，脑痛不止。

07270 近制清暑益气汤

【方源】《医学六要·治法汇》卷四。

【组成】 人参 白术 麦门冬 五味子 陈皮 甘草（炙） 黄柏（炒） 黄耆（蜜炙） 当归身

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 ①《医学六要》：夏月体虚。②《杂病广要》：夏月外感湿热，四肢困倦，精神短少，懒于动作，胸满气促，肢节沉痛，或气高而喘，身热而烦，心下膨痞，小便黄而少，大便溏而频，或痢出黄糜，或如泔色，或渴或不渴，不思饮食，自汗体重，或汗少，脉洪缓者。

07271 返阴丹

【方源】《圣惠》卷十一。

【异名】 破阴丹(《杂病源流犀烛》卷十九)。

【组成】 硫黄 太阴玄精石 消石 附子（炮裂，去皮脐） 干姜（炮裂，锉） 桂心各半两

【用法】 上药取前三味同研，子瓷瓶内慢火熔成汁后放冷，重研令细；后三味捣罗为末，与前药同研令匀，用软饭和丸，如梧桐子大。每服五丸，煎艾汤送下，不拘时候，频服。汗出为度。

【主治】 ①《圣惠》：阴毒伤寒，心神烦躁，头痛、四肢冷。②《得效》：阴毒伤寒，心神烦躁，头痛，四肢逆冷，面青腹胀，脉沉伏者；或气虚阳脱，体冷无脉，气息欲绝，不省人事，及伤寒阴厥，百药不效。

【备考】《三因》本方用法：上用铁铛，先铺玄精，次下消末各一半，中间铺硫黄末，又将二石余末盖上，以小盏合着，熟炭火三斤，烧令得所，勿令烟出，急取瓦盆合着地上，四面灰盖，勿令烟出，候冷取出研细，入后药为末，同研匀，米糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，煎艾汤送下，顿服，汗出为度。未退，乃大着艾炷，灸脐下丹田，气海；更不退，则以葱馅熨之。

07272 返精丸

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【异名】 养血返精丸(《医部全录》卷三三二引《集验方》)。

【组成】 破故纸二两（隔纸炒令香熟） 白茯苓一两（去皮）

【用法】 上为细末，用没药半两（捶破），以无灰煮酒浸，高没药一指许，候如稠饧状，搜前二味

为丸，如梧桐子大。每服二五十丸，随食汤送下。如没药性燥难丸，再以少酒糊同捣丸，食前服。

【功用】 高年服之嗜欲不衰，髭须如漆，长生。

【方论选录】 茯苓定心，没药养血，破故纸补肾。

07273 返睛丸

【方源】《异授眼科》。

【组成】 川芎一两 白蒺藜五钱 白术（上炒）五钱 木贼五钱 羌活五钱 细辛五钱 防风一两 熟地二两 独活五钱 白芷五钱 荆芥五钱 枸杞五钱 石决明五钱 甘草三钱 天麻二两 菊花五钱 蕤仁四钱 生地五钱 车前子（炒）一两 青葙子五钱 菟丝子五钱 草决明五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三五十丸，空心盐汤送下。

【主治】 心肾虚耗，水火不交，渐生内障者。

07274 返魂丹

【方源】《丹溪心法附余》卷二十一。

【异名】 益母丸、济阴丹(《女科指掌》卷四)。

【组成】 野天麻（一名益母草，方梗，四五月节间开紫花时，采花叶子，阴干）半斤 木香五钱 赤芍药六钱 当归七钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，子死腹中，冷痛，小便流出，腹胀四肢冷，爪甲青，用童便、酒和匀，煎沸化下；产后恶血不尽，脐腹刺痛，童便和酒化下；产时面垢颜赤，胎衣不下，败血自下如带，或横生不顺，心闷欲死，童便、薄荷自然汁和匀化下，盐酒亦可；产后三四日，起卧不得，眼暗生花，口干烦躁，心乱见鬼，不省人事，童便、酒、薄荷汁送下；产后烦渴，呵欠，不思饮食，手足麻疼，温米饮送下；产后浮肿，气喘，小便涩，咳嗽，恶心，口吐酸水，胁痛无力，酒送下；产后寒热如疟，脐腹作痛，米汤送下，桂枝汤亦可；产后中风，牙关紧急，半身不遂，失音不语，童便和酒送下；产后大便秘，心烦口渴，童便、酒化下，薄荷自然汁亦可；产后痢疾，未满月食冷物，与血相击，或有积，枣汤化下；产后身体百节疼痛，温米饮送下；产后崩中漏下，或伤酸物，状如鸡肝，脊背闷倦，糯米秦艽汤送下，桂枝汤下亦可；产后食热面，壅结成块，四肢无力，睡后汗出不止，月水不调，久成骨蒸劳，童便和酒送下；产后呕逆虚胀，酒送下；产后鼻衄，口干舌黑，童便、酒送下；产后赤白带下，秦艽同糯米煎汤送下。

【功用】 产前清热养血，产后推陈致新。

【主治】 子死腹中，冷痛，小便流出，腹胀，四肢冷，爪甲青；产后恶血不尽，脐腹刺痛；产时面垢颜赤，胎衣不下，败血自下如带，或横生不顺，心闷欲死；产后三四日起卧不得，眼暗生花，口干烦躁，心乱见鬼，不省人事；产后烦渴呵欠，不思饮食，手足麻疼；产后浮肿气喘，小便涩，咳嗽，恶心，口吐酸水，胁痛无力；产后寒热如疟，脐腹作痛；产后中风，牙关紧急，半身不遂，失音不语；产后大便秘，心烦口渴；产后痢疾，未满月食冷物，与血相击，或有积者；产后身体百节疼痛；产后崩中漏下，或伤酸物，状如鸡肝，脊背闷倦；产后食热面，壅结成块，四肢无力，睡后汗出不止，月水不调，久成骨蒸劳；产后呕逆虚胀；产后鼻衄，口干舌黑；产后赤白带下。

07275 返汗化水汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】 茯苓二两 猪苓三钱 刘寄奴三钱

【用法】 水煎服。一剂而汗止，不必再剂。

【功用】 利水消火。

【主治】 小肠热极，心头上一块出汗，不啻如雨，四肢他处又复无汗。

【方论选录】 茯苓、猪苓俱是利水之药，加入刘寄奴则能止汗，又善利水，其性又甚速，同茯苓、猪苓从心而直趋于膀胱，由阴器以下泄，因水去之急，而火亦随水而急去也，正不必再泄其火，以防伤损脏腑耳。

07276 含丸

【方源】 张文仲引《陶氏效验方》(见《外台》卷二十三)。

【异名】 昆布丸(《准绳·疡医》卷五)。

【组成】 槟榔三两 马尾海藻三两（洗） 昆布三两（洗）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如鸡子黄大。每日空腹含化一丸，徐徐取津咽之。

【主治】 瘿病。

【宜忌】 忌盐。

07277 含煎

【方源】《外台》卷二十二引《广济》。

【组成】 升麻 大青 射干各三两 栀子 黄柏各一升 蜜八合 蔷薇白皮五两 苦竹叶一升（切） 生地黄（汁）五合 生玄参汁五合（无汁，用干者二两）

【用法】 上切。以水六升，煎取二升，去滓，入生地黄汁、蜜，煎成一升如饧，细细含之。取愈即止。

【主治】 口舌生疮。

07278 含化丸

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 白前半两 五味子半两 桂心半两 贝母半两（微炒） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 甘草一分（炙微赤，锉） 皂荚子仁半两（微炒）

【用法】 上为细末，以炼蜜及煮枣肉和捣为丸，如弹子大。常含一丸咽津。

【主治】 久咳嗽上气。

07279 含化丸

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】 海藻 海蛤（煅） 海带 昆布 瓦龙子（煅） 文蛤（即花蛤，背有斑纹） 河子（去核） 五灵脂各一两 猪靥十四个（焙干，另研）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。临卧含化，时时咽下。兼灸法，以助丸功。

【主治】 瘿气。

07280 含咽丸

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】 黄药 白药 栝楼根 牛蒡子 马勃各一两 玄参一两半 砂糖半两 蜜三两

【用法】 上药前六味为末，熬蜜并糖和丸，如弹丸大。含一丸咽津，不拘时候。

【主治】 咽喉疼痛。

07281 含香丸

【方源】《千金》卷六。

【异名】 丁香丸(《圣惠》卷三十六)。

【组成】 丁香半两 甘草三两 细辛 桂心各一两半 川芎一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。临卧时服二丸。

【主治】 口气臭秽。

【备考】《圣惠》：丸如弹丸，绵裹一丸，含咽津亦得。

07282 含杏仁丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 杏仁三十个（汤浸，去皮尖双仁） 甘草一分（生用） 黄连一分（去根）

【用法】 上为细散。每取如杏仁大，绵裹含之，有涎即吐之，日三服，夜一服，以愈为度。

【主治】 口疮疼痛，吃食不得。

07283 含化三黄丸

【方源】《袖珍》卷三。

【异名】 加味三黄丸(《丹溪心法附余》卷十)。

【组成】 大黄 黄芩 黄连各二两半 黄药子 白药子各一两半 黄柏 苦参 山豆根各一两 硼砂一两 脑子一钱半 京墨三钱 麝香少许（一方有甘草）

【用法】 上为细末，用猪胆汁调匀，摊在碗内，甑上蒸三次，露一宿后，入脑子，麝香、硼砂为丸，如豆大。每服一丸，食后噙化。

【主治】 ①《袖珍》：积热。②《丹溪心法附余》：三焦积热，咽喉肿闷，心膈烦躁，小便赤涩，大便秘结。

【加减】 冬加知母。

07284 含化升麻散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】 川升麻一两半 射干一两 白矾半两（烧灰，细研） 络石一两 甘草三分（生，锉） 白药三分 黄药一两 天竹黄二两（细研） 犀角屑三分 白龙脑三分（细研） 马牙消一两（细研）

【用法】 上为细散，入瓷盒盛贮。每用一钱，以绵裹含化咽津。

【主治】 热毒上攻，咽喉干燥疼痛。

07285 含化菖蒲煎

【方源】《圣惠》卷六。

【异名】 菖蒲煎(《普济方》卷二十八)。

【组成】 菖蒲一两（末） 桂心二两 生姜半两（绞取汁） 白蜜十二两

【用法】 上先以水一大盏，煎菖蒲、桂心取五分，次入姜汁，白蜜炼成膏。取一茶匙含化咽津，不拘时候。

【功用】 温肺顺气通声。

【主治】 风冷伤肺，声音嘶哑。

07286 谷神丸

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】 小麦芽（炒） 陈曲（炒）各一两半 乌梅肉（炒）一两 生姜（切，焙） 陈橘皮（焙，去白） 枳实（去瓤，麸炒）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后米饮送下。

【主治】 脾胃虚冷，气久不顺，中脘痞闷，全不思食，痰逆呕哕，水谷迟化。

07287 谷神丸

【方源】《得效》卷九。

【组成】 人参 缩砂 香附子（炒去毛） 三棱（煨） 莪术（煨） 青皮 陈皮 神曲（炒） 麦芽（炒） 枳壳（炒，去瓤）各等分

【用法】 上为末，粳米糊丸，如梧桐子大。每服

三十丸，空腹米饮吞下；盐汤亦可。

【功用】 消食健脾益气，进美饮食。

【主治】 《奇效良方》：小儿宿食留饮，积聚中脘，嗳酸气闷。

07288 谷疸丸

【方源】 《三因》卷十。

【异名】 苦参丸(《得效》卷二)。

【组成】 苦参三两 龙胆草一两 栀子（去皮，炒）半两 人参三分

【用法】 上为末，以猪胆汁入熟蜜少许为丸，如梧桐子大。每服五十丸，以大麦煮饮送下，一日三次。不知，稍加之。

【主治】 谷疸，胃蓄瘀热，气浊，食谷不消，大小便不利，胀满不下食，趺阳脉紧而数。亦治因劳发热，热郁发黄者。

07289 谷疸丸

【方源】 《济生》卷四。

【组成】 苦参三两 龙胆一两 牛胆一枚

【用法】 上为细末，用牛胆汁少许炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心食前用热水或生姜、甘草煎汤送下。

【主治】 谷疸。

07290 谷精丸

【方源】 《普济方》卷八十三引《卫生家宝》。

【组成】 谷精草三两（为末） 羊肝一具（薄切作片子，三指大，用谷精草以水二大碗同煮）

【用法】 上和黑豆不拘多少，时嚼吃；如恐人不肯吃时，煮出乘热入臼内，捣成丸，如绿豆大。每服三十丸，食后茶清送下。小儿酌减。

【主治】 大人、小儿雀目翳睛。

07291 谷精散

【方源】 《普济方》卷七十八。

【组成】 羌活 蝉壳 蛇蜕 防风 谷精草 菊花 木贼 甘草 大黄 山栀子 黄连 沙苑蒺藜 各等分

【用法】 上为末。每服半钱，熟水调下。

【主治】 大人、小儿眼中生翳疼痛，并暴发赤眼。

07292 谷糠油

【方源】 方出《梅氏验方新编》卷七，名见《山东医药》(1972；2:58)。

【组成】 新米糠

【用法】 用火烧取滴下之油搽之。

【功用】 《山东医药》：散风止痒，消炎祛湿，防腐抗菌，促进角质形成。

【主治】 ①《梅氏验方新编》：蛇皮癣。②《山东医药》：多种亚急性、肥厚性皮肤损害。

【备考】 按：《山东医药》本方用法：用厚纸上以针刺许多小孔，密封碗口或盆口，上堆谷糠（新者佳）成山样，顶端用火点着，随时加糠，待糠燃至接近纸面时，将糠及灰扫去，撕去碗口纸，收取其中谷糠油。每用适量，涂抹皮肤患处。

07293 谷精夜明散

【方源】 《医级》卷八。

【组成】 谷精草二钱 夜明砂一钱

【用法】 上为末，甘菊汤调服。

【主治】 雀目，鸡盲。

07294 谷芽枳实小柴胡汤

【方源】 《医统》卷十八。

【组成】 谷芽 枳实 厚朴各一钱 山栀 大黄 柴胡 黄芩各六分 陈皮 半夏 人参 炙甘草各五分

【用法】 上加水二盏，生姜三片，大枣一个，煎八分，不拘时候服。

【主治】 谷疸，食已即肌，头痛，心中郁怫不安，饥饱所致蒸变而黄。

07295 坐药

【方源】 《外台》卷三十四引《近效方》。

【组成】 吴茱萸 萆薢子（熬）各二分 蛇床子三分 无食子一个

【用法】 上为散。以绵裹如枣许，纳子宫中。令热为度。

【主治】 下冷，子门痒闭。

07296 坐药

【方源】 《产科发蒙》(附录)。

【组成】 硫黄 桂皮 川芎 丁香各等分

【用法】 上为细末。以绢袋盛，大如指，束纳阴中。坐卧任意，勿走行，小便时取出，更安新者。

【主治】 妇人久不产，阴中隐隐如虫啮，冷冷如风吹，或转胞不通，或妊子不成，惯堕者。

07297 坐药龙盐膏

【方源】 《兰室秘藏》卷中。

【组成】 茴香三分 枯矾五分 良姜 当归梢 酒防己 木通各一钱 丁香 木香 川乌（炮）各一钱五分 龙骨 炒盐 红豆 肉桂各二钱 厚朴三钱 延胡五钱 全蝎五个

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。绵裹留系在外，纳丸药阴户内，每日易之。

【主治】 半产误用寒凉，阴户中寒，脐下冷痛，白带下。

07298 犹龙汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 连翘一两 生石膏六钱（捣细） 蝉蜕二钱（去足上） 牛蒡子二钱（炒捣）

【主治】 胸中素蕴实热，又受外感，内热为外感所束，不能发泄而致温病，时觉烦躁，或喘，或胸胁疼，其脉洪滑而长。

【加减】 喘，倍牛蒡子；胸中疼，加丹参、没药各三钱；胁下疼，加柴胡、川楝子各三钱。

【临证举例】 ①表寒内热证：一妇，年三十余，胸疼连胁，心中发热，服开胸、理气、清火之药不效。后愚诊视，其脉浮洪而长。知其上焦先有郁热，又为风寒所束，则风寒与郁热相搏而作疼也。治以此汤，加没药、川楝子各四钱，一剂得汗而愈。②喘咳一叟，年过七旬。素有劳病，因冬令伤寒，劳病复发，喘而且咳，而三日间，痰涎壅盛，上焦烦热。诊其脉，洪长浮数。投以此汤，加玄参、潞参各四钱，一剂汗出而愈。

07299 饭虎汤

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】 人参（去芦）一两 草果仁（炮）一两 高良姜半两（炒） 干姜半两（炮，洗） 陈橘皮七钱（去白） 白豆蔻仁 甘草（炙）一两

【用法】 上为细末。食前入盐沸汤点下。

【主治】 脾虚不思饭食。

【备考】 方中白豆蔻仁用量原缺。

07300 饭匙丸

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】 饭匙干末一斤（即做饭之锅焦） 莲肉（去心） 怀庆山药（炒香）（各为末）各半斤

【用法】 以饭匙末量取，打糊为丸，如梧桐子大。如湿热甚者，每服百丸，加青皮煎汤送下，或以米饮送下；脾虚者，以白术汤送下，空心、食远各一服。

【主治】 脾泻。

07301 肝疳丸

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】 五灵脂 夜明砂 龙胆草 天麻 干蟾头 全蝎二个 蝉退 川芎 芦荟 黄连 青黛 防风

【用法】 上为细末，猪胆汁浸为丸，如麻子大。每服十丸，以薄荷汤送下。

【主治】《痘疹一贯》：肝疳，肌肉削瘦，目胞赤肿，翳生泪多，白膜遮睛，泻多青色。

07302 肝肾双补丸

【方源】《眼科金镜》卷二。

【组成】 当归 川芎 杭萸肉 巴戟 茯苓 石斛 防风 细辛 川姜 甘草 枸杞

【主治】 肝肾两虚，真阴不足，冷泪无时长流，瞻视昏眇。

【方论选录】 血生于心，藏于肝，统于脾，当归、川芎养血益肝之圣药，枸杞子补肝滋肾，巴戟天、石斛益精血，茯苓补脾土，防风、细辛味辛散升发阳气，以干姜温中暖肾。使真阴足，肝木调，泪液不外溢，精华自盛，天真保守，肝肾不伤，故名之曰双补丸。

07303 肝肾两舒汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】 熟地 玄参各一两 茯苓二钱 白芍一两 柴胡一钱 当归五钱 甘草 炒栀子各一钱 丹皮三钱

【用法】 水煎服。

【功用】 舒肝解火，补肾济水。

【主治】 肝火郁结不伸，闷烦躁急，吐痰黄块。

【方论选录】 此方归、芍、柴、栀所以舒肝者，风以吹之也；熟地、玄、丹所以补肾者，雨以溉之也；茯苓、甘草又调和于二者之中，使风雨无太过不及之虞也，譬如夏令炎蒸，郁极而热，树木枯槁，忽得金风习习，大雨滂沱，则从前郁闷燔燥之气，尽快如扫，而枯槁者倏变为青葱，爽气迎人，岂犹有烦闷躁急等症哉。

07304 肝肾兼补丸

【方源】 方出《临证指南医案》卷八，名见《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】 熟地 枸杞子 山萸肉 五味 茯神 菊花 生神曲 谷精草 山药

【功用】 补肝肾。

【主治】 瞳神散大，左偏头痛先损左目，是焦烦郁勃，阳升化风，却伤血液使然。

07305 肝胆两益汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】 白芍一两 远志五钱 炒枣仁一两

【用法】 水煎服。

【主治】 胆气怯，夜不能寐，睡卧反侧，辗转不安，或少睡而即惊醒，或再睡而恍如捉拿。

【方论选录】 此方白芍入胆，佐以远志、枣仁者，似乎入心而不入胆，不知远志、枣仁既能入心，亦能入胆，况同白芍用之，则共走胆经，又何疑乎。胆得三味之补益，则胆汁顿旺，何惧心肾之相格乎。

07306 肚脐饼

【方源】《仙拈集》卷一。

【异名】托脐饼(《经验广集》卷一)。

【组成】轻粉二钱 巴豆(去油)四钱 硫黄一钱

【用法】上为末，成饼。先以新绵一片铺脐上，以药饼当脐按之，外用绵扎紧。如人行五六里，黄水自下，待三五度去饼，以温粥补之。

【主治】水臌肿满。

07307 肚蒜丸

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】猪肚一枚 大蒜

【用法】将肚净洗去脂膜，入大蒜在内，以肚子满为度，煮之，自晨至晚，以肚蒜糜烂为度，杵成膏子，入平胃散为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心以盐汤或米饮送下。

【主治】水泻。

【临证举例】五更泄 丁必卿云：渠每遇五更必水泄一次，百药无效，服此遂安。

07308 肠宁汤

【方源】《傅青主女科》卷七。

【组成】当归一两(酒洗) 熟地一两(九蒸) 人参三钱 麦冬三钱(去心) 阿胶三钱(蛤粉炒) 山药三钱(炒) 续断二钱 甘草一钱 肉桂二分(去粗，研)

【用法】水煎服。

【功用】补气补血。

【主治】妇人产后亡血过多，血虚少腹疼痛，按之即止。

07309 肠痈丸

【方源】《新急腹症学》。

【组成】乳香 没药各三两 木香四两 川朴 生大黄各六两

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每次一钱，每日三至四次。

【主治】急性阑尾炎。

【备考】阑尾周围脓肿，每日外用皮硝二两，外敷肿块处。

07310 肠痈汤

【方源】《医心方》卷十五引《集验方》。

【异名】薏苡仁汤(《圣济总录》卷一二九)、瓜子汤(《全生指迷方》卷四)、三仁汤(《医学入门》卷八)、薏苡瓜瓣汤(《张氏医通》卷十四)。

【组成】薏苡仁一升 牡丹皮三两 桃仁三两 冬瓜仁一升

【用法】凡四物，以水六升，煮取二升，分再服。

【功用】《千金方衍义》：排脓解毒。

【主治】肠痈、胃痈。

①《医心方》引《集验》：肠痈。②《千金》引崔氏：腹中疼痛，烦毒不安或胀满不思饮食，小便涩，此病多是肠痈；妇人产后虚热者多成斯病。纵非痈疽，疑是便服。③《疡医大全》：胃痈，小便赤涩，腹满不食。

【方论选录】《千金方衍义》：此为《金匮》薏苡附子败酱散之变方，以治脓成脉数不可下之证。虑附子助热，易以牡丹；又因败酱难觅，易以瓜瓣；更加桃仁以助牡丹之力。

07311 肠痈汤

【方源】《千金》卷二十三。

【异名】牡丹汤(《圣济总录》卷一二九)。

【组成】牡丹 甘草 败酱 生姜 茯苓各二两 薏苡仁 桔梗 麦门冬各三两 丹参 芍药各四两 生地黄五两

【用法】上㕮咀。以水一斗煮取三升，分三服，每日三次。

【主治】①《千金》：肠痈。②《千金方衍义》：肠痈，脓成脉数，不可下。

07312 肠覃汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】柴胡 当归 赤芍 白术 枳实 丹参 昆布 薏苡仁 三棱 莪术 益母草

【主治】痰湿癥瘕(肠覃)，腹部肿块，多以下腹部一侧向上增大，呈球形，可移动，无触痛。

07313 肠风黑散

【方源】《局方》卷八(淳祐新添方)。

【组成】荆芥(烧)二两 枳壳(去瓤)三两(二两烧，一两炒用) 乱发(烧) 槐花(烧) 槐角(烧)各一两 甘草(炙) 猬皮各一两半

【用法】上将各烧药同入瓷瓶内，黄泥固济，烧存三分性，出火气，同甘草、枳壳为末。每服二钱，水一盏，煎至七分，空心温服；温酒调下亦得。

【主治】①《局方》(淳祐新添方)：荣卫气虚，风邪冷气进袭脏腑之内，或食生冷，或啖炙煿，或饮酒过度，积热肠间，致使肠胃虚弱，糟粕不聚，大便鲜血，脐腹疼痛，里急后重，或肛门脱出，或久患酒痢，大便频并。②《奇效良方》：脏毒下血。

【备考】用法中甘草，《奇效良方》作“木馒头”。

07314 肠粘连缓解汤

【方源】《新急腹症学》。

【组成】川朴三～五钱 木香三钱 乌药三钱 炒莱菔子三～五钱 桃仁 赤芍各二钱 芒消二钱（冲服） 番泻叶三钱（泡服）

【用法】上加水500毫升，煎成200毫升，每日一至二剂，分二至四次服。服药后有轻泻为宜。

【主治】①《新急腹症学》：轻型（气滞血瘀）粘连性或部分性肠梗阻。②《古今名方》：胃肠道术后调整胃肠功能。

【加减】方中芒消、番泻叶，无便结者可酌减。

07315 龟甲汤

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】龟甲（醋炙） 当归（切，炒）各半两 乱发一块（鸡子大，取产多者妇人发，于瓦上烧灰）

【用法】上先细研发灰，次入当归末，以水一大盏半，煎取八分，然后下龟甲末，煎五七沸，分为三服；服后如入行四五里，更服。

【主治】产难，或子死腹中不下。

07316 龟甲散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】桑寄生散（《圣济总录》卷一五二）。

【组成】龟甲一两半（涂醋，炙令黄） 桑耳一两（微炙） 当归一两（锉，微炒） 白芍药三分 乌贼鱼骨一两（烧灰） 禹余粮二两（烧，醋淬七遍） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 柏叶一两（微炒） 桑寄生一两 芎藭三分

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】妇人久赤白带下，腰腿疼痛，面色萎黄，四肢少力。

07317 龟甲散

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】龟甲（炙） 木通（锉） 远志（去心） 菖蒲各半两

【用法】上为细散。每服方寸匕，渐加至二钱匕，空腹酒调下。

【主治】善忘。

07318 龟头散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】龟头一枚（枯者，炙令焦黄） 龙骨一两

【用法】上为细散。干贴一钱，于脱肛上接按纳之。

【主治】小儿久痢，脱肛不入。

07319 龟豕膏

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】杀猪心内之血一两 龟版膏二两 五味子二钱（为末）

【用法】先将龟版融化，后入猪心血，再入五味子末，调化膏，切片，含化。

【主治】胃气盛而每次饮食之时，头项至面与颈脖之间大汗淋漓，身又无恙。

07320 龟版丸

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】龟版（醋炙） 条芩 白芍 椿根皮各一两 黄柏（蜜炙）三钱

【用法】炼蜜为丸。淡醋汤送下。

【主治】妇人经水来而过多不止。

07321 龟柏丸

【方源】方出《丹溪心法》卷二，名见《医学入门》卷七。

【异名】椿皮丸（《明医指掌》卷六）。

【组成】龟版二两 侧柏叶一两半 芍药一两半 椿根皮七钱半 升麻 香附各五钱

【用法】上为末，粥为丸。四物汤加白术、黄连、陈皮、甘草、生姜煎汤送下。

【主治】便血久而致虚，腰脚软痛，及麻风疮疡见血。

07322 龟背丸

【方源】《回春》卷七。

【组成】枳壳（麸炒） 防风（去芦） 独活 大黄（煨） 前胡（去芦） 当归 麻黄（去节）各三钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如黍米大。每服十五六丸，食后以米饮送下。仍灸肺俞穴、心俞穴、膈俞穴，六处穴各灸小麦大三壮。

【主治】小儿龟背。

07323 龟背散

【方源】《水类钤方》卷二十一。

【异名】龟胸丸（《婴童百问》卷五）。

【组成】大黄三分（炒） 天门冬（去心，焙） 百合 杏仁（去皮尖，炒） 木通 桑白皮（蜜炙） 甜葶苈（隔纸炒） 朴消（制） 枳壳各等分

【用法】为大蜜丸。食后温汤化下。

【主治】儿生不能护背，客风入脊；或坐早伛偻背高，肺受热气胀满；或乳母食五辛，饮热伤肺而致龟胸、龟背。

【备考】本方方名，据剂型，当作"龟背丸"。

07324 龟胸丸

【方源】《回春》卷七。

【组成】 川大黄（煨）六钱 天门冬（去心） 百合 杏仁（去皮尖，麸炒） 木通（去节） 枳壳（麸炒） 桑白皮（蜜炙） 甜葶苈（隔纸炒） 软石膏各一钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，食后、临卧以温水化下。仍宜灸两乳前各一寸半，上两行三骨间，六处各灸三壮。春夏从下灸起，秋冬从上灸起，依法灸之。

【主治】 小儿龟胸，高如覆掌。

07325 龟胸丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 大黄（酒煨） 麻黄（去节） 百合 桑皮（姜汁炒） 木通 枳壳 甜葶苈（微炒） 杏仁（炒黑） 芒消各等分

【用法】 上为细末，以杏仁、芒消同研如脂，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，葱白汤化下。

【主治】 龟胸高起。

07326 龟龄集

【方源】《何氏济生论》卷七。

【异名】 鹤龄丹（《年氏集验良方》卷二）。

【组成】 振山威（即茄茸）一两五钱（砂罐内煮一昼夜，取出，埋土中一宿，晒干为末） 水陆使者（即穿山甲）一两（火酒煮软，酥油搽，炙黄色，为末） 金笋（即熟地）六钱（酒内浸一宿，瓦焙） 玉枝八钱（即生地，人乳浸一宿，晒干） 阴飞郎（即石燕子，坚固者）一对（好酒浸一宿，烧红，投姜汁内浸透） 劈天龙（即苁蓉，酒浸一宿，麸炒为末）九钱 九阳公（即附子，重一两四五钱者为佳，蜜水浸三炷香，白水煮三炷香，焙干为末）三钱 昆山雪（即雀脑，要雄者）十枚（加白硫一分，搅匀摊纸上，晒，为末） 赤羽娘（即红蜻蜓）十对（五月五日取，去翅足） 重阳英（即白菊花，九月九日取，酒浸一宿，为末）一钱五分 寿春紫（即锁阳，黑而实，酒浸一宿，新瓦焙，为末）四钱 宿砂蜜（即砂仁，去皮，为末）四钱 海上主人（即甘草，炙老黄色，为末）三钱 太乙丹（此药无考。用枸杞子，蜜酒浸，晒；为末）五钱 朝云兽（即海马）一对（酥油入铜锅内煎黄色，为末） 补骨先生（即故纸，米泔浸）四钱 乾坤髓（即辰砂，荞麦面色，煨，去面，研）三钱五分 旱珍珠（即白凤仙子，八月半取井水浸一宿，瓦焙）二钱五分 通天柱杖（即牛膝，酒浸一宿，焙）四钱 飞仙四钱（即紫梢花，酒浸一宿，瓦上隔纸焙） 先登（即青盐，河水略洗）四钱 吐蕃丝（即细辛，醋浸一宿，晒）一钱 仙人仗（即地骨皮，蜜水浸一宿，晒）四钱 玉丝皮（即杜仲，麸炒去丝，童便浸一宿）二钱 风流带（即淫羊藿，人乳拌炒）三钱 王孙草（即当归，酒浸一宿，焙）五钱 如字香（即小丁香，花椒水煮一炷香）二钱五分 云门令使（即天门冬，酒浸半日，焙）八钱

【用法】 上为极细末，通和一处，装瓷罐内，沙泥封口，重汤煮三炷香，取出，开口露一宿，捏作一块，入金盒内，如无金，以银代之，重十六两，盐泥封口，外用纸筋泥再封包成圆球，晒干，用铁鼎罐一个，将球入中间以铁线十字拴紧，悬于罐中，将黑铅化开，倾入鼎内，以满为率，冷定，再用一缸，贮桑柴灰半缸，安罐在中，以半截埋灰内，其上半截旁以炭垫烧着，每辰、戌二时换炭垫一次，炭垫用炭屑碾细如粉，入熟红枣肉同打，重一两六钱，长五寸，再用水一碗，不时向鼎内滴水，以声为验，如有声而水即干，则火逼略远指许，如无声而水不干，则火逼略近指许，如法制三十五日足，可将铅打开，倾盒于地冷定，开盒，其药必紫黑色，清香扑鼻，须入瓷罐收贮，蜡封口，勿泄气。每服五厘，渐加至二三分，置手心内舐入口，黄酒送下。浑身燥热，百窍通畅，丹田微痒，痿阳立兴。

【功用】 益精神虚，坚齿黑发，明目。

【主治】 ①《何氏济生论》：阳萎泄遗，不育。②《集验良方》：命门火衰，精寒肾冷，久无子嗣，五劳七伤。

【备考】《集验良方》有人参，无生地。

07327 龟柏姜栀丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 龟版三两 黄柏一两 干姜（炒）一钱 栀子二钱半

【用法】 上为末，酒糊为丸。白汤送下。

【主治】 赤白带下，或时腹痛。

07328 龟首种子丸

【方源】《齐氏医案》卷二。

【异名】 龟首丸。

【组成】 大龟首一个（醋炙） 大生地四两 山萸肉二两 怀山药二两 白茯苓二两（乳蒸） 粉丹皮一两 光泽泻 肉苁蓉（酒洗焙干） 真锁阳（醋炙）各一两

【用法】 炼蜜为丸，如梧桐子大。以酒送下。

【主治】 男子无子。

【临证举例】 男子无子 知府杨迦怿，年五十，尚未生子，与之龟首丸，调理数月，步履轻健、精神康壮，如夫人有喜矣。明年壬申，降生一子，又明年，又生一子，骨秀神清，均甚壮美。

07329 龟鹿二仙胶

【方源】《医便》卷一。

【异名】 龟鹿二仙膏(《摄生秘剖》卷四)、二仙胶(《杂病源流犀烛》卷八)、龟鹿二胶(《全国中药成药处方集》沈阳方)。

【组成】 鹿角（用新鲜麋鹿杀角，解的不用，马鹿角不用；去角脑梢骨二寸截断，劈开，净用）十斤 龟版（去弦，洗净）五斤（捶碎） 人参十五两 枸杞子三十两

【用法】 前三味袋盛，放长流水内浸三日，用铅坛一只，如无铅坛，底下放铅一大片亦可，将角并版放入坛内，用水浸高三五寸，黄蜡三两封口，放大锅内，桑柴火煮七昼夜，煮时坛内一日添热水一次，勿令沸起，锅内一日夜添水五次；候角酥取出，洗，滤净取滓，其滓即鹿角霜、龟版霜也。将清汁另放，外用人参、枸杞子用铜锅以水三十六碗，熬至药面无水，以新布绞取清汁，将滓石臼水捶捣细，用水二十四碗又熬如前；又滤又捣又熬，如此三次，以滓无味为度。将前龟、鹿汁并参、杞汁和入锅内，文火熬至滴水成珠不散，乃成胶也。候至初十日起，日晒夜露至十七日，七日夜满，采日精月华之气，如本月阴雨缺几日，下月补晒如数，放阴凉处风干。每服初一钱五分，十日加五分，加至二钱止，空心酒化下。常服乃可。

【功用】 补气血，生精髓，延龄育子。

①《医便》：延龄育子。②《增补内经拾遗》：坚筋壮骨，填精补髓。③《摄生秘剖》：大补精髓，益气养神。④《医方集解》：补气血。

【主治】 ①《医便》：男妇真元虚损，久不孕育；男子酒色过度，消铄真阴，妇人七情伤损血气，诸虚百损，五劳七伤。②《医方考》：精极，梦泄遗精，瘦削少气，目视不明。

【方论选录】 ①《医方考》：龟、鹿禀阴气之最完者，其角与版，又其身聚气之最胜者，故取其胶以补阴精，用血气之属剂而补之，所谓补以其类也；人参善于固气，气固则精不遗；枸杞善于滋阴，阴滋则火不泄。此药行，则精日生，气日壮，神日旺矣。②《增补内经拾遗》：龟也、鹿也，皆世间有寿之物，故称之曰二仙。龟、鹿禀阴之最完者，龟取板，鹿取角，其精锐之气，尽在于是矣。胶，粘膏也。③《医方集解》：此足少阴药也。龟为介虫之长，得阴气最全；鹿角遇夏至即解，禀纯阳之性，且不两月，长至一二十斤，骨之速生无过于此者，故能峻补气血；两者皆用气血以补气血，所谓补之以其类也。人参大补元气，枸杞滋阴助阳，此血气阴阳交补之剂，气足则精固不遗，血足则视听明了，久服可以益寿，岂第已疾而已哉。李时珍曰：龟、鹿皆灵而有寿。龟首常藏向腹，能通任脉，故取其甲以补心、补肾、补血，皆以养阴也；鹿鼻常反向尾，能通督脉，故取其角以补命、补精、补气，皆以养阳也。

【备考】 按：《全国中药成药处方集》（福州方）将本方改为丸剂，名“龟鹿二仙丸”。

07330 免怀汤

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【异名】 免怀散(《金鉴》卷四十九)。

【组成】 当归尾 赤芍药 红花（酒浸） 牛膝（酒浸）各五钱

【用法】 上锉。水煎服。

【功用】 通月经以摘乳。

【主治】《金鉴》：产后乳汁暴涌不止，食少，欲回其乳者。

【备考】 通其月经，则乳汁不行。

07331 弃杖散

【方源】《中西医结合治疗骨与关节损伤》。

【组成】 当归尾 姜黄 紫荆皮各四两 细辛 大黄 生川乌 皂角 肉桂 透骨草 丁香 白芷 红花各二两

【用法】 上为细末，以蜂蜜或凡士林调成软膏。外敷伤处，每三至五天换药一次。

【功用】 行瘀活血。

【主治】 各种损伤，作肿作痛，以及骨、关节损伤初期之瘀血凝滞。

07332 辛芎散

【方源】《医统》卷四十三引《医林方》。

【组成】 细辛 川芎 防风 桔梗 白术 羌活 桑白皮（炒） 薄荷叶各一两 甘草五分

【用法】 水二盏，加生姜三片，煎八分，食后温服。

【主治】 热痰壅塞，头目不清，语音不出。

07333 辛夷丸

【方源】《准绳·类方》卷八。

【组成】 南星 半夏（各姜制） 苍术（米泔浸） 黄芩（酒炒） 辛夷 川芎 黄柏（炒焦） 滑石 牡蛎（煅）各等分

【用法】 上为末，糊为丸。薄荷汤送下。

【主治】 头风，鼻涕白色稠粘。

07334 辛夷汤

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】 辛夷 川芎 白芷 防风 羌活 荆芥 藁本 薄荷 木通各一两 细辛 升麻 甘草（炙）各三钱

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎一盏，食远温服。

【主治】 肺气不利，头目昏眩，鼻塞身重，鼻渊涕水。

07335 辛夷散

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】 辛夷花一钱 黄耆一钱 人参一钱五分 当归一钱 白芍二钱 川芎一钱 白芷一钱 细辛八分 黄芩（酒炒）一钱 甘草六分

【用法】 上锉一剂。加灯心三十根，水煎，食远服。

【主治】 脑漏，鼻中流出臭脓水。

07336 辛香散

【方源】《普济方》卷四十六。

【组成】 细辛 丁香各等分

【用法】 上为细末。搐入鼻中。

【主治】 头风。

07337 辛夷消风散

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】 辛夷 黄芩 薄荷 甘菊 川芎 桔梗 防风 荆芥 甘草 生地 赤芍

【主治】 肺经感受风寒，久而凝入脑户，太阳湿热，又为蒸郁，涕泪涎唾下不止；肺气不清，风热郁滞，息肉结如瘤子，渐至下垂，孔窍闭塞，气不得通。

07338 辛夷清肺饮

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】 辛夷清肺散（《观聚方要补》卷七）、辛夷清肺汤（《喉症指南》卷四）。

【组成】 辛夷六分 黄芩 山栀 麦门冬 百合 石膏 知母各一钱 甘草五分 枇杷叶三片（去毛） 升麻三分

【用法】 水二钟，煎八分，食后服。

【主治】 肺热鼻内息肉，初如榴子，日后渐大，闭塞孔窍，气不宣通。

07339 辛凉清解饮

【方源】《秋温证治》。

【组成】 连翘 金银花各二钱 杏仁 牛蒡子各三钱 薄荷 淡豆豉 蝉蜕各一钱五分 桔梗六分 淡竹叶十片

【用法】 水煎服。

【主治】 太阴秋温，洒洒恶寒，蒸蒸发热，咽或痛或不痛，舌白腻，边尖红。

【加减】 胸闷，加栝楼皮、郁金各一钱五分；喉痛，加玄参三钱，马勃一钱；鼻衄，加鲜茅根十支，焦栀子三钱。

07340 辛黄三白汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】 人参 白术 白芍各一钱 白茯苓 当归五分 细辛 麻黄各二分 姜三片 枣一枚

【用法】 水煎，温服。

【主治】 阴症伤寒在表轻者。

【加减】 脉沉发热口和，加附子。

【备考】 按：方中白茯苓用量原缺。

07341 辛温平补汤

【方源】《医门法律》卷二。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 干姜（炮）各五分 当归一钱 肉桂五分 人参 甘草（炙） 黄耆（蜜炙） 白术（土炒） 白芍（酒炒）各一钱 五味子十二粒

【用法】 水二大盏，加煨生姜三片，大枣二枚（劈），煎至一盏，加蜜五蛤蜊壳，温服。

【功用】 平调脏腑荣卫。

【主治】 暴中寒证，其阳已回，身温色活，手足不冷，吐利渐除。

07342 应圣丸

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】 阿胶（蛤粉炒） 熟干地黄（洗） 黄耆（酒蒸）各七两 地榆（寸锉，炒焦） 木贼（存性、烧） 槐花（炒） 五倍子（烧存性） 卷柏（炒） 棕榈（煅存性） 蒲黄（隔纸炒令色变） 艾叶 人参（去芦） 鸡冠花（烧存性）各半两 赤石脂一分（煅）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心米汤送下。

【功用】 调荣卫，敛血归气。

【主治】 大肠失血。

07343 应神散

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 延胡索（炒） 胡椒各等分

【用法】 上为细末。每服二大钱，酒、水各半盏，煎七分，食前服。

【主治】 小肠气痛不可忍。

07344 应痛丸

【方源】《养老奉亲》。

【组成】乳香一两　五灵脂一两　没药一两　川乌头二两（去皮脐）

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，熟水吞下。

【主治】一切心腹刺痛。

07345　应痛丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】五灵脂（黑色者，炒）　草乌头（去皮脐，生，锉）　地龙（去土，炒）　白芥子　自然铜（煅，醋淬，研）各一两　乳香半两（研）　巴豆七粒（去皮心膜，醋煮黄色，研）

【用法】上为末，酒糊为丸，如小豆大。每服五丸，温酒送下。

【主治】风毒内攻，走注疼痛不定。

07346　应痛丸

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】苍术（去皮）　当归　草乌头（炮）　黑牵牛各一两

【用法】上为细末，醋糊为丸，如小豆大。每服二十丸，空心醋汤送下。

【主治】走注疼痛，疑是附骨疽。

07347　应验打老丹

【方源】《普济方》卷二二三。

【组成】白茯苓（去皮）　甘菊花　川芎　干山药　乌药　金铃子　覆盆子　钟乳粉（研）　山茱萸　云母石（火飞过，研）　续断（去芦头）　肉苁蓉（酒浸一宿，焙）　附子（炮，去皮脐）　蛇床子　桂心　天雄（炮，如无，附子代之）　巴戟（水浸，去心）　鹿茸（去毛）　远志（去心）　白术　麦门冬（去心）　牡蛎（煅）　生地黄　玄参（去芦）　独活（去芦）　柏子仁　五味子　干姜（炮）　泽泻　丹参（去芦）　紫菀（去芦）　黄耆（去芦）　蔓荆子（去萼）　枸杞子　牡丹皮　密蒙花　芍药　甘草（炙）　苦参（去皮）　石斛（去根）　熟地黄（去芦）　杜仲（炒）　人参（去芦头）　牛膝　荜拨　赤石脂（研）　天门冬（去心）　沙参　菟丝子（酒浸一宿）　茴香　藁本（去毛，拣净）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候。温酒送下，一日三次。服至六十日见效。

【功用】补丹田，安魂魄，壮筋骨，暖下元，添精髓，身轻体健，益寿延年，除百病，长生不老，驻颜色。

【临证举例】年老无子　薛侍郎使经泥川，见一女子将老人捶之，因问其故。女子曰：乃妾之子也。薛问：汝年几何？答曰：一百六十七岁。昔有伯父，向隐居于华山。一日归，见妾夫妇，年老无子，手足不遂。令服此药，至一百日，身轻体健，气力加倍，手足顿愈，变为童颜，经一年乃有此子。薛曰：愿闻此方。女子遂以授之。

07348　疔毒复生汤

【方源】方出《普济方》卷二七四，名见《外科正宗》卷二。

【异名】疔毒回生汤（《灵验良方汇编》卷二）。

【组成】牡蛎　大黄　山栀子　金银花　地骨皮　牛蒡子　连翘　木通　乳香　没药　皂角刺　瓜蒌各等分

【主治】①《普济方》：疔疮走黄，打滚将死。②《外科正宗》：疔毒走黄，头面发浮，毒气内攻，烦闷欲死。

【加减】气壮者，加朴消，水一碗，酒半碗同煎。

【备考】按：《外科正宗》本方用法：酒、水共一钟，煎一钟，食远服；不能饮者，只用水煎，临服入酒一杯和服。

07349　疔淋散

【方源】《外台》卷二十七引《崔氏方》。

【组成】石韦（洗，刮去毛）　大虫魄（即琥珀）一两（研）　滑石一两半　当归　芍药　黄芩　冬葵子　瞿麦各一两　乱发三团（如鸡子大，烧灰）　茯苓一两半

【用法】上为散。每服方寸匕，一日二次。

【主治】诸淋。

07350　疔本滋肾丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】疔肾滋本丸（《医方集解》）。

【组成】黄柏（酒炒）　知母（酒炒）各等分

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服一百丸至一百五十丸，空心盐白汤送下。

【主治】《济阳纲目》：肾虚目暗。

【方论选录】《医方考》：眼者，肝之窍；肝，木藏也，得水则荣，失水则枯。故用黄柏、知母之味厚者以滋肾水，所谓虚则补其母也。是方也，虽曰补肾，亦泻之之类也，脾强目暗者宜主之。

【宜忌】《医方考》：脾胃坏者，非所宜也。

07351　快气汤

【方源】《局方》卷三（吴直阁增诸家名方）。

【组成】缩砂仁八两　香附子（炒去毛）三十二两　甘草（爁）四两

【用法】 上为细末。每服一钱，用盐汤点下。

【功用】 快气美食，温养脾胃。

【主治】 一切气疾，心腹胀满，胸膈噎塞，噫气吞酸，胃中痰逆呕吐，及宿酒不解，不思饮食。

07352 快活丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】 良姜 干姜（炮）各四两 吴茱萸（炒） 木香各一两 枳实（不去白） 陈皮（不去白）各二两

【用法】 上为细末，酒煮神曲、面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，不拘时候，以生姜、陈皮汤送下。

【主治】 上膈停痰，中脘气痞不下，饮食不入，或时呕吐，食不消化，心腹胀满，大便不通。

07353 快膈丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】 橘皮（炮，去瓤，晒干称）一斤（用生姜十两，去皮，洗净，切片，同橘皮捣碎晒干，再以生姜六两切片，再捣，微炒，入后药） 半夏曲（炒） 藿香（去土） 丁香皮各四两 厚朴（去粗皮，姜制，炙）三两 天南星（汤泡七次） 茯苓（去皮）各二两

【用法】 上为细末，生姜自然汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜、紫苏汤送下。

【主治】 脾胃虚弱，不美饮食，痰涎上壅，胸膈不快，及酒食所伤。

07354 快膈汤

【方源】《医方类聚》卷九十四引《经验良方》。

【异名】 快膈散（《普济方》卷一六六）。

【组成】 白术（炒）一两 丁香 香附子（炒）各二钱半 草果仁 诃子（炮） 半夏（汤泡二次） 甘草（炙）各半两

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，大枣二个，煎七分，热服。

【主治】 胃脘停痰，膈中留饮，心头不快，时复有声，或饮食后、或早起口吐清水。

07355 快气饼子

【方源】《明医指掌》卷五。

【组成】 莱菔子（炒）二两 紫苏子一两 橘红一两 白豆蔻一两 白茯苓一两

【用法】 上为细末，炼蜜和姜汁为饼子。时时噙嚼之。

【主治】 气郁不快，食下则胸膈噎塞疼痛。

07356 快脾饮子

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【异名】 快中饮子（《魏氏家藏方》卷五）。

【组成】 草果子（去壳称） 人参（去芦头） 白术 陈橘皮（去白） 半夏（生姜自然汁一盏煮干） 厚朴（去粗皮，姜汁制） 甘草（炙） 乌梅肉（炒） 缩砂仁各一两 附子（八钱重者）一枚（炮，去皮脐）

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水一盏半，加生姜十片，大枣二枚，煎八分，去滓，食前温服。

【主治】 脾胃虚弱，中脘停寒，不进饮食，四肢无力。

07357 快膈消食丸

【方源】《证治准绳》卷十。

【组成】 三棱（煨） 蓬莪术（煨） 缩砂（去壳） 白术 神曲（炒） 麦芽（炒）各五钱 香附（炒） 一两 （一方加炒枳壳二钱）

【用法】 上为末，蒸饼为丸。生姜汤送下。

【主治】 宿食停滞，肚胀腹痛。

07358 冻疮膏

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 麻油三两 松香一钱 黄占一两五钱

【用法】 烊化搅匀。摊贴。

【主治】 冬令严寒，皮肤燥裂，死血冻疮。

07359 冻疮膏

【方源】《全国中药成药处方集》（南京方）。

【组成】 煅瓦楞子（研末，用水飞）一两 冰片五分 山羊油脂（熬化）二两

【用法】 将瓦楞子煅透，为末，水飞乳细，加冰片，共乳成细末，以山羊油熬化，调和成膏，用瓶或膏盒装之，每盒约重二钱。每用少许，涂于患处。

【主治】 冻疮已溃。

07360 冷风汤

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】 防风 黄芪 茺蔚子 桔梗 五味子 细辛 大黄

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 胬肉攀睛，乍发乍起。

07361 冷补丸

【方源】《济生》卷五。

【组成】 熟地黄（酒蒸，焙） 生地黄（洗） 天门冬（去心） 川牛膝（去芦，浸） 白芍药 地骨皮（去木） 白蒺藜（炒） 麦门冬（去心） 石斛 玄参 磁石（火煅七次，细研，水飞过） 沉香（别研，不见火）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每

服七十丸，空心盐酒、盐汤任下。

【主治】 肾水燥少，不受峻补，口干多渴，耳痒耳聋，腰痛腿弱，小便赤涩，大便或难。

07362 冷哮丸

【方源】《证治宝鉴》卷五。

【组成】 麻黄 生乌 细辛 牙皂肉 蜀椒 生白矾 半夏曲 胆星 生草 杏仁 紫菀 款冬花

【用法】 上为末，姜汁调神曲糊为丸。发时，临卧以生姜汤送服。发止住服，进补药。

【功用】 ①《重订通俗伤寒论》：散寒化痰，平喘止哮。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：保肺。

【主治】 ①《证治宝鉴》：哮证遇冷即发，属中外皆寒者。②《张氏医通》：背受寒气，遇冷而发喘嗽，顽痰结聚，胸膈痞满，倚息不得卧。

【宜忌】 ①《张氏医通》：气虚少食，及痰中见血，背气受伤者禁用。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌食五辛发物。

【备考】《张氏医通》本方用量：麻黄、川乌、细辛、蜀椒、白矾、牙皂、半夏曲、陈胆星、杏仁、甘草各一两，紫菀茸、款冬花各二两。

07363 冷香饮子

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】 草果子仁二两 甘草一两（炙） 陈橘皮（去白）半两 附子（炮，去皮脐）一分

【用法】 上㕮咀。每服半两，水三碗，煎至二碗，去滓沉冷，旋旋服之，不拘时候。

【主治】 伏暑中暑，内伤夹暑，霍乱呕吐，腹痛泻利，厥逆烦躁，引饮无度。

①《杨氏家藏方》：伏暑烦躁，引饮无度。②《医方考》：夏月饮食，杂以水果、寒冷之物食之，胸腹大痛，霍乱者。③《张氏医通》：中暑，内夹生冷饮食，泻利。④《杂病源流犀烛》：内伤夹暑者，暑月房劳，兼膏粱水果杂进，至周身阳气不伸，四肢厥逆拘急，呕吐。

【方论选录】 ①《医方考》：草果辛温，善消肉食；附子辛热，能散沉寒；橘红之辛，可调中气；甘草之温，堪以健脾。而必冷服者，假其冷以从治，《内经》所谓"必伏其所主，而先其所因"也。②《古方选注》：草果、陈皮，温脾去湿定呕；炙草、生姜，奠安脾经阴阳；以炮附子通行经络，交接上下。用饮子者，轻清留中也；冷服者，缓而行之也。

【临证举例】 太阴伤寒 《清代名医医案大全·叶天士医案》：脉沉微，腹痛吐利汗出，太阴伤寒，拟冷香饮子：泡淡附子，草果仁，新会皮，甘草，煎好候冷服。

07364 冶金煎

【方源】《目经大成》卷二。

【组成】 玄参 桑皮 枳壳 黄连 杏仁 旋覆花 防风 黄芩 白菊 葶苈子

【主治】 白睛肿胀，日夜疼痛。

【方论选录】 白睛肿胀，肺气中塞也；日夜疼痛，肺火上攻也。中塞者，须散而决，故用枳壳、杏仁、旋覆花、防风、白菊；上攻者，当寒而下，故用桑皮、黄连、玄参、黄芩、葶苈。

07365 沐头方

【方源】 方出《肘后方》卷六，名见《千金》卷十三。

【异名】 沐头汤（《普济方》卷五十引《海上方》）。

【组成】 桑白皮（锉）三二升

【用法】 以水淹，煮五六沸，去滓，洗须鬓。数数为之，即自不落。

【功用】《千金》：润泽头发。

【主治】 ①《肘后方》：须鬓秃落，不生长。②《千金》：脉极虚寒，须鬓堕落。

07366 沐头汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】 麻子汤（《圣济总录》卷一〇一）。

【组成】 大麻仁三升 秦椒二两 皂荚（屑）五两

【用法】 上为末，纳米泔汁中一宿渍，去滓，米泔搅之二五百遍，取劳，乃用沐发，燥讫，别用皂荚汤洗之，通理，然后敷膏。

【主治】 肺热劳损伤肺，气冲头顶，而致头风，不问冬夏老少，头生白屑，搔之痒起。

07367 沙参散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 沙参一两（去芦头） 白薇一两 石膏二两半 川芒消一两 人参三分（去芦头） 茯神一两 栀子仁一两 甘草半两（炙微赤，锉） 羚羊角屑一两 子芩一两

【用法】 上为粗散。每服三钱，水一中盏，煎至五分，去滓，入地黄汁一合，竹沥半合，更煎一两沸，食后温服。

【功用】 泄热安心。

【主治】 心实热，惊悸喜笑，心神不安。

【宜忌】 忌炙煿、热面。

07368 沙参粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】 沙参 15～30 克 粳米 50～100 克 冰糖适量

【用法】 先以沙参煎取药汁，去渣，入粳米煮稀薄粥，粥熟后加入冰糖。或用新鲜沙参 30～60 克，洗净切片，煎取浓汁，同粳米，冰糖煮粥服食。连用 3～5 天为一疗程。

【功用】 润肺养胃，祛痰止咳。

【主治】 肺热肺燥，干咳少痰，或肺气不足，肺胃阴虚的久咳无痰，咽干，或热病后津伤口渴。

【宜忌】 受凉感冒引起的伤风咳嗽患者忌食。煮沙参粥时宜稀薄，不宜稠厚。

07369 沙参麦冬汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 沙参三钱 玉竹二钱 生甘草一钱 冬桑叶一钱五分 麦冬三钱 生扁豆一钱五分 花粉一钱五分

【用法】 水五杯，煮取二杯，每日服二次。

【功用】《中医方剂学》：甘寒生津，清养肺胃。

【主治】 燥伤肺胃或肺胃阴津不足，咽干口渴，或热，或干咳少痰。现用于气管炎、肺结核、胸膜炎、慢性咽炎等属于肺胃阴伤者。

①《温病条辨》：燥伤肺胃阴分，或热或咳者。②《医方发挥》：气管炎、肺结核属肺胃阴虚者。③《中医方剂临床手册》：多用于胸膜炎、感染性多发性神经炎、慢性咽炎，以及乙脑或其他传染病恢复期。④《实用中医耳鼻喉科学》：本科之急性热病（如急性化脓性中耳炎、扁桃体周围脓肿等）汗出后口渴、唇燥、咽干、鼻干等津液受伤者；鼻前庭炎，以干燥皲裂为主者；萎缩性鼻炎、慢性咽喉炎证属阴虚肺燥者。

【加减】 久热久咳者，加地骨皮三钱。

【方论选录】《中医方剂学》：方中沙参、麦冬清养肺胃，玉竹、花粉生津解渴，生扁豆、生甘草益气培中，甘缓和胃，配以桑叶，轻宣燥热，合而成方，有清养肺胃、生津润燥之功。

【临证举例】 ①小儿迁延性肺炎 《辽宁中医杂志》（1986；（3）：24）：用沙参麦冬汤加减治疗小儿迁延性肺炎 25 例，结果治愈 20 例，好转 4 例，死亡 1 例。②小儿口疮 《陕西中医》（1984；5（1）：16）：用沙参麦冬汤加减治疗小儿口疮 34 例，结果 34 例全部治愈，一般服药 3～5 剂，溃疡面愈合。

07370 沃雪汤

【方源】《外台》卷十引《范汪方》。

【异名】 投杯麻黄汤（原书同卷）、投杯汤（《医心方》卷九引《小品方》）。

【组成】 麻黄四两（去节） 细辛二两 五味子半升 桂心 干姜各一两 半夏八枚（洗去滑，一方四两）

【用法】 上切。以水一斗，先煎麻黄去上沫，内余药，煮取三升，绞去滓，适寒温，服一升，每日二次。亦可从五合，不知稍增。

【主治】 上气不得息卧，喉中如水鸡声，气欲绝。

【宜忌】 忌生葱、生菜、羊肉、饧。

07371 沃雪汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生山药一两半 牛蒡子四钱（炒，捣） 柿霜饼六钱（冲服）

【主治】 脾肺阴分亏损，饮食懒进，虚热劳嗽；及一切阴虚之证，兼肾不纳气作喘者。

【临证举例】 喘证 一人，年四十余，素有喘证，薄受外感即发。医者投以小青龙汤，一剂即愈，习以为常。一日喘证复发，连服小青龙汤三剂不愈，其脉五至余，右寸浮大，重按即无。知其前服小青龙汤即愈者，因其证原受外感；今服之而不愈者，因此次发喘原无外感也。为拟此汤，服两剂全愈，又数服以善其后。

07372 沃焦散

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】 泥鳅鱼十头（阴干，去头尾，烧灰，碾为细末） 干荷叶（碾为细末）各等分

【用法】 上为末。每服各二钱匕，新汲水调下，遇渴时服，一日三次，候不思水即止。

【主治】 消渴，饮水无度。

07373 没沉汤

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】 青皮 灵脂 川楝 山甲各一钱 良姜 玄胡各七分 没药七分 沉香五分 大茴香一钱 槟榔七分 木香六分 砂仁少许 盐一分

【主治】 心痛喜按。

07374 没药丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】 没药（研） 乳香（研）各二钱 地龙（去土）半两 甜瓜子一分 自然铜（醋淬，研）一两 骨碎补 五灵脂各半两 干蝎（去土，炒）一分

【用法】 上除研者外，为细末，再和匀，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五丸，加至七丸，以温

酒送下。

【主治】 诸风，筋骨及遍身疼痛。

07375 没药丸

【方源】《全生指迷方》卷四。

【异名】 桃桂当归丸(《东医宝鉴杂病篇》卷十)。

【组成】 当归（焙）一两 桂心 芍药各半两 没药一分 桃仁（去皮尖，炒）一分 虻虫（去头足翅，炒） 水蛭（炒）各二十枚

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三丸，以醋汤送下。

【功用】《景岳全书》：逐滞血。

【主治】 ①《全生指迷方》：恶露方行忽然断绝，骤作寒热，脐腹大痛，胸中如以针刺，此大有蓄血留于经络。②《外科理例》：由冷热不调，或思虑动作，气乃壅遏，血蓄经络而恶血未尽，脐腹刺痛，或流注四肢，或注股内，痛如锥刺，或两股肿痛。

【方论选录】《医略六书》：没药散瘀血，当归养新血，赤芍破血泻血滞，桃仁破瘀开血结，水蛭攻血之坚凝，虻虫攻血之疼胀。醋丸以搜之，酒煎以行之，使瘀结即化，则坚胀自消，而胞门清肃，恶露复行，何坚胀疼痛之不除哉。

07376 没药丸

【方源】《奇效良方》卷五十六。

【组成】 没药 乳香 川芎 川椒（去目及合口者） 芍药 当归各半两 自然铜二钱半（火烧，醋淬七次）

【用法】 上为细末，用黄蜡二两，熔开，入药末，不住手搅匀为丸，如弹子大。每服一丸，用好酒一钟化开，煎至五分，乘热服之，随痛处卧。连服三三丸。

【主治】 打扑内损，筋骨疼痛。

07377 没药丸

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】 桃仁（炒）一两 乳香 没药 川芎 川椒（去目及合口者） 当归 赤芍各五钱 自然铜（火烧醋淬七次）二钱五分

【用法】 上为细末，用黄蜡二两，火化开入药末，不住手搅匀，丸如弹子大。每服一丸，以好酒一钟，将药化开，煎至五分，乘热服下。

【主治】 中石疽初起，寒气瘀血凝结，生于腰胯之间，其疽时觉木痛，难消难溃，坚硬如石，皮色不变。

07378 没药散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 没药一两半 麒麟竭一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 川芒消一两 生干地黄一两

【用法】 上为细散。每服二钱，食后以温水调下。

【主治】 血灌瞳仁，疼痛不可忍。

07379 没药散

【方源】《博济》卷四。

【组成】 没药 红花（拣净） 延胡索（洗） 当归（洗去土）各等分。

【用法】 上为细末。每服二钱，以酒半盏，童子小便半盏，相和匀，赤烧秤锤或小铃子，淬过后调下；常服只用温酒一盏亦得。

【主治】 妇人血气腹痛，月经不调，痛经。

①《博济》：妇人急血气，疼痛不可忍者。②《普济方》：月经欲来前后腹中痛。③《校注妇人良方》：血气不行，心腹作痛，或行注疼痛，或月经不调，发热晡热。

07380 没药散

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【异名】 止疼没药散(《秘传眼科龙木论》卷五)、止痛没药散(《金鉴》卷七十八)。

【组成】 没药一两半 麒麟竭 大黄（锉、炒） 芒消各一两

【用法】 上为细散。每服三钱匕，空心、食后以熟水调下，每日三次。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：破血积，止疼痛，消瘀退翳。

【主治】 血灌瞳仁，胞睑生疮，目生赤翳，胬肉遮睛及眼睛处伤。

①《圣济总录》：血灌瞳仁。②《银海精微》：心脾胃得热，致胞肉生疮。③《秘传眼科龙木论》：血灌瞳仁，外障。④《全国中药成药处方集》（沈阳方）：眼胞生疮，目赤生翳，疼痛难忍；或被物伤，血灌瞳仁，漏睛脓血，白睛赤红，瘀血胬肉遮睛。

07381 没药散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 没药 芎藭 木香 乌头（炮裂，去皮脐） 天麻 白芷 桂（去粗皮） 茯神（去木） 牡丹皮 芍药 当归（切，焙）各一两

【用法】 上为散。每服一钱匕，以温酒调下，一日三次。治血风疼痛者，用茶清调下。

【主治】 室女月水不利，遍身疼痛；妇人血风攻注，遍身疼痛。

07382 没药散

【方源】《宣明论》卷十三。

【组成】没药 乳香各三钱（别研） 川山甲五钱（炙） 木鳖子四钱

【用法】上为末。每服半钱至一钱，酒大半盏，同煎，不拘时候温服。

【主治】一切心腹疼痛，不可忍者。

07383 没药散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】虻虫一钱（去足羽，炒） 水蛭一钱（炒） 麝香一钱 没药三钱

【用法】上为细末。用四物汤四两，倍当归、川芎，加鬼箭羽、红花、玄胡各一两，水煎调服。

【主治】①《保命集》：血运，血结，血聚于胸中，或偏于少腹，或连于胁肋。②《东医宝鉴·杂病篇》：产后血瘀作痛。

07384 没石子丸

【方源】《局方》卷十。

【组成】没石子 地榆各半两 黄柏（锉，蜜炒）二两 黄连（炒，锉）一两五钱 酸石榴皮一两

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如麻子大。每服十丸至二十丸，食前以温米饮送下。

【主治】小儿肠虚受热，下痢鲜血，或便赤汁，腹痛后重，昼夜不止，遍数频多。

07385 没石子丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】木香 黄连各一分（一作各二钱半） 没石子一个 豆蔻仁二个 诃子肉三个

【用法】上为细末，饭为丸，如麻子大。食前以米饮送下。

【主治】小儿泄泻久痢，滑肠腹痛。

①《小儿药证直诀》：小儿泄泻白浊，及疳痢，滑肠腹痛。②《奇效良方》：小儿热泻久痢。③《普济方》：小儿水泻奶疳。④《准绳·幼科》：久患疳痢酿泻。

【备考】《医方类聚》引《经验良方》有蜡茶半两。

07386 没药四生丹

【方源】《医方类聚》卷一八八引《施圆端效方》。

【组成】防风 当归（炮） 川乌（炮，去皮脐） 草蔫（细切） 自然铜（醋淬七次） 骨碎补（去毛）各半两 乳香 没药各一分

【用法】上为细末，醋为丸，如小豆大。每服二十丸，食前以温酒送下，一日二次。

【主治】打扑闪肭损伤，筋骨疼痛，及寒湿骨痛。

07387 没药降圣丹

【方源】《局方》卷八（绍兴续添方）。

【组成】自然铜（火煅，醋淬十二次，研末，水飞过，焙） 川乌头（生，去皮脐） 骨碎补（燎去毛） 白芍药 没药（别研） 乳香（别研） 当归（洗，焙）各一两 生干地黄 川芎各二两半

【用法】上为细末，以生姜自然汁与蜜等分为丸，每二两作四丸。每服一丸，捶碎，水、酒各半盏，入苏木少许，同煎至八分，去苏木，空心食前热服。

【功用】《疡科心得集》：接续筋骨。

【主治】打扑闪肭，筋断骨折，挛急疼痛，不能屈伸，及荣卫虚弱，外受游风，风伤经络，筋骨缓纵，皮肉刺痛，肩背拘急，身体倦怠，四肢少力。

07388 没药除痛散

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】蓬莪术（炮）一两 当归（焙） 玄胡索 五灵脂 肉桂（去粗皮） 良姜（炒） 蒲黄（炒）各七钱半 甘草（炙） 没药各半两

【用法】上为细末。每服三钱，以温酒调下。

【功用】①《女科百问》：逐寒邪。②《医略六书》：调经。

【主治】①《女科百问》：腹痛。②《医略六书》：腹中坚痛，月经不调，脉紧涩滞者。

【方论选录】《医略六书》：没药散瘀血以止痛，蓬术化瘀结以消坚，蒲黄破血瘀以通经，灵脂破瘀血以降浊，延胡索活血通经，炙甘草缓中除痛，肉桂温经暖血，良姜暖胃逐冷，当归养血脉以生新，而宿血自化也。为散以散之，温酒以行之，使瘀化寒消，则腹中坚痛自退；月经之至自无不调矣。

07389 沉水膏

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】白及 白蔹各一两 乳香三钱

【用法】上为末，看疮大小，以水一碗，抄药在水中，以铁篦子打散，令药自澄，作白膏药。看疮势，以纸花子摊贴之。

【主治】疮肿肿起。

07390 沉附汤

【方源】《直指》卷十八。

【组成】附子（生）一钱 沉香 辣桂 荜澄茄 甘草（炙）各半钱 香附一钱（炒）

【用法】上锉一剂。加生姜七片，水煎，空心服。

【主治】 ①《直指》：肾虚无阳，小肠气痛，头额、小腹、外肾时冷，及湿症。②《何氏济生论》：气急不能眠卧。

07391 沉香丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 沉香半两 丁香半两 木香半两 槟榔半两 桂心一两 诃黎勒皮一两 川大黄半两（锉碎，微炒） 肉豆蔻半两（去壳） 麝香一分（细研）

【用法】 上为末，加麝香研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，以姜、枣汤嚼下，不拘时候。

【主治】 气膈。脾胃久冷，心腹痞满，吃食无味，面色萎黄

07392 沉香丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】 丁香 木香 吴茱萸 茴香 沉香各一分 青橘皮 肉豆蔻 槟榔各二两 （黑牵牛二两，醋浸令软，连二味同炒，令牵牛熟去出）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以生姜汤送下。

【主治】 由忧思惊恐寒热，动伤其气，结于胸膈之间，而致膈气，症见胸中气痞烦闷，饮食不下，或心下苦满，噫气吞酸，时闻食臭，大小便秘涩。

【备考】《御药院方》有麝香一钱。

07393 沉香散

【方源】《圣惠》卷四。

【异名】 沉香汤(《圣济总录》卷四十三)。

【组成】 沉香一两 桂心一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 白龙骨一两 木香三分 当归二分（锉，微炒） 枳实三分（麸炒微黄）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】 小肠虚冷，脐下急痛，小便滑数。

07394 沉香散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 沉香半两 人参半两（去芦头） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 红豆蔻三分（去皮） 白术半两 桂心半两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 脾胃气虚弱，不能饮食，食饮即吐，心腹时痛。

07395 沉香散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 沉香三分 黄耆三分（锉） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 滑石一两 黄芩半两 榆白皮一两（锉） 瞿麦三两 韭子一两（微炒） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以清粥饮调下。

【主治】 膏淋，脐下妨闷，不得快利。

07396 沉香散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 沉香半两 石韦半两（去毛） 滑石半两 当归半两（锉，微炒） 瞿麦半两 白术三分 甘草一分（炙微赤，锉） 葵子三分 赤芍药三分 王不留行半两

【用法】 上为细散。每服二钱，食前煎大麦饮调下。以通利为度。

【主治】 冷淋，脐下妨闷，小便疼不可忍。

07397 沉香散

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】 沉香 附子各一两 川楝子一两半

【用法】 上为细末。每服一钱半，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，盐少许，煎至七分，空心服。

【主治】 寒疝，小腹坚满，攻作不定，时发疼痛；肾虚受邪肿胀；及脏寒气弱，脐常痛。

07398 沉香散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 沉香 石韦 滑石 当归 王不留行各半两 葵子 白芍药各三分 甘草一分

【用法】 上为细末。每服一钱，食前煎大麦饮调下，一日二三次。

【主治】 冷淋脐下痛，小腹妨闷。

07399 沉香散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】 香附子一两 细辛半两 川芎 白芷 白僵蚕（直者，去嘴） 地龙各一分

【用法】 上为细末。揩疼处。

【主治】 牙风肿痛。

07400 沉香散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】 沉香 川升麻 细辛 白芷 地骨皮各一两 黑附子（生用）一分

【用法】 上为细末。每用一钱，白汤煠温温，冷即吐了。

【主治】 老人久患冷牙疼不可忍者。

07401 沉香散

【方源】《三因》卷八。

【组成】白术 茯苓各半两 木通 当归 橘皮 青皮 大腹子 大腹皮 芍药各一两 甘草（炙）一两半 白芷三两 紫苏叶四两 枳壳（麸炒，去瓤）三两

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一枚，煎七分，空腹温服。

【功用】宽气通噎，宽中进食。

【主治】五噎五膈，胸中久寒，诸气结聚，呕逆噎塞，食饮不化，结气不消。

【备考】本方名沉香散，但方中无沉香，疑脱；《医统》有沉香。

07402 沉香散

【方源】《三因》卷十二。

【组成】沉香（不焙） 石韦（去毛） 滑石 王不留行 当归（炒）各半两 蒌子（炒） 白芍药各三分 甘草（炙） 橘皮各一分

【用法】上为细末。每服二钱，食前煎大麦汤调下；饮调亦得。

【主治】五内郁结，气不得舒，阴滞于阳，而致气淋壅闭，小腹胀满，便溺不通，大便分泄，小便方利。

【备考】《丹溪心法附余》有木香、青皮各二钱五分。

07403 沉香散

【方源】《御药院方》卷九。

【异名】沉醉香散（《普济方》卷七十）、沉香白牙散（《丹溪心法附余》卷十二）。

【组成】沉香 麝香各一钱 细辛半两 升麻 藁本 藿香叶 甘松 白芷各二钱半 石膏四两 寒水石二两

【用法】上为细末。揩齿。

【功用】揩齿莹净令白。

【主治】口臭。

07404 沉香散

【方源】《医方类聚》卷一五七引《经验秘方》。

【组成】蓬术 天台乌药 茴香各三两 肉桂一两半（去粗皮，不见火） 益智仁半两 沉香一两半 玄胡索一两半（去皮） 荜澄茄一两半

【用法】上为细末。每服一钱，空心、食前以温酒、盐汤任调下。

【主治】沉寒痼冷，奔豚，小肠疼痛，阴核偏大，久不愈。

07405 沉香散

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】沉香 紫苏 白蔻仁各一钱

【用法】上为末。每服五七分，以柿蒂汤送下。

【主治】胃冷久呃。

07406 沉香散

【方源】《医碥》卷七。

【组成】沉香 石韦（去毛） 滑石 当归 王不留行 瞿麦各半两 黄连（去须）七钱半 细辛（去苗叶） 甘草（炙）各二钱半

【用法】上为末。每服二钱，以大麦汤调服，以利为度。

【主治】冷淋。

07407 沉香煎丸

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【异名】沉香煎（《婴童百问》卷七）、沉乳感应丸（《医学入门》卷六）。

【组成】乳香 沉香 杏仁（炒） 木香 丁香各一钱 百草霜二钱半 肉豆蔻（煨）一个 巴豆七粒（去油如霜）

【用法】上为细末，熔黄蜡加酒些少和为丸，如绿豆大。每服三五丸，以姜汤送下。以通为度。

【主治】①《奇效良方》：冷积，癥积，痃积，食积，乳积，中脘不和，痞气郁结，或泻利呕哕，肚腹疼痛，伤食泄泻。②《医学入门》：一切积痛，盘肠虫痛。

07408 沉香天麻汤

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】沉香 川乌（炮，去皮） 益智各二钱 甘草一钱半（炙） 姜屑一钱半 独活四钱 羌活五钱 天麻 黑附子（炮，去皮） 半夏（泡） 防风各三钱 当归一钱半

【用法】上㕮咀。每服五钱，水二盏，加生姜三片，煎一盏，食前温服。

【主治】①《卫生宝鉴》：小儿惊痫。②《赤水玄珠》：小儿恐惧发搐，痰涎有声，目多白睛，项背强急，行步动作，神思如痴，脉沉弦而急。

【宜忌】忌生冷、硬物、寒处坐卧。

【方法选录】①《卫生宝鉴》：《素问·举痛论》云："恐则气下，精竭而上焦闭"，又曰："从下上者，引而去之"。以羌活、独活苦温，味之薄者，阴中之阳，引气上行，又入太阳之经为引用，故以为君；天麻、防风辛温以散之，当归、甘草辛甘温以补气血不足，又养胃气，故以为臣；黑附、川乌、益智大辛温，行阳退阴，又治客寒伤胃；肾主五液，入脾为涎，以生姜、半夏燥湿化痰；《十剂》云：重可去怯。以沉香辛温体重清气去怯安神，故

以为使，气味相合，升阳补胃，恐怯之气，自得而平矣。②《医林纂要》：附子、川乌、益智仁、当归、生姜以大补肝肾，滋养气血以祛其内寒；二活、防风、天麻以捍其外忤；半夏、沉香以通阴阳上下之气而顺之，僵蚕以理之；虚甚者，加人参可也。

【备考】 本方改为丸剂，名"沉香天麻丸"（见《医林纂要》）；方中姜屑，《玉机微义》作"僵蚕"。

07409 沉香开隔散

【方源】《直指》卷五。

【组成】 沉香 荆三棱 蓬莪术 白豆蔻仁 荜澄茄 缩砂仁 草果仁 益智仁 川白姜 丁香 人参 丁皮各半两 木香 白茯苓 香附（炒） 藿香叶 半夏曲 青皮 陈皮各一两 甘草（炒） 一两一分

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜五片，大枣二枚，煎至中盏，食前服。

【主治】 五膈五噎，痞满呕吐，心腹刺痛，胁肋胀拒。

07410 沉香不二丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 沉香 广木香 荜茇 枳壳 官桂 厚朴 桔梗 丁香 干姜各二分 陈皮 青皮 砂仁 豆蔻 草果 神曲各五分 巴豆四分（去油）

【用法】 上为末，老米饭为丸，如樱桃大。每服一丸，将大枣一枚（去核）入药，纸包煨过，细嚼，临卧以米饮送下。

【主治】 翻胃转食，膈气。

07411 沉香内消丸

【方源】《普济方》卷二四九引《德生堂方》。

【组成】 沉香 木香各半两 葫芦巴（酒浸） 小茴香（炒）各二两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐酒、盐汤任下。

【主治】 小肠疝气，阴囊肿大，或左右肾偏，结核疼痛难忍，下元虚冷，久而不愈者。

07412 沉香化气丹

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】 香附子一斤（炒，内四两生用） 黑牵牛（头末）八两 苍术（米泔浸，炒）四两 青皮（炒）五两 陈皮五两 山药二两 枳壳（麸炒） 二两 枳实（麸炒）二两 三棱（煨）二两 川厚朴（生姜汁炒）一两 白豆蔻（去壳） 一两 莪术（煨） 二两 紫苏（煨）二两 木香一两 沉香七钱半 丁香二两 丁皮二钱半 干姜一两 白茯苓（去皮） 一两 石菖蒲二两 砂仁 一两（杵） 良姜一一两 南星（炮）一两 半夏（炮）一两 人参五钱 草果（去壳）一两半 槟榔一一两 萝卜子（微炒） 一两 炒神曲二两 山楂（去子，炒）二两 官桂五钱

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，临卧以淡姜汤送下；膀胱疝气，空心以盐汤送下；如要大便通利，渐加至百丸。

【功用】 蠲积聚，化滞气，逐病原，疏风顺气，和胃健脾，消酒化食，宽中快膈，消磨痞块。

【主治】 脾胃不和，过食生冷、油腻、面粉、湿面，停滞不化，胸膈满闷，呕逆恶心，腹胁膨胀，心脾疼痛，憎寒壮热，或面上四肢浮肿，甚至脏腑闷涩，上气喘急，睡卧不安，俱是有因气所伤，寒气、咽气、膈气、滞气、湿气、痞气、癖气、气块，凡一切气病。

【宜忌】 孕妇勿服。

07413 沉香化滞丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】 沉香五钱 蓬术三两 香附 陈皮各二两 甘草 木香 砂仁 藿香 麦芽（炒） 神曲各一一两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如绿豆大。每服五十丸，空心以沸汤送下。

【功用】 消积滞，化痰饮，去恶气，解酒积。

【主治】 ①《扶寿精方》：中满呕哕恶心。②《奇方类编》：脾胃不和，过食生冷油腻，停滞不化，胸膈饱闷，腹腋疼痛，一切气块。

【备考】 甘草以下六味剂量原缺，据《回春》补。

07414 沉香化滞丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 沉香六钱 山楂肉 川锦纹各一两五钱 川朴 枳实 槟榔 条芩 陈皮 半夏曲 生晒术 广木香 杜藿香 春砂仁各一两二钱

【用法】 姜汁、竹沥为丸。每服二三钱，以淡姜盐汤送下。

【主治】 脾胃不和，过食生冷油腻，停滞不化，胸膈饱闷，胁腹疼痛，一切气痰痞积。

07415 沉香化痰丸

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】 半夏曲八两（用生姜汁一小杯、竹沥一大盏制） 黄连二两（姜汁炒） 木香一两 沉香一两

【用法】 上为细末，甘草汤为丸。每服二钱，空

心以淡姜汤送下。

【功用】《医略六书》：调和气化，除湿热。

【主治】胸中痰热，积年痰火，无血者。

【方论选录】《医略六书》：湿热内滞，不能运化，而津液不行，故生痰为患。黄连清热燥湿；半夏燥湿化痰；木香调气化，醒脾胃；沉香顺气机，降逆气；甘草汤丸，以缓中；淡盐汤送以润下。使滞行气化，则湿热自消，何有热遇生痰之患。

07416 沉香匀气散

【方源】《活人心统》卷下。

【异名】沉香均气散(《医统》卷二十四)。

【组成】砂仁（炒） 沉香（另研）二钱五分 陈皮五钱 苏叶三钱

【用法】上为末。每服一茶匙或二钱，食远以生姜汤加盐少许调下；或以米汤送下。

【主治】呕吐日久，服药不效，神倦少食，或间断而呕吐。

07417 沉香四磨汤

【方源】《观聚方要补》卷三引《家宝》。

【异名】四磨汤(《得效》卷六)。

【组成】沉香 木香 槟榔 乌药

【用法】浓磨水煎服。

【主治】冷气攻冲，心腹疞痛。

07418 沉香永寿丸

【方源】《普济方》卷二一九引《德生堂方》。

【组成】莲肉一斤（先用酒浸一日后，装入雄猪肚内，缝合，将浸莲肉酒添水煮；猪肚大一个，小二个。取出晒干，肚不用） 茅山苍术一斤（分作四份，一份酒浸，一份泔浸，一份盐水浸，一份醋浸；春秋五日，夏三日，冬七日） 白茯苓四两 沉香 木香 熟地黄各一两 五味子 小茴香 川楝子（炮） 西枸杞子 山药 柏子仁 破故纸（用芝麻同纸一处炒香，去芝麻）各二两（以上同研细末）

【用法】上加青盐半两，同为末，酒为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至七十丸，空心温酒或盐汤送下，以干物压之。

【功用】大补元阳，滋益脾胃，调顺血气，添补精髓。

【临证举例】养生益寿 大梁郭文乡尚书常服此药，年至八十，精力倍加。得其方者，服之俱效。

07419 沉香圣饼子

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】沉香 檀香各一钱 丁香二钱 木香三钱 桂花 缩砂仁 槟榔各半两 吴白芷各一两半 甘松七钱半（水洗净） 京三棱（炮） 蓬莪术（炮）各一两 甘草四两（用糖缠，焙干）

【用法】上为细末，酥油饼为丸，如梧桐子大，捻作饼子。每服五七饼至十饼，细嚼白汤送下，不拘时候。

【主治】一切冷气上攻，心腹胁肋胀满刺痛，胸膈噎闷，痰逆恶心，嗳气吞酸，不思饮食，胃中虚冷，呕吐不止，及五膈五噎，宿食宿饮不散。

07420 沉香百补丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】熟地六两 菟丝子四两 杜仲（炒）三两 知母（炒）二两 黄柏二两（酒炒） 人参二两 山药 当归 苁蓉各三两 沉香一两

【用法】上为末，酒糊为丸。

【功用】①《丹溪心法》：补损。②《东医宝鉴·杂病篇》：补血气，滋阴。

【主治】《东医宝鉴·杂病篇》：虚劳。

07421 沉香交泰丸

【方源】《医学发明》卷四。

【组成】沉香 白术 陈皮（去白）各三钱 枳实（麸炒，去瓤） 吴茱萸（汤洗） 白茯苓（去皮） 泽泻 当归（洗） 木香 青皮（去白）各二钱 大黄（酒浸）一两 厚朴（姜制）半两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸至七八十丸，食前以温白汤送下。微利即止。

【功用】①《杏苑》：升清气，利浊气。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：化痞消食，开郁止痛。

【主治】气机郁滞，食积内停，腹中胀满，膈下痞闷，大便燥结。

①《医学发明》：浊气在上，而扰清阳之气，郁而不伸，以为膜胀。②《医学纲目》：胀，大便燥结，脉沉之洪缓，浮之弦者。③《全国中药成药处方集》（沈阳方）：膈下痞闷，胃中积滞，呕吐腹痛，停食停水。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：孕妇忌服。

【方论选录】《杏苑》：用沉香升清气、降浊气；木香、厚朴、枳实、橘红、青皮、吴茱萸等散壅滞以疏胀满；白术健脾燥湿；用茯苓、泽泻分利水气；大黄以下湿热；当归理气血，使各归其所。

07422 沉香快气丸

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】京三棱（泡去皮） 蓬术（煨） 白茯苓

青皮（去白） 砂仁 苍术（米泔水浸，炒） 益智（去皮） 白术 神曲 黑牵牛（头末） 商陆（白的） 大麦芽 连翘 藿香叶 草果（去皮）各四钱 丁香 肉桂 僵蚕各二钱 沉香 大腹皮各二钱 雄附子五钱（看病冷热，热者不用）

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十或四十丸。

【主治】 ①《摄生众妙方》：十种臌症。②《外科百效》：气蛊腹胀胸肿及单蛊胀。

【宜忌】 忌房事、辛辣、油腻、湿热之物，避暑湿，并忌盐酱油醋。

07423 沉香陈曲丸

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】 沉香半两 陈曲（微炒） 木香 槟榔（锉） 半夏（汤洗七遍，焙） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 人参 白豆蔻（去皮） 麦芽（微炒）各一两 诃黎勒皮 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 白术各二两 丁香 荜澄茄各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前以米饮送下。

【主治】 脾胃气虚，食少无力。

07424 沉香附子丸

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】 沉香 附子 官桂 当归 川芎 五灵脂 木香

【用法】 上为细末，醋糊为丸。每服三十丸，食前以米饮送下。

【主治】 妇人腰下冷气块，并月水不通。

07425 沉香定痛丸

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【异名】 沉香化滞定痛丸（《回春》卷五）。

【组成】 沉香二钱 乳香二钱 没药 大黄（炒）各五钱 元胡索（酒炒） 莪术各三钱 瓦楞子一个（煅红，酒淬）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如绿豆大。每服九丸，壮实者十一丸，以白滚汤送下，行二次，米饮补之即安。

【主治】 胃脘痛，胸中满闷，停痰积块，滞气壅塞，不拘远年近日。

07426 沉香降气丸

【方源】《瑞竹堂方》卷一。

【组成】 沉香（镑） 木香 荜澄茄 枳壳（去瓤） 缩砂仁 白豆蔻仁 青皮（去白） 陈皮（去白） 广术（炮） 枳实（麸炒） 黄连（去须） 半夏（生姜制） 萝卜子（另研）各半两 白茯苓（去皮）一两 香附子二两（炒去皮毛） 白术一两（煨） 乌药一两半

【用法】 上为细末，生姜自然汁浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，临卧煎橘皮汤送下，姜汤亦可，一日一次。

【功用】 升降水火，调顺阴阳，和中益气，推陈致新，进美饮食。

【主治】 胸膈痞满。

【宜忌】 忌生冷。

07427 沉香降气丹

【方源】《古今医鉴》卷五引李大尹方。

【组成】 黑牵牛（取头末）三两 大黄一两（酒蒸） 槟榔一两 当归一两（酒浸） 良姜二钱 苍术一两 青皮（炒）一两 陈皮五钱 乌药一两 砂仁五钱 枳壳（麸炒）一两 枳实（麸炒）五钱 香附一两（炒） 沉香三钱 三棱三钱（火煨） 半夏（制）五钱 木香三钱 莪术三钱（火煨） 黄连一两（姜汁炒） 黄芩一两（酒炒）

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，淡姜汤送下。

【主治】 翻胃，腹中有积块。

07428 沉香降气汤

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【异名】 沉香降气散（《准绳·类方》卷二引《说约》）。

【组成】 香附子（炒，去毛）四百两 沉香十八两半 缩砂仁四十八两 甘草一百二十两（煨）

【用法】 上为细末。每服一钱，加盐少许，凌旦雾露，空心沸汤点服。

【功用】 ①《局方》（绍兴续添方）：开胃消痰，散壅思食。②《丸散膏丹集成》：通顺气血。

【主治】 肝气郁结，脾失健运，胸脘痞闷，心腹胀满，恶心呕吐，食欲不振；妇女月经不调，少腹胀痛。

①《局方》（绍兴续添方）：阴阳壅滞，气不升降，胸膈痞塞，心腹胀满，喘促短气，干哕烦满，咳嗽痰涎，口中无味，嗜卧减食；及胃痹留饮，噎醋闻酸，胁下支结，常觉妨闷；及中寒咳逆，脾湿洞泄，两胁虚鸣，脐下撮痛；及脚气，毒气上冲，心腹坚满，肢体浮肿。②《普济方》：小儿因乳母忧闷愁思虑，或有忿怒之气乳儿，随气而上，不能剋化而致气奶呕吐。③《医略六书》：气逆眩晕，脉沉涩者。④《丸散膏丹集成》：妇人经水不调，小腹刺痛。

【方论选录】《医略六书》：气逆于中，肝气不

降，此眩晕之发于气逆焉，郁怒人多此。沉香降气以疏逆，香附调气以解郁，砂仁理气醒脾胃，甘草缓中和脾胃也，为散沸汤下，使逆气降而肝气平，则脾胃调而运化如常，何气逆眩晕之不已哉。

【备考】 本方改为丸剂，名"沉香降气丸"（见《丸散膏丹集成》）。

07429 沉香降气散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 沉香（细锉）三钱 砂仁七钱 甘草（炙）五钱 香附（盐水炒）五钱 元胡索（酒炒）一两 川楝子（煨，去肉净）一两

【用法】 上为末。每服二钱，淡姜汤调下。

【主治】 气滞心痛。

07430 沉香降气散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】 沉香 木香 柴胡 白芍 细辛 青皮 陈皮 苏子

【主治】 怒气伤肝头痛。

07431 沉香养气丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】 沉香二钱 木香半两 香附子四两 姜黄二两 甘草一两半 甘松一分

【用法】 上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五七丸，空心以米饮送下。

【功用】 和气调中，美进饮食。

【主治】 脾胃不和，膈脘痞闷，嗜酸吞酸，口苦无味，食入迟化，心腹胀痛，中酒呕吐，停滞不消。

07432 沉香养脾汤

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】 肉豆蔻（面裹，煨） 厚朴（去粗皮，姜制，炙） 甘草（炙） 沉香各一两（不见火） 人参（去芦） 黄耆（蜜炙）各二两 诃子（煨，去核） 橘皮（去瓤） 木香（炮）各三分 白术三两（炙，炒） 白茯苓一两半（去皮）

【用法】 上㕮咀。每服二钱半，水一盏，加生姜二片，大枣一枚，煎至半盏，食前温服。

【主治】 脾胃久虚，肌体羸弱，心腹胀闷，饮食迟化，口苦咽干，喜饮汤水，黄瘦自汗，潮热多惊。

07433 沉香桂附丸

【方源】《医学发明》卷六。

【组成】 沉香 附子（炮，去皮脐） 干姜（炮） 良姜（锉，炒） 官桂（去皮） 茴香（炒） 川乌头（炮，去皮脐，锉作小块子如豆大，再炒令黄用） 吴茱萸（汤浸，洗去苦，炒）各一两

【用法】 上为细末，用好醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空腹、食前以熟米饮送下，每日二次。

【功用】 ①《卫生宝鉴》：退阴助阳，除脏腑冷气。②《医略六书》：回阳逐邪。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：中气虚弱，脾胃虚寒，饮食不美，气不调和，脏腑积冷，心腹疼痛，胁肋膨胀，腹中雷鸣，面色不泽，手足厥冷，便利无度；及下焦阳虚，七疝痛引小腹不可忍，腰屈不能伸，喜热熨稍缓。②《普济方》：中寒心腹冷痛，霍乱转筋。

【宜忌】 忌生冷硬物。

【方论选录】《医略六书》：附子补火回阳以御邪，肉桂温经暖血以散邪，川乌逐在里之邪，泽泻泻逆上之邪，良姜暖胃散寒滞，吴茱萸肝降逆气，沉香导厥气之上逆，小茴温气化以下达也。醋丸盐汤下，使真火内充，则厥气下潜而客邪解散，疝气自消，安有急痛欲死之患，手足逆冷之虑乎。

【备考】《医略六书》有泽泻，无干姜。

07434 沉香鹿茸丸

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】 沉香一两 附子（炮，去皮脐）四两 巴戟（去心）二两 鹿茸（燎去毛，酒浸，炙）三两 熟干地黄（净洗，酒酒，蒸，焙）六两

【用法】 上为细末，加麝香一钱半，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心以好酒或盐汤吞下。

【功用】 ①《局方》（续添诸局经验秘方）：养真气，益精髓，明视听，悦色驻颜。②《普济方》：镇心肾，养肝，益五脏，调顺三焦。

【主治】 真气不足，下元冷惫，脐腹绞痛，胁肋虚胀，脚膝缓弱，腰背拘急，肢体倦怠，面无精光，唇口干燥，目暗耳鸣，心惊气短，夜多异梦，昼少精神，喜怒无时，悲忧不乐，虚烦盗汗，饮食无味，举动力乏，夜梦鬼交，遗泄失精，小便滑数，时有余沥，阴间湿痒，阳事不兴。

07435 沉香琥珀丸

【方源】《女科指掌》卷一。

【组成】 沉香 牙皂 琥珀各等分。

【用法】 上为末，饭为丸，益元散为衣。每服二钱，以温酒送下。

【主治】 妇人脬转，脐下急痛，烦闷汗出，气逆奔迫，内外壅塞，胀满不通者。

【备考】 本方治上症，需配合外用小麦秆煎汤熏

洗。

07436 沉香温胃丸

【方源】《内外伤辨》卷中。

【组成】附子（炮，去皮脐） 巴戟（酒浸，去心） 干姜（炮） 茴香（炮）各一两 官桂七钱 沉香 甘草（炙） 当归 吴茱萸（洗，炒去苦） 人参 白术 白芍药 白茯苓（去皮） 良姜 木香各五钱 丁香三钱

【用法】上为细末，用好醋打面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心、食前以热米饮送下，一日三次。

【主治】中焦气弱，脾胃受寒，饮食不美，气不调和，脏腑积冷，心腹疼痛，大便滑泄，腹中雷鸣，霍乱吐泻，手足厥逆，便利无度，及下焦阳虚，脐腹冷痛；及伤寒阴湿，形气沉困，自汗。

【宜忌】忌一切生冷物。

07437 沉香温胃丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】沉香（锉） 陈皮（去白） 青皮（去白） 人参（去芦头） 大麦芽（炒） 干姜（炮） 神曲（炒） 白茯苓（去皮） 桂（去粗皮） 甘草（炙）各一两 拣丁香 木香 白豆蔻仁 高良姜（锉） 丁香皮（切） 荜茇 缩砂仁 红豆各半两 白术（锉，炒）二两 大椒二钱半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作十丸。每服一丸，食前细嚼，生姜汤送下。

【功用】益脾胃，大进饮食，温中消痞，宽膈顺气。

【主治】脾胃虚弱，三焦痞塞，中脘气滞，胸膈满闷，宿寒留饮，停积不消，心腹刺痛，胁肋膨胀，呕吐痰逆，噫气吞酸，肠鸣泄利，水谷不化，肢体倦怠，不思饮食。

07438 沉香温脾汤

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】沉香 木香 丁香 附子（炮，去皮脐） 官桂 人参 缩砂 川姜（炮） 白豆蔻 甘草（炙） 白术各等分

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，加生姜五片，大枣一个，煎至七分，去滓，空心、食前热服；作粗末亦可。

【主治】脾胃虚冷，心腹疼痛，呕吐恶心，腹胁胀满，不思饮食，四肢倦怠，或泄泻吐利。

07439 沉香磁石丸

【方源】《医方类聚》卷一〇九引《济生》。

【组成】沉香半两（别研） 磁石（火煅，醋淬七次，细研，水飞） 葫芦巴（炒） 川巴戟（去心） 阳起石（火煅，研） 附子（炮，去皮脐） 椒红（炒） 山茱萸（取肉） 山药（炒）各一两 青盐（别研） 甘菊花（去枝梗） 蔓荆子各半两

【用法】上为细末，酒煮米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以盐汤送下。

【功用】《慈禧光绪医方选议》：温肾壮阳。

【主治】①《济生》：上盛下虚，头目眩晕，耳鸣耳聋。②《慈禧光绪医方选议》：阳虚肾弱，精冷囊湿，阳萎滑泄。

07440 沉香磨脾散

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】沉香一分 人参（去芦头）一分 丁香三分 藿香叶（去土）一两 檀香 甘草（炙） 白豆蔻仁 木香 缩砂仁 白术 肉桂（去粗皮） 乌药各半两

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，盐一捻，煎至八分，乘热服，沸汤调下亦得，不拘时候。

【主治】脾胃虚寒，心腹胀满，呕逆恶心，泄利腹痛。

07441 沉桂芦巴丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】川楝 芦巴各八两 沉香 肉桂 附子 吴萸（滚汤泡，浸七日，逐日换水） 巴戟各二两 茴香四两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心以温酒送下。

【主治】奔豚，疝气偏坠肿硬，攻疼冷木。

07442 沉麝香茸丸

【方源】《瑞竹堂方》卷一。

【组成】沉香二钱 麝香一钱 南木香 乳香各三钱 八角茴香四钱（炒） 小茴香四钱（炒） 鹿茸（酥炙） 莲肉（炒）各半两 晚蚕砂 肉苁蓉 菟丝子 牛膝 川楝子（酒浸）各半两 地龙（去土净）半两 陈皮半两（去白） 仙灵脾三钱（酥炙）

【用法】上为细末，酒糊加麝香为丸，如梧桐子大。每服三十丸，每朝不见红日，面东用温酒送下。

【主治】五痨百损，诸虚精怯，元气不固。

【宜忌】忌食羊肉、豆粉之物。

07443 沉香苁蓉煎丸

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】沉香（锉） 五味子（微炒） 鸡头实

（和皮用） 桑螵蛸（炒） 金樱子 熏草（去根，用茎、叶） 鹿茸（去毛，酥炙） 菟丝子（酒浸三日，别捣） 附子（炮裂，去皮脐，锉，以青盐、黑豆同煮透，焙干，去盐、豆） 牛膝（酒浸，切，焙）各一两 肉苁蓉（酒浸，切，焙，别捣末）八两

【用法】 上一十一味，捣罗十味为末，先将肉苁蓉末以好酒一升，慢火熬成煎，和前药为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前以生姜盐汤送下；温酒亦得。

【功用】 固真气。

【主治】 脐腹疼痛，脏腑不调，小便滑数。

07444 沈氏止涎汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】 川连四分 黄柏八分 茯苓 茯神各一钱半 白术 苍术 半夏各一钱 姜炒陈皮五分

【用法】 加竹沥、姜汁各三匙，水煎服。

【主治】 土病伤母，心热涎流不已，脉洪大，甚兼喜笑，舌痛。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典》引作"止涎汤"。

07445 沈氏止衄丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 香附二两 川芎一两 黑山栀 黄芩各五钱

【用法】 上为末。每服二钱，以开水调下。

【主治】 火热上升而衄极甚，或不止者。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典·补遗》引作"止衄丹"。

07446 沈氏中暑汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十二。

【组成】 川连六分（吴萸五粒泡水一二匙拌） 知母一钱（干姜一分泡水一二匙拌） 远志一钱（石菖蒲汁四五匙拌） 川贝母二钱（熟艾半分泡水一二匙拌） 枳实（磨汁） 八分 羚羊角一钱 瓜蒌仁三钱 麦冬二钱 西瓜翠衣五钱

【主治】 暑邪直中心肝二经，不头疼，不发热，时烦躁，舌短，手足牵搐者。

07447 沈氏双砂丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】 针砂四两（炒红，醋淬至白色） 砂仁一两（生，研） 香附（便浸，炒）五钱 皂矾（白馒头包，煅红）一两 广木香（生，研）一两 大麦粉三升

【用法】 胡桃肉四两生捣如泥，同黑枣一斤煮烂（去皮核）为丸。每服一钱半，脱力劳伤，以陈酒送下；一切黄病，以米饮送下。每病不过服四两，多至六两，无不愈。

【主治】 脱力黄及一切黄

07448 沈氏血癥丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【异名】 血癥丸（《类证治裁》卷三）。

【组成】 五灵脂 大黄 甘草梢 桃仁泥各五钱 生地七钱 牛膝四钱 官桂二钱 玄胡索 归身各六钱 三棱 蓬术 赤芍 川芎各三钱 琥珀 乳香 没药各一钱

【用法】 酒糊为丸。每服一钱，壮盛人一钱半。消过半即止，再随病体立方服药。

【主治】 脏腑虚弱，寒热失节，或风冷内停，饮食不化，周身运行之血气适与相值，结而生块；或因跌仆，或因闪挫，气凝而血亦随结，经络壅瘀，血不散成块，而致血癥，心腹胠胁间苦痛，渐至羸瘦，妨于饮食。

07449 沈氏固胞汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】 酒炒桑螵蛸二钱 酒黄耆五钱 炒菟子 萸肉各三钱 酒炒全当归 茯神 芡蔚子各二钱 生白芍一钱半 升麻二钱

【用法】 羊小肚子一个洗净，煎汤代水煎药。

【主治】 产后脬损，小便不禁。

【备考】 本方方名，《类证治裁》引作"固脬汤"。

07450 沈氏阖泉丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】 益智仁 茯苓 白术 白薇 黑山栀 白芍

【主治】 实热或寒而致小儿睡中遗尿。

【加减】 夹寒，去山栀，加萸肉、巴戟、干姜。

07451 沈氏荷叶汤

【方源】《杂病源流犀烛》（上海科技本）卷二十五。

【异名】 解雷汤（《类证治裁》卷五）。

【组成】 落帚子三钱 升麻 川芎 制茅术各一钱

【用法】 先将鲜荷叶一张折迭，不得扯碎，水二碗半，煎至二碗，再入药，加生姜三片，煎七分服。

【主治】 雷头风，三阳头痛而成核块，头面肿痛，憎寒壮热，状如伤寒。

【备考】 本方方名，原书崇文书局本引作"沈氏

解雷汤”。

07452 沈氏棉子丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】棉子八两 升麻 炮姜各四钱 白术一两 半夏八钱

【用法】砂糖炒烊为丸。每服二钱，空心米汤送下。服至半月许，当有寒积如稀痰一般随大便下，以下尽为度，即勿服，再服健脾暖腹之剂。

【主治】感伤寒冷成寒积，腹中疼痛，必以手重按或将物顶住稍可，口吐清水。

07453 沈氏温脐丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】补骨脂五钱 巴戟 白术 杜仲 乌药 故仁各一两 菟丝子一两半 苍术 小茴 青盐各四钱

【用法】神曲糊丸。空心米汤送下。

【主治】脐湿。

【临证举例】脐湿 余尝治一少年，数日必患腹痛，痛连少腹，脐中常湿，甚则黄水流出。诊其脉，两尺皆虚，右关濡而且沉。知其有伤肾元，又为脾湿所遏故。因制方沈氏填脐散填脐中，内服本方，数月痊愈。

07454 状元丸

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】石菖蒲（去毛，一寸九节者佳）地骨皮（去木） 白茯神（去皮木） 远志肉（甘草水泡，去心）各一两 人参（去芦）三钱 巴戟天（去骨）五钱

【用法】上为末，用白茯苓（去皮）二两、粘米二两共打粉，外用石菖蒲三钱打碎煎浓汤，去滓，煮糊为丸。每服三五十丸，食后、午时、卧时服。

【功用】开心通窍，定智宁神。

【主治】健忘。

07455 羌乌散

【方源】方出《丹溪心法》卷四，名见《准绳·类方》卷四。

【组成】川乌 草乌（二味童便浸，炒去毒）细辛 羌活 黄芩 甘草各等分 （一方有南星）

【用法】上为细末。茶清调服。

【主治】风热与痰致眉眶痛。

07456 羌吴汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】黄芩 黄柏各二钱 苍术一钱 羌活 麻黄 吴萸各四分 藁本 升麻 黄耆各二分 当归 川芎 蔓荆子 细辛 黄连 半夏 红花各一分

【用法】水煎，温服。

【主治】厥阴头顶项痛，或痰涎厥冷，脉浮而缓。

【备考】《证治宝鉴》无麻黄，有半夏。

07457 羌附汤

【方源】《济生》卷三。

【异名】羌活汤（《普济方》卷八十八引《仁存方》）。

【组成】羌活（去芦） 附子（炮，去皮脐） 白术 甘草（炙）各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风湿相搏，身体疼烦，掣痛不可屈伸，或身微肿不仁。

07458 羌活丸

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】羌活一两 天麻一两 附子一两半（炮裂，去皮脐） 麻黄一两（去根节） 蝼蛄三分（微炒） 桂心一两 乌蛇二两（酒浸，炙令黄，去皮骨）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】风痹，荣卫不行，四肢疼痛。

07459 羌活丸

【方源】《养老奉亲》。

【组成】羌活 牛膝（酒浴过，焙干） 川楝子 白附子 舶上茴香 黄耆（去皮，锉） 青盐 巴戟（去心） 黑附子（炮裂，去皮脐） 沙苑白蒺藜各等分

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心临卧盐汤送下。

【功用】补壮筋骨。

【主治】老人风走注疼痛，并风气上攻下疰。

07460 羌活丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】羌活（去芦头，米泔浸一宿，切，焙）二两半 白蒺藜子（炒，去角） 芎藭 干鸡苏各二两 白僵蚕（去头嘴，炒）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，荆芥茶嚼下，不拘时候；入龙脑、麝香尤佳。

【主治】脑风。气鼓或膈痰气逆，上冲于头，令头眩晕。

07461 羌活丸

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】羌活（去芦头） 槟榔（锉） 木香 桂（去粗皮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各一两 大黄（煨熟）二两 牵牛子半斤（捣取粉四两）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，渐加至三十丸，生姜、紫苏汤送下。

【主治】风气大肠秘涩。

07462 羌活汤

【方源】《圣济总录》卷七。

【异名】羌活人参汤（《普济方》卷九十二）。

【组成】羌活（去芦头）二两半 人参二两 附子（炮裂，去皮脐）一枚 甘草（炙）二两 桂（去粗皮）一两 独活（去芦头）三分 菖蒲（切）半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏，入荆沥、竹沥、地黄汁共半盏，同煎至一盏，去滓温服，空心、日午、夜卧各一服。

【主治】中风失音不语。

07463 羌活汤

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】羌活（去芦头） 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙）各一两 防风（去叉）三分 木香 槟榔（锉） 附子（炮裂，去皮脐） 白术 乌头（炮裂，去皮脐） 草豆蔻（和皮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 牛膝（酒浸一宿，切，焙） 当归（酒浸一宿，切，焙） 杏仁（去皮尖双仁，生用） 人参 白茯苓 甘草 芎藭 桂（去粗皮）各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服一两，水三盏，加生姜七片，煎至一盏，去滓，取七分，温服。服讫衣覆取汗。

【主治】偏风瘫痪，脚气。

【加减】大肠不通，加大黄末一钱，久不通者，加至三五钱；小肠不通，心腹胀，加葶苈、滑石末各一钱，滑石汤调下；上膈壅滞，咳嗽气急，加半夏、升麻、天门冬、知母末各二钱。

07464 羌活汤

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【异名】羌活饮。

【组成】羌活（去芦头） 桂（去粗皮）各一两 附子（炮裂，去皮脐） 当归（切，焙） 防风（去叉） 牛膝（酒浸，切，焙）各三分

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风湿腰痛；肾伤腰脚疼痛；腰脚痹痛，行步艰难。

07465 羌活汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】大羌活汤（《医学正传》卷六）、羌麻汤（《医学入门》卷八）、羌活石膏汤（《杏苑》卷八）。

【组成】羌活 菊花 麻黄 川芎 石膏 防风 前胡 黄芩 细辛 甘草 枳壳 白茯苓 蔓荆子 各一两 薄荷半两 吴白芷半两

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏半，加生姜五片，同煎至一盏，去滓稍热服，不拘时候，每日二次。

【主治】破伤风，半在表半在里。

【宜忌】《准绳·疡科》：邪入于里，不宜用。

07466 羌活汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】羌活 独活 防风 地榆各一两

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】破伤风，服左龙丸利后，及搐搦不已。

【加减】有热，加黄芩；有涎，加半夏。

【备考】本方方名，《医学正传》引作“小羌活汤”。

07467 羌活汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】炙甘草七分 泽泻三钱 酒洗瓜蒌根 白茯苓 酒黄柏各五钱 柴胡七钱 防风 细黄芩（酒洗） 酒黄连 羌活各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二中盏，煎至一盏，取清，食后、临卧通口热服之。

【主治】①《兰室秘藏》：风热壅盛上攻，头目昏眩。②《证治宝鉴》：眩晕，面浮而挟湿热者。

07468 羌活汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】羌活 苍术（米泔浸） 黄芩（酒炒） 当归 芍药（炒） 茯苓（去皮） 半夏（姜汁炒） 香附各一钱半 木香（另研） 陈皮各七分 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎服。

【功用】活血疏风，消痰去湿。

【主治】痛风症，遍身骨节走注疼痛。

【加减】风痛，加防风；湿痛，加苍术；热痰痛，倍酒芩、瓜蒌、枳实、竹沥；血虚痛，加生地黄；上痛，加白芷、威灵仙；下痛，加黄柏、牛膝；痛甚，加乳香；发热，加柴胡；小水短涩，加木通；手臂痛，加薄桂。

【宜忌】 不可食肉，戒油炒、热物、鱼、面。

07469 羌活汤

【方源】《续名家方选》。

【组成】 羌活 前胡 人参 桔梗 甘草 枳壳 川芎 天麻 茯苓 薄荷 蝉退 白术 生姜各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 瘾疹常发不止者。

07470 羌活散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 羌活一两 牛膝一两（去苗） 桂心三分 附子二两（炮裂，去皮脐） 草薢三分（锉） 海桐皮三分（锉） 防风半两（去芦头） 五加皮一两 当归一两（锉，微炒）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，入酒二合，更煎三两沸，去滓，食前温服。

【主治】 肾脏风毒流注，腰脚疼痛。

07471 羌活散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】 羌活一两 汉防已一两 荆芥一握 薏苡仁二两 防风一两（去芦头） 麻黄一两半（去根节） 酸枣仁一两 黄松节一两 附子一两半（炮裂，去皮脐） 芎藭一两 天麻一两半 道人头一两

【用法】 上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 风痹，手脚不仁。

07472 羌活散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】 羌活一两 天麻半两 胡麻子半两 细辛半两 麻黄三分（去根节） 藿香半两 附子一两（炮裂，去皮脐） 牛膝半两（去苗） 白鲜皮半两 芎藭半两 天南星半两 蝉壳半两 旋覆花一两 白附子半两（炮裂） 地龙半两（微炒） 乌蛇肉一两（酒浸，炙令黄） 晚蚕蛾半两（微炒） 干蝎一分（微炒） 麝香一分（细研） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为细散。每服二钱，以薄荷温酒调下，不拘时候。

【主治】 瘫痪风，手足垂弛，头痛目眩，涎唾不止。

07473 羌活散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【异名】 羌活汤（《医方类聚》卷二十一引《济生》）。

【组成】 羌活一两 侧子一两（炮裂，去皮脐） 秦艽一两（去苗） 桂心一两 木香一两 芎藭一两 当归一两 牛膝一两（去苗） 附子一两（炮裂，去皮脐） 骨碎补一两 桃仁三十枚（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】 上为粗散。每服二钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：白虎风，风毒攻注，骨髓疼痛，发作不定。②《得效》：因体虚饮酒当风，汗出入水，受风寒湿毒之气，凝滞筋脉，蕴于骨节而致白虎历节风，短气自汗，头眩欲吐，手指挛曲，身体魁羸，其肿如脱，其痛如掣，或在四肢，肉色不变，昼静夜剧，痛彻骨，如虎啮不可忍。

07474 羌活散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】 羌活 地骨皮 防风（去芦头） 酸枣仁 蔓荆子 杏仁（汤浸，去皮尖）各一两 生地黄三两

【用法】 上为散。每服半两，以水一大盏，酒一盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 睡中龃齿

07475 羌活散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】 羌活三分 防风半两（去芦头） 茵芋二分 五加皮三分 牛膝一两（去苗） 丹参半两 酸枣仁二分（微炒） 桂心三分 附子一两（炮裂，去皮脐） 赤芍药半两 当归半两（锉，微炒） 漏芦一两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】 腰脚冷痹，及风麻不仁，骨髓疼痛，不欲饮食，渐加瘦。

07476 羌活散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 羌活一两半 牛膝一两半（去苗） 当归一两半（锉，微炒） 防风一两半（去芦头） 赤芍药一两半 附子一两（炮裂，去皮脐） 五加皮一两 桂心一两 甘草一两（炙微赤，锉） 薏苡仁三两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇人风痹，手足不随，筋脉拘急，不能行动。

07477 羌活散

【方源】《局方》卷一。

【组成】 前胡（去芦） 羌活（去芦） 麻黄（去根节） 白茯苓（去皮） 川芎 黄芩 甘草（炙） 蔓荆子（去白皮） 枳壳（去瓤，麸炒） 细辛（去苗） 石膏（别研） 菊花（去梗） 防风（去芦） 各一两

【用法】 上为末。入石膏研匀。每服二钱，水一大盏，加生姜三四片，薄荷三两叶，同煎至七分，稍热服，不拘时候。

【主治】 ①《局方》：风气不调，头目昏眩，痰涎壅滞，遍身拘急，及风邪寒壅，头痛项强，鼻塞声重，肢节烦疼，天阴风雨，预觉不安。②《鸡峰》：伤寒头痛，体倦发寒热。

【备考】 本方改为丸剂，名“羌活丸”（见《御药院方》）。《鸡峰》有白僵蚕。

07478 羌活散

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】 羌活（去芦头） 甘草（炙） 石决明（生，研） 石膏（泥裹煅通赤，冷研） 密蒙花 苍术（去皮） 防风（去叉） 蒺藜子（炒去角） 木贼各半两 蓬蒿子 威灵仙（去土） 干桑叶 荆芥穗 原蚕沙（炒）各一分

【用法】 上为散。每服一钱匕，早、晚食后温熟水调下；眼赤涩，沙糖水调下，临卧再服。

【主治】 目昏茫茫，或见黑花蝇翅。

07479 羌活散

【方源】《本事》卷四引张昌时方。

【组成】 羌活（洗去土） 萝卜子各等分

【用法】 上药同炒香熟，去萝卜子不用，为末。每服二钱，温酒调下，一日一服，二日二服，三日三服。

【主治】 ①《本事》：水气。②《魏氏家藏方》：一切腹胀急。

【方论选录】《本事方释义》：羌活气味辛甘平，入足太阳，善能行水；萝卜子气味苦辛温，入足太阴、阳明，善能导滞；以酒送药，取其温通也。因水气盘踞，滞浊阻痹不行，故行水之药与行滞之药兼而行之，厥功大矣。

07480 羌活散

【方源】 方出《续本事》卷二，名见《普济方》卷四十六。

【组成】 羌活 僵蚕各一两 白蒺藜（去尖，炙） 一两 甘菊一两 白附子一两 朱砂一两 麝香一两

【用法】 上为细末。每服一钱，薄荷、茶、酒任下。

【功用】 清头目，去风邪，顺真气。

【主治】 头痛。

07481 羌活散

【方源】《三因》卷十六。

【异名】 羌青散（《医方类聚》卷七十六引《经验秘方》）。

【组成】 羌活 川芎 天麻 旋覆花 青皮 天南星（炮） 藁本各一两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，薄荷七叶，煎七分，食后服。一法入牵牛末二两，姜汁糊为丸，如梧桐子大，每服二三十丸，酒任下。

【主治】 ①《三因》：风毒气上攻，眼目昏涩，翳膜，生疮，及偏正头疼，目小黑花累累者。②《普济方》：内障及暴赤眼。

07482 羌活散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 细辛散。

【组成】 藁本 香白芷 桂枝各三分 苍术 升麻各五分 当归身六分 草豆蔻仁一钱 羌活一钱五分 羊胫骨灰二钱 麻黄（去根节） 防风各三钱 柴胡五钱 细辛少许

【用法】 上为细末。先用温水漱口净，擦之。

【主治】 各寒犯脑，风寒湿脑痛，项筋急，牙齿动摇，肉龈袒脱疼痛。

07483 羌活散

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】 柴胡四两 白芷 川芎 藁本各一两 桔梗 甘草 独活 羌活各半两

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏半，加葱白、生姜，煎七分，热服。

【主治】 四时伤寒，头疼鼻塞，或流清涕，项背拘急，恶风自汗。

07484 羌活散

【方源】《玉机微义》卷十五。

【异名】 羌活膏（《赤水玄珠》卷二十九）。

【组成】 羌活 独活 明矾 硫黄 狼毒 白鲜皮 白附子 蛇床子各一两 轻粉 黄丹各半两

【用法】 上为细末，香油调成膏。搽之。

【主治】 顽癣疥癞，风疮成片，流黄水，久不愈者。

07485 羌活散

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】 麻黄 羌活 半夏 前胡 枳实 桑白

皮 橘红 桔梗 苏叶 甘草

【用法】 加生姜、葱白，水煎服。

【主治】 肺风痰喘。

07486 羌活散

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 羌活 生白术 防风 炒白芍 黄芩各一两五钱 当归三两 白芷 川芎各一两 甘草六钱

【用法】 上为散。每服五钱，水煎，去滓温服。

【主治】 妊娠伤寒，侵表伤营，头痛发热，恶寒身痛，胎孕不安，脉浮紧涩者。

【方论选录】《医略六书》：羌活散太阳之邪，白芷散阳明之邪，白术健脾生血以安胎，当归养血荣经以养胎，防风通肌解表，白芍敛营和血，黄芩清热安胎，川芎活血行气，甘草缓中以和药也。为散水煎，使寒邪外解，则营气调和，而身疼头痛无不退，发热恶寒无不除，胎孕有不安者乎。

07487 羌活散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 羌活一两半（盐水炒） 人参一两半 远志一两半 茯苓一两半（去木） 大枣三枚

【用法】 上为散。每服三钱，竹沥六合，煎三沸，去滓温服。

【主治】 产后心气内虚，风乘虚袭，心气被扰，心神不宁，惊悸，脉浮虚者。

【方论选录】 羌活开经气以泄风邪，人参扶元气以雄心，茯神安神安志，远志通肾交心，大枣缓中以益脾也。为散竹沥煎，使心液内充，则心气雄壮，而风邪外解，心神宁静，何惊而且悸之不定哉。

07488 羌活散

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】 羌活 防风 川芎 薄荷 天麻 僵蚕（炒） 甘草（生） 川黄连 柴胡 前胡 枳壳（麸炒） 桔梗

【用法】 生姜为引，水煎服。

【功用】 散风清热。

【主治】 小儿风热而致急惊风，病不甚者。

07489 羌活膏

【方源】《幼幼新书》卷八引张涣方。

【组成】 羌活 独活各一两 天麻 全蝎 人参（去芦头） 白僵蚕（微炒）各半两 乌蛇肉一两（酒浸一宿，焙）

【用法】 上为细末，炼蜜为膏。每服一皂子大，麝香、荆芥汤化下。

【主治】 胎痫，昏闷不省。

07490 羌活膏

【方源】《幼幼新书》卷八引《张氏家传》。

【组成】 牛膝 羌活 蝎梢 防风 天麻 人参 干木瓜（老者） 当归 紫苏根（焙） 麝香各一分 白附子 朱砂各半钱

【用法】 上药除麝香外，细锉，酒浸一宿，来日慢火焙，捣为细末，入麝香令匀，沙糖和为膏。常服一皂子大；如筋急作搐，及疮子瘛疭，每服龙眼大，浓煎荆芥汤化下。先搐鼻，后下药，不嚏难治。

【功用】 宽筋定搐。

【主治】 小儿肝经壅，目直视，手足拳挛，伸舒立地不得。

07491 羌活膏

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】 羌活 防风 川芎 茯神（去木）各二钱 茯苓 白术 白附子（炮） 僵蚕（姜汁炒）各一钱 全蝎半钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服紫豆大，麦门冬、薄荷汤化下。

【功用】 定惊。

【主治】 小儿惊风。

07492 羌菊丸

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】 羌活（去芦头） 菊花（焙）各一两 白茯苓（去黑皮） 蒺藜子（炒，捣去角） 枳壳（去瓤，麸炒） 附子（炮裂，去皮脐） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 黄耆（锉）各三分 沉香（锉） 兔肝（炙） 草薢各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心食前薄荷盐汤送下。

【主治】 肾毒风攻冲，眼生黑花，风泪不止。

07493 羌防内托散

【方源】《麻疹备要方论》。

【组成】 羌活 防风 葛根 桔梗 楂肉 地骨皮 蝉退 僵蚕 连翘 甘草

【用法】 生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】 风寒外闭，麻疹欲出未出，热重无汗者。

07494 羌防四苓散

【方源】《顾松园医镜》卷八。

【组成】 羌活 独活 防风 白术 茯苓 猪苓 泽泻

【功用】 发表驱湿，健脾利水。

【主治】 太阳中湿，发热恶风，关节疼痛，小便不利，大便反快。

【加减】 兼热者，加芩、连、栀、柏、益元散之属。

07495 羌防行痹汤

【方源】《重订通俗伤寒论》引顾松园经验方。

【组成】 羌活 防风各一钱 秦艽 川断各二钱 威灵仙 全当归各二钱 明乳香 净没药 杜红花各五分

【用法】 用童桑枝、青松针各一两煎汤代水，煎服。

【功用】 活血祛风，宣通经隧。

【主治】 行痹，痛痹。

07496 羌活石膏散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 羌活 石膏 黄芩 藁本 蜜蒙花 木贼 白芷 萝卜子 细辛 麻仁 川芎 苍术 菊花 荆芥 甘草各等分

【用法】 上为末。每服二钱，蜜汤调服，一日三次；或加当归、枸杞、山栀、连翘、柴胡、薄荷、防风、天麻、桔梗各等分，为丸服。

【主治】 远年近日内外翳障，风热昏暗，拳毛倒睫，一切眼疾，及头风。

【方论选录】 羌活治热脑头风，石膏、黄芩洗心退热，藁本治偏头痛，蜜蒙花治羞明，木贼退翳障，白芷清头目，萝卜子、细辛起倒睫，麻仁起拳毛，川芎治头风，苍术开郁行气，菊花明目去风，荆芥治目中生疮，甘草和药。

07497 羌活冲和汤

【方源】《赤水玄珠》卷十八。

【组成】 羌活 白芷 黄芩 甘草各一钱半 防风 白术 生地各一钱半 川芎五分

【用法】 水二大钟煎之，去滓，后入炒陈壁土一匙，调服。

【主治】 太阳伤风，有汗脉浮缓。

【加减】 若一服汗仍未止，加黄耆一钱半，白芍一钱；仍未止，以小柴胡加桂枝、芍药各一钱。

07498 羌活导滞汤

【方源】《医学发明》卷八。

【异名】 羌活导痰汤（《寿世保元》卷五）、羌活导湿汤（《嵩崖尊生》卷十三）、羌活导气汤（《杂病源流犀烛》卷二十九）。

【组成】 羌活 独活各半两 大黄（酒煨）一两 防己 当归各三钱 枳实（麸炒）二钱

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服五钱或七钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服，以微利则已。

【主治】 ①《医学发明》：脚气初发，一身尽疼，或肢节肿痛，便溺阻隔。②《杂病源流犀烛》：痹厥。

07499 羌活防风汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 羌活 防风 川芎 藁本 当归 芍药 甘草各一两 地榆 华细辛各二两

【用法】 上㕮咀。每服五七钱，水一盏半，同煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】 破伤风，邪初传在表。

【加减】 热，加大黄三两；大便秘，加大黄一两。

07500 羌活防风散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】 羌活 防风 川芎 甘草 木贼 绿豆皮 荆芥各三钱 蝉蜕 谷精草 蛇蜕 鸡子壳（用内薄皮）各二钱

【用法】 上为极细末。每服一钱，食后茶清调下，一日三次。

【主治】 一切翳障。

07501 羌活苍术汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 苍术羌活汤（《普济方》卷二四〇）。

【组成】 炙甘草 黄柏 草豆蔻 生甘草 葛根各五分 橘皮六分 柴胡七分半 升麻 独活 缩砂仁 苍术各一钱 防风一钱五分 黄耆二钱 知母二钱五分 羌活三钱

【用法】 上㕮咀。分作二服，水二大盏，煎至一盏，去滓，空心服。

【主治】 脚膝无力沉重。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“羌活汤”。

07502 羌活连翘汤

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】 防风 羌活 连翘 夏枯草 柴胡 昆布（洗） 枳壳 黄芩（酒炒） 川芎 牛蒡子 甘草 金银花

【用法】 加薄荷，水煎服。

【主治】 瘰疬初发，寒热肿痛。

07503 羌活附子汤

【方源】《东垣试效方》卷五。

【异名】 羌附汤（《脉因证治》卷二）、羌活黑附汤（《医学入门》卷七）。

【组成】 麻黄三分（不去根节） 黑附子三分

羌活半钱　苍术半钱　防风二分　黄耆一钱　甘草升麻各二分　白芷　白僵蚕　黄柏各三分

【用法】 上作一服。水二盏，煎至一盏，食后去滓温服。

【主治】 冬月大寒犯脑所致脑风，令人脑痛齿亦痛。

07504　羌活附子汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 羌活一钱　附子　干姜各五分　炙甘草八分

【用法】 水煎服。

【主治】 客寒犯脑，脑痛连齿，手足厥冷，口鼻气冷。

07505　羌活胜风汤

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】 羌活胜湿汤(《张氏医通》卷十五)。

【组成】 白术五分　枳壳　羌活　川芎　白芷　独活　防风　前胡　桔梗　薄荷各四分　荆芥　甘草各三分　柴胡七分　黄芩五分

【用法】 作一服。水二盏，煎至一盏，去滓热服。

【主治】 ①《原机启微》：风热不制而风胜，眵多眊矇，紧涩羞明，赤脉贯睛，头痛鼻塞，肿胀涕泪，脑巅沉重，眉骨痠疼，外翳如云雾、丝缕、秤尾、螺盖；伤寒愈后之病。②《审视瑶函》：暴风客热风胜目痛。

【加减】 生翳者，随翳所见经络加药：翳自内眦而出者，加蔓荆子、苍术；自锐眦而入，客主人斜下者，加龙胆草、藁本，少加人参；自目系而下者，倍柴胡，加黄连；自抵过而上者，加木通、五味子。

【方论选录】 夫窍不利者，皆脾胃不足之证。故以白术、枳壳调治胃气为君；羌活、川芎、白芷、独活、防风、前胡诸治风药，皆主升发为臣；桔梗除寒热，薄荷、荆芥清利上焦，甘草和百药为佐；柴胡解热，行少阳厥阴之经，黄芩疗上热，主目中赤肿为使。热服者，热性炎上，令在上散，不令流下也。

07506　羌活胜湿汤

【方源】《内外伤辨》卷中。

【异名】 通气防风汤(《医学发明》卷五)、通气防风散(《普济方》卷九十七)、胜湿汤(《医级》卷七)。

【组成】 羌活　独活各一钱　藁本　防风　甘草(炙)　川芎各五分　蔓荆子三分

【用法】 上㕮咀，都作一服。水二盏，煎至一盏，空心食前去滓大温服。

【主治】 外伤于湿，郁于太阳，肩背痛，脊痛项强，或一身尽痛，或身重不能转侧，脉浮；邪在少阳、厥阴，卧而多惊。

①《内外伤辨》：手太阳气郁而不行，肩背痛，不可回顾者；足太阳经不通行，脊痛项强，腰似折，项似拔。②《医方考》：外伤于湿，一身尽痛者。③《医宗必读》：邪在少阳、厥阴，卧而多惊。④《金匮翼》：风湿在表，脉浮身重，不能转侧，自汗，或额上多汗。

【加减】 如经中有寒湿，身重腰沉沉然，加酒洗汉防己五分，轻者附子五分，重者川乌五分。

【方论选录】 ①《医方考》：《经》曰：风胜湿。故用羌、防、藁、独、芎、蔓诸风药以治之，以风药而治湿，如卑湿之地，风行其上，不终日而湿去矣；又曰无窍不入，惟风为能。故凡关节之病，非风药不可。用甘草者，以风药悍燥，用以调之，此之谓有制之兵也。②《医方集解》：此足太阳药也。《经》曰：风能胜湿。如物之湿，风吹则干。羌、独、防、藁、芎、蔓皆风药也，湿气在表，六者辛温升散，又皆解表之药，使湿从汗出，则诸邪散矣。藁本专治太阳寒湿；荆、防善散太阳风湿；二活祛风胜湿，兼通关节；川芎能升厥阴清气，上治头痛；甘草助诸药辛甘发散为阳，气味甘平，发中有补也。

07507　羌活胜湿汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】 羌活　防风　苍术　黄柏　泽泻　茯苓　广皮　甘草

【功用】 表里分消，散风胜湿。

【主治】 风湿相持，身体疼痛，不能转侧；风湿相搏，身肿身痛，小便不利。

【加减】 风湿兼寒，去黄柏，加桂枝。

07508　羌活胜湿汤

【方源】《一盘珠》卷一。

【组成】 羌活　独活　防风　川芎　苍术　甘草

【用法】 生姜为引，水煎服。

【主治】 风湿上冲，头重如裹，似有物蒙之。

07509　羌活退翳丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 滋阴地黄丸(《医学纲目》卷十三)、地黄丸(《普济方》卷七十九)、柴胡退翳丸(《银海精微》卷下)。

【组成】 黑附子(炮)　寒水石各一钱　酒防己

二钱 知母（酒炒） 牡丹皮 羌活 川芎各三钱 酒黄柏 生地黄（酒洗，炒） 丹参 茺蔚子 酒当归身 柴胡各五钱 熟地黄八钱 芍药一两二钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心白汤下，宿食未消，待饥则服之 药后省语言，以食压之。

【主治】 内障，右眼小眦青白翳，大眦微显白翳，脑痛，瞳子散大，上热恶热，大便秘涩，小便如常，遇天气暄热，头痛睛胀。

【加减】 翳在大眦，加葛根、升麻；翳在小眦，加柴胡、羌活。

07510 羌活退翳汤

【方源】 《兰室秘藏》卷上。

【异名】 羌活防风除翳汤（《一盘珠》卷十）。

【组成】 羌活一两五钱 防风一两 荆芥穗（煎成药加之） 薄荷叶 藁本各七钱 酒知母五钱 黄柏四钱 川芎 当归身各三钱 酒生地黄一钱 小椒五分 细辛少许 麻黄二钱（用根）

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水二大盏，煎至一盏半，入荆芥穗，再煎至一盏，去滓，食远稍热服。

【主治】 太阳寒水，翳膜遮睛，不能视物。

【宜忌】 忌酒、醋、湿面。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“羌活除翳汤”。

07511 羌活退翳膏

【方源】 《兰室秘藏》卷上。

【异名】 复明膏。

【组成】 椒树东南根二分，西北根二分 藁本 汉防己各二分 黄连 防风 麻黄（去根节） 柴胡 升麻 生地黄各三分 生甘草四分 当归身六分 羌活七分 蕤仁六个

【用法】 用净水一大碗，先煎汉防己、黄连、生甘草、当归、生地黄，煎至一半，下余药，再煎至一盏，去滓，入银石器中再熬之，有效为度。

【主治】 足太阳寒水，膜子遮睛，白翳在上，视物不明。

07512 羌活除风汤

【方源】 《银海精微》卷下。

【组成】 羌活 独活 川芎 桔梗 大黄 地骨皮 黄芩各一两 麻黄 苍术 甘草 菊花 木贼

【用法】 水煎服。

【主治】 脾肺之郁热，邪客于腠理，上下胞肿如桃，痛涩，泪出不绝如注。

【备考】 方中麻黄、苍术、甘草、菊花、木贼用量原缺。

07513 羌活除湿汤

【方源】 《医方集解》。

【组成】 羌活胜湿汤去独活、蔓荆、川芎、甘草，加升麻、苍术。

【主治】 风湿相搏，一身尽痛。

07514 羌活桃仁汤

【方源】 《观聚方要补》卷四引《吕氏经验方》。

【组成】 羌活 桃仁 红花 牛膝 玄胡索 大黄各等分

【用法】 水二盏，葱一根，煎服。

【主治】 坠堕闪挫，气血凝滞，攻刺腰痛。

07515 羌活续断汤

【方源】 《活人心统》卷下。

【组成】 防风 川芎 熟地 茯苓 细辛 芍药 官桂 人参 秦艽 牛膝 甘草 杜仲（炒去丝） 羌活 当归各等分

【用法】 水二钟，加生姜三片，煎七分，食远服，滓再煎。

【功用】 《保命歌括》：除风毒，消恶血。

【主治】 ①《活人心统》：风湿作疼，手足身颤骨疼。②《保命歌括》：脾肾气虚，骨酸痿厥，及涉水卧湿，伤肾成痹，湿流经络，腰膝疼痛，脚重行步不顺；风症脚气。

【备考】 《保命歌括》有川断、白芷，无甘草。

07516 羌活黑附汤

【方源】 《证治汇补》卷四。

【组成】 麻黄 羌活 防风 苍术各一钱 升麻二分 甘草二分 附子一分 白芷三分

【用法】 水煎服。

【功用】 补火升散。

【主治】 寒厥头痛，脉紧者。

【方论选录】 《医略六书》：阳虚寒袭，厥逆上干，清阳之气被困，故手足厥冷，头痛不止。黑附子补肾火以御寒，焦苍术燥脾湿以升阳，羌活散太阳之邪，白芷散阳明之邪，防风通肌表，麻黄开腠理，升麻升发清阳之气，甘草甘缓中州之土，俾火土合德，则肾厥自平，而寒邪外解，头痛无不瘳矣。

07517 羌活蒲蓝汤

【方源】 《辨证施治》。

【组成】 羌活三至五钱 蒲公英 板蓝根各五钱至一两

【用法】 水煎服。

【主治】 感冒风热，咽喉肿痛。

07518 羌蒡蒲薄汤

【方源】《中医方剂临床手册》。

【组成】羌活三至五钱 牛蒡子三钱 蒲公英五钱至一两 薄荷叶一至二钱

【用法】日服一剂，水煎，煮沸三至五分钟即可，分二至三次服。

【功用】解表，清热解毒。

【主治】外感发热，如流行性感冒、上呼吸道感染、扁桃体炎、腮腺炎等。

【加减】咳嗽等肺气不宣明显时，加桔梗、杏仁、前胡；咽喉肿痛严重者，加板蓝根、射干、马勃；胸闷、胃呆、泛恶、舌苔厚腻等湿浊中阻者，加厚朴、半夏、枳壳、六曲。

【方论选录】本方的配伍特点是辛温与辛凉同用，有较强的发散外邪作用；蒲公英的清热解毒与牛蒡子的清宣肺气相配伍后，还有宣肺清热的作用。

07519 完肌散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】密陀僧 桑白皮（新者） 龙骨各四两 陈石灰二两 黄丹五钱 麝香一钱（另研）

【用法】上为细末。干掺之。

【主治】刀镰斧伤。

07520 完肌散

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】定粉 枯矾 黄连 乳香 龙骨各二钱 黄丹 轻粉各一钱

【用法】上为极细末。看轻重贴疮口。

【功用】生肌长肉。

【主治】①《玉机微义》：疮疡。②《便览》：头疡疮。

07521 完肺饮

【方源】《辨证录》卷十二。

【异名】完肺散（《洞天奥旨》卷六）、完肺汤（《外科真诠》卷上）。

【组成】人参一两 玄参二两 蒲公英五钱 金银花二两 天花粉三钱 生甘草三钱 桔梗三钱 黄芩一钱

【用法】水煎服。

【功用】《洞天奥旨》：补胃益肺。

【主治】肺痈已成已破，胸膈作痛，咳嗽不止，吐痰更觉疼甚，手按痛处不可忍，咽喉之间，先闻腥臭之气，随吐脓血。

07522 完带汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】白术一两（土炒） 山药一两（炒） 人参二钱 白芍五钱（酒炒） 车前子三钱（酒炒） 苍术三钱（制） 甘草一钱 陈皮五分 黑芥穗五分 柴胡六分

【用法】水煎服。

【功用】①《傅青主女科》：大补脾胃之气，稍佐舒肝。②《中药方剂简编》：益气健脾，祛湿止带。

【主治】妇人湿盛火衰，肝郁气弱，脾土受伤，湿气下陷，致患白带终年累月下流白物，如涕如唾，不能禁止，甚则臭秽者。

【方论选录】①《中药方剂简编》：方中白术、苍术、山药、党参、甘草益气健脾燥湿，车前子导湿邪从小便出，白芍、柴胡柔肝疏肝，陈皮行气和胃，使补而不滞，又用芥穗与柴胡升达阳气。脾气健，肝郁解，湿邪祛，白带自愈。②《上海中医药杂志》（1981；9:24）：方中白术、山药、人参重用，意在大补脾胃之气，并配甘草以增强健脾之力；苍术、陈皮健脾燥湿；白芍疏肝滋生肝血，佐以柴胡升散除湿；车前子利水除湿；荆芥升阳散湿。全方之配伍，体现了“脾、胃、肝”三经同治之法，寓补于散之中，寄消于升之内，升提肝木之气，则肝血不燥，何至下克脾土；补益脾土之元，则脾气不湿，何难分消水气。至于补脾而兼以补胃者，由里以及表也。

【临证举例】①白带 《福建中医药》（1986；4:54）：林某某，女，30岁，已婚，1984年3月3日初诊。带下年余，缠绵不已，量多，色白清稀，无臭味，而色萎黄，纳呆便溏，四肢困倦，腰酸乏力，经期尚准，舌淡苔薄白，脉濡细。证属脾虚不运，寒湿带下。治拟健脾运中，升阳除湿。处方：党参15克，苍术10克，炒白术30克，炒山药30克，柴胡5克，黑荆芥5克，陈皮6克，车前子10克，炙甘草3克，炒白芍12克，芡实3克。六剂。二诊时白带明显减少，胃纳转佳，大便成形，腰酸如故。宗前方加川续断12克，菟丝子12克，续进九剂而愈。②经行泄泻 《福建中医药》（1986；4:54）：林某某，女，40岁，1970年10月5日初诊。患病二载，经行即腹泻，一日三至四次，虽经治疗，仍时愈时患。月经量多色淡，面色萎黄虚浮，饮食不思，神疲肢软，带下淋漓，腰酸背痛，舌胖苔白，脉沉缓。属脾肾阳虚，湿濡中焦。治拟健脾温肾。调中胜湿。处方：党参12克，炒白术30克，炒山药30克，炙草3克，柴胡5克，陈皮6克，苍术10克，巴戟10克，炒薏仁15克，炒白

芍10克，茯苓10克，黑荆芥5克。九剂。二诊时，纳谷渐强，带下甚少，诸症亦愈。嘱每月经前10天，服上方六剂，调治三月而愈。③慢性肝炎《吉林中医药》（1987，6:27）：颜某某，男，46岁，1985年5月6日诊。患者于1979年诊断为慢性肝炎。数年来右胁隐痛，纳差乏力，屡治不愈。近半年更觉口淡乏味纳呆，气短乏力，嗜卧，腹胀，泄泻日3～4次，小便淡黄短少，时有鼻衄，两足踝微肿，面苍白无华，神情悒郁，形体消瘦，舌淡苔薄白而润，脉虚缓无力。谷丙转氨酶180单位，麝浊18单位，锌浊20单位，麝絮（卅），HBsAg阳性。以往多服逍遥散加减，见效甚微。审证属久病脾胃大虚，运化无力，肝郁湿滞。处方：焦白术30克，山药30克，党参15克，白芍15克，车前子15克，茅根15克，炒苍术10克，炒鸡内金10克，柴胡6克，陈皮6克，炙甘草6克，黑芥穗3克，水煎服。服15剂后，腹胀、鼻衄、浮肿消失，饮食稍增，大小便正常，以本方加减共服60余剂，诸症消失。1985年9月11日查：HBsAg阴性，谷丙转氨酶32单位，麝浊10单位，锌浊8单位，麝絮（+）。已上班工作，至今未复发。

【备考】《辨证录》有半夏一钱。

07523 完胞饮

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】 人参一两 白术十两（土炒） 茯苓三钱（去皮） 生黄耆五钱 当归一两（酒炒） 川芎五钱 白及末一钱 红花一钱 益母草三钱 桃仁十粒（泡，炒，研）

【用法】 用猪羊胞一个，先煎汤，后煎药，饥时服。

【主治】 妇人生产之时，被稳婆手入产门，损伤胞胎，因而淋漓不止，欲少忍须臾而不能。

07524 完疮散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 滑石（飞）一两 赤石脂（飞）五钱 粉甘草三钱

【用法】 上为末。干掺，或用麻油调敷。

【主治】 湿烂诸疮肉平不敛，及诸疮毒内肉既平而口有不收者。

【加减】 痒，加枯矾一钱；痒甚，加水银三四钱，松香二钱。

07525 完舌圆药

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】 芥菜子

【用法】 上为末。以醋调敷颈项下。

【主治】 舌缩不能言。

07526 牢牙散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】 五倍子 干地龙（微炒）各半两

【用法】 上为末。先用生姜揩牙根，后以药末敷之。

【主治】 牙齿动摇欲落。

07527 牢牙散

【方源】 方出《三因》卷十六，名见《医学纲目》卷二十九。

【异名】 双枝散（《袖珍》卷一引《澹寮》）。

【组成】 槐枝 柳枝各长四寸一握（切碎） 皂角（不蛀者）七茎 盐四十文重

【用法】 上药同入瓷瓶内，黄泥固济，糠火烧一夜，候冷，取出，为细末。用如常法。

【功用】 牢牙，去风冷。

【主治】 蛀齲宣露，不问老少。

【临证举例】 齿疼脱落 有石佛庵主年七十余，云祖上多患齿疼脱落，得此方效，数世用之，齿白齐密。

07528 牢牙散

【方源】《济生》卷五。

【组成】 全蝎七个（去毒） 细辛（洗净）三钱 草乌二个（去皮） 乳香二钱（别研）

【用法】 上为细末。每用少许擦患处，须臾以温盐水盥漱。

【主治】 一切齿痛，不问久新。

07529 牢牙散

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【异名】 牢牙齿散（《普济方》卷七十）。

【组成】 羊筒骨灰 升麻各三钱 生地黄 黄连 石膏各一钱 白茯苓 人参各五分 胡桐泪三分

【用法】 上为极细末，入麝香少许，研匀。临卧擦牙后以温水漱之。

【主治】 牙齿无力，不能嚼物。

07530 牢牙地黄散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 藁本二分 生地黄 熟地黄 羌活 防己 人参各三分 当归身 益智仁各四分 香白芷 黄耆各五分 羊胫骨灰 吴茱萸 黄连 麻黄各一钱 草豆蔻皮一钱二分 升麻一钱五分

【用法】 上为细末。先用温水漱口净，擦之。

【主治】 脑寒痛及牙痛。

07531 诃子丸

【方源】《苏沈良方》卷四。

【组成】 诃子皮二两（洗，炮） 木香 白豆蔻 槟榔 桂 人参 干姜 茯苓各二两 牵牛子 两（略炒） 甘草（粗大者，炙） 一两

【用法】 上药酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，嚼烂，茶、酒任下。

【功用】 消食化气。

【主治】 气疾发动，吃食过多，筑心满闷；食饱胀满，及气膨胸膈。

【临证举例】 食郁 石普啖物极多，常致愤闷成疾，服此辄愈。

07532 诃子丸

【方源】《本事》卷四。

【异名】 诃附丸（《魏氏家藏方》卷五）。

【组成】 诃子（去核） 川姜（炮） 肉豆蔻 龙骨 木香 赤石脂 附子（炮，去皮脐）各等分

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，以米饮送下。

【主治】 脾胃不和，泄泻不止。

【备考】 方中木香，《魏氏家藏方》作“厚朴”。

07533 诃子丸

【方源】《普济方》卷三十二引《海岱居士秘方》。

【组成】 诃子 龙骨各一两

【用法】 上为末，滴水为丸，如小指头顶大，朱砂为衣。每服一丸，早晨空心葱汤送下。

【主治】 肾虚脱精。

07534 诃子汤

【方源】《宣明论》卷二。

【异名】 诃子甘桔汤（《医统》卷四十六引《医林方》）、诃子清音汤（《古今医鉴》卷二）。

【组成】 诃子四个（半炮半生） 桔梗一两（半炙半生） 甘草二寸（半炙半生）

【用法】 上为细末。每服二钱，用童子小便一盏，同水一盏，煎至五七沸，温服。

【主治】 失音不能言语。

【方论选录】 ①《准绳·类方》：桔梗通利肺气，诃子泄肺导气，童便降火甚速。②《医方集解》：诃子敛肺清痰、散逆破结，桔梗利肺气，甘草和元气，童便降火润肺。

07535 诃子饮

【方源】《济生》卷二。

【异名】 诃子散（《医统》卷四十四引《医林方》）。

【组成】 诃子（去核）一两 杏仁（泡，去皮尖） 一两 通草二钱五分

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏，加煨生姜（切）五片，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】 久咳语声不出。

07536 诃子散

【方源】《养老奉亲》。

【组成】 诃子皮五个 大腹五个（去皮） 甘草半两（炙） 白术半两（微炒） 草豆蔻十四个（用面裹，烧令面熟黄，去面，并皮用） 人参（去芦头）半两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜少许，大枣二个，同煎至六分，去滓温服。

【主治】 老人夏月脾胃忽生冷气，心腹胀满疼闷，泄泻不止。

07537 诃子散

【方源】《三因》卷九。

【组成】 诃子（炮，去核） 甘草（炙） 厚朴（姜制，炒） 干姜（炮） 草果（去皮） 陈皮 良姜（炒） 茯苓 神曲（炒） 曲芽（炒）各等分

【用法】 上为末。每服二钱，用水一盏，煎七分，加盐，候发刺不可忍时服；如速，则盐点。

【主治】 心脾冷痛不可忍，及老幼霍乱吐泻。

07538 诃子散

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 诃子一两（半生，半熟） 木香半两 黄连三钱 甘草三钱

【用法】 上为细末。每服二钱，以白术芍药汤调下。

【主治】 ①《保命集》：太阴脾经受湿，水泄注下，经治后腹痛渐已，泄下渐少。②《明医指掌》：久病滑泄不禁，气虚欲脱。

【宜忌】《医林纂要》：外邪未已者，此方非所用。

【加减】 如止之不已，宜归而送之也，诃子散加厚朴一两，竭其邪气也。

【方论选录】 ①《医方集解》：木香、黄连，香连丸也，行气清火，止痢厚肠；甘草、芍药，甘芍汤也，甘缓酸收，和中止痛；加诃子涩以收脱；加白术补以强脾；厚朴除湿散满，平胃调中，故更借以去余邪也。②《医林纂要》：诃子酸苦涩，补敛肺气，止泻收脱，其用半生半煨者，生以上行肺，煨以下敛大肠；木香辛苦，能行下焦无形之气以达于上而调和气血，降上焦有形之物以行于下而决渎去秽；黄连苦以降火而能厚肠，用茱萸炒即左金丸，引肺气下行以止肝之过于疏泄，以黄连合之木

香即香连丸，所以行大肠之郁滞而除其热；甘草以厚脾土而生肺金；用白术芍药汤调下，芍药以补敛肺金以敛大肠之气，白术以补土生金，补气而输之肺。

07539 诃术散

【方源】 方出《医学正传》卷七引《产宝》，名见《医部全录》卷三八七。

【组成】 诃子皮（煨） 白术各一钱 陈皮 良姜（炒） 木香 白芍药（酒炒） 炙甘草各半钱 肉豆蔻（面裹，煨）半钱

【用法】 上细切。加生姜五片，水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】 妊娠泄泻，两胁虚鸣，脐下冷痛，食瓜果生冷等物及当风取凉所致。

07540 诃黎丸

【方源】 《医学入门》卷七。

【异名】 诃子青黛丸（《杂病源流犀烛》卷一）。

【组成】 诃子皮五钱 海石 瓜蒌仁 青黛 杏仁 贝母 便制香附各二钱半

【用法】 上为末，姜汁和蜜为丸。含化，徐徐咽下。

【主治】 肺胀喘满，气急身重；及劳嗽干咳无痰。

【备考】 本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作"诃黎勒丸"。方中贝母，《杂病源流犀烛》作"半夏曲"。

07541 诃子皮散

【方源】 《兰室秘藏》卷下。

【异名】 诃子饮（《医方论》卷四）。

【组成】 御米壳（去蒂萼，蜜炒） 橘皮各五分 干姜（炮）六分 诃子（煨，去核）七分

【用法】 上为细末，都作一服。水二盏，煎至一盏，和滓，空心热服。

【功用】 去脱除滑，固气除寒，升阳益气。

【主治】 ①《兰室秘藏》：泻痢。②《东垣试效方》：肠胃虚寒泄泻，米谷不化，肠鸣腹痛；脱肛；或作脓血，日夜无度。

【方论选录】 ①《东垣试效方》：本草十剂云：涩可去脱，以粟壳之酸微涩上收，固气去脱，主用为君也；以诃子皮之微酸上收，固血治其形脱；橘皮微苦温，益真气升阳，为之使；以干姜大辛热之剂，除寒为臣。②《医方集解》：此手、足阳明药也。御米壳酸涩微寒，固肾涩肠；诃子酸涩苦温，收脱住泻；炮姜辛热，能逐冷补阳；陈皮辛温，能升阳调气，以固气脱，亦可收形脱也。③《医方论》：粟壳、诃子性皆寒涩，故用干姜、橘皮以通阳。④《成方便读》：诃子、粟壳皆酸涩而温，涩肠固下；干姜温其脾土，陈皮燥其脾湿，而复其健运之常，则病自愈矣。

【临证举例】 脱肛兼痢疾 《兰室秘藏》：癸卯冬，白枢判家一老仆面尘脱色，神气特弱，病脱肛日久，服药未验，复下赤白脓痢，作里急后重，白多赤少，不任其苦，以求其治。曰：此非肉食膏粱，必多蔬食，或饮食不节，天气虽寒，衣盖犹薄，不禁而肠头脱下者，寒也；真气不禁，形质不收，乃血滑脱也。此乃寒滑气泄不固，故形质下脱也。当以涩去其脱而除其滑，微酸之味，固气上收，以大热之剂而除寒补阳，以补气之药升阳益气，诃子皮散。

【备考】 本方方名，《玉机微义》引作"诃子散"。

07542 诃子灰散

【方源】 《疡医大全》卷二十四引周鹤仙方。

【组成】 黄柏（炒，存性） 诃子灰各二钱 麝香少许（一方无黄柏）

【用法】 上为极细末。掺患处。令睡，睡醒服冷水两三口，二七日即愈。

【主治】 妒精疮，玉茎烂一二寸者。

【宜忌】 切勿令阳道兴起，胀断疮脐。

07543 诃黎勒丸

【方源】 《外台》卷七引《近效方》。

【组成】 诃黎勒 青木香各等分

【用法】 上为末，筛，融沙糖和，众手一时捻为丸。随意服之。气甚者，每服八十丸，一日二次；稍轻者，每服四五十丸；性热者，以生牛乳送下；性冷者，以酒送下，不问食之前后。

【功用】 除恶气。

【主治】 气胀不下食。

07544 诃黎勒丸

【方源】 《圣惠》卷二十六。

【组成】 诃黎勒一两半（煨，用皮） 干姜一两（炮裂，锉） 桂心一两 桔梗一两（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 木香一两 五味子一两 白术半两 人参一两（去芦头） 沉香二两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 气极，呼吸短气，脏虚腹胀。

07545 诃黎勒丸

【方源】 《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】 诃黎勒皮一两半 肉豆蔻三分（去皮） 白术一两 干姜半两（炮） 吴茱萸二分（汤浸七遍，焙）

【用法】 上为末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以热粥饮送下，一日三次。

【主治】 大肠虚冷，乏气拘急，肠鸣滑泄。

07546 诃黎勒丸

【方源】《局方》卷六。

【组成】 诃黎勒皮 川乌头（炮，去皮脐） 缩砂仁 白矾（煅）各四十两 肉豆蔻（去皮，炮） 木香 干姜（炮）各二十两 龙骨（洗） 赤石脂各八十两

【用法】 上为末，粟米饭为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食前以温粟米饮送下；甚者可倍加丸数。

【主治】 肠胃虚弱，内受风冷，水谷不化，泄泻注下，腹痛肠鸣，胸满短气；肠胃积寒，久利纯白，或有青黑，日夜无度；脾胃伤冷，暴泻不止，手足逆冷，脉微欲绝。

07547 诃黎勒丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】 诃黎勒（半生半煨，并去核） 肉豆蔻（去壳） 木香各三分 干姜（炮） 甘草（炙，锉）各半两

【用法】 上为末，煮醋糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，米饮送下。

【主治】 五脏泄痢。

07548 诃黎勒丸

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】 诃子（去核梢）五钱 椿根白皮一两 母丁香三十个

【用法】 上为细末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，五更以陈米饭汤人醋少许送下。三日三服效。

【主治】 休息痢，昼夜无度，腥臭不可近，脐腹撮痛，诸药不效者。

【方论选录】《脾胃论注释》：方中诃子性温味苦酸，能涩肠止痢，休息痢多属肠间积滞，久痢滑脱，故用为主药；椿根白皮性凉味涩，治湿热久困，有除湿实肠功用；母丁香味辛性温，温脾胃，止五色毒痢，芳香化浊以除秽。

07549 诃黎勒丸

【方源】《济生》卷四。

【组成】 诃黎勒（面裹煨） 附子（炮，去皮脐） 肉豆蔻（面裹煨） 木香（不见火） 吴茱萸（炒） 龙骨（生用） 白茯苓（去皮） 荜拨各半两

【用法】 上为末，姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以米饮送下。

【主治】 大肠虚寒，肠鸣泄泻，腹胁气痛，饮食不化。

07550 诃黎勒丸

【方源】《医方类聚》卷一四二引《澹寮》。

【组成】 诃子（煨，去核） 附子（炮，去皮脐） 肉豆蔻 赤石脂 龙骨（不煅） 白矾（枯） 木香 干姜 乌头（炮）

【用法】 上为末，粟米粥为丸。每服二三十丸，空心以粟米饮送下。

【主治】 男子妇人脏腑滑泄。

07551 诃黎勒汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】 诃黎勒皮半两 五味子（炒）一两 麻黄（去根节） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加生姜三片，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【主治】 上气喘急。

07552 诃黎勒散

【方源】《金匮》卷下。

【组成】 诃黎勒十枚（煨）

【用法】 上为散。粥饮和，顿服。

【功用】《金匮要略译释》：温涩固肠。

【主治】 气利。

【方论选录】 ①《金匮玉函二注》：诃黎勒有通有涩，通以下涎液，消宿食，破结气，涩以固肠脱；佐以粥饮引肠胃，更补虚也。②《金匮要略心典》：诃黎勒涩肠而利气，粥饮安中益肠胃，顿服者，补下治下制以急也。③《金匮要略易解》：此方独用一味诃黎勒并收温敛虚滑、消除垢浊的功效，更调以粥饮来益胃补虚以助谷气、化精微，复上升之常，平下泄之变，真可谓善于利用药的专长及其兼长了。

【临证举例】 ①气利 《金匮发微》：予昔寓克白路，治乡人陶姓曾用之。所用为诃子壳，取其味涩能止。彼以药末味涩，不能下咽，和入粥中强吞之，日进一服，三日而止。气利用止涩之诃黎勒散者，实因久利而气虚下陷，意与近人治晨泄用四神丸略同。②气痢 《浙江中医杂志》（1980；8：356）：杨某，男，38岁。1957年秋，患痢疾已三天，小腹疼痛，里急后重，频欲登厕，每次多排出少量粉冻样肠垢，纯白无血，有时则虚坐努责，便

之不出。自觉肛门有物嵌顿重坠，昼夜不已。前医曾予芍药汤加减，一剂后，病情加剧。邀诊。舌苔白滑，脉沉带紧。询之知发病前后未见寒热现象，似属气痢，乃试用《金匮》诃黎勒散：诃子十枚（煨，剥去核），研末，用米粥汤一次送服。约隔一小时许，当肛门窘迫难忍之时，经用力努挣，大便迅即直射外出。从此肛门如去重负，顿觉舒适，后调理脾胃之方而康复。

07553　诃黎勒散

【方源】《圣惠》卷六。

【异名】诃黎勒汤（《圣济总录》卷二十）。

【组成】诃黎勒一两半（煨，用皮）　附子一两（炮裂，去皮脐）　当归三分（锉，微炒）　桔梗半两（去芦头）　肉豆蔻三分（去壳）　木香半两　吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒）　甘草一分（炙微赤，锉）　陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣三枚，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】①《圣惠》：大肠虚冷，肠鸣泄利，腹胁气痛，饮食不化。②《圣济总录》：肠痹飧泄。

07554　诃黎勒散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】诃黎勒皮三分　人参半两（去芦头）　桂心半两　甘草半两（炙微赤，锉）　陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙）　槟榔半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咽喉中如有物，妨闷噎塞，不下食。

07555　诃黎勒散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】诃黎勒皮一两　槟榔三分　桑根白皮一两（锉）　赤茯苓一两　陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）　麻黄一两（去根节）　甘草（炙微赤，锉）　枳壳三分（麸炒微黄，去瓤）　紫菀三分（洗去苗土）　半夏三分（汤洗七遍去滑）　杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】上气，咽喉窒塞短气，不得睡卧，腰背强痛，四肢烦疼，腹满不能食。

【备考】本方方名，《普济方》引作"诃黎勒皮散"。

07556　诃黎勒散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】诃黎勒皮一两　人参三分（去芦头）　白术三分　黄芪三分（锉）　神曲一两（炒微黄）　木香三分　桂心三分　麦芽三分（炒微黄）　高良姜三分（锉）　草豆蔻三分（去皮）　陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为细末。每服一钱，以生姜汤调下，不拘时候。

【主治】膈气，脾胃积冷，宿食不消，心胸不利。

【备考】本方方名，《普济方》引作"诃黎勒汤"。

07557　诃黎勒散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】诃黎勒一两（煨，用皮）　当归三分（锉，微炒）　红豆蔻三分（去皮）　木香半两　龙骨三两

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】气痢，心腹疼痛，不欲饮食。

07558　诃黎勒散

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】诃黎勒皮　白豆蔻　陈橘皮（去白，焙）　干姜（炮）各半两　丁香半分　木香　缩砂仁各一分

【用法】上为散。用猪肝一叶，去脂膜，细切后，入药末两匙头，分作四处，用面裹作馉子四个。每日一个，以文武火煨令黄熟，空心细嚼，以盐汤或米饮送下。

【主治】脾脏泄滑不止。

07559　补下丸

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】葫芦巴（酒浸，焙）　龙骨（研）　菖蒲各半两　远志（去心）一两半　补骨脂（炒）　益智（去皮）　肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【功用】温气除寒。

【主治】妊娠小便利多。

07560　补元汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】人参二钱　川芎　熟地　白术　紫河车　白芍各一钱二分　五味子　升麻各三分

【用法】加大枣十枚，水煎去滓，不拘时服。

【主治】产后产门不闭。

07561　补天丸

【方源】《摄生众妙方》卷十一。

【异名】补元丸《中国医学大辞典》。

【组成】紫河车（男用女胎，女用男胎，俱以初胎为佳，若不可得，即壮盛妇人者亦可） 黄柏（酒炒） 龟版（炙）各三两 杜仲（酥炙） 牛膝（酒浸）各二两 陈皮一两

【用法】上为细末，以河车水洗净，布绞干，或用酒煨熟，入诸药末捣匀，焙燥，再为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心温酒或白沸汤送下。

【主治】虚劳。六脉虚微，气血衰弱。

【加减】冬，加干姜五钱；夏，加五味子一两。

【方论选录】《医方集解》：黄柏、龟版滋肾之药，杜仲、牛膝腰膝之药，皆以补肾而强阴也。河车名曰混沌皮，用气血以补气血，借后天以济先天，故曰补天。加陈皮者，于补血之中而兼调其气也。冬月寒水用事，故加干姜以助阳；夏月火旺灼金，故加五味子以保肺。

07562 补天丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】紫河车（初胎者一具，米泔洗净，入砂锅内，用水一碗煮沸，候冷取起，放小竹篮中，用纸密糊烘干） 黄柏（蜜炒） 知母（乳炒） 龟版（酥炙）三两 熟地五两（煮） 牛膝（酒洗） 苁蓉（酒洗） 麦冬 山药 虎胫骨（酥炙） 茯神各一两半 杜仲 首乌 人参 白芍 生地 天冬 当归 五味各三两 枸杞二两

【用法】上为末，猪脊髓三条，蒸熟，炼蜜为丸。每服七八十丸，空心淡盐汤送下。

【主治】男妇虚损劳伤，形体羸乏，腰背疼痛，遗精带浊。

【加减】冬，加干姜。

07563 补天丹

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】麦饭石（醋煅七次）四两 煅鹿角（存性）四两 白蔹二两

【用法】上为细末。每取少许，小膏药贴之。

【功用】提毒长肉。

【主治】《药奁启秘》：溃疡久不生肉，不能收口者。

【宜忌】不可早用。

07564 补天串

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】象牙屑二钱 桑螵蛸一钱

【用法】上为末，作一服。

【主治】梦遗。

07565 补中丸

【方源】《竹林女科》卷四。

【组成】川芎 当归 黄耆（蜜炙） 白术（蜜炙） 人参 白芍 杜仲（盐水炒） 川续断 阿胶（炒珠） 五味子（炒）各一两 甘草（蜜炙）五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。白汤送下。

【主治】妇人脾胃虚寒，带脉无力，不孕。

07566 补中汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】升麻 柴胡 当归各二分 神曲三分（炒） 泽泻四分 大麦芽面 苍术各五分 黄耆二钱五分 炙甘草八分 红花少许 五味子二十个

【用法】上㕮咀，分作二服。水二盏，煎至一盏，去滓，空腹服。

【主治】面黄汗多目赤，四肢沉重，减食，腹中时时痛，咳嗽，两手寸脉短，右手脉弦细兼涩，关脉虚。

07567 补中汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】人参（少者，重用沙参）四钱 当归 蜜耆 白术各一钱半 炙草八分 陈皮八分 五味十五粒

【用法】姜、枣为引。

【主治】脾肺虚，而肾气不归元，以致气喘者。

【加减】气滞作胀，加砂仁、香附之属；或沉香亦妙。

07568 补气汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】柴胡二分 升麻三分 黄耆八分 当归身二钱 炙甘草四钱 红花少许

【用法】上㕮咀，作二服。水二盏，煎至一盏，去滓，食后稍热服。

【主治】年少时气弱，常于气海、三里灸之，节次约五七十壮，至年老添热厥头痛，虽冬天大寒，犹喜寒风，其头痛则愈。微来暖处，或见烟火，其痛复作，五七年不愈者。服清上泻火汤后用此方。

【备考】《医学纲目》有细辛少许，麻黄（炒）、苦丁香各半钱，无红花。

07569 补气汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】黄耆 白芍 甘草 泽泻 陈皮 人参

【用法】用水一盏半煎服。

【主治】皮肤麻痒。

【加减】有痰，加半夏、生姜。

07570 补气汤

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】白术一钱半 伏苓 山楂 人参各一钱半 夏八分 陈皮八分 干葛七分 砂仁五分 炙草三分

【主治】脾弱，饮食不长肌肉。

07571 补火丸

【方源】《医方考》卷三。

【组成】生硫黄一斤 猪肠二尺

【用法】将硫黄为细末，尽实肠中，烂煮二时取出，去肠，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服十丸，日渐加之。

【主治】①《医方考》：冷劳病瘠，血气枯竭，齿落不已，四肢倦怠，语言不足者。②《中药成方配本》：命门火衰，畏寒倦怠。

【宜忌】忌猪血、羊血、牛血及诸禽兽之血。

【方论选录】方中硫黄，火之精也，故用之以补火，然其性过热有毒，故用猪肠烂煮以解之。

07572 补心丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】酸枣仁（炒，去壳） 沉香（不见火） 薏苡仁（炒） 乳香（别研） 柏子仁（炒） 鹿茸（酥炙） 车前子（炒） 当归（去芦，酒浸） 五味子（去枝） 人参（去芦） 覆盆子（炒） 防风（去芦） 穿心巴戟（去心） 枸杞子 菟丝子（淘净，酒浸，研成饼） 白茯苓（去皮） 肉苁蓉（去皱皮，酒浸） 熟干地黄（洗）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，莲心汤送下，一日二次；盐汤饭饮亦得。

【功用】生养气血，补不足，泻有余，滋润精血，养固真元，使邪气无侵，令营卫坚守。

【主治】男子妇人，童男童女，忧愁思虑，食饱恚怒，耗伤心气，精神不守，酒后行房，百脉离经，营卫失调，脏腑遂生疾病：阴阳不足，则寒热往来；气血虚耗，皮毛枯槁；心气不足，怔忡冒乱，梦寐惊惶；肾不足，则乏力失精，小便淋沥；肝气不足，目昏疲倦，四肢烦疼；肺不足，则秘利不常，痰嗽喘急；脾不足，则面黄腹急，饮食无味。并治鼻衄，沙石淋及妇人产后虚劳，平日恶露，肌瘦骨蒸，久无子息，或妊月未足，多致损堕，诸虚不足，日久淹延之疾。

07573 补心丸

【方源】《医方大成》卷五引《济生》。

【组成】紫石英（煅，研） 熟地黄（洗） 菖蒲 茯神（去木） 当归（去芦） 附子（炮，去皮脐） 黄耆（去芦） 远志（去心，炒） 川芎 桂心（不见火） 龙齿各一两 人参半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，用枣汤送下，不拘时候。

【主治】忧愁思虑过度，心血耗散，故多惊恐，遗精盗汗。

07574 补心丸

【方源】方出《医学正传》卷三，名见《东医宝鉴》卷一。

【组成】川归身一两五钱 川芎一两 粉甘草一两五钱 生地黄一两五钱 远志（去心）二两五钱 酸枣仁 柏子仁各三两 人参一两 辰砂五钱（另研） 金箔二十片 麝香一钱 琥珀三钱 茯神七钱 胆南星五钱 半夏五钱 石菖蒲六钱

【用法】上为极细末，蒸饼为丸，如绿豆大，辰砂为衣。每服七八十丸，津唾咽下，或姜汤送下。

【主治】心虚手振。

07575 补心丸

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】黄耆 茯神 人参 远志各一两 熟地八钱 柏仁五钱 枣仁 五味各五分 朱砂二钱五分

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】常惯怔忡。

07576 补心丸

【方源】《竹林女科》卷三。

【组成】当归身 生地黄 熟地黄 茯神各一两 人参 麦冬各一两五钱 枣仁 柏子仁各八钱 炙甘草四钱 五味子 莲子各一两二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百余丸，芎归汤送下。得卧即安。

【主治】产后心气大虚，惊悸，言语颠倒。

07577 补心丹

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】干山药 人参 茯苓 菖蒲各四两 熟地黄 黄耆 紫石英各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，辰砂一两为衣。每服一丸，临卧白汤化下。

【主治】心虚诸疾。

07578 补心丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【异名】补心丸（《全国中药成药处方集》武汉方）。

【组成】人参 丹参 元参 天冬 麦冬 生地

茯神　远志　枣仁　当归　朱砂　菖蒲　桔梗　柏子仁　五味子

【主治】　心血亏虚，心悸怔忡，失眠梦遗。

①《杂病源流犀烛》：读书夜坐，阳气上升，充塞上窍，痰多鼻塞，能食，上盛下衰，寐则阳直降而精下注，有梦而泄。其或真阴损伤，而五志中阳火上燔为喉咙痛，下坠为遗，精髓日耗，骨痿无力，日延枯槁，宜早服补心丹，晚服桑螵蛸散。②《医方简义》：癫症与怔忡症。③《全国中药成药处方集》：神经衰弱，心血不足，心跳气短，失眠健忘，神志不宁，口燥咽干。

【备考】《医方简义》本方用法：炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。

07579　补心汤

【方源】《千金》卷十四。

【组成】　紫石英　茯苓　人参　远志　当归　茯神　甘草　紫菀各二两　麦门冬一升　赤小豆三合　大枣三十枚

【用法】　上㕮咀。以水一斗二升，煮取三升，分三次服。

【主治】　心气不足，惊悸汗出，心中烦闷短气，喜怒悲忧悉不自知，常苦咽喉痛，口唇黑，呕吐血，舌本强，不通水浆。

07580　补心汤

【方源】《千金》卷十四。

【组成】　远志　蒲黄（一方用菖蒲）　人参　茯苓各四两

【用法】　上㕮咀。以水一斗，煮取三升半，分三次服。

【主治】　心气不足，心痛惊恐。

【备考】　本方方名，《普济方》引作“远志散”。

07581　补心汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】　人参　白术　茯苓　茯神　菖蒲各半两　远志四钱　甘草　桂各三钱

【用法】　上为细末，每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一枚（擘破），同煎至七分，食后温服。

【主治】　心气不足，惊悸汗出，心中烦闷，短气，悲忧、独语、自梦悉不自知，及诸失血舌本强直。

07582　补心汤

【方源】《内经拾遗》卷一。

【组成】　茯神（去木）　贝母（去心）　麦冬（去心）　生地（姜汁炒）各二钱　天冬（去心）　酸枣仁（炒）　白芍　当归　橘红各一钱　黄连八分　川芎八分　甘草二分

【用法】　水二钟，加生姜三片，煎八分，食后服。

【功用】　补心。

【主治】　心血不足，心若掣。

【加减】　有郁，加香附。

07583　补心汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】　当归　生地各四钱　白芍　玄胡索　乌药　丹皮　远志　茯神各一钱　龙眼肉五枚

【用法】　水煎服。

【主治】　心气虚耗，不能藏血以养心，故心痛，四肢厥冷。

07584　补心汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】　当归一钱五分　川芎　炙草各一钱　生地一钱五分　远志二钱五分　枣仁　柏仁各二钱　人参一钱　琥珀五分　茯神七分　胆星五分　石菖蒲六分

【主治】　血虚颤动，心不宁。

【备考】　为丸服更妙。

07585　补血汤

【方源】《盘珠集》卷上。

【组成】　黄耆（炙）　当归　川芎

【主治】　血少不能荣养其胎，胎不动不坠，腹冷如冰者。

07586　补阳汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】　肉桂一钱（去皮）　知母（炒）　当归身（酒洗）　生地黄（酒洗）　白茯苓　泽泻　陈皮各三钱　白芍药　防风各五钱　黄耆　人参　白术　羌活　独活　熟地黄　甘草各一两　柴胡二两

【用法】　上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎至一大盏，去滓，空心服。

【主治】　①《兰室秘藏》：阳不胜其阴，乃阴盛阳虚，则九窍不通，令青白翳见于大眦，及足太阳、少阴经中郁遏，足厥阴肝经气不得上通於目，故青白翳内阻也。②《审视瑶函》：视正反斜症及内障。

【宜忌】《审视瑶函》：若大寒大风，过于劳役，饮食不调，精神不足，或气弱，俱不得服。

【方论选录】　①《兰室秘藏》：《内经》云，阴盛阳虚，则当先补其阳，后泻其阴，此治法是也，先补其阳，使阳气上升，通于肝经之末，利空窍于目矣。②《医方考》：人参、黄耆、白术、茯苓、甘

草、陈皮，甘温益气之品也，因所以补阳；柴胡、羌活、独活、防风，辛温散翳之品也，亦所以补阳；知母、当归、生熟地黄、芍药、泽泻虽养阴，亦所以济夫羌、防、柴、独，使不散其真阳耳，是亦所以补阳也。用肉桂者，取其辛热，热者火之象，可以散翳，辛者金之味，可以平肝木，盖眼者肝木之窍，以故用之。

07587 补阴丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】虎潜丸(《医统》卷四十八)、补阴种子丸(《医学正印》卷上)。

【组成】黄柏半斤（盐酒炒） 知母（酒浸，炒） 熟地黄各三两 龟版四两（酒浸，炙） 白芍（炒） 陈皮 牛膝各二两 琐阳 当归各一两半 虎骨一两（酒浸，酥炙）

【用法】上为末，酒煮羊肉为丸。每服五十丸，盐汤送下。

【功用】①《景岳全书》：降阴火，滋肾水。②《简明医彀》：济阴养血，补肾益精，强腰膝，壮筋骨，固精元。

【主治】①《摄生众妙方》：左尺肾脉洪大盛数，精元不固者。②《医钞类编》：精血不足，骨蒸劳热，筋骨痿弱，足不任地。

【加减】冬，加干姜半两。

【方论选录】《医方集解》：此足少阴药也。黄柏、知母、熟地所以壮肾水而滋阴；当归、芍药、牛膝，所以补肝虚而养血；牛膝又能引诸药下行，以壮筋骨，盖肝肾同一治也。龟得阴气最厚，故以补阴而为君；虎得阴气最强，故以健骨而为佐，用胫骨者，虎虽死犹立不仆，其气力皆在前胫，故用以入足，从其类也。琐阳益精壮阳，养筋润燥，然数者皆血药，故又加陈皮以利气，加干姜以通阳，羊肉甘热属火而大补，亦以味补精，以形补形之义，使气血交通，阴阳相济也。名虎潜者，虎阴类，潜藏也。一名补阴丸，益补阴所以称阳也。

07588 补阴丸

【方源】《准绳·类方》卷四引丹溪方。

【组成】败龟版（酒炙） 黄柏（酒炒） 知母 侧柏叶 枸杞子 五味子 杜仲（姜汁炒去丝） 砂仁各等分 甘草减半

【用法】上为末，猪脊髓加地黄膏为丸服。

【功用】《杂病源流犀烛》：滋阴降火。

【主治】①《准绳·类方》引丹溪方：腰痛。②《杂病源流犀烛》：咳血。阴虚、火动，痰不下降，先见红而后痰嗽者。

07589 补阴丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】熟地三两 丹皮 天冬 当归 枸杞子 牛膝 山药 女贞子 茯苓 龟版 杜仲 续断各一两二钱 人参 黄柏各五钱

【用法】石斛四两熬膏，和炼蜜为丸。每服三钱，早晨淡盐水送下。

【主治】肾气热，腰软无力，恐成骨痿。

07590 补阴丸

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】熟地八两 阿胶八两（蒲黄灰炒）

【用法】上为散，炼蜜为丸。每服五钱，米饮送下。

【主治】孕妇溺血，脉虚数者。

【方论选录】妊娠冲任两虚，不能吸血归经而偏渗膀胱，故溺血不止，胎因不安焉。熟地补阴资血，以滋冲任，阿胶补血益阴，以止尿血，蜜丸以润其经气，饮下以和其胃气，使经血内充则经脉完固，而血不妄行。

07591 补阴丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】磁石（紫者，烧赤，醋淬七次，水飞过，晒干称）三两 鹿茸三两（去毛，酥炙） 生干地黄八两 石斛三两 泽泻三两 官桂一两半（去粗皮） 杜仲二两（细切，炒去丝） 山茱萸三两（生用）

【用法】上为细末，入磁石末同研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒送下，或盐汤送下亦得，日进一服。服二月觉功，一百日见效。

【功用】滋益肾水真阴，镇伏心火大热，坚强骨髓，补养精气，通调血脉，润泽肌肤，交泰心肾。

【主治】发热怔忪，脚膝痹弱。

07592 补阴汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归 白芍（酒炒） 生地黄 熟地黄 陈皮 茴香（盐、酒炒） 故纸（酒炒） 牛膝（去芦，酒洗） 杜仲（去粗皮，酒炒） 茯苓（去皮）各一钱 人参五分 黄柏（去粗皮，酒炒） 知母（酒炒）各七分 甘草（炙）三分

【用法】上锉一剂。加大枣二枚，水煎服，不拘时候。如常服合丸药，俱为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米汤送下；酒亦可。

【主治】肾虚腰痛。

【加减】痛甚大者，加乳香、砂仁、沉香，去芍

药、生地、陈皮。

07593 补阴散

【方源】 方出《明医杂著》卷一，名见《医便》卷一。

【异名】 滋阴降火汤(《医便》卷一)。

【组成】 生地黄（酒洗） 甘草（炙） 干姜（炮）各五分 川芎 熟地各一钱 白芍药（炒）一钱三分 陈皮七分 当归 白术各一钱三分 黄柏（蜜水浸，炙）七分 知母（蜜水浸拌，炒） 天门冬（去心皮）各一钱。

【用法】 加生姜三片，水煎，空心温服。

【主治】 ①《明医杂著》：劳瘵色欲证，先见潮热、盗汗、咳嗽、倦怠者趁早服之。②《杂病源流犀烛》：阳强。

【加减】 若咳嗽盛，加桑白皮、马兜铃、瓜蒌仁各七钱，五味子十粒；若痰盛，加姜制半夏、贝母、瓜蒌仁各一钱；若潮热盛，加桑白皮、沙参、地骨皮各七分；若梦遗、精滑，加蛎、龙骨、山茱萸各七分；若赤白浊，加白茯苓一钱，黄连三分(炒)；若兼衄血、咳血，出于肺也，加桑白皮一钱，黄芩、山栀各五分（炒）；若兼嗽血、痰血，出于脾也，加桑白皮、贝母、黄连、瓜蒌仁各七分；若兼呕吐血，出于胃也，加山栀、黄连、干姜、蒲黄（炒）各一钱，韭汁半盏，姜汁少许；若兼咯唾血，出于肾也，加桔梗、玄参、侧柏叶（炒）各一钱。

【备考】 本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作“补阴降火汤”。

07594 补肝丸

【方源】《千金》卷六。

【异名】 兔肝丸(《圣济总录》卷一〇八)。

【组成】 兔肝二具 柏子仁 干地黄 茯苓 细辛 蕤仁 枸杞子各一两六铢 防风 芎藭 薯蓣各一两 车前子二合 五味子十八铢 甘草半两 菟丝子一合

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，一日二次。加至四十丸。

【主治】 肝痹所损，眼暗眩晕不明，寒则泪出。

【方论选录】《千金方衍义》：于前补肝丸中除去青葙、桂心、葶苈、杏仁、茺蔚、黄芩、地肤、泽泻、决明、门冬十味，添入山药、柏仁、芎藭、甘草。较前补肝丸用法稍平而补肝之功最稳。盖眩晕不明，肝肾精血不充、兔肝有同气相感之力，细辛、防风开发经络之滞，则诸药方得上注于目也。

07595 补肝丸

【方源】《瘦论萃英》。

【组成】 四物汤加防风 羌活各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸服。

【主治】 ①《医方集解》：风虚眩运，风秘便难。②《杂病源流犀烛》：酒色过度，当胁一点痛不止，名干胁痛。

【备考】 本方改为汤剂，名“治风六合汤”（见《医方集解》）；改为散剂，名“补肝散”（见《杂病源流犀烛》）。

07596 补肝丸

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 苍术（米泔水制） 熟地黄（焙干） 蝉退 车前子 川芎 当归身 连翘 夜明砂 羌活 龙胆草（酒洗） 菊花各等分

【用法】 上为细末，米泔水煮猪肝，捣烂，入末为丸，如梧桐子大。每服五十丸，薄荷汤送下。

【主治】 玛瑙内障。翳障薄而不厚，偏斜略带焦黄，如玛瑙之状。

07597 补肝丸

【方源】《异授眼科》。

【组成】 菟丝子（酒煮，捣烂） 柏子仁（炒）各三两 枸杞三两 山药三两 白茯苓二两 防风一两 栀子（炒）一两 五味子一两 车前子一两（炒） 细辛五钱 甘草五钱 蕤仁三钱 川芎一两

【用法】 上为细末，用熟地三两，兔肝一具，捣膏入药，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，灯草煎汤送下。

【主治】 肝虚目暗，渐渐昏矇，时见黑花，视一如二。

【宜忌】 忌萝卜、蒜、椒、姜、鱼腥、犬、羊、煎炒、油面、生冷之物。

07598 补肝汤

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】 人参 白茯苓（去黑皮） 玄参 黄芩（去黑心）各一两 防风（去叉） 知母 桔梗（炒） 茺蔚子各二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】 内障滑翳。

07599 补肝汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 柴胡半夏汤（原书同卷）、半夏苍术汤(《张氏医通》卷十四)。

【组成】 柴胡 升麻 藁本各五分 白茯苓七分 炒神曲 苍术各一钱 半夏二钱 生姜十片

【用法】 上为粗末，作一服。水二大盏，煎至一大盏，去滓，稍热服。

【主治】 素有风证，不敢见风，眼涩，头痛眼黑，胸中有痰，恶心，兀兀欲吐，遇风但觉皮肉紧，手足难举重物；如居暖室，少出微汗，其证乃减，再或遇风，病即复。

07600 补肝汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 黄耆七分 炙甘草五分 升麻 猪苓各四分 白茯苓 葛根 人参各三分 柴胡 羌活 陈皮 连翘 当归身 黄柏（炒） 泽泻 苍术曲末 知母 防风各二分

【用法】 上锉如麻豆大，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，空心稍热服。

【主治】 ①《兰室秘藏》：前阴冰冷并阴汗，两脚痿弱无力。②《保命歌括》：女子阴癞，肝肾虚者。

【宜忌】 忌酒、湿面。

07601 补肝汤

【方源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【组成】 细辛 防风 茺蔚子各一两 五味子 桔梗各一两 黑参一两半

【用法】 上为末。以水一盏，散一钱，煎至五分，去滓，空心温服。

【主治】 ①《秘传眼科龙木论》：散翳内障。②《普济方》：目风眼寒。

【备考】 原书治上证，宜先用金针拔之，然后服本方。

07602 补肝汤

【方源】《秘传眼科龙木论》卷二。

【组成】 芍药 细辛 桔梗 车前子 人参 茯苓各一两 羌活 防风各二两

【用法】 上为末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】 乌风内障。

07603 补肝汤

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 茯苓一钱 桔梗一钱 茺蔚子二钱 黄芩一钱 防风二钱 川芎一钱 知母一钱 黑参一钱 当归身二钱 人参一钱

【用法】 上为粗末。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【功用】 清散虚热。

【主治】 滑翳内障，肝风冲上，脑脂下注所致。

07604 补肝汤

【方源】 方出《临证指南医案》卷八，名见《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】 冬桑叶一钱 炒枸杞一钱半 小胡麻一钱半 望月砂三钱 制首乌三钱 石决明一具 黄菊花一钱 稽豆皮三钱

【主治】 脉涩细，左目痛，泪热翳膜，此肝阴内亏，厥阳上越所致。

07605 补肝散

【方源】《千金》卷六。

【组成】 青羊肝一具（去上膜，薄切之，以新瓦瓶子未用者，净拭之，纳肝于中，炭火上炙之，令极干汁尽，为末） 决明子半升 蓼子一合（熬令香）

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，食后以粥饮送下，一日二次。稍加至三匕，不过两剂。服之一年，能夜读细书。

【主治】 ①《千金》：目失明漠漠。②《医学六要·治法汇》：肝虚失明。

【方论选录】《千金方衍义》：决明久能益精光，蓼实温中明目，青羊即羖羊，青盲明目之专药，皆《本经》主治，不专滋阴补肝，兼能散血舒筋，同气相感之妙用。

07606 补肝散

【方源】《千金》卷六。

【组成】 地肤子一斗（阴干，为末） 生地黄十斤（捣取汁）

【用法】 上以地黄汁和散，晒干，更为末。每服方寸匕，酒送下，一日二次。

【功用】 明目。

【主治】 ①《千金》：男子五劳七伤之眼疾。②《普济方》：虚劳目暗。

【方论选录】《千金方衍义》：地肤子利小便，治膀胱之热；生地黄汁滋血润燥，除瘀积，和损伤。阴血不足，不能近视者宜之。

07607 补肝散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】 熟地黄 白茯苓（去皮） 家菊 细辛各半两 芍药三分 柏子仁一分 甘草半钱（炙） 防风一分 北柴胡一两（去芦）

【用法】 上锉散。每服三钱，水一盏半煎，食后服。

【主治】 肝肾俱虚，圆翳内障，黑珠上一点圆翳，日中见之差小，阴处见之则大白，或明或暗，视物不明，以冷药治之，转见黑花。

07608 补肝散

【方源】《证治汇补》卷二。

【组成】生地 熟地 当归 白芍药 石斛 丹皮 柴胡 甘草

【功用】《医略六书》：养阴血，退虚热。

【主治】①《证治汇补》：痨瘵。②《医略六书》：疲劳伤肝，肝血暗耗，故筋失所养而疲困成痨，脉弦数虚涩者。

【方论选录】《医略六书》：方中生地滋阴壮水，专退疲劳之热；熟地补阴滋血，专资耗亡之阴；当归养血荣肝，白芍敛阴和肝，石斛益阴平热，丹皮凉血退蒸，生草泻虚火以缓中，柴胡引诸药以入肝也。盖肝无补法，养阴滋血即所以补肝，水煎温服，使阴血内充，则肝得所养而疲劳自已。

【备考】《医略六书》本方用生地十两，柴胡五钱，熟地十两，归身六两，白芍（炒）四两，石斛三两，丹皮一两半，甘草一两。上为散，水煎，去滓温服。

07609 补肾丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】磁石二两（烧醋淬七遍，捣碎细研，水飞过） 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 五味子一两 细辛一两 熟干地黄一两半 泽泻一两 茺蔚子一两半 薯蓣一两 覆盆子一两半 肉苁蓉一两半（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 车前子一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心及晚食前以盐汤送下。

【主治】眼昏暗，瞳人不分明，成黑风内障。

07610 补肾丸

【方源】《济生》卷五。

【组成】磁石（火煅，醋淬七次，水飞） 菟丝子（淘净，酒浸蒸，别研）各二两 五味子 熟地黄（酒浸，焙） 枸杞子 楮实子 覆盆子（酒浸） 肉苁蓉（酒浸，焙） 车前子（酒蒸） 石斛（去根）各一两 沉香（别研） 青盐（别研）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】①《济生》：肾气不足，眼目昏暗，瞳人不分明，渐成内障。②《方症会要》：肾虚短气。

07611 补肾丸

【方源】《得效》卷十六。

【组成】巴戟（去心） 山药 破故纸（炒） 茴香 牡丹皮各半两 肉苁蓉一两（洗） 枸杞子一两 青盐一分（后入）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【主治】圆翳内障，眩晕目糊，或齿痛脓耳。

①《得效》：圆翳内障。②《医学入门》：头眩耳鸣，起坐生花，视物不真。③《外科理例》：耳内出脓，痛痒者；兼疗齿痛。④《张氏医通》：肾虚眼目无光。

【临证举例】脓耳《外科理例》：一人耳内出脓，或痛或痒，服聪耳益气汤不应，服防风通圣散愈甚，予用补肾丸而愈。

07612 补肾丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】补阴丸（《不居集》上集卷十七）。

【组成】干姜二钱 黄柏（炒） 龟版一两半（酒炙） 牛膝一两 陈皮半两

【用法】上为末，姜汁为丸，或酒糊为丸。每服七十丸，白汤送下。

【主治】①《丹溪心法》：痿厥之重者。②《赤水玄珠》：阴虚有痰，膈不清者。

07613 补肾丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】熟地 菟丝子（酒浸）各八两 归身三两半 苁蓉（酒浸）五两 黄柏（酒炒） 知母（酒浸）各一两 故纸（酒炒）五钱 山萸肉三钱半

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸。

【功用】《东医宝鉴·杂病篇》：补肾滋阴。

【主治】①《丹溪心法》：虚劳。②《东医宝鉴·外形篇》：阴虚火动，耳鸣。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作"八味肾气丸"。

07614 补肾丸

【方源】《医方类聚》卷一五三引《新效方》。

【组成】杜仲 龟版 黄柏 知母 当归 五味子 枸杞子各等分

【用法】上为末，猪脊髓为丸，如梧桐子大。

【主治】肾虚腰痛。

【加减】有湿热，加苍术、川芎、黄柏；有瘀血，加桃仁、红花。

07615 补肾丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷二。

【组成】人参 茯苓 五味子 细辛 肉桂 桔梗各一两 山药 柏子仁各二两半 干地黄一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心茶送下。

【主治】 黑风内障。

07616 补肾丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】 五味子 人参 泽泻 干山药 车前子 茯苓 细辛 黄芩各一两 干地黄三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心茶清送下。

【主治】 倒睫拳毛外障。

07617 补肾丸

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 石菖蒲 枸杞子 白茯苓 人参 山药 泽泻 菟丝子 肉苁蓉各一两

【用法】 炼蜜为丸。每服五十丸，盐汤送下。

【主治】 眼目有黑花，芒芒如蝇翅者。

【备考】 原书治上证，须先用猪苓散顺其肝肾之邪热，次用黑参汤以凉其肝，后用补肾丸。

07618 补肾丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】 熟地 杞子 山萸 山药 丹皮 补骨脂 核桃肉

【用法】 炼蜜为丸服。

【主治】 圆翳。黑珠上一点圆，日中见之差小，阴处见之即大，视物不明，转见黑花，由肝肾两虚而得。

07619 补肾丸

【方源】《异授眼科》。

【组成】 菟丝子 枸杞 白朱砂 青盐 熟地 破故纸 石斛 巴戟天 丹皮 酸枣仁 肉苁蓉 茴香

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。盐汤送下。

【主治】 目珠上转如月出东海状。

07620 补肾汤

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁） 牛膝一两（去苗） 桂心一两 黄耆一两半（锉） 人参一两（去芦头） 白茯苓一两 独活一两 芎藭一两 当归一两 白芍药一两 白术一两 白蒺藜一两（微炒，去刺） 附子一两（炮裂，去皮脐） 泽泻一两 汉椒一两（去目及闭口者，微炒去汗）

【用法】 上为粗末。每服用羊肾一对（切去脂膜），以水一大盏半，煎至一盏，去肾，下药末半两，更煎至六分，去滓，空心及晚食前分二次温服。

【主治】 虚劳肾脏乏损，耳聋体瘦，脚膝少力，疼痛。

07621 补肾汤

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】 黄耆（炙，锉）一两半 人参 白茯苓（去黑皮） 独活（去芦头） 芎藭 当归（切，焙） 芍药 白术（锉，炒） 蒺藜子（炒去角） 附子（炮裂，去皮脐） 泽泻各一两 蜀椒（去目及合口者，炒出汗）二两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水二盏，先煎羊肾一只至一盏半，入药煎取八分，去滓空心顿服。

【主治】 肾脏虚损，耳作蝉鸣，腹痛腰疼。

07622 补肾汤

【方源】《增补内经拾遗》卷四。

【组成】 人参 白茯苓 白术 五味子 川芎各一钱 甘草（炙） 黄耆（炙） 熟地各八分

【用法】 用水二钟，加红枣二枚，煎八分空心服。

【主治】 肾虚耳鸣。

07623 补肾汤

【方源】《仙拈集》卷一引《汇编》。

【组成】 熟地二两 山萸肉三两

【用法】 水五碗，煎一碗，加肉桂三钱，再煎至七分，空心一次服完，一日一剂。十日即愈。

【主治】 肾虚朝食暮吐，暮食朝吐者。

【加减】 食物下喉即吐者，去肉桂，加麦冬三钱煎服，十日即愈，后服用六味地黄丸两月。

07624 补肾汤

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】 当归 熟地 菟丝子 杜仲 破故纸 巴戟天 山萸 杞子 山药 淡苁蓉 淮牛膝 葡萄肉

【主治】 腰痛成龟背症。

07625 补肾羹

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】 羊肾一双（去脂，切） 葱白一分（切） 生姜一分（切）

【用法】 细切羊肾，加五味、葱、生姜，如常法作羹食之。

【主治】 肾虚劳损，精气竭绝。

07626 补肺丸

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】 麦门冬（去心） 款冬花 白石英 桑根白皮 桂心各二两 五味子三合 钟乳五分（研为粉） 干姜一两 大枣一百枚

【用法】 上为末，以枣膏为丸，如梧桐子大，每服十五丸，以饮送下，一日三次。

【主治】 肺气不足，失声胸痛、上气息鸣。

07627 补肺丸

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】 钟乳粉 人参 白石英各半两 阿胶（炙令燥） 五味子各一两 甘草（炙，锉）三钱 细辛（去苗叶） 二钱

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，甘草汤送下。

【主治】 肺虚喘咳少气。

07628 补肺汤

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】 五味子三两 干姜二两 款冬花二两 桂心一尺 麦门冬一升（去心） 大枣一百枚（擘） 粳米二合 桑根白皮一斤

【用法】 上切。以水一斗二升，先煮枣并桑白皮、粳米五沸，后纳诸药煮取三升，分三次服。

【主治】 ①《外台》引《深师方》：肺气不足，逆满上气，咽喉中闭塞短气，寒从背起，口中如含霜雪，语言失声，甚者吐血。②《张氏医通》：肺胃虚寒咳嗽。

【宜忌】 忌生葱。

07629 补肺汤

【方源】《外台》卷十引《集验方》。

【组成】 五味子 白石英（研，绵裹） 钟乳（研，绵裹） 桂心 橘皮 桑根白皮各三两 粳米二合 茯苓 竹叶 款冬花 紫菀各二两 大枣五十枚 杏仁五十枚（去皮尖双仁） 苏子一升 生姜五两 麦门冬四两（去心）

【用法】 上切。以水一斗三升，先煮桑白皮、枣、粳米令熟，去滓，纳诸药，煮取四升，分三次服，日再夜一。

【主治】 肺气不足，咳逆短气，寒从背起，口中如含霜雪，语无音声而渴，舌本干燥。

【宜忌】 忌大醋、生葱。

07630 补肺汤

【方源】《千金》卷十七。

【组成】 款冬花 桂心各二两 桑白皮一斤 生姜 五味子 钟乳各三两 麦门冬四两 粳米五合 大枣十枚

【用法】 上㕮咀。以水一斗二升，先煮粳米、大枣令熟，去之，纳药煎取二升，分三次温服。

【主治】 肺气不足，心腹支满，咳嗽喘逆上气，唾脓血，胸背痛，手足烦热，惕然自惊皮毛起，或哭或歌或怒，干呕心烦，耳中闻风雨声，面色白。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“款花散”。

07631 补肺汤

【方源】《妇人良方》卷六。

【异名】 清金汤。

【组成】 罂粟壳二两（制） 人参 粉草各半两 陈皮 茯苓 杏仁（制） 白术 明阿胶（炒） 北五味子 桑白皮 薏苡仁 紫苏茎各一两

【用法】 上㕮咀为末。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，大枣二枚，乌梅半个，煎至一盏，临卧温服。

【主治】 男子、妇人远年近日肺气咳嗽，上气喘急，喉中涎声，胸满气逆，坐卧不安，饮食不下，及肺感寒邪，咳嗽声重，语音不出，鼻塞头昏。

【备考】 原书云：仆每用无效，遂加百合、贝母（去心）、半夏曲、款冬花各一两，服之良验。

07632 补肺汤

【方源】《直指》卷八。

【组成】 阿胶（炒） 真苏子 北梗 半夏（制） 甘草（炙）各半两 款冬花 紫菀 细辛 杏仁（去皮，焙） 陈皮 桑白皮（炒） 青皮 缩砂仁 五味子 石菖蒲 草果各一分

【用法】 上锉散。每服三钱，加生姜四片，紫苏三叶，水煎服。

【主治】 肺虚气乏久嗽。

07633 补肺饮

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】 阿胶 兜铃 茯苓 五味子 杏仁 麦门冬 炙草 糯米

【用法】 加生姜一片，水煎服。

【主治】 肺虚久嗽无痰。

07634 补肺散

【方源】《普济方》卷二三一引《本事》。

【异名】 补肺汤（《妇人良方》卷五）。

【组成】 桑白皮 熟地黄各二两 人参（去芦） 紫菀 黄耆 五味子各一两

【用法】 上为细末。每服三钱，加四君子汤、秦艽、黄蜡，加蜜少许，水煎，食后服。

【主治】 肺虚劳嗽，盗汗自汗者。

①《普济方》引《本事》：劳嗽。②《校注妇人良方》：劳嗽、五脏亏损，晡时发热，盗汗自汗，唾痰喘嗽。③《医方集解》：肺虚咳嗽。

【宜忌】《妇人良方》：忌房劳，一切生冷、鱼腥、咸毒、腌藏等物。服药止可食淡煮猪蹄肉，仍须先煮熟肉去原汁，再以白汤熟煮。

【方论选录】 ①《医方考》：参、耆脾胃药也，肺虚而益脾胃，乃虚则补其母也；地黄滋肾药也，肺虚而益肾，恐其失养而盗气于母也；五味子酸收药也，咳多必失气，故用酸以收之；紫菀凉肺中之血；桑皮清肺中之气，所谓随其实而泻之。益其所利，去其所害，则肺受益，故曰补肺。②《医方集解》：此手太阴、足少阴药也。肺虚而用参、耆者，脾为肺母，气为水母也。用熟地者，肾为肺子，子虚必盗母气以自养，故用肾药先滋其水，且熟地亦化痰之妙品也。咳则气伤，五味酸温，能敛肺气，咳由火盛，桑皮甘寒，能泻肺火，紫菀辛能润肺，温能补虚，合之而名曰补肺，盖金旺水生，咳嗽自止矣。

07635 补肺散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】 人参一两 五味子五钱 桑白皮二两 款冬花五钱 蛤蚧一对

【用法】 上为细末。每服五钱，沸汤一盏调下。

【主治】 伤寒汗下后，喘咳不止，恐传肺痿。

【备考】 方中款冬花用量原缺，据《普济方》补。

07636 补肺散

【方源】《普济方》卷二八六引《永类钤方》。

【组成】 人参 北五味 黄耆

【用法】 上用羊肺、猪肺，瓦器煮，蘸好钟乳粉食。

【主治】 肺痈。

07637 补肺散

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】 山萸 当归 五味 山药 黄耆 川芎 熟地 木瓜 白术 独活 枣仁各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 胁痛。

07638 补肺散

【方源】《异授眼科》。

【组成】 当归五钱 黄芩一两 桔梗四钱 赤芍五钱 桑皮一两 麻黄四钱 枳壳四钱 葶苈五钱 地骨皮八钱 甘菊四钱 元参八钱 白芷四钱 生地四钱 甘草四钱 金银花四钱

【用法】 上为细末。每服三钱。

【主治】 眼有白翳多者。

07639 补荣汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 当归 芍药 生地 熟地 茯苓（去皮） 栀子 麦门冬（去心） 陈皮各等分 人参减半 甘草减半 乌梅一个

【用法】 上锉一剂，加大枣二枚，水煎，温服。

【主治】 吐血，衄血，咯、咳血，唾血。

07640 补胃丸

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】 桔梗（炒） 吴茱萸（炒） 白术 桂（去粗皮） 人参各一两半 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 枳壳（去瓤，麸炒） 干姜（炮裂） 甘草（炙，锉） 麦芽（炒） 陈曲（炒）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下；米饮亦得，日二夜一。

【功用】 除冷下气。

【主治】 虚劳脾胃虚冷，气满不能食，虽食不消。

07641 补胆汤

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】 黄芩 黄耆 天麻 玄参 地骨皮 泽泻 知母 薄荷 麦冬 充蔚子

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 瞳人干缺外障。

07642 补胎汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】 参 苓 术 草 归 白芍 芎劳 熟地 香附 陈皮 阿胶 杜仲 川断 乌梅 黄耆

【功用】 补胎，益肝气。

【主治】 妊娠一月，胎动不安。

【方论选录】 此方四君配黄耆以益气，四物以养血，杜、断以固肾，陈皮、香附和中宽膈开胃，乌梅为引，皆所以补胎也。

07643 补胎饮

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】 当归 川芎 黄连 白芍 熟地 人参 黄耆 白术 黄芩 香附 陈皮 甘草

【主治】 子鸣。妊娠腹内时似钟鸣，或儿腹中啼哭，母体气衰弱，无血养胎。

【方论选录】 是方四物养血安胎，参、耆、术、草大补元气，佐附、陈行胸滞膈闷，少加芩、连以清上、中二焦虚热，气血足，胎自安。

07644 补宫丸

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】 鹿角霜 白茯 白术 白芍 白芷 牡蛎（煅，童便炒） 山药 龙骨（煅） 赤石脂各等分 干姜（炒）减半

【用法】 醋糊为丸。空心米饮送下。

【功用】 固下元之脱。

【主治】 带下久不止。

07645 补宫汤

【方源】《女科切要》卷二。

【组成】 赤石脂 地榆 归身 艾叶 甘草 石菖蒲 白芍 川芎 蒲黄（炒） 熟地 小蓟

【用法】 水煎，冲热酒半杯服。

【主治】 冲任虚损，崩淋。

07646 补真丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】 肉苁蓉半斤（酒浸一宿，去皱皮，切，焙，为末） 菟丝子（酒浸一宿，净洗，焙，捣末）

【用法】 上为末，取生地黄汁二升，于银石器内慢火熬成膏，另取青竹沥一盏，时时洒膏内，候稠粘，放冷，和前药为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心温酒或盐汤送下，日中再服。

【功用】 壮元气，益精髓，润髭须，久服无暴性。

07647 补真丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】 葫芦巴（炒） 附子（炮，去皮脐） 阳起石（煅） 川乌（炮，去皮） 菟丝子（淘净，酒蒸） 沉香（不见火，别研） 肉豆蔻（面裹，煨） 肉苁蓉（酒浸，焙） 五味子各半两 鹿茸（去毛，酒蒸，焙） 川巴戟（去心） 钟乳粉各一两

【用法】 上为细末，用羊腰子二对，治如食法，葱、椒、酒煮烂，入少酒杵和为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前用米饮、盐汤任下。

【主治】 ①《济生》：房劳过度，真阳衰虚，坎火不温，不能上蒸脾土，冲和失布，中州不运，以致饮食不进，胸膈痞塞，或不食而胀满，或已食而不消，大腑溏泄。②《准绳·女科》：脾胃虚寒，饮食少思，大便不实，胸膈痞闷，吞酸嗳腐，食反不化。

07648 补真丹

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】 禹余粮 乌金石各四两 龙骨 赤石脂 牡蛎 艾各二两（醋煮一伏时） 川乌头 防风 芎各一两 吴茱萸 干姜各半两

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心酒或醋送下。

【主治】 血脏虚冷，崩中漏下，或月事频多，面色痿黄，四肢少力，脐腹疞刺，腰胯疼痛。

07649 补真丹

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】 黑附子一两（煨） 阳起石（火烧，酒淬）三钱 海马二钱 乳香 雄黄（为衣） 血竭各三钱 石莲子（去壳皮心） 黑锡（炒，去砂子）半两 石燕子（烧，以醋淬） 一对 麝香一分

【用法】 上为细末，面糊为丸。每服二十丸，空心五香汤送下。

【功用】 兴阳固肾。

【主治】 男子元脏虚冷。

【备考】 方中石燕子用量原缺，据《普济方》补。

07650 补真汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】 紫河车（干切）二钱 熟地五钱 附子一钱 山萸肉一钱五分 当归二钱 白芍一钱五分（酒炒） 茯神二钱 丹参二钱 远志五分（甘草水炒） 麦冬二钱 石斛二钱 独活一钱（酒炒） 牛膝二钱 红枣十枚 姜三片

【主治】 中风僵卧，气血皆虚，手不能举，足不能行，语言謇涩。

07651 补脑丸

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】 人参 麦门冬（去心） 茯苓 杜仲（盐水炒） 肉苁蓉（酒净） 山药（饭上蒸，切） 熟地黄 山茱肉各二两 黄耆（蜜水炒） 枸杞子 菟丝子各三两 鹿茸（酒浆微炙，切片） 五味子各一两

【用法】 上为末，另捣苁蓉、枸杞、熟地、麦冬，略添炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四钱，白滚汤送下。

【主治】 鼻渊久不愈。

07652 补益丸

【方源】《医学纲目》卷十七引丹溪方。

【组成】 龟版（酒炙）一两 琐阳（酒浸）一两 生地（酒浸） 一两半 归身（酒浸）一两 陈皮一两 杜牛膝（酒浸）一两 白术二两 干姜七钱半 黄柏（炒）半两 虎胫骨（酒炙）半两 五味子二钱 茯苓半两 白芍药（酒浸）一两 甘草（炙）一钱 菟丝子（酒蒸熟，研如糊，入余药末，晒干）一两

【用法】 上为末，紫河车为丸；如无紫河车，猪脑骨髓亦得。

【主治】 ①《医学纲目》引丹溪方：痿证。②《医宗必读》：肝肾下虚。

【备考】 方中菟丝子用量原缺，据《准绳·类方》补。

07653 补虚汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】人参一钱半 黄耆三钱（蜜炙） 白术一钱半（制） 当归三钱 川芎一钱 茯神一钱半（去木） 炙草八分 生姜三片 大枣三枚

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】产后虚羸寒热，脉软弦涩。

【方论选录】产后气虚邪伏，营气不振，故虚羸困乏，寒热不止。人参扶元补气以御邪，白术健脾生血以壮气，黄耆补气益卫，当归养血益营，茯神安神定志，川芎活血行气，炙草以缓中益胃，姜、枣以调和营卫。水煎温服，使元气内充，则虚邪外散而营卫调和。

07654 补虚汤

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】人参 黄耆（蜜炙）各一钱半 肉桂 炙甘草各五分 川芎 当归 白芍 白术各一钱（蜜炙）

【用法】上加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】蓐劳。产理不顺，调理失宜，或忧劳思虑，伤其脏腑，营卫不宣，令人寒热如疟，头痛自汗，痰咳气逆，虚羸喘乏，体倦肢怠。

【加减】热轻，加茯苓二钱；热重，加黄芩（酒炒）一钱，热甚，加干姜（炒黑）一钱。

07655 补虚饮

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】人参 麦门冬 山药各一钱 茯苓 茯神各八分 半夏 黄耆各七分 前胡 熟地各五分 枳壳 远志 甘草各一分

【用法】加生姜五片，秫米一撮，水煎服。

【主治】七情郁结，痰随气上留阳经，心中怔悸，四肢缓弱，翕然面热，头目眩冒，如欲摇动，一切风虚眩晕。

07656 补脾汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】黄耆 白茯苓各一两半 杜仲（去皮，锉，姜汁淹，炒断丝）三两 磁石（煅，淬） 五味子各三两 白术 白石英（捶碎）各二两半

【用法】上锉散。每服四钱，水一盏半，煎七分，去滓，空心温服。

【主治】膀胱虚冷，脚筋急，腹痛引腰背，不可屈伸，耳聋，目眩眩，坐欲倒，小便数，遗白，面黑如炭。

07657 补筋丸

【方源】《金鉴》卷八十九。

【组成】五加皮 蛇床子 好沉香 丁香 川牛膝 白云苓 白莲蕊 肉苁蓉 菟丝子 当归（酒洗） 熟地黄 牡丹皮 宣木瓜各一两 怀山药八钱 人参 广木香各三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每丸重三钱，用好无灰酒送下。

【主治】跌仆踒闪，筋翻筋挛，筋胀筋粗，筋聚骨错，血脉壅滞，宣肿青紫疼痛。

07658 补脾丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】丁香 人参（去芦头） 胡椒 木香 茴香 肉桂（去粗皮） 干姜（炮） 附子（炮，去皮脐） 缩砂仁各一两 神曲（炒） 大麦芽（炒） 木瓜 甘草（炒） 白术 乌梅肉（炒）各三分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两作十一丸。每服一丸，细嚼，食前米饮送下。

【主治】中焦不和，脾胃虚弱，心腹冷痛，泄利不时，不思饮食，呕吐痰逆，面色痿黄，肌肉消瘦，怠惰嗜卧，噎塞不通。

07659 补脾丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】白术（去芦）十两（分四分，一肉蔻、二五味、三故纸、四吴茱萸，各二两，拌炒，去四味，只用白术） 莲肉（去心，炒） 人参各一两 甘草 白芍（炒）各五钱 木香（煨）四钱 山药（炒） 陈皮各七钱 干姜三钱（炒）

【用法】上为细末，煮粥，加炒神曲末，打糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心淡姜汤送下。

【主治】滑泻，日夜无度，肠胃虚寒不禁，老人、弱人脾泄、飧泄。

07660 补脾汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】人参 茯苓 草果（去皮） 干姜（炮）各一两 麦芽（炒） 甘草（炙）各一两半 厚朴（去皮，姜制，炒） 橘皮 白术各三分

【用法】上锉散。每服四钱，水一盏半，煎七分，去滓，食前服。

【主治】脾虚寒病，泄泻腹满，气逆呕吐，心烦不得卧，肠鸣虚胀，饮食不消，劳倦虚羸，喜噫，四肢逆冷，多卧不起，情意不乐。

07661 补脾饮

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】白术 黄耆 茯苓 山药 广皮 当归 熟地 人参 香附 补骨脂 炙甘草

【功用】大补脾胃。

【主治】 妇人脾胃虚，水谷减少，血无由生，始则经来少而色淡，后则闭绝不通，饮食日减，面色萎黄，肌肉消瘦，渐至尪羸。

【方论选录】 是方四君加黄耆、山药、甘草以补脾，加香附、广皮以运脾，加归、地以补左尺，补骨脂以补右尺。胃旺则能纳水谷，脾旺则能运水谷，血渐充足而经自应时而至。

07662 补脾散

【方源】《三因》卷十一。

【组成】 麦芽（炒）三两 神曲（炒）二两 茴香（炒） 草果（逐个用面裹，煨熟） 厚朴（制） 干姜（炮） 陈皮各一两 木香（生）半两 甘草（炙）半两

【用法】 上为末。脾泄泻，诃子汤入盐，调下二钱；脾虚，肠鸣，气不和，泻不止，炒姜酒调下；常服盐汤点，空心食前服。

【主治】 脾泄不止，食积不消，癥瘕块结，大肠滑泄，脏毒下利，腹痛肠鸣。

07663 补漏丹

【方源】《外科大成》卷四。

【异名】 鹿茸补漏丸（《外科证治全书》卷三）。

【组成】 鹿茸（去毛，酥炙） 大附子（炮，去皮脐） 食盐各等分

【用法】 上为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心黄酒送下。

【主治】 心胸有孔久不愈，及胃痈、井疽、肝痈、心瘘。

07664 补髓丹

【方源】《百一》卷十一。

【组成】 杜仲（去粗皮，炒黑色） 补骨脂各十两（用芝麻五两同炒，候芝麻黑色无声为度，筛去芝麻） 鹿茸二两（燎去毛，酒炙） 没药一两（别研）

【用法】 上为细末，入没药和匀，再用胡桃肉三十个，汤浸去皮，杵为膏，入面少许，酒糊为丸，如梧桐子大，焙干。每服一百粒，食前米饮送下；温酒、盐汤亦得，二日一次。

【功用】 ①《百一》：升神水于百会，降神火于涌泉，还淳返朴，体合自然，骨正筋柔，益寿延年。②《直指》：补益真元。

【主治】 ①《百一》：腰痛、臂痛。②《直指》：肾虚腰痛。

07665 补骨脂丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】 补骨脂五两（微炒） 雄雀儿粪二两（头尖者是） 熟干地黄三两 木香三两 安息香一两（以胡桃仁捣熟） 硫黄二两（细研，水飞过）

【用法】 上为末，炼蜜并安息香为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【功用】 久服强力壮气，轻身明目，补填精髓，润泽颜色。

【主治】 男子五劳七伤，久虚积冷，腰胯疼痛，行履无力，脾胃不调，或时自泻，肾气乏弱，梦泄盗汗，终日恍惚，情常不乐，风湿外伤，阳道衰绝。

07666 补骨脂丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】 补骨脂二两（微炒） 葫芦巴一两（微炒） 胡桃瓤不计多少

【用法】 上为末，后用胡桃捣和，调入糯米粥少许为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温酒送下；盐汤亦得。

【主治】 肾脏虚冷，骨痿少力，腰膝沉重，行步艰难，气虚不思饮食。

07667 补骨脂丸

【方源】《本草纲目》卷十四引《局方》。

【组成】 补骨脂四两（炒香） 菟丝子四两（酒蒸） 胡桃肉一两（去皮） 乳香 没药 沉香各二钱半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心盐汤、温酒任下，自夏至起，冬至止，每日一次。

【功用】 壮筋骨，益元气。

【主治】 下元虚败，脚手沉重，夜多盗汗，纵欲所致。

07668 补骨脂丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】 补骨脂（炒）四两 龙骨 山茱萸 巴戟天（去心）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤或酒送下。

【主治】 梦泄。

07669 补骨脂丸

【方源】《普济方》卷一八〇引《郑氏家传渴浊方》。

【组成】 益智仁二两（去壳，青盐五钱炒） 川巴戟一两（去心） 补骨脂一两（净洗） 龙骨一两（火煅）

【用法】 上为末，羯羊肾子去膜并硬心子，细切，入瓦盆内，煮烂如泥，量入药末为丸，如梧桐

子大。每服一百丸，盐米汤送下。

【主治】 梦遗。

07670 补骨脂丸

【方源】《保命歌括》卷十三。

【组成】 川萆薢四两（分四制，童便、米泔、盐汤、酒各浸一宿，晒干）杜仲（如上制）四两 破故纸（炒香）三两 胡桃肉（去皮，另研如泥）四两

【用法】 上为末，不犯铁器，入胡桃肉，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下。干物压之。

【主治】 肾虚及寒湿一切腰痛。

07671 补骨脂丸

【方源】《妇科玉尺》卷五。

【组成】 补骨脂 杜仲 醋牡蛎 五味子各三两 车前子二两 艾叶一两

【主治】 年老人久带。

07672 补骨脂酊

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 补骨脂六两 75%酒精十二两

【用法】 将补骨脂碾碎，置酒精内，浸泡七昼夜，过滤去滓，用棉球蘸药涂子患处，并摩擦五至十五分钟。

【功用】 ①《赵炳南临床经验集》：调和气血，活血通络。②《中西医结合皮肤病学》：润肤止痒，生发祛白斑。

【主治】 ①《赵炳南临床经验集》：白癜风，扁平疣。②《中西医结合皮肤病学》：斑秃，神经性皮炎，瘙痒症。

07673 补骨脂散

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】 补骨脂（炒）一两 茴香子（舶上者，炒）三分

【用法】 上为散。每服二钱匕，空心、食前温酒或盐汤调下。

【主治】 ①《圣济总录》：虚劳肾气衰惫，梦寐失精，兼治肾虚腰痛。②《魏氏家藏方》：肾气虚冷，小便无度。

【备考】 本方改为丸剂，名“破故纸丸”（见《魏氏家藏方》）。

07674 补骨脂煎

【方源】 方出《本草图经》引《续传信方》（见《证类本草》卷九），名见《寿亲养老》卷四。

【异名】 补骨脂散（《得效》卷八）。

【组成】 破故纸十两 胡桃瓤二十两

【用法】 破故纸净择去皮，洗过，捣筛令细，胡桃瓤汤浸去皮，细研如泥，即入前末，更以好蜜和搅令匀如饴糖，盛于瓷器中 旦日以暖酒二合，调药一匙服之，便以饭压；如不饮人，以暖熟水调服亦可。

【功用】 ①《本草图经》引《续传信方》：延年益气，悦心明目，补添筋骨。②《圣惠》：暖下元，补筋骨，久服令人壮健悦泽。

【主治】 ①《本草图经》引《续传信方》：卑湿伤于内外，众疾俱作，阳气衰绝，服乳石补益之药不效者。②《医方类聚》引《经验秘方》：汗湿脚气。

【备考】 本方改为丸剂，名“补骨脂丸”（见《圣惠》）、“暖下丸”（见《朱氏集验方》）。

07675 补髓神丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 当归 白芍各一两 郁李仁 黑荆芥 丹皮各三钱 麦冬 川芎 藏蕊各五钱 细辛五分

【用法】 水煎服。二剂愈。

【功用】 大补肝气。

【主治】 因脑气不足，无故忽视物为两。

07676 补天大造丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】 紫河车一具（取男胎首生者佳，如无，得壮盛妇人产者亦好。先用米泔水将紫河车浸，洗净，不动筋膜，将竹器全盛，长流水浸一刻，以瓦盆全盛，木甑内蒸，文武火蒸极熟如糊取出） 怀生地黄（酒浸）一两五钱 怀熟地黄（酒蒸）二两 麦门冬（泡，去心）一两五钱 天门冬（泡，去心）一两五钱 牛膝（去芦，酒洗）一两 枸杞子七钱 五味子七钱 当归（酒洗）一两 杜仲（去皮，酥炙）一两半 小茴香（酒炒）一两 川黄柏（去皮，酒炒）一两 白术（去芦，炒）一两 陈皮（去白）八钱 干姜（炮）二钱 侧柏叶（采向东嫩枝条，隔纸焙干）二两

【用法】 上为细末，用蒸紫河车汁并河车共为末，为丸如梧桐子大，忌铁器，俱用石臼舂杵，或石磨磨之。每服一百丸，空心米汤送下，一日一次，有病者一日二次。

【功用】 滋养元气，延年益寿，壮阳元，滋坎水，年过四十，服之接补。

【主治】 虚烦之人，房室过度，五心烦热。

【加减】 血虚，加当归，地黄倍之；气虚，加人参、黄耆（蜜炙）各一两；肾虚，加覆盆子（炒）、小茴香、巴戟（去心）、山茱萸（去核）；腰痛，加

苍术（盐水炒）、萆薢、琐阳（酥炙）、续断（酒洗）；骨蒸，加地骨皮、知母（酒炒）；妇人去黄柏，加川芎、香附、条芩（俱酒炒）各一两。

07677 补天大造丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】人参二两 黄耆（蜜炙） 白术（陈土蒸）各三两 当归（酒蒸） 枣仁（去壳，炒） 远志（去心，甘草水泡，炒） 白芍（酒炒） 山药（乳蒸） 茯苓（乳蒸）各一两五钱 枸杞子（酒蒸） 大熟地（九蒸、晒）各四两 河车一具（甘草水洗） 鹿角一斤（熬膏） 龟版八两（与鹿角同熬膏）

【用法】以龟、鹿胶和药，炼蜜为丸。每服四钱，早晨开水送下。

【功用】补五脏虚损。

【加减】阴虚内热甚者，加丹皮二两；阳虚内寒者，加肉桂五钱。

07678 补天育麟丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】鹿茸一具 人参十两 山茱萸 熟地肉苁蓉 巴戟天各六两 炒白术 炙黄耆 淫羊藿 山药 芡实各八两 当归 蛇床子 菟丝子各四两 柏子仁 肉桂各三两 麦冬五两 北五味 锁阳各二两 人胞一个（火焙） 海狗肾一根 蛤蚧二条 黄连一两 砂仁五钱

【用法】上各为末，炼蜜为丸。每服五钱，早、晚各一次，连服二月。无海狗肾，可用大海马二个代之；不用蛇床子，可用附子七钱（甘草三钱，煮汤泡浸制）代之。

【功用】补心火。

【主治】心肾两虚，入房早泄。

07679 补中地黄汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】黄耆一钱 人参 当归 白术 山萸 山药各八分 陈皮 茯苓各八分 泽泻五分 丹皮五分 熟地一钱五分 升麻三分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】①《嵩崖尊生》：气血虚弱，无精神，体乏，腰腿酸。②《杂病源流犀烛》：积劳，肾病精浊，胫酸，腰背拘急。

07680 补中虎潜丸

【方源】《便览》卷三。

【组成】人参一两 黄耆（蜜炙）一两 白芍（炒）一两 当归（酒洗）一两 黄柏（盐水炒）一两 山药一两 牛膝（酒炒）一两 锁阳（酒浸，炒）一两或三钱 枸杞子五钱 虎胫骨（酥炙）五钱 龟版（酥炙）五钱 菟丝子（酒浸，炒）五钱 破故纸（炒）七钱半 杜仲（炒去丝）五味子各七钱半 熟地二两

【用法】上为末，炼蜜和猪脊髓为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，空心温酒或盐汤送下。

【功用】无病常服，补肾固精。

【主治】下元虚损，腰膝无力，精神倦怠，颜色不华，头目昏眩，滑精梦遗，盗汗自汗，一切不足之症。

07681 补中养胃汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】人参 白术（蜜炙） 当归头 侧柏叶（炒） 生地黄各一钱 炙甘草五分 茯苓 川芎 苏叶各八分

【用法】水二钟，煎一钟，食前服。

【主治】崩漏不止，气血皆虚。

【加减】血晕，加荆芥、泽兰叶各八分；虚汗，加黄耆（蜜炙）一钱，酸枣仁八分；崩中日久，白带不止，加龙骨、牡蛎粉各一钱；血崩日久不止，加棕榈皮（陈败者良，烧灰存性）、新丝棉（烧灰存性）各一钱；血得热则崩不止，唇干咽燥，大小便闭结，加黄连、黄芩、山栀（俱酒炒）各五分；血多而紫如泥，凝块，亦加黄连、黄芩、山栀（俱酒炒）各五分。

07682 补中益气汤

【方源】《内外伤辨》卷中。

【异名】医王汤（《伤寒论今释》卷七引《方函口诀》）。

【组成】黄耆一钱 甘草（炙）五分 人参（去芦） 升麻 柴胡 橘皮 当归身（酒洗） 白术各三分

【用法】上㕮咀，都作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，早饭后温服。如伤之重者，二服而愈。量轻重治之。

【功用】《方剂学》：补中益气，升阳举陷。

【主治】脾胃气虚，发热，自汗出，渴喜温饮，少气懒言，体倦肢软，面色㿠白，大便稀溏，脉洪而虚，舌质淡，苔薄白。或气虚下陷，脱肛，子宫下垂，久泻，久痢，久疟等，以及清阳下陷诸证。

①《内外伤辨》：饮食失节，寒温不适，脾胃受伤；喜怒忧恐，劳役过度，损耗元气，脾胃虚衰，元气不足，而心火独盛，心火者，阴火也，起于下焦，其系系于心，心不主令，相火代之，相火，下焦胞络之火，元气之贼也，火与元气不能两立，

胜则一负，脾胃气虚，则下流于肾，阴火得以乘其上位。始得之则气高而喘，身热而烦，其脉洪大而头痛，或渴不止，皮肤不任风寒而生寒热。②《小儿痘疹》：中气不足，困睡发热，元气虚弱，感冒风寒诸症。③《卫生宝鉴·补遗》：始为热中病，似外感阳证，头痛大作，四肢痠闷，气高而喘，身热而烦，上气鼻息不调，四肢困倦不收，无气以动，无气以言，或烦燥闷乱，心烦不安，或渴不止，病久者，邪气在血脉中，有湿则不渴，或表虚不任风寒，目不欲开，恶食，口不知味，右手气口脉大，大于左手人迎三倍，其气口脉急大而数，时一代而涩，其右关脾脉，比五脉独大而数，数中时显一代，右关胃脉损弱，隐而不见，惟内显脾脉如此。④《玉机微义》：妇人室女，经候不调，脉微，食少，体倦或热。⑤《袖珍》：五劳七伤，喘气不接，涎痰稠粘，骨蒸潮热。⑥《明医杂著》：中气不足，或误服克伐，四肢倦怠，口干发热，饮食无味，或饮食失节，劳倦身热，脉洪大而无力，或头痛恶寒，自汗，或气高而喘，身热而烦，脉微细软弱，或中气虚弱而不能摄血，或饮食劳倦而崇疟、痢，或疟、痢等症，因脾胃虚而不能愈者，或元气虚弱，感冒风寒不胜发表，或入房而后劳役感冒，或劳役感冒而后入房者。⑦《口齿类要》：中气伤损，唇口生疮，齿牙作痛，恶寒发热，肢体倦怠，食少自汗，或头痛身热，烦躁发渴，气喘，脉大而虚，或微细软弱。⑧《正体类要》：跌扑等损伤元气，或过服克伐，恶寒发热，肢体倦怠，血气虚弱不能生肌收敛。⑨《外科理例》：疮疡元气不足，四肢倦怠，口干发热，饮食无味，或头痛，恶寒自汗，脉洪大无力。⑩《校注妇人良方》：妇人脾虚，湿热下注，两臁生疮，漫肿作痛，或不肿不痛。⑪《医方考》：疟疾经年不愈。⑫《医方考》：狐疝，昼则气出而肾囊肿大，令人不堪，夜则气入而肿胀皆消，少无疾苦。中气虚弱，痘不起胀。⑬《寿世保元》：虚人脾气下陷，大便下血。⑭《济阴纲目》：脾胃受伤，阳气下陷，白带久不止。⑮《医灯续焰》：劳淋，尿留茎内，数起不出，引小腹痛，小便不利，劳倦即发。或因清阳之气不足则不能上达，头目空虚，眩晕时作，其脉右手大而无力，或胃气下陷不能统血，血露不绝，或小儿五软。⑯《金鉴》：肠胃气虚，便秘。⑰《沈氏经验方》：子宫下脱。⑱《成方便读》：中气不足，营卫衰弱，易感风寒，头痛身热，及烦劳内伤，清阳下陷等。

【宜忌】《张氏医通》：下元虚者禁用。

【加减】手指之肌表热，服补中益气汤一二服后，若更烦乱，腹中或周身有刺痛，皆血涩不足，加当归身五分或一钱；如精神短少，加人参五分，五味子二十个；头痛，加蔓荆子三分，痛甚，加川芎五分；顶痛脑痛，加藁本五分，细辛三分；如头痛有痰，沉重懒倦者，乃太阴痰厥头痛，加半夏五分，生姜三分；耳鸣，目黄，颊颔肿，颈、肩、臑、肘、臂外后廉痛，面赤，脉洪大者，以羌活一钱，防风、藁本各七分，甘草五分，通其经血，加黄芩、黄连各三分，消其肿，人参五分，黄耆七分，益元气而泻火邪，另作一服与之；嗌痛颔肿，脉洪大，面赤者，加黄芩、甘草各三分，桔梗七分；口干咽干者，加葛根五分升引胃气上行以润之；如夏月咳嗽者，加五味子二十五个，麦门冬（去心）五分；如冬月咳嗽，加不去根节麻黄五分，秋凉亦加；如春月天温，只加佛耳草、款冬花各五分；若久病痰嗽，肺中伏火，去人参，以防痰嗽增益；食不下，乃胸中胃上有寒，或气涩滞，加青皮、木香各三分，陈皮五分；如冬月，加益智仁、草豆蔻仁各五分；如夏月，少加黄芩、黄连各五分；如秋月，加槟榔、草豆蔻、白豆蔻、缩砂各五分；如春初犹寒，少加辛热之剂，以补春气不足，为风药之佐，益智、草豆蔻可也；心下痞、夯闷者，加芍药、黄连各一钱；如痞腹胀，加枳实、木香、缩砂仁各三分，厚朴七分，如天寒，少加干姜或中桂；心下痞，觉中寒，加附子、黄连各一钱；不能食而心下痞，加生姜、陈皮各一钱；能食而心下痞，加黄连五分、枳实三分；脉缓有痰而痞，加半夏、黄连各一钱；脉弦，四肢满，便难而心下痞，加黄连五分，柴胡七分，甘草三分；腹中痛者，加白芍药五分，甘草三分；如恶寒觉冷痛，加中桂五分；如夏月腹中痛，不恶寒，不恶热者，加黄芩、甘草各五分，芍药一钱，以治时热；腹痛在寒凉时，加半夏、益智、草豆蔻之类；胁下痛，或缩急，俱加柴胡三分，甚则五分，甘草三分；脐下痛者，加真熟地黄五分，如不已，乃大寒，加肉桂五分；如卧而多惊，小便淋漓者，邪在少阳、厥阴，宜太阳经所加之药，更添柴胡五分，如淋，加泽泻五分；大便秘涩，加当归一钱，大黄（酒洗，煨）五分或一钱；如有不大便者，煎成正药，先用清者一口，调玄明粉五分或一钱，大便行则止；脚膝痿软，行步乏力，或痛，乃肾肝伏热，少加黄柏五分，空心服，不已，更加汉防已五分；脉缓，沉困怠惰无力者，加苍术、人参、泽泻、白术、茯苓、五味子各五分。

【方论选录】 ①《内外伤辨》：夫脾胃虚者，因饮食劳倦，心火亢甚，而乘其土位，其次肺气受邪，须用黄耆最多，人参、甘草次之。脾胃一虚，肺气先绝，故用黄耆以益皮毛而闭腠理，不令自汗，损伤元气；上喘气短，人参以补之；心火乘脾，须炙甘草之甘以泻火热，而补脾胃中元气；白术若甘温，除胃中热，利腰脐间血；胃中清气在下，必加升麻、柴胡以引之，引黄耆、人参、甘草甘温之气味上升，能补卫气之散解，而实其表也，又缓带脉之缩急，二味苦平，味之薄者，阴中之阳，引清气上升；气乱于胸中，为清浊相干，用去白陈皮以理之，又能助阳气上升，以散滞气，助诸辛甘为用。②《医方集解》：此足太阴、阳明药也。肺者气之本，黄耆补肺固表为君；脾者肺之本，人参、甘草补脾益气和中，泻火为臣；白术燥湿强脾，当归和血养阴为佐；升麻以升阳明清气，柴胡以升少阳清气，阳升则万物生，清升则浊阴降，加陈皮者，以通利其气；生姜辛温，大枣甘温，用以和营卫，开腠理，致津液，诸虚不足，先建其中。③《法律》：东垣所论饮食劳倦，内伤元气，则胃脘之阳不能升举，并心肺之气，陷入于中焦，而用补中益气治之。方中佐以柴胡、升麻二味，一从左旋，一从右旋，旋转于胃之左右，升举其上焦所陷之气，非自腹中而升举之也。其清气下入腹中，久为飧泄，并可多用升、柴，从腹中而升举之矣。若阳气未必陷下，反升举其阴气，干犯阳位，为变岂小哉。更有阴气素惯上干清阳，而胸中之肉隆耸为膜，胸间之气漫散为胀者，而误施此法，天翻地覆，九道皆塞，有濒于死而坐困耳。

【临证举例】 ①风症 《明医杂著》：一儒者，素勤苦，恶风寒，鼻流清涕，寒噤，喷嚏，属脾肺气虚，反服祛风之药，肢体麻倦，痰涎自出，殊类风症。余以为风剂耗散元气，阴火乘其土位。以补中益气汤加麦冬、五味子治之而愈。②头痛《续名医类案》：某患头痛累月，苦不可忍，咸用散风清火之剂。诊其脉浮虚不鼓，语言懒怯，肢体恶寒。此劳倦伤中，清阳之气不升，浊阴之气不降，故汗之反虚其表，清之益伤其中，其恶寒乃气虚，不能上荣面外固也，况脉象浮虚，体倦语怯，尤为中气弱之验，与补中益气汤，一剂和，二剂已。③内伤发热 《四明医案》：庚子六月，吕用晦病热证。察其神气，内伤证也。询其致病之由，曰：偶半夜，出庭外与人语，移时就寝，次日便不爽快，渐次发热，饮食俱废，不更衣者数日矣，服药以来，百无一效。予曰：粗工皆以为风露所逼，故重用辛散，不进饮食，便曰停食，妄用消导，敦知“邪之所凑，其气必虚”，若投补中益气汤，则汗至而便通，热自退矣。遂取药立煎饮之，顷之索器，下燥矢数十枚，觉胸膈通泰，是晚热退进粥，连服数剂而愈。④崩漏 《薛立斋医案》：归大化之内，患崩漏，昏愦，发热不寐，或谓血热妄行，投以寒剂益甚，或谓胎成受伤，投以止血亦不效。立斋诊之曰：此脾虚气弱，无以统摄血，法当补脾而血自止。用补中益气汤加炮姜，不数剂而效。⑤癃闭《福建中医药》（1986；4:53）：某女，28岁，产后尿闭五天，面色苍白，少气懒言，汗出多，倦怠乏力，嗜睡，尿意急迫而不得出，少腹坠胀，恶露淡红，脉沉弱缓，舌质淡红，齿印。此为气血虚弱，中气下陷，膀胱气化不利。以补中益气汤加桃仁、红花、木通，五剂愈。⑥髂窝脓肿 《浙江中医杂志》（1980；3:137）某男，21岁，右髂窝脓肿，切排后半月，疮口不敛，面色苍白，精神疲乏，少寐纳差，舌淡脉细，疮口肉色灰暗，脓液清稀，为气血亏虚，中气不足。投补中益气汤，去柴胡加赤芍、川芎，十剂愈。

【现代研究】 ①治疗子宫脱垂的药理学研究《天津医药杂志》（1960；1:4）：本方对在体或离体子宫及其周围组织有选择性兴奋作用。小量补中益气汤可以兴奋心肌，使其收缩加强，过量则呈抑制作用。对小肠的作用较复杂，当蠕动亢进时呈抑制作用，当肠管处于抑制状态时，则使之蠕动增强。实验中还可以看出，在有升麻、柴胡的制剂中，对动物的作用明显，去掉升麻、柴胡，其作用减小，且不持久。②对实验肿瘤发生发展的影响《中医药研究参考》（1977；3:20）：本方对荷瘤小鼠的作用，提示能改善瘤机体的蛋白质代谢，防止贫血发展，增强体力。

【备考】 ①《小儿痘疹》有生姜、大枣。②本方改为丸剂，名“补中益气丸”（见《中药成方配本》苏州方）；本方改为片剂，名“补中益气片”（见《天津市中成药规范》）。

07683 补中益气汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】 黄耆一钱五分 甘草（炙） 人参 当归 白术各一钱 升麻 柴胡 陈皮各三分 麦门冬六分 五味子（炒）五分

【用法】 水二钟，加生姜三片，大枣二枚，煎一钟，空心热服。

【主治】 疮疡元气不足，四肢倦怠，口干发热，饮食无味，或饮食失节，或劳倦身热，脉洪大而无

力，或头痛而恶寒，或声高而喘，身热而烦。

07684 补中益气汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】人参五分 当归五分 白术五分 白茯苓一钱 川芎四分 白芍四分 萝卜子四分 木香三分

【主治】产后中风，气不足，微满，误服耗气药而胀者。

07685 补气升肠饮

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参一两（去芦） 生黄耆一两 当归一两（酒洗） 白术五钱（土炒） 川芎三钱（酒洗） 升麻一分

【用法】水煎服。

【主治】产妇气虚，肠下不收。

07686 补气运脾丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】人参二钱 白术三钱 茯苓 橘红各一钱半 黄耆一钱 砂仁八分 炙草四分 半夏一钱（无痰不用） 生姜三片 大枣二枚

【主治】胃汗。胃家虚，水谷气脱散，汗从胃自出。

07687 补气固经丸

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】人参 炙草 茯苓 白术 黄耆 砂仁

【主治】妇人气虚不能摄血，经水来而不止者。

【备考】《妇科大略》本方用法：共为细末，炼蜜为丸。

07688 补气养血汤

【方源】《中医原著选读》引关幼波方（见《古今名方》）。

【组成】生黄耆 首乌 白芍 川续断各15克 当归 丹参 黄精 生地 五味子各12克 生甘草9克

【功用】补气养血柔肝。

【主治】慢性迁延性肝炎、早期肝硬化，肝功能长期不正常，证属气血两虚者。症见心悸，气短，全身无力，面色苍白，消瘦，精神不振，右胁隐痛，舌苔薄白或无苔，脉沉细。

【加减】转氨酶长期不降，舌质红者，加土茯苓15克，大枣10枚，或土贝母15克；舌质淡者，加白芷9克；麝香草酚浊度试验和麝香草酚絮状试验长期不正常者，每日加服河车大造丸一丸；血浆蛋白倒置者，加龟版、鳖甲各12克；肝肿大，加延胡索、草河车、泽兰各9克；脾肿大，加生牡蛎15克，地龙9克；食欲不振，加山楂、白术各9克；牙出血，加小蓟、血余炭各12克。

07689 补气养荣汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】黄耆一钱 白术一钱 当归四钱 人参二钱 陈皮四分 炙草四分 熟地二钱 川芎二钱 黑姜四分

【主治】产后气短促，血块不痛。

【加减】如手足冷，加熟附子一钱；汗多，加麻黄根一钱，浮麦一小撮；渴，加麦冬一钱，五味子十粒；大便不通，加肉苁蓉一钱，麻仁一撮；伤面饭，加炒神曲一钱，炒麦芽一钱；伤肉食，加山楂、砂仁各五分。

【备考】原书按：麦芽有回乳之害，用者慎之。黄耆、白术一作各二钱，凡止汗用浮麦宜炒。

07690 补气黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】黄耆（锉） 人参 茯神（去木） 麦门冬（去心，焙） 白术 五味子 桂（去粗皮） 熟干地黄（焙） 陈橘皮（去白，焙） 阿胶（炙燥）各一两 当归（切，焙） 白芍药 牛膝（酒浸，切，焙）各三分 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片、大枣二枚（擘破），同煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肺劳饮食减少，气虚无力，手足颤掉，面浮喘嗽。

07691 补气解晕汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参一两 生黄耆一两 当归一两（不酒洗） 黑芥穗三钱 姜炭一钱

【用法】水煎服。一剂而晕止，二剂而心定，三剂而血生，四剂而血旺，再不晕矣。

【功效】补气以生血。

【主治】妇人产后气虚血晕。

【方论选录】本方用参、耆以补气，使气壮而生血也；用当归以补血，使血旺而养气也。气血两旺，而心自定矣。用荆芥炭引血归经，用姜炭以行瘀引阳，瘀血去而正血归，不必解晕而晕自解矣。

07692 补心四物汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】酒生地12克 麦门冬 当归各9克 酒白芍 炒枣仁各6克 远志 甘草各3克

【功用】滋阴降火，养血宁心。

【主治】心阴暗耗，虚火上炎，大眦肉浮胀，赤

脉色淡，且兼心悸，少寐，舌红，脉细数。

【方论选录】 方中酒生地、麦门冬补心阴以降虚火，当归、酒白芍、炒枣仁、远志养心血以安神宁志，甘草清心益脾兼和诸药。

07693 补心宁志丸

【方源】《广笔记》。

【组成】 天竺黄（另研如面）五钱 沉香（另研如面）三钱 天门冬（去心，酒洗，蒸）二两 白芍药（酒炒）三两 白茯神（去心）四两 远志肉（甘草汁浸，蒸）二两 麦门冬（去心）二两 炙甘草六钱 旋覆花一两五钱 真苏子（研）一两 香附（醋浸，晒干，童便拌，瓦上炒）三两 半夏（姜汁拌，以明矾末少许同浸）二两 皂角荚（不蛀者，去黑皮，酥炒，去子取末）二两

【用法】 上为末和匀，怀山药粉糊为丸，如豌豆大，朱砂一两（研如法）为衣。每服三钱，用竹沥点汤下。

【主治】 痫症。

07694 补心神效丸

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】 党参（去芦，米炒） 淮山（炒） 茯神各六钱 远志（去心）一钱五分 熟地四钱 枣仁（炒，即杵）三钱 北味二钱

【用法】 加另研柏子仁末三钱，炼蜜为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服三钱，党参、龙骨煎汤送下。

【主治】 心神不交，夜梦遗泄。

07695 补水宁神汤

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】 熟地黄 生地各二钱 白芍药 当归 麦门冬（去心） 茯神各一钱半 五味子三十粒 甘草（用生）六分

【用法】 上锉剂。白水二钟，煎至八分，去滓，空心温服。

【功用】 补肾水，宁心神。

【主治】 神光自现症。

【方论选录】 肾水亏虚，真阴不足，故用熟地黄，乃大生水之剂，大补真阴；生地黄有滋阴退热之效；麦门冬有清心降火之功；补血滋阴，须凭当归、白芍；神光荡漾，昼夜不宁，此神思间无形之火妄动故也，必用茯神与五味子，养精安神定志，能敛元精之气不走；细生甘草降神中之火，非此不能治。若然，则肾水上升，心火下降而神自宁，光亦可定矣。

07696 补北健行汤

【方源】《杂症会心录》。

【组成】 生地三钱 熟地三钱 茯苓四钱 丹皮一钱 龟版三钱 女贞子二钱 生苡仁四钱 南沙参三钱 阿胶三钱 丹参一钱 山药一钱五分

【用法】 水煎服。

【主治】 痿症，足不任地，真水不定，阳明为热灼而小筋弛长。

07697 补血当归汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】 当归 菊花各五钱 川芎 白术 细辛 荒蔚子 白芍 羌活 薄荷 大黄各二钱 甘草三钱 车前三钱 防风二钱半 白蒺藜三钱

【用法】 上为末。每服一钱五分，灯心汤下。

【主治】 妇人行经，去血过多，血衰肝虚，眼疼，黑眼花翳白陷。

07698 补血行滞汤

【方源】《胎产心法》卷二。

【异名】 催生汤。

【组成】 当归（酒浸） 川芎 白芍（炒） 熟地 香附（制）各一钱 桃仁（去皮尖） 枳壳（麸炒） 砂仁（碎） 紫苏各七分

【用法】 加生姜一片，大枣二枚，水煎服。

【功用】 催生。

【主治】 过月不产。

07699 补血定痛汤

【方源】《回春》卷六。

【组成】 当归 川芎 熟地 白芍（酒炒）各一钱 玄胡索七分 桃仁（去皮研细） 红花各三分 香附 青皮（炒） 泽兰 牡丹皮各五分

【用法】 上锉一剂。用水一盏半，加童便、酒各一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】 小产后瘀血腹痛。

07700 补血荣筋丸

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】 肉苁蓉 牛膝 天麻 木瓜 鹿茸 熟地黄 菟丝子 五味子各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米汤或温酒送下。

【主治】 ①《杏苑》：阴血衰弱，不能养筋，筋缓不能自胜持，故痿软无力。②《张氏医通》：肝衰筋缓，不能自收持。

【方论选录】《医略六书》：肝气虚衰，生阳不振，故肝血不能荣筋，筋痿不得自收持焉。熟地补阴滋肾以生肝血，鹿茸暖肾补阳以振生气，菟丝子补肾荣木，苁蓉润燥温肝，淮膝补肝肾壮筋骨，天麻散风湿发肝阳，五味敛津液以养肝，木瓜舒筋络

以醒脾也。丸以白蜜之润下，以参汤之补使血气得力则精髓内充，而肝藏受荫，筋络得养，筋骱无不健旺矣。

07701 补血祛风汤

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】当归 川芎 生地黄 防风 荆芥 细辛 藁本 蔓荆子 半夏 石膏 甘草 旋覆花（一方加羌活）

【用法】上锉。加生姜、大枣，水煎，食后服。

【主治】妇人肝血虚损，风邪乘虚而袭，而患头风，每发必掉眩，如立舟车之上。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·外形篇》引作"养血祛风汤"。

07702 补阳还五汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】黄耆四两（生） 归尾二钱 赤芍一钱半 地龙一钱（去土） 川芎一钱 桃仁一钱 红花一钱

【用法】水煎服。黄耆初用一二两，以后渐加至四两。至微效时，日服两剂，两剂服至五六日，每日仍服一剂。

【主治】半身不遂，口眼歪斜，语言謇涩，口角流涎，大便干燥，小便频数，遗尿不禁。

【加减】初得半身不遂，加防风一钱，服四五剂后去之；如已病二、两个月，前医遵古方用寒凉药过多，加附子四五钱；如用散风药过多，加党参四五钱。

【方论选录】《方剂学》：本方证系由正气亏虚，瘀血阻络所致，治当补气活血通络。方中重用黄耆以补气，使气旺血亦行，祛瘀而不伤正，为方中主药；辅以归尾、川芎、赤芍、桃仁、红花、地龙活血通络。因其主要目的不在于祛瘀，而在于补气通络，所以重用黄耆，取其力专性走，周行全身，以助推动诸药之力使气旺血行，瘀去络通，诸症自可渐愈。

【临证举例】①中风偏瘫《四川中医》（1985；11:15）：以补阳还五汤加减为基本方（黄耆30～60克，当归、桃仁、红花、川芎、赤芍10～15克，地龙15～20克，橘络5～10克，丹参、桑枝15～30克），治疗气虚血瘀中风偏瘫38例，其中脑溢血6例，脑血栓形成29例，脑栓塞3例。结果痊愈14例，显效14例，好转8例，无效2例。并认为本方用于出血性中风疗效较差，缺血性中风疗效较好。②坐骨神经痛《四川中医》（1986；9:44）：应用补阳还五汤加味治疗坐骨神经痛31例，痊愈15例，显效6例，好转15例。服药最少一个疗程10天，一般服药3个疗程。③面神经瘫痪《中医函授通讯》（1986；1:563）：用补阳还五汤加味治疗面神经瘫痪（口眼歪斜）18例，均属络脉空虚风邪损害引起（即外周性面瘫），18例皆获痊愈。④乳中结核《中医杂志》（1984；6:22）：运用补阳还五汤内服，配合自制之"万灵丹"（雄黄、乳香、没药、白芷、肉桂各50克，血竭30克，细辛、山柰、山甲珠、土贝母各25克，麻黄100克，天南星75克，冰片25克，樟脑100克，麝香5克，轻粉3克）外敷，治疗乳中结核18例，除1例效果不显，1例因故中断治疗外，其余16例均获痊愈。

【现代研究】①对血液流变学的影响《浙江中医杂志》（1986；3:110）：中风患者血液处于"粘、浓、凝、聚"的倾向，运用本方后，能增加血小板内环磷腺甙的含量，抑制血小板聚集和释放反应，抑制和溶解血栓，以改善微循环，促进侧枝循环。②对心、脑血管系统的药理作用《中药通报》（1987；2:51）：补阳还五汤静脉注射，有缓慢、持久的降压作用，对麻醉家兔能显著地增加心肌收缩幅度，反映心肌耗氧量的心肌张力时间指数显著降低，心肌营养性血流量明显增加。③对免疫功能的影响《陕西中医》（1986；10:466）：补阳还五汤能使免疫功能低下小鼠的免疫器官重量增加，提高单核巨噬细胞的吞噬功能，从而表明本方具有增强机体免疫功能的药理学基础。

07703 补阳抑阴汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】大丽参三钱 石菖蒲三钱 柏子仁三钱 菟丝子三钱 远志肉三钱 白蒺藜三钱（炒） 破故纸二钱 黄耆五钱 朱茯神三钱 粉甘草一钱 车前子三钱（炒，外包）

【用法】水煎服。

【主治】白昼青盲症，两眼不疼不赤，瞳孔无异常人，外视如无病，但夜明而昼昏。

07704 补阳滋阴汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】当归身四钱 人参二钱 黄耆四钱 生龟版四钱 生牡蛎四钱 知母三钱 柏子仁三钱 云故纸三钱 玄参五钱 金石斛三钱 车前子三钱（外包） 锁阳三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】神水将枯症属阴虚者。

07705 补阴止汗汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】 熟地一两 山茱萸五钱 人参二钱 白术三钱 地骨皮一两 沙参三钱 北五味子一钱 桑叶十片

【用法】 水煎服。二剂汗少止，四剂汗乃止，十剂汗不再出矣。

【主治】 阴虚盗汗。

07706 补阴再造丸

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】 败龟版（醋炙）知母 秦艽 银柴胡 丹皮 焦栀 当归 川芎 白芍 熟地 生地 天冬 麦门冬 川贝 阿胶 黄耆 白术 人参

【功用】 退虚热，止盗汗。

【主治】 室女血枯经闭，若兼干嗽、夜热、盗汗等症，则已经闭成痨，药最难治，此非瘀滞经闭，经血不通，因精血虚衰，血无源至，故断而不来。

【加减】 作煎服，加甘草，去熟地。

07707 补阴助阳汤

【方源】《辨证录》卷五

【组成】 玄参一两 麦冬一两 熟地一两 人参二钱 白芥子五钱 柴胡一钱 白芍一两 当归一两 白术一两 茯苓五钱 菖蒲一钱

【用法】 水煎服。一剂而昏迷苏，再剂而痰涎化，三剂而厥逆回，则可生也，否则不可救矣。

【主治】 阴厥。夜间发热，一时厥逆昏晕如死人状，惟手足温和，喉中痰声，不能出声。

07708 补阴降火汤

【方源】《回春》卷七。

【组成】 当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 熟地黄（酒蒸） 黄柏（炒） 知母（酒炒）各等分

【用法】 上锉。少用官桂为引，或以前胡、木香为引。

【主治】 小儿阴虚，尾骨节痛。

【加减】 如痛不止，加乳香、没药。

07709 补阴益气煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 人参一二三钱 当归二三钱 山药（酒炒）二三钱 熟地三五钱或一二两 陈皮一钱 炙甘草一钱 升麻三五分（火浮于上者，去此不必用） 柴胡一二钱（如无外邪者不必用）

【用法】 水二钟，加生姜三五七片，煎八分，食远温服。

【主治】 劳倦伤阴，兼感外邪，恶寒发热，及男子便血，妇人气虚血崩。

①《景岳全书》：劳倦伤阴，精不化气，或阴虚内乏，以致外感不解，寒热痎疟，阴虚便结不通，凡属阴气不足而虚邪外侵者。②《通俗伤寒论》：气不摄血，血从下脱，男子便血，妇人血崩，声微力怯，面白神馁，心悸肢软者。③《不知医必要》：妇人经期，热入血室，病虽渐愈，而元气素弱，血尚未止者。

07710 补阴益气煎

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】 生地五钱 人参三钱 山药三钱（炒） 阿胶三钱（蛤粉炒） 白芍一钱半（炒） 炙草一钱半 柴胡五分 茯神一钱半（去木） 黄耆三钱（蜜炙）

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 气阴两亏，不能摄火而火不归经，或下血，或潮热，脉软数者。

【方论选录】 方中生地滋肾水以济心火，人参扶元气，统血脉，山药补脾益阴，阿胶补阴益血，黄耆补中气以强卫，柴胡疏肝胆以升阳，白芍敛阴和血，茯神渗利宁神，炙草缓中以益胃气也。水煎温服，使气阴内充，则虚阳得归其部而营卫调和。

07711 补肝四物汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 当归 熟地各9克 白芍12克 川芎3克 枸杞子 炒枣仁各9克 龙齿6克

【功用】 补养肝血。

【主治】 肝血不足，目发干涩，视物昏渺，神光细弱，兼见头晕目眩，多梦易惊，胆怯怕事，脉弦细。

【方论选录】 方中四物汤补血调血，重用白芍取其味苦有滋胆之功，枸杞子补益肝肾而明目，炒枣仁、龙齿养肝镇惊而安神。血足神安，胆中之精气上达于目，神光自然充沛，而目昏之疾自去。

07712 补肝抑肺汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】 玄参八钱 当归四钱 川芎二钱 生地三钱 石斛三钱 胡黄连三钱 黄芩三钱 葶苈子五钱 木贼二钱 茺蔚子四钱 甘草一钱 田三七五分

【用法】 水煎，田三七为末冲服。

【主治】 逆顺障症。气轮之上赤丝纵横，风轮周围生白翳，稍露瞳神，昏涩疼痛。

07713 补肾生肝饮

【方源】《杂症会心录》卷上。

【组成】 当归二钱 熟地三钱 白芍二钱（炒） 女贞子二钱 山药一钱五分（炒） 人参一钱 枸

杞子一钱五分 丹参一钱 炙甘草一钱

【用法】 水二钟，煎七分，空腹温服。

【主治】 肝肾精亏，经脉失荣，血不运行，气不贯通，气血两虚，不仁不用。

07714 补肾地黄丸

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】 干山药（去黑皮） 山茱萸（酒浸润，蒸透去核，取皮为用） 熟干地黄（酒洗，焙干）各五钱 鹿茸（蜜涂炙，酒亦好） 川牛膝（酒洗，焙）各四钱 牡丹根皮（净洗） 白茯苓（去皮）各三钱 泽泻（去粗皮）二钱

【用法】 上锉、焙为末，炼蜜为丸，作麻仁大。每服十五丸，或二十五丸至三十五丸，空心温盐汤送下，温酒亦佳。

【主治】 ①《活幼心书》：小儿禀赋不足，肾气虚弱，骨髓枯竭，囟大，头缝不合，体瘦语迟，行步多艰，齿生缓者。②《保命歌括》：痢后鹤膝风。

07715 补肾地黄丸

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】 熟地黄 怀山药 山萸肉各一两 嫩鹿茸 淮牛膝各二两 粉丹皮 白云苓 宣泽泻 北五味 补骨脂各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三钱，空心淡盐汤送下。

【主治】 小儿先天不足，肝肾虚喘。

07716 补肾养脾丸

【方源】《便览》卷三。

【组成】 人参 黄耆 白术各二两 熟地（酒洗）四两 当归二两 知母（酒炒）二两 苁蓉（酒洗）三两 黄柏（酒炒）一两 桂七钱半 白茯二两 杜仲（炒）一两半 山药二两 故纸五钱 白芍（炒）一两 牛膝一两半 五味子一两 沉香七钱半 甘草五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心盐汤送下。

【功用】 补肾养脾，益气血，长精神。

【主治】 ①《便览》：肾经虚损，腰脚无力，脾土虚弱，饮食少进。②《东医宝鉴》引《北窗方》：虚劳诸证。

【宜忌】 忌三白。

07717 补肾益髓汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】 熟地四钱 山药 枣皮 益智仁 补骨脂（盐炒）各二钱 杜仲（盐炒） 肉桂 附子（制）各一钱半

【用法】 早晨服本方，大补阴阳汤中午服，每日同进为妙。

【主治】 产后肾阳不足，不能关键，小便失常。

07718 补肾鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】 鹿茸（去毛，酒浸一宿，酥炙） 磁石（煅、醋淬七遍） 枳实（去瓤，麸炒）各二两 附子（炮裂，去皮脐） 山芋 牡蛎（熬） 肉苁蓉（酒浸，切，焙）各一两半 五味子 巴戟天（去心）各一两 楮实（炒，别捣末）三两

【用法】 上十味，将九味为末，入楮实末再捣令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心浸牛膝酒下。

【主治】 肾劳虚后，耳常闻钟磬风雨之声。

07719 补肾磁石丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 磁石二两（烧令赤，以醋淬七遍，捣碎研，水飞过） 鹿茸二两（去毛，涂酥炙微黄） 附子一两半（炮裂，去皮脐） 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 牡蛎粉一两半 楮实子二两（水淘去赤汁，炒令干浮者） 肉苁蓉一两半（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 五味子一两 薯蓣一两半 巴戟一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸；空心以温酒送下，晚食前再服。

【主治】 劳聋肾虚，或耳中常闻钟磬风雨之声。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“磁石丸”。

07720 补肾磁石丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】 磁石（烧通赤，用醋淬七次） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 菟丝子（酒浸一宿，慢火焙干） 甘菊花 石决明各一两

【用法】 上为末，用雄雀十五个，去嘴、毛、足，留肠肚，以青盐二两，水三升同煮令雄雀烂，水欲尽为度，取出先捣如膏，和药为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温酒送下。

【主治】 肝肾气虚上攻，眼目昏暗，远视不明，时见黑花，渐成内障。

07721 补肾磁石丸

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】 磁石二两（煅，醋淬七次，水飞净） 菟丝子二两（酒制） 北五味五钱 建石斛一两 枸杞子一两（米泔浸一日夜，去泔，人乳拌晒） 熟地一两五钱 车前一两（酒炒） 覆盆子一两（酒炒） 楮实子一两 肉苁蓉一两（酒洗，去鳞

肠） 沉香五钱 青盐五钱 槐子五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服二钱，空心盐汤送下。

【主治】 肾气不足，瞳神昏暗，渐成内障。

【宜忌】 切戒郁怒。

07722 补肾磁石汤

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】 磁石二两（醋淬七遍） 山茱萸（洗，炒） 菖蒲（米泔浸一宿，锉，焙） 芎藭 牡荆子 茯神（去木） 白芷 枳壳（去瓤，麸炒黄） 甘草（炙，锉） 陈橘皮（汤浸去白，焙）各一两 地骨皮（去土） 天门冬（去心）各一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，加生姜半分（切），竹沥二合，同煎至七分，去滓温服，一日二次。

【主治】 劳聋，耳中溃溃然。

07723 补肺阿胶散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 薯蓣一两 人参一两（去芦头） 五味子一两 麦门冬一两（去心，焙） 干姜半两（炮裂，锉） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 白术一两 桂心三分

【用法】 上为细散。每服一钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】 肺脏气虚，胸中短气，咳嗽声微，四肢少力。

07724 补肺养阴汤

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】 熟地 玉竹 百合 山药 贝母 阿胶 白芍 北沙参 沙苑子

【用法】 梨肉为引。

【主治】 鸡胸。

【加减】 热甚，加麦冬，枇杷膏冲服。

07725 补肺黄耆散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】 黄耆一两（锉） 人参一两（去芦头） 茯神一两 麦门冬一两（去心） 白术三分 五味子一两 桂心一两 熟干地黄一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 当归三分（锉，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉） 白芍药三分 牛膝三分（去苗）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】 肺脏气虚无力，手脚颤掉，吃食减少。

07726 补肺清金饮

【方源】《马培之医案》。

【组成】 淮山药二钱 北沙参二钱 麦冬二钱 杏仁二钱 萎皮三钱 茯苓二钱 橘红一钱 川石斛三钱 毛燕二钱 莲子十粒（去心） 大贝二钱

【主治】 鸡胸，龟背，脉虚数，身热少食。

07727 补经固真汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 补阳固真汤（《医学六要·治法汇》卷七）、补真固经汤（《济阴纲目》卷三）、补真利经汤（《医略六书》卷二十六）。

【组成】 白葵花（去萼，研烂）四分 甘草（炙） 郁李仁（去皮尖，研泥） 柴胡各一钱 干姜（细末） 人参各二钱 生黄芩（细研）一钱 陈皮（留皮）五分

【用法】 上件除黄芩外，以水三大盏，煎至一盏七分，再入黄芩，同煎至一盏，去滓，空心热服，少时以早饭压之。

【主治】 ①《兰室秘藏》：妇人白带常漏，下流不止，诸药不效，心包尺脉微，其病在带脉。②《玉机微义》：白带下流不止，始病崩中，日久血少，复亡其阳，故白滑之物不去也。

【方论选录】 ①《济阴纲目》汪琪笺释：此方以用参、姜益阳，李仁、葵花润燥；柴胡升清气于下，陈皮和胃气于中，生芩后煎，妙其清凉不滞也。②《医略六书》：热伤元气，不能输化湿热而下注阴中，故为白带浸淫不已焉。人参扶元气之虚，黄芩泻湿热之溢，干姜温气化以从治，葵花泄湿热以清经，橘皮利气和中，李仁润燥解郁，柴胡升清以上行，炙草缓中州以益胃。水煎温服，使胃气调和，则元气来复而湿热顿化，经脉清和，何白带淫溢不已哉。

07728 补胃燥痰汤

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】 白术二钱 苍术 陈皮 半夏 南星 茯苓各一钱半 木香一钱 藿香七分 甘草四分

【用法】 加生姜五片，水煎服。

【主治】 阴痛，服凉药太过，损伤脾胃。

【加减】 甚者，加附子五分。

07729 补胆防风汤

【方源】《本事》卷一。

【组成】 防风十分（去钗股） 人参六分（去芦） 细辛五分（去叶） 芎藭 甘草（炙） 茯神（去木） 独活（黄色如鬼眼者。去芦，洗，焙，称）

前胡（去苗，净洗）各八分

【用法】 上为粗末。每服四大钱，水一盏半，加大枣二个，煎至八分，去滓，食前服。

【主治】 ①《本事》：胆虚目暗，喉痛唾数，眼目眩冒，五色所障，梦见被人讼，恐惧，面色变青。②《张氏医通》：胆虚风袭，惊悸不眠。

07730 补络补管汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生龙骨（捣细） 一两 生牡蛎（捣细） 一两 萸肉（去净核） 一两 三七二钱（研细，药汁送服）。

【主治】 咳血吐血，久不愈者。

【加减】 服之血犹不止者，可加赭石细末五六钱。

07731 补真玉露丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十五。

【组成】 白茯苓（去皮） 白龙骨（水飞） 韭子（酒浸） 菟丝（酒浸）各等分（火日修合）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒或盐汤送下，待少时，以饭羹压之。

【主治】 阳虚阴盛，精脱淫乐胫酸。

07732 补脑振痿汤

【方源】《衷中参西》中册。

【组成】 生箭耆二两 当归八钱 龙眼肉八钱 杭萸肉五钱 胡桃肉五钱 虻虫三枚（大者） 地龙（去净土）三钱 生乳香三钱 生没药三钱 鹿角胶六钱 制马钱子末三分

【用法】 上将前九味煎汤两钟半，去滓，将鹿角胶入汤内融化，分两次送服马钱子末一分五厘。

【主治】 肢体痿废偏枯，脉象极微细无力，服药久不愈者。

07733 补益石斛丸

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】 石斛一两半（去根） 萆薢一两（锉） 远志三分（去心） 覆盆子三分 泽泻一两 白龙骨一两 杜仲一两半（去粗皮，微炙，锉） 防风三分（去芦头） 牛膝一两半（去苗） 石龙芮一两 薯蓣三分 磁石二两（烧，醋淬七遍，捣碎，水飞过） 五味子三分 甘草半两（炙微赤，锉） 黄耆一两（锉） 鹿茸二两（去毛，涂酥炙微黄） 补骨脂一两（微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 人参一两（去芦头） 车前子一两 桂心一两 白茯苓一两 熟干地黄一两 山茱萸三分 钟乳粉二两 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 巴戟一两 菟丝子二两（酒浸三宿，晒干别捣为末） 蛇床子一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 虚劳肾气不足，阴痿，小便余沥，或精自出，腰脚无力。

07734 补益杞圆酒

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】 枸杞子 龙眼肉

【用法】 制酒服之。

【功用】 补虚长智，开胃益脾，滋肾润肺。

【主治】 五脏邪气，七情劳伤，心痛烦渴，神志不宁。

07735 补益附子丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐） 龙骨 牛膝（酒浸，切，焙） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 巴戟天（去心）各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午温酒盐汤任下。以知为度。

【主治】 虚劳漏精。

07736 补益消癌汤

【方源】《肿瘤的诊断与防治》。

【组成】 黄耆 30 克 人参 金银花 陈皮 地榆 贯众 蒲公英 大蓟 小蓟各 9 克 龙眼肉 生地 杜仲各 15 克 三七 6 克（冲服）

【功用】 养血止血，清热消癌。

【主治】 肺癌，结肠癌，宫颈癌，膀胱癌等。

07737 补虚生荣汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】 黄耆（蜜炒）三五钱 当归（去尾）二三钱 白术二钱 茯苓一钱 熟地三钱 益母草二钱 甘草（炙）二钱 干姜（炒黑透心）三五分 白芍（煨，酒炒）一钱半 荆芥穗（炒黑）七分

【用法】 水煎，少加酒、童便和服。可服数剂，气血易于复元，日后体旺而百病消除矣。人能有力，加参更妙。

【主治】 产后气血两虚，无神无力，不时昏迷。

【加减】 若不得力，黄耆可加至两余，再加附子七八分，以助药力。如有血气痛，名儿枕血，加山楂二钱，一剂愈，即去之，余药不可增入。

07738 补虚利膈汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 熟地一两 杜仲五钱 破故纸一钱 白术五钱

【用法】 水煎服。连服四剂自愈。

【主治】 肾虚腰痛，动则腰痛，自觉其中空虚无着者。

【方论选录】 熟地补肾水也，得白术则利腰脐而熟地不腻；杜仲、破故纸补火以止腰痛者也，得熟地则润泽而不至干燥。调剂相宜，故取效最捷耳。

07739 补偏愈风汤

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】 人参三钱 熟地黄六钱 茯苓三钱 生黄耆六钱 炙黄耆三钱 白术二钱 赤芍药一钱 当归三钱 杜仲（酒炒）三钱 怀牛膝三钱 羌活 独活各一钱半 桂枝八分

【用法】 加桑寄生八钱，煎汤代水煎服。

【主治】 气血虚弱，内风沸腾，不拘左偏右偏，两手足俱废之症。

07740 补脾人蔘散

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】 补脾人参汤（《圣济总录》卷四十四）。

【组成】 人参一两（去芦头） 石斛二分（去根） 黄耆三分（锉） 桔梗三分（去芦头） 白术三分 附子半两（炮裂，去皮脐） 桂心半两（去皮） 白茯苓半两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 丁香半两 草豆蔻半两（去皮）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候稍热服。

【主治】 脾虚身重如石，四肢不举，食少无力，腹胀肠鸣，神思昏闷。

【宜忌】 忌生冷、油腻、湿面。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“人参汤”。

07741 补漏生肌散

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 枯矾 轻粉 血竭 乳香各等分

【用法】 上共研极细腻。对漏处吹点，外用盐花、明矾少许，煎水洗之。

【主治】 目疾，阳漏，日间流水，色黄赤者。

07742 补髓膏蛾丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 破故纸（酒浸一宿，以脂麻炒令香） 菟丝子（淘净，酒浸一宿，烂研成饼，候干微炙） 各四两 韭子（炒） 胡桃各一两（别研）

【用法】 上为细末，炼蜜与胡桃肉同捣和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前盐汤送下。

【主治】 腰痛。

07743 补肾肉苁蓉丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 肉苁蓉二两（酒浸，去皱皮，微炒，炙） 磁石二两（烧醋淬七遍，捣碎，细研水飞过） 熟干地黄二两 山茱萸三分 桂心一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 薯蓣三分 牛膝一两（去苗） 石南三分 白茯苓三分 泽泻三分 黄耆三分（锉） 鹿茸二两（去毛，涂酥炙令微黄） 五味子三分 石斛一两（去根，锉） 覆盆子三分 远志三分（去心） 补骨脂一两（微炒） 萆薢三分 巴戟三分 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 菟丝子二两（酒浸三宿，晒干，别杵为末） 白龙骨一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下，晚食前再服。

【主治】 肾脏久虚，面色萎黑，足冷耳鸣，四肢羸瘦，脚膝缓弱，小便滑数。

07744 补肾虚磁石丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 磁石一两（烧令赤，以醋淬七遍，捣碎，水飞过） 鹿茸一两半（去毛，涂酥炙微黄） 人参一两（去芦头） 黄耆一两（锉） 白茯苓一两 远志三分（去心） 附子三分（炮裂，去皮脐） 牡蛎三分（烧为粉） 牛膝一两（去苗） 楮实子一两半（水淘去浮者，焙干） 防风三分（去芦头） 肉苁蓉三分（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 五味子半两 薯蓣三分 巴戟二分 石斛一两（去根，锉） 桂心三分 熟干地黄二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】 虚劳肾脏乏弱，耳聋，或常闻钟磬风雨之声。

07745 补肾腽肭脐丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 腽肭脐一两（微炙） 补骨脂一两（微炒） 牛膝三分（去苗） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 白茯苓一两 桑螵蛸一两（微炙） 楮实一两半（水淘去浮者，晒干，微炒） 五味子一两 石斛一两（去根） 覆盆子一两 桂心一两半 菟丝子一两半（酒浸三日，晒干，别杵为末） 鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 巴戟一两 熟干地黄一两半 肉苁蓉二两半（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 磁石一两（烧醋淬七遍，捣碎，细研，水飞过）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】 肾脏气衰，肌肤羸瘦，面色黧黑，脚膝无力，小便滑数。

07746 补益干地黄丸

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】 熟干地黄三两 鹿茸（去毛，酥炙） 远志（去心） 山茱萸各一两半 蛇床子半两 菟丝子（酒浸，别捣）二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前酒送下。

【主治】 肾劳，精气滑泄。

07747 补益黄耆浸酒

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 黄耆一两（锉） 萆薢一两半（锉） 防风一两半（去芦头） 牛膝二两（去苗） 桂心一两 石斛二两（去根） 杜仲一两半（去粗皮，炙微黄，锉） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 附子一两（炮裂，去皮脐） 山茱萸一两 石南一两 白茯苓一两

【用法】 上锉细，以绢袋盛，用酒二斗，子瓷瓶中浸，密封瓶头。候三日后，每子食前暖一小盏服。

【主治】 虚劳膝冷。

07748 补益覆盆子丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 覆盆子四两 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 龙骨一两半 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 附子一两（炮裂，去皮脐） 巴戟一两 人参一两半（去芦头） 蛇床子一两 熟干地黄二两 柏子仁一两 鹿茸二两（去毛，涂酥炙令微黄）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】 虚劳，梦与鬼交，失精，腰膝疼痛。

07749 补脾诃黎勒散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 诃黎勒半两（煨，用皮） 草豆蔻三分（去皮） 陈橘皮半两（汤浸去白瓤，焙） 附子三分（炮裂，去皮脐） 甘草一分（炙微赤，锉） 木香半两 当归三分（锉，微炒） 缩砂三分（去皮） 厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候热服。

【主治】 脾气虚，大肠下泄，腹痛，不思饮食，四肢少力。

07750 补天五子种玉丹

【方源】《产科心法》卷上。

【组成】 大原生地八两（清水洗刷净，入瓦罐中，水煮一昼夜，再蒸、晒九次，焙干） 山萸肉四两（酒拌炒） 淮山药四两（乳拌、蒸，晒） 丹皮三两（酒炒） 块云苓三两（乳拌，蒸，晒） 泽泻三两（盐水炒） 当归身四两（酒炒） 淮牛膝二两（炒） 杜仲二两（盐水炒） 川续断二两（盐水炒） 枸杞子四两（酒拌蒸，炒） 五味子二两（炒） 女贞子三两（盐水蒸，炒） 车前子二两（炒） 覆盆子三两（盐水洗，晒，炒） 紫河车一具（甘草煎水浸洗净，挑去血筋，煮烂打或焙干炒磨）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服四五钱，早晨淡盐汤送下。

【功用】 久服生精益肾，种子。

【加减】 如气不足，精不射者，加蜜炙黄耆十两熬膏，加入人参更妙；如精薄或精少，加大米鱼肚四两（用蛤粉炒），鹿角胶二三两（蛤粉炒），猪脊筋十条（取汁拌入茯苓内，蒸、晒、焙干）；临事易泄者，加鹿角霜三两（生研和入），金钗石斛三两（炒），人参一两（焙），麦冬二两（炒）；如体热，加地骨皮二两，莲须二两，牡蛎粉二两，金樱子熬膏代蜜；如精冷体寒之人，加肉桂一两（去皮研入），巴戟天二两（炒），鹿角胶四两（蛤粉炒），破故纸四两（盐水炒），或加入鹿茸一对（制）；劳心之人，心血耗散，常至临事不举，此心血亏少，非肾亏也，加桂圆肉四两（蒸），枣仁四两（炒），茯神四两（炒），人参、当归、柏子仁、益智仁等一派补心之药。

07751 补气升阳和中汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 生甘草 酒黄柏 白茯苓 泽泻 升麻 柴胡各一钱 苍术 草豆蔻仁各一钱五分 橘皮 当归身 白术各二钱 白芍药 人参各三钱 佛耳草 炙甘草各四钱 黄耆五钱

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，空腹服。

【主治】 风热下陷，阳气不行，闭目则浑身麻木，昼减而夜甚，觉而开目，则麻木渐退，久则绝止，常开其目，此证不作，惧其麻木不敢合眼，致不得眠，身体昏重，时有痰嗽，觉胸中常似有痰而不利时，烦躁，气短促而喘，诊得六脉俱中得弦洪缓相合，按之无力。

07752 补肝元柏子仁丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】柏子仁（研） 薏苡仁 乌麻仁 车前子 枸杞子 菟丝子（酒浸，别捣末）各一两 牡荆子 青葙子 五味子 蛇床子 桂（去粗皮） 菊花 山芋各半两 熟干地黄（焙） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 白茯苓（去黑皮）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【主治】肝虚视物漠漠，不能远见，睛轮昏暗涩痛，翳晕时聚时散。

07753 补益钟乳天雄丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】钟乳粉 天雄（炮裂，去皮脐） 巴戟各一两半 肉苁蓉（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干） 菟丝子（酒浸三日，晒干别捣，为末） 茴香子 补骨脂 木香 天门冬（去心，焙） 续断 沉香 石斛（去根，锉） 丁香 山茱萸 附子（炮裂，去皮脐） 肉桂（去皱皮） 当归 麝香（细研） 白术 人参（去芦头） 仙灵脾 萆薢 牛膝（去苗） 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 磁石二两（烧令赤，醋淬七遍，细研，水飞过） 熟干地黄 石龙芮各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每日三十丸，空心以暖酒送下，临卧时再服；如不饮酒，盐汤下亦得。

【主治】虚劳，水脏久惫，腰膝疼冷，筋骨无力，梦寐不安，阳道劣弱，面色萎黄，饮食不得，日渐羸瘦。

07754 补脾胃泻阴火升阳汤

【方源】《脾胃论》卷上。

【异名】泻阴火升阳汤（《玉机微义》卷十）、升阳泄火汤（《准绳·类方》卷一）、升阳降火汤（《便览》卷一）。

【组成】柴胡一两五钱 甘草（炙） 黄耆 苍术（泔浸，去黑皮，切作片子，晒干，锉碎，炒） 羌活各一两 升麻八钱 人参 黄芩各七钱 黄连（去须，酒制）五钱（炒） 石膏少许（长夏微用，过时去之，从权）

【用法】上㕮咀，每服三钱，水二盏，煎至一盏，去滓，大温服，早饭后午饭前，间日服。

【主治】饮食损胃，劳倦伤脾，火邪乘之而生大热。

【宜忌】服药之时宜减食，宜美食。服药讫忌语话一二时辰许，及酒、湿面大料之类，恐大热之物，复助火邪而愈损元气也。亦忌冷水及寒凉淡渗之物及诸果，恐阳气不能生旺也。宜温食及薄滋味以助阳气。

07755 启关散

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】恶实（炒） 甘草（生）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，水一盏，煎六分，旋含之，良久咽下。

【主治】风热客搏上焦，悬壅肿痛。

07756 启宫丸

【方源】《医方集解》。

【组成】芎藭 白术 半夏曲 香附各一两 茯苓 神曲各五钱 橘红 甘草各一钱

【用法】上为末，粥为丸服。

【功用】《医林纂要》：去痰燥湿，开郁化气，活血，助生气。

【主治】妇人肥盛，多由痰盛，子宫脂满壅塞，不能孕育。

【方论选录】此足太阴、厥阴药也。橘、半、白术燥湿以除其痰；香附、神曲理气以消其滞；川芎散郁以活其血，则壅者通，塞者启矣。茯苓、甘草，亦以去湿和中，助其生气也。肥而不孕，多由痰盛，故以二陈为君，而加气、血药也。

07757 启峻汤

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】人参 黄耆 当归 白术（炒枯）各一钱五分 陈皮八分 甘草（炙）五分 肉桂半钱 茯苓一钱五分 干姜（炮）四分 肉果 沉香各八分 附子（炮）一钱五分

【用法】水煎，温服。

【主治】脾肾俱虚，腹胀少食。

【加减】气滞硬满者，去黄耆，加厚朴。

07758 启窍汤

【方源】《辨证录》卷三。

【异名】启窍丹（《疡医大全》卷十三）。

【组成】熟地二两 山茱萸一两 麦冬一两 远志三钱 五味子二钱 石菖蒲一钱 炒枣仁三钱 茯神三钱 柏子仁三钱

【用法】水煎服。一连四服，而耳中必然作响，此欲开聋之兆也，再照前方服十剂。而外用龙骨一分，雄鼠胆汁一枚，麝香一厘，冰片三厘，研极细末为丸，分作三丸，绵裹塞之，不可取出，一昼夜即通矣。耳通后，仍用前汤再服。一月后再用大剂六味丸以为善后，否则不能久聪也。

【主治】大病之后或年老人，肾水内闭而气塞，双耳聋闭，雷霆喧呼之声，终不相闻，而耳内不

痛。

07759 启脾丸

【方源】《内经拾遗》卷一引《经验良方》。

【异名】小儿启脾丸(《摄生众妙方》卷十)。

【组成】人参（去芦） 白术（土炒） 白茯苓（去皮） 干山药 莲肉各一两 山楂（蒸，去核） 甘草（蜜炙） 陈皮 泽泻各五钱

【用法】上为细末，荷叶煮汤炊饭为丸，如梧桐子大。每服七、八十丸，食后米饮送下。

【功用】①《内经拾遗》引《经验良方》：开通脾气。②《摄生众妙方》：消食、止泄、止吐、消疳、消黄、消胀，定肚痛，益胃生肌，健脾开胃。

【主治】小儿脾胃虚弱，饮食积滞，五更泄泻，面黄肌瘦，身热神倦。

①《摄生众妙方》：小儿食伤诸病。②《医学入门》：大人、小儿脾积，五更泻。③《饲鹤亭集方》：小儿诸病之后，脾虚胃弱，面黄肌瘦，身热神倦。

07760 启脾散

【方源】《成方便读》卷四。

【组成】潞党参（元米炒黄，去米） 制冬术 建莲肉各三两 楂炭 五谷虫炭各二两 陈皮 砂仁各一两

【用法】上为末。每服二钱，开水下。

【主治】小儿因病致虚，食少形羸，将成疳积；或禀赋素亏，脾胃薄弱，最易生病者。

【方论选录】凡小儿之离母胎也，皆谓之后天，莫不藉谷食以为长养，因先天之禀赋不足者，难于接补；后天之气血亏弱者，易于滋培，故古人每有借后天以济先天之法，不特脾胃为后天之源，抑且土为万物之母，土旺则四脏皆旺，正自充而病自除耳。方中党参、莲肉、冬术大补脾元；陈皮、砂仁助其健运；而以楂炭、谷虫消磨不尽之滞；兼广补药之功。

07761 启膈散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】沙参三钱 丹参三钱 茯苓一钱 川贝母（去心） 一钱五分 郁金五分 砂仁壳四分 荷叶蒂二个 杵头糠五分

【用法】水煎服。

【功用】①《医学心悟》：通噎膈、开关。②《中医方剂学》：润燥解郁。

【主治】①《医学心悟》：噎膈。②《中医方剂学》：由于抑郁日久，气结津枯，咽下梗塞，甚则疼痛呕吐者。

【加减】虚者，加人参；若兼虫积，加胡连、芜荑；甚则用河间雄黄散吐之；若兼血积，加桃仁、红花；或另以生韭汁饮之；若兼痰积，加广橘红；若兼食积，加卜子、麦芽、山楂。

【方论选录】《中医方剂学》：方中沙参清胃滋燥而不腻，川贝解郁化痰而不燥，茯苓补脾和中，郁金开郁散结，杵头糠能疗卒噎，丹参补血活血，荷蒂宣胃气，与丹参合用，以收气血并治之功。

07762 启心救胃汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参一两 茯苓一两 白芥子三钱 菖蒲一钱 神曲三钱 半夏二钱 南星二钱 黄连一钱 甘草一钱 枳壳五分

【用法】水煎服。一剂而痰解，再剂而神清，三剂而呆病如失，不再呆也。

【功用】生胃气，消痰。

【主治】起居失节，则胃气伤而痰迷，致成呆病者。

07763 良附丸

【方源】《良方集腋》卷上。

【异名】止痛良附丸(《饲鹤亭集方》)。

【组成】高良姜（酒洗七次，焙研） 香附子（醋洗七次，焙研）

【用法】上二味，各焙、各研、各贮，否则无效。如病因寒而得者，用高良姜二钱，香附末一钱；如病因怒而得者，用高良姜一钱，香附末三钱；如病因寒怒兼有者，高良姜一钱五分，香附一钱五分。用时以米饮汤加入生姜汁一匙，盐一撮为丸。服之立止。

【功用】①《中国药典》：温胃理气。②《方剂学》：行气疏肝，祛寒止痛。

【主治】肝郁气滞，胃寒脘痛，胸闷不舒，喜温喜按者。

①《良方集腋》：心口一点痛，乃胃脘有滞，或有虫，多因恼怒及受寒而起，遂致终身不愈。②《饲鹤亭集方》：胃脘气滞，胸膛软处一点疼痛，经年不愈或母子相传。③《谦斋医学讲稿》：肝胃气痛之偏于寒者。④《中国药典》：寒凝气滞，脘痛吐酸，胸腹胀满。

【方论选录】《谦斋医学讲稿》：良姜长于温胃散寒，香附长于疏肝行气。

07764 良蒺丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】高良姜 干姜各一两 桂 黄橘皮各半两

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至百丸，空心生姜汤送下。

【主治】 中寒痰唾。

07765 良姜汤

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】 高良姜一两（锉碎，炒） 官桂一两（去皮） 当归（去芦头）一两（锉，炒） 干姜一块（炮） 人参一两（去芦） 吴茱萸七钱半（炒） 白茯苓一两 附子半两（炮）

【用法】 上为散。每服二大钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓，空心服。

【主治】 阴寒积冷，心腹大痛，呕逆恶心，手足厥冷，心胸不快，腰背疼痛。

07766 良姜散

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《石壁经》。

【组成】 良姜一钱 白龙骨半两

【用法】 上为末。每服半钱，空心饭饮吞下。

【主治】 小儿翻花脱肛。

07767 良姜散

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】 高良姜一斤（用好油熬热，旋下，滗令赤色，用麸皮揩去油，锉细） 丁香三两 甘草三两（炙赤色，锉） 人参（去芦头）二两半 胡椒一两 荜茇半两

【用法】 上为细末。每服二钱，入盐少许，食前沸汤点服。

【主治】 停寒积冷，心腹撮痛。

07768 良姜粥

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】 高良姜半两（为末） 粳米三合

【用法】 水三大碗，煎高良姜至二碗，去滓，下米，煮粥食之。

【主治】 心腹冷痛，积聚停饮。

07769 张天师草还丹

【方源】《元戎》卷九。

【组成】 地骨皮 生地黄 石菖蒲 牛膝（酒浸一宿） 远志（去心） 菟丝子（酒浸三宿，炒黄）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下；盐汤亦可。

【功用】 久服轻身，若发白者，从根而黑，如未白者，永不白。

07770 张走马家飞步丸

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】 乳香一两（另研） 白芍药 川乌（生，去皮脐） 草乌（生，去皮脐） 白胶香 木鳖子（取肉另研，去油）各二两

【用法】 上为细末，用赤小豆末煮糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，木瓜汤送下。病在上，食后服；病在下，空心服。忌热物片时。

【主治】 筋脉骨节、手足腰背诸般疼痛，挛缩不伸。

07771 改容丸

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】 大贝母（去心） 白附子 防风 白芷 菊花叶 滑石各五钱

【用法】 上为细末，用大肥皂十箧，蒸熟去筋膜，捣和药为丸。早、晚洗面。

【主治】 风热上攻，致生粉刺、雀斑。

07772 改容膏

【方源】《医方考》卷一。

【异名】 牵正膏（《何氏济生论》卷一）。

【组成】 蓖麻子一两 真冰片三分

【用法】 上捣为膏。中风口眼㖞僻在左，以此膏敷其右；㖞僻在右，以此膏敷其左。今日敷之，明日改正。

【主治】 中风口眼㖞僻。

【加减】 寒月，加干姜、附子各一钱。

【方论选录】 蓖麻子为引风拔毒之品也，佐以冰片，取其利气而善走窍；佐以姜、附，取其温热而利严寒。此惟冬月加之，他时勿用也。

07773 改容膏

【方源】《医级》卷八。

【组成】 石灰（醋炒红）

【用法】 再入醋熬如膏。左歪涂右，右歪涂左。

【主治】 口眼歪斜。

07774 灵乌丹

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】 川乌一斤（河水浸七日，换水浸，去皮尖，切片，干之） 牛膝二两（酒浸，焙） 何首乌四两（制如川乌法）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服七丸，渐加至十丸，空心酒送下。病已即止。

【主治】 一切冷疾疼痛，麻痹风气。

07775 灵龙丹

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】 五灵脂（去沙）七两（别研） 草乌头（生，去皮尖）半两 木鳖子（新者，去壳）二两（别研） 白胶香（别研） 地龙（去土） 乳香各半

两（别研） 麝香一钱（别研）

【用法】 上为细末，入诸别研药拌和，以辰年辰月辰日辰时取辰方上野水搜做小阿胶片，风干。每有患者，以一片分作三服，用酒磨下；卒中急风，以白矾一小块研末，用童便同酒磨下；或口噤灌少许入鼻中，待口开一时灌尽；小儿惊风，分作六服，薄荷汤入酒化下；手足疼痛，薄荷酒下，或姜汁磨涂患处；如治牙痛，以少许塞之。

【主治】 一切风疾，卒中潮搐，口噤不语，舌强脚弱，鹤膝瘫痪，半身不遂，偏风口眼㖞斜。

07776 灵仙丸

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】 威灵仙

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。红绢袋盛药一丸，用精猪肉四两，煮极烂去药，吃肉。其积化从大便而下，以知为度。

【主治】 一切癖。

07777 灵圣散

【方源】《永乐大典》卷一〇三六引《保婴集验名方》。

【组成】 天南星（生，锉） 防风（去芦，锉）

【用法】 上为细末。先用浆水、葱白、槐枝熬汤洗净，干贴疮口上。上用膏药盖之，一日二次。

【主治】 大人、小儿疯狗咬破疮，犬咬所伤疮。

07778 灵龟散

【方源】《永乐大典》卷一三八七九引《大方》。

【组成】 败龟（煅） 漏芦（并酥炙） 威灵仙 延胡索 牛膝（酒浸） 虎骨（酥炙） 桂心 地龙（去土） 自然铜（烧醋淬） 当归各等分

【用法】 上为细末。每服一钱，酒调下。

【主治】 血风偏注，筋骨痛。

07779 灵雨汤

【方源】《四圣心源》卷四。

【组成】 甘草二钱 人参二钱 茯苓三钱 半夏三钱 干姜三钱 柏叶三钱 丹皮三钱

【用法】 煎大半杯，温服。

【主治】 土败阳虚，呕吐瘀血，紫黑成块。

【方论选录】 吐血之证，中下湿寒，凝瘀上涌。用人参、甘草补中培土；茯苓、干姜去湿温寒；柏叶清金敛血，丹皮疏木行瘀，自是不易之法，尤当重用半夏，以降胃逆。

07780 灵宝丹

【方源】《简易》引《叶氏方》（见《医方类聚》卷二十）。

【组成】 川乌（去皮尖，略炮） 五灵脂各三两 没药一两半 胡椒半两 木香 乳香（研） 朱砂（研） 麝香各一分（和朱砂为衣）

【用法】 上将前五味为细末，择辰日辰时，取东方井花水，入乳香末和前药末为丸，如豆大，以朱砂、麝香为衣。每服一粒，生姜一片，同嚼，茶酒任下，不拘时候。如伤风头痛，及胎风，荆芥汤下。

【主治】 一切诸风，瘫痪伤风。

07781 灵宝散

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】 丁香 木香 乳香各一钱半 当归 玄胡索 白芍药各半两

【用法】 上为细末。每服一钱，食前温酒调下。

【主治】 妇人血气攻刺痛，引两胁疼痛，及痃癖冷气。

07782 灵砂丹

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】 威灵仙 黑牵牛 何首乌 苍术各半两 香附子六两 川乌头（去尖） 朱砂 没药 乳香各三钱 陈皂角四钱（炙黄，去皮）

【用法】 上为末，将皂角打破，用酒二升半，春、夏三日，秋、冬七日，取汁打面糊为丸，如桐子大。每服五丸，如破伤风。煎螵酒送下；如牙疼赤眼，捶碎研三五丸，鼻搐之。

【主治】 破伤风。一切诸风，牙疼，赤眼。

07783 灵砂丹

【方源】《医学启源》卷中。

【异名】 辰砂羌活丸（《摄生众妙方》卷三）。

【组成】 独活 羌活 细辛 石膏 防风 连翘 薄荷各三两 川芎 山栀 荆芥 芍药 当归 黄芩 大黄（生） 桔梗各一两 全蝎（微炒）半两 滑石四两 菊花 人参 白术各半两 寒水石一两（生用） 砂仁一钱 甘草三两（生） 朱砂一两为衣

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每两作十丸，朱砂为衣。每服一丸，食后茶清嚼下。

【主治】 风热郁结，血气蕴滞，头目昏眩，鼻塞清涕，口苦舌干，咽嗌不利，胸膈痞闷，咳嗽痰实，肠胃燥涩，小便赤；或肾水阴虚，心火炽甚，及偏正头风痛，发落齿痛，遍身麻木，疥癣疮疡，一切风热。

【备考】 本方方名，《北京市中药成方选集》引作“大灵砂丹”。

07784 灵香丸

【方源】《金匮翼》卷六。

【组成】 白胡椒 枳壳 白檀香 红花 五灵脂（去沙） 广木香

【用法】 上为末，于六月六日修合，水泛为丸。每用七丸，噙化。少顷痛即止。

【主治】 心胃痛。

07785 灵速散

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 细茶一两（水二钟，煎至半钟，去滓） 白芷 细辛 牙皂 紫苏 薄荷各三钱

【用法】 用茶汤煎七分，食后服。

【主治】 一切头痛。

07786 灵脂丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】 五灵脂（去砂石，炒） 当归（去芦，酒浸） 蓬莪术（炮） 木香各半两（不见火） 良姜二钱半（炒）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，米饮送下。

【主治】 脾血气心疼。

07787 灵脂酒

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【异名】 霹雳酒（原书同卷）、五灵脂散（《妇人良方》卷一）、抽刀散（《永类钤方》卷十五）。

【组成】 五灵脂不拘多少（新者，烧存三分性，出火毒）

【用法】 上为细末。每服二钱，却以炭火烧铁秤锤俟通红，以银盂盛，以无灰酒二三升投之。用酒调药服之。五灵脂须用成块，则力紧易取效，渐进一钱至二钱。

【主治】 ①《魏氏家藏方》：血崩。②《永类钤方》：妇人血山崩及丈夫脾积气。

【临证举例】 崩漏 有一老媪年八十，崩漏凡数年，得此药，服则病失去。

07788 灵脂散

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】 灵脂 玄胡 莪术 良姜 当归各等分

【用法】 醋煎服。

【主治】 急心痛。

07789 灵脂醋

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】 川五灵脂

【用法】 以米醋煎汁，含咽。

【主治】 恶血齿痛。

07790 灵效丸

【方源】《百一》卷三引钱闻礼方。

【组成】 锡磷脂（甘锅内煅通红） 白胶香（好明净者，研） 五灵脂（如沥青成块者） 当归（洗净，去芦） 白附子 没药 香白芷 草乌头（去尖） 糯米（炒令黄色） 桑柴灰（须是纯桑木烧，它木不可杂）各一两

【用法】 上为细末，用糯米糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心，临卧温酒送下。

【主治】 男子妇人痛风。

07791 灵液丹

方源】《局方》卷六（续添诸局经验秘方）。

【组成】 乌梅（去核，炒） 寒水石（火煅，研飞） 瓜蒌根 石膏（研） 葛根 赤茯苓各一两 麦门冬（去心，焙）一两半 龙脑（别研）一钱

【用法】 上为末，入研药令匀，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄绵裹，含化咽津。

【主治】 一切风热，脏腑积热，毒气上攻，胸膈烦躁，口舌干涩，心神壅闷，咽嗌不利，饮食无味。

07792 灵乌二仁膏

【方源】《医方新解》。

【组成】 灵芝 500 克 首乌 500 克 核桃仁 250 克 苡仁 250 克

【用法】 首乌、灵芝、苡仁反复浓煎，加蜜收膏。将核桃肉研碎末兑入。

【功用】 滋养肝肾，补益精血，调和脾肺。

【主治】 肝肾阴虚，精血亏损，症见头晕头痛，失眠多梦，心悸健忘，大便不畅，或兼咳喘。临床用于高血压病，冠心病，脑动脉硬化症，脂肪肝及高胆固醇血症。

【宜忌】《古今名方》：阳虚及腹泻者忌用。

07793 灵宝化积膏

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】 巴豆仁 蓖麻仁各一百粒 五灵脂四两 阿魏（醋煮化） 当归各一两 白附子 穿山甲 乳香（炙，去油） 没药（炙，去油）各五钱 麝香三分 松香一斤半 芝麻油五两

【用法】 除乳、没、麝、松、阿外，余药俱饮片，浸香油内三日，用砂锅煎药黑焦色，去滓再煎油，滴水成珠，每油四两入松香一斤，少煎一饭时，再入乳香、没药、麝香，取起入水中，抽洗金黄色，煎时以桃、柳枝不住手搅匀令枯。用狗皮摊贴患处，每日以热鞋底熨，令药气深入。

【主治】 一切痞积。

07794 灵砂安神丸

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】 灵砂一两（一半留为衣） 茯神（乳制） 远志 枣仁（炒） 生地 麦冬 石菖蒲 熟地 天冬各二两 熊胆八钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，灵砂为衣。每服五十丸，酒送下。

【主治】 癫痫。兼治心肾不交，怔忡恍惚，忘事，惊悸恐怖，吐血，劳瘵，怯弱。

07795 灵脂厚朴散

【方源】《医学从众录》卷三。

【组成】 灵脂 良姜 厚朴（姜汁炒）各等分

【用法】 上为细末。每服一钱，醋汤送下，即止。

【主治】 心头痛欲死，不可忍者。

07796 君子丸

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】 厚朴（去粗皮，姜制） 甘草（炙） 青黛 诃子（炒，去核取皮用，半生半熟）各半两 陈皮一分（去白） 使君子（去壳）一两（面裹煨熟） 白芜荑（去扇）三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。三岁下儿半丸，以上一丸，乳汁或米饮送下。

【主治】 疳劳发热，挼指咬甲，发疏腹胀，不思乳食，羸瘦虚滑，下痢无度，爱食泥土，及夹惊热泻。

07797 君朴丸

【方源】《普济方》卷三八〇引《全婴方》。

【组成】 使君子（炮） 厚朴（制） 黄连各一两 木香三钱（同炒）

【用法】 上为末，面糊为丸，如小豆大。三岁三十丸，米汤送下。五服效。

【主治】 小儿诸疳，小便白浊，久则黄瘦，不长肌肉。

07798 阿胶丸

【方源】《千金》卷三。

【组成】 阿胶四两 人参 甘草 龙骨 桂心 干地黄 白术 黄连 当归 附子各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，一日三次。

【主治】 产后虚冷洞下，心腹绞痛，兼泄泻不止。

【方论选录】《千金方衍义》：方下虽主虚冷洞下，而证见本寒标热，故汇推理中、驻车及本门龙骨丸三方，并去干姜而易附子，功力倍增。阿胶、当归专补营虚，人参、白术专扶胃弱，桂心、附子专治本寒，黄连一味专除标热，犹恐桂、附过热，乃进地黄以护真阴，龙骨以填渗漏，非但防虚阳之窃，并可杜虚寒之下脱也。

07799 阿胶丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥） 乌梅肉二两（微炒） 黄连二两（去须，微炒）

【用法】 上为末，用煨蒜研为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前粥饮送下。

【主治】 休息气痢。

07800 阿胶丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥） 乌贼鱼骨一两 白芍药二两 当归一两（锉，微炒） 刘寄奴一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前粥饮送下。

【主治】 妇人大便下血不止。

07801 阿胶丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】 阿胶一两半（捣碎，炒令黄燥） 鳖甲一肉（涂醋炙微黄，去裙襕） 续断一两 龙骨二两 芎藭一两 赤石脂一两半 甘草一两（炙微赤，锉） 当归一两（锉，微炒） 鹿茸二两（去毛，涂酥炙微黄） 乌贼鱼骨二两 丹参一两 龟甲二两（涂醋炙微黄）

【用法】 上为散，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】 产后崩中，下血不止，虚羸无力。

【方论选录】《济阴纲目》汪琪笺释：一派固血，不用补气，尤妙在鹿茸，谓其能引血上升也。

07802 阿胶丸

【方源】《医方类聚》卷一一七引《神巧万全方》。

【组成】 阿胶（蛤炒） 菊花 白术 紫菀 酸枣仁（炒） 麻黄（去节） 桑白皮各一两 杏仁二两（去皮，炒，研如膏） 甘草（炙） 款冬花各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，粥饮送下。

【主治】 肝咳，睡卧不得。

07803 阿胶丸

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】 阿胶（炒令燥） 酸石榴皮各半两 黄连（去须，炒）一两 当归（切，焙） 肉豆蔻（去壳）各三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如赤小豆大。每服十五丸，食前米饮送下。

【功用】 安胎气，止腹痛。

【主治】 妊娠下痢，日夜频并。

07804 阿胶丸

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】 天门冬（去心） 桔梗 生干地黄（焙） 阿胶（锉，炒燥） 桑白皮（锉，炒） 麦冬（去心） 柏子仁（炒，研）各半两 甘草（炙）一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，水一盏，煎至七分，食后温服。

【主治】 肺痿。

07805 阿胶丸

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 阿胶一分（用蚌粉炒令黄色） 贝母七枚（中等者，炮） 天南星一枚（重一分，炮令黄） 款冬花一分 紫菀一分（净洗） 知母一分 白矾一分（熬干）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服二十丸，食后煎生姜汤送下。

【主治】 肺受风寒，咳嗽不止，痰涎并多，上喘气促，睡卧不安；或肺经客热，咳而面赤，久不已者。

07806 阿胶丸

【方源】《奇效良方》卷二十二。

【组成】 阿胶（蛤粉炒） 生地黄（洗） 卷柏叶 大蓟根 五味子 鸡苏叶 山药各一两 柏子仁（炒，另研） 麦门冬（去心） 人参 防风各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，浓煎小麦汤或麦门冬汤咽下。

【主治】 ①《奇效良方》：劳嗽，并嗽血唾血。②《校注妇人良方》：发热哺热，口渴盗汗。

07807 阿胶丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 阿胶三两（蒲黄炒灰） 丹参一两半（炒黑） 川芎一两 鹿茸三两（炙灰） 续断三两（炒灰） 赤石脂三两（醋煅） 龙骨三两（煅灰） 当归三两 乌贼骨三两（煅）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服五钱，米饮煎，去滓温服。

【主治】 产后崩漏不止，不能乳子，脉软者。

【方论选录】 产后任阳亏损，冲血妄行，故崩漏不止，不能乳子焉。阿胶补阴益血以除崩漏，丹参去宿生新以和血脉，川芎行血海以升阳，当归养血脉以归经，赤石脂涩血定崩漏，鹿茸灰壮阳止血崩，白龙骨涩虚脱，乌贼骨止漏经，续断灰续经脉以止崩漏也。蜜丸以润之，饮下以和之，使经血内充，则冲任完复，而经气固密，血不妄行。

07808 阿胶汤

【方源】《千金翼》卷七。

【组成】 阿胶 当归 黄柏 黄连各一两 陈廪米一升 蜡如棋子二枚

【用法】 上㕮咀。以水八升，煮米蟹目沸，去米纳药，煮取二升，去滓，纳胶、蜡令烊，分四次服，一日令尽。

【主治】 产后下痢。

07809 阿胶汤

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】 阿胶（炒令燥） 五味子 麻黄（去节） 陈橘皮（汤浸去白，焙）各一两 甘草（炙，锉） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 冷嗽。

07810 阿胶汤

【方源】《圣济总录》（人卫本）卷六十八。

【组成】 阿胶（炙燥） 艾叶（焙）各三两 地榆 芍药各四两 蓟根五两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】 卒吐血不止。

【备考】 本方方名，原书文瑞楼本引作“阿胶散”。

07811 阿胶汤

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】 阿胶（炒令燥，捣末）一两 蒲黄半两

【用法】 上和匀。每服二钱匕，水一盏，煎至六分，入生地黄汁一合，更煎一二沸，温服，不拘时候。

【主治】 舌上出血不止，及鼻久衄不止。

07812 阿胶汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】 阿胶（炒，燥） 黄芩（去黑心）各三分 甘草（炙）半两 生地黄（绞取汁） 车前叶（生者，绞取汁） 藕节（绞取汁） 生蜜一盏

【用法】 上为粗末，同后四味搅匀。每服一大匙，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 肾客热连心，小便出血疼痛。

07813 阿胶汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】 阿胶（炙燥） 一两半 当归（切，焙） 一两 甘草（炙，锉）三分 白术二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】 妊娠胎萎燥，全不转动。

07814 阿胶汤

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】 阿胶（炙令燥） 冬葵子（炒） 牛膝（酒浸，切，焙） 当归（切，焙）各三分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。以下为度。

【主治】 妊娠堕胎，胞衣不出。

07815 阿胶汤

【方源】《鸡峰》卷十。

【异名】 阿胶散(《古今医鉴》卷八)。

【组成】 猪苓 茯苓 泽泻 滑石 阿胶各四分 车前子二分

【用法】 上为粗末。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 血淋。血随小便出，每便辄痛，由心气留热，搏于小肠，盖心主血，遇热即流散，渗于脬中，诊其心脉大散而数疾。

07816 阿胶饮

【方源】《观聚方要补》卷五引《医经会解》。

【组成】 桑白皮 麦门冬 黄柏 知母 生地黄 阿胶 归尾

【用法】 水煎服。

【主治】 肺咳唾血。

【加减】 有痰加贝母。

07817 阿胶散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 熟干地黄三分 白茯苓半两 人参三分（去芦头） 麦门冬半两（去心，焙） 蛤蚧一只（头尾全，涂酥炙令微黄） 侧柏叶一两（涂酥炙令黄）

【用法】 上为细散。每服一钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】 肺萎损败，气喘，咳嗽有血。

07818 阿胶散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】 阿胶半两（捣碎，炒令黄燥） 蒲黄一两

【用法】 上为细散。每服二钱，以水一中盏，加生地黄汁二合，煎至六分，温服，不拘时候。

【主治】 大衄，口耳皆出血不止。

07819 阿胶散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】 禹余粮散(《圣济总录》卷一五二)。

【组成】 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 鹿茸二两（去毛，涂酥炙令微黄） 禹余粮二两（烧醋淬七遍） 牡蛎二两（微锉） 当归一两（锉，微炒） 白芍药三分 蒲黄一两 乌贼鱼骨一两半（烧灰） 赤石脂一两

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 妇人带下五色，久不止。

07820 阿胶散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 黄芩一分 栀子仁一分 车前子一分 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为细散。每服半钱，用新汲水调下，一日三四次。

【主治】 小儿尿血，水道中涩痛。

07821 阿胶散

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】 阿胶（炙燥） 人参 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 甘草（炙，锉） 黄耆（半炙半生，锉） 紫菀（去苗土） 桔梗（锉，麸炒） 桑根白皮（炙，锉）各一两

【用法】 上为散。每服用猪胰一枚，葱白三寸，细切，渗药二钱匕，入盐花少许，湿纸裹煨熟，细嚼，空心温酒下。

【主治】 久咳嗽。

07822 阿胶散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 补肺散（原书同卷）、补肺阿胶散(《本草纲目》卷十八)、清肺饮(《治痘全书》卷十三)、补肺阿胶汤(《金匮翼》卷七)。

【组成】 阿胶一两五钱（麸炒） 鼠粘子（炒香） 甘草（炙）各二钱五分 马兜铃五钱（焙） 杏仁七个（去皮尖，炒） 糯米一两（炒）

【用法】 上为末。每服一二钱，水一盏，煎至六分，食后温服。

【功用】 养阴清肺，止咳平喘。

①《全生指迷方》：补阴平阳。②《普济方》：补肺。温养脾胃。③《医方集解》：补肺清火。

【主治】 肺虚热盛，咳嗽气喘，咽喉干燥，咯痰不多或痰中带血，脉浮细数，舌红少苔。

①《小儿药证直诀》：小儿肺虚，气粗喘促。②

《全生指迷方》：衄血吐血，发作无时，肌肉减少，由气虚弱，或从高坠下、劳伤所致，其脉虚弱。③《普济方》：小儿咳嗽，气急有痰，恶心，肺气虚怯，唇白色闷，乳气粗喘促，哽气长出气，皆肺虚损故也。④《治痘全书》：痘疮肺虚咳嗽，痰唾稠粘者。⑤《医方集解》：肺虚有火，嗽无津液而气哽者。⑥《幼科折衷》：肺虚有汗。

【方论选录】 ①《医宗金鉴》引程应旄：痰带红线，嗽有血点，日渐成痿，缘肺处脏之最高，叶间布有细窍，气从此出入，呼吸成液，灌溉周身，所谓水出高源也，一受火炎，吸时徒引火升，呼时并无液出，久则肺窍俱闭，喉间或痒或疮，六叶遂日焦枯矣。今用阿胶为君者，消窍痨也，用杏仁、大力子宣窍道也；马兜铃者清窍热也；糯米以补脾，母气到肺则肺自轻清无碍矣。②《医方集解》：此手太阴肺药也。马兜铃清热降火；牛蒡子利膈滑痰；杏仁润燥散风，降气止咳；阿胶清肺滋肾，益血补阴。气顺则不哽，液补则津生，火退而嗽宁矣。土为金母，故加甘草、糯米以益脾胃。

07823 阿胶散

【方源】《直指》卷二十六。

【组成】 人参 茯苓 生干地黄 天门冬（水浸，去心） 北五味子各一分 阿胶（炒酥） 白及各二钱

【用法】 上白及别为末，余药锉散。每服三钱，水一大盏，加蜜两大匙，秫米百粒，生姜五片同煎，临熟入白及少许，食后服。

【主治】 ①《直指》：肺破嗽血、唾血。②《医统》：肺燥咳嗽不已。

07824 阿胶散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】 薯蓣一两 阿胶一两（炒） 人参一两 五味子一两 麦门冬一两（去心） 白术一两 干姜三钱（炮） 桂枝五钱 杏仁二钱（去皮尖）

【用法】 上锉细。每服七钱，水二盏，加乌梅一钱，同煎服。

【主治】 伤寒汗下后咳嗽，肺虚声音斯败者。

07825 阿胶散

【方源】《脉因症治》卷上。

【组成】 阿胶二两（炒） 牡蛎（煅） 鹿茸（酥炙）四两

【用法】 煎散任下。

【主治】 小便不禁。

07826 阿胶散

【方源】《普济方》卷五十九。

【组成】 阿胶（炒燥） 蒲黄 黄耆（锉细）各一分

【用法】 上为细散。每服一钱匕，生地黄汁调下，并二服。

【主治】 舌上血出不止。

07827 阿胶粥

【方源】《普济方》卷二五九。

【组成】 阿胶半两（炙黄为末） 龙骨末一分 艾叶末一分

【用法】 上用糯米二合，入药以水煮作粥，空腹食之。

【主治】 妊娠下血。

07828 阿魏丸

【方源】《济生》卷四。

【组成】 阿魏（酒浸化，旋入） 官桂（不见火） 蓬术（炮） 麦芽（炒） 神曲（炒） 青皮（去白） 萝卜子（炒） 白术 干姜（炮）各半两 百草霜三钱 巴豆（去壳油）三七个

【用法】 上为细末，和匀，用薄糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，姜汤送下，不拘时候；面伤，用面汤送下；生果伤，用麝香汤送下。

【主治】 脾胃怯弱，食肉食面，或食生果，停滞中焦，不能克化，致腹胀疼痛，呕恶不食，或痢或秘。

07829 阿魏丸

【方源】《医方类聚》卷一一一引《济生续方》。

【组成】 木香（不见火） 槟榔各半两 胡椒 阿魏（用醋化开，旋入）各二钱半

【用法】 上为细末，用阿魏膏子并粟米饭为丸，如梧桐子大。每服四十丸，用生姜、橘皮汤送下，不拘时候。

【主治】 气积、肉积，心腹膨满，结块疼痛，或引胁疼痛，或痛连背脊，不思饮食。

07830 阿魏丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】 山楂 萝卜子 神曲 麦芽 陈皮 青皮 香附各二两 阿魏一两（醋煮软，另研）

【用法】 上为末，炊饼为丸服。

【主治】 ①《丹溪心法》：饱食停滞，胃壮者。②《医学纲目》：肉积。

【宜忌】 脾虚者勿服。

07831 阿魏丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】 小阿魏丸（《医学入门》卷七）、四味阿魏丸（《张氏医通》卷十三）。

【组成】 连翘一两 山楂二两 黄连一两二钱 阿魏二两

【用法】 上为末，醋煮阿魏作糊为丸。每服三十丸，白汤送下。

【主治】 肉积。

【方论选录】《医略六书》：肉食不消，停滞胃脘，蕴蓄为热，故发热而成癥积焉。阿魏善消肉积，连翘清解蕴热，山楂化瘀滞以磨积，黄连清湿热以开胃也。俾结消热化，则脾胃清和而健运有常，何患肉积不化，蕴热不解乎。此消积清热之剂，为肉积蕴热之专方。

07832 阿魏丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】 大阿魏丸(《明医指掌》卷四)。

【组成】 山楂 南星（皂角水浸） 半夏（皂角水浸） 麦芽（炒） 神曲（炒） 黄连各一两 连翘 阿魏（醋浸） 瓜蒌 贝母各半两 风化消石碱 萝卜子（蒸） 胡黄连二钱半（如无，以宣连代）

【用法】 上为末，姜汁浸，蒸饼为丸服。

【主治】 诸积聚。

【加减】 治嗽，加香附、蛤粉。

07833 阿魏丸

【方源】《李氏医鉴》卷五。

【组成】 阿魏二钱半 青皮 莪术 茴香 胡椒各一两 丁香 白芷 砂仁 肉桂 川芎各五钱

【用法】 醋阿魏打糊为丸，朱砂为衣。淡盐姜汤送下。

【主治】 积聚癥瘕。

07834 阿魏散

【方源】 方出《圣惠》卷二十二，名见《圣济总录》卷十。

【组成】 地龙半两（微炒） 阿魏半分 乳香一字

【用法】 上为细散。每服一钱，以好茶调下，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：白虎风。②《圣济总录》：白虎风，身体疼痛不可忍，转动不得。

07835 阿魏膏

【方源】《内科摘要》卷下。

【异名】 阿魏五香膏(《医级》卷九)。

【组成】 羌活 独活 玄参 官桂 赤芍药 川山甲 生地黄 两头尖 大黄 白芷 天麻各五钱 槐、柳、桃枝各二钱 红花四钱 木鳖子二十枚（去壳） 乱发如鸡子大一块

【用法】 于用香油二斤四两，煎熬去滓，入发煎，发化仍去滓，徐下黄丹煎，软硬得中，入芒消、阿魏、苏合油、乳香、没药各五钱，麝香二钱，调匀即成膏矣，摊贴患处，内服丸药。黄丹须用真正者效。凡贴膏药，先用朴消随患处铺半指厚，以纸盖，用热熨斗熨，良久，如消耗，再加，熨之二时许，方贴膏药；若是肝积，加芦荟末同熨。更服胡黄连丸。

【主治】 一切痞块。

07836 阿艾五苓散

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】 五苓散加阿胶 川芎各一钱 炙草一钱 当归 艾叶各三钱 白芍 熟地各四分

【用法】 水煎服。

【主治】 尿血，其人素好色，属虚者。

07837 阿胶五苓散

【方源】《金鉴》卷四十六

【组成】 五苓散加阿胶

【功用】《中医妇科治疗学》：扶气养血，温脬利尿。

【主治】 ①《金鉴》：转胞。②《中医妇科治疗学》：妊娠后期，小便不通，神疲懒言，头目昏晕，舌淡苔薄，脉滑无力。

【备考】《中医妇科治疗学》本方用法：水煎，温服。

07838 阿胶四苓散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 阿胶三两（蒲黄灰炒） 茯苓一两半 白术一两半（炒） 猪苓一两半 泽泻一两半

【用法】 制为散。每服三钱，生地汁调下。

【主治】 妊娠脾亏血热，挟湿热而血不归经，尿血不止，胎孕不安，脉弦涩者。

【方论选录】 方中白术健脾生血，以统妄行之血；茯苓渗湿和脾，以清湿热之气；猪苓利三焦之湿；泽泻泻膀胱之湿；阿胶补阴益血以止血也。生地汁调散，使湿热并化，则经气清和，而经血自归，无妄行之患。

07839 阿胶地黄丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十一。

【组成】 熟地膏（用熟地一斤，将八两煮汁，去滓，入八两汁内，煮烂成膏） 牡丹皮三两（焙） 山茱萸四两（去核，酒拌蒸，晒干，炒） 白茯苓三两（人乳拌透，晒干，焙） 怀山药四两（炒黄） 泽泻二两（淡盐水拌炒） 麦门冬（去心）四两（炒） 真阿胶三两（切块，蛤粉拌炒成珠）

【用法】 上为末，用熟地膏入药，炼蜜为丸。每服四钱，空心白汤或淡盐汤送下。

【主治】 金水两脏受伤，咳嗽吐血。

07840 阿胶枳壳丸

【方源】《三因》卷十七。

【组成】 阿胶 枳壳（麸炒，去瓤）各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，别研滑石为衣。每服二十丸，温水送下，半日来未通再服。

【主治】 ①《三因》：产后虚羸，大便秘涩。②《得效》：产卧虚羸，水血俱下，肠胃虚竭，津液不足，大便秘涩。

07841 阿胶梅连丸

【方源】《宣明论》卷十。

【异名】 阿胶黄连丸(《医略六书》卷二十五)。

【组成】 金井阿胶（净草灰炒透明白，别研，不细者，再炒，研细） 乌梅肉（去核，炒） 黄柏（锉，炒） 黄连 当归（焙） 赤芍药 干姜（炮） 赤茯苓各半两

【用法】 上为末，入阿胶研匀，水为丸，如梧桐子大。每服十丸，温米饮送下，食前兼夜五六服。小儿丸如绿豆大。

【主治】 ①《宣明论》：下痢无问久新、赤白青黑、疼痛诸证。②《医略六书》：五色痢至夜蒸热，脉虚沉数者。

【宜忌】 忌油腻脂肥诸物。

【方论选录】《医略六书》：阴虚热陷，伤脏气而利下五色，至夜蒸热，是阴虚阳扰而热发于外焉。阿胶止阴虚之痢；当归养痢亡之血；连、柏炒黑，寒而且燥，不使阳热内扰，则阴中之湿亦化；苓、芍敛而且渗，能挽阴液偏亡，则尿利，大便亦实；炮姜暖胃守中，乌梅敛肝收液也。丸以苦酒之敛，下以米饮之和，使阳热顿化则真阴复完，而无液有归，下痢蒸热并瘳矣。此养阴化热之剂，为五色痢夜热之专方。

07842 阿胶黄连汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 陈阿胶一钱半（烊冲） 生白芍二钱 小川连六分（蜜炙） 鲜生地六钱 青子芩一钱 鸡子黄一枚（先煎代水）

【功用】 滋阴清火。

【方论选录】 手少阴心主血，中含热气，故《内经》云：少阴之上，热气治之。凡外邪挟火而动者，总属血热。其症心烦不寐，肌肤枯燥，神气衰弱，咽干尿短。故君以阿胶、生地，滋肾水而凉心血（阿胶必须真陈，庶不碍胃，生地用鲜，庶不碍阴）。但少阴只有热气，能温血而不致灼血，若挟肝胆之相火，激动心热，轻则咽干心烦，欲寐而不能寐，重则上攻咽喉而为咽痛，下奔小肠而便脓血，故臣以白芍配芩、连，酸苦泻肝以泻火，而心热乃平。白芍合生地，酸甘化阴以滋血，而心阴可复。妙在佐鸡子黄，色赤入心，正中有孔，能通心气以滋阴。此为润泽血枯、分解血热之良方。

07843 阿胶麻仁汤

【方源】《四圣心源》卷六。

【组成】 生地三钱 当归三钱 阿胶三钱（研） 麻仁三钱（研）

【用法】 煎一杯，去滓，入阿胶，火化，温服。

【主治】 阳盛土燥，大便坚硬者。

【加减】 结甚，加白蜜半杯；胃热，加芒消、大黄；精液枯槁，加天冬、龟版。

07844 阿魏化痞散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 川芎 当归 白术 赤茯苓 红花 阿魏 鳖甲尖（酥炙，研）各一钱 大黄（酒炒）八钱 荞麦面一两（微炒）

【用法】 上为末。每服三钱，好酒一钟调稀，空心服。三日后腹痛，便出脓血为验。

【主治】 痞癖皆缘内伤过度，气血横逆，结聚而生。初起腹中觉有小块，举动牵引作疼，久则渐大成形，甚者翕翕内动，斯时必气血衰弱，饮食减少。

【宜忌】 忌食生冷、腥荤等。

【备考】 原书治上证，外贴乾坤一气膏。

07845 阿魏软坚散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 阿魏三钱 蜗牛（炙）三钱 象贝母三钱 月石一钱五分 桃仁一钱 僵蚕十条 南星三钱 腰黄三钱五分 冰片三分

【用法】 上为末，大膏药中摊贴。

【主治】 瘰疬痰块等。

07846 阿魏撞气丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 小茴 青皮 甘草 陈皮 莪术 川芎 各一两 生姜四两（用盐五钱淹一宿） 胡椒 白芷 肉桂 砂仁 丁香皮（炒）各五钱

【用法】 上为末，用阿魏一钱半，和面糊为丸，如芡实大，每药一斤，用朱砂七钱为衣。每服三五丸，男子气痛，炒姜盐汤送下；妇人血气痛，醋汤送下。

【主治】 五种噎疾，九种心痛，痃癖气块，冷气攻刺，腹痛肠鸣，呕吐酸水，男子疝气，女人血气。

07847 阿魏麝香散

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】 阿魏五钱（酒煮） 麝香一钱 雄黄三钱 野水红花子四两 神曲（炒） 人参 白术（生）各一两 肉桂五钱

【用法】 上为散。每服三钱，用乌芋（即荸荠）三个，去皮捣烂和药，早、晚各一服，砂仁汤过口。

【主治】 肠覃诸积痞块。

07848 阿胶鸡子黄汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 陈阿胶二钱（烊冲） 生白芍三钱 石决明五钱（杵） 双钩藤二钱 大生地四钱 清炙草六分 生牡蛎四钱（杵） 络石藤三钱 茯神木四钱 鸡子黄二枚（先煎代水煎服）

【功用】 ①《重订通俗伤寒论》：滋阴熄风。②《方剂学》：滋阴养血，柔肝熄风。

【主治】 ①《重订通俗伤寒论》：血虚生风。筋脉拘挛，伸缩不能自如，手足瘛疭。②《方剂学》：热邪久羁，灼烁阴血。筋脉拘急，手足瘛疭，类似风动，或头目眩晕，舌绛苔少，脉细数者。

【方论选录】 本方以阿胶、鸡子黄为君，取其血肉有情，液多质重，以滋血液而熄肝风；臣以芍、草、茯神木，一则酸甘化阴以柔肝，一则以木制木而熄风；然心血虚者，肝阳必亢，故佐以决明、牡蛎，介类潜阳；筋挛者络亦不舒，故使以钩藤、络石，通络舒筋也，此为养血滋阴，柔肝熄风之良方。

07849 陈曲丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】 陈曲一两半 干姜（炮） 官桂（不见火） 白术 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 人参（去芦） 当归（去芦，薄切，焙干） 甘草（炙）各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，酒或淡醋汤送下，空心食前服，一日二次。发时不时增数。

【功用】 磨积，止泄痢。

【主治】 ①《本事》：泄痢，心腹冷痛。②《本事方释义》：中虚不运，积聚不消，泄痢不止。

【方论选录】《本事方释义》：本方以理中护其中，以归、桂和其荣，曲、朴疏其滞。或酒或醋汤送者，引至病所也。此邪少虚多之治法也。

07850 陈茗粥

【方源】《药粥疗法》引《食疗本草》。

【组成】 陈茶叶5～10克 粳米30～60克

【用法】 先用茶叶煮汁，去滓，加粳米同煮为稀粥。上、下午分二次温服。

【功用】 消食化痰，清热止痢，除烦止渴，兴奋提神。

【主治】 食积不消，过食油腻，饮酒过量，口干烦渴，多睡不醒，赤白痢疾。

【宜忌】 临睡前不宜吃。

07851 陈黄汤

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】 黄耆 陈皮各五钱

【用法】 上为末。每服三钱，用火麻仁一合（研烂），以水投，取汁一钟，滤去滓，于银石器中煎，候有乳花起，即加白蜜一大匙，再煎令滚，调药末，空心服。

【主治】 老人大便秘结。

07852 陈槐汤

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】 当归（头、尾）二钱 川芎二钱 赤芍药二钱 黄芩二钱 槐花二钱 陈皮二钱 侧柏叶（蜜炒）二钱 乌药二钱 山栀子七个 藕节三分 细茶二钱

【用法】 用水二钟，煎一钟，热服，不拘时候。

【主治】 吐血衄血不止。

07853 陈橘丸

【方源】《养老奉亲》。

【组成】 陈橘皮（去瓤）一两 槟榔（锉细）半两 木香一分 羌活（去芦头）半两 防风（去芦头）半两 青皮（去瓤）半两 枳壳（麸炒，去瓤）半两 不蛀皂角两挺（去黑皮，酥炙黄） 郁李仁一两（去皮尖，炒黄） 牵牛（微炒，杵细，罗取末）二两

【用法】 上为末，郁李仁、牵牛同研拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前用生姜汤送下。未利，渐加三十丸，以利为度。

【主治】 老人大肠风燥气秘。

07854 陈橘皮丸

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】 陈橘皮（汤浸，去白，焙）二两 紫苏子三分 防己半两 桑根白皮（锉） 赤茯苓（去黑皮） 木通（锉） 郁李仁（汤浸，去皮尖，微炒） 甜葶苈（微炒）各一两

【用法】 上为散，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜、大枣汤送下，不拘时候。

【主治】 虚劳上气喘促，坐卧不安。

07855 陈橘皮汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 一分 赤茯苓（去黑皮） 枳壳（去瓤，麸炒）各半两 栝楼实一枚（去皮瓤，用子） 桂（去粗皮） 甘草（炙）各一分

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓温服，空心、日午、临卧各一次。

【主治】 胸痹连心气闷，喉中塞不通。

07856 陈橘皮饮

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 甘草（炙）各二两 草豆蔻（去皮）五枚

【用法】 上为粗末。每服四钱匕，水一大盏，加生姜半分（切），同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 干呕不止。

07857 陈橘皮散

【方源】 方出《圣惠》卷四十二，名见《普济方》卷一八七。

【组成】 陈橘皮二两（汤浸，去白瓤，焙） 枳壳二两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，生姜半分，同煎至六分，去滓，温温频服。

【主治】 胸痹，胸中愊愊如满，噎塞如痹，咽喉中涩，唾沫。

07858 陈橘皮散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【异名】 陈橘皮汤（《圣济总录》卷五十七）。

【组成】 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 汉防己半两 赤茯苓三分 槟榔三分 木通三分（锉） 紫苏茎叶一两 木香半两 大腹皮一两（锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：腹内诸气，胀满喘促。②《圣济总录》：久腹胀，寒气结搏不得散。

【备考】 方中槟榔用量原缺，据《圣济总录》补。

07859 陈橘皮散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 粟米半分（炒微黄） 甘草半两（炙微赤，锉） 诃黎勒皮二两 丁香一两

【用法】 上为细散。每服一钱，以生姜汤调下，不拘时候。

【主治】 膈气，脾气弱，呕逆不能下食。

07860 陈橘皮散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 白术一两 人参一两（去芦头） 胡椒半两 肉豆蔻一两（去壳） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：五膈气，胃中宿冷，食不消化，呕吐酸水。②《普济方》：胸满气逆，食不消化，呕吐。

07861 陈橘皮散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 陈橘皮二两（汤浸，去白瓤，焙） 白槟榔一两 人参一两（去芦头） 白术一两 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣二枚，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 哕逆酸咽，胸膈不利，食少腹胀。

07862 陈橘皮散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 白茯苓一两 半夏一两（汤洗七遍去滑） 麦门冬一两（去心） 甘草半两（炙微赤，锉） 人参三分（去芦头）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，淡竹茹一分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妊娠二三月恶阻病，呕吐不能食。

07863 陈橘皮散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】 陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒令黄） 桑根白皮（锉） 甜葶苈（隔纸炒令紫色） 甘草（炙微赤，锉）各一分

【用法】 上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】 小儿咳嗽，咽中作呀呷声。

07864 陈氏乌须丸

【方源】《石室秘录》卷四。

【异名】 乌须至补丹。

【组成】 桑椹一斤（蒸熟晒干，不蒸则此物最不肯干，但不可经铁器，饭锅蒸则无害） 生赤何首乌一斤（切片，饭锅蒸，晒干，九次为妙） 南烛叶一斤（亦饭锅蒸熟，晒干，若不蒸自干则无用） 熟地一斤 麦冬半斤 花椒（去壳皮）二两（以四两取米二两） 白果一两 白术一斤

【功用】 乌须补肾，以通任督。

07865 陈氏玉龙汤

【方源】《妇人良方》卷二十三。

【异名】 玉龙汤（《普济方》卷三五五）。

【组成】 四物汤加真龙骨末少许

【用法】 水煎，空心连进二服。麻油汤熏洗。

【主治】 妇人产后用力太过，产门恶出。

07866 陈氏咳喘膏

【方源】《温氏经验良方》。

【组成】 川乌六钱 官桂八钱 当归六钱 白芷八钱 木鳖子八钱 白及六钱 连翘八钱 茯苓六钱 赤芍八钱 草乌六钱 白薇八钱 牙皂五钱 乌药六钱 桃枝五钱 桑枝五钱 柳枝五钱 槐枝五钱

【用法】 上同麻油三斤浸一夜，熬焦去滓，加飞黄丹一斤（如麦色），急以柳、桃棍二根，搅至滴水成珠，加没药、乳香末各四两收膏。贴背脊骨，由上往下数第三骨节。入伏之日起，用膏药一帖，贴满三伏；再于冬至之日起，用膏药一帖，贴尽九九。去病除根。

【主治】 多年咳嗽气喘。

07867 陈皮石韦散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 石韦一两 赤芍药三分 瞿麦穗 木通各一两 陈皮 茯苓 桑白皮各三分

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服，一日二三次。以利为度。

【主治】 下焦有热，淋闭不通，小腹妨闷。

07868 陈皮滑石散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 陈皮 滑石 川芒消 葵子各一两 赤茯苓 赤芍药 子芩 瞿麦 石苇 蒲黄各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，食前米饮调下。

【主治】 气淋，腹胁胀满，脐下气结，小肠疼痛。

07869 陈米消胀丸

【方源】《万氏家抄方》卷二

【组成】 陈仓米二两（同巴豆四十九粒炒黄色，去巴豆） 莪术 三棱 青皮 陈皮各一两 香附一两半（醋炒） 干姜五钱

【用法】 上为末，面糊为丸。每服七十丸，生姜皮汤送下。

【主治】 鼓胀。

07870 陈氏脓窠疮药

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】 蛇床子 大风子肉 松香 枯矾各一两 黄丹 大黄各五钱 轻粉三钱

【用法】 上为细末，麻油调搽。烂者干掺之。

【主治】 脓窠疮。

07871 陈苓术芍甘连汤

【方源】《温热经解》。

【组成】 陈皮一钱 茯苓二钱 白术八分 白芍八分 甘草一钱 川连一钱

【功用】 扶土抑木。

【主治】 胆汁入胃，木火乘土，痢色绿者。

07872 附子丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 附子三分（炮裂，去皮脐） 川乌头三分（炮裂，去皮脐） 当归半两（锉，微炒） 桂心一两 荜澄茄三分 赤石脂三分 川椒半两（去目及闭口者，微炒去汗） 木香三分 茴香子一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】 小肠虚冷气，小腹疼痛不可忍。

07873 附子丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心半分 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 甘草一分（炙微赤，锉） 当归三分（锉，微炒） 小麦曲二两（微炒令黄） 川椒半两（去目及闭口，微炒出汗）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜、大枣汤送下，不拘时候。

【主治】 脾胃气虚弱，肌体羸瘦，不能饮食，食不消化。

【宜忌】 忌生冷、油腻、犬肉。

07874 附子丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 附子二两（炮裂，去皮脐） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干） 补骨脂一两（微炒） 鹿茸一两（去毛，涂酥炙令黄） 杜仲一两（去粗皮，炙令黄，锉） 黄耆一两半（锉） 五味子一两 牛膝一两（去苗） 薯蓣一两 山茱萸

一两　酸枣仁一两　芎藭三分　柏子仁一两　肉桂一两半（去皱皮）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】 骨极。肢节痠疼，脚胫无力，两耳虚鸣。

07875　附子丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 附子半斤（每日早以新汲水浸，日一度换水，浸经七日，去黑皮，薄切，晒干，为末）石斛四两（去根，锉）　肉苁蓉四两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）　补骨脂四两（微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 虚劳膝冷。

07876　附子丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】 附子一两（炮裂，去皮脐）　龙骨三分　当归一两（锉，微炒）　白术一两　干姜三分（炮裂，锉）　桂心半两　白矾二两（烧灰）　厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 久冷痢，大肠滑泄，吃食不消，腹胁疼痛。

07877　附子丸

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 附子一两（炮裂，去皮脐）　天麻一两　牛膝一两（去苗）　仙灵脾一两　川乌头一两（炮裂，去皮脐）　防风一两（去芦头）　虎胫骨一两（涂酥，炙令黄）

【用法】 上为细末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以温酒送下。

【主治】 妇人风痹，手足不遂。

07878　附子丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】 附子二两（炮裂，去皮脐）　巴戟天一两（去心）　白龙骨一两　茴香一两（炒）　干姜三分（炮裂）

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前盐汤送下，温酒下亦得。

【主治】 肾脏虚冷，小便滑数，脐腹疼痛，耳鸣目暗。

【备考】《圣济总录》有木香半两。

07879　附子丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐）　赤石脂　桂（去粗皮）　干姜（炮）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前米饮送下，一日三次。

【主治】 久痢不愈，肠垢出。

07880　附子丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐）　乌梅肉（炒干）各一两　干姜（炮）一两半　黄连（去须，炒）二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心米饮送下，日晚再服。

【主治】 洞泄寒中，注下水谷，或痢赤白，食入即吐，食物不消。

07881　附子丸

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐）　人参　当归（切，焙）　熟干地黄（焙）　桂（去粗皮）　延胡索　威灵仙（去苗土）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，温酒送下；胡桃茶亦得，不拘时候。

【主治】 产后腰痛不可忍。

07882　附子汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 附子二枚（炮，去皮，破八片）　茯苓三两　人参二两　白术四两　芍药三两

【用法】 上以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，一日三次。服药前先灸之。

【功用】 ①《注解伤寒论》：温经散寒。②《方剂学》：温肾助阳，祛寒化湿。

【主治】 ①《伤寒论》：少阴病，得之一二日，口中和，其背恶寒者；少阴病，身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者。②《金匮》：妇人怀娠六七月，脉弦发热，其胎愈胀，腹痛恶寒者，少腹如扇，所以然者，子脏开故也。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：辛以散之，附子之辛以散寒；甘以缓之，茯苓、人参、白术之甘以补阳；酸以收之，芍药之酸以扶阴。所以然者，偏阴偏阳则为病，火欲实，水当平之，不欲偏胜也。②《金镜内台方议》：以附子为君，温经散寒；茯苓为臣，而泄水寒之气；以白术、芍药为佐，而益燥其中；以人参为使，而补其阳，以益其元气而散其阴邪也。③《医方考》：伤寒以阳为主，上皆阴盛，几无阳矣。辛甘皆阳也，故用附、术、参、苓以养阳；辛温之药过多，则恐有偏阳之弊，故又

用芍药以扶阴。经曰：火欲实，水当平之。此用芍药之意也。④《医方集解》：肾主骨，寒淫则痛，此一身骨节尽痛，乃阳虚阴盛而生内寒所致，非外寒也。若以外感之痛治之，则杀人矣。故用参、附助阳而胜肾寒，加芍药敛阴以为阳之附也。⑤《古方选注》：附子汤，少阴固本御邪之剂，功在倍用生附，力肩少阴之重任，故以名方。其佐以太、厥之药者，扶少阴之阳，而不调太、厥之开阖，则少阴之枢终不得和，故用白术以培太阴之开，白芍以收厥阴之阖，茯苓以利少阴之枢纽。独是少阴之邪，其出者从阴内注于骨，苟非生附，焉能直入少阴，注于骨间，散寒救阳？尤必人参佐生附，方能下鼓水中之元阳，上资君火之热化，全赖元阳一起，而少阴之病霍然矣。⑥《金鉴》：少阴为寒水之脏，故寒伤之重者，多入少阴，所以少阴一经最多死证。方中君以附子二枚者，取其力之锐，且以重其任也；生用者，一以壮少火之阳，一以散中外之寒，则身痛自止，恶寒自除，手足自温矣。以人参为臣者，所以固生气之原，令五脏六腑有本，十二经脉有根，脉自不沉，骨节可和矣。更佐白术以培土，芍药以平木，茯苓以伐水，水伐火自旺，旺则阴翳消，木平土益安，安则水有制，制则生化，此诚万全之术也。⑦《伤寒论讲义》：本方重用附子，温经驱寒镇痛，与人参相伍，温补以壮元阳，与白术、茯苓相伍，健脾以除寒湿，佐芍药和营血而通血痹，可加强温经止痛的效果。

07883 附子汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】附子（炮） 甘草（炙）各二两 宿姜 半夏（洗，破）各四两 大枣二十枚（擘，去皮核） 白术三两 仓米半升

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，去滓，分为三服。

【主治】肺虚劳损，腹中寒鸣切痛，胸胁逆满气喘。

【宜忌】忌猪羊肉、饧、海藻、菘菜、桃、李、雀肉等。

07884 附子汤

【方源】《千金》卷七。

【组成】附子三枚 芍药 桂心 甘草 茯苓 人参各三两 白术四两

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取三升，分三服。

【主治】①《千金》：湿痹缓风，身体疼痛如欲折，肉如锥刺。②《三因》：风湿寒痹，骨节疼痛，皮肤不仁，肌肉重着，四肢缓纵。

【方论选录】《千金方衍义》：南阳太阳例中，甘草附子汤本治风湿相搏，骨节烦疼掣痛，《千金》借治湿痹缓风，可谓当矣。又恐辛温太过，津随汗泄，更合少阴例中附子汤，取人参固气，芍药敛津，茯苓渗湿，并助桂、附之雄，庶无风去湿不去、虚风复入之患矣。

07885 附子汤

【方源】《千金》卷十五。

【组成】龙骨 甘草 芍药 干姜 黄连各一两 石榴皮一具（大者） 阿胶二两 附子一枚 黄芩半两 粳米三合

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取三升，分三服。

【主治】暴下积日不住及久痢。

【方论选录】《千金方衍义》：暴痢势剧，火迫之象，日久不止，热烁津枯，不独下多亡阴，而真阳亦已告匮，故于驻车丸中除去当归之行血，掺入芍药辅阿胶以滋耗竭之真阴，附子助干姜以扶伤残之虚阳，黄芩佐黄连以屏宿蕴之余火，甘草、粳米缓清脾胃之虚热，龙骨、橘皮急收二肠之滑脱也。

07886 附子汤

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】附子半两（去皮脐，生用） 防风半两（去芦头） 枳壳半两（去瓤） 羌活半两 白芷半两 甘草半两（锉，生用） 蜂房半两 川椒二两（去目）

【用法】上为散。每用一两，以水三大碗，加生姜一两，生桑枝一握，黑豆一合，同煎，令豆熟，去滓，着冷暖得所，避风淋蘸手指。水冷重暖用之。

【主治】五指挛急。

07887 附子汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】附子（炮裂，去皮脐）一两 黄耆四两 甘草（炙，锉）半两 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙）五两 防风（去叉）半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服四钱匕，水一盏半，加大枣二枚（去核），生姜一枣大（擘碎），同煎至一盏，去滓温服，日二次，夜一次。

【主治】历节风疼痛，日夜不可忍。

07888 附子汤

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】附子（炮裂，去皮脐）二枚 桂（去粗皮）半两 当归（切，焙）半两 干姜（炮裂）一

分 麻黄（去节，先煎，掠去沫，焙干）半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至七分，去滓，空心顿服，以衣覆；如人行五里，再一服；少顷，以生姜煮热稀粥投之，身体四肢自然汗出，须臾头轻目明。

【主治】 阴毒伤寒，头痛眼疼，心中闷乱，身体沉重，四肢俱冷，精神恍惚，脉候沉细，欲得冷水，饮之必危。

【加减】 妇人病，加赤芍药半两。

07889 附子汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐）半两 黄连（去须，炒）一两 阿胶（炙令燥）三分 甘草（炙，锉） 干姜（炮）各半两 赤石脂 厚朴（去粗皮，姜汁炙）各一两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，空心食前温服，一日三次。

【主治】 冷痢及赤白滞下。

07890 附子汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐） 甘草（炙）各一两 干姜（炮）三分 半夏一两（汤洗去滑，生姜二两同捣作饼，炙） 白术（锉，炒）一两半 苍术（米泔浸，去粗皮，锉，炒）二两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏半，加大枣二枚（擘），生姜半分，煎至一盏，去滓，分为二服。

【主治】 虚劳，脾胃冷弱，胸满气逆，呕吐咳嗽，腹痛肠鸣。

07891 附子汤

【方源】《普济方》卷二一六。

【组成】 白术 附子（炮裂，去皮） 干姜（炮） 桂 赤石脂 一两

【用法】 上为末。每服一钱，空心生姜汤调下，一日二次。

【主治】 肾气虚寒，小便滑数。

【备考】 方中白术、附子、干姜、桂用量原缺。

07892 附子饮

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】 附子两枚（大者。一枚炮裂，去皮脐，一枚生用） 桂（去粗皮）二两 麻黄（去节，先煎，掠去沫，焙干）四两 甘草（炙，锉） 杏仁（汤退去皮尖双仁，炒）各二两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，以水二盏，煎至一盏，去滓温服，相去如人行五里再服。以衣被盖之，通体有汗即愈。未汗，用热生姜葱豉稀粥投之。常服，空心、临卧服二合甚佳。

【主治】 中风，四肢拘挛，屈伸不得。

07893 附子饼

【方源】《外科发挥》卷三。

【组成】 炮附子（去皮脐）

【用法】 上为末，以唾津和为饼，置疮口处，将艾壮于饼上，灸之。每日灸数次，但令微热，勿令痛。如饼干，再用唾津和做，以疮口活润为度。

【主治】 溃疡，气血虚不能收敛，或风邪袭之，以致气血不能运于疮所，不能收敛。

07894 附子散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】 附子一两（炮裂，去皮脐） 沉香一两 桂心一两 木瓜一两半 高良姜一两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【主治】 肝虚风冷所搏，转筋不止。

【宜忌】 忌鸡、猪、毒鱼、大蒜等。

07895 附子散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】 附子一两（炮裂，去皮脐） 麻黄一两（去根节） 杏仁 一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草一分（炙微赤，锉） 赤茯苓三分 菖蒲半两 肉桂一两（去皱皮） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣三枚，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 肺脏伤风冷，声嘶不出，或吃食后虚喘。

07896 附子散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 附子一两（炮裂，去皮脐） 石斛三分（去根，锉） 杜仲三分（去粗皮，炙微黄，锉） 五味子三分 人参三分（去芦头） 熟干地黄一两 续断三分 牛膝三分（去苗） 桂心一两 沉香一两 黄耆三分（锉） 当归三分（锉，微炒） 木香三分 白龙骨一两 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 肾脏风虚，两耳常鸣，腰背痛强，小便多利，虚羸无力。

07897 附子散

【方源】《圣惠》卷十一。

【异名】 桂附散(《普济方》卷一三五)。

【组成】 附子三分（炮裂，去皮脐） 桂心半两 当归半两（锉，微炒） 半夏一分（汤浸七遍去滑） 干姜一分（炮裂，锉） 白术半两 天南星一分（炮裂） 木香一分

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓热服，不拘时候。衣覆取汗；如人行十里未有汗，再服。

【主治】 ①《圣惠》：阴毒伤寒，唇青面黑，身重背强，四肢逆冷。②《普济方》：因服冷药过度，心腹胀满，昏沉不知人。

07898 附子散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 附子一两（炮裂，去皮脐） 川乌头一两（炮裂，去皮脐） 乌蛇肉二两（酒浸，去皮骨，炙微黄） 干蝎一两（微炒） 天麻一两 天南星一两（炮裂） 白附子一两（炮裂） 防风一两（去芦头） 白僵蚕一两（微炒） 蝉壳一两 麻黄一两（去根节） 藿香一两

【用法】 上为细散。每服一钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】 破伤风。身体强直，筋脉拘急，口眼偏斜。

07899 附子散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】 附子一两（炮裂，去皮脐） 熟干地黄二两 白龙骨一两 桂心三分 续断一两 干姜一两（炮裂） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 虚劳小便数，或不禁者。

07900 附子散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】 附子一两（炮裂，去皮脐） 牛膝三分（去苗） 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 羌活一两 桂心半两 当归一两半（锉，微炒） 防风二两（去芦头） 延胡索一两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 腰痛强直，不能俯仰，及筋脉拘急。

07901 附子散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】 附子一两（炮裂，去皮脐） 没药一两 蒲黄一两 当归一两 芎藭一两 姜黄一两 赤芍药一两

【用法】 上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【功用】 理血止痛。

【主治】 从高坠下，落马车辗，一切伤折。

07902 附子散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】 附子二两（炮裂，去皮脐） 没药一两 桂心二两 威灵仙一两 干漆一两（捣碎，炒令烟出） 牛膝一两（去苗）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 妇人腰脚积年疼痛不愈。

07903 附子散

【方源】《活人书》卷十六。

【异名】 附子汤(《圣济总录》卷二十七)、大附子当归散(《医方类聚》卷一五七引《施圆端效方》)。

【组成】 附子三分（炮裂，去皮） 桂心半两 当归半两（锉，微炒） 干姜一分（炮裂，锉） 半夏一分（汤洗七次去滑） 白术半两

【用法】 上为细散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓热服，不拘时候。衣覆取汗；如人行十里未汗，再服。

【主治】 阴毒伤寒，及诸沉寒痼冷等阴盛阳虚之证。

①《活人书》：阴毒伤寒，唇青面黑，身背强，四肢冷。②《三因》：因服冷药过度，心腹胀满，昏沉不知人。③《普济方》：阴毒伤寒为病，手足冷，腰背强，头疼腹痛，或烦渴，精神恍惚，额与手背时出冷汗，声郑重，爪甲唇面色青黑。妇人血室痼冷沉寒，赤白崩漏，脐腹疠痛，一切阴盛阳虚。④《简明医彀》：中寒阴证，诸沉寒痼冷。

07904 附子散

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮） 各二两半 细辛（去苗叶）一两半 干姜（炮） 防风（去叉）各二两半 甘草（炙，锉）三分

【用法】 上为散。每用一钱至二钱匕，温酒调下，空心、午时各一服。

【主治】 中风手臂不随，口面偏斜。

07905 附子散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐） 干姜（炮） 细

辛（去苗叶） 防风（去叉）各一两 山茱萸一两 山芋一两半

【用法】 上为细散。每服一钱匕，空心温酒调下。

【主治】 风眩目疼耳聋。

07906 附子散

【方源】 《圣济总录》卷七十四。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐）三分 干姜（炮） 龙骨各一两

【用法】 上为散。每服二钱匕，食前煎乌梅汤调下，一日二次。

【主治】 大便溏，滑利不止。

07907 附子散

【方源】 《圣济总录》卷九十七。

【组成】 附子一枚（炮裂，去皮脐）

【用法】 削去外面，留中心如枣大，为细散。每服一钱匕，蜜水调下。

【主治】 大便冷秘。

07908 附子散

【方源】 《圣济总录》卷一百四。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐） 磁石（煅，醋淬七遍） 龙骨 菖蒲 藁本（去苗土）各一分

【用法】 上为散。以绵裹一钱匕，塞耳中。

【主治】 耳聋。

07909 附子散

【方源】 《医学纲目》卷二十二引《本事》。

【组成】 人参一两 茯苓（白者）二两 附子七钱以上重者（炮，去皮脐） 粉草一两 黄耆一两（盐炙）

【用法】 上为细末。每服三大钱，盐汤煎服。

【功用】 保全胃气，生肌肉，进饮食，顺荣卫，常服大有补益。

【主治】 男、妇、小儿唇青面黄，肚里冷疼，引牵小腹，以至翻胃换食，呕吐，口苦舌干，少寐多寐，脚手牵掣，不拘年日远近，一切脾冷病。

【临证举例】 翻胃 有一妇人，年四十余，久患翻胃，面目黄黑，历三十余年，医不能效，脾俞诸穴烧灸交遍，其病愈甚。服此药七日，顿然全愈，服至一月，遂去其根。

07910 附子散

【方源】 《得效》卷六。

【组成】 绵附子一两（炮，去皮脐，盐水内浸良久） 泽泻（不蛀者）一两

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，加灯心七茎，煎服，随通而愈。

【主治】 阳虚小便不通，两尺脉俱沉微，用淋闭通滑之剂不效者。

07911 附子散

【方源】 《医方考》卷二。

【组成】 附子一枚（干姜煎汤泡七次）

【用法】 上为末。每服三钱。

【主治】 寒痰翻胃。

【方论选录】 膈上有寒痰壅塞中、下二焦之气，阴遏其阳，蓄极则通，故令翻胃。附子辛热能解寒痰，寒痰既解，则气道疏通，而无蓄极之阳矣，故翻胃顿除。

07912 附子散

【方源】 《张氏医通》卷十六。

【组成】 麻黄附子细辛汤加干姜 桂心 人参 防风 芎藭 羚羊角

【用法】 上为散。水煎，加竹沥，日服一剂。

【主治】 中风手臂不仁，口面㖞僻。

【方论选录】 《医略六书》：阳虚风中，遏热伤筋，故筋脉牵引，㖞僻不仁焉。附子、桂心补以温营；麻黄、防风散风发表；人参扶元气；川芎活血脉；干姜暖胃温中，俾邪勿复入；细辛通气散邪，使营卫以行；羚羊平厥阴之火；竹沥滋少阴之津，润则风邪外解，络气清和，脾得为胃行津液于肢臂焉。

07913 附子粥

【方源】 《药粥疗法》。

【组成】 制附子3～5克 干姜1～3克 粳米30～60克 葱白二根 红糖少许

【用法】 将附子、干姜研为极细末。先用粳米煮粥，待粥煮沸后，加入药末及葱白、红糖，同煮为稀粥。或用附子、干姜煎汁，去滓后，下米、葱、糖一并煮粥。每日分二次，温热食用，一般以三至五天为一疗程。

【功用】 温中补阳，散寒止痛。

【主治】 肾阳不足，命火衰微，畏寒肢冷，阳萎尿频，脾阳不振，脘腹冷痛，大便溏泄，冷痢，或因大汗出及大吐大泻引起的四肢厥逆，冷汗自出，口淡不渴，舌苔白，脉微细无力，阳气衰弱的危重病人。

【宜忌】 附子有小毒，煮粥时应选用制附子，且从小剂量开始为妥。对于热证实证的病人，不可服食。

07914 附子煎

【方源】 《圣济总录》卷五十二。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐） 诃黎勒皮 甘

草（锉） 牛膝（切）各一两 硫黄（船上者，碎） 茴香子（炒） 干姜各半两

【用法】 先将硫黄、甘草纳绢袋扎头，次将诸药粗捣银石器内，以水一斗，慢火同煎，不得入生水，频看，候煎至一大碗汁，取出滤去滓，分作四盏。每日空心一盏，温米饮调下，即用饭压之。如欲丸，除甘草不用，将诸药为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，生姜盐汤送下。

【主治】 脾肾虚冷，脐腹冷痛，大便时泄，腹胀羸瘦。

07915 附子煎

【方源】 《鸡峰》卷十一。

【组成】 附子 乌头各六两 干姜 当归各五两 槟榔十两 赤石脂八两 桂五两 蜀椒四两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心米饮送下。

【主治】 冷气及瘀血心痛兼癥块。

07916 附子煎

【方源】 《朱氏集验方》卷一。

【组成】 大附子一枚（重八钱，慢火炮裂，去皮，切作十片，同生姜、米泔淹一宿，去姜，薄片切，焙干） 防风一两 骨碎补半两（去毛，炒） 汉防己 白术各半两 乳香二钱（别研）

【用法】 上为细末，入乳香拌匀，好酒煮糊为丸。每服二三十丸，空心温酒送下。

【主治】 手臂无力，麻痹不仁，手足不随，风湿相搏，筋骨诸疾，痛不能举。

07917 附子膏

【方源】 《外台》卷十五引《古今录验》。

【异名】 摩风膏（《普济方》卷一一二）。

【组成】 附子（炮） 天雄（炮） 乌头（炮）各三两 防风二两（一方无防风）

【用法】 上切，以猪膏三升合煎之。先服商陆散，白癜上以膏敷之。

【主治】 白癜风。

07918 附术汤

【方源】 《济生》卷四。

【组成】 附子（炮，去皮） 白术各一两 杜仲（去皮，锉，炒去丝）半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】 ①《济生》：湿伤肾经，腰肿冷痛，小便自利。②《医方大成》：其脉沉缓，腰如带五千钱，不能俯仰。

【备考】 本方方名，《医方大成》引作“术附汤”。

07919 附芎散

【方源】 方出《本事》卷二，名见《普济方》卷四十四。

【组成】 大川芎二个（锉作四片） 大附子一个（生，和皮，为末）

【用法】 上以水和附子末如面剂，裹川芎作四处。如附子末少，加面少许裹毕，以针穿数孔，用真脑麝熏有穴处，纳香后再捻合其穴。如未觉内有香，即再熏一炷。细罗灰，用铫子纳热灰，炮熟末之。每服半钱，葱茶汤送下，不拘时候。

【主治】 ①《本事》：气虚头疼。②《普济方》：头风。

07920 附苓丸

【方源】 《永类钤方》卷二十一。

【组成】 附子（炮）半两 白茯苓 泽泻 滑石各二钱

【用法】 上为末，糊丸如小豆大。三岁每服二十丸，灯心汤送下。

【主治】 小儿溏泄，小便不利。

07921 附矾丸

【方源】 《普济方》卷三十三。

【组成】 附子（炮，去皮脐）二两 矾石二两（熬去汁）

【用法】 上为末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至二十丸，空心、夜卧清茶送下。

【主治】 白淫过甚。

07922 附梔煎

【方源】 《仙拈集》卷二。

【组成】 梔子（姜汁炒黑）十五粒 香附（童便炒） 川芎各一钱

【用法】 水煎，加生姜汁四匙调服。立愈。

【主治】 因郁火而心胃痛者。

07923 附香散

【方源】 《杨氏家藏方》卷一。

【异名】 附香饮（《易简》）、香附汤（《普济方》卷一八五）、附子散（《普济方》卷二六七）。

【组成】 附子二枚（炮，去皮脐） 木香二钱

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏半，加生姜十片，煎至一盏，食前温服。

【主治】 ①《杨氏家藏方》：中风偏痹，经络不通，手足缓弱，臂膝痠疼，风证始作，脉息不洪数者。②《普济方》：十指疼痛，麻木不仁；中风厥冷。

07924 附姜汤

【方源】《法律》卷二。

【组成】附子（炮，去皮脐） 干姜（炮）各五钱

【用法】用水二大盏，煎至一盏，略加猪胆汁一蛤蜊壳，浸和温冷服。

【主治】腠理素虚，卒暴中寒，自汗淋漓，身冷，手足厥逆；或阴盛于内，逼其阳亡于外，外显假热躁烦。

07925 附桂汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】附子三钱 肉桂一钱 黄柏 知母 升麻 甘草各五分 黄耆一钱半 人参七分

【用法】水煎服。

【主治】虚寒带下，白带腥臭，多悲不乐，大寒；兼治浊淫。

07926 附子丁香散

【方源】《普济方》卷三十六引《十便良方》。

【组成】白术五钱 甘草三钱 附子（炮）一两 干姜（炮）五钱 丁香五钱 肉豆蔻五钱

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏，加生姜五片，煎至六分，空心服。

【主治】翻胃恶心吐逆，脏冷泄泻等疾。

07927 附子八物汤

【方源】方出《千金》卷八，名见《三因》卷三。

【异名】附子八味汤（《准绳·类方》卷四引（活人书））、人参附子汤（《御药院方》卷一）、八物附子汤（《杏苑》卷七）。

【组成】附子 干姜 芍药 茯苓 人参 甘草 桂心各三两 白术四两（一方去桂，用干地黄二两）

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取三升，每日三服。

【主治】风寒湿痹，四肢关节痛不可忍；疮疡阳气脱陷，畏寒吐泻，四肢厥逆。

①《千金》：湿风体痛欲折，肉如锥刀所刺。②《三因》：风历节，四肢疼痛，如槌锻不可忍。③《女科撮要》：历节作痛，发热作渴，饮食少思。④《景岳全书》：疮疡，阳气脱陷，呕吐，畏寒泄泻，厥逆。

07928 附子八物汤

【方源】《外科正宗》卷七。

【组成】川芎 白芍 熟地 人参 白术 茯苓 当归 附子各一钱 肉桂五分 木香 甘草各三分

【用法】以水二钟，加生姜三片，大枣一枚，煎八分，空腹服。

【主治】流注，房欲后阴虚受寒，致生肿块，又或遍身腿脚疼痛，不能步履。

07929 附子乌鸡丸

【方源】《验方新编》卷九。

【组成】附子三钱 鹿茸（无则用鹿胶）一两 真山药 苁蓉 肉桂 蒲黄（炒黑） 当归 萸肉各五钱 白芍一两 熟地一两五钱 净乌鸡肉（去皮油，酒蒸）三两

【用法】米糊为丸。每服一百丸，空心酒送下。

【主治】大虚大寒，经如绿水，全无血色；及气血亏虚、经来全白色，五心烦热，小便作痛。

07930 附子六合汤

【方源】《元戎》。

【异名】桂枝六合汤（《伤寒全生集》卷三）、桂附六合汤（《伤寒广要》卷七）。

【组成】四物汤四两，加附子（炮，去皮脐）、肉桂各半两。

【主治】血虚有寒，大便下血；妇人白带，腹或阴中疼痛；妊娠伤寒，腹痛身凉，四肢拘急，脉沉迟或沉微。

①《元戎》：妊娠伤寒，四肢拘急，身凉微汗，腹中痛，脉沉而迟。②《玉机微义》：妇人赤白带下，脉沉微，腹痛或阴中痛。③《伤寒全生集》：阴证下血，紫黑如豚肝。

【方论选录】《成方切用》：桂、附虽辛热动胎之药，然寒证用之，适所以安胎。

【备考】本方方名，《玉机微义》引作"六合汤"，《济阴纲目》引作"四物汤"。《玉机微义》本方用法：上㕮咀。每服五钱，水煎，食前服。

07931 附子六物汤

【方源】《外科发挥》卷三。

【组成】附子 防己各四钱 甘草（炙）二钱 白术 茯苓各三钱 桂枝四钱

【用法】上作二剂。水一钟半，加生姜三片，煎一钟，食远服。

【主治】风寒湿邪流注四肢，关节烦痛，四肢拘急，恶寒自汗，小便不利；亦治骨疽、咬骨疽。

①《外科发挥》：四气流注于足太阴经，骨节烦痛，四肢拘急，自汗短气，小便不利，手足或时浮肿。②《医学入门》：兼治五痹。③《医宗金鉴》：附骨疽、咬骨疽发于腿里侧，属足太阴脾经者。

【临证举例】腿痛 《外科发挥》：一妇人两腿作痛，时或走痛，气短自汗，诸药不应。诊之尺脉弦

缓，此寒湿流注于肾经也。以附子六物汤治之而愈。

07932 附子四逆汤

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】 炮附子 炮姜各半两 白术一两 甘草二钱 桂七钱

【用法】 上㕮咀。每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】 伤寒寒结膀胱，脐似冰，饮水下焦声沥沥，主脉沉，客脉滑者。

07933 附子败毒汤

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】 羌活一钱 川附子（制）一钱 白僵蚕（炒）三钱 前胡一钱 连翘（去心）一钱五分 生黄耆一钱五分 蔓荆子一钱五分 陈皮一钱 防风一钱 白茯苓一钱五分 金银花二钱 甘草（节）五分

【用法】 上用生姜一片为引，水三钟，煎一钟，食远温服。

【主治】 湿毒瘰疬。

07934 附子泻心汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 泻心汤（《圣惠》卷九）。

【组成】 大黄二两 黄连一两 黄芩一两 附子一两（炮，去皮，破，别煮取汁）

【用法】 上四味，切三味，以麻沸汤三升渍之，须臾，绞去滓，纳附子汁，分二次温服。

【功用】《伤寒论讲义》：泻热消痞，扶阳固表。

【主治】 阳虚热结，心下痞闷，恶寒汗出，脉沉者。

①《伤寒论》：伤寒心下痞，而复恶寒汗出者。②《简明医彀》：心下痞，恶寒汗出，有阳证仍在，又见脉沉，足冷身重。③《张氏医通》：寒热不和，胁下痞结。④《类聚方广义》：老人停食，昏闷昏倒，不省人事，心下满，四肢厥冷，面无血色，额上冷汗，脉伏如绝，其状仿佛中风者，谓之食郁食厥。

【方论选录】 ①《古方选注》：用三黄彻三焦而泻热，即用附子彻上下以温经。三黄用麻沸汤渍，附子别煮汁，是取三黄之气轻，附子之力重，其义仍在乎救亡阳也。②《伤寒贯珠集》：按此证，邪热有余而正阳不足，设治邪而遗正，则恶寒益甚，若补阳而遗热，则痞满愈增。此方寒热补泻并投互治，诚不得已之苦心，然使无法以制之，鲜不混而无功矣。方以麻沸汤渍寒药，别煮附子取汁，合和与服，则寒热异其气，生熟异其性，药虽同行，而功则各奏，乃先圣之妙用也。③《伤寒论译释》：此汤治上热下寒之证，确乎有理，三黄略浸即绞去滓，但取轻清之气，以去上焦之热，附子煮取浓汁，以治下焦之寒，是上用凉而下用温，上行泻而下行补，泻其轻而补其重，制度之妙，全在神明运用之中，是必阳热结于上，阴寒结于下用之，乃为的对。若阴气上逆之痞证，不可用也。

【临证举例】 热痞兼阳虚证 《伤寒论译释》：肖琢如治宁乡某生，得外感数月，屡变不愈，延诊时，自云：胸满，上身热而汗出，腰以下恶风，时夏历六月，以被围绕，取视前所服方，皆时俗清利，搔不着痒之品，舌苔淡黄，脉弦，与附子泻心汤。阅二日复诊，云药完二剂，疾如失矣，为疏后方而归。

【备考】 本方改为丸剂，名“附子泻心丸”（见《证治宝鉴》）。

07935 附子建中汤

【方源】《医方大成》卷三引《济生》。

【组成】 肉豆蔻（面裹煨） 白豆蔻 附子（炮，去皮） 厚朴（去皮，炒） 白术 干姜（炮） 神曲（炒） 红豆各一两 丁香 木香（不见火） 甘草（炙） 胡椒各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脾气虚寒，腹胁胀满，身体沉重，面色萎黄，呕吐不食。

07936 附子茴香散

【方源】《医方大成》卷七引《澹寮》。

【组成】 肉豆蔻（煨） 茴香（炒） 白术（炒） 木香 人参 白茯苓 干姜（炮）各一两 附子一枚（大者，炮，去皮脐） 丁香 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏，加盐少许，煎七分，空心服。

【主治】 ①《直指》引《澹寮》：气虚积冷，心腹绞痛。②《景岳全书》：泄泻食少。

07937 附子神曲丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】 神曲 附子 诃黎勒 白豆蔻仁 荜茇 白术 白茯苓 人参各一两 厚朴二两 丁香 荜澄茄 沉香各半两 陈皮三分

【用法】 上为细末。酒煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前生姜汤送下。

【功用】 补脾。

【主治】 脾虚心烦，腹胀，食少无力。

07938 附子都气丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 六味地黄丸加附子二两 五味子三两

【用法】 炼蜜为丸服。

【主治】 ①《饲鹤亭集方》：阳虚恶寒，小便频数，下焦不约，咳喘痰多。②《中药成方配本》：肺肾两亏，阴损及阳，虚火上升，喘息多汗。

07939 附子涂脚方

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】 附子一枚（生，为末）

【用法】 上以姜汁和匀，摊脚心。

【主治】 口疮。

07940 附子理中丸

【方源】《局方》卷五。

【异名】 附子白术丸（《鸡峰》卷十二）、理中丸（《儒门事亲》卷十二）、大姜煎丸（《普济方》卷三九五）。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 人参（去芦） 干姜（炮） 甘草（炙） 白术各三两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每两作十丸。每服一丸，以水一盏化破，煎至七分，空心、食前稍热服。

【功用】《鸡峰》：养胃气。②《北京市中成药规范》：温脾散寒，止泻止痛。

【主治】 脾胃虚寒，食少满闷，腹痛吐利，脉微肢厥，霍乱转筋，或感寒头痛，及一切沉寒痼冷。

①《局方》：脾胃冷弱，心腹绞痛，呕吐泄利，霍乱转筋，体冷微汗，手足厥寒，心下逆满，腹中雷鸣，呕哕不止，饮食不进，及一切沉寒痼冷。②《普济方》：水气有余，致寒气大实于胃中，关脉弦；腰脚重，厚衣重覆也嫌单，尺脉迟；脾胃伏寒，吐利霍乱，烦闷，身体疼痛，发热嗜卧，手足厥逆。③《玉机微义》：中焦有寒腹痛，或恶寒头痛，发热恶寒，腹痛，不饮水。④《杏苑》：阳明经气不足，身以前皆寒。兼治新产内虚，虚人多唾。⑤《饲鹤亭集方》：下焦阳虚，火不生土，脏腑不调，食少便溏，及中寒腹痛，身痛拘急，蹲卧沉重。⑥《全国中药成药处方集》：五更肾泄，命门火衰，食入于胃，无火煎熬，难以熟腐，腹痛腰酸，肠鸣下气。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：忌食生冷食物，孕妇忌服。

【现代研究】 附子理中丸的药理作用《中成药》（1990；5:25）：实验证明，附子理中丸能增强小鼠的耐寒能力，对醋酸引起的小鼠腹痛有显著的镇痛作用。附子理中丸还可明显拮抗肾上腺素和乙酰胆碱对家兔离体肠管的作用，对离体肠管的运动状态有双向调节作用，即明显拮抗肾上腺素引起的回肠运动抑制和乙酰胆碱引起的回肠痉挛。

07941 附子理中汤

【方源】《三因》卷二。

【异名】 理中汤（《医方类聚》卷五十八引《澹寮》）、附子补中汤（《准绳·类方》卷六）、参附理中汤（《医略六书》卷二十六）。

【组成】 大附子（炮，去皮脐） 人参 干姜（炮） 甘草（炙） 白术各等分

【用法】 上锉散。每服四大钱，水一盏半，煎至七分，去滓服，不拘时候。口噤则斡开灌之。

【功用】《医方考》：补虚回阳，温中散寒。

【主治】 脾胃虚寒，腹痛食少，泄利呕逆，口噤肢厥，以及寒厥痼冷，霍乱脏毒，阴斑瘴毒，喉肿疮疡，口舌生疮，脉沉迟或沉细；并治阴盛格阳，发热烦躁。

①《三因》：五脏中寒，口噤，四肢强直，失音不语。②《岭南卫生方》：瘴毒内寒，自利烦渴，手足发冷，发热烦躁，呕逆闷乱。③《奇效良方》：中寒中湿，呕逆虚弱。④《扶寿精方》：伤寒五七日，太阴自利，不渴，寒多而呕，肚腹疼痛，泄泻。⑤《医便》：房劳内伤，寒邪中阴，面青腹痛，六脉沉微。⑥《医方考》：脾肺虚寒，痰涎壅塞，少有动作，喘嗽频促，脉来沉细。口食冷物，客寒犯胃，中焦痛甚，脉沉迟。腹痛，额头黎黑，手足收引，脉来沉下，无以气息。胃中虚寒，或又误服凉药，泻而手足厥冷者。⑦《寿世保元》：胃脘停痰，冷气刺痛。又治脏毒下寒，泄痢腹胀，大便或黄或白，或青黑，或有清谷。中焦虚寒，手足冷，肚腹痛，大便不实，饮食少思而作口舌生疮。⑧《景岳全书》：脾胃虚寒，疮疡。⑨《济阳纲目》：大病及吐泻后，身热如焚。⑩《张氏医通》：下焦虚寒，火不生土，泄泻呕逆。⑪《寓意草》：内伤转疟。⑫《嵩崖尊生》：眩晕口噤，昏迷肢冷，身不热，脉迟紧；炎暑月得寒病，身凉脉迟。⑬《医学心悟》：寒邪中于太阴，呕吐清涎沫，腹中冷痛，或下利清谷，吐蛔虫，脉来沉细。⑭《杂病源流犀烛》：霍乱吐泻不止，元气耗散，或水粒不入，或口渴喜冷，或恶寒战掉，手足逆冷，或发热烦躁，揭去衣被；痼冷，或遍身肢节拘急痛；寒积，房后着寒，或内伤生冷寒物而犯房事，内既伏阴，又加

外寒相搏，积寒伏于下，卫阳消于上，遂成阴盛格阳，阳气上脱之候，后五六日，胸前发出红斑，其色淡，其点小，是为阴斑。⑤《会约》：阴毒喉肿，四肢冷，六脉细。

【方论选录】《医方考》：人参、甘草、白术之甘温，所以补虚；干姜、附子之辛热，所以回阳。

【临证举例】①中寒 《妇人良方》：开庆己未年七月间，裕齐马观文夫人曹氏，病气弱倦怠，四肢厥冷，恶寒自汗，不进饮食。一医作伏暑治之，投暑药。一医作虚寒治之，投热药，无效。召仆诊之，六脉虽弱，而关脉差甚。裕齐问曰：此何证也。仆答曰：以脉观之，六脉虽弱，而关独甚，此中焦寒也。中焦者脾也。脾胃既寒，非特但有是证，必有腹痛吐泻之证。今四肢厥冷，四肢属脾，是脾胃虚寒无可疑者。答云未见有腹痛吐泻之证。当用何药治之。仆答曰：宜用附子理中汤。未服药间，旋即腹痛而泻，莫不神之！即治此药，一投而愈。②内伤转疟 《寓意草》：袁继明素有房劳内伤，偶因小感，自煎姜葱汤表汗，因而发热，三日变成疟疾。余诊其脉豁大空虚，且寒不成寒，热不成热，气急神扬，知为元阳衰脱之候。因谓其父曰：令郎光景，窃虑来日疟至，大汗不止，难于救药。倘信吾言，今晚急用人参二两，煎浓汤预服防危。渠父不以为意。次日五鼓时，病者精神更觉恍惚，扣门请救，及觅参至，疟已先发矣！余甚徬徨，恐以人参补住疟邪，虽救急无益也。只得姑俟疟势稍退，方与服之，服时已汗出粘濡，顷之果然大汗不止，昏不知人，口流白沫，灌药难入，直至日暮，白沫转从大孔遗出。余喜曰：白沫下行可无恐矣。但内虚肠滑，独参不能胜任。急以附子理中汤，连进四小剂，人事方苏能言，但对面谈事不清。门外有探病客至，渠忽先知，家人惊心为祟。余曰：此正神魂之离舍耳！吾以独参及附子理中驷马之力追人，尚在半返未返之界，以故能知宅外之事。再与前药，二剂而安。③痢疾 《续名医类案》：陈三农治一妇，久痢不止，口干发热，饮食不进，犹服香连等药，完谷不化，尚谓邪热不杀谷，欲进芩、连，数日不食，势正危迫，诊之脉大而数，按之极微，询之小便仍利，腹痛喜手按，此火衰不能生土，内真寒面外假热也。小便利则不热可知，腹喜按则虚寒立辨，亟进附子理中汤，待冷，与服一剂而痛止，连服数剂而愈。④腹痛 《续名医类案》：李北川仲夏患腹痛吐泻，两手足扪之则热，按之则冷，其脉轻诊则浮大，重诊则微细，此阴寒之证也，急服附子理中汤，不应仍服，至四剂而愈。⑤阴证伤寒 《全国名医验案类编》：刘铭彝，年二十八岁，天台县知县。腊月二十八日，去西乡白坭坦，返回即伤阴寒。恶寒甚剧，战慄动摇，烘以烈火，顷刻不离，舌苔边中黑而滑，脉沉而紧。沉紧为寒伤于里，伤寒所谓无热恶寒者，发于阴也。初服麻黄汤不应，继用附子理中汤加味，温下理中以祛寒。高丽参一钱、炒白术二钱、淡附片一钱半、炒川姜一钱、炙甘草一钱、葱白九枚、生姜二钱。服一剂，即遍身大汗，寒邪悉退而愈。

07942 附子理中汤

【方源】《口齿类要》。

【组成】茯苓 白芍药各二钱 附子 人参各二钱 白术四钱

【用法】水煎服。

【主治】①《口齿类要》：中气不足，虚火上炎，口舌生疮，饮食少思，大便不实，或畏寒恶热，作呕腹痞，四肢冷逆，或呕吐泄泻。②《准绳·疡医》：疮疡，脾胃虚寒，或误行攻伐，手足厥冷，饮食不入，或肠鸣腹痛，呕逆吐泻。

07943 附子理苓汤

【方源】《内经拾遗》卷二。

【组成】附子（炮）一钱五分 干姜（炮）一钱 甘草（炙）五分 人参（去芦）一钱 白术（炒）一钱 猪苓一钱 赤茯苓（去皮）一钱 泽泻一钱 官桂一钱

【用法】以水二钟，加生姜三片，煎八分，食前服。

【主治】①《内经拾遗》：大便溏泄。②《扶寿精方》：伤寒五六七日，传入三阴，大便自利，四肢厥冷，脐腹疼痛，小便不利作渴。

07944 附子绿豆汤

【方源】《三因》卷十四。

【组成】大附子一枚（重七钱者，生，去皮脐，半破） 绿豆二两

【用法】上以生姜一两（切），水二碗，煎至一碗，绞去滓，分三服，空腹温服。次日，将前附子破作四片，再用绿豆二两，生姜一两，如前煎服。第三日，复将附子作八片，如前煎。

【主治】寒克皮肤，壳壳然而坚，腹大身肿，按之陷而不起，色不变。

07945 附子温中丸

【方源】《医学发明》卷九。

【组成】附子 干姜 白术各一两 肉桂 炙甘草各半两 良姜七钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，一两作十丸。每服一丸，细嚼，生姜、橘皮汤送下；米饮亦得，食前服。

【功用】 顺气化痰，辟寒养正气。

【主治】 呕吐噎膈，留饮肠鸣，湿冷泄注。

07946 附子温中汤

【方源】《卫生宝鉴》卷二十三。

【组成】 干姜（炮） 黑附子（炮，去皮脐）各七钱 人参（去芦） 甘草（炙） 白芍药 白茯苓（去皮） 白术各五钱 草豆蔻（面裹煨，去皮） 厚朴（姜制） 陈皮各三钱

【用法】 上㕮咀。每服五钱或一两，以水二盏半，加生姜五片，煎至一盏三分，去滓，食前温服。

【主治】 中寒腹痛自利，米谷不化，脾胃虚弱，不喜饮食，懒言语，困倦嗜卧。

07947 附子粳米汤

【方源】《金匮》卷上。

【组成】 附子一枚（炮） 半夏半升 甘草一两 大枣十枚 粳米半升

【用法】 以水八升，煮米熟汤成，去滓温服一升，一日三次。

【功用】《金鉴》：胜寒气，和内外。

【主治】 腹中寒气，雷鸣切痛，胸胁逆满呕吐。

【方论选录】 ①《金匮要略心典》：下焦浊阴之气，不特肆于阴部，而且逆于阳位，中土虚而堤防撤矣。故以附子辅阳驱阴，半夏降逆止呕，而尤赖粳米、甘、枣培令土厚，而使敛阴气矣。②《古方选注》：治以附子之温，半夏之辛，佐以粳米之甘，使以甘草、大枣缓而行之，上可去寒止呕，下可温经定痛。

07948 附子粳米汤

【方源】《证治要诀类方》卷一。

【组成】 姜汁炮附子二钱（切作片）

【用法】 煎汤，煮粳米粥一盏，不拘时食，以效为度。

【主治】 胃中寒甚，呃逆不已，或复加以呕吐者。

【备考】 原书治上证，宜加炒川椒、丁香各二十三粒。

07949 附子粳米汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 人参三钱 附子二钱 炙甘草二钱 粳米一合 干姜二钱

【用法】 以水五杯，煮取二杯，滓再煮一杯，分三次温服。

【主治】 脾虚土败，自利不渴，甚则哕者。

07950 附虎四斤丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 牛膝一斤（用酒五升浸透，晒干） 乳香 没药各五钱 木瓜 天麻 肉苁蓉各一斤 附子 虎胫骨各二两

【用法】 上为末，用前浸药酒打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心木瓜煎汤或盐汤送下。

【功用】 补虚除湿，大壮筋骨。

【主治】 肾虚寒，下攻腰脚，筋脉拘挛掣痛，履地艰辛，脚心隐痛；及一切风寒湿痹，脚气缓弱。

07951 附姜归桂汤

【方源】《法律》卷二。

【异名】 姜附归桂汤（《医方集解》）。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 干姜（炮） 当归 肉桂各二钱五分

【用法】 用水二大盏，煎至一盏，入蜜一蛤蜊壳，温服。

【主治】 卒暴中寒，其人腠理素虚，自汗淋漓，身冷手足厥逆，或外显假热躁烦。

【方论选录】 附、姜专主回阳，而其所中寒邪，先伤荣血，故加归、桂驱荣分之寒，才得药病相当也。

07952 附姜白通汤

【方源】《法律》卷二。

【异名】 姜附白通汤（《成方切用》卷六）。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 干姜（炮）各五钱 葱白五茎（取汁） 猪胆（大者）半枚

【用法】 用水二大盏，煎附、姜二味至一盏，入葱汁并猪胆汁，和匀温服。再用葱一大握，以带轻束，切去两头，留白二寸许，以一面熨热，安脐上，用熨斗盛炭火熨葱白上面，取其热气，从脐入腹，甚者连熨二三饼。又甚者，再用艾炷灸关元、气海，各二三十壮。

【功用】 回阳散阴。

【主治】 ①《法律》：暴卒中寒，厥逆呕吐，泻利色青色冷，肌肤凛栗无汗，盛阴没阳之证。②《重订通俗伤寒论》：瘪脐痧，脉微欲绝，甚则十指脐绞瘪。

【方论选录】《重订通俗伤寒论》：以大剂附、姜回阳为君，臣以葱汁，得生阳之气独盛，以辛通脉道，反佐以一味胆汁者，恐阳药一饮即吐，格拒而不得入也。此为温热回阳，苦辛通格之良方。

07953 附桂理中丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【异名】 桂附理中丸(《全国中药成药处方集》(武汉方)

【组成】 附子一两 肉桂五钱 人参一两 白术二两 干姜一两 炙草一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，开水送下。

【主治】 脾胃虚寒，痰饮内停，中焦失运，呕吐食少，腹痛便溏，脉来迟细者。

07954 附子大建中汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 附子一两（炮，去皮脐） 黄耆（蜜炙） 白术（炒） 甘草（炙） 当归（去芦） 熟干地黄（洗） 木香（不见火） 肉桂（去粗皮，不见火） 白芍药各二两

【用法】 上为细末。每服五钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 自汗。

07955 附子赤石脂丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐） 赤石脂（烧） 巴戟天（去心） 补骨脂（炒）各半两 茴香子（炒） 益智（去皮）各一两

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前盐汤送下。

【主治】 虚劳，下元冷弱，膀胱气寒，小便数。

07956 附子赤石脂丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】 附子（炮，去皮脐，取末）二两 赤石脂（研细）一两

【用法】 上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温米饮送下。

【主治】 老人、虚人肠胃虚寒，洞泄不禁。

07957 附姜归桂参甘汤

【方源】《法律》卷二。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 干姜（炮） 当归 肉桂各一钱五分 人参 甘草（炙）各二钱

【用法】 上用水二大盏，加煨姜三片，大枣二枚，煎至一盏，入蜜三蛤蜊壳，温服。

【功用】《重订通俗伤寒论》：回阳，双补血气。

【主治】 卒暴中寒，服附姜汤、附姜归桂汤后，阳气将回，阴寒少杀者。

【方论选录】《重订通俗伤寒论》：君以附、姜轻剂，温和阳气，臣以归、桂暖血，参、草益气，佐以姜，使以大枣，调和营卫也。

07958 附子理中汤去甘草加厚朴广皮汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 生茅术三钱 人参一钱五分 炮干姜一钱五分 厚朴二钱 广皮一钱五分 生附片一钱五分（炮黑）

【用法】 用水五杯，煮取八分二杯，分二次服。

【主治】 阳明寒湿，舌白腐，肛坠痛，便不爽，不喜食。

【方论选录】 九窍不和，皆属胃病。胃受寒湿所伤，故肛门坠痛而便不爽；阳明失阖，故不喜食。理中之人参补阳明之正，苍术补太阴而渗湿，姜、附运坤阳以劫寒，盖脾阳转而后湿行，湿行而后胃阳复。去甘草，畏其满中也；加厚朴、广皮，取其行气。合而言之，辛甘为阳，辛苦能通之义也。

07959 陀柏散

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】 密陀僧9克 黄柏6克 冰片3克

【用法】 上为细末。用花生油调敷。

【功用】 清热除湿，止痒祛风。

【主治】 各种湿疹。

07960 陀僧散

【方源】 方出《百一》卷十五，名见《普济方》卷三〇一。

【组成】 密陀僧（好者）

【用法】 研令极细。扑使之干。

【主治】 ①《百一》：阴汗。②《普济方》：小儿生下遍身如鱼泡，如似水晶，破则成水，流渗又生。

07961 陀僧散

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】 蒲黄 黄药子各半两 密陀僧 黄柏 甘草各一两多

【用法】 上为细末。干贴口疮上。

【主治】 口舌疮不愈者。

07962 陀僧散

【方源】《洞天奥旨》卷十三。

【组成】 密陀一两 轻粉一钱 熟石膏二钱 枯矾二钱

【用法】 上为末。湿则干敷，干则桐油调搽。

【主治】 脚丫湿烂。

07963 坠痰丸

【方源】 方出《中藏经·附录》，名见《卫生宝鉴》卷九。

【异名】 逐痰丸(《医统》卷十)。

【组成】 天南星（九蒸九晒）

【用法】 上为末，姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，人参、菖蒲汤或麦门冬汤送下。

【主治】 风痫。

07964 坠痰丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】 黑丑（头末）二两 枳实（炒）一两半 白矾三钱（枯一半） 朴消二钱（风化） 枳壳一两半（炒） 猪牙皂角二钱（酒炒）

【用法】 上为末，用萝卜汁为丸。每服五十丸，鸡鸣时服。初则有粪，次则有痰。

【主治】 ①《丹溪心法》：痰饮。②《赤水玄珠》：食积痰饮，咳嗽，痞满气逆。

07965 坠痰丸

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 大黄（酒煨）一两 贝母（去心） 胆星 青礞石（煅过） 石菖蒲各一两 麝香一钱 蛇含石（煅红，醋淬七次）五钱

【用法】 上为末，姜汁为丸。每服一钱，空心白滚汤下。

【主治】 痰火凝结于胸膈，以致癫狂，谵语妄言。

07966 坠膈丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷五。

【组成】 五味子 干山药 知母 泽泻 车前子 石决明各一两 防风一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心茶送下。

【主治】 风赤疮瘙外障。眼初患之时，或即痒痛，作时发歇不定，或出多泪，遂合睑肉疮出，四眦如朱砂色相似，然后渐生膜翳，障闭瞳人。

07967 坠翳丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【组成】 石决明 细辛 知母 干地黄 防风各一两 兔肝一具（炙） 五味子 人参各二两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心茶送下。

【主治】 浮翳内障。

07968 坠翳丸

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】 青葙子 草决明（炒） 玄参 细辛 防风 赤芍各七钱 车前子 谷精草 密蒙花 熟地 龙胆草 黄芩各八钱 白蒺藜（炒，去刺） 木贼 蝉蜕各五钱（去足） 石决明（煅）五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后滚汤或酒送下。

【主治】 白翳黄心内障。

07969 坠翳散

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】 车前 青葙子 蒺藜 木贼 蝉蜕 石决明 草决明 黄芩 玄参 防风 细辛 大黄

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 玉翳浮满外障。

07970 坠血明目丸

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】 石决明 芎劳 五味子 知母 山药 细辛 人参 归尾 赤芍 生地 牛膝 蒺藜

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，酒送下。

【主治】 血灌瞳人外障。

07971 坠翳明目丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷五。

【组成】 石决明 芎劳 知母 干山药 五味子各一两 细辛 人参各一两半

【用法】 上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心茶送下。

【主治】 血灌瞳人外障。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“坠血明目丸。”

07972 妙功丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十八。

【组成】 大黄四两 黄连 郁金各一两 轻粉二钱 硇砂（煅）二钱 粉霜半钱或一钱 川芎二两 黑牵牛末八两 滑石四两 白豆蔻 沉香 木香各半两 蓬术 槟榔 黄芩各一两

【用法】 上药除粉霜、轻粉、硇砂另研，余药亦另研，和匀，水泛为丸或稀糊为丸，如梧桐子大。量虚实加减服。

【主治】 ①《丹溪心法附余》：饮食不节，起居失常，七情所感，动劳不一，以致气凝血滞于荣卫之中，或冒风寒湿气凝结于经络之间、脏腑之内，或为癥瘕，或为积聚癖块。②《袖珍》：或留聚为肿为痈，疥疡疮癣，风痹痿厥，及黄疸水湿，蛊毒鼓胀。

07973 妙功丸

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】 丁香 木香 沉香各半两 乳香（研） 麝香（另研） 熊胆各二钱半 白丁香三百粒 轻粉四钱半 雄黄（研） 青皮（去白） 黄芩 胡黄连各半两 黄连 黑牵牛（炒） 荆三棱（煨） 甘草（炙） 蓬莪术 陈皮（去白） 雷丸 鹤虱各一

两 大黄一两半 赤小豆三百粒 巴豆七粒（去皮心、膜、油）

【用法】 上为细末，荞面一两半作糊和匀，每一两作十丸，朱砂一两水飞为衣，阴干。每服一丸，用温水浸一宿，去水，再用温水化开，空心服之。小儿加减服。十年病一服即愈，若未愈，三五日再服，重者不过三服。

【主治】 ①《准绳·类方》：诸痫。②《张氏医通》：虫积在内，使人多疑善惑而成癫痫。

【临证举例】 癫痫 有一人好酒，得痫病二十年，用药一服，取下虫一条，约长四五寸，身有鳞，其病遂愈。

07974 妙应丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 乌头（去皮脐，生用）半两 栀子（去皮）一分 干姜（生用）一分

【用法】 上为末，生姜自然汁为丸，如梧桐子大。每服七丸，食前温酒送下，一日二次。

【主治】 ①《圣济总录》：胃寒肠热，腹胀泄利。②《宣明论》：水谷不化，痞满不已。

07975 妙应丸

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】 大附子 破故纸 荜澄茄 木香各半两 硇砂半钱

【用法】 上为细末，和大麦面裹药同烧，候面黄焦，去面，将药研为细末，用面糊为丸，如绿豆大。每服三五丸，食后、临卧米饮送下。

【主治】 气虚有积。

07976 妙应丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】 荜茇 木香 破故纸（炒）各一两 附子二枚（重六钱者，每一枚剜去心，入硇砂一钱，用附子末塞口，外以面裹，煨令面焦黄取出，去面不用。）

【用法】 上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服五丸至七丸，木香汤送下，不拘时候。

【主治】 ①《杨氏家藏方》：脾胃虚冷，饮食迟化，心腹刺痛，嗳气吞酸，两胁膨胀，胸膈痞闷，四肢倦怠，不美饮食。②《济生》：老人虚人一切虚寒痃癖积块，攻胀疼痛。

【备考】《济生》本方用法：醋调，面糊为丸，如绿豆大，每服十五丸至二十丸，食后生姜汤送下。

07977 妙应丸

【方源】《直指》卷十。

【组成】 真龙骨 辰砂 厚牡蛎（以腐草鞋重包插定，火煅，并研细） 石菖蒲各二钱半 白茯苓 益智仁 石莲肉 缩砂仁各三钱半 川楝子（蒸，去皮，取肉焙） 桑螵蛸（瓦上焙） 菟丝子（酒浸宿，焙，杵）各半两

【用法】 上为末，以山药碎炒末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，日间煎人参、酸枣仁汤送下，临卧粳米汤送下。

【主治】 赤白浊。

07978 妙应丸

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】 苍术（米泔水浸，酒炒） 人参 黄耆（蜜炙） 白术（土炒） 地黄（酒洗） 陈皮（去白） 半夏（制） 当归（酒洗） 茯苓各一两 滑石 炙甘草各七钱

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心生姜汤送下。

【主治】 妇人气虚痰盛，满溢子宫，不能受精，肥胖妇人无子。

07979 妙应丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 槟榔十二两 黑牵牛三两 大黄 雷丸 锡灰 芜荑 木香 使君子各一两

【用法】 上为末，用葱白煎汤，露一宿，为丸如粟米大。每服四钱，五更葱汤或木香煎汤送下；取寸白虫，用东方上石榴根煎汤，面东服之；小儿服一钱或五分。天明取下病根，或虫，或如烂鱼肠，或如马尾、蛤蟆、小蛇，诸般怪物，或小便取下青、黄、红、白，或米泔等色。此丸四时可服。

【功用】 追虫。

【主治】 凡人面上白斑与唇红，能食心嘈，颜色不常，脐上生有蟹爪露者，便有虫也；山岚瘴气，传尸痨瘵，水肿疟痢，咳嗽黄疸，噎膈，肠风痔漏，一切风气食积疼痛，疮癞热痰痞块，赤眼口疮，女人经脉不调，血瘕血闭，赤白带下，小儿癫痫，一切疳积，虫积。

【宜忌】 孕妇禁用。忌生冷荤腥等物。

【加减】 如失声，加沉香、琥珀。

【备考】 其虫皆因饮食中所感而成。此药不比巴霜、甘遂、硇砂等剂，不动真气，有虫取虫，有积取积，有气取气，有块取块，一服见效。

07980 妙应丹

【方源】《三因》卷九。

【组成】 附子四个（六七钱重者，生，去皮脐，剜作瓮，入硇砂，共一两七钱半，面剂裹，煨熟，

去面不用） 荜茇 木香（炮） 青皮 破故纸（炒）各三两半

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，生姜、橘皮汤送下；泄利，米汤送下。

【主治】 诸脏气虚、积聚、烦闷，及饮食中蛊毒；或食水陆果蓏，子卵入腹，而成虫蛇鱼鳖；或宿食留饮，妇人产后，败血不消，女子月水不通，结为癥瘕，时发寒热、唇口焦黑，肢体瘦削，嗜卧多魇，食少腹痛，而成冷痢；脾元气弱，久积阴冷，心腹满痛，面色青黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，食少多伤，嗳气吞酸，哕逆恶心，腹中虚鸣，大便泄泻，胸膈痞塞，食饮不下，霍乱呕吐，肌冷转筋；及五膈五噎，久痛久痢。

07981 妙灵丹

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】 木香 大茴香 川乌 草乌 花椒 胡椒 肉桂 良姜 三棱 杏仁 干姜 陈皮 莪术 巴豆各三钱

【用法】 上为末，面糊为丸，如蚕豆大。每服一丸，核桃肉三个，口中嚼烂，同药吞下。

【主治】 痞病。

07982 妙灵散

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】 木香三钱 沉香二钱 牛膝 何首乌 当归 螵蛸 桑寄生各一两 海藻二两 青葙子 昆布 海带 甘草节各半两

【用法】 上为末，每服三二钱，食后温酒调下。先服法制灵鸡弹，后将此散与内消连翘丸相间常服。疮愈方止。

【主治】 瘰疬马刀，腋下生者。

07983 妙贴散

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】 白芷五钱 南星五钱 肉桂五钱 蛤粉五钱 五倍子一两 芍药七钱 多年小粉八两（炒焦） 白及四两

【用法】 上为末。每用生姜自然汁、好醋、葱、蜜，捣汁和匀，火上熬热，调药如糊，敷四周，空中出毒。干再用前汁润之，以助药力。

【主治】 流注。

07984 妙香丸

【方源】《局方》卷六。

【组成】 巴豆三百一十五粒（去皮心膜，炒熟，研如面油） 牛黄（研） 龙脑（研） 腻粉（研） 麝香（研）各三两 辰砂（飞，研）九两 金箔（研）九十箔

【用法】 上为末，炼黄蜡六两，入白沙蜜三分，同炼令匀，为丸，每两作三十丸。如治潮热、积热，伤寒结胸发黄，狂走躁热，口干面赤，大小便不通，煎大黄，炙甘草汤送下一丸；毒利下血，煎黄连汤调腻粉少许送下；如患酒毒、食毒、茶毒、气毒、风痰伏痞、吐逆等，并用腻粉、龙脑、米饮送下；中毒吐血、闷乱烦躁欲死者，用生人血送下，立愈；小儿百病，惊痫，急慢惊风，涎潮搐搦，用龙脑、腻粉、蜜汤送下绿豆大二丸；诸积食积热，颊赤烦躁，睡卧不宁，惊哭泻利，并用金银薄荷汤送下，更量岁数加减；如大人及妇人因病伤寒时疾，阴阳气交结，伏毒气胃中，喘躁眼赤，潮发不定，再经日数七、八日已下至半月日未安，医不能明其证候，脉息交乱者，可服一丸，或分作三丸亦可，并用龙脑、腻粉、米饮调半盏送下，此一服，取转下一切恶毒涎，并药丸泻下。如要却收，水洗净，以油单子裹，埋入地中，五日取出，可再与。大人、小儿依法服一丸，救三人即不堪使。如要药速行，即用针刺一眼子，冷水浸少时服之，即效更速。

【功用】 ①《局方》：解五毒。②《准绳·幼科》：安神，通关，辟恶气。

【主治】 时疾伤寒，阴阳气交结，伏毒气胃中，喘躁眼赤，潮发不定；潮热，积热，伤寒结胸发黄，狂走躁热，口干面赤，大小便不通，毒利下血；酒毒、食毒、茶毒、气毒，风痰伏痞，吐逆；中毒吐血，闷乱烦躁欲死者；小儿百病，惊痫，急慢惊风，涎潮抽搐，诸积食积热，颊赤烦躁，睡卧不宁，惊哭泻利等。

【临证举例】 烦躁《医学纲目》引丹溪：一女子二十余岁，在室素强健，六月间发烦闷，困惫不食，发时欲入井，六脉皆沉细而弱数，两月后微渴，众以为病暑，治不效，四五日加呕而入瘦，手心极热，喜在阴处，渐成伏脉，时妄语，急予《局方》妙香丸，如桐子大，以井水下一丸，半日许大便，药已出，病无退减，遂以麝香水洗药，以针穿三窍，次日以凉水送下，半日许大便，下稠痰数升，是夜得睡，困顿伏枕，旬日而愈。

07985 妙香散

【方源】《局方》卷五（绍兴续添方）。

【异名】 辰砂妙香散（《直指》卷十六）。

【组成】 麝香（别研）一钱 木香（煨）二两半 山药（姜汁炙） 茯神（去皮、木） 茯苓（去皮、不焙） 黄耆 远志（去心，炒）各一两 人参

桔梗 甘草（炙）各半两 辰砂（别研）三钱

【用法】 上为细末。每服二钱，温酒调下，不拘时候。

【功用】 补益气血，安神镇心。

【主治】 心气不足之惊悸，失眠，盗汗，血汗，舌衄，黄疸，遗精，溺血，淋浊；妇女带下，产后谵狂，恶露不尽等。

①《局方》：男子、妇人心气不足，志意不定，惊悸恐怖，悲忧惨戚，虚烦少睡，喜怒不常，夜多盗汗，饮食无味，头目昏眩。②《直指》：饮酒行事，酒热瘀于心经，致成黄疸。渴证，小便涩数而沥，兼有油浊。③《得效》：梦中遗精。④《丹溪心法》：溺血。⑤《证治要诀类方》舌衄。⑥《明医指掌》：产后血虚之极，败血攻冲，邪淫于心，乍见鬼神，胡言乱语及恶露不尽。⑦《妇科玉尺》：临产败血冲心。带下。⑧《杂病源流犀浊》：大喜伤心，血汗者。

【方论选录】《医方集解》：此手足少阴药也。心，君火也，君火一动，相火随之，相火寄于肝胆，肾之阴虚，则精不藏，肝之阳强，则气不固，故精脱而成梦矣。山药益阴清热，兼能涩精，故以为君；人参、黄耆所以固其气，远志、二茯所以宁其神，神宁气固，则精自守其位矣，且二茯下行利水，又以泄肾中之邪火也；桔梗清肺散滞；木香疏肝和脾；丹砂镇心安神，麝香通窍解郁，二药又能辟邪，亦所以治其邪感也；加甘草者，用于交和于中也。是方不用固涩之剂，但安神正气，使精与神气相依而自固矣。以安神利气，故亦治惊悸郁结。

【备考】《直指》治黄疸，用茵陈煎汤调下；渴证，用灯草、茯苓煎汤送下。《得效》治梦遗，每服一匕，虚者温酒调下，热者麦门冬去心浓煎汤调下。《保命歌括》安神，以枣汤送下。《准绳·女科》治产后心神颠倒，以当归、生干地黄煎汤调服。《杂病源流犀烛》治血汗，用金银器煎汤调下，或莲肉煎汤调下。

07986 妙功十一丸

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】 丁香 木香 沉香 乳香 麝香 荆三棱（炮） 广茂（炮） 黑牵牛（微炒） 黄连 雷丸（炒） 鹤虱（炒） 胡黄连 黄芩 大黄（焙） 陈皮 青皮 雄黄 熊胆 炙甘草各二钱半 赤小豆三百六十粒（煮） 白丁香（直尖者）三百六十个 轻粉四钱 巴豆七个

【用法】 上为细末，赤小豆煮烂研泥，同荞麦面打糊，和作十一丸，朱砂为衣，阴干。服时水浸一宿，化下一丸。大便出为验，不可再服。

【主治】 痢症。

07987 妙功藏用丸

【方源】《宫明论》卷四。

【异名】 显仁丸、神芎丸。

【组成】 大黄 黄芩 黄连各半两 黑牵牛一两 滑石二分 荆芥穗二两 防风一分 川芎一两 木香二分 官桂三分（去皮）

【用法】 上为末，滴水为丸，如小豆大。每服二十至三十丸，生姜汤送下，温水亦得，每日三次。

【主治】 呕哕不食，痿弱难运，血溢血泄，淋闭不通，或泄利，三焦壅滞，传化失常。

07988 妙贴止疼散

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】 白及一两 乳香五钱 桔梗五钱 紫花地丁三钱 白蔹五钱

【用法】 上为末。鸡子清调，敷肿毒四围，空中出毒。干再润之。

【主治】 上部一切肿毒。

07989 忍冬丸

【方源】《三因》卷十。

【异名】 忍冬藤丸（《医学入门》卷八）。

【组成】 忍冬草不以多少（根、茎、花、叶皆可，洗净）

【用法】 上以米曲酒于瓶内浸，糠火煨一宿，取出晒干，入甘草少许，研为末，即以所浸酒为糊，丸如梧桐子大。每服五十丸至一百丸，酒、饮任下，不拘时候。

【功用】 预防消渴病愈后发痈疽，止渴。

【主治】 痈疽，五痔诸漏。

07990 忍冬汤

【方源】《医学心悟》卷四。

【异名】 银花甘草汤（原书卷六）。

【组成】 金银花四两 甘草三钱

【用法】 水煎，顿服。能饮者，用酒煎服。宜早服。

【主治】 ①《医学心悟》：一切内外痈肿。②《外科证治全书》：胃脘痈。胃脘胀痛，心下渐高，坚硬拒按，寒热如疟，身皮甲错，饮食不进，或咳嗽，或呕脓唾血者，皆胃中生毒之证。

07991 忍冬汤

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】 金银花一两 甘草二钱 黑料豆二两 土茯苓四两

【用法】 每日一剂。水煎服。外贴万全膏，并用

金蝉蜕甲酒。

【主治】 杨梅结毒。

07992 忍冬膏

【方源】 《惠直堂方》卷二。

【组成】 金银花并叶

【用法】 和酒糟研烂，用净瓦摊火上，烘热敷患处。

【主治】 湿气流注之处，痛不可忍。

07993 鸡子羹

【方源】 《圣济总录》卷一九〇。

【组成】 鸡子一枚 阿胶（炒令燥）一两

【用法】 上以清酒一升，微火煎胶令消后，入鸡子一枚，盐一钱和之。分作三服。

【主治】 妊娠胎不安。

07994 鸡矢醴

【方源】 《素问》卷十一。

【异名】 牵牛妙酒（《摄生众妙方》卷六）、鸡醴饮（《古今医鉴》卷六引刘同知方）、牵牛酒（《本草纲目》卷四十八引《积善堂经验方》）、鸡矢酒（《仙拈集》卷一）。

【组成】 鸡矢

【主治】 ①《素问》：鼓胀。心腹满，旦食则不能尊食。②《摄生众妙方》：一切肚腹、四肢发肿，不问水肿、气肿、湿肿。

【备考】 按：《圣济总录》本方用法：鸡屎（干者）为末。每用醇酒调一钱匕，食后、临卧服。《奇效良方》本方用法：鸡矢白半升，以好酒一斗渍七日，每服一盏，食后、临卧时温服。《摄生众妙方》本方用法：用干鸡屎一升，锅内炒黄，以好酒三碗淬下，煮作一碗，滤去渣，令病人饮之。少顷腹中气大转动作鸣，大便利下，于脚膝及脐上下先作皱起，渐渐消复。如利未尽，再服一剂。以田螺二枚，滚酒内绰熟，食之即止，后以温粥调理，安好如常。峨眉有一僧以此方治一人浮肿，一二日即愈，自能牵牛来谢，故名。

07995 鸡汁粥

【方源】 《中国烹饪》。

【组成】 母鸡一只（3～4斤重者，剖洗干净后，浓煎取汁） 粳米二两

【用法】 以原汁鸡汤分次同粳米煮粥，先用旺火煮沸，再改用微火煮到粥稠即可。可供早晚餐或点心，温热服食。

【功用】 滋养五脏，补益气血。

【主治】 年老体弱，病后羸瘦，气血亏损所引起的一切衰弱病证。

【宜忌】 体质壮实的老人，以及伤风感冒或生病发热期间不宜食用。

07996 鸡舌散

【方源】 方出陶隐居方（见《肘后方》卷六），名见《医心方》卷四引《效验方》。

【组成】 鸡舌香 藿香 青木香 胡粉各二两

【用法】 上为散。纳腋下，绵裹之。常作愈。

【主治】 狐臭。

07997 鸡舌散

【方源】 《丹溪心法附余》卷一引《圣惠》。

【组成】 蝎梢（去毒）二钱半 茯神（去木，微炒）一两 薄荷（焙）一两 （一方无茯神，有茯苓）

【用法】 上为末。每服一二钱，温酒调下。或以擦牙颊间亦好。

【主治】 中风舌本强硬，语言不正。

07998 鸡苏丸

【方源】 《杨氏家藏方》卷三。

【组成】 鸡苏叶半斤 荆芥穗一两 防风（去芦头）一两 黄耆（生用） 生干地黄 桔梗（去芦头，炒）各半两 甘草（炙） 川芎 甘菊花各一分 脑子半钱（别研）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两作十丸。每服一丸，麦门冬（去心）煎汤嚼下。

【主治】 虚热上壅，头昏面赤，咽干烦渴，痰嗽咳血或衄血。

①《杨氏家藏方》：虚热上壅，头目不清，面赤咽干，痰嗽烦渴。②《云岐子保命集》：虚热，昏冒倦怠，下虚上壅，嗽血衄血。③《嵩崖尊生》：怒气吐血，唇青面黑。

07999 鸡苏散

【方源】 《圣惠》卷七十二。

【异名】 鸡苏饮（《圣济总录》卷九十八）。

【组成】 鸡苏叶二两 滑石三两 刺蓟根一两（锉） 木通二两（锉） 生干地黄二两

【用法】 上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加竹叶三七片，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】 妇人血淋。

08000 鸡苏散

【方源】 《济生》卷二。

【异名】 生料鸡苏散（《医学纲目》卷十七）。

【组成】 鸡苏叶 黄耆（去芦） 生地黄（洗） 阿胶（蛤粉炒） 白茅根各一两 桔梗（去芦） 麦门冬（去心） 蒲黄（炒） 贝母（去心） 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《济生》：伤劳肺经，唾肉有血，咽喉不利。②《医学纲目》引《玄珠》：肺金受相火所制，鼻衄血。

【备考】 《得效》有桑白皮半两，大枣一枚。

08001 鸡肝药

【方源】 《医宗说约》卷五。

【异名】 鸡肝散(《全国中药成药处方集》上海方)。

【组成】 白肉雷丸一两（赤色者不用，用苍术一两同煮一二十滚，去苍术，切片） 使君子肉一两（黑油者不用）

【用法】 上焙干等分，为细末，用不落水鸡软肝一具，男用雌，女用雄，将末药一钱掺上，饭上蒸熟，小儿食之即愈。轻者二三服，重者不过七服。

【主治】 小儿疳积，肝经积热，以致眼闭、眼红、失明，腹胀。

【宜忌】 忌猪肝及猪、牛、犬肉，不忌损目。

08002 鸡肝粥

【方源】 《圣惠》卷九十七。

【组成】 雄鸡肝一具（切细） 菟丝子末半两 粟米二合

【用法】 以水二大盏半，入五味及葱，煮作粥，空心食之。

【主治】 五劳七伤，阴萎气弱。

08003 鸡肠散

【方源】 《圣惠》卷三十。

【组成】 赤雄鸡肠二具（炙令干） 鸡脛胫二具（炙令干） 熟干地黄一两 牡蛎粉三分 龙骨三分 白石脂三分 黄连三分（去须） 赤石脂三分 桑螵蛸三分（微炒） 肉苁蓉一两半（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 虚劳膀胱寒，小便数而精出。

08004 鸡肠散

【方源】 《直指小儿》卷四。

【组成】 鸡肠（烧） 牡蛎灰 白茯苓 真桑螵蛸（微炒）各半两 辣桂 龙骨各二钱半

【用法】 上为粗末。每服一钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 小儿遗尿，肾与膀胱俱虚而挟冷所致者。

08005 鸡鸣丸

【方源】 《回春》卷二。

【异名】 鸡鸣定喘丸(《全国中药成药处方集》吉林方)。

【组成】 知母四两（炒） 杏仁（去皮尖）二钱 桔梗（去芦）五钱 阿胶（蛤炒）四钱 葶苈（火上焙）三钱 款冬花四钱 旋覆花一两 半夏（姜汁炒）三钱 甘草（炙）一两 陈皮（去白）一两 兜铃一两 五味子四钱 麻黄一两 人参五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，五更，乌梅、生姜、大枣汤送下。

【功用】 《全国中药成药处方集》（吉林方）：宣肺化痰定喘。

【主治】 ①《回春》：男妇不问老少，十八般咳嗽吐血，诸虚等症。②《全国中药成药处方集》（吉林方）：风寒咳嗽，发热恶寒，头痛体痛，咳嗽痰清，以及肺经寒湿，痰饮喘嗽，交冬即发，喘咳难卧。

【宜忌】 《全国中药成药处方集》（吉林方）：忌食辛辣、腻物。

08006 鸡鸣散

【方源】 《朱氏集验方》卷一。

【组成】 槟榔七枚 陈皮 木瓜各一两 吴茱萸二钱 桔梗半两 生姜（和皮）半两 紫苏茎叶三钱

【用法】 上为粗末，分作八服。隔宿用水三大碗，慢火煎，留一碗半，去滓；用水二碗，煎滓取一小碗，两次以煎相和，安顿床头，次日五更分二三服，只是冷服，冬月略温亦得，服了用饼饵压下。如服不尽，留次日渐渐吃亦可。服此药至天明，大便当下一碗许黑粪水，即是肾家感寒湿毒气下来也。至早饭前后，痛住肿消，但只是放迟迟吃物，候药力过。

【功用】 《方剂学》：行气降浊，宣化寒湿。

【主治】 ①《朱氏集验方》：脚气。人感风湿，流注脚足，痛不可忍，用索悬吊，叫声不绝，筋脉肿大。②《方剂学》：湿脚气。足胫肿无力，麻木冷痛，恶寒发热，或挛急上冲，甚至胸闷泛恶。

【方论选录】 《方剂学》：方中以槟榔为君，质重下达，行气逐湿。臣以木瓜舒筋活络，并能化湿；陈皮健脾燥湿，更能理气。佐以紫苏叶、桔梗宣通气机，外散表邪，内开郁结；吴茱萸、生姜温化寒湿，降逆止呕。诸药相合，祛湿化浊，宣通以散邪，温散寒湿，行气开壅。但总以宣通为要，适用于湿脚气而偏寒者。

【备考】 《景岳全书》陈皮作橘红。

08007 鸡金散

【方源】《医宗必读》卷七。

【组成】 鸡内金一具（焙） 真沉香二钱 砂仁二钱 陈香橼（去白）五钱

【用法】 上为末。每用一钱五分，生姜汤送下，虚者人参汤送下。

【主治】 鼓胀肿满，小儿疳积。

①《医宗必读》：水肿胀满。②《仙拈集》：鼓胀。③《青囊秘传》：小儿疳积，湿臌阴胜之病。

【宜忌】《青囊秘传》：虚火者忌服。

08008 鸡肺散

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 雄鸡一只（一斤三四两者。取其搭脊脊血一块，即名鸡肺，将肺同后药共研烂） 辰砂三分（研细） 冰片三厘（研细）

【用法】 上共研细如膏，用无灰酒炖滚搅匀。食之即愈。

【主治】 疳疾眼，生白膜白翳。

08009 鸡胆丸

【方源】《续名家方选》。

【组成】 鸡胆 黄连 大黄 槟榔各等分

【用法】 上为末，糊为丸，如梧桐子大。每服五分，白汤送下。

【主治】 小儿腹中有虫，喜食土器壁土，或马粪等。

08010 鸡胫汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生鸡内金四钱（去净瓦石糟粕，捣碎） 于术三钱 生杭芍四钱 柴胡二钱 广陈皮二钱 生姜三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 气郁成臌胀，兼治脾胃虚而且郁，饮食不能运化。

【加减】 若小便时觉热，且色黄赤者，宜酌加滑石数钱。

【方论选录】 鸡内金为鸡之脾胃，中有瓦石铜铁皆能消化，其善化有形瘀积可知，故能直入脾中，以消化血管之瘀滞；而又以白术之健补脾胃者驾驭之，则消化之力愈大；柴胡，《本经》谓主肠胃中饮食积聚，能推陈致新，其能佐鸡内金消瘀可知，且与陈皮并用，一升一降，而气自流通也；用芍药者，因其病虽系气臌，亦必挟有水气，芍药善利小便，即善行水，且与生姜同用，又能调和营卫，使周身之气化流通也。

08011 鸡黄散

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】 鸡内金（焙干） 好黄连（焙干）

【用法】 上为末。麻油调敷，妙。

【主治】 口舌有疮，日有虫食。

08012 鸡清散

【方源】《医方类聚》卷一七六引《必用全书》。

【组成】 赤小豆 黄药子 大黄 盆消 皂角（去皮弦，酥炙） 木鳖子各等分

【用法】 上为细末。用鸡卵清调，鹅翎蘸药敷之。

【主治】 痈疽发背，丹毒恶肿，时行热毒，发作赤色，瘰疬初发，吹奶肿痛。

08013 鸡蛋饮

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】 鸡蛋一个 芒消二钱

【用法】 将鸡蛋倾入碗内搅匀，入芒消蒸服，用好酒送下。初起三天之内照服一方，即行消散。如毒势旺者，接连三服，无不尽消。

【主治】 肠痈、发背、脏毒、鱼口等证。

【宜忌】 皮色不变者勿服。

08014 鸡蛋油

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 鸡蛋

【用法】 炒出油搽之。

【功用】《寿世良方》：杀虫。

【主治】 ①《仙拈集》：肾囊风。②《寿世良方》：诸疮破烂，痒不可忍，或不收口者；及癣疥诸疮。

08015 鸡内金丸

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【异名】 鸡膶胫丸（原书卷五十九）。

【组成】 鸡内金（洗，晒干） 栝楼根（炒）各五两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，稍加至三十丸，食后温水送下，一日三次。

【主治】 膈消；膀胱有热，消渴饮水，下咽即利。

08016 鸡肉煎丸

【方源】《诚书》卷十一。

【组成】 芦荟 人参 柴胡 使君子 黄连（炒） 芜荑（去壳，炒） 胡黄连各三钱

【用法】 上为末拌和，将雌鸡一只去毛令净，于臀后开孔，去肠秽，净，拭干，入前药在鸡腹，以线缝好。取小甑，先以黑豆铺底三寸，然后放鸡，

亦以黑豆围裹，上亦以黑豆三寸，自卯蒸至酉，俟冷，去鸡骨，将肉研细，酒煮面糊为丸。米汤送下。

【主治】 食疳。面足痿黄，心腹胀满，遍体瘦瘠，好吃泥土，潮热多汗。

08017 鸡舌香汤

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】 鸡舌香 秦艽（去苗土）各三分 胡黄连 广香 芎藭各半两 柴胡（去苗）一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 黄疸。面黄，眼如金色，四肢羸弱，或时烦渴。

08018 鸡舌香散

【方源】《局方》卷二（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 香附子（炒，去毛） 赤芍药 天台乌药（去木） 良姜（去芦，麻油炒） 肉桂（去粗皮）各一两 甘草（炙）半两

【用法】 上为细末。每服二钱，入盐少许，用沸汤点服，不拘时候。

【主治】 男子、女人阴阳不和，脏腑虚弱，中脘气滞，宿寒留饮，停积不消，胸膈胀满，心脾引痛，攻刺腹胁，有妨饮食；及中酒吐酒，停饮浸渍，呕逆恶心，噫气吞酸。

【备考】 本方名鸡舌香散，但方中无鸡舌香，疑脱。

08019 鸡血藤膏

【方源】《中药成方配本》（苏州）。

【组成】 鸡血藤（干者） 一百斤

【用法】 将鸡血藤刨片，盛入丝篮中，入盆汤内，加清水一千斤淹没，煎八小时焖过夜，次日取汁去滓，用丝绵筛滤过，定清去脚，入锅内收浓，加阿胶五斤烊入，收成老膏，倒入锡膏盘内，俟冷切成小块，放在透风处吹干。每用三钱至五钱，炖烊，开水冲服。

【功用】 养血和血。

【主治】 血不养筋，筋骨痿痛，手足麻木，妇女月事衰少。

08020 鸡血藤膏

【方源】《中国药典》一部。

【组成】 滇鸡血藤膏粉 87.5 克 川牛膝 23.8 克 续断 21.2 克 红花 2 克 黑豆 5 克 熟糯米粉 175 克 饴糖 120 克

【用法】 以上七味，除滇鸡血藤膏粉、熟糯米粉、饴糖外，其余各药加水煎煮三次，滤过，合并煎液，浓缩成浸膏，加入滇鸡血藤膏粉等三味，充分拌匀，制成方块，干燥即得。将膏研碎，用水、酒各半炖化服，一次 6～10 克，一日二次。

【功用】 补血，活血，调经。

【主治】 血虚，手足麻木，关节痿痛，月经不调。

【宜忌】 孕妇慎用。

08021 鸡苏饮子

【方源】《外台》卷二十七引《范汪方》。

【组成】 鸡苏一握 竹叶一握（切） 石膏八分（碎） 生地黄一升（切） 蜀葵子四分（末，汤成下）

【用法】 上除蜀葵子末外，以水六升，煮取二升，去滓，和葵子末，分二次温服。如人行四五里久进一服。

【主治】 血淋不绝。

【宜忌】《奇效良方》：忌芜荑、蒜、面、炙肉等。

08022 鸡屎白散

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 鸡屎白

【用法】 上为散。每服方寸匕，以水六合和，温服。

【主治】 转筋，臂脚直，脉上下行，微弦，转筋入腹者。

08023 鸡屎米煎

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】 白米五合 鸡屎一升

【用法】 同炒焦为末，水一升煎，顿服。少顷吐出瘕，如研米汁，或白沫淡水，乃愈也。

【主治】 米瘕。好吃生米成瘕，不得米则吐清水，得米即止，米不消化。

08024 鸡屎醴散

【方源】《宣明论》卷一。

【异名】 鸡屎散（《济阳纲目》卷三十九）。

【组成】 大黄 桃仁 鸡屎（干者）各等分

【用法】 上为末。每服一钱，水一盏，加生姜三片，食后、临卧煎汤调下。

【主治】 臌胀，且食不能善食，痞满。

【备考】 本方方名，《医学正传》引作“鸡屎醴饮”，《本草纲目》引作“鸡矢醴”。

08025 鸡脆胫丸

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 鸡脆胫二两（微炙） 黄耆二两（锉） 龙骨一两 黄连半两（去须） 麦门冬一两（去心，

焙） 土瓜根半两 熟干地黄一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】 小便数而多。

【备考】 本方原名鸡膍胵散，与剂型不符，据《普济方》改。

08026 鸡膍胵汤

【方源】《女科指掌》卷五。

【组成】 鸡膍胵 鸡肠各三具（去垢净） 人参 当归 生地 甘草 枣

【用法】 以水一斗，煮鸡肠、胵、大枣，取五升，入药再煎服。

【主治】 产后小便不禁。

08027 鸡膍胵散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 鸡膍胵一两（微炙） 熟干地黄一两 牡蛎一两（烧为粉） 白龙骨一两（烧过） 鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 黄耆三分（锉） 赤石脂一两 桑螵蛸三分（微炒） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干）

【用法】 上为细散，用丹雄鸡肠三具，纳散在肠中，缝系了，于甑内蒸一炊久，取出焙干，为散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 膀胱虚冷，小便滑数，漏精，白浊如泔。

08028 鸡子黄连膏

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 鸡子一枚 黄连一钱

【用法】 用鸡子开一小窍，单取其清，盛以瓷碗，外用黄连研为粗末，掺于鸡子清上，用箸彻底速打数百，使成浮沫，约得半碗许，即其度矣。安放少倾，用箸拨开浮沫，倾出清汁，用点眼眦，勿得紧闭眼胞挤出其药，必热泪涌出数次即愈。内加冰片少许尤妙。若鸡子小而清少者，加水二三匙同打亦可。

【主治】 火眼暴赤疼痛，热在肤腠，浅而易解者。

08029 鸡峰乌金散

【方源】《直指》卷二十三。

【异名】 乌金散（《赤水玄珠》卷三十）。

【组成】 穿山甲 刺猬皮 黄牛角心（各碎，炒黄） 猪牙皂角 槐子 皂荚刺 枳壳 贯众 阿胶各等分（再夹和）

【用法】 上为末。每服一钱半，用胡桃肉研烂，食前酒调下；大肠有热，荆芥泡汤调下；漏血不止，当归煎汤调下。

【主治】 痔漏。

08030 鸡胵茅根汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生鸡内金五钱（去净瓦石糟粕，轧细） 生于术（分量用时斟酌） 鲜茅根二两（锉细）

【用法】 先将茅根煎汤数茶钟（不可过煎，一二沸后慢火温至茅根沉水底，汤即成），先用一钟半，加生姜五片，煎鸡内金末，至半钟时，再添茅根汤一钟，七八沸后，澄取清汤（不拘一钟或一钟多）服之。所余之滓，仍用茅根汤煎服。日进一剂，早、晚各服药一次。初服小便即多，数日后大便亦多。若至日下两三次，宜减鸡内金一钱，加生于术一钱。又数日，胀见消，大便仍勤，可减鸡内金一钱，加于术一钱。又数日，胀消强半，大便仍勤，可再减鸡内金一钱，加于术一钱。如此精心随病机加减，俾其补破之力，适与病体相宜，自能全愈。若无鲜茅根，可用药房中干茅根一两代之。无鲜茅根即可不用生姜。所煎茅根汤，宜当日用尽，煎药后若有余剩，可当茶温饮之。

【主治】 水臌气臌并病，兼单腹胀，及单水臌胀，单气臌胀。

08031 驱风丹

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】 川乌一两（生用，不去皮尖，大者破作四边，小者破两边，锉如骰子大，用麻油煎令黄色，勿焦，去油，焙） 草乌四两（择鸡心者，生用，不去皮尖，每个破作二片，择白净者用，心黑者不用，锉如骰子大。二两用油制，如制川乌法；二两用盐一两拌和，水微淹着，浸三昼夜，一日一度漉，转候日数足取出去水，再用干盐一两同炒，候干，去盐勿令焦；再用卤汁浸三昼夜，去卤汁，炒干用，无卤汁，盐代） 地龙四两（置阴润处少时，用纱帕裹定，轻捶，筛去土，取肉用，不必更秤） 鸡心槟榔一两（锉，焙） 何首乌一两（锉，焙） 干木瓜一两（锉，焙） 赤小豆一两（择去绿豆、黄豆）

【用法】 上为细末，用黄子醋一碗，好头面半两，煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心麝香、冷盐酒送下，不用温酒。服讫不可便食热物。若服药后觉遍身麻木，不可因麻木弃而不服。恐是丸数过多，或食热物太早。

【主治】 ①《朱氏集验方》：脚气，远年近日，不问阴阳二证，脚足肿痛不可忍。②《普济方》卷二四一引《澹寮方》：或患历节白虎，及筋脉拘挛

等症。

【宜忌】 忌香菜、茵陈、豆豉，一切动风毒物。

08032 驱风散

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】 防风（去芦叉）一两半 天南星（生，去皮脐） 甘草（生） 半夏（姜制，去脐） 黄芩（炒）各一两半

【用法】 上㕮咀。加生姜三片，同煎，不拘时候服。

【主治】 小儿卒暴中风，全不能言，口眼㖞斜，惊瘛抽掣，痰实烦闷，神昏有热，睡卧不稳。

08033 驱风散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】 防风（去芦） 龙胆草各五钱 铜青三钱 五倍子二钱 淡竹叶一握（去根）

【用法】 上为末。每服半钱，热汤一合泡，停冷澄清，洗眼。

【主治】 烂眩风赤浮翳，胬肉攀睛，涩痒眵泪。

08034 驱风膏

【方源】《本草纲目》卷四十三引《元戎》。

【异名】 白花蛇膏（《医统》卷九）。

【组成】 白花蛇肉四两（酒炙） 天麻七钱半 薄荷 荆芥各二钱半

【用法】 上为末。好酒二升，蜜四两，石器熬成膏。每服一盏，温汤送服，一日三次。急于暖处出汗，十日效。

【主治】 风瘫疠风，遍身疥癣。

08035 驱风膏

【方源】《增补内经拾遗》卷四。

【组成】 杏仁（剥去皮尖）不拘多少

【用法】 上浸。晨未洗脸之先，齿咀杏仁，连汁涂之，后洗净。

【功用】 驱肺风。

【主治】 风寒外袭之皯痤。

08036 驱邪汤

【方源】《准绳·类方》卷四引《会编》。

【组成】 麻黄 桂枝 杏仁 甘草 防风 羌活 独活 川芎 藁本 柴胡 家葛 白芷 升麻

【用法】 加生姜、薄荷，水煎服。

【主治】 风寒颈项强痛。

08037 驱疟汤

【方源】《直指》卷十二。

【异名】 驱疟饮（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】 草果仁 青皮 陈皮 人参 茯苓 半夏（制） 厚朴（制） 苍术（炒） 鸡心槟榔 白术 甘草（炙）各半两 良姜一分

【用法】 上锉散。每服三钱，加生姜五片、大枣二个、乌梅一个，水煎，空心服。

【主治】 诸疟、久疟。

08038 驱绦汤

【方源】《方剂学》。

【组成】 南瓜子肉 60～120 克 槟榔 30～60 克

【用法】 先将南瓜子肉嚼碎吞服，隔 1～2 小时后再服槟榔煎成的浓汁。4～5 小时后腹泻时可排出虫体。服药后如无腹泻，可冲服玄明粉 9 克，如头节未驱下，隔半月再服。

【功用】 驱绦虫。

【主治】 绦虫病。

【宜忌】 在部分虫体排出肛门口时，不要用手去拉，可用温水坐浴，使虫体自然排出；槟榔下降而能破气，且用量较重，故孕妇忌服。

08039 驱秽散

【方源】《简明医彀》。

【组成】 大黄三钱 檀香末一钱 槟榔八分 青木香 丁香各三分 麝香二分

【用法】 上为末。每服五分，生姜汤调下。泻秽毒出为度。外用除根法。

【主治】 体气。

【备考】 除根法：先剃去腋毛，用铅粉水调涂之，数日后看有一小孔，即出气处也，以艾炷如米大，灸七壮，孔实愈。

08040 驱痫散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】 朱砂（研） 雄黄（研） 蛇皮（炙黄） 石膏（煅通红，出火毒一宿）各一分 蜂房（炒） 远志（取肉，姜制，焙） 细辛（华阴者，去苗土） 麻黄（去节） 直僵蚕（炒） 川大黄（生） 川芎 独活各一分半

【用法】 上为末。每服一钱，加钩藤、蜜少许煎汤，温和调灌。

【主治】 诸痫。口眼相引，上视涎流，手足抽搐，头项反张，腰背强直。

08041 驱风上清散

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 酒黄芩二钱 白芷一钱半 羌活 防风 柴胡梢各一钱 川芎一钱二分 荆芥八分 甘草五分

【用法】 上为细末。每服四钱，白水二钟，煎至八分，食后服。

【主治】 风热上攻，眉棱骨痛。

08042 驱风化痰汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】人参 白术（去芦） 白茯苓（去皮） 半夏（姜炒） 陈皮 枳实（酒炒） 当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 桔梗（去芦） 南星 远志（甘草水泡，去心） 瓜蒌仁 白附子 僵蚕 天麻 黄连（酒炒） 黄芩（酒炒） 甘草 怀生地

【用法】上锉一剂。加生姜五片，水煎，温服。

【主治】癫狂、五痫、眩晕，气血虚，挟风痰郁火，时作时止，痰涎壅盛，心神昏愦。

08043 驱风换肌膏

【方源】《医部全录》卷三七五。

【组成】肥皂二斤 甘松 山柰 白芷各二两 薄荷 花粉 黄柏末 细辛 干葛 草果 防风 独活各一两 轻粉五钱

【用法】上为末，为丸。每朝洗面用之，再用玉面桃花粉。

【主治】雀子斑。

08044 驱毒保脱汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷八。

【组成】当归一两 煅羊胫骨三钱 桂心 生甘草各一钱 黑炮姜 麻黄 明乳香 净没药各五分

【用法】外用活蟾蜍皮敷足趾；内服此方。

【功用】活血和阳，以散其阴毒。

【主治】脱疽，由沉寒痼冷，阴毒搏於趾节而成。屈不能伸者，病在筋，伸不能屈者，病在骨，或生于趾头，或生于趾缝，初虽色白，继则色黑，久则溃烂，节节脱落，延至足背脚跟，白腐黑烂，痛不可忍。

08045 驱蛔承气汤

【方源】《新急腹症学》。

【组成】大黄三钱（后下） 元明粉三钱（冲服） 槟榔三钱 川楝子三钱 乌梅五钱 木香三钱 苦参三钱 川椒一钱

【用法】加水400毫升，煎成150至200毫升，成人每日一次，小儿分三次服。

【主治】蛔虫性肠梗阻痞结型及瘀结型早期。

【加减】呕吐重，加生姜、半夏、旋复花、代赭石；气虚，加党参；脾虚中寒，加炮姜、附子；热重，加银花、黄芩、生石膏。

08046 驱风散热饮子

【方源】《审视瑶函》卷三。

【异名】驱风散热汤（《眼科临证笔记》）。

【组成】连翘 牛蒡子（炒研） 羌活 苏薄荷 大黄（酒浸） 赤芍药 防风 当归尾 甘草少许 山栀仁 川芎各等分

【用法】上锉。白水二钟，煎至一钟，去滓，食远热服。

【功用】《眼科临证笔记》：清热降火。

【主治】天行赤热症。目赤痛，或脾肿头重，怕日羞明，涕泪交流，老幼相传。

【加减】少阳经，加柴胡；少阴经，加黄连。

08047 驴尿一物饮

【方源】方出《外台》卷八引《救急方》，名见《医方考》卷三。

【组成】驴尿

【用法】每服二合。

【主治】①《外台》引《救急方》：胃反。②《医方考》：郁火翻胃。

【方论选录】《医方考》：火郁于中，治以辛香开胃之药，益滋其燥，非所宜也。驴尿辛膻，可使开郁，然为浊阴之所降，则可以济火矣。

【临证举例】翻胃 昔在幼年，经患此疾，每服食饼及羹粥等物，须臾吐出。正观中，许奉御兄弟及柴蒋等，时称名医，奉勅令疗，竭其术竟不能疗，渐至羸惫，死在旦夕。忽有一卫士云：服驴子小便极验，旦服二合，午食惟吐一半，晡时又服二合，人定时食粥吐即定。后奏知大内中，五六人患翻胃，同服，一时俱愈。

08048 纯阳正气丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】藿香 肉桂（桂枝可代） 陈皮 半夏 公丁香 小茴香 紫苏 云苓 制茅术 生白术各一两 八宝红灵丹五钱

【用法】上为细末，同红灵丹研匀，用鲜花椒叶煎浓汁泛丸，如梧桐子大，纸囊封固，收藏燥处。每服五分，重者加倍，阴阳水送下。

【主治】时行疫疠，霍乱吐泻，绞肠腹痛。

08049 纯阳青蛾丹

【方源】《急救经验良方》。

【组成】青鱼胆不拘多少

【用法】上药以生石膏和匀，须干湿得宜，阴干为末，每两加梅片一钱，共研匀，瓷瓶收固。遇证吹之，立即开关。陈者更妙，勿泄药气。

【主治】双单乳蛾，喉闭。

08050 纯阳真人养脏汤

【方源】《局方》卷六（绍兴续添方）。

【异名】真人养肠汤（《直指》卷十三）、养脏汤（《直指小儿》卷四）。

【组成】人参 当归（去芦） 白术（焙）各六

钱 肉豆蔻（面裹，煨）半两 肉桂（去粗皮）甘草（炙）各八钱 白芍药一两六钱 木香（不见火）一两四钱 诃子（去核）一两二钱 罂粟壳（去蒂盖，蜜炙）三两六钱

【用法】 上为粗末。每服二大钱，水一盏半，煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】 大人、小儿肠胃虚弱，冷热不调，脏腑受寒，暴泻，下痢赤白，或便脓血，有如鱼脑，里急后重，脐腹疞痛，日夜无度，胸膈痞闷，胁肋胀满，全不思食，及脱肛坠下，酒毒便血，诸药不效者。

【宜忌】 忌酒、面、生冷、鱼腥、油腻。

【加减】 如脏腑滑泄夜起，久不愈者，可加炮附子三、四片，煎服。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手足阳明药也。脱肛由于虚寒，故用参、术、甘草以补其虚；肉桂、肉蔻以祛其寒，木香温以调气，当归润以和血，芍药酸以收敛，诃子、罂壳涩以止脱也。②《方剂学》：方中参、术、甘草益气健脾，合肉桂、肉豆蔻温中止泻，为方中主要部分；粟壳、诃子固肠止泻，当归、芍药和血止痛，木香调畅气机，为方中辅佐部分。合用以奏补虚温中，涩肠固脱之效。

【备考】 本方改为散剂。每服三钱。名“养脏散”、“真人养脏散”（见《全国中药成药处方集》吉林方）。

08051 纳气丸

【方源】 《张氏医通》卷十六。

【组成】 八味丸去桂、附，加沉香一两，砂仁二两。

【用法】 炼蜜为丸。如泄泻少食者，用干山药末，调糊为丸。

【主治】 脾肾皆虚，蒸热咳嗽，倦怠少食。

08052 玫瑰丸

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】五倍子 红雪（研）各 两 马勃 刂麻 矾蝴蝶（研） 硼砂（研）各半两 丹砂（研） 麝香（研） 龙脑（研）各一分 甘草（生用）三分

【用法】上为细末，糯米饭为丸，如鸡头子大。每服一丸，含化，不拘时候。

【功用】化涎，生津，去毒。

【主治】上焦有热，咽喉生疮，赤根白头，痰唾稠浊，口中腥臭。

08053 青药

【方源】《包氏喉证家宝》。

【组成】制矾三分 百草霜五厘 灯草灰五厘 粉草末二分 薄荷二分 冰片五厘

【用法】每制矾三分，先配百草霜五厘研细，入灯草灰五厘再研，配成瓦灰色，后加粉草末二分，薄荷二分再研细，入冰片五厘。此药须用时配合，多日则无效，阴雨只可用一日。

【功用】消痰清热，解毒祛风。

【主治】一切喉舌蛾痈。

【加减】如吹喉证，欲其出痰，加僵蚕、皂角末各三四厘。

【备考】制矾法：生明矾研极细末，入倾银罐内，先放大半罐且止，将罐入炉火内，用桴炭火煅熔，以铜箸搅无矾块为度，乃将枪消研细末，投入矾内约十分之五，次将白硼砂研，投入矾内亦十分之五。少倾再投矾末，逐渐投下，候矾尽化，照前投消、硼少许，如此逐层渐渐投尽，直待矾凉，启罐口如馒头样，方架起炭火烧至矾枯，用新瓦一片盖罐上一点钟，取起，将牛黄少许研末，用水五六匙调和，匀洒矾上，将罐仍入火内烘干，取起，连罐覆净地上，先用纸衬地，方合罐，罐上覆以碗，过七日夜取起，收贮听用。须轻松无竖纹者佳。煅时火候宜初起缓，亦不可太缓，恐矾僵则不熔化矣，化后用文武火。如矾未化尽即下消、硼，必不能熔，而坚实有竖纹矣。其罐择未倾银者用，必先放火上烘热，亦不可放炭火上使温气入罐。取百草霜法：须取其近锅底者，若锅底心及锅口者，俱不用。先轻轻刮去上面一层，轻取中一层用之，着底者亦不用。

08054 青云散

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】百草霜 食盐各等分。

【用法】上为末。水调，敷舌上。未破者用之。

【主治】舌硬肿痛。

08055 青龙丸

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】龙骨（研） 羌活（去芦头） 秦艽（去苗土）各一两 伏神（去木） 羚羊角（镑） 青葙子 甘菊花 白附子（炮） 丹砂（研如粉）各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后人参汤送下。

【主治】肝伤健忘，目视不明，面色青白，常多恐惧。

08056 青龙丸

【方源】《集验良方拔萃》卷一。

【异名】金龙丸。

【组成】马前子（即番木鳖，制法照小金丹式）四两 山甲片（炒黄色为度）一两二钱 白僵蚕（炒断丝，研末）一两二钱

【用法】上为末，黄米饭为丸，如梧桐子大。每服五分，量人虚实酌减，老年觉气血衰者，此丸只服四分，妇人新产半月以内者只服四分，如过满月者服五分。男妇瘰疬痰毒，夏枯草汤送下，或酒亦可。小儿周岁以内者服九丸，周岁以外者服十一丸，三岁者服十五丸，四五岁者服十九丸，五六岁者服二十一丸，八九岁者服二十三丸，十岁以上者服三分，十五岁以上者服四分，二十岁者照大人服法。如小儿不能吞送，以开水或甜酒调化送下。临睡时按部位用引经药煎汤送下。盖暖睡，勿冒风。如若冒风，觉周身麻木抽掣，甚则发抖，不必惊慌，过片刻即安。毒初起者，一二服即消散，已成脓者，服此自能出毒，不必咬头开刀，诚外科家第一妙方也。外加煎引：头面，羌活、川芎各五分；肩背，角刺尖五分；两臂，桂枝五分；胸腹，枳壳五分；两肋，柴胡五分；腰间，杜仲五分；两足膝，牛膝、木瓜各五分；咽颈，桔梗、甘草各五分；跌仆挛筋，当归、红花各五分，酒煎。

【主治】一切疔疮肿毒，并跌仆闪肭，伤筋挛痛，贴骨痈疽；兼治男妇大小颈项瘰疬，及乳串结核、痰气凝滞、硬块成毒，小儿痘后发痈。

08057 青龙丹

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】草乌头四两（生，去皮尖） 香附子（炒）二两 半夏（汤洗七次） 麻黄（去根节） 香白芷 白附子（生用） 血竭（别研） 天南星（生用） 川乌头（生，去皮脐尖） 赤芍药 薄荷叶（去土） 山药 螺青各一两 白僵蚕（炒去丝

嘴） 藿香叶（去土） 甘松（去土，焙） 零陵香 细松烟墨（烧，醋淬）各半两

【用法】 上为细末，醋煮面糊为丸，每一两作二十丸。每服一丸，生姜、薄荷同嚼，热酒送下，不拘时候。

【主治】 男子、妇人左瘫右痪，手足拳缩，口面眼㖞斜，遍身瘾疹，及伤风鼻塞脑痛，四肢顽麻，牙关紧急。

08058 青龙散

【方源】 《御药院方》卷五。

【异名】 橘皮五味子汤（《普济方》卷一六一）。

【组成】 人参（去芦头） 陈皮（去白） 五味子 紫苏叶各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 咳嗽上气不得卧。

08059 青龙散

【方源】 《御药院方》卷九。

【组成】 青黛三钱 薄荷叶二钱 细辛 益消 川芎 香白芷各半两

【用法】 上为细末。以指蘸药擦齿肿处，吐津，不拘时候。误咽不妨。

【主治】 阳明经风热，齿龈肿痛。

08060 青龙散

【方源】 《青囊秘传》。

【组成】 月石五钱 冰片三分 青黛五分

【用法】 上为末。外敷。

【主治】 无名肿毒。

08061 青白散

【方源】 《朱仁康临床经验集》。

【组成】 青黛30克 海螵蛸末90克 煅石膏末370克 冰片3克

【用法】 先将青黛研细，次加海螵蛸末研和，后加煅石膏末研和；冰片入研钵内轻轻研细，加入上药少许研和，再加全部药末研和。渗水多时，将药末掺上；渗水不多，用麻油调敷。

【功用】 收湿止痒，消炎退肿。

【主治】 湿疹，过敏性皮炎。

08062 青丝散

【方源】 《医学纲目》卷二十九引东垣方。

【组成】 香白芷 白茯苓各五钱 母丁香 细辛 当归 川芎 甘草 甘松各三钱 升麻 旱莲草 地骨皮 生地 熟地 青盐 破故纸各二钱 寒水石七钱（煅） 香附米一两（生姜汁浸一宿，炒） 何首乌一两 麝香五分 高茶末

【用法】 上为细末。擦牙，刷毕咽药，余津润髭，一月白者顿黑。

【功用】 补虚牢牙，黑髭须。

【宜忌】 忌食萝卜。

【备考】 方中高茶末用量原缺，《医统》作细茶末二钱。

08063 青皮汤

【方源】 方出《格致余论》，名见《医学正传》卷六。

【组成】 青皮

【主治】 乳硬。

【备考】 《医学正传》本方用青皮四钱，细切，以水一盏半，煎至一盏，每日二次。与十六味流气饮间服，至核消住药。

08064 青芝丹

【方源】 《顾氏医径》卷六。

【组成】 飞青黛三两 滑石一两五钱 黄柏一两

【用法】 上为细末。以鸡子白、菊汁和人调匀，涂敷伤处。

【主治】 烫火伤。

08065 青冰散

【方源】 《玉钥》卷上。

【组成】 胆矾二钱 硼砂二钱

【用法】 上为末，取青鱼胆一个，将药末入胆内，阴干去皮，再研极细，加冰片二分，收固。每遇喉闭、双单蛾等症，以男左女右吹入鼻中。

【主治】 喉闭，双单蛾。

08066 青阳汤

【方源】 《医醇剩义》卷四。

【组成】 青皮一钱五分（醋炒） 柴胡一钱（醋炒） 蓬莪茂四钱 乌药一钱 炮姜五分 广皮一钱 延胡一钱（酒炒） 木香五分 郁金二钱 花椒子二十四粒（打碎）

【功用】 疏肝化浊。

【主治】 肝胀。肝寒气滞，胁下满而痛引小腹。

08067 青苇散

【方源】 方出《圣惠》卷六十一，名见《普济方》卷二八六。

【组成】 青苇二茎（锉） 薏苡仁二合 甜瓜子二合 桃仁五十枚（汤浸，去皮尖）

【用法】 上药捣碎。先以水三大盏，煎苇至一大盏，去滓，入薏苡仁等三味，同煎至七分，分温二服，不拘时候。

【主治】 肺痈咳，其声破嗄，体有微热，烦满，胸前皮甲错。

08068 青苋膏

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 马齿苋四两（研烂） 青黛一两

【用法】 研匀。涂之，稍干，再换。内再服八正散尤佳。

【功用】 消肿止痛，退热。

【主治】 由中下二焦风热所致的肾囊风，疙瘩作痒，搔之作痛，及妇人脐下连二阴生疮，状如马刀，痛出黄汁，食减身浮，二便涩滞。

08069 青吹散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 青黛3克 薄荷叶末1克 黄柏末2克 川连末1.5克 煅石膏9克 煅月石18克 冰片3克

【用法】 先将头四味药研和，逐次加入煅石膏、煅月石，研细，最后加冰片研细，装瓶，勿泄气。用药管吹于患处。

【主治】 口疮，舌糜，咽喉病。

08070 青灵丹

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】 牛黄 冰片各一分 胆矾三分 雄精 硼砂 儿茶 山豆根各八分

【用法】 上为细末，用白梅三枚去核，共捣作十丸。分十日噙服。

【主治】 虚火上炎之喉癣，喉间生红丝，如戈窑纹，又如秋海棠叶背，不闭不肿，气出如常，干燥而痒，饮食不遂。

【宜忌】 宜清心戒欲，忌盐、酱及助火之物。

08071 青盂汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 荷叶一个（用周遭边浮水者良，鲜者尤佳） 生石膏（捣细）一两 真羚羊角二钱（另煎，兑服） 知母六钱 蝉蜕（去足土）三钱 僵蚕二钱 金线重楼（切片）二钱 粉甘草一钱半

【用法】 水煎，温服。

【主治】 温疫表里俱热，头面肿疼，其肿或连项及胸；亦治阳毒发斑疹。

【方论选录】 荷生水中，其叶边平兜，茎在中央，更有震卦仰盂之象，故能禀初阳上升之气，为诸药之舟楫，能载清火解毒之药上至头面，且其气清郁，更能解毒逐秽。金线重楼，一名蚤休，味甘而淡，其解毒之功，可仿甘草。然甘草性温，此药性凉，以解一切热毒，尤胜于甘草。羚羊角善清肝胆之火，兼清胃腑之热。其角中天生木胎，性本条达，清凉之中，大具发表之力，与石膏之辛凉，荷叶、连翘之清轻升浮者并用，大能透发温疫斑疹之毒火郁热，而头面肿处之毒火郁热，亦莫不透发消除也。僵蚕乃蚕将脱皮时病风而僵，故能为表散药之向导，而兼具表散之力。是以痘疹不出者，僵蚕能表出之。不但此也，僵蚕僵而不腐，凡人有肿痛之处，恐其变为腐烂，僵蚕又能治之，此气化相感之妙也。

【临证举例】 ①大头瘟 一妇人，年40许，得大头瘟证。头面肿大疼痛，两目肿不能开，上焦烦热，心中怔忡。彼家误为疮毒，竟延疡医治疗。医者自出药末，敷头面，疼稍愈。求其出方治烦热怔忡。彼言专习外科，不管心中病。时愚应他家延请，适至其村，求为诊治。其脉洪滑有力，关前益甚。投以青盂汤，将方中石膏改用二两，煎汁两茶钟，分二次温饮下，尽剂而愈。②瓜瓤瘟 一人，年20余，得温疫。三四日间头面悉肿，其肿处皮肤内含黄水，破后且溃烂，身上间有斑点，闻人言，此证名大头瘟。其溃烂之状，又似瓜瓤瘟，最不易治。惧甚，求为诊视。其脉洪滑而长，舌苔白面微黄。问其心中，惟觉烦热，嗜食凉物。遂晓之曰，此证不难治。头面之肿烂，周身之斑点，无非热毒入胃而随胃气外现之象。能放胆服生石膏，可保痊愈。遂投以青盂汤，方中石膏改用三两，知母改用八钱，煎汁一大碗，分数次温饮下。一剂病愈强半。翌日，于方中减去荷叶、蝉蜕，又服一剂痊愈。

08072 青枣散

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】 陈皮 甘草 干姜 良姜（各炒）各等分

【用法】 上为细末。每服一钱，空心盐汤点下。加生姜、大枣，水煎服亦得。

【主治】 脾胃泄泻，心腹膨胀疼痛，不纳饮食，或作吐逆翻胃，脾痛气不升降，兼脾胃积冷。

【宜忌】 忌生冷、鱼腥、酒、猪肉动气物。只可吃鸠子、雀儿、猪肝、肺等物。

08073 青矾散

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】 真青黛（水飞，去灰净）一分 明矾五分六厘

【用法】 上为细末，分七服包开。每日空心，用鸡子清一个，调送一服。药完病愈。至重者，两料除根。

【主治】 湿热黄疸，面目遍体、指甲皆黄，体倦，胸腹饱闷，食下即胀。

08074 青果膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 鲜青果一百六十两 胖大海四两 锦灯笼二两 山豆根一两 天花粉四两 麦冬四两 诃子肉四两

【用法】 上切。水煎三次，分次过滤后去滓，滤液合并，用文火熬煎、浓缩至膏状，以不渗纸为度，每两膏汁兑蜜一两。每服三至五钱，温开水调化送下，一日二次。

【功用】 清咽止渴。

【主治】 咽喉肿痛，失音声哑，口燥舌干。

【宜忌】 忌辛辣动火之物。

08075 青金丹

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】 硫黄 水银 木香（末）

【用法】 上将硫黄、水银二味同研，令不见水银星为度，合木香再研，用生姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服三丸，食后米饮送下。

【主治】 反胃，心下牢大如杯，朝食则暮吐，暮食则朝吐，关脉弦紧。

08076 青金丹

【方源】《本事》卷四。

【异名】 的奇丹（《杨氏家藏方》卷六）。

【组成】 硫黄一两（研） 水银八钱

【用法】 上二味铫子内炒，柳木篦子不住搅匀，更以柳枝蘸冷醋频频洒，候如铁色，法如青金块方成，刮下再研如粉，留少半为散，余以粽子尖三个，醋约半盏，研稀稠得所成膏为丸，如鸡头子大，朱砂为衣。每服一丸，煎丁香汤磨化下，热服。如服散子，丁香汤调下一钱。伤寒阴阳乘伏，用龙脑冷水磨下，一日二三次。

【主治】 ①《本事》：霍乱吐泻不止，及转筋诸药不效者。②《医方类聚》引《济生续方》：一切吐逆。

【方论选录】《本事方释义》：硫黄气味辛大热，入右肾命门；水银气味辛寒，能行九窍，能伏五金为泥；丁香汤送，以热为引也；龙脑汤送，以凉为引也。此治霍乱转筋，阴阳乘伏，二炁欲离，诸药不能效者，乃急救之方，司是术者当留心斟酌焉。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“一粒青金丹”。《医方类聚》引《济生续方》本方用法：生姜、橘皮煎汤送下，不拘时候。

08077 青金丹

【方源】《三因》卷十二。

【异名】 黑神丹（《普济方》卷一六三）、清金丹（《证治要诀类方》卷四）。

【组成】 杏仁（去皮尖，牡蛎煅取粉，入杏仁同炒黄色，去牡蛎粉不用）一两 青黛一两

【用法】 上为末，入黄蜡一两熔为丸，如弹子大，压扁如饼。每用中日柿一个，去核入药在内，湿纸裹煨，约药溶方取出，去火毒，细嚼，糯米饮送下。

【主治】 肺虚壅，咳嗽喘满，咯痰血。

【备考】 本方方名，《准绳·类方》引作“青金丸”。

08078 青金丹

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】 天南星一两 人参二钱半 半夏一两半 款冬花二钱 杏仁二两（去皮尖） 螺青半钱 百药煎二两 五味子五钱 僵蚕二个 白矾半钱 诃子五钱 皂角一两

【用法】 上为细末，姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，临卧清茶送下，一日三次。

【主治】 哮喘。

08079 青金散

【方源】《幼幼新书》卷三十引《王氏手集》。

【组成】 白及 青黛各等分

【用法】 上为末。每服半钱，糯米饮调下。

【主治】 肺嗽喘息有音，及热搏上焦，血溢妄行，咳唾血出，咽嗌疼痛，烦渴呕吐，寒热休歇，减食羸瘦。

08080 青金散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 芒消半钱 青黛半钱 乳香 没药各少许

【用法】 上为细末。鼻内搐之。

【主治】 ①《儒门事亲》：目暴赤肿痛不能开者。②《普济方》：鼻息肉，闭塞疼痛。

08081 青金散

【方源】《济生》卷五引王一郎方。

【异名】 清金散（《丹溪心法附余》卷十二引《竭效方》）。

【组成】 五倍子（去土垢）四两 青黛四钱

【用法】 上为细末。好油调，鸭羽扫口内向咽喉，流入咽喉中，疮烂，次日便下。

【主治】 小儿白口疮，急恶，状似木耳；兼治痔疮。

08082 青金散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 南硼砂一两（另研） 薄荷二两 甘草

七钱半（炒） 百药煎三钱 马牙消（枯，另研） 青黛（另研）各半两 紫河车二钱半 白僵蚕（直者，去头，微炒，取末） 一钱半 脑子半钱（另研）

【用法】 上除研药外，同为细末，入研药再研匀细。每用少许，时时干掺舌上，细细咽津。

【主治】 心肺客热上攻，咽喉肿痛生疮，舌本强硬，妨闷不利。

08083 青金散

【方源】《普济方》卷六十七。

【组成】 信砒 铜绿各一分

【用法】 上为细末。摊纸上，涂疳蚀处。

【主治】 走马恶疳，牙疳蚀损，唇舌肉腐，牙落臭烂。

08084 青金散

【方源】《普济方》卷七十三。

【组成】 铜青 滑石 蚌粉各等分 轻粉少许

【用法】 上为末。桑叶煎，少加青盐，泡洗。

【主治】 烂眩风眼，赤肿热痒。

【加减】 去胬肉翳膜，少加真白矾。

08085 青金散

【方源】《保婴撮要》卷十二。

【组成】 松香二两 真蛤粉五钱 青黛二钱五分

【用法】 上为末。用猪油调搽，或干掺之。

【主治】 小儿疥癣眉烁，或延及遍身瘙痒，或浓水淋漓，经年不愈。

【加减】 加轻粉、枯矾各三钱以治前证及胎毒疥癣尤效。

08086 青鱼散

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】 胆矾二钱 明矾二钱 冰片五分 雄精一钱半 山豆根三钱

【用法】 先将二矾研细，装入青鱼胆中，悬檐下阴干，取出与诸药同研细，收贮瓷瓶，勿令出气。以此药吹之。

【主治】 风火喉痛。

08087 青宝丹

【方源】《青囊秘传》。

【异名】 青敷药。

【组成】 大黄一斤 姜黄八两 黄柏八两 白芷六两 青黛四两 白及四两 花粉二两 陈皮四两 甘草二两

【用法】 上为细末。如毒红肿者，野菊花捣汁，或淡茶叶泡汤候冷，或加蜜水或甜菜汁，或丝瓜叶汁，或甘露根汁，或鲜芙蓉叶汁，或夏枯草泡汤，皆可调敷，随症选用。

【功用】 箍毒托脓。

【主治】 一切热毒红肿者。

08088 青胃散

【方源】《疡科遗编》卷上。

【组成】 姜黄 白芷 细辛 川芎各等分

【用法】 上为细末。先将盐汤漱口，然后蘸药擦牙。

【主治】 骨槽风，坚硬酸木。体虚而寒者。

08089 青衿散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 益元散加薄荷 青黛

【用法】 生蜜为丸，如弹子大。噙化。

【主治】 咽喉肿痛。

【备考】 本方方名，据剂型，当作青衿丸。

08090 青珠丸

【方源】《丹溪心法附余》卷二十二。

【组成】 天麻 半夏 南星 白附子 川乌各一钱 干蝎（头尾全）七枚 僵蚕七枚 青黛一钱 羌活二钱 朱砂一钱（为衣）

【用法】 上用研入巴豆七粒，去油，研匀，面糊为丸，如黍米大。每服五丸，金钱薄荷汤送下。

【主治】 急慢惊风，痰热往来。

08091 青莲膏

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 白砒一分 轻粉一钱 青黛二钱 乳香一钱 麝香五分

【用法】 上为细末，用香油调薄摊纸上，用槌捶实，阴干收之。每于卧时漱净口，拭干，随疮大小，剪药封之，至晓去药，漱净吐之。三上效。

【主治】 走马牙疳。

08092 青盐丸

【方源】《本事》卷二。

【组成】 茴香三两（炒香） 菟丝子四两 干山药二两 青盐一两

【用法】 上将菟丝子洗淘，无灰酒浸，日中煎七日，冬天近火煨之，晒干别末，将余药末和匀，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，盐酒、盐汤任下。

【功用】 壮力进食。

【主治】 ①《本事》：肾虚及足膝无力。②《校注妇人良方》：肝肾虚损，腰膝无力，颤振躄曳。

【方论选录】《本事方释义》：大茴香气味辛温，入肾；菟丝子气味甘平，入脾；干山药气味甘平，入脾；青盐气味咸、微寒，入足少阴。下焦肾虚致

足膝行走无力，其始必因肾家气弱不能运水，故必补脾之药，佐以酒浸引药入肾，以驱湿邪而本脏自安也。

【临证举例】 足鼾曳 妇人素患足鼾曳，久服此药，履地如故。

08093 青铅饮

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】 青铅一斤（化烊，即须倾水盆中，捞起，再烊再倾三五次。而即以此水煎药方） 生地 羚羊一钱 天冬三钱 石斛三钱 菖蒲 甘草各一钱

【主治】 子痫之甚者。

08094 青凉膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 煅石膏 250 克 青黛 9 克 冰片 3 克

【用法】 上为细末，油调外用。

【主治】 烫火伤。

08095 青娥丸

【方源】《局方》卷五（宝庆新增方）。

【异名】 青蛾丸（《普济方》卷一五四引《如宜方》）、青娥不老丸（《明医指掌》卷九）、青娥不老丹（《嵩崖尊生》卷十三）。

【组成】 胡桃（去皮、膜）二十个 蒜（熬膏）四两 破故纸（酒浸，炒）八两 杜仲（去皮，姜汁浸，炒）十六两

【用法】 上为细末，蒜膏为丸。每服三十丸，空心温酒送下，妇人淡醋汤送下。

【功用】 温肾暖腰，益精养血。

①《局方》（宝庆新增方）：壮筋骨，活血脉，乌髭须，益颜色。②《景岳全书》：益精助阳，壮脚力。③《鳞爪集》：滋补下元，益肾固本，养血滋阴，齿落再生，反老还童。④《中药制剂手册》：温肾暖腰。

【主治】 肾虚为风寒湿邪所伤，或坠堕伤损，气滞不散所引起的腰痛，头晕耳鸣，溺有余沥，妇女白带。

①《局方》（宝庆新增方）：肾气虚弱，风冷乘之，或血气相搏，腰疼如折，起坐艰难，俯仰不利，转侧不能，或因劳役过度，伤于肾经，或处卑湿地气伤腰，或堕坠伤损，或风寒客搏，或气滞不散，皆令腰痛，腰间似有物重坠，起坐艰辛者。②《全国中药成药处方集》（上海方）：腰腿酸软，头晕耳鸣，溺有余沥。③《中药制剂手册》：妇女白带。

08096 青娥丸

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】 补骨脂（即破故纸，四川合州者，洗净，酒浸少顷，纸炒香为度）四两 萆薢四两（真正者，切片分作四份用，一两盐水，一两童便，一两米泔水，一两无灰好酒各浸一宿，晒干） 杜仲（姜汁炒去丝）四两 胡桃肉（汤泡，去皮）八两 黄柏（蜜炒）四两 知母（蜜炒）三两 牛膝（酒洗，去芦）四两

【用法】 上为细末，春夏用糊，秋冬用蜜，其糊用糯米一碗煮粥，将胡桃仁捣烂为膏，和匀，石臼捣为丸，如梧桐子大。每服五十丸至八十丸，空心盐汤或盐酒送下。以干物压之。

【功用】 补肾壮阳，强筋止痛，乌须。

①《摄生众妙方》：滋肾水，壮阳，益筋骨。②《寿世保元》：乌须。③《全国中药成药处方集》（沈阳方）：强筋壮骨，止痛。

【主治】 肾虚腰膝疼痛无力，不孕，并耳聋，眩晕。

①《摄生众妙方》：腰膝足疼痛。②《医学正印》：肾虚腰痛，不能成育。③《全国中药成药处方集》（沈阳方）：足膝无力，耳聋耳鸣，头晕目眩。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：禁房事。

【方论选录】《医方考》：肾，坎象也，水火并焉。水衰，则阳光独治，而令肾热；火衰，则阴翳袭之，而令肾寒；水火俱衰，则土气乘之，而邪实于肾，均之令人腰痛也。是方也，破故纸、杜仲、胡桃味厚而温，黄柏、知母、牛膝味厚而寒，温者可使养阳，寒者可使养阴，均之味厚，则均之能走下部矣；若萆薢者，苦燥之品，足以利水土之邪而平其气也。曰青娥者，涵阳之坎也，假之以名方，明其全夫水火之真尔！

【临证举例】 不孕症 《医学正印》：董廉究五十无子，服此一年，连举二子。

08097 青梅散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 青梅 31 克 明矾 6 克 冰片 1 克

【用法】 将青梅与明矾一齐放入铁锅内，微火炒，待明矾化为液体，并渐渐被青梅吸收，将青梅炒焦存性，去核，研极细末，过筛，加入冰片，瓷瓶收贮。外涂。

【主治】 鹅口疮。

08098 青黄汤

【方源】《普济方》卷七十三引《海上方》。

【组成】 冬青叶　黄连各少许

【用法】 上煎浓汤。又入朴消少许，洗眼。甚妙。

【主治】 眼赤痛。

08099　青黄散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】 黄柏（蜜炙赤）五钱　青黛一分

【用法】 上为末。频擦患处。

【主治】 口疮。

08100　青黄散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 青黛　蒲黄各一钱

【用法】 新汲水服之。

【主治】 衄血。

08101　青黄散

【方源】《梅氏验方新编》卷一。

【组成】 青鱼胆一钱　黄瓜霜一钱　梅花冰片一分

【用法】 上为极细末。用瓷瓶收贮，勿令泄气。吹时俟喉中流吐痰涎即愈。

【主治】 喉风，喉闭，一切喉疮、喉毒。

【备考】 制青鱼胆法：冬月取大青鱼胆，每个入糯米数粒在内，勿将胆中苦水倾出，挂在背阴处风干，听用。制黄瓜霜法：拣老黄瓜，用竹刀将瓜蒂切下，挖去瓜子、瓜瓤，用皮消贮满瓜内，仍将瓜蒂盖上拴好，挂在有风无日处，待霜结瓜外，扫下听用。倘瓜烂无霜，将消倒出，仍可换瓜重制，每制必须多备几条，恐防瓜烂。

08102　青铜散

【方源】 方出《直指》卷二十一，名见《普济方》卷二九九。

【组成】 黄柏四钱　青黛二钱　铜绿一钱

【用法】 上为末。敷之。

【主治】 口疮。

08103　青葙丸

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】 菟丝子一两　茺蔚子一两　生地黄二两　青葙子二两　防风一两　五味子三钱　黑参一两　柴胡一两　泽泻一两　细辛三钱　车前子一两　茯苓一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心茶清送下。

【主治】 肝虚积热，时发时歇，初则红肿疼痛，涩泪难开，久则渐重，遂生翳膜，视物昏暗。

08104　青蛤散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 蛤粉（煅）一两　石膏（煅）一两　轻粉五钱　黄柏（生）五钱　青黛三钱

【用法】 上为末。先用香油调成块，次加凉水调稀，将疮洗净，薄涂患处。

【主治】 ①《外科大成》：黄水湿热等疮。②《金鉴》：小儿鼻蜜疮。

08105　青蒿丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】 青蒿一两半　天门冬一两（去心，焙）　柴胡一两（去心）　地骨皮一两　旋覆花一两　紫菀一两（洗去苗土）　贝母一两　人参一两（去芦头）　杏仁一两半（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　秦艽一两（去芦头）　龙胆半两　天灵盖一两半（涂酥炙令赤）　鳖甲一两半（涂酥炙令黄，去裙襕）　葳蕤一两　黄耆一两（锉）　川大黄一两（锉碎，微炒）　枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）　甘草三分（炙微赤，锉）　朱砂一两（细研，水飞过）　麝香半两（细研）

【用法】 上为细末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，麦门冬汤送下，不拘时候。

【主治】 妇人热劳，咳嗽，肌体消瘦，心膈烦热，夜多盗汗，四肢酸痛，食少无力。

08106　青蒿丸

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】 青蒿四两（童便浸七日，晒干）　龙胆　秦艽（去苗土）　黄芩（去黑心）　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒黄）　木香　麻子仁（研）　车前子　菟丝子（酒浸，别捣末）各五两　独活（去芦头）　柏子仁（研）　山茱萸各三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温汤送下。

【主治】 骨蒸劳，体瘦，咳嗽气急，日渐枯瘁。

08107　青蒿丸

【方源】《幼幼新书》卷二十六引《赵氏家传》。

【组成】 白槟榔一个　白芜荑四十九个　黄连（去须）十四茎　夜明砂一分（以上为末）　太阴玄精石　麝香　小葱子（炒）　朱砂各半钱　芦荟　天竺黄　青黛各一钱

【用法】 上为极细末，取青蒿自然汁半升，慢火熬汁，仍用赭猪胆一个取汁为丸，如粟米大。每服五丸至七丸，米饮送下；醋酒汤亦得。取疳虫，煎酸石榴汤送下，二十服取尽虫。

【功用】 取疳虫，退诸脏积热。

【主治】 小儿久积疳气，日渐羸瘦，面黄，头发作穗；好食土，咬指甲，捻鼻；骨蒸劳热。

08108 青蒿丸

【方源】 方出《本草纲目》卷四十一引《保婴集》，名见《怡堂散记》。

【组成】 青蒿虫（捣）十条 朱砂 汞粉各五分。

【用法】 上为丸，如粟粒大。一岁服一丸，乳汁送下。

【主治】 ①《本草纲目》：急慢惊风。②《怡堂散记》：心胞肝胆痰热生惊。

【宜忌】 《怡堂散记》：邪未入脏，不可轻投。

【方论选录】 《怡堂散记》：青蒿节内虫能入脏而清热；朱砂、铅粉入心胞，坠痰。病入心胞肝胆者，用之效。

【备考】 方中青蒿虫用量原缺，据《怡堂散记》补。

08109 青蒿饮

【方源】 《圣济总录》卷八十七。

【组成】 青蒿 甘草（炙） 柴胡（去苗） 知母（焙） 龙骨 麦门冬（去心）各一两 桃枝 柳枝各一握

【用法】 上锉如麻豆大，每服四钱匕，以童便一盏半浸经宿，入葱白、薤白各三寸（切），同煎至八分，去滓，食后温服。

【功用】 退热。

【主治】 暴急热劳，四肢烦疼，手脚心热，咽干虚渴，饮食减少。

08110 青蒿散

【方源】 《圣惠》卷七十。

【组成】 青蒿二两 龙胆三分半（去芦头） 栀子仁三分 知母三分 黄连一两（去须） 鳖甲二两（涂醋炙令黄，去裙襕） 黄耆一两（锉） 桑根白皮一两（锉） 地骨皮半两 白术一两 甘草半两（炙微赤，锉） 柴胡一两半（去苗）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇人骨蒸劳热，四肢烦疼，日渐羸瘦。

【方论选录】 《济阴纲目》：栀、连、龙胆所以清水火之热，桑、地、知母所以泻肺金之热，柴胡、鳖甲、青蒿解骨蒸劳热，然肺泻则气伤于上，火去则土无以生，故用黄耆、白术、甘草者，所以发巨橘之粟，以保赤子于干戈之地也。

08111 青蒿散

【方源】 《得效》卷九。

【组成】 青蒿（春、夏用叶，秋、冬用子，用子不用叶，用根不用茎，四者相用而反以为痼疾，必用童便浸过，使有功无毒） 一握 大鳖甲（炙黄，醋淬五七次，去裙） 白术（湿纸裹，煨熟） 地骨皮 白茯苓 粉草（炙） 拣参（去头） 栝楼根 北柴胡（去芦） 桑白皮（蜜炙）各半两

【用法】 上为散。每服三钱，水一盏半煎，温服，不拘时候。

【主治】 男子妇人骨蒸劳，憎寒壮热。

08112 青蒿煎

【方源】 《全生指迷方》卷四。

【组成】 青蒿汁一升 人参 麦门冬（去心）各一两

【用法】 上为末，用青蒿汁同熬成膏，丸如梧桐子大。每服二十丸，食后送下。

【主治】 颧骨赤大如钱，日晡发热，潮热有时，五心烦热，脉促涩者。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“青蒿丸”。

08113 青蒲散

【方源】 《卫生鸿宝》卷二。

【组成】 硼砂 蒲黄 黄柏 人中白（煅白如盐） 青黛（水飞净） 儿茶各一钱 薄荷（龙脑者） 玄明粉 僵蚕 马勃各一分 麝香 冰片各二分

【用法】 上为极细末。芦管吹数次愈。

【主治】 ①《卫生鸿宝》：走马牙疳，烂嘴，咽喉疼痛，舌胀龈臭，牙床溃烂。②《顾氏医径》：咽疮热毒。

08114 青橘丸

【方源】 《圣济总录》卷十七。

【组成】 青橘皮（去白，焙） 槟榔（锉） 郁李仁（麸炒，去皮）各一两 木香 羌活（去芦头） 半夏（汤洗七遍）各半两 牵牛子半斤（捣取粉四两） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，临卧生姜汤送下。

【主治】 风气壅滞，大便秘涩。

08115 青橘饮

【方源】 《玉案》卷六。

【组成】 青皮五钱（醋炒） 橘叶三十片

【用法】 水煎。食远服。

【主治】 妇人百不如意，久积忧忿，乳内有核，不痒不痛，将成乳癌。

08116 青黛丸

【方源】 《圣惠》卷八十七。

【组成】 青黛一分（细研） 胡黄连一分 鹤虱一分 芦荟一分（细研） 朱砂一分（细研）

【用法】 上为末，都研令匀，以猪胆汁为丸，如绿豆大。每服三丸，空心以热水送下。当有虫出。

【主治】 小儿蛔疳，一切诸疾。

08117 青黛汤

【方源】《治疫全书》卷五。

【异名】 青黛饮（《松峰说疫》卷二）。

【组成】 青黛五分 生甘草二钱 金银（净）五分 瓜蒌半个

【用法】 酒一钟，和水煎服，自愈。

【主治】 ①《治疫全书》：流注，瘟疫余邪未尽，头项身体生发疙瘩。②《松峰说疫》：两腿肿，发颐。

08118 青黛散

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】 青黛（淘净）五钱 硼砂五分 冰片少许

【用法】 上为末。干掺。

【主治】 口舌生疮。

08119 青黛散

【方源】《疡医大全》卷三十。

【组成】 青黛 黄柏 枯矾 雄黄 百药煎 硫黄各等分

【用法】 上为细末。湿则干掺，干用香油调搽。以愈为度。

【主治】 奶癣疮。

08120 青黛散

【方源】《类证治裁》卷六。

【组成】 黄连 黄柏 牙消 青黛 朱砂 雄黄 牛黄 硼砂 冰片

【用法】 上为末。掺患处。

【主治】 重舌。

08121 青黛散

【方源】《理瀹》。

【组成】 黄连三钱 黄柏（蜜炙） 蒲黄各二钱 青黛 芒消 元明粉 寒水石 儿茶 雄黄 硼砂 五倍子各一钱 漂朱砂 枯矾 铜绿 绿矾（煅） 薄荷 生甘草各五分 牛黄 冰片各三分 麝香一分

【用法】 上为末。临用以薄荷汤同姜汁、白蜜调敷颈上。

【主治】 口舌、牙齿、咽喉诸症。

【加减】 加人中白（人乳煅过）五钱，名“人中白散”。

08122 青黛散

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 青黛粉五钱 黄柏面五钱 滑石粉二两

【用法】 直接撒扑外用。

【功用】 收干止痒，清热定痛。

【主治】 脓疱疮，急性湿疹，接触性皮炎，或脂溢性皮炎，痱子。

08123 青露散

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】 白及 白蔹 白薇 白芷 白鲜皮 朴消 青黛 黄柏 大黄 天花粉 青露叶（即芙蓉叶） 老龙皮（即老松树皮）各等分

【用法】 上为细末。用生姜自然汁调，围敷。如干时，再用姜汁调润。

【主治】 发背疽，一切恶疮。

08124 青露散

【方源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】 生军一斤 芙蓉叶八两 川柏一斤 白薇八两 花粉一斤 青黛四两 陈皮四两 白及四两 生石膏一斤

【用法】 晒脆，为末。野菊花叶汁、丝瓜叶汁、蜜、菜油皆可调敷。

【主治】 一切红肿之症。

08125 青囊丸

【方源】《韩氏医通》卷下引邵应节方。

【组成】 香附子（为主，略炒）不拘多少 乌药（略炮，减附三分之一）。

【用法】 上为细末，水醋煮为丸，如梧桐子大。随证用引，如头痛，茶送下；痰，姜汤之类，多用酒下为妙。

【主治】 ①《韩氏医通》：妇人头痛。②《中国医学人辞典》：胃脘痛及气郁诸病。

08126 青麟丸

【方源】《续名医类案》。

【异名】 秘制清宁丸（《全国中药成药处方集》吉林方）。

【组成】 锦纹大黄十斤（先以淘米泔浸半日，切片晒干，再入无灰酒浸三日，取出，晒大半干，第一次用侧柏叶垫甑底，将大黄铺上，蒸一炷香久，取起晒干，以后每次俱用侧柏叶垫底，起甑走气不用；第二次用绿豆熬浓汁，将大黄拌透，蒸一炷香，取出晒干；第三次用大麦熬浓汁拌透，照前蒸晒；第四次用黑料豆熬浓汁拌透；第五次用槐条叶熬浓汁拌透；第六次用桑叶；第七次用桃叶；第八次用车前草；第九次用厚朴；第十次用陈皮；十一

次用半夏；十二次用白术，十三次用香附；十四次用黄芩；以上俱如前煎汤浸透蒸晒，第十五次用无灰酒拌透，蒸二炷香，取出晒透）。

【用法】 上为极细末，每大黄一斤，入黄牛乳二两，藕汁二两，梨汁二两，童便二两，如无童便，以炼蜜二两代之，外加炼蜜六两，为丸，如梧桐子大。每服二钱。

【功用】《全国中药成药处方集》（吉林方）：利便利尿，消火解毒。

【主治】 ①《续名医类案》：一切热症。②《全国中药成药处方集》（吉林方）：肝火便秘，小便不利，肠风便血等症。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（吉林方）：忌食辛辣。

08127 青麟丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【异名】 二十四制青麟丸(《丸散膏丹集成》)。

【组成】 锦纹大黄二十斤

【用法】 先用嫩藕汁蒸透，晒干，后用牡丹皮、地骨皮、甘蔗汁、泽泻、薄荷、韭菜、赤茯苓、石斛、黄柏、侧柏、玄参、连翘、木通、当归、知母、车前、猪苓、广皮、生地、贝母、甘草、薏苡仁、青盐，逐味照前法煎汤制，九蒸九晒，晒干，研为细末，再用陈酒泛丸。每服二三钱，熟汤送下。如火毒甚者，俱从小便出，或色深黄，不必疑忌。舌麻（一作糜）口碎，目赤鼻疮，唇肿喉闭，齿痛耳聋头痛，时疫暑热，火郁呛咳，甘桔汤送下，灯芯汤亦可；吐血、齿血、溺血、便血、遗精、淋浊，灯芯汤送下；肺痈、肠痈、痰火昏狂，如醉如痴者，灯芯汤送下；胸闷脘胀，气阻噎膈，肝胃气痛，大小便闭者，香附汤送下；湿热黄疸；瘴气疟疾，水肿臌胀，食积腹痛，大腹皮汤送下；痢疾初起，里急后重不爽，赤痢，焦槐米汤送下；白痢，淡姜汤送下；从高坠下，损伤蓄血于内，不思饮食者，童便送下，苏木汤亦可；妇女经痛，经事不调，产后恶露不尽，瘀血作痛，痰扰头晕，气闷呕恶，发热腹痛便秘者，益母汤送下；妇女赤白带下，骨蒸发热，地骨皮汤送下；小儿惊风，疳臌食积，形瘦内热，薄荷、麦芽（炒）煎汤送下。

【功用】 去五脏湿热秽毒。

【主治】 舌麻（一作糜）口碎，目赤鼻疮，唇肿喉闭，齿痛耳聋头痛，时疫暑热，火郁呛咳；吐血、齿血、溺血、便血、遗精、淋浊；肺痈、肠痈、痰火昏狂，如醉如痴者；胸闷脘胀，气阻噎膈，肝胃气痛，大小便闭者；湿热黄疸，瘴气疟疾，水肿臌胀，食积腹痛，痢疾初起，里急后重不爽；从高坠下，损伤蓄血于内，不思饮食者，妇女经痛，经事不调，产后恶露不尽，瘀血作痛，痰扰头晕，气闷呕恶，发热腹痛便秘者；妇女赤白带下，骨蒸发热；小儿惊风，疳臌食积，形瘦内热。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（上海方）：忌刺激性食物。

【备考】 方中贝母，《全国中药成药处方集》（上海方）作“川萆薢”。

08128 青木香丸

【方源】《局方》卷三。

【组成】 补骨脂（炒香） 荜澄茄 槟榔（酸粟米饭裹，湿纸包，火中煨令纸焦，去饭）各四十两 黑牵牛（二百四十两，炒香，别捣末）一百二十两 木香二十两

【用法】 上为细末，入牵牛末令匀，渐入清水和令得所，丸如绿豆大。每服二十丸，食后茶、汤、熟水任下。酒食后可每服五丸至七丸，小儿一岁服一丸。

【功用】 宽中利膈，行滞气，消饮食。

【主治】 胸腹痞满胀痛，呕逆不食，膀胱疝气，湿着腰痛。

①《局方》：胸膈噎塞，腹胁胀痛，心下坚痞，肠中水声，呕哕痰逆，不思饮食。②《直指》：膀胱疝气。③《杏苑》：浴出身上未干，忽尔熟睡，致肾经肿痛，腰背挛曲。

【宜忌】 怀妊妇人不得服之。

【备考】 ①方中黑牵牛，《医统》作黑豆。②本方《直指》治膀胱疝气用法：每服五十丸，以醇酒入葱白，煎五苓散送下。

08129 青木香丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十七。

【组成】 吴茱萸一两（分作二份，酒、醋浸一宿，焙干） 香附子一两 荜澄茄 青木香各半两

【用法】 上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤或乳香、葱白汤送下。

【主治】 肾冷，疝气胀痛。

08130 青木香丸

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】 青木香五钱 吴茱萸（酒、醋浸，炒）一两 香附（醋炒）一两 荜澄茄五钱 乌药五钱 小茴香五钱 川楝肉五钱（巴豆仁二十一粒，研碎，拌炒）

【用法】 上为末，合均，葱涎为小丸。每服三钱，酒、盐任下。

泄，甚非立方之旨，惟中风虚寒之慢脾风，其痰上塞，自可用之，然更取薄荷泄散，以为导引，亦是未妥。凡用古方，皆宜细心探讨，自有权衡，不可人云亦云，囫囵吞枣。

08145 青羊补肝汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 大熟地一两 菟丝子三钱 沙苑子三钱 枸杞三钱 苍术三钱 云苓三钱 楮实子三钱 柴胡二钱 冬虫草一钱 羊肝一具

【用法】 水煎服。

【主治】 视神经萎缩。

08146 青金泻白散

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】 桑皮 地骨皮 甘草 黄芩 山栀

【主治】 燥火伤肺金之血所致的腋痛。

【加减】 肝火刑金，加白芍药；胃火旺，加干葛、石膏。

08147 青草苍柏汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 苍术 黄柏各三钱 青皮一钱半 甘草五分

【用法】 水煎，入生姜汁少许，调服。

【主治】 ①《医学入门》：环跳穴痛不已。②《杂病源流犀烛》：附骨疽。

【加减】 虚者，加牛膝一钱；夏，加黄芩八分；冬，加桂枝五分；痛甚无汗，加麻黄二分。

08148 青铅六味饮

【方源】《证治宝鉴》卷五。

【组成】 熟地 萸肉 茯苓 山药 丹皮 泽泻 青铅

【功用】《类证治裁》：壮水镇阳。

【主治】 由纵欲而竭其肾真，阳亢阴腾或阴伤阳越所致的吐血。

08149 青蒿鳖甲汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【异名】 青蒿鳖甲煎(《湿温时疫治疗法》)。

【组成】 青蒿二钱 鳖甲五钱 细生地四钱 知母二钱 丹皮三钱

【用法】 水五杯，煮取二杯，每日服二次。

【主治】 夜热早凉，热退无汗，热自阴来者。

【方论选录】 夜行阴分而热，日行阳分而凉，邪气深伏阴分可知，热退无汗，邪不出表，而仍归阴分，更可知矣，故曰热自阴分而来，非上、中焦之阳热也。邪气深伏阴分，混处气血之中，不能纯用养阴，又非壮火，更不得任用苦燥。故以鳖甲蠕动之物，入肝经至阴之分，既能养阴，又能入络搜邪；以青蒿芳香透络，从少阳领邪外出；细生地清阴络之热；丹皮泻血中之伏火；知母者，知病之母也，佐鳖甲、青蒿而成搜剔之功焉。再此方有先入后出之妙，青蒿不能直入阴分，有鳖甲领之入也，鳖甲不能独出阳分，有青蒿领之出也。

08150 青黛石膏汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 青黛一钱半 鲜生地二两 生石膏八钱 升麻六分 黄芩二钱 焦栀子三钱 葱头三枚

【用法】 水煎，去滓，温服。

【主治】 妊娠伤寒，热郁阳明，热极而发紫黑斑，脉洪数者。

【方论选录】《医略六书》：妊娠伤寒，热郁阳明，热极而斑发紫黑，若不即治，胎殒在即，而命亦倾危。生地滋九地之阴以护胎，黄芩清九天之热以安胎，青黛清解郁热，石膏直清阳明，栀子清利三焦，升麻升散火热，葱白以通阳气而泄亢热也。水煎，温服，使极热顿解，则营阴暗滋，而斑黑自化，何胎孕之有不完哉。

08151 青黛海石丸

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】 青黛 海石 瓜蒌仁 川贝母

【主治】 肺经咳嗽，肺有热痰。

08152 青黛雄黄散

【方源】《三因》卷十。

【组成】 上好青黛 雄黄各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，新汲水调下。

【功用】 令毒气不聚。

【主治】 始觉中毒，及蛇虫咬，痈疽才作。

08153 青娥丸加黄柏知母方

【方源】《医方考》卷五。

【组成】 破故纸（酒浸少时，略炒） 川萆薢（童便浸一宿） 杜仲（姜汁炒断丝） 黄柏（盐水炒） 知母（酒炒） 牛膝（去芦）各四两 胡桃肉（去皮，炮）八两

【用法】 炼蜜为丸服。

【主治】 肾虚腰痛

【方论选录】 肾，坎象也，水火并焉，水衰则阳光独治，而令肾热；火衰则阴翳袭之，而令肾寒；水火俱衰，则土气乘之，而邪实子肾，均令入腰痛也。是方也，破故纸、杜仲、胡桃肉味厚而温，黄柏、知母、牛膝味厚而寒，温者可使养阳，寒者可使养阴，均是味厚，则均是能走下部矣；若萆薢者，苦燥之品，足以利水土之邪而平其气也。曰青

08139 青曩药酒

【方源】《回春》卷五。

【组成】苍术（米泔浸，炒） 乌药 牛膝（去芦） 杜仲（姜汁炒）各二两 陈皮 厚朴（姜汁炒） 当归 枳壳（去瓤，麸炒） 独活 槟榔 木瓜各一两 川芎 白芍 桔梗（去芦） 白芷 茯苓（去皮） 半夏（姜汁炒） 麻黄 肉桂 防己 甘草各一两

【用法】上锉，以麻布袋盛之，用酒三斗，将药悬坛内，密封坛口，锅内煮一时久，然后取出，过三日后，去药，随量饮之，滓晒干为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心酒送下。

【主治】男妇风湿相搏，腰膝疼痛，或因坐卧湿地，雨露所袭，遍身骨节疼痛，寒湿气。

08140 青云独步丹

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】赤白何首乌共一斤（黑豆三升半，煮，拌，浸何首乌一昼夜，去汁后，将豆拌首乌木甑蒸，浸五次） 当归身（酒洗）三两 赤茯苓半斤（用牛乳浸过，煮干） 白茯苓半斤（用人乳浸过，煮干） 补骨脂（盐、酒炒）四两 甘杞子（酒浸，焙）三两 菟丝子半斤（酒浸，蒸，捣饼，焙干） 怀牛膝（甘草水泡）四两 怀生地黄（酒浸，入砂仁三钱，同蒸干，为末） 真没药一两五钱（去砂）

【用法】晒干，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心酒送下；午间，生姜汤送下；临卧，盐汤送下。

【功用】乌须黑发，延年益寿。

【宜忌】忌铁器。

08141 青风还睛散

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】茯苓 人参 防风 地骨皮 车前子 羌活 川芎 细辛各等分

【用法】上为粗末。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】目内障久，变青风不足。

08142 青风羚羊汤

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】羚羊角一钱 元参一钱 地骨皮一钱 车前子一钱五分 川芎一钱 羌活一钱 细辛五分

【用法】上为粗末。以水二盏，煎至一盏，食远温服。

【主治】目内障久，变青风有余。

08143 青皮甘草散

【方源】《金鉴》卷四十九。

【异名】青甘散（《仙拈集》卷三）。

【组成】青皮 甘草各一钱

【用法】上为末。浓煎生姜汤调服。

【主治】乳岩。

08144 青州白丸子

【方源】《局方》卷一。

【异名】白丸子（《直指》卷十八）、青州白露丸（《全国中药成药处方集》南昌方）。

【组成】半夏（生用，白好者，水浸洗过）七两 川乌头（去皮脐，生用）半两 南星（生）三两 白附子（生）二两

【用法】上为细末，以生绢袋盛，用井花水摆，未出者，更以手揉令出，如有滓，更研，再入绢袋摆尽为度，放瓷盆中，日中晒，夜露至晓，弃水，别用井花水搅，又晒，至来日早，再换新水搅，如此春五日、夏三日、秋七日、冬十日，去水，晒干，候如玉片，碎研，以糯米粉煎粥清为丸，如绿豆大。初服五丸，加至十五丸，生姜汤送下，不拘时候。如瘫痪风，以温酒送下二十丸，每日三次。至三日后浴，当有汗，便能舒展，服经三、五日，呵欠是应。常服十丸以来，永无风痰膈壅之患；小儿惊风，薄荷汤送下二三丸。

【主治】风痰所致的半身不遂，口眼㖞斜，肢体麻木，痰涎壅盛，遗精，眉棱骨痛。

①《局方》：男子、妇人半身不遂，手足顽麻，口眼㖞斜，痰涎壅塞，及一切风，他药所不能疗者，小儿惊风，大人头风，洗头风，妇人血风。②《证治宝鉴》：遗精。③《杂病源流犀烛》：因痰火而致眉心并眉梁骨痛者。

【方论选录】①《医方考》：痰之生也，由于湿，故用半夏、南星之燥；痰之滞也，本于寒，故用乌头、白附之温，浸以数日，杀其毒也。②《中风斠诠》：喻嘉言曰，此方治风痰之上药，然虽经制炼，温性犹存，热痰迷窍，非所宜施。寿颐按，此方本用青州范公泉之水澄粉，故方以地名，如阿胶之类。取水性之沉重者，以开痰降浊，乌、附、星、夏，皆用其生，而澄漫去毒，又是制炼之一法，然本性犹存，诚如嘉言之论，要知制方之意，必为阴霾猝乘，真阳欲亡者，立法犹之三生饮，而其毒稍减，其性较和。虽曰专治风痰，须知风非外风，而痰是寒痰，本非通治热痰之剂，用生姜汤下者，仍是为星、夏、乌、附解毒之计，初非欲以疏泄外感风寒；若曰瘫痪，酒下，则苟是肝阳，温以济温，殊非良法；而小儿惊风，尤多热痰上壅，已非所宜，乃用薄荷汤下，是又以为外感之风，而欲其疏

空心服。

【主治】 胃虚，呕哕不止。

08161 枇杷膏

【方源】《验方新编》卷三。

【组成】 枇杷叶五十六片（新鲜者更佳，洗净毛） 大梨二个（深脐者佳，去皮心，切片） 白蜜半钟（先熬，滴水成珠，大便干燥者多加；大便溏泻者不用，以白糖代之） 大枣半斤（或黑枣、徽枣皆可） 建莲肉四两（不去皮）

【用法】 先将枇杷叶放铜锅内（砂锅亦可），以河水煎出浓汁，用绸沥清汁，去叶与滓不用，后将梨、枣、莲、蜜和入煎熬，以莲肉融烂为止，用瓷瓶收贮，随意温热食之。轻者二三料全愈，重者四五料除根，不必另服别药，免致误用害事；即无病常服，可保身强神旺。

【主治】 劳伤虚损，吐血咳嗽，发烧，身体瘦弱，四肢酸软，精神疲倦，腰背疼痛，饮食不进，以及一切不足弱症。

【加减】 如虚弱并不咳嗽者，枇杷叶不用，只用河水同煮；咳嗽多痰者，加川贝母一两（研极细末），俟煮熟时，入内煮一二滚，取起；若吐血，用藕节二十一个捣汁同煮，冬用多制，久收不坏，夏月随食随制。

08162 枇杷叶丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 枇杷叶（去毛刺）八两 黄芩（酒炒）四两 甘草一两 天花粉四两

【用法】 上为末，新安酒跌丸，如梧桐子大。每服一钱五分，食后并临睡白滚汤、茶汤俱可送下。

【主治】 肺风粉刺、鼻渣，初起红色，久则肉匏发肿者。

【宜忌】 忌火酒、煎炒。

08163 枇杷叶汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】 枇杷叶（拭去毛，微炒） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙透） 前胡（去芦头） 白术 人参 茯神（去木） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 半夏（汤洗七遍去滑，炒）各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜五片，煎至六分，去滓，食后温服。

【功用】 止逆进食。

【主治】 脾胃气虚弱，呕吐不食。

08164 枇杷叶汤

【方源】《卫生总微》卷十。

【异名】 枇杷叶散（《普济方》卷三九四）。

【组成】 枇杷叶一两（拭去毛尽，炙微黄） 丁香半两 人参（去芦）半两 甘草（炙） 白茯苓各半两

【用法】 上为细末。每服半钱，煎紫苏汤调下，不拘时候。

【主治】 小儿一切吐逆、烦渴。

08165 枇杷叶汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】 苏子 贝母 桑叶 花粉 沙参 百合 薄荷 射干 前胡 枇杷叶

【功用】 降气消痰。

【主治】 小儿龟胸肺实，胀满有痰。

08166 枇杷叶散

【方源】《圣惠》卷二十。

【异名】 枇杷叶汤（《圣济总录》卷十七）。

【组成】 枇杷叶一两（拭去毛，炙微黄） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 人参三分（去芦头） 桂心三分 半夏半两（汤洗七遍去滑） 诃梨勒皮半两 甘草半两（炙微赤，锉） 赤茯苓二两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：风痰气逆，不能食。②《圣济总录》：风痰气逆，呕吐不止，心腹刺痛，不思饮食。

08167 枇杷叶散

【方源】 方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷三十六。

【组成】 枇杷叶一两（拭去毛，炙微黄） 前胡一两（去芦头） 桂心半两 槟榔一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 人参二分（去芦头）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 反胃呕哕不止，胸膈闷。

08168 枇杷叶散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】 枇杷叶一两（拭去毛，炙微黄） 人参一两（去芦头） 半夏一两（汤洗七遍去滑） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 白术一两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 痰饮，发即烦闷不安，兼吐痰水。

08169 枇杷叶散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】 枇杷叶一分（拭去毛，微炙黄） 母丁香一分

娥者，涵阳之坎也，假之以名方，明其全夫水火之真尔。

08154 表解散

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】 桔梗 干葛 石膏 麻黄（去节） 升麻 赤芍药 甘草各等分

【用法】 上为散。每用一钱，葱白、薄荷同煎服。

【主治】 伤寒初作，壮热。

08155 表实六合汤

【方源】《元戎》。

【组成】 四物汤四两 麻黄 细辛各五钱

【主治】 妊娠伤寒，头痛，身热无汗，脉浮紧，太阳经病。

【方论选录】《医方集解》：此足太阳药也。凡妇人伤寒，六经治例皆同，有怀妊者，则以安胎为主，药中有犯胎者，则不可用也。海藏皆以四物为君，养血安胎，余同伤寒例分证而治，麻黄、细辛发汗解表，故加用之，治表实无汗者。

08156 坤宁散

【方源】《医方易简》卷三。

【组成】 乌药 厚朴 麦芽面 山楂肉 广木香 莲莪术 京三棱

【用法】 上为极细末，重罗再筛。每岁服一钱，姜汤调下。

【主治】 小儿恣食肥腻，过啖生冷，腹坚胀痛。

08157 坤顺丹

【方源】《痘疹一贯》卷六。

【异名】 八宝坤顺丹（《北京市中药成方选集》）。

【组成】 益母草三两（连花、子，忌铁） 全当归五钱（酒炒，忌铁） 南白芍五钱（酒炒） 条芩五钱（酒炒） 白术五钱（土炒） 白茯苓五钱（生用） 大生地五钱（姜炒） 大熟地五钱（姜炒） 香附五钱（童便、盐水浸，晒，微炒） 广木香一钱五分（生） 川芎五钱 砂仁二钱五分（炒） 广橘红五钱（盐水拌） 甘草二钱五分（生） 乌药五钱（生） 人参三钱（加倍更妙） 真阿胶二钱五分（蛤粉炒成珠） 全紫苏二钱五分（去根，生用） 川牛膝二钱 琥珀二钱五分（加倍炒，柏子仁煮干，去柏子） 沉香五钱

【用法】 上药各为细末，兑匀分两，和一处，炼白蜜为丸，重二钱，真飞金为衣。大病服半料全愈，小恙三五丸愈；常堕胎者，更宜修合此丸，保全无恙。服者照后引：喘嗽，杏仁、桑皮汤送下；咳嗽，款冬花、川贝母煎汤送下；呕吐，生姜汤送下；气急，苏子汤送下；泄泻，米汤送下；遍身虚肿，赤小豆汤送下；黄肿，灯心、木通汤送下；心虚，麦冬、当归汤送下；遍身酸疼，米汤送下；乳疼，蒲公英、金银花汤送下；经水不调，当归、地黄汤送下；便后带红，川连、生地汤送下；气抢，木香汤送下；赤白痢，诃子、肉豆蔻、莲肉汤送下；大便秘结，陈皮汤送下；小便不利，木通、灯心汤送下；赤白带，阿胶、艾叶汤送下；经闭结，桃仁、红花、连翘汤送下；行经身腰疼痛，防风、羌活汤送下；胎动不安、下血，阿胶汤送下；求嗣，归身、白术、白芍汤送下；横逆难产，冬葵子汤送下；胎前脐腹刺痛，胎动不安、下血，糯米汤送下；临产五六日前，每日服一丸，或滚白水、或糯米酒送下，胎后诸病不生；产后不进饮食，南山楂、麦芽汤送下；产后大便秘结，郁李仁汤送下；产后败血上冲心腹，发寒热，或自汗，薄荷、苏叶汤和童便、糯米酒送下；产后中风，牙关紧闭，半身不遂，失音不语，童便、糯米酒送下；产后血崩轻者，用糯米汤送下，如涌不止，荆芥、蒲黄汤送下；产后除引子外，一切恶症，童便、糯米酒送下，京师老酒亦可；胎前及养身常服，滚白水送下。凡引子内药味，有一味用六分，二味各三分，三味各二分，水一钟，煎六分，化丸药服。

【主治】 妇人胎前、产后，诸虚百损、时疾。

【宜忌】 忌大荤、生冷、油腻等物。

08158 坤顺汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 党参四钱 茯苓二钱 白术一钱 甘草四分 山药三钱 花粉三钱 石斛三钱 料豆三钱 川断二钱 牛膝二钱 红枣五枚 莲子十粒（去心）

【主治】 肉痿，胃干而渴，肌肉不仁。

08159 林钟丸

【方源】《家塾方》。

【异名】 甘连大黄丸。

【组成】 大黄六两 甘草 黄连各二两

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白汤送下。

【主治】 心烦，不大便者。

08160 枇杷散

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】 枇杷叶（去毛） 橘红各一两 半夏（汤泡） 赤茯苓（去皮） 人参各五钱 麦门冬（去心） 青竹茹各一两二钱 甘草四钱

【用法】 上锉。加生姜三片，水二盏，煎一盏，

【组成】 枇杷叶 桑白皮（鲜者更佳）各二钱 黄连 黄柏各一钱 人参 甘草各三分

【用法】 用水一钟半，煎七分，食远服。

【主治】 肺风酒刺。

08178 杵糠丸

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】 碓杵头细糠二合

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。空腹含化一丸，微微咽津。

【主治】 咽喉中如有炙脔，食即噎塞。

08179 板蓝根汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 板蓝根 12 克 银花 12 克 连翘 12 克 蒲公英 15 克 车前子 12 克 泽泻 6 克 黄芩 3 克 夏枯草 9 克 薄荷 4 克 茯苓 9 克 冬瓜皮 12 克

【用法】 水煎服。

【主治】 藜日光皮炎。

08180 板蓝根复方

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 板蓝根 15 克 蒲公英 15 克 连翘 15 克 黄芩 9 克 朱茯神 9 克 柏子仁 9 克 茯苓 9 克 甘草 9 克

【用法】 水煎服。

【主治】 带状疱疹。

【加减】 发热，加银花、黄连；表热，加牛蒡子、桑叶；头痛，加菊花、白芷；热盛，加大青叶、马勃；渗出湿盛，加茯苓、苡仁、白术、木通、竹叶、通草；便秘，加大黄、厚朴；身虚，用瓜蒌仁；痛，加乳香、没药、茯神；睡眠不好，加枣仁、柏仁。

08181 松膏

【方源】 方出《千金》卷八，名见《千金方衍义》卷八。

【组成】 松脂三十斤

【用法】 炼五十遍，酒煮十遍，不能五十遍，二十遍亦可；炼酥三升，温和松脂三升，熟搅令极调匀。每服方寸匕，平旦空腹以酒送下，一日三次。数数食面粥为佳。百日以后愈。

【功用】《千金方衍义》：治风逐湿，坚骨强筋。

【主治】 历节诸风，百节酸痛不可忍。

【宜忌】 慎血腥生冷物、酢果子。

【方论选录】《千金方衍义》：松质坚劲，岁寒不凋，故能治风逐湿、坚骨强筋；但松脂性燥，必极力炼煮，方可服食。

08182 松节酒

【方源】《肘后方》卷三。

【组成】 松节二十斤

【用法】 酒五斗，渍二七日。每服一合，一日五六次。

【主治】 历节风，四肢疼痛如解落。

08183 松节酒

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】 松节十斤（捶碎，以水一硕，煮取汁五斗，去滓） 糯米五斗（炊熟） 细曲五斤（捣碎）

【用法】 上药拌和，入瓮密封，三七日开，取酒。每次温饮一盏，一日三次。

【主治】 百节风虚，脚痹疼痛。

08184 松花散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】 松花一两半 甘草半两（炙微赤，锉） 紫菀半两（去苗） 百合半两 薯蓣一两 人参半两（去芦头） 鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥） 生干地黄一两 白茯苓半两 茜草根半两（锉） 刺蓟半两 艾叶一分

【用法】 上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】 吐血久不止。

08185 松枝酒

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 松节 桑枝 桑寄生 钩藤 续断 天麻 金毛狗脊 虎骨 秦艽 青木香 海风藤 菊花 五加皮各一两 当归三两

【用法】 每药一两，用生酒二斤煮，退火七日。饮。

【主治】 白虎历节风，走注疼痛，或如虫行，诸般风气。

【加减】 痛专在下，加牛膝。

【方论选录】《证因方论集要》：松节、桑枝，以治风湿；钩藤、菊花，以熄内风；当归、秦艽，所谓治风先治血，血行风自灭；虎骨追风；天麻定风；狗脊益血强机关；续断补肝理筋骨；五加皮祛风而胜湿；海风藤、桑寄生和血脉而除痹痛；用木香所以调气也。

08186 松实丸

【方源】 方出《圣惠》卷九十四，名见《圣济总录》卷一九八。

【异名】 松柏实丸（《医学入门》卷七）。

【组成】 炼松脂十斤 松实三斤（取仁） 柏实三斤（取仁） 甘菊花三斤

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日

【用法】 上为细散。如吐者，乳头上涂一字，令儿咂便止。

【主治】 小儿吐乳不定。

08170 枇杷叶散

【方源】 《局方》卷二。

【组成】 枇杷叶（去毛，炙） 陈皮（汤浸，去瓤，焙） 丁香各半两 厚朴（去皮，涂姜汁炙）四两 白茅根 麦门冬（去心，焙） 干木瓜 甘草（炙）各一两 香薷三分

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜二片，煎至七分，去滓温服；温水调下亦得。如烦躁，用新汲水调下，不拘时候。小儿三岁以下，可服半钱。

【主治】 ①《局方》：冒暑伏热，引饮过多，脾胃伤冷，饮食不化，胸膈痞闷，呕哕恶心，头目昏眩，口干烦渴，肢体困倦，全不思食，或阴阳不和，致成霍乱，吐利转筋，烦躁引饮。②《校注妇人良方》：暑毒攻心，呕吐鲜血。

【备考】 本方方名，《兰台规范》引作“枇杷散”。

08171 枇杷叶散

【方源】 《本事》卷四引庞老方。

【组成】 枇杷叶（去毛） 人参（去芦）各一钱 茯苓（去皮）半两 茅根二分 半夏三分（汤浸七次）

【用法】 上锉细。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，慢火煎至七分，去滓，入槟榔末半钱，和匀服之。

【功用】 定呕吐，利膈。

【主治】 翻胃呕吐，霍乱。

【方论选录】 《本事方释义》：枇杷叶气味苦辛，入手太阴、足阳明，最能下气，冬夏不凋，得天地四时之气；人参气味甘温，入足阳明；茯苓气味甘平淡渗，入足阳明；茅根气味甘寒，入手太阴、足阳明，能除伏郁之热；半夏气味辛温，入足阳明；使以生姜、槟榔末，取其辛通而能下行也。此呕吐，中脘如痞，膈间之气不利，苦辛之药以下其气，急以甘温补中之品护持中土，则土旺而浊不侵犯矣。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“枇杷散”、《准绳·类方》引作“枇杷叶饮”。

08172 枇杷叶散

【方源】 《御药院方》卷四。

【异名】 枇杷叶煎（《医统》卷二十七）。

【组成】 枇杷叶（去毛） 陈皮（去白）各等分

【用法】 上为粗末。每服五钱，一日三次，水一盏半，加生姜半分（擘碎），同煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《御药院方》：脾胃气虚，呕逆吐食。②《医统》：五噎。

08173 枇杷叶散

【方源】 《增补内经拾遗》卷四引《集验方》。

【组成】 枇杷叶（去筋膜丝及毛衣） 一两 山栀子五钱

【用法】 上为极细末。每服二钱或三钱，食后好酒调下。

【主治】 肺风并糟鼻。

08174 枇杷叶粥

【方源】 《药粥疗法》引《老老恒言》。

【组成】 枇杷叶 10～15 克（鲜者 30～60 克） 粳米 30～60 克 冰糖少许

【用法】 先将枇杷叶用布包入煎，取浓汁后去滓，或将新鲜枇杷叶刷尽背面的绒毛，切细后，煎汁去滓，入粳米煮粥，粥成后入冰糖少许，煮成稀薄粥，不宜稠厚，每日分二次服，以 3～5 天为一疗程。

【功用】 清肺化痰，止咳降气。

【主治】 肺热咳嗽，咳吐黄色脓性痰，或咳血、衄血，以及胃热呕吐、呃逆。

【宜忌】 对感受寒凉引起的咳嗽、呕吐患者，不宜选用。

08175 枇杷叶膏

【方源】 《中国医学大辞典》。

【异名】 枇杷膏《全国中药成药处方集》（南京方）。

【组成】 鲜枇杷叶不拘多少（刷去毛）

【用法】 清水煎浓汁，去滓滤清，加冰糖收成膏。

【功用】 ①《中国医学大辞典》：止咳，润肺。②《全国中药成药处方集》（南京方）：清热。

【主治】 ①《中国医学大辞典》：肺热久嗽、顿嗽。②《全国中药成药处方集》（南京方）：干呕气逆，咽痛声哑，及痰中带血。

08176 枇杷地榆液

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 枇杷叶 31 克 地榆 31 克

【用法】 水煎，热渍患部，罨包外用。

【主治】 急性渗出性湿疹、皮炎。

08177 枇杷清肺饮

【方源】 《外科大成》卷三。

挑粟许点上，自然蚀落。

【功用】 取痣。

08197 取癖丸

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】 甘遂（微炒） 芫花（炒） 牵牛（半炒半生，碾，筛，取肉） 辣桂 蓬术 青皮（去白） 木香 桃仁（浸，去皮，炒） 五灵脂各二钱

【用法】 上为细末，入去油巴豆一钱，研和十分细，飞面糊为丸，如麻子大，风干。每服一二丸，姜、蜜煎汤灌下。泄后冷粥补，仍和胃。

【主治】 癖气。

08198 刺蓟汤

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】 刺蓟 黄芩（去黑心） 大黄（锉，炒） 赤芍药各三两 蒲黄二两 侧柏叶四两 生干地黄（焙） 甘草（炙，锉）各五两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服。遂急以新汲水调下。

【主治】 鼻衄不止。

08199 刺蓟散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】 刺蓟二两 竹茹二两 蒲黄一两 艾叶一两 乱发灰一两 白药一两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入地黄汁一合，搅令匀，不拘时候。

【主治】 鼻久衄不止。

08200 刺蓟散

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】 刺蓟（焙） 蒲黄各半两 乱发（烧灰）一分

【用法】 上为细散。每服半钱匕，以新汲水调下，不拘时候。

【主治】 小儿鼻衄不止。

08201 刺猬皮散

【方源】 方出《本草纲目》卷五十一引《寿域方》，名见《医林改错》卷下。

【组成】 猬皮（烧灰）

【用法】 每服二钱，酒下。

【主治】 ①《本草纲目》引《寿域方》：五色痢疾。②《医林改错》：有梦或无梦遗精，无问虚实。

08202 苦参丸

【方源】《外台》卷四引《删繁方》。

【组成】 苦参三两 龙胆草二两 栀子仁三七枚

【用法】 上为散，若病甚，取猪胆为丸，如梧桐子大。每服五丸，以饮汁送下，一日三四次。

【主治】 劳疸、谷疸。

08203 苦参丸

【方源】 方出《千金》卷十四，名见《普济方》卷一〇一。

【组成】 苦参五斤

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如酸枣大。每服十丸。

【主治】 狂邪发无常，披头大唤，欲杀人，不避水火。

【方论选录】《医方考》：上证皆神明内乱也，故古人病狂谓之失心。苦参主心腹结气，故足以治时热狂言。

08204 苦参丸

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】 苦参二两（锉） 川芒消二两 牛蒡子二两（微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以温酒送下。

【主治】 风热，皮肤生痞瘰。

08205 苦参丸

【方源】《圣惠》卷六十五。

【异名】 乌蛇苦参丸（《东医宝鉴·杂病篇》卷八引《医方集成》）。

【组成】 苦参一斤半（水浸一宿，细切，煨干） 菖蒲四两 乌蛇八两（酒浸，去皮骨，炙微黄）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以熟水送下，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：一切癣。②《东医宝鉴·杂病篇》引《医方集成》：癞风。

08206 苦参丸

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 苦参二两（锉，捣取粉） 丹参（去土，微炙） 沙参（去尘土） 人参一两 五加皮（锉） 防风（去叉，锉） 蒺藜子（炒角黄） 乌蛇（酒炙，用肉） 蔓荆实（去白皮） 败龟（涂酥，炙令黄） 虎骨（涂酥，炙令黄） 玄参（坚者）各一两

【用法】 上为末。别以不蛀皂荚一斤，以水三升，搓取汁，去滓，于无油铁器内煎成膏，炼蜜为丸，如梧桐子大。每食后良久及夜卧服十五丸至二十丸，共三服，各用荆芥、薄荷、酒送下。

【主治】 肉苛，荣虚卫实，肌肉不仁。

08207 苦参丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】 苦参二两 黄连（去须） 栝楼根 知母（焙） 麦门冬（去心，焙） 人参 牡蛎（煅）

服五十丸，空心以温酒送下。服一百日以上，不复饥；服之一年，百岁人如三十者。

【功用】 ①《圣惠》：还年复命，久服长寿。②《圣济总录》：延年益寿，光润颜色。

08187 松脂散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】 松脂五两（桑柴灰汁一斗，煮至三升已来，倾入冷水内放凝；别用浆水一斗，再煮至三升已来，又倾入冷水内放凝，又用清水一斗，煮至五升已来，又倾入冷水内放凝，取出，干即同入药用） 虎胫骨三两（涂酥，炙令黄） 天雄三两（炮裂，去皮脐） 牛膝三两（去苗） 酸枣仁二两（微炒） 薏苡仁三两 羌活三两 白附子二两（炮裂） 桂心一两 当归一两（锉，微炒） 没药二两 麝香一分（细研）

【用法】 上为细散，研令匀。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 历节风，筋骨肢节疼痛久不愈。

08188 松脂散

【方源】《医统》卷六十三。

【组成】 松脂半两 大黄 白蔹 赤小豆 胡粉 各一分

【用法】 上为极细末。以鸡子清调涂唇上。

【主治】 唇生肿核。

08189 松脂膏

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】 松脂三分 黄连三分（去须） 川大黄半两 水银一两半 黄芩一两 苦参一两（锉） 蛇床子一分 白矾半两（烧令汁尽） 胡粉半两（合水银，入少许水，同研令星尽）

【用法】 上为细末，用腊月炼了猪脂，调令稀稠得所。每日敷疮上。

【主治】 ①《圣惠》：头疮经年不愈。②《中医皮肤病学简编》：疖肿，酒渣鼻。

08190 松叶浸酒

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】 五粒松叶二十斤（锉碎，净洗漉干） 清酒一硕

【用法】 上药都入于不津瓮中，密封七七日熟。量力饮之。

【功用】 去大风。

【主治】 骨节疼痛。

08191 松香合剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 肉桂 50 克 松香粉 100 克 樟脑 25 克 95% 酒精 500 毫升

【用法】 先将肉桂浸于酒精内，历三至五日后，再加其余二味药。外用。

【主治】 冻疮。

【宜忌】 溃烂者不用。

08192 松黄通幽汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】 松子仁 柏子仁 瓜蒌仁 生地 归身 枳壳

【主治】 受孕后，脾阴不足以养胎，致脾阳亢盛，腑气化燥，大便秘塞，胎因不安，每至五月而半产者。

08193 耵耳通气散

【方源】《医学六要·治法汇》卷八。

【组成】 郁李仁 芍药 人参 大黄 山萸 官桂 槟榔三枚 牡丹皮 细辛 木香 炙甘草

【用法】 上为末。每服一钱，空心温酒下。

【主治】 耳聋。

【备考】 方中除槟榔外，余药用量原缺。

08194 取虫丸

【方源】《医学六要·治法汇》卷五。

【组成】 胡黄连 芜荑 雷丸 鹤虱 大黄 使君子 锡灰 三棱 莪术 木香 槟榔 青皮

【用法】 上为细末，丸如梧桐子大。每晨空腹服十丸，开水送下。

【主治】 虫积，脐腹痛，时作时止，面上白斑，唇红能食，或偏嗜一物，脉乍大乍小者。

08195 取渊汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 辛夷二钱 当归一两 柴胡一钱 炒栀子三钱 玄参一两 贝母一钱

【用法】 水煎服。一剂涕减，再剂涕又减，三剂病痊愈。

【主治】 鼻渊。

【方论选录】 辛夷最能入胆，引当归以补脑之气，引玄参以解脑之火；加柴胡、栀子以舒胆中之郁热，则胆不来助火，而自受补气之益也。然不去止鼻中之涕者，清脑中之火、益脑中之气，正所以止之也。盖鼻中原无涕，遏抑上游出涕之源，何必截下流之水乎！

08196 取痣饼

【方源】《医学纲目》卷二十。

【组成】 糯米百粒 石灰拇指大 巴豆三粒（去壳，研）

【用法】 上为末，入瓷瓶，同窨三日。每以竹签

挑粟许点上，自然蚀落。

【功用】 取痣。

08197 取癖丸

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】 甘遂（微炒） 芫花（炒） 牵牛（半炒半生，碾，筛，取肉） 辣桂 蓬术 青皮（去白） 木香 桃仁（浸，去皮，炒） 五灵脂各二钱

【用法】 上为细末，入去油巴豆一钱，研和十分细，飞面糊为丸，如麻子大，风干。每服一二丸，姜、蜜煎汤灌下。泄后冷粥补，仍和胃。

【主治】 癖气。

08198 刺蓟汤

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】 刺蓟 黄芩（去黑心） 大黄（锉，炒） 赤芍药各三两 蒲黄二两 侧柏叶四两 生干地黄（焙） 甘草（炙，锉）各五两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服。遂急以新汲水调下。

【主治】 鼻衄不止。

08199 刺蓟散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】 刺蓟二两 竹茹二两 蒲黄一两 艾叶一两 乱发灰一两 白药一两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入地黄汁一合，搅令匀，不拘时候。

【主治】 鼻久衄不止。

08200 刺蓟散

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】 刺蓟（焙） 蒲黄各半两 乱发（烧灰） 一分

【用法】 上为细散。每服半钱匕，以新汲水调下，不拘时候。

【主治】 小儿鼻衄不止。

08201 刺猬皮散

【方源】 方出《本草纲目》卷五十一引《寿域方》，名见《医林改错》卷下。

【组成】 猬皮（烧灰）

【用法】 每服二钱，酒下。

【主治】 ①《本草纲目》引《寿域方》：五色痢疾。②《医林改错》：有梦或无梦遗精，无问虚实。

08202 苦参丸

【方源】《外台》卷四引《删繁方》。

【组成】 苦参三两 龙胆草二两 栀子仁三七枚

【用法】 上为散，若病甚，取猪胆为丸，如梧桐子大。每服五丸，以饮汁送下，一日三四次。

【主治】 劳疸、谷疸。

08203 苦参丸

【方源】 方出《千金》卷十四，名见《普济方》卷一〇一。

【组成】 苦参五斤

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如酸枣大。每服十丸。

【主治】 狂邪发无常，披头大唤，欲杀人，不避水火。

【方论选录】《医方考》：上证皆神明内乱也，故古人病狂谓之失心。苦参主心腹结气，故足以治时热狂言。

08204 苦参丸

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】 苦参二两（锉） 川芒消二两 牛蒡子二两（微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以温酒送下。

【主治】 风热，皮肤生痞瘾。

08205 苦参丸

【方源】《圣惠》卷六十五。

【异名】 乌蛇苦参丸（《东医宝鉴·杂病篇》卷八引《医方集成》）。

【组成】 苦参一斤半（水浸一宿，细切，煨干） 菖蒲四两 乌蛇八两（酒浸，去皮骨，炙微黄）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以熟水送下，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：一切癣。②《东医宝鉴·杂病篇》引《医方集成》：癫风。

08206 苦参丸

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】 苦参二两（锉，捣取粉） 丹参（去土，微炙） 沙参（去尘土） 人参一两 五加皮（锉） 防风（去叉，锉） 蒺藜子（炒角黄） 乌蛇（酒炙，用肉） 蔓荆实（去白皮） 败龟（涂酥，炙令黄） 虎骨（涂酥，炙令黄） 玄参（坚者）各一两

【用法】 上为末。别以不蛀皂荚一斤，以水三升，搓取汁，去滓，于无油铁器内煎成膏，炼蜜为丸，如梧桐子大。每食后良久及夜卧服十五丸至二十丸，共三服，各用荆芥、薄荷、酒送下。

【主治】 肉苛，荣虚卫实，肌肉不仁。

08207 苦参丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】 苦参二两 黄连（去须） 栝楼根 知母（焙） 麦门冬（去心，焙） 人参 牡蛎（煅）

黄耆（锉） 生干地黄（焙）各一两

【用法】 上为末，以牛乳汁为丸，如梧桐子大。每服三十丸，浆水送下，不拘时候。

【主治】 久消渴，饮水不绝。

08208 苦参丸

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】 苦参一分 白矾（烧枯）半两 山栀仁一两 木通（锉） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各半两 甘菊花三分 大黄（生，锉）一两 防风（去叉）半两 射干 玄参 甘草（炙，锉） 恶实（炒） 白药各一分 马勃二分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如酸枣大。每服绵裹一丸，夜后含化，咽津。

【主治】 咽喉肿痛，语声不出，痰唾稠浊。

【加减】 如喉不闭者，去白矾。

08209 苦参丸

【方源】《局方》卷一（续添诸局经验秘方）。

【组成】 苦参三十二两 荆芥（去梗）十六两

【用法】 上为细末，水糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后好茶送下，或荆芥汤送下。

【主治】 心肺积热，肾脏风毒攻于皮肤，时生疥癞，瘙痒难忍，时出黄水；及大风手足烂坏，眉毛脱落；一切风疾。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“二味苦参丸”。

08210 苦参丸

【方源】《急救仙方》卷五。

【异名】 大苦参丸（《医学入门》卷八）。

【组成】 苦参四两 防风 荆芥 白芷 川乌（生，去皮） 赤芍 何首乌 川芎 独活 栀子 牙皂 蔓荆子 茯苓 山药 蒺藜 黄耆 羌活 白附子各一两 草乌三钱

【用法】 上为细末，水糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心以酒送下，一日二三次。

【功用】 补肾水。

【主治】 入面疮久不愈者。

08211 苦参丸

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】 苦参一斤 防风 荆芥 苍耳子 胡麻各八两 川乌 白芷各一两半 黑蛇一条

【用法】 上为末，酒糊为丸。茶、酒任下。

【主治】 疠风，皮肉溃肿；并赤白癜风。

08212 苦参丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 苦参一斤 大风子肉六两 荆芥十六两 防风 白芷各六两 全蝎 何首乌 白附子 枸杞子 威灵仙 当归 大胡麻 川芎 蒺藜 大皂角 川牛膝 牛蒡子 独活各五两 蔓荆子 风藤 羌活 连翘 苍术 天麻 杜仲 草乌（泡，去皮尖） 甘草各三两 人参一两 砂仁二两 白花蛇二两（切片，炙黄）

【用法】 上为细末，醋打老米糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，温酒食前、后任下。

【主治】 大麻风，毋分新久，穿破溃烂。

【宜忌】 避风、忌口。

08213 苦参水

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 苦参 93 克 野菊花 15 克 白鲜皮 9 克

【用法】 水煎沸，去滓，用药液趁热洗头。

【主治】 脂溢性皮炎。

08214 苦参汤

【方源】《金匮》卷上。

【组成】 苦参

【主治】 ①《金匮》：狐惑病，蚀于下部，咽干。②《金匮要略方义》：阴肿、阴痒、疥癞。

【方论选录】 ①《金匮要略论注》：下部毒盛，所伤在血而咽干，喉属阳，咽属阴也，药用苦参熏洗，以去风热而杀虫也。②《金匮要略释义》：用苦参汤熏洗前阴病处，除湿热以治其本，则咽干自愈。

【备考】《兰台规范》本方用苦参一升，水一斗，煎取七升，去滓，熏洗，一日三次。

08215 苦参汤

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】 苦参（锉） 黄连（去须）各一两 大黄（炒）一两 栀子（去皮）七枚

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入生地黄汁一合，煎至七分，去滓温服。

【主治】 大衄，口耳皆血出不止。

【宜忌】《普济方》：忌芜荑、猪肉、冷水。

08216 苦参汤

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】 大黄 苦参 赤芍药各一两 黄柏二两 蛇床子二两 菝葜四两

【用法】 上㕮咀。每用一两，水三升，煎十余沸，去滓，通手洗之。

【主治】 小儿遍体生疮。

08217 苦参汤

【方源】《济生》卷八。

【组成】 苦参 蛇床子 白矾 荆芥穗各等分

【用法】 上煎汤。放温洗。

【主治】 疥疮。

08218 苦参汤

【方源】《眼科龙木集》卷七。

【组成】 苦参 地骨皮各半两 丹参三钱 乳香三钱（另研）

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水一钟半，煎至一钟，去滓温服，不拘时候。

【主治】 眼常见黑花如绳牵者。

08219 苦参汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 苦参四两 大菖蒲二两

【用法】 河水五瓢，同煮数滚，添水二瓢，盖片时，临洗和入公猪胆汁四五枚，淋洗患上。不二三次全愈。

【主治】 痤痈疮作痒，抓之又疼，坐如糠穗，难以安睡。

【宜忌】 愈后避风，忌食发物。

08220 苦参汤

【方源】《疡科心得集·补遗》引《大全》。

【组成】 苦参二两 蛇床子 白芷 金银花 野菊花 黄柏 地肤子 大菖蒲

【用法】 用河水煎汤，临洗入猪胆汁四五枚，洗二三次全愈。

【主治】 一切疥癞风癣。

【宜忌】 宜避风，忌发物。

【备考】 方中除苦参外，余药用量原缺。

08221 苦参酒

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 苦参 310 克 百部 90 克 野菊花 90 克 凤眼草 90 克 樟脑 125 克

【用法】 将前四种药装入大口瓶内，加入 75% 酒精（或白酒）5 升，泡七天后去滓，加樟脑溶化后备用。用毛笔刷外涂，每日一二次。

【功用】 灭菌止痒。

【主治】 脂溢性皮炎，皮肤瘙痒症，单纯糠疹，玫瑰糠疹等。

08222 苦参散

【方源】 方出《外台》卷十五（注文）引《张文仲方》，名见《圣惠》卷二十四。

【组成】 苦参三斤 露蜂房（炙） 松脂 附子（炮） 防风各三两 栀子仁五两 乌蛇脯六两（炙） 木兰皮二两

【用法】 上为散。每服一钱匕，以酒送下。

【主治】 白癜风。

【宜忌】 ①《外台》引《张文仲方》：宜常吃萝卜菜，忌食鸡肉、猪肉、冷水、热面、生菜。②《圣惠》：勿食雀肉，忌鱼、大蒜、湿面。

【备考】 方中木兰皮用量原缺，据《圣惠》补。

08223 苦参散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】 苦参四两（锉） 丹参四两（锉） 蛇床子半斤

【用法】 上为细散。先以温水洗疮，拭干后敷之。

【主治】 一切疥及风瘙痒，搔之成疮。

08224 苦参散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】 苦参（取头末）二两 猪肚一个

【用法】 上以苦参末掺猪肚内，用线缝合，隔宿煮软，取出洗去原药，先不吃饭五顿，至第二日先饮新水一盏，后将猪肚食之，如吐了，再食之，食罢，待一二时，用肉汤调无忧散五七钱，取出小虫一二万为效。后用皂角一斤（不蛀者，去皮弦及子，捶碎），水四碗，煮至一碗，用生绢滤去滓，再入苦参末搅，熟稀面糊膏子，取出放冷，后入：何首乌二两，防风一两半，芍药五钱，人参三钱，当归一两（焙），为细末，与皂角膏子为丸，如梧桐子大，每服三五十丸，温酒或茶清送下，不拘时候，一日三次；后用苦参、荆芥、麻黄煎汤冷洗。

【主治】 疠风。

08225 苦参膏

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】 苦参 盐各一分

【用法】 上为末，先以酒一升，煎至四合，入药二味搅匀，慢火再煎成膏，每用先以生布揩患处令赤，涂之。

【主治】 白癜风。

08226 苦酒汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 鸡子汤（《外台》卷二十三引《古今录验》）、鸡子法（《圣济总录》卷一二三）、鸡壳苦酒汤（《医学入门》卷四）、半夏苦酒汤（《类聚方》）。

【组成】 半夏（洗，破如枣核）十四枚 鸡子一枚（去黄，纳上苦酒着鸡子壳中）

【用法】 上二味，纳半夏着苦酒中，以鸡子壳置刀环中，安火上，令三沸，去滓，少少含咽之，不愈，更作三剂。

【主治】 少阴病，咽中伤生疮，不能语言，声不

出者。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：辛以散之，半夏之辛，以发声音；甘以缓之，鸡子之甘，以缓咽痛；酸以收之，苦酒之酸，以敛咽疮。②《金镜内台方议》：少阴客热所暴，则伤于经络干涩，使咽中生疮，不能言，声不出。故用苦酒为君，酸以敛疮；半夏为臣，辛以散结；鸡子为使，以缓咽痛而润其燥也。③《古方选注》：治少阴水亏，不能上济君火，而咽生疮声不出者。疮者，痈也。半夏之辛滑，佐以鸡子清之甘润，有利窍通声之功，无燥津涸液之虑。然半夏之功能，全赖苦酒摄入阴分，劫涎敛疮，即阴火沸腾，亦可因苦酒而降矣，故以名其汤。

08227 苦楝丸

【方源】《普济方》卷一七一引《圣济总录》。

【组成】 苦楝 茴香各一两 黑附子（炮，去皮脐）

【用法】 用酒二升，煮酒尽为度，晒干或阴干，捣为细末。每一两药末，入全蝎十八个，玄胡五钱，丁香十五个，共为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心酒送下；如痛甚，煎当归入酒。大效。

【主治】 奔豚，及小腹痛不可忍者。

08228 苦楝丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 苦楝（碎，酒浸） 茴香（炒） 当归各等分

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心酒送下。

【主治】 妇人赤白带下。

【加减】 如腰腿疼痛，加四物四两，羌活、防风各一两。

【方论选录】《医略六书》：寒湿伤于带脉，而收引无权，不能约束一身，故带下淫溢不已。苦楝子泻湿热以清带脉；小茴香温经气以祛寒湿；当归养血活血以荣经脉也。酒以丸之，酒以下之，使寒湿顿化，则经脉清和，而带脉完固，带下无不止矣。

08229 苦楝汤

【方源】 方出《外台》卷二十六引《肘后方》，名见《景岳全书》卷五十五。

【组成】 有子楝木根（锉）

【用法】 以水煮取浓赤黑汁，用米煮作糜，宿勿食，且先吃肥香脯一片，令虫闻香举头，稍从一口为度，始少进，渐加服一匕，服至半升，便下蛔虫。

【主治】 蛔虫，或攻心痛如刺，口中吐清水。

08230 苦参子膏

【方源】《中医外科学》。

【组成】 苦参子仁 90 克（研细） 凡士林 210 克

【用法】 上调匀成膏。按病变大小，敷贴患处。

【功用】 轻度腐蚀。

【主治】 肉疣瘡。

08231 苦参洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 苦参 62 克 银花 31 克 黄柏 31 克 蛇床子 15 克

【用法】 水煎洗。

【主治】 瘙痒性及炎症性皮肤病。

08232 苦葶苈丸

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】 人参二两 苦葶苈四两（于锅内纸上炒黄色为度）

【用法】 上为细末，用枣肉为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心、食前煎桑白皮汤送下，一日三次。

【主治】 一切水湿气，通身肿满不可当者。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作"葶苈丸"。

08233 苦楝子膏

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】 川楝子 40% 猪油（板油）60%

【用法】 先将川楝子炕黄（不要炕得过老，以能研末为准），研成细末，与猪板油拌成糊状药膏。先将患者头部残发剪光，后以明矾水将患者头部血脓痂洗净，再将川楝子药膏敷在溃伤面上，用力摩敷，每天或间日换药一次，每次换药时需用明矾水洗头，彻底除去旧油垢。

【功用】《朱仁康临床经验集》：杀虫灭菌。

【主治】 头癣奇痒，结血或脓痂。

【宜忌】 涂药后不要用绷带或戴帽子，以免影响新肌肉组织的生长。

08234 苦楝根粥

【方源】《圣济总录》（人卫本）卷一九〇。

【组成】 苦楝根（洗去土，取皮，细锉）半升

【用法】 以水二升半，慢火煎至八合，绞去滓，以粟米三合净淘，量水多少，并楝根汁同煮为稠粥，隔宿不食，平旦顿食之，即蛔虫尽下。

【功用】《药粥疗法》：杀虫驱蛔。

【主治】 蛔虫心痛。

【宜忌】《药粥疗法》：根据群众经验，经常栓牛的苦楝树根皮不宜选用。

【备考】 本方方名，原书文瑞楼本作“揀根粥”。

08235 苦参子仁酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 苦参子仁31克

【用法】 以75%乙醇100毫升浸。外用。

【主治】 青年扁平疣。

08236 苦参地黄丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 苦参（切片，酒浸湿，蒸晒九次为度，炒黄，为末）一斤 地黄四两（酒浸一宿，蒸熟，捣烂）

【用法】 加蜂蜜为丸。每服二钱，白滚汤或酒送下，一日二次。

【主治】 痔漏出血，肠风下血，酒毒下血。

08237 苦参栀子丸

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】 苦参一两 山栀子仁半两 龙胆 黄芩（去黑心）各一两

【用法】 上为细末，以猪胆汁为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后米饮送下，一日三次。

【主治】 谷疸。

08238 苦酒鸡子汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】 猪胆半酒盏 米醋一盏 鸡子黄一个

【用法】 上同煎至八分，作四次服。汗出乃愈。

【主治】 热毒发斑，咽痛，声音不出，心烦不眠。

08239 苦参苡米洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 苦参15克 苡米12克 甘草12克

【用法】 水煎后冲洗。

【主治】 黄水疮。

08240 英藤汤

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】 蒲公英一两 忍冬藤二两 生甘草三钱

【用法】 水二钟，煎一钟，食前服。二剂全消。

【主治】 乳痈初起。

08241 英夷戒烟丸

【方源】《外科传薪集》。

【异名】 英人戒烟丸（《青囊秘传》）。

【组成】 高丽参 西洋参 东洋参 北沙参 党参 韭菜子 淮牛膝 粉草各五钱

【用法】 用陈酒四斤，浸服，瘾到时服三四杯，即不知所苦。

【功用】 戒烟。

【宜忌】 初服七日忌猪肉，后忌醋、鸭子、虾、蟹、生冷、面食，断瘾方可食。

【备考】 本方方名，据剂型当作“英夷戒烟酒”。

08242 苓术汤

【方源】《三因》卷二。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 茯苓 白术 干姜（炮） 泽泻 桂心各等分

【用法】 上为散。每服四钱，水一盏半，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】 冒暑遭雨，暑湿郁发，四肢不仁，半身不遂，骨节离解，缓弱不收，或入浴晕倒，口眼㖞斜，手足躄曳，皆湿温类也。

08243 苓术散

【方源】《会约》卷八。

【组成】 人参随便 白术二两 茯苓一两半 苡仁（炒） 芡实（炒） 白扁豆（炒）各一两 淮药（炒） 一两 陈皮五钱 砂仁（炒）七钱 桔梗六钱 神曲（炒）七钱 甘草（炙） 谷虫各四钱 白莲肉（去心，炒）一两 陈米（微火炒黄，用水淬，去水再炒）一两三钱

【用法】 上为细末。加白糖少许，不时用开水调服。

【主治】 饮食过伤，腹胀有积，或起青筋，身体消瘦。

【加减】 如有虫，加使君子肉八钱，川椒皮（微炒）三四钱。

08244 苓术二陈煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 猪苓一钱半 白术一二钱 泽泻一钱半 陈皮一钱 半夏二三钱 茯苓一钱半 炙甘草八分 干姜（炒黄）一二钱

【用法】 水一钟半，煎服。

【功用】《重订通俗伤寒论》：温中利湿。

【主治】 痰饮水气停蓄心下，呕吐吞酸。

【方论选录】《重订通俗伤寒论》：脾气虚寒者，最易停湿，往往腹泻溺少，脉缓苔白，肢懈神倦，胃钝气滞。故君以苓、术、姜、半温中化湿；臣以二苓、泽泻，化气利溺；佐以橘皮疏滞；使以甘草和药。此为温脾健胃，运气利湿之良方。

08245 苓术菟丝丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 白茯苓 白术（米泔洗，炒） 莲肉（去心）各四两 五味二两（酒蒸） 山药（炒）二两 杜仲（酒炒）三两 炙甘草五钱 菟丝子（用好水淘净，入陈酒浸一日，文火煮极烂，捣为

饼，焙干，为末）十两

【用法】 上用山药末，以陈酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服百余丸，空心滚白汤或酒送下。

【主治】 脾肾虚损，不能收摄，以致梦遗、精滑、困倦。

【加减】 如气虚神倦，不能收摄者，加人参三四两。

08246 苓泽石膏汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】 茯苓三钱 泽泻三钱 栀子三钱 甘草二钱 半夏三钱 石膏

【用法】 水煎大半杯，热服。

【主治】 湿热熏蒸，目珠黄赤者。

【备考】 方中石膏用量原缺。

08247 苓姜术桂汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 茯苓块五钱 生姜三钱 炒白术三钱 桂枝三钱

【用法】 水五杯，煮取四杯，分温再服。

【功用】 运脾胃，宣通阳气。

【主治】 寒湿伤脾胃两阳，寒热，不饥，吞酸，形寒，或脘中痞闷，或酒客湿聚。

08248 苓桂理中汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】 理中汤加肉桂 茯苓

【功用】 降阳利水。

【主治】 火虚上乏，口糜，泄泻。

08249 苓夏补中汤

【方源】《医级》卷八。

【组成】 补中益气汤加茯苓 半夏

【主治】 中虚挟饮，胸膨嗳气。

08250 苓蔻人参汤

【方源】《四圣心源》卷六。

【组成】 人参二钱 甘草二钱 白术三钱 干姜三钱 茯苓三钱 肉蔻一钱（煨，炒） 桂枝三钱

【用法】 水煎大半杯，温服。

【主治】 泄利。

【加减】 大便寒滑不收，小便热涩不利，加石脂以固大肠，粳米以通水道。

【方论选录】 泄利缘肠胃寒滑，法以仲景理中为主，而加茯苓燥土，肉蔻敛阳，桂枝疏木，泄利自止。

08251 苓甘五味姜辛汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 五味细辛汤（《鸡峰》卷十一）、苓甘味姜辛汤（《普济方》卷一四〇）、桂枝五味甘草去桂加姜辛汤（《张氏医通》卷十三）。

【组成】 茯苓四两 甘草 干姜 细辛各三两 五味半升

【用法】 上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服半升，每日三次。

【主治】 ①《金匮》支饮，气逆上冲，服茯苓桂枝五味甘草汤后，冲气即低，而反更咳胸满者。②《鸡峰》：肺经感寒，咳嗽不已。

【方论选录】《金匮要略心典》：服前汤已，冲气即低，而反更咳胸满者，下焦冲逆之气即伏，而肺中伏匿之寒饮续出也。故去桂枝之辛而导气，加干姜、细辛之辛而入肺者，合茯苓、五味、甘草消饮驱寒，以泄满止咳也。

08252 苓甘五味加姜辛半杏大黄汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 苓甘味姜辛夏仁黄汤（《普济方》卷一四〇）、茯甘姜味辛夏仁黄汤（《医门法律》）。

【组成】 茯苓四两 甘草三两 五味半升 干姜三两 细辛三两 半夏半升 杏仁半升 大黄二两

【用法】 以水一斗，煮取三升，去滓，温服半升，一日三次。

【主治】 咳逆倚息不得卧。若面热如醉，此为胃热上冲熏其面。

【临证举例】 支饮 《橘窗书影》：京桥叠街，和泉屋清兵卫之母，年五十余，曾下血过多，以后面色青惨，唇色淡白，四肢浮肿，胸中动悸，短气不能步行，时下血，余与六君子汤加香附子，厚朴，木香，兼用铁沙丸。（铁沙、干漆、莎草、苍术，厚朴，橘皮，甘草）下血止，水气亦减，然血泽不能复常。秋、冬之交，咳嗽胸满甚，遍身洪肿，倚息不得卧，一医以为水肿，与利水之剂，无效。余诊之曰：恐有支饮，先制其饮，则咳嗽浮肿，自得其道；因与苓甘姜味辛夏仁黄汤加葶苈，服之二三日，咳嗽胸满减，洪肿忽消散，余持此案治水肿数人，故记以示后学。

08253 苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 苓甘味姜辛夏仁汤（《普济方》卷一四〇）、茯苓甘草五味姜辛汤（《医门法律》）、茯苓甘草五味辛夏仁汤（《方剂辞曲》）。

【组成】 茯苓四两 甘草三两 五味半升 干姜三两 细辛三两 半夏半升 杏仁半升（去皮尖）

【用法】 以水一斗，煮取三升，去滓。温服半升，每日三次。

【主治】 支饮，水去呕止，其人形肿。

【临证举例】 痰饮 《经方实验录》：叶瑞初君，咳延四月，时吐浊沫，脉右三部弦，当降其冲气。茯苓三钱，生甘草一钱，五味子一钱，干姜一钱半，细辛一钱，制半夏四钱，杏仁四钱。两进苓甘五味姜辛半夏杏仁汤，咳已略平，惟涎沫尚多，咳时不易出，原方加桔梗，服后竟告霍然。

08254 茄根散

【方源】《普济方》卷一一二。

【组成】 茄根 雄黄

【用法】 和涂之。

【主治】 赤白癜风。

08255 茄子根浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】 茄子根三斤（洗令净，晒干） 苍耳子一升（微炒，捣碎） 鼠粘子一升（微炒，捣碎） 牛膝一斤（去苗） 牛蒡根一斤 防风三两（去芦头） 萆薢一两 桂心二两 羌活三两 秦艽二两（去苗） 附子一两（炮裂，去皮脐） 晚蚕砂半斤 败龟二两 大麻子一升 虎胫骨（涂酥，炙微黄） 枸杞子一升半（半蒸，半微炒）

【用法】 上锉细，用生绢袋盛，以无灰酒五斗浸之，封闭勿令透气，经十日后开取，开时不得面向瓶口。每日空腹、午时、近夜各温饮一盏，常令醺醺为妙。

【主治】 风毒攻注，腰脚骨髓疼痛，皮肤冷痹，筋脉拘挛，屈伸不得。

【宜忌】 忌毒滑、鱼肉、动风物。

08256 茅花汤

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】 茅花 真郁金 生地黄 栀子仁 黄芩

【用法】 水煎，调百草霜服。

【主治】 小儿麻疹失血。

08257 茅花散

【方源】《普济方》卷三三一。

【组成】 茅花一握（炒） 棕树皮三寸 嫩荷叶三张 甘草节二两

【用法】 上为细末。每服半匙，空心酒调下。

【主治】 血崩不止，赤白带下。

08258 茅根汤

【方源】 方出《圣惠》卷五十八，名见《圣济总录》卷九十八。

【组成】 白茅根三两（锉） 露蜂房一两（微炙） 葛花一两

【用法】 上捣碎，以水二大盏，煮取一盏半，去滓，食前分为三服。当下石出。

【主治】 石淋，脐下妨痛。

08259 茅根汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】 茅根（洗，锉） 栀子仁 茵陈蒿 地骨皮 甘草（炙）各半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，用水一盏半，加生姜三片，豉三七粒，同煎至一盏，去滓，早、晚食后温服。

【主治】 伤寒发黄，通身如金色者。

08260 茅根汤

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】 陈皮（去白） 半夏（炒） 茯苓 甘草 天冬（去心） 杏仁泥 片芩 栀子 贝母 知母 石膏 瓜蒌霜 生地 桔梗

【用法】 水煎，取茅根自然汁和服。

【主治】 咳久连声不已，口鼻出血者。

08261 茅根汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】 白茅根一两 侧柏（炒成炭）二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 鼻血。

08262 茅根饮

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】 茅根（锉） 木通（锉）各三两 石韦（拭去毛） 黄芩（去黑心） 当归（洗，切，焙） 芍药 冬葵子（打碎） 滑石（碎）各二两 乱发（鸡子大）二枚（烧灰）

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 卒淋，结涩不通利。

08263 茅根散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】 茅根一两半（锉） 赤茯苓一两 瞿麦一两 生干地黄一两 滑石一两 黄芩一两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 虚劳小肠热，小便出血，水道中不利。

08264 茅根散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 白茅根三两（锉） 赤芍药一两 滑石二两 木通二两（锉） 子芩一两半 葵子二两 乱发灰一两半

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】 尿血，水道中痛不可忍。

08265 茅根散

【方源】《三因》卷十八。

【异名】 茅根汤(《普济方》卷二五四)。

【组成】 白茅根八两（生） 鞭麦穗 白茯苓各四两 蒲黄 桃胶 滑石 甘草（炙）各一两 紫贝十个（烧） 葵子 人参各二两 石首鱼脑骨二十个（烧）

【用法】 上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜三片，灯心二十茎，煎至七分，去滓温服。亦可为末，煎木通汤调下二钱，如气壅闭，木通、橘皮煎汤调下。

【主治】 产后诸淋，无问冷、热、膏、石、结气。

08266 茅根饮子

【方源】《外台》卷二十七引《延年秘录》。

【组成】 茅根一升 茯苓三两 人参 干地黄各二两

【用法】 上切。以水五升，煮取一升五合，去滓，分温五六服，一日食尽。

【主治】 胞络中虚热，时小便如血色。

08267 枣仁汤

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】 枣仁 远志 黄耆 茯苓 莲肉 当归 人参 茯神各一钱 陈皮 炙草各五分

【用法】 水煎，每日服二次。

【主治】 虚弱怔忡，卧不安。

08268 枣仁温胆汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】 枣仁（炒）二钱 茯神一钱五分 半夏一钱二分 丹皮一钱五分 丹参二钱 远志一钱二分 当归二钱 川芎一钱 延胡索一钱 石菖蒲八分 辰砂

【功用】 安神定惊，祛瘀豁痰。

【主治】 产后发狂因惊者。

【备考】 方中辰砂用量原缺。

08269 枣肉平胃散

【方源】《局方》卷三（新添诸局经验秘方）。

【组成】 陈橘皮（去白） 厚朴（去粗皮，姜制，炒香）各三斤二两 甘草（锉，炒） 生姜 红枣各二斤 苍术（去粗皮，米泔浸二日，炒）五斤

【用法】 上锉碎，拌匀，以水浸过面上半寸许，煮令水干，取出焙燥，碾为细末。每服二钱，空心、食前盐汤点下。

【功用】 常服调气暖胃，化宿食，消痰饮，辟风、寒、冷、湿四时非节之气。

【主治】 脾胃不和，不思饮食，心腹胁肋胀满刺痛，口苦无味，胸满短气，呕哕恶心，噫气吞酸，面色萎黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，体重节痛，常多自利，或发霍乱，及五噎八痞，膈气反胃。

08270 枣花鹘还睛散

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 车前子 知母 茺蔚子 人参 防风 黑参各二钱 黄芩一钱半 茯苓二钱

【用法】 上为粗末。以水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 枣花内障。怒伤肝胆，脑邪热冲入目中，风轮旁边，白睛之内，映出白翳，如枣花锯齿之状。

08271 雨益汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】 熟地二两 人参 麦冬各一两 山漆三钱

【主治】 肺肾火盛，皮毛出血。

08272 矾飞散

【方源】《普济方》卷五十九引《海上方》。

【组成】 白矾（飞） 百草霜各等分

【用法】 上为末。捻糟茄自熟水调，若口噤，挑灌之。

【主治】 木舌渐肿大满口，若不急治即塞杀人。

08273 矾石丸

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 矾石兑丸(《三因》卷十八)。

【组成】 矾石三分（烧） 杏仁一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如枣核大。纳脏中，剧者再纳之。

【主治】 妇人经水闭不利，脏坚癖不止，中有干血，下白物。

【方论选录】 《金匮要略心典》：脏坚癖不止者，子脏干血，坚凝成癖而不去也；干血不去，则新血不荣，而经闭不利矣；由是蓄泄不时，胞宫生湿，湿复生热，所积之血，转为湿热所腐，而成白物，时时自下。是宜先去其脏之湿热，矾石却水除热，合杏仁破结润干血也。

08274 矾石丸

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】 白矾（枯，研） 芎藭 干姜（炮） 半夏（锉碎，生姜汁浸透，同炒）各一两

【用法】 上为细末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服十五丸或二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【功用】 温胃利膈。

【主治】 冷痰，不思食。

08275 矾石丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】 矾石（烧令汁枯） 诃黎勒（煨，去核）各二两 黄连（去须）三两 木香一两

【用法】 上为末，水浸蒸饼，滤如糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前陈米饮送下。以泄为度。

【主治】 脾积痞气泄泻，日夜下痢白脓。

08276 矾石丸

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】 矾石（熬令汁枯）四两 木通（锉） 细辛（去苗叶）各半两 丹砂（研）一分

【用法】 上为末，面糊为丸，如小豆大。每用一丸，绵裹纳鼻中，一日一易，取下息肉则止。

【主治】 鼻生息肉。

08277 矾石汤

【方源】《金匮》卷上。

【组成】 矾石二两

【用法】 以浆水一斗五升，煎三五沸，浸脚。

【主治】 脚气冲心。

【方论选录】 ①《成方切用》：矾石收湿解毒，故以之为外治，然至冲心，亦能治之，盖脚气而至冲心，皆由肾水夹脚气以凌心，得矾石之却水，而势自不能相凌，所以有护心之功也。②《医学金针》：矾石酸涩燥烈，最收湿气，土燥气达，则病愈矣，此方百试百验。

08278 矾石汤

【方源】 方出《外台》卷二十二引《必效方》，名见《圣济总录》卷一一六。

【组成】 矾石一两 生地黄三两 苦参一两

【用法】 上切。以水八合，煮取三合，以绵滤之。微微点鼻中，每日三五度，愈止。

【主治】 鼻内热气生疮，有脓臭，并有虫。

08279 矾石散

【方源】 方出《肘后方》卷五，名见《外台》卷三十四引《古今录验》。

【组成】 矾石二分（熬） 甘草半分（炙） 大黄一分

【用法】 上药治下筛。取枣大，绵缠，导阴中。二十日即愈。

【主治】 妇人阴肿坠痛。

08280 矾石散

【方源】 方出《千金》卷六，名见《普济方》卷五十五。

【组成】 矾石 乌贼骨 黄连 赤石脂各等分

【用法】 上为末。以绵裹如枣核，纳耳中，每日三次。

【主治】 聤耳出脓汁。

08281 矾石散

【方源】 方出《千金》卷十，名见《外台》卷五。

【异名】 矾石滑石散（《三因》卷十）。

【组成】 矾石五两 滑石五两

【用法】 上为散。每服方寸匕，食前大麦粥汁下，一日三次。便利如血者，当汗出愈。

【主治】 湿疸之病，始得之，一身尽疼，发热，面色黑黄，七八日后壮热，热在里，有血当下，去之如豚肝状，其小腹满者，亦一身尽黄，目黄，腹胀满，小便不利。

08282 矾石散

【方源】《普济方》卷三〇一引《海上方》。

【组成】 白矾不拘多少

【用法】 上为末。入冷水内洗疮，即愈。

【主治】 阴囊上生湿疮，黄水流注，有妨行步。

08283 矾石散

【方源】《普济方》卷二一六引《余居士选奇方》。

【异名】 矾蛎散（《医略六书》卷二十八）。

【组成】 矾石（烧令汁尽） 牡蛎（熬）各等分

【用法】 上为末。以粟米粥饮服，每日三次。

【主治】 丈夫、妇人遗尿不知出时。

08284 矾石煎

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】 矾石一两（熬枯） 苦参 生地黄（洗令净，研，绞取汁）三合

【用法】 上三味，粗捣二味为末，以生地汁并水二盏，煎至三合，绵滤去滓。少少滴鼻中，三五度愈。

【主治】 鼻中热气生疮，有脓臭，兼有虫。

【备考】 方中苦参用量原缺。

08285 矾附丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐，重七钱者）一枚 矾石（熬令汁枯）半两

【用法】 上为末。水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至二十丸，空心、夜卧茶清送下。

【主治】 白淫过甚。

08286 矾黄丸

【方源】《备急灸法》。

【异名】神仙黄矾丸(《外科精要》卷上)、蜡矾丸(《直指》卷二十三)、黄矾丸(《医方类聚》卷一八七引《修月鲁般经后录》)、护膜丸(《仙传外科集验方》)、黄蜡丸(《普济方》卷二八四)、神仙蜡矾丸(《奇效良方》卷五十四)、神效黄矾丸(《校注妇人良方》卷二十四)、经验矾蜡丸(《寿世保元》卷六)、矾蜡丸(《医级》卷九)。

【组成】白矾一两(为末) 黄蜡半两(溶开)

【用法】上旋为丸,如绿豆大。每服五十丸,用温酒或些煎熟麻油送下,不拘时候。

【功用】定痛生肌,护膜消毒,托里排脓。

①《备急灸法》:托毒。②《外科精要》:止疼痛。③《增补内经拾遗》引《中流一壶》:定痛生肌,护膜止泻,消毒化脓,排脓托里。

【主治】痈疽诸疮,瘿瘤痰核,痔漏便毒,蛇咬伤。

①《备急灸法》:痈疽发背。②《外科精要》:痈疽未破或已破,或遍身生疮,状如蛇头,以及蛇咬。③《直指》:诸痔,诸痈恶疮,便毒。④《奇效良方》:肠痈。⑤《寿世保元》:瘿瘤痈疽,便血恶疮,久漏不愈者。

【宜忌】《中国医学大辞典》:忌食鸡肉三月。

【备考】《增补内经拾遗》引《中流一壶》:本方用法:以铁勺盛蜡置炭火上熬化,生布滤过,冷称一两,下勺再熬化,入细矾末一两搅匀,取出为丸,如绿豆大。每服八九十丸,每日一次,食远白汤送下,服三日止。

08287 矾葛散

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】白矾 干葛各四两

【用法】水煎,洗足。五日愈。

【主治】足汗。

08288 矾硫散

【方源】《医级》卷八。

【组成】白矾 硫黄 乳香各等分

【用法】上为末。用茄汁调敷。如无茄时,以荔枝壳煎汁代之,或用绵裹末擦之亦可。

【主治】肺风,酒渣鼻。

08289 矾石软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】熟石膏6克 苦矾2克 雄黄7克 冰片1克 凡士林加至200克

【用法】上为细末,配成软膏。外用。

【主治】婴儿湿疹。

08290 矾石四物汤

【方源】《普济方》卷二九九引《海上方》。

【组成】四物汤加矾石(末)少许

【用法】煎四物汤,研矾石末少许,搀入同服,再煎滓洗之,甚妙。

【主治】手缝痒。

08291 矾石消垒散

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】泽泻 半夏各二钱 茯神 白术各五钱 苡仁一两 附子二分 人参一钱 甘草五分 白矾一钱 黄连三分

【用法】水煎服。十剂自消。

【主治】气之不行,痰生块结,遍身累累不一。

08292 郁金丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】朱砂 郁金 白矾

【功用】补魄。

【主治】因惊忧得之,痰涎久留心窍,或因喜乐无极而伤魄所致的癫狂。

【备考】《丸散膏丹集成》本方用法:为细末,水为丸,如梧桐子大。每服三四十丸,熟汤送下。

08293 郁金丹

【方源】《丹溪心法附余》卷十。

【异名】金矾丸(《赤水玄珠》卷十四)。

【组成】川芎二两 防风 郁金 猪牙皂角 明矾各一两蜈蚣(黄、赤脚)各一条

【用法】上为末,蒸饼为丸,如梧桐子大。每服十五丸,空心茶清送下。

【主治】痫疾。

08294 郁金汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】郁金 生地 知母 阿胶 牛蒡子 杏仁 童便 桔梗 沙参 蝉蜕

【主治】寒包热而声哑者。

08295 郁金散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】郁金 木香 飞罗面 黄柏(锉)各一两 甘草一两半(炙微赤,锉)

【用法】上为散。以生地黄汁一大盏,旋旋拌药后,焙令干,又拌之,令地黄汁尽为度,再为细散。每服二钱,以青竹茹汤调下,不拘时候。

【主治】吐血、衄血不止。

08296 郁金散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 郁金一两 瞿麦一两 生干地黄一两 车前叶一两 滑石一两 川芒消一两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，如人行十里再服，以愈为度。

【主治】 血淋及尿血，水道涩痛。

08297 郁金散

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】 郁金一两 当归（切，焙）半两

【用法】 上为散。每服一钱匕，以生姜、乌梅汤调下。

【主治】 心脏积热，血脉壅盛，舌上血出。

08298 郁金散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】 郁金 白芷 细辛各等分

【用法】 上为细末。擦牙，仍以竹叶、竹皮浓煎，入盐少许，含咽，或炒盐敷亦可。

【主治】 ①《直指》：齿出血。②《奇效良方》：牙齿疼痛。

08299 郁金散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】 郁金 猪牙皂角各一两

【用法】 上用水同浸一宿，火煮透，郁金烂为度。去皂角，留郁金焙干，次用北细辛半两同为末，入麝香、硇砂各一钱或半钱拌匀，炼蜜为丸，如茶子大。食后以茶送下。

【主治】 鼻中息肉。

08300 郁金散

【方源】《永类钤方》卷十一。

【组成】 大黄 荆芥穗 薄荷叶 郁金 朴消各等分

【用法】 上为末，用鸡子清或嫩苎（根白者，打烂）调贴眉眶上及肿处。加生地黄尤好。

【主治】 眼目赤肿疼痛。

【加减】 痛，加乳香、没药。

08301 郁金散

【方源】《普济方》卷二一五。

【组成】 生干地黄 郁金 蒲黄各等分

【用法】 上为细末。每服一钱，食前以车前子叶汤调下；酒调下亦得。

【主治】 血淋。心头烦，水道中涩痛，小肠积热，尿血出者。

08302 郁金散

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】 郁金 桔梗 甘草 天花粉 葛根各等分

【用法】 上为末。每服五分，薄荷煎汤，入蜜调服。后用兰叶、浮萍、水苔同研绞汁，调朴消、土朱涂赤处。

【主治】 小儿初生身如丹涂者。

08303 郁金散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 郁金 槐花各一两

【用法】 上为末。每服二钱，淡豉汤送下。

【主治】 溺血。

08304 郁李仁丸

【方源】 方出《圣惠》卷五十四，名见《普济方》卷一九三。

【组成】 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒） 陈橘皮一两（汤浸，去白，焙） 甘遂一两（煨令微黄） 赤茯苓一两 甜葶苈二两（隔纸炒令紫色） 瞿麦一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心温水送下。良久当利三二行，不利即加五丸，再服，以利为效。

【主治】 水气。遍身浮肿，皮肤欲裂，心腹气急胀大，小便不利。

08305 郁李仁丸

【方源】《普济方》卷一六一引《圣惠》。

【组成】 郁李仁（去皮尖，研）一两一分 葶苈子（隔纸炒）三两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒，研）三分 防己二两 紫苏叶一两一分 陈橘皮（汤浸，去白瓤） 赤茯苓（去黑皮）各一两（一方各等分）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后紫苏汤送下。

【主治】 喘嗽痰实，身与面微肿，小便不利。

【备考】 方中紫苏叶，《保命歌括》作"真苏子（炒）"。

08306 郁李仁丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】 郁李仁（汤浸，去皮，研） 大黄（锉，炒）各一两 赤茯苓（去黑皮） 泽泻（锉） 葶苈（隔纸上炒）各二两 大麻仁一两半（研） 槟榔三两（锉） 杏仁（去皮尖双仁，麸炒，研）半两

【用法】 上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以甘草汤送下，一日三次；炒盐酒下亦得。

【主治】 三焦约，少腹肿痛，不得大小便。

08307 郁李仁丸

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】 郁李仁（去皮） 京三棱（锉） 芫花 蓬莪术（锉） 木香各一两

【用法】 上为末。用醋一升同煮醋尽，焙干，面糊为丸，如绿豆大。每服三五丸，生姜汤送下，一日三次。

【主治】 丈夫、妇人腹内癖气。

08308 郁李仁丸

【方源】《卫生总微》卷十六。

【组成】 郁李仁二两（汤浸，去皮） 大黄一两 槟榔二两 青皮（去瓤）半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十丸至十五丸，姜汤送下，不拘时候。

【主治】 大小便秘涩不通。

08309 郁李仁丸

【方源】《普济方》卷一七一。

【组成】 木香一两 郁李仁（去皮，生用）三两 沉香（锉） 槟榔（锉） 桂（去粗皮） 青橘皮（去白，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 茴香子（炒）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，茴香子或薄荷酒送下，一日三次。

【主治】 奔豚气。从小腹奔冲上攻，昏乱呕吐，痛甚。

08310 郁李仁汤

【方源】 方出《圣惠》卷五十四，名见《圣济总录》卷八十。

【组成】 桑根白皮三两（锉） 赤小豆一升（以水五升煮熟，取汁二升） 郁李仁二两（汤浸，去皮，微炒） 陈橘皮二两（汤浸，去白瓤，焙） 紫苏叶二两 白茅根三两（锉）

【用法】 上为散。每服五钱，以小豆汁一大盏，煎至五分，去滓温服，一日三次。

【主治】 水气，遍身浮肿，心胸急硬，气满上喘，大小便涩。

08311 郁李仁饮

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】 郁李仁（去双仁皮尖，研如膏） 朴消（研）各一两 当归（切，焙） 生干地黄（焙）各二两

【用法】 上二味为粗末，与别研者二味和匀。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，未通更服。

【主治】 产后肠胃燥热，大便秘涩。

08312 郁李仁散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒） 桑根白皮一两（锉） 赤茯苓一两 泽漆叶一两 汉防已一两 泽泻一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 甘遂一两（煨令微黄）

【用法】 上为粗散。每服二钱，用猪肾一对（切去脂膜），大豆半合，先以水二大盏，煮至一盏，去滓，入药又煎至五分，去滓，五更初温服，良久当利三两行。如未利，即再服。

【主治】 水气，脚膝浮肿，上攻腹胁，妨闷。上气喘息，小便不利。

08313 郁李仁散

【方源】《得效》卷九。

【组成】 陈皮 郁李仁 槟榔 茯苓 白术各一两 甘遂五钱

【用法】 上为末。每服二钱，生姜、大枣汤下。

【主治】 肿满，小便不利。

08314 郁李仁粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】 郁李仁一两（汤浸，去皮尖，微炒） 桑根白皮一两（锉） 粟米一合

【用法】 上为末，每服半两，以水一大盏，煎至七分，去滓，下米作粥，加少生姜汁，任意食之。

【主治】 小儿水气，腹肚虚胀，头面浮肿，小便不利。

08315 郁金酒调散

【方源】《银海精微》卷七。

【组成】 黄芩 郁金 大黄 防风 栀子 当归 川芎 赤芍药 龙胆草

【用法】 上为末。每服三钱，食后温酒调下，一日二次。

【主治】 旋螺尖起。积热于肝胆，毒壅于膈门，充攻睛珠疼痛，中央瞳人渐变青白色，忽然凸起血丝缠绕者。

08316 郁金黄连丸

【方源】《袖珍》卷二引《秘方》。

【组成】 郁金 黄连各一两 黄芩 琥珀（研） 大黄（酒浸）各二两 滑石 白茯苓各四两 黑牵牛（炒，取末）三两

【用法】 上为末，水为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心沸汤送下。

【主治】 心火炎上，肾水不升，致使水火不得相济，故火独炎上，水流下淋，膀胱受心火所炽而脬囊中积热，或癃闭不通，或遗泄不禁，或白浊如泔水，或膏淋如脓，或如栀子汁，或如沙石米粒，或如粉糊相似者，俱热证。

【加减】 如用消导饮食，降心火，可加沉香五钱。

08317 奔豚丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 川楝子（煨，去肉）一两 茯苓 橘核（盐酒炒）各一两五钱 肉桂三钱 附子（炮） 吴茱萸（汤泡七次）各五钱 荔枝子（煨）八钱 小茴香 木香各七钱

【用法】 熬砂糖为丸。每服二钱，淡盐汤送下。

【主治】 肾之积，在脐下，发于小腹，上冲心而痛。

【加减】 若有热者，去附、桂。

08318 奔豚汤

【方源】《金匮》卷上。

【组成】 甘草 川芎 当归各二两 半夏四两 黄芩二两 生葛五两 芍药二两 生姜四两 甘李根白皮一升

【用法】 以水二斗，煎取五升，温服一升，日三次，夜一次。

【功用】 ①《医学入门》：益元气，泄阴火，破滞气，削其坚。②《金匮要略浅释》：疏肝清热，降逆止痛。

【主治】 由惊恐恼怒，肝气郁结，奔豚气上冲胸；肝胃不和，气逆上攻，胁肋疼痛，噫气呕呃。

①《金匮》：奔豚，气上冲胸，腹痛，往来寒热。②《三因》：肾之积，发于小腹，上至心，如豚奔走之状，上下无时，久久不已，病喘逆，骨痿，少气，其脉沉而滑。③《金匮要略方义》：肝胃不和，气逆上攻之胁肋痛，胸膈胀闷，噫逆呕呃，时觉气上攻冲，或往来寒热，或口苦咽干，舌苔白微黄，脉弦者。

【宜忌】《外台》引《集验方》：忌海藻，菘菜、羊肉、饧。

【方论选录】 ①《金匮要略论注》：此因肝胆风邪相引，肾中积风乘脾，故气上冲胸而腹痛。厥阴受风，相应少阳，则往来寒热，是以芎、归、姜、芍疏养厥阴、少阳气血之正，而驱邪外出；以生葛、李根专解表里风热，而清奔豚逆上之邪；黄芩能清风化之热；半夏以和脾胃而化客痰，俾两经邪散，木不临脾而肾失其势，即奔豚自退。②《古方选注》：君以芍药、甘草奠安中气，臣以生姜、半夏开其结气，当归、芎劳入血以和心气，黄芩、生姜、甘李根白皮性大寒，以折其冲逆之气，杂以生葛者，寓将欲降之，以先升之之理。③《金匮要略浅释》：奔豚汤为小柴胡的变方。陈逊斋老师认为，方中生葛，系柴胡之误。葛主汲升，水逆上犯，决不宜升提；李根白皮以治热性奔豚；归、芎、芍以和肝镇痛；黄芩清解肝胆之热；姜、夏和胃降水逆。

【临证举例】 奔豚气 《辽宁中医》（1978；4：36）：潘某某，男，50岁，工人。八天前遇事突然惊恐，遂致阵发性气从少腹上攻心下，剧痛难忍，伴有腹胀，失眠，饮食不下，平均每二小时发作一次，一次持续5～30分钟，发作时有气从少腹上冲心胸，心下闷乱，恶闻人声，时时欲呕，手足厥冷，痛楚欲死，痛甚则大汗出，神志蒙昧，但发作后诸症消失，一如常人。住院经用西药镇痛剂、解痉挛、输液等对症治疗无效。患者面色不华，舌苔白厚有裂纹，脉濡弱无力。诊断为奔豚气。症脉合参，治以疏肝解郁，下气缓急，和血调肝，清热平逆。以奔豚汤加减：葛根20克，半夏15克，生姜10克，当归15克，芍药15克，川芎15克，黄芩15克，甘草10克，牡蛎50克，苍术15克。服药三剂，发作停止，稍有打呃腹胀，遵上方去生姜，加陈皮20克，厚朴20克，继服三剂，诸症悉退而愈。

08319 奇妙丸

【方源】《玉案》卷五。

【组成】 当归（酒洗） 白芍（酒炒） 杜仲各二两 广木香 肉桂 玄胡索 牛膝各一两 破故纸（炒） 甘草（炙） 桃仁（去皮尖） 生地 川芎各一两五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，空心白酒送下。

【主治】 妇人腰痛，血凝气滞，经水不调，肾经虚极。

08320 奇效丸

【方源】 方出《本草纲目》卷十六引丹溪方，名见《汉药神效方》。

【组成】 牡蛎粉

【用法】 醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，一日两次。

【主治】 梦遗，便溏。

08321 奇应轻脚丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 宣木瓜一个（用竹刀切开，顶作盖，剜去瓤，入熟艾实之，甑上蒸熟，薄切，焙干） 肉苁蓉（酒浸一宿，去土） 防风（去叉头芦） 牛膝（酒浸一宿） 金毛狗脊（去毛） 川萆薢 青盐（别研） 海桐皮各一两 川乌头四两（生用，去皮

脐）

【用法】 上为细末，将乌头末酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，空心温酒或盐汤送下。

【主治】 缓风湿痹，脚膝顽弱，腰腿疼痛，足胫肿满，或麻木不仁，或生疮不已。

08322 奇效四物汤

【方源】《校注妇人良方》卷一。

【组成】 当归（酒拌） 熟地黄（自制） 白芍药 川芎 阿胶（炒） 艾叶（炒） 黄芩各等分

【用法】 每用四钱，水煎服。

【主治】 ①《校注妇人良方》：肝经虚热，血沸腾而崩久不止。②《玉案》：经后潮热。

08323 奇验金箍散

【方源】《冯氏锦囊·外科》卷十九。

【组成】 白芙蓉叶二两（阴干，不经霜者佳） 五倍子 白及 白蔹各四钱 生大黄六钱

【用法】 上为末。用蛋白些小同醋调敷；如干，以生葱头酒润之；已有头者，露出头，敷四围为妙。

【主治】 痈疽诸毒。

08324 奇授藿香丸

【方源】《金鉴》卷六十五。

【异名】 清肝保脑丸、藿胆丸（《中医方剂临床手册》）。

【组成】 藿香连枝叶八两

【用法】 上为细末，雄猪胆汁为丸，如梧桐子大。每服五钱，食后苍耳子汤送下，或黄酒送下。

【主治】 鼻渊，浊涕淋漓。

08325 顶风立效散

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】 川乌一两（去皮脐，面裹煨） 草乌一两（去尖，姜汁炒） 羌活一两 海风藤二两（醋煮一夜，焙干）

【用法】 上为细末。每服五分，陈酒送下。

【主治】 一切风症，不拘手足疼痛，不能行动者。

08326 拔针散

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】 灵磁石（研）三钱 巴豆霜（去油）一钱 蓖麻子（去油）五钱 蜣螂虫六个 麝香二分

【用法】 上为末。掺膏药上贴之，肉中断针即提出。

【主治】 肉中断针。

08327 拔疔丹

【方源】《疡医大全》卷三十四。

【组成】 巴豆霜 乳香（去油） 没药（去油） 真蟾酥（酒化开，乳成膏） 明雄各二钱 樟冰 露蜂房（阴阳瓦焙存性） 劈朱砂各一钱 真轻粉 当门子各五分

【用法】 上药各为极细末，和匀，以蟾酥膏和杵为丸，如药珠大，晒干，瓷瓶密贮任用。疔疮肿毒初起磨研；已成已溃，用一粒放疮上，脓血即拔出；如遇阴疽、对口大症，可用十数粒铺疮上。

【主治】 一切疔疮、无名肿毒初起，已成已溃，阴疽，对口。

08328 拔疔散

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】 紫花地丁一两 甘菊花一两

【用法】 水煎服。一剂红线除，二剂疔疮散，三剂痊愈，不必四剂，毒尽而肉生也。

【功用】 消毒泻火。

【主治】 疔疮。

【加减】 若已溃烂，加当归二两。

【方论选录】《医林纂要》：此方主血分而兼气分。紫花地丁解毒泻火，以丁治疔；菊花泻火而兼辛散之意。

08329 拔疔散

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】 硇砂 白矾 朱砂 食盐各等分

【用法】 用铁锈刀烧红，将白矾、食盐放于刀上煅之。择丁日午时，共研为细末，收之。治牙疔、黑疔，俱用银簪尖挑破，以见血为度，搽拔疔散，再以蟾酥丸噙化，徐徐咽之；治痘疔，急用银钩钩破，去净恶血，随以苦茶漱口，搽拔疔散，再以冰片、硼砂、青黛、黄连、薄荷、荆芥、炒僵蚕，共为细末，吹之。

【功用】 化硬拔根。

【主治】 牙疔，生于两旁牙缝，肿起一粒，形如粟米，痛连腮项；黑疔，兼麻痒，破流血水，疼痛异常；痘疔，色紫黯黑硬如石，诸证蜂起，难灌脓。

08330 拔疔膏

【方源】《经目屡验良方》。

【组成】 野菊花 山慈姑 升麻（瓦炙） 血竭各一钱五分 天花粉一钱 七叶一枝花 紫花地丁 木耳 皂角刺（各瓦炙） 朱砂（水飞，净）各三钱 川贝母（去心） 知母（瓦炙，或用黄酒煮透，焙干亦可） 蟾酥各三钱（酒化，不见火） 生甘草 麝香各五分 蓖麻子肉一两（去壳衣，捣烂用）

【用法】 上药除麝香、蟾酥、血竭、蓖麻子肉、朱砂、生甘草六味，余概用瓦炙存性，同前药为极细末，同蓖麻肉捣烂成膏。如干，加山东胭脂，如无，麻油亦可。用时先将银针刺破疔根，入此膏少许，掩以膏药一对。周时疔自拔出矣。

【主治】 疔疮。

08331 拔毒散

【方源】 《局方》卷八（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 石膏三两 甘草 黄柏各一两 寒水石七两

【用法】 上为细末。每用水调，时复以鸡翎刷扫；以芭蕉白然汁调，妙。

【功用】 拔毒消肿，散热定疼。

【主治】 小儿丹毒，肉色变异，或着四肢，或在胸背，游走不定，焮热疼痛。

08332 拔毒散

【方源】 《儒门事亲》卷十二。

【组成】 寒水石不拘多少（烧令赤）

【用法】 上为末。以新水调，鸡翎扫痛处。

【主治】 小儿丹瘤，浮赤走引或遍身。

08333 拔毒散

【方源】 《普济方》卷二九五。

【组成】 大黄 黄柏 白及 石膏 黄芩各五钱 白蔹 黄连 栀子各三钱 朴消五钱

【用法】 上为末。用井花水调，涂敷扫痔肿毒处。

【主治】 痔肿毒。

08334 拔毒散

【方源】 《痈疽神秘验方》卷一。

【异名】 秘方拔毒散（《准绳·疡医》卷一）。

【组成】 乳香 没药 川山甲（炮） 当归 木鳖子各一钱 瓜蒌仁八钱 甘草（炙）五分 忍冬藤二钱 牙皂角七分（炒） 大黄（生、熟）各一钱半 连翘一钱 贝母十分

【用法】 上作一剂。用酒、水各一钟，煎至一钟，食前服。

【功用】 攻毒止痛化脓。

【主治】 一切痈疽肿毒。

【加减】 若有脓，或已溃者，可不用大黄；如亦有脓虽溃，脉仍洪数，或沉实喜冷者，又所宜用。

08335 拔毒膏

【方源】 《永乐大典》卷一〇三七引《保婴集验名方》。

【组成】 黄柏一两 寒水石一两 石膏半两 甘草二钱半 黄芩半两

【用法】 上为细末，醋调成膏，贴赤肿处；或新水调涂亦可。

【主治】 小儿丹毒赤肿，及颊肿痛。

08336 拔管丸

【方源】 《外科方外奇方》卷二。

【组成】 炒生地四两 炒槐米二两 炙猬皮二张 象牙屑四两 酒归身二两 炒黄耆二两 广胶二两（土炒成珠） 川山甲一两二钱（土炒）

【用法】 上为末，砂糖烊为丸，如梧桐子大。每服三钱，晨起灯芯汤送下。服二料。

【主治】 年久疮毒成管者。

【宜忌】 服药时善节养；忌饮火酒。

08337 拔毒生肌散

【方源】 《全国中药成药处方集》（武汉方）。

【组成】 冰片一两 净红升二两四钱 净黄丹二两四钱 净轻粉二两四钱 煅龙骨二两四钱 制甘石二两四钱 煅石膏二两四钱 白蜡末五钱

【用法】 上药混合研细，成净粉90%～95%即得。洗净患处，视患处大小，酌药量薄撒贴膏。

【主治】 痈疽已溃，久不生肌，疮口下陷，常流败水。

08338 拈痛丸

【方源】 《鸡峰》卷十一。

【组成】 五灵脂 木香 当归 良姜 蓬莪术各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七丸至十丸，空心木香汤送下。

【主治】 九种心痛。

08339 拈痛丸

【方源】 《直指》卷六。

【组成】 五灵脂 木香 当归 蓬莪术（煨）各半两 生干姜三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前橘皮煎汤送下。

【主治】 九种心痛。

08340 拈痛散

【方源】 《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 五灵脂（别研） 高良姜（炒）各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏，同煎至四分，却入米醋一盏，再煎至六分，乘痛时热服。

【主治】 男妇心腹痛疼不可忍者。

08341 拈痛散

【方源】 《御药院方》卷八。

【组成】 羌活（去芦头） 独活（去芦头） 细辛（去苗叶） 肉桂（去粗皮） 防风（去芦头并叉者）

白术 川乌（生，去皮脐） 良姜（锉） 麻黄（不去节） 天麻（去苗） 吴茱萸（生用） 葛根 乳香（另研） 小椒（去子及闭口者） 全蝎（生用） 当归（去苗）各一两 川姜（生用）半两

【用法】 上为粗末，入乳香匀，每抄药十钱，痛甚者加至十五钱，同细盐一升，一处炒令极热，用熟绢袋内贮药。熨烙痛处，不拘早晚，频用为效。如药冷，即再炒一次，用毕，其炒药不用。

【主治】 肢节疼痛。

08342 抽刀散

【方源】《产乳备要》。

【组成】 川乌头（炮，去皮脐） 牡丹皮 芍药 干姜（炮） 桂心 没药 当归各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，热酒调下。不过三服；轻可一服。产前后亦可用。

【主治】 妇人心腹胁肋疼痛不可忍。

【加减】 产后，加红花。

08343 抽刀散

【方源】《直指》卷十九引《究原方》。

【组成】 川乌（切片，姜汁浸，晒） 雄黄 蝉蜕（去头足）各半两 川芎 细辛各一两

【用法】 上为末。每服半钱，食后、临卧茶清调下。

【主治】 头风掣痛。

08344 抽刀散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】 川楝子一两（破四分，巴豆三个，同炒黄色，去巴豆） 茴香一两（盐炒黄色，去盐）

【用法】 上为细末。每服三钱，葱白酒调下，空心服之。

【主治】 小肠疝气。

08345 抽风汤

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】 防风二两 大黄 细辛 桔梗各一两 黑参 黄芩 芒消 车前子各一两半

【用法】 上为末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】 鸡冠蚬肉外障。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“抽风散”。

08346 抽风散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】 石决明 茯苓 车前子 五味子 人参 细辛 知母各一两半

【用法】 上为末。每服一钱七分，食后米饮汤调下。

【主治】 鹘眼凝睛外障。

08347 抽风散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷五。

【组成】 黄柏 秦皮 秦艽 防风 细辛各一两 黄连 木香各五钱

【用法】 上为末。以水一盏，浸一宿，去滓，入龙脑少许、蜜四两，同煎为膏。点眼。

【主治】 暴风客热外障。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“抽风膏”。

08348 抽薪汤

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】 生地 赤芍 当归 丹皮 荆芥 阿胶 滑石 大黄 玄胡粉 桃仁泥

【用法】 水煎服。

【主治】 膈热面赤，或胸中痛，或吐血色紫黑。

08349 抽薪汤

【方源】《治疹全书》卷上。

【组成】 石膏三钱 知母 连翘 山楂 栀子（炒黑） 黄连各一钱 牛蒡二钱 杏仁一钱五分

【用法】 加笋尖三个、樱桃核三十粒，水煎，温服。

【功用】 宣通疏利。

【主治】 心火盛而毒内攻，疹不出发斑者。

【方论选录】 此宣通疏利之剂，名为火里抽薪，使内热一解，则疹自出，纵不出亦无害。

08350 抽薪饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 黄芩 石斛 木通 栀子（炒） 黄柏各一二钱 枳壳一钱半 泽泻一钱半 细甘草三分

【用法】 水一钟半，煎七分，食远温服。内热甚者，冷服更佳。

【主治】 火热炽盛，瘟疫发狂，及孕妇外感发热。

①《景岳全书》：火炽盛而不宜补者。②《竹林女科》：孕妇外感发热。③《松峰说疫》：瘟疫发狂。④《医钞类编》：胃火发狂。

【加减】 如热在经络、肌肤者，加连翘、天花粉以解之；热在血分、大小肠者，加槐蕊、黄连以清之；热在阳明头面，或躁烦便实者，加生石膏以降之；热在下焦，小水痛涩者，加草龙胆、车前以利之；热在阴分，津液不足者，加门冬、生地、芍药之类以滋之；热在肠胃，实结者，加大黄、芒消以通之。

08351 抽薪散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 大附子

【用法】 上为末。津调，敷足心内，油纸盖之，绢条扎之。

【主治】 口舌生疮，并小儿火眼。

08352 抵圣丸

【方源】《普济方》卷一九二引《杨氏家藏方》。

【组成】 苦葶苈子不拘多少（于火上隔纸炒过）

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如小豆大。每服十丸，一日三次，食前煎麻子汤送下。五七日小便利，肿消为效。如喘嗽，煎桑白皮汤送下。如小儿须另丸小丸与服，看儿大小加减丸数服，煎枣肉汤送下。

【主治】 男子妇人头面手足虚肿。

【宜忌】 忌生冷、醋、粘滑食物及盐。

08353 抵圣汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 西赤芍一钱半（醋炒） 江枳壳一钱半（炒） 生人参一钱半 法半夏一钱半 泽兰叶三钱 新会皮一钱半 鲜生姜三片

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 腹胀呕吐，脉弦细涩者。

【方论选录】 产后瘀血内滞，脾胃不化，致痰湿阻遏其间，而脾不能运，胃不能纳，故腹胀呕吐不止焉。赤芍破瘀泻滞血，泽兰利水通血脉，枳壳泻滞气以宽胸，人参扶元气以助化源，半夏燥湿醒脾胃，陈皮利气和中州，鲜生姜温胃气以散痰湿也。水煎，温服，使瘀化滞行，则痰湿自消而脾胃调和，安有腹胀呕吐之患乎？

08354 抵圣散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】 夜明散（《普济方》卷八十三）。

【组成】 苍术二两

【用法】 上为细散。每服一钱，不计猪、羊子肝一个，用竹刀子批破，掺药在内，却用麻线缠定，用粟米泔一盏，煮熟为度，令患人先熏过眼后，药气绝即洒之，每日未发煎服。

【主治】 雀目不计日月。

08355 抵圣散

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】 椿根白皮（焙） 蒺藜子（炒） 枳壳（去瓤，麸炒） 防风（去叉）各一两

【用法】 上为散。每服一钱匕，白汤点下。

【主治】 肠风下血。

08356 抵圣散

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】 苦楝根白皮二两 白芜荑（去扇）半两

【用法】 上为末。每服一钱，水一小盏，煎取半盏，放冷，待发时服，不拘时候。

【主治】 小儿虫痛不可忍者。

08357 抵当丸

【方源】《伤寒论》。

【组成】 水蛭二十个（熬） 虻虫二十个（去翅足，熬） 桃仁二十五个（去皮尖） 大黄三两

【用法】 捣分四丸。每服一丸，以水一升，煮取七合服之。晬时当下血，若不下者，更服。

【主治】 伤寒有热，下焦蓄血，少腹满，小便自利者。

【方论选录】 ①《伤寒贯珠集》：此条证治与前条大同，而变汤为丸，未详何谓？尝考其制，抵当丸中水蛭、虻虫减汤方三分之一，而所服之数，又居汤方十分之六，是缓急之分，不特在汤丸之故矣。此其人必有不可不攻，而又有不可峻攻之势，如身不发黄，或脉不沉结之类，仲景特未明言耳。有志之士，当不徒求之语言文字中也。②《伤寒寻源》：同一抵当而变汤为丸，另有精义。经云：伤寒有热，少腹满，应小便不利，今反利者，为有血也，当下之，宜抵当丸。盖病从伤寒而得，寒主凝泣，血结必不易散，故煮而连滓服之，俾有形质相着得以逗留血所，并而逐之，以视汤之专取荡涤者，不同也。

【临证举例】 ①蓄血证 《普济本事方》：有人病伤寒七八日，脉微而沉，身黄发狂，小腹胀满，脐下冷，小便利。予曰，仲景云太阳病身黄，脉沉结，小腹硬，小便不利者，为无血也；小便自利，其人如狂者，血证谛也。投以抵当丸，下黑血数升，狂止，得汗解。经云，血在上则忘，在下则狂。太阳膀胱，随经而蓄于膀胱，故脐下膨胀，由阑门渗入大肠，若大便黑者，此其症也。②胁痛《名医类案》：虞恒德治一人，年四十余，因骑马跌仆，次年左胁胀痛，医与小柴胡汤，加草龙胆、青皮等药，不效。诊其脉，左手寸、尺皆弦数而涩，关脉芤而急数，右三部唯数而虚。虞曰：明是死血症（脉涩为血少，又云失血之后，脉必见芤；又曰关内逢芤则内痈作。论脉固属血病，然断之曰死血，亦因跌仆胁胀痛故耶）。用抵当丸一剂，下黑血二升许。后以四物汤加减调理而安。③经瘀腹痛《经方实验录》：常熟鹿苑钱钦伯之妻，经停九月，腹中有块攻痛，自知非孕。医予三棱、莪术多剂，未应。当延陈葆厚先生诊，先生曰：三棱、莪术仅能治血结之初起者，及其已结，则力不胜矣。吾有

药能治之，当予抵当汤丸三钱，开水送下。入夜，病者在床上反复爬行，腹痛不堪；天将旦，随大便下污物甚多，其色黄、白、红夹杂不一，痛乃大除。次日复诊，乃予加味四物汤，调理而愈。

08358 抵当汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 水蛭（熬） 虻虫各三十个（去翅足，熬） 桃仁二十个（去皮尖） 大黄三两（酒洗）

【用法】 以水五升，煮取三升，去滓，温服一升。不下，更服。

【功用】 ①《普济方》下瘀血。②《中医方剂学》：攻逐蓄血。

【主治】 伤寒瘀热在里，血蓄下焦，不结胸而少腹硬满，小便自利，大便硬而色黑易解，身黄有微热，脉沉结，或狂躁，或喜忘，或经水不利者。

①《伤寒论》：太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当硬满，小便自利者，下血乃愈；太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便自利，其人如狂者，血证谛也；阳明病，本有久瘀血，其人喜忘，屎虽硬，大便反易，其色必黑者；病人无表里证，发热七八日，下后脉数不解，合热则消谷善饥，至六七日不大便者。②《金匮》：妇人经水不利下。③《医林绳墨大全》：血结胸，谵语，小腹满，漱水不欲咽。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：苦走血，咸胜血，虻虫、水蛭之咸苦以除蓄血；甘缓结，苦泄热，桃仁、大黄之苦以下结热。②《金镜内台方议》：血在上则忘，血在下则狂。故与水蛭为君，能破结血；虻虫为臣辅之，此咸能胜血也；以桃仁之甘辛，破血散热为佐；以大黄之苦为使，而下结热也。且此四味之剂，乃破血之烈驶者也。③《伤寒附翼》：岐伯曰，血清气涩，疾泻之，则气竭焉；血浊气涩，疾泻之，则经可通也。非得至峻之剂，不足以抵其巢穴，而当此重任矣。水蛭，虫之巧于饮血者也；虻，飞虫之猛于吮血者也；兹取水陆之善取血者攻之，同气相求耳；更佐桃仁之推陈致新，大黄之苦寒，以荡涤邪热。名之曰抵当者，谓直抵其当攻之所也。

【临证举例】 ①蓄血证 《续名医类案》：张意田治角口焦姓人，七月间患壮热舌赤，少腹闷满，小便自利，日赤发狂，已三十余日，初服解散，继则攻下，但得微汗，而病终不解。诊之，脉至沉微，重按疾急。夫表证仍在，脉反沉微者，邪陷于阴也，重按疾急者，阴不胜真阳，则脉流搏疾，并乃狂矣。此随经瘀血，结于少腹也，宜服抵当汤。乃自制虻虫、水蛭，加桃仁，大黄煎服。服后下血无算。随用熟地一味捣烂煎汁，时时饮之，以救阴液；候其畅通，用人参、附子、炙草，渐渐服之，以固真元。共服熟地二斤余，人参半斤，附子四两，渐得平复。②闭经 《经方实验录》：周姓少女，年约十八九，经事三月未行，面色萎黄，少腹微胀，证似干血劳初起。因嘱其吞服大黄䗪虫丸，每服三钱，日三次，尽月可愈。自是之后，遂不复来，意其愈矣。越三月再诊，面颊以下几瘦不成人，背驼腹胀，两手自按，呻吟不绝。深悔前药之误。然病已奄奄，尤不能不一尽心力。第察其情状，皮骨仅存，少腹胀硬，重按痛益甚。此瘀积内结，不攻其瘀，病焉能除？又虑其元气已伤，恐不胜攻，思先补之，然补能恋邪，尤为不可。于是决以抵当汤予之。虻虫一钱，水蛭一钱，大黄五钱，桃仁五十粒。服药后下黑瘀甚多，胀减痛平。惟脉虚甚，不宜再下，乃以生地、黄耆、当归、潞党、川芎、白芍、陈皮、茺蔚子活血行气，导其瘀积。一剂之后，遂不复来。③发狂 《上海中医药杂志》（1981；5:26）：程某某，男，53岁，教师。1973年8月12日诊治。患者有头痛眩晕病已十余年，血压经常持续在250～180/150～110毫米汞柱之间，头痛恶热，得凉稍减。久服清热祛风，潜阳养阴之剂，症情时轻时重。因炎夏感受暑热，加之情志不舒而晕倒，昏不知人。住院服中西药治疗无效，邀吾诊治。症见形体肥胖，面色晦暗，昏不知人，骂詈不休。舌黄少津，质有瘀斑，少腹硬满，疼痛拒按，大便不通，脉象沉弦。血压220/120毫米汞柱。此素有血行不畅，又值暑热内侵，加之情志不舒，遂入血分，热与血结，瘀血攻心，致使神识昏迷。治宜通瘀破结，泻热通便。方用：酒大黄（后入）15克，水蛭12克，桃仁15克，虻虫4.5克，白芍15克。上方服后，泻下硬而黑晦如煤之便，腹痛减轻，神志清醒。续服2剂，又泻下4次，血压降至180/98毫米汞柱，诸症好转，继以它药调治而愈。

08359 抵疲汤

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】 天南星三钱（生） 礞石四钱（煅） 海浮石五钱 山甲三钱（炙） 诃子四钱 橘红五钱 龙骨三钱 甘草二钱

【用法】 元酒煎服。

【主治】 癫病呆呆痴痴，喜怒哀乐，发之皆不中节，或忘前失后，或言语不伦，或无故喜怒，或忽泣忽止，体较弱者。

【方论选录】 此方用南星为君能燥湿痰，佐以礞石能坠顽痰，诃子能化郁痰，橘红能导滞痰，以甘草调中，以龙骨收敛，以山甲引药达病所，使其积聚之痰，皆从海浮石由胸部之汗而出，其胸部愈见粘液愈妙。抵者触也，谓触动其痰，从汗而去也。

08360 抵当乌头桂枝汤

【方源】《外台》卷七引《伤寒论》。

【异名】 乌头汤(《圣济总录》卷九十四)、乌头桂枝汤(《普济方》卷二四八)。

【组成】 秋乌头（实中大者）十枚 白蜜二斤 桂心四两

【用法】 先以蜜微火煎乌头减半，去乌头，别一处，以水二升半，煮桂取一升，去滓，以桂汁和前蜜合煎之，得一升许，初服二合。不知，更服至三合；又不复知，更加之五合。其知，如醉状；得吐者，为中病也。

【主治】 寒疝腹满逆冷，手足不仁，若一身尽痛，灸刺诸药所不能治者。

【宜忌】 忌猪肉、冷水、生葱。

08361 抱龙丸

【方源】《幼幼新书》卷八引《灵苑方》。

【组成】 天南星一斤（生） 朱砂（细研，水飞） 紫石英（研，飞） 白石英（研，飞） 犀角（锉末）各一两 牛黄（研） 阿胶（锉碎，炒如珠子） 藿香 麝香（研）各半两 金箔五十片 雄黄（水磨通明者）四两（研）

【用法】 上为细末，更入乳钵内研如粉，以黄牛胆四十五个，取汁为丸，如樱桃大。每服一丸，以盐一捻，和药细嚼，新水吞下。如牛胆少，以煎水相和，诸疾服之，心膈清凉如冰雪，便觉精神爽快也。

【功用】 解一切热，化风痰。

【主治】 大人小儿风痫、惊痫，阳毒狂躁；及心热惊悸，夜卧不安，胸膈壅痰，厥头痛，心神恍惚。

08362 抱龙丸

【方源】《局方》卷六。

【组成】 雄黄（研，飞）四两 白石英（研，飞） 生犀角 麝香（研） 朱砂（研，飞）各一两 藿香叶二两 天南星（牛胆制）十六两 牛黄（研）半两 阿胶（碎，炒如珠）三两 金箔（研） 银箔（研）各五十片

【用法】 上为细末，入研者药令匀，用温汤为丸，如鸡头子大。每服一丸，用新汲水化破，入盐少许，食后服。

【主治】 风痰壅实，头目昏眩，胸膈烦闷，心神不宁，恍惚惊悸，痰涎壅塞；及治中暑烦渴，阳毒狂躁。

08363 抱龙丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 小抱龙丸(《局方》卷十淳祐新添方)、加减抱龙丸(《普济方》卷三八七)、保肝丸(《增补内经拾遗》卷四)。

【组成】 天竺黄一两 雄黄（水飞）一钱 辰砂 麝香（各别研）各半两 天南星四两（腊月酿牛胆中，阴干百日。如无，只将生者去皮脐，锉，炒干用）

【用法】 上为细末，煮甘草水为丸，如皂子大。每服百日小儿一丸分作三四服，五岁一二丸，大人三五丸，温水化下。淋浴后并可服，壮实小儿宜时与服之。伏暑，加盐少许，嚼一二丸，新水送下，腊月中雪水煮甘草和药尤佳。一法用浆水或新水浸天南星三日，候透软，煮三五沸，取出乘软切去皮，只取白软者，薄切，焙干，炒黄色，取末八两，以甘草二两半，拍破，用水二碗浸一宿，慢火煮至半碗，去滓，旋旋洒入天南星末，慢研之，令甘草水尽，入余药。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：伤风瘟疫，身热昏睡气粗，风热痰塞壅嗽，惊风潮搐，及蛊毒、中暑；亦治室女白带。②《寿世保元》：小儿四时感冒，疮疹欲出发搐。

【方论选录】 ①《育婴秘诀》：抱者，养也；龙者，纯阳之物，肝主风。小儿病则有热，热则生风，上二虑之，制此方以平肝木，防惊风，此抱龙之名义。②《小儿药证直诀笺正》：是方胆星、竺黄不过为痰热而设，然方下主治不少，皆为实热痰壅言之，以小儿伤寒温热，每多痰热窒塞，故可通治。方下瘟疫，即今之所谓温病，然麝香开泄太重，此方太多，宜大减之。又谓壮实小儿可以时服，则言之太过，方后谓亦治室女白带，则带下每多湿痰凝滞，停积胞中所致，此能涤痰清热，所以可治。腊雪合药，清温甚佳。③《小儿药证直诀类证释义》：此方竺黄、胆星清热化痰；雄黄祛痰解毒治惊痫；麝香、辰砂芳香开窍而安心神；故适于小儿痰热内壅而致的急惊实证。

【备考】 本方加琥珀，名“琥珀抱龙丸”(见《景岳全书》卷六十二)；以金箔为衣，名“金衣抱龙丸”(见《北京市中药成方选集》)。

08364 抱龙丸

【方源】《三因》卷三。

【组成】 赤小豆四两（略炒） 五灵脂 白胶香 破故纸（炒） 狗脊（火去毛） 木鳖子（去壳） 海桐皮 威灵仙 地龙（炒） 草乌（米泔浸三日，净洗，去皮尖）各一两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服五十丸，空心盐、酒任下。

【主治】 肝肾脏虚，风湿进袭，流注腿膝，行步艰难，渐成风湿脚气，足心如火，上气喘急，小腹不仁，全不进食。

08365 抱龙丸

【方源】《古方选注》卷下。

【组成】 琥珀五钱 辰砂三钱 雄黄七钱（香麻油煎十二时，再用水萝卜汁煮） 胆星二两一钱 僵蚕四钱（炒，去嘴足） 全蝎三钱（研末，用石榴一枚剜空，以无灰酒调末填入盖定，坐文火上徐徐搅动成膏，取出冷用） 牛黄一钱 麝香五分 天竺黄七钱 赤茯苓一两

【用法】 上药各为末，蒸饼为丸，金箔为衣。灯心、薄荷汤送下。

【功用】 熄风化痰，镇惊发音，保守肝魂。

【主治】 肝惊魂升，搐搦不语。

【方论选录】 僵蚕、全蝎、薄荷辛以散肝风，天竺黄、胆星苦辛以泄风痰，辰砂、琥珀安五脏、镇魂魄，雄黄搜肝胆之伏风，麝香利骨髓之伏痰，金箔佐辰砂可镇胎惊，竺黄佐牛黄可发音声，赤苓、灯心可止夜啼。集肝经之药复方，初无深义。一方加入参二钱五分，培植正气以御肝风；草河车三钱五分（即蚤休草，切片，黑稆豆制），能伏牛黄、丹砂之毒，并可治惊祛风，二味却有妙义，当纂入方中。

【备考】 按：本方加人参、草河车，名“人参抱龙丸”（见《饲鹤亭集方》）。

08366 抱胆丸

【方源】《春脚集》卷四。

【组成】 川郁金一两 天竺黄一两 雄黄五钱 白矾三钱

【用法】 上为细末，用不落水猪心血捣匀为丸，如龙眼肉大，朱砂为衣。每日服一丸，以石菖蒲五分煎汤调下。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：镇静化痰，防止抽搐。

【主治】 诸般疯狂癫痫，痰迷心窍。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌食油腻、五辛、酒类。

08367 拂手汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 大黄（酒蒸）三钱 青皮（醋炒） 石膏（煅） 黄连（酒炒） 甘草 白芍 厚朴（姜汁炒）各二钱

【用法】 水煎服，不拘时候。

【主治】 湿流入胃经，腹中作痛，时疼时止。

08368 拔粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】 薤白一握（去须，细切） 葱白一握（去须，细末） 白面四两

【用法】 以上和面，调令匀，临汤，以筋旋拨入锅中，熟煮，空腹食之。

【功用】《药粥疗法》：宽胸止痛，行气止痢。

【主治】 ①《圣惠》：赤白痢，休息气痢，久不愈者。②《药粥疗法》：胸胁刺疼，胸痹心痛，以及冠心病心绞痛。

【宜忌】《药粥疗法》：对发热病人，不宜选用。

【备考】《药粥疗法》本方用法：用于冠心病心绞痛辅助治疗，可以间断温热服用；治疗肠炎痢疾，以3～5天为一疗程，每天分2～3次温服。

08369 拔云丸

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】 当归一两二钱 川芎 地骨皮 白蒺藜 密蒙花 池菊 羌活 荆芥各一两 红花五钱 木贼一两 蔓荆子 薄荷 枳壳 甘草各五钱 蝉蜕 蛇蜕 川连各二钱 川椒七钱半

【用法】 上药各为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱。

【主治】 一切翳膜外障。

08370 拔云丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】 蔓荆子 木贼草 密蒙花 川芎各二钱 白蒺藜 当归各二钱半 甘菊二钱 薄荷五分 黄连 蝉蜕 楮实 花粉各六分 地骨皮八分 川椒七分 甘草四分

【用法】 上为末。空心水下。

【主治】 翳肉。

08371 拔云汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 黄耆一分 细辛 生姜 葛根 川芎各五分 柴胡七分 荆芥穗 藁本 生甘草 升麻 当归身 知母各五钱 羌活 防风 黄柏各一钱五分

【用法】 上㕮咀，如麻豆大，都作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，食后热服。

【主治】 寒水翳，寒膜遮睛，隐涩难开，两目紧缩而无疼痛，两手寸脉细紧，按之洪大无力，呵欠，善悲健忘，嚏喷眵泪，时自泪下，面赤而白，能食不大便，小便数而欠，气上而喘。

08372 拨云散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】 荆芥穗 川芎 防风各二两 枳壳（麸炒） 蝉蜕（去翅足） 薄荷 龙胆草 甘草各五钱

【用法】 上为末。每服二钱，食后服。

【主治】 上焦壅热，眼目赤肿疼痛，或生翳障。

08373 拨云散

【方源】《局方》卷七（绍兴续添方）。

【组成】 羌活 防风 柴胡 甘草（炒）各一斤

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏半，煎至七分，食后、临睡时薄荷汤调下；菊花苗汤下亦得。

【主治】 风毒上攻，眼目昏暗，翳膜遮障，怕日羞明，多生热泪，隐涩难开，眶痒赤痛，睑眦红烂，瘀肉侵睛；并治一切风毒眼疾。

【宜忌】 忌腌藏、鲜酱，湿面、炙煿，发风毒物。

08374 拨云散

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】 川芎 楮实 龙胆草 羌活 薄荷 石决明 苍术 大黄 荆芥穗 甘草 木贼 密蒙花 连翘 川椒 草决明 桔梗 石膏 甘菊花 白芷 地骨皮 白蒺藜 槟榔各半两 石燕一对重半两

【用法】 上为末。每服三钱，食后茶清调下，一日三次。

【主治】 眼因发湿热不退，而作翳膜遮睛，昏暗羞明，隐涩难开。

【宜忌】 忌杂鱼、猪、马、荞面、辛热之物。

【备考】 《普济方》有地肤子、白术，无地骨皮。

08375 拨云散

【方源】《程松崖眼科》。

【组成】 木贼一两 防风六钱 柴胡六钱 青葙子八钱 蝉蜕一两 黄芩六钱 菊花八钱 车前子八钱

【用法】 上为极细末。早晨空心开水调服二钱，晚服一钱。或用猪肝一块割开，放药末二钱填内，用湿棉纸包好，置灰中煨熟食之，亦可煎服之。外点消炉散。

【主治】 眼睛黑珠云翳围满，有瞳仁者。

08376 拨云散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 黄芩 甘草 薰本 栀子 防风 菊花 密蒙花 连翘 桔梗 薄荷 赤芍药 白蒺藜

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 三焦积热、肝膈风热上攻，眼赤涩肿痛，年深有红翳于乌睛上，浓泪如红霞映日者。

08377 拨云散

【方源】《回春》卷五。

【组成】 珍珠 胆矾 石燕（醋煅） 宫硼砂（飞过） 琥珀 玛瑙各五分 乳香 血竭各五分 石蟹一钱 辰砂 黄连各一钱 大片脑半分 炉甘石（火煅，童便淬）五钱

【用法】 上为极细末，用瓷器盛贮。先将凉水洗净眼后，用银簪挑药点眼，良久则效。如作膏子，用蜜调和点之。

【主治】 一切眼目风热肿痛，昏暗不明，生花障翳，或热极红赤，痛不可忍。

08378 拨云膏

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】 炉甘石 黄丹各一两 川乌七钱半 犀角 乳香 没药 硇砂 轻粉各一钱 铜绿 鹰条各一钱二分半 青盐 血竭 片脑各半钱 麝香 蕤仁各七钱半 当归二钱半 黄连一两五钱 蜜一斤

【用法】 上药各为细末，用白沙蜜十五两，慢熬，初沸下黄丹，二沸下炉甘石，三沸下诸药末，不粘手为度，用瓷盏纳。热水泡开，热点，不拘时候。

【主治】 ①《袖珍》：眼生云翳。②《丹溪心法附余》：攀睛瘀肉。

08379 拨风云膏

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 硇砂 硼砂 珍珠 琥珀（火煅） 珊瑚 玛瑙珏璟各三钱（火煅） 熊胆 石燕（火煅醋淬）三个 自然铜 乳香 没药 当归各二钱 轻粉 青盐 胆矾 铜青 血竭 海螵蛸 麝香 黄连 黄芩 黄柏 白丁香 石蟹 牛黄各二两 炉甘石半斤 黄丹四两

【用法】 上药各为末，用蜜一斤绢滤，入水二盏子铜锅内，熬至滴水成珠，方入黄丹搅匀，次入诸药和匀，捏成锭子，油纸摊放地上，盆覆出汗为度，次日用笋箬包裹收之。用时以井水或梨汁化开，银簪点入，将目紧闭仰卧，切不可走泪，使药随泪出无效。但有攀睛云翳，空心点眼，每日点三次，点三日，歇三日，看障翳俱尽，方研冰片三

匣，和膏半分，再点一次，光即复矣。

【主治】 攀睛云翳，火眼，胬肉攀睛，眼绊红丝。

【加减】 如火眼，加冰片；胬肉攀睛，眼绊红丝，加蕤仁、熊胆，与药等分，亦用水化开前药，将冰片等药研加之。

【宜忌】 忌牛、羊、鱼、肉、葱、蒜、韭、房事及酒。

【备考】 方中熊胆用量原缺。

08380 拨云退翳丸

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷一引《医林方》。

【组成】 甘菊 川椒 木贼 白蒺藜 密蒙花 蛇蜕 蝉蜕 川芎 蔓荆子 荆芥穗 石燕子（煅）黄连 薄荷 瓜蒌根 枳实 羌活 当归 地骨皮 甘草各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，茶清嚼下。

【功用】 消翳膜。

【主治】 ①《东医宝鉴·外形篇》引《医林方》：翳膜。②《中药制剂手册》：由于肝经风热引起的火眼外障，目赤肿痛，视物不清，畏光羞明。

【方论选录】《医方集解》：此足太阳、厥阴药也。羌活、荆芥、蔓荆、薄荷，以升阳散风；当归、川芎以和血养肝；黄连、地骨皮、花粉清火热；枳实破滞气；川椒温下焦；木贼、蛇蜕、蝉蜕以退翳；密蒙、蒺藜、甘菊，目家专药，以润肝补肾，泻火清金，炙甘草补中，以和诸药也。

【宜忌】《中药制剂手册》：忌食辛辣等刺激性之物。

【备考】《玉机微义》本方用法：翳者，米泔水送下；睛暗，当归汤送下；内障，木香汤送下。

08381 拨云退翳丸

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】 拨云丸（《全国中药成药处方集》上海方）、拨云退翳丹（《全国中药成药处方集》沈阳方）。

【组成】 川芎一两五钱 菊花一两 蔓荆子二两 蝉蜕一两 蛇蜕（炙）三钱 密蒙花二两 薄荷叶半两 木贼草（去节）二两 荆芥穗一两 黄连 楮桃仁各半两 地骨皮一两 天花粉六钱 炙草三钱 川椒皮七钱 当归 白蒺藜（去刺，炒）各一两五钱

【用法】 上为细末，炼蜜成剂，每两作八丸。每服一丸，食后、临睡细嚼，茶清送下。

【功用】《中国药典》：散风明目，消障退翳。

【主治】 ①《原机启微》：阳跻受邪，内眦即生赤脉缕缕，根生瘀肉，瘀肉生黄赤脂，脂横侵黑睛，渐蚀神水，锐眦亦然。俗名攀睛。②《中国药典》：目翳外障，视物不清，隐痛流泪。

【方论选录】《难经》曰：阳跻脉者，起于跟中，循外踝上行入风池，风池者，脑户也。故以川芎治风入脑，以菊花治四肢游风，一疗其上，一平其下为君；蔓荆子除手太阴之邪，蝉蜕、蛇蜕、木贼草、蜜蒙花除郁为臣；薄荷叶、荆芥穗、白蒺藜诸疗风者，清其上也，楮桃仁、地骨皮诸通小便者，利其下也，为佐；黄连除胃中热，天花粉除肠中热，甘草和协百药，川椒皮利五脏明目，诸所病处血亦病，故复以当归和血为使也。

【备考】《全国中药成药处方集》（上海方）有羌活、桃仁，无楮桃仁。《全国中药成药处方集》（沈阳方）"拨云退翳丹"少楮桃仁、川椒皮。

08382 拨云退翳丹

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】 水银一两二钱 青铅二两 硼砂一两六钱 火消一两二钱 明矾一两二钱 皂矾一两 防风 草决明 木贼 威灵仙 龙胆草 荆芥各二钱半 归尾五钱

【用法】 前六味中，先将水银熔化，入铅搅匀，倾出研细，然后每味各研和匀；次将后七味，用水五盏，煎至三盏，去滓，再煎至将干，下煎六味末结胎，盐泥固济，以三炷香为度，先文后武，取掇至地上出火气，子上刮取，其色要淡黄色为佳；每升药五分，配上好煅过炉甘石一钱，冰片、朱砂、雄黄、珍珠各二分，白丁香（飞过）、硇砂各一分，元明粉五厘，共研极细，瓷瓶收贮待用。点眼。

【主治】 一切星障胬肉，顽翳老膜，诸般实症；并治瞽目。

08383 转天汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【异名】 转胎汤（《中医症状鉴别诊断学》）。

【组成】 人参二两 当归二两（酒洗） 川芎一两 川牛膝三钱 升麻四分 附子一分（制）

【用法】 水煎服。一剂而儿转身，再二剂自然顺生。

【主治】 脚手先下难产。

【方论选录】 此方之妙，用人参以补气之亏，用芎、归以补血之亏，人人皆知其义。若用升麻又用牛膝、附子，恐人未识其妙也。盖儿已身斜，非用提挈则头不易转，然转其身非用下行则身不易降。升麻、牛膝并用，而又用附子者，欲其无经不达，

使气血迅速以催生也。

08384 转舌丸

【方源】《奇效良方》卷二。

【组成】 凉膈散加石菖蒲 远志

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大，朱砂为衣。每服一丸，薄荷汤化开，食后或临卧服。

【主治】 中风瘛疭，舌謇不语。

【方论选录】《医略六书》：积热生风，厥阴受病，故瘛疭便闭，舌塞不语焉，连翘散结清心，黄芩泻热清肺，合竹叶、薄荷以解厥阴之热，消、黄、甘草以除蕴积之热，菖蒲开窍，远志通心，栀子性寒降泄，使上热下行则风火并熄而舌自不塞，语言自便，瘛疭无不宁矣，何便闭之有？

【备考】 本方原名“转舌膏”，与剂型不符，据《张氏医通》改。

08385 转呆丹

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】 人参一两 白芍三两 当归一两 半夏一两 柴胡八钱 生枣仁一两 附子一钱 菖蒲一两 神曲五钱 茯神一两 天花粉三钱 柏子仁五钱

【用法】 水十碗，煎一碗，使强有力者，抱住其身，另用二人执拿其两手，以一人托住其下颔，一人将羊角去尖，插其口灌之。倘不肯服，不妨以杖击之，使动怒气，而后灌之。服后必然骂詈，少顷必倦而卧，听其自醒，切不可惊动，自醒则全愈，否则止可半愈也。

【功用】 大补心肝气血，祛痰开窍。

【主治】 呆痴。终日闭户独居，口中喃喃，多不可解，将自己衣服用针线密缝，与之饮食，时用时不用，尝数日不食，而不呼饥，见炭最喜食之。

08386 斩关丸

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】 薄荷 玄参 硼砂 风化消 石膏 山豆根 桔梗 甘草各二钱 片脑三分

【用法】 上为极细末，和匀，生蜜为丸，如芡实大。每用一丸，舌上噙化。

【主治】 咽喉肿痛，兼治口舌生疮。

08387 软坚汤

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】 苦桔梗一钱半 海石 香附 瓜蒌 半夏 贝母各七分 黄芩 橘红各一钱 风化消四分

【主治】 老痰积久，稠粘咯吐不出。

08388 软坚汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 瓦楞子 30 克（醋煅） 海浮石 12 克（醋煅） 白芍 30 克（醋炒） 柴胡 9 克（醋炒） 陈皮 9 克 枳壳 9 克 桔梗 6 克 香附 9 克

【功用】 软坚磨积，疏肝理气。

【主治】 腹中肿块（癥瘕），腹中作痛，拒按，摸之有肿块，舌苔白，脉沉弦。

【方论选录】 方中瓦楞子、海浮石性平味咸，能软坚磨积散结，为方中主药；白芍能柔肝止痛，柴胡疏肝理气，二药配伍，一疏一柔，可缓解腹中疼痛，消除慢性炎症；陈皮、枳壳、桔梗、香附疏肝理气，通调腹中气机。

08389 软金丹

【方源】《局方》卷十。

【异名】 软金丸（《圣济总录》卷一六九）。

【组成】 使君子（炒，为末） 香墨（烧研） 青黛（细研） 麝香（细研） 腻粉（研）各一分 胡黄连（为末）一分 寒食面七钱半 天浆子七个（炒为末）

【用法】 上合研匀。以白面糊为丸，如小豆大。每服一丸，煎金银薄荷汤化下。五岁以上可服二丸，更量大小、虚实加减。不拘时候。

【功用】《幼幼新书》引《庄氏家传》：治惊疳，下积聚。

【主治】 小儿惊疳积聚，壮热羸瘦，手足抽搐，目睛上视，项背强硬，牙关紧急，多睡昏愦，痰涎壅塞。

①《局方》：小儿惊风壮热，多睡惊掣，精神昏愦，痰涎壅塞。手足抽搦，目睛上视，项背强硬，牙关紧急。②《圣济总录》：小儿急惊，手足搐搦，目睛直视。小儿惊疳，壮热羸瘦。③《幼幼新书》引《庄氏家传》：惊疳积聚。④《永乐大典》引《庄氏家传》：小儿急慢惊风。

08390 软金丹

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 软金丸（《幼科指掌》卷二）。

【组成】 天竹黄 轻粉各二两 青黛一钱 黑牵牛（取头末） 半夏（用生姜三钱同捣成曲，焙干，再为细末）各三分

【用法】 上为末，熟蜜剂为膏。每服半皂子大至一皂子大，食后薄荷水化下。

【主治】 惊热痰盛，壅嗽膈实。

【备考】《幼科指掌》本方用天竺黄三钱、轻粉一钱、半夏五钱、青黛一钱、黑牵牛七钱，炼蜜为丸，薄荷汤送下。

08391 软石膏丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷三，名见《医学正传》卷三。

【异名】 祛痰火丸(《医学入门》卷七)。

【组成】 南星 半夏 软石膏 香附 炒栀子各等分

【用法】 上为丸服。

【主治】 胃中痰火，嘈杂、嗳气。

①《丹溪心法》：嗳气，胃中有火有痰。②《医学正传》：嘈杂。③《医部全录》：痰火气嗳。

【备考】《医学正传》本方用法：上为细末，粥丸，如梧桐子大。每服五十丸，姜汤送下。本方方名，《医统》引作"半星丸"。本方改为汤剂，名"星半汤"(见《回春》)。

08392 软硬皂子丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 皂子一盏(去粗皮黄心) 玄参 连翘各一两

【用法】 上用水五盏，煮干，拣皂子软者，食后细嚼津液送下；硬者研末，蜜为丸，如弹子大。每夜含化一丸，半月即效。未破者破，已破者令核易落。不问远年近日，肿硬疼痛皆宜。如体盛硬甚者，皂子用硇砂醋煮令酥，瘰少少服，瘰多多服。

【主治】 瘰疬。

08393 卧龙丹

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 西黄 金箔各四分 梅冰 荆芥 闹羊花各二钱 麝香 辰砂各五分 牙皂角一钱半 细辛一钱 灯心灰二钱四分

【用法】 上为极细末。搐鼻，取嚏。

【功用】 通肺窍。

【主治】 痰热而闭，脉必滑大，口闭不语如厥者。

【备考】 原书治上证，先用本方搐鼻取嚏，以通肺窍，次用导痰开关散，开水调服八分，以吐稠痰。

08394 卧龙丹

【方源】《霍乱论》卷四。

【组成】 西牛黄 飞金箔各四钱 梅花冰片 荆芥 羊蹄蹯各二钱 麝香 当门子五分 朱砂六分 猪牙皂角一钱五分 灯心炭二钱五分

【用法】 上为细末，瓷瓶密收，勿使泄气。每用少许搐鼻，取嚏；垂危重证，亦可以凉开水调灌分许；外用酒调涂患处。

【主治】 ①《霍乱论》：诸痧中恶，霍乱五绝，诸般卒倒急暴之证，并治痈疽发背，蛇蝎蜈蚣咬伤。②《疫喉浅论》：疫喉闷痧，闭象未开，疫火已炽。

【宜忌】《中国医学大辞典》：孕妇忌服。

08395 虎杖汤

【方源】《圣济总录》卷三十。

【异名】 虎杖散(《御药院方》卷八)。

【组成】 虎杖(细锉)四两

【用法】 上以水一斗，煎至五升，去滓，看冷热以渍手足，即愈。于避风处用。

【主治】 伤寒毒气攻手足，虚肿疼痛甚者。

08396 虎杖汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 虎杖 牡丹皮 京三棱(炒)各一两一分 芎藭 当归(炒)各一两半 桂(去粗皮) 陈橘皮各三分 大腹并皮五个

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入生姜一枣大(拍碎)，同煎至七分，去滓，下地黄汁一合，芒消一钱匕，更煎一二沸，空心、日午温服。

【主治】 室女月水不通。

08397 虎杖液

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 虎杖根 500 克(洗净，切片)

【用法】 加水 2 升，煎至 500 毫升。毛笔蘸外涂，或作湿敷。

【主治】 烧伤。

08398 虎杖散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】 虎杖一两半 桂心一两 当归一两半 赤芍药一两 天雄一两(炮裂，去皮脐) 桃仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 芎藭一两 枳实一两(麸炒微黄) 羌活一两 防风一两(去芦头) 秦艽一两(去苗) 木香一两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候，稍热服。

【主治】 白虎风。血脉结滞，骨髓疼痛，发作无时。

08399 虎杖散

【方源】《本事》卷十。

【异名】 苦杖散、地髓汤(《得效》卷八)。

【组成】 苦杖根(俗呼为杜牛膝。净洗，碎)一合

【用法】 用水五盏，煎一盏，去滓，用麝香、乳香少许，研调下，温服。

【主治】 妇人诸般淋症。

【方论选录】《本事方释义》：苦杖即虎杖，其根气味苦微温，入足厥阴；麝香气味辛温，入手足少阴，能引入经络；乳香气味辛微温，入手足少阴，能逐瘀浊，无论男女淋症，小溲疼痛，此药神效。盖下焦本属至阴之处，此方取通则不痛之意。

【临证举例】 砂石淋 鄞县武尉耿梦得其内人患砂石淋者十三年矣，每发痛楚不可忍，溺器中小便下砂石剥剥有声，百方不效，偶得此方，啜之一夕而愈。

08400 虎杖散

【方源】《吴鞠通医案》。

【组成】 杜牛膝五钱 丹皮三钱 归横须三钱 降香末三钱 琥珀（同研末）六分 两头尖三钱 桃仁泥三钱 麝香（同研冲）五厘

【用法】 水煮三杯，分三次服。

【主治】 由房事不遂而成小便淋浊，茎管痛不可忍。

【临证举例】 淋痛 普，三十八岁，小便淋浊，茎管痛不可忍，自用五苓、八正、萆薢分清饮等淡渗，愈利愈痛，细询病情，由房事不遂而成。余曰：溺管与精管异途，此症当通精管为是。用虎杖散，现无虎杖，以杜牛膝代之。服药后，一帖而痛减，五帖而痛止，七帖浊净，后以补奇经而愈。

08401 虎龟丸

【方源】《增补内经拾遗》卷四引《医学原理》。

【组成】 虎胫骨一两 败龟板二两 苍术三两 黄柏二两 防己四两 归梢二两 牛膝一两半

【用法】 上为末，糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，或一百丸。空心盐、姜汤送下。

【功用】《杏苑》：清湿热，泄阴火为主；理湿益阴退火，行血壮筋骨为标。

【主治】 ①《增补内经拾遗方论》引《医学原理》：足膝痿弱。②《杏苑》：湿热佛郁，以致阴火上腾，两足痿弱软而痛，或如火焙，从足踝下上冲。

【方论选录】《衡要》：用防己、苍术以理湿，黄柏、龟板益阴以退火，归尾行血，虎胫骨、牛膝壮筋骨。

08402 虎挣散

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】 马钱子一斤 穿山甲二两 川附子二两

【用法】 马钱子用清水浸十五天，夏季每隔一日换水一次，冬天用温水浸之，换水一次，刮净皮毛，切一分厚细条，投香油锅中，煎至油沫净，再煎数滚，透心黄脆，再放入黄土内炒拌，至土粉有油气，入筛内筛去油土，再换土粉炒，如是三次，油尽，取出马钱子研细。穿山甲砂土炒松脆，研细。川附子用水浸三天，一日换水一次，晒干，再研细。以上三味药同研细末。根据年龄病情和体质不同，给服不同分量。小儿：1～3 岁，2～3 厘；4～6 岁，3～5 厘；7～12 岁，5 厘～1 分。成人 1～2 分。饭后一小时，黄酒送服。

【功用】 宣通经络，调和营卫，健脾和胃，消肿止痛，化阴为阳。

【主治】 骨关节结核，已溃未溃。

【宜忌】 虚弱者，用量酌减。

08403 虎骨丸

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】 虎胫骨（酥炙） 牛膝（酒浸，切，焙） 当归（去芦头，切，焙） 防风（去叉） 赤箭各二两 威灵仙（去土） 大雄（炮裂，去皮脐） 丹参 五加皮（锉） 杜仲（去粗皮，锉，炒） 桂（去粗皮） 石斛（去根） 仙灵脾 苍耳各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，空腹食前，温酒送下，每日三次。

【主治】 妇人偏枯，半身板痹，举动不随，或缓或急。

08404 虎骨酒

【方源】《普济方》卷九十三引《医学切问》。

【组成】 茄子根（净洗，蒸过，九月十月者，晒干）五两 鼠粘子（炒） 蔓荆子各一两 火麻子 晚蚕砂各半升 苍耳子 枸杞子（蒸）各半升 秦艽 萆薢各二两 生牛蒡叶一握 虎骨二两

【用法】 上用绢袋盛，于大罐内以酒浸，封闭不令失气，二七日开，不令面向瓶口，恐药触人。每服一盏，一日三次。

【主治】 中风瘫痪。

08405 虎骨散

【方源】《直指》卷四。

【组成】 虎胫骨（酒炙黄）一两半 白花蛇（酒浸，取肉，炙黄） 天麻 自然铜（用醋淬七次） 防风 白附子（炮） 槟榔 官桂 当归 羌活 牛膝 白芷 川芎 僵蚕（炒去丝）各一两 全蝎（焙） 地龙（去土） 乳香 没药 雄黄各半两 麝香一分

【用法】 上为末。每服二钱，食前以暖豆淋酒调下。

【主治】 白虎历节，走注痒痛，不得屈伸。

08406 虎骨散

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】虎骨五两 防风五两 当归十两 乳香五两 僵蚕五两 全蝎二两 天麻五两 桂心五两 白花蛇十两 射香五分

【用法】上为散。每服三钱，豆淋酒调下。

【主治】肢节痛不可忍，脉弦浮者。

【方论选录】毒风伤营，筋脉失养，故历肢节痛甚不可忍，谓之历节痛风焉。虎骨追风壮骨，桂心暖血温营，当归养血以荣经脉，防风散表以逐风邪，天麻祛风胜湿，僵蚕活络祛风，全蝎攻毒风之伏匿，花蛇窜经络之邪凝，乳香活血脉以止痛，射香通毫窍以出邪。为散豆淋酒下，以奏活血祛除毒风之功也。使血活气行则营卫调和而毒风自解，何历节疼痛之不除哉！此追风攻毒之剂，为毒风攻注历节痛之专方。

08407 虎潜丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】健步虎潜丸(《饲鹤亭集方》)。

【组成】黄柏半斤（酒炒） 龟版四两（酒炙） 知母二两（酒炒） 熟地黄 陈皮 白芍各二两 锁阳一两半 虎骨一两（炙） 干姜半两（一方加金箔一片，一方用生地黄，一方无干姜）。

【用法】上为末，酒糊为丸或粥为丸。

【功用】①《医学入门》：壮元阳，滋肾水，养气血。②《中国药典》（一部）：养阴潜阳，强筋壮骨。

【主治】肝肾不足，筋骨痿软；阴虚劳热。

①《丹溪心法》：痿厥之重者。②《医学入门》：诸虚不足，腰腿酸痛，行步无力。③《杏苑》：肾虚精髓衰乏，骨萎足软，行步艰辛。④《东医宝鉴·杂病篇》：阴虚劳证。⑤《杂病源流犀烛》：肾虚多唾。⑥《中国药典》（一部）：肾阴不足，筋骨痿软，精血亏损，骨蒸劳热。

【备考】《东医宝鉴·杂病篇》有当归。《医学入门》本方用法：上为末，猪脊髓为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心盐汤送下，干物压之。《杏苑》有“金箔为衣”。

08408 虎杖二金汤

【方源】《千家妙方》。

【组成】虎杖 30 克 郁金 15 克 金铃子 10 克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】清肝利胆。

【主治】急性胆囊炎。

【加减】如无虎杖，可用川大黄代，用量须减半。

08409 虎骨木瓜丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】虎骨（酥炙） 南乳香（研） 没药各一两 木瓜 天麻 苁蓉 牛膝各二两（以上四味用好酒浸十日，取出焙干）

【用法】上为细末，将原浸酒作糊和丸，如梧桐子大。每服二十至五十丸，空心食前温酒送下，每日二三次。

【主治】饮酒过度，寒湿停驻，经络不和，伤败气血，走注筋骨，疼痛昼静夜甚，或筹所伤，致筋骨走注，并妇人血风疼痛。

08410 虎骨四斤丸

【方源】《医学六要》卷五。

【组成】虎胫骨一两（酥炙） 没药（另研） 乳香（另研）各五钱 附子（炮，去皮尖）二两 肉苁蓉（洗净） 川牛膝 木瓜（去瓤） 大麻各一两半

【用法】将木瓜、苁蓉捣如膏，余药为末，加酒糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心盐汤送下。

【主治】肝肾气血不足，又受风湿而致脚气，足膝痠痛，步履不遂。

08411 肾气丸

【方源】《金匮》卷下。

【异名】八味肾气丸（原书卷下）、地黄丸(《圣惠》卷九十八)、八仙丸(《养老奉亲》)、补肾八味丸(《圣济总录》卷五十一)、八味地黄丸(《小儿痘疹方论》)、附子八味丸(《证治要诀类方》卷四)、金匮肾气丸(《赤水玄珠》卷七)、桂附八味丸(《简明医彀》卷四)、桂附地黄丸(《简明医彀》卷八)、附桂八味丸(《医方论》)、桂附八味地黄丸(《胎产心法》卷一)。

【组成】干地黄八两 薯蓣四两 山茱萸四两 泽泻三两 茯苓三两 牡丹皮三两 桂枝 附子（炮）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至二十五丸，酒送下，每日二次。

【功用】温补肾阳。

①《圣惠》：暖肾脏，补虚损，益颜色，壮筋骨。②《养老奉亲》：补老人元脏虚弱，腑气不顺，壮筋骨，益颜容，固精髓。③《局方》：久服壮元阳，益精髓，活血驻颜，强志轻身。④《摄生众妙方》：阴阳双补。⑤《金鉴》：引火归源。

【主治】肾阳不足，腰痛脚软，下半身常有冷感，少腹拘急，小便不利或小便反多，舌质淡胖，

脉虚弱尺部沉细，以及痰饮咳喘、水肿脚气、消渴、转胞、久泄、阴疸等属肾中阳气虚衰者。

①《金匮》：虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利，或短气有微饮，或男子消渴，小便反多，以饮一斗，小便一斗，及妇人病饮食如故，烦热不得卧，而反倚息者，此名转胞，以胞系了戾，故致此病。②《崔氏方》引张仲景：脚气上入少腹，少腹不仁。③《肘后方》：虚劳不足，大伤饮水，腰痛，小腹急，小便不利。④《局方》：肾气虚乏，下元冷惫，脐腹疼痛，夜多漩溺，脚膝缓弱，肢体倦怠，面色黧黑，不思饮食。⑤《圣济总录》：肾气内夺，舌喑足废。⑥《直指》：冷证齿痛。⑦《明医杂著》：命门火衰，不能生土，以致脾胃虚寒，饮食少思，大便不实。⑧《普济方》引《如宜方》：禀气虚，骨弱，七八岁不能行立。⑨《普济方》引《仁存方》：肾水不能摄养，多吐痰唾，及脾虚不能克制肾水，多吐痰唾而不咳。⑩《摄生众妙方》：两尺脉微弱，阴阳俱虚。⑪《赤水玄珠》：肾虚不能摄水，津液不降，致成痰饮，咳逆，潮热，盗汗。⑫《症因脉治》：真阳不足，脾肾虚寒，土不生金，肺金亏损，肺气虚不能摄血，面色萎黄，时或咳嗽见血，脉多空大无力。⑬《证治汇补》：脾肾两败，水溢于外，土困于中而成水肿，或阳虚小便不通。⑭《张氏医通》：肾脏真阳不足，火不归元。⑮《金鉴》：百会疽漫肿平塌，紫暗坚硬，面赤而烦，口干不渴，唇润，属阳虚浮泛者，及颊疡牙关紧急不开或旁肿不消，脓水清稀，因而成漏，复被寒侵疮孔，致生多骨，经年缠绵难愈者。⑯《疡科心得集·方汇》：命门火衰，不能生土，以致脾胃虚寒而患流注、鹤膝等证，不能消溃收敛。

【宜忌】 ①《外台》引《崔氏方》：忌猪肉、冷水、生葱、酪物、芜荑。②《中成药研究》(1981；2:46)：有咽干口燥，舌红少苔等肾阴不足，肾火上炎表现者，不宜使用本方。

【方论选录】 ①《医经溯洄集》：八味丸以地黄为君，而以余药佐之，非止为补血之剂，盖兼补气也。气者，血之母，东垣所谓阳旺则能生阴血者此也。夫其用地黄为君者，大补血虚不足与补肾也；用诸药佐之者，山药之强阴益气；山茱萸之强阴益精而壮元气；白茯苓之补阳长阴而益气；牡丹皮之泻阴火，而治神志不足；泽泻之养五脏，益气力，起阴气，而补虚损五劳，桂、附之补下焦火也。由此观之，则余之所谓兼补气者，非臆说也。②《医方考》：渴而未消者，此方主之。此为心肾不交，水不足以济火，故令亡液口干，乃是阴无阳而不升，阳无阴而不降，水下火上，不相既济耳！故用肉桂、附子之辛热壮其少火，用六味地黄丸益其真阴。真阴益，则阳可降；少火壮，则阴自生。肾间水火俱虚，小便不调者，此方主之。肾间之水竭则火独治，能合而不能开，令人病小便不出；肾间之火熄则水独治，能开而不能合，令人小便不禁。是方也，以附子、肉桂之温热益其火；以熟地、山萸之濡润壮其水；火欲实，则丹皮、泽泻之酸咸者可以收而泻之；水欲实，则茯苓、山药之甘淡者可以制而渗之。水火既济，则开阖治矣。③《千金方衍义》：本方为治虚劳不足，水火不交，下元亏损之首方。专用附、桂蒸发津气于上，地黄滋培阴血于下，萸肉涩肝肾之精，山药补黄庭之气，丹皮散不归经之血，茯苓守五脏之气，泽泻通膀胱之气化。④《金鉴》引柯琴：火少则生气，火壮则食气，故火不可亢，亦不可衰，所云火生土者，即肾家之少火游行其间，以息相吹耳，若命门火衰，少火几于熄矣。欲暖脾胃之阳，必先温命门之火，此肾气丸纳桂、附于滋阴剂中十倍之一，意不在补火，而在微微生火，即生肾气也。故不曰温肾，而名肾气，斯知肾以气为主，肾得气而土自生也。且形不足者，温之以气，则脾胃因虚寒而致病者固痊，即虚火不归其原者，亦纳之而归封蛰之本矣。⑤《古方选注》：肾气丸者，纳气归肾也。地黄、萸肉、山药补足三阴经，泽泻、丹皮、茯苓补足三阳经。脏者，藏经气而不泄，以填塞浊阴为补；腑者，如府库之出入，以通利清阳为补。复以肉桂从少阳纳气归肝，复以附子从太阳纳气归肾。⑥《血证论》：肾为水脏，而其中一点真阳便是呼吸之母，水足阳秘，则呼吸细而津液调。如真阳不秘，水泛火逆，则用苓、泽以行水饮，用地、萸以滋水阴，用淮药入脾，以输水于肾，用丹皮入心，以清火安肾，得六味以滋肾，而肾水足矣。然水中一点真阳，又恐其不能生化也，故用附子、肉桂以补之。

【临证举例】 ①痞结泄泻 《内科摘要》：一人坐立久则手足麻木，虽夏月亦足寒如冰，复因醉睡觉而饮水复睡，遂觉右腹痞结，摩之则腹间沥漉有声，得热摩则气泄而止，饮食稍多则作痛泄，此非脾胃病，乃命门火衰不能生土，虚寒使之然也，服八味丸而愈。②反胃 《齐氏医案》：曾治富商汤名扬，自谓体旺，酒色无度，行年四十，饮食渐减，形神尪羸，或教以每早进牛乳酒，初食似可，久之朝食至暮，酒乳结成羊屎形，一吐去，其大小便日夜不过数滴，全无渣滓下行，卧床不起，告急请诊。按之两尺脉微如丝，右关弦紧，乍有乍无，两

寸与左关洪大而散。余曰：足下之恙，乃本实先拔，先天之阴虚宜补水，先天之阳虚宜补火，水火既济，庶可得生。乃用熟地一两，山茱、山药各四钱，茯苓、泽泻、丹皮、肉桂、附子各三钱，煎服一剂，明早令进牛乳酒，至暮则下行，而不上吐矣，连服十剂，饮食渐进。遂从前方药料为丸，日服二次，嘱戒酒色，半载而康。③水肿 《中医杂志》(1956;12:635)：本方治疗水肿12例，症见眼睑水肿，小便不利或尿闭，面色苍白或萎黄，舌苔白厚或干燥，脉象沉微细弱。以肾气丸每次三钱，每日二次（其中3例因下肢水肿配合五皮饮），一般服药二周后症状减轻，尿量排泄增加，水肿渐消，12例中除2例伴有钩虫病或血丝虫病者无效外，均获治愈，疗程21至90天。④尿毒症 《新医学》(1976；4:177)：作者认为，多数晚期尿毒症，虽有高热心烦，出血倾向，便闭，苔厚黄等湿热邪盛之象，不过为发病之标，而其病本均属脾肾阳虚，故以肾气丸为基本方，并重用人参煎汤送服以扶正祛邪，同时酌伍山药、黄耆、白术以补气健脾，公丁香、旋复花、半夏、竹茹以和胃降逆，配合必要的西药。经治5例，疗效满意，随访三年以上，情况良好，其中2例肾功能已恢复正常。⑤慢性肾炎蛋白尿 《安徽中医学院学报》(1982；3:63)：本方加黄耆、白术、荠菜花、煅龙牡等治疗慢性肾炎蛋白尿属肾阳亏损，脾阳不运，气不化水者3例，分别服药15至20剂，尿蛋白即由卅至卌全部转阴，随访年余未复发。⑥复发性口疮 《湖北中医杂志》(1983；2:11)：复发性口疮属元阳不归命门，虚火上升，浮阳于外，上热下寒，症见唇、舌或颊内等处出现黄豆大小的淡白色圆形或椭圆形溃烂斑点，周围颜色淡红，疼痛或重或轻，疲劳易发，同时伴有畏寒肢冷，乏力懒言，小便清长，大便溏薄等。治疗以本方温养命火，引火归元，若口腔溃烂有腐臭味者，加地骨皮10克，生石膏15克，丹皮增至10克；口渴明显者，加石斛20克，麦冬10克；另可用锡类散外搽患处。所治5例中，2例痊愈，2例愈后复发，按原方再服而愈，1例好转。

【现代研究】 ①抗动脉硬化作用的研究 《新药与临床》(1982；8:1366)：日人渡边宣佳等报告，服用八味地黄丸后，可使血中高密度脂蛋白——胆固醇（HDL-C）上升，且尤以女性为显著。由于高密度脂蛋白——胆固醇有抗动脉硬化的作用，因此本实验结果具有重要意义。②抗糖尿病成分的研究 《中成药研究》(1982；1:46)：采用链脲佐菌素（简称STZ）造成大鼠糖尿病模型，发现八味丸中抗STZ糖尿病的有效成分为山茱萸中的熊果酸与齐墩果酸。由于上述有效成分在八味丸的水提干浸膏中未能检出，故研究者认为应用八味丸治疗糖尿病时，以古方丸剂或散剂为宜。③对免疫功能的影响 《成都中医学院学报》(1985；4:40)：本方对小鼠体内外周血淋巴细胞转化率及抗体产生有一定影响。研究结果提示：金匮肾气丸可显著增强机体非特异性细胞免疫功能和体液免疫功能，并能促进抗体提前产生。

【备考】 本方方名，《崔氏方》引作“八味丸”（见《外台》）；改为汤剂，名“肾气汤”（见《普济方》）、“八味地黄汤”（见《辨证录》）、“八味饮”（见《西塘感证》）、“加味地黄汤”、“桂附地黄汤”（见《金鉴》）、“八味汤”（见《杂症会心录》）、“阳八味汤”（见《医门补要》）、“桂附八味汤”（见《喉科种福》）。

08412 肾气丸

【方源】 《保命集》卷下。

【组成】 苍术一斤（米泔水浸） 熟地黄一斤 川姜冬一两，夏五钱，春、秋七钱 五味子半斤

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服一百至二百丸，食前米饮送下或酒送下。

【功用】 ①《保命集》：养血益肾。②《保命歌括》：补肾虚，消水肿。

【主治】 阳盛阴虚，脾肾不足，房室虚损，形瘦无力，面多青黄而无常色。

【备考】 《脉因证治》有川芎，无干姜。

08413 肾气丸

【方源】 《竹林女科》卷二。

【组成】 熟地黄 菟丝子各八两 当归身三两五钱 肉苁蓉五两（酥炙） 山萸肉二两五钱 黄柏（酒炒） 知母（酒炒）各一钱 破故纸（酒炒）五两

【用法】 上为末，酒糊为丸。每服五七十丸，空心淡盐汤送下。

【主治】 子淋。因房劳内伤而致热积膀胱，小便淋涩，心烦闷乱。

08414 肾约汤

【方源】 《证治宝鉴》卷四。

【组成】 黄耆 人参 升麻 杞子 山药 益智仁

【用法】 水煎服。

【主治】 肾水不升，频频渗下，以致消渴。

08415 肾沥汤

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】磁石二两（捣碎，水淘去赤汁，以帛包之） 巴戟一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 沉香半两 石斛半两（去根，锉） 人参半两（去芦头） 肉桂一两（去皱皮） 白茯苓半两 牛膝三分（去苗） 黄耆半两（锉） 五味子半两 桑螵蛸半两（微炒） 泽泻半两 防风半两（去芦头） 熟干地黄一两 山茱萸三分

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，用羊肾一对（切去脂膜），加生姜半分，与磁石包子同煎至五分，去滓，空心及晚食前温服。

【主治】肾脏风虚，两耳常鸣。

08416 肾沥汤

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心三分 熟干地黄三分 人参三分（去芦头） 山茱萸三分 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁，以帛包之） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，去皱皮，炙令干）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，用羊肾一对（切去脂膜），加生姜半分、薤白三茎，与磁石包子同煎至五分，去滓，空心及晚食前温服。

【主治】肾脏风虚，两耳常鸣。

08417 肾沥汤

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】鸡肶胵一两（微炒） 远志一两（去心） 人参一两（去芦头） 黄耆一两（锉） 桑螵蛸一两（微炒） 泽泻一两 熟干地黄一两 桂心一两 当归一两 龙骨一两 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬二两（去心） 五味子半两 磁石三两（捣碎，水淘去赤汁） 白茯苓一两 芎藭二两 玄参半两

【用法】上为散。每服用羊肾一对（切去脂膜），先以水一大盏，煮羊肾至一盏，去水上浮脂及肾；次入药五钱，生姜半分，煎至五分，去滓，空心温服，晚食前再服。

【主治】消肾。肾气虚损，发渴，小便数，腰膝痛。

【备考】本方原名“肾沥丸”，与剂型不符，据《鸡峰》改。又本方方名，《普济方》引作“肾沥散”。

08418 肾沥汤

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】白羊肾一具（去脂膜，切） 黄耆（锉） 杜仲（锉，炒） 五味子 生姜（切）各一两半 生干地黄（焙）一两 人参半两 枣五枚（去核） 磁石三两（捶碎，绵裹）

【用法】上除羊肾、磁石外锉碎，分为二剂。先以水四升，煎肾与磁石至二升，去肾下诸药，再煎取八合，去滓，食前分二次服之。

【主治】消渴，小便白浊如脂。

08419 肾热汤

【方源】方出《千金》卷六，名见《医方考》卷五。

【组成】磁石 白术 牡蛎各五两 甘草一两 生麦门冬六两 生地黄汁一升 芍药四两 葱白一升 大枣十五枚

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，分三服。

【功用】《医方论》：清寒重镇，敛阴退火，健脾和胃。

【主治】肾热，背急挛痛，耳出脓血，或生核塞之，不闻人声。

【方论选录】①《医方考》：耳者，肾之窍，故肾热则令人病耳，生脓出血，不闻人声也。是方也，磁石能引肺金之气下降于肾，肾得母气，自然清肃，而热日愈；生地汁、麦门冬、白芍药，所以滋肾阴而泻肾热；乃葱白者，所以引肾气上通于耳也；牡蛎咸寒，能软坚而破结气，得葱白引之入耳，则能开听户而消脓血；乃白术、甘草、大枣者，健脾之品也，所以培万物之母，益土气而制肾邪尔！②《医方集解》：此足少阴药也。磁石体重辛咸，色黑补肾祛热，通耳明目，故以为君；牡蛎咸寒，软痰破结，生地大寒，泻火滋肾，麦冬、甘草补肺清金，白芍酸寒，平肝和血，皆能生水而制火，退热而敛阴；白术、甘草、大枣，补脾之品，益土气正以制肾邪也。数者皆固本之药，使精气充足，邪热自退，耳窍自通。加葱白者，以引肾气上通子耳也。

08420 肾疸汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】羌活 防风 藁本 独活 柴胡各五分 升麻五钱 白茯苓二分 泽泻三分 猪苓四分 白术五分 苍术一钱 黄柏二分 人参三分 葛根五分 神曲六分 甘草三钱

【用法】上锉，如大豆大。分为二服，每服以水三盏，煎至一盏，去滓，食前热服。

【主治】①《兰室秘藏》：肾疸目黄，甚至浑身黄，小便赤涩。②《寓崖尊生》：女劳疸，日夕热恶寒，额黑出汗，手足热，腹胀如水，大便黑时溏，身目黄，小便不利。

【备考】《脉因证治》有芍药，无葛根；《医学正传》有黄芩，无白茯苓；《金鉴》有黄芩，无藁本。

08421 肾着汤

【方源】《三因》卷十七。

【组成】茯苓 白术各四两 干姜（炮） 甘草各二两（炙） 杏仁（去皮尖，炒）三两

【用法】上锉散。每服四钱，水一盏半，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠腰脚肿痛。

08422 肾着汤

【方源】《易简方》。

【组成】苍术 白术 甘草各一两 干姜三两 茯苓一两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜三片、大枣一枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】腰重而冷疼者。

08423 肾着散

【方源】《外台》卷十七引《经心录》。

【异名】桂心散（《圣惠》卷四十四）、大肾着汤（《圣济总录》卷五十一）。

【组成】桂心三两 白术四两 茯苓四两 甘草二两（炙） 泽泻二两 牛膝二两 干姜二两 杜仲三两

【用法】上为散。每服三方寸匕，以酒一升，煮五六沸，去滓顿服，每日三次。

【主治】①《外台》引《经心录》：肾着腰痛。②《圣济总录》：肾着，腰冷如冰，腹重如物所堕。

【宜忌】忌生葱、桃、李、雀肉、海藻、菘菜、酢物。

08424 肾炎汤Ⅰ号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】冬瓜子30克 冬瓜皮30克 车前子30克（布包） 茯苓皮30克 赤小豆30克 薏苡仁30克 白茅根60克 泽泻12克 苏梗 桔梗各6克 陈皮6克 旱莲草9克 蝉蜕6克

【功效】利尿消肿。

【主治】急性肾炎。周身浮肿，腰酸痛，小便量少色黄，舌苔薄白，脉浮数。

【方论选录】冬瓜皮、冬瓜子、车前子、茯苓皮、赤小豆、薏苡仁淡渗利水；茅根、泽泻清热利尿，既消肿又消炎；陈皮、苏梗、桔梗理气，加强利尿作用；蝉蜕散风热，善治面部浮肿（风水）；旱莲草凉血益肾。

08425 肾炎汤Ⅱ号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】巴戟天9克 仙灵脾9克 补骨脂9克 制附片5克 黄耆15克 党参9克 茯苓12克 薏苡仁12克 猪苓12克 石韦15克 白茅根30克 旱莲草9克

【功用】健脾益肾，利尿消肿。

【主治】慢性肾炎（脾肾阳虚型）。周身浮肿，腰膝酸软无力，小便量少，形寒肢冷，舌质淡胖嫩，有齿痕，脉沉细无力。

【方论选录】巴戟天、仙灵脾、补骨脂温补肾阳，黄耆、党参健脾补气；茯苓、薏苡仁、猪苓、泽泻、石韦、白茅根利尿消肿，旱莲草益肾止血。

08426 肾浊秘精丸

【方源】《普济方》卷二十七。

【组成】石莲肉（去皮） 鹿角霜 熟地黄各四两 黄耆二斤（捶碎）

【用法】上前三药为末，将黄耆以水六升浸一宿，次早按洗味淡，去滓，于银石器中熬汁成膏，搅和前药末为丸，如梧桐子大。每服五十至百丸，空心食前以米汤、温酒任下。

【功用】守中安神，禁固精血，益气驻颜色，延年不老。

【主治】元气不固，夜梦遗精梦泄。

08427 肾着灵效汤

【方源】《千家妙方》。

【组成】白术15克 茯苓24克 甘草9克 制乳香3克 制没药3克 丹参12克 当归12克 土元9克 骨碎补12克 杜仲9克 木瓜9克 怀牛膝12克 续断12克 三七粉4.5克 金钱白花蛇一条 蜈蚣3条 桃仁9克 红花9克

【用法】水煎服。

【功用】补肾壮骨，强筋通络，祛风除湿，活血祛瘀。

【主治】增生性脊椎炎（寒湿瘀阻型）。

08428 咀华清喉丹

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】大生地黄（切片）一两 硼砂（研细）一钱半

【用法】将生地黄一片，裹硼砂少许，徐徐嚼细咽之，半日许宜将药服完。

【主治】咽喉肿疼。

【方论选录】生地黄之性能滋阴清火，无论虚热、实热，服之皆宜；硼砂能润肺，清热化痰，消肿止疼，二药并用，功力甚大。而又必细细嚼服者，因其病在上，煎汤顿服，恐其力下趋，而病转不愈，且细细嚼咽，则药之津液常清润患处也。

08429 鸣金汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 黄连三钱 麦冬五钱 玄参五钱 生地五钱 桔梗三钱 甘草二钱 天花粉二钱

【用法】 水煎服。一剂声出，二剂声响，不必三剂。

【功用】 泻心火之有余，滋肺金之不足。

【主治】 失音。心火太旺，销烁肺金，口渴之甚，舌上无津，两唇开裂，喉中干燥，遂至失音。

08430 败龟散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】 败龟二两（涂酥，炙令黄） 白僵蚕一两（微炒） 没药半两 薏苡仁一两 当归一两（锉，微炒） 桂心三分 乳香三分 虎胫骨二两（涂酥，炙令黄） 地龙三分（微炒） 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以暖薄荷汤调下。

【主治】 妇人风毒流注，腰脚疼痛，行立艰难。

08431 败毒汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】 荆芥 生地 川连 净花 连翘 防风 桔梗 甘草 栀子 力子 川柏 元参 竹叶

【功用】 清火解毒。

【主治】 麻疹表里俱实。

08432 败毒汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 金银花 30 克 连翘 30 克 蒲公英 30 克 板蓝根 30 克 犀牛角 6～9 克 丹皮 9 克 生地 15 克 赤芍 9 克 川黄连 9 克 菊花 9 克 甘草 6 克

【功用】 清热，解毒，凉血。

【主治】 局部化脓性感染有全身反应者。寒战，高烧，汗出，头痛，舌质红，苔黄，脉洪数。

【加减】 若热毒入脑，加服安宫牛黄丸或紫雪丹，以清热解毒，醒脑开窍。

【方论选录】 方中以金银花、连翘、蒲公英、板兰根、川黄连、菊花、甘草解毒清热；犀牛角、丹皮、生地、赤芍解毒凉血。

08433 败毒饮

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】 酒芩 川连 连翘 川贝 桔梗 栀子 银花 力子 生地 甘草 红花 竹叶

【功用】 清火解毒。

【主治】 麻疹色白，血分有热。

08434 败毒散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】 桔梗 天花粉 干葛 川升麻 川芎 赤芍药 独活 柴胡 甘草各等分

【用法】 上锉。每服四钱，水一盏，加生姜二片，煎至六分，不拘时候服。

【主治】 小儿丹毒初发，游走遍体，燥闷腹胀，啼哭。

08435 败毒散

【方源】《明医指掌》卷六。

【组成】 羌活一钱（去芦） 独活一钱（去芦） 柴胡一钱（去毛） 前胡一钱（去芦） 枳壳（炒）八分 茯苓八分（去皮） 川芎七分 甘草五分（炙） 桔梗八分（去芦）

【用法】 加生姜三片，水二钟，煎一钟服。

【主治】 ①《明医指掌》：脏毒协寒便血。②《医方集解》：伤寒头痛，憎寒壮热，项强睛暗，鼻塞，风痰及时疫，岚瘴鬼疟，或声如蛙鸣，赤眼口疮，湿毒流注，脚肿腮肿，喉痹毒痢，诸疮斑疹。

【备考】《医方集解》有薄荷少许；《疫疹一得》以葱为引。

08436 败毒散

【方源】《治疹全书》卷上。

【组成】 麻黄 桔梗 前胡 柴胡 羌活 防风 荆芥 薄荷 天麻 枳壳 川芎 骨皮 葱白

【主治】 疹不起。

08437 败酱汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】 败酱三两 桂心 芎劳各一两半 当归一两

【用法】 上㕮咀，以清酒二升，水四升，微火煮取二升，去滓，食前适寒温服七合，一日三次。

【主治】 产后疹痛引腰，腹中如锥刀所刺。

【方论选录】《千金方衍义》：产后疹块引痛如锥，须防瘀结成痈，故借《金匮》薏苡败酱附子散之法，于中除去附子之焕发，进以芎、归之柔和，可无痈成之患矣。

08438 败酱汤

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】 败酱二两 大黄（锉，炒）一两 桃仁二两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，先取皂荚刺一两，锉碎，以水二盏，煎至一盏半，漉出，下药及朴消一钱，同煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】 附骨疽。

08439 败酱散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】 败酱一两 桂心一两 芍药一两 当归一两（锉，微炒） 延胡索一两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，次入酒三合，更煎三二沸，去滓，食前温服。

【主治】 产后血气攻注，腰痛，痛引腹中，如锥刀所刺。

08440 败酱草散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 败酱草三两（炒黑） 炒生地五两 当归身三两（醋炒） 小川芎一两 白芍药二两（炒） 川续断三两（炒灰） 甜竹茹一两

【用法】 上为散。每服五钱，水煎，去滓温服。

【主治】 产后冲任脉虚，蓄泄无权，血露日久不止，脉虚数。

【方论选录】 生地滋血凉血，炒松能止暗渗之血；当归养血荣经，醋炒能归经络之血；小川芎入血海以升阳，白芍药敛阴血以止漏；败酱草泻热凉血，炒黑亦能止血；川续断补经续绝，炒黑亦能止漏；甜竹茹清肝胆以解阳明之郁热也。为散水煎，使经血内充，则冲任完固而血无妄行之患，安有血露之日久不止乎！

08441 败酱草膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 鲜败酱草（洗净）十斤

【用法】 上用净水八十斤煮，煎至3小时后过滤，再煎煮浓缩成膏五十两，加蜜等量贮存备用。每服二钱，一日二次。

【功用】 解毒清热，除湿消肿。

【主治】 毛囊炎、疖等化脓性皮肤病。

08442 败毒圣神丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】 金银花 蒲公英 生甘草 当归 天花粉（其量均须大于常用之量）

【用法】 水煎服。一剂消，二剂愈，不必三剂。

【功用】 内散痈疽。

【主治】 痈疽，或生于背，或生于胸腹之间，或生于头面之上，或生于手足之际，皆是五日之内者。

【方论选录】 金银花专能内消疮毒，然非多用则力轻难以成功；生甘草一味，已足解毒，况又用之于金银花内，益足以散邪而卫正；蒲公英阳明经药也，且能散结逐邪；天花粉消痰圣药；当归活血，是其专功，血不活所以生痈，今血活而痈自愈。

08443 败毒荆防汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】 力子 连翘 前胡 桔梗 江尧 银花 荆芥 防风 甘草

【功用】 发散托毒。

【主治】 麻疹见标。

【加减】 肺热、疫热，加黄芩、川连。

08444 败毒流气饮

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】 羌活 独活 青木香 赤芍药 当归 紫苏 陈皮 香附 白芷 三棱 蓬莪术 枳壳 川芎 桔梗 柴胡 半夏（姜制） 赤茯苓 甘草

【用法】 加生姜、生地黄、水煎服。

【功用】 疏邪流气。

【主治】 流注初发，堆核硬痛，不可忍者。

【加减】 热，加大黄、黄芩；虚，加人参、黄耆。

08445 败毒流气散

【方源】《直指·附遗》卷二十二。

【组成】 人参 桔梗 枳壳 甘草 防风 柴胡 前胡 川芎 羌活 白芷 芍药 紫苏各等分

【用法】 上㕮咀。水一钟半，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 痈疽。

08446 败毒黄连丸

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 黄连 连翘 羌活各二两 菊花二两 防风一两五钱 细辛 甘草各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，茶水送下。

【主治】 脾胃二经风热所致之上下眼丹初起，眼胞红热肿痛。

08447 明心汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】 沙参 黄耆 蔓荆各三钱 炒芍药 黄柏各二钱 升麻一钱半 炙草一钱

【主治】 少年耳聋。

08448 明目丸

【方源】《银海指南》卷二。

【组成】 当归 草决明 冬术 蝉退 川芎 大黄 红花 桑白皮 山栀 薄荷 白蒺藜 苍术 木通 连翘 石膏 池菊 荆芥 赤芍 枳壳 生地 黄芩 羌活 独活各一两 黄连五钱

【用法】 为丸服。

【主治】 五志之火甚者，上攻于目，生翳起障，赤肿疼痛，眵泪羞明，视物昏花。

08449 明目枕

【方源】《本草纲目》卷二十二引《卫生杂兴》。

【组成】 苦荞皮 黑豆皮 绿豆皮 决明子 菊花

【用法】 同作枕。

【功用】 至老明目。

08450 明睛散

【方源】《局方》卷七（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 赤芍药 当归（去芦，洗，焙） 黄连（去须） 滑石（细研）各五两

【用法】 上为细末，入研滑石拌匀。每用半钱，沸汤点，澄清去滓，热洗。

【功用】 退翳膜。

【主治】 外障。风毒上攻，眼疼赤肿，或睑眦痒烂，时多热泪昏涩。

【宜忌】 忌一切腌藏、鱼鲊、酒、面等毒物。

08451 明目二陈汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 陈皮9克 清半夏6克 茯苓 车前子各9克 炒枳壳6克 甘草3克

【功用】 祛湿化痰，降浊明目。

【主治】 痰湿内聚，上扰清窍，幼影色黄，胸闷头重，或咳嗽痰多，苔腻脉滑。

【方论选录】 方中二陈汤祛湿化痰；车前子引湿浊之邪下行；炒枳壳宽中理气，祛痰除满。诸药凑效，湿除痰祛，目自明也。

08452 明目大补汤

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】 十全大补汤加沉香 大附子 制白豆蔻

【功用】 镇阳光，壮肾水。

【主治】 气血俱损，眼目昏花，神光不足，及久患眼服凉药过多，气血凝滞，双目昏蒙，全不通路。

【备考】《审视瑶函》本方用量：各等分。用法：上锉剂，白水二钟，生姜一片，辉枣二个，煎至八分，不拘时候温服。

08453 明目四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】 当归（酒洗） 南芎 白芍（酒炒） 熟地黄 肉苁蓉（酒洗） 酸枣仁（炒）各一钱 木通五分 石菖蒲七分 甘枸杞子一钱 甘菊花一钱

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 血虚，目暗生花。

08454 明目四神丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】 杞子八两（酒水拌，分四股：一用小茴香三钱炒，去茴；一用川椒三钱，炒出汗，去椒；一用青盐三钱炒；一用黑脂麻三钱炒） 白蒺藜四两 归头（酒炒） 熟地各三两 石决明 甘菊 桑叶 谷精草各二两

【用法】 炼蜜为丸。每服三钱，开水送下。

【功用】 壮水滋阴。

【主治】 目病已久，而成虚候者。

08455 明目地黄丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】 怀生地（酒洗） 熟地各四两 知母（盐水炒） 黄柏（酒炒）各二两 菟丝子（酒制） 独活一两 甘枸杞二两 川牛膝（酒洗）三两 沙苑蒺藜三两（炒）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八十丸，夏月用淡盐汤送下，余月酒送下。

【功用】 生精养血，补肾益肝，祛风明目。

【主治】 翳膜遮睛，羞涩多泪，并治暴赤热眼。

【备考】 方中菟丝子用量原缺。

08456 明目地黄丸

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 生地（酒洗）一斤 牛膝二两 麦冬六两 当归五两 枸杞子三两

【用法】 用甘菊花八两熬膏，炼蜜为丸。每服三钱，开水送下。

【主治】 内障，隐涩羞明，细小沉陷。

08457 明目地黄丸

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】 熟地五两 萸肉二两 泽泻一两 丹皮一两半 茯神二两（去木） 山药三两（炒） 当归 川芎一两 麦冬三两（去心） 石斛三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，滚水送下。

【主治】 肝肾不足，两目昏暗，脉虚者。

【方论选录】 肝肾不足，精血不能上奉，故两目昏暗，视物不明焉。熟地补肾养肝，萸肉涩精秘气，丹皮凉血退阴火，山药补脾益真阴，当归养血以荣肝，川芎活血以欣木，泽泻泻湿热，茯神安神志，麦冬清心润燥，石斛平热滋阴也。蜜丸下，使肝肾两滋则精血自足而上奉子目，目暗无不自明矣。此补肾养肝兼清湿热之剂，为肝肾不足，两目昏暗之专方。

08458 明目地黄丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 六味丸一料 甘菊三两 杞子二两 石决明 白蒺藜

【用法】 上蜜丸五分，水法六分。每服三四钱，淡盐汤送下。

【主治】 男女肝肾两亏，风邪外乘，热气上攻，畏日羞明，瞳神散大，视物不清，迎风流泪，内生翳障，及时眼之后，久不还元，一切目疾。

【备考】 方中石决明、白蒺藜用量原缺。

08459 明目至宝丹

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】 上羊脑浮水甘石一斤（打碎，如莲子大，用童便浸四十九日，去童便晒干燥，研极细末，用大缸升一块，煅一炷香时取起，再用清水飞过，晒干听用） 羌活三钱 防风三钱 白菊花四钱 金银花四钱 谷精珠四钱 川连三钱 黄芩三钱 全当归三钱 白蒺藜四钱 蔓荆子二钱 川芎二钱 白芷二钱 生甘草二钱 玄明粉一钱五分（制过） 制丹石五分（枯过） 东丹一钱（漂过） 琥珠一钱（绢包豆腐煮过） 犀黄二分 头梅冰片五分

【用法】 上将生甘草前十四味煎浓汁滤过，将制过甘石拌湿，铜锅煮燥，研细过筛，约用五钱，再入后药，共为极细末，用小口瓷瓶收藏，勿令泄气。无论内风外风，用药少许，每日点眼角二三次，数日见效。

【主治】 赤眼羞明，迎风流泪，目眵目糊，上障作痛。

08460 明目壮水丸

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】 拣人参一两 当归（酒洗）一两 熟地黄（酒蒸）二两 生地黄（酒洗）二两 天门冬（去心）二两 麦门冬（去心）二两 山茱萸（酒蒸，去核）二两 枸杞子（酒洗）一两六钱 五味子一两 菟丝子（酒制）一两 白茯神（去皮木）二两 干山药一两 川牛膝（去芦，酒洗）一两三钱 柏子仁（去壳，炒）一两 泽泻一两 牡丹皮（酒洗）一两 家菊花（去梗）三两 黄柏一两半（乳汁拌匀，炒） 知母二两半（乳汁拌匀，晒干，炒） 白豆蔻（去壳，净）三钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心淡盐汤送下。

【功用】 壮水明目，补肾养肝，生心血。

【主治】 肝肾不足，眼目昏暗，常见黑花，多有冷泪。

【宜忌】 忌生冷、菜蔬。

08461 明目夜光丸

【方源】《疡医大全》卷十一引《治眼奇方》。

【组成】 生地（酒洗） 钗石斛 当归（酒洗） 菟丝子（酒煮，捣烂） 青葙子 枸杞子各二两 人参 山萸肉（去核） 怀牛膝（酒洗） 粉丹皮 玄参各一两 白茯苓 山药各一两五钱 密蒙花 菊花各五钱 北五味七钱

【用法】 炼蜜为丸。每服三钱，空心开水送下。

【主治】 目内障。

08462 明目细辛汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 川芎五分 生地黄（酒制） 蔓荆子各六分 当归梢 白茯苓 藁本各一钱 荆芥一钱二分 防风二钱 麻黄根 羌活各三钱 细辛少许 红花少许 椒八个 桃仁二十个

【用法】 上㕮咀，分作四服。每服水二盏，煎至一盏，去滓，临卧稍热服之。

【主治】 两目发赤微痛，羞明畏日，怯风寒，怕火，眼睫成纽，眵糊多，隐涩难开，眉攒肿闷，鼻塞涕唾稠粘，大便微硬。

【宜忌】 忌酒、醋、湿面。

【备考】 方中麻黄根，《东垣试效方》作“麻黄”。

08463 明目退翳汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】 生地 黄连 木贼 甘菊 胆草 石膏 郁金 旋覆花 青葙子 白蒺藜 蝉退各等分

【用法】 水煎，温服。点元灵丹、至宝丹。

【主治】 目病已久，带红丝、浮翳、薄雾者。

08464 明目益肾丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】 枸杞一两 当归（酒浸） 生地黄（酒浸）一两 五味五钱 知母七钱（酒炒） 黄柏七钱（酒炒） 山药半两 茯神一两 巴戟（去心）五钱 菟丝子一两（酒浸） 人参五钱 甘菊五钱 天门冬五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤送下。

【功用】 补损明目。

【主治】《济阳纲目》：上热而下元虚，目昏。

08465 明目蒺藜丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 黄连十二两 薄荷四十八两 连翘四十

八两　川芎四十八两　蔓荆子炭九十六两　当归九十六两　白芷四十八两　蒙花四十八两　生石决明四十八两　菊花一百四十四两　黄柏四十八两　甘草一十四两　生地九十六两　防风四十八两　黄芩九十六两　白蒺藜（炒）一百四十四两　栀子（炒）四十八两　蝉蜕四十八两　荆芥四十八两　赤芍四十八两　木贼草四十八两　复花四十八两　草决明四十八两

【用法】 上为细末，水泛为小丸。每服二钱，日服二次，温开水送下。

【功用】 清热散风，明目退翳。

【主治】 暴发火眼，云蒙障翳，羞明怕日，眼边红肿。

08466　明目硼消水

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 硼砂五钱　芒消三钱（消中若不明亮，用水化开，澄去其中泥土）

【用法】 上药和凉水多半钟，研至融化。用点眼上，一日约点三十次。若陈目病一日点十余次。冬日须将药碗置热水中，候温点之。

【主治】 眼疾暴发红肿疼痛，或眦多胬肉，或渐生云翳，及因有火而眼即发干昏花者。

08467　明目地肤子散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 地肤子一两　石决明一两半（捣细，研，水飞过）　羚羊角屑一两半　芎藭　车前子　酸枣仁（微炒）各一两

【用法】 上为细散。每服一钱，以黑豆汤调下，不拘时候。

【主治】 眼青盲。

08468　明眼生熟地黄丸

【方源】《直指》卷二十。

【组成】 生地黄　熟地黄各一斤半　净石斛（炒）　枳壳（麸炒）各六两　羌活　防风　牛膝各四两　甘菊（去萼）一斤　杏仁（去皮，焙）十两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前盐汤送下；或蒺藜煎汤送下。

【主治】 ①《直指》：肾气衰弱，肝受虚热，眼生黑花。②《普济方》：肝虚积热，上攻眼目，翳膜遮睛，羞涩多泪，及暴赤眼。

【宜忌】《普济方》：忌一切动风毒物。

08469　畅卫舒中汤

【方源】《易氏医按》。

【组成】 香附（醋炒）八分　苏梗五分　苍术（泔浸）五分　贝母八分　连翘（去心）五分　抚芎六分　神曲（炒）一钱　沙参一钱　桔梗四分　南木香半分

【用法】 大剂煎，徐徐呷之。

【主治】 气膈。

【方论选录】 香附、苏梗开窍行气，苍术健中，贝母开郁痰，连翘散六经之火，抚芎提发肝木之困，神曲行脾之郁，南木香逐气流行，桔梗升提肺气，沙参助正气而不助肺火。此方升上焦之火邪，乃火郁发之之义也。

【临证举例】 气膈　一人患膈满，胸膈胃脘饱闷，脐下空虚如饥，不可忍，腰腿酸疼，坐立战摇，日夜卧榻，大便燥结，每日虽进清粥一二钟，食下即呕酸，吐水醋心。众作隔治，服药二年许不效。诊得脉左右寸关俱沉大有力，两尺自浮至沉三候俱紧，按之无力摇摆之状。须开导其上，滋补其下，兼而行之，遂以本方投之，每日空心服八味地黄丸百粒，服二日，嗳气连声，后亦出浊气，五日可以坐立，啖饭两碗，服药至二七，动履如常。

08470　昆仑丸

【方源】《何氏济生论》卷六。

【组成】 橘核（盐炒）　川楝子（盐炒）　香附（童便浸）各二两　小茴香（盐水炒）　玄胡索　吴茱萸（盐酒泡七次，炒）各一两　山楂　枳实　陈皮各一两五钱　苍术（炒）　砂仁　青皮　槟榔各一两　川椒（去目）　木香各五钱　肉桂一钱五分

【用法】 醋煮米为丸。每服六七十丸，盐汤送下。

【功用】 内消疝气。

【主治】 疝气。

08471　昆布丸

【方源】 方出《外台》卷二十三引《肘后方》，名见《医心方》卷十六引《范汪方》。

【组成】 昆布　海藻各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如杏核大。含，稍稍咽汁，一日四五次。亦可酒浸服。

【主治】 颈下卒结，囊渐大欲成瘿者。

08472　昆布丸

【方源】《外台》卷二十三引《广济方》。

【异名】 通气丸(《圣济总录》卷一二五)。

【组成】 昆布二两（洗去咸汁）　通草一两　羊腐二具（炙）　海蛤一两（研）　马尾海藻一两（洗去咸汁）

【用法】 上炼蜜为丸，如弹子大。细细含咽汁。

【主治】 气瘿，胸膈满塞，咽喉项颈渐粗。

【宜忌】 忌生菜，热面，炙肉，蒜，笋。

【备考】 方中通草，《圣济总录》作“木通”。

08473 昆布丸

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】 昆布三分（洗去咸味） 赤茯苓三分 枳实半两（麸炒微黄） 甘草一分（炙微赤，锉） 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 干姜一分（炮裂，锉） 木香半两 诃黎勒皮一两 槟榔三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，不拘时候，以温酒送下。

【主治】 胸痹气闷，喉中噎塞。

08474 昆布丸

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】 昆布（洗去咸，焙末）一两 春杵头细糠一合

【用法】 上用老牛涎一合，生百合汁一合，二味慢火煎，入蜜搅成膏，搜前药和丸，如鸡头子大。含化咽津。

【主治】 膈气噎塞，食物不下。

08475 昆布丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】 昆布（洗去咸，炙） 海藻（洗去咸，炙） 蒺藜子（炒，去角） 芜荑仁（炒） 槟榔（锉）各一两半 枳壳（去瓤，麸炒） 大麻仁（研）各二两 木香 黄耆（锉） 诃黎勒（炮，去核）各三分 陈橘皮（去白，炒） 桃仁（去皮尖双仁，炒，研） 菟丝子（酒浸一宿，别捣）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前温酒或盐汤送下。

【主治】 阴疝肿大偏坠。

08476 昆布汤

【方源】 方出《圣惠》卷五十，名见《嵩崖尊生》卷九。

【组成】 昆布二两（洗去咸味） 小麦二合

【用法】 上药以水三大盏煎，候小麦烂熟，去滓。每服一小盏，不拘时候；仍拣取昆布，不住含一二片子咽津。

【主治】 胸中气噎不下食，喉中如有肉块。

【备考】 本方方名，《嵩崖尊生》三让堂本作“麦昆煎”。

08477 昆布散

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】 昆布（洗去咸，炙干） 海藻（洗去咸，炙干）各三两 松萝一两 海蛤 木通（锉） 白蔹 桂（去粗皮）各二两

【用法】 上为散。每服二钱匕，温酒调下，一日三次，不拘时候。

【主治】 气瘿初结。

08478 昆布散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】 防风 荆芥 黄连（酒炒） 昆布 海藻 海粉 羌活 升麻 连翘 青皮 胆星 贝母 牛蒡子（炒） 夏枯草 沉香 香附子 抚芎 黄芩（酒炒）

【用法】 加薄荷，水煎服。或末或丸俱可。

【功用】 祛风火郁滞，散痰气壅结。

【主治】 瘿气。

【加减】 痰多，加南星、半夏。

【宜忌】 宜灸天突穴为妙。

08479 昆花汤

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】 南夏枯草三钱 浙贝二钱 山慈菇一钱 玄参一钱 连翘一钱 牛蒡子一钱 橘红一钱 金银花一钱 海藻一钱 川芎一钱 当归一钱 香附一钱 白芷一钱 甘草五分 昆布三钱

【用法】 水三碗，煎一碗，空心服。

【主治】 项下肿核。乃痰气不清郁结而成，日久破坏，以致气血亏短，卒难收口，且连串不已，又名痨串。

【加减】 如破烂日久不收口者，加黄耆、白术各一钱，茯苓八分，升麻、柴胡各五分。

08480 昌阳泻心汤

【方源】《霍乱论》卷四。

【组成】 石菖蒲 黄芩（酒炒） 制半夏各一钱 川连（姜汁炒）五六分 苏叶三四分 制厚朴八分 鲜竹茹 枇杷叶（刷）各二钱 芦根一两

【用法】 天雨水急火煎，徐徐温服。

【主治】 霍乱后，胸前痞塞，汤水碍下，或渴，或呃。

【加减】 小溲秘涩者，加紫菀。

【方论选录】 此泻心汤证也，因暑热秽浊之邪所致，与伤寒不同，兹以菖蒲为君，辛香不燥，一名昌阳者，谓能扫涤浊邪，而昌发清阳之气也，合诸药以为剂，其奏调痰泄热，展气通津之绩。

08481 易产汤

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】 当归 川芎 生地 甘草 腹皮 广皮 白术 益母草各等分

【主治】 孕妇体肥禀厚临产艰难者。

08482 易黄汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】山药一两（炒） 芡实一两（炒） 黄柏二钱（盐水炒） 车前子一钱（酒炒） 白果十枚（碎）

【用法】水煎，连服四剂。

【功用】补任脉之虚，清肾火之炎。

【主治】黄带。带下色黄，宛如黄茶浓汁，其气腥秽。

【方论选录】盖山药、芡实专补任脉之虚，又能利水，加白果引入任脉之中，更为便捷，所以奏功之速也。至于用黄柏，清肾中之火也，肾与任脉相通以相济，解肾中之火，即解任脉之热矣。

08483 罗汉散

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】生地炭三两 黄芩炭 南楂炭 粟壳炭 棉花仁炭 槐米炭 柿饼炭 地榆炭各二两 莲房炭一两五钱 百草霜 黑驴皮胶（蛤粉炒）各一两 艾绒炭一钱 炙黑甘草 炮姜炭各六钱 枳壳炭 白芍炭各一两二钱（或加胡桃壳炭、瓜子壳炭各三两）

【用法】上为细末。每服一钱，用参三七，或红枣，或稻根须，煎汤调服。

【主治】痔血肠红，便血久治不瘳，面黄皮肿。

08484 罗备金散

【方源】《准绳·女科》卷一。

【组成】香附子四两（炒） 当归尾一两二钱 五灵脂一两（炒）

【用法】上为细末。每服五钱，空心醋汤调服。

【功用】行气。

【主治】妇人血崩不止。

08485 国老汤

【方源】《古今医鉴》卷八。

【异名】国老煎（《外科证治全书》卷三）。

【组成】横纹大甘草一两

【用法】上药截长三寸许，取山涧东流水一碗（不用井水、河水），以甘草蘸水，文武火慢炙，须用三时久，水尽为度；劈视草中润透，再以无灰酒二碗，煎煮至一碗，温服，一日一次。半月消尽。

【主治】①《古今医鉴》：悬痈。②《医学心悟》：脏毒。

【宜忌】《医学心悟》：忌煎炒、烟、酒、炙煿、辛辣、发气等物。

【备考】本方改为散剂，名“国老散”（见《医学心悟》）。用甘草七段，急流水一碗，浸之，炙干；又浸、又炙，以水尽为度，研细末。每服一钱，空心开水调下。

08486 国老散

【方源】《幼幼新书》卷二十引《聚宝方》。

【组成】甘草（炙） 银柴胡 秦艽 大乌梅肉（焙干）各二两

【用法】上为末，食后热汤点服。

【功用】去三焦壅滞，退虚热。

【主治】骨蒸热久，不思饮食。

【宜忌】忌炙煿。

08487 固下丸

【方源】《医学纲目》卷二十三。

【组成】苍术 肉豆蔻（煨）各一两 破故纸一两

【用法】上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服五十丸。

【主治】肾虚久泄。

08488 固下丸

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】龙骨八两（煅） 蒲黄八两（炒黑）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，生地汁送下。

【主治】孕妇溺血，久不能止，脉虚涩者。

【方论选录】妊娠脬气虚滑，血液暗渗，故溲溺出血，久不能止焉。白龙骨涩脬气之滑脱，以固经气之下泄；蒲黄灰止溺血之渗漏，以禁经血之妄行。白蜜以丸之，生地以下之，使溺道勿滑，则经气完固，而血无妄渗之患，何溺血之久不止者？胎孕无不自安矣。

08489 固下丸

【方源】《会约》卷十四。

【组成】当归二两 鹿角霜四两 茯神 龙骨（煅） 阿胶（蛤粉炒）各一两五钱 川芎七钱 杜仲（盐水炒）二两 香附（醋炒）八钱 甘草（炙）一两 补骨脂（盐水炒）六钱

【用法】上为末，以山药五两研末，开水泡糊为丸。每服七八钱，早晨酒送下。

【主治】妇人血道虚滑，不时下漏。

08490 固元汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】人参 五味子各五钱 黄耆 甘草 枣仁各二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】元气不足，以致血汗。

08491 固元煎

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】 熟地六钱 归身三钱 白芍（酒炒）一钱 菟丝子（炒）三钱 煅龙骨二钱 鹿角霜三钱 炙鳖甲三钱 杜仲（盐水炒）二钱 潼蒺藜三钱 益母草三钱 炙甘草五分 广木香八分

【用法】 水煎服。如素有癥瘕者，当先服神功散，继服本方。

【主治】 妇人经漏。

08492 固气汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】 人参一两 白术五钱（土炒） 大熟地五钱（九蒸） 当归三钱（酒洗） 白茯苓二钱 甘草一钱 杜仲三钱（炒黑） 山萸肉二钱（蒸） 远志一钱（去心） 五味子十粒（炒）

【用法】 水煎服。一剂血止，十剂痊愈。

【主治】 少妇甫娠三月，行房不慎，致伤元气，血崩胎堕。

08493 固心丹

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】 通明朱砂三两（用生绢袋盛，浸于无灰酒二碗半中七日，入银石器内慢火煮令九分干，再以井水浸一宿，研成膏） 乳香（以入参汤研如粉，入于朱砂内） 茯神 人参各一两半（并入朱砂、乳香膏内，研）

【用法】 上药和匀，人猪、羊心血为丸，如小鸡头子大。每服三二丸，食后临卧以人参、炒酸枣仁煎汤送下。

【功用】 益心志，壮心肾，除恍惚惊悸。

08494 固本丸

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 熟地黄 生地 菟丝子各一两 当归 五味子 甘杞各八钱 麦门冬（去心） 牛膝 天门冬各七钱 茯神 地骨皮各五钱 远志四钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一三十丸，空心淡盐汤送下；每晚茶、酒任下。可以久服。

【功用】 补精益目，久服延寿。

【主治】 禀受天真虚弱，肝肾二经不足，以致痘后两目清白，瞳神或开大，外无翳障，只艰于视者。

08495 固本丸

【方源】《叶氏女科》卷四。

【组成】 菟丝子（酒制） 熟地黄（酒蒸，捣） 干地黄（酒浸，捣） 天门冬（去心，酒浸） 麦门冬（去心，酒浸） 五味子 茯神各四两 淮山药（微炒）三两 莲肉（去皮心） 人参（去芦） 枸杞子各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，淡盐汤送下。

【主治】 男子精少艰嗣。

08496 固本丹

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】 牡蛎（白者，生为细末，用好醋和为丸，入火烧令通赤，放冷）四两 白石脂二两 硫黄一两半 阳起石一两

【用法】 上为细末，熟汤为丸，如梧桐子大，阴干；入盒子内，以赤石脂封口，外用盐泥固济，候干；煅令火焰绝，埋黄土内，出火毒三时辰取出。每服十五至三十丸，空心温酒或米饮送下。

【主治】 男子虚损衰弱，夜梦颠倒，遗精失溺，小便白浊；妇人血海久冷，崩中带下，久无子息。

08497 固本散

【方源】《普济方》卷六十六引《卫生家宝》。

【组成】 蝎梢 胡椒各等分

【用法】 上为末。擦痛处。

【主治】 牙痛。

08498 固阳丸

【方源】《古方选注》卷下。

【组成】 黄耆（酒炒）三两 当归（酒净）三两 干姜一两六钱 赤石脂一两二钱（泥罐中煅赤，研，水飞） 舶茴香八钱 白龙骨（煅，捶碎，绢袋盛，大豆同蒸干，豆熟取出，焙干，研，水飞）一两二钱 阳起石（用干锅于大火中煅令通红，取出酒淬，置阴地令干，研，水飞）一两二钱 肉桂八钱 韭菜子（酒浸，晒干，微炒）一两三钱 茯苓三两 黄盐（炒）三钱

【用法】 上为末，酒糊为丸。每服五十丸，温酒送下。

【主治】 妇女带下，由久旷失志，心阳内耗而命门失守，或内劳无度，液脱阳离而命门不禁引起者。

【方论选录】 黄耆、茯苓通阳明之气道，引领阳起石升发诸阳；干姜、赤石脂堵截阳明之津液，不使其顺流于前阴；当归、肉桂、茴香升少阳之气，以约在下之津液；韭菜子去淫欲之火，白龙骨固心肾之气；约以黄盐，使热药归下，成固摄之功。

08499 固阳丹

【方源】《证类本草》卷六引《经验后方》。

【组成】 菟丝子二两（酒浸十日，水淘，焙干为末） 杜仲一两（蜜炙，捣）

【用法】 上药用薯蓣末酒煮糊为丸，如梧桐子

大。每服五十丸，空心酒送下。

【主治】 ①《证类本草》引《经验后方》：腰膝积冷，痛或顽麻无力。②《普济方》：梦泄。

08500 固阳丹

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】 远志 蛇床子（酒浸，微炒） 鹿茸各一钱五分 晚蚕蛾二钱 紫梢花 续断各一钱 海马二对 黑丑（头末）三钱 麝香二钱五分 穿山甲五片 木香 乳香各二钱五分 川茴香三钱

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心酒送下。

【主治】 肾经虚惫，精液衰少，不能上济心火，火亦不能下养，以致阳事不举。

08501 固阳汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】 人参 黄耆各二钱 白术（去芦） 茯苓各四钱 干姜八钱 良姜三钱 白姜八钱 厚朴三钱（姜汁炒） 大附子（炮）四钱

【用法】 水煎，热服。

【主治】 阳症归阴，阴囊缩入，手足厥冷，腹痛胀，冷汗出，脉或洪弦。

【加减】 腹痛，倍良姜。

08502 固阴煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 人参适量 熟地三五钱 山药（炒）二钱 山茱萸一钱半 远志七分（炒） 炙甘草一二钱 五味十四粒 菟丝子（炒香）二三钱

【用法】 水二钟，煎至七分，食远温服。

【主治】 肝肾两亏，遗精滑泄，带下崩漏，胎动不安，产后恶露不止，妇人阴挺。

①《景岳全书》：阴虚滑泄，带浊淋遗，及经水因虚不固，肝肾并亏等证。②《竹林女科》：肝肾血虚，胎动不安；产后冲任损伤，恶露不止。③《会约》：妇人阴挺，属阴虚滑脱，以致下坠者。

【加减】 如虚滑遗甚者，加金樱子肉二三钱，或醋炒文蛤二钱，或乌梅肉二个；阴虚微热，而经血不固者，加川续断二钱；下焦阳气不足，而兼腹痛溏泄者，加补骨脂、吴茱萸适量；肝肾血虚，小腹疼痛而血不归经者，加当归二三钱；脾虚多湿，或兼呕恶者，加白术一二钱；气陷不固者，加炒升麻一钱；兼心虚不眠，或多汗者，加枣仁二钱（炒用）。

【方论选录】《证因方论集要》：人参、熟地两补气血，山萸涩精固气，山药理脾固肾，远志交通心肾，炙甘草补卫和阴，菟丝强阴益精，五味酸敛肾气，阴虚精脱者，补以固阴也。

08503 固肠丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】 椿根皮四两 滑石二两

【用法】 上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心白汤送下。

【功用】 燥湿，去脾胃陈积。

【主治】 湿气下利，大便下血，白带。

08504 固肠丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 龙骨 附子 枯矾 诃子各二两 良姜 赤石脂各一两半 丁香一两 木香五钱 白豆蔻 砂仁各六钱半

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，粟米饮送下。

【主治】 脾胃虚耗及脏腑停寒，脐腹疞痛，下利滑数，肌肉消瘦，饮食不入，气弱，时发虚热者。

08505 固肠丸

【方源】《准绳·女科》卷三。

【组成】 人参（去芦） 苍术（米泔浸一宿） 茯苓 木香（不见火） 诃子肉（煨） 乌梅肉 肉豆蔻（面裹煨） 罂粟壳（去蒂瓤）各等分

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，米饮送下。

【主治】 久泻不止。

08506 固肠汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】 酸石榴皮半两 黄连（炒） 地榆各一两 罂粟壳（醋炙） 茯苓各一两半

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，入生姜五片、乌梅一个，煎至七分，去滓，空心服。

【主治】 大肠虚寒，利下青白，肠中雷鸣，大便不节，小便黄赤，气上冲胸，不能久立，身肿，腹急，当脐疼痛。

08507 固肠汤

【方源】《三因》卷十二。

【组成】 罂粟壳三两（醋浸，炙稍黄） 枳壳（麸炒，去瓤） 白芍药各二两 橘红 当归 甘草（炙）各一两 诃子（煨，去核） 木香（煨） 人参 白姜（炮）各半两

【用法】 上锉散。每服四钱，以水一盏半，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】 肠虚下痢，赤白频并，日久无度。

08508 固肠汤

【方源】《观聚方要补》卷二引叶氏方。

【组成】 罂粟壳二两　甘草　干姜（炮）　诃子肉各三钱　木香一钱半　陈皮四钱

【用法】 上药入陈米一撮，水煎。

【主治】 冷热不调，下痢赤白，及泄泻不止。

08509　固肠散

【方源】《局方》卷六（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 陈皮（炒）　二十两　木香一两（不见火）　肉豆蔻（生用）　罂粟壳（去蒂盖，蜜炙）各二两　干姜（炮）　甘草（炙）各二两半

【用法】 上为细末。每服二钱，以酒一盏，入生姜二片、大枣一个，同煎至七分，温服，不拘时候；如不饮酒者，水煎亦得。

【主治】 脾胃虚弱，内受寒气，泄泻注下，水谷不分；冷热不调，下痢脓血，赤少白多，或如鱼脑；肠滑而泻，遍数频并，心腹胀满而痛，食减少力。

【宜忌】 忌酒、面、鱼腥等物。

【备考】 方中陈皮，《直指》作“陈米”。

08510　固肠煎

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】 附米　牡蛎　黄耆　白薇　赤芍　当归　川芎　人参　陈皮　甘草　桔梗　白术　矾石　五味子

【主治】 妇人产后胃与大肠虚滑，遗粪不知。

【加减】 七日外，加茯苓、熟地。

08511　固齿丹

【方源】《回春》卷五。

【组成】 生地黄二两　白蒺藜（炒，去刺）二两　香附（炒）四两　青盐一两半　破故纸一两（炒）　没石子（大者）四个

【用法】 上为细末。早晨擦牙，津液咽下。

【功用】 固齿乌须。

08512　固经丸

【方源】《产育宝庆集》卷上。

【组成】 艾叶　赤石脂　补骨脂（炒）　木贼各半两　附子一枚（炮，去皮脐）

【用法】 上为末，陈米饮为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下；米饮亦得。

【功用】《济阴纲目》：温涩固脱，以暖下元。

【主治】 妇人产卧伤耗经络，未得平复，而劳役损动，以致血暴崩下，淋漓不止；或因咸酸不节，伤蠹荣卫，气衰血弱，变为崩中，甚则肝经损坏，小腹满痛。

08513　固经丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷五，名见《医方类聚》卷二一〇引《新效方》。

【异名】 樗白固经丸（《简明医彀》卷七）。

【组成】 黄芩（炒）　白芍（炒）　龟版（炙）各一两　黄柏（炒）三钱　椿树根皮七钱半　香附子二钱半

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒或白汤送下。

【功用】《中国药典》：滋阴清热，固经止带。

【主治】 ①《丹溪心法》：妇人经水过多。②《中国药典》：阴虚血热，月经先期，量多，色紫黑，赤白带下。

【方论选录】《医方集解》：此足少阴、厥阴药也。经多不止者，阴虚不足以制胞络之火，故越其常度也；崩中漏下者，虚而挟热也；紫黑成块者，火极似水也。黄芩清上焦之火，黄柏泻下焦之火；龟版、芍药滋阴而养血，皆壮水以制阳光也；香附辛以散郁，樗皮涩以止脱。

【备考】 方中椿根皮，《准绳·女科》作“樗根皮”。

08514　固经丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】 黄柏（酒浸，炒）　香附（炒）各一两　山栀（炒黑）二两　苦参五钱　白术（去芦）　白芍（酒炒）各七钱半　山茱萸（酒蒸，去核）　椿根皮（酒炒）各五钱　贝母（去心）　干姜（炒）各二钱　败龟版（酒炙）二两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心白滚水送下。

【主治】 湿热带下。

08515　固经丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 附子一两半（盐水炒黑）　艾叶一两半（醋炒黑）　当归三两（醋炒）　血余三两（炙炭）　赤石脂二两（醋煅）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服二三钱，乌梅煎汤送下。

【主治】 产后阳虚崩脱，脉细者。

【方论选录】 产后阳气虚陷，不能吸血归脏，故暴崩势脱，危迫莫甚。附子补火回阳，石脂涩血固脱，艾炭止血燥湿，当归引血归经，血余炭止血以定暴崩也。蜜丸以缓之，乌梅以收之，务使火暖阳回，则经气秘密，而血不复下，何有暴崩势脱危迫若斯哉！

08516　固胎丸

【方源】《叶氏女科》卷二

【组成】 人参 黄耆（蜜炙） 茯苓 白术（蜜炙） 杜仲（盐水炒） 川续断 山萸肉 白芍 丹参 川芎 山药 当归 生地黄 香附（制） 砂仁 薄荷

【用法】 水煎服。

【主治】 气血不充之滑胎，妊娠三四月而堕，或六七月而堕，或屡孕屡堕。

【备考】《中国医学大辞典》本方用法：研为细末，水泛为丸。热汤送下。

08517 固胎饮

【方源】《医统》卷八十五。

【组成】 人参 黄耆 白术 条芩各二钱 当归一钱 川芎 芍药各七分 熟地黄 陈皮各五分 黄连 升麻 柴胡 糯米八十一粒

【用法】 上为细末，晚米粥为丸，如梧桐子大。每服五十丸，清米饮送下。

【主治】 妊娠气血俱虚，三个月内惯要坠胎。

【备考】 本方方名，据剂型，当作"固胎丸"。方中黄连、升麻、柴胡用量原缺。

08518 固胎煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 黄芩二钱 白术一二钱 当归 芍药 阿胶各钱半 陈皮一钱 砂仁五分

【用法】 水一钟半，煎服。

【主治】 肝脾多火多滞，而屡堕胎者。

08519 固涎散

【方源】《千家妙方》引孙孝洪方。

【组成】 桑螵蛸 30 克 菖蒲 9 克 远志 9 克 五味子 9 克 山茱萸 12 克 龟版 15 克 五倍子 9 克 当归 9 克 茯苓 9 克 人参 9 克（煎汤）

【用法】 上为细末。每服 6 克，人参汤送下。无人参，可用党参三倍量。亦可煎服。

【功用】 健脾安神，收涩止涎。

【主治】 小儿多涎症。

【加减】 肢冷畏寒者，加炮附子 9 克、益智仁 9 克。

08520 固真丸

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 黄柏（酒洗） 白芍药各五分 柴胡 白石脂（火烧赤，水飞，细研，晒干）各一钱 白龙骨（酒煮，晒干，水飞，为末） 当归（酒洗）各二钱 干姜四钱（炮）

【用法】 上除龙骨、白石脂水飞研外，同为细末，水煮面糊为丸，如鸡头仁大，晒干。空心白沸汤送下。无令胃中停滞，待少时以早饭压之，是不令热药犯胃也。

【主治】 白带久下不止，脐腹冷痛，阴中亦然，目中溜火，视物眩眩然无所见，齿皆恶热饮，痛须得黄连细末擦之乃止，唯喜干食，大恶汤饮。

【宜忌】 忌生冷、硬物、酒、湿面。

【方论选录】 此病皆寒湿乘其胞内，故喜干而恶湿；肝经阴火上溢，走于标，故上壅而目中溜火；肾水侵肝而上溢，致目眩眩而无所见；齿恶热饮者，是阳明经中伏火也。治法当大泻寒湿，以丸药治之。故曰：寒在下焦，治宜缓，大忌汤散。以酒制白石脂、白龙骨以枯其湿；炮干姜大热辛泻寒水；以黄柏之大寒为因用，又为乡导，治法云，古者虽有重罪，不绝人之后，又为之伏其所主，先其所因之意，又泻齿中恶热饮也；以柴胡为本经之使，以芍药五分导之，恐辛热之药太甚，损其肝经，故微泻之；以当归身之辛温大和其血脉，此用药之法备矣。

08521 固真丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 菟丝子一斤（淘洗净，用好酒浸三日，煮极熟，捣膏，晒干，或用净白布包蒸亦佳） 牡蛎（煅）四两 金樱子（去子，蒸熟）四两 茯苓（酒拌，蒸，晒）四两

【用法】 蜜丸。每服三钱，空心好酒送下，或盐汤亦可。

【主治】 梦遗精滑。

【方论选录】《成方便读》：此方之菟丝子大补肾中精气，蒸腾肾水，使之上升而不下降；牡蛎、金樱涩以固之；茯苓通以利之。以蜜丸者，取其甘缓协和之意，使通塞之剂，各得其平耳。

08522 固真丹

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 韭子四两 船上茴香（炒） 补骨脂（炒） 益智子 鹿角霜各二两 白龙骨二两（煅，别研细如粉）

【用法】 上为细末，以青盐、鹿角胶各一两，同煮，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下；盐汤亦得。

【主治】 肾与膀胱虚冷，真气不固，小便滑数。

08523 固真丹

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【异名】 缩泉丸（《医方类聚》卷一二五引《济生续方》）、二仙丸（《得效》卷七）。

【组成】 天台乌药（细锉） 益智仁（大者，去皮，炒）各等分

【用法】 上为末，别用山药炒黄为末，打糊为丸，如梧桐子大，晒干。每服五十丸，嚼茴香数十粒，盐汤或盐酒送下。

【主治】 肾经虚寒，小便滑数、白浊。

08524 固真丹

【方源】《医学纲目》卷二十九引罗天益方。

【组成】 晚蚕蛾一两 肉苁蓉 白茯苓 益智各一两 龙骨半两（另研）

【用法】 鹿角胶酒浸化开，和上药为丸，如梧桐子大。每服三粒，空心温酒送下，干物压之。

【主治】 梦遗。

【备考】 方中龙骨用量、炮制原缺，据《准绳·类方》补。

08525 固真丹

【方源】《直指·附遗》卷九。

【组成】 人参一两 干山药一两半（炒） 当归（酒浸） 黄耆（炒） 黄柏（炒） 白术各一两 杜仲（酒炙，炒断丝） 补骨脂（炒）各一两 五味子半两（炒） 泽泻半两 白茯苓 牡丹皮 山茱萸肉各一两 熟地黄四两（汤头阑膏于石臼内，捣如泥）

【用法】 上为极细末，和地黄膏拌匀，却入炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，空心淡盐汤送下。

【主治】 诸虚百损，五劳七伤，水火不升，下元虚冷，脐腹疼痛。

【加减】 腰腿无力，加牛膝一两（酒炒）、败龟版一两半（酥炙）；夏天服，加桂半两；脉弱食少，再加附子半两（炮）。

【备考】《济阳纲目》有羊肉，无当归。

08526 固真汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 正元汤。

【组成】 升麻 羌活 柴胡各一钱 炙甘草 草龙胆 泽泻各一钱五分 黄柏 知母各二钱

【用法】 上锉，如麻豆大，分作二服。水二盏，煎至一盏，去滓，空心稍热服，以早饭压之。

【主治】 两丸冷，前阴痿弱，阴汗如水，小便后有余滴，尻臀并前阴冷，恶寒而喜热，膝下亦冷。

【备考】《普济方》有苍术；《证治宝鉴》有汉防己。

08527 固真汤

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】 人参（去芦） 附子（汤浸，炮裂去皮） 白茯苓（去皮） 白术各二钱半 山药（去黑皮） 黄耆（蜜泡涂，炙） 肉桂（去粗皮） 甘草（湿纸裹，煨透）各三钱

【用法】 上㕮咀。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一枚，煎七分，空心温服。

【主治】 小儿慢脾风，四肢厥冷者。

①《活幼心书》：小儿吐泻痢后，胃虚脾慢，四肢口鼻寒冷，沉困不省人事。②《幼科铁镜》：小儿阴痫。身无烧热，手足青冷，口噤惊啼，吐舌摇头，面色黯晦，或从夜发，病在五脏骨髓者。③《金鉴》：慢脾风，闭目摇头，面唇青黯，额汗昏睡，四肢厥冷，舌短声哑，频呕清水。

【临证举例】 慢惊 《幼科铁镜》：余幼女于壬寅冬，麻症有失经理，冷泻成慢，眼闭不开约十余日，幸吮乳不辍，面上宝色有存。予用固真汤加附子五分，服三剂，眼一开，顷又闭，揣之药力未及，连服十剂愈。

08528 固脂鸭

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】 老鸭一只（去毛与肠杂，洗净） 固脂三钱（黄柏六分，煎水泡固脂一夜，晒干，烘干亦可，再用盐水炒） 核桃肉三钱 陈甜酒一茶碗（陈绍兴酒亦可） 好酱油三酒杯

【用法】 共入鸭肚内，以线缝好，放瓦钵内，不用放水，盖好，加纸封口，放锅内蒸极融烂，去药，连汤食。如不见效，即用七制固脂丸蒸鸭食，必有奇验。

【主治】 肾虚吐血，咳嗽，气虚喘。一切虚不受补者。

【临证举例】 吐血 一人肾虚吐血三年，百药不效，连食此鸭三只断根。

08529 固涩丸

【方源】《会约》卷十。

【组成】 白术 牡蛎（煅） 附子 干姜 肉蔻（面包煨） 赤石脂各一两 诃子肉 石榴皮（醋炒）各两半 枯矾三钱 五倍子四钱

【用法】 上为末，醋糊为丸。每服三钱，米饮送下。或加龙骨一两。

【主治】 滑泄，直肠泄，食入即出。

08530 固脬丸

【方源】《全生指迷方》卷四。

【异名】 大固脬丸（《鸡峰》卷十）。

【组成】 茴香（炒） 一两 桑螵蛸（炒）半两 菟丝子（拣净，酒浸一宿，乘润捣烂，焙干）二两 戎盐（炒）一分 附子（炮，去皮脐）半两

【用法】 上为细末，煮糊为丸，如梧桐子大。饮

下三十粒，空心服。

【主治】 ①《鸡峰》：作劳过度，肾与膀胱俱虚，不能禁固，小便滑数，日夜十数行，胫酸无力，脉微弱 ②《医统》：遗尿不觉，小便不禁。

08531 固脬丸

【方源】《普济方》卷二一九引《卫生家藏》。

【组成】 鹿茸二两半（去毛，酥炙） 当归（洗，焙） 牛膝（焙） 补骨脂（炒）各一两半 附子（炮，去皮脐） 巴戟（去心） 远志（去心） 白茯苓（焙） 柏子仁（研） 鹿角胶（麸炒）各一两 桑螵蛸一两一分（酒蒸一宿，焙） 肉苁蓉（洗，焙） 菟丝子（酒浸一宿，焙）各四两 泽泻半两（炒）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心用温酒、盐汤任下。

【功用】 接真气，益元阳，润肌肤，健筋骨，固脬寒，明目，养心肾。

【主治】 元脏气虚弱，荣卫不调，肢体倦怠。

【加减】 如要秘精，加龙骨、石莲肉、鸡头肉各一两，取金樱子汁熬膏，同蜜为丸；如梦寐遗精泄气，精寒滑下，虚损气厥晕闷，小便频数，加白茯苓神一两、醋煮韭子一两（炒）、钟乳粉七钱、阳起石（煅）半两、好桑蓣茄二两。

08532 固脬散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【异名】 固脬饮（《医部全录》卷三九三）、补脬饮（《沈氏经验方》）。

【组成】 黄丝绢三尺（以炭灰汁煮极化烂，用清水洗去灰，令净） 黄蜡半两 蜜一两 白茅根末二钱 马勃末二钱

【用法】 上用水一升，煮至一盏，空心顿服。如服时饮气服之，不得作声，如作声即无效。

【主治】 产妇临产时伤手胞破，小便不禁。

【方论选录】《济阴纲目》：黄绢煮烂固脬，黄腊护膜生肌，茅根破血止血，马勃塞虚漏之隙。

【备考】 黄绢须是真黄丝织成者，若是染者，不中用。

08533 固精丸

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 牡蛎（煅令熟）

【用法】 以豬猪脏近腹头处二三尺，洗净，翻过，恐油太多略去了些小，如不甚多则不须去，亦洗令净，却翻脂在内，旋旋入牡蛎末，候满扎定两头，慢火水煮，令脏烂以指甲掐得软为度，款款取出，莫教取破，候冷批开脏取出药末，将脏切细于，砂盆内研成膏，和药末为丸，如梧桐子大。每服四五十丸至百丸，米饮送下，日进三四服。初服七八日或十余日，小便所出状如凝脂，或如败血，或如细脓条，若曲蟮粪不断，每小便时必出三五次或十数次，切莫疑惑，此是败精出也。服至半月，病势已减七八分，至月余，病已瘳矣，更服至百日，永久不复发动。

【主治】 膏淋，小便精自出，多因惊而得。

08534 固精丸

【方源】《济生》卷四。

【组成】 肉苁蓉（酒浸，切薄片） 阳起石（火煅，研极细） 鹿茸（燎去毛，酥炙） 赤石脂（火煅七次） 川巴戟（捶去心） 韭子（炒） 白茯苓（去皮） 鹿角霜 龙骨（生用） 附子（炮，去皮脐）各等分

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐酒、盐汤任下。

【主治】 嗜欲过度，劳伤肾经，精元不固，梦遗白浊。

【方论选录】《古方选注》：夫房劳过度，则精竭阳虚，阳虚则无气以制其精，故寐则阳陷而精道不禁，随触随泄，不必梦而遗也，与走阳不甚相远。治之必须提阳固气，乃克有济，独用补涩无益也。鹿茸通督脉之气舍，鹿角霜通督脉之精室，阳起石提陷下之真阳，韭菜子去淫欲之邪火，肉苁蓉暖肾中真阳，五味子摄肾中真阴，巴戟入阴，附子走阳，引领真阳运行阳道，不使虚火陷入于阴，白茯苓淡渗经气，使诸药归就肾经，用石脂、龙骨拦截精窍之气而成封固之功。

【备考】《古方选注》有五味子。

08535 固精丸

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】 莲须八两 覆盆子 菟丝子（酒浸，捣成膏） 破故纸（炒） 山茱萸（去核）各四两 芡实五百个 沙苑蒺藜半两（酒浸） 龙骨二两（火煅醋淬七次）

【用法】 上为细末，蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心盐汤送下。

【主治】 遗精梦泄。

08536 固精丸

【方源】《直指·附遗》卷十。

【异名】 宁神固精丸（《寿世保元》卷五）。

【组成】 知母（炒） 黄柏（酒炒）各一两 牡蛎（煅） 龙骨（煅） 芡实 莲蕊 茯苓 远志（去心） 山茱萸肉各三钱

【用法】 上为末，煮山药糊丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸。

【主治】 心神不安，肾虚自泄精。

08537 固精丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】 当归（酒洗） 熟地黄 山药（炒） 人参（去芦） 白术（去芦） 茯苓（去皮） 锁阳 牡蛎 蛤粉 黄柏（酒炒） 知母（酒炒） 杜仲（酒和姜汁炒） 椿根皮 破故纸（酒炒）各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，辰砂为衣，如梧桐子大。每服五十丸，空心酒吞下。

【功用】《简明医彀》：扶元益肾秘精。

【主治】 阴虚火动而遗精。

【备考】《简明医彀》有金樱子，无当归。

08538 固真饮子

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 人参 山药 当归 黄耆 黄柏各一钱 熟地黄一钱半 白术 泽泻 山茱萸 补骨脂各五分 五味子十粒 陈皮 茯苓各八分 杜仲 甘草各七分

【用法】 水煎，温服。

【功用】 养气血，理脾胃，充腠理，补五脏。

【主治】 阴阳两虚，气血不足，饮食少，五心热，自汗，日晡潮热，精气滑脱，行步无力，腰胯酸痛，泄泻，脉沉弱；嗽少痰多，或干咳，或气血精神不足，体倦，头目昏，食少，脉虚数，潮热，将成痨症者；或伤力气虚，脉弱，腰背疼痛，动辄鼻衄者；或便血过多，面黄瘦瘁，食少气促者；或妇人阴虚瘦瘁，食少，虚热，自汗，腹痛，面浮，腰痛，赤白带下者。

【宜忌】 中年以上之人，可以常服。

【备考】《便览》：有半夏、生姜，无茯苓。

08539 固卫御风汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 炙黄耆 9 克 防风 9 克 炒白术 9 克 桂枝 9 克 赤白芍各 9 克 生姜 3 片 大枣 7 枚

【功用】 调营固卫，以御风寒。

【主治】 冷激性荨麻疹。

【加减】 日久发作不休者，加乌梅、五味子。

【方论选录】 本方为玉屏风散合桂枝汤组成。黄耆、白术、防风固表御风，桂枝、白芍、生姜、大枣调和营卫，发散风寒，佐赤芍活血祛风。

08540 固气填精汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】 人参一两 黄耆一两（生用） 白术五钱（土炒） 大熟地一两（九蒸） 当归五钱（酒洗） 三七三钱（研末，冲） 芥穗二钱（炒黑）

【用法】 水煎服。服一剂而血止，二剂而身安，四剂则全愈。

【功用】 急固其气，大补其精

【主治】 妊妇因行房气脱，水亏火盛，以致小产，血崩不止。

【宜忌】 若年逾四十，参、耆宜倍用，熟地宜减半用，以其气虚火衰也。否则，每令气脱不救。

【方论选录】 此方之妙，妙在不去清火，而惟补气补精，其奏功独神者，以诸药温润能除大热也。盖热是虚，故补气自能摄血，补精自能止血，意在本也。

08541 固本十补丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十一。

【组成】 熟地八两（锅刀切块，酒水各半煮烂，捣烂，入药） 山茱萸肉五两（酒拌，蒸，晒干，炒） 怀山药六两（炒黄） 白茯苓四两（人乳拌，晒干，焙） 淮牛膝四两（淡盐酒拌，晒干，炒） 厚杜仲三两（淡盐酒拌，晒干，炒） 鹿茄茸一具（拣饱满紫润者，去毛骨，锯厚片，切小方块，酥拌，炒松黄） 北五味子一两二钱（每个打扁，蜜酒拌，蒸，晒干，炒） 制附子一两五钱（切片，微火焙燥） 上肉桂一两五钱（临磨括尽粗皮，不见火，不出气）

【用法】 上为细末，用熟地捣烂入药，加炼蜜杵好为丸。每服五六钱，早空心淡盐汤送下，随进饮食压之。

【主治】 肾元不足，脾胃虚弱者。

【方论选录】 熟地重浊味厚，能补阴，且色黄而得土之正气，故走心脾，蒸晒至黑则减寒性，而专温补肝肾；山茱萸益肝，且精欲固而畏脱，茱萸味酸涩更可固精髓，以助肾家闭藏之职；山药甘咸，补脾而入肾，以化源也；茯苓淡渗，搬运下趋，精华可入于肾；牛膝、杜仲坚强筋骨，以为熟地之佐使；肉桂甘辛，补命门之真火，附子之健悍以嘘既槁之阳，和使阴从阳长；借鹿茸精血有情之品，助草木而峻补，令无情而变有情；五味子酸以敛之，咸以降之，以防辛温之药乘势僭越于上，且可敛肺金而滋水生津液而强阴，专纳气藏原。

08542 固本止崩汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】 大熟地一两（九蒸） 白术一两（土炒焦） 黄耆三钱（生用） 当归五钱（酒洗） 黑姜二钱 人参三钱

【用法】 水煎服。一剂崩止，十剂不再发。

【主治】 妇人虚火血崩，两目黑暗，昏晕在地，不省人事。

【宜忌】 若血崩数日，血下数斗，六脉俱无，鼻中微微有息，不可遽服此方，恐气将脱不能受峻补也；有力者，用辽人参（去芦）二钱，煎成，冲贯众炭末一钱，服之待气息微旺，然后服此方，仍加贯众炭末一钱，无不见效。无力者；用无灰黄酒冲贯众炭末二钱，服之待其气接，神清，始可服此方，人参以党参代之，临服亦加贯众炭末一钱（冲入）。

【方论选录】 此方妙在全不去止血，而唯补血，又不只补血，而更补气，非唯补气，而更补火。盖血崩而至于黑暗昏晕，则血已尽去，仅存一线之气，以为护持，若不急补其气以生血，而先补其血而遗气，则有形之气恐不能遽生，而无形之气，必且至尽散。此所以不先补血而先补气也。然单补气则血又不易生，单补血而不补火，则血又必凝滞，而不能随气而速生。况黑姜引血归经，是补中又有收敛之妙，所以同补气补血之药并用之耳。

08543 固本耳聪丸

【方源】 《冯氏锦囊·杂症》卷六。

【组成】 熟地四两（焙） 柏子仁（焙，去油） 人参一两（焙） 石菖蒲五钱（蜜酒拌，焙） 远志肉一两（甘草制，焙） 五味子七钱 白茯神一两（人乳拌，炒） 山药二两（炒黄）

【用法】 上为末，蜜为丸。每服三钱，早晚食前、食远白汤送下。

【主治】 心肾不足，诸虚耳聋。

【备考】 方中柏子仁用量原缺。

08544 固本还睛丸

【方源】 《医学正传》卷五。

【异名】 夜光丸（《济阳纲目》卷一〇一）。

【组成】 天门冬（去皮心，酒浸一宿，另杵如泥） 麦门冬（去心，焙干） 生地黄（酒浸，焙，勿犯铁） 熟地黄（酒洗净，用瓷器蒸，勿犯铁）各三两 人参一两五钱 白茯苓 干山药 枸杞子各一两五钱 川牛膝一两（酒洗） 石斛一两（去芦，酒洗） 草决明（微炒） 杏仁（去皮尖，另研） 甘菊花（用小金钱） 菟丝子（酒浸三宿，另研，焙干） 枳壳（麸炒黄色） 羚羊角各一两（细锉，取净末八钱） 乌犀角八钱（锉细，生用） 五味子七钱（焙干） 甘草七钱（炙） 防风八钱（去芦） 白蒺藜七钱（杵去刺） 黄连七钱（去毛） 川芎七钱 青葙子八钱（微炒）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，盐汤送下。

【功用】 《阿鹤亭集方》：升水降火，平肝益肾，明目清心。

【主治】 远年一切目疾，内外翳膜遮睛，风弦烂眼，及老弱人目眵多糊，迎风冷泪，视物昏花等。

【备考】 本方方名，《景岳全书》引作“祖传固本还睛丸”。

08545 固本明目汤

【方源】 《眼科临症笔记》。

【组成】 大丽参三钱 覆盆子二钱 玄参五钱 远志三钱 白芍四钱 茯神三钱 女贞子三钱 没石子三钱 蒺藜二钱（炒） 甘草一钱 磁石二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 瞳孔散大症。两眼瞳孔大如豆，头目眩晕，视物忽明忽暗，如在云雾中。

【临症举例】 瞳孔散大症 禹城夏某某之母，素无目疾，年过花甲，忽觉头目眩晕，视物昏蒙，瞳孔放大如豆，脉左尺细数，关部弦大，乃肾水不足，肝阳上越所致。先将上星、合谷、太阳频泻，嘱服滋阴敛光散，连服十剂，头晕目弦大有好转，目昏如故。后改服本方，连服十余剂，瞳孔略收，而视力自觉增加。又将攒竹、目窗、光明轮刺，常服磁朱丸，月余光收大半。

08546 固本泻火汤

【方源】 《眼科临症笔记》。

【组成】 生牡蛎五钱 生龙骨五钱 当归三钱 川芎二钱 白芍四钱 生地一两 生龟版四钱 金银花六钱 玄参三钱 知母三钱 寸冬三钱 黄连二钱 生甘草一钱 羚羊角五分

【用法】 水煎服。

【主治】 萤星满目症（玻璃体出血）。两眼黑珠与平人无异，不疼不红，自视火光乱飞，视物昏花。

【临证举例】 眼底出血 左某某，女，干部。忽觉头晕、目昏，视有红花，确诊为眼底出血。六脉洪大。乃肝火旺盛，上冲于脑，波及于目而致。先服本方十余剂，血即止。改服平肝泻火汤，三月余视力上达1.2。

08547 固本种子丸

【方源】 年氏《集验良方》卷二。

【组成】 巴戟天二两 远志肉二两 石斛四两 杜仲四两 川牛膝二两 五加皮三两 青盐二两 生地三两 当归二两 大茴香一两 山茱萸二两（去核） 沙苑蒺藜四两 益智子二两 羚羊角四两

锁阳十二两　鱼鳔八两　枸杞十两　人参十两　破故纸六两　覆盆子二两　巨胜子四两　桑螵蛸　阿胶一斤半　龟版胶一斤半　肉从蓉半斤　何首乌二斤　白茯苓八两　鸽蛋二百　淫羊藿　黑驴肾一具　黄狗肾十具（炙脆，为末）　鳖头一个

【用法】 炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，黄酒送下。寅、午、戌三时服三次，或早、晚二次。

【功用】 固本种子。

【宜忌】 不宜多服。忌房事一月。忌诸样血，不可食。

【备考】 方中桑螵蛸、淫羊藿用量原缺。

08548　固本养荣汤

【方源】 《外科正宗》卷三。

【组成】 川芎　当归　白芍　熟地　白术　山药　人参　牡丹皮　山萸肉　黄耆各一钱　甘草　肉桂　五味子各五分

【用法】 水二钟，加生姜三片，大枣二个，煎八分，食前服。

【主治】 骨疽已成，骨不吐出，或既出不能收敛，由气血之虚，脾胃弱也。

【备考】 本方改为丸剂，名“固本养荣丸”（见《中国医学大辞典》）。

08549　固本健阳丹

【方源】 《回春》卷六。

【异名】 固本健阳种子丹（《医学正印》卷上）。

【组成】 菟丝子（酒煮）一两半　白茯神（去皮木）　山药（酒蒸）　牛膝（去芦，酒洗）　杜仲（酒洗，去皮，酥炙）　当归身（酒洗）　肉苁蓉（酒浸）　五味子（去梗）　益智仁（盐水炒）　嫩鹿茸（酥炙）各一两　熟地（酒蒸）　山茱萸（酒蒸，去核）各三两　川巴戟（酒浸，去心）二两　续断（酒浸）　远志（制）　蛇床子（炒，去壳）各一两半　人参二两　枸杞子三两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心盐汤送下，酒亦可，临卧再进一服。若妇人月候已尽，此是种子期也，一日可服三次。

【功用】 《医学正印》培养元神，坚固精血，暖肾壮阳。

【主治】 无子。多是精血清冷，或禀赋薄弱；间有壮盛者，亦是房劳过甚，以致肾水欠旺，不能直射子宫所致。

【加减】 如精不固，加龙骨、牡蛎（火煅，盐酒淬三五次）各一两二钱，鹿茸五钱。

【临证举例】 不育证　刘小亭公，年四十无子嗣，阳事痿弱，精如水冷，两寸脉洪，两尺脉沉微无力。此真元衰惫，乃斫丧过度所致也。以固本健阳丹加人参、附子、枸杞子、覆盆子各二两，制一料服尽。觉下元温暖如前，又制一料，服至半料乃止。果孕，生一子。后传之于刘伯亭、刘敏庵俱服之，皆生子。

08550　固本理眩汤

【方源】 《冯氏锦囊·杂症》卷六。

【组成】 人参一钱五分　天麻（煨）一钱二分　当归一钱　白术（炒）一钱　橘红（盐汤煮）五分　白芍（酒炒）一钱五分　茯神一钱二分　半夏一钱　五味子四分

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 气虚头眩。

08551　固肝养荣汤

【方源】 《眼科临症笔记》。

【组成】 大熟地五钱　当归三钱　人参二钱　川芎二钱　枸杞三钱　肉苁蓉四钱　菟丝子三钱　巴戟三钱　蒺藜三钱（炒）　石斛三钱　菊花二钱　夏枯草三钱　云苓三钱　甘草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 无时冷热泪症（泪道阻塞）。两目搐昏，不疼不肿，视力不健，或冷或热，时常流泪。

08552　固齿白玉膏

【方源】 《外科大成》卷三。

【组成】 龙骨一两　阳起石五钱（姜蚕四十九个，防风、当归、川芎、牙皂、青盐、升麻、白芷、骨皮各五钱，细辛、藁本各三钱，为粗末，长流水于砂锅内，桑柴火熬汁，去滓，再煎汁一碗，将龙骨、阳起石火煅通红淬药汁内七次，焙干为末）　铅粉一两　珍珠三钱　象牙（末）五钱　麝香二钱

【用法】 上为末，和匀。黄蜡三两熔化，滤净再化，俟温方入前药和匀，乘热摊纸上，如冷，烧热熨斗，仰放，纸铺斗上摊之。用时先漱口净，剪小条贴齿根上，闭口不语。

【主治】 一切牙疼，及齿动摇而不坚固者。

08553　固齿将军散

【方源】 《景岳全书》卷五十一。

【组成】 锦纹大黄（炒微焦）　杜仲（炒半黑）各十两　青盐四两

【用法】 上为末。每日清晨擦漱；火盛者咽之亦可。

【功用】 牢牙固齿。

【主治】 牙痛牙伤，胃火糜肿。

08554 固真秘元煎

【方源】《医级》卷九。

【组成】人参一钱 菟丝三钱 龙齿一钱 五味五分 茯苓一钱半 芡实 金樱子二钱 桑螵蛸 车前各一钱五分

【主治】久带、久淋、梦与鬼交，并治男子梦遗精滑。

【备考】方中芡实用量原缺。

08555 固睛明目丸

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】大黄蒍二两 大熟地一两 大丽参五钱 白术六钱 远志五钱 蒺藜八钱（炒） 柏子仁一两 知母肉四钱 覆盆子一两 菟丝子一两 枣仁五钱 磁石五钱 车前子五钱 甘草三钱

【用法】上为细末，水打为丸，朱砂为衣。每服二钱，一日两次，白开水送服。

【主治】视正反斜症（中心性视网膜脉络膜炎）。两眼不疼不红，外观无异常人，但视物歪斜。

【临症举例】视正反斜症 道口吕某某，男，七十岁。素好饮酒，头晕目酸，视物歪斜，脉右寸微细，两关滑数。乃肺气不足，痰火郁膈，清气不升，浊气不降而致。先略刺上星、人中、阳白、神庭，另服固睛明目丸十余剂，而视物不甚歪斜，但头晕如故，又服柏子坠痰丸，刺头维、后顶、大陵数次，头晕止，视物正常。

08556 固精种子丸

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】紫河车一具 枸杞 韭子 当归 菟丝子 覆盆子 蛇床子 熟地 嫩黄蒍 琐阳 杜仲 巴戟三两 辽东参 于白术 白龙骨 天冬 海狗肾 陈皮 山药一两 山萸 麦门冬五两 补骨脂八两

【用法】上为蜜丸。每服六七十丸，渐加至百丸，盐汤送下。旅寓减半。

【功用】固精种子。

【备考】方中枸杞、韭子、当归、菟丝子、覆盆子、蛇床子、熟地、嫩黄蒍、琐阳、杜仲、辽东参、于白术、白龙骨、天冬、海狗肾、陈皮、山萸用量原缺。

08557 固精种子羊肾丸

【方源】年氏《集验良方》卷二。

【组成】甘枸杞（人乳浸一宿，晒干）二两 白莲蕊二两 大地黄（酒浸透，捣如泥）四两 芡实肉（蒸熟）四两 何首乌（黑豆汁浸蒸九次，晒干）四两 羊肾十对（淡盐腌一宿）

【用法】上为细末，将羊肾用酒三四碗煮烂为度，捣如泥，并地黄酒和前药末捣均为丸，如黄豆大，若难丸，少加炼蜜。每日三钱，淡盐汤送下。

【功用】固精种子。

08558 固精益肾暖脐膏

【方源】《摄生秘剖》卷四。

【组成】韭菜子一两 蛇床子一两 大附子一两 肉桂一两 川椒三两 真麻油二斤 抚丹（飞净者）十二两 倭硫黄一两（研） 母丁香一钱（研） 麝香三钱（研） 独蒜一枚（捣烂）

【用法】将上药前五味用香油浸半月，入锅内熬至枯黑，滤去滓，入丹再熬，滴水成珠，捻软硬得中即成膏矣。每用大红缎摊如酒杯口大，将倭硫、丁、麝末以蒜捣烂为丸，如豌豆大，安于膏药内贴之。

【主治】男子精寒，阳事痿弱，举而不坚，坚而不久，白浊遗精；妇人禀受气弱，胎脏虚损，子宫冷惫，血寒痼冷，难成子息，带下崩漏等症。

08559 果附汤

【方源】《医学纲目》卷十六。

【组成】附子 草果 良姜各等分

【用法】以酒煎服。

【主治】寒气心痛。

08560 钓肠丹

【方源】《局方》卷八。

【异名】钩肠丸（《疡科选粹》卷五）。

【组成】瓜蒌二枚（烧存性） 猬皮二个（锉碎，罐内烧存性） 鸡冠花（锉，微炒）五两 胡桃仁十五个（不油者，入罐内烧存性） 白矾（枯） 绿矾（枯） 白附子（生用） 天南星（生用） 枳壳（去瓤，麸炒） 附子（去皮脐，生用） 诃子（煨，去皮） 半夏（生）各二两

【用法】上为细末，以醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、临卧温酒送下。远年不愈者，服十日见效，久服永除根本；肠风等疾，一二年内者，十服可愈。

【主治】新久诸痔，肛边肿痛，或生疮痒，时有脓血；以及肠风下血，脱肛。

【备考】《卫生宝鉴》有乳发，无瓜蒌。

08561 钓鳖丸

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】威灵仙根不拘多少

【用法】用酽醋浸二日，晒干为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服一丸或二丸，半茶半汤送下。如觉要吐，用砂糖、铜青为末，共半匙，滴油一二

点，以茶汤调服，即可吐出原物；如药性来迟，令患者两手伏地，用清水一盆，鹅翎搅乱即吐出。

【主治】 骨梗咽喉，不能吞吐，势急者。

08562 钩藤饮

【方源】《圣济总录》卷一七一（人卫本）。

【组成】 钩藤 黄芩（去黑心） 犀角（镑）各半两 石膏（碎） 龙齿各一两 升麻 甘草（炙，锉）各三分，竹叶四十片

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服一钱匕，水一盏。煎至半盏，去滓，入麝香少许温服。

【主治】 小儿痫疾。

【备考】 本方方名，原书作“钩藤饮”。

08563 钩藤饮

【方源】《婴童百问》卷三。

【异名】 钩藤膏、钩藤散（原书同卷）、钩藤饮（《保婴撮要》卷下）。

【组成】 钩藤勾 茯神 茯苓 川芎 当归 木香 甘草 白芍药各一钱

【用法】 上为末。每服一钱，用生姜、大枣，略煎调下。

【主治】 小儿脏寒夜啼，以及盘肠气，痛则腰曲干啼，额上有汗，口闭脚冷，上唇干。

【加减】 惊啼，加蝉蜕、防风、天麻；心热而烦啼，面红舌白，小便赤涩，去木香，加朱砂末一钱（研和），每服一钱，木通煎汤调下，或锉散煎服。

08564 钩藤散

【方源】《本事》卷二。

【组成】 钩藤 陈皮（去白） 半夏（汤浸，洗七遍，薄切，焙干） 麦门冬（略用水浸，去心） 茯苓（去皮） 茯神（去木） 人参（去芦） 甘菊花（去萼梗） 防风（去钗股）各半两 甘草一分（炙） 石膏一两（生）

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏半，入生姜七片，煎至八分，去滓温服。

【功用】 清头目。

【主治】 肝厥头晕。

【备考】 本方方名，《妇人良方》引作“钩藤散”。

08565 钩藤膏

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】 乳香（用灯心研末） 五灵脂 没药 当归各一两 麝香一字

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如豌豆大。小儿百日内一丸，一岁二丸，三岁三丸，钩藤煎汤化下，或乳香煎汤化下，不拘时候。

【主治】 小儿禀受虚怯，邪干心痛，以及内吊夜啼，面唇青冷。

08566 钩藤膏

【方源】《准绳·幼科》卷九。

【组成】 钩藤（和钩） 玄胡索 当归（酒洗） 粉草（炙） 乳香各五钱 肉桂（去粗皮）二钱 麝香一字

【用法】 上前四味药焙干，肉桂不过火，同研为末；以箬叶裹，熨斗盛火熨透乳香，候冷，入乳钵同麝香细杵，后入前药末，再杵匀；炼蜜为丸，如芡实大。每服一至二丸，空心白汤化下。

【主治】 百日内婴儿面青腹痛，夜啼；以及周岁以上婴儿盘肠内吊，诸疝气疾。

08567 钩藤饮子

【方源】《永乐大典》卷九八〇引《养生必用》。

【异名】 钩藤饮（《旅舍》）、钩藤饮子（《卫生总微》卷五）、蝉壳饮（《普济方》卷三七一引《卫生家宝》）。

【组成】 钩藤钩子三分 白僵蚕（去丝嘴，炒） 川芎 蝉蜕（去头翅足，炙） 蛇蜕（炙） 甘草（炙）各一分 蜣螂（去头翅足，炙）三枚

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜五片，煎至七分，去滓，量儿大小，分作三四次灌下。若是阴痫，加附子（炮，去皮脐）指面大一块，依前法水煎，温服，日三夜二。

【主治】 小儿阴痫，多睡，手足冷，时瘛疭，目直视，乳食不进。

08568 和中丸

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】 人参 干生姜 橘红各一钱 干木瓜二钱 炙甘草三钱

【用法】 上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，温水送下，食前服。

【功用】 益气健脾，补胃进食，理气消痰。

①《兰室秘藏》：补胃进食。②《饲鹤亭集方》：理气分，消痰积，去湿滞，厚肠胃，进饮食。③《脾胃论注释》：调和脾胃，补益中气。

【主治】 脾虚胃弱，纳少脘痞，干呕吞酸，或肿满。

①《普济方》：服寒药脾胃虚弱。②《医学六要》：久病虚弱，厌厌不能食。③《医家心法》：鼓证肿满初起，或因郁而成者。④《饲鹤亭集方》：胃弱痞积，干呕吐酸。⑤《脾胃论注释》：脾胃病纳少化迟。

【方论选录】《脾胃论注释》：方中人参补气，又

用橘红利气，则补而不滞，利而不耗；重用炙甘草配干生姜，辛甘阳药有温脾助运的功用；配木瓜酸以敛阴，有养胃生津的效力。蒸饼为丸，有养脾胃消食化滞的作用。

【备考】《医学六要》有白术。

08569 和中丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】白术（陈土炒）四两 扁豆（炒）三两 茯苓一两五钱 枳实（面炒）二两 陈皮三两 神曲（炒黑） 麦芽（炒） 山楂（炒） 香附（姜汁炒）二两 砂仁一两五钱 半夏（姜汁炒）一两 丹参（酒蒸）二两 五谷虫（酒拌，炒焦黄色）三两

【用法】荷叶一枚，煎水送为丸。每服二钱，上午、下午开水送下，每日二次。

【功用】《笔花医镜》：消痞。

【主治】①《医学心悟》：鼓胀。②《笔花医镜》：腹胀食积，疟后痰结，或血裹肝气，伏于胁下，时痛时止，而成痞积。

【加减】若寒气盛，加干姜、吴萸、肉桂；若湿热盛，加黄连、连翘；若大便闭结，先用三黄枳术丸下之，随用本方渐磨之；若兼瘀血，加厚朴、赤芍；若脾气虚弱，用六君子汤吞服此丸，或以补中益气汤送下。

08570 和中汤

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】白术四两 橘皮（黄者） 厚朴二两半 人参 茯苓 甘草一两半

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，入生姜煎至七分，空心温服。

【功用】调适阴阳，通流荣卫，养脾胃，进饮食。

【主治】胁肋胀满，呕逆恶心。

08571 和中汤

【方源】《医统》卷二十四。

【组成】人参 白术 陈皮 半夏 茯苓各一钱 甘草五分 黄连一钱半（姜炒） 大枣二枚

【用法】上加粳米一撮，以水一盏半，煎至八分，温服。

【主治】虚火嘈杂。

08572 和中散

【方源】《局方》卷十。

【异名】和中汤（《医统》卷八十九）。

【组成】厚朴（去皮，姜炙）六两 白术三两 干姜（炮） 甘草（炙）各二两

【用法】上为末，每服一钱，水八分盏。生姜二片，煎六分，去滓稍热服，乳食前服。

【主治】小儿脾胃不和，呕逆恶心，冷热不调，减食泄泻，腹痛肠鸣，少力嗜卧。

08573 和中散

【方源】《阎氏小儿方论》。

【组成】人参（切，去须，焙） 白茯苓 白术 甘草（锉，炒） 干葛（锉） 黄耆（切，焙） 白扁豆（炒） 藿香叶各等分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，干枣二个（去核），生姜五片，煎八分，食前温服。

【功用】和胃气，止吐泻，定烦渴。

【主治】小儿腹痛吐泻，烦渴厌食。

08574 和中煎

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】槟榔 木香 橘皮 青皮 神曲 麦芽 茯苓 半夏各一两 人参 白术各半两

【用法】上为细末，姜煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下。

【功用】匀气宽中，宣通壅滞，调顺三焦，快利胸膈，温养脾胃，消化宿谷。

【主治】脾胃怯弱，饮食易伤，噎痞胀满，心腹刺痛，嗳腐吞酸，呕逆恶心，及妊娠中虚痰逆，食饮化迟。

08575 和气汤

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】木香 紫苏各五分 槟榔七分 陈皮 半夏各二分 香附 青皮各一钱 乳香 没药 甘草各三分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】①《嵩崖尊生》：虚痞刺痛。②《杂病源流犀烛》：任脉病，腹中有气如指，上抢心，拘急不得俯仰。

08576 和气饮

【方源】《广嗣纪要》卷九引李东垣方。

【异名】束胎和气饮（原书同卷）、束胎饮（《万氏女科》卷二）。

【组成】白术 黄芩各一钱半 大腹皮 枳壳（炒）各一钱 苏叶茎 砂仁（炒）各五分 炙草三分

【用法】水煎服。

【主治】子满。妊娠七八月，其妇奉养本厚，安居太过，胎元肥壮，温热内盛，腹大如鼓，腹满下坠，逼迫子户，坐卧不安。

【临证举例】子满 徐太和之妻，娠八月，得子

满病，腹满，胎坠下迫，玉门大张，胞形外露，但伸卧不能坐，势危，脉两手俱大坚搏手。密斋诊之曰：乃双胎也。胎肥气弱，不能束约，故下坠耳。用本方加人参一钱、升麻（炒）三分，服三剂，胎复上而安。后生一男一女。

08577 和气饮

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】苍术 紫苏 防风 赤苓 豆豉 藿香 陈皮 厚朴（姜炒） 炙甘草

【用法】加生姜、灯心，水煎服。

【功用】温散。

【主治】小儿断脐失护，风冷乘入，传于大肠，遂成脐寒泻，粪色青白，腹痛肠鸣。

08578 和气散

【方源】《局方》卷三（吴直阁增诸家名方）。

【组成】香附子（炒，去毛） 陈皮（去白） 肉桂（去粗皮） 良姜（去芦） 青皮（去白） 甘草（煨） 茴香（炒） 苍术（米泔浸）各一两 桔梗（去芦）三两

【用法】上为细末。每服二钱，入盐少许，沸汤点服，或盐酒调下，不拘时候。

【功用】温脾胃，进饮食。

【主治】①《局方》：脾胃不和，中脘气滞，宿寒留饮，停积不消，心腹胀满，呕吐酸水。脾疼泄泻，脏腑不调，饮食减少；一切气疾。②《普济方》引《医方集成》：心疼。

08579 和血汤

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】桃仁 红花 归尾 赤芍 生地黄 青皮 香附

【主治】死血所致小腹胀急痛，小便反利。

【备考】《中国医学大辞典》本方用法：清水煎服。

08580 和安汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】陈橘皮（汤浸，去白，焙）一斤 甘草（炙，锉）二两 干姜（炮）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓温服。

【主治】胃气逆，干呕不止。

08581 和肝饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 白芍 三棱 青皮各一钱五分 大茴香 木香 枳壳 柴胡 砂仁各八分

【用法】水煎服，不拘时候。

【主治】胁下杠梗一条作疼。

08582 和乳汤

【方源】《外科真铨》卷上。

【组成】公英五钱 银花三钱 当归一钱 川芎七分 青皮七分 香附七分 浙贝一钱 甲珠一片 桔梗一钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】肝气郁结，胃热壅滞之乳痈初起；或乳痈好后内结一核，如桃如李，累月不消者；或形寒饮冷加以气郁痰饮，流入胃络，积聚不散所致之乳癖，乳房结核坚硬，始如钱大，渐大如桃如卵，皮色如常，遇寒作痛者。

【加减】乳痈好后结核，加附片七分；乳癖，加附子七分，煨姜一片；有寒热头痛，加防风一钱，前胡一钱；气虚者，加生黄耆一钱，内脓已成者，再加皂刺一钱。

08583 和胁饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷十。

【组成】枳壳 青皮 姜黄 香附 甘草

【主治】①《杂病源流犀烛》：胠胁肋气痛。②《一见知医》：胁肋气痛，时止而膨，嗳即宽，旋便痛。

08584 和荣汤

【方源】《法律》卷三。

【组成】白术 川芎各一钱半 南星 半夏 芍药 茯苓 天麻各一钱 川归 生地黄 熟地黄 牛膝 酸枣仁 黄芩 橘红各八分 羌活 防风 官桂各六分 红花 甘草（炙）各四分 黄柏三分

【用法】水煎，入竹沥、姜汁，晨服。

【功用】补血活血，健脾燥湿消痰，清热疏风，开经络，通腠理。

【主治】血虚血热，挟痰挟火，经络肌表之间，先已有其病根，后因感冒风寒，或过嗜陈酒膏粱而助痰火，或恼怒而逆肝气，遂成半身不遂、口眼㖞斜，头目眩晕，痰火炽盛，筋骨时疼。

08585 和胃丸

【方源】《局方》卷三。

【组成】厚朴（去粗皮，锉碎，以生姜二两研烂同炒） 半夏（一半汤洗，晒干，微炒，一半生姜汁制作饼，炙黄） 鳖甲（九肋大者）一枚（黄泥外固，以米醋二碗，化硇砂一两，放鳖甲内慢火熬干，取二两细研如粉） 神曲（碎，炒） 麦芽（微炒） 白术（锉，炒） 肉桂（去粗皮）各二两 枳壳（去瓤，麸炒） 三棱（炮） 青皮（去白，炒） 人参各三两 陈皮（去白） 诃子（炮，去核）各

四两 槟榔 当归各一两半 芍药 甘草（炒）各一两 干姜（炮） 赤茯苓（去皮）各三分

【用法】 上为细末，蜜为丸，如小豆大。每服二十丸，加至三十丸，微嚼破，温水送下，不拘时候。老幼气弱皆可常服。

【功用】 温和脾胃，调进饮食。

【主治】 脾胃不和，中脘气痞，心腹胀闷，不思饮食，呕吐痰逆，噫气吞酸，面色萎黄，肌肉消瘦，腹胁刺痛，便利不调，少力嗜卧，体重节痛；及虚劳脾胃虚弱，饮食不化，心腹痞满。

08586 和胃汤

【方源】《古今医彻》卷二。

【组成】 人参一钱半 黄连六分（土炒） 当归一钱 黄芩七分（土炒） 白芍药一钱（酒炒） 茯神一钱 石菖蒲五分 神曲七分 半夏七分 枳实（麸炒）四分 红花三分 苏子一钱五分

【用法】 用陈壁土研细，搅入长流水，澄清后煎药，入姜汁、白蜜少许，童便一二匙，和服。

【主治】 噎膈。

08587 和胃饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 陈皮 厚朴各一钱半 干姜（炮）一二钱 炙甘草一钱

【用法】 水一钟半，煎七分，温服。

【主治】 ①《景岳全书》：寒湿伤脾，霍乱吐泻，及痰饮水气，胃脘不清，呕恶胀满，腹痛等证。②《妇科玉尺》：孕妇胃寒气实，胎气上逼者。

【加减】 此方凡藿香、木香、丁香、茯苓、半夏、扁豆、砂仁、泽泻之类，皆可随宜增用之；若胸腹有滞，而兼时气寒热者，加柴胡。

【备考】 此即平胃散之变方也。凡呕吐等症，多有胃气虚者，一闻苍术之气亦能动呕，故以干姜代之。

08588 和解散

【方源】《局方》卷二（绍兴续添方）。

【组成】 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 陈皮（洗）各四两 藁本 桔梗 甘草各半斤 苍术（去皮）一斤

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，入生姜三片，大枣二枚，煎至七分，热服，不拘时候。

【功用】 ①《岭南卫生方》：和脾胃，逐风邪。②《医统》：助胃驱邪，和解百病。

【主治】 四时伤寒，瘴病初起，伤食，胃寒腹痛，湿疟。

①《局方》：四时伤寒，头痛，憎寒壮热，烦躁自汗，咳嗽吐痢。②《岭南卫生方》：冷瘴初发。③《医统》：瘴病初作，胸腹满闷，头眩发热；伤风初作，未分证候。④《医碥》：伤饮食。⑤《成方切用》：胃寒，腹痛呕吐。及瘴疫湿疟。

【备考】《医方集解》有枳壳。

08589 和中大顺汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 人参二钱 麦冬二钱 丹参三钱 柏仁二钱 丹皮二钱 生地四钱 白赤芍各一钱 白潼蒺藜各三钱 赭石三钱（煅，研） 合欢花二钱

【用法】 加竹沥二大匙，生姜汁二滴，同冲服。

【主治】 关格。孤阳独发，阻格饮食，甚则作呃。

08590 和中化浊汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】 茅术一钱 厚朴一钱 茯苓二钱 枳壳一钱 青皮一钱 砂仁一钱 木香五分 乌药一钱 楂炭三钱 神曲三钱 车前二钱 荷叶一角 煨姜三片

【主治】 暑月贪凉受寒，过食生冷，肠胃受伤所致之泄泻。

08591 和中茵陈汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 当归二钱 茯苓二钱 白术一钱 广皮一钱 厚朴一钱 木香五分 砂仁一钱 茅术一钱 山栀一钱五分 茵陈三钱 萆薢二钱 车前二钱

【用法】 生熟谷芽各二钱，生熟苡仁各五钱，煎汤代水。

【主治】 谷瘅。乃脾胃不和，食谷则眩，谷气不消，胃中浊气下流，小便不通，湿热入于膀胱，身体尽黄。

08592 和中健脾丸

【方源】《医方集解》。

【组成】 健脾丸去人参、山楂、麦芽，加木香、槟榔、厚朴、半夏、甘草。

【用法】 神曲糊为丸。米饮送下。

【主治】 胃虚饥不欲食。

08593 和中蠲痛汤

【方源】《医学六要》卷五。

【组成】 草豆蔻（须用建宁者，无则用白豆蔻） 山楂 香附 川芎 半夏 苍术 厚朴 缩砂 枳实 炮姜

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 一切胃脘暴痛。

08594 和气养荣汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】人参 陈皮 白术 黄耆 茯苓 丹皮 当归 熟地各一钱 沉香 甘草各五分

【用法】水二钟，煎八分，食前服。

【主治】鹅口疮已成未溃，不得内消者。

08595 和血通经丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】芍药一两 木香 当归 肉桂 干漆（炒烟尽） 五灵脂 大黄各半两 水蛭（炒）二钱半 广茂半两 虻虫三十个（去头足，麸炒） 桃仁二十七个（浸，去皮尖）

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前醋汤送下，温酒亦得，一日一次。

【主治】妇人经水凝滞不行，腰背脐腹疼痛，渐成血瘕。

08596 和血通经汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】当归 京三棱（炮）各五钱 广茂（炮）四钱 木香 熟地黄 肉桂各三钱 红花 贯众 苏木各二钱 血竭一钱（另研）

【用法】上除血竭外，同为细末，和匀。每服三钱，食前热酒一盏调下。

【功用】《全国中药成药处方集》：和血化瘀。

【主治】①《卫生宝鉴》：妇人室女受寒，月事不来，恶血积结，坚硬如石，结为石瘕。②《全国中药成药处方集》：寒侵子宫，瘀血积聚，坚硬如石，小腹胀大，状如怀孕，经闭不通，时发胀痛，倦怠瘦弱。

【宜忌】忌生冷及当风大小便。

【方论选录】《医略六书》：寒气内凝，血积不散，女子不月，而成石瘕，故腹中疼痛不已焉。当归养血、和血脉，熟地补血、滋血室，苏木通经破瘀，血竭散瘀破血，贯众祛湿热之积，木香行结滞之气，红花活血散血，肉桂暖血温经，三棱消坚破积，广茂破血消癥。水、酒煎服，使寒凝解散，则坚积自消而经络清和，何血结石瘕之有哉？此破血消癥之剂，为寒凝石瘕之专方。

【备考】本方方名，《增补内经拾遗》引作“和血通经散”、《中国医学大辞典》引作“和血归经汤”。《全国中药成药处方集》将本方改为丸剂，名“和血通经丸”。

08597 和血散痛汤

【方源】《医学纲目》卷十二引李东垣方。

【异名】和血散瘀汤（《证治宝鉴》卷十二）。

【组成】羌活身 升麻 麻黄（去节）各一钱半 桃仁十个 柴胡二钱 红花一分 归身一分 防风一钱 甘草（炙）二分 独活五分 猪苓五分 黄柏一钱 防己六分 知母（酒）一钱 黄连（酒）六分

【用法】上㕮咀。分作四服，每服水一大盏，煎至一半，去滓，空心热服。

【功用】《中国医学大辞典》：和血止痛。

【主治】两手十指，一指疼了一指疼，疼后又肿，骨头里痛，膝痛，左膝痛了右膝痛，发时多则五日，少则三日，昼轻夜重，痛时觉热，行则痛轻，肿却重。

【备考】方中黄连用量原缺，据《赤水玄珠》补。

08598 和血熄风汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】当归一两 生黄耆六钱 真阿胶四钱（不炒） 防风三钱 荆芥三钱 川芎三钱 生杭芍二钱 红花一钱 生桃仁一钱半（带皮尖捣）

【功用】补助气血，逐邪发表。

【主治】产后受风发搐。

【宜忌】若产时下血过多，或发汗过多以致发搐者，此方不可用。

08599 和荣散坚丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】和营散坚丸（《疡科心得集》卷中）。

【组成】归身 熟地 茯神 香附 人参 白术 橘红各二两 贝母 南星 酸枣仁 远志 柏子仁 丹皮各一两 龙齿一对（煅，无龙齿，鹿角尖二两煅代之） 芦荟 角沉各八钱 朱砂六钱（为衣）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八十丸，食后用合欢树根皮煎汤送下。

【主治】失荣症。多生肩上，坚硬如石，不热不红，渐肿渐大者。

08600 和胃二陈煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】干姜（炒）一二钱 砂仁四五分 陈皮 半夏 茯苓各一钱半 甘草（炙）七分

【用法】水一钟半，煎七分，温服，不拘时候。

【主治】胃寒生痰，恶心呕吐，胸膈满闷，嗳气。

【方论选录】《成方便读》：此方以干姜入胃散寒，砂仁入胃理气，寒散气调，再以二陈化痰饮。治胃寒不甚虚者，为合法耳。

08601 和营消肿汤

【方源】《朱仁康临床经验集》引《章氏经验

方》。

【组成】 当归尾9克 赤芍9克 桃仁9克 红花9克 黑山栀9克 大贝母9克 花粉9克 丝瓜络9克 木通6克 炙甲片9克 炙乳没各9克

【功用】 活血和营，消肿解毒。

【主治】 一切痈肿（脓疡），见舌质紫暗，或有瘀斑，脉细涩。

【方论选录】 归尾、赤芍、桃仁、红花活血化瘀，山栀清热，贝母、花粉、甲片、木通通络消肿，乳香、没药活血止痛。

08602 和脾通经汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】 当归二钱 木香四分 丹参一钱五分 怀牛膝一钱五分 白术一钱五分 续断一钱五分 红花五分 独活八分 秦艽一钱 桑枝三钱 生姜二片 狗脊三钱

【主治】 龟背。脾俞脊驼，两旁作痛，行则伛偻，腰背板强。

08603 知母丸

【方源】《普济方》卷一六二。

【组成】 知母 贝母 甜葶苈（炒黄色） 杏仁（去皮，研）各等分

【用法】 上为细末，用饧糖笼内蒸七遍，与药末相合为丸，如豌豆大。每服三十丸，食后临卧淡姜汤送下；蜜汤亦可。

【主治】 远年近日，一切咳嗽，不得眠卧者；及远年上气喘嗽。

08604 知母汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】 知母一两半 石膏（碎）三两 升麻（锉） 甘草（炙，锉）各一两 竹叶一握（切） 白粳米一合 枇杷叶（拭去毛）三分

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 脾瘅，身热口甘，咽干烦渴。

08605 知母汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】 知母（焙） 泽泻 白茯苓（去黑皮） 黄芩（去黑心） 生姜（切）各二两 小麦八合（洗净） 大枣十五枚（去核） 淡竹叶（切）一升半 甘草（炙）二两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎一盏，去滓，食后温服。

【主治】 膈消，胸中烦渴。

08606 知母汤

【方源】《医彻》卷四。

【组成】 知母一钱 麦门冬一钱 竹茹一团 广皮七分 炙甘草三分 茯苓一钱

【用法】 灯心二十根，加生姜一片，水煎服。

【主治】 子烦。

08607 知母饮

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】 知母（切，焙） 生芦根各三两 土瓜根二两 黄芩（去黑心） 甘草（炙）各一两半 龙齿三两 大黄二两半

【用法】 上㕮咀。每服五钱匕，水三盏，煎取二盏，去滓，下生麦门冬汁二合，食后分三次温服。

【主治】 消渴，心脾实，躁热多渴，化为小便。

08608 知母饮

【方源】《医方大成》卷九引《简易方》。

【异名】 知母散（《普济方》卷三四〇）、知母汤（《医略六书》卷二十八）。

【组成】 赤茯苓 黄芩 黄耆各二两 知母 麦冬（去心） 甘草各二两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏，入桑白皮煎熟，再入竹沥同服。

【主治】 ①《医方大成》引《简易方》：妊娠心脾壅热，咽膈渴苦，烦闷多惊。②《医略六书》：子烦，脉软数者。

08609 知母饮

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】 知母 茺蔚子 防风 赤芍 青葙子 黄芩 大黄（酒蒸过） 桔梗 桑白皮 蒺藜 细辛（或加朴消）

【用法】 水煎，半饥温服。

【主治】 白陷鱼鳞外障。肝肺积热，充塞攻上，致黑睛遂生白翳，如鱼鳞铺砌之状，或如枣花中有白陷，发歇不时，或发或聚，疼痛泪出。

08610 知母饮

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】 知母 麦冬（去心） 黄耆（生用） 甘草各一钱

【用法】 去滓，入竹沥一杯，温服。

【主治】 子烦，心虚有火者。

【加减】 气虚，加人参一钱；口渴，加石膏一钱；热甚，加犀角（锉）五分。

08611 知母散

【方源】《圣惠》卷十二。

【异名】 知母汤（《圣济总录》卷二十九）。

【组成】 知母一两 石膏二两 甘草二分（炙微

赤，锉） 黄芩三分

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，入糯米一百粒，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒狐惑病，咽喉干痛，唇口破裂，或唾脓血者。

08612 知母散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】 知母三分 桔梗半两（去芦头） 紫菀三分（洗去苗土） 桑根白皮三分（锉） 柴胡一两（去苗） 人参半两（去芦头） 赤芍药三分 半夏三分（汤洗七遍，去滑） 秦艽一两（去苗） 地骨皮一两 甘草三分（炙微赤，锉） 生干地黄一两 天门冬一两半（去心，焙） 赤茯苓一两 黄芩三分 鳖甲一两半（涂醋，炙令黄，去裙襕）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 热劳。身体壮热，皮毛干枯，痰唾稠粘，四肢疼痛，食少无力，渐加羸瘦。

【宜忌】 忌苋菜、醋物。

08613 知母散

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】 知母一两 麦门冬一两（去心） 黄芩三分 川升麻三分 犀角屑三分 葛根三分（锉） 甘草三分（炙微赤，锉） 马牙消一两半

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，淡竹叶二七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 消渴，心热烦躁，口干颊赤。

08614 知母散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 知母一两 芦根一两半（锉） 栝楼根一两 麦门冬一两（去心） 黄芩三分 川大黄一两（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 心脾实热，烦渴不止。

08615 知母散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】 知母三分 黄芩三分 柴胡一两（去苗） 生干地黄一两 赤芍药三分 麦门冬三分（去心） 射干三分 川升麻一分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，淡竹叶二七片，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇人热劳，体瘦壮热，四肢烦疼，咽喉不利，少思饮食。

08616 知母散

【方源】《普济方》卷二七八。

【组成】 知母一两 钩藤 升麻 葛根（锉） 黄芩各一分 蓝叶 人参（去芦头）各半两

【用法】 上为细末。每服一钱，水八分，入竹沥三二点，同煎至五分，去滓，放温服。

【主治】 小儿心热弄舌，欲作痫。

08617 知母饮子

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】 知母 茺蔚子各一两 防风 细辛各一两半 桔梗 大黄 茯苓 芒消各一两半

【用法】 上为末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食后温服之。

【主治】 肝肺积热，壅实上冲入脑，致生花翳白陷外障。

08618 知母饮子

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】 知母 茺蔚子 车前子各二两 黄芩 桔梗 大黄 五味子各一两

【用法】 上为末。每服一钱，以水一钟，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】 五脏虚劳，风热冲入肝膈之间，致气逆生翳外障。

08619 知母干葛汤

【方源】《活人书》卷十七。

【组成】 知母三钱 干葛八钱 石膏六钱 甘草（炙）二钱 黄芩二钱 木香二钱 升麻二钱 葳蕤五钱 天南星（生）二钱 人参二钱 防风二钱 麻黄（去节，汤泡，焙）四钱 杏仁（炒）二钱 川芎二钱 羌活二钱

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓服；未知，再服之。

【主治】 风湿，身体灼热甚者。

08620 知母石膏汤

【方源】《伤寒总病论》卷五。

【组成】 知母一两 石膏一两半 葛根 姜蕤各三分 甘草 黄芩 升麻 人参 杏仁 羌活 防风各半两

【用法】 上㕮咀。水三升，煎一升半，去滓，温饮一盏，通口与之取汗。

【主治】 风温，因发汗后，身热不恶寒，而反恶热，无下证者。

08621 知母石膏汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】知母 石膏 葛根 甘草

【功用】清燥。

【主治】燥火伤于肺，上消，烦渴引饮，唇口干裂，寸脉浮数。

08622 知母石膏汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】知母 石膏 半夏 竹叶 麦门冬 甘草

【主治】燥火喘逆，口渴身热，面赤多汗，唇焦喘咳气逆；痰火呕吐，痰火咳嗽。

08623 知母石膏汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】知母 石膏 麦门冬 粳米

【功用】清里热。

【主治】表邪已解，里热自汗。

08624 知母茯苓汤

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】茯苓（去皮） 甘草各一两 知母 五味子 人参 薄荷 半夏（洗七次） 柴胡 白术 款冬花 桔梗 麦门冬 黄芩各半两 川芎三钱 阿胶三钱（炒）

【用法】上为末。每服三钱，水一盏半，加生姜十片，同煎至七分，去滓，稍热服。

【主治】①《宣明论》：肺痿，喘咳不已，往来寒热，自汗。②《女科万金方》：产后身热，吐痰咳嗽，或时见血，自汗喘息。

08625 知母黄芩汤

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】知母二钱 黄芩二钱 甘草一钱

【用法】水煎，热服。

【主治】伤寒胃中有热，心觉懊侬，六脉洪数，或大便下血。

08626 知母解肌汤

【方源】《外台》卷四引《古今录验》。

【组成】麻黄二两（去节） 知母三两 葛根三两 石膏三两 甘草二两（炙）

【用法】上切。以水七升，煮取三升，分为三服。

【主治】温热病，头痛、骨肉烦疼，口燥心闷者；或是夏月天行毒，外寒内热者；或已下之，余热未尽者；或热病自得痢，有虚热烦渴者。

【加减】若已下及自得下，虚热未歇者，除麻黄，加知母、葛根；病热未除，因梦泄者，可除麻黄，加白薇、人参各二两，即止。

08627 知柏天地煎

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】黄柏二两 知母二两 天门冬六两 生地黄六两

【用法】同煎三四次，冲玄武胶收膏。

【主治】肾虚阴火，上正门齿痛，或齿豁，或动而长，或浮痒燥黑，时常作痛，尺脉虚大洪数者；阴虚火旺之腰痛，热甚便秘，脉细数躁疾者；肾火上炎之肺热痿软，皮毛干揭，上则喘咳，下则挛拳。

08628 知柏四物汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【异名】知柏归地汤（《会约》卷十四）。

【组成】熟地黄 当归 川芎 赤芍 知母（酒炒） 黄柏（酒炒） 木通 甘草

【用法】水煎，食前服。兼服二补丸。

【主治】①《叶氏女科》：冲任伤损，血枯经闭。或误食辛热之物，以致血枯冲任伏火。②《会约》：月经先期，曾误服辛热暖宫之药，而血热者，冲任有伏火。

【宜忌】《会约》：此凉剂，不得过服，适病而止。

08629 知柏地黄饮

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】黄柏 黄芩各二钱 知母三钱 生地五钱 元参三钱 甘草梢 山栀仁各二钱

【用法】水煎，温服。

【功用】泻热养阴。

【主治】子淋。怀孕数月，小便频数涩少，有时尿道作痛，尿黄，体瘦面红，头重眩晕，有时两颧发红，或午后潮热，咽燥口渴，心烦夜寐不安，舌质红，苔黄燥或光剥无苔，脉虚数。

08630 制心汤

【方源】《医钞类编》卷十四。

【组成】黄连（姜汁炒） 石菖蒲 胆星 石膏（煅） 丹砂 枣仁 大黄（酒炒） 枳壳 乳香

【用法】水煎服。

【主治】狂病，痰火蔽塞心窍。

08631 垂柳膏

【方源】《卫生总微》卷二十。

【组成】垂柳枝五两 苦参二两 黄芩二两

【用法】上为散，每用三匙，水两碗，煎至一碗，去滓，研入好墨汁半匙搅匀，再熬成膏，以瓷盒盛，候冷。用少许涂疮上。

【主治】漆疮痒痛。

08632 使君子丸

【方源】《局方》卷十（绍兴续添方）。

【组成】厚朴（去皮，姜汁炙） 陈皮（去白） 川芎各一分 使君子仁（浸去黑皮） 一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如皂子大。三岁以上每服一粒，以下服半粒，陈米饮化下。

【主治】①《局方》：小儿五疳，脾胃不和，心腹膨胀，时复疼痛，不进饮食，渐致羸瘦。②《卫生宝鉴》：心腹满，时复疼痛。

08633 使君子丸

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】使君子 芜荑 鹤虱 槟榔 百部 苦楝根皮

【主治】脾气不足，强食伤脾，不能磨化，停积于中，湿热生虫，而致虫积腹胀之症。肚大青筋，腹皮胀急，反能饮食，或面见白斑黑点，或喜食一物，或腹起块扛，大便偶见长虫，脉乍大乍小，乍数乍迟，或见沉滑，或见沉实，或见弦急，或见沉弦。

08634 使君子丸

【方源】《医方集解》。

【组成】使君子（去壳）二两 南星（姜制） 槟榔一两

【用法】上药合炒，如喜食生米，用麦芽一斤炒；喜食茶叶，用茶叶炒；喜食炭土，用炭土炒；取药为末，蜜为丸。每晨砂糖水送下。

【功用】《中药成方配本》：杀虫。

【主治】①《医方集解》：虫积蛊胀腹痛，及食劳发黄，喜食茶米炭土等物。②《饲鹤亭集方》：五疳，蛔虫，脾胃不和，心腹胀痛，食少体瘦。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（南昌方）忌食辛辣及不易消化食物。

【方论选录】此手足阳明药也。使君子之甘，南星之毒，槟榔之苦，皆能杀虫。炒以诸物，因其所嗜。引以砂糖，诱之以甘也。

【备考】《中药成方配本》本方用法：共研细末，用白蜜三两，炼熟为丸，分作一百粒，每粒约干重五分，每日二次，每次三丸，糖汤送下，小儿减半，连服三天。

08635 使君子汤

【方源】《幼科折衷》卷上。

【组成】使君子 槟榔 川连 芜荑 枳壳 木香 楝皮

【用法】上加生姜一片，水煎服。

【主治】虫动腹痛。

08636 使君子散

【方源】《准绳·幼科》卷八。

【组成】使君子十个（瓦上炒，为末） 甘草（胆汁浸一夕） 白芜荑各一分 苦楝子五个（炮，去核）

【用法】上为末。每服一钱，水煎服。

【主治】小儿蛔疳。

08637 侧柏丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】侧柏一两（炙微黄） 白芍药 一两 黄耆一两（锉） 熟干地黄一两 续断一分 代赭一两半 牛角腮灰一两 当归一两（锉，微炒） 龟甲二两（涂醋，炙令微黄） 桑耳一两 禹余粮一两（烧，醋淬七遍） 艾叶一两（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服三十丸，空心以黄耆汤送下。

【主治】产后崩中，久下血不止，或赤或黑，脐下疼痛。

08638 侧柏丸

【方源】《经验女科》。

【组成】侧柏叶四两 黄芩四两

【用法】上为末，蜜为丸。每服一百丸，白汤送下。

【主治】胎前赤带如猪肝水。

08639 侧柏散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】侧柏二两（微炒） 龙骨二两 鹿角胶（捣碎，炒令黄燥） 熟干地黄 木香 当归（锉，微炒）各一两

【用法】上为细末。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】妇人大便后下血不止。

08640 侧柏散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】侧柏二两（微炙） 黄耆一两（锉） 地榆一两（锉） 赤芍药一两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 牛角腮二两半（烧灰） 禹余粮二两（烧，醋淬七遍） 代赭一两

【用法】上为细散。每服一钱，食前以温酒调下。

【主治】妇人崩中下五色，及下血，或月水不止。

08641 侧柏散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】侧柏（去枝） 木贼（锉，炒微焦）各

一两

【用法】 上为散。每服二钱匕，温酒调下；米饮亦得。

【主治】 室女月水不断。

08642 侧柏散

【方源】《救急选方》卷上引《卫生家宝》。

【异名】 柏叶散(《普济方》卷一九〇引《经验良方》)。

【组成】 侧柏叶一两半（蒸干） 人参一两 荆芥（烧灰）一两

【用法】 上为末。每服二钱，入飞罗面二钱相和，用新汲水调如稀糊嚼服。血如涌泉，不过二服即止。

【功用】《中国医学大辞典》引《准绳》：止血。

【主治】 ①《救急选方》引《卫生家宝》：吐血下血，其证皆因内损，或因酒食太过，劳损于内，或心肺脉破血妄行，其血出如涌泉，口鼻俱出，须臾不救。②《袖珍方》引《经验良方》：男子妇人九窍出血。

08643 侧柏散

【方源】《丹溪心法附余》卷十一。

【组成】 柏叶一握 干姜三片 阿胶二挺（炙）

【用法】 水二钟，煎至一钟，去滓顿服。

【主治】 内损吐血下血，因酒太过，劳伤于内，血气妄行，其出如涌泉，口鼻皆流，须臾不救，服此即安；又治男子妇人九窍出血。

08644 侧柏地榆汤

【方源】《济阴纲目》卷三。

【组成】 黄耆 侧柏叶 地榆 乌贼骨 白僵蚕 牡蛎（用盐泥固济，火煨透，去泥研）各一钱 白芷 肉苁蓉（酒浸） 蛇床子各一钱二分

【用法】 上锉。加生姜三片，水煎，半饥时服。

【主治】 赤白带下，以致不能成孕。

【方论选录】 主闭藏者肾，若滑脱者，肾气不固也。牡蛎咸寒而益肾；蛇床子辛温而壮气；其清而燥涩者，侧柏叶、地榆、乌贼；其温而补气者，则黄耆、苁蓉；若白芷行阳明于血海，僵蚕散结气以消痰。

08645 侧柏樗皮丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 樗皮二两 侧柏叶（酒蒸） 黄柏 黄连各五钱 香附 白术 白芍各一两 白芷（烧存性）三钱

【用法】 上为末，粥为丸。米饮送下。

【主治】 白带，因七情所伤而脉数者。

【方论选录】《济阴纲目》：椿根皮性凉而燥，湿热盛者宜之；以脉数而用黄连、侧柏；不用苍术，为其燥性多也；烧白芷入阳明而有涩止之能；白术补中气而有培土之妙。其它不言喻矣。

08646 迫虫丸

【方源】《医钞类编》卷九。

【组成】 黑牵牛（取头末） 槟榔 雷丸（醋炙） 木香

【用法】 上为细末，用茵陈、大皂角、苦楝根煎汁为丸。五更时沙糖水吞下。

【主治】 一切虫积。

08647 乳朱丹

【方源】《医方类聚》卷一六〇引《济生续方》。

【异名】 二灵丹(《普济方》卷九十九)。

【组成】 乳香（别研） 朱砂（细研，水飞）

【用法】 上用乳香溶化，拌和朱砂为剂，丸如龙眼大。每服一丸，侧柏叶浸酒磨化，烫温服，不拘时候。

【主治】 癫痫惊掣。

08648 乳豆丸

【方源】《普济方》卷三十七引《济生》。

【组成】 钟乳粉一两 肉豆蔻半两（面裹煨香，去面不用）

【用法】 上为末，煮枣肉杵为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心食前米饮送下。

【主治】 大肠虚寒，滑泄不止。

08649 乳吮散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】 枇杷叶一分（去毛，炙焦黄色） 母丁香一分

【用法】 上为末。每服少许，或半字、一字，涂乳上儿吮，便止。

【主治】 婴儿吐乳不定。

08650 乳灵丸

【方源】《得效》卷十三。

【组成】 川乌（去皮脐，生用）半两 生干地黄(酒浸一宿）一两 草乌头（小者，去皮脐，炒，去盐）半两 木香（不见火）二钱半 五灵脂（拣去沙石，微炒） 麻黄（去根节，微炒去汗） 自然铜（火煅七次，米醋淬七次，另研） 虎胫骨各一两（酥涂，火炙存性） 干木瓜（酸者）二两 滴乳香（好者，和灯心研为末，去灯心）二钱半 败龟（米醋浸三日，炙黄色，再用醋淬）七钱半

【用法】 上研细如粉，炼蜜去上白沫，为丸如龙眼大，每一两重作十二丸。每次以带皮生姜自然汁

化开一丸，热酒服，更以酒半盏送下，病在下，空心食前服；病在上，食后停少时服，一日二次。口有少麻，勿疑。

【主治】 痛风，数年不能举动，日夜呻吟。

08651 乳附丸

【方源】《永类钤方》卷二十。

【组成】 附子（炮，去皮） 乳香 当归 诃子（炮） 肉桂心 干姜（炮） 吴茱萸各等分

【用法】 上为末，酒糊为丸，如小豆大。月内儿每次一丸，空心用钩藤汤或米饮送下。

【主治】 脏寒胃冷，泄泻，气虚，便青白脓，心腹疼痛叫啼，有汗。

08652 乳毒丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 大黄（炒）三钱 连翘 白芷 独活各一钱

【用法】 上为末，用砂糖为丸，黄酒送下。尽醉为度，一泻即愈。

【主治】 乳毒。

08653 乳香丸

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】 乳香半两 人参半两（去芦头） 紫参半两 沙参半两（去芦头） 玄参半两 苦参半两（锉） 天麻半两 甘菊花半两 枳壳半两

【用法】 上生用为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后以温酒送下。百日内好转，六十日内两鼻内出血，不怪，是愈候也。

【主治】 大风疾，猝无眉鬓者。

08654 乳香丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】 乳香一分 诃黎勒一两（煨，用皮） 地榆半两（炙，锉） 赤石脂半两 干姜一分（炮裂，锉）

【用法】 上为末，粟米饭为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下，日三四服。

【主治】 小儿冷痢。

08655 乳香丸

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】 乳香一分（溶过，研） 干蝎（青色紧小者，去七，炒）三分 乌头（生，去皮脐）二两（黑豆同炒，以豆汗出为度，去豆不用）

【用法】 上为末，用醋半升，慢火熬成膏，下乳香末搅匀，候可丸，丸如绿豆大。每服十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】 风冷荣卫不行，四肢疼痛，皮肤不仁。

08656 乳香丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】 乳香（研）二分 天麻 麻黄（去根、节） 防风（去叉） 半夏 乌头（去皮脐） 天南星 芎藭各一两 地龙（去土）三分

【用法】 上为细末，入乳香和匀，用酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，荆芥茶送下，空心食前服。

【主治】 风虚气闭，目眼瞤动，偏正头痛。

08657 乳香丸

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】 乳香（研） 没药（研） 五灵脂（研）各一分 乌头（炮裂，去皮脐） 草乌头（炮） 白僵蚕（炒） 附子（炮裂，去皮脐） 自然铜（醋炒）各半两 黑牵牛（瓦上炒） 天麻（酒浸、切，焙）各一两

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，薄荷酒送下。

【主治】 风寒湿气留于血脉，痹痹不仁。

08658 乳香丸

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】 乳香一块（如豌豆大） 白矾一块（如皂荚子大）

【用法】 上药以铁匙先于炭火中熔白矾成汁，次下乳香安心中，急以手就丸乳香在矾内。每次以绵裹疼处牙咬之，有涎即吐却。

【主治】 牙齿疼痛。

08659 乳香丸

【方源】《局方》卷一（宝庆新增方）。

【组成】 糯米（炒） 川乌头（炮，去皮尖） 五灵脂（去砂土）各二两 乳香（研） 白芷（锉） 藿香叶（洗） 天南星（炮） 没药（研） 荆芥（去枝梗） 赤小豆（生） 骨碎补（去毛） 白附子（炮）各一两 松脂（研）半两 香墨（煅） 草乌头（炮，去皮脐）各五两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，冷酒吞下，茶清亦得，不拘时候。

【主治】 一切风疾，左瘫右痪，口眼㖞斜，半身不遂，语言謇涩，精神恍惚，痰涎壅塞，手足躄曳，筋脉拘挛，或遍身顽痹，走注疼痛，脚膝缓弱，行步艰辛；又治打扑损伤，瘀血不散，痛不可忍；或行路劳伤，脚膝浮肿疼痛；或肾脏风毒，上攻面肿耳鸣，下注脚膝沉重。

【宜忌】 忌热物一时辰。

08660 乳香丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 苍术五两（去黑皮，炒） 泽乌头三两（生，去皮脐） 乳香一两 天仙子（炒黑） 自然铜（醋淬七遍） 黑牵牛（微炒） 官桂（去粗皮）各二两二钱半

【用法】 上为细末，水面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，食前空心温酒送下。

【主治】 肾虚骨节疼痛；兼打扑伤折，从高坠下，跌扑伤损；及治寒湿搏于骨节之间，疼痛有时。

08661 乳香丸

【方源】《得效》卷十九。

【异名】 乳香定痛丸(《外科理例·附方》)。

【组成】 当归 川芎 交趾桂 川香芷 真绿豆粉各五钱 羌活 独活 五灵脂 乳香（别研） 没药各三钱 白胶香五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，用薄荷汤嚼下。

【主治】 发背及一切疽疮溃烂，痛不可忍者。

【加减】 手足诸般损痛不能起者，加大草乌一味，用木瓜盐汤细嚼下。

08662 乳香丸

【方源】《普济方》卷三一一。

【组成】 白胶香四两（为末） 草乌二两 赤小豆半斤 白芍药二两 木鳖子三两 乳香 没药各二两

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三四丸，温酒任下，或木瓜汤亦可，随病服。

【主治】 闪肭，脚气疼痛等病。

08663 乳香丸

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】 乳香一钱（另研） 巴豆三个

【用法】 上为末，以黄蜡溶化为丸，如麻子大。每用一丸，塞孔中。

【主治】 虫蛀牙疼。

08664 乳香汤

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】 木香 五灵脂（去砂石） 乳香各一钱（别研） 天南星（取中心末）一钱

【用法】 上为细末，同研匀。每服半钱，水半钟，生姜一片，煎至三分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 肠胃冷袭而痛，啼哭不休。

08665 乳香汤

【方源】《医方类聚》卷二二九引《仙传济阴方》。

【组成】 通明滴乳不拘多少

【用法】 上为末。每服一钱匕或半盏，沸汤点服；能酒人，以酒调服。

【功用】 去滞定痛止疼。

【主治】 产妇腰腹痛急。

08666 乳香饼

【方源】《医统》卷五十三。

【组成】 乳香一钱 蓖麻子十四粒

【用法】 上同捣烂，作饼，贴太阳穴上。如痛定急去之，解开头发出气。

【主治】 气攻头痛，不可忍者。

08667 乳香散

【方源】《理伤续断方》。

【组成】 肉桂 干姜各三两 牛膝 羌活各四两 白芷二两 川芎 细辛 姜黄各四两 骨碎补 当归各六两 芍药 草乌 川乌各四两 苍术六两 桔梗十两 赤小豆一升 乳香半斤（别研） 没药五两（别研） 何首乌十四两 木鳖（去壳、麸炒）六两 （一方去木鳖，加海桐皮）

【用法】 上焙，为末，续入乳、没末和汤。每服二钱，温汤调下，不拘时候。

【功用】 续筋接骨，结血止疼，生力。

【主治】 跌扑伤损，皮肉破绽，筋骨寸断，败血壅滞，结肿烂坏，疼痛至甚；或劳役所损，背肩四肢疼痛，损后中风，手足痿痹，不能举动，筋骨乖纵，挛缩不舒。

08668 乳香散

【方源】《普济方》卷一五六引《孙尚药方》。

【组成】 松节一两（细锉如米） 乳香一钱

【用法】 上于银石器内，慢火炒令焦，只留一二分性，出火毒，研细。每服一钱至二钱，热木瓜酒调下。

【主治】 脚转筋，疼痛挛急者。凡是筋病，皆治之。

08669 乳香散

【方源】 方出《外科精要》引《灵苑方》（见《医方类聚》卷八十三），名见《圣济总录》卷一二九。

【组成】 乳香（研细） 胆子矾（烧，研）各等分

【用法】 上为极细末。时时敷之。

【主治】 甲疽。胬肉裹甲，脓血，疼痛不愈。

08670 乳香散

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】 乳香（研）一分 鹤虱（炒）三分 槟榔（锉）一两半

【用法】 上为细散。每服三钱匕，大麻子汁调下。

【主治】 蛔心痛。

08671 乳香散

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】 乳香半钱（研） 蜀椒（轻炒取红，为细末）一钱

【用法】 上为散。每用半字或一字，揩贴痛处。良久，温荆芥汤漱口，立效。

【主治】 牙齿痛不可忍。

08672 乳香散

【方源】《传信适用方》卷二。

【异名】 痢疾乳香散(《普济方》卷二〇九)。

【组成】 白梅一两（烧灰） 枣子一两（烧灰） 罂粟壳一两（烧灰） 诃子半两（烧灰）

【用法】 上为细末。每服一二钱，水一小盏，乳香黑豆大一块，同煎至七分，温服，不拘时候。

【主治】 痢疾。

08673 乳香散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 乳香 没药各一钱 白矾（飞）半钱 铜绿少许

【用法】 上为细末。外掺用。

【主治】 赤口疮。

08674 乳香散

【方源】《永类钤方》卷十一。

【组成】 乳香 没药 青皮 陈皮 草乌各等分

【用法】 上为末。茶清或鸡子清调，贴眼眶上。

【主治】 睛疼。

08675 乳香散

【方源】《普济方》卷八十二引《神效方》。

【组成】 黄丹一两二钱（水飞过，沥干） 白矾一两（银器内盛汁） 乳香 没药各一钱 鹰条一钱半 血竭二分 麝香少许 轻粉三分 粉霜二分

【用法】 上先将白矾于银器内化成汁，次入黄丹末，以银牌搅匀，更入乳香、没药，慢火不住搅，令枯干为粉，候冷研极细，熟绢罗过后，入鹰条、血竭、麝香、轻粉、粉霜，研极匀如粉，再以熟绢罗过，以末点之。

【主治】 攀睛瘀肉。

08676 乳香散

【方源】 方出《袖珍》卷四引汤氏方，名见《寿世保元》卷八。

【组成】 没药 乳香各少许

【用法】 上为细末。用木香一块，于乳钵内磨水半盏，调乳香、没药末煎数沸服之。

【主治】 小儿盘肠气痛。

08677 乳香散

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【组成】 郁金二钱半 盆消 黄连各一钱 雄黄 乳香 没药 片脑各半钱

【用法】 上为末。鼻内搐少许，点亦可。

【主治】 眼赤肿疼痛不可忍。

08678 乳香散

【方源】《准绳·幼科》卷三。

【组成】 天仙藤一两（焙干为末） 乳香一钱（研）

【用法】 每服一钱，温酒送下。

【功用】 定疼。

【主治】 赤流丹疼痛。

08679 乳香膏

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】 甘草 黄连（去须）各半两（宜州者） 黄柏（去粗皮）三分

【用法】 上为粗末，以水二盏，煎至七分，绵滤去滓，后入腻粉少许、黄明乳香皂子大二块，研匀，点之。

【主治】 暴赤眼。

08680 乳香膏

【方源】《百一》卷八。

【组成】 光明白矾（枯过） 滴乳香各等分

【用法】 上为细末，溶蜡量多少和成膏，旋丸。看蛀牙孔子大小填之。其痛立止。

【主治】 蛀牙痛。

08681 乳姜汤

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】 乳香末二钱 生姜自然汁二钱

【用法】 水一大盏，同煎三五沸，通口服。一服效。

【主治】 寒疝气上冲，中脘筑痛。

08682 乳痈煎

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】 乳香一钱 没药五分 苡仁二钱 川芎五分 甘草五分 防风一钱 银花二钱 知母一钱 陈皮一钱 当归五分 瓜蒌仁二钱 木通一钱 香附一钱 贝母五分 橘叶二十片（鲜者更妙）

【用法】 水、酒各半煎，食后服。四服必愈。

【主治】 乳痈。

08683 乳蛎散

【方源】《医方类聚》卷九十四引《经验良方》。

【组成】乳香半两（研细） 牡蛎一两（火煅）

【用法】上为末，和匀。每服二钱，温酒或沸汤调下。

【主治】心脾疼，诸药不效。

08684 乳蜂散

【方源】《普济方》卷六十六。

【组成】露蜂房一枚 乳香二四块

【用法】上锉。同煎漱。

【主治】牙齿疼痛。

08685 乳香大丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】乳香（研） 没药（研）各一两 五灵脂（去砂石）四两 乌头（炮裂，去皮脐）一两半

【用法】上药各为末，再同和匀，滴水为丸，如小弹子大，以丹砂为衣。每服一丸，研薄荷酒化下，一日三次。

【主治】气血衰弱，风毒攻注，历节疼痛。

08686 乳香应丸

【方源】《普济方》卷一八五。

【组成】苍术半斤 川芎（炮）一两 地骨半两（去土） 芍药半两 五灵脂二两（炒，研） 自然铜（火煅） 葫芦巴 破故纸（炒） 甜瓜子（炒） 白姜 白附子 川椒（炒去汗） 茴香（炒） 两头尖 当归 牛膝各半两（酒浸） 乳香 没药 细辛各三钱（去叶） 血竭二钱半（研）

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五七丸，空心温酒送下，干物压之，盐汤亦可。

【功用】补虚驻颜。

【主治】手足麻痹筋痛。

08687 乳香法纸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】乳香（研细末）一两 甘草一两二钱 轻粉二钱

【用法】以呈文油纸四张，每纸一张摊平，筛乳香末二钱五分，匀筛纸上，双折，卷一寸阔，将卷纸复作三折，两头以线扎之，用甘草一两二钱，水三碗，将卷过药纸浸入甘草汤内，上用重物压之，煮数滚，取起纸来，解去扎线，将纸摊开桌上，每张用轻粉三钱掺乳香上，用棕糊刷排刷相匀，提起药纸，带湿以无药一面对板壁上贴之，阴干收用。临时随患大小剪纸多少，先用温汤洗疮，随将纸有药一面对疮贴之，绢扎，三日一换。如贴后内无水出，不必换贴自愈。

【功用】止痛生肌。

【主治】臁疮作痛。

08688 乳香饼子

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】乳香 麒麟竭 没药（并细研）各半分

【用法】上为细末，以狗胆和成膏，捏作饼子，如榆荚大。每用时看疮大小，以饼安疮上，外用膏药贴定。

【功用】止痛生肌。

【主治】疮疡。

08689 乳香煎丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】乳香（研）一两 麝香（研）半两 天麻二两 没药（研） 地榆 玄参 乌头（生，去皮脐） 甜瓜子各一两

【用法】上八味，将五味为细末，入研药和匀，别用麻黄（去根节）二两，捣罗为末，以酒一升，慢火熬为膏，更入炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，温酒送下；荆芥汤亦得。

【主治】柔风，四肢不收，里急不能抑。

08690 乳疖不二饮

【方源】《济急丹方》卷下。

【组成】鹿角（镑）三钱 广胶（麸炒）二钱 柴胡七分 穿山甲（炒）七片 瓜蒌一钱 桂枝四分 皂角刺三钱 青皮一钱 橘树枝七寸

【用法】用陈醇酒半斤，水一碗，煎至一碗，临卧时服之。善饮者，再饮酒以助药力，初起一二日者一服，三四日者二服。益暖出汗，即愈。

【主治】内外吹乳。

【加减】左乳，加白芷、没药各一钱；右乳，加川贝、乳香各一钱。

08691 乳没生肌散

【方源】《简明医彀》卷八。

【组成】软石膏（红色者尤佳，炭火煅红，待冷去灰土，取研细）一两 龙骨三钱 乳香 没药（俱出汗，研末） 血竭 赤石脂各一钱 轻粉五分

【用法】上药各为极细末，和匀重研，入瓷罐，塞紧勿出气。疮毒洗净，挹干掺上，外贴膏药或护纸。

【功用】生肌收口。

【主治】诸般疮疡痈疽毒。

08692 乳香川乌丸

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】乳香一分 川乌（去皮）七个 白矾一分 白酒曲一块

【用法】 上为末，用雄猪胆汁为丸，如粟米大。每用一丸，夜卧时放于大眦。

【功用】 止泪。

【主治】 一切冷泪。

08693 乳香木瓜丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 宣木瓜一个（开顶，去瓤） 乳香（别研） 熟艾 茴香（淘去沙，炒）各半两 青盐三钱

【用法】 上四味为细末，入在木瓜内盖定，使竹钉钉合，用炊饼剂裹定就蒸令熟，取出，去而不用，于砂钵内捣极细，看干湿得所，用好酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下，一日二次。

【主治】 一切脚气疼痛，脚膝缓弱，行步艰难，不能屈伸。

08694 乳香止痛散

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】 粟壳六两（制） 白芷三两 炙甘草 陈皮各二两 乳香 没药各一两 丁香半两

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏半煎服。

【主治】 一切疮肿，疼痛不止。

08695 乳香龙骨散

【方源】《直指》卷十九。

【组成】 龙骨 石膏（生） 五倍子各一分 白及 乳香 黄䗪丹各半分 麝香少许

【用法】 上为细末。先以苦参、大腹皮、紫苏茎叶煎汤温洗，后敷。

【主治】 外肾湿痒淫烂。

08696 乳香托里散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】 御米壳（去隔、蒂、萼，蜜炒）三两 当归 芍药 川芎各五钱 乳香 没药各一钱

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一盏半，煎至十分，去滓温服，病在上者食后服，病在下者食前服。若未止，即再服。如少壮气实者，先疏利，后服之。

【主治】 一切疮肿疼痛不可忍。

08697 乳香寻痛丸

【方源】《得效》卷十三。

【组成】 乳香 川乌 没药 五灵脂 白胶香 地龙 白姜 半夏 五加皮 赤小豆各等分

【用法】 上为细末。面糊为丸，随证汤引空心服。如瘫痪不遂，手足䐜曳，口眼㖞斜，或旋运僵卧，涎潮搐搦，卒中急风，不省人事，每服二十丸，黑豆淋酒送下；风虚眩晕，项筋拘急，太阳穴疼痛，宜用生地黄汁调酒送下；腰胠疼重，行步艰辛，筋脉挛促，俯仰不利，贼风所中，痛如锥刺，皮肤顽厚，麻痹不仁，或血脉不行，肌拘干瘦，生葱酒送下，或生葱茶亦可；风湿脚气，腿膝无力，或肿或疼，不能举步，两脚生疮，脓血浸渍，痒痛无时，愈而又发，温盐酒送下；打扑闪肭，筋骨内损，已经多年，每遇天寒，时发疼痛，没药酒送下。

【主治】 中风，瘫痪不遂，手足䐜曳，口眼㖞斜，或旋运僵卧，涎潮搐搦，卒中急风，不省人事；风虚眩晕，项筋拘急，太阳穴疼痛；腰胠疼重，行步艰辛，筋脉挛促，俯仰不利，贼风所中，痛如锥刺，皮肤顽厚，麻痹不仁，或血脉不行，肌拘干瘦；风湿脚气，脚膝无力，或肿或疼，不能举步，两脚生疮，脓血浸渍，痒痛无时，愈而又发；打扑闪肭，筋骨内损，已经多年，每遇天寒，时发疼痛。

08698 乳香护心散

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【异名】 护心散《外科正宗》卷一。

【组成】 绿豆粉四两 乳香一两 朱砂二钱

【用法】 上为细末。每服二钱，甘草汤调下。

【功用】 预防痈疽、疔疮、恶疮毒气攻心。

【备考】 本方方名，《疡科心得集·方汇》引作“护心丹”。

08699 乳香应痛丸

【方源】《局方》卷一（淳祐新添方）。

【组成】 龙骨（酒浸一宿，焙干，研粉，水飞三度，晒干）四两半 蜈蚣六条（去尾针，以薄荷叶裹，煨熟） 赤小豆（生用） 虎骨（酥炙焦）各六两 白僵蚕（炒，去丝嘴） 草乌头（炮，去皮尖）各十二两 白胶香（拣净，炼过） 天麻（去芦，洗） 川牛膝（酒浸，去芦） 川当归（去芦，酒浸）各三两 全蝎（去尾针，微炙）七十个 乳香（研）六钱 木鳖仁七十二个（别研）

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五丸至七丸，冷酒送下，或冷茶清下亦得，不拘时候。

【主治】 一切风气，左瘫右痪，口眼㖞斜，半身不遂，语言謇涩，精神恍惚，痰涎壅塞，筋脉拘挛；或遍身顽痹，走注疼痛，脚膝缓弱，行步艰难；又治打扑伤损，瘀血不散，痛不可忍；或行路劳伤，脚膝浮肿疼痛；或肾脏风毒上攻，面肿耳鸣，下注，脚膝沉重；及治偏正头痛，攻注眼目。

【宜忌】 忌诸热物一时辰久。此药但临睡服尤妙，忌湿、面、炙煿、鲊脯、发热、动风等物。

08700 乳香应痛丸

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】 乳香半两（另研） 五灵脂 赤石脂各一两（研） 草乌头一两半（炒） 没药五钱（另研）

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如小豆大。每服十五丸，空心温酒送下，一日二次。

【主治】 风走注疼痛。

08701 乳香没药丸

【方源】《局方》卷一（绍兴续添方）。

【异名】 通经活络丹（《普济方》卷一一五）。

【组成】 抚芎一百八两 踯躅花（炒） 木鳖仁 白胶香（拣净） 藿香（拣、炒） 白僵蚕（洗，焙） 五灵脂（拣） 白芷（拣） 当归各七十二两 地龙一百四十四两 何首乌二百四十四两 威灵仙（洗）二百二十二两 草乌头（炒）六百四十八两

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五丸，不可多服，食后用薄荷茶送下；温酒亦得。

【功用】 通经络，活血脉。

【主治】 男子妇人一切风气，筋骨疼痛，手足麻痹，半身不遂，暗风头旋，偏正头风，小中急风，手足疼痛，牙关紧急，四肢软弱。肾脏风毒，上攻头面，下注腰脚生疮，遍体疼酸。

【宜忌】 有孕妇人不可服。

【备考】 本方名乳香没药丸，但方中无乳香、没药，疑脱。

08702 乳香没药丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 乳香 没药各二钱半（并别研） 川乌头（炮，去皮脐） 黄耆（蜜炙） 五灵脂（别研） 萆薢 熟干地黄（洗） 当归（去芦，酒浸） 威灵仙（去泥）各半两 木瓜七钱半

【用法】 上为细末，好醋打面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下。

【主治】 风湿相搏，骨节疼痛，腰脚无力。

08703 乳香没药丸

【方源】《普济方》卷九十七。

【组成】 没药（研） 乳香（研） 虎胫骨（酥炙黄） 白附子（炮） 木鳖子（去壳） 草乌头（锉，炒黑存性）各一两 麻黄（去根节）三两 自然铜（醋淬七次，研）一两 干蝎（去土，炒）二两

【用法】 上为细末，再入研药拌匀，以酒磨浓墨汁和，先分作十块，每块更分作二十丸。每服一丸，温酒磨下，一日三五次，不拘时候。

【主治】 中风，偏枯气痹，手足不能举动。

08704 乳香定痛丸

【方源】《古今医统》卷十一。

【组成】 苍术五两（米泔浸） 五灵脂二两 草乌五两（去皮） 自然铜二两（火煅，醋淬） 乳香一两半 没药 羌活 当归尾各一两 两头尖（去皮，生用）五钱

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如小豆大。每服十五丸至二十丸，温酒送下。

【主治】 诸痹，风湿流注骨节，疼痛麻痹。

08705 乳香定痛散

【方源】《袖珍》卷二引《圣惠》。

【异名】 神圣散。

【组成】 乳香 没药 川芎 石膏 雄黄 盆消各等分 脑 麝少许

【用法】 上为细末。口噙水，搐鼻内。

【主治】 偏正头痛，鼻塞声重，风蛀牙疼。

08706 乳香定痛散

【方源】《杂病源流犀烛》卷三十。

【异名】 活血止痛汤。

【组成】 当归 生地 丹皮 赤芍 川芎 白术 甘草 乳香 没药各等分

【用法】 上为末。每服一钱，酒童便调下。

【主治】 金疮痛甚。

08707 乳香宣经丸

【方源】《局方》卷一（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 川楝子（锉，炒） 牵牛子（炒） 乌药（去木） 茴香（淘去沙土，炒） 橘皮（去白） 萆薢（微炙） 防风各二两 乳香（研） 草乌（乌豆一合同煮，竹刀切透黑，去尖，焙） 五灵脂（酒浸，淘去沙石，晒干，研）各半两 威灵仙（去芦，洗）二两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐汤、盐酒任下；妇人醋汤送下。

【功用】 活血止痛，补虚，壮筋骨。

【主治】 体虚为风、湿、寒、暑侵袭，四气相搏，半身不遂，手足顽麻，骨节烦疼，足胫浮肿，恶寒发热，渐成脚气；肝肾不足，四肢挛急，遍身攻注；或闪肭打扑，内伤筋骨；男子疝气，妇人经脉不调。

08708 乳香神应散

【方源】《医学发明》卷二。

【组成】 乳香 没药 雄黑豆 桑白皮 独科粟壳各一两 破故纸二两（炒香）

【用法】 上为细末。每服半两，醋一盏，于砂石器内煎至六分，入麝香少许，去滓温服。

【主治】 从高坠下，疼痛不可忍，及腹中疼痛。

08709 乳香盏落散

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】 御米壳（去蒂）四两 柴胡（去苗）桔梗（去芦） 甘草（炒） 陈皮各一两 乳香

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，灯草十茎，长四指，煎至七分，去滓食后服。

【主治】 男子、妇人偏正头疼不可忍。

【备考】 方中乳香原缺，据《病机沙篆》补。

08710 乳香宽筋丸

【方源】《普济方》卷九十三引《卫生家宝》。

【组成】 乳香（别研） 没药（别研） 川乌（炮，去皮尖） 草乌（炮，去皮尖） 地龙（去土） 白牵牛（砂器内煮数沸）各半两 何首乌一两（砂器内煮，去黑皮） 白僵蚕一钱（炒去丝嘴） 五灵脂（酒研，去石）七钱

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十五至二十丸，食后茶、酒任下。如疮干研油调涂，疮湿燥掺，如打扑闪肭，皮骨损碎，研入没药、乳香各半钱调涂。

【主治】 左瘫右痪，口眼㖞斜，走注风气，腰脚麻痹，一切风疾，赤眼白头风疮。

08711 乳香黄耆散

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】 乳香定痛散（《外科大成》卷一）。

【组成】 乳香 没药各五分 黄耆 粟壳（去筋膜，蜜炒） 人参 甘草 川芎 归身 白芍 陈皮 熟地黄各一钱

【用法】 水二钟，煎八分，量病上下食前后服之。

【功用】 未成者速散，已成者速溃败，腐脓毒不假，刀砭其恶肉自然脱下。

【主治】 痈疽发背，诸毒疔疮，疼痛不可忍者；及治打扑伤损，筋骨疼痛。

08712 乳香黑虎丹

【方源】《丹溪心法附余》卷二。

【组成】 苍术三两 草乌五两 白芷 五灵脂 羌活 川芎 自然铜（醋淬七次） 当归各一两 乳香一两

【用法】 上为细末。酒糊为丸，如梧桐子大，百草霜为衣。每服五七十丸，临卧温酒送下。

【主治】 诸风寒湿客子经络，浑身骨节疼痛。

【宜忌】 忌热物。

08713 乳核内消片

【方源】《古今名方》。

【组成】 柴胡 当归各6～9克 郁金（或用三棱） 橘核 山慈菇 香附 漏芦各9～12克 夏枯草 茜草各12～15克 赤芍15克 青皮 丝瓜络各6克 甘草3克

【用法】 制成浸膏片。每服6片，一日三次。

【功用】 疏肝活血，软坚散结。

【主治】 乳腺小叶增生，乳房胀痛，有肿块，与月经周期有明显的关系，于月经前症状明显，经至又渐好转。

08714 乳香善应托里散

【方源】《医方类聚》卷一九一引《烟霞圣效方》。

【组成】 麻黄（去根节） 当归（去芦头） 川芎 甘草（炮） 陈皮（水浸，去白）各一两 乳香 没药 红芍药 黄耆各半两 御米壳二两（去蒂，微炮）

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一大盏，煎至五分，去滓温服，病上食后，病下食前。

【主治】 一切恶疮，疼痛不可忍者。

08715 瓮头春酒

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】 头红花一斤 羊藿一斤（去毛边） 白芍二两（酒炒） 羯羊油一斤（炒羊藿极黑） 杜仲一两（童便浸一宿，炒） 苍术（炒）四两 天冬一两 肉苁蓉一两（去鳞甲） 牛膝四两 五加皮四两 白茯苓四两 砂仁五钱（炒） 故纸一两（炒） 人参一两 大附子五钱（制） 白蔻仁（炒）五钱 归身二两五钱 川椒五钱（焙去汗，去目） 丁香五钱 木香五钱 沉香五钱 枸杞三两 白术（炒）四两 甘草五钱 地骨皮一两（蜜水炒） 熟地三两 干菊一两 生地二两

【用法】 上为末，好糯米四斗，淘净，再浸一日夜，去浆澄清，如蒸酒法，糯米为糜，取出候冷，用原淘米浆二十斤，入锅温之，加葱白一斤，滚数沸，去葱白候冷，和入糜内，然后拌上细曲末四斤，粗曲末二斤。又将前药和入糜内拌匀，又将羊藿、红花二味各入绢袋，先置瓮底，方将此糜入瓮，按置实，落上面，用火酒十斤盖了。春、秋三日，夏一日，冬五日。后又加火酒八十斤，仍将瓮口封固，至二七日开缸，木杈打过三四百下，再加圆眼肉二斤，红枣五升，又煮糯米饭三升，候冷，投入瓮内，又从瓮底打起二百下，再过二七日，榨出清酒，入坛封口，煮三炷香，埋三日。秋冬不必

煮。第二次又用糯米二斗煮饭，拌曲末二斤，火酒五十斤，入在槽内封固。过五日打扒，又封。过五日打扒，再过五日上榨。人年四十以后用之。

【功用】 壮阳种子，填精补髓。

【主治】 女子宫冷、白带。

08716 念珠丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】 乳香（乳钵坐水盆中研） 硇砂各三钱（飞） 黄蜡一两

【用法】 乳香研细，硇砂同研匀，熔蜡为丸，分作一百单八丸，以线穿之，露一夕，次日用蛤粉为衣。每服一丸，用乳香汤送下。

【主治】 膀胱疝气，外肾肿胀，痛不可忍。

08717 金丹

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 苍术四钱半 草乌二钱 巴豆一钱半 羌活二两 杏仁二十一个

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，临卧姜汤送下。

【主治】 十种水气，臌胀。

【宜忌】 忌盐、酱、房事。

08718 金不换

【方源】《喉痧症治概要》。

【组成】 西瓜霜五钱 西月石五钱 飞朱砂六分 僵蚕五分 冰片五分 人中白三钱 青黛三钱 西黄二钱 珠粉三钱

【用法】 上为极细末，吹之。

【功用】 生长肌肉。

【主治】 疫喉。

08719 金贝煎

【方源】《竹林女科》卷三。

【组成】 金银花 贝母（去心） 蒲公英 夏枯草各三钱 红藤七八钱 连翘一两或五七钱

【用法】 酒二碗，煎一碗服，服后暖卧片时。

【主治】 吹乳。

【加减】 如火盛烦渴，乳肿者，加天花粉二三钱。

08720 金牛汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 郁金二钱 牛蒡子三钱（炒，研） 陈麻黄四分（蜜水炒） 瓜蒌皮三钱 苏子一钱半 芥子一钱 沉香五分 贝母二钱 杏仁三钱 橘红一钱 半夏一钱 桑皮二钱 枇杷叶二张（刷毛，蜜炙）

【主治】 咳嗽，痰气闭结，语音不出，此为塞金不鸣。

08721 金乌散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】 皂荚炭一两 枯白矾一钱

【用法】 上为细末。香油调敷。

【主治】 头耳眉癣，燕窝疮。

08722 金水丸

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 熟地 天门冬各90克 山萸肉 五味子各30克 生龙骨 生牡蛎各60克 车前子90克

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每次9克，淡盐汤送下，一日三次。

【功用】 滋补肾水，敛纳阳光。

【主治】 视远怯近症（远视、老花）。房劳伤肾，或悲泣伤肺，全不生水，自觉眼部干涩，远视较轻，近视模糊，视物不能持久，久视则更为不清，头额作痛，或白睛有赤丝发生。

【方论选录】 方中熟地、山萸肉大补肾阴，天门冬、五味子养肺滋阴以生肾水，生龙骨、生牡蛎滋阴潜阳，车前子利水固肾。诸药同用共奏滋阴补肾，敛纳阳光之功。

08723 金水膏

【方源】《活人方》卷二。

【组成】 天门冬六两 紫菀茸六两 威蕤六两（炒） 怀生地十二两 麦冬肉八两 白芍四两（炒） 百合四两 款冬花四两 知母二两（炒） 山药二两（略炒） 陈皮二两 川贝母二两（另研细末听用） 茜草二两

【用法】 如法熬膏，炼蜜收，冷后调入贝末，噙化口中，不拘时候，听其自然，临睡及睡醒时服妙。

【功用】 清痰治嗽，和伤止血，滋肺滋金，培金水之化源。

【主治】 虚痨烦咳，肺痿痰红。

08724 金玉膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 当归身31克 白芷9克 甘草31克 姜黄9克 轻粉6克 冰片3克 白蜡93克（夏）～125克（冬） 胡麻油1250毫升

【用法】 投前四味药于麻油内浸三天，以文火炸为微黄，滤滓，再加入白蜡，待化净，微凉时加入轻粉及冰片即成。外用。

【主治】 神经性皮炎。

08725 金丝膏

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】 脑子 牛黄 硼砂各一字 青盐 麝香各半字（并研如粉细）

【用法】 上为细末，用孩儿乳汁并乳香少许，沙糖少许，三味先研匀细，次入余药，调和，当以金银竹柱点。

【主治】 眼目热痒。

08726 金丝膏

【方源】《普济方》卷八十六引《卫生家宝》。

【组成】 川黄连半两 宣连半两 青盐二钱 硇丹二钱（研细） 黄柏皮半两（去粗皮） 乳香二钱 大枣二十四个 白丁香二十个 蜜四两（炼蜜同药入） 灯心三百茎

【用法】 上除蜜外，并捣碎，汤浴洗净，不须铁器，用井花水一升，砂石器中熬，切勿令火紧，候至十数沸，用生绢袋滤过放冷，至五七分，再熬令成膏。每日以绵缠箸头，点眦上。

【主治】 一切年深日近，风毒眼目，内外翳障攀睛，瘀血贯瞳人，或痒或疼。

08727 金丝膏

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 黄丹 代赭石 玄精石各半两 炉甘石一两（烧） 脑子半钱 黄连 蕤仁（去皮油）各三钱 白丁香 南硼砂各一钱

【用法】 上除硼砂、脑子外，同为细末，以河水一升，白砂蜜三两，同熬三五沸，然后入药末，再熬至半茶盏，用绵子滤过，去滓，次入硼砂、脑末，搅匀定，瓷器内放。徐徐点眼。

【主治】 目翳。

08728 金丝膏

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《经验普济加减方》。

【组成】 黄连四两（水二升，熬膏） 硇砂二钱 硼砂三钱 牙消二钱 轻粉一钱半 白丁香（直者）二钱 蕤仁霜三钱 朱砂二钱（水飞） 龙脑二字 麝香半钱

【用法】 上为细末，入黄连膏内搅匀。每日点之。

【主治】 翳膜昏涩，睛痛，发赤生疮，浮翳遮障，多见黑花，冷泪羞明。

08729 金光煎

【方源】《会约》卷六。

【组成】 黄柏二两 黄连二钱五分 栀子十五枚

【用法】 水煎顿服。先用黄连三五钱，浓煎，徐徐服之，不效，速服此方。

【主治】 舌衄。

08730 金刚丸

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】 川萆薢 杜仲（炒）

【用法】 上酒煮猪腰子为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心盐酒送下。

【主治】 肾损骨痿，不能起床。

08731 金朱丹

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】 赤蜈蚣大者一条（去头足，酒浸，炙） 乌蛇头（酒浸，炙，取肉） 延胡索（生）各一钱半 白附子 远志（姜汁浸一宿，炒） 铁粉 透明防风 全蝎（焙） 天麻各一钱 金银箔各三十片 大南星二钱半（末，姜浸一宿）

【用法】 上为末，以圆白半夏为稠糊，入黄牛胆汁，并脑、麝少许为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服二丸，金银器煎汤，泡薄荷调下。

【主治】 一切痫。

08732 金伤散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】 白及三两 陈石灰（风化） 桑白皮 黄丹各二两 白附子 南星 龙骨各一两

【用法】 上为细末。每用干贴之。

【功用】 辟风，止痛，生肌。

【主治】 刀镰斧伤。

08733 金华散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 黄丹（煅）一两 轻粉一钱 黄柏 黄连各半两 麝香少许

【用法】 上为末，先洗，次干掺之；如干癣疮，用腊月猪脂和敷；如无，用麻油亦可。

【主治】 干湿疮癣。

08734 金花丸

【方源】《博济》卷一。

【异名】 新添三黄丸（《宣明论》卷九）。

【组成】 黄芩 黄连（宣州者） 川大黄各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五至二十丸，空心、食后温水送下。

【功用】《宣明论》：流湿润燥。

【主治】 ①《博济》：急热劳，烦躁，羸，面目痿黄，头痛目涩，多困少力。②《宣明论》：五劳七伤，消渴，不生肌肉。

08735 金花丸

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 黄连 黄柏各四两 黄芩 人参各二两

桔梗三两半　半夏二两　栀子仁二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，茶送下。

【主治】 胬肉攀睛。

08736　金花丸

【方源】 《准绳·类方》卷八。

【异名】 栀子金花丸(《医方集解》)、金华丸(《麻科活人》卷二)。

【组成】 黄连　黄柏　黄芩　栀子　大黄（便秘加之）各等分

【用法】 上为末，水为丸。每服三十丸，白汤送下。

【功用】 《麻科活人》：润肠泻热。

【主治】 口疮。

08737　金花丸

【方源】 《寿世保元》卷六。

【组成】 黄连二两　桔芩二两　黄柏二两　栀子一两　大黄二两（酒蒸九次）　桔梗　白粉葛各二两

【用法】 上为细末，水为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，白温水送下。

【主治】 酒渣鼻红赤。

【临证举例】 酒渣鼻　一人酒渣鼻红赤，余用此方，晚服六味地黄丸仓料加当归二两，苦参四两，空心服。不两月而愈。

08738　金花散

【方源】 《鬼遗·附录》。

【组成】 郁金　黄芩　甘草　山栀　大黄　黄连　糯米各一两

【用法】 上药生为末。用蜜和冷水调敷患处。

【主治】 一切丹毒。

08739　金花散

【方源】 《圣惠》卷六十四。

【组成】 郁金一两　黄连一两　黄芩一两　糯米三合

【用法】 上为细散。用蜜水调令稀稠得所，用鸡翎薄扫丹上，干即更涂。

【主治】 一切丹毒，热焮疼痛。

08740　金花散

【方源】 《圣济总录》卷三十。

【组成】 郁金　甘草（炙，锉）　青黛各半两

【用法】 上为散。每服二钱匕，用鸡子白调下。

【主治】 伤寒吐血不止。

08741　金花散

【方源】 《三因》卷十六。

【组成】 郁金　黄芩　甘草　山栀　大黄　黄连　糯米各一两

【用法】 上药生为末，蜜和，冷水调，以鹅毛上患处。

【主治】 一切丹毒。

08742　金花散

【方源】 《普济方》卷四十六引《卫生宝鉴》。

【组成】 川乌六个（三个炮，三个生）　全蝎十个　雄黄　白僵蚕　苹茇各六两　石膏一两（煅）　香白芷　川芎各半两　荆芥一两　龙脑薄荷一两

【用法】 上为细末。每服一钱，用葱白茶调下。

【主治】 头风。

08743　金花散

【方源】 《青囊秘传》。

【组成】 松花　熟虎　黄柏

【用法】 上为末。麻油调搽。

【主治】 汤火伤。

08744　金花煎

【方源】 《医统》卷六十四。

【组成】 黄柏三两　黄连五钱　栀子二十枚

【用法】 上㕮咀。以酒二升，浸一宿，煮三沸，去滓。顿服。

【主治】 舌上出血，如箸孔。

08745　金余散

【方源】 《外科方外奇方》卷三。

【组成】 人指甲五分（煅）　鹅管石三分（煅）　真腰黄二分　硼砂三分（漂）　大梅片一分　僵蚕二分（炒断丝）

【用法】 上为末，研至无声为度。吹之。

【主治】 烂喉痧及紧喉风。

08746　金沙散

【方源】 《普济方》卷二一六引《德生堂方》。

【组成】 真琥珀　海金沙各三分　麝香当门子一个（大者）

【用法】 上为末。每服二钱，食前好酒调服；或灯心、萱草根熬汤调服亦可。

【主治】 小便不出，茎中有物塞硬疼痛，甚至为急。

08747　金沙散

【方源】 《普济方》卷三八八。

【异名】 金沙益元散(《赤水玄珠》卷二十六)。

【组成】 郁金　海金沙　滑石　甘草各等分

【用法】 上为末。每服三岁一钱，煎落帚母汤调下；灯心、木通汤亦得。

【主治】 小儿小便淋沥不通。

08748 金英酒

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】 金银花（连茎叶） 蒲公英各四两

【用法】 捣烂取汁。黄酒热服，盖暖出汗；仍将滓敷患处。

【主治】 吹乳成块。

08749 金枣儿

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【异名】 金枣丸(《寿世保元》卷八)。

【组成】 木香 半夏曲 南星（姜汁制）各三钱 丁香 陈皮各二钱五分 砂仁五钱 藿香五钱 人参一钱五分

【用法】 上为末，姜汁糊成锭，辰砂为衣。淡姜汤送下。

【主治】 小儿呕吐不止。

08750 金虎丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】 天南星 天麻 白附子 乌蛇（酒浸，去皮骨，焙） 附子（去皮脐） 干蝎（去土） 狼毒 白僵蚕各二两 桂（去粗皮）一两 槟榔（锉）三两 五灵脂三两 乌头（去皮脐）三两 牛黄 麝香 丹砂（三味同研细）各半两

【用法】 上药生用，除别研外，捣罗为末，共和匀，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，茶酒送下。若用牛胆丸尤妙。

【主治】 瘫缓风。

08751 金狗汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【异名】 金狗散(《女科秘要》卷三)。

【组成】 金毛狗脊 川续断 阿胶 地榆 川芎 当归 白芷各一钱 白芍 黄芩各八分 熟地黄二钱

【用法】 水煎空心服。

【主治】 经来十日半月不止，乃血热妄行也。

08752 金波散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】 净黄连一两 硼砂 寒水石 大黄各二钱 海螵蛸 铜青各一钱 玄明粉二钱半 麝香一字 全蝎七尾（去尖毒）

【用法】 除玄明粉、麝香，余七味锉晒为末，仍入玄明粉、麝香乳钵内，同前药末杵匀。每用一字至半钱，温净汤或凉水调化，澄清去滓，频洗，不拘时候。

【主治】 时行赤眼，肿痛成翳，有热多泪。

【宜忌】 忌酒荤三五日。

【加减】 有风夹虫作痒，加轻粉。

08753 金砂丹

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】 白花蛇 乌蛇（各酒浸，去皮骨取肉） 蝎梢（炒） 白僵蚕（炒） 犀角屑 玳瑁屑 天麻 人参 白茯神 甘草（炙）各一两 龙脑（研）一分 麝香（研）一分 朱砂（研）五两 牛黄（研）一分 雄黄（研）一分 真珠（研）一分 天竺黄（研）一分 金箔 银箔各二百二十片 铁粉（研）一分

【用法】 上为细末，真石脑油为丸，每两作十丸，瓷盒内收。每服一丸，人参汤化下；或竹叶汤、新汲水亦得。

【主治】 中风涎潮，失音不语，面赤，脉大数急，迷闷，口眼㖞斜，俱系风热之疾，半身觯曳；或伤寒刚痉瘛疭，妇人产后角弓反张。

08754 金砂散

【方源】《医学纲目》卷十九引《济生》。

【组成】 道人头（即苍耳子，微炒存性） 一两 硇砂三钱半 雄黄三钱 蟾酥（以多为妙）

【用法】 上为末。将疮四围刺破，以少油调药末，置于疮内，绯帛封之。数日疔自出。如疮入腹，呕逆者，将苍耳捣汁饮之。

【主治】 疔疮。

08755 金砂散

【方源】《保婴撮要》卷八。

【组成】 郁金 海金沙 滑石 甘草各等分

【用法】 上为末，每服一钱，煎地肤子汤调下；灯心、木通亦可。

【主治】 小便淋沥不通。

08756 金钥匙

【方源】《外科发挥》卷六。

【异名】 金锁匙(《外科正宗》卷二)。

【组成】 焰消一两五钱 硼砂五钱 脑子一字 白僵蚕一钱 雄黄二钱

【用法】 上药各为细末，和匀。以竹管吹患处，痰涎即出。如痰虽出，咽喉仍不消，急针患处，去恶血。

【主治】 喉闭，缠喉风，痰涎壅塞盛者，水浆难下。

【备考】 本方加枯矾、劈炒，名“红药”（见《理瀹》）。

08757 金胆丸

【方源】《普济方》卷三七九引《经妙良方》。

【组成】 黄连 黄柏 青皮 陈皮 三棱 莪术

槟榔　鹤虱　芜荑　川楝子（煨）　苦楝根各等分

【用法】 上为细末。猪胆汁浸蒸为丸，如黍米大。疳泻，黄柏紫苏木瓜盐米饮送下；疳虫蚀腹痛，使君子汤送下；伤食不止，藿香汤送下；退疳热，麦门冬汤送下；胀腹脾虚，木香陈皮汤送下；不思乳食，枣汤送下；取小儿虫，清油汤送下；赤白痢，干姜甘草汤送下；赤痢，甘草汤送下；白痢，干姜汤送下。

【功用】 磨积，退疳热。

【主治】 小儿一切疳积。

08758　金疮丹

【方源】 方出《疡医大全》卷三十七，名见《跌打损伤方》。

【组成】 龙骨（煅）二钱　乳香（去油）　没药（去油）各三钱　白矾（半生，半枯）　无名异各一两　五倍子（半生，半焙）二两

【用法】 上为末。干掺。不作脓，不怕风。

【功用】 止血，住痛生肌。

【主治】 金疮出血。

08759　金真丸

【方源】 《普济方》卷一七〇。

【组成】 川大黄（锉碎，微炒）　商枳实（面炒）　槟榔　黑牵牛（一半生，一半熟）各等分。

【用法】 上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，米饮送下。以大便和利为度。

【主治】 三焦气壅，结痞心胸，大便不通，伤寒下症，已服承气不利，服此百粒，安稳而通。

08760　金钱汤

【方源】 《银海精微》卷上。

【组成】 古钱（即老铜钱生锈者）七个　黄连（研末）二钱　白梅干五个（梅自落者为白梅）

【用法】 用老酒二小盏，于瓷罐内煎至半盏。至夜时冷可洗用，一日二次。不过三四次即愈。

【主治】 眼弦赤烂。因脾土蕴积湿热，不能化湿，湿热之气相攻，传发于胞睑之间，致使羞明泪出，含在睑胞之内，致使眼弦赤烂。春夏烂者用本方。

08761　金铃丸

【方源】 《中藏经》。

【组成】 牵牛子（炒）　青皮（去白）　良姜各等分　川楝子　舶上茴香各半两　玄胡索一两

【用法】 上为末，生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，烧绵为灰浸酒送下，不拘时候。

【主治】 小肠气。

08762　金铃丸

【方源】 《本事》卷三。

【组成】 金铃子肉五两　茴香（炒）　马蔺花（炒）　菟丝子（酒浸，晒干，用纸条子同碾）　海蛤　破故纸（炒香）　海带（净洗）各三两　木香丁香各一两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心、食前以温酒盐汤送下。

【主治】 膀胱肿硬，牵引疼痛；及小肠气，阴囊肿，毛间水出。

08763　金铃散

【方源】 《幼幼新书》卷二十一引茅先生方。

【组成】 金铃子（炮，去皮棱）　蓬莪术（炮）各一两　茴香　木香（炮）　荆三棱（炮）各半两

【用法】 上为末。每服一钱半，用热酒调下。

【主治】 小儿心痛。

08764　金倍散

【方源】 《金鉴》卷六十四。

【组成】 整文蛤（攒孔）一枚　金头蜈蚣（研粗末）一条

【用法】 将蜈蚣末装入文蛤内，纸糊封口，外再用西纸糊七层，晒干，面麸拌炒，以纸黑焦为度；去纸研极细，加麝香一分，再研匀。陈醋调稠，温敷坚硬核处，外用薄纸盖之，每日一换。

【主治】 瘰疬坚硬，难消难溃。

08765　金消丸

【方源】 《东医宝鉴·外形篇》卷二引《简易方》。

【组成】 黄柏　荆芥　射干　黄芩各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如樱桃大。每用一丸，含化。

【主治】 咽喉肿痛。

08766　金粉汤

【方源】 《圣济总录》卷六十八。

【组成】 熟干地黄（焙）　蒲黄各一两　芎藭半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，入糯米十四粒，同煎至七分，去滓温服。

【主治】 吐血。

08767　金黄汤

【方源】 《圣济总录》卷九十六。

【组成】 郁金（锉）　鼠麦穗　生干地黄　车前叶　芒消　滑石各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 小便出血，水道中涩痛。

08768 金黄散

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】郁金 甘草（炙）各半两 黄药子 黄柏（去粗皮，炙）各一分

【用法】上为细散。每服二钱匕，冷水调下，不拘时候，以止为度。

【主治】伤寒鼻衄不止。

08769 金黄散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】延胡 蒲黄（半生半炒） 生地 川芎 乌药 五灵脂 赤芍 枳壳 丹皮 香附 甘草 陈皮

【功用】祛瘀活血。

【主治】产后心烦，由余血奔心，故烦闷不安兼腹痛也。分娩后不饮童便，或平枕便卧，或饮食失宜，致余血奔停心下，大小腹俱痛。

【方论选录】方中延胡祛瘀血、止心痛，生地、川芎补血兼行血，乌药行腰腹以下之气，五灵脂行恶血止腹痛，赤芍凉血破血，枳壳祛滞，丹皮凉血行血，香附通利三焦结气，甘草和中缓急，陈皮行气快膈。

08770 金黄散

【方源】《妇人良方》卷二十三引《妇人经验方》。

【组成】川大黄 粉草各一两

【用法】上为细末，以好酒熬成膏，倾在盏中，放冷，摊纸上。贴痛处，仰面卧至五更。未贴时，先用温酒调一大匙，就患处卧，明日取下恶物。相度强弱用药。

【主治】奶痈。

【宜忌】羸弱不宜服。

08771 金黄散

【方源】《外科精义》卷下引《管窥卫生方》。

【组成】黄连 大黄 黄耆 黄芩 黄柏 郁金各一两 甘草五钱 龙脑五分（另研）

【用法】上为细末，入龙脑研匀。若治湿毒丹肿，新水调扫赤上，或蜜水调如稀糊，用小纸花子贴之，或小油调扫；如久不愈，热疮毒赤，干掺，或水调涂亦佳。

【功用】消肿散毒，生肌止痛。

08772 金黄散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】天花粉一两 黄柏五两 姜黄 大黄各五钱 白芷五钱 紫川朴 陈皮 甘草 苍术各二两 天南星二两

【用法】上为末，以瓷器收贮。凡遇红肿，及夏月火令时，用茶汤同蜜水调敷；如微热欲作脓者，以葱汤同蜜水调敷；如漫肿无头，皮色不变，附骨痈疽、鹤膝等，俱以葱酒并调；如天泡、火赤游丹、黄水疮，俱以板兰根叶捣汁调和；烫伤，麻油调；其次诸引，又在临用之际，顺合天时调，窥病势也。

【主治】痈疽发背，诸般疔疮，跌仆，湿痰流注，大头时肿，漆疮火丹，风热天泡，肌肤赤肿，下湿脚气，妇女乳痈，小儿丹毒等。

08773 金银散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【异名】金银花汤（《摄生众妙方》卷八）、金银花酒（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】金银草不拘多少（一名忍冬草，一名鹭鸶藤）

【用法】上锉。每服一两，用水一盏，酒一盏，煎至一盏半，去滓，分作两服，不拘时候。仍取叶烂研敷疮上。

【主治】痈疽，发背，一切疮肿，未结成者，服之内消；已结成者，服之易溃，兼减疼痛。

【备考】本方改为膏剂，名"忍冬膏"（见《医方集解》）；又名"金银花膏"见《成方切用》。

08774 金液丹

【方源】《普济方》卷二〇九引《指南方》。

【组成】好硫黄一斤（研）

【用法】用一瓷瓶内盛令七分满，以瓦子盖口，通用盐泥固济，晒干。用砖砌作炉，中心掘地安一罐子，合口与瓶底相当，满盛水，去口一指许，坐药瓶在上，将热炭火下在炉内，盖药罐子，可厚三五寸，每日用炭一斤，簇着瓶，却以热炭连大盖子更用砖盖炉子，如此七伏时，拨去候打开色赤黄为上，其滓石尽澄在下，刮去，细研为末。以浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，至百丸，空心米饮送下。

【功用】①《局方》：固真气，暖丹田，坚筋骨，壮阳道，除久寒痼冷，补劳伤虚损。②《普济方》卷二三九引《直指》：壮阳道，健胃气，除冷癖，杀诸虫。

【主治】①《局方》：男子腰肾久冷，心腹积聚，胁下冷癖，腹中诸虫，失精遗尿，形羸力劣，脚膝疼弱，冷风顽痹，上气衄血，咳逆寒热，霍乱转筋，虚滑下痢；又治痔瘘湿墨生疮，下血不止；及妇人血结寒热，阴蚀疽痔。②《普济方》：吐利日久，脾胃虚损，手足厥逆，精神昏睡，寒多，睡露

睛，口鼻气凉，欲成慢惊风者。又治大人阳虚阴盛，身冷脉细，自汗吐泻，小便不禁。

08775 金液丹

【方源】《诚书》卷八。

【组成】 僵蚕（制） 防风 牛黄 羌活 川芎 茯神 白术 茯苓 全蝎 附子（炮） 胆星 天麻（煨） 甘草（炙）各一钱 麦冬（去心）二钱 贝母（去心） 薄荷各五分

【用法】 上加水三碗，煎百沸，炼蜜成珠收膏。灯心调送下。

【主治】 急慢惊风。

08776 金液汤

【方源】《一草亭》。

【组成】 软前胡一钱 白桔梗八分 直防风一钱 川独活三分 京芍药一钱 肥知母五分 荆芥穗五分 苏薄荷六分 蔓荆子七分（炒） 北柴胡一钱（炒） 片黄芩五分（炒）

【用法】 上咀片，水煎，热服。如初发赤眼，服药六七剂可愈，且无后患。如屡发者，风邪积热，入在经络、遇寒即发，服金液汤十余剂后，或作散，或作丸服，调理三十四日，外用玉华丹日点一次，即愈。

【主治】 外障。

【宜忌】 如体虚者，须用加减地黄丸，空心服。饭后用金液散，此法最妙，如服金液汤，须饭后热服。每日只服一剂，不可骤进，恐伤胃气；服至六七日，自愈。如外障等症，多是有余，不可妄投补剂，恐助邪，为害不浅。

【加减】 如受风寒重者，初二剂加羌活五分，小川芎二分，白芷梢二分，后服仍去；如泪多者，加北细辛二分，家园菊五分；如肿胀者，加葶苈子三分；如痛甚者，加厚黄柏三分；如红甚者，加连翘三分，桑白皮四分，牡丹皮六分、红花三分；如翳膜者，加木贼四分，白蒺藜八分；如翳障胬肉者，加石决明一钱（煅）；如昏蒙者，加密蒙花八分，家白菊五分；如大眦红者，加栀仁七分（炒黑）；如小眦红者，加酸枣仁一钱（炒），远志肉（甘草煎水浸软，去骨，炒）一钱，麦冬一钱（去心），家白菊三分，生地黄一钱，当归尾三分，熟地黄一钱；如内热甚者，大便闭结，兼以体旺年少之人，加大黄一二钱，通后除去。

08777 金弹子

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】 天麻 升麻 草乌 防风 荆芥 石斛 细辛 半夏 白芷 羌活 甘草 秦艽 川芎 苍术 僵蚕 蝉蜕 全蝎 蜂房 乌药 当归 风藤 乳香 没药 朱砂 雄黄 金银花 两头尖 何首乌 石菖蒲各五钱 木香三钱 麝香一钱

【用法】 上为细末，听用；麻黄（去节）二斤，紫背浮萍八两，共用水煎浓，去滓，再熬膏，和匀为丸，如龙眼大，金箔为衣。每服一丸，葱姜煎酒送下。

【主治】 诸风，左瘫右痪，手足顽麻，半身不遂，口眼㖞斜，寒湿筋骨疼痛，偏坠疝气。

08778 金葵散

【方源】《普济方》卷二一五。

【组成】 葵子（微炒）

【用法】 用五月五日葵子微炒为末，每服一钱，食前以温酒调下，当下石出。拾取淋石，遇有人患石淋，以水研淋石吃佳。

【主治】 石淋。

08779 金粟丸

【方源】《普济方》卷一五七。

【组成】 粟壳（去筋，蜜炒）一两 五味子半两 杏仁（炒）半两 胡桃肉半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。水一盏煎服。

【主治】 一切嗽。

08780 金粟汤

【方源】《局方》卷六（宝庆新增方）。

【组成】 陈皮（去白）一两一分 车前子（炒）四两 干姜（炮）二两 甘草（炒） 罂粟壳（去瓤蒂，蜜炒）各半斤

【用法】 上为末。每服二大钱，水一盏，加大枣一个，生姜二片，煎至七分，空心食前稍热服，或饭饮调下亦得。

【主治】 丈夫、妇人、室女、小儿一切下痢，无问新久，冷热不调，日夜无度，脐腹绞痛即痢，肢体困倦，小便闭涩，不思饮食，渐加羸瘦；伤生冷，脾胃怯弱，饮食不消，腹胀雷鸣，泄泻不止，连月不愈。

【宜忌】 忌生冷、油腻、鱼腥、酢酱等。

08781 金鼎汤

【方源】《四圣心源》卷四。

【组成】 甘草二钱 茯苓三钱 半夏三钱 桂枝三钱 芍药三钱 龙骨二钱 牡蛎三钱

【用法】 煎大半杯，温服。

【主治】 惊悸。

【加减】 其上热者，倍芍药以清胆火；下寒者，加附子以温肾水；若病重年深奔豚，凝结少腹，气

块坚硬澌寒。

【方论选录】 惊悸之证，土湿胃逆，相火不藏，应用茯苓去湿，半夏降胃，桂枝达肝，芍药敛胆，龙骨、牡蛎藏精聚神，以蛰阳根。阳降根深，则魂谧神安，惊悸不作矣。

【备考】 此阴邪已盛，缓用附子，当燥土去湿，调其脾胃，后以温燥之药熬膏贴之。

08782 金锁丸

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐） 青橘皮（汤浸，去白，焙） 桂（去粗皮）各一两 硇砂半两（研） 巴戟天（去心）一两 人参 山茱萸 吴茱萸（汤洗，焙干，炒）各半两

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。别研丹砂为衣，每服十五丸，温酒或盐汤送下，空心、日午、夜卧服。

【主治】 肾心气痛。

08783 金锁丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】 巴戟天（去心）二两 龙骨 山茱萸各一两 韭子（炒）四两

【用法】 上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心温酒送下。

【功用】 补骨髓，去肾邪。

【主治】 虚劳失精。

08784 金锁丸

【方源】《普济方》卷二一七引《瑞竹堂方》。

【异名】 金锁丹（《普济方》卷二八〇引《郑氏家传渴浊方》）、金锁匙丹（《医统》卷七十引《医林方》）、金锁子丸（《普济方》卷三十三）。

【组成】 茯神二钱 远志（去心）三钱 五色龙骨三钱（煅红） 牡蛎四钱（左顾者，炒赤色） 坚白茯苓三钱

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心盐汤或酒送下。

【主治】 男子滑精，遗泄；妇人鬼交，小便白浊。

08785 金锁丹

【方源】《本事》卷二。

【异名】 茴香丸（原书同卷）、锁金丹（《普济方》卷二一七）。

【组成】 舶上茴香（炒） 胡芦巴 破故纸（炒香） 白龙骨各一两 木香一两半 胡桃肉三七个（研） 羊石子三对（破开，盐半两擦，炙熟，研如泥）

【用法】 上为细末。下二味同研成膏，和酒浸蒸饼杵熟为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心温酒送下。

【主治】 遗精梦漏，关锁不固。

【方论选录】《本事方释义》：舶上茴香气味辛温入足少阴、厥阴；胡芦巴气味辛温，入足少阴；破故纸气味辛大温，入足太阴，兼入命门；白龙骨气味凉涩，入手足少阴、厥阴；木香气味辛温，入足太阴；胡桃肉气味温涩，入足少阳；羊石子气味辛甘、微咸，入足少阴；酒浸酒送，欲其入里也。此治遗精梦漏，关锁不固，以补肾之品，佐以辛香固涩，则下焦有恃，鲜不中病矣。

08786 金锁丹

【方源】《宣明论》卷十二。

【组成】 龙骨（水飞） 菟丝子一两 破故纸 韭子 泽泻 牡蛎各半两 麝香少许

【用法】 上为末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前温酒送下，一日三次。

【主治】 男子本脏虚冷，夜梦鬼交者。

08787 金锁丹

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 鹿茸（去毛，酥炙） 桑螵蛸（炒） 白茯苓（去皮） 益智仁 石菖蒲（九节者，炒） 舶上茴香（拣净，炒） 钟乳粉 五色龙骨（煅，别研）各一两 阳起石（煅） 青盐各半两（并别研）

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大，每服四十丸，枣汤送下，日午、临卧服。

【主治】 下弱胞寒，小便白浊，或如米泔，或若凝脂，梦漏精滑，关锁不固，腰痛气短。

08788 金锁丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】 桑螵蛸（微炙黄色） 晚蚕蛾（雄者，微炒） 紫梢花 蛇床子（微炒） 远志（去心） 鹿茸（酥炙黄色） 川茴香（炒）各半两 穿山甲五片（炙焦） 海马二对（炙黄） 续断三钱 石燕子一对（炭火煅赤，淬七返，研） 麝香（研）一钱 南乳香（研）二钱半 木香二钱半 黑牵牛一两（微炒，取头末三钱）

【用法】 上为细末，用酒煮薄面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心及晚食前温酒送下。其功不可言也。如不及作丸，只作散服更妙。

【功用】 ①《御药院方》：延残年不衰，至耄无痿。②《瑞竹堂方》：延年益寿，添精和气，驻颜壮骨，养神调气。

08789 金锁丹

【方源】《普济方》卷三十三引《千金良方》。

【组成】 肉苁蓉五两（酒浸三日成膏） 巴戟二两 破故纸四两 附子三两（炮，去皮脐） 胡桃三十个（同苁蓉研）

【用法】 上为末。同前苁蓉膏为丸，如梧桐子大 每服五十丸，酒送下。

【功用】《臞仙活人心方》：闭精。

【主治】 肾冷及精滑，小便频数。

08790 金锁丹

【方源】《简明医彀》卷四。

【组成】 黄柏（盐水炒） 知母（炒）各一两 牡蛎（火煅，醋淬） 赤石脂 龙骨（三味另研） 莲芯 芡实 茯苓 远志 山萸肉各三钱 朱砂二钱

【用法】 上为末，山药末调糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服六十丸，空心酒送下。

【主治】 肾虚精滑，心神不安。

08791 金锁匙

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】 金钥匙(《明医指掌》卷八)。

【组成】 朴消一两 雄黄五钱 大黄一钱

【用法】 上为末。吹入喉中。

【主治】 一切风热咽喉闭塞。

08792 金锁散

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 鹿角霜一两半 白龙骨三分（米醋浸令黄赤色） 白茯苓（去皮） 益智仁各一两 菟丝子（淘净，酒浸，研成饼） 车前子（洗净）一分 牡蛎粉半两

【用法】 上为末。每服三钱，用船上茴香三十粒炒赤色香熟，入酒一盏，煎四五沸，放温调药服，不拘时候。

【功用】 益血养气。

【主治】 遗精，白浊。

08793 金箍散

【方源】《疮疡经验全书》卷九。

【组成】 黄柏（去粗皮）一斤 川白及四斤 芙蓉叶一斤 紫花地丁一斤 天花粉半斤 白蔹半斤

【用法】 上为极细末。随疮疖痈疽发背，每用葱一把捣碎，加蜂蜜少许，再捣取汁调匀，搽患处四向，空中出毒，干再用余汁润之，以助药力。如葱汁不便，夏月用蜜水，冬月用蜜汤。

【主治】 疮疖痈疽发背。

08794 金箍散

【方源】《疡医大全》卷八引吴近宸方。

【组成】 生大黄 三柰 生南星 姜黄 生半夏各四两 白及 人中白 白芷 天花粉各三两 草河车一两

【用法】 上为细末。用黄蜜调敷；如红白色者，用米醋调敷。

【主治】 一切火毒，无名肿毒，痈疽，初起者即消，已成者即轻。

08795 金箍散

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 五倍子（焙）四两 川草乌各二两 天南星 生半夏 川柏各二两 白芷四两 甘草二两 狼毒二两 陈小粉（炒黄） 一斤

【用法】 上为细末，和匀。未成者，茶露同蜜调；将溃者，醋膏调；已溃者，麻油调敷。

【主治】 痈疽，根脚散漫不收束者。

08796 金箍散

【方源】《顾氏医径》卷六。

【组成】 菊花汁调郁金四两 白及四两 白蔹四两 大黄四两 黄柏二两 轻粉五钱 白芷四两 绿豆粉二两

【功用】 束疔。

【主治】 疔疮。

08797 金箍膏

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】 凤仙花子 大黄 五倍子各十两（为细末） 人中白（如无，皮消一两五钱代之） 陈小粉十三两（三年者，共入铁锅内炒至黄焦色）

【用法】 上为末，米醋为膏。肿毒初起围之。

【主治】 肿毒。

08798 金箔散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】 金箔五十片（细研） 银箔五十片（细研） 铁粉二两（细研） 人参一两（去芦头） 龙齿一两半 琥珀一两（细研） 犀角屑一两 茯神一两半 酸枣仁一两（微炒） 防风三分（去芦头） 藏蕤三分 麦门冬一两半（去心，焙） 玄参三分 露蜂房三分（炙微黄） 牛黄半两（细研）

【用法】 上为细散。入牛黄、金箔、银箔，更研令匀。每服一钱，以薄荷酒调下，不拘时候。

【主治】 风惊，手足颤掉，精神错乱。

08799 金樱丸

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【异名】 经验金樱丸(《景岳全书》卷五十九)。

【组成】 金樱子 鸡头实各一两 莲花蕊 龙骨（煅）各半两

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心盐酒送下。

【主治】 精滑梦遗，及小便后遗沥。

08800 金樱丸

【方源】《古今医鉴》卷十五引怀园叔方。

【组成】 苦参一两 何首乌半斤 胡麻仁一两 牛蒡子（酒炒）一两 蔓荆子一两 白蒺藜二两 苍耳子一两 蛇床子（酒炒）一两 牛膝（酒洗）二两 肉苁蓉二两 苍术（泔制）一两 菟丝子（酒制）一两 金樱子（酒炒）一两

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，温酒送下。

【主治】 白癜风。

08801 金樱丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】 金樱（取汁） 山术（取汁） 生地黄（取汁） 仙灵脾（取汁） 肉苁蓉（酒浸） 菟丝子（酒浸，别研） 牛膝（酒浸） 生鸡头肉（干） 生莲子肉（干） 干山药 人参 茯苓（去皮） 丁香 木香 菖蒲 麝香（别研后入） 甘草（炒） 陈皮（去瓤） 柏子仁（别研）各二两

【用法】 上将菟丝子以下为细末，入柏子仁匀；以白沙蜜入银石器中，于天地炉中置熟火五斤炼微解，入孩儿乳汁二升已来，以木篦搅，以入上项膏汁，同搅令匀，勿令住手，倾入药末一处搅熬之，火消续续旋添，熟火勿令太紧，熬至膏成可丸即止；取出，却于银石器中候稍温，入麝香末一处搜和成剂；更于石臼中杵千余下，每两作一十丸。每服一丸，空心细嚼酒送下。

【功用】 常服充实肌肉，坚填骨髓，悦泽面目，长养精神，秘精固气，壮力强筋，冲和百脉，正理三焦，定神魄，安尸虫，乌髭发，牢牙齿，男子全道，使妇人妊娠，通神明，不老，能健捷。

【主治】 男子去血失精，妇人半产漏下，五劳七伤，三尸百疰，肌肉陷下，形色俱脱，传尸骨蒸，虚劳至损，诸风变易，瘦劣难痊；或因呕吐，或从汗出利，积久津液耗散；妇人崩漏无停，色肉衰朽；男子气滑不固，筋力消瘦；伤寒累经劳复，疮漏方在淹延，大虚不定，下血过多，心气不足，健忘成狂，目血衰虚，昏暗作瞑，阴阳衰废，饮食忘思。

08802 金樱膏

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】 金樱子（经霜后采红熟者，不拘若干，撞去刺，切开，去子，捣碎煮之，滤滓净用，复将滓榨汁干用，熬成膏） 枸杞子四两 拣人参二两 薏苡仁五两 山药二两 杜仲（姜汁炒）四两 芡实肉四两 山茱萸肉四两 益智仁一两 青盐三钱 桑螵蛸二两（新瓦焙燥）

【用法】 上㕮咀。同熬二次，去滓，熬成膏，和金樱子膏对半和匀，每服三四匙，空心滚白汤调下。

【主治】 虚劳，遗精白浊。

08803 金樱膏

【方源】《李氏医鉴》卷七。

【组成】 金樱子（取牛黄者，熬膏一斤，熟则全甘而失涩性） 芡实一斤（蒸熟为粉）

【用法】 和丸。盐酒送下。

【主治】 梦遗失精。

08804 金蟾丸

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《刘氏家传》。

【组成】 干虾蟆五个（烧灰） 胡黄连 鹤虱 肉豆蔻 苦楝根白皮 雷丸 芦荟 芜荑各半两 雄黄一分（飞过）

【用法】 上为末，面糊为丸，如绿豆大，雄黄为衣。每服十五丸，饭饮送下。

【主治】 小儿五疳羸瘦，合面卧地，筋青脑热，吐泻无度，浑身壮热，口舌生疮，痢下脓血，心腹胀满，喘促气急，乳食全少，多啼呕逆，饮食不化，或时憎寒，多涕咳嗽，鼻下赤烂，十指皆痒，蚀于唇齿，生疮出血，肛门不收，毛发焦黄。

08805 金蟾丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 人参 川连各三钱 子术一两五钱 山药 陈皮各一两 茯苓 建曲 神曲各七钱 胡连 川朴 泽泻 槟榔 肉果各五钱 银胡 山楂各一钱五分 川芎 青皮 莪术 使君子 甘草 干蟾各二钱

【用法】 炼蜜为丸。每服一丸，米饮送下。

【主治】 小儿疳积腹胀，食积面黄，不思饮食，发热烦渴，肌体瘦弱，并一切泻痢之症。

08806 金蟾散

【方源】《古今医鉴》卷六引李桐峰方。

【异名】 蟾砂散（《绛囊撮要》）、益欢散（《全国中药成药处方集》杭州方）、蟾香散（《全国中药成药处方集》上海方）。

【组成】 大虾蟆一个 砂仁

【用法】 以砂仁推入其口，使吞入腹，以满为度，用泥罐封固，炭火煅令透红，烟尽取出，候冷去泥，研末，为一服。或酒或陈皮汤送下。候撒屁

多，乃见其效。

【功用】《中药制剂手册》：理脾和胃，舒气宽胸。

【主治】①《古今医鉴》：气鼓。②《全国中药成药处方集》（杭州方）：气郁臌胀，胸腹胀满，气急难卧，二便不畅，神倦肢瘦，肚腹单胀，无论新久。

08807 金蟾散

【方源】《药奁启秘》。

【组成】干蟾皮不拘多少

【用法】研为末。银花露同蜜调敷。

【功用】消肿退毒。

08808 金蟾膏

【方源】《外科启玄》卷十一。

【组成】活虾蟆一个（去骨）

【用法】上捣如膏。敷在患上，留头；无头都敷上。一二日揭去，或有再一个全好。

【主治】发背疔毒。

08809 金露丸

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）引依林巢先生方。

【组成】生干地黄（锉，焙） 贝母（去心） 紫菀（洗，去苗，锉，焙） 柴胡（去芦，锉，焙） 干姜（炮） 桂心（不见火） 人参（洗，去芦，切，焙） 防风（去芦，锉，焙） 枳壳（汤浸，去瓤，麸炒） 蜀椒（去目，炒出汗） 桔梗（洗，去芦，锉，焙） 吴朱萸（汤浸七遍） 甘草（炙） 芎劳（洗，去芦，锉，焙） 菖蒲（米泔浸一宿） 白茯苓（去黑皮，锉，焙） 厚朴（去粗皮，姜汁制） 鳖甲（米醋炙黄） 甘松（净，洗）各一两 草乌头（炮） 黄连（洗，锉，焙）各二两 巴豆（去心膜，用醋煮三十沸，焙干，取一两，不去油，煮时须亲自数三十沸，便倾出焙干，若沸过则药无力）（一方用甘遂）

【用法】上为细末，以面糊为丸，如梧桐子大。每服五丸，小儿两丸。心中痰患，姜汤送下；心痛酸，石榴皮汤送下；口疮，蜜汤送下；头痛，石膏汤葱茶送下；一切脾气，橘皮汤送下；水泻、气泻，煮陈皮饮下；赤痢，甘草汤送下；白痢，干姜汤送下；赤白痢，甘草干姜汤送下；胸膈噎闷，通草汤送下；妇人血气，当归酒送下，如不饮酒，当归煎汤送下亦得；疝气、岚气、小肠气及下坠，附子汤送下；常服及应急诸般疾患，只米饮、茶、酒、熟水任下；伤冷腹痛，酒食所伤，酒疸、黄疸，结气痞塞，鹤膝，并用盐汤、盐酒送下。

【主治】腹内积聚癥块，久患大如杯，及黄瘦宿水，朝暮咳嗽，积年冷气，时复腹下盘痛绞结，冲心及两胁，彻背连心，痛气不息，气绕脐下，状如虫咬不可忍。又治十种水气，反胃吐食呕逆，饮食多噎，五般痔瘘，膜气走注风，有似虫行，手足烦热，夜卧不安，睡语无度。又治小儿惊痫，妇人五邪，梦与鬼交，沉重不思饮食，昏昏如梦，不晓人事，欲死俱多，或歌或哭不定，月候不调，心中如狂，身体羸瘦。心中痰患，心痛酸，口疮，一切脾气，水泻、气泻、赤痢、白痢；胸膈噎闷，妇人血气，疝气、岚气、小肠气及下坠，伤冷腹痛，酒食所伤，酒疸、黄疸，结气痞塞，鹤膝。

08810 金不换丸

【方源】《普济方》卷三三一。

【组成】当归半两 熟地黄一两 川白芷半两 五倍子一两 白石脂（煅）六两 禹余粮半两（煅七次，用醋浸） 赤石脂（煅）一钱 龙骨（煅）六两 熟艾一两 附子七钱

【用法】上为细末，醋糊为丸。每服二十丸，用艾叶煎酒送下，米饮亦得。

【主治】妇人子宫虚惫；或服冷药过多，致令赤白带下，淋沥不止；或产后用力过多，阴门突出不收，一应不正之疾。

【加减】虚，加附子一个。

08811 金不换散

【方源】《妇人良方》卷六。

【异名】金不换正气散（《校注妇人良方》卷六）。

【组成】罂粟壳半两（制） 杏仁（制） 甘草各三钱 枳壳四钱

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏半，生姜三片，乌梅半个，煎至八分，食后临卧渐渐热服。

【主治】男子女人肺胃虚寒，久嗽不已，喘促满闷，咳嗽涎盛，腹胁胀闷，腰背倦痛。或虚劳冷嗽，咳唾红痰，及年远日近，一切喘疾，诸药不效者。

08812 金沸草汤

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】金沸草一钱半（绢包） 嫩前胡一钱半 北细辛五分 荆芥穗一钱半 法半夏 白通草一钱半 生甘草八分 鲜生姜二片 细白葱一根

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】伤风，鼻塞声重，发热咳嗽，痰多脉弦者。

【方论选录】肺受风邪，清阳不能发越，故发热痰多，鼻塞声重而咳嗽不止焉。脉弦为风邪挟痰饮

之象，金沸、前胡消痰理咳嗽，荆芥、通草通窍散风湿，细辛搜水气，半夏化痰涎，生草和中以缓逆气也。加生姜散表，白葱通阳，俾风邪外解则发热自除而鼻塞无不通，痰嗽无不止矣。此疏风化痰之剂，为伤风咳嗽痰多之专方。

08813 金沸草汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 金沸草一钱半（绢包） 麻黄八分（炒） 赤芍八分（醋炒） 杏仁二钱（去皮） 五味五分 茯苓一钱半 甘草五分

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 产后感风咳嗽，脉浮者。

【方论选录】 产后感冒风邪，不能随时解散而入舍于肺，故肺络不清，咳逆不止焉。金沸草解散风邪以理咳，炒麻黄开发肤腠以逐邪，赤芍利营破血，杏仁降气疏痰，茯苓渗湿清治节，五味敛肺生津液，甘草缓中以和药也。水煎温服，使风邪解则肺络清和而肺气自顺，何有咳逆不已哉。

08814 金沸草散

【方源】《博济》卷一。

【异名】 金沸草汤（《医学纲目》卷十七）

【组成】 荆芥穗四两 旋覆花三两 前胡三两 半夏一两（洗净，姜汁浸） 赤芍药一两 麻黄（去节）三两 甘草一两（炙）

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜、大枣，同煎至六分，热服。如汗出并三服。

【主治】 伤寒感冒，发热恶寒，无汗恶风，肢体疼痛，鼻塞声重，咳嗽不已，痰涎不利，胸膈满闷；及外感风寒，齿浮，舌肿，牙痛。

①《博济》：伤寒壮热，风气壅盛，头目心胸不利，妇人血风潮发，丈夫风气上攻，状如中脘有痰，令人壮热，头疼项筋紧急，时发寒热，皆类伤风，有寒气则出汗，如风盛则解利。②《局方》：头目昏痛，颈项强急，往来寒热，肢体烦疼，胸膈满闷，痰涎不利，咳嗽喘满，涕唾稠粘，及时行寒疫，壮热恶风。③《三因》：风寒伤于心脾，令人憎寒发热，齿浮，舌肿牙痛。

【宜忌】《医学入门》：煎液用细绢滤过，免毛射肺，致咳嗽不已。

【方论选录】《医林纂要》：金沸草咸苦微辛，其花午开子落，与半夏意同而轻浮，上入于肺，苦能泄热气，咸能化痰结，辛能行痰湿，凡痰饮之逆于肺者，此能降而泄之；前胡甘苦微辛，能降泄高亢之气，而疏畅下行之滞，主下气行痰；麻黄以大开腠理而泄其风；荆芥辛苦而性上浮，祛头面之风，去经隧之湿，此方盖以此为君药，以兼去风痰，诸药亦随以上升于肺，而后乃降而下坠其痰也；赤芍药酸于泻肝敛阴，目监麻黄之过散，用赤者以行水分收痰湿也；轻用半夏者，以风则夹相火也，然必用之者，非此不足以通滞行痰也。金沸草轻虚，此以行于下所以助之；甘草以厚脾土，以缓肝急。

【临证举例】 ①舌肿 《三因》：辛未年，有人患舌肿如吹，满塞其中，粥药不入，其势甚危。大煎一剂，乘热以纸笼气，熏之遂愈。②牙疼 《三因》：一妇人牙疼，治疗不愈，致口颊皆肿，亦以此药熏漱而愈。

【备考】《三因》本方用法：每服四大钱，水一盏半，姜七片，枣二个，煎七分，去滓，漱口，吐一半，吃一半。

08815 金沸草散

【方源】《活人书》卷十七。

【组成】 前胡三两 荆芥四两 半夏一两（洗净，姜汁浸） 赤芍药二两 细辛一两 甘草（炙）一两 旋覆花三两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜五片，大枣一枚，同煎至六分，去滓热服，未知再服。

【主治】 伤寒中脘有痰，令人壮热，头痛，项筋紧急。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴药也。风热上壅，荆芥辛轻发汗而散风；痰涎内结，前胡，旋覆消痰而降气，半夏燥痰而散逆；甘草发散而和中；茯苓行水；细辛温经；盖痰必挟火而兼湿，故下气利湿而证自平。茯苓用赤者，入血分而泻丙丁也。

【备考】 方中赤芍药，《医方集解》引作“赤茯苓”。

08816 金沸草散

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】 金沸草 荆芥 前胡 麻黄 半夏 桂枝 干姜 五味 甘草 细辛 杏仁 枳壳 桔梗

【主治】 冷痰哮喘，冷而淋背，多吐冷沫，舌上白苔。

【加减】 喘甚，加姜汁磨木香汁半杯。

08817 金铃子丸

【方源】《局方》卷五（淳祐新添方）。

【组成】 金铃子（去核，炒）四两 益智仁 胡芦巴（炒） 石菖蒲 破故纸（炒） 茴香（微炒） 巴戟（去心）各二两 木香 白茯苓（去皮） 陈皮（去白）各一两

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐汤、温酒任下。

【主治】 肾气发动，牵引疼痛，脐腹弦急，攻冲不定。

08818 金铃子丸

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】 茴香 川楝子半两（每个作四片，用巴豆肉四十九粒炒焦为度，不用巴豆） 破故纸 胡芦巴（炒）各二两

【用法】 上为细末，酒糊为丸。每服三十丸，细嚼胡桃仁二个，热葱酒送下；常服，盐酒吞下亦可。

【主治】 膀胱小肠疝气，脐腹苦痛。

08819 金铃子散

【方源】《袖珍》卷二引《圣惠》。

【异名】 金铃散（《杂病源流犀烛》卷十一）。

【组成】 金铃子 玄胡各一两

【用法】 上为末。每服二三钱，酒调下，温汤亦可。

【功用】 行气疏肝，活血止痛。

【主治】 热厥心痛；肝气郁热之胃脘，胸胁痛，疝气疼痛；妇女经行腹痛，其痛时发时止，口苦，舌红苔黄，脉弦数。

①《袖珍》引《圣惠》：热厥心痛，或作或止，久不愈者。②《杂病源流犀烛》：二维病。③《中医大辞典·方剂分册》：肝气郁滞，气郁化火而致的胃脘、胸胁疼痛，疝气疼痛及妇女经行腹痛。④《方剂学》：肝郁有热，心腹胁肋诸痛，时发时止，口苦，舌红苔黄，脉弦数。

【宜忌】《江西中医药》：孕妇胃痛忌用，其他如胆结石及肝脉病，胃溃疡穿孔等均非本方适应症。

【方论选录】 ①《古方选注》：金铃子散，一泄气分之热，一行血分之滞。《雷公炮炙论》云：心痛欲死，速觅延胡。洁古复以金铃治热厥心痛。经言：诸痛皆属于心，而热厥属于肝逆，金铃子非但泄肝，功专导去小肠膀胱之热，引心包相火下行，延胡索和一身上下诸痛。时珍曰：用之中的，妙不可言。方虽小制，配合存神，却有应手取愈之功，勿以淡而忽之。②《谦斋医学讲稿》：本方主治肝气肝火郁滞，胁痛，少腹胀痛。方仅两药，用量相等，而以金铃子为名，说明以疏肝气、泄肝火为主。金铃子只能走气分，并且偏于苦寒，配合延胡辛温活血，亦能行气止痛。③《方剂学》：本方所治诸痛，乃由肝郁气滞，气郁化火所致。方中用金铃子疏肝气，泄肝火，为君药。玄胡行气活血，为臣使药。二药相配，气行血畅，疼痛自止，为气郁血滞而致诸痛的常用基本方剂。

【临证举例】 胃痛 《广东医学》（祖国医学版；1965；3:13）：用本方治愈胃痛15例。无论火郁，酒肉滞，肝阳犯胃，肝厥胃痛，胸痞脘痛，饥饱失时，阳微气阻等所致者，均用此方加味。一剂痛止，不出二剂痊愈。典型病例：覃某某，男，25岁，已婚。一九六三年秋间就诊，胃脘痛十余年，曾用中西药治疗，有时痛止，旋又复发。现已连痛三天，如刀刺，不想进食，时呕吐，症见神色颓丧，脉弦而涩，此因久病胃痛，胃络瘀滞所致。处方：金铃子、延胡、五灵脂、蒲黄、香附、半夏、陈皮。次日复诊，痛楚消失，精神安宁，追踪未见复发。

08820 金银花酒

【方源】《外科理例》卷一。

【组成】 金银花（生取藤叶）一把

【用法】 瓷器内烂研，入白酒少许，调和稀稠得宜，涂敷四周，中心留口，以泻毒气。

【主治】 痈疽发背，乳痈。

08821 金银花散

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【异名】 金银花酒（《外科理例》卷一）。

【组成】 金银花四两 甘草一两（炒）

【用法】 上为粗末。每服四钱，水、酒各一盏，煎至一盏，去滓，稍热服之。

【功用】 托里止痛，排脓。

【主治】 发背恶疮。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足太阴阳明药也。金银花寒能清热解毒，甘能养血补虚，为痈疮圣药；甘草亦扶胃解毒之上剂也。②《医林纂要》：金银花生用则力速，无生者乃用干者，茎叶皆可，而花尤良，芳馥之气味固在花也；甘苦微寒，清热解毒，其甘能养血补虚，其香能破郁行气，为痈疮家主药。生甘草补中平肝，厚脾扶胃，且解百毒。加酒一碗，藉酒之辛散以行于卫间。

08822 金银花露

【方源】《中药成方配本》。

【异名】 忍冬花露（《全国中药成药处方集》武汉方）。

【组成】 山银花一斤

【用法】 用蒸气蒸馏法，每斤干银花吊成露四斤。每服二两，隔水炖温服，一日三次。

【功用】 清热解毒。

【主治】 暑温，疮疖，热毒。

08823 金樱子丸

【方源】《直指》卷十。

【组成】 真龙骨 厚牡蛎（煅） 桑螵蛸各一两

【用法】 上以雄黑豆一盏淘湿，将前三件置豆上蒸半日，去豆，焙三件为末，入白茯苓一两（末），金樱子四十九枚，去刺并瓤蒂，洗净捶碎，瓷器内入水一盏，煮浓汁滤清，调茯苓末为糊丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前用益智五枚（连壳捶碎），北五味子十粒，缩砂仁三个煎汤送下。

【主治】 诸虚，漏精白浊。

08824 金樱子丸

【方源】《寿亲养老》卷四。

【异名】 金樱子煎（《普济方》卷三十三）、金樱丸（《医学入门》卷八）。

【组成】 金樱子一升（捶碎，入好酒二升，银器内熬之，候酒干至一升以下，去滓，再熬成膏） 桑白皮一两（炒） 鸡头粉半两（夏采，晒干） 桑螵蛸一分（酥炙） 白龙骨半两（烧赤，为末） 莲花须二分

【用法】 上为末，入前膏子为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤温酒送下。如丸不就，即用酒、面糊为之。

【功用】 补肾秘精，止遗泄，去白浊，牢关键。

08825 金樱子粥

【方源】《药粥疗法》引《饮食辨录》。

【组成】 金樱子 10～15 克 粳米（或糯米）1～2 两

【用法】 先煎金樱子，取浓汁，去滓，用粳米或糯米煮粥。每天分二次温服，以 2～3 天为一疗程。

【功用】 收涩、固精、止泻。

【主治】 滑精遗精，遗尿，小便频数；脾虚久泻，妇女带下病，子宫脱垂等。

【宜忌】 感冒期间以及发热的病人不宜食用。

【方论选录】 金樱子味酸涩，性平无毒，入肾、膀胱、大肠经。《蜀本草》说能治脾泄，下痢，止小便利，涩精气。《滇南本草》：治日久下痢，血崩带下，涩精遗泄。中医认为，脾气虚则久泻不止，膀胱虚寒则小便不禁，肾气虚则精滑自遗，金樱子入三经而收敛虚脱之气，所以治疗上述病证有很好的效果。

08826 金樱煎丸

【方源】《医便》卷三。

【组成】 芡实粉四两 白莲花须（未开者佳）二两 白茯苓二两（去皮心） 龙骨（煅）五钱 秋石（真者）一两

【用法】 上为末，听用。外采经霜后金樱子不拘多少，去子并刺，石臼内捣烂，入砂锅内用水煎，不得断火，煎约水耗半，取出澄滤过。仍煎似稀饧，和药末为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心盐酒送下。余膏每用一匙，空心热酒调服。

【主治】 梦遗精滑，及小便后遗沥或赤白浊。

08827 金髓煎丸

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】 生干地黄一斤 熟干地黄一斤 金钗石斛（去根，锉）四两 杏仁半斤（去皮尖，炒黑，捣为末，用纸三两重裹，压去油用） 牛膝（切，酒浸，焙） 防风（去芦头） 枳壳 当归各四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心温酒送下；粥饮亦可。

【功用】 滋血益水，去风助目。

【主治】 眼目昏花，远视不明，久视乏力。

08828 金刀如圣散

【方源】《伤寒标本》卷下。

【异名】 恶疮方。

【组成】 茅山苍术六两（米泔浸一日一夜） 白芷二两 川乌四两（去皮脐，生用） 防风四两（净，生用） 细辛三两（去土，净） 白术二两五钱 草乌四两 两头尖（无则以川芎）四两 雄黄五两（另研细末入药）

【用法】 上药俱各生用，晒干为末。一切金疮及多年恶疮，用自己小便洗过，贴药立效；破伤风紧急，用好酒调药半钱或一钱服之；蛇伤，入枯白矾少许调药敷之；蝎蜇伤，用吐服盖之汗也。如汗不出再服，或涎出亦验，伤处敷药也；疯狗咬伤处口噙水洗净，将药贴伤处；汤火烫伤者，以新汲水调药敷之；雷头风并干湿癣，麻痹，每服半钱，服之立效。

【主治】 金疮、破伤风，蛇、蝎、疯狗咬伤，汤火烫伤，雷头风，干湿癣麻痹。

08829 金刀如圣散

【方源】《直指》卷四。

【组成】 川乌（炮） 草乌（炮）各四两 朱砂（另研） 雄黄（另研） 荆芥 麻黄（去根） 天麻 当归 何首乌 细辛 石斛（去芦） 人参 全蝎（去足） 川芎 甘草 防风各五钱 苍术（泔浸，炒）一两

【用法】 上为细末。每服五分，临卧温茶送下；如病长者，初服三分，渐渐加至七分。看人肥瘦大小加减。

【主治】 三十六种风，七十二般气，口眼㖞斜，

半身不遂，偏身游风，白虎历节疼痛。

08830 金牛排石汤

【方源】《新医学》(1976；4:205)

【组成】金钱草二两 冬葵子五钱 飞滑石四钱 海金沙四钱 川牛膝三钱 川红花一钱半

【功用】清热渗湿，化瘀通淋。

【主治】尿路结石。

【加减】肾结石，加核桃肉四钱，鸡内金二钱，王不留行三钱，车前仁四钱；输尿管结石，加尿珠子、腊瓜各二两；膀胱结石，加石韦四钱；尿路结石，加火消一钱；气虚，去红花，加党参、黄耆各五钱；肾阳虚，加补骨脂四钱，菟丝子四钱，或肉桂一钱半，附子三钱；肾阴虚，加熟地、枸杞、核桃肉各四钱；脾虚，加山药、茯苓各四钱；如结石久不移动，舌苔，脉象均无虚象者，重用清利之药，并加一些行气活血的药，如桃仁、红花、山甲、当归等；腰痛腿痛，加桑寄生、川续断各四钱；尿道痛，加甘草梢三钱；血尿，加白茅根二两；有感染者，加黄芩四钱，紫花地丁或蒲公英一两；大便结，加生川军二钱；绞痛发作或持续甚者，加玄胡、香附、广木香各三钱。

08831 金凤化痰膏

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】凤仙花一捧（去青蒂，研末） 大葱自然汁一茶钟 好米醋一茶钟 广胶三钱（切如米粒大，入葱汁内泡之） 入中白八钱（火微煅，存性，研末）

【用法】上药先将葱汁、米醋、广胶投入锅内熬化，次下凤仙花末，熬成膏，再入入中白末，将锅离火，不时搅匀。用时以重汤炖化，量痰包之大小，薄纸摊贴，候膏自落，再换新膏。

【主治】痰注发。生于背脊，按之木硬，微觉疼，不热不红，皮色如常者。

08832 金水六君煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归二钱 熟地三～五钱 陈皮一钱半 半夏二钱 茯苓二钱 炙甘草一钱

【用法】水二钟，生姜三五七片，煎七八分。食远温服。

【功用】①《成方便读》：润枯燥湿。②《中药成方配本》：益阴化痰。

【主治】肺肾虚寒，水泛为痰。或年迈阴虚，血气不足，外受风寒，咳嗽，呕恶多痰，喘急等症。

【加减】如大便不实而多湿者，去当归加山药；如痰盛气滞，胸胁不快者，加白芥子七八分；如阴寒盛而嗽不愈者，加细辛五七分；如兼表邪寒热者，加柴胡一二钱。

【方论选录】①《成方便读》：凡年高之人，血脉枯涩，经络隧道多不流利，若有湿热内盛，肺失治节之令，则咳嗽连声，断续不已。甚则周身经络掣痛，或闪气心痛，斯时也不得不以二陈之属化其痰，然恐血枯之人，不足以当其燥，故特加归、地以濡其血而泽其枯，方为不偏不倚，两得相宜，全在学者酌宜用之耳。②《中国医学大辞典》：二陈汤为祛痰之通剂，盖以痰之本，水也，茯苓利水以治其本。痰之动，湿也，茯苓渗湿以制其动。方中只此一味是治痰正药，其余半夏降逆，陈皮顺气，甘草调中，皆取之以为茯苓之佐使耳。故仲景书，凡痰多俱加茯苓，呕者加半夏，古圣不易之法也。此方取熟地寒润，当归辛润，加此二味，用为脾肾虚寒，水泛为痰之剂，不知肺寒非干姜、细辛合用不可，肾寒非姜、附重用不可。若用归、地之寒湿助其水饮，则阴霾四布，水势上凌而气逆咳嗽之病日甚矣。

【临证举例】①支气管哮喘 《浙江中医杂志》(1964；2:3)：吴某某，男，74岁，门诊病历208108，1963年10月30日就诊。主诉：西医诊断为支气管哮喘已三年。一年来经中西医诊治，服小青龙汤，麻黄素，氨茶碱等药物，仍无著效。来门诊时，咳嗽气喘，呻吟不已。自诉胸痞不舒，咯痰不爽，颇有气机欲窒之状。诊其脉来细弱而虚，两尺略带涩象，舌苔微白而腻，中见光剥，渴喜热饮，食不知味，高年脾弱失运，下元失纳，积痰随气而升，拟金水六君煎等意，固肾降逆为治。方用姜半夏、杏仁各二钱，茯苓、熟地各三钱，当归、陈皮、炙草各一钱，别直参、五味子五分，白芥子八分，胡桃四钱。服二剂复诊，咳嗽已减，气促渐平，胸痞见舒，精神转爽。原方加附子一钱，别直易潞参，嘱服二剂，后经访问，基本恢复健康。②浸润型肺结核、肺气肿 《新中医》(1986；8:34)：郑某某，男，58岁，干部。1982年2月8日初诊。患者形容消瘦，咳嗽胸闷，气急喘促，反复发作多年。近二年来症状明显加重，发作时喘息抬肩不得卧，咽喉痕痒，喉间漉漉有声，胸闷气促，自觉有气从下而上，直窜喉间，且咳嗽频频，呕吐清涎，甚则喘时面红耳赤，眼泪鼻涕不止，胃纳呆。X线胸透：1. 右侧浸润型肺结核；2. 肺气肿。舌红，苔腻，脉弦细。中医辨证：虚喘（肾虚作喘，兼有痰湿）。治以补虚纳气，兼化湿除痰。方用金水六君煎加减。处方：熟地、栝楼皮各15

克，当归、杏仁、茯苓、法半夏、橘红、五味子、葶苈子各10克，苡仁24克、白蔻仁6克，生谷芽30克。12日复诊，服三剂症减。照方六剂，诸症大减，因要返汕，拟上方加减，由患者带处方回汕常服。后询其亲属，谓回汕后病情稳定，无大发作。③肺原性心脏病、慢性支气管炎 《新中医》(1986；8：35)：朱某某，男，68岁，退休干部。住院号01294。患者因胸闷气急，动则气喘十余年，近半个月来加剧，于1982年12月21日入院。入院时症见形体消瘦，面色微红，语声低顿短促，胸闷气急，呼吸气促，动则气喘，口干口臭不多饮，夜间尤甚，喉间有痰，粘稠难咯，晨起则咯出白色粘稠痰液数口。间有腰痠腿软，每遇寒冷天气易受风寒而上症益甚。曾先后多次治疗未见效。X线胸透：1. 肺原性心脏病；2. 慢性支气管炎。舌黯红，苔黄腻而干，脉弦细而代，证属喘证(虚实交错，本虚标实)。治以宣肺平喘，理气化痰，补虚纳气。用银芩泻白散加减。共服八剂后，喘证稍减，痰易咯出，能起床步行至厕所解二便，亦不须停顿休息。此时痰浊阻塞肺络的症状缓解，而上气不接下气等肾不纳气的症状突出，乃即转用金水六君煎加减以治本。处方：当归、熟地、茯苓、法半夏、橘红、杏仁、五味子、款冬花、紫菀各10克，甘草6克。服至1983年2月9日共40剂，病情好转出院。

【备考】 本方改为丸剂，名“金水六君丸”(见《中国医学大辞典》)、“金水六君子丸”(见《中药成方配本》)。

08833 金水平调散

【方源】《马培之医案》。

【组成】 麦冬二钱 茯苓二钱 女贞子三钱 料豆三钱 玉竹三钱 当归一钱半 毛燕三钱 怀牛膝一钱半 旱莲草一钱半 北沙参三钱 淮山药二钱 桑寄生三钱 红枣三个

【主治】 鸡胸龟背，内无痰热，脚弱不能站立。

08834 金水济生丹

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 天冬一钱五分 麦冬一钱五分 生地五钱(切) 人参一钱 沙参四钱 龟版八钱 玉竹三钱 石斛三钱 茜草根二钱 萎皮三钱 山药三钱 贝母二钱 杏仁三钱 淡竹叶十张 鸡子清一个 藕三两(煎汤代水)

【主治】 肺脾虚之甚者，火升体羸，咳嗽失血，咽破失音。此为碎金不鸣，症极危险。

08835 金玉保和汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 金石斛四钱 玉竹三钱 萎皮三钱 黄芩一钱(酒炒) 当归一钱五分 茯苓二钱 山药三钱 广皮一钱 枳壳一钱 苡仁四钱 荷叶一角 陈粳米一撮(煎汤代水)

【主治】 感燥下利，咽干作渴，腹痛，下利白滞。

08836 金丝万应膏

【方源】《摄生众妙方》卷一。

【组成】 木香 川芎 牛膝 生地黄 细辛 白芷 秦艽 当归尾 枳壳 独活 防风 大风子 羌活 黄芩 南星 蓖麻子 半夏 苍术 贝母 赤芍药 杏仁 白蔹 两头尖 艾叶 连翘 川乌 甘草节 肉桂 良姜 续断 威灵仙 荆芥 藁本 丁香 金银花 丁皮 藿香 红花 青风藤 乌药 苏木 玄参 白鲜皮 僵蚕 草乌 桃仁 五加皮 山栀 牙皂 苦参 川山甲 茅香 五倍子 降香节 骨碎补 苍耳头 蝉蜕 蜂房 鳖甲 全蝎 麻黄 白及各一两 大黄二两 蜈蚣二十一条 蛇蜕三条 桃 柳 榆 槐 桑 楝 楮七色树枝各三寸

【用法】 上切为粗片，用真麻油十二斤浸药在内，夏浸三宿，春五宿，秋七宿，冬十宿方煎，以药枯油黑为度，用麻布一片，滤去滓，贮瓷器内。另用片子松香不拘多少，先下净锅熔化后，方加药油，量香二斤，用油四两，拭水软硬，仍滤入水缸中，令人抽扯色如黄金即成膏矣。每制一料，计膏七十斤，约用银八九钱，量摊中大膏约一万有余，可济人五千之数。一切风气寒湿，诸般疼痛等症，贴患处；肚腹疼痛，泻痢疟疾，俱贴脐上，痢白而寒者尤效；咳嗽哮喘，受寒恶心，胸膈胀闷，妇人男子面色痿黄，脾胃等症及心疼，俱贴前心；负重伤力，浑身拘痛者，贴后心与腰眼；诸疝小肠气等症，贴脐下。

【主治】 一切风气寒湿，手足拘挛，骨节酸痛，男子痞积，女人血瘕及腰疼胁痛，诸般疼痛，结核转筋，顽癣顽疮，积年不愈，肿毒初发，杨梅肿块未破者。肚腹疼痛，泻痢疟疾，痢白而寒，咳嗽哮喘，受寒恶心，胸膈胀闷，面色痿黄，脾胃等症，心疼，负重伤力，浑身拘疼，诸疝小肠气。

【备考】 方中丁皮，《验方新编》作“青皮”。

08837 金光明目丸

【方源】《眼科秘书》卷上。

【组成】 甘草 枸杞(共四两，分四制：一两用脂麻炒，一两用花椒炒，一两用童便浸炒，一两用盐水浸炒，制完听用) 熟地 生地 麦冬 密蒙

花 白菊 赤芍 牡蛎 磁石（煅） 当归 川芎 各一两 蝉蜕（洗去土） 谷精草 山栀 泽泻各一两

【用法】 上共枸杞为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，早、午、晚食后滚水送下。

【主治】 五风内障，肾虚，不论老幼，远近血枯诸眼症。

08838 金光复明散

【方源】《医方类聚》卷六十七引《修月鲁般经后录》。

【组成】 密蒙花 甘草 木贼（去节） 蔓荆子 细辛 枸杞 僵蚕 薄荷叶 甘菊花 苍术 荆芥穗 香白芷 石膏 藁本 黄连各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，蜜水或茶清调服，每日早晚食后二服。

【主治】 远年近日内外风毒，一切眼昏之疾。

【备考】 昔滕州张相公，患双目不明半年余，于自宅内打墙，掘出一石碑，上有此方。

08839 金创迎刃散

【方源】《跌损妙方》。

【异名】 金疮迎刃散（《秘传打损扑跌药方》）。

【组成】 白芷 甘草 水龙骨各一两

【用法】 上为末，文武火炒赤色为度。用嫩苎叶、韭叶，取自然汁调前末，阴干，入参三七、血竭、南星、牛胆各一两，片脑三钱，野苎五钱。伤处搽上即愈。

【主治】 伤重出血不止。

08840 金创降真散

【方源】《跌损妙方》。

【异名】 金疮降真散（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】 降真香（用节） 松香 文蛤各等分

【用法】 上为末。掺伤处，夹缚定。

【主治】 金创，杖伤。

08841 金色泻黄饮

【方源】《明医指掌》卷八。

【组成】 白芷三钱 升麻二钱 枳壳（炒）二钱 黄芩（炒）二钱 防风（去芦）二钱 半夏二钱 石斛二钱 甘草一钱

【用法】 分作二帖。每帖加生姜三片，水煎，食后服。

【主治】 脾经风热，口唇燥裂。

08842 金宅龙脑丸

【方源】《续本事》卷二。

【组成】 龙脑薄荷五两 真蒲黄一两 麦门冬二两 阿胶一两 甘草一两半 人参一两 川当归一两 黄耆一两半 木通一两 生干地黄 柴胡各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，病上焦，饭后用熟水吞下，微嚼破更好；病下焦，空心服。

【主治】 胸中郁热，肺热喘嗽，口臭喉腥，脾疸口甘，丈夫吐血，妇人血崩。

08843 金豆解毒煎

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】 金银花二钱 绿豆皮二钱 蝉蜕八钱 僵蚕 陈皮 甘草各一钱

【功用】 大解瘟毒。

【主治】 瘟疫。

【方论选录】《医钞类编》：银花能清热解毒，疗风止渴；绿豆甘寒，亦清热解毒之品，兼行十二经，祛除诸毒，无微不入；甘草解一切毒，入凉剂则能清热，亦能通行十二经，以为银花、绿豆之佐；陈皮调中理气，使荣卫无所凝滞；蝉蜕取其性之善退轻浮，易透肌肤，又散风热，开肌滑窍，使毒气潜消也；僵蚕能胜风去瘟，退热散结。瘟疫之风湿若用苍、羌、防风等药，则烦躁愈甚而热愈炽矣。若兼大头发颐咽喉诸证，更宜加僵蚕。

【备考】《医钞类编》本方用法：井花水煎服。

08844 金花明目丸

【方源】《医学启蒙》卷三。

【组成】 川黄连（酒炒） 黄芩（酒炒） 山栀子（连壳捣炒） 黄柏（盐水炒褐色） 山菊花各等分

【用法】 上为末，清水滴丸，如绿豆大。每服一百丸，食远汤送下。

【功用】 清上焦郁火，明目，消肿止痛。

【主治】 头痛，齿痛，口舌生疮。

08845 金沙五苓散

【方源】《医统》卷七十一。

【组成】 海金沙 肉桂 甘草（炙）各二钱 赤茯苓 猪苓 白术 芍药各三钱 泽泻半两 滑石七钱 石韦一钱

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏，灯心三十茎，煎七分，空心服。

【主治】 五淋痛涩。

08846 金沙流湿丸

【方源】《杂类名方》。

【组成】 木通一两（去皮） 泽泻一两半 木香一两 白茯苓（去皮） 大黄（去皮）各一两半 滑石五两 海金沙五钱 牵牛头末五两 郁李仁一两

【用法】 上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服五十丸至八十丸，生姜汤送下；如小便不通，灯草汤送下；如伤酒，生姜汤送下；酒疸食黄，萝卜汤送下；痢疾，高良姜汤送下；妇人血气不调，当归汤送下；肢节疼痛，温酒送下；心痛者，韭根汤送下；膈气，枳实汤送下；中风，槐角汤送下。

【主治】 小便不通，伤酒、酒疸，痢疾，妇人血气不调，肢节疼痛，心痛，膈气，中风。

【宜忌】 忌湿面。

08847 金钗石斛丸

【方源】《局方》卷五。

【异名】 茴香乌药丸(《圣济总录》卷一八五)、石斛丸(《普济方》卷三十三)。

【组成】 川椒（去目，微炒出汗） 胡芦巴（炒） 巴戟天（去心） 地龙（去土，炒）各四两 苍术（去浮皮） 乌药各十六两 川乌头（炮，去皮脐） 羌活（去芦） 茴香（炒） 赤小豆 马蔺子（醋炒） 金铃子（麸炒） 石斛（去根）各八两 青盐二两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温酒送下；或盐汤亦得。

【功用】 补五脏，和血脉，驻颜色，润发进食，肥肌，大壮筋骨。

【主治】 真气不足，元脏虚弱，头昏面肿，目暗耳鸣，四肢疲倦，百节酸疼，脚下隐痛，步履艰难，肌体羸瘦，面色黄黑，鬓发脱落，头皮肿痒，精神昏困，手足多冷，心胸痞闷，绕脐刺痛，膝胫酸疼，不能久立，腰背拘急，不得俯仰，两胁胀满，水谷不消，腹痛气刺，发歇无时，心悬嗳酸，呕逆恶心，口苦咽干，吃食无味，恍惚多忘，气促喘乏，夜梦惊恐，心怯盗汗，小便滑数，或水道涩痛，一切元脏虚冷之疾。

08848 金钩钓食丸

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【组成】 威灵仙根不拘多少

【用法】 以好米醋浸一二日，晒干，为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服一丸或二丸，半茶半汤送下。如要吐，转用砂糖铜青为末，半匙滴油一二点，同茶汤调服，即吐出原物。如药性来迟，令患人两手伏地，用清水一盆，以鹅翎口中搅探，即吐出于盆内。

【主治】 诸梗。

08849 金疮必效散

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】 龙骨（煅） 乳香（制，去油） 没药（制，去油） 花蕊石（火煅红，放地上冷定后再煅，凡七次） 真降香节（炒油干，碾细） 紫草各五钱 白芷 紫苏叶 儿茶各三钱 白蜡一两（煅） 麝香三分

【用法】 上为细末，研匀，瓷瓶密贮。

【主治】 金疮。

08850 金疮如圣散

【方源】 方出《种福堂方》卷四，名见《青囊秘传》。

【组成】 陈石灰 无毛老鼠 韭菜根

【用法】 共捣极烂作饼，贴在背阴墙上，待干，用刀刮下，研细末。敷之。

【主治】 金疮。

【备考】《青囊秘传》本方用量：小肉老鼠（打烂）十只，陈石灰三两，韭菜汁一杯。

08851 金疮神效方

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【异名】 金疮神效散(《外科大成》卷四)、金疮琢合散(《青囊秘传》)。

【组成】 五倍子 降真香各等分

【用法】 上各炒焦，出火毒后研为末。干掺。

【主治】 金疮。

【加减】 虚者，加人参末。

08852 金疮铁扇散

【方源】《经验广集》卷四。

【异名】 铁扇散(《北京市中药成方选集》)。

【组成】 象皮五钱（切薄片，用小锅焙黄色以干为度，勿令焦） 龙骨五钱（用上白者，生研） 老材香一两（山陕等省无漆，民间棺殓俱用松香、黄蜡涂于棺内，数十年后，有迁葬者，棺朽另易新棺，其朽棺内之香蜡即谓之老材香。东南各省无老材香，即以数百年陈石灰一两代之，其效与老材香同） 寸柏香一两（即松香中的黑色者） 松香十两（与寸柏香一同熔化，搅匀，倾入冷水，取出凉干） 飞矾一两（将白矾入锅熬透便是）

【用法】 上为极细末，贮瓷罐中。遇有刀石破伤者，用药敷伤口，以扇向伤口处扇之。如伤口处发肿，煎黄连水用翎毛蘸涂之即消。

【主治】 刀石破伤。

【宜忌】 忌卧热处。

08853 金扁水洗剂

【方源】《皮肤病中医诊疗简编》。

【组成】 金钱草 45 克 扁蓄 30 克 楮桃叶 60 克

【用法】 加水适量，浓煎取汁。外洗局部。

【功用】 解毒，散风，止痒。

【主治】 银屑病，瘙痒性皮肤病。

08854 金珠化痰丸

【方源】《局方》卷四。

【组成】 皂荚仁（炒） 天竺黄 白矾（光明者，放石铁器内熬汁尽，放冷，研） 铅白霜（细研）各一两 半夏（汤洗七次，用生姜二两洗，刮去皮，同捣细作饼子，微炙黄色）四两 生白龙脑（细研）半两 辰砂（研，飞）二两 金箔（为衣）二十片

【用法】 上以半夏、皂荚子仁为末，与诸药同拌研匀，生姜汁煮曲糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，生姜汤送下，食后、临卧服。

【功用】 清痰热，安神志，除头痛。

【主治】 头痛眩运，心忪恍惚，胸膈烦闷，涕唾稠粘，痰实咳嗽，咽喉不利。

08855 金莲种子丹

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】 人参三钱 五味子三钱 白及一两 吴茱萸一两 细辛五钱 白茯苓一两 牛膝二两 石乳香三钱 菖蒲一钱 当归三钱（酒浸） 厚朴一两 羌活三钱

【用法】 上为末，以枣肉为丸，如梧桐子大。每服十五丸，无灰酒送下，一日三次，早寅，中午，晚酉时吞，以壬子日服起。有孕妇服之成双胎。

【功用】 种子。

08856 金莲种玉丹

【方源】《何氏济生论》卷七。

【组成】 白莲花蕊十一对（去梗留蒂，连须房瓣） 赤首乌（人乳浸蒸四次，日晒夜露）四两 芡实四两 人参（量用） 甘枸杞（人乳浸一宿，晒干） 生地黄（酒浸一宿，甑安，煮羊肾锅上蒸烂） 羊外肾十一对（盐腌一宿，用酒于瓦器内煮至如地黄色为度，去皮膜，同地黄杵千下）

【用法】 前五味为末，和后二味杵匀，量加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，盐汤送下。

【主治】 不孕。

【宜忌】 须戒定色欲，待女子经尽后交媾，即成孕矣。

08857 金莲稳步膏

【方源】《便览》卷四。

【组成】 地骨皮 红花

【用法】 上为细末。子鸡眼痛处敷之，或成疮亦敷之，次日结痂好。

【主治】 鸡眼。

08858 金铃泻肝汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 川楝子五钱（捣） 生明乳香四钱 生明没药四钱 三棱三钱 莪术三钱 甘草一钱

【用法】 上为末服。

【主治】 胁下燃疼。

【方论选录】 刘河间有金铃子散，即楝子之核与玄胡索等分，为末服之，以治心腹胁下作疼，其病因由于热者，甚效。诚以金铃子能引心包之火及肝胆所寄之相火下行，又佐以玄胡索以开通气血，故其疼自止也。而愚用其方，效者固多，而间有不效者。后拟得此方，莫不随手奏效。盖金铃子佐以玄胡索，虽能开气分之郁，而实不能化气。所谓化气者，无事开破，能使气之郁者，融化于无形，方中之乳香、没药是也；去玄胡索，加三棱、莪术者，因玄胡索性过猛烈，且其开破之力多趋下焦，不如三棱、莪术性较和平，且善于理肝也；用甘草者，所以防金铃子有小毒也。此方不仅治胁疼甚效，凡心腹作疼而非寒凉者，用之皆甚效验。

【临证举例】 胁下燃痛 仲冬，刘某某兄，病左胁燃疼，诸治无效，询方于弟，授以活络效灵丹方，服之不应。因延为视诊，脉象他部皆微弱，惟左关沉而有力，治以金铃泻肝汤加当归数钱，服一剂，翌日降下若干绿色粘滞之物，遂然而愈。盖此方原注明治胁下燃疼，由此知兄所拟方各有主治。方病相投，莫不神效也。

08859 金铃黄柏散

【方源】《顾松园医镜》卷十三。

【组成】 金铃子（去核） 黄柏 车前 茯苓各三钱 泽泻一钱许 川萆薢五钱 玄胡 山楂各二钱 青皮一钱许 橘核（炒，研）五钱

【功用】 清热祛湿。

【主治】 诸疝病属湿热者。

【加减】 如湿热内蕴，寒气外束者，加茴香、吴茱萸以散外寒，外煎浓紫苏汤熏洗；如坠逆气，槟榔、代赭石散瘀血，蒲黄、五灵清肝火，龙胆、黑山栀舒筋，羚羊角燥湿，苍术随适采用。

【方论选录】 金铃子导小肠膀胱湿热疝气要药；黄柏苦寒除湿热；车前、茯苓、泽泻利水渗湿热；川萆薢同热药祛寒湿，同凉药去湿热；玄胡、山楂行瘀血；青皮疏肝气；橘核苦平下气，最止疝痛。此苦寒清热祛湿之剂，合丹溪治疝法也。

08860 金海排石汤

【方源】《千家妙方》引江西万孟仪。

【组成】 金钱草 50 克　海金沙 15 克　苡仁 12 克　甘草梢 10 克　冬葵子 12 克　乳香 9 克　牛膝 15 克　鸡内金 10 克　萆薢 9 克　木通 5 克　琥珀末 1.5 克（另包，吞服）

【用法】 水煎服，每日一剂。

【功用】 清热，利湿，排石。

【主治】 输尿管结石，湿热蕴结下焦证。

【方论选录】 方中苡仁、木通、萆薢、甘草梢清热利湿；金钱草、海金沙、冬葵子排石通淋；牛膝、乳香、琥珀化瘀止痛，引石下行。诸药配合，相得益彰。

【临证举例】 输尿管结石　胡某某，女，30 岁，农民，一九七八年十月二日初诊。曾经南昌某医院检查，诊断为输尿管结石，建议手术治疗。因患者恐惧，由南昌返回，试服中药。症见尿急尿频，尿道刺痛，尿中带血，小腹作胀，排尿时尿道如有砂石感，舌质红，苔黄腻，脉濡数，以金海排石汤治之。连服五剂。二诊，尿频明显减轻，尿色较前清亮，少腹微胀痛，排尿仍然刺痛，腰酸膝软，神疲乏力，舌质红，苔薄黄，脉细数，应以运化结石，导其外泄。上方加生地 10 克，服后从尿道排出一块结石，形如小蚕豆大。诸症顿消，病愈康复，免去了手术之苦。

08861　金银六君汤

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【组成】 人参一钱　白术（土炒）一钱　茯苓一钱　半夏（姜制）一钱　陈皮一两　炙甘草五分　金银花二两

【用法】 加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】 疮疡作呕，不思饮食，面黄膨胀，四肢倦怠，大便溏利。

【加减】 如过食冷物，致伤脾胃，加藿香、砂仁。

08862　金银平怒散

【方源】《洞天奥旨》卷六。

【组成】 金银花二两　白芍五钱　当归一两　柴胡一钱　白芥子三钱　生甘草三钱　炒栀子三钱　丹皮三钱

【用法】 水煎服。一剂即消，二剂痊愈。

【主治】 胁痛生痈。

08863　金银定志汤

【方源】《医统》卷四十九。

【组成】 当归（酒浸）　人参　益智仁各一钱　甘草　石菖蒲　茯神各七分　五味子十五粒　琥珀（另研）　羚羊角（镑）各五分

【用法】 上以琥珀、羚羊角另放，用水二盏，金、银各一两，同煎至八分，去滓，入珀、角二末，调匀服。

【功用】 定志。

【主治】 心风失志，妄行妄语。

08864　金银解毒汤

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【组成】 黄芩一钱　黄柏一钱　黄连一钱　炒栀子一钱　金银花一两

【用法】 水煎，热服。

【主治】 积热疮疡，焮肿作痛，烦躁饮冷，脉洪数大实，口舌生疮，疫毒发狂。

08865　金锁正元丹

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】 五倍子　茯苓（去皮）各八两　紫巴戟（去心）十六两　补骨脂（酒浸，炒）十两　肉苁蓉（净洗，焙干）　胡芦巴（炒）各一斤　龙骨　朱砂（别研）各三两

【用法】 上为细末，入研药令匀，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心食前温酒吞下；或盐汤亦得。

【主治】 真气不足，元脏虚弱，四肢倦怠，百节痠痛，头昏眩痛，目暗耳鸣，面色黄黑，鬓发脱落，头皮肿痒，精神昏困，手足多冷，心胸痞闷，绕脐切痛，膝胫酸疼，不能久立，或脚弱隐痛，步履艰难，腰背拘急，不能俯仰，腹痛气刺，两胁虚胀，水谷不消，大便不调，呕逆恶心，饮食减少，恍惚多言，气促喘乏，夜多异梦，心怯盗汗，小便滑数，遗精白浊，一切元脏虚冷之病。

【方论选录】《济阴纲目》：肉苁蓉男得之而助阳，女得之而孕育；巴戟补髓添精；胡芦巴治虚冷，补骨脂起阳衰；五倍子燥阴湿；茯苓阳中之阴；朱砂镇心之主，寓降水升火之妙；龙骨固脱。故为天下真气不足者所服也。

08866　金锁玉关丸

【方源】《奇效良方》卷三十四。

【组成】 鸡头肉　莲子肉　莲花蕊　藕节　白茯苓　白茯神　干山药各二两

【用法】 上为细末。金樱子二斤，去毛刺，捶碎，水一斗，熬至八分，去滓，再熬成膏，仍用少许面糊同和为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，不拘时候，温米饮送下。

【主治】 遗精白浊，心虚不宁。

08867　金锁玉关丸

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 芡实 莲肉（去心） 藕节粉 白茯苓 干山药各等分 石菖蒲 五味子减半

【用法】 上为末。金樱子熬蜜代蜜，捣二千下，丸如梧桐子大。每服五十丸，饥时以醇酒、米汤任下。

【功用】 《医略六书》：实脾涩精。

【主治】 心肾不交，遗精白浊。

【方论选录】 《医略六书》：脾阴大亏，不能交媾水火，故心肾不交，无以统摄精舍而遗精。芡实实脾涩肾，莲肉清心醒脾，山药补脾阴以益肾，藕节凉心血以宁神，菖蒲通窍以慧神志，茯神渗湿以清精府，五味收敛津液而止遗精；更以金樱涩之，生地滋之，使心肾两交，则玉关自固，而精舍无漏泄之患，何遗精之有？此实脾涩精之剂，为心肾不交遗精之专方。

【备考】 方中白茯苓，《杂病证治》作“茯神”，并用生地汤送下。

08868 金锁补真丹

【方源】 《普济方》卷二一八引《德生堂方》。

【组成】 川续断 川独活 谷精草 黄精草各五分 莲花蕊一两（干用） 鸡头粉一两（煮熟用） 鹿角霜一两 金樱子五两（去皮尖）

【用法】 上为细末，次将金樱子捶碎，用水三升，煮至一升，去滓，银石器内用慢火熬至三合成膏，和匀，将药末为丸，如弹子大。每服止一丸，空心温酒送下。服数日，自然益气补丹田，精神加倍。若欲药行，早晨另丸药五十丸，如梧桐子大，温酒送下，应验。

【功用】 升降阴阳，壮理元气，益气，补丹田，振奋精神，大能秘精。

【主治】 梦遗白浊。

08869 金锁固精丸

【方源】 《医方集解》。

【组成】 沙苑蒺藜（炒） 芡实（蒸） 莲须各二两 龙骨（酥炙） 牡蛎（盐水煮一日一夜，煅粉）各一两

【用法】 莲子粉糊为丸。盐汤送下。

【功用】 补肾益精，固涩滑脱，交通心肾。

【主治】 ①《医方集解》：火炎上而水趋下，心肾不交之精滑不禁。②《中国医学大辞典》：真元亏损，心肾不交，梦遗滑精，盗汗虚烦，腰痛耳鸣，四肢无力。

【宜忌】 《方剂学》：本方多为收敛之品，偏于固涩。如属心、肝火旺或下焦湿热所扰以致遗精者，禁用本方。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足少阴药也。蒺藜补肾益精，莲子交通心肾，牡蛎清热补水，芡实固肾补脾，合之莲须、龙骨，皆涩精秘气之品，以止滑脱也。②《成方便读》：夫遗精一证，不过分其有火无火，虚实两端而已。其有梦者，责相火之强，当清心肝之火，病自可已；无梦者，全属肾虚不固，又当专用补涩以固其脱。既属虚滑之证，则无火可清，无瘀可导，故以潼沙苑补摄肾精，益其不足。牡蛎固下潜阳，龙骨安魂平木，二味皆有涩可固脱之能；芡实益脾而止浊，莲肉入肾以交心，复用其须者，有赖其止涩之功，而为治虚滑遗精者设也。③《方剂学》：方中沙苑蒺藜补肾涩精为君药；莲子、芡实助君药以补肾涩精，为臣药；君臣相配，以补不足为主；莲须、煅龙骨、牡蛎性涩收敛，专以涩精为用，共为佐使药。诸药合用，既可涩精液之外泄，又能补肾精之不足。但本方究以固涩为主，故遗精滑泄已止，便需用补肾之品，补虚固肾以治本。

【临证举例】 重症肌无力 《新中医》（1973；5：30）：患者吴某，45岁，患重症肌无力，右眼上睑完全下垂，四肢无力，躺卧不起，咀嚼困难，呼吸喘息气短。诊前曾给新斯的明0.5毫升肌肉注射，上述肌无力症状在10分钟内消失，不久即如故。住院期间，曾用过补中益气汤、归脾汤、杞菊地黄丸等方药加减施治，西药除用新斯的明外，还用过氯化钾、维生素B_1，维生素B_2等药物，病情时好时坏，一直未能痊愈。根据中医辨证，患者有遗精、腰痠痛、腿冷、舌质红、少苔等肾阴虚表现，故改用金锁固精丸（成药）治疗。每次服12克，每日三次，淡盐水送下。二周后病情明显好转，共服金锁固精丸36瓶，病获痊愈，观察六年未见复发。作者认为，本方具有补肾固精之效，常用以治疗遗精病人。方中药物，沙苑蒺藜补肾益阴，芡实健脾利湿，龙、牡镇心安神，涩精秘气，莲子、莲须清心养胃，交通心肾。诸药合用，可治真气亏损，肾虚遗精，四肢无力诸症。据患者的证情表现，乃属肾阴虚，肾不纳气的表现，用本方是治本之法，当获捷效。

08870 金锁思仙丹

【方源】 《女科切要》卷三。

【组成】 莲蕊 莲子 芡实各等分 茯神三两

【用法】 上为末。用金樱子一斤（去毛）煎膏为丸。每服三十丸，空心淡盐汤送下。服过一月后即不走泄，遇种子期，用车前子汤送下。

【主治】 男子欲劳过度，精神不佳、

08871 金蝉脱壳方

【方源】《秘传大麻风方》。

【组成】当归 川芎 防风 滑石 天麻各三两 芍药 桔梗各一两五钱 僵蚕 大黄各二两 人参 独活 山栀 黄连 白术 蝉蜕 黄芩 石膏各二两 苦参四两 连翘二两 黄柏二两 细辛一两 荆芥三两五钱 羌活二两 全蝎二两 芒消 沉香各一两 枫子肉四斤

【用法】先将枫子肉为膏，余药为末，用黄米饭打糊和膏，打千捶为丸，如梧桐子大。每服一百丸，一日三次，茶汤送下。

【主治】麻风。

【加减】血盛，加泽兰叶、革巴革、蚵蛾草各二两；麻木，加淫羊藿、天麻各二两；血少，加生地、熟地，血竭各二两；鼻塞不通，不闻香气，乃血气不行，不能贯通，以致滞塞，加片脑、朱砂、硼砂、牙消、玄明粉各等分为末。吹鼻内，一日三次即通。

08872 金蝉脱壳酒

【方源】《金鉴》卷七十三。

【组成】醇酒五斤 大虾蟆一个 土茯苓五两

【用法】上药浸酒内，瓶口封严，重汤煮二炷香时取出。待次日饮之，以醉为度。无论冬、夏，盖暖出汗为效。余存之酒，次日随量饮之，酒尽痊愈。

【主治】杨梅疮结毒，筋骨疼痛，诸药不效者。

【宜忌】服酒七日后，禁见风，忌口及房欲。

08873 金蝉蜕衣汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】桂枝9克 防风9克 蝉蜕9克 苍术6克 苡仁6克 茵陈12克 猪苓9克 银花15克 连翘15克 郁金6克 大枣6克

【用法】水煎，内服。

【主治】药物性皮炎。

【加减】热重，加石膏、知母；湿重，加扁豆、土茯苓；风胜，加荆芥、川芎；血热，加生地、丹皮、赤芍。

08874 金箔镇心丸

【方源】《局方》卷十。

【组成】紫河车（用黑豆煮软，切作片，焙干）二十五两 山药一百五十两 牙消（枯）十五两 甘草（煨） 人参（去芦） 茯苓（去皮）各五十两 朱砂（研，飞）一百两 龙脑（研）十两 麝香（研）五两 金箔一千二百箔（为衣）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两半作五十丸，以金箔为衣。每服一丸，薄荷汤化下，含化亦得，食后临卧服。

【功用】安镇心神，散败邪热，凉咽膈，止惊啼。

【主治】小儿风壅痰热，心神不宁，惊悸烦渴，唇焦颊赤，夜卧不安，谵语狂妄。

08875 金箔镇心丸

【方源】《周慎斋遗书》卷十。

【组成】人参 茯苓 紫河车 琥珀各一钱 甘草五分 朱砂 珍珠各一钱

【用法】炼蜜为丸，金箔为衣。

【主治】慢惊，惊痫。

08876 金箔镇心丸

【方源】《回春》卷四。

【异名】金箔镇心丹（《血证论》卷八）。

【组成】朱砂 琥珀 天竺黄各五钱 胆星一两 牛黄 雄黄 珍珠各二钱 麝香

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如皂肉子大，金箔为衣。每服一丸，用薄荷汤送下。

【主治】①《回春》：惊悸。②《东医宝鉴·内景篇》：癫痫，怔忡及一切痰火之疾。

【加减】心经有热，加炒黄连、当归、生地黄各一两，炙甘草五钱，人参一两，去雄黄、胆星、麝香。

【备考】方中麝香用量原缺，《东医宝鉴·内景篇》引本方麝香作半钱，并有牛胆一两。

08877 金箔镇心丸

【方源】《景岳全书》卷六十二。

【异名】金箔镇心丹（《中药成方配本》）。

【组成】金箔十二贴（为衣） 朱砂一两（飞） 人参 白茯苓 甘草各半两 山药一两半 牙消一钱半 麝香五分 片脑一分

【用法】上为末，炼蜜为丸。每一钱作十丸，以金箔为衣。每服一丸，薄荷汤化下；或含化亦可。

【功用】《中药成方配本》：益虚镇心，宣郁豁痰。

【主治】风壅痰热，心神不宁，惊悸烦渴，唇焦颊赤，夜卧不安，谵语狂妄。

【宜忌】《中药成方配本》：孕妇忌服。

08878 金樱莲子散

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】金樱子（冬采，干擦去毛）三两（净，炒，切破，去子净用） 莲子（去心） 头面各二两（炒） 白扁豆二两（炒） 牡荆实（即黄荆子） 糯米一合（炒）

【用法】 上为细末。每用四钱，入熟蜜三匙，滚汤调服。

【主治】 脾胃虚弱，赤白带下。

08879 金蟾脱甲酒

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】 金蟾退壳酒、捷验酒(《仙拈集》卷四)。

【组成】 好酒五斤 大虾蟆一只

【用法】 将虾蟆浸酒，封瓶口，煮香一枝取起，待次日随量之大小，以醉为度，冬夏盖暖出汗为效；存酒次日只服量之一半，酒尽疮愈。

【主治】 杨梅疮，不拘新久轻重；杨梅结毒，筋骨疼痛，诸药不效者。

【宜忌】 服酒七日后不许见风为要，忌口及房事。

08880 金不换内消丸

【方源】《医统》卷三十三引《医林》。

【组成】 苍术半斤（制，去皮） 枳壳一两半（麸炒） 青皮（去白） 陈皮（去白） 三棱（醋煮） 蓬术（醋煮） 香附子（制） 大茴香（炒） 干漆（炒） 藿香（洗）各一两 厚朴 杏仁（去皮尖） 砂仁各一两三钱 猪牙皂角二两（去皮弦） 黑牵牛二两 草果 百草霜各一两（用乡村烧百草柴者佳）

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，临卧或日中，不拘时候，好酒、茶清、盐汤任下一二服，便觉腹中宽快，并无泄泻之患。

【主治】 一切积聚，气蛊，胸膈膨胀，肚腹满闷，心紧束。

【宜忌】 妊娠禁服。

08881 金不换正气散

【方源】《传信适用方》卷一。

【组成】 藿香（去沙土枝梗） 半夏（汤泡洗七次） 甘草（炒） 陈皮（去白） 厚朴（去粗皮，姜制） 草果子（去皮） 苍术（米泔浸一宿） 白茯苓 白术 神曲（炒）各等分

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，同煎至七分，去滓，放温服，不拘时候。

【功用】 进饮食，调荣卫，正气逐冷，辟山岚瘴气。

【主治】 阴阳不和，往来寒热，诸般疟疾，解利四时伤寒；五种膈气，恶心痰逆，或吐或泻，冒冷伤食，脾胃虚弱。

08882 金花五味子汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】 桔梗 贝母各一钱 紫菀 当归各八分 桑白皮 麦门冬 薄荷各六分 五味子 山栀仁各五分 连翘五分 生地黄七分 半夏四分 黄芩（中枯者）一钱 甘草（生）三分 乌梅半枚 生姜三片

【用法】 上㕮咀，水煎熟。食后服。

【主治】 咳嗽有痰，痰中有血丝，此火刑金，最难痊愈。

【加减】 咽燥，去半夏。

08883 金莲种子仙方

【方源】《济阴纲目》卷六。

【异名】 金莲种子仙丹(《女科指掌》卷二)。

【组成】 熟地黄（酒洗） 当归（酒洗） 白芍药（酒炒黄） 益母草 川芎（酒洗） 苍术（米泔水浸一宿）各三两 蛇床子（酒洗炒） 条芩（酒洗） 覆盆子（炒） 玄胡索（微炒） 陈皮（水洗，去白） 丹参（水洗）各二两 砂仁（去壳）一两五钱 山茱萸（酒浸，去核） 香附（四制）各五两

【用法】 上为极细末，用白毛乌骨雄鸡一只，预先喂养一月，勿令与雌鸡同处，临时将鸡缉死，不出血，干去毛，剖开去肠内污垢物并膘内宿食，肫内黄皮用酒洗净，一应时件仍入鸡肚内，不令见火，置缸内，入酒二斤，封固，重汤煮烂取出，割下净肉捣如泥，仍将鸡骨用酥油和原汁或酒炙炼为末，入前药末内拌匀，再用醋煮米糊，同鸡肉末臼内捣极细为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，渐加至八九十丸，空心清米饮送下。

【功用】 种子。

【主治】 血虚不孕者。

【加减】 如月信先期而至者，加黄芩、地骨皮、黄连各一两半，清水送下；如月信后期而至者，加黄耆一两，人参、白术各一两半，温酒或淡盐汤送下；如白带者，加苍术、白术、升麻、白芷各一两半，淡姜汤送下。

【备考】 本方加茴香，去熟地，名“梦熊丸”。

08884 受拜齿药

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】 香附子半斤 细辛 盐各二两

【用法】 上取香附子新大者，去粗皮，细锉；用生姜一斤研取汁，拌和香附子，浸五七日，取出香附子，不用姜滓汁；后将细辛与香附子、盐用瓦炒存性。逐日揩牙。

【功用】 令牙齿坚牢，龈槽固密，诸疾不生。

08885 狐惑汤

【方源】《千金》卷十。

【组成】 黄连 熏草各四两

【用法】 上㕮咀，白酢浆一斗渍之一宿，煮取二升，分为三服。

【主治】 狐惑病，其气如伤寒，嘿嘿欲眠，目不得闭，卧不安，并恶食饮，不欲食，闻食臭其面目翕赤、翕白、翕黑，毒食于上者则声喝（一作嗄）也，毒食下部者则干咽也。

【方论选录】《千金方衍义》：黄连，即泻心汤中专主；佐以薰草，专辟恶气，即泻心汤中干姜之意；煮用酢浆，专收湿化之虫。味少力专，其功不在泻心之下耳。

08886 狗皮膏

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】 秦艽 三棱 莪术 蜈蚣各五钱 当归 大黄 黄连各三钱 穿山甲十四片 全蝎十四个 木鳖子七个 巴豆五钱（连皮打破）

【用法】 真香油二斤十两，将药泡油内，春五、夏三、秋七、冬十日；炸药黑色，捞出，将滓捣极细烂听用；复将药上火，入飞过黄丹一斤二两，用槐条搅匀，滴水成珠；将前研药滓入膏内，再入阿魏、芦荟各三钱，阿胶一两，麝香一钱，冰片二钱，乳香、没药各二钱，共研极细；候膏温，将药入内搅匀，瓷罐秘收，再勿见火。用时狗皮摊，每张重七钱，贴患处。三日发热，七日腹内觉痛，十日大便下脓血。一张可贴一百二十日。

【主治】 瘕疾，气块，口内生疳。

【宜忌】 忌生冷、腥膻、硬物一百日。

08887 狗皮膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 枳壳一两 青皮一两 川楝子一两 大风子一两 赤石脂一两 僵蚕一两 赤芍一两 官桂一两 天麻一两 小茴香一两 蛇床子一两 甘草一两 乌药一两 牛膝一两 羌活一两 黄柏一两 补骨脂一两 威灵仙一两 生川乌一两 当归一两 木香一两 细辛一两 续断一两 菟丝子一两 白蔹一两 桃仁一两 生附子一两 川芎一两 生草乌一两 生杜仲一两 远志一两 穿山甲（生）一两 香附一两 白术一两 橘皮一两 青风藤一两

上药三十六味，酌予碎断，用香油二百四十两，炸枯，过滤去滓；炼至滴水成珠，入黄丹一百两，搅匀成膏；取出，浸入水中去火毒后，加热溶化。另兑：

轻粉五钱 儿茶五钱 公丁香五钱 樟脑五钱 没药五钱 血竭五钱 乳香五钱

【用法】 共研为细粉，每二百四十两膏油兑入以上细粉搅匀摊贴。大张油重八钱，小张油重四钱，皮光。用时温火化开，贴患处。

【功用】 祛风散寒，舒筋活络，止痛。

【主治】 风寒湿痹，四肢麻木，腰腿疼痛，闪腰岔气，跌打损伤。

08888 狗肉粥

【方源】 方出《证类本草》卷十七引《食医心镜》，名见《长寿药粥谱》。

【组成】 肥狗肉半斤

【用法】 以米、盐、豉等煮粥，频日吃一两顿。

【功用】《长寿药粥谱》：温补脾肾，去寒助阳，轻身益气。

【主治】 ①《证类本草》引《食医心境》：脾胃冷弱，肠中积冷，胀满刺痛。②《长寿药粥谱》：年老体衰，阳气不足，营养不良，畏寒肢冷，腰膝软弱。

【宜忌】《长寿药粥谱》：可供早、晚餐或点心，温热服食，尤以秋、冬季节为宜。发热期间忌服；在服食狗肉粥时，忌吃蒜、姜以及中药杏仁、商陆。疯狗肉不可食用。

【方论选录】《长寿药粥谱》：狗肉不仅是营养丰富，味道鲜美的食品，同时又是一味滋养强壮的中药。中医说它有温补脾肾，去寒助阳的作用。唐·孟诜《食疗本草》中说：狗肉补五劳七伤，益阳事，补血脉，厚肠胃，实下焦，填精髓。

08889 狗肠丸

【方源】《洞天奥旨》卷九。

【组成】 黑狗肠一副（煮烂） 象牙（末）四两 细茶（末）四两 倍子（末）四两

【用法】 连肠为末，为丸如梧桐子大。每服三钱，饥时用淡盐汤送服。如不能丸，少加煎蜜为丸。

【主治】 漏疮。

【宜忌】 忌煎炒热物，尤忌房事。

08890 狗宝丸

【方源】《济生》卷八。

【异名】 寸金丸、返魂丹、再生丸、追命丹、延寿丸、来苏丸、知命丸、得道丸（《御药院方》卷十）、寸金丹（《外科精义》卷下）、来苏丹、知命丹（《赤水玄珠》卷二十九）、黍米寸金丹、延寿丹（《外科正宗》卷一）、百生丸（《疡科选粹》卷二）。

【组成】 狗宝一两（生用） 蟾酥二钱 乳香（别研） 没药（别研） 雄黄 硇砂 轻粉 麝香 铅白霜 粉霜（别研）各一钱 金头蜈蚣七个（头

尾脚足炙黄色，研如泥） 乌金石二钱 鲤鱼胆七个（干者用之，去皮，腊月者佳） 狗胆一个（干者用之，去皮，黑狗者，腊月者好） 头胎孩儿乳一合 黄蜡三钱

【用法】 上先将头胎孩儿乳、黄蜡放在铫内，文、武火化开，用前药末和成剂，放在瓷器内。要用，旋丸如麻子大两丸；如病大，三丸；用白丁香七个（直者为妙），以新汲水化开，送下狗宝丸。腰以下病，食前服；腰以上病，食后服。如人行三里，用热葱白粥投之，即以衣被盖定，汗出为度。以后只吃瓜蒂白粥，常服十奇散，留头四边，以乌龙膏贴之。

【主治】 痈疽发背等各种恶疮，初起憎寒壮热烦渴；以及暴中急症，猝然倒仆。

①《济生》：痈疽发背，附骨疽，诸般恶疮。②《御药院方》：发背、脑疽、气疽、痈肿，遍身附骨肿痛，先觉时饮水，口中烦渴，发寒发热，四肢沉重，身体壮热。③《外科正宗》：暴中急症，忽然卒倒者。

08891 狗宝散

【方源】《类证治裁》卷三。

【组成】 六君子加狗宝

【用法】 上为散。调服。

【主治】 噎膈反胃。

08892 狗脊丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【异名】 金刚骨丸（《御药院方》卷八）。

【组成】 狗脊二两 萆薢二两（锉） 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前服，以新萆薢渍酒二七日，取此酒下药。服经年之后，行及奔马、久立不倦。

【功用】 轻身，利脚膝。

【主治】 五种腰痛。

08893 狗脊汤

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】 金毛狗脊 黄连 五倍子 水杨根 枯白矾各一钱

【用法】 上为末，水煎汤，熏洗一二日。

【主治】 产妇儿胞下后，膀胱脱出，名曰茄病，或由临盆用力太过，或由气血两虚，其色紫者可治，白者难治。

【备考】 本方先熏后洗，乘热轻轻托进，内服补中益气汤去柴胡，加醋炒白芍，敛而举之。

08894 狗脊饮

【方源】《易简方便》卷三。

【组成】 金毛狗脊 川牛膝 海风藤 宣木瓜 桑树枝 松树节 续断 杜仲 秦艽 桂枝（上身不用，要用下身） 熟地各一钱 大归身二两 虎骨胶二两（此味不用亦可）

【用法】 用河水二碗，煎六分，绍酒一小杯同饮。一方分作五服，每日一服，六日全愈。如未全愈，用酒十斤将药泡服。

【主治】 气血俱亏，手足麻木，感受风湿，不能行动。

08895 狗脊酒

【方源】《普济方》卷 五五引《圣惠》。

【组成】 狗脊（去毛） 丹参 黄耆 萆薢 牛膝（去苗） 芎藭 独活（去芦头）各一两 附子（炮裂，去皮脐）一枚

【用法】 上锉，如麻豆大。用酒一斗浸，纳瓶中密封，重汤煮三时取出。如冷，旋温服一盏，不拘时候。

【主治】 腰痛强直，不能舒展。

08896 狗脑丸

【方源】《幼幼新书》卷六引《婴孺方》。

【组成】 狗脑一个 豺漆（五加皮也） 甘草（炙） 白术 防风 钟乳石 干地黄各一分 牛黄二分

【用法】 上以狗脑为丸，如小豆大。每服一岁二丸，饮送下，一日二次，未知，加之。儿囟常令暖。

【主治】 小儿脑长，喜摇头，解颅。

08897 狗头骨丸

【方源】《局方》卷六（淳祐新添方）。

【组成】 赤石脂 败龟（烧存性） 干姜各半两 肉豆蔻（面裹，煨） 附子（炮，去皮）各一两 狗头骨（一具，火烧存性，取末）一两

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心米饮送下。

【主治】 久患下痢，脐腹疞痛，所下杂色，昼夜不止；或其人久虚，频下肠垢，谓之恶痢者。

08898 饴姜片

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷五引《乡药集成方》。

【组成】 黑糖一斤 干姜（细末）四两

【用法】 上先溶糖，次下姜末和匀，待凝，作片。常常嚼下。

【主治】 冷嗽。

08899 肺风丸

【方源】《外科精义》卷下引《全体治世方》。

【组成】 细辛 旋覆花 羌活各一两 晚蚕蛾（去翅足） 苦参各二两

【用法】 上为细末，软饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，茶、酒任下，不拘时候。

【主治】 面鼻风皱及皱疱。

08900 肺伤汤

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】 人参 生姜（切） 桂心各二两 阿胶（炙） 紫菀各一两 干地黄四两 桑根白皮 饴糖各一斤

【用法】 上㕮咀。以水一斗五升，煮桑根白皮二十沸，去滓，纳药；煮取二升五合，次纳饴糖令烊。分三服。

【主治】 ①《千金翼》：肺气不足而短气，咳唾脓血不得卧。②《鸡峰》：胁下有痛处。

08901 肺炎汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 麻黄3克 炒杏仁9克 甘草3克 生石膏30克（先煎） 化橘红9克 牛蒡子12克 鱼腥草30克 川贝母9克

【用法】 水煎服。

【功用】 辛凉解表，清热解毒。

【主治】 大叶性肺炎。高热喘促，咳嗽胸痛，吐铁锈色痰，鼻翼煽动，脉洪大数，舌苔白或黄，少津。

【方论选录】 本方为麻杏石甘汤加味而成，以麻黄、石膏为主药。麻黄属辛温解表药，若与寒凉药配伍，可为辛凉宣透之剂。麻黄散邪；石膏降热；杏仁利肺，肺气宣畅，内热得清，喘咳可平；加化橘红、川贝母清肺利痰；鱼腥草、牛蒡子清热解毒。热毒炎消，胸痛痰喘可愈。

08902 肺痈汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】 当归二钱 白芍一钱 天冬二钱 阿胶一钱 苡仁一钱 银花一钱 连翘八分 桔梗八分

【用法】 水煎服。

【主治】 肺痈。

08903 肺寒汤

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】 款冬花 紫菀（去土） 甘草（炙） 桂（去粗皮） 麻黄（去节） 干姜（炮） 五味子 杏仁（汤浸，去皮尖，炒） 半夏（汤煮软，焙干）各二两 细辛（去苗叶）一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，生姜五片，大枣二枚（擘破），同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 肺胃虚寒，咳嗽痰盛，呀呷有声，呕吐停饮，咽喉干痛，上气喘满，面目虚浮，自汗恶风，语声嘶破，背寒中冷，心下悸动，哕逆恶心，全不入食。

08904 肺痿汤

【方源】《镜京直指》卷二。

【组成】 北沙参三钱 生地五钱 白及片三钱 葶苈三钱 炙桑皮二钱 炙兜铃子八分 生苡仁六钱 川贝母钱半 炙紫菀三钱 石膏六钱（冰糖水炒） 叭杏仁（去尖）三钱 陈海蜇头二两（切丝，水浸，挤淡）

【用法】 水煎。

【主治】 肺叶糜烂，咳吐臭痰，右胁隐隐而痛，右寸脉数无力，甚则脉伏。

08905 肺脓疡汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 川贝母 桔梗 化橘红各9克 葶苈子6克 苇根30克 薏苡仁18克 金银花 连翘各24克 旋覆花（布包）6克 代赭石（布包）12克 桃仁 杏仁各9克 冬瓜子30克

【用法】 水煎服。

【功用】 清热解毒，降气化痰，排脓。

【主治】 肺脓疡成痈期或溃脓期，咳吐腥臭脓痰或脓血，胸中烦闷而痛，脉滑数，舌苔黄腻。

【方论选录】 处方以葶苈子、旋覆花、代赭石、苇根等药组成，加入化痰排脓，清热解毒等药。方中清热解毒用金银花、连翘；降气化痰用旋覆花、代赭石、葶苈子；清肺化痰用川贝母、化橘红；排脓用桔梗、苇根、薏苡仁、冬瓜子；宣肺止咳用杏仁；活血祛瘀用桃仁。

08906 肺痈神汤

【方源】《医宗必读》卷六。

【异名】 葶苈薏苡泻肺汤（《张氏医通》卷十六）、肺痈饮（《仙拈集》卷四）、肺痈汤（《汉药神效方》）。

【组成】 桔梗二钱 金银花一钱 薏苡仁五钱 甘草节一钱二分 黄耆一钱（炒） 贝母一钱六分 陈皮一钱二分 白及一钱 甜葶苈八分（微炒）

【用法】 水二钟，姜一片，煎一钟，食后徐徐服。

【主治】 肺痈。劳伤气血，内有积热，外受风寒，胸中满急，隐隐痛，咽干口燥，时出浊唾腥臭，吐脓如米粥者死，脉滑数或实大。凡患者右胁按之必痛，但服此汤，未成即消，已溃即愈。

【加减】 新起，加防风一钱，去蓍；溃后，加人参一钱；久不敛，加合欢皮（一名夜合，即槿树皮）一钱。

08907 肺脓疡合剂

【方源】《古今名方》引金如寿方。

【组成】 半枝莲 金银花各15克 鱼腥草15～30克 虎杖 黄芩 桔梗各12克

【功用】 清热解毒，化瘀排脓，清肺透热，清养肺阴。具有退热快、排脓多、空洞闭合迅速的效果。

【主治】 急性肺脓疡（肺痈）。

【加减】 如高热不退，加生石膏30克、知母10克；痰中带血，加茅根30克、旱莲草15克；如果热退后，吐大量脓臭痰（排脓期）时，加桃仁9克、生薏苡仁18克，以祛瘀、化痰、排脓；如经X线检查，液面消失，脓腔全部显露时，加黄精、白及各15克，以助养阴补肺，促进脓腔闭合。

08908 肺痿独圣散

【方源】《吉人集验方》。

【组成】 白及二两

【用法】 上为末。每服二钱，临卧糯米汤送下；或用糯米汤调和服之。

【主治】 多年咳嗽，肺痿，咯血红痰。

08909 肺炎Ⅰ号合剂

【方源】《实用内科学》上册。

【组成】 鱼腥草 鸭跖草 半枝莲各30克

【主治】 肺炎。

08910 肺炎Ⅱ号合剂

【方源】《实用内科学》上册。

【组成】 鱼腥草 鸭跖草 半枝莲各30克 野荞麦根30克 虎杖根15克

【主治】 肺炎。

【备考】 根据临床实践，约90%患者服药后于三天内退热，对某些抗菌素治疗无效的肺炎患者，有时也有较好的疗效。缺点是个别病人因胃肠道反应剧烈而不能耐受。

08911 肿胀丸

【方源】《风劳臌膈四大证治》。

【组成】 真苍术一两 厚朴八钱 陈皮八钱 山楂二两 皂矾二两（煅白色） 香附八钱

【用法】 枣肉为丸。白汤送下。

【主治】 肿胀。

【宜忌】 忌盐水百日方可。

08912 肥儿丸

【方源】《幼幼新书》卷二十五引《朱氏家传》。

【异名】 四味肥儿丸（《小儿痘疹方论》）、五疳芜荑丸（《医方类聚》卷二五五引《经验良方》）。

【组成】 白芜荑（去壳秤） 黄连（去须） 神曲 麦芽各等分

【用法】 上为末，用猪胆汁煮糊为丸，如大麻子大。每服三十粒，食前米饮送下。

【主治】 小儿食积，脾热成疳，乳食不下，腹胀吐泻，腹大青筋，体瘦多涎，发稀白秃，龈烂目翳，口舌、周身生疮，小便澄白。以及惊风后失音。

①《幼幼新书》：或治疳积，或治疳瘦。②《直指小儿》：风后喑不能言。③《普济方》：涎多，乳食不下，涎流不出口者，乃名脾热。④《明医杂著》：小儿食积五疳或白秃体瘦，肚大筋青，发稀成穗，或遍身疮疥。⑤《保婴撮要》：呕吐不食，腹胀成疳，或作泻不止，或食积脾疳，目生云翳，口舌生疮，牙龈腐烂，发热瘦怯，遍身生疮，小便澄白。

【备考】 本方用法：《直指小儿》：每服五丸，用陈皮、木香、使君子、炙甘草煎汤送下。《普济方》：木通汤送下。

08913 肥儿丸

【方源】《卫生总微》卷十二。

【异名】 七味肥儿丸（《景岳全书》卷六十二）、大无肥儿丸（《不居集》上集卷三十）。

【组成】 黄连（去须） 神曲（炒）各一两 使君子仁 肉豆蔻（面裹煨，去面） 麦芽（炒）各半两 木香二钱 槟榔两个（不见火）

【用法】 上为细末，面糊为丸，如萝卜子大。每服二三十丸，熟水送下，食空服。

【功用】 ①《走马急疳治疗奇方》：进饮食，健脾胃，杀虫消积。②《医方类聚》引《澹寮方》：长肌退黄。

【主治】 小儿乳食不节或病久脏腑胃虚虫动所致诸疳，羸瘦面黄，肚腹胀大，发竖坚黄，不能行走，烂龈口臭，好食泥土，神疲发热，二便不调，或颈项结核。

①《卫生总微》：诸疳，久患脏腑胃虚虫动，日渐羸瘦，腹大不能行，发竖作穗，肌体发热，精神衰弱。②《普济方》引《全婴方》：好食泥土，发竖，面无精光。③《局方》（宝庆新增方）：面黄口臭。④《医方类聚》引《澹寮方》：烂龈。⑤《保婴金镜》：食积五疳，口渴，大便不调，小便不清，或颈项结核，发稀。

【宜忌】《普济方》引《全婴方》：忌生硬冷物。

【方论选录】《张氏医通》：此方近世所传，尚多胡黄连、雷丸、芜荑等味，大苦大寒，大伤元气，而因名误实，故世喜服之，意谓有益于儿也。曷知立方之义，本为疳热腹胀羸瘦，故用祛热伐肝之剂，消去疳积，元气得复，儿自肥矣。若本无疳热服之，与引寇破家何异？尝见富有之家，从幼好服此丸至十岁外，渐至蒸热咳嗽，盖缘真阳亏损，不能振生发之令，而成童劳者不少。奈何习俗成风，多所未悟，因特表而出之。

【临证举例】 小儿疳积 《不居集》：汪石山治一小儿病多，因缺乳食太早所致，或因久患脏腑胃虚虫动，日渐羸瘦，腹大不能行，发竖，发热，无精神，用大无肥儿丸一料而愈。

08914 肥儿丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】 麦芽（炒） 川黄连 大芜荑 神曲（炒） 胡黄连各半两

【用法】 上为末，纵猪胆汁为丸，如麻子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【主治】 小儿蒸热，腹胁胀满，面色瘦黄，饮食迟化，大小便不调。

【宜忌】 乳母忌酒面生冷。

08915 肥儿丸

【方源】《婴童百问》卷八。

【异名】 六味肥儿丸(《保婴撮要》卷八)。

【组成】 黄连 陈皮（去白） 神曲（炒） 麦芽（炒）各一两（加三棱、莪术） 白芜荑半两 川楝子一两（去核，炒）

【用法】 上为末，神曲糊为丸，如麻子大。每服三十丸，空心米饮吞下。

【功用】 化虫，消疳，退疳热。

【主治】 ①《婴童百问》：小儿因缺乳食肉太早，或患脏腑胃虚所致疳，黄瘦，肚急。肌肉消瘦。②《保婴撮要》：小儿脾疳，饮食少思，肚大颈细，发稀成穗，项间结核，发热作渴，精神倦怠，大便酸臭，嗜食泥土，或口鼻头疮，肚见青筋，啮齿下痢，便白五疳。

08916 肥儿丸

【方源】《准绳·幼科》卷八。

【组成】 胡黄连 神曲（炒） 麦芽各五钱 槟榔三钱 木香二钱 肉豆蔻（面裹煨） 使君子肉各二钱半

【用法】 上为细末，蒸饼为丸，如黍米大。用米饮食远服。

【功用】 ①《冯氏锦囊·杂证》：消虫进食。②《中国药典》：健胃消积，驱虫。

【主治】 小儿虫积，面黄肌瘦，肚大腹胀，食少痞积，口臭餐泥，腹痛泄泻，或后项有物如弹子。

①《准绳·幼科》：小儿脑后项边有物如弹子大，按之转动，软而不痛，名无辜疳。②《诚书》：脾疳痞积，黄瘦口秽，肚大。③《冯氏锦囊·杂证》：小儿餐泥。④《中国药典》：虫积腹痛，食少腹胀泄泻。

【备考】 按：《中国药典》本方用法：以上七味，粉碎成细粉，过筛，混匀；每100克粉末加炼蜜100～130克制成大蜜丸。口服一次1～2丸，一日1～2次。三岁以内小儿酌减。

08917 肥儿丸

【方源】《广笔记》卷三。

【组成】 人参三钱 芜荑一两 使君子肉一两 白芍药一两 橘红八钱 黄连一两 甘草五钱 红曲七钱 麦芽七钱 砂仁五钱 白茯苓一两 山楂肉七钱 滑石一两 莲肉二两 扁豆一两 青黛一两

【用法】 炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心白汤化下。服疳积散病愈，再用此方调理。

【主治】 小儿乳食不节，过饱伤脾，面黄腹大，小便浊如米泔，大便黄泄酸臭，皮毛枯索，甚而双目羞明生翳，形骸骨立，夜热昼凉。

08918 肥儿丸

【方源】《种福堂方》卷四。

【异名】 补养肥儿丸(《仙拈集》卷三)。

【组成】 山药二两（炒） 茯苓 白扁豆（炒） 五谷虫（淘洗净，炒） 山楂（炒） 白芍（炒） 麦芽（炒） 神曲（炒） 当归各一两五钱 白术（土炒） 陈皮 使君子肉（煨）各一两 生甘草七钱 胡连七钱（姜汁炒）

【用法】 炼蜜为丸，如绿豆大。每服一钱。

【功用】 常用可免饮食伤脾之症。

【主治】《文堂集验方》：面黄肌瘦，食积脾疳，大便不结，疳泻。

08919 肥儿膏

【方源】《人己良方》。

【组成】 莲肉 风栗 白茯苓 淮山药 白术（去芦） 麦芽 黄精 茱萸肉 天冬 黑枣 福橘 京柿各四两（小儿用各一两）

【用法】 捶烂作饼，蒸熟成膏；大人加熟肥肉同蒸饼。

【功用】 健脾胃，进饮食。

08920 肥儿糕

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】白茯苓(去皮) 怀山药 芡实仁 莲肉(去心皮)各四两(共为细面) 陈仓米半升 糯米半升 白沙糖一斤半

【用法】先将药面盛麻布袋,放入甑内蒸极熟;取出,再入白糖同搅极匀,掺作一块用小木印,印作饼子,晒干收用。随意服用。

【功用】养元气,健胃肠,进饮食。

【主治】腹胀泄泻,虚劳羸怯。

08921 肥气丸

【方源】《三因》卷八。

【组成】青皮(炒)二两 当归须 苍术各一两半 蛇含石(煅,醋淬)三分 蓬术(切) 三棱(切) 铁孕粉各三两(与三棱、蓬术同入醋煮一伏时)

【用法】上为末,醋煮米糊为丸,如绿豆大。每服四十丸,当归浸酒送下。

【主治】①《三因》:肝之积在左胁下,如覆杯,有头足如龟鳖状,久久不愈,发咳逆呕,痎疟,连岁月不已,其脉弦而细。②《医统》:肝积名肥气,色青,两胁下痛,牵引小腹,足寒转筋,男为积疝,女为痕聚。

08922 肥气丸

【方源】《东垣试效方》卷二。

【组成】厚朴半两 黄连七钱 柴胡二两 椒(炒去汗)四钱 巴豆霜五分 川乌头(切,去皮)一钱二分 干姜(炮)半钱 皂角(去皮弦子,煨)一钱半 白茯苓(去皮)一钱半 广术(炮)二钱半 人参(去芦)二钱半 甘草(炙)三钱 昆布二钱半

【用法】上件除茯苓、皂角、巴豆霜外,为极细末;另研茯苓、皂角为细末,和匀;另研巴豆霜旋旋入末和匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。初服二丸,一日加一丸,二日加二丸,渐渐加至大便微溏,再从两丸加服。周而复始,积减大半勿服。

【主治】肝之积,在左胁下,如覆杯,有头足,久不愈,令人发咳逆、痎疟,连岁不已。

【加减】秋、冬,加厚朴半两(通前一两),减黄连一钱半;若治风痫,子一料中加人参、茯神、菖蒲各三钱,黄连只依春、夏用七钱,虽秋、冬不减,空心淡醋汤送下。

08923 肥气丸

【方源】《简明医彀》卷三。

【组成】青皮 陈皮 三棱 蓬术(醋炒) 黄连 枳实 厚朴各一两 槟榔 萝卜子(炒) 川山甲 肉桂 干姜(炮)各五钱

【用法】上为末,入炒盐三钱,醋糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食远米汤送下。

【主治】肝积。

08924 肥皂丸

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【异名】玉容肥皂丸(《冯氏锦囊》卷十九)、玉容肥皂(《疡医大全》卷十二)。

【组成】白芷 白附子 白僵蚕 白及 猪牙皂角 白蔹藜 白蔹 草乌 山奈 甘松 白丁香 杏仁 豆粉各一两 轻粉 密陀僧各半两 孩儿茶三钱 肥皂(去裹外皮筋并子,只要净肉)一茶盏 樟脑半两

【用法】上先将净肥皂肉捣烂,用鸡清和,晒去气息;将各药为末,同肥皂、鸡清和为丸。

【功用】去白斑、黑点、白癣、诸般疮痕,令人面色好。

08925 肥皂方

【方源】《外科正宗》卷十。

【组成】皂角 甘松 山奈 白芷各二钱 密陀僧 白附子 樟脑各一钱 楮实子 绿豆粉各三钱

【用法】上为细末。用去净皮弦肥皂一斤,捶匀。洗擦患处。日久自效。

【主治】紫白癜风。

08926 肥儿八珍糕

【方源】《中国医学大辞典》。

【异名】八珍糕(《北京市中药成方选集》)。

【组成】潞党参三两 白术二两 陈皮一两五钱 茯苓 淮山药 建莲肉 薏苡仁 扁豆 芡实各六两 糯米 粳米各五升

【用法】上为细末,用白糖十两和匀,印糕。常常服之。大人脾胃虚弱者亦可服。

【功用】久服健脾开胃,进食生肌,令人气血充足。

【主治】小儿脾胃薄弱,饮食不化,形瘦色萎,腹膨便溏。

08927 服元丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十二。

【组成】菖蒲(去毛) 远志(甘草水煮,去心)各一两 白茯神 巴戟天(水煮,去心)各五钱 人参 地骨皮各三钱

【用法】上为末,用白茯苓二两,糯米二两共为粉,用石菖蒲三钱煎浓汤,去滓,打糊为丸。每食后、午时、临睡各服三五十丸。

【主治】不寐。

08928 服术方

【方源】《医心方》卷二十六引《大清经》。

【组成】 术（好白者）

【用法】 刮去皮，令净末，下筛。每服方寸匕，食后以酒浆服，一日三次。

【功用】 令人身轻目明，延年益寿，颜色光泽，发白更黑。

【宜忌】 禁食桃。

【备考】 弘农人刘景伯，服之不废，寿六百岁。

08929 服菊方

【方源】《医心方》卷二十六引《大清经》。

【组成】 菊（春三月采苗，夏三月采茎，秋三月采花，十月采实，十一月、十二月采根）

【用法】 皆令阴干百日，各令二分治，合下筛，春，加实一分，苗二分；夏，加茎三分，根二分；秋，加实一分，花二分；冬，加花三分，根二分，用白松脂捣丸，如梧桐子大。每服七丸，一日三次，饭后服。

【功用】 祛百病，聪耳明目，轻身益气，颜色泽好，气力百倍，白发复黑，齿落复生。

08930 服蛮煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 生地　麦门冬　芍药　石菖蒲　石斛　川丹皮（极香者）　茯神各二钱　陈皮一钱　木通　知母各一钱半

【用法】 水一钟半，煎七分，食远服。

【功用】 行滞气，开郁结，通神明，养正除邪。

【主治】 ①《景岳全书》：水不制火兼心肾微虚而狂。②《中医大辞典·方剂分册》：郁结不遂，疑虑惊恐，而致痴呆，言语颠倒，举动失常。

【加减】 如痰胜多郁者，加贝母二钱；痰盛兼火者，加胆星一钱五分；阳明火盛，内热狂叫者，加石膏二三钱；便结胀满多热者，玄明粉二三钱调服，或暂加大黄亦可；气虚神困者，加入参随宜。

08931 服枸杞方

【方源】《医心方》卷二十六引《大清经》。

【组成】 枸杞

【用法】 正月上寅之日取其根，二月上卯之日捣末服之；三月上辰之日取其茎，四月上巳之日捣末服之，五月上午之日取其叶，六月上未之日捣末服之；七月上申之日取其花，八月上酉之日捣末服之；九月上戌之日取其子，十月上亥之日，捣末服之；十一月上子之日取其根，十二月上丑之日捣末服之。其子赤，捣末，以方寸匕，着好酒中，日三服之。

【功用】 消除百病，强健身体，益气力，行如走马，肤如脂膏。

08932 服槐子方

【方源】《医心方》卷二十六引《大清经》。

【组成】 槐子（十月采）

【用法】 十月上巳日取，新瓦瓮盛，又以一瓮盖上，密封三七日后，洗去皮，从月一日起服一枚，二日二枚，三日三枚，如此至十日，服五十五枚，一月服一百六十五枚，一年服一千九百八十枚，六小月减六十枚。

【功用】 补脑，早服之令头不白，好颜色，长生。

08933 服天门冬方

【方源】《千金》卷二十七。

【组成】 天门冬（晒干）

【用法】 上药捣下筛。每服方寸匕，食后服，一日三次，可至十服。小儿服尤良。与松脂若蜜丸服之益善。或捣取汁，微火煎取五斗，下白蜜一斗，胡麻炒末二升，合煎，搅之勿息，可丸即止火，下大豆黄末和为饼，径三寸，厚半寸，每服一枚，一日三次。或酿酒服。

【功用】 补中益气，愈百病，白发变黑，齿落复生，延年益命。

【主治】 虚劳绝伤，年老衰损，羸瘦，偏枯不遂，风湿不仁，冷痹，心腹积聚，恶疮痈疽肿癞疾，重者周身脓坏，鼻柱败烂，阴痿耳聋，目暗。

08934 胁痛煎

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 金银花　地榆各五钱　贝母　角刺　连翘　白芷　川山甲　赤芍各钱半　夏枯草　紫花地丁各一两　菊花根一两（捣汁和服）

【用法】 水三大碗，煎一碗，入菊汁。食后分二次服。至重者二剂，不可多服。

【主治】 胁痛。

08935 胁痛饮

【方源】 方出《摄生众妙方》卷七，名见《仙拈集》卷二。

【组成】 草豆蔻（炒）　枳壳（炒）　赤芍药　砂仁　香附子　乌药各等分

【用法】 上用水二钟，煎至一钟。温服。

【主治】 胁痛。

08936 兔肝丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 兔肝二两（炙微黄）　防风三分（去芦头）　玄参一两　白茯苓一两　羚羊角屑三分　人

参二分（去芦头） 决明子三两 车前子一两 地骨皮二分 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 黄耆一两（锉） 熟干地黄一两 甘菊花三分 麦门冬一两半（去心，焙）

【用法】 上为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大。每服食前以温粥饮下三十丸。

【主治】 虚劳肝肾风虚，眼漠漠昏暗，不能久视，无力。

08937 兔肝丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】 兔肝（慢火炙干）二具 柏子仁 熟干地黄（焙） 防风（去叉）各一两 五味子 车前子 细辛（去苗叶） 兔丝子（酒浸一宿，别捣为末）各半两 芎藭 枸杞子 山芋各一两

【用法】 上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空心酒送下，一日二次。

【主治】 肝肾虚，目黑暗不明，冷泪时出。

08938 兔骨饮

【方源】《普济方》卷一七六引《仁存方》。

【异名】 兔骨粥（《仙拈集》卷二）。

【组成】 兔骨一具（微炙黄，捣碎） 大麦苗二斤

【用法】 上以水一斗，煮取汁五升，每服一小盏，一日三两服。

【主治】 消渴羸瘦，小便不禁。

【宜忌】 忌食兔肉。

08939 兔脑催生丹

【方源】《陈素庵妇科补解》卷四。

【组成】 麝香（每丸用）三厘 丁香五钱 肉桂一两 百草霜（筛净）三两 急性子二两 枳壳二两 腊月兔脑二个 红花二两 苏木三两（煎汁一两） 冬葵子二两。

【用法】 将红花，苏木汁和兔脑同前药作丸，每丸计重一钱二分，砂仁为衣。加生姜三片煎，汤化服。胞破见红方服。

【功用】 催生。

08940 鱼石散

【方源】 方出《医学正传》卷六，名见《东医宝鉴·内景篇》卷四。

【组成】 石首鱼脑骨五对（火煅，出火毒。即白鲞脑中骨也） 滑石五钱。

【用法】 上为细末。分作二服，煎木通汤调下。未愈，再服数剂，必待沙出尽乃安。

【主治】 沙淋，茎中有沙作痛。

08941 鱼肚丸

【方源】《医级》卷九。

【组成】 熟地四两 山药二两 杜仲 归身 川断 白芍 阿胶 菟丝子 白术各一两五钱 黄芩 香附一两 鱼肚四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，白滚汤送下。

【主治】 胎元不固，每致半产，或见漏红腹胀。

08942 鱼脑膏

【方源】《外台》卷二十二引《古今录验》。

【组成】 生雄鲤鱼脑八分 当归六铢 菖蒲六铢 细辛六铢 白芷六铢 附子六铢

【用法】 上㕮咀。以鱼脑合煎，三沸三下之，膏香为成，滤去滓，冷。以一枣核大纳耳中，以绵塞之。

【主治】 风聋年久，耳中鸣。

08943 鱼鳔丸

【方源】《何氏济生论》卷七。

【组成】 通州鱼鳔（圆桶者，蛤粉炒至无声，去蛤粉，分三四份下锅，用酥油炒，不可伤火） 一斤 沙苑蒺藜（炒）三两 莲蕊五两 当归三两 菟丝（自制）三两

【用法】 炼蜜为丸，每服五七十丸，淡盐汤送下。

【主治】 精薄气衰，不能结孕。

08944 鱼鳔丸

【方源】《医级》卷九。

【组成】 白鱼鳔一条（取大白鱼重七八斤者，取其白） 乌贼骨四两 茜草二两 当归四两 白芍 川芎各二两 生地 川断 阿胶 黄耆各三两 鸽蛋二十个（如有麻雀蛋更妙）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三四钱，米饮送下，一日二次。

【主治】 带下日久，经脉渐少，形气脉气不足，饮食不甘，渐将枯闭。

08945 鱼鳔丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】 鱼鳔胶 花龙骨各四两 枸杞子 杜仲各三两 牛膝 全当归 破故纸 茯苓各二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空腹时淡盐汤送下。

【功用】 强筋壮骨，健脚力，益精髓。

【主治】 腰肾亏虚，阴痿、梦遗。

08946 鱼鳔散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 鱼鳔（用裙带者，剪碎，用苘麻剪碎，

同炒胖透，去麻）

【用法】 上为末。每服三钱，卧时葱酒调服。

【主治】 八般头风。

【加减】 日轻夜重者，血虚头痛也，用当归一两、酒二钟，煎一钟，调服；梅毒头痛目肿者，用治梅毒汤药调服。

08947 鱼鳞汤

【方源】《千家妙方》卷下引周鸣岐方。

【组成】 生熟地各20克 黑芝麻40克 枸杞子15克 何首乌15克 白鲜皮15克 地肤子15克 当归20克 川芎10克 桂枝10克 丹参15克 苦参15克 防风15克 蝉蜕10克 甘草10克 大枣三枚

【用法】 水煎二次，早、晚温服。

【主治】 全身性皮肤角化症。

【加减】 心悸、气短、失眠、健忘者，加炒枣仁、合欢花、党参、生黄耆；纳呆脘胀者，减生熟地，加白术、鸡内金，砂仁；便溏者，减黑芝麻、杞果、生熟地，加白术、山药；服药后自汗多者，减防风，加生黄耆；初春，深秋和冬季，可加麻黄10克，威灵仙15克。

【临证举例】 全身性皮肤角化症 胡某某，男，19岁，学生。1977年6月2日初诊。患者自述据父母言，生后不久即见全身皮肤干燥，随年龄增长而加重，色灰，糙裂。若浴后皮鳞翘起而更为明显，且微痒，冬重夏轻，曾经多方治疗，内服外搽多种药物均不见效，而失去治疗信心。现头晕、耳鸣、腰酸、倦怠无力，因汗腺分泌减少，感觉周身不适，食欲尚可，二便自调。查其四肢，胸腹、躯干皮肤为鱼鳞状，鳞屑且色泽深灰，干而不润，用手摸之刺手似甲错，舌苔白腻，舌质红，脉来虚。拟用鱼鳞汤或丸剂加减，治疗八个月而愈。

08948 鱼脑石散

【方源】《中医耳鼻喉科学》。

【组成】 鱼脑石粉9克 冰片0.9克 辛夷花6克 细辛3克

【用法】 上为细末。吹鼻。

【主治】 鼻窒、鼻槁、鼻渊。

08949 鱼腥苇茎汤

【方源】《中医内科临床治疗学》。

【组成】 鱼腥草30克 苇茎30克 冬瓜仁30克 苡仁30克 桃仁9克 银花30克 桔梗9克 黄芩12克 红藤15克 甘草6克

【用法】 水煎服。

【功用】 清热解毒，化瘀消痈。

【主治】 肺痈（热毒壅肺，血瘀成痈型）。

【加减】 上方治肺痈可酌加连翘、蒲公英、败酱草、紫花地丁等清热解毒药；热盛烦躁，咯痰黄稠、恶臭，可加黄连、山栀、桑白皮、地骨皮、海蛤壳、淡竹沥、胆南星以清热化痰；热毒瘀结，痰味腥臭者，合犀黄丸解毒化瘀；咳嗽痰多，胸胀喘满，可加瓜蒌皮、贝母、淡竹沥、葶苈大枣泻肺汤以泻肺涤痰去壅；烦渴者，胃液受损，以知母、天花粉、石斛清热生津；高热伤阴，损入血络见心烦咯吐脓血，可加百合、麦冬、阿胶；胸痛，加全瓜蒌、枳壳、丹参、乳香、没药、赤芍、玄胡、郁金以活血化瘀，理气止痛；大便秘结为瘀热入腑，可加生大黄清热通腑。

【方论选录】 鱼腥草解毒排脓，苇茎（芦根）清肺泄热，为治肺痈之要药；冬瓜仁涤痰排脓；苡仁清热渗湿排脓；桃仁活血祛瘀行滞；双花清热解毒；红藤清热解毒，消痈散结；黄芩清肺中热；桔梗、甘草宣肺祛痰，排脓消痈，善开肺中郁闭，通肺气之壅滞。本方对于热壅血分，瘀热瘀血互结成脓，无论将成及已成者均可服用。

08950 备急丸

【方源】《医心方》卷六引《极要方》。

【组成】 大黄五两 干姜二两 巴豆三两（去心，熬） 芒消三两

【用法】 以蜜为丸。每服四丸，平晓饮下，不利更加一二丸。取得四五度利，利如不止，取醋饮止之。

【主治】 忽然心腹胀满，急痛气绝，大小便不通。

08951 备急丸

【方源】《活人方》卷三。

【组成】 延胡索三钱 木香一钱五分 五灵脂一钱五分 沉香一钱 巴霜七分

【用法】 上为末，蜜为丸，如芥子大。十丸起，五丸止，空心生姜汤吞服。

【主治】 中寒脾弱，复伤生冷，肉食不能腐熟，停滞肠胃，心腹绞结为痛，大便塞结不通，精神素旺者。

08952 备急压气散

【方源】《医方类聚》卷一九七引《医林方》。

【组成】 大槟榔四个 紫苏穗二钱半 生姜 斤（取自然汁）

【用法】 上为细末，分作二服。水煎，和滓温服，一日二次。

【主治】 奔豚气上至，心烦乱，不省人事，上至

心下，从少腹起，上至咽喉，闷绝不能言语。

08953 昏厥复省汤

【方源】《千家妙方》卷上引崔漱六方。

【组成】 玳瑁片3克 珍珠母30克（先下） 辰友冬9克 寒水石30克 蛇含石30克 朱茯神12克 天竺黄9克 陈胆星9克 川雅连2.4克 远志肉4.5克 干菖蒲4.5克 活磁石30克（先下） 白金丸9克（吞服）

【用法】 水煎服，每日一剂。

【功用】 平肝泄热，镇心定惊，佐以豁痰启窍。

【主治】 阴虚阳亢，心肝失养，热郁血分，气火挟痰，上蒙清窍之发作性昏厥。

【临证举例】 发作性昏厥 周某某，男，65岁，职员。患者以往有反复发作性意识丧失伴有尿失禁史。神经内科诊断为发作性昏厥。近两月来昏厥两次，发作时意识丧失，小便自遗，每次约1分钟，自觉胸中痞闷，心悸怔忡，口渴欲饮，心烦少寐，舌红苔薄，脉来细弦带数。恙有痰热内蕴，肝阳上亢，心阴不足，神不守舍之象。投以"昏厥复省汤"7剂后，昏厥头晕未作。后随证加减治疗近两月而停药，随访年余未发。

08954 炙肝散

【方源】 方出《史载之方》卷下，名见《中藏经》卷七。

【异名】 猪肝散(《普济方》卷二〇八)。

【组成】 白术半两 白芍药半两 桔梗一分 白芷半两

【用法】 上为细末。以猪肝四两片切，如食法，入少盐和之，不用油，用药先和一半于铫内，先煨过，次用木炭火上炙干，再傅末作两三次食之，止泄最妙。

【功用】 ①《史载之方》：止泻。②《中藏经》：逐胃中风邪，益脾进食。

【主治】 ①《史载之方》：久泻。②《中藏经》：凡人虚弱，用补药日久，渐至瘦损，食少倦怠，大便频数，泄漏。

08955 炙肝散

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】 石决明（洗） 谷精草（洗）各四两 皂荚（炙，去皮子）一分 甘草（炙，锉）二两 木贼（锉） 黄芩（去黑心）各五两 苍术（米泔浸七日，切，焙）半斤

【用法】 上为散。每用猪猪肝一叶，去筋膜，切数缝，掺药末五钱，分于缝内，仍掺盐一钱合定，用旋斫湿柳枝三四条捆起，慢火炙香熟，早晨空心冷吃尽，续吃冷饭一盏压之。仍于二里穴灸二三七壮，三日后有泪下为验，七日翳膜必退，每日用新水漱口。

【主治】 外障赤肉，翳膜遮障不明。

08956 炙肝散

【方源】《得效》卷五。

【异名】 五矾散(《普济方》卷一六二)。

【组成】 白矾（飞过，研） 五倍子（为末）

【用法】 上为末。每服各一钱，以生猪肝火上炙熟，蘸药，食后临卧服。

【主治】 喘并痰嗽。

08957 炙肝散

【方源】《普济方》卷二〇九。

【组成】 干姜（炮）半两 大附子（炮）半两 缩砂仁半两 肉豆蔻二个 小茴香四钱（炒） 川小椒四两

【用法】 上为末。每服三四钱，用白羊肝三一两，或猪猪肝，或猪羊腰子批开放药在内，盐末二钱，葱白二根，同肝一处，纸裹润湿，烧香熟为度。食前空心服之，细嚼，生姜汤下，或米汤、酒送下。

【主治】 饮食生冷，内受风寒，泄泻无度。

08958 炙甘草汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 复脉汤（原书）、甘草汤(《普济方》卷二十七)。

【组成】 甘草四两（炙） 生姜三两（切） 人参二两 生地黄一斤 桂枝三两（去皮） 阿胶二两 麦门冬半升（去心） 麻仁半升 大枣三十枚（擘）

【用法】 上以清酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去滓，纳胶烊消尽，温服一升，一日三次。

【功用】《医方集解》：补气血而复脉通心。

【主治】 气阴两虚，心悸，脉结代；肺痿，心中温温液液者。现常用于病毒性心肌炎，风湿性心脏病，心律失常等病证。

①《伤寒论》：伤寒脉结代，心动悸。②《千金翼》虚劳不足，汗出而闷，脉结心悸，行动如常。③《外台》：肺痿涎唾多，心中温温液液者。

【方论选录】 ①《医方考》：心动悸者，动而不自安也，亦由真气内虚所致。补虚可以去弱，故用人参、甘草、大枣；温可以生阳，故用生姜、桂枝；润可以滋阴，故用阿胶、麻仁；而生地、麦冬者，又所以清心而宁悸也。②《医方集解》：此手足太阴药也。人参、麦冬、甘草、大枣益中气而复脉；生地、阿胶助营血而宁心；麻仁润滑以缓脾

胃；姜、桂辛温以散余邪；加清酒以助药力也。③《古方选注》：人参、麻仁之甘以润脾津；生地、阿胶之咸苦，以滋肝液；重用地、冬浊味，恐其不能上升，故君以炙甘草之气厚、桂枝之轻扬，载引地、冬上承肺燥，佐以清酒芳香入血，引领地、冬归心复脉；仍使以姜、枣和营卫，则津液悉上供于心肺矣。脉络之病，取重心经，故又名复脉。④《血证论》：此方为补血之大剂。姜、枣、参、草中焦取汁，桂枝入心化气，变化而赤；然桂性辛烈能伤血，故重使生地、麦冬、芝麻以清润之，使桂枝雄烈之气变为柔和，生血而不伤血；又得阿胶潜伏血脉，使输于血海，下藏于肝。合观此方，生血之源，导血之流，真补血之第一方，未可轻议加减也。⑤《成方便读》：方中生地、阿胶、麦冬补心之阴；人参、甘草益心之阳；桂枝、生姜、清酒以散外来寒邪；麻仁、大枣以润内腑之枯槁。

【临证举例】 ①心悸 《经方实验录》：律师姚建尝来请诊，眠食无恙，按其脉结代，约十余至一停，或二三十至一停不等，又以事繁，心常跳跃不宁。服炙甘草汤十余剂而愈。②风湿性心脏病《江苏中医》（1959；1:14）：患者女性，35岁。有风湿性心脏病史6年。近2月突然头晕掉眩，心悸、心率150次/分，脉结代，苔薄白。证属营血亏滞，心无所养。与炙甘草汤21剂后病势渐缓，心悸平，食欲大振。③病毒性心肌炎 《江苏中医杂志》（1984；1:25）：用炙甘草汤随证加味，邪盛加黄芩、蒲公英、大青叶；阴虚重者加龟板、黄精；心神不宁加炒枣仁、珍珠母治疗病毒性心肌炎38例，其中男性26例，女性12例。年龄4～64岁（5～15岁占73.7%）。治疗结果：痊愈30例，有效4例，无效2例（系Ⅲ°房性传导阻滞）。总有效率为89.5%。④室性早搏 《广西中医药》（1984:4，27）：用炙甘草汤加减治疗室性早搏40例，取得较好疗效。其中各类器质性心脏病10例，心肌炎后遗症5例，原因不明者25例。临床表现为胸闷，心前区隐痛，心悸，气短，头晕及脉结代等症为主。经服本方加减20～80剂，早搏消失31例，早搏减少7例，无效2例。⑤崩漏 《浙江中医杂志》（1985；10:463）：刘某某，46岁，近一年月经不调，经常出血不止。此次来经20余天，色淡红质稀，伴眩晕、体倦，腰酸，舌淡胖苔少而润，脉细软。以炙甘草汤加减，药用炙甘草30克，党参15克，阿胶、炒白术、麦冬、熟地各10克、桂枝9克，干姜6克，大枣10枚，七剂后血止。

【现代研究】 抗心肌缺血缺氧及心律失常作用《全国第一届心血管药理学专业学术会议论文摘要汇编》：炙甘草汤对垂体后叶素所致大鼠的实验性心肌缺血及心律失常具有显著的抑制作用，能使心电图ST段抬高发生率减少，不出现T波振幅增高及心律失常现象，提示本方对垂体后叶素所致大鼠的急性心肌缺血有一定保护作用。炙甘草汤还能提高小白鼠心室肌3H-TDR的掺入率，延长小白鼠减压缺氧窒息死亡时间，当对照组仅有5.9%存活时，给以炙甘草汤者存活率达76.5%。此外，本方在体外尚能抑制心脏功能，能使心率减慢、心收缩力减弱，冠状动脉血流量减少。

【备考】 ①《千金翼》本方用法：上㕮咀。以水一斗，煮取六升，去滓，分六服，日三夜三。若脉未复，隔日又服一剂，力弱者三日一剂，乃至五剂十剂。以脉复为度，宜取汗。②方中麻仁，《伤寒来苏集》作“枣仁”。《血证论》作“芝麻”。

08959 炙粉草膏

【方源】 《外科正宗》卷九。

【异名】 大粉草膏（《疡医大全》卷二十三）、炙粉甘草膏（《寿世新编》卷中）。

【组成】 大粉草（用长流水浸透，炭火上焙干，再浸再炙，如此三度，切片）三两 当归身三两

【用法】 上用水三碗，慢火煎至稠膏，去滓再煎，稠厚为度。每日三钱，无灰好热酒一大杯化膏，空心服之。未成者即消，已成者即溃，既溃者即敛。

【主治】 悬痈已成服药不得内消者。

08960 周先生枯痔法

【方源】 《准绳·杂病》卷六。

【异名】 枯痔散（《外科十三方考》）。

【组成】 明矾 赤石脂五钱 辰砂（痛加）一钱 黄丹

【用法】 上为末。先用郁金末护肛门，如无郁金，用姜黄末代之，调涂四周好肉，如不就，加绿豆粉打合，却将枯药敷上，如肛门疼急，浓煎甘草汤放温，拂四周肛门上，就与宽肠药：槐花、大黄、枳壳、木通、连翘、瞿麦、当归，半酒半水煎。枯药早晨上一次，日午一次，洗去旧药，申时又洗去又上一次。如要急安，至夜半子时又洗上一次。至次日且看痔头淡淡黑色，两三日如乌梅，四五日内用竹篦子轻轻敲打痔头，见如石坚，至七八日便住，更不须上枯药。且待自然如萝卜根乃脱去也。洗用甘草、荆芥、槐花，洗去旧药，方上新药。

【主治】 痔。

【备考】 方中明矾、黄丹用量原缺。

08961 周先生割痔麻药

【方源】《济阳纲目》卷九十五。

【组成】 川乌 草乌尖 胡椒 花椒 吴茱萸 白僵蚕（炒）

【用法】 上为细末。酒调敷四边。然后割之，又以此药敷之。

【功用】 割痔麻醉。

【主治】 痔疮。

08962 刻欢丸

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】 过街笑（原书同卷）、刻欢丹（《玉钥》卷上）。

【组成】 蟾酥一钱（酒化透） 五灵脂 麝香各一钱

【用法】 上为末，研和为丸，约二百粒，新绸包好，丝线扎，固藏，勿泄香气。每服一丸咬于痛牙，丸化即愈。

【主治】 风火牙痛。

08963 京三棱丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】 京三棱三分（微煨，锉） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕） 川大黄一两半（锉碎，微炒） 木香半两 当归三分（锉，微炒） 白术三分 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 诃黎勒一两（煨，用皮） 枳壳一两（麸炒微黄） 麦芽一两（炒微黄） 神曲一两（锉，微炒） 桂心一两 槟榔一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 久痃癖气，心腹胀满，时时筑心背痛，宿食不消，呕逆，不思饮食；休息气痢，喘促黄瘦，面目虚肿。

08964 京三棱丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】 京三棱（微煨，锉） 木香 肉豆蔻（去壳） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 干姜（炮裂，锉） 青橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 蓬莪术各一两 巴豆半两（去皮心，水煮，复时研，纸压去油）

【用法】 上为末，入巴豆，研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，空心以生姜、橘皮汤送下。

【主治】 痃癖气，心腹胀满，不欲饮食。

08965 京三棱丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】 京三棱一两 槟榔一两 当归一两（锉，微炒） 川大黄一两（锉碎，微炒） 鳖甲半两（涂醋炙令黄，去裙襕）

【用法】 上为末，醋煮面糊和丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜、橘皮汤送下，不拘时候。

【主治】 食癥，疼痛至甚。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“黑三棱丸”。

08966 京三棱丸

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】 京三棱（炮，锉） 诃黎勒（煨，去核） 木瓜（焙） 鳖甲（醋炙，去裙襕） 玳瑁（镑）各三分 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 枳实（去瓤，麸炒） 干姜（炮） 白术 昆布（汤浸，去碱，焙） 赤茯苓（去黑皮） 木香各半两

【用法】 上为末，陈曲糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煨生姜、木瓜盐汤送下。

【主治】 膈气噎塞，脾胃虚冷，瘦劣，不下食。

08967 京三棱汤

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】 京三棱（炮，锉）一两 青橘皮（去白，焙）半两 桂（去粗皮）一分 大黄（锉碎，炒）半两 木香一分 槟榔（锉）半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓温服，空腹、日午、夜卧各一次。

【主治】 积年癥块。

08968 京三棱鳖甲丸

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】 京三棱（炮，锉） 鳖甲（去裙襕，醋炙） 黄耆（锉，焙） 白术各一两半 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙熟）二两 干姜（炮） 诃黎勒皮 吴茱萸（汤浸，焙炒） 枳壳（去瓤，麸炒） 橘皮（汤去白，焙干） 桔梗（炒） 麦芽（炒） 陈曲 干地黄 桂（去粗皮） 槟榔（锉） 木香 当归（切，焙） 甘草（炙，锉） 人参 白茯苓（去黑皮）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心米饮送下，加至四十丸；温酒下亦得。

【主治】 脾胃久冷，心腹胀满，宿食不消，时作呕逆，日渐羸瘦，兼癖瘕气块等疾。

08969 夜光丸

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【异名】 双美丸（《普济方》卷八十一引《医方集

成》)。

【组成】 蜀椒（去目并闭口，炒出汗）一斤半（捣罗取末一斤） 甘菊花（末）一斤

【用法】 上二味，和匀，取肥地黄十五斤，切，捣研，绞取汁八九斗许，将前药末拌浸令匀，晒稍干，入盘中摊，晒三四日内取干，候得所即止，勿令太燥，入炼蜜二斤，同捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、日午熟水送下。

【功用】 ①《圣济总录》：久服目能夜视，发白再黑，通神强志，延年益寿。②《普济方》：退翳膜。

【主治】 ①《圣济总录》：眼目昏暗。②《良朋汇集》：眼目昏暗，羞明怕日，不敢见灯火者。

08970 夜光丸

【方源】《瑞竹堂方》卷三。

【异名】 石斛夜光丸(《原机启微》卷二)。

【组成】 天门冬（去心，焙） 麦门冬（去心，焙） 生地黄（怀州道地） 熟地黄（怀州道地） 新罗参（去芦） 白茯苓（去黑皮） 干山药各一两 枸杞子（拣净） 牛膝（酒浸，另捣） 金钗石斛（酒浸，焙干，另捣） 草决明（炒） 杏仁（去皮尖、炒） 甘菊（拣净） 菟丝子（酒浸、焙干、另捣） 羚羊角（镑）各七钱半 肉苁蓉（酒浸，焙干，另捣） 五味子（炒） 防风（去芦） 甘草（炙赤色，锉） 沙苑蒺藜（炒） 黄连（去须） 枳壳（去瓤，麸炒） 川芎 生乌犀（镑） 青葙子各半两

【用法】 上除另捣外，为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心温酒送下；盐汤亦可。

【功用】 降心火，益肾，明目，除障。

【主治】 肾虚血弱，风毒上攻眼目，视物昏花不明，久而渐变内障。

08971 夜光丸

【方源】《经验秘方》引周祥卿方（见《医方类聚》卷七十）。

【组成】 天门冬（去心，火焙） 麦门冬（去心，焙） 熟地黄 生地黄（怀者佳） 新罗参（去须） 白茯苓（去皮） 干山药各二两 枸杞子（拣净） 金钗石斛（酒浸） 牛膝（酒浸） 甘菊花 草决明（炒） 羚羊角（镑，另捣）各一两半 肉苁蓉（酒浸） 五味子 白蒺藜（炒去刺） 防风（去芦） 甘草 黄连 枳壳（去瓤，麸炒） 川芎 生犀角（另捣） 青葙子各一两 菟丝子一两半（酒浸） 谷精草一两 当归三两 密蒙花一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤或温酒送下。

【功用】 降心火，益肾水，除昏退翳，可认细字。

【主治】 男子肾虚血弱，风毒上攻眼目，视物昏花不明，久而渐成内障。

08972 夜灵散

【方源】《医级》卷八。

【组成】 石决明（取九孔者，水煮一伏时用） 夜明砂（淘净，另研）各等分

【用法】 上为末。每服三钱，猪肝二两，竹刀批开，入药于内，用线扎好，水煮一二时。临卧连药及汁嚼服。服七日愈。

【主治】 目风内障，肝肺热深，至夜昏暗。

08973 夜明丸

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 夜明砂 木贼 防风 田螺壳 青木香 细辛各等分

【用法】 上为末，烂煮猪肝，用末药于净沙盆内研，令极匀，为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮或酒送下。

【主治】 雀目，青盲。

08974 夜明散

【方源】《医方类聚》卷七十引《施园端效方》。

【组成】 谷精草 甘草 夜明砂 青蛤粉 苍术 各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，猪肝二两，批开，掺药在内，麻扎定，米泔煮，熏眼；至熟，分三五次细嚼肝汤下。日均一剂。

【主治】 雀目久昏。

08975 夜清汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】 人参 麦冬各一两 甘草一钱 柏子仁 菟丝子各三钱 玄参 炒枣仁各五钱 黄连三分

【用法】 水煎服。

【主治】 入有夜不能寐，口中无津，舌上干燥，或开裂纹，或生疮点。

08976 夜明砂散

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】 石决明 夜明砂

【用法】 上为末，掺入猪肝内，扎紧，入砂锅，米泔煮吃。

【主治】 雀目。

08977 夜光柳红丸

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 人参 川芎 荆芥 白芷 川乌（火煨） 南星 石膏各二两 石决明 草乌（去火温炮，少用） 藁本 雄黄 细辛 当归 蒲黄 苍术（浸炒） 防风 薄荷 藿香 全蝎各二两 何首乌一两 羌活三两 甘松二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三十丸，茶清送下。

【主治】 风邪伤胞睑，致风牵出睑不收。

【备考】 本方制成散剂，名“夜光柳红散”（见《审视瑶函》）。

08978 夜光椒红丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 川椒（去白）二两 生地黄 熟地黄各四两 枸杞子四两 牡丹皮三两 麦门冬四两

【用法】 炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，温酒、盐汤任下。

【主治】 火衰，阴血亏而真火离散，目无精光，至夜昏甚。

08979 夜光椒红丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 椒红四两 巴戟肉二两 金铃子肉 熟附子 茴香各一两

【用法】 另研干山药末二两，酒煮为丸，如梧桐子大。每服30丸，空心盐汤送下。

【主治】 阳精伤而真火无光，目无精光，至夜昏甚。

08980 夜明八味汤

【方源】《千家妙方》引齐强方。

【组成】 熟地12克 丹皮9克 云苓12克 山药9克 泽泻6克 黄肉9克 肉桂3克 附子1.5克 夜明砂15克 苍术12克

【用法】 水煎服。每日一剂。

【功用】 温肾壮阳。

【主治】 命门火衰，肾阳虚惫之视网膜色素变性。

【临证举例】 视网膜色素变性：梁某某，女，24岁，汽车厂工人。近一年多来视力减退，经本厂医院治疗无效，于1973年7月16日介绍来诊求治。检查：视力右眼0.9，左眼0.7，外眼无异常。眼底：双眼视神经乳头色蜡黄，网膜有散在的褐色素斑点、斑块，视野缩小。全身情况尚好，脉弦细，舌质淡，苔薄。临床诊断为视网膜色素变性（双）。治疗用“夜明八味汤”加减，共投32剂，症状得除，眼底网膜较前改善。为巩固其效果，又投桂附地黄丸50丸，早、午、晚各服1丸。再次来诊检查，见眼底较前又有改善，追踪三年，已婚生育二胎，且未见复发。

08981 育阴煎

【方源】《疫痧草》。

【组成】 鲜沙参 玄参 麦冬 原地 丹皮 土贝 元武版 犀角 鳖甲 知母 花粉 金汁

【主治】 痧透肌燥，舌绛液干，喉烂便闭，脉弦无神。

08982 育肠丸

【方源】《局方》卷六（宝庆新增方）。

【组成】 乌梅肉 黄连（去须）各一分 诃子皮 罂粟壳（去盖筋，蜜炙） 肉豆蔻（包湿纸裹，煨）各半两 当归（去芦，酒浸一宿焙）一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心、食前饭饮送下。如小儿，作小丸，煎甘草、干姜汤送下。

【功用】《普济方》：实肠胃，进饮食。

【主治】 肠胃虚弱，内挟生冷，腹胀泄泻，时时刺痛，里急后重，下痢赤白，或变脓血，昼夜频并，经久不愈。

08983 育龟丸

【方源】《本经逢原》卷四。

【组成】 石龙子 蛤蚧 生犀角 生附子 草乌头 乳香 没药 血竭 细辛 黑芝麻 五倍子 阳起石等分

【用法】 上为末，生鳝鱼血为丸，朱砂为衣。每服一百丸，空心酒送下。

【主治】 壮年阳道不长。

08984 育金煎

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 沙参三钱 石斛三钱 茯苓三钱 白术一钱五分 山药三钱 料豆三钱 当归二钱 橘红一钱 莲子二十粒（打碎，去心）

【主治】 肺热移于大肠，口燥微咳，下利白滞。

08985 育神散

【方源】《简易方》引《叶氏录验方》（见《医方类聚》卷九十三）。

【组成】 人参（去芦） 白术 白茯苓（去皮） 甘草 当归（酒浸） 干姜（炮） 白茯神（去木） 防风 龙骨（别研如粉，临时入） 远志（去心） 紫菀茸 赤石脂（别研细，临时入） 桂心（去皮） 红芍药各等分

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一枚，煎七分，食后服。

【主治】 心气不宁，怔忡健忘，夜梦惊恐，小便

白浊。虚弱多惊，神色昏愦，言语无节，有类癫邪，心志不定，饮食无味。

08986 育真丹

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】 代赭石 左顾牡蛎（去两头，取中间者用） 紫石英 赤石脂各四两

上药并为细末，米醋和成剂，匀分为六铤，入在甘锅子内烧通赤，半时辰取出，放冷，再捣为细末，次入：

乳香二两（别研） 茴香（微炒）二两 五灵脂（去砂石）二两 干姜二两（炮）

【用法】 上药乳香以下四味为细末，与前四味末和匀，醋煮糯米糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前、空心煎茴香酒送下。

【主治】 妇人三十六疾，下脏久虚，沉寒痼冷，带下五色，变易不定，渐觉瘦弱。

08987 育魂丹

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】 胆星六钱 半夏（制）六钱 茯神六钱 黄连（炒）六钱 远志（水泡）六钱 白术（炒）六钱 枣仁（炒）六钱 柏子仁（炒）六钱 干山药一两 竹茹五钱 白附（煨）五钱 天麻（酒洗）五钱 陈皮三钱 全蝎三钱二分 川芎五钱 犀角（镑）三钱五分 枳实（炒）一钱 辰砂二钱二分 牛黄二钱二分 羚羊角三钱五分 白矾（生用）三钱 麝香一钱 飞金二十四贴

【用法】 上为细末，竹沥打甘草膏为丸，如芡实大。空心淡姜汤送下，或用薄荷汤调下。

【主治】 ①《古今医鉴》：一切惊痫、癫邪等证。②《东医宝鉴·内景篇》：怔忡惊怕恐惧之疾。

08988 育血1号

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 茅根 紫草 天花粉 乌梅 甘草 藕节 丹皮 白芍 玄参 生地

【功用】 凉血清营，滋阴降火。

【主治】 紫癜，属阴虚血热者。

08989 育血2号

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 黄耆 山药 黄精 当归 阿胶 白芍 牡蛎 五味子 鸡内金 甘草

【功用】 益气摄血。

【主治】 紫癜，属脾虚血弱者。

08990 育阴退翳汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 酒生地9克 当归6克 蝉蜕3克 密蒙花6克 木贼3克 车前子6克 元参9克

【功用】 清热育阴，明目退翳。

【主治】 冰瑕翳。青睛生翳，隐隐微现，如冰上之瑕。患病时间尚短，翳现浮嫩，微感涩痛羞明者。

【方论选录】 方中酒生地、当归补养肝血；元参、酒生地滋补肾阴，二味皆有育阴清热之效；蝉蜕、密蒙花、木贼退翳明目，密蒙花且能清热养阴；车前子养肝明目，利水道以除热邪，固精窍以养肾阴。诸药合用，具有育阴清热，明目退翳之功。

08991 育脾固肾地黄丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十一。

【组成】 熟地黄八两（姜酒煨，捣烂入药） 山茱萸（去核）五两（酒拌蒸，晒干，炒） 白茯苓四两（焙） 怀山药六两（炒黄） 泽泻三两（淡盐酒拌，晒干，炒） 五味子二两 补骨脂四两（盐酒浸一宿，炒香） 菟丝子（酒洗晒干，炒，另研净末）六两（即入药丸，勿令出气）

【用法】 上为末，用熟地捣烂入药，如干，加饴糖浆，为丸。每早米饮汤送下四钱，临晚食前白汤送下三钱。

【主治】 肾虚晨泻。

【宜忌】 戒酒面，以杜湿热。

08992 变水汤

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】 白术 茯苓 泽泻各二两 郁李仁二钱

【用法】 水煎，入姜汁服。

【主治】 肿胀。

08993 变通十味温胆汤

【方源】《中医治法与方剂》。

【组成】 橘络9克 茯神12克 半夏12克 甘草3克 枳实6克 生地15克 枣仁15克 生远志6克 石菖蒲6克 竹沥三匙（冲）

【用法】 水煎服。

【主治】 精神痴呆证，忽悲忽喜，哭笑无常，惊悸失眠，神志痴呆。

08994 疟母丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷二，名见《医学纲目》卷六。

【组成】 青皮 桃仁 红花 神曲 麦芽 鳖甲（醋煮） 三棱 蓬术 海粉 香附（并用醋煮）

【用法】 上为末，为丸如梧桐子大。每服五七十丸，白汤送下。

【主治】 疟母。

【方论选录】《医略六书》：疟因痰食，久则气衰，不能统运营气，故癖结胁下为疟母焉。鳖甲滋阴散结，海粉泻热软坚，桃仁、红花破血活血，三棱、蓬术削癖消坚，青皮、香附理气破结，神曲、麦芽消积化滞；不用痰药者，食化气行，则津液流通，而痰无不化矣。丸以曲糊，下以参汤，总是鼓运诸药之力以奏续也，此化积消坚之剂，为疟久癖结之专方。

【备考】《医略六书》本方用法：人参汤送下三钱。

08995　疟母丸

【方源】《准绳·幼科》卷九。

【组成】鳖甲（醋炙）二两　三棱　蓬莪术（各醋浸透，煨）各一两

【用法】上为细末，神曲糊丸，如绿豆大。每服二十丸，白汤送下。癖消一半即止。

【主治】疟母结癖，寒热无已。

08996　疟疾神效方

【方源】《便览》卷二。

【组成】常山　厚朴　半夏　茯苓　草果　槟榔　陈皮　甘草少许

【用法】水二钟，加生姜三片煎，露一宿。发日五更服。

【主治】疟疾。

【加减】渴，加乌梅一个；久者，加僵蚕七个。

08997　疝灵散

【方源】《回生集》卷上。

【组成】龙眼核　荔枝核（二味先捣碎，焙）小茴香各等分（焙）

【用法】上为细末。每服一钱，空心用升麻煮酒调下，重者二服。

【主治】偏坠七疝，肾囊肿大，疼连小腹，不能自忍。

08998　怔忡汤

【方源】《观聚方要补》卷五引《百代医宗》。

【组成】川芎　黄连　生地各八分　茯神　白芍　熟地　当归各一钱　朱砂六分　甘草三分

【用法】水煎服。

【主治】虚烦不眠，惊悸怔忡，健忘。

08999　怔忡酒

【方源】《增订医方易简》卷六。

【组成】麦冬（去心）二两　白茯苓一两　柏子仁（去油）一两　归身一两　生地一两五分　龙眼肉二两

【用法】上药盛绢袋中，用无灰酒十斤，坛内浸三日，连坛煮亦可。

【主治】虚劳怔忡。

09000　炒栀散

【方源】《内经拾遗方论》卷一。

【组成】炒山栀（炒黑）

【用法】上为细末。每服二钱，白滚水调下。

【主治】汗血。

09001　炉峰散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】炉甘石（绿者，十分细）一两　大南星　半夏（生）各半两　五倍子　赤小豆　片姜黄　直僵蚕　贝母　白及各四钱　乳香二钱半

【用法】上为细末。未破者酸醋调敷；已溃者，清蜜调敷；半干湿只掺；若红肿多汁，生地黄研汁调敷，仍煎苦参、桑白皮汤淋。

【主治】痈疽肿毒。

09002　炉消散

【方源】《中药制剂汇编》卷六。

【组成】羌活七两二钱　黄芩七两二钱　菊花七两二钱　蔓京七两二钱　川芎四两八钱　白芷四两八钱

【用法】上药用纱布包煎，混合两次滤液，浓缩成稠状；另以炉甘石十二两、火消一两九钱二分、冰片二钱四分分别研细，再混入煎剂内调匀即得。每次挑药如米粒大小，涂于胬肉或睑球粘着之患处，闭目半小时即可洗去，一日一、二次。

【功用】破血散瘀。

【主治】睑球粘着，翼状胬肉。

【宜忌】不要涂在黑眼珠上。

09003　炉甘石散

【方源】方出《直指》卷二十四，名见《普济方》卷三〇一。

【组成】绿色炉甘石一分　真蚌粉半分

【用法】上为细末。扑敷。

【主治】阴汗湿痒。

09004　炉甘石散

【方源】《医学纲目》卷十三。

【组成】炉甘石不拘多少（先用童便煅七次，次用黄连浓煎汁煅七次，次用谷雨前茶浓煎煅七次，又并三汁余者一次，再煅三次，然后安放地上一宿，出火气）

【用法】上为极细末，入冰片、麝香，点上。

【主治】烂风眼。

【备考】炉甘石煅时，须用好紫霄炭极大者凿一穴，以安炉甘石。

09005 炉甘石散

【方源】《保命歌括》卷十六。

【组成】 炉甘石（绿色者，煅）一两 真蛤粉 黄连 五倍子各半两

【用法】 上为末。先以蜂房、大腹皮并汤温洗，后拭干上药。

【主治】 阴汗，湿汗及阴茎、阴囊溃烂。

09006 炉甘石干眼药

【方源】《永乐大典》卷一千四一二引《经验普济加减方》。

【组成】 炉甘石（烧三次，红取为末）一两 青盐三钱 黄丹二钱 硇砂一钱 铜绿一钱半 胆矾一钱 轻粉半钱 蕤仁（去皮，取仁研）一钱半 白矾三钱

【用法】 上为末。每点三两箸。

【主治】 诸病眼，翳膜昏痛。

09007 净容散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 川山甲（炒）十片 生姜 野大黄各四两（捣汁） 川椒（去目）五钱

【用法】 上为末，和一处，用生绢包。擦患处；如干，醋湿之。擦三四次，其效如神。

【主治】 满面紫块如钱大者。

09008 泄水丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】 大智丸(《医学纲目》卷三十)。

【组成】 大戟 芫花 甘遂 海带 海藻 郁李仁 续随子各半两 樟柳根一两

【用法】 上为细末，水煮枣肉为丸，如小豆大。每服五七十丸，水送下。

【主治】 ①《儒门事亲》：疝，因饮水坐湿地，湿气下行，流入脬囊所致，大肿痛不可忍。腹中满痛，里壅之实证；水肿。②《医学纲目》：下疳疮。男子耻疮，或痛在茎之窍，或痛在茎之标。皆手足太阳不利，热毒下传，入手足厥阴，故变紫黑色，毁其茎而死。

09009 泄泻经验方

【方源】《景岳全书》卷五十七。

【组成】 糯米一升（水浸一宿，沥干，慢火炒，令极熟） 怀山药一两（炒）

【用法】 上为细末。和匀。每日清晨用半盏，入白糖二匙，川椒末少许，将极滚汤调食。

【功用】 滋补。

【主治】 泄泻，饮食少进。

【备考】 久服之，其有精寒不孕者，亦孕之。

09010 河车丸

【方源】《妇人良方》卷五。

【组成】 河车一枚（初生男子者尤良。于长流水中荡洗尽血，净入锅内熟煮，以手擘成小片，焙干，须在一日内便碾成末） 雪白茯苓半两 拣参一两 干山药二两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大，以少麝香末为衣。每服三、五十丸，米饮、温酒、盐汤送下，空心服；嗽甚者，五味子汤送下。

【主治】 劳嗽，一切劳瘵，虚损，骨蒸等疾。

09011 河车丸

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】 紫河车不拘几个（焙极干）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，梧桐子大。每七十丸，空心酒送下。

【主治】 久患心风癫，气血两虚之症。

09012 河车丸

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 紫河车一具 茯苓 茯神 远志各一两 人参五钱 丹参七钱

【用法】 炼蜜为丸。每早开水送下三钱。

【主治】 癫、狂、痫。

09013 河车丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】 人中白 河车 秋石 五味 人参 乳粉 阿胶 鳖甲 地骨皮 银柴胡 百部 青蒿

【用法】 童便、陈酒熬膏为丸。

【主治】 虚损劳瘵，骨蒸劳热，必兼肌瘦，舌红颊赤。

09014 河车丸

【方源】《河南中医》(1981；2:38)。

【组成】 紫河车一个 蛤蚧一对 黄耆 40 克 白术 30 克 川贝 20 克 甘草 10 克

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸重 3 克。每天早晚各服一丸。六岁以下减半。

【主治】 虚寒型小儿慢性支气管哮喘。体质较差，正气虚弱，易感风寒。

【宜忌】 避风寒。忌食腥荤、油腻食物。

【加减】 本方补药偏多，若有发热的表症，可先解除表症；若肺有实热，可配合桑皮、黄芩、石膏适量，水煎冲药丸服；若食欲欠佳，可配以麦芽、山楂、神曲，水煎服，或药量减半服。

09015 河车八味丸

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】 紫河车一具（头生男者，用白矾煎汤揉

洗极净，用姜汁同酒煮烂） 大地黄三两（姜汁、砂仁同酒煮烂） 净枣皮一两（炒干） 粉丹皮五钱（酒炒） 宣泽泻五钱（盐水炒干） 嫩鹿茸二两（切片，炒干） 白云苓一两五钱（乳汁蒸，晒） 怀山药五两五钱（酒炒） 川熟附（切，焙干燥） 青化桂七钱五分（去粗皮，研） 北五味二两（去梗，炒干） 大麦冬一两（去心，糯米拌炒）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如龙眼核大。每早一丸，用淡盐汤化服，以饮食正之；午及临卧，各用定痫丸一服。

【主治】 小儿痫症，年深日远，肝肾已亏，脾肺不足，心血耗散，证候不时举发。

09016 河车大造丸

【方源】《活人方》卷三。

【组成】 紫河车二具 熟地黄八两 人参四两 白术四两 当归四两 枸杞四两 茯苓四两 芍药四两 黄耆三两 川芎三两 杜仲三两 牛膝三两 山药三两 肉桂三两 甘草三两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。每服三五钱，空心白汤吞服。

【主治】 先天不足，精气本虚，强力入房，恣欲无度，精枯气遗，头目眩晕，皮寒骨热，肢体羸弱，神枯色萎，非此不治；兼起病后，精虚血弱；妇人多产，老年虚弱，月经不调，赤白带下。

【加减】 妇人虚脱，淋带不止，加鹿角霜三两。

09017 河车地黄丸

【方源】《寿世保元》卷四。

【异名】 河车六味丸（《张氏医通》卷十六。）

【组成】 怀生地（先将酒洗令净，再入酒拌匀，粗碗盛，坐放砂锅内，重汤蒸半日，取出加酒，再蒸至极黑为度，再入生姜汁拌匀，慢火焙干）八两 山茱萸（酒蒸，去核取肉）四两 怀山药四两 白茯苓（去皮筋膜，乳汁浸晒三次） 牡丹皮（去骨） 泽泻各三两

【用法】 上为极细末，用头生胞衣一具，男用男胎，女用女胎，长流水洗净，瓷碗盛放砂锅内，用文武火蒸一日，极烂，入臼内杵如泥，入药，再杵千余下为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心白汤送下；肾水不能摄养脾土，多吐痰唾，姜汤送下。或用斑龙胶酒化开为丸尤妙。

【主治】 中少之人，禀赋薄弱，不能谨慎，斫丧太过，以致肾水枯竭，相火妄动，而成阴虚火动之症。浑身发热，咳嗽吐痰，喘急上壅，夜多盗汗，五心烦热，日轻夜重，吐血衄血，尿血便血，咯血唾血，肺痈肺痿，咽疮声哑，口干发渴，耳鸣眼黑，头眩昏沉，盗胀肿满，小便淋沥，夜梦遗精，足膝酸软，肌肉消瘦，四肢困倦，饮食少思，血虚发热。

【宜忌】 忌铁器。

【加减】 如病人大便干燥，口干作渴，此相火太旺，加黄柏（酒炒）、知母（酒炒）、麦门冬（去心）、五味子各一两，同丸服。

09018 河车补阴丸

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】 紫河车一具（用热米泔水洗净，然后用麝香汤洗，用针挑去筋内红血水，漂数次者佳） 川黄柏二两（盐酒拌，晒干，炒褐色） 知母（盐酒炒）一两 人参 龟版一两（酥炙，去裙） 熟地黄四两（酒浸） 枸杞子二两 牡丹皮 茯苓各一两 泽泻 五味子 青盐各五钱

【用法】 上为细末，山药糊丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心白汤送下。

【主治】 酒色过度，血气俱虚，肾脏羸惫，虚火上炎，咯血，咳痰多嗽，盗汗，劳热，渐成骨蒸。

09019 河车封髓丹

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】 天门冬 熟地黄 人参 河车一具

【主治】 肾痹。腰痛遗精，小便时时变色，足挛不能伸，骨痿不能起，因房劳精竭者。

【备考】 方中前三味用量原缺。

09020 河车种子丸

【方源】《医学正印》卷上。

【组成】 当归（酒洗）二两 山茱萸（去核）四两 补骨脂（盐酒浸，炒）三两 天门冬（去心）二两 麦门冬（去心）三两 生地（酒洗）三两 人参二两 枸杞子（真甘州者佳）三两 菟丝子（酒煮，炒）四两 熟地（如法制，捣烂）三两 山药三两 覆盆子（酒蒸）三两 五味子一两 巴戟（去心，酒浸）二两 川牛膝（盐酒炒）二两 川黄柏（盐酒蜜三制，炒）一两五钱 白茯苓二两 锁阳（酒洗，酥炙）二两 白术（土炒）二两 陈皮一两 杜仲（去皮，盐酒炒去丝）二两五钱 肉桂（童便制）五钱

【用法】 上为末。紫河车一具（头生男子者，须不生疮疾洁净妇人者佳），水洗净，挑去筋膜，挤去紫血，用米泔漂数次，仍以酒洗过，盛瓷瓶内，入酒一小杯，封口，重汤煮烂捣如泥，入前药末共捣，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心温酒或盐汤送下。服之举子，屡有成效。

【主治】 男子气血两虚，阳衰精薄者。

09021 河车种玉丸

【方源】《景岳全书》卷六十一。

【组成】紫河车一具（只要母气壮盛，厚大新鲜者，但去胞内瘀血，不必挑去鲜红血脉，以米泔水洗净，用布绞干，石臼内生杵如糊，用山药末四五两收干，捻为薄饼八九个，于砂锅内焙干，以香如肉脯为妙） 大熟地（酒洗，烘干）八两 枸杞（烘干）五两 白茯苓（人乳拌、晒三次） 归身（酒洗） 人参 菟丝（制） 阿胶（炒珠）各四两 丹皮（酒洗） 白薇（酒洗）各二两 沉香一两 桂心 山茱萸 香附米（用酒、醋、水三件各半碗，浸三日，晒干略烘）各三两 大川芎（酒浸，切片，晒干）二两

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百余丸，空心或酒、或白汤、盐汤任下。

【功用】令人孕育。

【宜忌】服药后忌生萝卜、生藕、葱、蒜、绿豆粉之类。

【加减】如带浊多者，加赤白石脂各二两，须以清米泔飞过用。

09022 河车大造育麟丸

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】熟地四两（九蒸九晒） 紫河车一具（头胎肥大者，洗净蒸烂） 山药（炒） 白术（土炒）各一两五钱 茯神 茯苓 人参 枣仁（去壳，炒，研） 麦冬（去心） 阿胶（蛤粉炒成珠） 续断肉（酒蒸） 杜仲（盐水炒断丝） 沙参 黄耆（蜜炙） 神曲（炒） 建莲肉（炒） 条芩（酒炒） 白芍药（酒炒） 丹皮各一两 当归身一两五钱（酒洗） 五味三钱（炒，研）

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三钱，早、晚秋石或桂元汤任下。

【主治】妇人血气不足，苦于小产，或生而难育，或产下草迷而死。皆气血虚而胎不旺也。

【加减】如血不热，去条芩、丹皮，加肉桂三五钱亦可。

09023 油麻酒

【方源】《普济方》卷九十二。

【组成】胡麻（炒，捣）一斤

【用法】上为粗末，生绢袋贮，取酒一斗五升，浸七日。每服三合，稍稍服之。加至四五合，以愈为度。

【主治】中风，口面㖞斜。

09024 油煎散

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【异名】大效油煎散（《妇人良方》卷五）。

【组成】乌头（炮裂，去皮脐） 五加皮（锉） 芍药 牡丹皮 芎劳 海桐皮各一两（锉） 桂（去粗皮） 干姜（炮）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，水一盏，入油钱一文，同煎至七分，温服，不拘时候。

【主治】妇人血风劳气，攻身体骨节疼痛，早晚寒热，腰脚沉重，手足麻木，呕逆恶心，不思饮食、头旋目晕，日渐瘦瘁。

【备考】《鸡峰》无干姜，有当归。

09025 油蜜膏

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】公猪油一斤 蜜一斤

【用法】公猪油炼去滓，入蜜再炼，冷成膏。不时挑服一茶匙。

【主治】失音。

09026 泻心汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】大黄黄连泻心汤（《活人书》卷十四）、三黄汤（《圣济总录》卷三十）、三黄泻心汤（《奇效良方》卷六十三）。

【组成】大黄二两 黄连 黄芩各一两

【用法】上以水三升，煮取一升，顿服之。

【功用】泻火燥湿。

①《金鉴》：泻三焦热。②《金匮要略讲义》：苦寒清泄，降火止血。③《方剂学》：泻火解毒，燥湿泄痞。

【主治】邪火内炽，迫血妄行，吐血、衄血；或湿热内蕴而成黄疸，胸痞烦热；或积热上冲而致目赤肿痛，口舌生疮；或外科疮疡，见有心胸烦热，大便干结者。

①《金匮》：心气不足，吐血衄血。②《得效》：心受积热，谵言发狂，逾墙上屋。③《千金方衍义》：下痢不止，腹中幅坚而呕哕肠鸣者。④《类聚方广义》：中风卒倒，不省人事，身热，牙关紧急，脉洪大，或鼾睡大息，频频欠伸者，及省后偏枯，瘫痪不遂，缄默不语，或口眼㖞斜，言语謇涩，流涎泣笑，或神思恍惚，机转如木偶人者；酒客都热下血，肠痔肿痛下血，痘疮热气炽盛，七孔出血者；产前后，血晕郁冒，或如狂言；眼目焮痛，赤脉怒张，面热如醉者；齲齿疼痛，齿缝出血，口舌腐烂；唇风，走马疳，喉痹焮热肿痛；痈疔内攻，胸膈冤热，心气恍惚者；发狂，眼光莹莹，倨傲妄语，昼夜不就床者。

【方论选录】①《金鉴》：心气“不足”二字，

当是“有余”二字。若是不足，如何用此方治之，必是传写之讹。心气有余，热盛也，热盛而伤阳络，迫血妄行，为吐、为衄。故以大黄、黄连、黄芩大苦大寒直泻三焦之热，热去而吐衄自止矣。②《金匮要略浅注》：此为吐衄之神方也。妙在以芩、连之苦寒泄心之邪热，即所以补心之不足；尤妙在大黄之通，止其血，而不使其稍停余瘀，致血瘀后酿成咳嗽虚劳之根。③《金匮要略今释》：黄连、黄芩治心气不安，即抑制心脏之过度张缩，且平上半身之充血也。大黄亢进肠蠕动，引起下腹部之充血，以诱导方法，协芩、连平上部充血也。

【临证举例】 ①吐血 《吴鞠通医案》：史，五十岁。酒客大吐狂血成盆，六脉洪数，面赤，三阳实火为病。与大黄六钱，黄连五钱、黄芩五钱。泻心汤一帖而止，二帖脉平，后七日又发，脉如故，又二帖。②上消化道出血 《广西中医药》(1985；3:18)：上消化道出血，属中医呕血、便血范畴，是临床常见而多发的血证之一。我们从1981年7月～1982年7月，以泻心汤为主，治疗该病60例，取得满意效果。60例中，男50例，女10例。平素有烟、酒嗜好者36例，嗜食辛辣者9例，占60%左右。经胃和十二指肠检查而确诊者37例，经胃肠钡餐X线检查而确诊者17例，未确诊者6例。大便潜血试验（+++）43例，（++）17例；有呕血症状者29例。呕血量在100毫升以下者2例，200～300毫升13例，400～500毫升8例，600毫升以上者5例。经本方治疗后，痊愈者50例（呕血、便血消失，大便潜血试验连续两三次阴性）；好转9例（呕血止，大便潜血试验（+）；自动出院而中止治疗者1例。③天行赤眼《浙江中医杂志》（1983；4:175）：张某，男，32岁。三天来两眼睑红肿，球结膜充血严重，且见水肿，眼眵多，口干，大便干结，舌赤苔黄燥，脉数。诊断为：急性结膜炎，证属邪火上扰，治以清心降火。用泻心汤加玄明粉，眼六剂。眼睑红肿消退，大便通畅而愈。

【现代研究】 ①抗缺氧作用 《四川中医》(1988；8:5)：实验表明，本方水醇法提取液对常压下异丙肾上腺素、亚硝酸钠和氰化钾等引起的急性缺氧现象，有明显对抗作用。该作用可能与增强心肌耐缺氧能力、降低脑耗氧量、提高脑对缺氧的耐受力以及减小整体细胞耗氧量有关。②抗凝血作用 《中成药研究》(1988；6:24)：据实验，本方具有抑制血小板凝集、抗凝血作用。认为可用于某些血管梗塞性疾病。

09027 泻心汤

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 人参半两（去芦头） 木通一两（锉） 甘草一两（炙微赤，锉） 黄芩一两 川大黄一两（锉碎，微炙）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒六日，毒气攻心，心胸妨闷，烦热不解，面赤大渴，壮热，身体疼痛。

09028 泻心汤

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 黄连汤(《济阳纲目》卷二十五)。

【组成】 黄连一两（去须）

【用法】 上为末。每服五分，临卧取温水化下。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：小儿心气实，则气上下行涩，合卧则气不得通，故喜仰卧，则气上下通。②《济阳纲目》：心热颠狂谵语，二府涩黄者。

09029 泻心汤

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】 人参（去芦） 黄连 干姜（炮，洗） 黄芩 甘草（炙）各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏半，生姜十片，煎至七分，去滓温服。

【主治】 积热喉闭，舌肿口疮。

09030 泻心汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】 川黄连 甘草

【主治】 心火乘金，内伤胸痛，左寸洪数。

09031 泻心汤

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】 黄连 山栀 荆芥 黄芩 连翘 木通 薄荷 牛蒡各一钱 甘草五分

【用法】 加灯心，水煎服。另用针在患处刺出血，以冰硼散搽之。

【主治】 重舌、木舌、紫舌，胀满坚硬。

09032 泻心汤

【方源】《异授眼科》。

【组成】 通草 山栀 黄连 生地 甘草 滑石 荆芥 防风 当归 芍药 大黄 紫草

【主治】 夏月眼红，胬肉扳睛，热泪不止，刺痛难开，久不治，翳生瞳仁，身热，口舌生疮。

【备考】 方中紫草，《眼科撮要》作“柴胡”。

09033 泻心散

【方源】 方出《圣惠》卷九十，名见《普济方》卷二六五。

【异名】 金华散(《卫生总微》卷十一)。

【组成】 黄连一两（去须）

【用法】 上为末。用蜜调，蒸一炊久，旋与儿吃。

【主治】 ①《圣惠》：小儿燕口，及口内生疮。②《卫生总微》：滞痢多时，羸瘦体弱不堪，疾势困重。

09034 泻水丸

【方源】 《古今名方》引《肝硬变腹水证治》。

【组成】 生甘遂 巴豆 红大戟 净芫花各15克 上沉香3克 红枣90克（煮透，去皮核）

【用法】 前五味各为极细末，和匀，以枣肉和成硬膏为丸，如豌豆大，滑石粉封皮。每服15～20丸，清晨温开水送下。每隔二三天一次（视病者体质强弱而定）。

【功用】 攻里通下，逐水除饮。

【主治】 肝硬化腹水。

【宜忌】 体虚者慎用。

09035 泻白汤

【方源】 《三因》卷八。

【异名】 泻白散(《玉机微义》卷九)。

【组成】 橘皮 淡竹茹 黄芩 栀子仁 柏皮（炙）各半两 茯苓 芒消各一钱 生地黄五两

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，入生姜、大枣，煎七分。空心服。

【主治】 大肠实热，腹胀不通。夹脐痛，食不化，喘，不能久立，口生疮。

【备考】 《普济方》有“白术”。

09036 泻白散

【方源】 《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 泻肺散（原书同卷）、泻肺汤(《准绳·幼科》卷九)。

【组成】 地骨皮 桑白皮（炒）各一两 甘草（炙）一钱

【用法】 上锉散。入粳米一撮，水二小盏，煎七分，食前服。

【功用】 ①《保婴撮要》：化痰止咳，宽气进食。②《方剂学》：泻肺清热，止咳平喘。

【主治】 肺热咳嗽，甚则气喘，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数。

①《小儿药证直诀》：小儿肺盛，气急喘嗽。②《斑论萃英》：肺热目黄，口不吮乳，喘嗽。③《保婴撮要》：肺经有热生疮。④《医方集解》：肺火皮肤蒸热，洒淅寒热，日晡尤甚，喘嗽气急。

【方论选录】 ①《医方考》：肺火为患，喘满气急者，此方主之。肺苦气上逆，故喘满；上焦有火，故气急，此丹溪所谓气有余便是火也。桑白皮味甘而辛，甘能固元气之不足，辛能泻肺气之有余；佐以地骨之泻肾者，实则泻其子也；佐以甘草之健脾者，虚则补其母也。此云虚实者，正气虚而邪气实也。又曰：地骨皮之轻，可使入肺，生甘草之平，可使泻气，故名以泻白。②《古今名医方论》：季楚重曰：《经》云，肺苦气上逆。上逆则上焦郁热，气郁生涎，火郁生热，因而治节不行，壅甚为喘满肿嗽。泻白者，正金之令，驱气之逆，非劫金而泻之也，法使金清则气肃。桑根白皮，禀西方燥金之气，甘辛能入肺而泻气之有余；地骨皮凉平，调不足之阴，能清阴中之火，滋肾子以清母；甘草益土和中，且生能泻火，补母土以食子，泻补交致，金元自正；于以佐桑皮而行诸气之愤郁，鲜不达矣，较之黄芩、知母，苦寒伤胃者远矣。夫火热伤气，救肺之治有三：伤寒邪热侮肺，用白虎汤除烦，此治其标；内症虚火烁阴，用生脉散益阴，此治其本；若夫正气不伤，郁火又甚，则泻白散之清肺调中，标本兼治，又补二方之不及也。③《医方集解》：此手太阴药也。桑白皮甘益元气之不足，辛泻肺气之有余，除痰止嗽；地骨皮寒泻肺中之伏火，淡泄肝肾之虚热，凉血退蒸；甘草泻火而益脾；粳米清肺而补胃，并能泻热从小便出。肺主西方，故曰泻白。④《古方选注》：肺气本辛，以辛泻之，遂其欲也。遂其欲当谓之补，而仍泻者，有平肺之功焉。桑皮、甘草其气俱薄，不燥不刚，虽泻而无伤于娇脏。《经》言肺苦气上逆，急食苦以泄之。然肺虚气逆，又非大苦大寒如芩、连、栀、柏辈所宜，故复以地骨皮之苦，泄阴火，退虚热，而平肺气。使以甘草、粳米，缓桑、骨二皮于上，以清肺定喘。⑤《成方便读》：大肺为娇脏而属金，主皮毛，其性以下行为顺，上行为逆。一受火逼，则皮肤蒸热，喘嗽气急之证见矣，治此者，皆宜清之降之，使复其清肃之令。桑白皮皮可行皮，白能归肺，其甘寒之性，能入肺而清热，固不待言，而根者入土最深，能清而复降。地骨皮深入黄泉，无所底止，其甘淡而寒之性，能泻肺中之伏火，又能入肝肾，凉血退蒸。可知二皮之用，皆在降肺气，降则火自除也。甘草泻火而益脾，粳米清肺而养胃。泻中兼补，寓补于宣，虽清肺而仍固本耳。⑥《方剂学》：本方治肺有伏火郁热之证。肺主气，宜清肃下降，肺有郁热，则气逆不降而为咳喘；肺

合皮毛，外主肌表，肺热则皮肤蒸热，此热不属外感，乃伏热渐伤阴分所致，故热以午后为甚。方用桑白皮泻肺以清郁热为主，辅以地骨皮泻肺中伏火，兼退虚热。炙甘草、粳米养胃和中以扶肺气，共为佐使。四药合用，共奏泻肺清热，止咳平喘之功。本方之特点，既不是清透肺中实热以治其标，也不是滋阴润肺以治其本，而是清泻肺中伏火以消郁热，对小儿“稚阴”素质具有标本兼顾之功。

【临证举例】 ①咳嗽 《谢映庐医案》：杨协胜之女，寒热咳嗽，腹痛泄泻。医者未知痛一阵泻一阵属火之例，木强反克之理，妄用消耗之剂，渐至面浮气促，食减羸瘦，又误用耆、术之药，潮热愈重，痛泻愈多，延绵两月，众谓童痨难治。乞诊于余，先与戊己丸作汤，二剂痛泻顿止，继以泻白散合生脉汤，二剂潮嗽皆安。②肺结核，盗汗 《安徽中医学院学报》(1986；1:33)：杨某某，男，26岁，工人。1979年3月11日就诊。患浸润性肺结核，盗汗长期不愈，虽用抗痨药物，但每夜汗出均浸湿枕褥。由于长期汗出过多，耗伤津液，故口燥咽干，五心烦热，身体消瘦，颧红，舌质红绛，脉细数。即用桑白皮、地骨皮各30克，生甘草10克，浮小麦50克，水煎服。共服八剂，盗汗即止。③痘衄 《保婴撮要》：一小儿痘疮衄血，右寸脉数，此肺金有火也，用泻白散而血止，但四肢倦怠，用益元汤而愈。④荨麻疹 《安徽中医学院学报》(1986；1:33)：王某某，女，49岁，职工。1977年7月14日就诊。患荨麻疹六年余，时发时止，累经中西药物治疗，其效不佳。患者为病所苦，急躁心烦，夜难入睡。曾于1973年赴省医院诊断为：顽固性荨麻疹。经治疗后已愈。半年后因迁居新房，室内尚潮湿，数月后复发。瘙痒难忍，搔之随手增大，尤以四肢为重。遇热加剧，得冷稍减，冬轻夏重，反复两年多，延至1977年夏，皮疹遍及全身，唇厚如肿，触摸疹块处有灼热感，舌质红，苔薄黄，脉浮数。余即以风热挟湿论治，拟用桑皮、地骨皮各30克，甘草、苦参各10克，蝉衣20克捣碎，水煎服。相继服用十二剂而疹消。为巩固疗效，将前方碾为细末，每次6克，一日二次，连服两月，至今七年未发。

【备考】 本方改为丸剂，名“泻白丸”(见《集验良方》)。

09037 泻白散

【方源】 《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 桑白皮(炙) 紫苏叶 人参(去芦头) 汉防己 甜葶苈(微炒) 半夏(汤洗七次) 麻黄(去根节)各一两 甘草半两(炙) 陈橘皮(去白)三分 吴茱萸(汤洗七次，焙干)三分

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水一盏半，生姜三片，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 肺气上奔咽膈，胸胁隘满，喘急不止。甚者头面浮肿，腹胀，小便不利。

09038 泻白散

【方源】 《痈疽验方》。

【异名】 泻甘汤(《医钞类编》卷六)。

【组成】 桑白皮(炒)二钱 地骨皮 甘草(炙) 贝母(去心) 紫菀 桔梗(炒) 当归(酒拌)各一钱 瓜蒌仁一钱半

【用法】 作一剂。水一钟，生姜三片，煎八分，食远服。

【功用】 《全国中药成药处方集》：泻肺定喘。

【主治】 ①《痈疽验方》：肺痈。②《全国中药成药处方集》：肺痈，咳嗽喘息，胁肋疼痛，胸满气促；肺经蕴热，肺火咳嗽，久嗽喘息。

【备考】 《医钞类编》有粳米。

09039 泻白散

【方源】 《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】 桑皮 地骨皮 甘草 粳米 人参 茯苓 知母 黄芩

【主治】 晨嗽。

09040 泻血汤

【方源】 《兰室秘藏》卷下。

【组成】 生地黄(酒洗，炒) 熟地黄 蒲黄 丹参(酒炒) 当归(酒洗，去土) 汉防己(酒洗，炒) 柴胡(去芦) 甘草梢(炙) 羌活各一两 桃仁(去皮，汤浸)三钱

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，空心温服。

【主治】 邪入足太阳膀胱经络，血中有浮热，气分有微邪，发热昼少夜多，大小便如常，有时而发，有时而止。此虽杂证，当从热入血室论之。

09041 泻肝汤

【方源】 《千金》卷六。

【组成】 柴胡 芍药 大黄各四两 决明子 泽泻 黄芩 杏仁各三两 升麻 枳实 栀子仁 竹叶各二两

【用法】 上㕮咀。水九升，煮取二升七合，分三服。

【主治】 眼赤，漠漠不见物，息肉生。

【加减】 热多体壮，加大黄一两；羸老，去大黄，加栀子仁五两。

【方论选录】《千金方衍义》：目赤而生息肉，非上下开泄不能泻其结热。升麻、柴胡引之上泄，枳实、大黄引之下泄；泽泻、栀子、竹叶兼清水道，黄芩、芍药兼清肝火也。

09042 泻肝汤

【方源】《医方类聚》卷六十五引《龙树菩萨眼论》。

【组成】柴胡三两 决明子二两（捣破） 青葙子二两 桂心二两 升麻二两 栀子三十枚 芒消二两（汤成下） 淡竹叶一小升（切） 芍药二两

【用法】上粗锉。以水八升，浸一宿，早煮，取二升，去滓，为三服，泻三度，则冷饮止。

【主治】初患眼赤肿痛，生障翳，热昏暗，并头旋风等。

【宜忌】六月、七月、八月不多用此方。

09043 泻肝汤

【方源】《医心方》卷五引《眼论》。

【组成】黄芩二两 芍药二两 芒消一两 甘草一两半 大黄二两 大枣十二枚

【用法】上以水六升，煮取二升五合，分三服。

【主治】眼急生肤翳，及赤肉上黑睛。

09044 泻肝汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】前胡（去苗） 柴胡 秦皮（去粗皮） 细辛（去苗） 栀子仁 黄芩 升麻 蕤仁 决明子各等分

【用法】上锉散。每服四钱，水二盏，加苦竹叶、车前叶各五片，煎至盏半，纳药再煎至八分，去滓，入芒消一钱匕，煎溶，不拘时候服。

【主治】肝实热，阳气伏邪，胁痛，忿忿悲怒，发热喘逆，满闷，目痛，视物不明，狂悸，非意而言，乍宽乍急，所作反常。

09045 泻肝汤

【方源】《易简方》卷五。

【异名】泻肝散（《痘疹全书》卷下）。

【组成】羌活 防风 当归 川芎 木通 栀子 黄芩 柴胡 胆草

【用法】水煎服。

【主治】经水未断，适逢出痘，身发壮热，神思昏沉，言语狂妄，如见神鬼，寻衣撮空等。

【加减】便实，加大黄、竹叶。

09046 泻肝汤

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】黑参 地骨皮 车前子 芒消各一两 大黄 知母各一两半 茺蔚子二两

【用法】上为末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，空心温服。

【主治】蠛睛疼痛，外障。

【备考】《金鉴》有柴胡二钱。

09047 泻肝汤

【方源】《秘传眼科龙木论》卷六。

【组成】麦门冬 黑参 黄芩 知母 地骨皮各一两 赤芍药 茺蔚子各一两半

【用法】上为细末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】瞳仁干缺外障。

【备考】本方方名，《普济方》引作"泻胆散"。方中赤芍药，《普济方》引作"黄耆"。

09048 泻肝汤

【方源】《程松崖先生眼科》。

【组成】柴胡八分 防风六分 荆芥六分 川芎六分 归尾八分 赤芍八分 菊花八分 栀仁八分（酒炒） 青皮八分 车前子八分

【用法】生姜一薄片为引，水煎服。

【主治】肝火上冲，眼黑珠通红者，或痛极，或微痛。

【加减】痛甚者，加黄芩八分；服此痛不减，口渴，加龙胆草六分。

09049 泻肝汤

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】当归梢 赤芍药 生地黄 龙胆草（酒浸，炒） 防风 黄连（炒） 黄柏 知母（酒炒） 车前子（炒） 泽泻各一钱 甘草梢五分

【用法】上锉一剂。空心，水煎服。

【主治】肝经湿热不利，阴囊肿痛，或脓溃皮脱，睾丸悬挂，及下疳疮。

09050 泻肝汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】当归 川芎 白芍 柴胡 连翘 栀仁 青皮 胆草各一钱 生甘草五分

【用法】水煎，食后温服。

【主治】肝火上冲，两目红肿疼痛。

09051 泻肝汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】胆草一钱（酒洗） 当归 黄芩（酒炒） 甘草各一钱 车前子（炒） 木通各八分 泽泻 生地各七分

【用法】水煎服。

【功用】退肝火。

【主治】肝经实热，黑睛生赤丝，乌气笼罩瞳

仁。

09052 泻肝饮

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】柴胡（去苗） 决明子 升麻 苦竹叶 朴消（研）各二两 泽泻一两 芍药 大黄（蒸，锉） 栀子仁 黄芩（去黑心）各三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，以利为度。

【主治】眼热疹痛，赤肿泪出昏暗。

【备考】本方方名，《普济方》引作“泻肝散”。

09053 泻肝饮

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【异名】泻肝汤（《秘传眼科龙木论》卷二）。

【组成】防风（去叉）二两 五味子（炒） 细辛（去苗叶） 黄芩（去黑心） 车前子 茺蔚子 桔梗（锉，炒） 大黄（锉，炒） 芒消（研）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓放温，食后临卧服。

【主治】雷头风，恐成内障。

09054 泻肝散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】栀子仁 荆芥 大黄 甘草各等分

【用法】上水煎。每服二钱，食后服。

【主治】①《直指》：肝热，赤眼肿痛。②《济阴纲目》：肝实热，眼昏痒痛，全无翳障，头亦不旋，或五脏风毒，突起睛高，倒睫拳毛，及时行暴赤。

【宜忌】《张氏医通》：详此四味，治白睛赤痛则可，治风轮赤痛则不可。

09055 泻肝散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】郁李仁 荆芥各一分 甘草（炙） 大黄各半两

【用法】上锉散。每服三钱，水一盏半煎，食后温服。

【主治】乌风，眼虽痒痛，而头不旋，但渐渐昏暗，如物遮定，全无翳障，或时生花，此肝有实热。

09056 泻肝散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】麦门冬（去心）二两 大黄 黄芩 细辛 芒消各一两 黑参 桔梗各两半

【用法】上锉散。每服三钱，水一盏煎，食后服。

【主治】辘轳转关外障。

【备考】方中麦门冬，《秘传眼科龙木论》作“天门冬”。

09057 泻肝散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷五。

【组成】大黄 知母 芒消 车前子 茺蔚子 黄芩 天冬各一两 黑参一两半

【用法】上为末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】睑硬睛痛外障。

09058 泻肝散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】桔梗 黄芩 大黄 芒消 栀子 车前子

【用法】为散服。

【主治】小眦赤脉传睛。

09059 泻肝散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】黄芩 桔梗 芒消 大黄 黑参 羌活 车前 当归 知母各一钱 龙胆草五分

【用法】上为末。水煎服。

【主治】①《银海精微》：眼生翳如萝卜花，或鱼鳞子，入陷如碎米者。②《金鉴》：雷头风内障。

09060 泻肝散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】归尾 大黄 黄芩 知母 桔梗 茺蔚子 芒消 车前子 防风 赤芍药 栀子 连翘 薄荷各等分

【用法】每服六钱，水煎服。

【主治】玉翳遮睛。初则红肿，赤脉穿睛，渐渐生白翳膜，初起时如碎米，久则成片遮满乌睛，凝结如玉色。

09061 泻肝散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】苍术 枳壳 赤芍药 归尾 川芎 黄连 柴胡 香附子 甘草各五分 大黄二钱 朴消一钱

【用法】上药用水二盏，煎一盏，纳消、黄，再煎二三沸，半饥温服。

【主治】脾经湿热壅郁，上攻于目，以致眼目肿痛如桃，睑皮肿胀，内搓目睛。

09062 泻肝散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】升麻 大黄 赤芍药 黄芩 薄荷 栀子 木贼 陈皮 黄连 朴消 菊花 甘草 防风

五灵脂 葶苈 细辛各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，为散亦可，水煎，食后服。

【主治】 旋睫泛起。

【加减】 老人，加枳壳、厚朴。

09063 泻肝散

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】 生地黄 当归 赤芍 川芎 连翘（去心） 栀子（生） 龙胆草 大黄 羌活 甘草（生） 防风

【用法】 引用灯心，水煎服。

【主治】 痘热上攻，眼痛成痒湿赤烂，胞肿疼，白睛生翳，渐遮满，流泪羞明，目不睁。

09064 泻青丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 凉肝丸（《得效》卷十一）、泻肝丸（《普济方》卷二六二）。

【组成】 当归（去芦头，切，焙秤） 龙脑（焙，秤） 川芎 山栀子仁 川大黄（湿纸裹煨） 羌活 防风（去芦头，切，焙，秤）各等分

【用法】 上为末。炼蜜为丸，如鸡头大。每服半丸至一丸，煎竹叶汤同沙糖温水送下。

【功用】 清肝泻火。

①《得效》：解热疏风。②《春脚集》：清心平肝，疏风凉血，截风定搐。③《谦斋医学讲稿》：搜风散火。

【主治】 肝经郁火，目赤肿痛，烦躁易怒，不能安卧，尿赤便秘，脉洪实，以及小儿急惊，热盛抽搐等。①《小儿药证直诀》：肝热搐搦，脉洪实。②《保命集》：中风自汗，昏冒发热，不恶寒，不能安卧，此是风热烦躁。③《斑论萃英》：斑后风热毒，翳膜气晕遮睛。④《云岐子保命集》：小儿热结于内，腹胀，壮热，大便赤黄，烦躁闷乱者。⑤《婴童百问》：小儿赤眼多泪，睛疼心燥，并热翳、急惊发搐。⑥《外科枢要》：肝经实热，瘰疬肿痛，寒热，或胁乳作痛，大便秘结。⑦《赤水玄珠》：妇人经水不断，适逢出痘，发热昏沉，言语狂妄。⑧《准绳·疡医》：痈疽，目斜视上，黑睛紧小，白睛青赤，肝挟火邪。⑨《张氏医通》：肝经实热，大便不通，肠风便血，阴汗臊臭。⑩《医方集解》：肝火郁热，不能安卧，多惊多怒，筋痿不起，目赤肿痛。⑪《外科真铨》：小儿囟肿属热者。

【宜忌】《医方集解》：必壮实之人，方可施用。

【方论选录】 ①《医方考》：中风发热，不能安卧者，此方主之。肝主风，少阳胆则其腑也。少阳之经行乎两胁，风热相干，故不能安卧。此方名曰泻青，泻肝胆也。龙胆草味苦而厚。故入厥阴而泻肝；少阳火实者，头角必痛，故佐以川芎；少阳火郁者，必生烦躁，故佐以栀子；肝者将军之官，风淫火炽，势不容易治，故又夺以大黄；用当归者，培养乎血，而不使其为风热所燥也；复用乎羌活、防风者，二物皆升散之品，此火郁发之，木郁达之之意。乃上下分消其风热，皆所以泻之也。②《医方集解》：此足厥阴、少阳药也。肝者将军之官，风淫火炽，不易平也。龙胆、大黄、苦寒味厚，沉阴下行，直入厥阴而散泻之，所以抑其怒而折之使下也。羌活气雄，防风善散，故能搜肝风而散肝火，所以从其性而升之于上也。少阳火郁多烦躁，栀子能散三焦郁火，而使邪热从小便下行。少阳火实多头痛目赤，川芎能上行头目而逐风邪。且川芎、当归乃血分之药，能养肝血而润肝燥，又皆血中气药，辛能散而温能和，兼以培之也。一泻、一散、一补，同为平肝之剂，故曰泻青。惟肝常有余，散之即所以补之，以木喜条达故也。③《删补名医方论》：龙胆草直入肝经，以泻其火，佐栀子、大黄，使其所泻之火，从大小便而出，是治火之标也。肝主风，风能生火，治肝不治风，非其治也。故用羌活、防风散肝之风，即所以散肝之火，是治火之本也。肝之情欲散，故用川芎之辛以散之。肝之质喜滋，故用当归之濡以润之。是于泻肝之中，寓有养肝之意。泻肝者，泻肝之病也；养肝者，悦肝之神也。④《谦斋医学讲稿》：本方主治肝火烦躁不寐，易惊多怒，目赤肿痛等证。方内用龙胆、山栀、大黄苦寒泻热，当归、川芎、羌活、防风养血祛风，兼能发越郁火。按泻青丸和龙胆泻肝汤、当归龙荟丸三方同用于肝火实证，同为苦寒直折法，而泻火之力以当归龙荟丸为最强，龙胆泻肝次之，泻青较弱。三方的特点是，龙胆泻肝兼利小便，当归龙荟能通大便，泻青具有搜风散火而无通利二便的作用。

【临证举例】 ①惊风 《续名医类案》：罗田令治朱女，未周岁，病惊风。方用泻青丸，服之而搐转甚。盖喉间有痰，药末颇粗，为顽痰裹住，粘滞不行之故。乃煎作汤，用薄棉纸滤去滓，一服而愈。②发热 《续名医类案》：万密斋治黄学仪子，病热不退，其父治之已八日不效。全叩之，曰：日夜发热，小便赤，大便难；再叩药，曰：先与胃苓丸，今与镇惊丸。全曰：不效宜矣。其父曰：汝能已此病乎？全对曰，此名风热，乃肝病，宜用泻青丸，

热即退矣。黄氏相招，即令全往如法治之，五日而愈。

【备考】 本方改为汤剂，名“泻青汤”（见《痘疹一贯》）。改为散剂，名“泻肝散”（见《赤水玄珠》）。

09065 泻肾丸

【方源】《证论萃英》卷二。

【组成】 生地黄八钱 干山药 泽泻 牡丹皮 白茯苓各四钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。三岁以下每服一二丸或三五丸，空心，水送服。

【主治】 肾虚解颅，脉洪而实者。

09066 泻肾汤

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】 枸杞子一钱二分 生地黄 黄柏（酒洗，炒） 知母（酒洗，炒） 麦门冬（去心） 山萸肉（去核） 白芍 归尾各一钱 五味子七粒 白茯苓 独活各八分

【用法】 上锉一剂。白水二钟，煎至一钟，去滓热服。

【主治】 瞳神散大症。食辛辣炙煿之物过多所致者。

【备考】 服此后，兼服磁朱丸。

09067 泻肾汤

【方源】《异授眼科》。

【组成】 牛蒡 川芎 当归 玄参 生地 荆芥 防风 柴胡 芍药

【用法】 水煎，温服。

【功用】 明目。

【主治】 冬时眼目生花，如飞蝇之状，视人物若堆烟，视太阳若水花，久而不治则为青盲。

【备考】《异授眼科》本方有甘草。

09068 泻肺丸

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】 栝楼仁 半夏 浙贝母 郁金 苦葶苈子 杏仁 黄连 黄芩 大黄

【主治】 嗽血痰壅气逆，痰黄积热，形气实者。

【加减】 形气虚，或大便溏泻者，则减去大黄不用。

【备考】《血证论》有甘草一钱。

09069 泻肺汤

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 桑白皮一两（去外皮） 地骨皮一两（去骨） 甘草七钱 黄芩一两 桔梗一两

【用法】 上为末。每服三四钱，水煎，食后服。

【主治】 肺经得脾热，白仁变生鸡冠蚬肉。

09070 泻肺汤

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 桑白皮 黄芩 地骨皮 知母 麦门冬（去心） 桔梗各等分

【用法】 上锉，白水二钟，煎至八分，去滓，食后服。

【主治】 金疳。起初如玉粒，脾生必碍睛疼，沙擦涩紧，翳障生，若在气轮，目病珠痛，流泪不爽，阳分最苦气升，时交阴降略清宁，目小涩而坚硬。

09071 泻肺散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 当归 黄芩各一两 桔梗 麻黄 枳壳各半两 秦皮 葶苈 菊花 旋覆花 生地黄 防风 白芷 甘草 玄参 栀子各一两 地骨皮八钱

【用法】 上为末。每服三钱，桑白皮煎汤调下。

【主治】 风轮生疮或突起，愈后变成白翳，久不散者。

09072 泻荣汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 连翘 升麻各六分 桔梗五分 生黄芩 生地黄各四分 黄耆 苏木 黄连 地龙 全蝎 当归各三分 白豆蔻 人参各二分 甘草一分半 梧桐泪一分 麝香少许 桃仁三个 虻虫（去翅足，炒）三个 水蛭三个（炒令烟尽）

【用法】 上锉，如麻豆大，除连翘、梧桐泪、白豆蔻另为细末，麝香、虻虫、水蛭三味同为细末，都作一服。水二盏，酒一盏，入连翘煎至一盏，去滓，再入白豆蔻二味并麝香等，再煎至七分，稍热，早饭后、午饭前服之。

【主治】 疠风满面连颈，极痒不任，眉毛脱落。

【宜忌】 忌酒、湿面、生冷、硬物。

【备考】 先砭其处，令恶气消尽，后服此药。

09073 泻胃汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 大黄二钱半 葛根一钱 桔梗 枳壳 前胡 杏仁各五分

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 胃气实热，唇口干裂，便秘烦渴，睡流口涎。

09074 泻胆汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】 柴胡一钱五分 黄芩 人参 天门冬各一钱 知母一钱 甘草 麦门冬各五分 黄连四分

龙胆草　五味子各三分　山栀仁七分

【用法】　上㕮咀。水煎，食远温服。

【主治】　胆瘅。

09075　泻热汤

【方源】《千金》卷十五。

【组成】　前胡　茯苓　龙胆　细辛　芒消各三两　杏仁四两　玄参　大青各二两　苦竹叶（切）一升

【用法】　上㕮咀。以水九升，煮取三升，食后分三服。

【主治】　脾实热，舌本强直，或梦歌乐而体重不能行。

【方论选录】《千金方衍义》：泻热汤专用龙胆、大青、前胡、杏仁以清肝热内动之风；茯苓、细辛、玄参、苦竹以祛沃土外蒸之湿；或梦歌乐，可卜胃气之充；舌强体重，洵是脾家之实。实热交并，得不以芒消荡热存阴为务耶？

【备考】　方中前胡，《医心方》作“柴胡”。

09076　泻热汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】　黄连六分　归尾　连翘　黄芩各一钱五分　甘草　木通各一钱

【用法】　水煎服。

【主治】　囊脱。肾囊生毒烂破，肾子落出。

【备考】　外用紫苏汤日洗，取紫苏叶梗为末日敷，用青荷叶包裹，内服本方。

09077　泻胰汤

【方源】《千家妙方》引翟惟凯方。

【组成】　生大黄 15 克　厚朴 10 克　炒枳壳 10 克　广木香 10 克　蒲公英 30 克　柴胡 15 克　黄芩 15 克　茵陈 30 克

【用法】　水煎服。

【功用】　疏肝清热利湿，通腑攻下。

【主治】　急性胰腺炎（单纯水肿型）。

【加减】　大便秘结者，加玄明粉 12 克（冲服）；腹胀严重者，加槟榔 15 克，川楝子 10 克；呕吐严重者，加姜竹茹 10 克，或代赭石 15 克。

【临证举例】　用本方加减，在临床观察治疗 7 例急性胰腺炎病人，均在短期内治愈。

09078　泻脑汤

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】　防风　车前子　木通　茺蔚子　茯苓　熟大黄　玄参　玄明粉　桔梗　黄芩（酒炒）各等分

【用法】　上锉。白水二钟，煎至八分，去滓，食远热服。

【主治】　鹘眼凝睛症。

09079　泻脑汤

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】　防风二钱　细辛五分　桔梗一钱　赤芍药一钱　天门冬（去心）一钱　五味子五分　茺蔚子二钱

【用法】　上为粗末。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】　旋螺外障。气轮之内，乌珠色变，青白如螺蛳之壳，其色初青久黑，其形尖圆，乃肝经积热亢极，瘀血凝滞所致。

09080　泻黄散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】　泻脾散（原书同卷）、泻黄汤（《痘疹会通》卷四）。

【组成】　藿香叶七钱　山栀子仁一钱　石膏五钱　甘草三两　防风四两（去芦，切，焙）

【用法】　上锉，同蜜酒微炒香，为细末。每服一钱至二钱，水一盏，煎至五分，清汁温服，不拘时候。

【功用】《方剂学》：泻脾胃伏火。

【主治】　脾胃伏火，口疮口臭，烦渴易饥，口燥唇干，舌红脉数，以及脾热弄舌等。

①《小儿药证直诀》：脾热弄舌。②《证论萃英》：脾热目黄，口不能吮乳。③《得效》：脾胃壅实，口内生疮，烦闷多渴，颊痛心烦，唇口干燥，壅滞不食。偷针赘等。④《普济方》：小儿身凉，身黄睛黄，疳热口臭，唇焦泻黄沫，脾热口甜，胃热口苦，不吮乳。⑤《保婴撮要》：疮疡，作渴饮冷，卧不露睛，手足并热，属胃经实热者。⑥《片玉心书》：脾热，目内黄，目胞肿。

【方论选录】　①《医方考》：脾家伏火，唇口干燥者，此方主之。唇者，脾之外候；口者，脾之窍，故唇口干燥，知脾火也。苦能泻火，故用山栀；寒能胜热，故用石膏；香能醒脾，故用藿香；甘能缓脾，故用甘草，用防风者，取其发越脾气而升散其伏火也。或用何以不用黄连？余曰：黄连苦而燥，此有唇口干燥，则非黄连所宜，故惟栀子之苦而润者为当耳。又问曰：既恶燥，何以不去防风？余曰：东垣已言之矣，防风乃风药中之润剂也，故昔人审择而用之。②《医方集解》：此足太阴阳明药也。山栀清心肺之火，使屈曲下行，从小便出。藿香理脾肺之气，去上焦壅热，辟恶调中。石膏大寒泻热，兼能解肌。甘草甘平和中，又能泻火。重用防风者，取其升阳，能发脾中伏火，又能

于上中泻木也。③《方剂学》：本方证是由脾胃伏火熏蒸于上所致。脾开窍于口，故见口疮口臭，口燥唇干等症。脾胃内有伏热，故有烦渴易饥，不时弄舌等表现。方中石膏辛寒以治其热，山栀苦寒以泻其火，共成清上彻下之功。脾胃伏火与胃中实火不同，仅用清降，难彻此中伏火积热，故方中重用防风，取其升散脾中伏火，也属"火郁发之"的治则；更与石膏、山栀同用，是清降与升散并进，使能清降不伤脾胃之阳，升散能解伏积之火。藿香芳香醒脾，一以振复脾胃气机，一以助防风升散脾胃伏火；以甘草泻火和中，用蜜、酒调服，皆有缓调中上，泻脾而不伤脾之意。正如王旭高所谓"盖脾胃伏火，宜徐而泻却，非比实火当急泻也"。

【临证举例】 ①重舌 《广西中医药》(1984；5：27)：甘某，女，65岁。1981年8月14日就诊。因食煎饼，当晚感受风邪，出现舌中央有数个溃疡面，约花生米样大，舌下血脉胀起，状似小舌（约1×3厘米）色红有触痛，善食易饥，口干烦渴，疲倦烦热，小溲色黄，舌红苔黄中剥，脉细数。证属脾胃伏火，阴虚血结，风热内蕴。治宜清泻脾火，养阴行血，佐以疏风。处方：藿香10克，栀子10克，生石膏30克，银花15克，麦冬10克，山甲6克，防风12克，竹叶6克，甘草6克，每日一剂，水煎服。至8月20日，舌中溃疡基本消失，舌下血脉隐退，触之无疼痛，病已愈。②唇疮《广西中医药》(1984；5：27)：陈某，男，30岁。1981年12月24日就诊。患者在冬至前后，连续食火锅，下唇起疮，肿痛不止，口燥便结，食后腹胀，尿黄如茶色。服炎见宁、核黄素等未效。诊见舌质红，苔薄黄，脉弦数。辨为燥邪引动脾火上冲，治以泻黄润燥。拟泻黄散加麦冬6克，每日一剂。药后大便通畅，唇肿痛减，疮溢黄水，逐渐结痂，一周后痊愈。③小儿黄疸 《续名医类案》：薛立斋治一小儿，旬日内先两目发黄，渐及遍身，用泻黄散服之愈。④小儿牙关紧闭 《谢映庐医案》：傅毓尚之子，潮热恶寒，医以羌、防、柴、葛之属，热愈甚，大汗淋漓，四肢怠惰，食已即饥。医者犹谓能食为美，见其潮热不退，更认为疟疾，复用柴胡、槟榔之属；其热如故，问其大便甚难，又加大黄、枳壳，便仍未通，乃至牙关紧闭，口中流涎，面唇俱白，大汗嗜卧，腹中欲食，口不能入。前医束手而去，始延余诊。问其初有潮热畏寒，继则大汗易饥便坚，四体倦怠，后乃牙紧床肿涎流，诊得诸脉弦小，惟两关洪大之至。细察此症，虽属三阳经病，但与太阳、少阳全无相涉，悉是阳明胃病。盖胃中伏火，为中消候也。以泻黄散加蒺藜、升麻、大黄与之。方中最妙防风、升麻有升阳泻木之用，所以能启发胃中伏火，不致清阳、邪火两遏其中，使之尽行舒畅；又有蒺藜诱之，石膏凉之，大黄泄之，栀子引之，甘草调之，蜂蜜润之，井井有法，诚为胃中伏热之妙剂也。下咽下熟睡一顷，牙关即开，流涎亦止，潮热亦退，更以搜风润肠之药频服而健。

【备考】 本方改为丸剂，名"泻黄丸"（见《集验良方》）。

09081 泻黄散

【方源】《医方集解》引钱乙方。

【异名】 泻黄饮子(《济生》卷五)、泻黄饮(《嵩崖尊生》卷六)。

【组成】 白芷 防风 升麻 枳壳 黄芩各钱半 石斛一钱二分 半夏一钱 甘草七分

【主治】 脾胃伏火，口燥唇干，口疮口臭，烦渴易饥，热在肌肉，或唇口皱裂。

09082 泻黄散

【方源】《医统》卷八十八。

【异名】 泻黄汤(《保赤存真》卷十)。

【组成】 黄连 黄芩 栀子 黄柏 茵陈各五钱 茯苓 泽泻各三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《医统》：脾热口苦，身体蒸热，皮肤如橘之黄，困倦喜睡。②《幼幼集成》：小儿心脾有热，舌不转运，不能吮乳。

【备考】《幼幼集成》有灯心十茎。

09083 泻黄散

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】 石膏（煅）五钱 栀子仁（生）一两 甘草（生）三两 防风（酒拌，微炒香）二两 豨莶草（酒蒸，晒干）四两

【用法】 上为细末。每服壮人二钱，弱人一钱，小儿六七分，白滚水送下。

【主治】 皮翻证。眼皮外翻，状如舌舐唇，因胃经血壅气滞，胞肿睫紧所致者。

09084 泻脾汤

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 人参 黄芩 大黄 桔梗 白茯苓 芒消 茺蔚子各二两 白芍药一两 黑参两半 细辛 白芷各一两

【用法】 每服四五钱，水煎服。

【主治】 下睑生风粟，如杨梅之状，因脾得邪热，血滞不行所致。

09085 泻脾饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】山栀 石膏 黄连各八分 生地 黄芩 白茯苓各七分

【用法】加灯心十茎，水煎，徐徐灌之。

【主治】鹅口疮。

09086 泻脾散

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】归须 赤芍 石膏 黄柏 黄连 草决明 苍术 枳壳 柴胡 香附 大黄 朴消

【用法】水煎一二沸，再加消、黄同煎，半饥服。

【主治】鸡冠蚬肉外障。

09087 泻湿汤

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】车前子 黄芩 木通 陈皮各一钱 淡竹叶二十片 茯苓 枳壳 栀仁（炒黑） 荆芥穗 苍术各八分 甘草三分

【用法】上锉一剂。白水二钟，煎至八分，去滓热服。

【主治】目小眦漏，时流血水，其色鲜红，乃病由心络而来，下焦火横行之疾。

09088 泻膈散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】麦门冬（去心） 川大黄（锉碎，微炒） 川芒消各一两 茺蔚子 车前子 黄芩各一两半

【用法】上为散。每服二钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】眼睑肿硬，隐睛疼痛，视物不得。

09089 泻阴火丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】连柏益阴丸。

【组成】石决明三钱（炒存性） 羌活 独活 甘草 当归梢 五味子 防风各五钱 草决明 细黄芩 黄连（酒炒） 黄柏 知母各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五十丸至一百丸，茶清送下。

【主治】眼中生翳。

【宜忌】常多服补阳汤，少服此药，多则妨饮食。

09090 泻肝饮子

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】大黄 细辛 芒消 车前子 黄芩 桔梗 柴胡 知母各一两

【用法】上为末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】旋螺尖起外障，眼初患之时，忽然疼痛，作时由热积壅毒留在肝间。

09091 泻火止泻汤

【方源】《傅青主男科》卷下。

【组成】车前子二钱 茯苓 白芍 麦芽各一钱 黄连 猪苓各三分 泽泻五分 枳壳二分

【用法】水煎服。

【主治】小儿泄泻，身热如火，口渴舌燥，喜冷饮而不喜热汤。

09092 泻火止痛汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】炒栀子三钱 甘草一钱 白芍二两 半夏一钱 柴胡一钱

【用法】水煎服。

【主治】心痛，火气凌心，手足反冷。

【方论选录】此方妙在用白芍之多，泻水中之火，又加栀子直折其热，而柴胡散邪，半夏逐痰，甘草和中。用之得当，奏效如神。

09093 泻心导赤散

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】生地 木通 黄连 甘草梢

【用法】滚汤淬服之。

【主治】口疮糜烂，泄泻。吐舌，面红烦渴，尿赤涩。

【备考】本方加灯心为引，水煎服，名“泻心导赤汤”（见原书卷五十一）。

09094 泻白消毒散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【异名】泻白消毒饮（《痘科辨要》卷十）。

【组成】桑白皮 地骨皮（自采鲜者）各三钱 牛蒡子（炒，研） 荆芥穗各一钱半 桔梗 甘草各一钱 浮萍（晒干）二钱

【用法】上为粗末。每服三五钱，水一盏，煎六分，滤清服。

【主治】麻疹初起，咳嗽喷嚏，鼻流清涕，眼胞肿，其泪汪汪，面浮腮赤。

09095 泻肝降胃汤

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】生赭石八钱（捣细） 生杭芍一两 生石决明六钱（捣细） 瓜蒌仁四钱（炒，捣） 甘草四钱 龙胆草二钱 净青黛二钱

【主治】吐衄，左脉弦长有力，或胁下胀满，作疼，或频作呃逆。

【方论选录】此因病在胆火肝气上逆，故重用芍

药、石决明及龙胆草、青黛诸药，以凉之镇之。至甘草多用至四钱者，取其能缓肝之急，兼以防诸寒凉之伤脾胃也。

09096 泻肝柴胡散

【方源】《圣惠》卷二。

【组成】柴胡二两（去苗） 玄参半两 甘菊花半两 地骨皮半两 羌活半两 细辛半两 川大黄一两（锉碎，微炒） 石膏一两 黄芩半两 羚羊角屑半两 蔓荆子半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】肝实热，头疼目眩，心膈虚烦，大肠不利。

【宜忌】忌炙煿壅毒物。

09097 泻肝救肺汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】柴胡6克 胆草3克 酒黄芩 夏枯草 知母 麦门冬各9克 桔梗 牡丹皮各6克 赤芍 玄参各9克

【功用】清肝泻火，养阴清肺。

【主治】白睛俱青。初起羞明流泪，目珠胀痛，痛连眼眶、头部，白睛略呈隆起，色淡紫而暗，继则症状消退，白睛呈青兰色。

【加减】瞳神开大者，可加五味子3克，以收敛瞳神；瞳神缩小者，可加青葙子3克以散瞳。

【方论选录】方中柴胡、胆草、酒黄芩、夏枯草清泻肝胆郁热，夏枯草且有解毒散结之功；知母、麦门冬养阴清肺；桔梗宣肺散结，以除白睛郁结之邪；牡丹皮、赤芍药活血散瘀，且二味皆有清肝之力；玄参养阴滋肾，以防毒热内攻。

09098 泻肝清热汤

【方源】《疮疡经验全书》卷五。

【组成】龙胆草（酒拌炒） 当归梢 车前子（炒） 泽泻 生地 芍药 黄连 黄柏 知母 木通 淡竹叶 防风各二钱 甘草梢五分

【用法】上作一剂。水二碗，煎八分，食前服。

【主治】阴囊毒。此症肝经湿热不利，遂流毒于膀胱、肾经，感冒寒暑，邪气偏肾于阴之经络，以致血气凝聚，寒湿不散，阴囊上肿而痛，或溃烂皮脱，肾子悬挂。

09099 泻肺大黄煎

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】川大黄二两（锉碎，微炒） 生地黄汁三合 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，生研） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 牛蒡根汁二合 郁李仁二两（汤浸，去皮尖，微炒）

【用法】上为细散。用蜜四两，酥二两，入煎二味汁，同于银锅子内，入诸药末，搅令匀，慢火熬令成膏，收于瓷盒内。每服一茶匙，以清粥调下，不拘时候。

【主治】肺脏气实，心胸烦壅，咳嗽喘促，大肠气滞。

09100 泻肺通窍汤

【方源】《一盘珠》卷四。

【异名】泄肺通窍汤（《医钞类编》卷六）。

【组成】苏子 葶苈子 莱菔子 北芹子各一钱 麻黄（捶，水泡过）一钱 杏仁 枳壳 黄芩 桑皮各七分

【主治】肺胀，两鼻煽动，汗出如流，胸高气喘，肺脉急数。

【加减】大便不通，加大黄、槟榔。

【临证举例】一妇人年余六十，急患肺胀，两鼻如蝉翼，气喘，大汗如雨，诸医谓年老虚痰上涌，用姜桂六君子汤，汗更甚，请予诊之。诊得肺脉八九至，予曰：此肺胀也。若是虚汗，一二次必发寒厥，如此热汗如雨，淋淋不已，实为痰火内冲，肺窍闭塞。遂用泻肺通窍汤三剂，汗自止，吐痰数日而愈。后用八珍汤十剂而痊。又一小孩十二岁，患肺胀，热汗如雨，五六日不大便，气喘嗄声，面赤烦躁。余用泻肺通窍汤加大黄、黄连各一钱而愈。

09101 泻肺清肝汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】银花18克 酒黄芩12克 酒大黄 柴胡各6克 青葙子3克 赤芍 丹皮各9克 青黛0.3克

【功用】泻肺清肝，明目退翳。

【主治】肺火克肝，白睛红赤壅肿，花翳白陷，从青睛周围骤起者。

【方论选录】方中银花、酒黄芩、酒大黄泻肺中之实热，柴胡、青黛、青葙子清肝胆火邪，青葙子清肝明目之中且有平复白陷之功，赤芍、牡丹皮活血凉血以退目中之赤肿。

09102 泻热黄连汤

【方源】《东垣试效方》卷五。

【异名】黄连饮子（《景岳全书》卷六十）。

【组成】黄芩（酒制炒） 黄连（酒制炒） 草龙胆（酒制） 生地黄（酒制）各一两 升麻五分 柴胡一两

【用法】上㕮咀。每服二钱，将先煎药水纳入泻热黄连汤再煎，至一盏，去滓，于日午饭间热服

之。

【功用】 泻热。

【主治】 ①《丹溪心法》：眼暴发赤肿疼痛。②《准绳·幼科》：内障，有眵泪眊矇。

【宜忌】 午后服之，则阳逆不行；临睡休服，为反助阴也。

【方论选录】《准绳·类方》：本方治主治客之剂也。治主者，升麻主脾胃，柴胡行肝经，为君；生地黄凉血，为臣，为阳明、太阴、厥阴多血故也。治客者，黄连、黄芩皆疗湿热，为佐；龙胆草专除眼中诸疾，为使；为诸湿热俱从外来为客也。

【备考】 方中生地黄，《准绳·幼科》作大黄。

09103 泻脾大青汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【异名】 大青汤(《济生》卷五)。

【组成】 大青 升麻 大黄（锉，炒）各二两 生干地黄（切，焙）三两

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服。利即愈。

【主治】 咽喉唇肿，口舌糜烂，口甘面热。

09104 泻湿四苓散

【方源】 方出《医学纲目》卷二十三，名见《济阳纲目》卷二十二。

【组成】 白术三分加至一两半 泽泻一两 茯苓 猪苓 苍术各五钱

【主治】 泄泻。

09105 泻肾生干地黄散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 生干地黄一两半 丹参一两 赤茯苓一两 麦门冬一两半（去心） 槟榔一两 羚羊角屑一两 五加皮一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 牛膝一两（去苗） 前胡一两（去芦头） 黄芩一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，入淡竹叶二七片，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 肾脏实热，心胸烦闷，腹胁胀满，腰脊强急，四肢不利。

09106 泼火散

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【异名】 地榆散(《百一》卷七)、四味地榆散(《景岳全书》卷五十七)。

【组成】 青橘皮（去白） 赤芍药 黄连（去须） 地榆各等分

【用法】 上为细末。每服一钱，浆水调下；热泻用冷水调下，不拘时候。

【主治】 ①《杨氏家藏方》：中暑，烦躁发渴，口苦舌干，头痛恶心，不思饮食；血痢；妇人热崩。②《百一》：中暑昏迷，不省人事欲死者。

【加减】 蓄热，血妄行，加甘草等分。

09107 泼火散

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 生大黄三钱 川连一钱 白蔹三钱 地榆炭三钱

【用法】 上为末。香油调敷。

【主治】 汤泡火伤。

09108 泽下汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 人参一钱 当归二钱 白芍一钱 生地六钱 白苏子三钱 大麻仁三钱 石斛三钱 山药三钱 料豆三钱 红枣十枚

【主治】 脾脏燥热太过，令人体疲便硬，反不思食。

09109 泽兰丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 泽兰叶 牡丹皮 芎藭 当归（切，焙） 延胡索 蓬莪茂（炮，锉） 京三棱（炮，锉） 芍药 熟干地黄（焙）各一两 桂（去粗皮） 青橘皮（去白，炒） 乌头（炮裂，去皮脐）各三分

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前以温酒送下。

【主治】 室女血气不调，止后复来，脐腹冷疼。

09110 泽兰丸

【方源】《普济方》卷三五〇。

【组成】 泽兰 厚朴 人参 石斛 芜荑仁 续断 防风 桂心各三分 川芎 白术 柏子仁 北五味子 黄耆 远志各四分 赤石脂 甘草 干地黄各六分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，以酒送下，一日二次。

【功用】 补益，肥白悦泽。

【主治】 产后患风冷气，腹内不调。

09111 泽兰汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 泽兰二钱 柏子仁 当归 白芍 熟地 牛膝 芜蔚子各一钱五分

【用法】 水煎服。

【功用】 调经，通血脉。

【主治】 经闭。

09112 泽兰汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】泽兰三钱 丹皮 牛膝各二钱 桃仁（去皮尖，研）十粒 红花五分 当归尾五钱 广三七一钱 赤芍药一钱五分

【用法】水煎，热酒冲服。

【主治】闪挫跌扑，瘀血内蓄，转侧若刀锥之刺。

【加减】二便不通，加酒蒸大黄三钱。

09113 泽兰汤

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】泽兰 生地（酒洗） 当归 赤芍各一钱五分 甘草（炙）五分 生姜一钱 大枣四枚 桂心三分

【用法】水煎服。

【主治】产后恶露不行，败血上冲，癫狂及狂言谵语，乍见鬼神，胸腹胀痛。

09114 泽兰汤

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】龙齿（煅） 茯神 生地黄 当归 牛膝 远志肉 酸枣仁 泽兰叶各一钱

【用法】水煎服。

【主治】①《叶氏女科》：产后五六日，狂乱胡言，持刀欲杀人。②《妇科玉尺》：产后出血太多，肝虚火炎。

09115 泽兰散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】泽兰一两 当归三分（锉，微炒） 赤芍药三分 桂心三分 白术三分 芎藭三分 熟干地黄一两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣二枚，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】产后气力疲乏，心腹胀痛。

09116 泽肤膏

【方源】《医统》卷五十五。

【组成】牛骨髓 真酥油各等分

【用法】上二味，合炼一处，以净瓷罐贮之。每日空心用三匙热酒调服；不饮酒者蜜汤调。七日肌肤润泽。

【功用】滋阴养血，止嗽荣筋。

【主治】皮肤枯燥如鱼鳞。

09117 泽府汤

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】阿胶 当归各三钱 桃仁 麻仁各二钱 党参三钱 红花五分

【主治】津亏而致便秘不通。

09118 泽泻丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】泽泻（锉） 补骨脂（炒） 巴戟天（去心） 五味子 石斛（去根） 芍药 人参 甘草（炙）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒或盐汤送下，空心、日午、临卧各一次。

【主治】虚病，少腹冤热而痛，精气不守，溲便出白。

09119 泽泻汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】泽泻散（《普济方》卷一九一）、泽泻饮（《杏苑》卷四）。

【组成】泽泻五两 白术二两

【用法】上二味，以水二升，煮取一升，分温再服。

【功用】《金匮辨解》：利水除饮，健脾制水。

【主治】饮停心下，头目眩晕，胸中痞满，咳逆水肿。

①《金匮》：心下有支饮，其人苦冒眩。②《普济方》：水肿。③《医灯续焰》：胸中痞结，坚大如盘，下则小便不利。④《证治汇补》：饮水太过，肠胃不能传送。⑤《会约》：咳逆难睡，其形如肿。

【方论选录】①《金匮要略心典》：冒者，昏冒而神不清，如有物冒蔽之也；眩者，目眩转而乍见玄黑也。泽泻泻水气，白术补土气以制水也。②《金匮要略方义》：此方所治之冒眩，乃水饮停于中焦，浊阴上冒，清阳被遏所致。治当利湿化饮，健脾和中。本方泽泻白术两药相伍，一者重在祛湿，使已停之饮从小便而去；一者重在健脾，使水湿既化而不复聚。高学山称此为“泽泻利水而决之于沟渠，白术培土而防之于堤岸”，其意甚当。

【临证举例】①支饮 《经方实验录》：管某，女，咳吐沫，业经多年，每届冬令必发，时眩冒，胃则呕吐，大便燥，小溲少，咳则胸满。此为支饮，宜泽泻汤：泽泻一两三钱、生白术六钱。服1剂，即觉小溲畅行，而咳嗽大平。续服5服，其冬竟得安度。②伏饮眩冒 《吴鞠通医案》：陈某，51岁，人尚未老，阳痿多年。眩晕昏迷，胸中如伤油腻状，饮水多则胃不快，此伏饮眩冒症也。先与白术泽泻汤逐其饮，再议缓治湿热之阳痿。岂有六脉俱弦细，而恣用熟地，久服六味之理哉？冬于术二两，泽泻二两，煮三杯，分三次服。已效而未尽

除，再服原方十数帖而愈。③水肿 《江苏中医杂志》(1984；6:35)：王某某，女，60岁，水肿二年余，时轻时重，晨起见于眼睑，入暮甚于下肢，按之凹陷难复。伴头晕目眩，胃纳不振，四肢倦怠。舌苔白滑，脉沉细。此脾气虚弱，水湿不化。治以健脾利湿，泽泻汤主之。炒白术45克、泽泻30克，每日煎服1剂。连服5剂，水肿渐消。原方续进10剂后，头目转清，胃纳亦充，脉舌俱平。

【备考】 本方方名，《医钞类编》卷九引作"白术汤"。

09120 泽泻汤

【方源】 《圣济总录》卷八十五。

【异名】 肾着散(《普济方》卷一五五)。

【组成】 泽泻半两 桂(去粗皮)三分 白术 白茯苓(去黑皮) 甘草(炙，锉)各一两 牛膝(酒浸，切，焙) 干姜(炮)各半两 杜仲(去粗皮，锉，炒)三分

【用法】 上为粗散。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空心、日午、夜卧温服。

【主治】 五种腰痛。

09121 泽泻散

【方源】 方出《素问》卷十三，名见《圣济总录》卷十三。

【异名】 薇衔汤(《普济方》卷一一八引《指南方》)、麋衔汤(《三因》卷二)、泽术麋衔散(《张氏医通》卷十五)。

【组成】 泽泻 术各十分 麋衔五分

【用法】 合为散。每服三指撮，饭前服。

【主治】 ①《内经·素问》：酒风，身热懈惰，汗出如浴，恶风少气。②《三因》：因醉中风，恶风多汗，少气，口干善渴，近衣则身热如火，临食则汗流如浴，骨节懈惰，不欲自劳，名曰漏风。

【方论选录】 ①《素问》王冰注：术，味苦温平，主治大风，止汗；麋衔，味苦寒平，主治风湿筋痿；泽泻味甘寒平，主治风湿，益气。由此功用，方故先之。饭后药先，谓之后饭。②《古方选注》：麋衔祛在表之风，泽泻渗在里之湿，白术助脾胃之气以却邪。

09122 泽泻散

【方源】 《圣惠》卷二十九。

【组成】 泽泻三分 白龙骨一两 桑螵蛸一两(微炒) 车前子一两 狗脊二两

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 ①《圣惠》：虚劳内伤，肾气绝，小便余沥，不能自禁。②《圣济总录》：大虚损，内伤肾气，小便白浊。

09123 泽泻散

【方源】 《圣惠》卷五十八。

【组成】 泽泻一两 鸡苏一两 赤茯苓一两 石韦一两(去毛) 当归一两(锉，微炒) 桂心三分 槟榔一两 桑螵蛸半两(微炒) 枳壳半两(麸炒微黄，去瓤) 琥珀一两

【用法】 上为细散。每服二钱，煎葵子汤调下，不拘时候；木通汤调服亦得。

【主治】 冷淋，气淋，小便涩痛胀满。

①《圣惠》：冷淋，小便不通，涩痛胀满。②《医统》：气淋。③《嵩崖尊生》：先寒战，然后便数或淋。

【备考】 《圣济总录》有蒲黄一两。

09124 泽泻散

【方源】 《圣惠》卷五十八。

【组成】 泽泻一两 牡丹一两 牡蛎一两(烧为粉) 鹿茸一两(去毛，涂酥炙微黄) 桑螵蛸一两(微炒) 阿胶一两(捣碎，炒令黄燥) 赤茯苓一两

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以酒调下。

【主治】 遗尿，小便涩。

09125 泽泻散

【方源】 《幼幼新书》卷二十五引《家宝》。

【组成】 川泽泻 川郁金(生) 山栀仁(炒) 甘草(炙)各一分

【用法】 上为末。每服婴孩一字，二三岁半钱，五七岁一钱，甘草汤调下，日二次。再用青金散敷。

【主治】 ①《幼幼新书》引《家宝》：小儿肺积，鼻内生疮及鼻下赤烂。②《金鉴》：小儿风热客于肺经，而致鼻蕈疮，鼻下两旁色紫斑烂，脓汁浸淫，痒而不痛。

09126 泽泻散

【方源】 《云岐子脉诀》。

【组成】 赤茯苓 泽泻各半两 桑白皮 山栀子仁各一两

【用法】 上㕮咀。每服一两，水煎服，得小便利为度。

【主治】 小便赤涩，闭塞不通，脚酸疼，主脉沉，客脉洪。

09127 泽漆丸

【方源】 《圣惠》卷六十九。

【组成】 泽漆一两 甜葶苈一两(隔纸炒令紫

色，别捣） 桑根白皮一两（锉） 甘遂一两（锉，炒令黄） 牵牛子一两（生用） 昆布三分 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒，别捣） 枳实二两（麸炒微黄） 槟榔一两

【用法】 上为细末，研入甜葶苈、郁李仁，令匀细，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以温酒送下。

【主治】 妇人血分，通身浮肿，胸膈不利，腹胁胀闷，喘息气粗，不能饮食。

09128 泽漆汤

【方源】《金匮》卷上。

【组成】 半夏半升 紫参五两（一作紫菀） 泽漆三斤（以东流水五斗，煮取一斗五升） 生姜五两 白前五两 甘草 黄芩 人参 桂枝各三两

【用法】 上㕮咀。内泽漆叶中，煮取五升，温服五合，至夜尽。

【功用】 ①《金匮要略方义》：泻水逐饮，止咳消痰。②《张仲景药法研究》：逐水通阳，止咳平喘。

【主治】 水饮内结，咳喘浮肿，胸胁痛，脉沉。

①《金匮》：咳而脉沉者。②《脉经》：寸口脉沉，胸中引胁痛，胸中有水气。③《张氏医通》：上气咽喉不利。④《金匮释按》：久病咳喘，肺气不利，水道失于通调，水饮内蕴，泛溢肌肤而出现浮肿。

【方论选录】 ①《法律》：血结则痰气必为外裹，故用泽漆之破血为君，加入开痰下气、清热和荣诸药，俾坚叠一空，元气不损，制方之意若此。②《金鉴》：脉沉为水，以泽漆为君者，因其功专于消痰行水也。水性阴寒，桂枝行阳气以导之。然所以停水者，以脾土衰不能制水，肺气逆不能通调水道，故用人参、紫苏、白前、甘草补脾顺肺，同为制水利水之方也。黄芩苦以泄之，半夏、生姜辛以散之也。③《金匮要略心典》：泽漆汤以泽漆为主，而以白前、黄芩、半夏佐之，则下趋之力较猛；虽生姜、桂枝之辛，亦只为下气降逆之用而已，不能发表也。仲景之意，盖以咳皆肺邪，而脉浮者，气多居表，故驱之使从外出为易，脉沉者，气多居里，故驱之使从下出为易，亦因势利导之法也。④《金匮要略诠释》：方中泽漆逐水，消痰之力为猛；桂枝通阳，温化水气；紫菀、白前温肺，止咳平喘；生姜、半夏健胃涤痰、散饮；黄芩清肺，除水饮郁生之热；人参、甘草扶正健脾，运化水湿。本方先煎泽漆，汤成之后入诸药，取其逐饮为先，领诸药而治咳逆之气。

【临证举例】 ①肺胀 《成都中医学院学报》（1978；2：106）：曾某某，男，50余岁，农民。形体尚壮实，三年来长期咳嗽，吐泡沫痰挟少量稠粘痰，时作喘息，甚则不能平卧，咳喘冬夏均有发作，无外感时也可突然发作，面目及四肢凹陷性浮肿，饮食尚佳，口渴喜饮，口腻，大便时干时稀，小便短少，曾服小青龙、射干麻黄、杏苏散、苓甘五味姜辛汤等，均无显效，时作时止。舌苔薄白有津，舌根苔微黄，脉不浮而见沉滑。诊为肺胀，水饮内停，气郁化热。投泽漆汤原方。一剂咳吐痰涎明显减少，腹泻二次。再进四剂，诸证痊愈。观察三年未复发。②支饮咳嗽 《中医杂志》（1986；4：19）：许某，女，65岁。咳喘有年，日夜屈膝跪卧，食少便溏，脾虚不能运化，肺伤不能通调，则饮居胸阳而胸满心悸，水泛肤表而面浮身肿。况年逾花甲，阴盛阳衰，故拟泽漆汤加减。处方：泽漆9克，桂枝9克，炙麻黄6克，杏仁9克，党参9克，法半夏9克，炙甘草6克，炙紫菀9克，生姜3片。先煮泽漆，滤汁代水煎药。服4剂后，喘平肿消，胃开能食。此饮去阳复之兆，嘱其早服香砂六君子丸，晚用济生肾气丸以善后。

09129 泽漆汤

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】 泽漆 防己 甜葶苈（纸上炒） 郁李仁（汤浸，去皮，炒）各半两 百合 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 桑根白皮（锉） 木通（锉） 赤茯苓（去黑皮）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加大枣二枚（擘破），同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 三焦不调，上乘于肺，时发喘咳，身体浮肿，坐卧不安。

09130 泽漆汤

【方源】《三因》卷十四。

【组成】 泽漆（洗去腥）五两 桑白皮六两（炙） 射干（泔浸） 黄芩 茯苓 白术各四两 泽泻 防己各二两

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水三盏，乌豆一合，煎二盏，纳药，同煎七分，去滓，空腹温服，一日三次。

【主治】 石水，四肢瘦，腹肿，不喘，其脉沉。

09131 治中汤

【方源】《易简方》。

【组成】 人参 干姜 白术 甘草 橘红各二两

【用法】 水煎服。干霍乱，欲吐不吐者，先以盐

汤少许顿服，候吐出令透，即进此药。

【主治】 霍乱吐泻。及干霍乱心腹作痛，欲吐不吐，欲下不下。

09132 治虫散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 白芷散。

【组成】 桂枝一分 熟地黄二分 藁本 白芷各三分 当归身 益智仁 黄连各四分 羌活五分 吴茱萸八分 草豆蔻 黄耆 升麻各一钱 羊胫骨灰二钱 麻黄（不去节）二钱五分

【用法】 上为细末。先用温水漱口，净擦之。

【主治】 大寒犯脑，牙齿疼痛，及虫痛，胃经湿热肿痛。

09133 治汗汤

【方源】 方出《丹溪心法附余》卷十九，名见《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】 防风 黄耆 白术 麻黄根 牡蛎（洗净，煅过）各一两

【用法】 用水一钟，小麦一撮，煎至六分，温服。

【主治】 ①《丹溪心法附余》：气虚不足，津液枯竭，体常自汗，昼夜不止，日渐羸瘦。②《杂病源流犀烛》：表虚，汗出漆漆。

09134 治肠丸

【方源】《普济方》卷二〇八。

【组成】 黄连（去须） 干姜（炮） 肉豆蔻（面裹，煨香） 赤石脂 龙骨 吴茱萸（汤洗，微炒）各半两 诃子（煨，去核）一两半

【用法】 上为细末，粳米饭为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前以米饮送下。

【主治】 肠胃虚湿，泄泻频并，米谷不化，腹胀肠鸣，脐腹痛，肠滑洞下。

09135 治毒散

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】 当归 甘草 大黄各五钱 金银花少许

【用法】 上㕮咀。水、酒各一盏，煎至一盏，去滓，露一宿，温服。

【主治】 便毒。

09136 治疣汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 桃仁9克 红花9克 熟地9克 归尾9克 赤芍9克 川芎6克 白术6克 炮山甲6克 首乌6克 板蓝根15克 夏枯草15克

【用法】 水煎服。

【主治】 寻常疣。

09137 治疣汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【异名】 治瘊汤（《中西医结合皮肤病学》）。

【组成】 熟地12克 杜仲6克 赤小豆9克 牛膝9克 丹皮9克 红花9克 白术9克 桃仁9克 赤芍9克 白芍12克 穿山甲3克 何首乌6克

【用法】 水煎，分两次服，每次用烧酒30毫升作引子。

【功用】《中西医结合皮肤病学》：养血化瘀，脱瘊止痒。

【主治】 ①《中医皮肤病学简编》：青年扁平疣。②《中西医结合皮肤病学》：寻常疣，扁平疣，瘢痕疙瘩，瘙痒证，硬皮病，银屑病，症见皮肤干燥，刺瘊或扁平瘊，有厚鳞屑性皮疹，脉滑，舌质紫红，或有瘀斑。

【方论选录】 熟地、白芍、何首乌养血润燥；丹皮、赤芍、桃仁、红花活血化瘀；牛膝引药下行，杜仲入肾；白术、赤小豆健脾利湿；穿山甲通络化瘀；白酒引药上行于一身之表。故该方可治一切皮肤肌表血燥血瘀之证，不限于治疣。

09138 治疣汤

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】 桑叶 菊花 黄芩 紫草 夏枯草 益母草 珍珠母 生牡蛎 代赭石 板蓝根

【用法】 水煎服。

【功用】 平肝散风，活血解毒。

【主治】 疣。

09139 治疟母丸

【方源】《广笔记》卷一。

【组成】 鳖甲（醋炙）四两 䗪虫（煅存性，研极细）一两半 广橘红一两五钱 射干（晒干）一两 青皮（醋炒）八钱 人参八钱 肉桂（去皮）六钱 干漆（煅烟起存性，研如飞尘）五钱

【用法】 上为极细末，醋煮稀糊糊和丸，如梧桐子大。每服四钱，空心以淡姜汤送下。

【主治】 疟母。

09140 治消渴丸

【方源】《普济方》卷一七七引《十便良方》。

【组成】 麦门冬（用上元柏桥鲜肥者）二大两 黄连（九节大者）一两

【用法】 上为末，以肥苦瓜汁浸麦门冬经宿，然后去心，即于臼中捣烂，纳黄连末臼中，和捣为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后饮送下，一日二次。但服两日，其渴必定。若重者每一服一百五

十丸，第二日一百二十丸，第三日一百丸，第四日八十丸，第五日依次服之，至少可每日只服二十五丸。服讫觉虚，即取白羊头一枚，净去毛洗了，以水三大斗煮令烂，去头取汁，可一斗以来，细细服之，亦不用著盐，不过三剂平复。

【主治】 消渴。

09141 治风黄耆汤

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】 黄耆一两半 防风 远志 地骨皮 人参 茯苓 大黄各一两 知母二两

【用法】 上为末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】 漏睛脓出外障。初患之时，微有头旋昏闷，四体如劳，五脏多积风气壅毒，致令疮出于眼中，或流清涎，虽然不痛，渐加昏暗。

【备考】 本方方名，《普济方》引作"防风汤"。《眼科全书》有熟地黄、麦门冬。

09142 治要茯苓散

【方源】《校注妇人良方》卷三。

【组成】 麦门冬 茯神各一两半 通草 升麻各一两二钱半 赤石脂一两七钱五分 知母一两 大枣十二枚 紫菀 桂心各七钱五分 淡竹茹五钱

【用法】 上为末。每服一两，水煎服。

【主治】 心经实热，口干烦渴，眠卧不安，或心神恍惚。

【临证举例】 惊悸 《保婴撮要》：一小儿惊悸，睡卧不安，发热饮冷。用治要茯苓散而愈。

09143 治要除湿汤

【方源】《直指》卷十三。

【异名】 除湿汤(《医统》卷十七)。

【组成】 半夏曲 川厚朴（制） 苍术（炒）各二两 藿香叶 陈皮 茯苓各一两 甘草（炙）七钱

【用法】 上锉散。每服四钱，生姜七片，大枣一枚，水煎服。

【主治】 ①《直指》：霍乱吐泻。②《医方集解》：伤湿腹痛，身重足软，大便溏泻。

【加减】 霍乱泻而不吐，加桂；吐而不泻，去苍术，加桂、丁香；吐泻俱作，兼腹痛，加桂。

09144 治疫清凉散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 秦艽 赤芍 知母 贝母 连翘各一钱 荷叶七分 丹参五钱 柴胡一钱五分 人中黄二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 疫邪入里，腹胀满闷，谵语发狂，唇焦口渴。

【加减】 伤食胸满，加麦芽、山楂、萝卜子、陈皮；胁下痞，加鳖甲、枳壳；昏惯谵语，加黄连；热甚大渴，能消水，加石膏、天花粉、人参；便闭不通，腹中胀痛，加大黄；虚人自汗多，倍加人参；津液枯少，更加麦冬、生地。

【方论选录】《证因方论集要》：人中黄甘寒入胃，能解五脏实热；柴胡、秦艽撤寒热邪气；知母、贝母存津液以杜劫灼；丹参、赤芍和营；连翘泻火；荷叶升发胃气。

09145 治浊固本丸

【方源】《医学正传》卷六引东垣方。

【组成】 莲花须 黄连（炒）各二两 白茯苓 砂仁 益智 半夏（汤泡七次，去皮脐） 黄柏（炒）各一两 甘草（炙）三两 猪苓二两五钱

【用法】 上为末，蒸饼为丸。每服五十丸，空心以温酒送下。

【功用】《全国中药成药处方集》：固本兼利湿热。

【主治】 下焦湿热，便浊遗精，小便频数。

①《医学正传》引东垣方：便浊遗精。②《医方考》：胃中湿热，渗入膀胱，浊下不禁。③《全国中药成药处方集》：湿热精浊，小便频数，白浊不止。

【方论选录】 ①《医方考》：半夏所以燥胃中之湿；茯苓、猪苓所以渗胃中之湿；甘草、砂仁、益智，香甘益脾之品也，益脾亦所以制湿；而黄连、黄柏之苦，所以治湿热；莲花须之涩，所以止其滑泄耳。名之曰固本者，胃气为本之之谓也。②《医方集解》：此足少阴、太阳、太阴药也。精浊多由湿热与痰，黄连泻心火，黄柏泻肾火，所以清热；二苓所以利湿；半夏所以除痰；湿热多由于郁滞，砂仁，益智辛温利气，又能固肾强脾，既以散留滞之气，且少济连、柏之寒；甘草利中而补土；惟莲须之涩，则所以固其脱也。

09146 治痢保和丸

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】 广陈皮 法半夏 白云苓 陈枳壳 川厚朴 正雅连 京楂肉 六神曲 老麦芽各一钱 南木香 尖槟榔 炙甘草各五分

【用法】 上为细末，另以神曲煮糊为丸。每服一二钱，以米饮送下。

【主治】 小儿痢疾，积滞未尽，或在先原未得下，今已脾虚不可下者。

09147 治痢绝妙丸

【方源】《奇效良方》卷十三。

【组成】 金樱花叶及子 罂粟壳（去蒂萼，醋炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如手指头大。五色痢用春茶陈皮煎汤送下。如为末，用蜜一匙，春茶、乌梅煎汤调服。

【主治】 痢疾。

09148 治痰茯苓丸

【方源】《百一》卷五引《全生指迷方》。

【异名】 茯苓丸（《妇人良方》卷三）、消痰茯苓丸（《直指》卷十八）、指迷茯苓丸（《玉机微义》卷四）、千金指迷丸（《医学入门》卷七）、世传茯苓丸（《准绳·女科》卷二）、茯苓指迷丸（《不居集》上集卷十七）、指迷丸（《金鉴》卷四十一）。

【组成】 茯苓一两 枳壳（麸炒，去瓤）半两 半夏二两 风化朴消一分

【用法】 上为细末，生姜自然汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以生姜汤送下。

【功用】 ①《医学入门》：潜消痰积。②《中医治法与方剂》：燥湿导痰。

【主治】 痰浊内阻，手臂酸痛或抽掣，不能举物，肢体麻木，眩晕，梅核气，癫病，及妇人产后发喘，四肢浮肿。

①《百一》引《指迷方》：臂痛不能举手，或左右时复转移，由伏痰在内，中脘停滞，脾气不流行，与上气搏，四肢属脾，滞而气不下，故上行攻臂。其脉沉细。②《准绳·女科》：手臂抽牵或战掉不能举物。及脾气虚弱，痰邪相搏，停伏中脘，以致臂内筋脉挛急而痛。③《法律》：妇人产后发喘，四肢浮肿。④《中医治法与方剂》：痰浊内阻的眩晕及颠疾。

【宜忌】《医方论》：非大实者不可轻投。

【方论选录】 ①《医方考》：半夏燥湿，茯苓渗湿，湿去则饮不生；枳实削坚，风化消软坚，坚去则痰不固。②《成方便读》：方中以半夏化其痰，茯苓行其湿，枳壳破其气，而以姜汁开之，芒消下之，用法之周到，佐使之得宜，其痰有不去者乎。③《中医治法与方剂》：本方以小半夏加茯苓汤为基础，加枳壳和风化消而成。小半夏汤为著名的燥湿祛痰，降逆止呕剂。本方用之以燥湿浊而祛痰涎，配枳壳调畅气机，气行则痰湿亦行；又以茯苓利水渗湿，导水湿痰浊从前阴而出；风化消软坚涤痰，导痰浊从大便而出，共呈燥湿行气，消解顽痰功效。

【临证举例】 ①手臂抽掣 《百一》引《指迷方》：累有人为痰所苦，夜间两臂常若有人抽牵，两手战灼，至于茶盏亦不能举，只以此药治之，皆随服随愈。②肢体麻木 《四川中医》（1984；4：48）：冯某，女，50岁，右侧腓肠肌外缘麻木三个月，面积约有4×6cm。查患者舌象正常，脉滑实，乃痰客经络，血脉失养所致，疏方指迷茯苓丸，服12剂获验。③梅核气《四川中医》（1984；4：48）：赵某，女，36岁，咽嗌不适半年，如物堵塞，咯之不出，咽之不下。经耳鼻咽喉科检查无异常，脉滑，苔白，遂断为"梅核气"，方投指迷茯苓丸，服10剂后病愈。④癫病 《河北中医》（1984；4：47）：陈某某，女，46岁，因家务事发生口角后，遂至精神抑郁，烦躁易怒，寡言少语，食欲减退，呕吐痰涎，时而胡言乱语，曾用西药氯丙嗪、谷维素、安定等不效。患者表情淡漠，语无伦次，舌质淡，苔白厚腻，脉滑数，自感胸中有物堵塞。此留饮为患，疏指迷茯苓丸方加减：茯苓12克、枳壳12克、半夏9克、芒消12克、远志12克、石菖蒲12克、生姜3片，进2剂，大便通利；诸症遂减，食欲有增。后减芒消为9克，继进3剂而愈。

09149 治老人不寐丸

【方源】《外科传薪集》。

【组成】 六味地黄丸一料加麦冬四两 黄连三钱炒枣仁五两 肉桂五两 当归三两 甘菊花三两（要家种者） 白芥子三两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。每日五钱，饭前以白滚水送下。

【主治】 老人不寐。

09150 单兵散

【方源】 方出《证类本草》卷十三引《简要济众》，名见《产科发蒙》卷二。

【组成】 白槟榔一个（鸡心大者）

【用法】 上为末。用童便、生姜汁、温酒共半盏，调作一服。不拘时候。

【主治】 ①《证类本草》引《简要济众方》：脚气冲心。②《产科发蒙》：子痫。

09151 单方葶苈散

【方源】 方出《圣惠》卷六十一，名见《得效》卷五。

【异名】 葶苈散（《普济方》卷一六二）。

【组成】 甜葶苈二两半（隔纸炒，令紫）

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，煎至六分，不拘时候温服。

【主治】 肺痈咳唾脓血，喘嗽不得睡卧。

09152 单仙遗粮丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 仙遗粮一两

【用法】 上为末，蜜为丸如梧桐子大。每服五十丸，川椒煎汤送下。

【主治】 杨梅疮。鼻崩眉落，筋缓骨拳者。

09153 单骑溃围散

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】 皂角末

【用法】 醋调，厚敷肿处。

【主治】 急喉痹。

09154 单煮青皮汤

【方源】《医学正传》卷六引丹溪方。

【组成】 青皮四钱（细切）

【用法】 以水一盏半，煎一盏，一日服二次。

【主治】 妇人百不如意，久积忧郁，乳房内有核，如鳖棋子。

09155 宝光散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】 大黄 龙胆 赤芍药 川芎 白芷 牛蒡子 防风 防己 黄芩 当归 甘草 栀子 生地黄 细辛 羌活 荆芥各等分

【用法】 上㕮咀。用水一钟半，煎至一钟，去滓，食后温服。

【主治】 小儿五脏冷热相攻，致目中漏睛脓出者。

09156 宝精丸

【方源】《医学正印》卷上。

【组成】 白亮鱼胶八两（切作短块，用牡蛎八两炭火煅过，研末同炒。须炒得不可焦黑，黄色为度，去末用胶） 熟地黄四两 山药三两 人参二两（虚甚加一两） 沙苑蒺藜八两（酒洗，去衣，竹刀切开，去白膜） 白茯苓四两（去皮，切片，入乳拌晒三次） 牛膝三两（去芦，择粗壮者切碎，酒拌，微炒） 甘州枸杞四两（去蒂与枯者，乳汁拌，晒干，如此者五次） 鹿胶二两 菟丝子三两（水淘净，酒蒸熟，捣烂，晒干） 山茱萸肉四两（酒拌，烘干） 当归二两（去芦尾，取明亮者，酒洗，切片，晒干，微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，早晚淡盐汤送下。

【功用】 种子，添精补髓，滋阴壮阳，健步明目益年。

09157 定风丸

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】 川乌 附子 草乌（俱生姜煮过用）各一两五钱 川椒一两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如绿豆大。每服九丸，不可多服，空心酒送下，一日三次。

【主治】 半身不遂，日夜疼痛不绝声者。

09158 定风丹

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生明乳香三钱 生明没药三钱 朱砂一钱 全蜈蚣（大者）一条 全蝎一钱

【用法】 上为细末。每服分许，小儿哺乳时置其口中，乳汁送下，每日约五次。

【主治】 初生小儿绵风，其状逐日抽掣，绵绵不已，亦不甚剧。

【临证举例】 绵风 献县刘姓之婴孩，抽绵风不已，夜半询访，知病危急，适有按小儿风证方所制定风丹，与以少许，服之立止，永未再犯。

【备考】 能因证制宜，再煮汤剂以送服此丹，则尤效。

09159 定风汤

【方源】《医方考》卷五。

【组成】 牙皂角（炙）一寸（去皮） 白石膏五钱 朴消一钱 荆芥一钱 葱白三寸

【用法】 漱牙。

【主治】 风热牙疼，喜寒恶热者。

【方论选录】 内生风热，并于一颊，邪火自实，因致牙疼。故得寒饮则阴阳微和，而痛少可；得热饮则以火济火，而痛益深。是方也，用牙皂、荆芥、葱白之辛温以散其风；用朴消、石膏之咸寒以驱其热。

09160 定风酒

【方源】 方出《奇方类编》卷上，名见《仙拈集》卷一。

【组成】 生地 熟地 枸杞 木通 牛膝 川芎 薏苡仁 当归 金银花各二两 五加皮 苍术各一两 川乌 草乌各五钱 甘草 黄柏各五钱 松节四两

【用法】 上药用烧酒十六斤，煮三炷香时，埋土内退火气。早、中、晚三服之。

【主治】 中风半身不遂，日夜筋骨疼痛。

09161 定风膏

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷三。

【组成】 全蝎（头尾全者）四十九个（去毒，每个用生鲜薄荷一叶裹之，用丝缚定，火上焙燥，研为末） 朱砂 麝香各少许

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。食远

以钩藤煎汤研化服。

【主治】 胎痫。因胎中受惊，或因食毒所感，其候身热面青，手足搐掣，牙关紧急，腰直身强，睛斜目闭，多啼不乳，频愈频发者。

09162 定心丸

【方源】《得效》卷十六。

【异名】 定志丸(《眼科菁华》卷上)。

【组成】 石菖蒲 甘菊 枸杞子各半两 辰砂二钱 远志一分（去心） 麦门冬一两（去心）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后熟水送下。

【主治】 脅肉攀睛、或先赤烂多年，肝经为风热所冲而成，或痒或痛，或起筋膜，心气不宁，忧思不已。

09163 定心丸

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】 人参 白术 茯苓 枳实（面炒） 石莲肉（去心） 陈皮 韭子（炒）各一两 半夏 远志（去骨） 酸枣仁各五钱 牡蛎（煅）三钱 甘草（炙）一钱半

【用法】 上为末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤送下。

【主治】 妄想太过，遗精。

【加减】 久则加干姜（炒黑）三钱，樗根白皮五钱。

09164 定心汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】 茯苓四两 桂心 甘草（炙） 白芍药 干姜（炮） 远志（去心，炒） 人参各二两

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，加大枣两个，煎七分，去滓，食前温服。

【主治】 心劳虚寒，惊悸，恍惚多忘，梦寐惊魇，神志不定。

09165 定心汤

【方源】《简易方》引《叶氏录验方》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 茯神（去木） 黄耆（蜜炙）各三两 白术 赤石脂（研） 川芎 厚朴（姜汁制） 紫菀茸 防风各二两 麦门冬（去心）一两半 官桂（去皮） 甘草（炙）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，加赤小豆七十粒，煎七分，去滓，食后通口服。

【主治】 心气不足，营血衰少，多畏不乐，精神昏昧，魂魄飞扬，心神离散，梦中失精，白浊。

09166 定心汤

【方源】《袁中参西》上册。

【组成】 龙眼肉一两 酸枣仁（炒，捣）五钱 萸肉（去净核）五钱 柏子仁（炒，捣）四钱 生龙骨（捣细）四钱 生牡蛎（捣细）四钱 生明乳香一钱 生明没药一钱

【主治】 心虚怔忡。

【加减】 心因热怔忡者，酌加生地数钱。

【方论选录】《内经》谓“心藏神”，神既以心为舍宇，即以心中之气血为保护，有时心中气血亏损，失其保护之职，心中神明遂觉不能自主而怔忡之疾作焉。故方中用龙眼肉以补心血，枣仁、柏仁以补心气，更用龙骨入肝以安魂，牡蛎入肺以定魄。魂魄者心神之左辅右弼也，且二药与萸肉并用，大能收敛心气之耗散，并三焦之气化亦可因之团聚。特是心以行血为用，心体常有舒缩之力，心房常有启闭之机，若用药一于补敛，实恐于舒缩启闭之运动有所妨碍，故又少加乳香、没药之流通气血者以调和之。其心中兼热用生地者，因生地既能生血以补虚，尤善凉血而清热，故又宜视热之轻重而斟酌加之也。

09167 定血散

【方源】《医方类聚》卷二一〇引《医林方》。

【组成】 贯众（去毛，微炒）不以多少

【用法】 上为极细末。每服三钱，酒、醋、水各一盏同煎，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇人崩中，败血过多。

09168 定志丸

【方源】《医心方》卷三引《深师方》。

【组成】 人参二两 茯苓二两 菖蒲二两 远志二两 防风二两 独活二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，一日二次。

【功用】 定风气。

【主治】 恍惚健忘，怔忡恐悸，志不定。

09169 定志丸

【方源】《古今录验》引陈明方（见《外台》卷十五）。

【异名】 开心丸(《医心方》卷二十六引《医门方》)、远志丸(《扁鹊心书·神方》)。

【组成】 菖蒲 远志（去心） 茯苓各二分 人参三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七丸，一日三次。

【功用】《局方》：益心强志，令人不忘。

【主治】 ①《古今录验》引陈明方（见《外台》）：心气不定，五脏不足，甚者忧愁悲伤不乐，忽忽喜忘，朝愈暮剧，或暮愈朝发，发则狂眩。②《准绳·类方》：能近视，不能远视。

【宜忌】 忌酢物、羊肉、饧。

【方论选录】《医方集解》：此手少阴药也。人参补心气，菖蒲开心窍，茯苓能交心气于肾，远志能通肾气于心。心属离火，火旺则光能及远也。

09170 定志丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】 人参（去芦头） 白茯苓（去皮） 石菖蒲 远志（去心） 龙齿 酸枣仁（微炒） 铁粉（别研） 麦门冬（去心，焙干） 朱砂（飞过） 乳香（别研） 麝香（别研） 琥珀（别研）各等分

【用法】 上为细末，次入朱砂、铁粉同研匀，绞生地黄汁浸蒸饼为丸，如梧桐子大，别用朱砂为衣。每服二十丸，食后、临卧温熟水送下。

【主治】 怔忡健忘，精神恍惚，睡卧不宁，一切心疾。

09171 定志丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 柏子仁 人参 茯苓 远志（去心） 茯神 酸枣仁

【用法】 上为末，酒糊为丸，如小豆大。每服五七十丸，生姜汤送下。

【功用】《医部全录》：安魂定魄。

【主治】《医部全录》：落马堕井，或因打扑，便生心恙者。

09172 定志丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 远志（甘草水浸，去心） 石菖蒲各二两 人参一两 白茯神（去木）二两 黄柏（酒炒）二两 蛤粉（炒） 一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，空腹米汤送下。

【主治】 白浊经年不愈，或时梦遗，形体瘦弱。

09173 定志汤

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】 菖蒲 茯神 当归 橘皮各一钱 远志 人参各一钱二分 甘草五分（炙）

【用法】 上㕮咀，水煎，食前热服。

【主治】 言语失伦，常常戏笑而不发狂，属心虚者。

【加减】 如有痰，加半夏七分，生姜三片。

09174 定岩散

【方源】《古方选注》卷下。

【异名】 托里散（《古方汇精》卷三）、定痛散（《医方歌括》）、乳岩散（《梅氏验方新编》卷二）。

【组成】 猳鼠粪（两头尖）二钱 七棟实二钱（经霜有核者佳，不用川棟） 露蜂房二钱

【用法】 上猳存性，各取净末二钱，和匀。每服三钱，酒送下，间两日一服。

【功用】 止痛干脓，收敛合口。

【主治】 乳癌溃烂经年，仅存内膜者。

【方论选录】 定，止也，溃岩服之，痛定而烂止也。猳鼠粪性主走阴，专入厥阴血分，通经下乳。棟实用土者，取其微苦力薄，走中焦乳间泄热，不似川棟力厚，直行下焦。露蜂房入阳明经，驱肝经风毒犯胃，有收敛之性，凡外疡之毒根在脏腑者，非此不愈。

09175 定命丹

【方源】《局方》卷十。

【异名】 定命丸（《圣济总录》卷一七二）。

【组成】 青黛（研）半钱 蝤酥（干者，酒浸一宿）一钱 干蝎（全者，微炒）七个 麝香（研）一字 白附子（炮，为末）半分 天南星（炮，为末）一分（一本不用天南星）

【用法】 上为细末，以粟米粥为丸，如绿豆大，别以青黛为衣。每服一丸，荆芥、薄荷汤送下，后困睡无疑。但有患者，先化半丸，滴入鼻中，嚏喷者必愈。

【主治】 小儿急慢惊风，天钓撮口，潮发搐搦，奶痫壮热，昏塞不省。

09176 定命饮

【方源】《婴童百问》卷二。

【组成】 半夏 茯苓 木香 生姜各一钱 白术 甘草（炙） 天麻各五分

【用法】 上为末。每服半钱，生姜、大枣煎汤调下。

【主治】 ①《婴童百问》：慢惊。②《赤水玄珠》：慢惊吐泻困沉，欲传慢脾。

09177 定命散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】 蜈蚣一条（全者） 乌蛇（项后取） 白花蛇（项后取）各一寸（先酒浸，去骨，并酒炙）

【用法】 上为细散。每服二钱至三钱匕，煎酒小沸调服。

【主治】 破伤风，项颈紧硬，身体强直。

09178 定命散

【方源】《婴童百问》卷一引《活幼方》。

【组成】 蝉蜕十四个（去嘴脚） 全蝎十四个（去毒）

【用法】 上为细末，加轻粉少许和匀。每服少许，乳前用乳汁调下。

【主治】 初生儿口噤不开。

09179 定肺汤

【方源】《直指》卷八。

【异名】 定喘汤（《医方类聚》卷一一九）。

【组成】 紫菀茸 北五味子 橘红 杏仁（去皮尖，略炒） 甘草（炙） 真苏子（炒） 桑白皮（炒） 半夏（制） 枳壳（制）各等分

【用法】 上锉细。每服三钱，加生姜五片，紫苏五叶，食后煎服。

【主治】 上气喘嗽。

09180 定沸汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 熟地二两 山茱萸一两 麦冬一两 北五味二钱 茯苓一两 山药一两 玄参一两 白芥子三钱

【用法】 水煎服。宜连服十剂。

【主治】 肾热而火沸为痰，吐痰纯是白沫，咳嗽不已，日轻夜重。

09181 定经汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】 菟丝子一两（酒炒） 白芍一两（酒炒） 当归一两（酒洗） 大熟地五钱（九蒸） 山药五钱（炒） 白茯苓三钱 芥穗二钱（炒黑） 柴胡五分

【用法】 水煎服。

【功用】 舒肝肾之气，补肝肾之精。

【主治】 妇人经来断续，或前或后无定期。

09182 定胃汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】 熟地三两 山茱萸三两 肉桂三钱 茯苓三钱

【用法】 水煎服。一剂而吐止，十剂而病痊愈。

【功用】 大补肾中之水火。

【主治】 反胃，朝食暮吐，暮食朝吐。

09183 定神丸

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】 白茯苓（去黑皮） 远志（去心） 防风（去叉） 人参 柏子仁（炒）各一两一分 龙骨一两半 牡蛎（煅） 枣（去皮核，取肉，焙）各二两 甘草（炙，锉） 一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服二十丸，加至三十丸，温熟水送下，一日二次。

【主治】 阳厥狂怒。

09184 定神丸

【方源】《钱氏家藏方》卷十。

【组成】 白茯苓（去皮）二两 人参（去芦头）一两 白附子一两（炮） 酸枣仁一两半（炒） 麝香一分（别研） 辰砂半两（别研）

【用法】 上为细末，汤泡蒸饼为丸，如绿豆大，金箔为衣。每服三十丸，食后、临卧煎人参汤送下。

【主治】 心气虚弱，神志不宁，睡卧不安。

09185 定眩饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 明天麻 青皮 薄荷 柴胡 半夏各二钱 山茱萸 龙胆草 枳壳 黄连各一钱

【用法】 水煎，温服。

【主治】 头眩眼花。

09186 定疼汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 独活 羌活 藁本各二钱 川芎 甘草 防风 前胡 当归各一钱五分 陈皮 肉桂 苏子各八分

【用法】 酒煎，温服。

【主治】 寒痰不散，肩背项脊痛，并背心痛。

09187 定疼散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】 细茶叶 朴消 白芷 细辛 钟乳石 花椒各一两 冰片 麝香各一分

【用法】 上为末。每日早、晚擦之。

【主治】 虫牙作痛，不可忍者。

09188 定悸饮

【方源】《观聚方要补》卷五。

【组成】 李根皮一钱二分 茯苓 桂枝 白术 牡蛎各一钱 吴茱萸五分 甘草少许

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 奔豚。

09189 定喘丸

【方源】《普济方》卷三八七。

【组成】 麻黄（去节）三分 杏仁（去皮尖，炒）半钱 甘草（猪胆十个炙）三钱 栀子三钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。桑白皮汤吞下。

【主治】 痰喘。

09190 定喘汤

【方源】《妇人良方》卷六。

【组成】 半夏曲（炒） 明阿胶（炒） 甘草各一

钱半 罂粟壳半两（制） 五味子 桑白皮 麻黄（去节） 人参各一分 上姜三片 乌梅半个

【用法】 每服三大钱，加生姜三片，乌梅半个，煎至七分，去滓，食后临卧渐渐温服。

【主治】 丈夫、妇女远年近日肺气咳嗽，上气喘急，喉中涎声，胸满气逆，坐卧不安，饮食不下。及肺感寒邪，咳嗽声重，语声不出，鼻塞头昏。

09191 定喘汤

【方源】 《摄生众妙方》卷六。

【异名】 千金定喘汤（《寿世保元》卷三）、白果定喘汤（《李氏医鉴》卷五）、千金汤（《杂病源流犀烛》卷一）。

【组成】 白果二十一个（去壳，砸碎，炒黄色） 麻黄三钱 苏子二钱 甘草一钱 款冬花三钱 杏仁一钱五分（去皮尖） 桑皮三钱（蜜炙） 黄芩一钱五分（微炒） 法制半夏三钱（如无，用甘草汤炮七次，去脐用）

【用法】 上药用水三钟，煎二钟，作二服。每服一钟，不用姜，不拘时候徐徐服。

【功用】 ①《中医方剂临床手册》：宣肺平喘，清热化痰。②《方剂学》：宣肺降气，祛痰平喘。

【主治】 风寒外束，痰热蕴肺，哮喘咳嗽，痰稠色黄，舌苔黄腻，脉滑数。现常用于支气管哮喘、喘息性支气管炎、毛细支气管肺炎等。

①《摄生众妙方》：哮喘。②《景岳全书》：诸喘久不愈。③《寿世保元》：齁喘气急。④《医方考》：肺虚感寒，气逆膈热，作哮喘者。⑤《中医方剂临床手册》：痰热哮喘，咳嗽气急，痰多色黄，喉中有哮鸣声者。⑥《医方发挥》：风寒外束，痰热内蕴所致的哮喘证。症见痰多气急，痰稠色黄，或有表证恶寒发热，苔黄腻，脉滑数。

【宜忌】 《医方发挥》：新感风寒，无汗而喘，内无痰热者不宜用；哮喘日久，气虚脉弱者不宜用。

【方论选录】 ①《医方考》：声粗者为哮，外感有余之疾也，宜用表药；气促者为喘，肺虚不足之证也，宜用里药。寒束于表，阳气不得泄越，故上逆；气并于膈，为阳中之阳，故令热。是方也，麻黄、杏仁、甘草辛甘发散之物也，可以疏表而定哮；白果、款冬花、桑皮清金保肺之物也，可以安里而定喘；苏子能降气，半夏能散逆，黄芩能去热。②《医方集解》：此手太阴药也。表寒宜散，麻黄、杏仁、桑皮、甘草辛甘发散，泻肺而解表。里虚宜敛，款冬温润，白果收涩定喘而清金。苏子降肺气，黄芩清肺热，半夏燥湿痰，相助为理，以成散寒疏壅之功。③《成方便读》：夫肺为娇脏，畏寒畏热，其间毫发不容，其性亦以下行为顺，上行为逆。若为风寒外束，则肺气壅闭，失其下行之令，久则郁热内生，于是肺中之津液郁而为痰，哮咳等疾所由来也。然寒不去则郁不开，郁不开则热不解，热不解则痰亦不能遽除，哮咳等症何由而止。故必以麻黄、杏仁、生姜开肺疏邪；半夏、白果、苏子化痰降浊；黄芩、桑皮之苦寒，除郁热而降肺；款冬、甘草之甘润，养肺燥而益金，数者相助为理，以成其功。宜乎喘哮固疾，皆可愈也。

【临证举例】 ①喘息性支气管炎 《新医药》（1972；9:14）：用定喘汤治疗慢性喘息性气管炎100例，其中合并肺气肿者73例，合并肺原性心脏病者2例，合并高血压者15例，合并陈旧性肺结核者11例，合并先天性心脏病者1例。患者均有反复咳嗽、气喘、痰多而黄，胸闷或发热等症。每日1剂，连服10剂为1疗程。除个别病例因继发感染加用鱼腥草、蒲公英外，其余未加任何药物。结果：显效以上占83%，好转14%，无效2例，总有效率为97%。本方经临床证实，确有较好的止咳、平喘、祛痰作用，且尚有滋养强壮功效。大多数患者服用后，胸闷消失，体重增加，神色精力均有明显好转。②毛细支气管炎 《浙江中医杂志》（1981；1:6）：用定喘汤治疗婴儿急性毛细支气管炎30例。其药物组成以定喘汤为主，高热加生石膏15克，地骨皮7克；腹泻加茯苓、车前子各7克；无腹泻者加竹沥15毫升，分三次服。合并心功能不全者，可根据不同情况，补充水及电解质，静脉给西地兰。结果30例均获痊愈，除2例喘憋稽延较长者外，余28例都在3天内哮鸣音消失，喘憋缓解。住院2～5天，平均4天。③哮喘 《上海中医药杂志》（1983；3:33）：用加减定喘汤治疗急性哮喘实证一年余，疗效显著。用药以定喘汤为主，痰难咳出者加葶苈子5克，胸痛加白芥子5克，胸闷加瓜蒌仁10克，胃纳差有瘀血者加生鸡内金6克。在应用时，只须脉弦数有力，有舌苔即可。④热带性嗜酸性白细胞增多症 《科技交流》（1975；2:65）：患者男，59岁，渐觉疲乏无力，出汗，全身关节酸软，头晕头痛。半月后开始干咳、胸闷，伴恶寒发热，咳嗽渐重而至阵发呼吸困难，状如支气管哮喘。经多方治疗无效。检查：白细胞7200/立方毫米，分类嗜酸性细胞占36%，血沉42毫米/小时，嗜酸性白细胞计数2072/立方毫米，脉弦数，舌红苔微黄。辨证属肺寒膈热之喘证。连服定喘汤50余剂，症状消失，嗜酸性白细胞计数降至172/立方毫米，白细胞分

类嗜酸性细胞降至4%，体力亦恢复。

【现代研究】 定喘汤中白果用量的实验研究《浙江中医杂志》(1989；3:123)：用超声雾化器喷雾0.4%磷酸组织胺10秒钟，观察豚鼠抽搐倒地时间，以测定定喘汤及其拆方之平喘作用。结果表明，定喘汤重用白果者比轻用者效果好，未用白果者较差。急性毒性实验显示，即使重用白果，也很安全。按150克/公斤体重给小白鼠灌胃，三天内饮食，活动均正常，无毒性反应，无死亡。

09192 定喘汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 麦门冬（去心） 人参各二钱 辽五味二十一个 麻黄五分 白术（土炒） 杏仁（去皮尖） 陈皮 葶苈子各一钱二分

【用法】 加黑枣二个，水煎，食远服。

【主治】 胃虚作喘，脉气无力，抬肩撷项，喘而不休。

09193 定喘膏

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】 麻油一两 蜜二两 生姜自然汁半两 紫菀 麻黄 杏仁 桔梗 细辛 半夏 人参各酌量

【用法】 慢火熬成黑漆，临睡服二三匙。

【功用】 定喘。

【主治】 哮喘。

09194 定痫丸

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 明天麻一两 川贝母一两 胆南星（九制者）五钱 半夏（姜汁炒）一两 陈皮（洗，去白）七钱 茯苓（蒸）一两 茯神（去木，蒸）一两 丹参（酒蒸）二两 麦冬（去心）二两 石菖蒲（石杵碎，取粉）五钱 远志（去心，甘草水泡）七钱 全蝎（去尾，甘草水洗）五钱 僵蚕（甘草水洗，去嘴，炒）五钱 真琥珀（腐煮，灯草研）五钱 辰砂（细研，水飞）三钱

【用法】 用竹沥一小碗，姜汁一杯，再用甘草四两熬膏，和药为丸，如弹子大，辰砂为衣。每服一丸，照五痫分引下：犬痫，杏仁五个煎汤化下；羊痫，薄荷三分煎汤化下；马痫，麦冬二钱煎汤化下；牛痫，大枣二个煎汤化下；猪痫，黑料豆三钱煎汤化下，一日二次。

【主治】 男、妇、小儿痫症或癫狂。

【加减】 加人参三钱尤佳。

09195 定痫丹

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】 人参三钱 当归三钱 白芍（炒）三钱 茯神 枣仁（炒）各五钱 远志（去心）三钱 琥珀三钱 天竺黄四钱 白术（土炒）五钱 橘红 半夏（姜制） 天麻各三钱 钩藤钩四钱 甘草（炙）二钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如榛子大。每服一丸，淡姜汤化下。

【主治】 阴痫，病退调理。

09196 定痛丸

【方源】《宣明论》卷十三。

【组成】 乳香一分 川椒 当归 没药 赤芍药 芎藭 自然铜 玄胡

【用法】 上为末，熔蜡为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，酒送下。打扑骨损者，先整骨定用竹夹，然后先用好酒下麻黄三钱，然后服药；骨碎者，先用竹夹夹定三五日，依旧小可与服。

【主治】 打扑损伤，筋骨疼痛。

09197 定痛丸

【方源】《医学正传》卷四引丹溪方。

【组成】 乳香 没药 金星草 地龙（去土，炒） 五灵脂 木鳖子（去壳）各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，温酒磨化下；或只作小丸，温酒送下亦可。

【主治】 一切风湿痛。

09198 定痛丸

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】 威灵仙 木鳖子（去壳） 川乌（炮，去皮脐） 防风（去芦） 香白芷 五灵脂 地龙（去土，炒）各半两 水蛭（糯米炒熟） 朱砂（水飞）各三钱

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大，以朱砂为衣。每服十丸，空心温酒送下；妇人红花酒送下。

【功用】 常服轻身壮骨。

【主治】 风虚走注疼痛。

09199 定痛丸

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】 南星（姜制） 川芎 苍术 黄柏（酒炒） 白芷各二两 桃仁 羌活 防己（酒浸） 桂枝 威灵仙各一两半（酒浸） 神曲二两 红花（酒浸）二钱五分 龙胆草一钱

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心白汤送下。

【主治】 上中下痛风。

09200 定痛丸

【方源】《简明医彀》卷三。

【组成】乳香一两半（另研） 没药（并出汗） 羌活 归尾各一两 两头尖（去皮，生用）五钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煮酒送下。

【主治】诸痹风湿流注，骨节疼痛麻痹。

09201 定痛丹

【方源】《外科集腋》卷一。

【组成】真鸦片 胡桃膈 乳香（去油） 没药（去油） 全蝎（炙） 穿山甲（炙） 僵蚕（炙）各一钱

【用法】上为末，枣肉为丸。分三十服，陈酒送下。

【主治】一切痈疽疼痛，及诸痛皆效。

【宜忌】忌食茶、醋。

09202 定痛散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】华细辛半两（生） 香白芷一两（生） 川乌头一两（生） 乳香三钱

【用法】上为细末。每用少许，擦牙痛处，有津吐之，咽津无妨。

【主治】牙风疼痛。

09203 定痛散

【方源】《丹溪心法附余》卷十二引《御药院方》。

【组成】细辛（生）半两 草乌（生）一两 全蝎半两 乳香二钱

【用法】上为末。每用少许，擦牙痛处，引涎吐之，须臾，以盐汤灌漱即止。

【主治】牙风疼痛。

09204 定痛散

【方源】方出《丹溪心法》卷四，名见《校注妇人良方》卷七。

【组成】枳实十五片（一作橘核） 山栀（炒） 山楂（炒） 吴茱萸（炒）各等分

【用法】上为末。加生姜，水煎服，或每服一二钱，空心长流水调下；或酒糊为丸服。

【主治】诸疝。

【加减】湿胜，加荔枝核（炮）。

【备考】方中枳实，《校注妇人良方》作“枳壳”。

09205 定痛散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】苍耳子 骨碎补 自然铜 血竭 白附子 赤芍 当归 肉桂 白芷 没药 防风 牛膝各三两 五加皮 天麻 槟榔 羌活各一两 虎胫骨 龟版各二两

【用法】上为末。每服一钱，温酒调下。

【主治】风毒邪气，乘虚攻注皮肤骨髓之间，与血气相搏，痛无常处，游走不定，昼静夜甚，不得睡卧，筋脉拘急，不得屈伸。

09206 定痛散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】川乌五钱 草乌五钱 乳香一两 白龙骨一两 蟾酥（烧酒烊化）少许 没药一两 川椒一两

【用法】上为末。醋调敷患处。

【功用】止痛。

【主治】跌打损伤。

【宜忌】皮肉破者不用。

09207 定痛膏

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】芙蓉叶二两 紫金皮 独活 南星（生） 白芷各五钱

【用法】上为末，加生采马兰菜、墨斗菜各一两，杵捣极烂，和末一处，用生葱汁、老酒和炒，暖敷。若打扑跌磕压伤，骨肉酸疼，有紫黑色未破皮肉者，加草乌、肉桂、良姜各三钱，研末，姜汁调，温贴；若紫黑色已退，除良姜、肉桂、草乌、姜汁，却以姜汁、茶清调，温贴之。若折骨出臼者，加赤葛根皮、宝塔草各二两，捣烂和前药一处，又用肥皂十个（童便煮，去皮弦子膜），杵捣极烂，人生姜汁少许，生白面一两，砍烂和匀，人前药同杵捣匀，用芭蕉叶托，用前后正副夹，须仔细整顿其骨，紧缚着后，上下肿痛消，方可换药。肿痛未退，不可换药。

【主治】打扑伤损，动筋折骨，跌磕木石压伤，赤肿疼痛。

09208 定搐散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】赤蜈蚣（大者）一条（酒浸，炙） 麻黄（去节） 南星（炮） 白附子 直僵蚕（炒） 羌活 代赭石（煅，醋淬七次） 蝎梢 川姜黄各一钱 麝半钱 未砂一钱

【用法】上为末。每服一字，荆芥、紫苏煎汤调下。

【功用】定搐。

【主治】①《直指小儿》：小儿急惊风。②《医统》：小儿急慢惊搐。

【加减】如搐不止，加乌蛇肉。

09209 定磁散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】真定磁 赤芍药各等分

【用法】上为细末。每服二钱，浓煎灯心汤调下，不拘时候。

【主治】沙石淋。

09210 定风饼子

【方源】《袖珍》卷二。

【组成】草乌头半两（微炮） 香白芷一两 川芎二两 防风 天麻 甘草（炒）各一两 细辛五钱

【用法】上为末，姜汁为丸，如龙眼大，捏饼子。每服一饼，食后茶汤送下。

【主治】头风头痛。

09211 定喘饮子

【方源】《百一》卷五。

【组成】诃子三两 麻黄四两（不去节）

【用法】上为粗末。每服四大钱，用水二盏，煎至一盏二分，去滓，入好腊茶一大钱，再同煎至七分，通口服，不拘时候，临卧服尤佳。

【主治】喘。

【加减】加人参二两，名"诃参散"。

09212 定喘饼子

【方源】《普济方》卷一六二。

【组成】白矾 贝母 苦葶苈（并生）各一两

【用法】上为细末，白面作饼子，慢火烧熟。每服一钱，细嚼，食后生姜汤送下，一日二次。

【主治】咳嗽虚喘，闷气不眠。

09213 定嗽劫药

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】诃子 百药煎 荆芥穗

【用法】上为末，加生姜，炼蜜为丸。噙化。

【主治】痰嗽久远者。

【备考】本方方名，《医统》引作"百药煎"。

09214 定吐紫金丹

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】人参一钱 白术（炒） 茯苓 广藿香 梗各一两 木香五钱 建莲子一两 丁香二钱 甘草三钱

【用法】生姜汁浸一宿，晒干，为末。每服五分，生姜汤或淡参汤下。

【主治】小儿呕吐。

09215 定志补心汤

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】远志（去心） 菖蒲 人参 茯苓各四两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】心气不足，心痛惊悸。

09216 定志珍珠丸

【方源】《医统》卷七十引丹溪方。

【组成】人参 白茯苓 海蛤粉 黄柏（炒焦色）各二两 楝根皮二两 远志 石菖蒲 青黛各一两半

【用法】上为末，面糊为丸，青黛为衣，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤送下。

【主治】心虚梦泄。

09217 定神至宝丹

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】生地黄（姜汁炒）五钱 橘红 贝母 白茯苓（去皮） 黄连 远志（去心） 石菖蒲 酸枣仁（炒） 枳实（麸炒） 瓜蒌仁 天花粉 甘草少许

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】诸痫，神智不宁，时发狂躁，多言好怒，面容不泽。

09218 定崩四物汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】生地五钱（炒松） 白芷一钱半（炒黑） 白芍一钱半（醋炒） 川芎一钱 当归三钱（醋炒） 蒲黄三钱（炒炭） 阿胶三钱（血余炭炒） 小蓟根三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】产后风湿袭于冲任，不能去宿生新，血崩如豆汁，腹胁阵痛，脉浮涩微数者。

【方论选录】方中生地凉血止血，炒松能去阴中之湿；白芷祛风散湿，炒黑亦止崩漏之血；白芍敛阴血以固经；川芎入血海以升阳；当归引血归经；蒲黄散瘀止血；小蓟凉血散瘀；阿胶补阴益血，血余炭炒，以止血定崩也。水煎温服，俾风湿外解，则宿去新生而冲任完复，经色如常。

09219 定惊琥珀散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】琥珀三两 当归三两 乳香一两半 辰砂一两半

【用法】上为散。每服三钱，金箔汤送下。

【主治】产后惊悸，脉虚涩者。

【方论选录】产后心虚血滞，不能营运乎心，而心神失养，故惊而且悸不宁焉。琥珀安神散瘀，以通心气，当归养血归心以荣心血，乳香活血通心，

辰砂镇心安神也。为散，金箔汤下，使瘀血消化，则新血自生，而心神得养，心气自雄，焉有惊悸之患乎。

09220 定喘五虎汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】麻黄一钱 光杏仁三钱 生石膏四钱 炙甘草四分 北细辛五分

【主治】痰喘，寒痰遏热，壅塞气管，咳逆气粗，咯痰稠粘，甚则目突如脱，喉间漉漉有声者。

09221 定喘化痰汤

【方源】方出《丹溪心法附余》卷五，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷五。

【组成】南星（炮） 半夏（汤泡）各一两 甘草三钱（炙） 陈皮（去白）一两半 杏仁五钱（去皮尖） 款冬花二钱 五味子三钱 人参二钱

【用法】每服用水一钟半，加生姜五片煎，临卧温服。

【主治】咳嗽痰喘。

【宜忌】忌生冷、油腻。

09222 定喘款气丸

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】苦葶苈（纸上炒）二两 马兜铃根一两 麻黄（去根节） 桑根白皮（锉）各一分

【用法】上为末，用蒸枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后煎阿胶、皂子汤送下。

【主治】肺脏气虚，触冒风冷，呼吸邪气，喘促痞闷，眠睡不得。

09223 定喘葶苈丸

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】葶苈 木香 贝母各等分

【用法】上为末，蒸饼糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。煎桑白皮汤送下。或即以四味为末，仍以桑白皮汤送下尤妙。

【主治】鼓胀喘嗽。

09224 定痛生肌散

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】石膏（煅）一两 乳香 血竭 轻粉各五钱 冰片一钱

【用法】上为末。掺之。

【功用】定痛生肌。

【主治】疮疡溃烂，红热肿痛，无腐者。

【加减】有水，加白芷、龙骨各一钱；不收口，加鸡内金（炙）一钱。

09225 定痛羌活汤

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】羌活 防风 川芎 藁 生地各一钱 升麻一钱二分 细辛 荆芥 独活 薄荷各六分 石膏二钱 甘草五分

【用法】水煎，食后服。

【主治】风热攻注，牙根肿痛。

【加减】恶热饮者，加龙胆草（酒洗）一钱半；恶风作痛，加白豆蔻、黄连各五分；湿热甚者，加黄连一钱，山栀一钱。

09226 定痛塞耳丹

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】细辛 盆消各一钱 雄黄五分 牙皂二个

【用法】上为末，用大蒜一个，杵和为丸，如梧桐子大。每用一丸，绵裹之，如左牙疼塞左耳，右牙痛塞右耳，良久即止。一丸可治数人。

【主治】牙痛

09227 定嗽化痰方

【方源】《医学纲目》卷二十六。

【组成】黄芩一两半（酒洗） 滑石半两 贝母 南星各一两 风化消二钱半 白芥子五钱（去壳）

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸服。

【主治】咳嗽。

09228 宜儿丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】黄连（去须，微炒） 芜荑仁（别研） 神曲（炒）各半两 陈橘皮（去白） 干姜（炮） 百草霜（研）各二钱 麝香一字（别研）

【用法】上为细末，次入芜荑仁同研细，后入麝香研匀，煮面糊为丸，如黍米大。每服三十丸，食前温米饮送下。

【主治】小儿诸疳羸悴，皮肤干焦，头发作穗，下利烦渴，小便白浊。

09229 宜男酒

【方源】《同寿录》卷一。

【组成】全当归二两 茯神二两 枸杞子二两 川牛膝二两 杜仲（醋炒断丝）二两 桂圆肉（去皮核）二两 核桃肉（去皮）二两 葡萄干（去皮梗）二两

【用法】上药浸无灰好酒十斤，盛瓷坛内封固，重汤煮一炷香，埋土中七日，取起。早、晚温服二三杯。或用米烧酒十斤，则不必煮，但浸七日服之，亦可。

【功用】养精壮神，调经种子。

09230 官方七香丸

【方源】《续本事》卷三。

【组成】 丁香 檀香 丁香皮 木香 陈皮（去白） 甘松 三棱 莪术 缩砂 白豆蔻各半两 香附子四两（炒去毛）

【用法】 上为末，用曲饼汤泡和药为丸，如绿豆大。每服二十丸，细嚼，生姜汤送下。

【主治】 脾疼。

09231 实肠丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】 黄连一两（去须） 肉豆蔻（面裹煨香） 丁香 干姜（炮） 白茯苓（去皮） 当归（洗，焙） 诃子（煨，去核）各半两 木香一分

【用法】 上为细末，用猪胆汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米饮送下。

【主治】 肠胃虚弱，腹胀泄泻，时时刺痛。

09232 实肠散

【方源】《直指》卷十三。

【组成】 川厚朴（制）一两半 肉豆蔻 诃子（炮） 缩砂 橘红 苍术（炒） 茯苓各一两 木香半两 甘草（炒）四钱

【用法】 上为粗末。每服三钱，加生姜、大枣煎服。

【主治】 脾虚肠滑，泄泻不止。

①《直指》：泄泻不止。②《奇效良方》：小儿泄泻，肠滑脾虚。③《杂病源流犀烛》：大肠虚。

【加减】 手足冷，加干姜。

【备考】 本方改为丸剂，名“实脾丸”，（见《保命歌括》）。

09233 实表散

【方源】 方出《百一》卷七，名见《医方类聚》卷一五〇引《简易》。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 茱萸（酒浸一宿，焙干） 细辛 五味子各等分

【用法】 上为粗末，以四味黄耆建中汤相对合和令匀，煎服。不过三四服即安。

【主治】 腠理不密，易致感冒，先服此药。

09234 实脾丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】 人参（去芦） 白术（炒） 缩砂仁 陈皮（去白） 麦芽各半两（炒） 神曲三钱（炒） 半夏曲三钱 藿香三钱（去土）

【用法】 用蒸饼糊为丸，如黍米大。每服三五十丸，食前服，白汤吞下。

【主治】 小儿脾虚，不美饮食；兼治乳食不消，黄瘦。

09235 实脾汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十三（三让堂本）。

【组成】 白术二钱 人参二钱 肉果一钱半 茯苓 白芍各一钱 陈皮一钱 炮附八分 炙草七分 升麻五分

【主治】 久泻脱肛。

【备考】 本方方名，原书锦章书局本作“白术汤”。

09236 实脾饮

【方源】《回春》卷三。

【组成】 苍术（米泔制） 白术（土炒） 厚朴（姜汁炒） 茯苓（连皮用） 猪苓 泽泻 香附 砂仁 枳壳（麸炒） 陈皮 木香 大腹皮各等分

【用法】 上锉一剂。加灯心一团，水煎，磨木香调服。

【主治】 水肿。

【加减】 气急，加苏子、葶苈、桑白皮，去白术；发热，加炒山栀、黄连、去香附；泻，加炒芍药，去枳壳；小水不通，加木通、滑石，去白术；饮食停滞，加山楂、神曲，去白术；恶寒，手足厥冷，脉沉细，加官桂少许；腰上肿，加藿香；腰以下肿，加牛膝、黄柏，去香附；胸腹肿胀，饱闷，加萝卜子，去白术。

09237 实脾散

【方源】《医方类聚》卷一一八引《济生》。

【组成】 厚朴（去皮，姜制炒） 白术 木瓜（去瓤） 木香（不见火） 草果仁 大腹子 附子（炮，去皮脐） 白茯苓（去皮） 干姜（炮）各一两 甘草（炙）半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一个，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 ①《医方类聚》引《济生》：实脾土。②《方剂学》：温阳健脾，行气利水。

【主治】 ①《医方类聚》引《济生》：阴水。②《方剂学》：阳虚水肿，身半以下肿甚，手足不温，口中不渴，胸腹胀满，大便溏薄，舌苔厚腻，脉沉迟者。

【宜忌】《便览》：忌食盐酱，甜物少用。

【方论选录】 ①《医方考》：用白术、茯苓、甘草之甘温者补其虚，用干姜、附子之辛热者温其寒，用木香、草果之辛温者行其滞，用厚朴、腹子之下气者攻其邪，用木瓜之酸温者抑其所不胜。②《金鉴》：脾胃虚，则土不能制水，水妄行肌表，故身重浮肿，用白术、甘草、生姜、大枣以实脾胃之虚也。脾胃寒，则中寒不能化水，水停肠胃，故

懒食不渴，二便不实，用姜、附、草果以温脾胃之寒。更佐大腹、茯苓、厚朴、木香、木瓜者以导水利气。盖气者水之母也，土者水之防也，气行则水行，土实则水治，故名曰实脾也。③《方剂学》：本方所治之证，是谓阴水，缘于脾肾阳虚，阳不化水，水气内停所致。方中以附子、干姜为君，其中附子温脾肾，助气化，行阴水之停滞；干姜温脾阳，助运化，散寒水之沍凝；二者合用，温养脾肾，扶阳抑阴。茯苓、白术健脾燥湿，淡渗利水，使水湿从小便而利；木瓜芳香醒脾，化湿利水，以兴脾主运化之功；厚朴、木香、大腹子、草果下气导滞，化湿行水，使气行则湿邪得化。使以甘草、生姜、大枣调和诸药，益脾和中。群药相伍，共奏温暖脾肾，行气利水之效。然本方温补脾土之功偏胜，确有脾实则水治之功，故以“实脾”名之。

【备考】 按：本方方名，《准绳·类方》引作“实脾饮”。

09238 实脾散

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】 白术二两（炒） 附子一两（炮） 干姜一两（炒） 厚朴一两半（制） 木香一两 茯苓一两半 泽泻一两半 猪苓一两半 炙草五钱 姜皮一两

【用法】 上为散。每服五钱，空心沸汤调下。

【功用】 实脾利水。

【主治】 命火衰微，不能生脾土而气滞不化，寒水侵浸，泛滥于肌肉之间，肿满如泥，脉沉迟者。

【方论选录】 方中附子补火扶阳，白术实脾制水，干姜温中气以散寒，厚朴散滞气以除水，泽泻泻膀胱之水，茯苓渗脾肺之水，猪苓利三焦之水，姜皮散皮肤之水。为散，汤调，俾真火内充，则土暖水温而阴寒自散，滞气无不化，肿满无不除矣。

09239 空青决明膏

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】 空青（研极细）一两 决明子（马蹄者，炒） 干姜（炮）各一分 玉竹 黄芩（去黑心）各三分 白蜜（好者）一升 细辛（去苗叶）车前子 黄柏（去粗皮） 黄连（去须）各半两

【用法】 上为末，和蜜，纳铜器中，盖头，勿令透气，以米五升，安药器于上，蒸饭熟为度，乘热以绵滤去滓，瓷瓶子盛，以铜箸点眼眦。若多年青盲，点二十日见物，每点两日，即用摩顶膏。

【主治】 青盲内障，翳晕，无问冷热风泪等，但瞳子不破者。

09240 卷柏丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】 卷柏（去根）二两 当归（洗，焙）二两 熟干地黄（洗，焙） 川芎 柏子仁（微炒，别研）各一两半 香白芷 肉苁蓉（酒浸一宿，焙干） 牡丹皮各一两 川椒（去目及闭口者，微炒）三分 艾叶（炒）三钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒米饮任下。

【功用】 常服调和经脉、补暖元脏，润泽肌肤，长发去黯，除头风，令人有子。

【主治】 冲任本虚，血海不足，不能流通经络，致月事不调，妇女带下。

【备考】 方中香白芷，《普济方》作“香附子”。

09241 卷柏丸

【方源】《济生》卷六。

【组成】 黄耆（去芦，蜜水炙） 熟地黄（洗）各一两半 卷柏（醋炙） 赤石脂（煅，醋淬七次） 鹿茸（醋炙） 白石脂 芎劳 代赭石（煅，醋淬七次） 艾叶（醋炒） 桑寄生 鳖甲（醋炙） 当归（去芦，酒洗，微炒） 地榆各一两 木香（不见火） 龙骨各半两 干姜（炮）三分

【用法】 上为末，醋煮糯米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心食前米饮汤送下。

【主治】 妇人室女，腹脏冷热相攻，心腹绞痛，腰痛腿痛，赤白带下，面色萎黄，四肢羸乏。

09242 卷柏丸

【方源】《医统》卷四十二。

【组成】 卷柏（生石上老柏为妙，取叶用）

【用法】 上为末为丸。每服二钱，空心米饮送下。

【主治】 脏毒下血。

09243 卷柏散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】 卷柏一两 龙骨一两 诃黎勒一两（煨，用皮） 黄连一两（去须，微炒） 缩砂一两（去皮） 荜茇一两 肉豆蔻一两（去壳） 白石脂一两

【用法】 上为散。每服二钱，食前以粥饮送下。

【主治】 久痢不愈，脱肛。

09244 卷柏散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】 卷柏一两 当归三分（锉，微炒） 黄耆一两（锉） 白术三分 枳壳二两（麸炒微黄，去瓤） 白芍药三分 干姜半两（炮裂，锉） 甘草三分（炙微赤，锉） 芎劳三分 熟干地黄一两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】 肠风腹痛，下血不止。

09245 卷柏散

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】 乌贼骨（烧令焦） 卷柏叶（酒浸，炒） 白龙骨（煅）各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，空心米饮或温酒调下。

【主治】 体虚，经水不正，便血妄行。

09246 卷荷散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】 初出卷荷 红花 当归各一两 蒲黄（隔纸炒） 牡丹皮各半两

【用法】 上为细末。每服三钱，空心温酒调下；腊内用童便调下。

【主治】 产后血上冲心，血刺血晕，腹痛恶露不快。

【临证举例】 产后恶露不下 《名医类案》：一妇产后，血上冲心，闭闷欲绝。先以干漆烧烟熏鼻，次以卷荷散三服，服之苏醒，恶露渐下。

09247 试效丸

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】 归身 生地 茺蔚子（炒） 黄柏（盐水炒） 柴胡各五钱 熟地八钱 赤芍一两二钱 川芎 防风 知母（盐水炒） 羌活各三钱 牡丹皮 寒水石 丹参各一钱 香附（童便入盐煮熟，去皮毛）一钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下，随以食物压之。

【主治】 金星翳内障。

09248 诜诜丸 诜

【方源】《局方》卷九（淳祐新添方）。

【异名】 调生丸（《济阴纲目》卷六）。

【组成】 泽兰叶 白术各一两半 肉桂（去粗皮） 干姜（炮）各半两 熟地黄（洗，焙） 当归（洗，焙）各二两 川芎 石斛（酒浸，锉，炒） 白芍药 牡丹皮（去心） 延胡索各一两

【用法】 上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下。

【主治】 妇人冲任虚寒，胎孕不成，或多损坠。

【方论选录】《济阴纲目》汪琪笺：冲为血海，任主胞胎。此方以四物养荣，以白术、石斛养气，泽兰、丹皮、玄胡荡胞中之秽，干姜、肉桂暖子宫之寒。去旧生新，温中益胃，亦温和之正方也。

09249 视星膏

【方源】《永乐大典》卷一一四一三引《经验普济加减方》。

【组成】 黄连 苦参各一钱 乌鱼骨 蕤仁（去皮） 草龙胆 白丁香 石决明各半两

【用法】 上药用水三升，熬至半升，去滓。入白沙蜜四两，再熬稠，入轻粉、铜绿、龙脑各半钱，马牙消、硇砂、鹏砂、乳香各二钱，上七味再研为细末，一处匀，入前膏内，瓷盒内收之。每点三五箸。

【主治】 远年日近，不睹光明，七十二种病眼等。

09250 刷牙药

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 麝香一分 生地黄 酒防己 熟地各二分 当归身 人参各二分 草豆蔻皮五分 升麻一钱 羊胫骨灰 黄连各二钱 白豆蔻三钱 草豆蔻三钱 没食子三个 五倍子一个

【用法】 上为极细末。先用温水漱口，擦之妙。

【主治】 牙痛。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“刷牙散”。

09251 刷牙药

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】 川芎 滑石 细辛 白蒺藜 藁本 甘松 石膏 茯苓 胆矾 白檀 麝香各半两

【用法】 上为极细末。每日刷牙。

【主治】 黑牙缝。

09252 刷痰汤

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 半夏（汤泡七次） 赤茯苓（去皮） 紫苏叶 陈橘皮（去白）各一两 白术半两（炒）

【用法】 上㕮咀。每服一两，水二盏，加生姜一分（拍碎），同煎至八分，食前顿服。

【主治】 留饮停痰。

09253 肃音汤

【方源】《简明医彀》卷四。

【组成】 麦门冬二钱 桔梗 茯苓各一钱 橘红 甘草各七分 杏仁七粒（研）

【用法】 取金竹刮茹一团，劈取竹衣一钱，竹叶十片，水煎，加竹沥服。

【主治】 一切痰火，痨瘵失音。

09254 建中丸

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】 白术 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各二两 木香 诃黎勒（去核） 肉豆蔻（去皮） 芎劳

各一两

【用法】 上为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】 脾胃不和，不能饮食。

09255 建中丸

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】 人参 白术 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 干姜（炮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 枳壳（去瓤，麸炒）各半两 诃黎勒三个（炮，去皮）

【用法】 上为末，以煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜、橘皮汤送下，不拘时候。

【功用】 补虚调胃。

【主治】 虚劳脾胃冷弱，心腹痞满，不思饮食，四肢怠惰。

09256 建中丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】 大附子（炮，去皮脐） 大川乌（炮，去皮脐） 桂心 胡椒 荜茇 干姜 良姜（炒） 吴茱萸（去核，汤泡）各等分

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心、食前米饮送下。

【功用】 常服宽中，健脾养胃，育真固气。

【主治】 脾胃气弱，冒犯风冷，腹痛肠鸣泄泻，手足冷，面色青白，下部虚寒，中满气短。

09257 建中汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】 黄耆 芍药各三两 甘草（炙）二两 桂心三两 生姜六两 半夏五两（洗） 大枣十二个（擘） 饴糖十两

【用法】 上切。以水八升，煮取三升，分三次服。

【功用】 补气。

【主治】 肺虚损不足。

【宜忌】 忌羊肉、饧、海藻、菘菜、生葱。

09258 建中汤

【方源】《千金》卷十九。

【组成】 胶饴半斤 黄耆 干姜 当归各三两 大枣十五个 附子一两 人参 半夏 橘皮 芍药 甘草各二两

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升半，汤成下胶饴烊沸，分四服。

【主治】 五劳七伤，小腹急痛，膀胱虚满，手足逆冷，食饮苦吐，酸痰呕逆，泄下少气，目眩耳聋，口焦，小便自利。

【方论选录】《千金方衍义》：小建中为诸建中之母，本桂枝汤表药，藉胶饴之甘温入脾通津，大建中气，即伤寒荣气不足，尺脉不至，虚劳之腹痛里急，阳涩阴弦，咸可用为前导，温中而兼疏表气，扶阳而不碍阴虚，以桂枝达表，芍药安中，甘草和胃，大枣通脾，生姜散邪，胶饴资津，共襄建中之功也。加黄耆名黄耆建中，则偏助卫气，以治下元亏损，梦中失精，烦热悸衄等病。此治五劳七伤，则于黄耆建中方内加当归，合内补建中，大补荣血，以附子易桂心，峻温肾气；以干姜易生姜，专力温中；又加人参辅黄耆、甘草，保合元神；更加半夏、橘皮，开泄痰气，并行大枣、胶饴之滞也。

09259 建中汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 当归三钱 赤芍一钱半 肉桂一钱半

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 产后血亏挟滞，营气不能布护，寒气得以伤之，直入冲任而恶寒汗出，发热不休。脉紧细涩者。

【加减】 无汗，加炒黑荆芥；腹痛，加炒焦砂糖。

【方论选录】 方中当归养营血以荣冲任，赤芍泻滞血以行血脉，肉桂温经暖血以散寒邪也。无汗加黑荆，为和血疏邪之用，腹痛加焦糖，乃去宿缓中之方。水煎温服，俾滞血化而新血生，则营卫调和而冲任之寒邪无不外解。

09260 建胃丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】 丁香半两 甘草（炙）半两 肉豆蔻（面裹煨香） 细辛（去叶土） 附子（炮，去皮脐） 吴茱萸（汤洗七遍，微炒） 肉桂（去粗皮） 干姜（炮）各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁制）二两

【用法】 上为细末，煮粟米饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前米饮送下。

【主治】 脾胃久虚，心腹疼痛，胁肋胀满，脏腑溏泄，停饮不消，恶心呕逆，咳嗽上气，干哕涎沫，口苦无味，肢体羸困，全不思食。

09261 建瓴汤

【方源】《衷中参西》中册。

【组成】 生怀山药一两 怀牛膝一两 生赭石八钱（轧细） 生龙骨六钱（捣细） 生牡蛎六钱（捣细） 生怀地黄六钱 生杭芍四钱 柏子仁四钱

【用法】 磨取铁锈浓水以之煎药。

【主治】 （脑充血）头目时常眩晕，或觉脑中昏愦，多健忘，或常觉疼，或耳聋目胀；胃中时觉有

气上冲，阻塞饮食不能下行，或有气起自下焦，上行作呃逆；心中常觉烦躁不宁，或心中时发热，或睡梦中神魂飘荡；或舌胀、言语不利，或口眼歪斜，或半身似有麻木不遂，或行动脚踏不稳，时欲眩仆，或自觉头重脚轻，脚底如踏棉絮，脉弦硬而长，或寸盛尺虚，或大于常脉数倍，而毫无缓和之意。

【加减】 若大便不实去赭石，加建莲子（去心）二钱；若畏凉者，以熟地易生地。

09262 建脾丸

【方源】《千金》卷十五。

【组成】 钟乳粉三两 赤石脂 好曲 大麦芽 当归 黄连 人参 细辛 龙骨 干姜 茯苓 石斛 桂心各二两 附子一两 蜀椒六两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，加至三十丸，酒送下，一日三次，弱者饮服。

【主治】 虚劳羸瘦，身体重，脾胃冷，饮食不消，雷鸣腹胀，泄痢不止。

【方论选录】《千金方衍义》：建脾丸建中州之气以祛冷积之滞，即于温脾汤中除去大黄，加钟乳、石脂、龙骨、椒、辛助参、附、姜、桂以固下脱，曲、芽、黄连以除陈气，当归以和营血，石斛以清胃气，茯苓以通气化，并合黄连、石斛以化石药之悍也。

09263 建脾丸

【方源】《三因》卷十一。

【组成】 钟乳粉 赤石脂（煅）各一两半 枯矾 干姜（炮） 苁蓉（酒浸） 石斛（酒浸） 五味子 桂心 泽泻 桑寄生 远志（去心，炒） 人参 柏子仁 当归 酸石榴皮 龙骨（煅） 天雄（炮，去皮脐） 牡蛎粉 白头翁（去苗） 甘草（炙）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹米汤送下。

【主治】 虚劳羸瘦，身重，胃冷，饮食不消，泄泻不止，或作滞下，久变五色秽臭。

09264 建脾散

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】 陈橘皮（去白）七两 高良姜五两（炒） 干姜三两（炮）

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣二个，同煎至八分，热服，不拘时候。

【主治】 脾胃不和，心腹疼痛，呕逆恶心。

09265 建中黄耆汤

【方源】《外台》卷十七引《古今录验》。

【组成】 黄耆三两 甘草二两（炙） 桂心三两 生姜一斤（薄切） 饴糖半斤 大枣十二个（擘）

【用法】 上切。以水一斗，煮取三升，去滓，下糖，温服一升，每日三次。

【主治】 虚劳短气，少腹急痛，五脏不足。

【宜忌】 忌海藻、松菜、生葱。

09266 建中加木瓜柴胡汤

【方源】《此事难知》。

【异名】 建中加柴胡木瓜汤（《医碥》卷七）。

【组成】 桂枝二两半 芍药二两 甘草一两 胶饴半升 生姜一两半 大枣六个 木瓜五钱 柴胡五钱

【用法】 上锉，如麻豆大。每服一两，水三盏，煮至一盏半，去滓，下胶饴两匙，煎化服。

【主治】 吐泻转筋，胁下痛，脉弦者。

09267 降子汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【异名】 降子散（《辨证录》卷十二）。

【组成】 当归一两 人参五钱 川芎五钱 红花一钱 川牛膝三钱 柞木枝一两

【用法】 水煎服。

【主治】 交骨不开难产。

【方论选录】 此方用人参以补气，芎、归以补血，红花以活血，牛膝以降下，柞木枝以开关解骨，君、臣、佐、使，同心协力，所以取效如神，在用开于补之中也。

09268 降气汤

【方源】《局方》卷三（续添诸局经验秘方）。

【组成】 紫苏叶（去梗）四两 厚朴（去粗皮，姜汁制） 肉桂（去粗皮，不见火） 半夏（汤洗七次去滑） 川当归（去芦） 前胡（去芦，洗） 甘草（爁）各三两 陈皮（去白）三两半

【用法】 上㕮咀。每服二钱至三钱，水一大盏，加生姜三片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 常服消痰饮，散滞气，进饮食。

【主治】 中脘不快，心腹胀满，阴阳壅滞，气不升降，胸膈噎塞，喘促短气，干哕烦满，咳嗽痰涎，口中无味，嗜卧减食，宿寒留饮，停积不消，胁下支结，常觉妨闷。并治脚气上冲，心腹坚满，肢体浮肿，有妨饮食。

09269 降火膏

【方源】《本草纲目》卷三十二引《濒湖集简方》。

【组成】 吴茱萸

【用法】 上为末，醋调涂脚心。

【主治】 口疮口疳。

09270 降心丹

【方源】《局方》卷五（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 熟干地黄（净洗，酒浸，蒸，焙干） 天门冬（去心） 麦门冬（去心）各三两 茯苓（去皮） 人参 远志（甘草煮，去芦骨） 茯神 山药各二两 肉桂（去粗皮，不见火） 朱砂（研飞）各半两 当归（去芦，洗，焙）三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎人参汤吞下。

【功用】 常服镇益心神，补虚养血，益丹田，秘精气。

【主治】 心肾不足，体热盗汗，健忘遗精，及服热药过多，上盛下虚，气血不降，小便赤白，稠浊不清。

09271 降心汤

【方源】《直指》卷十七。

【组成】 人参 远志（姜淹，取肉，焙） 当归 川芎 熟地黄 白茯苓 黄耆（蜜炙） 北五味子 甘草（微炙）各半两 天花粉一两

【用法】 上锉细。每服三钱，加大枣煎，食前服。

【主治】 心火上炎，肾水不济，烦渴引饮，气血日消。

09272 降压膏

【方源】《新医学》（1972；7）。

【组成】 夏枯草 草决明 石膏各30克 槐角 钩藤 茺蔚子 黄芩各15克

【用法】 加水煎煮三次，过滤去滓，取滤液加蜜30克，浓缩成膏约120克，瓶装。以上为一日量，三次分服。亦可制成丸剂，或用作汤剂均可。

【功用】 平肝潜阳，降压清热。

【主治】 原发性高血压病。头晕、头痛、心悸失眠，舌红、脉弦。

09273 降补汤

【方源】《傅青主男女科》。

【异名】 降补丹（《中国医学大辞典》）。

【组成】 熟地一两 元参一两 麦冬一两 甘菊花五钱 生地五钱 车前子二钱 人参三钱 沙参五钱 地骨皮五钱

【用法】 水煎服。

【功用】 降胃火，补肾水。

【主治】 痿证。火盛内炽，肾水熬干，不能起床，已成废人者。

09274 降真丹

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 石膏一两半 乌头半两 白附子 白僵蚕 天南星 藿香各一两 辰砂一两 芎 甘草各一分 白芷半两 细辛一分 麝香半两（别研）

【用法】 上为细末，滴水为丸，如鸡头子大，于风阴处晾干。每服一丸，细嚼，食后腊茶送下。

【主治】 风痰偏正头痛，项背拘急，或伤风不可忍者。

09275 降痈散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 薄荷（辛佳者，用叶） 野菊花（连根叶）各一握 土贝母半握 茅根一握

【用法】 上干者可为末，鲜者可捣烂，同贝母研匀，外将茅根煎浓汤，去滓，用调前末乘热敷患处，仍留前剩汤顿暖，不时润于药上，但不可用冷汤，冷则不散不行，反能为痛。约敷半日，即宜换之。

【功用】 消肿，止痛，散毒，未成者即消，已成者敛毒速溃。

【主治】 痈疽诸毒，阳毒炽甚而疼痛势凶者。

09276 降痰丸

【方源】《医学纲目》卷二十一。

【组成】 木香 槟榔 青皮 陈皮 京三棱 枳壳（麸炒） 半夏（汤洗） 大黄 黑牵牛各一两

【用法】 上为末，面糊为丸。食后生姜汤送下。

【功用】 消食利膈，升降滞气，消化痰涎。

【主治】 三焦气涩，痞满咳唾稠粘，面热目赤，肢体倦怠，不思饮食。

09277 降霜丸

【方源】《活人方》卷五。

【组成】 黑豆四十九粒 绿豆四十九粒 百草霜五钱 硼砂二钱 朱砂二钱 牙消一钱 嫩儿茶一钱 滴乳香一钱 川黄连一钱（擂末）

【用法】 乌梅肉捣烂为丸，如芡实大。每用一丸，不时噙化。

【功用】 生津助液，润燥滋枯，攻逐结痰，以通咽路。

【主治】 火烈金囚，水源枯涸，咽嗌干燥，胃脘闭塞，先反胃而渐噎膈者。

09278 降气化痰汤

【方源】《观聚方要补》卷三引《医学统旨》。

【组成】 紫苏子（炒，捶碎）一钱半 前胡 半夏 茯苓 橘红 桑皮 杏仁 瓜蒌仁各一钱 甘草五分

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 喘因于痰者，喘则便有痰声。

09279 降气和中汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 苏子一钱五分 沉香五分 海石三钱 姜仁四钱 莱菔二钱 芥子一钱 橘红一钱 半夏一钱 桑皮二钱 贝母二钱 杏仁三钱

【用法】 加生姜汁两小匙，冲服。

【主治】 肺实而咳，胸脘喘满，时吐稠痰。

09280 降气和络饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 栝楼皮 甜杏仁 紫菀 川贝各三钱 枇杷叶（去毛筋净）一两 苏丹参 生淮牛膝各三钱 参三七汁 广郁金汁各四匙 生藕汁两瓢（和匀同冲）

【功用】 轻降辛润。

【主治】 远行负重，劳伤失血，气逆于上，胸胁闷痛，甚则呼吸亦痛，咳嗽带红。

09281 降气除湿汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】 沉香 木香 白术各二钱 泽泻 白茯苓 橘红各一钱五分 半夏一钱 防己一钱 甘草（炙）少许 白豆蔻五分 生姜五片

【用法】 上㕮咀。水煎，空心服。

【主治】 下部水肿，囊湿足冷，气喘上促。

09282 降火安金汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】 知母二钱 麦冬 生地各一钱半 桔梗 牛膝 甘草各一钱 桑皮 陈皮各一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 实火上炎，肺受火烁，咳嗽烦甚，脉洪大者。

【加减】 有痰易来，加半夏二钱；如咳甚而痰难来者，加贝母一钱半；如大便秘结，加酒炒大黄一钱半。

09283 降火导痰汤

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】 芩 连 瓜蒌 海石

【主治】 火逆咳嗽。

09284 降火清喉汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】 薄荷 黄芩各七分 桔梗 黄柏（酒炒） 知母 生地黄各一钱 贝母（炒）六分 山栀仁（炒）六分 甘草四分

【用法】 上㕮咀。水煎，食远温服。

【主治】 虚火炎上喉疼，吞吐如碍。

09285 降真龙骨散

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】 乳香 没药 降真节 苏木 川乌 油松节 自然铜（煅，淬醋中七次）各一两 地龙（去土，油炒） 水蛭（香油炒）各半两 血竭三钱 龙骨半两 土狗十个（油浸，炒）

【用法】 上为末。每服三钱，好酒送下。此药自顶心至足底周遍一身，遇病处则飒飒有声，患人自觉药力习习往来。

【主治】 打扑骨折。

09286 驾轻汤

【方源】《霍乱论》卷四。

【组成】 鲜竹叶 生扁豆各四钱 香豉（炒） 石斛各三钱 枇杷叶（刷）二钱 橘红（盐水炒） 陈木瓜各一钱 焦栀一钱五分

【用法】 水煎，温服。

【主治】 霍乱后，余邪未清，身热口渴，及余热内蕴，身冷脉沉，汤药不下而发呃者。

09287 参仁丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 麻仁 大黄各三两 人参七钱半 当归一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心热水送下。

【主治】 气壅风盛，便秘后重，疼痛烦闷。

09288 参末散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 苦参一斤

【用法】 上为末。酒调敷。

【主治】 汤火伤。

09289 参术汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 参耆汤（《回春》卷二）、补气汤（《嵩崖尊生》卷九）。

【组成】 黄柏（酒浸） 当归各二分 柴胡 升麻各三分 人参 陈皮 青皮各五分 神曲末七分 炙甘草 苍术各一钱 黄耆二钱

【用法】 上㕮咀，作一服。水二大盏，煎至一盏，食远服。

【主治】 脾胃虚弱，元气不足，四肢沉重，食后昏闷。

09290 参术汤

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】 人参 白术 黄耆各二钱 伏苓 甘草

陈皮各一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《赤水玄珠》：气虚颤掉。②《景岳全书》：泄泻、呕吐。

【加减】 甚者，加附子。

09291 参术饮

【方源】《丹溪心法》卷五。

【异名】 参术散(《广嗣纪要》卷十三)。

【组成】 四物汤加人参 白术 半夏（制） 陈皮 甘草

【用法】 上㕮咀，加生姜，煎，空心服。

【功用】《医方论》：调养荣卫，化痰理气，清升浊降。

【主治】 妊娠转胞。

【临证举例】 转胞 《丹溪治法心要》：一妇人怀胎，患转胞病，两脉似涩，重则弦，左稍和，此得之忧患，涩为血少气多，弦为饮。血少则胎弱，而不能自举，气多有饮，中焦不清而隘，则胎知所避而就下，故喜坠。以四物汤加参、术、半夏、陈皮、生甘草、生姜煎，空心饮，随以指探喉中出药汁，候少顷，气定又与一帖，次早亦然，至八帖安。

09292 参术散

【方源】《得效》卷四。

【异名】 参术汤(《类证治裁》卷六)。

【组成】 人参 白术（去芦，炒） 干姜（炮） 白豆蔻仁 缩砂仁 丁香 橘皮 甘草（略炒）各等分

【用法】 上㕮散。每服三钱，加生姜三片，煎取药汁，调炒过真蚌粉一大钱并服。

【主治】 心脾虚痛，虚寒泄泻。

①《得效》：虚弱人脾疼。②《杂病源流犀烛》：心痛，按之痛止者。③《卫生鸿宝》：痘疹灌脓时，虚寒泄泻。

09293 参术膏

【方源】《丹溪心法》卷五。

【异名】 参术汤(《万氏女科》卷三)、参术饮(《产孕集》卷下)。

【组成】 人参二钱半 白术二钱 桃仁 陈皮各一钱 黄耆一钱半 茯苓一钱 甘草（炙）半钱

【用法】 上㕮咀。水煎猪、羊胞，后入药，作一服。

【主治】 产后胞损成淋沥证。

【方论选录】 ①《成方切用》：产后胞损，必令气血骤长，其胞可完，若稍迟缓，恐难成功。故以参、耆、术、草以补之，加陈皮以宣其滞，桃仁以活其血，茯苓以助其下行，用猪羊胞煮汤，入药煎服，取其以胞补胞之义，不特引经也。②《成方便读》：方中参、耆、术、草，大补元气，而生阴血；然产后不无瘀浊垢滞之物，故以陈皮行气，茯苓降浊，桃仁去瘀，猪羊胞假血肉有情之品，以补其所损之处耳。

【临证举例】 产妇胞损 《丹溪治法心要》：尝见尿胞因收生者之不谨，以致破损而得淋沥病，徐氏妇，壮年得此。因思肌骨破伤在外者且可补完，胞虽在腹，恐亦可治。诊其脉虚甚，因悟曰：难产之人多是血虚，难产之后，气血尤虚，因用峻补之药，以术、参为君，桃仁、陈皮、黄耆、茯苓为佐，而煎以猪、羊胞中汤，于极饥时与之，每剂用一两，至一月而安，恐是气血聚长，其胞可完，若稍迟缓，恐难成功。

09294 参术膏

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】 上好人参半斤（切片，用水五大碗砂锅内慢火熬至三碗，将滓再煎汁一碗，共用密绢滤清，复熬稠厚，瓷碗内收贮听用） 云片白术六两 淮庆熟地六两（俱熬，同上法）

【用法】 以上三膏各熬完毕，各用瓷碗盛之，顿入水中，待冷取出，盖勿泄气。如患者精神短少，懒于言动，短气自汗者，以人参膏三匙，白术膏二匙，地黄膏一匙，俱用无灰好酒一杯炖热化服。如脾气虚弱，饮食减少，或食不知味，或已食不化者，用白术膏三匙，人参膏二匙，地黄膏一匙，好热酒化服。如患者腰膝酸软，腿脚无力，皮肤手足粗涩枯槁者，用地黄膏三匙，人参、白术膏各三匙化服。如气血、脾胃相等，无偏胜负者，三膏每各二匙，热酒化服。

【功用】 补气补脾并补血。

【主治】 痈疽、发背等症，大脓后气血大虚。

【备考】 此膏用于清晨并临睡时各进一次，自然强健精神，顿生气血，新肉易生，疮口易合，任疮危险势大脓多者，可保终无变症。夏炎天热恐膏易变，分作二次熬用亦好，愈后能服，须发变黑，返老还童。按：本方方名，《疡医大全》引作“参术地黄膏”。

09295 参归丸

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】 苦参（净末）四两 当归（净末）二两

【用法】 上用酒糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，食后热茶送下。

【功用】《北京市中药成方选集》：清热凉血。

【主治】①《古今医鉴》：血热入肺之酒渣鼻。②《北京市中药成方选集》：血燥风湿，头面生疮，粉刺疙瘩，口舌糜烂。

【备考】本方方名，《北京市中药成方选集》引作"归参丸"。

09296 参归汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄耆七分 甘草 生地黄各五分 柴胡草豆蔻仁 升麻各四分 当归身三分 熟地黄 人参各二分 益智仁少许 红花少许

【用法】上锉，如麻豆大，都作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食远服。

【主治】气血不足。

09297 参归汤

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】川芎 当归 人参各一钱 干姜 肉桂各五分

【用法】水煎服。

【主治】临产失血过多，虚热太甚，目暗神昏，手足厥冷者。

【加减】若汗多，加黄耆。

09298 参冬饮

【方源】《症因脉治》卷二。

【异名】参麦饮(《胎产心法》卷下)。

【组成】人参 麦门冬各等分

【用法】水煎服。

【主治】气虚喘逆，虚热，脉浮大，按之则空，或见濡软，散大无神。

09299 参芍汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】人参 白芍 附子 茯苓 炙甘草 五味子

【主治】休息痢，经年不愈，下焦阴阳皆虚，不能收摄，少腹气结，有似癥瘕。

【方论选录】纯然虚证，以痢久滑泄太过，下焦阴阳两伤。气结似乎癥瘕，而实非癥瘕，舍温补其何从？故以参、苓、炙草守补中焦；参、附固下焦之阳；白芍、五味收三阴之阴，而以少阴为主，盖肾司二便也。汤名参芍者，取阴阳兼固之义也。

09300 参朱丸

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【异名】参砂丸(《冯氏锦囊·杂症》卷五)。

【组成】人参 蛤粉 朱砂各等分

【用法】上为末，猪心血为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹煎金银汤下。

【主治】风痫。

09301 参麦汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】人参三钱 干麦冬（带心）四钱 生山药六钱 清半夏二钱 牛蒡子（炒，捣）三钱 苏子（炒，捣）三钱 生杭芍三钱 甘草一钱半

【主治】阴分亏损已久，浸至肺虚有痰，咳嗽劳喘，或兼肺有结核者。

【方论选录】人参为补肺之主药，而有肺热还伤肺之虞，有麦冬以佐之，则转能退热；麦冬为润肺之要品，而有咳嗽忌用之说，有半夏以佐之，则转能止嗽；至于山药，其收涩也，能助人参以补气，其粘润也，能助麦冬以滋液，虽多服久服，或有壅滞，而牛蒡子之滑利，实又可以相济；且牛蒡子能降肺气之逆，半夏能降胃气、冲气之逆；苏子与人参同用，又能降逆气之因虚而逆，平其逆气，则喘与嗽不治自愈矣。用白芍者，因肝为肺之对宫，肺金虚损，不能清肃下行以镇肝木，则肝火恒恣横而上逆，故加芍药以敛戢其火，且芍药与甘草同用，甘苦化合，味近人参，即功近人参，而又为补肺之品也。

09302 参花汤

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【组成】金银花一二两 人参一二两

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】溃疡，气血俱虚，发热恶寒，失血。

09303 参芦汤

【方源】方出《格致余论》，名见《本草纲目》卷十二。

【异名】人参芦汤(《医部全录》卷三二五)。

【组成】人参芦半两

【用法】逆流水一盏半，煎一大碗饮之。

【主治】①《格致余论》：性躁味厚，暑月因大怒而咳逆，每作则举身跳动，神昏不知人，形气俱实者。②《辨证录》：视物倒植，干霍乱，中暑热之气。

【临证举例】呃 《格致余论》：一女子性燥味厚，暑月因怒而病呃，每作则举身跳动，神昏不知人，形气俱实，乃痰因怒郁，气不得降，非吐不可。遂以人参芦半两，逆流水一盏半，煎一大碗饮之。大吐顽痰数碗，大汗昏睡，一日而安。

09304 参苏饮

【方源】《妇人良方》卷二十二引胡氏方。

【异名】二味参苏饮(《医方类聚》卷二三五引

《管见良方》)、参苏散(《永类钤方》卷十九)、小参苏饮(《得效》卷十四)、人参苏木散(《杏苑》卷八)、参苏夺命丹(《郑氏家传女科万金方》卷四)。

【组成】 人参一两(另末) 苏木二两

【用法】 以水二碗,煮苏木,取一碗,去滓,调参末,随时加减服。

【主治】 产后血入于肺,面黑发喘欲死者。

09305 参苏饮

【方源】《三因》卷十三。

【异名】 参苏汤(《普济方》卷四〇三)、人参前胡散(《奇效良方》卷六十四)、十味参苏饮(《保婴金镜录》)、冲和汤(《济阳纲目》卷十一)。

【组成】 前胡 人参 紫苏叶 茯苓各三分 桔梗 木香各半两 半夏(汤) 陈皮 枳壳(炒) 甘草(炙)各半两

【用法】 上为锉散。每服四钱,水一盏半,加生姜七片,大枣一个,煎至七分,去滓,空腹服。

【功用】 益气解表,理气化痰。

①《局方》(淳祐新添方):开胃进食。②《景岳全书》:解肌宽中。③《简明医彀》:疏邪清气,消痰除热。④《医林纂要》:调气,补中,解表。⑤《中药制剂手册》:疏风散寒,理肺止咳。

【主治】 虚人外感风寒,内有痰湿,发热恶寒,头痛鼻塞,咳嗽痰多,胸膈满闷,苔白脉浮。

①《三因》:痰饮停积胸中,中脘闭,呕吐痰涎,眩晕,嗜烦,忪悸,哕逆;及痰气中人,停留关节,手足瞤曳,口眼㖞斜,半身不遂,食已即呕,头疼发热,状如伤寒。②《局方》(淳祐新添方):感冒发热头痛,或因痰饮凝结,兼以为热,中脘痞闷,呕逆恶心。③《片玉心书》:小儿痘疹发热,面燥腮赤,目胞亦赤,呵欠烦闷,乍热乍凉,咳喷嚏,手足指冷,惊怖多睡。④《赤水玄珠》:伤风鼻塞,恶心有痰,胸膈不利。⑤《景岳全书》:孕妇伤寒,痘疹。⑥《证治宝鉴》:风寒气喘。⑦《医林纂要》:中气虚弱而感冒者。⑧《医钞类编》:四时感冒,伤寒头痛,发热无汗及伤风咳嗽声重,涕唾稠粘,潮热往来。⑨《方剂学》:虚人外感风寒,内有痰湿。憎寒发热,胸膈满闷,脉弱。

【加减】 哕者,加干葛;腹痛,加芍药。

【方论选录】 ①《古今名医方论》:叶仲坚曰,此咳嗽声重,痰涎稠粘,涕唾交流,五液无主,寒湿稽留于胸胁,中气不固可知矣,故以人参为君;然非风寒之外邪来侮,则寒热不发,而痰涎不遽生,故辅以紫苏、干葛;凡正气虚者,邪气必盛,故胸膈满闷,辅以陈皮、枳壳,少佐木香以降之;痰涎壅盛于心下,非辛燥不除,故用茯苓、半夏,少佐桔梗以开之;病高者宜下,故不取柴胡之升,而任前胡之降;欲解表者,必调和营卫,欲清内者,必顾及中宫,此姜、枣、甘草之所必须也。名之曰饮,见少与缓服之义。②《医方集解》:风寒宜解表,故用苏、葛、前胡;劳伤宜补中,故用参、苓、甘草;橘、半除痰止呕;枳、桔利膈宽肠;木香行气破滞,使内外俱和,则邪散矣。

【备考】 本方改为丸剂,名"参苏丸"、"参苏理肺丸"(见《江苏省中药成药标准暂行规定汇编》)。《局方》(淳祐新添方)有干葛;《易简方》有干葛,无木香。

09306 参连丸

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】 苦参一两半 黄连(去须)三两三分 栝楼根 牡蛎(煅) 知母(焙) 麦门冬(去心,焙)各一两三分

【用法】 上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食后米饮送下,一日二次。

【主治】 传尸劳骨蒸。

09307 参连丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】 艾叶(糯米糊拌,焙,取细末)一两半 干姜(炮,取末)二两(同艾末用米醋一升半,慢火熬成稠膏) 宣黄连一两半(锉如豆大,用吴茱萸一两半同黄连炒紫色,拣去吴茱萸不用) 木香一两半(别用黄连一两半为粗末,以水一升,慢火煮尽水,去黄连不用,将木香薄切,焙干) 人参(去芦头) 白术(去皮) 乌梅(去核,焙干) 酸石榴皮(炒) 白茯苓(去皮) 地榆 百草霜(别研) 当归(洗,焙)各一两半 龙骨一两三分(火煅通红) 赤石脂一两三分 诃子(煨,去核)一两 阿胶二两(蛤粉炒) 罂粟壳二两(蜜炙)

【用法】 上为细末,将艾膏为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前陈米饮送下。

【主治】 肠胃虚弱,冷热不调,泄利肠鸣,日夜无度。

09308 参连汤

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】 苦参一两半 黄连(去须,炒)二两 阿胶(炙令燥)一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕,水一盏半煎至八分,去滓,空心温服,日晚再服。

【主治】 湿蠹痢,虫蚀下部。

09309 参角丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】 苦参 肥皂角各二斤（去皮并子，捶碎，以水一斗浸，揉取浓汁，滤去滓，熬成膏）

【用法】 上将苦参杵为细末，以皂角膏为丸，如梧桐子大。每服二十丸，荆芥汤送下。

【主治】 肺风皮肤瘙痒，生瘾疹或疥癣等。

09310 参诃饮

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 诃子（去核） 白术（炒） 黄耆（蜜炙） 白茯苓（去皮） 人参（去芦） 半夏曲各二钱半 陈皮（去白） 五味子各二钱 甘草（炙） 款冬花各一钱

【用法】 上为粗末。每服三大钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】 虚寒痰嗽。

09311 参附汤

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生续方》。

【异名】 附参汤（《医统》卷二十二）、转厥安产汤（《叶氏女科》卷三）。

【组成】 人参半两 附子（炮，去皮脐）一两

【用法】 上㕮咀，分作三服。水二盏，加生姜十片，煎至八分，去滓，食前温服。

【功用】 ①《血证论》：大补元气。②《方剂学》：回阳、益气，固脱。

【主治】 元气大亏，阳气暴脱，汗出厥逆，喘促脉微。

①《医方类聚》引《济生续方》：真阳不足，上气喘息，自汗盗汗，气短头晕，但是阳虚气虚之证。②《普济方》引《如宜方》：久病困重。③《正体类要》：金疮杖疮，失血过多，或脓瘀大泄，阳随阴走。④《外科枢要》：寒凉汗下，真阳脱陷。⑤《校注妇人良方》：阳气虚寒，手足逆冷，大便自利，或脐腹疼痛，吃逆不食，或汗多发痉。⑥《保婴撮要》：痘疹阳气虚寒，咬牙寒战，饮沸汤不知热。⑦《景岳全书》：元阳不足，喘急，呃逆，呕恶，厥冷。⑧《冯氏锦囊·杂症》：中风，手撒口开，遗尿。⑨《医略六书》：产后阳气虚寒，不能卫外而虚阳越出，故手足厥冷，自汗不止。⑩《金鉴》：风邪中脏，形气俱虚，唇缓不收，痰涎流出，神昏不语，身肢偏废，或与五脏脱证并见。以及虚寒尸厥，阴血暴脱，孤阳无附而外越发热者。⑪《兰台轨范》：阴阳血气暴脱证。⑫《古今医彻》：夹阴伤寒，内外皆阴，阳气顿衰。

【方论选录】 ①《医略六书》：附子补真阳之虚，人参扶元气之弱，姜、枣调和营卫，领参、附以补真阳之不足而卫外为固也。水煎温服，使真阳内充，则卫气自密而津液无漏泄之虞，何致厥冷不暖，自汗不止哉？②《金鉴》：起居不慎则伤肾，肾伤则先天气虚矣。饮食不节则伤脾，脾伤则后天气虚矣。补后天之气无如人参，补先天之气无如附子，此参附汤之所由立也。二脏虚之微甚，参附量为君主。二药相须，用之得当，则能瞬息化气于乌有之乡，顷刻生阳于命门之内，方之最神捷者也。③《古今医彻》：夹阴伤寒，内外皆阴，阳气顿衰，必须急用人参健脉以益其元，佐以附子温经散寒。舍此不用，将何以救之？④《血证论》：人之元气，生于肾而出于肺，肺阴不能制节，肾阳不能归根，则为喘脱之证，用附子入肾以补阳气之根，用人参入肺以济出气之主，二药相济，大补元气，气为水之阳，水即气之阴，人参是补气之阴，附子是补水之阳，知此，则知一切补气之法。

【临证举例】 ①痢疾 《寓意草》：张仲仪初得痢疾三五行，即请往诊，行动如常，然得内伤之脉，而夹少阴之邪，余诊毕，即议云：此证仍宜一表一里。但表药中多用人参，里药中多用附子，方可无患，若用痢疾门诸药，必危之道也。仲议以平日深信，径取前药不疑，然疾势尚未著也。及日西，忽发大热，身重如巨石，头在枕上，两人始能扶动，人事沉困，举家惶乱，忙忙服完表里二剂。次早诊时，即能起身出房，再与参附药二剂全安。若不辨证用药，痢疾门中几曾有此等治法乎？况于疾未著而早见乎！②中风 《续名医类案》：景氏妇年近五旬，中风已五六日，汗出不止，目直口噤，遗尿无度，或以为坏症，脉之虽甚微，而重按尚有不疾不徐自然之势，此即胃气也。乃曰遗尿本属当时脱症，故不治，若多日安得不尿，且坐视数日而不脱，断非绝症也，投以参附汤，二三剂渐苏，重服温补而愈。③休克型肺炎 《新医药学杂志》（1977；11：41）：以参附汤为主，中西医结合抢救3例休克型肺炎病人，用人参三钱，附子三钱，浓煎温服。一例加麦冬三钱，五味子二钱，甘草二钱。疗效满意，服药2～3小时后，皮肤渐暖，紫绀逐渐消失，并开始排尿。休克缓解的时间在12～15小时之间，血压逐渐稳步上升，无较大的反复。④不育症 《成都中医学院学报》（1979；3：75）：某男，25岁，身体矮小，无胡须，外貌若十五、六岁，性欲减退，婚后五年未育。处方：人参30克，制附片60克，分十次煎服。一月后复诊好转，原方再服两剂，越年有子嗣。⑤小儿久咳 《广东中医》（1958；6：18）：某女，三岁，咳嗽近四月，

病势渐剧，身体瘦弱，食欲不振，舌白唇淡。处方：正高丽参一钱，焙附子四片，炖水温服，分二剂服。服一剂，咳减，睡眠安静，连进两剂，咳症顿除，食欲增强而愈。

【现代研究】 参附注射液对动物耐缺氧和急性心肌缺血的保护作用 《中草药》（1982；3:27）：参附注射液（东北红参、四川熟附片制剂）能显著提高小鼠耐缺氧的能力；能显著对抗由垂体后叶素所引起的大鼠心电图第二期ST的下移和各种不同类型的心律失常；并能明显促进戊巴比妥钠麻醉大鼠的复苏。《中成药研究》（1982；6:32）：参附注射液可明显增加离体兔心的冠脉流量，使离体兔耳和大鼠后肢灌流量增加；附子注射液有较明显的强心作用；参附注射液及其组成药均能显著延长小鼠常压耐缺氧时间；对乌头碱所致室性或室上性多种快速心律失常有显著治疗作用，但人参注射液效果不明显。

09312 参附汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 参耆汤加附子

【主治】 年老之人，虚寒遗溺者。

09313 参苓丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【异名】 参蒲丸(《医学纲目》卷三十一)。

【组成】 人参 赤茯苓（去黑皮） 菖蒲 远志（去心） 地骨皮 牛膝（酒浸，切、焙）各一两。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温水送下，一日三次，不拘时候。

【主治】 ①《圣济总录》：食㑊。胃中热结，消谷善食，不生肌肉。②《杂病源流犀烛》：肉极，身上淫淫如鼠走，体上干黑。

09314 参苓饮

【方源】《三因》卷十三。

【异名】 参苓散(《朱氏集验方》卷五)。

【组成】 茯苓 人参 白术各三两 枳实（麸炒，去瓤）二两 橘皮一两半

【用法】 上锉散。每服四大钱，水二盏，加生姜三片，煎七分，去滓，空腹温服。

【主治】 胸中停痰宿水，自吐出痰后，心胸间虚，气满不能食。

09315 参苓散

【方源】《医统》卷五十一。

【组成】 酸枣仁（炒，去衣） 人参 白茯苓各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，食远米饮调下。

【主治】 睡中汗出。

09316 参苓粥

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】 人参（锉） 一两 白茯苓（去黑皮、锉）半两 粳米（净洗）二合 生姜（切）二钱

【用法】 上四味，先将人参、茯苓、生姜，用水三升，煎至一升，去滓，下米煮作粥。临熟时下鸡子白一枚及盐少许，搅令匀，空心食之。

【功用】《药粥疗法》：益气补虚，健脾养胃。

【主治】 ①《圣济总录》：伤寒胃气不和，全不思食，日渐虚羸。②《药粥疗法》：气虚体弱，脾胃不足，倦怠无力，面色㿠白，饮食减少，食欲不振，反胃呕吐，大便稀薄。

【宜忌】《药粥疗法》：湿热忌用。

09317 参枣丸

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】 安志膏(《济阳纲目》卷五十四)。

【组成】 人参 酸枣仁各一两 辰砂五钱 乳香二钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷煎汤化下。

【主治】 一切惊心怖胆。

09318 参乳丸

【方源】《直指》卷十一。

【组成】 人参半两 当归一两（晒干） 乳香一钱半（研）

【用法】 上为末。山药煮糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，食后枣汤送下。

【主治】 心气不足，怔忪自汗。

09319 参乳丸

【方源】《医方集解》。

【组成】 人参末 人乳粉各等分

【用法】 炼蜜为丸服。

【功用】《冯氏锦囊·杂症》：交补气血，滋燥降火。

【主治】《冯氏锦囊·杂症》：一切虚怯。

【宜忌】 人乳能湿脾、滑肠、腻膈，久服亦有不相宜者。惟制为粉，则有益无损。须用一妇人之乳为佳，乳杂则其气杂；又须旋用，经久则油糟。

【方论选录】 ①《医方集解》：人参大补元气，人乳本血液化成，用之以交补气血，实平淡之神奇也。②《医方论》：平补气血，一壮水之源，一益气之主。后人两仪膏，从此化出。

【备考】 炖乳取粉法，取无病年少妇人乳，用银瓢或锡瓢，倾乳少许，浮滚水上炖，再浮冷水上立

干，刮取粉用，如摊粉皮法。

09320 参乳汤

【方源】《杂症会心录》卷上。

【组成】人参一钱 人乳一杯

【用法】不拘时候服。

【主治】燥病。

【方论选录】《证因方论集要》：人参味甘益血，人乳本血所化，味甘咸，入脾、肺、肾三经，补益精气血，阴血充足则燥平。

09321 参柏丸

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】苦参 黄柏各等分

【用法】上为末，酒糊为丸。每服百丸，空心酒吞下。

【主治】肠风下血。

09322 参柏饮

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】人参 侧柏叶各一两

【用法】上为细末。每服二钱，用飞罗面二钱和匀，用新汲水调如稀面糊服之。

【主治】血气妄行，势若涌泉，口鼻俱出，须臾不救。

09323 参萆汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】人参 鹿茸 附子 当归（炒） 茴香（炒） 菟丝子 杜仲

【主治】痢久阴阳两伤，少腹肛坠，腰胯脊髀酸痛，由脏腑伤及奇经

【加减】若其人但坠而不腰脊痛，偏于阴伤多者，去附子加补骨脂。

【方论选录】少腹坠，冲脉虚也；肛坠，下焦之阴虚也。腰，肾之腑也；胯，胆之穴也（谓环跳）；脊，太阳夹督脉之部也；髀，阳明部也；俱酸痛者，由阴络而伤及奇经也。参补阳明，鹿补督脉，归、茴补冲脉，菟丝、附子升少阴，杜仲主腰痛，俾八脉有权，肝肾有养，而痛可生，坠可升提也。

09324 参茯膏

【方源】《医统》卷二十七。

【组成】人参 陈皮 白茯苓 生地黄 麦门冬

【用法】以水一斗煎成膏，加丁香、沉香末各二钱，蜜半碗，姜汁一杯和匀。每服二匙，粟米饮送下。

【主治】五膈五噎，呕逆食不下。

【加减】有痰，加竹沥。

09325 参星汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】人参五钱 南星（炮） 一两

【用法】上为末。每服一钱，生姜、大枣汤送下。一日二次。

【主治】虚而痫，久不愈者。

09326 参香散

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】人参 丁香各等分

【用法】上为散。每服二钱，空心热米饮调下。

【主治】脾胃气虚弱，呕吐不下食。

09327 参香散

【方源】《三因》卷十三。

【组成】人参 黄耆 白茯苓 白术 山药 莲肉（去心）各一两 缩砂仁 乌药 橘红 干姜（炮）各半两 甘草（炙）三分 南木香 丁香 檀香各一分 沉香二钱（一方有炮熟附子半两）

【用法】上为粗末。每服四钱，水一大盏，加生姜三片，大枣一个，煎七分，去滓，食前服。

【功用】常服补精血，调心气，进饮食，安神守中。

【主治】心气不宁，诸虚百损，肢体沉重，情思不乐，夜多异梦，盗汗失精，恐怖烦悸，喜怒无时，口干咽燥，渴欲饮水，饮食减少，肌肉瘦瘁，渐成劳瘵。

09328 参姜饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参三五钱或倍之 炙甘草三五分 干姜（炮）五分或一二钱（或用煨生姜三五片）

【用法】水一钟半，煎七八分，徐徐服之。

【主治】脾、肺、胃气虚寒，呕吐，咳嗽气短，小儿吐乳。

【加减】此方或陈皮、或荜茇、或茯苓皆可酌而佐之。

09329 参桂汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】人参 桂（去粗皮） 泽泻 甘草（炙，锉）各三分 陈橘皮（汤去白，炒） 麦门冬（去心，焙）各二两 半夏（汤洗去滑，生姜汁制，炒）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，加生姜一枣大（拍破），水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候，一日三五次。

【主治】胃反，呕吐不止，妨碍饮食。

09330 参桂饮

【方源】《白喉全生集》。

【组成】 条参五钱 银花 法夏（姜汁炒） 僵蚕（姜汁炒）各二钱 肉桂五分（去皮） 陈皮 砂仁（姜汁炒） 粉草各一钱 生姜三片

【用法】 水煎服。

【主治】 白喉寒证渐重。白见于关内，成点成块，或满喉俱白，色如凝膏，喉内淡红微肿，时痛时止，头项强痛，身重，恶寒发热、咳嗽结胸，声低痰壅，舌苔白而厚，不思饮食，目眩，倦卧，或手足冷逆欲吐，腹痛。

09331 参莲汤

【方源】《蒿崖尊生》卷九。

【组成】 莲子（去心皮）五钱 人参五分

【用法】 水煎，温服。二服愈。

【主治】 噤口痢。

09332 参耆丸

【方源】《疡医大全》卷三十五。

【组成】 真黄耆 苦参（酒炒） 茅苍术（米泔炒）各一斤

【用法】 上为细末，水为丸，如绿豆大。每服三钱，白开水送下。

【主治】 疥疮脓窠。

09333 参耆汤

【方源】《朱氏集验方》卷二引《梁氏总要方》。

【组成】 人参 桔梗 天花粉 甘草各一两 白芍药 绵耆（盐汤浸）各二两 白茯苓 北五味子各一两半 （一方有木瓜、干葛、乌梅）

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，煎至八分。日进四服，留滓合煎。

【主治】 消渴。

09334 参耆汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 人参（去芦） 黄耆（蜜水炒） 茯苓（去皮） 当归 熟地黄 白术（去芦） 陈皮各一钱 升麻 肉桂各五分 益智仁八分 甘草三分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，大枣一个，水煎，空心服。

【主治】 气虚遗溺失禁。

09335 参耆汤

【方源】《何氏济生论》卷七。

【组成】 人参 黄耆 当归 白术（炒） 白芍药 艾叶一钱 阿胶一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人小产，气虚下血不止。

09336 参耆散

【方源】《直指》卷九。

【组成】 柴胡 明阿胶（炒酥） 黄耆（蜜炙） 白茯苓 紫菀茸 当归 川芎 半夏（制） 贝母（去心） 枳壳（制） 北梗 秦艽（洗） 甘草（焙）各半两 人参 北五味子 羌活 防风 杏仁（水浸，去皮） 款冬花 桑白皮（炒）各二钱半 生鳖甲（去裙，米醋炙黄）

【用法】 上为粗末。每服二钱半，加生姜、大枣，水煎，食后少顷服。

【主治】 劳瘵嗽喘，咯血，声焦，潮热盗汗。

09337 参萸丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【异名】 参茱丸（《赤水玄珠》卷六）。

【组成】 六一散一料 吴茱萸一两（制）

【用法】 上为末，饭为丸服。

【主治】 湿而滞气，上则吞酸，下则自利，湿热甚者。

09338 参黄汤

【方源】《感证辑要》卷四。

【组成】 别直参一钱半 生锦纹一钱半

【主治】 气虚甚而邪实，大便不通者。

09339 参漆丸

【方源】《良方集腋》卷上。

【异名】 参山漆丸（《饲鹤亭集方》）。

【组成】 生大黄四两（一半藕汁浸，一半韭汁浸，先蒸后浸，晒干，如法九次） 真野参山漆一两（生，研） 川郁金一两（生，研） 真西血琥珀一两（同灯草研） 怀牛膝二两（酒炒） 当归头二两（酒浸，炒）

【用法】 上为极细末，如飞尘，水泛为丸。每服一钱，开水送下。

【功用】《饲鹤亭集方》：祛瘀血，生新血。

【主治】 ①《良方集腋》：吐血。②《饲鹤亭集方》：暴起失血，或呕或吐，成碗成盏，一时难止者。

09340 参橘丸

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】 橘皮四两（洗） 人参一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【功用】 补气，顺气。

【主治】 气病。心下似硬，按之即无，常觉膨胀，多食则吐，气引前后，噫气不除，由思虑过多，气不以时而行则气结，脉涩滞。

09341 参橘汤

【方源】《直指》卷七。

【组成】 人参 真橘红 石莲肉各半两 透明乳香一钱半

【用法】 上为末。每服一钱，姜汤点服。

【主治】 翻胃。

09342 参橘饮

【方源】《会约》卷十四。

【组成】 人参一钱 白术二钱 炙草一钱 橘红 紫苏 麦冬 黄芩 竹茹 生姜各一钱 广香五分 茯苓一钱半

【用法】 加大枣为引。

【功用】 补气清热保胎。

【主治】 妊妇恶阻，呕逆不能食，六脉虚者。

【加减】 或加半夏二钱（姜炒）。

09343 参橘散

【方源】《简明医彀》卷七。

【组成】 人参 橘皮 白术 茯苓 麦芽各一钱 炙草五分 生姜二钱 竹茹一团 粳米一撮

【用法】 水煎服。

【功用】 益胃和中。

【主治】 妊娠胃虚，恶阻呕吐，饮食少进。

【加减】 未止，加制半夏。

09344 参归腰子

【方源】《寿亲养老》卷四。

【异名】 参归腰子丸（《摄生众妙方》卷七）、壮阳种子方（《墨宝斋集验方》卷上）。

【组成】 人参半两（细切） 当归半两（上去芦，下去细者，取中段切） 猪腰子一只

【用法】 上以腰子用水两碗，煮至一盏半，将腰子细切，入二味药同煎至八分，吃腰子，以汁送下。有吃不尽腰子，同上二味药滓焙干，为细末，山药糊为丸，如梧桐子大，每服三五十丸。此药多服为佳。

【主治】 心气虚损，怔忡而自汗。

09345 参苓饮子

【方源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】 麦门冬 五味子 白芍药 熟地黄 黄耆各三两 白茯苓二钱半 天门冬 人参 甘草各五钱

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，大枣二个，乌梅一个，煎至一盏，去滓，食后温服。

【功用】 生津液，思饮食。

【主治】 消渴口干燥，不思饮食。

09346 参贝六贤散

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】 制半夏四两 玄参 甘草各三两 姜制南星二两 青黛十两 陈皮一斤（去白，略煎去辣味）

【用法】 六味以好泉水同煮，候干晒燥，为细末。以西洋参、川贝母（去心）各二两，蛤壳（煅，飞）六两，俱研细和匀，每用五六分，开水调下，不拘时候。

【功用】 《重订通俗伤寒论》：涤痰止嗽，清火降气。

【主治】 ①《鸡鸣录》：胸膈不舒，痰多食少。②《重订通俗伤寒论》：瘦人阴虚多火并风寒夹痰。

09347 参术地黄汤

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】 人参 熟地黄 白术（蜜炙）各二钱 当归 川芎 黄耆 麦冬（去心） 茯苓各一钱 炙甘草五分 五味子十五粒 陈皮四分

【用法】 上加大枣二个，水二钟，煎一钟服。

【主治】 产后乳少，无以乳儿，以致母子俱瘦，饮食减少。

09348 参术启脾丸

【方源】《医便》卷五引钱霈方。

【组成】 人参（去芦）二两 白术（麸皮炒）四两 黄耆（蜜炙）二两 白茯苓（去皮）二两 山药（微炒）二两 甘草（炙）五钱 陈皮（去半白）一两 黄连（炒）八钱 法制半夏粉一两 砂仁一两 神曲（炒）五钱 白芍药（炒）一两五钱 山楂肉一两 藿香（水洗）三钱 麦门冬（炒，取末）五钱

【用法】 上各为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，白汤下，空腹食远皆可服。

【功用】 补脾胃，益元气，壮精神，化痰涎，灵饮食。久服肥健延年。

09349 参术附子汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】 人参 白术各二两 附子三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 小便之时，忽然寒嚏脱阳。

09350 参术实脾汤

【方源】《医学六要·治法汇》卷六。

【组成】 白术 人参各二钱 肉果（面包煨）一钱半 白茯 白芍 陈皮各一钱 甘草（炙）七分

【用法】 水二钟，加生姜三片，大枣二个，煎服。

【主治】 久泻滑肛。

【备考】《准绳·类方》有炮附子八分。

09351 参术香连汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】广木香五分 黄连一钱 人参八分 白术一钱半 甘草一钱 茯苓二钱 枳实一钱

【用法】水煎服。

【主治】休息痢，屡止屡发，久不愈者。因固涩太早，积未清所致。

09352 参术姜桂饮

【方源】《幼科证治大全》引《医述》。

【组成】人参五分 白术（炒）六分 干姜（炒） 桂 茯苓 扁豆（姜汁炒） 山药（炒）各六分 陈皮 甘草各四分

【用法】上加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿久泻，面色赤，身热口渴，属脾胃极虚，阳气外散者。

09353 参术健脾丸

【方源】《成方便读》卷三引东垣方。

【组成】人参二两 陈皮一两 白术（土炒）二两 麦芽（炒）一两 山楂一两五钱 枳实三两

【用法】神曲糊为丸。米饮送下。

【主治】脾虚饮食不消。

【方论选录】夫脾胃之虚，其来也渐，固为病之本。而食积停滞，其来也骤，则为病之标。治病当明标本缓急，急则治其标，故方中虽消补并行，而仍以治标为急。故君以枳实之苦寒，破气行血，消食消痰，为磨积之主药。而后以参、术驾驭之，不使其过而伤正。且枳实得参、术之力，而用益彰，参、术得枳实，则补而不滞，两者互相为用。然毕竟因食积起见，故又以麦芽之化谷，山楂之化肉，而赞助之。脾虚停积，则气不行，故以陈皮理之；用神曲糊丸者，助其蒸化，米饮下者，藉谷气以和脾胃耳。

09354 参术健脾汤

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《医方集略》。

【组成】人参 白术 白茯苓 厚朴 陈皮 山楂肉各一钱 枳实 白芍药各八分 神曲 麦芽 缩砂 甘草各五分

【用法】上锉，作一帖。加生姜三片，大枣二个，水煎服。

【功用】健脾养胃，运化饮食。

【主治】食伤。

09355 参术健脾汤

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】人参 白茯苓 陈皮 半夏 缩砂仁 厚朴（姜制）各一钱 白术二钱 炙甘草三分

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分。

【主治】胀满。

【备考】加曲芽、山楂肉，消胀尤妙。

09356 参术调中汤

【方源】《内外伤辨》卷中。

【组成】白术五分 黄耆四分 桑白皮 甘草（炙） 人参各三分 麦门冬（去心） 青皮（去白） 陈皮（去白） 地骨皮 白茯苓各二分 五味子二十个

【用法】上㕮咀，如麻豆大，都作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，早饭后大温服。

【功用】泻热补气，止嗽定喘，和脾胃，进饮食。

【主治】①《内外伤辨》：暑伤胃气。②《杏苑》：痞闷满膨，不思饮食，喘嗽蒸热。皆中气有亏所致。脾胃虚弱，遇六七月霖雨，身重短气，骨乏无力。

【宜忌】忌多语言劳役。

【方论选录】①《内外伤辨》：《内经》云："火位之主，其泻以甘。"以黄耆甘温，泻热补气；桑白皮苦微寒，泻肺火定喘，故以为君。"肺欲收，急食酸以收之。"以五味子之酸，收耗散之气，止咳嗽。脾胃不足，以甘补之，故用白术、人参、炙甘草，苦甘温补脾缓中为臣。地骨皮苦微寒，善解肌热；茯苓甘平降肺火；麦门冬甘微寒，保肺气为佐。青皮、陈皮去白，苦辛温散胸中滞气为使也。②《杏苑》：方中人参、白术、茯苓、炙草、黄耆补中益气为君；桑白皮、麦冬、五味清肺金止喘嗽为臣；青皮、陈皮行滞气消痞闷为佐；地骨皮解蒸为使。

09357 参术调中汤

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】人参 黄耆各五钱 当归身 厚朴（姜制） 益智仁 草豆蔻 木香 白术 甘草（炙） 神曲（炒） 麦芽面 橘皮各三钱

【用法】上锉，如麻豆大。每服一两，水二盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】内伤自利，脐腹痛，肢体倦，不喜食，食即呕，嗜卧懒言，足胫冷，头目昏。

09358 参归三圣散

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】舒筋三圣散去延胡索，加人参。

【用法】上为散。每服五钱，水煎去滓。早暮各一服。

【主治】 风中血脉，左半肢废，口目左㖞。

【方论选录】 左半肢废，气血不能运行，延胡耗血，胡敢轻试，必藉人参引领当归、肉桂，何虑虚风之不散乎。

09359 参归升麻汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 人参（去芦） 当归 生地黄 赤茯苓（去皮） 猪苓 泽泻 山栀 枳壳（去瓤） 牛膝（去芦，酒洗） 黄柏（酒炒） 知母（酒炒）各等分 升麻少许 甘草减半

【用法】 上锉一剂。加灯心一团，水煎，空心服。

【主治】 虚人小便不通。

09360 参归生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】 川芎一钱半 当归二钱 炙草五分 人参二钱 黄耆一钱半 肉桂五分 马蹄香二钱

【用法】 内服。

【主治】 产后恶露流于腰臂足关节之处，或漫肿，或结块，久则肿起作痛，肢体倦怠。

09361 参归荆芥汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】 人参一两 荆芥三钱 当归一两

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人甫产后，忽眼目昏晕，恶心欲吐，额上鼻尖有微汗，鼻出冷气，神魂外越，证属气虚欲脱而血晕。

09362 参归养荣汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】 人参 当归 熟地黄 白术（去芦） 茯苓（去皮） 白芍（酒炒） 陈皮 黄柏（酒炒） 知母（酒炒） 牛膝（去芦，酒洗） 杜仲（姜，酒炒） 破故纸（酒炒）各等分 甘草减半

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 痿症气血虚损，属虚热者。

【加减】 肥人气虚有痰，加半夏，去白芍；瘦人血虚有火，倍加当归、熟地黄。

09363 参归养荣汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】 人参 当归 川芎 白芍 熟地黄 白术 白茯苓 陈皮 甘草

【用法】 上锉一剂。加生姜一片，大枣一个，水煎，温服。

【主治】 ①《回春》：一切疮病。②《金鉴》：破伤风。生疮溃后受风者，因生疮溃而未合、失于调护，风邪乘虚侵入疮口，先从疮围起粟作痒，重则牙紧项软下视。

09364 参归益元汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 人参（去芦）五分 当归 白芍 熟地黄 白茯苓（去皮） 麦门冬（去心）各一钱 五味子十粒 陈皮 黄柏（酒炒） 知母（酒炒）各七分 甘草一分

【用法】 上锉一剂。加大枣一个，乌梅一个，炒米一撮，水煎服。

【主治】 注夏病。阴血虚，元气不足，夏初春末头眩眼花、腿酸脚软、五心烦热，口苦舌干、精神困倦、无力好睡、饮食减少、胸膈不利、形如虚怯、脉数无力。

【加减】 饱闷，加砂仁、白豆蔻；恶心，加乌梅、莲肉、炒米；哕，加竹茹；烦躁，加辰砂、酸枣仁、竹茹；泻，加炒白术、山药、砂仁、乌梅，去熟地、知母、黄柏；小水短赤，加木通、山栀；胃脘不开、不思饮食，加厚朴、白豆蔻、益智、砂仁、莲肉，去熟地、黄柏、知母；腰痛，加杜仲、故纸、茴香；腿酸无力，加牛膝、杜仲；皮焦，加地骨皮；头目眩晕，加川芎；虚汗，加黄耆、白术、酸枣仁；梦遗，加牡蛎、辰砂、山药、椿根皮；虚惊烦热，加辰砂、酸枣仁、竹茹；口苦舌干，加山栀、乌梅、干葛。

09365 参麦地黄丸

【方源】《成方便读》。

【组成】 六味地黄丸加西洋参 麦冬各三两

【主治】 金水两亏，阳虚火旺，肺中津液受灼，骨蒸劳热者。

【方论选录】 地黄丸本长于壮水，加参、麦则兼以清金。

09366 参苏半夏汤

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】 人参 桂（去粗皮） 甘草（炙） 木香各一两 五味子 桑白皮（炒） 陈皮（去白） 白术 紫苏叶 半夏（生姜制）各二两

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一大盏半，生姜十片，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】 咳嗽痰涎，咽膈不利，喘满，气不宣通。

09367 参苏温肺汤

【方源】《医学发明》卷六。

【组成】 人参 紫苏叶 甘草各半两 肉桂 五味子 木香各四钱 陈皮（去白） 白术各六钱

半夏（姜制） 白茯苓（去皮）各半两 桑白皮一两

【用法】 上为粗末。每服半两，水一盏半，加生姜三片，同煎至八分，去滓，食后大温服。

【功用】 《医略六书》：补肺散寒。

【主治】 形寒饮冷，伤肺喘嗽，烦心胸满，气不得通畅。

【加减】 如冬寒，每服中加不去节麻黄五分，先煎去沫，下诸药。

09368 参连开噤汤

【方源】 《金鉴》卷四十二。

【组成】 人参 黄连 石莲子

【用法】 煎汤，徐徐服之。下咽即好，外以贴脐王瓜藤散。

【主治】 噤口痢，不堪下者。

09369 参连开噤散

【方源】 《金鉴》卷五十三。

【组成】 人参 川连（姜炒） 莲子肉各等分

【用法】 上为细末。米饮调下。

【主治】 噤口痢。火毒冲胃，脉大身热，不能饮食，舌赤唇红，惟喜饮冷。

09370 参连菖蒲汤

【方源】 《医统》卷三十六。

【组成】 人参一钱 黄连一钱（姜炒） 石菖蒲八分 石莲子一钱

【用法】 上为末。水二盏，煎至一盏，终日细细呷之。如吐又服，但得一呷下咽便好，要封脐引热下行，用螺肉捣碎，入麝香少许，掩脐上。

【主治】 噤口痢。

09371 参附三白汤

【方源】 《重订通俗伤寒论》。

【组成】 老东参 生白术 白茯苓 炒白芍各一钱半 黑附块一钱 清炙草八分 生姜两片 大红枣二个

【主治】 阴证发斑。内伤脾阳，阳为阴逼者，斑点隐隐而稀，色多淡红，或夹淡灰，或夹皖白，多则六七点，少则三五点，形如蚊迹，只见于手足，或略见于腹部，似斑而实为细疹，四肢厥冷，神倦嗜卧，喜向里睡，神识似寐非寐，乍清乍昧，声低息短，少气懒言，大便多溏，溺色清白或淡黄，舌苔白而嫩滑，或胖嫩而黑润。

09372 参附龙牡汤

【方源】 《方剂学》。

【组成】 参附汤加龙骨 牡蛎

【功用】 敛汗、潜阳，扶正固脱。

【主治】 阴阳俱竭，阳越于上，汗出肢冷，面色浮红，脉虚数或浮大无根者。

【临证举例】 中风阳脱证 《江西中医药》（1983；6：13）：某女，61岁，近10天来精神软弱，头痛加重，卧床不起。突然神志不清，小便失禁，大便数日未解，面色苍白，呼吸稍急促，冷汗淋漓，目合口开，呼吸低微，喉中痰鸣，手撒肢冷，肢体软瘫，脉微欲绝，舌瘀质淡。证属正气虚，风痰内闭、阳气欲脱。急宜益气固脱，回阳救逆，佐以化痰开窍。予参附龙牡汤加味，红参9克（先煎）、制附片10克、龙骨30克（先煎）、牡蛎30克（先煎）、石菖蒲10克、制南星9克、急服一剂，次日神志稍清，能进汤粥，嘱其原方再服二剂，病情大为好转，能起床活动，改投二陈汤加味以健脾化痰善后。随访二年余，一切正常。

09373 参附再造汤

【方源】 《重订重俗伤寒论》。

【组成】 高丽参一钱至一钱半 淡附片五分 川桂枝一钱 羌活八分 绵蓍皮一钱半（酒洗） 北细辛三分 清炙草八分 防风八分

【功用】 助阳发汗。

【主治】 伤寒夹阴，阳虚不能作汗，尺脉迟弱者。

【方论选录】 阳虚者阴必盛，故君以附，桂破阴；阴盛者气必弱，故臣以参、蓍扶气；佐羌、防、细辛，以温散阴寒；使以甘草，以缓辛、附、羌、防之性。

09374 参附养荣汤

【方源】 《瘟疫论》卷一。

【组成】 当归一钱 白芍一钱 生地三钱 人参一钱 附子七分（炮） 干姜一钱（炒）

【用法】 照常煎服。如前证一服痞当如失，倘有不证，下后脉实，痞未除者，再下之。

【主治】 ①《瘟疫论》：因他病先亏，或因新产后气血两虚，或禀赋娇怯，疫邪留于心胸，令人痞满，因下益虚，失其健运，邪气留止，愈下而痞愈甚者。②《会约》：瘟疫下后虚痞，不热不渴，脉平而弱。

【宜忌】 若潮热，口渴，脉数而痞者，投之祸不旋踵。

09375 参附蓍蛎汤

【方源】 《产科发蒙》卷四。

【组成】 人参 黄耆 附子 牡蛎各等分

【用法】 上作大剂。以水二合，煮取一合，温服。

【主治】 产后绝汗如雨，手足清冷者。

09376 参附渗湿汤

【方源】《景岳全书》卷五十八引《局方》。

【异名】 渗湿汤(《杨氏家藏方》卷四)。

【组成】 人参 白术 茯苓 甘草 附子（炮） 干姜（炮） 桂枝 芍药各等分

【用法】 用水二钟，加生姜三片，大枣二个，煎八分，不拘时候。

【主治】 ①《景岳全书》引《局方》：坐卧湿地，雨露所袭，身重脚弱，关节疼痛，发热恶寒，小便不利，大便溏泄。②《杨氏家藏方》：肤腠不密，易冒风湿，身体烦疼，不能屈伸，多汗恶风，头目昏重，项背强急，手足时厥、周身麻痹，肢体微肿。

09377 参苓内托散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 归身 黄耆 川芎 白芍 陈皮 白术 山药 熟地 茯苓 人参各一钱 甘草 肉桂 熟附子 牡丹皮 地骨皮各五分

【用法】 上用水二钟，加生姜三片，大枣二个，煎八分，食远服。

【主治】 鬓疽已成，坚而不溃，溃而不敛，气血俱虚，身凉脉细，饮食少思，口淡无味，及形体消瘦者。

09378 参苓生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】 川芎一钱 当归二钱 黑姜四分 炙草五分 人参二钱 茯苓一钱 白芍一钱（炒） 益智一钱（炒） 白术二钱（土炒） 肉果一个（制）

【主治】 妇人胎前素弱，产后三日内块已消，泄泻，完谷不化者。

【加减】 泻水多，加泽泻、木通各八分；腹痛，加砂仁八分；渴，加麦冬、五味子；寒泻，加黑姜一钱，木香四分；食积，加神曲、麦芽消饭面，砂仁、山楂消肉食。

09379 参苓白术丸

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】 人参一两 白术（去芦，土炒）一两半 白茯苓（去皮）一两 怀山药（炒）一两 白扁豆（姜汁炒）一两 桔梗（去芦）一两 薏苡仁（炒）一两 莲肉（去心皮）二两 陈皮一两 半夏（汤泡，姜汁炒） 一两 砂仁五钱 黄连（姜汁炒）一两 神曲（炒）一两 香附（童便炒）一两 白芍（酒炒）一两 当归（酒炒）二两 甘草（炙）五钱

【用法】 上为末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，食后米汤送下。

【功用】 补气和血，健脾理胃，进美饮食，壮健身体，充实四肢，清火化痰，解郁顺气。

【主治】 病后元气虚弱，脾胃亏损。

【加减】 加远志（去心）一两亦妙。

09380 参苓白术散

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【异名】 白术调元散(《痘疹全集》卷十三)、参术饮(《张氏医通》卷十六)、白术散(《全国中药成药处方集》)。

【组成】 莲子肉（去皮） 薏苡仁 缩砂仁 桔梗（炒令深黄色）各一斤 白扁豆（姜汁浸，去皮，微炒）一斤半 白茯苓 人参（去芦） 甘草（炒） 白术 山药各二斤

【用法】 上为细末。每服二钱，枣汤调下。

【功用】 健脾益气，和胃渗湿。

①《局方》：久服养气育神，醒脾悦色，顺正辟邪。②《景岳全书》：调助脾胃。③《中国药典》：补脾胃，益肺气。

【主治】 脾胃虚弱，食少便溏，或吐或泻，胸脘闷胀，四肢乏力，形体消瘦，面色萎黄，舌苔白、质淡红，脉细缓或虚缓。

①《局方》：脾胃虚弱，饮食不进，多困少力，中满痞噫，心忪气喘，呕吐泄泻，及伤寒咳嗽。②《普济方》：胃虚口噤，及小儿疳渴，由脏腑宿有疳气，加之乳母恣食甘肥、酒面、炙煿，心肺壅热，日则烦渴饮水，乳食不进，夜则渴止。③《幼科类萃》：胎肥胎怯。④《寿世保元》：痘疮胃虚不进饮食或口干发渴，或吐泻。⑤《准绳·幼科》：久泻，及大病后、痢后消渴。⑥《张氏医通》：胃虚喘嗽，大便不实。⑦《金鉴》：脾虚食后即作泻，腹满不渴，少精神，面黄懒食，肌消瘦。及经来泄泻。⑧《中国药典》：脾胃虚弱，食少便溏，气短咳嗽，肢倦乏力。

【方论选录】 ①《医方考》：脾胃喜甘而恶秽，喜燥而恶湿，喜利而恶滞。是方也，人参、扁豆、甘草，味之甘者也；白术、茯苓、山药、莲肉、薏苡仁，甘而微燥者也；砂仁辛香而燥，可以开胃醒脾；桔梗甘而微苦，甘则性缓，故为诸药之舟楫，苦则喜降，则能通天气于地道矣。②《冯氏锦囊·杂症》：脾胃属土，土为万物之母。东垣曰：脾胃虚则百病生，调理中州，其首务也。脾悦甘，故用人参、甘草、苡仁；土喜燥，故用白术、茯苓；脾喜香，故用砂仁；心生脾，故用莲肉益心；土恶

水，故用山药治肾；桔梗入肺，能升能降。所以通天气于地道，而无否塞之忧也。

【临证举例】 ①脾虚泄泻 《福建中医药》(1965年；5:39)：某女，48岁，有腹泻史，经常腹痛肠鸣。近数月来每日均拉稀便二、三次，胃纳不佳，饮食乏味，形瘦神疲，舌质淡苔白，脉虚弱无力。此脾虚湿注，治宜健脾渗湿，拟参苓白术散主之。处方：西党参三钱、焦白术三钱、白茯苓三钱、淮山药四钱、炒扁豆三钱、薏苡仁四钱、苦桔梗一钱、缩砂仁（杵冲）八分、炒莲肉三钱、炙甘草一钱。三剂后，腹泻停止，再服七剂，胃纳增加，大便正常。②胃虚嘈杂 《福建中医药》(1965年；5:39)：某女，28岁，近来脘中嘈杂，得食稍舒，口淡乏味，食后即觉胀闷，大便不实。舌淡苔白，脉象虚细。此属胃虚腐熟转输功能减弱，治宜健脾养胃，宗参苓白术散意。处方：西党参三钱，白茯苓三钱，焦白术三钱，淮山药四钱，白扁豆三钱，姜半夏一钱半，陈会皮一钱半，炙甘草一钱。服上方二剂即愈。③慢性痢疾 《新医学》(1977年；83:140)：某女，35岁，患慢性菌痢数年（大便曾培养出B组痢疾杆菌），反复发作，解脓血便，每天4～6次，伴有腹痛，里急后重，精神疲乏，食欲减少。舌质淡红，苔薄白稍腻，脉沉濡弱。证属脾虚下痢，处方：党参五钱、白术四钱、陈皮二钱、山药五钱、苡米五钱、莲子肉三钱、木香二钱（后下） 黄连二钱、桔梗二钱、扁豆三钱、砂仁一钱五分（打、后下）鱼腥草五钱、甘草二钱。服药四剂后，症状消失，大便正常，嘱续服上方，共服十剂，疗效巩固。④慢性肾炎 《云南中医杂志》(1982；2:37)：用本方去桔梗，加虎杖治疗慢性肾小球肾炎13例。尿蛋白在（卅）～（卌）之间，经用本方治疗，最短一月，最长半年均获显效。其中8例临床治愈，出院时尿蛋白稳定在（－）～（±）之间；5例有效，尿蛋白控制在（＋）－（卄）之间，其它临床症状消失。笔者运用参苓白术散，减去苦辛载药上浮之桔梗，加入清热利水之虎杖，以达到治本为主，标本兼顾之目的。如阳虚寒重，水湿不化，浮肿严重者，先用真武汤之类，温阳利水，待水肿消退后，再用本方调治。若属气虚者，重用党参或酌加黄耆、杜仲、菟丝子等益气补肾。⑤行经泄泻 《福建中医药》(1965；5:39)：某女，35岁，近年来每逢月经来潮，即发泄泻，腹胀微痛，精神困倦，饮食少进，头目眩晕，月经或多或少，色淡，舌质淡红，脉象濡缓无力。症脉合参，良由脾胃虚弱，湿聚中焦所致。治宜运脾渗湿，理气调经。处方：西党参三钱、白茯苓三钱、淮山药四钱、薏苡仁四钱、炒扁豆三钱、炒莲肉三钱、缩砂仁（杵冲）八分、陈会皮八分、生白芍三钱、制香附一钱半、粉葛根一钱半、炙甘草一钱。上方加减连服四剂，诸恙悉除，经随访观察四月来未见复发。

【现代研究】 对消化系统功能的影响 《中成药研究》(1982；8:25)；参苓白术散水煎液小剂量对肠管蠕动有兴奋作用，大剂量有抑制作用，可解除肠管的痉挛，并能增加肠管对水和氯离子的吸收。解痉作用的机理初步看来一方面可直接作用于平滑肌，另一方面亦有拮抗拟胆碱药的作用。

【备考】 本方改为丸剂，名“参苓白术丸”（见《医林绳墨大全》；改为膏剂，名“参苓白术膏”（见《杂病源流犀烛》）。

09381 参苓白术散

【方源】《回春》卷三。

【组成】 人参 白术（去芦） 茯苓（去皮） 山药（炒） 砂仁（炒） 藿香 陈皮 干姜（炒） 莲肉（去心皮） 诃子（煨） 肉蔻（煨，去油） 甘草（炙）各等分

【用法】 上锉一剂。加生姜一片，灯心一团，水煎服。

【主治】 气虚泄泻。

【加减】 呕哕恶心，加半夏、乌梅；元气虚脱，昏倦，加黄耆、升麻少许，去砂仁、藿香；饱闷，加厚朴，去肉蔻、诃子；小水短涩，加木通、车前，去干姜；泻甚不止，加炒苍术、乌梅、熟附子少许。

【备考】 本方方名，《东医宝鉴·内景篇》引作“参苓莲术散”。

09382 参苓建中汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】 人参 茯苓 当归 白芍 肉桂 甘草 前胡 细辛 麦冬 陈皮 半夏

【主治】 虚劳往来潮热，兼自汗，食少，膝软，骨节疼。

09383 参苓造化糕

【方源】《赤水玄珠》卷十三。

【组成】 人参二两（虚者用四两） 白茯苓四两 干山药 芡实 莲肉（去皮心，炒） 苡仁（炒） 白扁豆（炒）各半斤 糯米（打白炒）五升 白糖霜二斤半

【用法】 上为末，瓷瓶收贮。每用四五钱，白汤随加白糖霜调服，一日三四次。久服精神倍加。

【功用】 平调脾胃。

【主治】 伤食。

09384 参苓琥珀汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十七。

【异名】 参茯琥珀汤(《丹溪心法》卷三)。

【组成】 人参五分 茯苓（去皮） 川楝子（去核，锉炒）一钱 琥珀二分 生甘草一钱 玄胡索七分 泽泻 柴胡 当归梢各三分

【用法】 上㕮咀，都作一服。用长流水三盏，煎至一盏，去滓，空心、食前温服。

【主治】 小便淋，茎中痛不可忍，相引胁下痛。

【方论选录】《医方考》：经曰：壮者气行则愈，怯者着而成病。是以房劳老弱之人，多有此疾。补可以去弱，故用人参、茯苓；滑可以去着，故用琥珀、归梢；泻可以去闭，故用泽泻、生甘草；用柴胡者，使之升其陷下之清阳；用玄胡、川楝者，使之平其敦阜之浊气；煎以长流水者，取其就下之意也。

09385 参苓滑石汤

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】 白术 滑石各一两 黄芩 人参 芍药各五钱 木通 陈皮各三钱 干姜一钱 甘草（炙）一钱

【用法】 分八帖，水煎服。

【主治】 泄泻。泄而困倦，小便不利，脉数，有虚热。

09386 参胡三白汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】 人参 白茯苓 白芍 白术 柴胡

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 ①《伤寒全生集》：伤寒过经不解，人弱脉虚，不可下者。②《古今名医方论》：汗下后，虚微少气，发热，口燥。

【加减】 心烦不安者，加麦冬、五味；渴，加天花粉、知母；阴火动，加黄柏、知母；走精者，加牡蛎；心烦口苦，痞满，加枳实、黄连；不眠，加远志、竹茹、辰砂。

【方论选录】《古今名医方论》：此热是少阳之虚，不得仍作火治，故于柴胡方中去黄芩；口燥而不呕，故去半夏；少气而反去甘草者，欲其下达少阴也。于真武汤中不取附子，欲其上通少阳也；所藉惟人参，故用为君；佐白术，以培太阴之母；白芍滋厥阴之血，茯苓清少阴之水，生姜助柴胡散表邪，大枣助人参补元气。信为大病后调理之圣剂，至当而可法者也。

09387 参胡三白汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】 人参五分 柴胡 白术（去芦） 白茯苓（去皮） 白芍（炒） 当归 陈皮 麦门冬（去心） 五味子十粒 山栀子 甘草各五分 乌梅一个

【用法】 上锉一剂。加大枣一个，灯草一团，水煎，温服。

【主治】 ①《回春》：霍乱吐泻止后，发热头疼身痛，口干脉数者。②《杂病源流犀烛》：霍乱虚烦。

09388 参胡温胆汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】 人参 茯苓 柴胡 橘红 枳实 半夏 甘草

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 ①《伤寒全生集》：伤寒过经不解，虚烦不得眠者。②《张氏医通》：往来寒热，呕而痞闷。

【方论选录】《寒温条辨》：脾胃虚寒，少阳不能行生发之令，故痰涎沃胆而不能眠，参、草、苓、枣之甘温，以补益脾气。柴胡之辛温，以升发阳气。二陈之辛散，枳实之导滞，以开发痰饮，痰饮散而胆不寒矣。

09389 参胡温胆汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】 陈皮 半夏 茯苓 枳实 人参各一钱 竹茹 香附 麦门冬 柴胡 桔梗各八分 甘草三分 生姜三片 大枣二个

【用法】 水煎，温服。

【主治】 ①《医学入门》：心胆虚怯，触事易惊，梦寝不安，气郁生痰，变生诸症，或短气悸乏，或复自汗，四肢浮肿，饮食无味，烦躁不安。②《杂病源流犀烛》：痰火。

09390 参茸地黄汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】 怀熟地一两 山萸肉四钱 山药四钱 白茯苓三钱 丹皮三钱 泽泻三钱 人参二钱 鹿茸二钱（或用鹿角胶亦可）

【用法】 水煎服。

【主治】 鼻渊脑漏，日久不止者。

09391 参茸固本丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 人参二两 鹿茸五钱 天冬 麦冬 生地 熟地各四两

【用法】 上为末，蜜为丸，每服三钱，开水送下。

【功用】 生精添髓，壮筋健骨，大补气血，固本培元，久服延年。

【主治】 诸虚百损，腰膝酸软，步履无力。

09392 参香八珍膏

【方源】《重庆堂随笔》卷上引薛生白方。

【组成】 丹参（去头尾，酒洗熏熟） 四制香附各四两 熟地 炙黄耆 白芍（酒炒） 蒸熟白术 白归身（酒炒） 茯苓各三两

【用法】 上八味熬膏。每用三钱，开水调服。

【功用】 调经。

【方论选录】 一瓢先生云：此女科调理方之首选也，气味和平，功能相称，同行脏腑，灌注血脉，虚人可以久服。愚按气属阳欲其刚健，血属阴欲其柔顺，女子多郁，则气行不健故去甘草之甘缓，加香附以承流耆术之宣化；郁则生热，故血行不顺，爰去川芎之温窜，加丹参以协和三物而涵濡；且黄耆得归、芍补血之功，敏于人参特舍彼而用此，不仅贫富可以共赏也。

09393 参桂通温汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】 白术 人参各八分 猪苓 茵陈 泽泻 木通各一钱 山栀一钱五分 桂枝五分

【用法】 加灯心三十茎，服。

【主治】 疸症。脉虚便赤。

09394 参耆内托散

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】 人参一钱（虚甚者倍用） 黄耆（酒炒）三钱 当归二钱 川芎（酒炒）五分 炙草一钱五分 陈皮五分 金银花五钱 丹皮一钱 远志（去心甘草水泡，炒）一钱五分

【用法】 加大枣五枚，水煎服。

【主治】 痈疽未溃或已溃。

09395 参耆术附汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】 人参 北耆 焦术各一两 附子五钱

【主治】 中风脱证。

09396 参耆归术膏

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】 人参 黄耆 白术（土拌炒） 当归各一两

【用法】 水四碗，煮稠膏，以牛膝三钱煎汤，入竹沥匀之，加姜汁服。

【主治】 疮疡，衰老气虚者。

【加减】 胃不和，加陈皮二钱；泄泻，去当归。

09397 参耆瓜蒌散

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】 瓜蒌一个 甘草二钱 当归五钱 没药一钱 乳香一钱（另研） 大力子五分 人参二钱 黄耆五钱

【用法】 水、酒各半，煎服。二剂即消。

【主治】 乳痈，乳疽，瘰疬。

09398 参耆托里散

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】 人参（气虚多用之） 黄耆（炒） 白术（炒） 当归 熟地 芍药（酒炒） 茯苓 陈皮各一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 疮疡气血俱虚，不能起发，或腐溃不能收敛，及恶寒发热者。

【临证举例】 瘀血成毒 《陆氏三世医验》：吴江宁见源，久居林下，年近古稀，常自逞强健，乘船起岸，每不欲人扶，一日下舟，偶而失脚堕水，足大股挫气作痛，左胁亦引痛，顺气活血之药服至数十帖，两处之痛，已愈三月矣，忽于左股内髀枢作痛，疼痛日甚，憎寒作热，甚至不可忍，惟求速死为幸。予诊其脉，六部洪数，而左关尺带弦。此必瘀血未尽，留而成毒也。因起视痛处，已有脓在内。亟令延外科商之。外科至，予令以针破之。出脓血数碗，服大料参耆托里散数十剂而痊。

09399 参耆完胞汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】 人参 白术 绵耆 当归 川芎 红花 益母草 白及 猪胞一个

【功用】 益气生肌，和血固脬。

【主治】 胞脬受伤，淋漓不止。

09400 参耆附子汤

【方源】《会约》卷六。

【组成】 人参 黄耆（蜜炙）二钱 附子（制）一钱半 甘草（炙）一钱 白术一钱五分

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《会约》：面白鼻冷，阳气大虚。②《观聚方要补》：虚汗。

09401 参耆益气汤

【方源】《准绳·类方》卷一。

【组成】 人参 黄耆 白术各一钱半 五味子二十粒（捶碎） 麦门冬（去心） 陈皮 炙甘草各一钱

【用法】 水二钟，加生姜三片，大枣二个，煎至

八分，食前服。

【主治】 气虚阳厥，脉伏，手足厥冷。

【加减】 阳虚，加附子（童便煮）一钱。

09402 参耆通乳汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】 人参 黄耆 当归 木通 麦冬 桔梗 七孔猪蹄

【主治】 产后数日，而乳无点滴之下，症属血少气衰者。

09403 参耆救元汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 黄耆（蜜炒） 人参 粉草（炙） 麦门冬（去心） 五味子

【用法】 上锉。水煎，加朱砂少许，不拘时候。

【主治】 肾水枯竭，不通运上，作消渴，恐生痈疽。

09404 参耆羚角汤

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 羚羊角（镑） 防风 五味子 赤茯苓 人参各一两 黄耆 芜蔚子 知母各一两半

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 风牵眼偏斜外障。

09405 参脂四物汤

【方源】《医林纂要》卷八。

【组成】 四物汤加人参 五灵脂（微焙，研末，酒飞过，去砂）各二钱

【功用】 补心软坚，散瘀通脉，和血养阴，止心腹血气绞痛，除冲任痼冷沉寒。

【主治】 冲脉虚寒，经止不行，冷气上抢心胸，心腹疼痛不止。

09406 参赭培气汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 潞党参六钱 天门冬四钱 生赭石（轧细）八钱 清半夏三钱 淡苁蓉四钱 知母五钱 当归身三钱 柿霜饼五钱（服药后含化徐徐咽之）

【主治】 中气不旺，胃气不能息息下阴，而乘虚上干，致痰涎并随逆气上并，以壅塞贲门，而生噎膈反胃者。

【加减】 若服数剂无大效，当系贲门有瘀血，宜加三棱、桃仁各二钱。

【方论选录】 治此证者（膈证），当以大补中气为主，方中之人参是也。以降逆安冲为佐，以清痰理气为使，方中之赭石、半夏、柿霜是也。又虑人参性热，半夏性燥，故又加知母、天冬、当归、柿霜，以清热润燥，生津生血也。用苁蓉者，以其能补肾，即能敛冲，冲气不上冲，则胃气易于下降。且患此证者，多有便难之虞，苁蓉与当归、赭石并用，其润便通结之功，又甚效也。

【临证举例】 噎膈 一叟，年六十余得膈证，向愚求方。自信犹能细嚼焦脆之物，用汤水徐徐送下，然一口咽之不顺，即呕吐不能再食，且呕吐之时，带出痰涎若干。诊其脉关后缓弱，关前又似滑实，知其上焦痰涎壅滞也。用此汤加邑武帝台所产旋覆花二钱，连服四剂而愈。

09407 参赭镇气汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 野台参四钱 生赭石（轧细）六钱 生芡实五钱 生山药五钱 萸肉（去净核）六钱 生龙骨（捣细）六钱 生牡蛎（捣细）六钱 生杭芍四钱 苏子二钱（炒，捣）

【主治】 阴阳两虚，喘逆迫促，有将脱之势；亦治肾虚不摄，冲气上干，致胃气不降作满闷。

09408 参熟桃苏汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】 人参 熟地各一两 破故纸五分 茯神 麦冬各五钱 胡桃一个 生姜 苏子各一钱 山萸 巴戟天各二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 痰气上冲于咽喉，气塞肺管，作喘而不能取息，其息不粗，而无抬肩之状者。

09409 参燕百补丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】 人参须一钱（另研） 燕窝（另研） 明党参 潞党参 麦门冬 玉竹 茯苓 女贞子 杜仲 象贝母 使君子各二钱 桑椹 牡蛎（煅）各三钱 罂粟壳 甘草（炙）各四钱 广皮 鹤虱各一钱五分 沉香（后入）五分 红枣一两 冰糖二两（化水）

【用法】 上为细末，红枣煎汤，冰糖化水泛丸，如绿豆大。或上药煎浓汁，去滓，入参燕汁，再入冰糖收成膏，名“参燕百补膏”。每服三四钱，熟汤化下，春、夏宜丸服，秋、冬宜膏服。

【功用】 益髓添精，壮水制火，补气养血，宁心滋肾。

【主治】 病后或戒烟后身体羸弱，诸虚百损，劳伤咳嗽，腰膝酸软，心悸不寐，头晕耳鸣，阳痿带下。

09410 参燕麦冬汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 北沙参 麦冬各三钱 光燕条一钱 辛

冰糖四钱

【功用】 ①《重订通俗伤寒论》：清补肺脏。②《湿温时疫治疗法》：滋养气液。

【主治】 ①《重订通俗伤寒论》：风燥犯肺，干咳失血者，经治将愈，以此善后。②《湿温时疫治疗法》：五色痢，阴虚欲脱，挽救得转者。

09411 参附龙牡救逆汤

【方源】《中医儿科学》。

【组成】 人参 附子 龙骨 牡蛎 白芍 炙甘草

【功用】 温补心阳，救逆固脱。

【主治】 心阳虚衰，突然面色苍白而青，口唇发紫，呼吸浅促，额汗不温，四肢厥冷，虚烦不安，右胁下并出现瘀块，舌苔薄白，质暗紫，脉象微弱疾数。

【加减】 气阴两竭，宜育阴潜阳救逆，可加生脉散；在心阳虚衰之时，常伴见面色、唇舌青紫郁血之症状，以及右胁下瘀块明显者，可酌加当归、红花、紫丹参等活血化瘀之品，以助血行畅利。

【方论选录】 方中人参大补元气，附子温阳救逆，龙骨、牡蛎潜阳敛汗；白芍、甘草和营护阴。诸药合用，有回阳救逆，潜阳护阴之功。

09412 参蜜附子回阳汤

【方源】《杂病广要》引《医宗说约》。

【组成】 人参一两 黄耆一两 当归五钱 附子一两 粉草二钱

【用法】 水三钟，煎至一钟半，服至脉回为度。

【主治】 暴厥，忽然仆倒，脉脱厥逆。

09413 驻车丸

【方源】《外台》卷二十五引《延年秘录》。

【异名】 小连丸（《幼科类萃》卷八）、小驻车丸（《医学入门》卷六）。

【组成】 黄连六两 干姜二两 当归三两 阿胶（炙）三两

【用法】 上捣筛，三年酢八合，消胶令熔合，并手丸如大豆大。每服三十丸，以饮送下，一日二次。

【主治】 久痢伤阴，湿热未尽，下痢脓血，腹痛后重，亦治休息痢。

①《外台》引《延年秘录》：赤白冷热痢腹痛。②《千金》：大冷洞痢肠滑，下赤白如鱼脑，日夜无节度，腹痛不可堪忍者。③《圣济总录》：产后冷热痢。④《局方》（续添诸局经验秘方）：一切下痢，无问新久。⑤《成方便读》：阴虚下痢发热，脓血稠粘，及休息痢。

【宜忌】《外台》引《延年秘录》：忌猪肉，冷水，粘腻等物。

【方论选录】《千金方衍义》：人身有车，皆附脊而行，以司精、气、神之运度。羊车属肺分，当在上，以职司化气生精，故位反在下；鹿车属肾分，当在下，以职司化火益气，故位反在中，牛车属脾分，当在中，以职司化味为神，故位反在上，此皆平人之常度也。平人失其常度而患下痢崩脱，良由鹿车过驶趱动；羊车过度，以致精血不藏；牛车过度，不能随鹿车之驰骤，以致水谷不充。故用干姜以助牛车之健运，黄连以挽鹿车之倾危，阿胶以救羊车之奔迫，当归以理血气之散乱，庶精、气、神各归其统，而无崩脱之虞。且冷痢得干姜可燎，热痢得黄连可瘥，冷热交错得姜、连可解，阿胶可滋干姜之燥，当归可和黄连之寒。不特为久痢神丹，尤为休息痢之专药。

09414 驻车丸

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】 独活 川乌 沙参 生地 蒺藜 白芷 木瓜 海桐皮各五钱 米仁 羌活 防风 细辛 甘草节 牛膝各一两

【用法】 上为末，用五加皮浸酒煎汁为糊，为丸如梧桐子大。每服七十丸，酒送下。

【主治】 历节痛痹，寒湿脚气抽掣。

09415 驻景丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 菟丝子五两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 车前子一两 熟干地黄三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下，晚食前再服。

【功用】《局方》：久服补肝肾，增目力。

【主治】 ①《圣惠》：肝肾俱虚，眼常昏暗。②《局方》：肝肾俱虚，眼常昏暗，多见黑花，或生障翳，视物不明，迎风流泪。

09416 驻景丸

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【异名】 补肾丸。

【组成】 车前子一两 当归（酒洗）五钱 熟地黄二两 楮实一两 川椒（炒，去黑子）一两 五倍子（炒）一两 枸杞（去核）一两 菟丝子（酒浸洗净）一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，空心清茶或酒送下。

【主治】 肝肾气虚，两目昏暗，视物不明。

09417 驻精丸

【方源】《普济方》卷二一八引《卫生家宝》。

【组成】 白龙骨　石莲肉（捶碎，和壳用）各等分

【用法】 上焙为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮、温酒、盐汤任下，空心、日午、晚服。

【功用】 镇心安魂，涩肠胃，益气力，止泄泻。常服养神益力，轻身耐老，除百病。

【主治】 泄泻，及夜梦邪交，小便白浊。

09418　驻颜小还丹

【方源】《赤水玄珠》卷十。

【组成】 鹿角霜八两　龟版霜八两　虎胫骨（好酒炙）六两　天门冬（酒洗，去心）　熟地黄各四两　人参（去芦）二两　松子仁二两　柏子仁二两　紫河车一具（焙干）

【用法】 鹿角胶、龟版胶各四两，酒化开，同前药为丸，如梧桐子大。每服五六七十丸，空心秋石汤送下。

【功用】 久服返老还童。

【主治】 诸虚百损。

【加减】 素有火者，加雄猪胆汁五枚，炼熟入之。

【方论选录】 此方用龟、鹿、虎者，以其多寿也，能壮人之筋骨；用天冬、地黄、人参等，法象三才，以补人之精髓；用紫河车以补人之元神；松、柏耐岁寒，皆足以养神气，非泛常木可比，故有驻颜延寿之功。

09419　驻景补肾明目丸

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 五味子　熟地黄（酒蒸，炒）　枸杞子　楮实子（酒浸）　肉苁蓉（酒蒸，焙）　车前子（酒洗）　石斛（去根）各一两　青盐（别研）一两　沉香（另研）五钱　磁石（火煨，醋，水飞过）　菟丝子（酒浸，另研）各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【功用】 安魂稳魄，补血气虚散。

【主治】 肝肾俱虚，瞳人内有淡白色，昏暗渐成内障者。

09420　绀珠膏

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】 制麻油四两　制松香一斤

【用法】 上将麻油煎滚，入松香文火熔化，柳枝搅候化尽，离火下细药末二两三钱，搅匀，即倾子水内，拔扯数十次，易水浸之听用。瘰疬、肿毒、瘰疬等证，但未破者，再加魏香散，随膏之大小，患之轻重，每加半分至三二分为率。毒深脓不尽，及顽疮对口等证，虽溃必用此膏获效。未破者贴之勿揭，揭则作痒，痛也勿揭，能速于成脓。患在平处者，用纸摊贴；患在弯曲转动处者，用绢帛摊贴，臁疮及臂、腿寒湿等疮，先用茶清入白矾少许，洗净贴之见效。头痛，贴太阳穴；牙痛，塞牙缝内。内痈等证，作丸，用蛤粉为衣，服下。便毒痰核，多加魏香散；如脓疮，再加铜青；如蟾拱头、癣毒，贴之亦效。

【主治】 一切痈疽肿毒，流注顽臁，风寒湿痹，瘰疬乳痈，痰核、血风等疮，及头痛牙疼，腰腿痛。

【备考】 制油法：每用麻油一斤，用当归、木鳖子肉、知母、细辛、白芷、巴豆肉、文蛤（打碎）、山茨菇（打碎）、红芽大戟、续断各一两，槐、柳枝各二十八寸，入油锅内浸二十一日，煎枯去滓，取油听用。制松香法：择片子净嫩松香（为末）十斤，取槐、柳、桃、桑、芙蓉等五样枝，各五斤，锉碎，用大锅水煎浓汁，滤净，再煮一次，各收之，各分五份。每用初次汁一分煎滚，入松香末二斤，以柳、槐枝搅之，煎至松香沉下水底为度，即倾入二次汁内，乘热拔扯数十次，以不断为佳，候温作饼收之。余香如法。

09421　练阳汤

【方源】《回春》卷七。

【组成】 苦楝根皮二钱　陈皮　半夏　茯苓各一钱　甘草五分

【用法】 上锉一剂。加生姜，煎服。

【主治】 小儿蛔虫。

09422　细辛丸

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】 细辛　杏仁（去皮尖双仁，熬）　泽泻　干姜　白术　茯苓　桂心　甘草（炙）各二两　附子（炮，去皮）　蜀椒（去目闭口者，汗）　大黄　木防己各五分　芫花　甘遂各一两

【用法】 上为末，别治杏仁如脂，合捣百杵，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，以酒送下，一日二次，不能者如大豆二丸，以知为度。饮家困于痰澼，服药患困者，参服此丸，暨相发助，又不令越逸。

【功用】 消饮，去结澼，令胸膈无痰，无逆寒之患，又令人不眩满迷闷。散发五脏六腑三焦。久服强气。

【主治】 冷热不调，痰结胸中强饮，百处不安。

09423 细辛丸

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】细辛半两 桂心三分 甜葶苈半两（隔纸炒令紫色） 川大黄半两（锉碎，微炒） 黄芩半两 甘遂半两（煨微寒） 芫花半两（醋拌炒令干） 汉防己半两 赤茯苓三分 附子半两（炮裂，去皮脐） 白术三分 泽泻三分 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，食前以粥饮送下，一日三次。以利为度。

【主治】痰冷癖饮，上气喘满，四肢浮肿。

09424 细辛丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】细辛（去苗叶） 芍药 吴茱萸（汤洗，焙干，炒） 人参 白术 桂（去粗皮） 干姜（炮） 甘草（炙，锉） 当归（切，焙） 附子（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】上为细末，稀面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下，一日三次。

【主治】厥疝冷逆，攻心腹痛。

09425 细辛丸

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】细辛（去苗叶） 草乌尖 乳香各等分

【用法】上为末，熔黄蜡和捻作细条。临使时，旋于火上丸。塞蛀牙孔中。

【主治】一切风齿疼痛，及蛀牙。

09426 细辛丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】乌头 藁本 川芎 细辛各半两 甘草一分

【用法】上为细末，用石膏半斤研细，入甘锅子内，大火煅过，飞去石末，滴石膏水为丸，如弹子大。每服一丸，茶、酒任下，不拘时候。

【主治】头痛久不愈。

09427 细辛丸

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】细辛 石菖蒲 木通各一分 麝香一厘

【用法】上为末。棉裹塞耳中。即愈。

【主治】耳闭。

09428 细辛汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】细辛（去苗叶） 防风（去叉） 白术 附子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮）各一两 石膏（碎） 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙干）各二两 枳实（去瓤，麸炒微黄） 甘草（炙，锉）各半两 黄芩 当归（切，焙）各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服四钱匕，水一盏，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肌痹。淫淫如虫行，或腠理开疏汗出，皮肤肉色不泽，唇鼻黄。

09429 细辛汤

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】细辛（去苗叶） 茱萸各等分

【用法】上为粗末。每用一钱匕，水一盏。煎数十沸，热漱冷吐。

【主治】牙齿痛，久不愈。

09430 细辛汤

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】细辛（去苗叶） 苦参各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏，煎五七沸，去滓，热漱冷吐。

【主治】牙齿痛。

09431 细辛汤

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】细辛一两 白芷 芎藭 露蜂房各一分

【用法】上为散。以水一碗，煎十余沸去滓，热含冷吐。

【主治】齿不生，及齿风连面疼痛。

09432 细辛汤

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】细辛（去苗叶）一两 胡椒一分

【用法】上为粗末。每用三钱匕，浆水一盏，煎五七沸，去滓，热漱冷吐。

【主治】牙齿根挺出摇动，痛不可忍。

09433 细辛汤

【方源】《本事》卷二。

【组成】细辛（去叶） 半夏曲 茯苓（去皮） 桔梗（炒）各四钱 桂枝（去皮，不见火）三钱 甘草二钱（炙）

【用法】上为粗末。每服四钱，水二盏，加生姜四片，蜜半匙，煎至七分，温服，一日三次。

【主治】肺虚实不调，鼻塞多涕，咽中有涎面喘，项强筋急或痛。

09434 细辛汤

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】升麻一两 细辛二两 黄连一两 蔓荆子一两半 牛蒡子一两半 茱萸一两半 薄荷五钱 黄柏七钱 知母七钱 防己一两

【用法】上锉。水煎，温服。

【主治】 上牙疼，属足少阴肾虚热者。

09435 细辛汤

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】 细辛 防风 人参 白茯苓 车前子 五味子 玄参各一两 地骨皮 黄芩 泽泻各一两半 甘草五分

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 胞肉胶凝外障。胞肉积久，坚硬厚实。

09436 细辛饮

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】 细辛 防风 茺蔚子 藁本 知母 黄芩 芎劳 五味子 熟地 白茯苓 地骨皮 菊花 木贼各一两

【用法】 上为末。每服二钱，清茶调下。

【主治】 充风泪出外障。肺脏久冷，大眦有孔，名为泪堂，此泪虽久，泪则冷，眼愈昏暗。

09437 细辛散

【方源】《外台》卷十二引《深师方》。

【组成】 细辛 干地黄 甘草（炙）各二两 桂心 茯苓各五两 枳实（炙） 白术 生姜 栝楼实各三两

【用法】 上为末。每服方寸匕，酒送下，一日三次。

【主治】 胸痹连背痛，短气。

【方论选录】《千金方衍义》：胸痹达背隐痛，胸中大气不布，致浊痰瘀垢攻冲背腧，故用姜、桂、细辛辛温利窍，枳、术、苓、甘甘温健脾，栝楼涤痰，地黄滋血，乃橘皮枳实生姜汤之变法也。

09438 细辛散

【方源】 方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷一一六。

【异名】 瓜丁散（《普济方》卷五十六）。

【组成】 瓜丁 细辛各等分

【用法】 上为末，以棉裹如豆大许，塞鼻中。须臾即通。

【主治】 齆鼻有息肉，不闻香臭。

09439 细辛散

【方源】《医心方》引五引《古今录验》。

【组成】 姜四分 细辛五分 皂荚二分 椒四分 附子二分

【用法】 上药治下筛。以棉裹如杏仁大，着鼻孔中，每日一次，五日浊脓尽。

【主治】 齆鼻有息肉，及中风有浊浓汁出。

09440 细辛散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 细辛一两 枳实半两（麸炒微黄） 防风一两（去芦头） 石膏一两 白术一两 麻黄二两（去根节） 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服。不拘时候。

【主治】 脾脏中风，肉热肌痹，淫淫如虫行，或腠理开，汗大泄，皮肤肉色不泽，唇鼻黄色。

【宜忌】 忌生冷、油腻、粘滑、猪、鸡肉。

09441 细辛散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】 细辛一两 赤茯苓一两 白术一两 芎劳一两 柴胡一两（去苗） 当归一两（锉，微炒） 麻黄二两（去根节） 干姜一两半（炮裂，锉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 防风一两半（去芦头） 独活一两半 石膏二两 甘草一两（炙微赤，锉） 桂心一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】 上为粗散，每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 中风痹，头目昏闷，肢节疼痛。

09442 细辛散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】 细辛半两 人参（去芦头） 赤茯苓 车前子 藁本 赤芍药 川大黄（锉碎，微炒） 玄参各一两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服二钱，食后竹叶汤调下。

【主治】 眼睑肿硬，刺痛不开。

09443 细辛散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 细辛一两 赤茯苓一两 黄芩一两 麦门冬一两半（去心，焙） 木通一两半 黄连一两半（去须） 川大黄一两（锉碎，微炒） 葳蕤一两半 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】 坠睛眼，风热牵瞳人向下。

【宜忌】 忌炙煿、油腻、毒滑鱼肉。

09444 细辛散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 细辛一两 甘草一两（炙微赤，锉） 桂心一两

【用法】 上为细散。每服一钱，以熟水调下，不拘时候。

【主治】 口臭。

09445 细辛散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】细辛一两 紫菀一两半（去苗土） 五味子三分 贝母一两（煨微黄） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 赤茯苓一两 人参三分（去芦头） 甘草一分（炙微赤，锉） 青橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，痰唾稠粘，心胸壅滞，饮食减少。

09446 细辛散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】细辛（去苗叶） 夏枯草各三钱 荜茇 高良姜各一钱

【用法】上为细散。每用少许，随痛左右搐入鼻内。如牙疼，用时须开口流涎，不得喷，候涎尽，以冷水点腊茶饮之，其痛立止。

【主治】偏头疼，连牙齿风痛不可忍。

09447 细辛散

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】细辛（去苗叶）一两半 熟干地黄（焙）一两半 甘草（炙，锉）一两半 桂（去粗皮）一两半 赤茯苓（去黑皮）二两半 枳实（麸炒）半两 白术（锉）一两半 干姜（炮）一两半 栝楼实（去皮）一两半

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，空心、日午、临卧各一次。

【主治】胸痹连背痛，短气。

09448 细辛散

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】细辛（去苗叶） 甘草（炙） 木通（锉） 附子（炮裂，去皮脐）各一分

【用法】上为散。以羊胆汁和如枣核大，塞鼻中。

【主治】齆鼻不闻香臭。

09449 细辛散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【异名】草乌头散（《御药院方》卷九）。

【组成】细辛（去苗叶）一两 草乌头（罐子内烧存性）一两

【用法】上为细散。每用少许揩牙。出涎。

【功用】《御药院方》：辟风邪，能令病牙易落。

【主治】①《圣济总录》：牙疼肉烂，血出不止。②《御药院方》：牙齿动摇不稳。

09450 细辛散

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】细辛（去苗叶） 桂（去粗皮） 干姜（炮）各一分

【用法】上为散。以乳汁和涂顶上。

【主治】小儿解颅。

09451 细辛散

【方源】《普济方》卷四十六引《海上方》。

【异名】附子芎劳汤。

【组成】细辛一两（净） 川芎一两 附子（净，炮）半两 麻黄一分

【用法】上㕮咀，加连根葱白、生葱、大枣，每服五钱，水一盏半，煎至一盏，连进三服。（一方无葱、枣，微热服）。

【主治】风寒客于足太阳之经人脑，搏于正气，头痛如破，痛连脑户，或但额间与眉相引，如风所吹，如水所浸，遇风寒则极，常欲得热煦熨火，脉微弦而紧。

09452 细辛散

【方源】《普济方》卷六十八引《海上方》。

【组成】细辛 草乌尖 乳香各等分

【用法】上为细末，熔黄蜡为条，用时就火丸，塞孔中，良久效，无孔，即咬于痛处，有涎即吐之。

【主治】蛀牙。

09453 细辛散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】细辛 瓦粉各二分 生黄芩 芍药各五分 酒黄连 川芎各七分 炒黄芩 酒黄芩各一钱 炙甘草一钱五分 柴胡二钱

【用法】上为粗末。每服三钱，水一大盏半，煎至一盏，取清，食后服之。

【主治】偏正头痛。

09454 细辛散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】北细辛 荜茇各二钱 白芷 川芎各三钱 川乌一个 全蝎五个

【用法】上晒干为末。或痛，先用盐水洗净，用少许敷痛处，立效；或有热肿，即人脑子少许，和药擦之，皆效。

【主治】牙疼。

09455 细辛散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】荆芥 细辛 露蜂房各等分

【用法】上为粗末。每用三钱，水一大盏，煎至

七分，去滓，温漱冷吐。

【主治】 牙齿疼痛。

09456 细辛散

【方源】《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。

【组成】 红椒（去目，炒） 鹤虱 牙皂 荜茇 缩砂（去壳）各半两 荆芥（去梗） 细辛（去苗）各一两 白芷 草乌各二两

【用法】 上为细末。每用少许，于痛处擦之。有涎吐出，不得咽。少时，温水漱口，频频擦之。

【功用】 疏邪杀虫。

【主治】 ①《局方》（续添诸局经验秘方）：风蛀牙痛，或牙龈宣烂，牙齿动摇，腮颔浮肿。②《医略六书》：虫牙蛀，脉滑者。

【方论选录】《医略六书》：牙蛀，本厥阴风化之气生虫蚀牙，而齿不坚牢，故齿骨损坏焉。荆芥疏血中之风，细辛散少阴之风，白芷散风燥湿，川椒温中杀虫，牙皂通窍杀虫，鹤虱祛湿杀虫，荜茇暖胃逐虫，砂仁理气开胃也。为散擦牙，使风虫消化，则齿日肃清，而齿骨坚固。

09457 细辛散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】 细辛 防风 知母 茺蔚子各二两 黑参 桔梗 大黄 羚羊角各一两

【用法】 上为末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】 倒睫拳毛外障。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“细辛汤”。

09458 细辛煎

【方源】 方出《圣惠》卷三十六，名见《景岳全书》卷六十。

【组成】 细辛

【用法】 煎取浓汁，热含冷吐。

【主治】 口臭及蜜齿肿痛。

09459 细辛膏

【方源】 方出《千金》卷六，名见《三因》卷十六。

【组成】 细辛 蜀椒 干姜 芎劳 吴茱萸 附子各十八铢 桂心一两 皂荚屑半两 猪膏一升

【用法】 上㕮咀，以棉裹，苦酒渍一宿，取猪膏煎，以附子色黄为度，去滓。绵裹纳鼻孔中，并摩鼻上。涕出不止，灸鼻两孔与柱齐七壮。

【主治】《千金》：鼻塞，常有清涕出。②《三因》：脑冷，清涕出不已。

09460 细辛膏

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】 细辛 防风（去芦头） 川大黄（锉，微炒） 黄芩各一分 川椒半两（去目） 蜡半两

【用法】 上锉细，用清麻油三合，煎药紫色，滤过，下蜡，候消为膏。每用大豆许，点于耳中，一日三次。

【主治】 小儿耳聋，或因脑热，或因水入，或因吹着者。

09461 细辛甘油

【方源】《中医皮肤学简编》。

【组成】 细辛（研粉末）10～20克

【用法】 用水调成糊剂，加甘油10～20毫升（蜂蜜亦可），放置纱布中（约7平方厘米），用绞布密封，贴于脐部三天。

【主治】 复发性口腔溃疡。

09462 细辛大黄汤

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】 天麻 防风各半两 细辛 大黄（焙） 川芎各一分 甘草（炙）一钱半

【用法】 上为散。每服三字，加犀角少许，煎服。

【主治】 小儿风痫内热。

09463 细辛附子汤

【方源】《普济方》卷一六〇引《指南方》。

【异名】 附子细辛汤（《全生指迷方》卷四）。

【组成】 附子（炮） 细辛各半两 人参 石菖蒲各一两 五味子二两 甘草半两

【用法】 上为散。每次三钱，水一盏，加生姜五片，煎至八分，去滓服。

【主治】 心咳恶寒，上引心痛，喉中介介然如梗，甚则咽喉肿痛，脉紧口噤。

09464 细辛黄柏散

【方源】《景岳全书》卷六十。

【组成】 黄柏 细辛各等分

【用法】 上为末。敷之，或掺舌上，吐涎水再敷，须旋含之。

【主治】 口舌疮。

09465 细辛醋糊剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 细辛（细末）3～6克

【用法】 上药加醋调，捏成小饼，敷于脐上。

【主治】 鹅口疮。

09466 细辛橘皮汤

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 半夏五两 茯苓四两 芍药三两（白者） 细辛 陈皮 桔梗 旋覆花 甘草 人参

桂各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜五片，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】 胸膈心腹中痰水冷气，汪洋嘈烦，或水鸣多唾，口中清水自出，胁肋急胀膨疼，不思饮食。

09467 细辛五味子汤

【方源】《局方》卷四（续添诸局经验秘方）。

【组成】 北细辛（去苗） 半夏（洗七次）各一两 甘草（炙） 乌梅（去核）各一两半 五味子罂粟壳（去蒂盖）各三两 桑白皮（炒）二两

【用法】 上为粗散。每服三钱，水二盏半，加生姜十片，煎至一盏，用炒帛滤去滓，温服。留二服滓并作一服，再煎。

【主治】 肺经不足，胃气怯弱，或冒风邪，或停寒有饮，咳嗽倚息，不得安卧，胸满迫塞，短气减食，干呕作热，嗽唾结痰，或吐涎沫，头目昏眩，身体疼重，语声不出，鼻塞清涕，头面脚膝时带虚浮，痰咳不止，痛引胸胁者。

09468 经济丹

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】 白茯苓 白茯神 白芍药各一两 远志（去心）一两 乳香半两（别研） 当归一两（酒浸） 酸枣仁（去壳，炒） 人参一两 没药一两（研） 朱砂（别研）半两 石菖蒲一两（真者）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，将朱砂为衣。只用枣仁丸亦得。每服三十丸，加至五十丸，食前枣汤、参汤任下，饮酒亦可。

【功用】 常服补心养血，安神定志，令人血壮气实。

【主治】 妇人血气不足，荣卫俱虚，心气不定，夜卧惊怖，梦寐不祥，心虚自汗，乏力倦怠，饮食减少，咳嗽痰实。

09469 经效散

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】 贯众二两（去芦头，烧存性，地上用碗合少顷去火毒，研为细末）

【用法】 上加麝香一字，同前药研令匀。每服二钱匕，空心、食前米饮调下，一日三次。

【主治】 肠风下血，久不愈。

09470 经验散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】 香附子（半生，半炒） 代赭石

【用法】 上为末。白汤调下。

【主治】 血崩。

09471 经验散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 桑皮一两半 前胡一两半 贝母二两（去心） 紫菀二两 五味八钱 茯苓一两半 竹叶一两半

【用法】 上为散。每服五钱，水煎，去滓温服。

【主治】 产后风热干于肺脏，肺金不得施化之令，自汗心烦，喘咳不止，脉浮数。

【方论选录】 方中桑皮清肺热以肃金，前胡疏风邪以降气，茯苓渗湿清治节，贝母清心化热痰，紫菀润肺泄热，五味敛液收津，竹叶除膈热以清肺凉肝也。为散水煎，使风热外解，则肺气清肃而分布有权。

09472 经痛饮

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】 当归 元胡各等分

【用法】 上为末。加生姜，水煎服。

【主治】 行经腹痛。

09473 经进地仙丸

【方源】《易简》引陶隐居方（见《永乐大典》卷一一六二〇）。

【异名】 经进地仙丹（《局方》卷一续添诸局经验秘方）、地仙丹（《得效》卷八）。

【组成】 川牛膝（酒浸一宿，切、焙） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 川椒（去目） 附子（炮）各四两 木鳖子（去壳） 地龙（去土）各三两 覆盆子 白附子 菟丝子（酒浸，研） 赤小豆 天南星 防风（去芦） 骨碎补（去毛） 何首乌 萆薢 川羌活 金毛狗脊（去毛） 乌药各二两 绵黄耆 人参各一两 川乌（炮） 白茯苓 白术 甘草各一两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心温酒送下。

【主治】 ①《易简》引陶隐居方（见《永乐大典》）：丈夫妇人，五劳七伤，肾气衰败，精神耗散，行步艰辛，饮食无味，耳焦眼昏，皮肤枯燥。妇人脏冷无子，下部秽恶，肠风痔漏，吐血泻血，诸风诸气。②《医方大成》：肾脏虚惫，风湿流注，脚膝酸疼，行步无力。

【临证举例】 风气疾 时有人母，幼年得风气疾，久治不愈五十余年。隐居处此方修合，日进二服。半年，母病顿愈，发白返黑，齿落再生，至八十岁，颜色如少年人，血气筋力倍壮，耳目聪明。其家老仆七十余岁，窃服此药，遇严冬御绨葛，履霜雪无寒色，有别业去家七十里，每使老仆，往返

不移时，又能负重，非昔时比，几成地仙。

09474 经进萆仙丸

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 沙苑蒺藜八两（淘净，隔纸微焙，取细末四两入药，留粗末四两同金樱子熬膏） 山茱萸（酒蒸，去核取净）四两 芡实四两（同枸杞捣） 白莲蕊四两（酒洗，晒干，如无，莲须代之） 枸杞子四两 菟丝子（酒浸，蒸烂，捣焙）二两 川续断（去芦，酒净）二两 覆盆子（去蕊，酒浸，九蒸九晒，取净）二两 金樱子（去净毛子）二两

【用法】 上为细末，以所留蒺藜粗末同金樱子熬膏，入前细末拌匀，再加炼白蜜为丸，如梧桐子大。每服八十丸，渐加至百丸，空腹淡盐汤送下。

【主治】 遗精。

09475 经效黄耆散

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】 黄耆十二分 白术 牡蛎 茯苓 防风 麦冬（去心） 地黄各八分 大枣八个

【用法】 上以水二升，煮取七合，去滓，空心温服。

【主治】 产后汗出不止。

09476 经验九藤酒

【方源】《医学正传》卷四。

【组成】 青藤 钩钩藤 红藤（即理省藤） 丁公藤（又名风藤） 桑络藤 菟丝藤（即无根藤） 天仙藤（即青木香） 阴地蕨（名地茶，取根）各四两 忍冬藤 五味子藤（俗名红内消）各二两

【用法】 上切细，以无灰老酒一大斗，用瓷罐一个盛酒，其药用真绵包裹，放酒中浸之，密封罐口，不可泄气，春、秋七日，冬十日，夏五日。每服一盏，一日三次。病在上，食后及卧后服；病在下，空心食前服。

【主治】 远年痛风，及中风左瘫右痪，筋脉拘急，日夜作痛，叫呼不已。

09477 经验石膏汤

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【异名】 石膏汤（《疡医大全》卷十六）。

【组成】 升麻 知母各一钱 石膏一钱半 大黄（酒蒸）二钱 山栀 薄荷 茯苓 连翘各八分 朴消六分 甘草五分

【用法】 水煎，食远服，频频口咽。即愈。

【主治】 胃有实热，牙痛或上牙肿痛。

09478 经验白术散

【方源】《普济方》卷一九四。

【组成】 白术一两 苦葶苈一两 川山甲五钱 蛇退一条（全） 黑牵牛（末）二两 土牛儿一个（土坑内烧，焙干）

【用法】 上为末。每服三钱，好酒调下。

【主治】 水蛊、气蛊病。

09479 经验贴癖膏

【方源】《便览》卷三。

【组成】 阿魏三钱 蜈蚣二条（炙） 全蝎三钱（炙） 硼砂三钱 血竭三钱 栀子二两（为末，五两亦得） 大黄二两 芦荟三钱 雄黄二钱 胡黄连二钱 硇砂三钱（上药，俱要真正者，研细听用）

【用法】 用蜂蜜五钱，皮消二两，萝卜汁二两，黑狗脑子一个，滚发酒糟二两，葱白汁二两 鸡子清二个，各汁合前末药和成膏子。每贴三钱或五钱，摊子生布上，外加布裹在病上，用一年老耐心人，昼夜常常用熨斗盛微火，慢慢熨之。每一贴贴一昼夜，待三五日再一贴。待大便见脓血，见效。消后须服补药。曾经针灸过及病势大者，难治。

【主治】 积聚癖块。

【宜忌】 忌发物。

09480 经验种子丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】 甘枸杞八两（酒洗） 白当归四两（酒洗） 莲蕊四两 沙苑蒺藜四两（微炒） 鱼鳔（切如豆，蛤粉炒）四两 牛膝四两（酒洗）

【用法】 上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每次五十丸，空心服。

【功用】 男服种子。

【主治】 色欲过度，下元虚损，不育者。

09481 经验养荣丸

【方源】《直指附遗》卷九。

【组成】 白术（土炒） 黄耆（蜜炙） 芍药（酒炒） 远志（甘草略煮，去心）各一两半 当归身（酒洗） 山药 熟地黄（酒洗） 五味子 人参（去芦）各一两 白茯苓二两 山茱萸（去梗） 生地黄（酒洗）各五钱 陈皮（泡）八钱

【用法】 上为细末，用鸭子一只取血入蜜，炼和前药为丸，如梧桐子大。每服八十丸，白盐汤送下；寒月盐汤送下。

【主治】 气血两虚，精神短少，脾胃不足，形体羸乏。

【加减】 咳嗽，加麦冬、贝母、紫菀茸、款冬花各一两；热，加黄柏、知母各一两；遗精带浊，加牡蛎一两，真龙骨五钱，吐衄血腥，加牡丹皮、赤芍药各一两。

09482 经验调经汤

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】当归（酒洗）一钱 阿胶（炒成珠）半夏（制） 白芍药（酒炒） 人参 牡丹皮 川芎 麦门冬 甘草各七分 桂心 吴茱萸（泡）各二分

【用法】上以水一钟半，加生姜三片，煎八分，空心稍热服。

【主治】月经不调，或前或后，来多来少，或逾月不来，或一月两至。

09483 经验理中丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】大戟二钱五分 木香二钱 牙皂三钱 黑丑一钱五分 甘遂一钱

【用法】用大枣打丸。每用三钱，匀三次进服。第一次葱白陈酒送下，二次莱菔子汤送下，三次牛膝木瓜汤送下。

【功用】益土胜水，去郁陈莝，破癖蠲饮。

【主治】三十六种水气，湿郁中满膨胀。

09484 经进龙虎金丹

【方源】《普济方》卷九十三引《卫生家宝》。

【组成】黑附子（去皮脐） 川乌头（去皮脐）虎骨（醋炙） 古文钱（醋碎，研） 当归（生用）白胶香（生，研） 地龙（去土） 木鳖子（火炮，去皮） 草乌头（盐炒令黄，发熬） 黑牵牛（生用） 苁蓉（酒浸） 牛膝（酒浸）各一两 乳香半两（生，研） 没药（生用） 巴戟（去心） 自然铜（醋淬）各一两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，渐加至三十丸，食前茶盐汤送下。

【主治】一切瘫痪风疾。

【方论选录】黑附子退寒热，川乌头补肾经，虎骨治伤折，古文钱接骨，当归补骨活血，白胶香去麻痹，地龙能行血，木鳖子冲开滞气，黑牵牛除肾脏气，苁蓉补肾经，牛膝补劳，乳香治一切疼痛，没药化内损坏脓血，巴戟治八般腰疼，自然铜治伤筋动骨。

09485 经验何首乌丸

【方源】《医便》卷一。

【组成】何首乌六两（用黑豆水浸煮晒干再煮，又晒，如前七次） 黄柏四两（一两酒炒，一两乳汁炒，一两童便炒，一两青盐水炒） 松子仁（去壳，净，一半去油，一半不去油） 柏子仁（去壳）菟丝子（酒煮烂，碾为末） 肉苁蓉（酒焙干，净）牛膝（酒洗，去芦） 天门冬（去心，焙干） 白术（净，不用油者，去梗） 麦门冬（去心，焙干）白茯苓（去皮） 小茴香（酒炒） 甘州枸杞子（酒洗炒干） 当归（酒洗，炒干） 白芍药 熟地黄（酒洗，焙干） 生地黄（酒洗，焙干）各二两 人参（去芦） 黄耆（蜜耆）各一两二钱

【用法】上为细末，加核桃仁（去壳并仁上粗皮），研如泥，水和炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心酒、米饮任下。半月半效，一月全效。

【功用】久服轻身延年耐久，添精补髓，益气强筋。

【主治】老人衰弱，血气不足，遗尿失禁，须发斑白，湿热相搏，腰痛疼痛，齿痿脚软，行步艰难，眼目昏花。

09486 经验调经种子丸

【方源】《医学正印》卷下。

【组成】香附半斤（醋、酒、童便、盐水各浸二两三日） 当归（酒洗） 川芎 白芍药（酒炒）麦门冬（去心） 川续断（酒洗） 条芩（酒炒）牡丹皮 白茯苓 杜仲（盐水炒丝断） 白术（陈壁土炒） 牛膝（酒洗） 人参（去芦） 阿胶（蛤粉炒）各二两 小茴香（炒）一两 艾叶（醋煮，捣烂作饼，新瓦焙干，研末）一两 怀熟地四两 黑豆（炒去壳）四十九粒

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心白汤送下。

【主治】妇人不孕，月经不调。

【加减】有痰，加广橘红一两。

09487 经验理中消胀丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】大戟二钱五分 制牙皂三钱 广木香二钱 炒黑丑一钱半 煨甘遂一钱

【用法】用红枣肉捣丸。每用三钱，匀三次进服，第一次葱白陈酒送，二次莱菔子，砂仁汤送，三次牛膝、木瓜汤送下。

【主治】痰胀。湿痰挟气阻滞胸腹，中满腹胀，上气喘逆，二便不利，甚或面肢俱肿者。

【宜忌】体虚者勿服。

09488 贯众丸

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】贯众（锉）一两 黄连（去须） 板兰根 木香各半两 胡黄连一分 诃黎勒皮 肉豆蔻（去壳）各三分

【用法】上为末，煮面糊丸，如梧桐子大。每服十五丸，煎甘草汤送下，不拘时候。

【主治】伏热下痢脓血。

09489 贯众汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】贯众（锉） 苏枋木（锉）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏，加生姜二片，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】年深咳嗽，唾脓血。

09490 贯众汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】贯众二钱（净，末） 血余五钱（烧灰） 侧柏叶（捣汁）一碗

【用法】上二末，入柏汁内搅匀，于大碗内盛之，重汤煮一炷香时，取出待温，加童便一小钟，黄酒少许，频频温服。

【主治】积热，吐血成斗，先吐痰而后见血，命在须臾。

09491 贯众汤

【方源】《中医杂志》（1959；3:3）。

【组成】贯众 苦楝根皮 土荆芥 紫苏各15克

【用法】煎汤服，每日一剂，连服三天。

【功用】驱钩虫。

09492 贯众酒

【方源】《直指》卷二十五。

【组成】贯众

【用法】五更嚼炙肉一片，莫吞，俟虫寻肉，其头向上，却吐出肉，嚼使君子三个，并轻粉一字，吞下，少顷以当晚所煎贯众酒，吞解毒雄黄丸七粒。泻下皆虫也。

【主治】寸白诸虫。

09493 贯众散

【方源】方出《证类本草》卷十引《本草图经》，名见《赤水玄珠》卷九。

【组成】贯众根

【用法】上为末。每服一钱匕，水调下。

【功用】止鼻血。

09494 贯众散

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】贯众一两（火煅存性） 五倍子半两（火煅存性） 白矾二铢（枯）

【用法】上为细末。每服三钱，米饮下。

【主治】肠风下血。

09495 贯众五物散

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【异名】五物散（《普济方》卷三十七）。

【组成】贯众（去毛上） 槐花 地榆 黄连（去须） 甘草各半两

【用法】上药并生用，为散 每服一钱匕，米饮调下。

【主治】泻血不定。

09496 承气丸

【方源】《肘后方》卷二。

【异名】调气丸（《圣惠》卷十六）。

【组成】大黄 杏仁各二两 枳实一两 芒消一合

【用法】炼蜜为丸，如弹丸大。和汤六七合服之，未通便服。

【主治】伤寒、时气、温病，十余日不大便者。

09497 承气丸

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】川大黄一两（锉碎，微炒） 郁李仁一两（汤浸去皮，别研） 枳实一分（麸炒令黄色） 川芒消二两 大麻仁一两（研入）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温水送下，不拘时候，未利再服。

【主治】热病，若十余日不大便者。

09498 承气养荣汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【异名】养荣承气汤（《重订通俗伤寒论》）。

【组成】知母 当归 芍药 生地 大黄 枳实 厚朴

【用法】加生姜，水煎服。

【功用】《重订通俗伤寒论》：润燥兼下热结。

【主治】①《瘟疫论》：瘟疫下证，以邪未尽，不得已而数下之，间有两目加涩，舌反枯干，津不到咽，唇口燥裂，热渴未除，里证仍在者。②《会约》：瘟疫，血虚体弱，里证未尽。

【方论选录】《重订通俗伤寒论》：方以四物汤去川芎，重加知母，清养血液以滋燥，所谓增水行舟也。然徒增其液，而不解其结，则扬汤止沸，转身即干，故又以小承气去其结热，此为火盛烁血，液枯便秘之良方。

09499 承气合小陷胸汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】生大黄五钱 厚朴二钱 枳实二钱 半夏三钱 栝楼三钱 黄连二钱

【用法】水八杯，煮取三杯，先服一杯，不下，再服一杯，得快利，止后服，不便再服。

【主治】温病三焦俱急，大热大渴，舌燥，脉不浮而躁甚，舌色金黄，痰涎缠甚，不可单行承气者。

09500 玳瑁丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】玳瑁（镑） 丹砂（研） 雄黄（研） 白芥子各半两 麝香（研）一分

【用法】上为末，再同研匀，别以银石器酒煎安息香一两为膏，和丸如绿豆大。每服十丸，温童便送下，不拘时候。

【主治】中风不语，精神冒闷，兼治忽中恶不语。

09501 玳瑁散

【方源】《小儿斑疹备急方论》。

【组成】生玳瑁（水磨浓汁）一合 磉猪心一个（从中取血一皂子大，同研）

【用法】上以紫草嫩茸浓煎汤调，作一服。

【主治】疮疹热毒内攻，紫黑色，出不快。

09502 玳瑁郁金汤

【方源】《通俗伤寒论》。

【组成】生玳瑁一钱（研碎） 生山栀三钱 细木通一钱 淡竹沥二瓢（冲） 广郁金二钱（生打） 青连翘二钱（带心） 粉丹皮二钱 生姜汁二滴（冲） 鲜石菖蒲汁二小匙（冲） 紫金片三分（开水烊冲）

【用法】先用野菰根二两，鲜卷心竹叶四十支，灯芯二小帚（五六分），用水六碗，煎成四碗，取清汤分作二次煎药。

【功用】开窍透络，涤痰清火。

【主治】热陷包络，蒸液为痰，迷漫心孔，其人妄言妄见，疑鬼疑神，神志昏蒙，咯痰不爽。

【方论选录】何秀山：本方以介类通灵之玳瑁，幽香通窍之郁金为君，一则泄热解毒之功，同于犀角，一则达郁凉心之力，灵于黄连。臣以带心连翘之辛凉，直达包络以通窍；丹皮之辛寒善清络热以散火；引以山栀、木通，使上焦之郁火，屈曲下行，以下焦小便而泄。佐以姜、沥、石菖蒲汁，辛润流利，善涤络痰。使以紫金片芳香开窍，助全方诸药透灵；妙在野菰根功同芦笋，而凉利之功，捷于芦根；配入竹叶、灯心轻清透络，使内陷包络之邪热及迷漫心孔之痰火，一举而肃清之。此为开窍透络，涤痰清火之良方。

09503 珍宝饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 白芍 人参 白茯苓 生地各一钱 蒲黄二钱（炒黑） 香附 川芎 白术 甘草 黄连各八分

【用法】入大枣二个，水煎，食前温服。

【主治】月信一月两至，或数日一至者。

09504 珍宝散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】珍珠三钱 硼砂 青黛各一钱 冰片五分 黄连 人中白各二钱（煅过）

【用法】上为细末。掺之。

【主治】口内诸疮。

09505 珍珠丸

【方源】《普济方》卷一八〇引《郑氏家传渴浊方》。

【组成】生珍珠一两 麝香 龙脑 人参 天花粉 干葛 白茯苓 甘草 紫草各二两 朱砂 黄连各半两

【用法】上为末，酒糊为丸，如鸡头子大。每服用麦门冬汤，细嚼咽下，含化为妙。

【主治】消渴。

09506 珍珠丸

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】天花粉三钱 僵蚕（炒去丝）二钱 珍珠（豆腐内煮半日）三钱 人参三钱 胆星四钱 雄黄二钱 辰砂五钱（水飞一半为衣） 琥珀二钱 礞石（煅）三钱 犀角三钱 麝香五分 牛黄七分 甘草一钱 冰片二分

【用法】上为细末，竹沥为丸，如芡实大，朱砂为衣。薄荷汤送下。

【主治】小儿急慢惊风，痰涎壅盛，癫狂谵妄。

09507 珍珠丹

【方源】《医宗说约》卷五。

【组成】皂荚（去筋子）八两 小槟榔（干切）六两 黑白丑（洗净，浮水者不用）各四两 巴豆肉六钱（捶碎，包夏布中）

【用法】上药和一处，用阴阳水十四碗，与药共煮，水尽，取起巴豆晒干，磨为细末，瓷瓶收贮。每服男用七九分，女用六八分，黑糖拌。治水蛊用川贝母、秦艽、花粉各一钱，真苏子九分，煎汤送下三分，隔一日，服药一次。

【功用】追虫去积，消食逐滞，消膨胀，通便结，化痰垢，疏滞气，推陈致新。

【主治】虫积、膨胀。

【备考】《一盘珠》有庄黄，无黑白丑。

09508 珍珠散

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《卫生家宝》。

【组成】晚蚕沙二两 谷精草一两 夜明沙一两 石决明三两（煅）

【用法】 上为细末。每一大钱，米泔水调，如赤肿上翳，用猪肝夹药扎定，泔一盏，煎至七分，先熏后服。

【主治】 目翳。

09509 珍珠散

【方源】《万氏家抄方》卷三下。

【组成】 炉甘石不拘多少（炭火中煅，先用黄连煎汁淬过，焙干） 冰片适量

【用法】 用当归、黄连、芍药、生地、薄荷、荆芥、防风、蔓荆子、甘草各等分煎汁，将炉甘石浸一昼夜，焙干，研，入小瓶内，水浸，使出火毒，然后再乳极细，次加冰片，亦乳极细，相和点之。

【主治】 烂眩赤眼。

09510 珍珠散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【异名】 真珠散(《疡科捷径》卷中)。

【组成】 黄连末 黄柏末 乳香 没药 孩儿茶轻粉 官粉（煅） 五倍子（炒） 珍珠（研） 象牙（锉）各等分

【用法】 上为末。以米泔水洗净，掺患处。

【主治】 下疳疮。

09511 珍珠散

【方源】《医方考》卷四。

【组成】 琥珀 珍珠粉 铁粉 天花粉 朱砂 寒水石 牙消 大黄（酒浸） 生甘草各等分

【用法】 上为末。每服三钱，用薄荷汤调下。

【主治】 男、妇、小儿五脏积热，心胸闷乱，口干舌燥，精神恍惚，癫狂等证。

【方论选录】 明可以安神，琥珀、珍珠皆明物也，故用之以安神魄；重可以去怯，铁粉、朱砂皆重物也，故用之以定惊狂；寒可以去热，消、黄、水石，皆寒物也，故用之以除积热；热之盛者必渴，天花粉可以生津；火之炽者必急，生甘草所以缓急。

09512 珍珠散

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】 月白珍珠散(《外科大成》卷一)。

【组成】 青缸花五分（如无，用头刀靛花轻虚色翠者代之，终不及缸花为妙） 珍珠一钱（不论大小，以新白为上，入豆腐内煮数滚，研至极细无声方用） 真轻粉一两

【用法】 共研千转，细如飞面，方入罐收。凡下疳初起，皮损搽之即愈；腐烂疼痛者，甘草汤洗净，猪脊髓调搽；如诸疮不生皮者，用此干掺，即可生皮；又妇人阴蚀疮，或新嫁内伤痛甚者，亦可搽此极效，汤泼火烧痛甚者，用玉红膏调搽之。

【主治】 下疳皮损腐烂，痛极难忍及诸疮新肉已满，不能生皮；又汤泼火烧，皮损肉烂，疼痛不止者。

09513 珍珠散

【方源】《张氏医通》卷十五

【异名】 珍珠十宝散(《外科方外奇方》卷二)。

【组成】 炉甘石（制如绛雪膏法，净）八两 珍珠（煅，净）一钱 琥珀（净末）七分 龙骨（煅，水飞，净）四分 赤石脂（煅，水飞净）四分 钟乳石（甘草汤煮一伏时，水飞净）六分 朱砂（水飞净）五分 麒麟竭二分 象皮（焙干为末）五分

【用法】 上为极细粉。每药一钱，入冰片二分，研匀和调，敷上立长。

【主治】 不拘何疾，溃烂不肯长肉者。

【备考】 方中珍珠，《外科方外奇方》作“珍珠母”。

09514 珍珠散

【方源】《医部全录》卷二七九引《良方》。

【组成】 蛤粉 牡蛎各等分

【用法】 上为细末。绢袋盛，扑。

【主治】 阴汗。

09515 珍珠散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 珍珠一钱五分 玛瑙一钱五分 琥珀一钱五分 珊瑚一钱五分（以上四味俱用豆腐煮过再研） 硼砂五分 熊胆五分（用笋壳盛，烘脆为末） 龙脑四分 麝香二分五厘 瓜蒂七分五厘 朱砂（细研水飞）七分五厘 黄连末（去须芦，细研）五分 明乳香（箬上炙干）五分 没药（箬上炙干）五分 芦甘石（按法炮制为主）一两五钱

【用法】 上各为细末，用上细粉罗筛过，再照分数称定，合为一处，研万匝，复以棉纸筛下，瓷罐收贮，听用。

【功用】《中药成方配本》：清火止痛，消肿退翳。

【主治】 ①《医学心悟》：眼目障翳初起。②《中药成方配本》：风火红眼，障翳胬肉，迎风流泪，老年昏花。

【备考】《中药成方配本》有石蟹，无血蝎。

09516 珍珠散

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 硼砂 雄精 川连 儿茶 人中白 冰片 薄荷 黄柏各等分 大破珠减半

【用法】 上为极细末。以刀点之，吹之立效。

【主治】 ①《外科全生集》：牙疳、牙根红肿。②《外科证治全书》：喉痈、喉间红肿疼痛。

09517 珍珠散

【方源】《徐评外科止宗》卷二。

【异名】 奇效八宝丹(《春脚集》卷四)、八宝丹、珍珠犀黄八宝丹(《梅氏验方新编》七集)、珍珠生肌散(《药奁启秘》)。

【组成】 珍珠一钱（人乳浸三日，夏天须每日换乳，研极细如飞面） 血竭五分 儿茶五分 石膏一钱（煅） 炉甘石一钱（以黄连五分煎汁煅淬，研极细，水飞净） 赤石脂一钱（煅） 陈年丝吐头五分（煅存性） 冰片一分二厘

【用法】 上各为细末，再称准，共研极匀，瓷瓶收贮，勿令泄气。用时掺疮面。

【功用】 生肌长肉，平口收功。

【主治】 诸毒脓腐已尽，未收口者。

【备考】 方中珍珠，《春脚集》、《梅氏验方新编》均作“珠母”。

09518 珍珠散

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【异名】 珍珠生肌散(《增订治疗汇要》卷下)。

【组成】 珍珠三钱（生研） 炉甘石一两（煅） 石膏一两五钱（在童便内浸四十九日，朝晒夜露，不可经雨，煅研）

【用法】 上为极细末。掺之。

【功用】 止痛生肌收口。

09519 珍珠母丸

【方源】《中医临症备要》。

【组成】 珍珠母 生地 熟地 党参 当归 柏子仁 酸枣仁 茯神 龙齿 沉香

【功用】 养肝熄风。

【主治】 痴呆。目光不活，言语迟钝，四肢举动亦不灵便，脉象迟缓，兼见头晕、多汗、心悸、艰寐。

【备考】 原书治上症，用本方加全蝎。

09520 珍珠粉丸

【方源】《保命集》卷下。

【异名】 珍珠母丸(《医略六书》卷二十五)。

【组成】 黄柏一斤（新瓦上烧令通赤为度） 真蛤粉一斤

【用法】 上为末，滴水为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心温酒送下。

【主治】 ①《保命集》：白淫梦泄遗精及滑出而不收。②《医略六书》：阴虚白浊，脉涩数者。

【方论选录】 阳盛乘阴，故精泄也。黄柏降火，蛤粉咸而补肾阴也，兼治思想所愿不得。

09521 珍珠粉丸

【方源】《内经拾遗》卷一。

【异名】 真珠粉丸(《景岳全书》卷五十七)。

【组成】 珍珠三两 蛤粉 黄柏（新瓦上炒赤）各一斤

【用法】 上为末，水为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心酒送下。

【主治】 溲出白液。

09522 珍珠粉丸

【方源】《医方考》卷四。

【组成】 牡蛎粉（取血色者，炙） 黄柏各一斤 珍珠三钱

【主治】 湿热在中、下二焦，令人便浊者。

【方论选录】 燥可以去湿，故用牡蛎粉；苦可以胜热，故用黄柏；滑可以去着，故用珍珠。

09523 珍珠八宝丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 珍珠 象皮 冰片 乳香 没药 鸡内金各三钱 生龙骨 赤石脂各二两 血竭 轻粉各四钱 铅粉一两 辰砂二钱

【用法】 上为末。掺患处。

【功用】 止血定痛，生肌长肉。

【主治】 金疮、刀疮，跌扑损伤，或一切疮毒，久不收口。

09524 珍珠八宝丹

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 赤石脂 9 克 制甘石 9 克 乳香 2 克 海螵蛸 9 克 血竭 2 克 没药 2 克 珠粉 2 克（后下） 冰片 2 克（后下）

【用法】 上为细末。外用。

【主治】 硬结红斑溃疡型。

09525 珊瑚散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 珊瑚三分 龙脑半钱 朱砂一分

【用法】 上先研珊瑚、朱砂如粉，次入龙脑，更研令匀。每以铜箸取一米许点之，每日三四次。

【主治】 眼赤痛，后生肤翳，远视不明，痒涩。

09526 毒淋汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 金银花六钱 海金沙三钱 石韦二钱 牛蒡子二钱（炒捣） 甘草梢二钱 生杭芍三钱 三七二钱（捣细） 鸦胆子三十粒（去皮）

【用法】 先将三七末、鸦胆子仁开水送服，再服

余药所煎之汤。

【主治】 花柳毒淋，疼痛异常，或兼白浊，或兼溺血。

【加减】 若兼受风者，可加防风二三钱；若服药数剂后，其疼痛减，而白浊不除，或更遗精者，可去三七、鸡胆子，加生龙骨、牡蛎各五钱。

09527 春风散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】 僵蚕 黄连（俱锉） 朴消 白矾 青黛各五钱

【用法】 腊月初一，取猪胆五六个，将上药装入胆内，缚定，用青纸裹，将地掘一方坑，长阔一尺，上用竹竿横吊，以胆悬定于内，候至立春日取出，置当风处吹干，去皮，以药研末，密收吹喉。

【主治】 咽喉肿痛，缠喉风闭塞。

【备考】《理瀹》无青黛，有薄荷；朴消作"火消"。

09528 春冰散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 大黄（生）一两 盆消二两 薄荷 甘草（微炒）各三两

【用法】 上为细末。每服二钱，食后新水一盏调服，入蜜少许亦可。

【主治】 脾肺积热，咽喉赤肿疼痛。

09529 春和膏

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】 白芷 当归 木香 川附子 穿山甲 木通 防风 荆芥 番木鳖 白芥子 僵蚕 青皮 核桃各二两 川草乌各一两 生半夏三两 生军三两 南星三两 青葱四两 蒲公英三两

【用法】 上切碎，用麻油十二斤浸三日，煎枯去渣，黄丹收膏，熔入松香五钱候冷，再加丁香四两，肉桂二两，琥珀一两，麝香三钱，为末。和匀收贮，用时摊贴之。

【主治】 阴寒痰毒，乳疖。

09530 春泽汤

【方源】《得效》卷二。

【组成】 人参 白术 茯苓 泽泻 猪苓

【用法】 水煎服。

【主治】 伤暑烦渴，引饮无度，兼治伤寒温热，表里未解，烦渴引水，水入即吐，或小便不利。

【临证举例】 水逆证 《中医杂志》（1983；1：44）：马某某，女性，回族。患儿于半年前某日中午外出拾柴，劳累汗出，口渴难忍，回家后暴饮生冷水二瓢，自觉胃脘胀满，夜寐不安，半夜后吐出清稀痰涎半碗许始得安睡。第二天晨起即觉口干，渴欲饮水，水入则吐，半年来未见好转，亦未延医诊治。就诊时心下胀满，活动时，胃脘有振水声，呕吐清水后腹中肠鸣，漉漉有声，脘腹微痛，喜热恶冷，大便微溏，小便不利，四肢欠温。舌质淡，苔白腻水滑，脉弦滑稍缓，诊为水逆之证。治以温化，春泽汤增损治之。处方：桂枝9克，茯苓9克，炒白术9克，猪苓9克，泽泻10克，党参6克，生姜6克，代赭石12克（先煎）。每日一剂，水煎温服，连服五剂，药后呕吐止，诸症减轻，继进前方去代赭石十剂，后以六君子汤加味而竟全功。

【备考】《证治要诀类方》春泽汤，为五苓散加人参。

09531 春容散

【方源】《古今医鉴》卷九引黄宾江方。

【组成】 白附子六钱 枯矾三钱 硫黄五钱 黑铅（炒枯）三钱 密陀僧二两 轻粉一钱 黄丹（飞过）一钱 麝香二分

【用法】 上为末。先将冷水擦红处，湿后以末药擦之，不可擦破。

【主治】 面上肺风疮。

【宜忌】 忌酒色恼怒。

09532 春雪膏

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】 蕤仁二钱（去皮，细研） 脑子一钱（别研） 杏仁十四个（去皮尖） 朴消（别研） 硼砂（别研）各半钱

【用法】 上将蕤仁、杏仁研细，次入诸药研匀成膏子。每用一粟米许点之。

【主治】 风毒气攻冲眼目，翳膜遮障，隐涩难开，或发肿痛，攀睛胬肉。

09533 春雪膏

【方源】《局方》卷七（淳祐新添方）。

【异名】 蕤仁春雪膏（《原机启微》卷下）、春雪眼药膏（《古人集验方》）。

【组成】 脑子二钱半（研） 蕤仁（去皮壳，压去油）二两

【用法】 用生蜜六钱，将蕤仁、脑子同和。每用铜箸或金银钗股，大小眦时复少许点之，治连眶赤烂，以油纸涂药贴。

【主治】 肝经不足，内受风热，上攻眼目，昏暗痒痛，隐涩难开，昏眩赤肿，怕日羞明，不能远视，迎风流泪，多见黑花。

【备考】《医方一盘珠》有熊胆，无脑子。

09534 春雪膏

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【异名】 玄明春雪膏(《医统》卷六十一)。

【组成】 硼砂三钱 脑子一钱 通明朴消半两

【用法】 上为细末，入乳钵研，再用细绢罗过。每用小钱尖弦若点津液，沾药末，入目中，闭霎时，令药匀，方开眼，泪出为度。

【主治】 眼目赤肿、翳障羞明。

09535 春雪膏

【方源】《医统》卷二十七。

【组成】 真绿豆粉一斤 真薄荷叶六两（同豆粉和匀，安于密瓶中，上以瓦盆盖密，勿令泄气，蒸一时，待冷取下） 沉香五钱（另研） 白硼砂五钱 冰片五分 砂仁五钱（另研） 真柿霜四两

【用法】 上以瓷瓶收贮窨土地上，不时调白水细呷之。

【功用】 豁痰开结。

【主治】 五膈五噎。

09536 春温汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】 人参 巴戟天 白术 杜仲各五钱 肉桂一钱 菟丝子五钱 破故纸三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人下身冰冷，非火不暖，交感之时，阴中无温热之感。

09537 枯药

【方源】《魏氏家藏方》卷七引《李防御五痔方》。

【异名】 独圣散(《普济方》卷二九六)、枯痔散(《外科十三方考》)。

【组成】 好白矾四两 生砒二钱半 朱砂一钱（生研，令十分细）

【用法】 上为细末，将生砒安在建盏中，次用白矾末盖之，用火煅令烟绝，其砒尽随烟去，只是借砒气于白矾中，将枯矾取出，研为细末，须是研令十分细。先看痔头大小，将所煅白矾末抄在手掌心上，入生朱末少许，二味作一处，以口津唾就掌心调令稀稠得所，用篦子涂在痔上，周遭令遍，一日上三次。须仔细看痔头颜色，只要色转焦黑，乃是取落之渐，至夜自有黄膏水流出，以布帛衬之，水尽多为妙，乃是恶毒之水，切勿它疑，至中夜更上药一遍，至来日依旧上药三次。纵有些小疼痛不妨。换药时用粗碗一只，盛新水或温汤在痔侧，以羊毛笔一管轻手刷洗痔上，去了旧药，却上新药，仍用护药，次用荆芥汤洗之。三两日之后，黄膏水流出将尽，痔头焦黑为度，以篦子敲打痔头，见得渐渐坚硬黑色，却于枯药中增添生朱，减退白矾，自然药力慢缓。须用药三两日以后方可增减，且以日子渐渐取之庶不惊人，全在用药人看痔头转色，增减厚薄敷药，方是活法。

【功用】 枯痔。

【主治】 痔疮。

【备考】 此药只是借用砒气，又有朱砂在内少解砒毒，所以不其疼痛者，盖非专用毒药也。

09538 枯矾散

【方源】《普济方》卷三六〇。

【异名】 白龙骨散。

【组成】 白矾（煅） 白龙骨各等分

【用法】 上为末。每用少许敷之。

【主治】 婴儿因剪脐，风伤于外，致脐疮不干。

09539 枯矾散

【方源】《灵验良方汇编》卷一。

【组成】 枯矾 龙骨各二钱 黄丹一钱半 麝香一分 干胭脂七分

【用法】 上为细末。先以棉签拭去脓，后以鹅毛管盛药放入耳中。如无干胭脂，只用上四味亦可。

【主治】 聤耳流脓。

09540 枯矾散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 枯矾一钱 制僵蚕一钱 硼砂三分 薄荷三分 大梅片一分 雄精一钱 胆矾一分 山豆根二分 苦甘草一分

【用法】 上为散，加麝香少许。吹之。

【功用】 开痰闭。

【主治】 一切风火喉症。

09541 枯桑膏

【方源】《济急丹方》卷上。

【组成】 经霜桑叶十余斤（在树枯者更妙）

【用法】 刷去叶上虫窠鸟粪，以清水洗过，置锅水煎，渐干渐加，至半日沥汁，去叶再熬半日，量加白蜜收膏。每服三钱，白滚汤送下。

【主治】 瘫痪。

【临床举例】 瘫痪 吾乡史扶九翁，瘫疾有年，不能举步，忽得老人授此方，服后日行数里

09542 枯痔疔

【方源】《中医外科学》。

【组成】 红砒 明矾 朱砂 雄黄 没药

【用法】 第一步：取红砒 0.3 克、明矾 0.6 克（捣碎），混合均匀后，置瓦壶内，四面用炭火烘，火力须猛，约烧 2～3 小时（黑烟消逝，白烟出现

即可）将瓦壶取出，待冷却后，即可得雪白的明矾与砒的化合物。第二步：①明矾与砒的化合物4份，朱砂1份，雄黄2份，没药半份。②米饭（干米计算）8份（煮成糊状）。把①项的四种成分先混合，捣碎，研成均匀粉末，并取出一成，与②项的米糊二成混合调匀，如太干可和开水，至可能搓成铁钉状的药锭，经过阴干或烘干，即可使用。在距齿线上0.3～0.5厘米处，沿肠壁纵轴成25°～35°方向旋转插入粘膜下痔核中心，一般深约1厘米，插钉多少，按痔核大小而定，一般每痔1次插4～6根，间距0.3～0.5厘米，应使钉外露1毫米，才能保持固定和防止插口出血。

【功用】 腐蚀痔核。

【主治】 痔疮。

09543 枯痔液

【方源】《中医外科学》。

【组成】 明矾（硫酸铝钾）6克 石炭酸（酚）1克 黄连2克 普鲁卡因1克 枸橼酸钠1.5克 甘油20毫升 蒸馏水加至100毫升

【用法】 (1) 将黄连用蒸馏水洗净，煎熬三次合并过滤备用，得溶液①；(2) 将酚溶液加于甘油中得溶液②；(3) 取适量的蒸馏水加热将明矾溶于水中，再加入枸橼酸钠及普鲁卡因，得溶液③；(4) 将溶液②缓缓不断加热搅拌下加入溶液③，得溶液④；(5) 最后将溶液①与④合并，加蒸馏水至全量过滤，再用3号玻璃球滤过，装瓶封口，普通蒸气消毒30分钟备用，溶液应呈金黄色透明液体，pH3.5。将药注射于痔核内。

【功用】 使内痔硬化或坏死脱落。

【主治】 痔疮。

09544 枯痔散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 红砒不拘多少（放旧瓦上火煅，白烟将尽取起） 枯矾各一钱 乌梅（烧存性）二钱（一加白灵药五分）

【用法】 上为极细末。用时以口津湿手指，蘸药于痔头、痔身上搓揉，一日二次。初敷不肿，五六日出臭水，出尽，其痔干枯，不用上药。轻者七八日全愈，重者半月收功。

【主治】 痔漏。

09545 枯瘤方

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 白砒 硇砂 黄丹 轻粉 雄黄 乳香 没药 硼砂各一钱 斑蝥二十个 田螺（大者，去壳）三枚（晒干，切片）

【用法】 上为极细末，糯米粥调安，捏作小棋子样，晒干。先灸瘤顶三炷，以药饼贴之，上用黄柏末水调盖敷药饼。候十日外其瘤自然枯落。次用敛口药。

【主治】 瘤初起成形未破者，及根蒂小而不散者。

09546 枯瘤膏

【方源】 方出《得效》卷十九，名见《仙拈集》卷四。

【组成】 甘草

【用法】 煎膏。笔蘸涂瘤傍四围，干后复涂，共三次；然后以大戟、芫花、甘遂等分为末，醋调，别笔涂敷其中。不得近著甘草处。次日缩小，又以甘草膏小晕三次，中间仍用大戟、芫花、甘遂如前法，自然焦缩。

【主治】 小瘤。

09547 枯热清心散

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】 寒水石一两 黄连二两 辰砂三分

【用法】 上为末。每服二钱，浓煎甘草汤调下。

【主治】 伤寒日久郁热，谵语狂乱。

09548 枳术丸

【方源】《内外伤辨》卷下引张洁古方。

【组成】 白术二两 枳实（麸炒黄色，去瓤）一两

【用法】 上为极细末，荷叶裹烧饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，用白汤送下，不拘时候。

【功用】 ①《内外伤辨》：治痞，消食，强胃。②《中国药典》一部：健脾消食，行气化湿。

【主治】 ①《普济方》：老幼虚弱，食不消，脏腑软，气不下降，胸膈满闷。②《金鉴》：胃虚，湿热饮食壅滞，心下痞闷。

【方论选录】 白术苦甘温，其甘温补脾胃之元气，其苦味除胃中之湿热，利腰脐间血，本意不取其食速化，但令人胃气强实，不复伤也；枳实味苦寒，泄心下痞闷，消化胃中所伤，是先补其虚，而后化其滞，则不峻利也；荷叶色青形空，食药感此气之化，胃气何由不上升乎？更以烧饭和药，与白术协力，滋养谷气，而补令胃厚，再不至内伤，其利广大也。

【备考】 本方方名，《北京市中药成方选集》引作“二味枳术丸”。

09549 枳术丸

【方源】《丹溪治法心要》卷四。

【组成】 白术二两 枳实一两 半夏一两 神曲

一两 麦芽一两 山楂一两 姜黄五钱 陈皮五钱 木香二钱半

【用法】 上为末，荷叶饭为丸服。

【主治】 痞，心下满而不痛者。

09550 枳术汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 枳实白术汤(《外台》卷八引《备急》)、枳实汤(《产育宝庆集》卷上)、白术汤(《准绳·女科》卷五)。

【组成】 枳实七个 白术二两

【用法】 以水五升，煮取三升，分三次温服。腹中软即当散也。

【主治】 心下坚大如盘，边如旋盘，水饮所作。

【宜忌】 忌桃、李、雀肉等物。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：心下，胃之脘也，胃气弱，则所饮之水，入而不消，痞结而坚，必强其胃，乃可消痞。白术健脾强胃，枳实善消心下痞，逐停水，散滞血。②《金鉴》：上脘结硬如盘，边旋如杯，谓时大时小，水气所作，非有形食滞也。用枳实以破结气，白术以除水湿，温服三服，则腹软结开而硬消矣。此方君枳实，是以泻为主也。然一缓一急，一补一泻，其用不同，只此多寡转换之间耳。

09551 枳术汤

【方源】《济生》卷四。

【组成】 肉桂（去皮，不见火）三分 附子（炮，去皮脐） 细辛（洗，去土叶） 白术各一两 桔梗（去芦，锉，炒） 槟榔 甘草（炙）各三分 枳实（面炒）二分。

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 饮癖气分，心下坚硬如杯，水饮不下。

09552 枳芎散

【方源】《医方大全》卷五引《济生》。

【组成】 枳实（炒） 川芎各半两 粉草（炙）二钱半。

【用法】 上为末。每服二钱，以生姜、大枣汤调下，酒亦可。

【主治】 左胁刺痛，不可忍者。

09553 枳芎散

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】 枳壳 抚芎 郁金 甘草

【主治】 瘀血轻之左胁痛。

09554 枳壳丸

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】 枳壳三两（麸炒微黄，去瓤） 天门冬一两半（去心，焙） 独活一两半 白蒺藜一两半（微炒，去刺） 牛蒡子一两 薏苡仁一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以温水送下。

【主治】 风热，头面皮肤瘙痒，烦闷，生痤瘰。

09555 枳壳丸

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 川大黄一两（锉碎，微炒） 川芒消一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以生姜汤送下。

【主治】 大肠结实。

09556 枳壳丸

【方源】《济生》卷四。

【组成】 皂角（去黑皮，微炒） 枳壳（去瓤，麸炒） 川大黄二两（锉，微炒） 羌活（去芦）木香（不见火） 橘红 桑白皮（蜜水炙） 香白芷各二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心米饮或姜汤送下。

【主治】 肠胃气壅风盛，大便秘实。

09557 枳壳丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】 木香三钱 枳壳（麸炒） 麻仁（炒黄） 大黄各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温水送下。

【功用】《济阴纲目》：通气凉血润肠。

【主治】 产后大小便涩滞，及饭食不化。

09558 枳壳丸

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】 枳壳（整个，去瓤）四两（每个入巴豆三粒，麻线十字扎定，用水五六碗煮透，去豆，将枳壳切碎，晒干） 橘红皮一两 青皮（去瓤）一两 广木香（不见火，研）三钱

【用法】 上为细末，陈老酒，陈粳米粉打糊为丸。临卧服五十丸。

【主治】 噎膈。

09559 枳壳汤

【方源】《苏沈良方》卷三。

【异名】 桔梗枳壳汤(《活人书》卷十八)、枳壳桔梗汤(《得效》卷十一)、枳桔汤(《症因脉治》卷四)。

【组成】 桔梗 枳壳（炙，去瓤）各一两

【用法】 上锉，如麻豆大。用水一升半，煎减半，去滓，分二次服。

【主治】 伤寒痞气，胸满欲死。

09560 枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【异名】 枳壳散(《本事》卷三)、枳壳煮散(《证治宝鉴》卷九)。

【组成】 枳壳（去瓤，麸炒） 一两 京三棱（炮，锉） 一两 干姜（炮）半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）半两 甘草（炙）半两 益智仁一两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）一两 木香 肉豆蔻（去壳）各半两 蓬莪术（锉） 槟榔（锉） 桂（去粗皮）各二两 青橘皮（汤浸，去白，焙）半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，加生姜三片，大枣一个（擘），煎至八分，去滓热服，不拘时候。

【功用】 顺气宽中，消散积聚。

【主治】 上焦有寒，胸膈满闷，背膂引痛，心腹膨胀，胁肋刺痛，食饮不下，噎塞不通，呕吐痰涎，口苦吞酸，羸瘦少力，短气烦闷，及痃癖积聚，惊忧恚气。

【方论选录】《本事方释义》：枳壳气味苦寒，入足太阴；三棱气味苦平，入足厥阴；橘皮气味苦辛微温，入手足太阴；益智仁气味辛温，入足太阴；莪术气味苦辛，入足厥阴，与三棱同功；槟榔气味辛温，入足太阴、太阳；肉桂气味辛热，入足厥阴；干姜气味辛温，入手足太阴；厚朴气味苦辛微温，入手足太阴；甘草气味甘平，入脾；青皮气味苦辛温微酸，入足厥阴；木香气味辛温，入脾；肉豆蔻气味辛温，入足太阴、阳明；佐姜、枣和菜匕。此宽中顺气之方，能治五种积气，三焦痞塞，心疼腹胀，痃癖诸症，使中宫之气流畅，勿令不宣也。

09561 枳壳汤

【方源】《保命集》卷下。

【异名】 枳芩散(《郑氏家传女科万金方》卷三)。

【组成】 枳壳半两 黄芩半两 白术一两

【用法】 上为粗末。每服五七钱，水一盏，煎至七分，食前空心服。

【功用】《景岳全书》：进食和中。

【主治】 ①《保命集》：妇人胎漏，及因事下血。②《景岳全书》：恶阻。

09562 枳壳汤

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】 枳壳半斤（面炒，去瓤） 绵黄耆半斤（洗）

【用法】 上为末。每服二钱，常汤调下，不拘时候。

【主治】 远年近日肠风下血。

09563 枳壳汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】 枳壳 苏梗 桔梗 陈皮 甘草

【主治】 肠痹，中气壅闭，气逆上冲而喘者。

09564 枳壳饮

【方源】《传信适用方》卷三。

【组成】 枳壳（水浸，去瓤，麸炒）

【用法】 上为粗末。每服一大钱，加阿胶二片，生姜五片，葱白五茎，水一大盏，煎至六分，去滓，入蜜少许，空心温服。次用葱白十茎，烂研涂脐心中，即以手巾蘸葱汤，自内肾腰间浴熨至小腹下，少顷气透即通。

【主治】 老人大便风秘不通，塞涩妨闷，或用蜜煎导类不能通者。

09565 枳壳散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 白术一两 诃黎勒一两半（煨，用皮） 桂心一两 人参一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗末。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 腹虚胀满，不下食。

09566 枳壳散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 泽泻一两 白术一两 前胡一两（去芦头） 汉防己一两 旋覆花一两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 支饮，头痛目眩，心下痞满。

09567 枳壳散

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】 枳壳（去瓤，麸炒）二两 苦参 蒺藜子（炒去角） 蔓荆实各一两

【用法】 上为细散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】 皮肤风瘙痒，麻痹。

09568 枳壳散

【方源】《直指》卷九。

【组成】枳壳五两（制） 甘草（炙）一两半 杏仁（去皮，炒） 阿胶（炒酥） 生地黄各一两

【用法】上细锉。每服三线，加生姜五片，蜜三匙，乌梅一个同煎，空腹服。

【主治】虚劳，大便秘涩。

09569 枳壳散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】枳壳（麸炒，去瓤） 槐子（微炒黄色） 荆芥穗各半两

【用法】上为细末。每服二钱，空心薄粟米粥调下，如人行一二里地再用粥压之，一日二三服。

【功用】散风疏壅，清热宽肠。

【主治】肠风痔瘘，便血无数，疼痛不可忍者。

【备考】方中槐子，《杏苑》作"槐花"。

09570 枳壳散

【方源】《保婴撮要》卷十四。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒） 槐花 荆芥 皂角子仁（炒） 猬皮（炙）各等分

【用法】上为末。每服一钱，滚汤送下；作丸服亦可。

【主治】痔疮肿痛下血。

09571 枳壳散

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】枳壳二两（炒） 黄连一两 槐花五钱（炒） 白芍一两 甘草二钱半 地榆五钱 （一方加当归、生地黄、防风）

【用法】上锉五剂。水煎，空心服。

【主治】大便下血。

09572 枳实丸

【方源】《千金》卷五。

【组成】枳实一两半 菊花 蛇床子 防风 白微 浮萍 蔗藜子各一两 天雄 麻黄 漏芦各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如大豆许。五岁儿饮用十丸，加至二十丸，一日二次。五岁以上者，随意加之；儿大者，可为散服。

【主治】小儿风瘙，痒痛如疥，搔之汁出，遍身瘖瘟，如麻豆粒，年年喜发，面目虚肥，手足干枯，毛发细黄，肌肤不光泽，鼻气不利。此则少时热盛极，身体当风，风热相搏所得者，不早治之，成大风疾。

09573 枳实丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】白术二两 枳实 半夏 神曲 麦芽各一两 姜黄 陈皮各半两 木香一钱半 山楂一两

【用法】上为末，荷叶蒸饭为丸，如梧桐子大。每服一百丸，食后姜汤送下。

【主治】积聚痞块。

【备考】《景岳全书》有苍术五钱。

09574 枳实汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】枳实（去瓤，麸炒）半两 栝楼实一个（并瓤用） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）二两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，用水二盏，煎至一盏，去滓温服，空心、日晚各一服。

【主治】胸痹。

09575 枳实汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】枳实（去瓤，麸炒）四个 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水二盏，加薤白一握（切），煎至一盏，去滓温服，空心、日晚各一服。

【主治】胸痹。

09576 枳实汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】枳实（去瓤，麸炒）二两 白术三两 桂（去粗皮）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜半分（切），煎至七分，去滓温服，一日三四次。

【主治】留饮不消，心下痞坚，时复作痛。

09577 枳实汤

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】枳实（去瓤，麸炒） 木香 槟榔（锉） 甘草（炙，锉） 吴茱萸（汤浸，焙干，炒） 荜茇（纸上炒令紫色）各半两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用水一盏，加生姜一分（拍碎），同煎至七分，去滓，空心、食前温服，一日二次。

【主治】肺积息贲，上气胸满咳逆。

09578 枳实汤

【方源】《医方类聚》卷一三〇引《济生》。

【组成】枳实（去瓤，麸炒）半两 厚朴（姜制，炒）一两 大黄（酒蒸） 甘草（炙）各三钱 桂心（不见火）二钱半

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣二个，煎至七分，去滓温服，不拘时

候。

【主治】 热胀。腹胀发热，大便秘实，脉多洪数。

【加减】 呕者，加半夏一分。

09579 枳实汤

【方源】《普济方》卷一三七。

【组成】 枳实一两（炙） 橘皮 半夏各一两 生姜 厚朴各三两

【用法】 上以水六升，煮取三升，去滓，分三次温服。

【主治】 人病寒饮，气上冲心，胸痞喘急。

【加减】 咽痛，加桔梗一两。

09580 枳实汤

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】 枳实一钱五分 陈神曲（炒）一钱 莱菔子一钱五分（炒，研） 青皮一钱 豆豉一钱 茵陈一钱 广皮一钱 山栀一钱（炒） 黄芩一钱 厚朴一钱（姜制）

【用法】 加生姜一片，水煎服。

【主治】 食疸。

09581 枳实散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】 枳实半两（麸炒微黄） 款冬花三分 赤茯苓三分 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 人参三分（去芦头） 干姜半两（炮裂，锉） 半夏三分（汤洗七遍去滑） 麻黄一两（去根节） 桂心三分

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 上气，胸中满塞，不得喘息。

09582 枳实散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】 枳实半两（麸炒微黄） 木香半两 槟榔半两 诃黎勒皮半两 甜葶苈半两（隔纸炒令紫色） 赤茯苓半两 五味子半两 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】 上为散。每服三钱，水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 息贲气，腹胁胀硬，咳嗽见血，痰粘不利。

09583 枳实散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】 枳实（去瓤，麸炒） 当归（切，炒） 牛膝（去苗，酒浸，切，焙） 桑根白皮（锉）各一两 大黄（略炒） 牡丹皮 甘遂各半两 防己二分 人参 猪苓（去黑皮） 青橘皮（去白瓤，炒）各一两 槟榔（锉） 木香（炮）各半两

【用法】 上为散。每服二钱匕，用沸汤点服，一日二次。

【主治】 妇人血分，身体浮肿，心腹烦满。

【备考】《普济方》有甘草，无甘遂。

09584 枳实散

【方源】《本事》卷七。

【组成】 枳实一两（麸炒，去瓤） 白芍药（炒黄） 雀脑芎 人参（去芦）各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，食前姜枣汤调下，酒亦得，一日三次。

【主治】 男子两胁疼痛。

【方论选录】《本事方释义》：枳实气味苦寒，入足太阴；白芍气味酸微寒，入足厥阴；雀脑芎气味辛温，入足少阳、厥阴；人参气味甘温，入足阳明；姜枣汤调送，或酒送，俱取其调和荣卫，先升后降也。男子两胁疼痛，皆由肝气乘中，故以苦寒、酸寒、辛温之药升降其气，而以甘温之品和其中，疼自止矣。

09585 枳梗汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】 枳壳 桔梗 甘草各等分

【用法】 水煎，温服。

【主治】 结胸痞气，胸满不利，烦闷欲死，不论寒热通用。

09586 枳椇粥

【方源】《老老恒言》卷五。

【组成】 枳椇子

【用法】 煮粥，醉后次早空腹食之。

【功用】 除烦清热，解酒毒，解烦渴。

【主治】《药粥疗法》：醉酒，烦热，口渴。

【备考】 枳椇子 10～15 克 粳米 30～60 克，先将枳椇子煎取浓汁，去滓，入粳米煮为稀粥。

09587 枳橘汤

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】 橘枳汤（《杏苑》卷四）。

【组成】 橘皮八钱 枳壳一钱半 生姜四钱

【用法】 水煎，食远温服。须审气滞何部，以引经药导之。

【主治】 胸痹，胸中气塞，短气。

【加减】 郁甚，加姜黄少许。

09588 枳橘散

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】 枳壳 橘红 姜黄各二钱 甘草一钱

【主治】 右胁痛。

09589 枳壳煮散

【方源】《本事》卷七。

【组成】 枳壳（去瓤，麸炒黄） 细辛（去叶） 桔梗（炒） 防风（去钗股） 川芎各四两 葛根一两半 甘草二两（炙）

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，煎至七分，滤去滓，空心、食前温服。

【主治】 悲哀烦恼伤肝气，致两胁骨疼痛，筋脉紧急，腰脚重滞，两股筋急，两胁牵痛，四肢不能举，渐至脊膂挛急。

【方论选录】《本事方释义》：枳壳气味苦寒，入足太阴；细辛气味辛温，入足少阴；桔梗气味苦辛平，入手太阴；防风气味辛甘微温，入足太阳；川芎气味辛温，入足少阳、厥阴；葛根气味辛甘平，入足阳明；甘草气味甘平，入足太阴，能缓药之性。此由肝气不舒，故用苦降升散之药，再佐以甘缓，及姜之和卫，使升降不致偏胜也。

09590 枳壳煮散

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】 枳壳 桔梗 甘草 细辛 葛根 肉桂 橘红 苏子 姜 枣

【主治】 肝咳，胁痛。

09591 枳壳锉散

【方源】《直指》卷十七。

【组成】 厚朴（制） 枳壳（制） 北桔梗各半两 甘草（炙） 大黄（蒸）各一分

【用法】 上锉。每服三钱，加生姜五片，大枣二个，乌梅一个，煎服。

【主治】 热证胀满。

09592 枳术二陈汤

【方源】《医统》卷二十三。

【组成】 枳实（炒）半两 白术（炒） 半夏（制） 茯苓 陈皮各八分 甘草（炙）五分

【用法】 用水一盏半，加生姜、大枣煎，温服。

【主治】 脾胃痰饮，胸膈不利。

09593 枳术青皮汤

【方源】《济阳纲目》卷十一。

【组成】 枳实 白术 橘红 黄连（姜汁炒） 麦芽（炒） 青皮 白芍药 山楂肉各一钱 大黄（酒浸）一钱五分 甘草三分

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 过食热物，有伤太阴、厥阴，呕吐痞胀，泻痢或不泻痢者。

09594 枳朴大黄汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】 陈枳实 厚朴 广皮 甘草 大黄

【主治】 食积腹胀，一条扛起，痛而欲利，利后稍减，脉右关多滑，或见沉实，或见滑动，或见弦急。

09595 枳壳木香丸

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】 枳壳（去瓤，麸炒）二两 木香 大黄（纸裹煨）各半两 槟榔（锉） 郁李仁（汤浸，去皮尖，焙，研） 芎藭各一两

【用法】 上为末，入郁李仁拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，食后、临卧温生姜汤送下。

【主治】 留饮宿食不消。

09596 枳壳防风丸

【方源】《婴童百问》卷五。

【异名】 枳壳丸(《丹溪心法附余》卷二十二)。

【组成】 枳壳（麸炒） 防风（去芦） 独活（去芦） 大黄（煨）各一钱 前胡（去芦） 当归 麻黄（去节）各一钱

【用法】 上为细末，面糊为丸，如黍米大。每服十丸，食后米饮送下。

【主治】 小儿龟背龟胸，鹤膝行迟。

09597 枳壳理中汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 炮姜一钱半 白术一钱半（炒） 枳壳一钱半（炒） 赤芍一钱半 肉桂一钱半（去皮） 砂仁三钱（炒灰）

【用法】 水煎浓汁，去滓温服。

【主治】 产后恶露冲脾，胀满，脉沉滞者。

【方论选录】 产后脾虚气滞，血瘀不消，故冲逆于中，而胀满不止，不治必成血臌。白术健脾运化以退胀，枳壳泻滞宽中以除满，赤芍破血降瘀，肉桂暖血温经，炮姜温中以逐冷滞，砂仁和胃以祛瘀血。水煎温服，使脾健气强，则瘀血顿化，胀满自已，何血臌之足忧哉！

09598 枳壳疏肝散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十。

【组成】 枳壳 枳实 川芎 柴胡 陈皮 香附 白芍 炙草

【主治】 肝实火盛之左胁痛。

09599 枳壳橘皮汤

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 茯苓 白术各一两半 人参 枳壳各一两 陈橘皮三分

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏半，加生姜七片，同煎至七分，去滓温服，每日二三次。

【主治】 痰气停积，胸中痞满，呕吐，不思饮食。

09600 枳连二陈汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 枳实一钱（拌炒川连八分） 竹沥 半夏 广皮 赤苓 山楂各一钱半 滑石三钱（包） 木通 葛根各七分 生炙草二分

【主治】 风寒夹食积痰饮，脘痛痞胀。

09601 枳连导滞汤

【方源】《活幼心法》卷末。

【组成】 陈枳壳（去瓤，炒） 黄连 山栀仁（炒黑）各六分 赤芍 前胡 连翘（去心蒂）各四分 三棱 莪术（俱醋炒） 槟榔 甘草各三分

【用法】 水煎，食远服。

【主治】 小儿腹痛属热者。

【加减】 如热甚，大便秘者，加酒炒大黄一钱二分，微利之。

09602 枳实大黄汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】 枳实 大黄 槟榔 厚朴各二钱 木香五分（另研） 甘草三分

【用法】 上锉一剂。水煎服。

【主治】 食积痛，并积热痛，大便不通者。

09603 枳实天麻汤

【方源】《活人心统》。

【组成】 白术 陈皮 半夏 天麻 人参 甘草（炙） 枳实（炒） 茯苓（去木） 川芎

【用法】 上用水二钟，加生姜三片，煎七分服，滓再煎服。

【主治】 痰湿气虚所致之眩晕。

【加减】 痰火脉数口干，去半夏，减人参，加贝母、酒炒黄连；手足厥冷脉迟者，加附子。

09604 枳实木香丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】 枳实（去瓤，麸炒）二两 木香 陈橘皮（汤浸、去白，焙） 人参 海藻（水洗去咸，焙） 葶苈（纸上炒令紫色）各一两 芍药（锉） 丁香各三分

【用法】 上为末，煮枣肉和丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，用炒豆煎汤送下，空心、日午、夜卧各一服

【主治】 肺积，息贲气上者。

09605 枳实分消汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】 川厚朴（去皮，姜汁炒）五钱 枳实（麸炒） 二钱半 大黄（酒蒸）一钱半 官桂一钱二分 甘草（炙）一钱五分

【用法】 上锉。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 热胀，腹胀发热，脉浮数，饮食如故。

【加减】 呕吐，加半夏；白利，去大黄；寒多，加干姜。

09606 枳实半夏汤

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 半夏一两（切作片子，汤洗七次，去滑） 陈橘皮（去白）一两 枳实（汤浸，去瓤，薄切，麸炒黄）半两

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水一盏半，加生姜十片，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 痰饮停留，胸膈痞闷，或咳嗽气塞，头目昏重，呕哕恶心，项背拘急。

09607 枳实芍药散

【方源】《金匮》卷下。

【组成】 枳实（烧黑，勿大过） 芍药各等分

【用法】 上为散。每服方寸匕，一日三次，以麦粥送下。

【功效】《金匮要略浅注》：调和气血之滞。

【主治】 产后腹痛，烦满不得卧；痈脓。

【方论选录】《金匮要略本义》：产妇血流不快，积于腹中作痛，心烦胁满不得卧，此为实邪。法应开散而行其瘀滞，则诸病可已。枳实烧黑者，入血中行积也；加以芍药走血分，而血癥可散矣；以麦粥下之者，即大麦粥取其滑润宜血，且有益胃气也。

09608 枳实导滞丸

【方源】《内外伤辨》卷下。

【异名】 枳术导滞丸（《脾胃论》）、导气枳实丸（《医学入门》卷八）。

【组成】 大黄一两 枳实（麸炒、去瓤） 神曲（炒）各五钱 茯苓（去皮） 黄芩（去腐） 黄连（拣净） 白术各三钱 泽泻二钱

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十至七十丸，食远温开水送下。

【功用】《中药制剂手册》：祛湿清热，消积导滞。

【主治】 ①《内外伤辨》：伤湿热之物，不得施

化，而作痞满，闷乱不安。②《中药制剂手册》：脾胃湿热引起的胸满腹痛，消化不良，积滞泻泄，或下痢脓血，里急后重。

【方论选录】《医方集解》：此足太阴、阳明药也，饮食伤滞，作痛成积，非有以推荡之则不行，积滞不尽，病终不除。故以大黄、枳实攻而下之，而痛泻反止，经所谓"通因通用"也；伤由湿热，黄芩、黄连佐以清热，茯苓、泽泻佐以利湿；积由酒食，神曲化食解酒，温而消之；芩、连、大黄苦寒太过，恐伤胃气，故又以白术之甘温，补土而固中也。

【备考】本方加木香、槟榔，名"木香导滞丸"（见《医学正传》卷二）。本方方名，《金匮翼》引作"导滞丸"。

09609 枳实导滞汤

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】枳实（炒）三钱 白术（炒焦）五钱 茯苓二钱 黄芩（酒炒）二钱 黄连（姜汁炒）三钱 泽泻（炒）二钱 大黄（酒蒸）一两 神曲（炒）四钱 生姜三片

【用法】水煎，食远服。

【主治】伤湿热之物，痞闷不安。

【方论选录】此枳术丸合三黄汤，而兼五苓之制，以祛湿热宿滞也。

09610 枳实青皮汤

【方源】《医便》卷二。

【组成】白术一钱半 枳实 青皮 陈皮 黄连（姜汁炒） 麦芽 山楂肉 神曲（炒）各一钱 甘草三分 酒大黄一钱七分

【用法】用水二钟，煎一钟，温服。

【主治】食热物过伤太阴、厥阴，呕吐，膨胀下痢，伤之轻者。

09611 枳实桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】枳实（麸炒）七个 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 桔梗（炒）各半两 甘草（炙）一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（拍破），薤白五寸（切），煎至八分，去滓温服。

【主治】胸痹。心下气坚，疼刺不可俯仰，气促，咳唾引痛，不能食。

09612 枳实消痞丸

【方源】《明医指掌》卷五。

【组成】枳实一钱（炒） 山楂肉一钱 黄连（炒）一钱 神曲（炒）一钱 甘草（炙）一钱 猪苓一钱 泽泻八分（去毛） 厚朴（姜汁拌炒）八分 砂仁八分（炒） 陈皮一钱 人参一钱（去芦） 黄芩一钱（炒） 干姜八分 姜黄八分 白术（炒）一钱

【用法】上为末，蒸饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后白汤送下。

【主治】食积，心下虚痞，按之痛者。

09613 枳实理中丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】人参（去芦头） 干姜（炮） 甘草（炙） 白术 枳实（麸炒） 茯苓（去皮）各一两 附子（炮，去皮脐）半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作四丸。每服一丸，水一大盏，煎至六分，和滓温服，不拘时候。

【主治】胸痹，心下痞，留气结胸，胸满，胁下逆气抢心。

09614 枳实理中汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】枳实 干姜 人参 白术 甘草 砂仁 桔梗 陈皮 厚朴

【用法】加生姜，水煎服。仍用生姜二三两捣滓，擦胸中。

【主治】寒结胸，心下满闷，按之痛；及胃口着寒，伤生冷者。

【加减】寒甚，加熟附子；生冷饮食，胃口着寒，加草果、丁香；有寒痰，加半夏。

09615 枳实理中汤

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】白术二钱（炒） 枳实一钱半（炒） 炮姜三钱 茯苓二钱 炙草六分

【用法】水煎，去滓温服。

【功用】温中化滞开结。

【主治】脾亏寒滞，不能运化，而痞结于中，脐腹疼痛，饮食减少，脉细滑者。

【方论选录】白术健脾元以运化，枳实破滞气以消痞，炮姜温中逐冷，炙草益胃缓中，茯苓渗湿以和脾。水煎，温服，俾寒化滞行，则脾强气旺而痞结自开，何患疼痛不退，饮食不进乎。

09616 枳桔二陈汤

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】陈皮 半夏 桔梗 枳壳 白茯神 甘草 白豆蔻 黄耆 苏子 山栀各等分

【用法】加生姜三片为引。

【主治】七情之气，结成痰气，形如梅核；或如

破布棉絮，在咽喉之间，咽不下，咯不出；或中脘痞满，气不舒畅，痰涎壅盛，上气喘息；或因痰饮恶心。

09617 枳梗二陈汤

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】枳桔二陈汤(《金鉴》卷四十六)。

【组成】二陈汤加枳壳 桔梗

【功用】宽胸膈，化痰气。

【主治】①《医学入门》：痞满。②《金鉴》：痰饮子嗽；小儿停痰呕乳，胸膈膨满，呕吐痰涎；小儿湿痰懒食，倦怠嗜卧，面色多黄，痰多者。

【加减】表热或寒热往来，加柴胡、黄芩；内热，加黄连；痰喘，加瓜蒌仁；口燥，加天花粉，去半夏。

09618 枳缩二陈汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】枳实（麸炒）一钱 砂仁七分 白茯苓（去皮） 贝母（去心） 陈皮 苏子（炒） 瓜蒌仁 厚朴（姜汁炒） 香附（童便炒）各七分 川芎八分 木香五分 沉香五分 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，入竹沥磨沉、木香服。

【主治】关格，上下不通。

09619 枳实栀子豉汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】枳实栀子汤(《千金》卷十)、栀豉枳实汤(《医学入门》卷四)。

【组成】枳实三个（炙） 栀子十四个（擘） 豉一升（绵裹）

【用法】上以清浆水七升，空煮取四升，纳枳实、栀子，煮取二升，下豉，更煮五六沸，去滓，分二次温服。复令微似汗。

【主治】大病愈后劳复者。

【方论选录】《伤寒贯珠集》：大病新愈，血气未复，余热未尽，而强力作劳，余热之气，因劳而外浮。故以枳实、栀子以下热，豆豉以散热。盖亦表里之剂，面气味轻薄，适宜于病后复发之体耳。

09620 枳实薤白桂枝汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】枳实薤白汤(《医学入门》卷七)、栝楼薤白桂枝汤(《金匮要略心典》卷中)。

【组成】枳实四个 厚朴四两 薤白半斤 桂枝一两 瓜蒌实一个（捣）

【用法】上以水五升，先煮枳实、厚朴，取二升，去滓纳诸药，煮数沸，分三次温服。

【功用】《金匮要略释义》：通气开泄。

【主治】胸痹，心中痞气，气结在胸，胸满，胁下逆抢心。

【方论选录】《金匮要略释义》：阴气结于胸间，故以枳实泄其胸中之气，厚朴泄其胁下之气，桂枝通心阳，瓜蒌、薤白开结宣气，病邪自去。

09621 柞叶汤

【方源】《苏沈良方》卷九。

【异名】柞木散(《本事》卷六)、柞木饮子(《外科精要》卷上)。

【组成】柞木叶（干）四两 干荷叶四两 萱草根（干）二两 甘草节一两 地榆一两

【用法】上细锉。每服半两，水二碗，煎去半，分二服，早、晚各服二服，滓并煎作一服。有脓血者自安，脓血在内者自大肠下，未成者自消。有疮者贴下药：通明牛皮胶一两（水半升，熬令化）黄丹一两，入胶中煮三五沸。上放温冷，以鸡羽敷疮口，有疮即敛，未成疮者涂肿处即内消。

【主治】发疽。

【方论选录】《本事方释义》：柞木叶气味苦平，入足厥阴；干荷叶气味苦辛平，入足少阳、厥阴；金樱根（萱草根）气味甘凉，入足厥阴，能利湿解毒；甘草节气味甘平，入足太阴，最能解毒，通行十二经络；地榆气味咸苦微寒，入手足阳明，此治痈疽发背之方也。大凡诸毒之发，皆由湿热壅痹，致气血凝滞而成，凉血之药，必兼分利湿热，则源头既清，病自消散矣。

09622 柏仁散

【方源】方出《千金》卷五，名见《奇效良方》卷六十四。

【组成】防风一两半 柏子仁 白及各一两

【用法】上为末。以乳和，敷囟上，每日一次。十日知，二十日愈。

【主治】小儿囟开不合。

09623 柏公汤

【方源】《袖珍》卷一引《经验方》。

【组成】柏皮三两 黄芩二两 黄连一两

【用法】上㕮咀。每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。

【主治】伤寒下痢，亦治久血热痢。

【加减】腹痛，加山栀子；小便不利，加赤茯苓、阿胶。

09624 柏石散

【方源】《中医耳鼻喉科学》。

【组成】黄柏 30 克 石膏 30 克 枯矾 15 克

【用法】 研为细末。外敷。

【功用】 清除湿热。

【主治】 旋耳疮，风热湿邪浸渍，黄水淋漓者。

09625 柏叶丸

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】 柏叶一两（微炙） 续断三分 芎劳三分 禹余粮二两（烧，醋淬七次） 艾叶三分（微炒） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 牡蛎一两（烧为粉） 地榆一两（锉） 熟干地黄一两 当归三分（锉，微炒） 丹参三分 鲍甲一两（炙微黄） 鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 鳖甲一两（涂醋炙微黄） 赤石脂一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】 妇人崩中漏下不止，渐加黄瘦，四肢无力，腹内疼痛，不思饮食。

09626 柏叶丸

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】 柏叶（去梗） 黄连（去须） 阿胶（炙令燥） 地榆（锉） 当归（焙）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温米饮送下，不拘时候。

【主治】 脓血久痢，腹内疼痛。

09627 柏叶丸

【方源】《秘传大麻风方》。

【组成】 侧柏叶（九蒸九晒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服百丸，一日三次，开水送下。

【功用】 能生眉发。

【主治】 大麻风，眉发脱落。

09628 柏叶汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 柏叶 干姜各三两 艾三把

【用法】 上以水五升，马通汁一升，合煮取一升，分温再服。

【主治】 吐血不止者。

【方论选录】《张氏医通》：血逆不止，当责之于火旺。故用柏叶治其旺气；即兼姜、艾之辛温散结，使无留滞之患；更加马通导之下行。非近世专用柏叶、棕灰、血余之属可比。

09629 柏叶汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】 柏叶（去梗，焙） 甘草（炙，锉） 阿胶（炒燥） 黄芩（去黑心，锉） 竹茹（切） 生干地黄（切）各一两

【用法】 上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 小便出血不止。

09630 柏叶汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】 柏叶（炙干）二两 当归（切，焙） 禹余粮（烧，醋淬七次）各一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入薤白二寸，细切，同煎至七分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】 产后血不止，兼漏下。

09631 柏叶散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 柏叶二两（微炙） 黄芩二两 车前子二两 甘草二两（炙微赤，锉） 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生地黄半两，竹叶二七片，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 小便出血，心神烦热，口干，眠卧不安。

09632 柏叶散

【方源】《圣惠》七十三。

【组成】 柏叶一两半（微炙） 续断一两半 芎劳一两半 禹余粮二两半（烧，醋淬七遍） 艾叶一两（微炒） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 赤石脂一两 牡蛎一两（烧为粉） 地榆一两（锉） 生干地黄一两（锉） 当归一两半（锉，微炒） 鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 龟甲一两半（涂酥炙令黄） 鳖甲一两半（涂酥炙令黄）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】 妇人元气虚弱，崩中漏下，面色萎黄，消瘦乏力，腹中疼痛，不思饮食，亦治白带。

①《圣惠》：妇人崩中漏下，不问年月远近。②《普济方》：妇人崩中漏下，渐加黄瘦，四肢无力，腹内疼痛，不思饮食。③《景岳全书》：元气虚弱，崩中漏血，年久不愈，亦治白带。

09633 柏叶散

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】 柏叶三分 阿胶 当归 熟地黄 赤芍 牡蛎各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，米饮调下，不拘时候。

【主治】 妇人赤白带下，腹内疞痛，四肢烦疼，

不欲饮食，日渐羸瘦。

09634 柏叶散

【方源】《本事》卷三。

【组成】 柏叶 麻黄（去根节） 山栀子（去皮） 枳壳（去瓤，锉，麸炒） 羌活（去芦） 羊肝石 白蒺藜（炒去角） 升麻 子芩（去皮） 防风（去钗股） 牛蒡子（隔纸炒） 荆芥穗 茺蔚子 大黄（湿纸裹，甑上蒸）各半两 苦参一两 乌蛇一条（酒浸，去皮骨，焙干）

【用法】 上为细末。每服二钱，温水调下，一日七八服。

【主治】 疠风。

【方论选录】《本事方释义》：柏叶气味苦辛微寒，入足太阴，麻黄气味辛温而散，入足太阳；山栀子气味苦寒，入手太阴、少阴；枳壳气味苦寒，入脾；羌活气味辛温，能行水，入足太阳；羊肝石气味淡平，入足少阳、厥阴，能解药毒；白蒺藜气味甘辛温，入足厥阴，能明目；升麻气味苦辛微温而散，入足阳明；子芩气味苦寒，入手太阴；防风气味辛甘平，入足太阳；牛蒡子气味苦辛平微寒，入手太阴；荆芥气味辛温，入足厥阴；茺蔚子气味辛甘微温，入手足厥阴；大黄气味苦寒，入手足阳明；苦参气味苦寒，入手足少阴；乌蛇气味甘平，善能治风，入足少阳、厥阴。此治疠风之方也。血分中热气阻痹脉络，不主流行，必成疥癞，久则延为疠风。故用凉血药兼以疏风。古人有云：治风先治血，血行风自灭也。

09635 柏叶散

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】 柏叶二两 地榆一两（锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 久血痢，小肠结痛不可忍。

09636 柏叶散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 侧柏叶（炒黄，为末） 蚯蚓粪（韭菜田内者佳） 黄柏 大黄各五钱 赤豆 轻粉各三钱

【用法】 上为细末。新汲水调搽。

【主治】 三焦火甚，致生火丹，作痒或作痛，延及遍身。

【备考】《金鉴》有雄黄，或用香油调搽，主治缠腰火丹。

09637 柏叶散

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】 柏叶三两 大黄一两 黄芩一两

【用法】 上为散。每服三钱，米饮调下。

【主治】 脏毒，脉盛者。

【方论选录】 热蕴于中，不能输化，而有伤脏气，故下血紫黑，乃为脏毒焉。柏叶芳香，力能醒脾开胃，专主凉血止血；黄芩苦寒，性善宽肠清肺，专解膈热移热；大黄荡涤蕴热，以解热毒。使毒化热解，则脏气清和，而血室完固，安有下血紫黑为脏毒之患乎？此解毒之剂，为脏毒下血之专方。

09638 柏皮丸

【方源】《医方类聚》卷一四一引《施圆端效方》。

【组成】 黄连 黄柏 芍药 槐花（炒）各二两

【用法】 上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下，一日二次。

【主治】 脏毒便血，疼痛呕哕。

09639 柏皮汤

【方源】《外台》卷二（注文）引《范汪方》。

【异名】 黄连阿胶汤（《圣济总录》卷三十三）、阿胶汤（《此事难知》）。

【组成】 黄柏二两 黄连四两 栀子仁十四个（擘） 阿胶一两（炙）

【用法】 上切。以水六升，煮前三味，取二升，去滓，纳胶令烊，温分再服。

【主治】 伤寒后下利脓血。

【宜忌】 忌猪肉、冷水。

【备考】 本方改为丸剂，名“黄连阿胶丸”（见《杏苑》）。

09640 柏皮汤

【方源】《直指》卷十三。

【异名】 黄连柏皮汤（《医学入门》卷四）。

【组成】 柏皮三两 黄芩二两 黄连一两

【用法】 上锉。每服四钱，水一大盏，煎七分，入阿胶末半钱，再煎少顷，温服。

【主治】 ①《直指》：协热泄泻，亦治血痢。②《医学入门》：热毒吐血。

09641 柏皮汤

【方源】《元戎》卷四。

【组成】 生地黄 甘草 黄柏 白芍药各一两

【用法】 上㕮咀。用醇酒三升，渍之一宿，以铜器盛，米饮下蒸一炊时久，渍汁半升，食后服。

【主治】 衄血、吐血、呕血等失血虚损，形气不理，羸瘦不能食，心悸少气，燥渴发热。

09642 柏花丸

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】贝母四钱　川柏（蜜炙）一钱　百合二钱　款冬花二钱五分　冰片三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如青豆大。每服一丸。

【主治】肺热咳嗽。

09643　柏连散

【方源】《得效》卷十。

【组成】胡粉（炒）　黄柏（炙）　黄连各等分

【用法】上为末。以面脂或猪脂调敷，一日三次。

【主治】面上有热毒恶疮。

09644　柏姜散

【方源】《喉证指南》卷四。

【组成】黄柏二钱　干姜八分

【用法】合熔成炭（存性），研极细末。吹之。

【主治】喉证，阴虚火盛。

09645　柏莲汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参　麦冬　玄参各五钱　茯苓　柏子仁　丹皮各三钱　丹参二钱　半夏　莲子心各一钱　生枣仁三钱

【用法】水煎服。

【主治】怔忡。

09646　柏黄散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】黄芩一两二钱半　当归　柏叶　蒲黄各一两　生姜五钱　艾叶二钱半　生地黄六两　伏龙肝二两七钱

【用法】上㕮咀。用水二升，煎取八合，分为二服。

【主治】经血不止。

09647　柏墨散

【方源】方出《圣惠》卷八十二，名见《阎氏小儿方论》。

【组成】黄柏末　釜下墨煤　乱发（烧灰）各一分

【用法】上药同研细。少少敷之。

【主治】①《圣惠》：小儿脐风，汗出不止。②《阎氏小儿方论》：小儿断脐后为水湿所伤，或困袍湿气伤于脐中，或解脱风冷所乘，致令小儿四肢不和，脐肿多啼，不能乳哺。

09648　柏子仁丸

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】柏子仁三两　酸石榴皮二两　秦椒三两（去目及闭口者，微炒去汗）　何首乌二两　马齿苋二两　莲子草二两　白芷二两　旋覆花二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以熟水送下，晚食前再服。

【功用】壮血脉，乌须发。

【主治】髭鬓早白。

【宜忌】忌大蒜、生葱等。

09649　柏子仁丸

【方源】《普济方》卷三三三引《指南方》。

【异名】柏子丸（《外科理例·附方》）、女科柏子仁丸（《饲鹤亭集方》）。

【组成】柏子仁（碎，另研）　牛膝　卷柏各半两　泽兰叶　续断各二两　熟地黄三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【功用】养血益阴。

【主治】阴虚血弱，水少火盛，经候微少，渐渐不通，手足骨肉烦疼，日渐羸瘦，渐生潮热，脉象微数。

【方论选录】《医方集解》：此手足少阴、厥阴药也。柏子仁安神而养心，地黄、续断、牛膝补肝肾而益冲任，卷柏、泽兰活血脉而通经闭。

09650　柏子仁丸

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】柏子仁　远志（去心）　干地黄各一两半　桂心　茯神　芎藭　人参　丹参　防风　沉香各一两　菖蒲　甘草各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】心虚恐畏，腹胁暴痛，志意不乐。

09651　柏子仁丸

【方源】《本事》卷六。

【组成】新柏子仁（研）　半夏曲各二两　牡蛎（甘锅子内火煅，用醋淬七次，焙）　人参（去芦）　麻黄根（慢火炙，拭去汗）　吴白术　五味子（拣）各一两　净麸半两（慢火炒）

【用法】上为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心米饮送下，一日二次。得效减一服，好愈即住。作散调亦可。

【功用】敛阳气、止盗汗，进饮食，退经络热。

【主治】《医方集解》：阴虚盗汗。

【方论选录】《医方集解》：心血虚则睡而汗出、柏子仁味甘辛平，养心宁神为君；牡蛎、麦麸咸凉，清燥收脱为臣；五味酸敛涩收，半夏和胃燥湿为佐；麻黄根专主肌表，引参术以固正气为使。

09652 柏子仁丸

【方源】《奇效良方》卷三十四。

【组成】柏子仁 枸杞子（炒）各一两 地肤子一两半 韭子三两（须十月霜后采者，酒浸，晒干，微炒）

【用法】上为细末，以煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及晚食前以粥饮送下。

【主治】虚劳梦泄。

09653 柏子仁汤

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】柏子仁（酒浸一宿，晒干） 桂（去粗皮） 人参 白术（米泔浸一宿，锉，炒） 干姜（炮） 甘草（炙） 防风（去叉） 山芋 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 芎藭 芍药 黄耆 磁石（煅，醋淬七次） 乌头（炮裂，去皮脐） 白茯苓（去黑皮）各一两半

【用法】上㕮咀。每服三钱匕，先以水三盏，煮羊肾一只，取汁一盏，去羊肾，下药，加生姜一枣大（拍碎），同煎至七分，去滓，食前温服。

【功用】补不足。

【主治】肾间有水，使人耳聋。

09654 柏子仁汤

【方源】《济生》卷六。

【组成】当归（去芦，酒炒） 芎藭 茯神（去木） 小草 阿胶（锉，蛤粉炒成珠子） 鹿茸（燎去毛，酒蒸，焙） 柏子仁（炒）各一两 香附子（炒去毛）二两 川续断（酒浸）一两半 甘草（炙）半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，生姜五片，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】妇人忧思过度，劳伤心经，致崩中下血。

【备考】方中甘草用量原缺，据《普济方》补。

09655 柏子仁汤

【方源】《济生》卷七。

【组成】柏子仁（炒） 白芍药 防风（去芦） 茯神（去木） 当归（去芦，酒浸） 芎藭 附子（炮，去皮脐）各一两 细辛（洗，去土叶） 桂心（不见火） 甘草各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝气虚寒，两胁胀满，筋脉拘急，腰膝小腹痛，面青口噤。

09656 柏子仁汤

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】柏子仁 川芎 茯神 阿胶 小草 香附各一钱 当归 续断 熟地各一钱五分 龙齿 甘草 棕灰各五分。

【用法】加生姜三片，水煎，入盐少许，空心服。

【主治】妇人思虑伤心，不能藏血，以致崩漏。

09657 柏子仁散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】柏子仁三分 羌活半两 当归三分（锉碎，微炒） 防风半两（去芦头） 赤箭三分 桂心半两 芎藭三分 白附子半两（炮裂） 牛膝三分（去苗） 桑寄生三分 薯蓣三分 仙灵脾三分 麝香一分（研入）

【用法】上为细散，研入麝香令匀。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】妇人风虚劳冷，气血不调，手脚挛急，头目旋眩，肢节烦疼痛。

09658 柏子仁散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】柏子仁 远志（去心） 人参（去芦头） 桑寄生 防风（去芦头） 琥珀（细研） 当归（锉，微炒） 熟干地黄 甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为散。每服以水一大盏，入白羊心一个（切），先煎至七分，去滓，下药五钱，更煎至四分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：产后妄言乱语，皆由内虚，是血邪气攻心。②《济阴纲目》：产后元气虚弱，瘀血停滞，妄言乱语，乍见鬼神。

09659 柏子仁散

【方源】《婴童百问》卷四。

【组成】防风 柏子仁各等分

【用法】上为末。以乳汁调涂囟门上。

【主治】囟门不合。

09660 柏子仁粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】柏子仁 10～15 克 蜂蜜适量 粳米 50～100 克

【用法】先将柏子仁去尽皮壳杂质，稍捣烂，同粳米煮粥，待粥将成时，兑入蜂蜜适量，稍煮一、二沸即可。每天服食二次。

【功用】润肠通便，养心安神。

【主治】慢性便秘，心悸，健忘，失眠。

【宜忌】平素大便稀溏者、患病发热者忌食。

【加减】年老体弱者，可将蜂蜜换为胡桃肉。

【方论选录】柏子仁味甘而有油，气微香，性平

无毒，入心、肝、脾经，有一定抗衰老效果，临床实践证明它是一味理想的滋补强壮，养心安神良药。凡是血虚老人，体弱患者，都可经常食用。适用于素体阴亏、年老虚衰、产后羸弱等肠燥便秘之症。另外，蜂蜜甘而滋润，能滑利大肠，内服可使大便通畅。对肠燥便秘，体虚而不宜攻下通便药物的甚为适宜。二药同米煮粥，其味颇佳，患者乐于服食，可收滋补强壮，养心润肠之效。

09661 柏子仁膏

【方源】《卫生总微》卷十六。

【组成】 柏子仁（拣净） 松子仁 胡桃仁各等分

【用法】 上研和膏。每服如弹子大，热汤化下，未快再服。

【主治】 大便秘涩。

09662 柏白皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】 柏白皮（焙干，锉）二斤 酸石榴枝一握（烧灰，细研）

【用法】 先将柏白皮为粗末，每用四钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，下石榴枝灰一钱半匕，更煎至八分，空心服，至晚再服。

【主治】 小便不禁。

【备考】 本方方名，《普济方》引作"柏皮汤"。

09663 柏子坠痰丸

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 黄耆二两 云苓一两 栝楼仁六钱（去油） 半夏八钱 胆星八钱 陈皮四钱 麦冬八钱 贝母五钱 犀角二钱 牛黄三分 青礞石五钱 急性子五钱

【用法】 共为细末，水打为丸。每服一钱半。先服固睛明目丸，待有好转，再服本方。

【主治】 两眼不疼不红，外观无异，但视物歪斜（中心性视网膜脉络膜炎）。

09664 柏子建宫丸

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】 熟地三两 当归三两（酒炒） 白芍一两半（酒炒） 川芎八钱（炒） 阿胶三两（麸炒） 艾叶一两五钱（醋炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，温酒送下。

【主治】 血虚宫冷，不孕，脉数濡弦微涩者。

【方论选录】 当归养血以荣血海，熟地补血以滋冲任，川芎行血中之气，白芍敛经中之阴，阿胶补任脉之血，艾叶暖子宫以调血气也。蜜以丸之，酒炒以行之，使血海充足，则子宫温暖而冲任化育有权，天下无不孕之妇矣。

09665 柏子养心丸

【方源】《医统》卷七十引《集验方》。

【组成】 柏子仁（鲜白不油炽者，以纸包捶去油） 白茯神 酸枣仁各二两 五味子半两 当归身 生地黄各二两 甘草 辰砂（细研） 犀角（镑）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如芡实子大，金箔为衣。每服一丸，午后、临卧时津嚼。

【主治】 心劳太过，神不守舍，合眼则梦，遗泄不常。

【备考】《丸散膏丹集成》有黄耆。治血虚内热，失眠心悸，及妇女经少，瘦损潮热。

09666 柏子养心汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】 生黄耆 麦冬 枣仁 人参 柏子仁各一钱 茯神 川芎 远志（制）各八分 当归二钱 五味子十粒 炙甘草五分

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 妊娠子烦，左寸脉微弱者。

09667 柏叶黄耆散

【方源】 方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一八八。

【组成】 生干地黄四两 黄芩 柏叶 甘草（炙微赤，锉）各一两 阿胶（杵，燥令碎、黄燥） 黄耆（锉）各二两

【用法】 上为散。每服三钱，于食后用糯米粥饮调服。

【主治】 吐血，日夜不止。

09668 柏叶鹿茸丸

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】 柏叶一两 当归 干姜各三分 阿胶半两 鹿茸一两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】 冲任气虚，脐腹疼痛，漏下赤白。

09669 栀子丸

【方源】《外台》卷三十六引《小品方》。

【组成】 栀子仁七个 黄连五分 黄柏三分（炙） 矾石四分（烧） 大枣四个（炙令黑）

【用法】 上为末，以蜜为丸，如小豆许。每服七丸，空腹时服；如未除，更服。

【主治】 小儿热痢不止。

09670 栀子丸

【方源】《千金》卷六。

【组成】栀子仁二升　芍药四两　大黄六两　豉三升　木兰皮半两　甘草四两

【用法】上为末，以蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，稍加至十五丸，一日三次。

【主治】酒渣鼻疱。

09671　栀子丸

【方源】《普济方》卷九十三引《海上名方》

【组成】山栀子（去皮）　草乌头（炮）　干姜（炮）各半两

【用法】上为末，煮枣肉为丸，如绿豆大。每服三丸，渐加至七丸，常服二丸，细嚼，茶、酒任送下。

【主治】瘫痪风。

09672　栀子汤

【方源】方出《外台》卷二十二引《古今录验》，名见《普济方》卷二九九。

【组成】大青四两　山栀子　黄柏各一两白蜜半升

【用法】上切。以水三升，煎取一升，去滓，下蜜更煎一两沸，含之。取愈止。

【主治】口疮，咽喉中塞痛，食不得入。

09673　栀子汤

【方源】《外台》卷三引《延年秘录》。

【组成】栀子三两　黄芩三两　豉一升（熬，绵裹）　葱白（切）一升　石膏四两（碎，绵裹）　干葛四两（切）

【用法】上切。以水七升，煮取二升六合，去滓，分三次温服，如人行八九里再服。

【主治】天行一二日，头痛壮热，心中热者。

【宜忌】忌面、酒、生冷等物。

09674　栀子汤

【方源】《外台》卷四引《延年秘录》。

【异名】栀子散（《圣惠》卷五十五）。

【组成】栀子仁四两　黄芩三两　柴胡四两　升麻三两　龙胆草三两　大黄三两　栝楼三两　芒消二两

【用法】上切。以水九升，煮取二升八合，去滓，分三次温服，相去四五里进一服。

【主治】遍身黄如橘，心肋满急。

【备考】《圣惠》本方用法：上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

09675　栀子汤

【方源】《千金》卷十九。

【组成】栀子仁　芍药　通草　石韦各三两　石膏五两　滑石八两　子芩四两　生地黄　榆白皮　淡竹叶（切）各一升

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，去滓，分三次服。

【主治】肾劳实热，小腹胀满，小便黄赤，末有余沥，数而少，茎中痛，阴囊生疮。

09676　栀子汤

【方源】《苏沈良方》卷三。

【组成】栀子二两　附子（炮）一两

【用法】每服三钱，水一大盏，蓬白三寸，同煎至五分，温服。

【主治】胸痹切痛。

【临证举例】胸痹　泗州有人病岁余，百方不愈，服此二服顿愈。

09677　栀子汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】栀子仁半两　黄连（去须）一两半　黄芩（去黑心）一两　枳实（麸炒）三分　龙胆一两　甘草（炙）三分　芍药一两　大黄（锉，炒）一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】目赤涩疼痛。

09678　栀子汤

【方源】《易氏医案》。

【组成】黑山栀　人参　麦冬　乌梅

【主治】妇人身倦怠，呵欠，口干饮冷，饮食不进，脉右寸微沉，右尺洪大侵上。

【方论选录】方中山栀炒黑，以去三焦屈曲之火，人参、麦冬以收肺中不足之金，乌梅酸以收之，火势既降，金体自坚，气畅血和而愈。

【临证举例】肺火病　一妇人患浑身倦怠，呵欠，口干饮冷，一月不食，强之食数粒而已。诸治不效。次年更甚，肌消骨露。诊之三焦，脉洪大侵上，脾肺二脉微沉，余部皆和平。以栀子汤饮之，进二服，即知饥喜食，旬日气体充实如常。

09679　栀子汤

【方源】《古今医彻》卷二。

【组成】栀子一钱（炒黑）　山楂二钱　橘核一钱　荔枝核一钱　泽泻一钱　枳实一钱　归尾一钱　茯苓一钱　小茴香一钱（盐水焙）　柴胡七分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】疝气或左或右，疼痛肿大。

09680　栀子散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】 栀子仁三分 黄连三分（去须） 黄柏三分（锉） 川大黄二分（锉碎，微炒） 芦根一两（锉） 葛根一两（锉）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入豉半合，葱白二茎，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒五日，头痛壮热，四肢烦疼，不能饮食，呕逆不定。

09681 栀子散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】 栀子仁一两 黄芩一两 石膏一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 葛根一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，入葱白二茎，豉五十粒，煎至五分，去滓热服，衣覆取汗，不拘时候。

【主治】 时气二日，头痛背强，身热恶寒。

09682 栀子散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】 栀子仁三分 黄芩三分 石膏一两 葛根一两（锉） 柴胡一两（去苗） 麦门冬一两（去心焙）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，入豉五十粒，葱白三茎，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 热病一日，头疼壮热，心中烦闷。

09683 栀子散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】 栀子仁一两 黄连一两（去须） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 龙胆一两（去芦头） 赤芍药一两 甘草三分（炙微赤，锉） 川大黄一两（锉碎，微炒） 柴胡一两半（去苗） 大青一两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 上焦壅热，眼睛疼痛，大小便秘涩，心神烦躁，不得眠卧。

09684 栀芩汤

【方源】《妇科玉尺》卷二。

【组成】 山栀 黄芩 当归 元参 枳壳 苏梗 广皮 白芍 杜仲

【用法】 水煎服。

【主治】 痛胎。妊娠时常腹痛。

09685 栀子仁丸

【方源】《济生》卷五。

【组成】 栀子仁

【用法】 上为末，溶黄蜡等分和为丸，如弹子大。空心茶酒嚼下。半月效。

【主治】 酒渣鼻。肺热鼻发赤瘰。

【宜忌】 ①《济生》：忌酒、炙煿。②《金鉴》：忌辛辣之物。

09686 栀子仁汤

【方源】《活人书》卷十六。

【异名】 柴胡散（《普济方》卷一三五）、阳毒栀子汤（《准绳·伤寒》卷三）。

【组成】 栀子仁一两 柴胡一两半（去苗） 川升麻二两 黄芩二两 赤芍药一两 大青一两 石膏二两 知母一两 甘草半两（炙赤，锉） 杏仁二两（汤浸，去皮尖双仁者，麸炒微黄）

【用法】 上为粗末。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，豉一百粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 阳毒伤寒，壮热，百节疼痛。

09687 栀子仁汤

【方源】《外科精义》卷下引《普济生灵方》。

【异名】 六味栀子仁汤（《景岳全书》卷六十四）、栀子仁散（《杏苑》卷八）。

【组成】 郁金 枳壳（去瓤） 升麻 栀子仁 牛蒡子 大黄各一两

【用法】 上为细末。每服三钱，蜜水调下。

【主治】 时气头面赤肿。

09688 栀子仁饮

【方源】《圣惠》卷七十四。

【异名】 栀子石膏汤（《胎产秘书》卷上）。

【组成】 栀子仁一两 川升麻三两 黄芩一两 生地黄二两 大青二两 石膏三两（捣碎）

【用法】 上为细末。每服半两，用水一中盏，入葱白七寸，豉四十九粒，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妊娠热病，斑出黑色，小便如血，气急胎欲落。

09689 栀子仁散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】 栀子仁一两 黄芩一两 柴胡一两（去苗） 川升麻一两 龙胆一两（去芦头） 川大黄一两（锉碎，微炒） 栝楼一个（干者） 川芒消一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，入葱白二茎，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 热病遍身黄如橘色，心胁满急。

09690 栀子仁散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】 栀子仁 甘草（炙微赤，锉） 黄连（去须） 黄芩各半两

【用法】 上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】 小儿胃中热，日渐肌瘦。

09691 栀子仁煎

【方源】《千金》卷六。

【组成】 栀子仁 蕤仁 决明子各一两 车前叶 秦皮各一两六铢 石膏二两（碎如小豆大） 苦竹叶二合 细辛半两 赤蜜三合

【用法】 上㕮咀。以井花水三升，煮取七合，去滓下蜜，更煎，取四合，以锦滤之，干器贮，密封，勿使草芥落中，仰卧，以药汁细细敷目中。

【主治】 肝实热，目眦痛如刺。

09692 栀子豉汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 栀子香豉汤、香豉栀子汤（《伤寒总病论》卷三）、栀子汤（《圣济总录》卷四十）、加减栀子汤（《云岐子脉诀》）、栀子豆豉汤（《准绳·幼科》卷五）、栀豉汤（《寿世保元》卷二）。

【组成】 栀子十四个（劈） 香豉四合（绵裹）

【用法】 上以水四升，先煮栀子，得二升半，纳豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进一服。得吐者止后服。

【功效】《伤寒贯珠集》：散胸中邪气，彻热，除烦止躁。

【主治】 伤寒汗吐下后，虚烦不得眠，心中懊侬、胸脘痞闷，饥不能食，脉数，苔薄黄腻。

①《伤寒论》：发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊侬；发汗若下之，而烦热胸中窒者；伤寒五六日，大下之后，身热不去，心中结痛者；阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重，若发汗则躁，心愦愦，反谵语，若加温针，必怵惕，烦躁不得眠，若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊侬，舌上胎者；阳明病下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊侬，饥不能食，但头汗出者。下利后更烦，按之心下濡，为虚烦者。②《肘后方》：霍乱吐下后，心腹烦满。③《普济方》：感冒发为寒热，头痛体痛。④《准绳·幼科》：小儿痘疹，虚烦惊悸不得眠。

【宜忌】 凡用栀子汤，病入旧微溏者，不可与服之。

【方论选录】 ①《伤寒来苏集》：栀子苦能泄热，寒能胜热，其形象心又赤色通心，故除心烦懊憹，懊侬结痛等症；豆形象肾，制而为豉，轻浮上行，能使心腹之邪上出于口，一吐而心腹得舒，表里之烦热悉除矣。②《成方便读》：栀子色赤入心，苦寒能降，善引上焦心肺之烦热屈曲下行，以之先煎，取其性之和缓；豆豉用黑豆酿而成，其气香而化腐，其性浮而成热，其味甘而变苦，故其治能除热化腐，宣发上焦之邪，用之作吐，似亦宜然，且以之后入者，欲其猛悍，恐久煎则力过耳。

【临证举例】 ①伤寒懊侬 《名医类案》：江应宿治都事靳相庄患伤寒十余日，身热无汗，佛郁不得，卧非躁非烦，非寒非痛，时发一声，如叹息之状。医者不知何证，迎予诊视曰：懊侬佛郁证也。投以本汤一剂，十减二三，再以大柴胡汤下燥屎，佛郁除而安卧，调理数日而起。②神经衰弱 《河北中医》（1985；2:14）：用栀子豉汤加减治疗神经衰弱106例，结果痊愈55例，显效33例，好转15例，无效3例。总有效率97.3%。辨证加减：肝阳上亢，灼伤心神型，加龙胆草，生地黄；心脾两虚，气血不足型，加甘草、人参、茯苓、白术；心肾不交、虚火妄动型，加生地黄、何首乌、丹皮。③鼻衄 《新中医》（1985；3:46）：余某，女，73岁。近十日每日上午10～11时自觉心烦、胸中如窒，随即鼻出鲜血，半小时后缓解。诊之血色鲜红，舌红、苔薄黄，脉弦稍数。用炒栀子、淡豆豉各15克，白茅根10克，服二剂即止。

09693 栀子干姜汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 栀子十四个（劈） 干姜二两

【用法】 以水三升半，煮取一升半，去滓，分二次服，温进一服。得吐者止后服。

【主治】 伤寒，医以丸药大下之，身热不去，微烦者。

【方论选录】 ①《医学入门》：盖丸药不能除热，但损正气，邪气乘虚留于胸中而未深入，则身热不去而微烦。是用山栀苦寒以吐烦，干姜辛热以益气。②《伤寒来苏集》：丸药大下，寒气留中，心微烦而不懊侬，则非吐剂所宜也。用栀子以解烦，倍干姜以逐内寒而散表热。

09694 栀子大青汤

【方源】《活人书》卷十九。

【组成】 升麻 栀子仁各二两 大青 杏仁（去皮尖） 黄芩各一两半

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，细切葱白三寸，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 ①《活人书》：妊妇发斑，变为黑色。②《普济方》：妊娠妇人七月，伤寒壮热，赤斑变为黑斑，溺血。

09695 栀子大青汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 生地五钱 升麻八分 栀子一钱半 黄芩一钱半 大青三钱 葱白三个

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 妊娠伤寒，火郁不解，营阴受伤而夹湿热，故斑发青紫，胎动不安，脉数弦大者。

【方论选录】 栀子清利三焦以降火热，大青解利郁热以泄斑狂，生地滋热伤之阴，条芩安热迫之胎，升麻升阳散热，葱白通阳安胎也。水煎温服，使郁热顿解，则营阴暗复，而血气融和，斑无不化，胎无不安矣。

09696 栀子大黄汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 枳实大黄栀子豉汤（《千金》卷十）、栀子汤（《千金翼》卷十八）、大黄散（《圣惠》卷五十五）、大黄汤（《圣济总录》卷六十）、枳实大黄汤（《普济方》卷一四二）。

【组成】 栀子十四个 大黄一两 枳实五个 豉一升

【用法】 以水六升，煮取三升，分三次温服。

【主治】 ①《金匮》：酒黄疸，心中懊侬，或热痛。②《肘后方》：酒疸，心懊痛，足胫满，小便黄，饮酒发赤斑黄黑。

【方论选录】《金匮玉函经二注》：栀子、香豉皆能治心中懊侬，大黄荡涤实热，枳实破结逐停，去宿积也。

【备考】 本方方名，《外台》引作“栀子枳实豉大黄汤”。

09697 栀子五味汤

【方源】《外台》卷四引《许仁则方》。

【组成】 栀子二十个 柴胡三两 黄芩三两 茵陈三两 芒消六两

【用法】 上切。以水八升，煮四味，取二升六合，去滓，纳芒消搅令消，分三次温服，如人行十里久，更服之效。

【功用】 取利。

【主治】 急黄服麻黄五味汤汗出后，病势未歇，经三五日者。

09698 栀子五物汤

【方源】《活人书》卷十九引《广济方》。

【异名】 栀子五物散（《普济方》卷三三九）。

【组成】 栀子 前胡 知母各二两 黄芩一两 白石膏四两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服抄五钱匕，用水一小盏半，煎至一盏，去滓服。

【主治】 妊娠伤寒，头痛壮热。

09699 栀子升麻汤

【方源】《活人书》卷十七。

【异名】 栀子升麻散（《得效》卷一）。

【组成】 栀子十个（切碎） 升麻一两半 生地黄半斤（切碎用） 柴胡（去芦） 石膏各二两半

【用法】 上锉，如麻豆大。每服抄五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓频服。病不解更作。

【功用】《医学入门》：清肌解热。

【主治】 ①《活人书》：晚发伤寒，三月至夏为晚发。②《医学入门》：兼治温热及虚烦不止。

09700 栀子升麻汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】 茵陈 山栀 黄芩 大黄 柴胡 升麻 龙胆

【用法】 加灯心，用水煎服。

【主治】 发黄，面目悉黄如金，小便浓而少，诸药不效者。

【加减】 人弱大便实，去大黄，加木通，猪苓。

09701 栀子乌梅汤

【方源】《活人书》卷十八。

【组成】 栀子半两 黄芩半两 甘草半两（炙微赤） 柴胡一两 乌梅肉十四个（微炒用）

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏半，生姜三片，竹叶十四片，豉五十粒，煎至七分，去滓温服。

【主治】 伤寒后，虚烦不得眠，心中懊侬。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“乌梅汤”。

09702 栀子六合汤

【方源】《元戎》。

【组成】 四物汤四两 栀子 黄芩各半两

【用法】 上为粗末。水煎服。

【主治】 妊娠伤寒，汗下后，不得眠者。

09703 栀子竹茹汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷四。

【组成】 山栀三钱 陈皮二钱 竹茹一钱半

【用法】 加姜汁，水煎服。

【主治】 胃热干呕。

09704 栀子杏仁汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】 山栀 升麻 黄芩 芍药 石膏 知母 杏仁 柴胡 甘草

【用法】 加豆豉，水煎服。

【主治】 伤寒，壮热疼痛，内外皆热，发斑，谵语发狂。

09705 栀子金花丸

【方源】《宣明论》卷四。

【异名】 既济解毒丸（原书同卷）、金花丸（《活法机要》）、小金花丸（《保命歌括》卷十）、三黄金花丸（《医方集解》）、大金花丸（《保命集》卷中）。

【组成】 黄连 黄柏 黄芩 栀子各半两

【用法】 上为末，滴水为丸，如小豆大。每服二三十丸，新汲水送下。小儿丸如麻子大，每服三五丸。

【主治】 中外诸热，寝汗咬牙，睡语惊悸，溺血淋闭，咳血衄血，瘦弱头痛，骨蒸，肺痿喘嗽。

09706 栀子金花丸

【方源】《中国药典》一部。

【组成】 栀子 116 克 黄连 4.8 克 黄芩 192 克 黄柏 60 克 大黄 116 克 金银花 40 克 知母 40 克 天花粉 60 克

【用法】 粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛为丸。每服 9 克，一日一次。

【功用】 清热泻火，凉血解毒。

【主治】 肺胃热盛，口舌生疮，牙龈肿痛，目赤眩晕，咽喉肿痛，吐血衄血，大便秘结。

【宜忌】 孕妇慎用。

09707 栀子柏皮汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 柏皮汤（《鸡峰》卷十）、柏皮散（《永乐大典》卷一〇三三引《全婴方》）。

【组成】 肥栀子十五个（劈） 甘草一两（炙） 黄柏二两

【用法】 上以水四升，煮取一升半，去滓。分二次温服。

【主治】 ①《伤寒论》：伤寒，身黄发热者。②《鸡峰》：衄血，或从口出，或从鼻出，暴出而色鲜，衄至一二斗，闷绝者。

【方论选录】《温病条辨》：栀子清肌表，解五黄，又治内烦；黄柏泻膀胱，疗肌肤间热；甘草协利内外。三者其色皆黄，以黄退黄，同气相求也。

【备考】《鸡峰》本方用法：为粗末。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

09708 栀子柏皮汤

【方源】《云岐子保命集》卷上。

【组成】 大黄 柏皮各二两 栀子十五个

【用法】 上锉，如麻豆大。每服一两，水三盏，煎服。

【主治】 燥热发黄。

【加减】 发黄，大便自利不止者，加黄连，黄柏皮各三两（生），减大黄。

09709 栀子厚朴汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 栀子十四个（劈） 厚朴四两（炙、去皮） 枳实四个（水浸，炙令黄）

【用法】 以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服。得吐者止后服。

【主治】 伤寒下后，心烦腹满，卧起不安者。

【方论选录】 ①《医学入门》：以山栀之苦，以吐虚烦；枳、朴之苦，以泄腹满。②《伤寒来苏集》：心烦则难卧，腹满则难起，起卧不安，是心移热子胃。栀子以治烦，枳、朴以泄满，此两解心腹之妙剂也。

09710 栀子胜奇散

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 蝉蜕 草决明 川芎 荆芥穗 蒺藜（炒） 谷精草 菊花 防风 羌活 密蒙花 甘草（炙） 蔓荆子 木贼草 山栀子 黄芩各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，食后、临睡热茶清调下。

【主治】 阳跻受邪，内眦生赤脉缕缕，根生瘀肉，瘀肉生黄赤脂，脂横侵黑睛，渐蚀神水，锐眦亦然，俗名攀睛者，并有眵泪，羞涩难开。

【方论选录】 以蝉蜕之咸寒，草决明之咸苦，为味薄者通，通者，通其经络也；川芎、荆芥穗之辛温，白蒺藜、谷精草之苦辛温，菊花之苦甘平，防风之甘辛为臣，为气辛者发热，发热者，升其阳也；羌活之苦甘温，密蒙花之甘微寒，甘草之甘平，蔓荆子之辛微寒为佐，为气薄者发泄，发泄者，清利其诸关节也；以木贼草之甘微苦，山栀子，黄芩之微苦寒为使，为厚味者泄，泄者，攻其壅滞有余也。

09711 栀子清肝汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 牛蒡子 柴胡 川芎 白芍 石膏 当归 山栀 牡丹皮各一钱 黄芩 黄连 甘草各五分

【用法】 上用水二钟，煎八分，食后服。

【主治】 少阳经虚，肝火风热上攻，遂成发疽，

痛连颈项、胸乳、太阳等处，或寒热晡甚，胸满，口苦舌干。

09712 栀子清肝汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 山栀 菖蒲 柴胡 当归 黄芩 黄连 丹皮 甘草 牛蒡子

【用法】 先以生猪脂、地龙、百草霜为末，和葱汁，捏如枣核大，棉包塞耳几日，待软挑出，后服此药。

【主治】 耳聋。因风热搏于耳中津液，结硬成块，壅塞耳窍，气脉不通，致疼痛不止，耳聋。

09713 栀连二陈汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】 陈皮 半夏 白茯苓 甘草 葛根 山栀 川连 竹茹

【主治】 外感胃热兼痰饮之呃逆，脉滑大而数；或内伤痰火上冲之呃逆。

09714 栀连四物汤

【方源】《医林纂要》卷八。

【组成】 四物汤加黄连 栀子各二钱

【主治】 挟暑挟热而经阻，或因怒伤经，血少目暗，或经期伤热，及郁怒气逆，相火并作，血逆上出者。

09715 栀连枳桔汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】 山栀 黄连 桔梗 甘草 青皮 木通 苏梗

【主治】 胸胁里热作痛，气道壅滞，寒热，咳嗽气逆，有汗，脉沉数者。

【备考】 原书用本方治上症，与黄芩泻白散同用。

09716 栀桃枳楂散

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】 山栀 桃仁 枳核 山楂各等分

【用法】 上为末。于砂钵内入姜汁，用水煲起，煎，热服。

【主治】 阳明湿热传入太阳，恶寒发热，小腹连毛际间闷痛不可忍。

【加减】 加吴萸，治食积与瘀血成痛，及冷热不调疝气。

09717 栀豉枳黄汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】 山栀 枳壳 柴胡各一钱 香豉五钱 大黄二钱 （人壮积坚者五钱）

【用法】 水煎，温服。

【主治】 食复发热。

【加减】 如内热，加黄芩；腹胀，加厚朴；伤肉，加山楂；伤面饭，加神曲。

09718 栀子甘草豉汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 栀子豉汤（《千金》卷二十四）、栀子仁散（《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》）、栀子仁汤（《普济方》卷三六九）、栀子豉加甘草汤（《温病条辨》卷二）。

【组成】 栀子十四个（擘） 甘草二两（炙） 香豉四合（绵裹）

【用法】 上以水四升，先煮栀子、甘草，取二升半，纳豉，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服。得吐者止后服。

【主治】 ①《伤寒论》：发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊侬，少气者。②《千金》：石毒，因食宿饭、陈臭肉及羹宿等发者。

09719 栀子生姜豉汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 栀子十四个（劈） 生姜五两 香豉四合（绵裹）

【用法】 上以水四升，先煮栀子、生姜，取二升半，纳豉，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服，得吐者止后服。

【主治】 发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊侬，呕者。

09720 栀子石膏香豉汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】 栀子十六个 石膏四两 香豉一两（绵裹）

【用法】 上用水三升， 先煮二味至二升半，下豉，煮取一升半，去滓，温饮一盏；一法，汤成入雄鼠矢二七枚（末）。

【主治】 伤寒劳复如初，自汗出者，脉浮滑，烦躁甚者。

09721 枸杞丸

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】 苁蓉 枸杞 川椒（取红） 甘菊各等分 巴戟减半。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心酒送下。

【功用】 明目活血。

【主治】 眼目昏暗。

09722 枸杞汤

【方源】《医心方》卷十二引深师方。

【组成】 枸杞根五升（锉皮） 石膏一升 小麦（一方小豆）三升

【用法】 上切。加水至没手，合煮麦熟，汤成去滓，适寒温服之。

【主治】 消渴，唇干口燥。

09723 枸杞汤

【方源】《千金》卷二十一。

【异名】 栝楼根汤（《圣济总录》卷五十八）、栝楼汤（《普济方》卷一七八）。

【组成】 枸杞枝叶一斤 栝楼根 石膏 黄连 甘草各三两

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分五服，日三夜二；剧者多合，渴即饮之。

【主治】 消渴或痈疽。

①《千金》：消渴。②《圣济总录》：发背痈疽，热渴闷乱。③《普济方》：渴而利者。

09724 枸杞汤

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】 枸杞子（炒）半两 赤芍药 山芋 升麻各一两半 蒺藜子（炒） 茯神（去木）各二两 防风（去叉）一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎取七分，加生地黄汁一合，去滓温服，临卧再服。

【主治】 风邪客于睑肤，令眼睑垂缓，甚则眼闭难开。

09725 枸杞汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 枸杞子 肉苁蓉 茯苓各一钱 五味子七分 人参 黄耆 山栀仁 熟地 石枣肉 甘草各五分 生姜一片 灯心一握。

【用法】 早空心温服。

【主治】 肾虚精滑。

09726 枸杞酒

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】 枸杞子二斤 生地黄汁三升

【用法】 上每子十月采枸杞子，先以好酒二升，于瓷瓶内浸二十一日，开封再入地黄汁，不犯生水者，同浸，勿搅之，却以纸三重封头，候至立春前三十日开瓶。空心暖饮一杯。

【功用】 变白轻身，乌髭发。

【主治】 精血虚损。

【宜忌】 忌食芜荑、葱。

09727 枸杞酒

【方源】《医方考》卷三。

【组成】 枸杞子一斗，酒二斗。

【用法】 上同煎，或渍之。随量饮三五杯。

【主治】 肝劳，面目青口苦，精神不守，恐畏不能独卧，目视不明者。

【方论选录】 肝为劳伤，故令目视不明。经曰：味为阴，味厚为阴中之阴。枸杞味厚，故足以养厥阴之阴；煮以纯酒，取其浃洽气血而已。

【备考】 用法项中或渍之及用量，据《增补内经拾遗方论》补。

09728 枸杞粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】 枸杞叶粥（《寿亲养老》卷四）。

【组成】 枸杞叶半斤（切） 粳米二合。

【用法】 上药以豉汁相和，煮作粥，以五味末、葱白等，调和食之。

【功用】《寿世新编》：益肾气。

【主治】 ①《圣惠》：五劳七伤，庶事衰弱。②《寿世新编》：肝家火旺血衰。

09729 枸杞粥

【方源】《长寿药粥谱》。

【组成】 枸杞子 30 克 粳米 60 克

【用法】 上加水适量，煮粥。供早点或晚餐服食，四季均可。

【功用】 补肾益血，养阴明目。

【主治】 中老年人肝肾不足，腰膝酸软，头晕目眩，久视昏暗，以及老年性糖尿病。

【宜忌】 凡脾胃虚弱，经常泄泻的老人忌服。

09730 枸杞煎

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】 枸杞三十斤（锉。叶生至未落，可用茎叶，落而未生可用根）

【用法】 上以水一石，煮取五斗，去滓，将滓更入釜与水依前煮取五斗，并前为一斛，澄之去淀，釜中煎之，取二斗许，更入小铜锅子煎，令连连如饴，或器盛重汤煮更好。每日早朝服一合半，日再服。初服一合，渐渐加之。

【功用】 轻身益气，令人有力；预防痈疽。

【主治】 虚劳。

09731 枸杞羹

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】 枸杞叶一斤 羊肾一对（切） 羊肉（切）三两 葱白七茎（切）

【用法】 上以五味汁煮作臛，空腹食之。

【主治】 虚劳羸瘦。

09732 枸橘汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 枸橘全个 川楝 秦艽 陈皮 防风 泽泻 赤芍 甘草各一钱五分。

【用法】 水煎服。

【主治】 子痈。

09733 枸杞子丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 枸杞子一两 白茯苓一两 黄耆一两（锉） 鸡脞胫两半（微炙） 栝楼根三分 泽泻半两 牡丹半两 山茱萸半两 麦门冬一两半（去心，焙） 牡蛎一两（烧为粉） 桑螵蛸三分（微炒） 车前子三分。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】 消肾，久渴不愈，困乏，小便滑数，心神虚烦。

09734 枸杞子丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】 枸杞子（汤洗） 菊花（拣净） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 桂（去粗皮） 黄耆（涂酥炙，锉） 牛膝（酒浸一宿，焙） 生干地黄（酒浸一宿，焙） 远志（去心） 山芋各二两 柏子仁（酒浸，焙炒） 人参 白茯苓（去黑皮）各一两半。

【用法】 上为末，以浸药酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心用温酒或盐汤送下。

【功用】 平补心肾，延年驻颜。

09735 枸杞子丸

【方源】《直指》卷十七。

【组成】 枸杞 菟丝子（酒浸，研，焙） 白茯苓 黄耆（炙） 牡蛎粉 牛膝 熟地黄（洗） 麦门冬（去心）各一两 鸡内金（微炙）一两半 桑螵蛸 瓜蒌根各三分 山茱萸 牡丹皮各半两。

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前粥饮送下。

【主治】 消肾，久渴困乏，小便滑数。

09736 枸杞子丸

【方源】《明医指掌》卷六。

【异名】 枸杞丸（《仙拈集》卷二）。

【组成】 枸杞子四两 南星二两 半夏二两 黄柏（酒炒）四两 苍术（盐炒）三两 山楂三两（去核） 白芷二两 神曲（炒）二两 滑石（炒）三两 昆布四两 吴茱萸四两。

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】 木肾。

09737 枸杞子酒

【方源】《医心方》卷十二引《极要方》。

【异名】 神仙枸杞子酒（《圣惠》卷九十五）。

【组成】 枸杞子五大升（干者，碎） 生地黄三大升（切） 大麻子五大升（碎）

【用法】 上于甑中蒸麻子使熟，放案上摊去热气，冷暖如人肌，纳地黄，枸杞子相和得所，入绢袋中，以无灰清酒二大斗浸之，春、夏五日，秋、冬七日，取服，任性多少，常使体中微有酒气。

【功用】《寿亲养老新书》：明目驻颜，轻身不老，坚筋骨，耐寒暑。

【主治】 虚羸，黄瘦，不能食。

09738 枸杞子散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 枸杞子一两 五味子三分 覆盆子三分 白芍药三分 白龙骨一两 麦门冬一两（去心，焙）

【用法】 上为细散。每服二钱，以温粥饮调下，不拘时候。

【主治】 虚劳，小便精出，口干心烦。

09739 枸杞叶羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】 枸杞叶三两 青蒿叶一两 葱白一握（去须，切） 豉一合

【用法】 上先以水三大盏，煎豉取汁一盏五分，去豉，下枸杞叶等，煮作羹，调和食之。

【主治】 骨蒸劳，肩背烦疼，头痛，不能下食。

09740 枸杞根汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】 枸杞根 栝楼根 麦门冬（去心，生） 黄连（去须）各一两半 土瓜根（干者） 知母 车前子（去土）各一两。

【用法】 上锉，如麻豆。每服五钱匕，水一盏半，入生地黄半分，切，同煎至八分，去滓温服，一日三次。

【主治】 胃热干渴，饮水不止。

09741 枸杞煎丸

【方源】《遵生八笺》卷六。

【组成】 枸杞子根三十斤（取皮，九蒸九晒）

【用法】 上为粉，取根骨清水煎之，添汤煮，去渣，熬成膏，和上粉为丸，如梧桐子大。每服三五十丸。

【功用】 增寿。

09742 枸杞羊肾粥

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】枸杞叶一斤 羊肾一对（细切） 米三合 葱白十四茎

【用法】上细切，加五味煮粥如常法。空腹食。

【主治】阳气衰，腰脚疼痛，五劳七伤。

09743 枸杞羊肾粥

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】枸杞叶一斤 羊肾一对（细切） 葱白一茎 羊肉半斤（炒）

【用法】上四味拌匀，入五味，煮成汁，下米熬成粥，空腹食之。

【功用】《药粥疗法》：益肾阴，补肾气，壮元阳。

【主治】①《饮膳正要》：阳气衰败，腰脚疼痛，五劳七伤。②《药粥疗法》：肾虚劳损，阳气衰败，腰脊疼痛，腿脚痿弱，头晕脑鸣，听力减退或耳聋，阳萎，尿频或遗尿。

【宜忌】《药粥疗法》：以冬季食用为好，对阳盛发热，或性功能亢进者，不可选用。

【备考】《药粥疗法》本方用法：将新鲜羊肾剖开，洗净，去内膜，细切；再把羊肉洗净，切碎。用枸杞叶煎汁，去滓，同羊肾、羊肉、葱白、粳米一起煮粥，待粥成后，加入细盐少许，稍煮即可。

09744 枸杞还童丸

【方源】《普济方》卷二一八引《德生堂方》。

【组成】茅山苍术一斤（四两酒浸，四两米泔浸，四两盐水浸，四两醋浸，各浸已日，将苍术和合作一处，自初伏一日为始，早晨朝东晒，日午南晒，至晚西晒，夜则露天明放，至伏尽日收起不晒，如遇天阴下雨，收藏至晴明日再晒） 西枸杞子一斤（晒干，另研细用）。

【用法】上为末，和匀，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心枣盐汤或酒送下，或米饮汤下亦可。

【功用】益气延年。

【主治】肝肾俱冷，眼目昏花，饮食少进。

【临证举例】延年 古杭陈鉴，以此常服，年近九十，亲笔传神不减少年；余人服之，咸有效验。

09745 枸杞菖蒲酒

【方源】《千金》卷七。

【组成】枸杞根一百斤 菖蒲五斤

【用法】上细锉，以水四石，煮取一石六斗，去滓，酿二斛米酒熟。稍稍饮之。

【主治】缓急风，四肢不随，行步不正，口急及四体不得屈伸。

09746 枸杞菟丝汤

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】枸杞子 菟丝子 覆盆子 青葙子 熟地 防风 薄荷 玄参 密蒙花 当归 石决明 龙胆草

【用法】上水煎，磨石蟹汁冲入，食后服。

【主治】枣花翳内障。

09747 柳仙散

【方源】《囊秘喉书》卷上。

【组成】薄荷一钱 儿茶八分 青黛五分 川连四分 冰片二分五厘

【用法】先取野蔷薇根煎汤漱口，后吹此药。

【主治】口舌碎痛。

09748 柳华散

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【异名】柳叶散（《保婴撮要》卷十一）。

【组成】黄柏（炒） 蒲黄 青黛 人中白（煅） 各等分

【用法】上为末。敷之。

【主治】热毒口疮。

09749 柳华散

【方源】《医学心悟》卷三。

【异名】柳花散（原书卷六）。

【组成】真青黛 蒲黄（炒） 黄柏（炒） 人中白各一两 冰片三分 硼砂五钱

【用法】上为细末。吹喉。

【主治】喉疮，并口舌生疮，走马牙疳，咽喉肿痛。

09750 柳花散

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】黄柏一两 淀花半两

【用法】上为散。临卧干掺。误咽也不妨。

【主治】口疮。

09751 柳花散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】黄柏（净，末）一两 青黛三钱 肉桂一钱 冰片二分

【用法】上为细末，共再研，瓷罐收贮。每用少许，吹之。

【主治】思烦大甚，多醒少睡，虚火发动，口破色淡，斑白点细，甚者陷露龟纹，脉虚不渴。

09752 柳枝汤

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】羌活 独活 地骨皮 防风（去芦头） 柳枝皮各一两 小椒半两（去目） 苍术八两（拣

净，去粗皮）

【用法】 上为细末，每用二钱，水一盏，入柳枝，黑豆少许，同煎至七分，去滓，食后热漱冷吐，一日三二次。

【主治】 牙根宣露，动摇疼痛。

09753 柳枝膏

【方源】《普济方》卷四〇七。

【组成】 垂柳枝五两 苦参二两 黄芩一两（一方用黄连一两）

【用法】 上为粗末。每用三匙头，以水两碗，煎至一碗，滤去滓，研入好墨半匙头，拌令匀，再熬成膏，以瓷盒盛，候冷。每用少许，涂于疮上。

【主治】 漆疮，四肢壮热。

09754 柳黄散

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】 黄连 黄柏 蒲黄 青黛 硼砂 胡黄连 芒消各等分 冰片少许

【用法】 上为细末。吹之。

【主治】 喉痛，口舌生疮，破烂。

09755 柳枝当归膏

【方源】《东垣试效方》卷三。

【组成】 当归尾（尖细梢，水浸）一两 杏仁（浸，去皮尖）一百个 黄丹（细研，水飞）六两 肥嫩柳枝三两半（切如一寸，水洗净，令干） 肥嫩桃枝一两半（洗净，令干） 芝麻油一斤

【用法】 先令油热，下桃、柳枝熬令半焦。以绵裹当归、杏仁，同熬至桃、柳枝黑焦为度，去药滓，滤油澄净，抹去铫子中滓秽净，再上火令沸，旋旋入黄丹，熬，滴水中不散为度，或只于纸上摊透为度。

【主治】 一切热疮。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“热疮寒膏药”。

09756 柱灵散

【方源】《袖珍》卷二引《圣惠》。

【组成】 良姜（细切，麸炒） 厚朴 五灵脂（明净者）各等分

【用法】 上为细末。热醋调服一钱。立止。

【主治】 心腹大痛，甚危急。

09757 柿灰散

【方源】《本草纲目》卷三十引《叶氏方》。

【组成】 干柿三枚（烧存性）

【用法】 上为末。陈米饮调服。

【主治】 小便血淋。

09758 柿饼丸

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】 棉花核（炒黑，去壳）二两 侧柏叶（炒黑）四两 槐米（炒）一两

【用法】 柿饼蒸烂，捣为丸。每服四五钱，清晨滚汤送下。

【主治】 肠风下血。

09759 柿饼饭

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】 柿饼（切细）

【用法】 杂干饭内，同蒸食。

【主治】 反胃。

【宜忌】 不用水，亦勿以它药杂之。

09760 柿饼粥

【方源】 方出《证类本草》卷二十三引《食疗本草》，名见《长寿药粥谱》。

【组成】 柿（研末） 粳米

【用法】 先以粳米煮粥，欲熟时，下柿末，更煮二三沸。小儿与奶母同食。

【功用】《长寿药粥谱》：健脾润肺，涩肠止血。

【主治】 ①《证类本草》引《食疗本草》：小儿秋痢。②《长寿药粥谱》：老人吐血，干咳带血，久痢便血，痔漏下血等出血病证。

【宜忌】《长寿药粥谱》：有胃寒病的老人忌服；忌食螃蟹。

【备考】《长寿药粥谱》本方用柿饼二三枚。

09761 柿钱散

【方源】 方出《证类本草》卷十二引《简要济众方》，名见《洁古家珍》。

【组成】 丁香一两 干柿蒂一两（焙干）

【用法】 上为散。每服一钱，煎人参汤下，不拘时候。

【主治】 伤寒咳嗽不止，及哕逆不定。

09762 柿蒂汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】 柿蒂 黄柏 黄连 生地 侧柏叶 丹皮 白芍 木通 茯苓 泽泻

【用法】 水煎服。

【主治】 心与小肠实热而致血淋，血色鲜红，脉数而有力。

09763 柿蒂散

【方源】《奇效良方》卷三十五。

【组成】 干柿蒂（烧存性）

【用法】 上为末。每服二钱，空心米饮调下。

【主治】 血淋。

09764 柽叶散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【异名】独圣散(《麻科活人》卷二)。

【组成】西河柳

【用法】青茂时采叶，晒干，为末。每服一二钱，茅根煎汤调下。

【主治】发热六七日以后，明是疹子却不见出者。

09765 桎叶葛根汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】西河柳 前胡 葛根 荆芥穗 贝母 元参 知母 麦冬 甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻疹，邪热壅于肺，发热而喘者。

【备考】原书用本方治上症，去甘草。

09766 故纸散

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】破故纸

【用法】炒，为末。每服一钱，热汤调下。

【主治】小儿遗尿。

09767 胡桃丸

【方源】《三因》卷十。

【组成】白茯苓 胡桃肉（汤去薄皮，别研）附子（大者）一枚（去皮脐，切作片，生姜汁一盏，蛤粉一分，同煮干焙）各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，米饮送下；或为散，以米饮调下，食前服。

【主治】肾消，亦云内消。多因快情纵欲，极意房中；年少惧不能房，多服丹石及失志伤肾，遂致唇口干焦，精溢自出，或小便赤黄，五色浮浊，大便燥实，小便大利而不甚渴。

09768 胡桃丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】乳香 沉香 木香 母丁香 大茴香 干姜 杜仲（姜汁炒去丝） 没药 菟丝子（酒制） 破故纸（酒炒）各等分 胡桃四个（去壳）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。黄酒送下。

【主治】腰痛。

09769 胡粉散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】胡粉一分（炒令黄） 黄连半两（末）

【用法】上药细研令匀。敷于疮上。

【主治】小儿燕口生疮。

09770 胡粉散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】杭粉一两 轻粉 石膏（煅） 蛤粉各三钱

【用法】上为极细末。将泡挑破，揩干掺之；或用丝瓜叶捣汁调搽亦好；如冬月无此，用染布青缸汁调搽。

【主治】天泡红肿发热，急胀疼痛。

09771 胡粉膏

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】胡粉（炒） 白矾（烧令汁尽）各等分

【用法】上为末，用青羊脂和成膏。以少许涂敷括肉上。

【主治】鼻中痤肉不通。

09772 胡麻丸

【方源】《幼科发挥》卷上。

【组成】胡麻仁（炒） 苦参 甘菊花 大力子（炒） 石菖蒲 何首乌 威灵仙 蔓荆子 乌梢蛇（酒浸，去皮骨，取肉焙干）各等分

【用法】上为末，酒为丸，如麻子大。竹叶汤下。

【主治】小儿疥癣。

09773 胡麻丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】大胡麻四两 防风 威灵仙 石菖蒲 苦参各二两 白附子 独活各一两 甘草五钱

【用法】上为细末，新安酒浆跌成丸子。每服二钱，形瘦者一钱五分，食后、临卧，白滚汤送下。

【主治】①《外科正宗》：癜风初起皮肤作痒，后发癜风，渐至开大者，②《麻科活人》：风热瘾疹，及疹后瘙痒生疮，日久不愈。

【宜忌】忌动风发物、海腥、煎炒、鸡、鹅、羊肉、火酒等件，愈后戒百日。

09774 胡麻散

【方源】《普济方》卷五十引《博济》。

【组成】胡麻子三两（轻燃） 何首乌三两 蔓荆子一两 威灵仙一两 九节菖蒲一两 苦参一两 荆芥穗 菊花 沙苑白蒺藜 鼠粘子（炒）各一两

【用法】上药洗净控干。如治大风，每服一钱，薄荷茶、酒任下，日五七服，不拘时候。如才觉便服，半月见效；如已患年岁，须服一月，方始见功，及五十日可减一半，服及百日其须发自生；如治皮肤风疾，瘙痒疥癣之类，即入下四味，与前六味为末，以薄荷自然汁和酒调下一钱；若肾脏风攻注，亦宜服之。如吃此药至三五日，须频暖浴，令其汗出也。

【主治】 五癞，头面遍身生赤黑，麻木，鼻内闻腥秽，须发退落。

09775 胡麻散

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】 胡麻子 白茯苓（去黑皮） 生干地黄（焙） 天门冬（去心，焙）各八两

【用法】 上为细散。每服方寸匕，食后温水调下。

【功用】 益寿延年，去客热。

09776 胡麻散

【方源】《局方》卷一（续添诸局经验秘方）。

【组成】 胡麻十二两 苦参 荆芥各八两 甘草（炙） 威灵仙各六两 何首乌（洗，焙）十两

【用法】 上为细末。每服二钱，食后薄荷茶点服；或酒调、或蜜汤点亦得。服此药后，频频洗浴，贵得汗出。

【主治】 脾肺风毒攻冲，遍身皮肤瘙痒，或生疮疥，或生瘾疹，用手搔时，浸淫成疮，久而不瘥，愈而复作；面上游风，或如虫行，紫癜白癜，顽麻等风；或肾脏风，攻注脚膝生疮。

09777 胡椒汤

【方源】《局方》卷十（宝庆新增方）。

【组成】 红豆 肉桂（不见火）各一两 胡椒六两 干姜（焙）三两 桔梗（焙）三十两 甘草（炒）七两

【用法】 上为细末。每服一大钱，入盐少许，沸汤点服，不拘时候。

【功用】 温暖脾胃，去寒顺气。

【主治】 脾胃受寒，胸膈不利，心腹疼痛，呕逆恶心。

09778 胡蜂酒

【方源】《中国药典》一部。

【组成】 胡蜂（鲜者）099克 白酒0990毫升

【用法】 胡蜂入酒浸泡15天，滤过。每服15～25毫升，一日二次。

【功用】 祛风除湿。

【主治】 急性风湿病，风湿性关节炎。

【备考】 服后偶有皮肤瘙痒，次日可自行消失。

09779 胡芦巴丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】 胡芦巴（微炒） 巴戟天（紫者，去心，炒） 肉苁蓉（酒浸，切，焙）各二两 楝实（去皮、醋浸一宿，焙） 桂（去粗皮） 补骨脂（炒） 蛇床子（酒浸一宿，焙） 牛膝（酒浸一宿，切，焙）各一两 蓬莪术（醋浸一宿，煨，锉）三分 附子（炮裂，去皮脐） 茴香子（炒）各一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大。常服二十丸，空心炒盐生姜汤送下；酒下亦得。

【主治】 肾气虚损，阳气痿弱。

09780 胡芦巴丸

【方源】《直指》卷十八。

【组成】 胡芦巴（炒） 川楝子（蒸，去皮核，焙）各四两 川乌（炮，去皮脐） 大巴戟（去心）各一两半 茴香（炒）三两 吴茱萸（半酒半醋浸一宿，焙干）二两半 牵牛（炒，取末）二两

【用法】 上为末，酒面稀糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【主治】 肾经虚冷，膀胱气痛，或阴肿偏坠，或小腹有物如卵，上下走痛。

09781 胡芦巴丸

【方源】《局方》卷八（续添诸局经验秘方）。

【组成】 胡芦巴（炒）一斤 吴茱萸（汤洗十次，炒）十两 川楝子（炒）一斤二两 大巴戟（去心，炒） 川乌（炮，去皮脐）各六两 茴香（淘去土，炒）十二两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心用温酒吞下；小儿五丸，茴香汤下。

【主治】 大人、小儿小肠气，蟠肠气，奔豚气，疝气，偏坠阴肿，小腹有形如卵，上下来去，痛不可忍，或绞结绕脐攻刺，呕恶闷乱。

09782 胡芦巴散

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】 胡芦巴 补骨脂（炒）各二两 荜茇 荜澄茄 茴香子（炒） 木香 丁香 楝实 桂（去粗皮） 槟榔 巴戟天（去心） 京三棱（微锉） 青橘皮（汤浸，去白焙） 附子（炮裂，去皮脐） 枳壳（去瓤麸炒）各一两

【用法】 上为散。每服二钱匕，水、酒共一盏，同煎三五沸，温服；如作丸，用酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心盐汤送下。

【主治】 肾脏虚惫，腰膝疼，小肠膀胱等气攻冲。

09783 胡桐泪散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】 胡桐泪一分 川升麻一分 白矾灰一分 细辛 独活 麝香（细研） 当归 附子（炮裂，去皮脐） 白芷各半分

【用法】 上为细散。夜临卧时，先揩齿，漱口令净，用少许贴之。

【功用】 牢牙定痛。

【主治】 齿痛。

09784 胡桐泪散

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】 松节一两 细辛半两 胡桐泪一两 蜀椒一分（去目及闭口者，微炒）

【用法】 上为散。分五次用，每次以酒二盏，煎十余沸，去滓，热含冷吐。

【主治】 骨槽风痛，龈肿齿疏。

09785 胡桐律散

【方源】《御药院方》卷九。

【异名】 胡桐泪散（《金鉴》卷六十五）。

【组成】 胡桐律 川芎 细辛 白芷各半两 生地黄一两 青盐二钱半（研） 寒水石（烧通赤，出火毒）二两

【用法】 上为细末。每用涂贴患处，吐津，误咽不妨，无时，日用五七次。

【主治】 齿龈肿闷，宣露血出。

09786 胡萝卜粥

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】 胡萝卜 粳米

【功用】 ①《本草纲目》：宽中下气。②《长寿药粥谱》：健胃，补脾，助消化。

【主治】《长寿药粥谱》：老人食欲不振或消化不良，皮肤干燥症、夜盲、以及高血压、糖尿病等。

【备考】《长寿药粥谱》本方用胡萝卜适量，粳米半斤，将胡萝卜切碎，同粳米煮粥，作早晚餐。

09787 胡黄连丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】 胡黄连半两 黄连（去须） 白芜荑仁各一两 木香半两

【用法】 上为细末，猪胆和于盏内，坐饭甑中蒸两度，为丸如粟米大。每服二十丸，米饮下。

【主治】 小儿干疳，饮食如常，肌体羸瘦，时作寒热，皮毛枯焦，嘿嘿不慧。

09788 胡黄连丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】 使君子仁二两 丁香 木香 厚朴（去粗皮，姜汁浸一宿，炒紫色） 胡黄连 肉豆蔻（面裹煨熟） 没石子各一两 芦荟一分（别研）

【用法】 上为细末，次入研者药和匀，煮粟米饮为丸，如黍米大。每服二十丸，乳食前橘皮汤送下。

【主治】 小儿脾疳，虽能饮食，不生肌肉，或时下利，小便白浊。

09789 胡黄连丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】 胡黄连五分 阿魏一钱半（醋浸） 神曲二钱 麝香四粒 炒黄连二钱

【用法】 上为末，猪胆汁为丸，如黍米大。每服二三十丸，白术汤送下。

【主治】 疳病腹大。

【方论选录】 方中胡黄连去果子积；阿魏去肉积；神曲去食积；炒黄连去热积。

09790 胡黄连散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】 胡黄连一两 人参三分（去芦头） 赤茯苓一两半 柴胡一两半（去苗） 鳖甲一两半（涂醋炙令微黄，去裙襕） 梔子仁三分 麦门冬一两半（去心，焙） 赤芍药三分 甘草半两（炙微赤，锉） 桔梗一两（去芦头） 槟榔半两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以童子小便一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 虚劳骨热，四肢烦疼，口干心躁。

【宜忌】 忌苋菜。

09791 胡黄连散

【方源】《卫生宝鉴》卷十一引麻孝卿方。

【组成】 胡黄连五分 细辛 宣黄连各三钱 藿香一钱

【用法】 上为末。每用半钱，干掺口内，漱千漱吐之。

【主治】 口糜。

09792 胡椒馄饨

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】 胡椒 干姜（炮）各半两 诃梨勒皮四个

【用法】 上为末，取精羊肉四两，细切和药，以面裹作小馄饨子，煮熟，空腹食之。以饱为度。

【主治】 气痢。

09793 胡连追毒丸

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 胡黄连一两（切片，姜汁拌炒） 麝香二分 刺猬皮一两（炙，切片，再炒黄为末）

【用法】 上为细末，软饭为丸，如麻子大。每服一钱，食前酒服。服药后，脓水反多，是药力到也，勿惧。

【功用】 ①《外科正宗》：追脓毒。②《北京市中药成方选集》：消肿解毒，清热化痔。

【主治】 痔漏不拘远年近日，有漏通肠，污从孔

出者。

【宜忌】《北京市中药成方选集》：忌辛辣食物。

09794 胡椒理中丸

【方源】《外台》卷九引《古今录验》。

【组成】胡椒 荜茇 干姜 款冬花 甘草（炙） 橘皮 高良姜 细辛各四两 白术五两

【用法】上为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服五丸，一日二次。

【主治】①《外台》引《古今录验》：咳嗽逆气，不能饮食，短气。②《局方》：肺胃虚寒，气不宣通，咳嗽喘急，逆气虚痞，胸膈噎闷，腹胁满痛，迫塞短气，不能饮食，呕吐痰水不止。

【宜忌】忌桃李、雀肉、生菜、海藻、菘菜。

09795 封囟散

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】柏子仁（炒） 细辛（去苗叶） 防风（去叉） 白及各一两 草乌头（炮）半两

【用法】上为细散。乳汁调涂囟开处。

【主治】小儿解颅，囟门开解。

09796 封脐散

【方源】《普济方》卷三六五引《卫生家宝》。

【组成】细辛不拘多少

【用法】上为末。以醋调，涂脐上。

【主治】小儿口疮。

09797 封脐散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】生南星

【用法】上为末。封脐。不可再见风。

【主治】小儿脐风撮口。

09798 封脐膏

【方源】《宋氏女科》。

【组成】五倍子不拘多少

【用法】上为末。津吐调匀，填脐内，封固，用绵缚之。

【主治】产后虚汗不止。

09799 封髓丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】黄柏三两 缩砂仁一两半 甘草二两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前用苁蓉半两切作片子，酒一大盏，浸一宿，次日煎三四沸，去滓服。

【功用】降心火，益肾水。

【主治】虚损。

09800 荆防方

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】荆芥穗二钱 防风二钱 僵蚕二钱 金银花四钱 牛蒡子三钱 丹皮三钱 紫背浮萍二钱 干地黄三钱 薄荷一钱半 黄芩三钱 蝉蜕一钱半 生甘草二钱

【功用】疏风解表，清热止痒。

【主治】急性荨麻疹，血管神经性水肿。

【加减】恶寒重，发热轻，风团皮损偏白者，去薄荷，重用荆芥，加干姜皮；兼吐泻、腹痛者，加周氏回生丹，每次7～10粒。

【方论选录】以荆芥、防风、薄荷、蝉衣为主药。荆芥驱散气分风邪；防风散骨肉之风；薄荷清轻凉散，解风热之邪，又可疏表透疹解毒；蝉衣凉散风热，开宣肺窍；牛蒡子疏散风热，解毒透疹；浮萍升散开窍；僵蚕祛风散结；银花、黄芩解毒清肺热；丹皮、干生地理血和血；生甘草解毒，调和诸药。

09801 荆防汤

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】防风 荆芥 生地 枳壳 葛根各一钱 细辛三分 蔓荆子七分（焙，研） 黄柏五分（酒炒黑）

【用法】水煎服。

【主治】外感风寒，齿痛寒热。

09802 荆防散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】荆芥一两半 防风一两半 米仁五两（炒） 通草四两 川芎八钱 茯苓三两 陈皮一两半 香附一两半（醋炒） 紫苏一两半

【用法】上为散。每服三钱，生姜皮汤送下。

【主治】产后离褥太早，冒风致湿，经络不能流通，遍体浮肿，脉浮涩者。

【方论选录】荆芥理血疏风，防风疏风燥湿，米仁健脾气以渗周身之湿，紫苏理血气以泄遍体之风，川芎入血海行血滞；香附调气海行气滞；通草利湿通肺气；茯苓渗湿和脾气；陈皮利中气调胃气。为散姜皮汤下，使风邪和解，则经络清和，脾胃健运，湿无不化，何遍身浮肿有不退乎。

09803 荆芥汤

【方源】《三因》卷十六。

【异名】甘桔汤（《易简方》）、三神汤（《医方类聚》卷七十四引《济生》）、荆芥散（《医方类聚》卷七十四引《澹寮方》）。

【组成】荆芥穗半两 桔梗二两 甘草一两

【用法】上为散。每服四钱，水一盏，加生姜三片，煎至六分，去滓温服。

【主治】 风热壅肺，咽喉肿痛，语声不出，喉中如有物哽，咽之则痛甚。

09804 荆芥汤

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】 荆芥 脑荷 升麻 细辛各等分

【用法】 上为末。每服二钱，以沸汤点，漱口含咽，并擦牙。

【主治】 风热齿痛。

09805 荆芥散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】 荆芥一两 牛蒡子三分（微炒） 蔓荆子半两 天麻半两 人参半两（去芦头） 黄芩三分 防风半两（去芦头） 乌蛇肉二两（酒浸，微炒） 独活半两 赤茯苓一两 苦参一两（锉） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】 上为细散。每服二钱，用温酒调下，不拘时候。

【主治】 风热皮肤瘙痒，生痞瘤。

09806 荆芥散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】 荆芥穗 薄荷叶（去土） 细辛（去叶土） 甘草（炙）各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，茶调下；或用药五钱，水一大碗，煎三五沸，通口慢慢盥漱亦得。

【主治】 风虫牙痛，牙槽浮肿。

09807 荆芥散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 生地五钱（炒炭） 荆芥五钱（炒灰） 白芍一钱半（醋炒） 白术一钱半（炒炭） 当归三钱（醋炒） 木香一钱 茯苓一钱半 血余灰三钱 败棕灰三钱 荷叶三钱（炒黑）

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 劳伤挟风邪而冲任不调，经血失守，崩漏腹痛，脉弦浮数者。

【加减】 血热，加丹皮灰；血滞，加延胡灰；血中气滞，加香附炭（醋炒）；血气虚脱，加赤石脂（醋煅）；咳嗽，加桑皮；气虚，加人参；阴血虚，加阿胶珠（蒲黄灰炒），胃中寒，加炮姜炭（淡盐水炒）。

【方论选录】 生地炭凉血滋血，兼去血中之湿以止血；荆芥灰和血疏风，能去经络之湿以抚血；当归身养血归经；白芍药敛阴和血；白术炭健脾燥湿；广木香调气醒脾；血余灰去瘀生新以除漏；败棕灰涩血固经以定崩；白茯苓渗湿和脾；荷叶灰升阳止血。血热加丹皮灰以凉血止血；血滞加醋炒香附炭，以调血中之气，亦兼止血；血气滑脱，加醋煅赤石脂，以涩滑脱之血，最能固下；咳嗽加桑皮以肃金气；虚加人参以扶元阴；血虚加阿胶以补任脉之阴，蒲黄灰炒以止冲脉之血；胃中寒加炮姜以缓中宫之冷，淡盐水炒以摄虚阳之动，且能坚肾以固冲任之虚脱也。

09808 荆枳汤

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】 荆芥穗 枳壳（炒） 槐花 香附 紫苏茎叶 甘草（炙）各等分

【用法】 上为末。每服二钱，米汤调下。

【主治】 气滞发痔。

09809 荆黄汤

【方源】《医方大成》卷七引《局方》。

【组成】 荆芥四两 大黄一两。

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏，煎六分，空心服。

【主治】 ①《医方大成》引《局方》：风热结滞，或生疮疖；风热上壅，脏腑实热，咽喉肿痛，大便秘结。②《得效》：恶疮生背胁、头脑、四肢要害处。

【宜忌】 非实热不可服。

09810 荆黄散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】 麻黄（去根节）一分 细辛（去叶土） 全蝎（去毒，炒） 藿香叶各半两

【用法】 上为细末。每服一钱，荆芥汤调下，不拘时候。

【主治】 偏正头疼，及洗头伤风。

09811 荆防化瘀汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 荆芥 9 克 防风 9 克 白芷 9 克 白鲜皮 15 克 炒牛蒡子 9 克 苦参 12 克 蝉蜕 9 克 地肤子 9 克 茯苓 6 克 甘草 9 克

【用法】 水煎，内服。

【主治】 荨麻疹。

09812 荆防牛蒡汤

【方源】《金鉴》卷六十六。

【组成】 荆芥 防风 牛蒡子（炒，研） 金银花 陈皮 花粉 黄芩 蒲公英 连翘（去心） 皂刺各一钱 柴胡 香附子 甘草（生）各五分

【用法】 上用水二钟，煎至八分，食远服。

【主治】 外吹乳初起。因乳母肝胃气浊，更兼子吮乳睡熟，鼻孔凉气袭入乳房，与热乳凝结，以致乳房肿痛，寒热往来，烦躁口渴者。

09813 荆防败毒散

【方源】《医学正传》卷八。

【异名】 消风败毒散(《医学六要·治法汇》卷五)。

【组成】 柴胡 甘草 人参 桔梗 川芎 茯苓 枳壳 前胡 羌活 独活 荆芥穗 防风各四分

【用法】 上细切，作一服。用水一盏，煎至七分，温服；或加薄荷五叶。

【功用】 ①《景岳全书》：发散痘疹。②《金鉴》：疏解寒热。

【主治】 痈疽疮疡初起，发热，脉浮数，及水肿邪在表者。

①《医学正传》：伤寒温毒发斑重者。②《外科理例·附方》：一切疮疡时毒，肿痛发热，左手脉浮数者。③《景岳全书》：痘疹，及时气风毒邪热。④《法律》：风水、皮水，凡在表宜从汗解者。⑤《医方集解》：肠风下血清鲜者。⑥《金鉴》：脑疽、甘疽、赤白游风、疥疮初起有表证，虚者。

【临证举例】 耳目赤肿 《准绳·疡医》：一人耳面赤肿作痛，咽干发热，脉浮数。先以荆防败毒散二剂，势退大半，又以葛根牛蒡子汤四剂而痊。

【备考】《医学六要·治法汇》有生姜三片。

09814 荆防败毒散

【方源】《摄生众妙方》卷八。

【组成】 羌活 独活 柴胡 前胡 枳壳 茯苓 防风 荆芥 桔梗 川芎各一钱五分 甘草五分

【用法】 上用水一钟半，煎至八分，温服。

【主治】 ①《摄生众妙方》：疮肿初起。②《金鉴》：血风，遍身瘙痒之疹；风温汗少者；及痘夹斑，毒火郁遏，伤于阴血，血热相搏，浮游之火散布皮肤之间，与痘相类而出，片片如云头突起者。

【临证举例】 接触性皮炎 《吉林中医药》(1986；2:28)：李某某，男，35岁。因搬运六六粉，出现头面皮肤瘙痒，灼热，搔后出现米粒或黄豆大小皮疹，一天后遍及上半身，并渗出黄水，伴恶寒发热，心烦，经治而愈。五个月后上症复发，面额、背部出现李子大脓疮，红肿焮痛，用抗生素、激素类药均无效。舌质稍红，苔厚白、脉浮。用上方加土茯苓煎汤内服，外用苍耳草、苦参、蛇床子煎汤熏洗，日二三次，十七剂后症状全愈。九年后随访未复发。

09815 荆防败毒散

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】 荆芥一两半 防风一两半 桔梗八钱 枳壳一两半(炒) 茯苓一两半 大力子三两(炒) 蝉衣一两半 橘红一两半 甘草八钱

【用法】 上为散。每服三钱，水煎，去滓温服。取汗。

【功用】 散风清膈。

【主治】 风毒内攻，清肃之气不行，故耳窍被扰，耳内作痒，脉浮数者。

【方论选录】 荆芥散血分之风；防风散气分之风；桔梗清利咽膈以清耳窍；枳壳破滞化气以平逆气；茯苓清治节，甘草和中气，大力子疏风解热，广橘红利气除痰，净蝉衣轻扬解散，善蜕皮肤，肃清耳窍，耳痒有不退者乎。

09816 荆防败毒散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 荆芥 粉草 连翘 川芎 羌活 独活 五加皮各七分 角刺 穿山甲(炒) 归尾 防风 苍术 酒防己 地骨皮各一钱 白鲜皮 金银花各一钱二分 土茯苓一两

【用法】 水煎，加酒，食后服。

【主治】 耳后忽然肿痛，兼发寒热表证者，及杨梅疮初发者。

09817 荆防败毒散

【方源】《白喉全生集》。

【组成】 防风三钱(去芦) 柴胡(去芦) 僵蚕(姜汁炒) 法夏(姜汁炒) 桔梗 前胡 独活各二钱 荆芥 羌活 银花各一钱五分 枳壳 粉草各一钱 生姜三片

【用法】 水煎服。

【主治】 白喉初起，白见于关内或关外，色必明润而平，满喉淡红微肿略痛，头痛，恶寒发热，饮食如常，舌苔白，二便和，寒邪尚在表者。

09818 荆防泻白散

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【异名】 荆防泻白汤。

【组成】 荆芥 防风 连翘 桔梗 金银花 元参 赤芍 甘草 生地 黄芩 桑皮 青黛 葛花

【主治】 肺伤风热，鼻流浊涕。

09819 荆防葛根汤

【方源】《烂喉丹痧》。

【组成】 葛根一钱半或一钱 牛蒡子三钱 桔梗一钱半 炒荆芥一钱半 枳壳一钱 白杏仁(去皮尖)三钱(便溏者勿研) 生甘草四分 上贝三钱(去心，研) 炒防风一钱半 浮萍草二钱

【主治】 时令平和时之烂喉丹痧，初起发热者。

【备考】 防风、荆芥不炒亦可。

09820 荆防解毒汤

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】薄荷叶　连翘（去心）　荆芥穗　防风　黄芩　黄连　牛蒡子（炒，研）　人青叶　犀角　人中黄

【用法】用灯心、芦根为引，水煎服。

【主治】麻疹见形三日之后，因调摄不谨，或为风寒所袭，或为邪秽所触，以致毒反内攻，一二日疹即收没，轻则烦渴谵狂，重则神昏闷乱者。

09821　荆芥四物汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地五钱　荆芥一钱半（炒黑）　白芍一钱半（炒）　当归三钱（酷炒）　条芩一钱半（炒黑）　川芎一钱　香附一钱半（童便制）　地榆二钱（炒黑）

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】风热伤于冲任经气，洋溢不能摄血，而血不归经，故经漏不止，脉浮数者。

【方论选录】方中生地滋阴凉血，当归养血归经，川芎入血海以升阳，白芍敛营阴以止血，条芩清在里风热，荆芥散血中风邪，香附调气解郁，地榆凉血涩血。水煎温服，使风热外解，则经气清和而血无妄行之患，何经漏之不止哉。

09822　荆芥蝉蜕汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】荆芥9克　蝉蜕9克　银花9～15克　川柏9克　茯苓9克　丹皮9克　白蒺9克　赤芍9克

【用法】水煎，内服。

【主治】慢性湿疹。

【加减】多量鳞屑，加当归、生地、首乌以养血润燥；皮色鲜红，加龙胆草、山栀、黄芩黄连以清热；便秘者，加大黄泻火。

09823　荆穗四物汤

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】当归　川芎　白芍　熟地黄　荆芥穗

【主治】血虚头晕。

09824　南附汤

【方源】《续易简》卷五。

【组成】天南星　生附子各一钱　全蝎三个或一只（不剪）

【用法】上锉散，作一剂，水一大盏，生姜七片，煎至半盏去滓，逐旋温服，不拘时候。

【主治】①《续易简方论》：慢脾风。小儿泄泻，虚脱生风，及服冷药过多者。②《得效》：小儿阴证惊痫，体冷强直，手足微动，昏睡不醒，口噤涎流，或声或嘿。

09825　南荆散

【方源】《朱氏集验方》卷九引定斋霍喆夫方。

【组成】南星一个（重一两）　荆芥穗半两

【用法】上将南星切片，用生姜自然汁淹一夜，次早捣为饼，新瓦上焙干微黄，同荆芥为末。每服二钱，入修仁茶少许调服，如无修仁，建茶亦得。

【主治】头风。

09826　南星丸

【方源】《普济方》卷四十六引《海上方》。

【组成】天南星大者一个　全蝎一对　川芎二两　人参　藁本各半两　龙脑二钱　防风一两

【用法】上为末，以蒸饼一个，水浸一宿，去皮搜和药末为丸，如鹅眼大。每服三丸食前茶清送下。入薄荷尤佳。

【主治】头风。

09827　南星散

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】天南星（大者）一个（开一坑，人朱砂半两，用酒塞坑内，于慢火煨制）　白及半两

【用法】上为末，令匀。淡醋调，涂囟上，以绢片隔，用慢火炙手，频频熨之。得效自升，如此六七次方见效。

【主治】小儿解颅；百日孩儿鼻塞不乳。

09828　南星膏

【方源】《疡科选粹》卷一。

【组成】五倍子一两（炒）　南星　草乌　黄柏　白及各二两

【用法】上为末，醋调如糊。随肿处渐渐围，逐至不险处。

【主治】疮疽毒发险处。

09829　南木香膏

【方源】《医统》卷六十二。

【组成】南木香　川当归　川芎　通草　细辛　蕤仁（去壳）　白芷各等分

【用法】上㕮咀，和羊髓熬白芷色黄，去滓为丸，如豆大。每用一粒，塞鼻内。立通。

【主治】鼻塞不利。

09830　南岳草熨丹

【方源】《魏氏家藏方》卷一引宋谦之方。

【组成】草乌头二两（去皮尖，炒）　全蝎（去毒）　地龙（去土）　白僵蚕（直者，炒，去丝）　穿山甲（炒）　木鳖子（去壳）　乳香（别研）　没药（别研）　天仙子　五灵脂（别研）　斑蝥（去头足翅，炒）　赤脚蜈蚣各半两

【用法】 上为细末，米醋糊为丸，如梧桐子大，朱砂、麝香为衣。每服五丸，空心、食前温酒送下；妇人用淡醋汤送下。

【主治】 头风。

09831 南星半夏散

【方源】《医学从众录》卷八。

【组成】 南星 半夏 皂角（去皮弦子，炒黄） 五倍子（去窠虫，炒黄）各等分

【用法】 研极细末。米醋调敷。一宿立效。

【主治】 吹奶，乳痈。

09832 茸朱丹

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生续方》。

【组成】 鹿茸（去毛，酒蒸）一两 朱砂半两（细研，水飞，蜜炒尤佳）

【用法】 上为细末，煮枣圈肉为丸，如梧桐子大。每服四十丸，午前、临卧炒酸枣仁煎汤送下。

【主治】 心虚血少，神志不宁，惊悸恍惚，夜多异梦，睡卧不安。

09833 茸附汤

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生续方》

【组成】 鹿茸（去毛，酒蒸）一两 附子（炮，去皮脐）一两

【用法】 上㕮咀，分作四服。水二盏，生姜十片，煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】 精血俱虚，荣卫耗损，潮热自汗，怔忡惊悸，肢体倦乏，但是一切虚弱之证。

09834 茸香丸

【方源】《直指》卷十五。

【组成】 鹿茸（酥炙） 肉苁蓉（酒浸，焙） 当归各半两 鸡内金七钱半（微炙） 龙骨 牡蛎灰 赤石脂 禹余粮（煅，醋淬，碎为度，各研细） 川白姜 益智仁 巴戟 乳香各二两半

【用法】 上为细末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】 下焦虚冷，尿多，或虚劳遗尿，或欲出而不禁。

09835 茸菟丸

【方源】《普济方》卷三十三引《经验方》。

【异名】 茸菟丹（《医方类聚》卷一三四引《经验良方》）。

【组成】 鹿茸 肉苁蓉 干地黄 萆薢 杜仲 五味子 白茯苓各二两 木瓜一两 巴戟 枸杞子 川牛膝 补骨脂 青盐各二两 菟丝子 金铃子各五两 莲肉八两

【用法】 上为末，酒煮山药末糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心、温酒或盐汤送下。

【主治】 心肾不交，小便滑数，精神耗散，腰脚无力。

09836 茸附益肾丸

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】 鹿茸一两（炙） 沉香二钱半 天雄半两（炮） 鹿角霜半两 家韭子半两（酒浸） 青盐半两 茴香半两（盐炒） 桑螵蛸一两（炒） 牡蛎粉半两 白石脂一两 鹿角胶一两（炒）

【用法】 上为细末，酒糊为丸。每服五十丸，空心温酒送下。

【主治】 易泄易衰。

09837 茸桂百补丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 鹿茸 肉桂各三两 党参 首乌丝子 杜仲各四两 熟地八两 川断 於术茯苓 萸肉 泽泻 牛膝 归身 白芍 楮实子 戟肉 苁蓉各三两 杞子 淡附子各二两 甘草一两五钱

【用法】 蜜丸。

【功用】 添精补髓，悦颜多嗣。

【主治】 元阳不振，督肾虚损，脾胃虚弱，阳痿精冷，筋骨痿软，血脉不充者。

09838 茜根汤

【方源】《幼幼新书》卷二十九引张涣方。

【组成】 茜根（锉） 地榆（锉） 黄连（去须） 赤石脂 阿胶（炙熟）各一两 甘草（炙） 黄柏各半两

【用法】 上为细末。每服一钱 水八分，煎至五分，去滓，放温服。

【主治】 血痢不愈。

09839 茜根散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】 茜根草 黄芩 侧柏叶 阿胶（杵碎，炒令黄燥） 甘草（锉，生用）各一两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生地黄半两，煎至六分，去滓，温服之。

【主治】 鼻衄，终日不止，心神烦闷。

09840 茜根散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】 茜根二两（锉） 白芍药三两 麦门冬三两（去心） 鸡苏叶四两 小蓟根三两 青竹茹四两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入生地黄汁一合，搅令匀，温服，不拘时候。

【主治】 吐血不止，心胸烦热。

09841 茜根散

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】 茜根 贯众 槐花（陈者） 椿根（锉） 甘草（炙，锉）各等分

【用法】 上为散。每服一钱匕，食前米饮调下，一日二次。

【主治】 血痢。

09842 茜梅丸

【方源】《本事》卷五。

【组成】 茜草根 艾叶各一两 乌梅肉（焙干）半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，乌梅汤送下。

【功用】《古今名方》凉血，行血，止血。

【主治】 衄血无时。

【方论选录】《本事方释义》：茜草根气味苦寒平微涩，入手足厥阴；艾叶气味苦微温，入足太阴少阴厥阴；乌梅肉气味酸平，入足厥阴；血热妄行而衄血无时，乃阳胜阴也，厥阳上逆无制，以苦辛酸泄之，则阳气下行，而病自缓矣。

【临证举例】 衄血 鞠运若茂之尝苦此疾，予授此方。令服后愈。

09843 茂芝丸

【方源】 方出《准绳·女科》卷四引朱丹溪方，名见《济阴纲目》卷六。

【组成】 白术二两 半夏曲 川芎 香附米各一两 神曲（炒） 茯苓各半两 橘红四钱 甘草二钱

【用法】 上并为末，粥为丸。每服八十丸。

【主治】 ①《准绳·女科》：妇人肥盛，脂膜闭塞子宫，以致经事不行，不能孕育。②《济阴纲目》引丹溪方：痰塞不孕。

【加减】 热多者，加黄连、枳实各一两。

【备考】 原书治上症，先用调理药（"济阴纲目"名"植芝汤"）送服本丸，服此药后，却服螽斯丸。

09844 茂香散

【方源】《局方》卷九（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 天台乌药 三棱（煨） 蓬莪（煨） 川当归（去芦） 荆芥穗 天麻 桂心（不见火） 延胡索 厚朴（姜汁制，炒） 附子（炮，去皮脐）各一两

【用法】 上为细末。每服一钱，生姜汁少许，和温酒调下。

【主治】 妇人血风脏气，头目昏晕，心烦怔忡，手足热疼，经候不调，脐腹时痛，或多便利，饮食减少。

09845 荜茇丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 荜茇一两 胡椒一两 槟榔一两 诃黎勒二两（煨，用皮） 白茯苓一两 肉桂一两（去皱皮） 人参一两（去芦头） 干姜一两（炮裂，锉） 陈橘皮二两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜汤或粥饮送下，不拘时候。

【主治】 脾胃气虚弱，腑脏积冷，或时呕吐，不能饮食，心腹胀满，面色萎黄。

【宜忌】 忌生冷。

09846 荜茇丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】 荜茇三分 白术三分 肉豆蔻三分（去壳） 丁香半两 诃黎勒二两（煨，用皮） 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心三分 胡椒半两 干姜半两（炮裂，锉） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙，令香熟） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 本香半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 气劳。大肠时泄，不欲饮食，四肢厥冷，面色青黄。

09847 荜茇丸

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】 荜茇 高良姜 肉豆蔻（去壳） 桂（去粗皮） 缩砂蜜（去皮） 附子（炮裂，去皮脐） 白术 胡椒 诃黎勒（炮，去核）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前粟米饮送下。

【主治】 脾脏虚冷，大便滑泄，及白痢脐腹多疼。

09848 荜茇丸

【方源】《妇人良方》卷一。

【异名】 陈氏二神丸（原书卷七）、二神丸（《普济方》卷三三五）。

【组成】 荜茇（盐炒，去盐，为末） 蒲黄各一两（炒）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三、四十丸，食后用盐、米饮吞下。

【主治】 妇人无时月水来，腹痛。及妇人血气不和，作痛不止。

09849 荜茇汤

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】荜茇 生地黄 当归尾 荆芥穗 白芷 桑白皮（炒） 蜂房（炒） 赤芍药 姜黄 细辛 藁本 甘草各等分

【用法】上为粗末。每用三钱，井水煎，漱。

【主治】齿痛。

09850 荜茇散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】荜茇

【用法】上为细散。每用一字，先令病人满口含温水，随病左右，搐入鼻中。

【主治】偏头疼。

09851 荜茇散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】良姜（锉，炒） 草乌头（生用）各一两 荜茇一钱

【用法】上为细末。揩牙上，有涎吐了。

【主治】牙疼。

09852 荜茇散

【方源】《普济方》卷六十八引《海上方》。

【异名】当面可。

【组成】良姜 荜茇 白芷 细辛 蜂窠 鹤虱各三钱

【用法】上为细末。以擦之；如牙蛀，用饭一粒药含之。即效。

【主治】风蛀牙疼，不可忍者。

09853 荜茇散

【方源】《卫生宝鉴》卷十一。

【组成】荜茇二钱 良姜一钱 草乌（去皮尖）五分

【用法】上为末。每用半字，先含水一口，应痛处鼻内搐上，吐了水，用指粘药，擦牙疼处。立定。

【主治】治风蚀牙疼，兼治偏正头疼。

09854 荜茇散

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】荜茇 细辛 白芷 荆芥穗 升麻 郁金 当归各等分

【用法】上为细末，瓦盒贮之，紧闭勿令泄气。每用少许，擦痛处，后以荆芥汤漱之。

【主治】牙疼。

09855 荜茇粥

【方源】《医方类聚》卷九十四引《食医心镜》。

【组成】荜茇 胡椒 桂心各一分（为末） 米三合

【用法】上煮作粥，下荜茇等末，搅和，空心食之。

【主治】心腹冷气刺痛，妨胀不能下食。

09856 荜茇粥

【方源】《养老奉亲》卷一。

【组成】荜茇末二合 胡椒末一分 青粱米四合（淘）

【用法】上以米煮作粥熟，下二味调之，空心食。常服尤效。

【功用】《药粥疗法》：温中、散寒、止痛。

【主治】①《养老奉亲》：老人冷气心痛，发动时遇冷气即痛。②《药粥疗法》：胃寒呕吐，食欲不振，脘腹疼痛，肠鸣泄泻。

【宜忌】《药粥疗法》：凡一切实热症及阴虚有火者忌用。

【方论选录】《药粥疗法》：方中荜茇大辛大热而无毒，专入脾胃经，温胃散寒，下气止痛；胡椒入胃及大肠经，功同荜茇，二者一并煮粥，其温中散寒之力颇强，且与米配合，煮粥食用，还能温中补虚，健脾暖胃，同时也能使荜茇、胡椒的散寒作用缓缓发挥，以提高疗效。

09857 荜澄茄丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】荜澄茄 白豆蔻（去壳） 附子（炮裂，去皮脐） 沉香 缩砂（去壳） 当归（锉，微炒） 诃黎勒皮 吴茱萸（汤浸七遍，焙干微炒） 青橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 白术 木香 厚朴（去粗皮，涂生姜汁，炙令香） 桂心 槟榔 芎藭 人参（去芦头） 枳实（麸炒微黄）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【主治】脾肾脏久积虚冷气攻心腹，宿食不消，四肢无力。

09858 荜澄茄丸

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】荜澄茄 白豆蔻（去皮） 肉豆蔻（去壳） 木香 草豆蔻（去皮，炒） 丁香 白术 缩砂仁 红豆蔻 桂（去粗皮） 益智（去皮） 诃黎勒（煨，去核） 人参 白茯苓（去黑皮） 附子（炮裂，去皮脐） 茴香子（舶上者，炒） 槟榔（锉） 胡椒 干姜（炮） 阿魏（面裹煨，去面）各一两 青橘皮（汤浸，去白，焙） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各二两 甘草（炙）四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，细嚼，温酒或盐汤送下，妇人醋汤送下。

【主治】 胃心痛。腹胀满，口吐酸水，饮食无味，及一切气疾。

09859 荜澄茄丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】 荜澄茄 藿香叶（去土） 人参（去芦头） 蓬莪茂（煨香，切） 甘草（炙） 丁香各一两 茴香二两（微炒） 木香一两半 肉豆蔻（面裹，煨熟）一分 麝香一钱（别研） 安息香一两（酒煮，研开，滤去沙石）

【用法】 上药除安息香外，并为细末，次入炼熟蜜半斤和丸，每一两作十五丸。每服一丸，食前细嚼，橘皮汤或木香汤送下。

【主治】 脾虚胃弱，气滞不匀，心腹疼痛，宿冷不消，腹胁虚胀，不思饮食，面色痿黄，脏腑滑泄，气不升降。

09860 荜澄茄丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】 荜澄茄不拘多少。

【用法】 上为细末，姜汁打神曲末煮糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食后淡姜汤送下。

【主治】 ①《济生》：脾胃虚弱，胸膈不快，不进饮食。②《奇效良方》：翻胃吐黑汁。

09861 荜澄茄汤

【方源】 方出《本草图经》（见《证类本草》卷九），名见《圣济总录》卷二十五。

【异名】 荜良汤（《卫生总微》卷七）、荜澄茄散（《朱氏集验方》卷三）。

【组成】 荜澄茄三分 高良姜三分

【用法】 上为散。每服二钱，水六分，煎十余沸，入少许醋搅匀，和滓如茶热呷。

【主治】 ①《证类本草》引《本草图经》：伤寒咳嗽，日夜不定。②《圣济总录》：伤寒呕哕，日夜不定。

09862 荜澄茄散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】 荜澄茄一两 白术一两 桂心一两 人参一两（去芦头） 黄耆一两 当归一两（锉，微炒） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 甘草半两（炙微赤，锉） 半夏半两（汤浸七遍，去滑） 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 川椒半两（去目及闭口者，微炒去汗） 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，枣三枚，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 心腹冷痛，全不思食，渐加羸瘦。

09863 荜澄茄散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】 荜澄茄 高良姜 肉桂 丁香 厚朴（姜汁炒） 桔梗（去芦） 陈皮 三棱（泡，醋炒） 甘草各一两五钱 香附（制）三两

【用法】 上为细末。每服四钱，加生姜三片，用水一盏，煎七分，和渣服。

【主治】 脾胃虚满，寒气上攻于心，心腹刺痛，两胁作胀，头昏，四肢困倦，吐逆，发热，泄泻，饱闷。

09864 草乌散

【方源】《普济方》卷六十九。

【组成】 草乌四个（紧小如鸟背者，不去皮） 全蝎二个 胡椒三十粒

【用法】 上为细末。揩牙出涎，即以荆芥汤灌漱。微觉麻，少顷即定。

【主治】 牙疼牙疏，风肿牙疼。

09865 草仙丸

【方源】《医钞类编》卷十四。

【组成】 沙苑蒺藜四两（酒炒） 枣皮 芡实 莲须 枸杞各二两 菟丝 续断 覆盆子 金樱子（去核）各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。

【主治】 精滑不痛。

09866 草花膏

【方源】《医级》卷八。

【组成】 羊胆一具 蜂蜜二钱

【用法】 蜜入胆内 搅匀，点两眼角，或研冰片一分加入。

【主治】 目赤肿痛。

09867 草还丹

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】 菊花（拣去萼） 枸杞子（拣去尘土及蒂） 巴戟天（去心） 肉苁蓉（酒浸，焙干，切）各四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，以丹砂为衣。每服三十丸，空心温酒或盐汤送下。

【功用】 补虚冷，调元气，壮筋骨，明耳目，进饮食，和脾胃，延年。

09868 草还丹

【方源】《瑞竹堂方》卷一引王国宝方。

【组成】 苍术四两（酒浸一两，醋浸一两，泔水浸一两，盐水浸一两，各一宿） 胡芦巴一两（酒浸一宿） 破故纸一两（酒浸一宿） 覆盆子二钱

（拣净） 茴香一钱（新肥者） 川楝子一两 木香半两（坚实者） 山药（坚白者） 穿山甲（酥炙者） 地龙（去净土） 茯苓（坚圆者） 枸杞子 牛膝各三钱（酒浸一宿）

【用法】 上晒干为细末，无灰酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，温酒送下，盐汤亦可，干物压之，一日二次。空心服毕，须行百步，使药力行。

【功用】 ①《瑞竹堂方》：壮脾胃，进饮食，益精髓，补肾经，固元阳，轻腰脚，安五脏，通九窍，令人耳目聪明，悦颜容，乌须发，固牙齿，延年益寿。②《杏苑》：滋补精血，调摄元神。

09869 草还丹

【方源】《医学纲目》卷五。

【异名】 青蒿丸（《不居集》下集卷四）。

【组成】 赤蒿一斗五升 童便三斗

【用法】 文武火熬，约童便减至二斗，去蒿，再熬至一升，入猪胆七个，再熬数沸，用甘草末收和为丸，如梧桐子大。每服五十丸。

【主治】 阴虚骨蒸。

09870 草灵丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】 生地黄三十二两（细切，用无灰酒一斗，夜浸昼晒，七日酒尽，焙干） 鹿茸二两（酥炙黄，焙干，为末） 肉苁蓉二两（酒浸七日，研为泥，焙干） 牛膝一两（酒浸七日，焙干） 桂心一两 蛇床子一两 菟丝子一两（酒浸七日，研为末，焙干） 远志一两（去心） 大枣一百个（煮熟，去皮核，焙干）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，或酒、蜜、面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【功用】 补肾益真，滋荣养卫，填实骨髓，坚固牙齿，聪耳明目，延年不老，悦颜色，黑髭鬓。

09871 草灵丹

【方源】《便览》卷三。

【组成】 茴香三两 川椒（去目）四两 甘草二两 熟地二两 山药二两 川乌一两 枸杞子一两半 苍术一两

【用法】 上炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤送下，干物压。

【主治】 中年后阴痿，腰膝痿痹，不能运用。

09872 草灵丹

【方源】《集验良方》卷一。

【异名】 天然透邪丹（《增广大生要旨》）。

【组成】 鹅儿不食草（一名地胡椒。采取阴干，晒燥，研末收贮）

【用法】 治鼻渊，鼻窍中时流黄色浊涕，用鲜草塞鼻；治鼻渊久而不愈，鼻中淋沥腥秽血水，头眩虚晕而痛者，用鲜草塞鼻数次，内服补中益气汤；鼻红，用嫩草头阴干，研细末，薄浆为丸，如梧桐子大，黑山栀极细末为衣，塞鼻；眼目生翳，取末搐鼻塞耳；头风疼痛，用鲜草塞鼻；感受风寒暑热，以致头痛胀闷，鼻窍不通，胸膈不舒，用末搐鼻。

【主治】 鼻渊，鼻红，眼目生翳，头风疼痛，风寒暑热，头痛胀闷，鼻窍不通，胸膈不舒。

09873 草果饮

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【异名】 草果饮子（《丹溪心法》卷二）。

【组成】 紫苏叶 草果仁 川芎 白芷 高良姜（炒） 青橘皮（去白，炒） 甘草（炒）各等分

【用法】 上为末。每服二大钱，水一盏，煎至七分，去滓热服，二滓并煎，当发日连进三服。

【功用】《丹溪心法附余》：进食理脾。

【主治】 疟疾。

①《局方》（绍兴续添方）：脾寒疟疾。②《岭南卫生方》：瘴疟头疼身痛，脉浮弦寒热。③《丹溪心法附余》：寒热疟疾初愈。④《明医指掌》：产后疟疾，寒热往来，或热胜于寒。

【备考】《丹溪心法》有陈皮。

09874 草果散

【方源】《妇人良方》卷十五。

【异名】 草果饮（《保命集》卷下）。

【组成】 厚朴（去粗皮，姜汁浸，炒黄）二两 肉豆蔻一个（面煨） 草豆蔻一个（煨）

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓热服。

【主治】 妊娠脏气本虚，宿夹风冷，脾胃久弱，脏腑虚滑，脐腹疼痛，日夜无度。

09875 草蔻丸

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】 草蔻 益智仁 青皮 神曲 麦芽 陈皮 苍术 厚朴 甘草

【用法】 水煎服。

【主治】 呕吐酸水，脉弦迟者。

09876 草蔻汤

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】 泽泻一钱 木香三分 神曲四分 半夏（制） 枳实（麸炒） 草豆蔻 黄耆 益智仁 甘草（炙）各五分 青皮 陈皮各六分 川归 茯苓

各七分

【用法】 上㕮咀。加生姜三片，黑枣一个，水煎服。

【主治】 脐腹虚寒疼痛。

09877 草乌头散

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】 草乌头（米泔浸一宿，去皮，切作片，炒） 一两 高良姜半两 细辛（去苗叶）半两 荜茇半两 白僵蚕半两 五灵脂半两 乳香一钱

【用法】 上为散。每用一字揩牙。合口少时去涎尽，以盐汤漱口。

【主治】 ①《圣济总录》：牙齿疼痛。②《医统》：风牙疼痛。

09878 草乌洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 川乌9克 草乌9克 当归9克 透骨草12克 红花6克

【用法】 水煎洗。

【主治】 冻疮。

09879 草龙胆散

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【组成】 龙胆草（洗，去头） 菊花（去梗） 本贼（洗净，去节） 草决明（微炒） 甘草（炙）各二两 香附子（炒，去毛） 川芎（不见火）各四两

【用法】 上为细末。每服二钱，用麦门冬熟水，入砂糖少许同调，食后服；或米泔调下亦得。

【主治】 上焦受于风热，气毒攻冲眼目暴赤，碜涩羞明，肿痛多眵，迎风有泪，翳膜攀睛，胬肉隐痛。

09880 草龙胆散

【方源】《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。

【组成】 蒺藜子（炒，去刺） 草龙胆各六两 赤芍药半斤 甘草（炙） 羌活 防风（去叉枝）各二两 菊花（去枝）半两 茯苓（去皮）四两

【用法】 上为末。每服二钱，食后、临卧温酒调下。

【主治】 眼暴赤肿痛，风气热上冲，睛疼连眶，睑眦赤烂，瘀肉侵睛，时多热泪；及因叫怒，逆损肝气，久劳瞻视，役损眼力，风砂尘土，入眼涩痛，致成内外障翳，及一切眼疾。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“龙胆草散”。

09881 草豆蔻丸

【方源】《圣济总录》（人卫本）卷四十四。

【组成】 草豆蔻（去皮） 干姜（炮） 桂（去粗皮）各一两 诃黎勒皮（焙）半两 甘草（炙） 白茯苓（去黑皮） 人参各二分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒或生姜汤送下。

【主治】 脾久虚，不下食，痰逆恶心；脾胃久冷，气攻心腹，肠鸣胀满。

【备考】 本方方名，原书文瑞楼本作“豆蔻丸”。

09882 草豆蔻丸

【方源】《内外伤辨》卷下。

【组成】 草豆蔻（面裹煨，去皮，取仁） 枳实（麸炒黄色） 白术各一两 大麦芽（面炒黄色）半夏（汤洗七次，晒干） 黄芩（括去皮，生） 神曲（炒黄色）各五钱 干生姜 橘皮 青皮各二钱 炒盐五分

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】 秋冬伤寒冷物，胃脘当心而痛，上肢两胁，膈咽不通。

【加减】 如冬月用，别作一药，不用黄芩。

【备考】 岁火不及，又伤冷物，加以温剂，是其治也。然有热物伤者，从权以寒药治之，随时之宜，不可不知也。

09883 草豆蔻丸

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】 草蔻丸（《医学入门》卷七）。

【组成】 泽泻一分（小便数，减半） 柴胡二分或四分（须详胁痛多少用） 神曲 姜黄各四分 当归身 生甘草 熟甘草 青皮各六分 桃仁（汤洗，去皮尖）七分 白僵蚕 吴茱萸（汤洗去苦烈味，焙干） 益智仁 黄耆 陈皮 人参各八分 半夏一钱（汤洗七次） 草蔻 豆蔻仁一钱四分（面裹烧，面熟为度，去皮用仁） 麦芽面（炒黄）一钱五分。

【用法】 上为细末，桃仁另研如泥，再同细末一处研匀，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，熟白汤送下，旋斟酌多少。

【主治】 脾胃虚而心火乘之，不能滋荣上焦元气，遇冬，肾与膀胱寒水旺时，子能令母实，致肺金大肠相辅而来克心乘脾胃，此大复其仇也。《经》云：大胜必大复。故皮毛、血脉、分肉之间，元气已绝于外，又大寒大燥二气并乘之，则苦恶风寒，耳鸣，及腰背相引胸中而痛，鼻息不通，不闻香臭，额寒脑痛，目时眩，目不欲开，腹中为寒水反乘，痰唾沃沫，食入反出，常痛，及心胃、胁下缩

急，有时而痛，腹不能努，大便多泻而少秘，下气不绝，或腹中鸣，此脾胃虚之至极也；胸中气乱，心烦不安，而为霍乱之渐，咽膈不通，噎塞，极则有声，喘喝闭塞，或日阳中，或暖房室内稍缓，日吸风寒则复作，四肢厥逆，身体沉重，不能转侧，头不可以回顾，小便溲而时躁。

09884 草豆蔻丸

【方源】《丹溪治法心要》卷三。

【组成】白豆蔻二钱 白术 三棱 草豆蔻 半夏各一两 砂仁 片姜黄 枳实 青皮 良姜（一作干姜） 陈皮 桂皮 丁香 蓬术 木香 藿香 小草各五钱

【用法】生姜汁蒸饼为丸。每服六七十丸，白汤送下。

【主治】肥人胃脘当心痛，或痞气在中脘不散。

09885 草豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】草豆蔻（去皮）一两半 厚朴（去粗皮，姜汁炙）二两 桂（去粗皮） 高良姜 当归（锉，焙）各一两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，以水一盏，煎取六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】厥逆冷气，上攻心痛，不食。

09886 草豆蔻汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】泽泻一分 木香三分 神曲四分 半夏（制） 枳实 草豆蔻仁 黄耆（春、夏去之） 益智仁 甘草各五分 青皮 陈皮各六分 茯苓 当归各七分

【用法】上为粗末，都作一服。水二大盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓，食远温服。

【主治】腹中虚寒胀痛。

①《兰室秘藏》：腹中虚胀。②《医统》：脐腹虚寒疼痛。③《杏苑》：腹中寒胀，少食难消，或胃脘疼连小腹。

09887 草豆蔻汤

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】草豆蔻（煨） 高良姜 广皮 陈神曲（炒） 吴茱萸（汤泡）五分 茯苓 半夏各一钱 炙甘草三分

【用法】加煨姜一片，水煎服。

【主治】客寒犯胃，或过食生冷，中脘疼痛，手足厥逆，脉见弦紧。

【宜忌】非脉实症寒者，勿轻用。

09888 草豆蔻散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】草豆蔻一两（去皮） 高良姜三分（锉） 桂心半两 丁香半两 木香半两 白术半两 当归半两（锉，微炒） 白豆蔻半两（去皮） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 肉豆蔻半两（去壳） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服一钱，食前以姜、枣汤调下。

【主治】①《圣惠》：大肠虚冷，肠鸣腹痛，下痢，不思饮食。②《圣济总录》：肠虚寒湿内攻，腹痛飧泄。

09889 草豆蔻散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】草豆蔻一两（去皮） 人参一两（去芦头） 桂心半两 白术一两 半夏半两（汤洗七遍去滑） 甘草一两（炙微赤，锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】虚劳，脾胃虚冷，食不消化。

09890 草豆蔻散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】草豆蔻一两（去皮） 当归一两（锉，微炒） 白术一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心一两半 高良姜一两（锉） 赤茯苓一两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 桔梗一两（去芦头） 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胸痹短气，脏腑久寒，脐腹疼痛，两胁胀满，心膈不利。

09891 草豆蔻散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】草豆蔻一两（去壳） 沉香半两 白豆蔻半两（去皮） 诃黎勒皮半两 白术半两 桂心半两 丁香母半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服一钱，以生姜汤调下，不拘时候。

【主治】妇人脾胃虚冷气，胸膈不利，食即呕吐。

09892 草豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 草豆蔻（去皮，锉）八两　生姜（和皮切作片子用）一斤　甘草四两（炙，锉）　陈橘皮（去白，焙）一两

【用法】 上和匀，入银器内，用水过药三指许，慢火熬令水尽，取出焙干为散。每服一钱匕，沸汤点之，夏月煎作冷熟水服。

【主治】 胃寒气逆，呕哕不止。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“豆蔻散”。

09893　草豆蔻散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 细辛叶　防风各二分　羊胫骨灰　熟地黄各五分　当归六分　草豆蔻仁　黄连各一钱三分　升麻二钱五分

【用法】 上为细末。先用温水漱口，牙痛处擦之。

【主治】 寒多热少，牙齿疼痛。

09894　草乌揭毒散

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】 草乌　贝母　天花粉　南星　芙蓉叶各等分

【用法】 上为末。用醋调搽四围，中留头出毒，如干用醋润之。

【主治】 痈疽肿毒。

09895　草果七枣汤

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】 草果　常山　贝母　鸡心槟榔　大枣　甘草　乌梅各等分　青蒿倍之

【用法】 每服四钱，用水一盏半，煎至七分，通口服，滓再煎服。

【主治】 瘴疟。

09896　草果平胃散

【方源】《易简方》。

【异名】 定斋草果饮子（《医方类聚》卷一二二引《简易》）、草果饮子（《永类钤方》卷十三）。

【组成】 厚朴三两半　苍术五两半　橘红三两半　甘草一两　草果一枚　乌梅一枚

【用法】 上㕮咀。每服四钱，加生姜七片，同煎。

【主治】 脾寒痞疾。

09897　草果知母汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 草果一钱五分　知母二钱　半夏三钱　厚朴二钱　黄芩一钱五分　乌梅一钱五分　花粉一钱五分　姜汁五匙（冲）

【用法】 水五杯，煮取二杯，分二次温服。

【主治】 背寒，胸中痞结，疟来日晏，邪渐入阴。

【方论选录】 是方以草果温太阴独胜之寒，知母泻阳明独盛之热，厚朴佐草果泻中焦之湿蕴，合姜、半而开痞结，花粉佐知母而生津退热；脾胃兼病，最畏木克，乌梅、黄芩清热而和肝；疟来日晏，邪欲入阴，其所以升之使出者，全赖草果。

09898　草乌复方洗剂

【方源】《中医皮肤病简编》。

【组成】 生草乌9克　百部9克　土槿皮9克　白鲜皮9克　猪牙皂9克　威灵仙9克

【用法】 醋250毫升，水250毫升，将上药煎一夜，浓煎熏洗。

【主治】 手癣。

09899　茵芋丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】 茵芋三分　狗脊三分　麻黄三分（去根节）　丹参半两　五加皮一两　杜仲一两（去粗皮，炙微黄）　朱砂三分（细研，水飞过）　甘草半两（炙微赤，锉）　附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】 上为末，研入朱砂令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】 历节风疼痛，皮坼及血出者。

【宜忌】 忌羊血。

09900　茵芋散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 茵芋一两　肉桂一两（去皱皮）　海桐皮一两　芎藭一两　狗脊一两　防风一两（去芦头）　牛膝一两（去苗）　附子二两（炮裂，去皮脐）　松节一两（锉）　苍耳子一两（微炒）　当归一两　羌活一两　木香一两　麝香一两（分）（研入）

【用法】 上为细散，入研了药令匀。每服二钱，以温酒调下，不拘时候；如不饮酒，荆芥、薄荷汤下亦得。

【主治】 风，身体疼痛，肢节不利。

【宜忌】 忌生冷、油腻、猪、鸡、犬肉。

09901　茵陈丸

【方源】《千金》卷十。

【组成】 茵陈　栀子　天门冬各四两　大黄　桂心各三两　通草　石膏各二两　半夏半升

【用法】 上药，蒸大黄、通草、天门冬、半夏、栀子，晒令干，为末，炼蜜为丸，如大豆大。每服三丸，一日三次。不知，加至十丸。

【主治】 气淋胪胀腹大，身体面目悉黄，及酒疸

短气不得息。

【宜忌】 忌生鱼，以豆羹服，不得用酒。

09902 茵陈丸

【方源】《外台》卷四引《必效方》。

【异名】 茵陈蒿丸(《圣济总录》卷六十)。

【组成】 茵陈四两 大黄三两 黄芩三两 栀子三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服二十丸，稍加至二十五丸，饮送下。

【主治】 一切黄，小便黄色及身黄者。

09903 茵陈丸

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】 茵陈蒿三分 大黄（锉，炒） 黄连（去须） 黄芩（去黑）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后、临卧温水送下。

【主治】 黄疸，身体面目皆黄。

09904 茵陈丸

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】 茵陈蒿 柴胡（去苗） 栀子仁各四两 龙胆 枳壳（去瓤，麸炒）各二两 黄芩（去黑心） 升麻 大黄（锉，炒）各三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，饮送下，一日二次。以利为度。

【主治】 ①《圣济总录》：身面悉黄，小便如浓栀子汁。②《医方类聚》引《施园端效方》：酒疸，食气，女劳疸，诸种黄疸。

09905 茵陈汤

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】 茵陈蒿 栀子仁 黄芩（去黑心） 大黄（锉，炒） 白鲜 黄连（去须）各一两 朴消（研） 贝齿（煅）各半两

【用法】 上药除朴消外为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，入朴消末一钱匕，再煎令沸，食后温服。

【主治】 急黄，目如栀子色，小便赤，心烦闷。

09906 茵陈汤

【方源】《医学纲目》卷三十一。

【组成】 茵陈 山栀 柴胡 黄柏（蜜炙） 黄芩 升麻 龙胆草各半两 大黄（炒） 一两

【用法】 上㕮咀。水煎，空心服。以利为度。

【主治】 伤寒发黄，目悉黄，小便赤。

09907 茵陈饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 六味回阳饮(《证治宝鉴》卷四)。

【组成】 茵陈 焦栀子 泽泻 青皮各三钱 甘草一钱 甘菊花二钱

【用法】 水三四钟，煎二钟，不时陆续饮之。治热泻者，一服可愈。

【主治】 ①《景岳全书》：挟热泄泻，热痢，口渴喜冷，小水不利，黄疸湿热闭涩。②《证治宝鉴》：喳膈反胃。

09908 茵陈散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】 茵陈三分 木通一两（锉） 栀子仁三分 甘草半两（炙微赤，锉） 栝楼根一两 麦门冬一两半（去心） 柴胡一两（去苗） 秦艽一两（去苗）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，加竹叶三七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 热病黄疸，目黄如金，小便如血，心烦躁闷，口苦头痛。

09909 茵陈散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】 茵陈二两 黄芩一两 栀子仁一两 川升麻二两 川大黄一两（锉碎，微炒） 龙胆一两（去芦头） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 秦艽一两（去苗）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 内黄。身面眼悉黄，如黄金色，小便浓如柏汁。

09910 茵陈散

【方源】《普济方》卷六十九。

【组成】 麻黄 荆芥穗 升麻 黄芩 羌活 独活 牡丹皮 薄荷 连翘 茵陈 射干 大黄 僵蚕 半夏各一分 细辛半两 牵牛一两

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏，先煎汤热，下药末，搅一搅，急泻出，食后临卧和滓热服。

【主治】 ①《普济方》：牙齿疼痛，外面疼痛不可忍，去骨槽风热。②《药奁启秘》：牙关拘紧不利。

09911 茵陈散

【方源】《回春》卷三。

【组成】 茵陈 栀子 赤苓 猪苓 泽泻 苍术 枳实 黄连 厚朴 滑石各等分

【用法】 上锉。加灯草一团，水煎服。

【主治】 湿热发黄。

【加减】 身热，加柴胡；小便短赤，加黄柏；胸

膈饱闷，加莱服子、茯苓；饮酒人，加瓜蒌仁、干葛、砂仁，去滑石。

09912 茵陈散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 茵陈 连翘 荆芥 麻黄 升麻 羌活 薄荷 僵蚕各五钱 细辛二钱半 大黄 牵牛（头末）各一两

【用法】 上为散。每服二钱，先以水一盏煎沸，入药搅之，急倾出，食后和滓热服。

【主治】 齿龈赤肿疼痛，及骨槽风热。

09913 茵陈粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】 绵茵陈 30～60 克 粳米 50～100 克 白糖适量

【用法】 先将绵茵陈洗净，煎汁去滓，入粳米后加水适量煮粥，煮熟时，加入白糖，稍煮一二沸，即可。疗程以 7～10 天为宜，每日分二至三次服食。粥宜稀薄，不宜稠厚，米只用粳米，不用糯米。

【功用】 利湿热，退黄疸。

【主治】 黄疸，小便不利，尿黄如浓茶色。

【宜忌】 阴黄或阳黄均可食用，钩虫引起的“黄胖病”不应服用。

09914 茵陈蒿汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 茵陈汤（《外台》卷四引《范汪方》）、涤热汤（《圣济总录》卷六十）、大茵陈汤（《准绳·类方》卷五）、茵陈栀子大黄汤（《济阳纲目》卷三十四）、茵陈大黄汤（《症因脉治》卷三）。

【组成】 茵陈六两 栀子十四枚（擘） 大黄二两（去皮）

【用法】 上三味，以水一斗二升，先煎茵陈减六升，纳二味，煮取三升，去滓，分三服。小便当利，尿如皂荚汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也。

【功用】 ①《准绳·伤寒》：利小便，退黄逐热。②《伤寒大白》：去热，退渴。

【主治】 湿热黄疸，面、目、一身尽黄，黄色鲜明，腹微满，口渴，小便不利，舌苔黄腻，脉沉数者。

①《伤寒论》：阳明病，发热汗出者，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，齐颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄。②《金匮》：谷疸之为病，寒热不食，食即头眩，心胸不安，久久发黄，为谷疸也。③《肘后方》：黄汗，身体四肢微肿，胸满，不得汗，汗出如黄柏汁，由大汗出，卒入水所致。④《医方集解》：湿热发黄，脉沉实者。

【方论选录】 ①《普济方》：小热之气，凉以和之，大热之气，寒以取之。茵陈、栀子之苦寒，以逐胃燥；大黄之苦寒，以下瘀热。②《金镜内台方议》：阳明者，为胃之土，其色黄，若发热汗出者，为热气得越，不能发黄也；但头上汗出，齐颈而还者，乃热气不能越也；小便不利，渴引水浆者，乃热甚于胃，津液内瘀，结为黄也。故用茵陈为君，能治黄；栀子为臣，栀能治黄，寒以治热也；以大黄为佐、使，以下泄瘀热，而除其黄也。③《医方考》：大热之气，寒以取之，故用茵陈；苦入心而寒胜热，故用栀子；推除邪热，必借将军，故用大黄。又曰，茵陈、栀子能导湿热，由小便而出。④《医方集解》：茵陈发汗利水，以泄太阴、阳明之湿热，故为治黄之主药；茵陈、栀子，能导湿热由小便出，大黄能导湿热由大便出。⑤《金鉴》：茵陈禀北方之气，经冬不凋，傲霜凌雪，偏受大寒之气，故能除热留结，率栀子以通水源，大黄以调胃实，令一身内外瘀热悉从小便而出，腹满自减，肠胃无伤，乃合引而竭之之法。此阳明利水之圣剂也。以推陈致新之茵陈佐以屈曲下行之栀子，不用枳、朴以承气与芒消之峻剂，则大黄但可以润胃中，而大便之不遽行可知，故必一宿而腹始减，黄从小便去而不由大肠去。

【临证举例】 ①传染性肝炎 《上海中医药杂志》（1957；8:19）：用茵陈蒿汤加减治疗传染性肝炎 20 例，初步观察，对传染性肝炎的黄疸消失，速度较快。20 例中，服药后第一周末即有 12 例黄疸指数减至 50～80%，占 60%，此与茵陈蒿汤之清热利湿——利胆、利尿等作用有关。肝功能之恢复，一般较慢，尤以麝香草酚浊度试验与絮状试验之变化较少。服茵陈蒿汤无任何副作用。②皮肤病《中医争鸣》（1960；12:17）：本方在皮肤科领域中应用的疗效甚佳。茵陈蒿 600 克，生大黄 400 克，生山栀 400 克，水煎成 5000 毫升，一日二次，每次 100 毫升，共治 413 例，其中：过敏性皮肤病痊愈 85.7%，显效 14.3%；皮肤瘙痒痊愈 7.1%，显效 64.3%，有效 28.6%；原因不明的皮肤病痊愈 34.5%，显效 4.4%，有效 24.1%。③急性病毒性肝炎 《伤寒论方医案选编》引韩德五：近年来应用茵陈蒿汤治疗 7184 例急性病毒性肝炎，近期治愈率均在 95%以上，有效率 100%。④胆道蛔虫症及胆系感染 《伤寒论方医案选编》引武汉医学院

附二院中医科：用本方为主治疗胆道蛔虫症及胆系感染121例，总有效率97.4%；治疗胆系感染40例，38例有效。

【现代研究】 保肝作用 《山西医药杂志》(1975；3:19)：本方用于以四氯化碳致成的大白鼠急性肝损伤的实验中，能不同程度地减轻肝细胞的肿胀、气球样变、脂肪变及坏死，使肝细胞内蓄积的糖原与核糖核酸含量有所恢复或接近正常，血清谷丙转氨酶活力显著下降，由此证明本方具有治疗肝炎和退黄作用。

09915 茵陈蒿汤

【方源】 方出《圣惠》卷五十五，名见《圣济总录》卷六十一。

【组成】 茵陈蒿 赤芍药 甘草（炙，锉） 木通（锉） 赤茯苓（去黑皮） 黄耆（锉）各一两 大黄（锉，炒）二两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，如人行十里再服。以大小便通利为度。

【主治】 黄汗，身体热不退，大小便不利。

09916 茵陈蒿汤

【方源】 《幼幼集成》卷四。

【组成】 茵陈蒿一钱五分 川黄柏 黑栀仁各一钱 灯心十茎

【用法】 水煎滚，热服。

【主治】 头汗至颈而还，将欲发黄。

09917 茵陈大黄汤

【方源】 《回春》卷三。

【组成】 茵陈 大黄 枳实 山栀 厚朴 滑石各等分 甘草减半

【用法】 上锉一剂。加灯草一团，水煎服。

【主治】 黄疸，大便结实。

09918 茵陈五苓散

【方源】 《金匮》卷中。

【异名】 茵陈散(《圣济总录》卷六十)、五苓茵陈散(《准绳·伤寒》卷四)、五苓散(《伤寒大白》卷三)、茵陈五苓汤(《中国医学大辞典》)。

【组成】 茵陈蒿末十分 五苓散五分

【用法】 上药和，先食饮方寸匕，一日三次。

【功用】 ①《医门法律》：润气分燥热。②《冯氏锦囊秘录》：清热祛湿。

【主治】 湿热黄疸，湿重于热，小便不利，烦渴。

①《金匮》：黄疸病。②《医学正传》引《活人书》：伤寒或伏暑发黄，小便不利，烦渴。③《鸡峰》：因病未除，忽然一身而目悉黄，如橘子色，由瘀血在里，或因大热，以冷水洗之，湿热相搏，熏蒸肌肉，谓之黄疸。④《冯氏锦囊秘录》：酒积黄疸，小便不利。⑤《笔花医镜》：阴黄，小便不利。

【方论选录】 ①《医方考》：茵陈，黄家神良之品也，故诸方多用之；猪苓、泽泻、茯苓、白术味淡，故可以导利小水；官桂之加，取有辛热，能引诸药直达热邪蓄积之处。②《古今名医方论》：罗东逸曰，治酒积黄疸，盖土虚则受湿，湿热乘脾，黄色乃见。茵陈专理湿热，发黄者所必用也；佐以五苓，旺中州，利膀胱；桂为向导，直达热所，无不克矣。

【临证举例】 ①黄疸 《本事》：有一家病伤寒七八日，身体洞黄，鼻目皆痛，两髀及项颈腰脊强急，大便涩，小便如金。予曰：脉紧且数，脾元受湿，暑热蕴蓄于太阳之经，宿谷相搏，郁蒸而不得散，故使头面有汗，至颈以下无之；若鼻中气冷，寸口近掌，无脉则不疗。急用茵陈汤调五苓散与之，数服愈。②传染性肝炎 《上海中医药杂志》(1959；2:22)：用茵陈五苓散治疗传染性肝炎3例，肝功能均转为正常，黄疸指数迅速下降。其中一例肝功能损坏较严重，故恢复时间较长。治疗过程无副作用，肝脏肿大及消化系统症状逐步消失，精神恢复迅速。

【备考】 本方方名，《外台》引作“茵陈蒿五苓散”。

09919 茵陈玉露饮

【方源】 《医醇剩义》卷三。

【组成】 茵陈三钱 玉竹三钱 石斛三钱 花粉二钱 葛根二钱 山栀一钱五分 广皮一钱 半夏一钱 茯苓二钱 萆薢二钱 苡仁一两

【用法】 煎汤代水服。

【主治】 酒瘅。平日嗜酒，湿热熏蒸，面目发黄，黄甚则黑，心中嘈杂，虽食甘芳，如啖酸辣，小便赤涩。

09920 茵陈术附汤

【方源】 《医学心悟》卷二。

【异名】 茵陈姜附汤(《笔花医镜》卷一)。

【组成】 茵陈一钱 白术二钱 附子五分 干姜五分 甘草（炙）一钱 肉桂三分（去皮）

【用法】 水煎服。

【主治】 阴黄。身冷，脉沉细，小便自利。

09921 茵陈四逆汤

【方源】 《伤寒微旨论》卷下。

【异名】 加味姜附汤(《寿世保远》卷三)、茵陈附子干姜甘草汤(《疾门法律》卷六)、茵陈姜附汤(《类证治裁》卷四)。

【组成】 甘草 茵陈蒿各二两 干姜一两半 附子一个(破八片)

【用法】 上为末。水四升,煮取二升,去滓放温,作四服。

【主治】 ①《伤寒微旨论》:阴黄。病人脉沉细迟,肢体逆冷,上自汗出。②《卫生宝鉴·补遗》:阴黄。皮肤凉又烦热,欲卧水中,喘呕,脉沉细迟无力;皮肤冷,心下硬,按之痛,身体重,背恶寒,目不欲开,懒言语,自汗,小便利,大便了而不了,脉紧细而发黄。

【方论选录】《医方考》:此阴证发黄也。阴寒盛于下,则戴阳于上,故上体见阳证,下体见阴证;阴盛于下,故见阴脉之沉迟,兼阴证之四逆;阳戴于上,故见阳证之发黄,上体之自汗也。茵陈,治黄之要药,故无分寒热而用之;附子、干姜、炙甘草,回阳之要品也,故有阴寒即用之。然必冷服者,恐姜、附发于上焦阳盛之区,而下部阴寒之分反不及也。

09922 茵陈白芷汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 绵茵陈 白芷 北秦皮 茯苓皮 黄柏 藿香

【主治】 酒客久痢,饮食不减。

【方论选录】 久痢无他证,而且能饮食如故,知其病之未伤脏真胃土,而在肠中也。痢久不止者,酒客湿热下注,故以风药之辛,佐以苦味入肠,芳香凉淡也。盖辛能胜湿,而升脾阳,苦能渗湿清热,芳香悦脾而燥湿,凉能清热,淡能渗湿也。俾湿热去而脾阳升,痢自止矣。

09923 茵陈地黄汤

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】 怀生地 京赤芍 正川芎 大当归 天花粉 赤茯苓 结猪苓 茵陈蒿 宣泽泻

【用法】 诸药随时定分两,水煎,母子同服。

【主治】 初诞小儿,面与浑身其黄如金,胎中受湿气也。

09924 茵陈栀子汤

【方源】《医学纲目》卷三十一。

【组成】 茵陈一钱 茯苓五分 山栀 苍术(炒) 白术(炒)各三钱 黄芩(生)六分 黄连 枳实(炒) 猪苓(去皮) 泽泻 陈皮 防己各二分 青皮

【用法】 上㕮咀,作一服。长流水煎,食前温服,二服可愈。

【主治】 谷疸,趺阳脉紧,食谷即眩,风寒相搏,谷气不清,胃中苦浊,浊气不流,小便不通,身体尽黄。

【方论选录】 山栀、茵陈能泻湿热而退黄,故以为君;枳实苦寒,泄心下痞满;肺主气,今热伤其气,故身体麻木,以黄芩苦寒泻火补气为臣;二术苦甘温,青皮苦辛温,能除胃中湿热,泄其壅滞,养其正气;防己苦寒,能去十二经滞湿;泽泻咸平,茯苓、猪苓甘平,导膀胱中湿热,利小便而去癃闭。

09925 茵陈茱萸汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】 吴茱萸 当归 附子 木通 干姜 茵陈 人参

【用法】 加灯心,水煎服。

【主治】 阴黄,腹痛或脉伏不出。

09926 茵陈将军汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】 大黄 茵陈 山栀 甘草 厚朴 黄芩 枳实

【用法】 水二钟,加生姜一片,灯心一握,煎之,热服。

【主治】 足太阴脾经,腹满身目发黄,小水不利,大便实,发渴,或头汗至颈节还,脉来沉重。

【加减】 大便自调者,去大黄、厚朴,加大腹皮,利小便清为效。

【备考】 本方方名,《医学入门》引作"茵陈汤"。

09927 茵陈麻黄汤

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】 茵陈蒿 麻黄

【用法】 水煎,加黄酒少许服。

【主治】 阳黄表实,无汗。

09928 茵陈解酲汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】 葛花解酲汤加茵陈

【主治】 酒疸虚者。

09929 茵陈附子干姜汤

【方源】《卫生宝鉴》卷二十三。

【异名】 附子茵陈汤(《证治宝鉴》卷十二)、茵陈附子汤(《杏苑》卷五)。

【组成】 附子(炮,去皮脐)三钱 干姜(炮)二钱 茵陈一钱二分 白术四分 草豆蔻(面裹煨)一钱 白茯苓(去皮)三分 枳实(麸炒)

半夏（汤泡七次） 泽泻各半钱 陈皮三分（去白）

【用法】 上㕮咀。为一服，水一盏半，加生姜五片，煎至一盏，去滓凉服，不拘时候。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：因凉药过剂，变为阴证，身目俱黄，四肢皮肤冷，心下痞硬，眼涩不欲开，自利睡卧。②《医学纲目》：身目俱黄，肢体沉重，背恶寒，皮肤冷，心下痞硬，按之则痛，眼涩不欲开，目睛不了了，懒言语，自汗小便利，大便了而不了，脉紧细，按之空虚，寒湿相合之阴症发黄。

【方论选录】 经云：寒淫于内，治以甘热，佐以苦辛；湿淫所胜，平以苦热，以淡渗之，以苦燥之。附子、干姜辛甘大热，散其中寒，故以为主；半夏、草豆蔻辛热，白术、陈皮苦甘温，健脾燥湿，故以为臣；生姜辛温以散之，泽泻甘平以渗之，枳实苦微寒泄其痞满，茵陈苦微寒，其气轻浮，佐以姜、附，能祛肤腠间寒湿而退其黄，故为佐、使也。

09930 茵陈栀子豆豉汤

【方源】 《伤寒大白》卷三。

【组成】 茵陈 栀子 豆豉

【主治】 阳热瘀在内，蒸发黄。

09931 茴香丸

【方源】 《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】 茴香一两（微炒） 附子一两（炮，去皮脐） 补骨脂一两（微炒） 胡桃仁一两

【用法】 上为末，入胡桃同捣烂，煮糯米粥为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前盐汤送下。

【主治】 膀胱气痛，及虚冷气下注。

09932 茴香丸

【方源】 《普济方》卷二十九引《指南方》。

【组成】 茴香一两 香附半两 菟丝子二两 桑螵蛸半两 盐（炒过）二钱

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【主治】 肾虚寒，小便数。

09933 茴香丸

【方源】 《局方》卷五。

【异名】 茴香煎（《鸡峰》卷七）。

【组成】 威灵仙（洗去土） 川乌头（炮，去皮脐） 陈皮（去白） 防风（去苗） 川楝子（麸炒） 萆薢各二两 乌药（去土）五两 川椒（去目及闭口者，炒出汗）二两 赤小豆 茴香（炒）各八两 地龙（去土，炒）七两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及晚食前温酒送下，盐汤亦得；小肠气痛，炒生姜、茴香酒送下；脚转筋，木瓜汤送下；妇人血脏虚冷，温醋汤送下；脐腹绞痛，滑泄冷痢，浓煎艾汤送下。

【功用】 久服补虚损，除风冷，壮筋骨，明耳目。

【主治】 ①《局方》：丈夫元脏久虚，冷气攻冲，脐腹绞痛，腰背拘急，面色萎黄，饮食减少，及膀胱、小肠气痛，并肾脏风毒，头面虚浮，目暗耳鸣，脚膝无力，肿痛生疮；妇人血脏虚冷，食减力少，肢体疼痛。②《证治宝鉴》：消渴，虫食津液而渴者。

09934 茴香丸

【方源】 《宣明论》卷十三。

【组成】 茴香（炒） 良姜 官桂各半两 苍术一两（汁浸）

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心、食后生姜汤送下；止痛，温酒送下。

【功用】 止痛。

【主治】 ①《宣明论》：男子、妇人脐腹疼痛刺胸膈不止者。②《普济方》：男子、妇人脐腹疼痛，下元久冷。

09935 茴香丸

【方源】 《儒门事亲》卷十二。

【组成】 茴香八两（炒） 川楝子（炒） 川乌（炮，去皮） 威灵仙（洗去土） 防风（去芦） 陈皮各三两 地龙一两（去土，微炒） 乌药五两 赤小豆八两

【用法】 上为末，酒糊为丸。每服三五丸，茶酒送下。

【主治】 湿气下行，流入脬囊，大肿，痛不可忍。

09936 茴香丸

【方源】 《朱氏集验方》卷八。

【组成】 苍术（水浸三日，去皮，锉，焙） 杜仲（制） 破故纸 川椒各二两 茴香一两一钱 厚朴一两

【用法】 上药以青盐三分之一，入在瓶内，酌量入水，文武火煮，水尽为度，焙干为末，酒糊为丸。每服五十丸，空心酒送下。

【功用】 补气血。久服明眼。

【主治】 腰疼。

09937 茴香丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】 胡芦巴八钱 茴香六钱 巴戟 川乌各二钱 川楝肉四钱 吴萸五钱

【用法】 酒糊为丸。每服十五丸，小儿五丸，盐酒送下。

【主治】 小腹冷癖，有形如卵，上下走痛不可忍。

09938 茴香汤

【方源】《局方》卷十。

【组成】 茴香（去土，炒）六斤 川楝子（洗，炒） 陈皮（炒）各二斤 甘草（炒）七斤 盐（炒）一斤

【用法】 上为末。每服一钱，如茶点吃。

【功用】 温中益气，利胸膈，进饮食。

【主治】 元脏气虚冷，脐腹胀满，疞刺疼痛，不思饮食及一切冷气。

09939 茴香汤

【方源】《局方》卷十（宝庆新增方）。

【组成】 白芷（不见火） 肉桂（不见火）各二两 桔梗（焙）三十两 茴香 甘草（并炒）各六两

【用法】 上为末，每服一钱，盐少许，食前沸汤点下。

【功用】 宽中，益气，温胃。

【主治】 元脏气虚冷，脐腹胀满，疞刺疼痛，不思饮食及一切冷气。

09940 茴香散

【方源】《本事》卷三。

【组成】 茴香（炒） 蓬莪术 京三棱各一两（二味炮熟，锉） 金铃子肉一两 甘草半两（炙）

【用法】 上为细末。每服二钱，热酒调下。每发痛甚连日，只二三服立定。

【主治】 膀胱气痛。

【方论选录】《本事方释义》：茴香气味辛温，入足厥阴；金铃子肉气味苦微寒，入手、足厥阴；蓬莪术气味苦辛温，入足厥阴；京三棱气味苦平，入足厥阴；甘草气味甘平，入足太阴，能缓诸药之性；热酒调送，欲药性之入厥阴也。此治膀胱气痛不可忍者。刚剂屡投而效，故治以攻坚破积之药，虽有缓中之品，而苦辛泄肝之药居多，气既得泄，病自缓矣。

09941 茴香散

【方源】《保命集》卷下。

【异名】 茴香汤（《洁古家珍》）。

【组成】 茴香（炒） 苦楝（炒）

【用法】 上为末。每服二钱，食前酒下。

【主治】 肾消病，下焦初证，小便如膏油。

09942 茴香散

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】 茴香 苦楝（炒） 五味

【用法】 上为末。每服二钱，食前酒送下。

【主治】 肾消，小便如油。

09943 茴香粥

【方源】《寿世青编》卷下。

【组成】 小茴香（炒）

【用法】 煎汤，去滓，入米煮粥食之。

【功用】 ①《寿世青编》：和胃。②《药粥疗法》：行气止痛，健脾开胃。

【主治】 ①《寿世青编》：疝气。②《药粥疗法》：小肠疝气，脘腹胀气，睾丸肿胀偏坠，胃寒呕吐，食欲减退以及鞘膜积液，阴囊象皮肿。乳汁缺乏。

【宜忌】《药粥疗法》：茴香粥属散寒止痛性药粥，对一切实热病症及阴虚火旺的患者，不可选食。

09944 茴姜汤

【方源】《得效》卷四。

【组成】 茴香二两半 青皮一两 良姜一两（酒浸，炒） 天台乌药（泔浸一日夜，炒黄为度）

【用法】 上为散。每服三钱，水一盏，加生姜五片，大枣一枚，煎，空心服。

【主治】 男子、妇人一切心腹胀满，气滞走痛。

【宜忌】 忌茶。

09945 茴香子丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】 茴香子一两 桂心一两 巴戟一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 补骨脂一两（微炒） 干姜一两（炮裂，锉）

【用法】 上为末，用羊肾二对，切去筋膜，以酒二升，煮令酒尽，烂研，和诸药末，捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、晚食前生姜酒送下。

【主治】 下元虚冷，腰膝疼痛，肌肉消瘦，渐加无力。

09946 茴香子散

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】 茴香子（炒） 荜澄茄 楝实（锉） 木香各一两半 葫芦巴 青橘皮（汤浸，去白，焙）各一两 槟榔（锉）半两

【用法】 上为散。每服一钱匕，空心、食前温酒调下，一日二次。

【主治】 小肠受邪，控睾痛引少腹。

【备考】 本方改为丸剂，名“茴香子丸”（见《普济方》）。

09947 茴香角子

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】 茴香子 木香 巴戟 附子（炮裂，去皮脐） 汉椒（去目及闭口者，微炒，去汗） 山茱萸各一两 猪肾一对（去脂膜，细切）

【用法】 上为末。每对猪肾，用药末二钱，入盐溲面，像肝角子样修制，灰火内煨令熟，空腹薄茶送下。

【主治】 五劳七伤，阴萎气乏。

09948 茴香草散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 茴香草 高良姜（晒干）各等分

【用法】 上为末。先吹鼻痔上二次，片时许，随后方行取法，其痔自然易脱。取鼻痔秘法：先用茴香草散，连吹二次，次用细铜箸二根，箸头钻一小孔，用丝线穿孔内，二箸相离五分许，以二箸头直入鼻痔根上，将箸线绞紧，向下一拔，其痔自然拔落，置水中观其大小。预用胎发烧灰同象牙末等分，吹鼻内，其血自止。戒口不发。

【主治】 鼻痔。

09949 茴香化气散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 小茴三两（炒） 白术一两半（炒） 枳壳一两半（炒） 青皮一两半（炒） 大茴三两（炒） 香附三两（酒炒） 乌药一两半 吴茱萸八钱（醋炒） 白蔻一两半（去壳，炒） 丁母香八钱

【用法】 上为末。每服三钱，广橘核汤下。

【主治】 六聚，脉弦沉涩者。

【方论选录】 产后任劳多郁，夹寒邪而肝脾受病，气化不调，故聚成六腑，或痛或不痛，或胀或不胀，以其聚散无常也。小茴温经以化其气；大茴散气以温其经；吴茱萸降逆气以调肝；丁香散滞气以缓胃；白术健脾气，运化乎中；枳壳泻滞气，消散其聚；青皮破气平肝；白蔻宽胸快膈；乌药顺清气，疏逆气，以散浊气也。为散，橘核汤下，以疏其结，使寒散结消，则六腑之聚自平，而脾气健运有常，肝气亦为调适，安有聚散无定，或痛或胀之患乎。

09950 茴香乌药汤

【方源】《顾松园医镜》卷十三。

【组成】 茴香（炒，研）钱许 乌药二钱 吴茱萸（汤泡）三五七分 破故纸（炒，研）钱许 川萆薢五钱 木瓜二钱 木香 砂仁各钱许 荔枝核（炒，研）五钱

【用法】 亦可浸酒服。

【主治】 疝气病初感寒邪或寒湿兼感，未郁为热者。

【宜忌】 郁久成热者，不宜服之。

【加减】 或加猪胞（炙，研）钱许；痛引腰脊，加牛膝、杜仲；寒甚，可加肉桂五分至一钱；虚甚，可加人参。

【方论选录】 茴香、乌药、吴茱萸、破故纸均为治寒湿疝气之病，川萆薢除下部湿邪，木瓜治筋病缓急，木香、砂仁止冷气腹痛，猪胞用为引导。

09951 茴香四神散

【方源】《医统》卷六十引《医学发明》。

【组成】 小茴香 南木香 川山甲（炮） 全蝎（微炒）各等分

【用法】 上为粗末。每服半两，酒、水各半盏煎服。

【主治】 诸疝痛。

09952 茴香益元散

【方源】《医统》卷七十一。

【组成】 茴香二钱（微炒黄色） 益元散三钱

【用法】 上为末。水一盏半，煎八分，食前服。

【主治】 气滞尿淋疼痛。

09953 茴香益智丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 川乌一两 小茴香（盐炒）一两 破故纸一两（炒） 益智仁一两（炒） 乌药一两

【用法】 上为末，用山药四两，打糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，盐汤送下。

【主治】 老人阳虚失禁，及房劳伤气，遗沥。

09954 茴香理中丸

【方源】《普济方》卷二十三。

【组成】 白术 人参（去芦） 干姜（炮） 甘草各二两半 茴香一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每二分作十丸。每服一丸，食前用白汤化下，嚼服亦得；或丸如梧桐子大服亦得。

【功用】 温脾胃，消痞满，顺三焦，进饮食，辟风寒邪气。

【主治】 中焦不和，脾胃虚冷，心下虚痞，肠中疼痛，呕吐冷痰，饮食不下，噫气吞酸，怠惰嗜卧；霍乱吐利，肠鸣不渴，手足不和，米谷迟化；大病、新产吐唾不止，及新产内虚。

09955 茴香楝子丸

【方源】《普济方》卷二四七。

【异名】茴香楝实丸(《医统》卷六十)。

【组成】川楝子一两三钱　小茴香一两半　吴茱萸二两　海藻一两　木香半两　泽泻半两　青盐三钱　蓬莪术七钱半（醋炙）　三棱七钱半（煨）　青皮一两　黑牵牛七钱（一半生用，一半炒用）

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前、空心酒送下。

【主治】诸疝证。

09956　茴楝五苓散

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】五苓散加茴香　川楝　葱　盐

【主治】膀胱水疝，尿不利。

09957　茱连丸

【方源】《直指》卷十四。

【组成】吴茱萸（拣净）　黄连（去须，半寸一截，同炒熟，分为二处）

【用法】上为末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，陈米饮送下。赤痢专服黄连；白痢专服茱萸；赤白痢并服。或多或少，以意增减。

【主治】①《直指》：赤白痢。②《医统》：痞满。

【备考】《医统》本方用法：为细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后白汤送下。

09958　茱连丸

【方源】《会约》卷十引丹溪方。

【组成】黄连（土炒）一两半　吴茱萸（泡，焙）一两　陈皮　苍术（米泔浸）　黄芩（土炒）桔梗　茯苓各一两二钱

【用法】上为末，神曲糊丸，如绿豆大。每服二三十丸，少用开水送下。

【主治】呕酸，吞酸。

09959　茱枳丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】茯苓（粉红者）四两（去皮）　枳实（去瓤，麸炒）　吴茱萸（汤泡七次，炒）各二两

【用法】上为细末，姜汁煮神曲糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，生姜汤送下，食后稍空服。

【功用】降气消饮，利小便。

【主治】中焦停饮痞，胸膈不快，恶心呕逆，痰气隘盛，头目旋晕，不美饮食。

09960　茱萸丸

【方源】《外台》卷三十三引《经心录》。

【组成】吴茱萸一升　蜀椒一升（去目汗，末）

【用法】炼蜜为丸，如弹子丸。绵裹，导子肠中，日再易。无所下，但开子脏，令阴温，即有子也。

【主治】妇人阴寒，十年无子。

09961　茱萸丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【异名】变通丸(《医方类聚》卷一三九引《澹寮》)、茱连丸(《万氏家抄方》卷一)。

【组成】吴茱萸二两（汤浸七遍，焙干，微炒）黄连二两（去须，微炒）

【用法】上为末，用软饭为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：水泻不止。②《普济方》：赤白痢，腹胁痛，日夜无度，脓血相杂，里急及肠风下血。

【备考】本方改为汤剂，名“茱萸汤”（见《圣济总录》）；改为散剂，名“二宜散”（见《普济方》）。

09962　茱萸丸

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】苁蓉（洗切，酒浸，焙）　五味子（炒）山茱萸　干山药各等分

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心饮送下。

【主治】消中，肾气败。其人素渴饮水，一旦不饮不渴，小便日夜数十行，气乏肉消脱。

09963　茱萸丸

【方源】方出《丹溪心法》卷三，名见《医方类聚》卷一九七引《新效方》。

【异名】咽酸丸(《医学纲目》卷二十二)、茱连丸(《医学正传》卷三)。

【组成】吴茱萸（去枝梗，汤煮少时，浸半日，晒干）　陈皮　黄芩各半两（陈壁土炒，去土用）黄连一两（陈壁土炒）　苍术七钱半（米泔浸）

【用法】上为末，神曲糊丸，如绿豆大。每服三五十丸，白术汤送下。

【主治】①《医方类聚》引《新效方》：吞酸。②《东医宝鉴·杂病篇》：郁积，吞酸吐酸。

【方论选录】《医方考》：胃中湿热，抑遏肝火，令人吞酸者，此方主之。湿郁则热，热郁则酸，故夏月饮食之类，以物覆冒之，其味必酸。曰肝火者，《洪范》曰：木曰曲直，曲直作酸，故责之肝也。是方也，连、芩治热，热去则不吐酸；苍术燥湿，湿除则不生热；陈皮理气，气行则热不郁；吴茱萸辛热而气臊，辛热可使就燥，气臊可使就肝，故能引连、芩入肝而泻肝火，此从治之义也。他如

火门方金丸亦良。

09964 茱萸汤

【方源】《医心方》卷九引《小品方》。

【异名】吴茱萸汤(《千金》卷十八)。

【组成】生姜三两 半夏三两 桂心三两 吴茱萸三两 人参一两 大枣三十个 甘草一两(炙)

【用法】以水九升，煮取三升，纳白蜜五合，分三服。

【主治】胸中积冷，心下淡水，烦满汪汪，不下饮食，心胸应背欲痛。

09965 茱萸汤

【方源】《千金》卷七引苏长史方。

【异名】木瓜茱萸汤(《普济方》卷二四四)、木茱汤(《奇正方》)。

【组成】吴茱萸六升 木瓜二颗(切)

【用法】以水一斗三升，煮取三升。分三服，相去如人行十里久进一服。或吐、或汗、或利、或大热闷。

【功用】《金匮翼》引苏长史方：下气除湿泄毒。

【主治】①《千金》引苏长史方：脚气入腹，困闷欲死，腹胀。②《普济方》：脚气毒气上攻心，手足脉绝；脚气入腹，困闷欲死，腹胀喘急，风湿胳膊，腰脚不能举动。

【备考】本方方名，《医心方》引作"木瓜汤"。改为丸剂，名"茱萸丸"(见《三因》卷三)。

09966 茱萸汤

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】食茱萸(炒) 白术 干姜(炮)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，空心、午间、临卧各一次。

【主治】脾心痛兼吐水。

09967 茱萸汤

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】当归(洗，焙)三钱 干姜(泡)三钱 肉桂(去粗皮)二两 附子(炮，去皮脐)二两 吴茱萸一两(汤洗七次)

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】肠胃虚寒，泄泻不止。

【备考】本方改为丸剂，名"茱萸丸"(见《普济方》)。

09968 茱萸汤

【方源】《易简方》。

【组成】槟榔二两 橘红 茱萸 木瓜 紫苏各一两半

【用法】上㕮咀。每服四钱，加生姜十片，水煎服。

【主治】脚气上攻，中满气急，更有下元虚冷，并尊年气虚之人，素有上壅之患，服补药不得者。

09969 茱萸汤

【方源】《得效》卷五。

【组成】吴茱萸(洗净)不拘多少

【用法】上用白水煮，去滓，入盐少许，通口服。

【主治】脾泄。老人肾虚，水土同化。

09970 茱萸散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】吴茱萸(汤洗，焙，炒)半两 乌贼鱼骨(去甲，炙) 芍药(锉，炒) 桑寄生(炙黄) 柏叶(炙)各一两 禹余粮(煅、醋淬七遍) 桑耳(炙)各一两半 生干地黄二两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心清米饮调下。

【主治】妇人白带下。

09971 茱萸内消丸

【方源】《局方》卷五。

【组成】吴茱萸(汤洗七次，焙) 陈皮(去白) 山药(焙) 川楝(蒸，去皮核) 山茱萸(去核) 青皮(去白) 茴香(炒) 马蔺花(醋炙) 肉桂(去粗皮，不见火)各二两 木香(不见火)一两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心温酒、盐汤任下。

【功用】补虚消疝，温养肾经。

【主治】肾与膀胱经虚，为邪气所搏，结成寒疝，伏留不去，脐腹疼刺，小肠气痛，奔豚痃癖，疼不可忍，阴核偏大，肤囊痈肿，结硬牵急，重大滋长，瘙痒疼痛，时出黄水，疮疡，腿沉重，足胫肿满，行步艰难。

【备考】《保命歌括》有破故纸，无山药。

09972 茱萸内消丸

【方源】《局方》卷八(续添诸局经验秘方)。

【组成】山茱萸(捣，去核，取肉，微炒) 桔梗(水浸一伏时滤出，慢火炒干为度) 白蒺藜(炒去刺) 川乌(炮，去皮脐) 肉桂(去粗皮) 茴香(船上者，淘去沙后，焙炒) 食茱萸 吴茱萸(微炒) 青皮(去白)各二两 海藻(洗，焙) 五味子(净拣) 大腹皮(酒洗，焙) 玄胡索各二两半 桃仁(去皮尖及双仁，麸炒，别研) 枳实(去瓤，麸炒) 陈皮(去白)各一两 川楝子

（锉，炒）二两　木香一两半

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】 肾经虚弱，膀胱为邪气所搏，结成寒疝阴癞，偏大上攻，脐腹疼痛，肤囊肿胀或生疮疡，时出黄水，腰脚沉重，足胫肿满，行步艰辛，服之内消，不动脏腑。

09973　茱萸内消丸

【方源】《得效》卷九。

【组成】 川楝三两（锉，炒）　大腹皮　五味子　海藻（洗）　玄胡索各二两半　茴香（炒）　桂心　川乌（炮，去皮脐）　吴茱萸　食茱萸　桃仁（麸炒，别研）各一两　木香一两半　桔梗　青皮　山茱萸各二两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【主治】 小儿阴癞偏大，上攻脐腹，肤囊肿胀或生疮疡，时出黄水，腰腿沉重，足胫肿满，行步艰辛。

09974　茱萸内消丸

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】 吴茱萸（醋浸一宿，焙干，炒过）　青化桂（去皮）　净枣皮（蒸，去核，捣）　玄胡索（醋炒）　大茴香（盐炒）　化橘红（炒）　杭青皮（醋炒）各一两　桃仁（炒）　白蒺藜（炒）　南木香屑各五钱

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如龙眼核大。每服一丸，淡盐汤送下。

【主治】 寒湿所袭，留伏作痛，癞疝偏坠。

09975　茱萸六一散

【方源】《医方集解》。

【异名】 吴萸六一散（《成方切用》卷七）。

【组成】 六一散去甘草，加吴茱萸一两。

【主治】 湿热吞酸。

09976　茱萸四逆汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【异名】 四逆加吴茱萸汤（《中国医学大辞典》）。

【组成】 茱萸（汤泡）　附子（泡）　干姜各二钱　炙甘草一钱半

【用法】 水煎，人姜汁温服。

【主治】 ①《伤寒全生集》：厥阴伤寒，呕吐涎沫及吐利逆冷，烦躁脉沉。②《医统》：厥阴中寒，小腹痛甚。

【加减】 胃虚寒，加丁香、人参、白术、陈皮。

09977　茱萸如圣丸

【方源】《普济方》卷二一〇引《卫生宝鉴》。

【组成】 吴茱萸一两（去梗）　黄连七钱半（微炒）　罂粟壳（去蒂瓤，净用）一两（火炙）　诃子（去核）半两　川厚朴（去皮）半两（姜制，微炒）　白芍药半两　肉豆蔻半两（用湿纸裹，火煨熟）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下；如白痢，干姜汤送下；赤痢，甘草汤送下；赤白痢，甘草干姜汤送下，俱食前服。

【主治】 脾寒脏寒，腹疼，肠滑下痢。

09978　茱萸附桂汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】 吴萸七分　附子二钱　肉桂八分　当归三钱　白芍一钱五分　白术一钱　木香六分　乌药一钱　大枣二个　生姜三片

【主治】 中寒，肝气厥逆，胁下及腹中绞痛，下利，手足厥冷，指爪皆青。

09979　茱萸黄耆丸

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】 黄耆　山茱萸　人参　五味子各三分　熟干地黄　鸡腿胫　肉苁蓉　牛膝　补骨脂　鹿茸各一两　麦门冬二两　地骨皮　白茯苓　玄参各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】 消肾。心神虚烦，小便无度，四肢羸瘦，不思饮食，唇舌干燥，脚膝乏力。

09980　茱萸鹿茸丸

【方源】《百一》卷十八。

【组成】 吴茱萸（汤洗三次）　附子（炮裂，去皮脐）　干姜　肉豆蔻（面裹煨）　白茯苓　黑龙骨（炭火三斤，烧通赤经宿，研细末，水飞）各半两　杜仲（锉碎，酒浸，炒断丝）　五味子　苁蓉（酒浸一宿）　鹿茸（削去皮毛，劈开，涂酥炙）　赤石脂（粘舌者）各一两　熟干地黄一两半

【用法】 上为细末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至七十丸，空心、食前热米饮送下。一二月血气已安，去龙骨加沉香半两，可以常服。

【功用】 补气固血。

【主治】 本脏因虚生寒，月经行多，或来不及期，腹痛怯风，脏腑不和。

09981　茯苓丸

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】 茯苓八分　甘草七分（炙）　杏仁五十枚　人参七分　厚朴五分（炙）　干姜七分　黄耆

六分　桂心四分　当归八分　芎藭五分　干地黄八分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服二十丸，加至三十丸，清白饮送下，一日二次。

【主治】 下焦虚寒损，腹中瘀血，令人喜忘，不欲闻人声，胸中气塞而短气。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、生葱、酢物、芜荑。

【方论选录】 《千金方衍义》：下焦真阳亏损，则胸中大气不布，而致血涩不调，瘀滞腹内，故需辛温攻补兼施，方克有济。盖参、耆、甘草不得厚朴、杏仁之宣散则滞而不行；芎、归、地黄不得姜、桂之破结，则瘀而不化；茯苓一味，不独治畜血喜忘，并守五脏正气也。

09982　茯苓丸

【方源】 《千金》卷二十一引《古今录验》。

【异名】 茯苓煎（《鸡峰》卷十九）。

【组成】 茯苓　白术　椒目各四分　木防己　葶苈　泽泻各五分　甘遂十一分　赤小豆　前胡　芫花　桂心各二分　芒消七分（别研）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。一日五丸，稍加，以知为度，蜜汤送下。

【主治】 ①《千金》引《古今录验》：水肿。②《鸡峰》：支饮上气，黄疸及脚气、消渴后成石水，腹胁坚胀，足胫浮肿，上气不得卧，口干，颈脉动，腹胀间冷，大小便不利。

【方论选录】 《千金方衍义》：丸中芫花、甘遂、葶苈、芒消、椒目、防己兼走二便；佐以茯苓、白术、桂心、泽泻、前胡、赤小豆利水下气之味，深得峻药缓攻之妙。

09983　茯苓丸

【方源】 《圣济总录》卷七十五。

【组成】 赤茯苓（去粗皮）　当归　黄连（去须，炒）　黄柏（去粗皮）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心米饮送下。

【主治】 赤痢及赤白痢。

【加减】 赤白痢，加阿胶末一两。

09984　茯苓丸

【方源】 《圣济总录》卷八十六。

【组成】 白茯苓（去黑皮）　远志（去心）　防风（去叉）　人参　柏子仁（微炒，研）　牡蛎（烧令赤）　甘草（炙，锉）各半两　龙骨三分

【用法】 上为末，炼蜜并同枣肉同为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹温酒送下。夜卧再服。

【主治】 肝劳热，恐畏不安，精神闷怒，不能独卧，志气错越。

09985　茯苓丸

【方源】 《圣济总录》卷一六〇。

【组成】 白茯苓（去黑皮）一两半　泽泻　人参各一两　桂（去粗皮）　菖蒲各一两半　麦门冬（去心，焙）半两　当归（切，焙）　熟干地黄（焙）各一两　远志（去心）一两一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎人参汤送下，不拘时候。

【主治】 产后血气虚，精神不安，言语错谬。

09986　茯苓丸

【方源】 《本事》卷二。

【组成】 辰砂（水飞）　石菖蒲（去须，洗）　人参（去芦）　远志（去心，洗，锉，炒令黄色）　茯神（去木）　白茯苓（去木）　真铁粉　半夏曲　南星（羊胆制）各等分

【用法】 上为细末，生姜四两，取汁，和水煮糊为丸，如梧桐子大。别用朱砂为衣，干之。每服十丸，加至三十丸，夜卧生姜汤送下。

【功用】 安神镇心，消风痰，止头眩。

【主治】 ①《本事》：惊悸。②《普济方》：风历年岁，或歌或笑或哭，言语无所不及。

【方论选录】 《本事方释义》：辰砂气味苦温，入手少阴；石菖蒲气味辛温，入手少阴、足厥阴；人参气味甘温，入脾胃；远志气味辛微温，入心肾；茯神气味甘平，入心，茯苓气味同而淡渗，入脾胃；真铁粉气味咸平，入肝；半夏曲气味辛微温，入胃；陈胆星气味苦寒，入手少阴、足厥阴；生姜为引。即同治上心疾不用辛温峻利之品者，欲其专行手少阴、足厥阴二经，使得安神定心，不使药性之胜脾胃也。

09987　茯苓丸

【方源】 《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 白茯苓（去皮）三两　菟丝子五两（酒浸一宿，别捣，焙干）　龙齿　益智（去壳）　破故纸（炒）　远志（去心）　人参（去芦头）　石菖蒲各二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心、食前煎灯心汤送下。

【功用】 滋养血气，蠲除风冷。

【主治】 真元气弱，荣卫俱虚，精滑不固，神气消耗。

09988　茯苓丸

【方源】 《普济方》卷三十三引《卫生家宝》。

【组成】 猪苓二两　茯苓半两　半夏半两

【用法】 上药，半夏汤浸八九次，锉作二片，同木猪苓一处炒令黄色，去猪苓不用，只取半夏研细，同茯苓、粟米糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前、空心热水送下。

【主治】 男子小便白浊，渐成淋沥，或痛或不痛，日久觉瘠瘦，四肢乏力，不思饮食。

09989 茯苓丸

【方源】《景岳全书》卷六十一。

【组成】 赤茯苓 人参 桂心 干姜（炮） 半夏（泡，洗，炒黄） 橘红各一两 白术（炒） 甘草（炒） 枳壳（麸炒）各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下，一日三次。

【主治】 妊娠烦闷，头晕，闻食吐逆，或胸腹痞闷。

09990 茯苓汤

【方源】《外台》卷八引《延年秘录》。

【组成】 茯苓三两 人参 生姜 橘皮 白术各二两

【用法】 上切。以水五升，煮取一升五合，去滓，分三次温服，中间任食。

【主治】 风痰气发，即呕吐欠呿，烦闷不安，或吐痰水者。

09991 茯苓汤

【方源】《千金》卷十八。

【组成】 茯苓四两 半夏一升 生姜一斤 桂心八两

【用法】 上㕮咀。以水八升，煮取二升半，分四服。

【主治】 胸膈痰满。

【宜忌】《普济方》：忌酢物、羊肉、生葱、猪肠。

【加减】 冷极者，加大附子四两；气满者，加槟榔三七个。

【方论选录】《千金方衍义》：痰气聚于胸中，使用小半夏加茯苓汤，不得桂心之辛散，难以逞破的之功。冷极加附子，是指真阳虚者而言，气满加槟榔，是指痰气盛者而言，非谓二味可以并入一方也。

09992 茯苓汤

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】 茯苓四两 厚朴四两（炙） 橘皮二两 白术二两 生姜十两

【用法】 上切。以水九升，煮取二升七合，绞去滓，分三次温服，每服相去如人行七八里。须利，加槟榔末一两半，汤欲熟时纳之，甚安稳，三日服一剂，频服五六剂，可则停。

【主治】 心头结气，连胸背痛，及吐酸水，日夜不止。

【宜忌】 忌酢物、桃、李、雀肉。

09993 茯苓汤

【方源】《外台》卷十一。

【组成】 茯苓五两 栝楼五两 知母四两 小麦二升 麦门冬五两（去心） 大枣二十个（去核） 生地黄六两 萎蕤四两 淡竹叶三升

【用法】 上切。以水三升，先煮小麦、竹叶，取九升，去滓，入诸药，煮取四升，分四服。不问早晚，随渴即进。

【功用】 泄热止渴。

【主治】 胃腑实热，引饮常渴。

【宜忌】 忌芜荑、酢物。

09994 茯苓汤

【方源】 方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】 赤茯苓一两 芦根一两（锉） 黄芩一两 知母一两 栝楼根一两 麦麸一两 麦门冬一两（去心） 甘草一两（炙微赤，锉） 木通一两（锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 心脾热，渴不止，小便难。

09995 茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 白茯苓（去黑皮）一两 半夏（汤洗七遍，焙干）一两 人参一两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）一两半 丁香半两 木香半两 白术一两 草豆蔻（去皮）二两 槟榔（锉）半两 桂（去粗皮）三钱 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两半 枳壳（去瓤，麸炒）半两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 胃冷不思食，痰逆多吐。

09996 茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】 白茯苓（去黑皮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 人参 白术 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 五味子 黄耆各一两 桂（去粗皮）二两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓温服，一日三次。

【主治】 腹冷膨胀，及虚气不能食。

09997 茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】 白茯苓（去黑皮） 麦门冬（去心，焙）各四两 石膏五两 茅根（锉）一升

【用法】 上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，加冬瓜一片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 消渴。口干唇焦，心脾脏热，唯欲饮水。

09998 茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】 白茯苓（去黑皮） 人参各二两 麦门冬（去心，焙） 陈橘皮（去白，焙） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 紫苏（微炒）各一两 酸枣仁（炒）五两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分（拍碎），煎至一盏，去滓，空腹温服，分二服相次服之。

【主治】 虚劳烦躁不得眠。

09999 茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】 白茯苓（去黑皮）三分 黄耆（锉）一两半 芎藭一两 桂（去粗皮）三分 麦门冬（去心，焙） 五味子各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分（拍碎），大枣二个（擘破），同煎至八分，去滓，空心温服，晚再服。

【主治】 痈溃脓太多，里虚热。

10000 茯苓汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】 茯苓 麦门冬 黄芩各一两 秦艽 柴胡各半两 五味子一两 杏仁一分

【用法】 上为粗末。每服五钱，水二盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 心咳，恶热脉疾，小便赤涩。

10001 茯苓汤

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】 赤茯苓（去皮） 桑白皮各二两 防风 官桂 川芎 芍药 麻黄（去节）各一两半

【用法】 上为末。每服五钱，水一盏，加大枣一个，煎至八分，去滓温服，以姜粥投之，汗泄为度。

【主治】 痛痹，四肢疼痛，拘倦浮肿。

10002 茯苓汤

【方源】《三因》卷十一。

【组成】 半夏三两（汤洗十次） 茯苓 熟地黄各一两八钱 橘皮 细辛 人参 芍药 川芎 旋覆花 桔梗 甘草（炙）各一两二钱

【用法】 上锉散。每服四大钱，水二盏，加生姜七片，煎七分，去滓空腹服。

【主治】 忧怒兼并，气攻血溢，停留胃管，嗳闻血腥，呕吐食饮，及妊娠恶阻，中脘宿冷，冷血侵脾，恶闻食气。

【加减】 客热烦渴口疮者，去橘皮、细辛，加前胡、知母；肠冷下利者，去地黄，入桂心（炒）；胃中虚热，大便秘，小便涩，去地黄，加大黄一两八钱，黄芩六钱。

10003 茯苓汤

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】 白茯苓（去皮） 泽泻 香附子 橘红 大腹皮 干生姜 桑白皮（细锉，炒）各等分

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水一盏半，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脾气不实，手足浮肿，小便秘涩，气急喘满。

10004 茯苓汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 生黄芩三分 当归身四分 肉桂 炙甘草各五分 猪苓 茯苓各六分 泽泻一钱 芍药一钱五分 苍术 生姜 升麻 柴胡各二钱。

【用法】 上㕮咀，如麻豆大，分作二服。每服水二盏，煎至一盏，去滓，食前稍热服。

【主治】 因伤冷饭水泄，一夜走十行，变作白痢，次日其痢赤白，腹中疞痛，减食，热躁，四肢沉困无力。

10005 茯苓汤

【方源】《济生》卷三。

【异名】 六味茯苓汤（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】 半夏（汤泡七次） 赤茯苓（去皮） 橘红各一两 枳实（去瓤，麸炒） 桔梗（去芦） 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 支饮，手足麻痹，多睡眩冒。

10006 茯苓汤

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】 人参 甘草 山药 当归 茯苓 桂心 麦冬 远志 大枣 生姜

【主治】 产后心虚。

10007 茯苓汤

【方源】《顾氏医镜》卷五。

【组成】茯苓　远志　菖蒲　竹黄　姜汁竹沥

【主治】小儿喜惊易悸，痰热内盛。

10008　茯苓饮

【方源】《外台》卷八引《延年秘录》。

【异名】外台茯苓饮(《金匮》卷中附方)、茯苓饮子(《鸡峰》卷十八)、茯苓汤(《校注妇人良方》卷六)。

【组成】茯苓三两　人参二两　白术三两　生姜四两　枳实二两（炙）　橘皮一两半（切）

【用法】上切，以水六升，煮取一升八合，去滓，分三次温服，如人行八九里进之。

【功用】消痰气，令能食。

【主治】心胸中有停痰宿水，自吐水出后，心胸间虚气满，不能食。

【宜忌】忌酢物、桃、李、雀肉。

【方论选录】《金鉴》：上、中二焦气弱，水饮入胃，脾不能输归于肺，肺不能通调水道，以致停积为痰，为宿水。吐之则下气因而上逆，虚与气结，满不能食，当补益中气，以人参、白术为君；茯苓逐宿水，枳实破诸气为臣；开脾胃，宣扬上焦，发散凝滞，则陈皮，生姜为使也。其积饮既去，而虚气塞满其中，不能进食，此证最多。

10009　茯苓散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】赤茯苓三两　白术一两　葵子一合　赤芍药一两　木通二两（锉）　榆皮三两（锉）　白茅根一握（锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入葱白三茎，煎至六分，去滓，食前温服。以利为度。

【主治】气淋。小腹胀闷，脐下时时切痛。

10010　茯苓散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】白茯苓一两　栀子仁一两　黄芩一两　人参一两（去芦头）　甘草半两（炙）

【用法】上为散。每服二钱，水一中盏，加青竹茹一分，煎至八分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】心脏实热，惊悸喜笑，神识不安。

10011　茯苓散

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】赤茯苓（去黑皮）　贯众　缩砂仁　甘草（炙）各一两

【用法】上为细散。每用一钱匕，掺喉中，以水送下。

【主治】喉中生谷贼，结肿疼痛，饮食妨闷。

10012　茯苓散

【方源】《本事》卷四。

【组成】郁李仁（去皮尖，微炒）四钱　槟榔二个　赤茯苓（去皮）　白术　甘遂（切片，炒）各一钱　橘皮一钱半（去白）

【用法】上为细末，每服一钱，姜、枣汤调下。

【主治】肿满，小便不利。

【方论选录】《本事方释义》：郁李仁气味辛平而润，入手、足太阴、阳明；槟榔气味苦辛温，入足太阴、太阳，能消积气；赤茯苓气味甘平，淡渗，入阳明；白术气味甘温微苦，入足太阴；甘遂气味苦寒，入足太阳，泄水之圣药；橘皮气味苦辛微温，入手太阴。此因湿邪肿满，小溲不利，故用分消群剂，使水气下泄，惟恐土衰，水不能去，以术培土，姜、枣和营卫，则溺得通利，岂有不奏绩耶。

10013　茯苓散

【方源】《宣明论》卷八。

【异名】槟榔散(《普济方》卷二九二引《医方集成》)。

【组成】芫花（醋拌，炒）　泽泻　郁李仁　甜葶苈　汉防己　藁本各三钱半　陈皮（去白）　白茯苓　白槟榔　瞿麦各半两　滑石　大戟各七钱半

【用法】上为末。每服三钱，桑白皮煎汤，空心调下，取下碧绿水如烂羊脂为度。

【主治】诸般气肿。

【宜忌】忌盐食百日。

【备考】方中茯苓原脱，据《袖珍》补。

10014　茯苓散

【方源】《妇人良方》卷十九。

【组成】茯苓（一方使茯神）　生地黄十二分　远志　白薇　龙齿各十分　防风　人参　独活各八分（同为末）

【用法】上以银一大斤，水一斗五升，煎取七升，下诸药，煎取三升，分三次温服。

【主治】产后狂语，志意不定，精神昏乱，心气虚，风邪所致。

【宜忌】忌菘菜、猪肉、生冷。

10015　茯苓散

【方源】方出《妇人良方》卷十九，名见《校注妇人良方》卷十九。

【组成】人参　甘草　芍药　当归　生姜各八分　远志　茯苓各十分　桂心六分　麦门冬　大枣各十分

【用法】 上为散。以水八升，煮取三升，去滓，分三次温服。

【主治】 ①《妇人良方》：产后心虚，忪悸不定，乱语错误，精神恍惚不主。②《校注妇人良方》：产后健忘少睡，或自汗盗汗。

10016 茯苓散

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】 藿香 甘草 人参 半夏 白茯苓 丁香 陈皮各等分

【用法】 上为末。每服一钱，藿香叶三寸，葱白一寸，同煎服。

【主治】 胃寒呕吐。

10017 茯苓散

【方源】《冯氏锦囊秘录》卷十八。

【组成】 茯苓一两 当归 川芎 桂心 白芍 黄耆 人参 熟地各五钱

【用法】 水二钟，加猪肾一双，去脂膜细研，加生姜三片，大枣二个，同煎一钟，去肾、生姜、大枣，加没药五分，煮取七分，去滓，食前分二次温服。

【主治】 产后薄劳。生产日浅，运动用力，四肢寒痛，寒热如疟。

10018 茯苓粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【异名】 白茯苓粥(《长寿药粥谱》引《直指》)。

【组成】 白茯苓（去黑皮，取末）半两 粳米二合

【用法】 上药，以米淘净煮粥，米熟即下茯苓末。任意食之，必得睡也。

【功用】《长寿药粥谱》引《直指》：健脾益胃，利水消肿。

【主治】 ①《圣济总录》：产后无所苦，欲睡而不得睡。②《长寿药粥谱》引《直指》：老年性浮肿，肥胖症，脾虚泄泻，小便不利，水肿。

【宜忌】《长寿药粥谱》引《直指》：老年人脱肛和小便多者不宜服食。

10019 茯苓糕

【方源】《回春》卷八。

【组成】 土茯苓（去粗皮，为细末）一斤 白蜜一斤 糯米粉一斤

【用法】 上药和匀，蒸糕食之。常用茯苓煎服，当茶吃。

【主治】 杨梅疮毒。

【宜忌】 不可饮茶水。

10020 茯神丸

【方源】《古今录验》引陈明进方（名见《外台》卷十五）。

【异名】 定志小丸。

【组成】 菖蒲 远志（去心） 茯苓各二分 人参三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七丸，一日五次。

【主治】 心气不定，五脏不足，甚者忧愁悲伤不乐，忽忽喜忘，朝愈暮剧，暮愈朝发，发则狂眩。

【宜忌】 忌酢物、羊肉、饧。

10021 茯神丸

【方源】 方出《古今录验》引陈明方（见《外台》卷十五），名见《圣济总录》卷十四。

【组成】 茯神一两半 牛黄五铢 菖蒲 远志（去心） 茯苓各二分 人参三两

【用法】 先将五味为细末，然后入牛黄同研，再罗，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，食后良久及夜卧时服。

【主治】 心惊恐，志意不定，五脏不足，甚者忧愁恐惧，悲伤不乐，忽忽喜忘，朝愈暮发，甚则狂眩。

【宜忌】 忌醋物、羊肉、饧。

10022 茯神丸

【方源】 方出《千金》卷十九，名见《鸡峰》卷十二。

【组成】 人参 麦门冬 赤石脂 远志 续断 鹿茸各一两半 茯苓 龙齿 磁石 苁蓉各二两 丹参 韭子 柏子仁各一两六铢 干地黄三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，一日二次。稍加至三十丸。

【主治】 梦中泄精，尿后余沥及尿精。

【备考】《鸡峰》有茯神，无丹参、茯苓。

10023 茯神丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】 人参（去芦头） 茯神（去木） 黄耆（蜜炙） 熟干地黄（洗，焙） 当归（洗，焙） 酸枣仁（去皮，炒） 朱砂（别研，一半入药，一半为衣）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎人参汤送下，不拘时候。

【主治】 心虚血少，神不守舍，多惊恍惚，睡卧不宁。

10024 茯神丸

【方源】《直指》卷十七。

【组成】 茯神 人参 枳壳（制） 麦冬（去心，

焙） 生干地黄 牡蛎粉 黄连（净）各一两 黄耆（炙） 石莲肉 知母各半两 瓜蒌根七钱五分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，清粥饮送下。

【主治】 消中，烦热，消谷，小便数。

10025 茯神丹

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】 朱砂半两（光明成颗块者） 豬猪心一枚

【用法】 上将朱砂入在猪心内，却用麻皮缚定，汤煮一伏时取出，将朱砂细研，不用猪心，别研茯神末，糊为丸，如梧桐子大。每服五丸，空心、食前煎人参酸枣仁汤送下。

【主治】 小便白浊，梦遗漏精，日久不愈。

10026 茯神汤

【方源】《外台》卷十五引《古今录验》。

【组成】 茯神 人参 菖蒲 茯苓各三两 赤小豆四十枚

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取二升半，分三服。

【主治】 ①《外台》引《古今录验》：五邪气入人体中，见鬼妄语，有所见闻，心悸跳动，恍惚不定。②《张氏医通》：心虚神气不宁，烦热惊悸。

【宜忌】 忌羊肉，饧。

10027 茯神汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】 茯神 独活各四两 黄耆 远志 防风五两 生姜各三两 甘草 人参 当归 牡蛎 白术 苁蓉 附子各二两

【用法】 上㕮咀。以芳水一斗二升，煮取三升，服五合，昼夜尽。

【主治】 风眩倒，屋转，吐逆，恶闻人声。

10028 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】 茯神（去木） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁）各三两 龙齿六两 凝水石（碎）一斤 升麻二两 石膏（碎）二十两 沙参 白鲜皮各二两 生麦门冬（去心）四两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓温服，一日三次。如病甚，煎成入竹沥半合，再煎至一盏服。

【主治】 风狂失神，少卧不饥，笑乐无节，弃衣登高。

10029 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】 茯神（去木） 龙齿（研） 防风（去叉） 杏仁（去皮尖双仁，炒） 羌活（去芦头） 芎藭 人参 麦门冬（去心，焙） 大黄（锉，炒） 钩藤 甘草（炙，锉）各一两

【用法】 将十味为粗末，与龙齿拌匀。每服六钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，空心温服。得利二三行，即止之。

【主治】 风痫发动，惊掣无时。

10030 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】 茯神（去木） 羌活（去芦头） 木通（锉） 防风（去叉） 细辛（去苗叶） 蔓荆实（去白皮） 生干地黄（焙） 白术 当归（切，焙） 芍药 陈橘皮（汤浸，去瓤，焙） 芎藭各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】 首风头痛，当先风则甚。

10031 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】 茯神（去木） 羌活（去芦头） 龙齿 麦门冬（去心，焙） 麻黄（去根节）各一两 蔓荆实 人参 薏苡仁 防风（去叉） 远志（去心） 犀角屑各三分 赤芍药 甘草（微炙）各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 心痹。神思昏塞，四肢不利，胸中烦闷，时复恐悸。

10032 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】 茯神（去木）三分 犀角屑 龙齿一两 升麻半两 麦门冬（去心，焙）一两 玄参（坚者）半两 竹茹一两 芍药三分 马牙消一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至五分，去滓，下地黄汁一合，搅匀，食后温服。

【主治】 伤寒后，心热烦闷，睡多惊悸。

10033 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】 茯神（去木） 黄耆（锉） 麦门冬（去心） 栝楼根各一两 生干地黄（洗，切，焙）三两 酸枣仁（炒） 羌活（去芦头） 葛根（锉） 羚羊角（镑屑）各半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 肝脏实热，风气上攻烦渴。

10034 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】 茯神（去木） 酸枣仁（炒） 人参各一两 附子（炮裂，去皮脐）半两 干姜（炮）一分

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，食前温服。先烙手心，次烙第三指间，又灸一七壮，次烙气海、上脘、人中、神庭穴，不愈，灸背心，下廉穴百壮。

【主治】 奸黄。病人向明卧多，爱索鞋拟起，身体全冷，肉色苍黑，睡中啼泣，或狂言妄语。

【宜忌】 无心肿脚肿，蓦回窥人者宜服本方。

10035 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【异名】 茯神散（原书卷九十）。

【组成】 茯神（去木） 麦门冬（去心，焙） 柴胡（去苗） 黄连（去须） 贝母（去心，焙）各一两半 秦艽（去苗土）一两 槟榔（锉）二两 甘草（炙，锉）一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】 ①《圣济总录》：风劳咳嗽，心躁烦热，惊悸，鼻塞咽干，唇肿口疮，胸满少睡，手臂及腰脚疼。②《普济方》：虚劳惊悸。

10036 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】 茯神（去木） 人参各一两 酸枣仁（炒，去皮，别研）五两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜半分（拍碎），煎至七分，去滓，空腹温服，日二次，夜一次。

【主治】 虚劳烦躁，不得睡。

10037 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】 茯神（去木） 人参 远志（去心） 甘草（炙，锉） 当归（切，焙） 陈橘皮（去白，焙） 龙齿 熟干地黄（焙）各一两 五味子 麦门冬（去心，焙） 桂（去粗皮）各一两半 黄耆（锉）二两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水二盏，加大枣七个（擘破），生姜五片，煎至一盏，去滓，空心温服，一日三次。先服麝香散，取虫后服本方。

【功用】 补五脏。

【主治】 传尸骨蒸。

10038 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】 茯神（去木） 赤芍药 葛根（锉）各一两 升麻 地骨皮（锉） 黄芩（去黑心）各一两半 大黄（锉，炒）一两

【用法】 上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，煎至四分，去滓温服，食后、临卧各一次。

【主治】 斑疮入眼。

10039 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】 茯神（去木） 山芋 远志（去心） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，切，焙） 地骨皮 蔓荆实 青葙子 羚羊角（镑） 甘草（炙）各半两 人参 甘菊花各三分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食后、临卧服，一日二次。

【主治】 眼昏暗，将成青盲。

10040 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】 茯神（去木） 蔓荆实（去白皮） 赤茯苓（去黑皮） 枳壳（去瓤，麸炒）各二两 麻黄（去根节）一两半 防风（去叉） 黄芩（去黑心） 芎藭 石膏（碎） 羌活（去芦头） 独活（去芦头） 甘草（炙）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜五片，薄荷五叶，同煎至七分，去滓热服。

【主治】 妇人血风，头目昏眩，身体疼痛，心忪烦躁，手足心热，伤寒。

10041 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】 茯神（去木） 麦门冬（去心，焙） 人参 龙齿（去土） 升麻 石膏（捶碎） 枳壳（去瓤，麸炒） 沙参 赤芍药 甘草（炙，锉） 羌活（去芦头） 防己各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，一日二次。

【主治】 妇人心气怯弱，感于风邪，惊悸不安。

10042 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 茯神（去木） 赤芍药 地榆 熟干地黄（焙）各一两半 地骨皮 白术 甘菊花 柴胡（去苗）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓温服。

【主治】 妇人月水不调，头目昏眩，心腹气痛，四肢麻痹，脐下胀闷。

10043 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】 茯神（去木） 一两 熟干地黄（焙）一两 甘草（炙）半两 钩藤一两 桔梗（炒） 人参 当归（切，焙） 芍药（锉，炒）各一两半

【用法】 上为粗散。每服二钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】 妊娠八九月或临月，因用力劳乏，便即动胎，忽然下血，心腹急痛，面目青黑，冷汗出，气息欲绝。

10044 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】 茯神（去木） 黄耆（炙，锉） 人参 白术各半两 藿香叶 甘草（炙）各二钱

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加生姜三片，同煎至六分，去滓，食前温服。

【功用】 升降阴阳，和调胃气。

【主治】 妊娠呕逆不下食。

10045 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】 茯神（去木）二两 人参 芍药（锉）各一两半 甘草（炙，锉） 当归（切，焙） 桂（去粗皮）各一两

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣二个（擘破），同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后血虚乱语，心志不宁。

10046 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】 茯神（去木）一两 人参 龙齿 琥珀 赤芍药 黄耆（锉） 牛膝（酒浸，切，焙）各三分 生干地黄一两半 桂（去粗皮）半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎取七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后血虚受邪，语言失度，精神恍惚。

10047 茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】 茯神（去木）二两 人参 白茯苓（去黑皮）各一两半 芍药（锉） 甘草（炙，锉） 当归（锉，焙） 桂（去粗皮）各一两

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后虚惊，心气不安。

10048 茯神汤

【方源】《济生》卷一。

【组成】 茯神（去木） 酸枣仁（炒，去壳） 黄耆（去芦） 白芍药半两 五味子 柏子仁（炒）各一两 桂心（不见火） 熟地黄（洗） 人参一两 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《济生》：胆气虚冷，头痛目眩，心神恐畏，不能独处，胸中满闷。②《景岳全书》：惊痫。

10049 茯神汤

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生》。

【组成】 茯神（去木） 人参 远志（去心，甘草煮） 通草 麦门冬（去心） 黄耆（去芦） 桔梗（去芦，锉，炒） 甘草（炙）各等分

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜一片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脉虚极，咳则心痛，喉中介介如梗状，甚则咽肿，惊悸不安。

10050 茯神汤

【方源】《医统》卷二十三。

【组成】 茯神（去心） 酸枣仁（炒，研） 人参 当归各一钱 麦门冬（去心）八分 五味子十五粒 芍药 生地黄 川芎 陈皮 山栀仁（炒） 甘草各六分

【用法】 上药以水一钟半，加生姜三片，煎八分，温服。

【主治】 劳心思虑，伤损精神，头眩目昏，心虚气短，惊惊烦热。

10051 茯神汤

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】 茯神 枣仁 芍药 绵耆 人参 半夏 广皮 生姜

【主治】 小儿善惊易悸，触事易惊，胆虚涎冷者。

10052 茯神散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】 茯神一两 柏子仁半两 酸枣仁一两（微炒） 黄耆一两（锉） 人参一两（去芦头） 熟干地黄半两 远志半两（去心） 五味子半两

【用法】 上为散。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：胆虚不得睡，神思不宁。②《家庭治病新书》：心神恍惚，健忘或怔忡者。

10053 茯神散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 茯神 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川升麻 白鲜皮 沙参（去芦头）各半两

龙齿一两　石膏二两　远志一两（去心）　犀角屑一两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 心风狂言，恍惚恐惧。

10054　茯神散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】 茯神一两　防风一两（去芦头）　当归一两　天雄一两（炮裂，去皮脐）　麻黄一两（去根节）　甘草一两（炙微赤，锉）　芎藭一两　独活一两　远志一两（去心）　丹参一两　桂心一两　酸枣仁一两（微炒）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 历节风，手脚曲戾，疼痛，心神闷乱。

10055　茯神散

【方源】《本事》卷二。

【组成】 茯神（去木）　熟干地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干）　白芍药　川芎　当归（洗，去芦，薄切，焙干）　白茯苓（去皮）　桔梗（炒）　远志（去心，洗，锉，炒令黄色）　人参（去芦）各一两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，加灯心、大枣，同煎至七分，不拘时候服。

【主治】 因惊语言颠错，不能服温药。

【方论选录】《本事方释义》：茯神气味甘平，入手少阴；茯苓气味同而淡渗，入足阳明；桔梗气味苦辛平，入手太阴；远志气味辛温，入手、足少阴；人参气味甘温，入脾胃；芎、归、芍、地乃四物汤，养血药也。此因惊致病，心主血，肝藏血，血既得养，神魂安入而惊自定，再佐以灯心之微苦以清心，枣之和缓以和荣，则高年戎马之惊，自然精神复而病却矣。

10056　茯神散

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】 茯神（去皮）　麦门冬　地骨皮　茯苓各一两　白鲜皮　酸枣仁　沙参　甘草（炙）半两

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，煎至六分，去滓，食后服。

【主治】 胆热多睡，神思不安，昏闷。

10057　茯神散

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】 茯神（去木）一两　人参　黄耆（炙）赤芍　牛膝　琥珀　龙齿（研）各一钱五分　生地一两五钱　桂心五钱　当归二两

【用法】 上为末。每服三钱，水煎服。

【主治】 产后血虚，心气弱，惊悸，恍惚不安宁。

10058　茯菟丸

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【异名】 茯苓丸（《医学纲目》卷二十九）。

【组成】 菟丝子五两　白茯苓三两　石莲子（去壳）二两

【用法】 上为细末，酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【功用】 镇益心神，补虚养血，清小便。

【主治】 心气不足，思虑太过，肾经虚损，真阳不固，溺有余沥，小便白浊，梦寐频泄。

10059　茯苓术散

【方源】《外台》卷三十二引《深师方》。

【组成】 白术一斤　茯苓　泽泻　猪苓各四两　桂心半斤

【用法】 上为散。每服一刀圭，食后服，一日三次，三十日发黑。

【主治】 发白及秃落。

10060　茯苓皮汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 茯苓皮五钱　生薏仁五钱　猪苓三钱　大腹皮三钱　白通草三钱　淡竹叶二钱

【用法】 水八杯，煮取三杯，分三次服。先服安宫牛黄丸，继用茯苓皮汤。

【主治】 吸受秽湿，三焦分布，热蒸头胀，身痛呕逆，小便不通，神识昏迷，舌白，渴不多饮。

10061　茯苓饮子

【方源】《医方类聚》卷一五八引《济生》。

【组成】 赤茯苓（去皮）　半夏（汤泡七次）　茯神（去木）　橘皮（去白）　麦门冬（去心）各一两　沉香（不见火）　甘草（炙）　槟榔各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 痰饮蓄于心胃，怔忡不已。

10062　茯苓川芎汤

【方源】《宣明论》卷二。

【异名】 川芎茯苓汤（《医学入门》卷七）。

【组成】 赤茯苓　桑白皮　防风　官桂　川芎　麻黄　芍药　当归　甘草（炙）各等分

【用法】 上为末。每服二钱，水二盏，大枣三个，同煎至一盏，去滓，空心温服。如欲出汗，以粥投之。

【主治】 着痹。留注不去，四肢麻，拘挛浮肿。

10063　茯苓升麻汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】茯苓（赤、白）各五钱　升麻一钱五分　当归三钱　川芎一钱　芒根三钱

【用法】急流水煎服；或调琥珀末二钱服，更佳。

【主治】孕妇转脬，小便不通。

【方论选录】用升麻以举其胎气，用茯苓以利小便，用归、芎以活其胎，用芒根理胞系之缭乱。此以升剂为通之法也。

10064　茯苓甘草汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】茯苓桂甘汤（《医学入门》卷四）、茯苓汤（《嵩崖尊生》卷七）。

【组成】茯苓二两　桂枝二两（去皮）　甘草一两（炙）　生姜三两（切）

【用法】上药以水四升，煮取二升，去滓，分三次温服。

【功用】《伤寒论讲义》：温中化饮，通阳利水。

【主治】心下停饮，心悸，汗出不渴，小便不利；咳而遗溺；奔豚。

①《伤寒论》：伤寒汗出不渴者；伤寒厥而心下悸者。②《圣济总录》：伤寒发汗后，腹下气满，小便不利。③《普济方》引《直指》：心下停水，怯悸。④《内科摘要》：膀胱腑发咳，咳而遗溺。⑤《疝癥积聚编》：疝作奔豚。

【方论选录】①《普济方》：茯苓、甘草之甘，益津液而和卫，桂枝、生姜之辛，助阳气而解表。②《内台方议》：今此汗出而渴者，为邪不传里，但在表而表虚也。故与茯苓为君而益津和中；甘草为臣辅之；以桂枝为佐，生姜为使，二者之辛而固卫气者也。③《伤寒附翼》：此厥阴伤寒发散内邪之汗剂，凡伤寒厥而心下悸者，宜先治水，后治其厥，不尔，水渍入胃，必作利也。此方本欲利水，反取表药为里症用，故虽重用姜、桂，而以里药名方耳。厥阴伤寒，先热者后必厥，先热时必消渴。今厥而心下悸，是下利之源，斯时不热不渴可知矣。因消渴时饮水多，心下之水气不能入心为汗，蓄而不消，故四肢逆冷而心下悸也。肺为水母，肺气不化，则水气不行。茯苓为化气之品，故能清水之源；桂枝、生姜，则从辛入肺，使水气通于肺，以行营卫阴阳，则外走肌表而为汗矣；佐甘草以缓之，汗出周身，而厥自止，水精四布，而悸自安。以之治水者，即所以治厥也。伤寒心悸无汗而不渴者，津液未亏，故也用此方大发其汗。用姜、桂与茯苓等分，而不用芍药、大枣，是大发其汗。佐甘草者，一以协辛发汗，且恐水渍入胃也。

【临证举例】心下停水　《伤寒论临床实验录》：程某，男，年48岁。平素脾气衰弱，常患嗳气胃满，消化滞呆之证。后在溽暑季节，贪食瓜果，而患腹泻。服健脾利水之剂，腹泻止，而胸脘满闷异常，逆气上冲，烦躁不宁，头眩欲呕，心下漉漉作水声，四肢逆冷，舌质淡，而苔白腻，脉象沉弦。此为脾不健运，水湿停潴之证。故以扶阳温胃行水之茯苓甘草汤治之。处方：桂枝15克，茯苓24克，生姜15克，甘草3克。连服两剂，而躁烦不作，脘闷消失，冲逆平息，脉象虚软。后以健脾行水之剂，调理而愈。

10065　茯苓四逆汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】茯苓四两　人参一两　附子一枚（生用，去皮，破八片）　甘草二两（炙）　干姜一两半

【用法】上药以水五升，煮取三升，去滓，温服七合，一日二次。

【功用】回阳益阴。

【主治】发汗，若下之，病仍不解，烦躁者。

【方论选录】①《内台方议》：发汗之，病当解，若不解，发汗外虚阳气；后若下之，内虚阴气，阴阳俱虚，邪独不解，故生烦躁也。与四逆汤以复阳气，加人参、茯苓以复阴气也。②《伤寒附翼》：先汗后下，于法为顺，而表仍不解，是妄下亡阴，阴阳俱虚而烦躁也。故制茯苓四逆，固阴以收阳。茯苓感天地太和之气化，不假根而成，能补先天无形之气，安虚阳外脱之烦，故以为君。人参配茯苓，补下焦之元气；干姜配生附，回下焦之元阳。调以甘草之甘，比四逆为缓，固里宜缓也。

【临证举例】①烦躁　《中医杂志》（1965；1：28）：段某某，素体衰弱，形体消瘦，患病年余，久治不愈，证见两目欲脱，烦躁欲死，以头冲墙，高声呼烦。家属诉：初起微烦头痛，屡经诊治，因其烦躁，均用寒凉清热之剂，多剂无效，病反增剧。面色青黑，精神极惫，气喘不足以息，急汗如油而凉，四肢厥逆，脉沉细欲绝。拟方如下：茯苓一两，高丽参一两，炮附子一两，炮干姜一两，甘草一两。急煎服之，服后烦躁自止，后减其量，继服十余剂而愈。②发热　《中医杂志》（1965；1：28）：患者李某某，女，35岁，农民，于1955年诊治。患者素阳不足，外感寒邪，发热恶寒，寒多热少，入夜尤甚，常增被而不暖。初用辛凉解表，继用苦寒泄下，以致病重，卧床不起已三月矣。现证：面色晄白无华，精神恍惚，形体消瘦，凉汗大

出，面颊沟汗满下流，语声低微、气息奄奄，四肢厥逆，六脉欲绝。拟方：茯苓一两，炮附子五钱，潞党参五钱，干姜五钱，甘草五钱，二日内连服七剂，汗止足温，六脉来复，继服20余剂而愈。③疟疾 《中医杂志》(1965；1:29)：患者马某某，82岁，住城关旭光社，于1965年诊治，久患疟疾，触邪而发，六脉沉弦，寒热往来，发作有时。发则高热谵语，胸满闷而疼，曾用大柴胡治疗，服后下利虚脱，急请抢救。证见：虚脱，倒卧子地，面色脱落，下利黑屎满身，牙关紧急，不能言语，仅有微息，六脉沉微欲绝，四肢厥逆。拟方：茯苓一两，炮附子八钱，炮干姜五钱，人参五钱，甘草五钱，急煎服之。一剂泻止足温，能言气壮，六脉来复，继服三剂，其疟亦随之而愈。④肺心病《浙江中医杂志》(1981；10:422)：陶某某，男，60岁，1980年3月3日初诊，素有"慢支"、"肺气肿"、"肺心"等病，已历10余年，每遇天气变化即发。刻诊面色黯滞，唇及四肢紫绀，咳嗽气急，心悸，坐卧不宁，肢冷，脉伏，舌色紫暗、苔白而灰糙。证属阴虚子里，阳脱于外。急予回阳救逆：茯苓、西党参各9克，淡附子、炙甘草各6克，干姜、黑锡丹（吞）各3克。3剂后，面唇紫绀已瘥，咳嗽气急亦减，肢端仍紫绀，便溏，尿少，脉沉细，舌质黯红，苔黄灰而腻。脾肾阳虚未复，仍予前方，淡附子加至9克，西党参加至15克。3剂后，面容转红润，气平，肢缓，二便正常。

10066 茯苓白术汤

【方源】《直指》卷三。

【组成】 茯苓 干姜（炮） 甘草（炙） 白术 辣桂 苍术（炒）各等分

【用法】 上锉。每服三钱，水煎服。

【主治】 中湿，身体痛重。

10067 茯苓半夏汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】 茯苓 半夏 枳实 桔梗 厚朴 大腹皮 本通 苍术 陈皮

【主治】 水结胸，但头汗出，心下满，揉之汩汩有声者。

10068 茯苓半夏汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷四。

【组成】 赤苓 半夏 陈皮 苍术 厚朴

【主治】 痰饮呕吐。

10069 茯苓戎盐汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 茯苓半斤 白术二两 戎盐（弹丸大）一枚

【用法】 先将茯苓、白术煎成，入戎盐再煎，分三次温服。

【功用】《金匮心释》：益肾健脾利湿。

【主治】 小便不利。

【方论选录】《沈注金匮要略》：夫湿热壅于膀胱则为淋，然伤脏未有不伤于脏者。故用白术健脾，茯苓渗湿，不使下流入肾为病；以戎盐养水软坚，而除阴火。

【备考】 本方方名，《本草纲目》引作"戎盐汤"。

10070 茯苓导水汤

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】 茯苓 槟榔 猪苓 缩砂 木香 陈皮 泽泻 白术 木瓜 大腹皮 桑白皮 苏梗各等分

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 妊娠肿满与子气，喘而难卧，胀满难堪；产后浮肿，喘嗽，小便不利者。

【加减】 胀，加枳壳；喘，加苦葶苈子；腿脚肿，加防己。

【临证举例】 于满 《新中医》(1979；3:30)：李某某，女，29岁。26岁结婚，婚后6个多月早产一次。现第二胎怀孕七个多月。从第四个月起，周身出现肿胀，腹部尤甚，先后延医数人，内服四十余剂中药，未见好转。现腹胀异常，四肢均有浮肿，自觉气短心悸，饮食少进，腰痛腿沉，白带甚多，行走困难来诊。处方：茯苓15克，白术15克，猪苓15克，泽泻5克，槟片5克，砂仁7.5克，木香3.5克，陈皮10克，腹皮15克，苏梗10克，当归10克，白芍7.5克。服药后胸脘略适，饮食稍增，尿量略多，守原方稍加减继服，十余剂后诸症基本痊愈，肿消痛减，惟体质较弱，改用当归散以善其后。

10071 茯苓苏子丸

【方源】《三因》卷十四。

【组成】 茯苓 苏子 杏仁（去皮尖）各二两 橘皮 防己 葶苈（纸炒）各一两一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服三十丸，食后桑白皮汤送下。

【主治】 面肿，小便涩，心腹胀满。

10072 茯苓补心汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】 白茯苓 人参 前胡 半夏（汤洗七次，去滑） 川芎各三分 橘皮 枳壳（麸炒，去

瓤） 紫苏 桔梗 甘草（炙） 干姜各半两 当归一两三分 白芍药二两 熟地黄一两半

【用法】 上为散。每服四大钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一个，煎七分，去滓食前服。

【主治】 心虚寒病，苦悸恐不乐，心腹痛，难以言，心寒，恍惚喜悲愁恚怒，衄血，面黄，烦闷，五心热渴，独语不觉，咽喉痛，舌本强，冷汗出，善忘，恐走，及治妇人怀孕，恶阻吐呕，眩晕，四肢怠惰，全不纳食。

10073 茯苓泽泻汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 茯苓汤（《千金翼》卷十九）。

【组成】 茯苓半斤 泽泻四两 甘草二两 桂枝二两 白术二两 生姜四两

【用法】 以水一斗，煮取三升，纳泽泻，再煮取二升半，温服八合，一日三次。

【主治】 ①《金匮》：胃反，吐而渴欲饮水者。②《三因》：霍乱，吐利后，烦渴欲饮水。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：胃反吐，津液竭而渴矣，斯欲饮水以润之，更无小便不利，而用此汤何哉？盖阳绝者，水虽入而不散于脉，何以滋润表里，解其燥郁乎？惟茯苓之淡行其上，泽泻之咸行其下，白术、甘草之甘和其中，桂枝、生姜之辛通其气，用布水精于诸经，开阳存阴，而治荣卫也。②《沈注金匮要略》：此外风乘胃，脾虚成饮之方也。风气通肝，木盛制土，脾胃气郁而反上逆，则为胃反，然吐则痰饮去而风火炽盛，胃津枯燥，以故吐而渴欲饮水，但木旺土衰，则水寡于畏，肾水反溢为饮，治当健脾，以除伏邪宿饮。故以姜、桂、术、草健脾和营卫，而驱邪外出，茯苓、泽泻导胃肾之余饮也。

【临证举例】 胃反 《金匮今释》：成绩录云，安部候臣菊池大夫，从候在浪华，久患胃反，请治于先生曰：不佞曩在江户得此病，其初颇吐水，间交以食，吐已乃渴，诸医交疗，百端不愈，一医叫我断食，诸证果已。七日始饮，复吐如初，至今五年，未尝有宁居之日，愿先生救之。先生乃诊其腹，自胸下至脐旁硬满，乃与茯苓泽泻汤，数日而痊愈。

10074 茯苓渗湿汤

【方源】《景岳全书》卷五十七引《活人书》。

【组成】 白茯苓 泽泻 茵陈 青皮 陈皮 防己各五分 栀子 黄芩各八分 黄连 枳实各七分 苍术 白术各一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 黄疸湿热，呕吐而渴，身目俱黄，小便不利，食少而热。

10075 茯苓渗湿汤

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】 白茯苓五分 泽泻五分 茵陈六分 猪苓二钱 陈皮 黄连 栀子 防己 白术 苍术 枳实各二分

【用法】 上㕮咀，作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，空心、食前温服。

【主治】 黄疸。寒热呕吐，渴欲饮冷，身体面目俱黄，小便不利，全不食，不得卧。

10076 茯苓琥珀散

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】 人参一两半 琥珀三两 川楝三两（酒炒） 泽泻一两半 延胡一两半（醋炒黑） 丹皮一两半 归梢三两 茯苓三两 甘草一两半

【用法】 上为散。长流水煎，去滓热服。

【主治】 血淋。茎中涩痛，牵引胁下，脉弦涩者。

【方论选录】 血滞膀胱，气不施化，故茎中痛引胁下，小便淋血不止焉。人参扶元化气以通血脉，茯苓渗湿利水以通水道，琥珀屑散瘀血通淋，延胡索活血滞止血，川楝子泻湿热除涩痛，牡丹皮凉血热退相火，归梢破宿血，泽泻利膀胱，草梢泻火缓中以除茎中之痛也。为散，长流水煎，是急方通剂，速其瘀化水行，俾膀胱之气化，则津液四布而水润木荣，小便淋血无不自止，何茎中痛引胁下之不痊哉。此扶元活血之剂，为血淋茎痛引胁之专方。

10077 茯神远志丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】 人参 龙齿 茯神 远志 菖蒲 知母 黄柏

【主治】 阴阳俱虚之遗泄。

10078 茯苓车前子饮

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】 茯苓 车前子各等分

【用法】 煎汤，时时代饮。

【功用】 利水导热。

【主治】 小便甚少，下利不止。

10079 茯苓杏仁甘草汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 茯苓汤（《千金》卷十三）、茯苓杏仁汤（《杏苑》卷二）。

【组成】 茯苓三两 杏仁五十个 甘草一两

【用法】 以水一斗，煮取五升，温服一升，一日三次。不愈，更服。

【主治】 ①《金匮》：胸痹，胸中气塞，短气。②《杏苑》：湿温，两胫逆冷，胸满头眩重疼，妄言多汗，其脉阳濡而弱，阴小而急。

【方论选录】《沈注金匮要略》：此痹胸中之气也，邪气阻塞胸膈，肺气不得往来流利，则胸中气塞短气。方用杏仁通调肺气，以茯苓渗导饮湿下行，甘草和中，俾邪去则痹开而气不短矣。

10080 茯苓栀子茵陈汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【异名】 茯苓茵陈栀子汤(《准绳·类方》卷五)。

【组成】 茵陈叶一钱 茯苓（去皮）五分 栀子仁 苍术（去皮，炒） 白术各三钱 黄芩（生）六分 黄连（去须） 枳实（麸炒） 猪苓（去皮） 泽泻 陈皮 汉防已各二分 青皮（去白）一分

【用法】 上㕮咀，作一服。用长流水三盏，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】 谷疸。

【方论选录】《内经》云：热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘。又：湿化于火，热反胜之，治以苦寒，以苦泄之，以淡渗之。以栀子、茵陈苦寒，能泻湿热而退其黄，故以为君；《难经》云：并主心下满。以黄连、枳实苦寒，泄心下痞满，肺主气，今热伤其气，故身体麻木，以黄芩苦寒，泻火补气，故以为臣；二术苦甘温，能除胃中湿热，泄其壅滞，养其正气，汉防已苦寒，能去十二经留湿，泽泻咸平，茯苓、猪苓甘平，导膀胱中湿热，利小便而去癃闭也。

【临证举例】 谷疸 《卫生宝鉴》：元颜正卿丙寅二月间，因官事劳役，饮食不节，心火乘脾，脾气虚弱。又以恚怒，气逆伤肝，心下痞满，四肢困倦，身体麻木，次传身目俱黄，微见青色颜黑，心神烦乱，怔忡不安，兀兀欲吐，口生恶味，饮食迟化，时下完谷，小便癃闭而赤黑，辰巳间发热，日暮则止，至四月尤盛，脉浮而缓。治以本方，一服减半，二服良愈。

10081 茯苓安肝定精神丸

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】 茯苓丸(《圣济总录》卷八十六)。

【组成】 茯苓 远志（去心） 防风 人参 柏子仁（熬）各五分 龙骨七分 牡蛎（熬） 大枣肉各八分 甘草四分（炙）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服二十丸，加至二十丸为度，暖清白饮送下，一日两次。

【主治】 肝劳热，恐畏不安，精神不守，闷怒不能独卧，感激惆怅，志气错越，不得安宁。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、大酢。

10082 茯苓桂枝甘草大枣汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 甘草大枣汤(《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》)、茯苓桂枝汤(《伤寒总病论》卷三)、茯苓汤(《圣济总录》卷二十六)、茯苓桂甘汤(《直指》卷十八)、茯苓桂甘大枣汤(《伤寒图歌活人指掌》卷四)、茯苓桂枝甘枣汤(《内台方议》卷六)、茯苓甘桂大枣汤(《医统》卷十四)、苓桂甘枣汤(《类聚方》)、桂苓甘枣汤(《医级》卷七)。

【组成】 茯苓半斤 桂枝四两（去皮） 甘草二两（炙） 大枣十五枚（擘）

【用法】 以甘澜水一斗，先煮茯苓减二升，纳诸药，煮取三升，每服一升，去滓温服，一日三次。

【功用】《注解伤寒论》：降肾气。

【主治】 ①《伤寒论》：发汗后，其人脐下悸，欲作奔豚。②《圣济总录》：伤寒发汗后，腹下气满，小便不利。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：本方用茯苓以伐肾邪，桂枝能泄奔豚，甘草、大枣之甘滋助脾土以平肾水气。煎用甘澜水者，扬之无力，取不助肾气也。②《金鉴》：此方即苓桂术甘汤去白术加大枣倍茯苓也。彼治心下逆满，气上冲胸，此治脐下悸，欲作奔豚。盖以水停中焦，故用白术，水停下焦，故倍茯苓。脐下悸，是邪上干心也，其病由汗后而起，自不外乎桂枝之法。仍以桂枝、甘草补阳气，生心液；倍加茯苓以君之，专伐肾邪；用大枣以佐之，益培中土；以甘澜水煎，取其不助水邪也。土强自可制水，阳建则能御阴，欲作奔豚之病，自潜消而默化矣。

【临证举例】 胃神经官能症 （《辽宁中医杂志》1982；12：27）：顾某，男，63岁，1971年7月8日来诊。脐下动悸，其势下趋，时轻时剧，日夜不休，甚则影响入睡，如此已2月。精神疲惫，颇为叫苦。脉弦虚滑，舌苔淡黄边有齿印，此为气血流行失畅，郁而求伸，因而脐下悸动。加味苓桂甘草汤：茯苓15克，桂枝6克，炒白术10克，炙甘草5克，大枣15枚，夜交藤30克，紫丹参15克，合欢皮12克，龙牡各30克，服药3剂，病愈十分之二。改方：茯苓18克，桂枝9克，炒白术10克，炙甘草6克，大枣20枚，龙牡各30克，淮小麦30克，百合12克，生地12克，3剂脐下动悸完全消

失，安然入睡已三夜矣。谁知停药后，又见小有发作，遂于7月18日再次就诊。自诉药后病情大有好转，但未见巩固。询之口不干，足见本方对证，效不变方，5剂而愈，一年后随访未复发。

10083 茯苓桂枝白术甘草汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 苓桂术甘汤(《金匮》卷中)、甘草汤(《千金》卷十八)、茯苓白术汤(《伤寒总病论》卷三)、茯苓汤(《圣济总录》卷五十四)、茯苓散(《普济方》卷四十三)、茯苓白术桂枝甘草汤(《伤寒全生集》卷四)、茯苓桂甘白术汤(《医统》卷十四)、茯苓桂术甘草汤(《医学入门》卷四)、苓桂汤(《杏苑》卷四)、苓桂术甘草汤(《景岳全书》卷五十四)、桂苓甘术汤(《医方集解》)。

【组成】 茯苓四两 桂枝三两（去皮） 白术 甘草（炙）各二两

【用法】 以水六升，煮取三升，去滓，分三次温服。

【功用】 温阳健脾，利水降冲。

①《注解伤寒论》：和经益阳。②《医方集解》：升阳化气。③《中医方剂学》：健脾渗湿，温化痰饮。

【主治】 ①《伤寒论》：伤寒，若吐若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者。②《金匮》：心下有痰饮，胸胁支满，目眩；短气有微饮。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：阳气不足者，补之以甘，茯苓、白术生津液而益阳也；里气逆者，散之以辛，桂枝、甘草，行阳散气。②《内台方议》：此阳气外内皆虚也，故用茯苓为君，白术为臣，以益其不足之阳，经曰：阳不足者，补之以甘，是也；以桂枝为佐，以散里之逆气；以甘草为使，而行阳气，且缓中也。③《金鉴》：此汤救麻黄之误汗，其邪尚在太阳，故主以桂枝，佐以甘草、苓、术，是扶表阳以涤饮也。

【临证举例】 ①饮证 《伤寒论诠解》：陈某某，女，52岁。大便秘结，五、六日一行，坚如羊屎，伴有口渴，但又不能饮，自觉有气上冲，头晕，心悸，胸满。每到夜晚上冲之势加甚，而头目昏眩则更甚。周身轻度浮肿，小便短少不利，面部虚浮，目下色青，舌胖质淡，苔则水滑。处方：茯苓30克，桂枝10克，白术10克，炙甘草6克。服两剂，头晕、心悸与气冲等证均减。二诊仍于上方加肉桂3克，泽泻12克，服两剂，口干止，大便自下，精神转佳，冲气又有进一步的减轻。三诊用苓桂术甘与真武汤合方，服三剂，诸证皆除。②咳嗽《湖北中医医案选集》：胡某某，男，34岁，少年体弱，常患咳嗽，吐痰沫，轻则用生姜擦背即愈，重则延医治疗，至成年后，每发则背心怕冷，需热手按摩觉舒，屡发屡治，难获远效。近因伤风，旧病又发，咳唾清痰，头晕目眩，胸胁胀满，口淡食少，心下如有物跳动，背部怕冷如掌大之处尤甚。脉沉细而弦，舌嫩，苔白滑，无发热身疼证，呼吸短浅难续，尿清量少，大便自调。宜用温阳化饮之苓桂术甘汤。茯苓四钱，桂枝二钱，焦术二钱，炙草二钱，外用药饼熨其背部冷处。五剂药尽，诸证悉平，现已观察二年，竟未复发。③咳而遗尿《伤寒论方医案选编》：姜某某，女，35岁，农民。患者于1962年6月生产一孩（第4胎），产后匝月，感受寒邪，引起咳嗽。咳嗽一月余即发现咳嗽时小便滴滴而出，夜间咳嗽尤甚，小便淋漓尤多，曾经中西医治疗，未见显效。胸部X线透视正常，听诊两肺底部有稀疏湿性罗音，未见其他异常病变。就诊时病已逾16个月，咯痰不多而色白，纳食正常，舌苔薄白，脉象弦细。处方：茯苓15克，桂枝6克，白术9克，甘草3克，服药3剂症大减，服6剂咳止，尿遗亦愈。

【备考】 本方方名，《准绳·类方》引作“桂苓术甘汤”。

10084 茶牙汤

【方源】《洪氏集验方》卷四。

【组成】 细茶牙一两 生草乌半两（去皮尖） 细辛半两

【用法】 上为粗末。每服五钱，水二盏，慢火煎至六分，去滓温服。

【主治】 偏正头疼，恶心呕吐不止者。

10085 茶调散

【方源】《普济方》卷四十五引《余居士选奇方》。

【组成】 香白芷二两半（炒） 川芎一两（锉，炒） 甘草一两（锉，炒） 川乌头半两（炮，锉）

【用法】 上为末。每服二钱，好茶少许、薄荷三叶，沸汤调下。

【主治】 偏正头风，诸药不愈者。

【加减】 暴伤风头疼，加葱白二寸（细切），和茶调下。

10086 荠苨丸

【方源】《济生》卷四。

【组成】 荠苨 大豆（去皮） 茯神（去木） 磁石（煅，研极细） 玄参 栝楼根 石斛（去根）

地骨皮（去木） 熟地黄（酒蒸） 鹿角各一两 沉香（不见火） 人参各半两

【用法】 上为细末，用猪肾一具，煮如食法，令烂，杵和为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。如不可丸，入少酒糊亦可。

【主治】 强中为病，茎长兴盛，不交精液自出，消渴之后，多作痈疽，多由过服丹石所致。

10087 荠苨散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 荠苨一两 人参一两（去芦头） 茯神一两 葛根一两（锉） 石膏二两 黄芩一两 栝楼根一两 知母一两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加大豆一百粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 消中烦热，吃食旋消，四肢羸弱。

10088 荠菜粥

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】 鲜荠菜 粳米

【用法】 煮粥服。

【功用】 ①《本草纲目》：明目利肝。②《长寿药粥谱》：补虚健脾，明目止血。

【主治】《长寿药粥谱》：水肿，吐血，便血，尿血，目赤目暗。现用于乳糜尿，视网膜出血，老年性浮肿，慢性肾炎。

10089 荛蔚丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【异名】 荛蔚子丸(《普济方》卷七十九)。

【组成】 荛蔚子 人参 干山药各二两 茯苓 石决明 大黄 黑参 黄芩各一两 干地黄一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心茶送下。

【主治】 鸡冠蚬内外障。

10090 荛蔚老姜汤

【方源】《蒲辅周医疗经验》。

【组成】 荛蔚子（益母草代亦可）一两 煨老生姜一两 红糖二两

【用法】 煎取三碗，分三次热服。每月行经时服之。

【功用】《古今名方》：活血调经，温经止痛。

【主治】 经行腹痛。

10091 荡鬼汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】 人参一两 当归一两 大黄一两 雷丸三钱 川牛膝三钱 红花三钱 丹皮三钱 枳壳一钱 厚朴一钱 小桃仁三十粒

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人有腹似怀妊，终年不产，甚至二三年不生者。其人面色黄瘦，肌肤消削，腹大如斗。

【方论选录】 此方用雷丸以祛秽，又得大黄之扫除，且佐以厚朴、红花、桃仁等味，皆善行善攻之品，何邪之尚能留腹中而不尽逐下也哉。尤妙在用参归以补气血，则邪去而正不伤。若单用雷丸、大黄以迅下之，必有气脱血崩之患矣。

10092 荡胞汤

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】 朴消 桃仁（去皮尖双仁，熬） 茯苓 牡丹皮 大黄各三两 人参 桂心 芍药 厚朴（炙） 细辛 牛膝 当归 橘皮各二两 附子一两半（炮，去皮） 虻虫（去翅足，熬） 水蛭各六十枚（熬）

【用法】 上㕮咀。以酒五升，水六合，渍一宿，煮取三升，分四服，日三次，夜一次。每服相去三时辰。少时更服如常，覆被少取汗，汗不出，冬月着火笼，必下积血及冷赤脓如赤小豆汁。本为妇人子宫内有此恶物令然，或天阴脐下痛，或月水不调，为有冷血不受胎，若斟酌下尽，气力弱，大困不堪更服，亦一日二三服即止。如大闷不堪，可食酢饭冷浆一口即止。然恐恶物不尽，不大得药力，若然，忍服尽大好，一日后仍着导药。

【主治】 妇人断续二三十年及生来无子并数数失子。

10093 荡胸汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 蒌仁二两（新炒者，捣） 生赭石二两（研细） 苏子六钱（炒，捣） 芒消四钱（冲服）

【用法】 上药，以水四钟，煎取清汁二钟，先温服一钟，结开，大便通行，停后服。若其胸中结犹未开，过二点钟，再温服一钟。若胸中之结已开，而大便犹未通下，且不觉转矢气者，仍可温服半钟。

【主治】 寒温结胸，其证胸膈痰饮与外感之邪互相凝结，上塞咽喉，下滞胃口，呼吸不利，满闷短气，饮水不能下行，或转吐出。

10094 荡痰汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生赭石二两（轧细） 大黄一两 朴消六钱 清半夏三钱 郁金三钱

【主治】 癫狂失心，脉滑实者。

10095 荨麻疹汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 生地 15 克 丹皮 9 克 白茅根 30 克 赤芍 9 克 金银花 15 克 连翘 15 克 当归尾 3 克 山栀 9 克 苍耳子 9 克 薏苡仁 15 克 谷芽 15 克 麦芽 15 克 白鲜皮 9 克

【功用】 凉血清热，活血祛风。

【主治】 荨麻疹，属血燥感风者，疹块突发，疹红，热痒。

【方论选录】 方中用生地、丹皮、茅根、赤芍凉血；金银花、连翘清热解毒；当归尾活血止痒；苍耳子祛风止痒；白鲜皮能清热解毒，祛风止痒；谷芽、麦芽助消化；山栀、薏苡仁引热下行。

10096 荔香散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 神香散(《医钞类编》卷五)。

【组成】 荔枝核（炮微焦） 大茴香（炒）各等分

【用法】 上为末。每服二三钱，用好酒调下。

【主治】 疝气痛极，在气分者，小腹气痛。

10097 荔枝橘核汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十一。

【组成】 荔枝 橘核 桃仁 甘草 茯苓 白术 枳壳 山楂 延胡索

【用法】 清水煎服。

【主治】 痛疝。

10098 药母鸡

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】 母鸡一只

【用法】 去毛肠，入当归三钱，白芷、羌活各二钱，细辛一钱，同好酒煮食。不可入盐醋，二三服痊愈。

【主治】 年久头风，妇人多有之。

10099 荣润汤

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】 四物汤加桃仁 红花 麻仁 枳壳

【主治】 腑噎，便秘。

【加减】 结甚，加熟大黄；中年人，加童便、韭汁、牛乳、羊乳、竹沥、姜汁。

10100 赴晏散

【方源】《回春》卷五。

【异名】 赴筵散(《外科正宗》卷四)。

【组成】 黄连 黄柏 黄芩 栀子 细辛 干姜 各等分

【用法】 上为细末。先用米泔水漱口，后搽药于患处，或吐或咽不拘。

【功用】《北京市中药成方选集》：清胃去火，消肿止痛。

【主治】 三焦实热，口舌上疮糜烂，痛不可忍者。

10101 赴筵散

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】 密陀僧 黄柏 青黛各等分

【用法】 上为细末。每用干掺于疮上。不经三二日愈。

【主治】 口疮不已者。

10102 赴筵散

【方源】《三因》卷十六。

【组成】 五倍子一两（洗） 黄柏（蜜涂，炙紫色） 滑石各半两

【用法】 上为细末。每用半钱许，掺患处。咽津不妨，便可饮食。

【主治】 口疮疼痛。

10103 赴筵散

【方源】《局方》卷七（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 良姜（去芦） 草乌（去皮） 细辛（去土叶） 荆芥（去梗）各二两

【用法】 上为末。每用少许，于痛处擦之。有涎吐出，不得吞咽，良久用温盐汤灌漱，其痛即止。常使揩牙，用腐炭末一半相和。

【功用】 止牙宣，辟口气。

【主治】 风牙、虫牙攻注疼痛，昼夜不止，痛不可忍，睡卧不安，牙龈宣露，动摇欲脱，或腮颔浮肿，龈烂血出。

10104 赴筵散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 五倍子 蜜陀僧各等分

【用法】 上为细末。先以浆水漱过，干贴。

【主治】 口疮。

10105 赴筵散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 铜绿 白矾各一钱

【用法】 上为末。掺舌上，温醋漱之。

【主治】 口疮，臭腐多脓。

10106 砒石膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 红砒石 3 克 水银 3 克 生明矾 15 克 硫黄 15 克 花椒 15 克 蛇床子 15 克 大风子油肉 15 克 升药底 15 克 老烟膏 9 克 樟脑 9 克

【用法】 上药各为极细末，用生猪油或麻油调成油剂或膏剂。外用。

【主治】 银屑病。

10107 砒霜散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】 砒霜一分 硫黄三分 密陀僧三分 腻粉二分

【用法】 上为细末，癣干，即以生油调涂；若癣湿，即用药末掺之。

【主治】 癣。不问干湿，积年不愈。

10108 砂仁粥

【方源】《老老恒言》卷五。

【组成】 粳米 砂仁（炒，为末）

【用法】 先以粳米煮粥，待粥成后，调入砂仁细末服。

【功用】 醒脾胃，通滞气，散寒饮，温肝肾。

【主治】 ①《老老恒言》：呕吐，腹中虚痛，上气咳逆，胀痞。②《长寿药粥谱》：脾胃虚寒性腹痛泻痢，消化不良，脘腹肿满，食欲不振，气逆呕吐。

【备考】《长寿药粥谱》本方用粳米二两，砂仁末一至二钱，煮粥成，调入砂仁末，早、晚温食。

10109 砂淋丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 黄色生鸡内金一两 生黄耆八钱 知母八钱 生杭芍六钱 硼砂六钱 朴消五钱 消石五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，食前开水送服，一日二次。

【主治】 砂淋，亦名石淋。

【方论选录】 鸡内金为鸡之脾胃，原能消化砂石；硼砂可为金银铜焊药，其性原能柔五金，治骨鲠，故亦善消硬物；朴消《本经》谓能化七十二种石，消石《本经》不载，而《别录》载之，亦谓其能化七十二种石，想此二味，性味相近，古原不分，即包括于朴消条中，至陶隐居始别之，而化石之能则同。然诸药皆取消破之品，恐于元气有伤，故加黄耆以补气分，气分壮旺，益能运化药力。犹恐黄耆性热，与淋证不宜，故又加知母、芍药以解热滋阴，而芍药之性，又善引诸药之力以至膀胱也。

10110 砂枳二陈汤

【方源】《医方集解》。

【组成】 二陈汤加砂仁 枳壳

【功用】 行痰利气。

【主治】 ①《医方集解》：嘈杂。②《类证治裁》：痰痞，中脘痰气不利。

10111 牵牛丸

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】 黑牵牛 黄芩 大黄 大椒 滑石各等分

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五丸至七丸，食后生姜汤送下。

【主治】 一切湿热肿满。

10112 牵牛丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 木香 白茯苓 厚朴各一两 大黄 泽泻各一两半 滑石 黑牵牛各六两

【用法】 上为细末，水煮稀糊为丸，如梧桐子大。每服二五十丸，淡姜汤送下。

【主治】 肚实热，二便不通。

10113 牵牛串

【方源】 方出《本草纲目》卷十八引《经验方》，名见《串雅内编》卷三。

【组成】 黑牵牛一斤（生）

【用法】 上药为末八两，余滓以新瓦炒香，再捣取四两，炼蜜为丸，如梧桐子大。至重者，每服三五十丸，陈橘皮、生姜煎汤，临卧服。半夜未动，再服三十丸，当下积聚之物。寻常行气，每服十丸。

【主治】 五积成聚。

【宜忌】《串雅内编》：虚者慎用。

10114 牵牛散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】 牵牛子二两（微炒） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 桑根白皮二两（锉） 槟榔一两 郁李仁二两（汤浸，去皮，微炒） 汉防己一两 猪苓一两（去黑皮） 木通一两（锉）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，空腹温服。如入行十里，当利三二行，如未利即再服。

【主治】 水气遍身浮肿，气息喘急，小便赤涩。

10115 牵正散

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【异名】 祛风散（《鲁府禁方》卷一）、三神散（《仙拈集》卷一）。

【组成】 白附子 白僵蚕 全蝎（去毒）各等分（并生用）

【用法】 上为细末。每服一钱，热酒调下，不拘时候。

【主治】 中风，口眼㖞斜，半身不遂。

【方论选录】 ①《医方考》：芎、防之属，可以驱外来之风，而内生之风，非其治也；星、夏之

辈，足以治湿土之痰，而虚风之痰，非其治也。斯三物者，疗内生之风，治虚热之痰，得酒引之，能入经而正口眼。白附之辛，可使驱风；蚕、蝎之咸，可使软痰；辛中有热，可使从风；蚕、蝎有毒，可使破结。医之用药，有用其热以攻热，用其毒以攻毒者，《大易》所谓同气相求，《内经》所谓衰之以属也。②《成方便读》：全蝎色青善走者，独入肝经，风气通于肝，为搜风之主药；白附之辛散，能治头面之风；僵蚕之清虚，能解络中之风；三者皆治风之专药，用酒调服，以行其经。

【备考】 本方改为丸剂，名"牵正丸"（见《慈禧光绪医方选议》）。

10116 牵牛子丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】 牵牛子三分（微炒） 汉防己一分 椒目一分（微炒） 滑石半两 瞿麦半两 槟榔半两 甘遂一分（煨令微黄） 泽漆一分（微炒） 桑根白皮半两（锉） 甜葶苈半两（隔纸炒令紫色） 郁李仁二分（汤浸，去皮，微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹以木通、灯心汤送下。以利为度。未得快利，即再服之。

【主治】 十种水气，遍身浮肿，大小便涩，喘促不止。

【备考】 方中泽漆，《普济方》作"泽泻"。

10117 牵牛子丸

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】 牵牛子（半生半炒）三两 槟榔（生，锉）二两 木香一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒、米饮任下。

【主治】 气胀满，大便秘涩，腹胁刺痛。

10118 牵牛子散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 牵牛子一两（微炒） 青橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 槟榔一两 汉防己半两 赤茯苓半两 木通三分（锉） 桑根白皮三分（锉）

【用法】 上为细散。每服三钱，空心煎生姜、葱白汤调下，以利为效，未利再服。

【主治】 妇人水气，腹胁妨闷，四肢浮肿，喘气微利，小便不利。

10119 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 厚朴三两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 陈橘皮二两（汤浸，去白瓤，焙） 草豆蔻一两（去皮） 白术一两 缩砂一两（去皮） 诃黎勒二两（煨，用皮） 桂心一两 干姜一两（炮裂，锉）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】 脾胃气虚冷，水谷不化，食即腹胀，胸膈不利。

10120 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】 厚朴三两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 黄连二两（去须，微炒） 木香一两 干姜一两（炮裂，锉）

【用法】 上为末，用醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 水泻。

10121 厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙熟） 丁香皮 桑根白皮（锉，炒） 白术 桔梗（炒） 沉香（锉） 人参 槟榔（锉）各一两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心橘皮汤送下。

【主治】 久腹胀，烦闷，食不消。

10122 厚朴丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】 厚朴四两 陈橘皮三两 干姜二两 附子一两

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】 脾胃虚积冷，腹胁刺痛，饮食进退，大便秘泄。

10123 厚朴饮

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 生姜（切，焙）各一两半 槟榔（锉）三枚 肉豆蔻（去壳，炮）一两 吴茱萸（洗，焙，微炒）三分 陈橘皮（汤浸，去白，焙）一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，空腹温服，如人行五里再服。

【主治】 反胃。两胁妨胀，食不消化。

10124 厚朴散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 吴茱萸一两（汤浸七遍，微炒） 白茯苓一两 桔梗一两（去芦头） 芎藭一两 白术二两 附子

一两（炮裂，去皮脐） 陈橘皮二两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，稍热服。

【主治】 中焦虚寒，好吐白沫清涎，吞酸。

10125 厚朴散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 沉香三分 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 槟榔半两 丁香半两 诃黎勒皮一两半 桂心半两 白术三分 高良姜三分（锉） 草豆蔻一两（去皮） 木香三分 人参三分（去芦头） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 膈气。脾胃久冷，宿食不消，心腹虚胀，四肢瘦弱。

10126 厚朴散

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】 厚朴 牡蛎 白术各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，空心米饮调下，一日二三次。

【主治】 白浊。

10127 厚朴散

【方源】《金鉴》卷四十一。

【组成】 厚朴 槟榔 木香 枳壳 青皮 陈皮 甘遂 大戟

【主治】 单腹鼓胀、肠覃属气实者。

10128 厚肠丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 厚朴丸(《普济方》卷三九三)。

【组成】 厚朴 青皮各二分 橘红 半夏 苍术 人参各三分 枳实 麦芽面 神曲末各五分

【用法】 上为极细末，水煮面糊为丸，如麻子大。每服二十丸，食前温水送下。

【主治】 小儿失乳，以食饲之，不能克化，或生腹胀，四肢瘦弱，或痢色无常。

【宜忌】 忌饱食。

10129 厚肠汤

【方源】《三因》卷十二。

【组成】 罂粟壳八两（锉，炒） 地榆六两 白术 紫苏叶 木瓜干各二两

【用法】 上为散。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，大枣二个，煎七分，去滓，空腹服。

【主治】 下痢赤白。

10130 厚朴七物汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 厚朴七味汤(《外台》卷七)、七物厚朴汤(《袖珍》卷三引《圣惠》)。

【组成】 厚朴半斤 甘草三两 大黄二两 大枣十枚 枳实五枚 桂枝二两 生姜五两

【用法】 上药以水一斗，煮取四升。每服八合，温服，每日三次。

【主治】 ①《金匮》：病腹满，发热十日，脉浮而数，饮食如故。②《千金》：腹满气胀。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜、生葱、羊肉、饧。

【加减】 呕者，加半夏五合；下利，去大黄；寒多者，加生姜至半斤。

【方论选录】 ①《沈注金匮要略》：此有表证腹满也。发热十日之久，脉尚浮数，当责风邪在表。然风气内通于肝，肝盛乘胃，故表见发热，而内作腹满；风能消谷，即能食而为中风，所以饮食如故。用小承气荡涤肠胃之热，桂、甘、姜、枣调和营卫，而解在表之风耳。②《张氏医通》：此本小承气合桂枝汤，中间裁去白芍之酸收，不致引邪入犯营血。虽同用桂枝、甘草，与桂枝汤泾渭攸分。其厚朴独倍他药，正以泄气之浊逆耳。

10131 厚朴三物汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 厚朴汤(《千金翼》卷十八)、三物汤(《血证论》卷八)。

【组成】 厚朴八两 大黄四两 枳实五枚

【用法】 上药以水一斗二升，先煮二味，取五升，纳大黄，煮取三升，温服一升。以利为度。

【主治】 腹满痛，大便闭。

①《金匮》：痛而闭者。②《千金翼》：腹满发热数十日。腹中热，大便不利。③《症因脉治》：暑湿腹痛，大便结。④《金匮翼》：食积痛、寒饮食过伤，心腹卒痛，如锥刺之状，若伤湿热之物，不得化而闷乱便秘者。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：闭者，气已滞也。《经》曰塞也，通因通用，此之谓也。于是以小承气通之。乃易其名为三物汤者，盖小承气君大黄以一倍，三物汤君厚朴以一倍者，知承气之行，行在中下也；三物之行，因其闭在中上也。绎此，可启悟子无穷矣。②《金匮要略心典》：痛而闭，六腑之气不行矣。厚朴三物汤与小承气同，但承气意在荡实，故君大黄；三物意在行气，故君厚

朴。

10132 厚朴大黄汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】枳朴大黄汤(《赤水玄珠》卷四)。

【组成】厚朴一尺 大黄六两 枳实四枚

【用法】上药以水五升，煮取二升，分二次温服。

【主治】①《金匮》：支饮胸满。②《症因脉治》：腹痛，脉数，应下之症。

【方论选录】①《金匮玉函经衍义》：凡仲景方，多一味，减一药，与分两之更重轻，则异其名，异其治，有如转丸者。若此三味，加芒消则谓之大承气，治内热腹实满之甚；无芒消，则谓之小承气，治内热之微甚；厚朴多，则谓之厚朴三物汤，治热痛而闭。今三味以大黄多，名厚朴大黄汤，而治是证。上三药皆治实热而用之。②《千金方衍义》：此即小承气汤，以大黄多，遂名厚朴大黄汤；若厚朴多，即名厚朴三物汤。此支饮胸满，必缘其人素多湿热，浊饮上逆所致，故用荡涤中焦药治之。③《金匮要略心典》：胸满疑作腹满。支饮多胸满，此何以独用下法？厚朴大黄与小承气同，设非腹中痛而闭者，未可以此轻试也。

10133 厚朴六合汤

【方源】《元戒》。

【组成】四物汤四两 厚朴（姜制）一两 枳实（麸炒）半两

【主治】虚劳气弱，咳嗽喘满；妊娠伤寒汗下后，虚痞胀满者。

10134 厚朴豆蔻散

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】厚朴（去粗皮，锉，姜制，炒） 干姜（炮，洗） 草果仁 肉豆蔻（面裹煨） 良姜（炒）各七钱半 人参（紧实者，去芦） 缩砂仁各半两 白术一两半（麸炒） 丁香三两半（不见火） 藿香叶七钱（去土） 木香三分半（湿纸裹煨）

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加肥枣二个，煎至七分，温服，不拘时候。

【功用】补脾养胃。

【主治】脾胃不足，饮食生冷伤动所致。

10135 厚朴枳实汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】厚朴枳实散(《保命歌括》卷二十二)。

【组成】厚朴 枳实各一两 诃子一两（半生半熟） 木香半两 黄连二钱 甘草三钱（炙） 大黄二钱

【用法】上为末，每服三五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】虚滑泻痢，久不愈者。

【备考】虚滑久不愈者，多传变为痢疾，太阴传于少阴，是谓贼邪，先以此汤防其传变。

10136 厚朴麻黄汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】厚朴石膏汤(《圣济总录》卷六十七)。

【组成】厚朴五两 麻黄四两 石膏如鸡子大 杏仁半升 半夏半升 干姜二两 细辛二两 小麦一升 五味子半升

【用法】上药以水一斗二升，先煮小麦熟，去滓，纳诸药，煮取三升，每次温服一升，一日三次。

【主治】①《金匮》：咳而脉浮。②《千金》：咳而大逆，上气胸满，喉中不利，如水鸡声，其脉浮者。

【方论选录】①《医门法津》：若咳而其脉亦浮，则外邪居多，全以外散为主，用法即于小青龙汤中去桂枝、芍药、甘草，加厚朴、石膏、小麦，仍从肺病起见。以故桂枝之热，芍药之收，甘草之缓，概示不用，而加厚朴以下气，石膏以清热，小麦引入胃中，助其升发之气，一举而表解脉和，尹以置力于本病，然后破竹之势可成耳。一经裁酌，直若使小青龙载肺病腾空而去。②《沈注金匮要略》：此以脉之浮沉而分肺之营卫受病也。咳而脉浮，风邪在卫，即肺胀之类，其病尚浅，当使邪从表出。故以厚朴、杏仁下泄胸中气实，麻黄开腠驱邪、石膏以清风化之热，辛、半、干姜兼驱客寒而涤痰饮，五味收肺之热，小麦以调脾胃也。③《古方选注》：厚朴麻黄汤，大、小青龙之变方也。咳而上气作声，脉浮者，是属外邪鼓动下焦之水气上逆，与桂枝、芍药、甘草和营卫无涉。故加厚朴以降胃气上逆，小麦以降心气来乘，麻、杏、石膏仍从肺经泄热存阴，细辛、半夏深入阴分，祛散水寒，干姜、五味摄太阳而监制其逆，一举而泄热下气，散邪固本之功皆备，则肺经清肃之令自行，何患咳逆上气作声有不宁谧者耶？

【临症举例】咳嗽 《治验回忆录》：朱某，病患咳嗽，恶寒头疼，胸满气急，口燥烦渴、尿短色黄，脉浮而小弱。以《金匮》厚朴麻黄汤服药三剂，喘满得平，外邪解，烦渴止。再二剂，诸恙如失。

10137 厚朴温中汤

【方源】《内外伤辨》卷中。

【组成】 厚朴（姜制） 橘皮（去白）各一两 甘草（炙） 草豆蔻仁 茯苓（去皮） 木香各五钱 干姜七分

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水二盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓，食前温服。

【功用】 《谦斋医学讲稿》：温中散寒。

【主治】 ①《内外伤辨》：脾胃虚寒，心腹胀满，及秋冬客寒犯胃，时作疼痛。②《证治汇补》：脾胃着寒停食。

【方论选录】 《成方便读》：夫寒邪之伤人也，为无形之邪，若无有形之痰、血、食积互结，则亦不过为痞满、为呕吐，即疼痛亦不致拒按也，故以厚朴温中散满者为君；凡人之气，得寒则凝而行迟，故以木香、草蔻之芳香辛烈，入脾脏以行诸气；脾恶湿，故用干姜、陈皮以燥之，茯苓以渗之；脾欲缓，故以甘草缓之；加生姜者，取其温中散逆除呕也。以上诸药，皆入脾胃，不特可以温中，且能散表，用之贵得其宜耳。

【备考】 本方方名，《医方类聚》引作“厚朴汤”，无草豆蔻仁、木香。

10138 厚朴温中饮

【方源】 《医略六书》卷三十。

【组成】 附子一钱半（炮） 厚朴一钱半（制） 白术一钱半（炒） 泽泻一钱半 吴萸一钱（醋炒） 木香一钱半 干姜一钱半（炒） 青皮一钱半（炒） 肉桂一钱半（去皮）

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 产后腹寒胀，脉紧涩者。

【方论选录】 产后火虚，寒滞腹痛，而大便溏泄，小便涩少，遂成腹胀，谓之寒胀。附子补火壮阳以生脾土，肉桂补火散寒以暖血分，干姜温中逐冷，吴萸温中降逆，白术健脾气以运化，厚朴散滞气以宽中，青皮平肝破气，木香调气醒脾，泽泻泻湿以利小便也。水煎温服。使火暖土强，则寒滞自化，而小水自快，大便亦实，安有腹胀疼痛之患乎。

10139 厚朴生姜半夏甘草人参汤

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 厚朴汤（《千金》卷九）、厚朴人参汤（《伤寒总病论》卷三）、厚朴生姜人参甘草半夏汤（《医学纲目》卷三十一）、厚朴姜夏草参汤（《内台方议》卷八）、厚朴半夏甘草人参汤（《医统》卷十四）、厚朴半夏甘参汤（《医学入门》卷四）。

【组成】 厚朴半斤（炙，去皮） 生姜半斤（切） 半夏半斤（洗） 甘草二两（炙） 人参一两

【用法】 上药以水一斗，煮取三升，去滓，每服一升，温服，一日三次。

【功用】 补中散滞，和胃降逆。

①《注解伤寒论》：和脾胃而降气。②《成方切用》引喻嘉言：益胃和脾，降气涤饮。③《医方集解》：补虚散滞。④《金鉴》：消胀散满，补中降逆。

【主治】 中虚气滞，腹胀满，呕逆。

①《伤寒论》：伤寒发汗后，腹胀满者。②《圣济总录》：伤寒心腹胀满。③《张氏医通》：胃虚呕逆，痞满不食。④《胎产心法》：妊娠腹胀后重，赤白相兼之痢。

【方论选录】 ①《内台方议》：此汗后腹胀满者，为津液不足，气滞不通，壅而为满，为脾胀也。故用厚朴之苦，以泄腹满为君；生姜、半夏之辛，以散滞气为臣；人参之甘，生津液，补不足；甘草之甘，以缓其中者也。②《千金方衍义》：《伤寒论》原名厚朴生姜甘草半夏人参汤。本桂枝证误用麻黄发汗，浊阴之邪乘虚入里而致喘满，与泻心汤证似同而实小异。浊气填满，故首取厚朴以泄气滞，姜、半以破痰结，参，草以助清阳，清阳运动，而浊阴自除。本非结胸之寒热互结，故无藉于干姜、芩连、大枣也。③《古方选注》：太阴病，当腹满，是伤中也，与吐下后邪气入里腹胀治法不同。厚朴宽胀下气，生姜散满升津，半夏利窍通阴阳，三者有升降调中之理。佐以甘草和阴、人参培阳。补之泄之，则阴结散，虚满消。④《伤寒贯珠集》：发汗后，表邪虽解而腹胀满者，汗多伤阳，气窒不行也，是不可以徒补，补之则气愈窒；亦不可以泛攻，攻之则阳益伤，故以人参、甘草、生姜助阳气，厚朴、半夏行滞气，乃补泄兼行之法也。

【临证举例】 腹胀 《岳美中医案集》：尹某，男性，自述心下胀满，日夜有不适感，是属虚胀症。投以厚朴生姜半夏甘草人参汤（厚朴12克，生姜9克，半夏9克，炙甘草6克，党参4.5克）。经复诊1次，未易方而愈。

10140 威喜丸

【方源】 《圣济总录》卷九十二。

【异名】 感喜丸（《丹溪心法》卷三）、补虚威喜丸（《全国中药成药处方集》杭州方）。

【组成】 白茯苓四两（去黑皮，锉作大块，与猪苓一分，瓷器内同煮三二十沸，取茯苓再细锉，猪苓不用） 黄蜡四两

【用法】 上先捣茯苓为末，炼黄蜡为丸，如小弹子大。每服一丸，细嚼干咽下。小便清为度。

【功用】《成方便读》：调理阴阳，固虚降浊。

【主治】 元阳虚惫，精气不固，梦遗，遗尿，白淫；妇人血海久冷，白带，白浊，不孕。

①《圣济总录》：精气不固，小便白淫，及有余沥，或梦寐遗泄，妇人血海久冷，白带白漏，日久无子。②《三因》：两耳虚鸣，口干。③《医学入门》：肾有邪湿，精气不固。④《张氏医通》：溲溺如泔，淫痛梦泄，便浊属火郁者。⑤《古方选注》：肺虚痰火久嗽。

【宜忌】 ①《局方·续添诸局经验秘方》：忌米醋，只吃糠醋，切忌使性气。②《普济方》：忌腥气。③《古方选注》：尤忌怒气劳力。

【方论选录】 ①《古方选注》：《抱朴子》云，茯苓千万岁，其上生小木，状似莲花，名威喜芝。今以名方者，须择云茯苓之年深质结者，制以猪苓导之，下出前阴，蜡淡归阳，不能入阴，须用黄蜡性味缓涩，有续绝补髓之功，专调斫丧之阳，分理溃乱之精，故治元阳虚惫而为遗浊带下者。若治肺虚痰火久嗽，茯苓不必结，而猪苓亦可不用矣。②《成方便读》：诸症皆从虚而不固中来，治之者似宜纯用敛涩之剂，然淫浊带下，皆属离位之精，则又宜分消导浊。茯苓，黄蜡二味，一通一涩，交相互用，性皆甘淡，得天地之至味，故能调理阴阳，固虚降浊，以奏全功耳。

10141 威灵仙丸

【方源】《圣济总录》（人卫本）卷十。

【组成】 威灵仙（去苗土） 五灵脂各一两 乌头（炮裂，去皮脐） 木鳖子（去壳） 乳香（研）各半两 赤芍药一分

【用法】 上为末，滴酒为丸，如梧桐子大。每服七丸，加至十丸，食前冷酒送下。

【主治】 风气走注，疼痛无常处。

【备考】 本方方名，原书文瑞楼本作“灵仙丸”。

10142 威灵仙丸

【方源】《鸡峰》卷十三。

【异名】 葳灵仙丸（《医方类聚》卷一三五引《济生续方》）。

【组成】 黄耆一两（蜜炙，切） 威灵仙（去土洗）半两 枳实一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下。又服紫苏、麻仁粥甚佳。

【主治】 年高之人，津液枯燥，无以润养，肠间干涩，气血俱衰，艰于运化，其脉燥大。

10143 威灵仙丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷四，名见《医统》卷五十四。

【组成】 南星（姜制） 苍术（泔浸） 黄柏（酒炒）各二两 川芎一两 白芷半两 神曲（炒）一两 桃仁半两 威灵仙（酒拌）三钱 羌活三钱 防己半两 桂枝三钱 红花（酒洗）一钱半 草龙胆半钱

【用法】 上为末，曲糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心汤送下。

【主治】 ①《丹溪心法》：痛风，上中下疼痛。②《医统》：湿病风痛，周身不已。

10144 威灵仙散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【异名】 威灵仙饮（《证治要诀类方》卷二）。

【组成】 威灵仙五两

【用法】 上为细末。每服一钱，食前以温酒调下。逐日以微利为度。

【主治】 ①《圣惠》：腰脚疼痛久不愈。②《外科大成》：癞风、囊风、紫云风、头风、历节风、破伤风、皮肤风痒、及疥癣、瘰疬、肿毒。

【宜忌】《外科大成》：忌茶、面。

10145 面膏

【方源】《千金》卷六。

【组成】 青木香 白附子 芎藭 白蜡 零陵香 香附子 白芷各二两 茯苓 甘松各一两 羊髓一升半（炼）

【用法】 上㕮咀。以水、酒各半升，浸药经宿，煎三上三下，候水、酒尽膏成，去滓。敷面作妆。如有黡黯皆落。

【功用】 去风寒，令面光悦，却老去皱。

10146 拱震丹

【方源】《百一》卷十八引孙琳方。

【组成】 鹿茸（酥炙，去皮毛用） 山茱萸（新好有肉红润者） 当归（洗去土）各四两 麝香半两（别研）

【用法】 上为末，入麝香拌匀，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，或五十丸，温酒、盐汤送下。

【主治】 方壮年而真气犹怯，乃禀气素弱，非虚衰而然。

10147 挺脾汤

【方源】《局方》卷十（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 麻油四两 良姜十五两 茴香（炒）七两半 甘草十一两七钱半

【用法】 上以炒盐一斤同药炒，为细末。每服一钱，白汤点下。

【功用】 常服快气，大解中酒，美进饮食。

【主治】 脾胃不快，宿酲留滞，呕吐酸水，心腹胀痛，不思饮食，伤冷泄泻。

10148 括痰丸

【方源】《景岳全方》卷五十一。

【组成】 半夏（制）二两 白芥子二两 干姜（炒黄）一两 猪苓二两 炙甘草五钱 陈皮四两（切碎，用盐二钱，入水中浸一宿，晒干）

【用法】 上为末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服一钱许，滚白汤送下。

【主治】 一切停痰积饮，吞酸呕酸，胸胁胀闷疼痛。

【加减】 如胸胁疼痛者，加台乌药二两。

10149 指迷汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】 人参五钱 白术一两 半夏 神曲各三钱 南星 甘草各一钱 陈皮 菖蒲各五分 附子三分 肉豆蔻一钱

【用法】 水煎服。四剂愈。

【主治】 起居失节，胃气伤而痰迷于心脘之下，以致一时而成呆病者。

10150 指迷温经汤

【方源】《观聚方要补》卷九引《十便良方》。

【异名】 温经汤（《妇人良方》卷一）、小温经汤（《医学入门》卷八）。

【组成】 当归 川芎 芍药 桂 牡丹皮 莪术各半两 人参 甘草 牛膝各一两

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《观聚方要补》引《十便良方》：妇人经道不通，绕脐寒疝痛彻，其脉沉紧。②《医学入门》：血海虚寒，或为风邪所袭，月水不利。

10151 拯肾汤

【方源】《会约》卷二。

【组成】 熟地四钱 枣皮 山药 枸杞 杜仲（盐水炒） 巴戟（去心）各一钱半 茯苓一钱 五味三分 补骨脂（盐水炒）一钱

【用法】 空心服。服之而效可照分量加二十倍，再加菟丝子酒蒸四两，青盐五钱，炼蜜为丸，每服七八钱，空心淡盐汤送下。

【主治】 肾阴虚，神昏身倦，或遗精白浊，玉茎隐痛。

10152 轻体丸

【方源】《普济方》卷三一一。

【组成】 乳香 没药各一两 草乌 山栀子 芍药各二两

【用法】 上为细末，用酒曲糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，温酒送下。

【主治】 一切闪肭，筋骨疼痛。

10153 轻骨丹

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】 独活（去土） 牛膝（酒浸） 菟丝子（酒浸） 苁蓉（酒浸） 萆薢（蜜炒） 金毛狗脊（去毛） 川心巴戟（盐炒） 骨碎补（去毛） 破故纸（炒） 胡芦巴（炒） 大附子（炮，去皮脐） 熟地黄 当归（去土） 天麻 防风（去芦头） 羌活（去土） 白芥子（炒） 川芎 五味子（炒） 川乌头（炮，去皮脐） 木香各一两 木鳖子半两 甜瓜子半两（炒） 地龙半两（去土） 全蝎一两（炒） 乳香半两（别研） 没药半两（别研） 续断一两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸、四十丸，食前温酒送下。

【功用】 壮筋骨，补虚，驻颜色，强骨生力，益真气，除骨髓间风邪。

【主治】 中风手足缓弱，肢节不伸，筋脉挛急，瘫痪偏风，半身不遂，口眼㖞斜，语言謇涩，肌肉不生，一切诸风。

10154 轻骨散

【方源】《医学正传》卷三。

【组成】 乌梅 龙胆草 胡黄连 贝母 知母 鳖甲（酥炙） 桔梗 秦艽 柴胡 甘草（炙） 栀子 人参 青蒿（酒煮） 阿胶（炒成珠子） 杏仁（去皮尖，炒）各等分

【用法】 上晒干为末，用好京墨一块，以井花水磨，调前药末作饼子，如大指头大，透风处阴干二七日。每用一饼，以井花水磨化，又用没药五分，磨成一盏，更加黄柏末二钱，同煎数沸，倾入盏内，频频打转，子五更时轻轻起服，服后就睡仰卧，甚者不过三服。

【主治】 ①《医学正传》：劳嗽。②《医统》：骨蒸劳热。

10155 轻黄散

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】 轻粉一钱 雄黄半两 杏仁一钱（汤浸之，去皮尖并双仁） 麝香少许

【用法】 上子乳钵内先研杏仁如泥，余药同研细匀，瓷合盖定。每有患者，不问深浅，夜卧用骨箸或竹箸，点如粳米大在鼻中息肉上，隔一日，夜卧点一次。半月有效。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：鼻中息肉。②《明医

指掌）；鼻臭。

10156 轻脚丸

【方源】《局方》卷一（续添诸局经验秘方）。

【组成】木鳖子（别研） 白胶香（别研） 白芍药各二两 草乌（去皮尖）四两 赤小豆一两（别研为末，打糊）

【用法】上为末，赤小豆糊为丸，如梧桐子大。每服七丸，旋加至十丸，温酒或木瓜汤送下。病在上，食后、临卧服；病在下，空心服。

【主治】左瘫右痪，脚弱不能行履。

【宜忌】忌热物少时。

10157 轻腰汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术一两 薏仁一两 茯苓五钱 防己五分

【用法】水煎服。连服二剂而腰轻矣。

【功用】利腰脐之气，以祛风利湿。

【主治】因房劳力役，又感风湿，腰脐之气未通，风湿入于肾而不得出之腰痛，两腰重如带三千文，不能俯仰者。

【备考】此方惟利湿而不治腰，又能利腰脐之气，一方而两治之也。然不可多服者，以肾宜补而不可泻，防己多用必至过泄肾邪。肾已无邪可祛，而反损正气，故宜用补肾之药（三圣汤），而前药（本方）不可再用矣。

10158 轻身一号

【方源】《中医杂志》（1980；10:40）。

【组成】黄耆 防己 白术 川芎 制首乌各15克 泽泻 生山楂 丹参 茵陈 水牛角各30克 仙灵脾10克 生大黄9克

【用法】上为一剂，水煎成100毫升。每次口服50毫升，一日2次。超重25%以上者可增至每日1.5剂，即150毫升。

【功用】益气健脾，温肾助阳，活血化瘀，利水消肿。

【主治】单纯性肥胖症，症见体态肥胖，疲倦乏力，胸闷气促，腹胀肢沉，腰脊酸痛，便溏浮肿，月经不调，皮肤紫纹，舌胖质淡，苔薄白或白腻，脉象细弱等。

【宜忌】每日主食一般不超过1斤。

【方论选录】黄耆、白术益气健脾；仙灵脾温肾助阳；制首乌滋肾填精；川芎、丹参理气活血；防己、泽泻利水消肿；生山楂、水牛角、茵陈降脂；并取茵陈配大黄增加利胆作用，促进脂肪代谢；取黄耆配防己调节水盐代谢。综观全方，具有益气健脾、温肾助阳、滋肾填精、活血调经、利水消肿和降低血脂等药理作用，使肾脾健、阴阳和、痰湿化、瘀血去，代谢过程恢复正常，从而使病情向好的方面转化。

【临证举例】用中药"轻身一号"治疗单纯性肥胖症50例，症状、体征明显好转，体重下降者48例，无效2例，总有效率96.0%，近期疗效满意。

10159 鸦胆子粉

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】鸦胆子（剥去外皮）

【用法】用鸦胆子仁压碎，置小瓶内高压消毒。患处消毒后，用小刀刮破，以见出血为止，将此药粉敷上，用纱布、胶布固定。一周即可脱落。未脱落涂硼酸软膏类即脱落。

【主治】寻常疣。

10160 鸦胆子仁软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】鸦胆子仁（研碎）30克

【用法】凡士林加至100克，调匀外用。用时胶布剪洞，如病灶大贴上，再敷药膏，上盖纱布，每二天换一次。

【主治】瘢痕疙瘩。

10161 点头散

【方源】《百一》卷九。

【组成】川芎二两（生） 香附子（去毛，炒）四两

【用法】上为细末。每服一钱，好茶清调下。常服可除根。

【主治】偏正头痛。

10162 点眼砂

【方源】《张氏医通》卷十五。

【异名】人马平安散（原书同卷）、诸葛行军散（《卫生鸿宝》卷一）。

【组成】冰片 麝香 雄黄（水飞） 朱砂（水飞）各半钱 焰消一钱

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮。男左女右，以少许点目大眦。立效。用此入时疫病家，则不沾染。

【主治】时疫毒气臭毒，痧胀腹痛。

10163 点眼煎

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】栀子仁 蕤仁（去皮） 决明子（微炒）各一两 石膏二两（研） 竹叶二握（洗） 车前叶（切）三合 桑皮（去粗皮）二分 白蜜三两（后

入）

【用法】 上前七味锉，以井花水五升，煎取汁一升，去滓，入蜜调匀，瓷器中重汤煮如稀饧。每点如大豆许。

【主治】 肝实热，目眦热痛。

10164 点眼地黄膏

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 生地一合 黄连一两 黄柏 寒水石各五钱

【用法】 用地黄捣自然汁和成饼子。用时衬纸点眼上。

【主治】 被物撞打，及风热暴赤肿痛，目热泪出。

【加减】 如火烧汤泼，再加黄芩、山栀、大黄各等分为末，酒调敷。

10165 点眼光明丹

【方源】《医学正传》卷五。

【异名】 开明银海丹（《卫生鸿宝》卷二）。

【组成】 白炉甘石一两（以黄连五钱煎浓汁，滤去滓，用炭火煅炉甘石通红，淬黄连汁内，如此者七次，研） 辰砂一钱 硼砂二钱 轻粉五分 片脑三分（多至五分） 麝香一分

【用法】 上各为极细末，一处和匀，再研一二日无声，银瓶盛贮，密封口不可令泄气。点眼。极妙。

【主治】 一切风热上壅，两目赤肿涩痛，风弦烂眼，及内外翳障。

【加减】 如赤眼肿痛，加乳香、没药各五分；内外翳障，加珍珠五分、鸭嘴胆矾二分、熊胆二分；烂弦风眼，加铜青五分、飞丹五分。

【备考】 本方方名，《医统》引作“光明丹”。

10166 点眼黄连煎

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】 黄连半两（去须） 马牙消一分 蜜半匙

【用法】 取大梨两枚，剜作坑子，留蒂作盖子，用绵裹诸药末，纳和梨中，以盖子覆之，冬月一伏时，夏月从旦至暮即得，勿令有尘污，取其汁。每日点眼三五次。

【主治】 眼赤痛。

10167 临河风气药酒

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】 当归身一两五钱 白芍药 薏苡仁 生地各一两 香附 杜仲各八钱 虎骨（酥炙） 秦艽各六钱 真川芎七钱 川续断 羌活 五加皮各五钱

【用法】 上用头生酒二十斤，封固煮三炷香，放土地上退火气一七。每晚温饮一杯。

【主治】 痛风。

10168 韭子丸

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】 韭子三合（微炒） 鹿茸二两（劈破，涂酥炙微黄） 杜仲一两半（去粗皮，微炙） 干姜一两（炮裂，锉） 桑螵蛸二两（微炒） 白龙骨一两 菟丝子二两（酒浸一宿，晒干，别捣为末） 天雄一两（炮裂，去皮脐）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 虚劳，小便白浊，及遗泄不知。

10169 韭子丸

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 家韭子（炒） 巴戟（去心） 益智子（炒） 白茯苓（去皮）各等分

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒或米饮送下。

【主治】 白浊。

10170 韭子汤

【方源】《医心方》卷十三引《小品方》。

【组成】 韭子一升 龙骨三两 赤石脂三两

【用法】 上药以水七升，煮取二升半，分三次服。

【主治】 失精。

10171 韭子煎

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】 家韭子 破故纸各一两

【用法】 上为末。每服三钱，水煎服，一日三次，即住。

【主治】 强中。茎强不痿，精流不住，常如针刺，捏之则痛。

10172 韭汁饮

【方源】《医方考》卷三。

【组成】 生韭汁 醇酒各等分

【用法】 每服二合，一日二次。

【主治】 血噎膈。

【方论选录】 血噎膈者，或因跌仆，或因大怒，血积胸膈，久久凝结，令人妨碍饮食，得热则宽，得寒则痛是也。生韭汁，能解畜血之瘀结，佐以醇酒行其势也。

10173 韭汁牛乳饮

【方源】《医方考》卷三。

【组成】 韭汁 牛乳各等分

【用法】 时呷之。

【主治】 胃脘有死血，干燥枯槁，食下作痛，翻胃便秘者。

【方论选录】 ①《医方考》：韭汁味辛，消瘀行血，牛乳甘温，能养血润燥。②《医方论》：韭汁去瘀生新，又能开通胃气；牛乳补血润燥，兼通大肠。不用辛热，劫阴伤津，洵为良法。

10174 韭汁牛乳饮

【方源】《温热经解》。

【组成】 韭菜汁一小杯 鲜牛乳六两 藕汁一杯 姜汁十滴 梨汁一杯 莱菔汁一杯

【主治】 胃中有瘀，噎膈反胃。

【临证举例】 噎膈反胃 天津钱氏妇患噎膈反胃，粒米不下，日服稀粥饮，服至一杯，必须呕吐，不吐则心中难受，必以手探之，吐而后已，复服复吐，如是者已经月余。余曰：此胃中有瘀，为拟韭汁牛乳饮，服一剂不吐，连服七剂愈。

10175 省风汤

【方源】《医方类取》卷二十一引《济生续方》。

【异名】 醒风汤(《永类钤方》卷十一)。

【组成】 半夏（生用） 防风（去芦） 甘草半两（炙） 全蝎（去毒）三个 白附子（生用） 川乌（生用） 木香 天南星（生用）各半两

【用法】 上㕮咀。每服半两，水二盏，加生姜十片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 中风痰涎壅塞，口眼㖞斜，半身不遂，不省人事。

【方论选录】《医方考》：风涌其痰，干于面部，则口眼㖞僻；塞于胸中，则痰涎壅盛。是方也，防风、白附、全蝎、川乌，可以活经络之风痰而正口眼；南星、半夏、甘草、木香，可以疗胸次之风痰而开壅塞。方名曰省风者，省减其风之谓也。

10176 咽喉碧玉散

【方源】《御药院方》卷九。

【异名】 碧玉散(《卫生宝鉴》卷十一)、罗青散(《瑞竹堂方》卷五)。

【组成】 青黛 盆消 蒲黄 甘草末各一两

【用法】 上为细末。每用药少许干掺在咽，咽内细细咽津，绵裹噙化亦得。若作丸，砂糖为丸，每两作五十丸。每服一丸，噙化咽津亦得。

【主治】 ①《御药院方》：心肺积热上攻，咽喉肿痛闭塞，水浆不下，或生喉疖、重舌、木舌肿胀。②《瑞竹堂方》：咽喉单双乳蛾。

【备考】 本方改为丸剂，名“碧玉丸”（见《医方大成》）。

10177 咳血方

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】 肺血丸(《医林纂要》卷四)。

【组成】 青黛 瓜蒌仁 诃子 海粉 山栀

【用法】 上为末，以炼蜜同姜汁为丸。噙化。

【功用】《古今名方》：清热化痰，敛肺止咳。

【主治】 ①《丹溪心法》：咳血。②《古今名方》：肺热咳嗽，痰中带血，咯痰不爽，心烦口渴，颊赤便秘，舌苔黄，脉弦数。

【加减】 咳甚者，加杏仁（去皮尖），后以八物汤加减调理。

【方论选录】 ①《医方考》：肺者，至清之脏，纤芥不容，有气有火则咳，有痰有血则嗽。青黛、山栀所以降火，瓜蒌、海粉所以行痰，诃子所以敛肺。然而无治血之药者，火去而血自止也。②《医方集解》：此手太阴药也。肝者，将军之官。肝火上逆，能烁心肺，故咳嗽痰血也。青黛泻肝而理血，散五脏郁火；栀子凉心而清肺，使邪热下行，二者所以治火。栝楼润燥滑痰，为治嗽要药；海石软坚止嗽，清水之上源，二者降火而兼行痰。加诃子者，以能敛肺而定痰喘也。③《医林纂要》：诃子肉苦酸涩，生用敛肺清金，降逆止咳；栀子苦酸，炒黑用，抑妄行之相火，决三焦之水道，敛肺宁心，降逆气，止妄血；海石咸涩，补心敛肺，清金降火，渗湿消痰；瓜蒌仁甘苦而能润，轻虚上浮，宁心润肺，泄逆清火，除痰去垢，开豁膻中之清气，亦治咳要药。青黛辛咸，此补肝而泻肺，然辛行肝气，使肝木自畅，则相火不至灼金；咸散肝血，则血各循经，而不至逆涌子上，且能解毒热。蜜亦润肺，能补清高之气。④《医方论》：咳嗽痰血，固属君相之火犯肺。此方但清火而不治血，乃去所扰则自安之义。然业经失血，则肺已大伤，岂可置之不论不议。去诃子而加清养肺阴之药，始为得之。

【备考】《医学纲目》本方用量为各等分。

10178 贴脑膏

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 川大黄 玄参 川朴消各一两

【用法】 上为细散，以生地黄汁调匀，摊于帛上。贴之下睑。

【主治】 眼白睛肿胀，赤涩热痛。

10179 贴脐膏

【方源】《膏药方集》引《外科活人定本》。

【组成】 大川芎 当归 白芍 地黄 人参 牡

丹皮 白术 白苓 黄耆 厚桂 泽泻各二钱 大附子 知母各四钱 黄柏三钱 干姜 北细辛 胡芦巴 白芷 远志 巴戟 菟丝子 蛇床子 故纸 苁蓉 锁阳 木鳖子 蓖麻子 龙骨 石枣 山药 杏仁各四钱

【用法】 水煎去滓，至大半干入油四两，桃、柳枝搅不住手，搅至水干，入密陀僧极细末一两半，成膏后入龙骨一钱五分，麝香一分，樟脑一钱五分，摊用。

【主治】 男子遗精、白浊，女人赤白带、崩漏。

10180 贴痞膏

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】 水红花子二钱 大黄 朴消 山栀 石灰各一钱 酒醇一块（鸡子大）

【用法】 上共捣成膏，用布摊开。贴痞块上，再用汤瓶熨，手帕勒之。三日后揭起，肉黑如墨，是其效也。

【主治】 诸积。

10181 星乌散

【方源】《奇效良方》卷二十四。

【组成】 天南星 川乌（生，去皮尖）各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，入细茶一钱，薄荷七叶，盐梅一个，同煎一二沸，入生姜汁些少，温服

【主治】 诸般头风，二三十年不愈者。

10182 星术丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 牛胆南星 白术 石膏 黄芩 芍药 薄荷各等分

【用法】 上为末，砂糖调成膏，津液化下。或为丸服亦可。

【主治】 吃茶成癖。

10183 星芎丸

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】 南星（制）四两 苍术（泔浸）四两 川芎四两 香附（童便浸三日，炒）四两

【用法】 上为细末，蒸饼糊为丸，如绿豆大。每服百丸，白汤送下。

【主治】 女人脂肥痰多，占住血海，因而崩漏下多者。

10184 星附汤

【方源】《普济方》卷八十九引《济生》。

【组成】 附子（生，去皮） 南星（生，去皮）各一两 木香（不见火）半两 （一方用沉香）

【用法】 上㕮咀。每服四钱，以水一盏半，加生姜九片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。痰涎壅塞，声如拽锯，服药不下，宜于关元、丹田二穴灸之。

【主治】 因虚中风，痰涎壅塞，不省人事，脉来沉伏，服凉药不得者。

【备考】 兼寒者，用熟附子。

10185 星香散

【方源】《易简方》。

【异名】 星香饮（《直指》卷三）、对星香散（《明医指掌》卷一）。

【组成】 南星八钱 木香一钱 生姜十四片

【用法】 水煎，分两次服。

【主治】 ①《易简方》：气盛人卒中，昏不知人，口眼㖞斜，半身不遂，咽喉作声，痰气上壅。②《明医指掌》：中风体肥，痰盛，口不渴者。

【备考】 本方方名，《袖珍》引作“星香汤”。方中南星，《明医指掌》作“胆星”。

10186 星夏汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 南星 半夏 苍术 神曲 细辛 白芷 甘草 黄芩（酒炒） 黄连（酒炒）

【主治】 鼻渊。鼻痈久不愈，结成息肉，如枣核塞于鼻中，气塞不通。

10187 星乌石膏散

【方源】《普济方》卷四十五。

【组成】 南星 草乌 石膏（煅）各一两

【用法】 上为细末。每服一钱，加生姜三片，薄荷七叶，盐梅一个，以水一盏，煎至半盏。如头风注眼，先将此药熏，服时再温，连白梅服之。

【主治】 偏正头痛，头风注眼。

10188 星桂接骨膏

【方源】《中西医结合治疗骨与关节损伤》。

【组成】 天南星二两 木鳖子 乳香 没药 肉桂各一两

【用法】 上为细末，以蜂蜜或凡士林调成软膏，加酒少许调。敷患处。

【主治】 骨折。疼痛难忍，气滞血瘀，肿胀较重。

10189 星附六君子汤

【方源】《法律》卷五。

【组成】 六君子汤加南星 附子

【主治】 ①《法律》：痰饮。②《一盘珠》：慢惊风。

10190 胃风汤

【方源】《局方》卷六。

【异名】 胃风煎(《医级》卷八)。

【组成】 白术 芎藭 人参（去芦） 白芍药 当归（去苗） 肉桂（去粗皮） 茯苓（去皮）各等分

【用法】 上为粗末。每服二钱，以水一大盏，加粟米百余粒，同煎至七分，去滓，空心稍热服。

【功用】 《玉机微义》：补血活血，益胃气。

【主治】 ①《局方》：风冷乘虚入客肠胃，水谷不化，泄泻注下，腹胁虚满，肠鸣疞痛，及肠胃湿毒，下如豆汁，或下瘀血，日夜无度。②《儒门事亲》：小儿风水，小便涩，饮食不进，形肿如腹，四肢皆满，状若水晶。

【方论选录】 《医方集解》：此足阳明、厥阴药也。胃风者，胃虚而风邪乘之也。风属肝木，能克脾土，故用参、术、茯苓以补脾气而益卫；当归、川芎以养肝血而调荣；芍药泻肝而能和脾；肉桂散风而能平木，故能住泄泻而疗风湿也。又曰白术、茯苓能壮脾而除湿，川芎、肉桂能入血而驱风。

【备考】 本方方名，《张氏医通》引作“人参胃风汤”。

10191 胃关煎

【方源】 《景岳全书》卷五十一。

【组成】 熟地三五钱或一两 山药（炒）二钱 白扁豆（炒）二钱 炙甘草一二钱 焦干姜一二三钱 吴茱萸（制）五七分 白术（炒）一二三钱

【用法】 上以水二钟，煎七分，食远温服。

【主治】 脾胃虚寒作泻，或甚至久泻，腹痛不止，冷痢。

【加减】 泻甚者，加肉豆蔻一二钱（面炒），或用破故纸亦可；气虚势甚者，加人参，随宜用；阳虚下脱不固者，加制附子一二三钱；腹痛甚者，加木香七八分，或加厚朴八分；滞痛不通者，加当归二三钱；滑脱不禁者，加乌梅二个，或北五味子二十粒；若肝邪侮脾者，加肉桂一二钱。

10192 胃苓汤

【方源】 《增补内经拾遗》卷三引《局方》。

【异名】 经验对金饮子(《加减灵秘十八方》)、胃苓散(《普济方》卷三二一引《大全良方》)、术苓汤(《女科万金方》)、平胃五苓散(《脉因症治》卷上)、对金饮子(《医学纲目》卷二十三)。

【组成】 苍术（泔浸）八钱 陈皮 厚朴（姜制）五钱 甘草（蜜炙）三钱 泽泻二钱五分 猪苓 赤茯苓（去皮） 白术各一钱半 肉桂一钱

【用法】 上为粗末，每服一两，以水二钟，加生姜三片，大枣二枚，炒盐一捻，煎八分，食前温服。

【功用】 ①《增补内经拾遗》引《局方》：安胃利水止泻。②《方剂学》：祛湿和胃。

【主治】 脾湿过盛，浮肿泄泻，呕吐黄疸，小便不利。

①《增补内经拾遗》引《局方》：小便癃闭，大便飧泄，濡泻。②《普济方》引《大全良方》：夏秋之间，脾胃伤冷，水谷不分，泄泻不止。③《普济方》引《如意方》：沉冷证小便不利，及胃虚不和，早晨心腹痛。④《丹溪心法》：阴囊肿，状如水晶，时痛时痒出水，小腹按之作声，小便频数，脉迟缓。⑤《保婴金镜录》：脾胃受湿，呕吐泄泻。⑥《便览》：黄疸。⑦《增补内经拾遗》引《保生备录》：阴水。⑧《杏苑》：中暑挟食不消，吐泻腹痛。⑨《张氏医通》：饮食停积，浮肿泄泻。

【加减】 口渴者，去肉桂。

10193 胃爱散

【方源】 《普济方》卷二十二引《十便良方》。

【组成】 丁香一分 人参一两 白术 茯苓 甘草各一分 肉豆蔻三个 黄耆 干姜各五钱

【用法】 上以白米二两，同为细末。每服二大钱，以水一盏，加生姜一片，同煎至七分，通口服。

【主治】 ①《普济方》引《十便良方》：脾久虚，中焦气滞上壅，或有冷涎上潮呕恶，或有胸腹疼痛，不思饮食。②《景岳全书》：脾胃久虚，泄泻不止。

10194 胃脾汤

【方源】 《外科正宗》卷四。

【组成】 白术 茯神 陈皮 远志 麦冬 沙参各六分 五味子 甘草各五分

【用法】 水二钟，煎六分，食远服。

【主治】 葡萄疫。多生小儿，感受四时不正之气，郁于皮肤不散，结成大小青紫斑点，色若葡萄。

【加减】 虚弱自汗者，去沙参，加人参、黄耆各五分。

10195 胃气痛丸

【方源】 《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】 黑沉香 金铃子 制于术 九香虫各一钱 制香附 延胡索 法半夏各一钱五分 当归身 炒白芍 炙鸡金 吴茱萸 川郁金各二钱 炙甘草 广木香 陈佛手各五分 杜仲三钱 广陈皮 春砂仁各八分 上安桂四分 香橼皮二钱

【用法】 上为末，加三年陈米，煎汤代水泛丸。

作煎方亦可。

【主治】 胃气痛。

10196 胃苓五皮汤

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】 胃苓丸 五皮汤

【用法】 上共锉，取长流水，加灯心，煎服。

【主治】 小儿水肿。

10197 思仙散

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 川木香一钱 茴香三钱 杜仲（炒去丝）三钱

【用法】 上以水一钟，酒半钟，煎服，去滓再服。

【主治】 腰痛。

10198 思仙续断丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】 思仙木（即杜仲也。去皮，锉，炒令黑）五两 五加皮 防风（去叉股） 薏苡仁 羌活（洗去土） 川续断（洗，锉，焙干） 牛膝（洗，锉，焙，酒浸一宿，再焙）各三两 萆薢四两 生干地黄五两

【用法】 上为细末，好酒三升，化青盐三两，用大木瓜半斤（去皮），以盐酒煮大木瓜成膏，为丸如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒、盐汤任下。膏子少益以酒糊。

【功用】 补五脏内伤，调中益精，凉血，坚强筋骨，益智轻身耐老。

【主治】 肝肾风虚气弱，脚膝不可践地，腰脊疼痛，风毒流注下经，行止艰难，小便余沥。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“续断丸”。

10199 思仙续断丸

【方源】《局方》卷五（宝庆新增方）。

【组成】 木瓜（去瓤）三两 续断 萆薢各六两 牛膝（洗，去芦，酒浸一宿，焙） 薏苡仁（炒）各四两 川乌（炮，去皮脐） 防风（去芦叉） 杜仲（去皮，姜炒断丝）各二两

【用法】 上为末，醋糊为丸。每服三十至五十丸，空心、食前温酒盐汤任下。

【功用】 补五脏内伤，调中益精凉血，坚强筋骨，益智轻身耐老。

【主治】 ①《局方》（宝庆新增方）：脾肾风虚，毒气流注，腿膝痿疼，艰于步履，小便遗沥，大便后重。②《普济方》引《如宜方》：肝肾风虚，腰脊疼痛。

10200 骨刺丸

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】 制川乌30克 制草乌30克 细辛30克 白芷30克 当归30克 萆薢60克 红花60克。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸重9克。每次9～18克，一日三次。

【功用】 祛风散寒，活血止痛。

【主治】 损伤后期及骨刺疼痛。

10201 骨髓丸

【方源】《古今名方》引《锦方汇集》。

【组成】 牛骨髓250克 人参15克 熟地 龙骨 鹿角胶 冬虫夏草 制首乌 北沙参各30克

【用法】 上为末，用煮熟的牛骨髓或少许蜂蜜为丸。每服3克，一日三次。

【功用】 养肝肾，益精血。

【主治】 白血病。

10202 骨碎补丸

【方源】《局方》卷一。

【组成】 荆芥穗 白附子（炮） 牛膝（酒浸，焙干） 肉苁蓉（酒浸一宿，切作片，焙）各一两 骨碎补（去毛，炒） 威灵仙（去苗） 缩砂仁各半两 地龙（去土，微炒） 没药各二钱半 白然铜（醋淬九遍） 草乌头（炮，去皮脐） 半夏（汤洗七次）各半两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五丸至七丸，温酒送下；妇人醋汤或当归酒送下。

【主治】 肝肾风虚，上攻下疰，筋脉拘挛，骨节疼痛，头面浮肿，手臂少力，腰背强痛，脚膝缓弱，屈伸不利，行履艰难。

【宜忌】 妊娠不宜服之。

10203 骨质增生丸

【方源】《外伤科学》。

【组成】 熟地黄二两 鸡血藤一两五钱 骨碎补一两五钱 肉苁蓉一两 鹿衔草一两 淫羊藿一两 莱菔子五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸三钱。每服一二丸，一日二三次。

【功用】 养血，舒筋，壮骨。

【主治】 肥大性脊椎炎，颈椎病，关节间游离体，骨刺，足跟痛，以及筋骨受伤后未能很好修复，而致经常性酸痛者。

10204 拜堂散

【方源】《医方类聚》卷六十七引《修月鲁般

经》。

【组成】 铜青二钱 五倍子 黄连各半两

【用法】 上为极细末。贴于烂皮上。立效。

【主治】 烂风眼。

10205 种子大补丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 人参 麦门冬 生地黄 熟地黄 杜仲 巴戟天 沙苑白蒺藜 天门冬 枸杞子 黄柏 白茯神 白茯苓 白术 白芍药各四两 牛膝 当归 黑桑椹 芡实 圆眼肉 鹿角胶各五两。

【用法】 上为末，用雄鹿血和蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。

【功用】 补肾种子。

10206 秋石交感丹

【方源】《本草纲目》卷五十二引《郑氏家传方》。

【组成】 秋石一两 白茯苓五钱 菟丝子（炒）五钱

【用法】 上为末，用百沸汤一盏，井华水一盏，煮糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，盐汤送下。

【主治】 白浊遗精。

10207 钟乳丸

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【异名】 钟乳人参丸（《鸡峰》卷十一）。

【组成】 钟乳 人参 桂心 干姜各八分 附子（炮） 款冬花 细辛各六两 紫菀十分 杏仁四分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服二丸，酒送下，一日三次。不知，稍稍加之。

【主治】 咳逆上气，燥嗽冷嗽，昼轻夜甚，喉中水鸡声。

【宜忌】 忌猪肉、冷水、生葱、生菜等物。

10208 钟乳丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 钟乳粉二两 熟干地黄一两半 人参一两（去芦头） 薯蓣一两 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 牛膝一两半 黄耆一两 白茯苓一两 枸杞子一两 巴戟一两 杜仲一两半（去粗皮，炙微黄，锉） 续断一两 天门冬一两半（去心，焙） 石斛一两半（去根，锉） 桂心一两 蛇床子一两 补骨脂一两（微炒） 石龙芮一两 覆盆子一两 防风一两（去芦头） 山茱萸一两 五味子一两 远志一两（去心） 附子一两（炮裂，去皮脐） 鹿茸二两（去毛，涂酥炙微黄） 车前子一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 虚劳乏弱，精少骨痿，腰膝无力，不能饮食，日渐羸困。

10209 钟乳丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【异名】 钟乳粉丸（《圣济总录》卷八十九）。

【组成】 钟乳粉二两 薯蓣一两 续断一两 桂心一两 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 附子一两（炮裂，去皮脐） 牛膝一两（去苗） 萆薢一两（锉） 槟榔一两半 石斛一两（去根，锉） 覆盆子一两 五味子一两 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 山茱萸一两 蛇床子一两 狗脊二两 杜仲二两（去粗皮，炙微黄，锉） 巴戟一两 熟干地黄一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹以温酒送下，晚食前再服。

【主治】 ①《圣惠》：肾脏虚惫，风冷所侵，致腰间久痛，行立不得。②《圣济总录》：虚劳少气，羸瘦无力。

10210 钟乳丸

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】 钟乳粉 沉香（锉） 桑螵蛸（炙） 龙骨（煅）各半两 白茯苓（去黑皮）一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前温酒送下。

【主治】 膀胱虚冷，小便利多，少腹冷痛，脚筋拘急。

10211 钟乳丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 团参 细辛 干姜 当归 附子各半两 钟乳粉一两 吴茱萸一分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一二十丸，空心温酒送下。

【主治】 脾胃受寒，中焦停饮，咳嗽喘满，冲气奔急，背冷面浮，呕吐白沫，呀呷有声，乘秋风冷，多作喘急而咳。

10212 钟乳丸

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】 滴乳石（酒湿研七日，水飞七次，甘草汤煮三伏时，蘸少许捻开，光亮如蠹鱼为度） 麻黄（醋汤泡，焙干） 杏仁（拣去双仁，泡，去皮尖） 甘草（炙）各等分

【用法】 上为末，炼白蜜为丸，如弹子大。五更、临卧各嚼化一丸。去枕仰卧，勿开言。数日效。

【主治】 冷嗽痰喘。

【备考】 有血者勿服。

10213 钟乳粉散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】 玉女粉二钱半（系益母草） 白附子二钱 白及二钱半 白蔹二钱 轻粉半钱 钟乳粉二钱 密陀僧一钱半 细辛末半钱

【用法】 上为细散。用孩儿母乳汁调，涂患处，或温水调亦得，临卧用，次日用温水洗去。

【主治】 黥黯，黯子。

10214 钟乳白泽丸

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】 白檀香（取末） 滴乳香（别研）各一两 阳起石（煅令通红，研） 附子（炮，去皮脐）各一两半 钟乳粉二两 麝香（别研）一钱

【用法】 上和匀，滴水搜成剂，分作六十丸。每服一丸，以水一盏，煎至七分盏，空心热服。如急病，不拘时候。

【功用】 久服补益精血，助阳消阴，安心神，定魂魄，延年增寿。

【主治】 一切虚劳之疾。丈夫诸虚损，五劳七伤，真气不足，元脏不固，神志俱耗，筋力顿衰，头目眩晕，耳内虚鸣，心腹急痛，气逆呕吐，痰嗽喘促，胸膈胀闷，脾泄下痢，遗精便浊，厥冷自汗，脉微欲绝；妇人血海虚冷，崩漏不止，赤白带下，经候不调，脐腹时痛，面无颜色，饮食不进。

10215 钟乳萎蕤汤

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】 苁蓉 钟乳 蛇床子 远志 续断 薯蓣 鹿茸各三两

【用法】 上为细末。每服方寸匕，酒送下，一日一次，倍蛇床子、远志、鹿茸、钟乳尤效。

【主治】 阴痿，精薄面冷。

【备考】 本方方名，据方中用药，当作“钟乳薯蓣汤”。

10216 钟乳黄耆汤

【方源】 方出《千金》卷十七，名见《普济方》卷二十六。

【组成】 黄耆五两 甘草 钟乳 人参各二两 桂心 干地黄 茯苓 白石英 厚朴 桑白皮 干姜 紫菀 橘皮 当归 五味子 远志 麦门冬各三两 大枣二十枚

【用法】 上㕮咀，以水一斗四升，煮取四升，分五服，日三次，夜一次。

【主治】 肺气不足，逆满上气，咽中闷塞短气，寒从背起，口中如含霜雪，言语失音，甚者吐血。

10217 钩虫丸

【方源】《治法与方剂》引陈彰维方。

【组成】 栀子 黄柏 甘松 白矾 甘草各10克 茵陈30克 茅苍术 青矾（煅）各20克

【用法】 上为细末，红糖为丸。早、晚各服一次，七日服完。重症患者，可连服4～5剂。

【功用】 清热燥湿，利胆杀虫。

【主治】 钩虫病。心悸气短，肢体面色萎黄或黄肿，或喜吃生米、泥土等物。亦治湿热型慢性胆囊炎。

10218 钩藤汤

【方源】《诚书》卷八。

【组成】 橘红 钩藤 胆星 天麻 僵蚕 人参 远志 石菖蒲 犀角

【用法】 加灯心，水煎，临服加牛黄、真珠末。

【主治】 小儿诸痫痉搐。

10219 钩藤散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 生地五两 川贝二两（去心） 池菊三两（去蒂） 薄荷一两半 茯神一两半（去木） 羚羊角一两半 甘草一两半 金斛三两 钩藤五两

【用法】 上为散。水煎五钱，去滓温服。

【主治】 妊娠血亏木旺，肝热生风，眩晕卒仆，胎孕不安，脉数急。

【方论选录】 生地滋阴壮水以护胎；羚羊角解热清肝以定眩；池菊解郁热，兼益金水；石斛退虚热，兼荣肾肝；薄荷散热清头；甘草缓中泻火；川贝清心解热；茯神渗湿安神；钩藤抑肝舒筋，以熄肝风也。为散水煎，使肾热退而肾水得滋，则水润木荣，而眩晕自退，胎无不安，何卒仆之不省哉。

10220 钩藤膏

【方源】《闫氏小儿方论》。

【异名】 钓藤膏（《幼幼新书》卷十引汉东王先生方）、钩藤汤（《嵩崖尊生》卷十五）。

【组成】 没药（研） 好乳香（水中坐乳钵研细称） 木香 姜黄各四钱 木鳖仁十二个

【用法】 先将后三味为细末，次研入上二味，炼蜜和成剂收之。每一岁儿可服半皂角子大，煎钩藤汤化下，不拘时候。次服魏香散。

【主治】 ①《闫氏小儿方论》：小儿盘肠内钓，腹中极痛，干啼后便。②《局方》（淳祐新添方）：小儿胎寒胃冷，肚腹疠痛，夜间啼哭，呕吐乳食，大便泻青，状若惊搐，时有冷汗。

10221 钩藤膏

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】钩藤丸(《幼科折衷》卷下)。

【组成】钩藤(和钩) 玄胡索 当归(酒洗) 粉草(炙) 乳香各五钱 肉桂(去粗皮) 一钱 麝香一字

【用法】前四味焙干,桂不过火,同为末。乳香箬叶裹,熨斗盛火熨透,候冷,入乳钵同麝香研细,后入前药末,再和匀,炼蜜为丸,如芡实大。每用一丸至二丸,空心白汤化服。

【主治】①《活幼心书》:百日内婴孩唇面青冷,腹痛夜啼,及周岁以上者盘肠内钩,诸疝气疾。②《幼科折衷》:小儿阴囊肿。

10222 钩藤膏

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】乳香(用灯心研末) 五灵脂 没药 当归各一钱 麝香一字

【用法】上为末,炼蜜为丸,如豌豆大。一百日内儿每服一丸,煎钩藤汤化下,饥服。

【主治】小儿内钩夜啼,仰身叫哭,唇面青冷。

10223 钩藤饮子

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】钩藤饮(《普济方》卷三七一引《全婴方》)、钩藤散(《婴童百问》卷三)、钩藤钩饮(《兰台轨范》卷八)。

【组成】钩藤三分 蝉壳 防风(去芦头,切) 人参(去芦头,切) 麻黄(去节,秤) 白僵蚕(炒黄) 天麻 蝎尾(去毒,炒)各半两 甘草(炙) 川芎各一分 麝香一分(别研入)

【用法】上为细末。每服二钱,以水一盏,煎至六分,温服,不拘时候。

【主治】吐利,脾胃虚风慢惊。

【加减】寒多,加附子末半钱。

【备考】本方方名,《幼幼新书》引作"钩藤饮",《准绳·幼科》引作"钩藤饮子"。

10224 钩藤生地竹沥饮

【方源】《产孕集》卷上。

【组成】钩藤三钱(后入) 大生地三钱(酒炙) 炒当归三钱 炒白芍二钱 明天麻一钱(煨) 川芎一钱五分 川贝母一钱(去心) 制半夏一钱五分 苏梗一钱 陈皮八分 川朴七分(姜汁炒) 桔梗二钱

【用法】加竹沥三茶匙,冲服。一剂不效,再服一剂。

【主治】妊娠七八月,因冬月外感风寒,壅于肺络,内风煽炽,痰气升逆,昏迷不醒,手足筋脉拘挛,右手脉闭,左手脉数而涩,症属于痫。

10225 复正散

【方源】《外科百效》卷下。

【组成】僵蚕 清风藤 生地黄 白附子各七钱 当归 川芎 何首乌 防风 白芷 荆芥 天麻 蒺藜 赤芍 胡麻 连翘 桔梗 藁本 蔓荆子各五钱 羌活 全蝎各三钱 升麻二钱 白僵蚕二钱 金银花一两 白花蛇二两(净)

【用法】上以好酒二十斤,大坛盛封。早、晚随量饮之。

【主治】口眼歪斜,痫症。

10226 复明丸

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】冬青子(生用)一斤(陈酒共蜜拌,蒸七次、晒七日,露七夜,焙干) 元蝙蝠(活捉)一只 夜明砂(酒洗,煮,炒) 枸杞(捣,焙) 熟地(酒浸,焙) 绿豆壳(炒)各一两 川黄连(微炒) 白术(制)各三钱 辰砂一两半(用一半蝙蝠捣烂,余为衣)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大,辰砂为衣。每服五十丸,食后热酒送下。

【主治】青盲症。

10227 复明散

【方源】(《准绳·类方》卷七)。

【异名】复明汤(《审视瑶函》卷五)。

【组成】黄耆一钱半 生地黄 柴胡 连翘 甘草(炙)各一钱 当归二钱 苍术 川芎 陈皮各五分 黄柏三分

【用法】上用水二大盏,煎至一盏,去滓稍热服。

【主治】①《准绳·类方》内障。②《审视瑶函》:内络气郁,玄府不和,视物却非本色。譬观太阳若冰轮,睹灯火反红色,视粉墙转如红如碧者。

【宜忌】忌酒、湿面、辛热大料之物。

10228 复明膏

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【组成】黄连一斤(洗净,去须,锉) 当归半斤(洗净,擘开腹儿) 诃子三两(洗净,捶碎) 黄柏三两(去粗皮)

【用法】上四味,以腊水一大桶,瓷器内浸十五日,入铜锅内熬至数十沸,滤去滓;炉甘石半斤,桑柴火煅七次,用前药四味汁蘸七次,如鸡子黄色,为极细末,水飞过;鹅梨二十五个,捣烂,用

生绢袋，滤去滓；黄丹半斤，水飞过，蜜二斤半，水二升半，葱一把，熬水尽，去滓；猪胰子十五个，择净脂油，用捍草裤一大把，同捣烂泥，生绢袋滤去滓，再过一次，同煎药汁下铜锅内煎熬，欲成稀膏，下后六味：青盐、盆消各一两，铜绿（研极细末）、硇砂、硼砂、熊胆各五钱，共为细末，入锅再熬一时，欲成稠膏子，下后四味：麝香三钱（水研细），龙脑、轻粉、粉霜各一钱（研细）。上药再熬，从紧至慢，渐渐微火熬成膏，出锅入瓷器内盛，放土中埋一个月，去火毒可用，以后若干时，却用乳汁化开。每日可点三五十次，若肿时歇一二日再点。以效为度。

【主治】 远年近日眼目昏花。

10229 复春丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】 萆薢四两 破故纸（炒） 杜仲（去丝） 胡芦巴（炒） 木通各二两 骨碎补（去毛） 虎骨（酥炙） 乳香（研） 槟榔 没药 木香各一两 甜瓜子（炒）二两 牛膝（去芦，酒浸，焙干） 巴戟（去心）各二两 胡桃仁一百个（去皮，另研极细末） 黑附子一两（炮）

【用法】 上为细末，再与胡桃仁同研极细，酒糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，食前温酒送下。

【功用】 活血驻颜，补虚。

【主治】 腰脚风湿劳损，手足麻痹，筋骨疼痛，不能屈伸。

10230 复春丹

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】 杜仲（酥炒断丝） 破故纸（酒浸一宿，用脂麻炒黄色） 萆薢（酥炙黄） 巴戟（去心）各一两 沉香五钱 胡桃五七个（去皮）

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心服。每服药时，先嚼胡桃一枚，同药温酒送下，干物压之。

【主治】 腰腿疼痛。

【宜忌】《医方大成》：忌食油腻之物，猪、羊血，绿豆粉，芫荽，浆水冷物。

10231 复音丸

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 硼砂一两 玄明粉 胆星 诃子肉各一钱 百药煎三个 冰片三分

【用法】 上为细末，外用大乌梅肉一两，捣如泥，为丸如龙眼核大，每用一丸，噙化。

【主治】 哑喉。

10232 复聪汤

【方源】《丹溪心法附余》卷十二引姚方伯方。

【异名】 复聪散（《便览》卷一）。

【组成】 半夏（制） 陈皮（去白） 白茯苓（去皮） 甘草（炙） 萹蓄 木通 瞿麦 黄柏（去粗皮，炒褐色）各一钱

【用法】 上用水二茶钟，加生姜三片，煎至一茶钟，空心、临卧各一服。

【主治】 痰火上攻，耳聋耳鸣。

10233 复元活血汤

【方源】《医学发明》卷三。

【异名】 伤原活血汤（《奇效良方》卷五十六）、再生活血止痛散（《跌损妙方》）、复元汤（《寿世保元》卷九）、复元通气汤（《证治宝鉴》卷九）、复元通气散（《证治宝鉴》卷十一）、当归复元汤（《医略六书》卷二十）。

【组成】 柴胡半两 瓜蒌根 当归各三钱 红花 甘草 川山甲（炮）各二钱 大黄（酒浸）一两 桃仁（酒浸，去皮尖，研如泥）五十个

【用法】 上除桃仁外，锉如麻豆大。每服一两，以水一盏半，加酒半盏，同煮至七分，去滓，食前温服。以利为度，得利痛减，不尽服。

【功用】 ①《伤科补要》：祛瘀生新。②《方剂学》：活血祛瘀，疏肝通络。

【主治】 跌仆损伤，瘀血内停胁下，疼痛不可忍，或伴发热便秘。并治虚劳积瘀，咳嗽痰多者。

①《医学发明》：从高堕下，恶血留子胁下，疼痛不可忍。②《景岳全书》：瘀闷及便毒初起疼痛。③《医略六书》：瘀血留结，发热便闭，脉数实涩大者。④《不居集》：虚劳积瘀，咳嗽痰多，夜不能卧。

【方论选录】 ①《医学发明》：《黄帝针经》云：有所堕坠，恶血留内。若有所大怒，气上而不行，下于胁则伤肝，肝胆之经俱行于胁下，经属厥阴、少阳，宜以柴胡为引，用为君；以当归和血脉；又急者，痛也，甘草缓其急，亦能生新血，阳生阴长故也，为臣；川山甲，瓜蒌根、桃仁、红花，破血润血，为之佐；大黄酒制，以荡涤败血，为之使。气味和合，气血各有所归，痛自去矣。②《医略六书》：血瘀于经，热壅于府，不能荣运一身，故发热有潮，大便闭结焉。当归养血活血，桃仁破瘀开结，甲片通经透络，大黄荡热通肠，红花活血滞，花粉清瘀热，柴胡疏腠理以升阳，甘草缓中气以和药。水煎温服，使瘀化气行，则大便自通而瘀热无不化，何潮热之有？此化瘀通闭之剂，为瘀结潮热

便毒之专方。③《成方便读》：夫跌打损伤一证，其痛皆在腰胁间，尤为明证。故此方以柴胡之专入肝胆者，宣其气道；行其郁结；而以酒浸大黄，使其性不致直下，随柴胡之出表入里，以成搜剔之功；当归能行血中之气，使血各归其经；甲片可逐络中之瘀，使血各从其散；血瘀之处，必有伏阳，故以花粉清之；痛盛之时，气脉必急，故以甘草缓之；桃仁之破瘀；红花之活血；去者去，生者生，痛自舒而元自复矣。

【临证举例】 ①异位妊娠破裂出血（不稳定型）《南京中医学院学报》（1982；3:21）：施某某，女，33岁，已婚。月经过期旬余未潮，夜间起突然下腹疼痛，呈绞痛样，痛不可忍，阴道持续点滴出血，量不多，伴有腹胀，大便不通。妇科检查：子宫颈着色，有抬举痛，呈绞痛样，痛不可忍，后穹隆饱满，穿刺有暗红色血液，不凝固，舌苔薄白，脉弦涩。辨证：冲任亏损，不任胞胎，孕育子宫之外，阻滞气血。治拟活血祛瘀，行气止痛。处方：大黄10克，天花粉15克，当归10克，桃仁10克，红花5克，延胡索10克，柴胡10克，枳壳10克，穿山甲10克，甘草5克，连服三剂。服首剂后腹痛略增，阴道出血量亦略增多，并有血块排出，随后出血减少，腹痛缓解，三天后出血即止。剂小其制，改用：大黄5克，天花粉10克，红花5克，赤芍10克，穿山甲10克，当归10克，甘草5克，连服四剂，一周后出院。②带状疱疹后遗神经疼痛 《湖南中医学院学报》（1984；（2）：36）：用复元活血汤治疗带状疱疹后遗神经疼痛23例，其中男17例，女6例。最小年龄24岁，最大者71岁，以40～55岁较多。疼痛在腰胁部16例，背部7例，疼痛时间最短2月，最长者10月，本组除2例肝癌患者经治疗无效外，均已痊愈。

10234 复元通气散

【方源】《活法机要》。

【异名】 复元通圣散（《医学入门》卷八）、复原通气散（《便览》卷一）。

【组成】 青皮 陈皮各四两 甘草三两（生熟各半） 川山甲（炮） 栝楼根各二两

【用法】 上为细末。热酒调下。

【功用】《卫生宝鉴》：活血止痛，内消疮肿，通一切气。

【主治】 ①《活法机要》：诸气涩耳聋，腹痛，便痛，疮疽无头。②《金鉴》：乳痈。

【备考】 原书治上证，加金银花一两，连翘一两

10235 复元通气散

【方源】《局方》卷八（续添诸局经验秘方）。

【异名】 复元通圣散（《万氏家抄方》卷二）。

【组成】 船上茴香（炒） 穿山甲（锉，蛤粉炒，去粉）各二两 南木香（不见火） 两半 延胡索（擦去皮） 白牵牛（炒，取末） 陈皮（去白） 甘草（炒）各一两

【用法】 上为细末。每服一大钱，热酒调服。病在上，食后服；病在下，食前服；不饮酒人，煎南木香汤调下。

【主治】 ①《局方》（续添诸局经验秘方）：疮疖痈疽，方作焮赤，初发疼痛，及脓已溃、未溃，小肠气、肾痈、便毒，腰痛气刺，腿膝生疮，及妇人吹奶。②《准绳·类方》：气不宣流或成疮疖，并闪挫腰胁，气滞疼痛。

【备考】 本方方名，《准绳·类方》引作“复原通气散”。

10236 复元通气散

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】 复元通气汤（《保命歌括》卷十六）。

【组成】 陈皮 白丑 甘草 玄胡索各一钱 茴香 穿山甲 木香 当归各一钱半 乳香 没药各五分

【用法】 上为末。每服二钱，热酒、白汤任下。

【主治】 ①《医学入门》：一切气不宣通，瘀血凝滞，周身走痛；并跌坠损伤，或负重挫闪，气滞血分作痛。②《保命歌括》：气疝作痛。

10237 复方丹参片

【方源】《古今名方》引上海中药制药二厂方。

【组成】 丹参750克 三七225克 冰片25克

【用法】 依法制片，共制成1000片。每服3片，一日三次。

【功用】 活血化瘀，芳香开窍，理气止痛。

【主治】 冠心病胸闷，心绞痛。

10238 复方红砒膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 红砒4克 轻粉4克 雄黄3克 冰片3克 液体石蜡10～20毫升 凡士林100克

【用法】 前四味药分别为细粉，混合均匀，加液体石蜡分散后，再加入凡士林，研磨成均匀细腻的软膏100克即成。将药膏涂布患处约铜板厚，上敷凡士林纱布一层，干纱布二层，再用绷带包扎。

【主治】 银屑病。

10239 复方黄连散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 黄连31克 青黛6克 马牙消1.5克 冰片1.5克

【用法】 上为细末。外用。

【主治】 鹅口疮。

10240 复方大承气汤

【方源】《中西医结合治疗常见外科急腹症》。

【组成】 炒莱菔子30克 厚朴 枳实各15克 木香10克 生军15～30克（后下） 芒消15～30克（冲服）

【用法】 水煎服，或胃管注入，每日1～2次。

【主治】 痞结型肠梗阻，肠腔积液少者。

10241 复方大陷胸汤

【方源】《急腹症方药新解》。

【组成】 大黄10～20克 川朴15～24克 枳实10克 芒消10～15克（冲服） 甘遂末0.9～1.5克（冲服）

【功用】 泻热通下，行气逐水。

【主治】 单纯性机械性肠梗阻，肠腔积液较多者，以及因腹腔炎症所致的肠麻痹。

【宜忌】 体虚无实邪者忌用。

10242 复方补骨脂酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 补骨脂30克 菟丝子20克 栀子20克 75%酒精200毫升

【用法】 上为粗末，浸于酒精中成酊剂。外用。

【主治】 白癜风。

10243 香平丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 香附 黑牵牛 三棱 莪术 干生姜各三两 平胃散一斤

【用法】 上为末，醋糊为丸，或入鸭头鲜血为丸，如梧桐子大。生姜汤送下。

【主治】 水肿、气肿、血肿。

10244 香术散

【方源】《妇人良方》卷十二。

【异名】 香莪散（《济阴纲目》卷八）。

【组成】 广中莪术一两（煨） 丁香半两 粉草一分

【用法】 上为细末。空心盐汤点服一大钱，觉胸中如物按下之状。

【主治】 妊娠五个月以后，因喜怒忧虑过多，饮食过节，以致胸腹间气刺满痛，或肠鸣，呕逆减食。

【临床举例】 ①妊娠心腹痛 《妇人良方》：蔡元度宠人有子，夫人怒欲逐之，遂病。医官王师处此方，三服而愈，后用累验。②妊娠恶阻 《普济方》：一妇患妊娠呕吐不止，粥药不下，众医袖手，吉安医官，用以此药，一服见效。后以治心脾疼痛，呕逆之证，不问男女服良验。

10245 香朴丸

【方源】《三因》卷十一。

【组成】 厚朴五两（姜汁制，炒） 白术三两 茴香（炒） 陈皮各三两 诃子（炮，去核） 赤石脂（煅）各一两半

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空腹米汤送下。

【功用】 常服暖肠胃。

【主治】 肠胃虚冷，泄泻注下无度，脾虚气闭，不进饮食。

10246 香朴汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】 厚朴（姜炒）一两 大附子（炮，去皮脐）七钱半 木香三钱

【用法】 上锉。加生姜七片，大枣一枚，水煎服。

【主治】 老人中寒下虚，心腹膨胀，不喜饮食，脉浮迟而弱，此名寒胀。

【备考】 本方改为丸剂，名香朴丸（见《嵩崖尊生》）。

10247 香芎散

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】 香附子半斤（炒去毛） 川芎三两 甘草二两 石膏一两（研）

【用法】 上为细末。每服一钱，食后腊茶、荆芥汤点服。

【主治】 一切头风。

10248 香芎散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】 贯芎 香附子（炒） 石膏（乱纹者良，水飞） 白芷 甘草 薄荷各一两（一方川乌头半两，去脐皮）

【用法】 上为细末。每服二钱，温酒或茶清调下。

【主治】 偏正头风。

10249 香壳丸

【方源】《宣明论》卷十三。

【组成】 木香 黄柏各三钱 枳壳（去瓤，炒） 厚朴各半两 黄连一两 猬皮一个（烧） 当归四钱 荆芥穗三钱

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服

二三十丸，食前温水送下，一日三次。

【主治】 湿热内甚，因而饱食，肠癖成痔，久而成瘘。

10250 香壳散

【方源】 《宣明论》卷十三。

【组成】 舶上茴香（用盐炒） 枳壳各一两 没药半两

【用法】 上为末。每服一钱，温热酒送下，不拘时候，并二三服。

【主治】 小肠气，脐腹搅痛急，阴股中疼闷，不省人事。

10251 香壳散

【方源】 《张氏医通》卷十四。

【组成】 香附（姜汁炒）三钱 枳壳（炒）二钱 青皮（炒） 陈皮 乌药 赤芍药 蓬术（醋炒）各一钱 归尾三钱 红花五分 甘草炙二分，生三分

【用法】 上为散。每服四五钱，水煎去滓，加童便半盏，空心温服，更以桃核黑糖酒助之。不应，加延胡索、穿山甲。

【功用】 《通俗伤寒论》：理气活血。

【主治】 ①《张氏医通》：蓄血暴起，胸胁小腹作痛。②《通俗伤寒论》：伤寒愈合，因事触怒，气郁血结，少腹急痛者。

【加减】 有外风寒，加桂枝、羌活。

10252 香芷汤

【方源】 《医醇賸义》卷四。

【组成】 香附二钱 白芷六分 当归一钱五分 川芎八分 防风一钱 桑叶一钱 菊花二钱 蝉衣一钱 蔓荆子一钱五分 桔梗一钱 黑芝麻三钱

【主治】 头痛有因于风者，肌表不固，太阳受风，巅顶作痛，鼻窍微塞，时流清涕。

10253 香苏散

【方源】 《局方》卷二（绍兴续添方）。

【异名】 神授香苏散（《保命歌括》卷六）。

【组成】 香附子（炒香，去毛） 紫苏叶各四两 甘草（炙）一两 陈皮二两（不去白）

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏，煎七分，去滓热服，不拘时候，一日三次；若作细末，只服二钱，入盐点服。

【主治】 外感风寒，内有气滞，形寒发热，头痛无汗，胸膈满闷，嗳气恶食，以及妊娠霍乱、子悬、鱼蟹积等。

①《局方》（绍兴续添方）：四时瘟疫、伤寒。②《医方集解》：四时感冒，头痛发热，或兼内伤，胸膈满闷，嗳气恶食。③《叶氏女科》：妊娠霍乱。④《杂病广要》：鱼蟹积。⑤《医方简义》：子悬。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手太阴药也，紫苏疏表气而散外寒，香附行里气而消内壅，橘红能兼行表里以佐之，甘草和中，亦能解表为使也。②《医林纂要》：紫苏辛温，补肝祛风发汗，亦表散风寒主药；香附辛温，行肝气于脾胃，以祛郁宣滞，此用治内也；陈皮辛，行肝气，苦理脾胃，去白则轻而能表，此以兼行内外；甘草缓肝和中；加姜、葱煎，以祛风表汗为主。此表里兼治，而用药有条理，亦良方也。此补肝而平胃也。

10254 香连丸

【方源】 《证类本草》卷七引《兵部手集方》。

【异名】 二和丸（《卫生总微论》卷十）、秘方香连丸（《医方类聚》一四一引《经验良方》）。

【组成】 宣连 青木香

【用法】 上分两停，炼白蜜丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空腹饮送下，一日二次。其久冷之人，即用煨熟大蒜作丸。

【主治】 热痢。内热口渴，下痢赤白，日夜不止，肛门灼痛；或泄泻不止。

①《证类本草》引《兵部手集方》：下痢。②《卫生总微论》：泻不止。③《医方类聚》引《经验良方》：泻及痢下脓血，日夜水止。④《医宗说约》：痢，内热口渴，肛门焦痛。

【临证举例】 伤寒带菌者 《中医杂志》（1959；11:1）：成人口服每次一钱，儿童每次五分，每日二次，连服六天为一疗程。结果：观察15例，经一次治愈者13例，两次治愈者1例，另1例经两个疗程治疗仍为阳性，未继续观察。

【备考】 本方改为散剂。名香连散（见《医方类聚》引《吴氏集验方》）。

10255 香连丸

【方源】 《圣惠》卷九十三。

【异名】 豆蔻香连丸（《局方》卷十吴直阁增诸家名方）。

【组成】 木香半两 黄连三分（去须，微炒） 诃黎勒半两（煨，去皮） 肉豆蔻一二枚（去壳） 丁香一分

【用法】 上为末，以烧饭为丸，如黍米大。每服五丸，以米粥饮送下，每日三四次。

【主治】 ①《圣惠》：小儿赤白痢。②《局方》（吴直阁增诸家名方）：小儿乳食不节，肠胃虚弱，冷热之气客于肠间，下痢赤白，肠内疞痛，日夜频并，不欲饮食。

10256 香身丸

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【异名】 共殿香、一座香。

【组成】 白豆蔻四两 木香二两 檀香一两 甘松一两 广陵零香一两半 丁香七钱半 白芷 当归 附子 槟榔 三奈 甘草（炙） 益智 桂心 各五钱 麝香少许

【用法】 上为极细末，炼蜜同酥油或羊尾油为丸，如黄豆大。每用一丸噙化。当口口香，后身亦香。又用一丸，投酒中，自然香美。

【主治】 男女秽气，心腹疼痛，胸膈不利，痰证诸疾。

10257 香灵丸

【方源】《本事》卷四。

【异名】 香脂丸(《卫生家宝产科备要》卷五)、六丁丸(《百一》卷二引姜尧章方)。

【组成】 丁香 好辰砂（研，飞）各六钱 五灵脂（拣如鼠屎者，淘去沙石，晒干）四钱

【用法】 上香、脂先为细末，后入砂，再研匀，狗胆或猪胆汁为丸，如鸡头子大。每服一丸，生姜、橘皮汤磨下。

【主治】 ①《本事》：呕吐不止。②《百一》引姜尧章方：翻胃。

10258 香灵散

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】 五灵脂（醋炒）一两 茅山玄胡索（醋炒）一两 广木香七钱 乳香（去油） 没药（去油） 陈皮（去白）各五钱 莪茇四钱 沉香三钱 香附末（制）一两五钱 吴萸（去梗）五钱 青木香（炒）一两

【用法】 上药各为末，称准配合。每服五分时酒送下；甚者火酒送下；不饮食者，吴萸汤送下。

【主治】 胃脘痛。

10259 香附饼

【方源】《外科发挥》卷五。

【异名】 五香饼(《医统》卷八十一)。

【组成】 香附

【用法】 上为末，酒和，量疮大小做饼覆患处，以热熨斗熨之。若风寒湿毒，宜用姜汁作饼。

【功用】 未成者内消，已成者自溃。

【主治】 瘰疬流注肿块，或风寒袭于经络，结肿或痛。

10260 香附散

【方源】《三因》卷十四。

【组成】 香附子不拘多少

【用法】 上为末。每用酒一盏，煎海藻一钱重，至半盏，先捞海藻嚼细，用所煎酒调香附末二钱服。

【主治】 ①《三因》：癫眠。②《普济方》：小肠气。

10261 香附散

【方源】《妇人良方》卷十五引陈景初方。

【异名】 天仙藤散。

【组成】 天仙藤（洗，略炒） 香附子（炒） 陈皮 甘草 乌药（不须要天台者，但得软白，香而辣者良）各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，水一大盏，加生姜三片，木瓜三片，紫苏三叶，同煎至七分，放温澄清，空心、食前服，一日三次。小便利，气脉通，体轻，肿渐消，更不须多服。

【主治】 妊娠自三月成胎之后，两足自脚面渐肿腿膝以来，行步艰辛，以至喘闷，饮食不美，似水气状。

10262 香附散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 香附 山栀 黄连 橘红 半夏

【主治】 嗳气。

10263 香矾丹

【方源】《幼幼新书》卷二十八引张涣方。

【组成】 木香 白矾（慢火枯成粉）各一两 诃黎勒皮（微炮） 酸石榴皮（炒黑）各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如黍米大。每服十丸，粥饮送下。

【主治】 泄泻久不愈。

10264 香参丸

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】 人参 生蒲黄 麦门冬（去心，焙） 当归（切，焙）各半两 甘草（炙，锉）一分 生干地黄（焙）一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小弹子大。每服一丸，温水化下，一日三四次。

【主治】 心脏热盛，舌上出血。

10265 香茸丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】 麝香一钱 破故纸四两 牛膝 鹿茸各二两 附子 苁蓉各四两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前盐汤或温酒送下。

【功用】 补益。

【主治】 肾脏虚寒，腰膝沉重。

10266 香茸丸

【方源】《南雅堂医案》卷六。

【组成】麝香一钱 鹿茸三两 当归身二两 生川乌五钱

【用法】上药为细末，以雄羊肾三对，用黄酒煮烂，将前药和匀为丸。每服一钱，开水送下。

【主治】痿症。精血内夺，无以营养筋骨，腰脊伛偻不伸，周身骨节尽痛，濈然汗出不解，冬月尤甚。

10267 香茗散

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】香附子二钱 川芎一钱 细茶一撮

【用法】上锉二剂。水煎，温服。

【主治】因气脑冲动，头痛。

10268 香疥药

【方源】《古今医鉴》卷十五引郑中仙方。

【组成】大风子（去壳）三十个 木鳖子（去壳）三十个 蛇床子五钱 白蒺藜五钱 杏仁三十个 川椒四钱 枯矾三钱 朝脑三钱 轻粉一钱半 人言一钱半

【用法】上药各为末，入柏油三两，搽疮。

【主治】疥疮。

10269 香珠散

【方源】《疡科选粹》卷四。

【组成】血竭五分 冰片一分 麝香一分 珍珠一分 轻粉一分

【用法】上为末。洗净，麻油调搽。或加飞丹少许。

【主治】下疳及臁疮。

10270 香桂丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】当归三两 川芎一两半 桂心一两半 木香一两半

【用法】上为末，炒砂糖糊为丸。每服三钱，炒荷叶煎汤送服。

【主治】产后脐下痛，脉弦沉涩者。

【方论选录】产后冲任脉虚，清阳下陷，寒邪内伏而气滞，血不得行，故脐下疼痛不止焉。当归养经中之血，川芎行血中之气，桂心温经散寒，以行血滞，木香开胃醒脾，以行气滞也。炒焦砂糖糊为丸，炒荷叶汤送下，使气行血活则冲任复完，而清阳上奉，精微四达，岂有脐下疼痛之患乎。

10271 香桂散

【方源】《马培之医案》。

【组成】生附子二钱 麝香二分 川乌二钱 细辛二钱 木香二钱 炙没药二钱 肉桂二钱 草乌二钱 丁香二钱 樟冰二钱

【用法】上为细末，掺膏药上贴之，随症听用。

【功用】温经通络。

【主治】一切风寒湿气，筋骨疼痛。

10272 香粉散

【方源】《普济方》卷二九〇。

【组成】藁本 牡蛎粉 川芎 白芷 蚌粉 麻黄根各等分

【用法】上为末。周身敷之。

【主治】小儿盗汗不止。

10273 香豉汤

【方源】《千金》卷二十。

【组成】香豉 薤白各一升 栀子 黄芩 地榆各四两 黄连 黄柏 白术 茜根各三两

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，分三次服。

【主治】下焦热毒痢鱼脑，杂痢赤血，脐下少腹绞痛不可忍，欲痢不出。

【宜忌】《千金方衍义》：若痢久元气下降而见虚滞不食者，禁用。

【方论选录】《千金方衍义》：毒痢势甚而饮食尚强，胃气未艾，故可用黄连解毒清燥之剂，其用香豉、薤白必缘邪热未除，后重不减，故专取二味为方中之首推，且以白术除热消食，茜根、地榆解散滞血，然惟毒势方张者为宜。

10274 香豉散

【方源】《外台》卷十九引《古今录验》。

【组成】生地黄三十斤 香豉三升（绵裹）

【用法】洗地黄㕮咀，先蒸半日晒燥，更合豉蒸半日，晒令燥，为末。每服三方寸匕，酒送下，一日三次。亦可水服。服数月有效。

【功用】益精爽气。

【主治】三十年风蹙，偏枯不能行。

10275 香豉粥

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】麻黄三分（去根节） 葛根一分 栀子仁一分 石膏半两 荆芥半两 生姜一分 豆豉一合 糯米一合半

【用法】上锉细。以水三大盏，先煎麻黄等七味，至一盏半，去滓，下米煮作稀粥。不拘时候服之。衣盖出汗即愈。

【功用】发汗。

【主治】伤寒三日，壮热不解。

10276 香黄散

【方源】《续易简方后集》卷四。

【组成】白芷　大黄各等分

【用法】上为细末。蜜醋调，敷赤肿痛处；蜜汤亦得，一日一换。愈。

【主治】痈肿。

10277　香棱丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】香积丸(《明医指掌》卷四)。

【组成】三棱六两（醋炒）　青皮　陈皮　莪术（炮，或醋炒）　枳壳（炒）　枳实（炒）　萝卜子（炒）　香附子各三两（炒）　黄连　神曲（炒）　麦芽（炒）　鳖甲（醋炙）　干漆（炒烟尽）　桃仁（炒）　硇砂　砂仁　归梢　木香　甘草（炙）各一两　槟榔六两　山楂四两

【用法】上为末，醋糊为丸。每服三五十丸，白汤送下。

【主治】五积六聚，气块。

10278　香椒散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】草乌头（生用）　胡椒　乳香（别研）　蝎梢（不去毒）各等分

【用法】上为末。擦牙痛处。吐涎，立愈。

【主治】牙疼。

10279　香葛汤

【方源】《得效》卷一。

【组成】紫苏（去根）　白芍药　香附子（炒，去毛）　川升麻　白干葛　薄陈皮各一两　白芷　大川芎各半两　苍术（米泔浸，切，炒黄色）一两　大甘草半两

【用法】上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜三片，煎热服，不拘时候。

【主治】四时感冒不正之气，头痛身疼，项强寒热，呕恶痰嗽，腹痛泄泻，或风寒湿瘴。

【加减】如发热无汗，遍体疼痛，加葱白二根，豆豉七粒，煎热服，得汗即解；呕，去苍术，加白术数片，藿香数叶；中脘胀满，大便秘，加枳实、槟榔各半钱；有痰，加半夏半钱；咳嗽，加五味子七粒；鼻塞，加桑白皮三寸；腹痛，加枳壳半片（去瓤，切）；泄泻，加木瓜三片；如伤寒不分表里，以此药导引经络，如热多，口渴心烦，脏腑坚，或加前胡；无汗，可加麻黄；汗太过，加麻黄根。

10280　香腊膏

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】黄连（宣州者，去须）　秦皮各一两

【用法】上为粗末，用腊月腊日五更井华水一碗，浸前药三七日，绵滤银器内，用文武火煎尽水如膏，加生龙脑少许和匀，瓷合收。每用倒流水化少药，候匀点之。

【主治】暴赤眼、风热痒痛。

10281　香楝酒

【方源】《回春》卷五。

【组成】南木香　小茴香　大茴香　川楝肉各三钱

【用法】上合作一服，锅内炒至香，入葱白（连须）五根，用水一碗，淬入锅内，以碗罩住，候煎至半碗，取出去滓，加好酒半碗合和，入炒盐一茶匙，空心热服。极痛者，一服立愈。

【主治】偏坠疝气。

10282　香雷散

【方源】《幼幼新书》卷三十一引张涣方。

【组成】雷丸　鹤虱　苦楝根　淡芜荑各半两

【用法】上为细末。每服半钱，用生精猪肉淡汤调下，不拘时候。

【主治】①《幼幼新书》引张涣方：小儿虫动啼叫不止。②《卫生总微》：蛲虫攻蚀下部。

10283　香蝎丸

【方源】《普济方》卷四〇〇引《全婴方》。

【组成】川乌头（大八角者）二个（生用）　全蝎二十一个（生用）　黑豆二十一粒（生用）　地龙（去土）半两（生用）

【用法】上为末，加麝香半字（研），拌糯米糊为丸，如麻子大。三岁十丸，酒送下，临卧服。微有汗即愈。

【主治】小儿白虎历节、诸风疼痛，游走无定，状如虫啮，昼静夜作，及一切手足不时作疼。

10284　香蝎散

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】乳香一钱　蝎梢二钱　川乌头（去皮，生用）三钱

【用法】上为细末。每服一钱，水一盏，煎至七分，入盐少许，空心连滓热服。

【主治】小肠疝气，阴囊肿痛。

10285　香橘丸

【方源】《医方类聚》卷九十四引《经验良方》。

【异名】香橘皮丸(《普济方》卷一八四)。

【组成】生姜半斤　陈皮二钱（不去白）　青皮二钱（不去白）　甘草　缩砂　神曲　麦芽各半两　丁香三钱

【用法】上以陈皮、青皮、甘草、缩砂，用生姜

烂研，同淹四味一宿，次日同诸药焙为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，白汤送下。

【主治】 冷气攻刺心腹，及脾胃不和，中脘气痞，心腹胀闷，不思饮食，呕吐痰逆，噫气吞酸，及宿食不消，吐之不出，咽之不下，诸般气疾。

10286 香橘汤

【方源】《直指》卷五。

【组成】 香附（炒） 半夏（制） 橘红各二两 甘草（炒）三分

【用法】 上锉散。每服三钱，加生姜五片，大枣二枚，水煎服。

【主治】 七情所伤，中脘不快，腹胁胀满。

10287 香橘饼

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】 木香 橘皮 青皮各二钱半 半夏 厚朴 神曲 麦芽 砂仁各五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如炱实大。每服一丸，紫苏煎汤或米汤任下。或加豆蔻、诃子。

【主治】 初生吐泻，壮热不思乳食，大便色白或不通。

10288 香薷丸

【方源】《局方》卷二。

【组成】 香薷（去土） 紫苏（茎叶，去粗梗） 干木瓜各一两 丁香 茯神（去木） 檀香（锉） 藿香叶 甘草（炙）各五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每两作三十丸。每服一丸至二丸，细嚼，温汤送下，或新汲水化下亦得；小儿服半丸，不拘时候。

【功用】《北京市中药成方选集》：清暑祛湿。

【主治】 ①《局方》：大人、小儿伤暑伏热，燥渴昏闷，头目昏眩，胸膈烦满，呕哕恶心，口苦舌干，肢体困倦，不思饮食，或发霍乱，吐利转筋。②《北京市中药成方选集》：伤暑伤湿，发热头痛，呕吐恶心，腹痛泄泻。

【方论选录】《慈禧光绪医方选议》：此方芳香除秽，酸甘养阴，略佐淡渗去湿，而重用香薷辛温解表散寒，兼能祛暑化湿。

10289 香薷汤

【方源】《局方》卷二（续添诸局经验秘方）。

【异名】 香薷饮（《内科摘要》卷下）。

【组成】 白扁豆（炒） 茯神 厚朴（去粗皮，锉，姜汁炒）各一两 香薷（去土）二两 甘草（炙）半两

【用法】 上为细末。每服二钱，沸汤点服，入盐点亦得，不拘时候。

【功用】 宽中和气，调营卫。常服益脾温胃，散宿痰停饮，能进食，辟风、寒、暑、湿、雾露之气。

【主治】 ①《局方》：饮食不节，饥饱失时，或冷物过多，或硬物壅驻，或食毕便睡，或惊忧恚怒，或劳役动气，便欲饮食，致令脾胃不和，三脘痞滞；内感风冷，外受寒邪，憎寒壮热，遍体疼痛，胸膈满闷，霍乱呕吐，脾疼翻胃；中酒不醒；四时伤寒头痛。②《东医宝鉴·杂病篇》：暑病吐泻。

10290 香薷散

【方源】《局方》卷二。

【异名】 香薷汤（《圣济总录》卷三十八）。

【组成】 白扁豆（微炒） 厚朴（去粗皮，姜汁炙熟）各半斤 香薷（去土）一斤

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏，入酒一分，煎七分，去滓，水中沉冷，连吃二服，不拘时候。立有神效。

【功用】《方剂学》：祛暑解表，化湿和中。

【主治】 ①《局方》：脏腑冷热不调，饮食不节，或食腥脍、生冷过度，或起居不节，或路卧湿地，或当风取凉，而风冷之气归于三焦，传于脾胃，脾胃得冷，不能消化水谷，致令真邪相干，脾胃虚弱，因饮食变乱于肠胃之间，便致吐利，心腹疼痛，霍乱气逆。有心痛而先吐者，有腹痛而先利者，有吐利俱发者，有发热头痛，体疼而复吐利虚烦者，或但吐利心腹刺痛者，或转筋拘急疼痛，或但呕而无物出，或四肢逆冷而脉欲绝，或烦闷昏塞而欲死者。②《方剂学》：夏月乘凉饮冷，外感于寒，内伤于湿，致恶寒发热，无汗头痛，头重身倦，胸闷泛恶，或腹痛吐泻，舌苔白腻，脉浮者。

【备考】 本方方名，《直指附遗》引作“香薷饮”。

10291 香蟾丸

【方源】《丹溪治法心要》卷八。

【组成】 三棱（炮） 蓬术（炮） 青皮 陈皮 神曲（炒） 麦芽（炒） 龙胆草 槟榔各五钱 胡黄连 川楝子 使君子 川连各四钱 白术一两 木香二钱 干蟾五个

【用法】 上为末，将蟾醋煮烂捣，再以醋糊为丸，如粟米大。每服二十丸，米饮送下。

【主治】 小儿疳积、食积、虫积、肉积，腹胀。

10292 香木洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 香附 30 克 木贼 36 克 板蓝根 30 克

【用法】 水煎，洗患处。

【主治】 青年扁平疣。

10293 香白芷散

【方源】《普济方》卷二十四。

【组成】 白芷 郁金 滑石各一两

【用法】 上为末。每服一钱，砂石血淋，用竹叶灰温酒调下。甚者二服愈。

【主治】 五淋。

10294 香附子散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 草香附子四两 细辛半两

【用法】 上为粗末。每用二钱，以水一盏，煎至八分，去滓，稍热漱冷吐。

【主治】 牙齿疼痛，往来不歇。

10295 香薷术丸

【方源】《外台》卷二十引《深师方》。

【异名】 香薷丸(《鸡峰》卷十九)。

【组成】 干香薷一斤 白术七两

【用法】 上白术为末，浓煮香薷取汁，和术为丸，如梧桐子大。饮服十丸，日夜四五服。夏取花、叶合用亦佳。

【功用】 利小便。

【主治】 暴水风，水气水肿；或疮中水，通身皆肿。

10296 香贝养荣汤

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】 白术（土炒）二钱 人参 茯苓 陈皮 熟地黄 川芎 当归 贝母（去心） 香附（酒炒） 白芍（酒炒）各一钱 桔梗 甘草各五分

【用法】 上加生姜三片，大枣二枚，以水二钟，煎八分，食远服。

【主治】 肝经郁结，气血凝滞经络，致成石疽。

①《金鉴》：肝郁凝结于经络，石疽生于颈项两旁，形如桃李，皮色如常，坚硬如石，痛而不热，初小渐大，难消难溃，既溃难敛，而属气虚者。②《医钞类编》：筋瘰，由肝伤恚怒，血虚不能荣筋，核坚筋缩，推之不移。③《疡科捷径》：石痰。

【加减】 胸膈痞闷，加枳壳、木香；饮食不甘，加厚朴、苍术；寒热往来，加柴胡、地骨皮；脓溃作渴，倍人参、当归、白术，加黄耆；脓多或清，倍当归、川芎。胁下痛或痞，加青皮、木香；肌肉生迟，加白蔹、肉桂；痰多，加半夏、橘红；口干，加麦冬、五味子；发热，加柴胡、黄芩；渴不止，加知母、赤小豆；溃后反痛，加熟附子、沉香；脓不止，倍人参、当归，加黄耆；虚烦不眠，倍人参、熟地，加远志、枣仁。

【备考】 本方去人参，加黄耆、柴胡，名“抑气养荣汤”（见《医钞类编》）。

10297 香艾芎归饮

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】 香附 焦艾 延胡各三钱 当归 川芎各二钱

【用法】 水煎，温服。

【功用】 理气行滞。

【主治】 产后恶露不下或所下甚少，腹胀而痛，但不拒按，腰部亦痛，舌淡苔薄白，脉弦。

【加减】 气滞而兼瘀，腹痛拒按，加蒲黄三钱，五灵脂二钱；面赤唇红，兼有心烦者，去川芎、当归，加桃仁、丹皮各三钱。

10298 香苏五皮饮

【方源】《湿温时疫治疗法》引《时方妙用》。

【组成】 制香附 紫苏叶 广皮各一钱半 浙苓皮 大腹皮 五加皮 桑白皮各三钱 炙甘草五分

【用法】 上加鲜生姜二片，葱白两枚，水煎服。

【主治】 阳水肿。气郁不舒，肿由面目先起，自上而下，皮肤如灌气状，以手按之随手而起，大便不爽，小便黄热，时或赤涩，甚则气粗而喘。

10299 香苏葱豉汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 制香附一钱半至二钱 新会皮一钱半至二钱 鲜葱白二三枚 紫苏一钱半至三钱 清炙草六分至八分 淡香豉三钱至四钱

【用法】 水煎服。

【功用】 理气发汗。

【主治】 妊娠伤寒。

【方论选录】 女子善怀，每多抑郁，故表无汗，以香苏饮为主方，盖香附为气中血药，善疏气郁；紫苏为血中气药，善解血郁；况又臣以葱、豉，轻扬发表；佐以陈皮理气，炙草和药，又气血调和，则表郁解而津津汗出矣。此为妊妇伤寒之主方，既能疏郁达表，又能调气安胎，血虚者可略加归、芍。

10300 香连化滞汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】 当归尾一钱 白芍一钱半 黄连一钱（去毛） 黄芩一钱（去皮） 黄柏一钱（去皮） 枳壳（去瓤，麸炒）一钱五分 槟榔一钱 木香一钱 大黄三钱（虚人用半） 滑石二钱 甘草二分

【用法】 上锉，水煎，空心服。

【功用】《全国中药成药处方集》（兰州方）：清

肠热，化食滞。

【主治】 赤白痢疾初起，积滞不行，里急后重，频登圊而去少，腹痛等症。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（兰州方）：虚寒气弱及孕妇忌服。

【备考】 本方改为丸剂，名“香连化滞丸”（见《全国中药成药处方集》兰州方）。

10301 香附芎归汤

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】 川芎 当归 香附 白芍 蕲艾 熟地 麦冬 杜仲 橘红 甘草 青蒿

【主治】 经行后期。

【加减】 半边头痛，加甘菊、藁本、荆芥、童便，去艾、杜仲、香附、橘红。

10302 香柿理中汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】 人参 白术 炙草 干姜（炮） 陈皮各一钱 丁香二分 柿蒂二钱

【用法】 水煎，温服。

【主治】 产后胃虚气寒，呃逆之声上冲。

【加减】 如有热证热脉，去丁香，加竹茹二钱。如阴火上冲，加肉桂、附子各一钱，引火归源，不致游移上逆也。

10303 香茸六味丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 鹿茸血片一钱 生地 熟地各一两 山萸肉四钱 淮山药 茯神各八钱 桑叶 丹皮各四钱 定风草三钱 真麝香五厘

【用法】 上为细末，豆淋酒糊为丸。每服三钱，细芽茶五分，杭菊五朵，泡汤送下。

【主治】 内风挟痰，上冲头脑，抬头屋转，眼常黑花，见物飞动，猝然晕倒者。

10304 香砂六君丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 党参 于术 茯苓 制香附各二两 姜半夏 广皮 炙甘草各一两 春砂仁一两半

【用法】 水泛为丸。每服二三钱。

【主治】 中虚气滞，饮食不化，呕恶胀满，胃痛，腹鸣泄泻。

10305 香砂平胃丸

【方源】《保命歌括》卷二十一。

【组成】 苍术（米泔浸，炒）五两 厚朴（酒炒） 陈皮各三两 甘草 香附子（盐水浸透） 神曲（炒） 砂仁各一两

【用法】 上为细末，荷叶水煮粳米粉为丸，如梧桐子大。每服五十丸，生姜、大枣汤送下。

【功用】 消食积，补脾胃。

【主治】 伤食泄泻，心腹胀满，下泄必臭，湿气作酸，先用下法去其积滞之物，待酸臭去尽，以本方和之。

10306 香砂平胃散

【方源】《回春》卷二。

【组成】 香附（炒）一钱 砂仁七分 苍术（米泔制，炒）一钱 陈皮一钱 甘草五分 枳实（麸炒）八分 木香五分 藿香八分

【用法】 上锉一剂。加生姜一片，水煎服。

【主治】 伤食。

【加减】 肉食不化，加山楂、草果；米粉面食不化，加神曲、麦芽；生冷瓜果不化，加干姜、青皮；饮酒伤者，加黄连、干葛、乌梅；吐泻不止，去枳实，加茯苓、半夏、乌梅。

10307 香砂平胃散

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】 苍术（米泔水浸，炒） 陈皮 厚朴（姜炒） 甘草（炙） 缩砂（研） 香附（醋炒） 南山楂 神曲（炒） 麦芽（炒） 枳壳（麸炒） 白芍（炒）

【用法】 生姜为引，水煎服。

【主治】 伤食腹痛。

10308 香砂枳术丸

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】 枳实（尖，炒）一两 白术二两 砂仁 香附子各五钱

【用法】 上为末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食远白汤送下。

【主治】 脾胃虚弱，饮食减少，胸膈痞闷。

【备考】 方中砂仁原缺，据《济阳纲目》补。

10309 香砂枳术丸

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】 木香 砂仁各五钱 枳实（麸炒）一两 白术（米泔浸，炒）二两

【用法】 上为末，荷叶裹烧饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白术汤送下。

【功用】 破滞气，消宿食，开胃进食。

【主治】 ①《张氏医通》：气滞宿食不消。②《杂病源流犀烛》：食积停滞，腹痛不可近或泄泻或头痛。

10310 香砂胃苓汤

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】 陈皮 厚朴 泽泻 藿香 砂仁各一钱

半　苍术　茯苓　猪苓各二钱　甘草五分　官桂五分　白术二钱

【用法】 上㕮咀。用水一钟半，加生姜三片，煎至七分，温服。

【功用】 《全国中药成药处方集》：除湿健胃。

【主治】 ①《摄生众妙方》：饮食过多泄泻。②《全国中药成药处方集》：呕吐泄泻，浮肿，小便不利。

【备考】 本方改为丸剂，名"香砂胃苓丸"（见《全国中药成药处方集》）。

10311　香砂养胃丸

【方源】 《集验良方》卷三。

【组成】 人参一两　木香一两　砂仁一两六钱　香附（醋制，炒）一两六钱　白术（土炒）二两　甘草（炙）一两六钱　白茯苓一两六钱　白蔻仁一两四钱　陈皮一两六钱　干姜一两　官桂一两　厚朴一两六钱　苍术

【用法】 夹肉蒸烂为丸，如梧桐子大。每服五六十丸。

【主治】 胃气虚寒，胸膈饱闷寒痛。

【备考】 方中苍术用量原缺。

10312　香砂养胃汤

【方源】 《回春》卷二。

【组成】 香附（炒）　砂仁　苍术（米泔制，炒）　厚朴（姜汁炒）　陈皮各八分　人参五分　白术（去芦）一钱　茯苓（去皮）八分　木香五分　白豆蔻（去壳）七分　甘草（炙）二分

【用法】 上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 ①《回春》：脾胃不和，胃寒不思饮食，口不知味，痞闷不舒。②《饲鹤亭集方》：胃气虚寒，胸膈不舒，湿痰呕恶，胀满便泄，食不运化，中虚气滞。

【加减】 脾胃寒，加干姜、官桂；肉食不化，加山楂、草果；米粉、面食不化，加神曲、麦芽；生冷瓜果不化，加槟榔、干姜；胸腹饱闷，加枳壳、萝卜子、大腹皮；伤食胃口痛，加木香、枳实、益智；伤食泄泻，加干姜、乌梅、白术；伤食恶心呕吐，加藿香、丁香、半夏、乌梅、干姜。

【备考】 本方改为丸剂，名"香砂养胃丸"（见《饲鹤亭集方》）。方中甘草用量原缺，据《寿世保元》补。

10313　香砂养胃汤

【方源】 《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】 白术　陈皮　茯苓　半夏各一钱　香附　砂仁　木香　枳实　蔻仁　厚朴　藿香各七分　甘草三分　姜三片　枣二枚

【功用】 ①《杂病源流犀烛》：调养脾胃，升降阴阳。②《中国药典》：和胃止呕。

【主治】 ①《杂病源流犀烛》：饮食不消致痞。②《中国药典》：由胃寒气滞引起的不思饮食，呕吐酸水，胃脘满闷，四肢倦怠。

【宜忌】 《中国药典》：忌食生冷，油腻之物。

【备考】 本方改为丸剂，名"香砂养胃丸"，（见《丸散膏丹集成》）。

10314　香砂理中丸

【方源】 《医统》卷二十三。

【组成】 人参　白术（炒）　干姜（炮）　甘草（炙）各二两　木香　砂仁（炒）各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如胡椒大。每服七八十丸，空心白汤送下。

【功用】 《重订通俗伤寒论》：温健脾阳。

【主治】 脾虚感寒，腹痛吐泻，肢冷脉微。

①《医统》：脾胃虚弱，感寒停饮，心腹卒痛，手足厥冷，呕吐清水，饮食不进。②《重订通俗伤寒论》：夏月饮冷过多，寒湿内留，上吐下泻，肢冷脉微，脾阳愈甚，中气不支者。③《全国中药成药处方集》（福州方）：脾胃冷弱，阴阳亏损，腹痛吐泻，反胃噎膈，及寒痹。

【方论选录】 《重订通俗伤寒论》：君以参、术、草守补中气，臣以干姜温健中阳，佐以香、砂者，取其芳香悦脾，俾脾阳勃发也。

【备考】 本方改为汤剂，名"香砂理中汤"（见《医灯续焰》）。

10315　香蔻和中丸

【方源】 《寿世保元》卷三。

【组成】 白术（去芦，炒）　山楂肉　连翘各四两　莱菔子（炒）五钱　白茯苓（去皮）　枳实（去瓤，麸炒）　陈皮（去白）　半夏（姜汁炒）　神曲（炒）各二两　干生姜一两　白豆蔻（炒）五钱　木香五钱

【用法】 上为细末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，食后白滚汤送下。

【主治】 噫气吞酸嘈杂，有痰有热，有气有食，胸膈不宽，饮食不化。

10316　香附旋覆花汤

【方源】 《温病条辨》卷三。

【组成】 生香附三钱　旋覆花三钱（绢包）　苏子霜三钱　广皮二钱　半夏五钱　茯苓块三钱　薏仁五钱

【用法】 上以水八杯，煮取二杯，分三次温服。

【主治】 伏暑、湿温胁痛，或咳或不咳，无寒，但潮热，或竟寒热如疟状。

【加减】 腹满者，加厚朴；痛甚者，加降香末。

10317 香砂六君子汤

【方源】《明医杂著》卷六。

【组成】 六君子加香附 藿香 砂仁。

【主治】 ①《内科摘要》：脾胃虚寒而致饮食少进，或肢体肿胀，肚腹作痛，或大便不实，体瘦面黄，或胸膈虚痞，痰嗽吞酸。②《医学传灯》：中寒呕吐痰水，微寒微热，甚则昏晕不醒，二便皆遗，脉沉细者。痰火初起之时，外无寒热诸症，内无烦热气急，但见神昏不安，肢体无力，声音低小，饮食不进，脉来沉细无力者。痰泻者，或多或少，或泻或不泻，中焦有痰，饮食入胃，里结不化，所以作泻，脉来弦细无力者。

10318 香砂六君子汤

【方源】《古今名医方论》卷一引柯韵伯方。

【异名】 香砂六君汤(《麻科活人》卷二)。

【组成】 人参一钱 白术二钱 茯苓二钱 甘草七分 陈皮八分 半夏一钱 砂仁八分 木香七分

【用法】 上加生姜二钱，水煎服。

【功用】 ①《中药成方配本》：疏补化痰。②《中国药典》：益气健脾，和胃。

【主治】 ①《古今名医方论》：气虚肿满，痰饮结聚，脾胃不和，变生诸证者。②《丸散膏丹集成》：中虚气滞，痰湿内阻，胸中满闷，食难运化，呕恶腹疼，肠鸣泄泻。

【方论选录】 四君子气分之总方也。人参致冲和之气，白术培中宫，茯苓清治节，甘草调五脏，胃气即治，病安从来。然拨乱反正，又不能无为而治，必举夫行气之品以辅之，则补品不至泥而不行，故加陈皮以利肺金之逆气，半夏以疏脾土之湿气，而痰饮可除也。加木香以行三焦之滞气，缩砂以通脾肾之元气，臆郁可开也。四君得四辅，而补力倍宣，四辅有四君，而元气大振，相须而益彰者乎。

【备考】 本方改为丸剂，名“香砂六君子丸”(见《丸散膏丹集成》)、又名“香砂六君丸”(见《全国中药成药处方集》)。

10319 选奇汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 羌活选奇汤(《伤寒大白》卷一)。

【组成】 炙甘草(夏月生用) 羌活 防风各三钱 酒黄芩一钱(冬月不用，如能食，热痛者加之)

【用法】 上㕮咀。每服五钱，以水二盏，煎至一盏，去滓，食后服。

【主治】 风热挟痰上壅，头痛眩晕，眉棱骨痛。

①《兰室秘藏》：眉痛不可忍。②《内科摘要》：风热上壅，头目眩晕。③《古今医鉴》：眉棱骨痛，属风热与痰，痛不可忍者。④《伤寒大白》：太阳风热头痛。

10320 重明散

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】 炉甘石一斤(火烧，用黄连水淬为末) 川椒二钱(熬膏子，入炉甘石末，以火焙干为度) 黄连 铜绿各半两 硇砂三钱 蒲黄半两 雄黄二钱 绿豆粉四两

【用法】 上同炉甘石为极细末，齿上嚼不糁为度，后用脑子一钱，南硼砂一钱，研细，用大豆养之。每用少许，以骨筷干点，卧少时。

【主治】 一切风热之毒上冲眼目，暴发赤肿疼痛，或生翳膜瘀肉，隐涩羞明，两睑赤烂。

【宜忌】 忌酒、湿面、诸杂、鱼肉、辛热等物。

10321 重型消黄汤

【方源】《中医原著选读》引关幼波方。

【组成】 茵陈90克 生石膏一两 炒知柏各三钱 藿香三钱 佩兰三钱 鲜茅根一两 杏仁三钱 赤芍五钱 丹皮五钱 泽兰五钱 酒胆草五钱 六一散(包)三钱

【功用】 清热利湿，活血解毒，芳香透表。

【主治】 肝炎。湿热弥漫三焦，热重于湿，黄疸重，恶心，呕吐，厌油，发热口渴，便干，尿赤，脉弦滑数，舌苔黄厚而燥。

【加减】 高烧(39度以上)，或兼神昏谵语者，加服安宫牛黄散四分，分二次冲服；或加服紫雪散一钱，分二次冲服；或加服局方至宝丹一丸，分二次服。便秘者，加酒军三钱，瓜蒌五钱。退黄时茵陈的用量要大，最大可用四两，并加活血药，以加速退黄的作用。

10322 便血丸

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】 血见愁一两 卷柏灰一两 乌梅灰二两 地榆灰二两 莲房灰二两 荷叶灰二两 榴皮灰二两 五倍灰二两 血余灰一两 柏叶灰二两 棕灰二两 木耳灰一两 槐花灰二两 白蔹一两 当归炭三两 白芍一两五钱 升麻一两 白术二两 生蒈三两 党参三两 椿根皮二两 凌霄花

【用法】 晒干为末，醋泛为丸。每服三钱，开水送下。

【主治】 便血日久不止。

【备考】 方中凌霄花用量原缺。

10323 修肝散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 栀子 薄荷 防风 当归 甘草 连翘 大黄 黄芩 苍术 羌活 菊花 木贼 赤芍药 麻黄各等分

【用法】 上为末。每服二钱，食后蜜水调下，或煎服，一日二三次。

【主治】 风轮生翳，如针如麻米，疼痛甚者。

10324 修肝活血汤

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 归尾 赤芍各一两半 川芎 羌活各七钱 黄耆 防风 大黄 黄连各三钱 薄荷 连翘 白蒺藜 菊花各一两

【用法】 每服四钱，水煎服。

【主治】 血翳包睛，眼中赤涩肿痛，泪出，渐有赤脉通睛，常时举发，久则发筋结厚，遮满乌睛，如赤肉之相，及风轮生疮或突起，愈后变成白翳，久不散者。

10325 保元汤

【方源】《博爱心鉴》卷上。

【异名】 参耆汤(《痘疹活幼至宝》卷终)、参耆饮(《简明医彀》卷六)、保元丹(《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】 人参一钱 黄耆三钱 甘草一钱 肉桂五分至七分

【功用】 ①《全国中药成药处方集》(沈阳方)：滋养益气，扶弱补虚。②《方剂学》：补气温阳。

【主治】 ①《简明医彀》：元气虚弱，精神倦怠，肌肉柔慢，饮食少进，面青㿠白，睡卧宁静，痘顶不起，浆不足，及有杂证。②《全国中药成药处方集》：气血不足，婴儿怯弱，痘毒内陷，面色苍白，气陷久泻，肢体无力，肺脾虚弱，恶寒自汗。

【宜忌】 ①《简明医彀》：血热毒壅之火证禁用。②《全国中药成药处方集》(沈阳方)：禁忌生冷。

【方论选录】 ①《博爱心鉴》：人参益内，甘草和中，实表宜用黄耆，助阳须凭官桂。前三味得三才之道体，后一味扶一命之巅危。②《古今名医方论》引柯韵伯：参、耆非桂引道，不能独树其功；桂不得甘草和平气血，亦不能绪其条理。

10326 保元汤

【方源】《会约》卷十二。

【组成】 熟地三五钱 枣皮二钱 山药一钱半 菟丝子(炒香，捣碎)二三钱 五味三分 益智仁(酒炒)一钱 附子一钱半 肉桂一二钱

【用法】 水煎，空心服。

【功用】 补阴固涩。

【主治】 肾虚无火而下焦滑遗者。

【加减】 虚滑遗甚者，加金樱子(净肉)二钱，或加乌梅二个；兼大便溏泄，加骨脂、吴茱萸之属。

10327 保气散

【方源】《妇人良方》卷十六。

【异名】 保气饮(《准绳·女科》卷四)。

【组成】 香附子四两 山药二两 缩砂仁一两 木香四钱 粉草一两一分 益智仁 紫苏叶各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，白汤点服。

【功用】 安胎，宽气进食，瘦胎易产。

【主治】 居处失宜，偶然顿仆，胎动胎痛，漏胎下血。

【备考】 本方改为丸剂，名“保气丸”(见《胎产心法》)。

10328 保孕丸

【方源】《医级》卷九。

【组成】 熟地 当归 川断 白术各四两 阿胶 香附各二两 陈皮 艾叶 益母草 川芎 黄芩各一两 砂仁五钱

【用法】 上以枣肉为丸。每服三四钱，米饮送下。

【主治】 妇人受孕，气血不足，经三月而堕胎者。

【宜忌】 宜节饮食，戒恼怒，绝嗜欲，静养。

10329 保生丹

【方源】《回春》卷四。

【组成】 嫩乌药 益智仁 朱砂(另研，水飞过，留一半为衣)各一两 干山药二两

【用法】 上药各为末，将山药打糊为丸，如不成，再加些酒糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心淡盐汤送下。

【主治】 夜梦遗精，旬无虚夕，或经宿而再者。

10330 保生汤

【方源】《妇人良方》卷十二引温隐居方。

【组成】 人参一分 甘草一分 白术 香附子 乌药 橘红各半两

【用法】 上㕮咀。每服三大钱，以水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。或作末调服。

【主治】 ①《妇人良方》引温隐居方：妊娠恶阻，经候不行，身无病而似病，脉滑大而六部俱

匀，精神如故，恶闻食臭，或但嗜一物，或大吐；或时吐清水。②《校注妇人良方》：少食呕吐，或兼吐泻作渴。

【加减】 如觉恶心呕吐，加丁香、生姜，煎服。

【备考】 方中乌药，《校注妇人良方》作"乌梅"。《玉案》有艾叶。

10331 保生汤

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】 砂仁 白术 香附 乌药 陈皮 甘草

【用法】 生姜为引。

【主治】 妊娠恶阻，呕吐而无其他兼证者。

【加减】 若气弱者，量加人参；气实者，量加枳壳。

10332 保安丸

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】 川大黄三两（新水浸一宿，蒸熟，切片子，焙） 干姜一两（炮） 大附子半两（去皮脐） 鳖甲一两半（好醋一升伏时炙令焙干）

【用法】 上为末，取三年米醋一大升，先煎四五合，然后和药，为丸如梧桐子大。每服十丸至二十丸，空心服，或酒米饮送下。后取积如鱼肠、脓血烂肉汁、青泥当下。

【主治】 癥积。心腹内结如拳，渐上不止，抢心疼痛，及绕脐腹痛不可忍者。

10333 保安丸

【方源】《简易方》引《究源方》（见《医方类聚》卷二十）。

【组成】 草乌（去皮） 五灵脂各等分

【用法】 上为细末，猪心血为丸，如鸡头子大。每服一丸，薄荷、生姜汁浸汤，食后服。

【主治】 诸风瘫，不问久远。

10334 保阴煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 生地 熟地 芍药各二钱 山药 川续断 黄芩 黄柏各一钱半 生甘草一钱

【用法】 上以水二钟，煎七分，食远温服。

【主治】 ①《景岳全书》：男妇带浊遗淋，色赤带血，脉滑多热，便血不止，及血崩血淋，或经期太早，凡一切阴虚内热动血等证。②《妇科玉尺》：胎气热而不安，及产妇淋沥不止。

【加减】 如小水多热或兼怒火动血者，加焦栀子一二钱；如夜热身热，加地骨皮一钱五分；如肺热多汗者，加麦冬、枣仁；如血热甚者，加黄连一钱五分；如血虚血滞，筋骨肿痛者，加当归二三钱；如气滞而痛，去熟地，加陈皮、青皮、丹皮、香附之属；如血脱血滑及便血久不止者，加地榆一二钱，或乌梅一二个，或百药煎一二钱，文蛤亦可；如少年或血气正盛者，不必用熟地、山药；如肢节筋骨疼痛或肿者，加秦艽、丹皮各一二钱。

10335 保肝散

【方源】《回春》卷五。

【组成】 当归 川芎 枸杞 苍术（米泔制） 白术（去芦） 密蒙花 羌活 天麻 薄荷 柴胡 藁本 石膏 木贼 连翘 细辛 桔梗 防风 荆芥各一钱 栀子 白芷各五分 甘草一钱

【用法】 上锉一剂。水煎，先食干饭后服药。

【主治】 肝病目生内障者。

10336 保和丸

【方源】《医统》卷八十九引《直指小儿》。

【组成】 白术五两 茯苓 半夏（制） 山楂 神曲（炒）各三两 陈皮 连翘 萝卜子各二两 苍术（制） 枳实（炒） 香附子（制） 厚朴（制） 黄芩（酒炒） 黄连（酒炒）各一两

【用法】 上为细末，生姜汁打面糊为丸，如黍米大。每服五十丸，渐加至七八十丸，食后茶汤送下。

【功用】 消食导滞，健脾和胃。

①《医统》引《直指小儿》：益脾胃。②《古今医鉴》：消痰利气，扶脾胃，进饮食。③《全国中药成药处方集》（北京方）：助消化，利胸膈，健胃肠，止泄泻。

【主治】 小儿食滞，脾胃不和，嗳气吞酸，呕吐泄泻，胸膈痞闷。

①《医统》引《直指小儿》：小儿食伤发热，欲成疳证。②《古今医鉴》：一切饮食所伤，胸膈满闷不安，或腹中有食不化，或积聚痞块。③《全国中药成药处方集》（北京方）：嗳气吞酸，呕吐泄泻，胸膈痞满，不思饮食。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（北京方）：忌饮酒及食肉面。

10337 保和丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】 山楂六两 神曲二两 半夏 茯苓各三两 陈皮 连翘 莱菔子各一两

【用法】 上为末，炊饼为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，食远白汤送下。

【功用】《中国药典》：消食导滞和胃。

【主治】 食积停滞，胸膈痞满，腹胀腹痛，嗳腐吞酸，厌食呕恶，或腹中有食积癖块，或大便泄痢。

①《丹溪心法》：一切食积。②《医学正传》引丹溪方：一切饮食所伤，胸腹饱闷不安，或腹中有食积癖块。③《保婴撮要》：饮食停滞腹痛，或恶寒发热。④《赤水玄珠》：食积痢，腹痛不知饿。⑤《准绳·幼科》：饮食停滞，胸膈痞满，嗳气吞酸或吐泻腹痛。⑥《景岳全书》：饮食酒积停滞，胸膈痞满腹胀。⑦《医方集解》：食疟。⑧《金鉴》：乳食过饱蓄胃中，乳片不化吐频频，身热面黄腹膨胀；滞热丹毒。

【方论选录】 ①《医方考》：伤于饮食，故令恶食。诸方以厉药攻之，是伤而复伤也。是方药味平良，补剂之例也，故曰保和。山楂甘而酸，酸胜甘，故能去肥甘之积；神曲甘而腐，腐胜焦，故能化炮炙之腻；卜子辛而苦，苦下气，故能化面物之滞；陈皮辛而香，香胜腐，故能消陈腐之气；连翘辛而苦，苦泻火，故能去积滞之热；半夏辛而燥，燥胜湿，故能消水谷之气；茯苓甘而淡，淡能渗，故能利湿伤之滞。②《医方集解》：此足太阴阳明药也。山楂酸温收缩之性，能消油腻腥羶之食；神曲辛温蒸罨之物，能消酒食陈腐之积；萝子辛甘下气而制面；麦芽咸温消谷而软坚；伤食必兼乎湿，茯苓补脾而渗湿；积久必郁为热，连翘散结而清热；半夏能温能燥，和胃而健脾；陈皮能降能升，调中而理气。此内伤而气未病者，但当消导，不须补益。③《成方便读》：山楂酸温性紧，善消腥羶油腻之积，行瘀破滞，为克化之药，故以为君；神曲系蒸罨而成，其辛温之性，能消酒食陈腐之积；莱萝子辛甘下气，而化面积，麦芽咸温消谷，而行瘀积，二味以之为辅；然痞坚之处，必有伏阳，故以连翘之苦寒散结而清热；积郁之凝，必多痰滞，故以二陈化痰而行气。此方虽纯用消导，毕竟是平和之剂，故特谓之保和耳。

【备考】《医学正传》引丹溪方有麦芽面。《准绳·类方》引丹溪方有麦芽、黄连。

10338 保和丸

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】 山楂肉六钱 苍术（米泔浸） 白术各三钱 半夏（姜制） 黄芩（土炒） 白茯苓各三钱 橘红三钱 萝卜子二钱 黄连（土炒，去土） 神曲各四钱 吴茱萸一钱 连翘一钱

【用法】 上为末，生姜自然汁煮宿，蒸饼糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，食远橘皮汤送下。

【主治】 吞酸嘈杂。

10339 保和丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】 楂肉 姜半夏 黄连 陈皮各五钱 神曲三钱 麦芽二钱

【用法】 将神曲打糊为丸。每服五十至七十丸，白汤送下。

【主治】 食积、酒积。

10340 保和汤

【方源】《修月鲁般经》引《劳证十药神书》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【异名】 保肺汤（《杏苑》卷五）、保真汤（《证治宝鉴》卷六）。

【组成】 知母 贝母 天门冬 麦门冬 款花各三钱 天花粉 薏仁 五味子各二钱 粉草 兜铃 紫菀 百合 桔梗各一钱 阿胶 当归 地黄各一分半 紫苏 薄荷各半分

【用法】 上各味依常法修制成粗末。每服用水二大盏，加生姜三片，共煎一盏，去滓，却用饴糖一匙，入药汁内服之。每日食后各进三盏。

【功用】 ①《医学入门》：止嗽宁肺。②《血证论》：润肺清火。

【主治】 ①《修月鲁般经》引《劳证十药神书》（见《医方类聚》）：劳证久嗽，肺燥成痿者。②《便览》：咳血、呕血、吐血。

【加减】 血盛，加用蒲黄、茜根、藕节、大蓟、小蓟、茅根；痰盛，加用南星、半夏、橘红、茯苓、枳壳、枳实；热盛，加用大黄、山栀、黄连、黄柏、黄芩、连翘；风盛，加用防风、荆芥、旋复、甘菊、细辛、香附子；寒盛，加用人参、芍药、桂皮、麻黄、五味、腊片；喘盛，加用桑白皮、陈皮、大腹皮、苏子、卜子、葶苈子。

【方论选录】《血证论》：方用饴、胶、地、归、百合、百部、甘草、紫菀、花粉、款冬，大生津液以润肺；五味、天冬、知母以清肺火；犹恐外寒闭之，则火郁而不清，故佐以姜、苏、薄荷以疏解其郁；痰饮滞之，则火阻而不降，故用贝母、苡仁以导利其滞。郁解滞行，火清肺润，咳嗽愈而痿燥除。

【备考】 本方改为丸剂，名“保和丸”（见《血证论》）。《十药神书》（陈修园注本）有杏仁、百部，无麦门冬。

10341 保和汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 知母（蒸）五分 贝母二钱 天冬（去心）三钱 麦冬（去心）一钱 苡仁五钱 北五味十粒 甘草 桔梗 马兜铃 百合 阿胶（蛤粉炒成珠）各八分 薄荷二分

【用法】 水煎，加饴糖一匙，温服。

【功用】《血证论》：清火降痰。

【主治】 ①《医方简义》：肺痿久咳不已，时吐白沫如米粥者。②《血证论》：肺津不足，痰凝火郁，肺痿咳嗽。

【加减】 虚者，加人参。

【方论选录】《血证论》：肺经之津足，则痰火不生，而气冲和。若津不足，则痰凝火郁，痿咳交作，而气失其和矣。方用饴糖、甘草、阿胶，补胃以滋肺津；复加清火、祛痰、敛浮、解郁之品，凡以保护肺金，使不失其和而已。

【备考】 方中天冬用量原缺，据《血证论》补。

10342 保和汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 麦芽 山楂 卜子 厚朴 香附各一钱 甘草 连翘各五分 陈皮一钱五分

【用法】 水煎服。

【主治】 伤食心痛。

【备考】 本方改为丸剂，名"保和丸"（见《笔花医镜》）。

10343 保命散

【方源】《幼幼新书》卷五引《医方妙选》。

【异名】 朱矾散（《片玉心书》卷五）。

【组成】 朱砂（研细，水飞，令干） 白矾（烧灰）各一分 马牙消半两（研细）

【用法】 上为细末。每服一字，取白鹅粪，以水搅取汁，调涂舌上、颌颊内。未用药时，先以手指缠乱发，揩拭舌上垢，然后使药敷之。

【功用】《医宗金鉴》：清热泻脾。

【主治】 婴儿初生七日间生胎毒者，其舌上有白屑如米，连舌下有膜如石榴子大，令儿语不发，如鹅口状，名曰鹅口疮。

10344 保肤膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 大蜂房一个 血余一丸 香油半斤

【用法】 上药入香油内，炸枯去滓，加黄蜡二两溶化，离火待温，加大黄末二两，朝脑末一两，二味研匀，和入任用。

【主治】 汤泡火烧及臁疮、秃疮。

10345 保肤膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 煅石膏 31 克 白及粉 15 克 密陀僧 3 克 轻粉 3 克 枯白矾 6 克

【用法】 上为细末。有脓水淋漓者，可用药粉干撒创面；慢性湿疹，可加红粉 0.6 克，研细加入，临用时以香油或凡士林调成 50% 软膏外用。

【主治】 慢性湿疹。

【宜忌】 忌用温水或肥皂水洗涤，不宜大面积应用。

10346 保肺汤

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】 白及 薏苡仁 贝母 金银花 陈皮 苦桔梗 苦葶苈 甘草节

【主治】 肺痈吐脓血。

【加减】 初起，加防风；溃后，加生黄耆、人参。

10347 保胎丸

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】 人参一两五钱 白术四两 黄芩二两 杜仲一两五钱（盐酒炒，另研） 当归二两 续断一两五钱（酒浸） 熟地黄一两（酒浸蒸） 陈皮一两 香附子一两（童便浸）

【用法】 上药各为细末，糯米饭为丸，如绿豆大。每服七十丸，空心白汤送下。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：补气养血安胎。

【主治】 ①《摄生众妙方》：屡经堕胎，久而不育者。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：习惯性流产，虚弱贫血，生殖机能减退，腰膝无力，小腹疼痛，寒凝气滞，心烦头晕，四肢倦怠，面黄肌瘦，食欲不振。

【备考】 妊娠过七个月后，不必再服。《胎产护生篇》有山药，无人参。

10348 保胎丸

【方源】《达生编》卷下。

【组成】 淮山药四两（炒） 杜仲三两（盐水炒） 续断二两（酒炒）

【用法】 上为末，糯米糊为丸。每服三钱，米汤送下。

【主治】 胎欲堕落，惯小产者。

10349 保胎丸

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】 杜仲八两 熟地 山药各六两 续断（盐炒）四两 当归（酒炒）二两

【主治】 妊娠腰痛。

10350 保真丸

【方源】《普济方》卷二二六引《卫生家宝方》。

【组成】 肉苁蓉（酒浸一宿） 舶上茴香（炒香） 川牛膝（酒浸） 白蒺藜（炒，捣去尖） 葫芦巴（炒香） 补骨脂（炒香） 黄耆（盐水浸） 附子

（炮，去皮脐） 杜仲（去粗皮，炒断丝） 菟丝子（酒浸二宿，蒸熟，研细） 白茯苓 山茱萸 薯蓣（炒） 桂心（去粗皮） 川楝子（肉） 南木香（湿纸裹煨）各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前盐、酒任下。

【功用】 壮阳补肾，益精髓。

【主治】 真气虚惫，下焦伤竭，脐腹强急，腰脚疼痛，精神困倦，面色枯槁，小肠疝气，夜梦遗精，小便滑数。

10351 保真汤

【方源】《修月鲁般经》引《劳证十药神书》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】 当归 人参 生地黄 熟地黄 白术 黄耆各三钱 赤茯苓 白茯苓各一钱半 天门冬 麦门冬各二钱 赤芍药 白芍药 知母 黄柏 五味子 柴胡 地骨皮各二钱 甘草 陈皮 厚朴各一钱半

【用法】 上为粗末。每服以水二盏，加生姜三片，大枣五枚，莲心五枚，同煎至一盏，去滓，食前服，一日三次，与保和汤间服。

【功用】《医学入门》：补虚除热。

【主治】 ①《修月鲁般经》引《劳证十药神书》（见《医方类聚》）：劳证骨蒸体虚。②《东医宝鉴》：虚劳骨蒸，潮热盗汗。

【加减】 惊悸，加用茯神、远志、柏子仁、酸枣仁；淋浊，加用萆薢、乌药、猪苓、泽泻；便涩，加用苦杖、木通、石苇、扁蓄；遗精，加用龙骨、牡蛎、莲须、莲心；燥热，加用滑石、石膏、青蒿、鳖甲；盗汗，加用牡蛎、浮麦、黄耆、麻黄根。

【备考】 方中甘草、陈皮、厚朴原无用量，据《十药神书》（陈修园注本）补。

10352 保真汤

【方源】《产后编》卷下。

【组成】 黄耆六分 人参二钱 白术二钱（炒） 炙草四分 川芎六分 当归二钱 天冬一钱 麦冬二钱 白芍二钱 枸杞二钱 黄连六分（炒） 黄柏六分（炒） 知母二钱 生地二钱 五味十粒 地骨皮六分

【用法】 上加大枣二枚（去核），水煎服。

【主治】 产后骨蒸。

10353 保生救苦散

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 生寒水石 大黄（火煨） 黄柏（油炒） 各等分

【用法】 上为细末，用油调涂，或干用此药涂之。其痛立止。

【主治】 火烧，或热油烙，及脱肌肉者。

10354 保安大成汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】 人参 白术 黄耆（蜜水拌炒）各二钱 茯苓 白芍 陈皮 归身 甘草（炙） 附子 山萸肉 五味子各一钱 木香 砂仁各五分

【用法】 上以水二钟，加煨姜三片（去皮），大枣三枚，煎八分，食远服。

【功用】 大补不足。

【主治】 溃疡。元气素虚，精神怯弱，或脓水出多，神无所主，以致睡卧昏倦，六脉虚细，足冷身凉，便溏或秘，胸膈或宽或不宽，舌虽润而少津，口虽食而少味，疮弦不紧，肉色微红。

10355 保和去滞丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】 陈皮五钱 半夏曲 白茯苓 枳实（麸炒） 厚朴（姜汁炒） 槟榔各五钱 莱菔子（炒） 二钱五分 木香二钱五分

【用法】 上为末，神曲糊为丸，如麻子大。陈米汤送下。

【主治】 小儿痢疾有积，胃弱不可重下者。

10356 保命延龄丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】 苣胜子（去皮，九蒸九晒） 补骨脂（酒浸一宿，焙） 牛膝（酒浸一宿，焙） 甘菊花 天门冬（去心） 菟丝子（酒浸一宿，湿杵作饼，火焙再杵） 枸杞子 人参（去芦头） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 白茯苓（去皮） 巴戟（去心，生用） 酸枣仁 柏子仁 山药 覆盆子 五味子 楮实 天雄（炮，去皮尖）各一两 肉桂（去粗皮）四两 生干地黄八两（切细，新瓦上炒令干）

【用法】 上为细末，春夏用白沙蜜、秋冬用蒸枣肉为剂，加好胡桃十枚（去皮），同药剂于臼内捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，空心、食前温盐汤送下。

【功用】 安神养气，补填骨髓，起弱扶衰，润泽肌肤，聪明耳目。久服黑髭发，牢牙齿，能夜读细书，心力不倦。

10357 保肺济生丹

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 天冬一钱五分 麦冬一钱五分 人参一钱 沙参四钱 五味五分 玉竹三钱 女贞子二钱

茯苓二钱　山药三钱　贝母二钱　茜草根二钱　杏仁二钱

【用法】　上加藕三两（切片），煎汤代水煎药服。

【主治】　肺虚而咳，肌表微热，神倦气短，不时火升，失血咽痛者。

10358　保肺雪梨膏

【方源】《重订通俗伤寒论》引胡在滋方。

【组成】　雪梨六十枚（压取汁二十杯）　生地　白茅根　生藕（合取汁十杯）　白萝卜　麦冬　荸荠（合取汁五杯）

【用法】　上加白蜜一斤，饴糖八两，竹沥一杯，柿霜一两，熬成膏。每于饭后及临卧取汁一杯，开水冲服。

【功用】　滋液润燥，化痰保肺。

【主治】　肺燥干咳失血，及肺痿出血，肺痈大势已退，余热未除。

10359　保胎无忧散

【方源】《达生编》卷下。

【组成】　大熟地五钱　山萸肉二钱五分　益母草一钱　条黄芩五分　麦冬二钱五分　生地一钱五分　阿胶一钱　北五味一分

【用法】　从受胎两个月服起，每日一剂，服五十剂止。

【主治】　小产诸症。

10360　保胎资生丸

【方源】《广笔记》卷二。

【异名】　资生丸（原书同卷）、人参资生丸（《金鉴》卷四十）。

【组成】　人参（人乳浸，饭上蒸，烘干）三两　白术三两　白茯苓（细末，水澄蒸，晒干，加人乳再蒸，晒干）一两半　广陈皮（去白，略蒸）二两　山楂肉（蒸）二两　甘草（去皮，蜜炙）五钱　怀山药（切片，炒）一两五钱　川黄连（如法炒七次）三钱　薏苡仁（炒三次）一两半　白扁豆（炒）一两半　白豆蔻仁（不可见火）三钱五分　藿香叶（不见火）五钱　莲肉（去心，炒）一两五钱　泽泻（切片，炒）三钱半　桔梗（米泔浸，去芦，蒸）五钱　芡实粉（炒黄）一两五钱　麦芽（炒，研磨取净面）一两

【用法】　上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每丸重二钱。用白汤或清米汤、橘皮汤、炒砂仁汤嚼化下。

【功用】　①《不居集》：妇人男子，调中养胃，饥能使饱，饱不使饥。②《霍乱论》：调和脾胃，运化饮食，滋养荣卫，消除百病，可杜霍乱等患。

【主治】　①《广笔记》：妊娠三月胎堕。②《成方便读》：脾胃气虚，湿热蕴结，以及小儿疳积腹胀，面黄肌瘦，久泄久痢等一切脾胃不足之症。

【方论选录】　①《不居集》：此方以参、术、苓、草、莲、芡、山药、扁豆、苡仁之甘平，以补脾元；陈皮、曲、麦、豆蔻、藿、桔之辛香，以调胃气；其有湿热，以黄连清之燥之。既无参苓白术散之滞，又无香砂六君之燥，能补能运，臻于至和，名之资生，诚信不诬。②《成方便读》：欲资生者，必先助其脾胃，故以四君子补益脾胃，合之山药、莲肉、扁豆、芡实之属以协助之。但脾者喜燥而恶湿，善运而不停，故以陈皮、白蔻香燥以舒之，苓、泽、苡米淡渗以利之，楂、曲、麦芽助其消导，藿香、厚朴借以温中，桔梗以引清气上行，黄连能使湿热下降。如是则脾复其常，可以资助生气矣。

【宜忌】　忌桃、李、雀、蛤、生冷。

10361　保胎磐石丸

【方源】《女科辑要》卷下。

【组成】　怀山药四两（微炒）　杜仲三两（去粗皮，净，盐水炒断丝）　川续断二两（酒炒）

【用法】　上为末，糯米糊为丸，如绿豆大。每服三钱，米汤送下。凡胎欲堕者，一服即保住；惯小产者，宜常服之；或每月服数次，至惯半产之月即服之，无不保全。

【功用】　保胎。

【主治】　堕胎小产。

10362　保元生脉固本汤

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】　天冬　麦冬　生地　熟地　人参　黄耆　炙草　五味

【功用】　固本，调脾肺肾三经之虚。

【主治】　肺脾肾虚，肺痿咳血成劳者。

10363　侯氏黑散

【方源】《金匮》卷上。

【组成】　菊花四十分　白术十分　细辛三分　茯苓三分　牡蛎三分　桔梗八分　防风十分　人参三分　矾石三分　黄芩五分　当归三分　干姜三分　芎藭三分　桂枝三分

【用法】　上为散。每服方寸匕，酒送下，每日一次，初服二十日，温酒调服。常宜冷食六十日止。药积在腹中不下也，热食即下矣，冷食自能助药力。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：驱风除热，通经活络。

【主治】 大风四肢烦重，风癫，中风瘫痪。

①《金匮》：大风四肢烦重，心中恶寒不足者。②《外台》引《古今录验》：风癫。③《全国中药成药处方集》：左瘫右痪，半身不遂，中风不语，手足拘挛，口眼歪斜，麻木不仁。

【宜忌】 ①《金匮》：忌一切鱼、肉、大蒜。②《外台》：忌桃、李、雀肉、胡荽、青鱼，鲊酢物。③《全国中药成药处方集》：孕妇忌服。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手太阴、少阴、足厥阴药也。菊花秋生，得金水之精，能制火而平木，木平则风息，火降则热除，故以为君；防风、细辛以祛风；当归、川芎以养血；人参、白术以补气；黄芩以清肺热，桔梗以和膈气，茯苓通心气而行脾湿，姜、桂助阳分而达四肢，牡蛎、白矾酸敛涩收，又能化顽痰，加酒服者，以行药势也。②《张氏医通》：方中用菊花四十分为君，以解心下之蕴热；防、桂、辛、桔以升发腠理；参、苓、白术以实脾杜风；芎、归以润燥熄火；牡蛎、矾石以固涩肠胃，使参术之性留积不散，助其久功；干姜、黄芩，一寒一热，寒为风之响导，热为火之反间。用温酒服者，令药性走表以开其痹也。郭雍曰：黑散本为涤除风热，方中反用牡蛎、矾石止涩之味，且令冷食，使药积腹中，然后热食，则风热痰垢与药渐而下之也。③《医方论》：此方刘宗厚与喻嘉言俱谓其风药太多，不能养血益筋骨；汪赖庵谓用此方者，取效甚多。各执一见。予谓方中四物咸备，不可谓无血药也。若中风初起表邪重者，用之尚可取效，然石膏、细辛二味，必须减去。

【备考】《外台》有“钟乳”。

10364 顺元散

【方源】《苏沈良方》卷三。

【异名】 顺元煮散(《圣济总录》卷二十七)、顺气散(《普济方》卷一六二)。

【组成】 乌头二两 附子（炮） 天南星各一两（炮） 木香半两

【用法】 上用药一钱，五积散同煎热服。或以水七分，酒三分，煎服。

【功用】 能温里外，和一切气，通血络。

【主治】 伤寒阴盛，里寒脉细，手足厥冷，脾胃冷痛；或气虚痰盛，头晕失眠；或产妇气乏难产，胎死腹中。

①《苏沈良方》：内外感寒，脉迟细沉伏，手足厥冷，虚汗不止，毛发悚慄，面青呕逆，产妇陈疏难产，经三二日不生，胎死腹中，或产母气乏委顿，产道干涩。②《医方大成》：体虚痰气不顺，头目眩晕。气虚痰盛，不得眠卧，气中痰厥。③《普济方》：一切气滞血络及脾胃冷，停痰作痛。

10365 顺气丸

【方源】《医方类聚》卷一二九引《医林方》。

【组成】 牵牛半两（一半生，一半熟） 桑白皮 赤茯苓 防己 羌活 陈皮 泽泻各二钱 甜葶苈 郁李仁（汤浸，去皮） 白术各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，食后温水送下。加至微利为效。

【主治】 水气。

10366 顺气汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】 当归 杜仲 香附 沉香 茴香 元胡 肉桂 生姜

【用法】 水煎服。

【主治】 气滞腰痛，循环痛胀。

10367 顺气散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】 顺气煮散(《圣济总录》卷四十四)。

【组成】 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 陈橘皮一两（汤浸，去瓤，焙） 白术一两 半夏一两（汤洗十四遍） 干姜半两（炮裂） 甘草半两（炙）

【用法】 上为散。每服二钱，以水一中盏，加生姜五片，大枣二枚，同煎至七分，温服，不拘时候。

【主治】 脾脏虚冷气，腹胁胀满，痰逆不思饮食。

10368 顺气散

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】 乌药十两（锉细） 麻黄（去根节）三两 枳壳三两（麸炒，去瓤） 桔梗（去芦头） 香白芷 川芎 甘草（炙） 白术 陈橘皮（去白）各五两 人参（去芦头）一两 干姜（炮）一两半

【用法】 上为细末。每服三钱，以水一盏，加生姜二片，大枣一枚，煎至八分，空心、食前温服；如伤风鼻塞头痛，加葱白三寸，薄荷五叶同煎；妇人血气，加当归少许同煎。

【功用】 调荣卫，进饮食，去虚风，行滞气。

【主治】 男子、妇人气血衰弱，虚风攻注肌体，头面、肩背刺痛，手脚拳挛，口面㖞斜，半身不遂，头目旋晕，痰涎壅盛，语言謇涩，行步艰辛，心忪气短；客风所凑，四肢拘急，鼻塞头疼；或脾气不和，心腹刺痛，胸膈不快，少力多困，精神不爽，不思饮食，呕逆恶心，霍乱吐泻；胎前产后，

气虚百病。

10369 顺气散

【方源】《普济方》卷一九〇引《卫生家宝》。

【组成】当归一两（洗净，去芦，切细） 川芎二两（切细） 木香四两（锉细） 陈皮二钱（洗去白，焙，锉细） 大蓟（野生荆芥、红花者，干湿皆可用）

【用法】上为末。每服四钱，以水一盏，加紫苏叶，煎取七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】气弱不足，血气欲妄行，觉喉口血腥，微微咯出，唾中带些红色。

10370 顺气散

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】槟榔一两 厚朴一两（制） 苍术一两（炒） 青皮一两（炒） 陈皮一两半 香附一两半（炒） 木香一两 枳壳一两（炒） 甘草五钱 砂仁一两（炒） 生姜七片

【用法】上为散。每服三钱，加薤白三枚，煎汤化下。

【主治】气郁腹痛，脉沉者。

【方论选录】湿伏气滞，妨碍肝脾三焦之气不能布护，故腹痛不止焉。苍术燥湿强脾气，槟榔破滞下逆气，厚朴散满宽中气，枳壳破滞化膈气，青皮破气平肝，甘草缓中和胃，陈皮理胃气，木香醒脾气，香附调气解郁，砂仁开胃醒脾也。加以生姜之温散，更用薤白之通阳，为散煎服，安有气不调，湿不化，腹痛不止之理乎？此调气解郁之剂，为气滞湿伏腹痛之专方。

10371 顺肝丸

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】黄连 黄芩 当归 蕤仁三十粒

【用法】上为末，炼蜜为丸服。

【主治】肝热眼赤而不痛。

【备考】方中黄连、黄芩、当归用量原缺。

10372 顺经汤

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】当归尾 川芎 枳壳 小茴香 柴胡 陈皮 玄胡索 白芍药 青皮 香附子 桃仁 红花 肉桂各等分

【用法】水煎，食后温服。

【功用】通经行血，止痛。

【主治】女子逆经，血灌瞳仁，满眼赤涩。

【加减】热甚，加黄连、黄芩。

10373 顺经汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】当归五钱（酒洗） 大熟地五钱（九蒸） 白芍二钱（酒炒） 丹皮五钱 白茯苓三钱 沙参三钱 黑芥穗三钱

【用法】水煎服。一剂吐血止；二剂经顺；十剂不再发。

【功用】补肾调经和血。

【主治】经前腹痛吐血。

10374 顺胃散

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】大附子一枚 生姜半斤（肥嫩者，以新布揩去土，切片，烂研，取自然汁半盏，并不得犯生水）

【用法】上以半斤硬炭熟火，用新瓦一片将火四周簇定为井子，将附子蘸姜汁置井子中，才干又蘸，以姜汁尽为度，附子去皮脐，切片，为末。每服半钱许，按手心内，遂旋以舌舐尽药末，空心服。

【主治】翻胃呕吐。

【宜忌】不得犯水。

10375 顺气化滞汤

【方源】《会约》卷八。

【组成】厚朴（姜炒）一钱 陈皮 藿香 香附 乌药 砂仁（炒）各一钱二分 广香五分 白芥子（炒，研）八分 山楂 麦芽（炒） 神曲（炒）各一钱 苍术一钱

【用法】水煎，热服。

【功用】理气化食。

【主治】脾虚气滞，过食饮食，暴伤生冷，以致腹痛胀满，或呕或泻者。

【加减】感外寒者，加桂枝一钱；内寒滞痛者，加炮干姜、吴茱萸各七八分；如呕而兼痛者，加半夏一钱半，丁香四分。

10376 顺气术香散

【方源】《局方》卷三（吴直阁增诸家名方）。

【组成】丁香皮（不见火） 缩砂仁 良姜（去芦，炒） 肉桂（去粗皮） 干姜（炮） 甘草（煨） 陈皮（去白） 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 苍术（米泔浸） 桔梗（去芦） 茴香（炒）各三两

【用法】上为细末。每服二钱，以水一盏，加生姜三片，大枣二枚，煎至八分，稍热服，不拘时候；或入盐少许，沸汤点服。

【功用】宽中顺气，和胃进食。

【主治】气不升降，呕逆恶心，胸膈痞闷，胁肋胀满；及酒食所伤，嗳气吞酸，心脾刺痛，大便不调，面黄肌瘦，不思饮食；及妇人血气刺痛，一切

冷气。

10377 顺气归脾丸

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】陈皮 贝母 香附 乌药 当归 白术 茯神 黄耆 酸枣仁 远志 人参各一两 木香 甘草（炙）各三钱

【用法】上为末，以合欢树根皮四两，煎汤煮老米糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，食远白滚汤送下。

【主治】思虑伤脾，致脾气郁结，乃生肉瘤，软如绵，肿似馒，脾气虚弱，日久渐大，或微疼或不疼者。

10378 顺气和中汤

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【异名】升气和中汤（《医统》卷五十三）、调中益气汤（《便览》卷一）。

【组成】黄耆一钱半 人参一钱 甘草（炙）七分 白术 陈皮 当归 白芍各五分 升麻 柴胡各三分 细辛 蔓荆子 川芎各二分

【用法】上㕮咀，作一服。以水二盏，煎至一盏，去渣，食后温服。一服减半，再服全愈。

【主治】气虚头痛。

①《卫生宝鉴》：阳虚头痛，恶风寒，气短弱而不喜食。②《玉机微义》：年高气弱，清气不能上升，头面昏闷，脉弱弦细而微。③《便览》：气血双虚头痛。

【方论选录】《卫生宝鉴》：以黄耆甘温补卫实表为君。人参甘温、当归辛温补血气，白芍酸寒收卫气而为臣。白术、陈皮、炙甘草苦甘温，养胃气，生发阳气，上实皮毛肥腠理为佐。柴胡、升麻苦平，引少阳、阳明之气上升，通百脉灌溉周身者也；川芎、蔓荆子、细辛辛温体轻浮，清利空窍为使也。

【临证举例】气虚头痛 杨参谋名德，字仲实，年六十岁，患头痛不可忍，昼夜不得眠。初医作伤寒解之，汗出痛加；复汗，头愈痛。今痛甚不得安卧，恶风寒而不喜饮食，诊甚六脉弦细而微，气短而促，语言而懒。此病年高气弱，清气不能上升头面，故昏闷，本无表邪，因发汗过多，清阳之气愈亏损，不能上荣，亦不得外固，所以头苦痛而恶风寒，气短弱而不喜食，正宜用顺气和中汤。此药升阳而补气，头痛自愈。

10379 顺气和中汤

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】半夏（制）六分 白茯苓七分 白术（土炒）八分 广皮（盐水浸，炒）一钱 枳实（麸炒）五分 甘草（炙）二分 香附（醋炒）一钱 山栀（姜汁炒黑）一钱 神曲（炒）六分 砂仁（炒）三分 黄连（姜汁浸，晒干，以猪胆汁拌炒）六分

【用法】上锉一剂。先以长流水入娇泥搅，澄清，取水一钟，加生姜三片，煎至七分，入竹沥、童便、姜汁，细细温服，不拘时候。

【主治】呕吐翻胃，嘈杂吞酸。

【加减】心胃痛，加姜汁三匙；气虚，加人参、黄耆各八分；血虚，加当归七分，川芎五分；恼怒或气不伸舒，加乌药五分，木香三分；胸膈饱闷，加萝卜子（炒）六分；心下嘈杂吞酸，加吴茱萸四分，倍黄连、白术；呕吐不止，加藿香七分；大便闭结，加苏子、麻仁、桃仁、杏仁，俱研如泥，每服一钱，白蜜调下。

10380 顺气逍遥散

【方源】《外科集腋》卷四。

【组成】柴胡 白芍 陈皮 当归 瓜蒌 半夏 白术 茯神 人参 甘草 川芎

【用法】水煎十剂，去瓜蒌再十剂。

【主治】乳痞。由肝脾郁结而成乳中结核，形如丸卵，或痛或不痛，皮色如常。

10381 顺气消滞汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】陈皮二钱 半夏（姜炒）二钱 白茯苓（去皮）三钱 炒神曲二钱 丁香三分 柿蒂二个 黄连（姜炒）一分 香附二钱 白术一钱半 竹茹四钱 甘草八分

【用法】上锉。加生姜五片，水煎服。

【主治】因饱食后得气，发呃逆，连声不止者。

10382 顺气宽中散

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】枳实（面炒） 槟榔 京三棱（煨） 蓬莪茂术（煨） 大麦芽（炒） 人参（去芦头） 桑白皮（去粗皮，锉，炒）各一两 甘草（炙）七钱

【用法】上为细末。每服二分，加盐末少许，生姜二片，沸汤点服，不拘时候。

【功用】宣通气血。

【主治】阴阳不和，三焦痞膈，气行涩滞，中满不快，咽嗌噎闷，恚气奔急，肢体烦倦，不欲饮食。

10383 顺气聪耳汤

【方源】《观聚方要补》卷七引《医学统旨》。

【组成】枳壳 柴胡各二钱 乌药 木通 青皮

川芎 石菖蒲各一钱 甘草五分

【用法】 上锉，水煎服。

【功用】 聪耳。

【主治】 因恼怒而耳鸣。

【按语】 方中川芎，《济阳纲目》作“川乌”。

10384 顺气豁痰汤

【方源】 《赤水玄珠》卷三。

【组成】 半夏（用白矾、生姜、皂角煮过）一钱半 茯苓 橘红 瓜蒌（去油） 贝母 黄连 桔梗 枳壳各一钱 香附（童便浸）七分 甘草四分

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 因痰气滞于心胞络，而致舌痹或麻。

10385 顺肝益气汤

【方源】 《傅青主女科》卷下。

【组成】 人参一两 当归一两（酒洗） 苏子一两（炒，研） 白术三钱（土炒） 茯苓二钱 熟地五钱（九蒸） 白芍三钱（酒炒） 麦冬三钱（去心） 陈皮三分 砂仁一粒（炒，研） 神曲一钱（炒）

【用法】 水煎服。一剂轻，二剂平，三剂全愈。

【主治】 妇人怀娠之后，肝血太燥，肝气横逆，恶心呕吐，思酸解渴，见食憎恶，困倦欲卧。

【备考】 本方方名，《女科证治约旨》引作“顺气益肝汤”。

10386 顺经两安汤

【方源】 《傅青主女科》卷上。

【组成】 当归五钱（酒洗） 白芍五钱（酒炒） 大熟地五钱（九蒸） 山萸肉二钱（蒸） 人参三钱 白术五钱（土炒） 麦冬五钱（去心） 黑芥穗二钱 巴戟肉一钱（盐水浸） 升麻四分

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人行经之前一日，因心肾不交，经流大肠，大便先出血者。

10387 追风丸

【方源】 《圣惠》卷二十一。

【组成】 雀瓮内虫七枚 桑螵蛸七枚 干蝎尾一分 半夏一分 芦荟一分 天南星一分 川乌头一分（去皮脐） 大蜘蛛二枚（干者） 乌蛇肉一分

【用法】 上生用为末，以熟枣瓤为丸，如大豆大。每服五丸，豆淋酒送下。更纳一丸于疮口中，上用薄纸盖之，当追风出，如吹动纸为验也。

【主治】 破伤风，筋脉拘急，腰背强直，牙关急硬。

10388 追风丸

【方源】 《圣惠》卷八十五。

【异名】 追风丹（《普济方》卷三七四引《十便良方》）。

【组成】 川乌头一两（炮裂，去皮脐） 干蝎一分（微炒） 白僵蚕一分（微炒） 白附子半分（炮裂） 干姜半分（炮裂，锉） 天南星半两（炮裂）

【用法】 上为末，煮槐胶为丸，如黍粒大。每服五丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：小儿急惊风甚者。②《普济方》引《十便良方》：小儿惊风，潮热至困者。

10389 追风丸

【方源】 《魏氏家藏方》卷一。

【组成】 草乌头四两（去皮尖，冷水浸三宿） 苍术二两（米泔浸一宿，去粗皮，炒） 麻黄（去节） 白芷各半两 防风（去芦） 川芎各一钱半 地龙一两（去土）

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服七粒，空心临卧薄荷茶送下，一日三次。或作散剂，每服一字，冷茶调服。

【主治】 诸风筋骨肢体痛，四肢不随。

【宜忌】 忌热物一时辰。

10390 追风丹

【方源】 《瑞竹堂方·补遗》。

【异名】 追风丸（《寿世保元》卷九）。

【组成】 何首乌 荆芥穗 苍术（米泔浸一宿，焙干） 苦参各等分。

【用法】 上为细末，好肥皂角三片（去皮弦），盛于瓷器内，熬膏为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心酒、茶任下。

【主治】 白癜风。

【宜忌】 忌一切动风之物。

10391 追风散

【方源】 《局方》卷一（宝庆新增方）。

【异名】 大追风散（《奇效良方》卷二十四）。

【组成】 川乌（炮，去皮脐尖） 防风（去芦叉） 川芎（洗） 白僵蚕（去丝嘴，微炒） 荆芥（去梗） 石膏（煅，烂研） 甘草（炙）各一两 白附子（炮） 羌活（去芦，洗，锉） 全蝎（去尾针，微炒） 白芷 天南星（炮） 天麻（去芦） 地龙（去土，炙）各半两 乳香（研） 草乌（炮，去皮尖） 没药（研细） 雄黄（研细）各一分

【用法】 上为细末。每服半钱，人好茶少许同调，食后及临睡服。

【功用】 清头目，利咽膈，消风壅，化痰涎。

【主治】 年深日近，偏正头痛；肝脏久虚，血气衰弱，风毒之气上攻头痛，头眩目晕，心忪烦热，

百节痠疼，脑昏目痛，鼻塞声重，项背拘急，皮肤瘙痒，面上游风，状若虫行；一切头风；兼治妇人血风攻注，头目昏痛。

10392 追风散

【方源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】北细辛 川乌 草乌 防风 白芷 川芎 薄荷 苍术各一钱 南星 雄黄各五分

【用法】上为极细末。热酒调敷，盖纸扎定，日换二次。先用热尿淋洗，挤出恶血，随敷此散。

【功用】追风拔毒。

【主治】疯犬刚咬。

10393 追虫丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】大黄 黑丑各一两 山楂 莪术各六钱 槟榔 大腹子各四钱 雷丸 沙糖各三钱 木香二钱 皂角一钱

【用法】上为末。沸汤调服。

【功用】追虫。

【主治】诸虫。

【备考】本方方名，据剂型当作"追虫散"。

10394 追虫丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷五。

【组成】苦楝根皮 贯众 木香 桃仁（去皮尖，炒） 芜荑（炒） 槟榔各一钱 当归 鹤虱（炒）各一钱五分 轻粉一角 干蟾（去头，酥炙） 黄连（炒）各一钱 史君子（肉）二十五粒

【用法】上为细丸。肉汁汤送下。

【主治】小儿疳积。

10395 追虫丸

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】大黄（酒拌，三蒸三晒）一两 木香五钱 槟榔一两 芜荑（去梗）一两 白雷丸一两 白术（陈土炒）七钱 陈皮七钱 神曲（炒）五钱 枳实（面炒）三钱五分

【用法】上为末，用苦楝根皮，猪牙皂角各二两，浓煎汁一碗，和前药为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心沙糖水送下。

【主治】湿热虫痛，贯心伤人。

【加减】大便不实者，除大黄。

10396 追虫散

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】槟榔

【用法】上为细末。每月初旬，先将炙香猪肉一块，嚼咽其津，勿食其肉，候虫上胸中，如箭攻钻然，用石榴东引根煎汤，调服二钱。其虫消杀。

【主治】寸白虫所苦，心腹痛，恶心。

10397 追毒散

【方源】《外科精义》卷下引成子玉方。

【组成】五灵脂 川乌头（炮） 白干姜（炮）各一两 全蝎五钱

【用法】上为细末。用少许掺疮口中；深者纸捻蘸药纳入疮口内，以膏贴之。或水浸蒸饼令浸透，搦去水，和药令匀，捻作锭子，每用纳入疮口中。

【主治】一切恶疮，脓水不快者。

【备考】本方制成锭剂，名"追毒锭子"。

10398 追毒散

【方源】《普济方》卷二八三。

【异名】四调膏。

【组成】滑石 寒水石 黄连 大黄

【用法】上为细末。用朴硝调，敷疮上肿处。

【主治】一切痈疽疮疖。

10399 追毒散

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】贯众 鹤虱 荆芥 细辛 蜂房各等分

【用法】上为粗末。每用三钱，加川椒五十粒，水一钟，煎七分，乘热漱之。

【主治】诸般牙疼。

10400 追毒膏

【方源】《回春》卷八。

【组成】乳香五分 没药一钱 儿茶二钱 血竭一分 青木香一钱 广木香五分 芙蓉叶四两 白及四两

【用法】上为细末，匀在一处。临用时看疮大小，以生蜜调涂患处，以绵纸附之不过三五次即消。

【主治】诸般恶疮及无名肿毒。

10401 追崇丹

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】大黄五钱 枳实三钱 丹皮一两 红花半斤 附子二钱 当归尾一两 人参五钱 牛膝五钱 麝香一钱 龟甲一两 半夏三钱 南星三钱 桃仁十四粒

【用法】水煎服。一剂而胎破矣，不须二剂，泻出恶物之后，单用当归三两，红花一两，水煎服。连用四剂，自庆安然。

【功用】去败血，生新血。

【主治】妇人怀妊终年不产，面色黄瘦，腹如斗大，肌肤消削，常至二三年未生者，此名鬼胎。

10402 追脓锭子

【方源】《元戎》卷十。

【组成】 雄黄二钱 巴豆一钱半 轻粉一钱半

【用法】 上为细末，油和作饼子，生面亦得。

【功用】 追脓。

【主治】 《准绳·疡医》：脓内溃不出。

10403 追风如圣散

【方源】 《准绳·类方》卷一引《医学统旨》。

【异名】 如圣散(《丹溪心法附余》卷四)、金刀如圣散(《遵生八笺》卷十八)。

【组成】 川乌 草乌 苍术各四两 金钗石斛一两 川芎 白芷 细辛 当归 防风 麻黄 荆芥 何首乌 全蝎 天麻 藁本各五钱 甘草三两 人参三钱 两头尖二钱

【用法】 上为细末。每服半钱匕，临卧茶清下；温酒亦可。不许多饮酒。服后忌一切热物饮食一时，恐动药力。亦可敷贴。

【主治】 男妇诸般风证，左瘫右痪，半身不遂，口眼歪斜，腰腿疼痛，手足顽麻，语言謇涩，行步艰难；遍身疮癣，上攻头目，耳内蝉鸣，痰涎不利，皮肤搔痒；偏正头风，无问新旧；及破伤风角弓反张，蛇犬咬伤，金刃所伤，血出不止。

10404 追风如圣散

【方源】 《外科正宗》卷四。

【组成】 细辛 防风 川乌 薄荷 草乌 川芎 白芷 苍术各一两 雄黄四钱

【用法】 上为末。温酒调敷伤处，以纸盖扎，早、晚换二次。

【功用】 拔毒。

【主治】 疯犬咬伤。

10405 追风应痛丸

【方源】 《局方》卷一(续添诸局经验秘方)。

【组成】 威灵仙 狗脊(去毛)各四两 何首乌 川乌(炮，去皮脐)各六两 乳香(研)一两 五灵脂(酒浸，淘去沙石)五两半

【用法】 上为末，酒糊为丸。每服十五丸，加至二十丸，食前麝香温酒吞下；只温酒亦得。

【功用】 轻身体，壮筋骨，通经活络，除湿祛风。

【主治】 一切风疾，左瘫右痪，半身不遂，口眼㖞斜，牙关紧急，语言蹇涩，筋脉挛急，百骨节痛，上攻下注，游走不定，腰痛沉重，耳鸣重听，脚膝缓弱，不得曲伸，步履艰难，遍身麻痹，皮肤顽厚；及妇人血风攻注，身体疼痛，面浮肌瘦，口苦舌干，头旋目眩，昏困多睡；或皮肤瘙痒，瘾疹生疮；暗风夹脑，偏正头疼。

【宜忌】 孕妇不可服。

10406 追风祛痰丸

【方源】 《摄生众妙方》卷六。

【组成】 防风 天麻 僵蚕 白附子各二两 全蝎(去毒) 木香各半两 朱砂七钱半 猪牙皂(炒)一两 白矾半两 半夏六两

【用法】 上为细末，生姜糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，食远、临卧用淡姜汤或薄荷汤送下。

【主治】 诸风痫暗风。

【备考】 《回春》有南星。

10407 追风逐湿膏

【方源】 《外科正宗》卷三。

【组成】 豨莶草 麻黄 川乌 草乌 风藤 半夏 南星 羌活 蓖麻子(打碎) 桂枝各三两 独活 细辛 当归 白芷 苍术 大黄各二两

【用法】 上药各切咀片，用葱汁、生姜汁各二碗拌药，先浸一宿，次日用香油半斤，同药入锅内，慢火煎至葱、姜汁将干不爆时，油方与药相煎，滓枯为度；细绢滤清，每油一斤，下飞过炒丹十两为准配用；再将前油入锅内煎滚，以油滴水成珠不散方下黄丹，徐徐搅入，其膏已成；再下松香净末一斤四两，再同熬化，取下锅来，以盆顿稳，再下乳香、本香、胡椒、轻粉各末二两，白芥子细末四两，渐入搅匀，倾入钵内盛贮。渐用热汤顿化，绫缎摊贴。七日后，诸病可痊，百发百中。

【主治】 风寒暑湿相伤，以致骨节疼痛，筋挛不能步履，或麻木湿痹。

10408 追虫取积丸

【方源】 《串雅补》卷二。

【组成】 广木香 鸡心槟榔 芜荑 锅灰各一两 生大黄三两 生黑丑头末十两 使君子肉二两

【用法】 上为末，将牙皂一两五钱，向南楝树根皮二两，水煎浓汁为丸，如绿豆大，沉香为衣。每服三四十丸，空心沙糖汤送下。

【主治】 虫积心痛。

10409 追疗夺命汤

【方源】 《急救仙方》卷二。

【异名】 追疗夺命丹(《赤水玄珠》卷二十九)。

【组成】 羌活 独活 青皮 防风(多用) 黄连 赤芍药 细辛 甘草节 蝉蜕 僵蚕 金线重楼 泽兰 金银花

【用法】 上㕮咀。每服五钱，先将一服加泽兰叶、金银花各一钱，生姜十钱，同药擂烂，好酒调热服之；如不饮酒者，水煎加少酒服尤妙。然后用酒、水各一盏半，生姜十片煎，热服。以衣被盖

覆，汗出为度。病退减后，再以前药加大黄二钱煎，热服，或利一两次，以去余毒为妙。

【功用】 内消肿毒。

【主治】 ①《急救仙方》：疔疮。②《秘传外科方》：痈疽发背。

【加减】 有脓，加何首乌、白芷；取利，加青木香、大黄、栀子、牵牛；在脚，加木瓜；呕逆恶心，加乳香、绿豆粉，甘草汤送下，又用紫河车、老姜、米醋一同调下；心烦呕，名伏暑，用朱砂五苓散；呕逆，加母丁香、石莲，同前药煎服；又不止，用不换金正气散，或加人参、木香煎服；呕不止，手足冷，名吃水，用黄连香薷饮吞消暑丸；手足冷，加宣木瓜、牵牛；心烦，加麦门冬、赤芍、栀子、灯草；潮热，加北柴胡、黄芩、淡竹青、丝茅根；眼花，加朱砂、雄黄、麝香少许；腹胀，加薏苡仁、寒水石；自利，加白术、茯苓、肉豆蔻、罂粟壳；腹痛不止，加南木香、乳香；喘嗽，加知母、贝母、白砂蜜少许；头痛，加川芎、白芷、葱白；痛不止，用萝卜子、川芎、葱白，擂碎，敷太阳穴；痰涎多，用生艾尾叶、米醋、擂取汁，漱去痰；咽喉痛，用山豆根、凌霄梗、栀子、淡竹叶、艾叶、灯草，水煎漱；大便闭，加姜制赤芍药、麸炒枳壳、大腹皮；小便闭，加赤芍药、赤茯苓、木通、车前子、灯草；尿血出，加生地黄、车前子；鼻出血，加野红花、地黄、藕节、姜皮；疮不痛，顶不起，灸三壮，更不痛，不治；骨蒸，加丝茅根；无脉，服二十四味流气饮。

10410 追脓化毒散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 穿山甲 当归 大黄各三钱 玄明粉 僵蚕 乳香 没药各一钱半 白芷二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 一切痈疽瘰疬、便毒，痰火胸紧初起。

10411 追风除湿圈药

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】 多年陈小粉四两（炒焦色） 干姜一两 官桂一两 五倍一两 白芷一两 龟版（醋炙）二两 当归一两 防风一两 白及三两 乌药一两 乳香一两

【用法】 上为细末，用老姜汁、酽醋各半，葱汁一分，蜜少许，火上熬热调药，乘通手揉四向，空中出毒，时用余汁热润之，以助药力。

【主治】 鹤膝风。

10412 禹功散

【方源】《儒门事亲》卷十一。

【组成】 黑牵牛（头末）四两 茴香一两（炒）（或加木香一两）

【用法】 上为细末。以生姜自然汁调一二钱，临卧服。

【功用】《景岳全书》引子和：泻水。

【主治】 产后瘀血不行，脐腹疼痛；阳证水肿，寒湿水疝、癫疝，属实证者。

①《儒门事亲》：妇人大产后，败血恶物所致脐腹腰痛，赤白带下或出白物如脂。②《得效》：卒暴昏愦，不知人事，牙关紧硬，药不下咽。③《丹溪心法》：阳水肿，若病可下而气实者。④《普济方》：癫疝。⑤《古今医鉴》：寒湿外袭，使内过劳，寒疝囊冷，结硬如石，阴茎不举，或控引睾丸而痛。⑥《张氏医通》：阳水便秘，脉实，初起元气未伤者。⑦《医方集解》：寒湿水疝，阴囊肿胀，大小便不利。

【方论选录】：①《医方集解》：此足少阴、太阳药也。牵牛辛烈，能达右肾命门，走精隧，行水泄湿，兼通大肠风秘、气秘；茴香辛热温散，能暖丹田，祛小肠冷气，同入下焦以泄阴邪也。②《古方选注》：禹功者，脾湿肿胀肉坚，攻之如神禹决水。牵牛苦热，入脾泻湿，欲其下走大肠，当从舶茴辛香引之，从戌入丙至壬，开通阳道，走泄湿邪，决之使下，一泻无余，而水土得平。

【宜忌】《医方论》：此方峻猛，不可轻用。

【备考】《得效》用生姜自然汁调药少许灌之鼻中。

10413 禹余粮丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【异名】 禹余粮散（《圣济总录》卷一一四）、禹粮丸（《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】 禹余粮一分（烧，醋淬七遍） 乌贼鱼骨一分 龙骨一分 釜底墨一分 伏龙肝一分 附子一枚（去皮脐，生用）

【用法】 上为末，以绵裹如皂荚子大，纳耳中，日再易之。如不愈者，内有虫也。

【主治】 ①《圣惠》：聤耳，有脓水塞耳。②《圣济总录》：耳聋有脓。

【备考】 本方方名，《普济方》引作"附子散"。

10414 禹余粮丸

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】 紫石英丸（《本事》卷十）。

【组成】 禹余粮一两（烧，醋淬七遍） 龙骨一两 紫石英一两（细研，水飞过） 人参半两（去芦头） 桂心半两 川乌头（炮裂，去皮脐） 泽泻

一两 桑寄生一两 川椒一两（去目及闭口者，微炒去汗） 石斛一两（去根，锉） 当归一两（锉，微炒） 杜仲一两（去皱皮，炙微黄，锉） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，微锉，去皱皮，炙干） 远志半两（去心） 五味子半两 牡蛎一两（烧为粉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，晚食前以热酒送下。

【功用】 ①《本事》和其阴阳，调其气血，使不相乘，以平为福。②《御药院方》：滋补本气。

【主治】 ①《圣惠》：妇人劳损，因成崩中，不可禁止，积日不断，故成漏下，致五脏空虚，肉色黄瘦。②《本事》：妇人病月经乍多乍少，或前或后，时发疼痛。

10415 禹余粮丸

【方源】《医方类聚》卷一四二引《济生》。

【组成】 禹余粮石（煅） 赤石脂（煅） 龙骨 荜茇 诃子（面裹煨） 干姜（炮） 肉豆蔻（面裹煨） 附子（炮）各等分

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食前米饮送下。

【主治】 肠胃虚寒，滑泄不禁。

10416 禹余粮散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】 伏龙肝散（《三因》卷十八）、赤石脂禹余粮汤（《女科切要》卷三）。

【组成】 禹余粮（烧，醋淬七遍） 赤石脂 牡蛎（烧为粉） 桂心 乌贼鱼骨（烧灰） 伏龙肝各一两

【用法】 上为细散。每于食前以温酒调下二钱。

【主治】 ①《圣惠》：妇人漏下久不止，使人无子。②《三因》：气血劳伤，冲任脉虚，经血非时，忽然崩下，或如豆汁，或成血片，或五色相杂，或赤白相兼，脐腹冷痛，经久未止，令人黄瘦，口干，饮食减少，四肢无力，虚烦惊悸，使人无力。

10417 鬼代丹

【方源】《宣明论》卷十五。

【异名】 神让散（《普济方》三〇五引《德生堂方》）。

【组成】 无名异（研） 没药（研） 乳香（研） 白然铜（醋淬，研） 地龙（去土） 木鳖子（去壳）各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。温酒送下一丸。

【功用】 打着不痛。

10418 鬼哭丹

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】 川乌十四个（生） 朱砂一两 乳香一分

【用法】 上为末，以醋一盏，加五灵脂末一两，煮面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服七丸，男子温酒送下；女子醋汤送下。

【主治】 腹中诸痛，气血凝滞，饮食未消，阴阳痞隔，寒热相乘，抟而为痛。

10419 鬼箭丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 鬼箭羽一两 川芒消一两 柴胡一两（去苗） 水蛭一分（炒微黄） 虻虫一分（炒令微黄，去翅足） 川大黄三分（锉，微炒） 赤茯苓三分 干漆半两（捣碎，炒令烟出） 川椒一分（去目及闭口者，微炒去汗） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 牡丹三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】 妇人脉不通，手足心热，腹满喘急，不欲睡卧，心神烦闷。

10420 鬼箭散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 鬼箭羽三两 瞿麦一两 葵子一两 石韦一两（去毛） 滑石三两 木通一两（锉） 榆白皮二两（锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脬转，不得小便。

10421 鬼箭散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【异名】 鬼箭羽散（《普济方》卷三一七）。

【组成】 鬼箭羽一两 白蒺藜一两（微炒，去刺） 桂心半两 麻黄一两（去根节） 赤箭三分 独活三分 芎藭三分 薏苡仁三分 蛇床子半两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服二钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇人血游风，遍身瘙痒不止。

10422 鬼箭羽丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 鬼箭羽 水蛭（熬） 细辛（去苗叶）各三分 桃仁（去皮尖双仁，炒，别研） 当归（切，焙） 芎藭各一两 大黄（锉，炒） 牛膝（酒浸，焙）各一两一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，渐加至二十丸，空腹酒送下。

【主治】 月水不通，腰腹疼痛。

10423 鬼箭羽汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 鬼箭羽 木香 当归（切，焙） 黄芩（去黑心） 桂（去粗皮） 芎藭 白术各一两 芍药一两一分 大黄（锉，炒） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒）四十九枚 土瓜根 刘寄奴各一两 虻虫四十九枚（去翅足，糯米同炒，米熟去米）

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜五片，煎至七分，去滓，下槟榔、朴消末各半钱匕，更煎一沸，温服。

【主治】 室女月水不通，肌肤不泽，日觉瘦瘁，滑血。

10424 鬼箭羽散

【方源】 方出《千金》卷二十一，名见《普济方》卷一九一。

【组成】 丹参 鬼箭羽 白术 独活各五两 秦艽 猪苓各三两 知母 海藻 茯苓 桂心各二两

【用法】 上㕮咀，以酒三斗，浸五日。每服五合，每日三次，任性量力渐加之。岁久服之，乃可得力耳。愈后可长服。

【功用】 微除风湿，利小便，消水谷。

【主治】 终身水肿，腹大，四肢细，腹坚如石，小劳即苦足胫肿，小饮食便气急。

10425 衍庆丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】 当归（酒洗） 肉苁蓉（酒洗） 山药（乳拌蒸） 枸杞各四两（酒蒸） 鱼胶一斤（麸炒） 核桃肉十两（去皮，捣烂） 补骨脂一斤（米泔水加盐浸，春二、夏一、冬五日） 菟丝子八两（酒浸一宿，煮吐丝） 熟地四两（酒洗） 吴茱萸三两（酒蒸，炒） 覆盆子四两（酒浸） 人参五钱（黄耆煎汤浸透，晒干）

【用法】 上炼蜜为丸。空心淡盐汤送下，初服一钱，次服一钱五分，三服二钱，四服二钱五分，五服三钱。初服禁房事三七日，便觉药力有效，至三月后，用酒送下三钱，即可得孕。

【功用】 ①《惠直堂方》：男子久服身体康健，饮食加进。②《全国中药成药处方集》：补益身体，强精种子。

【主治】 ①《惠直堂方》：兼治偏坠疝气。②《全国中药成药处方集》：身体衰弱，精气不足，肾虚寒冷，偏坠疝气。

【宜忌】 忌食猪、鸡、鹅、鸭等血，并君达菜。

【备考】 方中鱼胶，《全国中药成药处方集》（沈阳方）作“阿胶”。

10426 食郁汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】 苍术 厚朴 川芎 陈皮 神曲 山栀 枳壳 炙草 香附 砂仁

【主治】 食郁。嗳酸，腹满，不能食，黄疸，鼓胀痞块，脉紧实。

10427 食郁越鞠丸

【方源】《医方考》卷三。

【组成】 山楂 神曲 砂仁 香附（童便制） 苍术（米泔浸七日） 抚芎 栀子

【主治】 食郁噎膈者。

【方论选录】 食不自膈也，或由气塞，或由火郁，然后停食而作食膈。故用香附、苍术、抚芎以顺气，栀子以泻火，山楂、神曲、砂仁以消食。

10428 独乌膏

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】 川乌一两（为末）

【用法】 醋调如膏，涂于脑顶角太阳、风府处。须臾痛止。

【主治】 风寒头痛，服药不效者。

10429 独圣丸

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】 五灵脂（去土，炒烟尽）

【用法】 上为末，醋为丸，如绿豆大。每服一二钱，淡醋水送下；清酒亦得。虚人以补药相间而用。

【功用】《笔花医镜》：去瘀积。

【主治】 瘀血凝积，瘀血不去，新血不得归经，以致暴崩下血者。

10430 独圣汤

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】 黄芩（去黑心）五两

【用法】 上锉细，如麻豆大。每服七钱匕，以水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 血妄行，或衄或崩。

10431 独圣汤

【方源】《妇人良方》卷二十引京师祝景助教方。

【组成】 贯众（状如刺猬者）一个（全用，不锉

断，只揉去毛花萼）

【用法】 用好醋蘸湿，慢火炙令香熟，候冷，为细末，每服二钱，空心、食前米饮调下。

【主治】 产后亡血过多，心腹彻痛，然后血下，久而不止，及赤白带下，年深诸药不能疗者。

10432 独圣散

【方源】《医方集解》。

【组成】 白及

【用法】 上为末。每服二钱，临卧糯米汤调下。

【主治】 多年咳嗽，肺痿，咯血红痰。

【方论选录】 此手太阴药也。人之五脏，惟肺叶坏烂者可以复生。白及苦辛收涩，得秋金之令，能补肺止血，故治肺损红痰。又能蚀败疽死肌，为去腐生新之圣药。

10433 独圣散

【方源】《金鉴》卷三十。

【组成】 南山楂肉（炒）一两

【用法】 水煎，用童便沙糖和服。

【主治】 产后心腹绞痛欲死，或血迷心窍，不省人事。

【方论选录】 山楂不惟消食健脾，功能破瘀止儿枕痛；更益以沙糖之甘，逐恶而不伤脾；童便之咸，入胞而不凉下。相得相须，功力甚伟。

10434 独步散

【方源】《本草纲目》卷十四引《方外奇方》。

【组成】 香附米（醋浸略炒，为末） 高良姜（酒洗七次，略炒，为末）

【用法】 上各封收。用时和匀，以热米汤加生姜汁一匙，盐一捻，调下。

【主治】 心脾气痛，胃脘有滞，胸膛软处一点痛，因气及寒起，或致终身。

【加减】 因寒者，加生姜二钱，附子一钱；因气者，加附子二钱，生姜一钱；因气与寒者，各等分。

10435 独妙散

【方源】 方出《奇方类编》卷下，名见《仙拈集》卷三。

【组成】 生螃蟹壳

【用法】 瓦上焙焦，为末。每服二钱，黄酒冲服。以消为度。

【主治】 乳岩，乳中初起一粒如豆，渐至如蛋，七八年必破，破则难治。

10436 独虎散

【方源】《直指》卷十四。

【组成】 五倍子半两（末） 井水三碗

【用法】 入瓷瓶内慢火煎半，续入朴消、荆芥穗各一钱，乘热熏洗，仍以五倍子末敷之。

【主治】 脱肛不收。

10437 独参汤

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《劳证十药神书》。

【异名】 人参汤（《十药神书》周杨俊注）。

【组成】 大人参二两（去芦）

【用法】 上㕮咀。以水二盏，加大枣五枚，煎至一盏，细呷之。服后熟睡一觉，后服诸药除根。

【功用】 劳证止血后，用此药补之。

【主治】 大汗大下之后，及吐血、血崩、血晕诸症。

【宜忌】 咳嗽去之。

【方论选录】 陈修园：失血之后，脏阴太虚，阴虚则不能维阳，阳亦随脱，故用人参二两，任专力大，可以顷刻奏功。但人参虽有补虚之功，而咳嗽者忌之。乘此大血甫止之际，咳嗽未作，急急饮之。若得熟睡一夜，则血从心脏而生。

10438 独胜散

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】 五倍子

【用法】 上为末。津唾调，填满脐中，以绢帛缚定。一宿即止。或加枯矾末尤妙。

【主治】 自汗盗汗。

10439 独胜膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 独蒜

【用法】 六月捣膏，日中晒热，于遇冬所发处擦之，一日三次。

【主治】 冻风冻跟，冻耳，每逢冬寒则发。

【宜忌】 忌下汤水。

10440 独活汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】 独活（去芦头） 茯神（去木）各半两 甘草（炙） 当归（酒洒，切，焙） 牡蛎（煅） 白术 附子（炮裂，去皮脐） 肉苁蓉（酒浸，切，焙）各一两 黄耆（薄切）一两半 防风（去叉） 远志（去心）三分 人参二两半

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜三片，大枣一枚（去核），煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 风头眩，仆倒屋转，呕吐痰涎，恶闻人声。

【备考】 方中防风用量原缺。

10441 独活汤

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】 独活（去芦头） 甘菊花（择） 蔓荆实 芎藭各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加酸枣仁、恶实各五十粒（研碎），同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 肝风筋脉拘急，背膊劳倦，及头昏项颈紧急疼痛。

10442 独活汤

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】 独活（去芦头）一两 麻黄（去根节） 甘草（炙）各半两 桂（去粗皮） 葛根 芍药 栝楼根 防风（去叉）各三分 杜仲（去粗皮，炒） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 杏仁（去皮尖，别研）半两 熟干地黄（切，焙）二两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏，煎至六分，去滓，空心、日午、夜卧温服。

【主治】 腰痛牵引背脊，不可俯仰；腰脚疼痹不仁、无力。

10443 独活汤

【方源】《本事》卷一。

【组成】 独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，称） 羌活（去芦） 防风（去钗股） 人参（去芦） 前胡（去苗，净洗） 细辛（华阴者，去叶） 五味子（拣） 沙参 白茯苓（去皮） 半夏曲 酸枣仁（微炒，去皮，研） 甘草各一两（炙）

【用法】 上为粗末。每服四大钱，以水一盏半，加生姜三片，乌梅半个，同煎至八分，去滓服，不拘时候。

【主治】 肝经因虚，内受风邪，卧则魂散而不守，状若惊悸。

【方论选录】《本事方释义》：此驱风养正之方也。独活气味苦辛甘平，气味俱薄，浮而升阳也，入足厥阴、少阴，引经之风药，故以之为君；防风气味辛甘温，入手足太阳之风药；细辛气味辛温，气厚于味，阳也，入足厥阴、少阴，引经之药；枣仁气味苦平，入手少阴；前胡气味苦平、微寒，阳中之阴，降也，入手足太阴、阳明之风药，其功长于下气；半夏气味苦辛微温，沉而降，阴中阳也，入足阳明，除痰散逆；五味子气味酸苦咸微温，收敛散逆之气，入足少阴；沙参气味甘苦微寒，能补五脏之阴，入足厥阴；羌活之气味与独活同，入足太阳兼能利水；甘草气味甘平，兼通入十二经络，诸味得之，皆能缓其性，乃君子之品也；茯苓气味甘平淡渗，入足阳明，能引诸药达于至阴之处；人参气味甘微温，入足阳明，能补五脏之阳，使身中正气大旺，外邪不能侵犯矣。

10444 独活汤

【方源】《妇人良方》卷三。

【组成】 川独活 羌活 人参 防风 当归 北细辛 茯神（去木） 半夏 桂心 白薇 远志（去心） 菖蒲（去毛） 川芎各半两 甘草三分

【用法】 上㕮咀。每服五钱，以水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇女风虚昏愦不自觉知，手足瘛疭，坐卧不能，或发寒热，血虚不能服发汗药，及中风自汗。

【方论选录】《医方集解》：此手少阴、足厥阴药也。肝属风木而主筋，故瘛疭为肝邪。肝欲散，急食辛以散之。二活、防风祛风，细辛、桂心温经，半夏除痰，芎、归辛散风而温和血，血和则风散，辛以散之，即辛以补之也。心为肝子，肝移热于心则昏愦，故以人参补心气，菖蒲开心窍，茯神、远志安心神；白薇咸寒，退热而治厥，使风静火息，血活神宁，而瘛疭自已矣。

10445 独活汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 小独活汤（《杏苑》卷六）。

【组成】 炙甘草二钱 羌活 防风 独活 大黄（煨） 泽泻 肉桂各三钱 当归梢 连翘各五钱 酒汉防己 酒黄柏各一两 桃仁三十个

【用法】 上㕮咀。每服五钱，以酒半盏，水一大盏半，煎至一盏，去滓热服。

【主治】 因劳役，腰痛如折，沉重如山。

10446 独活汤

【方源】《准绳·女科》卷二。

【组成】 独活（去芦） 桑寄生 牛膝（酒浸） 秦艽（去芦） 赤茯苓（去皮） 桂心 防风（去芦） 附子（炮，去皮脐） 当归（炒，去芦） 生干地黄各一两 杜仲（锉，炒去丝） 细辛（去苗） 芎藭 赤芍药各七钱半 甘草（炙）半两

【用法】 上㕮咀。每服八钱，以水一中盏半，煎至一大盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇人风痹，手足不随，身体疼痛，言语謇涩，筋脉拘急。

10447 独活汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 独活 桑寄生 防风 秦艽 威灵仙 牛膝 茯苓各一钱 桂心五分 细辛 甘草（炙）

各三分　当归　金毛狗脊各二钱

【用法】 上加生姜二片，水煎服。

【主治】 肾虚兼受风寒湿气，腰冷如冰，喜得热手熨，脉沉迟或紧。

10448　独活散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 独活二两　赤茯苓一两　汉防己一两　芎藭一两　赤芍药一两　麻黄一两半（去根节）　牛膝一两（去苗）　当归一两（锉，微炒）　附子二两（炮裂，去皮脐）　甘草半两（炙微赤，锉）　萆薢一两（锉）　桂心二两　茵芋一两　防风一两（去芦头）　羚羊角屑一两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 偏风。手足不遂，肌肉顽痹。

【宜忌】 忌食生冷、油腻、猪、鱼、鸡、狗肉。

10449　独活散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 独活一两　白僵蚕三分（微炒）　干蝎半两（微炒）　附子一两（炮裂，去皮脐）　防风三分（去芦头）　芎藭一两　当归三分　麻黄一两（去根节）　桂心一两　赤芍药三分　天麻一两　细辛三分

【用法】 上为细散。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 破伤风，四肢不收，口中沫出，及中贼风。

10450　独活散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】 独活一两　桂心一两　芎藭一两　麻黄一两（去根节）　防风一两（去芦头）　白术一两　赤芍药一两　细辛一两　附子一两（炮裂，去皮脐）　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 柔风。肌肉软弱，身体疼痛，四肢不仁。

10451　独活散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】 独活　防风（去芦头）　羚羊角屑　酸枣仁（微炒）　茯神各一两　细辛　甘菊花　蔓荆子　决明子　前胡（去芦头）　桑根白皮（锉）各三分　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 眼偏视。风邪攻肝，牵射瞳人，致目不正。

【宜忌】 忌毒鱼肉。

10452　独活散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 独活一两　桑寄生一两　杜仲三分（去粗皮，炙微黄，锉）　牛膝一两（去苗）　细辛三分　秦艽一两（去苗）　赤茯苓一两　桂心一两　防风一两（去芦头）　芎藭三分　附子一两（炮裂，去皮脐）　当归一两（锉，微炒）　甘草半两（炙微赤，锉）　赤芍药三分　生干地黄一两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇人风痹，手足不随，身体疼痛，言语謇涩，筋脉挛急。

10453　独活散

【方源】《三因》卷二。

【组成】 独活　地骨皮　细辛　芎藭　菊花　防风（去叉）　甘草（炙）各等分

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，取六分清汁，入少竹沥，再煎，食后温服，一日二次。

【主治】 气虚感风，或惊恐相乘，肝胆受邪，使上气不守正位，致头摇摇，手足颤掉，渐成目昏。

10454　独活散

【方源】《准绳·类方》卷八。

【组成】 羌活　防风　川芎　独活　石膏　荆芥　升麻　干葛　生地黄　细辛　白芷　赤芍药　黄芩　甘草

【用法】 加薄荷，水煎服。

【主治】 风毒攻蛀，齿龈肿痛。

10455　独活散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 独活一两半（盐水炒）　白芍一两半（炒）　防风一两半（盐水炒）　当归三两　远志一两半　生地五两　龙齿三两（煅）　茯神二两（去木）　人参一两五钱　炙草一两五钱

【用法】 上为散。每服三钱，银器煎汤，去滓温服。

【主治】 产后风邪乘虚袭伤营阴，心神失养，心血心气俱馁，惊悸不安，脉浮虚微数。

【方论选录】 方中独活开经气，防风散风邪，生

地壮水以滋心血，当归养血以营心经，白芍敛阴和血以宁心，远志通肾交心以保心，人参扶元补心气，龙齿定魄安神志，茯神定神志，炙草缓中州以益胃气。为散，银汁煎，使风邪外解则血气内充，而心神得养，心气自雄。

10456 独脚顶

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】 番木鳖

【用法】 清水煮胀，去皮，晒干，将酒坛黄泥杵碎，筛细，拌木鳖，烈火炒松，勿令太焦，筛去黄泥，将木鳖为细末，或面糊为丸，如芥子大。临睡避风，清汤或老酒送下一分至三分。

【主治】 风痹瘫痪，湿痰走注，遍身骨节痠痛，类风不仁。

10457 独圣饼子

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】 蛤蚧一对（雌雄头尾全者，洗净，用法酒和蜜涂，炙熟） 人参（紫团参）一株（如人形良）

【用法】 上为末，熔蜡四两，滤去滓，和药末，作六饼子。用糯米作薄粥一盏，投药一饼，空心趁热细细呷之。

【主治】 肺气咳嗽，面肿，四肢浮。

10458 独活二妙丸

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】 独活 黄柏

【主治】 外感湿热伤于太阳，筋挛，左脉洪数。

【备考】 原书治上证，须与羌活冲和汤或四味舒筋汤合用。

10459 独活当归汤

【方源】 方出《千金》卷三引《小品方》，名见《普济方》卷三五〇。

【异名】 当归独活汤(《医略六书》卷三十)。

【组成】 独活八两 当归四两

【用法】 上㕮咀。以酒八升，煮取四升，去滓，分四服，日三夜一，取微汗。

【主治】 ①《千金》引《小品方》：产后中柔风，举体疼痛，自汗出。②《医略六书》：产后中风，脉弦涩。

【方论选录】《医略六书》：产后血虚亏乏，风邪袭入经中，营血不能灌溉，故肢体不仁，疼痛不止。当归养血以荣经脉，独活祛邪以除痹痛。水、酒合煎，使荣气内充，风邪外解，而经脉清和，营血溉注，焉有肢体不仁，疼痛不愈乎？

10460 独活寄生汤

【方源】《千金》卷八。

【异名】 独活汤(《圣济总录》卷一六二)、万金汤(《朱氏集验方》卷一)。

【组成】 独活三两 寄生 杜仲 牛膝 细辛 秦艽 茯苓 桂心 防风 芎藭 人参 甘草 当归 芍药 干地黄各二两

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服，温身勿冷。服汤，取蒴藋叶火燎，厚安席上，热眠上，冷复燎之。冬月取根，春取茎，熬，卧之佳。

【功用】 ①《千金》：除风消血。②《方剂学》：祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。

【主治】 痹证日久，肝肾两亏，气血不足，腰膝疼痛，肢节屈伸不利，或麻木不仁，畏寒喜温，心悸气短，舌淡苔白，脉象细弱。

①《千金》：腰背痛，因肾气虚弱，卧冷湿地，当风所得，不时速治，流入脚膝，为偏枯冷痹，缓弱痛重，腰痛挛脚重痹；新产便患腹痛，不得转动，腰脚挛痛，不得屈伸，痹弱。②《普济方》引《简易方》：风湿搏于腰背，气血凝滞，连引疼痛。③《普济方》引《如宜方》：历节走注，彻骨节疼痛，风湿气毒。④《保婴撮要》：鹤膝风，气血虚弱，四肢颈项等处肿，不问肿溃、日久不敛。⑤《外科理例》：风湿流气，有毒自手足起，遍身作痛，颈项结核如贯珠。⑥《医方集解》：肝肾虚热，风湿内攻，腰膝作痛，冷痹无力，屈伸不便。

【加减】 喜虚下利者，除干地黄。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足少阳、厥阴药也。独活、细辛入少阴，通血脉，借秦艽、防风疏经升阳以祛风；桑寄生益气血，祛风湿，借杜仲、牛膝健骨强筋而固下；芎、归、芍、地所以活血而补阴；参、桂、苓、草所以益气而补阳。辛温以散之，甘温以补之，使血气足而风湿除，则肝肾强而痹痛愈矣。②《千金方衍义》：风性上行，得湿沾滞，则留着于下，而为腰脚痹重，非独活、寄生无以疗之。辛、防、秦艽，独活之助，牛膝、杜仲，寄生之佐，桂、苓、参、甘以补其气，芎藭、芍、地以滋其血，血气旺而痹着开矣。③《成方便读》：熟地、牛膝、杜仲、寄生补肝益肾，壮骨强筋；归、芍、川芎和营养血，所谓治风先治血，血行风自灭也；参、苓、甘草，益气扶脾，又所谓祛邪先补正，正旺则邪自除也；然病因肝肾先虚，其邪必乘虚深入，故以独活、细辛之人肾经，能搜伏风，使之外出；桂心能入肝肾血分而祛寒；秦艽、防风、为风药卒徒，周行肌表，且又风能胜湿。

【备考】 本方改为丸剂，名“独活寄生丸”（见《全国中药成药处方集》）。

10461 独活续命汤

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】 麻黄（去根节）一两 人参（去芦头）一两 黄芩一两 芍药一两 芎劳一两 甘草（锉，炙）一两 防己半两 杏仁（去皮，炒黄，细切）一两 桂一两 防风（去芦头）一两半 附子（炮，去皮脐，细切）三两 白花蛇肉三钱 独活三钱 干蝎三钱

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏半，加生姜五片，煎取一盏，去滓，食前稍热服。久病风人，每遇天色阴晦，节候变更，宜先服之，以防瘖哑。

【主治】 卒暴中风，不省人事，渐觉半身不遂，口眼㖞斜，手足战掉，语言謇涩，肢体麻痹，神情昏乱，头目眩重，痰涎并多，筋脉拘挛，不能屈伸，骨节烦痛，不得转侧；及诸风，脚气缓弱。

10462 胆矾丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 胆矾一钱（真者，为粗末） 绿矾（真者）二两 大枣十四个（去核） 好醋一升（上药同煎，熬令枣烂和后药） 使君子二两（去壳） 枳实（去瓤，炒）三两 黄连 诃黎勒（去核，并为粗末）各一两 巴豆二十七枚（去皮，破之。上五味同炒令黑，约三分干，入后药） 夜明砂一两 虾蟆（烧灰存性）一两苦楝根皮（末）半两

【用法】 后三物再同炒，候干，同前四物杵罗为末；却同前膏和，入臼中，杵千下；如未成，更旋入熟枣肉，亦不可多，恐服之难化；太稠即入温水，可丸即丸，如绿豆大。每服二三十丸，米饮、温水送下，不拘时候。

【功用】 消癖进食，止泻和胃，追虫。

【主治】 小儿疳病。

10463 胆蛔汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 槟榔 15 克 苦楝根皮 6 克 使君子 9 克（炒香） 炒榧子 9 克 乌梅 3 克 木香 3 克 炒枳实 3 克

【功用】 驱蛔，解痉，止痛。

【主治】 胆道蛔虫病。右上腹阵发性剧痛，大汗淋漓，面色苍白，屈膝体位。

【备考】 本方用量为 6～10 岁儿童用量。

10464 胆汁二连膏

【方源】《眼病的辨证论治》。

【组成】 川连 1 克 胡黄连 1 克 牛胆汁 50 毫升 精制蜂蜜 5 毫升

【用法】 先将川黄连洗净，晒干后为粗末，加蒸馏水适量，煎二次，集二次煎出液放冷后，滤纸滤过；滤出液盛于蒸发皿中，加入牛胆汁、净蜂蜜，混和均匀后，在重汤锅上蒸发至全量为 50 毫升，测量酸碱度（pH 值），酌加硼砂、硼酸、精制食盐、冰片，使之成中性，以减少点眼时的刺激性。

【主治】 暴风客热，天行赤眼，赤脉传睛。

10465 胆道驱蛔汤

【方源】《新急腹症学》。

【组成】 槟榔一两 使君子八钱 苦楝皮五钱 川朴三钱 元胡五钱 木香五钱 大黄五钱

【功效】 利胆驱虫。

【主治】 胆道蛔虫病蛔滞型。症见发热，不思饮食，腹痛拒按，大便秘结，小便短赤，脉象弦滑或滑数，舌苔黄腻或黄燥。

10466 胆道排石汤Ⅰ号

【方源】《新急腹症学》引青岛市立医院方。

【组成】 柴胡四钱 郁金四钱 香附四钱 金钱草一两 木香六钱 枳壳四钱 大黄一两

【主治】 胆道系统感染及胆石症气郁型。

10467 胆道排石汤Ⅰ号

【方源】《新急腹症学》引遵义医学院方。

【组成】 枳壳三钱 木香六钱 大黄五钱 枳实五钱 茵陈十钱 黄芩三钱 银花三钱 芒消三钱

【主治】 胆系感染，胆石症湿热型。

10468 胆道排石汤Ⅱ号

【方源】《新急腹症学》引青岛市立医院方。

【组成】 双花 连翘 金钱草 茵陈 郁金各一两 木香六钱 黄芩 枳实各四钱 大黄一两 芒消二钱

【主治】 胆道系统感染、胆石症湿热性或脓毒型。

10469 胆道排石汤Ⅲ号

【方源】《新急腹症学》引遵义医学院方。

【组成】 黄连二钱 黄芩三钱 枳壳三钱 木香三钱 大黄二钱

【主治】 胆系感染、胆石症湿热型。

10470 胆道排石汤Ⅲ号

【方源】《新急腹症学》引遵义医学院方。

【组成】 枳壳三钱 青皮三钱 木香三钱 黄芩三钱 柴胡三钱 茵陈十钱 陈皮二钱 白术四钱

【主治】 胆系感染、胆石症气郁型。

10471 胆道排石汤Ⅳ号

【方源】《新急腹症学》引遵义医学院方。

【组成】 枳壳三钱 木香四钱 黄芩三钱 虎杖五钱

【主治】 胆系感染、胆石症湿热型。

10472 胆道排石汤Ⅴ号

【方源】《新急腹症学》引遵义医学院方。

【组成】 枳壳三钱 木香三钱 川楝子三钱 黄芩三钱 金钱草十钱 大黄二钱

【主治】 胆系感染、胆道蛔虫病、胆石症气郁型。

10473 胆道排石汤Ⅵ号

【方源】《新急腹症学》引遵义医学院方。

【组成】 枳壳五钱 木香五钱 延胡五钱 栀子四钱 虎杖十钱 金钱草十钱 大黄五钱

【主治】 胆系感染、胆石症湿热型。

10474 胜水汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 茯苓一两 车前子三钱 人参三钱 远志一钱 甘草三分 菖蒲一钱 柴胡一钱 白术一两 陈皮五分 半夏一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 补心生胃，散瘀利水。

【主治】 水气攻心，终日吐痰，少用茶水则心下坚筑，短气恶水。

10475 胜冰丹

【方源】《局方》卷六（续添诸局经验秘方）。

【组成】 白药子一两半 山豆根 红内消 黄药子 甘草（炙） 黄连各二两 麝香（研） 龙脑（研）各二钱

【用法】 上为末，用建盏盛，于饭上蒸，候冷，次入脑、麝，令匀，炼蜜为丸，如鸡头大。每用一丸，含化。又用津唾于指甲上，磨少许，点赤眼。

【主治】 三焦壅盛，上冲头目，赤热疼痛，口舌生疮，咽喉不利，咽热有碍，神思昏闷。

10476 胜红丸

【方源】《瑞竹堂方》卷一。

【组成】 三棱（醋炙） 广术（醋炙） 青皮（去瓤，炒） 陈皮（去白） 干姜（炮） 良姜 枳实（去瓤，炒） 白术（煨） 萝卜子（炒，别研）各一两 香附子二两（炒，去毛）

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，姜汤或木香汤、陈皮汤送下，不拘时候。

【功用】 消食快气，美进饮食。

【主治】 心腹痞满。

10477 胜红丸

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】 陈皮 青皮 莪术 三棱 炮姜 良姜各五钱 香附一两 枳实 姜连各五钱

【用法】 醋糊为丸服。

【主治】 酒积、血积、食积。

10478 胜金丸

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】 白僵蚕 细辛 天南星 皂角（炙黄） 川乌头（生） 乌蛇（真者，好酒浸，去骨） 白矾（枯） 桔梗 威灵仙 何首乌 草乌头各半两 荆芥穗 川芎各二两

【用法】 上为末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食后温酒调下。

【主治】 痫病。风热惊骇，不时旋运潮搐，口吐痰沫，忽然倒地，不省人事。

10479 胜金丸

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 鹿茸（燎去毛，切片，酥炙膏为度） 白茯苓（去皮） 桑螵蛸（酒浸一宿，瓦上焙） 龙骨（煅，别研） 川当归（去芦，酒浸） 熟干地黄（洗）各一两 附子一只（八九钱者，炮，去皮脐）

【用法】 上为细末，以肉苁蓉三两，洗净切片子，用酒一升煮干，研作膏，为丸如梧桐子大。每服三十丸，食后酒、盐汤任下；妇人醋汤送下。

【主治】 诸虚不足，小便白浊；妇人子宫久冷。

10480 胜金丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 补骨脂（炒） 杜仲（去粗皮，姜制，去丝） 延胡索（炒） 牛膝（去芦，酒浸）各一两 当归（去芦，洗）三分

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，细嚼，胡桃酒送下，食前服。

【主治】 腰疼。

10481 胜金丸

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】 熟地五两 人参一两半 白术一两（炒） 茯苓一两半 当归三两 白芍一两半（酒炒） 川芎一两 桂心一两半 香附二两（酒炒） 白薇一两（酒炒） 延胡一两半（酒炒） 炙草五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三五钱，温酒送下。

【主治】 经迟不孕，脉虚者。

【方论选录】 熟地补血，以滋冲任；当归养血，以营经脉；川芎行血海；白芍敛阴血；人参扶元补

气，兼通血脉；白术健脾统血，鼓运脾元；茯苓渗湿，以清血室；炙甘草缓中，以益胃气；延胡化血滞，力擅通经；香附解气郁，专主调经；桂心补火暖血；白薇降泄益阴。蜜以丸之，酒以行之，使血气内充，寒滞解散，而经气温暖，腹痛无不自退，岂有经迟不孕之患乎？

10482 胜金散

【方源】《直指》卷六。

【组成】桂枝 延胡索（炒） 五灵脂 当归各等分

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，酒三分同煎，食前服。

【主治】心下痛。

10483 胜金散

【方源】《济阳纲目》卷七十二。

【组成】五灵脂（水淘，炒）一两 玄胡索 桂枝 当归（酒洗） 香附（炒）各七钱 没药 草果各五钱

【用法】上为细末。每服三钱，食前温酒调服。

【主治】猝心脾痛。

10484 胜金煎

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】牛黄 昆布 海藻各二两半 牵牛二两 桂一两（冷者加作二两） 甜葶苈三两 椒目一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前米饮送下，每日三次；渐加至四五十丸，每日三四次。以水利为效。寻常些小发动，觉气促痰盛，夜卧不安，数服见效。

【主治】大腹水气，背刺，喘急，息不能通。

10485 胜骏丸

【方源】《三因》卷三。

【组成】附子一枚（炮，去皮脐） 当归（酒浸一宿） 天麻（酒浸） 牛膝（酒浸） 酸枣仁（炒） 熟地黄（酒浸） 防风（去叉）各二两 木瓜四两 乳香半两（别研） 麝香一分（别研） 全蝎（去毒） 木香 没药（别研） 羌活 甘草（炙）各一两

【用法】上为细末，用生地黄三斤净洗，研烂如泥，入无灰酒四升，煮烂如膏，以前药匀和，杵令坚，每两作十丸。每服一丸，细嚼，临睡酒送下。地黄春、夏极多，遇冬或无地黄，只炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐汤温酒送下。

【功用】①《三因》：益真气，壮筋骨，黑髭须，滑皮肤。②《寿亲养老》：散一切风。

【主治】①《三因》：元气不足，真气虚弱，及诸虚寒湿气进袭，手足拳挛，脚趾连脚面拘急，走注疼痛，筋脉不伸，行步不随，一切足弱鹤膝诸风。②《饲鹤亭集方》：手足麻木。

【加减】槟榔、萆薢、肉苁蓉（酒浸）、破故纸（炒）、巴戟（去木）各添一两，内熟地黄、当归各减一两尤妙。

【方论选录】如服此药五七日或半月，见效甚速，行步如飞，千里可至，乃名胜骏。

【备考】《外科正宗》有苍术。

10486 胜湿丸

【方源】《济阴纲目》卷三。

【组成】苍术（盐炒） 白芍药 滑石（炒）各一两 椿根皮（炒）一两 干姜（煨）二钱 地榆五钱 枳壳（炒） 甘草各三钱

【用法】上为末，粥为丸，如梧桐子大。空心米饮送下一百丸。

【主治】因湿热胜而下赤白带。

【方论选录】①《济阴纲目》汪淇笺释：此方加苍术以燥中宫，地榆以温下部，枳壳宽气于上，滑石利湿于下，干姜从而燥湿也。②《医略六书》：湿热内滞，血气俱伤，故赤白带下，淫溢不止焉。苍术燥湿强脾，以清带脉；白芍敛阴和血，以安冲任；枳壳灰破滞化气；滑石末清热渗湿；地榆涩血，以止赤带；椿皮涩脱，以固带脉；炮姜温胃守中；甘草缓中和胃也。粥以丸之，饮以下之，使滞气调而湿热化，则清气和而血气各有所归，何赤白带之淫溢不止乎？

10487 脉溢汤

【方源】《医碥》卷一。

【组成】人参 黄耆 当归 茯神 麦冬 石莲 朱砂 姜汁 生地

【主治】心极虚有火，血汗（又名脉溢），血自毛孔中出。

10488 胎产金丹

【方源】《胎产心法》卷中。

【组成】当归（酒洗） 丹皮（水洗，晒干，勿见火） 蕲艾（醋煮） 延胡索（酒拌，炒干） 川芎 益母草（取上半截，童便浸，晒干） 青蒿（人多内热者更宜，不用亦可） 白薇（洗净，人乳拌） 人参 赤石脂（火煅，水飞亦可） 白茯苓 川藁本（洗净） 白术（土炒）各二两 生地（酒洗，煮不犯铁器） 鳖甲（醋炙）各四两 香附四两（醋、酒、盐、童便各浸一两） 桂心 没药（去油） 粉草（酒炒）各一两二钱 北五味一两（去梗，焙） 沉香六钱

【用法】 上为细末；再用新鲜头次男胎紫河车一具，长流水浸半日，洗净；黑铅打成大铅罐一个，将河车放在铅罐内，再将黄柏四两放在河车下，加白酒酿二斤，清水二碗，灌满铅罐，仍以铅化封口；再以铁锅盛水，将铅罐悬在锅内，煮两日夜为度，取出捣烂，和入药内，拌匀，晒干，再研为末，炼蜜为丸，如弹子大，每丸重三钱五分，水飞朱砂为衣，再以黄蜡为皮，如蜡丸式收贮。妇人临产，米汤化服一丸，助精神气力，分娩顺利；产下，童便好酒服一丸，神清体健，再无崩晕之患；产后，每日服一丸，服过五日，气血完固，自无他病；行经后，川芎当归汤服一丸，服之三日，必然有孕；苦于小产者，胎动欲产，白滚汤服一丸，睡半日，其胎自安，每月常服二三丸，保全足月分娩无忧；产后血崩，童便好酒服一丸，即止；产后血晕者，当归川芎汤服一丸，即醒；产后惊风，防风汤服一丸，即解；儿枕痛者，山楂黑沙糖汤服一丸，即止；胞衣不下，干姜炒黑煎汤服一丸，即下；产后虚怯者，川芎当归汤每日服一丸，十丸痊愈；凡产后诸证，俱加好酒童便服。

【功用】 培补气血，安胎调经，益精种子。

①《胎产心法》：种子安胎。②《北京市中药成方选集》：补气养血。③《全国中药成药处方集》：散寒，助精壮气。④《中药制剂手册》：调经。

【主治】 ①《胎产心法》：妇人经水不调，诸虚百损，及胎前产后诸证，苦于小产，胎动欲产，产后血崩、血晕，惊风，儿枕痛，胞衣不下，产后虚怯。②《全国中药成药处方集》：临经腹痛，腰痠带多，面黄肢倦，子宫虚寒，难于受孕。脾胃虚弱，胎前漏血，腰腿痠痛，四肢浮肿，气血双亏，作冷作烧，不思饮食，自汗盗汗，骨蒸潮热。肚腹疼痛。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：忌食生冷；忌生气。

10489 急风散

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】 附子一枚（炮裂，去皮脐） 乌头二枚（炮裂，去皮脐） 天南星一枚（炮） 藿香（去梗） 防风（去叉） 白芷各半两 干蝎（全者，去土，炒） 白附子（炮）各一分

【用法】 上为细散。每服半钱匕，豆淋温酒调下，并二服，未愈再服。

【主治】 中风，身如角弓反张状。

10490 急风散

【方源】《局方》卷十（宝庆新增方）。

【异名】 急风丹〔原书卷十（宝庆新增方）〕。

【组成】 生川乌（炮，去皮脐） 辰砂（研，飞）各二两 生南星（洗，去皮）四两

【用法】 上为细末。每用酒调，涂痛处。小儿伤风，鼻塞清涕，酒调，涂囟门上，不可服之。

【主治】 偏正头痛，夹脑风，太阳穴痛，坐卧不安。小儿伤风，鼻塞清涕。

10491 急白汤

【方源】 方出《中医临证撮要》，名见《古今名方》。

【组成】 金银花 15 克 连翘 15 克 犀角粉1.5 克（冲服） 射干 6 克 板蓝根 9 克 天花粉 15 克 京赤芍 9 克 粉丹皮 9 克 生山栀 6 克 焦山栀 6 克 干芦根 30 克 淡竹叶 15 克

【功用】 清热解毒，凉营止血。

【主治】 急性白血病，寒热头痛，胸烦作恶，夜寐不安，神昏谵语，出汗口干，咽痛红肿，口鼻出血，舌苔黄腻，或糙，或干而焦黑，舌尖红，脉洪数或滑大。

【加减】 抽风，加忍冬藤 15 克，嫩钩藤 12 克，羚羊粉 2.4 克（冲服）；心烦，加胡黄连 3 克，黑玄参 9 克；皮肤血点，加丝瓜络 15 克，白茅根 15 克；尿血便血，加小蓟 15 克，生地榆 15 克，小生地 12 克；口腔咽喉腐烂，加青黛 2.4 克，轻马勃 4.5 克，入中黄 6 克，人中白 6 克。

10492 急救回生丹

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 朱砂（顶高者）一钱五分 冰片三分 薄荷冰二分 粉甘草一钱（细末）

【用法】 上为细末。分作三次服，开水送下，约半小时服一次。若吐剧者，宜于甫吐后急服之；若于将吐时服之，恐药未暇展布即吐出。服后温覆得汗即愈。服一次即得汗者，后二次仍宜服之；若服完一剂未全愈者，可接续再服一剂。若其吐泻已久，气息奄奄，有将脱之势，但服此药恐不能挽回，宜接服急救回阳汤。

【主治】 霍乱吐泻转筋，诸般痧症暴病，头目眩晕，咽喉肿痛，赤痢腹疼，急性淋证。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：体弱者及孕妇忌服。

【方论选录】 朱砂能解心中窜人之毒，且又重坠，善止呕吐，俾服药后不致吐出；此方中冰片，宜用樟脑炼成者，因樟脑之性，原善振兴心脏，通活周身血脉，尤善消除毒菌，特其味稍劣，炼之为冰片，味较清馥，且经炼而其力又易上升至脑，以

清脑中之毒也；薄荷冰善解虎列拉（即霍乱）之毒，且其味辛烈香窜，无窍不通，无微不至，周身之毒皆能扫除，矧与冰片又同具发表之性，服之能作汗解，使内蕴之邪由汗透出，且与冰片皆性热用凉，无论症之因凉因热，投之皆宜也；粉甘草最善解毒，又能调和中宫，以止吐泻，且又能调和冰片、薄荷冰之气味，使人服之不致过于苛辣也。

【临证举例】 霍乱脱证 辽宁宽姓媪，年过六旬，孟秋下旬染霍乱，经医数人调治两日，病势垂危。其证从前吐泻交作，至此吐泻全无，奄奄一息，昏昏似睡，肢体甚凉，六脉全无，询之略能言语，唯觉心中发热难受。处方：镜面朱砂一钱半，粉甘草一钱（细面），冰片三分，薄荷冰二分，共研细末，分作三次服。病急者四十分钟服一次，病缓者一点钟服一次，开水送下。复诊：将药末分三次服完，心热与难受皆愈强半。

10493 急救回阳汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】 党参八钱 附子八钱（大片） 干姜四钱 白术四钱 甘草三钱 桃仁二钱（研） 红花二钱

【用法】 水煎服。莫畏病人大渴饮冷不敢用。

【功用】《医林改错评注》：回阳救逆，活血化瘀。

【主治】 吐泻转筋，身凉汗多。

【方论选录】《医林改错评注》：方中用大量的参、附、姜、草（四逆汤加人参）回阳救逆，白术健脾补中，以助回阳之力；因阳气虚易致血瘀，故佐桃仁、红花通气血之路，阳气更易回复。

【备考】 本方方名，《湿温时疫治疗法》引作"新加附子理中汤"。

10494 急救回阳汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 潞党参八钱 生山药一两 生杭芍五钱 山萸肉八钱（去净核） 炙甘草三钱 赭石四钱（研细） 朱砂五分（研细）

【用法】 先用童便半钟炖热，送下朱砂，继服汤药。服此汤后，若身温脉出，觉心中发热有烦躁之意者，宜急滋其阴分，若玄参、生芍药之类，加甘草以和之，煎一大剂，分数次温饮下。

【功用】 交心肾，和阴阳。

【主治】 霍乱吐泻已极，精神昏昏，气息奄奄，至危之候。

【方论选录】 病势至此，其从前之因凉因热皆不暇深究，唯急宜重用人参以回阳；山药、芍药以滋阴；山萸肉以敛肝气之脱；炙甘草以和中气之漓，此急救回阳汤之所以必需也。用赭石者，不但取其能止呕吐，俾所服之药不致吐出，诚以吐泻已久，阴阳将离，赭石色赤入心，能协同人参助心气下降；而方中山药，又能温固下焦，滋补真阴，协同人参以回肾气之下趋，使之上行也；用朱砂且又送以童便者，又以此时百脉闭塞，系心脏为毒气所伤，将熄其鼓动之机，故用朱砂直入心以解毒，又引以童便使毒气从尿道泻出，而童便之性又能启发肾中之阳上达，以应心脏也。是此汤为回阳之剂，实则交心肾，和阴阳之剂也。

10495 度世丹

【方源】《遵生八笺》卷十七。

【组成】 枸杞子 甘菊花（去萼用） 远志（用头，捶破，取去心） 车前子 生地黄（用干者，去芦） 巴戟 覆盆子 白术 肉苁蓉（择有肉者，酒浸七日） 石菖蒲（细小九节者） 续断 菟丝子（酒浸七昼夜，晒干，炒令黄色为度） 牛膝（去芦，用酒浸七日） 细辛（去苗） 何首乌 地骨皮（去土）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【功用】 安神志，定魂魄，顺五脏，和六腑，添智慧，乌髭须，通脉络，除劳损，续绝补败，驻悦颜色，滋润肌肤，聪明耳目，强健四肢，延年益智。

【主治】 瘫痪痛楚，久在床枕，或有恶疾，肢体不安，行步艰辛，饮食少进，或瘙痒不安，或痛连筋骨。

【宜忌】 戒嗜欲。

【方论选录】 枸杞子是荧之精，益血海，足筋骨，补气安神；甘菊花是木之精，服之聪明耳目，去寒湿手软，利九窍，通三焦；远志治胃膈痞闷，去忧郁，润肌肤，壮筋骨；车前子是镇星之精，益胃，安魂魄，驻颜，去夜惊妄想；生地黄是太阴之精，开心神，去邪，养脾胃荣卫之神；巴戟是黄金之精，去心疾，补血海，轻身延年；覆盆子是神水之精，助阳轻身，安五脏之神；白术是太阳之精，能正气吐逆，消食化痰湿，养荣卫；肉苁蓉入小肠，补下元；石菖蒲能升智慧，添神明，暖下元，补虚减小便；牛膝治湿脚气腰膝疼痛；细辛疗百病，顺气益血海；续断治五劳七伤；何首乌性温无毒。

10496 疬疮疫核噙药

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】 昆布（酒洗） 海藻（酒洗） 大黄（酒拌，蒸二次） 白僵蚕（姜汁拌炒） 真青黛（水飞） 胆南星 连翘各二两 桔梗 柴胡 瓜蒌仁 川黄连（酒炒） 片黄芩（酒炒） 橘红各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。不拘日夜嚼之。

【主治】 痨疮痰核。

10497 疥灵丹

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 大风子肉一两五钱 油核桃仁二十个 杏仁二两 川椒（末）五钱 木鳖子肉一两五钱 水银五钱 樟脑七钱 枯矾五钱 猪脂油一块

【用法】 上药共捣千杵如泥，听用。须搔破搽之。

【主治】 五疥八癣，经久不愈者。

10498 疥癣光

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 松香一钱 水银 硫黄 枯矾各二钱 樟脑二钱（或）一钱 麻油少许

【用法】 上先将松香、水银加麻油少许研如糊，后入三味研如膏。擦之。

【主治】 疥疮，癣疮。

10499 疯油膏

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】 轻粉一钱半 东丹一钱 飞辰砂一钱

【用法】 上为细末，先以麻油四两煎微滚，入黄蜡一两再煎，以无黄沫为度，取起离火，再将药末渐渐投入，调匀成膏。涂擦患处。

【功用】 润燥，杀虫，止痒。

【主治】 鹅掌风，牛皮癣，慢性湿疹等皮肤皲裂，干燥作痒。

10500 炮肾散

【方源】《奇效良方》卷四十。

【组成】 巴戟（去心，麸炒） 甘遂（炒黄） 木香 苦葶苈（炒） 沉香（锉） 泽泻各一分 腻粉一钱 槟榔（一枚生，一枚炮） 陈皮（去白） 芫花（醋拌炒） 麦芽各半两

【用法】 上为末。每服二钱，用猪腰子一枚，以竹刀割开，去筋膜，切作三片，掺药末在内，用湿纸裹，慢火煨令香熟；先煮葱白三茎令熟，细切，将葱白与粟米同煮粥一碗。先食粥一半，方食腰子，药后再食粥令尽，临卧时服。至五更大小便下赤黄恶物是效。

【主治】 水气肿满。

10501 烂弦散

【方源】《全国中药成药处方集》（禹县方）。

【组成】 炉甘石一两 黄连一钱 黄柏一钱 蔓荆子一钱 菊花一钱

【用法】 将上药熬水冲甘石，澄清，干后以艾叶七十个熏之，装瓶内。香油调搽，抹眼患处。

【主治】 烂弦风，红眼眶。

【宜忌】 翳障眼忌用。

10502 烂眼煎

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 胆矾 防风 独活 僵蚕 桑皮各一钱

【用法】 上药用水一碗，放锅内，用纸盖好，蒸一炷香久，取出露一宿。洗之。

【主治】 赤红烂眼。

10503 烂腿膏

【方源】《沈氏经验方》卷上。

【组成】 甘石四两 白蜡十两 黄蜡十两 花椒一两五钱 密陀僧一两 麻油四十八两

【用法】 先以麻油、花椒二味同煎至花椒焦黑，捞去，再熬至滚，入各味搅极匀，至滴水成珠不散，离火略冷，用厚皮纸裁成长方，于锅中拖之，线穿，候干。用时贴二日，翻转再贴。

【主治】 里外臁疮，血风蚁窠。

10504 洁宫汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 沙参四钱 茯神二钱 远志五分（甘草水炒） 归身 麦冬二钱 贝母二钱 橘红一钱半夏一钱 白术一钱 砂仁一钱 姜三片

【主治】 心移于小肠之咳，其状咳而失气，气与咳俱失。

10505 洪宝丹

【方源】《外科集验方》。

【异名】 金丹、寸金、四黄散、一黄散、破血丹、黄药（原书同卷）、济阴丹（《正体类要》卷下）、抑阳散（《保婴撮要》卷十五）、截血膏（《准绳·疡医》卷六）、洪宝膏（《寿世保元》卷九）、少林截血丹（《理瀹》）、红宝丹（《外科证治全书》卷五）。

【组成】 天花粉三两 姜黄一两 白芷一两 赤芍药二两

【用法】 上为末，茶、酒、汤为使，随证热涂。若病势大热，可用热茶调敷；如证稍温，则用酒调；若用以撮脓，可用三分姜汁、七分茶调；凡疮口破处，肉硬不消者，疮口被风所袭也，此方中加独活以祛风，用热酒调；年少血壮之人，衰老血败之士，如有溅血，无药可止，血尽人亡，若在手

足，可用茶调敷手足上下尺余远；若在胸背腰腹，则全体敷之；治金疮重者，筋断脉绝，血尽人亡。如要断血，须用绳及绢袋缚住人手臂，却以此方从手臂上，用茶调敷住血路，然后却用断血药掞口，却不可使内补及四物等药；凡金疮在头面上者，血不止，急用此方，茶调团围敷颈上截血，疮口边亦用此敷，军中方掞口。重十日，轻者三日效；凡金疮着水，肉翻花者，可用薤汁调此方敷疮口两旁，以火微炙之；或用旱稻杆烟熏之，疮口水出即愈，如无水出即是风袭，可用南星茶调敷之即愈；治妇人产后，或经绝血行逆上，心不能主，或吐血、鼻衄、舌衄，可以此方用井花水调敷颈上，生艾汁调亦妙，其血立止，然后服药以绝原；此方用药调涂热毒，恐随干随痛，赤肿不退，当用鸡子清调敷，诸热毒难干妙；汤火疮同；打破伤损在胸膈上者，药通血不下，可用绿豆水调此药末吞之，即吐出而安。

【功用】 化血为水，凉肌生肉，去死肌烂肉，破血退肿。

【主治】 诸般热证痈肿之毒，金疮之证；妇人产后，或经绝血行逆上，心不能主，成吐血、舌衄。

【宜忌】 此方药性无他，遇凉效少，遇热效多，故非十分阳证不可轻用，恐或凝寒，治疗费力。若夫金疮出血，非此不可，乃第一药，余外但可为前二药之佐使尔，当审之审之。

【加减】 凡疮口破处，肉硬不消者，疮口被风所袭也，此方中加独活以去风，用热酒调；如又不消，则风毒已深，肌肉结实，又加紫荆皮，有必消之理矣。

10506 洞阳丹

【方源】 《济生》卷四。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 钟乳粉各二两 天雄（炮，去皮）三两 川乌（炮，去皮）四两 阳起石（火煅）一两 火砂一两（别研细）

【用法】 上为细末，酒煮神曲糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。

【主治】 阳虚阴盛，手足厥冷，暴吐大下，脉细羸瘦，伤寒阴证，悉皆治之。

【备考】 本方方名，《医统》引作“复阳丹”。

10507 洞天鲜草膏

【方源】 《外科全生集》卷四。

【异名】 洞天膏 洞天嫩膏（《内外科百病验方大全》）。

【组成】 壮年头发一斤 活牛蒡 甘菊 苍耳根叶 金银藤 马鞭草 仙人对坐草各鲜草一斤 白芷 甘草 五灵脂 当归各半斤

【用法】 先用壮年头发一斤，菜油二斤，入锅熬发枯浮，去滓听用；以活牛蒡、甘菊、苍耳根叶、金银藤、马鞭草、仙人对坐草，各鲜草十斤，入菜油十斤，熬至草枯沥出，再以白芷、甘草、五灵脂、当归各半斤，入锅熬至药枯出滓；俟油冷，将前头发熬过之油并入，共见过斤两；每油一斤，用当日炒透黄丹七两，入于油内搅匀再熬，熬至滴水成珠，以两指取膏为丸，而丸不粘指为度；离火俟退火气，以油纸摊膏。如做嫩膏者，每斤油内入黄丹四两熬黑，收起听用。贴患处。

【主治】 ①《外科全生集》：一切热毒痈疖。②《内外科百病验方大全》：乳疖、乳痈，痔腿及小儿游风丹毒。

10508 洗风散

【方源】 《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】 荆芥四两 苦参四两 防风（去芦头） 川芎 当归（洗，焙） 白蒺藜 香白芷 地榆 地骨皮 黄柏各二两

【用法】 上㕮咀。每用五钱，水三升，煎三五沸，通手淋渫患处。

【主治】 风热毒气攻注，遍身疮疥，瘾疹疼痛。

10509 洗风散

【方源】 《女科百问》。

【组成】 茺蔚草 晚蚕沙 赤小豆 黑牵牛 白芷 藁本 僵蚕 白附子 草乌头 白蔹 蔓荆子 各等分

【用法】 上为末。每用一钱，澡面。

【主治】 面上游风，或瘾疹，或风刺，或黑皯。

10510 洗心汤

【方源】 《审视瑶函》卷六。

【组成】 黄连 生地黄各一钱半 木通 炒栀仁 各一钱 甘草三分 当归尾 菊花各一钱二分

【用法】 上锉散。白水二钟，煎至八分，去滓温服。

【主治】 心经积热，四眦赤涩。

【宜忌】 发于秋者宜服。

10511 洗心散

【方源】 《局方》卷六。

【异名】 七宝洗心散（《医方类聚》卷一二五引《简易》）。

【组成】 白术一两半 麻黄（和节） 当归（去苗洗） 荆芥穗 芍药 甘草（爁） 大黄（面裹，煨，去面，切，焙）各六两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，入生

姜、薄荷各少许，同煎至七分，温服；如小儿麸豆疮疹欲发，先狂语多渴，及惊风积热，可服一钱，并临卧服；如大人五脏壅实，欲要溏转，加至四五钱，乘热服之。

【主治】 风壅壮热，头目昏痛，肩背拘急，肢节烦疼，热气上冲，口苦唇焦，咽喉肿痛，痰涎壅滞，涕唾稠粘，心神烦躁，眼涩睛疼；及寒壅不调，鼻塞身重，咽干多渴，五心烦热，小便赤涩，大便秘滞，并宜服之。

10512 洗心散

【方源】 《银海精微》卷上。

【组成】 荆芥 薄荷 连翘 麻黄 赤芍药 栀子 黄连 大黄各一两

【用法】 每服五钱，水煎服。

【主治】 患眼生翳，如珠垂帘遮睛者。

10513 洗心散

【方源】 《审视瑶函》卷四。

【组成】 大黄 赤芍药 桔梗 玄参 黄连 荆芥穗 知母 防风 黄芩 当归尾各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，食后茶清调下。

【主治】 火疳症。生于睑眦气轮，初起如粟疮榴子一颗，小而圆，或带横长而圆，状如豆，次后渐大，痛者多，不痛者少。

10514 洗阴散

【方源】 《名家方选》。

【组成】 五倍子 明矾 芒消 小麦 葱白各等分

【用法】 水煎，屡洗阴门。

【主治】 产后阴门肿痛者。

10515 洗阴煎

【方源】 《仙拈集》卷三。

【组成】 蛇床 五倍 明矾 花椒 葱白各五钱

【用法】 煎汤洗之。

【主治】 妇人阴痒生疮。

10516 洗肝散

【方源】 《幼幼新书》卷三十三引《灵苑方》。

【组成】 白蒺藜一两半（微炒，去角） 羌活 防风（去芦头）各半两 甘草一分（炙） 马牙消二两（细研）

【用法】 上为细末。每服二钱，用温热水调下，食后临卧时服。小儿及年少气实者，只用牙消一味为末，每服一钱。小儿一字，熟水调下。若是暴翳，不过两服便落。

【主治】 ①《幼幼新书》引《灵苑方》：翳膜。②《三因》：肝热，赤脉贯睛，涩痛，冲风泪下；兼治热血攻心。

10517 洗肝散

【方源】 《扁鹊心书·神方》。

【组成】 大黄二钱 黄芩三钱

【用法】 水煎，食前服。

【主治】 脏火太过，壅热攻目，或翳障疼痛。

10518 洗肝散

【方源】 《局方》卷七（吴直阁增诸家名方）。

【异名】 洗肝饮（《玉案》卷三）。

【组成】 当归（去芦） 薄荷（去梗） 羌活（去芦） 防风（去芦） 山栀子仁 甘草（炙） 大黄（煨） 川芎各二两

【用法】 上为末。每服二钱，食后冷水或熟水调下，一日三次。

【主治】 ①《局方》（吴直阁增诸家名方）：风毒上攻，暴作赤目，肿痛难开，隐涩眵泪，昏暗羞明，或生翳膜。②《杏苑》：痰盛咳嗽，肺气不利。

【方论选录】 ①《成方便读》：方中羌活、防风大开太阳之表，使邪从外解；薄荷能清利头目，轻宣上焦，以助羌、防之不逮，于是表邪自无容留之地；栀子专清上焦之火，能屈曲下行，导火邪从小便而出；大黄泻实火从大便而出，于是里邪亦无留着矣；甘草缓其急，而和其诸药；归、芎和血养肝，以善其后耳。②《眼科阐微》：川芎、当归入肝经，养肝血；肝主乎风，防风、羌活、薄荷，皆风药也；肝者火之母，一火动则五火俱煽而动，栀子、甘草所以清肝火也。诸药皆涤荡之品，故曰洗肝散。

【备考】 《金鉴》本方有谷精草，无大黄。《医学集成》有石膏、木通，无羌活。

10519 洗肝散

【方源】 《医统》卷六十一。

【组成】 川当归 羌活 薄荷 栀子 芎藭 生地黄 防风 大黄 龙胆草 甘草各等分

【用法】 上为末。每服三钱，白汤调服。

【主治】 风毒上攻，暴作目肿，痛涩难开，眵泪不绝。

10520 洗肝散

【方源】 《准绳·类方》卷七。

【组成】 川芎 当归尾 赤芍药 防风 生地黄 白蒺藜 木贼 蝉蜕 羌活 薄荷 苏木 菊花 红花各五钱 甘草三钱

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏半，松丝十余根，煎服。

【主治】 花翳。

10521 洗肝散

【方源】《金鑑》卷七十七。

【组成】 车前子一钱 柴胡一钱五分 黄芩一钱 细辛五分 黑参一钱 茺蔚子二钱

【用法】 上为粗末。以水二盏，黑豆三七粒，煎至一盏，去黑豆，空心温服。

【主治】 雀目内障。

10522 洗面药

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 洗面散(《扶寿精方》)。

【组成】 皂角三斤（去皮弦子，另捣） 好升麻八两 楮实子五两 白及一两（细锉） 甘松七钱 缩砂（连皮） 白丁香（腊月收） 三柰子各五分 绿豆八合（拣净另捣） 糯米一升二合

【用法】 上为细末。洗面。

【功用】 去皮肤燥痒，去垢腻，润泽肌肤。

【主治】 面有黯黯，或生疮，或生痤痱及粉刺之类。

【备考】《医学入门》有白芷、天花粉。

10523 洗眼方

【方源】《广笔记》卷三。

【组成】 皮消一两 杏仁（去皮尖） 铜绿 明矾各三分 侧柏叶三钱 甘菊花三钱 桑白皮五钱

【用法】 河水五碗，煎至二大碗，置铜盆内，洗眼及眉棱骨、两太阳，涕出即爽然矣。日夜不拘次数。一服冬可半月，夏十日。

【主治】 内障，外障，暴赤眼，眵泪，昏花，翳膜。

10524 洗眼汤

【方源】《千金》卷六。

【组成】 秦皮 黄柏 决明子 黄连 黄芩 蕤仁各十八铢 栀子仁七枚 大枣五枚

【用法】 上㕮咀。以水二升浸，煮取六合，澄清，仰卧洗目，每日一次。

【主治】 热上出攻，目生障翳，目热痛，汁出。

【宜忌】 忌猪肉。

10525 洗痔汤

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】 枳壳 天名精（一名地菘）各二两

【用法】 以河水三瓢，煎数滚，先熏后洗。甚者三次即愈。

【功用】 止痛消肿。

【主治】 肛门肿痛，下坠，无论新久。

10526 洗搗散

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 五倍子 花椒 蛇床子 苦参 白芷 葱各等分

【用法】 水煎，熏洗。

【主治】 妇人阴蚀疮，阴户中有细虫，其痒不可当，食人脏腑即死，令人发寒热，与劳症相似。

10527 洗方汤泡散

【方源】《得效》卷十六。

【异名】 汤泡散(《普济方》卷七十一)。

【组成】 当归尾 赤芍药 黄连（去须） 杏仁各五钱 铜青二钱 薄荷叶三钱 防风五钱

【用法】 上锉散。每用二钱，极沸汤泡，乘热先熏后洗，冷则再暖用，一日二三次。

【主治】 肝虚风热攻眼，赤肿羞明，渐生翳障。

10528 洗心凉血汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】 当归 赤芍 生地 黄连 菊花 木通 枯芩 栀子各五分 甘草四分

【用法】 水煎，热服。眼痛极红者，用二三剂。

【主治】 时行赤眼症。

【宜忌】 此降火之剂，壮盛者服。

【加减】 皮肿，加大黄。

10529 洗发菊花散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 甘菊花二两 蔓荆子 干柏叶 川芎 桑根白皮（去粗皮，生用） 白芷 细辛（去苗） 旱莲草（根、茎、花、叶）各一两

【用法】 上为粗末。每用药二两，浆水三大碗，煎至两大碗，去滓，沐发。

【主治】 头发脱落。

10530 洗眼栀子汤

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】 栀子仁半两 黄柏半两 黄芩半两 蕤仁一分 黄连半两 秦皮半两（锉） 决明子半两（微炒） 大枣五枚

【用法】 上锉细。都以水二大盏，煎取一大盏。以绵滤去滓，避风处，看冷暖，洗眼，一日三五次。

【主治】 热病，热毒气攻眼，生赤肿翳膜，疼痛，怕见光明。

10531 洗眼秦皮汤

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】 秦皮汤洗眼方。

【组成】 秦皮一两 蕤仁一两 甘草一两半 细辛一两 栀子仁一两 苦竹叶二握 印成盐一分

【用法】 上为散。以水三升，煎取一升，去滓，稍热洗目，不拘次数，冷即重暖用之。

【主治】 眼赤烂及眼痒急赤涩。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“秦皮散”、“秦皮洗眼汤”。

10532 洗眼紫金膏

【方源】 《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。

【异名】 洗眼金丝膏（《审视瑶函》卷三）。

【组成】 朱砂（别研） 乳香（别研） 硼砂（别研） 赤芍药 当归（洗，焙）各一分 雄黄（研，飞）二钱 麝香（别研）半钱 黄连（去须）半两

【用法】 上为细末，入研药拌匀，再擂，炼蜜搜和为丸，如皂荚子大。每次用一丸，安净盏内，以沸汤泡开，于无风处洗，药冷闭目少时，候三二时，再煨令热，依前洗，一贴可洗三五次。

【主治】 远年近日翳膜遮障，攀睛胬肉，昏暗泪多，瞻视不明，或风气攻注，睑生风粟，或连眶赤烂，怕日羞明，隐涩难开，并能治之。

【宜忌】 不得犯铜铁器内洗；如暴赤眼肿者，不可洗之。

10533 洗眼蕤仁汤

【方源】 《圣济总录》卷一〇三。

【异名】 蕤仁汤（《普济方》卷七十四）、玄参汤（《普济方》卷八十四）、菊花散（《普济方》卷八十四）。

【组成】 蕤仁（去皮） 秦皮（去粗皮） 防风（去叉）各一两 甘菊花（择）半分 竹叶二握（切） 山栀子仁 蒌蕤各半两

【用法】 上锉，如麻豆大。以水五盏，煎至两盏半，去滓热淋，如冷，炖暖再洗。痛止即住。

【主治】 目热赤痛碜涩。

【宜忌】 煎药不得犯铁器。

10534 洗痔枳壳汤

【方源】 《外科正宗》卷八。

【组成】 枳壳二两 癞虾蟆草（一名荔枝草，四季常有，面青背白麻纹累累者是）二两

【用法】 河水三大碗，同上二味煎数滚，先熏后洗，良久再将汤煎热熏洗。甚者三次即消。

【主治】 痔疮肿痛，肛门下坠，无论新久。

10535 洗肝胆车前子散

【方源】 《圣济总录》卷一〇三。

【异名】 车前散（《圣济总录》卷一一〇）、车前子散（《普济方》卷七十三）。

【组成】 车前子二两 石决明（炒）一两半 蕤仁（去皮）一两半 龙胆半两 青葙子一两 地肤子半两 前胡（去芦头）三分 菊花 甘草（炙）各半两 栀子仁一两

【用法】 上为散。每服三钱匕，空心以粟米饮调下，食后、临卧再服。

【主治】 目昏赤痛，倒睫赤眼，疼痛不开。

10536 活血丹

【方源】 《理伤续断方》。

【组成】 荆芥二两半 枫香一两（别研） 檀香一两（不见火） 降真节一两 草乌二两（酒煮） 山桂（去粗皮） 当归（酒浸一时） 苍术（米汁浸，春五、夏三、秋七、冬十日；炒干） 川羌活（去芦） 白及（面裹煨，晒干） 乌豆（以糯米炒黄为度） 地龙（去土）各半两 滴青一钱半（别研） 麝香半两（别研） 川芎半两（热汤洗三次） 五灵脂一两半（用灯心别研） 乳香一两（别研） 没药一两（别研） 川乌（酒炮） 骨碎补（去毛，炒） 川牛膝（酒浸一时） 细辛（去苗） 花桑木（烧灰存性） 白芷（不蛀者） 赤芍药（酒浸） 川牵牛（石灰炒） 南星（以石灰炒黄色为度） 自然铜（煅，酒淬，别研） 大栗间各半两 木鳖二十个（去油壳）

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如弹子大。入臼杵三十余下，团成块，称一两，分作三丸，候丸尽，分作三分，一分阴干，一分晒干半时久，一分焙半时久，却三分打和一处，令阴阳相合，候药上塵气为度，然后刷去塵，用黑漆光为度。每服半丸，用无灰酒磨化，微煎三五沸，温服，不拘时候。

【主治】 跌仆伤损，折骨断筋，疼痛浮肿，腹有瘀血，灌注四肢，烦闷不安；痈疽发背，肌肉坏烂；诸般风疾，左瘫右痪，手足顽麻，妇人血气风发动。

【宜忌】 孕妇勿服。

10537 活血丹

【方源】 《得效》卷十八。

【异名】 活血丸（《普济方》卷三一〇）。

【组成】 干地黄（酒煮）二两 当归（煨） 白芍药 续断（盐水炒） 白术（煨） 川芎（醋炒）各一两

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【功用】 活血宽筋。

【主治】 血脉不和，筋急，行步不利。

10538 活虎丹

【方源】 《医学入门》卷七。

【组成】 蝎虎一个（剪去四足爪，连血研细）朱砂 片脑 麝香各少许（研细）

【用法】 先用古礞石散控下痰涎，次用薄荷煎汤调前药，作一服化下。

【功用】 补气血，安心神。

【主治】 久年惊痫，癫狂。

10539 活肾丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 苍术一两 黄柏 枸杞子 滑石各七钱 南星 半夏 山楂 白芷 神曲各五钱 昆布 吴萸各三钱

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】 木肾，不痛者。

【加减】 如热，加山栀；寒，加附子；气，加香附、玄胡索；血，加桃心；气块，加姜黄、莪术。

10540 活络丹

【方源】《局方》卷一（吴直阁增诸家名方）。

【异名】 小活络丹〔《全国中药成药处方集》（上海方）〕、追风活络丹〔《全国中药成药处方集》（哈尔滨方）〕、小活络丸（《中医大辞典·方剂分册》）。

【组成】 川乌（炮，去皮脐） 草乌（炮，去皮脐） 地龙（去土） 天南星（炮）各六两 乳香（研） 没药（研）各二两二钱

【用法】 上为细末，入研药和匀，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午冷酒送下；荆芥汤送下亦可。

【主治】 ①《局方》：丈夫元脏气虚，妇人脾血久冷，诸般风邪湿毒之气，留滞经络，流注脚手，筋脉挛拳，或发赤肿，行步艰辛，腰腿沉重，脚心吊痛，及上冲腹胁膨胀，胸膈痞闷，不思饮食，冲心闷乱，及一切痛风走注，浑身疼痛。②《丸散膏丹集成》：跌打损伤，瘀血停滞之疼痛。

【方论选录】 ①《济阳纲目》：胆南星之辛烈，所以燥湿痰；二乌辛热，所以散寒湿；蚯蚓湿土所生，用之者何？《易》曰：方以类聚，欲其引星、乌直达湿痰所聚之处，所谓同气相求也。亦《内经》佐以所利，和以所宜之意。风邪注于肢节，久久则血脉凝聚不行，故用乳香、没药以消瘀血。②《成方便读》：川乌、草乌，直达病所，通行经络，散风邪，逐寒湿；而胆星即随其所到之处，建祛风豁痰之功；乳、没之芳香通络，活血行瘀；蚯蚓之蠕动善穿，用为引导；用酒丸酒下，虽欲其缓，而仍欲其行也。

10541 活络丹

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 真木瓜（去心） 牛膝（去芦） 肉苁蓉 天麻 黄耆（蜜炙） 大当归（去芦）各二两（上药用好酒浸三日，取出焙干） 川附子（炮，去皮脐） 虎骨（炙黄） 川萆薢 毛狗脊 没药（别研） 一两 乳香（别研）半两

【用法】 上为细末，用酒打面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前煎木瓜汤或盐酒送下；或用小续命汤送下尤妙。

【主治】 风湿相搏，遂致筋脉拘挛，足胫疼痛，浑身倦怠。

10542 活络汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】 陈皮 半夏 白术 苍术 香附 南星 黄芩（酒炒） 麻黄 当归 威灵仙 荆芥 甘草 生姜

【用法】 水煎服。

【主治】 湿热痰邪流络，臂痛。

10543 活痰丸

【方源】《医方易简》卷二。

【组成】 半夏（制）二两 白芥子二两 干姜（炒黄）一两 猪苓二两 炙甘草五钱 陈皮四两（切碎，用盐三钱入水中浸一宿，晒干）

【用法】 上为末。水浸蒸饼为丸，如绿豆大。开水送下。

【主治】 痰饮水气，停蓄胸胁，吞酸呕逆者。

10544 活血化坚汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 防风 赤芍 归尾 天花粉 金银花 贝母 川芎 皂角刺 桔梗各一钱 僵蚕 厚朴 五灵脂 陈皮 甘草 乳香 白芷梢各五分

【用法】 水二钟，煎八分，临服用酒一小杯，食后服。

【主治】 一切瘰疬、瘿瘤、痰核，初起未溃脓者。

10545 活血化痰汤

【方源】《回春》卷六。

【组成】 当归 川芎 白芍 生地黄 陈皮 半夏（姜炒） 白茯苓（去皮） 甘草各等分

【用法】 上锉一剂，加生姜三片，水煎服。

【功用】 活血化痰、调经。

【主治】 经水过期而来，色淡，痰多者。

10546 活血行经汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】 大附子 官桂各一钱五分 厚朴 香附

桃仁 红花 山楂 当归各二钱

【用法】 加生姜五片，水煎服。

【主治】 因坐冷水而得寒气，以致经闭。

10547 活血住痛散

【方源】《救伤秘旨》。

【组成】 白芷 山甲 小茴 甘草各三钱 当归 川芎各二钱 独活 羌活各一钱五分 木瓜 肉桂 淮乌各一钱 草乌 麝香各三分

【用法】 上为细末。作一次，姜、酒调服。

【功用】 活血行气，止痛。

【主治】 跌打损伤，骨折疼痛。

10548 活血应痛丸

【方源】《局方》卷一（绍兴续添方）。

【异名】 活血定痛丸(《奇效良方》卷三十九)。

【组成】 狗脊（去皮）四斤 苍术（米泔浸一宿，去皮）六斤 香附子（去毛，炒）七斤半 陈皮（洗，去蒂）五斤半 没药（别研）十二两 威灵仙（洗）二斤 草乌头一斤半（半炮）

【用法】 上为细末，用酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五粒至二十粒，温酒或熟水任下，不拘时候。

【功用】 活血脉，壮筋骨，宣流气脉。

【主治】 风湿客子肾经，血脉凝滞，腰腿重疼，不能转侧，皮肤不仁，遍身麻木；上攻头面虚肿，耳内常鸣；下注脚膝，重痛少力，行履艰难；项背拘挛，不得舒畅。

【宜忌】 久服忌桃、李、雀、鸽、诸血物。

10549 活血补气汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】 当归八钱 川芎三钱 白芍四钱 黄耆五钱 防风三钱 白芷三钱 二花四钱 寸冬三钱 酒黄芩三钱 菊花三钱 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 活血补气。

【主治】 产后病目症（继发性点状角膜炎）。两眼微红，头晕羞明，风轮之上星翳四起，视物昏蒙。

【临证举例】 产后病目症 濮阳李某某，女二十九岁。产后忽觉头晕目赤，酸涩羞明，视物不清。按其脉，六脉细数；视其目，二目微红。此乃虚火上攻头目，以致头晕目赤，视物昏花。先将攒竹、瞳子髎刺之，再服活血补气汤，三四剂即可。

10550 活血和气饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷三上。

【组成】 川芎三钱 青皮二钱 炙草 白芍 滑石各一钱 丹皮五分 桃仁七粒（去皮尖，研）

【用法】 水煎服。

【主治】 跌扑，瘀血在内。

10551 活血养肝汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】 知母肉三钱 当归四钱 川芎二钱 玉竹三钱 胡黄连三钱 寸冬三钱 夏枯草三钱 菊花二钱 香附三钱 木贼二钱 石斛三钱 甘草一钱 田三七五分（另为末，冲服）

【用法】 水煎服。

【功用】 活血养肝。

【主治】 花翳白陷症。两眼微红，风轮塌陷，白膜叠生，状如雪花，痠疼隐涩，热泪常流。

【临证举例】 花翳白陷症 王廷宾之女，19岁。初患月经不调，行经腹疼，经后忽觉二目微疼，视物昏蒙，隔日头疼，热泪下流，白膜隐隐，遂往张先生处调治。每日挑拨点药，终未服药，月余头疼虽止，昏蒙加倍，饮食减少，辞医返里，就诊于余。视其目，睛光低落，白膜深沉，六脉虚脱，惟太阴为甚，此乃脾蕴湿热，肝血亏乏。余先略刺巨髎、上星，内服活血养肝汤，外点消炉散。月余白膜微退，自顾有余。又改服养荣平肝汤，再轮刺攒竹、鱼腰、临泣，半年始愈。

10552 活血祛风汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 归尾9克 赤芍9克 桃仁9克 红花9克 荆芥9克 蝉衣6克 白蒺藜9克 甘草6克

【功用】 活血祛瘀，和营消风。

【主治】 慢性荨麻疹，皮肤瘙痒。

10553 活血祛瘀汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 丹参30克 当归9克 赤芍9克 鸡血藤15克 桃仁6克 玄胡9克 郁金9克 三七3克（研） 香附9克 枳壳6克 广木香6克 甘草3克

【功用】 活血，化瘀，止疼。

【主治】 慢性肝炎（血瘀型），肝区刺痛，痛处不移，舌质紫，脉细涩。

10554 活血除风汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 当归四钱 川芎二钱 赤芍三钱 生地三钱 寸冬三钱 茺蔚子五钱 羌活三钱 银花三钱 木贼二钱 僵蚕二钱（炒） 胡黄连三钱 枳椇子三钱 甘草一钱 薄荷二钱

【用法】 水煎服。

【功用】 活血除风。

【主治】 垂帘障症。从风轮上边生出白膜一块，下侵瞳神，大小眦略赤，不瘙疼流泪，只觉昏涩羞明。

【临证举例】 垂帘障症 泰安梅冬景，18岁。嗜于烟酒，伤及脑髓，以致白膜下垂，而瞳神微露下边。先经某医院治疗，月余稍轻。后又就诊于余，按其脉，六浮滑，惟太阴弦长，是知肝血不足，而肺气有余所致也。先轮流刺上星、强间，攒竹，内服活血除风汤，三月余始轻。以后目有赤丝不退，再用化针散常常洗之，年余始愈。

10555 活血破瘀汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】 黑玄参五钱 丹皮三钱 枯草三钱 香附三钱 当归四钱 川芎三钱 胡黄连三钱 蒺藜三钱（炒） 白芍三钱 谷精草二钱 木贼三钱 甘草一钱 田三七五分（为末）

【用法】 水煎服。

【功用】 活血破瘀。

【主治】 聚星障症（星状角膜炎）。风轮生出白点，如秤星状，两眼赤涩羞明。

【临证举例】 聚星障症 本县张某某，女，三十五岁，素患此症。初期如米，一点二点，甚至四五点，昏酸流泪，怕日羞明，治遍遐迩，百方罔效，自料难愈。迨其后，百病皆出，形容憔悴，饮食减少，变症即生。余赴濮路经其庄，邀余诊治。视其目，满目如星；按其脉，六脉沉数，惟关尺为甚。此乃肾水积热，肝木失养，而无根虚火，上冲于目，以致满目白膜如星，昏涩酸疼，怕日羞明等症状。先将头维、目窗、承泣略刺，再服活血破瘀汤，连服七剂，视其目，白膜已散，睛光已露。

10556 活血逐瘀汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 丹参五钱至一两 乌药二至四钱 白僵蚕二至四钱 三棱三至五钱 莪术三至五钱 白芥子三至五钱 厚朴二至四钱 橘红三至五钱 土贝母三至五钱 沉香五分至一钱

【功用】 活血逐瘀，软坚内消。

【主治】 腹部包块（癥瘕），乳房纤维瘤（乳气疽），体表小肿物或寒性脓肿，关节肿胀（鹤膝风）等。

10557 活血润燥丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 活血润肠丸（《丹溪心法》卷二）。

【组成】 当归梢一钱 防风二钱 大黄（湿纸裹煨） 羌活各一两 皂角仁（烧存性，去皮） 一两五钱 桃仁二两（研如泥） 麻仁二两五钱（研如泥）

【用法】 上除麻仁、桃仁另研如泥外，为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，以瓷器盛之，纸封无令见风。每服五十丸，白汤送下三两，服后须以苏麻子粥，每日早晚食之。大便日久不能结燥也。

【功用】 活血疏风，润燥通便。

【主治】 大便风秘，血秘，常常燥结。

【方证选录】《医方集解》：此手足阳阴药也。归尾、桃仁润燥活血，羌活搜风散邪，大黄破结通幽，麻仁滑肠利窍，血和风疏，肠胃得润则自然通利矣；皂角得湿则滑，湿滑则燥结自除。

【备考】 本方方名，《东医宝鉴·内景篇》引作"疏风润肠丸"。

10558 活血益气汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 黄耆八钱 党参五钱 当归四钱 川芎二钱 白芍三钱 白术三钱（炒） 柴胡二钱 枸杞三钱 荆子三钱 升麻三钱 荆皮一钱半 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 皮急紧小症（睑裂变小）之初期。两眼微红，不疼不痒，抽涩昏瘦而无强视力。

【临证举例】 皮急紧小症 余乡马某某，女，20岁。劳动忘餐，时常两目搐昏，初觉两小眦赤烂，有时不治而愈，以后眼渐渐皮急紧小。按其脉，厥阴沉细，太阴虚弱，是知肝血不足，脾胃不健，脂肪缺乏，以致两目干涩紧小，视扬昏蒙。即将强间、三阳络、少泽略刺，内服活血益气汤，十余剂而大轻。待脾健气盛，再服活血除风汤三剂，紧小之弊徐徐而愈。

10559 活血散瘀汤

【方源】《外科正宗》卷八。

【组成】 川芎 归尾 赤芍 苏木 牡丹皮 枳壳 瓜蒌仁（去壳） 桃仁（去皮尖）各一钱 槟榔六分 大黄（酒炒）二钱

【用法】 水二茶钟，煎八分，空心服，滓再煎服。

【功用】 活血散瘀，破气消积，润肠通便。

【主治】 ①《外科正宗》：肠痈；产后恶露不尽，或经后瘀血作痛；或暴急奔走，或男子杖后，瘀血流注肠胃作痛，渐成内疽，腹痛，大便燥者。

②《金鉴》：委中毒，木硬肿痛微红，屈曲艰难。

10560 活血散瘀汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】苏木三至五钱 赤白芍三至五钱 草红花三至五钱 桃仁三至五钱 鬼箭羽五钱至一两 三棱三至五钱 莪术三至五钱 木香一至三钱 陈皮三至五钱

【功用】活血散瘀定痛。

【主治】浅层静脉炎，皮下瘀血（隔血症），及跌扑损伤，瘀血胀痛。

10561 活血解毒汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】葶苈子五钱（炒） 黄芩三钱 大黄四钱 黄柏三钱 灵脂三钱 当归四钱 地骨皮三钱 赤芍三钱 银花六钱 石膏八钱 防风二钱 大贝四钱 龙胆草三钱 白芷二钱 牛膝三钱 甘草一钱

【功用】活血解毒。

【主治】肿胀如杯症（炎性睑肿）；两眼目珠赤疼，羞明胞痒，肿胀坚硬，热泪如汤，气轮起红泡，刺之血少；又治旋螺突出症：风轮高胀，偏突而起，形如旋螺，疼痛不止，热泪常流，赤丝横绕，眉骨微疼，此乃肝木独旺，胆液壅塞，火乘风起，上冲于脑。

【临证举例】旋螺突出 阳谷县康某某，男四十岁。秉性暴躁，素日嗜酒，半夜忽觉头疼目胀，忍疼待旦，急来就诊。按其脉，六脉弦数，惟厥阴为甚；观其目，风轮高起。此乃五脏积热，肝火旺盛，上攻于头目，以致左目旋螺突出，疼痛不已，热泪常流。先刺内迎香出血，继又将后溪、目窗略刺；授以活血解毒汤，加田三七五分煎服之，隔日疼止，连服七剂，红退而旋螺亦缩小大半。后又改用疏肝解肌汤常服，以消炎散常洗罨，月余能分五指，以后间服黄连上清丸，年余高胀虽退，但瘢痕终身未免。

10562 活肠败毒丹

【方源】《疡医大全》卷二十一。

【组成】当归 金银花各二两 生甘草三钱 地榆 牛膝各一两

【用法】水煎取汁一碗，调乳香、没药末各一钱五分，饮之；滓再煎一碗，又调乳香、没药末各一钱五分，饮之。

【功用】败毒溃脓。

【主治】肠痈已成。

【备考】本方方名，《中国医学大辞典》引作"活肠散毒丹"。

10563 活络祛寒汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆五钱 当归四钱 丹参四钱 桂枝尖二钱 生杭芍三钱 生明乳香四钱 生明没药四钱 生姜二钱

【功用】活络祛寒。

【主治】经络受寒，四肢发搐。

10564 活络效灵丹

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】当归五钱 丹参五钱 生明乳香五钱 生明没药五钱

【用法】水煎服。若作散，一剂分作四次服，温酒送下。

【功用】《方剂学》：活血祛瘀，通络止痛。

【主治】气血凝滞，痃癖癥瘕，心腹疼痛，腿疼臂疼，内外疮疡，脏腑积聚，经络湮瘀。现常用于冠心病、宫外孕、脑血栓形成、急性阑尾炎、坐骨神经痛、脑震荡后遗症等有血瘀气滞者。

【加减】腿疼，加牛膝；臂疼，加连翘；妇女瘀血腹疼，加生桃仁（带皮尖，作散服炒用）、生五灵脂；疮红肿属阳者，加金银花、知母、连翘；疮白硬属阴者，加肉桂、鹿角胶；疮破后生肌不速者，加生黄耆、知母、甘草；脏腑内痛，加三七（研细冲服）、牛蒡子。

【方论选录】《方剂学》：本方所治诸证皆由瘀血凝滞所致，故宜祛瘀止痛为主。方中当归活血养血；丹参助当归以加强活血祛瘀之力；乳香、没药活血祛瘀，行气止痛。诸药合用，使瘀去络通，则疼痛自止。本方祛瘀止痛之力颇强，为治疗血瘀所致心腹诸痛，癥瘕积聚，以及跌打损伤，瘀血肿痛之有效方剂。

【临证举例】①癥瘕 《衷中参西》：一人年三十许，当脐忽结癥瘕，自下渐长而上，其初长时稍软，数日后即硬如石，旬日长至心口。自言凌晨冒寒，得于途间，时心中有惊恐忧虑，遂觉其气结而不散，此病因甚奇，然不外气血凝滞。为制此方，于流通气血之中，大具融化气血之力，连服十剂全消。②疮疡 《衷中参西》：一少妇，左胁起一疮，其形长约五寸，上半在乳，下半在胁，皮色不变，按之甚硬，而微热于他处。延医询方，调治两月不效，且渐大于从前。后愚诊视，阅其所服诸方，有遵林屋山人治白疽方治者，有按乳痈治者。愚晓病家曰：此证硬而色白者，阴也。按之微热者，阴中有阳也。统观所服诸方，有治纯阴阳之方，无治半

阴半阳之方，勿怪其历试皆不效也。用活络效灵丹，俾作汤服之，数剂见轻，三十剂后，消无芥蒂。③冠心病、心绞痛 《江苏中医杂志》（1983；3:38）：仇某某，男，54岁。心前区疼痛阵作年余，剧时胸闷如窒，并向左臂部放射，每日三至四次，发时面色㿠白，心悸气短，怯冷，苔白质淡，有紫气；脉沉涩。心电图示：冠状T波。此心阳不振、血瘀凝滞之候也。治拟温振心阳，活血化瘀。迳用参附汤合活络效灵丹损益：炒党参12克，紫丹参12克，制附片9克，制黄精12克，全当归10克，杭川芎9克，生明乳香6克，生明没药6克，降香5克。服上方三帖后，痛减未已，续服十五帖后，胸次觉畅，余症亦见好转。原方出入持续治疗四月，心绞痛仅偶有发作，心电图亦趋好转。④宫外孕 《黑龙江中医药》（1986；3:24）：赵某某，女，24岁。患者停经二个月，一周来阴道不规律出血，伴下腹疼痛，妇科检查为宫外孕而收住院。查：阴道出血量多，挟有血块，下腹痛甚拒按，脉弦滑。治以活血化瘀，用活络效灵丹加味：当归20克，丹参20克，乳香15克，没药15克，杜仲炭10克，蒲黄炭15克，五灵脂15克，水煎服。三剂后血止，腹痛大减。九剂后腹痛消失，能下床活动。出院后随访情况良好。⑤中风（脑血栓形成）《黑龙江中医药》（1986；3:24）：王某某，女，56岁。患者于家中劳动时突然不能言语，随之右侧半身不遂，而色赤红，精神萎顿，言语不清，舌质红而干，脉弦。诊为中风，系由气虚挟痰火，复受风邪所致瘀血凝滞，经络阻塞。治以补虚化痰，清火疏风活络法，用活络效灵丹与化痰汤合剂加地龙、黄耆、桂枝、牛膝、红花、鸡血藤，服用月余，基本痊愈，随访三年情况良好，并能从事家务劳动。⑥肠痈（化脓性阑尾炎）《云南中医杂志》（1983；2:21）：赵某，女，47岁。患者右下腹疼痛，伴恶心，身微热。口干不欲饮，纳差，大便微结，舌质红而挟滞，苔薄黄，脉沉数。血常规化验：白血球12000/mm^3，中性80%，西医诊为化脓性阑尾炎，中医诊为肠痈（气滞血瘀，热毒聚结），予活络效灵丹加三七15克（研末冲服），丹皮10克，赤芍12克，枳壳10克，大黄9克，牛蒡子10克，桃仁10克，银花30克。二剂痛减，再进五剂，诸症皆除，随访未再发。

10565 活络通经丸

【方源】《三因》卷二。

【组成】 川乌头二两（一两生，不去皮尖；一两炮，去皮尖） 草乌二两（制如上法） 木鳖子三两三分（别研） 斑蝥一百个（去头足并翅，醋煮香熟，焙干） 乌蛇（酒浸，去皮骨，焙） 白花蛇（酒浸，去皮骨，焙） 好墨（火煅） 白胶香各一两（别研） 当归一两半 五灵脂三两三分

【用法】 上为末，将木鳖子末醋研为膏，和黑豆末一斤，好醋拌，一两作十丸，以墨为衣。每服一丸，空心、食前温酒盐汤嚼下。

【功用】 活络通经，宣导凝滞，壮筋骨，助血脉，起偏废。

【主治】 半身不遂，口眼㖞斜，瘫痪诸风。

10566 活血润燥生津汤

【方源】《医方集解》引丹溪方。

【异名】 生津汤（《医级》卷九）、活血润燥生津饮（《杂症会心录》卷上）。

【组成】 当归 白芍 熟地黄一钱 天冬 麦冬 栝楼八分 桃仁（研） 红花五分

【功用】 滋阴生津，活血润燥。

【主治】 内燥，津液枯少。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴、足厥阴药也。归、芍、地黄滋阴可以生血，栝楼、二冬润燥兼能生津，桃仁、红花活血又可润燥，分用各有专能，合用更互相济。

10567 济川煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 当归三五钱 牛膝二钱 肉苁蓉（酒洗去咸）二三钱 泽泻一钱半 升麻五七分或一钱 枳壳一钱（虚甚者不必用）

【用法】 水一钟半，煎七八分，食前服。

【功用】《方剂学》：温肾益精，润肠通便。

【主治】 虚损，大便秘结不通。

【加减】 气虚者，但加人参无碍；如有火，加黄芩；如肾虚，加熟地；虚甚者，枳壳不必用。

【方论选录】《方剂学》：方中用肉苁蓉温肾益精，暖腰润肠，是为君药；当归养血和血，润肠通便，牛膝补肾强肾，性善下行，共为臣药；枳壳下气宽肠而助通便，泽泻渗利小便而泄肾浊，共为佐药；尤妙在稍加升麻以升清阳，清阳升则浊阴自降，配合诸药，以加强通便之效，为使药。总之，本方在温补之中，寓有通便之功，故名“济川煎”。济，相助也，益也；川，此处指肾和后窍。顾名思义，便可知本方旨在温肾益精，以润肠通便，故对年老肾虚而大便秘结者，颇为适用。

10568 济阴丹

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】 熟地五两 人参一两半 当归三两 川

芎一两　肉桂一两半（去皮）　干姜一两（炒）　秦艽二两　木香一两　糯米一合（炒）

【用法】　上为末，炼蜜为丸。每服三钱，温酒送下。

【主治】　久不孕，脉软弦涩者

【方论选录】　气血两亏，寒凝经脉，不能输泄而天癸来迟，久不孕育焉。熟地补血以滋血海，人参扶元以通血脉，当归养血荣经，川芎活血行气，肉桂温经暖血，干姜暖胃散寒，秦艽活血脉以通经，木香调胃气以化气，糯米实七膏以滋营经脉也。炼蜜丸之，温酒下之，使寒滞消散，则血气充盈而经脉调和，天癸无来迟之患，即久不孕者，尚可图效耳。

10569　济阴汤

【方源】　《衷中参西》卷上。

【组成】　怀熟地一两　生龟版五钱（捣碎）　生杭芍五钱　地肤子一钱

【用法】　水煎服。

【主治】　阴分虚损，血亏不能濡润，小便不利。

【方论选录】　以熟地为君；辅以龟版，以助熟地之润；芍药善利小便，以行熟地之滞；少加地肤子为向导药。

10570　济腰汤

【方源】　《观聚方要补》卷四引《医学集要》。

【组成】　破故纸　小茴　玄胡索　牛膝　当归　杜仲　黄柏　知母

【用法】　加生姜，水煎服。

【主治】　一切腰痛不可忍者。

10571　津调散

【方源】　《三因》卷十五。

【组成】　黄连　款冬花各等分

【用法】　上为末。以地骨皮、蛇床子煎汤洗，用软帛挹干，以津调药敷之。

【主治】　妬精疮，脓汁淋漓，臭烂者。

【宜忌】　忌用生汤洗之。

【备考】　《普济方》有麝香少许。

10572　将军蛋

【方源】　《种福堂方》卷二。

【组成】　生大黄三分　生鸡子一个

【用法】　将鸡子顶尖上敲损一孔，入大黄末在内，纸糊煮熟。空心食之。

【主治】　赤白浊；梦遗。

10573　将军散

【方源】　《古今医鉴》卷十三。

【组成】　川大黄（酒浸，蒸）五钱　荞麦面（炒黄）三钱　阿魏一钱

【用法】　上为细末。每服三分，烧酒调服。

【主治】　癖疾。

10574　前胡汤

【方源】　《外台》卷三引《广济方》。

【组成】　前胡　升麻各八分　贝母　紫菀各六分　石膏十二分（碎，绵裹）　麦门冬八分（去心）　杏仁三十枚（去皮尖双仁）　竹叶（切）一升　甘草二分（炙）

【用法】　上切。以水八升，煮取二升五合，绞去滓，分温三服，相去如人行六七里进一服。不吐利愈。

【主治】　天行壮热咳嗽，头痛心闷。

【宜忌】　忌海藻、菘菜、油腻、猪、鱼等。

【加减】　《圣惠》加地骨皮一两，名"前胡散"。

10575　前胡汤

【方源】　《圣济总录》卷一〇六。

【组成】　前胡（去芦头）　赤芍药　青葙子各一两半　山栀子仁　细辛（去苗叶）　车前子各一两　淡竹叶五片（洗）　朴消一钱匕（汤成下）　柴胡（去苗）一两半　甘草（微炙，锉）二分

【用法】　上药除消、竹叶外，为粗末。每服四钱匕，水一盏半，入竹叶，煎至八分，去滓入消，放温，食后、临卧服。

【主治】　目暴肿生翳。

10576　前胡汤

【方源】　《圣济总录》卷一一六。

【组成】　前胡（去芦头）　木通（锉）　石膏各二两　黄芩（去黑心）　甘草（炙，锉）各一两半　大黄（锉，炒）一两

【用法】　上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入葱白一寸，豉二十粒，生姜一枣大（切），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】　鼻渊。脑热，鼻塞多涕。

10577　前胡汤

【方源】　《圣济总录》卷一五六。

【组成】　前胡（去芦头，锉）一两　半夏二两（以生姜自然汁一升半，浆水一升，同于银器内慢火煮，令水与姜汁尽，薄切，焙干）　人参　木香各一两（锉）　厚朴（涂生姜汁炙令香熟，细锉）　枳壳（去瓤，麸炒）　旋覆花　陈橘皮（汤浸，去白，焙干）　桔梗（炒）各半两　赤茯苓（去黑皮，锉）　白术各一两　甘草三分（炙微令黄，锉）

【用法】　上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妊娠痰饮留滞，不思饮食。

10578 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】 前胡（去芦头） 细辛（去苗叶） 芎藭 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙） 杏仁（去皮尖双仁，炒黄色） 枳壳（去瓤，麸炒） 防风（去叉） 泽泻 芍药各三两 茯神（去木）四两 白术 旋覆花各二两 甘草（擘破，炙） 干姜（炮裂）各二两半 半夏三两（水煮三五十沸，薄切放干，入生姜汁拌，炒黄色）

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入葱白一寸，同煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 妊娠伤寒，头痛恶寒，浑身壮热。

10579 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】 前胡（去芦头） 升麻 麻黄（先煮，掠去沫，焙） 人参 羚羊角（镑） 白术各一两 陈橘皮（去白，炒）三分 甘草（炙）一分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入葱白一寸，生姜三片，煎至七分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 妊娠伤寒，憎寒发热，头痛身疼。

10580 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】 前胡（去芦头） 白术 人参 石膏（碎） 黄芩（去黑心）各二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入葱白一寸，同煎至六分，去滓，空心、食前温服。

【主治】 妊娠伤寒，头疼壮热。

10581 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】 前胡（去芦头） 黄芩（去黑心） 石膏（碎） 阿胶（炙燥）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妊娠伤寒，头痛壮热。

10582 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】 前胡（去芦头） 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙） 柴胡（去苗） 人参 桔梗 芎藭 细辛（去苗叶） 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙）各一两 半夏半两（洗七遍去滑，姜汁炒）

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入生姜一枣大（切），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后伤寒，发热，头疼体痛，咳嗽痰壅。

10583 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】 前胡（去芦头） 半夏（为末，生姜汁制作饼，焙） 白术 人参 甘草（炙，锉） 桔梗（炒）各一两 诃黎勒（炮，去核）半两 麦门冬（去心，焙）三分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，生姜三片，大枣一枚（擘），同煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】 产后肺气不足，短气虚乏。

10584 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】 前胡（去芦头） 升麻 桂（去粗皮） 紫菀（去苗土） 白茯苓（去黑皮） 五味子 麦门冬（去心，炒） 杏仁（去皮尖双仁，炒）各一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后肺寒咳嗽。

10585 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】 前胡（去芦头） 龙胆 甘草（炙，锉） 人参 麦门冬（去心，焙）各一两

【用法】 上为粗末。每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓，食后温服。

【主治】 小儿变蒸，热气乘心，烦躁，啼叫不已，及骨蒸烦热。

10586 前胡汤

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生》。

【组成】 前胡（去芦） 半夏（汤泡七次） 杏仁（去皮尖，麸炒） 紫苏子（炒） 枳实（去瓤，麸炒） 橘皮（去白） 桑白皮（炙） 甘草（炙）各等分

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《医方类聚》引《济生》：气实极，胸膈不利，咳逆短气，呕吐不下食。②《杏苑》：嘈杂，湿痰气滞，不喜饮食。

10587 前胡汤

【方源】《普济方》卷七十二。

【组成】 防风（去叉） 决明子（微炒） 青葙子 黄连（去须） 木通 茯神（去木） 玄参 升麻 地骨皮各一两 羚羊角 前胡（去芦）一两半

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一盏半，煎至

七分，食后温服，临卧时再服。

【主治】 五脏气虚，风热乘之，毒气上攻，眼目赤痛。

10588 前胡汤

【方源】《奇效良方》卷六十三。

【组成】 前胡 白术各一钱半 黄芩二钱（炒） 栀子仁 知母 木香各二钱

【用法】 上作一服。水二钟，加竹茹一块，葱白三寸，煎一钟，不拘时候服。

【主治】 妊娠伤寒，头疼壮热，肢节烦疼。

10589 前胡汤

【方源】《四明心法》卷下。

【组成】 前胡 柴胡 紫苏 桔梗 陈皮 半夏 白芷 甘草

【用法】 生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】 十二月伤寒，或从畏寒而起者，此即感也，属表症。

【加减】 有食，加枳实。

10590 前胡汤

【方源】《引经证医》卷四。

【组成】 前胡 黄芩 栀子 茯苓 蝉衣 薄荷 甘草 通草

【主治】 身热恶寒，鼻塞脉数，面赤口干，不思纳谷，舌苔黄燥者。

10591 前胡饮

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】 前胡（去芦头） 桔梗（炒，锉） 旋覆花（炒） 玄参 人参 桂（去粗皮） 生干地黄（焙） 甘草（炙，锉）各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两半 半夏（汤洗去滑，焙）二两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一分（切），同煎取八分，去滓，食后顿服。

【主治】 肺脏感寒，痰嗽不止，心膈烦满，饮食不得，常多呕逆。

10592 前胡饮

【方源】《圣济总录》卷五十。

【异名】 前胡汤（《普济方》卷二十八）。

【组成】 前胡（去芦头）一两半 贝母（去心） 白前各一两 麦门冬（去心，焙）一两半 枳壳（去瓤，麸炒）一两 芍药（赤者） 麻黄（去根节）各一两半 大黄（蒸）一两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏，煎取七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】 肺热，咳嗽痰壅，气喘不安。

10593 前胡饮

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】 前胡（去芦头） 赤茯苓（去黑皮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 人参 半夏（汤洗七遍，去滑） 枇杷叶（炙，去毛） 旋覆花等分

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，入生姜七片，煎取七分，去滓，食后良久温服。

【主治】 痰饮呕逆，头目不利。

10594 前胡饮

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【异名】 前胡汤（原书卷八十三）。

【组成】 前胡（去芦头） 生姜（切，焙） 羚羊角（镑） 半夏（汤洗七遍） 大黄（锉，炒） 赤茯苓（去黑皮）各半两 枳壳（去瓤，麸炒）三分

【用法】 上细锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，下朴消一钱匕，搅匀，空腹温服。

【主治】 脚气攻心，腹胀满，呕吐不下食。

10595 前胡饮

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】 前胡（去芦头） 人参 白茯苓（去黑皮） 桂（去粗皮） 柴胡（去苗） 桔梗（炒） 生干地黄（焙） 黄芩（去黑心） 玄参 旋覆花 甘草（炙，锉）各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉）二两 麦门冬（去心，焙） 半夏（汤洗七遍，焙） 白术各一两半

【用法】 上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，入生姜七片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 暴急成劳，痰盛喘嗽。

10596 前胡饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】 前胡（去芦头） 细辛（去苗叶） 白茯苓（去黑皮） 甘草（炙） 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙烟出七遍）各半两

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加生姜一分（切），同煎至六分，去滓温服，不拘时候，一日二次。

【主治】 妊娠恶阻，食即吐逆，头痛颠倒，寒热。

10597 前胡散

【方源】 方出《千金》卷十六，名见《普济方》卷三〇六。

【组成】 前胡 芎藭 甘草 当归 石膏 人参 桂心 橘皮各二两 芍药三两 半夏四两 生姜五两 大枣三十枚 （一方无黄芩）

【用法】 上㕮咀。以水一斗三升，下黄芩三两，合煮取三升，分三服。

【主治】 呕吐，四肢痹冷，上气腹热，三焦不调。

【方论选录】《千金方衍义》：此以三焦真火式微，不能温养中土而致呕吐。用芩、姜、半、归、芍、参、甘下气温中诸味，但取石膏以治标热，桂心以代附子，川芎以佐归、芍，橘皮以佐姜、半，大枣以佐参、甘；以无坚满，故无取于消、黄；以无消渴，故无取于麦冬、栝楼、滑石。

10598 前胡散

【方源】《普济方》卷二十八引《千金》。

【组成】 前胡二两（去芦头） 半夏一两（汤洗七次，去滑） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 赤芍药二两 麻黄一两（去根节） 人参一两（去芦头） 赤茯苓一两 陈皮一两（洗，浸去白瓤） 白术一两 厚朴一两（去粗皮，生姜汁制） 甘草三两（炙微赤，锉）

【用法】 上为末。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候服。

【主治】 肺急，胸膈不利，咳逆头痛，呕吐不下食。

10599 前胡散

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】 前胡饮（《圣济总录》卷四十四）。

【组成】 前胡一两（去芦头） 大腹皮三分（锉） 赤芍药半两 赤茯苓半两 桔梗半两（去芦头） 羚羊角屑半两 旋覆花半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脾气实，四肢不利，头重目疼，腹胁胀闷，心膈壅滞，少思饮食。

10600 前胡散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 前胡一两（去芦头） 半夏半两（汤浸七遍去滑） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 旋覆花半两 赤茯苓一两 甘草半两（炙微赤，锉） 大腹皮一两（锉） 桔梗一两（去芦头） 麦门冬一两（去心）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脾脏气壅，气滞多涎，胸膈满闷，不下饮食。

【宜忌】 忌生冷、油腻、湿面、饴糖。

10601 前胡散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】 前胡一两（去芦头） 桔梗半两（去芦头） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 白术三分 人参三分（去芦头） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 桂心一两 甘草半两（炙微赤，锉） 陈橘皮一两（汤浸去白瓤，焙） 细辛半两 枇杷叶半两（拭毛，炙微黄） 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 肺脏因伤风冷，痰嗽不止，心膈烦满，或时呕逆，鼻中多涕。

10602 前胡散

【方源】《圣惠》卷六。

【异名】 前胡汤（《普济方》卷二十八）。

【组成】 前胡（去芦头） 紫菀（洗去泥土） 诃黎勒皮 枳实（麸炒微黄）各一两

【用法】 上为细散。每服一钱，以温水送服，不拘时候。

【主治】 肺喘，痰毒壅滞，心膈昏闷。

10603 前胡散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 前胡一两（去芦头） 大腹皮三分（锉） 半夏一两（汤洗七遍去滑） 杏仁一两（汤浸） 陈橘皮三分（汤浸去白瓤，焙） 白术一两 泽泻一两 赤茯苓一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 肾脏虚损，脾气乏弱，津液不荣，上焦生热，多唾稠粘，胸膈壅滞，不欲饮食。

10604 前胡散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】 前胡一两（去芦头） 人参一两（去芦头） 细辛半两 陈橘皮一两（汤浸去白瓤，焙） 桂心一两 赤茯苓一两 附子二两（炮裂，去皮脐） 诃黎勒一两半（用皮） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒，初觉头痛，膈上痰壅。

10605 前胡散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】前胡半两（去芦头） 半夏一分（汤洗七遍去滑） 甘草半两（炙微赤，锉） 桂心半两 人参半两（去芦头） 赤茯苓半两 白芷一分 白术半两 干姜一分（炮裂，锉） 当归半两（锉，微炒） 葛根半两（锉） 柴胡半两（去苗） 陈橘皮半两（汤浸去白瓤，焙） 木香半两 旋覆花半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒四日，虽经发汗后，心胸不利，头目多疼，胃气不和，少思粥食。

10606 前胡散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】前胡一两（去芦头） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川大黄一两（锉碎，微炒） 黄芩一两 川朴消一两 槟榔一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入竹叶三七片，煎至六分，去滓温服。不拘时候，取利为度，不利再服。

【主治】伤寒五日，心腹壅滞，烦热不退。

10607 前胡散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】前胡三分（去芦头） 桔梗三分（去芦头） 槟榔半两 桂心半两 诃黎勒皮一两 木香半两 当归半两（锉，微炒） 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，稍热频服，不拘时候。

【主治】阴毒伤寒，四肢厥逆，头痛心躁，胸中结实，两胁妨闷。

10608 前胡散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【异名】前胡汤（《不知医必要》卷一）。

【组成】前胡一两（去芦头） 麦门冬一两半（去心） 贝母一两（煨微黄） 桑根白皮一两（锉） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，涕唾稠粘，心胸不利，时有烦热。

10609 前胡散

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【异名】柴胡梅连散（《玉机微义》卷九引《瑞竹堂方》）、柴前梅连散（《玉机微义》引《瑞竹堂方》，见《医方类聚》卷六十三）、八煎散（《医方类聚》卷二十五引《医林方》）、柴胡梅连汤（《傅青主女科·产后编》卷下）、清骨散（《胎产心法》卷下）。

【组成】柴胡（去苗） 前胡（去芦头） 胡黄连 乌梅肉各等分

【用法】上㕮咀。每服五钱，水酒、童便共一盏半，猪胆一枚取汁，猪脊髓一条，葱、薤白各三寸，同煎至八分，去滓，食前冷服。

【主治】童男、室女骨蒸潮热，及热在肌肉，吐血等疾。

10610 前列腺汤

【方源】《中医外科学》。

【组成】丹参 泽兰 赤芍 桃仁 红花 乳香 没药 王不留行 青皮 川楝子 小茴香 白芷 败酱草 蒲公英

【用法】水煎服。

【功用】活血化瘀，行气导滞。

【主治】慢性前列腺炎，有瘀滞见症者。

10611 前蕊开翳散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】白蒺藜（炒，捣去刺） 苍术（洗，童便换浸二宿，晒）各一两 蝉壳（洗，晒） 蛇蜕（去头尾及脊上一线皮，不堪用，用皂角水洗，新瓦焙） 菜花蛇皮 好川芎 杏仁（水浸，去皮） 防风 羌活 白芷各半两 华阴细辛 独活各四钱 白附子（生） 明烂石膏 荆芥穗 真蚌粉各三钱

【用法】上为细末。每服一钱，沸汤点，茶清调，以舌浸于药中良久，毒涎自出；又别换药，食后临卧服。

【主治】眼生翳障。

10612 前蕊点翳膏

【方源】《直指》卷二十。

【组成】朱砂二钱 南硼砂一钱半 蕤仁二十一粒（用草纸去油，干为度） 真珠 烂石膏各半钱 熊胆一字 麝香少许

【用法】上为细末。用冬蜜研和，于铫内蒸，得粘，入角罐收，用时煎秦皮汁调，铜箸点于眼眦。泪出为效。

【主治】眼生翳障。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·外形篇》引作“点翳膏”。

10613 首乌丸

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】首乌62克 当归62克 女贞子62克 旱莲草62克 菟丝子62克

【用法】上为细末，以炼蜜为粘合剂，压制成0.5克片剂。每服5～7片，一日三次，或炼蜜为丸，每丸7克，一日服2～3丸。

【主治】斑秃。

10614 首乌丸

【方源】《中国药典》。

【组成】何首乌（制）360克 地黄20克 牛膝（酒制）40克 桑椹清膏70克 女贞子（酒制）40克 墨旱莲清膏48克 桑叶（制）40克 黑脂麻16克 菟丝子（酒蒸）80克 金樱子清膏70克 补骨脂（盐炒）40克 豨莶草（制）80克 金银花（制）20克

【用法】何首乌等十味为细末，用金樱子等三味清膏，加炼蜜与适量之水为丸；稍干后，再用剩余之墨旱莲清膏加炼蜜10克包衣，打光，干燥即得。口服一次6克，一日二次。

【功用】补肝肾，强筋骨，乌须发。

【主治】肝肾两虚，头晕目花，耳鸣，腰酸肢麻，须发早白，高血脂症。

10615 首乌粥

【方源】《大众医学》(1980；7:22)。

【组成】制首乌30克

【用法】浓煎去滓，加大米烧粥食用。

【主治】老年性高血脂，血管硬化，大便干燥者。

10616 首乌汤1号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】生地 熟地各9克 白芍9克 当归身9克 何首乌9克 枸杞子12克 菊花9克 女贞子9克 旱莲草9克 黑豆30克 鹿角胶3克 甘草3克

【功用】养血益肾。

【主治】脱发，头发变黄，逐渐脱落；斑秃。

10617 首乌汤2号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】何首乌9克 生地黄9克 白芍9克 当归身9克 夏枯草9克 菊花9克 连翘9克 霜桑叶9克 黑脂麻30克 白茅根30克 丹皮9克 黑豆30克

【功用】养血凉血，益肾清脑。

【主治】青年白发，或须发早白。

10618 首乌枸杞汤

【方源】《简明中医妇科学》。

【组成】首乌 枸杞 菟丝子 桑螵蛸 赤石脂 狗脊 杜仲各四钱 熟地八钱 藿香 砂仁各二钱

【用法】水煎服。

【主治】白带，属肾气虚弱者。

10619 养中汤

【方源】《局方》卷四（吴直阁增诸家名方）。

【组成】半夏曲（炙）八钱 甘草（炮） 肉桂（去粗皮）各半两 罂粟壳（去蒂盖，蜜炙）二两半

【用法】上为细末。每服一大钱，水一盏，生姜四片，同煎至七分，通口服，不拘时候。

【主治】肺胃受寒，咳嗽多痰，胸满短气，语声不出，昼夜不止，饮食减少。

10620 养中煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】养中汤(《不居集》上集卷十四)。

【组成】人参一二三钱 山药（炒）二钱 白扁豆（炒）二三钱 炙甘草一钱 茯苓二钱 干姜（炒黄）一二钱

【用法】水二钟，煎七分，食远温服。

【主治】中气虚寒，为呕为泄者。

【加减】如嗳腐气滞者，加陈皮一钱，或砂仁四分；如胃中空虚觉馁者，加熟地三五钱。

10621 养气丹

【方源】《局方》卷五（宝庆新增方）。

【组成】禹余粮石（火炼七次，醋淬七次，为末） 紫石英（火煅一次） 赤石脂（火煅一次）各半斤 代赭石（火煅七次，醋淬七次，为末）一斤 磁石（火煅十次，醋淬十次）半斤

上五各贮之，各为细末，又以水研之。挹其清者，置之纸上，纸用箕箕盛，欲使细末在纸上，而水滴在下，挹尽而上。既干，各用藏瓶盛贮，以盐水纸筋和泥固济，阴干；以好硬炭五十斤分为五处，每一处用炭十斤，烧红作一炉子，煅此五药，以纸灰盖之；两日后，火尽灰冷，则再煅，如此三次，埋地坑内两日，出火毒，再研，入后药：

附子（炮，去皮脐）二两 肉苁蓉（净洗，酒浸一宿，焙干）一两半 当归（酒浸一宿，焙干） 茴香（炒） 破故纸（酒炒香熟） 木香（不见火） 肉桂（去粗皮） 巴戟（盐汤浸，打，去心） 肉豆蔻（面裹；煨） 丁香 山药 鹿茸（酥炙） 白茯苓（去皮） 沉香 远志（去心）各一两

已上各如法修制，同研为末，却入：

乳香（别研） 五灵脂（去砂，别研） 没药（去砂石，研）各一两

已上三味入众药同研，却入：

朱砂（或煅或蒸） 阳起石（略煅，或只用酒煮） 钟乳粉各 两

已上三味别研，临时入。

【用法】 上为细末，用糯米粉煮糊为丸，每两作五十丸，阴干，入布袋内，擦令光莹。每服五丸至十丸，空心用温酒吞下，或姜盐汤、或枣汤送下亦可；妇人用艾醋汤吞下。

【功用】 ①《局方》：助养真气，生阳逐阴，温平不僭，消磨冷滞，克化饮食，使五脏安宁，六腑调畅，百病不侵。②《玉机微义》：固滑脱，镇虚逆，复阳助阴。

【主治】 诸虚百损，脾元耗惫，真阳不固，三焦不和，上实下虚，中脘痰饮上攻，头目昏眩，八风五痹；或卒暴中风，痰潮上膈，言语謇涩，神昏气乱，状若瘫痪；及奔豚肾气，上冲胸腹连两胁，膨胀刺痛不可忍者；阴阳上下，气不升降，饮食不进，面无精光，肢体浮肿，五种水气，脚气上冲，腰背倦痛，夜梦鬼交，觉来盗汗，胃冷心痛，小便滑数，牵引小腹，足膝缓弱，步履艰难；妇人血海久冷，赤白带下，岁久无子，及阴毒伤寒，面青舌卷，阴缩难言，四肢厥冷，不省人事者，急服百丸，用生姜、大枣煎汤灌下，即便回阳，命无不活；或触冒寒邪，霍乱吐泻，手足逆冷，六脉沉伏，唇口青黑，腹胁攻刺；及男子阳事痿怯，脚膝痠疼，腹脐虚鸣，大便自滑；兼疗膈胃烦壅，痰饮虚鸣，百药不愈者。

【加减】 《中国医学大辞典》：肾虚，加熟地黄三钱。

10622 养心丸

【方源】 《杨氏家藏方》卷十。

【组成】 茯神（去木） 人参（去芦头） 绵黄耆（蜜炙） 酸枣仁（去皮，别研成膏）各一两 熟干地黄（洗，焙） 远志（去心） 五味子 柏子仁（别研成膏）各半两 朱砂三分（研细，水飞）

【用法】 上为细末，入二膏和匀研细，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后、临卧浓煎人参汤送下。

【主治】 忧思太过，健忘怔忡，睡多恐惕，梦涉峻危，自汗不止，五心烦热，目涩昏倦，梦寐失精，口苦舌干，日渐羸瘦，全不思食。

10623 养心丹

【方源】 《活人心统》卷下。

【组成】 远志（去心）七钱 当归 熟地 阿胶（炒） 柏子仁 酸枣仁 黄耆 茯神 龙齿 茯苓 紫石英各一两 丹参五钱（为衣）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，枣汤送下。

【主治】 心血虚少，失心，神不守舍，恍惚，怔忡，健忘。

10624 养心丹

【方源】 《医统》卷四十八。

【组成】 生地黄 远志 当归 甘草（炙）各一两五钱 柏子仁 酸枣仁 川芎 人参各一两 茯神（去木）七钱 半夏曲 南星（制） 朱砂各五钱（另研为衣） 麝香一钱（另研） 石菖蒲 琥珀三钱 金箔二十片

【用法】 上为细末。汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服五十丸，津咽，有痰姜汤下。

【主治】 心虚手振。

10625 养心汤

【方源】 《医林绳墨大全》卷四。

【组成】 黄连 白茯苓 茯神 麦冬 当归 芍药 甘草 远志 陈皮 人参 柏子仁 半夏 五味子 川芎 肉桂 莲肉四个（去心）

【用法】 水煎服。

【主治】 痰多少睡，心神不足。

10626 养心汤

【方源】 《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】 炙黄耆一钱 茯神八分 川芎八分 当归二钱 麦冬一钱八分 远志八分 柏子仁一钱 人参一钱半 炙草四分 五味十粒（一方有元肉六枚）

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 产后心血不定，心神不安。

【备考】 《胎产指南》有枣仁。

10627 养生丹

【方源】 《外科大成》卷二。

【组成】 母猪大肠一尺（入朴消四两，两头扎住入瓦罐，水三碗煮将干，盐泥塞口，勿泄气，炭火煅存性，象牙末二两 刺猬皮二个（煅存性） 麝香一钱 猪悬蹄二十四个（切片，土炒） 川山甲二十四片（土炒） 乳香 没药 雄黄 地榆各三钱 大黄五钱 青盐七钱 白芷一两 明矾五钱 小活龟三个（连肉入罐内，用泥封口，煅存性） 蜂房一个（带子者）。焙干为末） 黄牛角腮一个（煅存性） 朴消七钱 槐花五钱（炒） 黄蜡一两 自然铜（煅，醋淬七次）五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，空心老酒送下，一日二次，服至半月出管。一月全愈，不用生肌。

【功用】 内消痔漏。

【主治】 痔漏。

10628 养肝丸

【方源】《济生》卷五。

【组成】 当归（去芦，酒浸） 车前子（酒蒸，焙） 防风 白芍药 蕤仁（别研） 熟地黄（酒蒸，焙） 川芎 楮实子各等分

【用法】 上为细末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，温热水送下，不拘时候。

【主治】 肝血不足，眼目昏花，或生眵泪，久视无力。

10629 养肝丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】 川芎 当归 白芍 熟地 防风 羌活

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，熟汤送下。

【主治】 筋伤。

10630 养肾散

【方源】《百一》卷十一引《荆岑方》。

【异名】 踊乌散（《普济方》卷一五六引《经验良方》）。

【组成】 全蝎半两 天麻三钱 苍术（去粗皮）一两 草乌头（去皮脐）二钱（生用） 黑附子（炮，去皮脐）二钱

【用法】 上为细末，拌匀。肾气，每服一大钱，豆淋酒调下（豆用黑大豆），药气所至，麻痹少时，须臾疾随药气顿愈；骨髓中痛，用胡桃肉酒调下。

【主治】《局方》（淳祐新添方）：肾气虚损，腰脚筋骨间疼痛，不能步履，久病脚膝缓弱，风、寒、湿悉治之。

【宜忌】《妇人良方》：孕妇勿服。

【临证举例】 脚气 忠州太守陈逢原传，云渠前知坊州，因暑中取凉食瓜，至秋忽然右腰腿间疼痛，连及膝胫，曲折不能，经月右脚艰于举动，凡治腰脚药服之无效。儿子云安刑曹似在商熙助教处得养肾散方服之，才一服，移刻举身麻痹，不数刻间脚遂屈伸，再一服即康宁。又，坊州监酒年几四十，虚损，两脚不能行步，试与此药，初进二钱，大腿麻木，遂能起立；再服二钱，大小拇指皆麻，迤逦可行；三服驰走如旧。太室居士得此方，乾道己丑岁在鄜州都慕府日，宋判院市言久病脚膝缓弱不能行，传之。数日来谢：此疾经年，无药不服，得方次日即合，二服见效，五服良愈，令有力，能拜起矣。后数日又云：因浴，遍身去薄皮如糊，肌骨遂苏，其效如神。

10631 养金汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】 生地 阿胶 杏仁 知母 沙参 麦冬 桑皮 蜜

【用法】 水煎服。

【主治】 喉燥痛，水涸火炎，肺金受克。

【宜忌】 忌辛热收涩。

10632 养荣汤

【方源】《三因》卷十三。

【异名】 人参养荣汤（《局方》卷五淳祐新添方）。

【组成】 黄耆 当归 桂心 甘草（炙） 橘皮 白术 人参各一两 白芍药三两 熟地黄 五味子 茯苓各三分 远志（去心，炒）半两

【用法】 上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜三片，大枣二个，煎至七分，去滓，空腹服。

【功效】 ①《医方集解》：养荣。②《医方论》：三阴并补，气血交养。

【主治】 心脾气虚，营血不足，倦怠无力，食少气短，惊悸健忘，夜寐不安，虚热自汗，咽干唇燥，消瘦，咳嗽痰白，皮肤干枯；或疮疡溃后气血不足，寒热不退，体倦瘦弱，食少气逆，疮口久不收敛。

①《三因》：积劳虚损，四肢沉滞，骨肉酸疼，呼吸少气，行动喘咳，小便拘急，腰背强痛，心虚惊悸，咽干唇燥，饮食无味，阴阳衰弱，悲忧惨戚，多卧少起；久者积年，急者百日，渐至瘦削；五脏气竭，难可振复；又治肺与大肠俱虚，咳嗽下利，喘乏少气，呕吐痰涎。②《校注妇人良方》：溃疡寒热，四肢倦怠，体瘦少食，面黄气短，不能收敛，或大疮愈后多服之。③《医方集解》：发汗过多，身振脉摇，筋惕肉瞤。

【加减】 便精遗泄，加龙骨一两；咳嗽，加阿胶。

【方论选录】 ①《医方考》：人参、黄耆、白术、茯苓、甘草、陈皮，皆补气药也，荣血不足而补气，此大易之教，阴生于阳之义也。阴者，五脏之所主，故用当归泽脾，芍药调肝，熟地滋肾，五味益肺，远志宁心，五脏和而阴血自生矣。桂性辛热，热者入心而益火，辛者入经而利血，又心为生脉之源，故假之引诸药入心而养荣血于脉耳！②《名医方论》：柯韵伯：古人治气虚以四君、治血虚以四物，气血俱虚者以八珍，更加黄耆、肉桂，名十全大

补，宜乎万举万当也。而用之有不获效者，盖补气而不用行气之品，则气虚之甚者，无气以受其补；补血而仍用行血之物于其间，则血虚之甚者，更无血以流行。故加陈皮以行气，而补气者悉得效其用；去川芎行血之味，而补血者因以奏其功。此善治者，只一加一减，便能转旋造化之机也。然气可召而止，血易亏难成，苟不有以求其血脉之主而养之，则营气终归不足，故倍人参为君，而佐以远志之苦，先入心以安神定志，使甘温之品，始得化而为血，以奉生身。又心苦缓，必得五味子之酸以收敛神明，使营行脉中而流于四脏，名之曰养荣，不必仍十全之名，而收效有如此者。③《古方选注》：养营者，调养营气循卫而行，不使其行之度数疾于卫也。故于十全大补汤中减川芎行血之品，独用血分填补收敛之药，则营行之度缓于气分。药中加广皮行气之品，则卫行之度速。观其一减一加，便能调平营卫，使其行度不愆。复远志、五味者，经言：营出中焦，心经主之。以远志通肾，使阴精上奉于心，佐以五味收摄神明，一通一敛，则营有所主而长养矣。

【临证举例】 贫血 《上海中医药杂志》(1985;1:35)：患者王某，女，50岁。患贫血7～8年，血色素5～7克之间。近两周来常有昏厥之象，面色不华，心慌耳鸣，少气懒言，易汗纳差，舌淡而胖，苔薄白，脉沉细。辨证属脾胃虚弱，气血不足。先用归脾汤7剂，继用本方大补气血。共服34剂，血色素上升至9.5克，症状逐渐消失。

【备考】 本方改为丸剂，名“人参养荣丸”（见《中国医学大辞典》）。

10633 养荣汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】 当归 小草 黄耆 枣仁 茯神木香 人参 白芍 麦冬 炙甘草 柏子仁各一钱

【主治】 ①《杂病源流犀烛》：思虑多而怔忡，兼不寐，便浊。②《中国医学大辞典》：劳伤血崩。

10634 养荣汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 当归 白芍 熟地 生地 秦艽 黄芩 防风 甘草

【功用】 滋养荣血。

【主治】 风燥，病在表者，肌肤枯，毛发槁，爪枯。

10635 养胃汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】 厚朴（姜制炒） 藿香（去梗） 半夏（汤洗七次） 茯苓各一两 人参 甘草（炙） 附子（炮，去皮脐） 橘皮各三分 草果（去皮） 白术各半两

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，乌梅半个，煎七分，去滓，空心服。

【功用】 ①《三因》：温胃消痰，进食下气，辟寒疫。②《岭南卫生》：辟山岚瘴气，四时瘟疫。

【主治】 外感寒邪，内伤生冷，脾胃虚寒，腹痛肠鸣，或呕哕不食，或寒湿肢体疼痛，或疟邪发作多吐者。

①《三因》：胃虚寒，胫寒不得卧，淅淅恶风，洒洒恶寒，腹中痛，虚鸣，寒热如疟，唇口干，面目虚浮，呕哕吐泻，四肢疼痛，不思饮食；或伤寒湿，骨节皆痛。②《济生》：寒多热少，或但寒不热，头痛恶心，胸满苦呕，身体疼痛，栗栗振寒，面色青白，不进饮食，脉来弦迟。③《医方类聚》引《直指》：外感寒邪，内伤生冷。④《保命歌括》：食疟及感寒湿疟，发作多吐者。

10636 养津饮

【方源】《古今名方》引广州市中医院肿瘤科方。

【组成】 雪梨干 芦根各30克 花粉 玄参 荠苨各15克 麦冬 生地 桔梗各9克 杭菊花12克

【功用】 养阴生津，润肺止渴。

【主治】 鼻咽癌放疗后反应，症见口干，舌燥，恶心，胃纳下降；白细胞降低，口咽部粘膜充血水肿，糜烂及唾液腺受到损害而引起的咽喉干燥疼痛等。

【加减】 咽痛、口腔糜烂者，加板蓝根、金丝草；口干不欲饮，舌苔白腻，加佩兰、金丝草。

10637 养神丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】 远志（去心） 麦门冬（去心，焙） 菖蒲 熟干地黄（焙） 山芋 人参 茯神（去木）各一两 甘草（炙）半两 白术三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后米饮送下。

【主治】 心气不定，惊悸多忘。

10638 养真丸

【方源】《妇人良方》卷九。

【组成】 鹿茸 当归 肉苁蓉 禹余粮 菟丝子 覆盆子 熟地黄 紫石英 海螵蛸各二两 五味子 真琥珀 白芍药 川芎 桑寄生 卷柏 艾叶 川姜 坚白茯苓 人参 牡蛎 酸枣仁各一两 钟乳

粉四两

【用法】 上为末。酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒送下，一日三次。吃后用粥饭压之。

【主治】 妇人血虚气惫，阴阳不升降，久不成妊娠者。

10639 养真丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】 补骨脂（炒） 益智仁 晚蚕蛾（微炒） 没药（研） 丁香 青盐（研） 川山甲（炙）各半两 茴香 白术 乳香（研） 南青皮各三钱 沉香（锉） 香附子（炒） 姜黄 薯蓣 木香 甘草（炙） 巴戟（去心）各一两 川楝子（去皮及子，麸炒黄色）一钱 牛膝（酒浸一宿）七钱 苁蓉（酒浸一宿）七钱 檀香七钱 苍术三两（酒浸二宿） 蛤蚧一对 缩砂仁半两

【用法】 上为细末，酒浸面糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心及食前温酒送下，一日二次。

【主治】 阴衰消小，痿弱不举。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“养真丸”。

10640 养真丹

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】 四物汤加羌活 天麻各等分

【用法】 炼蜜为丸，如鸡子大。每服一丸，木瓜、菟丝子浸酒送下。

【主治】 肝虚，为四气所袭，手足顽麻，脚膝无力，及瘫痪痰涎，半身不遂，言语謇涩，头目昏眩，营气凝滞，遍身疼痛；兼治产后中风，坠堕瘀血。

10641 养脏汤

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】 五倍子 白矾 蛇床子各等分

【用法】 上为末。水煎浸洗，洗后用赤石脂末少许放在芭蕉叶上，频用托入。

【主治】 小儿久痢脏寒，肛门出不收。

10642 养脾丸

【方源】《局方》卷三。

【异名】 大养脾丸（《岭南卫生方》卷中）。

【组成】 大麦芽（炒） 白茯苓（去皮） 人参（去芦）各一斤 干姜（炮） 缩砂（去皮）各三斤 白术半斤 甘草（锉，煨）一斤半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每两作八丸。每服一丸，细嚼，生姜汤送下，食前服。

【功用】 养胃进食。

【主治】 ①《局方》：脾胃虚冷，心腹绞痛，胸膈满闷，胁肋虚胀，呕逆恶心，嗳气吞酸，泄泻肠鸣，米谷不化，肢体倦怠，不思饮食。②《普济方》：小儿躯啼。

10643 养脾丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】 缩砂（连壳用） 干姜（炮，洗）各半斤 麦芽（炒） 白术（炒） 藿香叶（去土） 人参（去芦） 白扁豆 厚朴（去粗皮，锉，姜制，炒） 橘红 白茯苓（去皮） 神曲（炒） 丁香各五两（不见火） 甘草七两（炙）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每两分作八丸。每服一丸，空心细嚼，生姜汤送下。

【主治】 脾胃虚弱，胸膈痞闷，心腹疞痛，四肢少力，腹胀肠鸣，饮食不化。

10644 养儒汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】 熟地一两 金樱子 芡实 山药 玄参 麦冬各五钱 牡蛎末三钱 北五味五分

【用法】 水煎服。

【功用】 安心补肾。

【主治】 梦遗症，久则玉茎着被，精随外泄，不着则否，饮食减少，倦怠困顿。

10645 养心化痰丸

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】 龙齿（煅，研极细）一两 麦冬一两 白芥子一两（焙） 朱砂（水飞，猪心血煮三次） 五味子五钱（拣双核者） 半夏 胆星一两 远志（炒）二两 牡蛎（煅）一两 枣仁（炒）八钱 橘红一两 茯神一两 海粉

【用法】 上为细末，用淡竹沥一碗，生姜汁一杯，和匀，蒸饼为丸，如绿豆大。每服二钱，临卧百沸汤下；灯心、竹叶汤亦可。

【主治】 痰多不寐，谵妄神昏。

10646 养心四物汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 力参 1.5 克 炙甘草 石菖蒲各 3 克 远志 6 克 当归 12 克 熟地 9 克 酒白芍 6 克 川芎 1.5 克

【功用】 补心安神，益目生光。

【主治】 视瞻昏渺，神光内沉，兼有心悸心烦，健忘失眠，脉细弱等。

【方论选录】 四物汤为补血的要剂，力参、炙甘草补气以生血，力参且有开心明目之功；石菖蒲、远志养心安神，心中气血充裕，神自安和，神光发

越，甘白不昏。

10647 养心安神丸

【方源】《医统》卷七十。

【组成】当归身 白茯苓 酸枣仁 五味子 犀角 琥珀 玄明粉 黄连 朱砂（为衣） 甘草（熬膏）各等分

【用法】上为细末，甘草膏和炼蜜为丸，如黍米大。每服二十丸，夜卧时津吞下。

【功用】除乱梦、恶梦。

【主治】心虚多梦。

10648 养心固肾汤

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】生地 当归 茯神 山药 芡实 萸肉 陈皮 甘草 五味 石莲肉

【用法】河水煎，空心服。

【主治】漏精。

10649 养正通幽汤

【方源】《产后编》卷上。

【组成】川芎二钱半 当归六钱 炙草五分 桃仁十五粒 麻仁二钱（炒） 肉苁蓉（酒洗，去甲）一钱

【主治】产后大便秘结，类伤寒三阴症。

【加减】汗多便实，加黄耆一钱，麻黄根一钱，人参二钱；口燥渴，加人参、麦冬各一钱；腹满溢，便实，加麦冬一钱，枳壳六分，人参二钱，苁蓉一钱；汗出谵语便实，乃气血虚竭，精神失守，宜养营安神，加茯神、远志、苁蓉各一钱，人参、白术各二钱，黄耆、白芷各一钱，柏子仁一钱。

10650 养血四物汤

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地黄 人参 茯苓 半夏 黄连 栀子 甘草

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】血虚嘈杂。

【加减】去人参，加香附、贝母甚效。

【备考】《寿世保元》本方用量：当归三钱，川芎一钱五分，白芍（炒）二钱，熟地黄（姜炒）四钱，人参二钱，白茯苓（去皮）二钱，半夏（姜炒）二钱，黄连（姜炒）六分，栀子三钱，甘草八分。并有白术（去芦）一钱五分。

10651 养血地黄汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】熟地 生地 白芍 当归 阿胶 麦冬 白术

【用法】水煎服。

【主治】伤寒发汗过多则伤血，血虚无以荣筋，因拘急而惕惕然跳，四肢百骸亦瞤瞤然动者。

10652 养血托毒汤

【方源】《会约》卷二十。

【组成】当归二钱 白芍（酒炒）一钱半 熟地二钱 茯神一钱 淮山药（炒）一钱半 沙参一钱二分 甘草 生地（酒浸） 丹参各一钱 柏子仁（炒去油）八分 牛蒡子（炒，研）六分 白莲肉（去心，炒，研）一钱

【用法】水煎，频服。

【主治】麻现色白，心血不足，体虚神倦者。

10653 养血安神汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归身五分（酒洗） 川芎五分 白芍（炒）五分 生地黄（酒洗）一钱 陈皮五分 白术七分 茯神一钱 酸枣仁七分（炒） 柏子仁五分（炒） 黄连五分（酒炒） 甘草（炙）三分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】惊悸。

10654 养血定风汤

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】生地五钱 当归三钱 赤芍二钱 川芎五分 天冬二钱 麦冬二钱 僵蚕二钱（生研） 鲜首乌五七钱 丹皮一钱五分或二钱

【用法】上加桑枝二十寸，水煎，温服无时；或为丸服亦可。

【主治】痒风。遍身瘙痒，并无疮疥，搔之不止。

【备考】外用地肤子、苍耳叶、浮萍煎汤暖浴。

10655 养血胜风汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】生地六钱 当归二钱 白芍一钱五分 川芎一钱 枸杞三钱 五味五分 枣仁一钱五分 柏仁二钱 杭菊二钱 桑叶一钱 红枣十枚 黑芝麻三钱

【主治】血虚头痛，自觉头脑俱空，目眩而眩。

10656 养血祛风汤

【方源】《会约》卷十一。

【组成】当归二钱 白芍（酒炒）一钱半 熟地一钱半（若血虚有热者，改用生地） 秦艽一钱半 防风 独活各一钱二分 羌活一钱 桂枝八分 陈皮七分 松节四钱

【用法】水煎，温服。

【主治】风邪外中，历节肿痛，脉浮涩者。

10657 养血祛风汤

【方源】《中西结合治疗皮肤病学》。

【组成】 生地15克 当归9克 川芎9克 白芍9克 荆芥9克 防风9克 苍术9克 黄柏9克 甘草6克

【功用】 养血润燥，祛风利湿。

【主治】 慢性瘙痒症、慢性湿疹和慢性荨麻疹等属血虚生风者，证见慢性全身瘙痒性丘疹，头晕，五心烦热，全身奇痒，咽干，舌质淡红，脉细。

【方论选录】 生地、当归、川芎、白芍为四物汤，能养血润燥；荆、防祛风止痒；苍术，黄柏是二妙散，可燥脾清热祛湿，以佐四物；甘草和中。

10658 养血消风散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 熟地15克 当归9克 荆芥9克 白蒺藜9克 苍术9克 苦参9克 麻仁9克 甘草6克

【功用】 养血润燥，消风止痒。

【主治】 脂溢性皮炎，血虚风燥，皮肤干燥、脱屑、瘙痒等。

【方论选录】 熟地、当归滋阴养血，荆芥、白蒺藜、苦参消风止痒，苍术健脾，麻仁、甘草润燥。

10659 养血润肤饮

【方源】《外科证治全书》卷一。

【组成】 当归三钱 熟地 生地 黄耆各四钱 天冬（去心） 麦冬各二钱（去心） 升麻 片芩各一钱 桃仁泥 红花各六分 天花粉一钱五分

【用法】 水煎，温服。

【功用】《朱仁康临床经验集》：滋阴养血，润燥止痒。

【主治】 ①《外科证治全书》：面游风。初起面目浮肿，燥痒起皮，如白屑风状，次渐痒极，延及耳项，有时痛如针刺。湿热盛者浸黄水，风燥盛者干裂，或浸血水，日夜难堪。②《朱仁康临床经验集》：皮肤瘙痒症、牛皮癣静止期（血虚风燥型）、红皮症等。

【加减】 如大便燥结，加火麻仁、郁李仁各五钱；如风盛痒甚，加明天麻一钱五分。

10660 养血清火汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 当归 川芎七分 白芍（酒炒） 生地黄（酒洗） 黄连（酒炒）各一钱 片芩（去朽）八分 栀子（炒）八分 酸枣仁（炒） 麦门冬（去心）各一两 远志（去心） 辰砂五分（另研，调服） 甘草三分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，水煎，温服。

【主治】 怔忡，心慌神乱，烦躁不宁。

10661 养血清心丸

【方源】《续名家方选》。

【组成】 当归（酒洗）十钱 麦冬六钱 川芎 白芍 防风（去梢）各十钱 黄芩 荆芥 青皮各八分 黄连十钱 薄荷五钱 牛黄二钱 甘草三钱

【用法】 上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服五十丸，空心热酒送下。

【主治】 凡人口吃，语言謇涩者，心血虚而火亢甚也，轻者语涩，重者口眼㖞斜，医误为中风者。

10662 养血舒肝汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】 当归身二三钱 熟地三五钱 白芍（酒炒）一钱半 甘草（炙）一钱 阿胶（蛤粉炒） 白术 杜仲（盐水炒）各一钱半 枸杞 淮山药（炒）二钱

【用法】 加大枣为引，水煎服。

【功用】 生血养肝，固胎。

【主治】 受胎一月，系属肝经，前此或堕，后孕至期亦堕者。

10663 养血熄风方

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 黄耆15克 当归9克 白芍9克 川芎6克 红花9克 玄参9克 荆芥9克 白蒺藜9克 甘草6克

【功用】 养血润燥，消风止痒。

【主治】 老年皮肤瘙痒症。

10664 养阴软坚汤

【方源】《疡科捷径》卷上。

【组成】 海石 麦冬 川贝 云苓 橘红 沙参 生地 牡蛎 生草 海带 昆布 南星

【主治】 内伤气怒郁结，痰火凝集而成瘰疬。

10665 养阴清肺汤

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】 大生地二钱 麦冬一钱二分 生甘草五分 玄参一钱半 贝母八分（去心） 丹皮八分 薄荷五分 炒白芍八分

【功用】 养阴清肺。

①《玉钥》：养阴清肺，兼辛凉而散。②《北京市中药成方选集》：清热润肺。③《中国药典》：养阴润燥，清肺利咽。

【主治】 ①《玉钥》：喉间起白如腐，即所谓白缠喉也。初起发热，或不发热，鼻干唇燥，或咳或不咳，鼻通者轻，鼻塞者重，音声清亮，气息调匀易治。②《方剂学》：白喉。喉间起白如腐，不易

拔去，咽喉肿痛，初起发热，或不发热，鼻干唇燥，或咳或不咳，呼吸有声，似喘非喘。

【加减】 质虚，加大熟地，或生熟地并用；热甚，加连翘，去白芍；燥甚，加天冬、茯苓。

【宜忌】 如有内热及发热，不必投表药，照方服去，其热自除。

【方论选录】 ①《中医方剂学讲义》：方中麦冬、玄参、生地、丹皮养阴清热，凉血解毒；甘草生用，泻火解毒；贝母润肺化痰；薄荷宣肺达邪。合用具有养阴清肺之功。②《方剂学》：本方为治疗白喉的常用方。白喉一证，多由素体阴虚蕴热，复感疫毒所致，治宜养阴清肺为主，兼散疫毒。方中以生地养肾阴；麦冬养肺阴；玄参清虚火解毒；丹皮凉血而消肿；贝母润肺化痰；白芍敛阴泄热；少佐薄荷散邪利咽；甘草和药解毒。综合全方，滋养肺肾，消肿利咽，微散表邪，故对阴虚白喉，确有良效。

【临证举例】 ①喉痹 《冉雪峰医案》：魏某，女。患喉痹，咽喉肿痛，滴水不入，药不得下，病来较暴，俨已封喉，唇口色乌，眼面俱肿，气痰轳轳，筑筑然若将窒息，病势颇危，某医院拒不收治，求诊于余。予曰：热毒太炽，肿毒太剧，但非必死证。因喉闭药物难下，先以雷氏六神丸置舌上，以温水少许润之，至第二日茶水勉下，乃投养阴清肺汤，原方薄荷减半，生地加倍，越七日诸病消失，气平神清如常人。②白喉 《福建中医药》(1959；12:516)：采用养阴清肺汤加减制为合剂，治疗白喉213例，处方：生地一两，玄参、麦冬各八钱，丹皮、白芍、蒲公英、板蓝根各四钱，银花、连翘、百合、川贝、薄荷、甘草各三钱，煎成90毫升，分次频服，另加吹喉散吹喉。服药后多数于第二天退热，白膜消退最快者为2天，最迟者12天，平均为5.5天。杆菌培养转阴最快2天，最慢12天，平均6.4天。213例中，痊愈192例，死亡21例。③急性扁桃体炎 《中华医学杂志》(1962；3:169)：用本方加减，治疗急性扁桃体炎50例。处方：大生地八钱，白芍四钱，玄参八钱，浙贝四钱，甘草二钱，麦冬四钱，薄荷一钱，丹皮四钱。大便秘结者加玄明粉三钱；小便短黄者加车前子二钱；口干者加天花粉三钱。结果：治愈45例，好转3例，无效2例。在有效病例中，轻者服药1剂，重者4剂，多半服药2剂即可获效。服药过程中未发现不良反应。

【备考】 本方制成膏剂，名“养阴清肺膏”（见《全国中药成药处方集》北京方）；制成糖浆剂，名“养阴清肺糖浆”（见《中药制剂手册》）。

10666 养肺去痿汤

【方源】 《辨证录》卷十三。

【组成】 金银花三钱 生甘草五钱 生地二钱 麦冬三钱 紫菀五钱 百部五分 百合二钱 款冬花三分 天冬门一钱 贝母三分 白薇三分

【用法】 水煎服。

【主治】 肺痿：久嗽之后，肺受损伤，皮肤黄瘦，咽嗌嘶哑，自汗盗汗，卧眠不得，口吐稠痰，腥臭难闻，而毛色悴憔，嗽之时必忍气须臾，轻轻吐痰，始觉膈上不痛，否则必大痛不已，气息奄奄，全无振兴之状。

10667 养荣平肝汤

【方源】 《眼科临症笔记》。

【组成】 当归四钱 川芎二钱 白芍三钱 茺蔚子三钱 桑皮三钱 枳壳二钱（炒） 寸冬三钱 贝母三钱 石斛三钱 菊花二钱 夏枯草三钱 甘草一钱 羚羊角五分

【用法】 水煎服。

【主治】 倒睫卷毛症（眼睑内翻倒睫）。两眼赤酸，怕日羞明，上下眼皮弦紧皮松，倒睫卷毛，刺激眼球，发生白膜，热泪常流。

10668 养荣生化汤

【方源】 《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】 当归四钱 白芍一钱 白茯苓一钱 人参一钱 白术二钱 陈皮五分 大腹皮五分 香附五分 苏蓉一钱 桃仁十粒（制）（一本无桃仁）

【主治】 产后，大便不通，误服下药成胀，及腹中作痛者。

10669 养胃进食丸

【方源】 《御药院方》卷三。

【组成】 人参（去芦头） 甘草（锉）各一两 白术 白茯苓（去皮）各二两 厚朴三两（去粗皮，生姜制，炒） 陈皮（去白）一两半 神曲（炒）二两半 大麦芽（炒黄）一两半 苍术五两（去粗皮，泔浸）

【用法】 上为细末，水面糊为丸，如梧桐子大。每服三十至五十丸，食前用温生姜汤送下；或粥汤送下亦得。

【功用】 滋养脾胃，进美饮食，消痰导气，去风寒暑湿冷邪气。

【主治】 脾胃虚弱，心腹胀满，面色萎黄，肌肉清瘦，怠惰嗜卧，全不思食。

【备考】 本方改为汤剂，名“养胃进食汤”（见《类证治裁》卷六）。

10670 养胃增液汤

【方源】《中医儿科学》。

【组成】石斛 乌梅 北沙参 玉竹 甘草 白芍

【功用】养胃育阴。

【主治】小儿厌食。口干多饮而不喜进食，皮肤干燥，大便干结，舌苔光剥，或舌红少津，脉细。

10671 养脑利肢汤

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】野台参四钱 生赭石六钱（轧细） 怀牛膝六钱 天花粉六钱 玄参五钱 生杭芍四钱 生明乳香三钱 生明没药三钱 威灵仙一钱 䗪虫四枚（大者） 制马钱子末二分

【用法】上药十一味，将前十味煎汤，送服马钱子末；至煎滓再服时，亦送服马钱子末二分。

【主治】脑部充血以致肢体痿废，迨脑充血治愈，脉象和平，而肢体仍痿废者。

10672 养脾肥儿丸

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】人参 白术 甘草 陈皮 枳实 木香 茯苓 砂仁 山药 莲肉 麦芽 神曲 山楂 青皮

【用法】上为末，荷叶浸水煮粳米饭为丸，如麻子大。米饮送下。

【主治】脾胃久虚。

【临证举例】脾胃病 本县大尹朱云阁公子，常有脾胃病，向是韩医生调治。平时服养脾丸，伤食服保和丸，未有宁日。一日问余云：闻汝小儿甚精，小官人脾胃久虚，汝可治之？余曰：当攻补兼用，不可偏补偏攻。韩医云：密斋非所长也，如专补脾胃则饮食难化，如专消导则中气易耗。尹不听，曰：汝进一方来。乃进养脾肥儿丸，修合服之，大效，再无脾胃之病。尹犹相信，赐匾。

10673 养精种玉汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】大熟地一两（九蒸） 当归五钱（酒洗） 白芍五钱（酒炒） 山萸肉五钱（蒸熟）

【用法】水煎服。

【功用】补肾水，平肝木。

【主治】妇人身瘦不孕，一交男子，即卧病终朝。

10674 养血当归地黄散

【方源】《保命集》卷中。

【异名】当归地黄汤（《慎斋遗书》卷五）。

【组成】当归 地黄 芍药 川芎 藁本 防风 白芷各一两 细辛五钱

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，温服。

【主治】①《保命集》：破伤风，病日久气血渐虚，邪气入胃。②《景岳全书》：中风，少血偏枯，筋脉拘挛疼痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作"养血当归地黄汤"。

10675 养血壮筋健步丸

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】黄耆（盐水炒）一两 山药一两 五味子一两 破故纸（盐水炒）一两 人参一两 白芍（酒炒）一两五分 熟地黄四两 枸杞子一两 牛膝（酒浸）二两 菟丝子（酒炒）一两 川归二两（酒洗） 白术一两（炒） 杜仲（姜汁炒）二两 虎胫骨（酥炙）一两 龟版（酥炙）一两 苍术（米泔浸）三两 黄柏（盐水炒）二两 防风六钱（酒洗） 羌活五钱（酒洗） 汉防己五钱（酒洗）

【用法】上为末，用猪脊髓七条，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心盐汤送下。

【主治】气血两虚，双足痿软，不能行动，久卧床褥。

10676 举元煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参 黄耆（炙）各三五钱 炙甘草一二钱 升麻五七分（炒用） 白术（炒）一二钱

【用法】水一钟半，煎七八分，温服。

【功用】补气。

【主治】气虚下陷，血崩血脱，亡阳垂危。

【加减】如兼阳气虚寒者，桂、附、干姜随宜佐用；如兼滑脱者，加乌梅二个，或文蛤七八分。

【临证举例】①妊娠小便不通 《江西中医药》（1985；4:26）：黄某某，怀孕8个月，近半个月来尿频而少，渐至点滴不通，曾治未效。今小便点滴不通已两天，少腹胀急疼痛，弯腰曲背，坐卧不安，频频登厕而不便，气短乏力，头晕目眩，舌质淡，脉虚缓。治以举元煎加味：黄耆18克，党参15克，白术9克，桔梗9克，升麻4.5克，甘草3克。二剂一日服。翌日复诊，药后小便得通，少腹胀急疼痛等症顿除，仍服上方二剂而愈。②先兆流产 《江苏中医杂志》（1984；3:34）：陈某某，女，25岁。妊娠三月，因用力举物而致腰酸，小腹坠痛，阴道见红，血量较多，经注射黄体酮和止血剂不显。证见面色少华，精神萎靡，舌淡苔薄，脉沉细滑。治以举元煎加味：红参10克（另煎，和

冲），黄耆20克，焦白术10克，杜仲10克，续断10克，桑寄生10克，阿胶12克（烊化），艾炭10克，升麻6克，炙甘草3克，苎麻根30克。服3剂，症情改善，续服3剂，出血即止，腰酸坠痛亦除。③崩漏 《浙江中医学院学报》（1986；1:27）：董某某，女，45岁，经崩26天，时而量多如冲，头晕，肢倦神疲，面色㿠白，舌淡胖大，苔薄白润，脉细促。治以大剂举元煎加味：炒党参30克，炙黄耆50克，炒白术30克，升麻炭6克，炒白芍15克，黄明胶15克（烊冲），艾叶炭5克，仙鹤草30克，炙甘草5克。三剂血止。④恶露不尽《浙江中医学院学报》（1986；1:27）：姚某某，女，29岁。产后已临三月，恶露时多时少，时浓时淡，淋漓难尽，神疲肢倦，脉细，舌胖苔薄黄。治以举元煎加味：党参15克，白术15克，炙黄耆20克，升麻炭5克，荆芥炭5克，益母草30克，地榆炭15克，炒黄芩10克，炙甘草5克。服四剂，恶露尽。

10677 举肛丸

【方源】《医方考》卷三。

【组成】半夏 天南星 枯白矾各五钱 枯红矾 鸡冠花（炒） 白附子各五两 诃子肉（煅） 黑附子（生） 枳壳各一两 猬皮二枚（炙） 瓜蒌一枚（烧存性） 胡桃仁十五枚（烧存性）

【用法】上为末，醋糊为丸。每服三十丸，空心温酒下。

【主治】泄泻虚寒脱肛者。

【方论选录】湿盛则濡泻，久泻则胃虚，胃虚则脏寒，脏寒则无阳以升举，故令肛肠脱而不止。燥能去湿，故用半夏、南星；枯能制湿，故用红、白枯矾；温能暖脏，故用黑、白附子。乃若鸡冠花、刺猬皮、枳壳所以驱风；而诃子、瓜蒌、胡桃仁之灰，取其涩以固脱也。

10678 举胎四物汤

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】当归 白芍 熟地 川芎 人参 白术各二钱 陈皮 升麻各一钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】转胞。饮食如常，心烦不卧，不得小便。

10679 举卿举败散

【方源】方出《活人书》卷十九，名见《玉机微义》卷三十九。

【异名】愈风汤、举卿古拜散（《校注妇人良方》卷十九）、举卿古拜饮（《准绳·类方》卷五）。

【组成】荆芥末二钱

【用法】温酒调下。不愈再服。

【主治】①《活人书》：痉证。②《玉机微义》：妇人新产血虚痉者，汗后中风发搐。

【临证举例】产后昏睡 《续名医类案》：一妇人产后睡久及醒，则昏昏如醉，不省人事，用荆芥穗微焙为末，每服三钱，豆淋酒调服，或童便服。

10680 宣气散

【方源】《普济方》卷二十六引《济生》。

【组成】甘草 木通各二钱 栀子二钱 葵子 滑石各一钱

【用法】上为末。每服半钱，灯心汤调下。

【主治】小便不通，脐腹急痛。

10681 宣阳汤

【方源】《衷中参西》卷上。

【组成】野台参四钱 威灵仙一钱半 寸麦冬六钱（带心） 地肤子一钱

【主治】阳分虚损，气弱不能宣通，致小便不利。

【方论选录】以人参为君，辅以麦冬以济参之热，灵仙以行参之滞，少加地肤子为向导药，名之曰宣阳汤，以象日象暑。

【临证举例】水肿、癃闭 一媪，年六十余，得水肿证，延医治不效。时有专以治水肿名者，其方秘而不传，服其药自大便泻水数桶，一身水尽消，言忌咸百日，可保永愈。数日又见肿，旋复如故。服其药三次皆然，而病人益衰惫矣。盖未服其药时，即艰于小便，既服药后，小便滴沥全无，所以旋消而旋肿也。再延他医，皆言服此药愈后复发者，断乎不能调治。后愚诊视，其脉数而无力。愚曰：脉数者阴分虚也，无力者阳分虚也。膀胱之腑，有上口无下口，水饮必随气血流行，而后能达于膀胱，出为小便。此脉阴阳俱虚，致气化伤损，不能运化水饮以达膀胱，此小便所以滴沥全无也。爰立二方，曰宣阳汤、济阴汤，二方轮流服之，以象日月寒暑相推，往来屈伸相感之义。俾先服济阴汤，取其贞下起元也，服到三剂小便稍利，再服宣阳汤亦三剂，小便大利；又再服济阴汤，小便直如泉涌，肿遂尽消。

10682 宣补丸

【方源】《千金》卷二十一（注文）引《集验》。

【异名】茯神丸（《千金》卷二十一）。

【组成】茯神 黄耆 栝楼根 麦门冬 人参 甘草 黄连 知母各三两 干地黄 石膏各六两 菟丝子三合 苁蓉四两

【用法】 上为末，以牛胆汁三合加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以茅根汤送下，一日二次。渐加至五十丸。

【主治】 肾消渴，小便数者。

10683 宣解汤

【方源】《衷中参西》卷上。

【组成】 滑石一两 甘草二钱 连翘三钱 蝉退三钱（去足土） 生杭芍四钱

【主治】 感冒久在太阳，致热蓄膀胱，小便赤涩；或因小便秘，而大便滑泻；兼治湿温初得，憎寒壮热，舌苔灰色滑腻者。

【加减】 若滑泻者，甘草须加倍。

【临证举例】 风温 一叟，年六十五，得风温证。六七日间，周身悉肿，肾囊肿大似西瓜，屡次服药无效。旬日之外，求为诊视。脉洪滑微浮，心中热渴，小便涩热，痰涎上泛，微兼喘息，舌苔白厚。投以此汤，加生石膏一两，周身微汗，小便通利，肿消其半，犹觉热渴。遂将方中生石膏加倍，服后又得微汗，肿遂尽消，诸病皆愈。

10684 宣痹汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 枇杷叶二钱 郁金一钱五分 射干一钱 白通草一钱 香豆豉一钱五分

【用法】 水五杯，煮取二杯，分二次服。

【功用】 苦辛通阳，轻宣肺痹。

【主治】 太阴湿温，气分痹郁而哕者。

【临证举例】 ①呃逆 《成都中医学院学报》(1982；4:57)：陈某某，女，成年，售货员。呃逆频作，治疗三月余未效。症见呃逆连声，偶有嗳气，食欲不振，郁郁寡欢，苔薄白，脉缓。治以炙枇杷叶12克，郁金10克，射干10克，香豉6克，炙旋覆花12克，柿蒂10克，香附子10克，通花5克，进二剂，呃逆大减，续服而愈。②胸痛：《成都中医学院学报》(1982；4:57) 刘某某，女，30岁，工人。患右胸膜炎经西药治愈，唯胸膜增厚，胸部憋闷不适，疼痛经久不愈，服中西药罔效。凡负重或咳嗽，胸痛加剧，精神抑郁，食量减少，舌淡苔薄，脉弦。治以炙枇杷叶10克，郁金10克，射干10克，降香10克，橘络5克，路路通10克，炙旋覆花10克，丝瓜络15克，瓜蒌壳15克，青皮8克，通花5克，连进三帖，疼痛减轻，服至十余帖，诸证悉愈。 ③喉痹 《成都中医学院学报》(1982；4:57) 冯某某，女，35岁，工人。三月以来咽中不爽，常有异物梗阻感，饮食吞咽无异常不适，胃纳减少，形体偏瘦，心怀恐惧，神志不乐，舌红苔少，脉濡细数。治以炙枇杷叶12克，射干10克，郁金10克，瓜壳15克，北沙参15克，麦冬12克，重楼10克，大青叶10克，降香10克，通花5克。守方出入十余帖而愈。

10685 宣痹汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 防己五钱 杏仁五钱 滑石五钱 连翘三钱 山栀三钱 薏苡五钱 半夏（醋炒）三钱 晚蚕沙三钱 赤小豆皮三钱（赤小豆乃五谷中之赤小豆，味酸肉赤，凉水浸，取皮用。非药肆中之赤小豆，药肆中之赤小豆乃广中野豆，赤皮蒂黑肉黄，不入药者也）

【用法】 水八杯，煮取三杯，分温三服。

【功用】 辛苦通阳。

【主治】 湿痹。湿聚热蒸，蕴于经络，寒战热炽，骨骱烦疼，舌色灰滞，面目痿黄。

【加减】 痛甚，加片子姜黄二钱，海桐皮三钱。

【方论选录】 舌灰目黄，知其为湿中生热，寒战热炽，知其在经络；骨骱疼痛，知其为痹证。若泛用治湿之药，而不知循经入络，则罔效矣。故以防己急走经络之湿，杏仁开肺气之先，连翘清气分之湿热，赤豆清血分之湿热，滑石利窍而清热中之湿，山栀肃肺而泻湿中之热，薏苡淡渗而主挛痹，半夏辛平而主寒热，蚕沙化浊道中清气。痛甚，加片子姜黄、海桐皮者，所以宣络而止痛也。

10686 宣壅丸

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】 麻子仁 郁李仁（去皮）各二两（并研为膏） 陈橘皮 羌活 川芎 木香各一两 槟榔二分

【用法】 上为细末，与麻子仁、郁李仁膏同研，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，熟水送下，不拘时候。

【主治】 大便秘滞。

10687 宣白承气汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 生石膏五钱 生大黄三钱 杏仁粉二钱 栝楼皮一钱五分

【用法】 水五杯，煮取二杯，先服一杯。不知再服。

【主治】 阳明温病，喘促不宁，痰涎壅滞，右寸实大，肺气不降者。

【临症举例】 小儿麻疹并发肺炎 《陕西中医》(1983；6:3) 患儿于1969年3月患麻疹，第五日夜间皮疹突然隐没，伴喘咳，呼吸困难。体温

40.5℃，脉搏168次/分。面色苍白，双目紧闭，喘咳，呼吸表浅而急促，鼻翼煽动，口唇舌质呈青紫色。口腔可见麻疹粘膜斑，胸腹、头面四肢均可见紫暗色隐没的小疹点。对光反射，睫反射迟钝。胸腹灼热而胀满，四肢膝肘以下厥冷，并时有抽搐。指纹青紫色，直透三关射甲。听诊：两肺布满中等大小的湿性罗音，诊为"麻疹合并肺炎"。治以宣白承气汤加味：大黄、杏仁、石膏、连翘、银花各10克，麻黄3克，赤芍、僵蚕、蝉蜕、党参各6克，水煎服一剂。服药后约半小时开始腹泻，至夜半共十余次，四肢发热，腹色转红，紫绀解除，呼吸平稳，心率116次/分，体温37.8℃，转危为安。次日服沙参麦冬汤加连翘、银花、杏仁，二剂而愈。

10688 宣郁通经汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【异名】宣郁调经汤(《辨证录》卷十一)。

【组成】白芍五钱（酒炒） 当归五钱（酒洗） 丹皮五钱 山栀子三钱（炒） 白芥子二钱（炒，研） 柴胡一钱 香附一钱（酒炒） 川郁金一钱（醋炒） 黄芩一钱（酒炒） 生甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】补肝血，解肝郁，利肝气，降肝火。

【主治】妇人经前腹疼数日，而后经水行，经来多紫黑块。

10689 宣肺散结饮

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】桑皮9克 桔梗6克 酒黄芩 赤芍各9克 牡丹皮6克

【功用】清宣肺气，活瘀散结。

【主治】金疳。白睛上出现一个或数个突起的灰白色小泡，周围绕以赤丝，往往反复发作。

【加减】若小泡溃后不敛，此为正虚邪实，方中桑皮改炙桑皮，以免泻之过重，再加麦门冬9克以养阴润肺；若丝脉从两眦而来，可加生地9克，木通3克，以清心中之邪热；若赤脉从下方上冲而来，可加天花粉9克，茅根15克，以清胃火；若小泡位于风轮边缘，可加当归9克，补益肝血，以防肺邪侵入，或加青葙子3克，清肝中之邪热，以防二火相并，损伤风轮。

【方论选录】方中桔梗宣肺散结，桑皮降肺气，酒黄芩清肺热，这样一宣、一降、一清，肺中郁热均能祛除；更有赤芍、牡丹皮活血凉血，疏通络脉以退目中赤丝。

【临证举例】金疳 苟某某，男，18岁。1972年3月10日就诊。右目涩痛流泪10余天，结眵羞明。检查：患眼大眦赤胀，赤脉从眦部射出，白睛内侧有一灰白色小泡，周围有赤丝缠绕，且兼浸赤，脉数，舌红。此为金疳。为心肺二经邪热上攻所致。治以宣肺散结饮加生地9克，木通6克，服药3剂而愈，未再复发。

10690 宣毒发表汤

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】薄荷叶八分 葛根 防风 荆芥穗 连翘 牛蒡子（炒） 木通 枳壳 淡竹叶各一钱 升麻 桔梗 甘草

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】麻疹发热，欲出未出。

【加减】冬天寒月，可加苏叶八分，又加葱白为引；暑月炎天，可加生黄芩一钱，除升麻、甘草、桔梗不用；初潮无咳者，宜用留白陈皮以甚其咳，有咳切勿再加；初起，往来潮热者，除淡竹叶，免解肤热，致麻难透表；在寒月仍宜加苏叶，葱白以疏表之，初潮潮热太甚者，加赤茯苓、生地黄，并可加生黄芩，不必拘麻初用寒凉毒伏，麻不得出之说，正当用之，以保肺受火克之虞；但春冬寒月，黄芩等分，宜略少耳；初潮无汗，使毒透，切不可遽用胡荽酒霖之法，免助邪火内攻，肺金重受其克，药中略加胡荽作引，稍可；初潮不食，不必治之，盖热毒内蕴，自必不食，热毒一解，自然能食，切勿加进食开胃之药；初潮即见喘促，加黄芩、葶苈、瓜蒌仁，以清肺开胸，或更加姜汁炒白芥子、家苏子、莱菔子以降之；初潮呕吐，加竹茹，柿霜（如无柿霜，用柿饼亦可）；初潮呃逆，加枇杷叶、竹茹；初潮鼻衄，加鲜茅根；初潮即现咽喉痛者，加射干，倍用牛蒡子；初潮即现唇干齿燥、舌苔枯黄、口渴等候，加麦冬、花粉、黄芩，甚则加黄连、黄柏、栀仁等味，以预解之；初潮热甚，大便坚实者，加火麻仁二三钱以润之，用枳实以导之，免至闭塞，而热毒不得发越，致变紫黑；若便不通者，加生黑白丑牛末以利之，如利之不通者，必生气喘鼻扇逆证，即用黄连解毒汤加大黄、牛蒡子、连翘、地骨皮、桑白皮以通之；如兼口渴者，并加麦冬、天花粉；初潮大便溏者，方内之枳壳等分减用，以为开泄之路，庶可免便闭之患；初潮溏泄而有微汗，除薄荷、竹叶，不可兼用止汗止泄之品，以堵其发越之；初潮泄泻者，除枳壳；初潮洞泄者，除枳壳，加猪苓，泽泻，以分利之，不可止泄，以塞其舒畅之机；初潮小便赤者，除薄荷叶，加赤茯苓，或更加车前子以利之；初潮小便不

通者，合导赤散，除甘草，加车前子以通之；初溺溺血者，加生地黄、黄连、黄柏、黄芩、栀仁，俱可随意加入，更加牡丹皮以去其滞血，免使留而为殃；冬月寒天，无汗不咳者，量加蜜汁、和酒炒麻黄二三分，其余诸症，不能悉备，宜因所见之证，加减而用，至于等分之轻重，须量人之大小，若月内半周婴儿，只宜以杯许与服，当令乳母代服，使药性流入乳中，儿食母乳，如同服药。

10691 宣清导浊汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】猪苓五钱　茯苓五钱　寒水石六钱　晚蚕沙四钱　皂荚子（去皮）三钱

【用法】水五杯，煮成两杯，分二次服。以大便通快为度。

【主治】湿温久羁，三焦临漫，神昏窍阻，少腹硬满，大便不下。

【方论选录】此湿久郁结于下焦气分，闭塞不通之象，故用能升、能降、苦泄滞、淡渗湿之猪苓，合甘少淡多之茯苓，以渗湿利气；寒水石色白性寒，由肺直达肛门，宣湿清热，盖膀胱主气化，肺开气化之源，肺藏魄，肛门曰魄门，肺与大肠相表里之义也；晚蚕沙化浊中清气，大凡肉体未有死而不腐者，蚕则僵而不腐，得清气之纯粹者也，故其粪不臭不变色，得蚕之纯清，虽走浊道而清气独全，既能下走少腹之浊部，又能化浊湿而使之归清，以己之正，正人之不正也，用晚者，本年再生之蚕，取其生化最速也；皂荚辛咸性燥，入肺与大肠，金能退暑，燥能除湿，辛能通上下关窍，子更直达下焦，通大便之虚闭，合之前药，俾郁结之湿邪，由大便而一齐解散矣。二苓、寒石化无形之气，蚕砂、皂子逐有形之湿也。

10692 宫颈炎散

【方源】《妇产科学》。

【组成】青黛三钱　青果核二钱　月石二两　炉甘石三两　人中白三两　黄柏八钱　西瓜霜一两　甘草一两　石膏五两　冰片三分　黄连三分　硼砂三分

【用法】上为细末。先清洁子宫颈口，将药粉喷于子宫颈糜烂处，间日或每日一次，十次为一疗程。

【主治】慢性子宫颈炎。

【宜忌】治疗期禁性生活。

10693 宫方七香丸

【方源】《直指》卷六。

【组成】木香　丁香　檀香　甘松（净）　丁皮　橘红　缩砂仁　白豆蔻仁　三棱（醋炙）　蓬术（醋煮，焙干）各半钱　大香附（炒去毛）二两半

【用法】上为末，研米糊为丸，如绿豆大。每服三四十丸，姜汤送下。

【功用】消食快膈，和胃止痛。

【主治】胃痛。

10694 宫外孕Ⅰ号方

【方源】《中医妇科学》。

【组成】赤芍　丹参各15克　桃仁9克

【功用】活血祛瘀。

【主治】宫外孕已破损型。突发下腹剧痛，拒按，面色苍白，四肢厥逆，冷汗淋漓，恶心呕吐，血压下降或不稳定，有时烦躁不安或表情淡漠，脉微欲绝或细数无力。

10695 宫外孕Ⅱ号方

【方源】《中医妇科学》。

【组成】赤芍　丹参各15克　桃仁9克　三棱3～6克　莪术3～6克

【功用】活血化瘀，消癥消胚。

【主治】宫外孕未破损型及包块型。

10696 穿牙散

【方源】《济生》卷五。

【组成】全蝎七个（去毒）　细辛（洗净）三钱　草乌二个（去皮）　乳香二钱（别研）

【用法】上为细末。每用少许擦患处。须臾以温盐水盥漱。

【主治】一切齿痛，不问久新。

10697 穿针散

【方源】《续本事》卷四。

【组成】木贼半两（去黑不要尘者）　香附子　细辛　菊花　羌活各半两

【用法】上为细末。每服二钱，好茶少许同点，食后服。

【主治】眼目赤肿，翳障羞明。

10698 穿粉散

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】轻粉（研，隔纸微炒）　穿山甲（炙）　铅粉　黄丹（水飞过）各三钱

【用法】上为极细末。香油调敷。

【主治】①《金鉴》：旋耳疮。②《中医皮肤病学简编》：外耳湿疹，黄水疮。

10699 美容膏

【方源】《简明医彀》。

【组成】防风　零陵香　藁本各二两　白及　白附子　白蔹　天花粉　绿豆粉　僵蚕　白芷各一两

甘松 三奈 茅香各五钱 肥皂（去皮弦）

【用法】 上为末，蜜和捣。匀擦。

【主治】 面生黑黯，雀斑。

10700 姜汁汤

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 半夏半两 桔梗 橘皮（黄者） 茯苓各二两 附子 甘草 桂各一两 椒一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓，入姜汁半醋勺，再煎，食前服。

【主治】 胸中痰饮，积聚不消，咳嗽逆吐，饮食不下，脾胃久虚，肌体羸瘦，或自下者。

10701 姜合丸

【方源】《局方》卷三（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 丁香（不见火） 木香（不见火） 人参各一两 白术（焙） 青皮（去白） 陈皮（去白）各二两 附子（炮，去皮脐）二两半 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 肉豆蔻（炮）各二两 干姜（炮）三两

【用法】 上为细末，入硇砂八钱，姜汁、面糊为丸，每一两做二十丸。每服一丸，用老姜一块如拇指头大，切开作合子，安药子内，用湿纸裹，慢火煨一顿饭久，取出去纸，和姜细嚼，白汤送下。小儿一粒分四服。

【主治】 男子、妇人气血虚弱，久积阴冷，留滞不化，结聚成形，心腹膨胀，刺痛成阵，上连胸胁；或脾胃久虚，内伤冷物，泄泻注下，腹痛肠鸣；或久痢纯白，时下青黑，肠滑不禁。又治胃脘停痰，呕吐吞酸，痞塞不通，不思饮食，身体沉重，面色痿黄，或久患心脾疼痛。

【宜忌】 孕妇不得服。

10702 姜连丸

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】 黄连（去须） 龙骨（煅） 白石脂 川姜（炮） 枯矾各一两

【用法】 上为末，以粟米粥为丸，如麻子大。每服三十丸，乳食前米饮送下。

【主治】 ①《卫生总微》：小儿诸利。②《普济方》：元脏久冷，滑泄不止，饮食不进，渐至危困。

10703 姜连丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】 宣黄连（去须） 生姜（连皮同黄连炒）各四两 肉豆蔻（面裹煨） 当归（去芦）各二两 罂粟壳三两（去顶蒂，瓤，蜜炒） 干姜（炮，洗） 阿胶（蛤，蚬炒成珠）各一两

【用法】 上为细末，以枣子四十九枚，生姜四两切片，银石铫内同枣子水浸，煮候干，取枣去皮核，捣成膏为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【主治】 痢下赤白。

10704 姜附丸

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐） 一分 干姜（炮）三分 乌头（炮裂，去皮尖）一分 吴茱萸（汤浸一宿，焙干，炒）半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，空腹以酒送下，日三夜一；未效，稍加丸数。

【主治】 心中寒，心痛彻背，背痛彻心，或心下结实。

10705 姜附汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】 参术姜附汤（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】 人参 附子（炮，去皮脐）一两 干姜（炮） 白术各五钱

【用法】 上作二剂，水煎服。

【主治】 疮疡，真气亏损，或误行汗下，或脓血出多，失于补托，以至上气喘急，自汗盗汗，气短头晕。

10706 姜附汤

【方源】《赤水玄珠》卷二。

【组成】 干姜五钱 熟附子三钱

【用法】 水二钟，煎八分，作二次服。或虑此方太燥，即以附子理中汤相继服。

【主治】 中寒口噤，四肢强直，失音不语，忽然晕倒，口吐涎沫，状如暗风，手足厥冷，或复烦躁；兼阴症伤寒，大便利而发热；及中脘虚寒，久积痰水，心腹冷痛，霍乱转筋，四肢厥逆。

10707 姜附汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】 杜仲 干姜（炮） 附子（炮）

【用法】 水煎服。

【主治】 腰脐寒痛，腰间如冰，得热则减，得寒则增，脉必紧。

10708 姜附散

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】 香附子一斤 生姜三斤

【用法】 生姜捣汁，浸香附一宿，晒干再浸，再晒，以姜汁尽为度，为末。每服二钱，米饮调下。

【主治】 膈气不通，胸膈间结块，大如拳，坚如

石，呕吐恶心，饮食不下。

10709 姜矾散

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】 枯矾 干姜各等分

【用法】 上为末，先用细茶、食盐煎汤洗之，后用此散掺之。

【主治】 一切诸疮发痒者。

10710 姜柏散

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】 干姜 黄柏各等分

【用法】 各为末，共合一处。干搽口内，温水漱口。

【主治】 口糜。

10711 姜桂散

【方源】《直指》卷五。

【组成】 辣桂 川白姜（不炒）各一两 蓬莪术半两

【用法】 上为末。每服一钱，温酒调下。

【主治】 心中卒痛，腹胁气滞。

10712 姜黄丸

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】 二味消毒丸(《杏苑》卷三)。

【组成】 僵蚕一两 大黄二两

【用法】 上为末，姜汁为丸，如弹子大。每服一丸，井水入蜜少许研，徐徐食后呷服。

【主治】 头面肿大疼痛并喉痹。

10713 姜黄散

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】 姜黄（微炒） 当归（切，焙）各一两 木香 乌药（微炒）各半两

【用法】 上为散。每服二钱匕，煎茱萸醋汤调下。

【主治】 心痛不可忍。

10714 姜黄散

【方源】《妇人良方》卷一引《专治妇人方》。

【组成】 川姜黄（成片子者）四两 蓬莪术 红花 桂心 川芎各一两 延胡索 牡丹皮 当归各二两 白芍药三两

【用法】 上为细末。每服一钱，水半盏，酒半盏，煎至七分，热服。

【主治】 血脏久冷，月水不调，脐腹刺痛。

10715 姜黄散

【方源】《妇人良方》卷二十。

【组成】 没药一分 川姜黄末三分

【用法】 以水、童子小便各一盏，入药煎至一盏半，分作三服，通口服；约行五七里，再进一服即止。

【主治】 产后腹疼。

10716 姜黄散

【方源】《普济方》卷二十四。

【组成】 姜黄 滑石各二两 木通一两

【用法】 上为细末。每服一钱，水一盏，煎七分，温下，一日三次。

【主治】 五般淋。

10717 姜黄散

【方源】《赤水玄珠》卷十二。

【组成】 姜黄 甘草 羌活各一两 白术二两

【主治】 臂痛，非风、非痰者。

【加减】 腰以下痛者，加海桐皮、当归、芍药。

10718 姜豉饼

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】 生姜一两（碎切） 生葱五根 豆豉七钱（润者） 生盐一钱 生蒜七个（碎切） 酢糟一灯盏（无有糟酒代） 穿山甲（汤浸透，取甲，锉碎，同热灰铛内慢火炒令焦黄色）五钱

【用法】 石钵内同杵烂，捻作饼子，二寸阔，用微火炒热，带温贴脐上，外以绢帕兜住；如冷，依前法换带温者贴之，或再以火烘暖亦好。先投解表散，后用此药贴之。

【主治】 久因湿气中于膀胱，复为风邪客热攻激，小便不利，脐凸腹胀，食减作痛。

10719 姜橘汤

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】 姜橘散(《金鉴》卷五十二)。

【组成】 白姜二钱（炮） 陈橘皮（去白）一两 粉草（炙）三钱

【用法】 上为末。每服半钱或一钱，用温枣汤调化，空心少与缓服。

【功用】 温中定吐。

【主治】 ①《活幼心书》：脾慢胃冷，呕吐不止。②《金鉴》：小儿寒吐，朝食暮吐，乳食不化，吐出之物不臭不酸，四肢逆冷，面唇色白。

10720 姜芩四物汤

【方源】《金鉴》卷四十四。

【组成】 当归 赤芍 熟地 川芎 姜黄 黄芩 丹皮 延胡索 香附（制）各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 经水先期而至，血涩少，其色赤者，乃热盛滞血。

10721 姜砂二陈汤

【方源】《会约》卷八。

【组成】干姜（炒）一二钱　砂仁（炒）七八分　陈皮（去白）　半夏　茯苓各一钱半　炙甘草七分

【用法】水煎，温服。

【主治】胃寒胀满，或伤生冷，或寒痰滞塞，恶心。

【加减】如气滞不快者，加厚朴；如伤湿者，加苍术；如食滞者，加神曲、麦芽、山楂之属；如宿食宿水在上焦者，宜用此汤探而吐之，或用盐炒红滓水服，探吐最妙。

10722　姜桂参苓首乌汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】人参三钱　首乌三钱　桂枝三钱　甘草二钱　茯苓三钱　干姜二钱

【用法】煎大半杯，温服。

【主治】目珠塌陷。

10723　姜附赤石脂朱砂丹

【方源】《此事难知》。

【异名】朱砂丹（原书同卷）、姜附赤石脂丸（《赤水玄珠》卷十三）。

【组成】附子半两　生干姜半两（不炮）　朱砂一两（另研）　赤石脂一两半（水飞）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如黑豆大。每服十五至二三十丸，米饮送下；茯苓汤送下尤妙。

【主治】小便数而不禁，怔忡多忘，魇梦不已，下元虚冷，遗尿，精滑，或阳虚精漏不止，或肾气虚寒，脾泄肾泄。

10724　送胞汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【异名】送胎汤（《辨证录》卷十二）。

【组成】当归二两（酒洗）　川芎五钱　益母草一两　乳香一两（不去油）　没药一两（不去油）　芥穗三钱（炒黑）　麝香五厘（研，另冲）

【用法】水煎服。

【主治】正产胞衣不下，心烦意躁，时欲昏晕。

【方论选录】《辨证录》：此方以当归、川芎补其气血，以荆芥引气血归经，用益母草、乳香等药逐瘀下胎。新血既长，旧血难存，气旺上升，瘀浊自然迅降无留滞之苦也。

10725　祛风丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】没药（研）　木鳖子各一两　防风（去叉）半两　乳香（研）一分　血竭（研）半两　乌头（炮裂，去皮脐）一两半　荆芥穗半两　青橘皮（汤浸，去白，焙）一两　五灵脂（研）二两半。

【用法】上九味，除研者外，为细末，再和匀。用醇酒熬成膏，为丸如鸡头子大。每服一丸，热酒送下。

【主治】风，身体疼痛。

10726　祛风丸

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】绿豆粉　川乌头（炮）　草乌头（炮）　天南星　半夏各一两　甘草　川芎　藿香叶　零陵香　地龙　蝎梢各三钱　白僵蚕（淘米泔浸，去丝）　川姜半两（炮）

【用法】上为末，每一两，用绿豆粉一两，（又一法：用药一两，以白面二两），滴水为丸，如梧桐子大。每服五丸至七丸，细嚼，茶酒送下；食后初服三丸，渐加。

【主治】①《宣明论》：中风偏枯，手足战掉，语言謇涩，筋骨痛。②《儒门事亲》：上下齿痛，由于风热甚者。

10727　祛风散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】干姜一两（洗净）　铜绿一钱

【用法】上为细末。每用一字，于铜盂内以沸汤浸，澄清洗眼，渐渐闪开眼，放药入眼内，连睑通洗，直至药冷住，闭眼少时方开，洗之半月，赤烂自除。如冷，再烫令热，更洗一次。

【主治】风眼连睑赤烂，隐涩疼痛。

10728　祛风散

【方源】《永乐大典》卷一三八七九引《大方》。

【组成】白附子　白术　白芷　薄荷叶　藁本　防风（去叉）　芎藭　羌活　天麻　山药　细辛　全蝎（去毒）各一两　甘草（煨）　藿香各二钱

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，煎七分，去滓服。

【功用】理气祛风。

【主治】手足肢体麻痹。

10729　祛伤散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】川断一两五钱　全归二两　羌活一两　独活一两　加皮一两五钱　川芎五钱　牛膝一两　肉桂三钱　草乌五钱　细辛四钱　乌药一两　红花五钱　川乌五钱　甘草五钱

【用法】上为细末。热酒冲服。

【功用】通经活络，散寒祛瘀。

【主治】跌打损伤。

10730　祛毒散

【方源】《洞天奥旨》卷十三。

【组成】 白芷一两 生甘草五钱 夏枯草二两 蒲公英一两 紫花地丁一两 白矾二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 蛇咬疮毒。

10731 祛涎丸

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 天南星四两 半夏九两半 白附子二两六钱 川乌头七钱半

上并生为细末，用生绢袋盛，以井花水揉洗澄滤，有滓更研，再入袋摆洗尽，瓷盆中日晒夜露，每至晓澄去宿水，别换井花水，搅匀晒，春五日，夏三日，秋七日，冬十日，去水晒干如玉片，方入后诸药：

白花蛇（酒浸，去皮骨，焙干，称）一两 剑背乌梢蛇（酒浸一宿，去皮骨，焙干，称）一两 白僵蚕一两（炒去丝嘴） 全蝎一两（去毒，微炒） 川芎二两 天麻二两

【用法】 上为细末，生姜自然汁煮糊为丸，如绿豆大，以飞研细朱砂一两，麝香末二钱为衣，风干，密器中盛之。每服三十丸，食后生姜、薄荷汤送下。

【主治】 风痰壅盛，头目昏痛，旋晕欲倒，呕哕恶心，恍惚健忘，神思昏懵，肢体烦疼，颈项拘急，头面肿痒，手足不举，或时麻痹。

10732 祛痫饮

【方源】《证治宝鉴》卷二。

【组成】 天竺黄 陈皮 半夏 茯苓 甘草 胆南星 蝉蜕 僵蚕 麻黄 杏仁 天麻 葛根 远志 麦冬 羌活 防风 枳壳 竹沥

【用法】 水煎服。

【主治】 痫。忽然僵仆，手足劲强，半晌乃苏，俗名羊儿风。

10733 祛痛汤

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】 当归四钱 川芎二钱 天仙藤一钱 杜仲三钱（炒） 炒川断二钱 生沙苑子三钱 延胡三钱 肉桂五分 小茴四分（炒）

【用法】 水煎，入酒少许冲服。

【主治】 腰痛，小腹痛，不论虚实皆治。

【加减】 如小腹痛甚者，必瘀多，加青皮一钱，炒桃仁一钱，韭白一握，水煎服。

10734 祛湿汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】 泽泻 黄柏 白茯苓 木通各一钱 防己 苍术 杜仲 破故纸各一钱六分

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 湿热腰痛，重坠如带数千钱者。

10735 祛痰丸

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】 天南星（生） 半夏（生） 赤茯苓（去黑皮） 干姜（炮） 陈橘皮（汤浸去白，焙）各等分

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至四十丸，温米饮送下，不拘时候。

【主治】 风头旋，痰逆恶心，咽膈不利。

10736 祛痰丸

【方源】《医统》卷十。

【组成】 防风 天麻 白僵蚕 白附子（炮）各一两 全蝎（炒，去足） 木香五钱 朱砂 猪牙皂角一两（炒） 白矾五钱 半夏（汤泡七次，研为末，称六两作二分，一分生姜汁作面，一分皂角洗浆作面） 南星三两（一半水泡白矾浸，一半皂角浆浸一宿）

【用法】 上为末，姜汁糊丸，如梧桐子大。每服七十丸，食远姜汤送下。

【主治】 诸痫风证。

10737 祛癫汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】 人参五钱 白术一两 肉桂一钱 干姜一钱 白芥子五钱 甘草五分 菖蒲五分 半夏三钱 陈皮一钱

【用法】 水煎服。

【功用】《古今名方》：益脾健胃，温中散寒，化痰祛癫。

【主治】 癫症。

【方论选录】 用人参、白术专补脾胃，用桂、姜以祛寒邪，用白芥子、半夏以消顽痰，用甘草、菖蒲以引入心而开窍，自然正气回而邪痰散。

10738 祛湿药油

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 苦参四两 薄荷三两 白芷三两 防风三两 芥穗四两 连翘四两 白鲜皮五两 鹤虱草三两 大黄三两 苍术三两 威灵仙四两 大枫子（碎）十两 五倍子（碎）五两 香油二十斤

【用法】 将群药放香油内一昼夜后，文火炸黄焦，过滤，每斤油加青黛面五分。调药粉外敷，或涂油后外撒药粉，也可做清洁剂。

【功用】 除湿润肤。

【主治】 急性湿疹（风湿疡），接触性皮炎。

【宜忌】 慎勿入目、入口。

10739 祛湿药粉

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【异名】祛湿散。

【组成】川黄连八钱 川黄柏八两 黄芩四两八钱 槟榔二两二钱

【用法】直接撒扑，或用植物油调敷，或配制软膏用。一般丘疹样或有少量渗出液的皮损，可以直接撒扑或用鲜芦荟蘸药外搽，流水多或脓汁多者可用油调外用，暗红干燥脱皮者可用药粉配成软膏。

【功用】清热解毒，除湿止痒。

【主治】急性湿疹，接触性皮炎，脓疱疮，婴儿湿疹。

【宜忌】阴疮禁用。

10740 祛湿药膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【异名】祛湿软膏(《中医皮肤病学简编》)。

【组成】苦参四两 薄荷三两 白芷三两 防风二两 芥穗四两 连翘四两 苍术三两 大黄三两 鹤虱草三两 威灵仙四两 白鲜皮五两 五倍子五两 大枫子十两 青黛面六钱 白蜡一百二十两 香油（或豆油）二十斤

【用法】先把群药碾碎，放入油内浸泡一昼夜，后用文火炸至焦黄，过滤去滓，离火（青黛除外）称其重量，趁热兑入白蜡。春、秋季节每斤药油兑蜡四两，冬季兑蜡三两，夏季兑蜡五两。青黛后下，每斤药油兑五分，搅拌均匀冷却成膏。

【功用】清热除湿，润肤去痂。

【主治】①《赵炳南临床经验集》：单纯糠疹，鱼鳞癣以及皮肤干燥脱屑皮损。②《中医皮肤病学简编》：神经性皮炎。

10741 祛风白芷散

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】白芷三钱 黄连 黄柏 黄丹各二钱 茯苓一钱五分 轻粉一钱

【用法】上为细末，用油调搽癣疮上。或加孩儿茶二钱，麝香二分亦可。

【主治】面上风癣疮。

10742 祛风地黄丸

【方源】《金鉴》卷六十八。

【组成】生地 熟地各四两 白蒺藜 川牛膝（酒洗）各二两 知母 黄柏 枸杞子各二两 菟丝子（酒制） 独活各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，黄酒送下，夏月淡盐汤送下。

【主治】鹅掌风。无故掌心燥痒起皮，甚则枯裂微痛。又名掌心风。

10743 祛风定痛汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】川芎一钱 当归三钱 独活 防风 肉桂 荆芥各五分（炒黑） 茯苓一钱 地黄二钱 大枣二枚

【用法】水煎服。

【主治】产后起居太早，产门感风作痛，衣被难近身体。

10744 祛风胜湿汤

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】黄柏 苦参 银花 白鲜皮 茯苓皮 羌活 防风 荆芥 陈皮

【用法】水煎服。

【功用】清热利湿，祛风止痒。

【主治】湿热型瘙痒。

10745 祛风逐湿散

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】番木鳖（制，净末） 穿山尾甲（制，净末）各三钱 熟附子 桂枝 当归 延胡索各末一钱

【用法】上为末。每服二钱，好陈酒送下。随量饮醉，暖卧取汗，服至痛处更痛，头眩背汗，昏沉片刻即定，定则全愈。服后不觉痛麻，连服数剂，至知觉乃止。

【主治】痛风。周身痹痛，或手足不仁，遍身麻木，属血虚，风湿凝滞者。

10746 祛风换肌丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】威灵仙 石菖蒲 何首乌 苦参 牛膝 苍术 大胡麻 天花粉各等分 甘草 川芎 当归减半

【用法】上为末，新安酒泛丸，如绿豆大。每服二钱，白汤送下。

【主治】白屑风，及紫白癜风，顽癣，淫热疮疥，一切诸疮，瘙痒无度，日久不绝，愈而又发。

【加减】忌牛肉、火酒、鸡、鹅、羊等物。

10747 祛风清热散

【方源】《便览》卷一。

【组成】细辛一分半 酒芩二钱 白芷一钱二分 防风八分 柴胡梢八分 川芎一钱 荆芥七分 羌活七分 甘草五分 蔓荆子三分 天麻七分 石膏一钱半 菊花七分

【用法】水煎，食远热服。

【主治】风热头目昏痛，偏正头风，头痛鼻塞。

10748 祛风清热散

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】当归尾二钱 赤芍二钱 川芎一钱五分 生地黄三钱 黄连六分 黄芩二钱 栀子三钱 连翘三钱 薄荷八分 防风一钱五分 荆芥一钱 羌活二钱 桔梗八分 枳壳一钱 甘草八分 白芷稍一钱

【用法】上锉一剂，加灯草七根，水煎，食后服。

【主治】暴发眼肿如桃，并赤眼痛涩难开者。

【加减】肿痛甚，加大黄、芒消；风热，加蔓荆子、牛蒡子；乌珠痛，加天麻、川乌（生用三片）；犯眼，加苍术、朱砂；眼生翳障，加白蒺藜；眼目被人打伤青肿，加大黄；如杖疮肿痛未破作憎寒壮热，打重血气攻心，加大黄、桃仁；如打扑伤损内重，瘀血不散，加桃仁、大黄。

10749 祛风燥湿汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】乌蛇9克 独活9克 白芷6克 藁本9克 黄柏9克 白鲜皮9克 银花9克 甘草6克

【功用】驱风，除湿，清热。

【主治】肾囊风（阴囊湿疹，阴囊神经性皮炎），风重于湿，肾囊干燥发痒，搔后略有出水者。

【方论选录】乌蛇、独活、白芷、藁本、白鲜皮驱风止痒，黄柏、银花、甘草燥湿清热。

10750 祛火外消汤

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】地榆三钱 白及三钱 柏叶三钱 炒栀子二钱 白芍五钱 当归五钱 生甘草一钱

【用法】水煎服二剂，伤轻者药减半。

【主治】汤烫油烧。

10751 祛毒化肿汤

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】连翘 天花粉各一钱 当归 贝母 黄芩（酒炒）各七分 甘草节 桔梗 柴胡 昆布 海藻各五分 瓜蒌仁八分

【用法】上㕮咀，水煎熟，食远温服。

【功用】祛毒化肿。

【主治】瘿气发于颈项。

10752 祛热搜风饮

【方源】《回春》卷八。

【组成】苦参 金银花 柴胡 连翘 片芩 荆芥 黄柏（炒） 黄连（炒） 生地黄 薄荷 独活 枳壳（麸炒） 防风 甘草（蜜炙）

【用法】上锉。水煎，食远热服。

【主治】疥及脓疱疮。

10753 祛湿健发汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】炒白术 猪苓 茯苓块 萆薢 首乌藤 白鲜皮各15克 车前子（包） 川芎 泽泻 桑椹各9克 赤石脂 生地 熟地各12克

【功用】健脾祛湿，滋阴固肾，乌须健发。

【主治】脂溢性脱发。

【宜忌】避免用肥皂洗头。

【方论选录】方中炒白术、泽泻、猪苓、茯苓块、萆薢、车前子健脾祛湿，利水而不伤其阴；生熟二地、桑椹、首乌藤补肾养血，以助生发；川芎活血，且能引药上行；白鲜皮除湿散风止痒，以治其标；赤石脂能收敛，旨在减少油脂的分泌。

10754 祛瘀四物汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】酒生地 归尾 赤芍各9克 川芎3克 益母草6克 刘寄奴9克 红花1.5克

【用法】水煎服。

【主治】上胞下垂。

【方论选录】方中用四物汤，意在补血调血；而用归尾、赤芍，不用白芍、归身，是为增强其活血之力；益母草活血通经，有祛瘀生新之效，刘寄奴主跌仆损伤，有破血行瘀之功。

10755 祛痰定癫汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【异名】定癫汤（《集成良方三百种》）。

【组成】人参三钱 白术五钱 白芍五钱 茯神三钱 甘草一钱 附子一片 半夏三钱 陈皮一钱 菖蒲一钱

【用法】水煎服。

【主治】癫痫，卒然昏倒，口吐白沫，作牛羊马声。

【方论选录】参、术、茯、芍皆健脾平肝之圣药，陈皮、半夏、甘草不过消痰和中，妙在用附子、菖蒲以起心之迷，引各药直入心窍之中，心清则痰自散而癫痫自除矣，既不耗气，又能开窍，安有死法哉。

10756 神力丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】牛膝（去芦头，酒浸一宿，焙干） 肉苁蓉（酒浸一宿，焙干） 何首乌 川椒（去黑子闭口者，炒）各二两 木鳖子（去壳） 天南星（炮） 茴香（炒） 防风（去芦头） 萆薢 附子

（炮，去皮脐） 地龙（去土，微炒） 羌活（去芦头） 乌药 白蒺藜（炒，去刺） 骨碎补（去毛） 金毛狗脊（去毛） 黄耆 赤小豆覆盆子 白附子各一两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十至五十丸，空心以温酒或盐汤送下。

【主治】 风寒湿痹，客搏经络，四肢拘挛，及瘫缓躄曳，脚膝无力，筋骨疼痛。

10757 神功丸

【方源】 《兰室秘藏》卷中。

【异名】 神效丸（《片玉心书》卷五）。

【组成】 兰香叶 当归身 藿香（用叶） 木香各一钱 升麻二钱 生地黄（酒洗） 生甘草各三钱 黄连（去须，择净，酒洗） 缩砂仁各五钱

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服一百丸，加至二百丸止，食远白汤送下；若治血痢、血崩、肠澼下血等，则空心以米汤送下。

【主治】 多食肉人口臭不可近，牙齿疳蚀，牙龈肉将脱，牙齿落血不止；并治血痢及血崩，血下不止，血下褐色或紫色、黑色，及肠澼下血，脉洪大而缓者；及治麻木厥气上冲，逆气上行，妄闻妄见者。

【方论选录】 《古方选注》：东垣意在清热，仍以去湿为首务。湿淫所胜，治以黄连、木香，以苦燥之；佐以兰香、藿香，以辛散之。热淫所胜，治以木香、砂仁之苦温；佐以升麻、甘草之甘辛；反佐以清胃散中之当归、生地滋湿之品，引领风燥之药，并去其血分之湿热。

10758 神功饮

【方源】 《玉案》卷六。

【组成】 忍冬藤 蒲公英 甘草节 金银花各二钱 瓜蒌一个（连壳）

【用法】 生酒煎服。

【主治】 妇人乳内一核，初起如钱，不作疼痒，三五年成功红肿，溃时无脓，惟流清水，形如岩穴之凹。

10759 神功散

【方源】 《外科经验方》。

【组成】 黄柏（炒，为末）一两 草乌（炒，为末）一两

【用法】 上以漱口水调，入香油少许。搽患处。如干，仍用前水润之。

【主治】 发背痈疽及诸疮，不问肿溃。

【宜忌】 《准绳·疡医》：忌气怒、房室劳役；饮酒之人忌饮酒并羊、鸡、鱼、肉、瓜茄、姜辣之物。

【备考】 《准绳·疡医》本方用法：发背痈疽等疮才起者，将药敷于患处留头，候药干用淘米水常湿润，每日换药敷一次；如疮已成重患将溃烂者，先将槐枝、艾叶煎汤，顿温将疮洗净，用绢帛展去脓血，以香油润患处，用绵纸仍照患处剪成圆钱留头，贴上后用药涂于纸，如干依前用淘米水润，日换一次，听其自然流脓，不可手挤，如敷药后病人觉疮住疼减热即愈，如生肌则腐肉自落，腐而不落者剪割亦可。如治对口并脑疽，不必洗去旧药，逐次添药，恐动疮口惹风也。

10760 神术汤

【方源】 《重订通俗伤寒论》。

【组成】 杜藿香三钱 制苍术一钱半 新会皮二钱（炒香） 炒楂肉四钱 春砂仁一钱（杵） 薄川朴二钱 清炙草五分 焦六曲三钱

【功用】 温中疏滞。

【主治】 素禀湿滞，恣食生冷油腻而成湿霍乱，陡然吐泻腹痛，胸膈痞满。

【方论选录】 君以藿、朴、橘、术温理中焦，臣以楂、曲消滞，佐以砂仁运气，使以甘草缓其燥烈之性。此为温中导滞，平胃快脾之良方。

10761 神术散

【方源】 《杨氏家藏方》卷三。

【组成】 苍术五两（米泔浸一宿） 藁本（去土） 香白芷 羌活（去芦头） 细辛（去叶土） 甘草（炙） 川芎各一两

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，葱白三寸，同煎至七分，温服，不拘时候；微觉伤风鼻塞，只用葱茶调下。

【主治】 ①《杨氏家藏方》：四时瘟疫，头痛项强，发热憎寒，身体疼痛；及伤风鼻塞声重，咳嗽头昏。②《张氏医通》：风木之邪，内干湿土，泄利下血，色清稀。

【方论选录】 《张氏医通》：风能胜湿，苍术专主木邪乘土，故能治内外诸邪；风木之邪内干土脏，故用羌、藁、芷、辛等风药，兼川芎以引入血分，甘草以调和胃气，胃气散布有权，泄利下血自止。盖汗即血之液，夺其汗则血中之湿热邪气悉从外泄，而无内滞之患矣。

【备考】 本方改为汤剂，名“神术汤”（见《张氏医通》卷十三）；改为丸剂，名“神术丸”（见《中国医学大辞典》）。

10762 神白散

【方源】 《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】 石膏 白附子（炮） 天南星（炮）白芷 甘菊花 京芎 天麻各等分

【用法】 上为末。每服一钱，先嚼薄荷二五叶，再以温酒调下。

【主治】 头风。

10763 神白散

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】 益元散加麻黄二两（去节）

【用法】 上为细末。每服三钱，用蜜少许（无蜜亦可），温水调下；或欲冷饮者，新井泉水调下亦得，一日三次；解利发汗，每服水一盏，加葱白五寸，豆豉五十粒，煮取汁七分调，并三四服。以效为度。

【主治】 伤寒证用益元散不愈或小减者。

10764 神圣散

【方源】《圣惠》卷四十。

【异名】 神金散（《病机沙篆》卷下）。

【组成】 麻黄半两（去根节） 细辛半两 干蝎半两（一半微炒，一半生用） 藿香半两

【用法】 上为细散。每服一钱，以薄荷酒或荆芥汤调下，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：夹脑风，及洗头后伤风，头偏痛甚者。②《普济方》引《十便良方》：脑风，项背怯寒，脑户极冷，头痛不可忍，连眉骨项彻腮顶痛，并治妇人血气。

【备考】 本方干蝎，《医学纲目》作“干葛”。《普济方》引《十便良方》本方用法：每服二钱，煎荆芥、薄荷汤调下，或茶清、薄荷酒调下。

10765 神芎丸

【方源】《宣明论》卷四。

【异名】 加减三黄丸（《绀珠》卷下）、神芎导水丸（《医学纲目》卷四引《绀珠》）、导水丸（《保命歌括》卷四）。

【组成】 大黄 黄芩各二两 牵牛 滑石各四两 黄连 薄荷 川芎各半两

【用法】 上为细末，滴水为丸，如小豆大。始用十丸至十五丸，每服加十丸，温水送下，冷水下亦得，一日三次；或炼蜜为丸愈佳，以利为度。若热甚须急下者，便服四五十丸，未利再服，以意消息。三五岁小儿，丸如麻子大。此药至善，常服二三十丸，不利脏腑，但有益无损。

【功用】 ①《宣明论》：常服保养，除痰饮，消酒食，清头目，利咽膈，宣通结滞，强神健体，耐伤省病，推陈致新。②《医学六要·治法汇》：清利三焦，宣通郁结。

【主治】 痰火内郁，风热上侵，烦躁多渴，心神不宁，口舌生疮，咽喉干痛，胸脘痞闷，肢体麻痹，皮肤瘙痒，大便干结，小便赤涩，小儿积热惊风。

①《宣明论》：一切头目眩晕，风热杂病，闷壅塞，神气不和，及小儿积热，惊风潮搐。②《御药院方》：肾水真阴本虚，心火狂阳积甚，以致风热壅滞，头目昏眩，肢体麻痹，皮肤瘙痒，筋脉拘倦，胸膈痞闷；或鼻窒鼽衄，口舌生疮，咽嗌不利，牙齿疳蚀；或遍身多生疮疥，或睡语咬牙，惊惕虚汗；或健忘心忪，烦躁多渴；或大小便涩滞，烦热腹满；或酒过积毒；或劳役过度，一切劳损，神狂气乱，心志不宁，口苦咽干，饮食减少，变生风热诸疾，虚羸困倦，或酒病瘦悴；或脾肾阴虚，风热燥郁，色黑齿槁，身瘦耳焦；或热中烦满，饥不欲食；或痺成消中，善食而瘦，或消渴多饮而数小便。③《准绳·类方》：湿内甚，目赤肿或白睛黄色。④《张氏医通》：水肿内外俱实者。⑤《金匮翼》：梦遗。

【宜忌】 ①《宣明论》：脏腑滑泄，重寒脉迟，妇人经病，产后血下不止者，及孕妇不宜服。②《保命歌括》：非气脉实热甚者，不可轻服，常服宜少不宜多。

【临证举例】 梦遗 《金匮翼》：一中年梦遗，与涩药不效，改与神芎丸下之，后与猪苓丸遂愈。

10766 神芎丸

【方源】《医统》卷六十三。

【组成】 藿香 木香各一钱 当归一钱 升麻二钱 生地黄（酒洗） 生甘草各三钱 黄连（炒）砂仁各半两

【用法】 上为末，蒸饼为丸，如绿豆大。每服一百丸，汤送下。

【主治】 食肉多口臭。

10767 神芎散

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】 川芎 郁金各二钱 荆芥穗 薄荷叶 红豆各等分

【用法】 上为末，入盆消二钱，研匀。鼻内搐三二剂耳许。力慢即加药，病甚兼夜搐。

【主治】 风热上攻，头目眩痛，上壅鼻塞眼昏，并牙齿闷痛。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“神功散”。

10768 神曲丸

【方源】《千金》卷六。

【异名】 明目磁石丸（《医方类聚》卷十引《简要

济众方》)、磁石丸(《圣济总录》卷一〇九)、千金神曲丸(《三因》卷十六)、千金磁朱丸(《原机启微》卷下)、磁砂丸(《医学入门》卷七)、磁朱丸(《本草纲目》卷九)、内障神方(《惠直堂方》卷二)。

【组成】 神曲四两 磁石二两 光明砂一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。饮服三丸，每日三次。

【功用】 ①《千金》：益眼力，明目，百岁可读细书。②《中国药典》一部：镇心、安神、明目。

【主治】 肾阴不足，心阳偏亢，眼目昏花，耳鸣耳聋，心悸失眠，癫痫。

①《圣济总录》：肾脏风虚，眼黑生花。②《原机启微》：神水宽大渐散，昏如雾露中行，渐睹空中有黑花，渐睹物成二体，久则光不收，及内障神水淡绿色，淡白色。③《普济方》：虚劳，目暗昏闷。④《古今名医方论》引王又原：耳鸣及聋。⑤《古今名医方论》引柯韵伯：癫病。

【宜忌】 《外台》：忌生血物。

【方论选录】 ①《原机启微》：磁石辛咸寒，镇坠肾经为君，令神水不外移也；辰砂微甘寒，镇坠心经为臣，肝其母，此子能令其实也，肝实则目明；神曲辛温甘，化脾胃中宿食为佐。生用者，发其生气；熟用者，敛其暴气也。服药后，俯视不见，仰视渐睹星月者，此其效也。②《古今名医方论》引王又原：磁石直入肾经，收散失之神，性能引铁，吸肺金之气归藏肾水；朱砂体阳而性阴，能纳浮游之火而安神明，水能鉴，火能烛，水火相济，而光华不四射欤？然目受脏腑之精，精资于谷，神曲能消化五谷，则精易成矣。盖神水散大，缓则不收，赖镇坠之品疾收而吸引之，故为急救之剂也。其治耳鸣、耳聋等症，亦以镇坠之功，能制虚阳之上奔耳！③《古今名医方论》引柯韵伯：此病非金石之重剂以镇之，狂必不止。朱砂禀南方之赤色，入通于心，能降无根之火而安神明；磁石禀北方之黑色，入通于肾，吸肺金之气以生精，坠炎上之火以定志，二石体重而主降，性寒而滋阴，志同道合，奏功可立俟矣；神曲推陈致新，上交心神，下达肾志，以生意智，且食入于阴，长气于阳，夺其食则已，此《内经》治狂法也，食消则意智明而精神治，是用神曲之旨乎！炼蜜和丸，又甘以缓之矣。④《千金方衍义》：磁禀北方坎水之精，朱禀南方离火之气，以二味质重，故籍神曲发越其沉养之性，以镇神水之不清。

【临证举例】 幻听 《上海中医药杂志》(1981；7:40)：本组7例患者，或为精神分裂症以幻听为突出症状，或系精神分裂症经过治疗后基本症状消失而残留幻听者。用磁朱丸治疗，每次6～10克，每日1～2次，一般以一个月为一疗程(最短7天，最长3个月)。治疗后，显效(幻听消失或大部消失)3例；好转(幻听减轻)3例，无效1例。

10769 神曲丸

【方源】 《医学入门》卷七。

【组成】 神曲三两 苍术 陈皮各一两

【用法】 上为末，生姜汁别煮神曲末为糊和丸，如梧桐子大。每服三五十丸，姜汤送下。

【主治】 中脘宿食留饮，酸蜇心痛，口吐清水，嗳宿腐气。

10770 神曲汤

【方源】 《观聚方要补》卷一引《医经会解》。

【组成】 神曲 山楂 连翘 陈皮 半夏 茯苓 麦芽 萝卜子

【主治】 伤于食，身热头疼，噫气作酸，腹硬胀满，粪来通迫作声，下坠臭甚，如抱坏鸡子秽气，脉来沉实。

【加减】 肉积，加草果仁；伤酒，加黄连、葛花、砂仁；气虚，加人参、白术。

10771 神助丸

【方源】 《奇效良方》卷四十。

【异名】 葶苈丸。

【组成】 大戟(主青水，先从左边胁肿起，根在肝) 葶苈(主赤水，舌根肿起，一云脚根肿起，根在心) 甘遂(微炒。主黄水，腰腹肿起，根在脾) 桑白皮(主白水，从脚肿起，根在肺) 连翘(主黑水，从外肾肿起，根在肾) 芫花(醋炒。主玄水，从面肿起，根在外肾) 泽泻(主风水，从四肢肿起，根在骨) 藁本(主石水，从肾肿起，根在膀胱) 巴豆(去油。主蠱水，从小腹肿起，根在小肠) 赤小豆(主气水，或盛或衰，根在腹)

【用法】 上用所主药一两，余者各半两，研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，茯苓汤送下，每日三次。病痊后便服鸭头丸。

【主治】 十种水气，面目四肢遍身俱肿。

【宜忌】 忌盐百日外，忌鱼、虾、面食、一切毒物、房事。

10772 神龟散

【方源】 《洞天奥旨》卷八。

【组成】 大龟二个(一雌一雄) 远志二两 麦冬二两 山萸肉四两 肉桂一两 白术(炒)五两 苍术二两 熟地十两 玄参十两 茯神四两 何首乌十两(生用) 桑椹四两 紫花地丁四两 夏枯草

五两

【用法】 上为细末，将大龟饭锅蒸熟，火焙干为粉，同用蜜为丸。每服三钱，早、晚饭后白滚水送下，一料必痊愈。

【主治】 心肾不交，瘰疬久不愈者。

10773 神应丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】 新柏叶（蒸热，焙干） 槐花（瓦上炒） 鸡冠花（瓦上焙）各等分

【用法】 上酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】 肠风下血。

10774 神应丸

【方源】《证治宝鉴》卷六。

【组成】 大黄 鳖甲 桃仁 当归 生地黄 人参 甘草 黄芩

【用法】 韭汁和为丸，朱砂为衣。

【功用】 消其瘀血。

【主治】 郁滞日久则旧血不去，新血不生，气涩血枯，变为干血劳证。证见肌肤甲错，面目黧黑，咳嗽困倦，偏身黄肿，月事不行。

【宜忌】《证治汇补》：此药只可一服，病深者，一月后再服除根，不可多服。惟少男室女、孀妇可用，若男女交接者禁用。忌荤、冷、油腻物。

【方论选录】《医略六书》：干血内结，阻遏经气而蓄泄无权，故瘀热不化，郁久成劳。男子则遗精，女人则不月焉。大黄荡热启闭，酒制引入血分以通经；人参扶元补气，生用少佐诸药以助力；鳖甲入阴散结；桃仁入血破坚；甘草缓中州之气；黄芩清蒸热之余；当归养血活血，资助生地以滋新血也。此推陈致新之剂，洵为干血内结成劳之专方。丸以韭汁开血结，衣以朱砂宁神室，下以红花通经闭，地骨皮退蒸热，桑白皮清肺气，俱以降火散瘀之童便煎服。

【备考】《证治汇补》本方用大黄四两（醋炙），鳖甲、桃仁各一两，当归、生地黄各八钱，人参、甘草、黄芩各三钱。用韭汁糊为丸，每丸六钱，朱砂为衣。经闭，红花酒送下；骨蒸，加地骨皮；咳嗽，加桑白皮，俱用童便煎下，少倾饮酒一杯。至午后，当利一二行为验，啜温粥碗许。

10775 神应散

【方源】《三因》卷七。

【组成】 玄胡索 胡椒各等分

【用法】 上为末。每服二大钱，酒半盏，水半盏，煎七分，食前温服。

【功用】《医统》引《医学集成》：散气开郁。

【主治】 诸疝，心腹绞痛不可忍。

10776 神应散

【方源】《医统》卷六十引《医学集成》。

【组成】 玄胡索 胡椒 小茴香各等分

【用法】 上为末。每服二钱，酒调下。

【功用】 散气开郁。

【主治】 寒疝，诸疝，心腹痛不可忍。

10777 神奇散

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】 当归一钱 川芎七分 白芍药（酒炒）一钱 生地黄二钱 陈皮八分 砂仁七分 半夏（姜制）八分 白茯苓一钱 白术（土炒） 香附（醋炒）一钱 枳实（炒） 一钱 乌梅三个 藿香一钱 赤茯苓一钱 槟榔一钱 木通一钱 猪苓一钱 黄芩（炒）一钱 黄柏（酒炒）一钱 知母（人乳拌炒）一钱 赤芍药一钱 天门冬（去心）一钱 麦门冬（去心）一钱 甘草八分

【用法】 上锉一剂。用水二钟，煎一钟，入童便一盏服。

【主治】 噎食翻胃，三阳枯竭。

10778 神和散

【方源】《史载之方》卷上。

【组成】 草豆蔻 肉豆蔻 陈橘皮 白术各半两 厚朴（去粗皮） 丁香 木香 大芎 莲莪术各一分 吴茱萸三铢 诃黎勒三铢 芍药十铢

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏，加大枣二个，同煎八分，空心和滓服。

【主治】 腹痛，由湿邪所胜。腹满而痛，食减体重，四肢不举，腹鸣肠泄。

10779 神柞饮

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】 生柞枝（洗，锉） 益母草各一两 川芎五钱 当归五钱 人参三分

【用法】 水二钟，煎一钟，温服。

【主治】 少妇初产，交骨不开，或因临盆太早，用力摧逼，儿横腹内，诸药无效者。

【方论选录】《沈氏经验方》：用柞枝取其滑泽，益母动血活血，芎、归养血调气，人参接养母力，自必脱然而生矣。服药后产妇须仰卧片时，待药力通过，交骨自开，儿身顺正，然后扶起临盆，则产母全不费力也。

10780 神香散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 神妙散（《医方易简》卷七）。

【组成】 丁香 白豆蔻（或砂仁亦可）各等分

【用法】 上为末。每服五七分，其者一钱，清汤调下；若寒气作痛者，生姜汤送下，日数服，不拘时候。

【功用】《证治宝鉴》：温中散寒。

【主治】 ①《景岳全书》：胸胁胃脘逆气难解，疼痛，呕哕，胀满，痰饮膈噎，诸药不效者。②《霍乱论》：霍乱因于寒湿，凝滞气逆者。

10781 神秘汤

【方源】《三因》卷十三。

【异名】 神授汤（《妇人良方》卷六）。

【组成】 橘皮 桔梗 紫苏 人参 五味子各等分

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏，煎六分，去滓，食后服。

【功用】《杏苑》：润肺，疏利壅塞，补肺益气。

【主治】 ①《三因》：上气，不得卧。②《杏苑》：肺气虚败，壅塞喘息。

10782 神秘汤

【方源】《医学发明》卷四。

【组成】 橘皮（洗） 生姜 紫苏叶 人参 桑白皮（锉，炒）各半两 木香 白茯苓（去皮）各三钱

【用法】 上㕮咀。以水三升，煎至一升，去滓，分三次温服。

【主治】 病人不得卧，卧则喘者，水气逆上乘于肺，肺得水而浮，而使气不通流，其脉沉大。

10783 神效丸

【方源】《本草纲目》卷八引《选奇方》。

【组成】 密陀僧二两

【用法】 上为末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。一日五丸，浓煎蚕茧、盐汤或茄根汤或酒送下，日增五丸，至三十丸止，不可多服。五六服后，以见水恶心为度，恶心时以干物压之，日后自定。

【主治】 消渴饮水。

10784 神效方

【方源】《外科集腋》卷八。

【组成】 真龙骨一两（火酒煮） 生牡蛎 韭子（炒） 生菟丝各一合

【用法】 上为极细末。每服二钱，空心火酒送下。

【主治】 无梦滑精，及久遗虚寒。

10785 神效汤

【方源】《家庭治病新书》引《经验良方》。

【组成】 海螵蛸 生地 茯苓 侧柏炭各三钱 车前子一两

【用法】 水煎服。

【主治】 血淋或尿血。

10786 神效散

【方源】《三因》卷十二。

【组成】 杏仁（去皮尖，炒） 一两半 甘草（炙） 旋覆花各三两 白术 莲肉（去心皮） 射干（米泔浸） 前胡 御米（略炒） 百合（水浸，去沫） 白扁豆（略炒） 川芎各三两 人参 白茯苓各四两 神曲（炒）五两 桑白皮（炙） 干葛各六两 桔梗七两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个，煎七分，食前温服。

【主治】 老少喘嗽。

10787 神效散

【方源】《普济方》卷一七七引《家藏经验方》。

【组成】 白芍药 甘草各等分

【用法】 上为末。水调服，一日三次。

【主治】 消渴。

【临证举例】 消渴 昔鄂渚李祐之，尝病渴九年，服药不一，往往止而复作，与苏朴宰交，因授此方，服三四日，疾势顿愈，今年余不作，觉前后所服之药，取效无愈于此者，不当以所用之药平易而忽之也。

【备考】《医统》本方用法：上为粗末，每服三钱，水一盏半，煎八分，不拘时，一日三次，滓复煎，疾止则已。

10788 神效散

【方源】《医方类聚》卷八十二引《瑞竹堂方》。

【组成】 川芎二钱 牡丹皮二钱半（去骨） 滑石二钱（研） 御米壳二钱（蜜炒黄色）

【用法】 上㕮咀。每服五钱，加生姜一两，水一盏半，煎至七分，去滓，临卧温服。

【主治】 偏正头疼。

10789 神验丹

【方源】《春脚集》卷二。

【组成】 乳香 没药 木香 朱砂各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，生姜汤调服。

【主治】 胃脘痛。

10790 神捷丸

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】 吴茱萸（汤洗七次） 干姜（炮） 肉桂（去粗皮） 蓬莪术（煨香，切） 附子（炮，去皮脐） 川芎各等分

【用法】 上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子

大。每服五十丸，食前熟醋汤送下。

【主治】 急心痛不可忍，浑身手足厥逆，呕吐冷沫。

10791 神授丸

【方源】《杨氏家藏方》卷卜。

【异名】 面饼丸(《得效》卷七)。

【组成】 密陀僧二两（研） 黄连（去须）一两

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五丸，日加五丸，至三十丸止，临卧用出了蚕的空茧子并茄子根煎汤下。渴止住药。

【功用】 止消渴。

【主治】 消渴。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“神效丸”。

10792 神御散

【方源】《百一》卷五引华宫使方。

【组成】 御米壳（去顶蒂隔，蜜炙，细锉）四两 款冬花（去枝） 佛耳草 甘草（炙） 人参 陈皮（去白） 阿胶（蛤粉炒） 杏仁（去皮尖双仁，麸炒）各一两

【用法】 上为末。每服五钱，水一盏半，加生姜三片，肥乌梅一个（拍碎），同煎至七分，去滓温服，不拘时候，临卧服尤妙。

【主治】 痰盛喘乏，咳嗽不已。

10793 神犀丹

【方源】《医效秘传》卷一。

【异名】 神犀丸(《全国中药成药处方集》武汉方)。

【组成】 犀尖六两 生地一斤（熬膏） 香豉八两（熬膏） 连翘十两 黄芩六两 板蓝根九两 银花一斤 金汁十两 元参七两 花粉四两 石菖蒲六两 紫草四两

【用法】 上用生地、香豉、金汁捣丸，每丸重三钱。开水送下。

【功用】《北京市中药成方选集》：清热解毒。

【主治】 瘟疫，邪热入营，津涸液枯，寒从火化，壮热旬日不解，神昏谵语，斑疹，舌绛干光圆硬。

【备考】《全国中药成药处方集》本方用法：每服二钱，一日二次。小儿酌减。

10794 神愈散

【方源】《医统》卷六十二。

【组成】 细辛 白芷 防风 羌活 当归 半夏 川芎 桔梗 陈皮 茯苓各等分

【用法】 上锉。加薄荷三钱、生姜，水煎服。

【主治】 ①《医统》：肺热，鼻流浊涕，窒塞不通。②《寿世保元》：鼻不闻香臭。

10795 神术煎散

【方源】《医方类聚》卷五十六引《修月鲁般经》。

【组成】 甘草二两 苍术四两 厚朴四两 石菖蒲二两 藿香半两 陈皮半斤（一方无菖蒲，有香附）

【用法】 每服四钱，加生姜、大枣同煎，空心服。

【功用】 辟岚气，去湿寒，导滞气，益元阳。

【主治】 山岚瘴气。

【加减】 感冒，头痛壮热，蒸以葱、豉；痰疟，加半夏；霍乱，加五苓；理气，加木香、槟榔；和血，加当归四物；腿膝痛，加牛膝；下部之疾，加炒茴香；妇人诸气，加枳壳桔梗汤。

10796 神圣饼子

【方源】 方出《永类钤方》卷十一，名见《普济方》卷四十六。

【组成】 玄胡索七枚 青黛二钱 肥牙皂（去皮子）二斤

【用法】 上为末，水调，圆成饼子，如杏仁大。令病者仰卧，以水化开，灌人男左女右鼻中，闻见药到喉少酸，令病者坐，却咬定铜钱一个于当门齿上，当见涎出成盆而愈。

【主治】 ①《永类钤方》：头痛不可忍者。②《奇效良方》：牙痛，赤眼，脑泻，耳鸣。

10797 神效癞药

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 斑蝥五钱 百部二两 槟榔 土荆皮 枫子肉 白及 川椒各一两

【用法】 烧酒浸透，每日用鹅毛搽敷七八次即愈，擦之亦可。

【主治】 阴阳顽癣，无论远年近日诸般癣疮。

10798 神功七宝丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】 腽肭脐三两 黑附子（炒）三两 阳起石（火烧通赤，研）二两 钟乳粉二两 鹿茸（去毛，涂酥炙）三两 龙骨二两 沉香一两 麝香半两

【用法】 上为细末，再入麝香研匀，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下。

【功用】 补益真元，固精实髓，通畅百脉，悦泽颜色，久服延年益寿，强力壮神。

10799 神功内托散

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】 当归二钱 白术 黄耆 人参各一钱五分 白芍 茯苓 陈皮 附子各一钱 木香 甘草（炙）各五分 川芎一钱 山甲（炒）八分

【用法】 上加煨姜三片，大枣二个，以水二茶钟，煎至八分，食远服。

【主治】 痈疽、脑项诸发等疮，至十四日后，当腐溃流浓时不作腐溃，且疮不高肿，脉细身凉者。

10800 神功至宝丹

【方源】《纲目拾遗》卷九引王秋泉方。

【组成】 苦参一斤（为末） 鹅毛（香油炒存性）六两

【用法】 上用黄米糊为丸，朱砂为衣。随病上下，茶汤送下，一日二次。

【主治】 溜脓肥疮，脓窠疮，癞痢头，遍身风癞瘾疹疥癣，瘙痒异常，麻木不仁，诸风手足酸痛，皮肤破烂，阴囊痒极，并妇人阴痒湿痒。

【宜忌】 戒暴怒、房劳、炙煿、发毒之物。

10801 神功妙贴散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】 大南星（圆白者） 蓖麻子仁各四钱 五倍子（淡红者） 白芷（削片） 姜黄 半夏（生） 贝母 白及各二钱 没药 乳香各三钱 花蕊石散二帖

【用法】 上为细末，以井水入蜜调。疮色黯晦者，先用姜汁从晕边抹收入里，留中间如钱大贴膏药；若疮开大，可用纱布摊药，将旧茶笼内白竹叶尾剪两片如疮势（久年篷仰上竹叶亦得），先贴药上，然后贴疮，竹叶出水，藉药以行之。凡敷药须是细末则不痛。

【功用】 收晕敛毒，使脓血化为水出。

【主治】 痈疽。

10802 神仙不老丸

【方源】《寿亲养老》卷四。

【异名】 神仙不老丹（《济阳纲目》卷六十四）。

【组成】 人参（新罗者，须是团结、重实、滋润，去芦头，刷洗净，焙干，薄切，焙燥）二两 川牛膝（长三四尺而滋润者，去苗，刷洗净，焙干，寸截，用酒浸一宿，焙燥）一两半 川巴戟（色黑紫，沉重大而穿心者佳，若色带黄而浮轻者非，洗刷净，焙干，细切，酒浸一宿，焙燥）一两 川当归（大茎其稍如马尾状，滋润辛温芳香者，去芦头，刷净洗，焙干，细切，用酒浸一宿，焙燥）二两 杜仲（截之多丝者，削去粗皮，只取其肉，如去肉桂之法，然后刷洗净，焙干，横理锉碎如豆，用麦面炒令丝断色黄，去面别磨）一两半 地黄（冬节前采，以水浸沉者为是，以其肥者捣取汁，浸令浃，蒸毕，焙干，色黑味甘为度，用时以生干、熟二种焙干，酒浸一宿，滤出，竹刀细切，焙干，各称一两，忌铁器）二两 菟丝子（小如芥子，极坚硬者佳，大而轻者非，用新布撮起，挪洗，焙干，以酒浸一宿，滤出，将温汤淋去酒，焙燥，别磨）二两 柏子仁（色红而滋润者，去壳取仁，细研，临时和入众药）一两 石菖蒲（紧细节密者，去毛，刷洗净，焙干，细切，焙燥）一两 枸杞子（色白而肥润，去蒂洗净，焙干，用酒浸一宿，焙干）一两 地骨皮（色黄，人手轻者佳，重者非，略去浮皮，净洗，焙干，薄切，焙干）一两

【用法】 上不可晒，只用慢火焙，若太燥则又失药气，只八分干，即于风前略吹，令冷热相激，便十分燥，取净称份量，磨如细散，火日炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前、临卧以盐酒、盐汤任下。

【功用】 驻颜，乌髭发，大能温养荣卫，补益五脏，和调六腑，滋充百脉，润泽三焦，活血助气，添精实髓。

【宜忌】 忌食葱白、薤白、芦菔、豆粉及藕、诸般血。

10803 神仙五子丸

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】 覆盆子 五味子 枸杞子 蛇床子 菟丝子（酒浸三日） 干山药 熟地黄 巴戟（去心） 白茯苓（去皮） 续断 苁蓉（酒浸二日） 牛膝（酒浸三日，焙） 肉桂 槟榔 附子（炮）各一两 木香 沉香 乳香（另研） 没药（另研） 破故纸（炒） 木鳖子（去壳） 草薢各半两 茴香一两（盐炒，去盐） 枳实二两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。服至一月，气力俱壮，皮肤滑润，冬不至冷，夏不至热。

【功用】 令白发返黑，活血驻颜。常服强阴气，补元肾，益子息。

【主治】 男子失精，肌肉陷下，形色俱脱，骨蒸虚劳，诸风变易，脾胃久虚，全不思食，四肢怠惰，夜梦泄精，阴囊肿痛，湿润瘙痒。

10804 神仙风药酒

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 秦归身一两 大川芎一两 片白术（去芦）五钱 白茯苓（去皮） 大川乌（炮）各五钱 软防风五钱 荆芥穗五钱 羊角天麻五钱 全蝎（炒）二钱 香白芷五钱 北细辛五钱 何首乌五

钱　新草乌五钱　威灵仙五钱　金刚石斛五钱　川牛膝（去芦）五钱　川独活五钱　羌活五钱　麻黄节三钱　石楠藤五钱　薏苡仁一两　川干姜五钱　赤桂五钱　尖槟榔五钱　宣木瓜五钱　真石乳五钱　明没药二钱　川续断五钱　白苍术（米泔炒）一两　嫩黄耆五钱　两头尖五钱　南木香二钱　汉防己五钱　桑寄生五钱　赤茯神五钱　骨碎补五钱　甘草节三钱　虎骨胫（煅，乳浸）五钱

【用法】 上合一处，用生头酒五斤，文武火熬熟，去火毒。早晚随量饮酒。

【主治】 虚寒之鹤膝，不能动履，肿痛难当，及风湿麻木。

10805　神仙外应膏

【方源】《回春》卷二。

【组成】 川乌一斤

【用法】 上为细末，用隔年陈醋入砂锅内慢火熬如酱色成膏。先用升麻、皮消、生姜煎水洗患处，然后敷药。如病有一年，敷后一日发痒；如病有二年，二日发痒，痒时令人将手拍痒处，以不痒为度。

【主治】 ①《回春》：左瘫右痪，筋骨疼痛，手足拘挛。②《疡医大全》：湿痰流注。

【宜忌】 不可见风。

10806　神仙必效丸

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】 阿胶（炙令燥）二两　当归（切，焙）乌贼鱼骨（去甲）　白芍药　刘寄奴各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，空心米饮送下。

【主治】 便血无度。

10807　神仙百解散

【方源】《局方》卷二（续添诸局经验秘方）。

【异名】 神仙截伤寒四季加减百解散。

【组成】 山茵陈　柴胡（去芦）　前胡（生姜制，炒）　人参　羌活　独活　甘草　苍术（米泔浸，锉，炒）　干葛　白芍药　升麻　防风（去苗）　藁木（去芦）　藿香（去梗）　白术半夏（姜汁制）各一两

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，大枣二个，煎至一盏，热服，不拘时候，并进二服。如要表散，加葱白三寸，淡豆豉三十粒，同煎服，以衣被盖复，汗出而愈。

【功用】 ①《局方》（续添诸局经验秘方）：常服辟瘟疫。②《普济方》：调中顺气，祛逐寒邪，调顺三焦，解表救里，温润肺经，升降阴阳，进美饮食。

【主治】 ①《局方》（续添诸局经验秘方）：伤寒遍身疼痛，百节拘急，头目昏痛，肢体劳倦，壮热憎寒，神志不爽，感冒瘟疫瘴气。②《普济方》：伤寒在表，未传入经，发热恶寒，腰痛；已传经络，胸满短气，肢体烦疼，目睛微痛，耳聋，口燥咽干，或渴不渴，手足自温，或肢厥自利，或不自利，小便反快；或头面感寒，风伤腠理，头痛项强，发热，憎寒，鼻流清涕，咳嗽痰涎；或风湿相搏，骨节烦疼，身体沉重，洒淅恶风，时自汗出等，不问伤寒、伤风、中暑、中暍，食蒸头疼，气逆胸满，失饥吐逆，眩晕恶心，及已经汗后不解，下之不当，吐之不中者。

【加减】 立冬、立春以后不加减；立夏以后，一料加柴胡一分，赤茯苓、当归各半两；立秋以后减柴胡一分，不用当归、茯苓，加干姜（炮）、肉桂（去粗皮）各一分、麻黄（去节）半两。

10808　神仙回胶散

【方源】《胎产指南》卷八。

【组成】 蒲公英　天花粉　金银花　连翘　白芷　甘草

【用法】 上用酒水各半煎，饱服。

【主治】 乳痈。

【加减】 吹乳，加防风；久破烂，加人参、黄耆。

10809　神仙延寿酒

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】 补骨脂　熟地　生地　天冬　麦冬　人参　川芎　当归　白芍　茯苓　木香　砂仁　菖蒲　远志　柏子仁

【用法】 上以酒三十斤煮。

【主治】 老人气血两亏，下体痿弱，不善食而成痨者。

10810　神仙附益丹

【方源】《古今医鉴》卷十一引徐宪副方。

【异名】 神仙附益丸丹（《济阴纲目》卷六）、附益类仙丹（《医略六书》卷二十七）。

【组成】 香附米一斤（童便浸透，取出，水洗净，露一宿，晒干，再浸，再露，再晒，如此二次，用好醋浸透过宿，晒干为末）　益母草十二两（东流水洗净，烘干为末）。

【用法】 上用香附四两，北艾一两，煮汁三分，醋七分，将前二味和合为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心、临卧淡醋汤送下。

【主治】 妇人不孕，脉涩滞者。

①《古今医鉴》：妇人百病。②《济阴纲目》：血虚不孕。③《医略六书》：无孕，脉涩滞者。

【方论选录】《医略六书》：血凝于络，气滞于经，故天癸不调，不能媾精而孕子焉。香附理血中之气，力能解郁调经；益母调冲任之血，性善生新去宿。艾汤以丸之，温酒以行之，使子宫温暖，则血活气行而经脉融和，天癸如度，岂有不孕之妇乎？

10811　神仙拈痛散

【方源】《审视瑶函》。

【异名】拈疼散（《眼科阐微》卷四）。

【组成】生明矾（拣上白明透者佳，研极细如粉样）

【用法】上用鸡蛋清共矾粉调匀。以鹅翎毛蘸药搽肿眼胞疼痛之处。如干再搽数次，其痛即止。

【主治】一切暴发火眼，疼痛昼夜不止。

10812　神仙轻脚丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】远志（去心）　楮实子（炒）　巴戟（去心）　白茯苓（去皮）　五味子（去枝）　杜仲（锉，姜制，炒去丝）　舶上茴香（炒）　菟丝子（淘去泥，酒浸一宿，研成饼）　覆盆子（北地坚实者尤佳）　芡实（干者，去壳）　山茱萸（去核）各一两　干山药　肉苁蓉（酒洗，去皱皮，切片，再用酒浸一宿，焙）　宣木瓜（去瓤，切片，焙）　萆薢各一两半　牛膝（酒浸，锉，再用酒浸一宿，焙干）二两

【用法】上为细末，用北枣肥好不破者二百个，蛇床子四两水煮令熟，去蛇床子，用枣子（去皮核取肉）捣药末杵丸，如梧桐子大。每服三十丸或五十丸，空心温酒送下。

【功用】壮筋骨，延年益气。

【主治】脚弱，不能久行久立。

10813　神仙活命饮

【方源】《女科万金方》。

【异名】秘方夺命散（《袖珍》卷三）、真人活命散（《痈疽神秘验方》）、仙方活命饮（《校注妇人良方》卷二十四）、真人活命饮（《摄生众妙方》卷八）、神功活命汤（《疮疡经验全书》卷四）、十三味败毒散（《医方考》卷六）、真人夺命饮（《惠直堂方》卷三）、当归消毒饮（《医林纂要》卷十）。

【组成】穿山甲　甘草　防风　没药　赤芍药各一钱　白芷六分　归梢　乳香　贝母　天花粉　角刺各一钱　金银花　陈皮各三钱

【用法】用好酒三碗，煎至一碗半。若上身，食后服；若下身，食前服，再加饮酒三四杯，以助药势，不可更改。

【功用】①《袖珍》：消肿，化脓，生肌。②《寿世新编》：消肿止痛，化脓解毒，散瘀消痰。

【主治】一切热毒痈疽疮疡，红肿热痛，脓已成或未成者。

①《袖珍》：一切痈疽，无名恶疮。②《外科发挥》：一切疮疡，未作脓者，已成脓者，发背，脑疽，鬓疽，臀痈，脱疽，瘰疬，杨梅疮，便痈，囊痈，乳痈。③《保婴撮要》：热毒疮疡；一切疮毒肿痛，或作痒寒热，或红丝走彻，恶心呕吐，痘疔痘毒，痘疮焮痛。④《会约》：疮肿色赤，壮热焮痛。

【宜忌】①《痈疽神秘验方》：忌酸薄酒、铁器，服后侧睡觉，痛定回生。②《外科启玄》：忌豆芽、菜粉、油腻等物。③《医方集解》：若已溃后不可服。

【方论选录】①《医方考》：防风、白芷解表而泄其热；乳香、没药散血而消其毒；穿山甲、皂角刺能引诸药至有毒之处；金银花、赤芍药能解热毒于瘀壅之中；痰中诸热，贝母、天花粉可除；气血不调，甘草、陈皮、当归可疗。②《古今名医方论》：穿山甲以攻坚，皂刺必达毒所，白芷、防风、陈皮通经理气，而疏其滞；乳香定痛和血，没药破血散结，赤芍、归尾以驱血热，而行之以破其结；佐以贝母、花粉、金银花、甘草一以豁痰解郁，一以散毒和血，其为溃坚止痛宜矣。③《医方集解》：金银花散热解毒，痈疮圣药，故以为君；花粉清痰降火，白芷除湿祛风，并能排脓消肿；当归和阴活血，陈皮燥湿行气，防风泻肺疏肝，贝母利痰散结，甘草化毒和中，故以为臣；乳香调气托里护心，能使毒气外出不致内攻；没药散瘀消肿定痛，故以为佐；穿山甲善走能散，皂角刺辛散剽锐，皆厥阴、阳明正药，能贯穿经络直达病所而溃壅破坚，故以为使；加酒者，欲其通行周身，使无邪不散也。

10814　神仙既济丹

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】人参（去芦）　石菖蒲（米泔浸一宿）　鹿茸（燎去毛，酥炙）　柏子仁　远志（去心）　菟丝子（淘净，酒浸，研成饼）　巴戟（去心）　鹿角胶（酒化旋入）　牛膝（酒浸一宿，去芦）　白茯苓（去皮）　当归（酒浸一宿，去芦）　五味子（去枝）　诃子（炮，去核）　金樱子　生干地黄（洗净）各一两　鹿角霜四两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大，朱砂、麝香为衣。每服二十丸，空心、食前温酒送下。

【功用】 令心肾之气互相交养，气血荣盛，精固神全，久服精神健壮，轻身延年

【主治】 日以事物交战，损心劳神，神动气散，兼饮食过度，嗜欲无节，亏损精神，气动神疲，阴阳交错，水火不济，精神恍惚，肢体烦疼，夜梦阴交，遗精白浊，以致气衰血弱。

10815 神仙通隘散

【方源】《寿世保元》卷六引贾兰峰方。

【组成】 白硼砂二钱 孩儿茶一钱 蒲黄六分 青黛一钱 牙消六分 枯矾六分 白滑石一钱 片脑二分 黄连末五分 黄柏末五分

【用法】 上为细末。吹喉中。

【主治】 咽喉肿痛，生疮声哑，危急之甚，及虚劳声嘶喉痛。

【备考】《齐氏医案》无“白滑石”，有“潮脑”二分。

10816 神仙减水法

【方源】《普济方》卷一七九。

【异名】 斩龙剑子手。

【组成】 人参 知母 天花粉 苦参 宣连 扁豆 浮萍 麦门冬各一两 黄丹少许 黄耆一两

【用法】 上为细末。每服一钱，新汲水调下。

【主治】 三焦虚热，三消渴疾，不问日夜，饮水无度。

10817 神仙紫花丸

【方源】《医学正传》卷六。

【组成】 白花蛇（一具，出蕲黄州，黑质白纹，龙头虎口，背上二十四个方胜花，尾尖有一佛指甲，新鲜者佳，蛇腐者不堪用，去头尾各四五寸，并一两为率，连皮骨用）一两五钱 何首乌 荆芥穗 威灵仙各四钱 麻黄（连根节）二钱 胡麻子一钱 蛇床子二钱

上细切，同蛇用无灰酒一大碗，浸一宿，去蛇皮骨，通晒干，仍还原酒内，再浸再晒，酒尽为度，待晒极干，共为细末，另包。

木香 沉香各二钱五分 人参一两 当归七钱五分 明天麻 猪牙皂角各五钱 麝香一钱五分 乳香 没药各一钱 明雄黄 辰砂各五分（大块者佳） 肉豆蔻一枚（煨） 定风草（即天麻）二钱半 还瞳子（即草决明）一两

上麝至辰砂五味，各另研极细，不见火，其余草木味亦另研，细罗过，连前五味和匀另包。

防风（去芦） 羌活 甘草 细辛 川芎 独活 苍术（米泔浸一宿） 枇杷叶（去毛筋，焙干） 白芍药 白蒺藜 金银花 五加皮 香白芷 苦参各五钱 胡麻子 白附子（米泔浸，炒） 麻黄 川牛膝 草乌头（米泔浸，炮） 川乌（米泔浸，炮） 石菖蒲各二钱五分

上为细末，另包。

【用法】 用新鲜大枫子二斤，去油黄色者及壳，以瓷罐一个盛之，少入无灰酒，以皮纸竹箬重重包口，勿令泄气，顿滚汤中，勿令没罐口，外以物盖锅口，密封固，文武火蒸，候黑烂为度，杵无渣滓成油，分作三份；每一份入第二号药八钱重，第一号药六钱重，第三号药一两五钱重，和匀，加糯米饭捣极胶粘为丸，如梧桐子大，晒干，勿见火。每服二十丸，渐加至五六十丸，鸡鸣时、午时、临卧时各一服，茶清送下。轻者，一料可愈；重者，二三料除根。

【主治】 ①《医学止传》：疠风及诸般恶疮，风疮。②《中国麻风病学》：麻风，麻木不仁，筋脉枯萎。

【宜忌】 忌房劳，咸酸，酒醋，糟腌，猪羊鸡马驴肉，鱼腥煎煿，水果，五辛，姜椒大料，辛辣热物，荞麦绿豆之类，其余肉味，病愈后一年可食，但猪羊鸡肉，终身用忌。

【加减】 鼻塞声重者，麝香倍用。

【备考】《疡医大全》有赤芍、牛蒡子、石决明、无白芍药、川牛膝、草决明。

10818 神仙解语丹

【方源】《妇人良方》卷三。

【异名】 解语丹（《永类钤方》卷十一）。

【组成】 白附子（炮） 石菖蒲（去毛） 远志（去心，甘草水煮十沸） 天麻 全蝎（酒炒） 羌活 白僵蚕（炒） 南星（牛胆酿，如无，只炮）各一两 木香半两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大，量入辰砂为衣。每服二十至三十丸，生姜、薄荷汤吞下，不拘时候。

【主治】 心脾经受风，言语謇涩，舌强不转，涎唾溢盛；及淫邪搏阴，神内郁塞，心脉闭滞，暴不能言。

10819 神圣吹喉散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】 螺儿青 白僵蚕 焰消 甘草各二两

【用法】 上为细末，用腊月内牛胆一个，取出汁，同药拌匀，却盛在胆内，于透风处阴一百日

外，取出研细。每以一字或半钱，用筒子吹在喉内。

【主治】 走马喉闭，及喉闭肿痛。

10820 神圣香茸散

【方源】《苏沈良方》卷四引《五脏论》。

【异名】 神圣香薷饮(《圣济总录》卷四十)、黄连香薷饮(《伤寒标本》卷下)、黄连香薷汤(《卫生宝鉴·附遗》)、香薷饮(《回春》卷二)、四味香薷饮(《医方集解》)、四物香薷饮(《成方便读》卷三)。

【组成】 香薷穗（经霜者）一两半 新厚朴（取心）二两 川黄连二两 白扁豆一两（焙）

【用法】 先用姜汁四两，一处杵黄连、厚朴二味，令细，炒成黑色，入香薷、扁豆二味，都为末。每服五钱，水一盏，酒一盏，共煎至一盏，入瓷瓶内，蜡纸封，沉入井底，候极冷，一并服二服。

【功用】《医方集解》：散暑和脾。

【主治】 ①《苏沈良方》引《五脏论》：霍乱吐泻、转筋腹痛。②《卫生宝鉴·补遗》：伏暑引饮，口燥咽干，或吐或泻；及脏腑冷热不调，饮食不节，或食腥荤生冷过度，或起居不节，露卧湿地，当风取凉、风冷之气归于三焦，传于脾胃，脾胃得冷，不能消化水谷，致真邪相干，肠胃虚弱，吐利，心腹疼痛，霍乱气逆，发热头痛体疼，虚烦，或转筋拘急疼痛，四肢逆冷，脉欲绝，或烦闷昏塞而欲死者。

【方论选录】 ①《医方考》：暑，阳邪也，干于脾则吐利，干于心则烦心。香薷之香，入脾清暑而定吐利；黄连之苦，入心却热而治烦心；暑邪结于胸中，非厚朴不散；暑邪陷于脾胃，非扁豆无以和中；然必冷服者，经所谓治温以清，凉而行之是也。②《医方集解》：此手少阴、手足太阴、足阳明药也。香薷辛温香散，能入脾肺气分，发越阳气，以散皮肤之蒸热；厚朴苦温，除湿散满，以解心腹之凝结；扁豆甘淡，能消脾胃之暑湿，降浊而升清；黄连苦寒，能入心脾，清热而除烦也。

10821 神龟滋阴丸

【方源】《医学纲目》卷十七。

【组成】 龟版（炙）四两 知母（酒炒）二两 锁阳（酒洗）一两 黄柏（炒赤）二两 枸杞子 五味子各一两 干姜（炮）半两

【用法】 上为末，清水为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】 ①《医学纲目》：舌纵，口角流涎不止，口目槽斜，手足痿软。②《杂病源流犀烛》：膏粱之人，湿热伤肾，脚膝痿弱。

10822 神应救苦丹

【方源】《回春》卷八。

【组成】 大川乌（略炮） 肥草乌（略炮） 苍术 青皮（去瓤） 生地黄 西芎 枳壳（麸炒） 白芍 各五钱 五灵脂二两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，热酒送下，汗出即效。若为小丸亦可，不饮酒者，冬月热水送下。

【主治】 诸风百毒。头风肿痛，心腹痛、脚跟痛、疝气痛、手背痛、遍身骨节痛、破伤风痛、樟疮痛、痈疽发背及一切恶疮痛。

10823 神明补心丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】 远志（去心） 紫石英（飞研） 石菖蒲 各八钱 熟地黄 白茯苓（去皮）各半两 麦门冬（去心） 卷柏（去根土） 人参（去芦头） 丹参 黄耆 白术 泽泻 山茱萸 防风 秦艽 桔梗各四钱 柏子仁 川姜各二钱半 干山药 白蔹 芍药 石膏（飞研） 铁粉（飞研） 神曲（炒） 当归 半夏（生姜制） 牡丹皮各二钱 朱砂（研飞）四钱

【用法】 上为细末，入朱砂令匀，炼蜜和丸，每两作十丸，朱砂为衣。每服一丸，煎人参汤化下，温酒亦得，不拘时候。

【主治】 心气不足，神志不定，恍惚多惊，虚烦少睡，心情沉默，恶闻人声，一切心虚之证。

10824 神砂一粒丹

【方源】《宣明论》卷十三。

【组成】 附子（炮） 郁金 橘红各一两

【用法】 上为末，醋、面糊为丸，如酸枣大，以朱砂为衣。每服一丸，男子酒送下，妇人醋汤送下。

【主治】 一切厥心痛，小肠膀胱痛，不可止者。

10825 神秘漫酒方

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】 何首乌一两 石菖蒲一两 生地黄七钱 明天麻七钱 白附子五钱 白茯苓五钱 苍耳子一两（炒，研细） 五灵脂五钱（炒） 牛膝七钱 天南星七钱（姜汁炒） 二蚕沙五钱（炒） 当归七钱 苍术五钱（米泔水浸炒） 半夏七钱（姜汁炒） 红花五钱 光草乌末五钱 陈皮五钱（去白） 防风五钱 汉防己五钱 芍药五钱 甘草三钱 黄柏五钱 木瓜七钱 川芎五钱 桑树上络藤一两

【用法】 上㕮咀，以布袋盛，悬入坛内，无灰好

酒一斗，瓶口封固，重汤水煮五炷香。不拘时候，饮醉为妙。

【主治】 左瘫右痪，半身不遂，口眼歪斜，一切诸风，疼痛不可忍者。

10826 神效千捶膏

【方源】《医宗金鉴》卷六十二。

【异名】 千捶膏(《药奁启秘》)。

【组成】 土木鳖（去壳）五个 白嫩松香（拣净）四两 铜绿（研细）一钱 乳香二钱 没药二钱 蓖麻子（去壳）七钱 巴豆肉五粒 杏仁（去皮）一钱

【用法】 上合一处，石臼内捣三千余下，即成膏；取起，浸凉水中。用时随疮大小，用手捻成薄片，贴疮上，用绢盖之。

【功用】《北京市中药成方选集》：活血消肿，化坚止痛。

【主治】 ①《医宗金鉴》：疮疡，疔毒初起，并治瘰疬，大人臁疮，小儿利拱头。②《北京市中药成方选集》：疮疡初起，红肿坚硬，瘰疬结核，臁疮溃烂，经年不愈。

【备考】 本方方名，《北京市中药成方选集》引作“瘰疬千捶膏”。

10827 神效木瓜汤

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 吴茱萸（陈者，以沸汤泡七次，炒）四两 干木瓜（细锉，焙干）三两半 橘叶（洗，焙干，切）四两 大腹子二两半（细锉）

【用法】 上锉，如米粒大，拌和。每服二钱半，水二盏，先浸一食久，然后以慢火煎至八分，去滓，澄清汁七分盏，温服，早、晚食前及临卧时各一服，计三服，先服此药约半月余，后服牛膝丸。

【功用】 疏导毒气。

【主治】 脚气。由风湿毒气乘虚攻注下经所致者。

10828 神效东风散

【方源】《医钞类编》卷八引《普门医品方》。

【组成】 川连 黄芩 白芍 楂肉各一钱二分 枳壳 槟榔 厚朴（炒） 青皮各八分归尾 地榆（炒黑） 甘草各五分 红花（酒洗） 木香 桃仁（去皮尖，炒）各三分

【用法】 水煎服。

【主治】 痢疾初起，赤白相兼，腹痛后重。

【宜忌】 忌汗、下、分利、收涩。

【加减】 单白者，去当归、地榆、红花、桃仁；大便结滞，去黄连，加煨大黄。

10829 神效左经丸

【方源】《景岳全书》卷五十六。

【组成】 苍术（米泔浸） 草乌（去皮） 葱白 干姜各四两（上捣烂，装入瓶内，按实，密封瓶口，安于暖处三日，取出晒干，入后药） 金毛狗脊 藁本 白芷 破故纸（酒浸，焙干） 抚芎 小茴香（炒） 穿山甲（炮） 牛膝（酒浸）各二两 川乌（炮） 木瓜 白附子 虎胫骨（酥炙） 乳香（炙） 没药（炙）各一两（另研）

【用法】 上为末，酒糊为丸，如小豆大。每服三四十丸，空心酒送下。

【主治】 诸风寒湿痹，麻木不仁，肢体手足疼痛。

【加减】 此方加当归六两更佳。

10830 神效地黄散

【方源】《普济方》卷三十二引《杨氏家藏方》。

【组成】 地黄五两 丁香一两 苁蓉二两（酒浸） 蛇床子二两 枣子三两 黄精二两半 菟丝子 木香半两 远志二两 白茯苓二两 蛤蚧三两（一对） 人参一两 川楝子一两（炒） 青盐一两（炒） 茴香二两三钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服空心温酒送下。服七日见效。

【主治】 男子肾脏虚损，阳事不举。

10831 神效托里散

【方源】《局方》卷八（宝庆新增方）。

【异名】 神效散(《朱氏集验方》卷十二)、托里散(《医学正传》卷六引《疮疡集》)、神功托里散(《外科发挥》卷二)、金银花散(《外科发挥》卷五)、四妙汤(《医宗说约》卷六)、四金刚(《串雅内编》卷二)。

【组成】 忍冬草（去梗） 黄耆（去芦）各五两 当归一两二钱 甘草（炙）八两

【用法】 上为细末。每服二钱，酒一盏半，煎至一盏，若病在上食后服，病在下食前服。少倾再进第二服，留滓外敷，未成脓者内消，已成脓者即溃。

【主治】 痈疽发背，肠痈，奶痈，无名肿毒，焮作疼痛，憎寒壮热，类若伤寒，不问老幼虚人，并皆治之。

10832 神效麦面汤

【方源】《景岳全书》卷五十九。

【组成】 麦面（炒黄色）一钱 防风 白术（炒） 牡蛎（煅，醋淬） 黄耆（蜜炙）一钱半

【用法】 水一钟半，枣二枚，煎八分，调服辰砂

妙香散。

【主治】 心虚盗汗。

10833 神效吹喉散

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 神效吹口药(《种福堂方》卷三)、吹喉散(《外科传薪集》)。

【组成】 薄荷 僵蚕 青黛 朴消 白矾 火消 黄连 硼砂各五钱

【用法】 上为细末，腊月初一日取雄猪胆七八个，倒出胆汁，用小半和上药拌匀，复灌胆壳，以线札头，胆外用青缸纸包裹，将地挖一孔，阔深一尺，上用竹竿悬空横吊，上用板铺以泥密盖，候至立春日取出，挂风处阴干，去胆皮青纸，瓷罐密收，每药一两加冰片三分，同研极细。吹患上。

【主治】 缠喉风闭塞，及乳蛾喉痹，重舌木舌。

10834 神效沉香丸

【方源】《广笔记》卷二。

【异名】 聚宝丸。

【组成】 真沉香二钱 真麝香八分 血竭一钱五分 乳香一钱五分 缩砂仁二钱 木香二钱 玄胡索一钱 没药五分

【用法】 上为细末，糯米糊为丸，如弹子大，用辰砂一钱五分为衣。烧酒磨服。男妇腹疼及诸气作痛，产后气血攻心，用陈酒磨服；如热气痛，葱汤嚼下；小儿天吊作痛，啼叫不已，葱汤磨服。

【主治】 男子胃脘寒痰结阻，翻胃呕吐，饮食不通；男妇腹痛，诸气作痛，产后气血攻心；小儿天吊作痛，啼叫不已。

10835 神效明目汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 细辛二分 蔓荆子五分 防风一钱 葛根一钱五分 甘草二钱 (一方加黄耆一钱)

【用法】 上㕮咀，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，稍热临卧服。

【主治】 眼睑紧急，致倒睫拳毛，及上下睑皆赤烂，睛疼昏暗，昼则冷泪常流，夜则眼涩难开。

【备考】 本方方名，《医林纂要》引作“防风明目汤”。

10836 神效定痛丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 破故纸(炒) 茴香(淘去砂，炒) 延胡索各一两(炒) 黑牵牛半两(炒)

【用法】 上为细末，研蒜膏子为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前细嚼胡桃酒送下。

【功用】 定痛。

【主治】 腰痛不可忍，坐立不得。

10837 神效参香散

【方源】《局方》卷六(续添诸局经验秘方)。

【异名】 参香散(《医统》卷八十九)、神效参苓散(《嵩崖尊生》卷九、神效参术散(《会约》卷十五)。

【组成】 白扁豆(炒) 人参 木香各二两 茯苓(去皮) 肉豆蔻(去皮)各四两 陈皮(去白) 罂粟壳(去蒂)各十二两

【用法】 上为细末。每服三大钱，温米饮调下，不拘时候。

【主治】 ①《局方》(续添诸局经验秘方)：脏气虚怯，冷热不调，积在脏腑，作成痢疾，或下鲜血，或如豆汁，或如鱼脑，或下瘀血，或下紫黑血，或赤白相杂，或成五色，里急后重，日夜频并，脐腹绞痛，甚不可忍，及噤口，痟蛊，时瘟诸痢。②《会约》：产后泄泻，及痢疾日久，积秽已去，滑泄不止。

10838 神效桂附丸

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】 桂心 附子(炮，米醋浸淬三五次，去脐，火干) 厚朴(姜制) 粉草(炙) 白术(炒)各一两 木香一钱 乳香(另研)二钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心米汤送下。

【主治】 阳气虚，冷漏诸疮。

10839 神效黄耆汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 黄耆汤(《医学入门》卷八)。

【组成】 蔓荆子一钱 陈皮(去白)五钱 人参八钱 炙甘草 白芍药各一两 黄耆二两

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，临卧稍热服。

【主治】 浑身麻木不仁，或头面手足肘背或腿脚麻木不仁；及两目紧急缩小，羞明畏日，隐涩难开，或视物无力，睛痛昏花，手不得近，或目少精光，或目中热如火。

【加减】 如小便淋涩，加泽泻五分；如有大热证，加酒洗黄柏三分；如麻木不仁，虽有热不用黄柏，只加黄耆一两；如眼缩急，去芍药；如麻木甚者，加芍药一两。

【宜忌】 眼缩急者，忌酒、醋、面、大料物、葱、韭、蒜辛物。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典》引作“神功黄耆汤”。

10840 神效鹿胎丸

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林、哈尔滨方)。

【异名】百补鹿胎丸。

【组成】萸肉 萆薢 熟地 生地 寸冬五味 小茴 故纸 益子 鹿胶 杜仲 怀牛膝 青盐 柏仁 归身 巴戟 远志 锁阳 苁蓉 菟丝饼 巨胜 酒母 酒柏 川椒各五钱 仙茅 枸杞 黄精 云苓 人参 山药各一两 首乌二两 鹿胎一具

【用法】将鹿胎洗净晒干，合诸药一处碾细，炼蜜为丸，重二钱一分，大赤金为衣，用棉纸包之，外用蜡皮封固，贮于玻璃瓶或瓷坛中。早晚各服一丸，枣汤为引，或淡盐汤为引。

【功用】补肾填精，调月经，温子宫，益气养血。

【主治】肾虚阳痿，月经不调，子宫寒冷，虚劳。

【宜忌】君相火盛，血热者忌服。

10841 神效葶苈散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【异名】神助散(《局方》卷八)、葶苈散(《圣济总录》卷七十九)。

【组成】甜葶苈三两(隔纸炒令紫色) 牵牛子二两半(微炒) 猪苓二两(去黑皮) 泽泻二两 椒目一两半(微炒)

【用法】上为细散。取葱白三茎(切)，以浆水一大盏，煎取半盏，入清酒半盏，搅令匀，稍热空腹，调下三钱，以人行五里已来，即煮浆水粥，切入葱白，煮令烂熟，更入清酒五合，搅匀，面向东，热吃令尽。至午后来，或小便下三五升，或大便通利，气喘即定，肿减七分，隔日后再服，百日内切好将息。

【主治】十水之病，百方不愈，面目四肢俱肿，气息喘急，寝卧不得，小便渐涩，肿胀气闷，水不入口，垂命欲死。

【宜忌】不得吃盐及诸面食。

10842 神验乌龙丹

【方源】《证类本草》卷十引《梅师方》。

【异名】大圣丹(《百一》卷三)、乌头丸(《医方类聚》卷二十三引《王氏集验方》)、乌龙丸(《普济方》卷九十五)、乌龙丹(《仙拈集》卷一)。

【组成】川乌头(去皮脐) 五灵脂各五两

【用法】上为末，加龙脑、麝香研令细匀，滴水为丸，如弹子大。每服一丸，先以生姜汁研化，次用暖酒调服，一日二次，空心、晚食前服。

【主治】瘫缓风，手足躄曳，口眼㖞斜，语言蹇涩，步履不正。

10843 神验胎动方

【方源】《张文仲方》引《徐王效方》(见《外台》卷三十二)。

【异名】芎藭散(《圣济总录》卷一五五)、当归汤(《圣济总录》卷一五九)、佛手散(《本事方》卷十)、琥珀散(《卫生家宝产科备要》卷三)、圣功川芎汤(《卫生家宝产科备要》卷七)、催生神妙佛手散(《妇人良方》卷十二)、芎藭汤(《普济方》卷三二八)、神妙佛手散(《校注妇人良方》卷十二)、芎归汤(《摄生众妙方》卷十一)、芎归散(《张氏医通》卷十六)、归芎汤(《医学心悟》卷五)、芎归饮(《纲目拾遗》卷三)。

【组成】当归六分 芎藭四分

【用法】上切。以水四升，酒三升半，煮取三升，分三服。若胎死即出。血上心腹满者，如汤沃雪。

【功用】养血活血，祛瘀止痛，催生。

①《圣济总录》：安胎止痛。②《卫生家宝产科备要》：缩胎催生。化恶血，生好血。③《普济方》：调益营卫，滋养血气。④《摄生众妙方》：补血活血，生新逐败。⑤《纲目拾遗》：引血归经。

【主治】妊娠伤胎，胎动不安，腹痛出血，或于死腹中；及产后血虚，恶露不绝，血崩、发热；金疮跌打损伤失血过多，血晕。

①《张文仲方》引《徐王效方》：胎动。②《圣济总录》：妊娠腹痛不可忍；及子死腹中血气不清。③《本事方》：妊孕五七月，因事筑磕著胎，或子死腹中，恶露下，疼痛不止，口噤欲绝。④《卫生家宝产科备要》：产后血虚迷闷，眩晕耳鸣，不省人事，胸膈不快，恶心呕逆，血崩口噤，头痛发热，如伤寒证者。⑤《妇人良方》：伤胎、崩中、金疮、拔牙去血过多，昏晕欲倒者。⑥《普济方》：诸疾气血虚羸，短气，腹中疼痛，面体少色，心忪惊悸，虚烦汗出，时发寒热，倦久无力。⑦《医学心悟》：产后瘀血停积，阻碍新血，不得归经，恶露不绝，腹痛拒按。⑧《纲目拾遗》：失血涌吐。因饱食用力，或因持重努伤脉络，并治跌扑堕打而伤脉络，令人大吐者。

【备考】①《圣济总录》本方用法：上为散，每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。②《本事方》：口噤灌之，如人行五里再服，不过三二服便生。妊孕五七月，因事筑磕著胎，用此药探之，若不损则

痛止，子母俱安；若胎损立便逐下。

10844 神验噎膈方

【方源】《良方集腋》卷上。

【组成】威灵仙二两（水浸一宿取出，捣汁）食盐一钱五分 狗宝末三分

【用法】上药共调和，炖温服。服之少顷，病者觉上焦胸膈之间气机旋扰作动，勿令呕，次日仍用威灵仙二两，浸之隔宿，如前捣汁，入食盐一钱五分，刮入狗宝末四分，调服之，觉动处略下；第三日仍如前法再用威灵仙二两，绞汁入食盐一钱五分，狗宝末五分，调服，少停，动更下，则大便下黑血痰涎。下之后正气虚耗。必须预备三剂，服之则气机通利，病即愈矣。

【主治】噎膈。

【宜忌】愈后必得食淡一年，庶不再发，倘不能食淡，再发不治矣。

10845 神授卫生汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】羌活八分 防风 白芷 穿山甲（土炒，研） 沉香 红花 连翘 石决明（煅）各六分 金银花 皂角刺 归尾 甘草节 花粉各一钱 乳香五分 大黄（酒拌炒）二钱（脉虚便利者不用）

【用法】水二碗，煎八分，病在上部，先服药，随后饮酒一杯；病在下部，先饮酒一杯，随后服药，以行药势。

【功用】宣热散风，行瘀活血，解毒消肿，疏通脏腑。

【主治】痈疽发背，脑疽对口，丹瘤，瘰疬，恶毒疔疮，湿痰流注及一切疮症已成未成者。

【备考】药性平和，功效甚速，诚外科首用方也。

10846 神惠小灵丹

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】番木鳖二两（水煮胀，去皮毛，用麻油二两煠黄色） 甲片（麻油炒）一两 草乌（姜炒）六钱 乳香 没药 雄黄各五钱 蟾酥二钱 麝香二分

【用法】上为细末，酒为丸，如萝卜子大。每服七分，陈酒送下。勿令见风，出汗为妙。如见风发吐，以黄泥水煎饮即解。

【主治】附骨痈疽，诸毒疔肿。

10847 神仙巨胜子丸

【方源】《普济方》卷二二三引《德生堂方》。

【异名】乌金丸（原书卷二二一）、神仙巨胜丸（原书卷二二一）。

【组成】生地黄 熟地黄 何首乌各四两 巨胜子（九蒸九晒）二两 人参 肉苁蓉（酒浸） 牛膝（酒浸） 菟丝子（酒浸） 天门冬（去心，酒浸） 破故纸（酒浸，炒） 巴戟（去心，酒浸） 干山药 五味子 楮实（炙） 覆盆子（净） 鹿茸（嫩红色者，生用） 柏子仁（去壳，另研） 酸枣仁（去壳，另研） 白茯苓 西枸杞各一两 核桃十枚（去壳取仁，另研烂后，入药内再研匀）

【用法】上为细末，用枣一斤，去皮核煮熟研烂，与药末和匀为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心以温酒或盐汤送下，服后干物压之，丸数任意加减。

【功用】滋血气，壮元阳，髭发反黑，安魂定魄，改易容颜，通神仙，延寿命，生骨髓，扶虚弱，展筋骨，润肌肤，补益丹田，接养真气，活血荣颜，百病永除，根本坚固，水火既济，常服身体轻健，气力倍加，行走如飞。

【临证举例】种子延年 昔有一老人，耳聋目昏，年至七十无子，服此药后，齿落更生，发白再黑，二妻生一十三子，寿至一百余岁。

10848 神仙解毒万病丸

【方源】《百一》卷十七。

【异名】神仙追毒丸、圣后丹、玉枢丹、解毒丹、万病丸、紫金锭（《外科精要》卷中）、神仙解毒丸（《医方类聚》卷一九六引《王氏集验方》）、圣授丹（《普济方》卷二八三）、神仙解毒万病丹（《奇效良方》卷六十九）、太乙丹、紫金丹、神仙太乙丹（《外科经验方》）、万病解毒丹（《医学入门》卷七）、神仙太乙紫金丹、万病回春丹（《古今医鉴》卷十六）、追毒丸（《准绳·疡医》卷一）、万病解毒丸（《寿世保元》卷十）、卫生宝（《摄生秘剖》卷三）、解毒万病丹（《兰台轨范》卷一）、太乙玉枢丹（《霍乱论》卷下）、太乙紫金锭（《理瀹》）、神仙万病解毒丸（《中国医学大辞典》）。

【组成】文蛤三两（淡红黄色者，捶碎，洗净） 红芽大戟一两半（净洗） 山茨菇二两（洗） 续随子一两（去壳秤，研细，纸裹压出油，再研如白霜） 麝香三分（研）

【用法】上将前三味焙干，为细末，入麝香、续随子研令匀，以糯米粥为丸，每料分作四十丸（于端午、七夕、重阳日合，如欲急用，辰日亦得）。痈疽、发背未破之时，用冰水磨涂痛处，并磨服，良久觉痒，立消；阴阳二毒，伤寒心闷，狂言乱语，胸膈壅滞，邪毒未发，及瘟疫，山岚瘴气，缠

喉风，入薄荷一小叶，以冷水同研下；急中及癫邪，喝叫乱走，鬼胎鬼气，并用暖无灰酒送下；自缢、落水死，头暖者，及惊死、栗迷死，未隔宿者，冷水磨灌下；蛇、犬、蜈蚣伤，冷水磨涂伤处；诸般疟疾，不问新久，临发时煎桃柳汤磨下；小儿急慢惊风，五疳五痢，与薄荷小叶用蜜水同磨下；牙关紧急，磨涂一丸，分作三服，如丸小，分作二服，量大小与之；牙痛，酒磨涂及含药少许吞下；汤火伤，以东流水磨涂伤处；打扑伤损，炒松节无灰酒送下；年深日近太阳头疼，用酒人薄荷杂磨，纸花贴太阳穴上；诸般痛疾，口面㖞斜，唇眼掣眨，夜多睡涎，言语蹇涩，卒中风口噤，牙关紧急，筋脉挛缩，骨节风肿，手脚疼痛，行止艰辛，应是风气疼痛，并用酒磨下。

【功用】《古今医鉴》：解诸毒，疗诸疮，利关窍。

【主治】一切药毒，恶草、菇子、菌蕈、金石毒，吃自死马肉、河豚发毒，痈疽发背未破，鱼脐疮，诸般恶疮肿毒，汤火所伤，百虫、犬、鼠、蛇伤，时行疫气，山岚瘴疟，急喉闭，缠喉风，脾病黄肿，赤眼疮疖，冲冒寒暑，热毒上攻，或自缢死，落水及打折伤死，但心头微暖未隔宿者，急中及癫邪，喝叫乱走，鬼胎鬼气，诸般疟疾，小儿急慢惊风，五疳五痢，新久头痛，风气疼痛等。

【宜忌】孕妇不可服。

【方论选录】《医统》：其方用五倍子消毒杀虫解风为君；山茨菇、千金子、大戟皆驱逐走泄为臣；佐以麝香升散，用之以治痈疽实非所宜，果见脏腑有积毒，或异虫缠滞深固而体气不虚者亦快药，但戒勿轻用耳。

【临证举例】劳瘵　昔有一女子，久患劳瘵，命垂旦夕。此病为血尸虫所噬，磨一粒服之，一时久吐下小虫千余条，一大者正为两段。后只服苏合香丸，半月遂愈如常。

10849　冠心灵

【方源】《古今名方》引北京冠心病防治组方。

【组成】红花　川芎　栝楼　细辛　莪莪

【主治】冠心病心绞痛。

10850　冠心Ⅱ号

【方源】《古今名方》引北京冠心病防治组方。

【组成】丹参30克　赤芍　川芎　红花　降香各15克

【功用】行气活血，祛瘀通络。

【主治】冠心病、胸闷不适，或有胸前疼痛，心悸，气憋等。

【现代研究】①抑制血小板聚集作用　《心脏血管疾病》（1974；3:259）：实验结果表明，冠心病病人在服药后二至三个月ADP诱导血小板的聚集滴度较服药前明显下降；给一组家兔静脉注射冠心Ⅱ号后30分钟、60分钟和90分钟，ADP诱导血小板的60秒的聚集和最大的聚集程度较给药前均有减低，而另一组给生理盐水后，ADP诱导的血小板聚集程度较给水前有所增加，两组有非常显著的差异。②扩张血管、解除平滑肌痉挛及增加小鼠心肌营养性血流量的作用　《中西医结合杂志》（1982；3:176）：先给小白鼠冠心Ⅱ号注射液，后滴肾上腺素的7/10动物肠系膜微动脉血流未停止，3/10微动脉未收缩；冠心Ⅱ号与肾上腺素同用，可推迟血流停止时间，并使恢复时间缩短；先给肾上腺素，后滴冠心Ⅱ号对血流变化影响不显。实验观察表明冠心Ⅱ号对肾上腺素引起的小白鼠肠系膜微循环障碍有预防及对抗作用。

10851　冠心苏合丸

【方源】《中药制剂手册》引上海中药制药一厂方。

【组成】檀香二十一两　青木香二十一两　乳香（炙）十两零五钱　朱砂十两零五钱　冰片十两零五钱　苏合香十两零五钱

【用法】上除苏合香外，共为极细末，炼蜜为丸，每丸重五分，蜡皮封固。每次1丸，一日三次，口含服或咀嚼后咽服；也可于临睡前或发病时服用。

【功效】芳香开窍，理气止痛。

【主治】冠状动脉病变引起的心绞痛，心肌梗塞，胸闷等症。

【宜忌】《中国药典》：孕妇禁用。

【临证举例】①心绞痛　《新医药学杂志》（1975；2:28）：应用本方治疗心绞痛118例，其中轻度75例，中度33例，重度10例。经治疗后，显效40例，好转70例，无效8例，总有效率为93.2%。其中对重度心绞痛亦有不同程度的疗效。本组心电图资料完整者86例，疗前心电图不正常者74例，疗后显效2例，好转8例，显效率为13.5%。②银屑病　《中成药研究》（1982；2:26）：应用本方治疗78例寻常型银屑病，其中45例单独采用本方治疗，33例采用冠心苏合丸加活血方进行治疗。结果单用冠心苏合丸其有效率为75%，显效率为37.8%；冠心苏合丸加活血方则疗效有所提高，其有效率为87.9%，显效率为45.5%。随访16例，复发率为3/16。③胃痛　《浙江中医

杂志》（1983；9：396）：用本方治疗185例胃痛，其中男72例，女112例。一般每次1粒，于饭前服用，一日三次，药后十分钟后疼痛缓解。结果显效（服药一次疼痛缓解，一天后疼痛消失）者147例；有效（服药一天后疼痛减轻、三天后痛止者）27例；无效（服一次后只能缓解一时，一天反复多次）者11例，此11例中7例伴有胆结石，1例嵌顿性疝，3例胃癌。

10852 扁柏丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 生侧柏叶一斤（用白矾四两，入铜锅内，水五六碗，煎干为度，晒干，炒焦枯） 青州柿饼十个（烧灰） 旧陈棕（烧存性）二两 血余炭一两 槐花四两（炒焦）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，空心白酒送下，每日三次。以止为度。

【主治】 痔漏、肠风、脏毒等下血，及吐血、血崩等症。

10853 扁鹊丁香散

【方源】《医学心悟》卷二。

【组成】 丁香五个 柿蒂五个 甘草（炙）五分 干姜一钱

【用法】 上为末。沸汤点服，与附子理中汤同服。

【主治】 呃逆。三阴中寒，胃气欲绝而呃者，其证厥冷恶寒，下利清谷。

10854 弭痛丸

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】 五灵脂 木香 当归（切，焙） 高良姜（炮） 蓬莪术（炮）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十至三十丸，空心煎木香汤送下。

【主治】 九种心痛。

10855 既济丸

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】 菟丝子（酒制） 益智仁（炒） 白茯苓 韭子（炒） 肉苁蓉（酒洗） 当归 熟地黄各五钱 黄柏 知母（各盐酒、炒） 牡蛎（煅） 石枣（酒蒸，去核）各三钱 五味子一钱

【用法】 上为末，面糊为丸。每服百丸，空心盐汤送下。

【主治】 小便不禁。

10856 既济丹

【方源】《孙氏医案》卷一。

【组成】 鹿角霜 当归 白茯苓各二两 石菖蒲 远志各一两五钱 龙骨 白石脂各一两 益智仁五钱

【用法】 上为末，干山药打糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心白汤送下。

【主治】 妇女久患白带，变为白崩。

10857 既济汤

【方源】《袁中参西》上册。

【组成】 大熟地一两 萸肉一两（去净核） 生山药六钱 生龙骨六钱（捣细） 生牡蛎六钱（捣细） 茯苓三钱 生杭芍三钱 乌附子一钱

【主治】 大病后阴阳不相维系，阳欲上脱，或喘逆，或自汗，或目睛上窜，或心中摇摇如悬旌；阴欲下脱，或失精，或小便不禁，或大便滑泻。一切阴阳两虚，上热下凉之证。

【临证举例】 ①大便滑泻 一人，年二十余，禀资素羸弱，又耽烟色，于秋初患疟，两旬始愈。一日大便滑泻数次，头面汗出如洗，精神颓惫，昏昏似睡。其脉上盛下虚，两寸摇摇，两尺欲无，数至七至。延医二人皆不疏方。愚后至，为拟此汤（既济汤），一剂而醒，又服两剂遂复初。②心疼 友人张某某，曾治一少年，素患心疼，发时昼夜号呼。医者屡投以消通之药，致大便滑泻，虚气连连下泄，汗出如洗，目睛上泛，心神惊悸，周身瞤动，须人手按，而心疼如故。延医数人皆不敢疏方。张某某投以此汤（既济汤），将方中萸肉倍作二两，连服两剂，诸病皆愈，心疼竟从此除根。

10858 既济解毒汤

【方源】《卫生宝鉴》卷二十三。

【组成】 大黄（酒蒸） 黄连（酒制，炒） 黄芩（酒制，炒） 甘草（炙） 桔梗各二钱 柴胡 升麻 连翘 当归身各一钱

【用法】 上㕮咀。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 上热头目赤肿而痛，胸膈烦闷不得安卧，身半以下皆寒，足胫尤甚，大便微秘。

【宜忌】 忌酒、湿面、大料物及生冷硬物。

【加减】 大便利，去大黄。

【方论选录】 以黄芩、黄连苦寒，酒制炒亦为因用，以泻其上热，以为君；桔梗、甘草辛甘温上升，佐诸苦药以治其热；柴胡、升麻苦平，味之薄者、阳中之阳，散发上热以为臣；连翘苦辛平，以散结消肿，当归辛温和血止痛，酒煨大黄苦寒，引苦性上行至巅，驱热而下以为使。

【临证举例】 上热下寒 中书右丞姚公茂，六旬有七，宿有时毒，至元戊辰春，因酒病发，头面赤

肿而痛，耳前后肿尤甚，胸中烦闷，咽嗌不利，身半以下皆寒，足胫尤甚。由是以床相接作炕，身半以上卧于床，身半以下卧于炕，饮食减少，精神困倦而体弱。诊得脉浮数，按之弦细，上热下寒明矣。遂处一方，名曰既济解毒汤。投剂之后，肿消痛减，大便利。再服减大黄。慎言语，节饮食，不旬日良愈。

10859 退云散

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归 生地 白菊花 谷精草 木贼 羌活 石决明 大黄（酒炒） 蔓荆子 白芷 黄柏 连翘 龙胆草各一钱 蝉退七个

【用法】上锉一剂。水煎，食远服。

【主治】翳蒙瞳子。

10860 退风散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】防风一钱 荆芥五分 薄荷七分 僵蚕（炒）五分 天麻（酒洗）一钱 白芷一钱 麻黄一钱 茯苓一钱 当归身一钱 甘草（炙）五分

【用法】上锉一剂。加生姜七片，煎服。

【主治】破伤风，不省人事，角弓反张。

10861 退赤丸

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】生地黄 草决明 黄芩 当归 白术 木通 连翘 甘草各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，淡竹叶煎汤吞下。

【主治】目赤。

10862 退赤散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】生地黄 木通 甘草 栀子各等分

【用法】上为细末。每服二钱，食后用竹叶汤调下，每日三次。

【主治】肝实而血盛，血气上冲，流注于目，致目赤而不痛。

10863 退赤散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】黄芩 黄连 白芷 当归 赤芍药 栀子 桑白皮 木通 桔梗 连翘

【用法】水煎，食后服。

【主治】睑生偷针，因阳明胃经之热毒上充于眼目所致者。

10864 退赤散

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】生地9克 木通3克 酒黄芩 银花 赤芍各9克 牡丹皮6克 秦皮3克

【功用】清心肺，平肝。

【主治】心火侵肝，眦部赤脉侵入风轮，引起青睛生翳或昏暗者。

【方论选录】方中生地、木通清心泻火，银花、酒黄芩清肺解热，赤芍、牡丹皮凉血活血以退赤，秦皮清肝明目以退翳。

10865 退金丹

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】苍术（酒炒）八两 香附半两 青皮（去瓤）二两 陈皮四两 良姜一两 厚朴（姜炒）三两 乌药四两 三棱（煨）三两 莪术（煨）一两 青矾八两（用百草霜同炒）

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米汤送下。

【主治】入肿，腹中有积块胀满者。

10866 退热汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄耆一钱 柴胡七分 生甘草 黄连（酒制） 黄芩 芍药 地骨皮 生地黄（去血热） 苍术各五分 当归身 升麻各三分

【用法】上㕮咀，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食远温服。

【主治】表中虚热，或遇夜则甚。

【加减】如身体力困者，加麦门冬、五味子各五分，人参、甘草各一钱。

10867 退热散

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】赤芍药 黄连（炒） 木通 生地黄 炒栀仁 黄柏（盐水炒） 黄芩（酒炒） 当归尾 甘草梢 丹皮各等分

【用法】上为末。每服五钱，白水二钟，煎至八分，去滓热服。

【主治】赤丝虬脉。白珠有丝脉纵横，或稀密粗细不等，久而不愈。

10868 退黄丸

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】香附末四两 平胃散四两 针砂四两（炒三次）

【用法】上为末，醋糊为丸。量大小加减，白汤送下。

【主治】积聚发黄。

10869 退黄散

【方源】《回春》卷二。

【异名】茵陈退黄散（《寿世保元》卷二）。

【组成】 柴胡 升麻 茵陈 龙胆草 黄连 黄芩 栀子 黄柏 木通 滑石 甘草

【用法】 上锉。加灯草一团，水煎服。外用生姜捣烂，时时于黄处擦之，其黄自退。

【主治】 伤寒发黄，身目俱黄如金色，小便如浓黄柏汁，诸药不效者。

【加减】 大便实，加大黄；目睛黄，倍龙胆草；虚弱，加人参。

10870 退管丸

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】 炙蜂房（研） 一两五钱 真象皮（炙黑，研）二两 粉儿茶（研）四两 猪脚壳（炙黑）一两五钱 明乳香（去油，研）一两五钱 刺猬皮（炙黑） 一两五钱 生人脱（浸晒，炙黑，研）二两 胡连（焙）四钱 黑没药（去油）一两五钱 生矾（研）二两 象牙屑（焙黄，研）六两 瓜血竭（研）四两

【用法】 上为细末，炼蜜、黄蜡溶化打糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心陈酒送下。

【主治】 痔漏。

10871 退翳丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】 白芷 细辛 五味子 枳壳各一两（去瓤，麸炒） 牡蛎 茺蔚子各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心米饮汤下。

【主治】 混睛外障。因毒风在肝，积血睑眦之间，初患之时，先疼后痒，碜涩泪出，怕日羞明，白睛先赤，发歇无定，渐渐眼内赤脉横立遮睛，如隔纱看物，难以辨明。

10872 退翳丸

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 蝉退 白菊花 夜明砂 车前子 连翘各五钱 黄连 一两 蛇退 一条（炒）

【用法】 上为末，米泔煮猪肝为丸，如梧桐子大。每服三十丸，薄荷汤送下。

【主治】 一切翳膜。

10873 退翳散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】 人退 蝉退 蛇退 凤退（焙）各五分 木通 木贼各二钱 麝香一分

【用法】 上为细末。浮翳者可用吹之，即翳膜自起，灯心捲去三五次，以尽为度。

【主治】 一切翳膜。

10874 退翳膏

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】 蕤仁 升麻各三分 连翘 防风 青皮各四分 甘草 柴胡各五分 当归身六分 荆芥穗一钱（水半盏别浸） 生地黄 一钱半 黄连三钱

【用法】 上用水一碗，入前药煎至半碗，去滓，更上火煎至半盏，入荆芥水二匙，入蜜少许，再上火熬匀。点之。

【主治】 黑白翳。

10875 退管锭子

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 灵药二钱 白丁香 一钱半 雄黄 一钱 蟾酥一钱 轻粉 乳香 没药各五分 麝香二分 蜣螂三个（煅存性）

【用法】 上为末，饭为条，灯草粗二寸长，阴干，收用。外漏用此二三次，硬管即出。如追透通肠，亦可以穿线。

【主治】 诸疮漏。

10876 退肿束胎方

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 白术二钱（生） 枳壳二钱（炒） 泽泻一钱半 葶苈二钱 茯苓三钱

【用法】 水煎，去滓，温服。

【主治】 怀孕肿胀喘急，脉沉滑者。

【方论选录】 妊娠脾土不健，湿热上干，肺气不能通调水道，故肿胀喘急，小水不快焉。白术健脾土以化湿热，枳壳束胎元以泻滞气，葶苈子清利肺气，建泽泻通利水道，白茯苓渗湿气以清子室也。水煎温服，俾脾气健运，则肺气通调而湿热自化，喘急无不退，肿胀无不除，其胎孕有不安者乎？

10877 退管收功丸

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 胡黄连一两 穿山甲（麻油四两炙脆） 石决明（煅） 槐花（炒）各五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一钱，空心白滚水送下。

【主治】 痔疮漏管。

【加减】 如漏，四边有硬肉突起，加蚕茧二十个（炒焦为末），和入前药内，早、晚日进二服。至重者亦愈。

10878 除风丸

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】 天南星一两半（生） 川芎一两 白附子二两半 半夏二两半（生） 天麻（去苗） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 防风（去芦头）各一两半 石

膏一两　白花蛇（酒浸，去皮骨，取肉，焙干）一两　蝎梢（去毒，炒）一两半

【用法】上为细末，生姜自然汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后、临卧以生姜汤送下。

【主治】中风瘫痪，口眼㖞斜，四肢不收，肌肉顽痹，头目旋运。

10879　除风汤

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】防风二两　犀角　大黄　知母　黄芩　黑参各一两　桔梗　羚羊角各一两半

【用法】上为末。每服一钱，以水一盏，散一钱，煎至五分，去滓，空心温服。

【主治】睑生风粟外障，眼睑皮肉上下有肉如粟粒相似，唯多泪出涩痛，如米隐一般；积久年深，翳膜昏暗，渐渐加重。

10880　除风汤

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】防风　细辛　桔梗　茺蔚子　黄芩　大黄　五味子　薄荷　石膏　黄柏　草决明

【用法】水煎，食后服。

【主治】脾胃壅热，肝膈气充胞睑内，靥肉壅起，烂湿眵粘，胞肉胶凝。

10881　除风汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】细辛　僵蚕　白芷　藁本　羌活　独活　细茶　花粉各等分　葱头七个

【用法】水煎。先熏后吃。

【主治】偏正头痛日久，渐成内障。

10882　除根散

【方源】《医方类聚》卷一六六引《吴氏集验方》。

【组成】川楝子（去皮）　槟榔各一钱　轻粉一字　芜荑三钱　黄丹二钱

【用法】上为末，作一服。取石榴根煎酒调下，须五更初服；先以熟肉嚼取汁吃，却服药，同吃则吐。

【主治】寸白虫。

10883　除热饮

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【异名】除热饮子（《秘传眼科龙木论》卷三）。

【组成】黄芩（去黑心）　玄参　桔梗（去芦头，炒）　知母　芒消　防风（去叉）　茺蔚子　大黄各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空心、食后温服。

【主治】①《圣济总录》：丁翳毒热。②《秘传眼科龙木论》：肝、心毒热，上攻睛瞳而致钉翳根深，外障，睛中翳黑硬如钉子之形，其证疼痛赤涩，泪出羞明。

10884　除烦汤

【方源】《滹崖尊生》卷十四。

【组成】四物汤倍白芍、生地，加胡黄连一钱。

【用法】水煎服。

【主治】经水过多，五心烦热，日晡潮热。

10885　除湿丹

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】槟榔　甘遂　威灵仙　赤芍药　泽泻　萆薢各二两　乳香　没药各一两（另研）　黑牵牛半两　大戟二两（炒）　陈皮四两（去白）

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至七八十丸，食前以温水送下。

【主治】①《宣明论》：诸湿客搏，腰膝重痛，足胫浮肿，筋脉紧急，津液凝涩，便溺不利，赤瘾疹，疽痈发背，疥癣走注，脚气，疮疖。②《儒门事亲》：妇人腰胯疼痛、两脚麻木，恶寒喜暖者。闪肭膝踝足腕大痛及杖疮落马，坠堕打扑等。

【宜忌】①《宣明论》：服药前后，忌酒一日，药后亦忌湿面。食温粥补暖。②《赤水玄珠》：中病即止，虚弱者当慎。

【备考】《普济方》引《经验良方》有青皮，无萆薢。

10886　除湿汤

【方源】《普济方》卷一一八。

【组成】平胃散加半夏曲（炒）　藿香　白茯苓　白术各等分（一方去白术，用赤茯苓）

【用法】用水二盏，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】寒湿所伤或脾虚停湿，身体重着，腰脚痠痛，面足浮肿，腹胀痞满，大便溏，小便涩，及湿疟，泄痢。

①《普济方》：寒湿所伤，身体重着，腰脚酸痛、大便溏泄，小便涩闭。②《增补内经拾遗》：大病后，及疟痢疮疥后，脾土虚弱，一身之间，惟面与双足浮肿，早起则面甚，晚来则足甚。③《张氏医通》：湿热痞满不食。④《医略六书》：脾虚停湿，腰脚肿重，泄泻溺涩，脉缓者。⑤《金匮翼》：坐卧卑湿，或冒雨露，或著湿衣而伤湿、发热恶寒、身重自汗，骨节疼痛，腰脚痹冷。⑥《中国医学大辞典》：伤食兼湿。

【方论选录】《医略六书》湿滞伤脾不能健运，

而湿流关节，气闭不行，故腰脚肿重，泄泻溺涩焉，苍术燥湿强脾，厚朴散滞消肿，陈皮理气和中，藿香温中快胃，白术燥脾湿以健中，半夏理脾湿以醒胃，茯苓渗脾湿，甘草缓中州，生姜以温散寒湿也，使湿散脾强，则肿退泻除，而小便亦利矣。此除湿健中之剂，为湿滞伤脾肿泻之专方。

10887 除湿汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】茯苓 泽泻 茵陈 猪苓各八分 黄芩 黄连 知母 天花粉 白术各六分 防己 陈皮 青皮 苍术各三分

【用法】水煎，空心服。

【主治】黄疸内热，呕吐而渴，欲饮冷水，身体面目俱黄，小便不利。

10888 除湿汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十九。

【组成】半夏 苍术 厚朴 藿香 陈皮 甘草 白术 茯苓 木瓜 槟榔 白芷 生姜 大枣

【用法】水煎服。

【主治】腿、股、膝、腨、胫、足病之因于湿者。

10889 除湿散

【方源】《医方类聚》卷一六九引《施圆端效方》。

【组成】苦参 何首乌 荆芥穗 蔓荆子 薄荷各一两 白芷 天麻 川芎 防风（并生用） 乌蛇（酒浸一宿，焙干）各半两

【用法】上为细末。每服三钱，茶、酒调下，不拘时候，一日三次。六日一浴，令汗出血气宣通，一月肤泽如故。

【主治】一切风毒疥癣，瘙痒，状如风癞。

10890 除痰丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】天南星（炒） 半夏（汤洗七次）各二两 蛤粉（微炒）一两 皂角大一挺（去皮弦子，用水一大盏揉汁）

【用法】上除皂角汁，三味共为细末，调面糊和丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至五十丸，食后以生姜汤送下，临卧更进一服。

【主治】宿饮不消，咽膈不利，咳嗽痰涎，头目昏运。

【宜忌】忌甜物。

10891 除风清脾饮

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】广陈皮 连翘 防风 知母 元明粉 黄芩 玄参 黄连 荆芥穗 大黄 桔梗 生地各等分

【用法】上锉。白水二钟，煎至八分，去滓，食远服。

【主治】①《审视瑶函》：粟疮症。②《金鉴》：脾经风热，睑生风粟椒疮，泪多难睁，沙涩摩睛疼痛，粟疮如粟，其形黄软；及脾经湿热，椒疮如椒，其形红硬。

10892 除风解毒汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】二花一两 公英八钱 生地一两 归尾四钱 赤芍三钱 防风三钱 石膏八钱 连翘四钱 牛蒡子三钱（炒） 薄荷三钱 菊花四钱 黄芩三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。外涂三白散。

【主治】风赤疮瘸症（沙眼胞性湿疹）。初起赤疼，眵多流泪、隐涩羞明，睑肿而痒，重则眼睑内生粟疮。

【临证举例】风赤疮瘸症 董某某，男。外感风邪，忽觉头痛目赤，晨起眵多粘连，六脉皆数，关脉略带浮大，两目赤肿，热泪不止。此乃脾经风火上冲于脑。先刺合谷、上星、睛明、太阳，以泻其热；再用三白散涂之，内服除风解毒汤，四剂后，泪止肿消。

10893 除热清肺汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】石膏三钱 黑参 生地黄 赤芍 贝母 栝楼根各一钱 麦门冬（去心） 一钱半 甘草五分

【用法】水煎，温服。

【主治】麻疹尽透，而壮热咳嗽，大便秘结。

10894 除秽四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归身（酒洗）一钱 南芎五分 白芍（酒炒）一钱 槟榔七分 半夏（汤泡，姜汁炒）一钱 干姜（炒）五分 桔梗五分 枳壳（去瓤，麸炒）七分 青皮（去瓤）七分 金沸草五分 陈皮一钱 青木香五分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服，不拘时候。

【主治】胃气不和，生呕，不进饮食，无物吐出者。

10895 除湿木瓜汤

【方源】《医部全录》卷一九五。

【组成】苍术 白茯苓 白术 甘草 木瓜 薄桂 泽泻 薏苡仁 柴胡 青皮 蝉蜕 当归 白

芍 生地黄 乌药 牛膝 黄柏 知母 防风

【主治】 跟疽。

【加减】 如痛，加乳香；虚，加人参、黄耆；冬加附子。

10896 除湿达原饮

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】 槟榔二钱 草果仁五分（研） 厚朴一钱（姜汁炒） 白芍一钱 甘草一钱 栀子五分（研） 黄柏五分（酒炒） 茯苓二钱

【主治】 瘟疫兼湿。

【加减】 如兼三阳经症，酌加柴、葛、羌活。此方分两不过大概，临床加减用之。

【方论选录】 瘟而兼湿，故去知母而换黄柏，以燥湿，且能救水而利膀胱；去黄芩换栀子，泻三焦火而下行利水；加茯苓利小便而兼益脾胃；三者备而湿热除矣。再加羌活等风药，亦能胜湿，除湿散温，一举两得。

10897 除湿定痛汤

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】 黄柏（酒炒） 威灵仙（酒炒）各五钱 苍术 羌活 甘草各三钱 陈皮 白芍药各一钱

【用法】 上为细末。每服二钱，以沸汤入生姜汁、蛤壳调服。

【主治】 酒湿痰痛风。

10898 除湿胃苓汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 防风 苍术 白术 赤茯苓 陈皮 厚朴 猪苓 山栀 木通 泽泻 滑石各一钱 甘草 薄桂各三分

【用法】 水二钟，加灯心二十根，煎八分，食前服。

【主治】 ①《外科正宗》：脾肺二经湿热壅遏，致生火丹，作烂疼痛。②《金鉴》：缠腰火丹（俗名蛇串疮）属湿者，色黄白，水疱大小不等，作烂流水，较干者多疼。

10899 除湿消风饮

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 当归四钱 川芎二钱 赤芍三钱 黄柏三钱 栀子三钱 胡黄连三钱 茵陈三钱 薏苡仁三钱 苍术二钱（炒） 防风二钱 白芷二钱 土茯苓三钱 薄荷二钱 泽泻三钱 草决明三钱 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 迎风赤烂症（溃疡性睑缘炎）。

【临证举例】 迎风赤烂症 李氏，女。因操劳过度，内伤肝肾，外感风沙，两目常常赤烂生黄痂，隐涩羞明，屡用桑叶熏洗，不能痊愈，按其脉，太阴细数而厥阴弦数，是知脾经有湿，肝经有火，而不正之风上攻于目，发生赤烂，迎风则甚。先将太渊、睛明、肝俞等穴略刺，外敷一扫光，内服除湿消风饮，五六剂而大轻，又将上星、丝竹空、攒竹轮刺，按前方再加地肤子二钱，乌梅三个，苦参二钱，七剂而赤烂全消。

10900 除湿清火汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 当归六钱 赤芍三钱 黄芩三钱 栀子三钱 苍术三钱（炒） 茵陈三钱 夏枯草三钱 胡黄连三钱 地肤子三钱 连翘三钱 甘草一钱

【用法】 田三七五分为末，上药煎水冲服。外用化腐生肌散。

【主治】 阴阳漏症（泪囊炎），肿胀赤痒，大眦清黄液常流。

10901 除湿解毒汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 白鲜皮五钱 大豆黄卷四钱 生苡米四钱 土茯苓四钱 山栀子二钱 丹皮三钱 金银花五钱 连翘四钱 地丁三钱 木通二钱 滑石块五钱 生甘草二钱

【功用】 除湿利水，清热解毒。

【主治】 急性女阴溃疡，急性自家过敏性皮炎，急性接触性皮炎，下肢溃疡合并感染。

10902 除湿蠲痛汤

【方源】《准绳·类方》卷四。

【异名】 除热蠲痛汤（《金匮翼》卷六）、除湿捐痹汤（《杂病源流犀烛》卷十三）、除湿蠲痹汤（《类证治裁》卷五）。

【组成】 苍术（米泔浸，炒）二钱 羌活 茯苓 泽泻 白术各一钱半 陈皮一钱 甘草四分

【用法】 水二钟，煎八分，入姜汁、竹沥各三二匙服。

【主治】 痹症，湿邪偏重，身体沉重痠痛，天阴加重或发作。

①《准绳·类方》：痛痹。②《景岳全书》：风湿痛痹。③《张氏医通》：身体沉重痠痛，天阴即发。

【加减】 在上痛，加桂枝、威灵仙、桔梗；在下痛，加防己、木通、黄柏、牛膝。

【备考】 按：《灵验良方汇编》有威灵仙、桂枝。

10903 除湿蠲痹汤

【方源】《重订通俗伤寒论》引林羲桐经验方。

【组成】 杜苍术 赤苓各二钱 生子术 泽泻

广皮各一钱半　川桂枝八分　拌研滑石四钱（包）

【用法】 先用酒炒桑枝、青松针各一两，煎汤代水煮药，再用淡竹沥三瓢，姜汁三滴，和匀同冲服。

【主治】 着痹，麻木不仁。

10904　除痿四物汤

【方源】 《鲁府禁方》卷三。

【组成】 当归（酒洗）　川芎　白芍（酒炒）熟地黄　菟丝子（酒洗）　肉苁蓉（酒洗）　白术（去芦油）各一钱　五味子十个　陈皮　香附子　骨碎补各八分　鹿茸（酥炙）七分　破故纸（酒炒）七分

【用法】 上锉。水煎，空心服。

【主治】 身虚，四肢痿弱，倦怠。

10905　除风湿羌活汤

【方源】 《内外伤辨》卷中。

【异名】 除湿羌活汤（《回春》卷二）、除湿汤（《金鉴》卷三十九）

【组成】 羌活七分　防风　升麻　柴胡各五分　藁本　苍术各一钱

【用法】 上锉，如麻豆大，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，空心食前大温服之。

【主治】 湿从外受，或一身尽痛，或头重如蒙，甚而昏冒。

①《内伤外辨》：风湿相搏，一身尽痛者。②《金鉴》：湿因外中，得之于天阴淫雨，晴后湿蒸，早晨雾露，及久卧湿地，远行涉水，瘴气山岚，其证头身重痛，甚而昏冒，大便溏薄，皮肤浮肿。③《杂病源流犀烛》：湿似疸（黑黄黑晦一症，若兼一身尽痛，乃是湿病，非疸，当从湿治），霍乱因湿，及因于湿四肢重着，骨节烦痛，胸膈滞闷。④《一盘珠》：风湿上冲，头重如裹，似有物蒙之，兼有热者。

10906　除风湿羌活汤

【方源】 《脾胃论》卷中。

【组成】 羌活一两　防风（去芦）　苍术（酒浸，去皮）　黄耆各一钱　升麻七分　炙甘草　独活　柴胡各五分　川芎　黄柏　橘皮　藁本各三分　泽泻（去须）　猪苓（去黑皮）　茯苓各三分　黄连（去须）一分

【用法】 上㕮咀。每服三钱或五钱，水二盏煎至一盏，去滓，稍热服。量虚实施用。

【主治】 风湿热痹，痿证，眩晕麻木。

①《脾胃论》：痿，湿气胜，风证不退，眩晕麻木不已者。②《准绳·类方》：着痹。③《证治宝鉴》：热痹，或痛风挟热者，肌肉热极，体上如鼠走，唇裂。

【方论选录】 《医钞类编》：二活祛风胜湿，兼通关节；防风风药卒徒，善散太阳风湿；藁本专治太阳寒湿；川芎能升厥阴清气，上治头眩；六者辛温升散，又能解表之药，使湿从汗出也；苍术除湿，二苓、泽泻渗湿利水，四者使湿从大小便出也；黄耆固表，陈皮利气，黄柏除下焦之热，黄连除中焦之热，升柴升清降浊也。

【备考】 本方方名，《玉机微义》引作"羌活汤"。

10907　眉毛脱落丹

【方源】 《青囊秘传》。

【组成】 大皂角　鹿角　松毛各等分

【用法】 上烧炭存性，为末。姜汁调擦，立出。

【主治】 毛发脱落。

10908　柔脾汤

【方源】 《妇人良方》卷七引《养生必用》。

【组成】 甘草　白芍药　黄耆各一两　熟地黄三两

【用法】 上为末。每服四钱，水、酒各一盏，煎至七分，去滓，取六分清汁，食前温服。

【主治】 妇人虚劳吐血、衄血、下白，汗出。

【备考】 《鸡峰》有桂一两。

10909　柔肝息风煎

【方源】 《重订通俗伤寒论》引胡在兹方。

【组成】 制首乌　黄甘菊　辰茯神　归身　石斛　川断　广郁金各三钱　白蒺藜　远志肉各一钱半　川芎　明矾各八分

【功用】 柔肝育阴，息风除涎。

【主治】 肝阴虚，内风上冒神明，兼挟涎沫，而为失心癫狂，延久不愈。

10910　孩儿茶散

【方源】 《杏苑》卷八。

【组成】 黄连一钱　孩儿茶一钱　炉甘石五钱（火煅红，黄连煎滚汤淬七次）　轻粉五分　龙脑五分

【用法】 各研细和匀。时常用甘草汤温洗净，干敷。

【主治】 茎上湿痒作疮，及注干疮。

10911　绒花散

【方源】 《回春》卷二。

【组成】 鳖甲（醋炙九次）　鹿茸　乳香　没药　绒花树皮（即夜合花根）各二钱

【用法】 上各为细末，合一处研匀。每服五钱，五更以黄酒送下。男子至重者，二服出汗；女子至

重，止用一服。

【主治】 左瘫中痰。

10912 绛雪

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】 软石膏（煅，飞） 玄明粉各二钱 朱砂（飞） 硼砂各一钱 冰片二分

【用法】 上研细匀。频掺患处，咽下不妨；喉痛，芦管吹入。

【主治】 舌疮，口疮，咽喉肿痛。

10913 绛矾丸

【方源】《重订广温热论》卷二。

【异名】 黄病绛矾丸（《全国中药成药处方集》杭州方）。

【组成】 皂矾五钱（面裹烧红） 杜苍术五钱 真川朴八钱 广皮六钱 炒焦甘草三钱

【用法】 煮红枣肉为小丸，姜半夏粉一两为衣。每服一钱半或二钱，淡姜汤送下，每日两次。

【主治】 ①《重订广温热论》：湿遏热伏，发为阴黄，黄而昏暗，如熏黄色，而无烦渴热象者。②《全国中药成药处方集》（杭州方）：湿热黄胖，脱力劳伤，腹胀肠红，食积痞块，腿足浮肿，小便不利。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（上海、南昌方）：忌食茶面，孕妇忌服。

10914 绛雪散

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】 黄芩 黄丹 汉防已 栝楼实各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，临卧时以温浆水调下，并进三二服，即止。

【主治】 消渴，饮水无度，小便数者。

【备考】《普济方》有黄连。

10915 络石汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】 络石 紫菀（去苗土）各半两 升麻 射干各三分 桔梗（炒） 木通（锉） 赤茯苓（去黑皮）各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】 咽喉中如有物噎塞。

【加减】 如要通利，即汤成加芒消末一钱匕，搅匀服之。

10916 络石散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】 络石半两 细辛一分 玄参半两 黄药三分 甘草半两（生，锉） 赤芍药半两 川大黄三分（锉碎，微炒）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，入竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 咽喉卒肿痛。

10917 络石煎丸

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】 络石半两 射干半两 川大黄一分 木通一分（锉） 白药 川升麻半两 牛蒡子一分 玄参一分 甘草半两 白蜜二两 白蒺藜一分 马牙消一分 黄药一分 地黄汁半斤

【用法】 上除药汁外，捣罗为末，先以地黄汁及蜜，于银锅中，以慢火煎成膏，后入诸药末，相和令匀为丸，如小弹子大。用绵裹一丸，含咽津。

【主治】 咽喉干燥热疼。

10918 绝痛丹

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】 消煅礞石五钱 天竺黄六钱 当门子二分 煨明天麻三钱 辰州朱砂三钱 蛇含石五钱（酣煅） 陈胆星四钱 法半夏八钱

【用法】 上为末，以姜汁五钱，竹沥二两炼蜜为丸，如龙眼大。童便磨服半丸。立止，服三十一丸全愈。

【主治】 因惊恐而致之颠仆眼直，口吐痰沫，作羊鸣不省人事。

10919 艳容膏

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】 白芷 甘菊花（去梗）各三钱 白果二十个 红枣十五个 珠儿粉五钱 猪胰一个

【用法】 上将珠粉研细，余俱捣烂，拌匀，外以酒酿炖化，入前药蒸过。每晚搽面，清晨洗去。

【主治】 雀斑。

10920 珠宝散

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】 珍珠三分 西黄一分 铅粉五分 密陀僧一钱 熟石膏一钱 冰片一分 大黄三钱 寒水石三钱 人中黄三分

【用法】 上为极细末。用鸡子清调敷，如湿烂无皮者，干掺。

【主治】 火烫灼伤，腐烂不堪者。

10921 珠参散

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】 真珠 人参各等分

【用法】 上为末。入参汤送下，或莲肉汤亦可。

【主治】 真阴不足，阴涸内热，内障青盲。

10922 珠荟散

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】 真龙荟五分　龙脑薄荷叶五分　珍珠四分（研至无声为度）　真青黛三分　官硼砂二分　大冰片五厘　儿茶五分

【用法】 上为极细末，瓷次瓶贮好，以蜡塞口，勿令泄气。临用吹患处。

【主治】 小儿五疳积，发热，牙疳并花后牙疳。

10923　珠香散

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 煅研珍珠一钱五分　当门子五分　琥珀粉五钱　滴乳香一两

【用法】 薄撒患处。

【功用】 养血润肤，生肌固皮。

【主治】 一切清洁疮面，及烧、烫伤，上皮生长迟缓。

【宜忌】 撒布疮面后，往往很快结痂，切勿清除其痂皮，以防影响上皮生长。

10924　珠粉丸

【方源】《医家四要》卷三引《金鉴》。

【组成】 椿根皮　黑姜　蛤粉　黄柏　滑石　神曲　青黛

【主治】 湿热所致的赤白浊带下。

10925　珠黄散

【方源】《中国医学大辞典》引《局方》。

【组成】 珍珠（豆腐制）三钱　西黄一钱

【用法】 上为极细末，无声为度，密贮勿泄气。每用少许吹入患处。

【功用】 ①《中国医学大辞典》引《局方》：化毒去腐，清热生肌。②《饲鹤亭集方》：平疳化痰，清咽利膈，止痛。

【主治】 ①《中国医学大辞典》引《局方》：咽喉肿痛腐烂，牙疳口疳，梅毒上攻，蒂丁腐去，小儿痘瘡后余毒未消，口舌破碎。②《医级》：风痰火毒，喉痹，及小儿痰搐惊风。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（天津方）：忌烟、酒及辛辣食物。

【备考】《医级》本方用法：小儿痰痉，以灯心调服二三分。

10926　珠黄散

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】 西牛黄五分　冰片五钱　真珠六钱　煨石膏五两

【用法】 上为极细末，盛瓷瓶内，勿令泄气。用时吹入。

【主治】 口疳，喉痛。

10927　珠黄散

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】 西黄　灯心灰各五厘　象牙屑（焙）　真珠（豆腐煮过）各二分　人指甲（男用女，女用男）一分　大梅片三厘　薄荷叶　人中白　人中黄　硼砂各一分　青黛（飞净）三分　壁钱三十个（竹叶夹，炙存性）

【用法】 上为细末，吹患处。

【主治】 烂喉痧及喉痹、喉肿。

10928　珠黄散

【方源】《中医眼科学》。

【组成】 珍珠粉 2.1 克　犀黄 3 克　朱砂 2.1 克　麝香 2.1 克

【用法】 上为细末，瓷瓶收贮。应用时点于内眦。

【主治】 火疳，白膜侵睛。

10929　珠玉二宝粥

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生山药二两　生薏米二两　柿霜饼八钱

【用法】 上先将山药、薏米捣成粗渣，煮至烂熟，再将柿霜饼切碎，调入融化，随意服之。

【功用】 补肺健脾养胃。

【主治】 脾肺阴分亏损，饮食懒进，虚热劳嗽，并一切阴虚之证。

【方论选录】 山药、薏米皆清补脾肺之药，然单用山药，久则失于粘腻；单用薏米，久则失于淡渗；唯等分并用，乃可久服无弊。又用柿霜之凉可润肺，甘能归脾者，以为之佐使。病人服之不但疗病，并可充饥，不但充饥，更可适口，用之对证，病自渐愈。即不对证，亦无他患，诚为至稳善之方也。

【临证举例】 劳嗽　一少年因感冒懒于饮食，犹勤稼穑，枵腹力作，遂成劳嗽，过午发热，彻夜咳吐痰涎。医者因其年少，多用滋阴补肾之药，间有少加参、耆者，调治二月不效，饮食减少，痰涎转增，渐至不起，脉虚数兼有弦象，知其肺脾皆有伤损也，授以此方，俾一日两次服之，半月痊愈。

10930　珠黄夺命散

【方源】《卫生鸿宝》卷四引徐濬安方。

【组成】 廉珠四分　西黄三分　川连（炒）　冰片各五分　陈胆星七分　硼砂　人中白　橄榄核（煅灰）　蝉退各一钱　人中黄　山豆根　滑石　玄明粉　儿茶各一钱半　青黛二钱　大力子　土贝僵蚕（制）各三钱　青鱼胆（干者）二个　天名精（即土牛膝，俗名臭花娘，用叶、根、梗洗净，风

干研末）

【用法】 上为细末。锡盒收贮。

【主治】 烂喉丹痧。

10931 珠黄吹喉散

【方源】《中国药典》一部。

【组成】 珍珠 50 克 牛黄 30 克 硼砂（炒）250 克 西瓜霜 80 克 雄黄 40 克 儿茶 100 克 黄连 100 克 黄柏 150 克 冰片 50 克

【用法】 以上九味，除牛黄、冰片、西瓜霜外，珍珠、雄黄分别水飞或粉碎成极细粉，其余硼砂等四味粉碎成细粉，将牛黄、冰片研细，与上述粉末配研，过筛，混匀即得。外用适量，吹于患处，一日三至五次。

【功用】 解毒化腐。

【主治】 咽喉、口舌肿痛糜烂。

10932 珠珀滋阴淋浊丸

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 珍珠粉一分 琥珀四钱 茯神五钱 龟版胶五钱 黄柏一两 淮山药五钱 猪脊髓六条

【用法】 上为细末，打为丸。每服三钱。

【主治】 小便淋浊，溺时刺痛，及肾虚淋浊者。

10933 颃癖丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 浮萍 苍术 苍耳各一两 苦参一两半 黄芩五钱 香附二钱半

【用法】 上为末，酒糊为丸。白汤送下。

【主治】 颃癖。

10934 颃癖浮萍丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 紫背浮萍 苍术 苍耳草各二两 苦参四两 黄芩 僵蚕各一两 钩藤一两五钱 豨莶草二两（酒蒸）

【用法】 上为末，酒糊为丸。每服二钱，白滚汤送下。随病上下服。

【主治】 颃癖。

10935 蚕矢汤

【方源】《霍乱论》卷下。

【组成】 晚蚕沙三钱 木瓜三钱 生薏仁四钱 大豆黄卷四钱 川连二钱 醋炒半夏一钱 酒炒黄芩一钱 通草一钱 吴茱萸（炒）六分 炒山栀二钱

【用法】 上以阴阳水煎，稍凉，徐徐服之。

【主治】 霍乱吐利，转筋，肢痛，口渴烦躁，危急之症。

10936 蚕沙饮

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 蚕沙（布包）31 克 重楼 15 克 丹参 31 克 白鲜皮 9 克 地肤子 6 克 蝉蜕 6 克

【用法】 水煎服，早、晚各服一次。

【主治】 虚热型荨麻疹。疹色淡红，稀疏分布，日晡潮热，多在夜间发生，舌质红，苔薄，脉弦。

10937 蚕沙散

【方源】《点点经》卷二。

【组成】 蚕沙一钱 防己一钱 独活 杜仲 枸杞 防风 槟榔 半夏 羌活 秦艽 当归 川芎各一钱半 甘草一钱

【用法】 生姜为引。

【主治】 酒伤经络，筋软，周身不仁。

10938 蚕豆花露

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 蚕豆花一斤

【用法】 用蒸气蒸馏法，鲜者每斤吊成露二斤，干者每斤吊成露四斤。每用四两，隔水温服。

【功用】 清热止血。

【主治】 鼻血，吐血。

10939 蚕沙漫酒

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】 蚕沙（微炒，捣碎）五升

【用法】 上用生绢囊贮，以酒一斗五升，漫经七日。取饮之，三合至五合。令常有酒气，以愈为度。

【主治】 中风，口面㖞僻，口角涎流。

10940 蚕沙黄柏汤

【方源】 方出《种福堂方》卷二，名见《医学实在易》卷七。

【组成】 生蚕沙（研末）一两 生黄柏（末）一钱

【用法】 每服三钱，空心开水调下。六七服即愈。

【主治】 遗精白浊，有湿热者。

10941 蚕蝎归蒌汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 当归 黄耆各五钱 茯苓三钱 僵蚕 半夏各一钱 全蝎一个 陈皮五分

【用法】 水煎服。

【主治】 形体素虚，忽感风邪，遍身淫淫，循行如虫，或从左脚腿起，渐次而上至头，复下行于右脚，自觉身痒有声。

10942 秦艽丸

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】 秦艽二两（去苗） 黄芩二两（锉） 漏芦一两半 乌蛇四两（酒浸，去皮骨，炙令微黄） 防风一两半（去芦头） 黄连一两半（去须） 苦参二两（锉） 川大黄二两（锉碎，微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以温酒送下。

【功用】 ①《金鉴》：清热除痒。②《赵炳南临床经验集》：清血解毒。

【主治】 疥疮、湿疹、顽癣。

①《圣惠》：遍身生疥，干痒，搔之皮起。②《金鉴》：脓窠疥。③《赵炳南临床经验集》：慢性湿疹（顽湿疡）、神经性皮炎（顽癣）、皮肤瘙痒症（隐疹）、寻常性狼疮（流皮漏）、盘状红斑性狼疮。

【宜忌】 《赵炳南临床经验集》：体弱者慎用，孕妇忌服。

10943 秦艽汤

【方源】 《外台》卷三引《近效方》。

【组成】 秦艽一两 紫草一两 白鲜皮一两 黄芩一两 栀子一两

【用法】 上切。以水一大升半，牛乳一大升，煮取七合，分为二服。老小以意量之，一剂不愈，更吃一剂。

【主治】 天行三日外，忽觉心上妨满坚硬，脚手心热，变为黄。

【备考】 《圣济总录》有大黄。

10944 秦艽汤

【方源】 《圣济总录》卷十。

【组成】 秦艽（去苗土） 防风（去叉）各二两 黄芪（锉）三两 附子（炮裂，去皮脐）一两 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙）四两 当归（切，焙）一两

【用法】 上锉散。每服五钱匕，水一盏半，生姜三片，同煎至一盏，去滓温服，空心并二服，临卧并二服。厚覆，微出汗，慎外风。

【主治】 历节风，骨节疼痛，日夜不可忍。

10945 秦皮散

【方源】 《圣惠》卷三十二。

【组成】 秦皮三两 防风（去芦头） 黄连（去须） 甘草（炙微赤，锉）各一两半

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加淡竹叶二七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 眼赤肿痛有翳，胬肉，多泪难开。

10946 秦皮散

【方源】 《局方》卷七。

【组成】 秦皮 滑石（桂府者，捣碎） 黄连（去须）各十两

【用法】 上为细末。每用半钱，沸汤泡，去滓，温热频洗。

【主治】 ①《局方》：大人小儿风毒赤眼肿痛，痒涩眵泪，昏暗羞明。②《医统》：痘毒入眼。

10947 秦皮散

【方源】 《永类钤方》卷十一。

【组成】 当归 黄芩 川芎 荆穗 宣连 山枝仁 羌活 赤芍 秦皮 黄柏 蔓荆子各等分

【用法】 上细锉。用新汲水滤去沙灰，用二大钱煎，温热泡洗。

【主治】 暴赤肿痛，疼痛泗泪。

10948 秦桂丸

【方源】 《医略六书》卷二十七。

【组成】 肉桂一两（去皮） 秦艽一两 附子一两（炮） 当归二两 厚朴一两（制） 人参一两 干姜一两（炒） 白薇一两 半夏一两（制）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服二三钱，温酒送下。

【主治】 血海久冷不孕，脉细涩者。

【方论选录】 血海久冷，冲任少熏育之权，故腹痛经迟，时发寒热，而不能孕子焉。桂、附暖血海以逐冷，姜、朴温中气以散寒；当归养血脉，人参扶元气，秦艽活血通经，半夏化痰燥湿，白薇降泄以除寒湿热也。炼蜜以丸之，温酒以下之，俾血海温暖，则久冷顿消，而腹痛无不退，寒热无不除，何患天癸不调，不能孕子乎。

10949 秦艽天麻汤

【方源】 《医学心悟》卷三。

【组成】 秦艽一钱五分 天麻 羌活 陈皮 当归 川芎各一钱 炙甘草五分 生姜三片 桑枝（酒炒）三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 肩背臂膊痛。

【加减】 挟寒，加附子、桂枝。

10950 秦艽升麻汤

【方源】 《卫生宝鉴》卷八。

【组成】 升麻 干葛 甘草（炙） 芍药 人参各半两 秦艽 白芷 防风 桂枝各三钱

【用法】 上㕮咀。每服一两，水二盏，连须葱白三茎，长二寸，约至一盏，去滓，稍热服，食后。服药毕，避风寒处卧，得微汗出则止。

【主治】 中风，手足阳明经，口眼㖞斜，恶风恶寒，四肢拘急。

【方论选录】 ①《医略六书》：血脉受风，营气

不能灌注经络，故四肢拘急，口眼歪斜，而恶见风寒焉。秦艽祛风活血，桂枝温经散风，升麻、葛根升阳明之津气，防风、白芷燥太阴之湿邪，人参扶元气，白芍敛营阴，甘草缓三焦之急，葱白通一身之阳，燥润合宜，补散有法，则邪自外解而筋得所养，四肢无不和柔，口眼无不端正也，何恶见风寒之有。②《古今名医方论》：李士材曰：至哉坤元，为五脏之主，木胜风淫，则仓廪之官承制，脾主四肢，故痿痹也。口为土之外候，眼为木之外候，故俱病也。升麻、白芷皆阳明本药，故用为直入之兵，人参、桂枝固其卫气，芍药、秦艽和其营血，防风卑贱之卒，随令而行，葱根发汗之需，无微不达，又借甘草以和之，而邪有不散者乎？

10951 秦艽白术丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】秦艽（去芦） 桃仁（汤浸，去皮尖） 皂角仁（烧存性）各一两 当归梢（酒浸） 泽泻 枳实（麸炒黄） 白术各五钱 地榆三钱

【用法】上为细末，和桃仁泥研匀，煎熟汤打面糊为丸，如鸡头子大，令药光滑，焙干。每服五七十丸，空心白汤送下，待少时以美膳压之。

【主治】痔疾并痔漏有脓血，大便燥硬而作疼痛不可忍。

【宜忌】忌生冷、硬物、冷水、冷菜之类；并湿面、酒，及辣辛热、大料物之类。

【方论选录】①《兰室秘藏》：其疾甚者，当以苦寒泻火，以辛温和血润燥，疏风止痛，是其治也。以秦艽、当归梢和血润燥；以桃仁润血；以皂角仁除风燥；以地榆破血；以枳实之苦寒补肾，以下泄胃实；以泽泻之淡渗使气归于前阴，以补清燥受胃之湿邪也；白术之苦甘，以苦补燥气之不足，其甘味以泻火而益元气也。故曰甘寒泻火，乃借枳实之寒也。②《成方便读》：此方以秦艽入阳明，润燥宣风，能行能散；白术健脾胜湿，不特能利腰脐之血结，且可使离经之血仍统于脾，而协之以归尾、桃仁之破血润燥；枳实、皂角之导滞宽肠；泽泻以渗湿；地榆以凉瘀。丸以缓之，亦不欲其速化之意，立方之法，不愧为四大家之一耳。

【备考】本方改为汤剂，名秦艽白术汤（见《外科经验方》）。

10952 秦艽当归汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】大黄（煨）四钱 秦艽 枳实各一钱 泽泻 当归梢 皂角仁 白术各五分 红花少许 桃仁二十个

【用法】上都作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，食前热服。

【主治】痔漏，大便结燥疼痛。

【宜忌】宜避风寒；忌房事、酒、湿面、大辛热物。

10953 秦艽扶羸汤

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】软柴胡二钱 人参（去芦头） 鳖甲（米醋炙） 秦艽 地骨皮各一两半 半夏（汤洗七遍）各一钱 紫菀茸 甘草各一两五分 当归（洗，焙）一两一分

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏，加生姜五片，乌梅、大枣各一枚，煎至八分，去滓，食后通口服。

【主治】肺痿。骨蒸劳嗽，或寒或热，声嘎羸瘦，自汗，四肢怠惰，不美饮食。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴、足少阳药也。柴胡、秦艽散表邪兼清里热，柴胡解肌热，秦艽退骨蒸；鳖甲、地骨滋阴血而退骨蒸，地骨皮凉血，退有汗骨蒸；参、草补气；当归和血；紫菀理痰嗽，润肺除痰；半夏发音声。肺属金，声之所从出也，有物实之，则金不鸣，燥湿除痰，则金清而声自开矣。有声嘶而哑者，是肺已损也，难治。表里交治，气血兼调，为扶羸良剂。

10954 秦艽补漏汤

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】当归 川芎 白芍 生地 黄连 黄芩 山楂 连翘 秦艽 地榆 雷丸 枳壳 槐角 白芷 棕根 升麻各等分

【用法】水三碗，煎二碗。空心服之。

【主治】痔漏。

【加减】如肥人，加条黄芩三分。

10955 秦艽鳖甲散

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【异名】秦艽鳖甲饮（《医略六书》卷十九）。

【组成】柴胡 鳖甲（去裙，酥炙，用九肋者） 地骨皮各一两 秦艽 当归 知母各半两

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盏，加青蒿五叶，乌梅一个，煎至七分，去滓，空心、临卧温服。

【功用】《中医大辞典》：滋阴养血，清热除蒸。

【主治】阴亏血虚，外感风邪传里化热，致患风劳，骨蒸潮热，肌肉消瘦，唇红颊赤，呼吸气粗，神疲乏力，盗汗。

①《卫生宝鉴》：骨蒸壮热，肌肉消瘦，唇红颊

赤，气粗，四肢困倦，夜有盗汗。②《女科指掌》：经闭。③《金匮翼》：风劳之证，肌骨蒸热，寒热往来，痰嗽，盗汗，黄瘦，毛焦口臭，或成痟利，由风邪淹滞经络，瘀郁而然。

【方论选录】 ①《医方考》：风，阳气也，故在表则表热，在里则里热，附骨则骨蒸壮热，久蒸则肌肉消瘦。无风不作骨蒸，此昆之立言也。罗谦甫氏之主此方，盖有神契者矣。柴胡、秦艽，风药也，能驱肌骨之风；骨皮、知母，寒品也，能疗肌骨之热；鳖，阴类也，甲，骨属也，骨以及骨，则能为诸药之向导，阴以养阴，则能退阴分之骨蒸；乌梅味酸，能引诸药入骨而收其热；青蒿苦辛，能从诸药入肌而解其蒸；复有当归，一以养血，一以导诸药入血而除热于阴尔。②《医略六书》：营气受风，遏热伤乎阴血，故肌肉消瘦，骨蒸潮热不已，名曰风痨。生鳖甲专入厥阴，力能滋阴而散结；秦艽肉兼走阳明，性善活血以祛风，青蒿解少阳之热；柴胡疏肝胆之邪；当归益荣养血；知母润燥益阴；地骨皮退肌表之热；乌梅肉敛肝肾之阴。使热退阴充，则风自外解，而骨蒸无不退，肌肉无不生矣。此滋阴解热之剂，为风痨骨蒸，消瘦之专方。

10956 秦椒剪红丸

【方源】《成方便读》卷四。

【组成】 秦椒 大黄 三棱 莪术 干漆 木香 槟榔 贯众 雄黄

【用法】 上为末，神曲糊为丸。五更时用鸡汤送下。

【主治】 虫膈、血膈。虫膈与血膈两端，皆饮食不下，皆有痛处，但虫则作止无常，攻动不一，或饥则盛，而稍得食则缓，血则口中自觉有血腥气，时作呕逆；或因大怒而血逆于上；或因受伤而血郁于中。

【方论选录】 然虫膈最易裹血，血膈每易生虫，故出一方而两治之。方中行气破血之药，居其大半，而以杀虫之药辅之，用神曲糊丸者，助脾而复其健运之职。送服用鸡汤者，以甘美之味而易入虫口也。

10957 盎落汤

【方源】《内经拾遗》。

【异名】 落盎汤（《丹溪心法附余》卷十五）。

【组成】 石菖蒲 吴茱萸 高良姜 香附子 陈皮

【用法】 水一碗，煎七分，去滓，滴香油三五点，温服。

【主治】 心痛心痛。

10958 盎落散

【方源】《普济方》卷四十五。

【异名】 盎落汤（《证治宝鉴》卷十一）。

【组成】 米壳（去顶膈净）二两 柴胡五钱 桔梗五钱 甘草五钱

【用法】 上为末。每服五钱，水一盏，煎至七分，入灯草一茎，去滓，食后服。若不住疼痛，加生姜五片，依前煎服。药先闻，药汁后服。

【主治】 偏正头痛不可忍。

【备考】《证治宝鉴》有陈皮。

10959 桂车汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】 车前子一两 肉桂三分 知母一钱 王不留行二钱

【用法】 水煎服。一剂即通。

【功用】 泻膀胱之火以利水。

【主治】 膀胱之火壅塞，以致小便流白浊，如米泔之汁，如屋漏之水，或痛如刀割，或涩似针刺，溺溲短少，大便后急。

10960 桂心丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】 桂心二两 干姜二两（炮裂，锉） 丹参三两 杜仲三两（去粗皮，炙微黄，锉） 牛膝三两（去苗） 续断三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 五种腰痛并冷痹。

10961 桂心丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】 桂心三分 干姜半两（炮裂，锉） 丹参一两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 牛膝一两（去苗） 附子三分（炮裂，去皮脐） 续断二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】 虚损，腰脚冷痹不仁。

10962 桂心丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 桂心一两半 人参一两半 熟地五两 茯神一两半（去木） 柏仁三两（炒） 远志一两半 辰砂一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，酒煎，去滓温服。

【主治】 产后惊悸，脉虚弦细者。

【方论选录】 产后血气虚寒，心阳亏损，而心气不振，心神失养，故惊悸不安焉。桂心补火以振心阳，人参扶元以补心气，熟地补血滋心阴，茯神渗湿安神志，远志通肾交心，柏仁养心宁神，朱砂镇坠心气以安神也。蜜丸酒下，使血气内充，则虚寒自散，而心阳振发，心气自雄，安有惊悸不已之患乎。

10963 桂心汤

【方源】 方出《千金》卷十四，名见《圣济总录》卷四十三。

【组成】 甘草 桂心各二两 龙骨 麦门冬 防风 牡蛎 远志各一两 茯神五两 大枣二十枚

【用法】 上㕮咀，以水八升，煮取二升，分二服，相去如行五里许。

【主治】 ①《千金》：惊劳失志。②《圣济总录》：健忘。

【宜忌】 《外台》：忌海藻、菘菜、生葱、酢物。

【方论选录】 《千金方衍义》：惊劳失志，总由心肾不交，虚风内动所致。故以茯神、远志交通心肾，龙骨、牡蛎镇摄虚风，桂心、防风遏达肝气，麦冬、甘草、大枣滋益心脾，则虚风无隙可入矣。

10964 桂心汤

【方源】 方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷二〇三。

【组成】 桂心二两 木瓜二两（干者） 乌梅肉二两

【用法】 上为散。每服半两，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，一日三次。

【主治】 霍乱，脚转筋。

10965 桂心汤

【方源】 《圣济总录》卷三十二。

【组成】 桂（去粗皮）二两 菖蒲一两（去须）

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，用水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候，衣覆取汗。未退再服。

【主治】 伤寒邪气伤肺，失音不语。

10966 桂心汤

【方源】 《圣济总录》卷四十八。

【组成】 桂（去粗皮）二两半 麻黄（去节，煮，掠去沫，焙）半两 甘草（炙） 款冬花（焙） 杏仁（汤退去皮尖双仁，麸炒）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】 肺中寒，咳唾喘息。

10967 桂心汤

【方源】 《圣济总录》卷六十三。

【组成】 桂（去粗皮） 干姜（炮） 半夏（汤洗去滑，炒）各一分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，煎至六分，去滓，空心温服。

【主治】 脾胃虚寒，呕吐不止。

10968 桂心汤

【方源】 《圣济总录》卷一一四。

【异名】 磁石散（《济生》卷五）。

【组成】 桂（去粗皮） 羌活（去芦头） 黄耆（锉）各一分 防风（去叉）半两 芍药 人参 木通（锉）各一分半 磁石（煅，醋淬七遍）二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水三盏，先煮羊肾一只，去肾取汁一盏，然后下药，煎至七分，去滓温服。

【主治】 肾气不足，耳聋，耳中虚鸣。

10969 桂心汤

【方源】 《医学入门》卷八。

【组成】 桂心 小草 吴萸 干姜 独活 熟地 当归 白芍各一钱 甘草 细辛各三分

【用法】 水煎服。

【主治】 素有宿寒，因产大虚，寒搏于血，血凝不散，上冲心之脉络所致之心痛。

10970 桂心散

【方源】 《医部全录》卷二二八引《集验方》。

【组成】 桂心 漏芦 威灵仙 芎藭 白芷 木香 当归（去芦） 白僵蚕（炒） 地龙（炒，去土）各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】 风走注疼痛。

10971 桂心散

【方源】 《圣惠》卷十九。

【异名】 解语散（《传家秘宝》卷中）、桂附汤（《圣济总录》卷五）、解语汤（《简易方》引《资寿方》，见《医方类聚》卷二十）、资寿解语汤（《医方大成》卷一引《简易》）。

【组成】 桂心一两 羌活二两 防风二两（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 赤箭一两 羚羊角屑一两 酸枣仁一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入竹沥一合，更煎一两沸，温服，不拘时候。

【主治】 中风舌强，失音不语，精神昏闷，半身不遂，口眼㖞斜。

①《圣惠》：中风失音不语。②《圣济总录》：中风精神冒闷。③《普济方》：中风，半身不遂，口眼㖞斜，神气不清，一切风气并皆治之。

10972 桂心散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】桂心 丹桂 牛膝（去心） 附子（炮裂，去皮脐） 当归 赤芍药 木香 一两 萆薢 一两（锉） 麻黄一两（去根节）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】历节风，疼痛不可忍，肢节无力。

【宜忌】忌猪、鸡、犬肉，生冷，油腻。

【备考】方中自桂心以下六味药用量原缺。

10973 桂心散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】桂心一两 高良姜 一两（锉） 当归一两（锉，微炒） 草豆蔻一两半（去皮） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参一两（去芦头）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】冷气攻心，腹痛多呕，不欲饮食。

10974 桂心散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】桂心三分 白术一两 细辛一两 附子 一两（炮裂，去皮脐） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 槟榔三分

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓温服，一日三四次。

【主治】饮癖。气分，心下坚硬如杯，水饮所作。

10975 桂心散

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】桂（去粗皮） 昆布（洗去咸，焙） 海藻（洗去咸，焙） 甘草（炙，锉） 白面（微炒） 各一两 龙胆 海蛤 土瓜根 半夏（为末，生姜汁和作饼，晒干） 吴茱萸（汤浸，去涎，焙，炒） 牡蛎（烧）各一两半

【用法】上为散。每服二钱匕，食后、临卧酸浆水调下。

【主治】瘿气，咽喉肿塞。

10976 桂心散

【方源】《普济方》卷四十六。

【组成】桂（去粗皮） 荜茇 细辛（去苗叶） 各等分

【用法】上为散。每用一字，先含温水一口，即搐药于鼻中；偏头痛，随痛左右用之。

【主治】脑风头痛。

10977 桂心散

【方源】《医略六书》卷三上。

【组成】桂心一两半 蒲黄二两 延胡一两半（酒炒）

【用法】上为散。每服三钱，砂糖灰汤煎，去滓温服。

【主治】产后恶血冲心痛，脉紧涩滞者。

【方论选录】产后恶血不下，上冲心膈，故心气窒塞，心痛不休焉。桂心温经通闭，开心气之窒塞；蒲黄破瘀下行，降恶血之冲逆；延胡活血以通经脉也。为散，砂糖汤煎，使瘀血消化，则新血自生，而恶血无不下，安有上冲心膈，心痛不已之患乎。

10978 桂术汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】桂（去粗皮）一两 白术 人参 附子（炮裂，去脐皮）各三分 防风（去叉） 干姜（炮） 甘草（炙）各半两

【用法】上锉，如麻豆大，每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，一日二次。

【主治】伤寒柔痉，手足厥冷，筋急，汗不止。

10979 桂朴汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】肉桂四分 厚朴一钱 当归二钱 茯苓二钱 白术一钱 丁香五分 砂仁一钱 白芍一钱（酒炒） 广皮一钱 郁金二钱 大枣二枚 生姜三片

【主治】胃气虚寒，不能纳谷，呕吐作痛。

10980 桂曲丸

【方源】《百一》卷二。

【组成】人参 荜茇 白术 干姜（炮） 高良姜（微炒） 缩砂仁 肉豆蔻（面裹，煨） 陈皮（汤洗，去白） 桂枝（去粗皮）各一两 甘草（锉，炒） 丁香各半两 神曲三块（锉，炒熟）

【用法】上为细末，熟汤泡蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸至七十丸，食前一时，米饮送下。

【功用】①《百一》：健脾胃，进饮食，助克化。②《普济方》：克化生冷，温中下气。

【主治】食少易伤，胸满恶心，或心腹疼痛，病后衰弱，气不复常。

10981 桂花汤

【方源】《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】干姜（炮）九两　桂心　甘草（炒）各九斤　缩砂仁二斤十四两　炒盐十四斤

【用法】上为末。每服一钱，食前沸汤点下。

【主治】一切冷气，心腹刺痛，胸膈痞闷，胁肋胀满，呕逆恶心，饮食无味。

10982　桂灵散

【方源】《丹溪心法附余》卷十五。

【组成】桂心　良姜（麸炒）　厚朴　五灵脂（明净者）各等分

【用法】上为末。每服一钱，熟醋汤调下。

【主治】心腹大痛危急者。

【备考】方中桂心原脱，据《东医宝鉴·杂病篇》补。

10983　桂附丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】桂（去粗皮）　附子（炮裂，去皮脐）　干姜（炮）　赤石脂各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前米饮送下，一日三次。

【主治】溏泻、水痢久不止。

10984　桂附丸

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】肉桂一两　香附四两（泔、酒、醋、便四制）　延胡二两（醋炒）　熟艾一两（醋煮和饼，焙，捣）　当归（姜汁拌炒）三两　熟地四两（砂仁酒煮）　红花一两

【主治】外邪风冷所致妇人经水不通。

【方论选录】经水不行，因热结者少，由寒结者多。肉桂祛积冷，香附行滞气，故以为君；红花、延胡行瘀破积，熟艾行经络为臣；当归、熟地补阴，引诸药入血分为使。服久寒邪退，瘀血行，大小腹必无疠痛矣。

10985　桂附丸

【方源】《医学启源》卷中。

【组成】川乌头三两（炮，去皮脐）　附子三两　干姜二两（炮）　赤石脂二两　桂二两　蜀椒（去目，微炒）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温水送下。觉至痛处即止。若不止，加至五十丸，以知为度。若早服无所觉，至午后再服二十丸。若久心痛，每服三十丸至五十丸，尽一剂，终身不发。

【主治】风邪冷气，入乘心络，或脏腑暴感风寒，上乘于心，令人卒然心痛，或引背膂，甚则经久不愈。

【备考】方中蜀椒用量原缺，据《卫生宝鉴》补。

10986　桂附汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】黄柏（为引用）　知母各五分　肉桂一钱　附子三钱

【用法】上㕮咀，都作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食远热服。

【主治】①《兰室秘藏》：白带腥臭，多悲不乐。②《竹林女科》：阳气虚极，大寒之证，带久不止，下流白滑如涕，腥气难闻，多悲不乐。

【加减】如少食多饱，有时似腹胀夯闷，加白芍药五分；如不思饮食，加五味子二十个；如烦恼，面上如虫行，乃胃中元气极虚，加黄耆一钱五分，人参七分，炙甘草、升麻各五分。

【方论选录】《玉机微义》：此补阳气极虚，用黄柏等为引用，又升降阴阳药也。

【备考】方中黄柏，《卫生家宝》作“黄芩”。

10987　桂附汤

【方源】《得效》卷八。

【组成】交趾桂一两（去粗皮）　绵附子一枚（炮，去皮脐）

【用法】上为散。每服三钱，水二盏，加生姜三片、大枣二枚，水煎，食前温服。

【主治】①《得效》：虚汗不止，及体虚失血。②《东医宝鉴·杂病篇》引《医学入门》：阳虚血弱，虚汗不止。

10988　桂附汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】大附子　肉桂各二钱　川芎五钱　白芍　生地　当归　木瓜各一钱五分

【用法】水煎，温服。

【主治】血受寒而脊痛筋挛急。

10989　桂附散

【方源】《青囊立效秘方》卷一。

【组成】川草乌各一钱五分　丁香一钱　肉桂二钱　生南星一钱五分　干姜二钱　牙皂一钱五分　白芥子一钱五分　唐阿魏二钱　吴萸一钱　细辛一钱　火消一钱五分　附子二钱　银朱一钱五分　毛茛一钱五分　麝香三分

【用法】上为细末，乳至无声。

【主治】阴疽，流注痰块，及一切风寒湿痹，周身串痛。

10990　桂枝汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】阳旦汤(《金匮》卷下)。

【组成】桂枝三两(去皮) 芍药三两 甘草二两(炙) 生姜三两(切) 大枣十二枚(擘)

【用法】上㕮咀五味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力。温覆令一时许,遍身漐漐微似有汗者益佳,不可令如水流漓,病必不除。若一服汗出病愈,停后服,不必尽剂;若不汗,更服依前法,又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽。若病重者,一日一夜服,周时观之。服一剂尽,病证犹在者,更作服,若不汗出,乃服至二三剂。

【功用】解肌发表,调和营卫。

①《伤寒论》:解肌发汗,和营卫。②《古今医鉴》:实表散邪。③《伤寒来苏集》:滋阴和阳,调和营卫。

【主治】外感风寒,汗出恶风,头痛发热,鼻鸣干呕,苔白不渴,脉浮缓或浮弱;杂病、病后、妊娠、产后等见时发热,自汗出,微恶风,属营卫不和者。现用于感冒、流行性感冒见上述症状者。

①《伤寒论》:太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕,头痛者。太阳病,下之后,其气上冲者。太阳病,外证未解,脉浮弱者。太阴病,脉浮者。霍乱吐利止而身痛不休者。②《金匮》:妇人妊娠得平脉,阴脉小弱,其人渴,不能食,无寒热。产后风续之数十日不解,头微痛,恶寒,时时有热,心下闷,干呕,汗出。③《医灯续焰》:腹中痛在脐旁,名曰盘疝。脚气发于太阳经,发热头痛恶寒,目眩项强,腰脊、身体及外踝后至小趾外侧皆痛。④《伤寒附翼》:凡头痛发热恶风恶寒,其脉浮而弱,汗自出者,不拘何经,不论中风、伤寒、杂病,咸得用此发汗。愚常以此汤治自汗、盗汗、虚疟、虚痢随手而愈。⑤《杂症会心录》:胎疟。

【宜忌】①《伤寒论》:禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、恶臭等物。若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与之。若酒客病,不可与桂枝汤。②《注解伤寒论》:桂枝下咽,阳盛则毙。

【方论选录】①《注解伤寒论》:《内经》曰:"辛甘发散为阳",桂枝汤,辛甘之剂也,所以发散风邪。风淫所胜,平以辛,佐以苦甘,以甘缓之,以酸收之。是以桂枝为主,芍药、甘草为佐也;风淫于内,以甘缓之,以辛散之。是以生姜、大枣为使者也。②《医方考》:桂枝味辛甘,辛则能解肌,甘则能实表,经曰:辛甘发散为阳,故用之以治风;然恐其走泄阴气,故用芍药之酸以收之;佐以甘草、生姜、大枣,此发表而兼和里之意。③《伤寒附翼》:此为仲景群方之魁,乃滋阴和阳,调和营卫,解肌发汗之总方也。用桂枝发汗,即用芍药止汗,生姜之辛,佐桂以解肌,大枣之甘,佐芍以和里。桂、芍之相须,姜、枣之相得,阴阳表里,并行而不悖,是刚柔相济以为和也。甘草甘平,有安内攘外之功,用以调和气血者,即以调和表里,且以调和诸药矣。而精义尤在啜稀热粥以助药力。盖谷气内充,外邪勿复入,热粥以继药之后,则余邪勿复留,复方之妙用又如此。故用之发汗,自不至于亡阴,用之止汗,自不至于贻患。④《伤寒贯珠集》:此方用桂枝发散邪气,即以芍药摄养津气,炙甘草合桂枝之辛足以攘外,合芍药之酸足以安内,生姜、大枣、甘草相合补益营卫,亦助正气去邪气之用也。盖以其汗出而邪不出,故不用麻黄之发表,而以桂枝助阳以为表,以其表病而里无热,故不用石膏之清里,而用芍药敛阴以为里,此桂枝汤之所以异于麻黄、大青龙也。

【临证举例】①伤风 《全国名医验案类编·续编》:赵云龙,年五十二岁,业商,住南通,患伤风。下乡收帐,感受风寒,头痛有汗,谵语狂笑,大便不通,已经六日,小便自利,身热恶风,脉浮而大,宜桂枝汤。桂枝二钱,赤芍药二钱,甘草一钱,生姜二片,红枣二枚,服后笑语皆止,第二日大便自通,三日而愈。②发热 《伤寒论通俗讲话》:病者某某,女,成人。近一年来,每天都出现2~3次发热、汗出。查其饮食、大小二便、睡眠皆佳。曾按阴虚治疗,服药20余剂无效。诊其脉缓软,舌淡苔白,辨为营卫不和,用桂枝汤原方服二剂即热止汗不出。③多汗症 《福建中医药》(1964;5:35):治一青年渔民,某年夏天因汗后入海捕鱼,遂致自汗不止,无论冬夏昼夜常自汗出,曾用玉屏风散及龙、牡、麻黄根,桂枝汤加黄耆,均稍愈而复发。经过年余,体益疲乏,皮肤被汗浸呈灰白色,汗孔增大,肢末麻痹,头晕、口不渴,尿量减少,饮食如常,脉浮缓,重按无力。用桂枝汤原方如法服之,三日后全身温暖,四肢舒畅,汗已止。继用原方加黄耆15克,连服二剂,竟获全功。④妊娠恶阻 《新中医》(1984;4:12):病者王某某,24岁。妊娠月余,呕吐频频,曾服中药10余剂乏效,继又住院三天,中西医针药并举仍呕恶冲心难忍。近几天又增腹痛,望其面色不华,语声无力,无食欲,强食之则食之即吐,小便黄,

大便干，舌苔舌质无明显变化，脉弦数。诊为冲气上逆，非降逆平冲不能止呕。遂用桂枝、白芍各10克，竹茹、生姜各9克，大枣3枚，炙甘草3克。服一剂，自觉心中安定，呕吐有所减轻。连服三剂，呕吐已止，腹痛除，胎气安。作者指出，本方所治之妊娠恶阻，以既无明显寒象，又无明显热象为宜。⑤急惊 《全国名医验案类编·续编》：柯某之长子，年岁半，住云南昆明市铁道分局。病冒风急惊。民国十一年阴历九月初六日晨，寐醒抱出，冒风而惊，发热自汗沉迷，角弓反张，手足抽搐，目上视，纹赤而浮，唇赤舌淡白，脉来浮缓。由风寒阻塞太阳运行之机，加之小儿营卫未充，脏腑柔嫩，不耐风寒，以致猝然抽搐而成急惊，此为风中太阳肌表之症，以仲景桂枝汤主之。使太阳肌腠之风寒得微汗而解，一剂即熟寐汗出热退，次日霍然。⑥皮肤病 《浙江中医杂志》(1965；5:30)：以桂枝汤为主，治疗多形红斑、湿疹、荨麻疹、皮肤瘙痒症、冬季皮炎、冻疮、蛇皮癣等多种皮肤病之属风寒外袭，营卫不和，血脉阻滞而舌苔薄白，脉象浮缓或浮滑，以及有每逢冬季发作，春暖时症状减轻的规律者，获得满意效果。具体运用时，挟湿者，可加化湿利湿之品，如茅术、羌活、独活、防己、赤小豆、茯苓皮、薏苡仁、车前之类；营血不足者，加当归、首乌、鸡血藤、丹参之类。

【现代研究】 桂枝汤药理作用的初步研究 《中成药研究》(1983；3:25)：药理实验结果证明，桂枝汤具有较强的解热、镇痛、抗炎、镇静作用。其解热实验表明，75%桂枝汤能使发热兔肛温降低0.71℃，皮温试验也可使小鼠正常皮肤温度降低8.13%，同时，实验还提示，其解热作用除因促进汗腺分泌引起外，还与桂枝汤的镇静作用及中枢性降温作用有关；镇痛实验表明，在120分钟时，37.5%、75%桂枝汤使小鼠基础痛阈分别增高64.82%和105.35%，而且37.5%桂枝汤对小鼠扭体反应抑制率为80%，75%桂枝汤的抑制率为90%；抗炎实验表明，小鼠致炎后一小时，37.5%和75%桂枝汤对肿胀抑制率分别为85.72%和84.77%；实验还表明，桂枝汤能抑制小鼠自由活动，增强巴比妥类催眠作用。

10991 桂枝汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】 桂（去粗皮）二两 赤茯苓（去黑皮）一两半 白术一两 甘草（炙，锉）三分 陈橘皮（汤浸，去白，焙）半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎取七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒水在心下，心悸动，欲得人按。

10992 桂枝汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 桂枝 白术 芍药各半两 甘草二钱（炙）

【用法】 上锉。每服半两，水一盏，煎至七分，去滓取清，宜温服之。

【主治】 ①《保命集》：大肠经动，下痢为鹜溏，大肠不能禁固，卒然而下，成水泄，青色，其中或有硬物，欲起而又下，欲了而不了，小便多清。②《济阳纲目》：内寒泄泻。

10993 桂枝汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 桂枝 芍药 防风 羌活 川芎 白术 甘草

【用法】 上锉。加生姜三片、大枣一枚，水煎，温服。

【功用】 实表散邪。

【主治】 冬月正伤寒，足太阳膀胱经受邪，头痛，发热恶风，脊强，自汗，脉浮缓。

【宜忌】 无汗者不可服。

10994 桂枝散

【方源】《本事》卷七。

【组成】 枳壳一两（小者，去瓤，麸炒黄） 桂枝（去皮）半两（不见火）

【用法】 上为细末。每服二钱，姜、枣汤调下。

【主治】 因惊伤肝，胁骨里疼痛不已。

【方论选录】《本事方释义》：枳壳气味苦寒入足太阴，桂枝气味辛温入足太阳，因惊伤肝致胁骨疼痛不已，必延及太阴、太阳，故以苦寒、辛温二味护持经络，再以姜、枣之辛甘和其营卫，则受伤之肝得安而疼痛自然缓矣。

【备考】 本方方名，《东医宝鉴·外形篇》引作"桂枝汤"。

10995 桂苓丸

【方源】《局方》卷二（绍兴续添方）。

【组成】 肉桂（去粗皮，不见火） 茯苓（去粗皮）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每两作八丸。每服一丸，用新汲水或热水嚼下；化下亦得。

【功用】 大解暑毒。

【主治】 水饮停留胸腹，短气眩晕，面足浮肿，小便不利；肾气上逆，水冷为痰，逆冲膈上。

①《鸡峰》：水饮不消，停留胸腹，短气上喘，

头眩心忪，面目瘿瘿，心胸汪闷，不思粥食，两胁胀满，小便不利，腰腿沉重，足胫浮肿，遍身黄色，时复自汗。②《御药院方》：冒暑大渴，饮水过多伏冷，心腹胀满，见食欲呕，头眩，小便赤少，大便滑泻。③《张氏医通》：肾气上逆，水泛为痰，逆冲膈上。

【备考】 本方改为汤剂，名"桂苓饮"（见《张氏医通》）。

10996 桂苓汤

【方源】 方出《圣惠》卷四十二，名见《普济方》卷一八四。

【组成】 桂心半两 赤茯苓一两 半夏一两（汤洗七次去滑） 细辛半两 麻黄二两（去根节） 五味子一两

【用法】 上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 上气不得喘息，喉中作水鸡声。

10997 桂苓汤

【方源】 《直指》卷七。

【组成】 辣桂 赤茯苓 当归 川芎 赤芍药 蓬莪术 京三棱 槟榔 苍术（炒） 桑白皮（炒） 大腹皮 瞿麦穗 青皮 陈皮 甘草（炒）各半两 葶苈 大黄（湿纸煨）各一分

【用法】 上为散。每服三钱，加生姜五片，水煎服。

【主治】 血分水饮，经脉不行，血化为水，四肢红肿。

10998 桂苓饮

【方源】 《伤寒六书》卷三。

【组成】 猪苓 泽泻 桂枝 甘草 白术 知母 黄柏 山栀 蕨叶

【用法】 水二钟，加生姜三片，煎至一钟，再加滑石末一钱，煎三沸，温服。取微汗为效。

【主治】 伤寒初病，无热谵语，烦躁不安，精彩不与人相当，此因热结膀胱，名曰如狂。

【宜忌】 忌下。

10999 桂星散

【方源】 《直指》卷二十一。

【异名】 桂香散（《医学入门》卷七）、桂辛散（《张氏医通》卷十五）、桂花散（《杂病源流犀烛》崇文书局刻本卷二十三）。

【组成】 辣桂 川芎 当归 细辛 净石菖蒲 白蒺藜（炒，杵去刺） 木通 木香 麻黄（去节） 甘草 大南星（煨裂） 白芷稍各四钱

【用法】 上为散。每服三钱，水一盏半，加葱白二片，紫苏五叶，生姜五片，水煎，食后服。晚少食，临卧加些全蝎服。

【主治】 耳聋、耳鸣、头痛。

①《直指》：风虚耳聋。②《崇崖尊生》：风入聋鸣，必有时头痛。③《医钞类编》：寒虚耳聋。

11000 桂香丸

【方源】 《医方类聚》卷一三〇引《济生》。

【组成】 肉桂（不见火） 一两 麝香（别研） 一钱

【用法】 上为细末，饭为丸，如绿豆大。大人每服十五丸，小儿每服七丸，熟水送下，不拘时候。

【主治】 ①《医方类聚》引《济生》：过食杂果，腹胀气急。②《杂病源流犀烛》：多食果菜成积，不时泻利，腹中若有傀儡也。积聚、癥瘕、痃癖。

11001 桂香丸

【方源】 《直指》卷二十六。

【组成】 当归须 川芎 赤芍药 牡丹皮 南木香 细辛 辣桂（并晒干） 玄胡索（略炒） 乳香 没药各等分

【用法】 上煮米醋，将乳香、没药为膏，余药末之，揉和为丸，如梧桐子大。每服七十丸，续断煎汤送下；有热，多加生槐花煎汤送下。

【主治】 月事不调，心腹刺痛，寒热间作。

11002 桂香散

【方源】 《苏沈良方》卷五。

【组成】 高良姜（锉，炒香熟） 草豆蔻 甘草 白术 缩砂肉 厚朴（去粗皮，锉）各一两 青橘皮（去瓤，炒黄） 诃子肉各半两 肉桂一分 生姜 枣肉各一两（二味同厚朴一处，用水一碗，煮令干，同杵为团，焙干用）

【用法】 上同为末。每服二钱，入盐少许，空心沸汤点下。

【功用】 温脾止痛。

【主治】 脾胃虚弱，腹痛冷泻，及妇人脾血久冷。

11003 桂香散

【方源】 《医级》卷九。

【组成】 桂心 琥珀 当归 川芎各五钱 没药 香附 茴香 川楝子 木香 吴萸

【用法】 上为末。每服一钱，开水调下。

【主治】 妇人经脉虚滞，瘕气攻疼。

【加减】 加灵脂、沉香，又名桂珀散。

【备考】 方中没药、香附、茴香、川楝子、木香、吴萸以及灵脂、沉香用量原缺。

11004 桂姜汤

【方源】《直指》卷十八。

【组成】 吴茱萸十两（半酒半醋浸一宿，焙干） 川白姜（生） 辣桂各半两 良姜 毕澄茄 茴香（炒） 缩砂仁 益智仁 木香 茯苓 甘草（炙） 各三钱

【用法】 上锉，每服三钱，水煎，调苏合香丸，食前服。

【主治】 元阳脐冷疝气，兼治湿证。

11005 桂姜汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 肉桂 炮姜 甘草各五分

【用法】 上药各为极细末，滚水冲掉，将碗炖于滚水内，再掉，慢以咽下。但先以鹅毛蘸桐油，入喉捲痰，痰出服药更效。

【主治】 喉痛顷刻而起，前无毫恙者，此虚寒阴火之症；并治喉痹一切危急之症。

【备考】 本方方名，《仙拈集》引作"姜桂汤"。

11006 桂浆粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】 肉桂2～3克 粳米50～100克 红糖适量

【用法】 将肉桂煎取浓汁去滓，再用粳米煮粥，待粥煮成后，调入桂汁及红糖，同煮为粥。或用肉桂末1～2克，调入粥内同煮服食。

【功用】 补阳气，暖脾胃，散寒止痛。

【主治】 肾阳不足，畏寒怕冷，四肢发凉，阳萎，小便频数清长，脉搏微弱无力；脾阳不振，脘腹冷痛，饮食减少，大便稀薄，呕吐，肠鸣腹胀，消化不良，以及寒湿腰痛，风寒湿痹，妇人虚寒性痛经。

11007 桂麝散

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 麻黄五钱 细辛五钱 肉桂一两 牙皂三钱 生半夏八钱 丁香一两 南星八钱 麝香六分 冰片四分

【用法】 上为极细末。掺膏药内贴。

【主治】 一切阴疽流注。

11008 桂心酒粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】 桂心半两（末） 好酒一升

【用法】 上暖酒和桂心末，空腹分二次服，搅粥食之。

【主治】 肾脏虚冷，腰脚疼痛不可忍。

11009 桂心消积丸

【方源】《医略六书》卷二十

【组成】 桂心一两半 当归三两 赤芍一两半（酒炒） 桃仁三两 厚朴一两半（制） 三棱一两半（醋炒） 槟榔一两半 蓬术一两半（醋炒） 大黄三两（醋煮） 鳖甲三两（醋炙）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，酒煎，去滓温服。

【主治】 产后积聚，脉数弦洪紧涩者。

【方论选录】 产后血瘀气壅凝结，经久而遇热伤阴，遂成积聚，故腹大胀满疼痛不止焉。槟榔破气导滞以消其聚，当归养血活血以荣其经，桃仁破瘀清积，厚朴散聚宽胀，三棱破气中之血以消坚，蓬术破血中之气以消积，赤芍破血通经，鳖甲滋阴散结，大黄涤热通幽，醋煮引入血分，肉桂温经暖血，中心通闭力优。蜜丸酒煎，使瘀化气行，则积聚并散，而遇热顿清，营阴暗复，安有胀满疼痛之患乎？

11010 桂术二陈汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 桂枝八分 白术一钱五分 广皮一钱 半夏一钱五分 茯苓三钱 枳实一钱 泽泻一钱五分 牛膝一钱五分 车前二钱 生姜三片

【主治】 痰饮。水从胃出，下走肠间，辘辘有声，胸中微痞，头目作眩。

11011 桂附八珍汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 肉桂五分 大附子 人参 白术 白茯苓 当归 川芎 白芍（炒） 熟地各一钱 木香 甘草各三分

【用法】 加生姜三片，红枣二枚，水二钟，煎八分，食远服。

【主治】 房欲后阴虚受寒，致令肿块，或遍身腿脚疼痛。

11012 桂附止带汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】 附片三钱 肉桂五分 续断 焦艾 茯苓 芡实各三钱 盐小茴一钱 乌鲗骨五钱 金樱子三钱

【用法】 水煎，温服。

【功用】 温肾固摄。

【主治】 肾虚证。带下黑色，稀薄量多，绵绵不止，月经紊乱，甚或停闭，色多晦黯，小腹不痛，但有冷感，腰痠软，面色苍白，喜暖恶寒，大便时溏，小便清长，舌淡苔白，脉沉缓无力。

【加减】 腰痛甚，加鹿角霜二钱；下腹坠胀，阴中如有物坠出者，加升麻一钱半。

11013 桂附杜仲汤

【方源】《会约》卷七。

【组成】 肉桂三钱 附子三四钱（急则用生附子） 杜仲二钱

【用法】 热服。如上焦假热拒格，冷服。

【主治】 真寒腰痛，六脉弦紧，口舌青，阴囊缩，身战栗。

【加减】 如膝冷而痛，加川牛膝二三钱；如兼湿者，加苍术二钱。

11014 桂附苓术饮

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】 厚附片三钱 肉桂一钱 茯苓四钱 茅术 炒远志 生姜皮各二钱 制台乌一钱半

【用法】 水煎服。

【功用】 温肾行水。

【主治】 肾虚证。妊娠数月，面浮肢肿，面色灰黯，心悸气短，下肢畏寒，腰胀腹满，舌淡苔薄白而润，脉迟。

11015 桂附理中汤

【方源】《喉科种福》卷五

【组成】 苏党参八钱 白术五钱 附片六钱 干姜三钱 油桂一钱半（去粗皮，研，炮）

【主治】 中寒白喉，无恶寒发热，喉内起白皮，随落随长。

11016 桂枝人参汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 桂枝加人参汤（《云岐子保命集》卷上）。

【组成】 桂枝四两（别切） 甘草四两（炙） 白术三两 人参三两 干姜三两

【用法】 以水九升，先煮四味，取五升，纳桂，更煮取三升，去滓，温服一升，日再服，夜服一次。

【功用】 ①《内台方议》：和解表里。②《金鉴》：温补中两解表里。

【主治】 太阳病，外证未除，而数下之，遂协热下利，利下不止，心下痞硬，表里不解者。

【方论选录】 ①《内台方议》：桂枝以解表，人参、白术以安中止泻，加干姜以攻痞而温经，甘草以和缓其中，此未应下而下之以虚其中者主之也。②《尚论篇》：以表未除，故用桂枝以解之；以里适虚，故用理中以和之。此方即理中加桂枝而易其名，亦治虚痞下利之圣法也。③《伤寒来苏集》：此之谓有表里症，然病根在心下，非辛热何能化痞而软硬，非甘温无以止利而解表。故用桂枝、甘草为君，佐以干姜、参、术，先煎四物，后纳桂枝，使和中之力饶，而解肌之气锐，于以奏双解表里之功，又一新加法也。④《古方选注》：理中加人参，桂枝去芍药，不曰理中，而曰桂枝人参者，言桂枝与理中表里分头建功也。故桂枝加一两，甘草加二两。其治外协热而里虚寒，则所重仍在理中，故先煮四味，而后纳桂枝，非但人参不佐桂枝实表，并不与桂枝相忤，宜乎直书人参而不讳也。

【临证举例】 ①胃痛《老中医经验选》：谭某某，男，36岁。患者素患胃痛，反复发作，经胃肠钡餐检查，诊为十二指肠球部溃疡，近月来胃脘隐隐作痛，有时发作，而以饭后二～三小时及夜间尤痛。右上腹部有明显压痛及痞闷感，口淡无味，时泛清水，胃纳欠佳，神疲乏力，大便正常，小便较多，脉迟弱，舌质淡白，苔薄白。此为胃虚气寒，治按温中散寒，用桂枝人参汤：党参五钱，白术五钱，干姜三钱，炙甘草三钱，桂枝四钱（后下），三剂，每天一剂。二诊：服上药后，胃痛减轻，纳食稍增，时觉脘闷欲吐，脉舌如前，照上方加法半夏三钱以温胃止吐，三剂，每天一剂。三诊：服上药后，胃痛已止，饮食如常；但停药后胃痛又复发，痞闷喜按，小便较多，脉迟细，舌淡、苔薄白。仍照上法治之，拟第一方减桂枝一钱，服药3剂后止痛。以后按上方继续治疗，服至胃痛消失，不再复发。②麻疹后期腹泻《广东中医》（1963；3:40）：一女孩，三岁许，疹子已收，身热不退，体温39℃，下利日十余次，俱为黄色粪水，脉数无歇止，舌质尚正常。诊断为麻后热毒不净作痢，与葛根芩连汤加石榴皮。服后体温反升至39.5℃，仍下利不止，嗅其粪味并无恶臭气。沉思再三，观病孩颇倦容，乃毅改用桂枝人参汤，仍加石榴皮。一服热利俱减，再服热退利止。

11017 桂枝甘草汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 桂心汤（《圣济总录》卷五十五）。

【组成】 桂枝四两（去皮） 甘草二两（炙）

【用法】 以水三升，煮取一升，去滓顿服。

【功用】 ①《伤寒贯珠集》：补助心阳，生阳化气。②《伤寒论类方》：扶阳补中。

【主治】 ①《伤寒论》：发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者。②《伤寒论今释》引《证治大还》：妇人生产不快，或死腹中。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：桂枝之辛，走肺而益气；甘草之甘，入脾而缓中。②《伤寒附翼》：此补心之峻剂也。桂枝本营分药，得甘草则内补营气而养血，从甘也。此方用桂枝为君，独任

甘草为佐，以补心之阳，则汗出多者，不至于亡阳矣；姜之辛散，枣之泥滞，固非所宜；并不用芍药者，不欲其苦泄也。甘温相得，气和而悸自平。③《古方选注》：桂枝复甘草，是辛从甘化，为阳中有阴，故治胸中阳气欲失。且桂枝轻扬走表，佐以甘草留恋中宫，载还阳气，仍寓一表一里之义，故得以外止汗而内除烦。

【临证举例】 ①心悸《印机草》：病经一月，两脉浮虚，自汗恶风，此卫虚而阳弱，用黄耆建中汤以建立中气，而温卫实表也。越一日，病者叉手自冒心间，脉之虚濡特甚，此汗出过多而心阳受伤也。仲景云：发汗过多，病人叉手自冒心，心下悸者，桂枝甘草汤主之；桂枝，甘草，大枣。②心痛《福建中医药》(1964；5:封三)：林某，男，39岁。胸悸而痛喜按，十天来服许多止痛药均罔效，大小便正常，时有自汗出。诊其六脉微缓，舌白滑。断为虚痛，用桂枝甘草汤：桂枝六钱，甘草三钱，顿服，服后痛即消失。③体质性低血压《黑龙江医药》(1979；2:59)：秦某某，男，46岁。四年来，血压一直偏低，伴有头晕眼花，失眠多梦，健忘，周身乏力，心悸，心前区压迫感。曾用西药治疗无效，近20余日加重，血压85/58mmHg。诊断：体质性低血压。处方：甘草15克，肉桂15克，桂枝15克，五味子25克，水煎，早晚服两次。4日后血压有所上升，症状减轻；一周后血压升为110/85mmHg，症状消失，睡眠明显好转，自觉周身有气力，精神愉快，后未复发。

11018 桂枝四七汤

【方源】《直指》卷六。

【组成】 桂枝 白芍药 半夏（制）各一两 白茯苓 厚朴（制） 枳壳（制） 甘草（炙）各半两 人参 紫苏各一分

【用法】 上锉。每服四钱，加生姜七片，大枣二枚，水煎，食前服。

【主治】 风冷寒邪客搏，心腹作痛。

11019 桂枝四物汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 四物汤加桂枝倍当归

【主治】《金鉴》：妇人经产一切血病，风感太阳卫分，发热有汗。

【备考】《金鉴》本方用当归、熟地、川芎各二钱，白芍（炒）三钱，桂枝三钱，甘草（炙）一钱，加生姜、大枣，水煎服。

11020 桂枝半夏汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 桂枝八分 半夏一钱五分 茯苓三钱 广皮一钱 白术三钱 苏子一钱 厚朴一钱 紫苏一钱 贝母二钱 甘草四分 生姜三片

【主治】 伏饮。三阳之气为阴邪遏抑，郁而不舒，痰满喘咳吐，发则寒热，背腰痛，其人振振身瞤剧。

11021 桂枝加桂汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 桂枝加桂枝汤(《方剂辞典》)。

【组成】 桂枝五两（去皮） 芍药三两 生姜三两（切） 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘）

【用法】 以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。炙其核上各一壮。

【功用】 ①《伤寒贯珠集》：泄上逆之气。②《伤寒论方医案选编》：温通心阳，兼祛寒以平冲逆。

【主治】 烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚，气从少腹上冲心者。

【方论选录】 ①《伤寒论》：桂枝汤今加桂满五两，所以加桂者，以泄奔豚气也。②《伤寒论条辨》：与桂枝汤者，解其欲自解之肌也；加桂者，桂走阴而能伐肾邪，故用之以泄奔豚之气也。然则所加者桂也，非枝也，方出增补，故有成五两云耳。③《伤寒论类方》：重加桂枝，不特御寒，且制肾气。又药味重则能下达，凡奔豚症，此方可增减用之。④《伤寒论本旨》：相传方中或加桂枝，或加肉桂。若平肾邪，宜加肉桂；如解太阳之邪，宜加桂枝也。

【临证举例】 奔豚《经方实验录》：周右，住浦东。初诊：气从少腹上冲心，一日四五度发，发则白津出，此作奔豚论。肉桂心一钱，川桂枝三钱，大白芍三钱，炙甘草二钱，生姜三片，大红枣八枚。二诊：投桂枝加桂汤后，气上冲减为日二三度发，白津之出亦渐稀，下得矢气，此为邪之去路，佳。肉桂心一钱半，川桂枝三钱，大白芍三钱，炙甘草三钱，生姜三片，红枣十枚，厚朴一钱半，半夏三钱。三诊：气上冲、白津出，悉渐除，益矢气得畅行故也。

11022 桂枝芍药汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 桂枝 芍药各一钱半 当归三钱 生姜二片 葱头三枚

【主治】 妊娠营血不足，寒袭经中，身疼无汗，发热恶寒，脉浮弱者。

11023 桂枝防风汤

【方源】《幼幼集成》卷一。

【组成】嫩桂枝一钱五分　杭白芍二钱　北防风一钱五分　炙甘草一钱

【用法】上作一剂。加老生姜一钱，大红枣五枚，水煎，热服。有汗能止，无汗能发，不致过汗亡阳。

【功用】解散肌肉之邪。

【主治】半周、一岁以至三五岁幼儿，伤寒初起，恶寒发热，体重面黄，或面白喘急，口中气热，呵欠顿闷。

【加减】有痰，加芥子一钱；有呕吐，加陈皮、半夏各一钱；热多，加柴胡一钱；胸紧气急，加枳壳、桔梗各一钱。

11024　桂枝红花汤

【方源】《活人书》卷十九。

【组成】桂心　芍药　甘草（炙）各三两　红花一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜四片，大枣二枚，煎至七分，去滓服，良久再服。汗出而解。

【主治】①《活人书》：妇人伤寒，发热恶寒，四肢拘急，口燥舌干，经脉凝滞，不得往来。②《东医宝鉴·杂病篇》：热入血室及结胸。

11025　桂枝附子汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂附汤（《活人书》卷十二）。

【组成】桂枝四两（去皮）　附子三枚（炮，去皮）　生姜三两（切）　大枣十二枚（擘）　甘草二两（炙）

【用法】以水六升，煮取二升，去滓温服，一日三次。

【功用】①《医门法律》：祛风温经，助阳化湿。②《金鉴》：温散其风湿，从表而解。

【主治】①《伤寒论》：伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者。②《伤寒论方解》：恶寒发热，四肢掣痛，难以屈伸，厥，或心下悸，或脐下悸。

【方论选录】①《注解伤寒论》：不呕不渴，里无邪也；脉得浮虚而涩，身有疼烦，知风湿但在经也。与桂枝附子汤，以散表中风湿。风在表者，散以桂枝、甘草之辛甘；湿在经者，逐以附子之辛热；姜、枣辛甘，行营卫、通津液，以和表也。②《伤寒论类方》：此即桂枝去芍药加附子汤，但彼桂枝用三两，附子用一枚，以治下后脉促、胸满之症；此桂枝加一两，附子加二枚，以治风湿身疼、脉浮涩之症。一方而治病迥殊，方名亦异，分两之不可忽如此，又亦精矣。③《伤寒论方解》：加桂、附，是因冲逆、恶寒、身体烦疼、四肢掣痛诸症较重的关系。桂枝、甘草与大枣同用，可以平冲逆，能治心下悸或脐下悸；桂枝、甘草与生姜同用，辛甘发散，能解表而散水气，以防水流入胃。附子如只用一枚的小剂量，那只是为回阳设；如用到二枚或三枚之多，那便是取其温经止痛了。

【临证举例】伤寒变痹　《全国名医验案类编》：张幼文，三十二岁，贵胄之子，素因多湿，偶感风寒，发热恶寒，一身手足尽痛，不能自转侧，脉浮大而紧。风为阳邪，故脉浮大主病进，紧主寒凝，脉症合参，风寒湿三气合而成痹，桂枝附子汤主之：桂枝四钱，附子一钱半，甘草二钱，大枣六枚，生姜三钱。一日二服，三日举动如常；继服平调之剂全愈。

11026　桂枝参蓍煎

【方源】《重订通俗伤寒论》引卢氏方。

【组成】桂枝　太子参　生蓍　白芍　白术各二钱　新会皮八分　炙甘草五分　浮小麦五钱　麻黄根三钱（醋炒）

【功用】止汗固脱。

【主治】伤寒过汗、误汗，自汗不止、气脱者。

11027　桂枝柏叶汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】首乌三钱　桂枝二钱　丹皮三钱　生地三钱　柏叶三钱　生姜三钱　人参三钱　阿胶三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】须落发焦，枯燥不荣。

【加减】黄涩早白，加桑椹、黑豆；阳衰土湿者，加干姜、茯苓；肺气不充，重用黄耆。

11028　桂枝茯苓丸

【方源】《金匮》卷下。

【异名】夺命丸（《妇人良方》卷十二）、牡丹丸、夺命丹（《普济方》卷三五七）、仙传保命丹、安禳丸（《胎产心法》卷中）。

【组成】桂枝　茯苓　牡丹（去心）　桃仁（去皮尖，熬）　芍药各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如兔屎大。每日一丸，食前服。不知，加至三丸。

【功用】①《金鉴》：下其癥。②《金匮要略方义》：化瘀生新，调和气血。

【主治】①《金匮》：妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，为癥痼害。②《妇人良方》：妇人小产，下血至多，子死腹中，

其人憎寒，手指、唇口、爪甲青白、面色黄黑，或胎上抢心，则闷绝欲死，冷汗自出，喘满不食，或食毒物，或误服草药，伤胎动气，下血不止。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：桂枝、桃仁、丹皮、芍药能去恶血；茯苓亦利腰脐间血，即是破血。然有散有缓、有收有渗、结者散以桂枝之辛；肝藏血，血蓄者肝急，缓以桃仁、丹皮之甘；阴气之发动者，收以芍药之酸；恶血既破，佐以茯苓之淡渗，利而行之。②《金匮要略方义》：本方为化瘀消癥之缓剂。方中以桃仁、丹皮活血化瘀；配伍等量之白芍，以养血和血，庶可去瘀养血，使瘀血去，新血生；加入桂枝，既可温通血脉以助桃仁之力，又可得白芍以调和气血；佐以茯苓之淡渗利湿，寓有湿祛血止之用。综合全方，乃为化瘀生新、调和气血之剂。制作蜜丸，用法从小量开始，不知渐加，亦有下癥而不伤胎之意，更示人对妊娠病证应持慎重之法。如此运用，使癥消血止，胎元得安，故本方为妊娠宿癥瘀血伤胎之良方益法。

【临证举例】 ①癥瘕（宫外孕）《山东医刊》(1966；3：15)：宓某某，女，25岁。结婚八年未生育，四年前流产一次。这次月经两个月未来，前两天小腹突然疼痛剧烈，下坠，阴道点滴下血，血色紫黑。面黄瘦，语音低微，精神不振，急性病容，少腹疼痛拒按，舌苔白，脉沉滑。西医妇科检查：宫体增大如鸡卵，后穹隆饱满、触痛，似囊样感，宫体后与右侧附件有拳头大包块，压痛明显。西医诊断：子宫外孕。中医诊断：癥积瘀血。患者拒绝手术，故以中药与桂枝茯苓丸，服三次后，第二天腹疼减轻，阴道下血成淡红色血水，其量增多，饮食增加，精神好转；又继续服至三天时，流出一块扁圆形血块，淡红色，似烂肉状，并继续下黑紫色血，其量减少，腹痛消失，（但仍有压痛），脉搏沉缓；又续服三天，下血停止，腹部压痛消失。后穹隆稍有饱满，无压疼，中位子宫，附件双（－）。又继续服药两天后，所下血色变为鲜红，量多；改服加减胶艾汤两剂，下血停止，一切症状消除。继续观察一月，患者身体健康，月经来潮一次，持续四天。②产后恶露不净《蒲辅周医案》：陈某某，女，成年，已婚。1963年5月7日初诊：自本年3月底足月初产后，至今四旬，恶露未净，量不多，色淡红，有时有紫色小血块，并从产后起腰痠痛，周身按之痛，下半身尤甚，有时左少腹痛，左腰至大腿上三分之一处有静脉曲张，食欲欠佳，大便溏，小便黄，睡眠尚可，面色不泽，脉上盛下不足，右关弦迟，左关弦大，寸尺俱沉涩，舌质淡红无苔。由产后调理失宜，以致营卫不和，气血紊乱，恶露不化。治宜调营卫，和血消瘀。处方：桂枝一钱五分，白芍二钱，茯苓三钱，炒丹皮一钱，桃仁一钱（去皮），炮姜八分，大枣四枚，服五剂。16日复诊：服药后恶露已尽，少腹及腰腿痛均消失，食欲好转，二便正常，脉沉弦微数，舌淡无苔。瘀滞已消，宜气血双补，十全大补丸四十丸，每日早晚各服一丸，服后已恢复正常。③盆腔炎 《新中医》(1975；6：40)：以桂枝茯苓汤治疗盆腔炎50例，其中慢性盆腔炎35例，治愈27例，疗效达77.1%，疼痛症状消失平均为16.4天，附件压痛减轻平均为18天，附件压痛消失平均18.9天。亚急性盆腔炎10例，治愈8例，疼痛症状消失平均为6.8天，附件压痛减轻平均为11.1天。急性盆腔炎5例，治愈4例，急性期合用各种抗菌素治疗。其余例数均为无效。

【备考】 本方方名，《张氏医通》引作“桂心茯苓丸”。

11029 桂枝姜附汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 桂枝六钱 干姜三钱 白术（生）三钱 熟附子三钱

【用法】 水五杯，煮取二杯，滓再煮一杯服。

【主治】 寒湿伤阳，经络拘束，形寒不渴，脉缓，舌淡或白滑。

【方论选录】 形寒脉缓，舌白不渴，而经络拘束，全系寒证，故以姜、附温中，白术燥湿，桂枝通行表阳也。

11030 桂枝姜砂汤

【方源】《四圣心源》卷五。

【组成】 茯苓三钱 泽泻三钱 桂枝三钱 芍药三钱 甘草三钱（炙） 砂仁一钱（炒，研） 干姜三钱

【用法】 水煎大半杯，入砂仁略煎，去滓，入西瓜浆一汤匙，温服。

【主治】 气臌。

【加减】 膀胱湿热，小便红涩者，加栀子清之。

11031 桂枝桃仁汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】 桂枝 槟榔各一钱五分 白芍 生地 枳壳各一钱 桃仁二十五粒 炙草五分

【用法】 加生姜、大枣为引。更宜常服四制香附丸。

【主治】 肠覃。因经行之时，寒气自肚门而入客大肠，以致经血凝涩，月信虽行而血却少，其腹渐

大，如孕子状。

11032 桂枝菖蒲汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【异名】桂枝柴胡汤(《医学摘粹》)。

【组成】柴胡三钱 桂枝三钱 丹皮三钱 生姜三钱 甘草二钱 菖蒲二钱

【用法】水煎半杯，热服。

【主治】瞳子缩小。

11033 桂枝黄耆汤

【方源】《直指》卷十六。

【组成】白芍药一两半 辣桂 甘草（炙）各一两 黄耆（炙）二两 黄芩半两

【用法】上为散。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣三枚煎服。覆取微汗；未汗再服。

【主治】黄汗自出，发热身肿，小便不利。

11034 桂枝葛根汤

【方源】《直指》卷十九。

【组成】桂枝 芍药 甘草各七钱 葛根一两三钱

【用法】上为散。每服四钱，加生姜五片，大枣一枚，煎服。

【主治】太阳表虚，颈项强，汗出恶风。

11035 桂枝葛根汤

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】桂枝 葛根 赤芍药 升麻 防风 甘草各一钱

【用法】上锉细。加生姜三片、淡豆豉一钱，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿痧疹初发，如时大寒，则腠理闭密，气血凝涩，防其发泄得迟，有毒气壅遏之变。

11036 桂苓术附汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】白术（净，炒） 茯苓各三钱 肉桂（去皮，另炖）四分 附子（制）一钱

【用法】加生姜汁半酒杯，冲药服。

【主治】饮症属虚寒者。

11037 桂苓甘草汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】桂枝 茯苓 甘草

【用法】水煎服。

【主治】水停心下而悸者。

11038 桂苓甘露饮

【方源】《医学启源》卷中。

【异名】桂苓甘露散(《御药院方》卷二)。

【组成】白茯苓（去皮） 白术 猪苓 甘草（炙） 泽泻各一两 寒水石一两（别研） 桂（去粗皮）半两 滑石二两（别研）

【用法】上为末，或煎，或水调，二三钱任意，或入蜜少许亦得。

【功用】流湿润燥，宣通气液，解暑毒，兼利小水。

【主治】饮水不消，呕吐泻利，水肿腹胀，泄泻不能止者；兼治霍乱吐泻，下利赤白，烦渴。

11039 桂苓甘露散

【方源】《宣明论》卷六。

【异名】桂苓白术散（原书同卷）、桂苓甘露饮(《伤寒直格》卷下)。

【组成】茯苓一两（去皮） 甘草二两（炙） 白术半两 泽泻一两 桂半两（去皮） 石膏二两 寒水石二两 滑石四两 猪苓半两（一方不用猪苓）

【用法】上为末。每服三钱，温汤调下，新水亦得，生姜汤尤良。小儿每服一钱。

【主治】①《宣明论》：伤寒中暑，湿热内甚，头痛，口干烦渴，小便赤涩，大便急痛，霍乱吐下，腹满痛闷，及小儿吐泻、惊风。②《证治宝鉴》：伤暑吐血；痢疾。

11040 桂苓白术散

【方源】《医学启源》卷中。

【异名】桂苓甘露散(《儒门事亲》卷十二)、桂苓甘露饮(《卫生宝鉴》卷十六)、桂枝白术汤(《嵩崖尊生》卷九)、桂苓白术汤(《风劳臌膈四大证治》)。

【组成】木香 桂枝 藿香 人参 茯苓（去皮）各半两 甘草（炙） 白术 葛根 泽泻 寒水石各一两 滑石二两 石膏一两

【用法】上为末。每服三钱，白汤调下，新水或生姜汤亦得。

【主治】冒暑、饮食所伤转甚，湿热内甚，霍乱吐泻，转筋急痛，腹满痛闷；小儿吐泻、惊风。

【备考】方中滑石、石膏用量原缺，据《儒门事亲》补。

11041 桂枝去芍药汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】桂枝三两（去皮） 甘草二两（炙） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘）

【用法】以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。

【功用】《伤寒论方医案选编》：解肌祛风，去阴通阳。

【主治】 ①《伤寒论》：太阳病，下之后，脉促胸满者。②《伤寒论方解》：太阳经，经医误投泻下剂后，头痛、发热、汗出、恶风等证未解，既未成痞，亦未结胸，心下不痞硬，按之亦不痛，但觉气上冲胸，胸满而微闷，脉紧躁而并居寸口，关尺部在相形之下反觉不鼓指。

【方论选录】 ①《尚论篇》：用桂枝之辛甘，以驱散太阳之邪；其去芍药之意，酸收二字不足尽之，以误下故不敢用，恐其复领阳邪下入腹中也。②《伤寒贯珠集》：邪气仍在阳分，故以桂、甘、姜、枣甘辛温药，从阳引而去之；去芍药者，恐酸寒气味，足以留胸中之邪，且夺桂枝之性也。

【临证举例】 外感咳嗽 《临证指南医案》：某，44岁，寒热咳嗽，当以辛温治之，桂枝汤去芍加杏仁。

11042 桂枝加大黄汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 桂枝大黄汤（《伤寒图歌活人指掌》卷四）、桂枝芍药大黄汤（《伤寒大白》卷三）、桂枝加芍药大黄汤（《皇汉医学》）。

【组成】 桂枝三两（去皮） 大黄二两 芍药六两 生姜三两 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘）

【用法】 以水七升，煮取三升，每服一升，去滓温服，一日三次。

【功用】 ①《痘疹世医心法》：发表疏里。②《金鉴》：外解太阳之表，内攻太阴之里实。

【主治】 太阳表证未解，内有实热积滞，腹满实痛，大便不通。

①《伤寒论》：太阳病，医反下之，腹大实痛者。②《伤寒图歌活人指掌》：关脉沉实，按之痛，大便秘。③《痘疹世医心法》：痘疹，毒气内攻，发热，腹痛，大便不通。④《医学入门》：太阴传经热症，腹满而痛，咽干而渴，手足温，脉沉有力。

【方论选录】 ①《内台方议》：与桂枝汤以和表，加芍药、大黄以攻其里。且赤芍药性凉，而能泻血中热，大黄能除其实、泻其脾也。②《古方选注》：大黄入于桂枝汤中，欲其破脾实而不伤阴也。大黄非治太阴之药，脾实腹痛，是肠中燥屎不去，显然太阴转属阳明而阳道实，故以姜、桂入太阴升阳分，杀太阴结滞，则大黄入脾反有理阴之功，即调胃承气之义。燥矢去，而阳明之内道通，则太阴之经气出注运行而腹痛减，是双解法也。③《中国医学大辞典》：此方以桂、姜升邪外行，倍芍药以疏太阴之经，加大黄以通阳明之腑，又虑其苦泄太过，更加枣、草以扶之，此双解表里法也。

【临证举例】 ①太阳阳明同病 《经方实验录》：庆孙，起病由于暴感风寒，大便不行，头顶痛，此为太阳、阳明同病。自服救命丹，大便行，而头痛稍愈。今表证未尽，里证亦未尽，脉浮缓，身常自汗，宜桂枝加大黄汤：川桂枝三钱，生白芍三钱，生草一钱，生川军一钱，生姜三片，红枣三枚。②痢疾腹痛 《皇汉医学》：曾有一人病痢，其人于左横骨上约二寸处疼痛不堪，始终以手按之，用此方痢止，痛亦治，是痢毒也。③疹出不顺腹痛 《皇汉医学》：一人年二十有五，发热如燃而无汗，经四五日，疹子不出，腹满拘痛，二便不利，时或腰甚痛。因作桂枝加芍药大黄汤使饮之，微利二三行，拘痛渐安；兼用紫丸下之，下水五六行，其夜熟眠，发汗如洗，疹子随汗出。疹子收，全复旧。④荨麻疹 《江苏中医》（1958；2:24）：苏某某，女，32岁。患荨麻疹已达五年之久，开始时每年发五六次，后来逐年加剧。今年起愈发愈频，竟至没有间歇，曾用西药与中药多剂，均归无效。遍身有大小不等的疙瘩块，抓痒无度，此伏彼起，日夜无宁静之时，在发作剧烈时，特别怕冷，身必重裘，大便一直二天一次，且燥结难下，腹微痛。处方：桂枝三钱，芍药三钱，甘草一钱，生姜三钱，大枣三枚，大黄三钱，全瓜蒌四钱，麻仁四钱。服上药后约3小时，身痒渐止，疙瘩亦渐隐没，周身微汗，大便畅通，症状全部消失，迄今已半月余，未再发过。

11043 桂枝加芍药汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 桂枝三两（去皮） 芍药六两 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘） 生姜三两（切）

【用法】 以水七升，煮取三升，去滓，分三次温服。

【功用】 ①《金鉴》：外解太阳之表，内调太阴之里虚。②《伤寒论方医案选编》：调和营卫，兼缓急止痛。

【主治】 ①《伤寒论》：本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也。②《方机》：烦，脉浮数，无硬满状者；腹满寒下，脉浮，或恶寒，或腹时痛者。

【方论选录】 ①《伤寒贯珠集》：桂枝所以越外入之邪，芍药所以安伤下之阴也。按《金匮》云：伤寒阳脉濇、阴脉弦，法当腹中急痛者，与小建中汤；不瘥者，与小柴胡汤。此亦邪陷阴中之故。而桂枝加芍药，亦小建中之意，不用胶饴者，以其腹满，不欲更以甘味增满耳。②《古方选注》：桂枝

加芍药汤，此用阴和阳法也，其妙即以太阳之方，求治太阴之病。腹满时痛，阴道虚也，将芍药一味倍加三两，佐以甘草，酸甘相辅，恰合太阴之主药；且倍加芍药，又能监桂枝深入阴分，升举其阳，辟太阳陷入太阴之邪。复有姜、枣为之调和，则太阳之阳邪，不留滞于太阴矣。

【临证举例】 下痢 《山东中医学院学报》(1977；1:27)：王某某，男，46岁。患菌痢，当时经治已减，后又复发，缠绵不愈，变成慢性菌痢，每日少则三四次，多则五六次，排便甚急，不及入厕，则污衣裤，然登厕后又排便不爽，下重难通，大便状不成形，有红白粘液；急不可耐，伴有腹痛，肠鸣等症。脉沉弦而滑，舌红苔白，观其所服之方，寒必芩、连，热必姜、附，补以参、术，涩如梅、诃，尝之殆遍，讫无所效。此仍脾胃阴阳不和，肝气郁而乘之之证。治法：调和脾胃阴阳，并于土中平木。方药：桂枝三钱、白芍六钱，炙甘草三钱、生姜三钱、大枣十二枚。服二剂，下痢减至一二次，照方又服二剂而痊愈。

11044 桂枝加当归汤

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 桂枝9克 赤芍9克 当归12克 甘草4克 生姜4克 红枣6克

【用法】 水煎服。

【功用】 《中医外科学》：和营祛寒，温经通络。

【主治】 冻疮。

11045 桂枝加附子汤

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 桂枝附子汤(《普济方》卷三五三)、桂枝汤加附子方(《医门法律》卷二)。

【组成】 桂枝三两（去皮） 芍药三两 甘草三两（炙） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘） 附子一枚（炮，去皮，破八片）

【用法】 以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。

【功用】 ①《注解伤寒论》：温经复阳。②《尚论篇》：固表驱风，复阳敛液。

【主治】 ①《伤寒论》：太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者。②《千金》：产后风虚，汗出不止，小便难，四肢微急，难以屈伸。

【方论选录】 ①《医方考》：用桂枝汤，所以和在表之营卫；加附子，所以壮在表之元阳。与桂枝汤解在表之寒湿，加附子以温寒湿。②《伤寒来苏集》：用桂枝以补心阳，阳密则漏汗自止矣。坎中阳虚，不能行水，必加附子以回肾阳，阳归则小便自利矣。内外调和，则恶风自罢，而手足便利矣。③《古方洗注》：桂枝加附子，治外亡阳而内脱液。熟附虽能补阳，终属燥液，四肢难以屈伸，其为液燥，骨属不利矣。仲景以桂枝汤轻扬力薄，必籍附子刚烈之性直走内外，急急温经复阳，使汗不外泄，正以救液也。

【临证举例】 ①太阳证过汗 《本事》：有一士人，得太阳证，因发汗，汗不止，恶风，小便涩，足挛曲而不伸。诊其脉浮而大，浮为风，大为虚。予用桂枝加附子汤，三啜而汗止；复佐以甘草芍药汤，足便得伸。②风寒表证兼阳虚 《江西中医药》(1958；6:39)：黄某某，女，23岁。头痛，恶寒发热，身痛，呕逆，手足拘急，厥冷，舌质嫩，色淡，微罩白苔，脉沉而弱，汗出肢厥。汗出恶风、头痛发热、呕逆等，为桂枝汤证；手足拘急、肢厥，属阳虚征象。遂予桂枝加附子汤：桂枝（后下）、杭芍、生姜、熟附片各三钱，甘草二钱，大枣四枚，水二碗，煎至一碗，嘱温服后静卧。当晚一剂服完，次晨步行前来就诊，自云证已减半，唯头痛身倦，原方再服二剂而愈。③鼻衄 《浙江中医杂志》(1958；10:34)：孙某某，男，35岁。病鼻衄，出血盈斗，两昼夜不止，曾服寒凉止血剂无效。脉微，口淡，身无热，二便自调，给服桂枝加附子汤，二剂痊愈。④十指疼痛 《伤寒解惑论》：范某，女。素体弱，感冒后发热，微汗出，并十指疼痛，已十余日，诊其脉象沉细。此是平素阳虚体质，感冒后邪未尽去，而阳愈见绌，不能达于四末之故。与桂枝加附子汤，附子初用八分，后增至一钱半，共服三剂痊愈。

11046 桂枝加附子汤

【方源】 《云岐子脉诀》。

【组成】 桂 附子（炮）各一两 甘草三钱半

【用法】 上㕮咀，水煎服。

【主治】 腹中痛，脉迟缓。

11047 桂枝加著术汤

【方源】 《医略六书》卷二十。

【组成】 黄耆三钱（蜜炙） 桂枝三分 白术一钱半（炒） 白芍一钱半（酒炒） 甘草五分（炙） 生姜二片 大枣三枚

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 多汗，脉弦软者。

【方论选录】 脾肺两亏，清阳不能敷布，而卫气不密，故腠理空疏，汗出不止焉。黄耆补中固卫，白术燥湿健脾，白芍敛阴和营血，桂枝行阳温卫

气，炙草缓中益胃，姜、枣调营和卫也。水煎温服，使脾肺气强，则营卫调和，而腠理致密，安有汗不止之患。此补中实表之剂，为表虚多汗之专方。

11048 桂枝加黄耆汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】桂枝加黄耆五两汤(《三因》卷十)。

【组成】桂枝 芍药各三两 甘草二两 生姜三两 大枣十二枚 黄耆二两

【用法】以水八升，煮取三升，温服一升。须臾饮热稀粥一升余，以助药力，温覆取微汗；若不汗更服。

【功用】《金匮教学参考资料》：助阳散邪，以发郁阻之湿。

【主治】①《金匮》：黄汗之病，两胫自冷。若身重，汗出已辄轻者，久久必身瞤，瞤即胸中痛，又从腰以上必汗出，下无汗，腰髋弛痛，如有物在皮中状，剧者不能食，身疼重，烦躁，小便不利。②《准绳·类方》：黄疸，脉浮，而腹中和者。

【方论选录】①《医方考》：客者除之，故用桂枝之辛甘，以解肌表之邪；泄者收之，故用芍药之酸寒，以敛营中之液；虚以受邪，故用黄耆之甘温，以实在表之气；辛甘发散为阳，故生姜、甘草可为桂枝之佐；乃大枣者，和脾益胃之物也。②《医门法律》：用桂枝全方，啜热粥助其得汗，加黄耆固卫。以其发热，且兼自汗、盗汗，发热故用桂枝，多汗故加黄耆也。其发汗已仍发热，邪去不尽，势必从表解之。汗出辄轻，身不重也；久久身瞤胸中痛，又以过汗而伤其卫外之阳，并胸中之阳也；腰以上有汗，腰以下无汗，阳通而阴不通也，上下痞隔，更宜黄耆固阳，桂枝通阴矣。③《金匮要略方义》：以桂枝汤微解其表，和其营卫，使在表之湿随汗而解。表虚之人，虽取微汗，犹恐重伤其表，故少佐黄耆以实表，使之汗不伤正，补不留邪，此正为寓补于散，扶正祛邪之妙用。同时，黄耆与桂枝、生姜配伍，尤有化气行水之功。然黄耆固表，有碍桂枝之发散，故服后需饮热粥以助药力。其治黄疸者，因黄疸亦属湿郁之证，故其表虚者，亦一并主之。

【临证举例】虚黄 《静香楼医案》：面目身体悉黄，而中无痞闷，小便自利，此仲景所谓虚黄也，即以仲景法治之。桂枝、黄耆、白芍、茯苓、生姜、炙草、大枣。

【备考】《三因》本方用：桂枝（去皮）、芍药各三两，甘草二两（炙），黄耆五两。为散，每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣三枚，煎七分，去滓温服。

11049 桂枝加葛根汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝汤(《外台》卷十四引《深师方》)、桂枝加干葛汤(《保婴撮要》卷四)。

【组成】葛根四两 麻黄三两（去节） 芍药二两 生姜三两（切） 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘） 桂枝三两（去皮）

【用法】以水一斗，先煮麻黄、葛根减二升，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升。覆取微似汗，不须啜粥。余如桂枝法将息及禁忌。

【功用】①《医方集解》：发汗解肌。②《伤寒论讲义》：解肌祛风，升津舒经。

【主治】外感风寒，项背强，汗出恶风；麻疹、痢疾及胃肠病起见上述症状者。

①《伤寒论》：太阳病，项背强几几，反汗出恶风。②《症因脉治》：寒疟，寒伤阳明，寒多热少，有汗。③《伤寒论方解》：麻疹初期，疹初见未齐，见桂枝汤证者；痢疾初期，或胃肠病兼见桂枝汤证者。

【宜忌】《外台》引《深师方》：忌生葱、海藻、菘菜。

【方论选录】①《内台方议》：葛根性平，能祛风邪，解肌表，以此用之为使；而佐桂枝汤之用，以救邪风之盛行于肌表也。②《伤寒论集注》：用桂枝汤，以解太阳肌中之邪；加葛根，宣通经脉之气，而治太阳经脉之邪。③《古方选注》：桂枝加葛根汤，治邪从太阳来，才及阳明，即于方中加葛根，先于其所往，以伐阳明之邪。因太阳未罢，故仍用桂枝汤以截其后，但于桂枝、芍药各减一两，既不使葛根留滞太阳，又可使桂枝、芍药并入阳明，以监其发汗太过。其宣阳益阴之功，可谓周到者矣。④《伤寒论方解》：本方是桂枝汤减少桂枝、芍药的剂量，再加葛根一味所组成。原书中有麻黄，于理不合，当从林亿、朱肱诸氏之说，并参考《玉函》删去麻黄为是。仲景治项背强都要用到葛根，殆以葛根为治项背强的专药。葛根有解表、解热、解毒诸作用，仲景用以治项背强，后世用以透疹、解热，其道理即在此。

【临证举例】①伤寒背强 《伤寒九十论》：庚戌，建康徐南强，得伤寒，背强，汗出，恶风。予曰：桂枝加葛根汤证。病家曰：他医用此方，尽二剂而病如归，汗出愈加。予曰：得非仲景三方乎？曰：然。予曰：误矣！是方有麻黄，服则愈见汗

多，林亿谓止于桂枝加葛根汤也。予令生而服之，微汗而解。②偏颈 《成都中医学院学报》（1979；4:94）：吴某，女，5岁。1979年11月9日初诊，母代诉：8天前患儿在田间玩耍，不慎失足落水，当时仅将裤子打湿，头身未见外伤，患儿未诉任何不适。傍晚，其父发现患儿颈项向左偏斜，不能转动，入夜不能平睡，呼叫颈项疼痛。因疑为"失枕"，治疗8日，病无起色，又以为"骨伤"，骨科检查排除骨折，转到我处诊治。患儿头颈明显向左偏斜，颈项肌肉强硬，皮色不变，亦不发热，但压之疼痛；头汗甚多，口干喜饮，饮食减少，大便一日一次，小便不黄。舌质正常，苔白、脉浮。诊断：偏颈。辨证：太阳中风，经输不利。治则：解肌祛风，舒利经脉。处方：桂枝10克，白芍15克，生姜10克，大枣12克，甘草3克，葛根24克，花粉18克。11月12日二诊：上方连服3剂，1剂汗止，3剂项即不偏，唯转动尚欠灵活，此太阳经输元气尚未疏通之故。乃宗上方加蕤芄15克，丝瓜络12克，以祛风通络。服上方2剂后，颈项即活动自如。③荨麻疹 《江苏医学·中医分册》（1979；4:44）：李某某，女，37岁。患荨麻疹数年，每日必发，疹出如粟，逢汗出遇风时加重，病发则全身肌腠不舒。经多种方法治疗，效果始终未能满意，虽为小疾，但病情发作时，瘙痒难忍，心中作烦，颇影响工作与休息。该患为肌腠疏泄，玄府不固，风邪侵入肌肤，又善行而数变，故窜之毛窍瘙痒难忍；阳气外泄，故又汗出恶风，经气不舒。方拟桂枝加葛根汤，再加防风15克，共服20余剂，基本告愈。

11050 桂枝合白虎汤

【方源】《金鉴》卷五十三。

【组成】 桂枝 芍药 石膏（煅） 知母（生） 甘草（生） 粳米

【用法】 引用生姜、大枣，水煎服。

【主治】 风温，壮热多汗，身重睡鼾。

11051 桂枝二麻黄一汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 桂枝一两十七铢（去皮） 芍药一两六铢 麻黄十六铢（去节） 生姜一两六铢（切） 杏仁十六个（去皮尖） 甘草一两二铢（炙） 大枣五枚（擘）

【用法】 以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取二升，去滓，温服一升，一日二次。本云：桂枝汤二分，麻黄汤一分，合为二升，分再服，今合为一方。将息如前法。

【功用】 ①《注解伤寒论》：解散营卫之邪。②《金鉴》：小发营卫之汗。

【主治】 太阳病，服桂枝汤，大汗出，脉洪大，形似疟，一日再发者。

【方论选录】 ①《伤寒附翼》：邪气稍留于皮毛肌肉之间，固非桂枝汤之可解；已经汗过，又不宜麻黄汤之峻攻。故取桂枝汤三分之二，麻黄汤三分之一，合而服之，再解其肌，微开其表，审发汗于不发之中，此又用桂枝后更用麻黄法也。后人合为一方者，是大背仲景比较二分之轻重偶中出奇之妙理矣。②《古方选注》：桂枝铢两多，麻黄铢数少，即啜粥助汗之变化。桂枝汤减用四分之二，麻黄汤减用四分之一，则固表护阴为主，而以发汗为复，假麻黄开发血脉精气，助桂枝汤于卫分作微汗耳。第十六铢麻黄，不能胜一两十七铢桂枝、一两六铢白芍，则发汗之力太微，故又先煮麻黄为之向导，而以桂、芍袭其后也。

【临证举例】 ①太阳中风 《吴鞠通医案》：唐，五十九岁。头痛恶寒，脉紧，言謇，肢冷，舌色淡。太阳中风，虽系季春天气，不得看作春温，早间阴晦雨气甚寒，以桂枝二麻黄一法：桂枝六钱，杏仁五钱，生姜六片，麻黄（去节）三钱，炙甘草三钱，大枣（去核）二枚。煮三杯，先服一杯，得微汗，止后服；不汗再服；再不汗，促投其间。②寒热往来 《经方实验录》：王右，寒热往来，一日两度发，仲景所谓宜桂枝二麻黄一汤之证也。前医用小柴胡，原自不谬，但差一间耳。川桂枝五钱，白芍四钱，生草三钱，生麻黄二钱，光杏仁五钱，生姜三片，红枣五枚。病者服此，盖被自卧，须臾发热，遍身漐漐汗出。其病愈。

11052 桂枝二越婢一汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 桂枝越婢汤（《内台方议》卷一）、桂枝二越婢一汤（《古方选注》卷上）。

【组成】 桂枝（去皮） 芍药 麻黄 甘草（炙） 各十八铢 大枣四枚（擘） 生姜一两二铢（切） 石膏二十四铢（碎，绵裹）

【用法】 以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取二升，去滓，温服一升。本云：当裁为越婢汤、桂枝汤合之，饮一升。今合为一方，桂枝二分，越婢一分。

【功用】 《伤寒论讲义》：微发其汗，兼清里热。

【主治】 太阳病，发热恶寒，脉微弱者。

【方论选录】 ①《内台方议》：此汤亦即桂枝麻黄各半汤中减杏仁加石膏也，杏仁能发汗，去之；

石膏能去虚热，故加之。②《古方选注》：桂枝二越脾一汤，治脉微无阳。无阳者，阳分亡津之剂，故于桂枝汤照原方用四分之三以和阳，越婢汤照原方用四分之一以行阴。行阴者，发越婢气而行胃中之津，俾阳和津生而脉复，因其病在阳，故有阳用三、阴用一之殊。③《伤寒贯珠集》：本无热证而加石膏者，以其人无阳，津液不足，不胜桂枝之任，故加甘寒于内，少变辛温之性，且滋津液之用，而其方制之小，示微发于不发之中。④《金鉴》：桂枝二越婢一汤，即大青龙以杏仁易芍药也。名系越婢辅桂枝，实则大青龙之变制也。去杏仁恶其从阳而辛散，用芍药以其走阴而酸收。以此易彼，裁而用之，则主治不同也。以桂枝二主之，则不发汗，可知越婢一者，乃麻黄、石膏二物，不过取其辛凉之性，佐桂枝二中和表而清热，则是寓发汗于不发之中，亦可识也。用石膏者，以其表邪寒少，肌里热多，故用石膏之凉，佐麻、桂以和其营卫，非发营卫也。

【临证举例】 伤寒夹燥 《伤寒论汇要分析》：王某，女，20岁。三日前因接触冷水，当时即感有寒意。昨日上午开始头痛，恶寒发热，寒多热少，伴发咳嗽，略痰白粘。今晨仍头痛发热（体温38.2℃），虽得微汗出，但尚恶风，喜着厚衣，咳嗽，痰色转赭色，咽痛而干，口渴而不多饮，胃纳欠佳，腰背痠痛（据云今年二月分娩后，因不慎闪挫，以致腰痛至今），二便自调，形体较瘦，神色尚无异常，舌质无变，苔薄黄而滑，手足欠温，但未至厥冷，六脉滑数。应作伤寒太阳证治例，但燥气内伏，又当精变其制，诊断为伤寒夹燥。拟桂枝二越婢一、麻杏石甘汤两方并用，以散寒疏卫，和营消热。处方：桂枝二钱，白芍三钱，麻黄二钱，杏仁二钱，甘草二钱，生姜二钱，生石膏一两六钱，红枣三枚。仅服一剂，除因闪伤腰痛宿疾外，诸症悉除。继以自创“忍冬路通汤”专治其腰痛。

11053 桂枝生姜枳实汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 桂心枳实汤（《圣济总录》卷五十六）、生姜枳实汤（《鸡峰》卷十一）、桂枝枳实汤（《方剂辞典》）。

【组成】 桂枝 生姜各三两 枳实五枚

【用法】 以水六升，煮取三升，分三次温服。

【功用】 ①《金鉴》：通阳气，破逆气。②《金匮要略方义》：行气消痞，温中化饮。

【主治】 ①《金匮》：心中痞，诸逆心悬痛。②《金匮要略方义》：胃脘痞闷，气逆上攻作痛，呕恶嗳气，畏寒喜热者。

【宜忌】《外台》：忌生葱。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：枳实、生姜，原以治气寒，况于痞乎？故较前条稍减轻分两，使痞者下其气以开之。悬痛属饮者，得生姜以散之，既足建功矣。乃去橘皮而用桂枝者，以所逆非一，或肾气上冲，正未可知，桂伐肾邪，正其能事，不但调和营卫，为去痞臣也。②《金匮要略心典》：桂枝、枳实、生姜辛以散逆，苦以泄痞，温以祛寒也。③《金匮要略方义》：方中重用枳实快气消痞，以桂枝通阳降逆，以生姜散寒化饮，三药相合，使气行则痞消，阳盛则饮化，气畅饮消则诸逆痞痛自愈。

【临证举例】 吐水 《金匮要略今释》引《成绩录》：一妇人患吐水，水升胸间，漫漫有声，遂致吐水，每日晡而发，至初更乃已。诸医与大小柴胡汤及小半夏汤之类，无效。先生诊之，用桂枝枳实生姜汤，乃全愈。

【备考】 本方方名，《外台》引作“桂心生姜枳实汤”。

11054 桂枝芍药知母汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 桂芍知母汤（《沈注金匮要略》卷五）。

【组成】 桂枝四两 芍药三两 甘草二两 麻黄二两 生姜五两 白术五两 知母四两 防风四两 附子二枚（炮）

【用法】 以水七升，煮取二升，每服七合，温服，一日三次。

【功用】 ①《金匮教学参考资料》：通阳行痹，祛风逐湿，和营止痛。②《经方发挥》：祛湿，驱风，清热，散寒，通络，活血，补虚。

【主治】 ①《金匮》：诸肢节疼痛，身体尪羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐。②《皇汉医学》引《类聚方广义》：风毒肿痛，憎寒壮热，渴而脉数；痘疮将欲成脓而不能十分贯脓，或过期不结痂，憎寒身热，一身疼痛，脉数者。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：桂枝治风，麻黄治寒，白术治湿，防风佐桂，附子佐麻黄、白术。其芍药、生姜、甘草亦和发其营卫，如桂枝汤例也。知母治脚肿，引诸药祛邪益气力；附子行药势，为开痹大剂。然分两多而水少，恐分其服而非一剂也。②《沈注金匮要略》：此久痹而出方也，乃脾胃肝肾俱虚，足三阴表里皆痹，难拘一经主治，故用桂枝、芍药、甘、术调和营卫，充益五脏

之元；麻黄、防风、生姜开腠行痹而驱风外出；知母保肺清金以便治节；经谓风、寒、湿三气合而为痹，以附子行阳燥湿除寒为佐也。③《金匮要略心典》：桂枝、麻黄、防风，散湿于表；芍药、知母、甘草，除热于中；白术、附子，驱湿于下；而用生姜最多，以止呕降逆。为湿热外伤肢节，而复上冲心胃之治法也。

【临证举例】 ①历节 《经方实验录》：耿右，初诊：一身肢节疼痛，脚痛，足胫冷，日晡所发热，脉沉而滑，此为历节。宜桂枝芍药知母汤：川桂枝五钱，赤白芍各三钱，生甘草三钱，生麻黄三钱，熟附块五钱，生白术五钱，肥知母五钱，青防风五钱，生姜一块（打）。二诊：腰痛略减，日晡所热度较低，惟手足疼痛如故。仍宜前法：川桂枝五钱，赤白芍各五钱，生甘草三钱，净麻黄四钱，苍白术各五钱，肥知母五钱，青防风四钱，生姜一块（打），咸附子三钱（生用勿泡）。②类风湿性关节炎 《中医杂志》（1981；1:38）：运用桂枝芍药知母汤治疗类风湿性关节炎32例，结果治愈14例（1例加用强的松和四环素），显效6例，有效10例（3例加用强的松和四环素），无效2例，总有效率为93.7%，有效病例平均服药21.6剂。治疗后化验指标的变化：类风湿因子转为阴性的27例（84.4%）；抗“O”滴度下降；全血粘度（比）、血浆粘度（比）、红细胞电泳时间（秒）均有明显下降，和治疗前相比均有非常显著性差异；血沉未见明显下降，未恢复正常范围。

11055 桂枝当归桃仁汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】 桂枝三钱 芍药三钱 当归三钱 桃仁三钱 甘草二钱 茯苓三钱 川芎三钱 红花三钱

【用法】 水煎大半杯，温服。

【主治】 妇人经脉闭结，经血凝滞而不行。

【加减】 上热，加黄芩；中寒，加干姜；中气不足，加人参；血块坚硬，加鳖甲、䗪虫；脾郁，加砂仁。

11056 桂枝麻黄各半汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 麻黄芍药汤（《内台方议》卷一）、桂麻各半汤（《医学入门》卷四）、麻黄桂枝合半汤（《伤寒来苏集》卷一）。

【组成】 桂枝一两十六铢（去皮） 芍药 生姜（切） 甘草（炙） 麻黄（去节）各一两 大枣四枚（擘） 杏仁二十四枚（汤浸，去皮尖及二仁者）

【用法】 以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取一升八合，去滓，温服六合。本云：桂枝汤三合，麻黄汤三合，顿服。将息如上法。

【功用】 ①《注解伤寒论》：小发其汗，以解表邪。②《金鉴》：小小汗之以和营卫。

【主治】 ①《伤寒论》：太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发，面色反有热色，身痒者。②《皇汉医学》引《类聚方广义》：疮疮热气如灼，表郁难以见点，或见点稠密，风疹交出，或痘不起胀，喘咳咽痛者。

【方论选录】 ①《内台方议》：桂枝汤治表虚，麻黄汤治表实，二者均曰解表，胥壤之异也。今此二方合而用之者，乃解其表不虚不实者也。桂枝汤中加麻黄、杏仁，以取小汗也。②《伤寒贯珠集》：既不得汗出，则非桂枝所能解，而邪气又微，亦非麻黄所可发，故合两方为一方，变大制为小制。桂枝所以为汗液之地，麻黄所以为发散之用，且不使药过病，以伤其正也。③《伤寒论类方》：此方分两甚轻，计共约六两，合今之秤仅一两三四钱，分三次服，只服四钱零，乃治邪退后至轻之剂，犹勿药也。④《古方选注》：其法先煎麻黄，后纳诸药，显然麻黄为主，而以桂枝、芍药为监制也。盖太阳邪未解，又因阴阳俱虚，汗吐下皆禁，不能胜麻黄之说，故监以桂枝、约以白芍，而又铢两各减其半，以为小制，服后得小汗即已，庶无大汗亡阳之过尔。

【临证举例】 ①太阳病 《经方实验录》：顾左，寒热交作，一日十数度发，此非疟疾，乃太阳病，宜桂枝麻黄各半汤：桂枝三钱，甘草一钱半，杏仁五钱，麻黄一钱半，白芍一钱半，生姜二片，大枣四枚。②风寒表证 《贵阳中医学院学报》（1979；2:5）：某，女，47岁。恶寒发热已9日，每日午后三时许，微恶寒，并发热，入夜体温达38.5℃左右，随后汗出烧退。体检、血象、胸透均无异常，服用一剂解表剂、ABC及抗菌素无效。苔白，脉弦细。证属太阳伤寒，给予桂枝麻黄各半汤一剂。服后恶寒加重，并作寒噤，继而发热，遍体微汗，次日即未再发。

11057 桂苓五味甘草汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 茯苓桂枝五味甘草汤（原书同卷）、茯苓桂心甘草五味子汤（《千金》卷十八）、茯苓五味子汤（《三因》卷十三）、苓桂味甘汤（《普济方》卷一四〇）、苓桂五味甘草汤（《类聚方》）、桂苓甘草五味汤（《血证论》卷八）。

【组成】 茯苓四两 桂枝四两（去皮） 甘草三两（炙） 五味子半升

【用法】 以水八升，煮取三升，去滓，分三次温服。

【主治】 青龙汤下已，多唾口燥，寸脉沉，尺脉微，手足厥逆，气从小腹上冲胸咽，手足痹，其面翕热如醉状，因复下流阴股，小便难，时复冒者。

【宜忌】 《外台》忌海藻、菘菜、生葱。

【方论选录】 《金匮要略心典》服青龙已，冲气不归，而仍上逆也。茯苓、桂枝，能抑冲气，使之下行；然逆气非敛不降，故以五味之酸敛其气；土厚则阴火自伏，故以甘草之甘补其中也。

【临证举例】 ①冲气上逆 （《上海中医药杂志》1984；6:31）：陈某，女，40岁，1979年10月26日来诊，因情志因素致阵发性脐下悸已8个月，每日发作3～5次，发作时自觉从少腹有气上冲、胸闷喉痒，唇麻齿抖，语言不利，面色潮红，并有冷气下行，足冷腿软，步履困难，近一月来症状加重，头痛畏光，视力减退，发作完毕，一切如常，苔薄白，脉滑数有力。冲气上逆，治拟平冲降气，桂苓五甘汤主之。茯苓，桂枝各12克，甘草9克，五味子24克，共服21剂，诸证消失，随访2年，未复发。②气厥（癔病） （《上海中医药杂志》1984；6:31）：范某，女，60岁，每因生气出现脐下悸，惊恐气短，四肢发冷，遂即昏倒，小便失禁，甚时每日发作5～6次，历时半年余，西医诊断为癔病，苔薄白，脉滑数有力，辨证为气机逆乱，蒙蔽清窍，发为气厥。方用茯苓、桂枝各12克，甘草9克，五味子24克，服6剂后，除略有心悸外，余证悉平，继服24剂病告痊愈，随访无恙。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“茯苓桂枝五味子甘草汤”。

11058 桂枝加龙骨牡蛎汤

【方源】 《金匮》卷上。

【异名】 桂枝龙骨牡蛎汤（原书同卷）、龙骨汤（《外台》卷十六引《小品方》）、桂枝牡蛎汤（《圣济总录》卷九十一）、龙骨牡蛎汤（《广嗣纪要》卷二）。

【组成】 桂枝 芍药 生姜各三两 甘草二两 大枣十二枚 龙骨 牡蛎各三两

【用法】 以水七升，煮取三升，分三次温服。

【功用】 ①《金鉴》：调阴阳，和营卫，兼固涩精液。②《金匮要略方义》：调理阴阳，调和营卫，交通心肾，固精止遗。

【主治】 男子失精，女子梦交，自汗盗汗，遗尿。

①《金匮》：失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩（一作目眶痛），发落，脉极虚芤迟，为清谷亡血，失精，脉得芤动微紧，男子失精，女子梦交。②《金匮要略今释》引《橘窗书影》：遗尿。③《金匮要略方义》：自汗盗汗，心悸多梦，不耐寒热，舌淡苔薄，脉来无力者。

【宜忌】 《外台》引《小品方》：忌海藻、菘菜、生葱、猪肉、冷水。

【方论选录】 ①《医门法律》：用桂枝汤调其营卫羁迟；脉道虚衰，加龙骨、牡蛎涩止其清谷、亡血、失精。一方而两扼其要，诚足宝也。②《金匮要略论注》：桂枝、芍药，通阳固阴；甘草、姜、枣，和中、上焦之营卫，使阳能生阴，而以安肾宁心之龙骨、牡蛎为辅阴之主。②《医方集解》：桂枝、生姜之辛以润之，甘草、大枣之甘以补之，芍药之酸以收之，龙骨、牡蛎之涩以固之。

【临证举例】 ①遗尿 《金匮要略今释》引《橘窗书影》：幕府集会酒井六三郎，年十八。遗尿数年，百治罔效。余诊之，下元虚寒，小便清冷，且脐下有动，易惊，两足微冷。乃投以桂枝加龙骨牡蛎汤，兼服八味丸，数日而渐减，服经半年而痊愈。桂枝加龙骨牡蛎，本为治失精之方，一老医用此治愈老宫女之屡小遗者；和田东郭用此治愈高槻老臣之溺闭；服诸药不效者，余用此治遗尿，屡屡得效。②遗精 《经方实验录》：邹萍君，年少时染有青年恶习，久养而愈。本冬遗精又作，服西药先二星期甚适，后一星期无效，更一星期服之反剧。精出甚浓、早起脊痛头晕，不胜痛苦，自以为中、西之药乏效。余予桂枝、白芍各三钱，炙草二钱，生姜三大片，加花龙骨六钱、左牡蛎八钱，以上二味打碎，先煎二小时。一剂后，当夜即止遗，虽邹君自惧万分，无损焉。第三日睡前，忘排尿，致又见一次。以后即不复发，原方加减，连进十剂，恙除，精神大振。计服桂枝、芍药各三两，龙骨六两，牡蛎八两矣。③盗汗 《经方实验录》：吴兄凝轩，昔尝患盗汗之恙，医用浮小麦、麻黄根、糯稻根以止其汗。顾汗之止仅止于皮毛之里，而不止于肌肉之间，因是皮肤作痒异常，颇觉不舒。后自检方书，得本汤服之，汗止于不知不觉之间云。④自汗 《岳美中医案》：李某某，40岁，男性。患项部自汗，竟日淋漓不止，频频作拭，颇感苦恼，要求治疗。诊其脉浮缓无力，汗自出。分析病情，项部是太阳经所过，长期汗出，系经气向上冲逆，持

久不愈，必致虚弱。因投以张仲景之桂枝龙骨牡蛎汤，和阳降逆，协调营卫，收敛浮越之气。先服4剂，自汗止；再服4剂，以巩固疗效。③女子梦交《浙江中医杂志》（1984；1:46）：高某某，女，34岁，农民。入夜每与人交，天明始去，已四五年，误为"狐仙"，羞愧难言。初则不以为然，久则心悸胆怯，延期失治，病情日重，避卧于邻家，仍纠缠不散。形体消瘦，困倦乏力，少气懒言，头晕眼花，腰膝痿软，带多清稀，舌质淡红，苔薄白，脉细弱。系阴阳两亏，心肾不交，属梦交症。拟用桂枝加龙骨牡蛎汤：桂枝18克，白芍、龙骨各20克，甘草、生姜各9克，生牡蛎30克，红枣7枚。5剂后，诸症消除，予归脾丸巩固疗效。随访一年未复发。

11059 桂枝加厚朴杏子汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝加厚朴杏仁汤(《医学纲目》卷三十二)、桂枝加朴杏汤(《医学入门》卷四)。

【组成】桂枝三两（去皮） 甘草二两（炙） 生姜三两（切） 芍药三两 大枣十二枚（擘） 厚朴二两（炙，去皮） 杏仁（去皮尖）五十枚

【用法】以水七升，微火煮取三升，去滓，温服一升。覆取微似汗。

【功用】《伤寒论讲义》：解肌祛风，降气定喘。

【主治】太阳病表未解，下之微喘。

【方论选录】①《内台方议》：下后微喘者，则为里气上逆，邪气在表，故属此汤主之。与桂枝汤以解表邪，加厚朴、杏仁为佐，以下逆气也。②《伤寒论翼》：夫喘为麻黄症，方中治喘者，功在杏仁。桂枝本不治喘，此因妄下后，表虽不解，腠理已疏，则不当用麻黄而宜桂枝矣。所以宜桂枝者，以其中有芍药也，既有芍药之敛，若但加杏仁，则喘虽微，恐不能胜任，必加厚朴之辛温，佐桂以解肌，佐杏仁以降气。故凡喘家不当用麻黄汤，而作桂枝汤者，加厚朴、杏仁为佳法矣。③《伤寒论方解》：本方是桂枝汤加厚朴、杏仁两味所组成。厚朴除有驱除痰涎作用外，还能疏利气壅；杏仁有定喘镇咳作用。桂枝汤中加上这两味，是为痰多而喘嗽者设。

【临证举例】①误治致喘《伤寒九十论》：戊申正月，有一武弁在仪真，为张遇所虏，日夕置于舟舱板下，不胜跧伏，后数日得脱，因饱食，解衣扪虱以自快，次日遂作伤寒。医者以因饱食伤而下之，一医以解衣中邪而汗之，杂治数日，渐觉昏闷，上喘息高。医者怆惶，罔知所指。予诊之曰：太阳病下之，表未解，微喘者，桂枝加厚朴杏子汤，此仲景法也。一投而喘定，再投而濈濈汗出。至晚，身凉而脉已和矣。②外感引动宿喘《伤寒医案选》：刘某某，男，42岁。素有痰喘之疾，发作较频。春日伤风，时发热，自汗出，微恶风，头痛；且引动咳喘，发作甚于前，胸闷而胀，气喘倚息，痰白稠量多，咳喘之时则汗出更甚，不思食，舌苔白腻，脉浮缓，关滑有力。此风邪伤表，引动痰喘复发，外风挟痰浊壅滞胸脘，肺胃气逆不降所致。方用桂枝加厚朴杏子汤加味。处方：桂枝6克，白芍6克，生姜2片，炙甘草4.5克，厚朴9克，杏仁9克，麻黄1.5克，贝母9克，苏子9克，炒枳壳9克。连用3剂后，表证去，自汗止，痰喘亦平。

11060 桂枝加葛根瓜蒌汤

【方源】《此事难知》。

【异名】桂枝加葛根瓜蒌根汤(《普济方》卷一三二)。

【组成】桂枝 芍药 葛根 栝楼根各二钱半

【用法】上为末，水煎服。

【主治】柔痉有汗。

【备考】《普济方》有生姜七片、大枣二枚。《伤寒广要》有甘草。

11061 桂枝去芍药加皂荚汤

【方源】《千金》卷十七。

【异名】桂枝皂荚汤(《赤水玄珠》卷七)。

【组成】桂枝 生姜各三两 甘草二两 皂荚一挺 大枣十二枚

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取三升，去滓，分三次服。

【主治】肺痿吐涎沫不止。

【方论选录】《千金方衍义》：桂枝汤和营卫药，《千金》去芍药之酸收；参入皂荚一味，即《金匮》皂荚丸，不用蜜丸，而入汤液，然不若用汤送丸，不使皂荚之味辣喉，尤为得宜。此唯肥盛多湿浊垢支塞肺胃者，方为合剂；若瘦人津液素槁，虽有痰血，亦难胜皂荚之荡涤也。

11062 桂枝去芍药加附子汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】桂枝三两（去皮） 甘草二两（炙） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘） 附子一枚（炮，去皮，破八片）

【用法】以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。本云：桂枝汤，今去芍药加附子。将息如前法。

【功用】《伤寒论讲义》：解肌祛风，兼温经复阳。

【主治】太阳病，下之后，脉促胸满、微恶寒者。

【方论选录】①《注解伤寒论》：与桂枝汤以散客邪，通行阳气；芍药益阴，阴虚者非所宜，故去之。阳气已虚，若更加之微寒，则必当温剂以散之，故加附子。②《内台方议》：阳虚阴盛，邪在胸中，不可发汗，只得与附子以复阳温经，与桂枝以散其邪也。③《伤寒来苏集》：桂枝汤阳中有阴，去芍药之酸寒，则阴气流行，而邪自不结，即扶阳之剂矣。若微恶寒，则阴气凝聚，恐姜、桂之力不能散，必加附子之辛热。④《古方选注》：桂枝汤去芍药加附子者，下后微恶寒，显然阳气涣散于中下矣。当急救其阳，毋暇顾恋阳气，以附子直从下焦温经助阳，臣以桂枝、甘草，载还中焦阴气，以杜亡阳之机，为御后之策。

【临证举例】伤寒阴结《全国名医验案类编》：刘荣年治刘某某，30余岁。冬月伤寒，误服寒泻药而成。身体恶寒，腹胀满痛，不大便者二日，脉浮大而缓。显系伤风寒中证，医家不察，误为阳明腑证，误用大黄、芒消等药下之……以致寒气凝结、上下不通，故不能大便，腹胀大而痛更甚也，用桂枝汤去芍药加附子以温行之，则所服消、黄得阳药运行，而反为我用也。处方：桂枝尖一钱，黑附子一钱，炙甘草五分，生姜一钱，大枣二枚（去核）。服药后，未及10分钟，即大泻二次，恶寒、腹胀痛均除而痊。

11063 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】桂枝龙骨牡蛎汤（《内台方议》卷一）、桂甘龙骨牡蛎汤（《医学入门》卷四）。

【组成】桂枝一两（去皮） 甘草二两（炙） 牡蛎二两（熬） 龙骨二两

【用法】以水五升，煮取二升半，去滓，温服八合，一日三次。

【功用】①《伤寒来苏集》：安神救逆。②《经方发挥》：潜阳，镇惊，补心，摄精。

【主治】①《伤寒论》：火逆下之，因烧针烦躁者。②《经方发挥》：心悸，虚烦，脏躁，失眠，遗精，阳萎。

【方论选录】①《注解伤寒论》：辛甘发散，桂枝、甘草之辛甘也，以发散经中火邪；涩可去脱，龙骨、牡蛎之涩，以收敛浮越之正气。②《伤寒贯珠集》：桂枝、甘草，以复心阳之气；牡蛎、龙骨，以安烦乱之神。③《古方选注》：桂枝、甘草、龙骨、牡蛎，其义取重于龙、牡之固涩。仍标之曰桂、甘者，盖阴钝之药，不佐阳药不灵。故龙骨、牡蛎之纯阴，必须籍桂枝、甘草之清阳，然后能飞引入经，收敛浮越之火、镇固亡阳之机。

【临证举例】①惊悸《经方发挥》：殷某某，女，28岁。患者心悸善惊，稍劳则惕惕而动，并喜手按其胸，时有虚烦，已二年之久。近一年来上证增重，日轻夜重，睡眠后惊悸而醒。神志迟呆，记忆力锐减，失眠，自汗，胃纳不佳，手足易冰。曾多次用西药调治及服用中药安神养血之品不效。就诊时病情日渐加重，且常恐惧不安，天黑后一人不敢外出，在室中常幻听到有人呼唤她的名字，如无人伴随时，呼唤之声越来越大，惊惕更甚，以致每晚不敢独自在家，诊脉细而弱。考虑为心阳虚衰所致，给予桂枝甘草龙骨牡蛎汤二剂。服后自觉心悸善惊大有好转。又连服五剂，诸证悉愈。后宗此方配制丸药服一月之久，以后概未复发。②遗精《经方发挥》：曹某某，男，20岁，未婚学生。由手淫引起梦遗一年多，起初三至五日遗精一次，以后发展到每日遗精，虽服过不少的滋补固涩药品，效果不佳。伴有头晕眼花，心悸失眠，精神不振，潮热，自汗盗汗，面色㿠白，肌肉削瘦，腰腿疼困，乏力等证，脉细缓无力，舌光无苔。予以桂枝甘草龙骨牡蛎汤为主，加减出入，日服一剂，共治疗不到两月，诸证悉愈。观察二年，并未复发。③失眠《经方发挥》：石某某，男，45岁，干部。患失眠十余年，逐渐加重。近一年来，有时几乎通宵不寐，时觉虚烦不安。虽累用安眠、镇惊之中、西药，疗效不显，时好时坏，伴有头晕、心悸、耳鸣、易汗、手足不温等证；胃纳尚可，不欲饮水，小便清长，大便稀薄；脉沉迟无力，舌淡，舌胖有齿痕。以桂枝甘草龙骨牡蛎汤加茯苓等，服十三四剂后，睡眠基本正常，以后虽有反复，但证状轻微不足为害。又以此方剂制成丸药，常服以巩固疗效。

11064 桂枝去桂加茯苓白术汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】白术茯苓汤（《鸡峰》卷十八）、茯苓白术汤（《普济方》卷一四七引《十便良方》）、桂枝去桂加苓术汤（《内台方议》卷一）。

【组成】芍药三两 甘草二两（炙） 生姜（切） 白术 茯苓各三两 大枣十二枚（擘）

【用法】以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，小便利则愈。本云：桂枝汤，今去桂加茯苓、

白术。

【功用】《伤寒论讲义》：利水通阳。

【主治】太阳病服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利者。

【方论选录】①《尚论篇》：在表之风寒未除，而在里之水饮上逆，故变五苓两解表里之法，而用茯苓、白术为主治。去桂者，以已误不可复用也。然桂枝虽不可用，其部下诸属，皆所必需。倘并不用芍药以收阴，甘草、姜、枣以益虚而和脾胃，其何以定误汗、误下之变耶？故更一主将，而一军用命甚矣，仲景立方之神也。②《伤寒贯珠集》：表邪挟饮者，不可攻表，必治其饮而后表可解。桂枝汤去桂加茯苓、白术，则不欲散邪于表，而但逐饮于里，饮去则不特满痛除，而表邪无附，亦自解矣。③《古方选注》：苓、术、芍、甘，治太阳里水法也。解肌或下，水邪不去，而反变症，是非解肌者矣，当去桂枝，而以苓、术、生姜代桂枝行阳，存芍药以收阴；不取辛甘发散于表，取苓、芍约阴利水，甘、枣培土制水，即太阳入里用五苓表里两解之义也。④《伤寒论类方》：凡方中有加减法，皆佐使之药，若去其君药，则另立方名。今去桂枝为名，所不可解。殆以此方虽去桂枝，而意仍不离乎桂枝也。

【临证举例】①流行性感冒《新医学》（1975；3:159）：患者年岁颇高，偶感风寒，初起鼻塞头胀，喉痒咳嗽，咯痰清稀不多，服西药发汗后症状仍不解。笔者以桂枝汤为底，重用桂枝、生姜、甘草，加苏叶、细辛，一剂而愈。其后不久，正值流感流行，患者又染上流感，症状与前类似，但痰多而伴有胸闷、胃胀欲呕。病者自以上方治之，但无效。邀笔者再诊，投以下方：桂枝二钱，赤芍三钱，甘草二钱，大枣四钱，生姜四钱，川朴花三钱，法夏三钱，茯苓四钱，白术四钱。服药2剂，病愈。②低热《伤寒论诠解》：陈慎吾先生曾治一数年低热患者，而有翕翕发热，小便不利等证。陈用本方原方，仅两三剂，便热退病愈。

11065 桂苓甘味合附子都气丸

【方源】《丁甘仁医案》卷四。

【组成】桂枝八分 云苓三钱 炙甘草五分 五味子五分 生白术五钱 制半夏二钱 炙远志一钱 炒补骨脂五钱 熟附块五钱 怀山药三钱 大熟地（炒松）三钱 合桃肉二枚

【功用】温化痰饮，摄纳肾气。

【主治】咳嗽气喘。

11066 桂枝去芍药加茯苓白术汤

【方源】《金鉴》卷三十一。

【异名】桂枝汤去芍药加茯苓白术汤（原书同卷）、桂枝去芍加茯苓白术汤（《伤寒论方解》）。

【组成】桂枝汤去芍药加茯苓 白术各三两

【用法】依桂枝汤法煎服。小便利则愈。

【主治】太阳病服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利者。

【方论选录】①《金鉴》：此条为汗下后表不解、而心下有水气者立治法也。桂枝去桂加茯苓白术汤，去桂当是去芍药，此方去桂，将何以治仍头项强痛、发热无汗之表乎？若去桂则是芍药、甘草、茯苓、白术，并无辛甘走营卫之品，而曰余依桂枝汤法，无所谓也。且论中有脉促胸满、汗出恶寒之证，用桂枝去芍药加附子汤主之，去芍药者，为胸满也；此条证虽稍异，而其满则同，为去芍药可知矣。用桂枝汤以解表，去芍药之酸收，避无汗、心下之满；加茯苓之燥渗，因水停小便不利也。余依桂枝汤法煎服，谓依桂枝汤法取汗也。小便利则愈，谓饮病输水道则愈也。此方即桂苓甘术汤而有生姜、大枣，其意专在解肌，利水次之，故用生姜、大枣佐桂枝，以通津液取汗也。②《伤寒论方解》：本方如去桂，便与证候不合。日医如吉益猷、丹波元简、山田正珍诸氏亦认为不当去桂。因此，理应从《金鉴》及吉益猷氏的说法，将“去桂”改为“去芍”，庶几药与证合。

11067 桂枝附子汤去桂加白术汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】白术附子汤（《金匮》）、桂枝附子去桂枝加白术汤（《金鉴》卷十三）、桂枝附子汤去桂加术汤（《伤寒瘟疫条辨》卷五）、桂枝附子去桂加白术汤（《医效秘传》卷三）、桂枝附子去桂加术汤（《类聚方》）。

【组成】附子三枚（炮，去皮，破） 白术四两 生姜三两（切） 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘）

【用法】以水六升，煮取三升，去滓，分三次温服。初一服，其人身如痹，半日许复服之；三服都尽，其人如冒状，勿怪，此以附子、术并走皮内，逐水气未得除，故使之耳。虚弱家及产妇，宜减服之。

【功用】①《金匮教学参考资料》：助里阳以逐表湿。②《金匮要略讲义》：祛湿温经。

【主治】伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不喝，大便硬，小便自利者。

【宜忌】《外台》：忌葱、猪肉、菘菜、海藻、

桃、李、雀肉。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：桂发汗走津液；此小便利、大便硬，为津液不足，去桂加术。②《伤寒来苏集》：病本在脾，法当君以白术，代桂枝以治脾，培土以胜湿，土旺则风自平矣，桂枝理上焦，大便硬、小便利，是中焦不治，故去桂。③《伤寒贯珠集》：去桂枝之辛散，加白术之苦燥，合附子之大力健行者，于以并走皮中，而逐水气，以避虚就实之法也。④《古方选注》：湿胜于风者，用术附汤。以湿之中人也，太阴受之，白术健脾去湿，熟附温经去湿，佐以姜、枣和表里，不必治风，但使湿去，则风无所恋而自解矣。

【备考】 本方方名，《外台》引作"附子白术汤"、"附子汤"。

11068 桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 桂枝去芍加麻辛附子汤（原书同卷）、附子汤（《外台》卷八引《深师方》）、桂附汤（《三因》卷十四）、桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤（《赤水玄珠》卷五）、桂甘姜枣麻辛附子汤（《金匮要略心典》卷中）、桂甘姜枣麻附细辛汤（《金匮悬解》卷十）、桂姜枣草黄辛附汤（《类聚方》）。

【组成】 桂枝三两　生姜三两　甘草二两　大枣十二枚　麻黄二两　细辛二两　附子一枚（炮）

【用法】 以水七升，煮麻黄，去上沫，纳诸药，煮取三升，分三次温服。当汗出，如虫行皮中，即愈。

【功用】 ①《金匮要略方义》：振奋阳气，调和营卫，外解风寒，内化水饮。②《金匮要略讲义》：温阳散寒，通利气机。

【主治】 ①《金匮》：气分，心下坚，大如盘，边如旋杯，水饮所作。②《金匮要略方义》：心肾阳虚，外感风寒，水饮内停，头痛身痛，恶寒无汗，手足逆冷，心下痞坚，腹满肠鸣，相逐有声，或矢气，或遗尿，脉沉迟而细涩无力。

【宜忌】《外台》引《深师方》：忌海藻、菘菜、生葱、猪肉、冷水、生菜。

【方论选录】 ①《金匮要略论注》：药既用桂、甘、姜、枣以和其上，而复用麻黄、附子、细辛少阴的剂以治其下，庶上下交通而病愈，所谓大气一转，其气乃散也。②《古今名医方论》引柯琴：用附子、姜、桂以生阳之气，麻黄、细辛以发阳之汗，甘草、大枣以培胃脘之阳，使心下之水饮外达于皮毛，必如虫行皮中，而坚大如盘者始散。③《金匮要略方论》：本方是桂枝去芍药汤合麻黄细辛附子汤两方相合而成，桂枝去芍药汤主治表证而兼心阳不足者；麻黄细辛附子汤主治素体阳虚（主要为肾阳虚）而外感风寒者。今两方合用，殆为心肾阳虚、外感风寒之证而设。方中桂枝配伍麻黄，辛温发汗，宣散水气；附子温经助阳，与细辛相合可祛寒化饮。盖阳虚之体，邪客较深，取细辛可通彻表里，搜邪外出。佐以生姜、大枣，伍麻黄发越水气，合桂枝温通营卫；佐以甘草，调和诸药。

【临证举例】 阴水　《福建中医医案医话选编》：陆某，女，24岁。全身浮肿，面色苍白，恶寒，四肢冰冷，脉象沉迟，舌苔白腻，渴不多饮。此证系阴盛阳微，水气泛滥，病名阴水。盖患者脾肾阳气素虚，水湿内蕴，脾主健运，肾主排泄，脾虚不能制水，肾虚不能化水，故水聚而成胀也。治宜消阴救阳、祛寒逐水，主以桂枝去芍药加麻辛附子汤：桂枝三钱，麻黄二钱，甘草二钱，细辛一钱，附子二钱，生姜二钱，大枣十枚。连服二剂，药后得微汗，四肢转温，恶寒已减，药已中肯，当乘胜再追，用前方再服一剂。恶寒已罢，小便通利，腹胀减小，脉象转缓，阳气亦有渐升之象，前方再服一剂。上部浮肿已消，腹胀再有减小，两足仍浮。后以鸡鸣散、实脾饮出入治愈。

【备考】 本方方名，原书（涵芬楼本）作"桂姜草枣黄辛附汤"；《医门法律》引作"桂枝去芍药加麻辛附子汤"；《方剂辞典》引作"桂枝去芍药加黄辛附子汤"。

11069 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 桂枝救逆汤（《金匮》卷中）、桂枝蜀漆牡蛎龙骨救逆汤（《医学纲目》卷三十二）、救逆汤（《圣济总录》卷二十八）、桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤（《准绳·伤寒》卷五）、桂枝去芍药加龙骨牡蛎救逆汤（《医灯续焰》卷十八）、桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎汤（《古方选注》）。

【组成】 桂枝三两（去皮）　甘草二两（炙）　生姜三两（切）　大枣十二枚（擘）　牡蛎五两（熬）　蜀漆三两（去腥）　龙骨四两

【用法】 以水一斗二升，先煮蜀漆减二升，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

【功用】《中医方剂学》：镇惊安神。

【主治】 ①《伤寒论》：伤寒脉浮，医者以火迫劫之，亡阳，必惊狂，卧起不安者。②《方机》：火逆烦躁，胸腹动剧者；及疟疾而有上冲者。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：与桂枝汤，解未尽表邪；去芍药，以芍药益阴，非亡阳所宜也；

火邪错逆，加蜀漆之辛以散之；阳气亡脱，加龙骨、牡蛎之涩以固之。本草云：涩可去脱，龙骨、牡蛎之属是也。②《尚论篇》：桂枝汤，阳药也。然必去芍药之阴重，始得疾趋以达以阳位；既达阳位矣，其神之惊狂者，漫难安定，更加蜀漆为之主统，则神可赖之以攸宁矣。缘蜀漆之性最急，丹溪谓其能飞补是也，更加龙骨、牡蛎有形之骨属，为之舟楫，以载神而反其宅，亦于重以镇祛、涩以固脱之外，行其妙用。③《伤寒贯珠集》：被火者，动其神则惊狂，起卧不安，故当用龙、牡；其去芍药者，盖欲以甘草急复心阳，而不须酸味更益营气也，与发汗后，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，用桂枝甘草汤同义。蜀漆，即常山苗，味辛，能去胸中邪结气。此证火气内迫心包，故须之以逐邪而安正耳。④《医学摘粹》：用桂枝、甘草疏木而培中，生姜、大枣补脾而降逆，蜀漆吐腐瘀而疗狂，龙骨、牡蛎敛神魂而止惊也。

【临证举例】 心悸《中医杂志》(1980；11:58)：常山、蜀漆，如用量稍多，常致恶心、呕吐，出现此反应，也常是产生效果的标志。临床上尝遇有些卒发重症心悸不宁、气短、四肢不温、脉来疾数，往往不易计数（如心率＞160 次/分，心电图检查为室性或室上性阵发性心动过速），往往用中西医一般治疗措施而未能控制。曾用本方通阳镇惊安神，因无蜀漆，遂用常山，急煎服之，药液入胃，移时恶心呕吐，吐出痰涎及部分药汁，心动旋即恢复正常，心悸顿失，诸症均减。继以加减出入为方巩固，以防再发。体会到桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤能满意地控制心动过速，确有“救逆”之功。

11070 桂苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 茯桂五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤(《金匮》)卷中、苓甘味姜辛夏汤(《普济方》卷一四〇)、茯苓五味甘草去桂加姜辛夏汤(《医门法律》卷五)、桂苓五味甘草去桂加姜辛半夏汤(《千金方衍义》卷十八)、苓甘五味姜辛半夏汤(《金匮要略心典》卷中)、姜苓五味细辛汤(《四圣心源》卷五)、苓甘姜味辛夏汤(《类聚方》)、桂苓五味甘草去桂加姜辛夏汤(《金匮要略今释》卷四)。

【组成】 茯苓四两　甘草　细辛　干姜各二两　五味子　半夏各半斤

【用法】 以水八升，煮取三升，去滓，温服半斤，一日三次。

【功用】 ①《金匮要略释义》：去胸中之饮。②《金匮教学参考资料》：逐饮止呕。

【主治】 ①《金匮》：支饮者法当冒，冒者必呕。②《金匮要略方义》：肺寒留饮，咳嗽痰多，清稀色白，头昏目眩，胸满呕逆，舌苔白腻，脉沉弦滑。

【临证举例】 ①咳嗽 《金匮要略今释》引《续建殊录》：一男子，郁郁不乐，咳嗽短气，动摇则胸悸甚，上气微呕，不欲饮食，小便不利，盗汗出，时时抢于心下，或胸中痛，与苓甘姜味辛夏汤加人参，服药而诸证渐退，逾月全愈。②痰饮《江西医药》(1964；6:266)：胡某某，男，47 岁，工人。咳嗽气短，倚息不得卧，吐白痰夹水，每于早晚咳甚，咳时须俟痰出而后安，伴有胸闷不适，胃脘胀满，舌白而润，脉象弦滑。病属痰饮为患，肺有宿寒，无见外感，故拟从除痰涤饮、温肺除寒入手，方用苓甘五味姜辛半夏汤：茯苓四钱，炙甘草一钱，五味子一钱，生姜三钱，细辛五分，制半夏二钱，饮片二剂。服后诸症悉减，咳平安卧，精神倍增，早晚咳痰减少，脉仍弦而滑，胃脘略不适，病仍属肺气虚寒、痰饮未尽，守原方加广皮二钱，生姜易干姜二钱。五剂后咳止痰平，其病如失，饮食大增，精神舒畅，睡眠安宁，脉息和缓而虚，舌净口和，唯食后稍有胀闷，继从香砂六君子汤加味调理中州，以善其后。

11071 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 桂枝加芍药生姜人参汤、桂枝加芍药生姜人参新加汤(《金匮玉函经》)、桂枝新加汤、桂枝芍药人参生姜汤(《伤寒图歌活人指掌》卷四)、桂枝加人参芍药新加汤(《普济方》卷四十三)、桂枝芍药人参新加汤(《医统》卷十四)、桂枝人参芍药汤(《伤寒大白》卷一)、桂枝加芍药人参新加汤(《中国医学大辞典》)、新加汤(《伤寒论方解》)。

【组成】 桂枝三两（去皮）　芍药四两　甘草二两（炙）　人参三两　大枣十二枚（擘）　生姜四两

【用法】 以水一斗二升，煮取三升，去滓，温服一升。

【功用】 ①《伤寒贯珠集》：益不足之血，散未尽之邪。②《金鉴》：温补其营卫。

【主治】 ①《伤寒论》：发汗后，身疼痛，脉沉迟者。②《方机》：发汗后，疼痛甚，脉沉迟，或痹，或四肢拘挛、心下痞塞者。

【方论选录】 ①《尚论篇》：桂枝方中倍加芍药、生姜各一两以去邪，用人参三两以辅正。名曰新加汤者，明非桂枝汤中之旧法也。②《金鉴》：汗后

身疼痛，是营卫虚而不和也，故以桂枝汤调和其营卫。倍生姜者，以脉沉迟、营中寒也；倍芍药者，以营不足血少故也；加人参者，补诸虚也。桂枝得人参，大气周流，气血足而百骸理；人参得桂枝，通行内外，补营阴而益卫阳，表虚身疼未有不愈者也。③《古方选注》：桂枝汤调和营卫，一丝不乱，桂枝、生姜和卫，芍药、大枣和营。今祖桂枝人参汤法，则偏于卫矣。妙在生姜加一两，佐桂枝以大通卫气，不使人参有实邪之患；尤妙芍药亦加一两，仍是和营卫法。名曰新加者，申明新得其分两之理而加之也。④《医学摘粹》：汗泄血中温气，阳虚肝陷，经脉凝涩，风木郁遏，故用甘草补其脾精，桂枝达其肝气，芍药清风木之燥，生姜行经络之瘀，人参补中气以充经脉也。

【临证举例】 ①误治伤正身冷痛 《皇汉医学》引《续建殊录》：一老人，大便不通数日，上逆头眩。医与备急丸而自若，因倍加分量而投之，得利，于是身体麻痹，上逆益甚，而大便复结。更医诊之，与以大剂承气汤，一服不得下利，服三帖，下利如倾盆，身体冷痛，不得卧，大便复结。又转医作地黄剂使服之，上逆尤剧，面色如醉，大便益不通。于是请治于先生，心下痞硬，少腹无力，即与桂枝加芍药生姜人参汤，服之三帖，冲气即降，大便通快；经过二三日，冷痛止，得卧，大便续通快。二旬之后，诸证去而复常。②妊娠恶阻 《浙江中医杂志》（1965；8:26）：刘某某，24岁。月经三月未行，四肢痠软无力，恶心呕吐，渴不欲饮，口淡无味，不思纳食，眩晕，嗜眠，形寒发热，脉滑而细，舌苔薄白，即予桂枝汤一剂。复诊：诸证较前有所减轻，脉滑而弱，舌质淡红，续予桂枝新加汤二剂，症状消失。于次年分娩，产后健康。③剖腹产后高热 《江苏医药·中医分册》（1979；1:43）：蔡某某，女，29岁。因妊娠毒血症治疗无效，行剖腹产手术，术后高热持续四天，虽用退热药，静滴葡萄糖、氯霉素等，热势不减，体温39.4℃。苔薄白，脉浮数，发热，汗出，微恶寒，口不渴。病属手术后气血两伤，卫阳不固，营阴不守，风邪乘袭。治宜调和营卫，处方：红参10克、桂枝3克、白芍10克、炙甘草3克、生姜1片、大枣3枚、白薇10克、青蒿5克。服头汁后，体温由39.4℃陡降至37.8℃，续服2剂告愈。

11072 桔干汤

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】 荆芥 防风 连翘 桔梗 牛蒡 射干 玄参 山豆根 竹叶 甘草

【主治】 痰热客肺，喘急上气，致失音者。

11073 桔梗丸

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】 枯梗 细辛 菖蒲 紫菀各三分 肉桂 陈橘皮（去瓤）各一两 百合 杏仁（去皮，炒令黄） 人参各半两 甘草一分（炙）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，绵裹，咽津含化。

【主治】 肺脏伤风冷，喘促咳嗽，言语声嘶，咽喉不利。

11074 桔梗汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 甘草桔梗汤（《医方类聚》卷五十四引《通真子伤寒括要》）、如圣汤（《幼幼新书》卷三十四引《养生必用》）、散毒汤（《圣济总录》卷一二二）、国老汤（《普济方》卷二十七引《十便良方》）、甘草汤（《医级》卷八）、桔梗甘草汤（《经方实验录》卷下）。

【组成】 桔梗一两 甘草二两

【用法】 以水三升，煮取一升，去滓，温分再服。

【功用】 宣肺祛痰，利咽宽胸，解毒排脓。

①《兰室秘藏》：快咽喉，宽利胸膈。②《医方类聚》引《吴氏集验方》：解野葛毒。③《金鉴》：解肺毒，排脓肿。④《中医方剂临床手册》：宣肺祛痰，利咽。

【主治】 风热客于少阴，咽喉肿痛；风热郁于肺经，致患肺痈，咳唾脓血。

①《伤寒论》：少阴病二三日，咽痛不瘥者。②《幼幼新书》引《养生必用》：喉痹舌颊肿，咽喉有疮。③《局方》：风热毒气上攻咽喉，肿塞妨闷。④《证类本草》引《杜壬方》：口舌生疮，嗽有脓血。⑤《圣济总录》：肺气上喘。⑥《兰室秘藏》：小儿斑已出。⑦《医方类聚》引《吴氏集验方》：野葛毒。⑧《内台方议》：肺痿。⑨《外科发挥》：肺气壅热，胸膈不利，痰涎壅盛。⑩《内科摘要》：心脏发咳，咳而喉中如梗状。⑪《医统》：痘疹咽喉疼痛生疮。⑫《金鉴》：咳而胸满，振寒脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥之肺痈；及血痹。

【方论选录】 ①《内台方议》：用桔梗为君，桔梗能浮而治上焦，利肺痿，为众药之舟楫也；以甘草为臣佐，合而治之，其气自下也。②《伤寒大白》：以桔梗开发肺气，同甘草泻出肺中伏火。因

此，悟得欲清肺中邪结，必要开肺清肺，二味同用，则肺中之邪始出。③《金鉴》：肺痈今已溃后，虚邪也，故以桔梗之苦，甘草之甘，解肺毒排痈脓也，此治已成肺痈，轻而不死者之法也。

【临证举例】 肺痈 《内科摘要》：武选汪用之，饮食起居失宜，咳嗽吐痰，用化痰发散之药。时仲夏，脉洪数而无力，胸满面赤，吐痰腥臭，汗出不止，余曰：水泛为痰之证，而用前剂，是谓重亡津液，得非肺痈乎？不信，仍服前药。翌日，果吐脓，脉数，左三右寸为甚。始信，用桔梗汤一剂，脓数顿止，再剂全止，面色顿白，仍于忧惶，余曰：此症面白脉涩，不治自愈。又用前药一剂，佐以六味丸治之而愈。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典》引作"二味桔梗汤"。

11075 桔梗汤

【方源】《外台》卷十引《古今录验》。

【异名】 桔梗白术汤(《圣济总录》卷五十)。

【组成】 桔梗三升 白术二两 当归一两 地黄二两 甘草(炙) 败酱 薏苡仁各二两 桑白皮一升(切)

【用法】 上切。以水一斗五升，煮大豆四升，取七升汁，去豆，纳清酒三升，合诸药煮之，取三升，去滓，服六合，日三次，夜二次。

【功用】《重订通俗伤寒论》：肺脾双补，清肃余毒。

【主治】 ①《外台》引《古今录验》：肺痈经时不愈。②《重订通俗伤寒论》：赤膈伤寒，毒蕴于肺成痈，经治诸证皆安，唯痰中血丝终不能除，胸中尚隐隐痛，大便已转嫩黄，时溏时燥。

【宜忌】 忌猪肉、芜荑、桃、李、雀肉、海藻、菘菜。

11076 桔梗汤

【方源】《局方》卷四。

【异名】 桔梗半夏汤(《类证活人书》卷十八)、半夏汤(《瑞竹堂方·补遗》)、枳梗半夏汤(《得效》卷二)。

【组成】 桔梗(细锉，微炒) 半夏(汤洗七次，姜汁制) 陈皮各十两(去瓤) 枳实(麸炒赤黄)五两

【用法】 上为粗末。每服二钱，水一中盏，加生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 ①《局方》：除痰下气。②《类证活人书》：顺阴阳，消痞满。

【主治】 ①《局方》：胸胁胀满，寒热呕哕，心下坚痞，短气烦闷，痰逆恶心，饮食不下。②《类证活人书》：伤寒冷热不和，心腹痞满，时发疼痛。

11077 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【异名】 退热桔梗饮子(《秘传眼科龙木论》卷四)。

【组成】 桔梗(锉，炒) 大黄(锉，炒) 玄参 芍药 防风(去杈) 黄芩(去黑心)各一两 茺蔚子二两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，加芒消末半钱匕，食后、临卧温服。

【主治】 ①《圣济总录》：眼睛突起。②《秘传眼科龙木论》：五脏毒风之突起睛高外障。

11078 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】 桔梗(去芦头) 大黄(锉，炒) 细辛(去苗叶) 黄芩(去黑心) 玄参 芒消(炼过者)各一两 防风(去杈) 车前子各一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，食后、临卧温服。

【主治】 目生鸡冠蜕肉。

11079 桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】 桔梗(锉，炒) 甘草(生) 恶实(微炒)各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加竹叶十片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 咽喉内生疮疼痛；咽喉干痛，吐咽不利。

【备考】 原书卷一二四本方用法：入竹茹一弹丸大。

11080 桔梗汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 桔梗一两半 半夏曲二两 陈皮一两(去白) 枳实一两(麸炒) 白茯苓一两(去皮) 白术一两半 厚朴一两(姜制，炒香)

【用法】 上㕮咀。每服一两，水一盏，煎至七分，取清，温调木香散二钱，隔夜空腹食前服之。三服之后，气渐下吐渐止。

【功用】 和中。

【主治】 ①《保命集》：上焦气热上冲，食已暴吐，脉浮而数。②《云岐子脉诀》：涩脉关前胃气并。

【备考】《嵩崖尊生》有木香。本方方名，《玉机

微义》引作“和中桔梗汤”。

11081 桔梗汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】当归身 马勃各一分 白僵蚕 黄芩各三分 麻黄五分（不去节） 桔梗 甘草各一钱 桂枝少许

【用法】上为粗末，作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，食后稍热服之。

【主治】咽肿微觉痛，声破。

11082 桔梗汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】宁肺桔梗汤（《外科正宗》卷二）、十六味桔梗汤（《张氏医通》卷十六）。

【组成】桔梗（炒） 贝母（去心） 当归（酒浸） 瓜蒌仁 枳壳（麸炒） 薏苡仁 桑白皮（炒） 甘草节 防己（去皮）各一钱 黄耆（盐水拌炒） 五味子（捣，炒） 百合（蒸）各一钱五分 葶苈（炒） 地骨皮 知母（炒） 杏仁各五分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】肺痈咳嗽，胸膈两胁作痛，咽干口燥，烦闷作渴，时出臭浊。

11083 桔梗汤

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】牛蒡 玄参 升麻 桔梗 犀角 黄芩 木通 甘草

【功用】《医略六书》：疏热开结。

【主治】①《证治汇补》：咽喉诸病。②《杂病证治》：风火结痰，喉痹疼肿，咽物妨碍。

【方论选录】《医略六书》：风火结痰，其喉为痹，故咽物妨碍，咽喉肿痛焉。牛蒡子疏风解热，乃喉痹要药；乌犀角清胃凉心，能善解热毒；桔梗清利咽喉之痛；玄参清降上浮之火；荆芥散热退肿；黄芩清肺凉膈；小木通降心火以热从溺泄；生甘草泻火毒能和药缓中。煎令微温，俾火化风消，则结痰自开而咽喉肃清，喉痹无不退矣。此疏热开结之剂，为喉痹疼肿之专方。

【备考】《医略六书》有荆芥穗，无升麻。

11084 桔梗散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】桔梗半两（去芦头） 射干一两 麦门冬一两（去心） 青橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 麻黄一两（去根节） 赤茯苓三分 前胡二分（去芦头） 木通三分（锉） 大腹皮三分（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺实热，上气胸满烦闷，呼吸气促，咽喉不利。

11085 桔梗二陈汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】茯苓 陈皮 半夏 甘草 桔梗 枳壳 黑山栀 黄芩 黄连

【主治】火喘。

11086 桔梗杏仁煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】桔梗 杏仁 甘草各一钱 阿胶 金银花 麦冬 百合 夏枯草 连翘各二钱 贝母三钱 枳壳一钱半 红藤三钱

【用法】水二钟，煎八分，食远服。

【主治】咳嗽吐脓，痰中带血，或胸膈隐痛，将成肺痈者。

【加减】如火盛兼渴者，加天花粉二钱。

11087 桔梗枳壳汤

【方源】《得效》卷十一。

【组成】枳壳（去瓤） 桔梗（去芦）各五钱 半夏（汤洗） 黄芩 瓜蒌仁 黄连（去须）各三钱

【用法】上为散。加生姜、麦门冬去心水煎服。利黄涎沫即安。

【主治】热气痞满，胸膈两胁按之则痛。

11088 桐油饯

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】桐油三四匙

【用法】先用温汤半碗，加入桐油三四匙搂匀。用硬鸡翎蘸油探入喉中，连探四五次，其痰壅出，再探再吐，以人苏醒声高为度。后服清咽利膈之药。

【功用】探吐顽痰。

【主治】喉风、喉闭。其症先两目紧闭，胸膈气急，呼吸短促，蓦然咽喉肿痛，手足厥冷，气闭不通，顷刻不治。

11089 栝楼丸

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《医方类聚》卷一二四引《神巧万全方》。

【组成】栝楼根二两 麦门冬二两（去心，焙） 苦参三分（锉） 人参三分（去芦头） 知母三分

【用法】上为末，用牛胆汁为丸，如小豆大。每服二十丸，以清粥饮送下，不拘时候。

【主治】消渴。四肢烦热，口干心躁。

11090 栝楼丸

【方源】《三因》卷九。

【组成】栝楼（去瓤，取子炒香熟，留皮与瓤别用） 枳壳（麸炒，去瓤）各等分

【用法】上为细末，先取栝楼皮瓤研末，水熬成膏，和二物末为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，食后以热熟水送下，一日二次。

【主治】胸痞，胸中痛彻背，气塞喘息，咳喘，心腹痞闷。

11091 栝楼汤

【方源】《医心方》卷十二引《范汪方》。

【组成】栝楼二两 黄连一升 甘草二两

【用法】以水五升，煮取二升半，分三服。

【主治】消渴。日饮一斛，小便亦如之。

11092 栝楼汤

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《外台》卷十一。

【组成】栝楼根 生姜各五两 生麦门冬（用汁） 芦根（切）各二升 茅根（切）三升

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】①《千金》：消渴。②《普济方》：胃热。

11093 栝楼汤

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】栝楼散（《奇效良方》卷六十五）。

【组成】栝楼根二钱 白甘遂一钱

【用法】上用慢火炒焦黄色，研匀。每服一字，煎麝香、薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】小儿高热，惊风抽搐，癖结胀满。

①《小儿药证直诀》：小儿慢惊。②《普济方》：癖结胀满。③《医方类聚》引《疮疹方》：小儿斑疹作搐。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：白甘遂即蚤休，苦寒降泄，清热解痉，主治惊痫，摇头弄舌，胎风，手足抽搐等证，专用此一味，以治胎风，可见白甘遂是一味主痉的专药，钱氏用此加栝楼根治慢惊，是佐以润肺滑痰，解渴生津，使润而能收，猛而能缓，从二药性味分析，本方适用于小儿高热、惊风抽搐，但方前明言治慢惊，是谓治标之意。

11094 栝楼汤

【方源】《内经拾遗》卷二。

【组成】栝楼一枚（大者，重一二两者，连皮捣烂） 甘草（蜜炙）二钱 红蔻花五分

【用法】上水二钟，煎八分，温服，不拘时候。

【主治】左胁气痛。

11095 栝楼汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】瓜蒌 生栀 大力 连翘 柴胡 黄芩 陈皮 青皮 花粉 银花 甘草 皂角 甜酒

【主治】乳痈初起。

11096 栝楼散

【方源】《医心方》卷十二引《范汪方》。

【组成】石韦二分 通草一分 栝楼二分 葵子四分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，先食以麦粥送下，一日三次。

【主治】淋病。

11097 栝楼散

【方源】《集验背疽方》。

【异名】瓜蒌散（《丹溪心法附余》卷十六）。

【组成】栝楼一个（去皮，焙，研为末，急用则烂研，子多者有力） 当归（净洗，去芦，焙，细锉）半两 甘草半两（细锉，生用） 通明没药一分（别研） 乳香一钱（别研）

【用法】上用无灰酒三升，同于银石器中慢火熬，取一升清汁，分三服，食后良久服。如有奶劳，便服此药，可绝病根。如毒已成，能化脓成黄水；毒未成，即于大小便中通泄。疾甚再合服，以退为妙。

【主治】①《集验背疽方》：妇人乳疽，奶劳。②《金鉴》：吹乳、结核。

【备考】本方方名，《妇人良方》引作“神效瓜蒌散”。

11098 栝楼实丸

【方源】《普济方》卷一五四引《济生方》。

【组成】栝楼实（别研） 枳壳（去瓤，麸炒） 半夏（汤泡七次） 桔梗（去芦头）各一两

【用法】上为细末，姜汁打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后用淡姜汤送下。

【主治】胸痞。胸中痛彻背胁，喘急妨闷。

11099 栝楼根丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】栝楼根一两 甘草半两（炙微赤，锉） 黄连一两（去须） 泽泻一两 赤石脂半两 熟干地黄一两 石膏半两（细研） 黄耆三分（锉） 黄丹三分 桑螵蛸二七枚（微炒） 子芩一两 龙骨三分 牡蛎一两（烧为粉） 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末）

【用法】 上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以清粥饮送下，不拘时候。

【主治】 肾消，小便数。

11100 栝楼根汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 萎根三两 人参一钱半 麦冬三钱（去心） 生地五钱 阿胶三钱

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 口渴，脉虚数者。

【方论选录】 产后血气两虚，胃家伏热不化，而消烁津液，故口渴不止，善饮善消焉。生地滋阴壮水以制火；麦冬清心润燥以生津；人参扶元补气，壮生水之源；萎根清胃泻热，杜发渴之由；阿胶补阴益血，荣阳光之灼烁；炙草益胃缓中，资太阴之母气也。水煎温服，使胃热顿化，则血气并充，而津液得以上奉，岂有口渴不止之患乎！

11101 栝楼根散

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】 熟干地黄 生干地黄 葛根 栝楼根各等分

【用法】 上药焙干，为细末。每服二钱，温米饮调下，不拘时候。

【主治】 消渴，饮水不止。

11102 栝楼根散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 栝楼根三两 生人参一两半 生牡蛎三两 桑螵蛸三两（炙） 川黄连六钱 白芍药一两半（炒） 炙甘草一两半

【用法】 上为散。每服二钱，水煎，去滓温服

【主治】 产后遗尿，脉濡数者。

【方论选录】 产后气虚热炽，迫动水府，而溺不能藏，故烦热口渴，小便遗失不知焉。栝楼根清热止渴专除燥火，生人参扶元补气可固下元，川连清心脾之火，牡蛎涩热伤之阴，白芍药敛阴中之不足，桑螵蛸涩膀胱之溺窍，炙草缓中以益胃气也。为散水煎，使气充热化，则膀胱得操蓄泄之权，而水府自无遗漏之患，津液四泛，无不上敷下达，何有烦渴不解，遗尿溺不止哉。

11103 栝楼牛蒡汤

【方源】《金鉴》卷六十六。

【组成】 栝楼仁 牛蒡子（炒，研） 花粉 黄芩 生栀子（研） 连翘（去心） 皂刺 金银花 甘草（生） 陈皮各一钱 青皮 柴胡各五分

【用法】 水二钟，煎八分，入煮酒一杯和匀，食远服。

【主治】 胃火郁结之乳疽、乳痈，憎寒壮热，红肿焮热痛。

11104 栝楼牡蛎散

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 瓜蒌牡蛎散（《普济方》卷一四二）。

【组成】 栝楼根 牡蛎（熬）各等分

【用法】 上为细末。每服方寸匕，饮送下，一日三次。

【主治】 百合病，渴不愈者。

【方论选录】《金鉴》：与百合洗身而渴不瘥者，内热甚而津液竭也。栝楼根苦寒，生津止渴，牡蛎咸寒，引热下行也。

11105 栝楼乳香散

【方源】《梅氏验方新编》卷四。

【组成】 栝楼一个（连皮子捣碎） 当归 净银花各三钱 白芷一钱 青皮五分 乳香五分 没药五分 甘草四分 蒲公英五钱

【用法】 水煎，加酒温服。

【主治】 产后乳疽、乳痈。

11106 栝楼桂枝汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 瓜蒌桂枝汤（《普济方》卷一一二）、桂枝加瓜蒌汤（《中国医学大辞典》）。

【组成】 栝楼根二两 桂枝三两 芍药三两 甘草二两 生姜三两 大枣十二枚

【用法】 以水九升，煮取三升，分温三服，取微汗。汗不出，食顷，啜热粥发之。

【主治】 太阳病，其证备，身体强，几几然，脉反沉迟，此为痉。

【方论选录】 ①《法律》：即系湿热二邪交合，不当从风寒之表法起见，故不用葛根之发汗解肌，改用栝楼根味苦入阴，擅生津撤热之长者为君，合之桂枝汤，和荣卫，养筋脉，而治其痉，乃变表法为和法也。②《金匮要略论注》：其原由筋素失养而湿复挟风以燥之，故以桂枝汤为风伤卫主治，加栝楼根以清气分之热而大润其太阳经既耗之液，则经气流通，风邪自解，湿气自行，筋不燥而痉愈矣。

【临证举例】 小儿抽搐症 《陕西中医》（1985；7:304）：以栝楼桂枝汤治疗小儿抽搐症60例，其中男38例，女22例，年龄1～6岁，病程1月～2年，属于热性病后遗症25例，不明原因者35例。处方：栝楼根15克，桂枝8克，白芍12克，炙草、生姜各6克，大枣5枚；气虚加党参，脾虚加

白术，血虚加当归，阴虚加石斛，每日一剂，水煎服，服药忌食生冷油腻。结果，40例15天内治愈，18例1个月内治愈，2例无效，总有效率达96%。

【备考】 本方方名，《法律》引作“栝楼根桂枝汤”、《幼幼集成》引作“瓜蒌根桂枝汤”。

11107 栝楼葛根汤

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】 石膏 甘草 人参 栝楼根 葛根 防风

【主治】 风温，无大热而渴。

【方论选录】 缘风温之热邪内蕴，故借白虎加人参汤裁去知母、粳米，加栝楼根以清热解渴，葛根以布胃行津，防风以开表散邪，人参、甘草佐石膏、栝楼以化热，性虽甘温，当无助长伏邪之虞。

11108 栝楼瞿麦丸

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 瓜蒌瞿麦丸(《济阳纲目》卷九十二)。

【组成】 栝楼根二两 茯苓三两 薯蓣三两 附子一枚（炮） 瞿麦一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，饮送下，一日三次；不知，增至七八丸。以小便利，腹中温为知。

【功用】《金匮要略讲义》：化气，利水，润燥。

【主治】 小便不利者，有水气，其人苦渴。

【方论选录】 ①《金匮要略心典》：此下焦阳弱气冷，而水气不行之证，故以附子益阳气，茯苓、瞿麦行水气。观方后云“腹中温为知”可以推矣。其人苦渴，则是水寒偏结于下，而燥火独聚于上，故更以薯蓣、栝楼根除热生津液也。夫上浮之焰，非滋不息；下积之阴，非暖不消；而寒润辛温，并行不悖，此方为良法矣。欲求变通者，须于此三复焉。②《金鉴》：小便不利，水蓄于膀胱也。其人苦渴，水不化生津液也。以薯蓣、花粉之润燥生津，而苦渴自止；以茯苓、瞿麦之渗泄利水，而小便自利；更加炮附宣通阳气。上蒸津液，下行水气，亦肾气丸之变制也。然其人必脉沉无热，始合法也。

【临证举例】 ①慢性肾小球肾炎 《成都中医学院学报》：(1981；1:59)：刘某某，女，40岁，重庆建设银行职工，1964年12月20日初诊：水肿，小便不利一年许，口渴增剧，水肿加重两月左右。现证：全身水肿，口渴引饮，腰冷腿软，精神萎靡不振，纳差，每餐约一两米饭，小便不利，短少而淡黄，尿无热感，大便2～3天一次，不结燥，面色浮白，唇淡，无苔乏津，脉沉细。西医诊断为慢性肾小球肾炎，经服中西药，治疗一年左右疗效不显，近两月来，病情加剧，其人苦于渴饮，水肿愈增，小便淡黄短少，于是前来重庆市第二中医院就诊。此系肾阳不足，气化紊乱，形成上燥下寒之渴肿、小便不利证。拟以润燥生津，温阳利水主治，方用栝楼瞿麦丸改用汤剂，加鹿胶以填补精血。方药：栝楼根30克、淮山药30克、茯苓15克、瞿麦15克、制附片15克（另包，先煎两小时）、鹿胶12克（另包，蒸化兑服）。上方服二剂，口渴大减，饮水量减少一半，水肿亦大减，小便量增多而畅利，饮食增加，其余舌脉同上，效不更方，将原方再进二剂。口渴更减，小便畅利，水肿基本消失，饮食接近正常，大便正常，腰冷消失。现觉腰痠腿软，精神仍疲倦，夜尿3～4次，舌质淡，无苔微润脉沉细。于原方中将栝楼根改用15克，其余药物和剂量不变，嘱进二剂。服药后渴饮，水肿消失，饮食正常，精神比原来大有好转，时而仍感疲乏，尿色淡黄无热感，夜尿2～3次，腰痠腿软，面色接近正常，唇淡红，舌质淡，无苔津润，脉沉细。②癃闭 《山东中医杂志》：(1983；2:8)：患者余某，年72岁，患小便点滴不通，曾用八正、五苓及西药利尿、导尿诸法均不效。患者拒用手术，经友人介绍余诊，诊见：口渴甚苦而不欲饮，以水果自慰之，小便点滴不通，少腹胀急难忍，手足微凉，舌质淡胖有齿痕，苔黄腻偏干，脉沉细而数。诊为高年癃闭，投瓜蒌瞿麦丸加车前、牛膝、天花粉12克、瞿麦10克。茯苓12克、山药12克、牛膝12克、车前子12克（包）、熟附子10克。药服一剂，小便渐通，胀急略减，再三剂病去若失。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“瞿麦丸”。

11109 栝楼薤白白酒汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 瓜蒌薤白白酒汤(《冯氏锦囊》卷七)。

【组成】 栝楼实一枚（捣） 薤白半斤 白酒七升

【用法】 上同煮，取二升，分温再服。

【主治】 胸痹。喘息咳唾，胸背痛，短气，寸口脉沉而迟，关上小紧数。

【方论选录】《古方选注》：君以薤白，滑利通阳；臣以栝楼实，润下通阴；佐以白酒，熟谷之气上行药性，助其通经活络，而痹自开。

11110 栝楼薤白半夏汤

【方源】《金匮》卷上

【异名】 瓜蒌薤白半夏汤(《济阳纲目》卷七十二)、瓜蒌薤白汤(《医醇剩义》卷四)、瓜蒌半夏白酒汤(《医学金针》卷三)。

【组成】 栝楼实一枚（捣） 薤白三两 半夏半斤 白酒一斗

【用法】 上同煮，取四升，温服一升，日三服。

【主治】 胸痹不得卧，心痛彻背者。

【宜忌】 《外台》引《范汪方》：忌羊肉、饧。

【方论选录】 ①《金匮要略心典》：胸痹不得卧，是肺气上而不下也；心痛彻背，是心气塞而不和也，其痹为尤甚矣。所以然者，有痰饮以为之援也。故于胸痹药中加半夏以逐痰饮。②《古方选注》：君以薤白，滑利通阳；臣以栝楼实，润下通阴；佐以白酒熟谷之气，上行药性，助其通经活络而痹自开，而结中焦而为心痛彻背者，但当加半夏一味，和胃而通阴阳。

【临证举例】 冠心病 《福建中医》（1988；1：41）：张某，男，54岁，干部。初诊自述心窝部闷痛彻背伴短气，间歇性发作已半个月，常于饭后或劳累时诱发，每次2～3分钟，心电图提示心肌供血不足，诊断为冠心病心绞痛。舌质淡暗，黄白腻，脉细弦，证为气滞血瘀所致之胸痹。处方：栝楼，薤白、葛根、丹参15克，半夏、当归各10克，赤芍、桑寄生各12克，水煎服。每日一剂，连服5剂后症减，原方去葛根，加郁金10克、黄耆15克，连服30剂，随访半年胸痛未复发。

11111 桃仁丸

【方源】 《圣惠》卷四十八。

【组成】 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 没药 安息香 乳香 麝香（细研） 木香 吴茱萸（汤浸七遍，焙干微炒） 桂心各一分

【用法】 上为末，用蒸饼为丸，如小豆大。每服二十丸，以暖酒嚼下，不拘时候。

【主治】 心疝，心腹痛，四肢逆冷，面色青黑。

【备考】 方中桂心用量原缺，据《医方类聚》补。

11112 桃仁丸

【方源】 《圣惠》卷七十一。

【组成】 桃仁三两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 虻虫四十枚（炒微黄，去翅足） 水蛭四十枚（炒微黄） 川大黄三两（锉碎，微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心以热酒送下。

【主治】 ①《圣惠》：妇人腹内有瘀血，月水不利，或断或来，心腹满急。②《圣济总录》：伤寒八九日至十二日，病不解，发热如狂，少腹满闷，其脉沉结，内有瘀血。

11113 桃仁丸

【方源】 《圣济总录》卷六十五。

【组成】 桃仁 杏仁（各汤浸，去皮尖双仁，细研）各一两 款冬花 贝母各一两（捣细末，与前药和匀）

【用法】 上先以沙糖一两，入铫子内销溶后入药同熬黄熟，入白捣丸，如弹子大。每服一丸，含化咽津。

【主治】 咳嗽。

11114 桃仁汤

【方源】 《外台》卷七引《集验方》。

【组成】 桃仁（去皮尖） 吴茱萸 橘皮 海藻 各三两 生姜 茯苓 羌活 蒺藜子（去角）各三两

【用法】 上切。以水三大升，煮取九合，分为三服，空心服。

【主治】 疝气

【宜忌】 忌酢物。

【备考】 《圣济总录》有桂、槟榔。

11115 桃仁汤

【方源】 《千金》卷二十五。

【异名】 桃仁散(《圣惠》卷六十七)。

【组成】 桃仁五十枚 大黄四两 芒消三两 桂心 当归 甘草各二两 虻虫 水蛭各二十枚

【用法】 上㕮咀。以水八升，煮取三升，绞去滓，适寒温服一升，一日三次。

【主治】 ①《千金》：堕落瘀血。②《圣济总录》：妇人因冷血瘀不通，结积脐腹，发为气痛，经水痞涩，面黄体瘦。

【方论选录】 《千金方衍义》：兼并桃核承气、抵当汤、丸，加当归以和血止痛，攻血之峻剂也。

11116 桃仁汤

【方源】 《全生指迷方》卷四。

【异名】 桃仁散(《医略六书》卷三十)。

【组成】 苏木 地黄 桃仁（去皮尖，炒）各半两 虻虫（去头足翅，炒） 水蛭（炒）各三十枚

【用法】 上为散。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。恶露行即住服。

【功用】 《景岳全书》：逐瘀血。

【主治】 恶露顿绝，或渐少，腰重痛，下注两股，刺痛如锥刀刺，留血于经络，不即通之，大有痛处，必作痈肿。

【方论选录】 《医略六书》：产后瘀血不化，遇热

于经，而经脉不利，故腰痛不止焉。桃仁破瘀润燥，生地凉血退热，苏木疏经气以破血，虻虫破瘀血以通经，水蛭攻瘀积以流走经络也。水煎温服，使瘀血消化，则遏热自解，而经脉清和，何腰痛之不止哉！

11117 桃仁汤

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】桃仁（炒，研）十粒 当归三钱 牛膝二钱 泽兰三钱 苏木一钱

【用法】水煎，热酒冲，空心服。

【主治】产后腰痛。

11118 桃仁散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 当归一两（锉，微炒） 赤芍药三分 琥珀三分 延胡索三分 芎藭半两 鬼箭羽一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 桂心半两 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后余血不散，结成癥块，疼痛。

11119 桃仁散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 蓬莪术三分 桂心半两 当归一两（锉，微炒）

【用法】上为细散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】产后败血不散，上冲心腹，痛不可忍。

11120 桃仁散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【异名】杜牛膝散（《得效》卷十五）、桃花散（《普济方》卷三三三）。

【组成】红花 当归（洗，焙） 杜牛膝 桃仁（焙）各等分

【用法】上为细末。每服三钱，空心、食前温酒调下。

【主治】妇人、室女血闭不通，五心烦热。

11121 桃仁粥

【方源】方出《证类本草》卷二十三引《食医心镜》，名见《圣惠》卷九十七。

【组成】桃仁三两（去皮尖）

【用法】以水一升，研取汁，和粳米二合煮粥食之。

【功用】《药粥疗法》：活血通经，祛瘀止痛。

【主治】咳嗽气喘，胸膈痞满，痃癖血癥，血瘀所致的心腹疼痛；妇女血滞经闭、痛经，及跌打损伤等。

①《证类本草》引《食医心镜》：上气咳嗽，胸膈痞满，气喘；传尸鬼气，痃癖注气，血气不通，日渐消瘦。②《圣惠》：产后血癥，疼痛，不多食。③《圣济总录》：冷气心腹痛、妨闷。④《药粥疗法》：瘀血停滞所引起的妇女血滞经闭、痛经，产后瘀阻腹痛，跌打损伤，瘀血肿痛，胸胁刺痛，以及高血压、冠心病、心绞痛。

11122 桃仁膏

【方源】《景岳全书》卷五十四引《百一》。

【组成】桃仁（炒，去皮尖） 大茴香（炒）各等分

【用法】上为细末。每服二钱，先以葱白二寸煨熟，蘸药细嚼，空心以热酒下。

【主治】①《景岳全书》引《百一》：气血凝滞，疝气，膀胱小肠气，痛不可忍。②《会约》：血疝，小腹硬而有形，大便秘结而黑，小水利。

11123 桃奴散

【方源】《医学正传》卷三。

【组成】桃奴（十二月收用） 玄胡索 鼠粪 香附子 官桂 五灵脂 砂仁 桃仁（去皮尖）各等分

【用法】上为末。每服三钱，温酒调下。

【主治】妇人或室女月经不通，渐成胀满；及男子坠马，跌仆损伤，以致瘀血停积，成血蛊病。

【方论选录】《医略六书》：血瘀肝脾，不能鼓运气化，而成血臌，男女皆有之，惟经闭为女科所独焉。桃奴抑心气以生血，延胡化滞血以通经，桃仁破瘀血，灵脂降浊阴；鼠粪通幽降浊，香附解郁调经，肉桂温经以运乎经血，砂仁醒脾以鼓运乎经气也。为散以消之，酒煎以行之，使瘀结顿化，则经脉自通，而经闭无不行，胀满无不退矣。

【备考】本方原名“桃奴丸”，与剂型不符，据《医学入门》改。

11124 桃红散

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【异名】绛雪散（《杨氏家藏方》卷十一）、绛雪（《医统》卷六十四）。

【组成】龙脑（研）一钱 丹砂（研）半两 硼砂（研）一钱 马牙消（研）半钱 寒水石（煅，研如粉）半两

【用法】上为细末。每用一字，掺咽喉中，咽津。

【主治】 咽喉痛。

11125 桃红散

【方源】 方出《陶氏小儿方论》，名见《卫生总微》卷十八。

【异名】 红绵散(《百一》卷十)、红玉散(《保婴集》)、桃花散(《丹溪心法》卷四)、红白散、通云散(《普济方》卷三六四)。

【组成】 白矾（火飞）一钱 麝香一字 坯子胭脂一钱

【用法】 上为末。每用少许，先用绵裹杖子撮脓尽，掺之。

【主治】 小儿脓耳。

11126 桃花丹

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 大黄三两（醋煮） 代赭三两（醋煅） 桃花三两（炒黑）

【用法】 上为末，薄荷汁为丸。每服三钱，沸汤送下。

【主治】 血胀，噎食，脉洪涩大。

【方论选录】 产后血瘀，肝胃不能输化，而胃气上逆，故胸腹胀满，噎食不下焉。桃仁破瘀血，以润胃燥，炒黑，不伤好血；代赭镇逆气以平厥阳，醋煅，引之入肝；醋煮大黄，以搜涤其血。薄荷汁丸、百沸汤下，使瘀血消化，则胃气自平，而腹胀无不退，噎食无不下矣。

11127 桃花丹

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 章丹3克 生石膏60克

【用法】 将章丹入乳钵内研细，再加石膏研极细末。用少许掺疮面。

【功用】 生肌长肉。

【主治】 溃疡疮面，腐肉已清，已露新肌。

11128 桃花汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 三物桃花汤(《杏苑》卷三)。

【组成】 赤石脂一斤（一半全用，一半筛末） 干姜一两 粳米一升

【用法】 以水七升，煮米令熟，去滓，温服七合，纳赤石脂末方寸匕，一日三次。若一服愈，余勿服。

【功用】《注解伤寒论》：固下，散寒，止利。

【主治】 ①《伤寒论》：少阴病二三日至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便脓血者。②《温病条辨》：痢无度，脉微细，肢厥，不进食。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：涩可去脱，赤石脂之涩以固肠胃；辛以散之，干姜之辛以散里寒；粳米之甘以补正气。②《医方考》：此方用赤石脂，以其性寒而涩，寒可以济热，涩可以固脱；用干姜者，假其热以从治，犹之白通汤加人尿、猪胆，干姜黄连黄芩人参汤用芩、连，彼假其寒，此假其热，均之假以从治耳；用粳米者，恐石脂性寒损胃，故用粳米以和之。向使少阴有寒，则干姜一两，岂足以温？而石脂一斤之多，适足以济寒而杀人矣！岂仲景之方乎？③《古方选注》：桃花汤，非名其色也，肾脏阳虚用之，一若寒谷有阳和之致，故名。石脂入手阳明经，干姜、粳米入足阳明经，不及于少阴者，少阴下利便血，是感君火热化太过，闭藏失职，关闸尽撤，缓则亡阴矣。故取石脂一半，同干姜、粳米留恋中宫，载住阳明经气，不使其陷下；再纳石脂末方寸匕，留药以沾大肠，截其道路，庶几利血无源而自止，其肾脏亦安矣。

【临证举例】 ①慢性肠炎 《浙江中医杂志》(1982；8:378)：王某，女，52岁。1981年4月21日诊。患者久有慢性肠炎病史，大便溏薄，腹痛绵绵。今年正月初四因食油腻，下利不止，服土霉素、氯霉素、痢特灵等药后泻利稍减，但仍是日十余行，呈白色粘冻状，兼见小便不利，腹部冷痛，四肢发凉，面色青黄，精神萎靡，口淡不渴，舌淡苔白，脉沉无力。证属脾阳虚衰，下元失固。治宜补脾回阳，温中固涩。方用赤石脂30克，粳米60克，干姜15克。服六剂，腹痛消失，大便已转正常。②癃闭 《中医杂志》(1984；7:18)：曾某，女，42岁。1978年4月5日诊。1977年10月起即作腹痛，少腹拘急，尿少而频，日排尿仅100～200毫升左右。曾经双氢克尿塞、速尿治疗，尿量增至1500～2000毫升，腹胀随减，停药诸症又发。中药曾服八正散、五苓散、济生肾气丸、滋肾通关丸等剂，亦仅服药时症状好转，停药复如旧，病趋重笃，刻下面色苍白，形体肥胖，口和纳呆，恶心欲呕，心烦易怒，少腹拘急，腹胀尿少，尿意频频，尿色白浊，大便干，三四日一行，舌暗淡肥大，脉沉紧。此属脾肾阳气衰惫，枢机不运，气化无权。治宜温运脾肾阳气，枢转气机，方拟桃花汤：赤石脂60克，干姜、粳米各30克，清水煎至米烂熟为度，去渣，分昼二夜一温服，二日后大便通，小便利，色白浊，精神好转，寐安，纳食稍增，余症减轻。嘱再二剂，煎服法同前。四日后尿量增，腹胀、少腹拘急和心烦欲呕等证已除，面色转红润，纳增，舌体肥胖，苔净，脉沉紧，此中阳已运，肾气来复，原方再进，十日后舌脉复如常

大，小便正常，大便通畅，遂以调理脾肾之剂善后。

11129 桃花汤

【方源】《家塾方》。

【组成】桃花二钱 大黄一钱

【用法】以水二合，先纳桃花煮取一合二勺，纳大黄，煮取六勺，顿服。

【主治】浮肿，大小便不通。

11130 桃花散

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】白及 白蔹 黄柏 黄连 乳香（另研） 麝香（另研） 黄丹各等分

【用法】上为极细末。掺在疮上。二三日生肌平满。

【功用】生肌。

【主治】一切疮。

11131 桃花散

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】桃红散(《准绳·疡医》卷五)。

【组成】好石灰（用纱净筛）十两 清油小半灯盏 大黄（五钱，锉碎，水浸透取汁）大半盏

【用法】上石灰先用铁铛炒令带熟，次入大黄汁，清油和匀，以慢火炒如桃花色，乌盆盛之，倾出在内，浮而不沉，鹅翎拂聚纸上，别着瓦器收藏。凡是破损伤痕，用涂立效。仍服疏风散、活血散。

【主治】①《活幼心书》：一切破损，肢体出血作痛。②《广笔记》：跌损，刀伤，狗咬烂脚。

11132 桃花散

【方源】《沈氏经验方》卷上。

【组成】冰片一钱 铜绿三两 白占二钱 樟脑五钱 浮甘石一两（黄连制）

【用法】上为细末。如黑腐已尽，肉色红活，以猪骨髓同捣匀，做成夹膏，针刺多孔，贴之，二三日翻身，外用布捆。

【主治】烂腿。

11133 桃花散

【方源】《中国医学大辞典》引马氏方。

【组成】石膏（煅）二两 轻粉一两 桃丹五钱 冰片五分

【用法】研极细末。掺于疮口，外用膏贴。外皮破碎者，以此敷之立结皮。

【功用】提脓拔毒，生肌收口。

【主治】①《中国医学大辞典》引马氏方：痈疽疮疡溃后，脓水淋漓，口不收敛。②《中医皮肤病学简编》：冻疮。

11134 桃灵丹

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】桃仁五钱 五灵脂五钱（火煨裂）

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，或醋汤送下。

【主治】诸般心腹气痛，或瘀血作痛。

11135 桃蜜膏

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】杜仲四两 故纸二两 桃核肉三十个。

【用法】炼蜜为膏。空心滚水服。

【主治】腰痛。

11136 桃蝎散

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】大全蝎二十一个 核桃二十一个（擘开，去肉，将蝎装入扎紧，火煅存性）

【用法】每用一枚，研末。临卧陈酒调下。

【主治】忧思郁结，痰留气滞，乃生瘰疬。

11137 桃红洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】桃仁 90 克 桂枝 90 克 红花 30 克 川芎 30 克

【用法】水煎，熏洗。

【主治】冻疮。

11138 桃仁当归汤

【方源】《准绳·类方》卷六。

【组成】桃仁（去皮尖）二钱 当归尾（酒洗） 玄胡索各一钱半 川芎 生地黄 赤芍药（炒） 吴茱萸 青皮（醋炒）各一钱 牡丹皮八分

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，食前服。

【主治】疝因瘀血作痛。

11139 桃仁延胡汤

【方源】《医彻》卷三。

【组成】桃仁泥十粒 木香 炮姜各五分 炙甘草三分 香附（醋炒） 延胡索（醋煮） 广皮各一钱 钩藤 泽兰各一钱半 砂仁五分

【用法】水煎服。

【主治】心痛素喜食热物者，瘀血停于胃口也。

11140 桃仁承气汤

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】桃仁十二个（去皮尖） 官桂 甘草 芒消各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三五钱，水一大盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】 妇人月事沉滞，数月不行，肌肉不减。

11141 桃仁承气汤

【方源】《校注妇人良方》卷七。

【组成】 桃仁半两 大黄（炒） 二两 甘草二钱 肉桂一钱

【用法】 姜水煎，发日五更服。

【主治】 妇人瘀血，小腹急痛，大便不利，或谵语口干，漱水不咽，遍身黄色，小便自利；或血结胸中，手不敢近腹，寒热昏迷，其人如狂。

【方论选录】《医略六书》：室女血瘀，冲任结滞小腹，而蓄泄不灵，故腹痛不止，经闭不通焉。桃仁生用破积血以开瘀结，大黄醋煮逐瘀血以通经脉，甘草和中缓胃，官桂通经活血也。水煎温服，使瘀血消化则冲任调和，而月事时下，何腹痛之有哉！

11142 桃仁雄黄膏

【方源】《金鉴》卷四十九。

【组成】 桃仁 雄黄末

【用法】 桃仁研膏，合雄黄末，鸡肝切片，蘸药纳户中。其虫一闻肝腥，皆钻肝内吮食，将肝提出，其病即愈。

【主治】 阴痒。

11143 桃红四物汤

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】 川芎三钱 酒芍三钱 熟地三钱 桂心一钱半（研） 附片一钱半 桃仁一钱（去皮尖，研） 红花一钱 当归身七钱（炒）

【主治】 经期诸痛。

11144 桃红四物汤

【方源】《中医妇科治疗学》引张香南方。

【组成】 生地四钱 归尾 赤芍各三钱 川芎 桃仁 红花各二钱 丹皮 五灵脂各三钱

【用法】 水煎，空腹服。

【功用】 清热通瘀。

【主治】 月经先期，血瘀而兼热者，经色紫，质稠粘，中夹血块，腹痛拒按，舌质淡红或略带紫色，苔黄而干，脉沉数或弦滑有力。

11145 桃花化浊汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 桃仁二钱 红花五分 牛膝二钱 延胡索一钱 归尾一钱五分 赤芍一钱 丹参二钱 茵陈二钱 泽泻一钱五分 车前二钱 降香五分 血余炭一撮

【功用】 通利下焦，兼去瘀。

【主治】 女劳瘅，膀胱急，小腹满，身尽黄，额上黑，足下热，大便黑而时溏，以因血瘀不行，积于膀胱少腹。

11146 桃枝当归膏

【方源】《东垣试效方》卷三。

【组成】 当归身（去细梢，洗去土，干）一两 杏仁（汤浸，去皮尖）一百个 肥嫩柳枝三两半（切寸许，水洗，干） 肥嫩桃枝一两半（切寸许，水洗，干） 黄丹（水飞）六两 脂麻油一斤

【用法】 上件先令油热，下桃枝、柳枝，熬至半焦，以绵裹当归、杏仁熬至桃枝、柳枝黑焦为度，去药滓滤油净，抹出铫子中滓秽合净，再上火令沸，旋旋入黄丹，熬成滴水中不散为度，或只摊纸上不透为度。

【主治】 一切热疮。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作"寒疮热膏药"。

11147 桃核承气汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 桃仁承气汤（《医方类聚》卷五十四引《伤寒括要》）。

【组成】 桃仁五十个（去皮尖） 桂枝二两（去皮） 大黄四两 芒消二两 甘草二两（炙）

【用法】 上以水七升，煮取二升半，去滓，纳芒消，更上火微沸。下火，先食温服五合，一日三次，当微利。

【功用】《中医方剂学》：破血下瘀。

【主治】 下焦蓄血，少腹急结，大便色黑，小便自利，甚则谵语烦渴，其人如狂，至夜发热，及血瘀经闭，痛经，跌打损伤。

①《伤寒论》：太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，少腹急结者。②《外台》引《古今录验》：往来寒热，胸胁逆满。③《丹溪心法》：吐血，觉胸中气塞，上吐紫血者。④《柯氏方论》：女子月事不调，先期作痛与经闭不行者。⑤《嵩崖尊生》：牙根出臭汗。⑥《类聚方广义》：痢疾身热，腹中拘急，口干唇燥，舌色殷红，便脓血者；淋家，小便急结，痛连腰腿，茎中疼痛，小便涓涓不通者；打仆疼痛，不能转利。⑦《喉科种福》：刺伤咽喉，肿痛非常，有碍饮食者。

【宜忌】 ①《外台》引《古今录验》：忌海藻、菘菜。②《中医方剂学》：孕妇忌服。

【方论选录】 ①《医方考》：桃仁，润物也，能泽肠而滑血；大黄，行药也，能推陈而致新；芒消，咸物也，能软坚而润燥；甘草，平剂也，能调胃而和中；桂枝，辛物也，能利血而行滞。又曰：

血寒则止，血热则行。桂枝之辛热，君以桃、消、黄，则入血而助下行之性矣，斯其治方之意乎！②《古方选注》：桃仁承气，治太阳热结解而血复结于少阳枢纽间者，必攻血通阴，乃得阴气上承，大黄、芒消、甘草本皆入血之品，必主之以桃仁，直达血所，攻其急结，仍佐桂枝泄太阳随经之余热，内外分解，庶血结无留恋之处矣。

【临证举例】 ①痢疾 《诸证辨疑》：一妇长夏患痢疾，痛而急迫，其下黄黑色，两尺脉紧而涩，知寒伤宫也。细问之，答曰："行经之时，渴饮冷水一碗，遂得此证。"此乃血被冷水所凝，瘀血归于大肠，热气所以坠下，遂用桃核承气汤，内加马鞭草、延胡索，一服。次早下墨血升许，痛止脏清，次用调脾活血之剂，遂愈。②癫狂 《遯园医案》：李某，年二十余，先患外感，诸医杂治，证屡变，由其父陪来求诊。审视面色微黄，少腹胀满，身无寒热，坐片刻即怒目注人，手拳紧握，伸张如欲击人状，有倾即止，嗣复如初，脉沉涩，舌苔黄暗，底面露鲜红色。病已入血分，前但知用气分药，宜其不效。《内经》言："血在上善忘，血在下如狂。"此证即《伤寒论》热结膀胱，其人如狂也。当用桃核承气汤，即疏方投之，一剂知，二剂已。嗣以逍遥散加丹、栀、生地调理而安。③慢性前列腺炎《湖南中医学院学报》（1979；1:30）：周某，男，32岁，患慢性前列腺炎，小腹及会阴部灼热胀痛，伴阳萎、小便频数等证经年。经用杜仲、补骨脂、淫羊藿、熟地黄、泽泻等数剂，遂致二便俱闭，小腹胀满剧痛，有灼热感，小便点滴难出，大便未解，心烦口渴，呼吸急迫，痛苦不堪，舌红，苔黄厚糙，脉数。此为膀胱热结瘀阻，水道不通，大便为邪热所干，燥粪难下，治宜急攻瘀热，以桃核承气汤，昼夜连进两剂，便通痛解，再以草薢分清饮合知柏地黄丸加减，治疗两月而愈。④胞衣不下《伤寒论今释》：一妇人，小产后胞衣不下，忽然上攻，喘鸣促迫，正气昏冒，不知人事，自汗自涌，心下不硬而少腹濡，眼中如江兰，乃予桃核承气汤，须臾，胞衣得下。⑤闭经 《江苏中医》（1960；6:40）：陈某，女，20岁，未婚。自诉小腹胀痛，月经停止不行已有六月之久，缘因正当行经时，在田间插秧，适雷雨骤至，衣服尽湿后即经停不行，小腹日渐痛。询其过去经事，皆按期正常。按其腹，指下有凝滞抵抗之状，腹壁紧急，四肢乏力，头目昏眩，大便微难，小溲如常。余断为蓄血，是因月经时受冷，冷则血凝之故。遂处以桃核承气汤二帖，服后痛胀若失，经事畅行，紫黑色血块甚多，至今月经按月畅行。

11148 桃仁承气饮子

【方源】《赤水玄珠》卷十八。

【异名】 桃仁承气汤（《寿世保元》卷二）。

【组成】 桃仁 桂枝 芒消 大黄 芍药 柴胡 青皮 当归 甘草 枳实

【用法】 以水二钟，加生姜三片煎，临服入苏木煎汁三匙服。

【功用】《江西中医药》：疏肝行气，通瘀生新。

【主治】 蓄血证。热邪传里，热蓄膀胱，其人如狂，小水自利，大便黑，小腹满痛，身目黄，谵语，烦渴，脉沉有力。

【方论选录】《江西中医药》：桃仁承气饮子为桃仁承气汤加味组成。桃仁承气汤乃仲景为膀胱蓄血证而设。方中大黄、芒消泻结去热，桃仁破瘀行血，桂枝通经脉中瘀血，甘草和中调胃。此加青皮、枳实破血行气，当归、芍药祛瘀生新，柴胡疏肝升清，苏木助桃仁、桂枝以逐瘀血，是方消中有利，升中有降，寒温适度，配伍谨严，功能疏肝行气，通瘀生新，确属治疗气机阻滞，瘀血内停诸症的首方。

【临证举例】 宫外孕 《江西中医药》（1984，3:9）：陈某，女，40岁。1976年10月5日初诊。主诉：停经50余天，阴道不规则流血二十余天。现病史：左下腹阵发性胀痛拒按，有欲便坠胀感，行走弯腰不便，阴道流血淋漓不尽，时有小血块，遂入院治疗。妇科检查：子宫位置大小触及不满意，后穹窿较饱满，宫颈抬举明显疼痛，阴道内有少量血性分泌物，左下腹可摸到似鸡蛋大的包块，穹窿穿刺可见不凝固的血性液体，确诊为宫外孕。血压104/68mmHg，面色萎黄，形体消瘦，精神倦怠，痛苦呻吟不已，伴有胸闷，食纳欠佳，不发热，二便如常，舌暗淡，苔薄白，脉弦细滑。辨证为气机阻滞，血瘀少腹。法以疏肝行气，通下祛瘀。处方：桃仁6克，大黄6克（后下），芒消6克（冲），甘草5克，桂枝5克，青皮10克，枳实10克，当归12克，白芍10克，苏木10克，柴胡5克。上方服三剂，大便转泄，腹痛见减，阴道流血增多，伴有黑色瘀块，腹部包块缩小。效不更方，继进三剂，腹痛流血均止，少腹包块明显缩小，精神转佳，纳谷始觉有味。仍守上方，去芒消，大黄减量，继服七剂，腹部柔软，包块消失。继以八珍汤加益母草调理而安。

11149 都气丸

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】六味地黄丸加五味子。

【功用】①《医方集解》：益肺之源，以生肾水。②《中药成方配本》：补肾纳气。

【主治】肺肾两虚，咳嗽气喘，呃逆，滑精，腰痛。

①《症因脉治》：肺虚身肿，肺气不能收摄，泻利喘咳，面色惨白，小便清利，大便时溏。②《张氏医通》：肾水不固，咳嗽精滑。③《医钞类编》：伤肾咳嗽，气逆烦冤，牵引腰痛，俯仰不利。④《己任篇》：阴火呃逆，脉两尺洪盛或弦细而数，面时赤。

【临证举例】①阴虚咳嗽《静香楼医案》：脉虚数，颧红声低，咳甚吐食，晡时热升，多烦躁。此肝肾阴亏，阳浮于上，精液变化痰沫。病已三年，是为内损，非消痰治嗽可愈。固摄下焦，必须绝欲。以饮食如故，经年可望其愈，都气丸加女贞子、枸杞子、天冬。②遗精《静香楼医案》：遗精伤肾，气不收摄，人夜卧著，气冲上膈，腹胀，呼吸不通，竟夕危坐，足跗浮肿清冷，小便渐少，此木实先拔，枝将败矣，难治之证也。都气丸加牛膝、肉桂。

【备考】本方改为饮剂，名"都气饮"（见《盘珠集》）。

11150 真火汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术五钱　巴戟天一两　附子一钱　防风一钱　牛膝三钱　石斛三钱　萆薢三钱　茯苓三钱

【用法】水煎服。连服四剂而皮肉温矣，又服四剂而骨髓热矣，再服四剂脚膝之痛去，更服四剂而步履无艰难之态矣。

【主治】冷痹，脚膝疼痛，行步艰难，自按其皮肉直凉至骨。

【方论选录】方中用巴戟天为君，补火仍是补水之药，而辅佐之味又彼此得宜，不用肉桂，当归之品，温其血分，实有意义。盖补气则生精最速，生精既速，则温髓亦速矣。若一入血分之药，则沾濡迟滞，欲速而不达矣。萆薢原忌防风，使之相畏而相使，更复相宜，所以同群而共济矣。

11151 真武汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】玄武汤（《千金》卷九）、固阳汤（《易简方》）。

【组成】茯苓　芍药　生姜各三两（切）　白术二两　附子一枚（炮，去皮，破八片）

【用法】以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，每日三次。

【功用】①《注解伤寒论》：益阳气，散寒湿。②《医方集解》：散寒利水，济火而利水。

【主治】脾肾阳虚，水气内停，小便不利，四肢沉重疼痛，腹痛下利，或肢体浮肿，苔白不渴，脉沉；太阳病误汗不解，发热，心下悸，头眩，身瞤动

①《伤寒论》：太阳病发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地者；少阴病腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳，或小便利，或下利，或呕者。②《医方类聚》引《易简方》：虚劳之人，憎寒壮热，咳嗽下利。③《普济方》引《直指》：治少阴肾证，水饮与里寒合而作嗽，腹痛下利。

【宜忌】①《外台》：忌酢、猪肉、桃、李、雀肉。②《法律》：纂病之呕即用真武尚不相当。

【加减】若咳者，加五味子半斤，细辛一两，干姜一两；若小便利者，去茯苓；若下利者，去芍药，加干姜二两；若呕者，去附子，加生姜，足前为半斤。

【方论选录】①《注解伤寒论》：脾恶湿，甘先入脾，茯苓、白术之甘，以益脾逐水。寒淫所胜，平以辛热，湿淫所胜，佐以酸平，附子、芍药、生姜之酸辛，以温经散湿。②《金鉴》：小青龙汤治表不解有水气，中外皆寒实之病也；真武汤治表已解有水气，中外皆寒虚之病也。真武者，北方司水之神也，以之名汤者，赖以镇水之义也。夫人一身制水者脾也，主水者肾也；肾为胃关，聚水而从其类者；倘肾中无阳，则脾之枢机虽运，而肾之关门不开，水虽欲行，孰为之主？故水无主制，泛溢妄行而有是证也。用附子之辛热，壮肾之元阳，而水有所主矣；白术之苦燥，建立中土，而水有所制矣；生姜之辛散，佐附子以补阳，温中有散水之意；茯苓之淡渗，佐白术以健土，制水之中有利水之道焉。而尤妙在芍药酸敛，加于制水、主水药中，一以泻水，使子盗母虚，得免妄行之患；一以敛阳，使归根于阴，更无飞越之虞。然下利减芍药者，以其阳不外散也；加干姜者，以其温中胜寒也。水寒伤肺则咳，加细辛、干姜者，散水寒也。加五味子者，收肺气也。小便利者去茯苓，以其虽寒而水不能停也。呕者，去附子倍生姜，以其病非下焦，水停于胃也。所以不须温肾以行水，只当温胃以散水，佐生姜者，功能止呕也。③《内台方

议》：用茯苓为君，白术为臣，二者入脾走肾，逐水祛湿；以芍药为佐，而益脾气；以附子、生姜之辛为使，温经散寒也。④《寒温条辨》：白术，茯苓补土利水之物也，可以伐肾而疗心悸；附子、生姜回阳益卫之物也，可以壮火而制虚邪；白芍酸以收阴，用白芍者，以小便不利，则知其人不但真阳不足，真阴亦已亏矣，若不用白芍，以固护其阴，岂能用附子之雄悍乎！

【临证举例】 ①水肿 《中医杂志》(1965；7：39)：魏某某，男，59岁。于1963年7月诊治。患者初病时，因头面及下肢午后浮肿，曾服中西药两月余仍未见效，病日增重，而来就诊。现症：全身除胸腹及手心未肿之外，均浮肿，按之凹陷不起，小便稀少，饮食不进，口虽渴，但不饮，神倦体寒，着衣被而不暖，面色灰黯无华，舌苔黑而滑润，舌质红色娇艳，脉浮大无根，此乃真阳衰极，上不制水所致。拟方：炮附子60克，白术24克，白芍24克，茯苓24克，潞党参60克，玉桂6克，炙甘草24克，生姜30克，水煎三次，头煎一次顿服，二三煎不论次数，频频饮服，一日尽一剂。上药连进三剂，浮肿已消退十之六七，查其苔已不黑，脉不浮而反沉，此乃虚焰渐衰，正气渐复之佳象，上方附片，党参、玉桂、生姜量减半，续服四剂而愈。②喘证 《哈尔滨中医》(1965；2:53)：王某某，女，61岁，患者有慢性咳喘病史，逢寒病作。时值秋末冬初，其病发作，喘息抬肩，动则喘息更甚，伴有咳嗽，吐痰色白，痰稀量多，形瘦神惫，时而汗出。观其面有微绛，舌苔薄白，脉沉弱无力，投二陈、青龙皆不收效，后服白果定喘汤，但只能缓解，不能根除，停药病仍发，百医不效。余诊之曰：此仍肾中真阳不足，水寒射肺也。痰生于饮，治痰必驱其饮。处方：真武汤重用茯苓60克，加干姜6克，细辛24克，服一剂知，二剂病大减。复诊：咳喘已平，吐白痰仍多，纳食不佳。前方加五味子6克，白术9克，三剂面痊愈。③大汗亡阳 《新医药杂志》(1979；12:17)：张某某，男，34岁。1963年8月17日就诊。素体虚弱，外感风寒，服解表药后高热退，但午后潮热不退，继服辛凉解表之剂，则发热渐高，持续不退，又投凉药泻下，则大汗不止，诸法救之无效，抬来我院诊治。症见形体消瘦，精神萎靡，汗出如雨，担架衣被浸湿，低热仍不退，筋脉拘急，眩晕不能站立，二便均无，四肢厥冷，脉沉细。此表阳不固，虚阳外越，治宜温阳固表。处方：炮附片（先煎）、白芍、白术、茯苓、生姜各30克，大剂频频饮之，汗出稍止而神气复，继服上方7剂，发热亦随之而愈。④痉病 《伤寒解惑论》：张某某，女，47岁，1976年4月28日初诊。患者于产后40天，始觉两臂振颤，以后逐渐加重，发展至全身不自主震颤，已两个半月，阵发性加剧，影响睡眠及进食，病人就诊时亦不能稳坐片刻，并伴有舌颤，言语不利，憋气，以长息为快，食欲差，舌质尖部略红，左侧有瘀斑，舌苔白，两手脉俱沉滑弱。治宜温阳镇水，真武汤加味：茯苓30克，白术24克，制附子12克，白芍15克，生姜12克，桂枝9克，半夏12克，生龙牡各30克，炙甘草6克。水煎服二剂。4月30日复诊：患者自述，29日晨8时服第一剂药，至当日下午6时许，颤动基本停止，腹内鸣响，当晚又进第二剂，颤动停止，晚上睡眠明显好转，仅有时自觉头有阵阵轰鸣，上方白芍药改用30克，加钩藤12克，磁石30克，再服三剂，以巩固疗效。

【备考】 本方改为丸剂，名“真武丸”（见中国医学大辞典）

11152 真珠丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 银粉丸(《普济方》卷三九二)、木香真珠丸(《普济方》卷三九二)。

【组成】 木香 白丁香（真者） 丁香（末）五分 巴豆仁十四个（水浸一宿，研极腻） 轻粉各五分（留少许为衣） 白滑石（末）二钱

【用法】 上为末，湿纸裹烧，粟米饭为丸，如麻子大。一岁一丸，八九岁以上至十五岁服八丸，炮皂子煎汤，放冷送下；挟风热难动者，先服凉药一服；乳癖者，减丸数，隔日临卧一服。

【功用】 ①《小儿药证直诀》：疗腹胀，行滞气。②《小儿药证直诀类证释义》：行气攻痰，杀虫消积。

【主治】 小儿虚中，一切积聚，惊涎宿食乳癖，大小便涩滞。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：此方行气攻痰与杀虫消积诸味相辅而成，方中三香（木香、白丁香、丁香）理气行滞，轻粉、巴豆化痰泻下，滑石渗湿利窍，可治积聚惊涎，单腹臌胀等证。方中的白丁香即麻雀屎，腊月采得，去两畔，钵中细研，以甘草水浸一夜，去水焙干。用治癥瘕久痼诸病，取雀食诸谷，易致消烂之义。

11153 真珠丸

【方源】《本事》卷一。

【异名】 真珠母丸(《保婴撮要》卷十)、真珠丹

(《丹溪心法附余》卷十)、珍珠母丸(《张氏医通》卷十四)。

【组成】 真珠母三分（未钻真珠也，研如粉，同碾） 当归（洗，去芦，薄切，焙干后称） 熟干地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干）各一两半 人参（去芦） 酸枣仁（微炒，去皮，研） 柏子仁各一两 暹逻犀角（镑为细末） 茯神（去木） 沉香（忌火） 龙齿各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服四五十丸，日午、夜卧金银薄荷汤送下。

【功用】 《本事方释义》：安神熄风。

【主治】 ①《本事》：肝经因虚，内受风邪，卧则魂散不守，状若惊悸。②《女科百问》：小便赤色，不痛不涩。

【方论选录】 《本事方释义》：此安神熄风之方也。真珠母气味咸寒，入足厥阴，以之为君；熟地黄气味甘寒微苦，入足少阴，当归气味苦辛甘微温，入少阴，二味为臣；人参气味甘微温，入足阳明，柏子仁气味苦辛微温，入足厥阴，枣仁气味苦平，入手少阴，茯神气味甘平，人手少阴，犀角气味苦酸咸寒，人足厥阴，龙齿气味凉涩，入足厥阴，沉香气味辛微温，入足少阴，以之为佐使者。因肝虚受邪，内风鼓动，致神魂不守，藉水之滋养，肝风得熄，飞扬者得以镇静，使坎离交合，神旺气和，自然安适矣。

11154 真珠丸

【方源】 《三因》卷十。

【组成】 知母一两一分 川连一两（去毛） 苦参一两 玄参一两 铁胴粉一两一分（研） 牡蛎（煅）一两一分 朱砂（另研）二两 麦门冬（去心） 天花粉各半两 金箔银箔二百片 白扁豆（煮，去皮）一两

【用法】 上为末，炼蜜入生栝楼根汁少许，丸如梧桐子大，用金银箔为衣。每服二十丸至三十丸，先用栝楼根汁下一服，次用麦门冬熟水送下，病退一日二次。

【主治】 心虚烦闷，或外伤暑热，内积愁烦，酣饮过多，皆致烦渴口干舌燥，引饮无度，小便或利或不利。

【宜忌】 忌炙煿酒色。

11155 真珠散

【方源】 《圣惠》卷四。

【组成】 真珠粉 琥珀末 寒水石 天竹 黄铁粉 朱砂 栝楼根末各一分 马牙消半分 甘草末（生用）半分

【用法】 上为细末。每服半钱，以竹叶汤放温调下，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：心胸烦热，口舌干燥，心神不利。②《局方》：五脏积热，毒气上攻，心忪闷乱，坐卧不宁。

11156 真珠散

【方源】 《圣惠》卷三十三。

【组成】 真珠末半两 石决明一两（捣碎，细研，水飞过） 黄芩二两 甘菊花一两 青葙子二两 芎劳一两 甘草一两（炙微赤，锉） 人参一两（去芦头）

【用法】 上为细散。每服一钱，食后以温浆水调下。

【主治】 眼忽生翳膜，赤涩疼痛。

11157 真珠散

【方源】 《圣惠》卷三十三。

【组成】 真珠一分 龙脑半分 琥珀一分 朱砂半分 硼砂二豆大

【用法】 上为细末。以铜箸取少许，点在眦上，一日三五次。

【主治】 风热眼中生赤脉，冲贯黑睛，及有花翳。

11158 真珠散

【方源】 《袖珍》卷十二引《圣惠》。

【组成】 盆消七钱半 白滑石一两 乳香一钱半 片脑少许

【用法】 上为细末。用一字，口噙水，搐鼻内。

【主治】 偏正头疼头风。

11159 真珠散

【方源】 《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】 定粉一两半（研） 白蔹末一两 白及末半两 龙骨末二钱 黄丹二两（飞，研） 乌贼鱼骨末一分

【用法】 上为极细末。干掺疮上；疮干，以津唾润动敷之。

【主治】 一切浸淫恶疮，久不生肌，疮口不敛。

【加减】 臁疮，加乳香二钱。

11160 真蛤散

【方源】 方出《直指》卷十九。名见《普济方》卷三十。

【组成】 芦甘石（绿者）一分 真蚌粉 黄连 五倍子各半分

【用法】 上为细末。以蜂房、大腹皮煎汤温洗，敷之。

【主治】 阴汗湿痒。

11161 真珠粉丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 蛤粉 黄柏各等分

【用法】 水为丸。酒送下。

【功用】 滋阴降火。

【主治】 遗精白浊。

【加减】 或加樗皮、青黛、滑石、知母尤妙。

11162 真人明目丸

【方源】《医方考》卷五。

【组成】 生地黄 熟地黄 川椒（去目及闭口者，微炒）各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐米饮送下。

【功用】 明目。

【主治】 目昏多泪。

【方论选录】 肾主目之瞳子，肾水虚竭，故令目昏；肝之液为泪，肝有风热，故令泪出。是方也，生地所以凉肝，熟地所以补肾，乃川椒者，味辛而热，可以疗肝肾之痹气，痹气者，湿热着而不散之气也。又于空心之时，以盐饮吞之，宜其直达肝肾之区矣。病在标而治其本，可谓神于病情者，此其所以为真人之方欤！

【临证举例】 目昏多泪 江陵傅氏，目昏多泪，家贫鬻纸为业，性喜云水，见必邀迎。一日，有客方巾布袍过之，授以此方治目，如方修服，不一月目明，夜能视物。

11163 真方白丸子

【方源】《瑞竹堂方》。

【组成】 大半夏（汤泡七次） 白附子（洗净，略泡） 天南星（洗净，略泡） 天麻 川乌头（去皮尖，略泡） 全蝎（去毒，炒） 木香 枳壳（去瓤，麸炒）各一两

【用法】 上为细末，生姜汁为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧茶清热水送下，一日三次；瘫痪，温酒送下；小儿惊风，每服二丸，薄荷汤送下。

【主治】 ①《瑞竹堂方》：诸风，可常服，永无风疾隔壅之患。②《丹溪心法附余》：中风痰涎壅盛，口喎不语，半身不遂，及小儿惊风潮搐。

11164 真君妙神散

【方源】《本草纲目》卷十一引《坦仙皆效方》。

【异名】 真君妙贴散（《仙传外科集验方》）、妙贴散（《中国医学大辞典》）。

【组成】 好硫黄三两 荞麦粉二两

【用法】 上为末，井水和，捏小饼，晒干收之。临用细研，新汲水调敷之。

【主治】 ①《本草纲目》引《坦仙皆效方》：一切恶疮。②《金鉴》：痈疽诸毒顽硬恶疮，散漫不作脓，及皮破血流，湿烂痛苦，天泡，火丹、肺风酒刺、赤白游风、鱼脊疮。

11165 真珠牛黄丸

【方源】《痧喉汇言》。

【组成】 珍珠八分 硼砂四分 辰砂六分 人中白八分 青黛四分 冰片一分 儿茶四分 琥珀八分 牛黄二分

【用法】 上为极细末。吹之。

【主治】 咽喉臭烂不收口

11166 索矩三和汤

【方源】《卫生宝鉴·补遗》。

【组成】 橘皮 厚朴 槟榔 白术各三两 甘草（炙） 紫苏各二两（去粗梗） 木通 海金沙各一两

【用法】 上锉。每服五钱，水一盏，加生姜三片，煎至八分，温服。

【主治】 病愈后面肿，或腰以下肿。

11167 壶公丹

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】 附子一个（半生半熟，以面包煨） 倍子五钱（炒微黑） 麻黄五钱 枯芩五钱 甘草节五钱

【用法】 上为细末。用米醋调涂留头。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：回阳化毒。

【主治】 诸般肿毒阴症。

11168 壶公妙剂散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 穿山甲（炒） 葫芦巴 槐花 黑丑（头末） 当归各等分

【用法】 上为末。每服五钱，用温酒调成块，挑入口内，温酒送下，随饮几杯，以助药力。

【主治】 一切诸毒，乳痈，便毒，筋骨疼痛不问新久。

11169 荸荠退翳散

【方源】《中医眼科学讲义》。

【组成】 硼砂 冰片 麝香 荸荠粉

【用法】 点眼。

【主治】 宿翳。

11170 莱子丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷二，名见《惠直堂

方》卷二。

【组成】 杏仁（去皮尖） 萝卜子各半两

【用法】 上为末，粥为丸服。

【主治】 ①《丹溪心法》：痰嗽。②《惠直堂方》：风痰咳喘，或吐脓血，并老人痰喘。

【备考】《惠直堂方》本方用法：共捣烂，加蜜为丸，如梧桐子大。每服一钱，清汤送下。

11171 莱菔饮

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【异名】 萝卜饮（《直指》卷二十六）。

【组成】 萝卜

【用法】 捣取自然汁一盏，入盐一钱调匀，顿服。

【主治】 ①《杨氏家藏方》：鼻衄不止。②《直指》：诸热吐血、衄血。

11172 莱菔粥

【方源】《老老恒言》卷五。

【组成】 莱菔

【用法】 生捣汁，煮粥食。

【功用】 宽中下气，消食去痰，止嗽止痢，制面毒

【主治】 消渴。

11173 莱菔膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 鲜萝卜缨

【用法】 杵烂罨之。

【功用】 消肿止痛。

【主治】 烫火伤未溃，红肿热痛者。

11174 莱菔子汤

【方源】《医彻》卷三。

【组成】 莱菔子（焙，研） 山楂各一钱半 厚朴（姜制） 枳实 广皮各一钱 蓬术八分（醋制） 炙甘草三分

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 因面食坚硬等味，过用不化所致的心痛。

11175 莱菔子粥

【方源】《寿世青编》卷下。

【组成】 莱菔子三合

【用法】 煮粥食。

【功用】 ①《老老恒言》：化食除胀，利大小便，止气痛。②《长寿药粥谱》：化痰平喘，行气消食。

【主治】 ①《寿世青编》：气喘。②《长寿药粥谱》：老年慢性气管炎，肺气肿，咳嗽多痰，胸闷气喘，不思饮食，嗳气腹胀。

11176 莲子丹

【方源】《三因》卷十三。

【组成】 新莲肉四两（去心皮） 白龙骨一两（醋煮） 甘草一分

【用法】 上为末。车前草汁，入面少许，煮糊为丸，如绿豆大。每服二五十丸，盐汤，酒任下。

【主治】 真气虚惫，口苦舌干，心常惨戚，夜多异梦，昼少精神，或梦鬼交通，遗泄白浊，小便余沥，阳事不举，目暗耳鸣，面色黧黑。

11177 莲子散

【方源】《直指》卷七。

【组成】 石莲肉

【用法】 上为末。入肉豆蔻末少许，米汤乘热调服。

【主治】 翻胃，噤口痢。

11178 莲子粥

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】 莲肉（去心皮）六两 芡仁（炒）四两 白茯苓（水飞）三两

【用法】 上为末，和匀。每一两用海松子细屑五钱，水一升，同碎米心煮成粥，和蜜少许，长服极佳。

【功用】 止渴，止痢，益神安心强志，益气聪耳明目，补脏腑，养气力，润皮肤，肥五脏，补虚羸。

【主治】 水气。

11179 莲心散

【方源】《医方大成》卷四引《简易方》。

【异名】 莲心饮（《普济方》卷二二八）。

【组成】 莲肉一两 白术 人参 白茯苓 五味子 木香 薏苡仁（炒） 北桔梗（炒） 甘草（炙） 白扁豆（炒） 丁香 白芷 当归各半两 桑白皮 干葛（炒） 黄耆（炒） 杏仁（去皮尖，炒） 干姜（炮） 山药（炒） 半夏曲 百合 神曲（炒）各一两

【用法】 上㕮咀。每服三分，水一盏，姜、枣同煎，空心温服。

【主治】 虚劳或大病后心虚脾弱，盗汗，遗精。

11180 莲心散

【方源】《普济方》卷三十九。

【组成】 莲心四十九粒（瓦上焙干，为末） 建茶一小挑 蜜一匙

【用法】 上作一服，用井花水半盏，调匀服之。

【功用】 通阴阳，利大小便。

【主治】 大小便不通。

11181 莲叶饮

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】莲叶二个（炙焦捣碎） 甘草（炙）二两（锉如麻豆大） 生蜜一匙 生地黄汁三合 蒲黄二两（汤成下）

【用法】上五味，以前二味用水五盏，煎取二盏，去滓，下蜜并地黄汁再煎三五沸，入蒲黄搅匀，分五次温服。

【主治】产后血晕不识人，狂言乱语。

11182 莲肉散

【方源】《奇效良方》卷三十四。

【异名】石莲散（《医学入门》卷七）。

【组成】莲肉 益智仁 龙骨（五色者）各等分

【用法】上为细末。每服二钱，空心用清米饮调下。

【主治】小便白浊，梦遗泄精。

11183 莲肉膏

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】莲肉 粳米（各炒）四两 茯苓二两

【用法】上为末，沙糖调成膏。每服五六匙，白滚汤送下。

【主治】病后胃弱，不能饮食。

11184 莲米散

【方源】《验方新编》卷七。

【组成】黄老米（炒）三合 莲肉三两（去心） 猪苓 泽泻（炒） 白术（土炒）各五钱 木香一钱半 白沙糖一两 干姜二钱（用湿纸包煨熟）

【用法】上为细末。每服三钱，空心白汤下。

【主治】老人五更泄泻。

11185 莲实丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】莲实（去皮） 附子（炮裂，去皮脐） 巴戟天（去心） 补骨脂（炒）各二两 山茱萸 覆盆子各一两 龙骨（研）半两

【用法】上为末，煮米糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心盐汤送下。

【主治】下元虚冷，小便白浮。

11186 莲子六一汤

【方源】《直指》卷十。

【异名】甘莲散 《仙拈集》卷二。

【组成】石莲肉（连心）六两 甘草（炙）一两

【用法】上为末。每服二钱，食后灯心一小撮，煎汤调下。

【主治】心热，小便赤浊。

【备考】本方方名，《医统》引作“莲子六一散”。

11187 莲子黄连丸

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】黄连五钱（猪胆汁浸一宿，晒干） 胡黄连三钱 瓜蒌根二钱 乌梅（去核）二钱 杏仁（浸去皮，焙）二钱 石莲子二钱

【用法】上为末，用猪胆汁浸糕糊为丸，如麻子大。每服十五丸，煎乌梅、姜蜜汤送下。

【功用】敛阴和脾。

【主治】小儿潮热往来，五心烦热，盗汗骨蒸，喘咳，痞而成痨者。

【方论选录】方中黄连、胡黄连拔骨蒸，瓜蒌根清胸膈之热，乌梅敛真阴，伏虫蠱，杏仁润心肺，以破坚结，石莲子理脾胃，以交心肾。

11188 莲子清心饮

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】石莲肉 麦冬 黄芩 地骨皮 人参 车前子 甘草 赤芍 黄耆

【主治】白浊。并治带下赤白，五心烦热。

【加减】如发热，加柴胡、薄荷；上盛下虚，加酒炒黄柏、知母。

11189 莲枣麦豆汤

【方源】方出《种福堂方》卷二，名见《医学实在易》卷五。

【组成】莲子七粒 黑枣七个 浮麦一合 马料豆一合

【用法】用水一大碗，煎八分，服三剂愈。

【主治】盗汗。

11190 莳萝散

【方源】方出《便易经验集》，名见《卫生鸿宝》卷三。

【组成】荞麦面四两 葫芦巴四两（酒浸，晒燥，勿炒） 莳萝一两（炒，即小茴香）

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服一钱，空心盐汤送下。服至一月，大便必有湿热之物如脓者泄出。

【主治】小肠疝气。

【备考】本方方名，据剂型当作“莳萝丸”。

11191 莴苣饮

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【异名】莴苣子粥（《药粥疗法》）。

【组成】莴苣子一合（淘） 糯米 粳米各半合（淘）

【用法】用甘草半两，煎汁一升，研前三味，滤去滓，分作三服。服之立下。

【功用】 补脾胃，通乳汁。

【主治】 产后乳汁不下。

【方论选录】《药粥疗法》：莴苣微苦，配合甘草以矫味，同米煮粥以增强补脾胃通乳汁之功效。

11192 莪术散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】 香附三两 当归（酒洗） 莪术（醋煨） 玄胡索 赤芍药 枳壳（麸炒） 熟地黄 青皮（去瓤） 白术（去芦） 黄芩各一两 三棱（醋煨） 小茴香（炒） 砂仁各八钱 干漆（炒尽烟） 红花各五钱 川芎八钱 甘草一钱

【用法】 上为细末。每服二钱，空心好米酒调服。

【功用】 逐去瘀血。

【主治】 妇人三十八九岁，经血断早，瘀血未尽，不时攻痛成疾，经水不行，腹中有块痛，头晕眼花，不思饮食。

11193 荷叶散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】 荷叶三分 延胡索三分

【用法】 上为散。水一大盏，煎至六分，去滓，入地黄汁二合，更煎三二沸，分二次温服，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：产后七日内，恶血不散，时时冲心，闷绝不识人。②《医略六书》：产后烦心，脉涩数者。

【宜忌】《济阴纲目》：忌肉食一日。

【方论选录】《医略六书》：产后血滞夹热，心包阳气不舒，故不能滋养心主而发烦不安焉。延胡化血滞以通心；生地滋心血以退热，荷叶升阳散瘀以和中也。为散，米饮煎，使血滞化而热自解，则心包之阳气发舒而心气清和，心神得养，何发烦之不瘁哉。

11194 荷叶散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】 干荷叶二两 鬼箭羽一两 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 蒲黄一两 刘寄奴一两

【用法】 上为散。每服三钱，以童子小便一中盏、生姜半分、生地黄一分，拍碎，同煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 产后恶露不下，腹中疼痛，心神烦闷。

【方论选录】《医略六书》：产后瘀血凝结挟热，而心神烦闷，恶露不行，故胁腹阵痛不已。荷叶升阳散瘀以除胁痛，鬼羽破血辟邪以止腹疼；刘寄奴通经破血，生蒲黄破瘀通经，桃仁泥破血润燥以开瘀结也。为散，大黄以涤之，生姜以温之；童便以降之，使瘀热消化，则结闷自开，而恶露无不下，何胁腹烦痛之不止哉。

【备考】《医略六书》无生地黄，有大黄三分。

11195 荷叶粥

【方源】《饮食治疗指南》。

【组成】 荷叶二张

【用法】 煎水后和粳米煮粥食。

【功用】 升清、消暑、化热、宽中、散瘀。

【主治】 ①《饮食治疗指南》：暑热、水肿、瘀血症。②《长寿药粥谱》：高血压病，高血脂症，肥胖症，以及夏天感受暑热，头昏脑胀，胸闷烦渴，小便短赤者。

【备考】《长寿药粥谱》本方用法：用荷叶煎汤同粳米二两、沙冰糖少许煮粥食。

11196 荷杏石甘汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 苏薄荷一钱 光杏仁三钱 石膏四钱 知母三钱 生甘草六分 细辛三分 鲜竹叶三十片

【主治】 伤寒愈后，伏热未尽，复感新邪，邪郁于内，其病复作，烦躁，头痛发热，恶风或恶寒，舌燥口渴，或兼咳嗽。

11197 莎草根丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】 莎草根（用猪胆炒令香） 草乌头（用净水浸，一半生，一半炒熟，去皮尖）各二两 威灵仙（去土） 蹄蹯花 刘寄奴各一分

【用法】 上为末，用乳香、没药各半两研入，醋煮面糊为丸，如梧桐子大，火煅自然铜，细研为衣。每服五丸，渐加至十丸，煨葱酒送下。

【主治】 风走注，循入经络疼痛，及腰膝苦痛。

11198 莨菪丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】 莨菪子二两（水淘去浮者，煮令芽出，晒干，炒令黑黄色） 干姜二两（炮裂，锉） 白矾二两（烧令汁尽）

【用法】 上为末，以醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，一日三次。

【主治】 久痢，肠滑不止，下肠垢，羸困。

11199 莼菜羹

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】 莼菜 鲫鱼（纸裹，炮令熟，研）各四两

【用法】 加橘皮、生姜、葱白煮羹。空腹食之。

【主治】 脾胃气弱，不下饮食，四肢无力，日渐羸瘦。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“鲫鱼羹”。

11200 莹珠膏

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】 猪脂油十两 白蜡三两（熔化离火，候温，入轻粉、樟冰各一两五钱）

【用法】 上为末，搅匀，俟稍凝，再入冰片末一钱，搅匀成膏，罐收听用。先用甘草、苦参各三钱，水煎洗净，贴膏。杖疮用荆川纸摊极薄贴之，热则易之，其疔瘀即散，疼痛立止。

【功用】 去腐、定痛、生肌。

【主治】 溃疡，并梅疮、杖疮、臁疮，下疳。

【加减】 杨梅疮，加红粉三钱；顽疮、乳癌，加银珠一两；臁疮，加水龙骨三钱，或龙骨四钱。

11201 莹肌如玉散

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 白丁香 白及 白牵牛 白蔹各一两 白芷七钱 当归梢 白蒺藜 升麻各五钱 白茯苓 楮实子各三钱 麻黄（去节）二钱 白附子 连翘各一钱五分 小椒一钱

【用法】 上为细末。用之如常。

【功用】 去垢腻，润泽肌肤。

【主治】 面有黡点或疮，痤痱，及粉刺，皮肤燥痒。

11202 莹肌如玉散

【方源】《卫生宝鉴》卷二十。

【组成】 楮实五两 白及（肥者）一两 升麻（内白者）半斤 甘松七钱 白丁香 连皮 砂仁各半两 糯米一升二合（末） 三赖子三钱 绿豆五两（另用绢罗子罗，一本用一升） 皂角三斤（水湿烧干，再入水中再烧干，去弦皮子，可得二斤半，为末，另用纱罗子罗）

【用法】 上为末，入糯米、绿豆、皂角末，一处搅匀。

【功用】 去垢腻，润泽肌肤。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：黡点粉刺。②《济阳纲目》：皮肤搔痒。

11203 盐汤

【方源】 方出《金匮》卷下，名见《三因》卷十。

【异名】 独圣散（《得效》卷六）、盐水饮（《玉案》卷四）。

【组成】 盐一升 水三升

【用法】 上二味，煮令盐消，分三次服。当吐出食便愈。

【主治】 宿食停滞不消，心腹胀痛，吐泻不得。①《金匮》：贪食，食多不消，心腹坚满痛。②《千金》：霍乱蛊毒，宿食不消，积冷，心腹烦满，鬼气。③《普济方》：病涉三因，或脏虚，或肠胃素实，忽然心腹胀满，疼刺疼痛，蛊毒烦悗，欲吐不吐，欲痢不痢，状若神灵所附，顷刻之间，便至闷绝。

11204 盐煎散

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】 川乌头四两（去皮、生用） 益智子（去皮）三两 青橘皮二两 白姜一两半（炮） 舶上茴香一两

【用法】 上为散。每服一大钱，入盐煎五分，热呷。

【主治】 小肠虚冷，小腹疼痛不可忍。

11205 盐煎散

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）。

【组成】 草果仁（去皮，煨） 缩砂（去壳，取仁） 槟榔（炮，锉） 厚朴（去粗皮） 肉豆蔻（煨） 羌活（去芦） 苍术（米泔浸二宿） 陈皮（去白） 荜澄茄 枳壳（去瓤，麸炒） 良姜（油炒） 茯苓（去皮） 大麦芽（炒） 茴香（炒） 川芎（洗，锉） 甘草（煨）各二两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏半，入盐一字，同煎至八分，空心、食前服之。

【主治】 男子、妇人一切冷气，攻冲胸胁，及前后心连背膂疼痛，转项拘急；或脾胃虚冷，不思饮食，时发呕吐，霍乱转筋，脐腹冷疼，泄泻不止，及膀胱成阵刺痛，小肠气吊，内外肾疼；又治妇人血气刺痛，血积血瘕，绕脐撮痛。

11206 盐煎散

【方源】《局方》卷三（续添诸局经验秘方）。

【组成】 良姜（炒） 苍术（去皮）各十二两 缩砂（去皮） 茴香（炒）各五两 肉桂（去粗皮，不见火） 丁皮各二两 橘红十两 甘草（炒）六两 青皮（去白）四两 山药半斤

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏半，入盐一字，煎至八分，空心食前服。

【主治】 男子、妇人一切冷气，攻冲胸胁，及前后心连背膂疼痛，转项拘急；或脾胃虚冷，不思饮食，时发呕吐，霍乱转筋，脐腹冷疼，泄泻不止；及膀胱成阵刺痛，小肠气吊，内外肾疼；又治妇人血气刺痛，血积血瘕，绕脐撮痛。

11207 盐煎散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】当归 川芎 芍药 三棱 莪术 青皮 枳壳 茯苓 厚朴 神曲 麦芽 小茴 木香各等分

【用法】每服四钱，葱白一根，食盐少许，水煎服。

【主治】男妇形寒饮冷，胸胁心腹疞痛，及膀胱小肠气痛。

【加减】冷痛，加官桂。

11208 盐煎散

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】槟榔一两半 厚朴一两半（制） 草果一两（炒） 良姜一两 澄茄一两 甘草五钱 青皮一两半 陈皮一两半 葛根一两半

【用法】上为散。每服三钱，入盐少许，煎服。

【功用】温中破滞。

【主治】冷气攻冲，胸腹刺痛，脉沉者。

【方论选录】《医略六书》：澄茄温中散冷，良姜暖胃驱寒，槟榔破滞气，厚朴除腹满，草果散寒消滞，甘草和胃缓中，青皮破气平肝，陈皮利气调胃，葛根升阳开胃，入盐润下以降逆也。俾逆气平而肝胃调，则清气升而浊气降，其胸腹冷气无不散，攻冲胸腹无不平，何刺痛之不瘳哉。此温中破滞之剂，为冷冲胸腹刺痛之专方。

11209 耆陈汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】黄耆 赤芍 茵陈各一钱 石膏二钱 麦门冬 豆豉各五分

【用法】姜煎，温服。

【主治】黄汗。

【备考】《杂病源流犀烛》有甘草。

11210 耆附汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】附子二钱（炮，去皮脐） 黄耆一钱（盐水或蜜拌，炙）

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，枣子一枚，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】阳虚盗汗、自汗。

①《魏氏家藏方》：盗汗。②《医方类聚》引《济生续方》：气虚阳弱，虚汗不止，肢体倦怠。③《济阳纲目》：阳气虚脱，恶寒自汗，或口噤痰涌，四肢逆冷，或吐泻腹痛，饮食不入，及一切虚寒等证。

11211 耆附汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】人参 茯神各三钱 白术 黄耆各五钱 附子二分

【用法】水煎服。

【功用】补气消痰。

【主治】气虚不能化痰，痰聚于胸中，气不能通于手足，而觉手足麻木，无口眼喎斜。

11212 恶实散

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】恶实（炒） 乌梅（去核）各半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】上为散。每服三钱匕，童便一盏，煎至三五沸，和滓乘热含漱，冷吐，一日三次。

【主治】唇肿生核。

11213 栗子粥

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】栗子 粳米

【用法】煮粥食之。

【功效】①《本草纲目》：补肾气，益腰脚。②《济众新编》：益气，厚肠胃。

【主治】①《济众新编》：一切风头风旋，手战，筋惕肉瞤，恶心厌食，气虚嘈杂，风痹麻木不仁，偏枯。②《长寿药粥谱》：老年肾虚，腰酸腰痛，腿脚乏力，脾虚泄泻。

【备考】《济众新编》本方用法：黄栗细米不拘多少，和水煮，入碎米心或米泔心煮粥。和蜜服。

11214 栗树叶洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】鲜板栗树叶 250 克 生甘草 31 克 雄黄粉 15 克 铁锈粉 31 克。

【用法】水煎，外洗。

【主治】漆性皮炎。

11215 速效散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 栀子 连翘 薄荷 荆芥穗 柴胡 归尾 生地黄 地骨皮 天花粉 甘菊花 蔓荆子 牛蒡子 白蒺藜 草决明 枳壳 甘草

【用法】上锉。水煎，食后服。

【功用】《杂病源流犀烛》：疏肝清热。

【主治】眼疾。

【加减】如大眦头红肉堆起，乃心经实热，宜清心补肾，加黄连、生地黄，减菊花、牛蒡子；小眦头红丝血胀，乃心经虚热，宜补心补肾，加茯苓、莲肉，减荆芥、蔓荆子；大乌睛上有红白翳障，乃

肝经病，宜清肝补肾，加柴胡、连翘；白珠上死血红，加地骨皮、天花粉，减薄荷；若白珠有红筋翳膜，清肺为主，加羚羊角为君；上睑胞肿如桃，此脾经病，泻脾，加砂仁、连翘，减草决明、天花粉；日夜疼痛，加防己、玄参、火眼后昏暗，加柴胡、游草。

11216 赶经汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】 人参 白术 归身各一钱 川芎五分 熟地八分 白芍六分 香附六分 肉桂四分 炙草四分

【主治】 妇人素体脾虚，血不化生所致的月经后期。

11217 赶痛汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 乳香 没药 地龙（酒炒） 香附（童便浸） 桃仁 红花 甘草节 牛膝（酒浸） 当归 羌活 五灵脂（酒淘去土）

【用法】 上锉。水煎，温服。

【主治】 瘀血湿痰，蓄于肢节之间，筋骨之会，空窍之所，而作痛也。肢节沉重者，是湿痰，晚间病重者，瘀血也。

11218 起右汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】 陈皮 半夏 南星 茯苓 甘草 人参 白术 乌药 羌活 秦艽 桂皮 酒芩 酒柏 防风 白芷

【用法】 上水一盏半，加生姜五片，煎服。

【主治】 中风，换右者，气虚痰盛，言语謇涩。

【加减】 肥白人，加熟附子三分；言语难，加菖蒲、桔梗；手足不遂，加威灵仙、续断；血少，加川芎、当归；足肿，加防己；大便燥，常服搜风顺气丸。

11219 起左汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】 乌药（童便煮）一钱 桔梗 枳壳（炒） 秦艽 橘红 生地各八分 半夏（姜炒） 白茯苓 黄芩（酒炒）各一钱 当归（酒洗） 芍药（酒炒） 羌活 川芎各七分 甘草（炙） 枳实（去穰，炒）各五分 细辛二分 南星（炮）八分

【用法】 上水一盏半，加生姜五片，煎服。

【主治】 中风，气厥、痰厥、血虚，瘫左者。

【加减】 心神不宁，加茯神、远志、归身。

11220 起阳汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】 炮附 皂角各 钱（酥炙，去皮弦） 干姜（炒） 甘草各二分半 麝香 分

【用法】 水煎服。

【主治】 寒证，阳物缩入腹内。

11221 起阴汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 人参五钱 白术 两 巴戟天一两 黄耆五钱 北五味子一钱 熟地二两 肉桂一钱 远志 钱 柏子仁一钱 山茱萸三钱

【用法】 水煎服。连服四剂而阳举矣，再服四剂而阳旺矣，再服四剂必能久战不败；苟长服至三月，如另换一人，不啻重坚一番骨，再造一人身也。

【功用】 大补心肾之气。

【主治】 心气不足之阴痿。交感之时，忽然阴痿不举。

11222 起枕汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 当归三钱 赤芍一钱半 官桂一钱半 蒲黄一钱半 五灵脂三钱 白芷一钱半 丹皮一钱半 炙草一钱半

【用法】 水煎，去滓，入童便一杯，温服。

【主治】 产后冲任受风，波及阳明，而瘀血凝结，故恶露不下，脐腹作痛，脉浮滞涩者。

【方论选录】 当归养血活血脉，赤芍破血泻血滞，生蒲黄破瘀通经脉，五灵脂破瘀降浊阴，官桂温经通闭，白芷升阳散风，丹皮凉血散瘀，炙草缓中益胃也。水煎入童便温服，使风邪外解，则瘀结内消，而恶露无不下，何脐腹作痛之不止哉。

11223 起迷丹

【方源】《傅青主男女科·男科》卷下。

【组成】 人参 半夏各五钱 菖蒲二钱 菟丝子一两 茯苓三钱 皂荚 生姜各 钱 甘草三分

【用法】 水煎服。

【功用】 攻痰而开心窍。

【主治】 素有痰气，忽然发厥，闭目撒手，喉中有声，有一日死者，有二三日死者。

11224 起痔汤

【方源】《外科正宗》卷八。

【异名】 落痔汤（《张氏医通》卷十四）。

【组成】 黄连 黄柏 黄芩 大黄 防风 荆芥 栀子 槐角 苦参 甘草各 两 朴消五钱

【用法】 上药分作三次，用水煎洗。待痔落之后，换搽生肌散。

【主治】 诸痔上枯药之后，黑色坚硬，裂缝者。

11225 起睫汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】白术9克 茯苓6克 甘草3克 当归 白芍各9克 蔓荆子 防风各3克

【功用】培土生金，养血舒筋，少佐除风。

【主治】倒睫拳毛。

【方论选录】方中白术、茯苓、甘草健脾以培土生金。当归、白芍养血以舒筋，白芍配甘草敛阴和营，缓解挛急。蔓荆子、防风疏散风邪，且无伤阴之弊，并能助白芍、甘草解散挛急。

【临证举例】倒睫生翳邢某某，男，72岁。初诊：二目下胞睫毛倒入年余，刺痛流泪，羞明难睁，右目视物不真。检查：双目下胞皮宽弦紧，睫毛倒入，右重左轻，右目白睛红赤，青睛下方生翳，此为倒睫生翳。治以起睫汤加黄芩、木贼各6克，服药6剂。复诊：皮宽稍轻，倒睫部分已起。右目白睛有少量赤丝，云翳渐退。又服上方6剂。三诊：左目下睑稍有宽纵，还有数根倒睫没起；右目睫毛仍大部倒入，白睛稍赤，云翳甚微。以前方去黄芩、木贼又服24剂。二年后，因他事来本院，左目倒睫已愈，右目还有数根没起。嘱其用生姜3片、红糖1撮，浸水喝，每日一次。

11226 起睫膏

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】木鳖子（去壳）一钱 自然铜五分（制）

【用法】上捣烂，为条子。搐鼻；又以石燕末，入片脑少许，研水调敷眼弦上。

【主治】《审视瑶函》：倒睫拳毛。

11227 起痿丹

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】菟丝子（酒洗、煨，烂捣饼，晒干）二两五钱 肉苁蓉（酒浸）二两 川萆薢 破故纸（酒炒） 胡芦巴（酒炒） 沙苑蒺藜（微炒） 川牛膝（去皮，酒洗） 川杜仲（酒炒） 防风（酒洗） 甘枸杞子各二两

【用法】上为末，酒煮猪腰子，捣烂为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心酒送下。

【主治】肾气虚惫，腰膝痿痛，行步无力。

11228 起痿汤

【方源】《衷中参西》中册。

【组成】生箭耆四钱 生赭石六钱（轧细） 怀牛膝六钱 天花粉六钱 玄参五钱 柏子仁四钱 生杭芍四钱 生明没药三钱 生明乳香三钱 䗪虫四枚（大者） 制马钱子末二分

【用法】将前十味煎汤，送服马钱子末；至煎滓再服时，亦送服马钱子末二分。徐服此药，久自能愈。

【主治】因脑部充血以致肢体痿废，迨脑充血治愈，脉象和平，而肢体仍痿废者。

11229 起阳至神丹

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】熟地半两 山茱萸四钱 远志一钱 巴戟天一钱 肉苁蓉一钱 肉桂二钱 人参三钱 枸杞子三钱 茯神三钱 杜仲一钱 白术五钱

【用法】水煎服。

【主治】过于琢削，日泄其肾中之水，而肾中之火亦日消亡，致痿而不振者。

【方论选录】此方用热药于补水之中，则火起而不愁炎烧之祸，自然煮汤可饮，煮米可餐。断不致焦釜沸干，或虞爆碎也，此皆男治之法也。

11230 起痿延生丹

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】麦冬五钱 百部五分 款冬花五分 白薇五分 生甘草一钱 天门冬一钱 生地一钱 天花粉一钱 桔梗一钱 玄参三钱 山豆根三分

【用法】水煎服。

【主治】肺痿损伤，焦瘦气促。

11231 顾步汤

【方源】《辨证录》卷十三。

【异名】顾步保脱汤（《中国医学大辞典》）。

【组成】牛膝一两 金钗石斛一两 人参三钱 黄耆一两 当归一两 金银花三两

【用法】水煎服。一剂而黑色解，二剂而疼痛止，三剂全愈。若已溃烂，多服数剂，无不愈也。

【功用】大补气血，泄毒。

【主治】脚疽。因气血大亏，不能遍行经络，火毒恶邪，固结于骨节之际，以致脚趾头忽先发痒，已而作痛，指甲现黑色，第二日脚指俱黑，第三日连足而俱黑，黑至脚上胫骨即死；及无名肿毒。

【方论选录】此方用金银花以解毒，非用牛膝、石斛不能直达于足趾，非用人参、归、耆亦不能流通气血而散毒也。故用此方治脚疽多效。

11232 破血汤

【方源】《保命歌括》卷三十二。

【组成】桃仁（去皮尖，研） 红花（酒洗） 川芎 香附（童便浸） 青皮各等分

【用法】上㕮咀。水煎服。

【功用】破血行气。

【主治】瘀血所致的胁痛。

11233 破血汤

【方源】《眼科纂要》卷下。

【组成】刘寄奴 红花 生地 赤芍 菊花 苏木 丹皮 桔梗 生甘草

【功用】《古今名方》：清热凉血、活血化瘀。

【主治】眼目击伤，红肿，凝血疼痛。

【加减】如出血，加血竭；肿甚、加赤小豆；祛翳，加海螵蛸、桑皮、草决明等。

【临证举例】目外伤，永邑卢龄长左目被物击伤，红肿而不能开视。用生番椒叶捣黄糖贴之，一眼目开痛止，又用破血汤二剂全安。

11234 破阴丹

【方源】《本事》卷八。

【组成】硫黄（舶上者） 水银各一两 陈皮（去白） 青皮（去白）各半两（为末）

【用法】先将硫黄铫子内熔，次下水银，用铁杖子打匀，令无星，倾入黑茶盏内研细，入二味匀研，用厚面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸。如烦躁，冷盐汤送下；如阴证，冷艾汤送下。

【主治】①《本事》：伤寒时疫；阴中伏阳。②《通俗伤寒论》：伏阳伤寒，身虽大寒，反不欲近衣，胸满恶心，头痛脊疼，指末虽冷而内热烦躁，舌苔绛底浮白，甚或嫩红胖大。

【方论选录】《本事方释义》：硫黄气味辛大热，入命门；水银气味辛寒，能行九窍，伏五金为泥；陈皮气味苦辛微温，入手足太阴；青皮气味辛酸平，入足少阳、厥阴；厚面糊丸，缓其药性也。此阴中伏阳之证，冷热皆在难投，故以冷汤送药，排达直入，则所伏之阳得透，自必汗出而解矣。

【临证举例】伏阳伤寒 乡人李信道得疾，六脉沉不见，深按至骨，则沉紧有力，头疼，身温烦躁，指末皆冷，中满恶心。更两医矣，医者不识，只供调气药。予因诊视曰，此阴中伏阳也，仲景法中无此证，世人患此者多，若用热药以助之，则为阴邪隔绝，不能导引真阳，反生客热，用冷药，则所伏真火愈见消铄，须用破散阴气，导达真火之药，使火升水降，然后得汗而解。予授此药二百粒，作一服，冷盐汤下。不半时，烦躁狂热，手足躁扰，其家大惊。予曰，此俗所谓换阳也。须臾稍定，略睡已得汗，自昏达旦方止，身凉而病除。

11235 破饮丸

【方源】《局方》卷四（淳祐新添方）。

【组成】旋覆花八两 白术 斤一两 肉桂（去粗皮） 干姜（炮）各六两 赤茯苓（去皮）七两 枳实（麸炒）二两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，熟水送下。

【主治】一切停饮不散，时呕痰沫，头眩欲倒，膈脘不快。

11236 破郁丹

【方源】《回春》卷二。

【组成】香附米（醋煮）四两 栀子仁（炒）四两 黄连（姜汁炒）二两 枳实（麸炒）二两 槟榔一两 莪术一两 青皮（去瓤）一两 瓜蒌仁一两 苏子一两

【用法】上为末，水为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后滚水送下。

【主治】妇人嗳气胸紧，连十余声不尽，嗳出气心头略宽，不嗳即紧。

【备考】本方改为汤剂，名“破郁汤”（见《嵩崖尊生》三濮堂本）、“解郁汤”（《见嵩崖尊生》锦章书局本）。

11237 破结丸

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】琥珀 玄胡索 降香 五灵脂 莪术 牛膝各五钱 桃仁 归尾各一两 肉桂心 血竭各三钱

【主治】妇人过食生冷酸涩而经闭者。

【备考】《中国医学大辞典》本方用法：上为细末，滴水为丸，熟汤送下。

11238 破结散

【方源】方出《千金》卷二十四，名见《三因》卷十五。

【异名】破血散（《秘传外科方》）。

【组成】海藻 龙胆 海蛤 通草 昆布 礬石（一作矾石） 松萝各三分 麦曲四分 半夏二分

【用法】上为细末。每服方寸匕，酒送下，一日三次。十日知，二十日愈。

【主治】石瘿、气瘿、劳瘿、土瘿、忧瘿等。

【宜忌】禁食鱼、猪肉、五辛、生菜、诸难消之物。

【临证举例】瘰疬 《医学正传》：有人于项上生疬，大如茄子，潮热不食，形瘦日久，百方不效，后得此方，去松萝，加真桑寄生一倍服。三五日后，其疮软面散，热退而愈。屡医数人皆效。

【备考】《秘传外科方》有贝母（去心）三分。改为丸剂，名“海藻散坚丸”（见《医学入门》卷八），蜜为丸，如绿豆大。每服三十丸，临卧葱白煎汤送下，并含化咽之。

11239 破积散

【方源】《回春》卷五。

【组成】 香附米四两（醋浸煮干） 栀子仁（炒黑）二两 三棱 莪术 郁金 枳壳 黄连 大黄各一两

【用法】 上为细末，水为丸，如梧桐子大。每服三十丸，淡姜汤送下。

【主治】 心气痛，食积肚腹痛，饮热积块痛，症属实热者。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“破积丸”。

11240 破棺丹

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【异名】 破棺急救丹（《外科启玄》卷十一）、破棺丸（《痘疹仁端录》卷十）。

【组成】 大黄二两（半生半熟） 芒消 甘草各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服半丸，食后茶清、温酒任化下，童便半盏研化服亦得。

【主治】 诸热疮肿，疮气入腹，谵语发狂。

①《卫生宝鉴》：疮肿，一切风热。②《准绳·疡医》：疮气入腹，危者。③《外科理例》：疮肿热极，汗多大渴，便秘，谵语或发狂，结阳之证。

【宜忌】 忌冷水。

11241 破瘀汤

【方源】 方出《千金》卷二十五，名见《伤科汇纂》卷八。

【组成】 荆芥半分 䗪虫三十枚 大黄 川芎各三两 蒲黄五两 当归 桂心 甘草各二两 桃仁三十枚

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三次服。

【主治】 腹中瘀血痛，瘀在腹中不出，满痛短气，大小便不通。

11242 破瘀汤

【方源】《四圣心源》卷四。

【组成】 甘草三钱 茯苓三钱 丹皮三钱 桂枝三钱 丹参三钱 桃仁三钱（泡，去皮尖） 干姜三钱 首乌三钱（蒸）

【用法】 水煎大半杯，温服。

【主治】 肝血瘀滞，肌肤枯槁，目眦青黑者。

11243 破血金丹

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】 香附十两（醋制） 艾叶四两（焙干） 当归二两（酒浸一宿，醋煮，焙干） 红花一两（焙干） 桃仁一两（去皮尖）

【用法】 上为末，醋糊为丸。每服二钱，淡醋汤送下，早、晚各服一次。经通药止。

【主治】 妇女月经不通，腹痛有块者。

11244 破滞气汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 木香化滞散（原书同卷）、木香化滞汤（《赤水玄珠》卷五）。

【组成】 炙甘草四分 白檀 藿香 陈皮 大腹子 白豆蔻仁 白茯苓 桔梗各五分 砂仁 人参 青皮 槟榔 木香 姜黄 白术各二钱

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【功用】 破滞气。

【主治】 心腹满闷。

【宜忌】《准绳·杂病》：忌生冷硬物。

11245 破血红花散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 当归梢 川芎 赤芍药 枳壳 苏叶 连翘 黄连 黄耆 栀子 大黄 苏木 红花 白芷 薄荷 升麻各等分

【用法】 水煎，加酒三盏，温服。

【主治】 心热血旺，血翳包睛，痛者。

11246 破血明目汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 生地18克 赤芍 当归尾 刘寄奴各9克 苏木6克 茜草9克 血竭6克 益母草9克

【功用】 祛瘀通络。

【主治】 由外伤而致之血灌瞳神。

【加减】 痛甚者，加没药6克以活瘀止痛；眼眶青肿者，加大黄9克以逐瘀消肿。

【方论选录】 方中生地、赤芍、当归尾活血凉血；刘寄奴、苏木、血竭活血祛瘀；茜草止血活血；益母草去瘀生新。

【临证举例】 血灌瞳神崔某，女，38岁。初诊：10天前被土块打伤右眼，现已不痛，稍有胀感，满目红光，不能见物。检查：白睛淡赤，青睛内面下方有少量积血，瞳神散大，呈一片鲜红，仅辨明暗，不辨人物。眼底不能窥见。此为血灌瞳神，治以破血明目汤加香附9克。服药15剂。复诊：青睛下方积血已尽，瞳神稍有缩小，色转暗红。上方再服十剂，视力：右眼达0.08，左眼1.5。给明目地黄丸常服。

11247 破血散疼汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 破血散痛汤(《东垣试效方》卷六)、破血散(《玉机微义》卷四十三)。

【组成】 羌活 防风 中桂各一钱 苏木一钱五分 连翘 当归梢 柴胡各二钱 水蛭二钱(炒去烟尽,别研) 麝香少许(别研)

【用法】 分二次服,每服酒二大盏,水一大盏,除水蛭、麝香另研如泥,煎余药作一大盏,去滓,上火令稍热,调二味,空心服之。

【主治】 乘马损伤,跌其脊骨,恶血流于胁下,其痛苦楚,不能转侧,妨于饮食。

【备考】 本方方名,《准绳·疡医》引作"破血消痛汤"。

11248 破血散聚汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】 桃仁 红花 归尾 牛膝各一钱 三棱 莪术各二钱 苏木 木通 官桂 青皮 穿山甲各八分

【用法】 酒煎,空心服。

【主治】 血臌肿胀,坚硬如石,朝宽暮急,脐凸发喘。

11249 破证夺命丹

【方源】《百一》卷七。

【异名】 人参汤(《直指》卷二十六)、破证夺命散、独参汤、独柱汤(《内经拾遗》卷一)、夺命独参汤(《普济方》卷一三三引《德生堂方》)、破证夺命汤(《普济方》卷一三五)、坏证夺命散(《丹溪心法附余》卷一)、夺命散(《医统》卷七十六)。

【组成】 人参一两(去芦,薄切)

【用法】 水一大升,银石器内煎至一盏,以新水沉之,取冷一服而尽。汗不自它出,只在鼻梁尖上,涓涓如水,是其应也。

【功用】 《中医大辞典·方剂分册》:益气固脱。

【主治】 伤寒坏证,元气大亏,阳气暴脱,喘息脉微,吐血咯血等。

①《百一》:伤寒阴阳二症不明,或投药错误致患人困重垂死,七八日以后皆可服。②《直指》:吐血咯血。③《内经拾遗》:气虚喘急。④《中医大辞典·方剂分册》:元气大亏,阳气暴脱,面色苍白,神情淡漠,肢冷汗出,脉息微弱;近代也用于大出血,创伤性休克,心力衰竭等重症的抢救。

【临证举例】 时疫坏证申某之子妇,产后病时疫已二十余日,已成坏证,偶见闻,因劝其只服一味人参遂安。

【备考】 ①本方方名,《本草纲目》引作"复脉汤"。②《内经拾遗》本方用法:水二钟,红枣十个,煎八分,食后温服。

11250 破积导饮丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十四

【异名】 破积导引丸(《医统》卷三十二)。

【组成】 槟榔 陈皮(去白) 广木香 青皮(去白) 枳壳(麸炒) 枳实(麸炒) 广茂(炮) 半夏(泡七次) 京三棱(泡) 神曲(炒) 麦芽(炒) 干生姜 茯苓(去皮) 甘草(炙) 泽泻各五钱 牵牛(头末)二钱 巴豆三个(去心膜,取霜)

【用法】 上为末,入巴豆匀,生姜汁打糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前温姜汤送下。

【主治】 积块坚硬,饮食不消,心下痞闷。

【备考】《理瀹》无茯苓、枳实,有黄连、车前子。

11251 夏枯草汤

【方源】《增补内经拾遗》卷四引《经验良方》。

【异名】 夏枯草散(《医学入门》卷八)。

【组成】 夏枯草六两

【用法】 上作一服。水二钟,煎七分,食远温服;虚甚当浓煎膏服,并涂患处。

【功用】《全国中药成药处方集》(天津方):化瘀止痛,解热散结。

【主治】 ①《增补内经拾遗》引《经验良方》:瘰疬马刀、不问已溃未溃,或日久成漏。②《良朋汇集》:痈疽发背,无名肿毒。

【备考】 本方改作膏剂,名"夏枯草膏"(见《医学入门》),又名"夏枯膏"(见《良朋汇集》)。《良朋汇集》本方用法:茎叶捣烂,取汁熬膏,贴之;破者,白滚水调服二三茶匙。

11252 夏枯草汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 夏枯草散(《一盘珠》卷五)。

【组成】 夏枯草二钱 当归三钱 白术 茯苓 桔梗 陈皮 生地 柴胡 甘草 贝母 香附 白芍各一钱 白芷 红花各三分

【用法】 先用夏枯草,水三碗,煎至二碗,滤清,同药煎至八分,食后服;将药滓同前夏枯草滓,共再煎六七分,临卧时入酒半小钟和服。

【主治】 瘰疬马刀,不问已溃未溃,或已溃日久成漏,形体消瘦,饮食不甘,寒热如疟,渐成痨瘵。

【宜忌】 宜食淡味物件。

11253 夏枯草汤

【方源】《古今医衡》卷二

【组成】 夏枯草二钱 玄参 黄芩 土贝母 金银花 连翘 天花粉 薄荷 桔梗各一钱 甘草节三分

【用法】 灯心一握，水煎。

【主治】 瘰疬。

【加减】 郁怒，加香附、柴胡、钩藤、远志；血虚，加当归、白芍；血热，加生地、牡丹皮。

11254 夏枯草膏

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】 京夏枯草一斤半 当归 白芍（酒炒） 黑参 乌药 浙贝母（去心） 僵蚕（炒）各五钱 昆布 桔梗 陈皮 抚芎 甘草各三钱 香附（酒炒）一两 红花二钱

【用法】 上药共入砂锅内，水煎浓汤，布滤去滓，将汤复入砂锅内，慢火熬浓，加红蜜八两，再熬成膏，瓷罐收贮。每用一二匙，滚水冲服；亦可用薄纸摊贴。

【功用】 化硬消坚。

【主治】 ①《金鉴》：男妇小儿，忧思气郁，肝旺血燥，瘰疬坚硬。②《全国中药成药处方集》（杭州方）：瘿瘤坚硬，结核肿痛，痈疖肿毒，目珠夜痛等症。

【宜忌】 戒气怒、鱼腥。

11255 夏陈六君汤

【方源】《镜京直指》。

【组成】 西潞党三钱 江西术二钱（炒） 白茯苓二钱 仙半夏二钱 橘红八分 炙甘草四分 怀山药三钱 炒枣仁三钱 生苡仁六钱 老姜二片（去皮） 大枣三个（擘）

【主治】 劳倦伤中，脾虚咳嗽，饮食不强，痰薄易出。

11256 逐风汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生箭蓄六钱 当归四钱 羌活二钱 独活二钱 全蝎二钱 全蜈蚣（大者）两条

【主治】 中风抽掣及破伤后受风抽掣者。

【临证举例】 狂犬病曾治一媪，年六旬，其腿为狗咬破受风，周身抽掣。延一老医调治，服药十余日，抽掣愈甚。所用之药，每剂中皆有全蝎数钱，佐以祛风、活血、助气之药，仿佛此汤而独未用蜈蚣。遂为拟此汤，服一剂而抽掣即止，又服一剂，永不反复。

11257 逐水散

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】 生章陆 赤豆各二两 鲫鱼三个

【用法】 三味实鱼腹中，以麻线缚之，水三升，煮赤豆烂，去鱼，只取二物，空腹中食之，以鱼汁送下。不汗利即愈。甚者，过二日再作之，不过三剂。

【功用】 消肿满。

11258 逐虫丹

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 白薇 茯苓各三钱 雷丸 甘草 槟榔各一钱 黄连五分 使君子十个 乌梅一个

【用法】 水煎服。

【主治】 腹内生虫，腹痛，得食则减，遇饥则甚，面黄体瘦，日加困顿者。

11259 逐虚汤

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】 白术五钱 防风五分 黄耆五钱 人参二钱 陈皮五分 甘草一钱 桂枝五分

【用法】 水煎服。

【主治】 气虚而中风湿，手麻木。

【方论选录】 方中黄耆、人参、白术，俱补气去湿之药，防风乃去风之品，然必得桂枝始能入子手经也。经络既清，自能奏功。

11260 逐瘀汤

【方源】《傅青主男女科·男科》卷上。

【组成】 水蛭（炒黄，为末） 雷丸 红花 枳壳 白芍 牛膝各三钱 当归二两 桃仁四十粒

【用法】 水煎服。服一剂血尽者，可改服四物汤调理，于补血内加白术、茯苓、人参，补元气而利水。

【主治】 或因跌闪而瘀血不散，或郁忧而结血不行，或风邪而蓄血不散，留在腹中致成血臌，腹胀如臌，而四肢手足并无臌意。

11261 逐瘀汤

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】 刘寄奴二钱 茜根一钱 王不留行一钱五分 漆渣八分（可炒尽烟） 归尾三钱 赤芍二钱 生地三钱 桃仁七粒 红花一钱 紫草一钱 楂肉一钱五分 青皮一钱 苏木一钱五分

【用法】 水煎，酒兑服。

【主治】 瘀血气滞腹痛。

11262 逐瘀饮

【方源】《观聚方要补》卷九。

【组成】 冬葵子一钱 红花八分 滑石 桃仁 牛膝 延胡索各六分 牡丹皮 木香各四分

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人血水壅遏，遍身洪肿。

11263 逐痰丸

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】 陈皮（去白） 半夏（热水泡七次） 南星（热水泡七次） 香附子（去毛）各一两

【用法】 用白矾一两，热水溶化，煮四味，后用牙皂一两煎水，打米糊为丸。不拘多少，空心姜汤送下。

【主治】 梅核气。因积热生痰后，痰积如核在喉中，吞之则不下，吞则在喉，但可以进水，不可以进饮食。

11264 逐呆仙丹

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】 人参一两 白术二两 茯神三两 半夏五钱 白芥子一两 附子五分 白薇二钱 菟丝子一两 丹砂三钱（研末）

【用法】 先将各药煎汤，调朱砂末，与半碗服。如患者不肯服，以炭烙之，欣然服矣；又烙之，又服半碗，然后听其自便。患者必倦怠欲卧，乘其睡熟，将其衣服被褥尽行火化，单留身上所着之衣，另用新被盖之，切不可惊醒。此一睡有睡至数日者，醒来必觅衣而衣无，觅被而被非故物，患者必大哭，然后又以前药与一剂，必不肯服，即烙之炭亦断不肯，不妨以鞭责之，动其怒气，用有力之人将前药执而灌之，彼必大怒，已而又睡。此时断须预备新鲜衣服被褥等项，俟其半日即醒，彼见满房皆是亲人，心中恍然如悟，必又大哭不已，诸人当以好言劝之，彼必说出鬼神之事，亲人说幸有某人治疗，已将鬼神尽行祛遣，不必再虑，听之欣然而病亦全愈。

【主治】 呆病如痴，默默不言，悠悠如失，意欲癫而不能，心欲狂而不敢；有时睡数日不醒，有时坐数日不眠；有时将他人物件深深藏掩；与人言则无语而神游，背人言则低声而泣诉；与之食，则厌薄而不吞；不与食，则吞炭而若快，因胸膜之中有痰气所致。

【方论选录】 此方妙在大补心脾，以茯神为君，使痰在心者尽祛之而出，其余之痰药，又得附子引之，无经不入，将遍身上下之痰，尽行祛入膀胱之中而消化。白薇、菟丝子皆是安神妙药，而丹砂镇魂定魄，实多奇功，所以用之而奏效也。

11265 逐风通痹汤

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】 生箭耆六钱 麻黄三钱 全当归五钱 丹参三钱 乳香三钱 没药三钱 全蝎二钱

【主治】 风袭肌肉经络，初则麻木不仁，渐至肢体关节不利。

【加减】 脉象迟弱无力，恶寒者，将黄耆重用一两，再照加乌头二三钱；脉象有力，恶热者，以薄荷易麻黄，再加天花粉一两。初服以遍体皆得微汗为佳；至汗后再服，宜将麻黄减半，或只用一钱；筋骨软弱者，加明天麻三钱；口眼歪斜者，加蜈蚣二条，其病剧者，可加三条。

【方论选录】 方中以黄耆为主药，取其能升补胸中大气以通于卫气，自能逐风外出。故《本经》谓：黄耆能主大风，而又以最善发表之麻黄辅之，一则扶正以祛邪，一则发汗以透邪，二药相济为用，其逐风之力虽猛，而实不至伤正气也；至于当归、丹参、乳、没、全蝎诸药，或活血以祛风，或通络以祛风，皆所以赞助黄耆、麻黄以成功也。至于病偏凉者加乌头，更将黄耆增重；病偏热者加花粉，更以薄荷易麻黄，此随病机之所宜，以细为调剂，不使服药后有觉凉觉热之龃龉也；筋骨软弱者加明天麻，取其能壮筋骨兼能祛风也；口眼歪邪者加蜈蚣，取其善理脑髓神经，而有牵正口眼之力也。

【临证举例】 半身不遂 曾治一人，夏月开轩当窗而寝，为风所袭，其左半身即觉麻木，肌肉渐形消瘦，左手足渐觉不遂，为拟此方。其病偏于左，又加鹿角胶二钱作引（若偏于右，宜用虎骨胶作引），一剂周身得汗，病愈强半，即方略为加减，又服二剂全愈。

11266 逐血补心汤

【方源】《准绳·女科》卷五。

【组成】 红花 赤芍药 生地黄 桔梗 苏叶 前胡 茯苓 防风 牛胆 南星 黄连 粉葛各一钱 当归三钱 薄荷 人参 升麻各一钱五分 半夏二钱五分 甘草一钱

【用法】 上为散，分作二服。每服水一钟半，生姜三片，煎至七分，空心服，滓再煎服。

【主治】 ①《准绳·女科》：产后失音不语。②《济阴纲目》：产后心肺二窍为血所侵，又感伤风，故失音不语。

【方论选录】《医略六书》：产后中风，痰热内滞，故心气闭塞，而心窍闭塞，令人不语焉。生地壮水以交心，黄连清热以燥湿，赤芍泻血滞，当归养心血，防风疏风邪之外袭，人参助心气之内虚，胆星豁痰以益肝胆，菖蒲开窍以通神明，生姜散痰涎，甘草和胃气也。水煎温服，使风邪外解，则痰热内消，而心窍自通，神机鼓舞，何不语之有哉。

11267 逐血破瘀汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 水蛭二至四钱 虻虫二至四钱 地龙三至五钱 䗪虫二至四钱 黑丑三至五钱 路路通五钱至一两 透骨草三至五钱 水红花子三至五钱 盘龙参三至五钱 紫草三至五钱

【功用】 活血破瘀，通经活络。

【主治】 深部栓塞性静脉炎（血痹），腹腔瘀血（血瘕），腹腔肿物（癥瘕）。

【加减】 寒凉重者，加紫油肉桂一至二钱。

【方论选录】 本方为活血汤方的重剂。方中水蛭、虻虫、地龙、䗪虫破血逐瘀；紫草、水红花子软坚理气化痰；黑丑峻下，可以清除陈旧的瘀滞；路路通、透骨草活血通络化瘀；盘龙参益气滋阴而扶正。本方祛邪扶正兼顾，但以祛邪为主。

11268 逐寒荡惊汤

【方源】《福幼编》。

【组成】 胡椒一钱（研） 炮姜一钱 肉桂一钱 丁香十粒（打）

【用法】 上四味，用灶心土三两，煮水澄极清，煎药大半茶杯，频频灌之。一二剂后呕吐渐止，即其验也。再服加味理中地黄汤。

【功用】 开寒痰，宽胸膈，止呕吐，荡惊邪，回元气。

【主治】 小儿气体本虚或久病不愈，或痘疹后，或误服凉药，泄泻呕吐，转为慢惊，清热败风，愈治愈危者。

【方论选录】 ①《卫生鸿宝》：凡因风热不退，及吐泻而成者，总属阴虚阳越，必成慢惊，非感寒可比，故不宜发散，治当培元固本，引火归元，先用辛热冲开寒痰，再进温补。用椒、姜者，补土所以敌木也。②《成方便读》：夫慢惊一证，无不皆从久虚而来。小儿为稚阳之体，元气未充，虚则生寒，以致生气日索，阴气日甚。斯时也，若仅以区区温补之剂，缓不济事。故以炮姜、肉桂、丁香等破阴回阳，以复下焦之生气；但寒痰之在上膈者，格拒汤药，呕不能下，故以胡椒之大辛大热者，冲开寒痰，而以伏龙肝散逆和中，自不致呕而不纳。药力直行中下，以建大功。

【临证举例】 慢惊 《衷中参西》：族侄荫霖六岁时，曾患此证。饮食下咽，胸膈格拒，须臾吐出。如此数日，昏睡鼾睛，身渐发热。投以逐寒荡惊汤原方，尽剂未吐。欲接服加味理中地黄汤，其吐又作。恍悟此药取之乡间小药坊，其胡椒必陈。且只用一钱，其力亦小。遂于食料铺中，买胡椒二钱，炮姜、肉桂、丁香，仍按原方，煎服一剂，而寒痰开豁，可以受食。继服加味理中地黄汤，一剂而愈。

11269 逐瘀化痰汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】 桃仁泥四钱 粉丹皮三钱 当归三钱 川芎二钱 半夏三钱 胆星三钱 青礞石二钱 天竺黄五分 大白三钱 陈皮一钱半 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 胞轮跳动症。两眼不赤不疼，跳动不安，常觉心乱，目胀头晕。

11270 逐瘀夺命丹

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】 益母草 白芷 泽兰 甘草 冬葵子 生地 丹皮 干姜 官桂 当归 附子 赤芍 南星 苏木 牛膝

【主治】 产后儿已生，而胞衣不下，或儿生后，产母体疲，不能复用力，经停之间，外冷乘之，则血道阻涩或恶血流入胞中，衣为血所胀满，故胞衣不下也。

【方论选录】 是方姜、桂、附子辛热以逐瘀；苏本、归尾以行血；白芷、南星之燥，可以束胞中之水；冬葵、牛膝之滑利下行，可以使胞速下；益母、泽兰、芎、归、生地、丹皮、赤芍又能行血、养血、破血，胞中无瘀血填塞，则自下矣。

【临证举例】 ①不孕症 《陕西中医》（1986；10:453）：张某，女，32岁。1983年4月30日诊。婚后七年未曾受孕，症见经期小腹冷痛，先后不定期，经量少色紫，夹有血块，面色不华，头痛唇干，心悸气短，腰酸肢冷，白带淋漓，舌黯苔白，脉细涩。辨证为瘀阻胞宫，寒凝脉络，气血两虚，津不上承。治宜活血化瘀，温宫通络，养血滋阴，益气调经。予本方加减化裁。处方：泽兰、益母草、当归、苏本、牛膝、赤白芍、冬葵子、生熟地、党参各10克，白芷、官桂、制附片、干姜、丹皮、甘草各6克，三剂。药后白带减少，经期小腹冷痛好转，诸恙亦有减轻，效不更方，守原方继进五剂。三诊诸症愈其大半，仍嘱原方连服七剂。四诊诸恙悉除，按原方略具增损还服七剂，以资巩固，后即怀孕得子。②闭经《陕西中医》（1986；10:453）：范某，女，18岁。1984年7月15日诊。于田间农活时，月经适来，突遇雨淋，回家后即感全身不适，继而畏寒发热，经治已愈。但月经未潮已半年。妇检未孕，诊为闭经。症见小腹冷痛，白带较多，形若蛋清，纳谷不香，有时恶心，头痛腰酸，舌暗红，苔薄白，脉沉涩。证属寒凝经脉，瘀

滞胞宫。治应祛寒通经，逐瘀温宫。用本方化裁主治。处方：制附子、干姜、当归、泽兰、益母草、冬葵子、炒赤芍、苏木、川牛膝各10克，官桂、白芷、丹皮、制南星、甘草各6克，熟地20克，三剂。药后小腹冷痛轻，白带少，纳谷香，仍守原方连服五剂，闭经遂通。

11271 振中汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 于白术六钱（炒） 当归身二钱 陈皮二钱 厚朴一钱半 生明乳香一钱半 生明没药一钱半

【主治】 腿疼，腰疼，饮食减少者。

【方论选录】 此方重用白术以健补脾胃，脾胃健，则气化自然旁达。且白术主风寒湿痹，《神农本草经》原有明文。又辅以通活气血之药，不惟风寒湿痹开，而气血之痹而作疼者必自开也。

【临证举例】 腿疼 一室女腿疼，几不能步，治以拙拟健运汤而愈，次年旧病复发，又兼腿疼，再服前方不效，诊其脉，右关甚濡弱，询其饮食减少，为制此汤，数剂，饮食加多，二十剂后，腰疼腿疼皆愈。

11272 振阳汤

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】 鹿角霜二钱 淡苁蓉三钱 怀牛膝三钱 枸杞子三钱 远志肉六分 菟丝子三钱 茯神二钱 破故纸（炒）三钱 杜仲（炒）三钱 豨莶草二钱 大枣五枚

【主治】 阳痿。

【加减】 如禀赋不足者，加人参二钱；如色伤肾阳，相火不足，加肉桂五分、川柏、知母各五分；如高年阳衰者，加黄耆三钱，木香五分。

11273 振颓丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 人参二两 于术（炒）二两 当归一两 马钱子（法制）一两 乳香一两 没药一两 全蜈蚣（大者，不用炙）五条 穿山甲（蛤粉炒）一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，无灰温酒送下，一日二次。

【主治】 痿废，偏枯，痹木诸证。

【备考】 制马钱子法：将马钱子先去净毛，水煮两三沸即捞出。用刀将外皮皆刮净，浸热汤中，旦、暮各换汤一次，浸足三昼夜，取出。再用香油煎至纯黑色，擘开视其中心微有黄意，火候即到。将马钱子捞出，用温水洗数次，将油洗净。再用沙土同入锅内炒之；土有油气，换土再炒，以油气尽净为度。

11274 振颓汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生黄耆六钱 知母四钱 野台参二钱 于术三钱 当归三钱 生明乳香三钱 生明没药三钱 威灵仙一钱半 干姜二钱 牛膝四钱

【主治】 痿废。

【加减】 热者，加生石膏数钱，或至两许；寒者，去知母，加乌附子数钱；筋骨受风者，加明天麻数钱；脉弦硬而大者，加龙骨、牡蛎各数钱，或更加山萸肉亦佳；骨痿废者，加鹿角胶、虎骨胶各二钱（另炖同服），然二胶伪者甚多，若恐其伪，可用续断、菟丝子各三钱代之；筋骨受风者，加明天麻；手足皆痿者，加桂枝尖二钱。

【方论选录】 方中黄耆以补大气；白术以健脾胃；当归、乳香、没药以流通血脉；灵仙以祛风消痰；恐其性偏走泄，而以人参之气血兼补者佐之；干姜以开气血之痹；知母以解干姜、人参之热，则药性和平，可久服而无弊。其阳明有实热者，加石膏以清阳明之热，仿《金匮》风引汤之义也；营卫经络有凝寒者，加附子以解营卫经络之寒，仿《金匮》近效术附汤之义也；至其脉弦硬而大，乃内风煽动，真气不固之象，故加龙骨、牡蛎以息风敛真气；骨痿者加鹿胶、虎胶取其以骨补骨也；筋骨受风者，加明天麻取其能搜筋骨之风，又能补益筋骨也；若其痿专于腿，可但用牛膝以引之下行，若其人手足并痿者，又宜加桂枝兼引之上行。

11275 挫气丹

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】 山楂子（去核）四两 北茴香（炒）一两

【主治】 挫气腰痛。

11276 换肌散

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】 白花蛇 黑乌蛇（各酒浸一宿） 地龙（去土） 蔓荆子 威灵仙 荆芥 甘菊花 沙苑蒺藜 苦参 紫参 沙参 甘草（炙） 不灰木 木贼 九节菖蒲 天门冬 赤芍药 定风草 何首乌 胡麻子（炒黄） 木鳖子 草乌（去皮） 苍术 川芎各三两 天麻二两 细辛 当归 白芷各一两

【用法】 上为末。每服五钱匕，食后温酒调下。酒多为妙，服至逾月。

【主治】 大风年深久不愈，以至眉毛坠落，鼻梁崩塌，额颅肿破。

【方论选录】《医方考》：身半以上，病则气受

之、气受之则上病，故眉落、鼻坏而颅破也。高巅之上，惟风可到，故用细辛、白芷、天麻、蔓荆、威灵、甘菊、木贼、川芎、蒺藜、木鳖子、定风草诸物者，气味轻清，可以亲上，可以驱风，可以胜湿；乃不灰木、石菖蒲、草乌、苍术则直可以疗湿矣；若苦参、紫参、沙参、何首乌皆用之以解毒；当归、甘草、门冬、赤芍、胡麻皆养血清气于驱风燥湿之队者也；地龙者，泥蟠之物，湿土所化也，故能引诸药以就湿；白花、乌梢者，奔腾之类，风动之象也，故能君诸药以驱风，此《易》所谓云从龙，风从虎也。

【备考】《外科百效》无不灰木，有石灰、木通。

11277 换肠丸

【方源】《御药院方》卷七。

【组成】御米壳一两（去隔蒂，碎，微炒，净秤） 木香 诃子皮 白芍药 甘草（炒） 当归（去芦头，炒） 人参各一两 白术 白茯苓（去皮）各一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，水一盏煎化，食前稍热服。

【主治】泄泻不止，及诸下痢之疾。

11278 换骨丹

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】当归 芍药 人参 铁脚威灵仙各二两 南星三两 乳香（去油）二两 没药（去油）二两 麻黄三斤（去节，另煎膏）

【用法】上为末，先将前五味和匀，后入乳香、没药，以麻黄膏和匀，为丸，如弹子大。先灸脐下三百壮，服金液丹一斤，再服此药。每服一丸，五日一服，以无灰酒送下，出汗，仍常服延寿丹、金液丹。

【主治】中风，半身不遂，言语謇涩，失音者。

11279 换睛散

【方源】《永乐大典》卷一一四一三引《经验普济加减方》。

【组成】荆芥穗二两 蝉壳 草龙胆 川芎 甘草各一两

【用法】上为细末。每服三钱，食后茶、酒调下。一月见效，小可病眼，三服效。

【主治】目昏病，发痛赤肿，渐生翳膜，眵泪。

11280 换肌消毒散

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】当归 生地黄 赤芍药 川芎 皂刺 土茯苓 金银花 连翘（去心） 甘草（生） 白芷 苦参 白鲜皮 防风

【用法】灯心为引，水煎服。外用清凉膏或鹅黄散敷之。

【主治】父母素有杨梅结毒，传染胞胎，致生下婴儿上半身赤烂，或下半身赤烂，甚至色带紫黑者。

11281 挨积丸

【方源】《局方》卷十（宝庆新增方）。

【组成】京三棱（炮） 丁香皮（不见火）各二两 丁香（不见火） 青皮（去白）各一两 干姜（炮） 巴豆（去皮膜油）各二钱半

【用法】上为细末，入巴豆研匀，面醋糊为丸，如粟米大。每服五十丸至六十丸，二岁儿可服七至十丸，生姜汤吞下，熟水亦得，不拘时候。

【功用】消积滞，进乳食，退黄长肌。

【主治】小儿脾胃不和，宿滞不化，腹胀肠鸣，呕逆恶心，便利不调，乳食减少，或痢泻积泻，大便酸臭；丈夫、妇人胸膈不快，酒积食积，呕逆恶心，吐泻脾疼。

11282 致和汤

【方源】《霍乱论》卷四。

【组成】北沙参 生扁豆 石斛 陈苍米各四钱 枇杷叶（刷） 鲜竹叶 麦冬各二钱 陈木瓜六分 生甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】霍乱后津液不复，喉干舌燥，溺短便溏。

11283 热郁汤

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】山栀（炒） 青黛 香附 苍术 抚芎

【主治】热郁。瞀闷，小便赤，脉沉数。

【加减】春，加芎；夏，加苦参；秋、冬，加吴茱萸。

【备考】本方为原书六郁汤之第四方。

11284 热郁汤

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】连翘四钱 薄荷叶 黄芩各一钱五分 山栀仁二钱 麦门冬（去心）三钱 甘草五分 郁金一钱 瓜蒌皮瓤二钱 竹叶七片

【用法】水煎服。

【主治】①《准绳·类方》：郁热，非阴虚、非阳陷，亦不发热，而常自蒸蒸不解者。②《杂病源流犀烛》：肺因壅热生风，在外风适与之相袭，症见声重鼻塞，咳嗽咽干音哑。

11285 热六合汤

【方源】《元戎》。

【组成】 四物汤加黄连 栀子

【主治】 发热而烦，不能睡卧者。

11286 鸬鹚涎丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】 光杏仁 栀子（炒黑） 石膏 蛤粉 天花粉各二两 牛蒡子三两 生甘草四钱 麻黄八钱 青黛 射干各一两 细辛五钱

【用法】 共为细末，鸬鹚涎三两加蜜为丸，如弹子大。每服一丸，灯心、竹叶煎汤化下。

【功用】《中药成方配本》：理肺止咳。

【主治】 ①《中国医学大辞典》：小儿鸬鹚瘟。②《中药成方配本》：百日咳（即小儿顿嗽）。

11287 柴平汤

【方源】《增补内经拾遗》卷三引《宦邸便方》。

【异名】 柴平饮（《证治宝鉴》卷二）、柴平煎（《中医大辞典·方剂分册》）。

【组成】 银柴胡二钱 黄芩一钱五分 人参（去芦） 半夏（汤泡七次）各一钱 甘草五分 陈皮一钱二分 苍术（泔浸）一钱半 厚朴（姜制）一钱

【用法】 上用水二钟，加生姜三片，红枣二枚，煎八分，未发先服。

【主治】 痎疟，湿疟，食疟；春嗽。

①《增补内经拾遗》引《宦邸便方》：由夏伤暑所致痎疟。②《医方考》：湿疟，发时一身尽痛，手足沉重，寒多热少，脉濡。③《医方集解》：春嗽。④《金鉴》：小儿饮食无节，复受风暑之气，以致食疟，寒热交作，胸腹胀满，痞闷不通，面黄恶食，症轻者。

【加减】 发于午前为阳，属气虚，加白术（土炒）八分，白茯苓（去皮）七分；发于午后为阴，属血虚，加当归（酒浸）九分，川芎七分；发于午前，延及午后，此气血两虚，上四味俱加；食积，加神曲（炒）八分，麦芽（炒）七分，山楂一钱，枳实（麸炒）一钱。

【方论选录】 ①《增补内经拾遗》引《宦邸便方》：方用小柴胡汤以散风寒，平胃散以消饮食，故曰柴平。②《医方考》：用小柴胡汤以和解表里，平胃散以健脾制湿，二方合而为一，故名曰柴平。

11288 柴芩汤

【方源】《保婴撮要》卷十八。

【异名】 柴芩汤（《景岳全书》卷五十四）、柴芩散（《治疹全书》卷上）、柴胡汤（《不知医必要》卷三）。

【组成】 柴胡 黄芩 猪苓 泽泻 茯苓 白术 各一钱五分

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 ①《保婴撮要》：痘疹，小便不利。②《景岳全书》：身热烦渴，泄泻。

11289 柴芩煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 柴胡二三钱 黄芩 栀子 泽泻 木通各二钱 枳壳一钱五分

【用法】 水二钟，煎八分，温服。

【主治】 ①《景岳全书》：伤寒表邪未解，外内俱热，泻痢，烦渴喜冷，气壮，脉滑数；及疟痢并行，内热去血，兼表邪发黄。②《会约》：湿热伤脾，下及肝肾，热渴下血，表邪未解。

【加减】 疟痢并行，鲜血纯血者，加芍药一钱、甘草一钱；湿胜气陷者，加防风一钱。

11290 柴附汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 柴胡 香附 郁金 丹参 枳实 当归 赤芍 益母草

【功用】 疏肝解郁，养血通经。

【主治】 流产后肝气郁结闭经，下腹作胀或胀痛，或少腹疼痛，或乳房发胀。

11291 柴苓饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 柴苓煎（《医级》卷七）。

【组成】 柴胡二三钱 猪苓 茯苓 泽泻各二钱 白术二三钱 肉桂一二三钱

【用法】 水一钟半，煎服。

【主治】 风湿发黄，发热身痛，脉紧，表里俱病，小水不利，中寒泄泻。

【加减】 寒邪胜，加生姜三五片；汗出热不退，加芍药一二钱。

11292 柴胡汤

【方源】《外台》卷三引《救急方》。

【组成】 麻黄二两（陈者，去节） 柴胡三两 黄芩三两 甘草二两（炙） 干葛二两 石膏五两（碎，绵裹） 葱白根（切）一升（勿令有青处，青即热，白即冷。一作桑根皮） 豉七合（绵裹，三沸出之）

【用法】 上切。以水九升，宿渍药，明旦先煮麻黄令沸，掠去上沫，然后并诸药煮取二升七合，分三服，服别相去三食顷。良久覆取汗。汗出以粉拭之。

【主治】 天行热气，头痛，骨肉痠痛，壮热，已进豉汤，病不除者。

【加减】 恶寒多，加桂心一两。

【宜忌】 忌海藻、菘菜。

11293 柴胡汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 柴胡 芍药 龙胆草 当归 青皮 山栀 连翘各一钱 甘草五分

【用法】 上锉一剂。水煎，食后服。

【主治】 肝火盛，水气实，或胁痛，或气从左边起者，或目红肿痛。

11294 柴胡汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】 柴胡二钱 黄芩一钱 陈皮一钱 甘草一钱 生姜一钱 大枣一枚

【主治】 ①《瘟疫论》：瘟疫里症下后，续得盗汗，表有微邪者。②《会约》：疫病下后，内无邪热，犹未汗者。

11295 柴胡饮

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】 柴胡五钱 红花三钱 大桃仁（不去尖）三钱（研末）

【用法】 将柴胡、红花用酒煎好，调桃仁末热服。

【主治】 大怒及从高坠下，血积胁下，左边疼。

11296 柴胡散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】 柴胡一两（去苗） 赤芍药一两 枳实三分（麸炒微黄） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 黄芩三分 川大黄二两（锉碎，微炒） 槟榔一两 汉防己三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 大肠实热，气壅不通，心腹胀满，发歇寒热。

11297 柴胡散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】 柴胡一两半（去苗） 五味子一两 桔梗一两（去芦头） 熟干地黄一两 白茯苓一两 麦门冬一两（去心） 紫菀一两（洗，去苗土） 人参一两（去芦头） 地骨皮一两 黄耆一两（锉） 甘草三分（炙微赤，锉） 桂心一两 牡蛎粉一两 半夏三分（汤浸七遍去滑） 白术一两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 虚劳寒热，夜卧盗汗，四肢无力，吃食口苦，上气咳嗽。

11298 柴胡散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】 柴胡 前胡 川芎 当归 人参 芍药 粉草 生地黄各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，加生姜三片，大枣三枚，水煎服。

【主治】 ①《云岐子保命集》：孕妇伤寒。②《医方类聚》引《徐氏胎产方》：妊娠伤寒，头痛项强，身热口干，胸胁疼。

【加减】 要出汗，加葱。

【备考】《医方类聚》引《徐氏胎产方》有葱白三根。

11299 柴胡散

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】 地骨皮 两半 柴胡 鳖甲（去裙，醋炙） 知母各一两 五味子半两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏半，加乌梅四个，青蒿五叶，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 虚劳羸瘦，面色萎黄，四肢无力，不思饮食，夜多盗汗，咳嗽不止。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“柴胡饮”。

11300 柴胡散

【方源】《补要袖珍小儿》卷四。

【组成】 柴胡 地骨皮 甘草各五钱

【用法】 上锉散。每服二钱，加水一小盏煎服。

【主治】 小儿骨蒸潮热，面黄瘦弱。

11301 柴桔汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】 柴胡二钱 黄芩 枳壳 半夏 桔梗各一钱 人参七分 甘草五分 生姜 大枣

【主治】 支结症，即伤寒未曾下，而心下妨闷，不满不硬，非痞亦非结胸者。

11302 柴陷汤

【方源】《医学入门》卷四。

【异名】 柴胡陷胸汤（《寒温条辨》卷四）。

【组成】 小柴胡汤合小陷胸汤

【功用】 疏表和中。

【主治】 结胸痞气初起有表，及水结、痰结、热结。

11303 柴胡饮子

【方源】《宣明论》卷四。

【异名】 柴胡饮（《校注妇人良方》卷五）、人参柴胡饮子（《准绳·类方》卷 ）。

【组成】 柴胡 人参 黄芩 甘草 大黄 当归 芍药各半两

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，煎至七分，温服，每日三次。

【主治】 伤寒发汗未解，气血已虚，寒热往来，口干烦渴，大便秘结，脉洪实弦数。

①《宣明论》：一切肌骨蒸积热作，发寒热往来，蓄热寒战，及伤寒发汗不解，或中外诸邪热，口干烦渴，或下后热未愈，汗后劳复或骨蒸肺痿喘嗽，妇人余疾，产后经病。②《儒门事亲》：妇人产后一二日，潮热口干；双身妇人病疟。③《永类钤方》：小儿伤寒五六日，发热潮热，大便秘，母多服。④《保婴撮要》：脉洪实弦数，大便坚实。

【方论选录】《杏苑》：用人参、当归、芍药益阴血以胜阳热，黄芩解肌热，柴胡退蒸热，大黄下积热，生甘草泻火兼和药。

【临证举例】 二阳病 《名医类案》：张子和治常仲明病寒热往来，时咳一二声，面黄无力，懒思饮食，夜寝多汗，日渐瘦削，诸医作虚损治之，用二十四味烧肝散、鹿茸、牛膝，补养二年，口中痰出，下部转虚，戴人断之曰，上实也，先以涌剂吐痰二三升，次以柴胡饮子降火益水，一月余复旧，此二阳病也。

11304 柴术参苓汤

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】 白术（炒） 人参 茯苓各一钱 柴胡 川芎 山栀 芍药（炒） 甘草（炒）各五分 熟地（自制） 当归各八分

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人肝火血热，遍身瘙痒，或起赤晕，或筋挛结核。

11305 柴芩双解汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】 柴胡一钱半 生葛根一钱 羌活八分 知母二钱 炙草六分 青子芩一钱半 生石膏四钱（研） 防风一钱 猪苓一钱半 白蔻末六分（冲）

【功用】 和解表里，调剂阴阳。

【主治】 少阳相火，郁于腠理而不达，表邪未罢，里邪已盛，寒热，身疼无汗，口渴，恶热。

【方论选录】 少阳相火，郁于腠理而不达，则作寒热，非柴胡不能达，亦非黄芩不能清，与少阳经气适然相应，故以为君；若表邪未罢，而兼寒水之气者，则发寒愈重，证必身疼无汗，故必臣以葛根、羌、防之辛甘气猛，助柴胡以升散阳气，使邪离于阴，而寒自已；里邪已盛，而兼燥金之气者，则发热亦甚，证必口渴恶热，亦必臣以知母、石膏之苦甘性寒，助黄芩引阴气下降，使邪离于阳，而热自已；佐以猪苓之淡渗，分离阴阳，不得交并；使以白蔻之开达气机，甘草之缓和诸药。而为和解表里之重剂，亦为调剂阴阳，善止寒热之良方也。

11306 柴芩承气汤

【方源】《急腹症方药新解》。

【组成】 金银藤 蒲公英各30克 柴胡 黄芩各15克 青香藤 金铃子 陈皮各10克 大黄10克 芒消10克（冲服）

【用法】 水煎服，每日一至二剂。

【功用】 清肝解郁，通腑行气。

【主治】 急性水肿型胰腺炎。

【方论选录】 金银藤、蒲公英、黄芩清热燥湿；柴胡、青香藤、金铃子、陈皮行气止痛；大黄、芒消通里攻下。

【临证举例】 急性水肿型胰腺炎 治疗97例病人，治愈96.9%，减轻2.1%，只6例并发胆道感染使用了抗菌素。

11307 柴芩清膈煎

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】 川柴胡八分 生锦纹（酒浸）一钱半 生枳壳一钱半 焦山栀三钱 青子芩一钱半 苏薄荷一钱半 苦桔梗一钱 青连翘二钱 生甘草六分 鲜淡竹叶三十六片

【功用】 攻里清膈。

【主治】 少阳表邪，内结膈中，膈上如焚，寒热如疟，心烦懊侬，大便不通。

【方论选录】 君以凉膈散法，生军领栀、芩之苦降，荡胃实以泄里热；佐以枳、桔，引荷、翘、甘、竹之辛凉，宣膈热以解表邪；妙在柴胡合黄芩分解寒热。此为少阳、阳明攻里清膈之良方。

11308 柴连解毒汤

【方源】《麻疹备要方论》。

【组成】 柴胡 黄芩 黄连 玄参 知母 贝母 防风 赤芍 连翘 牛蒡子 陈皮 甘草

【用法】 水煎服。

【主治】 麻出不透，毒未尽出，气因热逼，热极而致目红，发痰作喘。

11309 柴芩二妙汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】 柴胡 黄芩 半夏 甘草 赤苓 赤芍 泽泻 苍术 黄柏 木瓜 续断 牛膝 杜仲

【用法】 水煎服。

【主治】 风湿，下体疼痛不止者。

11310 柴胡丁香汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 生地黄二分 丁香四分 当归身 防风 羌活各一钱 柴胡一钱五分 全蝎一个

【用法】 上作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食前稍热服。

【主治】 妇人年三十岁，临经先腰脐痛，甚则腹中亦痛，经缩三两日。

【方论选录】《医略六书》：柴胡疏风通腠，丁香散滞温中，羌活散太阳游风，全蝎搜厥阴伏风，生地以滋暗伤之阴，当归以养荣运之血。水煎温服，使经脉濡润，则沟满渠通而风邪外解，经候自长，何致腰腹有预先痛甚之患哉！

11311 柴胡天水散

【方源】《观聚方要补》卷一引《统旨》。

【组成】 柴胡 黄芩 人参各二钱 甘草一钱 滑石二钱半

【用法】 加竹叶十片，水煎服。

【主治】 中暑。咳嗽寒热，盗汗不止，脉数。

11312 柴胡六合汤

【方源】《元戎》。

【异名】 柴胡四物汤(《金鉴》卷七十四)。

【组成】 四物汤四两 柴胡 黄芩各七钱

【主治】 妊娠伤寒，胸胁满痛，烦躁，蓄血呕血；妇人经行身热，及产妇头昏项强，脉弦或数。

①《元戎》：妊娠伤寒，胸胁满痛而脉弦，少阳也；产妇头昏项强。②《丹溪心法》：妇人经行身热，脉数头昏。③《伤科汇纂》：烦躁胁痛，蓄血呕血。

11313 柴胡石膏汤

【方源】《袖珍》卷四引《圣惠》。

【组成】 柴胡四两 甘草二两 石膏八两

【用法】 上㕮咀。每服八钱，水一盏半，加生姜五片，煎八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《袖珍》引《圣惠》：妊妇伤暑，头痛恶寒，身热躁闷，四肢疼痛，项背拘急，口干燥。②《景岳全书》：少阳阳明，外感挟火，头痛口干，身热恶寒拘急。

【加减】 气虚体冷，加人参四两。

11314 柴胡石膏散

【方源】《局方》卷二。

【异名】 柴胡升麻汤（原书同卷宝庆新增方）、柴胡石膏汤(《奇效良方》卷十)。

【组成】 赤芍药 柴胡（去苗） 前胡（去苗） 石膏（煅） 干葛各五十两 升麻二十五两 黄芩 桑白皮各二十七两 荆芥穗（去土）三十七两

【用法】 上为粗末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，豉十余粒，同煎七分，去滓，稍热服。小儿分作三服，不拘时候。

【主治】 外感风热、少阳、阳明合病，壮热恶风，头痛身疼，鼻塞咽干，口渴心烦，咳嗽自汗，脉浮缓。

①《局方》：时行瘟疫，壮热恶风，头痛体疼，鼻塞咽干，心胸如满，寒热往来，痰实咳嗽，涕唾稠粘。②《医方集解》：少阳阳明合病，伤风，及阳气郁遏，元气下陷。③《杂病源流犀烛》：春夏感冒，头痛身热，鼻塞流涕，恶风恶寒，声重声哑，甚至痰壅气喘，咳嗽咽干，自汗，脉浮缓。

【方论选录】《医方集解》：柴胡平少阳之热，升、葛散阳明之邪，前胡消痰下气而解风寒，桑皮泻肺利湿而止痰嗽，荆芥疏风热而清头目，赤芍调营血而散肝邪，黄芩清火于上中二焦，石膏泻热于肺胃之部；加姜、豉者，取其辛散而升发也。

11315 柴胡四物汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 川芎 熟地黄 当归 芍药各一两半 柴胡八钱 人参 黄芩 甘草 半夏曲各三钱

【用法】 上为粗末。煎服。

【主治】 妇人虚劳日久，血虚阴亏，微有寒热；经行感冒，热入血室；经枯发热；妊娠吐衄。

①《保命集》：日久劳虚，微有寒热，脉沉而浮。②《便览》：血虚阴虚，午后或夜分发热。③《东医宝鉴·杂病篇》：三阴经温疟或夜发者。④《张氏医通》：妇人经行感冒，热入血室。⑤《医略六书》：经枯发热，脉虚弦数者。⑥《叶氏女科》：妊娠吐衄。妊娠忧虑惊怒伤其脏腑，气下于上，血随溢而心闷，胸满久不已，必致堕胎。

【方论选录】《医略六书》：以四物汤滋荣血室，柴胡汤疏热扶元，二方合剂，异路同归，水煎温服，务使正气内充而邪热外却，何患发热不止，天癸不来乎！

11316 柴胡白虎汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】 川柴胡一钱 生石膏八钱（研） 天花粉三钱 生粳米三钱 青子芩一钱半 知母四钱 生甘草八分 鲜荷叶一片

【功用】《湿温时疫治疗法》：清胃泄热。

【主治】《湿温时疫治疗法》：温疟，热重寒轻，脉多弦数，或右脉洪盛。

【方论选录】 柴胡达膜，黄芩清火，本为和解少

阳之君药；而臣以白虎法者，以其少阳证少而轻，阳明证多而重也；佐以花粉，为救液而设；使以荷叶，为升清而用。合而为和解少阳阳明，寒轻热重，火来就燥之良方。

【备考】《湿温时疫治疫法》有仙露夏，无天花粉、鲜荷叶。

11317 柴胡白虎煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡二钱 石膏二钱 黄芩二钱 麦冬二钱 细甘草七分

【用法】加竹叶二十片，水一钟半，煎服。

【主治】阳明温热，表邪不解。

【方论选录】《证因方论集要》：柴胡疏达流通，散邪外出；黄芩清肺胃火，使里热内彻；麦冬清润止渴；甘草泻热和中；竹叶之加，又仿竹叶石膏汤之制，外托表邪，内清里热。

11318 柴胡芎归汤

【方源】《回春》卷五。

【异名】柴胡归芎汤(《寿世保元》卷五)。

【组成】柴胡 川芎 白芍 青皮（去瓤） 枳壳（麸炒）各一钱半 香附 当归 龙胆草 木香（另研） 砂仁 甘草各五分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，水煎服，不拘时候。

【主治】肝火盛而木气实，胁下痛。

11319 柴胡百合汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】柴胡 人参 黄芩 甘草 知母 百合 生地黄 陈皮

【用法】水二钟，加大枣一枚，生姜三片，槌法醋煮鳖甲煎之，温服如圣饮。

【主治】伤寒愈后，昏沉发热，渴而错语失神，及百合劳复。

【加减】渴，加天花粉；胸中烦躁，加山栀；有微头痛，加羌活、川芎；呕吐，入姜汁炒半夏；胸中饱闷，加枳壳、桔梗；食复者，加枳实、黄连；甚重大，大便实，加大黄；胸中虚烦，加竹茹、竹叶；愈后干呕，错语失神，呻吟，睡不安，加黄连、犀角；咳喘，加杏仁、百合、麻、连；心中惊惕为血少，加当归、茯苓、远志；虚汗，加黄耆；脾倦，加白术；腹如雷鸣，加煨生姜；劳复时热不除，加葶苈、乌梅、生艾叶。

11320 柴胡竹茹汤

【方源】《古今医鉴》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 竹茹 知母 甘草

【用法】上锉。加生姜一片，水煎服。

【主治】伤寒潮热作渴，呕逆不止。

11321 柴胡抑肝汤

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】柴胡抑肝散(《古今医鉴》卷十一)、柴胡益肝散(《寿世保元》卷七)。

【组成】柴胡二钱半 赤芍 牡丹皮各一钱半 青皮二钱 连翘 生地各五分 地骨皮 香附 苍术 山栀各一钱 川芎七分 甘草三分 神曲八分

【用法】水煎，空心临卧服。

【功用】《济阴纲目》：疏肝开郁，散结气结血，凉心启脾。

【主治】寡居独阴，寒热类疟。

【方论选录】《医略六书》：生地黄滋阴凉血，地骨皮退热清肌，柴胡疏热解郁，青皮破气平肝，丹皮凉血以化瘀结，赤芍破血以通经隧，川芎行血中之气，山栀清屈曲之火，神曲消食滞，苍术燥脾湿，香附调气解郁，甘草泻火缓中也。

11322 柴胡连翘汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】中桂三分 当归梢一钱五分 鼠粘子二钱 炙甘草 酒黄柏 生地黄各三钱 柴胡 黄芩（炒） 酒知母 连翘各五钱 麦穗六钱

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，水二大盏，煎至一盏，去滓，稍热，食后服之。

【主治】①《兰室秘藏》：男子、妇人马刀疮。②《医钞类编》：男妇热毒、瘰疬，并气寒血滞经闭。

【方论选录】《古方选注》：以柴胡散少阳之结气，连翘散外疡之血结气聚，瞿麦穗决上焦之壅肿，鼠粘子消上焦之热肿，生地、当归和手足少阳之血脉，黄芩、知柏解三焦之郁热，炙甘草调和寒热之剂。微加中桂者，马刀坚硬，用以消皮肤浮冻之气也。

11323 柴胡青黛汤

【方源】《杂病广要》引《粹言》。

【组成】柴胡五分 青黛五分 香附一钱 川芎一钱 青皮八分 黄连八分（酒炒） 栀子八分（姜汁炒黑） 甘草八分

【用法】水二钟，煎一钟，温服。

【功用】泻肝火。

【主治】怒气伤肝。

11324 柴胡泻肝汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】柴胡一钱二分 甘草五分 青皮（炒）

一钱 黄连（炒）八分 山栀（炒）八分 当归（酒制）一钱二分 芍药一钱 龙胆草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 郁怒伤肝，胁肋痛在左者。

11325 柴胡细辛汤

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】 柴胡 细辛 薄荷 归尾 地鳖虫 丹参 制半夏 川芎 泽兰叶 黄连

【用法】 水煎服。

【功用】 去瘀生新，调和升降。

【主治】 脑震伤。

【临证举例】 脑外伤后遗症 《中医杂志》(1982；10:11)：石某某，女，29岁，1979年9月8日初诊。患者于1978年不慎从高处摔下，与石头相撞而外伤。头巅、后脑及两颞部疼痛如裂，家属视病情严重，特来求治。患者伏驴背上而来，精神欠佳，动弹不得，自己不能上床。诊视：头项强痛，头昏，畏风，恶寒，汗出如洗，面色黧黑，胸脘痞闷，泛泛欲吐，默默不愿言，眼球发红并有牵引性疼痛。形体消瘦，腹满便秘，小便不利，口唇紫绀，爪甲发黑，舌苔微黄，中间黑，脉弦涩。诊为脑外伤后遗症。处方：柴胡细辛汤加石菖蒲。七剂后诸症减轻，上方加紫草根10克，五剂诸症大减。继用上方七剂为粗末，早、晚各冲服15克以巩固疗效。随访二年半再未复发。

11326 柴胡枳桔汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】 柴胡 黄芩 半夏 甘草 枳壳 桔梗 瓜蒌仁

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 伤寒小结胸。脉弦数，口苦，心下硬痛，或往来寒热，或耳聋目眩，或心烦而呕，痰热烦渴。

【加减】 有痰，加陈皮；心下痞满硬，加枳实；渴，加天花粉；烦热，加黄连、山栀。

11327 柴胡厚朴汤

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【异名】 柴胡汤(《圣济总录》卷五十七)。

【组成】 柴胡 厚朴（炙）各十分 茯苓 橘皮 紫苏各八分 生姜十二分 槟榔五分（末）

【用法】 上切。以水七升，煮取二升五合，绞去滓，分温三服。服别相去如人行六七里，进一服，微利。

【主治】 心腹胀满。

【宜忌】 忌酢物、生冷、油腻、粘食。

11328 柴胡复生汤

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】 柴胡复明汤(《医统》卷六十一)。

【组成】 藁本 川芎各三分半 白芍药四分 蔓荆子 羌活 独活 白芷各三分半 柴胡六分 炙草 薄荷 桔梗各四分 五味子二十粒 苍术 茯苓 黄芩各五分

【用法】 作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食后热服。

【主治】 目红赤羞明，泪多眵少，脑顶沉重，睛珠痛应太阳，眼睫无力，常欲垂闭，不敢久视，久视则酸疼，翳陷下，所陷者或圆或方、或长或短，如镂如锥如凿。

【方论选录】 以藁本、荆子为君，升发阳气也；川芎、白芍药、羌活、独活、白芷、柴胡为臣，和血补血疗风，行厥阴经也；甘草、五味子为佐，为协诸药，敛肚气也；薄荷、桔梗、苍术、茯苓、黄芩为使，为清利除热去湿，分上下、实脾胃二土，疗目中赤肿也。此病起自七情五贼劳役饥饱，故使生意下陷，不能上升，今主以群队升发，辅以和血补血，导入本经，助以相协收敛，用以清利除热实脾胃，如此为治，理可推也。

11329 柴胡养荣汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】 柴胡 黄芩 陈皮 甘草 当归 白芍 生地 知母 天花粉

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 ①《瘟疫论》：瘟疫解后，表有余热。②《重订通俗伤寒论》：伤寒经水适断，血室空虚，邪乘虚传入，邪胜正亏，经气不振，不能鼓散其邪者。

11330 柴胡桂枝汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 柴胡加桂汤(《三因》卷四)、柴胡加桂枝汤(《医学纲目》卷三十)、桂枝柴胡各半汤(《痎疟论疏》)。

【组成】 桂枝（去皮）一两半 黄芩一两半 人参一两半 甘草一两（炙） 半夏二合半（洗） 芍药一两半 大枣六枚（擘） 生姜一两半（切） 柴胡四两

【用法】 以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。

【主治】 外感风寒，发热自汗，微恶寒，或寒热往来，鼻鸣干呕，头痛项强，胸胁痛满，脉弦或浮大。现用于感冒、癫痫、流行性出血热等。

①《伤寒论》：伤寒六七日，发热，微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者。②《外台》：寒疝腹中痛。③《活人书》：伤寒发汗多，亡阳谵语者。④《元戎》：伤寒脉浮大。⑤《伤寒指掌图》：风湿汗后，风热病而心下妨闷动气。⑥《玉机微义》：伤寒发热，潮热脉弦，自汗，或渴或利。⑦《校注妇人良方》：伤风发热，自汗，鼻鸣干呕。⑧《医学入门》：少阳病，头额痛，项强，胁痛胸满，发热恶寒，乍往乍来。⑨《准绳·幼科》：疟，身热多汗。⑩《证治宝鉴》：行痹走注，历节。⑪《张氏医通》：太阳少阳并病、合病。

【方论选录】 ①《伤寒来苏集》：桂、芍、甘草，得桂枝之半；柴、参、冬、夏，得柴胡之半；姜、枣得二方之半，是二方合并非各半也。取桂枝之半，以解太阳未尽之邪；取柴胡之半，以解少阳之微结；凡口不渴，身有微热者，当去人参，此以六七日来邪虽不解，而正气已虚，故用人参以和之也。外证虽在，而病机已见于里，故方以柴胡冠桂枝之前，为双解两阳之轻剂。②《古方选注》：以柴胡冠于桂枝之上，即可开少阳微结，不必另用开结之方；佐以桂枝，即可解太阳未尽之邪；仍用人参、白芍、甘草，以奠安营气，即为轻剂开结之法。③《医门棒喝》：此小柴胡与桂枝汤合为一方也。桂枝汤疏通营卫，为太阳主方，小柴胡和解表里，为少阳主方。因其发热微恶寒，肢节烦疼之太阳证未罢，而微呕，心下支结之少阳证已现，故即以柴胡为君，使少阳之邪开达，得以仍从太阳而解也。少阳证必呕，而心下支结，逼近胃口，故小柴胡用人参、姜、半，通胃阳以助气，防其邪之入府也。然则虽曰和解，亦为开达驱邪之法，故可仍从汗解。世俗反畏人参之补而去之，乃失其功用，而中虚之人，邪不能外出，必致内陷而致危，是皆不明表里证治故也。

【临证举例】 ①太阳少阳合病 《辽宁中医杂志》(1981；10:39)：某某某，女，65岁。外感风邪，头痛发热，肢节酸痛，皮肤苍白，胸胁苦满，默默不欲食，口苦咽干，舌苔白，脉象浮数。经服柴胡桂枝汤，每日一剂，二天即愈。②腹痛 《丛桂草堂医案》：王善余次子，年十六岁，陡患腹痛呕吐，恶寒发热，痛甚则出汗，舌苔薄腻，脉缓滑。与柴胡桂枝汤去人参，加薏仁、木香，一剂痛呕俱止，寒热亦退，接服一剂痊愈。③感冒引发胃痛 《伤寒论方运用法》：患者男性，32岁。患十二指肠球部溃疡已两年，每因感冒或饮食不节，胃痛即发。周前又发作，服药无效。胸骨下时觉疼痛，五天来每餐只能饮稀粥少许。询知其此次胃痛系感冒之后转剧，现仍微有寒热(37.5℃)，头晕，口苦，肢倦，不思饮食，深呼吸时觉胸部不舒，微咳，时欲呕，大便三天未行，舌苔薄白，脉浮数。予柴胡桂枝汤五剂愈。④癫痫 《中成药研究》(1982；12:20)：用本方制成桂芍镇痫片，治疗36例不同类型的难治型癫痫患者，经过6～12个月的临床治疗，显效者11例，有效者5例，总有效率达44.44%。⑤流行性出血热 《辽宁中医杂志》(1984；8:17)：沈阳市传染病院用柴胡桂枝汤为主治疗流行性出血热112例，仅死亡1例，疗效优于对照组，经统计学处理，两组差异非常显著。⑥失眠 《浙江中医杂志》(1983；5:223)：虞某某，女，24岁。两月来夜寐不安，多梦易醒，甚至彻夜难眠，精神不振，周身不适，不可名状。脉浮软，苔薄白，舌淡红。予柴胡桂枝汤加当归，4剂获愈。

【现代研究】 ①抗癫痫及镇静作用 《Planta medical》(1978；3:294)：对柴胡桂枝汤加芍药进行神经药理研究，结果表明，其2%的溶液对戊四氮所致日本蝎牛食管下神经节的D神经细胞放电有显著的抑制作用，这一放电效应与注射戊四氮和用其它方法引起哺乳动物大脑皮层细胞放电的类型极为相似，故作为抗癫痫药的筛选模型。《生药学杂志》(1978；4:273)：实验表明，本方溶液能使蛙的离体坐骨神经纤维的复合活动电位消失，其强度约为0.5%的普鲁卡因之0.3倍，表明本方具有一定的局部麻醉作用。这种局麻作用也可能与本方抗癫痫效果有关。②抗溃疡作用及对肠平滑肌的影响 《诊断与治疗》(1987；11:176)：实验表明，本方能抑制半胱胺所致大鼠胃溃疡的形成，胃液检测发现本方可抑制胃酸分泌，尤其是能明显抑制胃蛋白酶的分泌，血清胃泌素测定表明本方还可抑制胃泌素分泌和防止半胱胺所致胰泌素的下降，可见本方抗胃溃疡的作用是从增强机体对胃溃疡形成的防御因子和对抗攻击因子两方面而获效的。《药学杂志》(1982；4:371)：本方还具有显著的解痉作用，实验证明对于乙酰胆碱所致离体豚鼠回肠收缩，有显著的解痉作用，此作用与小柴胡汤类似而弱于大柴胡汤。③保肝作用 《国外医学·中医中药分册》(1984；2:121)：本方组成药柴胡、甘草、人参、黄芩、白芍和大枣均有保肝作用。对于D-半乳糖胺所致大鼠肝损害，本方有与大、小柴胡汤类似的保肝效果，能抑制SGPT的上升及肝透明变性。④抗炎作用 《日本东洋医学会志》(1972；3:28)：本方对大鼠巴豆油性肉芽囊的渗出和棉球肉

芽肿增生均有显著抑制作用，以对前者为强；而大、小柴胡汤的抗炎作用则以对晚期炎症为强，本方抗炎作用的上述特点与其适用于治太阳少阳合病而有表证未去者，即多用于急性炎症性疾病相符。⑤毒性 《药学杂志》（1980；6:602）：本方毒性小，大鼠连续口服4周，对生长发育、肝、脾、肾上腺、胸腺的重量等均无显著影响，电镜观察肝脏之超微结构变化以及生化检测等均表明本方对肝脏蛋白含量、葡萄糖-6-磷酸酶、5-核苷酸酶、琥珀酸胞嘧啶还原酶以及NADH胞嘧啶还原酶等活性也均无影响。

11331 柴胡破瘀汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】 柴胡 黄芩 半夏 甘草 赤芍 当归 生地各等分 五灵脂 桃仁各减半

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 ①《医学入门》：蓄血症，及热入血室。②《东医宝鉴·杂病篇》：产后因伤寒，热入血室或恶露不下。

【加减】 大便闭，加大黄一片。

【宜忌】 非瘀血症，不可轻用。

11332 柴胡消肿汤

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】 黍粘子（炒） 黄连各五钱 归尾 甘草各一两 花粉 黄耆各一钱五分 黄芩 柴胡各二钱 连翘三钱 红花五分 玄参一钱

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二钟，煎八分，食后热服。

【主治】 马刀疮肿盛。

【宜忌】 忌酒、湿面、房劳、气怒。

11333 柴胡消痈汤

【方源】《古今名方》。

【组成】 柴胡10～20克 夏枯草 紫地丁 三颗针各10克 黄芩 白芍 芦消各5～10克 野菊花5克 郁金 大黄 法半夏 甘草各3～5克

【功用】 清热解毒，通里泻火。

【主治】 胆道感染，痈疡型（脓毒型）。

【加减】 热重，重用柴胡、黄芩，选加紫地丁、野菊花、黄连；大热、大渴、脉洪大者，加石膏、知母、天花粉、鲜芦根；湿重，重用茵陈、郁金、金钱草、栀子、大黄；痛重，加玄胡、川楝子；呕吐，加半夏、竹茹、生姜；驱蛔，加苦楝根皮、槟榔、使君子；瘀血，加丹参、川芎、红花；气阴欲脱，加独参汤、生脉散。

11334 柴胡陷胸汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】 柴胡一钱 姜半夏三钱 小川连八分 苦桔梗一钱 黄芩一钱半 栝楼仁（杵）五钱 小枳实一钱半 生姜汁四滴（分冲）

【功用】 和解开降达膜。

【主治】 少阳结胸，症见少阳证具，胸膈痞满，按之痛，用柴胡枳桔汤未效者。现用于慢性胆囊炎急性发作、急性支气管炎。

【临证举例】 ①慢性胆囊炎急性发作 《云南中医杂志》（1982；3:33）：李某某，女，55岁，营业员，1980年10月5日初诊。患者11年前患急性胆囊炎后，常觉右胁胀痛，近年来渐觉怠倦乏力，大便艰涩，二、三日方一行。前日突觉右胁胀痛难忍，恶寒发热，口苦，胸闷，恶心，大便秘结，小便黄少，面色黯黄，精神不振，舌苔薄黄，脉沉细。证属肝胆湿热气滞，然因病久体弱，不可过用苦寒攻剂，当辛开苦降，调达气机，予柴胡陷胸汤加郁金10克，木香10克，二剂之后，大便畅行，证情减轻，再进四剂，诸证消失。②急性支气管炎《云南中医杂志》（1982；3:33）：胡某某，男，40岁，工人，1981年1月27日初诊。病人素体消瘦，面白无华，胃纳不佳。五天前开始恶寒发热，鼻塞流清涕，头痛，咽痒，咳嗽吐少许白稠痰，自服西药后，头痛恶寒鼻塞减轻，但咳嗽频频，痰多黄稠，微觉喘急，汗出畏风，动则发热，口粘苦，脘闷不饥，苔白黄而腻，脉濡滑。证属风寒咳嗽化热，痰热互结，而表邪未净，当透表清热，化痰止咳，用柴胡12克，黄芩10克，黄连5克，姜半夏10克，瓜蒌仁15克，枳实10克，桔梗10克，生姜15克，杏仁10克。连进三剂痊愈。

11335 柴胡通经汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 柴胡 连翘 当归梢 生甘草 黄芩 鼠粘子 京三棱 桔梗各二分 黄连五分 红花少许

【用法】 上锉，如麻豆大，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，稍热食后服。

【主治】 小儿项侧马刀疮，坚而不溃。

【宜忌】 忌苦药泄大便。

11336 柴胡清肝汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 川芎 当归 白芍 生地黄 柴胡 黄芩 山栀 天花粉 防风 牛蒡子 连翘 甘草节各一钱

【用法】 水二钟，煎八分，食远服。

【主治】 ①《外科正宗》：鬓疽初起未成者，毋论阴阳表里。②《医部全录》：肝火壅盛，并胁生痈疽。

【临证举例】 耳廓湿疹 《北京中医》（1985；2：30）：谢某，男，57岁，1966年3月16日初诊。右耳廓红肿瘙痒已三天，听力好，无耳鸣，但感口苦，大便干，小便黄。查：右耳廓红肿发热，外耳道未见异常。舌尖红，苔白腻微黄，脉弦滑。证属肝胆湿热，循经上攻。治宜清利肝胆湿热之法：醋柴胡5克，当归10克，赤芍6克，生地10克，川芎3克，炒山栀5克，炒牛蒡子10克，防风4.5克，天花粉6克，连翘10克，车前子15克（包煎），甘草3克。水煎服两剂。药后，耳廓肿消痒止而告痊愈。

11337 柴胡清肝散

【方源】《明医杂著》卷六。

【异名】 柴胡清肝饮（《证治汇补》卷四）。

【组成】 柴胡 黄芩（炒）各一钱 黄连（炒）山栀（炒）各七分 当归一钱 川芎六分 生地黄 牡丹皮各一钱 升麻八分 甘草三分

【用法】 水煎服。

【主治】 肝气郁结，风热外侵，颈项结核，肿痛不消，或有寒热；肝热犯脾，口唇肿裂；妇人肝火内盛，月经先期而量多者。

①《明医杂著》：肝胆二经风热、怒火，颈项肿痛，结核不消，或寒热往来，呕吐痰水；及妇人暴怒，肝火内动，经水妄行，胎气不安。②《口齿类要》：肝经怒火，风热传脾，唇肿裂，或患茧唇。③《证治汇补》：肝火口酸。

【加减】 脾胃弱，去芩、连，加苓、术。

11338 柴胡清肝散

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】 银柴胡 栀子（微炒） 连翘（去心） 胡黄连 生地黄 赤芍 龙胆草 青皮（炒） 甘草（生）

【用法】 灯心、竹叶为引，水煎服。

【主治】 肝疳。面目爪甲皆青，眼生眵泪，隐涩难睁，摇头揉目，合面睡卧，耳疮流脓，腹大青筋，身体羸瘦，燥渴烦急，粪青如苔。

11339 柴胡清燥汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】 柴胡 黄芩 陈皮 甘草 花粉 知母

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 瘟疫下后，或数下，膜原尚有余邪，未尽传胃，邪与胃气并，热不能顿除。

11340 柴胡葛根汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 柴胡 天花粉 干葛 黄芩 桔梗 连翘 牛蒡子 石膏各一钱 甘草五分 升麻三分

【用法】 水二钟，煎八分服，不拘时候。

【功用】 清热解毒。

【主治】 颐毒。表散未尽，身热不解，红肿坚硬作痛者。

11341 柴胡疏肝散

【方源】《准绳·类方》卷四引《统旨》。

【异名】 柴胡舒肝散（《验方新编》卷五）、柴胡疏肝汤（《不知医必要》卷二）。

【组成】 柴胡 陈皮（醋炒）各二钱 川芎 芍药 枳壳（麸炒）各一钱半 甘草（炙）五分 香附一钱半

【用法】 上作一服。水二钟，煎八分，食前服。

【功用】《杂病证治新义》：疏肝理气。

【主治】 因怒气郁而胁痛，寒热往来，痛而胀闷，不得俯仰，喜太息，脉弦。现用于神经官能症、中耳炎等。

①《准绳·类方》引《统旨》：胁痛。②《景岳全书》：胁肋疼痛，寒热往来。③《医钞类编》：肝实胁痛，不得转侧，喜太息。④《内科概要》：胁痛，因怒气郁者，痛而胀闷，不得俯仰，脉弦。

【方论选录】 ①《景岳全书》：柴胡、芍药以和肝解郁为主；香附、枳壳、陈皮以理气滞；川芎以活其血；甘草以和中缓痛。②《谦斋医学讲稿》：本方即四逆散加川芎、香附和血理气，治疗胁痛，寒热往来，专以疏肝为目的。用柴胡、枳壳、香附理气为主，白芍、川芎和血为佐，再用甘草以缓之，系疏肝的正法，可谓善于运用古方。

【临证举例】 ①神经官能症《四川中医》（1989；4：23）：一患者，自觉咽中有异物，多方检查结果均无异常，并见精神抑郁，时叹息，其症状每随情志波动而变化。治用本方加半夏、瓜蒌各15克。服药2剂，咽部异物感明显减轻，继服5剂而痊愈。②中耳炎 《四川中医》（1989；4：23）：一患者，自觉耳内胀闷堵塞，听力下降。西医诊断为"非化脓性中耳炎"。检查：耳鼓膜轻度充血并呈内陷。证属：肝气郁结，气血凝滞。治用本方加陈皮、僵蚕各12克，菖蒲6克。服药5剂，耳闭塞明显减轻，继服上方19剂，听力恢复，余症消除。

【现代研究】 对泌胆功能的影响 《实用中医内科杂志》（1989；1：11）：王昕等用雄性大白鼠制成肝郁模型，然后用本方灌胃给药，在腹腔麻醉条件

下，做胆汁引流，记录1小时胆汁流量。结果表明本方对肝郁动物的泌胆功能有显著的促进作用（P<0.01），其具体作用机制有待进一步研究。

11342 柴胡聪耳汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】连翘四钱 柴胡二钱 炙甘草 当归身 人参各一钱 水蛭五分（炒，别研） 麝香少许（别研） 虻虫三个（去足，炒，别研）

【用法】上除三味别研外，加生姜三片，水二大盏，煎至一盏，去滓，再下三味，上火煎一二沸，食远稍热服。

【主治】耳中干结，耳鸣耳聋。

11343 柴胡鳖甲丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】柴胡（去苗） 鳖甲（醋浸一宿，炙黄） 地骨皮 人参（去芦头） 枸杞子 白茯苓（去皮） 白芍药 知母 贝母（去心） 麦门冬（去心） 黄耆（蜜炙） 山栀子仁（炒）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎乌梅、青蒿、小麦汤送下，不拘时候。

【主治】虚劳客热，荣卫不和，全不思食，寒热相间，咳嗽痰涎，肢体倦怠，及伤寒汗后，余热不解，潮作寒热，日渐消瘦。

11344 柴胡鳖甲汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】柴胡（去苗） 一两 鳖甲（小便浸三日，逐日换小便，炙黄，去裙襕脊骨） 一两半 秦艽（去苗土） 桔梗（炒） 人参 芎劳 当归（切，焙） 白茯苓（去黑皮） 桂（去粗皮） 槟榔（锉） 紫菀（去苗土） 桑根白皮（锉） 地骨皮 生干地黄（焙） 白术 知母（焙） 芍药各一两 甘草（炙，锉）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水、童便各半盏，同煎至七分，去滓，通口服，空心、日午、临卧各一次。

【主治】虚劳潮热，心神烦躁，咳嗽盗汗，肢节痠痛，夜卧不安。

11345 柴胡鳖甲饮

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】鳖甲三钱（醋炙） 柴胡三分（盐水炒） 青蒿一钱半 地骨皮一钱半 丹皮一钱半 生地五钱 知母一钱半（盐水炒） 麦冬三钱（去心） 茯神二钱（去木） 乌梅三枚

【用法】水煎，去滓温服。

【功用】滋阴疏热。

【主治】虚劳，骨蒸烦渴，脉弦数。

【方论选录】生鳖甲滋阴散结，软柴胡疏热解蒸，青蒿叶解蒸热之余，地骨皮退肌表之热，丹皮凉血退蒸，茯神安神定志，麦冬清心热润肺，生地壮肾水滋阴，知母滋肾涤热以存阴，乌梅敛液生津以止渴。水煎温服，使热退阴生，则津液得全而骨蒸自退，虚劳无不愈矣。

11346 柴梗半夏汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】柴胡二钱 黄芩 半夏 枳壳 桔梗 瓜蒌仁各一钱 青皮 杏仁各八分 甘草四分

【用法】水煎，温服。

【主治】邪热挟痰攻注，发热咳嗽，胸满，两胁锉痛。

【加减】口燥渴，去半夏；痰在胁下，加白芥子或竹沥、姜汁。

11347 柴葛二妙汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 干葛 赤芍 苍术 黄柏 枳壳 厚朴 川芎 香附

【主治】寒疝，标寒束其本热，囊冷如冰，坚硬如石，阴茎不举，或控睾丸而痛，脉来滑大有力。

11348 柴葛败毒散

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】柴胡 干葛 人参 羌活 防风 荆芥 桔梗 苏叶 甘草

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】疑似伤寒。

11349 柴葛桂枝汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】嫩桂枝一钱 杭芍药一钱五分 北柴胡一钱 粉干葛一钱 炙甘草八分 老生姜一钱 大红枣五两

【用法】净水浓煎，热服。

【主治】小儿伤风，自汗发热。

11350 柴葛解肌汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【异名】葛根解肌汤（《古今医鉴》卷三）、柴胡解肌汤（《回春》卷二）。

【组成】柴胡 干葛 甘草 黄芩 芍药 羌活 白芷 桔梗

【用法】水二钟，加生姜三片，大枣二枚，随法用石膏末一钱，煎之热服。

【功用】①《伤寒六书》：解肌清热。②《方剂

学》：辛凉解肌，兼清里热。

【主治】 三阳合病，头痛发热，心烦不眠，恶寒无汗，嗌干耳聋，眼眶痛，衄血，脉浮洪而紧。现用于外感热病、沙门氏菌属感染、小儿上呼吸道感染高热等。

①《伤寒六书》：足阳明胃经受证，目疼，鼻干，不眠，头疼，眼眶痛，脉来微洪，属阳明经病；太阳、阳明合病，衄血，脉浮洪而紧者。②《幼科指南》：小儿发热胎疾。③《金鉴》：三阳合病，头痛发热，心烦不眠，嗌干耳聋，恶寒无汗，三阳证同见者。

【加减】 本经无汗，恶寒甚者，去黄芩，加麻黄，冬月宜加，春宜少，夏、秋去之，加苏叶。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足太阳、阳明药也。寒邪在经，羌活散太阳之邪（用此以代麻黄），芷、葛散阳明之邪，柴胡散少阳之邪；寒将为热，故以黄芩、石膏、桔梗清之（三药并泄肺热），以芍药、甘草和之也。②《删补名医方论》：葛根、白芷解阳明正病之邪；羌活解太阳不尽之邪；柴胡解少阳初入之邪；佐膏、芩治诸经热，而专意在清阳明；佐芍药敛诸散药而不令过汗；桔梗载诸药上行三阳；甘草和诸药通调表里。③《成方便读》：以柴胡解少阳之表，葛根、白芷解阳明之表，羌活解太阳之表，如是则表邪无容足之地矣。然表邪盛者，必内郁而为热，热则必伤阴，故以石膏、黄芩清其热，芍药、甘草护其阴，桔梗能升能降，可导可宣，使内外不留余蕴耳。用姜、枣者，亦不过借其和营卫，致津液，通表里，而邪去正安也。④《方剂学》：方用葛根、柴胡解肌退热为主药；羌活、白芷解表邪，并宣痹痛，黄芩、石膏清泄里热，四药均以为辅；白芍、甘草酸甘化阴，和营泄热，桔梗宣利肺气，以助疏泄邪气，生姜、大枣调和营卫，并以和中，五药均以为佐；甘草又兼调和诸药，是以为使。诸药寒温并用，辛凉为主，共成辛凉解肌、兼清里热之功。

【临床举例】 ①阳明伏暑 《徐渡渔医案》：阳明伏暑，经府交病，表热里泄，脉弦细数，五日。予柴葛解肌汤。②沙门氏菌属感染 《云南中医杂志》（1984；4:28）：乔某，男，7个月。发热咳嗽，喉中痰鸣，咽赤，全身灼热，体温39°～40℃。白细胞9700/mm³，分叶核45%，淋巴42%，嗜酸性0。西医诊断为沙门氏菌属感染，诸抗菌素用后症不减。精神不振，面赤气粗，烦躁不宁，咳嗽痰鸣，身灼无汗，口干咽赤，时而呕逆，小便短少。舌红苔腻，指纹紫黑。投本方两剂，加生姜一小片。当晚体温降至37.5℃，其它症状缓减，二剂后体温正常，诸症消失，仅见精神欠佳，口唇干燥。投益气养阴之剂调理之。两剂后愈。③外感热病 《湖北中医杂志》（1983；2:25）：万某某，男，发热、微恶风寒4天，伴头痛流涕，周身关节酸痛，曾用抗生素，退热镇痛剂治疗无效。诊见体温38.4℃，大汗出，咳嗽，咯痰白色，口渴欲饮，苔淡黄舌干，脉浮数。胸透提示Ⅲ型肺结核（增殖期）。时值炎夏，病由外感温热时邪所致，治宜清热解肌。拟柴葛解肌汤化裁：粉葛、柴胡、二花、石膏各30克，羌活、白芍、黄芩各18克，前胡、桔梗各15克，白芷12克，进一剂，诸证平息。④小儿上呼吸道感染高热 《新中医》（1986；9:29）：夏某某，男，9岁，1984年7月16日就诊。发热7天，初起微恶风寒，继则发热渐增，汗出不解，体温39～40.5℃，头痛神烦，鼻干口渴，舌红少津，苔薄黄，脉浮洪数。白细胞7600/mm³，中性65%，淋巴35%，肺部X线检查未见异常，肥达氏反应结果正常。诊断为病毒性上感，静滴红霉素、氢化考的松等药，体温不降。辨证为寒郁化热，内传阳明，故从阳明经治，用柴葛解肌汤加减：柴胡、黄芩、知母各10克，葛根12克，生石膏50克，羌活、白芷各7.5克，薄荷、甘草各5克。连服两剂，体温平复，诸症悉除。

11351 柴葛解肌汤

【方源】《医学心悟》卷二。

【组成】 柴胡一钱二分 葛根一钱五分 赤芍一钱 甘草五分 黄芩一钱五分 知母一钱 贝母一钱 生地二钱 丹皮一钱五分

【用法】 水煎服。

【主治】 春温夏热之病，其症发热头痛，与正伤寒同，但不恶寒而口渴。

【加减】 心烦，加淡竹叶十片；谵语，加石膏三钱。

【现代研究】 解热作用 《中西医结合杂志》（1985；6:378）：实验表明，本方有显著的解热效果，对于内毒素所致家兔发热，给药后4小时，对照家兔仍处明显发热状态，体温无下降趋势，但给予柴葛解肌汤的家兔，体温下降0.9℃。

11352 柴蒿鳖甲汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷九。

【组成】 柴胡二钱 青蒿一钱半 生鳖甲三钱 黄芩二钱 白芍三钱 丹皮三钱 鲜生地四钱 麦冬二钱 栀子二钱 生甘草一钱

【用法】 水五杯，煎二杯，分两次服。

【主治】 妇人病温，经水适来或适断，热入血室，耳聋口苦，昼则脉静身凉，夜则发热脉数。

【加减】 渴，加花粉；胸胁痞满而痛，加枳实、栝楼仁、牡蛎各三钱。

11353 柴芍六君子汤

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】 人参 白术（土炒） 茯苓 陈皮 半夏（姜制） 甘草（炙） 柴胡 白芍（炒） 钩藤钩

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 慢惊。脾虚肝旺，风痰盛者。

【临证举例】 ①眼睑瞤动 《湖南中医学院学报》(1989；4:209)：颜某，男，8岁。双目上眼睑不自主跳动，时作眨眼状，历时3个月。发作较剧时1分钟达20余次，父母劝阻不能罢，打骂不能止，苦于不能自制。伴见色萎形瘦，纳差，神疲懒动，咳嗽吐痰，舌淡红，苔白微腻，脉虚。证属土虚木贼，肝风内动之候。治当健脾化痰，柔肝止风。予柴芍六君子汤加天麻6克，僵蚕5克。服药2剂，眼睑跳动即现好转，精神稍佳，仍纳差，守原方加鸡内金6克，又4剂。服后精神振，胃纳增，眼睑跳动恢复正常。②慢惊风 《湖南中医学院学报》(1989；4:209)：欧某，女，18个月。阵发性抽搐2月余。始则10日半月一次，最近日发2～3次，多方诊治，疗效不好。惊风发作则手呈鸡爪，目上视，面呈青色，不省人事。须臾自止。症见面色苍白，头发稀疏而直立，纳呆，舌淡，指纹浅红。证属脾虚血少，木失滋荣，肝风内动。方以柴芍六君子汤加僵蚕3克，天麻6克，全蝎2克。服上方2剂惊风止，4剂胃纳增，后去虫药，守原方复进3剂，追访至年底，惊风未再发，神态颇佳。

11354 柴胡加芒消汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 柴胡二两十六铢 黄芩一两 人参一两 甘草一两（炙） 生姜一两（切） 半夏二十铢（本云，五枚，洗） 大枣四枚（擘） 芒消二两

【用法】 上以水四升，煮取二升，去滓，纳芒消，更煮微沸，分温再服，不解更作。

【主治】 ①《伤寒论》：伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利，此本柴胡证，下之以不得利，医以丸药下之而反利。②《张氏医通》：少阳过经不解。

【方论选录】 ①《医方集解》：此少阳、阳明药也。表证误下，邪热乘虚入胃，以致下利而满呕，潮热之证犹在，故仍与柴胡汤以解少阳，加芒消以荡胃热，亦与大柴胡两解同意。②《古方选注》：芒消治久热胃闭，少阳热已入胃而犹潮热、胁满者，则热在胃而证未离少阳，治亦仍用柴胡，但加芒消以涤胃热，仍从少阳之枢外出，使其中外荡涤无遗，乃为合法。

【临证举例】 ①热入血室 《伤寒论方医案选编》：郑某某，女，29岁，工人。患者月经来潮忽然中止，初起发热恶寒，继即寒热往来，傍晚发热更甚，并自言乱语，天亮时出汗，汗后热退，又复恶寒。口苦咽干，目眩目赤，胸胁苦满，心烦喜呕，不欲饮食，神倦，9天不大便。查询病史：结婚多年，未曾生育。月经不正常，一般3～4个月来潮一次，经期甚短，量少，继即恶寒发热，虽服药未能根治。舌苔白，脉弦数。予柴胡加芒消汤煎服，当日上午10时服药，下午4时许通下燥屎，所有症状解除，嘱常服当归流浸膏，月经恢复正常。至今4年未见复发，并生育2个女孩。②潮热腑实 《伤寒论方运用法》：患者女性，49岁。1961年8月6日初诊。发热十余日，经芳香清解，渗利导滞而寒热不退，入晚热高，微汗，连日来体温升降于37.8～38.8℃之间。不恶寒而恶热，头重目眩，四肢酸重，口苦，咽干，唇燥，面垢，喜饮而饮不多，不欲进食，胸闷，时作叹息，大便干燥难解，小便短少，腹胀满不舒，舌燥苔黄，脉弦而迟。病处少阳阳明两经之间，迭经汗下，中气嫌虚，拟小柴胡汤轻剂，加知母、芒消（冲服）泄热去实，服一剂。8月7日二诊，昨夜解燥屎二三枚，腹满减，胸腹较舒。今晨体温37.3℃，舌略润，苔薄黄，脉仍弦迟。续前法，原方加减共服四剂，热退净，调理而愈。

11355 柴胡茵陈五苓散

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】 五苓散一两 茵陈半两 车前子一钱 木通 柴胡各一钱半

【用法】 上分二服。用水一钟半，灯草五十茎煎服，连进数服。小便清利而愈。

【主治】 伤寒温湿热病，汗下太早，湿热未除，以致遍身发黄，小便赤黑，烦渴发热。

【加减】 酒后，加干葛二钱。

11356 柴胡桂枝干姜汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 柴胡桂姜汤（《金匮》卷上附方引《外台》）、姜桂汤（《全生指迷方》卷二）、桂姜汤（《三因》卷六）、姜桂饮子（《普济方》卷一九七）、柴胡姜桂汤（《玉机微义》卷九）、柴胡桂枝汤（《伤寒全

生集》卷二)、柴桂干姜汤(《医原》卷下)。

【组成】 柴胡半斤 桂枝三两(去皮) 干姜三两 栝楼根四两 黄芩三两 牡蛎三两(熬) 甘草二两(炙)

【用法】 以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,每日三次。初服微烦,复服汗出便愈。

【功用】 《经方研究》:和解少阳,兼化痰饮。

【主治】 伤寒四五日,身热恶风,颈项强,胸胁满微结,渴而不呕,但头汗出,往来寒热,及牡疟、劳疟、疟久不愈者。现用于肝炎、窦性心动过速、冠心病心动过缓、月经不调、乳腺囊性增生。

①《伤寒论》:伤寒五六日,已发汗而复下之,胸胁满微结,小便不利,渴而不呕,但头汗出,往来寒热,心烦者。②《外台》:伤寒四五日,身热恶风颈项强,胁下满,手足温而渴者。③《金匮》附方引《外台》:疟寒多微有热,或但寒不热。④《三因》:牡疟。⑤《普济方》:劳疟,及疟久不愈者。⑥《家塾方与方极》:小柴胡汤证而不呕、不痞,上冲而渴,腹中有动者。

【宜忌】 《外台》引《伤寒论》:忌生葱、海藻、菘菜。

【方论选录】 ①《伤寒明理论》:《内经》曰:热淫于内,以苦发之。柴胡、黄芩之苦,以解传里之邪;辛甘发散为阳,桂枝、甘草之辛甘,以散在表之邪;咸以软之,牡蛎之咸,以消胸胁之满;辛以润之,干姜之辛,以固阳虚之汗;津液不足而为渴,苦以坚之,栝楼之苦以生津液。②《古方选注》:以桂枝行太阳未罢之邪,重用柴胡、黄芩转少阳之枢,佐以干姜、甘草,开阳明之结,使以花粉,佐牡蛎深入少阴,引液上升,救三阳之热。不必治厥阴,而三阳结邪,一一皆从本经而解矣。用柴胡和少阳之阳,即用黄芩和里;用桂枝和太阳之阳,即用牡蛎和里;用干姜和阳明之阳,即用天花粉和里;使以甘草,调和阴阳,其分两阳分独重柴胡者,以正疟不离手少阳也;阴药独重于花粉者,阴亏之疟,以救液为急务也。③《金鉴》:少阳表里未解,故以柴胡桂枝合剂而主之,即小柴胡汤之变法也。去人参者,因其正气不虚;减半夏者,以其不呕,恐助燥也。加栝楼根,以其能止渴兼生津液也;倍柴胡加桂枝,以主少阳之表;加牡蛎,以软少阳之结。干姜佐桂枝,以散往来之寒;黄芩佐柴胡,以除往来之热,且可制干姜不益心烦也。诸药寒温不一,必需甘草以和之。初服微烦,药力未及;复服汗出即愈者,可知此证非汗出不解也。④《寒温条辨》:柴胡除少阳之寒热,桂枝解太阳之余邪,花粉彻阳明之渴热,干姜去胸胁之烦满,甘草调汗下之误伤,此少阳阳明两解之治法也。⑤《金匮玉函经二注》:用柴胡为君,发其郁伏之阳;佐以桂枝、干姜,散其肌表之痹;栝楼根、牡蛎为臣,除留热、消瘀血;佐以黄芩助柴胡,治半表半里;甘草以和诸药、调阴阳也。得汗则痹邪散,血热行而病愈耳。⑥《中国医学大辞典》:柴胡、桂枝、黄芩,并转少阳之枢,而达太阳之气;牡蛎则启厥阴之气,以解胸胁之结;栝楼根引水液上升,而止烦渴;汗下后,中气必虚,故用甘草理中。

【临证举例】 ①郁冒 《成绩录》:一农夫,年三十余,去年起,郁冒时发,有时稍吐血,盗汗,往来寒热,微渴而脐旁动悸,予本方治之而愈。②肝炎 《刘渡舟医案》:刘某某,男,54岁。患肝炎而腹胀作泻,不欲饮食,胁痛及背。服药无效,效果不显。某君请余为治。脉弦而缓,舌淡苔白,此乃肝病及脾,脾阳先衰之象。为疏柴胡桂枝干姜汤:柴胡12克,黄芩4.5克,炙甘草9克,干姜9克,花粉12克,牡蛎12克。凡四服而腹胀与泻俱止,饮食较前为多,精神亦有好转。后以肝脾共调,佐以健脾利湿之品,肝功化验日趋正常而愈。③窦性心动过速 《北京中医》(1988;3:19):康某,男,20岁。半年来胸闷心悸不止,形瘦颧红,左乳下其动应衣,每入夜则身冷寒战,至后半夜身热汗出而解,昼日无寒热,脘痞纳呆,口干唇燥,舌质红,舌体略胖,苔薄白,脉弦细疾数。心电图示:窦性心动过速,心率110次/分。予柴胡桂枝干姜汤加龙骨30克,五味子10克。服药三剂后心悸大减,寒热止,纳增,脉转和缓(90次/分)。上方剂量减半,再予三剂而愈。④冠心病心动过缓 《北京中医》(1988;3:19):赵某,女,60岁。三年前确诊为冠心病,现心中空虚怔忡,稍动作即心中憎憎大动,不能下地行走,已1月有余,曾服消心痛、活心丹等中西药不效。心电图:心率50次/分,ST段Ⅲ、V_5下移0.05。伴头昏身热,微恶寒,时自汗出,口干苦不欲饮,纳食尚好,神情郁闷,大便时溏时结。体丰,舌略红略胖,苔薄白微黄,脉迟缓。投柴胡桂姜汤加五味子6克,3剂,水煎服。药尽诸症均减,已下地活动,脉和缓(60~70次/分)。上方去五味子,加川贝10克,炒麦芽15克,继服3剂,追访至今未再发。⑤月经不调 《古方便览》:一妇人,平素月经不调,其气上冲,两胁急缩,腰痛不可忍,经行之时,脐下疼痛,下如豆汁,一日或半日即止,已十余年。诊

之，胸胁苦满，脐上动悸甚，予本方，服之数月，前证得愈。⑥乳腺囊性增生症 《新医药学杂志》(1979；1:33)：王某，女，39岁。左乳房外上方有一肿块，如核桃大，肿块近处，有黄豆大数粒小肿块，右乳房中上方稍偏外侧，有一肿块如大枣状，触之有痛感，质坚硬，推之可移，边界不清，而两腋下淋巴结不肿大，诊断为乳癖（乳腺囊性增生症），给以本方，服二十剂后，两侧乳房肿块全消，自觉症状消失而痊愈。三年后随访，未见复发。

【现代研究】 ①对内分泌腺的影响 《药学杂志》(1980；6:602～607)：实验研究证实，本方及单味柴胡可使肾上腺与胸腺等脏器发生重量变化，特别是柴胡的有效成分柴胡皂甙可使肾上腺肥大，造成胸腺萎缩，柴胡皂甙d的作用最显著。②保肝作用《药学杂志》(1984；7:798)：实验性肝损害证实，当腹腔注射D-半乳糖胺后，分别给与本方和小柴胡汤等柴胡方剂，能抑制血清转氨酶（GPT、GOT）上升（抑制率60%）。③抗癫痫作用 《生药学杂志》(1978；4:273)：本方加芍药的溶液对软体动物（蜗牛）的神经节细胞有抑制作用，实验表明有抗戊四氮（PTZ）作用，方中芍药、生姜、桂枝有与本方加芍药相同的抗PTZ作用。对小鼠听源性惊厥呈有意义的抑制，证实了在临床上抗癫痫的疗效。

【备考】 本方方名，《外台》引作“小柴胡汤”、“小柴胡桂姜汤”。

11357 柴胡加龙骨牡蛎汤

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 柴胡龙骨牡蛎汤(《伤寒总病论》卷三)。

【组成】 柴胡四两 龙骨 黄芩 生姜（切） 铅丹 人参 桂枝（去皮） 茯苓各一两半 半夏二合半（洗） 大黄二两 牡蛎一两半（熬） 大枣六枚（擘）

【用法】 以水八升，煮取四升，纳大黄，切如棋子，更煮一两沸，去滓，温服一升。

【功用】 ①《杂病广要》：下肝胆之惊痰。②《经方研究》：疏解泄热，重镇安神。

【主治】 ①《伤寒论》：伤寒八九日，下之，胸满，烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者。②《杂病广要》：癫痫。

【方论选录】 ①《内台方义》：用柴胡为君，以通表里之邪而除胸满，以人参、半夏为臣辅之，加生姜、大枣而通其津液；加龙骨、牡蛎、铅丹，收敛神气而镇惊为佐，加茯苓以利小便而行津液；加大黄以逐胃热、止谵语；加桂枝以行阳气而解身重错杂之邪，共为使。以此十一味之剂，共救伤寒坏逆之法也。②《伤寒来苏集》：取柴胡之半，以除胸满心烦之半里；加铅丹、龙、牡，以镇心惊，茯苓以利小便，大黄以止谵语；桂枝者，甘草之误也，身无热无表证，不得用桂枝，去甘草则不成和剂矣；心烦谵语而不去人参者，以惊故也。③《医方集解》：柴胡汤以除烦满，加茯苓、龙骨、牡蛎、铅丹，收敛神气而镇惊；而茯苓、牡蛎又能行津液、利小便，加大黄以逐胃热、止谵语；加桂枝以行阳气，合柴胡以散表邪而解身重，因满故去甘草。④《古方选注》：柴胡引阳药升阳，大黄就阴药就阴，人参、炙草助阳明之神明，即所以益心虚也；茯苓、半夏、生姜启少阳三焦之枢机，即所以通心机也；龙骨、牡蛎入阴摄神，镇东方甲木之魂，即所以镇心惊也；龙、牡顽钝之质，佐桂枝即灵；邪入烦惊，痰气固结于阴分，用铅丹即坠。至于心经浮越之邪，借少阳枢转出于太阳，即从兹收安内攘外之功矣。

【临证举例】 ①癫痫 《刘渡舟医案》：尹某某，男，34岁。胸胁发满，夜睡呓语不休，且乱梦纷纭，时发惊怖，精神不安，自汗出，大便不爽。既往有癫痫史，此病得之于惊吓之余。视其人神情呆滞，面色发青，舌红而苔白黄相兼，脉来沉弦。辨为肝胆气郁，兼阳明腑热，而心神被扰，不得潜敛之证。治宜疏肝泻胃，镇惊安神。予本方一剂，大便通畅，胸胁满与呓语皆除，精神安定，不复梦扰，唯欲吐不吐，胃中似嗜不适，上方加竹茹、陈皮，服之而愈。②恚怒卒倒 《生生堂治验》：一妇岁五十余，恚怒即少腹有物上冲，心绝倒，牙关禁闭，半许时自省，月一发，或二发，先生诊之，胸腹动悸，与柴胡加龙骨牡蛎汤数旬愈。③痰饮《王旭高医案》：心境沉闷，意愿不遂，近因患疟，多饮烧酒，酒酣之后，如醉如狂，语言妄乱，及今二日。诊脉小弦滑沉，舌苔薄白，小水短赤，大便不通，渴欲饮冷，昏昏默默，不知病之所在，因思疟必有痰，酒能助火，痰火内扰，神明不安，此少阳阳明同病而连及厥阴也。少阳为进出之枢，阳明为藏邪之薮。今邪并阳明，弥漫心包，故发狂而昏昏默默也。仿仲景柴胡加龙牡汤主之：柴胡、黄芩、半夏、茯苓、龙骨、甘草、牡蛎、铅丹、菖蒲、大黄、竹沥、姜汁。④神经官能症 《陕西中医》(1984；12:41)：梁某，女，32岁。2年多来，自觉头晕乏力，夜寐不安，心悸怔忡，胸脘痞闷，胃纳不佳，有时脘痛，大便不实，月经不调，白带

多。上述症状每因情志不畅而加重，自疑癌症。查无阳性体征，服中西药不效，苔薄，诊断为肝郁型神经官能症，予本方6剂后，症状明显好转；继服10余剂，除脘部略有不适，余症消失。⑤帕金森氏综合征 《上海中医药杂志》（1986；4:25）：潘某，女，59岁。高血压、动脉硬化史10年。两年前两手颤抖，走路不稳，西医诊断为帕金森氏综合征。给安坦、莨菪浸膏片、安定等治疗，病情好转。4个月前因精神刺激颤抖加重，继用上药无效。现患者两手呈有节律之细震颤，走路呈慌张病态，头部前倾，摇摆不止。胸部闷胀，烦躁口苦，小便黄赤。舌微红，苔边白中黄，脉弦劲。证属阴虚阳亢，郁怒化火，火盛生风，风火相煽，元神失主，筋脉失约所致。治宜调肝清热，潜阳熄风，镇惊安神。予本方加蜈蚣2条，水煎服。上方服12剂后颤抖明显减轻，继服24剂后颤抖消失，追访两年未复发。⑥舞蹈病 《北京中医学院学报》（1983；4:30）：张某，女，12岁。手足乱动、行走不稳、挤眉弄眼等5个多月，伴烦躁易怒，时时叹气，脉弦而细。某医院诊断为舞蹈病。证属邪入少阳，痰湿内郁，风邪外客。拟本方去铅丹、大黄，加白芍6克，生甘草6克，煎服3剂后诸症好转，继服30剂而愈。

【现代研究】 ①对小鼠自发运动量（SMA）的影响 《湖北中医杂志》（1986；6:48）：通过对SMA的观察，能了解对中枢神经系统有作用的药物对行为方面的影响。实验表明，本方对正常状态的小鼠的SMA没有影响，但呈现在兴奋时起抑制作用，在抑制时则起促进性的作用，这一效果具有重要意义，它为本方在临床的辨证应用提供了一个有力的依据。②对儿茶酚胺心血管损伤的保护作用《广东中医》（1959；12:510）：实验表明，本方可有效地保护机体抵抗儿茶酚胺（CA）的心血管损伤作用。③对血小板凝集功能的影响《黑龙江中医药》（1984；6:30）：实验表明，本方对血小板没有直接的凝集作用，但能增强肾上腺素对血小板的凝集作用；这种增强凝集的作用，可被育亨宾（α_2受体拮抗剂）阻断，而不被哌唑嗪（α_1受体拮抗剂）和乙基马来酰胺阻断。因此，其作用机理之一，可能是对α_2-肾上腺素能受体具有激动作用。④对肥大细胞颗粒及组胺释放的作用 《广西中医药》（1985；1:14）：shizuo Toda报道，本方对48/80复合物引起的小鼠腹腔肥大细胞颗粒及组织胺释放作用基本上无抑制作用，这可能是因为本方中龙骨、牡蛎所含有钙盐的关系。

11358 紧皮膏

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 石燕一对（煅末） 石榴皮 五倍子各三钱 黄连 明矾各一钱 刮铜绿五分 真阿胶 鱼胶 水胶各二钱

【用法】 上除胶，六味为末，用水三五碗，入大铜杓内文火煎熬，以槐、柳枝不住手搅为浓糊，将成膏，方入冰、麝各二分，研细搅匀，用瓷器内收贮。将新笔涂上下眼皮，每日三五次，干而复涂。毛自出矣，凉天可行此法，三日见效，轻者三十日全出，重者五十日向外矣。

【主治】 倒睫拳毛症。

11359 逍遥饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 当归二三钱 芍药一钱半 熟地三五钱 枣仁二钱（炒） 茯神一钱半 远志（制）三五分 陈皮八分 炙甘草一钱

【用法】 水二钟，煎七分，食远温服。

【主治】 ①《景岳全书》：妇人忧思过度，致伤心脾，冲任之源血气日枯，渐至经脉不调。②《叶氏女科》：妇人心脾气虚，胎虚不安。

【加减】 气虚，加人参一二钱；经水过期，兼痛滞，加酒炒香附一二钱。

11360 逍遥散

【方源】《局方》卷九。

【异名】 逍遥汤（《圣济总录》卷一六三）。

【组成】 甘草（微炙赤）半两 当归（去苗，锉，微炒） 茯苓（去皮，白者） 芍药（白） 白术 柴胡（去苗）各一两

【用法】 上为粗末。每服二钱，水一大盏，加烧生姜一块（切破）、薄荷少许，同煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【功用】 疏肝解郁，养血健脾。

①《内经拾遗》：调荣益卫，止嗽消痰。②《金鉴》：调肝理脾。③《医林纂要》：降火滋阴。④《方剂学》：疏肝解郁，健脾养血。

【主治】 肝郁血虚，两胁疼痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，往来寒热；妇人月水不调。

①《局方》：血虚劳倦，五心烦热，肢体疼痛，头目昏重，心忪颊赤，口燥咽干，发热盗汗，减食嗜卧；血热相搏，月水不调，脐腹胀痛，寒热如疟；及室女血弱阴虚，荣卫不和，痰嗽潮热，肌体羸瘦，渐成骨蒸。②《圣济总录》：产后亡阴血虚，心烦自汗，精神昏冒，头痛。③《得效》：产后血虚发热，感冒热潮。④《口齿类要》：血虚有热，

口舌生疮。⑤《女科撮要》：或因劳疲所伤，或食煎炒，血得热而流于脬中，小便带血。⑥《保婴撮要》：乳母肝脾有热，致小儿痘疮欲靥不靥，欲落不落。⑦《杏苑》：女子月经来少色淡，或闭不行。⑧《疡科选粹》：怒火而致翻花疮。⑨《医宗必读》：血虚小便不禁。⑩《医家心法》：肝胆二经郁火，以致胁痛、头眩，或胃脘当心而痛，或肩背绊痛，或时眼赤痛，连及太阳；六经伤寒阳证；或妇人郁怒伤肝，致血妄行，赤白淫，砂淋、崩浊。⑪《医林纂要》：心肝郁而致肝痈，左胁痛，手不可按，左胁见紫色而舌青。⑫《兰台轨范》：肝家血虚火旺，头痛目眩，口苦，倦怠烦渴，抑郁不乐，两胁作痛，小腹重坠。⑬《会约》：伤寒火郁于中，干咳连声而痰不来，或全无痰。⑭《方剂学》：肝郁血虚所致的神疲食少，乳房作胀，舌淡红，脉弦而虚者。

【方论选录】 ①《医方集解》：肝虚则血病，当归、芍药养血而敛阴；木盛则土衰，甘草、白术和中而补土；柴胡升阳散热，合芍药以平肝，而使木得条达；茯苓清热利湿，助甘、术以益土，而令心气安宁；生姜暖胃祛痰，调中解郁；薄荷搜肝泻肺，理血消风，疏逆和中，诸证自已，所以有逍遥之名。②《古方选注》：治以柴胡，肝欲散也；佐以甘草、肝苦急也；当归以辛补之；白芍以酸泻之；治以白术、茯苓，脾苦湿也；佐以甘草、脾欲缓，用苦泻之，甘补之也；治以白芍，心苦缓，以酸收之；佐以甘草，心欲软，以甘泻之也；加薄荷、生姜，人煎即滤，统取辛香散郁也。③《医林纂要》：因肝木受郁不得解，以至于生热，而血液枯竭，肝木亦未尝不虚，故既以归、姜补肝，又以术、苓厚培其根，以柴胡、薄荷条达其枝，所谓雷以动之，风以散之；然后泻之以酸，缓之以甘，畅遂肝气之方，莫此为最。④《成方便读》：此方以当归、白芍之养血，以涵其肝；苓、术、甘草之补土，以培其本；柴胡、薄荷、煨生姜俱系辛散气升之物，以顺肝之性，而使之不郁。⑤《方剂学》：方用柴胡疏肝解郁，当归、白芍养血补肝，三药配合，补肝体而助肝用为主；配伍入脾之茯苓、白术为辅，以达补中理脾之用；加入少许薄荷、生姜为佐，助本方之疏散条达；炙甘草为使者，助健脾并调和诸药。诸药合用，使肝郁得解，血虚得养，脾虚得补，则诸症自愈。

【临证举例】 ①伤寒 《马元仪医案》：恶寒发热，倦怠懒言，神气怯弱，两脉虚弦，此甲木内郁，生气不荣，阳明受病也。是皆木郁土衰之故，木气既郁，惟和风可以达之，阴雨可以滋之，逍遥散。②肝郁内热 《南雅堂医案》：肝郁木不条达，致成内热，拟用逍遥散加减法：柴胡一钱五分，当归身二钱，炒白芍二钱，白茯苓三钱，广郁金一钱，甘草七分，薄荷五分，生姜一片。③呕吐 《南雅堂医案》：呕吐时作时止，每吐必尽倾而出，症系肝郁所致，法宜开郁平肝，庶木气条达，则其患自平。仿逍遥散法：柴胡一钱，白芍药三钱，白术三钱，当归身二钱，白茯苓三钱，陈皮八分，甘草五分，生姜两片。④月经不调 《南雅堂医案》：经水不调，咳嗽，潮热往来，骨蒸劳热，口干，大小便不爽，血虚肝燥使然，拟用逍遥散。⑤血风疮 《外科发挥》：一妇人患此作痒，五心烦热，以逍遥散数剂而止。⑥牙痛 《校注妇人良方》：一妇人发热齿痛，日晡益甚，月水不调，此脾经血虚，用逍遥散加升麻寻愈。后因怒复痛，仍以前药加川芎而痊。

【现代研究】 ①对中枢神经系统的影响 The KAMPO，(1983；2:13)：实验表明，逍遥散能增强硫贲妥钠、戊巴比妥钠等对小鼠的麻醉作用，延长其麻醉时间，增强麻醉效果，具有显著的镇静作用；对戊四氮所致小鼠惊厥有明显保护作用，能降低死亡率，减轻惊厥程度，具有一定的抗惊作用。醋酸扭体法实验表明，本方能显著减少小鼠扭体次数，具有明显的镇痛作用。②对性腺功能的影响 The KAMPO，(1983；12:13)：实验表明，本方具有温和的雌激素样活性，此作用是通过卵巢实现的。③保护肝脏作用 《山西医药杂志》，(1976；2:71)：实验表明，本方能使血清谷丙转氨酶活力下降，肝细胞变性坏死减轻，并可使肝细胞内糖元与核糖核酸含量趋于正常，方中以茯苓、当归的作用最为显著。

【备考】 将本方改为丸剂，名“逍遥丸”（见《中国药典》）。

11361 逍遥散

【方源】 《女科万金方》。

【组成】 麦门冬二钱五分 当归四钱 白芍四钱 柴胡四钱 黄芩 川芎 熟地各三钱 半夏二钱五分 甘草一钱五分

【用法】 分四帖。每帖加生姜三片，水二钟，煎八分，空心服。

【功用】 补血，扶脾胃，调经水。

【主治】 室女十七八岁时脾胃虚弱，误食生冷，经脉不通，或阻百日，或半年，颜色有异，饮食少进，寒热往来，四肢困倦，头疼目眩，腹疼恶心，

烦热呕吐，腹胀。

【加减】 呕吐，加白术、砂仁、香附各三钱；咳嗽气急，加五味子、苏叶、桔梗各二钱。

11362 逍遥散

【方源】《赤水玄珠》卷二十。

【组成】 地骨皮 甘草 黄芩 川芎各三钱 北柴胡五钱 香附三钱

【用法】 加竹叶十片，水煎，空心服。

【主治】 日夜虚热，脉微细。

11363 逍遥散

【方源】《女科切要》卷一。

【组成】 当归 白芍 茯苓 白术 甘草 柴胡 薄荷 丹皮 山栀

【功用】 解郁调经，和气血。

【主治】 肝郁血虚，妇人经闭及月经不调。

①《女科切要》：妇人胃气不调，貌本壮实，饮食渐减，经水不通。②《笔花医镜》：肝经血虚木郁。③《全国中药成药处方集》（北京方）：月经不调，脐腹胀痛，午后烦热，精神疲倦。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（北京方）：忌气恼劳碌。孕妇忌服。

【备考】 本方改为丸剂，名“逍遥丸”（见《全国中药成药处方集》北京方）。

11364 逍遥蒌贝散

【方源】《中医外科学》。

【组成】 柴胡 当归 白芍 茯苓 白术 瓜蒌 贝母 半夏 南星 生牡蛎 山慈菇

【用法】 水煎服。

【功用】 疏肝理气，化痰散结。

【主治】 乳癖、瘰疬、乳癌初起。

11365 唤痔散

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】 翻肛散（《外科十三方考》）。

【组成】 草乌（生用）一钱 刺猬皮一钱（烧存性） 枯矾五钱 食盐（炒）三钱 麝香五分 冰片二分

【用法】 上为细末。先用温汤洗净肛门，随用津唾调药三钱，填入肛门，片时痔即当出，去药，上护痔膏。

【主治】 内痔不得出。

11366 眩晕汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】 生地二钱 当归一钱 川芎八分 藁本六分 丹参一钱 麦冬六分 陈皮八分 升麻三分

【用法】 水煎服。

【主治】 血虚眩晕。

11367 眩晕汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】 黄耆二钱 玉竹二钱 白术一钱 香附一钱 川芎八分 半夏八分 山药一钱 吴萸八分

【用法】 水煎服。

【主治】 气虚眩晕。

11368 鸭头丸

【方源】《医方类聚》卷一二八引《济生》。

【组成】 甜葶苈（略炒） 猪苓（去皮） 汉防己各一两

【用法】 上为细末，绿头鸭血为丸，如梧桐子大。每服七十丸，用木通汤送下。

【主治】 水肿。面赤烦渴，面目肢体悉肿，腹胀喘急，小便涩少。

11369 蚌津散

【方源】《洞天奥旨》卷十六。

【组成】 水中大蚌

【用法】 置大碗中，任其口开，用冰片二三分、当门麝二三分为末，挑人蚌口内，即浆水流人碗内，再加冰片、麝香少许。用鸡翎扫伤处，先外而内遍扫，随干随扫。凉入心脾，便不痛而愈。

【主治】 汤泡火烧。

【备考】 如所扫之处，不肯干，必溃烂，将蚌壳烧灰存性为末，入冰、麝少许掺之妙。

11370 恩袍散

【方源】《卫生宝鉴》卷十二。

【异名】 秋莲散（《普济方》卷一九〇）。

【组成】 生蒲黄 干荷叶各等分

【用法】 上为末。每服三钱，食后浓煎桑白皮汤放温调下。

【主治】 咯血、吐血、唾血及烦躁。

11371 哭来笑去散

【方源】《古今医鉴》卷九引齐双泉方。

【组成】 雄黄 乳香 胡椒 麝香 荜茇 良姜 细辛各等分

【用法】 上为末。每用少许，吹男左女右鼻中；如牙痛脸肿，用纸捲药末在内作条，蘸香油点着，燎牙痛处，火灭再燃再燎，条烧尽则止。

【主治】 牙齿痛，脸肿。

11372 圆明膏

【方源】《东垣试效方》卷五。

【组成】 柴胡五钱 麻黄（微捣）五钱（去节） 当归身三钱 生地黄半两 黄连五钱 甘草二钱 诃子皮二钱（湿纸裹，煨）

【用法】 先以水二碗，熬麻黄至一碗，掠去沫，外六味各㕮咀，如豆大，筛去末，称毕，入在内同熬，滴入水中不散，入去沫，蜜少许再熬动。如常点之。

【主治】 劳心过度、饮食失节而致内障生翳，及瞳子散大。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足少阳、厥阴药也。柴胡、麻黄发散表邪，当归、生地和肝养血，黄连清肝火，甘草和中州，瞳子散大，故加诃子以收之也。②《医林纂要》：障翳自内，火妄血枯，内枯而瞳散，外浊而翳生。故君生地而协以归、连、甘草，以治内也；翳成于外矣，散以柴胡、麻黄，自内而拔之于外；目阴欲尽，诃子皮以敛之。

11373 圆明内障升麻汤

【方源】 《兰室秘藏》卷上。

【异名】 冲和养胃汤（原书同卷）、内障升麻汤（《杏苑》卷六）。

【组成】 干姜一钱 五味子二钱 白茯苓三钱 防风五钱 白芍药六钱 柴胡七钱 人参 炙甘草 当归身（酒洗） 白术 升麻 葛根各一两 黄耆 羌活各一两五钱

【用法】 上㕮咀。每服五七钱，水三大盏，煎至二大盏，入黄芩、黄连二钱，同煎数沸，去滓，煎至一盏，食远热服。

【主治】 ①《兰室秘藏》：脾胃元气衰弱，心火与三焦俱盛，饮食不节，形体劳役，心不得休息，而致内障。②《准绳·类方》：内障初起，视觉微昏，空中有黑花，神水变淡绿色，次则视物成二，神水变淡白色；久则不睹，神水变纯白色。

【方论选录】 《准绳·类方》：因肝木不平，内挟心火，故以柴胡平肝、人参开心、黄连泻心火为君；酒制当归荣百脉，五味敛百脉之沸，心包络主血，白芍药顺血脉，散恶血，为臣；白茯苓泻膀胱之湿，羌活清利小肠之邪，甘草补三焦，防风升胆之降，为佐：阴阳皆总于脾胃，黄耆补脾胃，白术健脾胃，升麻、葛根行脾胃之经；黄芩退壮火，干生姜入壮火为导为使。

11374 钻胃丸

【方源】 《鸡峰》卷二十。

【组成】 大黑附子一枚（去心，以刀子剜开成瓮子，入硇砂半钱、焰消半钱，以蒸饼剂生裹附子，慢火煨面焦熟，剥去面不用，只留附子用之） 橘皮一两（须是好红色者，汤浸，去白瓤，每以一片子裹巴豆一粒，同米半升入铫内，慢火炒令熟，巴豆不用，只留橘皮用之） 半夏曲 青皮各一两 丁香一百二十粒 天南星一两 胡椒一百二十粒 藿香 荜茇 蜜姜 柿蒂 白术各一两

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如弹子大。每服一丸，生姜一大块，纳药一丸在生姜内，湿纸裹煨熟，和生姜嚼吃，空心米饮送下。

【功用】 和暖脾胃，消进饮食。

【主治】 一切膈气，及一切气疾。

11375 铁酒

【方源】 《圣济总录》卷一一四。

【异名】 铁液酒（《普济方》卷三六四）。

【组成】 铁五两 酒一升

【用法】 烧铁令赤，投酒中，去铁饮之；仍以磁石塞耳中。

【主治】 ①《圣济总录》：耳聋。②《普济方》：大人及小儿十岁以上耳聋、脓耳及耳后生疳疮。

11376 铁门闩

【方源】 《春脚集》卷二。

【组成】 玄胡 莪术 良姜 五灵脂 当归各等分

【用法】 每服一钱至三钱，用好陈醋温热一杯调服。

【主治】 胃气疼。

11377 铁井阑

【方源】 《本草纲目》卷三十六引《简便方》。

【异名】 铁井槛（《普济方》卷二七八）、铁井栏（《医统》卷九十三）。

【组成】 芙蓉叶（重阳前取，研末） 苍耳（端午前取，烧存性，研末）各等分

【用法】 蜜水调，涂四围。

【主治】 痈疽肿毒。

11378 铁围散

【方源】 《丹溪心法》卷五。

【组成】 乳香 没药半两 大黄 黄柏 黄连 南星 半夏 防风 皂角刺 木鳖子 瓜蒌 甘草节 草乌 阿胶

【用法】 上为末，醋调成膏，砂石器内熬黑色。鹅翎敷之。

【主治】 痈疽肿毒。

【备考】 方中除没药外，余药用量原缺。

11379 铁刷汤

【方源】 《局方》卷三（宝庆新增方）。

【异名】 铁刷散（《景岳全书》卷五十八）。

【组成】 良姜（油炒）六两 茴香（炒）二两 甘草（炙）八两半 苍术（米泔浸一宿）八两

【用法】 上为细末。每服二钱，加生姜三片，盐一捻，水一盏，煎至七分，温服，或热酒调下亦得；如脾寒，用酒一盏煎，临发时连进三服；四方之人不伏水土，小儿脏寒脱肛，并加生姜三片，大枣一枚，水煎服；冒暑伏热，擦生姜冷水调下；行路早起，大枣一枚（去核），包药少许，同生姜三片嚼下。

【主治】 ①《局方》（宝庆新增方）：男子脾积心气痛，妇人血气刺痛，中酒恶心，一切疟痢气疾，肠风下血脏毒，滑肠泄泻，四方之人不伏水土；小儿脏寒脱肛，冒暑伏热，四时非节疫疠，痧瘴。②《普济方》：黄疸，面目遍身如金色。

11380 铁刷汤

【方源】《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】 香附子六两 桔梗一斤半 甘草一斤 干姜半斤 肉桂（去粗皮）四两 茴香半斤 良姜 陈皮各十二两

【用法】 除肉桂外，同炒，为细末。每服一钱，入盐少许，沸汤点下，不拘时候。

【功用】 快气。

【主治】 胃气不和，心腹疼痛；饮酒过度，呕哕恶心，脾痛翻胃；内感风冷，肠鸣泄泻；妇人血气刺痛。

11381 铁砂丸

【方源】《古今医鉴》卷六引思恒方。

【组成】 苍术三两（米泔制，炒） 香附三两（醋炒） 白术一两 猪苓一两 泽泻一两 茯苓一两 茵陈一两五钱 牛膝一两 槟榔一两 木瓜一两 草果一两 砂仁一两 枳壳一两五钱（麸炒） 青皮一两 陈皮一两五钱 三棱一两（醋炒） 莪术一两（醋炒） 当归一两 神曲二两 青矾三两（麸炒黑）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服九十丸，温酒送下；醋汤亦可。

【主治】 黄疸，腹内有块。

11382 铁骨丹

【方源】《直指》卷三。

【组成】 川乌头 草乌头（各炮，去皮脐尖） 川芎 当归（酒浸，晒） 辣桂 川续断（洗，晒） 华阴细辛 补骨脂（炒） 乌蛇（洗，酒浸，取肉，晒干）七钱半 直僵蚕（炒去丝） 木鳖子（去壳，炒熟） 天麻（酒浸，晒） 巴戟（酒浸，去心，晒） 防风 滴乳香 没药 麻黄（去节） 羌活 独活 坚白南星（炮熟） 白蒺藜（炒，捣去刺） 薏苡仁 苍术（炒）各半两 萆薢（盐水煮干） 杜仲（去粗皮，锉，姜汁制，炒焦） 牛膝（酒浸，晒）各一两 虎胫骨（洗，酒浸，炙焦） 自然铜（烧红，醋淬七次）各三两 白附子（炮） 川五灵脂各四钱 秦艽 全蝎（去毒，微炒）各二钱半 麝香半钱

【用法】 上为细末，乳香、没药、麝香别研，渐入拌和，以浸药酒调飞面煮糊为丸，如弹子大。每服一丸，温酒磨下，或宣木瓜煎汤送下、黑豆淋酒送下，不拘时候。仍间用高良姜（碎）一升煎汤围熏，汤浴最妙。未服药前，须以斑蝥二十一个（去翅足），用黑豆一建盏，慢火同炒焦，只用七个，并豆入全蝎十四枚（微炒），五灵脂二钱半，为末，糕糊为丸，如麻子大，每服二十一丸，老酒送下，先去其风根。

【主治】 诸风瘫痪拳挛，半身不遂。

【备考】 方中川乌头至补骨脂等八味用量原缺。

11383 铁粉丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 铁粉一两（细研） 生干地黄三两 鸡腿胫二两（微炙） 牡蛎二两（烧为粉） 黄连一两（去须）

【用法】 上为末，入研了药，令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 消肾。心肺热极，羸瘦乏力，口干心烦，小便如脂。

11384 铁粉丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】 铁粉（研，水飞过，干称）三两（再研） 鸡腿胫（阴干） 五枚（炙熟） 黄连（去须）三两 牡蛎（炒，研如面）二两

【用法】 上四味，先捣二味为细末，再与铁粉、牡蛎研匀，炼蜜和剂，以酥涂杵熟捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至四十丸，食前煎粟米饮送下。

【主治】 消渴。脏腑枯燥，口干引饮，小便如脂。

11385 铁粉散

【方源】《得效》卷八。

【组成】 颗块大朱砂一两（另研） 红明琥珀一两（另研） 天南星二两 圆白半夏二两 白矾（煅）五钱 真铁粉 白附子各二两 大川乌（生，去皮脐）一两半 羌活二两半 全蝎五十个 真金箔三十片 僵蚕一两（去丝嘴）

【用法】 上为末。每服四钱，生姜四两净洗，取

自然汁，温暖调服；如不任辣味，加温水少许服。

【主治】 癫狂谵语，乱说视祟，不避亲疏，登高履险，或歌或笑，裸体，不饮食，数日昏不知人；及风证狂怒，或如醉如痴。

11386 铁桶膏

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】 铁箍散(《外科传薪集》)。

【组成】 铜绿五钱 明矾四钱 胆矾三钱 五倍子（微炒）一两 白及五钱 轻粉 郁金各二钱 麝香三分

【用法】 上为极细末，用陈米醋一碗，杓内慢火熬至一小杯，候起金色黄泡为度，待温，用上药一钱搅入膏内。每用炖温，用新笔将膏涂疮根上，以绵纸盖其疮根。自生皱纹，渐收渐紧，再不开大为效。

【功用】《青囊秘传》：拔毒消肿。

【主治】 发背将溃已溃时，根脚走散不收束。

11387 铁笛丸

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】 当归（酒洗）一两 怀熟地黄一两 怀生地黄一两 天门冬（去心，盐炒）五钱 黄柏（蜜炒）一两 知母五钱 麦门冬（去心，盐炒）五钱 玄参三钱 白茯苓（去皮）一两 诃子五钱 阿胶（炒）五钱 入乳一碗 牛乳一碗 乌梅肉十五个 甜梨汁一碗

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如黄豆大。每服八九十丸，诃子汤送下；萝卜汤亦可。

【主治】 声嘶失音。

11388 铁脚丸

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】 皂角（炙，去皮子）不拘多少

【用法】 上为末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，酒送下。

【功用】《医方考》：化下焦之气，通膀胱之滞。

【主治】 ①《宣明论》：大小便不通。②《医方考》：少腹急，小便不通，气不化者。

【方论选录】《医方考》：皂角之气，能通关开窍，皂角之味，能去垢涤污。

11389 铁弹丸

【方源】《局方》卷一（绍兴续添方）。

【组成】 乳香（别研） 没药（别研）各一两 川乌头（炮，去皮尖脐，为末）一两半 麝香（细研）一钱 五灵脂（酒浸，淘去沙石，晒干）四两（为末）

【用法】 先将乳香、没药于阴凉处为细末，次入麝香，次入药末再研，水为丸，如弹子大。每服一丸，食后、临卧以薄荷酒磨化下。

【功用】 通经络，活血脉。

【主治】 卒暴中风，神志昏愦，牙关紧急，目睛直视，手足瘛疭，口面㖞斜，涎潮语塞，筋挛骨痛，瘫痪偏枯，或麻木不仁，或瘙痒无常；及打扑伤损，肢节疼痛。

【方论选录】《本事方释义》：乳香气味辛微温，入手足少阴，没药气味苦平，入足阳明，皆能通瘀血、伸缩经络；五灵脂气味甘温，能通瘀行血，入足厥阴，川乌气味辛热，入足太阳少阴，风邪入骨者，非此不能达；再佐以麝香之走窜入窍，盖瘫痪之症，五脏无病，病在脉络，四肢麻痹不仁，表里之药俱不能却，非有毒通瘀辛香入络之品，不能直入病处。峻利之药而用丸剂者，亦缓攻之意也。

11390 铁弹丸

【方源】《三因》卷二。

【组成】 白附子 没药（别研） 虎胫骨（酒浸一宿，炙干） 全蝎 乌头（炮，去皮尖） 麻黄（不去节） 自然铜（烧存性，醋浸一宿）各一两 白花蛇（酒浸）半两 辰砂（别研）一分 五灵脂一分 木鳖子二十个（去皮，别研，不入罗） 脑麝各一分（别研） 乳香（柳木捶研）一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。用无灰酒一升浸一丸，分二十服；伤风鼻塞，分三十服，空心、临卧各一服；大风五丸可安。

【主治】 男子、妇人一切风疾，无问远近。瘫痪中风，口眼㖞斜，言语謇涩，手足躄曳，难以称举，或发搐瘛，或如虫行，或失音不语，牙关紧急，脚不能行，身体顽麻，百节疼痛，精神不爽，头虚烦闷，夜卧不安，多涎，胸膈不利，口干眼涩，多困少力，如破伤风，身如角弓，口噤不开，作汗如油；及洗头风，脑重，眉梁骨痛，卒中不语迷闷；白癜风，遍身瘾疹，鼻多清涕，耳作蝉鸣；小儿惊风，天钓搐搦；妇人血风，手足烦热，夜多虚汗，头旋倒地。

11391 铁箍散

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】 芙蓉花、叶（晒干）

【用法】 上为细末。以好醋调，敷贴患处；如杖疮赤肿，用鸡蛋清调贴；冷水亦可。加皂角少许尤妙。

【主治】 诸疮发背，疮疖肿毒，杖疮赤肿。

11392 铁箍散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 乳香 没药 大黄 黄柏 黄连 南星 半夏 防风 羌活 皂刺 木鳖子 瓜蒌根 阿胶 甘草节 草乌各等分

【用法】 上为末。醋调成膏，砂锅内火熬黑色，敷之，寒者热用，热者寒用。

【主治】 痈疽肿痛，赤晕散漫，及诸般疮疖。

11393 铁箍散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二引《石氏治疹经验良方》。

【组成】 白及 白蔹各一两 黄柏二两 山豆根 连翘 黄芩 乳香 没药各五钱 川乌六钱 地骨皮七钱 射干三钱

【用法】 上为末。茶酒调敷。

【主治】 疹后余毒，流注肌肉之间，结成痈疽，肿痛。

11394 铁布衫丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 自然铜（煅红，醋浸七次） 当归（酒洗，捣膏） 无名异（洗去浮土） 木鳖子（香油搽壳上，灰焙，用肉） 乳香 没药 地龙（去土，晒干） 苏木各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服三丸，用白汤送下，受刑前预服之。

【功用】 令受刑不痛。

11395 铅丹散

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】 铅丹二两 栝楼八两 茯苓 甘草（炙）各一两半 麦门冬八两（去心）

【用法】 上为散。每服方寸匕，且以浆水送下，每日二次。

【主治】 消渴。

11396 铅粉散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 黑铅（四两，铁杓化开，倾入水中，取起再化，如此百遍，以铅尽为度，去水澄下者）三钱 松脂一钱 黄丹（飞，炒）五分 轻粉五分 麝香一分

【用法】 上为末。先用葱汤洗净，麻油调，涂疮口，油纸盖外。

【功用】 回阳。

【主治】 冷疔生于脚上，初起紫白泡，疼痛彻骨，渐至腐烂，深孔紫黑，血水气秽，经久不愈。

11397 积气丸

【方源】《局方》卷三。

【组成】 巴豆一百个（去皮心膜，出油，取霜三钱） 桃仁（去皮尖，麸炒，别研）一两半 附子（炮，去皮脐）四两 米醋五升（以硇砂、大黄同用慢火熬成膏） 大黄（面裹，煨，去面，为末） 干漆（炒焦） 木香 鳖甲（醋炙黄）各一两 三棱（煨，乘热捣碎） 肉桂（去粗皮） 硇砂（研） 各二两 朱砂（研，飞） 麝香（别研）各二钱半

【用法】 上为细末，入研药匀，醋膏为丸，如梧桐子大。每服二丸，食后、临卧炒生姜汤温下，或木香汤亦得。

【主治】 阴阳不和，脏腑虚弱，寒冷之气留滞于内，使气积不散，胸胁支满，食即气噎，心腹膨胀，气刺气急，宿食不化，心腹引痛，噎气吞酸，停饮浸渍，恶心呕逆，癖块疼痛，脏腑不调，饮食不进，往来寒热，渐觉羸瘦，以致着床，面黄肌热，精神困顿。

【宜忌】 忌生冷，硬物。

11398 积气丹

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】 槟榔二个 芫花一两 硇砂二钱 巴豆二钱半（生） 青皮（去白） 陈皮各三钱 蓬莪术 鸡爪黄连 京三棱 章柳根 牛膝各一两 肉豆蔻三个 大戟 川大黄 甘遂 白牵牛 干姜 青礞石 干漆各半两 木香二钱半 石菖蒲三钱

【用法】 上为末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服一丸，临卧烧枣汤送下，每夜一丸或二丸。候肚内作声，病退为度。

【主治】 一切新久沉积气块，面黄黑瘦，诸气无力，癥瘕积聚，口吐酸水。

11399 秘丹

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】 黄连 花粉 人乳 地黄汁 藕汁

【用法】 上药蜜为膏。徐徐留舌上，以白汤送下。

【主治】 ①《脉因证治》：三消。②《回春》：吐血。

11400 秘元煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 远志八分（炒） 山药二钱（炒） 芡实二钱（炒） 枣仁（炒，捣碎）二钱 白术（炒） 茯苓各一钱半 炙甘草一钱 人参一二钱 五味子十四粒（畏酸者去之） 金樱子（去核）二钱

【用法】 水二钟，煎七分，食远服。

【主治】 肝肾亏虚，脾虚气陷，遗精滑精，小便频数，带浊漏下。

①《景岳全书》：遗精带浊、久遗无火，不痛而

滑者。②《证治宝鉴》：肝肾虚而精滑者。③《会约》：脾土虚陷，不能统摄荣血，而为漏为数。

【加减】 有火觉热者，加苦参一二钱；气大虚者，加黄耆一二三钱。

11401 秘红丹

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 川大黄细末一钱 油肉桂细末一钱 生赭石细末六钱

【用法】 将大黄、肉桂末和匀，用赭石末煎汤送下。

【主治】 肝郁多怒，胃郁气逆，致吐血、衄血，及吐衄之证屡服他药不效者；无论因凉因热，服之皆有捷效。

【加减】 身体壮实而暴得吐血者，大黄、肉桂细末各一钱半，将生赭石末六钱与之和匀，分三次服，白开水送下，约一点半钟服一次。

【方论选录】 平肝之药，以桂为最要，而单用之则失于热；降胃止血之药，以大黄为最要，胃气不上逆，血即不逆行也，而单用之又失于寒；若二药并用，则寒热相济，性归和平，降胃平肝，兼顾无遗。况俗传方，原有用此二药为散，治吐血者，用于此证当有捷效。而再以重坠之药辅之，则力专下行，其效当更捷也。

【临证举例】 吐血 一妇人，年近三旬，咳嗽痰中带血，剧时更大吐血，常觉心中发热。其脉一分钟九十至，按之不实。投以滋阴宁嗽降火之药数剂无效。自言夜间睡时，常作生气恼怒之梦，怒极或梦中哭泣，醒后必然吐血。遂用本方，吐血顿愈，恼怒之梦，亦以此不作。后又遇吐血者数人，投以此方，皆随手奏效。

11402 秘真丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【异名】 秘精丸(《百一》卷十五)、秘元丹(《御药院方》卷六)、秘精丹(《普济方》卷二一七)、秘真丹(《证治汇补》卷八)。

【组成】 龙骨（研）一两 诃梨勒（炮，取皮）五枚 缩砂仁（去皮）半两 丹砂（研）一两（留一分为衣）

【用法】 上为末，煮糯米粥为丸，如绿豆大，以丹砂为衣。每日空心热酒送下一丸，夜卧冷水送下二丸；或太秘欲通，用葱汤点茶服之。

【功用】 温中助阳，固精止尿。

①《御药院方》：助阳消阴，正气温中。②《明医指掌》：固精止尿。③《医宗必读》：固精安肾。④《医略六书》：镇坠固涩。

【主治】 心肾两虚，阳气衰微，精气不固，白淫不止，梦遗，小便不禁及有余沥，脉短涩。

①《圣济总录》：小便白淫不止。②《宣明论》：白淫，小便不止，精气不固，及有余沥，或梦寐阴人通泄。③《御药院方》：内虚里寒，冷气攻心，胁肋胀满，脐腹刺痛，呕逆泄泻，自汗时出，小便不禁，阳气衰微手足厥，久虚下冷，真气不足。④《医统》：精不禁，危急者。⑤《医略六书》：心肾两虚，遗溺，脉短涩。

【宜忌】 不可多服。

【方论选录】《医略六书》：龙骨固涩肾气，收束浮弱之脉；灵砂镇坠心神，降抑虚浮之气；砂仁炒黑归肾，调其蓄泄之权；诃子炒黄收脱，兜其遗失之溺也。覆盆膏丸，人参汤下，使真气布护，则心肾相交，而脬气自固，安有遗尿之患乎。此镇坠固涩之剂，为心肾虚浮遗溺之专方。

【备考】《医略六书》本方用法：覆盆膏为丸。每服三钱，参汤送下。

11403 秘真丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 五倍子一两（去净虫粪） 粉甘草八钱

【用法】 上为细末。每服一钱，竹叶煎汤送下，日再服。

【主治】 诸淋证已愈，因淋久气化不固，遗精白浊。

11404 秘真丹

【方源】《医学正传》卷六。

【异名】 秘真丸(《不居集》上集卷十九)。

【组成】 菟丝子（酒浸，炒） 韭子（炒） 柏子仁各一两 龙骨（煅） 牡蛎（煅，醋淬） 山茱萸（去核取肉） 赤石脂（煅）各五钱 补骨脂一两（炒） 远志（去心） 巴戟天（去心） 覆盆子 枸杞子 黄柏（盐酒炒黑色） 山药各七钱五分 芡实（去壳） 杜仲（姜汁炒丝断）各一两 金樱子（半青黄者，去刺核取肉，焙干）二两 干姜（炒黑色）一两 鹿角胶一两五钱（炒成珠）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心姜盐汤送下。

【主治】 好色肾虚，遗精梦泄，白淫白浊。

【备考】 本方方名，《医统》引作“经验秘真丹”。

11405 秘精丸

【方源】《济生》卷四。

【异名】 固精丸(《得效》卷七)、固本丸(《嵩崖尊生》卷十四)、固髓丹(《一见和医》卷四)。

【组成】 牡蛎（煅） 菟丝子（酒浸，蒸，焙，别研） 龙骨（生用） 五味子 韭子（炒） 桑螵蛸（酒炙） 白茯苓（去皮） 白石脂（煅）各等分

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心以盐酒、盐汤任下。

【主治】 ①《济生》：下虚胞寒，小便白浊或如米泔，或若凝脂，腰重少力。②《校注妇人良方》：小便无度。

11406 秘方化滞丸

【方源】《丹溪心法附余》卷三。

【异名】 化滞丸(《医统》卷二十三)。

【组成】 南木香（坚实者，不见火） 丁香（去苞，不见火） 青皮（四花者，去瓤） 红橘皮（水温去白） 黄连（大者）各二钱半 京三棱（慢火煨） 莪术（慢火煨）各四钱八分 半夏曲（拣白净半夏为末，生姜自然汁和为饼，晒干）二钱五分（前八味晒干，和研为细末） 巴豆（去壳，滚汤泡，逐一研开，去心膜，以瓦器盛，用好醋浸过一宿，慢火熬至醋干，称六钱，重为细末，将前药末和再研令匀，入后乌梅肉膏）四钱五分 乌梅（用肉厚者，打碎对核，细锉，火焙干，为细末，称五钱重，用米醋调略清，慢火熬成膏，和入前药）

【用法】 上药统和匀了，用白面八钱，重水调得所，慢火调糊为丸，如粟米大。每服五七丸，人盛者十丸，五更空心用橘皮汤送下；不欲通泄，津液咽下；停食饱闷，枳壳汤送下；但有所积物，取本汁冷下；因食吐不止，津液咽下即止；食泄不休及霍乱、呕吐，俱用冷水送下；赤痢，冷甘草汤送下；白痢，冷干姜汤送下；心动，石菖蒲汤送下；赤白痢，冷甘草干姜汤送下；诸气痛，生姜橘皮汤送下；小肠气痛，茴香酒送下；妇人血气，当归汤送下；若欲宣积，滚姜汤送下；痞积常服，米饮送下，不拘时候。利多饮冷水一口补住，此药得热则行，得冷则止。小儿量岁数加减丸服。

【功用】 磨滞，理气，化积，通塞，调阴阳。

【主治】 ①《丹溪心法附余》：停食饱闷，食泻，霍乱，呕吐，痢疾，气痛，小儿痞积。②《金鉴》：一切气滞积痛。

【宜忌】 孕妇勿服。

11407 秘方龙骨丸

【方源】《得效》卷十五。

【组成】 白牡蛎 北赤石脂 大赭石（以上并煅） 白龙骨 伏龙肝 海螵蛸 五灵脂 侧柏叶各等分 棕榈不拘多少（烧灰） 真蒲黄多加入

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十五丸，以十全大补汤三钱，加嫩鹿茸（去毛，酒炙）、阿胶（蛤粉炒）各一钱半，生姜三片，大枣二枚，乌梅二个，煎，吞服。

【主治】 半产后及下虚，数月崩漏不止。

11408 秘方苍术汤

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】 苍术 玄参 甘草 远志 茺蔚子各等分

【用法】 上㕮咀。每服五钱，入秦皮一片，水一钟半，煎至一钟，食后温服，滓再煎。

【主治】 视物不明。

11409 秘方定心丸

【方源】《赤水玄珠》卷十四引《统旨》。

【异名】 定振丸(《济阳纲目》卷四十五)、秘方定振丸(《医学六要·治法汇》卷五)。

【组成】 天麻（蒸熟） 秦艽（去芦） 全蝎（去头尾） 细辛各一两 熟地 生地 川归 川芎 芍药各二两 防风 荆芥各七钱 白术 黄耆各半两 威灵仙（酒洗）五钱

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，食远以白汤或酒送下。

【主治】 老人因风气及血虚战动而振。

11410 秘方枳壳汤

【方源】《医学正传》卷五引《局方》。

【异名】 枳壳汤(《杏苑》卷五)、枳壳川连汤(《症因脉治》卷四)。

【组成】 枳壳一两（麸炒黄色） 黄连二两（以槐花四两同炒，去槐花不用）

【用法】 量水煎浓汁，食前温服。

【主治】 ①《医学正传》引《局方》：大便肠风，下血。②《症因脉治》：膏粱厚味，致热积腹。

11411 秘方洗心散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】 荆芥 甘草 菊花 大黄 当归 芍药各等分

【用法】 上㕮咀。每服三钱，加生姜、薄荷少许，水一钟半，煎至一钟，去滓，食后温服。

【主治】 ①《葆光道人眼科龙木集》：目痛而身热。②《济阳纲目》：风邪客于腠理，湿气相争，停于两睑，目时赤痛。

11412 秘方换腿丸

【方源】《局方》卷一（续添诸局经验秘方）。

【异名】 换腿丸(《普济方》卷二十九)、换脚丸(《古今医鉴》卷十)。

【组成】 薏苡仁 石南叶 天南星（洗，姜制，

炒） 川牛膝（酒浸，焙） 肉桂（去粗皮） 当归（去芦） 天麻（去苗） 附子（炮，去皮脐） 羌活 防风（去叉） 石斛（去根） 草薢（微炙） 黄耆（蜜炙） 续断各一两 苍术（米泔浸） 一两半 槟榔半两 干木瓜四两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至五十丸，空心以温酒或木瓜汤吞下，一日二三次。

【功用】 舒筋轻足。

【主治】 肾经虚弱，下注腰膝，或当风取凉，冷气所乘，沉重少力，移步迟缓，筋脉挛痛，不能屈伸，脚心隐痛，有妨履地；干湿脚气，赤肿痛楚，发作无时，呻吟难忍，气满喘促，举动艰难，面色黧黑，传送秘涩。

11413 秘方猪苓汤

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】 猪苓 木通 栀子 大黄 金毛狗脊 萹蓄各等分

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水一钟半，煎至一钟，去滓温服，不拘时候。

【主治】 眼常见黑花如绳牵，时复落落蝇羽。

11414 秘方琥珀膏

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【异名】 立退丸、定志丸。

【组成】 人参二钱 石菖蒲（炮） 天门冬（去心） 远志（去心） 预知子各一两 白茯苓 麦门冬（去心）各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服十丸，茶清或水送下。

【主治】 旋螺突睛。

11415 秘方揩牙散

【方源】《得效》卷十七。

【组成】 良姜 细辛 大椒 草乌尖

【用法】 上为末。以指蘸少许揩牙上，噙少时，开口流去涎。

【主治】 牙疼，遇吃冷热独甚。

【备考】《普济方》本方用量：良姜、细辛、大椒、草乌尖各等分。

11416 秘方蝉花散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】 蝉花一两 菊花四两 白蒺藜二两

【用法】 上为末。每服三钱，清水调下。

【主治】 白膜遮睛。

11417 秘传二仙糕

【方源】《扶寿精方》。

【异名】 秘传三仙糕（《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《集略》）、八仙糕（《外科正宗》卷一）。

【组成】 人参 山药 白茯苓 芡实仁 莲肉（去皮心）各半斤 糯米一升半 粳米三升半 蜜半斤 白糖十斤

【用法】 上为细末，合匀，将蜜糖溶化，和末掺搓得宜，小木笼炊蒸之，上以米一撮成饭，则药成矣，取起尽作棋子块，慢火上烘干作点心，或为末，贮瓷器。每早一大匙，白汤调下。百日内见效。

【功用】 ①《扶寿精方》：固齿黑发，壮阴阳，益肾水，养脾胃。②《外科正宗》：轻身耐老，壮助元阳。

【主治】 ①《东医宝鉴·杂病篇》引《集略》：内伤脾胃虚弱，饮食不进者。②《外科正宗》：痈疽脾胃虚弱，精神短少，饮食无味，食不作肌，及平常无病，久病但脾虚食少，呕泄者。

11418 秘传飞步丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】 苍术八两 草乌（不去皮尖）四两 川芎 白芷各二两 葱白（连根） 生姜各四两

【用法】 上切细，作一处入罐内，封固罐口，倒覆阴土地上，在春停五日，夏三日，秋七日，冬十日，取出前剂晒干为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心茶、酒任下。

【主治】 诸风湿，瘫痪，痛风。

【宜忌】 忌热物，宜避风，孕妇勿服。

11419 秘传斗门散

【方源】《局方》卷六（续添诸局经验秘方）。

【异名】 秘传斗门方（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】 黑豆（炒，去皮）十二两 干姜（炮）四两 罂粟壳（蜜炒）半斤 地榆（炒） 甘草（炙）各六两 白芍药三两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，煎七分，温服。

【主治】 八种毒痢，脏腑撮痛，脓血赤白，或下瘀血，或成片子，或五色相杂，日夜频并，兼治禁口恶痢，里急后重，久渴不止，全不进食，他药不能治者。

11420 秘传正骨丹

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】 降真香 乳香 没药 苏木 松节 自然铜（醋煅七次） 川乌（炮） 真血竭各一两 地龙（去土，酒浸，烘干） 生龙骨各一钱 土狗十个（浸油内死，烘干）

【用法】 上为末。每服五钱，随病上下酒调服。觉药自顶门而至遍身，搜至病所，则飒飒有声而筋骨渐愈，病人自知之。服药后仍服人参、白术、黄耆、当归、川芎、肉桂、甘草、白芷、厚朴以调补元气。

【功用】 续筋骨。

【主治】 跌打损伤，骨折血瘀。

11421 秘传玉锁丹

【方源】 《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【异名】 玉锁丹（《普济方》卷二十九引《仁存方》）。

【组成】 茯苓（去皮）四两 龙骨二两 五倍子六两

【用法】 上为末，水为丸。每服四十丸，空心以盐汤送下，一日三次。

【主治】 心气不足，思虑太过，肾经虚损，真阳不固，漩有遗沥，小便白浊如膏，梦寐频泄，甚则身体拘倦，骨节痠疼，饮食不进，面色黧黑，容枯肌瘦，唇口干燥，虚烦盗汗，举动力乏。

【备考】 本方改为散剂，名“玉锁散”（见《不知医必要》）。

11422 秘传当归膏

【方源】 《直指》卷九。

【异名】 当归膏（《医学入门》卷七）。

【组成】 当归（酒洗）一斤六两 生地黄一斤（酒洗） 熟地黄三两（酒洗） 薏苡仁八两（米粉同炒） 白芍药一斤（粉炒） 白茯苓十二两 白术一斤 莲子四两（去心） 山药五两 人参四两（加洗用） 甘草三两 枸杞子一斤四两（甘州者佳） 贝母三两（去心） 地骨皮四两 麦门冬五两（去心） 天门冬二两（去心） 五味子一两 琥珀一钱二分

【用法】 上各锉细，和足，以水十斤，微火煎之，再加水十斤，如此四次，滤其滓，取汁，文武火煎之，如法为度，每斤加炼熟净蜜四两，春五两，夏六两，共熬成膏。

【功用】 养血和中，滋荣筋骨，养阴抑阳。

【主治】 五劳七伤，诸虚劳极，脾胃虚弱。

【加减】 吐血，加牡丹皮二两；骨蒸，加青蒿汁二碗，童便二碗；劳痰，加钟乳粉一两

11423 秘传延寿丹

【方源】 《良方集腋》卷上。

【异名】 延寿丹（《世补斋医书·文集》卷八）、首乌延寿丹（《中药成方配本》）。

【组成】 何首乌（取赤白两种，黑豆汁浸一宿，竹刀刮皮，切薄片晒干，又用黑豆汁浸一宿，次早柳木甑桑柴火蒸三柱香，如是九次，晒干）共七十二两 菟丝子（先淘去浮空者，再用清水淘，挤去沙泥，五六次，取沉者晒干，逐粒拣去杂子，取坚实腰样有丝者，用无灰酒浸七日方入甑，蒸七炷香，晒干，再另酒浸一宿，入甑蒸六炷香，晒干，如是九次，晒干磨细末）一斤 豨莶草（五六月采叶，长流水洗净，晒干，蜂蜜同无灰酒和匀拌潮一宿，次早蒸三炷香，如是九次，晒干为细末）一斤 桑叶（四月采取嫩叶，长流水洗净，晒干，照制豨莶法九制，取细末）八两 女贞实（冬至日摘腰子样黑色者，剥去粗皮，酒浸一宿，蒸三炷香，晒干，为细末）八两 忍冬花（一名金银花，摘取阴干，照豨莶草法九制，晒干，细末）四两 川杜仲（厚者是，去粗皮，青盐同姜汁拌潮，炒断丝）八两 雄牛膝（怀庆府产者佳，去根芦净，肉屈而不断，粗而肥大为雄，酒拌，晒干）八两 怀庆生地（取钉头鼠尾或原枝末，入水曲成大枝者有效，掐如米粒者，晒干，为细末）四两

【用法】 用四膏子（旱莲草熬膏一斤，金樱子熬膏一斤，黑芝麻熬膏二斤，桑椹子熬膏一斤）同前药末为丸，如膏不足，白蜂蜜增补，捣润方足。

【功用】 乌须黑发，却病延年。

【主治】 阴虚，脾虚，麻木，头晕，目昏，肥人痰湿多。

【加减】 阴虚，加熟地黄一斤；阳虚，加附子四两；脾虚，加人参、黄耆各四两，去地黄；下元虚，加虎骨一斤；麻木，加明天麻、当归各八两；头晕，加玄参、明天麻各八两；目昏，加黄甘菊、枸杞子各四两；肥人痰湿多，加半夏、陈皮各八两。

11424 秘传抱龙丸

【方源】 《种福堂方》卷四。

【组成】 赤芍一钱 川贝母一钱七分 防风五钱 桔梗三钱 明天麻一钱七分 钩藤三钱三分 枳壳三钱 薄荷叶三钱 胆星七钱 陈皮三钱 天竺黄三钱 茯神二钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如芡实大，朱砂为衣。每服一丸，以滚汤送下；有外邪者，姜汤送下。

【主治】 小儿着惊，唇青四肢摇动，起卧不安。

11425 秘传降气汤

【方源】 《局方》卷三（宝庆新增方）。

【组成】 桑白皮（炒）二两 骨碎补（去毛，炒） 草果仁（去皮，煨） 五加皮（酒浸半日，炒

黄） 半夏（生，为末，生姜自然汁为饼，再碎炒） 桔梗 诃子（炮，去核）各半两 甘草（炒） 枳壳（去瓤，麸炒） 陈皮（去白，炒黄） 柴胡（去芦） 地骨皮（炒黄）各一两

【用法】 上为粗末，和匀，再就蒸一伏时，晒干。每服二钱，紫苏三叶，姜钱三片，水一盏，同煎至七分，食后通口服。后以所主药治之。

【功用】 调顺荣卫，通利三焦，开膈化痰，和五脏。

【主治】 ①《局方》（宝庆新增方）：男子妇人上热下虚之疾，凡饮食过度，致伤脾胃，酒色无节，耗损肾元，水土交攻，阴阳关隔，遂使气不升降，上热则头目昏眩，痰实呕逆，胸膈不快，咽喉干燥，饮食无味；下弱则腰脚无力，大便秘涩，里急后重，脐腹冷痛；治以凉则脾气怯弱，肠鸣下利；治以温则上焦壅热，口舌生疮。及脚气上攻，与久痢不愈。②《普济方》：气壅耳聋，发热咽疼。

【加减】 痰嗽，加半夏曲；心肺虚，加人参、茯苓；上膈热，加北黄芩；下部大段虚，加少许炮附子，如使附子多，加生姜；妇人血虚，加当归。

【备考】 本方方名，《普济方》卷一八一引作“降气汤”。

11426 秘传香连丸

【方源】 《直指附遗》卷十四。

【组成】 川黄连（酒润，炒）五两 木香 白蔻各一两半 乳香 没药各五钱

【用法】 上为细末，面糊为丸，如弹子大。每服一丸，赤者以甘草汤磨下，白者以生姜汤磨下。

【主治】 诸般痢疾作痛，并久痢虚脱，脓血不止者。

【宜忌】 如初痢一二日之间，不可服，恐拦住积滞热毒，他证愈剧。

11427 秘传保安丸

【方源】 《医学入门》卷六。

【异名】 秘传保和丸（《育婴家秘》卷一）。

【组成】 白术（土炒）三两 神曲 木香 槟榔 茯苓 三棱 使君子 厚朴 莪茅 甘草各一钱 苍术二两 陈皮 枳实 人参 莪术各一两半 黄连（猪胆汁浸） 砂仁 麦芽 益智仁 肉豆蔻 藿香 白豆蔻各五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，米饮化下；呕吐，以姜汤化下。

【主治】 小儿五疳八痢，吐泻，肚大青筋，面黄肌瘦，疳积。

【加减】 肉积，加山楂；喘，加莱菔子；泻，加泽泻、猪苓各一两。

【备考】 方中莪茅，《育婴家秘》作“青皮”。

11428 秘传顺气散

【方源】 《古今医鉴》卷二。

【组成】 青皮 陈皮 枳壳 桔梗 乌药 人参（去芦） 白术 茯苓 半夏（制） 川芎 白芷 细辛 麻黄（去节） 防风（去芦） 干姜 僵蚕（炒） 甘草 秦艽（去芦） 羌活 独活各等分

【用法】 上㕮咀。加生姜三片，水二钟，煎至八分，空心温服。先服三五剂，后进祛风药酒。

【主治】 诸风口眼㖞斜，半身不遂，左瘫右痪。

11429 秘传独圣散

【方源】 《直指》卷三。

【异名】 独蝉散（《疡科选粹》卷五）。

【组成】 蝉退（去头足土，净）五钱

【用法】 上为末。用好酒一碗煎滚服之。

【主治】 破伤风。五七日未愈，已至角弓反张，牙关紧急。

11430 秘传洞关散

【方源】 《松崖医径》卷下。

【组成】 珍珠五分 牛黄 片脑 麝香各三分 朱砂一钱

【用法】 上为细末。用少许，吹入喉中。

【主治】 喉痈。

11431 秘传起瘘丹

【方源】 《医方大成》卷四。

【异名】 起瘘丹（《普济方》卷二二六引《永类钤方》）。

【组成】 附子（炮，去皮尖） 枸杞子（拣去枝梗） 肉苁蓉（酒浸，焙干） 沉香（不见火） 官桂（去粗皮） 朱砂（别研） 熟地黄（酒洗，蒸） 母丁香 木香（不见火） 阳起石（火煅） 天雄（炮，去皮脐，或用鹿茸亦可） 硫黄 麝香（别研）各一两 腻粉半两 白丁香一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每用一丸，以姜汁火上入药溶化，却用手点药于腰眼上磨擦至药尽，用至二十丸。

【主治】 肾经虚败，遂成骨瘘，腰脚难举，日加困乏。

【加减】 若有他处瘫痪风疾，加皂角一片（去筋搥烂，姜汁浸一宿，瓦上焙干为末）。

11432 秘传铁箍散

【方源】 《直指附遗》卷二十二。

【组成】 霜后芙蓉叶二两 海金沙五钱 草乌 金线重楼 天南星（生者佳）各五钱

【用法】 上为细末，用好米醋调药成膏。围敷患处。

【主治】 痈疽。

【加减】 发背，加木鳖子五钱。

11433 秘传通塞散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】 石韦（去毛） 滑石 瞿麦 萹蓄 冬葵子 木通 王不留行 地肤草各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，滚白汤调送下。

【主治】 小便淋闭，茎中作痛。

11434 秘传清咽散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】 荆芥 薄荷 防风 桔梗 山栀 连翘 玄参 大力子 片芩 生甘草

【用法】 上切细。用水二盏，煎一盏，去滓服。

【主治】 咽疮并口舌生疮。

【加减】 热甚，加僵蚕，犀角。

11435 秘传循经丸

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】 南星三两（炮） 地龙三两（去土） 川当归三两（酒浸） 川乌三两（炮，去皮脐） 草乌一两（炮，去皮脐） 豆饼二两（用黑豆不以多少，去皮，好酒煮烂，候酒干，擂碎，捏作饼子，晒干） 乳香 没药各一两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，用温酒吞下，不拘时候。

【主治】 诸经络风邪寒湿，气血留滞，流注作痛，筋脉挛拳。

11436 秘传膈噎膏

【方源】《种福堂方》卷二引缪仲淳方。

【组成】 人乳 牛乳 蔗浆 梨汁 芦根汁 龙眼 肉浓汁各等分 姜汁少许 人参浓汁

【用法】 隔汤熬成膏子，下炼蜜。徐徐频服。

【主治】 膈噎。

【宜忌】 安心平气，勿求速效。

11437 秘传豁痰丸

【方源】《直指附遗》卷七。

【组成】 陈皮（去白）四两 山楂 神曲各二两 当归 黄芩 白术各四两 半夏（姜汁浸七日） 黄连 白茯苓 甘草各一两五钱 枳实二两五钱

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，临卧或食后淡姜汤送下。

【主治】 ①《直指附遗》：食积痰热。②《保命歌括》：小儿心下痞。

11438 秘传豁痰汤

【方源】《增补内经拾遗》卷三。

【组成】 栝楼仁一钱半 柴胡一钱二分 羌活 独活 枳壳（麸炒） 半夏（汤泡七次） 乌药各一钱 橘红 青皮 当归 川芎 黄芩 黄连各七分 南星（矾皂角煮过者）一钱

【用法】 水二钟，加生姜三片，煎八分，临服入姜汁一茶匙，竹沥一酒杯，日进一服。十日后渐安。

【主治】 痰厥中风，口眼歪斜，手足不随，不省人事。

【宜忌】 不可性急，不可轻服续命汤、活络丹、天麻丸、清心丸、苏合香丸、辛香热药。

11439 秘制白浊丸

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】 海金沙 飞滑石 生甘草 生大黄 车前子 黄柏各一两 琥珀一钱 牛膝梢五钱

【用法】 上为末，鸡蛋清五枚为丸。

【主治】 赤、白二浊，久患不愈；或成淋症，为气淋、血淋、劳淋、石淋、热淋五淋；或有湿毒热毒积滞膀胱，以及小便不通，积患而成；及因花柳传染致病者，小便短少，尿管红肿，痛如针刺，膀胱疝气，白浊浊流不止，痔疗初发。

11440 秘验血崩丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】 真阿胶二两（炒成珠） 槟火草二两（炙焦，碾） 棕毛（烧存性） 龙骨（煅） 牡蛎（煅，醋淬） 真蒲黄（炒黑色） 乌梅肉各一两（焙焦碾末）

【用法】 以酒半盏，将阿胶化开，和前末药为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空心以酒送下。

【主治】 妇人血崩不止。

11441 秘验带下丸

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】 芡实粉二两 白茯苓 赤石脂（煅） 牡蛎（煅，酒淬） 禹余粮（煅）各一两 石灰（风化）八钱（好醋一盏，拌和前末，干，再捣筛过）

【用法】 上药用糯米煮粥，和捣为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至六七十丸，空心以米汤送下。

【主治】 ①《医林绳墨大全》：带下。②《集验良方》：妇人带下虚脱症。

11442 秘验清胃饮

【方源】《景岳全书》卷五十七。

【组成】 石膏 栀子 黄连 黄芩 当归 生地

白芍 苍术各一钱 青皮八分 细辛 藿香 荆芥穗各六分 升麻五分 丹皮 甘草各四分

【用法】 水二钟，煎八分，食后缓缓含饮之。

【主治】 一切风热湿痰，牙痛床肿，血出动摇。

11443 秘精菟丝丸

【方源】《疡医大全》卷十一。

【组成】 怀山药七分（打烂） 白茯苓 石莲肉各二两 菟丝子（煮饼）五两

【用法】 山药糊加蜜为丸。每服三钱，空心、临卧俱用盐汤送下。

【主治】 内障昏花翳障，肾气虚损，目眩耳鸣，四肢倦怠，夜梦遗精。

11444 秘方仙遗粮汤

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【异名】 仙遗粮汤（《会约》卷七）。

【组成】 土茯苓（即名仙遗根，用鲜者）二两（洗净，以木石相捶碎，用水三碗，煎二碗，去滓，入后药煎服） 当归 生地 防风 木通 薏仁各八分 金银花 黄连 连翘各一钱 白术 白鲜皮各七分 皂刺六分 甘草四分

【用法】 加灯心二十根，用遗粮汤二碗，煎一碗，食远服。

【主治】 一切杨梅疮，不拘始终虚实。

11445 秘方茶酒调散

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】 石膏（另为细末） 菊花 细辛（去苗） 香附子（去须，炒）各等分

【用法】 上为末。每服二钱，食后以温茶酒调下，一日三次。

【功用】 清爽神志，通和开窍。

【主治】 诸风痰壅，目涩，昏眩头疼，心懊烦热，皮肤痛痒，风毒壅滞，及恶汗。

11446 秘传大补元丸

【方源】《直指附遗》卷九。

【组成】 黄柏（蜜炒褐色） 知母（乳汁浸，炒） 龟版（酥炙）各二两 淮熟地黄（酒洗）五两 牛膝（酒洗） 麦门冬（去心） 肉苁蓉（酒洗） 虎胫骨（好酒炙） 淮山药 茯神（去心） 黄耆（蜜炙）各一两半 杜仲（去粗皮，好酒炒断丝） 枸杞子（甘州者佳） 何首乌（篾刮去皮） 人参（去芦）各二两 当归身（酒洗） 天门冬（去心） 五味子（去枝核） 淮生地黄（酒洗）各一两 白芍药（酒炒） 二两（冬月只用一两） 紫河车一具（一名混沌皮，即今之胞衣，取初产者为佳。如无初产者，或壮盛妇人胎者亦可。取一具，用线吊于急流水中漂一昼夜，去其污浊血丝，取起，再用净米泔水一碗许，于小罐内微火煮一沸，取出勿令泄气，再用小篮一个，四周用纸密糊，将河车安于篮内，用慢火烘干，为末）。

【用法】 上为极细末，入猪脊髓三条，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心以淡盐汤送下；寒月用温酒送下。

【主治】 男妇诸虚百损，五劳七伤，形体羸乏，腰背疼痛，遗精带浊。

【加减】 梦遗白浊，加牡蛎一两，白术，山茱萸各一两五钱，茯苓二两；冬加干姜五钱（炒黑色）。

11447 秘传仙遗粮散

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】 仙遗粮（即土茯苓）二斤（忌铁） 荆芥一两五钱 防风一两五钱 五加皮一两五钱 白鲜皮一两五钱 威灵仙一两五钱 木瓜一两五钱 生地（酒洗）一两 当归一两（酒洗） 白芍一两（炒） 白茯苓一两 川芎一两 牛膝一两（酒洗） 杜仲（炒去丝）一两 白芷一两 地骨皮一两 青风藤一两 槐花一两 黄连一两

【用法】 上㕮咀，作十帖。每一帖用水一钟，米白酒一钟，煎熟，疮在上，食后服；疮在下，食远服；滓再煎，每一日服一帖，煎二次合为一处，使浓淡得均，分作二次温服。其药滓逐日晒干，至三帖，共煎汤洗浴。初服五帖之内疮势觉甚，乃毒气攻外，勿惧，轻者至十日内可见效；重者虽服二三十帖无妨。

【功用】 补元气。

【主治】 远年杨梅风漏，筋骨疼痛；轻粉毒。

【宜忌】 切忌房事、茶、生冷、煎炒、鸡、鹅、羊、牛血，虾、猪蹄首各发物、动风之物。只用雄猪肉。

11448 秘传酸枣仁汤

【方源】《永类钤方》卷十二。

【异名】 酸枣仁汤（《准绳·类方》卷一）。

【组成】 酸枣仁（泡，去皮，炒）一两 净远志肉 黄耆 莲肉（去心） 罗参 当归（酒浸，焙） 白茯苓 茯神各一两 净陈皮 粉草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，瓦器煎七分，临卧一服。每日三次。

【主治】 心肾水火不交，精血虚耗，痰饮内蓄，怔忡恍惚，夜卧不安。

11449 秘传膈噎仙方

【方源】《医林绳墨大全》卷三。

【异名】 开关膏(《卫生鸿宝》卷一)。

【组成】 白硼砂一钱五分 真青黛一钱 乌角沉香二钱(共为细末) 白马尿一斤 白萝卜一斤(取汁) 鲜生姜半斤(取汁)

【用法】 后三味于铜锅内熬成膏，每服用膏三茶匙，加前末药七厘，以好白酒调送下，每日三次。

【功用】 通关进食。

【主治】 噎膈。

【加减】 翻胃，去白马尿，加黑驴尿。

【宜忌】 忌煎炒大荤滞气生痰之物，并戒恼怒。

11450 秘方千金种子丹

【方源】《扶寿精方》。

【异名】 秘传千金种子方(《便览》卷三)、种子丹(《叶氏女科》卷四)。

【组成】 沙苑蒺藜四两(净末，如蚕种，同州者佳，再以重罗罗，二两极细末，二两粗末，用水一大碗，熬膏) 莲须(极细末)四两(金色者固精，红色者败精) 山茱萸(极细末)三两(须得一斤，用鲜红有肉者佳，去核取肉，为细末) 覆盆子(南者佳，去核，取极细末)二两 鸡头实五百个(去核，如大小不一等，取极细末四两) 龙骨五钱(五色者佳，火煅。煅法，以小砂锅将龙骨入锅内，以火连砂锅煅红，去火毒)

【用法】 上用伏蜜一斤炼，以纸粘去浮沫数次，无沫，滴水中成珠者伺候。只用四两，将前六味重罗过，先以蒺藜膏和作一块，炼蜜四两为丸，如黄豆大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【功用】 延年益寿，令人多子。

【主治】 虚损，梦遗，白浊。

【宜忌】 忌欲事二十日。

11451 秘传牛黄清心丸

【方源】《医便》卷四。

【组成】 天麻四两 防风二两(去芦) 牛胆南星二两半 僵蚕(炒) 全蝎各二两半 白附子(生用) 干天罗(即丝瓜)五钱 川乌五钱 远志(去心)二两 川山甲(蛤粉炒)三两 蝉退二两(去土) 蒿虫(不拘多少) 辰砂(天葵煮)一两 雄黄一两(二味另研) 犀角(镑细)五钱 蜈蚣三钱 蟾酥五分(另研)沉香三钱 细辛五钱 龙齿五钱 琥珀二钱(另研) 珍珠三钱(另研) 天竺黄三钱 蛤蚧一对 金银箔各十帖

【用法】 上药各制净，为末；外用荆芥一斤，麻黄一斤，木通一斤，皂角半斤，甘草四两，苍耳子四两，六味熬膏，入真酥合油，炼蜜为丸，如芡实大，金银箔为衣，蜡封。随症调引用。

【主治】 小儿惊风，大人中风、中痰、中气，一切风痰。

11452 秘传龙骨锁精丹

【方源】《直指附遗》卷十。

【组成】 白龙骨(煅)二两半 牡蛎(煅)二两 知母五钱 黄柏六钱 猪苓五钱 人参(去芦)一两 远志(甘草汤煮，去心) 两半

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心以盐酒或盐汤送下。

【主治】 梦遗滑精。

11453 秘传加味二陈汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】 陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄连 黄芩 山栀 桔梗(各以生姜汁炒)

【用法】 上细切。用水二盏，加生姜三片，大枣一枚，煎服。

【功用】 消痰。

【主治】 嗳气。

11454 秘传加味二陈汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】 陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄芩 枳壳 苏子 桔梗 厚朴 肉桂少许

【用法】 上细切。用水二盏，加生姜三片，大枣一枚，煎，临服以姜汁磨木香服之。

【主治】 痰热过甚而致梅核气，咯之不出，咽之不下。

11455 秘传加味二妙丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】 苍术(米泔水浸)四两 黄柏(酒浸，炒)二两 川牛膝(去芦) 当归尾(酒洗) 川萆薢 汉防己 龟版(酥炙)各一两 虎骨(酥炙)一两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心以姜汤送下。

【主治】 湿邪为病，两足湿痹疼痛，或如火燎，从足跗热起，渐至腰胯，麻痹痿软。

11456 秘传加味四物汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】 当归 川芎 熟地黄 白芍药 人参 白茯苓 黄连 山栀仁 半夏 甘草(炙)

【用法】 上细切。用水二盏，加生姜三片，大枣一枚，煎服。

【功用】 补血。

【主治】 心血虚少，痰火所扰，嘈杂，似饥不饥，似痛不痛，便浓不白宁，嗳气，痞满，恶心，

渐至胃脘作痛。

【加减】 嘈杂心痛，加茯神、生地黄。

11457 秘传加味四物汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】 当归 川芎 熟地黄 远志 白芍药 人参 甘草 茯神 山栀

【用法】 上细切。用水二盏，煎一盏，去滓服。

【主治】 心跳。

11458 秘传远志养心丹

【方源】《直指附遗》卷九。

【异名】 经验远志养心丹(《保命歌括》卷十二)。

【组成】 生地黄（酒洗） 远志（甘草汤煮，去心） 当归（酒洗） 甘草（炙）各一两五钱 柏子仁 酸枣仁各三两 川芎 人参（去芦）各一两 茯神（去木）七钱 半夏（姜汁泡）七次 南星（炮） 朱砂（研末，为衣）各五钱 麝香一钱 石菖蒲六钱 琥珀三钱 真金箔二十片

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服四五十丸，津唾咽下；有痰者，用姜汤送下。

【主治】 心虚手振。

11459 秘传金锁思仙丹

【方源】《直指附遗》卷十。

【异名】 金锁思仙丹(《医统》卷七十引万氏方)。

【组成】 莲花蕊十两（忌硫黄、蒜） 石莲子十两（取净粉用） 鸡头实十两（取其实并中，捣烂晒干，再捣筛，取净粉）

【用法】 上以金樱子三斤，取霜后半黄者，木臼中转杵，却刺勿损，擘为两片，去水淘净，烂捣，入大锅，以水煎，不绝火，约水耗半取出，滤过重煎，如稀饧；市肆干者焙之，用水浸转，去子，煎令如法，入前药末为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以盐汤送下。

【主治】 男子嗜欲过多，精气不固。

11460 秘传枳术二陈汤

【方源】《直指附遗》卷七。

【异名】 枳术二陈汤(《医统》卷二十七)。

【组成】 白术（泔洗，锉，土炒）一钱 黑枳实（麸炒） 陈皮（去白）各八分 茯苓（去粗皮） 香附子（童便浸，炒） 半夏（汤泡七次）各一钱 黄连（姜汁炒） 槟榔（鸡心者） 白豆蔻各五分 青皮（麸炒） 吴茱萸 生甘草各三分

【用法】 上㕮咀。用水一钟，加生姜三片，大枣一枚，煎八分，食远服。

【主治】 痰气食膈，呕吐痰涎，翻胃嘈杂。

【加减】 气虚，加人参、黄耆；血虚，加当归、地黄；郁，加神曲、抚芎。

11461 秘传黄连地黄汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【异名】 黄连地黄汤(《回春》卷五)。

【组成】 黄连 生地黄 天花粉 五味子 川归 人参 干葛 白茯苓 麦门冬 甘草

【用法】 上细切。加生姜一片，大枣二枚，竹叶十片，用水二盏煎，去滓温服。

【功用】 泻火润燥，清心滋肾。

【主治】 消渴，心脉多浮，肾脉多弱。

【加减】 上焦渴，加桔梗、山栀；中焦渴，加黄芩；头眩，渴不止，加石膏；下焦渴，加黄柏、知母。

【备考】 若作丸剂，加薄荷，炼蜜为丸，如弹子大。噙化咽下。

11462 秘传增补香芷丸

【方源】《点点经》卷四。

【组成】 香白芷四两（焙干）

【用法】 上为细末，用牙猪脑髓四个，银簪拨去血筋，入瓷碗盛之，放在饭甑内蒸七日，露七夜，令脑髓蒸熟，同上药为丸，如梧桐子大。每服五钱，煮葱白十七根汤送下，一日三次。

【主治】 头被火久注，脑髓受伤，作痛不休，服药不退，鼻流臭水不堪闻，恐成脑崩。

【宜忌】 忌房事。

11463 秘传十六味流气饮

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】 人参 当归 官桂五分 川芎 防风 白芷 桔梗 黄耆 炙草 厚朴 木香 白芍药 大腹皮 乌药 枳壳 苏叶各一钱

【用法】 上为末。每服六钱，以酒调下，服药后饮酒以助药力。不饮酒者，木香汤代之，米饮亦可。

【功用】 发散风毒，调理气血，排脓止痛，长肉生肌。

【主治】 痈疽。

【加减】 不退热，加茯苓、白术、地黄；不进饮食，加香附、砂仁；疼痛，加乳香、没药；水不干，加知母、贝母；疮不穿，加皂角刺；大便闭，加大黄、枳壳；咳嗽，加陈皮、枳壳、半夏、杏仁、生姜；小便闭，加麦门冬、车前子、木通、滑石、灯草；瘰疬，加羌活、夏枯草、连翘、青皮、柴胡、黄芩。

【备考】 方中人参、当归用量原缺。

11464 敌痰丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二引完颜府判方。

【组成】黑牵牛二两　皂角二两（去皮弦，火中微烧）白矾（枯）一两　半夏曲（炒）一两　陈皮（去白）一两

【用法】上为细末，煮萝卜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，临卧淡姜汤送下。

【功用】宽胸膈，快气。

【主治】痰盛。

【备考】本方方名，《普济方》引作"涤痰丸"。

11465　舐掌散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】海藻一两　黄柏二两

【用法】上为末。每用少许置掌中，时时舐之，津液送下。如消三分之二即止。

【功用】开结。

【主治】瘿瘤。

11466　氤氲汤

【方源】《谦斋医学讲稿》。

【组成】豆卷　藿香　佩兰　焦栀皮　连翘　滑石　通草　郁金　菖蒲

【功用】清化透泄。

【主治】湿温气分证而见白痦。

【加减】与红疹同见，加丹皮、赤芍、紫草根。

11467　透天丸

【方源】《济阳纲目》卷一〇四。

【组成】雄黄　龙脑叶　石菖蒲各二两　片脑二钱

【用法】上药为细末，入片脑同研，炼蜜为丸，如鸡头子大。绢帛包裹，系作纽子，入鼻孔即效。

【主治】鼻孔壅塞，不闻香臭，久不愈者。

11468　透耳筒

【方源】《奇效良方》卷五十八。

【组成】椒目　巴豆　菖蒲　松脂各一钱　（一方无松脂）

【用法】上为末，摊令薄，卷作筒子。塞耳内，一日一易。

【主治】肾虚耳聋，耳中如风水声，或如钟鼓声。

11469　透邪煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归二三钱　芍药（酒炒）一二钱　防风七八分　荆芥一钱　炙甘草七分　升麻三分

【用法】水一钟半，煎服。

【功用】疏表达邪。

【主治】①《景岳全书》：麻疹初热，未出之时；痘疹初热未出者。②《专治麻疹初编》：体质单弱，痧疹不能透达。

【加减】热甚，脉洪滑，加柴胡一钱

11470　透肌散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】炒牛蒡二钱半　葛根二钱　荆芥一钱二分　蝉退三十个

【用法】酒一小杯，水一大杯半，煎六分，温服

【主治】瘾疹初出，隐隐淹在肌肉内，已出即没者。

【加减】一次，加羌活五分；二次，加紫苏、枳壳六分；三次，加牛膝五分。

11471　透关散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】蜈蚣头　蝎梢（去毒）　草乌头尖（如麦粒大）　川乌头底（如钱薄）各七枚　胡椒七粒　雄黄七粒（如麦粒大，别研）

【用法】上为细末。用纸捻子蘸醋点药少许，于火上炙干，塞两耳内，闭口少时。

【主治】牙疼。

11472　透关散

【方源】《玉案》卷四。

【组成】白豆蔻　子丁香　沉香各四钱　青皮（醋炒）　香附（醋炒）　橘红　枳实各五钱　青礞石（煅过）三钱

【用法】上为末。每服二钱，空心煮酒送下。

【主治】噎膈不通，痞满气结，饮食难下。

11473　透空丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】香附子　藁本　藿香叶　地龙（去土）　川芎　白僵蚕（炒）　干姜（炮）　甘草（炙）　干蝎　天麻（去苗）　天南星（生姜制）各一两　白芷七分　神曲（碎炒）　茴香（炒）　麦芽（净，炒）各二两半　胡椒一两　川乌头（炮制）一两二分

【用法】上为细末，每药末三两，白面六两，水为丸，如小弹子大。每服一丸，细嚼，食前茶、酒任下。

【主治】男子、妇人一切诸风颈麻疼痛，上攻头目，下注腰脚，手背颤动。

11474　透骨丹

【方源】《丹溪心法附余》卷四。

【组成】天麻　全蝎各四两　地黄　木瓜各二两　没药　乳香　穿山甲各一钱　川芎

【主治】 风湿腰腿骨节疼痛。

【备考】 方中川芎用量原缺。

11475 透骨丹

【方源】《准绳·类方》卷四引《集验方》。

【组成】 地骨皮 甜瓜子（炒） 芸苔子（葱捣为饼）各三两 乳香（另研） 没药（另研） 草乌头各一两（锉，炒） 苍术 牛膝（酒浸） 赤芍药 当归（去芦） 川乌头（炮，去皮脐） 白然铜（醋煅） 五灵脂各二两

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，加至十五丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】 男妇一切走注疼痛不可忍。

【备考】 先用甜瓜子一两炒香，研烂，酒煎数沸，量虚实调黑牵牛末五钱服之，以利为度，然后服此方。

11476 透脓散

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】 透脓汤（《名家方选》）。

【组成】 黄耆四钱 山甲（炒，末）一钱 川芎三钱 当归三钱 皂角针一钱五分

【用法】 水二钟，煎一半，随病前后服，临服入酒一杯亦好。

【主治】 痈疽诸毒，内脓已成不穿破者。

11477 透脓散

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】 黄耆四钱 皂刺 白芷 川芎 牛蒡子 穿山甲（炒，研）各一钱 金银花 当归各五分

【用法】 酒、水各半煎服。

【主治】 痈毒内已成脓，不穿破者。

【方论选录】《成方便读》：方中黄耆大补元气；芎、归润养阴血；而以白芷、牛蒡宣之于皮毛肌肉之间，使之补而不滞；甲片、角刺为精锐之品，能直达病所，以成速溃之功；金银花以化其余毒；酒则行其药势耳。

11478 透睛膏

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《经验普济加减方》。

【组成】 南硼砂 川朴消各三钱 轻粉一钱半 青盐一钱 硇砂半钱 龙脑一字 麝香一字

【用法】 上为细末，入生姜汁或白沙蜜和膏。每点少许。不过三点自明矣。

【功用】 消瘀肉，解肿痒，收冷泪。

【主治】 眼内翳膜昏赤，睛痛隐涩。

11479 透体香丸

【方源】《便览》卷四。

【组成】 丁香一两半 藿香 零零香 甘松各二两 白芷 香附 当归 桂心 槟榔 益智各一两 麝香五钱 白豆蔻二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，噙化。二十日后异香。

【主治】 通身炽腻、恶气及口齿气。

11480 透体异香丸

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【异名】 透体气口丸（《寿世保元》卷五）。

【组成】 沉香 木香 丁香 藿香 没药 陵零香 甘松 缩砂 丁皮 官桂 白芷 细茶 香附 凡茶 白蔻 槟榔 人参各一两 乳香 檀香 三奈 细辛 益智 当归 川芎 乌药各五钱 麝香 朝脑各二钱 薄荷一两

【用法】 先将大粉草半片锉片，水煮汁，去滓，将汁熬成膏，将前药为末，炼蜜共膏，为丸，如芡实大。每服一丸，清晨噙化，用黄酒送下。

【功效】 壮阳滋肾，补益丹田。

【主治】 五膈、五噎痞塞，诸虚百损，五劳七伤，体气、口气。

【宜忌】 忌生冷，毒物。

11481 透疹四紫汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 紫浮萍 1.5 克 紫花地丁 6 克 紫草 6 克 紫菀 3 克 桑叶 4.5 克 苇根 6 克 蝉蜕 3 克 连翘 4.5 克 淡豆豉 4.5 克 山栀衣 4.5 克（以上为三岁儿童用量）

【功用】 透疹解毒。

【主治】 麻疹出疹期，麻疹开始透标或尚未出齐时，发热，躁烦，咳嗽。

11482 透膈宽肠散

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】 白牵牛一两 芒消三两 川大黄二两 甘遂半两

【用法】 上为细末。每服一钱，食后温蜜水调下，疏动止。

【主治】 肠间壅实，膈热难行者。

11483 倒阳汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】 元参三两 肉桂三分 麦冬三两

【用法】 水煎服。

【主治】 虚火炎上，肺金之气不能下行，以致强阳不倒。

【方论选录】 此方妙在元参以泻肾中浮游之火，尤妙肉桂引其入宅而招散其沸越之火，同气相求，

火自回舍；况麦冬又助肺金之气清肃下行，以生肾水，水足火自息矣。

11484 倒换散

【方源】《宣明论》卷十五。

【异名】荆黄汤(《内经拾遗》卷二)。

【组成】大黄（小便不通减半） 荆芥穗（大便不通减半）各等分

【用法】上药各为末。每服一二钱，温水调下。

【主治】久新癃闭不通，小腹急痛，肛门肿疼。

【方论选录】《医方考》：用荆芥之轻清者，以升其阳；用大黄之重浊者，以降其阴；清阳既出上窍，则浊阴自归下窍，而小便随泄矣。方名倒换者，小便不通，倍用荆芥；大便不通，倍用大黄，颠倒而用，故曰倒换。

11485 倒换散

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】大黄 杏仁(大便不通，大黄一两，杏仁二钱；小便不通，大黄三钱，杏仁一两)

【用法】水煎服。

【主治】大小便不通。

11486 倍力丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】牛膝（去芦，酒浸） 羌活（生） 巴戟（去心） 官桂（去粗皮，怀干） 天麻（酒浸） 狗脊（生，去毛） 萆薢（生） 杜仲（去皮，姜汁制，炒去丝） 茴香（淘去沙，炒） 桐皮 附子（炮，去皮脐） 川乌头（炮，去皮脐） 青盐各一两（别研） 没药（制研） 木香（湿纸裹煨） 防风（去芦，洗）各半两

【用法】上为细末，用黑牵牛四两，微炒取粉，和面同煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前盐汤送下。

【主治】腰痛。

11487 倍术丸

【方源】《外台》卷八引《深师方》。

【组成】白术一斤 桂心 干姜各半斤

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以饮送下，稍加之；取下，先食服之，每月二次。

【主治】①《外台》引《深师方》：五饮酒癖。②《幼幼新书》引《王氏手集》：小儿脾胃受湿，心下停饮，烦渴呕吐，肠间沥沥有声，胸膈痞满，短气，腹胁胀痛，小便不利，身面虚浮，全不思食。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、生葱。

11488 倍灵丸

【方源】《洪氏集验方》卷四。

【异名】倍槐丸(《魏氏家藏方》卷七)。

【组成】槐花六两 五倍子三两 五灵脂三两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】肠风下血。

11489 倍榆散

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】五倍子 地榆各等分

【用法】上为末。每服五分或一钱，米饮调下。

【主治】小儿脱肛。

11490 健中散

【方源】《普济方》卷二十五。

【组成】白术 枳实（麸炒） 人参 白芍药 干姜（炮） 桂（去粗皮） 高良姜（锉） 丹参 大腹皮 槟榔（锉） 吴茱萸（汤浸，焙干，炒） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 桔梗（锉，炒） 干木瓜 艾枝（炙） 草豆蔻（去皮）各等分

【用法】上为末。每服三钱匕，温酒调下。

【主治】脾胃气虚弱，呕吐不下食，脐腹胀满，积聚不消。

11491 健运汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆六钱 野台参三钱 当归三钱 寸麦冬（带心）三钱 知母三钱 生明乳香三钱 生明没药三钱 莪术一钱 三棱一钱

【主治】气虚腿疼、臂疼；腰疼。

【备考】减麦冬、知母三分之一，改为丸剂，名“健运丸”。

11492 健步丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】防己（酒洗）一两 羌活 柴胡 滑石（炒） 炙甘草 瓜蒌根（酒洗）各五钱 泽泻 防风各三钱 苦参（酒洗） 川乌各一钱 肉桂五分

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心煎愈风汤送下。

【主治】膝中无力，伸而不得屈，屈而不能伸，腰背腿膝沉重，行步艰难。

【备考】本方改为膏剂，名“健步膏”（见《理瀹》）。

11493 健忘丹

【方源】《便览》卷三。

【组成】远志（去心）一两 石菖蒲（去毛）一

两 黄连（姜炒）五钱 川身（酒洗）二两 枸杞（甘州者）二两 酸枣仁（炒）一两 麦冬（去心）一两 甘菊花五钱 生地黄五钱 人参五钱

【用法】 炼蜜为丸，朱砂三钱为衣。每服五十丸，茶送下。

【主治】 心虚损，遇事多惊，作事健忘，读诵诗书健忘。

11494 健脚煎

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】 鹿茸（酒洗，炒） 续断 当归（酒洗） 芎劳 芍药 熟地黄 牛膝（酒洗） 杜仲（炒去丝）各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人产后痿躄。

11495 健脾丸

【方源】《医学六要·治法汇》卷一。

【组成】 人参 白术各四两 枳实三两 山楂一两五钱 麦芽一两 陈皮一两

【用法】 神曲糊为丸服。

【主治】 食后不便转化，因而食少。

11496 健脾丸

【方源】《准绳·类方》卷五。

【异名】 大健脾丸(《不居集》下集卷九)。

【组成】 白术（白者）二两半（炒） 木香（另研） 黄连（酒炒） 甘草各七钱半 白茯苓（去皮）二两 人参一两五钱 神曲（炒） 陈皮 砂仁 麦芽（炒，取面） 山楂（取肉） 山药 肉豆蔻（面裹煨熟，纸包捶去油）各一两

【用法】 上为细末，蒸饼为丸，如绿豆大。每服五十丸，空心、下午各服一次，陈米汤送下。

【主治】 ①《准绳·类方》：脾胃不和，饮食劳倦。②《不居集》：食积。

11497 健脾汤

【方源】《老中医临床经验选编》。

【组成】 党参 白术 茯苓 半夏各9克 陈皮6克 黄连 吴茱萸各3克 白芍15克 甘草3克 瓦楞子12克

【功用】 健脾和胃，缓急止痛，降逆止呕。

【主治】 脾胃虚弱，中脘疼痛，呕恶泛酸，精神疲乏，纳食减少，脉濡细或虚而无力；胃和十二指肠溃疡病，慢性胃炎等偏于脾胃虚寒者。

【加减】 脾虚不能运化，加炒麦芽、炒谷芽各12克，肉桂1.5～3克；脾虚湿盛，加苍术、厚朴各9克；脾虚不能统血，加当归、黄耆、阿胶、仙鹤草；肝胃不和，胃气上逆，加旋覆花、代赭石。

11498 健脾散

【方源】《普济方》卷二十三。

【组成】 人参 白茯苓（去黑皮） 黄耆（锉） 麦芽（炒黄）各一两 甘草（炙，锉） 面曲（炒令黄）各半两

【用法】 上为末。每服二钱匕，入盐沸汤点服，不拘时候。

【主治】 脾胃虚冷，水谷迟化，不能饮食。

11499 健步四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】 当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 熟地黄各一钱五分 牛膝（去芦，酒洗） 木瓜 川续断各一钱

【用法】 上锉。水煎，空心服。

【主治】 血虚不荣于下部而令足痿弱，不能行步。

11500 健步虎潜丸

【方源】《回春》卷二。

【组成】 黄耆（盐水炒） 当归（酒洗） 枸杞子（酒洗） 龟版（酥炙）一两 知母（人乳汁、盐、酒炒） 牛膝（去芦，酒洗） 白术（去芦） 白芍（盐、酒炒） 生地黄 熟地黄 虎胫骨（酥炙） 杜仲（姜、酒炒） 人参（去芦）各二两 破故纸（盐、酒炒）一两 麦门冬（水泡，去心） 一两 白茯神（去皮木） 木瓜 石菖蒲（去毛） 酸枣仁 远志（甘草水泡，去心） 薏苡仁（炒） 羌活（酒洗） 独活（酒洗） 防风（酒洗）各一两 黄柏（人乳汁、盐、酒炒）二两 五味子 沉香 大附子（童便浸透，面裹煨，去皮脐，切四片，又将童便浸，煮干）各五钱

【用法】 上为末，炼蜜和猪脊髓五条为丸，如梧桐子大。每服一百丸，温汤或酒送下。

【功用】 ①《鳞爪集》：祛风活血，壮阳益精。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：强筋壮骨，补肾填精，燥湿利下。

【主治】 肝肾不足，中风瘫痪，舌强言謇；筋骨痿弱，腰腿痠痛，四肢无力。

①《回春》：中风瘫痪，手足不能动，舌强謇于言。②《鳞爪集》：老年衰迈或壮年病后，筋骨无力、步行艰难，腿膝疼痛麻。③《全国中药成药处方集》（沈阳方）：筋骨痿弱，腰腿痠痛，四肢无力，阴虚盗汗，遗精白浊，肾虚脚气，一切肝肾不足。

11501 健脾化痰丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生白术二两　生鸡内金（去净瓦石糟粕）二两

【用法】 上药各为细末，各自用慢火焙熟（不可焙过），炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，开水送下。

【主治】 脾胃虚弱，不能运化饮食，以至生痰，厌于饮食，腹中一切积聚。

【方论选录】 白术纯禀土德，为健补脾胃之主药；然土性壅滞，故白术多服久服，亦有壅滞之弊，有鸡内金之善消瘀积者以佐之，则补益与宣通并用。俾中焦气化，壮旺流通，精液四布，清升浊降，痰之根底蠲除矣。

11502　健脾胜湿汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 当归四钱　黄耆八钱　地肤子三钱（炒）　茵陈三钱　黄柏三钱　蒺藜三钱（炒）　荆子三钱　防风二钱　生石膏六钱　大贝三钱　苍术三钱（炒）　白芷二钱　五加皮三钱　甘草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 倒睫拳毛症（眼睑内翻倒睫）。两眼赤痠，怕日羞明，上下眼皮弦紧皮松，倒睫拳毛刺激眼球，发生白膜，热泪常流。

【临证举例】 倒睫拳毛　余江尹某某，女，素患目疾，不避风沙，不忌酸辣，久则酸涩流泪，睫毛即倒，一九五八年来我院就诊。按其脉，他脉皆平，惟太阴细数。此是脾蕴湿热，上冲于脑，以致倒睫，刺激目珠，而生翳膜。先将攒竹、鱼腰略刺，内服健脾胜湿汤，七剂而轻；又加细辛二钱，川芎三钱，连服十余剂而痊愈。

11503　健脾祛风汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 苍术9克　陈皮6克　茯苓9克　泽泻9克　荆芥9克　防风9克　羌活9克　木香3克　乌药9克　生姜3片　大枣5枚

【功用】 健脾理气，祛风散寒。

【主治】 肠胃型荨麻疹。

11504　健脾除湿汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 生薏米五钱至一两　生扁豆五钱至一两　山药五钱至一两　芡实三至五钱　枳壳三至五钱　萆薢三至五钱　黄柏三至五钱　白术三至五钱　茯苓三至五钱　大豆黄卷三至五钱

【功用】 健脾除湿利水。

【主治】 慢性湿疹，渗出较多；慢性下肢溃疡（湿臁疮），慢性足癣（脚蚓）渗出液较多者；下肢浮肿，盘状湿疹（病疮）。

11505　健脾除湿汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 茯苓皮　白术　黄芩　山栀　泽泻　茵陈　枳壳　生地　竹叶　灯心　甘草

【功用】 健脾除湿。

【主治】 脾虚湿盛而致掌跖发疱；脾虚湿恋而致皮肤皲裂。

11506　健脾润肤汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 党参　茯苓　苍白术　当归　丹参　鸡血藤　赤白芍　陈皮

【功用】 健脾燥湿，养血润肤。

【主治】 脾虚血燥皮肤肥厚。

11507　健脾利水生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】 川芎一钱　茯苓一钱半　归身二钱　黑姜四分　陈皮五分　炙草五分　人参三钱　肉果一个（制）　白术一钱（土炒）　泽泻八分

【主治】 妇人产后块已除，患泻症。

【加减】 寒泻，加干姜八分；寒痛，加砂仁、炮姜各八分；热泻，加炒黄连八分；泻水腹痛，米饮不化，加砂仁八分，麦芽、山楂各一钱；泻有酸腐臭气，加神曲、砂仁各八分；泻水者，加苍术一钱。

11508　衄血丸

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】 牡丹皮　白芍（酒炒）　黄芩（酒炒）　蒲黄（炒）　侧柏叶

【用法】 上为末，糯米糊为丸。每服一百丸，空心白汤送下。

【主治】 妇人妊娠过食辛热之物，血热妄行冲伤胞络，衄血，常从口鼻中出。

11509　射干汤

【方源】《普济方》卷四十一引《护命》。

【组成】 射干　黄芩（去黑心）　麦门冬（去心，焙）　大黄（锉，焙）　知母　木通（锉）各等分

【用法】 上为散。每服三钱匕，水一盏，入葱白五寸（切碎），同煎至八分，去滓，食后温服，以利为度。若三服以上未通，急煎芎藭汤一盏，投之即下，自早至夜可两服。

【主治】 小肠实热，小便赤涩，疼痛不可胜忍。

【宜忌】 不可常吃。

11510　射干汤

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】射干 升麻各三分 桔梗（锉，炒）一两 玄参 木通（锉）各三分 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入竹叶七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】咽喉生谷贼，咽物妨闷。

【加减】如要通利，加大黄一两，以利为度。

11511 射干汤

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】射干一钱 防风 荆芥 桔梗 薄荷各一钱 大力子一钱半（焙，研） 广皮八分 甘草三分

【用法】加灯心一握，生姜一片，水煎服。

【主治】喉痹。

【加减】火甚，加玄参、天花粉；肺虚，加川贝母、茯苓。

11512 射干散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】射干一两 杏仁五分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 麻黄一两（去根节） 麦门冬一两（去心） 贝母三分（煨令微黄） 百合三分 甘草半两（炙微赤，锉） 赤茯苓一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒咳嗽，气促喉鸣，干咳无唾，喉中如哽者。

11513 射干散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】射干一两 半夏三分（汤洗七遍，去滑） 甘草半两（炙微赤，锉） 诃黎勒皮三分 木通三分（锉） 枳实三分（麸炒微黄） 桂心三分 鸡舌香三分 紫苏子三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服之，不拘时候。

【主治】膈气，咽喉噎塞，全不下食。

11514 射干散

【方源】《寿世保元》卷六引吴绍源方。

【组成】升麻 桔梗 射干 昆布 连翘 甘草

【用法】上锉。水煎，热服。汗出立愈。

【主治】耳肿作痛，牙关紧急，乍寒乍热，饮食不下；面肿牙痛，咽喉痛。

11515 射干煎

【方源】《千金》卷十五。

【组成】射干八两 大青三两 石膏十两（一作一升） 赤蜜一升

【用法】上㕮咀。以水五升，煮取一升五合，去滓，下蜜，煎取二升，分三服。

【主治】①《千金》：舌本强直，或梦歌乐而体重不能行。②《圣济总录》：脾实，咽干口燥，舌本肿强，腹胁满胀，大便涩难。

【方论选录】《千金方衍义》：射干苦寒有毒而能解毒，为喉痹咽痛专药，舌本强直，亦宜用之，以其能破宿血散结气也；大青解心下热毒，泻肝胆实火，正所以祛心胃之邪热；石膏治心下逆气，舌焦不能息，腹中坚痛，肢体沉重；赤蜜主心腹邪气，止痛解毒，且能安五脏，和百药。

【备考】本方方名，《外台》引作“射干汤”。

11516 射干消毒饮

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】射干 黑参 连翘 荆芥 鼠粘子各等分 甘草减半

【用法】水煎，温服。

【主治】麻疹咳嗽声瘖，咽喉肿痛。

11517 射干麻黄汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】紫菀散（《普济方》卷三八七）、麻黄射干汤（《不居集》上集卷十五）。

【组成】射干十三枚（一法三两） 麻黄四两 生姜四两 细辛 紫菀 款冬花各三两 五味子半升 大枣七枚 半夏（大者，洗） 八枚（一法半斤）

【用法】以水一斗二升，先煎麻黄二沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，分温三服。

【主治】咳而上气，喉中水鸡声。

【方论选录】①《千金方衍义》：上气而作水鸡声，乃是痰碍其气，气触其痰，风寒入肺之一验。故于小青龙方中，除桂心之热，芍药之收，甘草之缓，而加射干、紫菀、款冬、大枣。专以麻黄、细辛发表，射干、五味下气，款冬、紫菀润燥，半夏、生姜开痰，四法萃于一方，分解其邪，大枣运行脾津以和药性也。②《金匮要略心典》：射干、紫菀、款冬降逆气；麻黄、细辛、生姜发邪气；半夏消饮气。而以大枣安中，五味敛肺，恐劫散之药并伤及其正气也。

【临证举例】①哮症 《浙江中医杂志》（1980；3:123）：用射干麻黄汤加减治疗哮症12例，均属寒饮为患，治疗后，5例3年随访未见复发；3例

2年随访也得到控制；另4例治后复诊1次，复发轻微，续服原方3剂而愈。②小儿外感咳嗽 《成都中医学院学报》(1982；2:53)：用射干麻黄汤治疗小儿外感咳嗽71例，均获痊愈，其中服药2～3剂者50例，3～4剂者14例，5～6剂者7例。典型病例：刘某，男，3岁半。发烧2天，无汗，流清涕，咳嗽气紧，喉中痰鸣，有时咳吐清痰，口不干，舌微红，苔白薄，脉浮紧。处方：麻黄6克，射干、紫菀、冬花各9克，法夏5克，细辛1克，五味子、甘草各3克，生姜1片，大枣1枚，石膏20克。二剂后复诊：母述于回家当天，共服药6次，半夜汗出，烧退，次日咳嗽气紧明显减轻，喉中痰鸣较发时少大半，其舌质稍红，苔微黄。上方去生姜、大枣，加鱼腥草30克。后随访痊愈。

【备考】 本方改为丸剂，名“射干麻黄丸”(见《全国中药成药处方集》南昌方)。

11518 臭灵丹

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 硫黄末一两 油核桃一两 水银一钱 生猪脂油一两

【用法】 捣匀任用；如脓疥，挑破搽之，微痛，三次愈。

【功用】《金鉴》：润燥杀虫。

【主治】 疥疮，酒渣，顽癣，溃疡。

①《外科大成》：干疥。②《金鉴》：湿疥。③《中医皮肤病学简编》：酒渣，顽癣，溃疡。

11519 臭樗皮散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】 臭樗皮一两(微炙，锉) 酸石榴皮一两 地榆一两(锉) 黄连一两(去须) 艾叶三分(微炒) 阿胶一两(捣碎，炒令黄燥)

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】 痔瘘，下脓血不止。

11520 臭梧桐洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 臭梧桐31克 野菊花31克 地肤子31克 明矾10克

【用法】 水煎。熏洗。

【主治】 慢性湿疹。

11521 息炎汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 黄连 甘草 黄芩各一钱 麦冬五钱 天冬 生地 玄参各三钱 紫菀 天花粉 石膏各二钱 竹叶三十片 陈皮三分

【用法】 水煎服。

【主治】 生长膏粱，素耽饮酒，劳心过度，心火太盛，移热于肺，致咽喉臭痛。

11522 息贲汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】 半夏(汤七次) 吴茱萸(汤洗) 桂心各二两半 人参 甘草(炙) 桑白皮(炙) 葶苈(炒)各二两半

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，大枣两枚，煎七分，去滓，食前服。

【主治】 肺之积，在右胁下，大如覆杯，久久不愈，病洒洒寒热，气逆，喘咳，发为肺痈，其脉浮而毛。

【备考】 本方改为丸剂，名“息贲丸”(见《简明医彀》)。

11523 息焚安胎汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】 生地一两(酒炒) 青蒿五钱 白术五钱(土炒) 茯苓三钱 人参三钱 知母二钱 花粉二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人怀妊，胃火炎炽，熬煎胞胎之水，以致胞胎之水涸，胎失所养，而见口渴汗出，大饮冷水，烦躁发狂，腰腹疼痛，胎欲堕者。

11524 徐长卿汤

【方源】《本草纲目》卷十三引《圣惠》。

【组成】 徐长卿(炙)半两 茅根三分 木通 冬葵子一两 滑石二两 槟榔一分 罹麦穗半两

【用法】 每服五钱，入朴消一钱，水煎，温服，每日二次。

【主治】 气壅，关格不通，小便淋结，脐下妨闷。

【备考】 方中木通用量原缺。

11525 徐长卿洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 徐长卿31克

【用法】 水煎。内服或外洗。

【主治】 牛皮癣，带状疱疹。

11526 釜底抽薪散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 吴茱萸15克 胡黄连9克 大黄9克 生南星15克

【用法】 上为极细末。外用，一岁以下每次3克，一岁以上每次6克，用醋调，涂两足心。

【主治】 口炎，虚火者。口色淡红，满口白斑微

点，轻度溃烂，局露裂纹，夜间潮热，不渴，便溏尿数，舌质红无苔，脉虚。

11527 狼牙汤

【方源】《金匮》卷下。

【组成】 狼牙三两

【用法】 以水四升，煮取半升，以绵缠箸如茧，浸汤洞阴中，每日四次。

【主治】 ①《金匮》：少阴脉滑而数，阴中蚀疮烂者。②《三因》：妇人阴中蚀疮烂溃，脓水淋漓臭秽。

【方论选录】 ①《金匮要略心典》：脉滑者，湿也；脉数者，热也。湿热相合，而系在少阴，故阴中即生疮，甚则蚀烂不已。狼牙味酸苦，除邪热气，疥瘙恶疮，去白虫，故取治是病。②《金鉴》：阴中，即前阴也。生疮蚀烂，乃湿热不洁而生蛊也。用狼牙汤洗之，以除湿热杀蛊也。狼牙，非狼之牙，乃狼牙草也。如不得，以狼毒代之亦可。某疮深，洗不可及，则用后法也。③《高注金匮要略》：狼牙味苦性寒，以寒能胜热，苦能燥湿，而尤能杀虫，故主此以洗之耳。

11528 狼毒丸

【方源】《济生》卷三。

【组成】 狼毒（锉，炒）一两　芫花（醋炒）　川乌（炮，去皮尖）各一两　椒红（炒）　干漆（炒烟尽）　鳖甲（醋煮）　三棱　没药各半两　干姜（炮）半两　全蝎（去毒）九枚

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心以姜汤、温酒任下。

【主治】 七疝，久而不愈，发作无时，脐腹坚硬疼痛。

11529 狼毒膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 狼毒　槟榔　硫黄　五倍子　川椒　风子肉　蛇床子各三钱

【用法】 上为末，用香油一大杯煎滚，入皮消三钱，再煎滚，次下公猪胆汁一个，和匀。调前药搽患上。

【主治】 肾囊风。湿热为患，疙瘩作痒，搔之作疼。

【备考】《金鉴》有枯白矾。

11530 狼毒洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 狼毒 6 克　苦参 62 克

【用法】 水煎洗。

【主治】 慢性湿疹。

11531 狼毒浸剂

【方源】《中医皮肤病学简编》

【组成】 黄柏 500 克　龙骨 500 克　狼毒 500 克

【用法】 上药浸于酒精 8000 毫升，历七天，取滤液 5000 毫升，加漆片、松香各 200 克，聚乙烯醇缩丁醛 250 克，搅拌均匀即成。外用涂成膜。

【主治】 稻田皮炎。

11532 胰楞丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】 瓦楞子　海石各一两（二味先浸净，烘燥，同芒消五钱煮半日，醋煅）　红曲　酒曲各七钱　半夏曲五钱　鸡内金十付（洗、炙）　延胡　猪胰二个（蒸捣）

【用法】 上为末，熬糯米浓汁为丸，如梧桐子大。每服一钱五分，渐加至三钱，空心米饮送下。

【主治】 癥瘕痞积，肠覃，积之结于肠外募原者。

【加减】 石瘕，加斑蝥四个（米炒）服。

【宜忌】 间服芎归六君子汤尤妙。

11533 胰腺清化汤

【方源】《急腹症方药新解》。

【组成】 柴胡　黄芩　白芍各 15 克　厚朴　枳实　佩兰各 10 克　金银花　大青叶各 30 克　大黄 10 克（后下）　芒消 6 克（冲服）

【用法】 水煎服，每日一剂，早、晚分服；重症患者可每日服两剂，分四次服，每六小时一次。

【功用】 理气解郁，清热化湿。

【主治】 急性胰腺炎及其并发症。

【加减】 高热，加生石膏 30 克，知母 24 克，连翘 12 克；腹痛重，加川楝子、玄胡各 10 克；黄疸，加茵陈 30 克；呕吐，加姜夏、竹茹各 10 克；胸闷，加全瓜蒌 30 克，陈皮 10 克；湿重，加藿香、茯苓各 10 克；腹中寒冷，加干姜 6 克；腹泻每日超过三四次，去芒消；胆道蛔虫引起的胰腺炎，加苦楝皮根 15 克，使君子 10 克；麻痹性肠梗阻，加重大黄、芒消、枳实、厚朴用量；胰腺囊肿或假囊肿，加栀子、黄连、红藤、地丁和三棱、莪术、山甲、皂刺等。

【方论选录】 白芍、厚朴、枳实理气解郁；柴胡、黄芩、金银花、大青叶、佩兰清热化湿，大黄、芒消清热凉血，泻热导滞。

11534 胸膜炎汤 1 号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 旋覆花（布包）6 克　代赭石（布包）12 克　广陈皮 9 克　枳壳　桔梗各 6 克　全瓜蒌

18克 薤白头9克 郁金 青橘叶各9克 苇根 连翘各15克 杏仁9克

【用法】 水煎服。

【功用】 调气止痛。

【主治】 干性胸膜炎。咳嗽，胸疼，呼吸浅表，发热，脉弦数，舌苔薄白。

【方论选录】 方中旋覆花、代赭石降逆下气；广陈皮、枳壳、桔梗理气；全瓜蒌、薤白头通胸中之阳而止痛，为治胸膜炎特效药；青橘叶、郁金解郁止痛；苇根、连翘清热消炎；杏仁止咳平喘。各药协同作用，使胸中气机通畅，炎症得消，则疼痛可止。

11535 胸膜炎汤2号

【方源】 《临证医案医方》。

【组成】 冬瓜子30克 葶苈子9克 薏苡仁30克 茯苓12克 旋覆花（布包）6克 代赭石（布包） 瓜蒌各12克 薤白 杏仁 广皮各9克 枳壳 桔梗各6克

【功用】 泻肺利水，止咳。

【主治】 渗出性胸膜炎，发热，咳嗽胸疼，胸膜积液，呼吸不畅，脉滑数，舌苔白。

【方论选录】 方中冬瓜子、葶苈子、薏苡仁、茯苓利胸水；瓜蒌、薤白、广皮、枳壳、桔梗理气止痛；旋覆花、代赭石、杏仁降逆止咳。

11536 脏头丸

【方源】 《医学入门》卷七。

【异名】 猪脏丸（《杂病源流犀烛》卷二十八）。

【组成】 槐子一两 牙皂七分 黄连四两 糯米一升

【用法】 上为末，用雄猪大肠一条，去油洗净，将前药入内，两头扎住，砂锅内煮烂为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，米饮送下。

【主治】 肠风下血，脱肛。

11537 脏连丸

【方源】 《医统》卷四十二。

【组成】 大鹰爪黄连半斤 槐花米二两 枳壳一两 防风 粉草 槐角 香附子 猪牙皂角 木香各五钱

【用法】 上为细末，用猪大脏约二尺长水洗净，陈熟仓米三合同香附一处为末装入，缚定口，量用水二大碗，砂锅炭火煮干，即添水，慢慢煮烂猪脏如泥，取起和药捣如糊，再入黄连等末为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心米饮送下。

【功用】 ①《饲鹤亭集方》：散火毒，驱湿热，止血消肿，生肌定痛。②《全国中药成药处方集》（禹县方）：定痛消毒，退管生肌。

【主治】 ①《医统》：远年近日肠风、脏毒下血。②《饲鹤亭集方》：诸痔肿痛，肠风下血，脱肛痛痒，肠痈、脏毒成漏。

【宜忌】 ①《医统》：忌面、蒜、生冷、煎炙之物。②《饲鹤亭集方》：忌房欲、恼怒、酸辣动火之物。③《全国中药成药处方集》（禹县方）：寒症忌用。

11538 脏连丸

【方源】 《外科启玄》卷二十。

【组成】 胡黄连 荆芥穗 地榆各一两 槐花一两五钱 槐树木耳一两五钱

【用法】 上为细末，用活鲫鱼一尾，重十两，去肠刺，取肉，捣如泥，和作团，用健猪大肠头一尺五寸翻过，去油洗净，装前药扎定煮熟，空心食之，至重不过二次；如年久日远，以药末晒干为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一钱，空心以酒送下或以白汤送下。

【主治】 多年痔漏。

11539 脏连丸

【方源】 《外科正宗》卷三。

【组成】 黄连（净末）八两

【用法】 用公猪大脏尽头一段长一尺二寸，温汤洗净，将连末灌入脏内，两头以线扎紧，用时酒二斤半，砂锅内煮酒将干为度；取起脏药，共捣如泥；如药烂，再晒一时许，复为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心温酒送下。久服除根。

【功用】 《中药成方配本》：清泄肠热。

【主治】 ①《外科正宗》：新久痔，但举发便血作痛，肛门坠重。②《全国中药成药处方集》（杭州方）：大肠湿热，大便下血，日久不止，多食易饥，肛门坠肿以及脏毒等症。

【宜忌】 ①《全国中药成药处方集》（杭州方）：若血色晦淡属虚寒者忌之。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌五辛发物、房室。

11540 脏连丸

【方源】 《外科大成》卷二。

【组成】 黄连一斤 槐花半斤

【用法】 上为末。用雄猪肥壮大肠，以酒醋洗净，入药扎两头；次用韭菜五六斤，一半铺甑底，药肠盘于上，一半盖之，文火蒸之，以肠脂化尽、肠皮如油纸薄为度；去肠取药晒干，稀糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，以白滚汤送下，一日二次。

【主治】 痔漏，肠风下血，及水泻痢疾。

11541 脏连固本丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】 怀生地六两 干山药四两 茯苓三两（去皮） 牡丹皮三两 泽泻二两 山茱萸四两（去核） 黄连四两 黄柏三两 知母（去毛）二两 人参二两 当归二两 皂角二两 槐角三两 天花粉二两

【用法】 上为末，用猪大肠头一段去油，灌入药末，两头线扎住；用糯米一升煮饭，将半熟捞起入甑内，将药肠盘藏于饭之中如蒸饭之熟；待冷取出，去两头无药之肠，将药肠捣烂为丸，如硬，加饭为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心以白汤送下。

【主治】 膏粱富贵之人，饮食色欲，火酒犯房所致痔疾。

【宜忌】 戒醇酒厚味。寡欲。

11542 胶艾丸

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】 香附 生地 枳壳 白芍 砂仁 艾叶 阿胶 山药

【用法】 糊为丸。

【主治】 妇人血虚有寒，经水后期而行。

11543 胶艾汤

【方源】《外台》卷三十三引《小品》。

【组成】 阿胶二两（炙） 艾叶二两

【用法】 以水五升，煮取二升半，分三服。

【功用】《医林纂要》：安胎。

【主治】 妊娠胎动不安，腰腹疼痛，下血甚多。

①《外台》引《小品》：损动母，去血腹痛。②《妇人良方》：妇人妊娠忽然下血，腰痛不可忍。③《普济方》：妊娠漏胎下血过多；漏胎不安。

【方论选录】《医林纂要》：阿胶澄清下部秽浊而大滋血气，不独能养阴而已；艾叶大暖下部而补虚去寒，且能和血。

11544 胶艾汤

【方源】《普济方》卷三三七引《指南方》。

【异名】 胶艾芎归汤（《医学入门》卷八）、胶艾当归散（《医学正印》卷下）。

【组成】 阿胶 川芎 甘草（炙）各二两 艾叶 当归各三两

【用法】 上为粗末。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，温服。

【主治】 ①《普济方》引《指南方》：妊娠胞阻。②《东医宝鉴·杂病篇》：胎动下血在八、九月内，及半产后因续下血不绝。

【加减】 冷痛，加干姜二两。

11545 胶艾汤

【方源】《三因》卷十七。

【组成】 熟地黄一两 艾叶（炒） 当归 甘草（炙） 芍药 川芎 阿胶（炙）各一两 黄耆一两

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，煎七分，去滓，食前温服。

【功用】 安胎。

【主治】 ①《三因》：妊娠顿仆，胎动不安，腰腹痛，或有所下，或胎奔上刺心，短气。②《大生要旨》：怀孕而阴虚不足以济火，气虚不足以固血，点滴下血。

【加减】 胸中逆冷，加生姜五片，大枣三枚。

【方论选录】《医方考》：阿胶、熟地、当归、川芎，益血药也；黄耆、甘草、艾叶，固气药也。血以养之，气以固之，止漏安胎之道毕矣。

11546 胶连饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】 黄连 当归身 阿胶各二钱 赤芍 芡实 泽泻 车前子 牛膝 山药各七分 川芎 熟地各一钱

【用法】 水煎，临服加入童便一小钟。

【主治】 一切崩淋。

11547 胶胡散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】 烟胶五钱 羊胡子一撮（烧灰） 轻粉一钱

【用法】 上为末。湿则干搽，干则油调。

【主治】 羊胡子疮。

【备考】 本方方名，《疡医大全》引作“羊胡散”。

11548 胶蜡汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】 阿胶一两 蜡（如博棋）三枚 当归一两半 黄连二两 黄柏一两 陈廪米一升

【用法】 上㕮咀。以水八升，煮米蟹目沸，去米纳药，煮取二升，去滓纳胶、蜡令烊，分四服。一日令尽。

【主治】 ①《外台》引《深师方》：产后下痢。②《千金》：产后三日内，下诸杂五色痢。

【方论选录】《千金方衍义》：峻投连、柏以坚肠胃之崩迫，归、胶以滋营气之虚躁，蜂蜡以安脓血之绝伤，陈米以资胃气之敷化。此驻车丸之支派，于中除去干姜而加黄柏、米、蜡也。按驻车丸亦《千金》所立专调肾脾肺三车之气，以鹿车之力过疾，则以黄连驻之；牛车之力过缓，则以干姜御

之；羊车之力过劳，则以阿胶滋之。而驾驭二车者，血与气耳，用当归者，藉以统摄伤残之余，不使更失常度而瀉胥不止也。夫产后虚能受热，正宜温理中气，何反除去辛温而进苦寒？是必西北风气刚劲，资禀偏阳，难胜辛热，所以去彼取此。设当东南水土卑弱，躯体柔脆，又当悠赖干姜而远黄柏矣，孰谓异法方宜之可忽乎！

11549　胶蜜汤

【方源】《直指》卷十五。

【组成】连根葱白三片　透明阿胶（炒）二钱　蜜二匙

【用法】新水煎，去葱，入阿胶、蜜溶开，食前温服。

【主治】老人、虚人大便秘涩。

11550　胶艾芎归汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】当归三钱　人参一钱半　艾叶一钱（醋炒）　茯苓一钱半　阿胶三钱（糯米炒）　川芎一钱　大枣三枚

【用法】水煎，去滓。温服。

【主治】孕妇小腹痛，脉弦细者。

【方论选录】妊娠劳伤冲任，阴血耗伤而经脉不足，络虚召寒，故小腹疼痛，胎因不安焉。人参扶元补气以充血脉，当归养血荣经以养经脉，阿胶补冲任之阴而络脉受荫，川芎行血中之气而经脉调和，茯苓清治节以通调，艾叶理血气以逐冷，大枣缓中益脾元。水煎温服，使血气内充，则经气布护而寒邪自散，何小腹疼痛之不已哉，胎孕有不安者乎？

11551　胶艾榴皮汤

【方源】方出《千金》卷二，名见《张氏医通》卷十五。

【组成】阿胶　艾叶　酸石榴皮各二两

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取二升，去滓，纳胶令烊，分三服。

【主治】妊娠注下不止。

【方论选录】《千金方衍义》：艾叶温血，阿胶佐之；榴皮固脱，艾叶辅之。允为安胎断痢之专药，不在药味之繁多也。

11552　脑漏散

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】川芎　荆芥　防风　干姜　白芷　甘松各一两　羌活　甘草各半两

【用法】上为末。每服二钱，食后以茶清送下。

【主治】鼻流清浊涕，积年不愈。

11553　脑麝祛风丸

【方源】《普济方》卷九十三。

【组成】白花蛇头一个（带项三寸，酒浸，炙）　乌梢蛇尾二个（长七寸，酒浸，炙）　川乌头尖三个（去黑皮）　附子四个（去黑皮）　天南星（炮）　半夏（姜制）　白附子　细辛（去叶）　防风（去芦）　天麻　全蝎（去毒，炒）　白僵蚕（去丝嘴，炒黄）　草乌头（炮）各半两　脑　麝各一分（研）

【用法】上为细末，姜汁为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸，煎小续命汤送下，不拘时候。

【主治】左瘫右痪。

11554　脓溃生肌散

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】生龙骨三钱　螵蛸　熟石膏各二钱　干胭脂　陈石灰　象皮各一钱（煅）　浮干石六分　珍珠八分

【用法】上药各为末，研细如飞面。每用少许掺膏上。

【主治】痈疽脓毒溃尽，肌肉不生。

11555　鸱头丸

【方源】《普济方》卷一〇〇引《济生》。

【组成】飞鸱头一枚（烧灰）　虢丹五钱（细研）　皂角五锭（酥炙）

【用法】上为细末，糯米糊为丸，如绿豆大。每服十五丸，加至二十丸，以粥饭送下，不拘时候。

【主治】①《普济方》引《济生》：风痫，不问长幼，发作渐频，呕吐涎沫。②《东医宝鉴·内景篇》：癫痫恶病。

11556　皱肺丸

【方源】《三因》卷十三。

【组成】贝母（炒）　知母　秦艽　阿胶（炒）　款冬花　紫菀茸　百部（去心）　糯米（炒）各一两　杏仁（去皮尖，别研）四两

【用法】上为末。将羊肺一个，先以水灌洗，看容得水多少，即以许水更添些，煮杏仁令沸，滤过，灌入肺中，系定，以糯米泔煮熟，研细成膏，以前药末为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前以桑白皮汤送下。

【主治】喘咳。

11557　皱肺丸

【方源】《百一》卷五。

【组成】款冬花　人参　五味子　桂（去皮）　紫菀　白石英（微带青色者）　钟乳粉各等分

【用法】上为末，用羯羊肺一具，去皮尖杏仁半

斤，同用水煮肺烂为度，去筋膜与杏仁同研极烂，和众药为丸，如梧桐子大，阴干。每服五七十丸至一百丸，食后临卧，糯米饮送下。

【主治】 久嗽。

11558 逢原饮

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 天冬一钱五分 麦冬一钱五分 南沙参四钱 北沙参三钱 胡黄连五分 石斛三钱 玉竹三钱 蛤粉四钱 贝母二钱 茯苓三钱 广皮一钱 半夏一钱五分

【用法】 加梨汁半杯冲服。

【功用】 清润，渗湿化痰。

【主治】 上消。肺气焦满，水源已竭，咽燥烦渴，引饮不休，肺火炽盛，阴液消亡，火盛则痰燥，其消烁之力，皆痰为之助虐。

11559 高良姜丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】 高良姜二两 干姜（炮） 肉桂（去粗皮） 人参（去芦头） 白术 甘草（炒）各一两 丁香一分 荜澄茄一分 肉豆蔻七枚（面裹煨） 缩砂仁半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两作十丸。每服一丸，食前以生姜汤化下。

【主治】 脾胃虚弱，中脘停寒，心腹作痛，泄泻不止，不思饮食。

11560 高良姜汤

【方源】《医学六要·治法汇》卷五。

【组成】 高良姜 厚朴 官桂

【用法】 作一服，水一钟半，煎一钟，去滓，稍温服。

【主治】 因寒，心胀痛。

11561 高良姜散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【异名】 高良姜汤（《圣济总录》卷五十七）。

【组成】 高良姜半两（锉） 人参三分（去芦头） 草豆蔻一两（去皮） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 诃黎勒一两（煨，用皮） 丁香半两 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 桂心三分 甘草一分

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加大枣二枚，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 脾虚腹胀，肠鸣切痛，食少无力。

11562 高良姜散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】 高良姜三分（锉） 诃黎勒皮一两 白术三分 赤茯苓三分 半夏三分（汤洗七遍去滑） 细辛半两 桂心三分 桔梗半两（去芦头） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参半两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 胃气虚冷，胸膈冷气，痰饮，口中清水自出，胁急胀痛，不欲饮食。

11563 高良姜粥

【方源】《医方类聚》卷九十四引《食医心鉴》。

【组成】 高良姜六分（锉） 米三合

【用法】 上以水二升，煎高良姜，取一升半，去滓，投米煮粥食之。

【主治】 ①《医方类聚》引《食医心鉴》：心腹冷结痛，或遇寒风及吃生冷即发动。②《圣惠》：霍乱，吐利腹痛。

11564 高良姜粥

【方源】《养老奉亲》。

【组成】 高良姜二两（切，以水二升，煎取一升半汁） 青粱米四合（研淘）

【用法】 上以姜汁煮粥，空心食之，日一服。

【主治】 老人冷气，心痛郁结，两胁胀满。

11565 高枕无忧散

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】 人参五钱 软石膏三钱 陈皮 半夏（姜汁浸，炒） 白茯苓 枳实 竹茹 麦门冬 龙眼肉 甘草各一钱半 酸枣仁（炒）一钱

【用法】 上锉。水煎服。

【功用】《杏苑》：理痰气。

【主治】 ①《古今医鉴》：心胆虚怯，昼夜不睡，百方无效者。②《杏苑》：虚烦失志，心气不足。

11566 离珠丹

【方源】《医学发明》卷七。

【异名】 神珠丹（原书同卷）、神珠丸（《赤水玄珠》卷二）。

【组成】 杜仲三两（去丝） 萆薢二两 诃子五个 龙骨一两 破故纸（炒）三两 朱砂一钱半（研） 胡桃一百二十个（去隔皮） 缩砂仁半两 巴戟（酒浸，去心）二两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服二十丸，空心盐汤、温酒任下。

【主治】 ①《医学发明》：下焦阳虚，脐腹冷痛，足胫寒而逆。②《卫生宝鉴》：下焦元气虚弱，小

腹疼痛，皮肤燥涩，小便白利。

11567 离照汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】琥珀一钱 丹参二钱 朱砂五分 茯神三钱 柏仁二钱 沉香五分 广皮一钱 青皮一钱 郁金二钱 灯心三尺 姜皮五分

【主治】心胀。烦心短气，卧不安。

11568 离宫锭子

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】血竭三钱 朱砂二钱 胆矾三钱 京墨一两 蟾酥三钱 麝香一钱五分

【用法】上为末，凉水调成锭。凉水磨浓涂之。

【功用】《北京市中药成方选集》：化坚祛毒，消肿止痛。

【主治】①《金鉴》：疔毒肿毒，一切皮肉不变，漫肿无头。②《北京市中药成方选集》：疔毒恶疮，初起坚硬，疼痛难忍。

11569 疳积丸

【方源】《医方类聚》卷一九〇引《修月鲁般经》。

【组成】白芜荑 陈皮 缩砂 神曲（炒） 麦芽 使君子各二钱半 甘草一钱半 蟾一个（炙黄） 陈米一勺（同巴豆七粒浸一宿，炒黄，只用米）

【用法】上为末，水为丸，如绿豆大。每服十丸，加至二十丸，空心饮送下。

【主治】疳积。

11570 疳积饼

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】青皮（去瓤）五钱 陈皮五钱 山楂肉五钱 神曲（炒）五钱 麦芽（炒）五钱 砂仁（炒）四钱 白术（去芦）六钱 三棱（煨）五钱 莪术（煨）五钱 木香五钱 槟榔四钱 甘草（炙）四钱 小茴（炒）三钱 史君子（去壳）二两 川楝子（酒蒸去核）三钱 肉豆蔻（煨）四钱 诃子（去核）四钱 夜明砂（炒）三钱（另研） 干蟾蜍一大个 川黄连（去毛净）六钱（清水浸，取汁和药末）

【用法】上焙干，为细末，用好细白面六斤，微炒黄，以砂糖十两，水煮化，和前面药得所，印作饼子，每个重一钱。每服三五饼，任意嚼吃。

【主治】小儿五疳诸积，肚大青筋，面黄肌瘦，饮食少进，或泻、或痢、或腹痛。

11571 疳积散

【方源】《准绳·幼科》卷八。

【组成】厚朴（厚而紫色有油者佳，去粗皮，切片，生姜自然汁炒熟，为末，净） 一两 广陈皮（去白，为末）八钱 粉甘草（去皮，净，为末）真芦荟（净末）各七钱 芜荑（真孔林大而多白衣者佳，去白衣壳，净末）五钱 青黛（取颜料铺中浮碎如佛头青色者，研，净末）三钱 百草霜（山庄人家锅底墨，净末）二钱 旋覆花（净末）一钱半

【用法】上匀和成剂。每一岁用药一分，用灯心汤早上空腹时调服，服后病即愈。当再用肥儿丸调理；如脾气未实，用启脾丸或大健脾丸。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：健脾消积，杀虫利气。

【主治】小儿魃乳、病乳、夹乳、夹食，大病之后，饮食失调，平居饮食过饱伤脾，致成疳积，面黄腹大，小便色如米泔，大便泻黄酸臭，头皮干枯，毛发焦穗，甚至目涩羞明，睛生云翳，形体骨立，夜热昼凉，丁奚哺露。

【加减】如疳气未尽，用陈皮一两，白术、木香三钱，白茯苓五钱，加好平胃散三钱，陈米粥汤调服。

【备考】本方改为丸剂，名“疳积丸。（见《中国医学大辞典》）。

11572 疟腮汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】连翘三钱 大力 羌活 防风 柴胡各二钱 荆芥 薄荷 甘草各一钱 生姜

【主治】寒火冲耳而致疟腮。

11573 悦脾汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】白术一钱 茅术一钱 茯苓二钱 附子八分 砂仁一钱 木香五分 乌药一钱 苡仁四钱 青皮一钱 神曲三钱（炒） 姜三片

【主治】脾湿胀痛。脾本湿土，寒邪乘之，寒与湿凝，是为重阴，脘下至当脐胀满作痛。

11574 烧伤散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】寒水石 156 克 炉甘石 156 克 赤石脂 156 克 生石膏 156 克 冰片 6 克

【用法】上为细末。用香油调，外涂。

【主治】烫火伤。

11575 烧肾散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】磁石一两（烧，醋淬七遍，细研，水飞过） 附子一两（炮裂，去皮脐） 巴戟天一两 川

椒一两（去目及闭口者，微炒出汗）

【用法】 上为细散。用猪肾一具（去筋膜，细切），葱白、薤白各一分（细切），入散药一钱，盐花一字，和搅令匀，以十重湿纸裹，于煻灰火内烧熟，空腹细嚼，酒解薄粥下之。十日效。

【主治】 ①《圣惠》：耳聋。②《圣济总录》：肾脏虚风，上攻头面，耳内生疮，及腰脚重痛。

11576 烧胃丸

【方源】《医方类聚》卷一五七引《施圆端效方》。

【组成】 干姜 厚朴（二味同捣，炒） 附子（炮，去皮） 茯苓 甘草 陈皮 桂枝 荷子皮各等分

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】 脾胃虚冷，疼痛泻痢。

11577 烧裈散

【方源】《伤寒论》。

【组成】 妇人中裈近隐处（烧作灰）

【用法】 上一味，每服方寸匕，水调下，一日三次。小便即利，阴头微肿，此为愈也。妇人病，取男子裈烧服。

【主治】 伤寒，阴阳易，其人身体重，少气，少腹里急，或引阴中拘挛，热上冲胸，头重不欲举，眼中生花，膝胫拘急。

【方论选录】 ①《医方考》：裈裆味咸而腐秽，故能入少阴；烧之则温，故足以化气；灰之则浊，故足以溺膀胱。《经》曰：浊阴归六府，是也。药物虽陋，而用意至微，不因其陋而忽之，则升仲景之阶矣。②《古方选注》：裈裆穿之日久者良。阴阳易本无客邪，惟病人愈后，蕴蓄之热，乘虚袭人，溷逆三焦，仍取秽浊之物，导归阴窍，亦求之于其所属也。烧以洁其污，灰取其色黑下行。③《医宗金鉴》引方有执：裈裆近阴处，阴阳二气之所聚也。男女易用，物各归本也。

【临证举例】 阴阳易 《陕西中医学院学报》（1983；1:36）：患者张某，女，28岁。面色苍白，恶寒汗出，盖被后又加盖皮大衣仍抖动不止，每间隔2～3分钟即发出恐惧凄惨的尖叫声。询言阴中拘引，有一股热气直冲心下，自感欲死而发叫，两腿酸困，项软头重不欲举，气短不续，双目紧闭，睁目则眩晕，小便三日未解，阴中流出霉腐样粘液。舌质淡，苔薄白，脉弦细稍数。因病情怪异，复询其夫，乃实告曰：三日前患感冒初愈，同房后即感身体不适，至天明病重不起，急送医院。经查体温、血压、血象未见异常，用西药对症治疗三日无效。此疾与阴阳易之病相合，令其夫如法烧服烧裈散，药后约三十分钟，阴中拘引感消失，心神渐安而入睡。三小时后，于病室畅尿一次，病症若失，惟感身体疲乏。患者执意去室外雪地排便，返回后病症复发如前。因忆烧裈散服法有小便利即效，予五苓散加木通，岂知服药后病情加剧。急令再调烧裈散后病症又消失。坚持服药三天，未再复发。以归脾汤、桂附地黄丸调理康复。

11578 烧脾散

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）。

【组成】 赤芍药 干姜（炮）各六两半 良姜（油炒）十两 甘草（炙）四两

【用法】 上为末。每服二大钱，白汤点下，不拘时候。

【主治】 脾胃虚弱，久寒积冷，心气脾痛，冷痰翻胃，脐腹刺痛，呕吐恶心，不思饮食；及妇人血气攻刺，腹胁撮痛。

11579 烧脾散

【方源】《医方大成》卷三引《济生》。

【组成】 干姜（炮） 厚朴（姜炒） 草果仁 缩砂仁 神曲（炒） 麦芽（炒） 陈皮 高良姜 甘草（炙）各等分

【用法】 上为末。每服三钱，热盐汤点服，不拘时候。

【主治】 ①《医方大成》引《济生》：饮啖生冷果菜，停留中焦，心脾冷痛。②《奇效良方》：老人霍乱吐泻。

11580 烧腰散

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】 杜仲 故纸 青盐各等分

【用法】 入猪腰或羊腰内烧食。

【主治】 肾虚腰痛，脚膝酸软。

11581 烟胶散

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】 烟胶 小槟榔各等分

【用法】 上为细末。用柏油调搽。

【主治】 燕窝疮生于项上；牛皮癣，四湾疮痛，痒久不愈。

11582 烟熏散

【方源】《外伤科学》。

【组成】 苍术一两五钱 松香二两 大风子五两 五倍子二两五钱 苦参 黄柏 防风各一两五钱 白鲜皮五钱 鹤虱二两

【用法】 上为细末，取草纸两张，上置药物二

钱，卷成纸条，点火将烟熏于患处，每次10～15分钟，用药量多少可依据皮损范围大小而定，一般三至四钱（二钱约能燃10分钟），每日二次。温度的标准，可依据患者耐受程度而定。

【功用】 杀虫止痒。

【主治】 鹅掌风，慢性湿疹等皮肤干燥瘙痒者。

11583 凌花散

【方源】《医方大成》卷九引《澹寮》。

【异名】 凌霄花散（《济阴纲目》卷二）。

【组成】 当归（酒浸） 凌霄花 刘寄奴 红花（酒浸，候煎药一二沸即入） 官桂（去皮） 牡丹皮（洗） 川白芷 赤芍药 延胡索各等分

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏，酒半盏，煎八分，再入红花煎，热服。

【主治】 ①《医方大成》引《澹寮》：妇人月水不行，发热腹胀。②《普济方》：妇人腹满，身体疼痛，瘦悴食少，发热自汗。

【方论选录】《医略六书》：凌霄花破血降火；刘寄奴破血通经；当归养血，统营之运；赤芍破血，泻火之亢；延胡化血滞以通经脉，红花活血脉以浚血海；官桂温经通闭；丹皮凉血化血；白芷散阳明之邪以清冲任之脉也。为散以散之，温酒以行之，使瘀血顿化，则经气自调，而经血应时以下，何经闭发热之不瘳乎？

11584 凌霄散

【方源】《洁古家珍》。

【异名】 五九散（《儒门事亲》卷十五）、凌霄花散（《医学入门》卷八）。

【组成】 蝉壳 地龙（炒） 白僵蚕 全蝎各七个 凌霄花半两

【用法】 上为极细末。每服二钱，酒调下，于浴室内常在汤中住一时许服药效。

【主治】 疠风。

【方论选录】《医方考》：疠风攻蚩气血，木石不能获效者，非其类也，故用血气之属，能主风者以治之。蝉退主风热，地龙主风湿，僵蚕、全蝎主风毒，凌霄花主风坏之血，斯五物者，皆有微毒，用之以治疠风，所谓衰之以属也。然必坐子浴室汤中服药者，所以开泄腠理，使邪气有所出尔！

11585 凌霄花汤

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 凌霄花（去萼，一名紫葳） 芫花（醋炒焦） 红蓝花各半两 没药一分（研）

【用法】 上为粗末。每服一钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食前热服。

【主治】 妇人血闭不行，脐下硬痛，及腰痛不可忍。

11586 凌霄花散

【方源】 方出《百一》卷九，名见《普济方》卷五十七。

【组成】 凌霄花 山栀子各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，食后茶汤调下，每日二次。

【主治】 酒渣鼻。

【临证举例】 酒渣鼻 临川曾景仁尝苦此疾，一日得此方子都下一异人，不三次遂去根本。

11587 凌霄花散

【方源】《妇人良方》卷二十。

【组成】 凌霄花一分 牡丹皮 山栀子仁 赤芍药 紫河车 血竭 没药 硇砂 地骨皮 五加皮 甘草各二两 红娘子十一个 桃仁 红花 桂心 延胡索 当归各一两

【用法】 上为细末。每服一钱，温酒调下。

【主治】 妇人血瘕、血块及产后秽露不尽，儿枕急痛，积聚疼痛，渐成劳瘦。

11588 凉血丸

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】 枇杷叶 白芍 五味子 生地 青蒿 甘草 山萸 黄柏 川断 杜仲 阿胶

【用法】 山药糊为丸服。

【主治】 妇人血热，经期先行，腰腹发热者。

11589 凉血饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】 人参 黄耆 黄连 生地 川芎 当归 槐角 黄芩 升麻 枳壳各一钱

【功用】 凉血清热。

【主治】 痔漏。

11590 凉肾汤

【方源】《医宗必读》卷六。

【组成】 生地黄三钱 赤茯苓一钱 玄参一钱 远志一钱（去木） 知母八分（酒炒） 黄柏六分（酒炒）

【用法】 水一钟半，煎八分服。

【主治】 ①《医宗必读》：肾劳实热，腹胀耳聋。②《医钞类编》：小便黄赤涩痛；阴痿。

【备考】 本方原名凉肾丸，与剂型不符，据《医钞类编》改。

11591 凉肺汤

【方源】《玉案》卷六。

【组成】 黄芩 贝母 天花粉 枳壳各七分 橘红 山栀 桔梗 麦门冬 甘草各五分

【用法】 加灯心三十茎，水煎，食远服。

【主治】 肺热咳嗽，痰盛音哑。

11592 凉肺汤

【方源】《医宗必读》卷六。

【组成】 知母（去毛，炒） 贝母 天门冬（去心） 麦门冬各一钱半 黄芩 橘红各一钱 甘草五分 桑皮八分

【用法】 水一钟半，煎八分服。

【主治】 肺劳实热，咳嗽喘急。

11593 凉肢散

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 茯苓 薏仁 玄参各五钱 甘草 升麻各一钱 炒荆芥一钱 甘菊三钱 麦冬三钱 天花粉二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 肌肉热极生风，体上如鼠走，唇口反裂，久则缩入，遍身皮毛尽发红黑。

11594 凉胃汤

【方源】《医宗必读》卷八。

【组成】 黄连一钱二分 生甘草四钱 陈皮二钱（去白） 茯苓四钱（去皮）

【用法】 水二杯，煎一杯，食远服。

【主治】 ①《医宗必读》：脾胃有热，消谷善饥，溺色黄赤。②《杂病源流犀烛》：胃气盛，身以前皆热。

11595 凉胆丸

【方源】《得效》卷十六。

【异名】 凉膈丸（《银海精微》卷下）。

【组成】 黄连（洗，不见火） 荆芥 黄芩 草龙胆各半两 芦荟 防风各一两 黄柏（去皮）一分 地肤子一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，薄荷汤送下。

【主治】 胆受风寒而致黑花翳，其状青色，大小眦头涩痛，频频下泪，口苦，不喜饮食。

【备考】 方中黄柏用量原缺，据《普济方》补。又《普济方》引本方有地骨皮、葫芦子各一分，无地肤子。

11596 凉胎饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 生地 芍药各二钱 黄芩 当归各一二钱 甘草（生）七分 枳壳 石斛各一钱 茯苓一钱半

【用法】 水一钟半，煎七分，食远温服。

【主治】 胎气内热不安。

【加减】 热甚，加黄柏 二钱。

11597 凉惊丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 草龙胆 防风 青黛各三钱 钩藤二钱 黄连五钱 牛黄 麝香 龙脑各一字

【用法】 面糊为丸，如粟米大，每服二五丸，金银花汤送下。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：小儿惊痫。②《保婴撮要》：小儿热搐。心神惊悸，白睛赤色，牙关紧急，潮热流涎，手足动搐。

11598 凉解汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 薄荷叶三钱 蝉退（去足土）二钱 生石膏（捣细）一两 甘草一钱五分

【功用】 凉散。

【主治】 温病表里俱觉发热，脉洪而兼浮者。

11599 凉膈散

【方源】《局方》卷六。

【异名】 连翘饮子（《宣明论》卷六）、连翘消毒散（《外科心法》卷七）。

【组成】 川大黄 朴消 甘草（炙）各二十两 山栀子仁 薄荷叶（去梗） 黄芩各十两 连翘二斤半

【用法】 上为粗末。每服二钱，小儿半钱，水一盏，加竹叶七片，蜜少许，煎至七分，去滓，食后温服。得利下住服。

【功用】 养阴退阳，清热泻火，止渴除烦。

①《准绳·伤寒》：养阴退阳。②《北京市中药成方选集》：清热降火，除烦止渴。③《方剂学》：泻火通便，清上泄下。

【主治】 上中二焦热邪炽盛，头昏目赤，烦躁口渴，胸膈烦热，口舌生疮，咽喉肿痛，睡卧不宁，谵语狂妄，便秘溲赤，以及小儿惊风、重舌、木舌、牙痛、翳障、疫喉属膈热火盛者。

①《局方》：大人小儿脏腑积热，烦躁多渴，面热头昏，唇焦咽燥，舌肿喉闭，目赤鼻衄，颐颊结硬，口舌生疮，痰实不利，涕唾稠粘，睡卧不宁，谵语狂妄，肠胃燥涩，便溺秘结，一切风壅。②《宣明论》：伤寒表不解，半入于里，下证未全；下后燥热拂结于内，烦心懊侬不得眠，疮癣发斑，惊风，热极黑陷将死。③《丹溪心法》：火气上蒸胃中之湿，亦能汗。④《准绳·伤寒》：心火上盛，膈热有余，吐血，咳嗽痰涎，淋闭不利，阴耗阳

竭，小儿疮痘黑陷。⑤《寿世保元》：三焦实火，六经积热，酒毒，呕血，风眩，阳毒，结胸心下满，眼中翳障。⑥《痘科类编》：疹夹丹毒。⑦《证治宝鉴》：痰火上扰之口噤，重舌木舌，中消能食而大便秘。⑧《麻科活人》：瘟疫时行，表里实热。⑨《金鉴》：热极生风而致小儿急惊风，肺热喘急。⑩《疫喉浅论》：疫喉上焦火盛，中焦燥实。⑪《北京市中药成方选集》：牙龈肿痛。

【宜忌】《北京市中药成方选集》：孕妇勿服。

【方论选录】①《医方考》：黄芩、栀子，味苦而无气，故泻火于中；连翘、薄荷，味薄而气薄，故清热于上；大黄、芒消，咸寒而味厚，故诸实皆泻；用甘草者，取其性缓而恋膈也；不作汤液而作散者，取其泥膈而成功于上也。②《医方集解》：此上中二焦泻火药也。热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘，故以连翘、黄芩、竹叶、薄荷升散于上，而以大黄、芒消之猛利推荡其中，使上升下行，而膈自清矣；用甘草、生蜜者，病在膈，甘以缓之也。③《张氏医通》：消、黄得枳、朴之重著，则下热承之而顺下；得芩、栀、翘、薄之轻扬，则上热抑之而下清，此承气、凉膈之所攸分也；用甘草者，即调胃承气之义也；《局方》专主温热时行，故用竹叶。④《古方选注》：薄荷、黄芩，从肺散而凉之；甘草从肾清而凉之；连翘、山栀，从心之少阳苦而凉之；山栀、芒消，从三焦与心包络泻而凉之；甘草、大黄，从脾缓而凉之；薄荷、黄芩，从胆升降而凉之；大黄、芒消，从胃与大肠下而凉之。上则散之，中则苦之，下则行之，丝丝入扣，周遍诸经，庶几燎原之场，顷刻为清虚之腑。⑤《成方便读》：以大黄、芒消之荡涤下行者，去其结而逐其热，然恐结邪虽去，尚有浮游之火，散漫上中，故以黄芩、薄荷、竹叶清彻上中之火，连翘解散经络中之余火，栀子自上而下，引火邪屈曲下行，如是则有形无形、上下表里诸邪，悉从解散。⑥《方剂学》：方中重用连翘清热解毒，配栀子、黄芩以清热泻火，又配薄荷、竹叶以清疏肺、胃、心胸之热；胃热伤津而腑实证尚未全具，不宜峻攻，方中芒消、大黄与甘草、白蜜同用，既能缓和消、黄之急下，更利于中焦热邪之清涤，又能解热毒、存胃津、润燥结，使火热之邪，假阳明为出路，体现了“以下为清”之法。

【临证举例】①热厥《临证指南医案》：某，先发水疮，已感冬温小愈，不忌荤腥，余邪复炽，热不可遏，入夜昏烦，辄云头痛，邪深走厥阴，所以发厥，诊脉两手俱细，是阳极似阴，鼻煤舌干，目眦黄，多属邪闭坏败，谅难挽回，用凉膈散。②时疫《南雅堂医案》：时疫来势甚暴，目赤口渴，壮热无汗，斑疹隐隐未透，烦躁不已，脘腹按之作痛，大小便闭，热毒内炽，邪势不能外达，防有内陷昏喘之变。拟仿凉膈法，并加味酌治，俾热从外出，火从下泄，冀其邪去正复，得有转机。连翘三钱，大黄一钱五分（酒浸），芒消一钱五分，牛蒡子一钱五分，枳实一钱，栀子八分（炒黑），甘草一钱五分，淡黄芩八分，薄荷八分，竹叶一钱，生白蜜半盏。③疮疡《外科发挥》：一妇人面患毒，焮痛发热作渴，脉数，按之则实，以凉膈散二剂少愈。④牙痛《口齿类要》：表兄颜佥宪牙痛，右寸后半指脉洪而有力，余曰：此大肠积热，当用寒凉之剂。自泥年高，服补阴之药，呻吟彻夜，余与同舟赴京，煎凉膈散加荆、防、石膏，与服一钟即愈。

11600 凉膈散

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】山栀子仁一两 连翘 黄芩各二两 大黄半两 薄荷一两半

【用法】上为粗末。每服一两，水二盏，同竹叶七片，煎至一盏，去滓，入蜜少许，食后服。

【主治】①《云岐子脉诀》：实脉关前胸热甚，主脉浮，客脉实，浮实相合，实在上焦，阳气有余，胸中热甚。②《松峰说疫》：赤膈伤寒。表症已退，大便燥实，胸膈肿痛者。

【备考】《松峰说疫》有甘草。治上症加蒌仁、枳壳、桔梗、紫金皮、赤芍。

11601 凉膈散

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】连翘 栀子各三钱 大黄四钱（酒蒸） 芒消一钱 黄芩三钱 薄荷八分 知母一钱五分 升麻四分 石膏三钱 黄连六分 甘草八分

【用法】上锉一剂。水煎，频服。

【主治】胃有实热，齿痛，或上牙痛尤甚者。

11602 凉膈散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】防风 荆芥 桔梗 山栀 玄参 石膏 薄荷 黄连 天花粉 牛蒡子 贝母 大黄各等分

【用法】水二钟，前八分服，不拘时候。

【主治】咽喉肿痛，痰涎壅盛，膈间有火，大便秘涩。

11603 凉膈散

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】芒消 大黄 车前子各一钱 黑参一钱

半 黄芩 知母 栀子（炒） 茺蔚子各一钱

【用法】 上为粗末。以水二盏，煎至一盏，食后温服。

【主治】 膈中积热，肝经风毒上冲于目，而致睑硬睛疼，初患之时，时觉疼胀，久则睑胞肿硬，眼珠疼痛。

11604 凉膈散

【方源】《疫疹一得》卷下。

【组成】 连翘 生栀子 黄芩 薄荷 桔梗 甘草 生石膏 竹叶

【功用】 泻火。

【主治】 疫疹。心火上盛，中焦燥实，烦躁口渴，目赤头眩，口疮唇裂，吐血衄血，诸风瘛疭，胃热发狂，惊急搐风。

【方论选录】 热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘。故以连翘、黄芩、竹叶、薄荷升散于上；古方用大黄、芒消推荡其中，使上升下行而膈自清矣。予忆疫疹乃无形之毒，投以消、黄之猛烈，必致内溃，予以石膏易去消、黄；使热降清升而疹自透，亦上升下行之意也。

11605 凉髓丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】 地骨皮一两 丹皮一两 麦冬五钱 金钗石斛三钱 牛膝二钱 茯苓二钱

【用法】 水煎服。

【功用】 补肾水。

【主治】 肾水不能制火，每夜发热如火，至五更身凉，时而有汗，时而无汗，觉骨髓中内炎，饮食渐少，吐痰如白沫。

【方论选录】 此方用地骨皮、丹皮，不特补肾中之水，且取其能凉骨中之髓与消骨外之血也。夫骨中髓热，必耗其骨外之血；骨外血热，必烁其骨中之髓，故兼用二味，则髓与血两治，无太过之虞，肾中宁独热哉？况石斛、牛膝，无非补肾阴之味，阴旺则阳平，水胜则火退，骨蒸不蒸，而痨瘵何能成哉？

11606 凉七味汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 生地五钱 萸肉一钱半 泽泻八分 丹皮一钱半 茯神一钱半（去木） 山药三钱（炒） 知母一钱半（盐水炒）

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 吐血，脉虚软尺躁。

【方论选录】 生地滋阴血以壮肾水，知母润肾燥以退虚炎，丹皮凉血散血，萸肉秘气涩精，山药补脾益阴，茯神安神定志，泽泻泻浊阴以清血海也。水煎温服，使阴血内充，则虚火自降，而血不妄行，安有吐血之患乎？

11607 凉血饮子

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 生地黄一钱半 黄连五分 黄芩 荆芥 黑参各一钱 红花三分 赤芍 丹皮各八分 木通七分

【用法】 水煎，温服。

【主治】 麻疹火毒炽盛，紫赤而黯。

11608 凉心清肝汤

【方源】《疡医大全》卷十。

【组成】 生地 当归 白芍 炒山栀 丹皮 丹参 扁柏叶 川连 生甘草

【用法】 灯心十寸为引。

【主治】 双目流血。

11609 凉血五花汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 红花三至五钱 鸡冠花三至五钱 凌霄花三至五钱 玫瑰花三至五钱 野菊花三至五钱

【功用】 凉血活血，疏风解毒。

【主治】 血热发斑，热毒阻络所致盘状红斑性狼疮初期，玫瑰糠疹（风癣）、多形性红斑（血风疮）及一切红斑性皮肤病初期，偏于上半身或全身散在分布者。

【方论选录】 方中凌霄花凉血活血泻热为主，玫瑰花、红花理气活血化瘀，鸡冠花疏风活血，野菊花清热解毒。因为药味取花，花性轻扬，所以本方以治疗病变在上半身或全身散发者为宜。

11610 凉血五根汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 白茅根一两至二两 瓜蒌根五钱至一两 茜草根三至五钱 紫草根三至五钱 板蓝根三至五钱

【功用】 凉血活血，解毒化斑。

【主治】 血热发斑，热毒阻络所引起的多形性红斑（血风疮）、丹毒初起，紫癜、结节性红斑（瓜藤缠）及一切红斑类皮肤病的初期偏于下肢者。

【方论选录】 本方以紫草根、茜草根、白茅根凉血活血为主，佐以瓜蒌根养阴生津，板蓝根清热解毒。因为根性下沉，所以本方以治疗病变在下肢者为宜。

11611 凉血四物汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】 当归 黄连 山栀 香附 槐花 川芎

各一钱　白芍　生地各二钱

【用法】 加灯心三十茎，水煎，空心服。

【主治】 月信先期而来，及紫黑色。

11612　凉血四物汤

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】 当归　生地　川芎　赤芍　黄芩（酒炒）　赤茯苓　陈皮　红花（酒洗）　甘草（生）各一钱

【用法】 水二钟，加生姜三片，煎八分，加酒一杯，调五灵脂末二钱热服。

【功用】 化滞血。

【主治】 酒渣鼻。胃火熏肺、风寒外束、血瘀凝结，鼻准头及鼻两边先红后紫，久变为黑。

【加减】 气弱，加酒炒黄耆二钱。

11613　凉血地黄汤

【方源】《脾胃论》卷中。

【组成】 黄柏（去皮，锉，炒）　知母（锉，炒）各一钱　青皮（不去皮瓤）　槐子（炒）　熟地黄　当归各五分

【用法】 上㕮咀，作一服。用水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】 时值长夏，湿热大盛，客气胜而主气弱，肠澼病甚。

【加减】 小便涩，脐下闷，或大便则后重，调木香、槟榔细末各五分，空心或食前稍热服。

【方论选录】《脾胃论注释》：黄柏、知母燥湿清热为主，熟地黄、当归滋血和血为辅，青皮理气为助，槐实入肠凉血为引。

11614　凉血地黄汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 生地黄汤（《杏苑》卷八）、地黄汤（《女科秘要》卷四）。

【组成】 黄芩　荆芥穗　蔓荆子各一分　黄柏　知母　藁本　细辛　川芎各二分　黄连　羌活　柴胡　升麻　防风各三分　生地黄　当归各五分　甘草一钱　红花少许

【用法】 上㕮咀，作一服。水三大盏，煎至一盏，去滓，稍热空心服。

【主治】 妇人肾水阴虚，不能镇守包络相火，而致血崩。

【方论选录】《济阴纲目》：血属阴，阴不自升，故诸经之血，必随诸经之气而后升；若气有所陷，则热迫血而内崩矣。故用黄柏以清下焦胞络之火；心者火之主也，故又以生地、黄连以治火之原；知母、黄芩滋水之母；归尾破瘀，红花生血，所谓去故生新也；川芎行血海之余，蔓荆凉诸经之血，而风药者，皆所以升诸经之气也，诸经之气升，则阴血不得不随之而起矣。

11615　凉血地黄汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 川芎　当归　白芍　生地　白术　茯苓各一钱　黄连　地榆　人参　山栀　天花粉　甘草各五分

【用法】 水二钟，煎八分，食前服。

【主治】 脏毒已成未成，或肿不肿，肛门疼痛，大便坠重，或泄或秘，常时便血，头晕眼花，腰膝无力。

11616　凉血地黄汤

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 归尾一钱五分　生地二钱　赤芍一钱　黄连（炒）二钱　枳壳一钱　黄芩（炒黑）一钱　槐角（炒黑）三钱　地榆（炒黑）二钱　荆芥（炒黑）一钱　升麻五分　天花粉八分　甘草五分　生侧柏二钱

【用法】 水两大钟，煎一钟，空心服。三四剂则痛止肿消，更外兼熏洗。

【主治】 痔肿痛，出血。

11617　凉血抑火汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 当归　赤芍各二钱　大黄三钱　黄芩　黄连　丹皮　生地　川芎各一钱五分

【用法】 加灯心三十茎。临服加藕汁半杯。

【主治】 吐血、衄血初起，气盛上逆，不能下降归经。

11618　凉血明目汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】 熟地黄一钱五分　羌活　防风各六分　甘菊花　山栀子（炒）　谷精草　柴胡各五分　木贼四分　甘草三分　川芎　当归各一钱　白芍八分

【用法】 上㕮咀。水煎熟，食前温服。

【功用】 凉血明目。

【主治】 眼久昏疼，或视物不清，恶日羞明。

【加减】 有泪，加川椒（炒）十粒；红热，加黄连（酒浸）五分，龙胆草（酒浸）三分。

11619　凉血固真汤

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】 当归身七分　川芎五分　白芍药七分　生熟地黄各一钱　条实黄芩（生用，细切）一钱二分　香附子（童便浸透）七分　续断五分　柴胡八分　丹参五分　白术七分　荆芥穗五分　黄柏（微

炒）五分

【用法】 上锉一剂。用水一钟半，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 血分有热，月水频并，劳倦腰疼，手足烦热，头目昏眩，渐成崩漏。

11620 凉血活血汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 槐花 紫草根 赤芍 白茅根 生地 丹参 鸡血藤

【功用】 清营凉血活血。

【主治】 心肝二经蕴热郁于血分，蒸灼肌肤所致血热白疕，皮肤起红斑，基底红较明显，表面银白色鳞屑多，剥离后有出血点，发病迅速。

11621 凉血消风散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 生地30克 当归9克 荆芥9克 蝉衣6克 苦参9克 白蒺藜9克 知母9克 生石膏30克 生甘草6克

【功用】 消风清热。

【主治】 血热生风、风燥所引起的脂溢性皮炎，人工荨麻疹，玫瑰糠疹，舌质红，脉弦滑数。

【加减】 玫瑰糠疹，加紫草；人工荨麻疹，加紫草、桃仁。

11622 凉血润燥饮

【方源】 方出《朱仁康临床经验集》，名见《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 生地30克 丹皮9克 紫草15克 茜草12克 黄芩9克 大青叶15克 玄参9克 麦冬6克 石斛9克 花粉9克 白蒺藜9克

【功用】 凉血清热，滋阴润燥。

【主治】 ①《朱仁康临床经验集》：毛发红糠疹，头皮、颜面、双肘、膝部皮肤发红脱屑、瘙痒。②《中医症状鉴别诊断学》：青年素禀血热之体，心绪烦扰，五志化火，血热化燥生风，肌肤甲错，潮红瘙痒，破如刀锉。

【方论选录】 生地、丹皮、紫草、茜草、黄芩、大青叶凉血清热，玄参、麦冬、石斛、花粉滋阴润燥，佐以白蒺藜消风止痒。

【临证举例】 毛发红糠疹 张某某，男，13岁，三周来脸面潮红脱屑，毛囊角化，尤以头部为明显，瘙痒甚剧，抓后出现痂皮，脉细滑，舌质红，苔光，乃血热生风，风胜则燥，治以凉血清热，滋阴润燥，先服凉血润燥饮三剂，接服加味苍术膏。一月后复诊，四肢皮肤损害明显消退，痒已不显。

11623 凉血调经丸

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】 黄芩 黄柏 白芍 鳖甲 杞子 归身 椿皮

【主治】 妇人血热经病及热甚经闭。

11624 凉血清肠散

【方源】《观聚方要补》卷六引《医学统旨》。

【组成】 生地黄 当归 芍药各一钱五分 防风 升麻 荆芥各一钱 黄芩 黄连 香附 川芎各八分 甘草五分

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《观聚方要补》引《医学统旨》：大肠热甚脱肛。②《何氏济生论》：肠风下血。

11625 凉血清肺饮

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 生地30克 丹皮9克 赤芍9克 黄芩9克 知母9克 生石膏30克 桑白皮9克 枇杷叶9克 生甘草6克

【功用】 清肺胃经热。

【主治】 肺胃积热上蒸于肺而成肺风粉刺、酒刺、痤疮、酒渣鼻。

【加减】 大便秘结，加大黄、大青叶。

【方论选录】 生地、丹皮、赤芍凉血清热，黄芩、枇杷叶、桑白皮清肺热，知母、生石膏清胃热，生甘草清热解毒。

11626 凉血清脾饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 生地 当归 黄芩 白芍 连翘 防风 薄荷 石菖 甘草

【主治】 舌头不硬，惟肿痛流血者。

【加减】 伤酒，加青黛；伤厚味，加大黄、枳壳、山楂；脾火，加姜黄连。

11627 凉血解毒丸

【方源】《回春》卷八。

【组成】 苦参八两 黄连四两 连翘 牛蒡子 生地黄 白芷各二两 防风 石膏各一两 大黄二两半

【用法】 上为末，荆芥汤打糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，先服升麻葛根汤发其毒，毒出后，再服本丸，空心温水送下。

【主治】 下疳。

11628 凉血解毒汤

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】 广角粉0.9克（冲服） 生地30克 玄参15克 麦冬9克 丹皮9克 白芍12克 银花30克 黄芩15克 栀子9克 白鲜皮30克 土

茯苓30克

【功用】 凉血清热，解毒祛风。

【主治】 急性进行性银屑病，剥脱性皮炎（急性期）、肢端红痛症、丹毒、蜂窝组织炎等见有营血毒热证候者。

【加减】 口渴喜饮者，加生石膏、知母。

【方论选录】 广角、生地、白芍、丹皮，乃是犀角地黄汤，用以清血热；麦冬、玄参可加强凉血之作用；银花、黄芩、栀子清热解毒；白鲜皮、土茯苓清热利湿。该方是凉血解毒之重剂，适应于血热炽盛者。

11629 凉肝导赤汤

【方源】《疡医大全》卷十。

【组成】 生地 丹皮 泽泻 赤茯苓 炒山栀 人中黄 赤芍 木通

【用法】 灯心七寸为引。

【主治】 双目流血。

11630 凉荣泻火汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 川芎 当归 白芍 生地 黄芩 黄连 山栀 木通 柴胡 茵陈 胆草 知母 麦门冬各一钱 甘草五分 大黄（酒炒）二钱

【用法】 水二钟，煎八分，空心服。

【主治】 妇人怀抱忧郁，致生内热，小水涩滞，大便秘结；及阴中火郁作痛，亦如淋淋。

【加减】 便利，去大黄。

11631 凉营清气汤

【方源】《喉痧症治概要》。

【组成】 犀角尖五分（磨，冲） 鲜石斛八钱 黑山栀二钱 牡丹皮二钱 鲜生地八钱 薄荷叶八分 川雅连五分 京赤芍二钱 京玄参三钱 生石膏八钱 生甘草八分 连翘壳三钱 鲜竹叶三十片 茅芦根各一两 金汁一两（冲服）

【功用】《中医症状鉴别诊断学》：凉营透气，清热凉血。

【主治】 ①《喉痧症治概要》：痧麻虽布，壮热烦躁，渴欲冷饮，甚则谵语妄言，咽喉肿痛腐烂，脉洪数，舌红绛，或黑糙无津之重症。②《中医症状鉴别诊断学》：气热亢盛而汗出濡濡，营血热炽而丹痧密布。

【加减】 痰多，加竹沥一两，冲服珠黄散，每日二分。

11632 凉膈白虎汤

【方源】《保命歌括》卷十七。

【组成】 凉膈散合白虎汤

【主治】 ①《保命歌括》：上焦积热，肺胀而咳，胸高上气而渴。②《金鉴》：火热刑金作喘；胃热口干舌燥作渴，面赤唇红。

11633 凉膈清脾饮

【方源】《外科正宗》卷四

【组成】 防风 荆芥 黄芩 石膏 山栀 薄荷 赤芍 连翘 生地各一钱 甘草五分

【用法】 先用软绵纸蘸水荫之眼胞上，少顷用左手大指甲佣于患眼，右手以披针尖头齐根切下，随用翠云靛磨浓涂之，后以水二钟，灯心二十根，煎八分，食后服。

【主治】 ①《外科正宗》：脾经蕴热凝结而成眼胞菌毒，头大蒂小，渐长垂出，甚则眼翻流泪，昏蒙。②《疡科心得集·方汇》：痈疡热甚。

【宜忌】 忌海腥、煎炒、椒、姜、火酒。

11634 酒调散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 槐花 栀子 牛蒡子 防风 蛤粉

【用法】 上为末。水煎，食后入酒少许调服。

【主治】 眼睛白仁肿痛。

11635 酒调散

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】 当归 川芎 赤芍 黄芩 栀子 木通 防风 龙胆草 大黄

【用法】 上为细末。老酒调下。

【主治】 白陷鱼鳞外障。

11636 酒癖丸

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【组成】 雄黄（拣）六个（如皂荚子大） 巴豆（不去皮，不出油） 蝎梢各十五个

【用法】 上为细末。入白面称五两半，滴水和如豌豆大，候稍干，入麸内同炒香。将一粒放水中，如药粒浮于水上，即去麸不用。每服二粒，食后温酒送下。寻常伤酒，每服一粒，茶、酒任下。

【主治】 饮酒过度，头旋恶心，呕吐不止；及酒积停于胃间，遇饮即吐，久而成癖。

11637 酒煮当归丸

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 茴香五钱 黑附子（炮制，去皮脐） 良姜各七钱 当归一两（上四味锉如麻豆大，以上等好酒一升半同煎至酒尽，焙干） 炙甘草 苦楝（生用） 丁香各五钱 木香 升麻各一钱 柴胡二钱 炒黄盐 全蝎各三钱 延胡索四钱

【用法】 上与前四味药同为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五、七十丸，空心淡醋汤送

下。

【功用】《玉机微义》：升阳胜湿。

【主治】①《兰室秘藏》：癫疝，白带下注，脚气，腰以下如在冰雪中，以火焙炕，重重厚绵衣盖其上，犹寒冷不任，面白如枯鱼之象，肌肉如刀割削瘦。小便不止，与白带长流而不禁固，自不知不觉，面白目青，蓝如菜色，目眩眩无所见，身重如山，行步倚侧，不能安地，腿膝枯细，大便难秘，口不能言，无力之极，食不下，心下痞，烦心懊憹，不任其苦，面停垢，背恶寒，小便遗而不知，此上中下三阳真气俱虚竭。胃虚之极，哕呕不止，脉沉厥紧而涩，按之空虚。②《玉机微义》：小腹下痛。

11638 酒煮黄连丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】黄连（去须）五两 厚朴（去粗皮）三两 肉豆蔻一两（面裹煨）

【用法】上锉。用无灰酒、米醋各一升，慢火熬尽，烈日晒干为末，再用酒醋打面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，米饮送下。

【功用】厚肠胃，止泄泻。

【主治】泻痢。

11639 酒蒸黄连丸

【方源】《活人书》卷十八。

【异名】酒煮黄连丸（《鸡峰》卷五）、酒连丸（《三因》卷十五）、黄龙丸（《局方》卷二吴直阁增诸家名方）、小黄龙丸（《得效》卷二）、独连丸（《普济方》卷一七七引《神效方》）。

【组成】黄连四两（以无灰好酒浸面上约一寸，以重汤熬干）

【用法】上为细末，糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，滚水送下。

【功用】①《直指》：治膈热，解酒毒。②《御药院方》：除热气，止烦渴，厚肠胃。

【主治】胃肠积热，泻痢，消渴，反胃呕吐。

①《活人书》：暑毒伏深，及伏暑发渴者。②《三因》：酒痔下血。③《局方》（吴直阁增诸家名方）：呕吐恶心，伤酒过多，脏毒下血，大便泄泻。④《御药院方》：消瘅。⑤《丹溪心法》：伤于酒，每晨起必泻。⑥《普济方》：身热下痢鲜血，烦渴多渴，或伤热物过度。⑦《证治要诀类方》：三消。⑧《医统》：一切热泻。⑨《医灯续焰》：嗜杂吞酸，嗳膈反胃，吐酸、干呕、胃痛、挟虫者。⑩《法律》：酒痔。⑪《外科大成》：砂疝。

【方论选录】《医方考》：黄连，苦寒枯燥之物也。苦寒，故能胜热；枯燥，故能胜湿。而必煮以酒者，非酒不能引之入血也。

11640 消化丸

【方源】《修月鲁般经》引《劳证十药神书》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】青礞石二两（消煅） 明矾 橘红三两 薄荷一两 猪牙皂角二两（火炙，去皮弦） 南星二两（生用） 半夏二两（生用） 枳壳一两半 白茯苓 枳实各一两半

【用法】上为细末，和匀，神曲打糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，每夜上床时，饴糖拌吞。次噙嚼太平丸，二药相攻，痰嗽扫迹，除根立愈也。

【主治】劳热痰壅盛者。

【备考】陈修园注本《十药神书》有沉香，名"沉香消化丸"。

11641 消化汤

【方源】《洞天奥旨》卷七。

【组成】金银花二两 紫贝天癸五钱 天花粉三钱 当归一两 生甘草三钱 通草一钱

【用法】水煎服。一剂即消。

【主治】乳房作痛生痈。

11642 消丹饮

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】玄参三两 升麻二钱 麦冬一两 桔梗二钱 生甘草一钱

【用法】水煎服。一剂丹化，不必二剂。

【主治】火丹。身热之后，其身不凉，遍身红紫之色。

【方论选录】此方用玄参解其浮游之火，以麦冬滋其肺金之火，用桔梗、升麻表散于毛窍之间，用甘草调和于脏腑，经络之内，引火外行，所以奏功神速耳。

11643 消风饮

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】陈皮 白术（去芦） 当归（酒洗） 白茯苓（去皮）各一钱 防己 独活 木瓜四分 秦艽六分 半夏（姜制） 牛膝 桂枝各八分 元胡索 羌活 枳壳（去瓤） 甘草各三分 防风五分

【用法】上锉。加生姜，水煎服，不拘时候。

【主治】痛风，手足不能屈伸，周身疼痛。

【加减】气虚，加人参八分。

11644 消风散

【方源】《局方》卷一。

【异名】人参消风散（《卫生宝鉴》卷九）。

【组成】荆芥穗 甘草（炒） 芎藭 羌活 白

僵蚕（炒） 防风（去芦） 茯苓（去皮，用白底） 蝉壳（去土，微炒） 藿香叶（去梗） 人参（去芦）各二两 厚朴（去粗皮，姜汁涂 炙熟） 陈皮（去瓤，洗，焙）各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，茶清调下。如久病偏风，每日三服，便觉轻减。如脱着淋浴，暴感风寒，头痛身重，寒热倦疼，用荆芥茶清调下，温酒调下亦得，可并服之。小儿虚风，目涩昏困，及急慢惊风，用乳香、荆芥汤调下半钱，并不拘时候。

【主治】 风湿上攻，或外侵肌肤，头目昏痛，瘙痒瘾疹，眼痒昏涩，耳鸣咳嗽，偏风，小儿疮疹，急慢惊风，胎风赤烂，妇人血风。

①《局方》：诸风上攻，头目昏痛，项背拘急，肢体烦痛，肌肉蠕动，目眩旋晕，耳啸蝉鸣，眼涩好睡，鼻塞多嚏，皮肤顽麻，瘙痒隐疹；妇人血风，头皮肿痒，眉梭骨痛，旋晕欲倒，痰逆恶心；或久病偏风，或脱着沐浴，暴感风寒，头痛身重，寒热倦疼；或小儿虚风，目涩昏困，及急慢惊风。②《普济方》：小儿痘疮或发或未发，忽面青暴吼，为风邪所伤，耳冷，尻冷，足下冷，耳后有红缕，心胸间细点如粟起。③《保婴撮要》：赤白游风。④《医学入门》：眼胞皮肉有似胶凝，肿如桃李，时出热泪及偏风牵引两睑赤烂，经年不安。⑤《便览》：丹疹属血风血热。⑥《明医指掌》：胎热，妇人妊娠多食辛厚味之物，妊娠将临月，两眼失明，不见灯火，头痛眩晕，腮颔肿，不能转项。⑦《张氏医通》：风热咳嗽，遍身疥瘰。小儿疮疹余热。

【方论选录】 ①《医方考》：风热则表实，实者宜散之，荆芥、芎劳、防风、羌活皆辛散也；表实则里虚，虚则宜补之，人参、甘草、茯苓皆甘补也；风盛则气壅，厚朴所以下气，陈、藿所以泄气；风热生痰，治以僵蚕；表热留连，治以蝉退。②《医方集解》：此足太阳、手太阴药也。羌、防、荆、芎之辛浮，以治头目项背之风；僵蚕、蝉蜕之清扬，以去皮肤之风；藿香、厚朴以去恶散满；参、苓、甘、橘以辅正调中，使风邪无留壅也。

【备考】 本方去人参，加雄黄，名“雄风散”。（见《中国医学大辞典》）。

11645 消风散

【方源】《济生》卷七

【组成】 石膏（煅） 甘菊花（去枝梗） 防风（去芦） 荆芥穗 川羌活（去芦） 羚羊角（镑） 川芎 大豆黄卷（炒） 当归（去芦，酒洗） 白芷 各一两 甘草（炙）半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，入好茶半钱，煎至八分，去滓，食后通口服。

【主治】 妊娠胎气有伤肝脏，毒热上攻，太阳穴痛，呕逆，背项拘急，头旋目晕，视物不见，腮项肿核。

【宜忌】《重订严氏济生方》：“大忌酒面，煎炙、烧煿，鸡、羊、鹅、鸭、豆腐、辛辣，一切毒食，并房劳及稍温药。

【临证举例】 两眼失明 《重订严氏济生方》：有一妊妇，将临月，两眼忽然失明，灯火不见，头痛目晕，项腮肿满，不能转颈，诸医治疗不瘥，转加危困，偶得此方，对证合之服，病减七八，获安分娩。其眼带吊起，人物不辨，服四物汤加荆芥、防风，更服天门冬饮子，以此二般药间服，目渐稍明。

11646 消风散

【方源】《医统》卷五十五。

【异名】 二味消风散（《景岳全书》卷五十六）。

【组成】 苏州薄荷叶 蝉退（去头足土净）各等分。

【用法】 上为末。每服一钱，食远温酒调下。

【主治】 皮风瘙痒。

11647 消风散

【方源】《便览》卷一。

【组成】 陈皮 当归 茯苓 白术各一钱 玄胡 半夏 牛膝各八分 甘草三分 枳壳 防风各五分 防己 羌活 独活各六分 木瓜四分 秦艽六分 川芎八分

【用法】 上用水二盏，加生姜二片，煎服。

【主治】 手足不能屈伸，周身疼痛。

11648 消风散

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】 生地 当归 防风 荆芥 白芷 细辛 蝉蜕 僵蚕 花椒

【主治】 风牙痛。不其肿痛，不怕冷热。

【备考】 外用草乌、僵蚕、蜂房（煅）、牙皂研末搽。

11649 消风散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 蛇床子三钱 苦参二钱 枯矾一钱 艾叶七个 川椒五分 荆芥一钱半 薄荷一钱

【用法】 水煎洗。

【主治】 目痒如虫行症。

【备考】 凡初期患此症者，先刺三阳络、素髎、内庭等穴；内服当归活血汤。如其不愈，再用本方

洗之最妥

11650 消石汤

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】消石（碎） 罂麦穗 葵子 滑石（碎） 甘草（炙，锉） 大黄（锉） 木通（锉）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加葱白三寸，煎服七分，入生地黄汁半合，去滓温服，不拘时候。

【主治】小便不通，小腹急痛闷绝。

11651 消石散

【方源】《新急腹症学》。

【组成】郁金粉二分 白矾末一分五厘 火消粉二分五厘 滑石粉六分 甘草梢一分

【主治】气郁型胆结石。

11652 消血饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】元胡索 归尾 苏木 桃仁 红花 赤芍 五灵脂 没药

【主治】负重努伤，或有跌仆损伤，或妇人有经来瘀闭，或有产后恶露未尽，皆成死血，痛有定处，脉必芤涩。

11653 消导饮

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】厚朴 枳实 砂仁 山楂肉 半夏 神曲 槟榔 三棱 莪术 丁香

【用法】加干姜，水煎服。

【功用】消食理脾。

【主治】小儿饮食过度，伤损脾胃，或饱闷，或吞酸，或吐泻未愈，而痘随出。

11654 消谷丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】肉豆蔻一枚（面裹煨） 槟榔（尖者）一枚 神曲二两（炒） 青橘皮（去白） 京三棱（剉，切） 陈橘皮（去白） 大麦芽（炒）各一两 木香半两

【用法】上为细末，用汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后橘皮汤送下。

【主治】脾胃气弱，饮食多伤，胸膈痞闷，不思饮食。

11655 消饮丸

【方源】《外台》卷八引《深师方》。

【组成】干姜 茯苓各三两 白术八两 枳实四枚（炙）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，一日三次，稍加之。

【主治】①《外台》引《深师方》：酒癖。饮酒停痰水不消，满逆呕吐，目视眩眩，耳聋，腹中水声。②《直指》：水饮

【宜忌】忌桃李、雀肉、大醋、生冷之类。

【加减】若下，去枳实，加干姜二两，名为"五饮丸"。

11656 消疔散

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】苍耳虫三十条 蝦人指甲一撮 蜘蛛五只 耳垢一撮 僵蚕一钱 蟾酥二钱 倒扯尘灰把

【用法】上为细末，每取少许，放小膏药中，贴疔头上，日易一次。

【功用】消疔。

【宜忌】已溃禁用。

11657 消肾丸

【方源】《普济方》卷二四八。

【组成】牵牛半斤（取头末四两，二两炒熟，二两生用） 香附子（净） 一两（半两炒，半两生用） 川楝子半两（半炒，半生用）

【用法】上为细末，用大蒜二十个，半煨半生，捣烂为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心葱盐汤送下。取大便三二行，不利再加，如利即减。

【主治】下部肾囊肿胀，攻击疼痛。

【宜忌】忌湿面。

11658 消肾汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】海藻 海带 昆布（俱洗淡） 橘核 桃仁 楝子肉各二钱 木香 白术 茯苓各一钱 玄胡 木通 当归 肉桂 人参各五分 淫羊藿三分 盐 酒各少许

【主治】一切疝气

【备考】本方改为丸剂，名"橘核消肾丸"（见《疡医大全》）

11659 消乳汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】知母八钱 连翘四钱 金银花三钱 穿山甲三钱（炒捣） 瓜蒌五钱（切丝） 丹参四钱 生明乳香四钱 生明没药四钱

【功用】消肿止疼。

【主治】结乳肿疼或成乳痈新起者；一切红肿疮疡。

【临证举例】乳痈 在德州时，有张姓妇，患乳痈，肿疼甚剧，投以此汤，两剂而愈。然犹微有疼时，恐患其再服一两剂，以消其芥蒂。

11660 消肿丸

【方源】《三因》卷十四。

【组成】滑石 木通 白术 黑牵牛（炒）通脱木 茯苓 茯神（去木） 半夏（汤洗去滑） 陈皮各一分 木香半分 罂麦穗 丁香各半钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，灯心、麦门冬汤送服。

【主治】水肿喘满，小便不利。

11661 消肿丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】淡豉二两（新好者；研） 巴豆一两（去壳，河水半升煮干，去心，去油取霜） 京山棱（煨，切） 大戟（新者） 杏仁（烧留性，研细）各半两 五灵脂（去砂石）一分

【用法】上为细末，以生面水调，搜和为丸，如绿豆大。每服五丸，食后浓煎桑白皮汤送下。大便秘者，加至十丸；喘息者，用杏仁去皮尖，研细，煎汤送下。

【主治】水气腹胀，小便赤涩，头面、四肢、阴囊皆肿，喘息咳嗽，睡卧不得。

【宜忌】忌甘草三日，并须忌盐、酱、藏淹之物。

11662 消肿汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】消毒汤（《普济方》卷二七二）、消肿丹（《类证治裁》卷八）。

【组成】鼠粘子（炒） 黄连各五分 当归梢 甘草各一钱 瓜蒌根 黄耆各一钱五分 生黄芩 柴胡各二钱 连翘三钱 红花少许

【用法】上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓稍热，食后服。

【主治】①《兰室秘藏》：马刀疮。②《扶寿精方》：一切无名肿毒并痈疽背瘰。

【宜忌】忌酒、湿面。

11663 消肿汤

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】葶苈二钱 椒目一钱 猪苓一钱半 泽泻八分 葱白三根

【用法】上药水煎，并用牵牛末为丸，用本方送下，则大小便俱通。

【主治】水肿喘满，大小便不利。

11664 消肿汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】猪苓 泽泻 木通 车前子 葶苈子各二钱 地骨皮 五加皮 生姜皮 海金沙 枳壳各一钱

【用法】加灯心三十茎，空心服。

【主治】腰以下肿，小便不利。

11665 消肿汤

【方源】《疡科全书》。

【组成】夏枯草三钱 山慈姑二钱（去皮毛） 煅牡蛎二钱 海藻二钱 昆布二钱 生甘草一钱 桔梗二钱 元参二钱 花粉二钱 白芥子二钱

【主治】无名疡，骤然红肿，非色欲所至，即餐膳不谨。

11666 消肿散

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】白及 白蔹 牙皂 僵蚕 赤豆五倍 雄黄各三钱 南星 半夏 大黄 黄柏 草乌 白芷 贝母 山茨菇 芙蓉叶各五钱 天花粉 牡蛎各一两

【用法】上为末，姜汁、靛青调敷。

【主治】疮疡。

11667 消胀丸

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】木香 茯苓 厚朴（制）各一两 大黄 泽泻一两半 滑石 黑牵牛末各六两

【用法】上为细末，水为丸，如梧桐子大。每服五十丸，姜汤送下。

【主治】胀满。

【备考】方中大黄用量原缺。

11668 消疝丸

【方源】《普济方》卷二四七。

【组成】苍术二两 茴香（盐炒） 玄胡各一两 牵牛半两（盐炒） 木香一钱 川楝半两（用巴豆二七，不要碎，炒黑，不用豆）

【用法】上为末，酒糊为丸。一半用酒送下，一半病发时酒调送下。

【主治】诸疝。

11669 消疝丹

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】白术 荔枝核（炒） 山楂 小茴香（炒，研） 槟榔 木通 猪苓 岗橘子 昆布 白茯苓 海藻 官桂 泽泻 川楝子各等分

【用法】水二钟，煎一钟，食前洗浴温服。

【主治】小肠疝气。

【加减】如房劳肾虚，加人参五分。

11670 消炎散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】硼酸三钱 白矾一钱 梅片二分

【用法】 水冲洗罨，一日三次。

【功用】 消炎退赤。

【主治】 五脏积热，肝火旺盛，上攻于头目，头痛目胀，风轮高起，左目旋螺突出，疼痛不已，热泪常流，惟厥阴弦紧。

11671 消炎散

【方源】《中西医结合治疗急腹症》。

【组成】 芙蓉叶 大黄各十两 黄芩 黄连 黄柏 泽兰叶各八两 冰片三钱

【用法】 上为细末。用黄酒或葱酒煎调敷，调成麻酱稠度，按照炎症范围和脓肿大小，摊于油纸上或塑料布上约0.3～0.4厘米厚，敷于患处，外加纱布敷盖固定。每日调换一至二次。在形成良好的包块后外敷消结膏。

【主治】 腹膜炎和阑尾脓肿急性炎症期。

11672 消毒丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】 白僵蚕（炒去丝嘴） 牛蒡子（微炒）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两作十五丸。每服一丸，食后含化。

【主治】 喉痹口疮，腮颊肿痛。

11673 消毒饮

【方源】《得效》卷十六。

【异名】 加味荆黄汤（《医学入门》卷七）。

【组成】 大黄半两（煨） 牛蒡子一分（炒） 甘草一分 荆芥半两

【用法】 上锉散。每服三钱，水一盏半煎，食后温服。

【主治】 肝壅瘀血，两睑上下初生如粟米大，渐渐大如米粒，或赤或白，不甚疼痛，坚硬者。

11674 消毒饮

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】 当归 白芷 青皮（炒） 天花粉 贝母 柴胡 僵蚕（炒） 银花各三钱

【用法】 上锉一剂。水煎服。先服人参败毒一二剂，方可服此药。如无前证，即服本方二三剂，或肿不消，宜服托里药。

【主治】 吹乳、乳痈，憎寒壮热头痛者。

11675 消毒饮

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】 防风 元参 连翘 牛蒡子 荆芥 桔梗 知母 山栀仁 甘草

【主治】 咽喉肿痛，上膈热甚。

11676 消毒饮

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 大黄四钱 黄芩二钱 黄柏三钱 木通三钱 牛蒡子三钱（炒） 人贝三钱 银花一两 胆草三钱 花粉三钱 甘草一钱 蒲公英五钱 全蝎五个

【用法】 水煎服。

【主治】 脾经湿热，肝火旺盛，眼胞肿胀坚硬，气轮之上起红泡，热泪长流。

11677 消毒散

【方源】《局方》卷十。

【异名】 消毒饮（《易简》）、三味消毒散（《疮疡经验全书》卷八）、三味消毒饮（《麻科活人》卷二）、解毒三贤饮（《疡医大全》卷三十三）。

【组成】 牛蒡子（煨）六两 荆芥穗一两 甘草（炙）二两

【用法】 上为粗末。每服一钱，用水一盏，煎七分，去滓，食后温服。

【主治】 疮疹壮热出而不快；上膈壅热，咽喉肿痛，口舌生疮。

①《局方》：小儿疮疹已出，未能匀透，及毒气壅遏，虽出不快，壮热狂躁，咽膈壅塞，睡卧不安，大便秘涩。及大人小儿上膈壅热，咽喉肿痛，胸膈不利。②《活幼心书》：小儿急惊风毒，赤紫丹瘤，咽喉肿痛，九道有血妄行及遍身疮疥。③《便览》：口舌生疮，牙根臭烂。

【宜忌】 若大便利者，不宜服之。

【备考】 本方方名，《本草纲目》引作“必胜散”。

11678 消毒散

【方源】《洁古家珍》。

【组成】 丁香 乳香各一钱 蝉壳 贯仲 紫花地丁各半两

【用法】 上为细末。温酒调下。

【主治】 疔疮毒气入腹，昏闷不食。

11679 消毒散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】 滑石一斤 黄柏二两 黄丹一两 乳香五钱 轻粉三钱

【用法】 上为细末。每用干掺，或烧汤。及下注臁疮、风湿疥癣等疮，油调涂之。

【功用】 生肌止痛，消毒散肿。

【主治】 诸恶疮，臁疮，疥癣。

11680 消毒散

【方源】《回春》卷五。

【组成】 南星（姜制） 半夏（姜制） 陈皮 枳

实 桔梗 柴胡 前胡 黄连 连翘 赤芍 防风 独活 白附子 苏子 莪术 蔓荆子 木通 甘草

【用法】 上锉一剂。加生姜二片，灯草一团，水煎服。

【主治】 咽喉结核，肿块如桃，坚硬疼痛，颈项不回转，四腋下或有块硬如石。

【备考】 本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作"消解散"。

11681 消毒散

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】 大黄一两 芙蓉叶（晒干为末）一两 麝香三分 冰片三分 五倍子一两 藤黄三钱 生矾三钱

【用法】 上药各为末。米醋调成如厚糊一样，涂于多骨疽之左右四周。以药围其皮肉，中留一头如豆大，以醋用鹅翎不时扫之。

【主治】 多骨疽，痈疽疖毒。

【宜忌】《串雅内编》：此方只宜于痈疖等阳毒，但不可施之阴症，似于多骨疽不甚相宜。

【方论选录】《串雅内编选注》：方中大黄、芙蓉叶清热解毒，麝香、冰片活血散瘀止痛，五倍子、藤黄、生矾有消肿止痛之功。凡痈疽疖毒初起，红肿痛热者，用醋调局部四周，有止痛消肿功效。

11682 消食丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】 神曲（炒） 麦芽（炒） 青皮（去瓤） 木香（不见火） 丁香（不见火） 京三棱（炮） 陈皮（去白） 蓬莪术（炮） 干姜（炮，洗） 良姜（炒）各等分

【用法】 上为细末，用神曲糊丸，如麻子大。每服十五丸，生姜汤吞下。大人为丸如梧桐子大亦可服。

【主治】 小儿宿食不化，瘦悴。

11683 消食丸

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】 山楂 神曲（炒） 麦芽（炒） 萝卜子 青皮 陈皮 香附各二两 阿魏一两（醋浸，另研）

【用法】 汤泡蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食远姜汤送下。

【主治】 一切食积停滞。

11684 消食饼

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】 莲肉（去皮） 山药（炒） 白茯苓（去皮） 芡实（去壳；炒） 神曲（炒） 麦芽（炒） 扁豆（炒） 山楂（去子）各等分

【用法】 上为末。每四两，入白面一斤，水同和，烙焦饼用。

【主治】 小儿时常伤食，皮黄肌瘦，肚大腹胀。

11685 消食散

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】 白术一钱 茯苓一钱 枳壳一钱 山楂二十粒 麦芽二钱 谷芽二钱 六曲三分 半夏一钱 甘草五分 砂仁三粒

【用法】 水煎服。

【主治】 伤食之症，心中饱闷，见食则恶，食之转痛。

11686 消疬丸

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】 夏枯草 连翘 蓖麻仁各四两

【用法】 上为细末，装入猪大肠一段内，两头扎紧，酒浸蒸烂，为丸如梧桐子大。每服五十丸，酒送下。

【主治】 瘰疬。

11687 消核汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 金银花 天花粉 山药各一钱五分 蒲公英 夏枯草 海石粉 南苍术 前胡各一钱

【用法】 用水二钟，煎八分，食远服。

【主治】 痰核。

11688 消核饮

【方源】《证治宝鉴》卷九。

【组成】 海带 当归（酒制） 昆布 海藻 白芍 生地 柴胡 贝母 青皮 陈皮各一钱 夏枯草 荆芥 半夏 赤芍七分 防风五分 香附二钱

【用法】 加生姜煎服。

【主治】 瘰疬。

11689 消核散

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】 海藻三两 牡蛎 玄参各四两 糯米八两 甘草（生）一两 红娘子（同糯米炒胡黄色，去红娘子，用米）二十八个

【用法】 上为细末。每服一钱或一钱半，酒调服。

【主治】 颈项痰凝瘰疬。

11690 消核膏

【方源】《徐评外科正宗》卷五。

【组成】 制甘遂二两 红芽大戟二两 白芥子八钱 麻黄四钱 生南星一两六钱 姜半夏一两六钱 僵蚕一两六钱 藤黄一两六钱 朴消一两六钱

【用法】 用真麻油一斤，先投甘遂、南星、半夏，熬枯捞出；次下僵蚕；三下大戟、麻黄；四下白芥子；五下藤黄，逐次熬枯，先后捞出；六下朴消，熬至不爆。用绢将油滤净，再下锅熬滚，徐徐投入炒透东丹，随熬随搅，下丹之多少，以膏之老嫩为度。夏宜稍老，冬宜稍嫩。膏成，趁热倾入水盆中，扯拔数十次，以去火毒，即可摊贴，宜厚勿薄。

【主治】 瘰疬、乳核及各种结核。

【宜忌】 已溃者不可贴。

11691 消积丸

【方源】 《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 丁香丸(《普济方》卷三九二)。

【组成】 丁香九个 缩砂仁二十个 乌梅肉三个 巴豆二个（去皮油心膜）

【用法】 上为细末，面糊为丸，如黍米大。三岁以上每服二五丸，三岁以下每服二三丸，温水送下，不拘时候。

【主治】 小儿乳食积滞，吐泻腹胀，大便酸臭及一切积聚成疳。

①《小儿药证直诀》：小儿大便酸臭。②《医方类聚》引《简易》：小儿食积，面黄白色，多睡，口中气温，大便黄赤而臭。③《普济方》：小儿积聚成疳腹胀，及乳积，吐乳泻，此由啼哭未已，以乳与儿，停滞不化得之。④《幼幼集成》：小儿食停胃口而作吐。

11692 消积丸

【方源】 《冯氏锦囊·杂症》卷十三。

【组成】 广皮 三棱 莪术 槟榔 青皮 卜子 枳实 草豆蔻 麦芽各一两 木香七钱 神曲二两 山楂肉 厚朴各一两五钱

【用法】 上为末，黑沙糖为丸，每丸重一钱。每服一丸，白汤送下。

【主治】 癥瘕痞癖。

11693 消积丸

【方源】 《不居集》（下集）卷六。

【组成】 海粉 石碱 三棱 莪术 五灵脂 红花 香附

【用法】 上为丸服。治虚劳日久，不任舟车。禹功等丸者，宜四物汤送下。

【主治】 一切积热瘀血，坚积石瘕。

11694 消脓汤

【方源】 《新急腹症学》。

【组成】 大黄五钱（后下） 黄芩三钱 黄连五钱 黄柏三钱 冬瓜仁 败酱草 银花各一两 连翘 蒲公英 地丁各六钱 当归 赤芍 木香各三钱

【功用】 清热解毒，通便下热。

【主治】 急性阑尾炎化热期或毒热期。

11695 消疳丸

【方源】 《医级》卷八。

【组成】 大黄五两半 槟榔三两 黑丑（头末）三两五钱 芦荟 使君子

【用法】 上为末，面糊为丸，每服三钱，白汤送下。以虫下为验

【主治】 诸般虫积

11696 消疳散

【方源】 《审视瑶函》卷四。

【组成】 使君子（用白者，去油） 雷丸（去皮，用白者，红者杀人勿用，以米泔水浸苍术少许，将雷丸同苍术用火煴之，用雷丸去苍术炒干）各等分

【用法】 上为细末。每一岁用一分，以鸡肝炖半熟，蘸药食。

【主治】 小儿疳积，眼生翳膜遮睛。

【加减】 若翳厚，加木贼草（烧灰）、雄黄、珍珠各一钱，另研极细末，入前药服。

11697 消瘙汤

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 杏仁9克 桑白皮12克 连翘9克 蝉蜕6克 赤小豆31克 公英12克 紫花地丁12克 甘草6克 浮萍9克 防风6克 赤芍9克 白术6克

【用法】 水煎，内服。

【主治】 荨麻疹。

11698 消痈汤

【方源】 《赵炳南临床经验集》。

【组成】 金银花五钱至一两 连翘三钱至五钱 公英五钱至一两 赤芍三钱至五钱 花粉三钱至五钱 白芷三钱至三钱 川贝母三钱至五钱 陈皮三钱至五钱 蚤休三钱至五钱 龙葵三钱至五钱 鲜生地五钱至一两

【功用】 清热解毒，散瘀消肿，活血止痛。

【主治】 蜂窝组织炎，痈症初起，深部脓肿等化脓感染。

11699 消蛊汤

【方源】 《直指》卷十七。

【组成】 紫苏茎叶 缩砂 肉豆蔻（生） 枳壳（制） 青皮 陈皮 三棱 莪术 槟榔 辣桂 白豆蔻仁 荜澄茄 木香各一分 半夏（制） 萝卜子（生） 甘草（炙）各一分半

【用法】 上锉，每服三钱，加生姜、大枣，煎服。

【主治】 气作盛胀，但腹满，而四肢头面不肿。

11700 消痔散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 硇砂一钱 轻粉 雄黄各三分 冰片五分

【用法】 上为细末。用草梗咬毛蘸药，点痔上，每日五七次。渐化为水。

【主治】 鼻痔。

11701 消痔散

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】 煅田螺一两 煅戚橄榄核一两 冰片五分

【用法】 上为细末。用油调敷痔上。

【功用】 消痔，退肿，止痛。

【主治】 内痔脱出，直肠脱垂。

11702 消跗散

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 茯苓一两 茵陈一钱 防己一钱 炒栀子一钱 薏仁一两 泽泻三钱 木瓜一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 脚气。两跗忽然红肿，因而发热，两胫俱浮，作疼作痛。

11703 消痞丸

【方源】《宣明论》卷四。

【组成】 黄连 干葛各一两 黄芩 大黄 黄柏 栀子 薄荷 藿香 厚朴 茴香（炒）各半两 木香 辣桂各一分 青黛一两（研） 牵牛二两

【用法】 上为细末，滴水为丸，如小豆大。小儿丸如麻子大。每服十丸，新水送下；温水亦得。

【主治】 积湿热毒，其者身体面目黄，心胁腹满，呕吐不能饮食，痿弱难以运动，咽嗌不利，肢体焦尪，眩悸膈热，坐卧不宁，心火有余而妄行，上为咳血、衄血，下为大小便血，肠风痔漏，三焦壅滞，热中消渴，传化失常，小儿疳积热。

【加减】 本自利者，去大黄、牵牛。

【宜忌】 忌发热诸物。

11704 消痞丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 大消痞丸（《东垣试效方》卷二）、大温中丸（《丹溪心法》卷二）。

【组成】 干生姜 神曲（炒） 炙甘草各二分 猪苓二钱五分 泽泻 厚朴 砂仁各三钱 半夏（汤洗七次） 陈皮 人参各四钱 枳实五钱（炒） 黄连（净、炒） 黄芩各六钱 姜黄 白术各一两

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五七十丸至百丸，空腹白汤送下。

【主治】 心下痞闷，一切所伤及积年不愈者。

11705 消痞丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 生香附（醋炒）四两 延胡索（醋炒）一两半 归尾二两 川芎 红花 浮海石 瓦楞子（火煅，醋淬）各一两

【用法】 上为末，醋打面糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸。

【主治】 积久成痞，痞散为臌者。

11706 消痞膏

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】 三棱 莪术 穿山甲 木鳖仁 杏仁 水红花子 萝卜子 透骨草（晒干） 大黄各一两 独头蒜四个

【用法】 上用香油一斤，入前药十味，煎油成，以飞丹收之，后下细药真阿魏、乳香、没药各一两，麝香三钱，搅匀待冷，倾水中浸数日，用瓷瓶收贮，勿使泄气。用时以白布或坚白纸摊贴，八九日一换。或见大便去脓血勿以为异，亦有不去脓血而自愈者。若治泻痢，可贴脐腹。凡贴癥积痞块，先用荞麦面和作一圈，围住患处四边，其块上放皮消二三两，盖厚纸以熨斗熨，令热气内达，然后去消，用膏药贴之。

【主治】 癥积痞块，泻痢。

11707 消痞膏

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】 朴消 蒜头（杵）各五钱 大黄 急性子各三钱 三棱 莪术各四钱 乳香（制） 真阿魏 没药（制）各二钱

【用法】 捋三棱、莪术、大黄、急性子研末。用脂麻油四两，煎蒜头、朴消及药末，煎好去蒜头，下黄丹二钱。候已成膏，以乳香、没药、阿魏三味研粉加入，再加麝香二分，搅匀，贮有盖瓦器内，俟二两日，火气去净。以白布或厚油纸摊贴，白天日一换。或见大便有脓血勿以为异，亦有不下脓血者。

【主治】 积聚痞块。

【宜忌】 忌房事及一切生冷物。

11708 消滞丸

【方源】《卫生宝鉴》卷四。

【组成】 黑牵牛二两（炒末） 五灵脂（炒） 香附（炒）各一两

【用法】 上为末，醋糊为丸，如小豆大。每服三十丸，食后生姜汤送下。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：一切所伤，心腹痞满刺痛，积滞不消。②《普济方》引《德生堂方》：妇人血气心腹疼，大便秘结。

11709 消寒饮

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 白术 人参各五钱 肉桂 肉豆蔻 甘草各一钱

【用法】 水煎服。一剂即止。

【主治】 终日腹痛，手按之而宽快，饮冷则痛剧。

11710 消瘀饮

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】 当归 芍药 生地黄 桃仁 红花 苏木 大黄三钱 芒消三钱 甘草

【用法】 上锉一剂。水一钟半，煎至八分，入大黄煎，再入芒消。温服。

【主治】 瘀血腹痛。

【备考】 方中除大黄、芒消外，余药用量原缺。

11711 消痰汤

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】 白茯苓五钱 海藻 半夏 贝母 白芥子 天南星 人参 桔梗各三钱 昆布 生甘草各一钱 附子一分

【用法】 水煎服。

【主治】 瘿瘤。

11712 消管丸

【方源】《外科全生集》（武昌节署本）卷四。

【组成】 苦参四钱 川连（酒炒）二两 当归 槐花 荜澄茄各一两 五倍子五钱

【用法】 上为细末，用小鳖二个（每个约八九两），真柿饼四钱，二味共煮，以白捣烂，入前药末为丸。每服四钱，空心开水送下。

【主治】 痔漏。

【备考】 本方方名，原书潘敏德堂重刻本作“双鳖丸”。

11713 消瘰丸

【方源】《医学心悟》卷四。

【异名】 消疬丸（《疡医大全》卷十八）。

【组成】 玄参（蒸） 牡蛎（煅，醋研） 贝母（去心，蒸）各四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，开水送下，一日二次。

【功用】《中医方剂临床手册》：消瘰养阴，化痰软坚。

【主治】 ①《医学心悟》：瘰疬初起。②《中医方剂临床手册》：痰核。

【宜忌】 宜戒恼怒，断煎炒，及发气、闭气诸物，免致脓水淋漓，渐成虚损。

【方论选录】《中医方剂临床手册》：方用玄参滋阴降火，苦咸消瘰；贝母化痰消肿，解郁散结；牡蛎咸寒，育阴潜阳，软坚消瘰。合而用之，对瘰疬早期有消散之功；病久溃烂者，亦可应用。

【备考】 本方改为汤剂，名“消疬汤”（见《外科真诠》）。

11714 消瘰丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 牡蛎（煅）十两 生黄耆四两 三棱二两 莪术二两 朱血竭一两 生明乳香一两 生明没药一两 龙胆草二两 玄参三两 浙贝母二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，用海带五钱，洗净切丝，煎汤送下，一日二次。

【主治】 瘰疬。

【方论选录】 此方重用牡蛎、海带，以消痰软坚，为治瘰疬之主药。恐脾胃弱者，久服有碍，故用黄耆、三棱、莪术以开胃健脾，使脾胃强壮，自能运化药力，以达病所。且此证之根在于肝胆，而三棱、莪术善开至坚之结。又佐以血竭、乳香、没药，以通气活血，使气血毫无滞碍，瘰疬自易消散也。而犹恐少阳之火炽盛，加胆草直入肝胆以泻之，玄参、贝母清肃肺金以镇之。且贝母之性，善于疗郁结利痰涎，兼主恶疮。玄参之性，《名医别录》谓其散颈下核，《开宝本草》谓其主鼠瘘，二药皆善消瘰疬可知。

11715 消瘰膏

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生半夏一两 生山甲三钱 生甘遂一钱 生马钱子四钱（剪碎） 皂角三钱 朱血竭二钱

【用法】 上药前五味用香油煎枯去滓，加黄丹收膏，火候到时，将血竭研细掺膏中，熔化和匀，随疮大小摊作膏药。临用时，每药一贴加麝香少许。

【功用】 消瘰疬。

【临证举例】 友人之女年五岁，项间起瘰疬数个，年幼不能服药，为制此药，贴之痊愈。

11716 消瘿酒

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】 昆布三钱 海藻五钱 沉香 雄黄各一钱（研末） 海螵蛸二钱

【用法】 上㕮咀，用好酒一升，汤煮，或浸十余日亦可饮。每服一二钟，不拘时候。

【主治】 瘿瘤。

11717 消癖丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】 三棱 莪术（各醋浸，炒） 陈皮 枳壳（麸炒） 厚朴（姜汁炒） 山茱萸 使君子 夜明砂 黄连（炒） 木香 干姜（炒）各二两 海藻（洗净）半两 神曲 麦芽 半夏曲各二钱 干蟾（炙） 九肋鳖甲（醋炒）各三钱

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如麻子大。米饮送下。

【主治】 疟母、食癥、痰癖、五饮成癖。

11718 消水肿膏

【方源】 方出《本草纲目》卷四十六引《仇远稗史》，名见《杂病广要》。

【组成】 田螺 大蒜 车前子各等分

【用法】 上捣膏。敷贴脐上。水从便旋而出。

【主治】 水气浮肿。

【临证举例】 水肿 象山县民病此，得是方而愈。

11719 消乳岩丸

【方源】《疡医大全》卷二十。

【组成】 夏枯草 蒲公英各四两 金银花 漏芦各二两 山茨菇 雄鼠粪 川贝母（去心） 连翘 金橘叶 白芷 甘菊花 没药（去油） 瓜蒌仁 乳香（去油） 茜草根 甘草 广陈皮 紫花地丁各一两五钱（一方去瓜蒌仁，加天花粉、桔梗、广胶，用夏枯草熬膏为丸。）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。每服二三钱，早、晚食后送下。

【主治】 乳岩。

【宜忌】 戒气恼。

11720 消胀饮子

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】 猪苓 泽泻 人参 白术 茯苓 半夏 陈皮 青皮 厚朴 紫苏 香附 砂仁 木香 槟榔 大腹皮 木通 莱菔子 甘草各等分

【用法】 上锉。加生姜五片，大枣一枚，水煎服。

【主治】 胀蛊，单腹胀。

11721 消炎3号

【方源】《中草药通讯》（1972；2:14）。

【组成】 板蓝根30克 猫眼草30克 人工牛黄6克 硇砂3克 威灵仙60克 制南星9克

【用法】 制成浸膏干粉。每服1.5克，一日四次。

【功用】《古今名方》：清热解毒，通经活络。

【主治】 食管癌。

11722 消炎合剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 银花31克 连翘31克 黄芩9克 桔梗9克 草河车9克 紫草6克 赤芍9克 生地15克 元参15克 大青叶31克 野菊花31克 蒲公英31克 当归9克 大黄6～9克

【用法】 水煎，内服。

【主治】 口炎。

11723 消癌核桃

【方源】《景岳全书》卷五十五。

【组成】 莪术（酒洗） 当归（酒洗） 白芥子 急性子各四两（俱捣碎） 皮消 海粉各八两 大核桃百枚

【用法】 先以群药入砂锅内，宽水煮一二沸，后入大核桃重五钱者百枚，同煮一日夜，以重一两为度，取起晾干，先用好膏药一个，掺阿魏一钱，麝香半分，量痞大小贴住，以热手磨擦，每空心服前桃一个，三日后二个，以至三个。服完后，须四物汤之类数贴即愈。

【主治】 痞块。

11724 消下破血汤

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】 柴胡 川芎 大黄 赤芍药 当归 黄芩 五灵脂 桃仁 枳实 栀子 赤牛膝 木通 泽兰 红花 苏木 生地

【用法】 水煎，加老酒、童便和服。

【主治】 下膈被伤。

11725 消风玉容散

【方源】《金鉴》卷七十四。

【组成】 绿豆面三两 白菊花 白附子 白芷各一两 熬白食盐五钱

【用法】 上为细末，加冰片五分，再研匀收贮。每日洗面，以代肥皂用之。内服疏风清热饮。

【主治】 吹花癣，俗称桃花癣。初如痤瘤，或渐成细疱，时作痛痒，发于春月，妇女多有之。

11726 消风百解散

【方源】《局方》卷二（宝庆新增方）。

【异名】 百解散（《保婴撮要》卷十）。

【组成】 荆芥 白芷 陈皮（洗，去白） 苍术 麻黄（去节）各四两 甘草（炙）二两

【用法】 上为细末。每服二大钱，用水一大盏，

加生姜三片，乌梅一个，同煎七分，温服，不拘时候；或紫酒调下。

【主治】 ①《局方》（宝庆新增方）：四时伤寒，身体烦疼，四肢倦怠，行步喘乏，及寒壅咳嗽，鼻塞声重，涕唾稠粘，痰涎壅盛，气急满闷者。②《保婴撮要》：感冒风邪，发热自汗。

【加减】 欲发散邪风，入连须葱白三寸同煎。

【方论选录】《医方考》：伤风宜解肌，咳嗽宜利气，荆芥、白芷、麻黄，可以解肌；陈皮、苍术、甘草，可以利气。《经》曰：辛甘发散为阳。夫六物皆辛甘，则皆解散矣。

【备考】 本方方名，《北京市中药成方选集》引作"百解发汗散"。

11727 消风导赤汤

【方源】《金鉴》卷七十六。

【组成】 生地 赤茯苓各一钱 牛蒡（炒，研） 白鲜皮 金银花 南薄荷叶 木通各八分 黄连（酒炒） 甘草（生）各三分

【用法】 上加灯心五十寸，水煎，徐徐服。

【主治】 婴儿胎瘾疮，又名奶癣。痒起白屑，形如癣疥。

11728 消风导赤汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 生地9克 赤芍9克 牛蒡子9克 白鲜皮9克 银花9克 薄荷6克 木通7克 黄连6克 甘草6克

【用法】 水煎，内服。

【主治】 急性湿疹。

11729 消风养血汤

【方源】《医方考》卷五。

【组成】 荆芥 蔓荆子 菊花 白芷 麻黄（去节） 桃仁（去皮尖） 红花（酒炒） 防风 川芎 各五分 当归（酒洗） 草决明 石决明 白芍药（酒炒） 甘草各一钱

【用法】 煎服。

【主治】 眼痛赤肿。

【方论选录】 ①《医方考》：是方也，荆芥、菊花、蔓荆、白芷、麻黄、防风、川芎可以消风，亦可以去热，风热去，则赤肿去矣；桃仁、红花、当归、芍药、草石决明可以消瘀，可以养血，亦可以和肝，瘀消则不痛，养血和肝则复明；乃甘草者，和诸药而调木气也。②《医方集解》：此足太阳、厥阴药也。荆芥、防风、麻黄、白芷、甘菊、蔓荆轻浮上升，并能消风散热；桃仁、红花、川芎、归、芍辛散酸收，并能养血去瘀；两决明皆除肝经风热，专治目疾，瘀去血活则肿消，风散热除则痛止。又目为肝窍，搜风养血，皆以和肝。加甘草者，亦以缓肝而止痛也。

11730 消风脱甲散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 番白草 红花 甘草 威灵仙 山栀 蝉蜕 连翘 皂角针 大风子肉 薄荷 风藤 金银花 冬瓜皮 木通 苍术各一钱 土茯苓四两

【用法】 水三碗，煎二碗，二次服，用好酒一大杯过口，滓再煎服。

【主治】 杨梅结毒，筋骨疼痛，腐烂作臭，气血壮实者。

11731 消风清热饮

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 荆芥9克 防风9克 浮萍9克 蝉衣6克 当归9克 赤芍9克 大青叶9克 黄芩9克

【功用】 消风清热。

【主治】 急性荨麻疹风热型，舌质红，苔薄布，脉细滑。

11732 消风清燥汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 川芎 当归 白芍 生地 防风 黄芩 黄连 天花粉 蝉蜕 苦参 灵仙各一钱 甘草五分

【用法】 用水二钟，煎取八分，食远服。

【主治】 癞风初起。

11733 消风清燥汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 当归9克 威灵仙6克 防风9克 虫蜕9克 川芎9克 黄连6克 花粉6克 苦参9克 白芍6克 生地21克 黄芩21克 生石膏12克 甘草6克

【用法】 水煎，内服。

【主治】 脂溢性皮炎。

11734 消风豁痰汤

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】 黄芩（酒炒） 羌活 红花 半夏（姜制） 陈皮 白茯苓 甘草 独活 防风 白芷 家葛 柴胡 升麻

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 风寒挟痰，颈项强痛。

【加减】 一方多加紫金藤。

11735 消石矾石散

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 消石散(《圣济总录》卷六十)、矾石散(《鸡峰》卷九)、矾消散(《医学入门》卷七)、消矾散(《类聚方》)、矾石消散(《证治宝鉴》卷九)。

【组成】 消石 矾石(烧)各等分

【用法】 上为散。每服方寸匕,以大麦粥汁和服,一日三次。病随大小便去,小便正黄,大便正黑,是候也。

【主治】 女劳疸。黄家日晡所发热,而反恶寒,膀胱急,少腹满,身尽黄,额上黑,足下热,因作黑疸,其腹胀如水状,大便必黑,时溏。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》:肾者,阴之主也,为五脏之根,血尽属之。血虽化于中土,生之于心,藏之于肝,若肾阴病,则中土莫得而化,心莫得而生,肝莫得而藏,荣卫莫得而行,其血败矣,将与湿热凝滞于肠胃之间。肾属水,其味咸,其性寒,则治之之药,必用咸寒,补其不足之水,泻其所客之热,荡涤肠胃,推陈致新。用消石为君,②《本草》矾石能除固热在骨髓者,骨与肾合,亦必能治肾热可知也。大麦粥汁为使,引入肠胃,下泄郁气。大便属阴,瘀血由是而出,其色黑。小肠属阳,热液从是而利,其色黄也。③《金匮要略直解》:《内经》,中满者泄之于内。润下作咸,消石之苦咸,矾石之酸咸,皆所以泄中满而润下,使其小便黄而大便黑也。然消石主胃胀闭,涤蓄结;矾石主热在骨髓,而经言劳者温之,是方得无太峻峭?然所服者,方寸匕耳,和以大麦粥汁,正所以宽胃而益脾也。

【临证举例】 急性病毒性肝炎 《山西医药杂志》(1978;4:47):杨某某,男,5岁,于1957年5月发病,发热恶心呕吐,腹胀腹痛,不思食,小便色黄,肝功检查:谷丙转氨酶710单位,黄疸指数30单位,麝浊20单位,麝絮+++,诊为急性病毒性肝炎。经中西医治疗延续至10月份,疗效不佳,来我小组就诊。面容消瘦,巩膜及皮肤黄染,周身发痒,腹胀纳差,小便色黄,肝于肋下3cm。确诊后,停服一切药物,改服本方(消石三份,矾石十份,取山药代大麦,炼蜜为丸,每丸重1.5g,每服1丸,一日三次,饭后服)。七天后,临床症状消失,饮食增加,肝脾未触及,亦无压痛。连服15天后,再次肝功检查,谷丙转氨酶100单位以下,黄疸指数7单位,麝浊8单位,麝絮+。随访二年余,身体健康,发育良好。

【备考】 本方方名,《证治宝鉴》引作"矾石消石散"。

11736 消虫神奇丹

【方源】《傅青主男女科》。

【组成】 当归 鳖甲 地栗粉各一两 雷丸 神曲 茯苓 白矾各三钱 车前子五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 虫臌。小腹痛,四肢浮肿而未甚,面色红而有白点,如虫食之状。

11737 消汗至神丹

【方源】《石室秘录》卷五。

【组成】 黄耆 当归各七钱 桑叶十四片 北五味三钱 麦冬半两

【用法】 水煎服。

【主治】 大汗。

11738 消导二陈汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 生枳壳一钱半 六和曲三钱 炒楂肉二钱 真川朴一钱 仙半夏二钱 广皮红一钱 焦苍术八分 童桑枝一两

【功用】 消食导滞。

【主治】 伤寒夹食,食滞在胃。

【备考】 先去外邪,继用本方。

11739 消导宽中汤

【方源】《医学六要·治法汇》卷五。

【组成】 白术一钱半 枳实(麸炒) 厚朴(姜制) 陈皮 半夏 茯苓 山楂 神曲 麦芽 萝卜子

【用法】 加生姜三片,水煎服。

【主治】 水肿。

【加减】 小便不利,加猪苓、泽泻。

11740 消阴来复汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 鹿茸一钱 附子八分 枸杞二钱 菟丝四钱 当归二钱 破故纸一钱五分 益智一钱 小茴香一钱 金毛脊二钱(去毛,切片) 木香五分 独活一钱(酒炒) 牛膝二钱 枣二枚 姜三片

【主治】 肾痹者善胀,尻以代踵,脊以代头。

11741 消阴利导煎

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 当归二钱 茯苓三钱 白术一钱五分 广皮一钱 厚朴一钱 肉桂五分 附子八分 木通一钱五分 大腹皮一钱五分 牛膝一钱五分 泽泻一钱五分 车前二钱 鲜姜皮一钱 葶苈一两

【主治】 目窠上微肿,如新卧起之状,其颈脉动,时咳,阴股间寒,足胫肿,腹乃大,其水已成,以手按其腹,随手而起,如裹水之状。

11742 消坚化痰汤

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】陈皮 鳖甲 贝母 香附 茯苓 半夏 白芥子 川芎 海粉 木香 青皮 枳实 甘草 花粉

【用法】水煎服。

【主治】胸腹痞块，按之痛者

11743 消疔化毒汤

【方源】《治疔汇要》卷下。

【组成】紫地丁 甘菊花 金银花各一两 蒲公英五钱 夏枯草 连翘各三钱 郁金二钱 甘草四钱（生） 鲜菊叶二两（打汁冲）

【主治】疔毒。

【加减】若已溃烂，加当归一两。

11744 消补兼施汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】人参一钱 白术五钱 薏仁五钱 茯苓三钱 黄耆五钱 防风五分 白矾一钱 白芍三钱 陈皮五分 白芥子三钱

【用法】水煎服。

【主治】气虚痰滞，人身生块而不消者。

【方论选录】此方妙在补气多，而祛痰之药少，气足而痰自难留。况又有白芥子，无痰不消，白矾无坚不入，况又有白芍以和肝木，不来克脾胃之土，而土益能转其生化之机，又得薏仁、茯苓，以分消其水湿之气，何身块之不消乎？

11745 消肿止痛散

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】芙蓉叶一两 陈小粉一两五钱 五倍子 生南星 生半夏 生草乌各三钱

【用法】上为末。醋调敷。

【主治】痈疽。

11746 消肿利咽汤

【方源】《衷中参西》中册。

【组成】天花粉一两 连翘四钱 金银花四钱 丹参三钱 射干三钱 玄参三钱 乳香二钱 没药二钱 炙山甲一钱半 薄荷叶一钱半

【用法】煎汤服。

【主治】咽喉肿痛。

【加减】脉象洪实者，加生石膏一两；小便不利者，加滑石六钱；大便不通者，加大黄二钱。

11747 消肿南星散

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】黄柏 姜黄 天南星 草乌头 黄连各等分

【用法】上为末。以生姜自然汁调匀，贴两太阳穴。

【主治】诸般热眼，肿痛难开者。

11748 消肿通气汤

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】石膏一钱五分 青皮 当归 皂角刺各一钱 白芷 天花粉各六分 金银花 甘草节各五分 瓜蒌仁七分 橘叶三十片 连翘八分 没药四分 升麻四分

【用法】上㕮咀。用水、酒各半煎，食远温服。

【主治】妇人乳硬，其中生核如栱子。

11749 消肿遗粮汤

【方源】方出《丹溪心法附余》卷十六，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷八。

【组成】冷饭团（即土茯苓）十五两 防风 木通 薏苡仁 防己 茯苓 金银花 木瓜 白鲜皮 皂角刺各五钱 白芥子四钱 当归身七钱

【用法】上作三十服。每服用水一钟半，煎至八分，空心、午饭前、晚饭前各一服。

【主治】杨梅疮后肿块。

【宜忌】忌鱼、鸡、生冷，房事，及煎炒、茶酒十余日。

【加减】虚弱人加人参五钱

11750 消胀万应汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】地骷髅三钱 大腹皮二钱 真川朴一钱 莱菔子二钱（拌炒） 青砂仁五分 六神曲一钱半 陈香橼皮八分 鸡内金两张 人中白（煅透）五分 灯心五小帚

【用法】以此方送下消臌万应丹。

【功用】消滞除胀。

【主治】黄疸变膨，气喘胸闷，脘痛翻胃，疳胀结热，伤力黄肿，噤口痢。

11751 消毒化坚汤

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】当归一钱 黄耆一钱 白芍一钱 玄参六分 天花粉六分 连翘一钱五分 柴胡一钱 黄芩五分 牛蒡七分 龙胆草四分 升麻七分 桔梗一钱 陈皮八分 羌活七分 薄荷四分 海昆布七分 甘草四分

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】瘰疬马刀，生耳前后，或项下胸腋间，累累如珠者，未破已破皆治。

【加减】一方加甘草节、知母、贝母、海藻更佳。

11752 消毒百应丸

【方源】《同春》卷四。

【组成】苍术　黄柏　槐花　金银花　当归　皂角各四两

【用法】上六味切片，分作四份。每份用水七碗，煎至四碗，去滓，留药汁浸大黄片一斤，浸一宿，次日取出，安筛内晒干。如此将四次水浸晒尽为度。将大黄为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每一次六十四粒，空心熟白水送下。

【主治】痔漏疮，脏毒。

【宜忌】忌厚味、胡椒、烧酒之类。

11753　消毒利黄汤

【方源】《中医临证撮要》。

【组成】川黄连1.5克　生山栀4.5克　淡竹叶6克　生甘草2.4克　连翘壳4.5克　西茵陈6克　赤茯苓6克　细木通2.4克　炒麦芽4.5克　生枳壳2.4克

【功用】清胎毒，利黄疸。

【主治】新生儿黄疸。婴儿出生十日左右，面目身黄，啼哭不安，腹胀，不思吮乳，或发热，舌红口干，指纹青紫。

【加减】大便干燥，加生大黄2.4克；大便溏泻，去生山栀，加生白术3克；吐乳，去生甘草，加藿香梗3克；发热不退，加京赤芍3克；夜啼不安，加净蝉衣2.4克，灯心1.2克；抽风，加嫩钩藤、僵蚕各6克。

11754　消毒青黛饮

【方源】《赤水玄珠》卷十八。

【组成】黄连　甘草　石膏　知母　柴胡　玄参　生地　山栀　犀角　青黛　人参

【用法】水二钟，加生姜一片，大枣二枚煎，临服入苦酒一匙。

【主治】热邪传里，里实表虚，血热不散，热气乘于皮肤而为斑，轻则如疹子，重则如锦纹，重甚则斑烂皮肤。

【加减】大便实者，去人参，加大黄。

11755　消毒神圣丹

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【异名】消毒圣神汤(《疡医大全》卷七)。

【组成】金银花四两　蒲公英二两　生甘草二两　当归二两　天花粉五钱

【用法】水煎服。

【主治】背痈，或胸腹头面手足之疽。

【方论选录】《疡医大全》：方中金银花专能内消疮毒，然非多用，则力轻难以成功。生甘草一味已足解毒，况又用之于金银花内，益足以散邪而卫正。蒲公英阳明经药也，且能散结逐邪；天花粉消痰圣药。当归活血，血不活所以生痈，今血活而痈自愈。

11756　消毒宽喉散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】寒水石（生）四两　马牙消　朴消各六钱　青黛半两

【用法】上为极细末。每服二钱，浓煎薄荷汤点匀，热漱咽喉内，冷吐，误咽不妨，不拘时候，日用三五次。

【主治】急慢喉痹，咽喉闭塞，或舌本强硬，满口生疮。

11757　消毒救苦散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】大黄三钱　黄芩　黄连　黄柏　芙蓉叶　大蓟根　白及　白敛　天南星　半夏　红花　檀花　当归尾　赤小豆　白芷各一钱五分　朴消　雄黄（另研末）各一钱

【用法】米醋调涂，敷四周，留头，如干即又敷。

【功用】消肿散毒。

【主治】疮疡。

11758　消毒麻仁丸

【方源】《医统》卷六十九。

【组成】芝麻四两（研，取汁）　杏仁二两（去皮尖，研如泥）　大黄五两　山栀十两

【用法】上为末，炼蜜入麻汁和丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前白汤送下。

【主治】胃实便秘，能饮食而小便赤。

11759　消毒犀角饮

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】消风犀角散(《疡科捷径》卷下)。

【组成】犀角（镑）　防风各一钱　甘草五分　黄连三分

【用法】上用水二钟，加灯心二十根，煎取四分，徐徐服之。

【主治】小儿丹毒，身热气粗，啼叫惊搐不宁。

11760　消食平胃汤

【方源】《陈氏幼科秘诀》。

【组成】藿香　厚朴　苍术　半夏　香附　陈皮　山楂　神曲　茯苓

【用法】水煎服。

【主治】伤食吐泻，乳食不化，或吐与泻皆酸臭。

【加减】泻色黄赤属热，加姜炒黄连；青白属

冷，只用本方，甚则加木香、丁香、肉桂、干姜、肉蔻等；腹痛，加砂仁；身热，加柴胡；伤食重，枳实、青皮、槟榔可渐知；身凉吐沫、泻青白、呵欠、烦闷不渴、哕气、常见露睛，此病久佳苦，因成吐泻，急宜补脾，量加人参、白术、干姜、肉桂、附子、木香、丁香等。

11761 消食导气饮

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】 人参 白术 茯苓 炙草 川芎 半夏 青皮 陈皮 枳实 香附 神曲 砂仁 木香

【用法】 用水一钟半，加生姜三片，煎七分，食远温服。

【主治】 脾土本虚，不胜肝气，凡遇怒气便作泄泻。

11762 消积三棱煎

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】 沉香一两（为末） 槟榔一两（为末） 京三棱 蓬莪术 乌梅肉（焙干，为末）各二两

【用法】 上将京三棱、蓬莪术二味锉碎，用酸醋浸一宿，取出焙干为末，入沉香等拌匀，每称药末一两，用肥巴豆十五个（去皮心膜细研，以竹纸裹压数次去油，取霜），与前项药末一两，再研匀，醋煮稀糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食后温生姜汤送下。

【主治】 脾胃虚弱，少食多伤，五积六聚，气块痞痛。

11763 消积化痞丹

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】 白术五两 茯苓三两 六曲二两 地栗粉八两 鳖甲一斤（醋炙） 人参五钱 甘草一两 川芎三两 半夏一两 白芥子一两 萝卜子五钱 厚朴五钱 肉桂三钱 附子一钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服五钱，临睡送下，以美物压之。

【主治】 痞块。

【方论选录】 此方有神功，妙在用鳖甲为主，则无坚不入；尤妙用地栗粉，佐鳖甲以攻邪，又不耗散真气。其余各品，俱是健脾理正之药，则健脾而物自化。尤妙用肉桂、附子，冲锋突围而进，则鳖甲大军相继而入，勇不可当，又是和平之师，敌虽强横，自不敢抵抗，望风披靡散走，又有诸军在后，斩杀无遗，剿抚并用，有不告捷者哉？

【备考】 本方方名，《医门八法》引作“栗粉丸”。

11764 消积化聚丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 三棱 莪术 陈皮 丁香 阿魏 青皮 木香 白芷 川归 草豆蔻 川贝 玄明粉 黄连 香附 神曲 麦芽 甘松 砂仁 莱菔子（炒）各五钱

【用法】 上为末，酒为丸，如梧桐子大。每服八十丸，姜汤送下，或酒送下。

【主治】 五积六聚，气积胀满，不食。

11765 消积阿魏丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 威灵仙一两 阿魏三钱 磁石（煅过） 牵牛 槟榔各五钱 莪术（煨）五钱 三棱一两 穿山甲（黄土炒黄）

【用法】 上为末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米汤送下。

【主治】 久年痞块，食积兼有形者。

11766 消积通经丸

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【异名】 调经化瘀丸（《中药制剂手册》）。

【组成】 南香附（醋炒）十两 艾叶（醋炒）二两 当归（酒洗）二两 南芎一两 赤芍一两 生地二两 桃仁（去皮）一两 红花（酒洗）一两 三棱（醋炒）一两 莪术（醋炒）一两 干漆（炒）一两

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，临卧淡醋汤送下。

【功用】 调经行血，温中化瘀。

【主治】 ①《鲁府禁方》：经闭。②《中药制剂手册》：气血不调引起的血瘀、血滞，经血不调，行经腹痛，经闭不通，以及骨蒸烦热、腰腿疼痛。

【宜忌】 孕妇忌服。由于血虚引起的经闭不宜服用。

11767 消疳芜荑汤

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】 大黄 芒消 芜荑 芦荟（生） 川连 胡黄连 黄芩 雄黄

【用法】 水煎服。

【功用】 泻热毒。

【主治】 牙疳。毒热攻胃，龈肉赤烂疼痛，口臭血出，牙枯脱落，穿腮蚀唇。

【加减】 服后便软及不食者，去大黄、芒消，加石膏、羚羊角。

11768 消疳明目汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 苍术6克 鸡内金3克 神曲 当归各

6克　酒白芍3克　甘草1.5克

【功用】 消疳健脾，养肝明目。

【主治】 疳疾上目，病变初期，始见雀目者。

【方论选录】 方中苍术健脾除障而明目，鸡内金、神曲健脾消食而除积，当归、酒白芍补养肝血，甘草健脾和中。

11769　消疳定痛散

【方源】 《外科大成》卷二。

【组成】 黑羊角（煅）二钱　川山甲（炒）二钱　乳香一钱　没药一钱

【用法】 上为末，作一服。空心黄酒调下。

【主治】 下疳痛不可忍者。

11770　消疳退云饮

【方源】 《审视瑶函》卷四。

【异名】 消疳退云散（《眼科菁华录》卷下）。

【组成】 陈皮　厚朴（姜汁炒）　苍术（米泔浸）　莱菔子（炒，研碎）少许　柴胡　甘草（炙）少许　枳壳（麸炒）　草决明（炒，研碎）　桔梗　青皮　黄连（酒炒）　蜜蒙花　栀子（炒黑）　黄芩（酒炒）　神曲（炒）　家菊花各等分。

【用法】 上锉一剂。姜皮、灯心为引，水二钟煎服，滓再煎服。

【主治】 疳眼伤脾湿热熏，木盛土衰风毒生，渴泻肚大青筋露，目札涩痒且羞明，时时揉鼻常捋发。

11771　消疳退翳汤

【方源】 《张皆春眼科证治》。

【组成】 胡黄连1.5克　青黛0.3克　炒山楂　炒神曲各6克　鸡内金3克　槟榔6克

【功用】 消疳除积，清肝退翳。

【主治】 土虚木旺，肝火上攻，白膜满遮，糜烂枯凸者。

11772　消疳理脾汤

【方源】 《金鉴》卷五十二。

【组成】 芜荑　三棱　莪术　青皮（炒）　陈皮　芦荟　槟榔　使君子肉　甘草（生）　川黄连　胡黄连　麦芽（炒）　神曲（炒）

【用法】 灯心为引，水煎服。

【主治】 脾疳。面黄，肌肉消瘦，身体发热，困倦喜睡，心下痞硬，乳食懒进，睡卧喜冷，好食泥土，肚腹坚硬疼痛，头大颈细，有时吐泻，口干烦渴，大便腥粘。

11773　消菔通结汤

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 净朴消四两　鲜莱菔五斤

【用法】 将莱菔切片，同朴消和水煮之。初次煮，用莱菔片一斤，水五斤，煮至莱菔烂熟捞出。就其余汤，再入莱菔一斤。如此煮五次，约得浓汁一大碗，顿服之。若不能顿服者，先饮一半，停一小时，再温饮一半，大便即通。

【主治】 大便燥结久不通，身体兼羸弱者。

【加减】 若脉虚甚，不任通下者，加人参数钱，另炖同服。

【方论选录】 软坚散结，朴消之所长也。然其味咸性寒，若遇燥结甚实者，少用之则无效，多用之则咸寒太过，损肺伤肾。其人或素有劳疾或下元虚寒者，尤非所宜也。惟与莱菔同煎数次，则朴消之咸味，尽被莱菔提出，莱菔之汁浆，尽与朴消融化。夫莱菔味甘，性微温，煨熟食之，善治劳嗽短气，其性能补益可知。取其汁与朴消同用；其甘温也，可化朴消之咸寒；其补益也，可缓朴消之攻破。若或脉虚不任通下，又借人参之大力者，以为之扶持保护。然后师有节制，虽猛悍亦可用也。

11774　消痔千金散

【方源】 《医统》卷七十四引《活人心统》。

【组成】 孩儿茶五分　冰片半分　熊胆二分　甘草三分　赤石脂　黄连各三分　寒水石五分　硼砂一分

【用法】 上为细末。猪胆汁调搽。或入胆内以竹管入胆内，以线缚口，紧插入肛门内捽之，自然痔病愈。

【主治】 大便诸痔，肿疼不已。

11775　消斑青黛饮

【方源】 《片玉心书》卷五。

【组成】 黄连　甘草　石膏　知母　柴胡　山栀仁　玄参　升麻　生地　黄芩　人参　青黛

【用法】 加生姜三片、豆豉二十粒为引，水煎服。

【主治】 阳毒发斑。或发于面部，或发于背部，或发于四肢，极其稠密，状如绵纹。

【备考】 方中黄芩，《幼科指南》作“黄耆”。

11776　消斑青黛饮

【方源】 《回春》卷二。

【组成】 柴胡　玄参　黄连　知母　石膏　青黛　生地黄　山栀　犀角　人参　甘草

【用法】 上锉一剂。加生姜一片，大枣一个，水煎，临服入醋一匙同服。

【主治】 热传里，里实表虚，血热不散，热气乘虚出于皮肤而为斑，轻如疹子，重则如锦纹，重甚则斑烂皮肤。

【方论选录】《医方集解》：发斑虽出胃热，亦诸经之火有以助之。青黛、黄连以清肝火，栀子以清心肺之火，玄参、知母、生地以清肾火，犀角、石膏以清胃火。此皆大寒而能解郁热之毒者；引以柴胡，使达肌表，使以姜、枣，以和营卫，其用人参、甘草者，以和胃也。胃虚故热毒乘虚入里，而发于肌肉也。加苦酒者，其酸收之义乎！

11777 消暑十全饮

【方源】《玉机微义》卷十一。

【异名】消暑十全散(《赤水玄珠》卷二)。

【组成】香薷 扁豆 厚朴 甘草 紫苏 白术 茯苓 藿香 木瓜 檀香

【用法】上㕮咀。水煎服。

【主治】①《玉机微义》：伤暑。②《赤水玄珠》：伏暑，胃气不和，心腹满痛。

11778 消暑十全散

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】香薷二钱 扁豆（炒，捶） 厚朴（姜制） 陈皮 甘草（炙） 白术 茯苓 木瓜 藿香 苏叶各一钱

【用法】水煎，热服，不拘时候。取微汗效。

【主治】伤暑，兼感风邪，发热头痛。

【方论选录】《医略六书》：暑伤心脾，风侵经络，故头痛恶心，发热口干焉。香薷散夏月之表，厚朴疏胸腹之里，扁豆助脾却暑，白术燥湿健脾，藿香快胃以祛暑，木瓜舒筋以和脾，陈皮理中气，茯苓清治节，苏叶散风邪，甘草和胃气也。此调中解表之剂，为风暑合邪之专方。

11779 消痞阿魏丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】阿魏 川连 制南星 姜半夏 瓜蒌仁 白芥子 连翘 神曲 川贝 麦芽 山楂 莱菔子各一两 风化消 食盐 胡连各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，辰砂为衣。每服一二钱，开水送下。服后食胡桃肉以除药气。

【主治】①《重订通俗伤寒论》：痞。②《饲鹤亭集方》：诸般积聚、癥瘕、痃癖。

11780 消痞狗皮膏

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】三棱 蓬莪 米仁 山栀 秦艽各一两五钱 黄连四钱 大黄 当归各九钱 甲片四十片 全蝎四十只 木鳖二十个 巴豆十粒

【用法】上用麻油一百二十斤，煎枯去滓后，下黄丹五十二两收膏，加入阿魏、阿胶、芦荟各一钱，麝香、乳香、没药各三钱，研末调和膏内。用时将膏在热茶壶上烘至暖烊，贴患处，以手心揉百转，无不效验。贴后能作寒热、肚痛下秽，其疾消，愈矣。

【主治】一切气疾痞块，癥瘕血块，积聚腹胀疼痛。

【宜忌】百日内禁忌酒色气恼，劳心劳力，诸般发物。

11781 消湿化怪汤

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】白术九钱 茯苓三钱 薏仁九钱 芡实九钱 泽泻五钱 肉桂五分 车前子二钱 人参三钱 牛膝二钱 萆薢三钱 白矾五分 陈皮二钱 白芥子三钱 半夏二钱

【用法】水煎服。

【功用】峻补脾气，分消湿邪。

【主治】脾经湿气，结成肿块，脚肚之上，忽长一大肉块，如瘤非瘤，如肉非肉，手不可按，按之而痛欲死。

11782 消障救目汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】石蟹一钱半（生，研末） 连翘一钱半 羚羊角一钱 草决明一钱 白蒺藜一钱 防已一钱 茺蔚子一钱 龙胆草五分（酒炒） 木贼草五分 甘菊花八分

【用法】水煎服。

【主治】眼生翳障，及胬肉、红筋、白膜。

11783 消瘤二反膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】甘草 大戟 芫花 甘遂

【用法】先用甘草煎浓膏，笔蘸涂瘤四围，待干再涂，共三次；次以大戟、芫花、甘遂等分为末，以醋调，另用笔蘸药涂其中，不得近着甘草处。次日则缩小些，又以甘草膏涂四围，比先小些，中涂照前，自然渐渐缩小而消矣。

【主治】瘿瘤、瘰疬、结核。

11784 消瘤神应散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】山慈姑 海石 昆布 贝母各等分

【用法】上为末。每服二钱，白滚水调下。

【主治】瘿瘤。

11785 消瘤碧玉散

【方源】《金鉴》卷六十六。

【组成】硼砂三钱 冰片 胆矾各三分

【用法】上为细末。用时以箸头蘸药点患处。

【功用】开结通喉，搜热。

【主治】 喉瘤。

11786 消瘿五海丸

【方源】《全国中药成药处方集》(西安方)。

【组成】 海带 海藻 海蛤 海螵蛸 昆布 大贝 木香各一两

【用法】 上为极细末，炼蜜为丸，每丸重三钱，蜡皮封固。成人每服一丸，饭前温开水送服，或煎一碗当茶饮，一日三次。小儿酌减。外用樱桃核、好醋磨敷患处。

【主治】 瘿瘤初起，肉色不变，渐长渐大。及瘰疬。

11787 消瘿五海饮

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】 消瘿五海散(《回春》卷五)。

【组成】 海带 海藻 海昆布 海蛤 海螵蛸各三两半 木香 三棱 莪术 桔梗 细辛 香附各二两 猪琰子七个(陈壁土炒，去油，焙干)

【用法】 上为末。每服七分半，食远米汤送下。

【主治】 脂瘤，气瘤。

11788 消凝大丸子

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 川芎 当归各七钱 防风 荆芥 羌活 藁本 薄荷各半两 桔梗 甘草(炙)各七钱 滑石 石膏 白术 黄芩 山栀各一两 连翘 菊花各七钱

【用法】 先将滑石、石膏另研，余作细末，和匀，炼蜜为剂，每剂一两，分八丸。每服一丸或二丸，茶汤嚼下。

【主治】 目中青暗，如物伤状，重者白睛如血贯，或有眵泪沙涩。

【方论选录】 上方消凝滞药也。君以川芎、当归治血和血；臣以羌活、防风、荆芥、藁本、薄荷、桔梗疗风散邪，引入手足太阳经；佐以白术、甘草、滑石，石膏调补胃虚，通泄滞气，除足阳明经热；使以黄芩、山栀、连翘、菊花去热除烦。淫热反克，风热不制者，俱宜服也。

11789 消翳复明膏

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 黄丹(水飞)四两 青盐一两(另研) 白沙蜜一斤 诃子八个(去核取末) 海螵蛸三钱(取末。前药一处蜜熬数沸，净纸搭去蜡面，却下黄丹，用棍搅匀，旋下余药，将至紫色取出。)黄连十两 蕤仁半两 木贼草一两 龙胆草二两 杏仁七十五个(去皮尖)

【用法】 上药黄连等五味入瓷器内，以水一斗浸之，春、秋五日、夏三日、冬十日，入锅内，文武火熬至小半斤，滤去滓，重汤炖成膏子，却入前药熬之，搅成紫色，入龙脑一钱，每用少许，点眼，药干，净水化开用。

【主治】 阳跻受邪，内眦即生赤脉缕缕，根生瘀肉，瘀肉生黄赤脂，脂横侵黑睛，渐蚀神水，锐眦亦然。

【方论选录】 上方以黄连为君，以疗邪热也；蕤仁、杏仁、龙胆草为臣，为除赤痛，润烦躁，解热毒也；黄丹、青盐、龙脑、白沙蜜为佐，为收湿烂，益肾气，疗赤肿，和百药也；诃子、海螵蛸、木贼草为使，消障磨翳也。

11790 消翳复明膏

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 黄丹一两 青盐二钱半 海螵蛸 真珠各七分半 熊胆 麝香各二分 片脑五分(临时加入) 诃子二个(去核，研末) 槐柳枝各四十九条 冬蜜(熬一沸，去白沫，滤净)四两(上将蜜和黄丹炼至紫色，旋下余药，熬至滴水沉下成珠为度，除脑、麝成膏，后入)黄连二两半 防风 当归 龙胆草 生地黄各五钱 木贼 白菊花各二钱半 蕤仁一钱 杏仁五分

【用法】 上如前煎熬成膏，入蜜和匀，瓷碗盛，放汤瓶口上蒸炖成膏，滤净，入脑、麝和匀。点眼，又以热汤泡化洗眼。

【主治】 眼目昏花，翳膜遮睛，内外障眼，一切眼疾。

11791 消臟万应丹

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 煅透人中白一两 地骷髅 莱菔子 六神曲各五钱 砂仁二钱(以上俱炒) 陈香橼一个

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。每服五七丸，灯心汤送下。

【主治】 黄疸变臟，气喘胸闷，脘痛翻胃，痞胀结热，伤力黄肿，噤口痢。

11792 消瘿去积丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 川楝子(巴豆七粒炒紫色，去巴豆)三棱(煨) 莪术(煨) 槟榔 青皮 陈皮 川芎 当归 玄胡(炒) 血竭 黄连 香附各五钱 木香三钱 阿魏二钱半 干漆二钱(炒)

【用法】 上为末，醋化阿魏、神曲糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】 男女血瘕、血瘿、气块疼痛，寒热面黄，少食肿胀。

11793 消积滞集香丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】京三棱 广茂 青皮 陈皮 丁香皮 益智 川楝子 茴香各一两 巴豆（和皮米炒焦）五钱

【用法】上为细末，醋糊为丸，如绿豆大。每服五七丸，食前温水、生姜汤任下。

【主治】伤生冷硬物不消。

11794 消脂膜导痰汤

【方源】《济阴纲目》卷六。

【组成】半夏（姜制） 南星（火炮） 橘红 枳壳（去瓤，麸炒） 茯苓 滑石（研细）各一钱 川芎 防风 羌活各五分 车前子七分

【用法】上细切，作一服。加生姜五片，水煎，空心服，以干物压之。

【主治】①《济阴纲目》：宫冷不孕。②《医略六书》：痰纳胞门，闭遏子室，天癸不调，不能孕育。

【方论选录】《医略六书》：南星散痰燥湿，半夏燥湿化痰，防风祛闭以胜湿，枳壳泻滞以化气，滑石通肌利窍，羌活燥湿通经，橘红利气除痰，川芎活血行气，茯苓渗湿以清经脉，车前利湿气以净子宫，生姜开豁痰涎以清廓胞门也。水煎温服，使痰化结开，则胞门清肃而经脉融和，天癸无不如度，何患不能生子乎！

11795 消肿调脾顺气汤

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】苍术 陈皮 厚朴 草果 砂仁 猪苓 木香 槟榔 大腹皮 香附 枳壳 泽泻 桔梗 三棱 莪术 官桂 大茴香 木通 人参 木瓜 桑白皮 牵牛（女用黑，男用白） 大黄 甘草

【用法】上锉。加生姜，水煎服。

【功用】消胀满，顺气和脾，除湿利水。

【主治】水肿。

11796 海艾汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】海艾 菊花 薄荷 防风 藁本 藿香 甘松 蔓荆子 荆芥穗各二钱

【用法】上用水五六碗，同药煎数滚，连滓共入敞口钵内，先将热气熏面，候汤温，蘸洗之，留药照前再洗。

【主治】①《外科正宗》：油风。血虚，肌肤失养，风热乘虚攻注，毛发脱落成片，皮肤光亮，痒如虫行。②《中医皮肤病学简编》：斑秃。

11797 海石丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】海石 三棱 莪术 桃仁 红花 五灵脂 香附 蚶壳 石碱各等分

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白术煎汤送下。

【主治】痰与食积、死血成块。

11798 海石散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】海石二钱 香附一钱

【用法】上为末。川芎、山栀煎汤，加姜汁令辣，调服。

【主治】脾痛、疝痛。

11799 海青丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】海粉一两 青黛三钱 黄芩二钱 神曲一两

【用法】留半煮，为丸如梧桐子大。每服二三十丸，白汤送下。

【主治】痰积泄泻。

11800 海青丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】海蛤粉 青黛 瓜蒌仁 诃子皮 便香附 半夏各一两

【用法】姜汁糊为丸。每服三十丸，姜汤送下。

【主治】火郁肺胀，气急息重者。

11801 海青膏

【方源】《瑞竹堂方》卷三。

【组成】黄丹四两（水飞） 诃子八个（去核，为细末） 乌鱼骨（白者）二钱 青盐一两（另研） 白沙蜜（净者）一斤

【用法】上将蜜滚去白沫，先下黄丹，用槐条四十九根，少时下余药。不住手一顺搅，直搅蜜紫色，滴水中不散为度。后再用黄连二两为末，水三大碗，于熬药锅内熬数沸，将锅并槐条上药洗净，别用瓷器收之，澄清。专洗风赤冷泪等眼。前所熬膏子药，用点云翳白膜等疾。

【主治】一切昏翳内障眼疾。

11802 海参丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】海参一斤 全当归（酒炒） 巴戟肉 牛膝（盐水炒） 破故纸 龟版 鹿角胶（烊化） 枸杞子各四两 羊肾（去筋，生打）十对 杜仲（盐水炒） 菟丝子各八两 胡桃肉一百个 猪脊髓十条（去筋）

【用法】上为细末，鹿角胶为丸。每服四钱，温

酒送下。

【功用】 补气，壮阳，益肾，强筋骨，健步；久服填髓种子，乌须黑发，延年益寿。

【主治】 腰痛，梦遗泄精。

11803 海参粥

【方源】 《老老恒言》卷五。

【组成】 海参适量

【用法】 先将海参煮烂，细切，入米，加五味。

【功用】 ①《老老恒言》：温下元，滋肾补阴。②《药粥疗法》：补肾，益精，养血。

【主治】 ①《老老恒言》：痿。②《药粥疗法》：精血亏损，体质虚弱，性机能减退、遗精，肾虚尿频。

11804 海带丸

【方源】 《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】 海带 贝母 青皮 陈皮各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。食后噙化一丸。大效。

【主治】 瘿气久不消。

【备考】 《种福堂方》有海藻。

11805 海带散

【方源】 《圣济总录》卷一三二。

【组成】 海带不拘多少

【用法】 上为散。临卧贴。一两宿愈。

【主治】 缘唇疮。

11806 海浮散

【方源】 《疮疡经验全书》卷四。

【异名】 生肌散(《济阳纲目》卷八十八)。

【组成】 乳香 没药各等分

【用法】 上为细末。掺恶肉上。

【功用】 ①《疮疡经验全书》：去恶肉。②《济阳纲目》：止痛生肌。

【主治】 疮有恶肉不去。

11807 海菜丸

【方源】 《得效》卷十九。

【组成】 海藻菜 荞麦（炒，去壳） 白僵蚕（炒断丝）

【用法】 上为末，取白梅肉泡汤为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，临卧米饮送下。其毒当自大便泄去。

【主治】 疬生子头项上交接处，名蛇盘疬者。

【宜忌】 忌食豆腐、鸡、羊、酒、面。

11808 海蛤丸

【方源】 《圣惠》卷五十四。

【组成】 海蛤一两（研细） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 海藻一两（洗去咸味） 昆布一两（洗去咸味） 赤茯苓一两 汉防己二两 泽漆一两 桑根白皮二两（锉） 木通二两（锉）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 水气，遍身浮肿，上喘，小便不通。

11809 海蛤丸

【方源】 《圣惠》卷五十四。

【组成】 海蛤一两（研细） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 赤茯苓一两 桑根白皮一两（锉） 郁李仁一两（汤浸去皮，微炒） 汉防己一两 陈橘皮一两（汤浸去白瓤，焙） 甘遂半两（煨令微黄）

【用法】 上为末，别捣葶苈如泥，纳药末中和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】 大腹水肿，四肢洪满，小便涩少。

11810 海蛤丸

【方源】 《圣济总录》卷七十九。

【组成】 海蛤（研）一两半 消石（研）二两 葶苈（微炒，研）一两半 杏仁（汤去皮尖 双仁，炒黄，研）一两

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前煎木通汤送下，一日二次。

【主治】 水气，头面俱肿，四肢无力，小便涩。

11811 海蛤丸

【方源】 《圣济总录》卷七十九。

【组成】 海蛤（研）三分 葶苈（隔纸炒） 桑根白皮（切）各一两 赤茯苓（去黑皮）一两 郁李仁（汤浸，去皮，炒） 陈橘皮（汤浸，去白瓤，炒）各半两 防己（锉）三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服二十丸，渐加至三十丸，米饮送下，早、晚各一服。

【主治】 石水。四肢细瘦，腹独肿大。

11812 海蛤丸

【方源】 《医学纲目》卷十六引丹溪方。

【组成】 海蛤（烧为灰，研极细，过数日火毒散用之） 瓜蒌仁（蒂瓤同研）

【用法】 上以海蛤入瓜蒌内，干湿得所，为丸。每服五十丸。

【主治】 痰饮心痛。

11813 海蛤汤

【方源】 《圣济总录》卷八十三。

【异名】 海蛤散(《奇效良方》卷三十九)。

【组成】 海蛤 泽漆叶（新者） 防己 木通（锉） 百合各一两 桑根白皮（锉，炒）一两半

郁李仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 牵牛子（炒） 槟榔（锉）各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，空心、日午温服。

【主治】 脚气变成水肿，小便不通，喘息。

11814 海蛤汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】 海蛤 木通（锉） 猪苓（去黑皮）各半两 滑石（碎） 冬葵子（微炒）各一分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加灯心十茎，同煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 妊娠子淋。

11815 海蛤散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】 海蛤一两（研细） 泽漆叶一两 汉防己一两 桑根白皮一两（锉） 百合一两 赤茯苓一两半 槟榔一两 木通一两（锉） 牵牛子一两（微炒） 甜葶苈一两（隔纸炒，令紫色） 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。以利为度。

【主治】 肺气咳嗽，面目浮肿，小便不通，喘息促急，欲成水病。

11816 海蛤散

【方源】《活人书》卷十九。

【组成】 海蛤 滑石 甘草各一两（炙） 芒消半两

【用法】 上为散。每服二钱，鸡子清调下。

【主治】 妇人伤寒血结胸膈，揉而痛不可抚近者。

11817 海藻丸

【方源】《外台》卷八引《范汪方》。

【组成】 海藻 木防己 甘遂 芫蓉 蜀椒（去汗） 芫花（熬） 葶苈子（熬）各一两

【用法】 上为末，蜜和为丸，如梧桐子大。每服十丸。不愈，当增之。

【主治】 腹中留饮。

11818 海藻丸

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】 海藻（洗去咸；炙干） 槟榔（锉） 昆布（洗去咸，炙干） 诃黎勒皮 文蛤（研）各三两 半夏（汤洗七遍） 生姜（切，焙）各二两 小麦（米醋浸三宿，晒干）三合 海蛤（研）二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，含化，一日三次。

【主治】 咽喉中噎闷成瘿。

11819 海藻丸

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】 海藻（洗，晒）一两 海蛤（煅） 松萝各七钱半 当归 川芎 官桂 白芷 细辛 藿香 白蔹 明矾（煅） 昆布（洗，晒）各五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每次一丸，含咽下。

【主治】 瘿瘤。

11820 海金沙散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】 海金沙（别捣）二两 滑石（研细） 甘草（炙，锉） 山栀子仁各一两

【用法】 上将甘草、栀子仁为细散，入余药再研匀。每服一钱匕，茶清调下，不拘时候。

【主治】 气淋，结涩不快。

11821 海金沙散

【方源】《御药院方》卷八。

【异名】 大海金砂散（《赤水玄珠》卷十五）。

【组成】 海金沙（研） 木通 瞿麦穗 滑石（研） 通草各半两 杏仁（汤浸，去皮尖，麸炒黄，研）一两

【用法】 上为细末。每服五钱，水一盏半，加灯心二十根，同煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 小便淋涩，及下焦湿热，气不施化，或五种淋疾，癃闭不通。

11822 海金沙散

【方源】《得效》卷八。

【组成】 海金沙 滑石末各一两 甘草末一分

【用法】 上为末。每服一匕，用麦门冬汤下；灯心汤亦可。

【主治】 膏淋。

11823 海金沙散

【方源】《保婴撮要》卷十五。

【组成】 海金沙 郁金 滑石 甘草各等分

【用法】 上为末。每服四五分，白汤调下。

【主治】 下焦湿热，不施化而小便不利。

11824 海金沙散

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】 香附米（酒炒） 正川芎（酒炒） 赤茯苓（酒炒）各五钱 海金沙 白滑石（水飞）各一两 陈枳壳（炒） 宣泽泻（焙） 陈石韦（焙） 尖槟榔（炒）各二钱五分

【用法】 上为细末。每服一钱，淡盐汤调下。

【主治】 小儿诸淋属热者。

11825 海桐皮丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】海桐皮（锉）二两 白芥子（研）半两 乳香（研）半两 芸薹子（研） 地龙（炒） 甜瓜子各一两 牡蛎（生）三两 枫香脂（研） 一两 金毛狗脊（去毛）二两 威灵仙（去土）一两半 蔓荆实一两 苍术（炒） 一两半 草乌头（生，去皮尖）一两 木鳖子（去壳）一两半 没药（研）半两 续断一两 自然铜（煅，醋淬七遍） 乌药各二两半

【用法】上药除研外，为末和匀，醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，空心、食前木瓜温酒下。

【主治】摊缓风，手足不随，或时麻木，口眼㖞斜，头昏脑闷。

11826 海桐皮酒

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】海桐皮 五加皮 独活（去芦头） 防风（去叉） 枳壳（去瓤，麸炒） 杜仲（去粗皮，炙）各一两 牛膝（去苗） 薏苡仁各二两 生地黄半斤

【用法】上锉细，绵裹，以无灰酒二升，春、夏浸七日，秋、冬二七日。每日空腹温服一大盏，一日三次，常令酒气不绝。

【主治】风冷流于脚膝，行立不得。

11827 海桐皮散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】海桐皮一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 麻黄二两半（去根节） 天麻二两 牛膝二两（去苗） 桂心一两 防风一两半（去芦头） 当归一两 酸枣仁一两（微炒）

【用法】上为末。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】历节风。身体四肢无力，骨节疼痛。

11828 海桐皮散

【方源】《卫生总微》卷十九。

【异名】海桐散（《医学入门》卷六）。

【组成】海桐皮 当归（去芦，洗净，焙干） 牡丹皮（去心） 熟干地黄 牛膝（去芦酒浸，焙干）各一两 山茱萸 补骨脂各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水八分，加葱白二寸，煎至五分，去滓温服。

【主治】①《卫生总微》：小儿脚挛不能伸举。②《普济方》：小儿禀受肾气不足，血气未荣，脚趾拳缩无力，不能伸展。

11829 海桐皮散

【方源】《直指》卷四。

【组成】独活 萆薢（盐水浸，焙） 川芎 当归各三分 桃仁（去皮，焙） 天麻 辣桂 牛膝 麻黄（去节） 枳壳（制） 海桐皮 白芍药 川乌（炮，去皮脐） 松节 防风 杜仲（姜制） 甘草（炙）各半两 麝香一分 虎胫骨（酒炙黄）一两

【用法】上为粗末。每服二钱，加生姜五片，大枣二枚，水煎，食前服。

【主治】历节走注，骨节疼痛。

11830 海桐皮煎

【方源】《永乐大典》卷一三八八〇引《大方》。

【组成】乌头（生） 海桐皮 牛膝 骨碎补 虎骨（煅） 当归各四两 木鳖子 白胶香（别研） 乳香（别研）各二两 自然铜 没药（别研）各一两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服五七丸至十五丸，茶汤、酒盐汤送下。

【主治】男子风寒湿痹，气血凝滞，筋骨疼痛，手足麻木。

11831 海马保肾丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】海马一对 砂仁二钱 远志肉（炙）二钱 杞子三钱 鹿茸（去毛）三钱 黄耆一两三钱 山药三钱 白术（炒）三钱 肉桂（去粗皮）二钱 锁阳三钱 茯苓六钱 蛤蚧（去头足）一对 苁蓉（炙）一两 人参（去芦）三钱 熟地六钱 杜仲炭三钱 狗脊（去毛）三钱 钟乳石（煅）二钱 阳起石（炙）一钱 巨胜子一钱 黄精（炙）一钱 龟版（炙）一钱 淫羊藿（炙）五分

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸，用牡蛎粉二钱为衣。每服二钱，一日二次，温开水送下。

【功用】滋阴益气，补骨助阳。

【主治】肾气虚寒，精神衰弱，脑亏健忘，四肢无力。

【宜忌】忌色欲及刺激性食物。

11832 海桐皮洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】海桐皮 60 克 透骨草 30 克 乳香 10 克 没药 10 克 当归 15 克 花椒 15 克 红花 15 克 威灵仙 30 克 白芷 15 克 防风 15 克 甘草 15 克

【用法】煎汤熏洗。

【主治】皮肤瘙痒症。

11833 海桐皮浸酒

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】 海桐皮（锉） 五加皮（锉） 独活（去芦头） 防风（去叉） 干蝎（炒） 杜仲（去粗皮，切） 牛膝（去苗，酒浸，切，焙） 薏苡仁（炒）各一两 生干地黄（焙）三两

【用法】 上为粗末，生绢囊贮，以好酒一斗五升，浸于瓷瓶中密封，秋、夏三日，春、冬七日开取，每服三合，加至四五合，食前温酒送下，不拘时候。甚者常令酒气相续。

【主治】 热毒风结成疽，肿痛行履不得。

11834 海藻玉壶汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】 海藻消瘿汤（《嵩崖尊生》卷六）。

【组成】 海藻 贝母 陈皮 昆布 青皮 川芎 当归 半夏 连翘 甘草节 独活各一钱 海带五分

【用法】 上药用水二钟，煎至八分，量病上下食前后服之。

【功用】《方剂学》：化痰软坚，消散瘿瘤。

【主治】 ①《外科正宗》：瘿瘤初起，或肿或硬，或赤不赤，但未破者。②《方剂学》：肝脾不调，气滞痰凝。石瘿，坚硬如石，推之不移，皮色不变。

【宜忌】 凡服此药，先断厚味、大荤，次宜绝欲虚心。

【方论选录】《方剂学》：本病多成于气滞痰凝，由气及血，以致气血结聚而成。故用海藻、昆布、海带化痰软坚，为治瘿瘤主药；青皮、陈皮疏肝理气，当归、川芎、独活活血以通经脉，配合理气药可使气血和调，促进瘿病的消散。象贝、连翘散结消肿，甘草调和诸药，共以收化痰软坚，行气活血之功。

11835 海藻散坚丸

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】 海藻 昆布各二两 小麦四两（醋煮，晒干） 柴胡二两 龙胆草（酒拌，炒焦）二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，临卧白汤送下；浸化咽之，尤好。

【主治】 肝经瘿瘤。

11836 海藻散坚丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 海藻 昆布 龙胆草 蛤粉 通草 贝母 枯矾 真松萝各三钱 麦曲四钱 半夏二钱

【用法】 上为末。酒调服。或蜜丸绿豆大，每次三十丸，临卧葱白煎汤送下，并含化咽之。

【主治】 瘰疬、马刀坚硬，形瘦潮热不食；兼治一切瘿气。

【宜忌】 忌甘草、鱼、鸡、猪肉、五辛、生冷。

11837 海藻溃坚丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】 海藻 海带 昆布各一两 广茂 青盐各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如指尖大。每服一丸，食后噙化。

【主治】 瘿气大盛，久不消散。

11838 海藻溃坚丸

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【异名】 海藻散坚丸（《何氏济生论》卷六）。

【组成】 海藻 昆布 川楝肉 吴茱萸（汤泡）各一两 木香 青皮 小茴 荔枝核（炒） 玄胡索（炒） 肉桂各五钱 海带 橘核（炒） 桃仁（麸炒，去皮尖）各一两 木通七钱

【用法】 酒糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空心盐、酒任下。

【主治】 木肾如斗，结硬如石。

11839 涂舌丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 乌贼骨 蒲黄各等分

【用法】 炒，为细末。涂舌上。

【主治】 舌肿出血如泉者。

11840 涂囟法

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 涂囟麝香散（《御药院方》卷十一）。

【组成】 麝香一字 薄荷叶半字 蝎尾（去毒，为末）半钱 蜈蚣末 牛黄末 青黛末各一字

【用法】 上同研，用熟枣肉剂为膏，新绵上涂匀。贴囟上，四方可出一指许。火上炙手频熨。百日内外小儿可用。

【主治】《御药院方》：小儿百日内发搐。

11841 涂脐膏

【方源】《医方类聚》卷一二八引《济生》。

【组成】 地龙 猪苓（去皮） 针砂各一两

【用法】 上为细末，擂葱涎调成膏。敷脐中，约一寸高阔，绢帛束之，以小便多为效，一日二次。

【主治】 水肿，小便绝少。

11842 浮水膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】 水萍（晒干）五两

【用法】 上为末，以白蜜调和稀稠得所，入瓷盒

中盛，每卧时涂面。

【功用】 令面皎白

【主治】 面皯疱。

11843 浮石丸

【方源】《名家方选》。

【组成】 莪术 三棱 桃仁 大黄 浮石各等分

【用法】 上为末，糊为丸服。

【主治】 经闭，及血块。

11844 浮麦散

【方源】《竹林女科》卷三。

【组成】 人参二钱 当归 熟地黄各一钱五分 麻黄根五分 黄连（酒炒）五分 浮小麦一撮

【用法】 水一钟半，煎七分服。

【主治】 产后阴虚盗汗。

11845 浮萍丸

【方源】《金鉴》卷七十三。

【组成】 紫背浮萍（取大者，洗净，晒干）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，豆淋酒送下。

【主治】 ①《金鉴》：白驳风。②《赵炳南临床经验集》：圆形脱发（油风脱发），皮肤瘙痒病（瘾疹），白癜风，荨麻疹（痦瘤）。

【备考】《赵炳南临床经验集》本方用紫背浮萍一斤，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二至三钱，一日二次。

11846 浮萍酒

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】 浮萍不拘多少

【用法】 捣烂，用好酒一斤或半斤煎滚，冲浮萍内半时许，通口服。随嚼浮萍草敷疗上。

【主治】 红丝疔。

11847 浮萍散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 浮萍一两 荆芥 川芎 甘草 麻黄（去根）各一两 或加当归 芍药

【用法】 上为粗末。每服一两，水二盏，煎至七分，去滓温服。汗出则愈。

【主治】 癞风。

【备考】《明医指掌》本方用法：加入葱白、豆豉，煎服。

11848 浮萍地肤汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 浮萍草9克 净麻黄2克 净蝉蜕2克 地肤子9克 苦参片4克 白僵蚕9克 白蒺藜9克 豨莶草9克 生苡仁12克 粉丹皮4克 白鲜皮9克 生甘草2克

【用法】 水煎，内服。

【主治】 风寒型荨麻疹。疹出色白，碎小微红，冷时发作，遇热则轻，畏风，兼以表症，苔薄白，脉浮紧。

11849 浮萍茯苓丸

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 浮萍一分 茯苓半分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三钱，黄酒送下。

【主治】 紫白癜风。

11850 浮萍葛根汤

【方源】《四圣悬枢》卷二。

【组成】 浮萍三钱 葛根三钱 石膏三钱 玄参三钱 甘草三钱 芍药三钱

【用法】 流水煎大半杯，热服。

【主治】 温疫，阳明经证，目痛鼻干，烦躁不卧者。

11851 涤风散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】 黄连（去须） 蔓荆子各半两 五倍子三钱

【用法】 上为细末。分三次，用新水煎，滤清汁，以手沃洗。

【主治】 风毒攻眼，赤肿痒疼。

11852 涤饮丸

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】 黑丑三两 枳实一两半（炒） 朴消三两 白矾三两 牙皂三两 枳壳一两半（炒）

【用法】 上为末，萝卜汁为丸。每服二三钱，白汤送下。以胀退、大腹和软为度。

【功用】 逐饮涤结。

【主治】 留饮。大腹胀满，便闭，脉沉紧数者。

【方论选录】 饮留于中，气结不化，故大腹胀满，大便不通焉。黑丑逐饮，枳实破结，朴消荡热逐留饮，枳壳泻滞通便闭，白矾、牙皂消溶水湿以通窍也。萝卜汁为丸，白汤下，使饮化气行，则肠胃肃清，而大便无不通，胀满无不退矣。此逐饮涤结之剂，为留饮气结胀闭之专方。

11853 涤肠汤

【方源】《医统》卷三十六引《发明》。

【组成】 生枳壳 生大黄各三两 尖槟榔 黑牵牛（为末）各半两 白朴消二两 生枳实一两

【用法】 上为粗末。每服一两，水一盏半，煎八分，空心食前服。

【主治】 积滞下痢，里急后重，日夜无度。

11854 涤肠汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】 大黄六钱（锦纹佳） 山尾三钱 赤芍三钱 桃仁二十粒（去皮尖） 延胡索二钱 红花一钱 木香八分 冬瓜子三钱（或肥皂核仁亦可）

【用法】 水煎服。

【主治】 大肠生痈。

11855 涤瘀汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】 山楂 苏木 桃仁 陈皮各一钱半 归尾 红花各一钱 泽兰四钱 甜酒

【主治】 腹痛，痛不移处，为死血。

【备考】 方中甜酒用量原缺。

11856 涤痰丸

【方源】《金鉴》卷四十五。

【组成】 白术（土炒）二两 半夏曲 川芎 香附米各一两 神曲（炒） 茯苓各五钱 橘红四钱 甘草二钱

【用法】 上为末，粥为丸。每服八十丸，以涤痰汤送下。

【主治】 妇人形肥盛，不孕，以身中有脂膜闭塞子宫。

【加减】 如热者，加黄连、枳实各一两。

11857 涤痰汤

【方源】《奇效良方》卷一。

【异名】 涤痰散(《兰台轨范》卷二)。

【组成】 南星（姜制） 半夏（汤洗七次）各二钱半 枳实（麸炒）二钱 茯苓（去皮）二钱 橘红一钱半 石菖蒲 人参各一钱 竹茹七分 甘草半钱

【用法】 上作一服。水二钟，加生姜五片，煎至一钟，食后服。

【功用】《丸散膏丹集成》：豁痰清热，利气补虚。

【主治】 中风，痰迷心窍，舌强不能言。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴、足太阴药也。心脾不足，风邪乘之，而痰与火塞其经络，故舌本强而难语也。人参、茯苓、甘草补心益脾而泻火；陈皮、南星、半夏利气燥湿而祛痰；菖蒲开窍通心，枳实破痰利膈，竹茹清燥开郁，使痰消火降，则经通而舌柔矣。

【备考】 本方制成丸剂，名“涤痰丸”（见《丸散膏丹集成》）；其用量、用法为：为细末，用胆星烊化泛丸，如梧桐子大。每服二三钱，熟汤送下。

11858 涤痰汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 陈皮 半夏 茯苓 甘草 麦门冬 胆南星 枳实 黄连 人参 桔梗各五分 竹茹一钱

【用法】 水二钟，煎八分，食后服。

【主治】 心火克肺金，久而不愈，传为肺痿，咽嗌雌哑，胸膈痞闷，呕吐痰涎，喘急难卧者。

11859 流气饮

【方源】《局方》卷七（吴直阁增诸家名方）。

【异名】 明目流气饮(《袖珍》卷三)。

【组成】 大黄（炮） 川芎 菊花（去枝） 牛蒡子（炒） 细辛（去苗） 防风（去苗） 山栀（去皮） 白蒺藜（炒，去刺） 黄芩（去芦） 甘草（炙） 玄参（去芦） 蔓荆子（去白皮） 荆芥（去梗） 木贼（去根节）各一两 苍术（米泔浸一宿，炒控）二两 草决明一两半

【用法】 上为末。每服二钱半，临卧用冷酒调下。如婴儿有患，只令乳母服之。

【主治】 肝经不足，内受风热，上攻眼目，昏暗，视物不明，常见黑花，当风多泪，怕日羞明，堆眵赤肿，隐涩难开，或生障翳，倒睫拳毛，眼弦赤烂；及妇人血风眼，及时行暴赤肿眼，眼胞紫黑。应有眼病，并宜服之。

11860 润下丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】 加味润下丸(《摄生众妙方》卷六)。

【组成】 南星一两 半夏二两（各依橘红制） 黄芩 黄连各一两 橘红半斤（以水化盐五钱，拌令得所，煮干，焙燥） 甘草（炙）一两

【用法】 上为末，蒸饼为丸，如绿豆大。每服五七十丸，白汤送下。

【功用】 降痰。

【主治】 胸膈有痰，兼嗽。

【加减】 上热，加青黛；有湿，加苍术；或加参、芪，看虚实作汤使。

11861 润气煎

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 紫菀（去土） 人参 紫苏叶 甘草（炙，锉） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 五味子（去梗）各一两

【用法】 上为细末。蜜半盏，生姜自然汁三分同药和匀，置瓷器中，甑上炊熟。每服半匙许，热汤化下，不拘时候。

【主治】 产后上气喘急，咽嗌不利。

11862 润血汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】当归须一钱二分　川芎一钱　麻仁一钱　桃仁（去皮尖）一钱　红花（酒洗）三分　甘草（生）四分　赤芍药　黄芩　生地黄七分　橘皮（去皮）七分

【用法】上㕮咀。水煎熟，食前服。

【主治】噎，食物必屈曲，水饮难下者。

【加减】如大便结闭，加酒炒大黄少许。

11863　润肌膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】麻油四两　当归五钱　紫草一钱

【用法】上同熬，药枯滤清，将油再熬，加黄蜡五钱，化尽，倾入碗内，顿冷。搽擦患处。

【主治】秃疮干枯，白斑作痒，发脱。

11864　润肌膏

【方源】《金鉴》卷六十三。

【组成】香油四两　奶酥油二两　当归五钱　紫草一钱

【用法】将当归、紫草入二油内，浸二日，文火煿焦去滓，加黄蜡五钱，溶化尽，用布滤，倾碗内，不时用柳枝搅冷成膏。每用少许，日擦二次。

【主治】白屑风。因肌热当风，风邪侵入毛孔，郁久血燥，肌肤失养，头面作痒，抓起白屑皮脱去又起，其燥痒倍增，肌肤燥裂者。

11865　润肌膏

【方源】《疡医大全》卷十九。

【组成】当归身一两五钱　粉甘草一两　白芷八钱　血竭六钱　紫草茸五钱　白蜡（切片）二两

【用法】用真麻油八两，先将当归身、白芷、甘草熬深黄色，滤去滓，再入血竭熬化，又滤净，再入紫草、白蜡片略沸十数滚，即起火，滤去紫草滓，其色即鲜明可爱则膏成。先将葱汤浸洗良久，随以本膏擦之。

【主治】腋痛。风寒气郁于皮毛，致血不荣于肌表，皮稿则多痛，手足似无皮之状。

【宜忌】就暖勿见风冷。

11866　润字丸

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】大黄三两　前胡一两半　枳实一两半（炒）　杏仁二两　牙皂一两半　花粉三两　槟榔一两　楂肉三两（炒）　橘红一两半　半夏一两半（制）

【用法】上为末，水泛为丸。每服二三钱，空心白滚汤化下。

【功用】疏痰通闭。

【主治】实痰喘嗽，大便闭结，脉沉者。

【方论选录】痰实内壅，不得施化，而大便闭结，遏热刑金，故喘嗽不止焉。杏仁疏痰降气，牙皂搜风涤痰，橘红利气化痰，半夏燥湿化痰，楂肉消滞化积，前胡降气疏痰，槟榔破滞气以消积，枳实攻坚积以推陈，花粉清热邪壅结，大黄荡地道不通。泛丸汤下，俾痰消热降，则胸宇廓然，而肺金清肃，喘嗽自宁；津液施化，大便无闭结之患矣。此疏痰疾通闭之剂，为痰实喘嗽秘结之专方。

11867　润体丸

【方源】《局方》卷一。

【组成】防风（去芦叉）一两半　白龙脑（别研）　乳香（别研）　羚羊角末（别研如粉）　附子（炮，去皮脐）　白僵蚕（微炒）　槟榔　肉豆蔻仁　沉香　蒺藜子（微炒）　丁香　蔓荆子（去白皮）　牛黄（别研如粉）　藿香叶　麻黄（去根节）　生犀角末（别研）　雄黄（研飞）　麝香（研如粉）　木香　辰砂（研飞）　茯苓（去皮）　白附子（炮）　羌活（去芦）　原蚕蛾（微炒）　人参（去芦）　肉桂（去粗皮）　芎藭各一两半　真珠末（别研如粉）　独活（去芦）各三分　干蝎（微炒）　半夏（水煮三十沸，薄切，焙干，入生姜汁炒）　川乌头（炮裂，去皮脐，捣碎炒黄）各二两　白花蛇（酒浸，炙，去皮骨，取肉）　天麻（去苗）各三两　琥珀（别研如粉）　腻粉（研）　白豆蔻仁各半两　金箔六十片（为衣）

【用法】上为细末，入研药令匀，炼蜜为丸，如鸡头大。每服一丸，加至二丸，细嚼，温酒送下，荆芥茶下亦得。如破伤中风，脊强手搐，口噤发痫，即以热豆淋酒化破三丸，斡口开灌下，少时再服，汗出乃愈；若小儿惊风诸痫，每服半丸，薄荷汤化下，不拘时候。

【主治】诸风手足不遂，神志昏愦，语言謇涩，口眼㖞僻，筋脉挛急，骨节烦疼，头目眩晕，恍惚不宁，健忘怔忪，痰涎壅滞；及皮肤顽厚，麻痹不仁。

11868　润肠丸

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】大黄（去皮）　当归梢　羌活各五钱　桃仁（汤浸，去皮尖）一两　麻子仁（去皮，取仁）一两二钱五分

【用法】上除麻仁另研如泥外，余为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心用白汤送下。

【功用】润燥，和血，疏风。

【主治】 饮食劳倦，风结血结，大便秘涩，或干燥闭塞不通，全不思食。

【方论选录】《医方集解》：此手足阳明药也。归尾、桃仁润燥活血，羌活搜风散邪，大黄破结通函，麻仁滑肠利窍，血和风疏，肠胃得润，则自然通利矣。

11869 润肠丸

【方源】《济生》卷四。

【异名】 苁蓉润肠丸(《医学纲目》卷二十三)、苁沉丸(《医学入门》卷七)、肉苁蓉丸(《不知医必要》卷三)。

【组成】 肉苁蓉（酒浸，焙）二两 沉香（别研） 一两

【用法】 上为细末，用麻子仁汁打糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心米饮送下。

【主治】 发汗利小便亡津液，大腑秘结。

【宜忌】 老人虚人皆可服。

11870 润肠丸

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】 麻子仁（另研） 大黄（酒煨）各一两半 桃仁泥子 当归尾 枳实（麸炒） 白芍药 升麻各半两 人参 生甘草 陈皮各三钱 木香 槟榔各二钱

【用法】 上除麻仁、桃仁外，为末，却入二仁泥子，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，食前温水送下。

【主治】 风中脏腑，胸膈痞闷，大便涩滞。

11871 润肠丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【异名】 润麻丸(《衡要》卷六)。

【组成】 麻子仁 当归 桃仁 生地黄 枳壳各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸服。

【功用】 润血燥。

【主治】 大便不通。

【备考】《衡要》本方用法：上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心白汤送下。

11872 润肠丸

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】 桃仁 麻仁 当归尾 大黄 羌活各五钱 升麻 红花 郁李仁

【用法】 上除桃仁、麻仁另研为泥外，余为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心白汤送下。

【主治】 脾胃中伏火秘结，及风结血结。

【备考】 方中升麻、红花、郁李仁用量原缺。

11873 润肠汤

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【异名】 润燥汤(《摄生众妙方》卷七)。

【组成】 麻子仁一钱半（细研，用水浸，滤去皮，取浓汁） 脂麻半盏（微炒，研，用水浸，取浓汁） 桃仁（汤浸，去皮尖，麸炒黄熟，研如泥） 一两 荆芥穗（捣末） 一两

【用法】 上煎数沸，入盐少许，如煎茶，不得煎过。食前恣意饮之。以利为度。

【主治】 大便秘涩，连日不通。

11874 润肠汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 生地黄 生甘草各一钱 大黄（煨） 熟地黄 当归梢 升麻 桃仁 麻仁各一钱 红花三分

【用法】 上㕮咀。水二盏，煎至一盏，去滓。食远温服。

【主治】 大肠结燥不通。

【备考】 本方方名，《东医宝鉴·内景篇》引作"和血润肠汤"；《医方集解》引作"当归润肠汤"。

11875 润肠汤

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】 蜂蜜一两 香油五钱 朴消一撮

【用法】 上合一处，水一钟，煎数沸，温服。

【主治】 虚人、老人大便秘结。

11876 润肠汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 当归 熟地 生地 麻仁（去壳） 桃仁（去皮） 杏仁（去皮） 枳壳 厚朴（去粗皮） 黄芩 大黄各等分 甘草减半

【用法】 上锉一剂。水煎，空心热服。大便通即止药，不能多服，如修合润肠丸，将药加减各为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心白汤吞下。

【主治】 大便闭结不通，为实热燥闭者。

【宜忌】 切忌辛热之药。

【加减】 发热，加柴胡；腹痛，加木香；血虚枯燥，加当归、熟地、桃仁、红花；风燥闭，加郁李仁、皂角、羌活；气虚而闭，加人参、郁李仁；气实而闭，加槟榔、木香；痰火而闭，加瓜蒌、竹沥；因汗多，或小便去多，津液枯竭而闭，加人参、麦门冬；老人气血枯燥而闭，加人参、锁阳、麦门冬、郁李仁，倍加当归、熟地、生地，少用桃仁；产妇去血多，枯燥而闭，加人参、红花，倍加

当归、熟地，去黄芩、桃仁。

11877 润肠散

【方源】《医学纲目》卷二十三引朱丹溪方。

【组成】人参 黄耆各一钱 厚朴八分（炒） 地黄七分 桃仁 枳壳（炒）各一钱 甘草少许（炙） 锁阳 苁蓉各二钱 桃仁一钱

【用法】煮粥，入竹沥服之。

【主治】脾约。血虚肠燥，大便秘涩，小便如常，咽塞不通，食下便有痰出，脉涩。

11878 润肠散

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】鳖头灰 五倍末 伏龙肝 生矾末 赤石脂 诃子肉各五钱（俱晒干）

【用法】上为极细末。葱汤洗净，掺于肠头上，频频换之。以愈为度。

【主治】痢后脱肛。

11879 润肤丸

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】桃仁一两 红花一两 熟地一两 独活一两 防风一两 防已一两 粉丹皮一两五钱 川芎一两五钱 全归一两五钱 羌活二两 生地二两 白鲜皮二两

【用法】共为细末，水泛为丸，如绿豆大。每服一至二钱，温开水送下，一日二次。

【功用】活血润肤，散风止痒。

【主治】牛皮癣（白疕风），鱼鳞癣（蛇皮癣），皮肤淀粉样变（松皮癣），毛发红糠疹，脂溢性湿疹，皲裂性湿疹（鹅掌风）。

11880 润肺丸

【方源】《医略六书》卷二十二。

【组成】百部二两 黄连一两 明矾一两 桑皮一两 使君子三两 鹤虱二两 楝根二两 甘草五钱

【用法】上为末，白及膏糊丸。每服三钱，滚水送下。

【功用】杀虫，化湿热。

【主治】湿热生虫蚀肺，咳嗽不止，烦心恶热，脉数者。

【方论选录】湿热不消，变化生虫而侵蚀肺叶，故咳嗽不止，烦心恶热焉。黄连清热燥湿，百部温肺杀虫，明矾却湿以杜生虫之本，鹤虱杀虫以绝化虫之源，桑皮清肺气以肃金，甘草缓中州以和胃，使君子健脾气化积，楝根皮泻湿热杀虫，白及膏润补肺之残缺也。糊丸，滚汤下使湿热顿消则虫积自化，而肺损复完，安有咳嗽成劳之患乎，此杀虫化湿热之剂，为虫蚀肺叶咳嗽之专方。

11881 润肺汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 一两 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙干）二两 甘草（炙）一两 紫苏子（炒）一分 贝母（炒，去心）一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，入干柿一枚（切），煎至六分，去滓温服，空心、日午、临卧各一次。

【主治】肺气喘急，四肢乏力，饮食无味。

11882 润肺汤

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】知母二钱 紫菀五钱半（洗净） 山栀仁五分 甘草一钱半（炒） 麻黄五分（滚汤泡，去白沫，晒干） 荆芥五分（去梗） 马兜铃五分（去筋膜） 前胡二钱（去芦） 赤芍一钱 桑白皮二钱半（去红皮，用蜜炒） 半夏三钱（汤泡七次，晒） 赤茯苓二钱（去皮） 杏仁五钱半（去皮尖，研成泥用） 黄芩二钱半（去腐土）

【用法】每服一两四钱半，用水二大钟，加生姜五片，初感风寒，加葱白三根；久患咳嗽，加枣二枚，不用葱白，煎至一钟半，去滓，临睡时，将身右卧，用绢帛顶住右软肚，次用竹筒缓缓吸药，热服不言语呼唤。

【主治】上盛下虚，脾肺湿热，气喘，咳嗽痰盛，心胸气闷，不思饮食，或寒热往来，或感冒风寒，喘嗽气急，五劳七伤，吐血。

【宜忌】切忌房劳。

11883 润肺饮

【方源】《医宗必读》卷九。

【组成】贝母（糯米拌炒） 天花粉各三钱 桔梗一钱 甘草五分 麦门冬（去心） 橘红（去白） 茯苓（去皮）各一钱半 知母（酒炒）七分 生地黄二钱半

【用法】用水二钟，加生姜三片，煎至七分，食后服。

【主治】肺经燥痰，脉涩面白，气上喘促，洒淅寒热，悲愁不乐，其痰涩面难出者。

11884 润肺饮

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】沙参 麦门冬 地骨皮 生地各9克 当归尾6克

【功用】养阴润肺，以降虚火。

【主治】赤丝虬脉。肺阴不足，目干涩而痒、经

脉细而色淡者。

【方论选录】 方中沙参、麦冬养阴滋肺，地骨清肺中虚热，生地凉血育阴，归尾活血通络，引血下行。

【加减】 目中痒甚，加荆芥穗1.5克，以祛风止痒。

11885 润肺散

【方源】《局方》卷十。

【异名】 润肺汤(《圣济总录》卷一七五)、人参润肺散(《直指》卷八)。

【组成】 贝母（去心，麸炒黄） 杏仁（汤浸，去皮尖及双仁者，焙干，麸炒）各二两半 麻黄（去根节） 人参各二两 阿胶（炒令黄燥） 桔梗各半两 陈皮（去白）一分 甘草（炙）一两

【用法】 上为粗末。每服一钱，水八分，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 小儿肺气不利，咳嗽喘急，语声不出，痰涎壅塞，胸膈烦满，鼻塞清涕，咽喉干痛。

11886 润肺散

【方源】《医学纲目》卷二十六引朱丹溪方。

【组成】 贝母一两 瓜蒌仁半两 青黛五钱

【用法】 上为末，姜蜜调成膏。噙化。

【主治】 ①《医学纲目》引朱丹溪：咳嗽。②《东医宝鉴·杂病篇》：燥痰干嗽，劳嗽。

11887 润肺膏

【方源】《修月鲁般经后录》引《十药神书》(见《医方类聚》卷一五〇)。

【组成】 羊肺一具 干柿 真酥 绿豆粉 杏仁（研碎）各一两 白蜜二两

【用法】 上将羊肺洗净，次将五味药用水解薄打搅，令稠粘得所，灌入肺中，白水煮熟，如常服食。

【主治】 劳久嗽，肺燥肺痿。

【备考】 本方方名，《本草纲目》引作“羊肺汤”。

11888 润胃丹

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 石膏五钱 知母一钱 玄参一两 生地五钱 牛膝三钱 甘草五分

【用法】 水煎服。

【主治】 胃火沸腾，大便闭结，烦躁不宁，口渴舌裂，两目赤突，汗出不止。

11889 润胆汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 白芍一两 当归一两 柴胡一钱 炒栀子二钱 玄参一两 天花粉三钱 菖蒲八分

【用法】 水煎服。

【主治】 少阳胆气不舒，风邪乘之，火不得散，双耳忽然肿痛，内流清水，久创变为脓血，身发寒热，耳内如沸汤之响，或如蝉鸣。

11890 润涸汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】 熟地二两 白术一两 巴戟天一两

【用法】 水煎服。

【功用】 大补肾水，兼补肾火。

【主治】 阴已痿弱，肾水燥，见色不举，若勉强入房，耗竭其精，则大小便牵痛，数至圊而不得便，愈便则愈痛，愈痛则愈便。

【方论选录】 此方用熟地以滋肾中之真阴，巴戟天以补肾中之真阳，虽补阳而仍是补阴之剂，则阳生而阴长，不至有强阳之害，二者补肾内之水火，而不为之通达于其间，则肾气未必遽入于大小之肠也。加入白术以利其腰脐之气，则前后二阴，无不通达，何至有干燥之苦，数圊而不得便哉。

11891 润喉丸

【方源】《中医耳鼻喉科学》。

【组成】 甘草粉300克 硼砂15克 食盐15克 玄明粉30克 酸梅750克（去核）

【用法】 共研为细末，以荸荠粉250克为糊制丸，每丸重3克。含服。

【主治】 慢喉喑。语调嘶哑，日久不愈，喉部微痛不适，干燥，喉痒，干咳痰少。

11892 润喉汤

【方源】《洞天奥旨》卷十六。

【组成】 熟地一两 山萸四钱 麦冬一两 生地三钱 桑白皮三钱 甘草一钱 贝母一钱 薏仁五钱

【用法】 水煎服。先服化癣神丹六剂后，续服本方。

【主治】 喉生癣疱，先痒后痛。

【加减】 久则加肉桂一钱。

11893 润脾膏

【方源】《千金》卷六。

【组成】 生地黄汁一升 生麦门冬四两 生天门冬（切）一升 藏蕤四两 细辛 甘草 芎藭 白术各二两 黄耆 升麻各三两 猪膏三升

【用法】 上㕮咀，诸药苦酒淹一宿，绵裹药，临煎下生地黄汁，与猪膏共煎取膏鸣水气尽，去滓。取细细含之。

【主治】 脾热，唇焦枯无润。

11894 润输汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】黄耆五钱 当归一两 川芎五钱 升麻五分 红花五分 麦冬 肉苁蓉各五钱

【用法】水煎服。

【主治】气虚不能推送，大肠闭结不通，饮食无碍，并无火症之见，亦无后重之机，有至一月不便者。

11895 润燥丸

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】生地 熟地 当归 阿胶各一两 麻仁 杏仁各五钱 枳壳三钱

【用法】蜜丸服。

【主治】老人便结。

11896 润燥汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】当归润燥汤(《东垣试效方》卷七)。

【组成】升麻 生地黄各二钱 熟地黄 当归梢 生甘草 大黄（煨） 桃仁泥 麻仁各一钱 红花五分

【用法】上除桃仁、麻仁另研如泥外，锉如麻豆大，都作一服。水二盏，入桃仁、麻仁泥，煎至一盏，去滓，空心稍热服。

【主治】大便燥结。

11897 润燥汤

【方源】《点点经》卷一。

【异名】桃杏散、开滞散。

【组成】桃仁 杏仁 大黄各二钱

【用法】共研末。煎一碗，蜜兑服。

【主治】大便不通，小便自利；及酒疾湿毒成淋，气凝血枯，小便不通，小腹作痛，肿结肾囊。

11898 润燥汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】当归二三钱 熟地三五钱 生地二钱 威参八钱 肉苁蓉三钱 枸杞一钱半 牛膝一钱半 小茴（盐炒）三分 麦冬一钱

【用法】水煎，空心服。

【主治】伤寒血虚而燥，二便艰涩。

11899 润燥汤

【方源】《会约》卷八。

【组成】当归二钱 熟地（再用姜汁入瓷器内炒干）二钱 麦冬（去心，炒）一钱 陈皮（去白）八分 白豆蔻（去壳，炒，研）八分 肉苁蓉一钱半 威参四钱

【用法】水煎，加牛乳、白蜜、竹沥、姜汁各四五匙调合，每用半杯，频频服之，不得间断。或食稀粥或猪肉汤、羊肉汤。

【功用】养血润燥。

【主治】噎塞而食不下，火燥而津液枯者。

【宜忌】忌食鸡鸭、炙煿之类。

【加减】服药而有气不足者，加人参，或加沙参、黄耆之类，但由轻而重，不得顿加。

11900 润燥饮

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】麦冬一两 熟地一两 苏子一钱 白芥子二钱 甘草一钱 桔梗三钱 天门冬三钱 山茱萸五钱 北五味五分 人参一钱

【用法】水煎服。

【主治】阴虚枯槁，肺气困乏，嗌塞喉干，咯痰动嗽。

【方论选录】此方用二冬以润肺，用熟地、茱萸以补肾，肺肾相通；加人参、五味以益气，气旺而津液尤易生也；又恐过于补肾，而不上走益肺，故加桔梗升提之味，使益肺多于益肾；尚虑用参以助燥，更入苏子、甘草调和于上焦之间，同白芥子以消膈膜之痰，又不动火以增燥，亦何致有痰嗽之患哉。

11901 润阴坚骨汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】元参一两 熟地二两 麦冬一两 牛膝二钱

【用法】水煎服。

【主治】痿病。阳明胃火，铄尽肾水，骨中空虚，久卧床席，不能撤起。

【方论选录】此方之妙，全不在治阳明，而直治肾经以补其匮乏。肾水一生，则胃火自然息焰，况又有麦冬以清肺气，牛膝以坚膝胫。故以此方长治之，则痿废之状可免。

11902 润肠五仁丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】桃仁三两 杏仁二两（去皮） 松子仁三两 郁李仁三两 柏子仁三两

【用法】上为末，蜜为丸。每服三钱，米饮送下。

【主治】产后血瘀便秘，脉沉涩滞者。

【方论选录】产后血瘀，气逆不能施化津液而肠胃枯涩，大便燥结不通。桃仁破瘀血以润燥，杏仁降逆气以润肠，松子仁润胃燥以解郁，柏子仁养心神以泽枯，郁李仁润肠散结以宣通也。蜜丸以润之，饮下以和之，使瘀化气平，则津液施化而胃肠

无枯涩之虞，何秘结之足患乎？

11903 润燥泻肺汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 玉竹四钱 萎皮三钱 桑皮三钱 沙参四钱 麦冬二钱 黄芩一钱 贝母二钱 杏仁三钱 莲仁四钱

【用法】 梨汁半杯冲服。

【主治】 肺火自本经而发者，缘燥气相逼，清肃之令不能下行，故肺气焦满，微喘而咳，烦渴欲饮，鼻端微红，肌肤作痒。

11904 涩翳七宝丸

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 珍珠五钱 琥珀二两 石决明二两 龙脑一分 茺蔚子一两 人参一两 熊胆一两

【用法】 为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一钱，食前茶清送下。先用涩翳还睛散，后用此方。

【功用】 消翳。

【主治】 涩翳证。瞳神内微赤如凝脂之色，瞳神端正，渐渐昏蒙，时复涩痛而无泪出，其翳无定，或聚或开。

11905 涩翳还睛散

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 车前子一钱半 防风一钱 桔梗一钱 元参一钱 五味子五分 知母二钱 黄芩一钱 细茶二钱半 茺蔚子一钱

【用法】 上为粗末。以水二盏，煎至一盏，食前去滓温服。后用七宝丸。

【主治】 涩翳证。瞳神内微赤如凝脂之色，瞳神端正，渐渐昏蒙，时复涩痛而无泪出，其翳无定，或聚或开。

11906 涌泉汤

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】 王不留行（炒）三钱 川山甲（炒）三钱 天花粉 归身各一钱五分 木通 甘草各一钱

【用法】 用健猪前蹄有七孔者一只，煮烂取汁三碗，煎药至半碗，二次顿热，食远服之。外用旧木梳，火烤热，梳乳上七房，次第梳之。其乳若涌泉。

【主治】 乳汁不下。

11907 涌泉散

【方源】《寿世保元》卷七。

【异名】 秘传涌泉散（《济阴纲目》卷十四）。

【组成】 王不留行（酒浸） 白丁香 漏芦 天花粉 白僵蚕（炒） 穿山甲（炒黄色）各五钱

【用法】 上为细末。每服三钱，食后以猪蹄汤调下。

【主治】 乳妇思虑滞结，乳汁不行。

11908 浚川丸

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】 十水丸（《医学入门》卷七）。

【组成】 桑白皮 大戟 雄黄 茯苓 芫花 甘遂 商陆 泽泻 巴戟 葶苈各五钱

【用法】 上为末，醋糊为丸。每服三十丸，姜汤或木香汤送下。

【主治】 十种水气初起。

【宜忌】 忌鱼、面、盐百日。

【加减】 从面肿起，根在肺，桑白皮加至一两；从四肢肿起，根在脾，大戟加至一两；从背肿起，根在胆，雄黄加至一两；从胸肿起，根在皮肤，茯苓加至一两；从胁肿起，根在肝，芫花加至一两；从腰肿起，根在胃，甘遂加至一两；从腹肿起，根在肺，商陆加至一两；从阴肿起，根在肾，泽泻加至一两；从手肿起，根在腹，巴戟加至一两；从脚肿起，根在心，葶苈加至一两。

11909 浚血丸

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 人参 白术（生） 赤茯苓各一两 甘草（炙）四钱 半夏曲七钱（炒） 浮石五钱（煅） 牡丹皮五钱 当归身四钱 桃仁三钱（干漆拌，炒，去漆） 穿山甲三钱 桂三钱（病在胁下，用官桂，在少腹，用肉桂）

【用法】 上为末，红曲为丸。每服三钱，温酒送下。瘦人去半夏、浮石，加生地黄，蓬术，蜜丸服之。

【主治】 肥人多年内伤，血蓄于胃，杂于痰涎，诸药不效者。

11910 羖羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】 羊角（镑） 蓼蕊 木通（锉）各一两半 甘菊花 泽泻 大黄（锉，炒）各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，下芒消一钱匕，空心、临卧温服。

【主治】 肝肺实热，目生白翳。

11911 粉汗散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】 麻黄根一两 牡蛎一两（烧赤） 龙骨半两 赤石脂半两

【用法】 上为细末，盛以绢袋，如扑粉扑之。

【主治】 汗出过多。

11912 粉黛散

【方源】 方出《医说》卷四引《类编》，名见《医略六书》卷二十二。

【异名】 黛蛤散(《中药成方配本》)。

【组成】 青黛 蚌粉

【用法】 用新瓦将蚌粉炒令通红，拌青黛少许。每服三钱，米饮下。

【主治】 痰嗽。

11913 粉矾平胃丸

【方源】 《医统》卷十八。

【组成】 苍术（米泔浸） 白术各二两 厚朴（姜汁炒）半两 陈皮一两 甘草 砂仁各五钱 皂矾二两（用粉制）

【用法】 上药除皂矾为细末。皂矾另制，红秫米粉一升，先将皂矾砂锅内炒去烟尽，再下粉炒香熟为度，取起，和前平胃末一处醋煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，姜汤送下，一日二次。

【主治】 脾胃积滞，湿郁黄胖而似浮肿。

【宜忌】 忌面食生冷。

11914 益儿丸

【方源】 《卫生总微》卷十三。

【组成】 神曲（炒黄） 白芜荑（去扇，炒）各一两 宣连（去须）二两 陈皮 木香各半两（一方有没石子、芦荟各一两）

【用法】 上为细末，猪胆汁和药末成剂，再入胆内，系口定，以浆水煮数沸，取汁为丸，如绿豆大。每服一二十丸，米饮送下；腹胀，木瓜汤送下，不拘时候。

【主治】 胃冷，气不和，食不消化，疳气。

11915 益儿饼

【方源】 《回春》卷七。

【组成】 白术（去芦）四钱 槟榔一钱半 木香一钱 神曲（炒）二钱半 山楂肉 使君子（去壳） 水红花子各五钱

【用法】 上为末，入黄蜡、面、水和作煎饼吃。

【主治】 小儿癖疾。

11916 益元汤

【方源】 《伤寒六书》卷三。

【组成】 熟附子 干姜 黄连 人参各五分 五味子九粒 麦冬 知母各一钱 葱 甘草 艾各三分

【用法】 水二钟，加生姜一片，大枣二个，煎之，临服入童便三匙，顿冷服。

【主治】 伤寒身热，头疼全无，便作躁闷，面赤，饮水不得入口。

11917 益元散

【方源】 《宣明论》卷十。

【异名】 太白散(《伤寒直格》卷下)、天水散(《伤寒标本》卷下)、六一散(《伤寒标本》卷下)、神白散(《儒门事亲》卷十三)、双解散(《摄生众妙方》卷四)。

【组成】 桂府腻白滑石六两 甘草一两（炙）

【用法】 上为细末。每服三钱，加蜜少许，温水调下，不用蜜亦得，一日三次；欲饮冷者，新汲水调下；解利伤寒，发汗，煎葱白、豆豉汤调下；难产，紫苏汤调下。

【功用】 利小便，宣积气，通九窍六腑，生津液，去留结，消蓄水，止渴宽中，补益五脏，大养脾肾之气，安魂定魄，明耳目，壮筋骨，通经脉，和血气，消水谷，保元，下乳催生；久服强志轻身，驻颜延寿。

【主治】 身热，吐利泄泻，肠澼，下痢赤白，癃闭淋痛，石淋，肠胃中积聚寒热，心躁，腹胀痛闷；内伤阴痿，五劳七伤，一切虚损，痫痉，惊悸，健忘，烦满短气，脏伤咳嗽，饮食不下，肌肉疼痛；并口疮牙齿疳蚀，百药酒食邪毒，中外诸邪所伤，中暑、伤寒、疫疠，饥饱劳损，忧愁思虑，恚怒惊恐传染，并汗后遗热劳复诸疾；产后血衰，阴虚热甚，一切热证，兼吹奶乳痈。

【宜忌】 孕妇不宜服。

【加减】 加黄丹，名红玉散；加青黛，名碧玉散；加薄荷叶（末）一分，名鸡苏散。

【方论选录】 ①《医方考》：滑石性寒，故能清六腑之热，甘草性平，故能缓诸火之势。②《成方切用》：滑石重能清降，寒能泄热，滑能通窍，淡能行水，使肺气降而下通膀胱，故能祛暑住泻，止烦渴而利小便也。加甘草者，和其中气，又以缓滑石之滑降也，其数六一者，取天一生水，地六成之之义也。

【临证举例】 ①膀胱炎 《福建中医药》(1965；6:20)：林某某，男，69岁。突感尿意急迫，排尿频繁，量少，滴沥难下，小腹部灼痛，诊断为急性膀胱炎。唇口红甚，舌苔黄浊，脉数有力，给六一散二两，冲开水600毫升，澄清，分三次服，每日一剂，连服四天痊愈。②晕厥 《山西中医》(1987；2:29)：张某某，男，48岁，厨师。1977年5月14日初诊。患者一年前用鳍刺刺伤右手食指，翌日全身不适，低热，右肢剧痛，纳呆、恶心、晕厥，经强心输液复苏。此后常无规律晕厥。患者面容憔悴，神情恐慌，右背及右腿外侧均见大

小不等之紫斑十余块，大者如掌，小者似卵，质硬压痛，舌红有瘀点，诊为破伤中毒，毒瘀血分。遂予六一散 200 克，每次用绿豆水冲服 10 克，一日二次，十日后诸症缓解，又十日诸证痊愈。③泡疹《山西中医》(1987;2:30)：雷姓女婴，8 个月，因腹泄服西药后全身泛发泡疹，小豆样，疹周红润，伴咳嗽，低烧，舌红，指纹淡红浮现，小便淋沥不畅。遂予六一散 30 克，冲调徐徐凉饮，晚 7 时许服药，夜畅尿数次，翌晨泡疹全消，一切恢复正常。

【备考】 本方加青黛，又名“若玉散”（见《准绳·类方》）。

11918 益中丹

【方源】《普济方》卷一三九。

【组成】 高良姜 干姜各二两 半夏 橘皮各四两

【用法】 上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白饮送下。

【主治】 太阴病，食则吐，胃中痛，腹胀时嗳者。

11919 益中汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】 人参 白术 黄连 黄芩 枳壳 干姜 甘草

【主治】 肠鸣下气，暂止复响。

11920 益气丸

【方源】《洁古家珍》。

【组成】 麦门冬（去心） 人参各二钱 橘皮（去白） 桔梗 炙甘草各五分 五味子一钱（去子）

【用法】 上为极细末，水浸油饼为丸，如鸡头子大。每服一丸，细嚼，唾津咽下。

【功用】 补上益气。

【主治】 语言多，损气懒语。

11921 益气汤

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】 茴香 木香 全蝎 玄胡 陈皮 石菖蒲各一钱 羌活 僵蚕 川芎 蝉蜕各五分 穿山甲一钱 甘草一钱五分

【用法】 酒煎服。

【主治】 因大气得之，气闭耳聋者。

11922 益气汤

【方源】《傅青主男女科·男科》。

【组成】 人参 甘草各一钱 黄耆二钱 五味子三十粒 柴胡 白芍各七分 姜三片 枣二枚

【用法】 水煎，热服。

【主治】 两手发麻，困倦嗜卧。

11923 益火丹

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】 人参 焦术 熟地 当归 炮姜 附子 泽泻 牛膝 炙草

【主治】 鼻衄。属虚火，饮热恶冷者。

11924 益心丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】 人参 当归各五钱 麦冬 炒枣仁各一两 天花粉 北五味 远志 神曲 丹砂各一两 菖蒲五分 菟丝子三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 劳心思虑，心血亏损，心火沸腾，夜梦不安，久则惊悸健忘，形神憔悴，血不华色。

11925 益母丸

【方源】《妇人良方》卷十三引《产乳》。

【异名】 一母丸(《医方类聚》卷二二四引《管见良方》)、知母丸(《校注妇人良方》卷十二)。

【组成】 知母一两（洗，焙）

【用法】 上为粗末，以枣肉为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，煎人参汤送下。

【主治】 子烦。妊娠因服药致胎气不安，有似虚烦不得卧者。

11926 益光散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 寒水石八钱 菟丝子三钱 知母三钱 玄参五钱 石决明四钱 车前子三钱（外包） 大生地六钱 寸冬三钱 川芎二钱 栀子三钱 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 肝火太盛，肾水亏乏，耗散真阴，瞳神渐渐缩小。

11927 益血丹

【方源】《元戎》。

【组成】 当归（酒浸，焙） 熟地黄各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。细嚼，酒送下。

【主治】 久虚亡血，大便燥。

11928 益阳丹

【方源】《普济方》卷三十三引《洗洗方》。

【组成】 丁香二钱 木香三钱 木通二钱（去皮） 远志一两 石莲肉半两 麦门冬半两（去心） 白茯苓半两 龙骨（煅）一两 半夏半两（切作小粒，用大猪苓半两同炒色黄，去猪苓） 茴香半两（用斑蝥十四个，去翅足，同炒黄色，去斑蝥）。

【用法】 上为末，同酒煮山药入砂盆内杵千下，丸如梧桐子大。每服四十丸，空心盐酒或盐汤送下。

【主治】 丈夫心肾不交，阳气萎弱，才交即泄，梦遗白浊。

11929 益阴汤

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】 山萸 地黄 丹皮 芍药 麦冬 五味 山药 泽泻 灯草 地骨皮 莲子

【主治】 里虚，盗汗有热。

11930 益阴煎

【方源】《金鉴》卷四十四。

【组成】 生地三钱 知母 黄柏各二钱 龟版四钱（酥炙） 缩砂仁 甘草（炙）各一钱

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 妇人四十九岁后，天癸不行，因血热复来者。

11931 益阴煎

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】 熟地 巴戟天 破故纸 淡苁蓉 杜仲 杞子 菟丝子 山萸 覆盆子 葡萄肉 鹿角霜

【主治】 龟背。

11932 益志汤

【方源】《三因》卷八。

【异名】 益智汤（《准绳·类方》卷六）。

【组成】 鹿茸（酥涂炙，去毛尽） 巴戟（去心） 熟干地黄（酒浸） 枸杞子 苁蓉（酒浸） 牛膝（酒浸） 附子（炮，去皮脐） 桂心（不焙） 山茱萸 白芍药 防风（去叉） 甘草（炙）各等分

【用法】 上为散。每服四大钱，水一盏半，加生姜五片，盐少许，煎七分，去滓，食前服。

【主治】 右肾虚寒，小便数，腰胁引痛，短气咳逆，四肢烦疼，耳鸣，面黑，骨间热，梦遗白浊，目眩、诸虚困乏。

11933 益肝散

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】 当归 川芎 白芍 半夏 柴胡 黄芩 草决明 甘草 蒺藜 胆草 楮实子

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 乌风内障。

11934 益君汤

【方源】《简明医彀》卷三。

【组成】 当归 白芍药 生地黄 熟地各二钱 人参五分 白术 茯苓 麦冬 栀子 陈皮各八分 甘草三分 乌梅一个

【用法】 加炒米百粒，水煎成，调辰砂（水飞）五分，临睡服。

【主治】 心血少而嘈者。

11935 益肾散

【方源】《直指》卷二十一。

【异名】 益智散（《丹溪心法》卷四）、益肾膏（《普济方》卷五十三）。

【组成】 磁石（火烧醋淬七次，研细，水飞） 巴戟 大川椒（开口者）各一两 沉香 石菖蒲各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，用猪肾一只，细切，和以葱白、少盐并药，湿纸十重裹，煨令香熟，空心嚼，以酒送下。

【主治】 肾虚耳聋。

11936 益经汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】 大熟地一两（九蒸） 白术一两（土炒） 山药五钱（炒） 当归五钱（酒洗） 白芍三钱（酒炒） 生枣仁三钱（捣碎） 丹皮二钱 沙参三钱 柴胡一钱 杜仲一钱（炒黑） 人参二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 年末七七，由于心、肝、脾之气郁，经水先断。

11937 益荣丹

【方源】《瑞竹堂方》卷一。

【组成】 当归二两（去芦，酒浸，焙） 紫石英（火煅醋淬七次，研细）一两 桑寄生 柏子仁（炒，另研） 酸枣仁（去壳） 小草 木香（不见火） 茯苓（去木） 桑寄生 卷柏叶（酒炙） 熟地黄（洗净，酒蒸，焙） 龙齿各一两（另研） 辰砂半两（另研）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食前用麦门冬汤送下。

【功用】 滋血助心。

【主治】 思虑伤心，忧虑伤肺，血少气虚，目涩口苦，唇燥舌咸，怔忡，白浊。

11938 益荣汤

【方源】《医方类聚》卷一五八引《济生》。

【组成】 当归（去芦，酒浸） 黄耆（去芦） 小草 酸枣仁（炒，去壳） 柏子仁（炒） 麦门冬（去心） 茯神（去木） 白芍药 紫石英（细研）各一两 木香（不见火） 人参 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片、大枣一个，煎至七分，去滓温服，不拘时

候。

【主治】 思虑过度，耗伤心血，心帝无辅，怔忡恍惚，善悲忧，少颜色，夜多不寐，小便或浊。

11939 益胃汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】 黄耆 甘草 半夏各二分 黄芩 柴胡 人参 益智仁 白术各三分 苍术一钱半 当归梢 陈皮 升麻各五分

【用法】 上㕮咀。水二大盏，煎至一盏，去滓，食前稍热服。

【主治】 头闷，劳动则微痛，不喜饮食，四肢怠惰，躁热短气，口不知味，肠鸣，大便微溏，黄色，身体昏闷，口干不喜食冷。

【宜忌】 忌饮食失节，生冷硬物、酒、湿面。

【备考】 本方方名，《医方集解》引作"参术益胃汤"。

11940 益胃汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 沙参三钱 麦冬五钱 冰糖一钱 细生地五钱 玉竹（炒香）一钱五分

【用法】 水五杯，煮取二杯，分二次服，滓再煮一杯服。

【主治】 阳明温病，下后汗出，胃阴受伤。

11941 益胃散

【方源】《内外伤辨》卷十一。

【异名】 温胃汤（《脾胃论》卷下）、温胃散（《医部全录》卷四三八）。

【组成】 陈皮 黄耆各七钱 益智仁六钱 干生姜 白豆蔻仁 泽泻 姜黄各三钱 缩砂仁 甘草 厚朴 人参各二钱

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏，煎至七分，食前温服。

【主治】 服寒药过多，或脾胃虚弱，胃脘痛。

11942 益胃散

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】 黄连 五味 乌梅 生甘草各五分 炙甘草三分 升麻二分

【主治】 每饮食即出汗者。

【宜忌】 忌湿面、酒、五辛。

11943 益胆汤

【方源】《医学正传》卷五。

【组成】 黄芩（去朽） 甘草（炙） 人参各一钱 官桂五分 苦参 茯神各三分 远志（取肉去骨）七分

【用法】 上切细，作一服。水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 谋虑不决，肝胆虚气上溢则口苦。

11944 益真丸

【方源】《医方类聚》卷一五三引《烟霞圣效》。

【组成】 天门冬 麦门冬（各去心） 干地黄 车前子 枸杞子 人参 补骨脂（炒） 茴香（炒香）各等分

【用法】 上为细末，酒打面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，食前温酒或盐汤送下；米饮亦得。

【功用】 久服利九窍，益精气，悦颜色，长精神，明耳目，壮筋骨，美饮食，养肺气，通血脉。

【主治】 诸虚不足，五劳七伤，面色无光，饮食无味。

11945 益黄散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 补脾散（原书同卷）、益黄汤（《集验良方》卷五）。

【组成】 陈皮（去白）一两 丁香二钱（一方用木香） 诃子（炮，去核） 青皮（去白） 甘草（炙）各五钱

【用法】 上为末。三岁儿服一钱半，水半盏，煎三分，食前服。

【主治】 脾胃虚弱，脾疳，腹大身瘦。

11946 益智丸

【方源】《普济方》卷四十一引《护命》。

【组成】 益智子（去皮） 草薢 狗脊（去毛） 芎藭 巴戟天（去心） 干木瓜 续断 牛膝（酒浸，切，焙）各半两 附子（炮裂，去皮脐，大者）一枚

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心盐汤送下。

【主治】 小肠虚寒，小便后余沥、阴萎不起。

11947 益智丸

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【异名】 朱子读书丸。

【组成】 石菖蒲（一寸九节）一两 橘红（去白）七钱 甘草二钱五分 当归身五钱 人参七钱 茯神一两 远志（去心，用甘草汤浸一宿）一两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如金凤子大，朱砂为衣。每服五丸，卧时用灯心汤送下。

【功用】 益智。

11948 益智汤

【方源】《局方》卷十。

【组成】 益智仁四斤半 京三棱（煨）一斤半

干姜（炮）三两　青皮　蓬莪茂　陈皮各十二两　甘草（炒）十五斤　盐（炒）十六斤半

【用法】 上为细末。每服一钱，沸汤点下，不拘时候。

【功用】 常服顺气宽中，消宿冷，调脾胃。

【主治】 一切冷气，呕逆恶心，脐腹胁肋胀满刺痛，胸膈痞闷，饮食减少。

11949　益脾饼

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 白术四两　干姜二两　鸡内金二两　熟枣肉半斤

【用法】 上药四味，白术、鸡内金皆用生者，每味各自轧细焙熟，再将干姜轧细，共和枣肉，同捣如泥，作小饼，木炭上炙干。空心时当点心细嚼咽下。

【主治】 脾胃湿寒，饮食减少，长作泄泻，完谷不化。

11950　益瞳丸

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 萸肉二两（去净核）　野台参六钱　柏子仁（炒）一两　玄参一两　菟丝子一两（炒）　羊肝一具（切片，焙干）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，开水送下，一日二次。

【主治】 目瞳散大昏耗，或觉视物乏力。

11951　益母草散

【方源】 《圣惠》卷八十。

【组成】 益母草一两　赤芍药　桂心　当归（锉，微炒）　川大黄（锉，微炒）　桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）各三分　牛膝（去苗）　蒲黄　苏枋木（锉）各半两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 产后恶露不下，在于腹中不散，身体烦闷，及腹内疠刺疼痛不可忍。

11952　益母草膏

【方源】 《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【异名】 坤膏、坤草膏。

【组成】 益母草若干

【用法】 于端午日采紫花方茎之益母草，连根洗净，于石臼内捣烂，以布滤取浓汁，入砂锅中，文武火熬成膏，如沙糖色为度。用遮光瓶装或瓷缸存贮。每服一匙，用红糖水冲下；或用黄酒冲下。

【功用】 去瘀生新。

【主治】 经血不调，恶露不尽。

【宜忌】 孕妇忌服。

11953　益智子汤

【方源】 《奇效良方》卷三十四。

【组成】 益智仁二十四枚

【用法】 上为末，水一中盏，加盐少许，同煎服。

【功用】 益气安神，补不足，安三焦，调诸气。

【主治】 遗精虚漏，小便余沥，夜多小便。

11954　益智仁汤

【方源】 《济生》卷三。

【组成】 益智仁　干姜（炮）　甘草（炙）　茴香（炒）各三钱　乌头（炮，去皮）　生姜各半两　青皮（去白）二钱

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水二盏，加盐少许，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】 肾经有积冷，疝痛，连小腹挛搐，叫呼不已，其脉沉紧。

11955　益智仁散

【方源】 《育婴秘诀》。

【异名】 益智散（《幼幼集成》卷四）。

【组成】 益智仁　破故纸（炒）　白茯苓各等分

【用法】 上为细末。盐汤调服。

【主治】 遗尿。

11956　益气安胎饮

【方源】 《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 黄耆　党参　糯米　白术　菟丝子　续断　白芍　甘草　苎麻根　莲房炭

【功用】 益气养血安胎。

【主治】 气血两虚，胎动不安。

11957　益气安神汤

【方源】 《回春》卷四。

【组成】 黄连八分　生地黄　麦门冬（去心）　酸枣仁（炒）　远志（去心）　人参　黄耆（蜜炙）　淡竹叶　胆星各一钱　小草六分　当归一钱二分　茯神（去皮木）二钱一分

【用法】 上锉一剂。加生姜一片，大枣一个，水煎服。

【主治】 七情六淫相感而心虚，夜多梦寐，睡卧不宁，恍惚惊怖痰癖。

11958　益气导源汤

【方源】 《医学探骊集》卷五。

【组成】 茯苓四钱　泽泻三钱　广缩砂三钱　大腹皮四钱　升麻三钱　茅苍术四钱　车前子四钱（炒）　木通三钱　猪苓三钱　通草一钱

【用法】 水煎，温服。

【功用】 健脾利水。

【主治】 气水肿胀。

【宜忌】 忌盐。

【方论选录】 此方以苍术为君，大健其脾胃；以茯苓、广砂为臣，培养其脾胃；以泽泻、升麻、腹皮为佐，升降其上下内外之水气；以猪苓、车前、木通、通草为使，直导其水气由小便出，小便一利，肿胀自愈矣。

11959 益气导溺汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】 泡参五钱 白术二钱 扁豆 云苓各三钱 桂枝一钱 炙升麻一钱 甜桔梗一钱半 通草二钱 台乌一钱半

【用法】 水煎，温服。

【功用】 补气升提。

【主治】 妊娠气虚下陷，小便不通，脐腹胀痛，面色苍白带青，心悸气短，神倦食少，舌淡苔白，脉沉滑无力。

11960 益气收乳汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 党参 黄耆 当归 白芍 麦冬 山茱萸 甘草

【功用】 补气养血，佐以固摄。

【主治】 气虚，乳汁自漏。

11961 益气补肺汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 阿胶二钱（蛤粉炒） 五味子五分 地骨皮 天冬 麦冬 人参各二钱 百合三钱 贝母 茯苓各二钱 苡仁四钱

【用法】 加糯米一撮，煎汤代水饮。

【主治】 肺劳。肺气大虚，身热气短，口燥咽干，甚则咳嗽吐血。

11962 益气除风汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 黄耆12克 白术 当归 白芍各9克 防风 僵蚕各6克

【功用】 补中益气，养血除风。

【主治】 气虚受风之上胞下垂。起病较急，忽然上胞下垂，痒如虫行，头痛，目眩。

11963 益气健脾丸

【方源】《医学六要·治法汇》卷一。

【组成】 人参三两 白术三两 陈皮一两半 炙甘草八钱 枳实一两半 白茯苓二两

【主治】 脾弱不能运化，四肢倦怠，面色萎黄，口淡耳鸣，食少。

【加减】 大便泄泻，加山药、扁豆、炒莲肉；甚者，加肉豆蔻。

11964 益气健脾汤

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】 人参二钱 白术一钱五分（去芦，土炒） 白茯苓（去皮）三钱 陈皮二钱 白芍（炒）三钱 苍术一钱五分（米泔浸） 干姜（炒黑）八分 诃子（煨）二钱 肉桂（面裹煨）六分 升麻（酒洗）四分 甘草（炙）八分

【用法】 上锉。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 气虚泄泻，饮食入胃不住，完谷不化。

【宜忌】 忌油腻。

【加减】 腹痛加桂。

11965 益气救脱汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 人参 三七粉

【功用】 峻补元气，止血固脱。

【主治】 产后气虚血崩之轻证。

11966 益气清金汤

【方源】《金鉴》卷六十六。

【异名】 益气左金汤（《外科证治全书》卷二）。

【组成】 苦桔梗三钱 黄芩二钱 浙贝母（去心，研） 麦冬（去心） 牛蒡子各一钱五分（炒研） 人参 白茯苓 陈皮 生栀子（研） 薄荷 甘草各一钱（生） 紫苏五分

【用法】 加竹叶三十片，水三钟，煎一钟，食远服，滓再煎服。

【主治】 喉瘤。

11967 益气聪明汤

【方源】《东垣试效方》卷五。

【组成】 黄耆 甘草各半两 芍药一钱 黄柏一钱（酒制，锉，炒黄） 人参半两 升麻 葛根各三钱 蔓荆子一钱半

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服，临卧近五更再煎服之。得肿更妙。

【功用】 令目广大，久服无内外障、耳鸣耳聋之患。又令精神过倍，元气自益，身轻体健，耳目聪明。

【主治】 饮食不节，劳役形体，脾胃不足，得内障，耳鸣或多年目暗，视物不能。

【宜忌】 忌烟火酸物。

【加减】 如烦闷或有热，渐加黄柏，春、夏加之，盛暑夏月倍之，如脾胃虚去之。

【方论选录】《医方集解》：参、耆甘温以补脾胃；甘草甘缓以和脾胃；干葛、升麻、蔓荆轻扬升

发，能入阳明，鼓午胃气，上行头目。中气既足，清阳上升，则九窍通利，耳聪而目明矣；白芍敛阴和血，黄柏补肾生水。盖目为肝窍，耳为肾窍，故又用二者平肝滋肾也。

11968 益火生光汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 丽参3克 茯苓9克 远志3克 炙甘草6克 巴戟天 肉苁蓉各9克 肉桂1.5克

【功用】 温肾助阳，开心明目。

【主治】 心虚目瞑。因思虑过度，损伤心脾，或命门火衰，神光不能生发而致双目不痛不痒，不红不肿，羞明怕光，不时瞑目，重者双目紧闭，欲睁不能；有时忽然睁开，如常人之状，瞬间复闭如故，眦部淡赤或呈虚浮，神光内沉，瞳神微昏。或兼心悸失寐，或兼五更泄泻，阳萎滑精。

【加减】 若兼心悸、失寐，可加炒枣仁12克，以养心安神；若兼阳萎、滑精，可加芡实、锁阳各9克，以固肾涩精；兼五更泻泄者，可加煨肉蔻9克，以温中止泻。

【方论选录】 方中丽参、茯苓、远志、炙甘草补心气以发神光；丽参、茯苓、炙甘草且能健脾补中以助脾阳；巴戟天、肉苁蓉温肾阳以助命门相火；肉桂辛甘大热，以补火助阳。心、脾、肾三经之阳气充沛，神光生有源、发有力，眼睑运动自如，何羞明、目瞑之有？

11969 益母止啼汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】 人参 黄耆 当归 麦冬 橘红 甘草

【主治】 子鸣。妊娠七八月，忽然儿啼腹中者。

11970 益母草汁粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】 益母草汁二合，生地黄汁二合 藕汁二合 生姜汁半合 蜜二合 白粱米一合（水淘，研令细）

【用法】 先以水一大盏，煮米作粥，次入诸药汁，更煎三二沸。每服二合，一日三次。

【主治】 产后虚劳，血气不调，腹肚绞痛，血晕昏惫，心热烦躁，不多食。

11971 益母毓麟丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 当归 熟地各四两 党参 鹿角霜 白术 茯苓 川断 杜仲 香附 白芍 菟丝子各二两 川芎 川椒 甘草各一两

【用法】 加蜜二十两为丸服。

【主治】 妇人血气俱虚，经水不调，腹痛腰疼，饮食不甘，瘦弱不孕及赤白带下。

11972 益血和中散

【方源】《古方汇精》。

【组成】 败龟版（煅存性）

【用法】 每服三钱，糖拌，好酒送下。尽醉即消。

【主治】 乳岩，乳疖初起。

11973 益血润肠丸

【方源】《准绳·类方》卷六。

【组成】 熟地黄六两 杏仁（炒，去皮尖） 麻仁各三两（以上三味俱杵膏） 枳壳（麸炒） 橘红各二两五钱 阿胶（炒） 肉苁蓉各一两半 苏子 荆芥各一两 当归三两

【用法】 上为末，以前三味膏同杵千余下，仍加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心白汤送下。

【主治】 ①《准绳·类方》：年高老人，大便秘涩。②《活人方》：久病及老年肾水虚寒，精枯血竭，脾肺之元气虚，失统运转导之用，里急后重，时泄清水。

11974 益阴生血汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 熟地一两 茱萸 白术 白芍 麦冬各五钱 人参三钱 白芥子三钱 五味子五分

【用法】 水煎服。

【主治】 血虚不能养筋，左手半边不仁，语言謇涩，口角流涎。

11975 益阴肾气丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 益阴补气丸《原机启微》卷下。

【组成】 泽泻 茯苓各二钱五分 生地黄（酒洗，干） 牡丹皮 山茱萸 当归梢（酒洗） 五味子 干山药 柴胡各五钱 熟地黄二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸，淡盐汤送下。

【主治】 眼目内障。

【备考】 本方方名，《摄生秘剖》引作“明目地黄丸”。

11976 益阴通闭丸

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 阿胶八两（粉炒） 枳壳一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，米饮送下。

【主治】 孕妇大便不通，脉涩数。

【方论选录】 妊娠血亏气滞，津液无以下润肠

胃，故大便不通，胎因不安焉。阿胶补阴益血，力能护养胎元，兼滋肠燥；枳壳破滞化气，性专通泄大便，燥结自行。蜜丸以润之，饮下以和之，使阴血内充，则滞气自化，而津液四布，大便自通，胎得所安，何虚秘之足患哉。

11977 益寿比天膏

【方源】《回春》卷四。

【组成】附子（去皮脐） 牛膝（去芦） 虎胫骨（酥炙） 蛇床子 菟丝子 川续断 远志肉 肉苁蓉 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 杏仁 生地 熟地 官桂 川楝子（去核） 山茱萸（去核） 巴戟（去心） 破故纸 杜仲（去皮） 木鳖子（去壳） 肉豆蔻 紫梢花 谷精草 川山甲 大麻子（去壳） 鹿茸各一两 甘草二两（净末，看众药焦枯方下） 桑槐 柳枝各七寸

【用法】上锉细。用真香油一斤四两浸一昼夜，慢火熬至黑色；用飞过好黄丹八两，黄香四两入内，柳棍搅不住手；再下雄黄、倭硫、龙骨、赤石脂各二两，将铜匙挑药滴水成珠，不散为度；又下母丁香、沉香、木香、乳香、没药、阳起石、煅蟾酥、哑芙蓉各二钱，麝香一钱为末，共搅入内；又下黄蜡五钱。将膏贮瓷罐内，封口严密，入水中浸五日去火毒，每一个贴六十日方换。

【功用】添精补髓，保固真精；善助元阳，滋润皮肤，壮筋骨，理腰膝，通二十四道血脉，坚固身体，返老还童。

【主治】下元虚冷，五劳七伤，半身不遂，或下部虚冷，膀胱病症，脚膝痿麻，阳事不举。赤白带下，沙淋血崩，疮疖。

11978 益寿固真丹

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四。

【组成】菟丝子（酒浸，煮，焙，捣作末）三两 熟地黄（酒蒸，下筛） 生干地黄（酒浸，焙） 磁石（火煅，醋淬九次，研，水飞） 何首乌（泔浸一宿，切作片） 黑豆汁（拌蒸，晒干） 肉苁蓉（酒浸，去鳞甲，蒸，取肉）各二两 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 山药（微炒） 当归（酒洗，焙） 白茯苓（水飞） 泽泻（酒蒸） 牡丹皮各一两半 人参 芡仁 山茱萸（酒浸，取肉） 石斛（酒洗，焙） 覆盆子（酒洗，焙） 枸杞子（酒洗，焙） 五味子（酒洗，焙） 蛇床子（炒，搓去皮） 杜仲（去皮，锉，姜汁炒去丝） 巴戟（盐水煮，去骨） 鹿茸（燎去毛） 韭子（炒） 赤石脂（水飞） 益智（去皮，盐水煮一沸） 莲花蕊 破故纸（炒） 柏子仁（去皮） 青盐 天雄（童尿浸三日，炮，去皮脐） 阳起石（火煅）各一两 腽肭脐（酥炙黄色）一部（无则以黄狗阴茎三个或五个，酥炙黄色代用）

【用法】上药不犯铁，捣为细末，糯米粉和清酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服二三钱，空心盐汤、温酒或米饮送下。中年人最宜常服。

【功用】填精补血，益气养神，返老还童，延年益寿。

【宜忌】忌葱蒜萝卜及醋，酒色亦宜节。

【加减】夏月去天雄，加黄柏。

11979 益明长智丸

【方源】《证治宝鉴》卷三。

【组成】龟心九枚 龙骨 远志 龟版 辰砂 石菖蒲 天门冬 麦门冬 柏子仁 白茯苓 玄参 桔梗 人参 丹参 酸枣仁 胆南星 熟地黄 五味子 川当归 茯神 甘草 熊胆

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。灯心，大枣煎汤送下。

【功用】清心益智。

【主治】健忘。

11980 益胃升阳汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】升阳益胃汤（《便览》卷四）。

【组成】柴胡 升麻各五分 炙甘草 当归身（酒洗） 陈皮各一钱 人参（去芦） 炒神曲各一钱五分 黄耆二钱 白术三钱 生黄芩少许

【用法】上㕮咀。每服二钱，水二大盏，煎至一盏，去滓稍热服，不拘时候。

【功用】①《兰室秘藏》：补胃气以助生发之气。②《便览》：大补气血，滋养脾胃。

【主治】妇人经候不调，漏下不止，水泄日二三行，食罢烦心，饮食减少，甚至瘦弱。

【加减】有嗽，去人参；腹中痛，加白芍药三分，中桂少许；渴或口干，加葛根二分。

11981 益真鹿茸丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】石斛 牛膝（酒浸一宿，焙） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 紫石英 鳖甲（醋炙） 续断 柏子仁 五味子 黄耆（蜜炙） 巴戟（去心）各一两 安息香（酒浸，去砂石） 鹿茸（酒炙） 沉香各半两 山药 覆盆子各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心酒、盐汤或糯米饮送下。

【主治】冲任俱虚，血海久冷，经候不调，肌体羸瘦，饮食减少。

11982 益智安神汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】柏子仁四钱 石菖蒲三钱 生地三钱 知母三钱 白芍五钱 胆星三钱 远志肉三钱 石决明六钱 茯神三钱 甘草一钱 羚羊角五分

【用法】水煎服。

【主治】云雾移睛。

11983 益智和中汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】肉桂一分 桂枝四分 牡丹皮 柴胡 葛根 益智仁 半夏各五分 当归身 炙甘草 黄耆 升麻各一钱 白芍药一钱五分 干姜少许

【用法】上为粗末，都作一服，水三盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】肠澼下血，或血色紫黑，腹中痛，腹皮恶寒，右手关脉弦，按之无力，而喜热物熨之。

11984 益脾镇惊散

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】人参一钱半 白术（土炒） 茯苓各三钱 朱砂八分 钩藤二钱 甘草（炙）五分

【用法】上为细末。每服一钱，灯心汤调下。

【功用】镇心，抑肝，益脾。

【主治】惊泻。小儿气弱受惊，夜卧不安，昼则惊惕，泻泄粪稠若胶，色青如苔。

11985 益智桑螵蛸散

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】益智仁 桑螵蛸 人参 黄耆 鹿茸 牡蛎 赤石脂

【用法】上为末。空心米饮下。

【主治】脬内素有冷气，因产后气虚无阳以输化，小便清长而数者。

11986 兼金丸

【方源】《三因》卷十四。

【组成】大黄（湿纸裹煨）八钱 消石 桂心 甘草（炙）各四两 桃仁四十个（去皮尖）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七丸，至十丸，米饮送下。

【主治】热入膀胱，脐腹上下兼胁肋疼痛，便燥，欲饮水，按之痛者；及妇人血闭疼痛。

11987 兼金散

【方源】《三因》卷十六。

【组成】细辛 黄连各等分

【用法】上为末。先以熟水温帛揩净，掺药患处。良久涎出吐之。

【主治】蕴毒上攻，或下虚邪热，口舌生疮。

11988 宽中丸

【方源】《普济方》卷二〇四引《卫生家宝》。

【组成】三棱一两 莪术一两 缩砂仁（炒） 青皮（去白） 沉香 陈皮（去白） 香附子 胡椒 各半两

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后紫苏、生姜汤送下。

【功用】宽胸膈，化冷物。

【主治】十膈五噎，滞满不通。

11989 宽中散

【方源】《奇效良方》卷十六。

【组成】白豆蔻（去皮）一两 青皮（去白） 缩砂（去皮） 丁香各二两 木香一两半 甘草（炙）二两半 陈皮（去白）四两 香附子（炒去毛） 厚朴（去粗皮，姜汁制，炒）各八两 沉香一两 槟榔二两

【用法】上为细末。每服二钱，用生姜盐汤调服，不拘时候。

【主治】忧患郁结，或作寒热，遂成膈气，不进饮食。

11990 宽气汤

【方源】《百一》卷六。

【异名】缩砂香附汤（《得效》卷三）。

【组成】香附子六两（新砂盆内打令净，焙干称） 乌药二两（去心，取肉称，用真天台者） 缩砂仁一两 甘草一两一分（炒）

【用法】上为细末，每服一大钱，浓煎橘皮汤送下，不拘时候。

【功用】①《百一》：利三焦，顺脏腑。②《得效》：调中快气。

【主治】三焦气滞，脘腹胀痛，大便秘结。

①《百一》：大便气秘；②《得效》：心腹刺痛；③《奇效良方》：小儿噫宿腐气，心膨膜满，或时冷痛。

【备考】《得效》本方用法：为末，每服一钱，用紫苏叶三片，盐少许，沸汤调下。

11991 宽气饮

【方源】《金鉴》卷五十五。

【组成】杏仁（去皮尖，炒） 桑白皮（炒） 橘红 苏子（炒） 枳壳（麸炒） 枇杷叶（蜜炙） 麦冬（去心） 生甘草 苦葶苈

【用法】水煎服。

【主治】小儿龟胸。

11992 宽快汤

【方源】《直指》卷十五。

【组成】 香附（杵净）二两　天台乌药（去心）枳壳（制）各一两半　缩砂仁七钱半　苏子（炒）半两　青木香二钱　甘草（炙）七钱半

【用法】 上为末，每服二钱，陈皮煎汤调下；或吞青木香丸少许。

【主治】 气不下降，大腑涩滞。

11993　宽带汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】 白术一两　巴戟天五钱　补骨脂一钱　肉从蓉三钱　人参二钱　麦冬三钱　五味子三分　杜仲三钱　莲肉二十个（不去心）　熟地五钱　当归二钱　白芍三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人脾胃不足，带脉拘急，小腹之间自觉紧迫，急而不舒，断难生子者。

11994　宽胸丸

【方源】《新医药学杂志》1973；3。

【组成】 荜拨900克　高良姜　延胡索　檀香各450克　细辛150克　冰片30克

【用法】 上药提取挥发油，制成浸膏，晒干，研细，装入胶囊，每个胶囊0.3克。每服0.3克，一日三次。

【功用】 温中散寒，芳香开窍，理气止痛。

【主治】 冠心病，心绞痛。

【备考】 本方方名，《北京市中成药规范》改作"宽胸片"。

11995　宽胸饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】 柴胡　郁金　川芎　当归　降香　香附　陈皮　砂仁　甘草　延胡索

【功用】 疏肝。

【主治】 肝实胸痛，不能转侧，善太息者。

11996　宽筋丸

【方源】《普济方》卷二四〇。

【组成】 防风　荆芥　麻黄（连节，去根）　干木瓜　独活各一两　牛膝半两　（上药锉碎，用好酒浸二宿，漉出，焙干为末）　草乌头二两　黑豆一两（上二味用水五碗，煮令干，去黑豆，薄切乌头焙干，亦为末）

【用法】 上二末和匀，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，渐加至二三十丸，食后温茶或酒送服。

【主治】 风壅气道不宣，筋脉拘挛，难以屈伸；兼治脚气疼痒。

11997　宽腰汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】 车前子三钱　薏仁五钱　白术五钱　茯苓五钱　肉桂一分

【用法】 水煎服。

【主治】 腰痛。日重夜轻，小水艰涩，饮食如故者。

11998　宽膜汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 白芍三钱　枳壳三分　甘草五分　神曲三钱　白芥子三钱　郁金一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 肝气郁甚，老痰结成粘块，凝滞喉咙之间，欲咽不下，欲吐不能。

11999　宽中养胃汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】 苍术（炒）四分　香附七分　枳壳（麸炒）五分　厚朴（姜炒）五分　藿香五分　山楂三分　陈皮一钱　砂仁三分（细研）　神曲（炒）四分　槟榔三分　麦芽（炒）四分　枳实（麸炒）四分　半夏五分　茯苓五分　青皮（去瓤）三分　甘草（炙）三分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，大枣一枚，水煎，食远服。

【主治】 胸膈胀满，饮食少用。

12000　宽中健脾丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 白术六两　人参　黄耆　苍术　茯苓　五加皮各二两　黄连（用茱萸水炒）　白芍　泽泻各二两半　陈皮（用盐水炒）　半夏　香附　薏苡仁　山楂各三两　草豆蔻　苏子　萝卜子各一两半　沉香六钱　大瓜蒌二个（每个镂一孔，用川椒末三钱，多年粪碱末二钱，装入瓜蒌内，纸糊瓜口，盐泥固济，晒干，煅红为度，去泥与黑皮）

【用法】 上药同为末，用荷叶、大腹皮煎汤煮黄米糊丸，如梧桐子大。每服百丸，白汤送下。

【主治】 单腹胀，及脾虚肿满，膈中闭塞，胃口作痛。

12001　宽中喜食无厌丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 宽中进食丸。

【组成】 木香五分　青皮　人参　干姜各一钱　炙甘草一钱五分　白茯苓　泽泻　槟榔　橘皮　白术各二钱　缩砂仁　猪苓各二钱五分　半夏七钱　枳实四钱　草豆蔻仁五钱　神曲五钱五分（炒）　大麦芽面一两（炒）

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子

大。每服二五十丸，食远米汤送下。

【功用】 资形气，喜饮食。

12002 家宝丹

【方源】《丹溪心法》卷一。

【组成】 川乌 南星 五灵脂（姜汁制，另研） 草乌各六两 白附子 全蝎 没药 辰砂各二两 羌活 乳香 白僵蚕（炒）各三两 片脑五钱 天麻三两 麝香二钱半 地龙四两 雄黄 轻粉各一两

【用法】 上为末。每服三分，不觉，服半钱，茶酒调服皆可；或炼蜜为丸，如弹子大。含化。

【主治】 风疾瘫痪，痿痹不仁，口眼㖞斜。

12003 家菊散

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】 家菊花（去蒂） 石膏（水飞） 牛蒡子各等分

【用法】 上为末。每服二钱，早、晚食后茶、酒任意调服。

【功用】 去风明目。

【主治】 诸般头风。

12004 家韭子丸

【方源】《三因》卷十二。

【组成】 家韭子六两（炒） 鹿茸四两（酥炙） 苁蓉（酒浸） 牛膝（酒浸） 熟地黄 当归各二两 巴戟（去心） 菟丝子（酒浸）各一两半 杜仲（去皮，锉制，炒断丝） 石斛（去苗） 桂心 干姜（炮）各一两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至百丸，空心、食前、盐汤温酒送下。小儿遗尿，别作一等小丸服。

【功用】 补养元气，进美饮食。

【主治】 少长遗尿；男子虚剧，阳气衰败，小便白浊，夜梦泄精。

【备考】 本方方名，《明医指掌》引作“韭子丸”。

12005 家传西圣膏

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】 当归 川芎 赤芍 生地 熟地 白术 苍术 甘草节 陈皮 半夏 青皮 香附 枳壳 乌药 何首乌 白芷 知母 杏仁 桑皮 金银花 黄连 黄芩 黄柏 大黄 白蔹藜 栀子 柴胡 连翘 薄荷 威灵仙 木通 桃仁 玄参 桔梗 白鲜皮 猪苓 泽泻 前胡 升麻 五加皮 麻黄 牛膝 杜仲 山药 益母草 远志 续断 良姜 藁本 青风藤 茵陈 地榆 防风 荆芥 两头尖 羌活 独活 苦参 天麻 南星 川乌 草乌 文蛤 巴豆仁 芫花各五钱 细辛 贝母 僵蚕 大枫子 川山甲各一两 蜈蚣二十一条 苍耳头二十一个 虾蟆七个 白花蛇 地龙 全蝎 海桐皮 白及 白蔹各五钱 木鳖子八两 桃 柳 榆 槐 桑 楝或杏 楮或椿七枝各二七寸 血余四两

【用法】 上药用真麻油十三斤浸之，春五、夏三、秋七、冬半月，日数毕，入大锅内，慢火煎至药枯，浮起为度，住火片时，用布袋滤净药渣，将油称准，将锅展净，复用细绢滤油入锅内，投血余，慢火熬至血余浮起，以柳棒挑看，似膏溶化之象，熬熟，每净油一斤，用飞过黄丹六两五钱，徐徐投入，火加大些，夏秋亢热，每油一斤，加丹五钱，不住手搅，俟锅内先发青烟，后至白烟，叠叠旋起，气味香馥者，其膏已成，即便住火，将膏滴入水中，试软硬得中，如老加熟油，若稀加炒丹少许，渐渐加火，务要冬夏老嫩得所为佳，掇下锅来，搅挨烟尽，下细药搅匀，倾水内，以柳棍搂，成块再换，冷水浸半时，乘温每膏半斤，拔扯百转，成块又换冷水投浸。用时，取一块铜杓内熔化摊用。细药开后：乳香、没药、血竭各一两，轻粉八钱，朝脑二两，龙骨二两，赤石脂二两，海螵蛸五钱，冰片、麝香各三钱，雄黄二两，上药共为末，加入前膏内。五劳七伤，遍身筋骨疼痛，腰脚痿软无力，贴膏肓穴、肾俞穴、三里穴；痰喘气急咳嗽，贴肺俞穴、华盖穴、膻中穴；左瘫右痪，手足麻木，贴肩井穴、曲池穴、三里穴；遗精白浊，赤白带下，经脉不调，血出崩漏，贴阴交穴、关元穴；痢疾水泻，贴丹田穴；疟疾，男贴左臂，女贴右臂；腰痛，贴命门穴；疝气，贴膀胱穴；头风，贴风门穴；心气痛，贴中脘穴；走气痛，贴章门穴；寒湿脚气，贴三里穴；胸腹胀闷，贴中脘穴；噎食转食，贴中脘穴；痞疾，先用面作圈，围痞块上，入皮消两许，纸盖，熨斗熨热去消，贴膏再熨，出汗至腹内觉热方止；跌打损伤及诸毒诸疮，俱贴患处。凡内外诸症，贴之必用热布熨之，疥癣疹癞等症，贴脐熨之，汗出为度；血瘕痞块，加阿魏、马齿苋膏各二两贴之。

【主治】 男妇小儿，远年近日，五劳七伤，左瘫右痪，手足麻木，遍身筋骨疼痛，咳嗽痰喘，疟疾痢疾，痞疾走气，遗精白浊，偏坠疝气，寒湿脚气；及妇人经脉不调，赤白带下，血崩经漏；并跌打损伤，一切肿毒瘰疬，顽疮结毒，臭烂，筋骨疼痛不能动履者。

12006 家传消痞丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】天花粉（捣烂，水浸三日，取沉者，晒干用）四两　绿豆粉四两（用薄荷叶蒸过）　香附米（童便浸）二两　贝母一两　茯苓一两　白术一两　柿霜四两　牛皮胶三两　牡蛎（煅）　百合　山茨菇　杏仁各二两　细茶　粉草各一两　青黛六钱　硼砂三钱　白矾二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服二钱，一日二次，俱白滚水送下。

【主治】瘰疬。

12007　家秘胆星丸

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】陈胆星　青黛　海石　龙胆草　甘草

【主治】胆火成痰，痰火内扰不得眠。

12008　家秘祛痛散

【方源】《直指》卷六。

【组成】青皮（去瓤）　五灵脂（研飞，去砂净）　川楝子　川山甲各二钱　良姜（香油炒）　延胡索　没药各一钱五分　沉香一钱　八角茴香二钱　槟榔一钱五分　木香一钱二分　砂仁少许

【用法】上㕮咀为粗末，用木鳖子去壳一钱二分锉片，同前药炒令焦香，去木鳖子不用，共为末。每服一钱，加盐一星，用酒或滚水送下。

【主治】诸般心气疼痛，气滞不行，攻刺心腹，痛连胸胁，小肠吊疝，及妇人血气刺痛。

12009　家秘舒筋丸

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】当归二两　白芍药二两　知母二两　黄柏二两　秦艽四两　木瓜四两（上俱为末）　金银藤二斤　钩藤一斤　天门冬六两　怀生地六两　威灵仙四两（酒浸）　何首乌四两（蒸）

【用法】上将后六味水煎，去渣，收厚膏，拌前药末，打为丸。

【主治】内伤筋挛。

12010　家秘加味枳术丸

【方源】《直指》卷六。

【组成】白术（泔浸，土炒）二两　枳实（去瓤，麸炒）一两　神曲（炒）　麦芽（炒，研取粉）　陈皮（去白）　山楂肉　香附（炒）各一两　砂仁（炒）五钱

【用法】上为细末，荷叶烧陈老米饭为丸，如绿豆大。每服五十丸，用清米饮或滚水送下；如胸膈胀闷，枳壳汤送下；如伤酒，干葛汤送下。

【功用】宽中进食，和畅脾胃。

【主治】脾胃虚弱，饮食减少，胸膈膨闷，酒伤食积，气滞腹满。

【加减】脾胃虚弱者，加人参五钱。

【备考】本方方名，《医统》引作"加味枳术丸"。

12011　家秘烂口神效散

【方源】《寿世新编》。

【组成】顶上人中白一两五钱（煅过）　上孩儿茶四钱　洋青黛三钱（水飞）　苏薄荷二钱（去梗）　关黄柏一钱五分（炒）　明雄黄一钱　大梅片二三分（或五分）　青果核三钱（炕，研极细末）　制铜绿六分　枯白矾八分　鸡内金二钱（刷净秽，炕存性）　白硼砂一钱五分

【用法】共选道地药材，为极细末，瓷罐收贮，塞极紧。临用时，先用温水漱净口中涎秽，再蘸药少许搽烂处，含片刻，吐去毒涎，逾时又搽，数次即愈。

【主治】口舌牙龈腐烂疼痛，走马牙疳，烂喉诸症。

12012　浆水散

【方源】《保命集》卷中。

【异名】浆水饮（《会约》卷十）。

【组成】半夏二两（汤洗）　附子半两（炮）　干姜五钱　良姜二钱半　甘草五钱（炙）　桂五钱

【用法】上为细末。每服三五钱，浆水二盏，煎至一盏。和滓热服，甚者三四服，微者三服。

【主治】暴泄如水，周身汗出，一身尽冷，脉微而弱，气少不能语，甚至呕吐。

12013　资生汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生山药一两　玄参五钱　於术三钱　生鸡内金二钱（捣碎）　牛蒡子三钱（捣碎）

【主治】劳瘵羸弱已甚，饮食减少，喘促咳嗽，身热脉虚数者；亦治女子血枯不月。

【加减】热甚者，加生地黄五六钱。

12014　资生大造丸

【方源】年氏《集验良方》卷二。

【组成】人参二两　山药二两　山茱萸二两　补骨脂二两　五味子一两（去蒂）　川牛膝二两　覆盆子一两　楮实子一两　龟版一两（酥炙）　鹿角胶二两　生地一两　枸杞子一两　肉苁蓉二两　菟丝子一两　紫河车一具　白茯苓四两　川杜仲二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每早四钱，白开水或盐汤送下。

【功用】添精补髓，益气生血，固元阳，健脾胃，壮筋骨，安五脏，驱风湿，令人耳目聪明，不

受外邪，健步乌须。

【宜忌】 忌生姜、胡椒、生萝卜、油面，炒料等物。

12015 资生健乾丸

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】 秋石四两 鹿角霜四两 人参（拣明实者佳） 枸杞子 山茱萸肉 麦门冬（去心） 天门冬（去心） 杜仲（姜汁炒断丝） 生地黄 熟地黄（各酒浸）各二两

【用法】 上为末，老米面作糊为丸，如梧桐子大。男子每服五十丸，空心滚白汤送下。一月后，候女子月经方过，金水正生之时，男子空心服车前子汤半盏，至夜交会，即有子矣。

【主治】 丈夫少病而无子者。

【备考】 此种子良方，寒热不偏，君佐不紊，滋补无过。

12016 资液救焚汤

【方源】《法律》卷五。

【组成】 生地黄二钱（取汁） 麦门冬二钱（取汁） 人参一钱五分（人乳拌蒸） 炙甘草 真阿胶 胡麻仁（炒，研）各一钱 柏子仁七分（炒） 五味子四分 紫石英 寒水石 滑石各一钱（俱敲碎，研为末） 生犀汁（研）三分 生姜汁二茶匙

【用法】 上除四汁及阿胶，余八物用名山泉水四茶杯，缓火煎至一杯半，去滓，入四汁及阿胶，再上火略煎，至胶烊化斟出，调牛黄细末五厘，日中分二三次热服。空朝先服崔氏八味丸。

【主治】 五志厥阳之火而成之关格。

12017 烫火药

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】 烫火散（《中华人民共和国药典》一部）。

【组成】 地榆炭八两 黄柏四两 生大黄二两 寒水石（煅）二两 石膏（煅）四两

【用法】 共研为细粉，过罗。香油调敷患处。

【功用】 清热解毒。

【主治】 汤烫火灼，红肿起泡。

12018 烫伤膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 生地榆面六钱 乳香粉四钱 凡士林四两

【用法】 上调匀成膏，涂纱布上外贴，或制成油纱条外用。

【功用】 解毒止痛，润肤收敛。

【主治】 一二度烫伤。

12019 烫伤乳剂

【方源】《中药制剂汇编》引《赤脚医生》。

【组成】 白糖一斤 石灰三至五两 陈茶叶二至四两 桐油适量

【用法】 将陈茶叶加水6000毫升，煎至3000毫升，去滓搅匀，沉淀后过滤，再加白糖搅拌过滤，最后放入桐油适量，边加边搅拌，待成白色乳状即成。外涂，每日数次，不包扎，暴露伤面。

【功用】 制酸止痛。

【主治】 烫火伤。

12020 烫洗囊湿止痒药方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】 白鲜皮五钱 地肤子五钱 蛇床子五钱 独活四钱 川楝子四钱 吴茱萸四钱 小茴香五钱 川椒三钱 枯白矾二钱 明雄黄二钱 生甘草三钱

【用法】 上为粗末，装布袋内水煮熨洗。

【功用】 清热渗湿，祛风止痒。

【主治】 阴囊湿疹，瘙痒者。

12021 诸疮洗药

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 蛇床子 龙胆草 苦参子 石菖蒲 金银花 生甘草 明矾各等分

【用法】 上药煎汤，洗患处。

【主治】 疥疮、黄水疮、脓窠疮、坐板疮、湿癣等。

12022 诸疮一扫光

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】 一扫光（《嵩崖尊生》卷十二）。

【组成】 苦参 黄柏各一斤 烟胶一升 木鳖肉 蛇床子 点红椒 明矾 枯矾 硫黄 风子肉 樟冰 水银 轻粉各二两 白砒五钱

【用法】 上为细末，熟猪油二斤四两化开，入药搅匀作丸，如龙眼大，瓷瓶收贮，用时搽擦患处。

【主治】 痒疮。不论新久及身上下，或干或湿，异类殊形，但多痒少痛者。

【宜忌】 此方有毒，不可口服。

12023 诸葛行军散

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 麝香一钱 西牛黄一钱 珠粉二钱 冰片一钱二分 腰黄二钱 马牙消二分 姜粉四分

【用法】 上各取净末，共研至极细为度，分装七十瓶，每瓶约一分。每用一至二分，开水吞服。小儿减半。

【功用】 消暑解毒，辟秽利窍。

【主治】 中暑昏晕，腹痛吐泻，热症烦闷，及小儿惊闭。

12024 诸葛卧龙丹

【方源】《经验秘方类钞》卷上。

【组成】当门麝香一钱 灯草灰（用青竹筒装满，烧存性，净重）一两 猪牙皂角三角 闹洋花二钱 梅花冰片脑一钱 细辛二钱 西牛黄六分（产西戎者，非犀牛也，其体轻气香，置舌上先苦后甜，清凉透心者为真）

【用法】上为细末，贮瓷瓶中，勿令泄气。临用取少许搐鼻。误落水中，心头尚温，及自缢气管初闭，二便未行者，速用芦管速吹取嚏即醒；风火牙痛，以指头蘸药擦之；痈疽发背，及一切无名疔毒，用酒调涂；蜈蚣蛇蝎诸虫毒，及一切山岚瘴毒，亦用酒调涂；妇人胞衣不下，吹药取嚏即下；天行时疫，霍乱吐泻，腹中急痛，四肢发厥，顷刻垂危，用一分，开水调吞。

【主治】中寒中暑，猝然牙关紧闭，倾倒在地；及大人中风中痰，小儿急慢惊风；伤寒胸闷，胸膈壅滞，邪毒郁蒸；及瘟疫发热，外感头痛肢疼。

12025 诸葛解甲风

【方源】《内经拾遗》卷三引《医家必用》。

【异名】发汗散（原书同卷）、诸葛行军散（《良朋汇集》卷一）。

【组成】麻黄（去根节）八两 绿豆十两（连皮）

【用法】上为细末，用无根水半茶钟调服。量强弱加减，壮者钱半，次者一钱，十岁以下用五六分。不用被盖，其汗立出。

【功用】发汗。

【主治】①《内经拾遗》：夏月感冒。②《良朋汇集》：瘟疫。

12026 诸葛武侯平安散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】朱砂二钱 麝香 冰片各五厘 明雄黄硼砂各五分 白消二分

【用法】上研极细末，用小瓷罐收贮。每用清水，以骨簪点二三厘在大眼角内，如点眼药法。

【主治】干霍乱，欲吐不得，欲泻不能，变在须臾，名搅肠痧；或遍体紫黑，名乌痧胀。

【宜忌】点后，忌热茶、饮食半日。

【备考】原书治上症，先急用烧盐和阴阳水吐之，或用四陈汤服之，外用本方点眼角。

12027 读书丸

【方源】《医统》卷五十。

【组成】人参 远志 石菖蒲 菟丝子 生地黄 地骨皮 五味子 酸枣仁 当归 川芎各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心枣汤送下。

【功用】除百病，日记万言。

【主治】健忘。

12028 调卫汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】周卫汤（《奇效良方》卷四十四）。

【组成】苏木 红花各一分 猪苓二分 麦门冬 生地黄各三分 半夏（汤洗七次） 生黄芩 生甘草 当归梢各五分 羌活七分 麻黄根 黄耆各一钱 五味子七枚。

【用法】上㕮咀，如麻豆大，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，稍热服。

【主治】①《脾胃论》：湿胜自汗，卫气虚弱，表虚不任外寒。②《医心方》：湿胜自汗，一身尽痛，脉濡者。

【方论选录】《医方考》：风能胜湿，故用羌活；辛能燥湿，故用半夏；淡能渗湿，故用猪苓；湿伤气，黄耆，甘草、麦冬所以益气；湿伤血，苏木、红花、归梢所以消瘀；五味子、麻黄根，收汗液而固表虚；生地、黄芩、凉阴血而除湿热。

【备考】本方方名，《普济方》引作“调卫散”。

12029 调卫汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】黄耆三钱（蜜炙） 炒白术一钱 人参一钱半 炒苍术一钱 桂枝五分 白芍（酒炒）一钱半 五味子一钱半 炙甘草五分

【用法】水煎，去滓，温服。

【主治】卫虚多汗，脉浮软者。

【方论选录】卫虚气弱，不能卫外而腠理不密，故多汗不止，黄耆补卫气之虚，白术壮脾气之弱，人参扶元益气，苍术燥湿强脾，白芍敛阴，五味收津液，桂枝行阳气于卫，炙草益胃气于中。使气壮卫强，则腠理缜密而汗可自止，安有不能卫外之患乎？此强中益卫之剂，为卫虚自汗之专方。

12030 调元散

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】调元地黄汤（《幼科金针》卷上）。

【组成】干山药（去黑皮）五钱 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 茯神（去皮木根） 白术 白芍药 熟干地黄（酒洗） 当归（酒洗） 黄耆（蜜水涂炙）各二钱半 川芎 甘草（炙）各三钱 石菖蒲二钱

【用法】上㕮咀。每服二钱，以水一盏，生姜二

片，大枣一个，煎七分，温服，不拘时候。如婴孩幼嫩，与乳母同服。

【主治】 禀受元气不足，颅囟开解，肌肉消瘦，腹大如肿，致语迟行迟，手足如病，神色昏慢，齿生迟者。

12031 调中汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷二。

【组成】 白术 川芎 当归 熟地 人参 黄耆 苍术 甘草 陈皮 川断 香附 砂仁 柴胡 乌梅 大枣

【功用】 理顺三焦，养血安胎。

【主治】 妊娠四月，胎动不安。

12032 调中汤

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】 制厚朴 陈皮（去白） 制半夏各一两 白术一两半 人参五钱 甘草（炙）三钱

【用法】 上㕮咀。每服一两，水二盏，加生姜七片，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 腹胀胃虚空，关脉浮者。

12033 调中汤

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】 调中疏邪汤(《医学入门》卷七)。

【组成】 苍术一钱半 陈皮一钱 砂仁 藿香 芍药（炒） 甘草（炙） 桔梗 半夏 白芷 羌活 枳壳各一钱 川芎半钱 麻黄 桂枝各半钱

【用法】 上㕮咀。加生姜三片，水煎服。

【主治】 ①《丹溪心法》：内伤外感而发阴斑。②《伤寒绪论》：食积挟外感发热。

【方论选录】《医方考》，内伤则里热，外感则表热，两热而无泄，故令斑烂。内伤者，调其中，苍、陈、砂、藿、半、芍、枳、桔，皆调中药也；外感者，疏其表，麻、桂、羌、芎、芷、草，皆疏表药也。表里治而斑自愈矣。

12034 调中汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 白术一钱半（炒） 当归三钱 白芍一钱半（酒炒） 茯苓一钱半 木香一钱 香附二钱（酒炒） 苏梗三钱 续断三钱（酒炒） 杜仲三钱（酒炒） 砂仁一钱（炒）

【用法】 水煎，去滓，温服。

【主治】 孕妇腹痛脉弦。

【方论选录】 妊娠血气不调，不能荣养其胎，故腹中疼痛，胎孕不安。白术健脾生血以安胎；当归养血荣经以养胎；木香开胃醒脾，力能调气和中；白芍敛阴和血，性善除痛固胎；茯苓渗湿和脾气；香附调气解郁结；苏梗顺气安胎；砂仁醒脾开胃；续断续经脉；杜仲补腰肾。水煎温服，使血气调和，则胎得所养而胎无不安，何腹痛之不止哉。

12035 调中散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 北沙参三两 荷叶（去筋净）一两 广陈皮（浸去白）一两 茯苓一两 川贝母（去心，粘米拌炒）一两 丹参二两 陈仓米（炒熟）三两 五谷虫（酒炒焦黄）一两

【用法】 上为细末。每服二钱，用米饮调下，一日三次。

【功用】 开关和胃。

【主治】 噎膈。

12036 调中散

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】 青木香 川楝子 暗没药 白茯苓 上肉桂 杭青皮 莱菔子 陈枳壳 尖槟榔 炙甘草 各等分

【用法】 入葱白二寸，盐一钱，水煎，空心服。

【主治】 婴儿盘肠气，腹内筑痛。

12037 调气汤

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】 白芍药 陈皮 生地黄 黄柏（盐水炒） 香附子（醋制） 知母（盐水炒） 当归身各一钱 枳壳 白茯苓各八分 甘草（用生梢）五分

【用法】 上锉碎。白水二钟，煎至一钟，去滓热服；服此药后，兼服磁朱丸。

【主治】 因暴怒，以致瞳神散大者。

12038 调气汤

【方源】《衡要》卷六。

【组成】 白蔻一两 丁香一两 檀香五钱 砂仁五钱 炙草一两 木香五钱

【用法】 共为细末。每服三五钱，以盐沸汤调服，或八味顺气散亦妙。

【主治】 气郁作厥。

【方论选录】《经》云：辛以散气。用白豆蔻、丁香、檀香、木香、砂仁、藿香等诸辛窜以行壅滞之气，甘草缓中和药。

12039 调气汤

【方源】《证治汇补》卷六。

【异名】 调气散(《医略六书》卷二十三)。

【组成】 香附 乌药 陈皮 青皮 砂仁 甘草 木香 藿香

【用法】 水煎服。

【主治】 气逆心痛。

【方论选录】《医略六书》：暴怒伤肝，肝气上逆，横于胃口，而胃气不化，故心痛不止。香附调气解郁，青皮破气平肝；乌药顺气以降浊；木香调气以和胃；陈皮利气除痰；甘草缓中和药；藿香开胃气；砂仁醒脾气。使脾胃调和，则肝木自平而逆气自降，胃气调和，心痛无不霍然矣。此降气平肝之剂，为气逆心痛之专方。

【备考】《医略六书》本方用：香附一钱半（炒），乌药一钱半，青皮一钱半（炒），木香一钱，陈皮一钱半，藿香一钱半，甘草五分，砂仁一钱（炒）。水煎去滓，温服。

12040 调气饮

【方源】《金匮玉函经·附遗》。

【组成】黄蜡三钱　阿胶三钱

【用法】上同溶化，入黄连末五钱搅匀，分三次热服。

【主治】赤白痢，少腹痛不可忍，下重，或面青，手足俱变者。

12041 调气散

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】生姜半两　葱一茎（根叶并用）　盐一捻　豆豉三十粒

【用法】捣烂，安脐中。良久即通。

【主治】老人大小便不通。

12042 调气散

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】槟榔一钱半　紫苏一钱半　枳壳一钱半（炒）　青皮一钱半（炒）　郁金一钱半　乌药一钱半　香附三钱（炒）　厚朴一钱半（制）　泽泻一钱半　桔梗八分　生姜三片

【用法】水煎去滓，温服。

【主治】肢面浮肿，腹胀便闭，脉弦实者。

【方论选录】气实肝脾，邪更闭遏，而湿伏不化，故肢面浮肿，腹胀便闭。槟榔、枳实破滞宽胀；紫苏、厚朴散肿除满；乌药散浊气以顺气；青皮破滞气以平肝；郁金散气解郁；香附解郁调经；桔梗利咽膈；泽泻通利膀胱；生姜之温散，佐降药以通闭结也。使邪解气行则肝脾调和，而胃气无不化，安有大便不通腹胀不退乎？此散肿宽胀之剂，为气壅邪遏之专方。不论男妇，皆可施治。

12043 调饥散

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】人参五分　山药一两　白芍三钱　甘草五分　肉桂一钱　菖蒲五分　肉豆蔻一个　炒枣仁三钱

【用法】水煎服。

【主治】未见饮食则思，既见饮食则厌，勉强进用，饱塞于上脘，微微胀闷，由胃气之虚、心包之火不足使然。

12044 调阴汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】当归一钱半　川芎一钱　白芍（酒炒）一钱　生地二钱　阿胶（炒）一钱　丹参三钱　陈皮八分　续断一钱半　青蒿一钱半

【用法】水煎服。

【主治】伤寒热入血室，下血谵语，烦躁不宁。

【加减】如血热而下，加赤芍一钱半，青蒿加重；如血虚燥热，加熟地三、五钱；如瘀血作梗，血滞紫色，加酒炒元胡二钱，红花六、七分；如邪未散而寒热时有者，加柴胡一钱半。

12045 调肝汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】山药五钱（炒）　阿胶三钱（白面炒）　当归三钱（酒洗）　白芍三钱（酒炒）　山萸肉三钱（蒸熟）　巴戟一钱（盐水浸）　甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】平调肝气，既能转逆气，又善止郁疼。

【主治】妇人肾气涸，行经后少腹疼痛。

12046 调肝饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归　川芎　乌药　玄胡索　青皮各一钱五分　柴胡　槟榔　广木香　桃仁（去皮尖）各一钱

【用法】水煎，热服。

【主治】季胁痛连小腹。

12047 调肝散

【方源】《外台》卷二十一引《深师方》。

【组成】细辛　柏实各二两　蕤仁　甘草（炙）各一两　羊肝一具（去脂膜，炙干）

【用法】上为散。每服方寸匕，以酒送服。

【主治】肝气之少，眼视眩眩，面目青，眼中眵泪，不见光明。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生菜、猪肉、冷水、桃李、雀肉等。

12048 调肝散

【方源】《直指》卷十八。

【组成】半夏（制）三分　辣桂　宣木瓜　当归　川芎　牛膝　细辛各二分　石菖蒲　酸枣仁（汤浸去皮，微炒）　甘草（炙）各一分

【用法】上锉细。每服三钱，加生姜五片，大枣

一个煎服。

【主治】 ①《直指》：郁怒伤肝，发为腰痛。②《张氏医通》：小腹偏左结痛。

12049 调经丸

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】 香附半斤（童便、酒、醋各浸一分，生一分，俱酒炒） 川杜仲（姜汁炒）半斤 大川芎 白芍药 当归（去尾） 怀生地 广陈皮 小茴香（酒炒） 玄胡索（略炒） 肉苁蓉（酒浸） 旧青皮（麸炒） 台乌药（炒） 枯黄芩（酒炒） 乌贼鱼骨（酥炙）各四两

【用法】 上为末，醋和面打糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心好酒送下。

【功用】 调经种子。

12050 调经丸

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】 当归 陈皮 白芷 牛膝 三棱 蓬术（醋制） 玄胡索各一两 白术 川芎 枳壳 小茴香 熟地各一两五钱 香附二两 粉草五钱

【用法】 醋煮粳米为丸，如梧桐子大。每服九十丸，空心米饮或酒送下。先服逍遥散，次服加味八珍汤，再服此方。

【功用】 补气血，扶脾胃，调经水。

【主治】 室女十七八岁，脾胃虚弱，误食生冷，经脉不通，或阻百日，或半年，颜色青黄，饮食少进，寒热往来，四肢困倦，头痛目弦，肚腹疼痛，五心烦热，呕吐膨胀。

12051 调经汤

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】 香附（童便制）四两 炙甘草一两 茯神一两五钱 陈皮（泡去白，炒）二两。

【用法】 上为末。每服二钱，空心用滚汤调下。

【主治】 月经不调而无子者。

12052 调经汤

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】 当归 玄胡索 白术各二钱 香附 白芍 生地各一钱 川芎 陈皮 丹皮各八分 甘草六分 益母草三钱

【用法】 月经来日，空心服。

【主治】 瘀积经闭。

12053 调经饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 当归三至五钱 牛膝二钱 山楂一至二钱 香附二钱 青皮 茯苓各一钱半

【用法】 水二钟，煎七分，食远服。

【主治】 妇人经脉阻滞，气逆不调，多痛而实者。

【加减】 如因不避生冷而寒滞其血者，加肉桂、吴茱萸之类；如兼胀闷者，加厚朴一钱，或砂仁亦可；如气滞者，加乌药二钱；或痛在小腹者，加茴香一钱半。

【备考】《会约》有玄胡索、陈皮，无青皮。

12054 调经散

【方源】《产育宝庆集》卷上。

【异名】 小调经散（《妇人良方》卷二十二）、小调经汤（《医统》卷八十五）。

【组成】 没药（另研） 琥珀（另研） 桂心 赤芍药 当归 细辛 麝香（另研）各半钱

【用法】 上为末。每服半钱匕，生姜汁，温酒各少许调匀服。

【主治】 ①《产育宝庆集》：产后四肢浮肿。因产后败血停积于五脏，循经流入于四肢，留淫日深，腐败如水，故令四肢面目浮肿。②《局方》（续添诸局经验秘方）：产后败血上干于心，心不受触，致心烦躁，卧起不安，如见鬼神，言语颠倒。

【备考】 本方加炙甘草，名“调经汤”（见《妇科玉尺》），又名“调经饮”（见《医级》）。

12055 调经散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】 当归一钱半 川芎 桂心 甘草各五分 熟地黄 白芍药 香附子 莪术 苏木各一钱 木通八分 红花三分 桃仁二十个（去皮尖，研细）

【用法】 上细切。用水一盏半，煎至一盏，去滓，空心温服。

【主治】 月经过期不行。

12056 调经散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 香附米 当归尾各一两 大黄五钱（蒸） 黄芩二两 黄连 生地黄 赤芍药 川芎 羌活 栀子 薄荷 木贼 苏木 红花 甘草各一两

【用法】 为散服。

【功用】 下气破血通经。

【主治】 室女或肥壮妇人血热经闭，过期不行，则血逆于上，血灌瞳仁，满眼赤涩者。

12057 调荣汤

【方源】《直指》卷二十六。

【组成】 川芎 当归 芍药 生干地黄 三棱 莪术 白芷 延胡索 蒲黄 香附子 泽兰 细辛 川白姜 厚朴（制） 桃仁（浸，去皮，焙）各二

分 辣桂 半夏（制） 甘草（炙）各二分

【用法】 上锉散。每服三钱，加生姜、大枣，水煎。食前服。

【主治】 妇人瘀血不消，脐腹引腰背俱痛。

12058 调荣饮

【方源】《直指》卷十七。

【异名】 调荣散（《赤水玄珠》卷五）。

【组成】 华阴细辛 莪术 辣桂 赤芍药 延胡索 当归 川芎 白芷 槟榔 大腹皮 桑白皮（炒） 瞿麦穗 赤茯苓 陈皮 荸荠（炒香） 大黄（湿纸煨）各一分 甘草（炙）一分半

【用法】 上锉。每服三钱，加生姜、大枣，水煎，食前服。

【主治】 瘀血留滞，血化为水，四肢浮肿，皮肉赤纹，名曰血分。

12059 调息丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】 陈皮 蔻仁 射干 紫菀 桑皮 桔梗 石碱 海浮石 旋覆花

【用法】 水泛为丸。

【功用】 降气清热，开痰散结。

【主治】 息贲。右胁下如覆盆状，令人洒洒寒热，背痛呕逆，喘咳。

【备考】《外科证治全书》有白芥子。

12060 调营丸

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】 香附一斤（醋浸炒） 莪术二两（醋炒） 当归八两

【用法】 上为末，醋糊为丸。每服三钱，红花子汤送下。

【主治】 经愆积癖块刺痛，脉弦牢者。

【方论选录】 气滞不行，血亦留止，结成痃癖积块，故腹中刺痛，天癸愆期。香附调气解郁结，莪术破结削积坚，当归养营血以活血脉。醋丸化癖痃消积块，红花子汤下，散血结调天癸。使血活气行，则痃癖积块自消，而腹中刺痛无不退，天癸愆期无不调矣。此调经消积之剂，为痃癖积块痛经之专方。

12061 调营散

【方源】《风劳臌膈》。

【组成】 莪术 川芎 当归 前胡 白芷 槟榔 赤芍 桑皮 瞿麦 大腹皮 赤苓 荸荠各一钱 大黄一钱半 细辛 官桂 炙草各五分 生姜三片 大枣三个

【主治】 瘀血留滞，血化为水，四肢浮肿，皮肉赤纹，名曰血分。

【备考】 此方只作一服，不欲多用，倘服后不减，未可再服，且再用活血补气之药调三五日，徐进此药，虚甚者，此参、附合用，得大力主持其间驱逐之，始能建功也。

12062 调脾汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】 人参五钱 玄参一两 麦冬五钱 甘菊花五钱 苡仁五钱 金钗石斛三钱 芡实一两 山药五钱

【用法】 水煎服。

【功用】 益太阴之阴水，以胜其阳明之阳火。

【主治】 阳明之火，固结于脾而不肯解，善用肥甘之物，食后即饥，少不饮食，便觉头红面热，两足乏力，不能行走。

12063 调痛散

【方源】《直指》卷六。

【组成】 木香 丁香 檀香 大香附 天台乌药 莪术（煨） 辣桂 片姜黄 生白姜 白豆蔻仁 缩砂仁 甘草（炙）各等分

【用法】 上锉。每服二钱半，加紫苏四叶，水煎服。

【主治】 脾疼气膈。

12064 调卫养荣汤

【方源】《医统》卷八十二引《集验方》。

【组成】 陈皮 白术 当归 生地黄 沙参 麦门冬各一钱 牡丹皮 地骨皮各八分 桔梗 柴胡梢各五分 谷芽一钱 甘草四分

【用法】 上加莲子、生姜、大枣，水煎，早、晚服。

【主治】 妇人室女月经不调，或先或后，或经闭不通，憎寒壮热，口苦无味，饮食少思，连声咳嗽，烦躁头眩，渐成痨证者。

【加减】 痰中带血，加侧柏枝；烦躁口干者，加炒山栀，倍麦门冬；胁下胀疼，加青皮、川芎；胸膈满闷，加黄连（姜炒）、枳实，去麦冬、地骨皮；夜出盗汗，加黄连、黄耆，去柴胡、桔梗；大便闭结，加桃仁，倍当归；咳嗽不已，加瓜蒌、阿胶；头眩头痛，加天麻、川芎；小水不利，加木通、茯苓；烦渴不利，加滑石、倍麦门冬。

12065 调元生脉散

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】 黄芩 人参 麦门冬 甘草 五味子

【用法】 水煎服。

【主治】 小儿伤暑发热，身热，自汗，作渴，昏

睡，手足冷。

12066 调元百补膏

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】当归身（酒洗）四两 怀生地黄二斤 怀熟地黄四两 甘枸杞子一斤 白芍（米粉炒）一斤 人参四两 辽五味子一两 麦门冬（去心）五两 地骨皮四两 白术（去芦）四两 白茯苓（去皮）十二两 莲肉四两 怀山药五两 贝母（去心）三两 甘草三两 琥珀一钱三分 薏苡仁（用米粉炒）八两

【用法】上锉细末，和足水十斤，微火煎之，如干，再加水十斤，如此四次，滤去滓，取汁，文武火熬之，待减去三分，每斤加炼净熟蜜四两，春五两，夏六两，共熬成膏。每服三匙，白汤调下。

【功用】养血和中，宁嗽化痰，退热定喘，止泻除渴。

【主治】五劳七伤，诸虚劳极，元气虚损，脾胃亏弱。

【加减】吐血，加牡丹皮二两；骨蒸，加青蒿汁、童便各两碗，同热服之。

12067 调元肾气丸

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】淮生地（酒煮捣膏）四两 山萸肉 山药 牡丹皮 白茯苓各二两 人参 当归身 泽泻 麦门冬（捣膏） 龙骨 地骨皮各一两 木香 砂仁各三钱 黄柏（盐水炒） 知母（童便炒）各五钱

【用法】上为末，鹿角胶四两，老酒化稠，加蜜四两，同煎滴水成珠，和药为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心温酒送下。

【主治】房欲劳伤，忧恐损肾，致肾气弱而骨失荣养，遂生骨瘤，其患坚硬如石，形色或紫或不紫，推之不移，坚贴于骨，形体日渐衰瘦，气血不荣，皮肤枯槁，甚者寒热交作，饮食无味，举动艰辛，脚膝无力者。

【宜忌】忌白萝卜、火酒、房事。

12068 调元固系丸

【方源】《医级》卷九。

【组成】熟地六两（蒸晒） 当归 白芍 川断（俱酒炒） 阿胶各三两 人参（片焙）一两 白术（土炒） 茯苓（人乳拌蒸） 甘草（蜜炙） 杜仲（盐水炒） 山药（米泔制） 菟丝（酒制） 香附（酒醋分制） 麦冬 血余（真者片研） 燕窝（煮捣） 藕节各二两（切片） 二蚕绵四两（剪炒另研）

【用法】先将地黄、燕窝捣烂，后入炒制诸药，以糯米粥饮浓汁打糊作丸，如梧桐子大。每服三四钱，早晚龙眼汤送下，白汤米饮亦可。

【主治】妊娠气血不足，冲任虚而胎系不固，屡孕屡堕。

【宜忌】忌食发气、助火、生痰、生冷等物。

12069 调元健步丸

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】当归（酒洗） 川黄柏（盐酒炒） 枸杞各二两 牛膝三两（盐酒浸） 白芍药（微炒） 白茯苓 白术（炒） 苍术 陈皮各一两 炙甘草三钱 木瓜 五加皮各八钱 川续断七钱 泽泻 防己各五钱

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸或百丸，空心盐汤送下。

【主治】阴虚血少，湿热兼行，足履无力。

12070 调中二陈汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 枳壳 大腹皮 红花 川芎 当归 白芍各八分 防风 槟榔 黄耆 桔梗 青皮 乌药 苏木 枳实 黄芩 紫苏各六分 木香三分

【用法】用水二钟，加生姜三片，大枣二个，煎八分，不拘时服。

【主治】跌扑损伤，或从高坠下，以致瘀血流入脏腑，昏沉不醒，大小便秘；及木杖后瘀血内攻肚腹，膨胀结胸，不食恶心，干呕，大便燥结，已服行药之后。

12071 调中大成汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】白术 茯苓 归身 白芍 陈皮 山药 牡丹皮 黄耆各一钱 人参二钱 藿香 砂仁 远志 甘草各五分 附子 肉桂各八分

【用法】上用水二钟，加煨姜二片，大枣二个，煎八分，食远服。

【主治】流注溃后，脓水清稀，饮食减少，不能生肌收敛。

12072 调中平胃丸

【方源】《摄生秘剖》卷二。

【组成】人参五钱 黄耆（蜜炙） 陈皮各二两 甘草（蜜炙） 苍术（酒浸炒） 厚朴（姜汁炒） 木香各一两

【用法】上为末，米糊为丸，如椒目大。每服三钱或二钱，食后白滚汤送下。

【主治】脾胃虚弱，中气不调。

【方论选录】 人参、黄耆、甘草甘温之品，甘者中之味，温者中之气，气味皆中，故能调补中气；而苍术、厚朴之苦辛皆平胃中敦阜之气；陈皮、木香之辛香能去胃中陈腐之气。夫敦阜之气平，陈腐之气去，宁有不调之中乎。

12073 调中沉香汤

【方源】《局方》卷三。

【异名】 沉香汤（《普济方》卷二十二引《简易方》）。

【组成】 麝香（研）半钱 沉香二两 生龙脑（研）一钱 甘草（炙）一分 木香 白豆蔻仁各一两

【用法】 上为细末，入研药和匀，每服半钱，食后用沸汤点服；或入生姜一片，盐少许亦得。

【功用】 调中顺气，除邪养正。常服饮食增进，脏腑和平，肌肤光悦，颜色光润。

【主治】 心腹暴痛，胸膈痞满，短气烦闷，痰逆恶心，饮食少味，肢体多倦。

12074 调中思食丸

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】 陈曲（捣碎，炒黄色） 陈橘皮（汤浸去白，焙） 人参 麦芽（炒黄色） 钟乳粉 槟榔（大者，锉） 白术 半夏曲 枳壳（去瓤麸炒）各半两

【用法】 上除钟乳别入外，余为细末，拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温米饮送下。

【主治】 脾胃气虚弱，肌体羸瘦。

12075 调中顺气丸

【方源】《医学发明》卷三。

【组成】 木香 白豆蔻仁 青皮（去白） 陈皮（去白） 京三棱（炮）各一两 半夏（汤洗七次）各二两 缩砂仁 槟榔 沉香各半两

【用法】 上为细末，水糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至五十丸，煎陈皮汤送下。

【主治】 三焦痞滞，水饮停积，胁下虚满，或时刺痛。

12076 调中益气汤

【方源】《脾胃论》卷中。

【组成】 黄耆一钱 人参（去芦头） 甘草 苍术各五分 柴胡 橘皮 升麻各二分 木香一分或二分

【用法】 上锉，如麻豆大，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，带热服，宿食消尽服之。

【主治】 脾胃虚弱，四肢满闷，肢节烦疼，难以屈伸，身体沉重，烦心不安，忽肥忽瘦，四肢懒倦、口失滋味，腹难舒伸，大小便清利而数，或上饮下便，或大便涩滞不行，一二日一见；夏月飧泄，米谷不化，或便后见血、见白脓，胸满短气，膈咽不通，或痰嗽稠粘，口中沃沫，食入反出，耳鸣耳聋，目中流火，视物昏花，胸肉红丝，热壅头目，不得安卧，嗜卧无力，不思饮食，脉弦洪缓而沉，按之中之下得，时一涩。

【加减】 如时显热燥，是下元阴火蒸蒸发也，加真生地黄二分、黄柏三分；如大便虚坐不得，或大便了而不了，腹中常逼迫，血虚血涩也，加当归身；如身体沉重，虽小便数多，亦加茯苓二分，苍术一钱，泽泻五分，黄柏三分；如胃气不和，加汤洗半夏五分，生姜三片，有嗽者，去人参，加生姜、生地黄各二分；如痰厥头痛，加半夏二分；如腹中气不得运转，更加橘皮一钱。

【方论选录】《医方考》：脾胃不调者，肠鸣、飧泄、膨胀之类也；气弱者，语言轻微，手足倦怠也。补可以去弱，故用人参、黄耆、甘草甘温之性行，则中气不弱，手足不倦矣；苍术辛燥，能平胃中敦阜之气；升麻、柴胡轻清，能升胃家陷下之气；木香、陈皮辛香，能去胃中陈腐之气。夫敦阜之气平，陷下之气升，陈腐之气去，宁有不调之中乎？

【备考】《兰室秘藏》有黄柏，无木香。

12077 调中益气汤

【方源】《东垣试效方》卷一。

【组成】 黄耆一钱 人参（去芦）半钱 甘草（炙）半钱 陈皮二分 五味子七粒 芍药三分 白术五分 当归五分 升麻二分 柴胡二分

【用法】 上㕮咀，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】 因饥饱劳役，损伤脾胃，元气不足。其脉弦或洪缓而沉，按之无力，中之下，时得一涩。其证身体沉重，四肢倦懒，百节烦疼，胸满短气，膈咽不通，心烦不安，耳鸣耳聋，目有瘀肉，热壅如火，视物昏花，口中沃沫，饮食失味，怠惰嗜卧，忽肥忽瘦，溺色变，或清利而数，或上饮下便，或夏月飧泄，腹中虚痛，不思饮食。

【加减】 如下元阴火蒸蒸发，燥热者，加生地黄二分；如咳嗽，加五味子十粒；腹中气不转运者，更加陈皮三分、木香二分；身体沉重，虽小便数多，加茯苓二钱、苍术一钱、泽泻半钱、黄柏三分；如胃气不和，加汤洗姜制半夏五分；痰厥头疼，加半夏；如夏月，须加白芍药三分，以补肺气

不足；如春夏腹疼，尤宜加芍药；恶热燥渴而腹疼者，更加白芍药半钱；严寒腹疼，加中桂二钱；如冬月腹疼，不可用芍药，以太寒故也，只加干姜二分，或加半夏四分（姜制）。

【方论选录】《内经》云：劳则气耗，热则伤气，以黄耆、甘草之甘泻其热邪为主，以白芍、五味子之酸，能收耗散之气；又《经》云：劳者温之，损者温之，以人参甘温补气不足，当归辛温补血不足为臣；以白术、陈皮苦甘温除胃中客热，以养胃气为佐；升麻、柴胡苦平，味之薄者，阴中之阳，为脾胃之气下溜，上气不足，故从阴引阳以辅之，又行阳明少阳二经为使也。

12078 调中益气汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】黄耆 人参 甘草（炙） 苍术（米泔浸，炒） 川芎各六分 升麻 柴胡 陈皮 黄柏（酒炒） 蔓荆子各三分 当归六分 细辛二分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】气血两虚之头痛。

12079 调中益气汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】人参一钱半 黄耆（蜜炙）三钱 白术（炒）一钱半 苍术（炒）一钱 当归二钱 白芷一钱 升麻五分 柴胡五分 陈皮一钱半 甘草五分

【用法】水煎去滓，温服。

【主治】中虚湿伏，抑遏清阳，恶寒终日不罢，脉缓弱者。

【方论选录】劳伤中气，湿遏清阳，营气不能分布，故恶寒终日不罢。人参、黄耆扶元，补中气；苍术、白术燥湿健脾阳；甘草缓中和胃；当归养血益营；升麻、柴胡升九天之阳；陈皮、白芷调中气以疏湿郁。俾气壮脾强，则清气上升，而营运有权，湿邪自化，恶寒无不自止。此调中升阳之剂，为湿伏阳陷恶寒之专方。

12080 调气平胃散

【方源】《医统》卷三十九。

【异名】调气和胃散（《赤水玄珠》卷十六）。

【组成】白豆蔻 丁香 檀香 木香各二钱 藿香 砂仁各四钱 甘草六钱 苍术八钱 厚朴五钱 陈皮五钱

【用法】上为末。每服二钱，加生姜、大枣，煎汤，入盐少许调服。

【主治】①《医统》：卒暴尸厥，触犯邪气，昏晕卒倒无所知。②《景岳全书》：胃气不和，胀满腹痛。

12081 调气四物汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】当归 酒白芍各9克 酒生地12克 川芎3克 陈皮 香附各6克 五味子3克

【功用】行气活血，收敛瞳神。

【主治】瞳神受损而散大者。

【方论选录】方中四物汤活血养血；陈皮、香附理气以助血行；五味子收敛瞳神。诸药合用，共起养血活血，行气缩瞳之功。

12082 调气养神汤

【方源】《裹中参西》上册。

【组成】龙眼肉八钱 柏子仁五钱 生龙骨（捣碎）五钱 生牡蛎（捣碎）五钱 远志（不炙）二钱 生地黄六钱 天门冬四钱 甘松二钱 生麦芽三钱 菖蒲二钱 甘草一钱半 镜面朱砂（研细，用头次煎药汤两次送服）三分

【用法】磨取铁锈浓水煎药。

【功用】养神明，滋心血，理肝气，清虚热。

【主治】其人思虑过度，伤其神明，或更因思虑过度，暗生内热，其心肝之血，消耗日甚，以致心火肝气，上冲头部，扰乱神经，致神经失其所司，知觉错乱，以是为非，以非为是，而不致于疯狂过甚者。

【方论选录】龙眼肉色赤入心，且多津液，最能滋补血分，兼能保和心气之耗散，故以之为主药；柏树杪向西北，禀金水之精气，其实采于仲冬，饱受霜露，且多含油质，故善养肝，兼能镇肝（水能养木，金能镇木），又与龙骨，牡蛎之善于敛戢肝火、肝气者同用，则肝火肝气自不挟心火上升，以扰乱神经也；用生地黄者，取其能泻上焦之虚热，更能助龙眼肉生血也；用天门冬者，取其凉润之性，能清心宁神，即以开燥痰也；用远志、菖蒲者，取其能开心窍，利痰涎，且能通神明也；用朱砂、铁锈水者，以其皆能镇安神经，又能定心平肝也；用生麦芽者，诚以肝为将军之官，中寄相火，若但知敛之镇之，或激动其反应之力，故又加生麦芽，以将顺其性，盖麦芽炒用能消食，生用则善舒肝气也。至于甘松，用之以清热、开瘀、逐痹，兼有安养神经之效。

12083 调气暖宫丸

【方源】《济阴纲目》卷六。

【组成】当归（酒洗） 川芎 肉桂各二钱 白芍药（煨） 香附 艾叶（醋炒） 阿胶（蛤粉炒成珠）各四两。

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米汤送下。

【主治】 宫冷不孕。

12084 调肝细辛散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】 细辛散(《普济方》卷八十五)。

【组成】 细辛一两 蕤仁二两（汤浸，去赤皮） 柏子仁二两（微炒） 甘草一两（炙微赤，锉） 羊子肝二具（细切，炙干）

【用法】 上为细散。每服二钱，空心以温酒调下，晚食前再服。

【主治】 肝气虚乏，视物眩眩、欲成青盲、面目青、眼中炙泪。

12085 调补中州散

【方源】《会约》卷十三。

【组成】 人参（无者，以时下生北条参二三两代之） 腿白术（制）三两 茯苓二两 苡仁（炒） 山药（炒） 白扁豆（炒） 芡实（炒）各二两半 陈皮八钱 桔梗一两 元砂仁（去壳炒）七钱 干姜（炮）六钱 甘草（炙）八钱 神曲（炒）七钱 白莲肉（炒）一两 陈米（炒黄，少淬水再炒）一两半

【用法】 共研细末。每服五六钱，开水调服，大小悉宜。如犹有虫者，用川椒皮、苦楝根皮煎水调服，五更时再细嚼使君子肉四枚；如腹大而胀，是有积者，加谷虫七钱，共研末服；如口无味者，姜枣煎汤调服；如大便泄者，加肉豆蔻（面包煨）一两，同研末服；如胃寒气滞作痛者，用真藿香煎水调服。

【主治】 一切脾胃虚寒，饮食少思，腹胀倦怠，泄泻嗳气，及虫积下后。

12086 调和肺胃汤

【方源】 方出《蒲辅周医疗经验》，名见《古今名方》。

【组成】 全瓜蒌四钱 薤白三钱 法半夏三钱 厚朴二钱 炒枳壳二钱 苏梗二钱 陈皮二钱 生姜二钱 麦芽二钱

【用法】 一剂二煎，共取 160 毫升，分二次温服。

【功用】 调和肺胃，温化痰湿。

【主治】 痰滞胸膈，肺胃不和之胸痹。左胸闷痛，腹胀，咳痰不多，消化力弱，舌苔白腻，脉浮候缓，中候弦滑，沉候有力者。

12087 调和营卫汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 川芎 当归 陈皮 独活各一钱 赤芍 白芷 乌药 大茴香 黄耆各八分 炙甘草 红花各五分

【用法】 水二钟，煎八分，入酒一杯，量病上下服。

【主治】 流注初起，气血凝聚，结肿不散，已成未成者。

【加减】 病在下部者，加牛膝。

12088 调经乌鸡丸

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】 白毛乌骨未炖雄鸡一只（约重一斤，以糯米喂七日，勿令食虫蚁，以绳缢死，干捋其毛，去肚内杂脏不用，纳生地黄、熟地黄、天门冬、麦门冬各二两于鸡肚内，以好酒十碗，文火煮烂，取出肚内药，将鸡连骨用桑柴火焙干，仍以前煮过之生地等药酒，又浸又焙，至鸡骨肉枯为度，研极细末） 人参五钱 肉苁蓉（酒洗净） 炒破故纸 砂仁 当归 白术 川芎 丹参 茯苓 甘草（炙） 杜仲（盐水炒）各一两 香附米（醋制）四两

【用法】 共为细末，入鸡骨肉末和匀，酒面糊为丸。每服五十丸，空心米汤下。

【主治】 月经愆期。由脾胃虚弱，冲任损伤，气血不足，致经来或前或后。

12089 调经过期汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】 熟地二钱 当归一钱 白芍八分 丹参八分 吴萸八分 白术一钱 香附一钱 川芎八分

【用法】 水煎服。

【功用】 调经。

【主治】 月经过期。

12090 调经补真汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 调经固真汤(《东垣试效方》卷四)。

【组成】 独活 干姜（炮） 藁本 防风 苍术各二分 麻黄（不去节） 炙甘草 人参（去芦） 当归身 白术 生黄芩 升麻各五分 黄耆七分 良姜 泽泻 羌活各一钱 柴胡四钱 杏仁二个 桂枝少许 白葵花七朵（去萼）

【用法】 上㕮咀，除麻黄、黄芩各另外，都作一服。先以水三大盏半，煎麻黄一味令沸，掠去沫，入余药同煎至一盏零七分，再入生黄芩煎至一盏，空心服之。候一时许，可食早饭。

【主治】 冬后一月，白带再来，阴户中寒。

12091 调经种子丸

【方源】《摄生秘剖》卷三。

【组成】 当归（酒洗）四两 川芎（微炒）一两 白芍（炒）三两 熟地黄四两 白术（土炒）三两 白茯苓三两 人参一两 甘草（蜜炙）一两 制香附三两 阿胶（炒珠）三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心白汤送下。

【主治】 妇人月经不调，久不受孕。

12092 调经种玉汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【异名】 调经种子汤（《外科全生集》卷二）。

【组成】 当归身八钱 川芎四钱 熟地一两 香附六钱（炒） 白芍（酒炒）六钱 茯苓（去皮）四钱 陈皮三钱 吴茱萸（炒）三钱 丹皮三钱 玄胡索三钱

【用法】 上锉，作四贴。每剂加生姜三片，水一碗半，煎至一碗，空心温服；滓再煎，临卧时服，经至之日服起，一日一服，药完经止，则当入房，必成孕矣，纵未成孕，经当对期，俟经来再服最效。

【功用】 调经种子。

【主治】《寿世保元》：妇人无子。因七情所伤，致使血衰气盛，经水不调，或前或后，或多或少，或色淡如水，或紫色如块，或崩漏带下，或肚腹疼痛，或子宫虚冷，不能受孕。

【加减】 若过期而经水色淡者，乃血虚有寒也，加官桂、炮姜、熟艾各一钱；若先期三五日色紫者，血虚有热也，加条芩三钱。

12093 调经养血丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】 香附十二两（酒、醋、盐汤、童便各浸三日，取出炒） 当归（酒洗） 白芍（酒炒）各二两 川芎一两 生地黄（酒洗）二两 茯苓（去皮） 白芷各一两 牡丹皮（酒洗） 干姜（炒）一两 肉桂一两 红花一两 桃仁（泡去皮）一两 玄胡索六钱 没药一两 半夏（香油炒）一两 甘草（炙）一两 小茴（炒）三钱 莪术（煨，醋炒）五钱 阿胶（蛤粉炒成珠）一两

【用法】 上为末，醋糊为丸。每服八十丸，空心白汤、黄酒任下。

【主治】 妇女经脉不行或不调，或前或后，赤白带下，久不成孕。

12094 调经养荣汤

【方源】《内经拾遗》卷一引《经验秘方》。

【组成】 归身一钱半 川芎七分 白芍八分 熟地一钱 生地五分 丹参八分 玄胡六分 丹皮五分 香附一钱 陈皮七分 白术八分 砂仁二分 红蓝花三分

【用法】 上以水二钟，煎八分，空心服。

【主治】 血枯经闭。

12095 调经益母丸

【方源】《成方便读》卷四。

【组成】 熟地八两 归身三两 香附二两 川芎 延胡索各二两 蒲黄一两 炮姜五分

【主治】 妇人血气虚寒，或经行前后凝滞作痛；及产后因虚恶露不行。

【方论选录】 方中以熟地大补阴血为君；归身养血和血为臣；而佐之以川芎活血理气，使之补而不滞；香附、延胡行其气；蒲黄去其瘀；炮姜之温，以助药力，则虚者得补，而滞者可行耳。

12096 调经琥珀汤

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】 三棱 莪术 白芍 刘寄奴 当归 熟地 官桂 甘菊 延胡索 蒲黄

【主治】 闭经。

【加减】 痛甚，加炮姜、红花、桃仁、牛膝、苏木、香附。

【备考】 本方名“调经琥珀汤”，但方中无琥珀，疑脱。

12097 调经愈痛散

【方源】《女科指南》。

【组成】 四物汤加桃仁 红花 蓬术 升麻 香附 木香 黄连 黄芩 延胡索 砂仁

【用法】 姜煎服。

【主治】 经行作痛。

12098 调荣化滞汤

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 当归 川芎 赤芍 生地 红花（俱酒洗） 黄芩（酒炒） 陈皮各一钱 生甘草五分 生姜三片

【用法】 上用水二钟，煎八分，加酒少许，调五灵脂末二钱，食后服。

【主治】 酒渣鼻。

【加减】 气弱形肥者，加酒炒黄耆。

12099 调荣活络汤

【方源】《回春》卷五。

【异名】 调荣活络饮（《准绳·类方》卷四）。

【组成】 当归 桃仁 大黄 牛膝各二钱 川芎 赤芍 红花 生地黄 羌活各一钱 桂枝三分

【用法】 上锉一剂。水煎服。

【主治】 失力腰闪或跌扑，瘀血凝滞，及大便不

通而腰痛者。

【备考】 方中桃仁，《准绳·类方》作“杏仁”。

12100 调荣活络汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】 大黄 牛膝 赤芍 当归 杏仁 羌活 生地 红花 川芎 桔梗

【主治】 腰间死血痛，转动如锥刀之刺，大便黑，小便或黄或黑，日轻夜重，脉芤。

12101 调荣活络散

【方源】《证治汇补》卷七。

【组成】 大黄 当归梢 牛膝 杏仁各二钱 赤芍 红花 羌活 桃仁各一钱 川芎 桂枝各三分 香附一钱半

【用法】 水煎服。

【功用】 通经络。

【主治】 瘀血腰痛。

12102 调荣养卫丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】 人参 黄耆 当归 白术 白芍 茯苓 山药 麦冬 远志 山萸 陈皮 熟地 生地 五味子

【用法】 鸭血、蜜为丸。

【主治】 久痨。因杂病久不愈，病久必虚，虚久成劳者。

12103 调荣养卫汤

【方源】《伤寒六书》卷四。

【异名】 调营养气汤(《赤水玄珠》卷十八)。

【组成】 人参 黄耆 当归 羌活 防风 白术 陈皮各八分 柴胡 地黄各一钱 甘草 细辛各三分 川芎七分

【用法】 上用水二钟，加生姜三片，大枣二个，捶入葱白一茎，煎之，温服。

【主治】 劳力感寒症。因内伤气血，外感寒邪，致头疼身热，恶寒微渴，濈然汗出，身作痛，脚腿疼，无力沉倦，脉空浮而无力。

【加减】 元气不足者，加升麻少许；口渴，加天花粉、知母；喘嗽，加杏仁，去升麻；汗不止，加芍药、去升麻，细辛；胸中饱闷，加枳壳、桔梗，去生地黄、甘草，黄耆；痰盛者，加瓜蒌仁、贝母、去防风、细辛；腹痛，去耆、术，加芍药和之。

12104 调胃承气汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 小承气汤(《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》)、调胃承气散(《医方大成》卷一)、承气汤(《外科发挥》卷六)。

【组成】 大黄四两（去皮，清酒洗） 甘草（炙）二两 芒消半斤

【用法】 上切。以水三升，煮取一升，去滓，纳芒消，更上火微煮令沸，少少温服之。

【功用】 ①《内经拾遗》：推陈致新以和中。②《医方集解》：除热荡实，润燥软坚，甘平和缓。

【主治】 阳明腑实，发热汗出，口渴心烦，大便秘结，腹满痛拒按，脉滑数。胃热发斑，口齿咽喉肿痛，中消，疮疡等见上述症状者。

①《伤寒论》：伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝误攻其表，胃气不和，谵语者；发汗后，不恶寒，但热，属实者；太阳病未解，但阴脉微者；伤寒十三日，过经谵语，自下利，脉和，内实者；太阳病，过经十余日，心下温温欲吐，而胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦，先此时自极吐下者；阳明病，不吐不下，心烦者；太阳病三日，发汗不解，蒸蒸发热者；伤寒吐后，腹胀满者。②《口齿类要》：中热，大便不通，咽喉肿痛，或口舌生疮。③《医方集解》：渴证中消，善食而瘦。④《温病条辨》卷二：热结旁流。阳明温病，纯利稀水无粪者。斑疹，阳明证悉具，外出不快，内壅特甚者。

【方论选录】 ①《医方考》：大黄苦寒，可以荡实；芒消咸寒，可以润燥；甘草甘平，可以和中，此药行，则胃中调而里气承顺，故曰调胃承气。②《医宗金鉴》：本方有调和承顺胃气之义，非若大、小专攻下也。《经》曰：热淫于内，治以咸寒，火淫于内治以苦寒，君大黄之苦寒，臣芒消之咸寒，二味并举，攻热泻火之力备矣。更佐甘草之缓，调停于大黄、芒消之间，又少少温服之，使其力不峻则不能速下而和也。

【临证举例】 蛔厥（蛔虫性肠梗阻）《上海中医药》1966；2：62：王某，女，73岁。先患泄泻二天，日下数十次，经治泻止，继而腹胀，二便不通，腹痛，痛极汗出，烦躁不安，呕吐黄色稀水，先后吐出蛔虫四条，诊为蛔虫性肠梗阻，其时口唇干燥，腹胀如鼓，脉象沉细，舌苔黄厚，证属蛔厥。但正气不足，未宜猛下，以调胃承气汤和之。生大黄9克，玄明粉9克，生甘草3克。药后当天大便四次，粪色先黑后黄，中夹蛔虫七条，呕吐止，腹胀消，当晚进牛奶少许，次日即进流质饮食。

【备考】 本方改为丸剂，名“调胃丸”（见《玉机微义》引《元戎》），又名“调胃承气丸”（见

《中药成方配本》苏州方）。

12105 调营定痛丸

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】熟地五两 人参一两半 炒白术一两半 川芎一两（醋炒） 当归三两 木香一两 白芍一两半（酒炒） 香附二两（酒炒） 茯苓一两半 紫石英三两（醋煅）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服五钱，温酒送下。

【主治】经后脐腹疼痛，不孕，脉虚涩者。

【方论选录】血脉空虚，气滞而血去，脉络愈虚，故经后脐腹疼痛，不能怀孕焉。熟地补血滋血，人参补气通脉，白术健脾气以生血，当归养营血以荣经，川芎行血中之气，白芍敛血室之阴，木香化滞气以调中，香附调营气以定痛，茯苓渗湿以清血室，石英涩血以暖子宫也。蜜丸酒下，使经血内充，则滞气自化而冲任调和，何有经后疼痛之患，尚可冀其怀孕矣。

12106 调营活络散

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】羌活 秦艽各一两 当归二两 乳香一两 香附一两 木香一两 续断二两（酒炒） 杜仲一两（酒炒） 牛膝一两半（酒炒）

【用法】上为散。水、酒各半，煎，去滓，早暮各一服。

【主治】血滞腰痛，脉弦涩者。

【方论选录】闪挫伤营，血滞不化，不能荣养经脉，故腰痛不止焉。羌活通经彻络，乳香活血散滞，秦艽活血脉以通肌，当归养营血以荣经，木香调和经气，香附调气解郁，杜仲补肾强腰，续断理伤续筋，牛膝补肝肾以壮筋骨也。为散水酒煎服，使血活滞行，则经络通畅而腰痛自瘳，何闪挫之足虑哉？此通经活络之剂，为闪挫腰痛之专方。

12107 调营敛肝饮

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】归身二钱 白芍一钱五分（酒炒） 阿胶一钱五分（蛤粉） 枸杞三钱 五味五分 川芎八分 枣仁一钱五分（炒研） 茯苓二钱 广皮一钱 木香五分

【用法】上加大枣二个，生姜三片，水煎服。

【主治】肝虚作痛。操烦太过，营血大亏，虚气无归，横逆胀痛。

12108 调脾抑火汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】白茯苓 黄连 山栀仁 白术各二钱 陈皮 黄芩 甘草各一钱

【用法】水煎，不拘时服。

【主治】脾气不足，心中不时嘈杂。

12109 调脾清毒饮

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】天花粉 连翘 荆芥穗 甘草 桑粘子 桔梗 白茯苓 白术 苏薄荷 防风 广陈皮各等分

【用法】上锉。白水二钟，煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】两目睑浮肿如球，微有湿热，重则流泪，赤肿。

12110 展阳神丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参六两 白芍 当归 杜仲 麦冬 巴戟天各六两 白术 熟地 菟丝子各五两 肉桂 牛膝 柏子仁 破故纸各三两 龙骨二两（醋焠） 琐阳二两 蛇床子四两 覆盆子 淫羊藿各四两 驴鞭一具 人胞一个 蚯蚓十条 海马二对 附子一个 肉苁蓉一枝 鹿茸一具（照常制）

【用法】上药各为末，炼蜜为丸。每日五钱，酒送下。但必须保养三月始验，否则无功。

【主治】男子天生阳物细小，而不得子者。

12111 陷胸汤

【方源】《千金》卷十一。

【组成】大黄 栝楼实 黄连各二两 甘遂一两

【用法】上㕮咀。以水五升，煮取一升五合，分三服。

【主治】胸中心下结积，饮食不消。

【方论选录】《千金方衍义》：小陷胸用半夏、黄连、栝楼实以涤胸中痰垢，大陷胸用大黄、芒消、甘遂以散心下结硬。此以食积仓廪而蕴热，故于小陷胸中除去半夏，参入大陷胸中大黄，乃革去大小二字，仅取陷胸之名，以除水谷陈气，而与有形坚积略无干预也。

12112 陷胸散

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】前胡（去芦头） 甘遂（麸炒） 甜葶苈（隔纸炒） 大黄（锉，微炒） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒） 马牙消（研）各一两

【用法】上为末。每服一钱匕，生姜蜜水调下，更看虚实加减。

【主治】伤寒结胸，伏阳在里，心下坚硬，按之则痛。

12113 陷胸泻心汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 栝蒌仁四钱 仙半夏一钱五分 小川连八分 小枳实 青子芩各一钱 淡竹茹二钱

【用法】 水煎，去滓，入生姜汁二滴，竹沥二瓢，冲服。

【功用】 豁痰降火。

【主治】 痰躁。火痰郁遏胸隔，咳嗽不爽，胸中气闷，夜不得眠，烦躁不宁者。

12114 陷胸承气汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 瓜蒌仁六钱（杵） 小枳实一钱半 生川军二钱 仙半夏三钱 小川连八分 风化消一钱半

【功用】 开肺通肠。

【主治】 痰火结闭，肺气失降，大肠之气痹，胸膈痞满而痛，甚则神昏谵语，腹满便闭。

【方论选录】 此方君以蒌仁、半夏辛滑开降，善能宽胸启膈；臣以枳实、川连苦辛通降，善能消痞泄满；然下既不通，必壅于上，又必佐以硝、黄咸苦达下，使痰火一齐通解。

12115 预知子丸

【方源】《局方》卷五。

【异名】 镇心丸(《御药院方》卷六)。

【组成】 枸杞子（净） 白茯苓（去皮） 黄精（蒸熟） 朱砂（研，水飞） 预知子（去皮） 石菖蒲 茯神（去木） 人参（去芦） 柏子仁 地骨皮（去土） 远志（去心） 山药各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如龙眼核大，更以朱砂为衣，每服一丸，细嚼，人参汤送下，不拘时候。

【主治】 心气不足，志意不定，神情恍惚，语言错妄，忪悸烦郁，愁忧惨戚，喜怒多恐，健忘少睡，夜多异梦，寤即惊魇，或发狂眩，暴不知人。

12116 能消丸

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】 威灵仙（去苗土）四两 卷柏（去根） 防风（去叉） 猬皮（烧灰存性） 阿胶（炙燥）各半两 糯米（炒）一合

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，加至二十丸，入参汤送下，一日三次，不拘时候。

【主治】 痔疾疼痛，如锥刀刺不可忍。

12117 桑仁粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】 桑椹子 20～30 克（鲜者 30～60 克） 糯米 2 两 或加冰糖少许

【用法】 先将桑椹浸泡片刻，洗净后与米同入砂锅内煮粥，粥熟加冰糖稍煮即可。每日二次，空腹食之，5～7 天为一疗程。

【功用】 补肝滋肾，养血明目。

【主治】 肝肾血虚，头晕目眩，视力减退，耳鸣腰痠，须发早白，及肠燥便干。

【宜忌】 煮粥忌用铁锅，以砂锅为好；桑椹以紫者为佳，红者次之，青者不可用；平素大便稀溏或泄泻者不宜服。

【方论选录】 桑椹味甘性寒无毒，入肝肾经，有滋补肝肾，养血明目作用。用于头晕目暗，失眠贫血，腰膝痠软，须发早白，及老人便秘。

【现代研究】 据近代研究，桑椹含糖、鞣酸、苹果酸，及维生素 B_1、B_2、C、A、D 和胡萝卜素。桑椹油的脂肪酸主要由亚油酸、油酸和少量硬脂酸组成。药理实验认为，桑椹在胃中能补胃液的缺乏，以增强胃的消化能力；入肠能刺激肠粘膜，增加肠蠕动，使肠液分泌增加。

12118 桑白散

【方源】《银海精微》卷下。

【异名】 桑皮汤(《杂病源流犀烛》卷二十二)。

【组成】 桑白皮 元参 升麻 杏仁 旋覆花 赤芍药 菊花 葶苈 防风 黄芩 枳壳 甘草（炙）各一两

【用法】 上加生姜三片，用水一钟半，煎至八分，食远温服。

【主治】 肺气壅塞，邪热上攻眼目，白睛肿胀，日夜疼痛，心胸烦闷。

12119 桑皮饮

【方源】《直指》卷十七。

【组成】 桑白皮（炒） 青皮 陈皮 槟榔（制） 枳壳 赤茯苓 青木香 当归 川芎 石韦（炙，去毛） 羌活各一分 牵牛（炒，末） 半夏（制） 葶苈（炒香） 甘草（炙）各一分半

【用法】 上锉细。每服三钱，加姜四片，用水煎服。

【主治】 肺间积水，头面浮肿。

12120 桑皮饮

【方源】《准绳·类方》卷八。

【组成】 桑白皮二钱 干葛 柴胡 黄芩 玄参各一钱 地骨皮 天门冬 麦门冬各一钱半 甘草 木通各四分

【用法】 上加生姜三片、葱一寸，用水二盏，煎

八分，食远服。取微汗。

【主治】 皮肤痛，不可以手按。

12121 桑皮散

【方源】《直指》卷八。

【组成】 脑荷 北桔梗 川芎 防风 桑白皮（炒） 黄芩 北前胡 柴胡 紫苏 赤茯苓 枳壳（制）各一分 甘草（炙）一分半

【用法】 上锉细。每服三钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 上焦有热，壅血腥闷，嗽声连并，气不得透。

12122 桑皮散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 桑白皮 郁李仁各一钱 赤茯苓二钱 木香 防己 大腹皮各五分 苏子 木通 槟榔 青皮各七分半

【用法】 上为散，加生姜，水煎服。

【主治】 脚气感发，两脚浮肿，小便赤涩，腹胁胀满，气急，坐卧不得。

12123 桑朴汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 桑皮二钱 厚朴一钱 橘红一钱 半夏一钱 茯苓二钱 沉香五分 苏子一钱五分 杏仁二钱 葵皮二钱 贝母二钱 郁金二钱 佛手五分

【用法】 上加生姜三片，水煎服。

【主治】 肺痹。烦满，喘而呕者。

12124 桑耳饮

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】 桑耳（微炙） 芍药 地榆 茜根 牛角腮（烧灰） 阿胶（炙令燥）各一两 艾叶 鸡苏各三分 白龙骨二两

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，温服，早晨、日午、夜卧各一次。

【主治】 产后下血不止。

12125 桑杏汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 桑叶一钱 杏仁一钱五分 沙参二钱 象贝一钱 香豉一钱 栀皮一钱 梨皮一钱

【用法】 上以水二杯，煮取一杯，顿服之。重者再作服。

【功用】 清气分之燥。

【主治】 秋感燥气，右脉数大，伤手太阴气分者。

【方论选录】《方剂学》：方中以桑叶、豆豉宣肺散邪，以杏仁宣肺利气，沙参、贝母、梨皮润肺止咳，栀子清泄胸膈之热。诸药合用，共奏清宣温燥，润肺止咳之效。

12126 桑枝煎

【方源】《外台》卷十四引《张文仲方》。

【异名】 扶桑煎（《惠直堂方》卷二）。

【组成】 桑枝（锉，不用全新嫩枝）一大升

【用法】 上以水一大斗，煎取二大升，夏月沉井中。每服一盏，空腹时服，服尽又煎。

【主治】 ①《外台》引《张文仲方》：偏风及一切风。②《惠直堂方》：风热臂痛。

12127 桑枝煎

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】 桑枝十斤（锉） 益母草三斤（锉）

【用法】 上以水五斗，慢火煎至五升，滤去滓，入小铛内，熬为膏。每服半合，夜卧时以温酒调服。

【主治】 紫癜风。

12128 桑枝膏

【方源】《活人方》卷六。

【组成】 青桑枝（取朝东者，锉碎，晒一周）不拘多少

【用法】 上用河水、井水各半，熬膏至滴水成珠不散，略用熟白蜜收贮，早、晚空心用史国公酒调服。

【功用】 ①《活人方》：滋肾益阴，祛风润燥。②《中药成方配本》：祛风宣络。

【主治】 ①《活人方》：痛风，肝虚血少，风热风盛者。②《中药成方配本》：肢节痠痛。

【备考】《中药成方配本》本方用法：鲜桑枝用水煎透，去滓滤清收汁，加白砂糖收膏。每服五钱，一日二次，开水冲服。

12129 桑柴饮

【方源】《温病刍言》。

【组成】 桑叶 黄芩 法半夏各 10 克 柴胡 薄荷各 5 克 忍冬藤 连翘各 12 克

【用法】 水煎服。

【功用】 辛凉解表，和解少阳。

【主治】 温热之邪入于半表半里，而仍偏表，寒热往来一日数作者。

12130 桑菊饮

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 杏仁二钱 连翘一钱五分 薄荷八分 桑叶二钱五分 菊花一钱 苦梗二钱 甘草八分（生） 苇根二钱

【用法】 上用水二杯，煮取一杯。一日二服。

【功用】《方剂学》：疏风清热，宣肺止咳。

【主治】 太阴风温，但咳，身不甚热，微渴者。

【加减】 二三日不解，气粗似喘，燥在气分者，加石膏、知母；舌绛，暮热甚，燥邪初入营，加元参二钱、犀角一钱；在血分者，去薄荷、苇根，加麦冬、细生地、玉竹、丹皮各二钱；肺热甚，加黄芩；渴者，加花粉。

【方论选录】《方剂学》：风温袭肺，肺失清肃，所以气逆而咳。受邪轻浅，所以身热不甚，口微渴。治当以辛以散风，凉以清肺为法。本方用桑叶清透肺络之热，菊花清散上焦风热，并作君药。臣以辛凉之薄荷，助桑菊散上焦风热，桔梗、杏仁一升一降，宣肃肺气以止咳。连翘清透膈上之热，苇根清热生津止渴，用作佐药。甘草调和诸药，是作使药。诸药配合，有疏风清热，宣肺止咳之功。但药轻力薄，若邪甚病重者，处方时应酌情加减。

【备考】 本方改为散剂，名桑菊散（见《全国中药成药处方集》重庆方）。

12131 桑麻丸

【方源】《同寿录》卷尾。

【组成】 桑叶一斤（炒为末） 黑芝麻 糯米 黑豆各一升（同炒为末） 黑枣一斤（去核，煮熟）

【用法】 上药同捣为丸。每服三钱，早、晚以酒或滚汤送下。

【功用】 养血宽筋，温和血脉。

【主治】 肢体瘫痪挛痹。

12132 桑椹酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】 桑椹（捣汁煎）

【用法】 上同曲末如常法酿酒饮。

【功用】 补五脏，明耳目。

【主治】 水肿。不下则满，下之则虚，入腹则十无一活。

12133 桑螵散

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】 桑螵蛸三十个 人参 黄耆 鹿茸 牡蛎 赤石脂各三钱

【用法】 上为末。每服二钱，空心米饮送下。

【主治】 小便数，及遗尿。

12134 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】 桑根白皮（锉） 人参 知母（切，焙） 麦门冬（去心，焙） 枇杷叶（去毛，微炙） 黄连（去须，锉，炒） 葛根（锉） 地骨皮（去土） 淡竹根（洗去土，暴干，锉）各半两

【用法】 上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食前服，一日二次。

【主治】 消渴及心脏燥热，饮水无度。

12135 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】 桑根白皮（锉） 紫苏（连茎叶） 知母（焙） 贝母（去心，炒） 款冬花 半夏（汤洗七遍，焙干） 五味子各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 甘草（炙，锉） 人参各半两

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，生姜二片，同煎至七分，去滓温服。一日三次。

【主治】 咳嗽，胸满气急。

12136 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】 桑根白皮（切）三两 射干 赤茯苓（去黑皮） 黄芩（去黑心） 白术各二两 泽漆（炙，锉） 防己 泽泻各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水三盏，煮大豆一撮，至一盏半，去豆下药末，煎至七分，去滓，温服，一日二次，夜一次。

【主治】 膀胱石水，四肢瘦者。

12137 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】 桑根白皮（炙，锉） 猪苓（去黑皮） 滑石（碎） 木通（锉） 郁李仁（汤浸，去皮尖，炒） 赤茯苓（去黑皮）各一两半 陈橘皮（汤浸，去白）半两 槟榔（微煨，锉）三枚 泽泻三分

【用法】 上为粗散。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，温服。

【主治】 虚劳，脾肾气弱，水液妄行，四肢浮肿，小便不利。

12138 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】 桑根白皮（锉）一两半 茅根（锉）二两半 木通（锉） 干百合（锉）各二两

【用法】 上为粗末，每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】 气淋结涩，溲便不利。

12139 桑白皮汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】 桑根白皮（锉，焙干） 山栀子仁 芦根（锉） 赤茯苓（去黑皮） 冬葵子 茅根（锉） 甘草（炙）各一分 滑石（研入）半两

【用法】 上为粗末。五六岁儿，每服一钱匕，水一小盏，煎至五分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】 小儿淋痛，小便如血色。

12140 桑白皮汤

【方源】《医统》卷四十四引《医林》。

【组成】 桑白皮 半夏 苏子 杏仁 贝母 山栀 黄芩 黄连各八分

【用法】 上以水二盏，加姜三片，煎至八分，通口服。

【主治】 肺气有余，痰火盛而作喘者。

12141 桑白皮汤

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 桑白皮一钱半 泽泻 黑元参各八分 甘草二分半 麦门冬（去心） 黄芩 旋覆花各一钱 菊花五分 地骨皮 桔梗 白茯苓各七分

【用法】 上为末。用白水二钟，煎至八分。去滓，温服。

【主治】 眼白涩症，不肿不赤，昏蒙涩痛。

【备考】《金鉴》桑白皮汤，治白眼痛，不红不肿，沙涩疼痛，多生红丝赤脉，无地骨皮。

12142 桑白皮饮

【方源】《养老奉亲》。

【组成】 桑白皮四两（切） 青粱米四合（研）

【用法】 以桑汁煮作饮，空心渐食，常服尤佳。

【主治】 老人水气，面目手足浮肿，腹胀气急。

12143 桑白皮饮

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】 桑根白皮（锉，炒） 赤芍药 郁李仁（研） 百合各一两半 木通（锉）二两 大腹五枚

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食前温服，如人行五里再服。

【主治】 水气。面目浮肿，胸满短气，小便不利。

12144 桑白皮散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 桑根白皮三分（锉） 子芩一两 瞿麦半两 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 葵子一两 牵牛子一两（微炒）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前煎生姜灯心汤调下。

【主治】 卒然小便淋涩不通。

12145 桑枝膏丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十六。

【组成】 制首乌 杞子 归身 三角胡麻 菊花炭 柏子仁 刺蒺藜

【用法】 上为末，以桑枝膏和为丸。

【主治】 肝血不足，虚风内动，左指胀痛引肩。

12146 桑寄生散

【方源】 方出《经效产宝》卷上，名见《圣惠》卷七十五。

【异名】 寄生葱豉汤（《医方类聚》卷二二四引《胎产救急方》）、当归散（《普济方》卷三四二）。

【组成】 当归四分 芎藭三分 阿胶二分（炙，临时入） 葱白十四茎 豉八合 桑寄生四分

【用法】 上用水二升，煎取八合，下阿胶，分两次空腹服。

【主治】 ①《经效产宝》：妊娠胎动不安，烦闷。②《圣惠》妊娠胎动，腹痛闷乱。

【备考】《圣惠》本方用桑寄生一两，当归一两（锉，微炒），芎藭三分，阿胶二分（捣碎，炒令黄燥）。上为散，每服四钱，以水一中盏，入豉五十粒，葱白七寸，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

12147 桑寄生散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】 桑寄生一两 桂心一两 鹿角屑一两（微炒） 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】 元脏久虚，腎腰疼痛。

12148 桑寄生散

【方源】《医方类聚》卷二二四引《济生》。

【异名】 寄生散（《医统》卷八十五）、桑寄生汤（《杏苑》卷八）。

【组成】 桑寄生 当归（去芦，酒浸） 川续断（酒浸） 芎藭 香附子（炒，去毛） 阿胶（锉，蛤粉炒如珠子大） 茯神（去木） 白术各一两 人参半两 甘草（炙）半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，姜五片，煎七分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】 妊娠胎动不安，下血不止。

12149 桑椹子膏

【方源】《中药成方配本》（苏州）。

【组成】 鲜桑椹子（紫色）一百斤

【用法】 先将鲜桑椹子榨汁，其渣入锅内加水煮透，去滓滤清，加入原汁一并收膏，约成膏十斤。每用五钱，开水冲服。

【功用】 养血祛风。

【主治】 肝肾两亏，关节不利。

12150 桑椹膏丸

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】 陈皮 半夏 茯苓 当归 川芎 白芍 熟地 牡蛎 龙骨 甘草 丹参 神曲

【用法】 上为末，以桑椹膏捣丸，如绿豆大。每服五十丸，温酒送下。

【主治】 妇人瘰疬，经闭无潮者。

12151 桑螵蛸丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 五味子 龙骨各半两 桑螵蛸七枚（切细，炒）

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒、盐汤任下。

【主治】 下焦虚冷，精滑不固，遗沥不断。

12152 桑螵蛸散

【方源】《妇人良方》卷二十三引《千金翼》。

【异名】 人参螵蛸散(《胎产心法》卷下)。

【组成】 桑螵蛸三十个（炒） 鹿茸（酥炙） 黄耆各三两 牡蛎（煅） 人参 厚朴 赤石脂各二两

【用法】 上为末。每服二钱，空心粥饮调下。

【主治】 产后小便数，及遗尿。

12153 桑螵蛸散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 桑螵蛸一两（微炒） 赤石脂二两 补骨脂二两（微炒） 狗脊三分 萆薢一两（锉） 白龙骨二两 韭子三分（微炒） 鹿茸二两（去毛，涂酥炙令微黄） 肉苁蓉四两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 菟丝子二两（酒浸三日，曝，别研为末）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】 膀胱虚冷，小便滑数，色如泔淀。

12154 桑螵蛸散

【方源】《本草衍义》卷十七。

【组成】 桑螵蛸 远志 石菖蒲 人参 茯神 当归 龙骨 龟甲（醋炙）各一两

【用法】 上为末。每服二钱，夜卧时以人参汤调下。

【主治】 小便数，如稠米泔，色亦白，心神恍惚，瘦瘁食减，或男女虚损，阴萎梦遗。

12155 桑螵蛸散

【方源】《直指》卷十。

【组成】 桑螵蛸（蒸过，略焙） 远志（水浸，取肉，晒，姜汁和，焙） 石菖蒲 人参 白茯神 当归 龙骨（别研） 鳖甲（醋炙黄）各半两 甘草（炙）二钱

【用法】 上为末。每服二钱，夜卧时以人参、茯苓煎汤调下。

【主治】 心肾不和，小便白浊，或如米泔，或为梦泄。

12156 桑螵蛸散

【方源】《医学纲目》卷十四。

【异名】 桑螵蛸龙骨散(《类证治裁》卷八)。

【组成】 桑螵蛸半两（炒） 龙骨一两

【用法】 上为细末。每服二钱，空心米饮调下。

【功用】《类证治裁》：缩溺。

【主治】 产后小便数及遗尿。

12157 桑螵蛸散

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】 桑螵蛸三十个 人参 黄耆 鹿茸 牡蛎 赤石脂各三钱

【用法】 上为末。每服二钱，空心米饮送下。

【主治】 小便数。

12158 桑丹泻白汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 霜桑叶三钱 生桑皮四钱 淡竹茹二钱 清炙草六分 粉丹皮一钱半（醋炒） 地骨皮五钱 川贝母二钱（去心） 生粳米三钱 金橘饼一枚（切碎） 大蜜枣一枚（对劈）

【用法】 水煎服。

【功用】 清肝保肺，蠲痰调中。

【主治】 肝火燥肺，咳则胁痛，不能转侧，甚则吐血，或痰中夹有血丝血珠者。

【方论选录】 何秀山：本方以桑、丹辛凉泄肝为君；臣以桑皮、地骨皮泻肺中之伏火，竹茹、川贝涤肺中之粘痰；佐以炙草、粳米温润甘淡，缓肝急以和胃气；使以橘、枣微辛甘润，畅肺气以养肺液。此为清肝保肺，蠲痰调中之良方。适用于火郁生热，液郁为痰，痰热上壅，治节不行，而作咳喘者。

【宜忌】 咳由风寒而致者忌用。

12159 桑苏桂苓汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 桑皮三钱 苏子二钱 桂枝八分 茯苓三钱 泽泻一钱半 大腹皮一钱半 橘红一钱 半夏一钱半 杏仁三钱 猪苓一钱

【用法】 上加生姜三片煎服。

【主治】 支饮。水停心下，入于胸膈，咳逆倚息，短气，其形如肿。

12160 桑杏清肺汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 霜桑叶 瓜蒌皮 蜜炙枇杷叶各三钱 光杏仁 川贝 炒牛蒡各二钱 杜兜铃 桔梗各一钱

【用法】 加鲜葱白三枚，淡香豉三钱，水煎服。

【功用】 清宣肺气。

【主治】 冬温兼寒。即寒包火，首先犯肺之轻证。

12161 桑枝秦艽汤

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】 鲜桑枝尖每岁一寸 秦艽三钱 明天麻一钱五分 广皮一钱 当归三钱 川芎一钱 羌活节三节 小桂枝二钱 桔梗二钱 甘草一钱 皂刺二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 肩臂肘痛。

12162 桑根白皮散

【方源】 方出《圣惠》卷五十四，名见《普济方》卷一九二。

【组成】 桑根白皮一两（锉） 大腹皮一两（锉） 汉防已一两 泽漆二两 赤茯苓二两 紫苏茎叶一两

【用法】 上为散。每服四钱，以酒一大盏，入炒熟黑豆五十粒，煎至五分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】 石水，四肢瘦，腹大，胸中满闷，食即喘急。

12163 桑菊愈风汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 桑叶三钱 杭菊三钱 蔓荆子一钱半 当归一钱半 桔梗一钱 枳壳一钱 川贝二钱 杏仁三钱 川芎八分

【用法】 加黑芝麻一撮，煎服。

【主治】 风邪伤脑，鼻窍不通，时流清涕。

12164 通天散

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】 赤芍药 川芎 黄连 黄芩 玄胡索 草乌头 当归 乳香（别研）各等分

【用法】 上为细末。以纸捻子蘸药，搐鼻。

【功用】 通一切壅滞，明目。

【主治】 偏正头痛，并夹脑风。

12165 通气丸

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】 木通（锉） 射干 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 恶实（微炒） 昆布（洗去咸，焙） 诃黎勒（煨，去核） 海藻（洗去咸，焙） 黄耆（锉）各一两 白茯苓（去黑皮）三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每日早、晚各含化一丸。

【主治】 瘿气，咽喉肿塞，毒气壅闷不通。

12166 通气丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 海藻 海带 昆布 木通 甘草各一两 诃子 薄荷各半两 杏仁少许（汤浸，去皮尖）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。每夜噙化一丸。

【主治】 瘿赘。

【宜忌】 忌食油腻物。

【备考】《准绳·疡医》有夏枯草，无甘草。

12167 通气汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】 柴胡一钱 石菖蒲 知母 黄柏（酒浸） 白芷各七分 防风 羌活各六分 乌药七分 枳壳 甘草各五分 干生姜三分 全蝎（炒）三枚

【用法】 上㕮咀。水煎至八分，食前热服。

【主治】 风气上壅，耳聋，或气定而聪者。

12168 通气散

【方源】《妇人良方》卷十二。

【组成】 破故纸不拘多少（瓦上炒令香熟）

【用法】 上为末。空心先嚼胡桃肉半个，再服药二钱，温酒调下。

【主治】 ①《妇人良方》：妊娠腰痛，状不可忍。②《景岳全书》：妇人肾虚腰痛。

12169 通气散

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】 木通 木香 枳壳 菖蒲各五钱 川芎 柴胡 陈皮各二钱 白芷 羌活 僵蚕（炒） 全蝎 蝉蜕各二钱 甘草一钱半 川山甲（炮）三钱

【用法】 上为末。每服三钱，酒调下。

【主治】 气闭耳聋。

【备考】《济阳纲目》有延胡索，无柴胡。

12170 通心饮

【方源】《得效》卷十一。

【组成】 木通（去皮节） 连翘 瞿麦 栀子仁 黄芩 甘草各等分

【用法】 上锉散。每服二钱，以水一盏煎，灯心、麦门冬（去心）汤送下。心经有热，每服四钱，以水一盏半，入灯心十茎、滑石末一匕、麦门冬二十粒、桑白皮七寸煎汤，去滓，再入生车前草汁一合，和匀服；心脾蕴热作呕，每服三钱，加灯心、藿香叶煎服；口疮，加地黄、野苋根煎服；旋螺风，先用土牛膝、泽兰煎水外洗，再服上药。

【功用】 清心热，利小便，退潮热，分水谷。

【主治】 心经有热，唇焦面赤，发热，小便不通；心脾蕴热作呕，潮热乍来乍去，心烦，面赤口

干，如疟状；小儿钓气；口疮；旋螺风，赤肿而痛者。

【加减】 春，加蝉蜕、防风；夏，加茯苓、车前子；秋，加牛蒡、升麻；冬，加山栀子、连翘；小儿钓气，加钩藤、川楝子，或加白茅根、竹叶。

12171 通心饮

【方源】《奇效良方》卷三十五。

【组成】 木通 连翘各等分

【用法】 上为细末。每服一至二钱，用麦门冬或灯心煎汤调下，不拘时候。

【主治】 心经有热，唇焦面赤，小便不通。

12172 通圣饼

【方源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】 黄连末一钱 巴豆五粒 独头蒜一颗 盐五分 皂角末一钱

【用法】 上研烂，捻作寸半阔饼子，贴脐上。

【主治】 大小便不通。

12173 通皮饮

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 广皮一钱 青皮一钱 冬瓜皮二钱 茯苓皮四钱 当归二钱 厚朴一钱 枳壳一钱 砂仁一钱 泽泻一钱五分 车前子二钱 鲜姜皮一钱

【功用】 调和气血，疏导行水。

【主治】 三焦胀。气满于皮肤中，轻轻然而不坚。

12174 通耳汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 熟地三两 麦冬一两 炒枣仁 茯神 玄参各五钱 菖蒲一钱 柏子仁 炒黑荆芥各三钱

【用法】 水煎服。十剂自通。

【主治】 大病之后，或年老人，肾水内闭而气塞，双耳聋闭，雷霆喧呼之声，终不相闻，而耳内不痛。

12175 通耳法

【方源】《奇效良方》卷五十八。

【异名】 通耳散(《景岳全书》卷六十)。

【组成】 磁石（用紫者）如豆大一块 穿山甲（烧存性，为末）一字

【用法】 上用新绵包裹，塞所患耳内，口中衔少许生铁，觉耳中如风雨声即愈。

【主治】 耳聋日久，不闻声响。

12176 通血丸

【方源】《得效》卷十六。

【组成】 生地黄（焙） 赤芍药各半两 川芎一两 甘草五钱 防风 荆芥 当归尾各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。食后荆芥、薄荷茶嚼下。

【功用】 引血归肝。

【主治】 因损伤或肝气闭，使血无所归，血灌瞳仁，致目痛如锥刺，而无翳膜，视物不明者。

12177 通血散

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】 生地 赤芍 当归各一钱 川芎 防风 苏木各六分 荆芥八分 菊花一钱五分 红花 炙甘草各五分

【用法】 上入葱头二个，以水二钟，煎至八分，食后温服。

【主治】 目因物撞，瘀血蓄内，致生翳障，疼痛昏花。

【备考】 原书治上症，先用本方，次服经效散、还睛丸。

12178 通血散

【方源】《异授眼科》。

【组成】 草决明 防风 荆芥 赤芍 当归 大黄 山栀 羌活 木贼 蒺藜 甘草

【用法】 上为末。每服三钱，茶汤调下。

【主治】 目中赤脉下垂，眼目昏痛。

12179 通关丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 滋肾丸（原书同卷）、坎离丸(《明医指掌》卷二)、知母黄柏滋肾丸、大补滋肾丸(《医林绳墨大全》卷六)、泄肾丸(《医部全录》卷二六五)、通关滋肾丸(《全国中药成药处方集》上海方)。

【组成】 黄柏（去皮，锉，酒洗，焙） 知母（锉，酒洗，焙干）各一两 肉桂五分

【用法】 上为细末，熟水为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心白汤送下。药后顿两足，令药易下行，如小便利，前阴中如刀刺痛，当有恶物下为验。

【主治】 ①《兰室秘藏》：热在下焦血分，口不渴而小便闭。②《医方集解》：肾虚蒸热，脚膝无力，阴痿阴汗，冲脉上冲而喘，及下焦邪热，口不渴而小便秘。

【方论选录】 ①《医方集解》：肾中有水有火，水不足则火独治，故虚热；肝肾虚而湿热壅于下焦，故脚膝无力，阴痿阴汗；冲脉起于三阴之交，直冲而上至胸，水不制火，故气逆上而喘，便秘不渴。治当壮水以制阳光。黄柏苦寒微辛，泻膀胱相火，补肾水不足，入肾经血分；知母辛苦寒滑，上

清肺金而降火，下润肾燥而滋阴，入肾经气分，故二药每相须而行，为补水之良剂；肉桂辛热，假之反佐，为少阴引经，寒因热用也。②《古方选注》：《难经》关格论云：关则不得小便。口不渴而小便不通，乃下焦肾与膀胱阴分受热，闭塞其流，即《内经》云无阴则阳无以化也。何则？膀胱禀大寒之气，肾感寒水之运，气运窒塞，故受热而闭。治法仍须用气味俱阴之药，除其热，泄其闭。治以黄柏泻膀胱之热，知母清金水之源，一燥一润，相须为用；佐以肉桂，寒因热用，伏其所主而先其所因，则郁热从小便而出，而关开矣。

【临证举例】 肾绞痛 《湖北中医杂志》1983；4:封3：将通关丸改成散剂，治疗26例肾绞痛，疗效显著。所治患者均有腰腹绞痛，尿频，排尿困难等症状，于就诊时立即用温开水送服上药1克，多数患者在3～5分钟内疼痛减轻，10分钟内疼痛大减，20分钟绞痛基本缓解。若数分钟内绞痛不减者，可继服药末1克。一般患者，首次服药后半小时再服药1克，此后可三小时服药1克，每日四次。经上述治疗后，一般于三天内绞痛可完全控制。

【备考】 本方改为汤剂，名"滋肾通关饮"，（见《丁甘仁医案》卷六。

12180 通关散

【方源】《苏沈良方》卷二。

【组成】 旌德乌头四两（破皮，旌德有芦头肌白者） 藁本 防风 当归 白芷 天南星 川芎 干姜 雄黄（细研） 桂各半两（并生，勿近火）

【用法】 上为末。每服一字或半钱，葱酒调下，亦可以薄荷酒调下。小儿药量减半。

【主治】 诸中风伤寒。

【加减】 瘫痪，加牛黄、麝香。

【临证举例】 ①中风偏瘫 曾在江南，见市门有卧者，乃客贩因病偏风，医之，遂至病困，为邸家所委，时伯氏为邑，使人舁到令舍，调药（即通关散）饮之，又与十服。数日伯氏出，市有一人，扶倚床而呼曰：昔日卧者，今能扶榻而行矣，药尽，愿少继之。伯氏又与十服，服讫能起。②痉挛 一吏病疮而挛，逾岁月卧矣。伯氏与散（即通关散）二钱匕，为八服。吏谬以为一服，服已，僵眩呕吐，几困将殆，数日疮挛悉除。

12181 通关散

【方源】《传信适用方》卷二。

【组成】 盆消 甘草 蒲黄 白僵蚕 青黛各等分（并生用）

【用法】 上为细末。每用一字，干掺在舌上，咽津。

【主治】 一切咽喉危急症。

12182 通关散

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【异名】 开关散（年氏《集验良方》卷一）。

【组成】 细辛（洗去土叶） 猪牙皂角（去子）各一钱 （一方有半夏一钱）

【用法】 上为末。每用少许搐鼻，候喷嚏服药。

【主治】 ①《丹溪心法附余》：卒中风邪，昏闷不醒，牙关紧闭，汤水不下。②《笔花医镜》：小儿急惊风。

【方论选录】《成方便读》：此亦治中风闭证之一法也。凡邪气骤加，正气被遏，经隧不通，肢厥脉绝，此时不特药力所不能达，且亦不能进，唯有取嚏一法，先开其关，使肺气一通，则诸脏之气皆通，然后方可用药施治。二味皆辛散之品，俱能开窍，均可上行，合之为散，以搐鼻中，一取嚏而关即通也。

12183 通关散

【方源】《中国药典》一部。

【组成】 细辛十两 牙皂二十两 薄荷四两 麝香二钱

【用法】 上除麝香外，余为极细末，将麝香与末研匀。每用少许，吹鼻取嚏。

【功用】 开窍取嚏。

【主治】 中风痰厥，昏迷不省。

【宜忌】 孕妇慎用。

12184 通阳汤

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】 茯苓 附子 干姜 草果 陈皮 厚朴 车前子 椒目

【主治】 寒湿鼓胀。寒湿留着中焦，清阳不布，满腹坚胀，面黄，不渴不食，脉沉迟。

12185 通声膏

【方源】《千金》卷十八。

【异名】 通声煎（《圣济总录》卷六十六）。

【组成】 五味子 通草 款冬花各三两 人参 细辛 桂心 青竹皮 菖蒲各二两 酥五升 枣膏三升 白蜜二升 杏仁 姜汁各一升

【用法】 上㕮咀，以水五升，微火煎，三上三下，去滓，纳姜汁、枣膏、酥、蜜，煎令调和。酒服枣大二丸。

【主治】 咳嗽语声不出。

①《千金》：暴嗽失声，语不出。②《奇效良

方》：咳嗽气促，胸中满闷，语声不出。③《证治宝鉴》：喑由久病肺虚、风邪传肺及久嗽所致者。

【方论选录】《千金方衍义》：肺脏方中酥蜜膏专滋肺胃之燥以化其气，此方专滋脾肺之津以通其声。方中五味、人参滋肺之气，款冬、竹茹清肺之燥，桂心、细辛搜肺之邪，通草、菖蒲利肺之窍，杏仁、酥、蜜、姜汁、枣膏滋培津气而通其声。

12186 通彻丸

【方源】《袁中参西》下册。

【组成】牵牛头末

【用法】和水为丸，如秫米粒大。每次三至五钱，清晨空心服下。

【功用】温通下积。

【主治】肠有冷积，少腹时觉下坠冷痛，脉两尺沉弦；或因心有忿怒，饱食当风，治失其宜而为温病结胸，初但心下痞闷，继则胸膈痞塞，且甚烦热，其脉左部沉弦，右部沉牢者。

【临证举例】冷积腹痛 王某，年五十岁。少腹时觉下坠，眠时须以暖水袋熨脐下，不然则疼不能寐。若屡服热药，上焦即觉烦躁，是已历二年不愈。脉象沉弦，左右皆然，至数稍迟。其两尺沉弦、凉而且坠论之，知其肠中当有冷积。此宜用温通之药下之。即予以自制通彻丸三钱，俾于清晨空心服下。阅三点钟，腹中疼似加剧，须臾下如绿豆糊所熬凉粉者若干，疼坠脱然全愈，亦不觉凉。继为开温通化滞之方，俾再服数剂，以善其后。

12187 通肝散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】山栀子 蒺藜（炒，去尖） 枳壳（去白） 荆芥各半两 车前子 牛蒡子各一分（炒） 甘草五钱（炙）

【用法】上为末。每服二钱，食后苦竹叶汤调下。

【主治】①《得效》：胆气盛，攻子肝，致生冰翳，如冰冻坚实，傍观目透于瞳仁内，阴处及日中看之，其形一同，疼而泪出；旋螺尖起，目疼痛，生翳膜，尖起而赤似旋螺；睑硬睛疼，睑中红赤而坚硬，眼睛疼痛而泪出无时，怕日羞明。②《医学入门》：垂帘膜，赤膜自上垂下遮睛。

12188 通肝散

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】白芍 柴胡 黄芩 细辛 草决明 龙胆草 蔓荆子 青葙子 木贼草 蒺藜 防风 玄参

【用法】白水煎，食后服。

【主治】冰翳内障，有头疼、鼻颊骨疼，或因呕吐而起，其翳如冰雪之状，阴看不大，阳看不小者。

12189 通肝散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】栀子（炒黑） 白蒺藜（炒，去刺）各一两 羌活二两 荆芥穗 当归 牛蒡子（炒，研） 甘草（炙）各一两二钱

【用法】上为散。每服三钱，食后竹叶汤调服。

【主治】辘轳转关，睑硬睛疼，风热翳障。

12190 通肠丸

【方源】《医学六要》卷五。

【组成】大黄（酒浸） 滑石（飞研）各二两 陈皮（去白） 厚朴（姜汁制）各一两五钱 人参 当归 贯众（去毛） 干漆（炒烟尽）各一两 木香 槟榔各七钱五分 三棱（煨） 莪术（煨） 川芎 薄荷 玄明粉 雄黄 桃仁泥 甘草各五钱

【用法】俱各另研，取细末，用竹沥等汁各二杯，烧酒、姜汁一杯，隔汤煮浓和丸，如芥子大。每服三钱，去枕仰卧，唾津咽下。通利，止后服。

【主治】反胃噎膈。

【宜忌】①《医学六要》：服此丸后，得药不反，切不可便与粥饭及诸饮食，每日用人参五钱、陈皮二钱作汤细啜，以扶胃气。②《准绳·杂病》：扶胃气，觉稍安，渐渐加人参，旬日、半月间方可小试陈仓米饮及糜粥。仓廪未固，不宜便贮米谷，常见即食粥饭者，遂致不救。

【备考】《准绳·杂病》本方用法：俱各另取细末，用竹沥、童便、韭汁、人乳、驴尿、芦根汁、茅根汁、甘蔗汁、烧酒、米醋、蜜各二杯，姜汁一杯，隔汤煮浓和丸。

12191 通肠丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】忍冬藤 归尾 白芷 皂角刺 乳香 没药 甘草 苡仁 花粉

【用法】用矾一两、黄占一两为丸。

【主治】肠痈，脓未成者。

12192 通灵丸

【方源】《妇人良方》卷四。

【组成】白附子 僵蚕各一两（炒去丝） 全蝎半两（炒） 麝香一字

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，温酒送下，一日三次。

【主治】男子、妇人手足痛风，不可忍者。

12193 通郁汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】白芍一两　茯神三钱　人参二钱　熟地二钱　玄参三钱　麦冬三钱　当归五钱　柴胡一钱　菖蒲五分　白芥子二钱　白术五钱

【用法】水煎服。一剂而郁少解，二剂而郁更解，四剂而郁尽解。

【功用】通肝气，补心肾。

【主治】肝郁不舒，忽忽如有所失，目前之事，竟不记忆，一如老人之善忘。并治诸郁，阴虚而兼郁者尤宜。

12194　通肾汤

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】菖蒲（锉）　羚羊角（镑）　生干地黄（焙）　赤芍药各二两　五加皮（锉）　甘草（炙，锉）　猪苓（去黑皮）　泽泻各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服。

【主治】解㑊。少气不欲言，脊脉急痛，腰背强直，足下热疼，小便癃闭，心烦嗌干。

【方论选录】《古方选注》：解，舒缓也；㑊者，疑也，不可必之辞。病有脊脉痛，少气安卧，不欲言，诊其尺脉沉缓而涩，察其病疑于寒，亦疑于热；疑于壮，亦疑于弱，此作强之官精气内滞，不能运行于形体也。以菖蒲、五加皮通九窍，强志意，能运动肾精；猪苓、泽泻助阳通窍，起阴利肾；生地、羚羊角起阴气，强筋骨；赤芍入阴散气；甘草入肾缓急。

12195　通明汤

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【异名】通明散（《秘传眼科龙木论》卷一）。

【组成】柏子仁（捣，研）二两　防风（去叉）　茺蔚子各一两　车前子　桔梗（炒）各二两　人参　白茯苓（去黑皮）　玄参各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓。食后、临卧温服。

【主治】内障，黑水凝翳。

12196　通明散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】柏子仁二两　防风一两半（去芦头）　茺蔚子一两　车前子二两　前胡一两（去芦头）　人参一两（去芦头）　白茯苓一两　蔓荆子一两　黄耆一两（锉）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每子食后及临卧温服。

【主治】风内障，黑水凝翳，恐绝三光。

12197　通畅饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】麻仁（研为泥）　桃仁（去皮尖）　杏仁（去皮尖）　当归　滑石各一钱五分　瓜蒌仁（去壳）　郁李仁（去壳）　玄明粉　陈皮　枳壳各一钱

【用法】水煎，临服入蜜一两，热服。

【主治】血枯肠燥，大便闭结。

12198　通乳丹

【方源】《傅青主女科》卷下。

【异名】生乳丹。

【组成】人参一两　生黄耆一两　当归二两（酒洗）　麦冬五钱（去心）　木通三分　桔梗三分　七孔猪蹄二个（去爪壳）

【用法】水煎服。二剂而乳如泉涌矣。

【功用】补气血，生乳汁。

【主治】产后气血两虚，乳汁不下。

12199　通乳汤

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】猪蹄（下节）四只　通草二两　川芎一两　穿山甲十四片（炒）　甘草一钱

【用法】上用水五升，煮汁饮之。更以葱汤频洗乳房。

【功用】《杂病源流犀烛》：下乳。

【主治】产后气血不足，经血衰弱，乳汁涩少。

【宜忌】忌生冷，避风寒，夜卧不宜失盖。

12200　通乳饮

【方源】《医统》卷九十七。

【组成】川当归一钱半　王不留行一钱半　川芎八分　穿山甲七片（炒，研末）　木通一钱　漏芦一钱　升麻一钱　甘草节一钱

【用法】上用水二盏，生姜三片，大枣一枚，煎一盏，稍热服。随饮酒数杯以助药力。

【主治】养子妇入无乳及未行经者。

12201　通经丸

【方源】《本事》卷十。

【异名】椒姜通经丸（《医略六书》卷二十六）。

【组成】桂心（不见火）　青皮（去白）　大黄（炮）　干姜（炮）　川椒（去目并合口，微炒，地上出汗）　蓬莪术　川乌（炮，去皮尖）　干漆（炒令烟出）　当归（洗，去芦，薄切，焙干）　桃仁（去皮尖，炒）各等分

【用法】上为细末，将四分用米醋熬成膏，和余六分末为丸，如梧桐子大，阴干。每服二十丸，加至三十丸，用淡醋汤送下，温酒亦得，空心食前服。

【功用】 ①《本事方释义》：去故生新。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：调理经闭。

【主治】 经闭腹痛，血瘕，妊娠腹痛，吐血。

①《本事》：妇人室女月候不通，疼痛，或成血瘕。②《普济方》引《医学类正方》：怀妊三四个月，头晕腹痛，不能饮食，日渐羸瘦。③《医方类聚》引《仙传济阴方》：吐血上行。

【方论选录】《医略六书》：经寒血闭，结成癥瘕，故冲脉不行，月经不通焉。当归养血活血以荣经脉，桂心暖血温经以通经闭；川椒补火散寒，干姜温中开结；桃仁破积血以通经，干漆消除垢以化积；青皮平肝破瘕，蓬术削积溃癥；川乌振发生阳之气，大黄荡涤陈积之结也。醋以丸之，酒以行之，使经寒解散，则血闭自行而癥瘕无不退、月经无不通矣。

【临证举例】《普济方》引《医学类正方》：经闭腹痛 尝有一妇人经水不行，腹中疼痛，诸医皆进温中治寒气药剂，其痛尤甚。告之亲族曰：痛不能忍，欲求自尽。举家无主。因看《本事方》通经丸论说，遂合，数服顿愈。妊娠腹痛 一妇人怀妊三四个月，头晕腹痛，不能饮食，日渐羸瘦，沉重危困，医治不效，已办后事。偶得通经丸服之，痛止，进食如故。月数满足，遂生一女，子母皆安。

【备考】《永类钤方》：入鸡子清同丸，畏漆入肠胃生疮也。

12202 通经丸

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】 熟地黄三两 虻虫（去头翅，炒） 水蛭（糯米炒） 桃仁（去皮尖）各五十个

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，渐加至七丸，空心酒送下，以通为度。

【主治】 经闭不通，结积成块。

12203 通经丸

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】 归尾 桃仁（去皮尖） 大黄（煨） 丹皮 干漆（炒烟尽） 肉桂各一两 三棱五钱 莪术（醋炒） 牛膝各一两 麝香八分

【用法】 上为末，皂角五钱，芫花二钱，水煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米汤送下。

【主治】 经闭不通及血块疼痛。

12204 通经丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】 桂心 青皮 大黄 姜炭 蓬术 干漆 当归 桃仁 延胡索

【主治】 妇人因经闭而火升，致喉症肿痛者。

12205 通经散

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】 苏木一两 大黄五钱 红花一两 黄芩二两 黄连 羌活 薄荷 黑栀子 香附 生地黄 当归 赤芍药 木贼 甘草 川芎各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱，以水一盏半，煎至七分，去滓，食后温服。

【功用】 破血通经。

【主治】 女子血热逆经，血灌瞳仁，满眼赤涩或生胬肉。

12206 通草散

【方源】 方出《千金》卷六，名见《三因》卷十六。

【异名】 通草膏（《济生》卷八）、通草丸（《医学入门》卷七）、通气丸（《仙拈集》卷二）。

【组成】 通草 细辛 附子各等分

【用法】 上为末。以蜜和，绵裹少许，纳鼻中。

【主治】 ①《千金》：鼻齆。②《三因》鼻齆，气息不通，不闻香臭，并有息肉。

【方论选录】《千金方衍义》：鼻齆，必有息肉阻碍，气道不得贯通之故，故以散结通气为主。方用通草开通关窍，细辛解散结邪，附子流行经络，立方最捷。

【备考】 方中通草，《三因》作“木通”。《普济方》有辛夷一钱。

12207 通幽汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】 桃仁泥 红花各一分 生地黄 熟地黄各五分 当归身 炙甘草 升麻各一钱

【用法】 上㕮咀，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，食前稍热服之。

【功用】 润燥通塞。

①《兰室秘藏》：以辛润之。②《医林纂要》：润枯槁，通壅塞。③《医方论》：调和气血，开通胃腑。

【主治】 胃肠燥热，阴液损伤，通降失司，噎塞，便秘，胀满。

①《脾胃论》：脾胃初受热中，幽门不通，上冲，吸门不开，噎塞，气不得上下，大便难。②《古今医鉴》：燥热内甚，血液俱耗，以致大便闭结。③《准绳·类方》：胀满。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手足阳明药也。当归、二地滋阴以养血，桃仁、红花润燥而行血，槟榔下坠而破气滞。加升麻者，天地之道，能升而后能降，清阳不升，则浊阴不降，经所谓地气上为

云，天气下为雨也。②《医林纂要》：当归身辛甘而润，滋而能行，可以化湿而为血，调热而顺气，独用其身者，以养血而专治幽门也。升麻甘辛寒，行肝气以达脾胃，而达之膻中，使清气升则浊气自降。槟榔苦涩温，能敛气而降泄之，以燥湿除痰，使下行而达于下极，治二便闭结，里急后重。此与升麻一升一降，皆所以通壅塞。桃仁苦甘辛润，缓肝火，和脾土，去瘀血，生新血，润枯槁。红花辛甘苦，功专润燥行血，去瘀生新。生地黄滋阴血以达于上，以助当归而润幽门之槁；熟地黄坚肾水以守于下，而安下焦命门之火。甘草厚脾土而滋血气、和阴阳也。

【备考】 本方方名，《东垣试效方》作"导滞通幽汤"；《中国医学大辞典》引作"导气通幽汤"。《兰室秘藏》本方用法：上都作一服，水二大盏，煎至一盏，去滓，调槟榔细末五分，稍热食前服之。《张氏医通》有生甘草，将成用药汁磨槟榔五分调服；《金匮翼》有大黄一钱。

12208 通幽汤

【方源】《医方考》卷二。

【组成】 生地黄 熟地黄 当归梢 大黄（酒浸，煨） 桃仁泥 红花 升麻

【主治】 结燥腹痛。

【方论选录】 此方服之，可以通其留滞，故曰通幽。大便燥结，升降不通，故令腹痛。燥者濡之，生地、熟地，皆濡物也；逸者行之，大黄、归梢，皆行物也；留者攻之，桃仁、红花，皆攻物也；抑者散之，升麻之用，散抑郁也。

【备考】《景岳全书》本方用法：用水一钟半，煎服。

12209 通幽汤

【方源】《清代名医医案大全·叶天士医案》。

【组成】 归须 红花 郁李仁 柏仁 麻仁 生地 升麻

【功用】 润下。

【主治】 高年肾阴暗亏，血液不能灌溉四旁，肠中枯燥，更衣颇觉费力，大便艰涩不爽，脐间隐隐作痛。

12210 通脉汤

【方源】《达生篇》。

【组成】 黄耆（生用）一两 当归五钱 白芷五钱

【用法】 七孔猪蹄一对，煮汤，吹去浮油，煎药一大碗服之。覆面睡，即有乳。或未效，再一服，无不通矣。新产无乳者，不用猪蹄，只用水一半、酒一半煎服。

【功用】 ①《仙拈集》：通乳。②《医林纂要》：补养气血。

【主治】 乳少或无乳。

【加减】 新产体壮者，加好红花三五分以消恶露。

【方论选录】《医林纂要》：乳即经血所化，血下溢于肝则为经，酿成于胃则为乳，而两乳则阳明胃脉所经行，肝脉交于脾，脾脉络于胃，故乳得从胃化而出。是欲酿乳，补胃为本。黄耆充胃气而壮卫气，甘缓益土，生用则行，故能通也。乳本血也，当归辛润滋血，而惟血所归，又所以为乳之本。合生耆即东垣补血汤，气倡而血从，血充而乳足。白芷辛温色白，行阳明胃经，宣木气于土中，达血脉于经隧，除血中之壅滞，故用以为佐使。猪蹄，旧说须七孔者，然可不必，但要公猪前蹄，若后蹄则少力，母猪者不足用。盖前蹄为全身筋力所在，味甘咸平，能补气血，养虚羸，润肌肉，又水畜也，故善通经隧，能通乳汁，又以血气补血气，古人多用之。煮汤去油，恐油腻能滞经络，且滑肠。

【备考】 本方方名，《仙拈集》引作"通乳煎"。

12211 通音煎

【方源】《笔花医镜》卷一。

【组成】 白蜜一斤 川贝二两 款冬花二两 胡桃肉十二两（去皮，研烂）

【用法】 上将川贝、款冬为末，四味和匀，饭上蒸熟。开水送服。

【主治】 ①《笔花医镜》：音哑。②《集验良方拔萃》：喉癣。

【备考】 本方改为丸剂，名"通音丸"（见《青囊秘传》）。

12212 通津丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】 赤茯苓 木通 大腹子 木香 破故纸（炒） 牵牛茄 苦葶苈（隔纸炒）各半两 白牵牛五两（微炒，取头末二两半）

【用法】 上为细末，水面糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，渐加至七八十丸，食后或食远陈皮、灯芯汤送下。

【功用】 宣导小水。

【主治】 一切肿满，风湿脚气变成肿气。

12213 通神散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】 全蝎一枚 土狗二枚 中地龙二条 雄黄 明矾（半生半煅）各半钱 麝香一字

【用法】 上为细末，葱白引药入耳，闭气面壁坐一时。三日一次。

【主治】 耳聋。

【备考】《张氏医通》无上狗，有蜣螂三枚。

12214 通泰丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 栀子仁一两 茵陈二两 海金沙一两 木通一两 赤苓 滑石（炒） 黄连各一两 大黄一两

【用法】 上为末，稀糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，茵陈汤送下。

【主治】 湿热黄疸，形体、尿、汗皆黄，口渴，心下满闷。

12215 通窍汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】 防风 羌活 藁本 升麻 干葛 川芎 苍术 白芷各一钱 麻黄 川椒 细辛 甘草各三分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，葱白三根，水煎，热服。

【主治】 ①《回春》：鼻不闻香臭者，肺经有风热也。②《古今医鉴》：感冒风寒，鼻塞声重，流涕。

【加减】 肺有邪火，加黄芩一钱。

12216 通淋散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 瞿麦穗三两 赤茯苓一两半 条黄芩一两半 白芍药一两半 麦门冬三两（去心） 生甘草一两半 桑白皮一两半 车前子二两 冬葵子三两

【用法】 上为散。每服三钱，水煎去滓，温服。

【主治】 子淋，脉滑数者。

【方论选录】 妊娠湿热，渍于胞门，膀气不得施化而溺窍闭塞，故小便涩痛，淋沥不已，谓之子淋，胎孕何以能安？瞿麦降心热，以通淋闭；条芩清肺热，以安胎元；白芍敛阴护胎，最滋阴血；麦冬润肺清心，得振水源；赤苓利营渗水道；生草泻火，缓涩痛；桑白皮肃清肺金；冬葵子滑利溺窍；车前子清降以利小水也。为散水煎，使湿热并解，则气化有权，而胞门清肃，小便快利，何淋沥涩痛之不已者？胎孕无不安矣。

12217 通隘散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】 通嗌散（《金匮翼》卷五）。

【组成】 白硼砂二钱 孩儿茶一钱 蒲黄六分 青黛一钱 牙消六分 枯矾六分 片脑二分 黄连五分（末） 滑石一钱 寒水石一钱 黄柏五分

【用法】 上为末。以苇筒装药少许，吹入喉中。

【主治】 喉痛生疮声哑。

【备考】《金匮翼》本方用法：上为细末，炼化白砂糖为丸，如芡实大。卧时舌压一丸，自化入喉。

12218 通解散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】 黑丑（炒，捣末） 大黄（炒） 桃仁（去皮尖） 官桂 白芍 泽泻各二钱半 干姜一钱 甘草五分

【用法】 上锉二剂。水煎，空心服。

【主治】 男子交感，强固不泄，以致血气交错，大小便涩滞，或肛门肿痛，或作便毒痈疽。

12219 通痹散

【方源】《普济方》卷一八七引王海藏方。

【组成】 独活半两 羌活二钱 防风 细辛 当归各半两 白术一两 没药二钱 僵蚕二钱 藁本三钱 甘草二钱 白芷一两 川芎二钱 苍术三钱 川山甲三钱 麝香半两

【用法】 上为末。每服三钱，食后酒调下。

【主治】 腰脚冷痹。

12220 通瘀煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 归尾三五钱 山楂 香附 红花（新者，炒黄）各二钱 乌药一二钱 青皮一钱半 木香七分 泽泻一钱半

【用法】 水二钟，煎取七分，加酒一二小钟，食前服。

【主治】 妇人血滞血积，经脉不利，痛极拒按，及产后瘀血实痛，并男妇血逆、血厥等证。

【加减】 兼寒滞者，加肉桂一钱，或吴茱萸五分；血盛内热，血燥不行者，加炒栀子一二钱；微热血虚者，加芍药二钱；血虚涩滞者，加牛膝；血瘀不行者，加桃仁三十粒（去皮尖），或加苏木、玄胡索之类；瘀极而大便结燥者，加大黄一二三钱，或加芒消、蓬术亦可。

12221 通瘀煎

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】 生蒲黄三钱 五灵脂三钱 川郁金一钱半 小枳实一钱半（炒） 白术炭一钱半 建泽泻一钱半 西赤芍一钱半 桃仁泥三钱 明琥珀三钱

【用法】 水煎，去滓，温服。

【主治】 血瘀成臌，脉涩滞者。

【方论选录】 血瘀不消，脾失健运之职，不能输化精微，故浊阴窒塞而胀满有加，是为血臌。蒲黄破瘀血，通经络；灵脂破瘀血，降浊阴；桃仁破瘀润燥；赤芍破瘀泻火；枳实消胀满；术炭健脾气；郁金调气开郁结；泽泻分清阳；琥珀散瘀血，以通渗道也，使瘀化气调，则冲脉清和，而肝脾气化，窒塞顿开，何腹脉之不退哉？

12222 通膈丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】 黄连（去须） 茯苓（去皮） 人参各三两（去芦） 朱砂一分（水飞） 真脑子少许

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五丸，熟水送下，每日二三次。

【主治】 上焦虚热，肺脘咽膈有气如烟抢上。

【方论选录】《本事方释义》：黄连气味苦寒，入手少阴；茯苓气味甘平淡渗，入足阳明；人参气味甘温，入足阳明；朱砂气味苦温，入手少阴；脑子气味辛大热，能行十二经络。此上焦虚热，肺脘胸膈之间有气如烟上逆欲抢者，非大热之品不能引苦寒之药入里也。

12223 通膈丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】 槟榔三两 枳实四两（麸炒）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，食后生姜汤送下，温水亦得。

【主治】 胸中气痞不通，水饮停滞。

【备考】 本方改为散剂，名“通膈散”（见《御药院方》）。

12224 通精散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 防风 川芎 当归 赤芍药 大黄 芒消 蒺藜 石膏 黄芩 甘草 桔梗 牙消 黄连 羌活 滑石 荆芥

【用法】 加姜三片，煎，食后服。

【主治】 睑生偷针。

12225 通闭饮子

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】 厚朴（制） 生姜（焙） 草果 香附子（去毛，炒） 荜澄茄 陈皮各三钱 青皮二钱

【用法】 上为细末。空心沸汤、盐点服。

【主治】 膈气。

12226 通灵玉粉

【方源】《圣惠》卷九十八。

【异名】 扁鹊玉壶丹（《中藏经》卷下）、通灵玉粉散（《普济方》卷一五四）、玉壶丹（《医级》卷八）。

【组成】 硫黄半斤

【用法】 上以桑柴灰五斗，淋取汁，煮三复，时时以铁匙抄，于火上试之，候伏火即止，候干，以火煅之，如未伏，更煮，以伏火为度，伏了即研为细散；又穿地作坑，深一尺二寸，投水于中，待水清取和硫黄末，水不得绝，于瓷锅内煎之，候欲干，即取铁鏊子一所，仰著纳细砂，砂上布纸，鏊下著微火，令鏊热，即于瓷锅内抄硫黄于纸上滴之，自然如玉色，光彩射人；为细末，以饭为丸，如扣子大。每服十丸，空心盐汤送下。

【功用】 ①《圣惠》：暖水脏，益颜色。②《中藏经》：驻颜补暖，祛万痛。

【主治】 ①《圣惠》：腰膝痛。②《医级》：命火衰微，阳气暴绝，及虚寒水肿，寒中等候。

【临证举例】《普济方》：余乡人王昭服之，年九十颜貌如童，夜视细字，力倍常人。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“扁鹊玉壶丸”，并云本方亦可作散，每服两字盐汤调下。

12227 通明赤丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】 乌蛇（去头骨并皮） 麻黄（去根节） 白僵蚕各一两 白附子（生用） 半夏（汤洗去滑） 干蝎（去土） 干姜（炮） 天南星 附子（去皮脐）各半两 麝香（研）一分

【用法】 上并生用，为末，以汤浸槐胶研和为丸，如大麻子大，以生绢袋盛，不得置盒内，亦不得以火焙。每服三丸至五丸，空心微嚼破，薄荷酒送下，如觉药冲，煅甘草含之。如中风，急以温薄荷酒磨五丸或七丸服之；小儿中诸风痫、天钓风等，以母乳磨一丸或二丸，量力服之。

【主治】 中风瘫痪，并柔风，一切风疾。

12228 通草饮子

【方源】《外台》卷二十七引张文仲方。

【组成】 通草 葵子 茅根 王不留行 蒲黄（炮） 桃胶 瞿麦 滑石各一两 甘草七钱

【用法】 上切。以水一斗，煮取六升，去滓，分五六次温服。

【主治】 热气淋涩，小便赤如红花汁色。

12229 通天再造散

【方源】《三因》卷十五。

【异名】 再造散（《丹溪心法》卷四）。

【组成】 郁金半两（生） 大黄一两（炮） 白牵牛六钱（半生半炒） 皂角刺一两（炮，经年黑大者）

【用法】 上为末。每服五钱，日未出面东以无灰酒调下，尽量为度。晚利黑头小虫，病稍轻者止利如鱼肠臭秽物，甚者不过三二次。

【主治】 ①《三因》：大风恶疾。②《疠疡机要》：疠疡下体患多。

【宜忌】 ①《三因》：轻者忌毒半月，但食稠粥软饭，渐生眉毛，皮肤如常；甚者须将理，不可妄有劳动，并终身不得食牛、马、骡、驴等肉。②《丹溪心法》：忌房事。

【方论选录】 《医钞类编》：郁金散肝郁，下气破血，下虫毒；皂刺出风毒于荣血中；大黄利出瘀恶；牵牛利大小便，且苦寒皆能杀虫也。

【临证举例】 疠疡 《疠疡机要》：一男子冬间口苦耳鸣，阴囊湿痒，来春面发紫块，微肿麻木，至冬遍身色紫，不知痛痒，至春紫处俱大，至夏渐溃，又至春眉落指溃。此患在肝胆二经，今刺手指缝并臂腿腕出黑血，先与再造散二服，下毒秽，更以小柴胡合四物汤加白芷、防风、天麻、皂角刺，渐愈。又与换肌散，但遍体微赤，此血虚有火，因家贫未得调理，秋间发热，至春面仍发块，用前散并养血药，喜年少谨疾得愈。

12230 通天达地散

【方源】 《冯氏锦囊·杂症》卷六。

【组成】 连翘 防风 贝母 荆芥 玄参 枳壳 甘草 白芥子 赤芍 天花粉 桔梗 牛蒡子 黄芩 射干

【用法】 加灯心，水煎服。

【主治】 ①《冯氏锦囊》：诸喉病，痄腮肿毒。②《会约》：喉痹肿痛。

【备考】 《会约》本方用量各等分；用法：外用木鳖子磨醋噙喉中，引去其痰，不可咽下，太酸，少掺清水亦可；随服煎药，后用吹药。

12231 通天愈风汤

【方源】 《医学纲目》卷十七。

【组成】 人参一钱 威灵仙（去芦）半钱 南星（汤泡） 贝母（去心）各一钱 连翘 防风（去芦）各五分 瓜蒌仁十五粒 白术一钱半 桔梗三钱 甘草 荆芥穗各五分 生姜三片

【用法】 上以水一钟半，煎至七分，去滓，入荆沥一呷，姜汁些少，半饥时送下清心导痰丸五十丸，每日一次。

【主治】 ①《医学纲目》：舌纵，涎下多唾。②《杂病源流犀烛》：肝风。始而口角流涎，渐至口眼歪斜。

12232 通气防风汤

【方源】 《内外伤辨》卷中。

【异名】 防风通气汤（《杏苑》卷二）。

【组成】 防风 羌活 陈皮 人参 甘草各五分 藁本 青皮各三分 白豆蔻 黄柏各二分 升麻 柴胡 黄耆各一钱

【用法】 上㕮咀，都作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【功用】 ①《内外伤辨》：泻风热。②《脾胃论注释》：开泻肺经的风热，解肌表而和膀胱。

【主治】 ①《内外伤辨》：风热乘肺，肺气郁甚，肩背痛，汗出，小便数而少。②《脾胃论》：手太阳气郁而不行，肩背痛不可回顾。

【宜忌】 ①《内外伤辨》：如面白脱色，气短者，不可服。②《脾胃论》：气盛者，宜服。

【方论选录】 《脾胃论注释》：用柴胡、升麻升阳气；黄耆、人参、甘草益肺气；防风泻肺经风热，用于升阳与益气之中，因为防风既是风药中润剂，又能助黄耆以益气；羌活、藁本散太阳的风寒，橘皮运脾气，青皮理胃气，藁仁宣肺气，三使分途而出，少用黄柏引热下行，阳气舒伸，气通痛定，溲便自调。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“防风汤”。

12233 通气利中丸

【方源】 《原机启微》卷下。

【组成】 白术一两 白芷 羌活各半两 黄芩 滑石（取末）各一两半 大黄二两半 牵牛（取末）一两半

【用法】 上除滑石、牵牛另研极细末外，余合为细末，入上药和匀，滴水为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至百丸，食后、临卧茶汤送下。

【主治】 眵多眊矇，紧涩羞明，赤脉贯睛，脏腑秘结，或风热不制，热甚而大便硬者。

【方论选录】 方以白术苦甘温，除胃中热为君；白芷辛温解利，羌活苦甘平微温，通利诸节为臣；黄芩微苦寒，疗热滋化，滑石甘寒，滑利小便，以分清浊为佐；大黄苦寒，通大便，泻诸实热；牵牛苦寒，一说味辛，利大便除风毒为使。此逆攻之法也。然牵牛有毒，非神农药，今与大黄并用者，取其性猛烈而快也。

【宜忌】 不宜久用，久用伤元气。

12234 通气散坚丸

【方源】 《外科正宗》卷二。

【组成】 陈皮 半夏 茯苓 甘草 石菖蒲 枳实（炒） 人参 胆南星 天花粉 桔梗 川芎

当归 贝母 香附 海藻 黄芩（酒炒）各等分

【用法】 上为末，荷叶煎汤泛为丸，如豌豆大。每服一钱，食远以灯心二十根，生姜三片，泡汤送下。

【功用】 《金鉴》：清肺气，调经脉，理劳伤，和荣卫。

【主治】 ①《外科正宗》：忧郁伤肺，致气浊不清，聚结为瘤，色白不赤，软而不坚，随喜怒消长者。②《金鉴》：劳伤元气，腠理不密，外寒搏之，致生气瘿、气瘤。

12235 通补奇经丸

【方源】 《温病条辨》卷五。

【组成】 鹿茸八两（力不能者以嫩毛角代之）紫石英（生研极细）二两 龟版（炙）四两 枸杞子四两 当归（炒黑）四两 肉苁蓉六两 小茴香（炒黑）四两 鹿角胶六两 沙苑蒺藜二两 补骨脂四两 人参二两（力绵者，以九制洋参四两代之） 杜仲二两

【用法】 上为极细末，炼蜜为丸，如小梧桐子大。每服二钱，渐加至三钱。

【功用】 《吴鞠通医案》：通补八脉。

【主治】 ①《温病条辨》：妇人肝虚而热，每殒胎必三月者。②《吴鞠通医案》：疟疾，带下，月经不调。

【宜忌】 《吴鞠通医案》：暂戒猪肉，永戒生冷。

【加减】 大便溏者，加莲子、芡实、牡蛎各四两，以蒺藜、洋参熬膏为丸；淋带者，加桑螵蛸、菟丝子各四两；癥瘕久聚少腹痛者，去补骨脂、蒺藜、杜仲，加肉桂、丁香各二两。

【临证举例】 ①疟疾 《吴鞠通医案》：孙，四十岁，少阴三疟，二年不愈，寒多热少，脉弦细，阳微损及八脉，与通补奇经丸四两，服完全愈。②带下，月经不调 《吴鞠通医案》：乙酉八月十九日，余氏，二十三岁，产后漏经半年，经止后一年有余，忽来如崩，又疑半产。以温经法后至九月初一日经通，舌白滑，五日前面肿腹痛，带下特甚，其为带脉之寒湿下注无疑。以温经散寒利湿等法后至十一月十四日，带症已少，不时举发，经不调，六脉阳微之极。此症病起产后，漏经半年，胞宫之损可知，体厚湿重易肿，纳食不旺，阳明之虚又可知矣，当兼治之。每日空心服奇经丸三钱，以补胞宫；午间、晚间各服温经行湿汤药一碗，以理阳明为主。

12236 通补温络汤

【方源】 方出《临证指南医案》卷七，名见《证因方论集要》卷三。

【组成】 黄耆四两 茯苓三两 生白术三两 炙草 淡苁蓉二两 当归三两 牛膝二两 仙灵脾二两 虎骨胶 金毛狗脊十二两（无灰酒浸半日，蒸熬膏）

【用法】 胶、膏为丸服。

【功用】 温养通补。

【主治】 痹痛止而行走痿弱无力。

【方论选录】 行走痿弱，有属肝肾阳不足者，肉苁蓉生精补阳，仙灵脾专益精气，金狗脊能健筋骨，虎骨胶追风定痛，耆、术、苓、草以护持脾阳，当归、牛膝以通达肝络。

【备考】 方中炙草、虎骨胶用量原缺。

12237 通明补肾丸

【方源】 《银海精微》卷上。

【组成】 楮实子 五味子 枸杞子各一两 人参 菟丝子 肉苁蓉 菊花 熟地黄 当归 牛膝 知母 黄柏 青盐各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。每服五十丸，空心盐汤送下。

【主治】 玉翳遮睛。因肝风入脑，肝膈积热，久则肾虚，致眼中发热或赤痛，初起红肿赤脉穿睛，渐生白翳，久则成片遮瞒乌睛，凝结如玉色。

12238 通乳四物汤

【方源】 《医略六书》卷三十。

【组成】 生地五钱 当归三钱 白芍一钱半（酒炒） 川芎一钱 木通一钱半 王不留行三钱 花粉三钱 猪蹄二只 知母一钱半（酒炒）

【用法】 水、酒各半浓煎，去滓，温服。

【功用】 《中医妇科治疗学》：清营养血。

【主治】 ①《医略六书》：乳汁不行，脉虚数者。②《中医妇科治疗学》：产后血虚兼热，乳汁不行，面色苍白，有时颊赤，头眩心悸，手心灼热，口舌干燥，或午后潮热，心烦寐少，小便淡黄，大便干燥，舌红苔薄黄，脉细数。

【方论选录】 产后血虚热炽，不能施化津液以上奉为乳，故乳汁不行，乳房不起焉。生地壮水以滋血室，当归养血以荣经脉，川芎人血海行血气，白芍敛营阴养血脉，花粉清热润燥，木通降热通经，王不留走经隧以周流于身，雄猪蹄滋津液以上奉乎乳，知母清热润燥以资生乳汁也。水、酒煎服，使血脉内充，则瘀热自化，而津液无不上奉，乳房无不起胀，安有乳汁不行之患乎。

12239 通变黑锡丹

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 铅灰二两（用黑铅数斤熔化后，其面上必有浮灰，屡次熔化，屡次取之，研细） 硫化铅一两（用黑铅四两，铁锅内熔化；再用硫黄细末四两，撒于铅上；硫黄皆着，急用铁铲拌炒，铅经硫黄烧炼，结成砂子，取出晾冷，碾轧成饼者去之，余者，再用乳钵研极细） 麦曲一两半（炒熟）

【用法】 上用水为丸，如梧桐子大。每服五六丸，多至十丸，用净芒消四五分冲水送服。若服药后，大便不利者（铅灰、硫化铅皆能涩大便），芒消又宜多用。

【主治】 痫风。

12240 通治瘰疬方

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 陈皮 白术 柴胡 桔梗 川芎 当归 白芍 连翘 茯苓 香附（醋炒） 夏枯草 黄芩各一钱 藿香 半夏 白芷 甘草各五分

【用法】 水二钟，加生姜三片，煎取八分，入酒一小杯，临睡时服。

【主治】 瘰疬，不分新久、表里虚实，及诸痰结核。

12241 通经止痛汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 酒丹参30克 杭白芍30克 醋柴胡9克 当归尾9克 酒川芎6克 鸡血藤15克 玄胡12克 乌药9克 香附9克 青皮 陈皮各9克 苏梗 桔梗各6克 甘草3克

【功用】 活血理气，调经止痛。

【主治】 痛经属气滞血瘀型。经前或经期小腹胀痛，按之痛甚，经行量少不畅，色紫有块，舌质紫暗，脉沉弦或沉涩。

【方论选录】 本方以丹参、白芍、柴胡为主药。丹参、当归尾、川芎、鸡血藤、玄胡活血；香附、青皮、陈皮、苏梗、桔梗、乌药理气；白芍酸敛缓急，柴胡辛散解郁，两药相伍为用，调和气血而止痛，甘草调和诸药、缓痉止痛。上药合用，活血理气，调经止痛。

12242 通经导滞汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 香附 赤芍 川芎 当归 熟地 陈皮 紫苏 牡丹皮 红花 牛膝 枳壳各一钱 甘草节 独活各五分

【用法】 水二钟，煎八分，入酒一小杯，食前服。

【主治】 妇人产后，败血流注经络，结成肿块疼痛者。

12243 通脉四逆汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 通脉加减四逆汤（《圣济总录》卷二十一）、姜附汤（《普济方》卷二〇一引《十便良方》）、通脉四逆加减汤（《法律》卷二）。

【组成】 甘草二两（炙） 附子（大者）一枚（生，去皮，破八片） 干姜三两（强人可四两）

【用法】 上以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。其脉即出者愈。

【功用】 回阳通脉。

①《注解伤寒论》：散阴通阳。②《重订通俗伤寒论》：回阳通脉。③《金鉴》：回阳胜寒。

【主治】 少阴病，阴盛隔阳。下利清谷，里寒外热，反不恶寒，手足厥逆，脉微欲绝。

①《伤寒论》：少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者。下利清谷，里寒外热，汗出而厥者。②《千金》：霍乱，吐利已断，汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝。③《永类钤方》：霍乱，腹痛，呕吐泄泻，发热恶寒，小便自利属少阴者。④《卫生宝鉴·补遗》：四肢冷，身不热，恶心，踡足卧，或引衣被自覆，不渴，或下利，或大便如常，脉沉微不数，或虽沉实按之则迟弱，此名冷厥。男子阳易，头重不欲举，眼中生花，腰踝内连腹痛，身重少气，阴肿入里，腹内绞痛。

【宜忌】《普济方》引《十便良方》：忌海藻、菘菜、猪肉。

【加减】 面色赤者，加葱九茎；腹中痛者，去葱，加芍药二两；呕者，加生姜二两；咽痛者，去芍药，加桔梗一两；利止脉不出者，去桔梗，加人参二两。

【方论选录】 ①《古今名医方论》：通脉四逆是于水中温土。里寒外热，浑是肾中阴寒逼阳于外，故君以干姜，树帜中宫；臣以国老，主持中外；更以附子，大壮元阳，共招外热返之于内。盖此时生气已离，存亡俄顷，若以柔缓之甘草为君，何能疾呼外阳？故易以干姜，然必加甘草与干姜等分者，恐丧亡之余，姜、附之猛，不能安养夫元气，所谓有制之师也。其加减法内，面色赤者加葱，后人遂以葱白为通脉四逆，不知阳亡于外，更用葱以助其散，则气从汗出，而阳无由内返也，岂不误耶？盖白通立名，因下利脉微，用葱白以通上下之阳；此里寒外热，用通脉以通内外之阳，故主方不用葱也。宜详辨之。②《古方选注》：通脉四逆，少阴

格阳，而亦阳越欲亡，急用干姜、生附夺门而入，驱散阴霾，甘草监制姜附烈性，留顿中宫，扶持太和元气，葱白入营通脉，庶可迎阳内返。推仲景之心，只取其脉通阳返，了无余义矣。③《历代名医良方注释》：此方与四逆汤三药同，但加重干姜，方名通脉四逆汤，是其所以通，端在干姜，原无疑义。窃干姜守而不走，其何能通，而此能通者，盖谷入于胃，脉道乃行，中气鼓荡，是为行脉之本。若下焦脉绝，本为不治，但仅寒邪凝阻，而脉不通，则加干姜温暖中气，以鼓舞之，兴奋体工，由中以达四末，脉即可复，不通之通，乃妙于通，仲景用干姜之神化如此。脉资生于中焦谷气，此方已求到资生源头，是此方通脉，较强心以复脉，尤深一层。

【临证举例】 霍乱 《冉雪峰医案》：田某儿媳患霍乱寒多，渴不欲饮，饮亦喜热，舌苔白，吐泻多清水，不太臭，惟耽搁时间过久，救治较迟，肢厥筋挛，皮瘪目陷，六脉全无，病已造极，拟大剂温肾以启下焦生气、温脾以扶中宫颓阳，作最后挽救，拟通脉四逆汤加重其剂，方用：甘草二钱，干姜六钱，乌附八钱。隔三时复诊，吐泻未止，厥逆未回，嘱照原方再进一剂；隔二时又再复诊，吐泻虽缓，厥逆仍未回，俨似正气与邪气同归于尽状，细审细察，探其手心，微有温意。曰：生机在此。盖正气过伤，迟迟其复，兆端已见，稍候即当厥回向愈，嘱其续将三煎药服完，另用前方，姜、附各减为三钱，并加党参四钱，夜间作二次缓服。翌晨复诊，厥回脉出，已能起坐，特精力匮乏，为拟理中加知母、栝楼根善后。

12244 通宣理肺丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 紫苏叶一百四十四两 黄芩九十六两 枳壳（炒）九十六两 甘草七十二两 橘皮九十六两 桔梗九十六两 茯苓九十六两 杏仁（去皮，炒）七十二两 前胡九十六两 麻黄九十六两 法半夏（炙）七十二两

【用法】 上将杏仁另研成泥，余药为细末，再和匀，共为极细末，过罗，炼蜜为丸，每重二钱。每服一至二丸，温开水送下，日服二次。

【功用】 解热止嗽。

【主治】 外感咳嗽，发热恶寒，头痛无汗，四肢疲懒，鼻流清涕。

12245 通窍明目汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】 当归四钱 桃仁三钱（炒） 红花二钱 丽参三钱 黄耆五钱 白术二钱（炒） 菖蒲二钱 茯神三钱 川芎三钱 细辛二钱 甘草一钱

【用法】 水煎，并用牙皂五分，镜砂二分，赤金三张，共为细末，随药水冲服。

【主治】 暴盲症（视网膜中央静脉血栓）初期属虚脱证者。

【加减】 愈后头疼目胀，不时昏乱者，去细辛、牙皂，加楮实子五钱、茺蔚子四钱、川羌三钱、白芍四钱、生地八钱，以上加倍，共为丸，镜砂为衣。每服三钱，一日二次，白水送下。虽不能光明如初，亦可保守睛光不失。

12246 通窍活血汤

【方源】《医林改错》卷上。

【组成】 赤芍一钱 川芎一钱 桃仁三钱（研泥） 红花二钱 老葱三根（切碎） 鲜姜三钱（切碎） 红枣七个（去核） 麝香五厘（绢包）

【用法】 用黄酒半斤（各处分两不同，宁可多二两，不可少），煎前七味至一钟，去滓，入麝香再煎二沸，临卧服。大人每日一付，连吃三付，隔一日再吃三付；若七、八岁小儿，两晚吃一付；三、四岁小儿，三晚吃一付。麝香可煎三次，再换新的。头发脱落，用药三付发不脱，十付必长新发；眼疼白珠红，无论有无云翳，先将此药吃一付，后吃加味止痛没药散，一日二付，三二日必全愈；糟鼻子，无论三、二十年，此方服三付可见效，二三十付可全愈；耳聋年久，晚服此方，早服通气散，一日两付，三、二十年耳聋可愈；白癜风、紫癜风，服三、五付可不散漫，再服三十付可痊；紫印脸，如三、五年，十付可愈，若十余年，三、二十付必愈；青记脸如墨，三十付可愈；牙疳，晚服此药一付，早服血府逐瘀汤一付，白日煎黄耆八钱，徐徐服之，一日服完，一日三付，三日可见效，十日大见效，一月可全愈；出气臭，晚服此方，早服血府逐瘀汤，三、五日必效；妇女干劳，服此方三付或六付，至重者九付，未有不全愈者；男子劳病，轻者九付可愈，重者十八付可愈，吃二付后，如果气弱，每日煎黄耆八钱，徐徐服之，一日服完，此攻补兼施之法；若气不甚弱，黄耆不必用，以待病去，元气自复；交节病作，服三付不发；小儿疳证，用此方与血府逐瘀汤、膈下逐瘀汤三方轮服，未有不愈者。

【功用】 活血祛瘀，通络开窍。

①《医林改错》：通血管。②《医林改错评注》：通络开窍、行血活血。③《江苏中医杂志》：活血祛瘀，通络止痛，芳香开窍。

【主治】 血瘀所致的脱发，暴发火眼，酒糟鼻，耳聋，白癜风，紫癜风，牙疳，男女劳病，小儿疳证，头痛，骨膊胸膈顽硬刺痛，中风。

①《医林改错》：头面、四肢、周身血管血瘀所致的头发脱落；眼疼白珠红；糟鼻子；耳聋年久；白癜风，紫癜风；紫印脸，脸如打伤血印，色紫成片，或满脸皆紫；青记脸如墨，长于天庭者多；牙疳；闻出臭气；妇女干劳，经血三、四月不见，或五、六月不见，咳嗽急喘，饮食减少，四肢无力，午后发烧，至晚尤甚；男子劳病，初病四肢酸软无力，渐渐肌肉消瘦，饮食减少，面色黄白，咳嗽吐沫，心烦急躁，午后潮热，天亮汗多；交节病作；小儿疳证，初起尿如米泔，午后潮热，日久青筋暴露，肚大坚硬，面色青黄，肌肉消瘦，皮毛憔悴，眼睛发瞪。②《血证论》：瘀血在上焦，或发脱不生，或骨膊胸膈顽硬刺痛，目不了了。《吉林中医药》：中风。

【方论选录】 ①《医林改错评注》：方中赤芍、川芎行血活血，桃仁、红花活血通络，葱、姜通阳，麝香开窍，黄酒通络，佐以大枣缓和芳香辛窜药物之性。其中麝香味辛性温，功专开窍通闭，解毒活血（现代医学认为其中含麝香酮等成分，能兴奋中枢神经系统、呼吸中枢及心血管系统，具有一定抗菌和促进腺体分泌及兴奋子宫等作用），因而用为主要药；与姜、葱、黄酒配伍更能通络开窍，通利气血运行的道路，从而使赤芍、川芎、桃仁、红花更能发挥其活血通络的作用。②《历代名医良方注释》：妇女干血劳或小儿疳证，都因瘀血内停，新血不生所致，必须活血化瘀，推陈致新。本方用活血通窍之品治疗劳症，深得此法。方中麝香为君，芳香走窜，通行十二经，开通诸窍，和血通络；桃仁、红花、赤芍、川芎为臣，活血消瘀，推陈致新；姜、枣为佐，调和营卫，通利血脉；老葱为使，通阳人络。诸药合用，共奏活血通窍之功。

【临证举例】 ①中风 《吉林中医药》：作者应用通窍活血汤治疗中风34例。其中脑溢血14例（均经西医抢救和治疗3～7天，病情已相对稳定，没有继续恶化）、脑血栓形成20例。其临床表现：浅昏迷9例，失语14例，语言障碍14例，二便失禁17例，半身不遂34例。均予赤芍9克，川芎9克，红花9克，红枣10枚，鲜生姜3片，老葱3根，冰片0.1克，黄酒一钟。加减法：若见气虚者，加黄耆60克；阴虚者，加玄参20克，生地30克；肝阳上亢者，加羚羊角粉0.3克，石决明30克；风痰者，加僵蚕9克，天南星9克；兼腑实者，加小承气汤。本组14例出血性中风从发病3～7天开始服中药治疗，基本恢复率为78.5%；而20例缺血性中风病例病程较长，基本恢复率为65%。②白癜风 《陕西中医学院学报》：作者应用通窍活血汤治疗白癜风128例，其中110例治愈（病变部位颜色恢复正常），18例也有不同程度好转，疗效满意。

12247 通淋琥珀丸

【方源】《玉案》卷五。

【组成】 琥珀三钱 鳖甲五钱 滑石 黄连各八钱 石首鱼脑骨三对（煅） 牛膝八两（熬膏）

【用法】 上为细末，以牛膝膏为丸。每服二钱，空心清茶送下。

【主治】 砂石淋，茎中涩痛不可忍。

12248 通脾泻胃汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】 生石膏一两 知母四钱 黄芩三钱 玄参四钱 栀子三钱 大黄四钱 芜蔚子三钱 连翘三钱 防风三钱 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 黄膜上冲症（前房积脓）初起未甚。

12249 通隘不二散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 硫黄一钱 靛花一分

【用法】 上为细末。用凉水一酒钟调服。外吹紫粉入中白散，或用红粉涂之。

【主治】 杨梅结毒发于咽，腐烂疼痛，汤水难入者。

12250 通变大柴胡汤

【方源】《衷中参西》卷五。

【组成】 柴胡三钱 薄荷三钱 知母四钱 大黄四钱

【主治】 伤寒温病，表证未罢，大便已实者。

【加减】 若治伤寒，以防风易薄荷。

【方论选录】 方中用防风、薄荷以散表邪，所以防邪之内陷；用柴胡以升之，所以防邪之下陷也。

【临证举例】 伤寒 一人，年二十余，伤寒六七日，头疼恶寒，心中发热，咳吐粘涎，至暮尤寒热交作，兼眩晕，心中之热亦甚，其脉浮弦，重按有力，大便五日未行。投以此汤，加生石膏六钱、芒硝四钱，下大便二次，上半身微见汗，诸病皆见轻，惟心中犹觉发热，脉象不若从前之浮弦，而重按仍有力，拟投以白虎加人参汤，恐当下后，易作滑泻，遂以牛山药代粳米，连服两剂而愈。

12251 通变白头翁汤

【方源】《衷中参西》卷三。

【组成】生山药一两　白头翁四钱　秦皮三钱　生地榆三钱　生杭芍四钱　甘草二钱　旱三七三钱（轧细）　鸭蛋子六十粒（去皮，拣成实者）

【用法】上药先将三七、鸭蛋子用白蔗糖水送服一半，隔点半钟，再将余药煎汤服。所余一半，至二煎时如前法服。

【主治】热痢下重腹疼，及曾有鸦片嗜好而患痢之人。痢久而肠中腐烂者。

【临证举例】痢疾　王剑秋，年四十许。己未孟秋，自郑州病归，先泻后痢，腹疼重坠，赤白稠粘，一日夜十余次，其脉弦而有力，知其下久阴虚，肝胆又蕴有实热也。投以此汤，一剂痢愈，仍变为泻，日四五次，自言腹中凉甚，愚因其疾原先泻，此时痢愈又泻，且恒以温水袋自熨其腹，疑其下焦或有伏寒，遂少投以温补之药。才服一剂，又变为痢，下坠腹疼如故，惟次数少减。知其病原无寒，不受温补，仍改用通变白头翁汤。一剂痢又愈，一日犹泻数次，继用生山药一两，龙眼、莲子各六钱，生杭芍三钱，甘草、茯苓各二钱，又少加酒曲、麦芽、白蔻消食之品，调补旬日全愈。

12252　通脉四逆加猪胆汁汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】四逆加猪胆汤（《外台》卷六引《小品方》）、四逆加猪胆汁汤（《普济方》卷三一八）。

【组成】甘草二两（炙）　干姜三两（强人可四两）　附子（大者）一枚（生，去皮，破八片）猪胆汁半合（无猪胆，以羊胆代之）

【用法】上四味，以水三升，煮取一升二合，去滓，内猪胆汁，分温再服。其脉即来。

【功用】《历代名医良方注释》：回阳救阴。

【主治】①《伤寒论》：霍乱，吐已下断，汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝者。②《退思集类方歌注》：阴盛格阳，手足厥冷，脉微欲绝，面赤咽疼烦躁者。

【方论选录】《历代名医良方注释》：此方回阳救阴，双管齐下，乃治霍乱吐下将止，阴阳气并竭，故为此两两斡旋之方也。一方面仍用通脉扶阳，一面重加胆汁益阴。胆汁气血有情，味苦健胃，能刺激神经，鼓舞细胞，奋起一身体工机能，此方将通脉之辛温，融纳于胆汁润沃之中。就阳方面解说，为激发阴气，以为藏起亟之本；就阴方面解说，为维护残阳，以为摄阳奠定之根。方注曰分温再服，其脉即出，履险如夷，煞具旋乾转坤，拨乱返正手段，此中分际，此项疗法，岂但从治、岂但正治，学者所当深深体认也。

12513　验胎法

【方源】《医学纲目》卷三十五引《灵苑》。

【异名】探胞汤（《三因》卷十七）、川芎散（《卫生家宝产科备要》卷六）、探胎汤（《医方类聚》卷二二七引《仙传济阴方》）、探胎饮（《医统》卷八十五）。

【组成】真川芎

【用法】上为细末。每服一匕，浓煎艾汤调下。腹内渐动，是有胎也。

【功用】验胎。

【主治】妇人经脉不行已经三月。

【方论选录】《串雅内编选注》：川芎常用于月经困难、经闭腹痛、难产、胞衣不下等症，具有活血行气的功能。故凡妊娠之可使胎动，再佐以具有安胎作用的艾叶煎汤，即可达到验胎，而又安胎的作用。

【备考】《普济方》本方用法：如药后胎不转动，腰重如石，可用酒调下。

12254　绣球丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】樟冰　轻粉　川椒　枯矾　水银　雄黄各二钱　枫子肉一百枚（别研）

【用法】上为细末，同大枫子肉再研和匀，加柏油一两化开，和药搅匀作丸，如龙眼大。于疮上擦之。

【主治】一切干、湿疥疮，及脓窠烂疮，瘙痒无度者。

【备考】《金鉴》本方用法：上药先以鼻闻，次擦患处。

12255　绣球丸

【方源】《串雅补》卷五。

【组成】苦参一两　黄柏五钱　枯矾二钱五分　雄黄一两

【主治】疥疮。

12256　理中丸

【方源】《伤寒论》。

【异名】四顺理中丸（《千金》卷二）、白术丸（《圣济总录》卷一七一）、调中丸（《小儿药证直诀》卷下）、大理中丸（《得效》卷五）、顺味丸（《普济方》卷一五九）、人参理中丸（《疠疡机要》卷下）。

【组成】人参　干姜　甘草（炙）　白术各三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡子黄许大。以沸汤数合，和一丸，研碎，温服之，日三次，夜二次。腹中未热，益至三四丸。

【功用】 温中祛寒，补气健脾。

①《局方》：温脾暖胃，消痰逐饮，顺三焦，进饮食，辟风、寒、湿、冷邪气。②《直指》：补肺止寒咳。③《伤寒论章句》：温补中土。④《饲鹤亭集方》：分理阴阳，安和胃气。

【主治】 脾胃虚寒，自利不渴，呕吐腹痛，不欲饮食，中寒霍乱，阳虚失血，胸痹虚证，病后喜唾，小儿慢惊。

①《伤寒论》：霍乱，头痛发热，身疼痛，寒多不用水者；大病瘥后，喜唾，久不了了，胸上有寒。②《外台》引《崔氏方》：三焦不通，呕吐不食，并霍乱吐逆下痢，及不得痢。③《局方》：中焦不和，脾胃宿冷，心下虚痞，腹中疼痛，胸胁逆满，噎塞不通，呕吐冷痰，饮食不下，嗜酷吞酸，口苦失味，怠惰嗜卧，全不思食；伤寒时气，里寒外热，霍乱吐利，心腹绞痛，手足不和，身热不渴，及肠鸣自利，米谷不化。④《圣济总录》：小儿胎寒腹痛，啰啼下利。⑤《阎氏小儿方论》：小儿吐痢不渴，米谷不化，手足厥冷。⑥《医方类聚》引《简易方》：妇人新产，五内俱虚，血脉未定，及产后腹痛作泻。⑦《卫生宝鉴·补遗》：胃虚寒，蛔上入膈，吐蛔。⑧《景岳全书》疟疾，瘴气、瘟疫，中气虚损，久不能愈，或中虚生痰。⑨《证治汇补》：阴黄为病。⑩《张氏医通》：胸痹，心胸痞气。

【宜忌】《外台》：忌桃、李、雀肉、海藻、菘菜。

【方论选录】 ①《伤寒明理论》：心肺在膈上为阳，肾肝在膈下为阴，此上下脏也。脾胃应土，处在中州，在五脏曰孤脏，属三焦曰中焦，自三焦独治在中，一有不调，此丸专治，故名曰理中丸。人参味甘温，《内经》曰：脾欲缓，急食甘以缓之。缓中益脾，必以甘为主，是以人参为君；白术味甘温，《内经》曰：脾恶湿，甘胜湿。温中胜湿，必以甘为助，是以白术为臣；甘草味甘平，《内经》曰：五味所入，甘先入脾，脾不足者，以甘补之。补中助脾，必先甘剂，是以甘草为佐；干姜味辛热，喜温而恶寒者，胃也，胃寒则中焦不治，《内经》曰：寒湿所胜，平以辛热。散寒温胃，必先辛剂，是以干姜为使。②《医方考》：寒者温之，故用干姜之辛热；邪之凑也，其气必虚，故用人参、白术、甘草之温补。③《伤寒附翼》：太阴病，以吐利腹满为提纲，是遍及三焦矣。然吐虽属上，而由于腹满；利虽属下，而由于腹满，皆因中焦不治，以致之也。其来由有三：有因表虚而风寒自外入者，有因下虚而寒湿自下上者，有因饮食生冷而寒邪由中发者，总不出于虚寒，法当温补以扶胃脘之阳，一理中而满痛吐利诸症悉平矣。故用白术培脾土之虚，人参益中宫之气，干姜散胃中之寒，甘草缓三焦之急也。且干姜得白术，能除满而止吐；人参得甘草，能疗痛而止利，或汤或丸，随机应变，此理中确为之主剂欤。夫理中者，理中焦，此仲景之明训。④《古方选注》：理中者，理中焦之气，以交阴阳也。上焦属阳，下焦属阴，而中焦则为阴阳相偶之处。仲景立论，中焦热则主五苓以治太阳；中焦寒，则主理中以治太阴，治阳用散，治阴用丸，皆不及于汤，恐汤性易输易化，无留恋之能，少致和之功耳。人参、甘草甘以和阴也，白术、干姜辛以和阳也，辛甘相辅以处中，则阴阳自然和顺矣。

【临证举例】 喜唾 《南雅堂医案》：大病初愈，元气虚而未复，脉沉迟无力，喜唾，乃胃中虚寒，津液不主收摄，若遽以汤剂峻补，久虚之体恐非所宜，须以丸药温之为合，以理中丸。

12257 理中丸

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】 人参八分 白术八分 甘草八分（炙） 干姜六分 高良姜八分 桂心六分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹以饮送下，一日二次。渐加至四十丸，老小以意加减。

【主治】 冷热不调，霍乱吐痢，宿食不消。

【宜忌】 忌生冷、油腻、生葱、海藻、菘菜、桃、李、雀肉。

12258 理中丸

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】 高良姜（锉） 白术各一两 桂（去粗皮） 甘草（炙）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，浓煎橘皮汤化下，不拘时候。

【主治】 霍乱吐泻，心腹疼痛。

12259 理中丸

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】 人参 甘草 白术（炒）各等分

【用法】 上为末，生姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】 中气虚热，口舌生疮，不喜冷饮，肢体倦怠，饮食少思。

12260 理中丸

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】 人参一钱 干姜（炒）一钱 茯苓一钱 甘草（炙）一钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，每丸重一钱。取一丸细嚼，淡姜汤送下。

【主治】 转筋霍乱，上吐下利，心腹疼痛，及干霍乱，并真阴症，手足厥冷。

【宜忌】 忌食米汤。

【临证举例】 真阴症 嘉靖甲子年间，梁宋之地人多患此，自脚心麻至膝，死者不计其数，时大方伯赵公出示此方，患者咸蒙其惠。

12261 理中汤

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 人参汤（《金匮》卷上）、治中汤（《千金》卷二十）、理中煎（《鸡峰》卷十二）、人参理中汤（《校注妇人良方》卷二十）、干姜理中汤（《中国医学大辞典》）。

【组成】 人参 干姜 甘草（炙） 白术各三两

【用法】 上切，用水八升，煮取三升，去滓，温服一升，一日三次。服汤后，如食顷，饮热粥一升许，微自温，勿发揭衣被。

【功用】 温中祛寒，补益脾胃。

①《局方》：温中逐水，止汗去湿。②《三因》：理中脘，分利阴阳，安定血脉。③《普济方》引《德生堂方》：温中散寒，固卫止汗。④《明医指掌》：祛寒温脾固胃。⑤《简明医彀》：温养脾胃，补益气血，助阳固本。

【主治】 脾胃虚寒，脘腹疼痛，喜温喜按，自利不渴；呕吐，腹痛，不欲饮食，中寒霍乱，阳虚失血，病后喜唾，胸痹虚证，小儿慢惊。

①《伤寒论》：霍乱，头痛发热，身疼痛，寒多不用水者。②《金匮》：胸痹，心中痞气，气结在胸，胸满，胁下逆抢心。③《医心方》引《产经》：产后下利。④《千金》：霍乱吐下胀满，食不消，心腹痛。⑤《局方》：脾胃不和，中寒上冲，胸胁逆满，心腹疞痛，痰逆恶心，或时呕吐，心下虚痞，膈塞不通，饮食减少，短气羸困；肠胃冷湿，泄泻注下，水谷不分，腹中雷鸣；伤寒时气，里寒不热，霍乱吐利，手足厥冷；胸痹心痛，逆气结气。⑥《三因》：伤胃吐血者。胀满，食不消，心腹痛。⑦《直指小儿》：小儿柔痉，厥冷自汗。⑧《医学正传》：蛔厥。⑨《便览》：五脏直中寒邪，口噤失音，四肢强直，腹痛冷泄。⑩《外科正宗》：中气不足，虚火上攻，以致咽间干燥作痛，吐咽妨碍。⑪《证治宝鉴》：中气虚，不能制游行之火，口中生疮。⑫《医林纂要》：慢惊、慢脾风，吐泻后转而中寒者。⑬《文堂集验方》：阴虚病后调理失宜，以致周身色似黄疸者，其状耳鸣口淡，恒忡微热，四肢无力，怠惰嗜卧，脚软脉细，噤口痢。⑭《杂病源流犀烛》：脱肛，由于寒者。

【宜忌】 《外台》：忌海藻、菘菜、桃、李、雀肉。

【加减】 若脐上筑者，肾气动也，去术，加桂四两；吐多者，去术，加生姜三两；下多者，还用术；悸者，加茯苓二两；渴欲得水者，加术，足前成四两半；腹中痛者，加人参，足前成四两半；寒者，加干姜，足前成四两半；腹满者，去术，加附子一枚。

【方论选录】 ①《伤寒论后辨》：阳之动，始于温，温气得而谷精运，谷气升而中气赡，故名曰理中。实以燮理之功，予中焦之阳也。若胃阳虚，即中气失宰，膻中无发宣之用，六腑无洒陈之功，犹如釜薪失焰，故下至清谷，上失滋味，五脏凌夺，诸症所由来也。参、术、炙草，所以固中州，干姜辛以守中，必假之以焰釜薪而腾阳气。是以谷入于阴，长气于阳，上输华盖，下摄州都，五脏六腑皆以受气矣。此理中之旨也。②《医方集解》：此足太阴药也。人参补气益脾，故以为君；白术健脾燥湿，故以为臣；甘草和中补土，故以为佐；干姜温胃散寒，故以为使。以脾土居中，故曰理中。③《温病条辨》：理中汤温中散寒，人参、甘草，胃之守药；白术、甘草，脾之守药；干姜能通能守，上下两泄者，故脾胃两守之；且守中有通，通中有守，以守药作通用，以通药作守用。④《伤寒寻源》：盖理中者，理中焦之寒也。寒在胃上，取丸药之缓，逗留于上，以温胃而散寒；若寒胜热之霍乱，利在急温，则不宜丸而宜汤。缓宜丸，急宜汤，此先圣之成法，不可紊也。

【临证举例】 ①脾虚泄泻 《江西医药》（1964；3:149）：王某，男性，39岁，初诊于1949年2月11日。病患腹泻已逾一年，经常肠鸣，大便稀溏，日下八九次，食欲欠佳，完谷不化，曾经数十医诊而少效。予诊时，患者面色惨白无华，精神疲乏，腹部稍胀而喜按，舌苔浮有一层黄色厚腻，脉细迟。此是脾虚泄泻，法宜补中益土，方用仲景理中汤：人参三钱，炒白术三钱，黑干姜二钱半，炙甘草二钱。连服六剂即愈。②胃脘痛 《续名医类案》：一妪胃痛久，诸药不应，六脉微小，按之痛稍定，知中气虚而火郁为患也。投理中汤一服随愈。②中虚血脱 《静香楼医案》：疟发而上下血溢，责之中虚，而邪又扰之也，血去既多，疟邪尚

炽，中原之扰，未为已也，谁能必其血之不复来耶，谨按古法，中虚血脱之证，从无独任血药之理，而疟病经久，亦必固其中气，兹拟理中一法，止血在是，止疟亦在是，惟高明裁之。④妊娠胃口膨胀 《医宗己任编》：吴餐霞室人患妊娠胃口膨胀，不思饮食，口渴，下利，面少精采，医以消导寒凉与之，病转甚而胎不安，予曰，此得于饮食后服凉水所致耳，投以大剂理中汤，数剂而愈。⑤口疮 《齐氏医案》：张思良口舌常破，如无皮状，或咽喉作痛，服凉药愈痛，以理中汤令伊常服而不发。

【现代研究】 抗大鼠实验性胃溃疡作用 《陕西中医》(1987；7:333)：该实验通过对照观察证实，理中汤确有显著促进实验性胃溃疡愈合的作用，并对实验性胃溃疡的发生有保护作用。实验表明，理中汤能降低胃液中游离盐酸浓度，从而减轻对膜的浸蚀和减少胃蛋白酶激活，对溃疡发生起到了保护作用；理中汤还能促进醋酸型胃溃疡愈合，说明它能够促使粘膜细胞再生修复。因此，理中汤既能抑制攻击因子，又能强化防御因子，通过两方面综合作用发挥其抗溃疡作用。

12262 理中汤

【方源】《普济方》卷三七一。

【组成】 人参（去芦） 白术 白僵蚕（炒） 甘草（炙）各等分

【用法】 上为末，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 小儿慢惊虚困，痰涎不利。

【加减】 手足厥冷，加附子、炮姜回阳。

12263 理中汤

【方源】《广嗣纪要》卷十二。

【组成】 人参 白术各一钱 炙草三分 干姜五分 藿香叶五分

【用法】 水一盏半，加姜汁一匙服。

【主治】 妊娠吐清水，同食物出者。

12264 理中汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 砂仁 干姜（炒） 苏子 厚朴（姜汁炒） 官桂 陈皮 甘草（炙）各一钱 沉香 木香各五分（水磨入）

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，水煎，磨沉、木香同服。

【主治】 寒喘。

【加减】 若脉细，手足冷，加附子。

【备考】 本方方名，《医部全录》引作“九味理中汤”。

12265 理中汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】 人参 白术（去芦） 干姜（炒）各一钱 官桂 甘草（炙）各五分 陈皮 藿香 茯苓（去皮） 良姜各七分 乌梅一个

【用法】 上锉一剂。加生姜三片、大枣二个、灯草一团，水煎，温服。

【主治】 寒泻症。

【加减】 寒极手足冷，脉沉细，加附子，去良姜、官桂；腹痛，加厚朴、砂仁、木香，去人参；呕哕恶心，加丁香、半夏，去良姜、官桂；泻不止，加苍术、山药；泻多不止，加肉蔻、诃子、附子，去良姜、官桂；虚汗，加黄耆，去藿香、官桂；饱闷，加厚朴、砂仁，去人参、良姜、官桂。

12266 理中汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】 人参 白术（蜜炙）各八分 五味子 甘草各三分 干姜五分

【用法】 水煎，空心服。

【主治】 肾虚经来泄泻，经来之时五更泄泻，如乳儿尿。

12267 理中汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 白术三钱 炮姜一钱半 炙草一钱半

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 孕妇心气疼痛，脉迟者。

【方论选录】 胎寒气逆，上犯心包，故心气冷疼，食卒不下焉。白术健脾土以安胎，炮姜暖中气以逐冷，炙草缓中益胃以除痛也。水煎，温服，使土暖气温，则冷气自化而胎得所安，何有心气冷痛、食卒不下之患哉。

12268 理中汤

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】 人参 白术（土炒） 干姜（炮）各一钱 甘草八分 乌梅肉二个 川椒十粒

【用法】 水煎服。

【主治】 吐蛔。

12269 理中散

【方源】《外台》卷六引《必效方》。

【组成】 青木香六分 桂心八分（炙） 厚朴八分（炙） 甘草八分（炙） 白术八分 干姜十分（炮） 附子六分（炮）

【用法】 上为散。每服两钱匕，饮调下。如人行五六里，不定，更服一钱匕，愈止。

【主治】 霍乱及转筋，吐痢不止。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、生葱、猪肉、桃、李、雀肉。

12270 理中散

【方源】《传家秘宝》。

【异名】 增损理中散(《圣济总录》卷四十六)。

【组成】 干姜 人参 白术各一两 甘草半两 吴茱萸半两 槟榔半两 陈皮(汤浸，去瓤，焙干) 一两 厚朴一两(去皮，姜炙) 荜茇半两

【用法】 上为细末。每服一钱，食前生姜汤点下，一日三次。

【主治】 ①《传家秘宝》：胃中冷，食后咽酸呕哕，胸胁胀满，不思饮食。②《圣济总录》：脾气虚弱。

12271 理气丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】 枳壳(麸炒，去瓤) 蓬莪术各半两 半夏(洗七次) 姜黄 甘松(去土)各二钱 陈皮(去白) 大麦芽(炒)各七钱半

【用法】 上为细末，水面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后煎陈皮汤送下。

【功用】 常服消导滞气。

【主治】 胸中噎塞，气涩不通，酒食所伤。

12272 理气汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】 人参 茯苓 白术 甘草 川芎 当归 白芍 枳实 枳壳 木香 乌药 香附 陈皮 砂仁 桔梗

【功用】 温中和胃，除满去胀，养血安胎。

【主治】 妊娠胸痞，心下胀满，胃脘作痛，饮食不进。

【方论选录】 胸膈痞满，由妇人素有冷气，兼以客寒犯胃，宿冷与新邪相搏。受娠之后，经血闭而养胎，体质更弱，饮食失节，痰饮停积胸中，是以痞满而足痛也。治宜先祛寒邪，以辛温、辛散、辛凉之剂温中除满，再加甘温、苦温之药固本安胎，痞满自除。是方参、苓、术、草以益元气，芎、归、白芍以补阴血，木、砂、陈、附运气散寒，桔梗祛胸膈之满，乌药顺中下二焦之气，枳壳、枳实上下分消其滞。不独无形者立散，即有形者渐除。

12273 理血汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生山药一两 生龙骨(捣细)六钱 生牡蛎(捣细)六钱 海螵蛸(捣细)四钱 茜草二钱 生杭芍三钱 白头翁三钱 真阿胶(不用炒)三钱

【主治】 血淋及溺血、大便下血证之由于热者。

【加减】 溺血者，加龙胆草三钱；大便下血者，去阿胶，加龙眼肉五钱。

【方论选录】 血淋之症，大抵出之精道也。其人或纵欲太过而失于调摄，则肾脏因虚生热。或欲盛强制而妄言采补，则相火动无所泄，亦能生热，以致血室中血热妄动，与败精溷合化为腐浊之物，或红或白，成丝成块，溺时杜塞牵引作疼。故用山药、阿胶以补肾脏之虚，白头翁以清肾脏之热，茜草、螵蛸以化其凝滞而兼能固其滑脱，龙骨、牡蛎以固其滑脱而兼能化其凝滞，芍药以利小便而兼能滋阴清热。

12274 理冲丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 水蛭(不用炙)一两 生黄耆一两半 生三棱五钱 生莪术五钱 当归六钱 知母六钱 生桃仁(带皮尖)六钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，早、晚开水送下。

【主治】 妇女经闭不行，或产后恶露不尽，结为癥瘕；室女月闭血枯，男子劳瘵，一切脏腑癥瘕、积聚、气郁、脾弱、满闷、痞胀、不能饮食。

12275 理冲汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生黄耆三钱 党参二钱 于术二钱 生山药五钱 天花粉四钱 知母四钱 三棱三钱 莪术三钱 生鸡内金(黄者)三钱

【用法】 用水三钟，煎至将成，加好醋少许，滚数沸服。

【主治】 妇人经闭不行，或产后恶露不尽，结为癥瘕，以致阴虚作热，阳虚作冷，食少劳嗽，虚证沓来。室女月闭血枯，男子劳瘵，一切脏腑癥瘕、积聚、气郁、脾弱、满闷、痞胀，不能饮食。

【加减】 服之觉闷者，减去于术；觉气弱者，减三棱、莪术各一钱；泻者，以白芍代知母，于术改用四钱；热者，加生地、天冬各数钱；凉者，知母、花粉各减半，或皆不用；凉甚者，加肉桂(捣细冲服)、乌附子各二钱；瘀血坚甚者，加生水蛭(不用炙)二钱；若其人坚壮无他病，惟用以消癥瘕积聚者，宜去山药；室女与妇人未产育者，若用此方，三棱、莪术宜斟酌少用，减知母之半，加生地黄数钱，以濡血分之枯；若其人血分虽瘀，而未见癥瘕，或月信犹未闭者，虽在已产育之妇人，亦少用三棱、莪术；若病人身体羸弱，脉象虚数者，去三棱、莪术，将鸡内金改用四钱，因此药能化瘀

血，又不伤气分也，迨气血渐壮，瘀血未尽消者，再用三棱、莪术未晚。若男子劳瘵，三棱、莪术亦宜少用，或用鸡内金代之亦可。

【临证举例】 ①癥瘕 一妇人，年二十余，癥瘕结于上脘，其大如橘，按之甚硬，时时上攻作疼，妨碍饮食。医者皆以为不可消，后愚诊视，治以此汤，连服四十余剂，消无芥蒂。②痃癖 一少年，因治吐血，服药失宜，痃癖结于少腹，大如锦瓜，按之甚坚硬，其上相连有如瓜蔓一条，斜冲心口，饮食减少，形体羸弱，其脉微细数。治以此汤，服十余剂痃癖全消。

12276 理阴煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 理营煎(《仙拈集》卷一)。

【组成】 熟地三五七钱或一二两 当归二三钱或五七钱 炙甘草一二钱 干姜（炒黄色）一二三钱（或加桂肉一二钱）

【用法】 水二钟，煎七八分热服。

【功用】 ①《重订通俗伤寒论》：滋补脾阴，温运胃阳。②《不居集》：温补阴分，托散表邪。

【主治】 脾肾阴阳两虚，喘满，呕逆，泻痢，腹痛，经迟。

①《景岳全书》：脾肾中虚等证宜温润者。真阴虚弱，胀满呕哕，痰饮恶心，吐泻腹痛，妇人经迟血滞之证。②《幼幼集成》：小儿肾肝亏败，不能纳气，浮散作喘。③《妇科玉尺》：妇人脏寒忽呕，胎气不安；产后脾气虚寒，呕吐食少腹痛；产后阳虚中寒，或外感寒邪，以致心腹痛，呕吐厥逆。④《会约》：妇人血亏阳虚经后期者；脾肾虚寒，血色紫黑，脉或大而无力，及大吐大下，或外假热等证。小儿脾肾阴阳俱虚，慢脾等证。⑤《成方便读》：营阴虚弱，寒水内乘，或久虚泻痢。

【加减】 凡真阴不足或素多劳倦之辈，因而忽感寒邪不能解散，或发热，或头身疼痛，或面赤舌焦，或虽渴而不喜冷饮，或背心肢体畏寒，但脉见无力者，宜用此汤照后加减以温补阴分，托散表邪。加附子即名附子理阴煎，再加人参即名六味回阳饮，治命门火衰，阴中无阳等症。若风寒外感，邪未入深，但见发热身痛，脉数不洪，凡内无火证，素禀不足者，加柴胡一钱半或二钱，连进一二服；若寒凝阴盛而邪有难解者，必加麻黄一二钱。若阴胜之时，外感寒邪，脉细恶寒，或背畏寒者，乃大阳少阴证也，加细辛一二钱，甚者再加附子一二钱，或并加柴胡以助之亦可。若阴虚火盛，其有内热不宜用温，而气血俱虚，邪不能解者，宜去姜、桂，单以三味加减与之，或只用人参亦可。若泄泻不止，及肾泄者，少用当归，或并去之，加山药、扁豆、吴茱萸、破故肉、豆蔻、附子之属。若腰腹有痛，加杜仲、枸杞。若腹有胀滞疼痛，加陈皮、木香、砂仁之属。

【方论选录】 ①《重订通俗伤寒论》：君以归、地甘润和阴，佐以姜、草辛甘和阳。②《成方便读》：此理中汤之变方也。理中者，理中焦之阳，故用参、术，此则理中焦之阴，故用归、地。凡人之脏腑，各有阴阳，倘二气不能两协其平，则有胜负而为病矣。中焦阳气不足而受寒者，固前人论之屡矣；中焦阴血不足而受寒者，其方未多见。故景岳理阴煎一方，实为最切于时用者也。方中用归、地补养阴血，即以炮姜温中逐寒，然恐其刚燥太盛，故以甘草之和中补土，缓以监之；且归、地得炮姜，不特不见其滞，而补阴之力，愈见其功。

12277 理饮汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 于术四钱 干姜五钱 桂枝尖二钱 炙甘草二钱 茯苓片二钱 生杭芍二钱 橘红一钱半 川厚朴一钱半

【主治】 心肺阳虚，致脾湿不升，胃郁不降，饮食不能运化精微，变为饮邪，停于胃口为满闷，溢于膈上为短气，溃满肺窍为喘促，滞腻咽喉为咳吐粘涎，甚或阴霾布满上焦，心肺之阳不能畅舒，转郁而作热。或阴气逼阳外出为身热，迫阳气上浮为耳聋。

【宜忌】 诊其脉，确乎弦迟细弱者，方能投以此汤。

【方论选录】 方中用桂枝、干姜以助心肺之阳而宣通之；白术、茯苓、甘草以理脾胃之湿而淡渗之；用厚朴者，叶天士谓“厚朴多用则破气，少用则通阳”，欲借温通之性，使胃中阳通气降，运水谷速于下行也；用橘红者，助白术、茯苓、甘草以利痰饮也。至白芍，若取其苦平之性，可防热药之上僭，若取其酸敛之性，可制虚火之浮游，且药之热者，宜于脾胃，恐不宜于肝胆，又取其凉润之性，善滋肝胆之阴，即预防肝胆之热也。

【临证举例】 ①痰饮 一妇人，年三十许，身形素丰，胸中痰涎郁结，若碍饮食，上焦时觉烦热，偶服礞石滚痰丸有效，遂日日服之，初则饮食加多，继则饮食渐减，后则一日不服，即不能进饮食，又久服之，竟分毫无效，日仅一餐，进食少许，犹不能消化，且时觉热气上腾，耳鸣欲聋，始疑药不对证，求愚诊治，其脉浮大，按之甚软。愚

曰：此证心肺阳虚，脾胃气弱，为服苦寒攻泻之药太过，故病证脉象如斯也。拟治以理饮汤。病家谓，从前医者，少用桂、附即不能容受，恐难再用热药。愚曰，桂、附原非正治心肺脾胃之药，况又些些用之，病重药轻，宜其不受。若拙拟理饮汤，与此证针芥相投，服之必无他变。若畏此药，不敢轻服，单用干姜五钱试服亦可。病家依愚言，煎服干姜后，耳鸣即止，须臾觉胸次开通，继投以理饮汤，服数剂，心中亦觉凉甚，将干姜改用一两，又服二十余剂，病遂除根。②发搐　邑韩蕙圃医学传家，年四十有四，偶得奇疾。卧则常常发搐，旋发旋止，如发寒战之状，一呼吸之间即愈，即不发搐时，人偶以手抚之，又辄应手而发。自治不效，广求他医治疗皆不效。留连半载，病势浸增。后愚诊视，脉甚弦细，询其饮食甚少，知系心肺脾胃阳分虚惫，不能运化精微以生气血，血虚不能荣筋，气虚不能充体，故发搐也。必发于卧时者，卧则气不顺也。人抚之而辄发者，气虚则畏人按也。授以理饮汤方，数剂，饮食加多，搐亦见愈。二十剂后，病不再发。

12278　理苓汤

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】理中汤合五苓散

【主治】①《张氏医通》：胃虚食滞，喘胀浮肿，小便不利。②《医略六书》：产后霍乱，脉紧细者。

【方论选录】产后脾胃两虚，寒邪搏湿，故挥霍撩乱，呕吐泄泻，谓之霍乱。与常人霍乱不同。人参补胃气之虚，白术助脾气之运，炮姜温中逐冷，猪苓利水泻湿，泽泻利肾膀之湿，茯苓渗脾肺之湿，炙草缓中和胃，肉桂补火散寒也。水煎，温服，使脾健胃强，则寒湿自散而经脏清和，安有挥霍撩乱，呕吐泄泻之患乎。

12279　理物汤

【方源】《证治要诀类方》卷一。

【组成】理中汤合四物汤

【主治】①《证治要诀类方》：交肠。②《医略六书》：下血久不止，脉细数者。

【方论选录】《医略六书》：肠红经久，血弱脾寒，不能吸血归经，故下血久不止焉。理中汤温脾吸血，四物汤补血归经，二方合用，异路同归，洵为崇土滋营之剂，乃血弱脾寒下血经久之专方。

【备考】《医略六书》本方用法：水煎，去滓温服。

12280　理肺膏

【方源】《得效》卷十九。

【组成】河子（去核）　百药煎　五味子（微炒）　条参（去芦）　款冬花蕊　杏仁　知母　贝母　甜葶苈子　紫菀　百合　甘草节各五钱

【用法】上为末，白茅根净洗，称三斤，研取自然汁，入瓷石器中熬成膏，更添入好蜜二两，再熬匀候冷，调和前药为丸，如梧桐子大。温水吞下。

【主治】肺痈正作，咳唾不利，胸膈迫塞。

【备考】本方方名，据剂型，当作"理肺丸"。

12281　理脾糕

【方源】《寿世青编》卷下。

【组成】松花一升　百合　莲肉　山药　薏米　芡实　白蒺藜各一升（一方加砂仁末一两）

【用法】上药各为末，粳米粉一斗二升、糯米粉三升、砂糖一斤，拌匀蒸熟，炙干食之。

【主治】老人、小儿脾泄水泻。

12282　理痰汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生芡实一两　清半夏四钱　黑脂麻（炒，捣）三钱　柏子仁（炒，捣）二钱　生杭芍二钱　陈皮二钱　茯苓片二钱

【主治】痰涎郁塞胸膈，满闷短气，或渍于肺中为喘促咳逆，停于心下为惊悸不寐，滞于胃口为胀满哕呃，满于经络为肢体麻木或偏枯，留于关节、着于筋骨为俯仰不利、牵引作疼；随逆气肝火上升为眩晕不能坐立。

【方论选录】方以半夏为君，以降冲胃之逆；即重用芡实，以收敛冲气，更以收敛肾气，而厚其闭藏之力；用脂麻、柏实者，润半夏之燥，兼能助芡实补肾也；用芍药、茯苓者，一滋阴以利小便，一淡渗以利小便也；用陈皮者，非借其化痰之力，实借其行气之力，佐半夏以降逆气，并以行芡实、脂麻、柏实之滞腻也。

【临证举例】①痰饮　一妇人，年四十余，上盛下虚，痰涎壅滞，饮食减少，动则作喘，他医用二陈汤加减治之，三年，病转增剧。后延友人毛仙阁诊视，投以此汤，数剂病愈强半，又将芡实减去四钱，加生山药五钱，连服二十余剂，痰尽消，诸病皆愈。至今数年，未尝反复。②痫风　一少妇，患痫风，初两三月一发，渐至两三日一发。脉滑，体丰，知系痰涎为恙。仙阁亦治以此汤加赭石三钱，数剂竟能拔除病根。

12283　理中化痰丸

【方源】《明医杂著》卷六。

【组成】人参　白术（炒）　干姜　甘草（炙）　茯苓　半夏（姜制）

【用法】 上为末，水为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，白滚汤送下。

【主治】 脾胃虚寒，痰涎内停，呕吐少食；或大便不实，饮食难化，咳唾痰涎。

12284 理中当归汤

【方源】《医心方》卷二十三引《产经》。

【组成】 甘草三两 当归二两 人参一两 白术一两 干姜半两

【用法】 水七升，煮取二升半，分三次服。

【主治】 产后腹中虚冷，心腹痛，不思饮食，呕吐厥逆。

12285 理中安蛔汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】 人参中 白术中 干姜上 茯苓中 乌梅二个 花椒

【用法】 加生姜，水煎服。如合丸药，用乌梅浸烂蒸熟，捣如泥，入前末药再捣如泥。每服十丸，米汤吞下。

【功用】《成方便读》：温扶脾土，去虫。

【主治】 ①《伤寒全生集》：蛔厥，手足冷而吐蛔。②《成方便读》：胃寒吐蛔，腹痛不止，其痛也，腹中似有形攻击之状，上下作止不一，亦无喜按拒按之分，喜热喜冷之辨，或好食泥土茶炭等物，脉象三五不调，唇色或赤或白。

【加减】 手足冷，加附子；有呕，加陈皮、半夏；吐蛔未止，加黄连、苦楝根皮、细辛。

【方论选录】 ①《伤寒全生集》：治蛔不可用甘草甜物，盖蛔得甘则动于上，得酸则静，见苦则安，得辛辣则头伏于下也。②《成方便读》：夫腹痛一证，固有寒热虚实之不同，其为虫积者尤多，以其饮食不节，生冷过度，脾胃阳气薄弱，不能运化精微，蕴酿而成虫积矣。自有病证可征，急用理中，温理中脏，复其健运之职，而杜其生虫之源，加入川椒、乌梅大辛大酸之品以杀之。用蜜丸者，使之易入虫口，以缓椒、梅之急耳。

【备考】 本方方名，《准绳·伤寒》引作"理中安蛔散"。本方炼蜜为丸，名"理中安蛔丸"（见《医方集解》）。《回春》本方用量：人参七分，白术、茯苓各一钱，乌梅一个，花椒一分，干姜五分。

12286 理中豁痰汤

【方源】《东医宝鉴·内景篇》卷二引《必用方》。

【组成】 白术 白芍药各一钱 人参 白茯苓 半夏 制瓜蒌仁 陈皮 天门冬 麦芽（炒）各七分 黄芩（酒炒） 香附子（盐水炒） 黄连（姜汁炒） 苦萸各五分 枳实 甘草各三分

【用法】 上锉作一贴。水煎，去滓，加生姜汁二匙，竹沥六匙调服。

【主治】 膈上胃中热痰。

12287 理气活血汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 柴胡6克 杭白芍 归尾 牡丹皮 香附各9克 青皮3克 炒栀子6克

【功用】 疏肝解郁，理气活血。

【主治】 暴盲。

【方论选录】 方中柴胡、香附、青皮疏肝理气，白芍、归尾、牡丹皮活血、柔肝、祛瘀，少佐以炒栀子清心泻火，以防肝郁化火耗损肾阴。

12288 理气健脾丸

【方源】《医方集解》。

【组成】 白术 陈皮 山楂 香附 木香 半夏 茯苓 神曲 黄连 当归 芍药 （一方无芍药）

【用法】 荷叶烧饭为丸服。

【主治】 脾胃虚弱，久泻久痢。

12289 理气宽肠汤

【方源】《中西医结合治疗急腹症》。

【组成】 当归五钱 桃仁 青皮 陈皮各二钱 乌药三钱

【用法】 水煎服。

【功用】 通络活血，顺气宽肠。

【主治】 宿结型、瘀结型肠梗阻。

【宜忌】 适于梗阻轻微，体质虚弱，或年高不宜急下者。

【临证举例】 肠梗阻 《中医杂志》（1963；5：16）：以理气宽肠汤为主，配合禁食、输液、胃肠减压、灌肠等非手术疗法治疗肠梗阻24例，其中2例服药失败而做手术；2例症状减轻，但检查中发现肿物压迫，患者拒绝手术自动出院；20例完全治愈，无一例死亡，治愈率为83.33%。

12290 理气通经汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 当归 川芎 丹参 红花 香附 青皮 益母草

【功用】 开郁行气，活血调经。

【主治】 肝气郁结，经行后期，经色紫红有块，小腹胀痛，胸胁或乳房作胀。

12291 理气散瘀汤

【方源】《傅青主女科》。

【异名】 理气止瘀汤（《辨证录》卷十二）。

【组成】 人参一两 黄耆一两（生用） 当归五钱（酒洗） 茯苓三钱 红花一钱 丹皮三钱 姜

炭五钱

【用法】 水煎服。服一剂而流血止，二剂而昏晕除，三剂而全安矣。

【主治】 妊妇有跌扑闪挫，遂致小产，血流紫块，昏晕欲绝者。

【加减】 胎未堕，宜加杜仲（炒炭）一钱，续断（炒黑）一钱；若胎已堕，服原方；血崩不止，加贯众炭三钱；若血闭心晕，加玄胡炭一钱。

【方论选录】 此方用人参、黄耆以补气，气旺则血可摄也；用当归、丹皮以生血，血生则瘀难留也；用红花、黑姜以活血，血活则晕可除也；用茯苓以利水，水利则血易归经也。

12292 理郁升陷汤

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 生黄耆六钱 知母三钱 当归身三钱 桂枝尖一钱半 柴胡一钱半 乳香（不去油）三钱 没药（不去油）三钱

【主治】 胸中大气下陷，又兼气分郁结，经络湮滞者。

【加减】 胁下撑胀，或兼疼者，加龙骨、牡蛎各五钱；少腹下坠者，加升麻一钱。

【临证举例】 ①胸中气分郁结下陷 一妇人，年三十许。胸中满闷，时或作疼，鼻息发热，常常作渴。自言得之产后数日，劳力过度。其脉迟而无力，筹思再三，莫得病之端绪。姑以生山药一两滋其津液，鸡内金二钱，陈皮一钱，理其疼闷，服后忽发寒热。再诊其脉，无力更甚，知其气分郁结，又下陷也。遂为制此汤，一剂诸病皆觉轻，又服四剂痊愈。②癥瘕 一少女，年十五。脐下左边起癥瘕，沉沉下坠作疼，上连腰际，亦下坠作疼楚，时发呻吟，剧时常觉小便不通，而非不通也。诊其脉，细小而沉。询其得病之由，言因小便不利，便时努力过甚，其初腰际坠疼，后遂结此癥瘕。其方结时，揉之犹软，今已五阅月，其患处愈坚结。每日晚四点钟，疼即增重，至早四点钟，又渐觉轻，愚闻此病因，再以脉象参之，知其小便时努力过甚，上焦之气陷至下焦而郁结也。遂治以理郁升陷汤，方中乳香、没药皆改用四钱，又加丹参三钱，升麻一钱半，二剂而坠与疼皆愈。遂去升麻，用药汁送服朱血竭末钱许，连服数剂，癥瘕亦消。

12293 理肺泻心汤

【方源】 《眼科临症笔记》。

【组成】 芜蔚子四钱 当归三钱 赤芍三钱 川芎二钱 黄芩三钱 木贼二钱 川黄连二钱 枳壳二钱 桔梗三钱 柴胡一钱半 薄荷二钱 甘草一钱 蝉蜕一钱半

【用法】 水煎服。

【主治】 阴阳翳症。

12294 理疝芦巴丸

【方源】 《鳞爪集》卷二。

【组成】 胡芦巴十六两 川楝子一斤二两 吴茱萸十两 小茴香二十两 川乌一两 巴戟肉一两

【用法】 上为细末，水泛为丸。每服三钱，盐汤送下。

【功用】 散寒化滞，扶气补虚。

【主治】 小肠气结，奔豚瘕疝，睾丸坚硬，小腹有形，上下去痛，或绕脐攻刺，呕吐气滞。

12295 理脾却涎散

【方源】 《万氏家抄方》卷五。

【组成】 白术（炒）一钱 人参五分 茯苓八分 陈皮一钱 黄连（炒）五分 藿香五分 半夏曲（炒）八分 厚朴（姜汁炒）八分 山楂肉一钱 甘草（炙）三分

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 小儿口涎多。

12296 理中加丁香汤

【方源】 《丹溪心法》卷三。

【异名】 理中丁香汤（《杏苑》卷四）、理中汤（《产孕集·补遗》）。

【组成】 人参 白术 甘草（炙） 干姜（炮）各一钱 丁香十粒

【用法】 上㕮咀。加生姜十片，水煎服。

【功用】 《杏苑》：补中散寒。

【主治】 胃寒呕吐，呃逆。

①《丹溪心法》：中脘停痰，喜辛物，入口即吐。②《医方考》：呕吐腹痛。③《医学入门万病衡要》：胃感寒呕吐不止。④《产孕集·补遗》：产后呃逆。

【加减】 或加枳实半钱亦可。

【方论选录】 ①《医方考》：呕吐而痛即止者为火，呕吐而痛不止者为寒。然寒则收引，胡然能吐？师曰，寒胜格阳，故令吐也。治寒以热，故用丁香、干姜之温；吐多损气，故用人参、白术、甘草之补。②《医学入门万病衡要》：用人参、白术、炙草诸甘温以补中气，干姜、丁香诸辛热以散寒，生姜散逆气以止呕吐。

12297 理中加半夏汤

【方源】 《会约》卷四。

【组成】 人参（少者以山药三钱炒黄代之） 白术二钱 干姜（炒）一钱 甘草（炙）一钱 生姜

半夏各一钱半

【用法】 水煎服。如虚热拒格，冷服。

【主治】 脾胃虚寒，吞酸，冷咽涎沫，呕吐。

【加减】 如寒气内格，食入即吐，加黄芩七分以引之。若寒甚者，加附子；如呕而胸满，及食谷欲呕者，加吴茱萸一钱，汤泡一次用。

12298 理中加茵陈汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷五。

【组成】 人参 白术 甘草 干姜 茵陈各二钱

【用法】 水二盏，煎至八分，去滓服。

【主治】 伤冷中寒，脉弱气虚，变为阴黄。

【临证举例】 黄疸 《南雅堂医案》：一身面目俱黄，暗如熏黄，已食如饥，倦怠嗜卧，短气，小便色黄，自利，乃脾胃湿热内郁，膀胱之气不化，渐成黄疸，证属虚候，以炒白术三钱，人参一钱，干姜八分，炙甘草八分，绵茵陈二钱，白茯苓三钱治之。

12299 培本丸

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】 西洋参（龙眼肉同蒸透） 沙蒺藜（盐水炒） 萸肉（酒炒） 茯苓（人乳拌药）各二两 直生地 直熟地（砂仁末拌炒） 白术（土炒）各四两 杞子（酒蒸五次）一两五钱 肉苁蓉（焙）五两 血余一两二钱 虎胫骨（酥炙）一对

【用法】 上为末，用羯羊肉四斤，剔净油膜取纯精者，酒、水炙取浓汁为丸，如梧桐子大。每服四钱，淡盐汤送下。

【主治】 下元虚弱，腰足软，神疲色萎，劳怯损伤诸证。

12300 培补保元丸

【方源】《会约》卷二。

【组成】 本支地八两（拣六七钱重一支者，有小直纹而无横纹，其色不纯黑，内有菊花黄心为佳，略洗，用玄砂仁四钱微炒研末，同米酒入砂锅内，以纸湿封数层，久蒸取出晒干，加酒再蒸，如是者九次，切勿用砂锅煮熟，以真汁耗也，最忌铁器。有谓用姜汁蒸者，姜入脾经，切不可依） 枣皮四两（下部滑遗者加一两，酒蒸） 淮山药（炒）四两 白云苓四两（去皮） 粉丹皮一两六钱（酒浸，如血虚热燥者，加五六钱） 建泽泻一两二钱（淡盐水浸，如小便短涩，加五六钱） 当归三两（酒蒸） 白芍二两半（煨，酒炒） 杜仲三两（盐水炒） 甘枸杞三两（酒蒸） 菟丝子四两（淘净泥沙，酒蒸，晒干研末） 北五味一两半（微炒）

【用法】 先将地黄、枣皮、枸杞、当归共捣成膏，然后将余药研末，加炼蜜一斤多为丸，如梧桐子大。每服一百丸，早晨用淡盐水送下。

【主治】 一切体弱脉虚，肾亏神倦，及失血，咳嗽，梦遗火炎，小便短赤，喉舌干燥。

【宜忌】 立夏便服，交秋忌用。少年体弱者宜服。人于少年时，每年制服一料，可免内伤阴虚之病。若有是症，更宜多服，不可忽视延捱。

【加减】 如血虚发热者，加上阿胶三两（蛤粉炒成珠），即失血者亦用，或多用；如咳嗽有痰者，加川贝母四两（糯米拌炒），麦冬三两（去心酒蒸）；如下部虚滑，加莲须三两，牡蛎（煅，净粉，醋炒）四两；如肾中之阳虚，加补骨脂（盐炒）三两；如乏嗣者，加胡桃肉四两。此方或少加熟附子一两以助各药之力。如中年右尺脉虚，属命门火衰，及肾中之阳不足而乏嗣者，俱宜加肉桂三两，制附子三四两，补骨脂、胡桃肉各四两，更效。

12301 培脾舒肝汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 于术三钱 生黄耆三钱 陈皮二钱 川厚朴二钱 桂枝尖一钱半 柴胡一钱半 生麦冬二钱 生杭芍四钱 生姜二钱

【主治】 肝气不舒，木郁克土，致脾胃之气不能升降，胸中满闷，常常短气。

【方论选录】 脾主升清，所以运津液上达；胃主降浊，所以运糟粕下行。白术、黄耆为补脾胃之正药，同桂枝、柴胡能助脾气之升，同陈皮、厚朴能助胃气之降。清升浊降，满闷自去，无事专理肝气，而肝气自理。况桂枝、柴胡与麦芽，又皆为舒肝之妙品乎。用芍药者，恐肝气上升，胆火亦随之上升，且以解黄耆、桂枝之热也。用生姜者，取其辛散温通，能浑融肝脾之气化于无间也。

12302 梧桐叶散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 臭梧桐叶（用卷的，阴干）

【用法】 上为末，初服七分，每日加一分至一钱四分为率，又每日退一分至七分为率，俱用无灰酒调服。避风，初一服，则小便如油，至四服浑身骨响，至八服汗出如泉冷，至十二服，麻木处有红点，则知痛痒；至十五日发斑如云片，以瓷锋砭出黑血，仍用梧桐末掺之愈。

【主治】 大麻风。

【宜忌】 忌食盐、酱、母猪、羊、牛、烧酒、面食、房劳、一切发物。

12303 梧桐律散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】 梧桐律半两 细辛 地骨皮 防风各一两 白芷半两 荜草 芎各一两

【用法】 上为细末。每用半钱揩牙，食久漱，冷即吐之。

【主治】 口齿浮动宣露，血不止。

12304 梧桐濯足汤

【方源】《增补内经拾遗》卷二。

【组成】 梧桐叶不拘多少

【用法】 用水数十碗，煮十数沸取出。只浴两足后跟，其泻即止。

【主治】 泄泻不止。

12305 梅豆汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 乌梅一个 黑豆一百粒 薏苡仁二合

【用法】 水煎，入阿胶、生蒲黄各一钱，再煎服。

【主治】 肠痈冷热症，及肺痈咳唾脓血不止。

12306 梅柿丸

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 乌梅二两 柿饼四两

【用法】 加水少许，饭上蒸熟，捣烂为丸，如梧桐子大。每服五钱，一二口吞下。两三次愈。

【主治】 便血。

12307 梅柿饮

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】 乌梅肉五分 柿霜二钱 天冬 麦冬各二钱 玄参二钱 硼砂二钱

【用法】 炼蜜为丸。噙化。

【主治】 久嗽喉痛。

12308 梅茸丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】 乌梅肉（用新瓦熨干） 鹿茸（火燎去毛，酥炙） 鸡爪黄连（去须，用米醋一盏炙干）各等分

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前盐酒或米饮汤送下。不用黄连亦得。

【主治】 肠风脏毒，经年下血不止者。

【临证举例】 便血 傅元元十余年便血，服此药遂愈。

12309 梅花饮子

【方源】《外科精要》卷三。

【组成】 忍冬藤四两 栝楼根 甘葛根 川芎 乌梅 绵黄耆（炒） 甘草 苏木各一两

【用法】 上作四剂。水酒煎服。

【功用】 痈疽初服防毒内攻。

【主治】 痈疽邪气盛而真气虚者。

12310 梅觉春丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 丁香 木香 朱砂（研）各一钱 黑附子一个（重半两者，剜去中心成空瓮子）

上将丁香、木香、朱砂等二味同为细末，倾在附子瓮儿内，以荞麦面和如饼剂，裹却，用生萝卜一个，径四寸，劈作两半，中间剜得可容上件药置之于内，以竹签子签定，用六一泥固了，约厚半指许，于净地剜一坑子，深五寸许，用炭火烧红，去了炭火及灰，令坑内净，用好醋一盏泼在坑子，泣定，将药安在坑内，四畔用炭火一斤铺盖煅之，一时辰为度，去火，用新盆合定，令冷，与后药一处为末。

舶上茴香（炒） 天台乌药 白茯苓（去皮）各一钱 地龙（去土）一字

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，空心乳汤酒送下。

【主治】 阳事痿弱。

12311 梅地柴胡饮

【方源】《医级》卷九。

【组成】 柴胡 当归 芍药 丹皮 黑栀 生地 甘草 泽泻 乌梅

【功用】 疏肝清降。

【主治】 师尼少寡萌欲不遂，经气逆而阴阳从乘，发为寒热，状如疟。

12312 梅花五气丹

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 梅花五炁丹（《疡科捷径》卷上）。

【组成】 梅花片五分 当门麝五分 轻粉 辰砂各六分 乳香 没药 瓜儿血竭 明雄黄各一钱 真酥散（预于端午前寻之，至午日，取酥二钱，用头男乳调膏）

【用法】 上各为极细末，对准分数，于端午日辰时制度，候至午时，将上药九味和入蟾酥膏内，向日为丸，如芥子大，一时内晒干。用川椒二十七粒，灯心二十七段同药收于瓷罐内养之，以蜡封口，不泄药气为妙。凡遇恶疮大毒，开器取出一枚，先用美馔食饱，次用无根水漱净口内，再含水一口，少顷待温，用葱白五寸同水嚼烂咽下，随将药丸安放舌下，睡于暖处，以被覆盖，药化苦水，徐徐咽之，疮势大者，二三丸亦可；药尽其汗即到如淋，诸病若失。如冬月天寒难汗，噙后将葱白汤催之亦妙，凡治无有不效。如暗疔人所不知觉，及

知觉而失治者，毒气入里，人便昏沉，一中便倒，不能依法服药，急用连须葱白七个，煎酒一杯，研药五丸灌下，药气到心，其功如汤泼雪，患者即便苏醒。

【主治】 脑疽、发背、诸般疔肿，初起寒热交作，筋骨疼痛，有似伤风，恶心呕吐，但未成脓者。

12313 梅花取香汤

【方源】《普济方》卷一七六引《德生堂方》。

【异名】 斩龙剑子手（原书同卷）、梅花聚香汤（《奇效良方》卷三十三）。

【组成】 天花粉 乌梅肉 人参 干葛 枇杷叶 黄耆 栝楼子 麦门冬 五味子各一两 檀香五钱

【用法】 上为细末。水调服之，随意不拘时候。

【主治】 消渴，饮水至石斗，病极者。

12314 梅花点舌丹

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【异名】 梅花丸子〔《全国中药成药处方集》（抚顺方）〕、梅花点舌丸（《中国药典》一部）。

【组成】 朱砂二钱 雄黄二钱 白硼二钱 血竭二钱 乳香（去油）一钱 没药（去油）二钱 蟾酥（人乳浸）一钱 牛黄一钱 苦葶苈二钱 冰片一钱 沉香一钱 麝香六分 珍珠六分（上白者佳） 熊胆六分

【用法】 上为细末，将人乳浸透蟾酥，研入诸药调匀为丸，如梧桐子大，金箔为衣。凡遇疮毒，用药一丸，压舌根底含化，随津咽下，药尽用酒葱白随量饮之，盖被卧之，出汗为度。

【功用】《全国中药成药处方集》（抚顺方）：解毒，消肿，镇痛。

【主治】 ①《洞天奥旨》：诸般无名肿毒，十三种红丝等疔，喉痹。②《全国中药成药处方集》（抚顺方）：无名肿毒，疔毒恶疮，外科热毒初起之时，发热恶冷，红肿疼痛，呕吐恶心，烦闷搅闹，起线走黄，喉蛾喉痹，肿闭不通，实火牙痛，口舌诸疮，龈腐起疳，小儿惊风，发热抽搐。

【宜忌】 ①《洞天奥旨》：忌发物三七日更妙。②《全国中药成药处方集》：阴性疮疽，慢惊风症，阴虚白喉等均忌用，孕妇勿服。

【备考】《全国中药成药处方集》：外可用陈醋调敷患处。

12315 豉薤汤

【方源】 张文仲引陶氏方（见《外台》卷二）。

【异名】 薤白栀子汤（《伤寒总病论》卷三）、薤白汤（《活人书》卷十八）、栀子汤（《圣济总录》卷一八四）、薤白散（《治痘全书》卷十三）。

【组成】 豉一升 栀子十四枚 薤白一把

【用法】 以水五升，煮取二升半。分三次服。

【主治】 温毒下利。

①《外台》引《小品方》：温毒，及伤寒内虚，外热攻肠胃，下黄赤汁，及如烂肉汁。赤滞，伏气腹痛诸热毒。②《圣惠》：伤寒暴痢腹痛。③《圣济总录》：乳石发，赤白痢，兼热烦闷。④《治痘全书》：痘疮下痢，后重烦躁。

【方论选录】《医方集解》：栀、豉苦寒，能升能散；薤白辛温，能开胸痹，及大肠气滞。

【备考】《外台》引《小品方》本方用法：水四升，先煮栀子、薤白令熟，纳豉煮取二升，分三次服。

12316 乾坤一气膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】 一气膏〔《全国中药成药处方集》（吉林方）〕。

【组成】 当归 白附子 赤芍 白芍 白芷 生地 熟地 川山甲 木鳖肉 巴豆仁 蓖麻仁 三棱 莪术 五灵脂 续断 肉桂 玄参各一两 乳香 没药各一两二钱 麝香三钱 真阿魏二两（切薄片听用）

【用法】 上㕮咀。用香油五斤，存下四味，余皆入油浸，春三、夏五、秋七、冬十，期毕，桑柴火熬至药枯，细绢滤清；每净油一斤，入飞丹十二两，将油入锅内，下丹，槐枝搅搅，其膏候成，端下锅来，用木盆坐稳，渐下阿魏片，泛化已尽，方下乳、没、麝香，再搅匀，乘热倾入瓷罐内，分三处盛之，临用汤中顿化。痞病红缎摊贴，余病绫绢俱可摊之，有肿者对患贴之。男子遗精、妇人白带，俱贴丹田；诸风瘫痪，贴肾俞穴并效。

【功用】《全国中药成药处方集》（吉林方）：活血杀菌，驱风散寒，渗湿除痰，暖宫调经。

【主治】 痞疾，诸风瘫痪，湿痰流注，各种恶疮，百般怪症。男子夜梦遗精，妇人赤白带下。男女精寒血冷，久无嗣息者。

12317 勒马听徽散

【方源】《外科大成》卷三。

【异名】 勒马听徽丝（《金鉴》卷六十五）。

【组成】 白砒一分 麝香三分 青黛（飞）一两 青绵一根（扯碎）

【用法】 清油拌匀收之。用时先以清米泔水漱口净，次以针尖挑些须塞牙齿根缝内。

【主治】 ①《外科大成》：牙疳臭烂者。②《金

鉴》：走马牙疳，牙缝黑腐不尽，及腐烂深坑，药不能到。

12318 菴茼子酒

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】菴茼子一斤 桃仁二两（汤浸，去皮尖双仁） 大麻仁二升

【用法】上为末，于瓷瓶内，以酒二斗浸，密封头，五日后。每服三合，温饮，渐加至五合，一日三次。

【主治】妇人风有风冷，留血结聚，月水不通。产后脏腑风虚，恶血凝滞，致月水不通。

12319 菴茼子散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】菴茼子三分 川大黄半两（锉碎，微炒） 当归三分（锉，微炒） 桂心半两 牛膝三分（去苗） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川芎消三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】妇人月水不通，脐腹疞刺疼痛。

12320 菝葜饮

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】菝葜（锉，炒） 汤瓶内碱各一两 乌梅二两（并核捶碎，焙干）

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，于石器中煎至七分，去滓，稍热细呷。

【主治】消渴饮水无休。

12321 菝葜散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】菝葜二两

【用法】上为细散。每服一钱匕，米饮调下。服毕用地椒煎汤，浴连腰浸，须臾即通。

【主治】沙石淋重者。

12322 菝葜散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】菝葜（锉） 桑螵蛸（微炒） 附子（炮裂，去皮脐） 龙骨各一两 韭子半两（微炒） 桂心半两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】妇人虚冷，小便滑数。

12323 菝葜八味汤

【方源】《外台》卷二十七引《许仁则方》。

【异名】菝葜散（《圣惠》卷五十八）、黄耆汤（《圣济总录》卷四十八）、菝葜饮（《圣济总录》卷五十八）、菝葜汤（《普济方》卷一七八）。

【组成】菝葜 土瓜根各三两 黄耆 地骨皮 五味子各四两 人参三两 石膏八两（碎） 牡蛎三两

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，去滓，分三次温服，每服如人行十里服一剂，服至五六剂佳。隔五日服一剂，剂数满，宜合黄耆十四味丸服之。

【主治】①《外台》引许仁则方：消渴小便数。②《圣济总录》：肺消饮少溲多；冷淋寒颤涩痛。

12324 菖蒲丸

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《圣济总录》卷一一四。

【异名】羊肾丸（《朱氏集验方》卷九）。

【组成】菖蒲三分 羊肾一对（以酒一升，煮酒尽为度，薄切，晒干） 葱子三分（微炒） 皂荚一挺（去黑皮，涂酥炙微焦，去子） 川椒三十二枚（去目及闭口者，微炒去汗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【主治】①《圣济总录》：肾虚耳聋。②《普济方》：重听，耳卒痛，及聋塞不闻声。

12325 菖蒲丸

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】菖蒲半两 人参半两（去芦头） 黄连半两（去须） 丹参三分 麦门冬一两（去心，焙） 天门冬一两（去心，焙） 赤石脂三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，温水研下，不拘时候。

【主治】小儿五六岁不语者，为心气不足，舌本无力，发转不得。

12326 菖蒲丸

【方源】《阎氏小儿方论》。

【组成】石菖蒲二钱 丹参二钱 人参（切去顶，焙）半两 赤石脂三钱 天门冬（去心，焙） 麦门冬（去心，焙）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大，或麻子大。每服五七丸至一二十丸，温水送下，一日三四次，不拘时候。久服取效。

【主治】心气不足，五六岁不能言。

12327 菖蒲丸

【方源】《普济方》卷五十四。

【组成】石菖蒲 蓖麻子仁 附子（炮）各等分

【用法】上为末，葱涎为丸，如杏仁大。绵裹塞耳中，一日二次。

【主治】 卒聋不闻及痛。

12328 菖蒲丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 石菖蒲 赤茯苓各三钱 人参五钱 丹参三钱 天门冬（烘热，去心，焙） 麦门冬（去心） 远志肉（甘草制） 甘草（炙）各一钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如赤豆大，朱砂为衣。每服二三十丸，空心灯心汤送下。

【主治】 小儿心气不足，不能言语。

12329 菖蒲饮

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】 菖蒲（石上者）一分 桂（去粗皮）一两

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 中风失音。

12330 菖蒲酒

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 菖蒲三分 木通三分（锉） 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁） 防风三分（去芦头） 桂心三分

【用法】 上锉细。以酒一斗，用绵裹，浸七日后，每日空心暖饮一盏，晚再饮之。

【主治】 耳虚聋及鸣。

12331 菖蒲酒

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【异名】 菖蒲浸酒。

【组成】 菖蒲（米泔浸一宿，锉，焙）三分 木通 磁石（捣碎，绵裹） 桂（去粗皮）各半两 防风（去叉） 羌活（去芦头）各一两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。以酒一斗渍，寒七日，暑三日。每日空腹饮三二盏，以愈为度。

【主治】 ①《圣济总录》：耳聋。②《普济方》引《朱氏家藏方》：耳鸣。

12332 菖蒲散

【方源】《医心方》卷二十五引《产经》。

【异名】 菖乌散（《幼幼新书》卷三十三引《婴孺方》）。

【组成】 菖蒲 乌头（炮）各四分

【用法】 上为散。以绵裹，纳耳中，日二易。

【主治】 ①《医心方》引《产经》：小儿耳白鸣，日夜不止。②《普济方》：风聋积久。

12333 菖蒲散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 菖蒲一两 远志三分（去心） 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心一两 防风三分（去芦头） 人参三分（去芦头） 山茱萸三分 杜仲三分（去粗皮，炙微黄，锉） 熟干地黄一两 天麻三分 石斛三分（去根，锉） 沉香一两 黄耆三分（锉） 磁石二两（捣碎，水淘，去赤汁，以帛包之）

【用法】 上为粗散。每服五钱，以水一大盏，入磁石包子同煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 肾脏风虚，耳中常鸣，或如风雨声。

12334 菖蒲散

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】 菖蒲（锉） 人参 生干地黄（洗，切，焙） 远志（去心） 白茯苓（去黑皮） 山芋各一两 桂（去粗皮）半两

【用法】 上为细散。每服一钱匕，食后、临卧，粥饮调下。

【功用】 补心益志。

【主治】 精神恍惚，或爽或昏，意思不佳，日多伸欠，眠食不时。

12335 菖蒲羹

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】 菖蒲（米泔浸一宿，锉，焙）二两 猪肾（去筋膜，细切）一对 葱白一握（擘碎） 米（淘）三合

【用法】 上药先以水三升半煮菖蒲，取汁二升半，去滓，入猪肾、葱白、米及五味作羹，如常法。空腹服。

【主治】 耳聋，耳鸣如风水声。

12336 菖蒲导赤散

【方源】《医级》卷七。

【组成】 石菖蒲 黄连 生地 木通 甘草梢 竹叶 灯心

【主治】 伤寒传热内侵心包，烦渴昏沉，小便不利。

12337 菖蒲导痰汤

【方源】《中医内科临床治疗学》。

【组成】 半夏9克 茯苓12克 橘红9克 甘草6克 菖蒲12克 南星6克 枳实6克

【用法】 水煎服。

【功用】 豁痰开窍。

【主治】 痰气生厥，忽然眩仆，喉有痰声，或呕吐涎沫，平素可见痰多、胸闷、乏力等，脉多沉滑。

【方论选录】 菖蒲导痰汤，即二陈汤去乌梅，加菖蒲、南星、枳实而来。二陈汤燥湿化痰，理气和中；南星燥湿，祛风止痉，配半夏、陈皮可豁痰顺

气；枳实行气化痰，散结消痞；菖蒲芳香化湿，开窍宁神，合之则本方有豁痰理气开窍的功效，用于发作将息甚为适宜。

【备考】 先以通关散搐鼻开窍，继以菖蒲导痰汤治疗。

12338 菖蒲郁金汤

【方源】《温病全书》。

【组成】 石菖蒲三钱 炒栀子三钱 鲜竹叶三钱 牡丹皮三钱 郁金二钱 连翘二钱 灯心二钱 木通一钱半 淡竹沥（冲）五钱 紫金片（冲）五分

【用法】 水煎服。

【功用】 清营透热。

【主治】 伏邪风温，辛凉发汗后，表邪虽解，暂时热退身凉，而胸腹之热不除，继则灼热自汗，烦躁不寐，神识时昏时清，夜多谵语，脉数舌绛，四肢厥而脉陷，症情较轻者。

12339 萝卜粥

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】 大萝卜五个（煮熟绞取汁）

【用法】 用粳米三合，同水并汁煮粥食之。

【功用】《本草纲目》：消食利膈。

【主治】 消渴，舌焦口干，小便数。

12340 萝卜子饮

【方源】《直指》卷十七。

【组成】 萝卜子（生用）半两 赤茯苓（去皮）半两 牵牛末一两 荸荠（炒香） 甘草（炙）各四两 半夏（制） 川芎 槟榔（煨，锉） 青木香 辣桂 青皮 陈皮 白色商陆各三钱

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏，加生姜四片，煎服。

【主治】 水病浮肿。

12341 萝卜牙皂散

【方源】《医学从众录》卷六。

【组成】 萝卜子四两（用巴豆十六粒同炒） 牙皂一两五钱（煨，去弦） 沉香五钱 枳壳四两（火酒煮，切片，炒） 大黄一两（酒煨） 琥珀一两

【用法】 上为末。每服一钱，随病轻重加减，鸡鸣时温酒送下，姜汤下亦可。后服金匮肾气丸调理。

【主治】 五臌。

12342 萎蕤汤

【方源】《千金》卷九注文引《小品方》。

【异名】 葳蕤散（《圣惠》卷十）、萎蕤散（《普济方》卷一三一）。

【组成】 萎蕤 白薇 麻黄 独活 杏仁 川芎 甘草 青木香各二两 石膏三两

【用法】 上㕮咀，以水八升，煮取三升，去滓，分三服，取汗。

【主治】 ①《千金》引《小品方》：冬温及春月中风、伤寒则发热头眩痛，喉咽干，舌强，胸内疼，心胸痞满，腰背强。②《千金》：温风之病，脉阴阳俱浮，汗出体重，其息必喘，其形状不仁，嘿嘿但欲眠，下之者则小便难，发其汗者必谵语，加烧针者则耳聋难言，但吐下之则遗矢便利。

【加减】 若一寒一冷，加朴消一分及大黄三两下之。如无木香，可用麝香一分。

【方沦选录】《千金方衍义》：《千金》体究长沙余蕴，悟得发汗后汗出而喘无大热者可与麻黄杏仁甘草石膏汤，借此以治温病汗后灼热，兼取麻黄升麻汤中萎蕤合麻杏甘草，仅取方中四味而麻黄升麻汤之格局，俨然萎蕤滋肾益肺，内化厥阴火热，外通少阳风气；佐石膏以降逆满；独活、川芎、杏仁佐麻黄以解郁蒸，得石膏之寒化不独解表，并能散火；甘草一味专和麻黄、杏仁之性也。此方中萎蕤、白薇、青木香、石膏自是一路，为方中之主；麻黄、杏仁、川芎、独活自是一路，为方中之宾，作两路看方，得宾主历然之妙，深得风湿主治之奥。

12343 萎蕤汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】 萎蕤 柴胡（去苗） 羚羊角（镑）各一两 石膏（碎）半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒数日，余热不解，时发寒热。

12344 萎蕤汤

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】 萎蕤 升麻 黄连（去须）各一两半 秦皮（去粗皮）三分 地骨皮 山栀子仁 甘草（炙，锉）各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，投芒消末一钱匕，食后、临卧温服。

【主治】 眼生息肉淫肤。

12345 萸连丸

【方源】 方出《百一》卷六，名见《证治要诀类方》卷四。

【组成】 吴茱萸 黄连（去芦）各等分

【用法】 上药好酒浸透，各自拣、焙或晒干为

末，糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，赤痢用黄连丸，甘草汤送下；白痢用茱萸丸，干姜汤送下；赤白痢，二丸各半，甘草、干姜汤送下。

【主治】 痢。

12346 萸连栀石丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 吴萸 黄连 山栀 滑石各五钱 荔枝核（烧存性）三钱

【用法】 上为末，姜汁糊为丸服。

【主治】 湿热心痛引小腹，欲作疝者。

12347 萆麻丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 萆麻仁二十一粒 皂角（煅，取肉）五分 地龙大者二条 全蝎二个 远志肉 磁石（煅，飞） 乳香各二钱 麝香少许

【用法】 上为末，熔黄蜡为丸，塞耳中。

【主治】 久聋。

12348 萆薢丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】 萆薢一两（锉） 白蒺藜一两（微炒去刺） 赤茯苓一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 麻黄一两（去根节） 防风一两（去芦头） 羌活一两 人参一两（去芦头） 羚羊角屑一两 柏子仁一两 薏苡仁一两 桂心一两 生干地黄一两 当归一两（锉，微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【主治】 偏风手足不遂，筋脉缓弱，肢节疼痛。

12349 萆薢丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】 萆薢一两（锉） 熟干地黄三分 牛膝二两（去苗） 桂心半两 五加皮半两 酸枣仁半两（微炒） 羌活半两 附子一两（炮裂，去皮脐） 石斛三分（去根，锉） 白芍药三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】 腰脚冷痹，沉重无力。

12350 萆薢丸

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】 萆薢 山芋 牛膝（去苗，酒浸，焙） 泽泻各一两 熟干地黄（焙） 二两半 地肤子 干漆（炒烟去） 狗脊（去毛）各三分 白术半两 茵芋一分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下，一日一次。

【主治】 血痹，风冷痹，游走无定处。

12351 萆薢丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】 萆薢六两 杜仲（去粗皮，炙）二两半 牛膝（酒浸二日，切，焙） 续断 干木瓜（焙）各三两 桂（去粗皮）半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如小弹子大，研丹砂末为度。每服一丸，食前温酒送下，木瓜汤送下亦得。

【主治】 元脏虚损，下注腰脚，行步艰难，膝胫少力。

12352 萆薢丸

【方源】《普济方》卷二一六。

【组成】 萆薢 菟丝子 白茯苓 鹿茸 肉苁蓉 黄耆 川巴戟 杜仲 金毛狗脊 益智仁

【用法】 上为末，酒和为丸，如梧桐子大。每服四十丸，盐水送下。

【功用】 益肾气。

【主治】 小便频数。

12353 萆薢饮

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 萆薢三钱 文蛤粉（研细） 石韦 车前子 茯苓各一钱五分 灯芯二十节 莲子心 石菖蒲 黄柏各八分

【主治】 膏淋，诸淋。

12354 萆薢酒

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】 萆薢 杜仲（去粗皮，炙）各三两 枸杞皮根（洗）五两

【用法】 上锉细，用好酒五升于净瓶内浸，密封，重汤煮二时许，取出候冷，旋暖饮之，常令微醉，不拘时候。

【主治】 风湿腰痛，及湿痹不散。

12355 萆薢散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】 萆薢一两（锉） 狗脊一两 桂心一分 槟榔半两 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒） 桑根白皮三分（锉） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 腰痛急强如板硬，俯仰不得。

12356 萆薢散

【方源】《校注妇人良方》卷三。

【组成】 萆薢（酒浸） 狗脊 杜仲（炒去丝） 白茯苓（去皮）各一两 何首乌 天雄（去皮脐，

炮） 泽泻各半两

【用法】 上为末。每服二钱，米饮调下。急灸肾俞百壮。

【主治】 肾脏中风，腰疼不得俯仰，或偏枯耳鸣，语声浑浊，面色浮肿，骨节酸疼，精神昏愦，喜怒好忘，而肌色黧黑，身体沉重，发汗恶风，隐曲不利，或两脚冷痹，头昏耳聋，语言浑浊，或脊骨促痛，不能行立，肌肤黑色，两胁赤黄如饼者。

12357 萆薢浸酒

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】 萆薢三两 附子三两（炮裂，去皮脐） 杜仲二两（去粗皮，炙微黄） 狗脊二两 羌活二两 桂心二两 牛膝三两（去苗） 桑寄生二两

【用法】 上锉细，用生绢袋盛，以酒二斗浸，密封七日后开。每服一中盏，食前温服。

【主治】 五种腰痛，连脚膝筋脉拘急酸疼。

12358 萆薢分清饮

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 川萆薢二钱 黄柏（炒褐色） 石菖蒲各五分 茯苓 白术各一钱 莲子心七分 丹参 车前子各一钱五分

【用法】 水煎服。

【功用】《证因方论集要》：导湿理脾。

【主治】 ①《医学心悟》：赤白浊属湿热者。②《寿世青编》：诸淋。

12359 萆薢分清散

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【异名】 分清散（《济生》卷四）、分清饮（《瑞竹堂方》卷一）、萆薢分清饮（《丹溪心法》卷三）、萆薢饮（《古今医鉴》卷八）、萆薢散（《寿世保元》卷五）。

【组成】 益智仁 川萆薢 石菖蒲 乌药各等分

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏半，入盐一捻，同煎至七分，食前温服。

【主治】 真元不足，下焦虚寒，小便白浊，频数无度，漩面如油，光彩不定，漩脚澄下，漩如膏糊，或小便频数，虽不白浊。

【临证举例】 慢性前列腺炎 《广西中医药》（1982；4:29）：李某，男，32岁，结婚五年无子，会阴部胀痛，小便频数短赤，尿后泌出米汤样粘液，滴沥难尽，遗精、早泄、阳萎，经检查诊断为慢性前列腺炎，拟方：萆薢15克，茯苓12克，车前子12克，黄柏10克，山栀子10克，益智仁、乌药、芡实各12克，桃仁8克，当归尾10克，甘草梢5克，共服药30余剂，病告痊愈。次年喜得一子。

【备考】 本方改为丸剂，名“萆薢分清丸”（见《北京市中药成方选集》）。

12360 萆薢渗湿汤

【方源】《疡科心得集·补遗》。

【组成】 萆薢 薏仁 黄柏 赤苓 丹皮 泽泻 滑石 通草

【主治】 湿热下注，臁疮漏蹄。

12361 菟丝煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 人参二三钱 山药（炒）二钱 当归一钱半 菟丝子（制，炒）四五钱 枣仁（炒） 茯苓各一钱半 炙甘草一钱 远志（制）四分 鹿角霜（末）

【用法】 上药用水一钟半，煎成，加鹿角霜末四五匙调，食前服。

【主治】 心脾气弱，思虑劳倦，遗精。

12362 菟丝子丸

【方源】《普济方》卷二一七引《孟氏诜诜方》。

【组成】 白茯苓 熟地黄 真龙齿 石莲肉 远志（洗，取肉）各三两 菟丝子四两（如前制）

【用法】 上为末，用山药打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒、盐汤任下。

【主治】 丈夫真气不固，随尿走失，不能饮食，筋骨痿弱。

12363 菟丝子丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 菟丝子三两（酒浸三日，晒干，别捣） 车前子二两 鹿茸二两（去毛，涂酥，炙令微黄） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 桂心二两 杜仲二两（去粗皮，炙令黄，锉） 熟干地黄五两 附子二两（炮裂，去皮脐） 牛膝二两（去苗）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【功用】 补益驻颜。

【主治】 肾劳虚损，腰疼少力。

12364 菟丝子丸

【方源】《局方》卷五。

【异名】 大菟丝子丸（《准绳·类方》卷二）。

【组成】 菟丝子（净洗，酒浸） 泽泻 鹿茸（去毛，酥炙） 石龙芮（去土） 肉桂（去粗皮） 附子（炮，去皮）各一两 石斛（去根） 熟干地黄 白茯苓（去皮） 牛膝（酒浸一宿，焙干） 续断 山茱萸 肉苁蓉（酒浸，切） 防风（去苗）

杜仲（去粗皮） 补骨脂（去毛，酒炒） 荜澄茄 沉香 巴戟（去心） 茴香（炒）各三分 五味子 桑螵蛸（酒浸，炒） 芎劳 覆盆子（去枝叶萼）各半两

【用法】 上为细末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒或盐汤送下，空心服；如脚膝无力，木瓜汤送下，晚食前再服。

【功用】 填骨髓，续绝伤，补五脏，去万病，明视听，益颜色，轻身延年，聪耳明目。

【主治】 肾气虚损，五劳七伤，小腹拘急，四肢酸疼，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鸣，心忪气短，夜梦惊恐，精神困倦，喜怒无常，悲忧不乐，饮食无味，举动乏力，心腹胀满，脚膝痿缓，小便滑数，房室不举，股内湿痒，水道涩痛，小便出血，时有余沥。

12365 菟丝子丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】 菟丝子（酒浸，别捣） 白茯苓（去黑皮） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 桂（去粗皮） 菖蒲 远志（去心）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒或盐汤任下，空心、日午、临卧各一次。

【主治】 肾气内夺，舌瘖足废。

12366 菟丝子丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】 菟丝子（酒浸一宿，别捣末） 白茯苓（去黑皮） 山芋 人参 防风（去叉） 车前子 熟干地黄（焙） 黄耆（锉） 石决明各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下，临卧再服。

【主治】 肾肝虚，目昏暗，不能远视。

12367 菟丝子丸

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】 菟丝子（先子臼内杵百下，筛去杂物末） 五味子各一两 生干地黄三两（焙）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前饮送下。

【主治】 四肢发热，逢风如炙如火，由阴不胜阳，阳盛则热起于四末，少水不能灭盛火，而阳独治于外。

12368 菟丝子丸

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】 菟丝子（拣净，酒浸透，捣烂，焙干） 干地黄（焙）各二两 杜仲（去粗皮，杵碎，酒拌一宿，炒焦）三两 牛膝（酒浸）一两 萆薢一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前饮送下。

【主治】 骨痿，腰脊不举。由远行劳倦，逢大热而渴，阳气内伐，热舍于肾，水不胜火，则骨枯而髓减，盖阳明并肾，则肾脂枯而宗筋不调，宗筋主束骨而利机关也。

12369 菟丝子丸

【方源】《鸡峰》卷十。

【异名】 菟丝丸（《奇效良方》卷三十五）。

【组成】 菟丝子（去尘土，掏净，酒浸，控干，蒸，捣焙） 桑螵蛸（炙）各半两 泽泻二钱半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心清米饮送下。

【主治】 膏淋。

12370 菟丝子丸

【方源】《百一》卷十一引葛丞相方。

【组成】 菟丝子（酒浸） 杜仲（去皮，炒断丝）各等分

【用法】 上为细末，以山药糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐酒或盐汤任下。

【主治】 腰痛。

12371 菟丝子水

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 干菟丝子 31 克 鹤虱 31 克 蛇床子 31 克

【用法】 水煎，熏洗。

【主治】 肛门瘙痒症。

12372 菟丝子酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 新鲜菟丝子 93 克

【用法】 将上药浸于酒精内，一二日后过滤，用酊外涂。

【主治】 白癜风。

12373 菟丝子散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】 菟丝子三分（汤浸三宿，焙干，别捣，为末） 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙令微黄） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，去皱皮，炙令干） 桑螵蛸一两（微炒） 牡蛎一两（烧为粉） 五味子一两 鸡腰胫二两（微炙）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】 膀胱及肾脏虚冷惫伤，小便滑数，白浊不止。

12374 菟丝子散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】菟丝子二两（酒浸一宿，晒干，别捣，为末） 韭子二两（微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 当归一两 芎藭一两 桂心一两 车前子二两 白矾二两（烧，为末）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】虚劳，小便白浊，及梦遗尿精。

12375 菟丝子粥

【方源】《药粥疗法》。

【组成】菟丝子 30～60 克（新鲜者可用 60～120 克） 粳米二两 白糖适量

【用法】先将菟丝子洗净后捣碎，或用新鲜菟丝子捣烂，加水煎取汁、去清后，入米煮粥，粥将成时加入白糖，稍煮即可。分早、晚二次服食。七至十天为一疗程。

【功用】补肾益精，养肝明目。

【主治】肝肾不足所致的腰膝酸痛，腿脚软弱无力，阳痿，遗精，早泄，小便频数，尿有余沥，头晕眼花，视物不清，耳鸣耳聋；妇人带下病，习惯性流产。

12376 菊女饮

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】女贞子一两 甘菊花五钱 麦冬五钱

【用法】水煎服。

【主治】双目不痛，瞳神日加紧小，口干舌苦。

12377 菊甘散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】菊花四两 甘草五钱 生地黄四两 白蒺藜（去刺，炒）二两

【用法】上为末。每服二钱，食后米泔水下。

【主治】能近视，不能远视者。

12378 菊花丸

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】甘菊花（择） 枸杞子（择） 天麻（酒浸，切，焙） 独活（去芦头） 蔓荆实（去皮） 木香 芎藭 防风（去叉） 羌活（去芦头） 天竺黄（研） 赤茯苓（去黑皮） 藁本（去土）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，荆芥汤送下，不拘时候。

【主治】风头旋。目晕欲倒，胸中痰逆，筋骨疼痛。

12379 菊花丸

【方源】《异授眼科》。

【组成】菊花四两 巴戟一两六钱 五味子二两 肉苁蓉（酒洗）一两 枸杞二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，盐汤送下。

【主治】目有瞳仁倒者，五脏俱损也。外因五色，内因五味，精液妄行，以致肾水枯竭而伤肺肝，五脏损也。

12380 菊花汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】菊花 石膏各一两（碎） 芎藭半两 甘草（炙）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】风头疼。

12381 菊花汤

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】甘菊花一两 大黄（锉，炒）半两 茯神（去木） 玄参 淡竹叶 升麻 犀角（镑） 决明子 黄芩（去黑心） 黄连（去须）各三分

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】热毒上冲，眼赤疼痛。

12382 菊花汤

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】菊花 茯神（去木） 防风（去叉） 玄参 升麻（锉） 石膏（碎） 芎藭（锉） 葛根（锉）各一两 大黄（锉，炒）一两半

【用法】上为粗散。每服五钱匕，以水一盏半，煎至七分，去滓，食后放温服，临卧再服。

【主治】息肉淫肤，初发睑眦，渐渐胀起，攀系白睛。

12383 菊花散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】甘菊花 防风（去芦头） 决明子 栀子仁 黄芩 车前子 川升麻 玄参 地骨皮 柴胡（去苗） 麦门冬（去心） 生干地黄 甘草（炙微赤，锉） 羚羊角屑各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加淡竹叶二七片，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肝心壅热，眼涩痛。

【宜忌】忌炙煿、油腻、热面、生果。

12384 菊花散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】甘菊花 羌活 蔓荆子 半夏（汤浸七遍，去滑） 芎藭各一两 枳壳一两半（麸炒黄，去瓤） 石膏一两 赤芍药一两 甘草半两（炙微

赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 眼风毒攻眉骨及目睛，疼痛如欲破，碜涩泪出，目不能开。

12385 菊花散

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】 菊花一两 白附子（炮）三分 防风（去叉）半两 甘草（炙）一分 枳壳（去瓤，麸炒）三分

【用法】 上为散。每服二钱匕，以蜡茶清调下，不拘时候。

【主治】 风痰气厥，头疼昏眩。

12386 菊花散

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】 菊花一两 苍术五两（肥实者，就银石器入皂荚一寸，以河水煮一日，去皂荚，取术，以铜刀刮去黑皮，切，晒干取三两） 荆芥穗 草决明（温水洗） 木贼 旋覆花 甘草（炙）各一两 蝉蜕（温水洗）三分 蛇蜕（微炙）一分

【用法】 上为细散。每服一钱匕，加蜡茶半钱匕，空心、临卧点下。

【主治】 风邪牵睛，目偏视，视物不正，目风泪出。

12387 菊花散

【方源】 《圣济总录》卷一一一。

【异名】 荆防菊花散（《准绳·类方》卷七）。

【组成】 菊花 防风（去叉） 木通（锉） 木贼（锉） 仙灵脾（锉） 荆芥（去梗） 甘草（炙）各一两

【用法】 上为散。每服一钱匕，食后用茶半钱匕，同点温服。

【主治】 眼目肤翳侵及瞳仁，如蝇翅状。

12388 菊花散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】 蝉蜕（去足） 木贼各一两（童便浸一宿，晒干） 白蒺藜（炒焦，去刺） 羌活各三两 白菊花四两 荆芥 甘草各二两

【用法】 上为末。每服二钱，食后茶清调下。

【主治】 肝受风毒，眼目昏朦，渐生翳膜。

12389 菊花散

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】 菊花 川芎 细辛 白芷 白术各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后白滚水送下

【主治】 老人冷泪不止。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“菊花丸”。

12390 菊花散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 苍术（半斤同皂荚三挺砂锅内河水煮一日，去皂荚，将苍术刮去皮，切片，盐水炒净）三两 木贼（去节） 草决明 荆芥 旋覆花 甘草（炙） 菊花（去蒂）各半两

【用法】 上为散。每服二钱，空心、临卧浓茶调下。

【主治】 见风流泪，见东南风则甚，渐生翳膜。

【加减】 有翳者，加蛇蜕一钱，蝉蜕三钱。

12391 菊睛丸

【方源】《局方》卷七。

【组成】 枸杞子三两 巴戟（去心）一两 甘菊花（拣）四两 苁蓉（酒浸，去皮，炒，切，焙）二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心、食前温酒或盐汤送下。

【功用】 补不足，强目力。

【主治】 肝肾不足，眼目昏暗，瞻视不明，茫茫漠漠，常见黑花，多有冷泪。

12392 菊精丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【异名】 菊青丸（《普济方》卷八十一）。

【组成】 巴戟（水浸，去心）一两 肉苁蓉二两（酒浸一宿，切，焙） 五味子三两 枸杞子（拣净）四两 甘菊花五两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食空盐酒送下。

【功用】 久服能夜看细书。

【主治】 眼目昏暗，视物不明，眵泪难开。

12393 菊藻丸

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 菊花 62 克 海藻 62 克 三棱 62 克 蚤休 62 克 制马钱子 62 克 银花 93 克 瀉芦 93 克 马蔺子 93 克 山慈菇 93 克 蜈蚣 31 克 首乌 125 克

【用法】 上为细末，水泛为丸，如梧桐子大。每克生药约作十丸。每次三十丸，开水送下，一日二次。

【主治】 皮肤癌。

12394 菊花芍药汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 菊花 赤白芍 白蒺藜 丹皮 钩藤

天麻 夜交藤 生地 桑椹子

【功用】 养阴平肝定眩。

【主治】 阴虚阳亢，头晕目涩，心烦失眠，多梦，或有盗汗，手足心热，口干，舌红少苔，或无苔，脉细数或细弦。

12395 菊花决明散

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 草决明 石决明（东流水煮一伏时，另研极细入药） 木贼草 防风 羌活 蔓荆子 甘菊花 甘草（炙） 川芎 石膏（另研极细入药） 黄芩各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，水盏半，煎八分，食后连末服。

【主治】 ①《原机启微》：目久病，抱轮，白睛微变青色，黑睛稍带白色，黑白之间赤环如带，视物不明，昏如雾露中，睛白高低不平，其色如死，甚不光泽，口干舌苦，眵多羞涩，上焦有邪热。②《医统》：风热毒攻，卒生翳膜，赤脉贯睛，羞明多泪，渐成内障，暴发客热。

12396 菊花补肝散

【方源】《秘传眼科七十二症全书》卷二。

【组成】 甘菊 熟地 白芍 白茯 细辛 防风 柴胡 甘草 柏子仁各等分

【用法】 上药用半水半酒煎，食后服。

【主治】 肝虚目暗内障。

12397 菊花茶调散

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【组成】 菊花 川芎 荆芥穗 羌活 甘草 白芷各二两 细辛一两（洗净） 防风（去芦）一两半 蝉蜕 僵蚕 薄荷各五钱

【用法】 上为末。每服二钱，食后茶清调下。

【主治】 诸风，头目昏重，偏正头痛，鼻塞。

12398 菊花通圣散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 白菊花一两半 滑石三两 石膏 黄芩 甘草 桔梗 牙消 黄连 羌活各一两 防风 川芎 当归 赤芍药 大黄 薄荷 连翘 麻黄 白蒺藜 芒消各半两 荆芥 白术 山栀子各二钱半

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，同煎七分，食后服。

【主治】 两睑溃烂，或生风粟。

12399 萃仙丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 潼蒺藜 山萸肉 芡实 连须 枸杞子 菟丝子 川断 覆盆 金樱子

【用法】 炼蜜为丸。淡盐汤送下。

【主治】 神思恍惚，夜多异梦，腰腿酸软，精泄不收者。

12400 菩萨散

【方源】《局方》卷七。

【组成】 白蒺藜（炒） 防风（锉，炒） 苍术（米泔浸一宿，去皮，锉，炒）各二两 荆芥穗一两半 甘草（炙）一两

【用法】 上为末。每服一大钱，入盐少许，沸汤或酒调下，不拘时候。

【主治】 男子、妇人风气攻注，两目昏暗，眵泪羞明，睑皆肿痒，或时赤痛、耳鸣头眩。

12401 菀贝茅根酒

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 紫菀五钱 川贝四钱 鲜茅根一两 生桑皮 生苡仁 赤苓各三钱 青子芩 竹沥 半夏各一钱半

【功用】 清肃中上气机。

【主治】 肥甘过度，肺胃湿热蕴隆，蒸痰动血，及烟酒不节，戕伤清气，咳呕频并，痰血时出，或便血、溲血者。

【宜忌】 戒荤、酒。

12402 黄土汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 伏龙肝汤（《三因》卷九）、伏龙肝散（《脉因症治》卷上）、黄土散（《何氏济生论》卷二）。

【组成】 甘草 干地黄 白术 附子（炮） 阿胶 黄芩各三两 灶中黄土半斤

【用法】 上七味，以水八升，煮取三升，分温二服。

【功用】 温阳健脾，养血止血。

①《温病条辨》：健脾渗湿，保肝肾之阴。②《血证论》：滋补气血，清和。③《中医治法与方剂》：温阳健脾，益阴止血。

【主治】 脾虚阳衰，大便下血，或吐血，衄血，妇人崩漏，血色黯淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力者。

①《金匮》：下血，先便后血，此为远血；亦主吐血，衄血。②《张氏医通》：阴络受伤，血从内溢，先血后便，及产后下痢。③《类聚方广义》：吐血，下血久久不止，心下痞，身热恶寒，面青体瘦，脉弱；或腹痛下利，或微肿者；脏毒痔疾，脓血不止，腹痛濡泻，小便不利，面色萎黄，日渐瘦瘠，或微肿者。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：欲崇土以求类，莫如黄土，黄者，土之正色，更以火烧之，火乃土之母，其得母燥而不湿，血就温化，则所积者消，所溢者止；阿胶益血，以牛是土畜，亦是取物类；地黄补血，取其象类；甘草、白术养血补胃和平，取其味类；甘草缓附子之热，使不潜上。是方之药，不惟治远血而已，亦可治久吐血，胃虚脉迟细者，增减用之。盖胃之阳不化者，非附子之善走，不能通诸经脉，散血积也；脾之阴不理者，非黄芩之苦，不能坚其阴以固其血之走也；黄芩又制黄土、附子之热，不令其过，故以二药为使。②《金匮要略论注》：以附子温肾之阳，又恐过燥，阿胶、地黄壮阴为佐；白术健脾土之气，土得水气则生物，故以黄芩、甘草清热；而以经火之黄土与脾为类者引之入脾，使脾得暖气，如冬时地中之阳气而为发生之本。③《金匮要略心典》：黄土温燥入脾，合白术、附子以复健行之气；阿胶、生地黄、甘草以益脱竭之阴，又虑辛温之品，转为血病之房，故又以黄芩之苦寒，防其太过，所谓有制之师也。④《血证论》：方用灶土、草、术健补脾土，以为摄血之本；气陷则阳陷，故用附子以振其阳；血伤则阴虚火动，故用黄芩以清火；而阿胶、熟地又滋其既虚之血。合计此方，乃滋补气血，而兼用清之品以和之，为下血崩中之总方。

【临证举例】 ①便血 《吴鞠通医案》：福，二十四岁。病后冰振水果不能戒，粪后便血如注，与《金匮》黄土汤。每剂黄土用一斤，附子用八钱。服至三十余剂，而血始止。《蒲辅周医案》：苗某某，女，58岁。大便后流鲜血，或无大便亦流大量鲜血。每次流血量约1至2茶碗之多，每日2至3次，已二十余日。两少腹有隐痛，自觉头晕心慌，气短自汗，脸肿，饮食尚可；素有失眠及关节疼痛，月经已停止二年。脉沉数，舌微淡无苔。以黄土汤加味：熟地一两，白术六钱，炙甘草六钱，黑附子三钱，黄芩二钱，阿胶五钱，侧柏叶（炒）三钱，黄土二两。用开水泡黄土，澄清取水煎，服二剂。复诊时已有好转，仍有心跳气短，已无头晕及自汗出，饮食尚可，眠佳，舌无苔，脉仍沉数。原方再服三剂，便血已很少，以益气滋阴补血以资善后。②咯血 《江西中医药》（1984；4:11）：黄某某，女，35岁，咳嗽半月伴咯血四天，经中西药治疗后，仍咯血不止，咳嗽无痰，头晕乏力，舌苔薄白，脉细软。用黄土汤温摄：制附子6克，白术15克，干地黄15克，黄芩9克，阿胶15克，灶心土50克，甘草6克。服上药二剂咯血止。守上方加沙参15克，三剂而愈。③血淋 《河南中医》（1983；5:42）：赵某某，男，32岁。房事后有堕感，尿急，点滴不通，割如刀割，后尿出玉米粒大四五块血饼，经治半年无效。察其面色黄白，嘴唇红，舌质红，苔薄白，双尺脉沉迟无力。治以清热温脾，固肾摄血。处方：土炒白术9克，九蒸熟地9克，黄芩6克，阿胶9克，炮附子4.5克，灶心土12克，甘草3克，饭后服。连服十五剂病愈，随访四年无复发。

12403 黄丹散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 黄丹三分（炒令紫色） 栝楼根一两 前胡一两 甘草一两（炙微赤，锉） 泽泻半两 石膏一两（细研） 赤石脂半两（细研） 贝母半两（煨令微黄）

【用法】 上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以清粥饮调服，不拘时候。

【主治】 消渴，心神烦闷，头痛。

12404 黄甘散

【方源】《仙拈集》卷二。

【异名】 黄甘饮（《经验广集》卷二）。

【组成】 黄连六钱 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 多食炙煿，郁热当心而痛。

12405 黄龙丸

【方源】《医学纲目》卷三十八。

【组成】 三棱 蓬术各三两 青皮 陈皮各一两半 山楂 干姜各七钱半 槟榔半两

【用法】 上晒干，为末，糊为丸，如黍米大。三岁儿每服二十丸，食后姜汤送下，食前乌犀丸相间服。

【功用】 化积磨积。

【主治】 停食，小儿疳积。

12406 黄龙汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】 大黄 芒消 枳实 厚朴 甘草 人参 当归

【用法】 水二钟，加生姜三片，大枣二枚，煎，后再加桔梗煎一沸，热服为度。

【功用】《温疫论》：回虚逐实，补泻兼施。

【主治】 ①《伤寒六书》：伤寒热邪传里，胃中燥屎结实，而致结热利证，心下硬痛，下利纯清水，谵语发渴，身热。②《温疫论》：温疫应下失下，耽搁失治，或为缓药羁迟，火邪壅闭，耗气搏血，精神殆尽，元神将脱，邪火独存，以致循衣摸

床，撮空理线，筋惕肉瞤，肢体振战，目中不了了。

【加减】 年老气血虚者，去芒消。

【方论选录】 ①《温疫论》：大虚不补，虚何由以回？大实不泻，邪何由以去？勉用参、地以回虚，承气以逐实，此补泻兼施之法也。②《张氏医通》：汤取黄龙命名，专攻中央燥土，上既燥竭，虽三承气萃集一方，不得参、归鼓舞胃气，乌能兴云致雨？或者以为因虚用参，殊不知参在群行剂中，则迅扫之威愈猛，安望其有补益之力欤！③《伤寒瘟疫条辨》：虚人热结于里，攻之不行，乃肠胃枯涸之故，故陶氏加参、归、地于大承气汤中以助气血，建背城之功。

【临证举例】 粘连性肠梗阻 《江西中医药》(1985；1:13)：邱某某，男，42岁，农民。患者于1970年曾行"胃全切除术"，这次因进食红薯叶后腹痛腹胀，肛门停止排便排气2天，于1983年9月18日入院。X线腹部透视，诊为粘连性肠梗阻，经用大承气汤治疗后病情依然，次日患者精神萎靡，面色不华，眼窝下陷，卧床呻吟不已，舌淡微胖，苔黄白相兼而厚腻，脉象细弦，重按无力。改投黄龙汤；大黄（后下）10克，芒消（另冲）10克，厚朴15克，枳实15克，党参25克，当归10克，桔梗10克，甘草5克，白芍15克，头二煎混合取汁500毫升。服后诸症顿消，守方稍加出入，调治两天出院。

12407 黄龙汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】 黄耆一钱五分（蜜炙） 当归 白芍 白术（蜜炙） 苍术（米泔浸） 陈皮各一钱 生地黄 甘草（炙）各三钱 熟地黄五钱 柴胡二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人劳役，脾胃虚损，漏下不止，其色鲜红，气短气逆，自汗不止，身体发热，大便泄泻，四肢无力，不思饮食。

12408 黄龙散

【方源】《景岳全书》卷六十二引钱氏方。

【异名】 黄龙汤（原书卷五十五引钱氏方）。

【组成】 柴胡五钱 赤芍药三钱 黄芩（炒） 甘草（炙）各二钱

【用法】 每服二三钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 小儿发热不退，或往来寒热。

12409 黄龙膏

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】 藤黄

【用法】 茶磨稀汁。露顶涂之一二层。即愈。

【主治】 无名肿毒。

12410 黄白丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 黄连 瓜蒌仁 白术 神曲 麦芽各一两 川芎七钱 青黛五钱 人中白二钱

【用法】 上为末，姜汁浸蒸饼为丸服。

【主治】 阴虚食积痰火。

12411 黄白散

【方源】《医方大成》卷八引《简易》。

【组成】 雄黄 白矾 细辛 瓜丁各等分

【用法】 上为细末。搐于鼻中。

【主治】 鼻齆，息肉，鼻痔。

12412 黄白散

【方源】《回春》卷五。

【组成】 黄柏 孩儿茶 枯白矾各等分

【用法】 上为细末。凡患人先用陈仓小米熬汤，候冷漱口洁净，次将药末掺患处。不拘三五年诸治不愈者，此药敷三五次即愈。

【主治】 口疮及口中疳疮。

12413 黄白膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 炉甘石31克 赤石脂31克 枯矾9克 香白芷9克 松香6克 冰片9克

【用法】 上药烘干制成粉后，再加入樟丹9克；另取凡士林适量，待熔化后，将药粉放入搅拌，作成糊剂。外用。

【主治】 脓疱疮。

12414 黄芽丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 人参二两 焦干姜三钱

【用法】 炼蜜为丸，如芡实大。常嚼服之。

【主治】 脾胃虚寒、或饮食不化，或时多胀满泄泻，吞酸呕吐。

12415 黄芽丸

【方源】《上池杂说》。

【组成】 制谷芽四两（半生半炒。制法：用糯谷三四升，韭叶捣汁浸数日，候谷出芽，取起筛盛，微日晒略干，即以韭菜汁洒之，以芽带绿色为度，晒干听用） 人参一两（如不用，以党参、黄耆代之） 芡实二两（炒） 莲子肉四两（去心取肉，连皮入猪肚内煮透，去肚晒干）

【用法】 上为细末，用荷叶一张煮汁，和山药末打糊为丸，如绿豆大。每服二钱，米饮送下，一日三次。

【主治】 胃强脾弱，能食不能消，及脾泄。

12416 黄芩汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 黄芩三两 芍药二两 甘草（炙）二两 大枣（擘）十二枚

【用法】 上四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日二服，夜一服。

【功用】《伤寒论讲义》：清热止痢。

【主治】 泄泻或痢疾。身热不恶寒，腹痛，口苦咽干，舌苔黄，脉弦数。

①《伤寒论》：太阳与少阳合病，自下利者。②《卫生总微》：伤寒口舌诸病，舌黄，舌黑，舌肿，舌裂，舌上生芒刺，舌上出血。③《卫生宝鉴》：协热下利，脐下热，大便赤黄，或有肠垢者。④《医学入门》：冬月阳明症，潮热发作有时，脉但浮者，为有风，宜有汗，而天寒无汗，夜睡必有盗汗。⑤《准绳·幼科》：下利而头痛胸满，口苦咽干，或往来寒热而呕，其脉浮大弦者。⑥《麻科活人》：伏气发溢，小肠膀胱三焦胆腑合病自痢。⑦《幼幼集成》：小儿麻疹发热自利。⑧《杂病源流犀烛》：正气虚，伏邪更重，往来寒热，头痛呕吐稍愈后，浑身壮热。⑨《随息居重订霍乱论》：温病变霍乱。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：虚而不实者，苦以坚之，酸以收之，黄芩，芍药之苦酸以坚敛肠胃之气；弱而不足者，甘以补之，甘草，大枣之甘以补固肠胃之弱。②《内台方议》：黄芩为君，以解少阳之里热，苦以坚之也；芍药为臣，以解太阳之表热而行营气，酸以收之也；甘草为佐，大枣为使，以辅肠胃之弱而缓中也。③《医方集解》：黄芩以彻其热，而以甘、芍、大枣和其太阴，使里气和则外证自解。④《伤寒贯珠集》：热气内淫，黄芩之苦，可以清之；肠胃得热而不固，芍药之酸，甘草之甘，可以固之。⑤《医林纂要》：太阳郁热，则上烁肺而下遗大肠，故用黄芩以除肺肠之热；少阳郁热，则木乘土，故用芍药以泻相火而和太阴；寒淫于内，治以甘热，故用甘草、大枣以治寒，且以厚脾胃生气血而治自利。⑥《霍乱论》：黄芩清解温邪，协芍药泄迫血之热，而以甘、枣奠安中土。

【临证举例】 痢疾《陕西新医药》（1979；9：31）：盛某某，男，26岁。夏季间患痢疾，痢下脓血便，红多白少，腹部挛急而痛，肛门作坠，身热，脉弦数，舌苔黄。治以调气和血，清热燥湿。白芍9克，甘草3克，黄芩9克，广木香6克（后下）。连服3剂，下痢止，腹痛除。

【备考】 本方方名，《玉机微义》引作“黄芩芍药汤”。

12417 黄芩汤

【方源】《外台》卷二十二引《古今录验》。

【组成】 黄芩 黄连 甘草（炙） 黄柏各一两

【用法】 上切。以水三升，煎取一升，含之，冷吐取愈。

【主治】 口疮，喉咽中塞痛，食不得入。

12418 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】 黄芩（去黑心） 麦门冬（去心，焙） 栝楼根 栀子仁 石膏（碎） 淡竹叶各一两

【用法】 上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脾胃热极而致消中，消谷引食，化为小便。

12419 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】 黄芩（去黑心） 柴胡（去苗） 地骨皮 人参 干漆（炒令烟出） 鳖甲（去裙襕，醋炙黄） 甘草（炙） 半夏（汤洗七遍，同生姜捣作饼子，晒干） 葛根（锉） 干青蒿 白茯苓（去黑皮）各半两 麦门冬（去心，焙）一分

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，先用水二盏，加小麦、乌梅、生姜各少许，煎五七沸，去小麦等，入药末煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 热劳。心忪肌热，夜有盗汗，面黄肌瘦，饮食减少，骨节酸痛。

12420 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】 黄芩（去黑心） 阿胶（炒燥） 甘草（炙，锉）各二两 柏叶一把（锉）

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，人生地黄一分（拍碎），同煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】 小便出血。

12421 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】 黄芩（去黑心） 黄连（去须） 木通（锉） 柴胡（去苗） 赤芍药各二两 地骨皮 山栀子仁各一两半 萎蕤 大黄（蒸过，切，炒） 甘草（炙，锉）各二两半 石膏六两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎取七分，去滓，入朴消半钱匕，食后良久温服，一日

二次。

【主治】 白膜晕赤侵黑睛生翳，横冲瞳人，成丁翳痛。

12422 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】 黄芩（去黑心） 木通（锉） 黄连（去须）各二两 地骨皮 萎蕤 甘草（炙，锉）各一两半

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】 花翳。

12423 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】 黄芩（去黑心） 当归（切，焙） 柏叶（焙） 蒲黄（微炒）各半两 艾叶（炒）一分 生干地黄（焙）二两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】 妇人经血暴下，兼带下赤白不止。

12424 黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】 黄芩（去黑心） 瞿麦（取穗） 当归（切，焙） 冬葵子（炒） 木通（锉）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，一日三次。

【主治】 产后小便不通。

12425 黄芩汤

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】 白术 黄芩各等分

【用法】 上为末。每服三钱，加水二盏，当归一根，同煎至一盏，稍温服。

【主治】 妇人孕胎不安。

12426 黄芩汤

【方源】《济生》卷一。

【组成】 泽泻 栀子仁 黄芩 麦门冬（去心） 木通 生干地黄 黄连（去须） 甘草（炙）各等分

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《济生》：心劳实热，口疮，心烦腹满，小便不利。②《直指》：心肺蕴热，咽痛膈闷，小便淋浊不利。

12427 黄芩汤

【方源】《得效》卷十四。

【组成】 黄芩 白术 缩砂 当归各等分

【用法】 上锉散。每服三钱，加水一盏半煎，温服。

【主治】 胎孕不安。

12428 黄芩汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十。

【组成】 黄芩五分 川归 侧柏叶 蒲黄各四分 艾叶一分 生地二钱半 伏龙肝二钱

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 经血不止。

12429 黄芩汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 黄芩 山栀 桔梗 芍药 桑白皮 麦门冬 荆芥 薄荷 连翘各一钱 甘草三分

【用法】 上锉一剂。水煎，食后服。

【主治】 肺火咳嗽，吐血、痰血、鼻血，咽喉肿痛干燥生疮，或鼻孔干燥生疮，或鼻肿痛，右寸脉洪数。

12430 黄芩汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】 黄芩 山栀 桔梗 麦门冬（去心） 当归 生地黄 干葛 人参 天花粉 白芍各等分 乌梅一个

【用法】 上锉一剂。食远频服。

【主治】 上焦渴症，饮水多而食少。

12431 黄芩饮

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】 黄芩（去黑心） 桑根白皮（锉）各三分 葛根（锉） 麦门冬（去心，焙）各一两 甘草（炙）半两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒汗后烦热，燥渴不止。

12432 黄芩饮

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】 黄芩（去黑心） 黄柏（去粗皮） 黄连（去须） 槲叶（炙）各一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，入地黄汁半合，去滓温服，不拘时候。

【主治】 大肠风热，下血不止。

12433 黄芩散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】 黄芩一两 栀子仁一两 前胡二两（去芦头） 赤芍药一两 甘草半两（炙微赤，锉） 石膏三两

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，入豉

少半合，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 热病五日，头痛壮热，骨节疼痛。

12434 黄芩散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】 黄芩一两 黄连半两（去须） 生干地黄半两 川升麻半两 知母半两 葛根半两（锉） 栀子仁一分 大青半两

【用法】 上为散。每服一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【功用】 除劳热。

【主治】 热病烦渴不止。

12435 黄芩散

【方源】《圣惠》卷十八。

【异名】 黄芩汤（《圣济总录》卷二十九）。

【组成】 黄芩一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 栀子仁半两 刺蓟一两 蒲黄半两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 热病，鼻衄不止。

12436 黄芩散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】 萎蕤犀角散（《圣济总录》卷一〇六）。

【组成】 黄芩 栀子仁 黄连（去须） 葳蕤 川升麻 蕤仁（汤浸，去赤皮） 甘草（炙微赤，锉）各一两 犀角屑半两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服，临卧再服之。

【主治】 ①《圣惠》：眼生蟹目。②《圣济总录》：黑睛疼痛。

12437 黄芩散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】 黄芩一两 鸡苏一两 滑石一两 小蓟根一两 生干地黄一两 木通一两（锉）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】 血淋，小便疼痛不可忍。

12438 黄连丸

【方源】《外台》卷十一引《肘后方》。

【组成】 黄连一斤（去毛） 生地黄十斤

【用法】 上为末，绞生地黄取汁，渍黄连，出，晒之燥，复纳之，令汁尽干，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，一日三次；亦可为散，每服方寸匕，以酒送下，一日三次。尽，更令作即愈。

【主治】 消渴。

【宜忌】 忌猪肉，芜荑。

【方论选录】《千金方衍义》：黄连清燥膈上之热，生地滋培下焦之阴。

12439 黄连丸

【方源】 方出《千金》卷二十一，名见《千金》同卷注文引《张文仲方》。

【异名】 羊乳丸（《千金》卷二十一注文引《张文仲方》）、黄连羊乳丸（《圣济总录》卷五十九）。

【组成】 黄连不限多少 生栝楼汁 生地黄汁 羊乳（无，即用牛乳及人乳亦得）

【用法】 取三般汁乳和黄连末任多少，众手捻为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至四十丸、五十丸，以麦饮送下，每日三次。轻者三日愈，重者五日愈；若药苦难服，即煮麦饮汁送下亦得。

【主治】 ①《千金》：岭南山瘴气兼风热毒气入肾中，变成寒热脚弱，虚满而渴。②《圣济总录》：脾胃有热，烦渴不止。

【宜忌】 忌猪肉、芜荑。

12440 黄连丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 黄连一两（去须） 栝楼根一两 麦门冬一两半（去心，焙） 知母三分 茯神三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以粥饮送下；或牛乳汁送下亦得。

【主治】 ①《圣惠》：胃实热，多渴心烦；时气烦热口干。②《圣济总录》：胃实热气盛，消谷善饥，头目昏痛；食已如饥，肌肉羸瘦。

12441 黄连丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 黄连一两（去须） 栝楼根一两 白龙骨一两 苦参一两（锉） 牡蛎一两（烧为粉） 山茱萸一两 葳蕤一两 土瓜根一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候以煎大麦汤送下。

【主治】 消肾，小便滑数，白浊，心神烦躁。

12442 黄连丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】 黄连（去须） 大黄（锉，炒令香熟）各一两 防风（去叉） 龙胆（去土） 人参 黄芩（去黑心）各三分 细辛（去苗叶）半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以温水送下，临卧再服。

【主治】 肝气壅实，目痛如刺。

12443 黄连丸

【方源】《医方类聚》卷一四一引《经验秘方》。

【组成】 宣连一两（去须芦） 吴茱萸（去枝梗，净）一两 白芍药一两 诃子肉五钱

【用法】 上为末，用大蒜两介，去壳，将纸包裹，灰火煨熟，取出擂细，加白米糊少许为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心米饮汤送下，与治痢红丸子间服。

【主治】 泻痢不止。

12444 黄连丸

【方源】《普济方》卷一七六。

【组成】 苦参一大斤 黄连七分 栝楼 知母 牡蛎粉 麦门冬（去心）各五两

【用法】 上药治下筛，搅使匀，以牛乳和，并手捻丸，如梧桐子大，晒干。每服二十丸，饱食讫以浆水送下，一日二次；如微利，减十丸；如食热面、酒等，即加服五丸。

【主治】 消渴，中焦热渴。

【宜忌】 忌猪肉。

12445 黄连汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 黄连三两 甘草三两（炙） 干姜三两 桂枝三两（去皮） 人参二两 半夏半升（洗） 大枣十二枚（擘）

【用法】 上以水一斗，煮取六升，去滓温服，昼三次，夜二次。

【功用】 ①《金鉴》：调理阴阳而和解。②《医方发挥》：平调寒热，和胃降逆。

【主治】 胸中有热，胃中有寒，阴阳痞塞，升降失常，心下痞满，腹痛欲吐。

①《伤寒论》：伤寒胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐。②《张氏医通》：胃中寒热不和，心中痞满。③《退思集类方歌注》：湿家下之，丹田有热，胸中有寒，舌上如胎。④《伤寒论临床实验录》：上部有热邪壅闭，脾阳虚弱不任苦寒者。

【方论选录】 ①《金镜内台方议》：胃中有邪气，使阴阳不交，阴不得升为下寒，故腹中痛；阳不得降为上热，故欲呕吐也。故用黄连为君，以治上热；干姜、桂枝、半夏以散下寒为臣；人参、大枣、甘草以益胃而缓其中也。③《医方集解》：此足阳明药也。黄连苦寒泄热以降阳，姜、桂辛温除寒以升阴，人参助正祛邪，半夏和胃止呕，甘草、大枣调中止痛，上中二焦寒热交战，以此和解之。③《金鉴》：君黄连以清胸中之热，臣干姜以温胃中之寒；半夏降逆，佐黄连呕吐可止；人参补中，佐干姜腹痛可除；桂枝所以安外，大枣所以培中也。然此汤寒温不一，甘苦并投，故加甘草协和诸药。此为阴阳相格，寒热并施之法也。

【临证举例】 ①呕吐 《赵守真治验回忆录》：陈襄人，男，25岁，久泻愈后，又复呕吐，医进参、术、砂、半，复进竹茹、麦冬、芦根，诸药杂投无效。其证身微热，呕吐清水，水入则不纳，时有冲气上逆，胸略痞闷，口不知味，舌光红燥，苔腻不渴，脉阴沉迟而阳浮数，乃上热中虚之证，应用黄连汤，服药呕吐渐止；再剂，证全除，能进稀粥。后用五味异功散加生姜温胃益气而安。②泄泻《伤寒论临床实验录》：朱某，男，26岁，患下利证，心中烦热，恶心不欲食，头眩，大便水泄，日十数次，两手厥冷，脉象沉细。此平素胃肠虚弱，而热邪乘虚陷入胃中，故呈现心中烦热恶心，厌食，胃脘拒按之热证。根据胃热症状，宜用苦寒泄热之品。而大便泻泄，脉象沉细，舌质淡而苔微黄，则为脾阳不足。古方中既能清胃热，又可健脾扶阳者，只有《伤寒论》黄连汤可为对证之方，因疏此方与之。服药后便泄顿减而烦热亦轻，食欲较前好转。按此方连服三剂，泄泻止而呕吐之证亦不见，后以健脾和胃法调理而愈。

12446 黄连汤

【方源】《外台》卷二十五引《深师方》。

【组成】 黄连 黄柏 干姜 石榴皮 阿胶（炙）各二两 甘草一两（炙）

【用法】 上切。以水七升，煮取二升，分为三服。

【主治】 赤白下痢。

12447 黄连汤

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】 黄连（去须，微炒）二两 黄柏一两（锉，微炒） 阿胶一两（蛤粉炒） 栀子仁半两

【用法】 上为粗末。每服一二钱，水六分，煎至四分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒热入肠胃，下痢脓血。

12448 黄连汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 黄连（去须） 当归各半两 甘草二钱（炙）

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水一盏，煎至七分，食后温服。

【主治】 ①《保命集》：湿毒下血，大便后下血，腹中不痛。②《医碥》：湿毒便血，不痛，血色不鲜，或紫黑如豆汁。

12449 黄连汤

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】 黄连 黄柏皮 地榆 乌梅 甘草 赤芍药各等分

【用法】 每服四钱，水一盏半煎，去滓，食前服。

【主治】 赤白痢。

12450 黄连汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 黄连 山栀 生地黄 麦门冬（去心）各一钱 当归 芍药各一钱 薄荷 犀角 甘草各五分

【用法】 上锉一剂。水煎，食后频服。

【主治】 ①《回春》：心火舌上生疮，或舌上肿，燥裂，或舌尖出血，或舌硬。②《杂病源流犀烛》：木舌。由心脾热壅，舌肿粗大，渐渐硬塞满口，气不得吐，如木之不和软。

12451 黄连酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 黄连25克 花椒10克 70%酒精100毫升

【用法】 浸泡三日后，外用。

【主治】 体癣。

12452 黄连散

【方源】 方出《外台》卷二十五引《肘后方》，名见《圣惠》卷五十九。

【异名】 黄连汤（《圣济总录》卷七十七）。

【组成】 黄连二两（去须，微炒） 龙骨二两 阿胶二两（捣碎，炒令黄燥） 艾叶（微炒）

【用法】 上为散。每服三钱，食前煮仓米粥饮调下。

【主治】 休息痢，多时不愈，肌体瘦瘁。

12453 黄连散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 黄连一两（去须） 石膏二两 人参一两（去芦头） 知母一两 麦门冬一两（去心） 栀子仁一两 赤芍药一两 犀角屑一两 茯神一两 紫菀一两（去苗土） 川芒消二两。

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，生地黄半合，更煎一两沸，每于食后温服。

【主治】 心实热，多惊梦，多喜，畏惧不安。

12454 黄连散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】 黄连三分（去须） 黄柏半两（锉） 甘草半两（生，锉） 蔷薇根三分 栀子仁半两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，入淡竹叶二十片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒上焦壅热，口舌生疮。

12455 黄连散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】 黄连（去须，微炒） 当归（锉，微炒） 阿胶（捣碎，炒令黄燥） 黄芩 赤芍药 地榆（锉）各三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】 伤寒热毒痢，下脓血，腹痛。

12456 黄连散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】 黄连一两（去须） 大青一两 栀子仁一两 茵陈一两 柴胡一两（去苗） 地骨皮一两 黄芩一两 川芒消一两 川大黄二两（锉碎，微炒） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 黄疸，遍身面目悉黄。

12457 黄连散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 黄连二两（去须，捣罗为末） 生地黄汁三合 生瓜蒌汁三合 牛乳三合

【用法】 上用三味汁相和，每服三合，调下黄连末一钱，不拘时候。

【功用】 润肺心。

【主治】 消渴。

12458 黄连散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】 黄连（去须） 白蔹 赤石脂 龙骨 乌贼鱼骨各半两

【用法】 上为散。以绵裹如枣核大，塞耳中，湿即更易之。

【主治】 小儿聤耳久不愈。

12459 黄连散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】 黄连半两（去须） 黄柏半两（锉） 甘草半两（生，锉） 寒水石半两 槟榔一分

【用法】 上为散。炼蜜调涂于唇上，一日两三度换之。

【主治】 小儿紧唇。是五脏热毒气上冲，唇肿反粗。

12460 黄连散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】 黄连三分（去须） 大青三分 川升麻

三分　桑根白皮半两（锉）　甘草半两（炒微赤，锉）

【用法】 上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，放温，量儿大小，分减服之。若与奶母服，即加栀子、黄芩各半两，每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】 小儿口疮，心热烦闷。

12461　黄连散

【方源】 《普济方》卷二九九引《海上方》。

【组成】 鹰爪黄连　露蜂房　猪牙皂角各等分

【用法】 浓煎，冷灌漱。一云加荆芥尤妙。

【主治】 上下腭生疮，不可食。

12462　黄连散

【方源】 《宣明论》卷十三。

【组成】 黄连　贯众　鸡冠花　乌梅肉　大黄各一两　甘草（炙）三分

【用法】 上为细末。每服二钱，以米汤调下，不拘时候。

【主治】 肠风下血，疼痛不止。

【备考】 本方方名，《医统》引作"鸡冠散"。

12463　黄连散

【方源】 《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】 乳香一钱半（别研）　黄连（去须）一两　荆芥一百穗　灯心一百茎

【用法】 上㕮咀。每用三钱，水二盏，煎至一盏，滤去渣，热洗。

【主治】 ①《杨氏家藏方》眼睑赤烂。②《普济方》引《永类钤方》：肝受风热，眦赤烂。

12464　黄连散

【方源】 《普济方》卷二七五引《卫生家宝》。

【组成】 黄连　黄柏　黄丹各一两　白及　龙骨　轻粉各半两

【用法】 上为末。以冷熟水调敷疮口，疮湿即干掺。

【功用】 断脓生肉。

【主治】 一切新旧恶疮。

12465　黄连散

【方源】 《儒门事亲》卷十五。

【组成】 川黄连　黄柏（去粗皮）　草决明　轻粉各等分

【用法】 上为细末。用生小油调药于疮上涂。

【主治】 小儿头疮。

12466　黄连散

【方源】 《朱氏集验方》卷十二。

【组成】 大椒　黄柏皮　黄连各半两　槟榔一两

【用法】 上为细末，用巴豆二十粒，煎麻油涂之。巴豆煎至黑为度。

【主治】 疥疮。

12467　黄连散

【方源】 《疡科选粹》。

【组成】 白矾七分五厘　黄连五分　冰片半分

【用法】 上为末。绵裹纳耳中。

【主治】 耳脓经年不愈。

12468　黄连煎

【方源】 《外台》卷二十一引《深师方》。

【异名】 黄连汤（《医心方》卷五引《古今录验》）。

【组成】 黄连半两　大枣一枚（切）

【用法】 以水五合，煎取一合，去滓，展绵取如麻子注目，日十次，夜二次。

【功用】 除热。

【主治】 眼赤痛。

12469　黄连煎

【方源】 《圣惠》卷三十二。

【组成】 黄连二两（去须）　薏仁二两（去赤皮，研）　硼砂一分

【用法】 先取黄连，以水三大盏，煎取一大盏，绵滤去滓；去滓过，又取薏仁，以绢裹，别以水一盏令浆尽，却和前黄连汁，同煎似稀膏，又以浆水半合浸硼砂，化尽，去夹石，入前药中，更以慢火煎如稠膏，刮取摊于瓷盒中后，以新砖一口，上安艾如鸡子大，烧之，以药盒覆盖，勿令烟出熏之，以艾尽为度，后研令匀。每以简箸取如绿豆大，点之。

【主治】 眼远年风赤。

12470　黄连煎

【方源】 《圣济总录》卷一〇三。

【组成】 黄连（去须，捣末）半分　大枣三枚（擘破）　灯心（擘碎）一握

【用法】 上以水一盏半，银石器内煎至五分，以新绵滤去滓，纳瓷盒中。每用铜箸点少许目眦头，一日三五次，临卧再点。

【主治】 目赤痛。

12471　黄连膏

【方源】 方出《千金》卷六，名见《普济方》卷二九九。

【组成】 猪膏一斤　白蜜一斤　黄连一两

【用法】 三味合煎，搅令相得。每含如半枣大，日四五次，夜二次。

【主治】 口疮，咽喉塞不利，口燥。

12472 黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【异名】龙脑黄连膏(《原机启微》卷下)。

【组成】黄连不拘多少(去须，为末，银器内重汤熬成膏) 龙脑少许

【用法】上入罐子内，油单封闭令紧，沉于井底着泥处。一宿取出，点眼。

【主治】①《圣济总录》暴赤眼。②《准绳·类方》目中赤脉，如火溜热炙人，及翳膜昏花，神物不明。

12473 黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】黄连(去须，捣)二两 竹叶二握(净洗，切) 枣一两(焙干，为末)

【用法】先将竹叶以水三盏煎至一盏半，去竹叶，下黄连、枣末，入白蜜半合，煎至一盏，绵滤去滓，重煎如稀饧，纳瓷瓶中。每以箸点目眦头，日夜三五次。

【主治】肝脏壅热，目中生胬肉，冲续黑睛，赤痛不可止。

12474 黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】黄连(去须) 升麻 槐白皮 大青 苦竹叶各一两

【用法】上锉细。以水二升，煎至半升，去滓取汁，入龙脑、蜜，搅令匀，煎成膏。涂疮上，一日三次。

【主治】久患口疮。

12475 黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】黄连(去须)三分 大铜钱七文 白矾(烧灰)一分

【用法】以水井白蜜各三合，用铜器盛，于饭上炊一次，绵滤去渣，贮瓷盒内。点眼。

【主治】小儿眼烂眦痒痛泪出，不能视物，风伤则痛。

12476 黄连膏

【方源】《活法机要》。

【组成】黄连末一斤 生地黄自然汁 白莲藕汁 牛乳汁各一斤

【用法】将汁熬成膏，搓黄连末为丸，如梧桐子大。每次二十丸，少呷温水送下，日十次。

【功用】《医门法》：生津液，除干燥，长肌肉。

【主治】①《活法机要》：燥在上焦，多饮水而少食，大便如常，小便清利。②《准绳·类方》：口舌干，小便数，舌上过脉。

12477 黄连膏

【方源】《医方类聚》卷七十引《经验秘方》。

【组成】白矾 黄连 甘草 乳香 杏仁各等分

【用法】上同于口内嚼烂，以绵滤过。以指头粘于眼皮上。

【主治】眼痛不可忍。

12478 黄连膏

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】黄连八两 杏仁 菊花 栀子 黄芩 黄柏 龙胆草 防风 当归 赤芍药 生地黄各一两

【用法】以水煎浓汁，去滓再煎，滤净，碗盛，放汤瓶口上重汤顿成膏，滴入水中可丸为度。以阳丹收为丸。临用加片脑少许研和，以井水化开，鸭毛蘸点眼。

【主治】目中赤脉如火，溜热炙人。

12479 黄连膏

【方源】《金鉴》卷五。

【组成】黄连三钱 当归尾五钱 生地一两 黄柏二钱 姜黄三钱

【用法】用香油十二两将药 枯，捞去滓，下黄蜡四两溶化尽，用夏布将油滤净，倾入瓷碗内，以柳枝不时搅之，候凝为度。

【功用】①《金鉴》润诸燥疮。②《中药成方配本》：清火解毒。

【主治】疗疮作燥，皮肤湿疹，水火烫伤，老年性阴道炎。

①《金鉴》：鼻疮；及汤火伤痛止生脓时。②《青囊全集》：疗疮作燥。③《中药成方配本》：一切皮肤湿疹，红肿热疮，水火烫伤，乳头碎痛等症。④《妇产科学》：老年性阴道炎。

12480 黄连膏

【方源】《外科传薪集》。

【组成】黄连五钱 黄柏五钱 姜黄三钱 归尾三钱 白芷三钱 丹皮二钱 赤芍三钱 生地一两 合欢皮一两 大黄一钱 黄芩三钱 秦艽三钱 紫草一两 白鲜皮五钱

【用法】上药用麻油二十两，煿枯，捞去渣，下黄白蜡各二两，溶化收膏，入瓷瓶内，以油纸摊。贴患处。

【主治】多年臁疮湿毒，鼻疮结毒。

12481 黄吹散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】牛黄0.3克 月石30克 冰片1.5克

【用法】 先将牛黄入乳钵中研细，加月石研细，最后加冰片研细，装瓶勿泄气。用吹管吹药入内。

【功用】 清热利咽。

【主治】 咽喉肿痛腐烂，口糜，舌碎。

12482 黄灵丹

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】 大黄四两 川黄柏一两 胡黄连二两 生石膏二两

【用法】 晒脆，为细末。

【主治】 腿胫红肿臭烂，延开他处。

12483 黄鸡羹

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】 黄雌鸡一只（治如常） 粳米二合 葱白一握

【用法】 上同煮作羹，下五味以煮盐，空心食之。

【主治】 老人烦渴，小便黄，无力。

12484 黄金丸

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】 大黄（煨） 郁金（即姜黄。要极小者佳） 牙皂（去筋皮）各等分

【用法】 上为细末，用牛胆汁入瓷罐内煎成稀膏，和药为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，量病加减，白汤送下。大便少行一二次即止，不伤元气。

【主治】 积热积痰，并五脏三焦有余之热，夹热下利，食痞膈闷，咽痛，目赤肿，中暑中热，烦躁，及初发肿毒。

12485 黄金散

【方源】《疡科机要》卷下。

【组成】 滑石 甘草各等分

【用法】 上为末。挑破去水敷之。

【功用】 止痛消毒。

【主治】 天疱疮。

12486 黄金散

【方源】《疡科捷径》。

【组成】 石膏三钱 黄柏三钱 大黄三钱 轻粉三分

【用法】 上为细末。猪胆、麻油调敷。

【主治】 坐板疮。

12487 黄金霜

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 水银 31g 白矾 31g 火消 63g 白砒 1g 轻粉 31g 硇砂 3g

【用法】 上药共为细末，放锅内用碗和盖，盐泥封固，用麻杆火烧三炷香时即成。碗上金黄色结晶为灵药，下剩是药滓。

【主治】 银屑病，湿疹、白癜风。

12488 黄昏汤

【方源】《千金》卷十七。

【异名】 夜合汤（《圣济总录》卷五十）

【组成】 黄昏手掌大一片（中合昏皮也）

【用法】 上㕮咀。以水三升，煮取一升，分二服。

【主治】 肺痈，咳有微热，烦满，胸心甲错。

【方论选录】《千金方衍义》：合欢属土与水，补阴之功最捷。其干相著即粘合不解，故治肺痈溃后长肺之要药。一名合昏，又名黄昏，宁无顾名思义之意存焉。

12489 黄柏丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】 黄柏（去粗皮）二两 黄连（去须）半斤

【用法】 上为末，用酥拌和捣三百杵，为丸如梧桐子大。每服三十丸，温浆水送下。

【主治】 消中。

12490 黄柏酒

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】 黄柏 猪胰各四两

【用法】 生浸，饮之。

【功用】 润脏滑肌。

【主治】 有相火而好饮酒者生疮。

12491 黄柏散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】 黄柏一两（炙微赤，锉） 当归一两（锉，微炒） 黄连一两（去须，微炒） 地榆三分（锉）

【用法】 上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】 血痢日夜不止，腹中疞痛，心神烦闷。

12492 黄柏散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】 黄柏一两（炙微赤，锉） 栀子仁一两 黄连一两（去须） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 当归一两（锉，微炒）

【用法】 上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】 脓血痢，心烦，腹疞痛。

12493 黄柏散

【方源】《圣惠》卷九十一。

【异名】 白敛散(《得效》卷十二。

【组成】 黄柏（去粗皮，炙，锉） 白敛各半两

【用法】 上为细散。先用汤洗疮，后以生油调涂之。

【主治】 小儿冻耳成疮，或痒或痛。

12494 黄柏散

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】 黄柏二两（涂蜜，慢火炙焦）

【用法】 上为散。每服二钱匕，温糊米饮调下。

【主治】 心脏热极，舌上出血。

12495 黄柏散

【方源】《得效》卷十九。

【组成】 鸡子壳 黄柏树皮 朴消 大黄 寒水石各等分

【用法】 上为末。白水调涂。

【主治】 汤火伤。

12496 黄柏散

【方源】《普济方》卷三〇〇。

【组成】 黄柏一两 五倍子二钱 密陀僧少许 甘草少许

【用法】 除黄柏外为末，水调匀，敷于黄柏上，火炙三五次，炙尽药末为度。将黄柏薄片，临睡贴之，天明即愈。

【主治】 茧唇。

12497 黄柏散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 黄柏一块

【用法】 猪胰涂，炙酥，为末。湿者干掺；干者，麻油调搽。

【主治】 ①《医学心悟》：面上生疮，如水痘，蔓延不止者。②《外科十法》：天泡疮，肿起白泡，小如绿豆大，大如蚕豆大。连片而生，或生头顶，或生耳前后。

12498 黄柏散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 黄柏 78 克 青黛 6 克 肉桂 3 克 冰片 1 克

【用法】 上为细末。外用。

【主治】 口炎。

12499 黄柏膏

【方源】《圣济总录》卷一一三。

【组成】 黄柏（去粗皮，锉）一两 蕤仁半两 大枣（青卅者）三枚（擘）

【用法】 上以水三升同纳瓷器内，慢火煎至一升，去滓，去清汁，再以净瓷瓶子收。每用铜箸点眼，一日三五次。

【主治】 风热冲目，多生眵矇。

12500 黄柏膏

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】 黄柏（去粗皮） 一分 大豆一合

【用法】 上为粗末，以水一盏，煎至二合，去滓，重煎如饧，入少许龙脑研和。涂敷。

【主治】 小儿口疮。

12501 黄柏膏

【方源】《卫生总微》卷二十。

【组成】 黄柏（末） 白蔹（末）各一两 白及（末）半两 生芝麻二合（杵烂取汁）

【用法】 上为细末，以蒸萝卜一枚，好酒一盏，一处杵烂成膏。每用少许，先以童子小便洗疮了，后以药涂。

【主治】 冻疮。

12502 黄柏蜜

【方源】《外台》卷二引《深师方》。

【异名】 蜜渍柏皮(《世医得效方》卷一)、蜜渍黄柏汁(《伤寒图歌活人指掌》卷四)。

【组成】 黄柏（削去上皮，取里好处，薄料削）

【用法】 以崖蜜半斤极消者，以渍柏一宿，唯欲令浓，含其汁，良久吐之，更复如前。如胸中热有疮时，饮三五合尤良。

【主治】 ①《外台》：伤寒热病口疮。②《得效》：口疮，舌溃烂。

12503 黄药汤

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】 黄药 甘草（锉）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】 舌肿及重舌。

12504 黄药酒

【方源】 方出《图经本草》引《千金月令》（见《证类本草》卷十四），名见《本草纲目》卷二十五。

【组成】 万州黄药子半斤（须紫重者为上，如轻虚即是他州者，力慢，须用一倍）

【用法】 取无灰酒一斗，投药其中，固济瓶口，以糠火烧一复时，停腾，待酒冷即开。患者时时饮一盏，不令绝酒气，经三五日，常须把镜自照，觉消即停饮，不尔便令人颈细也。

【主治】 忽生瘿疾一二年者。

12505 黄香散

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】 硫黄 川椒各五钱

【用法】 上为末，加生姜、葱头各五钱，和生猪板油捣融，用布包好。烘热，时时擦之，其效甚速。

【主治】 疥疮。

12506 黄胖丸

【方源】《续名家方选》。

【组成】 铁砂一百钱 葛根 黄连各十二钱 百草霜五钱

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二钱，白汤送下，一日三次。

【主治】 黄胖病。

12507 黄胖药

【方源】《医述》卷八。

【组成】 红枣四两 皂矾二两 锅焦三两 荷叶二面 灰面十二两

【用法】 灰面炒黄，红枣煮熟，去皮核，取肉，锅焦煮烂，皂矾，荷叶煎汁捣丸。每服三钱。

【主治】 黄胖，其证必吐黄水，毛发皆直，或好食生米、茶叶、土、炭。

12508 黄耆丸

【方源】《千金》卷十九。

【异名】 补益黄耆丸(《圣济总录》卷二十)。

【组成】 黄耆 鹿茸 茯苓 乌头 干姜各三分 桂心 芎藭 干地黄各四分 白术 菟丝子 五味子 柏子仁 枸杞白皮各五分 当归四分 大枣三十枚

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。旦服十丸，夜十丸，酒送下，以知为度。

【主治】 虚劳。

12509 黄耆丸

【方源】《外台》卷十二引《延年秘录》。

【组成】 黄耆五分 白术六分 鳖甲五分（炙） 白薇三分 牡蛎四分（熬） 茯苓六分 桂心三分 干姜四分 枳实四分（炙） 橘皮三分 当归四分 槟榔子六分 人参六分 前胡四分 附子四分（炮）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，酒送下，一日二次，加至二十丸。

【主治】 风虚盗汗不能食，腹内有痃癖气满者。

【宜忌】 忌醋物、猪肉、冷水、苋菜、生葱。

12510 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】 黄耆半两（锉） 人参半两（去芦头） 龙齿一两 侠神三分 铁粉一两（细研） 金银箔各五十片（细研） 防风半两（去芦头） 远志半两（去心） 熟干地黄三分

【用法】 上为散，入铁粉，金银箔，都研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 伤寒后，心虚惊悸，恍惚不定。

12511 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 黄耆二两（锉） 覆盆子一两 牛膝一两（去苗） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕） 石斛二两（去根，锉） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 白术一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 肉桂二两（去皱皮） 五味子一两 人参一两（去芦头） 沉香一两 熟干地黄二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【功用】 充肌调中助力。

【主治】 脾劳羸瘦，脚膝疼痛。

12512 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 黄耆二两（锉） 巴戟二两 桂心一两 石斛一两（去根，锉） 泽泻一两 白茯苓一两 柏子仁一两 干姜一两（炮裂，锉） 独活二两 白芍药一两 山茱萸一两 天雄一两（炮裂，去皮脐） 半夏一两（汤洗七遍去滑） 细辛半两 白术一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】 肉极。体重怠惰，四肢不欲举，关节疼痛，不嗜饮食。

【宜忌】 忌饴糖、湿面。

12513 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 黄耆二两（锉） 牛膝二两（去苗） 桂心一两 熟干地黄二两 薯蓣一两 远志半两（去心） 覆盆子一两 巴戟一两 五味子一两 石斛一两半（去根，锉） 肉苁蓉一两半（酒浸一宿，削去皱皮，炙干） 鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】 五劳六极七伤，骨髓虚惫，四肢无力。

12514 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】 黄耆一两（锉） 人参一两（去芦头） 桂心一两 当归一两 赤石脂一两（细研） 茯神一两 龙骨一两（细研） 朱砂一两（细研） 远志

一两（去心） 桔梗三分（去芦头） 柏子仁三分 五味子一两 麦门冬一两半（去心，焙） 薯蓣一两 枳实一分（麸炒）

【用法】 上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，不拘时候，以温酒送下。

【主治】 虚劳。惊悸不安，心膈烦满，不能嗜食。

12515 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 黄耆一两（锉） 牡蛎二两（烧为粉） 栝楼根半两 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬一两半（去心，焙） 地骨皮半两 白石脂半两 泽泻半两 知母半两 黄连半两（去须） 薯蓣半两 熟地黄半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候以清粥饮送下。

【主治】 消中。渴不止，小便赤黄，脚膝少力，纵食不生肌肤。

12516 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 黄耆三分（锉） 熟干地黄一两 麦门冬二两（去心，焙） 鸡腿胫一两（微炙） 山茱萸三分 人参三分（去芦头） 五味子三分 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 地骨皮半两 白茯苓半两 玄参半两 牛膝一两（去苗） 补骨脂一两（微炒） 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙令黄）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】 消肾。心神虚烦，小便无度，四肢羸瘦，不思饮食，唇口干燥，脚膝乏力。

12517 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 黄耆一两（锉） 白茯苓三分 黄连一两（去须） 土瓜根三分 熟干地黄一两 麦门冬二两（去心，焙） 玄参三分 地骨皮三分 牡蛎一两（烧为粉） 龙骨三分 栝楼半两（锉） 人参三分（去芦头） 桑螵蛸三分（微炒） 五味子三分 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙微黄）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以清粥饮送下。

【主治】 消肾。小便白浊，四肢羸瘦，渐至困乏。

【备考】 方中栝楼，《普济方》引作“菝葜”。

12518 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】 黄耆一两（锉） 麦门冬一两（去心，焙） 人参三分（去芦头） 黄芩三分 枸杞子三分 茯神一两 百合半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 秦艽半两（去苗） 酸枣仁三分（微炒） 柴胡一两（去苗） 赤芍药半两 知母半两 鳖甲三两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草半两（炙微赤，锉） 生干地黄一两 郁李仁三分（汤浸，去皮，微炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候，以清粥饮送下。

【功用】《济阴纲目》：补气益精，养血安神，清肺热，解劳热，宽胸膈。

【主治】 妇人骨蒸烦热，四肢羸瘦疼痛，口干心躁，不得眠卧。

【宜忌】《济阴纲目》：郁李仁、杏仁虽能润燥，然大便滑者不宜。

12519 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】 黄耆一两（锉） 白芍药二分 当归一两（锉，微炒） 桂心三分 柏子仁三分 续断二分 芎藭二分 五味子半两 熟干地黄半两 牛膝三分（去苗） 白术半两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 肉苁蓉三分（酒洗，去皱皮，炙干） 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 沉香三分

【用法】 上为散，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】 产后薄劳。寒热进退，头痛目眩，百节疼疼，气力羸弱。

12520 黄耆丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】 黄耆半两（锉） 赤芍药半两 麦门冬一两（去心，焙） 人参半两（去芦头） 柴胡三分（去苗） 胡黄连半两 鳖甲一两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服五丸，不拘时候，以粥饮送下。

【主治】 小儿羸瘦体热，面色萎黄，不欲乳食。

12521 黄耆丸

【方源】《局方》卷五。

【组成】 黄耆 杜蘅藜（炒，去刺） 川楝子茴香（炒） 川乌（炮，去皮脐） 赤小豆 地龙（去土，炒） 防风（去芦叉）各一两 乌药二两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心以温酒送下，盐汤亦得，妇人醋汤送下。

【主治】 ①《局方》：丈夫肾脏风虚，上攻头面虚浮，耳内蝉声，头目昏眩，项背拘急；下注腰脚，脚膝生疮，行步艰难，脚下隐疼，不能踏地，筋脉拘挛，不得屈伸，四肢少力，百节酸疼，腰腿冷痛，小便滑数；及瘫缓风痹，遍身顽麻；妇人血风，肢体痒痛，脚膝缓弱，起坐艰难。②《圣济总录》：刺风，气血内虚，风寒蕴滞，寒热相搏，遍身如针刺；肾脏风攻注腰脚生疮，或虚肿热痛，行步不得。

12522 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】 黄耆（锉） 防风（去叉） 地骨皮 枳实（去瓤，麸炒）各一两 羌活（去芦头） 苦参 当归（切，炒） 升麻 大黄（锉，炒） 甘草（炙，锉）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后温荆芥汤送下。

【主治】 风气有热，烦惋，头面生疮。

【备考】 方中黄耆、防风、地骨皮用量原缺，据《普济方》补。

12523 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】 黄耆（炙，锉） 熟干地黄（焙） 龙骨（去土，碎）各一两半 枳壳（去瓤，麸炒） 肉苁蓉（酒浸，切焙） 泽泻各一两一分 菟丝子（酒浸一宿，别捣） 鹿茸（去毛，酥炙） 麦门冬（去心，焙）各二两 牡丹皮 石斛（去根） 五味子（炒）各一两 桑螵蛸二十一枚（炙）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹煎黄耆汤送下。

【主治】 肾风虚冷，小便多，腿细脚弱，渐渐羸瘦。

12524 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】 黄耆（锉） 鹿茸（去毛，酥炙）各二两 牡蛎（煅一复时） 土瓜根 黄连（去须） 白茯苓（去黑皮）各一两 人参一两半

【用法】 上为末，研令细，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，用何首乌汤下。

【主治】 消渴。小便数少，虚极羸瘦。

12525 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】 黄耆（细锉） 五味子各二两 乌梅（取肉，炒） 麦门冬（去心，焙）各一两 干姜（炮）半两 茯神（去木） 一两半 附子（炮裂，去皮脐，大者）两枚 酸石榴皮（锉） 生干地黄（焙） 泽泻各半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，浆水送下，不拘时候。

【主治】 虚燥，渴不已。

12526 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】 黄耆（锉）一两 熟干地黄（焙）二两 石斛（去根） 五味子（炒） 白术 枸杞子 肉苁蓉（酒浸一宿，去皱皮，焙） 山芋 桂（去粗皮） 人参 甘草（炙，锉）各一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，饮下亦得，每日二次。稍加至三十丸。

【功用】 补虚益气。

【主治】 虚劳。阳气不足，四肢逆冷，虚羸少气。

12527 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】 黄耆（锉） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 五味子 天雄（炮裂，去皮脐） 牛膝（酒浸，切，焙）各二两 熟干地黄三两 干姜（炮） 山芋 山茱萸 桂（去粗皮）各一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以酒送下。

【主治】 五劳七伤，髓液虚惫，四肢逆冷。

12528 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】 黄耆（锉）三两 白术 枳壳（去瓤，麸炒） 白茯苓（去黑皮） 甘草（炙，锉）各二两 生干地黄（洗去土，切，焙）四两 地骨皮一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以人参汤送下，每日二次。

【主治】 骨蒸。热虽稍退，瘦弱无力，饮食不为肌肉。

12529 黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】 黄耆（锉） 白茯苓（去黑皮） 石斛（去根）各二两 鹿茸（去毛，酥炙）一两半 五味子（炒）二两 防风（去叉） 牡丹皮 酸枣仁 覆盆子 生干地黄（焙）各三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以温酒送下。加至三十丸。

【主治】 肝虚劳，兼膀胱久积虚冷，目眩见花不明，渐成内障。

12530 黄耆丸

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】黄耆 肉苁蓉 鹿茸各一两 人参三分 枸杞子二分 熟干地黄二两 白茯苓三分 甘草各半两 地骨皮半两 泽泻 附子 巴戟 禹余粮 桂 牡丹皮 五味子 龙骨各三分 磁石一两 赤石脂三分 麦门冬半两 牡蛎三分

【用法】上为细末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以米饮送下。

【主治】大渴后，上焦烦热不退，下元虚乏，羸瘦无力，小便白浊，饮食微少。

12531 黄耆丸

【方源】《本事》卷五。

【异名】黄耆枳壳煎丸(《普济方》卷二九七)。

【组成】黄耆（蜜炙） 枳壳（去瓤，细切，麸炒黄） 威灵仙（去苗，洗）各二两 续断（洗，推去节，锉，焙） 槐角子 白矾（枯） 当归（洗，去芦，切，焙干，炒） 干姜（炮） 附子（炮，去皮脐） 生干地黄 连翘（炒）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以米饮送下。

【主治】远年肠风痔漏。

12532 黄耆丸

【方源】《妇人良方》卷五。

【组成】黄耆 麦门冬（去心） 茯神 北柴胡 甘草 生干地黄各一两 酸枣仁（炒） 郁李仁 杏仁（去皮尖、双仁，麸炒黄） 枸杞子 人参（去芦） 黄芩各三分 百合 枳壳（去瓤，麸炒） 赤芍药 知母各半两 鳖甲二两（制）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，清粥吞下，不拘时候。

【主治】妇人骨蒸烦热，四肢羸瘦，疼痛口干，心躁不得眠卧。

12533 黄耆丸

【方源】《普济方》卷二七五。

【组成】黄耆一两（锉，炒） 附子四钱（炮，去皮脐） 菟丝子（酒煮，浸） 茴香（微炒） 熟干地黄各一两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以酒送下。

【主治】内虚，精寒髓冷，恶疮多时不效者。

12534 黄耆丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】熟地五两 黄耆三钱（蜜炙） 鳖甲三两（醋炙） 川芎一两 当归三两 白芍一两半（醋炒） 五味一两半 柏仁三两（炒） 桂心一两半 续断三两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服五钱，以米饮送下。

【主治】蓐劳，脉数弦软微涩者。

【方论选录】产后血气两虚，肝阴不足而阴不维阳，故潮热憎寒，自汗不止，势必将成蓐劳。熟地补阴滋血，柏仁养心宁神，黄耆补气益卫阳，当归养血益营阴，鳖甲滋肝阴以散结，白芍敛脾阴以和营，川芎引入血海，五味收敛津液，续断续完筋脉，桂心温暖营血，蜜丸饮下，使血气内充，则肝阴自复而营卫调和，何虑寒热自汗不止，蓐劳将成不痊乎？

12535 黄耆汤

【方源】《外台》卷十七引《深师方》。

【异名】黄耆建中汤(《外台》卷十七引《深师方》)、黄耆姜桂汤(《圣济总录》卷三十一)。

【组成】黄耆三两 半夏一升（洗） 大枣二十枚（擘） 生姜四两 桂心四两 芍药四两 人参二两 甘草二两（炙）

【用法】上切。以水一斗二升，煮取四升，分四次服，日夜再服。

【主治】①《外台》引《深师方》：大虚不足，少腹里急，劳寒拘引，脐气上冲胸，短气，言语谬误，不能食，吸吸气乏，闷乱。②《圣济总录》：伤寒后脏气不足，虚乏。

【宜忌】忌生葱、海藻、菘菜、羊肉、饧。

【加减】手足冷，加附子一两。

12536 黄耆汤

【方源】《千金》卷十七。

【组成】黄耆四两 人参 白术 桂心各二两 大枣十枚 附子三十铢 生姜八两（一方不用附子）

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取三升，去滓，分四服。

【主治】①《千金》：气极。虚寒，皮毛焦，津液不通，虚劳百病，气力损乏。②《医方考》：肺劳。短气虚寒，皮毛枯涩，脉来迟缓。

【方论选录】《医方考》：黄耆、人参甘温者也，故能补气，《经》曰：损其肺者益其气，是故用之；桂心、附子辛热者也，气虚则阴凑之而为寒，热能壮气，是故用之；白术、姜、枣脾胃药也，《经》曰：虚则调其母，脾是肺之母，是故用之。

12537 黄耆汤

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《外台》

卷十一。

【组成】 黄耆 茯神 栝楼根 甘草 麦门冬各二两 干地黄五两

【用法】 上㕮咀。以水八升，煮取二升半，去滓，分三服，日进一剂，服十剂佳。

【主治】 消渴。

【宜忌】 《外台》：忌芜荑、酢物、海藻、菘菜。

12538 黄耆汤

【方源】 《圣济总录》卷十。

【组成】 黄耆四两 防风（去叉） 附子（炮裂，去皮脐）各一两半 芎劳一两 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙）五两 当归（焙）一两 甘草（炙，锉）半两 芍药一两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，加大枣二枚（去核），生姜一分（擘碎），煎至一盏，去滓温服，空心、日午、夜卧各一次。

【主治】 历节风，日夜疼痛。

12539 黄耆汤

【方源】 《圣济总录》卷十三。

【组成】 黄耆（锉） 人参各二两 麻黄根 牡蛎（煅赤）各三两 枸杞根白皮二两半 龙骨四两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，大枣一枚（擘破），同煎，去滓，取六分，空心服，日三次。

【主治】 风虚多汗，夜卧尤甚，床席衣被尽湿。

12540 黄耆汤

【方源】 《圣济总录》卷十九。

【组成】 黄耆（锉） 芍药 桂（去粗皮）各三两 当归（切，焙） 白茯苓（去黑皮） 菖蒲 人参各二两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜五片，大枣二枚（擘破），同煎去滓，取一盏，温服，不拘时候。

【主治】 脉痹，身体不仁。

12541 黄耆汤

【方源】 《圣济总录》卷四十三。

【组成】 黄耆（锉） 麦门冬（去心，焙）各二两 人参 白茯苓（去黑皮） 芍药 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 甘草（炙，锉）各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加大枣二枚（擘），煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 心虚言语错谬，精神恍惚，多惊。

12542 黄耆汤

【方源】 《圣济总录》卷四十六。

【组成】 黄耆（锉）三分 甘草（炙，锉）半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）二两 干姜（炮）三分 桂（去粗皮） 白术 熟干地黄（焙） 人参 白茯苓（去黑皮） 当归（切，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 陈橘皮（汤浸，去白）各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜三片，大枣二枚（擘破），同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脾胃气虚弱，四肢少力，肌体羸瘦，不欲饮食。

12543 黄耆汤

【方源】 《圣济总录》卷四十八。

【组成】 黄耆三两 五味子 人参 麦门冬（去心，焙） 桑根白皮各二两 枸杞 熟干地黄（焙）各一两一分

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，以水二盏，煎取一盏，去滓温服，日三次。

【功用】 《宣明论》：补肺平心。

【主治】 肺消，饮少溲多。

12544 黄耆汤

【方源】 《圣济总录》卷五十七。

【组成】 黄耆（锉）一两 当归（切，焙） 人参 甘草（炙，锉）各一两 干姜（炮）二两 芍药 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 半夏（汤洗去滑） 桂（去粗皮）各一两半 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】 心腹彻痛，诸虚冷气胀满。

【加减】 冷气多者，加附子一枚（炮裂，去皮脐）。

12545 黄耆汤

【方源】 《圣济总录》卷五十九。

【组成】 黄耆（细锉） 栝楼根（锉） 麦门冬（去心，焙） 赤茯苓（去黑皮） 人参 甘草 黄连（去须） 知母（锉，焙） 生干地黄（焙） 菟丝子（酒浸一宿，焙干） 肉苁蓉（酒浸一宿，去皱皮，锉，焙） 石膏（煅赤）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 气虚燥渴引饮。

12546 黄耆汤

【方源】 《圣济总录》卷一一四。

【异名】 菖蒲汤（原书卷一一五）。

【组成】 黄耆（锉）一两半 附子（炮裂，去皮脐） 菖蒲（米泔浸一宿，切）各一两 木通（锉）

二两 磁石（火烧醋淬十七遍）三两 五味子 防风（去叉） 玄参 人参 杜仲（去粗皮，锉，炒） 白茯苓（去黑皮） 熟干地黄（焙）各一两一分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏半，入生姜三片，大枣一枚（擘），同煎至七分，去滓，空心温服，日三次。

【主治】 风聋，飕飕如风雨钟磬声，或时出清水，或有脓汁；五聋鸣闹，不闻人声，出黄水；耳内生疮。

12547 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】 黄耆（锉）一两半 阿胶（炙燥）二两 甘草（炙，锉）一两 大枣（去核）五十颗

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】 妇人漏下赤白，淋漓不断。

12548 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】 黄耆（锉） 白术（锉，炒） 牡蛎（熬为粉） 白茯苓（去黑皮） 防风（去叉） 生干地黄（焙） 麦门冬（去心，焙）各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《圣济总录》：产后荣卫虚损，汗出不止。②《宋氏女科秘书》：产后阴虚，又遇风邪，虚汗不止。

【方论选录】《济阴纲目》：黄耆得防风其功愈大，为易于固表也；牡蛎肾家药也，以肾液入心为汗，故止汗又宜固肾，其他可意解也。

【备考】《玉机微义》有甘草、大枣；《金鉴》有浮小麦、甘草；《女科指掌》有当归、甘草。

12549 黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】 黄耆（锉）一两 赤石脂一两半 阿胶（炒令燥） 黄连（去须）各一两 黄柏三分 白术一两（锉，炒） 龙骨一两半（火烧红）

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，日二夜一。

【主治】 产后赤白痢，脓血相兼，疼痛。

12550 黄耆汤

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】 黄耆 伏神 瓜蒌根 人参 甘草各一两半 麦门冬 熟干地黄各二两半

【用法】 水煎服。先服肾气丹补其虚损，食后宜此药。

【功用】 止渴退热。

【主治】 男子消渴，小便极多，水饮一斗，小便一斗。

【宜忌】 此病切忌慎者三：一饮酒，二行房，三咸食及面食。

12551 黄耆汤

【方源】《本事》卷五。

【组成】 黄耆（蜜炙） 熟干地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干称） 白芍药 五味子（拣） 麦门冬各三分（水浸，去心） 白茯苓一分（去皮） 甘草（炙）半两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜、大枣、乌梅同煎，去滓。

【功用】 ①《本事》：生津液。②《本事方释义》：专补五脏之阴。

【主治】 口干烦躁，不思食。

【方论选录】《医方集解》：此足太阴药也。黄耆、人参补气，熟地、芍药补血，乌梅、五味敛耗生津，天冬、麦冬泻火补水，茯苓淡以利湿，甘草甘以和中。湿去气运，则脾和而思食，津生而燥退矣。

【备考】《医方集解》有天冬、人参。

12552 黄耆汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 黄耆 白术 防风各等分

【用法】 上㕮咀。水煎五七钱至十余钱，或半两一两，水煎，温服。

【功用】 止汗。

【主治】 伤寒太阳证，春夏有汗，脉微而弱，恶风恶寒。

【加减】 汗多，恶风甚者，加桂枝。

12553 黄耆汤

【方源】《妇人良方》卷十二。

【组成】 糯米一合 黄耆 川芎各一两

【用法】 上细锉。水二大盏，煎至一盏三分，温服。

【功用】《景岳全书》：安胎。

【主治】 胎动不安，腹痛下黄汁。

12554 黄耆汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 调元汤（《痘疹心法》卷二十三）、参耆饮（《准绳·幼科》卷四）。

【组成】 黄耆二钱 人参一钱 炙甘草五分

【用法】 上㕮咀。作一服，水一大盏，煎至半盏，去滓，食远服。加白芍药尤妙。

【功用】《直指小儿》：内固外护，扶阳助气。

【主治】①《兰室秘藏》：小儿惊风。②《准绳·幼科》：小儿虚弱痘证。元气虚弱，精神倦怠，肌肉柔慢，面青眺白，饮食少进，睡卧宁静而不振者，不分已出未出者。

【宜忌】《痘疹心法》：气壮实者不宜。

【方论选录】①《兰室秘藏》：此三味皆甘温能补元气，甘能泻火，《内经》云：热淫于内，以甘泻之，以酸收之。白芍药酸寒，寒能泻火，酸味能泻肝而大补肺金，所补得金土之位大旺，火虚风木何由而来克土，然后泻风之邪。②《直指小儿》：人参、黄耆、甘草性味甘温，专补中气而能泻火，故虚火非此不去也。三味之剂借以治痘，以人参为君，黄耆为臣，甘草为佐，上下相济，治虽异而道则同。予尝计其药性之功，用黄耆能固表，人参能固内，甘草能解毒，究其治痘之宜治，必须此三味之神品。

【备考】本方方名，《直指小儿》引作"保元汤"。用水一盅半，生姜一片，煎至五分，不拘时服。

12555 黄耆汤

【方源】《医方类聚》卷一五九引《济生》。

【组成】黄耆（去芦，蜜水炙）一两半 白茯苓（去皮） 熟地黄（酒蒸） 肉桂（不见火） 天门冬（去心） 麻黄根 龙骨各一两 五味子 小麦（炒） 防风（去芦） 当归（去芦，酒浸） 甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】喜怒惊恐，房室虚劳，致阴阳偏虚，或发厥自汗，或盗汗不止。

【加减】发厥自汗，加熟附子；发热自汗，加石斛。

12556 黄耆汤

【方源】《直指》卷十七。

【组成】黄耆 茯神 瓜蒌根 麦门冬（去心）各一两 北五味子 甘草（炙）各半两 生干地黄一两半

【用法】上锉细。每服四钱，新水煎服。

【主治】诸渴疾。

12557 黄耆汤

【方源】《局方》卷六（续添诸局经验秘方）。

【组成】绵黄耆 陈皮（去白）各半两

【用法】上为细末。每服三钱，用大麻仁一合（烂研），以水投，取浆一盏，滤去滓，于银石器内煎，候有乳起，即入白蜜一大匙，再煎令沸，调药末，空心、食前服，秘甚者不过两服愈。常服即无秘涩之患，此药不冷不燥。

【主治】年高老人，大便秘涩。

12558 黄耆汤

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】黄耆 茺蔚子各二两 防风一两半 地骨皮 茯苓 川大黄 人参 黄芩各一两 甘草五钱

【用法】上为末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食后温服。先宜镰洗散去瘀血，熨烙二五度，然后服黄耆汤，煎摩风膏摩之，睑内涂白蔹膏即愈。

【主治】风牵睑出外障。初患之时，乍好乍恶，发歇无时，多因泪流不止，盖因胃气受风，肝膈积热，壅毒在睑，皆致使眼皮翻出。

12559 黄耆汤

【方源】《普济方》卷三五三引《便产须知》。

【异名】延寿汤。

【组成】黄耆 白术 防风 熟地黄 牡蛎粉 白茯苓 麦门冬各等分（一方有甘草）

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加红枣二个，煎大半盏服。

【主治】产后血虚为风邪所搏，汗出不止。

12560 黄耆汤

【方源】《普济方》卷二八九。

【异名】神效黄耆汤（《疡科心得集》卷上）。

【组成】黄耆（细锉） 麦门冬（去心，焙）各一两 熟干地黄（焙） 人参 甘草（炙，锉）各三分 白茯苓（去黑皮） 当归（锉，焙） 芍药 芎藭 桂（去粗皮） 远志（去心）各半两（一方有五味子）

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏，加生姜半分（拍碎），大枣二枚（擘破），同煎至五分，去滓，空心温服，日晚再服。

【功用】去脓汁，理虚劳，内补。

【主治】①《普济方》：发背已溃者。②《疡科心得集》：痈毒内虚，毒不起化，及溃后诸虚，不能收口。

12561 黄耆汤

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】黄耆二钱二分 当归一钱二分 生地一钱五分 天门冬一钱五分 麦门冬一钱 五味子七分 防风五分 白茯苓一钱五分 麻黄根一钱 甘草八分 浮小麦一撮（炒）

【用法】 上锉一剂。水煎，温服。

【主治】 ①《古今医鉴》：元气虚弱自汗。②《增补内经拾遗》：风伤于卫，令人善病风厥，漉漉然汗出。

【备考】《增补内经拾遗》有熟地黄。

12562 黄耆汤

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】 黄耆（蜜炙）二钱 人参 白术 茯苓 白芍（炒）各一钱 甘草（炙）八分 桂枝五分

【用法】 水煎服。

【主治】 汗多气虚发痉。

12563 黄耆汤

【方源】《审视瑶函》。

【组成】 黄耆 麦门冬（去心） 白茯苓 防风 人参 地骨皮 漏芦 知母 远志（去心） 熟地黄各等分

【用法】 上锉一剂。白水二钟，煎至八分，去滓热服。

【主治】 阴漏症。眼眦漏不止。

12564 黄耆饮

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】 黄耆 茯神（去木） 栝楼根 麦门冬（去心，焙） 甘草（炙）各三两 生干地黄（切，焙）四两

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 膈消，胸中烦渴。

12565 黄耆饮

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】 黄耆（锉） 杜仲（去粗皮，炙，锉） 山茱萸 人参 知母（切，焙）各二两 龙骨（碎）三两

【用法】 上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，加大枣一枚（擘），煎至一盏，去滓温服，日三夜二。

【主治】 消肾。干渴，小便多，羸瘦少力。

12566 黄耆饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】 黄耆（锉） 地榆 桑寄生各一两半 艾叶半两 白龙骨（研）二两 生地黄二两 生姜半两

【用法】 上锉如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎取八分，去滓，食前温服，如人行三五里再服。

【主治】 妊娠胞漏，月水时下。由冲任脉虚，不能制约太阳少阴之经，故令血下。

12567 黄耆酒

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】 黄耆 桂（去粗皮） 巴戟天（去心） 石斛（去根） 泽泻 白茯苓（去黑皮） 柏子仁 干姜（炮） 蜀椒（去目并闭口，炒出汗）各三两 防风（去叉） 独活（去芦头） 人参各二两 天雄（炮裂，去皮脐） 芍药 附子（炮裂，去皮脐） 乌头（炮裂，去皮脐） 茵芋 半夏（汤洗七遍去滑） 细辛（去苗叶） 白术 黄芩（去黑心） 栝楼根 山茱萸各一两

【用法】 上㕮咀，绢袋盛，以清酒三斗渍之，秋、冬七日，春、夏三日。初服三合，日二次。渐加之，以微麻木为效。

【主治】 脾痹。肉极虚寒，体重怠惰，四肢不欲举动，关节疼痛，不嗜饮食。

12568 黄耆酒

【方源】《杂病源流犀烛》卷十三。

【组成】 黄耆 防风 细辛 独活 川芎 牛膝各一两半 附子 川椒 炙草各一两 川乌 山萸 秦艽 葛根各七钱

【用法】 浸酒，日、午、夜服三次。

【主治】 痹病甚而麻木不知者。

【加减】 虚，加肉苁蓉；下利，加女萎；多忘，加石斛、菖蒲。

12569 黄耆散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 黄耆一两（锉） 龙骨一两 防风一两（去芦头） 远志一两（去心） 茯神一两 麦门冬一两（去心） 牡蛎一两半（烧为粉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 心风虚烦，神思恍惚不安。

12570 黄耆散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】 黄耆三分（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 桂心一两 白术一两 熟干地黄一两 人参一两（去芦头） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 白茯苓一两 当归一两（锉，微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 干姜三分（炮裂，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脾胃气虚弱，令人身重，不欲饮食，四

肢少力，肌体羸瘦。

【宜忌】 忌生冷、油腻、犬肉。

12571 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 黄耆二两（锉） 人参一两（去芦头） 桂心一两 紫菀一两（洗去苗土） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 五味子一两 柴胡一两（去苗） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 桑根白皮一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬一两半（去心，焙）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 气极。虚热，皮毛干焦，津液不通，四肢无力。

12572 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】 黄耆一两（锉） 白术一两 白茯苓一两 人参一两（去芦头） 麦门冬一两半（去心，焙） 甘草半两（炙微赤，锉） 五味子三分 熟干地黄一两半 牡蛎粉一两

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加大枣三枚，煎至六分，去滓温服。

【主治】 虚劳盗汗，翕翕少气，四肢乏力，咽子食少。

12573 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【异名】 黄耆汤（《圣济总录》卷八十八）。

【组成】 黄耆二两（锉） 白芍药一两 桂心一两 当归一两 麦门冬一两半（去心，焙） 白龙骨一两 熟干地黄一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 虚劳少气，小便数，无力，不能食。

12574 黄耆散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】 黄耆一两（锉） 人参三分（去芦头） 牡蛎粉三分 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 熟干地黄一两 附子一两（炮裂，去皱皮脐） 石南三分 防风半两（去芦头） 五味子半两 白茯苓一两 白芍药半两 桂心半两 石斛一两（去根，锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 磁石一两（捣碎，水淘去赤汁）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 虚劳损，小便余沥，阴萎湿痒，四肢羸弱，不欲饮食。

12575 黄耆散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 黄耆一两（锉） 白茯苓一两 熟干地黄一两 韭子一两（微炒） 麦门冬一两半（去心，焙） 车前子一两 鹿茸一两（去毛，涂酥，炙微黄） 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 白龙骨三分

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温粥调下。

【主治】 虚劳。肾气乏弱，或时失精，心中虚烦。

12576 黄耆散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】 黄耆半两（锉） 甘草半两（生锉） 栀子仁半两 黄芩三分 玄参一两 赤茯苓半两 槟榔半两 川升麻三分 紫菀半两（洗去苗土） 麦门冬一两（去心，焙） 牛蒡子半两

【用法】 上为粗散。每服二钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 咽喉内生疮疼痛。

12577 黄耆散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 黄耆一两（锉） 麦门冬一两（去心） 芦根一两（锉） 栝楼根一两 紫苏茎叶一两 生干地黄半两（锉） 桑根白皮半两（锉） 泽泻半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 消中烦闷，热渴不止。

12578 黄耆散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】 黄耆一两（锉） 麦门冬一两（去心） 茯神一两 龙骨一两 栝楼根一两 熟干地黄一两 泽泻一两 白石脂一两 桑螵蛸一两（微炒） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 消肾。心神烦闷，小便白浊。

12579 黄耆散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【异名】 黄耆汤（《圣济总录》卷六十一）。

【组成】 黄耆二两（锉） 赤芍药二两 茵陈一两 石膏四两 麦门冬一两（去心） 豉二两

【用法】 上为散。每服半两，以水一大盏，加竹叶十四片，煎至五分，去滓温服，日四五次。

【主治】 ①《圣惠》：黄汗病。身体重，汗出而不渴，其汗沾衣，黄如柏染。②《医宗必读》：黄汗身肿，发热不渴。

12580 黄耆散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【异名】 黄耆汤(《圣济总录》卷一五四)。

【组成】 黄耆一两半（锉） 桑寄生一两 地榆一两（锉） 艾叶三分（微炒） 龙骨三分 熟干地黄一两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 妊娠五月六月，下血不止，名曰漏胎。

12581 黄耆散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【异名】 黄耆汤(《圣济总录》卷一五五)。

【组成】 黄耆三分（锉） 白术三分 人参三分（去芦头） 麦门冬三分（去心） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 芎劳半两 白茯苓三分 前胡三分（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【功用】 安胎和气，思食，利四肢。

【主治】 妊娠胎不长。

【方论选录】《济阴纲目》：此方悉以补气为主，而前胡散结气，川芎行结血，皆所助其生长也。

12582 黄耆散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】 黄耆一两（锉） 麦门冬一两（去心） 赤茯苓一两 当归半两 甘草半两（炙微赤，锉） 生干地黄一两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，人生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后口干，烦闷心躁。

12583 黄耆散

【方源】《圣惠》卷九十一。

【异名】 黄耆汤(《圣济总录》卷一八二)。

【组成】 黄耆三分（锉） 白鲜皮半两 防风二分（去芦头） 黄芩三分 枳壳一分（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】 上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓放温，分减服之。

【主治】 ①《圣惠》：小儿风瘙瘾疹。②《圣济总录》：小儿风疹，壮热心躁。

12584 黄耆散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】 黄耆（锉） 白及 白蔹 黄明胶（炒令燥）各二两

【用法】 上为散。每服二钱匕，糯米饮调下。

【主治】 吐血。

12585 黄耆散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 牡蛎散(《普济方》卷三八五)。

【组成】 牡蛎（煅） 黄耆 生地黄各等分

【用法】 上为末。水煎服，不拘时候。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：小儿虚热盗汗。②《普济方》：小儿血虚，自汗潮热。

【备考】《卫生宝鉴》本方用法：每服一二钱，水一盏，小麦二三十粒，煎至七分，去滓，食后温服。

12586 黄耆散

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】 石斛一两半 黄耆 补骨脂 人参各一两 熟干地黄二两 泽泻 远志 当归 桂心各三两 牛膝 白茯苓 龙骨各一两 五味子半两 鹿茸一两半

【用法】 上为粗末。每服用羊肾一对，切去脂膜，以水一盏半，煮取汁一盏，去羊肾入药五钱，煎至五分，去滓，食前温服，晚食前服，滓再煎之。

【主治】 虚劳不足，小便数，四肢少力，不能自持。

12587 黄耆膏

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生箭耆四钱 生石膏四钱（捣细） 净蜂蜜一两 粉甘草二钱（细末） 生怀山药三钱（细末） 鲜茅根四钱（锉碎，如无鲜者，可用干者二钱代之）

【用法】 上先将黄耆、石膏、茅根煎十余沸去滓，澄取清汁二杯，调入甘草、山药末同煎，煎时以箸搅之，勿令二末沉锅底，一沸其膏即成，再调入蜂蜜，令微似沸，分三次温服下，一日服完，如此服之，久而自愈。然此乃预防之药，喘嗽未犯时，服之月余，能拔除病根。

【主治】 肺有劳病，薄受风寒即喘嗽，冬时益甚者。

【方论选录】 用黄耆以补肺之阳，山药以滋肺之

阴，茅根以通肺之窍，俾肺之阴阳调和，窍络贯通，其阖辟之力自适均也；用石膏者，因其凉而能散，其凉也能调黄耆之热，其散也能助茅根之通也；用甘草者，因其味甘，归脾益土，即以生金也；用蜂蜜者，因其甘凉滑润，为清肺润肺，利痰宁嗽之要品也。

12588 黄耆膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 黄耆四百八十两

【用法】 上药酌予切碎，水煎三次，分次过滤，去滓，滤液合并，用文火煎熬浓缩至膏状，以不渗纸为度，每一两膏汁兑炼蜜二两成膏，装瓶，重二两。每服五钱，日服二次，开水冲服。

【功用】 ①《北京市中药成方选集》：补中益气，调养荣卫。②《赵炳南临床经验集》：补中益气，托里生肌。

【主治】 ①《北京市中药成方选集》：气虚血亏，虚劳盗汗，肺虚作喘，身体羸瘦。②《赵炳南临床经验集》：疮面久不愈合，阴疮脓毒未尽，下肢顽固性溃疡，鱼鳞癣（蛇皮症）。

12589 黄病丸

【方源】《内外验方秘传》卷下。

【组成】 白术一两　山药一两　茵陈一两五钱　苦参一两　陈皮一两　茯苓一两五钱　苡仁二两　六曲二两　煅皂矾一两　煅针砂一两

【用法】 晒干为末，用黑枣八两煮烂，去皮核，捣和药末为丸。每服三钱，温花酒送下。

【主治】 黄病。面黄无力，食少，脉数滑。

12590 黄疸汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 茵陈 30 克　山栀 9 克　金银花 15 克　连翘 15 克　败酱草 15 克　板蓝根 15 克　赤芍　白芍各 9 克　柴胡 6 克　神曲 15 克　苏梗 6 克　桔梗 6 克　大豆黄卷 15 克

【功用】 清热利湿退黄。

【主治】 急性黄疸型肝炎（阳黄）。巩膜黄染，周身皮肤发黄，小便黄赤，舌苔黄腻，脉弦数。

【方论选录】 茵陈清热利湿退黄，大豆黄卷解湿热退黄，金银花、连翘、板兰根、败酱草、山栀清热解毒，苏梗、桔梗、柴胡舒肝理气，神曲发酵协助退黄，芍药柔肝养阴与柴胡配伍应用，为治疗肝胆疾患的要药。

12591 黄蓉散

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】 生大黄五钱　芙蓉叶一两

【用法】 上为细末。苦茶调敷。

【主治】 手足肿毒，已成未成。

12592 黄雷丸

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】 雷丸三钱　大黄三钱　白矾三钱　铁衣三钱　雄黄三钱

【用法】 上为末，和匀，枣肉为丸。每用酒送下三钱。立时便下如人精一碗，胸中便觉开爽，再服则鳞甲尽落。

【主治】 人身忽长鳞甲于腹间胁上者。

12593 黄蜡膏

【方源】《普济方》卷二七六引《德生堂方》。

【组成】 槐条　椿皮　桃条　楝条　柳条　荆芥　黄蜡

【用法】 上除黄蜡外，熬汤，无时汤洗拭干，用黄蜡于纸上摊膏十个，将十层都拴于疮上，日三次洗疮，除去着疮蜡纸一个，不候一月即愈。

【主治】 臁疮无问年深日近。

12594 黄蜡膏

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 香油一两　胎发如梅大　白胶香　黄蜡各一两　生龙骨　赤石脂　血竭末各一两

【用法】 香油入胎发熬消化，入白胶香、黄蜡溶化，再入生龙骨、赤石脂、血竭末搅匀候冷，瓷器收贮。每用捏作薄片贴疮上，外以箬叶绢帛缚之，三日后翻过药贴，以活血药煎汤洗之。

【主治】 ①《医学入门》：内臁、外臁。②《疡医大全》：肾脏风疮。

12595 黄精丸

【方源】 方出《圣惠》卷九十四，名见《圣济总录》卷一九八。

【组成】 黄精十斤（净洗，蒸令烂熟）　白蜜三斤　天门冬三斤（去心，蒸令烂熟）

【用法】 上为丸，如梧桐子大。每服以温酒下三十丸，每日三次，久服。

【功用】 延年补益。

12596 黄精酒

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】 黄精四斤　天门冬三斤（去心）　术四斤　松叶六斤　枸杞根三斤

【用法】 上锉，以水三石，煮取汁一石，浸曲十斤，炊米一石，如常法酿酒。候熟，任饮之。

【功用】 延年补养，发白再黑，齿落更生。

【宜忌】 忌桃、李、雀肉。

12597 黄精粥

【方源】《饮食辨录》卷二。

【组成】黄精（切碎） 米

【用法】上二味同煮粥食。

【功用】《药粥疗法》：补脾胃，润心肺。

【主治】①《饮食辨录》：一切诸虚百损，不拘阴阳气血衰惫。②《药粥疗法》：脾胃虚弱，体倦乏力，饮食减少，肺虚燥咳，或干咳无痰，肺痨咳血。

【宜忌】《药粥疗法》：平素痰湿较盛，口粘，舌苔厚腻，以及脾胃虚寒，大便泄泻的病人，不宜选用。食后一旦出现胸满气闷时，即应停服。

【备考】《药粥疗法》本方用黄精15～30克（或鲜黄精30～60克），粳米二两，白糖适量。先将黄精浓煎，取汁去滓，入粳米煮粥，粥成后加白糖即可。每日食二次，以3～5天为一疗程。

12598 黄犬肉丸

【方源】《济生方》卷一。

【组成】磁石三两（煅，水飞） 川乌（炮，去皮尖） 附子（炮，去皮脐） 桑寄生 鹿茸（燎去毛，酒蒸） 麋茸（同上制） 仙茅（酒浸） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 川巴戟（去心） 胡芦巴（炒）各二两 沉香（别研） 阳起石（煅，研极细） 龙骨（生用） 虎胫骨（酥炙） 覆盆子（酒浸）各一两 青盐（别研）

【用法】上为细末，用犬肉二斤，以酒、葱、茴香煮烂，杵和为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐酒、盐汤任下。

【主治】真精衰惫，脐腹冷痛，小便频数，头晕耳鸣，足胫酸冷，步履无力，腰背拘痛，水谷不消，饮食无味，肌肉瘦悴，遗泄失精。

12599 黄丹软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄丹12克 黄柏粉12克 枯矾6克 凡士林70克

【用法】上为细末，与凡士林调成软膏。外用。

【主治】神经性皮炎。

12600 黄丹油膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】松香6克 黄丹6克 硫黄6克 黄柏6克 铅粉1克

【用法】上为细末，麻油调。外敷。

【主治】湿疹。

12601 黄水疮散

【方源】《全国中药成药处方集》（呼和浩特方）。

【组成】轻粉 蛤粉 石膏 黄柏各等分

【用法】上为细面。

【主治】黄水疮。

12602 黄连补汤

【方源】《千金》卷十八。

【异名】黄连汤（《圣济总录》卷五十）。

【组成】黄连四两 茯苓 芎藭各三两 酸石榴皮五片 地榆五两 伏龙肝（鸡子大）一枚

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取二升半，去滓，下伏龙肝末，分三服。

【主治】大肠虚冷，痢下青白，肠中雷鸣相逐。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、冷水、大醋。

12603 黄连油膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄连25克 蓖麻油75克

【用法】混合。外用。

【主治】急性湿疹。

12604 黄柏饮子

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】黄柏（薄切小片）

【用法】蜜渍一宿。嚼柏汁渍疮。

【主治】天行口疮。

12605 黄药子散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】黄药子一两

【用法】上为细末。每服一钱，白汤下。吐出顽痰即愈。

【主治】缠喉风，颐颔肿，及胸膈有痰，汤米不下者。

12606 黄耆豆汤

【方源】《医学实在易》卷五。

【组成】黄耆 马料豆各等分

【用法】二味用水一大碗，煎八分服。半月愈。

【主治】盗汗，自汗。

12607 黄耆饮子

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】黄耆 五味子 当归 白茯苓各半两 白芍 远志 麦子（一方用麦门冬） 人参 吴术各一分 甘草三铢

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏半，姜三片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人血气不足，夜间虚乏，有汗倦怠者。

12608 黄耆浸酒

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】黄耆（去芦头）二两 萆薢 防风（去

叉） 芎藭 牛膝（去苗）各一两半 独活（去芦头） 山茱萸各一两 五味子二两

【用法】 上细锉。用生绢袋子贮之，以好酒二斗浸，秋、冬五日，春、夏三日。每日空腹温服半盏。

【功用】 补虚。

【主治】 虚劳。手足逆冷，脚膝疼痛。

12609 黄耆煎散

【方源】 《医略六书》卷三十。

【组成】 熟地五两 人参一两半 黄耆三两（蜜炙） 鳖甲三两（醋炒） 当归三两 茯苓一两半 白芍一两半（酒炒） 麦冬三两（去心） 桂心一两半

【用法】 上为散。姜、枣汤煎五钱，去滓温服。

【主治】 产后气血两亏，虚寒内伏而清阳不振，营阴暗伤，寒热倦怠，将成蓐劳，脉数虚弦软涩者。

【方论选录】 熟地补阴滋血以资血室，人参补气扶元以壮气海，黄耆补气益卫，当归养血益营，鳖甲滋肝肾以散结，麦冬润肺燥以生津，白芍敛阴和血脉，桂心温经散寒邪，白茯苓清治节以和中也。为散，姜、枣汤煎，使气血内充，则虚寒自散而清阳敷布，营阴暗复，安有寒热倦怠之患乎？

12610 黄病神丹

【方源】 年氏《集验良方》卷四。

【异名】 黄神丹（《仙拈集》卷一）。

【组成】 皂矾八两（面一斤，和作饼，入火内煨焦为度） 苍术（米泔浸炒） 厚朴（去皮，姜汁炒） 陈皮 甘草各六两 川椒（去闭口并椒目）十两

【用法】 上为末，用好枣肉三斤（煮熟，去皮核），核桃三斤（去皮），同捣成膏，丸如梧桐子大。每服七八十丸，酒服。初服觉香，病愈则闻臭矣。

【主治】 黄疸。

12611 黄雌鸡方

【方源】 《普济方》卷一九一。

【组成】 雌鸡一只 赤小豆一升

【用法】 同煮，候豆烂，即食其汁，日二夜一，每服四合；若瘦者，渐食之良。

【功用】 补肾，扶阳气。

【主治】 腹肿水癖，水肿，冷气。

【宜忌】 先患骨热者，不可食也。

12612 黄雌鸡粥

【方源】 《圣惠》卷九十六。

【组成】 黄雌鸡一只（治如食法）

【用法】 上以烂煮取肉，随意食之；其汁和豉作粥食之亦妙。

【主治】 消渴口干，小便数。

12613 黄土稻花汤

【方源】 《许氏幼科七种·治验》。

【组成】 黄土（纯黄无杂色者）一两 稻花一合（捣熟入药） 人参五分 乌梅肉五分 广橘皮四分 半夏（姜汁拌）五分 茯苓七分 甘草二分

【用法】 新汲水搅黄土，澄清煎药，汤熟，入稻花，再煎数沸，温服。

【主治】 暑风吐泻，将成慢惊。

【方论选录】 黄土、稻花养胃之神品也；人参佐之，以益胃中元气；吐甚则胃中元气大耗，乌梅之酸以收之；橘皮、半夏助之以宣布也。

12614 黄风菊花汤

【方源】 《银海精微》卷下。

【组成】 防风 黄连 桑白皮 赤茯苓 瞿麦 车前子 栀子 大黄 黄芩 细辛 桔梗 连翘

【用法】 水煎，半饥温服。

【主治】 初起胬肉攀睛。

12615 黄龙四物汤

【方源】 《济阴纲目》卷九。

【组成】 柴胡二钱 黄芩一钱半 人参 甘草 当归 川芎 芍药 地黄各一钱

【用法】 上锉。水煎服。

【主治】 ①《济阴纲目》：妊娠伤寒愈后发热者。②《医略六书》：孕妇伤寒后，潮热，脉数濡弦者。

【加减】 因于食者，加枳实。

【方论选录】 《医略六书》：生地滋阴壮水，以济心火，人参补气扶元以生肾水，柴胡解热疏邪，黄芩安胎清热，当归养血荣经脉，白芍敛阴和营血，川芎活血调营，甘草缓中和胃也。水煎温服，使血气内充，则余热顿解，而潮热无不退，胎孕无不安矣。

12616 黄芩五物散

【方源】 《外台》卷二十五引《许仁则方》。

【组成】 黄芩 黄连 黄柏各五两 黄耆四两 龙骨六两

【用法】 上为散。以饮下之，初服一方寸匕，日二服，稍稍加至二三匕。愈乃止。

【主治】 水痢。心腹甚痛，食无妨，但食后即痢，食皆化尽，唯变作水谷无期度，多食多下，少食少下。

【宜忌】 《普济方》：忌猪肉、冷水。

12617 黄芩贝母汤

【方源】《医学摘粹》卷三。

【组成】黄芩二钱 柴胡 玄参 桔梗 杏仁 芍药 贝母（去心）各三钱 五味一钱

【用法】煎半杯，热服。

【主治】鼻孔发热生疮。

12618 黄芩六一丸

【方源】《济阳纲目》卷九十六。

【组成】条芩六两 升麻一两

【用法】上为末，面糊为丸服。

【主治】积热脱肛。

12619 黄芩六合汤

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤四两加黄芩 白术各一两

【主治】妇女经水过多，别无余证。

【备考】本方方名，《准绳·女科》引作"四物加黄芩白术汤"。

12620 黄芩石膏汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】黄芩三钱 石膏三钱 生甘草二钱 半夏三钱 升麻二钱 芍药三钱

【用法】水煎半杯，热服，徐咽。

【主治】牙痛龈肿。

12621 黄芩白术汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】黄芩 白术各五钱 苏叶二钱五分

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】妊娠中湿，或因早行感雾露之气，或冒雨，或久居下湿之地，或汗出取冷水浴之，其证发热，骨节烦痛，身体重著，头痛鼻塞。

12622 黄芩白芷汤

【方源】《医部全录》卷一六五引《种杏仙方》。

【组成】黄芩（酒洗）二钱 白芷一钱

【用法】上为细末。食后、临卧茶清调下。

【主治】眉棱风热痛。

12623 黄芩白芷散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】当归 黄芩 防己 防风 川芎 白芷 蒺藜 石决明 草决明 桔梗 青葙 蒙花 茺蔚子 菊花 木贼 知母 赤芍药

【用法】上为细末。食后茶清下。

【主治】眼血翳，泪出羞明，发久不愈。

12624 黄芩半夏汤

【方源】《医统》卷四十四引《医经大旨》。

【组成】半夏 枳壳 黄芩（酒炒） 桔梗 紫苏 麻黄 杏仁 甘草各等分

【用法】上水二盏，加姜三片，枣一枚，煎八分，食远服。

【主治】①《医统》引《医经大旨》：寒包热兼表里。②《赤水玄珠》：寒包热哮喘，咳嗽。

【加减】天寒，加桂枝。

12625 黄芩羊角汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】黄芩（去黑心） 羚羊角（镑） 赤芍药 细辛（去苗叶） 桔梗（锉，炒） 人参 远志（去心） 甘草（炙，锉）各半两 防风（去叉）一两半

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食后温服，每日二次。

【功用】泻肝。

【主治】蟹睛疼痛。

12626 黄芩利膈丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】生黄芩 炒黄芩各一两 半夏 黄连 泽泻各五钱 南星 枳壳 陈皮各三钱 白术二钱 白矾五分

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食远温水送下。

【主治】胸中热，膈上痰。

【宜忌】忌酒、湿、面。

12627 黄芩利膈丸

【方源】《证治宝鉴》卷九。

【组成】黄芩 黄连 黄柏 南星 半夏 枳壳 陈皮 白矾 莱菔子 小皂角 泽泻 白术

【用法】上为末，蒸饼为丸。每服五十丸，汤送下。

【主治】痞而热，胸中有实热，膈上有稠痰，寸浮关沉。

12628 黄芩茅花汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】黄芩 茅花各二钱 白芍药一钱五分 甘草一钱

【用法】上㕮咀。用水浓煎，常服。

【主治】上膈极热而衄者。

12629 黄芩知母汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】黄芩 二母 桑皮 天冬 杏仁 花粉 炒栀 桔梗 甘草

【主治】鼻中干燥。

12630 黄芩定乱汤

【方源】《霍乱论》卷四。

【组成】黄芩（酒炒） 焦栀子 香豉（炒）各一钱五分 原蚕砂三钱 制半夏 橘红（盐水炒）各一钱 蒲公英四钱 鲜竹茹二钱 川连（姜汁炒）六分 陈吴萸（泡淡）一分

【用法】阴阳水二盏，煎一盏，候温徐服。

【主治】温病转为霍乱，腹不痛而肢冷，脉伏；或肢不冷，而口渴苔黄，小水不行，神情烦躁。

【加减】转筋者，加生苡仁八钱，丝瓜络三钱；溺行者，用木瓜三钱；湿盛者，加连翘、茵陈各三钱。

12631 黄芩射干汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】黄芩（去黑心） 射干各一两 枳实（去瓤，麸炒） 半夏（汤洗七遍，去滑，焙） 甘草（炙，锉）各三分 升麻一两半桂（去粗皮）一两一分

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盏半，入生姜五片，同煎至八分，去滓温服，每日三次。

【主治】咽喉如有物噎塞。

12632 黄芩射干汤

【方源】《医钞类编》卷十二。

【组成】黄芩 射干

【用法】水煎服。

【主治】肺胃两经热毒所致喉中腥臭。

12633 黄芩黄连汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】黄芩（酒洗，炒） 黄连（酒洗，炒） 草龙胆（酒洗四次，炒四次） 生地黄（酒洗）各一两

【用法】上㕮咀。每服二钱，水二盏，煎至一盏，去滓热服。

【主治】①《兰室秘藏》：内障。②《景岳全书》：两眼血热赤痛。

12634 黄芩麻黄汤

【方源】《伤寒总病论》卷四。

【组成】葛根 橘皮 杏仁（生） 麻黄 知母 黄芩 甘草各半两

【用法】上㕮咀。水二升，煮八合，去滓，温温分减服之。呕吐先定，便宜消息。

【主治】冬温未至发病，至春被积寒所折不得发，至夏得热，其春寒解，冬温毒始发于肌中，斑烂隐疹如锦纹，咳闷呕吐清水。

【加减】不呕者，去橘皮。

12635 黄芩清肺汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十七。

【异名】黄芩清肺饮（《玉机微义》卷二十八）、黄芩清肺散（《保婴撮要》卷十五）、清肺饮（《赤水玄珠》卷十五）、黄芩泻肺汤（《麻疹全书》卷三）。

【组成】黄芩二钱 栀子二个（擘破）

【用法】上作一服。水一盏半，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】肺燥所致小便不通。

【加减】不利，加盐豉二十粒。

12636 黄芩清肺饮

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】川芎 当归 赤芍 防风 生地 干葛 天花粉 连翘 红花各一钱 黄芩二钱 薄荷五分

【用法】水二钟，煎八分，食后服，用酒一杯过口。

【主治】肺风、粉刺，鼻渣初起红色，久则肉匏发肿者。

12637 黄芩清肺饮

【方源】《叶氏女科》卷二。

【异名】黄芩清肺汤（《竹林女科》卷二）。

【组成】人参 天冬（去心） 黄芩 地骨皮 陈皮 茯苓各八分 知母（酒炒） 山栀仁（炒）各一钱 五味子二十粒 甘草（炙）五分 桑白皮（炒） 当归身各一钱半

【用法】加姜三片，水煎服。

【主治】妊娠吐衄。

12638 黄芩滑石汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】黄芩三钱 滑石三钱 茯苓皮三钱 大腹皮二钱 白蔻仁一钱 通草一钱 猪苓三钱

【用法】水六杯，煮取二杯，滓再煮一杯，分三次温服。

【主治】脉缓身痛，舌淡黄而滑，渴不多饮，或竟不渴，汗出热解，继而复热，内不能运水谷之湿，外复感时令之湿。

【方论选录】湿热两伤，不可偏治，故以黄芩、滑石、茯苓皮清湿中之热，蔻仁、猪苓宣湿邪之正，再加腹皮、通草，共成宣气利小便之功。气化则湿化，小便利则火腑通而热自清矣。

12639 黄连二陈汤

【方源】《金鉴》卷五十。

【组成】半夏（姜制） 陈皮 茯苓 生甘草 黄连（姜炒）

【用法】引用生姜，水煎服。

【主治】小儿胎前受热，面黄赤，手足温，口吐

黄涎酸粘者。

12640 黄连人参膏

【方源】《景岳全书》卷六十。

【组成】 宣黄连 人参各五分或一钱

【用法】 上切碎。用水一小钟，同浸，饭锅蒸少顷，取出冷定，频点眼角；或于临用时研入冰片少许更妙。

【主治】 目赤痒痛。

12641 黄连上清丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 黄连 黄芩 黄柏 山栀各八两 大黄十二两 连翘 姜黄各六两 玄参 薄荷 归尾 菊花各四两 葛根 川芎 桔梗 天花粉各二两

【用法】 炼蜜为丸。每服三钱，临卧茶清送下。

【功用】 ①《中药成方配本》：清化三焦积热。②《全国中药成药处方集》（北京方）：清热通便。

【主治】 ①《饲鹤亭集方》：三焦热积，赤眼初起，咽喉疼痛，口舌生疮，心膈烦热，小便赤涩，一切风热之症。②《中药成药配本》：目赤咽痛，头痛，齿痛，口舌生疮，便秘溲赤。

【宜忌】 ①《中药成方配本》：孕妇慎用。②《全国中药成药处方集》（北京、济南、沈阳方）：忌饮酒食厚味。禁忌辛辣刺激等食物；虚弱者忌服。

12642 黄连木香汤

【方源】《医方类聚》卷一八四引《经验秘方》。

【组成】 枳壳一两（去瓤，生用） 黄连一两 木香二钱

【用法】 上先隔宿煎枳壳汤停起，次日清晨，用水一大盏，煎黄连、木香，煎至八分，去滓，入冷枳壳汤作半碗，空心就床口服。令药下腹，慢起，如此六服，亦不发。

【主治】 肠风下血。

12643 黄连化痰丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】 黄连清化丸（《直指·附遗》卷七）、黄连清痰丸（《保命歌括》）卷二十）。

【组成】 半夏一两半 黄连一两 吴茱萸（汤洗）一钱半 桃仁二十四个（研） 陈皮半两

【用法】 上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服一百丸，姜汤送下。

【主治】 ①《丹溪心法》：痰。②《保命歌括》：伤热物吐酸者。

12644 黄连化痰丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】 黄连 梨汁 藕汁 莱菔汁 生薄荷汁各等分

【用法】 入砂糖，细火熬膏。以匙挑服。

【主治】 热嗽。伤于暑热而得嗽，其脉数，必兼口燥，声嘶，烦热引饮，或吐涎沫，甚至咯血。

12645 黄连牛乳丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】 黄连（去须）一斤（为末） 麦门冬（去心）二两（烂研） 牛乳 地黄汁 葛汁各一合

【用法】 上研，为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心粥饮送下，每日二次。渐加至四十丸。

【主治】 消渴。

12646 黄连升麻散

【方源】 方出《千金》卷六，名见《卫生宝鉴》卷十一。

【组成】 升麻三十铢 黄连十八铢

【用法】 上为末。绵裹含，咽汁，亦可去之。

【主治】 ①《千金》：口热生疮。②《卫生宝鉴》：口舌生疮。

【方论选录】《千金方衍义》：升麻散火，黄连祛湿，专主中上二焦燥渴引饮之病。用绵裹含咽，缓祛浮外寒热，不用汤液荡涤于里，反戕脏腑正气。

【备考】 ①本方方名，《医学纲目》引作"黄连升麻汤"。②《卫生宝鉴》本方用：升麻一两半，黄连七钱半。

12647 黄连乌梅丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】 黄连（去须） 阿胶（蛤粉炒成珠子） 当归（洗净）各二两 人参（去芦头） 龙骨（煅红） 赤石脂 干姜（炮） 白茯苓（去皮） 乌梅肉（焙干） 陈橘皮（去白） 诃子（煨，去核） 肉豆蔻（面裹煨香） 木香 罂粟壳（蜜炙）各一两 白矾（枯）半两

【用法】 上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米饮送下；如腹痛，煎当归汤下；下血，煎地榆汤下。

【主治】 饮食不节，荣卫不和，风邪迸袭脏腑之间，致肠胃虚弱，泄泻肠鸣，腹胁膨胀，里急后重，日夜频并，不思饮食。

12648 黄连六一汤

【方源】《医学正传》卷三引朱丹溪方。

【异名】 黄连六一散（《济阳纲目》卷七十二）。

【组成】 黄连六钱 甘草（炙）一钱

【用法】 上细切，作一服。水一大盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】 因多食煎煿烧饼热面之类，以致胃脘当心而痛，或呕吐不已，渐成反胃。

12649 黄连平胃散

【方源】《金鉴》卷六十七。

【组成】 黄连五钱 陈皮 厚朴（姜炒）各三钱 甘草（生）二钱 苍术（炒） 一两

【用法】 上为细末。每服三钱，白滚水调服。外用三妙散干撒渗湿即愈。

【主治】 脐痈溃后，肠胃湿热积久，脐中不痛、不肿，甚痒，时津黄水。

【宜忌】 忌酒、面、生冷、果菜，不致再发。

12650 黄连甘乳膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 黄连粉一两 乳香粉一两 炉甘石粉二两 去湿药膏（或凡士林）七两

【用法】 调匀成膏。外敷患处。

【功用】 解毒收敛，止痛生肌。

【主治】 下肢溃疡（臁疮），女阴溃疡（阴蚀），脓疱疮（黄水疮）。

【宜忌】 用药前后勿用水洗患处。

12651 黄连白术汤

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】 白术四钱 黄连 陈皮各二钱半 丹皮二钱 木通 茯苓 山萸 人参各一钱半 炙草三分

【主治】 月经来止，多少不匀。

12652 黄连白术饮

【方源】《证治宝鉴》卷四。

【组成】 黄芩 黄连 生地 白术 石斛 甘草 入参

【主治】 中消，不能用下法者。

12653 黄连芍药方

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】 黄连 芍药 黄芩 当归 槟榔 大黄 枳壳 川芎 栀子 连翘各二钱半 甘草五分

【用法】 上用水一钟半，煎至八分，温服。

【主治】 脏腑燥结，大便不通。

12654 黄连芍药汤

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】 黄连 条芩 白芍 生甘草 枳壳 槟榔 广木香（生用）

【用法】 水煎服。

【主治】 痢疾。

12655 黄连竹茹汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】 黄连（姜汁炒） 山栀（炒黑） 竹茹各一钱 人参五分 白术（去芦） 茯苓（去皮） 陈皮 白芍（炒） 麦门冬（去心） 甘草三分 炒米一撮

【用法】 上锉一剂。加乌梅一个，枣一枚，水煎，徐徐温服。

【主治】 胃热，烦渴呕吐。

【加减】 发热，加柴胡。

12656 黄连竹茹汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】 黄连 竹茹 麦门冬（去心） 山栀 陈皮 半夏各一钱 砂仁 沉香 木香 茴香各五分 苏子八分 甘草二分

【用法】 上锉一剂。加姜一片，乌梅一个，水煎，磨沉香、木香调服。

【主治】 胃中痰火发呃。

12657 黄连闭管丸

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】 胡连闭管丸。

【组成】 胡黄连（净末）一两 穿山甲（麻油内炸黄色） 石决明（煅） 槐花（微炒）各五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如麻子大。每服一钱，空心清米汤送下，早、晚日进二服。至重者四十日而愈。

【主治】 痔漏；及遍身诸漏。

【加减】 漏之四边有硬肉突起者，加蚕茧二十个，炒末和入药中。

12658 黄连导痰汤

【方源】《济阳纲目》卷二十四。

【组成】 半夏 陈皮 茯苓 甘草 黄连 枳实

【用法】 上锉。加生姜，煎服。

【主治】 热痰。

12659 黄连进退汤

【方源】《古今医彻》卷二。

【组成】 川黄连（姜汁炒） 炮姜 半夏 川牛膝（盐水炒） 白芍（酒炒）各一钱 人参一钱半 大枣肉三枚 童便小半杯

【用法】 水煎服。

【主治】 关格。

【加减】 如阳虚肢冷，加熟附子一钱，减连五分；阴虚燥渴，加麦门冬一钱，去半夏。

12660 黄连杏仁汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】 酒炒黄连 炙麻黄 杏仁 干葛 橘红 甘草 栀子 力子 连翘 木通

【主治】 麻疹心肺邪毒壅盛，咳嗽烦躁。

【加减】 泄泻，加厚朴。

12661 黄连利气丸

【方源】《全国中药成药处方集》（禹县方）。

【组成】 黑白丑六斤 大黄二斤 陈皮一斤半 元胡索 槟榔 川芎各一斤半 黄连半斤 木通一斤半 香附 枳壳各一斤 广木香 甘草各半斤 木瓜一斤

【用法】 上为细末，水为丸，如小绿豆大。每服一钱，以开水送下；十岁每服五分。

【主治】 肠胃积热，咽喉肿痛，口燥舌干，大便秘结，小便赤黄。

【宜忌】 孕妇忌用。

【备考】 有效期二年。

12662 黄连阿胶丸

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《养生必用》。

【组成】 黄连（去须）一两半 白茯苓 白芍 阿胶（杵碎，慢火炒如珠子白色，别杵为细末）各半两

【用法】 上为细末，斟酌米醋多少，熬胶得所，和匀，入白杵臼下，众手为丸，如绿豆大。每服自二十丸为始，止于五十丸，食前以米饮送下，每日二三次。以知为度，未知加药。更丸一等如黄米大，与小儿服。

【主治】 热痢下重，脓血疼痛，腹中痛不可忍。

12663 黄连阿胶汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 黄连鸡子汤（《伤寒指掌图》卷四）。

【组成】 黄连四两 黄芩二两 芍药二两 鸡子黄二枚 阿胶三两（一云三挺）

【用法】 上五味，以水六升，先煮三物，取二升，去滓，纳胶烊尽，小冷，纳鸡子黄，搅令相得。温服七合，每日三次。

【功用】 ①《注解伤寒论》：扶阴散热。②《伤寒附翼》：降火引元。

【主治】 少阴病，心中烦，不得卧；邪火内攻，热伤阴血，下利脓血。

①《伤寒论》：少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧。②《伤寒指掌图》：少阴下利脓血。③《张氏医通》：热伤阴血便红。④《医学金针》：少阴中风。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：阳有余，以苦除之，黄连、黄芩之苦以除热；阴不足，以甘补之，鸡子黄、阿胶之甘以补血；酸，收也，泄也，芍药之酸，收阴气而泄邪热也。②《伤寒附翼》：此少阴之泻心汤也。凡涤心必藉芩、连，而导引有阴阳之别。病在三阳，胃中不和而心下痞者，虚则加参、甘补之，实则加大黄下之；病在少阴而心中烦，不得卧者，既不得用参、甘以助阳，亦不得用大黄以伤胃矣。用芩、连以直折心火，佐芍药以收敛神明，所以扶阴而益阳也。鸡子黄禀南方之火色，入通于心，可以补离宫之火，用生者搅和，取其流动之义也；黑驴皮禀北方之水色，且咸先入肾，可以补坎宫之精，内合于心而性急趋下，则阿井有水精凝聚之要也，与之相溶而成胶；用以配鸡子之黄，合芩、连、芍药，是降火引元之剂矣。《经》曰：火位之下，阴精承之；阴平阳秘，精神乃治。斯方之谓欤。③《伤寒溯源集》：黄连苦寒，泻心家之烦热，而又以黄芩佐之；芍药收阴敛气；鸡子苦，气味俱厚，阴中之阴，故能补阴除热；阿井为济水之伏流，乃天下十二经水之阴水也；乌驴皮黑而属水，能制热而走阴血，合而成胶，为滋养阴气之上品。协四味而成剂，半以杀风邪之热，半以滋阴水之源，而为补救少阴之法也。④《古方选注》：芩、连，泻心也；阿胶、鸡子黄，养阴也；各举一味以名其汤者，当相须为用也。少阴病烦，是君火热化为阴烦，非阳烦也，芩、连之所不能治，当与阿胶、鸡子黄交合心肾，以除少阴之热。鸡子黄色赤，入通于心，补离中之气；阿胶色黑，入通于肾，补坎中之精。第四者沉阴滑利，恐不能留恋中焦，故再佐芍药之酸涩，从中收阴，而后清热止烦之功得建。⑤《衷中参西》：黄连味苦入心，性凉解热，故重用之以解心中发烦，辅以黄芩，恐心中之热扰及肺也，又肺为肾之上源，清肺亦所以清肾也。芍药味兼苦酸，其苦也善降，其酸也善收，能收降浮越之阳，使之下归其宅，而性凉又能滋阴，兼能利便，故善滋补肾阴，更能引肾中外感之热自小便出也。阿胶其性善滋阴，又善潜伏，能直入肾中以生肾水。鸡子黄中含有副肾髓质之分泌素，推以同气相求之理，更能直入肾中以益肾水，肾水充足，自能胜热逐邪以上镇心火之妄动，而心中发烦自愈矣。

【临证举例】 ①顽固性失眠 《江西中医药》（1984；6:17）：用黄连阿胶汤加生地治疗顽固性失眠18例，均获得近期治愈。表现在口渴、烦躁感迅速消失，在停用一切西药情况下，每晚能安睡6小时以上，服药最少3剂，最多12剂，一般在3～6剂之间。②脑神经衰弱失眠症 《辽宁中医杂志》（1980；10:47）：吕某，由于工作繁劳和因事忧虑而致神经衰弱。主要是胸闷，头晕，梦遗精滑较

频，虚烦不眠，心神虚怯，两腿酸软，面容青暗苦闷，舌苔薄黄少津，脉沉而虚数。诊为水火不济，心肾不交。治以清热养阴，养心安肾。处以黄连阿胶汤加肉桂。2剂服后，睡眠良好，遗精好转，精神愉快，面色红润，舌苔正常，脉转虚缓。因其食欲不振，投以开胃进食汤2剂，病告痊愈。③焦虑症《黑龙江中医药》(1984；4:41)：用黄连阿胶汤略作加减治疗焦虑症42例，痊愈10例。显效23例，好转8例，无效1例；服药一周内见效21例(50%)，二周内见效16例(38%)，三周内见效5例(12%)。④冬温《中国医药汇海·医案部》(张石顽案)：郑墨林室素有便红，怀妊七月，正肺气养胎时，而患冬温，咳嗽，咽痛如刺，下血如崩，脉较平时反觉小弱而数，此热伤手太阴血分也。与黄连阿胶汤二剂，血止后，去黄连，加萎蕤、桔梗、人中黄，四剂而安。⑤舌苔剥落不生《继志堂医案》：舌乃心之苗，舌上之苔剥落不生者久矣，是心阴不足，心阴有余也。黄连阿胶汤去芩，加大生地。⑥伏暑酿痢《徐渡渔先生医案》：伏暑酿痢，冬令而发，由冬及春至夏半载余矣，脉细数，舌光红，痢伤阴也。拟仲圣法：黄连阿胶汤加建神曲、南楂炭、广橘白。⑦产后发热《上海中医药杂志》(1986；7:29)：应某某，女，28岁，会计。素有贫血史，半月前分娩时大量流血，产后发热不退(37.9～38.8℃)，曾用西药，热仍不退。证属阴虚火旺，治宜滋阴降火，予黄连阿胶汤加肉桂。3剂后热渐退尽。⑧产后失眠《上海中医药杂志》(1986；7:29)：陈某某，女，39岁，工人。大龄初产，出血甚多。产后20天，失眠渐重，甚则彻夜不寐。证属阴血不足，心火上亢，治当滋阴养血，清心降火，拟与黄连阿胶汤。7剂而寐安。

【现代研究】 镇静作用《经方研究》：给小白鼠腹腔注射100%的黄连阿胶汤煎剂0.5ml，30分钟后发现其自由活动明显减少，出现安静、嗜睡现象。表明本方有较明显的镇静作用。

12664 黄连阿胶汤

【方源】《镜京直指》卷二。

【组成】 川连一钱 中生地五钱 炙甘草八分 炒地榆三钱 阿胶珠三钱 炒黄芩二钱 当归六钱 生白芍五钱

【主治】 春温内陷，赤痢伤阴。

12665 黄连苦参汤

【方源】《普济方》卷一一二。

【组成】 黄连四两 苦参二两 阿胶一两

【用法】 上为末，以水一斗，煮取二升，去滓，适寒温。每服二合，少少益至半升，每日三次，服汤尽者复合，以愈为度。

【主治】 得病羸劣，服药不愈，因作肠滑，下痢脓血，日数十行，腹中绞痛，身热如火，头痛如破，其脉如涩。

12666 黄连败毒散

【方源】《异授眼科》。

【组成】 黄连 黄柏 黄芩 独活 羌活 防风 当归 连翘 藁本 桔梗 人参 苏木 甘草 黄耆各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 目有枣花，形如锯齿。

12667 黄连和中汤

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】 黄连一钱(吴萸七分拌炒) 姜半夏一钱五分 茯神三钱 陈皮一钱 炙甘草五分 防风一钱五分 苍术一钱(米泔浸，炒) 桂枝一钱 白芍(酒炒)二钱 干姜一钱 神曲二钱 藿香二钱

【用法】 加竹茹一团，乌梅一枚，水煎，温服。

【主治】 湿霍乱。吐利并作，腹痛如绞，肢冷，汗出口渴。

【加减】 如四肢转筋者，本方加泡淡附子三钱，木瓜二钱；如指甲青，唇吻青，本方加淡附子四钱，木瓜三钱，白术(土炒)二钱，水煎，冷透与服，徐徐呷下。

【宜忌】 如病者得药即时吐出，切勿畏为不受，宜续渐灌下，随吐随灌，以止为度，使胃气一醒，自然渐愈。

12668 黄连制附丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 姜川连一两 煨附子七分

【用法】 上为末，神曲为丸，如梧桐子大。每服六十丸，以淡姜汤送下。

【主治】 气虚膈塞吞酸。

12669 黄连肥儿丸

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】 鹰爪黄连(净)一两 芜荑(焙) 麦芽(炒) 神曲(炒)各半两 青皮(去白) 使君子肉(焙)各二钱半

【用法】 上为末，猪胆汁浸糕为丸，如麻子大。每服七丸，以米汤送下。疳热眼，以山栀仁煎汤送下。

【主治】 小儿一切疳，及疳眼赤肿，痛痒昏暗，雀盲，或经月合眼。

12670 黄连泻心汤

【方源】《云岐子脉诀》。

【异名】泻心汤(《杂病源流犀烛》卷十八)。

【组成】黄连 生地黄 知母各半两 黄芩一钱 甘草半两

【用法】上㕮咀。每服一两，水一盏半，煎服。

【主治】伤寒太阳、少阳相合，伏阳上冲，变为狂病。

12671 黄连泻心汤

【方源】《证治要诀类方》卷一。

【组成】大黄 黄连各一两 甘草五钱

【用法】上用滚汤二盏，浸一时，绞出津汁。分作二服，温服，不拘时候。

【主治】伤寒阳痞，时有热证者。

【备考】原书用本方治上症，宜先用桔梗枳壳汤，后用本方。

12672 黄连泻心汤

【方源】《医统》卷十四。

【组成】黄连 生地黄 知母各一钱半 甘草五分

【用法】水一盏半，煎八分，温服。

【主治】①《瘟疫论》：大头时疫。②《证治宝鉴》：心脉实，舌干，或破或肿者。

12673 黄连泻心汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】黄连 山栀 荆芥 黄芩 连翘 木通 薄荷 牛子各一钱 甘草五分

【用法】水二钟，加灯心二十根，煎八分，食后服。

【主治】大人、小儿心火妄动，结成重舌、木舌、紫舌、胀肿坚硬，语言不利。

12674 黄连泻心汤

【方源】《明医指掌》卷五。

【组成】黄连一钱二分 厚朴一钱（制） 干姜八分 甘草五分 人参八分 白芍药八分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水二钟，煎八分，空心热服。

【主治】①《明医指掌》：心下虚痞，按之痛。②《医略六书》：痞满，脉弦数者。

【方论选录】《医略六书》：黄连清膈热以消痞，厚朴泻中满以除痞，干姜温胃散寒滞，人参挟元鼓胃气，甘草和中气，半夏燥痰湿，更以生姜温气散寒滞也。

12675 黄连泻心汤

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】大黄 黄芩 黄连 生地 甘草 木通

【主治】心热口苦。

12676 黄连泻心汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】姜黄连 甘草 生地 归尾 赤芍 木通 连翘 防风 荆芥

【主治】舌心疮。

12677 黄连定厥汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】黄连二钱 当归五钱 麦冬五钱 玄参一两 贝母三钱 菖蒲五分

【用法】水煎服。

【主治】阳厥。日间忽然发热，一时厥去，手足冰冷，语言惶惑，痰迷心窍，头晕眼昏。

12678 黄连降火汤

【方源】《费伯雄医案》。

【组成】川连（酒炒）八分 生军三钱 玄明粉二钱 连翘二钱 山栀三钱 赤芍二钱 谷精珠三钱 菊花二钱 夏枯穗三钱 桑皮叶各二钱 丹皮二钱 玄参二钱 竹叶三十张 灯心尺许 黑荆一钱 芦根一两 白蔻仁一粒

【主治】眼大角红，为实火，肿痛，眵泪多。

12679 黄连栀子汤

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】黄芩 黄连 栀子 降香 神曲 木香 槟榔 川芎 香附 芒消

【用法】水煎，加姜汁、童便服。

【主治】心膈疼。

12680 黄连厚朴汤

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】黄连八分 厚朴（制） 阿胶 当归各六分 艾叶 黄柏各四分 干姜五分

【用法】上为细末。每服方寸匕，空心以米饮调下，每日三次；或水煎服。

【主治】妊娠腹痛，下痢脓血不止。

12681 黄连点眼方

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】黄连（去须，捣末）半两

【用法】上以生竹筒一个，留节，可长六七寸，以水二大合，将黄连末用新绵裹，纳竹筒中，著古铜钱一文，盖筒口，于炊饭甑中密盖之，待下馈即取出，以绵滤过，候冷，纳瓶中。每以铜箸点少许，著目眦头，每日三次，不可过多，一两日愈；若治眼暗，不过一七日愈。

【主治】热毒乘肝，上冲于目，推眵赤肿，碜涩

疼痛。

12682 黄连胃风汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】人参 白术 茯苓 川芎 当归 芍药 木香 黄连 官桂 粟米

【用法】水煎服。

【主治】下血人虚者。

【加减】脓多，加阿胶；血多，加地榆、乌梅、炒蒲黄；血甚不止，加乌梅、椿皮、京墨；有热，加柴胡。

12683 黄连胃苓汤

【方源】《杂病广要》引《医经会元》。

【组成】川黄连（浓煎吴茱萸汤并炒）一钱 干葛一钱 赤茯苓一钱 白术一钱 猪苓七分 泽泻八分 苍术一钱 川厚朴（姜汁拌炒）七分 甘草生炙各二分 陈皮五分

【用法】水一钟半，加灯心七根，大枣一枚，食远乘热服。

【主治】受热气并食油滑热物，及饮不正气酒作泻。

12684 黄连香茹饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】黄连 香茹 扁豆 厚朴 甘草

【用法】水煎，冷服。

【主治】霍乱。身热烦渴气粗，口苦齿燥，小水短赤，因于暑也。

12685 黄连香薷汤

【方源】《奇效良方》卷五。

【异名】黄连香薷散（原书卷十三）、黄连香薷饮（《杂病源流犀烛》卷十五）。

【组成】香薷三钱 厚朴（姜制） 黄连各二钱

【用法】上先将厚朴、黄连二味，同生姜四钱，一处捣细，于银石器内慢火同炒令紫色，取起，入香薷，入水一盏，酒一盏，煎八分，去滓，用瓷器盛，于新汲水中沉令极冷服。

【主治】①《奇效良方》：伏暑伤冷，霍乱转筋，心腹撮痛，四肢厥冷。②《幼科释谜》：中暑热盛，口渴心烦，或下鲜血。

【加减】如中暑搐搦，加羌活二钱；寻常感冒燥渴，吐泻不甚重者，去黄连，只加白扁豆二钱（微炒，捶），煎，如前法服之。

【宜忌】如炒、煮药，莫犯铜铁器。

12686 黄连香薷饮

【方源】《会约》卷十二。

【组成】黄连二钱 香薷一钱半 厚朴（姜炒）一钱半 扁豆（炒）三钱（研） 茯苓一钱半 甘草一钱

【用法】水煎，热服。

【主治】阳暑中热，口干舌燥，小便赤短，身热目赤，脉洪体壮，一切实证。

【加减】如大便泻而小便短，加苍术、泽泻、萆薢（此味要重），或加木瓜；腹痛，加白芍。

12687 黄连养目膏

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】黄连六钱 当归三钱 防风二钱

【用法】水煎浓汁半碗，用丝绵滤净，加白蜜半小钟，重汤煎成膏，瓷器贮。牙簪点大眦。

【主治】风热时眼赤肿，迎风流泪，畏日羞明。

12688 黄连除湿汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】黄连 黄芩 川芎 当归 防风 苍术 厚朴 枳壳 连翘各一钱 甘草五分 大黄 朴消各二钱

【用法】水二钟，煎八分，空心服。

【主治】脏毒初起，湿热流注，肛门结肿疼痛，小水不利，大便秘结，身热口干，脉数有力，或里急后重。

12689 黄连消毒饮

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】柴胡 黄连 黄芩 连翘 防风 荆芥 羌活 川芎 白芷 桔梗（倍） 枳壳 牛蒡 射干 甘草 大黄各等分

【主治】喉痹，连头项肿。

12690 黄连消毒散

【方源】《东垣试效方》卷三。

【异名】黄连独活散（《瑞竹堂方》卷五）、黄连消毒汤（《卫生宝鉴》卷十三）、复煎散（《医方类聚》卷一七五引《居家必用》）、黄连消毒饮（《医学正传》卷六）、黄连消痈饮（《内外科百病验方大全》）。

【组成】黄连一钱 黄芩五分 黄柏五分 生地黄四分 知母四分 羌活一钱 独活四分 防风四分 藁本五分 当归尾四分 桔梗五分 黄耆二分 人参三分 甘草三分 连翘四分 苏木二分 防己五分 泽泻二分 橘皮二分

【用法】上锉，如麻豆大，都作一服。水三盏，煎至一盏半，去滓，食后温服。

【主治】脑疽，背疽，附骨疽，喉外生痈，耳疔及骨槽风等。

①《东垣试效方》：疮疡。②《卫生宝鉴》：膏粱之变，发背、脑疽始觉者。③《玉机微义》：痈疽

发于脑项，或背太阳经分，肿势外散，热毒焮发，麻木不通者，或痛而发热。④《医学正传》：附骨疽。⑤《外科枢要》：脑疽，背疽，肿焮疼痛或麻木。⑥《外科启玄》：太阳经痈疽，发于头顶脊背，焮赤肿痛及麻木不痛者。⑦《惠直堂方》：脑疽对口，及一切头上太阳经病，初患三日者；及骨槽风初起。⑧《内外科百病验方大全》：喉外生痈及耳疔。

【方论选录】 君以黄芩、黄连、黄柏、生地黄、知母酒制之，本经羌活、独活、防风、藁本、防己、当归、连翘以解结；黄耆、人参、甘草配诸苦寒者三之一，多则滋营气、补土也；生甘草泻肾之水，补下焦元气；人参、橘皮以补胃气；当归尾去恶血；生地黄、当归身补血；酒制汉防己除膀胱留热；泽泻助秋去酒之湿热；凡此诸药，必得桔梗为舟楫，乃不下沉。

【临证举例】 ①疮疡 《东垣试效方》：戊申岁，以饮酒太过，脉候沉数。九月十七日至真定，脑之下、顶之上出小疮，不痛不痒，谓是白疮，漫不加省。是夜宿睡善甫家，二日后觉微痛，见国医李公明之，不之问，几三见之，终不以为言。又二日，脑项麻木，肿势外散，热毒焮发，且闻此府刘帅者，近以脑疽物故，便疑之。三日间，痛大作，夜不复得寐。二十二日请镇之疡医，遂处五香连翘；明日再往，又请同门一医共视之，云：此疽也；然而不可连疗。十八日得脓，俟脓出用药，或砭刺，三月乃可平，四月如故。予记医经：凡疮见脓，九死一生；果如二子言，则当有束手待毙之悔矣。乃诣姨兄韩参谋彦俊家，请明之诊视。明之见疮，谈笑如平时，且谓予言：疮固恶，子当恃我，无忧恐耳。膏粱之变，不当投五香，五香已无及，且疽已八日，当先用火攻之策，然后用药。午后以大艾炷如两核许者攻之，至百壮，乃痛觉。次为处方云，是足太阳膀胱之经，其病逆，当反治。脉中得弦紧，按之洪大而数，又且有力，必当伏其所主，而先其所因；其始则同，其终则异，可使破积，可使溃坚，可使气和，可使必己。必先岁气，无伐天和。以时言之，可收不可汗；经与病禁下，法当结者散之，威以软之。然寒受邪而禁威，诸苦寒为君；为用甘寒为佐；酒热为引，用为使；以辛温和血，大辛以解结，为臣。三辛三甘益元气而和血脉，淡渗以导酒湿，扶持秋令，以益气泻火；以人本经之药和血，且为引用，既以通经，以为主用。投剂之后，疽当不痛不折，精气大旺，饮啖进，形体健。予如言服之，药后投床大鼾，日出乃寤，以手扪疮，肿减七八，予疑疮透候，遽邀明之视之，明之惊喜曰：疮平矣。屈指记曰，不五七日作痂子，可出门矣。②附骨疽《医学正传》：一老人年七十，因寒湿地气，得附骨疽于左腿外侧少阳胆经之分，微浸足阳明经分，阔六七寸，长一小尺，坚硬漫肿，不辨肉色皮泽，但行步作痛，以指按至骨，大痛。与此药一服即止。次日坚软肿消而愈。

【备考】 本方方名，《医学正传》引作“升阳益胃汤”、“升阳益胃散”。

12691 黄连消暑丸

【方源】《医方集解》。

【组成】 消暑丸（半夏、茯苓、甘草）一两 黄连二钱

【主治】 伏暑烦渴而多热痰。

12692 黄连消痞丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】 黄连 黄芩各六钱 枳实五钱 半夏四钱 姜黄 白术 泽泻各三钱 人参 陈皮 厚朴各二钱 猪苓一钱半 砂仁 干姜 神曲 甘草各一钱

【用法】 蒸饼为丸。每服一百丸，以汤送下。

【主治】 热痞，脉数，烦渴。

12693 黄连黄耆丸

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】 黄耆 黄连 熟干地黄 牡蛎 鹿茸各一两 白茯苓 土瓜根 玄参 地骨皮 龙骨 人参 桑螵蛸 五味子各三分 麦门冬二两 菟爽半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食前以米饮送下。

【主治】 消肾。小便白浊，四肢羸瘦，渐至困乏。

12694 黄连救苦汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 黄连 升麻 葛根 柴胡 赤芍 川芎 归尾 连翘 桔梗 黄芩 羌活 防风 金银花 甘草节各一钱

【用法】 水二碗，煎八分，临服人酒一杯，食后服。

【主治】 ①《外科正宗》：脑疽、发鬓、发颐及天行时毒，初起憎寒壮热，头面耳项俱肿。②《嵩崖尊生》：对口疽，初起寒热发肿。

12695 黄连猪肚丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【异名】 猪肚丸（《妇人良方》卷六）

【组成】 黄连三两（去须） 人参一两（去芦头） 赤茯苓一两 黄耆一两（锉） 木香半两 鳖甲一两半（涂醋，炙令黄，去裙襕） 柴胡一两（去苗） 地骨皮半两 桃仁一两半（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】 上为细散。用好嫩猪肚一枚，净洗后，将前药末安猪肚内，以线缝合，蒸令烂熟，砂盆内研令如膏，为丸如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】 妇人热劳羸瘦。

12696 黄连猪肚丸

【方源】《得效》卷七。

【组成】 猪肚一枚（治如食法） 黄连（去芦） 小麦（炒）各五两 天花粉 茯神（去木）各四两 麦门冬（去心）二两

【用法】 上为末，纳猪肚中缝塞，安甑中，蒸之极烂，木臼小杵，为丸如梧桐子大。每服七十丸，以米饮送下，随意服之。如不能丸，入少炼蜜。

【主治】 强中消渴，已服栝楼散、荠苨汤者。

12697 黄连清气散

【方源】《摄生众妙方》卷四。

【组成】 羌活 独活 柴胡 前胡 防风 黄芩 黄连各一钱五分 川芎 茯苓 桔梗 枳壳各一钱半 荆芥八分 甘草四分

【用法】 水一钟半，煎服。

【主治】 风热上攻，头目不清。

12698 黄连清火汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】 黄连五分 玄参一钱五分 归尾一钱五分 赤芍一钱 丹皮一钱五分 贝母二钱 荆芥一钱 防风一钱 桑叶一钱 蝉衣一钱 前胡一钱 菊花二钱 竹叶十张 灯心三尺 芝麻三钱

【主治】 风火盛，目睛红肿，眵泪多而目中如有沙子者。

12699 黄连清心饮

【方源】《内经拾遗》卷二。

【异名】 黄连清心汤（《古今医鉴》卷八）。

【组成】 黄连 生地（酒洗） 归身（酒洗） 甘草（炙） 茯神（去木） 酸枣仁 远志（去骨） 人参（去芦） 石莲肉（去壳）

【用法】 水二钟，煎八分，食后服。

【主治】 白淫，遗精，精滑。

①《内经拾遗》：白淫。②《医学入门》：心有所慕而遗者。③《杂病源流犀烛》：精滑。

【备考】《观聚方要补》有川楝子。

12700 黄连清肺饮

【方源】《类证治裁》卷六。

【组成】 黄连 山栀 豆豉

【功用】 清解。

【主治】 鼻塞属肺火盛者。

12701 黄连清喉饮

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】 川连一钱 桔梗 牛蒡子（炒） 玄参 赤芍 荆芥各一钱五分 甘草一钱 连翘 黄芩 天花粉 射干 防风各一钱五分

【用法】 水煎，热服。

【主治】 喉痈。喉间红肿疼痛。

【备考】 此方治喉痈实火证也。但喉病实火者少，虚火者多，不可轻试。若寒，必先投苏子利喉汤一、二剂，不应，且有口干便秘烦热之证，方可用之。

12702 黄连清膈丸

【方源】《内外伤辨》卷中。

【组成】 麦门冬（去心）一两 黄连（去须）五钱 鼠尾黄芩（净刮）三钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三十丸，食后以温水送下。

【主治】 心肺间有热及经中热。

12703 黄连温胆汤

【方源】《六因条辨》卷上。

【组成】 温胆汤加黄连

【用法】 水煎服。

【主治】 伤暑汗出，身不大热，烦闭欲呕，舌黄腻。

【临证举例】 ①心惊胆怯 《继志堂医案》：湿热生痰，留于手足少阳之府，累及心包，心惊胆怯，性急善忘，多虑多思，舌苔浊腻带黄，胸脘内热。清化为宜。黄连温胆汤加洋参，枇杷叶。②精神分裂症 《江西中医药》（1983；2:49）：杨姓，男，43岁，干部。80年4月7日就诊。十年前，因私怨，心怀忧郁致神志异常，悲伤哭泣之症每年发作四月余，用过各种镇静药均未控制发作或缩短发作时间。予黄连温胆汤加菊花、白蒺藜、朱麦冬，前后共服十一剂，诸证悉除，以健脾养心之法善后调理。③不寐 《吉林中医药》（1986；6:19）：付某某，女，42岁，干部。1979年5月14日初诊。半月前，因事争吵后夜卧不宁，心烦不安，服药无效。治以清肝豁痰安神，予黄连温胆汤加珍珠母、夜交藤，水煎服。3剂后每晚能睡3～4小时；前方加栀子，10剂后，诸症悉和，睡眠正常。随访

三年，未复发。④口甘 《吉林中医药》(1986；6：19)：张某某，女，33岁，打字员。1980年7月24日初诊。口中甜腻，食无味，胃脘灼热嘈杂已月余。诊见：形瘦，面色萎黄，胸脘闷，舌边齿痕，苔黄，脉弦滑。证由痰热浊邪上泛所致。方用黄连温胆汤加薏仁、佩兰、石菖蒲，水煎服。6剂后，口甘减；原方加白术，15剂后诸证皆除。

12704 黄连解毒汤

【方源】 方出《肘后方》卷二，名见《外台》卷一引《崔氏方》。

【异名】 解毒汤(《保命集》卷中)、火剂汤(《脉因证治》卷上)、黄连黄柏汤(《伤寒总病论》卷三)、既济解毒汤(《医方类聚》卷五十六引《修月鲁般经》)、三黄解毒汤(《外科十法》)、三黄汤(《不居集·下集》卷四)。

【组成】 黄连三两 黄柏 黄芩各二两 栀子十四枚。

【用法】 水六升，煎取二升，分二次服。

【主治】 一切实热火毒之证，三焦热盛。症见大热烦躁，口燥咽干，目赤睛痛，错语不眠；或热病吐血、衄血、便血，甚或发斑；外科痈疽疮疡。现亦用于胆道感染、脓疱疮、湿疹等属于实热火毒壅盛者。

①《肘后方》：烦呕不得眠。②《外台》引《崔氏方》：大热盛，苦烦闷，干呕，口燥，呻吟，错语不得卧。②《外科发挥》：流注、积热疮疡，焮肿作痛，烦躁饮冷，脉洪数或口舌生疮，或疫毒发狂。④《医统》：一切火热毒，狂躁烦心，口燥舌干，热势之甚者，及吐下后，热不解面脉洪，喘急，郑声目赤，睛痛。⑤《医方考》：阳毒，上窍出血，里热壅盛者。⑥《幼幼集成》：吐血，并便前下血；麻疹出后，仍发热烦躁，麻未出尽。⑦《医林纂要》：丹毒有热甚速甚者，初发头角或脑后，不一时流走耳前后，又不一时流及肩膊，若流入腹内，则不可救。⑧《痘麻绀珠》：痘疮夹疹夹痧。⑨《疡科遗编》：疳疮初起，阳物痛痒、坚硬、色紫腐烂，血水淋漓。

【宜忌】 《外台》引《崔氏方》：忌猪肉、冷水。

【方论选录】 ①《医方考》：用黄连泻心火，黄芩泻肺肝之火，黄柏泻肾火，栀子泻上下之火。②《医方集解》：此手足阳明、手少阳药也。三焦积热，邪火妄行，故用黄芩泻肺火于上焦，黄连泻脾火于中焦，黄柏泻肾火于下焦，栀子泻三焦之火从膀胱出。盖阳盛则阴衰，火盛则水衰，故用大苦大寒之药，抑阳而扶阴，泻其亢甚之火，而救其欲绝之水也，然非实热不可轻投。③《删补名医方论》：君以黄连直解心经火毒也，黄芩泻肺经火毒，黄柏泻肾经火毒，栀子通泻下焦火毒，使诸火毒从膀胱出。

【临证举例】 ①反胃《生生堂治验》：间街五条比大坂屋德兵卫之妻，年二十有六，月事不常，朝食辄吐之暮，暮食则吐之朝，每吐上气烦热，头痛、眩晕，时医或以为翻胃治之，曾无寸效，其面色焰焰，而脉沉实，心下至小腹拘挛，而所按尽痛。先生曰，有一方可以治矣，乃与黄连解毒汤三贴，前症颇愈，后数日，卒然腹痛，泻下如块，月事寻顺也，三旬复旧。②胆道感染《浙江中医药》(1977；2：33)：郑某某，男，35岁，农民，1974年5月3日初诊。诉右上腹持续疼痛，痛连右肩，发热，干呕，目微黄腻，脉象弦数。既往曾患胆囊炎，症属肝胆湿热。治以清热利胆，方用黄连解毒汤加枳壳、广木香、大黄（后下）、茵陈。3剂后腹痛减轻，大便日解二次，原方去大黄，继服3剂，诸症缓解。③肠热脱肛《浙江中医药》(1977；2：33)：徐某某，男，4岁，1975年3月1日初诊。脱肛已年许，每次便后肛门脱出，曾服补中益气汤无效，症属脾胃积热，下注大肠，治拟黄连解毒汤加地榆、枳壳，服药7剂后，脱肛已愈，诸症消失。④小儿流涎《浙江中医药》(1977；2：33)：徐某某，男，4岁，1974年5月16日初诊。据其母诉，口角流涎，经久不止，下颏糜烂，环唇红肿，涎水渍襟，污染衣被，舌红，尿赤。治用黄连、黄芩、甘草各一钱，栀子、茵陈各二钱。五剂即见流涎减少，唇红消退，继服五剂而愈。⑤幼儿湿疹《浙江中医药》(1977；2：34)：某某，男，产下月余。额头湿水浸淫，面部脓痂成片，耳颈皮肤红赤，烦躁多啼，尿赤。内服黄连解毒汤、每日1剂；外用黄柏、滑石、煅石膏、青黛研细末敷患处，服药四剂而愈。⑥脓疱疮《浙江中医药》(1977；2：34)：徐某某，男，6岁，1974年4月26日初诊。皮肤丘疹抓痒，感染成疮，脓疱疮臀部较多，四肢也发，脉数。治拟清热解毒，黄连解毒汤加银花、连翘，5剂愈。

【现代研究】 ①抗病原微生物作用 《中医杂志》(1958；10：704)：黄连解毒汤具显著的抗菌作用。且难于形成耐药性。对单味黄连产生耐药性的细菌，可在原抑菌浓度的32倍环境中生长，但对黄连解毒汤耐药者，仅能子4倍抑菌浓度生长。《中成药研究》(1986；12：39)：黄连解毒汤对金黄色葡萄球菌所致小鼠腹腔感染也有保护作用，能降低

死亡率。试验表明：以本方煎剂25g/kg灌服，对照组死亡率为90%，本方死亡率仅30%。②抗细菌毒素作用 《全国中医内科急症治疗学术交流会论文集》285页（1979；12）黄连解毒汤对内毒素发热有对抗作用，还能对抗内毒素所致低血糖症和体温的严重降低，并可使内毒素血症时肾、脑等重要生命脏器的营养性血流量增加，炎性细胞吞噬异物活性下降的幅度减少，并能降低内毒素所致大、小鼠的休克死亡率。此外，黄芩还能显著对抗内毒素所致实验动物全身性急性DIC，对多种化学毒物也有显著解毒效果。③解热作用《中药通报》（1986；1:51）：黄连解毒汤具显著的解热效果，对内毒素所致家兔发热，黄连解毒汤的解热作用起效较慢，但持续时间长，给药后6小时发热兔体温仍继续下降。④抗炎作用及对免疫功能的影响 《四川医学院学报》（1959；1:55、1960；1:13）黄连解毒汤有显著抗炎效果，脓毒败血症患者服药后，可见其白细胞吞噬作用加强。黄连解毒汤还能增强小鼠及兔网状内皮系统的吞噬活性，其增强吞噬效果与黄连及黄连解毒汤对细菌毒素形成及抗毒作用密切有关。⑤降压作用及对血液系统和心血管系统的影响《国外医学·中医中药分册》（1981；1:56）：黄连解毒汤的降压作用以黄连、黄柏为最强，去黄连、黄柏后作用消失，但本方去黄芩后作用最强，单去黄连则出现快速耐受性。其降压机制不是通过对末梢的乙酰胆碱及儿茶酚胺的影响，但能增强乙酰胆碱的作用。《汉方医学》（1986；8:17）：对实验性轻～中度高血压大鼠，每日给予本方1g/kg，可见明显的降压效果，作用迅速，给药翌日即可使血压下降，5～7日即能使血压恢复正常。本方的特点是仅使过高的血压降至正常，而不会使其降至正常水平以下，这与许多降压西药不同，此外，本方可使脑卒中易发性大鼠的脑卒中发作减少。⑥止血作用 《汉方医学》（1982；3:13）：本方对热盛之出血有良效，对Ⅷ因子、Ⅸ因子等内凝因子有活性，家兔凝血酶原时间测定表明对外凝系统无影响。对于双香豆素（华法令）所致小鼠出血死亡，黄连解毒汤可明显延缓死亡时间。本方有一定促凝止血效果。⑦对肾上腺皮质功能的影响 《中药方剂近代研究及临床应用》：实验结果表明，黄连解毒汤中黄连、黄柏中所含的小檗碱，能明显兴奋垂体——肾上腺皮质系统，因而认为此作用在临床疗效上可能具有一定意义。

12705 黄连解毒汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 黄连 黄芩 黄柏 栀子各二钱 柴胡 连翘各二钱

【用法】 上锉一剂。水煎，温服。

【主治】 ①《回春》：伤寒大热不止，烦躁干呕，口渴喘满，阳厥极深，蓄热内甚，及汗叶下后，寒凉不能退其热者。②《医学正印》：嗜酒不育，脉六部洪大，重按则觉微细无力者。

12706 黄连解毒散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 黄连 黄芩 黑参 龙胆草 荆芥 栀子 天花粉 茵陈 生地黄 车前子 桔梗 连翘

【用法】 水煎，加童便三盏，温服。

【主治】 酒毒所致白睛黄赤。

12707 黄连熟艾汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】 黄连 黄柏各一两半 龙骨一两 熟艾两鸡子大

【用法】 上㕮咀。水四升，煮一升二合，去滓，分减温服。

【功用】 除热止痢。

【主治】 伤寒四日而大下，热利时作，白通诸药多不得止者。

12708 黄连磨积丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】 黄连一两（纳五钱吴茱萸同炒，五钱益智仁同炒，去二味不用，只用黄连） 栀子仁（炒，去朽） 白芥子（醋浸炒）各五钱 川芎 苍术（米泔浸七日） 桃仁（去皮，存尖） 青皮（去瓤） 香附子（童便浸，炒） 莪术（酒浸炒） 山楂肉 莱菔子（炒，研） 白术各一两 三棱（用西安府者）各一两五钱

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，以白汤送下。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：破结磨坚，行气活血，消除积瘕。

【主治】 一切痰饮痰积，积聚拂郁，胁下闷懑，懒惰，饮食不消，或吐逆恶心，眩晕怔忡，时作时止。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：忌热物，孕妇忌服。

12709 黄金化毒汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 黄连五分 金银花二钱 赤芍一钱 丹皮二钱 连翘一钱五分 大贝二钱 花粉二钱 菊花二钱 薄荷一钱 甘草五分 淡竹叶二十片

【主治】 痈疡初起，肿痛大热，烦渴引饮。

12710 黄柏红升散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 黄柏 62 克 煅石膏 62 克 轻粉 12 克 红升丹 12 克 枯矾 6 克

【用法】 上为细末。豆油调，外敷。

【主治】 黄水疮。

12711 黄耆十补汤

【方源】《直指》卷九。

【组成】 黄耆（蜜炙） 当归（酒浸，焙） 熟地黄（洗） 茯神各半两 白芍药一两 人参 白术 酸枣仁（微炒） 半夏（制） 陈皮 北五味子 肉桂 天台乌药 甘草（炙） 麦门冬（去心）各一分 木香 沉香各一钱

【用法】 上锉。每服三钱，加生姜五片，大枣二枚，食前煎服。

【功用】 补虚劳，养血气。

12712 黄耆人参汤

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】 黄耆 人参 半夏 陈橘皮 麦门冬 当归 赤茯苓各半两

【用法】 上为粗末。每服四钱，水二盏，加生姜三片，煎七分，去滓，下阿胶末一小匕。温与之，每日三四次。

【功用】 安胎。

【主治】 妊娠伤寒，服汗下诸药，热已退，觉气虚不和者。

12713 黄耆人参汤

【方源】《脾胃论》卷中。

【组成】 黄耆一钱（如自汗过多，更加一钱） 升麻六分 人参（去芦） 橘皮（不去白） 麦门冬（去心） 苍术（无汗更加五分） 白术各五分 黄柏（酒洗） 炒曲各三分 当归身（酒洗） 炙甘草各二分 五味子九个

【用法】 上㕮咀，都作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食远或空心稍热服。

【功用】 助元气，理治庚辛之不足。

【主治】 ①《脾胃论》：脾胃虚弱，上焦之气不足，遇夏天气热盛，损伤元气，怠惰嗜卧，四肢不收，精神不足，两脚痿软，遇早晚寒厥，日高之后阳气将旺，复热如火，乃阴阳气血俱不足，故或热厥而阴虚，或寒厥而气虚，口不知味，目中溜火，而视物眩眩无所见，小便频数，大便难而结秘，胃脘当心而痛，两胁痛或急缩，脐下周围如绳束之急，甚则如刀刺，腹难舒伸，胸中闭塞，时显呕哕，或有痰嗽，口沃白沫，舌强，腰、背、胛眼皆痛，头痛时作，食不下，或食入即饱，全不思食，自汗尤甚，若阴气覆在皮毛之上，皆天气之热助本病也，乃庚大肠、辛肺金为热所乘而作。②《痈疽神秘验方》：痈疽脓血大泄，败臭痛甚者，及溃后虚而发热或作痛，少寐。

【宜忌】 忌酒、湿面、大料物之类及过食冷物。

【加减】 如心下痞闷，加黄连二分或三分；如胃脘当心痛，减大寒药，加草豆蔻仁五分；如胁下痛或缩急，加柴胡二分或三分；如头痛，目中溜火，加黄连二分或三分，川芎三分；如头痛，目不清利，上壅上热，加蔓荆子、川芎各三分，藁本、生地黄各二分，细辛一分；如气短，精神如梦寐之间，困乏无力，加五味子九个；如大便涩滞，隔一二日不见者，致食少，食不下，血少，血中伏火而不得润也，加当归身、生地黄、麻子仁泥各五分，桃仁三枚（汤泡去皮尖，另研），如大便通行，所加之药勿再服；如大便又不快利，勿用别药，少加大黄（煨）五分；如不利者，非血结血秘而不通也，是热则生风，其病人必显风证，单血药不可复加之，止常服黄耆人参汤药，只用羌活、防风各五钱，二味㕮咀，以水四盏，煎至一盏，去滓，空心服之，其大便必大走也，一服便止；如胸中气滞，加青皮（皮薄清香可爱者）一分或二分，并去白橘皮倍之，去其邪气，此病本元气不足，惟当补元气，不当泻之；如气滞太甚，或补药太过，或病人心下有忧滞郁结之事，更加木香、缩砂仁各二分或三分，白豆蔻二分，与正药同煎；如腹痛、不恶寒者，加白芍药五分，黄芩二分，却减五味子。

12714 黄耆人参汤

【方源】《证治汇补》卷七。

【组成】 黄耆 人参 白术 陈皮 甘草 当归 麦冬 五味 生地 黄柏 熟地 天冬

【主治】 煎厥。

12715 黄耆人参汤

【方源】《医略六书》卷二十四。

【组成】 人参一钱半 黄耆三钱（蜜炙） 生地五钱 熟地五钱 麦冬二钱（去心） 五味一钱半 天冬三钱（去心） 黄柏一钱半（盐水炒） 炙草一钱半

【用法】 水煎，去滓，温服。

【主治】 气虚阴火发厥，脉软数者。

【方论选录】 元气虚衰，不能收摄阴火，而神明失其主宰，故昏昧无知，卒仆发厥焉。人参扶元气以摄火，黄耆补中气以退热，生地滋阴壮水，熟地

滋肾补阴，麦冬清心润肺，天冬润肺益阴，五味子收耗亡之气，炙甘草缓上炎之火，黄柏以清相火之上逆也。使阴火下潜，则元阴完复，而神志清灵，虚热无不退矣。此补气摄火之剂，为气虚火厥之专方。

12716 黄耆九物汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】黄耆二钱 防风一钱 党参五钱 茯苓二钱 白术一钱 鹿胶一钱五分（角霜炒） 独活一钱（酒炒） 牛膝二钱 甘草五分 大枣二枚 生姜三片

【主治】中风。半身不遂，手足弛纵，食少神疲，不能步履，属气虚者。

12717 黄耆五两汤

【方源】《鸡峰》卷十九。

【异名】黄耆建中汤（《易简》）、黄耆建中散（《济阴纲目》卷十三）。

【组成】黄耆五两 白芍药 桂 甘草各三两

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜七片，大枣一枚，同煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】黄汗。

12718 黄耆内托散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎 当归 黄耆各二钱 白术 金银花 天花粉 皂角针各一钱 甘草 泽泻各五分

【用法】水二盅，煎八分，食前服。

【主治】鱼口、便毒、横痃等症已成，不得内消者。

12719 黄耆内托散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】黄耆 当归 川芎 厚朴 桔梗 防风 甘草 人参 白芍各五分 肉桂三分

【用法】上为末，温酒服。

【主治】老弱人患发颐，不可全用攻泻者。

12720 黄耆六一汤

【方源】《局方》卷五（宝庆新增方）。

【异名】黄耆汤（《普济方》卷二二九）、黄耆饮（《证治要诀类方》卷二）。

【组成】黄耆（去芦，蜜炙）六两 甘草（炙）一两

【用法】上㕮咀。每服二钱，水一盏，大枣一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】平补气血，安和脏腑。

【主治】气虚津伤，肢体劳倦，口常干渴，面色萎黄，不思饮食；或先渴而后生疮疖，或患痈疽之后而口渴；或卫虚自汗；或痔漏脓水不绝。

①《局方》（宝庆新增方）：男子妇人诸虚不足，肢体劳倦，胸中烦悸，时常焦渴，唇口干燥，面色萎黄，不能饮食，或先渴而欲发疮疖，或病痈疽而后渴者。②《丹溪心法》：盗汗虚者。③《疮疡经验全书》：疮疡溃后，虚汗如雨不止。④《医学正传》：三消、痈疽发渴。⑤《外科大成》：痔漏漏孔穿开，脓水不绝者。⑥《张氏医通》：卫虚自汗，昼日烦热。

12721 黄耆六一汤

【方源】《直指》卷九。

【组成】黄耆（炙）六钱 甘草（炙）一钱 白术 白芍药各三钱

【用法】上为粗末。每服二钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】虚劳自汗。

12722 黄耆六一汤

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】黄耆 当归 甘草各等分

【用法】上㕮咀。水一盏，加生姜、大枣，水煎，空心服。

【主治】风湿相搏，肌肉瞤动。

【备考】本方治上症，宜先服渗湿汤，次用是药。

12723 黄耆六一汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】黄耆（半生，半蜜水炒）六钱 甘草（半生，半炙）一钱五分 人参一钱

【用法】水二钟，煎八分，食远服。

【主治】流注溃后，脓水出多，口干作渴，烦躁不宁。

12724 黄耆甘草汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】黄耆四两（生） 甘草八钱

【用法】水煎服。病重一日两付。

【主治】老年溺尿，玉茎痛如刀割，不论年月深久。

12725 黄耆四君汤

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【异名】黄耆四君子汤（《普济方》卷二九六）。

【组成】四君汤加黄耆 白扁豆

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】五痔下血。

12726 黄耆四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十三。

【组成】 黄耆（蜜炒） 当归 川芎 熟地黄各等分

【用法】 上锉，每服四钱，水煎服。

【主治】 ①《济阴纲目》：产后虚羸。②《会约》：产后气血虚弱。

【加减】 气虚，加参、术、茯苓、甘草；发热，加干姜；自汗多者，少用川芎，勿用茯苓，倍加蜜炙黄耆；口渴，加五味子、麦门冬；腹痛者，非白芍不可，虽新产亦用，但以酒炒不妨。

12727 黄耆生地汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十。

【组成】 麻黄二钱（先煎去沫方入） 黄耆一钱 白术 人参 柴胡 防风 生地各五分 羌活 黄柏各一钱 甘草三分 杏仁三个

【用法】 临卧服。

【主治】 风湿。阳气不升，四肢倦怠，走注身痛，阴室中汗出，懒语。

12728 黄耆白术汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 黄耆白术散(《普济方》卷三二八)。

【组成】 细辛三分 吴茱萸 川芎各五分 柴胡 升麻各一钱 当归身一钱五分 黄柏（酒洗） 炙甘草 羌活各二钱 五味子三钱 白术 人参各五钱 黄耆一两

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水二大盏，加生姜五片，煎至一盏，去滓，食前热服。

【主治】 妇人四肢沉重，自汗，上至头，际头而还，恶风，头痛躁热。

【加减】 如腹中痛不快，加炙甘草一钱；汗出不止，加黄柏一钱。

12729 黄耆芍药汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】 黄耆（锉） 人参各一两 芍药 桂（去粗皮） 五味子各三分 白术半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入生姜三片，大枣二枚（去核），同煎至六分，去滓，空心食前温服。

【主治】 伤寒后，气血不复，虚羸。

12730 黄耆芍药汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 黄耆三两 甘草（炙）二两 升麻 葛根 白芍药各一两 羌活半两

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水煎，温服。

【主治】 ①《兰室秘藏》：衄血多岁，面黄，眼涩多眵，手麻。②《济阳纲目》：湿，身重，卧起不能。

12731 黄耆托里汤

【方源】《疡科选粹》卷四。

【组成】 黄耆 甘草 当归身 升麻 葛根 漏芦 连翘 防风 瓜蒌仁 黏粘子 皂角刺 白芷 川芎 肉桂 炒柏

【用法】 水一盏，入酒一盏，煎服。

【功用】 解毒补血益气。

【主治】 乳岩溃烂。

【方论选录】《医钞类编》：黄耆之甘温以排脓益气生肌，为君；甘草补胃气解毒，当归和血生血，为臣；升麻、葛根、漏芦为足阳明本经药；连翘、防风、瓜蒌仁、牛子解毒去肿，皂刺引至患处，白芷入阳明排脓长肌，川芎、肉桂、炒柏为引。

12732 黄耆当归丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 人参三两 黄耆五两（蜜炙） 白术三两（制） 当归三两 白芍一两半（炒） 陈皮一两半 炙草一两半 猪脬一具

【用法】 上为末，煮猪脬捣烂为丸。每服五钱，以淡盐汤送下。

【主治】 遗溺，脉软者。

【方论选录】 产后脾肺气亏，清阳不振，无以统摄津液，故小便遗失不知焉。人参扶元气以补肺，黄耆补中气以壮脾；白术健脾土，力能统摄津液；陈皮和中气，更能调和脾胃；当归养血荣经脉，白芍敛阴固经脉；炙草缓中益胃气也。煮猪脬捣为丸，盐汤下，使脾肺气充，则脬气亦厚，而水府蓄泄有权，岂有小便遗失不知之患乎。

12733 黄耆当归汤

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【异名】 黄耆当归散(《金鉴》卷四十八)。

【组成】 黄耆 归身尾 芍药各一钱半 白术一钱 人参 陈皮各五分 甘草（炙）少许

【用法】 水煎，热服。

【主治】 妇人产后尿不禁，面微浮，略发热子午后，此膀胱为坐婆所伤。

12734 黄耆竹叶汤

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】 黄耆 甘草 麦门冬 黄芩 芍药各三两 当归 人参 石膏 芎劳 半夏各二两 生姜五两 生地黄八两 大枣三十枚 淡竹叶一握

【用法】 上㕮咀。以水一斗二升，先煮竹叶，取二升，去滓，纳药煮取三升，分四服，相去如人行

三十里间食，每日二次，夜一次。

【主治】 ①《千金》：痈疽发背。②《简明医彀》：痈疽气血虚，胃火盛，而作渴干呕。

【宜忌】 《外台》：忌海藻、菘菜、羊肉、饧。

12735 黄耆防风汤

【方源】 《医说》卷一引许胤宗方。

【异名】 珊瑚蒸(《申雅外篇》卷二)。

【组成】 黄耆 防风

【用法】 数十斛置于床下熏蒸。

【主治】 感风不能言，脉沉而紧。

【临证举例】 感风不能言 许胤宗，常州义兴人，初仕陈，为新蔡王外兵参军，时柳太后感风不能言，脉益沉而噤。胤宗曰：口不下药，宜以汤气蒸之，令药入腠理，周时可愈。遂造黄耆防风汤数十斛置于床下，气如烟雾。如其言，便得语。由是超释义太守。

12736 黄耆防风汤

【方源】 《医林改错》卷下。

【组成】 黄耆四两（生） 防风一钱

【用法】 水煎服。小儿减半。

【主治】 脱肛，不论十年八年。

12737 黄耆赤风汤

【方源】 《医林改错》卷下。

【组成】 黄耆二两（生） 赤芍一钱 防风一钱

【用法】 水煎服。小儿减半。治瘫腿，多用一分，服后以腿自动为准，不可再多。

【主治】 瘫腿，诸疮诸病，或因病虚弱。

【临证举例】 ①三叉神经痛 《中医药学报》(1984；5:56)：李某某，女，53岁，工人，1980年12月6日来诊。有头痛史，在某医院检查诊断为"三叉神经痛"。投本方加乳香、蜈蚣。前后共服14剂，头痛完全消失，恢复原工作，嘱经常用此方加白术泡开水代茶饮，并加服补中益气丸以善后，半年后随访，未复发。②唇风 《中医药学报》(1984；5:57)：张某某，59岁，社员。患者自述下唇肿痛及灼热感已半年，诊为"唇风"。投黄耆赤风汤加虫退、乳香，水煎服。外用鸡蛋清调冰片、黄连末以搽唇部。守方服至12剂后，唇颤动已完全停止，局部疼痛麻木亦消失，唇色已滑润如常。嘱患者停药服八珍丸培补气血以巩固疗效，随访至今未复发。③咀嚼肌胀痛 《中医杂志》(1981；8:70)：倪某某，男，33岁，工人。右咀嚼肌前缘咀嚼时胀痛近年，咬牙时疼痛加剧，嚼食受限，舌下痛。予黄耆赤风汤加全当归、制乳没。十剂后，病愈十之六，改加全当归、制乳没、广陈皮，续进十剂而病遂愈。

12738 黄耆束气汤

【方源】 《观聚方》卷六引《儿科方要》。

【组成】 黄耆一钱二分 白芍一钱 人参 破故纸各七分 升麻 益志仁各五分 五味三分 薄桂二分

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 气虚遗溺。

12739 黄耆补中汤

【方源】 《医学发明》卷一。

【组成】 黄耆一钱 人参八分 炙甘草 白术 苍术 橘皮各半两 泽泻 猪苓 茯苓各三分

【用法】 上㕮咀，都作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，大温送下消痞丸。

【主治】 ①《医学发明》：一切心下痞闷，及积年久不愈者。②《赤水玄珠》：脾胃不能渗湿，内痞外浮。

【备考】 《嵩崖尊生》有升麻、柴胡。

12740 黄耆补气汤

【方源】 《傅青主女科》卷下。

【异名】 黄耆补血汤(《辨证录》卷十二)。

【组成】 黄耆二两（生用） 当归一两（酒洗） 肉桂五分（去粗皮，研）

【用法】 水煎服。五剂愈。

【主治】 妊妇有畏寒腹疼因而堕胎者。

12741 黄耆补气汤

【方源】 《古今医彻》卷四。

【组成】 黄耆一钱半（蜜炙） 人参二钱 白术一钱半（土炒） 当归一钱 芍药一钱 炙甘草三分 茯苓一钱 肉桂五分 附子五分（制）

【用法】 加大枣二枚，煨姜一片，水煎服。

【主治】 产后去血过多，自汗体倦。

12742 黄耆补肺汤

【方源】 《杏苑》卷五。

【组成】 黄耆一钱五分 五味子 人参各一钱 麦门冬八分 桑白皮五分 枸杞子六分 熟地黄七分

【用法】 上㕮咀。水煎熟，不拘时候服。

【主治】 虚劳嗽血。

【加减】 本方治上症，加阿胶；如气急，加杏仁、桑白皮。

12743 黄耆固真汤

【方源】 《片玉心书》卷五。

【组成】 黄耆 人参 白术 甘草（炙） 当归 麦冬

【用法】 水煎服。

【主治】 小儿大病后，气血尚弱，液溢自汗；或潮热、或寒热发过之后，身凉自汗，日久令人黄瘦，失治则变为骨蒸痨劳。

12744 黄耆固真汤

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】 嫩黄耆一钱 官拣参五分 漂白术五分 当归身一钱 炙甘草五分 天圆肉三枚

【用法】 水煎服。

【主治】 小儿气虚自汗。

12745 黄耆建中汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 黄耆汤（《外台》卷十七引《古今录验》）。

【组成】 小建中汤加黄耆一两半

【用法】 以水七升，煮取三升，去滓，纳胶饴，更上微火消解，温服一升，每日三次。

【功用】《谦斋医学讲稿》：温养中气。

【主治】 虚劳病，阴阳气血俱虚，里急腹痛，喜温喜按，形体羸瘦，面色无华，心悸短气，自汗盗汗。现用于胃、心、肺等慢性消耗性疾患。

①《金匮》：虚劳里急诸不足。②《医统》：尺脉迟，伤寒身痛，汗后身痛脉弱。③《济阳纲目》：卫虚恶寒。④《杂病广要》：血汗出污水，甚如坏染，皆由大喜伤心，喜则气散，血随气行故也。⑤《家塾方与方极》：里急、腹皮拘急及急痛证而盗汗，或自汗者。⑥《谦斋医学讲稿》：胃虚痛，痛时常在空腹，得食或温罨缓解，伴见泛酸，畏冷喜暖，舌质淡，苔薄白，脉象沉细无力或见虚弦。

【宜忌】《外台》忌海藻、菘菜、生葱。

【方论选录】 ①《金匮要略论注》：小建中汤本取化脾中之气，而肌肉乃脾之所生也，黄耆能走肌肉而实胃气，故加之以补不足，则桂、芍所以补一身之阴阳，而黄耆、饴糖又所以补脾中之阴阳也。②《金匮要略心典》：里急者，里虚脉急，腹中当引痛也。诸不足者，阴阳诸脉并俱不足，而眩、悸、喘、喝、失精、亡血等证相因而至也。急者缓之必以甘，不足者补之必以温，充虚塞空，则黄耆尤有专长也。③《金匮要略方义》：此方乃小建中汤加黄耆而成。黄耆为补气扶弱之品，得饴糖则甘温以益气，得桂枝则温阳以化气，得白芍又有益气和营之效。综合全方，其补虚益气之功优于小建中汤。

【临证举例】 ①虚劳 《临证指南医案》：汪，三九，此劳力伤阳之劳，非酒色伤阳之劳也。胃口消惫，生气日夺，岂治嗽药可以奏功？黄耆建中汤去姜。《种福堂方》：何，三一。脐流秽水，咳嗽，腹痛欲泻。询知劳动太过，阳气受伤。三年久恙，大忌清寒治嗽，法当甘温以治之。黄耆建中汤去姜。②咳嗽《南雅堂医案》：诊得脉左细右虚，咳嗽日久，吸短如喘，肌表微热，形容渐致憔悴，虑成内损怯症，奈胃纳渐见减少，便亦带溏，若投以寒凉滋润之品，恐嗽疾未必能治，而脾胃先受损伤，岂云妥全，昔贤谓上损过脾，下损及胃，均称难治，自述近来背寒忽热，似虑先理营卫为主，宗仲师元气受损，甘药调之之例，用建中加减法。桂枝一钱，白芍药三钱，炙甘草八分，炙黄耆一钱，饴糖二钱，加大枣三枚，同煎服。③吐血 《临证指南医案》：许，四八。劳倦伤阳，形寒，失血，咳逆，中年不比少壮火亢之嗽血。黄耆建中汤。④伤寒《印机草》：病经一月，两脉虚浮，自汗恶气，此卫虚阳弱。人身之表，卫气主之。凡所以温分肉，肥腠理，司开阖者，皆此卫气之用，故《经》曰：阳者卫外而为固也。今卫气一虚，则分肉不温，腠理不密，周身毛窍，有开无合，由是风之外入，汗之内出，其孰从而拒之，用黄耆建中汤以建立中气，而温卫实表也。桂枝、生姜、芍药、甘草、大枣、饴糖、黄耆。⑤泄泻不食 《得心集医案》：胡晓鹤孝廉尊堂，素体虚弱，频年咳嗽，众称老痨不治。今春咳嗽大作，时发潮热，泄泻不食，诸医进参、术之剂，则潮热愈增，用地黄、鹿、胶之药，而泄泻胸紧尤甚。延医数手，无非脾肾两补，迨至弗效，便引劳损咳泻不治辞之。时值六月，始邀予诊，欲卜逝期，非求治也。诊之脉俱迟软，时多歇止，如徐行而息，偶羁一步之象，知为结代之脉，独左关肝部弦大不歇，有土败木贼之势。因思诸虚不足者，当补之以味，又劳者温之，损者益之，但补脾肾之法，前辙可鉴，然舍补一着，又无他法可施，因悟各脏俱虚之脉，独肝脏自盛，忽记洁古云，假令五脏胜，则各刑已胜，法当补其不胜，而泻其胜，重实其不胜，微泻其胜。此病肝木自盛，脾土不胜，法当补土制肝，直取黄耆建中汤与之。盖方中桂、芍，微泻肝木之胜；甘、糖味厚，重实脾土之不胜；久病营卫行涩，正宜姜、枣通调，而姜以制木，枣能扶土也；用黄耆补肺者，盖恐脾胃一虚，肺气先绝。连进数剂，果获起死回生，但掌心微热不除，且口苦不寐，咳泻虽止，肝木犹强，原方加入丹皮重泻肝木之胜再胜而安。⑥溃疡病《广西中医药》（1981；4:45）：用黄耆建中汤略作加减，治疗胃、十二指肠球部溃疡43例，治愈22

例，好转17例，无效4例。用药最长者为55天，最短者为25天，平均30.3天。《湖北中医杂志》(1982；3:21)：用黄耆建中汤或黄耆建中片（黄耆、炙甘草、白芍、云苓各9克，肉桂1克，煅瓦楞3克，制成浸膏片）治疗72例胃、十二指肠球部溃疡患者，治愈55例，好转14例，无效3例，总有效率为95.8%。平均溃疡愈合天数为28.9天。⑦阵发性室上性心动过速、早搏《江苏中医杂志》(1980；6:15)：顾某某，男，41岁。1967年运动时突发心速，数分钟自行缓解，后每年有多次类似发病。EKG示：阵发性室上性心动过速。每发心率均＞200次/分，发病前先有频繁早搏。1978年4月初诊，予益气建中，养心益阴之黄耆建中汤合生脉散主之，治疗一月余，诸症缓解，一般良好，患者要求配成丸药，乃将前方15帖剂量，饴糖炼丸，日服二次，每次6丸，以作较长时间调治巩固，半年后随访未再复发。⑧自汗盗汗《江苏中医》(1965；4:31)：范某某，男，18岁。患者身体素弱，形体苍瘦，面㿠欠华，近来眠则遍身汗出，衣衫皆湿，脉濡细，此卫阳失固之候，治拟扶正实表。予生黄耆四钱，川桂枝一钱，大白芍四钱，炙甘草一钱，老生姜一钱，大红枣四钱，糯稻根须三钱。上方连服五剂。汗泄得止。⑨小儿慢性支气管炎《上海中医药杂志》(1984；1:22)：张某某，女，6岁。1977年12月10初诊。咳嗽、喉鸣时轻时重反复发作4年余。两月前感寒而发，发烧、咳嗽、喘鸣，某医院诊为慢性支气管炎急性发作，给予青、链霉素及麻杏石甘汤等，药后烧退，咳喘不愈，来院求诊。拟黄耆建中汤加半夏、白术，服6剂后诸症缓解，嘱以原方加紫河车粉，3日1剂，计进28剂停药观察，追访3年未见复发。

【现代研究】 ①抗溃疡作用《药学学报》(1965；7:440)：以黄耆建中汤煎剂给大白鼠皮下注射10g/kg时，可防止结扎幽门所致胃溃疡发生，并抑制胃液分泌，减少游离酸及总酸度，使胃液pH值上升。另以本方减去甘草的煎剂皮下注射，同样也有抗溃疡作用，但作用较弱。说明黄耆建中汤除甘草外，尚有其他抗溃疡的成分。②中枢镇静作用《北京中医学院学报》(1960；3:208)：加味黄耆建中汤（本方加当归）对中枢神经系统有明显的镇静作用，可使小白鼠自由活动减少。但没有催眠和中枢的镇痛作用，对平滑肌的正常运动有抑制作用，尤其在异常兴奋状态下更为显著，有较弱对抗由组织胺引起的胃酸增高现象。认为本方的主要作用是对中枢神经的镇静及对胃肠平滑肌的解痉作用，抗酸作用可能不是主要的。

【备考】 本方改为丸剂，名“黄耆建中丸”（见《全国中药成药处方集》南昌方）。

12746 黄耆建中汤

【方源】《外台》卷十七引《必效方》。

【组成】 黄耆三两 桂心二两 人参二两 当归二两 芍药三两 生姜八两 胶饴八两 大枣三十枚

【用法】 上切。以水一斗，煮七味，取三升，去滓，下饴烊销，分三服。

【主治】 虚劳。下焦虚冷，不甚渴，小便数。

【加减】 若失精，加龙骨一两，白蔹一两。

【宜忌】 忌生葱。

12747 黄耆建中汤

【方源】《百一》卷四引陆彦安方。

【组成】 黄耆（去芦） 白术 枳壳（汤浸，去瓤） 前胡各三分 杏仁（去皮尖） 柴胡（银州者） 人参 白茯苓 甘草 当归 川芎 半夏（汤洗七次） 黄芩 白芍药 羚羊角 生地黄 麦门冬（去心）各二分

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一大盏半，加生姜四片，煎至八分，去滓，食后服，每日二次。

【主治】 虚劳有热，胸中烦，手足热，心怔忡，口苦咽干，咳嗽潮热等。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“十七味大建中汤”。

12748 黄耆建中汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】 黄耆 芍药 桂枝 胶饴 甘草 陈皮 白术

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 汗多亡阳，尺脉虚弱者。

【加减】 元气虚甚，加人参；热，加柴胡。

12749 黄耆建中汤

【方源】《医方考》卷一。

【组成】 黄耆 桂各一钱半 白芍药三钱 甘草一钱

【主治】 伤寒汗后身痛，脉迟弱者。

【方论选录】 黄耆、甘草之甘，补中气也，然桂中有辛，同用之足以益卫气而实表；芍药之酸，收阴气也，桂中有热，同用之足以利荣血而补虚。此方以建中名者，建立中气，使其生育荣卫，通行津液，则表不虚而身痛自愈矣。

12750 黄耆茵陈散

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】 黄耆一钱二分 赤芍药一钱 茵陈一钱五分 石膏 麦门冬 豆豉各八分 甘草（炙）五分

【用法】 上㕮咀。水煎熟，食前服。

【主治】 黄汗不止及黄疸。

12751 黄耆桃红汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】 黄耆八两（生） 桃仁三钱（研） 红花三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 产后抽风，两目天吊，口角流涎，项背反张，昏沉不省人事。

12752 黄耆益气汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】 黄耆一钱（蜜炒） 人参 白术 陈皮 半夏（姜汁炒） 当归（酒炒） 川芎 藁本 甘草（炙）各五分 升麻 黄柏（酒炒） 细辛各三分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，水煎服。

【主治】 气虚头痛。

12753 黄耆益气汤

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】 补中益气汤加红花 黄柏

【主治】 气虚皮痹，皮麻不知痒与疼。

【加减】 秋，加五味子；夏，加黄芩；冬，加桂枝皮。

12754 黄耆理中汤

【方源】《千金》卷二十。

【组成】 黄耆 桂心各二两 丹参 杏仁各四两 桔梗 干姜 五味子 茯苓 甘草 芎藭各三两

【用法】 上㕮咀。以水九升，煮取三升，分为三服。

【主治】 上焦虚寒，短气不续，语声不出。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜、猪肉、生葱、大醋。

【方论选录】《千金方衍义》：短气不续、语声不畅，胸中大气不足可知。故用辛温助阳散逆和荣，略入五味以收耗散之气。

12755 黄耆葛根汤

【方源】《证治汇补》卷三。

【组成】 黄耆一两 葛根五钱

【用法】 水煎服。大汗而愈。

【主治】 ①《证治汇补》：酒郁，内热恶寒。②《医略六书》：气虚人伤酒恶寒，脉微者。

【方论选录】《医略六书》：酒资湿热，得气化行，自可免于酒病焉。今气虚不能自运其湿热，故以黄耆补气，即用葛根解肌。二味成方，能使酒湿内从气化而消，外从元府而泄，安有病酒之患乎？此壮气解表之剂，为虚人伤酒恶寒之专方。

12756 黄耆鳖甲饮

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】 黄耆三钱（蜜炙） 鳖甲二钱（生，醋炙） 白芍一钱半（炒） 熟地五钱 归身二钱 麦冬三钱（去心） 茯神二钱（去木） 山药三钱（炒） 甘杞三钱 桂圆三钱（去壳、核） 大枣三枚

【用法】 水煎去滓，温服。

【主治】 虚痨羸瘦，脉软数者。

【方论选录】 血气两虚，不能营运，而蒸热不解，故渐至羸瘦，乃成虚痨焉。黄耆补气益卫，鳖甲散结滋阴；归身养血脉以荣经，白芍敛营阴以和血；熟地补阴滋血，麦冬润肺清心；茯神安神志，枸杞补髓填精；桂圆肉滋养心脾，肥大枣缓中益脾，并能资生血脉也。俾血旺气充，则营卫强壮而肌体丰腴，虚劳无不复元矣。此滋补元阴之剂，为虚劳羸弱之专方。

12757 黄耆鳖甲散

【方源】《局方》卷五（吴直阁增诸家名方）。

【异名】 黄耆鳖甲汤（《医学入门》卷八）、黄耆鳖甲煎（《金匮翼》卷三）。

【组成】 人参 肉桂（去粗皮） 苦梗各一两六钱半 生干地黄（洗，焙干）三两三钱 半夏（煮） 紫菀（去芦） 知母 赤芍药 黄耆 甘草（炙） 桑白皮各二两半 天门冬（去心，焙） 鳖甲（去裙，醋炙）各五两 秦艽（去芦） 白茯苓（焙） 地骨皮（去土） 柴胡（去芦）各三两三钱

【用法】 上为粗末。每服二大钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】 ①《局方》（吴直阁增诸家名方）：虚劳客热，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心烦热，口燥咽干，颊赤心忡，日晚潮热，夜有盗汗，胸胁不利，减食多渴，咳唾稠粘，时有脓血。②《直指》：男女虚热，身瘦，五心烦热，四肢怠惰，咳嗽咽干，自汗食少。

【方论选录】 ①《痰火点雪》：方意以黄耆治五劳羸瘦，寒热自汗，补气实表；以鳖甲治劳瘦，除骨节间劳热结实，补阴补气；以地骨皮治骨蒸烦热；以秦艽、桔梗、人参，并主传尸骨蒸，劳热自汗；桑白皮去肺中水气，及火热嗽血；以天冬除肺气，清肺热，除咳痰；以紫菀止咳脓血，消痰益肺；以生地黄治咳嗽吐血；以知母泻肺火，滋肾

水，除命门相火；以柴胡治劳热，消痰止咳；以甘草泻火养阴补脾；以茯苓补五劳七伤，肺痿痰壅等症；以白芍利肺益脾，是方也，备一十五味药品固繁，而用之亦精，犹韩信将兵，多多益善，战有不胜者乎！②《医方集解》：此手足太阴足少阳药也。鳖甲、天冬、芍、地、知母滋肾水而泻肺肝之火，以养阴也；黄耆、人参、桂、苓、甘草固卫气而补脾肺之虚，以助阳也；桑皮、桔梗以泻肺热；半夏、紫菀以理痰嗽；秦艽、地骨以散内热而除蒸；柴胡以解肌热而升阳，此表里气血交治之剂也。

12758 黄病绛矾丸

【方源】《丸散膏丹集成》。

【组成】 绛矾六两 厚朴 白术（炒焦） 茯苓各三两 枳壳（炒焦） 茅术（炒焦） 广皮各二两

【用法】 上为细末，米汤泛为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，以熟汤送下。

【主治】 湿热肠红，脱力劳伤，黄病腹胀，腿足浮肿，食积、痞块、疟痢。

12759 黄病鼓胀丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 平胃散一两 针砂三钱 皂矾六钱 车前子三钱

【用法】 上为末，红枣泥捣和为丸。每服三钱，以开水送下。

【主治】 黄病鼓胀。

【宜忌】 忌食盐、酱百天。

12760 黄雌鸡馄饨

【方源】《养老奉亲》。

【组成】 黄雌鸡肉五两 白面七两 葱白二合（切细）

【用法】 上以切肉作馄饨，下椒酱五味，调和煮熟，空心食之，每日一次。

【功用】 益脏腑，悦泽颜色。

【主治】 老人脾胃气弱，不多食，瘦瘦。

12761 黄连天花粉丸

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 黄连一两 天花粉四两 菊花 川芎 薄荷各一两 连翘二两 黄芩 栀子各四两 黄柏六两

【用法】 上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至百丸，食后、临睡以茶汤送下。

【主治】 眵多眊矇，紧涩羞明，赤脉贯睛，脏腑秘结者。

12762 黄连炉甘石散

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】 黄连甘石散（《医统》卷六十一）。

【组成】 炉甘石一斤 黄连四两 龙脑量入

【用法】 先以炉甘石置巨火中，煅通红为度；另以黄连用水一碗，瓷器盛贮，纳黄连于水内，却以通红炉甘石淬七次，就以所贮瓷器置日中晒干，然后用黄连研为细末；欲用时以一二两再研极细，旋量入龙脑。每用少许，井花水调如稠糊，临睡以箸头蘸敷破烂处；不破烂者，点眼内眦，锐眦尤佳。

【主治】 眼眶破烂，畏日羞明。

【加减】 奇经客邪之病，量加朴消泡汤滴眼瘀肉黄赤脂上。

【宜忌】 不宜使入眼内。

【方论选录】 方以炉甘石收湿除烂为君，黄连苦寒为佐，龙脑去热毒为使。诸目病者俱可用，病宜者治病，不宜者无害也。

12763 黄连清凉饮子

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】 黄连 当归 炙草 大黄（酒煎） 赤芍药各等分

【用法】 每服一两五钱，水煎服之。利下，其痛减七八，明日再进，前症悉除。

【主治】 发背疽五七日，觉疮重如负石，热如火，痛倍常，六脉沉数，按之有力。

【宜忌】 邪气酷热脉实有力者宜用。

12764 黄耆十四味丸

【方源】《外台》卷二十七引《许仁则方》。

【组成】 黄耆 黄连 土瓜根各五两 苦参三两 玄参六两 栝楼 地骨皮 龙骨 菝葜 鹿茸（炙）各四两 牡蛎（熬） 人参 桑螵蛸（炙）各三两 五味子一升

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服十五丸，稍加至三十丸，用后竹根饮下之，每日二次。

【主治】 消渴。小便数，多而渴，饮食渐加，肌肉渐减，乏气力，少颜色。

【宜忌】 忌猪肉、冷水。

12765 黄耆防风饮子

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 蔓荆子 黄芩各半钱 炙甘草 黄耆 防风各一钱 葛根一钱半 细辛二分

【用法】 水二盏，煎至一盏，去滓，大热服。

【主治】 眼棱紧急，以致倒睫卷毛，损睛生翳，及上下睑眦赤烂羞涩难开，眵泪稠粘。

【方论选录】 方以蔓荆子、细辛为君，除手太阳、手少阴之邪，肝为二经之母，子母平安，此实

则泻其子也；以甘草、葛根为臣，治足太阴、足阳明之弱，肺为二经之子，母薄子单，此虚则补其母也；黄耆实皮毛，防风散滞气，用之以为佐；黄芩疗湿热，去目中赤肿，为之使也。

12766 黄耆柏子仁散

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】柏子仁四两（别研） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮） 远志（去心）各三两 车前子一两 人参（去芦） 茯苓（白者，去皮） 山药 草薢 黄耆（蜜炙）各二两

【用法】上为细末。每服方寸匕，空心、食前以酒送下，一日三次。

【功用】安心气。

【主治】怔忡；丈夫腰肾损败。

12767 黄芩黄连甘草汤

【方源】《保命歌括》卷六。

【组成】黄芩（酒炒） 黄连（酒炒） 生甘草各等分

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏，煎七分，徐徐呷之，不住服。

【主治】小儿大头瘟病。

【备考】剂毕未退，再用大黄（煨）、黍粘子各等分，水煎，去滓，入芒消等分，再煎，亦徐徐呷之，无令饮食在前。得微利及肿消，只服前三味以和之。如不退，依前法次第服之，得大利，邪气即止。

12768 黄连半夏解毒汤

【方源】《医学启源》卷中。

【组成】黄连 黄柏 黄芩 大栀子各半两 半夏三个（生用） 厚朴二钱 茯苓四钱（去皮）

【用法】水一盏半，加生姜三片，煎半盏，去滓温服。

【主治】腹满呕吐，欲作利者。

12769 黄连防风通圣散

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】防风通圣散加黄连

【主治】鼻渊，久病热郁深者。

12770 黄连香附桃仁丸

【方源】《保命歌括》卷二十七。

【组成】黄连（一半用吴茱萸半两同炒，去茱萸；一半用益智仁同炒，去益智）一两半 茱萸子（炒）一两半 台芎 山栀仁 三棱 莪术（二味醋煮） 麦芽（炒） 神曲（炒） 桃仁（去皮尖）各五钱 香附子（童便浸，焙干） 山楂肉各一两

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，以姜汤送下。

【主治】小儿食积、痰饮、血块在两胁动作，雷鸣，嘈杂，眩运，身热。

12771 黄连解毒凉膈散

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】黄芩 黄连 栀子 黄柏（酒炒） 连翘 薄荷叶 桔梗 枳壳 麦冬 山楂 花粉 木通 生地 大力子（酒炒） 甘草 竹叶 灯心 大黄（酒炒） 枳实（麸炒）

【用法】水煎服。

【主治】痘疮。毒火内盛发热，人事昏沉，狂言妄语，大便结，小便赤，或腹痛咽痛者。

12772 黄耆当归人参汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】黄连一分 生地黄三分 炒神曲 橘皮 桂枝各五分 草豆蔻仁六分 黄耆 人参 麻黄（不去节）各一钱 当归身一钱五分 杏仁五个（另研如泥）

【用法】上㕮咀，作二服。水二大盏半，煎麻黄令沸，去沫，煎至二盏，入诸药同煎至一大盏，于巳、午之间，食消尽服之。一服立止。

【功用】安心定志，镇坠其惊，调和脾胃，大益元气，补其血脉，令养其神。

【主治】妇人经水暴崩不止。

【临证举例】经水暴崩不止 丁未仲冬，郭大方来说，其妻经水暴崩不止，先曾损身失血，自后一次缩一十日而来，今次不止，其人心窄，性急多惊，以予料之，必因心气不足，饮食不节得之。大方曰：无。到彼诊得掌中寒，脉沉细而缓，间而沉数，九窍微有不利，四肢无力，上喘气短促，口鼻气皆不调，果有心气不足，脾胃虚弱之证，胃脘当心而痛，左胁下缩急有积，当脐有动气，腹中鸣，下气，大便难，虚证极多，不能尽录，拟先治其本，余证可以皆去。安心定志，镇坠其经，调和脾胃，大益元气，补其血脉，令养其神。以大热之剂去其冬寒凝在皮肤内；少加生地黄，去命门相火，不令四肢痿弱。与黄耆当归人参汤，一服立止。其胃脘痛，乃胃上有客寒，与大热药草豆蔻丸一十五丸，白汤送下，其痛立止。再与肝之积药除其积之根源而愈。

12773 黄耆桂枝五物汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】黄耆汤（《圣济总录》卷十九）、黄耆五物汤（《三因》卷三）、桂枝五物汤（《赤水玄珠》卷十二）、五物汤（《东医宝鉴·杂病篇》卷二）。

【组成】 黄耆三两 芍药三两 桂枝三两 生姜六两 大枣十二枚 一方有人参

【用法】 以水六升，煮取三升，温服七合，每日三次。

【功用】 《金鉴》：调养荣卫，祛风散邪。

【主治】 血痹。阴阳俱微，寸口关上微，尺中小紧，外证身体不仁，如风痹状。

【方论选录】 《金鉴》：以黄耆固卫；芍药养阴；桂枝调和营卫，托实表里，驱邪外出；佐以生姜宣胃；大枣益脾，为至当不易之治也。

【临证举例】 ①痹 《种福堂方》：张，形寒，手足痛，肌肉渐肿，劳力行走，阳气受伤，客邪内侵，营卫失和。仿《局方》"痹在四肢，汗出阳虚者，与黄耆五物汤"。黄耆、桂枝、茯苓、炙草、当归、煨姜、南枣。②真中风 《南雅堂医案》：诊得两手脉厚而长，惟左手略兼弦象，两寸稍紧，脉厚者，得土之敦气，厚道足以载福，为长寿之征。但弦为风脉，紧为痛脉，今紧在两寸，主上半身有痹痛之患，据称手腕及臂上痛，时愈时作，已阅五年之久，且指尖时苦麻木，昔年尤甚，近年略减，细察此症，系风在关节而作痛，至其所以痛者，乃气血与风邪相抗拒，非同偏枯者之全不觉痛，其妙在于痛处，不难扶正以屏邪，书称中指麻木，三年内防患中风，以中指属手心经故也。今幸麻木之处以食指、拇指为甚，系肺与大肠气之不调，尚无大害，然风善行而变数，必须及早治之，然斯时若肥风药以预防中风，是适招风取中，无异借寇兵而齐盗粮，宜出诸郑重，切勿孟浪以图一逞，宜用黄耆五物汤。黄耆二钱，桂枝尖二钱，生白芍二钱，生姜四钱，大枣二枚，同煎服。③脑血管意外后遗症《四川中医》（1983；5:27）：一老妪，证见右半身瘫痪，口眼㖞斜，手足麻木，肌肉不仁，右半身自汗出。血压：150/100毫米汞柱。此乃营卫气血虚亏，阳气阻闭，经脉失于营养之证。予黄耆桂枝五物汤治之。共服15剂，血压：140/90毫米汞柱，脉舌正常。诸症蠲除，一如常人。四年后追访，终未再作。④血痹 《四川中医》（1983；5:27）：刘某，患四肢麻木一年余，夜晚尤甚。用维生素B_{12}与维生素B_1肌肉注射60余日，疗效不明显。后改为针灸治疗，初针有小效，继之无效。证见气虚懒言，疲乏无力，四肢麻木以上肢较甚，臂部发凉。脉双沉细，舌质淡嫩，苔薄白。取黄耆桂枝五物汤治之。服15剂，诸证俱蠲。⑤自汗 《天津中医》（1986；3:17）：患者，女，31岁。工人。痢后继见汗出，已两年余。动则大汗淋漓，乍冷乍热，时时恶风，并出现肠鸣，进食不慎即泻，头晕无力，舌淡苔薄白，脉无力寸浮大。经某医院诊为"植物神经功能紊乱"，屡治罔效。遂用黄耆桂枝五物汤加白术、五味子，水煎四剂，服后自汗明显改善，将桂枝减量，白术增制，使之外助黄耆以固表，内达健脾以收功。继进六剂，肠鸣消失。再进三剂，诸症悉除。⑥胸痹 《天津中医》（1986；3:18）：患者，女，51岁，干部。病初自觉胸闷气短，继则胸前区时感隐痛，并向左肩背放射，遇寒痛甚，已两年余。心电图诊为"冠状动脉供血不足"。予黄耆桂枝五物汤加薤白、炙甘草，共服30余剂，胸痛诸证得以控制，心电图近于正常。⑦胃脘痛《天津中医》（1986；3:18）：患者，女，42岁，工人。胃脘时感隐痛，逢劳遇寒尤甚，已五年许，钡餐透视诊为"胃窦炎"。曾屡服大剂辛热理气之品，渐致腹胀纳呆，大便时溏，周身乏力，舌淡润，脉沉弦迟。方用黄耆桂枝五物汤加炙甘草、干姜，服药后，胃痛顿解。酌去干姜，加腹皮与茯苓交替使用，予以健脾，因病陈久，宜缓缓图治。继服20余剂，诸证渐愈。⑧低热 《江苏中医杂志》（1984；1:37）：朱某某，女，35岁，教师。低热二年余，体温常在37.5℃左右，偶尔达38℃。伴有怯风怕冷，自汗津津，声低气短，纳谷不香，大便溏薄，周身乏力等证。舌苔薄白，舌质淡红而胖，脉细缓无力。证属气虚身热。拟取甘温除热法，黄耆桂枝五物汤加焦白术、炙甘草。服上方十二剂后，症状基本消失。改用补中益气丸调服半月以善后，随访至今未发。

12774 黄芩加半夏生姜汤

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 黄芩加半夏汤（《准绳·幼科》卷五）、黄芩半夏汤（《杏苑》卷四）。

【组成】 黄芩三两 芍药二两 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘） 半夏半斤（洗） 生姜一两半（一方三两，切）

【用法】 上六味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，每日二次，夜一次。

【主治】 痢疾或泄泻，身热不恶寒，腹痛口苦，干呕；胆咳，咳而呕苦水者。 ①《伤寒论》：太阳与少阳合病，自下利而兼呕者。②《金匮》：干呕而利。③《玉机微义》：胆府发咳，呕苦水若胆汁。④《幼幼集成》：麻疹发热吐泻。

【方论选录】 ①《内台方义》：黄芩汤中以黄芩为君，以解少阳之里热，苦以坚之也；芍药为臣，以解太阳之表热而行营气，酸以收之也；以甘草为

佐，大枣为使，以辅肠胃之弱以缓中也；加半夏之辛以散逆气，加生姜之辛以和其中而止呕也。②《古方选注》：用甘草、大枣和太阴之阳；黄芩、芍药安太阴之阴；复以半夏、生姜宣阳明之阖，助太阳之开。上施破纵之法，则邪无客着，呕止利安。③《金鉴》：用半夏、生姜入上焦而止呕；甘草、大枣入中焦而和脾；黄芩、芍药入下焦而止利，如是则正气安而邪气去，三焦和而呕利止矣。

12775 黄连解毒合天水散

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】正雅连 川黄柏 枯黄芩 黑栀仁 飞滑石 炙甘草

【用法】净水浓煎，空心滚热服。

【主治】麻疹自利，里急后重，欲作痢也。

12776 黄连解毒合甘桔汤

【方源】《片玉痘疹》卷六。

【组成】酒芩 酒连 酒栀子 石膏 桔 甘草 薄荷叶 连翘 荆芥穗 牛蒡子（炒）

【用法】水煎，和竹沥饮之。

【主治】痘未出而热不止，昼夜烦躁，口舌生疮，唇裂咽痛者，此毒内熏，其热甚急。

12777 黄耆建中加当归汤

【方源】《本事》卷八。

【异名】黄耆建中汤、黄耆汤（《普济方》卷二三四）。

【组成】黄耆（蜜炙） 当归（洗，去芦，薄切，焙干）各一两半 白芍药三两 桂枝一两一分（去粗皮，不见火） 甘草一两（炙）

【用法】上为粗末。每服五钱，加生姜三片，大枣一个，水一盏半，同煎至八分，去滓，取七分清汁，日三次，夜二次。尺脉尚迟，再作一剂。

【主治】伤寒。发热，头疼，烦渴，脉浮数而无力，尺以下迟而弱，未可表散发汗者。

【方论选录】《本事方释义》：黄耆气味甘平，入手足太阴；当归气味辛甘微温，入手足少阴足厥阴；白芍药气味酸微寒，入足厥阴；桂枝气味辛温，入足太阳；甘草气味甘平，入足太阴；姜、枣之辛甘和荣卫。此建中汤也，以之治伤寒之头疼烦渴，脉浮数而无力，尺以下迟而弱者，未可表散发汗故也。

【临证举例】伤寒 昔有乡人丘生者，病伤寒，予为诊视，发热头疼烦渴，脉虽浮数而无力，尺以下迟而弱。予曰，虽属麻黄证，而尺迟弱，仲景云，尺中迟者，荣气不足，血气微少，未可发汗，予于建中汤加当归黄耆令饮，翌日脉尚尔，其家煎迫，日夜督发汗药，言儿不逊矣。予忍之，但只用建中调荣而已，至五日尺部方应，遂投麻黄汤，啜第二服，发狂，须臾稍定，略睡已得汗矣，信知此事是难是难。

12778 黄连竹茹橘皮半夏汤

【方源】《温热经纬·三时伏气外感篇》。

【组成】黄连 竹茹 橘皮 半夏

【主治】幼儿脾胃失伤，呕逆者。

【方论选录】王士雄：于橘皮竹茹汤去生姜之温，甘草之甘；加黄连之苦寒，以降诸逆冲上之火；半夏之辛开，以通格拒搏结之气。

12779 黄连凉膈甘桔解毒汤

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】甘草 桔梗 黄连 黄芩 黄柏 栀子 连翘 薄荷 大力子 麦冬 升麻 山豆根

【用法】加竹叶、灯芯，水煎服。

【主治】小儿毒火内甚，上攻咽喉而致痘疮发热，咽喉作痛，饮水难吞。

【加减】如火甚，加石膏（煅过）二分、知母。

12780 黄耆芍药桂枝苦酒汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】耆芍桂酒汤（原书同卷）、黄耆苦酒汤（《圣济总录》卷六十一）、苦酒汤（《全生指迷方》卷三）、黄耆桂枝苦酒汤（《鸡峰》卷十九）、耆桂酒（《玉案》卷三）、黄耆芍药桂酒汤（《症因脉治》卷三）。

【组成】黄耆五两 芍药三两 桂枝三两

【用法】上三味，以苦酒一升，水七升，相和，煮取三升，温服一升。当心烦，服至六七日乃解；若心烦不止者，以苦酒阻故也。一方用美酒代苦酒。

【主治】①《金匮》：黄汗，身体肿，发热，汗出而渴，状如风水，汗沾衣，色正黄如柏汁，脉自沉。②《明医指掌》：伤寒脉沉，咽痛自汗。

【方论选录】①《千金方衍义》：水湿从外渐渍子经，非桂之辛温无以驱之达表；既用桂、芍内和营血，即以黄耆外壮卫气以杜湿邪之复入；犹恐耆、芍固护不速，而用苦酒收敛津液不使随药外泄。乃服药后每致心烦，乃苦酒阻绝阳气不能通达之故，须六七日稍和，心下方得快，然非若水煎汤液之性味易过也。②《金匮要略心典》：黄耆、桂枝、芍药，行阳益阴，得酒则气益和而行愈固，盖欲使营卫大行，而邪气毕达耳。云苦酒阻者，欲行而未得遂行，久积药力，乃自行耳，故曰服至六七日而解。

【临证举例】 黄汗 《山东中医杂志》(1982；1：34)：张某某，女，22岁。因家务劳作汗出，即用凉水浸毛巾擦洗身体，后发现上半身出汗，色黄，量多而粘，衣物均被黄染。自觉乏力，纳呆，微发热，有时干哕，月经正常，小便色略赤，大便色正常，巩膜皮肤无黄染，舌质正常苔薄白，脉略滑。辨证：黄汗。时值盛夏，暑热当令，劳则阳气张，遂汗出，复受水寒之气，致热伏于内，酿成外寒湿，内郁热之势，交相蒸郁，汗液排泄障碍，或发热汗出而色黄。治则：调和营卫，清泄郁热。方药：耆芍桂酒汤去苦酒加栀子、黄柏。药用：黄耆18克，白芍12克，桂枝9克，黄柏9克，水煎分二次服。服三剂黄汗已止。随访三年未再发现黄汗。

【备考】 本方方名，《外台》引作“黄耆芍药桂心酒汤”、《准绳·类方》引作“耆芍桂苦酒汤”、《医灯续焰》引作“黄耆芍桂酒汤。

12781 黄耆肉桂柴胡酒煎汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 内托黄耆酒煎汤(《东垣试效方》卷三)、内托酒煎汤(《医学入门》卷八)、黄耆柴胡汤(《杏苑》卷八)、内托酒煎散(《外科大成》卷二)。

【组成】 黄耆 当归梢各二钱 柴胡一钱五分 黍粘子(炒) 连翘 肉桂各一钱 升麻七分 炙甘草 黄柏各五分

【用法】 上㕮咀。好糯酒一大盏半，水一大盏半，同煎至一大盏，去滓，空心温服。少时便以早饭压之，不致大热上攻中上二焦也。

【主治】 附骨痈，坚硬漫肿，不辨肉色，行步作痛，按之大痛。

【备考】 本方方名，《医学正传》引作“托里黄耆汤”；《疡科选粹》引作“柴胡黍粘子汤”。

12782 黄连解毒合犀角地黄汤

【方源】《温热暑疫全书》卷一。

【组成】 黄连(酒洗) 黄芩(酒洗) 黄柏(酒洗) 栀子各一钱半 犀角(磨水更佳，镑屑亦可) 生地黄(酒浸，捣) 牡丹皮 芍药各二钱

【用法】 上先以七味水煎去滓，入地黄再煎数沸，滤清，加藕节汁、侧柏汁，并磨好墨少许，搅令黑，服之。

【主治】 温毒发斑，斑色紫者。

12783 梦灵丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】 羊子肝(去皮膜，薄批作片，线串日中晒)七叶 太阴玄精石(研) 石决明(洗净) 黄连(去须)各一两 蕤仁(研)半两

【用法】 上为末，用陈粟米粥为丸，如梧桐子大。临卧好茶送下二十丸。

【主治】 ①《圣济总录》：肝气不足，翳膜昏暗，久不见物者。②《普济方》引《卫生家宝》：五脏积热，目昏不见物。

12784 梦灵丸

【方源】《普济方》卷七十八引《卫生家宝》。

【组成】 防风一两(蜜炙) 石决明一两(水一升煮干) 菊花二两 威灵仙一两 蕤仁一两 谷精草一两 枸杞子一两 苍术一两(米泔浸一宿，锉焙) 蚌粉一两(飞过)

【用法】 上为细末，用雄猪肝一具，竹刀切去筋膜，和药捣一千下，入面少许共捣，为丸如梧桐子大。食后盐汤送下三十丸。

【主治】 内外障眼。

【宜忌】 忌煎爆酢豆腐等毒物。

12785 梦遗方

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】 黄柏三两 熟地 麦冬 枸杞 萸肉 天冬各一两五钱 鱼鳔三两(炒) 莲须 五味各八钱 车前五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸或金樱膏为丸，如梧桐子大。空心清汤送下三钱。药完病愈。

【主治】 梦遗。

12786 梦遗方

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】 净山萸肉(为末) 鳗鱼三、五条(一斤重者，去头尾，煮烂去骨)

【用法】 捣鳗鱼成泥，绞汁，入萸肉末为丸，如梧桐子大，候半干，辰砂为衣。空心淡盐汤送下二钱。后即不遗，一月除根。

【主治】 梦遗。

12787 梦熊丸

【方源】《竹林女科》卷四。

【组成】 黄耆(蜜炙)四两 黄鱼鳔胶(蛤粉炒珠)二斤 沙苑蒺藜八两(马乳浸蒸熟，焙)

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服八十丸，空心温酒送下。

【主治】 男子嗜欲不节，施泄太多，肾虚精薄，不能直射子宫。

12788 梦仙备成丹

【方源】《医方类聚》卷二十引《简易方》。

【异名】 乌龙丹(《普济方》卷八十九)。

【组成】 川乌五两(炮微黄色) 五灵脂(取净)

二两半　没药五两　乳香一钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每一丸，先以酒一盏，姜七片，薄荷七叶同煎七分，去滓候温，入脑子一字，细嚼药一丸，窨气少时用前酒送下，临卧服。

【主治】 卒急中风，瘫痪，口眼㖞斜，语言不正，不省人事，一切风证。

12789　硇附丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】 附子半两（炮）　丁香一钱（不见火）　干姜一钱半　硇砂一钱（汤飞过）

【用法】 上为细末，旋入硇砂研和，用稀面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，加至二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】 虚中有积，心腹胁胁胀痛。

12790　硇砂丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 硇砂二两（于净生铁器内用酸浆水两碗旋旋添，以慢火熬尽浆水为度）　干漆一两（捣碎，炒令烟出）　桂心一两　没药一两　琥珀一两

【用法】 上为末，入硇砂都研令匀，用糯米软饭为丸，如梧桐子大。每次二十丸，食前以温酒送下。

【主治】 妇人月水不通，脐腹积聚，或时疼痛，不思饮食。

12791　硇砂丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 硇砂二两（以浆水一升，熬如膏）　当归（锉，微炒）　琥珀　附子（炮裂，去皮脐）　没药　桂心　木香各一两

【用法】 上为末，以枣肉并硇砂膏同和为丸，如梧桐子大。每次十五丸，食前以温酒送下。

【主治】 妇人久积虚冷，四肢羸瘦，饮食微少，月水来时脐腹疼痛不可忍。

12792　硇砂丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】 硇砂二两（细研）　青盐二两（细研）　生姜五斤（捣绞取汁）　附子半斤（去皮脐，为末，将硇砂并青盐、附子，于姜汁内，用慢火煎令稠，取出焙干，捣罗为末，入后药）　肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）　山茱萸二两　石斛二两（去根，锉）　远志二两（去心）　木香二两　巴戟二两　薯蓣二两

【用法】 上为末，与前药相和令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日空心以温酒送下二十丸，渐加至三十丸。

【主治】 肾脏虚惫，腰间疼痛，小便滑数，冷气攻筑，虚损不足。

12793　硇砂丸

【方源】《普济方》卷二二二引《博济》。

【组成】 硇砂（水煎飞成霜）　木香　桂（去粗皮）　肉豆蔻（去壳，炮）　茴香子（炒）　附子（炮裂，去皮脐）　青橘皮（去白，焙）　陈橘皮（去白，焙）各半两　山芋半斤　木瓜二枚

【用法】 上为末，先以木瓜切盖出瓤，如小瓮子样，存取原盖；逐个木瓜共入硇砂末半两，以原盖紧缚；用无灰酒三升，于银石器内，以慢火煮，候酒欲干，木瓜烂，取出入前八味药末相和为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，盐汤或盐酒送下。

【主治】 脾元虚弱，冷气攻上，饮食减少。

12794　硇砂丸

【方源】《医方类聚》卷一〇六引《神巧万全方》。

【组成】 大附子一分（剜去中心肉，别和后药，杵）　硇砂（水飞过）　丁香各半两　青橘皮（去白瓤）　木香　肉豆蔻各一分　槟榔三分（生用）

【用法】 上以净硇砂纳入剜了附子中和，不尽，都将熟面如馒头裹入，灰中煅令焦，却和丁香等，都杵为末，滴水和，再杵，丸如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下。

【主治】 五膈气噎闷，或吐逆不下。

12795　硇砂丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】 硇砂一两（别研细，水飞）　蓬莪术（炮，锉）　楝实（麸炒）　青橘皮（汤浸去白，焙）　木香　丁香　荜澄茄　肉豆蔻（去壳，炮）　槟榔（锉）　附子（炮裂，去皮脐）　巴戟天（去心）　茴香子（炒）各半两

【用法】 上除硇砂外，为末，以酒一升，先取硇砂，并飞硇砂水一盏，同熬及一升，入诸药再熬，频搅候得所，丸如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。加至三十丸。

【主治】 控睾，小肠气痛。

12796　硇砂丸

【方源】《本事》卷三。

【组成】 硇砂（研）　荆三棱（锉末）　干姜（炮）　白芷（不见火）　巴豆（去油）各半两　大黄（别研）　干漆各一两（锉，炒令烟尽）　木香　青皮（去白）　胡椒各一分　槟榔　肉豆蔻各一个

【用法】 上为细末，醋醋二升，煎巴豆五七沸，后下三棱、大黄末，同煎五七沸，入硇砂同煎成稀膏，稠稀得所，便入诸药和匀，杵丸如绿豆大。年深气块，生姜汤送下四五丸；食积熟水送下；白痢，干姜汤送下；赤痢，甘草汤送下；血痢，当归汤送下，葱酒亦得。

【主治】 一切积聚停饮，心痛。

【方论选录】 ①《本事方释义》：硇砂气味咸苦微温，入足太阳阳明厥阴；荆三棱气味苦平，入足厥阴，能破血攻坚；干姜气味辛温，入手足太阴；香白芷气味辛温，入足太阳；巴豆气味辛温，入足太阴阳明，能消痞下凝寒之滞；大黄气味苦寒，入足阳明，有斩关夺门之能；干漆气味辛温降而行血，入足厥阴；木香气味辛温，入足太阴；青皮气味辛温微酸，入足厥阴；胡椒气味辛热，入足太阴少明厥阴；槟榔气味辛温，入足太阴太阳；肉豆蔻气味辛温，入足太阴阳明。凡一切积聚停饮，以及下利诸病，久而不愈者，非籍破血消滞下夺不能效，必佐以温中者，欲药性之流行也。②《医方集解》：此治肉积，气积、血积之通剂也。硇砂化肉食，干漆散瘀血，木香、青皮行滞气，三棱破血而行气，肉蔻暖胃而和中，白芷散风而除湿，干姜、胡椒除沉寒锢冷，大黄、巴豆能斩关门。方内多辛热有毒之品，用之以破冷攻坚，惟大黄苦寒，假之以荡热去实，盖积聚既深，攻治不得不峻，用醋者酸以收之也。

12797 硇砂丸

【方源】《本事》卷三。

【组成】 木香 沉香 巴豆肉（全者）各一两 青皮二两（不去皮） 铜青半两（研） 硇砂一分（研）

【用法】 上二香，青皮三味细锉，同巴豆慢火炒令紫色为度，去巴豆为末，入青、砂二味研匀，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服七丸至十丸，空心、食前盐汤吞下，一日二三服。

【主治】 膀胱疝气，外肾肿胀，痛不可忍。

【方论选录】《本事方释义》：木香气味辛温，入足太阴；沉香气味苦辛温，入足少阴；巴豆肉气味辛温，入足太阴、阳明；青皮气味苦辛酸，微温，入足厥阴；铜青气味酸平，入足少阳厥阴，能杀疳虫；硇砂气味咸苦微温，入足太阳阳明厥阴。蒸饼和丸，盐汤送药，不欲药性之发于上也。

12798 硇砂丸

【方源】《普济方》卷三二四。

【组成】 硇砂半两 虻虫四十九个 水蛭（炒黑） 粉霜三钱 丁香 干漆（炒令烟出） 白丁香 甘遂（炮） 牡蛎 大麦（炒） 槟榔各五钱 胆矾三钱 阿魏一钱（研） 大枣五十枚（去皮核） 木香五钱

【用法】 上为细末，用枣肉为丸。每服十丸。任汤使下。

【主治】 血蛊块等疾。

【备考】 方中水蛭用量原缺。

12799 硇砂丸

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】 硇砂二钱（红色者，研细） 皂角子一百个 干醋一斤

【用法】 前二味入醋内浸三日，入砂锅内熬之将干，将锅底硇砂拌于皂子上，候干，以微火焙干，或以炉台上炕之。每晚嚼五粒或八粒，一日早晚吃两次，以滚白水送下；然干则皂子过硬，为末服亦可。

【主治】 瘰疬鼠疮，满项满胸，破烂流脓者。

12800 硇砂散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】 硇砂一两（细研） 芫花半两（醋拌炒干） 虻虫半两（去翅足，微炒） 水蛭半两（微炒） 琥珀三分 干漆半两（捣碎，炒令烟出） 没药三分 桂心半两 麝香一分（研入）

【用法】 上为细散，入研了药令匀。每服一钱食前以温酒调下。

【主治】 产后恶血不散，结成癥块，脐腹疼痛。

12801 硇砂散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】 硇砂（明净者，生用）一字 蓬砂半钱 龙脑一钱

【用法】 上药各为末，再同研令匀细。每以少许，掺放翳上，一日三四次。

【主治】 斑疮入眼，及诸般眼疾。

12802 硇砂散

【方源】 方出《圣济总录》卷一三八，名见《普济方》卷三〇〇。

【组成】 硇砂少许 胶香

【用法】 上以硇砂和胶香令匀。贴之。根即出。

【主治】 肉刺。

12803 硇砂散

【方源】《圣济总录》卷一四八。

【组成】 雄黄半两 硇砂一分

【用法】 上为细散。以少许敷之。

【主治】 守宫咬。

12804 硇砂散

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】硇砂 雄黄 天南星 砒霜各等分 麝香少许

【用法】上为细末。用竹针针开，用药封。黄水出疮已。

【主治】一切疔疮。

12805 硇砂散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】硇砂一钱 轻粉三分 冰片五厘 雄黄三分

【用法】上为末。用草桔咬毛蘸药勤点痔上，日用五六次，自然渐化为水而愈。

【功用】《全国中药成药处方集》：消毒，化坚，散肿。

【主治】《外科正宗》：鼻生息肉，初起如瘤子，渐大下垂，名为鼻痔。《金鉴》：由肝经怒火，肾经相火，胃经积火凝结而成的耳痔，耳蕈、耳挺，微肿闷痛，色红皮破，痛引脑巅。

12806 硇砂散

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】硇砂五分 白矾（煅枯）五钱

【用法】上为细末。每用少许，点鼻痔上即消。

【主治】鼻痔。鼻生息肉，起子湿热者。

12807 硇砂煎

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】硇砂二两（白色不夹石者，研） 阿魏一分 京三棱 诃黎勒各一两（炮） 丁香 人参 附子（炮） 青橘皮（去瓤） 木香 舶上茴香各半两 槟榔 神曲各一两半（别研为末）

【用法】诃黎勒以下药为细末，以好酒一升，先煎硇砂，次入阿魏同煎五七沸后，以帛滤过，再煎之，后下神曲末，搅令调，慢火熬成膏，拌和诸药末，入臼捣为丸，如梧桐子大。每服十五至二十丸，食前以生姜汤送下；温酒亦得。

【主治】脾脏虚冷，心腹有积滞气，发歇疼痛，心膈不利，两胁胀满，不能饮食。

12808 硇砂膏

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】硇砂（生用）一钱 石矿灰一两（炒黄色） 白丁香三钱（炒黄色） 丹黄半斤（生用） 碱一斤（淋水五碗）

【用法】前四味研为极细末，次将碱水煎作一碗，成膏待冷，以前末入膏和匀，藏瓷器中。一应毒物，以此膏点之。

【主治】痈疽肿毒，瘰疬，疣痣。

【备考】白丁香，即麻雀儿屎，用坚尖者，不用软颓者。

12809 硇砂膏

【方源】《饲鹤亭集方》。

【异名】外科硇砂膏（《全国中药成药处方集》杭州方）。

【组成】鲜桃枝 柳枝 桑枝 槐枝各五尺 大山栀八十个 头发一两二钱 象皮 炒甲片各六钱

【用法】上用麻油四斤，煤枯去滓，再熬至滴水成珠，后下飞黄丹一斤半，成膏，加入真硇砂三钱，血竭一钱，儿茶二钱，三味预研细，共搅极匀，出火气听用。贴患处。

【功用】化腐消坚，生肌收口。

【主治】痈疽发背，对口疔疮，痰核痞块，破烂恶疮，一切无名肿毒。

12810 硇砂搽剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】硇砂 10 克 蜂蜜 30 克

【用法】将硇砂研细过筛后，放入加热溶化的蜂蜜内，边加边搅拌，调匀即成。外搽。可使皮肤发赤、起泡及色素沉着。

【主治】白癜风。

【备考】硇砂即氯化铵结晶体，若无此药，可用氯铵代替。

12811 硇砂煎丸

【方源】《苏沈良方》卷四。

【异名】硇砂丸（《普济方》卷三五五）。

【组成】硇砂一两（拣通明无石者，别研令如粉） 舶上茴香一两（略炒） 当归一两（无灰酒浸一宿，去芦了，薄切片子焙） 金铃子三两（洗过切破，四两无灰酒浸一宿，候软以刀子削下瓤，去皮核不用） 肉苁蓉一两（无灰酒浸一宿，薄切作片子，干） 穿心巴戟一两（无灰酒浸一宿，去心用） 天雄一两（无灰酒煮五七百沸，候软刮去皮） 槟榔一两 木香 沉香 黑附子各一两 阿魏半两（米醋磨成膏入诸药）

【用法】上为细末，以无灰酒煮，白面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、日午温酒送下。

【功用】养血，去积滞，化气消食，补益真气。

【主治】一切积滞。

【临证举例】产后下痢 予家妇尝病蓐中下痢，日久甚困笃，百方不愈。士人李潜善医，曰：蓐中下痢，与他痢不同，常痢可用苦涩药止之，蓐中痢生于血不足，投涩药则血愈不行，痢当更甚。为予

作硇砂法。先以桂丸下之，次投此丸，日九十丸，痢顿减半，次日遂愈。

12812 硇砂煎丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】 黑附子二个（各重五钱半以上，炮，去皮脐，剜作瓮子） 木香三钱 破故纸（隔纸微炒） 荜拨（真者）各一两 硇砂三钱

【用法】 上先将硇砂用水一盏续续化开于瓮内，熬干为末，安在附子瓮内，却用剜出附子末盖口，用和成白面裹约半指厚，慢灰火内烧匀黄色，去面，同木香等药为细末，却用原裹附子熟黄面为末，醋调煮糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至三十丸，生姜汤送下。

【功用】 消磨积块。

【主治】 积块痃癖，一切凝滞。

【宜忌】 老人虚人无妨。

12813 盛椹散

【方源】《医方类聚》卷七十三引《经验秘方》。

【组成】 荆芥穗四两 旋覆花 前胡 麻黄（去节）各一两 赤芍药 半夏（汤泡七次） 甘草（炙）各一两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，大枣二枚，煎七分，去滓，漱口，吐一半，咽一半，以此熏漱立愈。

【主治】 牙疼致口颊皆肿。

12814 爽神丸

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】 人参三钱 白术一钱 全蝎一钱 防风一钱 羌活半钱 天麻一钱 僵蚕半钱（汤泡浸洗） 丁香二钱 木香一钱 茯神一钱

【用法】 上为末，以酒煮面糊为丸，如绿豆大。每服五七丸，糯米饮送下。次以南星散贴之。

【主治】 小儿解颅。母气衰，胎气冷，父精不足，胎中受气不足，肾气未全而生，身上无血色，肌羸骨细，面容衰，脑分十字，颅门陷，头角阔而颅开，目无光彩，白睛猥。

12815 雪煎

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】 川大黄五两（锉碎，微炒）

【用法】 上为细散，用腊月雪水五升，煎如膏。每服以冷水调半匙服之，不拘时候。

【主治】 热病狂语及诸黄。

12816 雪羹

【方源】《古方选注》卷中。

【组成】 人孝荠四个 海蜇（漂去石灰矾性）一两

【用法】 水二钟，煎八分服。

【功用】 泄热止痛。

【主治】 ①《古方选注》：肝经热厥，少腹攻冲作痛。②《本草纲目拾遗》：小儿一切积滞。

【方论选录】 羹，食物之味调和也；雪，喻其淡而无奇，有清凉内沁之妙。孝荠味甘，海蜇味咸，性皆寒而滑利，凡肝经热厥，少腹攻冲作痛，诸药不效者，用此泄热止痛，捷如影响。

12817 雪乳汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 生地三钱 熟地三钱 天冬一钱五分 麦冬一钱五分 玉竹四钱 五味子五分 当归一钱五分 白芍一钱 山药三钱

【用法】 人乳一大杯，藕汁一大杯，水二钟，煎服。

【主治】 燥火血虚，毛发衰落，肌肤枯槁，身热咽干。

12818 雪梅丸

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 冰片 犀黄各一分 胆矾 雄精 硼砂 山豆根 儿茶各八分 白梅二枚

【用法】 共打为丸。均含十日。

【主治】 喉癣。

【备考】《喉科家训》：上共研细末，另用盐梅三个，打融入药，和匀为丸，如龙眼大。临卧纳口过夜。

12819 雪梨膏

【方源】《医学从众录》卷一。

【组成】 雪梨六十只（取汁二十匙） 生地 茅根 藕各取汁十杯 萝卜 麦冬各取汁五杯。

【用法】 水煎，人炼蜜一斤，饴糖八两，姜汁半杯，再熬如稀糊则成膏矣。每日用一二匙，含咽。

【主治】 咯血吐血，痨嗽久不止。

12820 雪梨膏

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 鲜梨一百斤 冰糖五斤

【用法】 将梨刨丝去核榨汁，将滓加水两倍煎透，榨汁去滓，将两次汁滤清收浓，加冰糖炼透，滤清收膏，约成膏十六斤。每服三钱，一日三次，开水冲服。

【功用】 清肺润燥。

【主治】 肺燥干咳。

12821 掩脐法

【方源】《得效》卷六。

【组成】 连根葱一茎（带土不洗） 生姜一块 淡豆豉二十一粒 盐二匙

【用法】 上药同研烂，捏饼。烘热，掩脐中，以帛扎定。良久气透自通。不然，再换一剂。

【主治】 大小便不通。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“掩脐方”。本方捣碎为末，米汤送下，名“葱豆汤”（见《普济方》卷三十九）。

12822 掩验汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】 苍术一钱八分 当归一钱半 生白芍一钱三分 白扁豆（炒，去皮）三钱 陈皮 建泽泻 甘草 淮木通各一钱 滑石二钱 川萆薢四钱 黄连一钱三分 大腹皮一钱半（洗净） 宣木瓜一钱三分 广木香五七分 熟大黄一钱半或二钱

【用法】 多水煎服。

【主治】 痢初起，腹痛尿短，下痢脓血，或红或白，或红白齐下，日夜无数，里急后重者。

12823 排气饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 陈皮一钱五分 木香七分或一钱 藿香一钱五分 香附二钱 枳壳一钱五分 泽泻二钱 乌药二钱 厚朴一钱

【用法】 水一钟半，煎七分，热服。

【主治】 ①《景岳全书》：气逆食滞胀痛。②《谦斋医学讲稿》：脐腹痛，痛时多在脐腹周围，喜手按或温掩，伴见肠鸣自利，饮食少味，消化迟钝，舌苔白腻。

【加减】 如食滞者，加山楂，麦芽各二钱；如寒滞者，加焦干姜、吴茱萸、肉桂之属；如气逆之甚者，加白芥子、沉香、青皮、槟榔之属；如呕而兼痛者，加半夏、丁香之属；如痛在小腹者，加小茴香；如兼疝者，加荔枝核（煨熟，捣碎）用二三钱。

12824 排风汤

【方源】《千金》卷八。

【异名】 排风饮（《圣济总录》卷八十七）。

【组成】 白鲜皮 白术 芍药 桂心 芎藭 当归 杏仁 防风 甘草各二两 独活 麻黄 茯苓各三两 生姜四两

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升，每服一升。覆取微汗，可服三剂。

【功用】 安心定志，聪耳明目，通脏腑。

【主治】 男子、妇人风虚湿冷，邪气入脏，狂言妄语，精神错乱，其肝风发，则面青心闷乱，吐逆呕沫，胁满头眩，重耳不闻人声，偏枯筋急，曲拳而卧；其心风发，则面赤翕然而热，悲伤嗔怒，目张呼唤；其脾风发，则面黄身体不仁，不能行步，饮食失味，梦寐倒错，与亡人相随也；其肺风发，则面白咳逆唾脓血，上气奄然而极也；其肾风发，则面黑手足不遂，腰痛难以俯仰，痹冷骨痛。诸有此候，令人心惊，志意不安，恍惚多忘。

【临证举例】 中风 《妇人良方》：癸丑春，有一妇人，年四十四、五，其证说话短气，足弱，行得数步则口苦含霜，七十日内三次经行，遇行则口冷，头目眩晕，足冷则透心冷痛，每行则口中冷，气不相续，有时鼻中热，面赤翕然而热，身体不仁，不能行步，手足不随，不能俯仰，冷痹骨痛，有时悲伤，梦与前夫相随，则上气奄然而极，心惊，志意不定，恍惚多忘，却能食，如此仅一年许。医者投热药则面翕然而热，气满胸中，咽中窒塞，闷厥；投冷药则泻。又一医者以十全汤服之，则发烦躁，心惊而跳。一医者以双和汤服之，觉得面上与腹中甚如火燔，心愈惊，欲吐不吐，大便秘，里急后重。求仆诊之，六脉弦缓，喜见于春，此是可治之疾。未供药间，忽然吐泻，泻后觉肛门如火，虽泻六次，却不多。仆一时识证未尽，且与俞山人降气汤八服。次日诊之，脉差有力，云服药之后，觉鼻中热，心烦闷绝，齿噤。与参苏饮八服，黄连丸二两许。越三日，云服药之后，其疾如故。与茯苓补心汤服之，皆无效。仆以脉证详之，只有排风汤甚对此证。或曰：何以见得是此证？一、能食饮，此风饥也；二、七十日三次经行，此是荣经中风，血得风散也；三、头目眩晕，此肝风也；四、面赤翕然而热，悲伤，此心风也；五、身体不仁，不能步行，梦与前夫相随，此脾风也；六、手足不随，腰痛难以俯仰，冷痹骨疼，此肾风也。诸有此疾，令人心惊，志意不定，恍惚多忘，真排风汤证也。或曰风脉当浮，今脉弦缓微弱，恐非风也。答曰：风无一定之脉，大抵此证虚极生风。然排风汤所用之药有十全大补汤料，亦有平补之意，却不僭燥。共十服。越三日，云服之有效，脉亦差胜，只是心中如烟生，似有微热，大便尚秘。此真是风证，再与排风汤十服，兼牛黄清心丸，皂角丸助之。越三日，云服前药一、二日，大烦躁，于热诸证悉除。只是足弱不能支持，脉亦弱，予秘传降气汤十服。又越三日云诸证悉退，只是梦里虚惊，大便滑泄，如食伤相似，奏厕频数，脉尚弱。与五积散数服，加人参、盐煎，兼感应丸即愈。自后云，皆无恙矣。但上重而头眩，不能久

立久坐，服与排风汤，则脱然安矣。

【备考】 方中茯苓，《千金翼》作“茯神”。

12825 排风汤

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】 天麻 桔梗 防风 赤芍 五味子 陈皮 升麻 桑白皮

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 两睑粘睛。

12826 排风散

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】 白附子 麻黄（去根节） 天麻 骨碎补（去毛） 白僵蚕 羌活（去芦头）各一两

【用法】 上药并生为散。每服五钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】 中风瘫痪。

12827 排风散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】 天麻 桔梗 防风各三两 乌蛇 五味子 细辛 芍药 干蝎各二两

【用法】 上为末。空心、食后米饮汤调下一钱。先宜钩割、熨烙，后服本方。

【主治】 ①《秘传眼科龙木论》：两睑粘睛外障。②《金鉴》：风牵㖞僻，睑皮痒赤，时时口眼相牵而动。

12828 排风散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 天麻三钱 当归四钱 赤芍三钱 茵陈三钱 苦参三钱 银花三钱 胆草三钱 大黄三钱 防风三钱 羌活三钱 白芷二钱 全蝎一钱半 甘草一钱 地肤子三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 皮翻粘睑症。两眼赤痒，略疼流泪，眼皮上下反粘，亦无云翳，只觉昏蒙。

12829 排石汤

【方源】《千家妙方》引杨友信方。

【组成】 金钱草 30 克 生鸡内金 15 克 萹蓄 15 克 瞿麦 15 克 滑石 30 克 车前子 15 克 木通 6 克 冬葵子 30 克 留行子 18 克 牛膝 10 克 白茅根 30 克

【用法】 水煎服，每日一剂。

【功能】 清热排石，利水通淋。

【主治】 下焦湿热，泌尿系结石。

【临证举例】 石淋 夏某某，男，23 岁，邮电工人，住院号：7976。经常左侧腰痛，尿急、尿血一月余，经 X 光腹部平片检查，发现左输尿管中段有黄豆大不透光阴影，诊断为左输尿管结石。曾在门诊服药 20 剂，因突起左腰后痛，尿血，急诊入院。服“排石汤”18 剂，排出结石一块（1.1×0.8cm），痊愈出院，随访 5 年未再复发。叶某某，男，34 岁，内科医师。近一月来左侧腰腹绞痛（阵发性）共 6 次，在外院拍片，发现泌尿系结石转来我院。检查：急性病容，左少腹轻压痛，脉弦数，苔黄腻，尿检：红细胞（卅），白细胞（卅），X 光泌尿系造影，显示左输尿管轻度扩张，其末端有绿豆大不透光阴影。诊为左输尿管结石。服“排石汤”，每日一剂，临床症状逐日转向正常，患者每日小便均用纱布过滤，但未见结石排出，服药 58 剂时，拍片检查（腹部平片及泌尿系造影），原结石阴影消失，输尿管扩张复原。随访 10 年，未再复发。

12830 排脓汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 甘草二两 桔梗三两 生姜一两 大枣十枚

【用法】 上四味，以水三升，煮取一升，温服五合，日服二次。

【功用】 ①《金匮要略心典》：行气血，和荣卫。②《古方选注》：开提肺气，调和营卫。

【主治】 ①《金匮》：疮痈，肠痈。②《张氏医通》：内痈，脓从呕出。

【方论选录】 ①《古方选注》：排，斥也；脓，血肉所化也。甘、桔、姜、枣、仍从上焦开提肺气，调和营卫，俾气行而脓自下。②《金匮教学参考资料》：排脓汤以桔梗、甘草清热利气排脓，生姜、大枣和营卫，助正达邪。

【临证举例】 ①肺痈 《金匮要略今释》引《续建殊录》：一男子，患肺痈，其友人佐佐氏投药，尔后脓自口鼻出，两便皆带脓，或身有微热，时恶寒，身体羸瘦，殆知不可药，乃来求治。先生与以排脓汤及伯州散，经日而瘳。②淋病 《金匮要略今释》引《续建殊录》：加州士人某者，来在浪华，患淋病七年，百治无效。先生诊之：小腹挛急，阴头含脓，疼痛不能行步，乃作排脓汤与之，服之数日，旧疴全瘳。③痈 《金匮要略今释》引《成绩录》：一男子患痈，所谓发背，大如盘。一医疗之，三月而不愈，因转医，加外治，肿痛引股，小便难，大便不通，腹硬满，短气微喘，舌上无苔，脉弦数。先生视其硬满，与以大黄牡丹皮汤，虽秽物下，硬满减，唯发背自若，喘满时加，浊唾粘涎如米粥，因与以排脓汤，兼服伯州散，吐粘痰数升，

诸愈。

12831 排脓散

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 枳实十六枚 芍药六分 桔梗二分

【用法】 上为散。取鸡子黄一枚，以药散与鸡黄相等，揉和令相得，饮和服之，日一服。

【主治】 ①《金匮》：疮痈，肠痈。②《方极》：疮家胸腹拘满，若吐粘痰，或便脓血者。

【方论选录】 ①《金匮要略心典》：枳实苦寒，除热破滞为君，得芍药则通血，得桔梗则利气，而尤赖鸡子黄之甘润，以为排脓化毒之本也。②《古方选注》：排，斥也；脓，血肉所化也。枳实、赤芍佐以桔梗，直从大肠泄气破血，斥逐其脓。③《金匮要略释义》：夫气行则水行，水行则脓尽，故排脓必用桔梗开利其气以行其水，并佐枳壳为之助；因脓由血化，故兼利血，而用芍药；唯血既腐化而成脓，则去血必多，爰一面排脓以去其气分之实，而用鸡子黄以补其血分之虚。④《金匮要略方论集注》：是方芍药行血分之滞而不伤阴，桔梗利气分之结而不损阳，枳实导水以消肿，鸡子黄调胃以护心安神。允为排脓之良剂也。

【临证举例】 便脓血 《金匮要略今释》引《成绩录》：加贺侯臣某，便脓血既五年，来浪华从医治之亦三年，一门生，与桂枝加术附汤及七宝丸，不治，遂请先生诊之。腹满挛急，少腹硬，底有物，重按则痛，乃与排脓散。受剂而去，未几，来谢曰，宿疴尽除矣。

12832 排脓散

【方源】《得效》卷十九。

【异名】 四味排脓散(《景岳全书》卷六十四)。

【组成】 嫩黄耆二两 川白芷 北五味子（炒） 人参各一两

【用法】 上为末。炼蜜为丸，如小指头大。食后、临卧偃仰入口噙化，旋旋咽下。

【功用】 排脓补肺。

【主治】 肺痈，吐脓后。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“内护排脓散”。

12833 排脓散

【方源】《外科发挥》卷四。

【异名】 八味排脓散(《景岳全书》卷六十四)、八味排脓汤(《会约》卷十九)。

【组成】 黄耆（炒） 当归（酒拌） 金银花 白芷 川山甲（蛤粉拌炒） 防风 连翘 瓜蒌各二钱

【用法】 用水二钟，煎八分，食前服。或为末。每服三钱，食后蜜汤调下亦可。

【主治】 肠痈。少腹痛，脉滑数，或里急后重，或时时下脓。

【备考】《准绳·疡医》有甘草。

12834 排壅汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】 乌药二钱 藿香 香附 枳壳 陈皮（去白）各一钱五分 槟榔 木香各七分 厚朴一钱

【用法】 水煎，热服。

【主治】 妇人癥瘕，邪气壅滞，刺痛之甚者。

【加减】 如气逆之甚者，加白芥子、沉香、青皮之类；如痛在小腹，加小茴。如兼疝者，加荔枝核（煨熟，捣碎）二三钱。

12835 排脓内托散

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 排脓散(《仙拈集》卷四)。

【组成】 当归 白术 人参各二钱 川芎 白芍 黄耆 陈皮 茯苓各一钱 香附 肉桂各八分 甘草五分 白芷（项之上加三分） 桔梗（胸之上加五分） 牛膝（下部加五分）

【用法】 加生姜三片，水二钟，煎八分，食远服。

【功用】 排脓内托。

【主治】 痈疽脑项诸发，已溃流脓者。

12836 排脓内补散

【方源】《直指》卷二十三引《究原方》。

【组成】 人参 当归 川芎 厚朴（姜制） 防风 北梗（焙） 白芷 辣桂 黄耆（炙） 甘草（炙） 白茯苓各等分

【用法】 上为末。每服三钱，温酒调下；如不饮酒，南木香煎汤送下；诸痈热证，黄瓜蒌煎汤送下。

【功用】 活血排脓，扶养内气，救里内塞。

【主治】 痈疽大溃开烂者；肠痈冷证。

12837 排脓内消散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】 何首乌一两 当归 川芎 生地黄 川续断（各洗，焙） 茯苓 芍药 白芷 半夏曲 藿香叶各半两 紫草茸 甘草（炙）各三钱半

【用法】 上为粗末。每服三钱，新水二分，酒一分，加姜、枣煎服。

【功用】 活血排脓消毒，内消红肿。

【主治】 痈疽发背。

【加减】 有热者，加灯心，只用水煎服。

12838 推云散

【方源】《疡医大全》卷十一。

【组成】 石蟹（滚水泡，去夹石并砂土，用竹纸包，槌碎，再研至无声为度） 黄连（去须） 白丁香各一钱 宫粉 金锡（坚重有金星，研飞） 青盐（锅内水化开，澄去砂土，火上煎干） 赤石脂 铜绿（古钱上者刮下，研细，水飞，晒干）各三分 硼砂 乳香（透明者，箬包四五层，铜锅内清水煮数沸，换水煮去油） 没药（制同上）各四分 熊胆（去皮膜） 当门子 枯矾 冰片各一分

【用法】 共乳细用。

【主治】 诸般外障，云翳蟹睛，血翳赤膜。

12839 推云散

【方源】《异授眼科》。

【组成】 炉甘石五分 珍珠二分 玛瑙三分 朱砂四分 熊胆一分半 黄连一分半 乳香六厘 没药六厘 麝香二厘 硼砂三厘

【用法】 上为细末。点眼。

【主治】 白膜遮睛。

12840 推车丸

【方源】《古今医鉴》卷六引毛惟中方。

【组成】 沉香一钱 木香一钱 巴豆一钱（半生半熟） 胡椒一钱（炒爆）

【用法】 上为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服五六十丸。消上，用葱白捣烂，热酒送下；次日消中，用陈皮汤送下；三次消下，用牛膝汤送下。去三五次，不补自止，后用十皮散紧皮。

【主治】 水肿，气肿，单腹胀。

12841 推车散

【方源】 方出《续本事》卷六，名见《得效》卷六。

【组成】 推车客七个 土狗七个（如男子病推车客用头，土狗用身；如女子病土狗用头，推车客用身）

【用法】 上新瓦上焙干为末。用虎目树皮向南者，浓煎汁调，只一服。经验如神。

【主治】 大小便秘，经月欲死者。

【备考】 本方方名，《东医宝鉴·内景篇》引作"车狗散"。该书云：推车客即蜣螂，土狗即蝼蛄，虎目树一云樗木，一云虎枚，恐樗木为正。

12842 推车散

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 推车虫（即蜣螂，炙、研细末）一钱 干姜末五分

【用法】 上为细末。每吹孔内。内有骨，次日不痛自出。吹过周时无骨出，则知内无多骨也。

【主治】 骨槽风生多骨者。

12843 推气丸

【方源】《扬氏家藏方》卷五。

【组成】 槟榔 枳实（小者去瓤） 陈橘皮（去白） 黄芩 大黄 黑牵牛各等分（并生用）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。临卧温熟水送下一百丸。

【主治】 三焦痞塞，气不升降，胸腹胀满，大便秘涩，小便赤黄。

12844 推气散

【方源】《医学正传》卷四引《局方》。

【组成】 片姜黄 枳壳（麸炒） 桂心各五钱 甘草（炙）三钱

【用法】 上为细末。每服二钱，姜汤调下，水煎亦可。

【主治】 ①《医学正传》引《局方》：右胁痛甚，胀满不食。②《普济方》：右胁下大如杯，久不已，令人洒淅寒热，喘嗽、发肺痈。

【方论选录】《医方考》：用枳壳破其气，姜黄利其郁，桂心引二物至于痛处，又曰木得桂而柔，以故用之；甘草取其和缓之气，以调肝木之急。

12845 推气散

【方源】《医宗必读》卷八。

【组成】 枳实 川芎各五钱 甘草（炙）二钱

【用法】 上为细末。每服三钱，姜汤送下。

【主治】 左胁刺痛。

12846 推气散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 枳壳一钱 郁金一钱 桂心 甘草（炙）各五分 桔梗 陈皮各八分

【用法】 加生姜二片，大枣二枚，水煎服。

【主治】 右胁痛。

12847 推荡饮

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】 沙参 当归 知母 槟榔 莱菔 大黄 厚朴

【主治】 因阳明积热而噎膈者。

【加减】 甚者，加芒硝。

12848 推车客散

【方源】《医宗说约》卷五。

【组成】 枣仁（炒） 远志肉 山甲（炒） 骨皮 枳壳（醋煮） 侧柏叶（白矾水煮） 苍术（盐、醋、米、泔、童便制）各二两 槐角子（炒） 陈

棕灰　贯众（酒拌，九蒸九晒）各三两　猬皮（煅存性）一两　白花地丁（七八月采，生白花者阴干）六两

【用法】 上为极细末。空心酒下三钱；白汤送下亦可。服一月后，每服加推车客末三分（即蜣螂），管自推出，出者用快剪剪去。

【主治】 痔漏。

12849　捻头散

【方源】 《小儿药证直诀》卷下。

【异名】 捏头散（《鸡峰》卷二十四）。

【组成】 延胡索　川苦楝各等分

【用法】 上为细末。每服五分或一钱，食前捻头汤调下。如无捻头汤，即汤中滴油数点代之。

【主治】 小儿小便不通。

【方论选录】 ①《本事方释义》：延胡索气味辛温入足厥阴，川苦楝子气味甘寒入手足厥阴。此苦辛泄降之方也。凡小儿小便不通亦是厥阴为病，肝不疏泄，故必用疏肝之法。②《小儿药证直诀类证释义》：延胡、苦楝疏肝泄降，活血止痛。用捻头汤调下，是取其温中益气，润肠利便。

【备考】 《小儿药证直诀类证释义》：捻头汤中捻头，又名寒具。其制法：以糯米粉和面，搓成细绳，盘曲如环形，入油煎之，可以久藏。捻头汤即用寒具煎成之汤。

12850　接气丹

【方源】 《局方》卷五（淳祐新添方）。

【组成】 沉香一两　硫黄（如黑锡丹砂子结，放冷，研为细末）　黑锡（去滓秤）各二两　牛膝（酒浸）　白术（焙）　苁蓉（酒浸）各半两　丁香三钱　川楝子（去核用肉）　木香　茴香（炒）　肉豆蔻（煨）　破故纸（炒）　桂心（去粗皮）　附子（炮，去皮脐）　葫芦巴（炒）　阳起石（煅）各一两

【用法】 上药并砂子四两为细末，用糯米粉酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒、盐汤空心送下。

【主治】 真元虚惫，阴邪独盛，阳气暴绝，或大吐大泻，久痢虚脱。

12851　接气饮

【方源】 《辨证录》卷十二。

【组成】 人参　白术　黄耆　麦冬各五钱　茯苓三钱　当归三钱　贝母　神曲各一钱　炮姜五分

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人气虚，有怀妊至七、八月，忽然儿啼腹中，腹亦隐隐作痛者。

12852　接骨丸

【方源】 《正体类要》引《本事》。

【异名】 接骨丹（《杏苑》卷七）。

【组成】 接骨木半两（即蒴藋也）　乳香半两　赤芍药　当归　川芎　自然铜各一两

【用法】 上为末，用黄蜡四两溶入前末搅匀为丸，如龙眼大。如打伤筋骨及闪痛不堪忍者，用一丸，热酒浸开热呷，痛便止。若大段伤损，先整骨，用川乌、草乌等分为末，生姜汁调贴之，夹定服药，无不效者。

【主治】 打折伤损。

12853　接骨丹

【方源】 《洁古家珍》。

【组成】 天南星四两　木鳖子三两　没药半两　官桂一两　乳香半两

【用法】 上为细末，生姜一斤（去皮，烂研）取自然汁，入米醋少许，白面为糊同调，摊纸上。贴伤处，以绵系之，用篦子夹定，麻索子缠。

【主治】 跌打损伤。

12854　接骨丹

【方源】 《御药院方》卷八。

【组成】 当归（切，焙）二两　甘草（锉、炒）三两　没药（别研）半两　桂（去粗皮）一两半　乳香（别研）半两　泽兰一两　自然铜（火烧红，醋淬七次，研）一两

【用法】 上为细末，入研者药再研令匀，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，不拘时候，日进三服。

【主治】 从高坠堕，伤损疼痛。

12855　接骨丹

【方源】 《元戎》卷十。

【组成】 没药　乳香　当归　川椒　自然铜（醋淬）　赤芍药　败龟版（炙）　虎骨　白芷　骨碎补（炙）　千金藤（郁李仁是也）各等分　（又方加龙骨　川芎）

【用法】 上为细末，化蜡半两为丸，如弹子大。每服一丸，好酒半升化开煎，用东南柳枝搅散，热服。

【主治】 折伤。

12856　接骨丹

【方源】 《赤水玄珠》卷十二。

【组成】 防风　牛膝　当归　虎骨（酥炙）各一两　枸杞子二两半　羌活　独活　龟版　秦艽　萆薢　松节　二蚕沙各一两　茄根二两　苍术四两

【用法】 酒糊为丸。空心服。

【主治】 诸风及鹤膝风。

12857 接骨丹

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】 南星（生）四两 木鳖子三两 紫金皮 芙蓉叶 独活 白芷 官桂 松香 枫香各一两 小麦面二两 乳香 没药各五钱

【用法】 上为末，米醋生姜汁各少许，入酒调匀，摊油纸上夹缚。冬月热缚，夏月温缚。

【主治】 折骨出臼。

12858 接骨丹

【方源】《济阳纲目》卷八十六。

【组成】 乳香 没药各五钱 自然铜一两（醋淬） 滑石二两 龙骨 赤石脂各三钱 麝香一字

【用法】 上为末，用好酒三碗，煮干，就炒燥为末，化黄蜡为丸，如弹子大。每一丸，酒煎，用东南柳枝搅散热服。多服尽好，临卧含化一丸亦妙。

【主治】 折伤。

【加减】 倘若骨已接尚痛，去石脂、龙骨。

12859 接骨丹

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】 土鳖虫（火酒醉死，焙干，雌雄不拘）二钱 自然铜（火煅醋淬十四次）三钱 血竭三钱 骨碎补（去毛）五钱 当归（酒浸）五钱 乳香（去油）五钱 硼砂二钱 大半夏（制）三钱 （一方有半两钱十文）

【用法】 上为细末。每服八厘或一分，酒送下。

【功用】 接骨。

12860 接骨丹

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】 大鳖甲（九轮者，醋煅）一个 地鳖虫（以当归、红花水拌，煅七日）十二个 生姜末三钱 自然铜（醋煅七次）三钱 血竭一钱 儿茶一钱 乳香六分 没药六分 生地炭一钱

【用法】 上为细末。每服一钱。其骨自接，重者三服立愈。

【功用】 接骨。

【主治】 跌打损伤。

12861 接骨散

【方源】《百一》卷十三。

【组成】 半两古老钱（用火煅，醋内淬数过） 没药 乳香各等分 麝香少许

【用法】 上为末。每服一字，用淡姜汤调服，不拘时候。

【主治】 打扑伤损折。

12862 接骨散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】 金头蜈蚣一个 金色自然铜半两（烧红，醋淬，研为细末用之） 乳香二钱（研为细末用之） 铜钱（重半两者）三文或五文（烧红，醋淬细研） 金丝水蛭一钱半（每个作三截，瓦上煨去气道为度） 没药三钱（研细）

【用法】 上为细末。如疮肿处，津调半钱涂，立止痛；如见得出脓，先用粗药末少许，小油少半匙，同打匀，再入少半匙，再打匀，又入前药接骨散半钱，再都用银钗子打成膏子，用鸡翎扫在疮肿处，立止痛，天明一宿自破便效。如骨折损，立接定不疼。如不折了，吃了药，立便止住疼痛。服药觀可以食前服，食后服。又外用接骨药。

【主治】 打折损伤，恶疮

【加减】 如打折骨头并损伤，可用前项接骨散半钱，加马兜铃末一钱，用好酒一大盏，热调，连滓温服。

12863 接骨散

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】 没药 乳香各半两 自然铜一两（煅淬） 滑石二两 龙骨三钱 赤石脂三钱 麝香一字（另研）

【用法】 上为末，好醋浸没，煮多为上，干就炒燥为度。临睡服时入麝香，抄以茶匙，留舌上，温酒下，分上下食前后服。

【主治】 跌扑伤损。

【加减】 若骨已接尚痛，去龙骨、赤石脂，而服多尽好，极效。

【备考】《准绳·疡医》有“白石脂”。

12864 接骨散

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】 自然铜（醋淬）一两 乳香 没药 真血竭 地龙 甜瓜子各五钱 骨碎补 合欢藤 续断各一两 苏木七钱 川归二两

【用法】 上为末。每服二钱至三钱，酒调下。

【主治】 跌扑伤损，骨折筋伤。

12865 接骨膏

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【异名】 当归合气散（原书同卷）、接骨丹（《济阳纲目》卷八十六）。

【组成】 当归一两半 川芎一两 乳香五钱 没药一两 广木香二钱 川乌八钱（火煅） 骨碎补一两 古老钱七个（酒浸七次） 黄香一斤 油三两（熬熟下药）

【用法】 上为末，和油成膏。油纸摊贴。

【功用】 骨碎依旧，筋断续而复初。

12866 接骨膏

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】 五加皮 30 克 乳香 15 克 没药 15 克 土鳖 15 克 骨碎补 15 克 白及 15 克

【用法】 上为细末，蜂蜜或白酒调成糊状。外敷。

【功用】 接骨、活血、止痛。

【主治】 骨折损伤。

12867 接真丹

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】 黑附子 干姜 鹿茸各二两（去毛，酒煮，片切焙干） 硫黄（别研） 补骨脂 官桂 茴香 金铃子各一两

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如梧子大，朱砂为衣。每服三十丸，加至五十丸，生姜汤下，早、晚食前各一服。

【功用】 益气补血，强力进食，退昏倦。

【主治】 脾肾虚损，四肢不持。

12868 接真汤

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】 沉香二钱 丁香二钱 附子（炮裂，去皮脐）四钱 麝香一钱

【用法】 上为粗末。水二盏，生姜七片，枣二枚去核，煎至一盏，滤去滓，温服，只作一服。

【主治】 阴病手足厥冷，脐腹疼痛，真气不足，衰惫欲绝。

12869 接舌金丹

【方源】《疡医大全》卷十五。

【组成】 生地 人参（透明者） 龙齿（透明者）各三钱 象皮一钱 冰片三分 土狗（去头翅）三个 地虱二十个

【用法】 上药先将人参各项俱研细，后用土狗、地虱捣烂，入前药末内捣匀，佩身上，三日干，为末，盛在瓶内听用。此药接骨最奇，服下神效，骨断者服一钱即愈。

【功用】 接骨。

【主治】 舌断，骨断。

12870 接骨仙方

【方源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】 五加皮四两 雄鸡一只（重六两，黑者更妙）

【用法】 鸡去毛，连骨皮血与五加皮捣烂敷患处，用布包好，准贴一周时揭去，切不可太过时。内自完好，神效无比，再用五加皮五两酒煎服。尽量饮醉睡为妙。

【主治】 骨断粉碎者。

12871 接骨灵丹

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】 白萝卜

【用法】 上切碎，捣烂，略去滓汁。敷患处，裹紧。过夜即愈。

【功用】 接骨。

12872 接骨金丹

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 土鳖（阴干听用） 乳香 没药 龙骨 自然铜（煅，醋淬七次）各等分 麝香少许

【用法】 上为细末。每服三分，取土鳖一个为末，加入和匀，黄酒调服。先需整骨而后服之，否则骨接错矣。

【主治】 跌扑损伤。

12873 接骨金丹

【方源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】 半两钱七个或五个（打碎） 明乳香（去油）三钱 甜瓜子每岁十粒（同半两钱炒黄色，去半两钱，只用甜瓜子）

【用法】 上甜瓜子、乳香二味和匀研末，先用蕲艾煎汤沃洗伤处，以新絮包暖，再用好酒冲服。以醉为度，盖暖取汗，其骨自然相接。伤在上身食后服，伤在下身食前服。此方旋配旋用即效，如隔宿则不堪用矣。

【主治】 跌打损伤。

12874 接骨神丹

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【异名】 接骨如神丹（《疡科选粹》卷八）。

【组成】 半夏（一个，对土鳖一个，二味一处捣烂，锅内炒黄色，秤）一两 自然铜二钱 乳香五钱 古铜钱三钱（同自然铜俱用火烧红，入醋淬七次） 没药五钱 骨碎补七钱（去毛）

【用法】 上为极细末。每服三分，用导滞散二钱搅匀，热酒调服，药行患处疼即止；次日再进一服，药末三分、导滞散五分，重者三服，轻者一二服全愈。

【主治】 折伤。

12875 接骨六一散

【方源】《外伤科学》。

【组成】 五加皮 6 份 土鳖 1 份

【用法】 上为细末。蜜调外敷。

【功用】 接骨、活血、止痛。

【主治】 骨折中、后期。

12876 接骨续筋丹

【方源】《医统》卷七十九引《永类钤方》。

【组成】乳香 没药 自然铜（制） 南木香 生地黄 熟地黄 川羌活 川独活 防风 南星 松嫩心（去毛） 粉草 侧柏叶（醋煮） 草乌五枚（炮、去尖） 柘木（糠火煨成炭）

【用法】上药各等分，唯松、柘、柏并加一倍，共为细末。生姜自然汁调下一钱；或蜜丸弹子大，姜汁和酒嚼下。

【功用】生血止痛。

12877 控涎丸

【方源】《医方类聚》卷一六〇引《济生》。

【异名】控涎丹（《袖珍》卷三）、控痰丸（《中国医学大辞典》）。

【组成】生川乌（去皮） 半夏（洗） 僵蚕（不炒，三味锉碎，生姜汁浸一宿）各半两 全蝎（去毒）七个 铁粉三钱 甘遂二钱半

【用法】上为细末，生姜自然汁打糊为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服十五丸，食后用生姜汤送下。

【主治】诸痛久不愈，顽涎聚散无时，变生诸症。

【宜忌】忌食甘草。

12878 控涎丹

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】甘遂（面裹煨） 大戟（制） 真白芥菜子（炒）各等分

【用法】上为末，加桃仁泥糊丸，如梧桐子大。每服五七丸，渐加至十丸，临卧姜汤送下。

【主治】一身及两胁走痛，痰挟死血者。

12879 探渊丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】辛夷一钱 当归五钱 麦冬二两 茯苓三钱 黄芩二钱 白芍一两 天花粉三钱 生地五钱 桔梗二钱

【用法】水煎服。

【主治】鼻渊。涕流黄浊，如脓如髓，腥臭不堪闻者。

12880 掺药

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】白龙骨二分 寒水石三分 轻丹（飞）一分

【用法】上为细末。干贴疮。

【主治】诸疮口脓水不干。

12881 掺脐散

【方源】方出《颅囟经》卷下，名见《保婴易知录》卷下。

【组成】白矾一钱（煅过） 龙骨一分

【用法】上为细末。入麝香少许，每次使拭脐干掺之。用帕裹，避风。

【主治】小儿脐中不干。

12882 辅阳饮

【方源】《证因方论集要》卷二。

【组成】茯苓 半夏 杏仁 熟附子 生姜 砂仁

【主治】外冒阴暑，内滞不消，口渴喜热而不喜冷，大汗如雨，只在上半一身。

【方论选录】茯苓、半夏通阳；杏仁能利肺气；砂仁可和中焦；附子挽回失散之元阳，并可收敛营液；生姜辛以宣其阴凝。

12883 辅正驱邪汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】当归三钱 熟地四钱 人参随便（可用沙参三钱或威参一两代之） 白术三钱 茯苓二钱半 山药三钱 甘草一钱 干姜（炒）一钱（或用煨生姜一钱半） 麻黄一二钱 桂枝一二钱

【用法】水煎服。

【主治】气血两虚，外受风寒，难以疏散者。

【加减】如阳虚寒甚，加附子；头痛，加川芎，白芷，细辛；骨痛，加防风。

12884 救中汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【异名】蜀椒救中汤。

【组成】蜀椒（炒出汗）三钱 淡干姜四钱 厚朴三钱 槟榔二钱 广皮二钱

【用法】加水五杯，煮取二杯，分二次服。

【功用】急驱浊阴，救中焦之真阳。

【主治】卒中寒湿，内挟秽浊伏阴与湿，眩冒欲绝，腹中绞痛，脉沉紧而迟，甚则伏，欲吐不得吐，欲利不得利，甚则转筋，四肢欲厥，俗名发痧，又名干霍乱。

【加减】兼转筋者，加桂枝三钱，防己五钱，薏仁三钱；厥者，加附子二钱。

【方论选录】以大建中之蜀椒，急驱阴浊下行，干姜温中；去人参、胶、饴者，畏其满而守也；加厚朴以泻湿中浊气，槟榔以散结气，直达下焦，广皮通行十二经之气。

12885 救生散

【方源】《三因》卷十六。

【组成】菊花蒂 川芎 石膏（煅）各一两 甘

草一分

【用法】 上为末。每服二钱，煎葱汤调下，不拘时候。如觉胸痞，即调此下宽中丸。

【主治】 外伤风冷，内积忧思，气郁聚涎，随气上厥，伏留阳经，头疼壮热，眩晕，或胸膈寒痞。

12886 救生散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 雄黄（另研） 藜芦 猪牙皂角（生，去皮尖） 白矾（生用，另研）各二钱

【用法】 上除研药外，为细末，入研药同研匀细。每用一字，搐两鼻内。出黄水为效。

【主治】 咽喉闭塞，气息难通。

12887 救生散

【方源】《普济方》卷三五六。

【组成】 乌蛇蜕一条 蝉蜕二七个 血余一个（即胎发）

【用法】 上烧灰。每服二钱，温酒调下，并进二服，仰卧霎时。

【主治】 孕妇逆生。

12888 救生散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 生斑蝥七个（去头翅足） 杭粉一钱

【用法】 上为末。空心温黄酒调服。一时许，小便行出血片白脂，乃恶物也。如便疼，煎甘草汤饮之自利。如毒未尽，次早再一服，至小便清白，方为毒尽。

【主治】 疯犬咬伤。

12889 救母丹

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】 人参一两 当归二两（酒洗） 川芎一两 益母草一两 赤石脂一钱 芥穗三钱（炒黑）

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人生产三四日，儿已到产门，交骨不开，儿不得下，子死而母未亡者。

【方论选录】 此方用芎、归以补血，人参以补气，气旺血旺，则上能升而下能降，气能推而血能送；况益母草又善下死胎，石脂能下瘀血，自然一涌而出，无少阻滞矣。

12890 救汗汤

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】 芍药三两 官桂（去皮，取有味者）三两 甘草二两 附子（生用，不去皮）三两（一方不用附子）

【用法】 上㕮咀。每服五大钱，水一盏半，加生姜五片，大枣二个，同煎八分，去滓温服，不拘时候。合滓再煎。

【主治】 阳虚自汗不止。

12891 救苦丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 黄连一两 当归二钱 甘草一钱

上同锉细，新水半碗，浸一宿，以慢火熬约至一半，以绵滤去滓，以净为妙，用火再熬作稠膏子为度，摊在碗上，倒合以物盖之，用熟艾一大弹子许，底下燃之，用艾熏膏子，艾尽为度。再入下项药：

朱砂一钱（飞） 脑子半钱 乳香 没药等分

【用法】 上为极细末，入黄连膏内，搜和为丸，如米大。每用二丸，点眼大角内，仰面卧，药化则起。

【主治】 眼暴发赤，嗔痛不可忍者。

12892 救苦丹

【方源】《一草亭》。

【组成】 公猪胆一个

【用法】 入银铫内，微火煎成膏，候冷，入冰片末二三厘。点入眼中。渐觉翳轻，又将猪胆白膜皮晒干，合作小绳如钗，火烧灰存性，点翳。

【主治】 久患目盲，白翳遮睛。

12893 救苦汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 还阴救苦汤（《病机启微》卷下）。

【组成】 桔梗 连翘 红花 细辛各一分 当归身（夏月减半） 炙甘草各五分 苍术 草龙胆各七分 羌活 升麻 柴胡 防风 藁本 黄连各一钱 生地黄 黄柏 黄芩 知母各一钱五分 川芎三钱

【用法】 上㕮咀。每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 眼暴发赤肿，睑高苦疼不任者。

【加减】 若苦痛，则多用苦寒者兼治本经之药，再行加减。若睛昏，加知母、黄柏一倍。

12894 救脉汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 人参救肺散（原书同卷）、救肺饮（《脉因证治》卷上）、人参救肺汤（《医学纲目》卷十七）、救脉散（《医统》卷四十二）。

【组成】 甘草 苏木 陈皮各五分 升麻 柴胡 苍术各一钱 当归梢 熟地黄 白芍药 黄耆 人参各二钱

【用法】 上为粗末，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，稍温食前服。

【主治】 吐血、衄血。

12895 救逆汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 于加减复脉汤内去麻仁，加生龙骨四钱，生牡蛎八钱

【用法】 煎如复脉法。

【主治】 温病误表，津液被劫，或在少阴，或在厥阴，心中震震，舌强神昏，中无所主者。

【加减】 脉虚大欲散，加人参二钱。

12896 救绝汤

【方源】《傅青主男科》卷上。

【异名】 救绝止喘汤(《石室秘录》卷六)。

【组成】 人参 熟地各一两 山萸三钱 牛膝 五味子 白芥子各一钱 麦冬五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 虚喘，气少息，喉无声，肩不抬。

12897 救脱汤

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】 人参三两 附子一钱 黄耆三两 熟地 麦冬各一两 五味子一钱

【主治】 精脱耳聋。

12898 救睛丸

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】 栀子 薄荷叶 赤芍药 枸杞子各二两 苍术三两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，井花水送下，或茶清送下亦可。

【主治】 旋螺突睛。

【加减】 年老之人，加茯苓三两。

12899 救睛丸

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 苍术 枳实 甘草 川芎 荆芥 蝉蜕 薄荷 当归 木贼 草决明 谷精草各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后茶清送下。

【主治】 睛肿，旋螺突出，青盲有翳。

12900 救睛散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 川芎 防风 羌活 甘草 木贼 石膏 薄荷 菊花 石决明

【用法】 上为末。每服三钱，清茶调下。

【主治】 五脏壅热，肝膈毒气上冲，忽然眼目肿痛难忍，五轮振起。

12901 救生蕾阳汤

【方源】《准绳·幼科》卷九。

【组成】 石菖蒲 天麻 生乌蛇肉 全蝎 白僵蚕 附子（炮，去皮脐） 羌活 人参 白附子各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水两盏，加生姜五片，薄荷五叶，煎至一盏，滤去滓，温热时时与服。

【主治】 小儿中风昏迷。

12902 救呆至神汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【异名】 收呆至神汤(《串雅内编》卷一)、救呆至神丹(《集成良方三百种》)。

【组成】 人参 柴胡 当归 白芍 半夏 甘草 生枣仁 天南星 附子 菖蒲 六曲 茯苓 郁金

【用法】 水煎服。

【主治】 抑郁不舒，愤怒而成呆病。

【备考】 本方方名《串雅内编选注》引作“收呆汤”。方中用量，《串雅内编》作：人参一两，柴胡一两，当归一两，白芍四两，半夏一两，甘草五钱，生枣仁一两，天南星五钱，附子一钱，菖蒲一两，神曲五钱，茯苓三两，郁金五钱。

12903 救苦化坚汤

【方源】《兰室秘藏》(人卫本)卷下。

【异名】 救苦胜灵汤(《准绳·疡医》卷三)、消瘰化坚汤(《医林纂要》卷十)。

【组成】 黄耆一钱 人参三分 炙甘草五分 真漏芦 升麻各一钱 葛根五分 连翘一钱 牡丹皮三分 当归身 生地黄 熟地黄各三分 白芍药三分 肉桂二分 柴胡八分 黏粘子三分 羌活一钱 独活 防风各五分 昆布二分 京三棱（煨）二分 广茂（煨）三分 益智仁二分 大麦芽面一钱 神曲末（炒黄色）二分 黄连（去须）三分 黄柏（炒）三分 厚朴三钱二分（姜制）

【用法】 上为细末，汤浸蒸饼为丸，捻作饼子，晒干，捣如米粒大。每服三钱，白汤送下。

【主治】 瘰疬，马刀挟瘿。

【加减】 如气短不调及喘者，加人参剂量；如夏月，倍白芍药，冬寒则不可用；如有烦躁者，去肉桂；如疮不在少阳经，去柴胡；无肿者，不用黏粘子；如疮不坚硬，不用京三棱、广茂；如无唾多，吐沫，吐食，去益智仁；如有热，或腿脚无力，或躁烦欲去衣，宜加用黄柏，无则不用；如无腹胀，不用厚朴；如气不顺，加橘皮，甚者加木香少许；如只在阳明分为瘰疬者，去柴胡、黏粘子；如在少阳分，为马刀挟瘿者，去独活、漏芦、升麻、葛根，加粗麦糵三分；如本人素气弱，其病势来时气

盛而不短促者，不可考其平素，宜作气盛而从病变之权也，宜加黄芩、黄连、黄柏、知母、防己之类，视邪气在上中下三处，假令在上焦，加黄芩（一半酒洗，一半生用）；在中焦，加黄连（一半酒洗，一半生用）；在下焦则加酒制黄柏、知母、防己之类；如本人大便不通而滋其邪盛者，加酒制大黄以利；如血燥而大便燥干者，加桃仁、酒制大黄二味；如风结燥不行者，加麻仁、大黄；如风涩而大便不行，加煨皂角仁、大黄、秦艽以利之；如脉涩，觉身有气湿而大便不通者，加郁李仁、大黄以除气燥也；如阴寒之病为寒结闭而大便不通，以《局方》中半硫丸或加煎附子、干姜，冰冷与之。大抵用药之法，不惟疮疡一说，诸疾病量人素气弱者，当去苦寒之药，多加人参、黄耆、甘草之类，泻火而先补其元气，余皆仿此。

【方论选录】 黄耆护皮毛间腠理虚，及治血脉生血，亦疮家圣药也，又能补表，实元气之弱也；人参补肺气之药也；炙甘草能调中，和诸药，泻火，益胃气，亦能去疮邪；漏芦、升麻、葛根三味俱足阳明本经药也；连翘一味，十二经疮中之药，不可无也，能散诸血结气聚，此疮家之神药也；牡丹皮去肠胃中留滞宿血；当归、生地、熟地，诸经中和血、生血、凉血药也；白芍药其味酸，其气寒，能补中益肺之虚弱，治腹中痛必用之；肉桂大辛热，能散结积，阴证疮疡须当少用之，此寒因热用之意，又为寒阴覆盖其疮，用大辛热以消浮冻之气；柴胡功同连翘；羌活、独活，防风，此三味必关手足太阳证，脊痛项强，不可回视，腰似折，项似拔者是也；昆布其味大咸，若疮坚硬结硬者宜用，咸能软坚；麦芽治腹中缩急，兼能消食补胃；黄连以治烦闷，黄柏泻肾中伏火也。

【备考】 本方方名，《济生拔萃》本作“救苦胜灵丹”；改为丸剂，名“救苦化坚丸”（见《杏苑》）。

12904 救苦黄耆散

【方源】《杂类名方》卷十。

【组成】 黄耆 甘草 当归 瓜蒌根 芍药各一两五钱 悬蒌一对 熟地黄不拘多少 金银花二两 皂角棘针（为引）

【用法】 上㕮咀。每服五钱，无灰好酒一升，同引子装于瓷瓶内，将瓶用笋叶封，坐子锅内，上以大盆覆锅口，盆外用黄土封之，无令出气，煮之，外闻药香为度。取出瓶，澄定饮清，将药滓再添酒一升，依前煮服，若不饮酒者，以水煮服，若酒少者，酒、水各半煮服。疮在上，食后临卧服；在下，空心服之。

【主治】 诸恶疮痈疖。

12905 救败求生汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】 人参二两 当归二两（酒洗） 白术二两（土炒） 九蒸熟地一两 山萸五钱（蒸） 山药五钱（炒） 枣仁五钱（生用） 附子一分或一钱（自制）

【用法】 水煎服。

【功用】 补气以回元阳，摄血以归神，生精而续命。

【主治】 少妇产后半月，不慎房帏，血崩昏晕，目见鬼神。

12906 救命延年丸

【方源】《续本事》卷六。

【组成】 黄连六两 干姜 川当归 阿胶各三两

【用法】 上为末，用米醋煮阿胶令消尽，不可剩，将药搜醋丸，如梧桐子大。每服三十丸，饭饮吞下。

【主治】 一切重痢。

12907 救急稀涎散

【方源】《证类本草》卷十四引《孙尚药方》。

【异名】 急救稀涎散（《附广肘后方》卷三）、稀涎散（《本事》卷一）、稀涎饮（《岭南卫生方》卷中）、吐痰散（《点点经》卷二）。

【组成】 猪牙皂角四挺（须肥实不蛀，削去黑皮） 晋矾一两（光明通莹者）

【用法】 上为细末，再研为散。如有患者，可服半钱，重者三字匕，温水调灌下，不大呕吐，只是微微稀冷出，或一升二升，当时惺惺，次缓而调治，不可大呕吐之，恐伤人命。

【功用】《方剂学》：开关涌吐。

【主治】 中风闭证，痰涎壅盛，喉中痰声漉漉，气闭不通，心神昏闷，四肢不收，或口眼㖞斜，脉滑实者；亦治风痫，喉痹。

①《证类本草》引《孙尚药方》：卒中风，昏昏若醉，形体昏闷，四肢不收，或倒或不倒，或口角似利微有涎出，斯须不治，便为大病，此风涎潮于上膈，痹气不通。②《点点经》：一切风痫，人事不知，口吐痰涎。③《医方集解》：喉痹不能进食。

【方论选录】 ①《医方集解》：《经》曰：病发于不足，标而本之，先治其标，后治其本。治不与疏风补虚，而先吐其痰涎。白矾酸苦，能涌泄，咸能软顽痰，故以为君；皂角辛能通窍，咸能去垢，专制风木，故以为使，固夺门之兵也。师曰，凡吐中风之

痰，使咽喉疏通，能进汤药便止，若尽攻其痰，则无液以养筋，令人挛急偏枯，此其禁也。②《方剂学》：本方偏于化痰开窍，而涌吐之力较弱。方中皂角辛能开窍，咸能软坚，善能涤除浊腻之痰；白矾酸苦涌泄，能化顽痰，并有开闭催吐之功。二者相合，具有稀涎作用，能使冷涎微微从口中吐出。对于中风闭证，痰涎壅盛，阻塞气机，妨碍呼吸者，先以本方催吐，使其痰稀涎出，咽喉疏通便止，然后续进他药，随证调治。

12908　救损安胎汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】当归一两（酒洗）　白芍三钱（酒炒）　生地一两（酒炒）　白术五钱（土炒）　炙草一钱　人参一钱　苏木三钱（捣碎）　乳香一钱（去油）　没药一钱（去油）

【用法】水煎服。

【主治】妊娠跌损，致伤胎元，腹中疼痛，势如将堕者。

12909　救脱活母汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参二两　当归一两（酒洗）　熟地一两（九蒸）　枸杞子五钱　山萸五钱（蒸，去核）　麦冬一两（去心）　阿胶二钱（蛤粉炒）　肉桂一钱（去粗皮，研）　黑芥穗二钱

【用法】水煎服。

【主治】产后气喘。

【方论选录】此方用人参以接续元阳，然徒补其气而不补其血，则阳躁而狂，虽回生于一时，亦旋得旋失之道；即补血而不补其肝肾之精，则本原不固，阳气又安得而续乎？所以又用熟地、山萸、枸杞之类，以大补其肝肾之精，而后大益其肺气，则肺气健旺，升提有力矣。特虑新产之后，用补阴之药，腻滞不行，又加肉桂以补命门之火，使火气有根，助人参以生气，且能运化地黄之类，以化精生血。若过于助阳，万一血随阳动瘀而上行，亦非保全之策，更加荆芥以引血归经，则肺气安而喘速定，治几其神乎。

12910　救肠败毒至圣丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【异名】败毒至圣散（《惠直堂方》卷三）。

【组成】金银花九钱（煎水二碗）　当归半两　地榆七钱　薏仁五钱

【用法】上用水十五碗，煎二碗，分作二服。上午一服，临睡一服。

【主治】肠痈。

12911　虚痰丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】枳壳（去瓤）八十二个　斑蝥（去头足翅）八十只　全蝎四十只　蜈蚣十条　大枣半斤（煮烂，去皮核）

【用法】将枳壳内藏斑蝥二只，全蝎一只，对合，芒线结紧，放水中煮极烂，然后取出枳壳内斑蝥、全蝎，炙脆研细；再用炙山甲五钱，炙蜈蚣十条，共研细，入枳壳内，与枣子杵极烂；再加元米七八合，炒黄磨末，入药共杵和，为丸如梧桐子大。每日白毛夏枯草汤送下，五钱为度。未成即消，已溃即敛，然久服可痊，少者两月而愈。

【主治】颈前瘰疬。

12912　虚痰丸

【方源】《朱仁康临床经验集》引《章氏经验方》。

【异名】内消丸。

【组成】炙山甲片末250克　炙全虫末125克　炙蜈蚣60克（研末）　斑蝥末30克

【用法】上为末。另用糯米粽三只石臼内捣烂，逐渐加入上药，捣至适能捻成丸子为度，丸如梧桐子大，晒干备用。每日服三丸，开水送下。

【功用】消肿软坚。

【主治】痈疽，无名肿毒，肿瘤。

12913　雀儿粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】雀粥（《医统》卷八十七）。

【组成】雀儿五只（治如食法，细切）　粟米一合　葱白三茎（切）

【用法】先炒雀儿肉，次入酒一合，煮少时，入水二大盏半，下米煮作粥，欲熟，下葱白五味等，候熟。空心食之。

【主治】脏腑虚损，羸瘦，阳气乏弱。

12914　雀目散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】雄猪肝　夜明砂

【用法】用竹刀批开雄猪肝，纳夜明砂扎好，米泔煮七分熟。取肝细嚼，将汁送下。或雄猪肝煮熟，和夜明砂为丸亦可。

【主治】雀目。肝虚血少，时时花起，或时头痛，久则双目盲，日落即不见物也。

12915　雀盲方

【方源】《千金》卷六。

【组成】地肤子五两　决明子一升

【用法】上为末，以米饮汁和丸。每服二十至三

十丸，食后服，一日二次。药尽即更合，愈止。

【主治】 雀盲。

12916 雀儿药粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】 雀儿十枚（剥去皮毛，剥碎） 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 覆子一合 五味子一两 枸杞子一两 粳米二合 酒二合

【用法】 上为末。将雀肉先以酒炒，入水三大盏，次入米煮粥，欲熟，下药末五钱，搅转，入五味调和令匀，更煮熟空心食之。

【功用】《药粥疗法》：壮阳气，补精血，益肝肾，暖腰膝。

【主治】 ①《圣惠》：下元虚损，阳气衰弱，筋骨不健。②《药粥疗法》：肾气不足所致的阳虚羸弱，阴痿（即性机能减退），早泄，遗精，腰膝酸痛或冷痛，头晕眼花，视物不清，耳鸣耳聋，小便淋沥不爽，遗尿多尿，妇女带下。

【宜忌】《药粥疗法》：发热病人和性机能亢进者忌服。

12917 雀目泻肝汤

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 芒消 大黄 白芍药 桔梗各一钱 黄芩 防风各二钱

【用法】 上为粗末。以水二盏，煎至一盏，食前去滓温服。

【主治】 雀目内障。肝风邪火上冲于目，致成患时暮暗朝明，多痒多涩，发作不常，或明或暗，夜中惟能视直下之物，而不能视上。

12918 常山饮

【方源】《局方》卷八（绍兴续添方）。

【异名】 太医常山饮（《三因》卷六）、常山饮子（《卫生宝鉴》卷十六）。

【组成】 知母 川常山 草果 甘草（炙）各二斤 良姜二十两 乌梅（去仁）一斤

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏，生姜五片，枣子一枚，煎至七分，去滓温服。

【主治】 疟疾。因外邪客于风府，生冷之物内伤脾胃，或先寒后热，或先热后寒，或寒热独作，或连日并发，或间日一发，寒则肢体颤掉，热则举身如烧，头痛恶心，烦渴引饮，气息喘急，口苦舌干，脊膂痠疼，肠鸣腹痛，诸药不治，渐成劳疟者。

12919 常山饮

【方源】《三因》卷六。

【组成】 常山 川山甲（醋炙） 木通 秦艽各一分 辰砂半字（别研） 甘草（炙）半两

【用法】 上锉散，作一剂。水三盏，乌梅、枣子各七枚，煎半盏，再入酒一盏，煎至八分，去滓，入辰砂温服。虚人、老人皆可服。

【主治】 劳疟。

12920 常山饮

【方源】《张氏医通》卷十二。

【组成】 常山（醋炒） 槟榔 青皮（炒） 甘草 当归各一钱 穿山甲（煅）八分（世本作木通） 黑豆四十粒 生姜七片

【用法】 水、酒各半，煎露一宿，侵晨热服。

【主治】 疟发晡时至夜不止，脉实邪盛者。

【方论选录】《医略六书》：邪盛于中，阳明受病而疟发晡时，营阴暗伤故夜热不止焉。当归养血益营，黑豆益阴补肾，使营阴内充则疟邪不至深入阴分；槟榔疏利三焦，甲片透彻经络，使表里交通则疟邪不至逗留中外；青皮破气平肝，甘草缓中和胃，使中气振发则疟邪不致留恋经中；更以生姜散邪，常山涌泄，水、酒各半煎露一宿，总以振祛邪止疟之力。此养营涌泄之剂，为疟久伤正邪陷脉实之专方。

12921 啄木散

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】 腊月啄木鸟一个（用无灰酒三升，先以瓦罐子一个，底铺荆芥穗叶厚一寸，上顿啄木鸟；又用荆芥穗叶盖一寸厚，倾酒在内，仍用纸封合，盐泥固济，炭煅之，候酒干，青烟出为度，去火放冷，只取啄木鸟研为末，次入以下项药） 石膏二两（煅，研） 铁粉（用浆水半升煮尽，研细末用）一两 朱砂一分（研，水飞） 附子一两（正生者，炮裂，去皮脐） 麝香一分（研） 脑子一钱（研）

【用法】 上为细末。每服一钱，先令病人呷温水三两口，以温酒一盏，先少许调药饮之，余酒送之，服毕便就枕睡少时。临发时一服，候一两日更服一次，不过十服即愈。小儿可减服。

【主治】 多年痫病。

【临证举例】 痫病 予有一亲姓王，患痫病十余年，发即涎潮，手足僵踣，颠仆不省，服此药，百服而愈。

12922 啄木鸟膏

【方源】《类证治裁》卷三。

【组成】 啄木鸟（去毛，和骨捣烂熬膏） 麝香一钱

【用法】 密收，入瓷罐。不时嗅之。

【主治】 噎膈反胃。

12923 唾调散

【方源】《朱氏集验方》卷十五。

【组成】 五味子末

【用法】 唾调敷。

【主治】 谷道生泡，痒而复痛，此风毒流行证。

12924 睎露丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】 广茂一两（锉） 京三棱一两（锉，并酒浸） 干漆五钱（洗去腥，炒烟尽） 川乌五钱 硇砂四钱 青皮 雄黄（另研） 茴香（盐炒） 穿山甲（炮）各三钱 轻粉一钱（另研） 麝香半钱（另研） 巴豆三十个（去皮，切开）

【用法】 上除研药外，将巴豆炒三棱、广茂二味深黄色，去巴豆不用，共为末，入研药匀，生姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前，姜汤送下；酒亦得。

【主治】 ①《卫生宝鉴》：寒伤于内，气凝不流，结于肠外，久为癥瘕，时作疼痛，腰不得伸。②《类证治裁》：肠覃，坚久作痛。

12925 眼科保瞳丸

【方源】《中药成方配本》。

【异名】 保瞳丸（《全国中药成药处方集》杭州方）。

【组成】 熟地四两 麦冬三两 杞子三两 白菊花二两 青葙子一两五钱 决明子二两 女贞子二两 菟丝子三两 潼蒺藜三两 煅玄精石一两五钱 谷精草三两 密蒙花一两五钱 知母一两五钱 茯苓二两 车前子一两五钱

【用法】 上为细末，用白蜜六两炼熟，化水泛丸，如绿豆大，约成丸二十八两。每服二钱，开水吞服，每日二次。

【功用】 滋肾保瞳。

【主治】 肝肾两亏，眼目昏花。

12926 蚵蛾丸

【方源】《局方》卷十（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 白芜荑（去皮） 黄连（去须） 蚵蛾（酒浸，去骨，焙） 胡黄连各一两半 青黛半两（为衣）

【用法】 上为细末。猪胆汁面糊为丸，如粟米大。每服三十丸，食后、临卧用饭饮吞下，一日三次。

【主治】 小儿五疳八痢，乳食不节，寒温调适乖违，发竖毛焦，皮肤枯悴，脚细肚大，颅解胸陷，渐觉尪羸，时发寒热，盗汗咳嗽，脑后核起，腹内块生，小便泔浊，脓痢淀青，挥眉咬指，吃土甘酸，吐食不化，烦渴并频，心神昏瞀，鼻赤唇燥，小虫既出，蛔虫咬心，疳眼雀目，名曰丁奚。

12927 蚺蛇酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】 蚺蛇肉一片 羌活一两

【用法】 上药用袋盛，同曲置于缸底，糯饭盖之，酿成酒饮；亦可浸酒。

【功用】 杀虫辟瘴。

【主治】 诸风痛痹，癞风，疥癣，恶疮。

【宜忌】 忌风及欲事。

12928 蚱蝉汤

【方源】《普济方》卷三七七。

【组成】 干蚱蝉七枚（微炙） 白鲜皮一两 钩藤 细辛（去土） 川芎（锉，微炙） 天麻 牛黄（别研）各一分 蛇蜕五寸许（炙令黄）

【用法】 上为末，同牛黄拌匀。每服一钱，加水八分，入人参、薄荷各少许，煎五分，去滓，稍热服。

【主治】 诸风痫，胸中痰盛。

12929 蚯蚓散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】 蚯蚓（去土） 川芎各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，食后、临卧茶清调下。

【主治】 耳聋。

12930 蛇头丸

【方源】《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】 蛇含石十个（煅三度，醋淬，却用甘草汤煮，出酸气，研，飞，为细末） 铁脂粉二两 五灵脂（酒浸，去砂） 神砂（研） 蝎梢 白附子（炮） 郁金（炮）各二两 龙脑（别研）半两 麝香（研）一两 花蛇头十个（酒浸，去骨，用齿并肉）

【用法】 上为细末，面糊为丸，如鸡头大。每服一丸，薄荷自然汁磨，以井花水化开，量儿大小加减与服。

【主治】 小儿急慢惊风，手足抽掣，眼睛直视，角弓反张，证候危急者。

12931 蛇苓汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 乌梢蛇9克 淡黄芩9克 焦荆芥9克 川柏片9克 根生地31克 粉丹皮12克 苦参片12克 白鲜皮12克 地肤子12克 粉萆薢12克

【用法】 水煎，内服。

【主治】 急性湿疹。

12932 蛇矾散

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】 明矾半斤 蛇壳一条

【用法】 将明矾放在铜勺内烧烊，将竹箸子在中间搅一孔，用蛇壳一条捏一团，入矾孔内，同烧枯，研末。吹之。

【主治】 耳内出脓。

12933 蛇退散

【方源】《会约》卷十五。

【组成】 蛇退（烧存性）一条 枯矾 黄丹 扁蓄 藁本各二钱 硫黄 荆芥穗 蛇床子各一钱三分

【用法】 共为细末。香油调搽，湿则干掺。先以荆芥蛇床子汤熏洗，挹干敷药。

【主治】 妇人阴疮。

12934 蛇黄丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 蛇黄（真者）三个（火煅，醋淬） 郁金七分（一处为末） 麝香一字

【用法】 上为末，饭为丸，如梧桐子大。每服一二丸，煎金银磨刀水化下。

【主治】 惊痫。

12935 蛇黄丸

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】 蛇黄一个（煨醋淬七八次，研细） 郁金 雄黄各二钱 铁粉（筛净研细）三钱 青礞石 朱砂各一钱

【用法】 上为末，粳米饭为丸，如梧桐子大。每服一丸，入参煎汤送下。

【主治】 诸痫。

12936 蛇黄散

【方源】《得效》卷十三。

【组成】 蛇黄不以多少（米醋烧淬七次）

【用法】 上为细末。每服二钱，温酒调下；数服便愈，年深者亦效。

【主治】 暗风。忽然仆地，不知人事，良久方醒。

12937 蛇蜕散

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】 蛇蜕一条（烧存性） 枯矾 黄丹 扁蓄 藁本各一两 硫黄 荆芥穗 蛇床子各半两

【用法】 上为细末。香油调搽，湿则干搽。先以荆芥、蛇床子汤熏洗，挹干敷药。

【主治】 妇人阴疮。

12938 蛇蜕膏

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】 蜜蜂二十一个 蛇蜕七分半 蜈蚣（端午前收者佳）二条

【用法】 上用香油四两，将前三药入油，用文武火爆枯，捞去滓；入淀粉二两，用如箸粗桑枝七条，急搅候冷，出火气七日夜。用纸摊贴患处。

【主治】 瘰疬溃后。

12939 蛇蝎液

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 蛇皮 60 克 全蝎 15 克 蜂房 15 克

【用法】 浸泡于食醋 200 毫升中，历 24 小时。外用。

【主治】 疖。

12940 蛇蝎散

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】 蛇蜕（烧存性） 全蝎各等分

【用法】 上为细末。每用少许，敷舌上。

【主治】 舌肿强硬。

12941 蛇蝎散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 全蝎 40 克 祁蛇 40 克 蜈蚣 20 克

【用法】 上为粉末，混合均匀。分作 30 包，每包 3 克。每次一包，一日三次。

【主治】 麻风。

12942 蛇床子汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 蛇床子 当归尾 威灵仙 苦参各五钱

【用法】 水五碗，煎数滚，入盆内。先熏，待温浸洗。二次愈。

【主治】 肾囊风，湿热为患，疙瘩作痒，搔之作疼者。

12943 蛇床子汤

【方源】《金鉴》卷六十九。

【组成】 威灵仙 蛇床子 当归尾各五钱 缩砂壳三钱 土大黄 苦参各五钱 老葱头七个

【用法】 加水五碗，煎数滚，倾入盆内。先熏，候温浸洗。

【主治】 肾囊风。

12944 蛇床子散

【方源】《金匮》卷下。

【组成】 蛇床子仁

【用法】 上为末。加白粉少许，和合相得，如大枣大，绵裹纳之。自然温。

【功用】 温阴中。

【主治】 妇人阴寒。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：风寒入阴户，痹而或冷，或用蛇床以起阴分之阳，阳强则痹开而温矣。②《金匮要略心典》：阴寒，阴中寒也。寒则生湿，蛇床子温以去寒，合白粉以除湿也。此病在阴中而不关脏腑，故但纳药阴中自愈。

12945 蛇床子散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 蛇床子半两 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别研为末） 远志半两（去心） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 五味子半两 防风半两（去芦头） 巴戟三分 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 熟干地黄一两

【用法】 上为细散。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】 虚劳阴萎，四肢乏力。

12946 蛇床子散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 蛇床子 细辛 藁本 吴茱萸 小椒 枯矾 紫稍花各半两

【用法】 上为细末。每用药末半两，加水三碗，煎至两碗，临卧稍热淋渫。

【主治】 阴萎，阳事不举。

12947 蛇床子散

【方源】《中医妇科学》。

【组成】 蛇床子 川椒 明矾 苦参 百部各10～15克

【用法】 煎汤。趁热先熏后坐浴，一日一次，十次为一疗程。

【主治】 阴痒。

【加减】 阴痒破溃者，去川椒。

12948 蛇蜕皮散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】 蛇蜕皮半两（烧灰） 麝香一钱

【用法】 上为细末。每服一钱，以热酒调下，并进三四服。

【主治】 吹奶。痈肿疼痛，寒热发歇，昼夜呻唤。

12949 蛇床子软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 蛇床子（粉末）30克 白凡士林70克

【用法】 调成软膏外用。

【主治】 湿疹。

12950 蛇床子洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 蛇床子31克 苦参31克 威灵仙9克 苍术9克 黄柏9克 明矾9克（一方加荆芥、防风、五倍子）

【用法】 水煎，熏洗。

【主治】 急性湿疹。

12951 蛇床百部酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 蛇床子200克 百部200克

【用法】 上为粗末，用75%酒精浸。外用。

【主治】 皮肤搔痒症，神经性皮炎。

12952 蛇床鹤虱粉

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 蛇床子10克 鹤虱10克 黄柏10克

【用法】 上为细末。撒布，干包。

【主治】 足癣糜烂型。

12953 蛇蝎续命汤

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】 白花蛇（酒浸，去皮骨，焙） 全蝎（炒） 独活（去土） 天麻 附子（炒，去皮脐） 人参 防风 肉桂（去粗皮） 白术 藁本 白附子（炮） 赤箭 川芎 细辛（去叶） 白僵蚕（去土灰，炒） 甘草（炒） 半夏（汤浸糊，切） 白茯苓（去皮） 麻黄（去节，水煮三沸，去沫，细切）各一两

【用法】 上为粗末。每服五钱，加水一盏，入生姜五片，煎至七分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 卒中急风，牙关紧急，精神昏愦，口眼㖞斜，不省人事，痰涎不利，喉中作声。

12954 野茴香膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 野茴香222克 除虫菊根44克 白鲜皮44克 干姜44克 蜂蜜1062克

【用法】 将蜂蜜倒入容器，置沸水中熔化（水浴）搅拌除沫，将上药共研细过筛的药面，徐徐倒入蜜内，充分搅拌成稀糊状，放置即成膏状。每日三次，每服15克。10天后，每次增加5克，一直加至30克（日量90克），直至痊愈。

【主治】 白癜风。

12955 野蔷薇露

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 野蔷薇花瓣一斤

【用法】 用蒸汽蒸馏法，每斤吊成露三斤。每用四两，隔水温服，小儿酌减；外用漱洗。

【功用】 宣郁解热。

【主治】 口疮，口糜。

12956 婴儿湿疹软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 煅蛤粉 5 克 煅石膏 5 克 枯矾 5 克 青黛 5 克 轻粉 5 克 硫黄 3 克 冰片 1 克 黄丹 1 克 川椒 0.1 克 蜂蜜 30 克 凡士林 40 克

【用法】 上为细末，调膏。外用。

【主治】 婴儿湿疹。

12957 铜末散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【异名】 熟铜末散(《御药院方》卷九)。

【组成】 熟铜末一两 当归 地骨皮 细辛 防风（去芦头）各一两

【用法】 上为末，和铜末同研如粉。以封齿上，日夜三度。三五日后牢定。

【功用】 令牙齿牢定。

【主治】 牙齿非时脱落。

【宜忌】 一月内不得咬着硬物。

12958 铜青散

【方源】《得效》卷十二。

【组成】 川白芷半两（生） 马牙消一钱 铜青一分 麝香一字

【用法】 上为末。干敷口角，及擦齿上。

【主治】 走马疳。口内生疮，牙龈溃烂，齿黑欲脱，或出血臭气。

12959 铜粉丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 铜青五钱 官粉三钱 明矾一钱五分 麝香一分五厘 冰片一分二厘 黄连二两（切片，煎稠膏） 轻粉一钱五分

【用法】 上为细末，黄连膏为丸，如芡实大。每用一丸，放碗内，汤泡纸盖，候烊顿热，用上面清水勤洗之。自愈。

【主治】 唇风。下唇发痒作肿，破裂流水，不疼难愈。

12960 铜绿散

【方源】 方出《洁古家珍》，名见《普济方》卷三〇一。

【组成】 五倍子（细研）五钱 白矾一钱 铜绿少许 轻粉一字 乳香半钱

【用法】 上为极细末，洗净掺之。

【主治】 ①《洁古家珍》：男子、妇人阴部湿淹疮。②《医略六书》：阴内痔核，脉缓者。

12961 铜绿软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 铜绿 30 克 密陀僧 30 克 铅粉 30 克 松香 30 克 黄蜡 30 克 香油 500 克

【用法】 常法炼膏。

【主治】 慢性湿疹，神经性皮炎。

12962 银白散

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】 白术 人参 白茯苓 甘草（炙） 白扁豆（炒） 薏苡仁（炒） 藿香

【主治】 呕逆哕，哕不止。

12963 银花汤

【方源】《竹林女科》卷三。

【组成】 金银花 黄耆（生）各五钱 当归八钱 甘草一钱八分 枸橘叶（即臭橘叶）五十片

【用法】 水酒各半煎服。

【功用】 未成者消，已成者溃，已溃者收功。

【主治】 乳岩，积久渐大，蟾岩色赤出水，内溃深洞。

12964 银杏汤

【方源】《竹林女科》卷二。

【组成】 熟地黄一两 山萸肉 薏苡仁 怀山药各四钱 茯苓三钱 泽泻 丹皮各二钱 黑豆三合

【用法】 上先将黑豆汤煎汁二碗，先取一碗，入银杏（即白果）十个，大红枣二十个，煎好，再入诸药，加水二碗，煎八分服。仍有豆汁，候覆滓用。

【主治】 妊娠白带。

12965 银杏散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 杏仁（去皮尖，研） 轻粉 水银（铅制） 雄黄各一钱

【用法】 上各为细末。每用五分，枣肉一枚为丸。用丝绵包裹，留绵条捻线在外，用埚痒汤煎洗，药裹安入阴内，留线在外，如小便，取出再入，一日一换。

【主治】 妇人湿热下注，阴中作痒，及内外生疮。

12966 银杏散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 雄黄 干白果 朝脑 生矿子灰各等分

【用法】 上为末。用干烧酒调敷。

【主治】 阴湿疮，瘙痒彻骨不可忍者。

12967 银杏膏

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】 陈细茶四两（略焙，为细末） 白果肉四两（一半去白膜，一半去红膜，擂烂） 核桃肉四两（擂） 家蜜半斤

【用法】 上药入锅内炼成膏。不拘时候服。

【主治】 久年咳嗽吐痰。

12968 银荷汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 连翘 黄芩 防风 荆芥 麝香各一钱 银花一钱半 薄荷八分 黄连 甘草各五分

【用法】 水煎服。

【主治】 缠喉风及一切喉证。

12969 银粉散

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】 银朱散(《嵩崖尊生》卷十三)。

【组成】 好锡六钱 朱砂末二钱 水银一两 杭粉一两

【用法】 上先将锡化开，下朱砂搅炒，砂枯去砂，留锡再化开，投入水银和匀，倾出听用；杭粉研细，铺夹纸上卷成一条，一头点火煨至纸尽为度，吹去灰，用粉与汞锡同煎，加真轻粉一两，共成一家研细。凡遇患者，先用甘草汤淋洗挹干，随用此药掺上。

【功用】 止痛生肌，收敛疮口。

【主治】 下疳无论新久，但腐烂作痛，及杨梅疮熏后结毒，玉茎腐烂，或阳物半伤半全者。

12970 银液丹

【方源】《局方》卷一。

【组成】 黑铅（炼十遍，秤三两，与水银结沙子，分为小块，同甘草三两，水煮半日，候冷，取出研用） 铁粉 水银（结沙子）各三两 朱砂（研，飞）半两 天南星（炮，为末）三分 腻粉（研）一两

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二丸，食后用薄荷蜜汤送下，生姜汤亦得；如治风痫，不拘时候服。微利为度。

【主治】 诸风痰涎蕴结，心膈满闷，头痛目运，面热心忪，痰唾稠粘，精神昏愦，及风痫潮搐，涎潮昏塞。

12971 银翘汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 银花五钱 连翘三钱 竹叶二钱 生甘草一钱 麦冬四钱 细生地四钱

【用法】 水煎服。

【功用】《方剂学》：滋阴透表。

【主治】 阳明温病，下后无汗脉浮者。

【宜忌】 下后脉浮而洪，或不浮而数者，忌用。

【方论选录】《方剂学》：银翘汤为透表清热之轻剂。因下之后，积秽去，腑气通，余邪还表，但以气阴俱伤，未得外透，证见无汗脉浮，故仿银翘散意，仍以银花、连翘解毒而轻宣表气；配伍竹叶清上焦之热，生甘草益气清火，增入麦冬、细生地滋阴清热，使还表之邪，得汗而解。若下后虽无汗，但脉浮而洪，或不浮而数者，不可用此方。

12972 银翘散

【方源】《温病条辨》卷一。

【异名】 银翘解毒散(《全国中药成药处方集》西安方)。

【组成】 连翘一两 银花一两 苦桔梗六钱 薄荷六钱 竹叶四钱 生甘草五钱 芥穗四钱 淡豆豉五钱 牛蒡子六钱

【用法】 上为散。每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煮。肺药取轻清，过煎则味厚而入中焦矣。病重者，约二时一服，日三服，夜一服；轻者三时一服，日二服，夜一服；病不解者，作再服。

【功用】 ①《温病条辨》：辛凉平剂。②《方剂学》：辛凉透表，清热解表。

【主治】 ①《温病条辨》：太阴风温、温热，温疫、冬温，初起但热不恶寒而渴者。②《福建中医药》(1964；5:16)：温病范围的各种疾病，如急性支气管炎、肺炎、流感、百日咳、腮腺炎、麻疹、水痘、急性喉头炎等属外感温邪，有肺卫症者。

【加减】 若胸膈闷者，加藿香三钱，郁金三钱，护膻中；渴甚者，加花粉；项肿咽痛者，加马勃、玄参；衄者，去芥穗、豆豉，加白茅根三钱，侧柏炭三钱，栀子炭三钱；咳者，加杏仁利肺气；二三日病犹在肺，热渐入里，加细生地、麦冬保津液；再不解，或小便短者，加知母、黄芩、栀子之苦寒，与麦、地之甘寒，合化阴气，而治热淫所胜。

【方论选录】 ①《温病条辨》：本方谨遵《内经》“风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘；热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦”之剂。又宗喻嘉言芳香逐秽之说，用东垣清心凉膈散，辛凉苦甘，病初起，且去入里之黄芩，勿犯中焦；加银花辛凉，芥穗芳香，散热解毒，牛蒡子辛平润肺，解热散结，除风利咽，皆手太阴药也。此方之妙，预护其虚，纯然清肃上焦，不犯中下，无开门揖盗之弊，有轻以去实之能，用之得法，自然奏效。②《成方便读》：银翘散，治风温温热，一切四时温邪。病从外来，初起身热而渴，不恶寒，邪全在表者。故以辛凉之剂，轻解上焦。银花、连翘、薄荷、荆芥，皆辛凉

之品，轻扬解散，清利上焦者也。豆豉宣胸化腐，牛蒡利膈清咽，竹叶、芦根清肺胃之热而下达，桔梗、甘草解胸膈之结而上行，此淮阴吴氏特开客气温邪之一端，实前人所未发耳。③《方剂学》：温者，火之气也，自口鼻而入，内通于肺，所以说"温邪上受，首先犯肺。"肺与皮毛相合，所以温病初起，多见发热头痛，微恶风寒，汗出不畅或无汗。肺受温热之邪，上熏口咽，故口渴，咽痛；肺失清肃，故咳嗽。治当辛凉解表，透邪泄肺，使热清毒解。吴氏宗《素问·至真要大论》："风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘"之训，综合前人治温之意，用银花、连翘为君药，既有辛凉透邪清热之效，又具芳香辟秽解毒之功；臣药有二，即是辛温的荆芥穗、豆豉，助君药开皮毛而逐邪；桔梗宣肺利咽，甘草清热解毒，竹叶清上焦热，芦根清热生津，皆是佐、使药。本方特点有二，一是芳香辟秽，清热解毒；一是辛凉中配以小量辛温之品，且又温而不燥，既利于透邪，又不背辛凉之旨。方中豆豉因制法不同而有辛温辛凉之异，但吴氏于本方后有"衄者，去荆芥、豆豉"之明文。在银翘散去豆豉加细生地、丹皮、大青叶，倍元参汤的方论中又明确指出："去豆豉，畏其温也。"所以本方的豆豉还应作辛温为是。至于用法中"香气大出，即取服，勿过煮。"此说实为解表剂煎煮火候的通则。

【临证举例】 ①风热感冒 《广东中医》（1962；5:25）：用银翘散粗末治疗风热感冒1150例，凡感受风温湿热，温疫，冬温等邪气所引起的病，症见微恶风寒，发热，自汗，头痛，口渴或不渴而咳，脉浮数，舌苔白，属风热型者，均可用本方治疗，一般一剂后热度降低，2至4天可全愈，平均2.7天。②小儿肺炎《湖北中医杂志》（1982；1:55）：用本方加减治疗小儿肺炎25例，均于3至5天内痊愈。其中2天内退热者17例，4天内退热者8例；湿罗音于3天内消失者9例，5天内消失者16例；X线胸透者12例，病灶均在5天内消失。作者认为本方对屡用抗菌素治疗效果不好的肺炎有一定疗效。③麻疹初期《中医争鸣》（1958；3:9）：用本方加减治疗55例麻疹，平均退热时间为7.0±0.24天，而用一般药物治疗的101例为8.41±0.22天。本方不仅退热快，且能使透疹过程顺利，其他症状的缓解消失也较快。④温病范围的各种疾病 《福建中医药》（1964；5:16）：运用银翘散治疗温病范围的各种疾病的初起约100多例（其中包括急性支气管炎、肺炎、流感、百日咳、腮腺炎、麻疹、水痘、急性喉头炎等），其初期共同症状有发热，头痛，咳嗽，鼻塞流涕或口干，咽痛等，属外感湿邪，邪在肺卫者，用本方治疗，均取得满意效果。

【现代研究】 ①解热作用 《中医杂志》（1986；3:29）：对2.4-二硝基酚所致的大鼠发热，本方有强而迅速的解热作用。注射发热剂后，对照鼠体温于30分钟内上升1℃以上，2小时才逐渐恢复正常，而灌服银翘散袋泡剂10g/kg后，可完全抑制大鼠的发热反应，整个实验期间大鼠体温均保持于正常状态。银翘解毒片在倍量时也有一定解热效果。②对免疫功能的影响 《中医杂志》（1986；3:219）：小鼠实验表明，本方不能增强网状内皮系统对血流中惰性炭粒的吞噬廓清，对肝、脾、胸腺重量也无明显影响，但对腹腔巨噬细胞对鸡红血球的吞噬能力及细胞内消化能力则有显著的促进作用，表明本方能增强非特异性吞噬功能。对以2.4-二硝基氟苯所致小鼠皮肤迟发型超敏反应，本方无论是煎剂、片剂及袋泡剂均有显著的抑制作用。此外，对于天花粉所致小鼠及大鼠之皮肤被动过敏反应，以及天花粉所致小鼠速发型超敏反应，均有不同程度的抑制作用，表明本方仅具有显著的抗过敏作用。

【备考】 本方改为丸剂，名"银翘解毒丸"（见《北京市中药成方选集》）；改为片剂，名"银翘解毒片"（见《中国药典》一部）；本方改为膏剂，名"银翘解毒膏"（见《全国中药成药处方集》天津方）。

12973 银苇合剂

【方源】《方剂学》。

【组成】 银花 连翘各五钱 桔梗三钱 杏仁二至四钱 红藤一两 鱼腥草一至二两 冬瓜仁 桃仁各三钱 鲜芦根二尺（去节）

【主治】 肺脓疡成脓期。

【加减】 高热，痰腥臭，可加桑白皮、地骨皮各五钱至一两；心烦，咯吐脓血，可加百合一两，麦冬三钱，阿胶三钱（烊冲）；胸痛，可加瓜蒌三钱，枳壳一钱半，丹参四钱。

12974 银杏无忧散

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】 银杏散（《嵩崖尊生》卷十三）。

【组成】 水银（铅制） 杏仁（去皮，捣膏） 轻粉 雄黄 狼毒 芦荟各一钱 麝香一分

【用法】 上除水银、杏仁膏，余药为末，入上二味，再研匀。先用土菖蒲煎汤洗之，用针挑去虱孔，随用津唾调擦。

【主治】 阴虱。

【宜忌】 忌牛、犬、鳖肉。

12975 银杏瓜蒌散

【方源】《医级》卷七。

【组成】 蒌仁 银杏 甘草 银花 连翘 贝母 黄芩 石斛 花粉 蒂丁

【主治】 胃脘成痈，胸下拒按，呕脓。

12976 银翘马勃散

【方源】《温病条辨》卷一。

【异名】 银翘马勃射干牛蒡汤(《温热经解》)。

【组成】 连翘一两 牛蒡子六钱 银花五钱 射干三钱 马勃二钱

【用法】 上为散。每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煮。病重者，约二时一服，日二服，夜一服；轻者三时一服，日二服，夜一服；病不解者，作再服。

【主治】 湿温，喉阻咽痛。

【加减】 喉不痛，但阻甚者，加滑石六钱，桔梗五钱，苇根五钱。

12977 银翘辛夷汤

【方源】《中医内科临床治疗学》引冷柏枝方。

【组成】 银花9克 连翘12克 辛夷3克 山栀3克 黄芩3克 桑叶3克 荆芥6克 薄荷3克 桔梗6克 生甘草3克 丝瓜藤10克

【用法】 水煎服。

【主治】 鼻窦炎。

12978 银翘散加生地丹皮赤芍麦冬方

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 银翘散内加生地六钱 丹皮四钱 赤芍四钱 麦冬六钱

【用法】 上为散。每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煎，病不解，作再服。

【主治】 太阴伏暑，舌赤口渴，无汗者。

12979 银翘散去牛蒡子玄参加杏仁滑石方

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 银翘散内去牛蒡子、玄参，加杏仁六钱，飞滑石一两

【用法】 上为散。每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煎，病不解，作再服。

【主治】 太阴伏暑，舌白口渴，无汗者。

【加减】 胸闷，加郁金四钱，香豉四钱；呕而痰多，加半夏六钱，茯苓六钱；小便短，加薏仁八钱，白通草四钱。

12980 银翘散去牛蒡子玄参芥穗加杏仁石膏黄芩方

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 银翘散内去牛蒡子、玄参、芥穗，加杏仁六钱，生石膏一两，黄芩五钱

【用法】 上为散。每服六钱，鲜苇根汤煎，香气大出，即取服，勿过煮，病不解，作再服。

【主治】 太阴伏暑，舌白口渴，有汗，或大汗不止者。

12981 银翘散去豆豉加细生地丹皮大青叶倍玄参方

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 银翘散内去豉，加细生地四钱、大青叶三钱、丹皮三钱、玄参加至一两

【主治】 太阴温病，发疹者；阳明温病，下后疹续出者。

【方论选录】 银翘散内加四物，取其清血热；去豆豉，畏其温也。

12982 移毒散

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】 白及一两六钱 紫花地丁八钱 乌骨鸡(煅) 朱砂 雄黄 轻粉各一钱 五倍子二钱 大黄二钱 猪牙皂角八分

【用法】 上为末。用好醋调敷毒之上截，即移至下半截。

【功用】 毒发于骨节间，移之免残疾。

12983 移险散

【方源】《外科大成》卷四。

【异名】 移险膏(《理瀹》)。

【组成】 南星 白及 草乌 黄柏各二两 文蛤(炒)一两

【用法】 上为末，调如糊。随四围匝如墙壁。再用南星、白及、白蔹、白芷、贝母等分，为末，水调，此药敷前围药之内，提起内毒，制之有理。

【功用】 可移险处肿毒就不险处。

12984 移热汤

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】 五苓散合导赤散

【主治】 口糜。

12985 甜浆粥

【方源】《纲目拾遗》卷八引陈廷庆方。

【组成】 豆腐浆

【用法】 煮粥食。

【功用】 泻火，通淋浊。

【主治】《长寿药粥谱》：年老体衰，营养不良，以及血管硬化症，高血压，冠心病的防治。

12986 甜瓜子丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】甜瓜子（净）二两（炒黄色） 干木瓜一两半（去皮瓤） 威灵仙一两 川乌头半两（炮，去皮脐）

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。避风处少息，汗出为度。若病在上，食后服；病在下，食前服。

【主治】风湿相搏，腰脚疼痛。

【宜忌】服药后当日忌食热物，及相反药材，如半夏、瓜蒌、贝母、白及之类。

12987 甜瓜子散

【方源】《医方类聚》卷一七二引《圣惠》。

【组成】甜瓜子二两 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 牡丹一两 川大黄一两半（锉碎，微炒） 川朴消一两 薏苡仁一两 败酱一两 当归半两 槟榔三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肠痈。肿痛妨闷，气欲绝。

12988 甜葶苈丸

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 人参三分（去芦头） 赤茯苓三分 蛤蚧一对（头尾全者，涂酥炙令微黄） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，一日三四次。

【主治】一切咳嗽久不愈。

12989 甜葶苈丸

【方源】《圣惠》卷四十六。

【异名】葶苈丸（《百一》卷五）、葶苈防己丸（《赤水玄珠》卷五）。

【组成】甜葶苈二两（隔纸炒令紫色） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 汉防己一两 贝母一两（煨令微黄） 木通一两（锉）

【用法】上为末，以枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎桑根白皮送下，不拘时候。

【主治】肺气咳嗽，面目浮肿，喘促，眠卧不安，小便赤涩。

12990 甜葶苈丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】甜葶苈二两（隔纸炒令紫色） 汉防己一两 海蛤一两（细研） 椒目一两（微炒去汗） 川芒消一两 赤茯苓一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服以木通一两，桑根白皮一两，百合一两，郁李仁半两，捣粗罗为散，以水一中盏，煎至六分，去滓，送下三十丸，一日三次。

【主治】卒身面四肢浮肿，腹胁气胀满，小便不利。

12991 甜葶苈丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】甜葶苈 杏仁 半夏 槟榔各二两 神曲一两 黑牵牛四两（半生，半熟） 皂荚五挺

【用法】上为细末，后入葶苈、杏仁再研匀调，浸皂荚酒为面糊和丸，如梧桐子大。每服二十丸或三十丸，温生姜汤送下。

【功用】顺气宽中，破坚祛积，逐痰水，行结气，消除腹胀，通利痞塞。

【主治】肺气壅滞，喘闷不快，胃中停饮，腹胀鼓痛；或呕逆涎痰，呼吸短气；或胁气牢满，骨间刺痛；及咳逆肿满，背脊拘急，大便秘滞，小水赤涩。

12992 甜葶苈散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【异名】葶苈散（《普济方》卷一六一）。

【组成】甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 木通半两（锉） 旋覆花半两 紫菀半两（去苗土） 大腹皮三分（锉） 槟榔半两 郁李仁一两（汤浸去皮，微炒） 桑根白皮一两（锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，面目浮肿，不得安卧，涕唾稠粘。

12993 梨膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】秋梨三千二百两 麦冬三十二两 贝母三十二两 百合三十二两 款冬花二十四两 冰糖六百四十两

【用法】上将秋梨切碎，加麦冬等四味，水煎三次，分次过滤后去滓，滤液合并，用文火煎熬，再将冰糖溶化，兑入浓缩液内成膏状，以不渗纸为度。每两膏汁，兑炼蜜一两，瓶装，每服三钱至五钱，开水调化送下，一日二次。

【功用】润肺利咽，生津止嗽。

【主治】肺热咳嗽，口燥咽干，失音声哑，气促作喘。

12994 偏风散

【方源】《良方集腋》卷上。

【组成】 白当归四两（福珍酒洗、晒干、炒） 奎白芍四两（炒黄） 石膏四两（煅） 牛蒡子四两（炒）

【用法】 上为末。每服三钱，加黄糖一钱，卧时陈酒冲服，量饮取汗。

【主治】 半偏头痛。

12995 假苏散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 荆芥 陈皮 香附 麦芽（炒） 瞿麦 木通 赤茯苓各等分

【用法】 上为末。每服三钱，开水调下。

【主治】 气淋。

12996 兜涩固精丸

【方源】《活人方》卷四。

【组成】 白术四两 人参二两五钱 茯苓二两五钱 半夏二两 远志肉一两 肉果（面煨）一两 补骨脂（盐水炒）一两 赤石脂（醋煅）一两 五味子（焙）五钱 益智仁（盐炒）五钱

【用法】 上为末，炒莲肉粉糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，早晨空心米汤送下。

【主治】 脾肺肾元气虚寒，素有湿痰积饮，留滞肠胃，上则呕吐冷涎，恶心痞满，下则滑泄不禁，昼夜无度，久则胃弱而食减，脾虚而不运，男兼滑精，女兼淋带。

12997 徙薪饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 徙薪散(《叶氏女科》卷三)。

【组成】 陈皮八分 黄芩二钱 麦冬 芍药 黄柏 茯苓 牡丹皮各一钱半

【用法】 水一钟半，煎七分。食远温服。

【主治】 三焦凡火，一切内热，渐觉而未甚者。

【加减】 多郁，气逆伤肝，胁肋疼痛，或致动血者，加青皮、栀子。

12998 得效百部丸

【方源】《普济方》卷一五七。

【组成】 百部（焙） 麻黄各七钱半（为末） 杏仁四十九粒（去皮尖，炒，别研为末）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如芡实大。熟水化下。若肺受风邪不散，喘急，目能认人，口不能言，每服一丸，煎陈皮、罂粟、桑白皮汤化下。

【主治】 大人、小儿咳嗽。

12999 衔化丸

【方源】《玉案》卷三引《千金》。

【组成】 玄明粉 石膏（煅红，黄连煎汁淬，如此九次） 玄参各二两 白硼砂 薄荷叶 黄柏各四钱 冰片五分

【用法】 上为末，牛蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，含化。外用珍宝散掺上，即愈。

【主治】 上焦实热，口内溃烂，饮食难进。

13000 敛汗丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 黄耆一两 牡蛎粉一两（煅） 肉桂五钱 知母一两（炒） 人参五钱 白术一两 芡实一百枚

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，煎麦汤送下。

【主治】 自汗无度，或多冷汗。

13001 敛汗汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】 黄耆一两 麦冬五钱 北五味二钱 桑叶十四片

【用法】 水煎服。

【主治】 大病之后，无过而遍身出汗，日以为常，是阳气之虚，外泄而腠理不能自闭。

13002 敛肠丸

【方源】《百一》卷六。

【组成】 木香 丁香 附子（炮，去皮脐） 缩砂仁 诃子皮 罂粟壳（炒，去瓤顶） 川姜（炮） 没石子 梓州厚朴（姜制） 白龙骨 肉豆蔻（面裹煨） 赤石脂（煅） 禹余粮（醋淬七遍）各一两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前米饮送下。

【主治】 久泻。

13003 敛肺汤

【方源】《成方便读》卷四。

【组成】 百药煎 诃子皮 五味子 黄耆皮 白及片 胡桃肉 罂粟壳 甜杏霜

【主治】 久嗽，纯虚无邪。

【方论选录】 方中百药煎、诃子皮、罂粟壳，皆清虚之品，入肺而敛其耗散；五味子敛而兼补，且能保肺滋肾；耆皮固肺气；白及补肺损；胡桃、杏仁润肺燥耳。

13004 敛毒散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】 南星 赤小豆 白及各等分

【用法】 上为末。井水调敷四围，软帛贴之。

【功用】 收毒。

【主治】 痈疽。

13005 敛带丸

【方源】《简明医彀》卷七。

【组成】当归 川芎 茯苓 白术 香附（醋炒） 山药 臭椿根皮 杜仲（姜汁、酒炒） 牡蛎（火煅，醋淬） 鹿角霜（另研） 破故纸（酒炒） 白芍（酒炒） 人参各等分

【用法】上为末，乌梅肉蒸捣和入，加醋糊丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心米汤送下。

【主治】带久，气血两虚，面黄肌瘦，无力身热，饮食无味，四肢倦怠。

【加减】虚，加黄耆、地黄；热，加地骨皮、青黛；痰，加陈皮、半夏、南星；小便涩，加车前子；瘦人，加黄柏；胸满，去人参，加砂仁；腹痛，去参，加延胡索、小茴香；冬，加炮姜；久，加升麻、柴胡。

13006 敛疮丹

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】马屁勃一两 轻粉一钱 三七根末三钱

【用法】上为细末。先用葱盐汤洗净，拭干，以药末敷之。即愈。

【主治】臁疮不敛。

13007 敛瞳丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地一两 山茱萸五钱 白芍一两 当归五钱 黄连三钱 五味子一钱 人参三钱 甘草一钱 地骨皮五钱 柴胡五分 柞木枝三钱 陈皮五分 黄柏五分

【用法】水煎服。连服四剂，瞳子渐小，再服四剂，而视物有准矣，服一月全愈。

【功用】解热益气滋阴。

【主治】目痛，二瞳子大于黄睛，视物无准，以小为大，是气血之虚，而骤用热物火酒以成之者。

13008 敛阴泻肝汤

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】生杭芍一两半 天花粉一两 射干四钱 浙贝母四钱（捣碎） 酸石榴一个（连皮捣泥）

【用法】上同煎汤一钟半。分两次温服下。

【功用】酸敛止汗，凉润复液，宣通利咽。

【主治】咽痹。

13009 猪心丸

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】猪心一个（不下水，切片，焙脆，研末） 甘遂三钱 石菖蒲一钱半

【用法】上为末，用贝母三钱煎汤为丸。每日早晨以生铁落二两煎汤送下。虚人、小儿须服少许。

【主治】痰火入心发狂。

13010 猪肝丸

【方源】《千金》卷十五。

【组成】猪肝一斤（熬令干） 黄连 乌梅肉 阿胶各二两 胡粉七枚子

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，每日三次。亦可为散，每服方寸匕。

【主治】下痢肠滑，饮食及服药俱完出。

【方论选录】《千金方衍义》：猪肉补阳而肝藏淫火，食之能令病发，惟血病用为向导。此治下痢肠滑，必是瘀血积阻，脾失健运，所以药食完出。故用猪肝熬枯以攻滞血，黄连以坚肠胃，阿胶以滋营血，乌梅以敛津液，胡粉以镇浊恶，同猪肝速趋下行，而脾胃康复，运化不失其常矣。学者不可以猪肝败血之品反为治痢之用而致谔谔也。

13011 猪肝脯

【方源】《眼科秘诀》卷二。

【组成】猪肝一具（割去苦胆，连血存之，不用水洗，竹刀割净白筋膜，切成柳叶薄片听用） 南谷精草二两（以手断碎，不见铁，黄酒淘去泥土，又黄酒泡透听用） 枸杞子七钱（黄酒泡透听用） 甘菊花一两（去梗、蒂、叶、尘土净，黄酒泡透听用） 玄参五钱（不见铁器，黄酒泡透听用） 真秋石二钱（为细末，听用）

【用法】上六味，除秋石外，将上五味合一处调匀，分作五份，肝亦分五份，用黑薄皮瓷罐子一个，底加一层药，药上排一层肝，肝上撒秋石，又药一层，肝一层，肝上仍加秋石末，如此三四层，上用药盖肝，加酒一碗泡肝；用白净布一块水湿，布内夹纸五六层，封固罐口，麻线扎住，入锅内重汤煮一日，锅内水耗，时时加热水，其水不宜入罐内；候肝香气外闻，取开；当肝内无嫩血色，住火；俟火气尽，取出，即细嚼慢咽十数片；待冷，取出肝来，去药，将药收之，还煮一具肝，其肝瓷碗盛着。每日吃五七次，每次温热吃十数多片，不可太多。五、六、七旬以外，加人乳一碗，参汤一茶钟，酒二茶钟，当归汤二钟。十一月、十二月、正月、二月可用。

【主治】翳障。

13012 猪肝散

【方源】《医部全录》卷一四五。

【组成】夜明砂（末）二钱匕

【用法】用猪肝二两批开，夜明砂末掺在肝内，麻绳缚定，用水一盏煮令肝转白色，取出。烂嚼，

食后煮肝汤送下。

【主治】 内外障翳眼。

13013 猪肝散

【方源】《疡医大全》卷十一。

【组成】 犍猪肝尖七个 苍术三钱

【用法】 上用米泔水浸，清晨至晚，入罐内煮至水干为度，露一宿。空心服，三四次即愈。

【主治】 雀目。

13014 猪肝羹

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】 猪肝一具 粟米一合

【用法】 上如常法作羹粥。空心食之。

【主治】 妇女产后乳不下，闭闷妨痛。

13015 猪肚丸

【方源】《千金》卷二十一。

【异名】 黄连猪肚丸(《三因》卷十)、猪肚黄连丸(《圣惠》卷五十三)、猪肚儿丸(《普济方》卷一七六引《如宜方》)。

【组成】 猪肚一枚（治如食法） 黄连 粱米各五两 栝楼根 茯神各四两 知母三两 麦门冬二两

【用法】 上为末，纳猪肚中缝塞，安甑中蒸之极烂，接热及药，木臼中捣为丸；若强，与蜜和之为丸，如梧桐子大。随渴即饮服三十丸，加至五十丸，每日二次。

【主治】 ①《千金》：消渴。②《中国医学大辞典》：下元虚弱，湿热郁结，强中消渴，小便频数，甚至梦遗白浊，赤白带淋。

【备考】《圣惠》有柴胡。

13016 猪肚丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】 栝楼根一两半（生用） 牡蛎粉 黄丹（别研）各半两 水银 黑铅各八钱（结砂子） 苦参 密陀僧 知母各一两

【用法】 上为细末；男子患，用米生养草猪肚一枚，妇人患，用豬猪肚一枚，贮药在内，以绵缝合，用绳子十条系在一口新砖上煮，不令得转；更别取栝楼根半斤细切，在水中一处同煮，自卯至午取出；细切肚子，研令如泥者软硬，同诸药末为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、日午、临卧米饮送下。

【主治】 消渴。

【宜忌】 此药宜阴干，不得日晒。忌热面、猪肉、葱白、炙煿物及酒色一百日。

13017 猪肚丸

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】 川乌（炮） 附子（炮）各四两 干姜（炮） 白术 厚朴各一两半 良姜（炒） 肉豆蔻（煨） 荜茇 禹余粮（火煅，醋淬） 缩砂仁 丁香 桂心各一两

【用法】 上为细末；用豬猪肚一只净洗，以川椒一两（去目），茴香一两，大曲二两，入猪肚内，用线缝定，酒醋煮烂；取出川椒、茴香、大曲焙干，为末，均和前药，以猪肚子杵和得所，为丸如梧桐子大。每服五六十丸，空心米饮送下。脏寒泄泻，早晨先用厚朴、附子二味，加生姜、大枣水煎，服此猪肚丸。

【主治】 脏寒泄泻。

13018 猪肚丸

【方源】《御药院方》卷六。

【异名】 经验猪肚丸(《医统》卷七十)、积肥丸(《摄生众妙方》卷五)、参术丸(《仙拈集》卷二)。

【组成】 白术四两 牡蛎（烧）四两 苦参三两

【用法】 上为细末，以猪肚一个煮熟，锉研成膏，为丸如梧桐子大。每服三四十丸，米饮送下，一日三次。瘦者服即肥。

【功用】 ①《医统》：进饮食，健肢体。②《仙拈集》：固精养血。

【主治】 ①《御药院方》：男子肌瘦气弱，咳嗽，渐成劳瘵。②《饲鹤亭集方》：膏粱湿热，酿于脾胃，留伏阴中，男子便数梦遗，妇女淋带秽浊。

【宜忌】《集验良方拔萃》：忌食猪肝、羊血、番茄。

13019 猪肚羹

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】 豬猪肚一枚（净洗，先以小麦煮令半熟，取出肚细切，令安一处） 黄耆（锉碎）半两 人参三分 粳米三合 莲实（锉碎）一两

【用法】 上以水五升煮猪肚，入人参、黄耆、莲实，候烂，滤去药并肚；澄其汁令清，方入米煮；将熟，入葱白五味调和作粥。任意食之。

【主治】 产后积热劳极，四肢干瘦，食饮不生肌肉。

13020 猪苓丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】 猪苓（去黑皮）半两 肉豆蔻（去壳，炮）二枚 黄柏（去粗皮，炙）一分

【用法】 上为末，米饮为丸，如绿豆大。每服十丸，食前熟水送下。

【主治】 肠胃寒湿，溏泻无度，嗜卧不食。

13021 猪苓汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】猪苓散(《圣惠》卷十六)。

【组成】猪苓（去皮） 茯苓 泽泻 阿胶 滑石（碎）各一两

【用法】上五味，以水四升，先煮四味取二升，去滓，纳阿胶烊消，温服七合，每日三次。

【功用】①《医方集解》：利湿泻热。②《血证论》：滋阴利水，祛痰。

【主治】水热互结，阴亏津伤，发热心烦，渴欲饮水，小便不利，或兼有咳嗽、呕恶下利。现亦用于乳糜尿、流行性出血热休克期、急性膀胱炎。

①《伤寒论》：阳明病脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者。 少阴病下利六七日，咳而呕渴，心烦不得眠者。②《得效》：五淋。③《医学入门》：先呕后渴，头痛身痛，胃燥，及秋疫发黄。④《幼科发挥》：湿热，泻时有腹痛，或痛或不痛，所下亦有完谷而未尽化者，有成糟粕者。⑤《片玉痘疹》：疮初发热作泄。⑥《瘟疫明辨》：渴而小便不利，少腹不可按，尺脉必数。⑦《医方集解》：湿热黄疸，尿赤。⑧《奇正方》：子肿，妊娠七八个月，面目浮肿，小便少者。⑨《医学金针》：水停腹胀。⑩《血证论》：肾经阴虚，水泛为痰者。

【宜忌】①《伤寒论》：阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤。②《外台》：忌醋物。③《古方选注》：虽渴而里无热者，不可与也。

【方论选录】①《内台方议》：五苓散中有桂、术，兼治于表也；猪苓汤中有滑石，兼治于内也。故用猪苓为君，茯苓为臣，轻淡之味，而理虚烦，行水道；泽泻为佐，而泄伏水；阿胶、滑石为使，镇下而利水道者也。②《医方考》：猪苓质枯，轻清之象也，能渗上焦之湿；茯苓味甘，中宫之性也，能渗中焦之湿；泽泻味咸，润下之性也，能渗下焦之湿；滑石性寒，清肃之令也，能渗湿中之热；四物皆渗利，则又有下多亡阴之惧，故用阿胶佐之，以存津液于决渎尔。③《伤寒论注》：五味皆润下之品，为少阴枢机之剂。猪苓、阿胶黑色通肾，理少阴之本也；茯苓、滑石白色通肺，滋少阴之源也；泽泻、阿胶咸先入肾，壮少阴之体；二苓、滑石淡渗膀胱，利少阴之用，故能升水降火，有治阴和阳，通理三焦之妙。④《伤寒附翼》：下焦阴虚而不寒，非姜、附所宜；上焦虚而非实热，非芩、连之任，故制此方。二苓不根不苗，成于太空元气，用以交合心肾，通虚无氤氲之气也；阿胶味厚，乃气血之属，是精不足者，补之以味也；泽泻气味轻清，能引水气上升；滑石体质重坠，能引火气下降，水升火降，得既济之理矣。⑤《医林纂要》：猪苓甘淡微苦色黑，主入膀胱渗湿行水；茯苓淡以渗湿，有白赤二色，此似宜用赤者，以渗小肠之湿，合猪苓以通阑门之关，而交际水火也，但古人多不分用；泽泻咸以泻肾，合二苓以去下焦湿热；滑石色白入肺，甘淡渗湿，此乃决上焦之源而下之；阿胶甘咸润滑，益肺滋阴，澄清水道，此又以去水中之浊热。此方主治阳明腑热湿壅于上下，故君滑石而佐以阿胶；阳明之热盛，故去热为主，然滑石过燥，而阿胶以润之也。⑥《成方便读》：二苓泽泻，分消膀胱之水，使热势下趋；滑石甘寒，内清六腑之热，外彻肌表之邪，通行上下表里之湿；恐单治其湿，以致阴愈耗而热愈炽，故加阿胶养阴熄风，以存津液，又为治阴虚湿热之一法也。

【临证举例】①乳糜尿 《河南中医学院学报》(1978；1:48)：鞠某某，男，25岁。1975年10月始见尿呈白色，伴有尿频、尿急，继感腰痛，症状渐重，治疗20余天，好转出院后上述症状再现，于1975年12月27日住我科。舌质淡，舌苔薄白，脉沉细，左肾叩击痛（+）。化验：血微丝蚴φ；嗜伊红细胞10%；尿：蛋白（卅），白细胞1～3/高倍，红细胞卅/高倍，乳糜尿（+）。诊断：乳糜尿（膏淋）。处方、用法：阿胶三钱（另包冲服），云苓四钱，泽泻四钱，滑石四钱，猪苓四钱。每日一付，水煎服。十剂后，尿化验转为正常，乳糜尿转阴。②流行性出血热休克期 《中医杂志》(1982；6:34)：病例均为出血热休克期伴少尿的青壮年患者，男10例，女3例。在休克期前阶段主要表现为发热面赤，烦躁恶心，口渴恣饮，少尿，眼结膜充血（或出血），水肿，舌红，苔薄白或薄黄而干，脉浮细数；进入后阶段的表现为心烦不寐，时有谵语，唇裂齿枯，口干不欲饮，小便短赤不利，大便多数干结，舌红绛，胖厚僵硬，舌苔黄厚干，或焦黄，或少苔而燥，脉细数沉滑，实验室检查发现血钠降低，血红蛋白升高，舒张压明显升高，脉压变小。治疗以口服猪苓汤为主。处方：猪苓30克，泽泻30克，茯苓15克，阿胶30克（隔水烊化约30毫升，加糖另服）。有腹泻者另加滑石10克，煎药时加水量每剂不超过300毫升，文火煎2次，每次浓缩至70～80毫升，先服烊化的阿胶，再服第一煎药，分数次或一次服完，以不呕出为原则；半小时后继服第二煎药。服中药时，适当补给不同浓度的晶体液（包括纠酸用的碱性溶液）

和葡萄糖液。结果：11例在休克期前阶段给药后，9例中止进入休克期后阶段，2例进入休克期后阶段；另2例先经西药治疗，因治疗棘手，在进入休克期后阶段后改用猪苓汤治疗。全组13例无一例死亡。讨论：猪苓汤虽作用缓慢，每次尿量不多，但利尿效应长于速尿2倍以上（平均持续达7.8小时）。其实际排尿总量较对照组为多，服药后24小时内血钠普遍上升，水、电解质也趋向恢复正常。经验：猪苓汤治疗本病休克期宜早期应用，如已进入肾小管严重坏死的少尿期，用之常不理想。对合并出现弥漫性血管内凝血高凝阶段的患者，酌情加用活血化瘀药如丹参、丹皮、赤芍、川芎。③急性膀胱炎 《浙江中医杂志》（1982；10:448）：近年用猪苓汤治疗急性膀胱炎107例，均服药1～6剂痊愈。典型病例：张某某，女，32岁，1980年1月21日诊。晨起小便淋涩，尿道刺痛，少腹坠胀，身寒颤栗，舌红苔薄，脉浮弦；小便检查：蛋白（卅），白细胞满视野，红细胞（卅）。乃湿热蕴蓄下焦，膀胱气化不利。宜清热通淋，凉血止血。投猪苓10克，茯苓18克，滑石15克，阿胶6克（烊化），加桔梗6克，茜草10克，白茅根15克。2剂后症状缓解，少腹仍胀；续服2剂痊愈。

【现代研究】 ①利尿作用 《国外医学·中医中药分册》（1981；2:121）：日本原中氏等的研究表明，本方对大鼠有明显的利尿作用，给予10倍常用量猪苓汤，可见大鼠24小时尿量及钠排泄量均显著增加，连续给药1月，对大鼠血浆和各脏器的电解质量以及水分的分布均无明显影响，也不影响体重增加和一般活动，肾脏组织学检查未见异常。②《汉方医学》（1985；10:119）：给大鼠饲以含有3%之乙醇酸的饲料，引起草酸钙性肾结石，再在饲料中拌以1%之猪苓汤提取物，可明显抑制结石形成，并使肾组织草酸含量明显降低为6.0±2.6mg/ml（对照组为26.7±4.7mg/ml）。③对肾功能的影响 《汉方医学》（1982；4:10）：用烧灼损伤大鼠肾皮质所致实验性肾性肾功能不全研究本方的作用，将其提取物以1g/kg剂量混于饮水中，从实验动物造型时即开始给服，连续12个月，结果表明本方有显著疗效。表现为动物生长等一般情况比对照动物好，血红蛋白量增高，寿命也延长。④对免疫功能的影响及抗癌作用 《汉方医学》（1985；5:14）：用猪苓汤提取物腹腔注入，连续5日，可显著增强艾氏腹水癌荷瘤小鼠的网状内皮系统吞噬功能，吞噬指数K明显增高，并使肝脏及胸腺明显增重，而吞噬系数a则未见明显上升，表明其增强网状内皮系统对血流中惰性炭粒的吞噬活性可能主要来自肝脏枯否氏细胞的增殖。观察艾氏腹水癌所致小鼠的死亡时间，猪苓汤有一定延缓作用。

13022 猪苓汤

【方源】《问春》卷四。

【组成】 木通 猪苓 泽泻 滑石 枳壳（炒） 黄柏（酒浸） 牛膝（去芦） 麦门冬（去心） 瞿麦 车前子各等分 甘草梢减半 扁蓄叶十片

【用法】 上锉。加灯心一团，水煎，空心服。

【主治】 热结小便不通。

13023 猪苓汤

【方源】《异授眼科》卷一。

【组成】 五味子 熟地 猪苓 肉苁蓉（酒洗） 枸杞子 覆盆子各一钱五分

【用法】 不用引，水煎服。

【主治】 肾虚目有黑花，如飞蝉蝇。

13024 猪苓散

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 三物猪苓散（《三因》）、猪苓汤（《赤水玄珠》卷四）。

【组成】 猪苓 茯苓 白术各等分

【用法】 上为散，饮服方寸匕，每日三次。

【功用】 ①《金匮要略心典》：祛士逐水。②《金鉴》：利水，止呕吐。

【主治】 ①《金匮》：呕吐而病在膈上，后思水者。②《普济方》引《肘后》：黄疸病及狐惑病。

【宜忌】《外台》：忌桃、李、雀肉、醋物。

【临证举例】 ①水逆证 《东医宝鉴·杂病篇》：一人每呕水二三碗，诸药不效，但吃井华水一口即止，用此药即愈。②肠套叠 《湖南省老中医医案选》（一）：刘某，男，26岁。忽患腹痛如刀割，腹胀如鼓，大便不通，大渴。每饮一大杓，饮下不久即呕出，呕后再饮，寝室满地是水。诊断为"肠套叠"，须用大手术，痛延至三日，医皆束手，危在旦夕。诊其脉沉紧而滑，首用白术、茯苓、猪苓各五钱，水煎服一剂，呕渴皆除，大便即通。继用附子粳米汤，腹痛、腹胀等证亦渐痊愈。

13025 猪苓散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】 猪苓一两（去黑皮） 麻黄一两（去根节） 陈橘皮一两（汤浸去白瓤，焙） 桑根白皮一两（锉） 百合一两 赤茯苓一两 槟榔一两 滑石二两

【用法】 上为粗散。每服五钱，以水一盏，煎至

五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 气水，肿满喘急，小便涩。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“猪苓汤”。

13026 猪肾丸

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】 猪腰子一对（劈开两片，去油膜，纳姜制杜仲于内，合住，线扎，隔水蒸熟，焙干） 青盐二钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸。空心淡盐汤送下。

【主治】 ①《叶氏女科》：妊娠血虚，肾亏腰痛。②《竹林女科》：胎动腰痛。

【备考】《女科秘要》本方用法：空心酒服三四十丸。

13027 猪肾丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】 猪肾一枚（去膜）

【用法】 上入附子末一钱，湿纸包，煨熟。空心食之，饮酒一杯，不过三五服。

【主治】 肾阳虚微，精关滑泄，自汗盗汗，夜多梦与鬼交。

13028 猪肾汤

【方源】《外台》卷三十四引《广济方》。

【组成】 猪肾一具（去脂，四破） 香豉一升 白粳米一升 葱白（切）一升 人参 当归各二两

【用法】 上切。加水一斗，煮取三升，去滓，每服七合。

【功用】《医方考》：大补气血。

【主治】 妇女产后劳损，虚羸喘乏，或乍寒乍热，状如疟。

【宜忌】 忌大肉、热面、蒜。

【方论选录】《医方考》：人参补气，当归补血，糯米益胃，葱、豉醒脾；而猪肾者，取其以类相从，能补系胞之区也。

13029 猪肾汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷二。

【组成】 芎 归 白芍 熟地 参 苓 术 草 耆 陈皮 香附 杜仲 川断 黄芩 麦冬 生姜 猪肾一对

【用法】 上将猪肾煮汤，入药煎服。

【功用】 益肾。

【主治】 妇女妊娠九月，胎动不安。

13030 猪肾粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】 猪腰子粥（《医便》）。

【组成】 猪猪肾一对（去脂膜，细切） 葱白二茎（去须，切） 人参一分（去芦头，末） 防风一分（去芦头，末） 粳米二合 薤白七茎（去须，切）

【用法】 上先将药末并米、葱、薤白着水下锅中煮，候粥临熟，拨开中心，下肾，莫搅动，慢火更煮良久，入五味。空腹食之。

【主治】 肾脏气惫，耳聋。

13031 猪肾羹

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】 猪肾（去筋膜，细切）一对 陈橘皮（洗，切）半分 蜀椒（去目并合口，炒出汗）三十粒

【用法】 用五味汁作羹，空腹食。

【主治】 耳聋、耳鸣，如风水声。

13032 猪肤汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 猪肤一斤

【用法】 上以水一斗，煮取五升，去滓，加白蜜一升，白粉五合，熬香，和令相得。分六次温服。

【功用】 ①《兰台轨范》：引少阴之虚火下达。②《医原》：甘咸润纳。

【主治】 ①《伤寒论》：少阴病，下利咽痛，胸满心烦。②《天津中医》：失音。

【方论选录】 ①《注解伤寒论》：猪，水畜也，其气先入肾。少阴客热，是以猪肤解之；加白蜜润燥除烦，白粉以益气断利。②《伤寒来苏集》：猪为水畜，而津液在肤，君其肤以除上浮之虚火；佐白蜜、白粉之甘，泻心润肺而和脾，滋化源，培母气。水升火降，上热自除而下利止矣。③《中国医学大辞典》：猪为水畜，属肾，而肤主肺，取其遍达周身，从内而外；蜜乃稼穑之味，粉为五谷之精，合之猪肤之润，皆足以交媾阴阳，调和荣卫；熬香者，取香气助中土之义也。

【临证举例】 ①咽痛 《续名医类案》：张路玉治徐君玉，素禀阴虚多火，且有脾约便血症，十月间患冬温发热咽痛，里医用麻、杏、橘、半、枳实之属，遂喘逆，倚息不得卧，声飒如哑，头面赤热，手足逆冷，右手寸关虚大微数，此热伤手太阴气分也。与萎蕤、甘草等药不应，为制猪肤汤一瓯，命隔汤炖热，不时挑服，三日声清，终剂病如失。②失音 《天津中医》（1986；5:40）：患者，男，12岁。1978年秋季觉咽部干燥不适，有时疼痛干咳，以后逐渐声音低沉，甚至嘶哑，诊断为“慢性喉炎”，经中西药物屡治无效，声音嘶哑由间歇性转为持续性，乃于1979年10月来我院门诊。形体

消瘦，五心烦热，咽干口燥，舌红无苔，脉来细数，失音已达四月，拟猪肤汤长服：猪肤半斤（刮净肥肉），白蜜半斤，米粉四两，先将鲜肉皮置锅中，加水适量，文火煮沸，使肉皮完全溶化为度，然后再加入白蜜煮沸，最后调入米粉，煮成糊状，收贮于瓷罐中。一日三次，每次一匙，开水冲服。逾半年而愈。

13033 猪肺丸

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】 梨汁 藕汁 莱菔汁 人乳 童便各一碗 猪肺（不落水）一个（入童便灌足，将手拍热，抖去浊沫）

【用法】 上和，煎至汁存二碗半，以炒米粉为丸。每服五钱。

【主治】 吐血。

13034 猪胆丸

【方源】《卫生总微》卷三。

【异名】 二连丸(《普济方》卷三八五)。

【组成】 胡黄连 宣黄连（去须）各半两 赤芍药一两

【用法】 上为细末，以猪胆汁和成剂，却入在胆皮中，悬铫上，用浆水煮，勿令浆水入，煮熟取出为丸，如绿豆大。每服三十丸，食后、临卧米饮汤送下，一日三次。

【主治】 小儿血热，早食后发热，至晚则凉。

13035 猪胆膏

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】 猪胆一只 硇砂（细研）

【用法】 以硇砂穰在猪胆中成膏，系定，悬当风处；白衣如霜出，扫下，收瓷盒子内。旋旋用柱子点入眦中，觉痒乃罢，便无翳膜；未尽再点之。

【主治】 翳障。

13036 猪胆膏

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】 猪胆七枚

【用法】 上取汁，以建盏盛，炭火熬成膏，用单纸摊敷。须先用槐根白皮煎汤温洗，然后敷药。

【主治】 痔疮。

13037 猪脊汤

【方源】《三因》卷十。

【组成】 大枣四十九枚（去皮核） 新莲肉四十九粒（去心） 西木香一钱半 甘草二两（炙）

【用法】 上与雄猪脊骨一尺二寸同煎，用水五碗，于银石器煮，去肉骨，滤滓，取汁一碗，空腹任意呷服。以滓减去甘草一半，焙干为末，米汤调服，不拘时候。

【主治】 三消渴疾。

【宜忌】 忌生冷、盐、脏等物。

13038 猪胰酒

【方源】 方出《肘后方》卷三，名见《圣惠》卷六。

【组成】 猪胰三具 大枣一百枚 酒三升

【用法】 上渍数日，服二二合，加至四五合。

【主治】 ①《肘后方》：久咳嗽上气，十年、二十年诸药治不愈者。②《千金》：胸胁支满多喘。

【宜忌】《千金》：二七日忌盐。

【备考】《千金》本方用法：以酒五升渍之，秋、冬七日，春、夏五日，出，布绞去滓，七日服尽。羊胰亦得。

13039 猪脂丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷四。

【组成】 杏仁 松仁 白蜜 橘饼各四两

【用法】 上以猪油（熬净）一杯，同捣，时时食之。

【主治】 反胃，久闭不通，服通剂过多，血液耗竭，转加闭结者。

13040 猪脏丸

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】 净黄连二两（锉碎） 嫩猪脏二尺（去肥）

【用法】 以黄连塞满猪脏，系两头，煮十分烂，研细，添糕糊为丸，如梧桐子大。先用海螵蛸炙黄去皮，取白者为末，以木贼草煎汤调下。服之三日后，再服猪脏丸，每服三五十丸，米饮送下。

【主治】 ①《直指》：野鸡。大人小儿大便下血日久，多食易饥，腹不痛，里不急。②《兰台轨范》：妇人血崩。

13041 猪脏丸

【方源】《得效》卷五。

【组成】 吴茱萸（净，去枝梗）不拘多少（用水浸透）

【用法】 用猪脏头一截，去脂膜，净洗，将茱萸入脏内，两头扎定，慢火煮令极烂，用甑蒸熟尤好，将二味于臼内杵千下，令极细，为丸如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下。

【主治】 脏寒泄泻，不进饮食，气体倦怠。

13042 猪脏丸

【方源】《普济方》卷二〇八。

【组成】 硫黄二两（为末） 猪脏一斤（洗净，入硫黄于内，以线缚两头，用米醋五升入瓷瓶，以

盐泥固济，用炭火一秤煅，俟醋干为度，取出，入后药） 吴茱萸二两（炒） 厚朴一斤（去皮，姜炒）

【用法】 上为末，先研脏细，入药末一处都拌匀，为丸如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤盐酒送下。

【主治】 元脏久冷，滑泄不止，饮食不进，渐至危困。

13043 猪脾粥

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】 猪脾一具 猪胃一枚

【用法】 上净洗，细切，入好米两合，如常法煮粥。空腹食。

【主治】 脾胃气弱，不下食，米谷不化。

13044 猪蹄汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】 猪蹄四只（以水五升，煮汁三升，澄清） 瞿麦（去梗） 漏芦（去芦头） 木通（锉）各一两

【用法】 上四味，捣罗三味为末。每服三钱匕，猪蹄汁一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇女产后乳汁少或不下。

13045 猪蹄汤

【方源】《景岳全书》卷六十一。

【组成】 八物汤加黄耆 漏芦 陈皮 木通

【用法】 先以猪蹄煮汁二碗，再煎上药服之。

【主治】 气血不足，乳汁不下。

13046 猪蹄汤

【方源】 方出《景岳全书》卷六十一，名见《不知医必要》卷四。

【组成】 猪蹄一副 通草二两 川芎一两 甘草一钱 川山甲十四片（炒）

【用法】 上将猪蹄洗，切，入水六碗，同药煎煮约至三碗，加葱、姜、盐料，取汁饮之。并时用葱汤洗乳为佳。

【功用】 助其气血，下乳。

【主治】 气血不足，乳汁不下。

【宜忌】 忌冷物。夏月不可失盖。

【备考】《不知医必要》有陈皮六分。

13047 猪蹄粥

【方源】《医方类聚》卷二三八引《食医心鉴》。

【组成】 猪蹄一具 白米半升

【用法】 上煮令烂，取肉切，投米煮粥，着盐、酱、葱白、椒、姜，和食之。

【主治】 产后虚损，乳汁不下。

13048 猪心血丸

【方源】《赤水玄珠》卷六。

【组成】 归身 白芍 侧柏 川芎各五钱 陈皮 甘草 黄连各二钱 朱砂一钱

【用法】 猪心血为丸服。

【主治】 劳役大虚心跳。

13049 猪肾子饮

【方源】《医学正传》卷七引《产宝》。

【异名】 猪腰饮（《医统》卷八十五）、猪腰汤（《景岳全书》卷六十一）、猪肾汤（《叶氏女科》卷三）、猪腰粥（《卫生鸿宝》卷五）。

【组成】 猪腰子一对（切作四片） 当归 白芍药各一两

【用法】 上以当归、芍药二味细切，用水三碗，煮至二碗，去滓；将腰子切碎如骰子状，入前药汁内，用晚粳米一合，香豉一两，葱白五七根同煮糜烂，空腹食之，每日一服。

【主治】 ①《医学正传》引《产宝》：妇女产后薄劳，寒热如疟，咳嗽头疼，自汗体瘦，腹中疞痛。②《女科指掌》：产后气血虚弱，饮食未复，虚乏倦怠，乍卧乍起，颜色憔悴，口干头昏，百节疼痛，时有盗汗，背膊烦闷。

13050 猪膏发煎

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 膏发煎（原书卷下）。

【组成】 猪膏半斤 乱发（如鸡子大）三枚

【用法】 上药都拌匀，煎之，发消药成。分二次服。病从小便出。

【功用】《金匮要略选读》：润燥通便。

【主治】 湿热化燥，腑气不通，致患黄疸、阴吹。

①《金匮》：诸黄。谷气实，胃气下泄，阴吹而正喧。②《肘后方》：由大劳大热交接，交接后入水所致女劳疸，身目皆黄，发热恶寒，小腹满急，小便难。③《女科指掌》：积聚癥瘕。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：阳明不能升发谷气上升，变为浊邪，反泄下利，子宫受抑，气不上通，故从阴户作声而吹出。猪脂补下焦、生血、润腠理；乱发通关格。腠理开，关格通，则中焦各得升降，而气归故道也。②《金匮要略心典》：湿热经久，变为坚燥譬如盦曲，热久则湿去而干也。《本草》：猪脂利血脉，解风热；乱发消瘀，开关格，利水道；故曰病从小便出。③《金匮要略浅注》引沈目南：此黄疸血分通治之方也。寒湿入于血分，久而生热，郁蒸气血不利，证显津枯血燥，

皮肤黄而暗晦，即为阴黄。当以猪脂润燥，发灰入血和阴，俾脾胃之阴得其和，则气血不滞，而湿热自小便去矣。盖疸皆因湿热郁蒸、相延日久，阴血必耗，不论气血二分，皆宜兼滋其阴，故云诸黄主之。④《金匮悬解》：前阴气吹而正喧鸣，此谷气之实，后窍结塞而不通也。猪膏发煎，猪膏、乱发利水而滑大肠，泄湿而通膀胱也。

【临证举例】 ①黄疸 《成方切用》引徐忠可：予友骆天游，黄疸，腹大如鼓，百药不效，用猪膏四两，发灰四两，一剂而愈。②妇女阴吹 《湖北中医医案选辑》：沈某，38岁，1947年7月间分娩一孩，将近弥月。一日中午，因气候甚热，神疲欲睡，遂将竹床于阴凉处迎风而卧，约二小时；是夜即发生前阴出气作声，如放屁然，但无臭气，自后经常如此，迁延五六年。诊其色脉及各部，俱无病证，唯询得大便经常秘结，遂按《金匮》法用膏发煎治之。猪油半斤，乱头发如鸡子大三团，洗净油垢，共熬至发溶化，候温度可口，分二次服。服两剂，果获痊愈。

13051 猪肝枸杞酒

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】 甘州枸杞子（肥者）二升（捣碎，绢袋盛之，纳一斗酒中浸，封固密三七日后，每朝夕饮之，任情勿醉） 猪肝（炙熟，薄切，以花椒、盐、酱蘸食之）

【用法】 用上枸杞酒咽猪肝，只饮二三杯，勿醉。

【主治】 肝虚迎风有泪。

13052 猪肚黄连丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】 猪肚一枚（洗，去脂膜，不切破） 黄连（去须，捣罗为末）五两

【用法】 以大麻子仁二合烂研，以水四升，调如杏酪汁，煮猪肚，候烂取出，入黄连末在内，密缝肚口，蒸令极烂，乘热切细，和黄连末以木臼捣之，候可丸，即为丸如梧桐子大，晒干。每服三十丸，温水送下，不拘时候。

【主治】 消渴变为消中，饮食到胃，即时消化，小便多而色白，所食多而不觉饱。

13053 猪肾荠苨汤

【方源】《千金》卷二十一。

【异名】 石子荠苨汤（《三因》卷十）、二石荠苨汤（《医统》卷五十二）。

【组成】 猪肾一具 大豆一升 荠苨 石膏各三两 人参 茯神（一作茯苓） 磁石（绵裹） 知母 葛根 黄芩 栝楼根 甘草各二两

【用法】 上㕮咀。以水一斗五升，先煮猪肾、大豆，取一斗，去滓下药，煮取三升，分三服，渴乃饮之。下焦热者，夜辄合一剂，病势渐歇即止。

【主治】 ①《千金》：强中之病，茎长兴盛，不交精液自出。消渴之后，即作痈疽，皆由石热。②《三因》：中焦虚热注于下焦，烦渴引水，饮食倍常。

【方论选录】 ①《法律》：此方用白虎等清凉之剂，加入猪肾、大豆、磁石，引诸清凉入肾，且急服之，凡热炽盛于上下三焦者，在所必用。②《千金方衍义》：石药之悍，虽流布中外，其毒必伏匿少阴经中，所以借水兽之肾引领荠苨专主强中之味，与磁石、知母、黑大豆同入肾经，佐以石膏、黄芩、葛根、甘草、栝楼根，辅佐荠苨分解内外之毒，制剂虽专，不得人参阳药助胃以行其力，则毒匿幽深何由发越，孰谓人参壅补热邪而致扼腕耶。

【备考】 本方方名，《证治要诀类方》引作“荠龙汤”。

13054 猪腰青盐杜仲方

【方源】《医方考》卷五。

【组成】 猪腰一具 青盐三钱 杜仲（末）五钱

【用法】 先将猪腰剖开，后入青盐、杜仲于内，湿纸包裹煨熟。空心服之。

【主治】 腰痛。

【方论选录】《易》曰：方以类聚，物以群分，故猪腰可以补腰。《经》曰：五味入口，咸先入肾，故青盐可以就下。杜仲辛甘，益肾之物也。君以猪腰，佐以青盐，则直走肾而补之矣。

13055 猫头丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 猫头骨一个（酥炙） 蝙蝠一个（以朱砂三钱填入腹内，瓦上炙焦） 南星 白矾各一两

【用法】 上为末，用黄蜡溶化为丸，如绿豆大。每服三十丸，临卧米饮送下；便燥，用蜜为丸，空心及夜卧含化三丸。

【主治】 瘰疬，马刀，不问远年近日，已破未破。

【加减】 如风热实者，加防风、黄芩、山栀、蝉蜕、川芎、连翘、桔梗各五钱；虚者，加夏枯草二两；虚劳骨蒸，加玄参一两，胡黄连五钱；汗多，加牡蛎三钱；有咳，加麦门冬一两；血虚，加归、芍、生地；气虚，加参、术各一两；毒重，加雄黄；痛甚，加乳、没各二钱；坚硬，加海藻四钱；

成漏，加穿山甲一两。

13056 猫胞散

【方源】《医级》卷八。

【组成】猫胞一个（酒洗） 胡桃膈十片（俱煅）

【用法】上为末。丁香汤调下。

【主治】反胃噎膈，食不下。

13057 猫蚣散

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】猫儿骨一全付（炙） 蜈蚣七条

【用法】上为末。每服三钱，防风、羌活、黄芩、栀子、蝉蜕、海藻、薄荷、川芎、连翘、甘草、夏枯草煎汤调下。

【主治】瘰疬。

13058 脚气粉

【方源】《朱仁康临床经验集》

【组成】六一散9克 枯矾3克

【用法】上为细末。掺脚缝内。

【功用】收湿止痒。

【主治】脚气渗水，糜烂发痒。

13059 脚针膏

【方源】《疡医大全》卷二十七。

【组成】阿魏 莪术各三钱 三棱二钱 麝香五分 鸡肫皮七个（阴干） 鳝鱼血一杯 大黄四两 荜茇（连皮，阴干）二十四个

【用法】上用麻油一斤，先熬群药，去滓；入阿魏熬枯，再下鳝血，滴水成珠，入炒黄丹四两，徐徐投搅成膏，冷定，下麝末。摊贴。

【主治】鸡眼。

13060 脚气渫洗法

【方源】《医学发明》卷八。

【组成】威灵仙 防风（去芦） 荆芥穗 当归（去芦） 地骨皮 蒴藋叶 升麻（去腐） 白芍药（去皮）各一两

【用法】上为细末。以水二斗，煮至一斗五升，去滓。热渫洗，不拘时候。

【功用】开导，泄越其邪。

【主治】脚气，内受湿邪，不能外达。

【备考】本方方名，《普济方》引作“导气除湿汤”。

13061 脚汗牡蛎散

【方源】《景岳全书》卷六十。

【组成】牡蛎（煅） 枯白矾 密陀僧 黄丹各等分

【用法】上为细末。每用少许，干掺脚指缝中。即收。

【功用】除秽气。

【主治】脚汗。

13062 脱凡散

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】蝉退（去头足土，净）五钱

【用法】上为末，用好酒一碗煎滚，服之立苏。

【主治】破伤风，五七日未愈，至角弓反张，牙关紧急。

13063 脱衣散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】附子 硫黄各五钱

【用法】共为末，姜汁调，以茄蒂蘸擦。三四次全愈。

【主治】汗斑。

13064 脱衣散

【方源】《回春》卷六。

【组成】川牛膝三钱 归尾二钱 木通三钱 滑石四钱 冬葵子二钱半 枳壳二钱

【用法】上锉。水煎，热服。

【主治】胞衣不下。

13065 脱壳散

【方源】《幼幼新书》卷十八引《张氏家传》。

【组成】鸡抱出壳子

【用法】于新瓦上焙干，去膜，取壳捣研如粉。用酒调一字，涂儿唇上，含舐；或以酒调涂风池、背上、心前；或热汤调一字吃之。

【主治】小儿斑疮倒陷不出，或脏腑粪血粪黑，头疮，昏睡不醒。

13066 脱肛散

【方源】《医统》卷七十四引复斋方。

【组成】磁石 军姜各一钱 枯矾五分

【用法】上为极细末，以葱涎调，以绵裹蘸，塞肛内。其疮自翻出，疮即愈。后须内服补中益气之剂、六味丸、八味丸。

【主治】脱肛，内痔。

13067 象皮散

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】猪身前蹄扇骨（煅炭，研粉）十两 象皮（炙炭存性）一两

【用法】上为极细末。凡遇烂孔如掌之大者，以此撒上。至孔收小后，用六和散敷。

【主治】刀伤，跌损出血。

13068 象皮膏

【方源】《伤科补要》卷四

【组成】大黄二两 川芎 当归 生地各一两

红花三钱　川连三钱　甘草五钱　荆芥三钱　肉桂三钱　白及三钱　白蔹二钱

【用法】 用麻油一斤，先将药片入锅内煎，用柳枝搅匀，俟药滓枯色，以麻布绞去药滓，入黄白占各三两，白及、白蔹末同熬滚，至滴水不化，倾入净水缸内，将膏在水中捻长一块，分作五块，渐入大锅内溶化，膏入带水气，油花滚泛满锅，看药泛红黄色，渐渐化尽其膏，如镜面可以照入，将膏滴水试老嫩，贴手不粘为度。如老，加麻油；如嫩，加百草霜一两，搅匀。再入后药：地别虫一两，血竭五钱，象皮五钱，乳香（去油）五钱，没药（去油）五钱，龙骨三钱，海螵蛸三钱，真珠二钱，入参二钱（共研细末）。入膏内，搅匀。

【主治】 跌打断骨破伤。

13069　象牙抗增丸

【方源】 《千家妙方》卷下。

【组成】 象牙 100 克　砂仁 15 克　独活 20 克　赤芍 30 克　怀牛膝 30 克　归尾 30 克　熟地 70 克　肉苁蓉 20 克　骨碎补 50 克　淫羊藿 30 克　鸡血藤 30 克　莱菔子 30 克　白蒺藜 60 克

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸重 10 克。早、晚各服一丸。每服一丸后，吃蒸熟鹅蛋一个。

【功用】 补肾强筋，活血止痛。

【主治】 骨质增生症，肾阴虚者。

【临证举例】 裴某某，男，老人。脚跟疼痛已半年，经 X 光拍片诊为骨质增生。经服用“象牙抗增丸”一料，药完病愈，随访已数年未复发。

13070　旋覆汤

【方源】 《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】 川芎　细辛　赤苓　前胡　鲜枇杷叶　旋覆花

【主治】 肝着。

【备考】 《春脚集》本方用量：川芎、细辛、赤苓各一钱，前胡一钱五分，鲜枇杷叶、旋覆花各一钱。

13071　旋覆花丸

【方源】 《圣惠》卷五十一。

【组成】 旋覆花一两　汉防己一两　赤茯苓一两　甜葶苈一两（隔纸炒令紫色）　桂心一两　前胡一两（去芦头）　枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）　槟榔一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以桑根白皮汤送下。

【主治】 支饮。心胸壅滞，喘息短气，皮肤如肿。

13072　旋覆花汤

【方源】 《金匮》卷下。

【异名】 旋覆葱绛汤（《疡科心得集》补遗）、新绛旋覆花汤（《湿温时疫治疗法》卷下）。

【组成】 旋覆花三两　葱十四茎　新绛少许

【用法】 以水三升，煮取一升，顿服之。

【主治】 ①《金匮》：肝着。其人常欲蹈其胸上，先未苦时，但欲饮热。寸口脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，寒虚相搏，此名曰革，妇人则半产漏下。②《张氏医通》：虚风袭入膀胱，崩漏鲜血不止。

【方论选录】 ①《沈注金匮要略》：旋覆花咸温软坚散结，以葱助其驱风而下饮逆；新绛引入血分宣血，俾血行则风灭，着自开矣。②《张氏医通》：旋覆花性专下气，兼葱则能散结祛风；佐以蚕丝专补膀胱，加以红蓝染就，深得本经散结气之旨。③《金匮要略心典》：详《本草》旋覆花治结气，去五脏间寒热，通血脉；葱主寒热，除肝邪；绛帛入肝理血，殊与虚寒之旨不合。然肝以阴脏而舍少阳之气，以生化为事，以流行为用，是以虚不可补，解其郁聚即所以补；寒不可温，行其血气即所以温。④《金匮要略浅注补正》：葱白以通胸中之气，如胸痹而用薤白之例；旋覆以降胸中之气，如胸满噫气而用旋覆之例也；唯新绛乃茜草所染，用以破血，正是治肝经血着之要药。

【临证举例】 ①胁痛　《杏轩医案》：家若谷兄乃郎胁痛。感证已逾两月，胁痛依然不愈，按外感胁痛，病在少阳，内伤胁痛，病在厥阴。今外邪解经多日，胁痛何以不瘳，既无情志抑郁，定属动作闪力之伤，外邪引发耳。夫久痛在络，络主血，防其蓄瘀动红，从金匮肝着例，用旋覆花汤一法。②肝着　《广东中医》（1962；7:36）：郑锡晃，男，成人。以胸次不舒，心中懊侬，甚则坐卧不安，历时三月未愈而就诊于余。诊其脉象：两寸脉大，其余正常。症状表现又无发热、头痛、心悸。以胸次不舒，病久入络，为肝着之象。处方：覆花三钱，绛纬二钱，青葱茎七条。目的在于通络脉，舒肝郁，宣阳散结。果然一服而愈。③崩漏　《江苏中医杂志》（1981；3:19）：戴某某，女。1975 年来我处就诊。自诉于去年小产后，阴道出血至今未净。诊脉细数，舌红润，苔白，小腹部时有隐痛，下血量虽不多，但终日淋漓不清，其症显属半产后瘀血结聚，用旋覆花汤治之。处方：旋覆花（布包）10 克，新绛（茜草）12 克，青葱 10 根，生地 15 克，当归 10 克，白芍 6 克，川芎 6 克。三剂。服药后

下血块数枚，血渐止，腹亦不痛，继以十全大补汤调理而愈。

13073 旋覆花汤

【方源】《本事》卷三。

【组成】 旋覆花（拣去梗） 细辛（去叶） 橘红（去白） 桂心（不见火） 人参（去芦） 甘草（炙） 桔梗（炒） 白芍药 半夏（汤洗七次）各半两 赤茯苓（去皮）三分

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎至八分，去滓温服。

【主治】 心腹中脘痰水冷气，心下汪洋嘈杂，肠鸣多唾，口中清水自出，胁肋急胀，痛不欲食，脉沉弦细迟。

【方论选录】《本事方释义》：旋覆花气味咸温，入手太阴、阳明；细辛气味辛温，入足少阴；橘皮气味辛微温，入手足太阴；桂心气味辛甘热，入足厥阴；人参气味甘温，入脾胃；甘草气味甘平，入脾；桔梗气味苦辛平，入肺；白芍气味酸微寒，入足厥阴；半夏气味辛温，入足阳明；赤茯苓气味甘平淡渗，入手太阳、足阳明；以姜为引，引药入里。此因胃气虚冷，痰饮蟠踞心下，冷气汪洋，嘈杂肠鸣，人倦多睡，胁肋急胀，不欲思食，以咸苦辛酸之药逐痰驱饮，以甘缓之药调和中焦正气，则病去而渐能纳食矣。

13074 旋覆花汤

【方源】《济生》卷二。

【组成】 旋覆花（去梗） 半夏（汤泡七次） 橘红 干姜（炮）各一两 槟榔 人参 甘草（炙） 白术各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 中脘伏痰，吐逆眩晕。

13075 旋覆花汤

【方源】《校注妇人良方》卷六。

【组成】 旋覆花 枇杷叶 川芎 细辛 赤茯苓各一钱 前胡一钱五分

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 ①《校注妇人良方》：风痰呕逆，饮食不下，头目昏闷。②《何氏济生论》：肝着胸痛。

13076 旋覆花汤

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】 旋覆花 橘红 半夏 茯苓 甘草 厚朴 芍药 细辛

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 胸中嘈杂汪洋，常觉冷涎泛上，兀兀欲吐，饱闷。

13077 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 旋覆花半两 木香半两 赤茯苓一两 白术一分 人参一两（去芦头） 前胡一两（去芦头） 半夏一两（汤洗七遍去滑） 桂心一两 青橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 芎藭一两 附子半两（炮裂，去皮脐） 大腹皮半两（锉）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 膈气。胸中痰结，否塞不通，不能饮食。

13078 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 旋覆花半两 白芷半两 芎藭半两 藁本半两 蔓荆子半两 赤茯苓一两 防风半两（去芦头） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 独活半两 细辛半两 羌活半两 石膏二两 半夏半两（汤洗七遍去滑） 前胡一两（去芦头） 羚羊角屑二分 杜若三分 甘草半两（炙微赤，锉） 甘菊花半两

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，薄荷七叶，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇人风眩头疼，痰壅烦闷，不下饮食。

13079 旋覆花散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【异名】 旋覆花汤（《妇人良方》卷六）。

【组成】 旋覆花半两 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄） 芎藭半两 细辛半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 前胡半两（去芦头） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 羌活半两 人参半两（去芦头） 桂心半两 赤茯苓三分 藿香半两 甘草三分（炙微赤，锉） 羚羊角屑三分

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 妇人风痰呕逆，不下饮食，头目昏闷。

13080 旋覆代赭汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 旋覆代赭石汤（《普济方》卷一二七）、代赭旋覆汤（《医方集解》）、旋覆花代赭石汤（《类聚方》）。

【组成】 旋覆花三两 人参二两 代赭石一两 甘草三两（炙） 半夏半升（洗） 生姜五两 大枣十二枚（擘）

【用法】 以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三

升，温服一升，一日三次。

【功用】《方剂学》：降逆化痰，益气和胃。

【主治】①《伤寒论》：伤寒发汗，若吐若下解后，心下痞硬，噫气不除者。②《方剂学》：胃虚气逆证。心下痞硬，噫气频作，反胃呕吐，吐涎沫，舌苔白滑，脉弦而虚。

【方论选录】①《注解伤寒论》：硬则气坚，咸味可以软之，旋覆之咸，以软痞硬；虚则气浮，重剂可以镇之，代赭之重，以镇虚逆；辛者散也，生姜、半夏之辛，以散虚痞；甘者缓也，人参、甘草、大枣之甘，以补胃弱。②《删补名医方论》引罗天益曰：方中以人参、甘草养正补虚；生姜、大枣和脾养胃，所以定中州者至矣；更以代赭石之重，使之敛浮镇逆；旋覆花之辛用以宣气涤饮；佐以人参以归气于下；佐半夏以蠲饮于上。浊降则痞硬可消，清升则噫气可除矣。③《医方考》：旋覆之咸，能软痞硬而下气；代赭之重，能镇心君而止噫；姜、夏之辛，所以散逆；参、草、大枣之甘，所以补虚。④《伤寒论三注》：旋覆花能消痰结软痞，治噫气；代赭石治反胃，除五脏血脉中热，健脾，乃痞而噫气者用之，谁曰不宜？于是佐以生姜之辛，可以开结也；半夏逐饮也；人参补正也；桂枝散邪也；甘草、大枣益胃也。余每借之以治反胃、噎食不降者，靡不神效。⑤《成方便读》：旋覆花能斡旋胸腹之气，软坚化痰；而以半夏之辛温散结者协助之；虚则气上逆，故以代赭之重以镇之；然治病必求其本，痞硬噫气等疾，皆由正虚而来，故必以人参、甘草补脾而安正，然后痰可消，结可除，且旋覆、半夏之功，益彰其效耳；用姜枣者，病因伤寒汗吐下后而得，则表气必伤，藉之以和营卫也。

【临证举例】①噫气 《王氏医案》：予素患噫气，凡体稍不适，其病即至，即响且多，势不可遏，戊子冬发之最甚，苦不可言。孟英曰，此阳气式微，而浊阴上逆也，先服理中汤一剂，随以旋覆代赭汤投之，遂愈。嗣后每发，如法服之，辄效。后来发亦渐轻，今已不甚发矣。予闻孟英常云，此仲圣妙方，药极平淡，奈世人畏不敢用，殊可陋也。②眩晕呕吐 《浙江中医杂志》(1966；7:30)：用本方适当加减治疗50例，其中经西医诊断的有：急慢性胃炎和溃疡6例，神经官能症11例，高血压、美尼尔氏症、癔病及脑膜炎后遗症各1例。不论原发并发，均以此次发病的眩晕呕吐为主证。主要脉证为头晕目眩，胸痞呕恶，口淡，脉象弦缓，弦滑，舌苔白薄滑腻。部分病例兼见咳唾粘痰，食欲不振，胃痛泛酸，耳鸣心悸，失眠多梦。治疗效果：50例中服药最少为二剂，最多为18剂，平均6剂，一般3～6天见效。治后34例眩晕呕吐俱止，14例眩晕呕吐减轻，2例无效。③癔症球《上海中医药杂志》(1984；4:18)：以本方加减治疗癔症球45例，结果最少服药6剂，最多35剂，一般10～20剂。症状消失，眠食正常，恢复工作，属于治愈者34例；症状基本消失，眠食尚好，恢复工作，属于基本治愈者8例；无效3例。④顽固性呕吐《江西中医药》(1985；6:47)：本方为主治疗顽固性呕吐10例，其中慢性胃炎急性发作、慢性肾炎尿毒症、胃癌肝转移、肾肿瘤广泛转移、脑脓肿所致呕吐各1例，神经性呕吐5例，均获满意疗效。另以本方加减治胃气虚弱，痰湿内阻之呕吐11例，其中包括胃溃疡、胃扩张、胃大部切除术后、肝癌晚期等所致呕吐，均获显效。

13081 旋覆代赭汤

【方源】《证治汇补》卷五。

【组成】旋覆花三钱 代赭石一钱（研）

【用法】用旋覆花煎，调赭石末服。

【主治】呕吐不已，真气逆而不降，用此镇坠。

13082 旋覆半夏汤

【方源】《济生》卷七。

【组成】旋覆花（去枝萼） 芎藭 细辛（洗去土） 人参 甘草（炙）各半两 半夏（汤泡七次） 赤茯苓（去皮） 干生姜 陈皮（去白）各一两 当归（去芦，酒浸）一两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠恶阻，心下愤闷，吐逆不食，恶闻食气，头晕，四肢骨节烦痛，多卧少起。

13083 商陆丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】商陆一两 川芒消半两 甘遂半两（煨令黄色） 芫花半两（醋拌炒，令干） 荛花半两（微炒） 麝香一分（细研） 猪苓半两（去黑皮）

【用法】上为末，研入麝香令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，食前以粥饮送下。

【功用】利小便。

【主治】水气遍身浮肿，及疗酒客虚热，当风饮冷水，腹胀满阴肿。

【备考】《普济方》有大黄。

13084 商陆丸

【方源】《普济方》卷二九二。

【组成】商陆 牵牛 赤小豆 萝卜子各等分

【用法】 上为末，糯粥为丸，如梧桐子大。约量丸数，用萝卜子汤送下。

【主治】 水气浮肿。

【宜忌】 忌鱼、酢、面食。

13085 商陆豆

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】 生商陆（切如麻豆） 赤小豆各等分 鲫鱼三枚（去肠存鳞）

【用法】 上三味，将二味实鱼腹中，以绵缚之；水三升，缓煮豆烂，去鱼只取二味，空腹食之，以鱼汁送下。甚者过二日，再为之，不过三剂。

【主治】 水气肿满。

13086 商陆散

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】 商陆根（取自然汁）一盏 甘遂末一钱 土狗一枚（自死者，细研）

【用法】 上药同调，只作一服。空心、日午水调下。

【功用】 取水。

【主治】 十种水气。

【宜忌】 忌食盐一百日，忌食甘草三日。

13087 商陆粥

【方源】 方出《外台》卷二十引《近效》，名见《圣济总录》卷一八八。

【组成】 商陆根（去皮取白色，不用赤色，切如小豆）一大盏

【用法】 上以水三升，煮取一升以上，即取粟米一大盏煮成粥，仍空腹服。若一日两度服，即恐利多，每日服一顿，即微利。

【主治】 水气。

【宜忌】 不得吃生冷等。

13088 商陆鲤鱼汤

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 商陆一两（锉） 木通一两（锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 赤小豆半斤 鲤鱼一枚重一斤（理如食法） 桑根白皮二两（锉）

【用法】 上以水五升，入生姜二两，葱白五茎，同煮令豆熟为度。每服吃汁一中盏，鱼豆任意食之，不拘时候。

【主治】 妇人水病，头面及四肢浮肿，喘急，小便不利。

13089 商陆赤小豆汤

【方源】《三因》卷十七。

【异名】 赤小豆汤（《得效》卷十四）。

【组成】 赤小豆 商陆十各等分

【用法】 上锉散。每服一两，水一碗，煎至七分盏，取清汁服。

【主治】 妊娠手脚肿满拳急。

13090 鹿子丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】 嫩鹿茸（去毛，酥炙微黄） 大附子（炮，去皮脐） 盐花各等分

【用法】 上为末，枣肉为丸。每服三十丸，空心好酒送下。

【主治】 肺痿，胸前有孔；兼治腰痛。

13091 鹿角丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】 鹿角半斤（镑细，以少牛乳拌和得所，于小甑子内以大麦压蒸一复时） 黄耆半两（锉） 补骨脂二两（微炒） 韭子三两（微炒） 蛇床子一两 人参二两（去芦头） 石龙芮一两 覆盆子一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 远志一两（去心） 续断一两 石斛一两（去根，锉） 当归三两 龙骨二两 柏子仁一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】 虚劳，肾气久弱，阴下湿痒，小便遗失，因梦鬼交，精泄不禁。

13092 鹿角丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】 鹿角屑十斤（熬令微黄） 菟丝子一斤（酒浸一宿，别捣为末） 远志一两（去心） 肉苁蓉五两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 天雄二两（炮裂，去皮脐） 熟干地黄六两 五味子五两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹以温酒送下，晚食前再服。

【主治】 五种腰痛，肾脏虚冷，颜容萎黄，形体消瘦，腰痛不可忍，虚惫无力。

13093 鹿角丸

【方源】《三因》卷十三。

【组成】 鹿角屑一两（酥炙） 附子（炮）二两 桂心三分

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心盐酒送下。

【主治】 肾虚伤冷，冷气入肾，其痛如掣。

13094 鹿角丸

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生》。

【组成】 鹿角二两 川牛膝（去芦，酒浸，焙）一两半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】 骨虚极，面肿垢黑，脊痛不能久立，气衰，发落齿槁，腰脊痛，甚则喜唾。

13095 鹿角散

【方源】《医心方》卷二十八引《洞玄子方》。

【组成】 鹿角 柏子仁 菟丝子 蛇床子 车前子 远志 五味子 苁蓉各四分

【用法】 上为散。每服五分匕，食后服，一日三次。不知，更加方寸匕。

【主治】 男子五劳七伤，阳痿不起，精自引出，小便余沥，腰背疼冷。

13096 鹿角散

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】 乌贼骨 白龙骨（煅；并别研） 牡蛎粉各半两 龟甲一两（米醋炙焦黄） 鹿角二两（镑，入酥少许拌炒）

【用法】 上为细末。每服二钱，空心、食前煎乌梅、甘草、生姜汤调下，温酒米饮亦得。

【主治】 血海虚损。经水不止，漏下白水。

13097 鹿角散

【方源】《直指》卷十。

【组成】 鹿角屑 鹿茸（去皮，酥炙）各一两 白茯苓三分 人参 白茯神 桑螵蛸（蒸，焙） 芎藭 当归 故纸（炒） 龙骨（别研） 新韭子（酒浸一宿，焙）各半两 柏子仁（去壳） 甘草（炙）各一分

【用法】 上为末。每服三钱半，加生姜五片，大枣二枚，粳米一百粒，水煎，食前服。

【主治】 脏腑久虚，梦泄。

13098 鹿角散

【方源】《外科正宗》卷七。

【组成】 鹿角尖三寸

【用法】 用炭火煅稍红存性，碾末。每服三钱，食后用热酒一茶钟调服；甚者再一服。

【主治】 乳痈新起，结肿疼痛，憎寒发热，但未成者。

13099 鹿附汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 鹿茸五钱 附子三钱 草果一钱 菟丝子三钱 茯苓五钱

【用法】 上用水五杯，煮取二杯，一日二次，滓再煮一杯服。

【主治】 寒湿，湿久不治，伏足少阴，舌白身痛，足跗浮肿。

【方论选录】 湿伏少阴，故以鹿茸补督脉之阳。督脉根于少阴，所谓八脉丽于肝肾也；督脉总督诸阳，此阳一升，则诸阳听令。附子补肾中真阳，通行十二经，佐之以菟丝，凭空行气而升发少阴，则身痛可休。独以一味草果，温太阴独胜之寒以醒脾阳，则地气上蒸天气之白苔可除；且草果，子也，凡子皆达下焦。以茯苓淡渗，佐附子开膀胱，小便得利，而跗肿可愈矣。

13100 鹿茸丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】 鹿茸不拘多少（切作片子，酥炙黄）

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二五十丸，空心、食前盐汤送下。

【主治】 肾虚腰痛。

13101 鹿茸丸

【方源】《三因》卷十。

【组成】 鹿茸（去毛，切，炙）三分 麦门冬（去心）二两 熟地黄 黄耆 鸡腹胵（麸炒） 苁蓉（酒浸） 山茱萸 破故纸（炒） 牛膝（酒浸） 五味子各三分 茯苓 玄参 地骨皮各半两 人参三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，米汤送下。

【主治】 失志伤肾，肾虚消渴，小便无度。

13102 鹿茸丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【异名】 内补鹿茸丸(《普济方》卷三十三)。

【组成】 鹿茸（火燎去毛，酒浸，炙） 附子（炮，去皮脐） 五味子 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 牛膝（酒浸一宿）各一两 熟干地黄（洗，焙）五两 干山药三两 杜仲一两半（炒去丝）

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒或盐汤送下。

【主治】 真元虚惫，五劳七伤，小腹拘急，四肢酸疼，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鸣，心忪气短，精神困倦，喜怒无常，饮食无味，举动乏力，小便滑数，或时出血。

13103 鹿茸丸

【方源】《妇人良方》卷一。

【异名】 生料鹿茸丸(《医略六书》卷二十六)。

【组成】 鹿茸（燎去毛，酥炙） 赤石脂 禹余粮（制）各一两 艾叶 柏叶 附子（炮）各半两 熟地黄（洗，焙） 当归 续断各二两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】 经候过多，其色瘀黑，甚者崩下，吸吸少气，脐腹冷极则汗出如雨，尺脉微小。由冲任虚衰，为风冷客乘胞中，气不能固。

【方论选录】《医略六书》：附子补真火以扶阳，鹿茸补督脉以壮阳，盖阳回气壮则冲任自固；而又以赤石脂涩血固下，禹余粮涩气固经，俾气血完固，则血不妄行；熟地补阴滋血脉；当归养血归经脉；续断续绝扶虚羸；艾叶温经暖子宫；侧柏灰以止血定崩下也。蜜以丸之，饮以下之，使阳气内充，则风冷外解，而经脉完固，何有崩下不止之患哉？

13104 鹿茸丸

【方源】《济生》卷一。

【异名】 生料鹿茸丸(《准绳·类方》卷二)。

【组成】 川牛膝（去芦，酒浸） 鹿茸（去毛，酒蒸） 五味子各二两 石斛（去根） 菟丝子（淘净，酒浸） 蒺藜 杜仲（去皮，锉，炒） 川巴戟（去心） 山药（锉，炒） 阳起石（煅） 附子（炮，去皮脐）各一两 沉香（别研）半两 川楝子（取肉，炒） 磁石（煅） 官桂（不见火） 泽泻各一两

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐酒、盐汤送下。

【主治】 肾虚少气，腹胀腰痛，小腹急痛，手足逆冷，饮食减少，面色黧黑，百节痛疼，日渐无力。

13105 鹿茸丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十四。

【组成】 熟地（酒煨）五两 山茱肉（去核，酒拌蒸，炒）三两 茄茸一具（去毛骨，酥炙） 山药三两（炒黄） 五味子二两（蜜酒拌蒸，晒干，炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服四五钱，早、晚、食前白汤送服。

【主治】 精滑无度，阴窍漏气。

13106 鹿茸酒

【方源】《普济方》卷二一九。

【组成】 好鹿茸五钱或一两（去皮，切片） 干山药一两（为末）

【用法】 上以生薄绢裹，用好酒一瓶，浸七日后，开瓶饮酒，一日三盏为度。酒尽再浸。

【主治】 虚弱，阳事不举，面色不明，小便频数，饮食不思。

13107 鹿茸散

【方源】 方出《千金》卷四，名见《圣济总录》卷一五二。

【组成】 鹿茸 阿胶各三两 乌贼骨 当归各二两 蒲黄一两

【用法】 上药治下筛。每服方寸匕，空心酒调下，日三夜再服。

【主治】 妇人漏下不止。

【方论选录】《千金方衍义》：本虚标热，而见漏下不止，故用鹿茸、归、胶温补冲督，其力最专。但漏下不止，必有干血内着，又须乌贼、蒲黄予以出路也。

13108 鹿茸散

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】 鹿茸 海螵蛸各三钱 白芍 当归 桑寄龙骨 人参各三钱 桑螵一钱半（劈破，碾，炙黄）

【用法】 上为末。酒调服。

【主治】 遗尿滑脱，属寒者。

13109 鹿胎丸

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】 鹿胎（去秽，煮烂） 熟地八两（用人乳粉、山药各二两拌蒸至五两为度） 菟丝子十两（酒煮五两） 枸杞八两（人乳浸） 何首乌（连皮，用黑豆煮干，去豆；以人乳浸，日晒夜露）八两 石斛（酒炒）六两 巴戟（酒浸）五两 黄耆（酥炙）五两 人参四两 沉香二两

【用法】 炼黄蜡膏为丸。每服一百丸，盐汤送下。

【主治】 房劳精损，困乏，虚火，晕，聋，遗精，步履欹邪，欲成劳瘵。

13110 鹿菟丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 鹿茸一两 菟丝子 山药各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮或人参煎汤或盐酒送下。

【主治】 饮酒积热，熏蒸五脏，津血枯燥，小便并多，肌肉消烁，专嗜冷物寒浆。

13111 鹿角胶丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】 肉苁蓉二两（酒浸一宿，切，焙） 牛膝二两（酒浸一宿） 菟丝子（汤浸去浮，别用酒浸取软） 附子（炮，去皮脐） 桑寄生 覆盆子 熟干地黄（洗，焙） 山药 五味子 山茱萸 白蒺藜（炒） 当归（洗，焙） 肉桂（去粗皮）各二两 川萆薢四两 破故纸二两半（炒） 柏子仁二两 茴香二两半（炒） 鹿角胶二两（蚌粉炒焦）

茯神（去木）二两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒或盐汤送下；妇人温醋汤送下。

【功用】 补养元阳，滋荣气血，驻颜美食。

【主治】 真元虚弱，下元冷惫，脐腹疼痛，夜多小便，腰脚无力，肢体倦怠，怔忪恍惚，头昏目运，面色黧黑，耳内蝉鸣，饮食减少；妇人诸虚不足，一切冷病，久娠不成，发落面黑。

13112 鹿角胶丸

【方源】《医学正传》卷四。

【异名】 鹿胶丸(《嵩崖尊生》卷十一)。

【组成】 鹿角胶一斤 鹿角霜 熟地黄各半斤 川牛膝 白茯苓 菟丝子 人参各二两 当归身四两 白术 杜仲各二两 虎胫骨（酥炙） 龟版（酥炙）各一两

【用法】 上为细末，另将鹿角胶用无灰酒三盏烊化为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心姜、盐汤送下。

【主治】 血气虚弱，两足痿软，不能行动，久卧床褥。

13113 鹿角胶丸

【方源】《证治汇补》卷八。

【组成】 鹿角胶 熟地 发灰

【用法】 上为末，茅根汁为丸。盐汤送下。

【主治】 溺血。

【方论选录】《医略六书》：鹿角胶补精血以壮肾阳；熟地黄补肾水以养真阴；血余灰止血溢，生新血也。胶丸，淡盐汤下，使阳旺阴充，则阴阳既济，而血自归经，何患溺血久不止哉。此温肾止血之剂，为阳虚溺血久不止之专方。

13114 鹿角霜丸

【方源】《普济方》卷二二二引《卫生家宝》。

【组成】 鹿角霜二两 白茯苓一两 山药一两 远志半两（去心） 附子一个（炮，去皮尖）

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸或四十丸，用米饮、温酒任下，空心食前服。

【主治】 精气虚滑，真气不接。

13115 鹿角霜丸

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】 川芎七钱 香附（醋制）二两 炙草五钱 川续断一两半 鹿角霜 柏子仁（去壳，炒） 归身 茯神 龙骨（煅） 阿胶（蛤粉炒成珠）各一两

【用法】 上为末，山药五两研作糊为丸。每服五十丸，空心温酒送下。

【主治】 中气下陷，元气不固，崩久成漏，连年不休者。

13116 鹿角霜丸

【方源】《古今医鉴》卷二。

【组成】 黄耆（蜜炙）二两 人参二两 白术二两 白茯苓二两 当归（酒洗）二两 川芎一两 肉桂一两 熟地黄二两 茴香（炒）一两 牛膝（去芦）一两半 木瓜一两半 白芍药（酒炒）二两 川乌一两半 羌活一两 独活一两 肉苁蓉（酒洗）一两半 槟榔一两 防风一两半 乌药（炒）一两半 破故纸（酒炒）二两 木香二钱 续断一两五钱 甘草五钱 苍术（米泔水浸）二两 附子一两 （童便和煨） 杜仲二两（姜汁炒去丝） 虎胫骨（酥炙）一两五钱 鹿角霜一斤

【用法】 上为极细末，酒为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心米汤送下。

【主治】 诸风瘫痪，半身痿弱，或二三年不能动履者。

13117 鹿角秋石丸

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】 鹿角八两（烧灰） 秋石一两（煅灰）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，乌梅汤送下。

【主治】 溺血久不止，脉细数者。

【方论选录】 鹿角温散，烧灰善鼓阳气以摄血液；秋石咸平，煅黑善全阴气以净溺红；白蜜之甘以缓之；乌梅之酸以收之。使阴气得全，则阳气秘密，而血自归经，溺血无不止矣。此交济阴阳之剂，为阴虚阳不秘密溺血之专方。

13118 鹿角菟丝丸

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】 鹿角霜二两 菟丝子 牡蛎 白术 杜仲各五钱 莲须三钱 银杏五钱 芡实三钱

【用法】 上为细末，酒煮米糊为丸，如梧桐子大。每服二钱，一日二次，空腹时盐汤送下。

【功用】 补肾温阳。

【主治】 妇人白带清稀，久下不止，面色苍白，精神疲乏，形寒肢冷，头晕眩，心悸气短，腰痛如折，小便频数，五更泄泻，带不甚多者。

【加减】 寒甚者，加肉桂一钱，附片三钱。

13119 鹿茸大补汤

【方源】《局方》卷五（淳祐新添方）。

【组成】 鹿茸（制） 黄耆（蜜炙） 当归（酒

浸） 白茯苓（去皮） 苁蓉（酒浸） 杜仲（炒去丝）各二两 人参 白芍药 肉桂 石斛（酒浸，蒸，焙） 附子（炮） 五味子 半夏 白术（煨）各一两半 甘草半两 熟干地黄（酒蒸，焙）三两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，加生姜三片，大枣一个，水一盏，煎七分，空心热服。

【主治】 ①《局方》：男子、妇人诸虚不足，产后血气耗伤，一切虚损。②《杂病源流犀烛》：遗泄。

13120 鹿茸石斛丸

【方源】《普济方》卷十二引《余居士选奇方》。

【组成】 鹿茸一对（浸一宿，微炙） 金钗石斛（去根）一两 犀角（镑）一两 羚羊角（镑）一两 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皮） 熟干地黄一两 酸枣仁一两（汤浸，去赤皮） 青木香一两 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，另捣为末，一两生用） 车前子一两 覆盆子一两 茺蔚子一两 地肤子一两 柏子仁一两 葳蕤一两 麦门冬一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、午前、临睡用青盐汤送下，一日三次。

【功用】 退昏，除内障膜。

【主治】 肝肾虚，血气不能营养于睛，致目久视眩眩，有黑花簇簇，雾气昏昏，视物如霜雪之形者。

13121 鹿茸四斤丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 肉苁蓉（酒浸一宿，去皱皮） 牛膝（去芦，酒浸一宿，焙） 干木瓜（大片者，去心） 天麻（通明者）各二两 鹿茸（去毛，酒浸，炙） 虎胫骨（醋炙令黄） 附子（炮，去皮脐，切片，再用酒煮令透） 杜仲（去皮，锉，酒洒，炒去丝，勿令焦干） 北五味子（去枝，研砂，作饼，焙） 川当归（净洗，酒浸一宿）各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至六十丸，空心、食前温酒、盐汤送下；脚疼，木瓜汤送下。

【功用】 补气血，壮元阳，强筋骨，除风湿。

【主治】 腰重脚弱，筋骨酸疼，倦怠无力。

13122 鹿茸四斤丸

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】 肉苁蓉（酒浸） 天麻 鹿茸（燎去毛，酥炙） 菟丝子（酒浸通软，别研细） 熟地黄 牛膝（酒浸） 杜仲（酒浸） 木瓜干各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒、米汤送下。

【主治】 肝肾虚，热淫于内，致筋骨痿弱，不自胜持，起居须人，足不任地，惊悸战掉，潮热时作，饮食无味，不生气力，诸虚不足。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“鹿茸四神丸”。

13123 鹿茸补肝丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】 鹿茸（燎去毛，酒浸，微炙）一两 熟干地黄一两半（洗，焙） 当归（洗，焙） 白术 黄耆（蜜炙） 人参（去芦头） 附子（炮，去皮脐）各一两 柏子仁（炒） 石斛（去根） 枳壳（去瓤，麸炒）各三分 白茯苓（去皮） 覆盆子 酸枣仁（炒） 沉香 肉桂（去粗皮）各十两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒或米饮送下。

【功用】 补五脏，益肝血，驻颜色。

【主治】 产后劳伤血气，肝经不足，头运怳惚，四肢懈倦，翕翕气短，目视茫茫，耳鸣听重。

13124 鹿茸肾气丸

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】 熟地五两 萸肉三两 鹿茸三两（锉） 丹皮一两半 山药三两（炒） 茯苓一两半（蒸） 泽泻半两 菟丝三两（焙） 龟版三两（盐水炙） 巴戟三两（炒） 石斛三两（焙）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三五钱，淡盐汤送下。

【主治】 肾虚不能纳气，眩晕脉虚者。

【方论选录】 熟地补阴滋肾脏，萸肉秘气涩精海；鹿茸壮元阳以归肾，龟版壮肾水以滋阴；山药益脾阴，茯苓渗湿热，丹皮平相火，泽泻泻浊阴；菟丝补肾填精，巴戟补火温肾，石斛以退虚热也。丸以白蜜，下以盐汤，使肾水充足，则虚炎自退，而真气无不归原，何眩晕之有？此补肾纳气之剂，为肾虚眩晕之专方。

13125 鹿茸益精丸

【方源】《直指》卷十。

【组成】 鹿茸（去皮，酥炙微黄） 桑螵蛸（瓦上焙） 肉苁蓉 当归 巴戟（去心） 菟丝子（酒浸软，研） 杜仲（截碎，姜汁淹，炒断丝） 川楝子（蒸，去皮取肉，焙） 益智仁 禹余粮（煅红，醋淬，以碎为度）各三分 韭子（微炒） 故纸（炒） 山茱萸 赤石脂 龙骨（别研）各二分 滴乳香一分

【用法】 上为细末，酒调糯米糊为丸，如梧桐子

大。每服七十丸，食前白茯苓煎汤送下。

【主治】 ①《直指》：心虚肾冷，漏精白浊。②《杂病源流犀烛》：遗泄伤阳者。

13126 麻药

【方源】 《准绳·疡医》卷六。

【异名】 麻肌散(《中国接骨图说》)。

【组成】 川乌 草乌 南星 半夏 川椒

【用法】 上为末。唾调搽之。

【主治】 跌仆伤损。

13127 麻药

【方源】 《石室秘录》卷一。

【异名】 麻肺丹(《伤科汇纂》卷七)、麻沸散(《华佗神医秘传》卷三)。

【组成】 羊蹄蹋三钱 茉莉花根一钱 当归一两 菖蒲三分

【用法】 上水煎，服一碗，即人如睡寝。

【功用】 ①《石室秘录》：任人刀割，不痛不痒。②《华佗神医秘传》：能令人麻醉，忽忽不知人事，任人劈破，不知痛痒。

【主治】 《华佗神医秘传》：腹中癥结，或成龟、蛇、鸟、兽之类，各药不效，必须割破小腹，将前物取出；或脑内生虫，必须劈开头脑，将虫取出者。

13128 麻药

【方源】 《理瀹》。

【组成】 草乌 川乌

【用法】 上为末，凉水调，摊贴患处。

【功用】 止痛。

【主治】 缺唇缝合手术。

13129 麻子汤

【方源】 《千金》卷十七。

【组成】 麻子一升 桂心 人参各二两 阿胶 紫菀各一两 生姜三两 干地黄四两 桑白皮一斤 饧一斤

【用法】 上㕮咀。以酒一斗五升，水一斗五升，煮取四升，分五次服。

【主治】 肺气不足，咳唾脓血，气短不得卧。

【方论选录】 《千金方衍义》：此炙甘草汤之变方。因咳唾血脓，肺中津伤，故用人参、阿胶、地黄、麻仁以滋津血之燥，生姜、桂枝以散肺气之结，紫菀即甘草之变味，桑皮即麦冬之变味，饧糖则大枣之变味耳。

13130 麻子粥

【方源】 方出《证类本草》卷二十四引《食医心镜》，名见《圣济总录》卷一八八。

【异名】 麻子仁粥(《冯氏锦囊·杂症》卷六)。

【组成】 冬麻子半斤（碎，水研，滤取汁） 米二合

【用法】 以麻子汁煮米作稀粥，着葱、椒、姜、豉，空心服之。

【主治】 风水，腹大脐肿，腰重痛不可转动。

13131 麻子粥

【方源】 《养老奉亲》

【组成】 冬麻子一升（研，取汁） 鲤鱼肉一两（切）

【用法】 上取麻子汁，下米四合，和鱼煮作粥，以五味葱椒，空心食，每日二次，频作皆愈。

【主治】 老人水气肿满，身体疼痛，不能食。

13132 麻仁丸

【方源】 《圣惠》卷五十八。

【组成】 大麻仁二两 川大黄一两（锉碎，微炒） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 赤芍药一两 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒） 川芒消一两 槟榔一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以生姜汤送下，晚再服之。

【主治】 大便难，五脏气壅，三焦不和，热结秘涩。

13133 麻仁丸

【方源】 《杨氏家藏方》卷四。

【组成】 麻仁一两（别研） 杏仁（去皮尖，麸炒）二钱半 枳实（去瓤，麸炒）半两 白芍药半两 黑牵牛一两七钱半（微炒）

【用法】 上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温熟水送下。

【主治】 大便秘涩。

13134 麻仁丸

【方源】 《儒门事亲》卷十二。

【组成】 郁李仁（去皮，另捣） 火麻子仁（另捣）各二两 大黄二两（半生、半蒸） 槟榔半两 干山药 防风（去芦） 枳壳（炒，去瓤） 羌活 木香各五钱半

【用法】 上为细末，入另捣者三味搅匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食后温水送下。

【主治】 大便燥涩。

【加减】 加牵牛、滑石亦妙。

13135 麻仁丸

【方源】 《景岳全书》卷五十五。

【组成】 芝麻四两（研，取汁） 杏仁四两（去

皮尖，研如泥） 大黄五两 山栀十两

【用法】 上为末，炼蜜入麻汁为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前白汤送下。

【主治】 大便秘结，胃实能食，小便热赤者。

13136 麻仁丸

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】 麻仁三两 杏仁二两（去皮） 桃仁二两 枳实一两半（炒） 郁李仁三两 当归三两 大黄三两 厚朴一两半 白芍二两（酒炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，白汤送下。

【主治】 气滞血燥，大便不通，小腹胀满。

【方论选录】 气滞于胃，血燥于肠，津液不得传送大府，故大便不通，小腹胀满焉。生麻仁润燥滑肠，制大黄润肠开结；厚朴散气宽胀，桃仁破瘀血润燥，郁李仁润肠散结，扁杏仁润燥降气；当归养血荣肠胃，枳实破气宣壅滞，白芍药敛阴血以致津液也。蜜丸汤下，俾血润气行，则津液流通，而大府自润，传送有权，焉有大便燥闭，小腹胀满乎？

13137 麻仁煎

【方源】《医方考》卷五。

【组成】 麻仁四升

【用法】 以水六升，煎七合，空心服。三剂效。

【主治】 癫风。

【方论选录】 麻仁，润药也。多与之令人通利，故足以泻癫风。然可以济火，可以泽肝，可以润脾，可以濡肾，有攻邪去病之能，无虚中坏气之患，足称良也。

13138 麻桂饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 麻桂汤（《会约》卷十）。

【组成】 官桂一二钱 当归三四钱 炙甘草一钱 陈皮（随宜用，或不用亦可） 麻黄二三钱

【用法】 上以水一钟半，加生姜五七片或十片，煎至八分，去浮沫，不拘时服。但取津津微汗透彻为度。四季皆可用之。

【主治】 ①《景岳全书》：伤寒、瘟疫、阴暑、疟疾，凡阴寒气胜而邪有不能散者。②《会约》：风寒中经，头痛恶寒，拘急身痛，脉浮紧者。

【加减】 若阴气不足者，加熟地黄三五钱；若三阴并病者，加柴胡二三钱；若元气大虚，阴邪难解者，当以大温中饮更迭为用。

【方论选录】 此实麻黄桂枝二汤之变方，而其神效则大有超出二方者。

13139 麻黄丸

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】 麻黄三分（去根节） 桂心 独活 防风（去芦头） 赤芍药 川大黄（锉，微炒） 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 松花各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下，每日二次。

【主治】 小儿龟背。

13140 麻黄汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 麻黄解肌汤（《外台》卷一引《深师方》）。

【组成】 麻黄三两（去节） 桂枝二两（去皮） 甘草一两（炙） 杏仁七十个（去皮尖）

【用法】 上以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取二升半，去滓，温服八合。覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。

【功用】 ①《景岳全书》：峻逐阴邪。②《方剂学》：发汗解表，宣肺平喘。

【主治】 外感风寒，恶寒发热，头身疼痛，无汗而喘，口不渴，舌苔薄白，脉浮而紧。现用于流行性感冒、支气管炎、支气管哮喘、某些皮肤疾患等具有上述症状者。

①《伤寒论》：太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者；太阳与阳明合病，喘而胸满者；太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在者。②《准绳·类方》：肺脏发咳嗽而喘急有声，甚则唾血。③《金鉴》：风寒湿成痹，肺经壅塞，昏乱不语，冷风哮吼者。

【方论选录】 ①《金镜内台方议》：麻黄味苦辛，专主发汗，故用之为君；桂枝味辛热，以辛热之气佐之散寒邪，用之为臣；杏仁能散气解表，用之为佐；甘草能安中，用之为使。《经》曰：寒淫于内，治以甘热，佐以辛苦是也。先圣配此四味之剂，以治伤寒者，乃专主伤寒脉浮紧，恶寒无汗者之所主也。若脉微弱自汗者，不可服此也。②《医方考》：麻黄之形，中空而虚，麻黄之味，辛温而薄；空则能通腠理，辛则能散寒邪，故令为君。佐以桂枝，取其解肌；佐以杏仁，取其利气；入甘草者，亦辛甘发散之谓。③《伤寒来苏集》：麻黄色青入肝，中空外直，宛如毛窍骨节状，故能旁通骨节，除身疼，直达皮毛，为卫分驱风散寒第一品药。然必藉桂枝入心通血脉，出营中汗，而卫分之邪得尽去而不留，故桂枝汤不必用麻黄，而麻黄汤不可无桂枝

也。杏为心果，温能散寒，苦能下气，故为驱邪定喘之第一品药。桂枝汤发营中汗，须啜稀热粥者，以营行脉中，食入于胃，浊气归心，淫精于脉故尔；麻黄汤发卫中汗，不须啜稀热粥者，此汗是太阳寒水之气，在皮肤间，腠理开而汗自出，不须假谷气以生汗也。④《古方选注》：麻黄汤，破营方也。试观立方大义，麻黄轻清入肺，杏仁重浊入心，仲景治太阳初病，必从心营肺卫入意也。分言其功能，麻黄开窍发汗，桂枝和阳解肌，杏仁下气定喘，甘草安内攘外，四者各擅其长，有非诸药之所能及。兼论其相制七法，桂枝外监麻黄之发表，不使其大汗亡阴；甘草内宁麻黄之出汗，不使其劫阴脱营；去姜、枣者，姜性上升，又恐碍麻黄发表；枣味缓中，又恐阻杏仁下气。辗转回顾，无非欲其神速，一剂奏绩。若喜功屡用，必不戢而召亡阳祸矣。故服已又叮咛不须啜粥，亦恐有留恋麻黄之性也。

【临证举例】 ①伤寒吐血 《名医类案》：陶尚文治一人伤寒四五日，吐血不止，医以犀角地黄汤等治而反剧。陶切其脉浮紧而数，若不汗出，邪何由解？遂用麻黄汤一服，汗出而愈。②流行性感冒《新医药资料》(1975；4:32)：患者多为青年矿工，平素身体壮实，多起病急骤，恶寒发热，寒热俱甚，头痛身疼，鼻塞流涕，无汗，脉浮紧，用荆防败毒散疗效不佳者，遂投麻黄汤，一般服2～3剂即汗出热退而愈。③儿童银屑病 《浙江中医杂志》(1965；2:38)：麻黄汤合四物汤加减，治疗儿童银屑病10例，服药4～40剂，平均19剂，结果2例痊愈，5例基本痊愈，2例显著进步，1例进步。

【现代研究】 ①发汗解热作用 《国外医学·中医中药分册》(1981；4:12)：实验表明，组成麻黄汤的药物如麻黄、桂枝、甘草及全方都有解热作用。麻黄有发汗解热效果，其水溶性提取物可使大鼠脚底部分水分发散，即具有发汗作用。《成都中医学院学报》(1986；31)：麻黄碱对人也有发汗效果，使其暴露于高温环境时出汗量明显增加。麻黄加桂枝时则可使汗腺上皮细胞水泡明显扩大，数目也显著增加，但糖原颗粒不变。观察汗液分泌，也可见麻黄桂枝合用时发汗作用明显增强。②镇咳平喘作用 《中医杂志》(1984；8:65)：麻黄汤具有显著的平喘和祛痰镇咳效果，在小鼠肺支气管灌流实验中，本方可使灌流时间缩短20.39%，表明本方具有扩张支气管作用。此外，本方还能显著延长氨雾刺激所致小鼠咳嗽的潜伏期，减少咳嗽次数；显著促进小鼠支气管对酚红的排泌，抑制蟾蜍口腔粘膜纤毛的运动，提示本方有显著的祛痰和镇咳作用。

13141 麻黄汤

【方源】 《外台》卷一引《崔氏方》。

【异名】 葱豉汤(《活人书》卷十八)。

【组成】 麻黄二两（去节） 葛根三两 葱白十四茎 豉一升（绵裹）

【用法】 上切。以水七升，煮取二升半，分三次服。

【主治】 ①《外台》引《崔氏方》：伤寒，服葛根汤不得汗，恶寒而拘急者。②《活人书》：伤寒一二日，头项、腰背痛，恶寒，脉紧无汗者。

13142 麻黄汤

【方源】 《外台》卷三引《广济方》。

【组成】 麻黄五两（去节） 葛根四两 栀子二七枚（擘） 葱（切）一升 香豉一升（绵裹）

【用法】 上㕮咀。以水八升，先煮麻黄、葛根三两沸，去沫，纳诸药，煎取二升五合，绞去滓，分为三服。服别相去如人行五六里更进一服。覆取汗，后以粉粉身。

【功用】 发汗。

【主治】 天行壮热，烦闷。

【宜忌】 忌风及诸热食。

13143 麻黄汤

【方源】 《圣济总录》卷八。

【组成】 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙干）一两半 独活（去芦头）一两 细辛（去苗叶） 黄芩（去黑心）各半两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，以水二盏，煎至一盏，去滓，空心温服，相去如人行五七里再服。微汗即愈。病在四肢者，并为一次服。

【主治】 中风四肢拘挛，百节疼痛，心烦，恶寒淅淅，不欲饮食。

【加减】 有热，加大黄二分（锉如麻豆，用醋炒令紫色）；腹满，加枳壳二分（去瓤，麸炒）；气逆，加人参二分；胁下悸满，加牡蛎灰二分；渴加栝楼根二分；素有寒，加附子一枚（炮裂，去皮脐）。

13144 麻黄汤

【方源】 《圣济总录》卷八十。

【组成】 麻黄（去根节）二两半 白术（锉碎，微炒）二两 甘草（炙）一两 石膏（碎）三分 赤茯苓（去黑皮）一两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，以水二盏半，

加大枣二枚（劈破），生姜一枣大（拍碎），同煎至一盏，去滓温服，每日三次。每服后盖覆，令汗出愈。

【主治】 水气通身肿。

13145 麻黄汤

【方源】《易简方》。

【组成】 麻黄 甘草 杏仁 五味子 茯苓各等分 橘红倍之

【主治】 肺感寒邪，咳嗽喘急。

【宜忌】 有汗者及虚劳咳嗽忌服。

13146 麻黄汤

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】 麻黄（不去节） 甘草（生用） 杏仁（生用）

【用法】 上为粗末。每服二三钱，水煎，温服。

【主治】 因风寒衣服薄致嗽。

13147 麻黄汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】 麻黄 桂枝 杏仁 甘草 川芎 防风 羌活

【用法】 上加生姜、葱白、豆豉一撮，水煎，热服。取汗。

【主治】 冬时正伤寒，头痛如斧劈，身热如火炽，恶寒体痛，腰背项强拘急，脉浮紧无汗。

【加减】 若渴，加天花粉；恶心，加姜汁、半夏；泄泻，加炒苍术、升麻；元气虚，加人参，去杏仁；骨节烦痛，倍加羌活、防风、苍术；有痰，加半夏；胸胁满痛，加枳壳、桔梗。

【宜忌】 中病即止，不得多服。

13148 麻黄汤

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】 麻黄（去根节，制过） 升麻 牛蒡子（炒） 蝉壳（洗净，去足翅） 甘草各一钱

【用法】 上锉细。加腊茶叶一钱，以水一盏，煎至七分，去滓服。

【功用】 托里发表。

【主治】 发热六七日以后，明是疹子，却不见出，此皮肤坚厚，腠理闭密，又或为风寒袭之，曾有吐利，故伏而不出。

【加减】 烦渴，加石膏末四钱。

13149 麻黄饮

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】 麻黄（去根节，煎掠去沫，焙） 大黄（锉，炒） 牡蛎（熬） 黄芩（去黑心）各二两 凝水石（碎） 石膏（碎） 赤芍药 滑石（碎） 紫石英（碎） 白石脂各四两 人参 桂（去粗皮）各一两 蛇蜕（炙）半两 龙齿（研）二两 甘草（炙） 一两半

【用法】 上为粗末，用绢袋盛，悬于透空处。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，食后良久服。

【主治】 风痫卒倒，吐沫口噤，手足瘛疭。

13150 麻黄饮

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】 麻黄（去根节，汤煮，去浮沫） 前胡（去芦头） 白前 桑根白皮（锉） 杏仁（去皮尖双仁，炒）各一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加葱白三寸（切），煎至七分，去滓温服。

【主治】 肺中寒气，头痛咳逆，涕唾稠浊，鼻塞短气。

13151 麻黄饮

【方源】《医学纲目》卷二十。

【组成】 麻黄半两（去根留节） 防风半两 羌活 石膏六钱半（煅） 黄芩四钱 滑石一两 陈皮 紫萍各七钱半 鼠粘子七钱半 缩砂二钱半 苍耳草三钱半 苍术半两 生甘草三钱半 薄荷叶一钱半 荆芥二钱半

【用法】 上㕮咀。每服六钱，以水一钟半，猛火煎取六分，入好酒四五滴，去滓热服。须得通身有汗，其疮自安。甚者，服至百服之后，看汗出到何处，若自上而下出过脚脚脉，其疮自愈。

【主治】 湿热症，上体生疮，或痒或痛，黄水浸淫，结痂堆起，延蔓于三阳之分，根窠小，带红肿。

【备考】 方中羌活用量原缺。

13152 麻黄散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】 麻黄二两（去根节） 葛根二两 桂心一两 豉二合 赤芍药一两 石膏二两（捣碎）

【用法】 上锉细，和匀。每服半两，以水一大盏，加生姜半分、大枣三枚，煎至五分，去滓热服，不拘时候。服后便吃葱粥，衣覆取汗，如未汗出，即再煎服之。

【主治】 伤寒三日不得汗，烦热闷乱。

13153 麻黄散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】 麻黄（去根节） 葛根（锉） 知母 柴胡（去苗） 栀子仁 陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 甘草（炙微赤，锉）各半两 石膏一两

【用法】 上为粗散。每服五钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 伤寒壮热，烦渴头痛。

13154 麻黄散

【方源】 《圣惠》卷十一。

【组成】 麻黄一两（去根节） 甘草三分（炙微赤，锉） 赤芍药三分 桂心半两 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 石膏一两半（杵碎）

【用法】 上锉细，拌令匀，分为三服。每服以水一大盏半，煎至一盏，去滓，分二次温服。不拘时候，如人行五七里再服。以汗出为度。

【主治】 伤寒头痛，百节酸疼，气壅烦喘。

13155 麻黄散

【方源】 《圣惠》卷二十六。

【组成】 麻黄一两（去根节） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 桂心半两 五味子三分 麦门冬一两（去心） 细辛半两 诃黎勒一两半（煨，用皮） 甘草半两（炙微赤，锉） 紫苏子半两（微炒）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 气极肺虚，上气喘急。

13156 麻黄散

【方源】 《圣惠》卷四十二。

【组成】 麻黄一两（去根节） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 赤茯苓一两 桑根白皮一两（锉） 紫苏茎叶一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 甜葶苈一两（隔纸烧令紫色）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 久上气喘急，坐卧不得。

13157 麻黄散

【方源】 《圣惠》卷五十四。

【组成】 麻黄二两（去根节） 石膏三两（研） 白术二两 附子二两（炮裂，去皮脐） 汉防己二两 桑根白皮二两（锉）

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，加大枣二枚、生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 风水。遍身肿满，骨节酸痛，恶风脚弱、皮肤不仁。

13158 麻黄散

【方源】 《本事》卷三。

【组成】 麻黄一两一分（去根节） 羌活一两（去芦头） 黄芩三分（去皮） 细辛（真华阴者，去叶） 黄耆各半两（蜜炙）

【用法】 上为粗末。每服五钱，以水二盏，煎至八分，去滓温服。接续三四服。有汗慎风。

【功用】 发汗。

【主治】 历节。

13159 麻黄散

【方源】 《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 阿胶（蛤粉炒） 皂角（去皮，炙令黄色） 杏仁（去皮尖，炒） 甘草（炙） 麻黄（去节，称）各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，临卧白汤调下。

【主治】 肺感寒邪，暴生咳嗽，涎痰上喘。

13160 麻黄散

【方源】 《局方》卷四（宝庆新增方）。

【组成】 麻黄十两（去根节） 款冬花（去芦枝梗） 诃子皮（去核） 甘草（爁）各五两 桂六两（去皮，不见火） 杏仁三两（去皮尖，麸炒）

【用法】 上为细末。每服二钱，以水一盏，加好茶一钱，同煎八分，食后夜卧通口服。如半夜不能煎，但以药末入茶和匀，沸汤点，或干咽亦得。

【主治】 久近肺气咳嗽，喘急上冲，坐卧不安，痰涎壅塞，咳唾稠粘，脚手冷痹，心胁疼胀。兼伤风咳嗽，膈上不快。

【宜忌】 忌鱼、酒、炙煿、猪肉、腥臊物。

13161 麻黄散

【方源】 《兰室秘藏》卷中。

【组成】 防风 藁本各三分 羊胫骨灰 当归身 熟地黄各六分 草豆蔻仁 升麻 黄连各一钱 羌活一钱五分 麻黄（不去节） 草龙胆（酒洗） 生地黄各二钱 细辛少许

【用法】 上为细末。先用温水漱口净，擦之。

【主治】 冬寒时分，寒湿脑痛，项筋急，牙齿动摇疼痛。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“黄连散”。

13162 麻黄散

【方源】 《奇效良方》卷六十三。

【组成】 麻黄 杏仁 桑白皮 甘草各八分 紫菀 天门冬各二钱半 桔梗一钱七分 竹茹弹子大

【用法】 上作一服，以水二钟，煎至一钟，去滓，入蜜半匙，再煎二沸，不拘时候服之。

【主治】 妊娠咳嗽不止，胎动不安。

13163 麻黄散

【方源】 《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】 麻黄（蜜酒炒） 蝉蜕（焙） 升麻（酒炒） 牛蒡子（炒）

【主治】 疹子出迟。

13164 麻黄膏

【方源】 《医学心悟》卷八。

【组成】 雄猪油四两 斑蝥三个 麻黄五钱 蓖麻子（去壳，研极烂）一百粒 大风子（去壳，研烂）一百粒

【用法】 先将猪油化开，下斑蝥，煎数沸，随去斑蝥，再下麻黄，煎枯，滤去滓，将大风子、蓖麻肉和匀，擦患处。

【主治】 疥疮。细小不足脓，或肥大灌脓者。

13165 麻黄膏

【方源】 《饲鹤亭集方》。

【组成】 猪板油二斤（熬去渣入） 麻黄 百部 风子肉 花椒各二两 升麻 紫草 枯矾各一两

【用法】 上同熬枯，去滓，滤清后加黄丹二两收，加杏仁泥、硫黄（研极细末），同收成膏。外涂。

【主治】 一切风寒湿毒或传染而起脓窠癞疥，或湿热湿毒，坐板成疮。

13166 麻黄膏

【方源】 《中药成方配本》。

【组成】 麻黄二两 黄柏一两 百部二两 蛇床子一两 川椒一两（以上为甲组药） 飞雄黄五钱 硫黄一两 升药底二钱 枯矾三钱（以上为乙组药）

【用法】 将甲组药用猪油二斤熬枯去滓，加入大枫子油八两，黄蜡四两溶入。将乙组药研末，徐徐拌和，约成膏三十八两，搽涂患处。

【功用】 燥湿杀虫。

【主治】 湿毒疥疮。

【宜忌】 不可入口。

13167 麻雀粥

【方源】 方出《本草纲目》卷四十八引《食治方》，名见《长寿药粥谱》。

【组成】 雀儿五只（如常治） 粟米一合 葱白三茎

【用法】 先炒雀熟，入酒一合，煮少时，入水二盏半，下葱、米，作粥食。

【功用】 ①《本草纲目》：补益老人。②《长寿药粥谱》：壮阳暖肾益精。

【主治】 ①《本草纲目》引《食治方》：老人脏腑虚损羸瘦，阳气乏弱。②《长寿药粥谱》：中老年人阳虚羸弱，阳痿，肾虚多尿，腰酸怕冷等证。

13168 麻子仁丸

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 麻仁丸（《外台》卷十八）、脾约麻仁丸（《局方》卷六）、脾约丸（《直指》卷四）、麻仁脾约丸（《治痘全书》卷十四）、麻仁滋脾丸（《全国中药成药处方集》）。

【组成】 麻子仁二升 芍药半斤 枳实半斤（炙） 大黄一斤（去皮） 厚朴一尺（炙，去皮） 杏仁一升（去皮尖，熬，别作脂）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。饮服十丸，每日三次，渐加，以知为度。

【功用】 ①《普济方》：破气消积。②《全国中药成药处方集》（天津方）：滋润大肠，健胃通便。

【主治】 胃强脾弱，津亏便秘。

①《伤寒论》：伤寒脾约，趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则硬。②《外台》：大便坚，小便利而不渴。③《局方》：肠胃燥涩，津液耗少，大便坚硬，或秘不通，脐腹胀满，腰背拘急，及有风人大便结燥。④《圣济总录》：脚气，大便坚硬结涩而不渴。⑤《鸡峰》：产后大便秘。⑥《普济方》：心腹痞塞。⑦《全国中药成药处方集》（杭州方）：老年血亏，津枯便艰。

【宜忌】 《全国中药成药处方集》：气虚年老者，体弱而大便溏泄者，及孕妇、产妇忌服。忌食辛辣、油腻等物。

【方论选录】 ①《伤寒论讲义》：本方是小承气汤加麻仁、杏仁、芍药而组成。取麻仁润肠滋燥通利大便为主药，配以杏仁润肺肃降，使气下行，并具有润肠道、通大便的作用。芍药和营而缓急。大黄、枳、朴泄热去实，行气导滞。以蜜和丸，渐加，以知为度，取其缓缓润下之义。②《方剂学》：方中麻子仁润肠通便，为主药；辅以杏仁降气润肠，芍药养阴和里；佐以枳实破结，厚朴除满，大黄通下；使以蜂蜜润燥滑肠，合而为丸，具有润肠、通便、缓下之功。

【临证举例】 老年性精神病 《浙江中医杂志》（1985；4：174）：岳××，男，66岁，1974年10月25日诊治。久有心烦失眠之症，常见头晕目眩。近1年来，大便干结，小便频数，时见神志失常，骂詈不休。经某院诊为老年性更衣性精神病，予以清热泻火安神之剂，病情稍有好转，旋即如故。今且大便干结已结五日，口苦心烦，急躁易怒，胸胁痞闷，舌红少津，边有瘀斑，苔薄黄，脉弦细。此津液不足，大肠干燥，肝胆失于条达，肺失宣降，瘀热上犯，上蒙清窍所致。治宜泻火逐瘀，润燥滑

肠。方用：大黄（后下）9克，杏仁、白芍、火麻仁、枳实、厚朴各15克，蜂蜜60克，冲服。服3剂，泻下坚硬黑晦如煤之便，烦躁减轻，神识清楚，继服2剂，又泻3次，诸症好转，用上方改汤为丸，调治而愈。

【现代研究】《方剂学》：麻子仁丸能加强肠管蠕动作用，取25%麻子仁液4滴作用于离体家兔肠管，发现肠管蠕动波波幅大于正常，频率较大而规则。

13169 麻风锭子

【方源】方出《本草纲目》卷十五引《乾坤生意》，名见《万方类纂》卷三。

【组成】苍耳草（五月五日或六月六日五更带露采）

【用法】上捣取汁，熬作锭子，取半斤鲤鱼一尾，剖开（不去肚肠），入药一锭，线缝。以酒二碗，慢火煮熟，令吃。不过三五个即愈。

【主治】大风疠疾，眉发脱落，遍身顽麻。

【宜忌】忌盐一百日。

13170 麻黄根汤

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】麻黄根一两　黄耆一两（锉）　五味子半两　牡蛎二两（烧为粉）　甘草三分（炙微赤）　龙骨一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒虚汗不止。

13171 麻黄根汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】麻黄根二两　牡蛎（烧赤）一两半　黄耆（锉）一两　人参一两　龙骨一两　枸杞根皮二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏半，加大枣二枚（擘破），同煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后虚汗不止。

13172 麻黄根汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】人参二钱　当归二钱　黄耆一钱半（炙）　白术一钱（炒）　桂枝五分　麻黄根一钱　粉草五分（炒）　牡蛎（研）少许　浮麦一大撮

【主治】产后虚汗不止。

【加减】虚脱汗多，手足冷，加黑姜四分，熟附子一片；渴，加麦冬一钱，五味子十粒；肥白人产后多汗，加竹沥一盏、姜汁半匙，以清痰火；血块不落，加熟地三钱；恶风寒，加防风五分，桂枝五分。

13173 麻黄根散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【异名】麻黄根散粉（《圣济总录》卷十三）。

【组成】麻黄根二两　附子一两（炮裂，去皮脐）　牡蛎二两（烧为粉）

【用法】上为细散。以药末一两，和白米粉一升，拌令匀，以粉汗上。即止。

【主治】①《圣惠》：风虚汗出不止。②《圣济总录》：大虚汗出欲死，或自汗不止。

13174 麻子苏子粥

【方源】《本事》卷十。

【异名】紫苏麻仁粥（《济生》）、苏麻粥（《寿亲养老》卷四）、苏子麻仁粥（《医统》卷六十九）、麻苏粥（《济阴纲目》卷十四）、麻仁苏子粥（《医方集解》）。

【组成】紫苏子　大麻子各半合

【用法】上药净洗，为极细末。用水再研取汁一盏，分二次煮粥啜之。

【功用】《济生》：顺气，滑大便。

【主治】妇人产后郁冒多汗，大便秘，及老人、诸虚人风秘。

【方论选录】《本事方释义》：紫苏子气味辛温，入手太阴、足厥阴，能降逆下气。大麻子气味辛甘平而润，入手足阳明、足太阴，能润肠胃。

【备考】本方改为丸剂，名"苏麻丸"（见《中国医学大辞典》）。

13175 麻仁四物汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】生地五钱　当归三钱　白芍一钱半（炒）　川芎八分　麻仁三钱

【用法】水煎去滓，入白蜜一匙，温服。

【主治】大便燥闭，脉虚涩者。

【方论选录】生地滋阴壮水以资血液，当归养血荣经以润肠胃，白芍敛阴和血脉，川芎活血行气，麻仁润燥以通大便也。水煎入蜜，使津液内充，则肠胃润泽而传送有权，何燥闭之有不通哉。

13176 麻附五皮饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】麻黄一钱　淡附片八分　浙苓皮三钱　大腹皮二钱　细辛五分　新会皮一钱半　五加皮三钱　生姜皮一钱

【功用】温下发汗。

【主治】一身尽肿。

【方论选录】 何秀山按：此以仲景麻附细辛汤合华元化五皮饮为剂。君以麻黄，外走太阳而上开肺气；臣以辛、附，温化肾气；佐以五皮，开腠理以达皮肤。

13177 麻桂二陈汤

【方源】《会约》卷八。

【组成】 陈皮一钱半 半夏二钱 茯苓二钱 甘草一钱 桔梗一钱半 枳壳一钱 苍术一钱半 厚朴（姜炒）一钱 麻黄五七分 桂枝一钱 白芷一钱 川芎一钱 黄芩一钱 防风一钱

【用法】 上加生姜五分，水煎，热服。

【主治】 外冒风寒，痰嗽寒热，头痛身疼，鼻塞声重。

【加减】 头痛，加北细辛三分；如体虚者，加当归一钱三分，白芍七分；有汗者，去麻黄；久咳不止者，去桂枝，加杏仁（去皮尖）十三粒。

13178 麻桂各半汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 桂枝6克 麻黄3克 赤芍9克 杏仁6克 生甘草4克 大枣6克

【用法】 水煎服。

【主治】 皮肤瘙痒症。

13179 麻黄升麻汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】 麻黄二两半（去节） 升麻一两一分 当归一两一分 知母十八铢 黄芩十八铢 葳蕤十八铢（一作菖蒲） 芍药六铢 天门冬六铢（去心） 桂枝六铢（去皮） 茯苓六铢 甘草六铢（炙） 石膏六铢（碎，绵裹） 白术六铢 干姜六铢

【用法】 以水一斗，先煮麻黄一两沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，分三次温服，相去如炊二斗米顷令尽。汗出愈。

【功用】《伤寒论讲义》：发越郁阳，清上温下。

【主治】 ①《伤寒论》：伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，吐脓血，泄利不止。②《张氏医通》：冬温误行汗下，阳热陷于厥阴，经脉为邪气所遏，下部脉不至，咽喉不利，唾脓血。

【方论选录】《张氏医通》：邪遏经脉，非兼麻黄、桂枝之制不能开发肌表以泄外热，非取白虎、越婢之法不能清润肺胃以化里热，更以芍药、甘草、参、黄芩汤寒因寒用，谓之应敌。甘草、干姜合肾著汤，热因热用，谓之向导。以病气庞杂，不得不以逆顺兼治也。②《古方选注》：方中升散、寒润、收敛、渗泄诸法具备，推其所重，在阴中升阳，故以麻黄升麻名其汤。膏、芩、知母苦辛，清降上焦之津；芍药、天冬酸苦，收引下焦之液；芩、草甘淡，以生胃津液；归、术、葳蕤缓脾，以致津液。独是十味之药，虽有调和之致，不能提出阴分热邪，故以麻黄、升麻、桂枝、干姜开入阴分，与寒凉药从化其热，庶几在上之燥气降，在下之阴气坚，而厥阴错杂之邪可解。

【临证举例】 慢性肠炎 《陕西中医》（1986；10:462）：高×，男，38岁，农民。患者素有脾虚便溏（慢性肠炎），去年十月曾因潮热盗汗，经拍片诊为肠结核。今感冒十日，初发热恶寒，头痛无汗，后渐有胸闷咳嗽，痰多色黄。现症：发热恶寒，头痛无汗，胸闷咳喘，痰稠黄带血丝，口渴不欲多饮，咽痛烦躁，肠鸣腹痛，大便糖薄，舌苔薄白，舌尖稍红，脉寸浮滑，关尺迟缓，证属表里同病。宜表里同治，用麻黄升麻汤外可解太阳寒邪，内可清阳明之热，下可温太阴之寒，又配有养肺阴之品，实为恰当。麻黄、桂枝、白术、茯苓各8克，知母、黄芩、干姜、天冬、葳蕤、白芍、炙草各6克，升麻、当归各3克，生石膏20克。水煎服，一剂后，全身漐漐汗出，两剂后表证尽解，共服三剂后，诸证悉解。再以金水六君子汤善其后。

13180 麻黄石膏汤

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】 麻黄（去根节）六两 石膏八两 甘草（炙）二两 白术三两 附子（炮裂，去皮脐）一枚

【用法】 上㕮咀，如麻豆。每服五钱匕，以水二盏，加生姜一枣大（拍碎）、大枣二枚（擘破），同煎至一盏，去滓温服，每日三次。服讫复令汗出愈。

【主治】 风水遍身肿，骨节疼痛，恶风脚弱，汗出不仁。

13181 麻黄左经汤

【方源】《三因》卷三。

【组成】 麻黄（去节） 干葛 细辛 白术（切，米泔浸） 茯苓 防己 桂心（不见火） 羌活 防风 甘草（炙）各等分

【用法】 上为粗末。每服四钱，以水二盏，加生姜三片，大枣一枚，煎至七分，去滓，空腹服。

【主治】 ①《三因》：风寒暑湿流注足太阳经，手足挛痹，行步艰难，憎寒发热，无汗恶寒，或自汗恶风，头疼眩晕，腰重关节痛。②《准绳·疡医》：附骨疽、咬骨疽发于腿之后面。

【加减】 自汗，去麻黄，加桂、芍药；重者，加

术、橘皮。无汗，减桂，加杏仁、泽泻，所加等分。

13182 麻黄四物汤

【方源】《金鑑》卷四十四。

【组成】当归 熟地 白芍 川芎各二钱 麻黄 桂枝各一钱 杏仁二十粒 甘草一钱

【用法】上加生姜、大枣，水煎服。

【功用】调经。

【主治】妇人寒伤太阳柴分，发热无汗。

13183 麻黄白术汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】麻黄白术散(《东垣试效方》卷七)。

【组成】青皮（去腐） 酒黄连各一分 酒黄柏 橘红 甘草（炙，末） 升麻各二分 黄耆 人参 桂枝 白术 厚朴 柴胡 苍术 猪苓各三分 吴茱萸 白茯苓 泽泻各四分 白豆蔻 炒曲各五分 麻黄（不去节）五钱 杏仁四个

【用法】上㕮咀，分作二服。以水一大盏半，先煮麻黄令沸，去沫，再入诸药，同煎至一盏，去滓，稍热食远服。

【主治】大便不通，五日一遍，小便黄赤，浑身肿，面上及腹尤甚，色黄，麻木，身重如山，沉困无力，四肢痿软，不能举动，喘促唾清水，吐哕，痰唾白沫如胶，时躁热发欲去衣，须臾而过则振寒，项额有时如冰，额寒尤甚，头旋眼黑，目中溜火，冷泪，鼻不闻香臭，少腹急痛，当脐有时动气，按之坚硬而痛。

【方论选录】《医方集解》：此足三阳三阴通治之剂也。桂枝、麻黄解表祛风；升麻、柴胡升阳散火；黄连、黄柏燥湿清热，而黄柏又能补肾滋阴；蔻、朴、青、陈利气散满，而青、紫又能平肝，蔻、朴又能温胃；杏仁利肺下气；神曲化滞调中；吴萸暖肾温肝；参、耆、甘草、苍白二术补脾益气；二苓、泽泻通利小便，使湿去而热亦行。方内未曾有通大便之药，盖清阳升则浊阴自降矣。

13184 麻黄加术汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】麻黄白术汤(《三因》卷五)、麻黄白术散(《袖珍》卷一)。

【组成】麻黄三两（去节） 桂枝二两（去皮） 甘草一两（炙） 杏仁七十个（去皮尖） 白术四两

【用法】上以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取二升半，去滓，温服八合。覆取微似汗。

【功用】发汗。

【主治】风寒夹湿，留着肌表，身体烦疼。

①《金匮》：湿家身烦疼。②《三因》：寒湿相并，身体烦疼，无汗，恶寒发热，脉浮缓细。③《张氏医通》：湿家身体烦疼，日晡潮热。④《古方新用》：寒湿性荨麻疹，风疹块为鲜红色或苍白色风团，大小不一，发的快，消的也快，并伴有痒感，遇寒即发，上背冷，欲盖被烤火者。

【方论选录】①《张氏医通》：用麻黄汤开发肌表，不得白术健运脾气，则湿热虽以汗泄，而水谷之气依然复为痰湿，流薄中外矣。然术必生用，若经炒焙，但有健脾之能而无祛湿之力矣。②《成方便读》：方中用麻黄汤祛风以发表，即以白术除湿而固里，且麻黄汤内有白术，则虽发汗而不至多汗，而术得麻黄并可以行表里之湿，即两味足以治病。况又有桂枝和营达卫，助麻黄以发表；杏仁疏肺降气，导白术以宣中；更加甘草协和表里，使行者行，守者守，并行不悖。③《古方新用》：方中以麻黄开汗孔以发汗，杏仁利气，甘草和中，桂枝从肌以达表。又恐大汗伤阴，寒去而湿不去，故加白术健脾生液以助除湿气，在发汗中又有缓汗之法。

13185 麻黄豆蔻丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】麻黄草豆蔻丸(《准绳·类方》卷四)。

【组成】木香 青皮 红花 厚朴各二分 苏木三分 草澄茄四分 升麻 半夏（汤洗） 麦芽面 缩砂仁 黄耆 白术 陈皮（去白） 柴胡 炙甘草 吴茱萸 当归身各五分 益智仁八分 神曲末（炒）二钱 麻黄（去节）三钱 草豆蔻仁五钱

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下；或细嚼，汤下亦可。

【主治】客寒犯胃，心胃大痛不可忍。

13186 麻黄苍术汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】麻黄八钱 苍术五钱 黄耆一钱五分 草豆蔻六分 柴胡 羌活各五分 生甘草 当归梢 防风各四分 炙甘草 黄芩各三分 五味子九个

【用法】上㕮咀，分作二服。以水二盏，煎至一盏，临卧稍热服。

【主治】秋冬每夜五更嗽，连声不绝，乃至天晓日高方缓，口苦，两胁下痛，心下痞闷，卧而多惊，筋挛，肢节疼痛，痰唾涎沫，日晚神昏呵欠，不进饮食。

13187 麻黄赤芍汤

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】 灵仙除痛饮(《古今医鉴》卷十)。

【组成】 麻黄 赤芍各一钱 防风 荆芥 羌活 独活 白芷 苍术 威灵仙 片芩 枳实 桔梗 葛根 川芎各五分 甘草 归尾 升麻各三分

【用法】 水煎服。

【主治】 湿热流注，肢节肿痛。

【加减】 下焦，加酒柏；妇人，加酒炒红花；肿多，加槟榔、泽泻；痛，加乳、没；瘀血，加桃仁、大黄。

13188 麻黄杏仁饮

【方源】 《医学入门》卷四。

【组成】 麻黄 桔梗 前胡 黄芩 陈皮 半夏各一钱 杏仁 细辛各八分 防风七分 甘草四分

【用法】 加生姜三片，水煎温服。

【主治】 太阳伤寒轻证，发热恶寒，头痛无汗，脉浮紧而咳嗽。

【加减】 夏月，去麻黄，加苏叶；自汗，去麻黄，加桂枝、芍药；表热，换柴胡；口渴，加天花粉；胸满，加枳壳；喘急，加瓜蒌仁。

13189 麻黄附子汤

【方源】 《金匮》卷中。

【组成】 麻黄三两 甘草二两 附子一枚（炮）

【用法】 以水七升，先煮麻黄，去上沫，纳诸药煮取二升半，温服八分，一日三次。

【功用】 《金匮要略释义》：温经发汗，兼顾肾阳。

【主治】 水病，其脉沉小。

13190 麻黄泻白散

【方源】 《保命歌括》卷十八。

【组成】 桑白皮 地骨皮各一钱 甘草 麻黄 杏仁各半钱

【用法】 上㕮咀。加生姜三片，水煎服。

【主治】 风寒伤肺，喘急咳嗽。

13191 麻黄定喘汤

【方源】 《张氏医通》卷十三。

【组成】 麻黄（去节）八分 杏仁十四粒（泡，去皮尖，研） 厚朴（姜制）八分 款冬花（去梗） 桑皮（蜜炙） 苏子（微炒，研）各一钱 甘草（生，炙）各四分 黄芩 半夏（姜制）各一钱二分

【用法】 水煎去滓，以生银杏七枚捣烂入药，绞去滓，乘热服之。去枕仰卧，暖覆取微汗。

【主治】 ①《张氏医通》：寒包热邪，哮喘痰嗽，遇冷即发。②《医略六书》：寒滞郁热，逆满喘急，脉浮紧数者。

【方论选录】 《医略六书》：寒邪外束，热壅于内，升降失其常度，故胸膈逆满，喘急不已焉。麻黄开发肺邪，黄芩清肃肺热，苏子散痰解郁，杏仁降气疏痰，厚朴宽中散逆满，半夏醒燥温痰，桑白皮泻温热清肺，款冬花润肺燥散结，生甘草以和中缓急。水煎绞银杏汁服，俾痰热内消，寒邪外解，而经府清和，逆满无不退，喘急无不除矣。此疏邪降气之剂，为寒滞郁热喘满之专方。

13192 麻黄栀子汤

【方源】 《圣济总录》卷六十一。

【组成】 麻黄（去根节）半两 栀子仁七枚 甘草（炙）三分

【用法】 上各锉细。用水二盏，煎至一盏，去滓，食后分二次温服。服药前宜先烙上脘穴，更灸二十壮，次烙气海、下廉、内乳等穴，不愈，灸气海、天窗百壮。

【主治】 阴黄。病人寒热并十指疼痛，鼻中煤生。

13193 麻黄茱萸汤

【方源】 《兰室秘藏》卷下。

【异名】 麻黄吴茱萸汤(《医学纲目》卷十五)。

【组成】 麻黄 羌活各五分 吴茱萸 黄耆 升麻各三分 黄芩 当归 黄柏 藁本各二分 川芎 蔓荆子 柴胡 苍术 黄连 半夏各一分 细辛少许 红花少许

【用法】 上锉，如麻豆大，都作一服。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后稍热服。

【主治】 胸中痛，头痛，食减少，咽嗌不利，左寸脉弦急。

13194 麻黄复煎散

【方源】 《兰室秘藏》卷中。

【异名】 麻黄复煎汤(《准绳·伤寒》卷二)。

【组成】 白术 人参 生地黄 柴胡 防风各五分 羌活 黄柏各一钱 麻黄（去节，微捣，不令作末，水五大盏煎令沸，去沫，煎至二盏，入下项药再煎） 黄耆各二钱 甘草三钱 杏仁三个（去皮）

【用法】 上㕮咀，都作一服。入麻黄汤煎至一盏，临卧服之。勿令食饱，取渐次有汗则效。

【功用】 发汗升阳。

【主治】 风湿相博，下焦伏火而不得伸，阴室中汗出，懒语，四肢困倦无力，走注疼痛，躁热，一身尽痛。

13195 麻黄宣肺散

【方源】 《外科大成》卷三。

【异名】 麻黄宣肺酒(《金鉴》卷六十五)。

【组成】 麻黄 麻黄根各二两

【用法】 以头生酒五壶，重汤煮三炷香，露一宿，早、晚各饮二五杯。至三五日，出脓成疮，十余日则脓尽而愈。

【主治】 酒渣鼻。

13196 麻黄桂枝汤

【方源】《三因》卷九。

【异名】 加味麻黄汤(《得效》卷四)。

【组成】 麻黄（去节，汤浸，焙干） 桂心 白芍药 细辛（去苗） 干姜（炮） 甘草（炙）各三分 半夏（汤洗七次） 香附（炒去毛）各半两

【用法】 上为锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜五片，煎七分，去滓，食前服。大便秘，入大黄如博棋大两枚，煎。

【主治】 外因心痛，恶寒发热，内攻五脏，拘急不得转动。

13197 麻黄黄芩汤

【方源】《活人书》卷二十。

【组成】 麻黄（去节）一两 黄芩 赤芍各半两 甘草（炙） 桂枝（去皮）各一分

【用法】 上为细末。每服二钱，暖水调服，每日三次。

【主治】 ①《活人书》：小儿伤寒无汗，头痛发热恶寒；兼治天行热气，痘疮不快，烦躁昏愦，或痘出身尚疼热。②《玉机微义》：小儿伤寒，头痛，身壮热无汗，鼻塞目涩，小便清。

13198 麻黄葛根汤

【方源】《活人书》卷十七。

【异名】 麻黄汤(《云岐子脉诀》)。

【组成】 麻黄（用沸汤泡十二次，焙干称） 芍药各三两 干葛四分 葱白七茎 豉一合

【用法】 上锉，如麻豆大。每服四钱，以水一盏半，煎至一中盏，去滓温服。服后以厚衣盖覆，如人行四五里再服。良久如未得汗出，更煮葱粥少许，热投之，取汗。

【主治】 ①《活人书》：伤寒一日至二日，头项及腰背拘急疼痛，浑身烦热恶寒。②《普济方》：刚痉无汗。

13199 麻黄葛根汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】 麻黄（去根节）一两半 葛根（锉） 柴胡（去苗）各一两 芍药三分

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加豉一百粒、开口椒十七粒、连须葱白三寸，薄荷叶二十叶，同煎至八分，去滓热服。服后葱豉汤一盏投之，衣覆取汗，汗未快再服。

【功用】 发汗。

【主治】 伤寒初得一二日。

13200 麻黄温痹汤

【方源】《千家妙方》卷上引范国樑方。

【组成】 麻黄 10 克 羌活 10 克 独活 10 克 制川乌 10 克 制草乌 10 克 八里麻 1 克 桂枝 10 克 黄耆 20 克 川牛膝 12 克 木瓜 12 克 威灵仙 12 克 鸡血藤 10 克 细辛 3 克 制附块 10 克 伸筋草 10 克 寻骨风 10 克 苍耳子 10 克 秦艽 10 克 桑寄生 10 克 炙甘草 10 克

【用法】 水煎服，每日一剂。

【功用】 祛风散寒，舒筋活络。

【主治】 风寒湿邪侵袭经络，留滞关节，关节肿大疼痛者。

【加减】 气血虚亏，可酌加党参、枸杞、当归、白芍以扶正气。

13201 麻黄解肌汤

【方源】《肘后方》卷二。

【组成】 麻黄 甘草 升麻 芍药 石膏各一两 杏仁二十枚 贝齿三枚

【用法】 上为末，以水三升，煮取一升，顿服。覆取汗出。后食豉粥补虚。

【功用】 解肌。

【主治】 ①《肘后方》：伤寒、时气、温病一二日。②《圣济总录》：时行疫疠一二日，头痛壮热烦躁。

13202 麻黄解肌汤

【方源】《元和纪用经》。

【组成】 麻黄（去根节，陈者佳） 甘草 升麻 赤芍药 石膏各等分

【用法】 上为末。每服四匕，以水一升半，加杏仁七个（去尖碎之），同煎至八合，去滓温服，连绵三五服，以衣被覆取汗出即愈。

【主治】 伤寒风邪，寒冷头痛，项强急，寒热腰痛，四肢烦疼而无汗者。

13203 麻黄蝉蜕汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 麻黄 6 克 蝉蜕 9 克 槐花 6 克 黄连 3 克 浮萍 9 克 甘草 3 克

【用法】 水煎服。

【主治】 荨麻疹。

13204 麻菊二陈汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 明天麻一钱 滁菊花一钱半 钩藤钩 茯神木各四钱 荆芥一钱半 川芎八分 姜半夏三钱 广皮红一钱 清炙草四分

【功用】 祛风平晕。

【主治】 外风挟痰上扰巅顶，抬头屋转，眼常黑花，见物飞动，猝然晕倒者。

13205 麻黄加知母汤

【方源】 《衷中参西》上册。

【组成】 麻黄四钱 桂枝尖二钱 甘草一钱 杏仁二钱（去皮，炒） 知母三钱

【用法】 先煮麻黄五六沸，去上沫，纳诸药，煮取一茶盅，温服。复被取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。

【主治】 伤寒无汗。

【方论选录】 方中用麻黄之性热中空者，直走太阳之经，外达皮毛，借汗解以祛外感之寒；桂枝之辛温微甘者，借同甘草以温肌肉，实腠理，助麻黄托寒外出；杏仁之苦降者，入胸中以降逆定喘；原方止此四味，而愚为加知母者，诚以服此汤后，间有汗出不解者，非因汗出未透，实因余热未清也。佐以知母于发表之中，兼寓清热之意，自无汗后不解之虞。此乃屡经试验，而确知其然，非敢于经方轻为加减也。

13206 麻黄人参芍药汤

【方源】 《脾胃论》卷下。

【异名】 麻黄桂枝汤（《兰室秘藏》卷中）。

【组成】 人参 麦门冬各三分 桂枝 当归身各五分 麻黄 炙甘草 白芍药 黄耆各一钱 五味子二个

【用法】 上㕮咀，都作一服。以水三盏，煮麻黄一味，令沸，去沫，至二盏，入余药同煎至一盏，去滓，临卧热服。

【主治】 久患吐血，愈后复发；吐血外感寒邪，内虚蕴热。

【方论选录】 《医方集解》：此足太阳手太阴药也。桂枝补表虚，麻黄去外寒，黄耆实表益卫，甘草补脾，白芍安太阴，入参益元气而实表，麦冬保肺气，五味子安肺气，当归和血养血。盖取仲景麻黄汤与补剂各半服之。但凡虚人当服仲景方者，当以此为剂也。

【临证举例】 吐血 一贫士，病脾胃虚，与补药，愈后继居旷室，卧热坑而吐血数次。予谓此人久虚弱，脐附有形，而有大热在内，上气不足，阳气外虚，当补表之阳气，泻里之虚热。冬居旷室，衣服复单薄，是重虚其阳，表有大寒壅遏里热，火邪不得舒伸，故血出于口。因思仲景太阳伤寒，当以麻黄汤发汗，而不与之，遂成衄血，却与之立愈，与此甚同，因与麻黄人参芍药汤。

13207 麻黄附子甘草汤

【方源】 《伤寒论》。

【异名】 麻黄甘草附子汤（《医统》卷十四）、附子麻黄汤（《赤水玄珠》卷五）。

【组成】 麻黄（去节）二两 甘草（炙）二两 附子一枚（炮，去皮，破八片）

【用法】 上以水七升，先煮麻黄一两沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，每日三次。

【功用】 《伤寒论讲义》：温经解表。

【主治】 素体阳虚，感受风寒，恶寒，不发热，或有微热，苔白，脉沉；肾阳不足，风湿外侵，通身浮肿。

①《伤寒论》：少阴病，得之二三日无里证。②《卫生宝鉴补遗》：病人寒热而厥，面色不泽，冒昧，两手忽无脉，或一手无脉。③《景岳全书》：风湿通身浮肿。④《医方集解》：气水，脉沉虚胀。⑤《张氏医通》：少阴病脉沉发热，及水肿喘咳。

【方论选录】 ①《沈注金匮要略》：麻黄附子汤中以附子固护表里之阳，且助麻黄、甘草通阳散邪。俾邪出而真阳不出，即开鬼门之变法也。……麻黄、附子一散一补，固本通阳，则病去而不伤阳气。②《准绳·伤寒》：麻黄、甘草之甘以散表寒，附子之辛以温寒气。③《金鉴》：此少阴脉而表反热，便于表剂中加附子以预固其阳，是表热阳衰也。夫发热无汗太阳之表，脉沉但欲寐少阴之里，设用麻黄开腠理，细辛散浮热，而无附子以固元阳，则太阳之微阳外亡。惟附子与麻黄并用，则寒邪散而阳不亡，此里病及表，脉沉而当发汗者，与病在表脉浮而发汗者迥庭也。若表微热则受寒亦轻，故以甘草易细辛，而微发其汗，甘以缓之与辛以散之者，又少间矣。④《古方选注》：以熟附固肾，不使麻黄深入肾经劫液为汗，更妙在甘草缓麻黄，于中焦取水谷之津为汗，则内不伤阴，邪从表散，必无过汗亡阳之虑矣。

【临证举例】 伤寒少阴病 《经方实验录》：余尝治上海电报局高君之公子，年五龄，身无热，亦不恶寒，二便如常，强呼之醒，与之食，食已，又呼呼睡去。按其脉，微细无力。余曰：此仲景先圣所谓少阴之为病，脉微细，但欲寐也。顾余知治之之方，尚不敢必治之之验，请另乞诊于高明。高君自明西医理，能注强心针，顾又知强心针仅能取效于一时，非根本之图，强请立方。余不获已，书：熟

附片八分，净麻黄一钱，炙甘草一钱，与之，又恐其食而不化，略加六神曲、炒麦芽等消食健脾之品。次日复诊，脉略起，睡时略减。当与原方加减。

13208 麻黄细辛附子汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】麻黄附子细辛汤(《注解伤寒论》卷六)、附子细辛汤(《三因》卷四)。

【组成】麻黄二两（去节） 细辛二两 附子一枚（炮去皮，破八片）

【用法】上以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升，每日三次

【功用】①《伤寒论讲义》：温经解表。②《方剂学》：助阳解表。

【主治】素体阳虚，外感风寒，无汗恶寒，发热，踡卧，苔白，脉沉。亦治肾咳及寒厥头痛。

①《伤寒论》：少阴病，始得之，反发热，脉沉者。②《三因》：少阴伤寒，口中和，而背恶寒，反发热倦怠，自汗而渴，其脉尺寸俱沉而紧者。③《内科摘要》：肾脏发咳，咳则腰背相引而痛，甚则咳涎。又治寒邪犯齿致脑齿痛。④《东医宝鉴·杂病篇》：少阴病但欲寐，发热脉沉。⑤《景岳全书》：寒气厥逆头痛，脉沉细者。⑥《张氏医通》：水肿喘咳。大寒犯肾，暴哑不能出，咽痛异常，卒然而起，或欲咳而不能咳，或无痰，或清痰上溢，脉弦紧，或数疾无伦。

【方论选录】①《注解伤寒论》：麻黄之甘以解少阴之寒，细辛、附子之辛以温少阴之经。②《医方集解》：以附子温少阴之经，以麻黄散太阳之寒而发汗，以细辛肾经表药联属其间，是汗剂之重者。③《金鉴》：夫发热无汗，太阳之表不得不开。沉为在里，少阴之枢，又不得不固。设用麻黄开腠理，细辛散浮热，而无附子以固元阳，则少阴之津液越出，太阳之微阳外亡，去生便远。惟附子与麻黄并用，则寒邪虽散而阳不亡。④《衷中参西》：用附子以解里寒，用麻黄以解外寒，而复佐以辛温香窜之细辛，既能助附子以解里寒，更能助麻黄以解外寒，俾其自太阳透入之寒，仍由太阳作汗而解，此麻黄附子细辛汤之妙用也。⑤《古方选注》：用麻黄发太阳之表汗，细辛散少阴之浮热，相须为用。欲其引麻黄入于少阴，以出太阳陷入之邪，尤借熟附合表里以温经，外护太阳之刚气，内固少阴之肾根，则津液内守，而微阳不致外亡，此从里达表，由阴出阳之剂也。

【临证举例】①少阴表证 《山东中医杂志》(1984；2:41)：张某某，男，39岁，济南市四十中教师。1977年12月12日诊：感冒十余日，经中西药治疗，仍感畏寒无汗，纳少不渴，微咳嗜卧，大便调，小便清，体温38℃，舌质淡苔薄白，脉微细，诊为少阴表证。处方：麻黄9克，熟附子6克，细辛3克。一剂冷止，三剂痊愈。②肾咳《江苏中医杂志》(1982；2:37)：黄某某，女，40岁，农民。患者发热畏寒，身痛咳嗽，曾经中西医治疗，缠绵不愈，已历数月。阅前所服方药，多以参苏饮、止嗽散等方治疗，终难收效。余诊时，患者自述周身畏寒，喜厚衣，咳嗽则腰背相引而痛，咳甚则吐涎，口不渴，二便无异常。诊其脉沉细而迟，舌质淡而苔薄润，面色淡暗无华。综合四诊，知其症为少阴阳虚，复受寒邪，肺气不宣所致，乃投麻黄附子细辛加五味子治之。麻黄6克，附子3克，细辛4克，五味子3克，水煎服。患者服药至二剂时，畏寒已除，咳嗽已减其大半，继服原方三剂而安。③暴喑 《江苏中医杂志》(1982；2:37)：邹某某，男，30岁，全南人。常易感冒，该次患伤风鼻塞流涕，咳嗽音哑已有20余天，经中西药治疗，病情未见改善。余诊之，其脉沉细无力，舌质淡而胖嫩，苔薄白。视其面色惨淡忧郁，身穿厚衣，头戴风雪帽，声音嘶哑。细询之，常易感冒，微热则自汗畏风，四肢不温，喜欲蒙被而卧，脉证合参，诊为少阴伤寒，寒客会厌。拟助阳解表，宣肺散寒，仿麻黄附子细辛汤加味。麻黄4克，附子6克，细辛4克，桔梗6克，水煎服。患者服上方一剂，觉声嘶减轻，二剂而畏风除，声音已恢复正常。④无汗症 《上海中医杂志》(1982；8:35)：黄某，女，68岁。1980年6月10日初诊，十三年前曾患风湿性心脏病，经治疗症状控制。但此后，一年四季从未小汗，天寒睡眠不佳，天热则睡眠良好，但神疲怕风，纳少无味，前后延医十余年，未收效验。时值仲夏，天气炎热，无汗出，周身不舒，欲求汗出则快。患者面色无华，扪之体肤无汗，舌质淡红，舌苔白滑，脉沉缓。又因患者早年患风湿病，故辨证为寒湿入侵，内舍于脏，久之肾阳折损，不能温煦肌腠，无力鼓汗达表，终年不得汗泄。姑拟助阳透表，投麻黄附子细辛汤治之。炙麻黄10克，炮附片12克，细辛4克。服3剂后，即有小汗出，周身颇感舒适。7剂后，汗出如平人，肢体舒展舒达，不料十年痼疾，竟获效于一周，原方续进7剂，以为巩固。

13209 麻黄茵陈醇酒汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】麻黄　茵陈

【用法】用无灰好酒煎服。

【主治】黄疸，表实无汗。

13210　麻黄加独活防风汤

【方源】《此事难知》。

【异名】麻黄加独防汤(《伤寒全生集》卷四)。

【组成】麻黄（去节）　桂枝各一两　甘草半两　杏仁二十五个（去皮尖）　独活　防风各一两

【用法】上锉细。每服一两，以水三盏，煮至一盏半，去滓温服。

【主治】刚痉。发热无汗，恶寒。

13211　麻黄连翘赤小豆汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】麻黄连翘汤(《医学纲目》卷三十一)、连翘赤小豆汤(《普济方》卷三六九)。

【组成】麻黄二两（去节）　连翘二两　杏仁四十个（去皮尖）　赤小豆一升　大枣十二枚（擘）　生梓白皮（切）一升　生姜二两（切）　甘草二两（炙）

【用法】上㕮咀。以潦水一斗，先煮麻黄再沸，去沫，次纳诸药，煎取三升，去滓，分三次温服，半日服尽。

【功用】《伤寒论讲义》：解表散邪，清热除湿以退黄。

【主治】湿热黄疸，兼有表邪者。

①《伤寒论》：伤寒瘀热在里，身必黄。②《普济方》：小儿伤寒，发黄身热。③《张氏医通》：湿热发黄。④《方剂学》：湿热内郁，表证未解而发黄者。

【方论选录】①《金鉴》：用麻黄汤以开其表，使黄从外而散；去桂枝者避其热也；佐姜枣者和其荣卫也；加连翘、梓皮以泻其热，赤小豆以利其湿，共成治表实发黄之效也。成无已曰：煎以潦水者，取其味薄不助湿热也。②《古方选注》：麻黄连翘赤小豆汤，表里分解法，或太阳之热，或阳明之热，内合太阴之湿，乃成瘀热发黄，病虽从外至内，而粘着之邪，当从阴以出阳也。杏仁、赤小豆泄肉理湿热，生姜、梓白皮泄肌表湿热，仍以甘草、大枣奠安太阴之气，麻黄使湿热从汗而出太阳，连翘根导湿热从小便而出太阳，潦水助药力从阴出阳。经云：湿上甚为热，若湿下行则热解，热解则黄褪也。③《伤寒论讲义》：方用麻黄、杏仁、生姜以辛温宣发，解表散邪。连翘、赤小豆、生梓白皮苦寒清热除湿以退黄。炙草、大枣甘平和中，本方为表里双解之剂，适用于湿热发黄而又兼有表证。

13212　麻黄杏仁甘草石膏汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】麻黄杏子甘草石膏汤（原书）、麻黄杏仁汤(《普济方》卷三六九)、麻黄杏子草膏汤(《赤水玄珠》卷二十九)、麻杏甘石汤(《张氏医通》卷十六)、四物甘草汤(《千金方衍义》卷九)、麻杏石甘汤(《金鉴》卷五十九)。

【组成】麻黄四两（去节）　杏仁五十个（去皮尖）　甘草二两（炙）　石膏半斤（碎，绵裹）

【用法】上以水七升煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取二升，去滓，温服一升。

【功用】①《伤寒论讲义》：清宣肺热。②《方剂学》：辛凉宣泄，清肺平喘。

【主治】邪热壅肺，发热喘急，烦渴，汗出，苔黄，脉数。现用于肺炎、猩红热（烂喉痧）、过敏性哮喘等。

①《伤寒论》：伤寒发汗后，汗出而喘，无大热者。②《元戎》：太阳与阳明合病，喘而胸满。③《金鉴》：温热内发，表里俱热，头痛身疼，不恶寒反恶热，无汗而喘，大烦大渴，脉阴阳俱浮。④《医钞类编》：痘疹烦喘渴燥，如疹初出不透，无汗喘急。⑤《清代名医医案精华》：肺痈。风伤皮毛，热伤血脉，身热咳逆，痰有腥味，脉象数大。⑥《方剂学》：外感风邪，身热不解，有汗或无汗，咳逆气急，甚或鼻煽，口渴，舌苔薄白或黄，脉浮滑而数者。

【宜忌】《古今名医方论》：脉浮弱、沉紧、沉细，恶寒恶风，汗出而不渴者，禁用。

【方论选录】①《金鉴》：喘不在胃而在肺，故不须粳米。其意重在存阴，不必虑其亡阳也，故于麻黄汤去桂枝之监制，取麻黄之专开，杏仁之降，甘草之和，倍石膏之大寒，除内外之实热，斯漐漐汗出而内外之烦热与喘悉除矣。②《衷中参西》：用麻黄协杏仁以定喘，伍以石膏以退热，热退其汗自止也。复加甘草者，取其甘缓之性，能调和麻黄、石膏，使其凉热之方溶和无间，以相助成功，是以奏效甚捷也。③《中国医药汇海·方剂部》：盖以石膏清其里热；有汗者，得麻黄疏泄，而壅者亦宣；无汗者，得麻黄疏散，而闭者亦开；有杏仁以定喘，甘草以泻火，烦热乌有不解者乎？④《方剂学》：方中石膏辛甘寒，清泄肺胃之热以生津，麻黄辛苦温，宣肺解表而平喘。二药相制为用，既能宣肺，又能泄热，虽一辛温，一辛寒，但辛寒大于

辛温，使本方仍不失为辛凉之剂，共为主药；杏仁苦降，协助麻黄以止咳平喘，为佐药；炙甘草调和诸药，以为使。药仅四味，但配伍严谨，共成辛凉宣肺、清泄肺热、止咳平喘之功。⑤《伤寒论讲义》：麻黄配石膏，清宣肺中郁热而定喘。石膏用量多于麻黄一倍，借以鉴制麻黄辛温之性而转为辛凉清热之用；杏仁宣降肺气，协同麻黄以治喘；甘草和中缓急，调和诸药。

【临证举例】 ①烂喉痧 《经方实验录》：前年三月间，朱锡基家一女婢病发热，请诊治。予轻剂透发，次日热更甚，未见疹点。续与透发，三日病加剧，群指谓猩红热，当急送传染病医院受治。锡基之房东尤恐惧，怂恿最力。锡基不能决，请予毅然用方。予允之。细察病者痧已发而不畅，咽喉肿痛，有白腐意，喘声大作，呼吸困难不堪，咯痰不出，身热胸闷，目不能张视，烦躁不得眠，此实烂喉痧之危候。当与：净麻黄一钱半，生石膏五钱，光杏仁四钱，生草一钱，略加芦根、竹茹、蝉衣、蚕休等透发清热化痰之品。服后即得安睡，痧齐发而明，喉痛渐除。续与调理，三日全愈。事后婢女叩谢曰：前我病剧之时，服药（指本方）之后，凉爽万分，不知如何快适云。②小儿肺炎 《上海中医药杂志》（1959；2:23）：用麻杏石甘汤治疗小儿肺炎30例，患者表现为发热、气喘咳嗽、咽痛、咽部充血、肺部可闻干性罗音等症状，用本方治疗，痊愈26例，显效1例，好转3例，有效率100%，笔者认为本方具有降温、消炎、化痰、扩张支气管、缓解痉挛等作用。③过敏性哮喘 《浙江中医药》（1979；8:301）：叶某某，女，28岁。1977年10月11日诊。患者因鼻炎引起过敏性哮喘已8年，秋冬季节发作频繁。近感风寒，身热，有汗，鼻塞多涕，咳嗽气喘，胸膈烦闷，口唇发绀，便秘，口苦而渴，舌苔薄黄，脉浮数。证属风寒在表，肺有郁热，失其宣降。法当宣肺泄热，降气平喘。麻黄3克，生甘草3克，生石膏15克，苦杏仁、桑白皮、瓜蒌皮、苏子各9克，生代赭石30克。服药三剂，气喘平，循法继续治疗，诸证皆得改善，以后复发，均用该方获效。④鼻渊 《福建中医药》（1965；2:32）：柳××，男，36岁，干部，1963年2月14日诊。患者鼻塞不通已三年，浊涕由喉呛出，而气窒仍然。检查鼻孔有黄色脓样分泌物阻塞，经冲洗后发现粘膜充血，鼻周围、额窦、筛窦均有压痛。西医诊断为慢性副鼻窦炎。服磺胺噻唑片及点青霉素溶液无效。就诊时诉：鼻塞头痛，头昏脑胀，鼻塞不通，当有黄脓样鼻涕流出，嗅觉减退，饮食无味，肢疲乏力，脉右寸浮数，断是肺移热于脑，成为脑漏。处方：麻黄二钱，杏仁三钱，生石膏六钱，甘草二钱，地龙干三钱。连服七剂，头昏脑胀消失，鼻孔通畅，嗅觉恢复，病告痊愈。

【现代研究】 抗病毒、解热、镇静、平喘、镇咳、利尿作用 《新医学》（1977；9:452）：根据现代药理实验，本方可有如下作用：第一，抗病毒。麻黄的挥发油对病毒有抑制作用，石膏亦有一定的效果。第二，解热。动物实验发现石膏、麻黄有解热作用。第三，平喘。麻黄有舒张支气管平滑肌的作用。第四，镇咳祛痰。杏仁主要通过氢氰酸的作用而镇咳祛痰。第五，利尿。麻黄的伪麻黄碱有利尿作用。第六，镇静。石膏有抑制神经肌肉兴奋性的作用。

13213 麻黄杏仁薏苡甘草汤

【方源】 《金匮》卷上。

【异名】 薏苡麻黄汤（《外台》卷十九引《古今录验》）、杏仁薏苡汤（《伤寒总病论》卷三）、薏苡仁汤（《全生指迷方》卷二）、麻黄杏仁薏苡仁汤（《普济方》卷一一八）、麻黄杏仁甘草薏苡汤（《保命歌括》）、麻杏薏苡甘草汤（《证治宝鉴》卷十二）、麻黄杏子薏苡甘草汤（《医钞类编》卷三）、麻杏苡甘汤（《金匮要略释义》）。

【组成】 麻黄（去节）半两（汤泡） 甘草一两（炙） 薏苡仁半两 杏仁十个（去皮尖，炒）

【用法】 上锉，如麻豆大。每服四钱，以水一盏半，煎至八分，去滓温服。有微汗避风。

【功用】 《方剂学》：发汗解表，祛风利湿。

【主治】 ①《金匮》：汗出当风或久伤取冷所致风湿，一身尽疼，发热，日晡所剧者。③《古方新用》：风湿性荨麻疹，症见日晡所加剧者。

【宜忌】 《外台》卷十九引《古今录验》：忌海藻、菘菜、桃李、雀肉等。

【方论选录】 《古方新用》：方中麻黄散寒；薏苡除湿；杏仁利气，助麻黄之力；甘草补中，给薏苡以胜湿之权。

【临证举例】 ①多发性疣 《新医药学杂志》（1978；1:30）：唐某某，男，战士。双手背、前臂有百数个赘生物，诊为多发性疣。曾用维生素B_{12}加普鲁卡因局部封闭治疗无效，改用上方，服9剂后，赘生物开始剥落而愈。②风湿性感冒 《云南中医学院学报》（1978；3:14）：李某，男，36岁，工人，1975年因汗出风吹，以致汗郁皮下成湿，湿郁化热，今发热已十余日不解，每日下午热势增

重，全身痛重。伴有咽痛而红肿，咳嗽痰白而粘稠，无汗，自用辛凉解表药，更增恶寒，舌苔白腻，脉濡缓略浮，遂议为风湿性感冒病，因风湿郁闭，湿阻气机，气机不畅而出现各症，劝其试服麻杏薏甘汤。麻黄、杏仁各10克，薏苡仁30克，甘草7克，更加秦艽10克，豆蔻7克，仅服一剂，果然热退身安，咽已不痛，咳嗽亦舒，劝其更服二剂，以巩固疗效。

13214 痔疮丸

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】 黄连 苦参 乳香（去油） 没药（去油） 雄黄各一两 连翘 僵蚕 蝉蜕 防风 全蝎 槐角（入牛胆汁煮） 生地 牛膝 陈皮 穿山甲 当归 枳壳 地龙（去泥，晒干）各二两 蜈蚣（焙，去头足）二十条 象牙末五钱 人参二钱五分 蜂房一个（入玄明粉于眼内，草纸湿透包好，用微火煨之）

【用法】 上药各为末，炼蜜为丸。空心开水送下三钱。服过六七日，再用荔枝草、马鞭草（阴干）各半斤，蒲公英二两，甘草三钱，入罐煎好，再入皂矾一两，略煎数沸，先熏后洗。

【主治】 痔疮。

【宜忌】 忌一切火酒、发物、房事。

13215 痔漏丸

【方源】《摄生秘剖》卷三。

【组成】 鱼鳔四两（极明净者） 黄蜡四两 明矾二两（研末） 朱砂一两（研末） 珍珠五钱（研末） 象牙五钱（研末）

【用法】 先将鱼鳔酒煮极烂，杵如膏，入蜡化尽，离火入矾，并朱砂、象牙末和匀，丸如梧桐子大。每服三十丸，空心酒送下。

【主治】 一切内外痔漏及诸般顽漏。

【方论选录】 黄蜡、明矾为解毒生肌之圣药，加朱砂、象牙末，其功更倍之矣。用鱼鳔为君者，取其味厚滋补，而有胶固不漏之义焉。

13216 痔漏丸

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】 大熟地四两 白茯苓 山药 山萸肉 牡丹皮 白芍各二两 象牙一两五钱 鳖甲 肉苁蓉 何首乌各三两

【用法】 炼蜜为丸，如梧桐子大。白汤送下三钱。

【主治】 痔漏。

13217 痔漏丸

【方源】《内外科百病验方大全》。

【组成】 刺猬皮（大者） 一张（新瓦上煅脆为末） 象牙屑一两 绿豆粉一两 青黛三钱 槐花末一两五钱 陈细茶五钱

【用法】 上为末，用陈糙米煮烂饭和药为丸。每服三钱，金银花汤送下。

【主治】 痔漏。

13218 痔漏无双丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 白矾八十两 黄腊八十两 朱砂十六两

【用法】 将白矾、朱砂为极细末，混合均匀，黄蜡溶化为小丸。每服二钱，温开水送下。

【功用】 消肿止痛。

【主治】 痔疮漏疮，肛门肿痛，坚硬不消，痛痒难忍。

13219 痔漏消管丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 刺猬皮（煅）一两 石决明（煅） 一两 僵蚕五钱 胡连五钱 木鳖子肉五钱 地龙肉八钱 连翘炭 一两五钱 芥穗八钱 大黄 一两二钱 当归尾一两 槐花一两五钱 乳香（炙）八钱 鹅管石（煅）一两 赤芍五钱 龟头二个 蜂房五钱 马钱子（炙）五钱 血竭五钱

【用法】 上为细末，用冷开水泛为小丸，每十六两用滑石粉四两为衣，闯亮，盒装重六钱。每服二钱，每日二次，温开水送下。

【功用】 化痔消管，解毒止痛。

【主治】 痔疮漏疮，肛门红肿，痔漏生管，淋沥脓水。

【宜忌】 孕妇忌服。

13220 惜红煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 白术 山药 炙甘草 地榆 续断（炒） 芍药（炒） 北五味子十四粒 荆芥穗（炒） 乌梅二枚

【用法】 上以水一钟半，煎至七分，食远服。

【主治】 妇人经血不固，崩漏不止，及肠风下血。

【加减】 如火盛者，加黄连、黄芩；如脾虚兼寒脾泄者，加破故纸、人参。

【备考】 方中白术、山药、炙甘草、地榆、续断、芍药、荆芥穗用量原缺。

13221 惊气丸

【方源】《局方》卷一（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 紫苏子（炒）一两 橘红 南木香 附子（生，去皮脐） 麻黄（去根节） 花蛇（酒浸，

炙，去皮骨） 白僵蚕（微炒） 南星（洗，浸，薄切，姜汁浸一宿） 天麻（去苗）各半两 朱砂（研）一分半（为衣） 干蝎（去尾针，微炒）一分

【用法】 上为末，入研脑、麝少许，同研极细，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一粒，用金银薄荷汤化下，温酒亦得。

【主治】 惊忧积气，心受风邪，发则牙关紧急，涎潮昏塞，醒则精神若痴。

【临证举例】 ①惊气 戊申年军中一人犯法，褫衣将受刃，得释，神失如痴，与一粒服讫而寐，及觉，疾已失。②失心 江东提辖张载阳妻避寇，失心数年，授此方，不终剂而愈。

13222 减味竹叶石膏汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 竹叶五钱 石膏八钱 麦冬六钱 甘草三钱

【用法】 上以水八杯，煮取三杯，一时服一杯，约三时令尽。

【主治】 阳明温病，脉浮而促者。

13223 减味普济消毒饮

【方源】《白喉证治通考》。

【组成】 连翘一两 薄荷三钱 马勃四钱 牛蒡干六钱 芥穗三钱 僵蚕（直者）五钱 元参一两 银花一两 板蓝根五钱 苦桔梗一两 生甘草五钱

【用法】 上为粗末。每服六钱，重者八钱，以鲜苇根汤煎，去滓服。

【主治】 湿毒咽痛喉肿。

13224 清上丸

【方源】《赤水玄珠》卷十六。

【组成】 石菖蒲 酸枣仁 胆星 茯苓 黄连 半夏 神曲 橘红各一两 僵蚕 青黛 木香各五钱 柴胡七钱半

【用法】 上用竹沥打糊为丸。食后茶下一钱五分。

【功用】 安神。

【主治】 痰火眩晕。

13225 清上汤

【方源】《医方简义》卷三。

【组成】 瓜蒌仁（炒）四钱 海石一钱 栀子炭三钱 杏仁（光）三钱 煅石膏二钱 黄芩（炒）一钱 茜草一钱 生牡蛎四钱

【用法】 上加青果二枚，竹叶二十片，水煎服。

【主治】 六淫侵上，吐咳咯衄，牙宣舌血。

【加减】 如因寒者，加苏子二钱；如因暑者，加青蒿一钱，鲜荷一片；如因风者，加生莱菔子一钱，桔梗一钱；如因湿者，加滑石；如因燥者，加生地、麦冬各三钱；如因火者，加犀角、羚羊之类。

13226 清上饮

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】 柴胡 黄芩 赤芍 厚朴 枳实 栀子 郁金 黄连 半夏 青皮 大黄 芒消 甘草

【用法】 上锉。加生姜三片，水煎，热服。

【主治】 心胃刺痛，并两胁肋痛，呕吐胸痞，大便坚，六脉数，或发热口干。

13227 清中丸

【方源】《便览》卷二。

【组成】 陈皮 黄芩（酒炒） 干葛（炒） 天花粉 白米（炒） 薄荷各一两 贝母 枳实各一两五钱 黄连八钱五分

【用法】 上为末，用天门冬、麦门冬、甘草各一两，水二十碗，慢火熬成膏丸。每服百丸，白汤送下。

【主治】 上焦有火，胸膈有痰，血分有热，气分有滞，脾胃停痰，头目昏眩，烦扰作渴。

13228 清中汤

【方源】《准绳·类方》卷四引《医学统旨》。

【组成】 黄连 山栀（炒）各二钱 陈皮 茯苓各一钱半 半夏一钱（姜汤泡七次） 草豆蔻仁（捣碎） 甘草（炙）各七分

【用法】 上以水二钟，加生姜三片，煎至八分，食前服。

【主治】 ①《准绳·类方》引《医学统旨》：胃脘火痛。②《症因脉治》：外感胃脘痛，里有热者。

13229 清中汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 香附 陈皮各一钱五分 黑山栀 金铃子（即川楝子） 元胡索各八分 甘草（炙）五分 川黄连（姜汁炒）一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 热厥心痛。

13230 清中汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 黄连一钱半 青黛三钱 花粉三钱 池菊三钱（去蒂） 新会白一钱半 甘草一钱半 元参一钱半 薄荷一钱半（泡） 钩藤五钱（迟入）

【用法】 水煎，去渣温服。

【主治】 孕妇心膈热痛，脉数者。

【方论选录】 胎热气逆，肝火炽盛，故上侵心胞，而疼痛至急，谓之子痛。黄连清心包伏火，青

黛清肝胆郁火，花粉清胃火以润燥，元参清肾火以益阴；池菊清郁热兼益金水之源，薄荷散郁火兼舒结伏之热，新会白和中启胃，生甘草泻火暖中，纯钩藤平上逆之邪以舒经脉也。水煎，温服，使热化气平，则心包宁静，而胎得所养，何心痛急暴之不瘳乎。

13231 清中汤

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】山栀（炒） 半夏各一钱 黄连七分 茯苓 广皮各一钱 炙甘草三分

【用法】上加竹茹一钱，川椒十粒，生姜一片，水煎服。

【主治】呕酸黄水，烦躁吐蛔，脉数者。

13232 清中散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】当归 黄连 生地 山栀各一钱 牡丹皮六分 升麻八分 甘草五分

【用法】上以水二钟，煎八分，食远服。

【主治】胃经积热，牙齿或牙龈肿痛，或牵引头脑作痛，或面热耳红者。

13233 清化丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】贝母 杏仁 青黛

【用法】上为末，沙糖入姜汁泡蒸饼为丸，如弹子大。噙化。

【主治】①《丹溪心法》：肺郁痰喘嗽，睡不安宁。②《重订通俗伤寒论》：梅核气。燥痰粘结喉头，咳逆无痰，喉间如含炙脔，咯之不出，咽之不下者。

13234 清化饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】芍药 麦冬各二钱 丹皮 茯苓 黄芩 生地各二三钱 石斛一钱

【用法】上以水一钟半，煎至七分，食远温服。

【主治】①《景岳全书》：妇人产后，因火发热，及血热妄行，阴亏诸火不清等证。②《医学集成》：噎膈，因酒而得者。

【加减】如觉骨蒸多汗者，加地骨皮一钱半；热甚而渴或头痛者，加石膏一二三钱；下热便涩者，加木通一二钱，或黄柏、栀子皆可随症用之；如兼外邪发热，加柴胡一二钱。

13235 清化饮

【方源】《会约》卷六。

【组成】白芍 麦冬各二钱 丹皮 茯苓 黄芩 生地各二三钱 白蒺藜三五钱 石斛一钱 苍耳二三钱（炒）

【主治】湿热上蒸，津汁溶溢而下，离经腐散，致鼻流臭涕。

13236 清化膏

【方源】《医学六要·治法汇》卷三。

【异名】门冬膏（原书同卷）。

【组成】天门冬一斤 麦门冬一斤半 生地黄一斤 当归（洗）六两 知母四两 白术六两 甘草三两 陈皮三两

【用法】上煎成浓膏，加竹沥、梨汁、白蜜各一碗，生姜汁半盏。每服十数匙，白汤调下。

【功用】清肃肺金，降火养阴。

【主治】阴虚肠胃干燥，口干，咳嗽，血枯噎膈者。

【宜忌】胃弱者忌用。

13237 清化膏

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】生地五两 熟地五两 天冬三两（去心） 麦冬三两（去心） 川贝三两（去心） 瓜蒌霜一两半 柿霜三两

【用法】上除柿霜外，水煎净汁炼膏，入柿霜收贮。空心温服三匙。

【功用】滋阴润燥豁痰。

【主治】燥痰。阴虚液燥，痰格喉间，咯不出，咽不下，脉涩数者。

【方论选录】方中生地滋阴壮水，熟地滋肾补阴，天冬清心凉肺以益肾水，麦冬润肺清心以生津液，瓜蒌霜润燥豁痰，柿霜润燥退热。炼膏温服，使阴液内充，则燥痰自化而咽嗌清和，何有咯不出、咽不下之患哉。洵为滋阴润燥豁痰之专方。

13238 清气丸

【方源】《玉案》卷三。

【组成】青皮 黄连 黄芩 甘草各五钱 石膏 檀香各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，滚汤送下。

【主治】口臭。

13239 清风散

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】防风五分 荆芥三分 羌活五分 独活五分 连翘五分 当归五分 赤芍药一钱 生地黄五分 苍术一钱 陈皮一钱 半夏（制）一钱 白茯苓一钱 乌药七分 槟榔五分 木瓜六分 牛膝七分 木香三分 黄连五分 玄参七分 鼠粘子（炒）五分 草薢二钱 金银花六分 升麻一钱

白蒺藜（炒）八分　防己五分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，葱白五寸，以水二盏，煎八分服。

【主治】 风热气滞，身体麻木，遍身结核，俗谓风疙瘩。

13240　清六丸

【方源】 《丹溪心法》卷二。

【组成】 六一散一料　红曲（炒）半两

【用法】 上为末，饭为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，白汤送下。治泄泻，与清化丸同用。

【功用】 去三焦湿热，补脾补血。

【主治】 泄泻，产后腹痛或自利、血痢。

【方论选录】 ①《医方考》：血痢者，此方主之。滑石能清六腑之热，甘草能调六腑之气，红曲能和六腑之血。②《赤水玄珠》：此方专清六腑湿热，故名清六。内用红曲者，以其能消食积而化瘀血也。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“青六丸”。改为散剂，名“青六散”（见《金鉴》）。

13241　清火汤

【方源】 《银海指南》卷三。

【组成】 连翘　山栀　归尾　赤芍　石斛

【用法】 水煎服。

【主治】 天行热毒，头疼目赤，痒痛异常，或泪如血水，舌红口渴，小便短赤。

【方论选录】 连翘除其上热；山栀导其下热；归、芍破其血，为血实宜破之也；石斛清其中，为中热宜清之也。合导赤散同用，以治两眦红肿之症，应手取效。

13242　清火汤

【方源】 《医学集成》卷三。

【组成】 山药　芡实　麦冬各一两　元参　生地各五钱　丹参三钱　莲心二钱　天冬一钱　五味五分

【主治】 因心包火动遗精。

13243　清心丸

【方源】 《圣济总录》卷一八五。

【组成】 黄柏（去粗皮，锉）一两

【用法】 上为末，入龙脑一钱匕，同研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，浓煎麦门冬汤送下。

【主治】 ①《圣济总录》：热盛梦泄，心忪恍惚，膈壅舌干。②《济阳纲目》：经络中火邪，口疮咽燥。

13244　清心丸

【方源】 《魏氏家藏方》卷九。

【组成】 蜜陀僧二两　黄连一两

【用法】 上为细末，汤泡蒸饼为丸，如梧桐子大。浓煎茄根空茧汤送下五丸至十丸，或三十丸止，临卧觉恶心住服。

【主治】 消渴。

13245　清心丸

【方源】 《元戎》。

【组成】 黄柏（生）二两　天门冬一两　黄连半两　龙脑一两　麦门冬（去心）一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，临卧麦门冬酒送下，薄荷汤亦得。

【主治】 热症，心火旺盛者。

13246　清心丸

【方源】 《医统》卷四十九。

【组成】 人参　生地黄（酒洗）　郁金　天麻各一钱　朱砂二钱　牛胆南星二钱

【用法】 上为末，蒸饼为丸，如黍米大，朱砂为衣。每服三十丸，人参汤送下。

【主治】 心受邪气，精神恍惚，狂言呼叫，睡卧不安。

13247　清心丸

【方源】 《张氏医通》卷十六。

【组成】 黄连三钱　黄芩二钱　西牛黄半钱　郁金一钱半

【用法】 上以猪心血为丸，如黍米大，朱砂为衣。三岁儿每服三十丸，灯心汤送下。

【主治】 心热神昏，惊悸不宁。

13248　清心丸

【方源】 《医学心悟》卷四。

【组成】 生地（酒洗）四两　丹参二两　黄柏五钱　牡蛎　山药　枣仁（炒）　茯苓　茯神　麦冬各一两五钱　北五味　车前子　远志各一两

【用法】 上用金樱膏为丸。每服三钱，开水送下。

【功用】 清心火，泻相火，安神定志，止梦泄。

【主治】 遗精。

13249　清心丹

【方源】 《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】 黄连（酒炒）三钱　滑石（飞）六钱　甘草　辰砂（飞）各一钱　薄荷六分　犀角屑二钱

【用法】 上为末。每服一钱五分，蜜拌薄荷汤送下，夜再服。

【主治】 耳出红脓，名曰脓耳；舌上生疮，如杨梅状者。

13250 清心汤

【方源】《外科发挥》卷二。

【异名】外科清心汤(《景岳全书》卷五十七)。

【组成】防风通圣散加黄连五钱

【用法】每剂一两，以水二钟，煎至八分服。

【主治】疮疡肿痛，发热饮冷，睡语不宁，脉沉实。

13251 清心汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】黄连 连翘 生地各一钱半 山栀二钱 黄芩一钱 归尾三钱 黄柏 丹皮 甘草各五分 赤芍八分 甘菊七分 灯心三分 川芎六分

【用法】水煎，温服。

【主治】斑疹。疹出痕如朱点，或赤或紫，烦躁不宁者。

13252 清心饮

【方源】《医醇剩义》(耕心堂本)卷一。

【组成】牛黄五分 琥珀一钱五分 黄连五分 丹参三钱 远志五分(甘草水炒) 菖蒲八分 橘红一钱 胆星五分 麦冬一钱五分 淡竹叶二十张

【主治】风火上犯，神明散乱，舌不能言，口流涎沫，甚或神昏鼾睡，面色油红。

【备考】本方方名，原书上科本作“牛黄清心饮”。

13253 清心饮

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】黄连五分 蒲黄一钱五分 犀角五分 元参一钱五分 丹参二钱 连翘一钱五分 蒌皮三钱 茯苓二钱 薄荷一钱 竹叶二十张 灯心三尺

【用法】先用生蒲黄三钱，泡汤频漱，再服此方。

【主治】心阳炽盛，舌卷而肿，塞口作痛，难于语言。

13254 清心散

【方源】《赤水玄珠》卷一。

【组成】青黛 硼砂 薄荷各二钱 牛黄 冰片各三分

【用法】上为末。先以蜜水洗舌，后以生姜汁擦舌，将药末蜜水调稀，搽舌本上。

【主治】①《医学六要·治法汇》：舌强不语。②《景岳全书》：风痰不开。

13255 清丙汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】生地黄三钱 木通二钱 甘草梢二钱 泽泻八分 茯苓八分 猪苓五分 白术八分 肉桂五分 黄连二分 金银花五钱

【用法】水煎服。

【主治】小肠痛。当脐稍下偏左内痛，不可手按，其左足常屈而不能伸。

13256 清玉散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归(酒洗) 川芎 生地黄 牡丹皮 陈皮 黄连 升麻 甘草 半夏(姜制) 白茯苓 赤芍 苍术(米泔浸) 香附 黄芩 柴胡(去芦)

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】妇人赤白带下，上热下寒，口出恶气，或咽干，或牙痛，或耳鸣，或遍身流注疼痛，发热憎寒，或口吐酸水，或心腹气痛，或下五色腥臭。

13257 清白散

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归 川芎 白芍(炒) 生地(酒洗过，姜汁炒) 黄柏(盐水炒) 贝母 樗根白皮(酒炒)各等分 干姜(炒黑) 甘草各减半

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】①《古今医鉴》：白带。②《会约》：白带兼有湿热多火者。

【加减】肥人多湿痰，加白术、半夏；赤带，加酒芩、荆芥；久下，加熟地、牡蛎；气虚，加人参、黄耆；腰腿痛，加鹿角胶。

13258 清白散

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】桑白皮(蜜炒) 地骨皮各三钱 甘草一钱 贝母二钱 寒水石(煅)二钱 天花粉 酒芩 天门冬各一钱五分

【用法】上为末。以蜜水调，食后服。或白通草煎汤送下，尤妙。

【主治】肺热痰火上壅，耳出白脓，名曰缠耳。兼治咳嗽。

13259 清宁丸

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】大黄十斤(须锦纹者，切作小块如棋子大，用好酒十斤，先将泔水浸透大黄，以侧柏叶铺甑，入大黄蒸过晒干，以酒浸之，再蒸晒收干。另用桑叶、桃叶、槐叶、大麦、黑豆、绿豆各一斤，每味煎汁蒸收，每蒸一次，仍用侧柏叶铺甑，蒸过晒干，再蒸再晒。制后再用半夏、厚朴、陈皮、白术、香附、车前各一斤，每味煎汁蒸收如上法，蒸过晒干)

【用法】上用好酒十斤制透为丸，如梧桐子大。每服一二钱。或为散亦可。

【功用】《北京市中药成方选集》：清理胃肠，泻热润燥。

【主治】①《银海指南》：一切热病。②《北京市中药成方选集》：饮食停滞，腹胁膨胀，头晕口干，大便秘结。

【宜忌】《北京市中药成方选集》：孕妇忌服。

13260 清宁散

【方源】《医方类聚》卷二一七引《徐氏胎产方》。

【组成】石膏 黍粘子（炒） 川芎各等分 菊花 细辛减半

【用法】上为末。食前茶清调下。

【主治】妇人偏头痛，连睛痛者。

13261 清宁膏

【方源】《医级》卷八。

【组成】天冬八两 麦冬 杏仁 半夏（制） 贝母各四两 桔梗 甘草 诃子 北沙参各等分 桑皮 牛蒡子

【用法】上以水熬二次，去渣，再熬至碗余，入葛粉四两，白蜜一斤，搅匀，重汤煮一日成膏，取出频服二三匙。

【主治】肺受火刑，咳嗽瘖哑。

【备考】方中桑皮、牛蒡子用量原缺。

13262 清耳膏

【方源】《医方类聚》卷七十八引《吴氏集验方》。

【组成】附子尖（生） 石菖蒲 蝉蜕（生，去土）各等分

【用法】上为末。耳痛，麻油调入；耳痒，生姜汁调成锭子，以红绵裹定，入耳中，药干便换。

【主治】耳内或痒或痛。

13263 清血丸

【方源】《幼科指南》卷上。

【组成】槐花（炒） 荆芥穗（炒） 侧柏叶（炒）各五分 黄连 枳壳

【用法】上为末，醋糊为丸。陈米汤送下。

【主治】小儿痢下鲜血。

【备考】方中黄连、枳壳用量原缺。

13264 清阳汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】红花 酒黄柏 桂枝各一分 生甘草 苏木各五分 炙甘草一钱 葛根一钱五分 当归身 升麻 黄耆各二钱

【用法】上㕮咀，都作一服。以酒三大盏，煎至一盏三分，去渣，食前稍热服。服讫，以火熨摩紧结处。

【主治】口㖞颊腮急紧，胃中火盛，汗不止而小便数。

13265 清串汤

【方源】《青囊秘诀》卷下。

【组成】白芍一两 白术一两 柴胡二钱 蒲公英三钱 天花粉三钱 茯苓五钱 陈皮一钱 附子一钱 紫背天葵五钱

【用法】水煎服。六剂痰块渐消，再服十剂而瘰疬化尽，再服一月痊愈。愈后可服六君子汤数十剂，以为善后之计，永不再发也。

【功用】平肝健脾。

【主治】人有生痰块于项颈，坚如石者，久则变成瘰疬，流脓流血，一块未消，一块又长，未几又溃，或耳下，或缺盆，或肩上，有流行串走之状，故名鼠疮，又名串疮。

【方论选录】此方妙在蒲公英、天葵为消串之神药。然非佐之以白芍、柴胡则肝木不平，非辅之以白术、茯苓则脾土不健，何以能胜攻痰破块之烈哉？惟有攻有补，则调剂咸宜。更得附子之力，以引降药，直捣中坚，所以能愈宿疾沉疴于旦夕耳。

13266 清利汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】大黄六钱 芒消四钱 山栀仁 黄柏各二钱

【用法】水煎服，不拘时候。

【主治】黄疸腹胀，小便不利，表和里实者。

13267 清彻膏

【方源】《何氏济生论》卷三。

【组成】藁木 蔓荆子 薄荷 细辛 川芎 甘草

【主治】头痛。

13268 清肝汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】川芎 当归各一钱 白芍一钱半 柴胡八分 山栀（炒） 牡丹皮各四分

【用法】水煎服。

【主治】肝经血虚而有怒火。

13269 清肝饮

【方源】《常见病的中医治疗研究》。

【组成】茵陈 败酱草 金银花各一两 丹皮 栀子 大黄 枳实 郁金 龙胆草各三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】急性黄疸型肝炎。

13270 清肝散

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】当归 赤芍 白芍 羌活 柴胡 前胡 知母 防风 荆芥 薄荷 黄芩 川芎 桔梗 甘草 石膏 滑石 枳壳 黄连

【用法】水煎，食后热服。

【主治】沉翳内障。因肝脏劳热，眼前常见黑花，年久凝结成翳，其色青白，瞳仁若沉在水中，多年清泪黄色。

13271 清肝散

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】川芎 赤芍 白芍 黄芩 防风 荆芥 薄荷 知母 柴胡 前胡 甘草 山栀 桔梗 羌活各五分 滑石 石膏 大黄 朴消各八分

【用法】加枳壳、黄连，水煎，食后服。

【主治】瞳仁干缺外障。

【备考】方中枳壳、黄连用量原缺。

13272 清肝散

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】白芍 炒栀 丹皮 黄连 木通 滑石 甘草 车前

【主治】肝热溺血。

13273 清肝散

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】白芷二两 炒栀八钱 黄连 枳壳各三钱 甘草二钱

【用法】为散服。

【主治】肝火腹痛，乍痛乍止。

13274 清肝煎

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】生牡蛎五钱 琥珀八分 焦栀子三钱 丹皮二钱 黄芩（炒）一钱 桑叶一钱五分 鲜生地八钱 煨天麻八分 羚羊角（先煎）一钱五分

【用法】上加竹叶二十片，灯心一团，水煎服。

【主治】肝火内炽，晕眩欲厥。

13275 清肠汤

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】当归 生地黄（焙） 栀子（炒） 黄连 芍药 黄柏 瞿麦 赤茯苓 木通 萹蓄 知母各一钱 甘草减半 麦门冬一钱（去心）

【用法】上锉一剂。加灯心、乌梅，水煎，空心服。

【主治】心移热子小肠，小便出血。

【加减】尿血，茎中痛，加滑石、枳壳，去芍药、茯苓。

13276 清肠饮

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】金银花三两 当归二两 地榆一两 麦冬一两 元参一两 生甘草三钱 薏仁五钱 黄芩二钱

【用法】水煎服。

【功用】壮水泻火，活血解毒。

【主治】大肠痈。腹中痛甚，手不可按，右足屈而不伸者。

13277 清灵膏

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】公猪油一斤

【用法】炼去滓，入蜜一斤，再炼令成膏。不时挑服一茶匙。

【主治】失音。

13278 清灵膏

【方源】《玉钥》。

【组成】薄荷三钱 贝母一钱 甘草六分 百草霜六分 冰片三分 玉丹二钱 玄丹八分

【用法】上为细末，蜜调，噙化，随津唾咽下。

【主治】喉癣。

13279 清郁丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】楂肉六两 神曲二两 川黄连二两 青黛二两（飞，澄净） 黑山栀二两 桃仁一两 红花一两 延胡索一两 抚芎一两

【用法】韭汁为丸，空心白汤吞服二钱。

【主治】胸胁痞胀，结涩为痛，或小腹窘痛，渐至饮食难进，形枯色萎，传为关格血郁之症。

13280 清郁散

【方源】《古今医鉴》卷十。

【异名】清郁汤（《类证治裁》卷六）。

【组成】陈皮一钱 半夏一钱（香油炒） 白茯苓一钱 苍术一钱（米泔浸，炒） 川芎六分 干姜五分（炒黑） 香附（童便炒）一钱 神曲（炒）一钱 黄连（姜汁炒）一钱 栀子（姜汁炒）一钱 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎服。此方为丸服亦妙。

【主治】胃中有伏火，膈上有稠痰，胃口作痛，及恶心，呕吐清水，或作酸水，酸心烦闷。

【加减】呕吐甚，加藿香四分，砂仁四分。

13281 清肾汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】焦黄柏 生地 天门冬 茯苓 煅牡蛎

炒山药

【主治】 肾中有火，精得热而妄行，频频精泄，心嘈不寐。

13282 清肾汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 知母四钱 黄柏四钱 生龙骨四钱（捣细） 生牡蛎（炒，捣）三钱 海螵蛸（捣细）三钱 茜草二钱 生杭芍四钱 生山药四钱 泽泻一钱半

【主治】 小便频数疼涩，遗精白浊，脉洪滑有力，确系实热者。

【临证举例】 遗精 一叟，年七十余，遗精白浊，小便频数，微觉疼涩。诊其六脉平和，两尺重按有力，知其年虽高，而肾经确有实热。投以此汤，五剂全愈。

13283 清肾汤

【方源】《眼科金镜》卷三。

【组成】 当归 川芎 枸杞子各二钱 茯苓三钱 木贼 菊花 密蒙花各一钱半 石决明 知母 黄柏各二钱半 防风一钱

【用法】 上锉。水三钟，煎一钟，温服。

【主治】 阴虚火动，生蠛睛者。

13284 清明丹

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】 好猪肝一具（先用好醋浸半日，尽去瘀血皮膜，用竹刀切作片，研令极细） 木贼草（炒） 川羌活（鞭节者） 苍术（米泔水浸一宿，再炒） 当归（去芦，酒浸） 远志（去心） 甘菊花各一两半 荆芥穗 枸杞子（去蒂，酒浸） 川乌头（炮，去皮脐） 防风（去芦） 车前子（炒） 旋覆花（去枝） 地肤子（炒） 白芷 黄芩 玄参 人参（去芦） 海螵蛸（炙，去壳） 雄小黑豆（炒，去壳）各一两 白茯苓一两二钱（去皮） 川芎 甘草（炙）各二两 麦门冬二两半（去心） 苦胡麻仁 蝉蜕（去土） 草决明子（炒） 荠苨子（春收者）各半两

【用法】 上为细末，用前猪肝为丸，如弹子大。如肝少，入蜜。每服一丸，食后荆芥茶汤送下。

【功用】 明目，补肝清胆，还元固本。

【主治】 上热下冷翳障黑花，睹物茫茫。

13285 清明散

【方源】《济阳纲目》卷一〇一。

【组成】 皂矾不拘多少（瓦器盛，于三伏内晒之至白色，须晒十余日方好） 黄连末十分之一

【用法】 每用少许，水和，隔纸洗眼。立时见效。

【主治】 暴发烂弦风眼。

13286 清和散

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】 连翘 防风 荆芥 薄荷 苦参 玄参 升麻 秦艽 瓜蒌根

【用法】 上加灯心，水煎，食后服。

【主治】 胞肉生疮外障。

13287 清和膏

【方源】《外科医镜》。

【组成】 木芙蓉五两（重阳日采叶，或根皮或花俱妙） 紫荆皮三两 独活二两 南星一两半 赤芍一两半 白芷一两

【用法】 上用麻油二斤熬枯，滤去渣，将油再熬沸，徐徐投入炒飞黄丹一斤，或铅粉亦可，以桑枝搅匀，至滴水取丸不粘指为度，倾入水中去火性，摊用。

【功用】 活血定痛，散瘀消肿，拔脓去腐，生肌长肉。

【主治】 痈疽发背及阴阳不和等毒。

13288 清金丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】 与点丸（原书同卷）、泻金丸（《景岳全书》卷五十七）、青金丸（《济阳纲目》卷二十八）。

【组成】 片子黄芩（炒）

【用法】 上为末，面糊为丸，或蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸。

【功用】 泻肺火，降膈上热痰。

【主治】 咳嗽。

13289 清金丸

【方源】《本草纲目》卷二十六引《医学集成》。

【异名】 青金丸（《回春》卷二）。

【组成】 萝卜子（淘净，蒸熟，晒干）

【用法】 研，和姜汁浸，蒸饼为丸，如绿豆大。每服三十丸，以口津咽下，每日三次。

【主治】 胸喘痰促，遇厚味即发者。

13290 清金丸

【方源】《活人方》卷一。

【组成】 黄芩四两 黄连二两 黄柏八钱 山栀一两六钱

【用法】 水泛为丸。午后临睡热茶吞服一二钱。

【主治】 脏腑实火内炽，以致肺金枯燥，气逆喘嗽，甚至热极反兼风化，则头疼目胀，鼻息不利，或为渊，或为衄，耳脓胀闷，舌破喉干，斑疹发痒，三消燥渴，二便不通者。

13291 清金汤

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【异名】青金汤(《普济方》卷一六一)。

【组成】粟壳(蜜炒)半两 甘草(炙)五钱 陈皮(去白) 茯苓(去皮) 杏仁(去皮尖,炒) 阿胶(炒) 五味子 桑白皮(炒) 薏苡仁 紫苏 贝母(去心) 半夏曲 百合 款冬花各一两 人参五钱

【用法】上㕮咀。每服八钱,以水一盏半,加生姜三片,大枣二枚,乌梅一个,煎至八分,去滓,食后温服。

【主治】远年近日咳嗽,上气喘急,喉中涎声,胸满气逆,坐卧不安,饮食不下。

13292 清金汤

【方源】《会约》卷九。

【组成】天冬 麦冬各一钱半 杏仁十一粒(去皮尖) 桑白皮(蜜炙) 甘草 山栀各一钱 桔梗二钱

【用法】水煎温服。

【主治】肺热喘急,右寸脉洪者。

【加减】如痰滞,加半夏一钱半,瓜蒌仁(去油)一钱。或加葶苈一钱,白芥子八分。

13293 清金散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】防风 黄芩 生地 丹皮 当归 蒲黄(炒) 地榆(黑) 白芍(生) 川芎 槐花 杜仲(炒) 甘草 泽兰 阿胶(炒)

【功用】清大肠风热,养血。

【主治】产后血虚,风热客于大肠,大便便血。

【方论选录】是方养血清热为主。四物加阿胶、丹皮、杜仲、蒲黄以养血、补血、凉血;黄芩、槐花、防风、地榆、甘草、兰叶直入阳明,以清热祛风。血虚则补之,风热则清之,便血自止矣。

13294 清金散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】黄连三钱 枳壳一钱 陈皮一钱 乳香一钱 没药五分

【用法】用水二钟,煎至一钟,空心服。

【主治】痔漏肿痛。

13295 清金散

【方源】《何氏虚劳心传》。

【组成】麦冬三四钱 天冬二钱 白花百合一两(有血倍用) 桑皮(蜜炙)二钱(咳甚倍用) 骨皮二钱(内热甚加一钱) 薄荷一钱 花粉二钱 茯苓二钱 贝母二钱(痰多痰红倍用) 枇杷叶(蜜炙)二大片(咳甚加) 米仁五钱(食少有血倍用)

【用法】上加人乳、牛乳各一杯,煎成,加炼蜜或饴糖数匙,薄荷、贝母(研细)亦和匀其内,频频温服。

【功用】润燥、清金、降气、消痰。

【主治】阴虚咳嗽,或多痰,或干咳,或痰血红,或纯血。

【加减】酒客病,加甘蔗汁半杯;有血,加生地三、四、五钱,茅根四两,藕汁、童便各一杯。若热甚痰多,大便燥结者,加梨汁半杯,炖滚服。

13296 清金散

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】生栀子 黄芩 枇杷叶(蜜炙) 生地黄 花粉 连翘(去心) 麦冬(去心) 薄荷 元参 生甘草 桔梗

【用法】引用灯心,水煎服。

【功用】清金化毒。

【主治】鼻疳。疳热攻肺,鼻塞赤痒痛,浸淫溃烂,下连唇际成疮,咳嗽气促,毛发焦枯,热盛者。

13297 清金膏

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】天门冬(去心)八两 麦门冬(去心)四两 贝母四两 杏仁(去皮)四两 半夏(姜制)四两

【用法】上切片,水熬,去渣,取汁五碗,加白粉葛末四两、蜜一斤,共前汁入坛内,重汤煮一日,成膏取出。每日频频服之,不拘时候。

【主治】久嗽痰喘,百药不效,并年久不愈者,或能饮酒人久嗽。

13298 清肺丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】木香 青黛(研) 蛤粉(研) 前胡 人参(去芦头) 黄连各半两 桔梗(微炒) 枳壳(麸炒,去瓤) 薄荷叶 半夏(汤洗七次) 天南星(生)各一两 大黄(生) 牵牛(微炒)各二两

【用法】上为细末,滴水为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食后生姜汤送下。

【主治】心肺伏热,咳嗽烦闷,时有痰涎,喉中介介,咽嗌不利,气不宣畅。

13299 清肺汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】薏苡仁 防己 杏仁 冬瓜子仁各三分

鸡子白皮一分

【用法】 上锉为散。每服四钱，先以苇叶（切）半握，水二盏，煎盏半，入药同煎至七分，去滓，食前服。

【主治】 肺实热，肺壅，汗出若露，上气喘逆咳嗽，咽中塞如呕状，短气客热，或唾脓血。

13300 清肺汤

【方源】《三因》卷十三。

【异名】 紫菀汤(《普济方》卷一八四)。

【组成】 紫菀茸 杏仁（去皮尖） 诃子（煨，去核）各二两 汉防己一两

【用法】 上锉为散。每服四钱，以水一盏半，加鸡子白皮一片，煎至七分，去滓，食后服。

【主治】 ①《三因》：上气，脉浮，咳逆，喉中如水鸡声，喘息不通，呼吸欲绝。②《永类钤方》：因食伤脾，停滞痰饮，发为寒热。

13301 清肺汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 黄芩（去朽心）一钱半 桔梗（去芦） 茯苓（去皮） 陈皮（去白） 贝母（去心） 桑白皮各一钱 当归 天门冬（去心） 山栀 杏仁（去皮尖） 麦门冬（去心）各七分 五味子七粒 甘草三分

【用法】 上锉，加生姜、大枣，水煎，食后服。

【主治】 一切咳嗽，上焦痰盛。

【加减】 痰咯不出，加瓜蒌、枳实、竹沥，去五味子；咳嗽喘急，加苏子、竹沥，去桔梗；痰火咳嗽，面赤身热，咯出红痰，加芍药、生地黄、紫菀、阿胶、竹沥，去五味子、杏仁、贝母、桔梗；久嗽虚汗多者，加白术、芍药、生地黄，去桔梗、贝母、杏仁；久嗽喉痹，声不清者，加薄荷、生地黄、紫菀、竹沥，去贝母、杏仁、五味；嗽而痰多者，加白术、金沸草，去桔梗、黄芩、杏仁；咳嗽身热，加柴胡；咳嗽，午后至晚发热者，加知母、黄柏、生地、芍药、竹沥，去黄芩、杏仁；咳嗽痰结，胁痛者，加白芥子、瓜蒌、枳实、砂仁、木香、小茴、竹沥、姜汁少许，去贝母、杏仁、山栀，亦加柴胡引经。

13302 清肺汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 片黄芩一钱 山栀子 枳实 桑白皮 陈皮 白茯苓（去皮） 杏仁（去皮尖） 苏子 麦门冬（去心） 贝母（去心）各八分 沉香（磨水） 辰砂（研末，二味临服调入）各五分

【用法】 上锉一剂。加生姜一片，水煎，入竹沥同服。

【主治】 火喘，乍进乍退，得食则减，止食则喘者。

13303 清肺汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 茯苓（去皮） 陈皮 当归 生地黄 芍药 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 黄芩 山栀 紫菀 阿胶（蛤粉炒） 桑白皮各等分 甘草减半 乌梅一个

【用法】 上锉一剂。加大枣二枚，水煎，温服。

【主治】 肺有积热，先吐痰而后见血者。

【加减】 喘急，加苏子，去天门冬。

13304 清肺汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】 桑白皮（蜜水泡）三两 地骨皮（去骨，生甘草水泡）三两 麦冬五两 栀仁二两（炒） 川黄连（用红花二钱酒煎，汤泡，炒）八钱 车前子（微炒）八钱 熟大黄二两

【用法】 上为末，菊花煎汤为丸，如绿豆大。每服三钱，早饭后或临卧滚白水送下。红退为度。

【主治】 热在心肺，眼多红丝者。

13305 清肺汤

【方源】《金鉴》卷四十一。

【组成】 麦冬 天冬 知母 贝母 甘草 橘红 黄芩 桑皮

【主治】 肺燥热咳嗽。

【加减】 痰燥而难出，加栝楼子；痰多加半夏；喘加杏仁；胸膈气不快，加枳壳、桔梗；久则宜敛，加五味子。

13306 清肺汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】 五味子 五倍子 黄芩 甘草各等分

【主治】 久咳失音。

13307 清肺饮

【方源】《证治汇补》卷八引东垣方。

【组成】 茯苓 黄芩 桑皮 麦冬 车前 山栀 木通各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 肺热口渴，小便不通。

13308 清肺饮

【方源】《直指》卷八。

【异名】 清肺散(《保命歌括》卷十七)。

【组成】 前胡 荆芥 桑白皮（炒） 甘草（炙） 枳壳（制）各三分 知母 贝母（去心，炒） 脑荷 赤茯苓 北梗 紫苏 阿胶（炒） 杏仁（去

皮） 天门冬（去心）各半两

【用法】 上锉散。每服三钱，加生姜三片，乌梅一枚，食后水煎服。

【主治】 肺气上热咳嗽。

13309 清肺饮

【方源】《直指小儿》卷三。

【异名】 清肺汤（《得效》卷十二）、地黄清肺饮（《婴童百问》卷八）。

【组成】 桑白皮（炒）半两 紫苏 北前胡 黄芩 当归 天门冬（去心） 连翘 防风 赤茯苓 北梗 生干地黄 甘草（炙）各一分

【用法】 上锉散。每服二钱，井水煎，食后服，次用化蜜丸。

【主治】 ①《直指小儿》：小儿肺热疳蜃，蚀为穿孔，汁臭，或生息肉。②《得效》：肺疳咳嗽，气逆多啼，揉鼻咬甲，寒热。

13310 清肺饮

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】 茯苓 白术 猪苓 泽泻 琥珀 木通 甘草 薄荷 瞿麦 扁蓄 滑石

【用法】 上加灯心，水煎服。

【主治】 伤寒上焦有热，肺气伤而不清，渴而小便不利。

13311 清肺饮

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】 前胡（去芦） 柴胡 荆芥 桑白皮（蜜炙） 炙甘草 枳壳各三分 知母 贝母 薄荷叶 茯苓 桔梗 紫苏 阿胶（炒） 杏仁（去皮，另研） 天冬各五分

【用法】 上锉散，用乌梅同煎，去滓服。

【主治】 ①《育婴秘诀》：肺气上逆咳嗽。②《幼幼集成》：气逆而咳，面白有痰。

【宜忌】《幼幼集成》：忌油腻。

13312 清肺饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】 银柴胡 玄参 陈皮 桔梗各一钱 白茯苓 地骨皮 麦门冬 薏苡仁 人参 甘草 瓜蒌仁各八分

【用法】 上加灯心三十茎，煎八分，食远服。

【主治】 肺痈。咳吐脓痰，胸膈胀痛，上气喘急，发热。

13313 清肺饮

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】 桔梗 甘草 杏仁 天花粉 黄芩 山栀 薄荷 连翘

【用法】 水煎服。

【主治】 肺经咳嗽，气急喘咳，痛引缺盆右胁下，洒淅恶寒，或右臂筋吊痛，痰咯难出，或吐白涎，口燥声嘶，寸口脉洪数者。

13314 清肺饮

【方源】《症因脉治》卷三。

【异名】 甘露饮子。

【组成】 石膏 桔梗 山栀 知母 连翘 川黄连 甘草 麦冬 杏仁 枇杷叶

【主治】 湿火上消。湿热伤肺，烦渴引饮，咳嗽面肿。

13315 清肺饮

【方源】《医方集解》。

【组成】 杏仁（去皮尖） 贝母 茯苓各一钱 桔梗 甘草 五味子 橘红各五分

【用法】 上加生姜，水煎，食远服。

【主治】 痰湿气逆而咳嗽。

【加减】 若春时伤风咳嗽，鼻流清涕，宜清解，加薄荷、防风、紫苏、炒芩；夏多火热，宜清降，加桑皮、麦冬、黄芩、知母、石膏；秋多湿热，宜清热利湿，加苍术、桑皮、防风、栀、芩；冬多风寒，宜解表行痰，加麻黄、桂枝、干姜、生姜、半夏、防风；火嗽加青黛、栝楼、海石；食积痰加香附、山楂、枳实；湿痰除贝母，加半夏、南星；燥痰加栝楼、知母、天冬；午前嗽属胃火，宜清胃，加石膏、黄连；午后嗽属阴虚，宜滋阴降火，加芎、归、芍、地、知、柏、二冬，竹沥、姜汁传送；黄昏嗽为火浮于肺，不可用凉药，宜五倍、五味，诃子敛而降之。劳嗽见血，多是肺受热邪，宜加归、芍、阿胶、天冬、知母、款冬、紫菀之类；久嗽肺虚，加参、耆；如肺热，去人参、用沙参可也。

【方论选录】 此手太阴之药，治肺之通剂也。杏仁解肌散寒，降气润燥；贝母清火散结，润肺化痰；五味敛肺而宁嗽；茯苓除湿而理脾；橘红行气；甘草和中；桔梗清肺利膈，载药上浮，而又能开壅发表也。

13316 清肺饮

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】 天麻 胆星 贝母 桔梗 陈皮 花粉 桑皮 枳壳 黄芩

【用法】 水煎服。

【主治】 小儿龟胸、龟背，外证渐减而有痰热者。

13317 清肺饮

【方源】《宋氏女科秘书》。

【组成】当归 川芎 黄芩 贝母（去心） 知母（蜜水炒） 阿胶（炒成珠） 生地 蒲黄（炒） 陈皮各一钱 白芍药（酒炒） 天门冬（去心） 前胡各一钱 藕节（小片） 炙甘草三分

【用法】食前徐徐温服。先服此方，后服逍遥散。

【功用】清热止血。

【主治】妇人虚劳热发，咳嗽吐血。

13318 清肺饮

【方源】《证因方论集要》卷二引黄锦芳方。

【组成】黄芩 生地 阿胶 甘草梢

【主治】肺热移于小肠，溺血，饮食如故。

【方论选录】黄芩以清肺热；阿胶以润肺燥；生地以泻心火；甘草梢以通小肠，直入血分，不杂气药。

13319 清肺饮

【方源】《卫生鸿宝》卷四。

【组成】桑叶 沙参 羚角 连翘 桔梗 甘草 橘红 川贝

【用法】水煎服。

【主治】痧点已透，喉烂渐减，神爽热淡而咳嗽未平者。

13320 清肺饮

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】生地 生石膏 麦冬 知母 栀子 黄芩 苍耳子 丹皮 川芎

【用法】上以猪胆汁为引。

【主治】鼻渊。

13321 清肺饮

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】生地三钱 天麦冬各二钱 贝母三钱 百合三钱 条参二钱 玉竹三钱 白芍二钱 阿胶二钱

【用法】以梨肉三片为引，水煎服。

【主治】胸前骨凸，将成鸡胸。

13322 清肺饮

【方源】《马培之医案》。

【组成】杏仁二钱 苏梗一钱 瓜蒌皮三钱 川贝母一钱 橘红一钱 桑叶一钱 枳壳八分 枇杷叶三钱（去毛） 牛蒡子 桔梗一钱

【主治】鸡胸，内有痰热兼受外风者。

【备考】方中牛蒡子用量原缺。

13323 清肺饮

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】桑皮9克 酒黄芩12克 天花粉9克 桔梗6克 石膏12克 赤芍9克 薄荷6克

【主治】肺经风热，暴发火眼。热重于风，痒轻痛重，赤重于肿，眵泪胶粘，且兼口渴、便秘，脉数有力。

【方论选录】方中桑皮泻肺利水；酒黄芩清肺而燥湿，二者皆能伤阴，肺中火邪炽盛亦能损伤肺阴，故用天花粉清中有润，免伤阴液。石膏解肺经之邪热，更兼桔梗宣通肺气，以使热邪易除。赤芍活血凉血以退目中之赤，薄荷辛凉疏表，风邪可祛。

【加减】兼有大便秘结者，可加酒大黄6克通泻大肠。

13324 清肺散

【方源】《玉机微义》卷二十八。

【组成】五苓散 加琥珀半钱 灯心一分 木通七分 通草一分 车前子（炒）一分 瞿麦半钱 萹蓄七分

【用法】上为细末。每服五钱，水煎，食前服。作汤亦可。

【主治】渴而小便闭，或黄或涩。

13325 清肺散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】桑白皮 黄芩 菊花 枳壳 防风 荆芥 柴胡 升麻 赤芍 归尾 元参 苦参 蒺藜 木贼 旋覆花 甜葶苈 甘草

【用法】上锉。水煎，食后服。

【主治】肺气上攻眼目，白睛肿胀，日夜疼痛。

13326 清肺散

【方源】《便览》卷四。

【组成】麻黄一钱半 知母一钱 荆芥一钱 麦冬一钱 菖蒲八分 诃子八分（去核） 天花粉一钱 桔梗一钱

【用法】上以生姜汁、竹沥同水煎服。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：清肺化痰，散风解表。

【主治】①《便览》：疹后肺热，咳嗽声哑。②《全国中药成药处方集》：感冒风寒，憎寒壮热，咽干声哑，咳嗽痰多，气滞喘促，胸中闷热，咯痰不出，口干舌燥。

【宜忌】忌鱼类。

13327 清肺散

【方源】《回春》卷五。

【异名】清肺饮（《寿世保元》卷六）。

【组成】连翘 川芎 白芷 黄连 苦参 荆芥

桑白皮　黄芩　山栀　贝母　甘草各等分

【用法】 上锉一剂。水煎，临卧服。

【主治】 肺火，面生粉刺。

13328　清肺散

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】 桑白皮　桔黄芩各一钱（酒炒）　生甘草三分　辛夷花一钱　苦桔梗一钱　凤凰壳一个（煅，临吃调）

【用法】 上以水二钟，加灯心十二茎，煎服。

【主治】 鼻中作痒，清晨打嚏，至午方住，明日亦然。

【方论选录】《医略六书》：热郁肺窍，肺气不得宣通而失降下之令，与热相搏，故鼻痒多嚏焉。黄芩清肺热以降下，辛夷散肺热以肃金，桔梗清肺之体，桑皮清肺之用，生甘草缓中和胃气，凤凰壳清肺肃气化也。为散，灯心汤下，以降心火，俾心火下潜，则肺金清肃而降下有权，呼吸如其常度，安有鼻痒多嚏之患乎？此清金达热之剂，为鼻痒多嚏之专方。

13329　清净膏

【方源】《异授眼科》。

【组成】 南星　薄荷　荆芥　白芍各等分

【用法】 上为末，用鸡子清调敷眼眶上。

【主治】 心经热搏，上攻于脑，目与太阳穴如针刺肿痛。

13330　清空散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 川芎五钱　柴胡七钱　黄连（炒）　防风（去芦）　甘草（炙）　羌活各一两　栀子一两半　黄芩三两半（炒一半，酒制一半）

【用法】 上为细末。每服一钱，热酒内入茶少许调为膏，临卧抹口内，少用白汤送下。

【主治】 ①《银海精微》：患眼头痛，偏正头痛，属热痛者。②《会约》：偏正头痛，属风湿热，及脑痛不愈者。

13331　清空膏

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 青空膏（《医学入门》卷七）、清空汤（《症因脉治》卷一）。

【组成】 川芎五钱　柴胡七钱　黄连（炒）　防风（去芦）　羌活各一两　炙甘草一两五钱　细挺子　黄芩三两（去皮，锉，一半酒制，一半炒）

【用法】 上为细末。每服二钱匕，于盏内入茶少许，汤调如膏。临卧抹在口内，少用白汤送下。

【主治】 偏正头痛，年深不愈，及风湿热上壅损目，脑痛不止者。

【加减】 如苦头痛，每服加细辛二分；如太阴脉缓有痰，名曰痰厥头痛，减羌活、防风、川芎、甘草，加半夏一两五钱；如偏正头痛，服之不愈，减羌活、防风、川芎一半，加柴胡一倍。

【方论选录】 ①《医方考》：风者，天之阳气也。人身六阳之气，皆聚于头。复感于风，是重阳而实矣，故令热痛。辛甘发散为阳，故用羌活、防风、川芎、柴胡、甘草。用黄芩、黄连者，苦寒之品也，以羌活之属君之，则能去热于高巅之上矣。②《医方集解》：此足太阳、少阳药也。头为六阳之会，其象为天，清空之位也。风寒湿热干之，则浊阴上壅而作实矣。羌、防入太阳，柴胡入少阳，皆辛轻上升，祛风胜湿之药；川芎入厥阴，为通阴阳血气之使；甘草入太阴，散寒而缓痛；辛甘发散为阳也；芩、连苦寒，以羌、防之属升之，则能去湿热于高巅之上矣。③《成方便读》：此方用羌、防、柴、芎之入肝搜风者，上行而解散其邪，即以酒炒芩、连之苦寒，先升后降，以逐其火。甘草缓急调中，协和各药。用茶者，取其禀至清之气，能除上焦之浊垢下行耳。

13332　清降汤

【方源】《衷中参西录》上册。

【组成】 生山药一两　清半夏三钱　净萸肉五钱　生赭石六钱（轧细）　牛蒡子二钱（炒、捣）　生杭芍四钱　甘草一钱半

【主治】 因吐衄不止，致阴分亏损，不能潜阳而作热，不能纳气而作喘，甚或冲气因虚上干，为呃逆、为眩晕；心血因虚甚不能内荣，为怔忡、为惊悸不寐；或咳逆、或自汗，诸虚蜂起之候。

13333　清经散

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】 丹皮三钱　地骨皮五钱　白芍三钱　青蒿二钱　黄柏五分　熟地三钱　茯苓二钱

【用法】 分二剂，水煎服。

【主治】 先期经来，经水甚多。

【方论选录】 方中虽是清火之品，然仍是滋水之味，火泻而水不与之俱泻，则两不损而两有益也。

13334　清毒饮

【方源】《仙拈集》卷一引《锦囊》。

【组成】 贯众三钱　葛根二钱　甘草一钱半　白僵蚕一钱

【用法】 上加黑豆十粒，水煎服。

【主治】 大头瘟。

13335　清毒散

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】寒水石（煅） 黄柏末各一两 黄丹（炒）半两 朴消半两

【用法】上为细末。每服少许，凉水调，鸡翎醮药扫上，干则再换。

【主治】小儿腮耳颔赤肿红晕。

13336 清带汤

【方源】《衷中参西》

【组成】生山药一两 生龙骨六钱（捣细） 生牡蛎六钱（捣细） 海螵蛸四钱（去净甲，捣） 茜草三钱

【主治】妇女赤白带下。

【加减】单赤带，加白芍、苦参各二钱；单白带，加鹿角霜、白术各三钱。

【方论选录】此方用龙骨、牡蛎以固脱；用茜草、海螵蛸以化滞；更用生山药以滋真阴固元气。愚拟此方，则又别有会心也。尝考《神农本草经》龙骨善开癥瘕，牡蛎善消鼠瘘，是二药为收涩之品，而兼具开通之力也；乌贼骨即海螵蛸，茹芦即茜草，是二药为开通之品，而实具收涩之力也。四药汇集成方，其能开通者，兼能收涩；能收涩者，兼能开通，相助为理，相得益彰。

【临症举例】①白带 一妇人，年二十余，患白带甚剧，医治年余不愈。后愚诊视，脉甚微弱。自言下焦凉甚，遂用此方，加干姜六钱，鹿角霜三钱，连服十剂全愈。②赤白带 一媪年六旬，患赤白带下，而赤带多于白带，亦医治年余不愈。诊其脉甚洪滑，自言心热头昏，时觉眩晕，已半载未起床矣。遂用此方，加白芍六钱，数剂白带不见，而赤带如故，心热，头眩晕亦如故，又加苦参、龙胆草、白头翁各数钱。连服七八剂，赤带亦愈，而诸疾亦遂全愈。

13337 清咽丸

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】薄荷 桔梗 柿霜 甘草各四两 硼砂 儿茶各三钱 冰片二分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。噙化，不拘时候。

【主治】喉痛。

13338 清咽汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】蒲公英 24 克 牛蒡子 12 克 大青叶 15 克 山豆根 15 克 马勃 6 克 郁金 9 克 炒枳壳 9 克 桔梗 9 克 元参 24 克 石斛 15 克 麦冬 15 克 化橘红 9 克 甘草 3 克

【用法】每日一付，水煎后去滓，再将药汁浓缩为 100 毫升，加入蜂蜜 20 克，分两次温服。

【功用】清热、理气、生津。

【主治】慢性咽炎。咽痛，咽干、咽紧堵闷，咽部有异物感。

13339 清咽散

【方源】《喉科家训》卷二。

【组成】甘草 桔梗 荆芥 防风 牛蒡 枳壳 薄荷 前胡

【用法】水煎服。

【主治】一切咽喉肿痛，或红或白，形寒恶热，头疼身痛，汗少不得宣达，风痰壅塞，汤饮难咽。

【加减】郁热痰多，加川贝、蒌仁；食滞不快，加神曲、谷芽；呃逆，加橘络、竹茹；便泻，加葛根、荷叶；血热，加丹皮、栀子；热甚，加黄芩、黄连；火毒，加银花、连翘；便秘，加青宁、明粉；溺赤，加赤苓、木通；胸下痞闷，加川朴；咳嗽，加杏仁、杷叶；秽浊、加佩兰、去甘草；痉厥动风，加羚羊、钩藤。

13340 清胃汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】山栀（炒） 连翘（去心） 牡丹皮 条芩各一钱 石膏二匙 生地黄（酒洗） 黄连（炒）各八分 升麻 白芍（煅） 桔梗各七分 藿香五分 甘草二分

【用法】上锉一剂。水煎，食远服。

【主治】阳明大肠与胃二经之火，致牙床肿痛，牙齿动摇，黑烂脱落。

13341 清胃汤

【方源】《济阳纲目》卷十五。

【组成】黄连（用吴茱萸同炒，去吴茱萸不用）陈皮各三钱 茯苓 苍术 黄芩各一钱 甘草五分

【用法】上锉。水煎，食前服。

【主治】胃热吐酸。

13342 清胃汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】石膏（煅熟）三钱 白芷 升麻各一钱 干葛 黄柏各二钱 甘草五分

【用法】水煎，食后服。

【主治】胃中积热或平昔喜酒致齿痛者。

13343 清胃汤

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】山栀仁（炒黑） 枳壳 苏子各六分 石膏（煅） 川黄连（炒） 陈皮 连翘 归尾 荆芥穗 黄芩 防风各八分 甘草（生）三分

【用法】 上锉一剂。以白水二钟，煎至一钟，去滓热服。

【主治】 脾生痰核，眼胞红硬。

13344 清胃汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】 升麻 生地 丹皮 山栀 甘草 黄连

【功用】 清胃。

【主治】 阳明有热，咽喉作痛，咽物即痛。

13345 清胃汤

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】 生地一钱半 石膏二钱 升麻五分 丹皮 防风 枳壳各一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 龈肿溃烂。

【加减】 下龈甚者，加芍药、黄芩。

13346 清胃饮

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】 当归 生地黄 黄芩 石膏各一钱 升麻五分 白芍药 青皮 黄连各八分 甘草 牡丹皮各四分 栀子仁 苍术各一钱 细辛 藿香 荆芥穗各六分

【用法】 上以水二钟，煎至八分，食后缓缓含呷之。

【主治】 一切风热湿痰牙痛，床肿，血出，动摇。

13347 清胃饮

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】 黄连 黄芩 栀子 石膏 生地 滑石 连翘各一钱 知母 升麻 葛根 大黄（酒炒） 石斛各八分 甘草五分

【用法】 加芦根，水煎服。

【主治】 口臭。

【加减】 口甜，加枳壳、骨皮，去知母、葛根、石斛。

13348 清胃饮

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【异名】 清胃汤（《金鉴》卷六十五）。

【组成】 黄芩 黄连 生地 丹皮 升麻 石膏各一钱

【用法】 外以草乌、青盐、皂角入瓦器内烧存性，擦之。

【主治】 ①《嵩崖尊生》：牙缝出血。②《金鉴》：胃经实热之牙衄、口臭；小儿胎风，初起皮色红，状如汤泼火烧。

【备考】《金鉴》本方用法：上以水二钟，煎至八分，食后服；治小儿胎风，乳母服，婴儿亦饮少许。

13349 清胃散

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】 清胃汤（《疮疡经验全书》卷一）、消胃汤（《不知医必要》卷二）。

【组成】 真生地黄 当归身各三分 牡丹皮半钱 黄连（拣净）六分（如黄连不好，更加二分，如夏月倍之） 升麻一钱

【用法】 上为细末，都作一服。以水一盏半，煎至七分，去滓，放冷服之。

【功用】《古今名方》：清胃凉血。

【主治】 胃经积热，上攻口齿，上下牙痛不可忍，牵引头脑，满面发热，其齿喜冷恶热，或牙龈溃烂，或牙宣出血，或唇口腮颊肿痛，口气臭热，舌咽干燥，舌红苔黄，脉滑大而数者。

①《脾胃论》：因服补胃热药，阳明经中热盛，而致上下牙痛不可忍，牵引头脑，满面热发大痛，喜寒恶热。②《疮疡经验全书》：牙宣、牙缝出血。③《痘疹金镜录》：痘后牙疳肿痛。④《口齿类要》：胃火血燥唇裂，或为茧唇，或牙龈溃烂，或恶寒发热。⑤《正体类要》：胃经湿热，唇口肿痛。⑥《准绳·幼科》：胃经有热，饮冷作渴，口舌生疮，或唇口肿痛，脓连头面，或重舌、马牙、吐舌、流涎。⑦《张氏医通》：胃中蕴热，中脘作痛，痛后火气发泄，必作寒热乃止。⑧《血证论》：脏毒。⑨《竹林女科证治》：子淋。⑩《古今名方》：胃有积热，牙痛、口臭，牙龈红肿、溃烂出血，口干舌燥，舌红苔黄，脉滑大而数。

【方论选录】 ①《医方考》：升麻能清胃，黄连能泻心，丹皮、生地能凉血，用当归者，所以益阴，使阳不得独亢尔。②《医方集解》：此足阳明胃药也。黄连泻心火，亦泻脾火。脾为心子，而与胃相表里者也。当归和血，生地、丹皮凉血，以养阴而退阳也。石膏泻阳明之大热，升麻升阳明之清阳。清升热降，则肿消而痛止矣。

【临证举例】 急性牙周炎 《中医杂志》（1985；7:65）：牙龈红肿疼痛、出血，牙周袋有脓性分泌物，伴发热，口渴喜饮，口臭，大便秘结，小便短赤，舌质红、苔黄厚，脉洪数。治以清胃凉血，清胃散加味：黄连、竹叶各6克，生地、连翘各12克，丹皮、升麻、当归、大黄各10克，生石膏30克（先下），天花粉15克。每日一剂。共治56例。多数患者服3～5剂后痊愈。观察结果：痊愈32例，占57.1%；显效19例，占33.9%；有效4

例，占7.2%；无效1例，占1.8%。

13350 清胃散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】黄芩 黄连 生地 丹皮 升麻 石膏各一钱

【用法】以水二茶钟，煎至八分，食后服。

【主治】胃经有热，牙齿或牙龈作肿，出血不止。

【备考】《外科证治全书》有生甘草一钱。

13351 清胃散

【方源】《诚书》卷六。

【组成】防风 黄芩 天花粉 厚朴（姜制） 石膏（制） 枳壳 黄连 陈皮 甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿舒舌、弄舌。

13352 清胃散

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】生地 丹皮 山栀 知母 玄参 黄芩 石膏 升麻 干葛 甘草

【主治】阳明经齿痛。

13353 清胃散

【方源】《金鉴》卷六十三。

【组成】姜黄 白芷 细辛 川芎各等分

【用法】上为细末。先以盐汤漱口，再以此散擦牙痛处。内服清阳散火汤。

【主治】骨槽风初起。乃手少阳三焦，足阳明胃二经风火，起于耳前，连及腮颊筋骨隐痛，肿硬难消，热不盛者。

13354 清胃散

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】车前子 石膏 大黄 柴胡 桔梗 黑参 黄芩 防风各一钱

【用法】上为粗末。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】小儿生赘。固脾胃积热上壅，赘生眼胞之内，初起如麻子，久则渐长如豆，隐蔽瞳仁，赤涩泪出。

13355 清胃散

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】雅黄连 白当归 绿升麻 怀生地 粉丹皮 白芷梢各等分 北细辛减半

【用法】水煎，热服。

【主治】走马牙疳。

13356 清胃散

【方源】《喉症指南》卷四。

【组成】石膏四钱（煅） 生地三钱 黄连 连翘 丹皮各二钱 升麻八分

【用法】水煎服。

【主治】阳明实火，牙痛，口疮。

13357 清骨散

【方源】《得效》卷九。

【组成】北柴胡 生地黄各二两 熟地黄 人参（去芦） 防风（去芦） 秦艽 赤茯苓各一两 胡黄连半两 薄荷叶七钱半

【用法】上锉散。每服三钱，以水一盏半煎，温服。先服荆蓬煎丸一服，微泄脏腑后服此。

【主治】妇人、童男童女初觉劳瘵。

13358 清骨散

【方源】《准绳·类方》卷一。

【组成】银柴胡一钱五分 胡黄连 秦艽 鳖甲（醋炙） 地骨皮 青蒿 知母各一钱 甘草五分

【用法】上以水二钟，煎至八分，食远服。

【主治】骨蒸劳热。

【加减】血虚甚，加当归、芍药、生地；嗽多，加阿胶、麦门冬、五味子。

【方论选录】①《医方集解》：此足少阳、厥阴药也。地骨皮、黄连、知母之苦寒，能除阴分之热而平之于内；柴胡、青蒿、秦艽之辛寒，能除肝胆之热而散之于表；鳖，阴类，而甲属骨，能引诸药入骨而补阴；甘草甘平，能和诸药而退虚热也。②《成方便读》：以银柴、青蒿、秦艽之苦寒直入阴分者，宣热邪而出之于表；胡黄连、鳖甲、地骨、知母苦寒、甘寒之性，从阴分以清伏热于里；用炙甘草者，缓其中而和其内外，使邪去正安之意耳。

13359 清骨散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】柴胡 白芍各一钱 秦艽七分 甘草五分 丹皮 地骨皮 青蒿 鳖甲各一钱二分 知母 黄芩 胡黄连各四分

【用法】水煎服。加童便尤妙。

【主治】咳嗽吐红，渐成骨蒸劳热之症。胃强气盛，大便结，脉有力。

13360 清香散

【方源】《普济方》卷四十六。

【组成】川芎 藁本各一两 防风 羌活各二钱 细辛三钱 香白芷一两 甘草半两

【用法】上为细末。食后茶清调服。

【主治】偏正头风并牙痛。

13361 清香散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 小茴香 荔枝核 青皮各等分

【用法】 上为末。每服二钱，酒调下。

【主治】 外肾肿大如斗。

13362 清顺汤

【方源】《玉案》卷三。

【方药】 黄芩 麦门冬 黄连 连翘 山栀仁 生地各二钱 大黄四钱

【用法】 上加生姜三片，水煎服，不拘时候。

【主治】 舌强壅肿。

13363 清胆汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 青蒿叶 青菊叶 薄荷梗 连翘 苦丁茶 鲜荷叶汁

【主治】 因大声喊叫，右耳失聪。以外触惊气，内应肝胆，胆脉络耳，震动其火风之威，至郁而阻窍成聋者。

【宜忌】 忌食腥浊。

13364 清音丸

【方源】《准绳·类方》卷二引《医学统旨》。

【组成】 桔梗 诃子各一两 甘草五钱 硼砂 青黛各三钱 冰片三分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，噙化。

【功用】《医学六要》：化痰止咳，清金降火。

【主治】 ①《准绳·类方》引《医学统旨》：咳嗽。②《全国中药成药处方集》（西安方）：咽喉肿痛，咳嗽失音。

13365 清音丸

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】 元参（去芦） 桔梗 山豆根 胖大海 薄荷叶 生硼砂 金果榄 射干 黄连各一两 诃子肉二两 银花一两五钱 麦冬一两五钱 黄芩 生栀子 净金灯 川贝 甘草各五钱

【用法】 上为细粉，炼蜜为丸，每丸一钱重。蜡皮或蜡纸筒封固。每次一丸，含在口中，缓缓咽下，每天含二三丸。

【功用】 清凉解热，生津止渴。

【主治】 咽喉肿痛，音哑声嘶，口干舌燥，咽下不利。

【宜忌】 忌辛辣食物。

13366 清音散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】 诃子三钱（半生半泡熟） 木通二钱（半生半泡熟） 桔梗（生用） 甘草三钱（半生半炙）

【用法】 上锉。水煎，用生地黄捣烂，入药服之。

【主治】 声音不清。

【备考】 方中桔梗用量原缺。

13367 清宫汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 元参心三钱 莲子心五分 竹叶卷心二钱 连翘心二钱 犀角尖二钱（磨冲） 连心麦冬三钱

【用法】 水煎服。

【主治】 太阴温病，神昏谵语者。

【加减】 热痰盛，加竹沥、梨汁各五匙；咯痰不清，加瓜蒌皮一钱五分；热毒盛，加金汁人中黄；渐欲神昏，加银花三钱、荷叶二钱、石菖蒲一钱。

13368 清神丹

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】 山药 归身 远志（甘草汤浸，去骨） 白茯苓 辰砂各六钱 麦门冬（去心）五钱 川黄连（姜汁炒） 贝母（去心） 人参 白术（炒）各四钱 酸枣仁（炒）五钱 甘草（炙）二钱

【用法】 上为细末，竹沥为丸，如豌豆大，辰砂为衣。米汤化下。

【主治】 小儿夜啼。

13369 清神丹

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】 石菖蒲（去毛）二两 辰砂六钱（研细，水飞过，以一半为衣）

【用法】 上为末，猪心血打面糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心白汤送下。

【主治】 痫症。

13370 清神汤

【方源】《万氏妇人科》卷二。

【组成】 人参 白术 茯苓 炙耆 炙草 麦冬 归身各等分

【用法】 生姜、大枣为引，水煎，食远服。兼服寿星丸。

【主治】 ①《万氏妇人科》：子痫，气虚挟痰挟火。②《胎产心法》：孕妇忽然眩晕卒倒，口噤不能言，状如中风，须臾即醒，醒而复发。

【备考】《胎产心法》有白芍。

13371 清神汤

【方源】《医略六书》卷二十二。

【组成】 黄连一钱半 茯神一钱半 枣仁三钱 柏仁二钱 远志一钱半 甘草五分 菖蒲三钱 竹沥三匙（冲） 姜汁一匙（冲）

【用法】 水煎，去滓，冲二汁服。

【主治】 虚热痰迷，病痫脉数。

【加减】 肺虚加人参；肺热加沙参；痰多加南星、半夏。

【方论选录】 心肺虚热，痰迷膈上，故神明昏昧，病痫时发焉。黄连清心泻热，枣仁养心宁神，菖蒲发痰通窍，茯神定心安神，柏子仁养心神，远志肉交心肾，甘草缓虚热，姜汁散痰涎，竹沥化痰润液以安神清膈也。肺虚加人参以扶元，肺热加沙参以清肺，痰多加半夏，南星以豁之。端不外清热存阴、扶元益虚之治，何虚热痰迷、病痫卒仆不除乎？

13372 清神汤

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】 全蝎 荆芥 防风 木通 甘草 菊花 川芎 羌活 菖蒲 木香 僵蚕

【主治】 风邪入耳，气壅耳鸣、耳痒，眼中流火，内热甚而脉洪大者。

13373 清神散

【方源】《局方》卷一。

【组成】 檀香（锉） 人参（去芦） 羌活（去苗） 防风（去苗）各十两 薄荷（去土） 荆芥穗 甘草（爁）各二十两 石膏（研）四十两 细辛（去苗，洗，焙）五两

【用法】 上为末。每服二钱，食后沸汤点服；或入茶末点服亦得。

【功用】 消风壅，化痰涎。

【主治】 头昏目眩，心忪面热，脑痛耳鸣，鼻塞声重，目眼瞤动，精神昏惫，肢体疼倦，颈项紧急，心膈烦闷，咽嗌不利。

13374 清神散

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】 龙脑薄荷叶 荆芥穗各二两 甘草一两（炙） 川芎 牛蒡子（炒）各一两

【用法】 上为细末。每服二钱，食后沸汤调下。

【主治】 风壅热盛，咽膈不利。

【备考】 本方原名“清神汤”，与剂型不符，据《普济方》改。

13375 清神散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】 干菊花 白僵蚕（炒去丝嘴）各一两 荆芥穗 羌活 木通 川芎 防风各半两 本香二钱 甘草 石菖蒲各三钱

【用法】 上为末。每服三钱，食后、临卧服，茶清调下。

【主治】 ①《朱氏集验方》：气壅于上，头目不清，耳常重听。②《医略六书》：耳聋作痛，脉浮数者。

【方论选录】《医略六书》：风热内攻，听户闭塞，聪明之气不行，故暴聋作痛焉。羌活疏散，行气于听户；蠚蚕轻扬，行气于经络；防风散风调气；荆芥散风和血；羚羊角清肝火，兼肃肺气；甘菊花解郁热，并益金水；川芎行血中之气以聪耳；菖蒲通耳中之窍以听声；木通降心火利小便；甘草缓中州和胃气也。为散煎服，使风热得解，则清阳上奉而诸窍皆聪，安有暴聋作痛之患乎？此散风清热之剂，为暴聋作痛之专方。

【备考】《医灯续焰》无木香，有香附；《医略六书》无木香，有羚角。

13376 清神散

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】 人参 白术 茯苓 甘草 防风 桔梗 细辛 天花粉各等分

【用法】 上咀散。入薄荷少许煎服，不拘时候。

【主治】 肺热鼻塞生疮，不闻香臭。

13377 清神散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 甘草节五钱 真绿豆粉一两 大朱砂三钱 梅花片五分 牛黄三分

【用法】 上为细末。每服一钱，淡竹叶、灯心汤调服。

【主治】 脱疽、疔疮，发背，毒积甚者，腠理发越不尽，烦躁闷乱，睡则谵言，呕吐不食。

13378 清络饮

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 鲜荷叶边二钱 鲜银花二钱 西瓜翠衣二钱 鲜扁豆花一枝 丝瓜皮二钱 鲜竹叶心二钱

【用法】 上以水二杯，煮取一杯，每日二次。

【主治】 手太阴暑温，发汗后，暑证悉减，但头微胀，目不了了，余邪不解者。

13379 清热汤

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】 车前子 灯心 侧柏叶 栀子 黄芩 滑石 乌梅 竹叶 大黄（酒蒸熟） 蒲黄 猪苓 甘草 赤茯苓

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 赤浊，便血，血淋。

13380 清臭饮

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 赤芍 黄芩 藁本 生地 黄连 石菖

蒲 远志各等分 甘草三分

【用法】 水煎服。

【主治】 鼻中臭气。

13381 清胰丸

【方源】《新急腹症学》。

【组成】 柴胡 黄芩 半夏各一两 全瓜蒌二两 薤白 枳实 川楝子 白芍各一两 生军五钱或一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸重三钱。早、晚各一丸。

【主治】 急性胰腺炎。

13382 清胰片

【方源】《中西医结合治疗常见外科急腹症》。

【组成】 柴胡 黄芩 胡连 木香 元胡 杭芍各9.4克 生大黄15.6克

【用法】 制成片剂。每次四片，一日三次。

【主治】 急性水肿型胰腺炎。

13383 清胰汤

【方源】《外伤科学》。

【组成】 柴胡三钱 黄芩三钱 胡黄连三钱 厚朴三钱 枳壳三钱 木香三钱 大黄三钱（后下） 芒消三钱（冲服）

【用法】 水煎服。

【功用】 疏肝理气，清热通便。

【主治】 气滞型胰腺炎。

13384 清疹汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生石膏（捣细）一两 知母六钱 羚羊角二钱 金线重楼（切片）一钱半 薄荷叶二钱 青连翘二钱 蝉退（去足土）一钱半 僵蚕二钱

【用法】 上水煎，取清汤一钟半，分二次温服。以服后得微汗为佳。若一次得微汗者，余药仍可再服。若服一次即得大汗者，余药当停服。此药分量，系治七八岁以上者，若七八岁以下者，可随其年之大小，斟酌少用。

【主治】 小儿出疹，表里俱热，或烦躁引饮，或喉疼声哑，或喘逆咳嗽。

13385 清凉丸

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】 当归尾 石菖蒲 赤芍药各二钱 川黄连（生） 地肤子 杏仁（生）各一钱 羌活五分 胆矾二分

【用法】 上为粗末，以大红绸包之，如樱桃大。甜滚水浸泡，乘热蘸洗，勿见尘土。

【主治】 眼胞菌毒初起。脾经素有湿热，思郁气结而生者。

13386 清凉丹

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】 天南星四两（腊月黄牛胆制者） 牛黄三两（别研） 蝎梢（去毒，炒） 石膏各一两半 白花蛇（酒浸，取肉） 犀角屑 防风（去芦头） 甘草 真珠末 朱砂（别研） 大黄各一两 脑子半两（别研）

【用法】 上为细末，研匀，炼蜜为丸，每一两作十丸。每服一丸，食后、临卧薄荷汤化下。

【主治】 风热壅实，上攻头面，口眼㖞斜，语言不利，肌肉瞤动，面若虫行；及伤寒热盛，狂言昏冒，刚痉，一切风热。

13387 清凉汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】 白芍一钱三分 甘草 栀子 茯苓 泽泻 黄芩 枳壳 木通 黄连各一钱

【用法】 水煎温服。

【主治】 湿热泻痢，或发热喜冷，或腹痛手不可按，或所泻者臭恶而热，或小便痛而赤，属暴病脉实者。

【加减】 如大便带血，加熟大黄一钱、当归一钱；如内热甚者，加黄柏、胆草。

13388 清凉饮

【方源】《简明医彀》卷二。

【组成】 黄连 黄芩 栀子 连翘 薄荷 甘草

【用法】 上加灯心，水煎服。

【主治】 恶寒而脉洪数，兼目痛口渴，心烦便秘属热者。

【加减】 夏月外穿棉衣，脉洪数，小便短赤，大便秘结，加大黄、芒消。

13389 清凉散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】 蔓荆子 荆芥 苦竹叶 甘草各半两 山栀子一分（去皮）

【用法】 上锉散。每服三钱，以水一盏半，加薄荷七叶煎，温服。

【主治】 冰瑕深翳。五脏俱受风热，黑水内横深瑕盘，青色沉沉深入，痛楚无时。

13390 清凉散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】 马牙消 白矾 曾青各一两半 龙脑 青黛各一分

【用法】 上为细末，研令匀细。每至临卧时用散干点半字在眼内。

【主治】 冰瑕翳深外障。

13391 清凉散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 升麻 赤芍药 川芎 柴胡各三两 元参 黄芩 荆芥 甘草 白术 栀子 赤茯苓 干葛 草决明

【用法】 上为末。每服六钱，水煎服。

【主治】 眼胞睑壅肿如桃者。

13392 清凉散

【方源】《回春》卷五。

【组成】 山栀 连翘 黄芩 防风 枳壳 黄连 当归 生地 甘草各等分 桔梗 薄荷减半 白芷减半（或不用亦可）

【用法】 上锉一剂。如灯心一团，细茶一撮，水煎，磨山豆根调服。

【主治】 一切实火咽喉肿痛。

【加减】 咽喉干燥，加人参、麦门冬，天花粉，去白芷；咽喉发热，加柴胡；咽喉肿痛，加牛蒡子、玄参，去白芷；痰火盛，加射干、瓜蒌、竹沥，去白芷；咽喉生疮，加牛蒡子、玄参，去白芷；极热大便实，加大黄，去桔梗；虚火泛上，咽喉生疮，喉不清者，加黄柏、知母，去白芷。

13393 清凉煎

【方源】《秘传眼科龙木论》卷六。

【组成】 龙脑 腻粉 马牙消 秦皮各一两 防风 黄连各三分

【用法】 上为极细末。以水二碗浸药二日后，煎取二大盏，滤去滓，更煎三五沸，用瓷盒子盛之，别入龙脑，搅匀，密封，勿令尘入。用之点眼。

【主治】 眼赤膜下垂外障。

13394 清凉膏

【方源】《本草纲目》卷三十六引《鸿飞集》

【异名】 清露散（《本草纲目》卷三十六）、芙蓉外敷法（《医方集解》）、芙蓉膏（《仙拈集》卷四）、青露散、玉露散（《青囊秘传》）、清凉散（《中医皮肤病学简编》）

【组成】 芙蓉叶（末）

【用法】 水和，贴太阳穴。

【主治】 ①《本草纲目》引《鸿飞集》：赤眼肿痛。②《本草纲目》：一切痈疽发背，乳痈恶疮。

【备考】《本草纲目》治痈疽本方用法：生研或干研末，以蜜调涂于肿处四围，中间留头，干则频换。

13395 清凉膏

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】 栀子仁一分 黄连一分（去须） 生地黄二两 葱白十枚（擘） 白芷一分 黄蜡半两 清麻油四两

【用法】 上锉细，于油铛中煎，以地黄焦黑为度，绵滤去滓，澄清，却于铛中入蜡，慢火熬，候蜡消，倾于瓷盒内。每使时，用鸡翎搵少许涂疮上。取愈为度。

【功用】 止疼痛，解火毒，润肌生肉。

【主治】 汤泼火烧。

【备考】 本方加石膏，名"清凉散"（见《疡科选粹》）。

13396 清凉膏

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】 木鳖子（去壳） 黄柏 败荷叶 黄芩 芙蓉叶 黄连 草乌头 朴消（别研） 蒺藜 玄参各等分

【用法】 上为细末，用生姜汁调成膏，敷肿上。如热甚，即以水并蜜调敷，外以纱片掩其上，干即再换，多敷尤佳。如有丝瓜，取自然汁调敷亦妙。

【主治】 发背痈疽，初肿发未成脓者，或脓已破者。

【加减】 痛甚，加乳香、没药。

13397 清凉膏

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 生南星 薄荷叶各半两 荆芥 百药煎各三钱

【用法】 上为末，并水调成膏，贴眼角上。

【主治】 ①《准绳·类方》：目赤肿痛。②《景岳全书》：眼目赤肿不能开，痛闷热泪如雨。

13398 清凉膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】 玉糊膏（《疡科纲要》卷下）、清凉油（《中医皮肤病学简编》）。

【组成】 白石灰一升 麻油减半

【用法】 将白石灰用水二碗和匀，候一时许，用灰上面清水倾入碗内，加麻油和匀，以竹筋搅百转，自成稠膏，外搽。

【功用】 ①《北京市中药成方选集》：清热消肿，解毒止痛。②《中医方剂临床手册》：清热润肤。

【主治】 杖疮、汤火伤，皮肤潮红或起燎泡出水，疼痛难忍。

①《外科正宗》：杖疮，汤泼火烧。②《外科大成》：汤泼火烧，火药伤，痛不可忍。③《医述》婴儿生下无皮。④《中医方剂临床手册》：烫伤初期，皮肤潮红，或有燎泡出水者。

13399 清凉膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 鸡子清一钟 香油半钟

【用法】 箸打千百下，扫之。

【主治】 汤泼火烧，痛不可忍者。

13400 清凉膏

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】 石灰一块 香油半钟 雄黄末少许

【用法】 将石灰凉水化开，加水打浑，少时取清水一钟，兑香油半钟，打数百成膏，加雄黄末少许，再打匀。鹅翎扫患处。

【主治】 丹毒，缠腰火丹。

13401 清凉膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 当归一两 紫草二钱 大黄面一钱五分 香油一斤 黄蜡四两（或六两）

【用法】 以香油浸泡当归、紫草三日后，用微火熬至焦黄，离火，将油滤净去滓，再入黄蜡，加火熔匀，待冷后加大黄面（每斤油膏加大黄一钱五分），搅匀成膏。外敷患处。

【功用】 清热解毒，凉血止痛。

【主治】 汤烧伤，冻伤，多型红斑（血风疮）、牛皮癣（白疮）等炎症性干燥脱屑皮损。

【宜忌】 阴疮、阴疽慎用。

13402 清流饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 生地 芍药 茯苓 泽泻各二钱 当归二钱 甘草一钱 黄芩 黄连各一钱半 枳壳一钱

【用法】 上以水一钟半煎服。

【主治】 阴虚夹热泄痢，或发热、或喜冷，或下纯红鲜血，或小水痛赤等。

【加减】 如热甚者，加黄柏；小水热痛者，加栀子。

13403 清营汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 犀角三钱 生地五钱 元参三钱 竹叶心一钱 麦冬三钱 丹参二钱 黄连一钱五分 银花三钱 连翘二钱（连心用）

【用法】 上以水八杯，煮取三杯，每日三服。

【功用】《方剂学》：清营解毒，透热养阴。

【主治】 ①《温病条辨》：暑温，邪入手厥阴，脉虚，夜寐不安，烦渴舌赤，时有谵语，目常开不闭，或喜闭不开及阳明温病，邪在血分，舌黄燥，肉色绛，不渴者。②《方剂学》：邪热初入营分，身热夜甚，口渴或不渴，时有谵语，心烦不眠，或斑疹隐隐，舌绛而干，脉象细数。

【方论选录】 ①《成方便读》：方中犀角、黄连，皆入心而清火，犀角有轻灵之性，能解夫疫毒，黄连具苦降之质，可燥乎湿邪，二味为治温之正药；热犯心包，营阴受灼，故以生地、元参滋肾水，麦冬养肺金，而以丹参领之入心，皆得遂其增液救焚之助；连翘、银花、竹叶三味，皆能内彻于心，外通于表，辛凉轻解，自可神安热退，邪不自留耳。②《方剂学》：犀角咸寒清解营分之热毒，为主药；热甚伤阴，故以玄参、生地、麦冬甘寒清热养阴，共为辅药；温邪初入营分，根据"入营犹可透热转气"的理论，佐以苦寒之黄连、竹叶心、连翘、银花清心解毒，并透热于外，使热邪转出气分而解，体现了本方气营两清之法。丹参清热凉血，并能活血散瘀，以防血与热结，亦为佐药。

【临证举例】 暑温 《吴鞠通医案》：温邪入心包络，神昏痉厥，极重之症。连翘三钱，生石膏六钱，麦冬（连心）五钱，银花五钱，细生地五钱，知母二钱，丹皮三钱，生甘草一钱五分，竹叶二钱，今晚二帖，明早一帖，再服紫雪丹四钱。

13404 清痒汤

【方源】《仙拈集》卷三引《全生方》。

【组成】 黄耆 防风 荆芥 苦参 蝉蜕 蒺藜（炒） 僵蚕 当归 生地 赤芍 川芎 何首乌各五分

【用法】 上水煎，晚徐服。

【主治】 小儿浑身风疹，密如蚕子，痒不可当。

13405 清暑汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 连翘 花粉 赤芍 银花 甘草 滑石 车前 泽泻各等分

【用法】 水煎服。外贴洞天膏。

【主治】 一切暑热，头面生石疖。

13406 清脾汤

【方源】《济生》卷一。

【异名】 清脾饮子（《保婴撮要》卷七）、清脾饮（《济阴纲目》卷九）、九味清脾汤（《泻疫新论》卷下）。

【组成】 青皮（去白） 厚朴（姜制，炒） 白术 草果仁 柴胡（去芦） 茯苓（去皮） 半夏（汤泡七次） 黄芩 甘草（炙）各等分

【用法】 上㕮咀，每服四钱，以水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《济生》：瘴疟脉来弦数，但热不寒，或热多寒少，膈满能食，口苦舌干，心烦渴水，小

便黄赤，大便不利。②《济阴纲目》：妊娠疟疾。

【方论选录】 ①《医方考》：方曰清脾者，非清凉之谓，乃攻去其邪而脾部为之一清也。故青皮、厚朴清去脾部之痰，半夏、茯苓清去脾中之湿，柴胡、黄芩清去脾中之热，白术、甘草清去脾脏之虚，而草果仁又所以清膏粱之痰也。②《医方集解》：脾虚恶寒，胃虚恶热。寒热间作，脾亦有之，不独少阳也。虽十二经皆能为疟，而脾胃受伤者实多。故仲景小柴胡汤人参、甘草、半夏、姜、枣，皆脾胃药，其治少阳，独柴胡一味而已。严氏宗之，故以小柴胡加减而立清脾饮，是明从脾胃论治矣。

13407 清脾散

【方源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】 白术 白滑石（飞）各五钱 甘草一钱 黄连（酒炒）二钱 扁豆（炒） 茯苓各三钱 葛根一钱半 石斛三钱

【用法】 上为末。每服一钱，灯心汤调下。

【主治】 滞颐。

13408 清脾散

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】 薄荷叶 升麻 甘草（减半） 山栀仁（炒） 赤芍药 枳壳 黄芩 广陈皮 藿香叶 石膏 防风各等分

【用法】 上为细末。每服二钱五分，水煎服。

【主治】 脾家燥热瘀滞，眼上生毒，名为土疳眼，俗称偷针。

13409 清魂汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】 柴胡胜湿汤（原书同卷）、青红汤（普济方）卷三〇一）

【组成】 柴胡 生甘草 酒黄柏各二钱 升麻 泽泻各一钱五分 当归梢 羌活 麻黄根 汉防已 草龙胆 茯苓各一钱 红花少许 五味子二十个

【用法】 上锉如麻豆大，分作二服。以水二盏，煎至一盏，去滓，食前稍热服。

【主治】 两外肾冷，两髀阴汗，前阴瘙，阴囊湿痒臊气。

【宜忌】 忌酒、湿面、房事。

13410 清魂散

【方源】《产育宝庆集》。

【异名】 清魄散（《三因》卷十七）、芎劳汤（《普济方》卷三四八引《仁存方》）。

【组成】 泽兰叶 人参各一分 荆芥穗一两 川芎半两

【用法】 上为末。每服一钱，温酒、热汤各半盏调匀，急灌之。

【主治】 ①《产育宝庆集》：产后血气暴脱，未得安静，血随气上攻，迷乱心神，眼前生花，极甚者，令人闷绝，不知人事，口噤神昏气冷。②《医方集解》：产后恶露已尽，忽然昏暴不知人。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足厥阴药也。气血虚弱，故以芎劳、泽兰养其血，人参、甘草补其气；外感风邪，故以荆芥疏其风。风邪去，气血生，则神清矣。肝藏魂，故曰清魂。②《成方便读》：荆芥芳香辛苦，独走肝经血分，搜散风邪，故以为君。病既因虚而来，故仍以人参甘草之补正。虽虚而得之产后，不免血气或有留滞，故以泽兰之祛瘀行水，川芎之活血理气。调以温酒者，助其解散之功耳。

13411 清解汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 薄荷叶四钱 蝉退（去足土）三钱 生石膏六钱（捣细） 甘草一钱五分

【用法】 水煎服。

【主治】 温病初得，头疼，周身关节酸疼，肌肤壮热，背微恶寒，无汗，脉浮滑者。

13412 清痰丸

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】 治痰丸（《杏苑》卷四）。

【组成】 苍术二两 香附一两半 瓜蒌仁 半夏各一两 黄连 黄芩各五钱

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食远茶清送下。

【主治】 吞酸嗜杂。

13413 清痰汤

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】 山栀 黄芩 半夏（炮） 橘红 茯苓 瓜蒌仁 枳壳 贝母 香附（童便浸）各一钱 甘草五分

【用法】 水煎，入竹沥、姜汁各三四匙，食远服。

【主治】 痰火攻作，项强口噤，角张反痉。

13414 清痰饮

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】 陈皮（去白） 半夏（姜制） 天花粉 栀子仁（炒黑） 石膏（煅） 黄芩 白茯苓 胆南星 枳壳（炒）各一钱 青黛六分

【用法】 上锉。以白水二钟，煎至一钟，去滓热服。

【主治】 因患头风，痰厥头疼，以致瞳神散大。

13415 清膈汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】 黄连 黄柏 枳壳 石膏 玄参 大黄各三钱 甘草一钱

【用法】 水煎服，不拘时候。

【主治】 口疮作痛，上焦实热者。

13416 清膈散

【方源】《传信适用方》卷一。

【组成】 麻黄一两（去节） 阿胶一两（炒） 罂粟壳一两（蜜炙） 乌梅肉一两 杏仁半两（去皮尖）

【用法】 上为细末。每服二钱，以水一盏，煎至七分，去滓，临卧温服。

【功用】 发散肺寒

【主治】 痰嗽。

13417 清聪丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】 橘皮（盐水洗，去白）一两半 赤茯苓（去皮） 半夏（姜制）一两 青皮（醋炒） 柴胡梢 酒黄芩 玄参 蔓荆子 桔梗 全蝎（去毒） 菖蒲 黄连（酒炒）各一两五钱 生甘草五钱

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如绿豆大。每服一百二十丸，临卧茶清送下。

【主治】 耳鸣及壅闭，至于聋者。

13418 清震汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 羌活 酒黄柏各一钱 升麻 柴胡 苍术 黄芩各五分 泽泻四分 麻黄根 猪苓 防风各三分 炙甘草 当归身 藁本各二分 红花一分

【用法】 上锉如麻豆大，都作一服。以水二盏，煎至一盏，去渣，临卧服。

【主治】 小便溺黄，臊臭，淋沥，两丸如冰，阴汗浸多。

【宜忌】 忌酒、湿面。

13419 清震汤

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 升麻 赤芍药 甘草 荆芥穗 葛根 苏薄荷 黄芩 青荷叶 苍术（米泔水浸一宿，炒）各等分

【用法】 上锉。以水二钟，煎至八分，去滓热服。

【主治】 大小雷头风，头痛极不可忍，身热目痛，大便不通，小便赤涩，痛不可禁，兼治发热恶寒口渴者。

13420 清镇丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 小柴胡汤内加人参一倍 青黛半两

【用法】 上为细末，面糊为丸，如桐子大。每服五十丸，生姜汤送下。

【主治】 ①《保命集》：热嗽。②《脉因症治》：上焦气热所冲，食已暴吐，头痛有汗，脉弦。

13421 清镇汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】 茯神 枣仁 远志 菖蒲 石莲 当归 生地 贝母 麦冬 柏子仁

【功用】 养心血，调心气，清热豁痰。

【主治】 劳心怔忡。用心太劳，甚至一经思虑便动。

13422 清膻汤

【方源】《三因》卷八。

【异名】 青膻汤（《普济方》卷二十九）。

【组成】 榆白皮 冬葵子各五两 石苇四两（去毛） 黄芩 通草 瞿麦各三两

【用法】 上为粗末。先以水二盏，入车前叶数片，煎至一盏半，入药末数钱，再煎七分，去滓热服。

【主治】 右肾实热，身热，脊胁相引痛，足冷，小便黄赤，如栀子汁，每欲小便，即苦头痛。

13423 清燥汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】 茯苓燥湿汤（《东垣试效方》卷九）。

【组成】 黄连（去须） 酒黄柏 柴胡各一分 麦门冬 当归身 生地黄 炙甘草 猪苓 建曲各二分 人参 白茯苓 升麻各三分 橘皮 白术 泽泻各五分 苍术一钱 黄耆一钱五分 五味子九枚

【用法】 上㕮咀，如麻豆大。每服半两，以水二盏半，煎至一盏，去滓，稍热，空心服。

【主治】 ①《脾胃论》：痿厥之病，腰以下痿软，瘫痪不能动，行走不正，两足畏侧。②《保婴撮要》：小儿自汗，或因热伤元气，大小便秘涩。

【方论选录】《医略六书》：清湿而曰清燥者，以湿热不化，营阴暗伤，故风燥成痿也。黄耆补气，白术健脾，苍术、茯苓渗湿燥湿，黄连、黄柏清热燥湿，陈皮利气和胃，甘草缓中和脾，建曲化津气，生地滋营阴，当归养血，麦冬生津，五味子保肺收耗散，升麻举陷升清阳，柴胡升少阳清气，猪苓、泽泻泻湿以降阴浊也。使湿流燥润，则脾健气强而营血灌注，何患风燥不除，湿热成痿之不愈

哉。

13424 清燥汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】麦冬五钱 知母二钱 人中黄一钱五分 细生地五钱 元参三钱

【用法】上以水八杯，煮取三杯，分三次服。

【主治】温病下后无汗，脉下浮而数者。

【加减】咳嗽胶痰，加沙参三钱，桑叶一钱五分，梨汁半酒杯，牡蛎三钱，牛蒡子三钱。

13425 清肺饮子

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】清肺饮(《准绳·疡医》卷四)。

【组成】灯心一分 通草二分 泽泻 瞿麦 琥珀各五分 萹蓄 木通各七分 车前子（炒）一钱 茯苓（去皮）二钱 猪苓（去皮）三钱

【用法】上为粗末。每服五钱，以水一盏半，煎至一盏，食远稍热服。

【主治】邪热在上焦气分，渴而小便闭涩不利。

【备考】本方方名，《准绳·类方》引作“清肺散”。

13426 清凉饮子

【方源】《婴童百问》卷四。

【异名】四顺清凉饮(《外科正宗》卷四)。

【组成】大黄 连翘 芍药 羌活 当归 防风 甘草 山栀仁各等分

【用法】上锉散。每服二钱，以水半盏，煎至三分，去滓服，不拘时候。

【主治】①《婴童百问》：项颈结热，头面疮疖，肚中热痛。②《外科正宗》：汤泼火烧，热极逼毒入里，或外被凉水所激，火毒内攻，致生烦躁，内热口干，大便秘实者。

13427 清上泻火汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】荆芥 川芎各二分 蔓荆子 当归身 苍术各三分 酒黄连 生地黄 藁本 生甘草各五分 升麻 防风各七分 酒黄柏 炙甘草 黄耆各一钱 酒黄芩 酒知母各一钱五分 羌活三钱 柴胡五钱 红花少许 细辛少许

【用法】上锉如麻豆大，分作二服。每服以水两盏，煎至一盏，去滓，食后稍热服。

【主治】热厥头痛。虽冬天大寒，犹喜寒风，其头痛则愈，微来暖处，或见烟火，其痛复作，五七年不愈。

13428 清上瘀血汤

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【异名】消上瘀血汤(《杂病源流犀烛》卷三十)。

【组成】羌活 独活 连翘 桔梗 枳壳 赤芍药 当归 栀子 黄芩 甘草 川芎 桃仁 红花 苏木 大黄

【用法】上加生地黄，水煎，和老酒、童便服。

【主治】上膈被伤者。

13429 清中蠲痛汤

【方源】《医学六要治法汇》卷五。

【组成】炒黑山栀 炒黑姜 川芎 黄连（姜汁炒） 橘红 制香附 苍术 神曲

【用法】水煎服。

【主治】胃脘痛久，脉数有火者。

13430 清气天麻汤

【方源】《何氏济生论》卷一。

【组成】香附子 苍术 天麻 陈皮 茯苓 僵蚕 半夏 川芎 天南星 防风 甘草 黄连 枳实 白芷 山栀

【主治】因气怒头眩，胸满气胀，手足麻木。

13431 清气化痰丸

【方源】《医方考》卷二。

【组成】陈皮（去白） 杏仁（去皮尖） 枳实（麸炒） 黄芩（酒炒） 瓜蒌仁（去油）、茯苓各一两 胆南星 半夏（制）各一两半

【用法】生姜汁为丸服。

【功用】《全国中药成药处方集》：清肺止咳，降逆化痰。

【主治】诸痰火症。

【方论选录】①《医方考》：气之不清，痰之故也，能治其痰则气清矣。是丸也，星、夏所以燥痰湿，杏、陈所以利痰滞，枳实所以攻痰积，黄芩所以消痰热，茯苓之用渗痰湿也。若瓜蒌者，则下气利痰云尔。②《医方集解》：此手足太阴之药，治痰火之通剂也。气能发火，火能役痰，半夏、南星以燥湿气，黄芩、栝楼以平热气，陈皮以顺里气，杏仁以降逆气，枳实以破积气，茯苓以行水气。水湿火热，皆生痰之本也，火退则还为正气而安其位矣。故化痰必以清气为先也。

13432 清火止咳汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】枳壳 杏仁 黄芩 石膏 山栀 瓜蒌霜 桔梗 桑皮 知母 贝母 前胡 甘草 生姜

【主治】火嗽。

13433 清火止痛汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】川连 元参 甘菊 连翘 黄芩 木通

当归　丹皮　白芍药　木贼草　羚羊角　生地　谷精草

【主治】　心火上炎，目赤，寸脉数。

13434　清火健脾丸

【方源】《医学六要·治法汇》卷一。

【组成】　白术三两　枳实一两　半夏　陈皮各一两五钱　炒栀子一两　炒黄连五钱

【用法】　水泛为丸。

【主治】　脾胃弱，有火症，食少，嘈杂恶心。

13435　清心莲子饮

【方源】《局方》卷五。

【组成】　黄芩　麦门冬（去心）　地骨皮　车前子　甘草（炙）各半两　石莲肉（去心）　白茯苓　黄耆（蜜炙）　人参各七两半

【用法】　上锉散。每服三钱，加麦门冬十粒，水一盏半，煎取八分，去滓，水中沉冷，空心，食前服。

【功用】　①《局方》：清心养神，秘精补虚，滋润肠胃，调顺血气。②《方剂学》：益气阴，清心火，止淋浊。

【主治】　心火偏旺，气阴两虚，湿热下注，遗精淋浊，血崩带下，遇劳则发；或肾阴不足，口舌干燥，烦躁发热。

①《局方》：心中蓄积，时常烦躁，因而思虑劳力，忧愁抑郁，是致小便白浊，或有沙膜，夜梦走泄，遗沥涩痛，便赤如血；或因酒色过度，上盛下虚，心火炎上，肺金受克，口舌干燥，渐成消渴，睡卧不安，四肢倦怠，男子五淋，妇人带下赤白；及病后气不收敛，阳浮于外，五心烦热。②《校注妇人良方》：热在气分，口干，小便白浊，夜间安静，尽则发热，口舌生疮，口苦咽干，烦躁作渴，小便赤涩，下淋不止，或茎中作痛。③《保婴撮要》：心肾虚热，便痈，发热口干，小便白浊，夜则安，昼则发。④《外科正宗》心经蕴热，小便赤涩，玉茎肿痛，或茎窍作痛；及上盛下虚，心火炎上，口苦咽干，烦躁作渴。⑤《玉案》：上盛下虚，心肾不交，血虚内热，淋涩作痛。

【加减】　发热加柴胡、薄荷煎。

【方论选录】　①《局方》：药性温平，不冷不热。②《回春》：此药温平，清火养神秘精。③《医方集解》：此手足少阴、足少阳太阴药也。参、耆、甘草，所以补阳虚而泻火，助气化而达州都，地骨退肝肾之虚热，柴胡散肝胆之火邪，黄芩、麦冬，清热子心肺上焦，茯苓、车前利湿于膀胱下部，中以石莲清心火而交心肾，则诸证悉退也。

【备考】　本方方名，《医方集解》引作“莲子清心饮”。

13436　清心莲子饮

【方源】《直指》卷十。

【组成】　石莲肉　白茯苓各一两　益智仁　远志（水浸，取肉，姜制，炒）　麦门冬（去心）　人参各半两　石菖蒲　车前子　白术　泽泻　甘草（微炙）各一分

【用法】　上锉散。每服三钱，加灯心一握，水煎服。

【主治】　心中客热烦躁，赤浊肥脂。

【加减】　有热，加薄荷。

13437　清血四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】　当归（酒洗）　川芎　赤芍　生地黄各一钱　鬼箭　三棱（醋浸，炒）　玄胡索各七分　红花五分　姜黄　苏木各八分　白术（去芦）　牡丹皮各一钱

【用法】　上锉。水煎，人酒同服。

【主治】　血壅过期不行。

13438　清肌渗湿汤

【方源】《金鉴》卷七十四。

【组成】　苍术（米泔水浸炒）　厚朴（姜汁炒）　陈皮　甘草（生）　柴胡　木通　泽泻　白芷　升麻　白术（土炒）　栀子（生）　黄连各一钱

【用法】　水二钟，加生姜三片，灯心二十根，煎至八分，温服。外敷真君妙贴散。

【主治】　猫眼疮，一名寒疮，由脾经久蕴湿热，复被外寒，凝结而成。初起形如猫眼，光彩闪烁，无脓无血，痛痒不常，久则近脛。

【宜忌】　多食鸡、鱼、蒜、韭。忌食鲇鱼、蟹、虾。

13439　清阳散火汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】　升麻　白芷　黄芩　牛蒡子　连翘　石膏　防风　当归　荆芥　白蒺藜各一钱　甘草五分

【用法】　水二钟，煎八分，食后服。

【主治】　骨槽风。牙根尽处结肿，连及耳项作痛。

13440　清阳散火汤

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】　牛蒡子　防风　荆芥　薄荷　黄芩　龙胆草　黄连　贝母

【用法】　水煎，食远温服。

【主治】　骨槽风。

13441 清肝止淋汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】白芍一两（醋炒） 当归一两（酒洗） 生地五钱（酒炒） 阿胶三钱（白面炒） 粉丹皮三钱 黄柏二钱 牛膝二钱 香附一钱（酒炒） 红枣十个 小黑豆一两

【用法】水煎服。

【主治】赤带。带下色红，似血非血，淋沥不断。

【方论选录】此方但主补肝之血，全不利脾之湿者，以赤带久为病，火重而湿轻。夫火之所以旺者，由于血之衰，补血即足以制火，且水与血合而成赤带之病，竟不能辨其是湿非湿，则湿亦尽化而为血矣。所以治血则湿亦除，又何必利湿之多事哉。此方之妙，妙在纯子治血，少加清火之味，故奏功独奇。倘一利其湿，反引火下行，转难遽效矣。方中芍以平肝，则肝气得舒，肝气舒自不克土，脾不受克，脾土自旺，是平肝正所以扶脾，又何必加人参、白术之品以致累事哉。

13442 清肝达郁汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】焦山栀三钱 生白芍一钱半 归须一钱 川柴胡四分 粉丹皮二钱 清炙草六分 广橘白一钱 苏薄荷四分（冲） 滁菊花一钱半 鲜青橘叶五片（剪碎）

【功用】清疏肝郁。

【主治】肝郁不伸，胸满胁痛，腹满而痛，甚则欲泄不得泄，即泄亦不畅。

【加减】暴怒气盛者，加制香附三钱，醋炒青皮八分，暂为平气以伐肝；肠鸣飧泄者，加乌梅炭三分，白僵蚕一钱半，升达肠气以泄肝；疝气肿痛者，加小茴香二分，炒橘核三钱、炒香荔枝核一钱半，疏肝泄气以止痛；因子湿热食滞，腹中痛甚者，加《局方》越鞠丸三钱，疏畅六郁以定疼。

【方论选录】本方以逍遥散法疏肝达郁为君；然气郁者多从热化，丹溪所谓气有余便是火也，故又以栀、丹、滁菊清泄肝火为臣；佐以青橘叶清芬疏气，以助柴薄之达郁。此为清肝泄火，疏郁宣气之良方。

13443 清肝导滞汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】萹蓄四钱 瞿麦三钱 滑石二钱 甘草一钱

【用法】上以水二钟，加灯心二十根，煎八分，空心服。

【主治】肝经湿热，玉茎肿痛，小水涩滞作痛。

【加减】便秘，加大黄二钱。

13444 清肝芦荟丸

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎 当归 白芍各二两 生地（酒浸，捣膏）二两 青皮 芦荟 昆布 海粉 甘草节 牙皂 黄连各五钱

【用法】上为末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，食前后白滚水送下。

【主治】恼怒伤肝，致肝气郁结为瘤，坚硬色紫，垒垒青筋，结若蚯蚓，遇喜则安，遇怒则痛。

13445 清肝凉胆汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十。

【组成】白芍一钱半 川芎 当归各一钱 柴胡八分 山栀 丹皮 龙胆草各四分

【主治】肝血虚，胆汁少，有怒火。

13446 清肝益荣汤

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【异名】清肝益营汤（《诚书》卷十五）。

【组成】柴胡 山栀（炒）各五分 当归 川芎 芍药（炒）各一钱 熟地黄（自制） 白术（炒） 木瓜（不犯铁器） 茯苓各五分 甘草三分 龙胆草（酒拌炒黑）五分 薏苡仁五分

【用法】水煎服。

【主治】①《校注妇人良方》：肝胆经风热，血燥筋挛结核，或作瘰疬。②《景岳全书》：肝胆小肠经风热血燥，筋挛结核，或耳项胸乳胁肋作痛，并一切肝火之症。

13447 清肝渗湿汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎 当归 白芍 生地 柴胡 龙胆草 山栀 天花粉 黄芩各一钱 泽泻 木通 甘草各五分

【用法】水二钟，加灯心二十根，煎八分，食前服。

【主治】囊痈。肝经湿热结肿，小水不利，发热焮痛。

13448 清肝渗湿汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】苍术 白术 茯苓 山栀 厚朴 泽泻 陈皮 木通 天花粉 昆布各一钱 甘草五分 木香三分 川芎 当归各六分

【用法】水二钟，煎八分，空心服。

【主治】阴囊玉茎湿肿如猪肚，小水不利，坠重作痛。

【加减】 作热红色，加黄连、龙胆草各七分。

13449 清肝渗湿汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 川芎 当归 白芍 生地 山栀 黄连 连翘 龙胆草各一钱 银柴胡 泽泻 木通各六分 滑石三钱 芦荟五分 甘草三分 防风八分

【用法】 水二钟，加淡竹叶、灯心各二十件，煎八分，食前服。

【主治】 肝经郁滞，邪火流行，致阴肿痛，或风热作痒。

13450 清肝解郁汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 当归 白芍 茯苓 白术 贝母 熟地 山栀各一钱 半夏 人参 柴胡 丹皮 陈皮 香附 川芎各六分 甘草四分

【用法】 水二钟，加生姜三片，煎八分，食远服。

【主治】 暴怒伤肝，忧思郁结，致肝火妄动，发为鬓疽，头眩，痛彻太阳，胸膈痞连两胁，呕酸水。

13451 清肠解毒汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 焦山栀三钱 银花炭 青子芩 连翘 赤芍各二钱 川连 川柏 川生军 焦枳壳 煨防风各一钱

【主治】 膏粱积热，酒酪聚湿，而为脏毒下血，血色如烟尘，沉晦瘀浊，便溏不畅，胃气不健，肢体倦怠。

13452 清郁二陈汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】 陈皮 半夏（姜汁炒） 茯苓各一钱 苍术（制）八分 川芎八分 香附一钱 神曲（炒）五钱 枳实（麸炒）八分 黄连（炒） 栀子（炒）各一钱 白芍（炒）七分 甘草三分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，水煎服。

【主治】 酸水刺心，吞酸嘈杂。

13453 清肾抑阳丸

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】 寒水石（另研） 黄柏（盐水制） 生地黄 知母（盐水制） 枸杞子 黄连（酒炒） 白茯苓各二两 独活八钱 草决明（炒） 当归（酒洗，炒） 白芍药（酒洗，炒）各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心滚白汤送下。

【主治】 瞳神缩小。其病神水紧小，小而又小，积渐之至，竟如芥子许。

13454 清金二母汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 知母 贝母 桔梗 茯苓 当归 白术 陈皮各一钱 桑皮 紫苏 杏仁 柴胡 瓜蒌仁 黄芩 五味子 甘草 麦门冬各五分

【用法】 上用水二钟，煎八分，入童便一杯，食后服。

【主治】 肺痿。多嗽少痰，午后发热，口干，烦躁不宁。

13455 清金化痰汤

【方源】《杂病广要》引《统旨》。

【组成】 黄芩 山栀各一钱半 桔梗二钱 麦门冬（去心） 桑皮 贝母 知母 瓜蒌仁（炒） 橘红 茯苓各一钱 甘草四分

【用法】 水二钟，煎八分，食后服。

【主治】 咳嗽。因火者，咽喉干痛，面赤，鼻出热气，其痰嗽而难出，色黄且浓，或带血丝，或出腥臭。

【加减】 如痰带血丝，加天门冬、阿胶各一钱。

13456 清金宁肺丸

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 清金保肺丸（《疡科捷径》卷中）。

【组成】 陈皮 茯苓 桔梗 贝母 人参 黄芩各五钱 麦门冬 地骨皮 银柴胡 川芎 白芍 胡黄连各六钱 五味子 天门冬 生地（酒浸，捣膏） 熟地（捣膏） 归身 白术各一两 甘草三钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食远白滚汤送下。

【主治】 肺痈。咳嗽日久，脓痰不尽，身热虚羸，渐成劳瘵。

13457 清金宁肺汤

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 知母 贝母 麦冬 薏仁 桔梗 生地 薄荷 芍药 当归 苏子 桑白皮 条芩 白术 甘草

【用法】 水二钟，加生姜一片，煎七分，食远服，渣再煎。

【主治】 男妇骨蒸劳热，咳嗽吐痰或血。

【加减】 有汗，加小麦；烦渴，加石膏、淡竹叶；久咳，加款冬花、杏仁（炒）。

13458 清金宁嗽汤

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】 橘红 前胡 生甘草 杏仁（去皮尖，炒） 桑皮（蜜炙） 川连 栝楼仁 桔梗 浙贝母

（去心）

【用法】 引用生姜、红枣，水煎服。

【主治】 麻疹已出，肺为火灼，咳嗽。

13459 清金百部汤

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】 桔梗 元参 川贝 百部 生地 麦冬 丹皮 白芍 生甘草 地骨皮 灯心

【主治】 虚劳久嗽。

【加减】 喘急，加白前、海粉、竹茹；如痰吐稠粘，脾肺火盛，加清金散、竹茹、花粉。

13460 清金保肺汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 天冬一钱五分 麦冬一钱五分 南沙参三钱 北沙参三钱 石斛二钱 玉竹三钱 贝母二钱 茜根二钱 杏仁三钱 婆皮三钱 茯苓二钱 蛤粉三钱 梨三片 藕五片

【主治】 肺受燥热，发热咳嗽，甚则喘而失血。

13461 清金养营汤

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】 当归二钱 白芍八分 熟地二钱 黄连二钱 连翘一钱 黄芩一钱五分 熟大黄一钱半 枳壳二钱 麻仁二钱 茯苓一钱 天花粉一钱 甘草五分

【用法】 用水二钟，煎至一钟，食前服。

【主治】 痔漏肿痛，大便燥急，里急后重者。

【宜忌】 忌辛热等物。

13462 清金凉肝散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】 黄连 黄芩 栀子 连翘 葶苈 桑白皮 麦门冬 天花粉 赤芍药 干葛 荆芥 杏仁 青皮 甘草

【用法】 水煎，加蜜一盏，煎一沸，食后温服。

【主治】 白睛黄赤。

13463 清金益气汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生黄耆三钱 生地黄五钱 知母三钱 粉甘草三钱 玄参三钱 沙参三钱 川贝母（去心）二钱 牛蒡子（炒捣）三钱。

【主治】 恬羸少气，劳热咳嗽，肺痿失音，频吐痰涎，一切肺金虚损之病。

13464 清金解毒汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生明乳香三钱 生明没药三钱 粉甘草三钱 生黄耆三钱 玄参三钱 沙参三钱 牛蒡子三钱（炒捣） 贝母三钱 知母三钱 三七二钱（捣细，药汁送服）

【主治】 肺脏烂损，将成肺痈，或咳嗽吐脓，血，又兼治肺结核。

【加减】 将成肺痈者，去黄耆，加金银花三钱。

【临证举例】 肺结核 一人，年四十八，咳吐痰涎甚腥臭，夜间出汗，日形羸弱，医者言不可治，求愚诊视。脉数至六至，按之无力，投以此汤，加生龙骨六钱，又将方中知母加倍，两剂汗止，又服十剂痊愈。

13465 清肺平肝汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 大生地八钱 花粉四钱 黄芩三钱 连翘三钱 银花四钱 寸冬四钱 地骨皮四钱 知母肉四钱 车前子三钱（外包） 大黄三钱 甘草一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 混睛障症。两眼酸疼，气轮被赤丝横绕，风轮赤白兼杂，微露瞳神，视物昏蒙，重则瞳神皆无，只有光感。

13466 清肺养肝汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 银花 酒黄芩 赤芍 当归各9克 酒生地12克 车前子9克 茺蔚子3克

【功用】 清肺，养肝，起陷。

【主治】 花翳低陷。肺盛肝虚，肺火克肝，白睛红赤，羞明流泪，结眵青睛，边缘有低陷者。

【方论选录】 方中银花、酒黄芩清肺解热，当归、酒生地补血养肝，赤芍活血凉血以退目中之赤，车前子清肺养肝以明目，酒茺蔚子祛瘀生新以起陷。

13467 清肺葶苈丸

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】 葶苈二两（甜） 杏仁二两（去尖） 木通一两半 川贝二两（去心） 防己二两

【用法】 上为末，枣肉为丸。每服三钱，桑皮煎汤送下。

【主治】 肺热内壅，肺气逆满，不能通调水道，喘急浮肿，右侧不眠，浮数者。

【方论选录】 葶苈泻气分湿热，防己泻血分湿热，气血肃清则肺气无不清矣；杏仁降气疏风痰，川贝清心化热痰，痰化气清则肺气无不降矣；木通利小肠以降心火，火降湿消则肺行降下之令而无刑克之虞，何患肺胀不消，浮肿不退乎；丸以枣肉之缓中益脾，下以桑皮之泻火清肺也。此清肺以泻湿热之剂，为肺胀喘急、不眠之专方。

13468 清荣槐花饮

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归一钱（酒洗） 白芍一钱 生地黄一钱 川芎（盐酒制）六分 槐花一钱 槐角八分 黄连（酒炒）八分 枳壳（麸炒）七分 黄芩（酒炒）七分 苍术八分 防风六分 升麻四分 荆芥穗八分 生甘草四分

【用法】上锉，水煎，空心热服，滓再煎服。

【主治】便血，不拘新久。

13469 清咽太平丸

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】薄荷叶一两 川芎二两 桔梗三两 甘草二两 防风二两 柿霜二两 犀角二两（用人乳浸，焙干为末）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。含化，不拘时候。

【主治】①《万氏家抄方》：咽喉肿痛，流热涎。②《医方集解》：膈上有火，早间咯血，两颊常赤，咽喉不清。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴药也。薄荷辛香升浮，消风散热；防风血药之使，泻肺搜肝；川芎血中气药，升清散瘀；柿霜生津润肺；犀角凉心清肝；甘草缓炎上之火势，桔梗载诸药而上浮，又甘桔相合，为清咽利膈之上剂也。

13470 清咽抑火汤

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】连翘一钱五分 片芩一钱 栀子一钱 薄荷七分 防风一钱 桔梗二钱 朴消一钱 黄连一钱 黄柏五分 知母一钱 玄参一钱 牛蒡子一钱 大黄一钱 甘草五分

【用法】上锉一剂，水煎，频频热服。

【主治】咽喉肿痛，痰涎壅盛，初起或壮盛人，上焦有实热者。

【加减】曾生过杨梅疮者，加防风、山豆根二两

13471 清咽利膈汤

【方源】《准绳·幼科》卷三。

【组成】元参 升麻 桔梗（炒） 甘草（炒） 茯苓 黄连（炒） 黄芩（炒） 牛蒡子（炒，杵） 防风 芍药（炒）各等分

【用法】每服一二钱，水煎服。

【主治】心脾蕴热，咽喉腮舌肿痛。

13472 清咽利膈散

【方源】《外科理例·附方》。

【异名】清咽利膈汤。

【组成】金银花 防风 荆芥 薄荷 桔梗 黄芩 黄连各一钱半 山栀 连翘各一钱 玄参 大黄（煨） 朴消 牛蒡子 甘草各七分

【用法】水煎服。

【主治】①《外科理例》：积热咽喉肿痛，痰涎壅盛，或胸膈不利，烦躁饮冷，大便秘结。②《灵验良方汇编》：积热咽喉肿痛，痰涎壅盛；及乳蛾喉痛，重舌木舌。

13473 清胃化痰汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】桃仁泥五钱 当归四钱 苏子三钱 半夏四钱 胆星三钱 陈皮三钱 黄芩三钱 大黄四钱 石膏六钱 芥穗二钱 连翘三钱 防风二钱 生地四钱 枳壳二钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】化痰清胃。

【主治】眼胞痰核。脾胃蕴热与痰湿互结，阻塞脉络，痰火上攻，凝结眼睑之内而生核，上下无定，大小不等。初期如米易治，久如杏仁则难疗，妨碍视力，只痒不疼。

13474 清胃射干汤

【方源】《金鉴》卷六十七。

【组成】射干 升麻 犀角 麦冬（去心） 元参 大黄 黄芩各一钱 芒消 栀子 竹叶各五钱

【用法】水煎服。

【主治】胃痈。因饮食之毒、七情之火，热聚胃口成痈，中脘穴隐痛微肿，寒热如疟，身皮甲错，无咳嗽，咯吐脓血，脉沉数。

13475 清胃理脾汤

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】平胃散加黄连 黄芩 大黄

【主治】醇酒厚味，湿热为病，痞胀哕呕，不食，吞酸，恶心，嗳气，更兼大便粘臭，小便赤涩，饮食爱冷，口舌生疮。

13476 清骨滋肾汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】地骨皮一两（酒洗） 丹皮五钱 沙参五钱 麦冬五钱（去心） 元参五钱（酒洗） 五味子五分（炒，研） 白术三钱（土炒） 石斛二钱

【用法】水煎服。三十剂，骨蒸解，再服六十剂，自可受孕。

【主治】骨蒸夜热不孕，遍体火焦，口干舌燥，咳嗽吐沫。

13477 清音嚆化丸

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】清音汤（《嵩崖尊生》卷六）。

【组成】 诃子 真阿胶 天门冬（盐水拌炒） 知母各五钱 麦门冬（去心） 白茯苓 黄柏（蜜炙） 当归 生地 熟地各一两 人参三钱 乌梅肉十五个 人乳 牛乳 梨汁各一碗（共熬稠膏）

【用法】 上为细末，和膏，炼蜜为丸，如鸡头子大。每用一丸，仰卧噙化，日用三丸。如改作小丸，每服一钱，诃子煎汤或萝卜汤送下，亦取效。

【主治】 肺气受伤，声音嘶哑，或久嗽咳伤声哑。

13478 清热化痰汤

【方源】《金鉴》卷二十八。

【组成】 人参 白术 茯苓 甘草（炙） 橘红 半夏 麦冬 石菖蒲 枳实 木香 竹茹 黄芩 黄连 南星

【用法】 水煎，加竹沥、生姜汁服。

【主治】 中风痰热，神气不清，舌强难言；及痰火内发，神短忽忽，言语失常，头眩脚软。

【方论选录】 方中用参、苓、术、草以补气，木香、枳实以利气，橘、半、南星以化痰，黄芩、黄连以泻热，菖蒲通心，麦、竹清心，姜汁、竹沥通神明去胃浊，则内生诸病自渐愈矣。

13479 清热地黄汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 生地五钱 黄连一钱半（炒黑） 白芍一钱半（醋炒） 荆芥一钱半（炒黑） 知母一钱半（炒黑） 黄柏一钱半（炒黑） 当归三钱（醋炒） 丹皮一钱半（炒黑） 地榆三钱（炒炭）

【用法】 水煎，去滓，温服。

【主治】 血崩烦热，脉洪涩者。

【方论选录】 血亏伏热，迫血妄行，故烦热不止，血崩特甚焉。生地滋阴壮水，黄连降火清心，黄柏清相火之炽，知母润血气之燥，荆芥散火之伏以理血，白芍敛血之走以存阴，丹皮灰凉血止血，醋当归养血吸血，地榆炭涩血以定血也。水煎温服，使伏火化而血气充，则烦热自退而血无妄行之患，何血崩之不止哉！

13480 清热导痰汤

【方源】《古今医鉴》卷四。

【组成】 黄连（炒）一钱半 枳实（炒）一钱半 瓜蒌仁一钱 南星（制）一钱半 半夏（制）一钱半 陈皮一钱 白茯苓一钱 桔梗一钱 黄芩（炒）一钱 白术（炒）一钱 人参八分 甘草六分

【用法】 上锉一剂。加生姜、大枣，水煎，入竹沥、姜汁各三匙同服。

【主治】 ①《古今医鉴》：憎寒壮热，头目昏沉迷闷，上气喘急，口出涎沫，证类伤寒。此因内伤七情，以致痰迷心窍，神不守舍。②《寿世保元》：中风，痰涎壅盛，不能言语，不省人事，牙关紧急，有火有痰有气，或面赤身热，手足温暖，脉紧盛。痰厥气厥，不省人事者。

13481 清热和胃丸

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】 川连（生）五钱 栀子（生）五钱 竹茹四钱 麦冬（去心）五钱 连翘（去心）四钱 山楂一两 神曲（炒）一两 麦芽（炒）一两 陈皮四钱 枳壳（麸炒）五钱 大黄五钱 甘草（生）三钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每丸重一钱。用滚开水化下。

【主治】 小儿食痢。初面黄腹满，吐利酸臭，后变时时发搐。

13482 清热退翳汤

【方源】《金鉴》五十二。

【组成】 栀子（微炒） 胡黄连 木贼草 赤芍 生地 羚羊角 龙胆草 银柴胡 蝉蜕 甘草（生） 菊花 蒺藜

【用法】 引用灯心，水煎服。

【主治】 眼疳。疳热上攻于眼，痒涩赤烂，眼胞肿疼，白睛生翳，流泪羞明，目不能睁。

13483 清热透肌汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 黑参 石膏 瓜粘子 荆芥 防风 前胡 葛根 杏仁各等分 生甘草减半

【用法】 水煎，热服。

【主治】 ①《张氏医通》：小儿麻疹未透，热甚而咳。②《麻证集成》：发热时寒，邪郁于肌肉，留连不散。

13484 清热解郁汤

【方源】《回春》卷五。

【异名】 清热解郁散（《证治宝鉴》卷十一）。

【组成】 栀子（炒黑）二钱 枳壳（麸炒） 西芎 黄连（炒） 香附（炒）各一钱 陈皮 干姜（炒黑）各五分 苍术（米泔浸）七分 甘草三分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，水煎，热服。服后戒饮半日，滓再煎服。

【主治】 心痛稍久，胃中有郁热。

13485 清热解毒汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 黄连（酒炒） 山栀（炒黑） 连翘 当

归各半钱　芍药　生地黄各一钱　金银花二钱　甘草六分

【用法】 水煎，热服。

【主治】 疮疡焮肿赤痛，形病俱实。

13486　清凉甘露饮

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 犀角　银柴胡　茵陈　石斛　枳壳　麦门冬　甘草　生地　黄芩　知母　枇杷叶各一钱

【用法】 上以水二钟，加淡竹叶、灯心各二十件，煎八分，食后服。

【主治】 茧唇。膏粱所酿，暴怒所结，遂成斯疾，高突坚硬，或损破流血，或虚热生痰，或渴症久作。

13487　清凉华盖饮

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 甘草六钱　生明没药四钱（不去油）丹参四钱　知母四钱

【主治】 肺中腐烂，浸成肺痈，时吐脓血，胸中隐隐作疼，或旁连胁下亦疼者。

【加减】 病剧者，加三七二钱（捣细送服）；脉虚弱者，酌加人参、天冬各数钱。

【方论选录】 甘草为疮家解毒之主药，且其味至甘，得土气最厚，故能生金益肺，凡肺中虚损糜烂，皆能愈之。特其性微温，且有壅滞之意，而调以知母之寒滑，则甘草虽多用无碍，且可借甘草之甘温，以化知母之苦寒，使之滋阴退热，而不伤胃也。丹参性凉清热，色赤活血，其质轻松，其味微辛，故能上达于肺，以宣通脏腑之毒血郁热而消融之。乳香、没药同为疮家之要药，而消肿止疼之力，没药尤胜，故用之以参赞丹参，而痈疮可以内消。三七化瘀解毒之力最优，且化瘀血而不伤新血，其解毒之力，更能佐生肌药以速于生肌，故于病之剧者加之。至脉虚者，其气分不能运化药力，方虽对证无功，又宜助以人参；而犹恐有肺热还伤肺之虑，是以又用天冬，以解其热也。

13488　清凉润燥汤

【方源】《赤水玄珠》卷十二。

【组成】 当归　生地各一钱半　黄连　黄芩　芍药　川芎各一钱　天麻　防风　羌活　荆芥各八分　细辛六分　甘草五分

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《赤水玄珠》：风热血燥，麻木。②《寿世保元》：皮肤瘙痒，头面手足麻。

【加减】 麻甚者，加川乌（炮过）三分，以行经络。

13489　清凉救苦散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】 芙蓉叶　霜桑叶　白蔹　白及　大黄　黄连　黄柏　紫车前　白芷　雄黄　芒消　赤小豆各等分

【用法】 上为细末，用蜜水调敷于肿痛处，频扫之。

【主治】 ①《伤寒全生集》：大头伤寒，三阳俱受邪，并于头面耳目鼻者。②《回春》：头目耳鼻肿痛。

13490　清暑六和汤

【方源】《古今医鉴》卷三。

【组成】 砂仁五分　半夏（汤泡）五分　杏仁（泡）五分　人参（去芦）五分　赤茯苓五分　藿香一钱　扁豆（姜炒）一钱　木瓜一钱　香薷二钱　厚朴（姜炒）二钱　黄连（麸炒）一钱

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】 心脾不调，气不升降，霍乱转筋，呕吐泄泻，寒热交作，痰喘咳嗽，胸膈痞满，头目昏痛，肢体浮肿，嗜卧倦怠，小便赤涩，并阴阳不分，冒暑伏热烦闷，或成痢下；中酒烦渴，畏食。

13491　清暑益气汤

【方源】《脾胃论》卷中。

【组成】 黄芪（汗少减五分）　苍术（泔浸，去皮）　升麻各一钱　人参（去芦）　泽泻　炒曲　橘皮　白术各五分　麦门冬（去心）　当归身　炙甘草各三分　青皮（去白）二分半　黄柏（酒洗，去皮）二分或三分　葛根二分　五味子九枚

【用法】 上㕮咀，都作一服。以水二大盏，煎至一盏，去滓，食远温服。剂之多少，临病斟酌。

【功用】《方剂学》：清热益气，化湿生津。

【主治】 平素气阴俱虚，感受暑湿，身热头痛，口渴自汗，四肢困倦，不思饮食，胸闷身重，便溏尿赤，舌淡苔腻，脉虚弱。

①《脾胃论》：时当长夏，湿热大胜，蒸蒸而炽，人感之，多四肢困倦，精神短少，懒于动作，胸满气促，肢节沉疼，或气高而喘，身热而烦，心下痞痞，小便黄而数，大便溏而频，或痢出黄如糜，或如泔色，或渴或不渴，不思饮食，自汗体重或汗少者，血先病而气不病也，其脉中得洪缓。若血气相搏，必加之以迟。②《内科摘要》：暑热泻痢、疟疾。③《准绳·幼科》：暑邪干卫，身热自汗。④《证书》：痢疾已愈，中气虚弱者，暑令尚在。⑤《幼科铁镜》：伤暑烦热。⑥《金鉴》：暑厥昏

眩，不知人，气虚挟痰上冲心虚者。

【加减】 若中满者，去甘草；咳甚者，去人参；如口干、咽干者，加干葛；如烦乱犹不能止，少加黄连以去之；如气浮心乱，则以朱砂安神丸镇固之，得烦减，勿再服；如心下痞，亦少加黄连；长夏湿土客邪火旺，可以权加苍术、白术、泽泻，上下分消其湿热之气也；湿气大胜，主食不消化，故食减，不知谷味，加炒曲以消之。复加五味子、麦门冬、人参泻火，益肺气，助秋损也；浊气在阳，乱于胸中，则膈满闭塞，大便不通，夏月宜少加酒洗黄柏大苦寒之味，冬月宜加吴茱萸大辛苦热之药以从权，乃随时用药，以泄浊气之下降也；清气在阴者，乃人之脾胃气衰，不能升发阳气，故用升麻、柴胡辛甘之味，以引元气之升，不令飧泄也。暑月阳盛，则于正药中加青皮、陈皮、益智、黄柏，散寒气、泄阴火之上逆；或以消痞丸合滋肾丸；滋肾丸、黄柏、知母，微加肉桂，三味是也；或更以黄连别作丸。二药七八十丸，空心约宿食消尽服之。待少时，以美食压之，不令胃中停留也。如食已心下痞，别服橘皮枳术丸；如脉弦、四肢满闭，便难而心下痞，加甘草、黄连、柴胡；如大便秘燥，心下痞，加黄连、桃仁，少加大黄、当归身；如心下夯闷者，加白芍药、黄连；如心下痞腹胀，加五味子、白芍药、缩砂仁；如天寒，少加干姜或中桂；如心下痞，中寒者，加附子、黄连；如心下痞、呕逆者，加黄连、生姜、橘皮；如冬月，不加黄连，少入丁香、藿香叶；如口干咽干，加五味子、干葛；如胸中满闷郁郁然，加橘红、青皮、木香少许；如食少不饥，加炒曲；如食不下，乃胸中、胃上有寒，或气涩滞，加青皮、陈皮、木香，此三味为定法；如冬天，加益智仁、草豆蔻仁；如夏月少用，更加黄连；如秋月气涩滞、食不下，更加槟榔、草豆蔻仁、缩砂仁，或少加白豆蔻仁；如三春之月，食不下，亦用青皮少、陈皮多，更加风药以退其寒复其上；如初春犹寒，更少加辛热以补春气之不足，以为风药之佐，益智、草豆蔻皆可也；如胸中窒塞、或气闭闷乱者，肺气涩滞而不行，宜破滞气，青皮、陈皮，少加木香、槟榔；如冬月，加吴茱萸、人参；丹田有热者，必尻臀冷、前阴间冷汗，两丸冷，是邪气乘其本而正气走于经脉中也。遇寒则必作阴阴而痛，以此辨丹田中伏火也，加黄柏、生地黄，勿误作寒证治之；如多唾、或唾白沫者，胃口上停寒也，加益智仁；如腹中气上逆者，是冲脉逆也，加黄柏三分，黄连一分半以泄之；如腹中或周身间有刺痛，皆血涩不足，加当归身；如哕，加五味子多、益智少；如脉涩，觉气涩滞者，加当归身、天门冬、木香、青皮、陈皮，有寒者，加桂枝、黄芪；如秋、冬天气寒凉而腹痛者，加半夏或益智或草豆蔻之类；如胁下急或痛甚，俱加柴胡、甘草；如头痛有痰、沉重懒倦者，乃太阴痰厥头痛，加半夏五分、生姜二分或三分；气犹短促者，为膈上及表间有寒所遏，当引阳气上伸，加羌活、独活、藁本最少，升麻多，柴胡次之，黄耆加倍；如脚膝痿软，行步乏力或疼痛，乃肾肝中伏湿热，少加黄柏，空心服之；不愈，更增黄柏，加汉防己五分，则脚膝中气力如故也。

【方论选录】 ①《脾胃论》：《内经》曰：阳气者，卫外而为固也。炅则气泄。今暑邪干卫，故身热自汗，以黄耆甘温补之为君。人参、橘皮、当归、甘草，甘微温，补中益气为臣。苍术、白术、泽泻，渗利而除湿；升麻、葛根，甘苦平，善解肌热，又以风胜湿也；湿胜则食不消而作痞满，故炒曲甘辛、青皮辛温，消食快气；肾恶躁，急食辛以润之，故以黄柏苦辛寒，借甘味泻热补水；虚者滋其化源，以人参、五味子、麦门冬，酸甘微寒，救天暑之伤于庚金为佐。②《医方集解》：此手足太阴足阳明药也。热伤气，参、耆益气而固表；湿伤脾，二术燥湿而强脾；火盛则金病而水衰，故用麦冬，五味以保肺而生津，用黄柏以泻热而滋火；青皮平肝而破滞；当归养血而和阴；神曲化食而消积；升、葛解肌热而升清；泽泻泻湿热而降浊；陈皮理气；甘草和中。合之以益气强脾，除湿清热也。

【备考】 本方改为丸剂，名“清暑益气丸”（见《饲鹤亭集方》）。

13492 清暑益气汤

【方源】 方出《温热经纬》卷四，名见《中医方剂学讲义》。

【组成】 西洋参 石斛 麦冬 黄连 竹叶 荷秆 知母 甘草 粳米 西瓜翠衣

【功用】 清暑热，益元气。

【主治】 ①《温热经纬》：湿热证，湿热伤气，四肢困倦，精神减少，身热气高，心烦溺黄，口渴自汗，脉虚者。②《方剂学讲义》：暑热伤气，汗多烦渴，脉大而虚。

【方论选录】 《中医方剂学讲义》：方中黄连、竹叶、荷梗、西瓜翠衣清热解暑，西洋参、麦冬、石斛、知母、粳米、甘草益气生津，合而用之，具有清暑热、益元气之功，方名清暑益气汤，即本于此。

13493 清脾凉血汤

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】荆芥 防风 赤芍 黑参 陈皮 蝉蜕 苍术（炒） 白鲜皮各一钱 连翘（去心） 生大黄（酒洗）各一钱五分 厚朴（姜炒） 甘草（生）各五分

【用法】上加竹叶三十片，水煎，食远服。

【主治】脾胃血热，致患椒疮、粟疮，生眼胞之内，椒疮则赤坚而难消，粟疮则黄软而易散。

13494 清膈化痰丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】黄连一两 黄芩一两 黄柏半两 山栀半两 香附一两半 苍术二两

【用法】上为末，蒸饼为丸，如绿豆大。白汤送下。

【功用】《医统》：清热去湿利痰。

【主治】①《丹溪心法》：痰证。②《医统》：上焦痰火壅盛，咳嗽烦热，口渴，胸中否闷。

【备考】《医统》本方用法：上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

13495 清瘟败毒饮

【方源】《疫疹一得》卷下。

【组成】生石膏大剂六两至八两，中剂二两至四两，小剂八钱至一两二钱 小生地大剂六钱至一两，中剂三钱至五钱，小剂二钱至四钱 乌犀角大剂六钱至八钱，中剂三钱至四钱，小剂二钱至四钱 真川连大剂四钱至六钱，中剂二钱至四钱，小剂一钱至一钱半 生栀子 桔梗 黄芩 知母 赤芍 玄参 连翘 竹叶 甘草 丹皮

【用法】疫证初起，恶寒发热，头痛如劈，烦躁谵妄，身热肢冷，舌刺唇焦，上呕下泄，六脉沉细而数，即用大剂；沉而数者，用中剂；浮大而数者，用小剂。如斑一出，即用大青叶，量加升麻四五分，引毒外透。

【功用】解外化内，升清降浊。

【主治】一切火热，表里俱盛，狂躁烦心，口干咽痛，大热干呕，错语不眠，吐血衄血，热盛发斑。现代多用于乙型脑炎、钩端螺旋体病，败血症等。

【加减】头痛倾侧，加石膏、玄参、甘菊花；骨节烦痛，腰如被杖，加石膏、玄参、黄柏；遍体炎炎，加石膏、生地、川连、黄芩、丹皮；静躁不常，加石膏、川连、犀角、丹皮、黄芩；火扰不寐，加石膏、犀角、琥珀、川连；周身如冰，加石膏、川连、犀角、黄柏、丹皮；四肢逆冷，加石膏；筋抽脉惕，加石膏、丹皮、胆草；大渴不已，加石膏、花粉；胃热不食，加石膏、枳壳；胸膈遏郁，加川连、枳壳、桔梗、瓜蒌霜；昏闷无声，加石膏、川连、犀角、黄芩、羚羊角、桑皮；筋肉瞤动，加生地、石膏、黄柏、玄参；冷气上升，加石膏、生地、丹皮、川连、犀角、胆草；口秽喷人，加石膏、川连、犀角；满口如霜，加石膏、川连、连翘、犀角、黄柏、生地；咽喉肿痛，加石膏、桔梗、玄参、牛子、射干、山豆根；嘴唇燃肿，加石膏、川连、连翘、天花粉；脸上燎泡，加石膏、生地、银花、板蓝根、紫花地丁、马勃、归尾、丹皮、玄参；大头天行，加石膏、归尾、板蓝根、马勃、紫花地丁、银花、玄参、僵蚕、生大黄；痄腮，加石膏、归尾、银花、玄参、紫花地丁、丹皮、马勃、连翘、板蓝根；颈颔肿痛，加石膏、桔梗、牛蒡子、夏枯草、紫花地丁、玄参、连翘、银花、山豆根；耳后痛硬，加石膏、连翘、生地、天花粉、紫花地丁、丹皮、银花、板蓝根、玄参；耳聋口苦，加生地、玄参、柴胡、黄柏；嗜舌弄舌，加石膏、川连、犀角、黄柏、玄参；红丝绕目，加菊花、红花、蝉衣、谷精草、归尾；头汗如涌，加石膏、玄参；咬牙，加石膏、生地、丹皮、龙胆草、栀子；鼻血泉涌，加石膏、生地、黄连、羚羊角、桑皮（生用）、玄参、棕炭、黄芩；舌上珍珠，加石膏、川连、犀角、连翘、净银花、玄参、花粉；舌如铁甲，加石膏、犀角、川连、知母、天花粉、连翘、玄参、黄柏；舌丁，加石膏、川连、犀角、连翘、银花；舌长，以片脑为末涂舌上，应手而缩，甚者必须五钱而愈；舌衄，加石膏、丹皮、生地、川连、犀角、栀子、败棕炭；齿衄，加石膏、黄柏、生地、丹皮、栀子、犀角、川连、玄参、黄芩；谵语，加石膏、川连、犀角、丹皮、栀子、黄柏、龙胆草；呃逆，加石膏、柿蒂、银杏、竹茹、羚羊角、枇杷叶，不止，用四磨饮一钱，调服本方即止；呕吐，加石膏、川连、滑石、甘草、伏龙肝；似痢非痢，加石膏、川连、滑石、猪苓、泽泻、木通；热注大肠，加同上；大便不通，加川军，另用蜜煎导法；大便下血，加生地、槐花、棕炭、侧柏叶；小便短缩如油，加滑石、泽泻、猪苓、木通、通草、萹蓄；小便溺血，加生地、桃仁、滑石、茅根、川牛膝、琥珀、棕炭；发狂，加石膏、犀角、川连、栀子、丹皮、川黄柏；痰中带血，加石膏、黄芩、棕炭、生桑皮、羚羊角、生地、瓜蒌霜；遗尿，加石膏、川连、犀角、滑石；喘嗽，加桑皮、黄芩、石膏、羚羊角；发黄，加石

膏、滑石、栀子、茵陈、猪苓、泽泻、木通；循衣摸床，加石膏、川连、犀角、丹皮、栀子、胆草；狐惑，加石膏、犀角、苦参、乌梅、槐子；战汗，战后汗出，脉静身凉不用药，有余热即服本方小剂，一药而安；瘟毒发疮，加石膏、生地、川连、紫花地丁、金银花，上加升麻，下加川牛膝，胸加枳壳、蒲公英，背加威灵仙，出头者加皂刺。

【方论选录】 ①《疫疹一得》：此十二经泄火之药也。斑疹虽出于胃，亦诸经之火有以助之。重用石膏直入胃经，使其敷布于十二经，退其淫热；佐以黄连、犀角、黄芩泄心肺火于上焦，丹皮、栀子、赤芍泄肝经之火，连翘、玄参解散浮游之火，生地、知母抑阳扶阴，泄其亢甚之火，而救欲绝之水，桔梗、竹叶载药上行，使以甘草和胃也。此皆大寒解毒之剂，故重用石膏，先平甚者，而诸经之火自无不安矣。②《历代名医良方注释》：本方为大寒解毒之剂。方中综合白虎、犀角地黄、黄连解毒三方加减，合为一方。白虎汤清阳明经大热，犀角地黄汤清营凉血，黄连解毒汤泻火解毒，加竹叶清心除烦，桔梗、连翘载药上行。共奏清热解毒，凉血救阴之功。

【临证举例】 ①乙型脑炎 《湖南中医学院学报》1988；3:55：用本方共治疗78例乙型脑炎，其中轻型17例，中型28例，重型22例，暴发型11例。方法：卫、气分证明显者，本方去犀角，牡丹皮，加金银花、大青叶等，并重用连翘、竹叶；营、血分证为主者，去连翘、竹叶，加麦冬、羚羊角、钩藤、全蝎等，平均用药6.8剂，并配用安宫牛黄丸或至宝丹等。结果：痊愈69例，好转5例，死亡4例，总有效率为94.9%。②钩端螺旋体病《广西中医药》1987；3:6：用本方加减治疗68例钩端螺旋体病。其中流感伤寒型62例，黄疸出血型3例，脑膜脑炎型2例，肺出血型1例。方用：水牛角、生石膏、生地黄、土茯苓、薏仁各30克、黄连6克、知母、黄芩、栀子、牡丹皮、赤芍各10克，每日一剂，水煎，分2次服，病危重者每日2～3剂。湿热并重，加白蔻仁；湿重于热，加茵陈、金钱草；热入营血，加大黄、藕节、血余炭；热入心包，肝风内动，加安宫牛黄丸、紫雪丹；高热烦躁，加青蒿、花粉；恶心呕吐，加藿香、白蔻。危重者，辅以西药抢救治疗。结果：68例中以服基本方为主，治愈者65例，另外3例经中西医结合治疗亦获痊愈。

【备考】 ①《增订伤暑全书》本方用法：先煮石膏数十沸，后下诸药，犀角磨汁和服。②方中生栀子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、竹叶、甘草、丹皮用量原缺。

13496 清聪化痰丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】 橘红（盐水洗，去白） 赤茯苓（去皮） 蔓荆子各一两 枯芩（酒炒）八钱 黄连（酒炒） 白芍（酒浸，煨） 生地黄（酒洗） 柴胡 半夏（姜汁炒）各七分 人参六钱 青皮（醋炒）五钱 生甘草四钱

【用法】 上为细末，葱汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服百丸，晚用生姜汤、茶清任意送下。

【主治】 饮食厚味，夹怒气以动肝胃之火，而致耳聋耳鸣，壅闭不闻声音。

13497 清燥救肺汤

【方源】《法律》卷四。

【异名】 清燥汤（《伤寒大白》卷四）。

【组成】 桑叶（去枝梗）三钱 石膏（煅）二钱五分 甘草一钱 人参七分 胡麻仁（炒、研）一钱 真阿胶八分 麦门冬（去心）一钱二分 杏仁（泡去皮尖，炒黄）七分 枇杷叶一片（刷去毛，蜜涂炙黄）

【用法】 上以水一碗，煎六分，频频二三次滚热服。

【主治】 诸气膹郁，诸痿喘呕。

【加减】 痰多，加贝母、瓜蒌；血枯，加生地黄；热甚，加犀角、羚羊角或牛黄。

【方论选录】 ①《医门法律》：桑叶经霜者，得金气而柔润不凋，取之为君；石膏禀清肃之气，极清肺热；甘草和胃生金；人参生胃之津，养肺之气。命名清燥救肺汤，大约以胃气为主，胃土为肺金之母也。②《金鉴》：《经》云，损其肺者益其气。肺主诸气故也。然火与元气不两立，故用人参、甘草甘温而补气，气壮火自消，是用少火生气之法也。火燥膹郁于肺，非佐甘寒多液之品不足以滋肺燥，而肺气反为壮火所食益助其燥矣。故佐以石膏、麦冬、桑叶、阿胶、胡麻仁辈使清肃令行，而壮火亦从气化也。《经》曰：肺苦气上逆，急食苦以降之。故又佐以杏仁、枇杷叶之苦以降气，气降火亦降，而制节有权，气行则不郁，诸痿喘呕自除矣。要知诸气膹郁则肺气必大虚，若泥于肺热伤肺之说而不用人参，郁必不开而火愈炽，皮聚毛落，喘咳不休而死矣。此名救肺，凉而能补之谓也。若谓实火可泻，而久服芩、连，苦从火化，亡可立待耳。③《成方便读》：此必六淫火邪，外伤于肺，而肺之津液素亏，为火刑逼，是以见诸气膹

郁，诸痿喘呕之象。然外来之火，非徒用清降可愈，《经》有火郁发之之说，故以桑叶之轻宣肌表者，以解外来之邪，且此物得金气而柔润不凋，取之为君；石膏甘寒色白，直清肺部之火，禀西方清肃之气，以治其主病；肺与大肠为表里，火逼津枯，肺燥则大肠亦燥，故以杏仁、麻仁降肺而润肠；阿胶、麦冬以保肺之津液；人参、甘草以补肺之母气；枇杷叶苦平降气，除热消痰，使金令得以下行，则膜郁喘呕之证皆可痊矣。

13498 清肝明目消障汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】 川羌活（九节者，中曲者不用） 真川芎 防风 赤芍（酒炒） 黄连 青葙子 白茯苓 九制大黄 柴胡各四分 生地一钱 全当归 草决明 车前子 苍术 蔓荆子各六分 甘草三分 蜜蒙花（蜜水拌晒，酒炒） 灯芯三十寸

【用法】 上以水二钟，煎八分，食后热服。

【主治】 风热目病，红肿云翳，缠绵三五月不退。

13499 清肺消毒化痰汤

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】 牛蒡子 防风 荆芥穗 贝母各五分 连翘 黄芩 前胡 茯苓各七分 桔梗 枳壳各一钱 甘草二分

【用法】 上以水一钟，煎至五分，分作十余次徐服之。

【主治】 疹后喘嗽，声音不清，不思饮食，眼目不清，唇口干燥。

13500 清痰养志宽气丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 胆星 川连各五钱 茯苓 贝母（炒） 半夏（炮） 枳实（炒） 远志（去心）各一两 橘红七钱

【用法】 上为末，生姜汁为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】 男子郁气，痰涎壅滞，情志不快。

13501 清金润燥天门冬丸

【方源】《法律》卷五。

【组成】 天门冬（去心，焙）一两半 百合 前胡 贝母（煨） 半夏（汤洗去滑） 桔梗 桑白皮 防己 紫菀 赤茯苓 生地黄 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄，研如膏）各七钱半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，一日三次，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】 肺脏壅热咳嗽，痰唾稠粘。

13502 清络饮加杏仁薏仁滑石汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 清络饮 杏仁二钱 滑石末二钱 薏仁二钱

【主治】 暑瘵。寒热咯血，舌苔白，不渴。

【方论选录】 寒热，热伤于表也；舌白不渴，湿伤于里也；皆在气分，而又吐血，是表里气血俱病。此证纯清则碍虚，纯补则碍邪。故以清络饮清血络中之热，加杏仁利气，薏仁、滑石利在里之湿，冀邪退气宁而血可止也。

13503 清络饮加甘桔甜杏仁麦冬汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 清络饮 甘草一钱 桔梗二钱 甜杏仁二钱 麦冬三钱

【主治】 手太阴暑温，但咳无痰，咳声清高者。

【方论选录】 咳而无痰，偏于火而兼湿，用清络饮清肺络中无形之热，加甘、桔开提，甜杏仁利肺而不伤气，麦冬、知母保肺阴而制火也。

13504 清宫汤去莲心麦冬加银花赤小豆皮方

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 犀角一钱 连翘心三钱 元参心二钱 竹叶心二钱 银花二钱 赤小豆皮三钱

【用法】 煎汤送服至宝丹或紫雪丹。

【主治】 湿温邪入心包，神昏肢逆。

【方论选录】 湿温着于经络，多身痛身热之候。以清宫汤清包中之热邪，加银花、赤豆以清湿中之热，而又能直入手厥阴也。至宝丹去秽浊复神明，若无，以紫雪代之。

13505 添精丹

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】 熟地 山药 芡实 麦冬各五钱 五味五分

【主治】 肾虚梦遗。

13506 添精补髓丹

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】 赤石脂二钱 茯苓一两 山药三两 苁蓉四两 巴戟一两（去心） 杜仲三两 牛膝一两（酒浸） 五味一两 泽泻一两 菟丝三两 熟地 山茱肉各一两 晚蚕蛾二两（如无，以鹿茸代） 山甲七钱（酒炙） 地龙一两（去土） 柏子仁一两 枸杞 故纸各二两 川椒一两（去目） 厚朴一两 人参二两 白术二两 仙灵脾一两半（羊脂炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。

【功用】 补虚损。

【加减】 腰痛，加小茴香。

13507 淋浴九仙散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】附子（炮裂，去皮脐） 蛇床子（去土） 石菖蒲 紫稍花 远志（去心） 雄蚕蛾各一两 浮萍草二两 丁香半两 韶脑半两（另研）

【用法】上为粗末。每用水二碗，药末一两，葱白一茎（细切），煎至一碗半，乘热淋洗，拭干，仍避风冷。十年痿者十次见效。

【功用】助阳退阴。

【主治】阴痿，阳事不举。

13508 混元胎丹

【方源】《洪氏集验方》卷一。

【组成】首儿衣（二八月者不用，收时连带中元血。用长流水净洗，控干，入瓷瓶中，下无灰酒三大盏，脑子、麝香随力下之，多至一钱或半字，以纸封瓶口，下用文武火煅，候酒将尽取出，再入酒三盏，依前煅，却用竹篦或金银篦不住搅，以搅烂糜似粥样，待冷，取入砂盆内，细研为粉，别入外料） 人参二两 茯苓二两 乳香半两 朱砂半两（水飞过，晾干，取净） 山药四两（上为细末，入所煮药内，如干，更用原煅酒，旋旋添）

【用法】上拌匀一处，搅搜为丸，如梧桐子大，慢火焙干。每日空心五十粒，加至一百粒，用温酒、盐汤送下。良久，用甜淡饮食饱压，逐日荤味中减少五味。服至五七日，微觉小腹连腰沉重，不须疑虑，乃是药力攻，元气相补助如此。

【功用】补漏壮气，固神益髓，通神明，延寿命。

【主治】久无嗣息者。

13509 淮南王枕中丸

【方源】《医心方》卷十三引《录验方》。

【组成】石斛 巴戟天 桑螵蛸 杜仲各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。酒服十丸，每日二次。

【功用】强阴气，补诸虚。

【主治】阴气衰，腰背痛，两胫悄疼，小便多沥，失精，精自出，囊下湿痒。

13510 淮南八公石斛万病散

【方源】《千金》卷七。

【异名】淮南八公石斛散（《千金翼》卷十五）、石斛万病散（《普济方》卷一八五）。

【组成】防风 茯苓 菊花 细辛 蜀椒 干姜 云母 苁蓉 人参 干地黄 附子 石斛 杜仲 远志 菟丝子 天雄 草薢 桂心 牛膝 蛇床子 白术 萆薢 巴戟 菖蒲 续断 山茱萸各一两 五味子半两

【用法】上为末。酒服方寸匕，每日二次。

【主治】风湿痹疼，腰脚不遂。

13511 淡渗汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】苍术一钱五分 厚朴（姜水炒）一钱 生白芍一钱三分 甘草一钱二分 扁豆三钱 赤茯苓 建泽泻 淮木通 猪苓 宣木瓜各一钱 陈皮八分 川萆薢四钱 车前子八分 广木香三分（煨熟）

【用法】每味拣道地土料，称足分量，多用水煎服。一刻即愈。

【主治】新病水泄，小便短少而黄，或口渴腹痛，不拘男妇大小。

【加减】如受寒邪，身痛发热，加桂枝一钱；头痛，加白芷、川芎各一钱，北细辛二三分；虚寒腹痛喜按者，加砂仁、真藿香各八分；夹食者，加神曲、麦芽各（炒）八分；舌黄、口渴喜冷者，加黄芩一二钱，生石膏三钱，或加黑山栀八分。

13512 淡竹叶汤

【方源】《得效》卷八。

【组成】淡竹叶 甘草 灯心 枣子 乌豆 车前子

【用法】上不拘多少，以水浓煎汤，代熟水服。

【主治】①《得效》：诸淋。②《普济方》：砂、血淋。

13513 淡竹叶汤

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】淡竹叶七片 黄芩 知母 麦冬各一钱 茯苓二钱

【用法】水煎服。

【主治】子烦。孕妇火盛内热而烦者。

13514 淡竹茹汤

【方源】《三因》卷九。

【异名】竹茹汤（《普济方》卷一一九）。

【组成】麦门冬（去心） 小麦各二两半 甘草（炙）一两 人参 白茯苓各一两半 半夏（汤洗七次）二两

【用法】上锉散。每服四大钱，以水二盏，加生姜七片，大枣三枚，淡竹茹一块（如指大），煎七分，去滓，食前服。

【主治】①《三因》：心虚烦闷，头疼短气，内热不解，心中闷乱，及产后心虚惊悸，烦闷欲绝。②《济阴纲目》：妊妇心虚惊悸，脏躁，悲伤不止。

13515 渗肠丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】附子（炮，去皮脐） 阿胶（蛤粉炒） 白术 诃子（煨，去核） 白龙骨 赤石脂 干姜（炮）各等分

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心、食前温米饮送下。

【主治】泄泻不止，久痢不愈，不问赤白脓血。

13516 渗脐散

【方源】《金鉴》卷五十。

【组成】枯矾 龙骨（煅）各二钱 麝香少许

【用法】上研细末。干撒脐中。

【主治】小儿脐湿。

13517 渗湿汤

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】厚朴二两 丁香 甘草 附子各一两 砂仁 干姜 肉果（面裹，煨透） 高良姜各八钱

【用法】上锉碎。每用五钱，加生姜三片，大枣三枚，水一盏，煎七分，去滓，空心服。

【功用】暖脾胃，辟风寒，祛瘴疫，除风湿。

【主治】脾胃虚寒，四肢困倦，骨节酸疼，头晕鼻塞，恶风，多虚汗，痰饮不清，胸满气促，心腹胀闷，两胁刺痛，霍乱吐泻。

13518 渗湿汤

【方源】《局方》卷二（吴直阁增诸家名方）。

【异名】七味渗湿汤（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】苍术 白术 甘草（炙）各一两 茯苓（去皮） 干姜（煨）各二两 橘红 丁香各一分

【用法】上㕮咀。每服四钱，以水一盏半，加生姜三片，大枣一枚，煎七分，食前温服。

【主治】因坐卧湿处，或因雨露所袭，或因汗出衣衾冷湿，久久得之，寒湿所伤，身重腰冷，如坐水中，小便或涩或利，大便溏泄；或腰下重疼，两脚疼痛，腰膝或肿或不肿，小便利，反不渴者。

【备考】《玉案》无干姜，有姜黄。

13519 渗湿汤

【方源】《济生》卷三。

【组成】白术二两 人参半两 干姜（炮） 白芍药 附子（炮，去皮脐） 白茯苓（去皮） 桂枝（不见火） 甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，以水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】坐卧湿地，或为雨露所袭，身重脚弱，关节重疼，发热恶寒，或多汗恶风，或腿膝浮肿，或小便不利，大便溏泄。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作"胜湿汤"。

13520 渗湿汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】苍术（米泔制） 白术（去芦） 茯苓各一钱半 陈皮一钱 泽泻一钱 猪苓一钱 香附 抚芎 砂仁 厚朴（去皮）各七分 甘草三分

【用法】上锉剂。加生姜一片，灯草一团，水煎服。

【主治】①《回春》：一切湿症。②《寿世保元》：中湿而肿胀泄泻者。

【加减】脾虚发肿满，气急喘嗽，去白术、甘草，加腹皮、枳壳、木香、苏子、桑皮、萝卜子；面白浮肿，去抚芎、泽泻、厚朴、香附，加山药、炒芍药、倍苍术；泻不止，加肉豆蔻、诃子、乌梅、干姜；呕哕，去厚朴、香附、抚芎，加炒山药、乌梅、炒米，甚不止，加煨干姜；湿症身体重痛，手足麻木酸软肿痛，或枯细痿弱，筋脉拘挛，去香附、抚芎、厚朴、猪苓、泽泻、加当归、生地、芍药、木香、乳香、薄桂、牛膝、酒芩、羌活、防风。

13521 渗湿汤

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】胃苓汤加香附 抚芎 砂仁 黄连

【主治】湿热生痰昏冒。

13522 渗湿消痰饮

【方源】《济阴纲目》卷三。

【组成】白术 苍术（炒） 半夏（姜汤泡七次） 橘红 白茯苓 白芷 香附各一钱 甘草（炙）五分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】湿热痰积，渗入膀胱，白带不止。

【加减】有热，加黄芩；血虚，加芎、归；气虚，加参、耆；久不愈，加升麻、柴胡。

13523 渗湿清脾散

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】石膏一钱 苍术 白芷 白芍 黄芩 黄连 栀子 羌活 防风 枳壳各八分 荆芥 甘草各五分 滑石（水飞）三钱

【用法】水煎，调入滑石末，食远服。

【主治】脾胃湿热，上下眼眶常赤烂者。

13524 羚羊饮

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】羚羊角（镑） 一钱五分 知母 黄芩

黑参 桔梗 柴胡 栀子（炒）各一钱 茺蔚子二钱

【用法】 上为粗末。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 肝肺之热，冲于眼内，致生赤膜下垂。初患之时，气轮上边起赤膜一片，垂至风轮，下覆瞳仁，泪流痛痒。

13525 羚羊角丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 羚羊角屑一两 石决明二分（捣，细研，水飞过） 决明子三分 独活半两 防风半两（去芦头） 蔓荆子半两 甘菊花半两 吴蓝子半两 车前子三分 甘草半两（炙微赤，锉） 犀角屑三分 栀子仁半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后温浆水送下。

【主治】 绿风内障。肝肺风热壅滞，见红白黑花，头额偏疼，渐渐昏暗不见物者。

13526 羚羊角汤

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】 羚羊角半分 蝉壳半分 茯神（去心） 麦门冬 柴胡 地骨皮各一分 黄芩 甘草（炒） 各半分

【用法】 上锉散。每服一钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 小儿诸惊壮热。

【备考】 方中羚羊角、黄芩用量原缺，前者据《普济方》补，后者据《婴童百问》补。

13527 羚羊角汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 羚羊角0.6克 防风6克 知母 元参 茯苓 酒黄芩 车前子 夏枯草各9克 五味子3克

【功用】 清肝祛风，除湿降浊。

【主治】 绿风内障。肝经风热挟湿邪上攻，头痛目痛剧烈，白睛混赤，瞳神散大色绿，按之石硬，视力锐减，或兼恶心呕吐者。

【加减】 若兼恶心呕吐，可加竹茹9克、清半夏6克，降逆止呕。

【方论选录】 方中羚羊角、酒黄芩、夏枯草清肝泻火，羚羊角且有熄风之力，酒黄芩且有燥湿之能；茯苓、车前子降浊除湿，导湿热下行；防风驱散风邪；知母、元参、五味子滋肾阴以降虚火，五味子酸敛且有缩瞳之能。

【临证举例】 绿风内障 范某某，男，34岁，工人。1972年11月28日初诊：左目胀痛，连及患侧头痛2天。6天前开始感觉左眼发胀，视物尚可，没经治疗。前天晚上因他事不从其心，饮酒后蒙头便睡，深夜便觉头痛，左目胀痛，视灯光如火团，室内之物不能看清，今日更重，头痛如裂，视物昏蒙。检查：视力，右眼1.5，左眼1米指数，胞睑浮肿，白睛混赤，抱轮尤重，青睛混浊，如蒙一层蒸气，瞳神散大，色昏暗淡绿，按之目珠坚硬。此为绿风内障，因肝经风热挟湿邪上攻而成，治以羚羊角汤（未点缩瞳剂），服药2剂。11月30日复诊：头痛眼痛大减，白睛红赤减退，青睛周围已现青润，瞳神稍敛，视力0.3，又服上方2剂。12月3日三诊：气、风二轮已复如常，瞳神稍大，色暗，按之目珠较硬，仍视物不清。以平肝潜阳汤服至12月18日，一切恢复正常，视力，双眼1.5。嘱其常服明目地黄丸，禁忌饮酒。观察1年，未见复发。

13528 羚羊角散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 羚羊角 升麻 细辛各等分 甘草半之

【用法】 上为细末。一半为散；一半炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，以米泔水煎羚羊角散送下，食后临卧服。

【主治】 ①《保命集》：冰翳久不去者。②《审视瑶函》：鱼鳞障，色虽白而不光亮，状常斜歪者。

13529 羚羊角散

【方源】《济生》卷七。

【异名】 羚羊角汤（《东医宝鉴·杂病篇》卷十）、羚羊散（《寿世保元》卷七）。

【组成】 羚羊角（镑） 川独活（去芦） 酸枣仁（炒，去壳） 五加皮（去木）各半钱 薏苡仁（炒） 防风（去芦） 当归（去芦，酒浸） 川芎 茯神 杏仁（去皮尖）各四分 木香（不见火） 甘草（炙）各二分半

【用法】 上㕮咀。每服四钱，以水一盏，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《济生》：妊娠中风，头项强直，筋脉挛急，言语蹇涩，痰涎不消，或发搐搦，不省人事，名曰子痫。②《医方集解》：妊娠中风，涎潮忽仆，目吊口噤，角弓反张，名子痫。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足厥阴药也。羚羊（角）之辛凉以平肝火，防风、独活之辛温以散肝邪，茯神、酸枣以宁神，当归、川芎以活血，杏仁、木香以利气，薏仁、甘草以调脾也。②《医林纂要》：子痫作于猝然，旧有风湿，溢于冲任，

因孕而动，肝血养胎。血热风生，时或动其经血，而风涎猝作，非中风也。羚羊角苦咸寒，补心宁神，宣布血脉，搜剔经络，无坚不软，无瘀不行，兼平君相之火，降已亢之阳，除妄作之热，故可以治痫而安胎也。独活、防风以去风湿，当归、川芎以滋血补肝，茯神、酸枣仁以收散宁心，杏仁降逆气，破坚结，润心肺，薏苡仁甘淡清肺和脾，缓肝舒筋，能除血脉经络中风湿，木香行肝气之滞，甘草缓肝急，加姜煎，姜亦能补肝行瘀。总之，当归、川芎以补肝血而行之，茯神、枣仁以安心神而敛之，防风、独活以达其风，杏仁、木香以顺其气，君以羚羊角以穷极隐之风湿无不搜而逐之，且清宫除道以安心主也，加用薏苡、甘草以和其脾，则以培木之本也。

【临证举例】 子痫 《赤水玄珠》：一妊妇因怒，急仆地，良久而苏，吐痰发搐，口噤项强，用本方渐愈。

13530 羚羊角散

【方源】《医统》卷十一。

【组成】 羚羊角 薄荷 附子 独活 白芍药 防风 川芎各等分

【用法】 上以水一盏半，加生姜三片，煎至七分服。

【主治】 筋痹，肢节束痛。

【方论选录】《法律》：按此方治筋痹之义，美则美矣，未尽善也。以七味各用等分，漫无君、臣、佐、使之法耳。盖筋痹必以舒筋为主，宜倍用羚羊角为君；筋痹必因血不荣养，宜以白芍、川芎，更加当归为臣；然恐羚羊（角）性寒，但能舒筋，不能开痹，必少用附子之辛热为反佐；更少用薄荷、独活、防风，入风寒湿队中，而为之使可也。用方者必须识此。

13531 羚羊角散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 羚羊角 防风 麦冬 玄参 知母 黄芩 牛子各八分 甘草二分

【用法】 上以水二钟，加淡竹叶十片，煎至六分，食远服。

【功用】 清热凉血。

【主治】 小儿葡萄疫初起，因感受四时不正之气，郁于皮肤不散，结成大小青紫斑点，色若葡萄，发在遍体头面。

13532 羚羊角散

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】 半夏（制七次） 当归身 川芎 白芷 防风 明天麻 枳壳 甘草各二钱半 茯神 羚羊角（锉细末）各一两

【用法】 上为粗末。每服四钱，加生姜三片，水煎，去滓服。

【主治】 视物颠倒。

13533 羚羊角散

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】 羚角二两 独活八钱 当归二两 白芍（酒炒）一两半 生地四两 肉桂四钱 川芎一钱 防风八钱

【用法】 上为散。每服三钱，以竹沥、生姜汁各半调下。

【主治】 筋痹，肢节束痛，脉弦数者。

【方论选录】 血不荣筋，筋失所养，风热乘间袭入厥阴，故成筋痹，而疼痛如束焉。羚角清厥阴之热，生地滋厥阴之阴，当归养血荣筋，白芍敛阴舒筋，川芎行血中之滞气以却痹，肉桂搜厥阴之淫气以平肝，防风开腠理，独活祛伏风，竹沥、姜汁以活络行经也。俾风热两解，则经气清和而筋痹自舒，束痛自止。此散风热以舒筋络之剂，为筋痹肢节束痛之专方。

13534 羚羊角散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 生地五两 羌活一两半 羚羊角八钱 防风一两半 池菊三两（去蒂） 白术一两半（炒） 川贝二两（去心） 茯神二两（去木） 钩藤五两

【用法】 上为散。每服五钱，水煎，去滓温服。

【主治】 孕妇中风，脉浮数者。

【方论选录】 妊娠中风，遏热侵犯厥阴，木火内煽，而神明失指，故昏仆不知人，胎亦因之难安焉。生地滋阴壮水以护胎息，羌活升阳开泄以散风邪，羚羊角清厥阴之火，白池菊清伏匿之热，防风行气于元腑，白术健脾以生血，川贝清心化热痰，钩藤抑肝舒筋络，茯神渗湿以安神明也。为散煎服，使风邪外解，则遏热顿清，而肝胃无相乘之患，神明有主宰之权，何虑昏仆不知，胎孕不安乎？

13535 羚羊三黄汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 羚羊角 1～1.5 克 生地 12 克 生黄柏 9 克 黄连 6 克 黑栀子 12 克 白芍 9 克 金银花 18 克 丹皮 9 克 陈皮 6 白茅根 15 克 甘草 2 克 阿胶 12 克

【用法】 水煎服。

【主治】 紫斑，火热型者。

【加减】 羚羊角可改用犀角5克，或加汉三七3克。

13536 羚羊角饮子

【方源】《秘传眼科龙木论》卷二。

【异名】 黑风羚羊饮(《金鉴》卷七十七)。

【组成】 羚羊角 羌活 黑参 细辛 桔梗 黄芩 柴胡各一两 车前子 茺蔚子各一两半 防风一两

【用法】 上为粗末。以水二盏，煎至一盏，食后去滓温服。

【主治】 黑风内障。眼初患之时，头旋额角偏痛，连眼睑骨及鼻颊骨时时亦痛，兼眼内痛涩，有黑花来往，先从一眼患，以后相牵俱损。多因肾脏虚劳，房室不节所致。

【备考】 本方用法，原作丸剂，与方名不符，据《金鉴》改。

13537 羚羊角饮子

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】 羚羊角 五味子 细辛 大黄 知母 芒消各一两 防风二两

【用法】 上为末。以水一盏，散一钱，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】 ①《秘传眼科龙本论》：小儿实热急疳，黑翳如珠外障。眼初患之时，忽然疼痛难忍，泪出不开，有翳如黑珠子在黑眼上。②《审视瑶函》：本疳。生于风轮，其色蓝绿青碧，小而痛涩者。

13538 羚羊角饮子

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】 羚羊角二两 人参 茯苓 大黄 天门冬 黑参 黄芩 车前子各一两

【用法】 上为末。以水一盏，散一钱，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】 眼目疼痛外障。初患之时，忽然发动，疼痛如锥刺，睑皮亦如火炙。

13539 羚羊角饮子

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 羚羊角（锉末） 犀角（锉末） 防风 桔梗 茺蔚子 玄参 知母 大黄（炮） 草决明 甘草减半 黄芩（炒） 车前各等分

【用法】 上锉。以白水二钟，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】 逆顺障症。多因瘀滞在内，症见色赤而障，及丝脉赤虬，纵横上下，两边往来，风轮际处，由白睛而来，粗细不等，赤脉周围圈圆，侵入黑睛上，障起昏涩；或伤于膏水，则有翳嫩白天，而变为花翳白陷；若燥涩甚者，则下起一片，变为黄膜上冲之病，甚则头疼目珠胀急。

13540 羚角钩藤汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 羚角片一钱半（先煎） 霜桑叶二钱 京川贝四钱（去心） 鲜生地五钱 双钩藤三钱（后入） 滁菊花三钱 茯神木三钱 生白芍三钱 生甘草八分 淡竹茹五钱（鲜刮，与羚羊角先煎代水）

【用法】 水煎服。

【功用】 凉肝熄风。

【主治】 ①《重订通俗伤寒论》：肝风上翔，头晕胀痛，耳鸣心悸，手足躁扰，甚则痫疯，狂乱痉厥；及孕妇子痫、产后惊风。②《浙江中医杂志》(1982，9:413)：癔病属阴虚火旺、肝阳浮越者。

【方论选录】 ①《重订通俗伤寒论》何秀山按：以羚、藤、桑、菊熄风定惊为君；臣以川贝善治风痉，茯神木专平肝风；但火旺生风，风助火势，最易劫伤血液，尤必佐以芍药、甘草、鲜生地酸甘化阴，滋血液以缓肝急；使以竹茹，不过以竹之脉络通人之脉络耳。②《谦斋医学讲稿》：本方原为邪热传入厥阴、神昏抽搐而设，因热极伤阴，风动痰生，心神不安，筋脉拘急。故用羚羊、钩藤、桑叶、菊花凉肝熄风为主，佐以生地、白芍、甘草甘酸化阴，滋液缓急，川贝、竹茹、茯神化痰通络，清心安神。由于肝病中肝热风阳上逆，与此病机一致，故亦常用于肝阳重证，并可酌加石决明等潜镇。③《浙江中医杂志》(1982，9:413)：方中以羚羊角、钩藤为主，桑叶、菊花为辅，平肝潜阳，清热熄风；生地、甘草、白芍养液增液，柔肝舒筋；邪热亢盛，每易灼津为痰，扰乱心神，故用象贝、竹茹清热化痰，茯神宁心安神。

【临证举例】 癔病 《浙江中医杂志》(1982；9:413)：梁××，男，24岁。1980年8月15日入院。患者双夏期间劳累过度，加上情志不畅，导致旧病复发。症见彻夜不眠，惊惕不安，抽搐频频，不能自主，口角流涎，沉默不语，偶有大小便失禁，进食被动，病已一周。舌质红，苔薄黄，脉弦滑。体温37.8℃，扁桃体左Ⅲ右Ⅱ，白细胞13200。诊断为癔病性精神病。证属肝阳浮越，内风扰动。治宜熄风止痉，清热化痰，羚羊钩藤汤加减：羚羊角2克，钩藤、茯苓、僵蚕、天竺黄各12克，生地30克，石决明20克，生白芍15克，象贝、竹茹、地龙各10克，冬桑叶6克，蜈蚣2条。并结合针刺。前后用药20余剂，痊愈出院。

【备考】 本方方名，《谦斋医学讲稿》引作“羚羊钩藤汤”。

13541 断下丸

【方源】《普济方》卷二二一。

【组成】 白龙骨 干姜 白茯苓 牡蛎 伏龙肝 黄耆（生） 厚朴 乌梅肉 黄牛角鰓（烧灰） 海螵蛸 赤石脂（炒，淬醋，研）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，温梅汤送下。

【主治】 妇人血气虚弱，漏下五色，淋沥不断。

13542 断下丸

【方源】《退思集类方歌注》。

【组成】 香连丸加诃子 龙骨 乌梅

【主治】 久痢滑脱。

13543 断下汤

【方源】《三因》卷十二。

【组成】 罂粟壳（炙，去瓣）十四个 草果一个（不去皮，炒） 白术一钱 甘草（炙）半钱 茯苓一钱

【用法】 上为散，作一剂。水一大碗，加生姜七片，大枣七个，煎至一大盏，分二服，空腹服。

【主治】 下痢赤白，无问久近长幼。

【加减】 下纯赤，加黑豆二十七粒；白则加炮干姜一钱。

13544 断下汤

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】 人参（去芦头） 乌贼鱼骨（烧灰） 当归（洗，焙）各二两 熟干地黄（洗，焙）一两 艾叶（醋炒）一两 川芎七钱半 阿胶（蛤粉炒成珠子）七钱半 干姜半两（炮）

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水一盏半，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 冲任气虚，崩中漏下，经脉不调，每遇月候将行，脐腹腰脚先痛，渐减饮食，四肢乏力及带下。

13545 断下汤

【方源】《直指》卷十四。

【组成】 茯苓 白术各一钱 甘草半钱 草果（连皮）一枚 大罂粟壳十四枚（去筋蒂，剪碎，醋浸，炒燥） 木香半钱

【用法】 上为粗末。分作两服，每服加生姜五片，大枣三个，大乌梅三个，食前煎服。

【主治】 赤白痢。

13546 断汗汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 黄耆一两（蜜炙） 防风（去芦） 龙骨（煅） 麻黄（用根节） 白术（炒） 牡蛎粉各半两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，去滓，空心服。

【主治】 盗汗。

13547 断红丸

【方源】《济生》卷八。

【异名】 剪红丸（《丹溪心法附余》卷十一）。

【组成】 侧柏叶（微炒黄） 川续断（酒浸） 鹿茸（燎去毛，酒煮） 附子（炮，去皮脐） 黄耆（去芦） 阿胶（锉，蛤粉炒成珠子） 当归（去芦，酒浸）各一两 白矾（枯）半两

【用法】 上为细末，醋煮米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前米饮送下。

【功用】《血证论》：补肾。

【主治】 肠虚，脏腑久虚而肠风痔疾，下血不止，或所下太多，面色萎黄，日渐羸瘦。

13548 断红丸

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 侧柏叶（炒香） 川续断（酒炒）各三钱 鹿茸一具（酥炙）

【用法】 上为细末，醋煮阿胶为丸。每服四五十丸，乌梅汤、人参汤、米饮汤任下。

【主治】 下血久不止，虚寒色淡晦。

【方论选录】《医略六书》：肠脏虚寒，不能吸血归经，故渗入大肠便血不止焉。鹿茸灰补肾脏真阳以吸血，续断灰续损伤经脉以维络，侧柏叶灰涩血止血以除便血也。务使命门温暖，则虚寒自散，而肠脏融和血有所归，安有下血之患乎？煮以苦酒之敛，阿胶之益，下以参汤之补，乌梅之敛，因病制宜，无不头头是道。

13549 断痢汤

【方源】《千金》卷十五。

【组成】 半夏一升 生姜五两 茯苓 甘草 龙骨各二两 附子一两 人参 黄连各三两 大枣十二枚

【用法】 上㕮咀。以水八升，煮取三升，分三服。

【主治】 冷痢，胸心下伏水。

13550 断痢散

【方源】《施园端效方》引大名王国祥方（见《医方类聚》卷一四一）。

【组成】 肉豆蔻 丁香 干姜各二两半（炮） 甘草（炙） 陈皮 诃子（去核）各一两 御米壳（去蒂，蜜浴炒）三两

【用法】 上咬咀。每服二钱半，水一盏，加乳香一粒，粟米百粒，同煎至七分，去滓，食前温服；霍乱吐泻，水冷服。

【主治】 泻痢，腹痛久不愈。

13551 断痫丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【异名】 断痫丹［《婴童宝鉴》引汤氏方（见《袖珍》卷四）］。

【组成】 蛇蜕（微炙）三寸 蝉蜕（去土，炒）四枚 黄耆（锉） 细辛（去苗叶） 钩藤钩子 甘草（炙，锉）各半两 牛黄（研）半钱

【用法】 上为末，再同和匀，煮面糊为丸，如小豆大。百晬内小儿服三二丸，二三岁儿十丸至十五丸，人参汤送下，不拘时候。

【主治】 小儿胎风久为惊痫，时发时愈。

13552 断痫丸

【方源】《永类钤方》卷六。

【组成】 紫石英（醋淬煅七次）二两 白矾（飞过）二两

【用法】 上为末，酒糊为丸。每服二十丸，白汤送下。

【主治】 风痫。

13553 断渴汤

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】 乌梅肉二两 麦门冬 人参 甘草 茯苓 干葛各一两

【用法】 上为末。每服三钱，以水一盏半，煎至六分，去滓温服。

【主治】 消渴不止。

13554 断下渗湿汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 樗根皮（炒黑）一两 生茅术一钱 生黄柏一钱 地榆（炒黑）一钱五分 楂肉（炒黑）三钱 银花（炒黑）一钱五分 赤苓三钱 猪苓一钱五分

【主治】 久痢带瘀血，肛中气坠，腹中不痛。

【方论选录】 重用樗根皮之苦燥湿，寒胜热，涩以断下，专入血分而涩血为君；地榆得先春之气，木火之精，去瘀生新；苏木、黄柏、赤苓、猪苓开膀胱，使气分之湿热，由前阴而去，不致遗留于血分也；楂肉亦为化瘀而设；银花为败毒而然。

13555 剪红丸

【方源】《永类钤方》卷三引曾异庵方。

【组成】 使君子一两 雷丸一两半 槟榔半两 黑牵牛八钱 木香半两 净青皮一两半 天花粉半两 草乌二两半（炮） 香附子 三棱（炮）各一两

【用法】 上为末，皂角熬膏为丸，如绿豆大。每服三十丸，空心用冷茶送下。

【主治】 五积六聚。

13556 剪红丸

【方源】《永类钤方》卷四。

【异名】 秦川剪红丸（《奇效良方》卷十六）。

【组成】 雄黄半两 木香半两 槟榔 三棱 莪术（煨） 陈皮 贯众（去毛）各一两 大黄（春）二两（秋、冬、夏）一两 干漆一两（炒烟起）

【用法】 上为末，糊为丸。每服五十丸。吐出瘀血及虫而愈。

【主治】 ①《永类钤方》：膈气变翻胃。②《杂病源流犀烛》：胃痛有因诸虫者。

13557 剪红丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】 当归身 黄连（炒） 槐角子（炒） 侧柏叶（炒） 荆芥穗 枳壳（炒）各等分

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如麻子仁大。陈米汤送下。

【主治】 痢血。

13558 寄生汤

【方源】《妇人良方》卷十二。

【组成】 桑寄生（洗，锉） 秦艽 阿胶各半两 糯米半两（作粉）

【用法】 上以新汲水三升，先下寄生、秦艽二味，煮至二升，去滓；次入阿胶、糯米再煮，约有一升止。分作三服，空心、食前、日午服之。娠妇胎气至五月以后常不安者，服之必效；顷见娠妇好饮酒，食咸酸五辛，胎必动，不可不知之。

【主治】 胎气常不安。

13559 寄生饮

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】 桑寄生一两 桑根白皮（锉，炒）三分 木香半两 紫苏茎叶一两 大腹二分半

【用法】 上锉细，如麻豆大，拌匀。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】 妊娠遍身虚肿。

13560 寄生散

【方源】《外台》卷十七引《必效方》。

【组成】 桑寄生 鹿茸（炙） 杜仲各一分

【用法】 上为散。每服方寸匕，酒下，一日三次。

【主治】 肾虚腰痛。

13561 寄生散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】桑寄生 续断 芎藭各一两 龙骨三分 当归 伏龙肝 阿胶各一两 干姜 甘草各一分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜三片、大枣一个，煎至六分，去滓，空心、食前温服。

【主治】妊娠胎动不安，腹内疼痛，下血不止。

13562 寄生防风汤

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】独活 川芎 芍药（炒黄） 桂心 续断 生姜 桑寄生各六分 当归 防风各八分

【用法】上锉，水煎服。

【主治】①《济阴纲目》：产后风邪头眩，腰痛不可转侧，四肢沉重，行步艰难。②《妇科指要》：袭风腰痛，脉浮弦涩。

【方论选录】《医略六书》：产后风伤营气，不能营运筋脉，而腰失所养，故腰痛不止焉。独活开泄经气，防风疏散风邪，当归养血脉以荣经，白芍敛营阴以和血，桂心温营暖血，寄生补肾强腰，续断续筋脉，川芎行血气，生姜温胃气，以行痹也。水煎，温服，使风邪外解，则营气完复，而经脉荣运有常，何腰痛之不止哉！

13563 密香散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】黄连 密陀僧 槟榔 木香各等分

【用法】上为细末。每用少许掺疮口，如脓干，以津唾调敷之。

【主治】臁上生疮，浸溃不止，疮口不敛，肌肉不生。

13564 密陀僧散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】黄连（去须） 密陀僧（火煅，另研） 香白芷 白蔹各半两 腻粉半钱

【用法】上为细末。先以盐汤洗疮，次用生油调药，以翎毛敷之。

【主治】热毒攻注，遍身生疮，臭秽不可近。

13565 密陀僧散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】开通钱十文（米醋一碗，用炭火将铁线子串钱炼赤，淬醋尽度，去铁线不用） 密陀僧半两 麝香一字（别研） 轻粉一字

【用法】上为末。每用先令浴了，剃去腋毛，以生姜一块，切作两片，蘸药，左手托右，右手托左。

【主治】腋气。

13566 密陀僧散

【方源】《准绳·幼科》。

【组成】密陀僧一两 轻粉五十贴 麝香一字

【用法】上为细末。于乳钵内杵匀。每用半钱，擦患处。

【主治】走马疳，齿焦黑烂。

13567 密陀僧散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】硫黄 雄黄 蛇床子各二钱 石黄 密陀僧各一钱 轻粉五分

【用法】上为末。醋调搽上。

【主治】汗斑。

13568 密陀僧散

【方源】《疡医大全》卷二十七。

【组成】密陀僧一两 石膏 枯白矾各二钱 轻粉一钱

【用法】上研细末。桐油调搽，湿则干掺。

【主治】脚丫痒烂。

13569 密陀僧膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】密陀僧 31 克 硫黄 15 克 斑蝥 3～5 个 轻粉 9 克 水银 9 克 江米面适量 冰片 9 克 木香 3 克 雄黄 3 克 枯矾 9 克 米醋 1000 克

【用法】按常法熬膏。外用。

【主治】皮肤癌。

13570 密蒙花散

【方源】《局方》卷七。

【异名】蒙花散（《治痘全书》卷十四）。

【组成】密蒙花（净） 石决明（用盐同东流水煮一伏时滤出，研粉） 木贼 杜蒺藜（炒去尖） 羌活（去芦） 菊花（去土）各等分

【用法】上为细末。每服一钱，腊茶清调下。

【主治】风气攻注，两眼昏暗，眵泪羞明，睑生风粟，隐涩难开，或痒或痛，渐生翳膜，视物不明，及患偏头疼，牵引两眼，渐觉细小，昏涩隐痛，并暴赤肿痛。

13571 密蒙花散

【方源】《奇效良方》卷五十七。

【组成】密蒙花 甘菊花 杜蒺藜 石决明 木贼（去节） 白芍药 甘草各等分

【用法】上为细末。每服一钱，茶清调下，服半月后加至二钱。

【主治】冷泪昏暗。

13572 密蒙花散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】密蒙花　羌活　菊花　蔓荆子　青葙子　木贼　蒺藜　石决明　枸杞子各等分

【用法】上为末。每服三钱　食后清茶送下。

【主治】肝胆虚损，眼羞明怕日，瞳仁不清。

【加减】脾胃虚者，加白术五分。

13573　密蒙花散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】密蒙花　羌活　菊花　石决明　木贼　黄柏　白蒺藜　黄芩　蔓荆子　青葙子　枸杞子

【用法】每服三钱，茶送下，水煎亦可。

【主治】拳毛倒睫。

13574　密蒙花散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】蒙花　威灵仙　草决明　羌活　黑附子　大黄　石膏　川椒（炒）　木贼　甘草　蝉蜕　独活　楮实子　川芎　荆芥　车前子　防风　菊花　黄连　苍术

【用法】加灯心，煎服。

【主治】久患内外障翳，羞明怕日，迎风流泪，肿痛难开，胬肉攀睛，风热气障。

13575　密陀僧复方

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】雄黄31克　硫黄31克　密陀僧31克　黄丹31克　生南星31克

【用法】上为细末。用生姜蘸药粉搽。

【主治】白癜风。

13576　盗汗汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】熟地二钱　当归一钱　元参八分　车前八分　枣仁一钱　五味五分　白芍八分　牡蛎一钱

【用法】水煎服。

【主治】盗汗。

13577　鞁裂膏

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】荆芥9克　防风9克　桃仁9克　红花9克　当归9克

【用法】上药置半斤猪油中煎枯，去滓。

【功用】养血润肤，祛风止痒。

【主治】手足鞁裂肥厚者。

13578　屠苏酒

【方源】《小品方》引华佗方（见《本草纲目》卷二十五）。

【组成】赤木桂心七钱五分　防风一两　菝葜五钱　蜀椒　桔梗　大黄各五钱七分　乌头二钱五分　赤小豆十四枚

【用法】以三角绛囊盛之，除夜悬井底，元旦取出置酒中，煎数沸，举家东向，从少至长次第饮之。药滓还投井中，岁饮此水，一世无病。

【功用】辟疫疠一切不正之气。

13579　屠苏酒

【方源】《外台》卷四引《肘后方》。

【异名】岁旦屠苏酒（《千金》卷九）、屠苏（《御药院方》卷二）、屠苏饮（《东医宝鉴·杂病篇》卷七）。

【组成】大黄　桂心各五十铢　白术十铢　桔梗十铢　菝葜　蜀椒各十铢（汗）　防风　乌头各六铢

【用法】上切，绛囊盛，以十二月晦日中悬沉井中，令至泥，正月朔旦平晓出药，至酒中煎数沸，于东向户中饮之，先从小起，多少自在，一人饮，一家无疫。

【功用】辟疫气，令人不染温病及伤寒。

【备考】《御药院方》有虎杖，无菝葜、防风。

13580　堕翳丸

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】石决明（刮洗）　人参（焙）各一两　细辛（去苗叶）半两　防风（去叉）　生干地黄（焙）各二两　五味子一两半　兔肝一具（炙干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空心茶汤送下。

【主治】内障浮翳及枣花翳针后。

13581　绫锦养脾丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】木香　丁香　沉香　红豆　大椒　官桂（去粗皮）　附子（炮裂，去皮脐）各一钱一字　肉豆蔻　白豆蔻（去皮）　荜澄茄　川姜（炮裂）　荜茇　甘草（锉，炙黄）　人参（去芦头）　白茯苓（去皮）　白术　陈皮（去白）　神曲（打碎，微炒）　麦芽（炒黄）　缩砂仁　诃子肉各二钱半　良姜（锉，炒）　厚朴（去粗皮，生姜制）　破故纸（微炒）各六钱一字

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作六丸。此药虽有三五味辛热药，炼蜜合和，成约四两半药，并炼净熟蜜约四两半，计九两分作五十四丸，每一丸重一钱六分有余。每服一丸，空心、食前沸汤磨化下。

【功用】大补脾胃，极进饮食，调顺三焦，保养荣卫。

【主治】《普济方》：脾肾俱虚，冷气攻刺心胸腹

胁，小肚疼痛，呕逆痰水，口苦，噫气吞酸，及膀胱冷气奔冲，腰背脐腹绞痛，手足微冷，小便频数。又治卒暴心疼，霍乱吐逆。妇人血气癥瘕，心腹刺痛。

13582 续命丹

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】 川芎 羌活 南星（姜制） 川乌（炮，去皮） 天麻 白鲜皮 当归 防风 海桐皮 地榆 虎骨 熟地黄 朱砂 乌蛇（生） 铅白霜 干蝎 肉桂各一两 牛黄 雄黄各二钱 轻粉二钱或一钱 麻黄（去节）四两（以好酒三升浸二昼夜，不用麻黄用酒）

【用法】 上为末，麻黄酒汁入蜜半升同熬成膏，和前药末为丸，如弹子大。每服一丸，豆淋酒下，或葱汁化下，不拘时候。

【主治】 男子、妇人卒中诸风，口眼㖞斜，言语謇涩，牙关紧急，半身不遂，手足搐搦，顽麻疼痛，涎潮闷乱。妇人血运血风，咳嗽吐逆，睡卧不宁。

【临证举例】 中风 戊辰春，中书左丞相张仲谦患半身不遂麻木，太医刘子益与服之，汗大出，一剂而愈。

13583 续命丹

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【异名】 神授保生丹。

【组成】 天南星（用米泔水浸七日，每日换水，削去皮脐，薄切，晒干。寒天加两日）六两 川乌头（制法与前同，去皮脐尖）六两 五灵脂（淘去沙石，晒干，用姜汁浸晒十日，每日添姜汁，直候其汁转黑，晒干）六两 地龙（去土，水洗净，晒干）四两 滴乳香（研） 没药 白僵蚕（铁铛炒丝断净，去足嘴） 羌活 天麻各二两 全蝎（去毒，晒干，生用） 白附子（生用） 辰砂（研） 轻粉（研） 雄黄（研）各一两 片脑（研）一钱半 麝香（研）一两二钱五分

【用法】 上为细末，用生姜自然汁煮糯米饭搜和为丸，成锭子，晒干，以瓦罐收贮。每服一锭，生姜自然汁和好酒一处磨化，临卧通口热服。以衣被厚盖汗出为度。

【功用】《通俗伤寒论》：通瘀散寒，宣通经络。

【主治】 ①《丹溪心法附余》：男子、妇人左瘫右痪，口眼㖞斜，半身不遂，失音不语。遍身疼痛，打扑伤损。外感风邪及诸风瘖暗风，角弓反张，目睛上视，搐搦无时，但患风疾皆可服之。②《通俗伤寒论》：痹证。肩背腰腿及周身疼痛，重着不移者，为寒凝血瘀。

【宜忌】 忌诸动风之物二七日。

13584 续命汤

【方源】《千金》卷十四引徐嗣伯方。

【组成】 竹沥一升二合 生地黄（汁）一升 龙齿 生姜 防风 麻黄各四两 防己三两 附子三分 石膏七两 桂心一两

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】 风眩。发则烦闷无知，口沫出，四体角弓，目反上，口噤不得言。

【加减】 有气，加附子一两，紫苏子五合，橘皮半两。

【方论选录】《千金方衍义》：此续命汤治风眩烦闷，但取麻黄、防风、桂心、附子、石膏、生姜六味开拓表里阴阳，调适经腑寒热，乃加竹沥以治经络四肢膜外之痰，地黄以治周身脏腑痹着之血，龙齿以治惊痫诸痉、癫疾狂走，防己以治中风挛急、风热诸癫。

13585 续命汤

【方源】《医学纲目》卷十一。

【组成】 人参 桂心 当归 独活 黄芩 干姜（炮） 甘草（炙）各七钱半 石膏一两 杏仁四十枚

【用法】 上㕮咀。以水九升，煮取三升，分温三服，日二服，取汗。

【主治】 卒中，半身不遂，手足拘急，不得屈伸，身体冷，或智或痴，或身强直不语，或生或死，狂言不可名状，角弓反张，或欲得食，或不用食，大小便不利。

【加减】 无汗者，加麻黄。

13586 续命汤

【方源】《准绳·幼科》卷二。

【组成】 麻黄 人参 黄芩 川芎 芍药 甘草（炙） 防风 杏仁（炒去皮尖） 官桂（去皮） 防己 附子（炮裂，去皮脐）各等分

【用法】 上锉。每服二钱，水一钟，加生姜三片，煎至五分，不拘时候服。

【主治】 小儿手足拘挛，不能屈伸。

13587 续骨丸

【方源】《苏沈良方》卷九引《灵苑方》。

【异名】 神验续骨丸（《遵生八笺》卷十八）。

【组成】 腊月猪脂五两 蜡半斤（以上先煎） 铅丹（罗） 自然铜 密陀僧各四两（研细） 白矾十二两 麒麟竭 没药 乳香 朱砂各一两（细

研）

【用法】 新鼎中先熔脂，次下蜡，出鼎于冷处，下密陀僧、铅丹、自然铜，暖火再煎，滴入水中不散，出鼎于冷处，下诸药，用柳篦搅匀，泻入瓷瓶内，不停手搅至凝，丸如弹子大。日用笋皮之类衬之，极冷收贮。凡伤折用一丸，入少油火上化开，涂伤痛处，以油单护之。其甚者，以木板夹之，更取一丸，分作小丸，热葱酒送下，痛即止。如药力尽，再觉痛，更一服，痛止即已。骨折者两上便安。牙疼甚者贴之即止。

【主治】 骨折，跌打损伤，疼痛，牙疼。

【备考】 本方方名，《伤科汇纂》引作"接骨金丹"。

13588 续骨丹

【方源】《本事》卷四。

【组成】 天麻（明净大者，酒浸一夕） 白附子（炮） 牛膝（洗，锉，焙，酒浸一宿，再焙） 木鳖子（去壳，研）各半两 乌头（炮，去皮脐）一分 川羌活（洗去土）半两 地龙（去土）一分 滴乳香（乳钵坐水盆中研细） 真没药（研）各二钱 朱砂（水飞）一钱

【用法】 上以生南星末一两，无灰酒煮糊为丸，如鸡头子大，朱砂为衣。每服一丸，食前薄荷汤磨下。

【主治】 两脚软弱，虚羸无力及小儿不能行。

【方论选录】《本事方释义》：天麻气味辛平，入足阳明、厥阴；白附子气味辛甘大温，入足阳明；牛膝气味酸咸平，入足厥阴；木鳖子气味甘温微苦，入足太阴；乌头气味苦辛大热，入足太阳少阴；羌活气味辛甘平，入足太阳；地龙气味咸寒，入足阳明、厥阴；乳香气味辛微温，入足少阴；没药气味苦平，入足阳明；朱砂气味苦温，入手少阴；南星气味苦辛温，入手、足太阴。以酒丸薄荷汤送下，取其引药入络也。此治虚羸无力，两脚软弱及小儿不能行走者，皆用辛通热药，少佐以下行之品，不欲其停留在上，而任行于筋骨也。

13589 续断丸

【方源】《苏沈良方》卷十三。

【组成】 川断 当归 防风 附子 萆薢 天麻 乳香 没药 白芍

【用法】 炼蜜为丸，酒送下。

【主治】 风湿，四肢浮肿，肌肉麻痹，甚则手足无力，筋脉缓急。

13590 续断丸

【方源】《张氏医通》卷十四引《局方》。

【组成】 续断（姜酒炒） 牛膝（姜酒炒） 川萆薢（姜汁炒）各二两 防风一两半 川乌头（炮）二枚

【用法】 炼白蜜为丸，如弹子大。每服一丸，醇酒细嚼送下。

【主治】 风寒湿痹，筋挛骨痛。

13591 续断丸

【方源】《景岳全书》卷五十四引《本事》。

【组成】 杜仲五两 五加皮 防风 薏苡仁 羌活 续断 牛膝（酒浸）各三两 萆薢四两 生黄耆五两

【用法】 上为末，用好酒三升，化膏盐三两，用木瓜半斤去皮子，以前盐酒煮成膏和药为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心、食前酒盐汤送下。

【功用】 补五脏内伤，调中益气凉血，强筋骨。

【主治】 肝肾风寒，气弱脚不能践地，脚膝疼痛，风毒流注下部，行止艰难，小便余沥。

13592 续断丸

【方源】《御药院方》卷六。

【异名】 续断丹（《准绳·类方》卷五）。

【组成】 续断二两 萆薢（锉碎）二两 牛膝（酒浸一伏时，焙干）二两 干木瓜二两 杜仲（去粗皮，锉碎，炒令丝尽）二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，食前温酒送下。

【功用】 活血通关节，行经络，引滞气，散寒湿。

【主治】 筋挛骨痛。

13593 续断丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】 续断二两 破故纸 牛膝 杜仲 木瓜 萆薢各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心无灰酒送下。

【主治】 腰痛并脚酸腿软。

13594 续断汤

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】 续断（焙） 桂（去粗皮） 防风（去叉） 大黄（锉，炒） 牡丹皮 芎藭 牛膝（去苗，酒浸，焙） 细辛（去苗叶） 秦艽（去苗土） 赤茯苓（去黑皮） 海桐皮（去粗皮，锉） 当归（切，焙） 赤芍药各一两 杜仲（去粗皮，锉，炒） 熟干地黄（焙）各二两

【用法】 上为粗散。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 腰痛强直，不得俯仰。

13595 续断汤

【方源】《妇人良方》卷十五。

【组成】 当归 生地黄各一两 续断半两 赤芍药一分

【用法】 上为末。每服二钱，空心，葱白煎汤调下。

【主治】 妊娠下血及尿血。

13596 续断汤

【方源】《济生》卷三。

【组成】 川续断（酒浸） 芎藭 当归（去芦，酒浸） 橘红 半夏（汤洗七次） 干姜（泡）各一两 桂心（不见火） 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 肝劳虚寒，胁痛胀满，关节疼痛，挛缩烦闷，眼昏不食。

13597 续断饮

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】 续断三钱 当归 阿胶各二钱 杜仲三钱 桃仁 延胡索各一钱五分 肉桂五分

【主治】 腰痛，下焦虚寒，血滞不行。

13598 续断散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 生地五两 续断三两（炒炭） 白芍一两半（炒） 当归三两

【用法】 上为散。每服五钱，荆芥灰汤送下。

【主治】 孕妇尿血，脉虚数者。

【方论选录】 妊娠血虚，邪伏血不归经，故尿血不止，谓之溺血。生地黄滋阴壮水以凉血；续断灰补经续绝以定血；当归养血脉以归经；白芍敛阴血以止血；为散，荆芥灰汤下，使经血内充，则邪得外解，而血无妄行之患，何溺血不止者，胎孕无不安焉。

13599 续筋丹

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】 土鳖虫 三七 血竭 龙骨各等分

【用法】 上为细末。用津唾调搽。

【功用】 接续断筋。

13600 续嗣丹

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】 萸肉 天冬 麦冬各二两 补骨脂四两 菟丝子 杞子 覆盆子 蛇床子 韭子 熟地各一两半 龙骨 牡蛎 黄耆 当归 锁阳 山药各一两 人参 杜仲各七钱半 陈皮 白术各五钱 黄狗外肾（酥炙）二对

【用法】 上为末，紫河车一具蒸制，同门冬、地黄烂捣为丸。每服一百丸，早、晚各以盐汤任下。

【功用】《中国医学大辞典》：壮阳。

【主治】 丈夫无子。

13601 续命煮散

【方源】《妇人良方》卷三。

【组成】 防风 独活 当归 人参 细辛 葛根 芍药（炒） 川芎 甘草（炒） 熟地黄（自制） 半夏 远志（去心） 荆芥穗各半两 桂心七钱半

【用法】 每服五七钱，姜水煎服。

【功用】《景岳全书》：补虚，消风，通经络，行气血，除瘛疭疼痛。

【主治】 风气昏愦，四肢无力，口眼瞤动，或时搐搦，或津液不足，渴饮热汤，及产后中风自汗。

13602 续随子丸

【方源】《医学发明》卷六。

【组成】 人参 木香 汉防已 赤茯苓（面蒸） 大槟榔 海金沙各五钱（另研） 续随子一两 葶苈四两（炒）

【用法】 上为末，枣肉和为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食前，煎桑白皮汤送下。

【主治】 ①《医学发明》：通身肿满，喘闷不快。②《医门法律》：肺经有湿，通身虚肿。喘闷不快，或咳或喘。

13603 续阴救绝汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】 人参二两 白术三两 附子一钱 巴戟天一两

【用法】 水煎服。一剂血止，二剂阴生，连服四剂，可以不死。

【功用】 补阳。

【主治】 房事大泄，精尽阳脱。

【方论选录】 此方补阳气之圣药也。用人参回绝续于无何有之乡，用白术以通利其腰脐之气，用附子以追其散失之元阳，用巴戟天补其心肾之阳，纯是补阳之药，则阳回而阴亦回也。倘不用人参，只用附、术、巴戟亦可夺命于须臾，然无参为君主之味，则附子之热无以驾驭，恐有阳旺阴消之弊。倘能以补之药济其后，亦不至有偏胜耳。

13604 续命风引汤

【方源】《千金》卷十四。

【组成】 麻黄 芎藭 石膏 人参 防风各三两 甘草 桂心 独活各二两 防已 附子 当归各一两 杏仁三十枚 陈姜五两

【用法】 上㕮咀。以酒三升，水一斗，合煎取四升，分四服，日三次，夜一次。

【主治】 中风癫眩，不知人，狂言，舌肿出。

13605 续断止血方

【方源】《千金》卷二十。

【异名】 止血汤(《圣济总录》卷四十)。

【组成】 续断 当归 桂心各一两 干姜 干地黄各四两 甘草二两 蒲黄 阿胶各一两

【用法】 上㕮咀。以水九升，煮取三升半，去滓，下胶取烊，下蒲黄，分三服。

【主治】 下焦虚寒损，或先便转后见血，此为远血，或便或不利，好因劳冷而发。

【宜忌】 忌海菘菜、生葱、芜荑。

【方论选录】《千金方衍义》：先便后血为远血，《金匮》主以黄土汤，专取术、附、灶土以破瘀结，胶、地、甘草以和营血，黄芩以化术、附之热。《千金》以血既下脱，不须复用破结之剂，乃以姜、桂代术、附，归、续代灶土，蒲黄代黄芩，虽用法稍平，而功用不殊。然须验其血色，晦淡则当用《金匮》法，鲜紫当用《千金》法，方为合辙。

【备考】 本方方名，《外台》引作“续断止痢汤”，《普济方》引作“续断散”。

13606 续断地榆煎

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】 续断 甘草 地榆 鹿茸 丹参 小蓟根各十三铢 干地黄一两半 龟版三两 川芎 阿胶 石脂 当归各一两半 柏子仁一两 秦牛角鰓二两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，日再，稍加至三十丸，空心温酒送下。

【主治】 崩漏。

13607 续嗣降生丹

【方源】《妇人良方》卷九。

【组成】 当归 桂心 龙齿 乌药（真天台者佳） 益智 杜仲 石菖蒲 吴茱萸各一两半 茯神 川牛膝 秦艽 细辛 苦桔梗 半夏 防风 白芍药各三分 干姜一两（半生半炒） 附子一只（重八钱者，脐心作一窍，如皂子大，入朱砂一钱重，湿面裹煨） 川椒二两（汤浸半日，焙） 牡蛎一大片（要取漳、泉二州者，却用学堂童子小便浸四十九日，五日一换，取出用硫黄末一两，米醋涂遍，却用皮纸裹，又用米醋浸令纸湿，盐泥厚固济，干，用炭五斤煅，每遇合药入二两，余者留后次合药用）

【用法】 上为细末，取附子纳朱砂别研为细末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至一百丸，空心淡醋、温酒、盐汤皆可送下，一日二服。

【主治】 妇人禀受气虚，胎脏虚损，子宫冷惫，血寒固冷，难成子息；男子精气不固，阳事衰弱，白浊梦泄；妇人血虚带下，肌瘦寒热；男女诸虚百损，客热盗汗，气短乏力，面无颜色，饮食少味。

13608 续命汤加紫苏陈皮方

【方源】《医方考》卷五。

【组成】 竹沥一升二合 生姜汁五合 生地汁一升 龙齿（末） 防风 麻黄各四两 防己 附子（炮） 石膏 桂枝各二两 陈皮（去白） 紫苏各半两

【主治】 痫疾。发则仆地，闷乱无知，嚼舌吐沫，背反张，目上视，手足搐搦，或作六畜声者。

【方论选录】 是方也，有麻黄、桂枝、防风、紫苏，则可以泄在经之邪；有竹沥、姜汁、陈皮，则可以行痰涎之滞；有生地汁、石膏，则可以清心肺之壅；有龙齿，则可以安魂；有防己，可以通塞；若夫沉痼之痰，非附子不足行其滞，而其大热之性，又足以益火之原而消阴翳，譬之太阳中天，幽谷之翳障无不消灭，此古人用附子之意也。

13609 绵胶散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】 新绵（烧灰，研） 黄明胶（炙燥，捣末）各等分

【用法】 上为散。每服一钱匕，临卧糯米饮调下。

【主治】 肺损吐血。

13610 绵煎散

【方源】《永乐大典》卷一四九四七引《烟霞圣效方》。

【组成】 瞿麦 石膏（乱文者） 赤石脂各等分

【用法】 上为细末。每服五钱，水一中盏，绵裹同煎服。

【主治】 妇人胎前产后吐血，血运，发虚热，小便不通，脐腹痛。

13611 绿云散

【方源】《苏沈良方》卷七。

【异名】 青黛散(《得效》卷十七)、绿袍散(《回春》卷五)。

【组成】 黄柏半两 螺丝黛二钱

【用法】 上研如碧玉色。临卧，置舌根一字，咽津无妨。迟明愈。凡口疮不可失睡，一夜失睡，口疮顿增。

【主治】 ①《苏沈良方》：口疮。②《三因》：口

疮，臭气，瘀烂，久而不愈。

【备考】 本方原名绿云膏，与剂型不符，据《简易》引《必用方》（见《医方类聚》）改。

13612 绿云散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】 柏叶 百合 人参 阿胶（炙令燥）各二两

【用法】 上为散。每服二钱匕，用糯米粥饮调下。

【主治】 吐血。

13613 绿云散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】 青黛一钱 硼砂五分 寒水石一钱 紫车前一钱 消石一钱 山豆根一钱 元明粉一钱 冰片一分

【用法】 上为细末。竹管吹喉中入至病处。

【主治】 咽喉肿痛。

13614 绿云膏

【方源】《医学正传》卷六。

【组成】 黄连 大黄 黄芩 玄参 黄柏 木鳖（去壳）各一钱

【用法】 上细切，用香油一两同煎焦色，去药，入净松香五两，再煎成膏，滤入水中，扯拔令金色，入铫再熬放温入后药：猪胆汁三枚，铜绿三钱（醋浸一宿，绵滤去渣）。用竹篦带温搅匀，然后如常摊贴。兼治疮口不干，加乳香、没药、轻粉尤妙。

【主治】 瘰疬浸淫，流注于腋胁手足。

13615 绿玉膏

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】 黄蜡二两（提过） 松香四两（提过） 白蜡五钱 轻粉五钱 杏仁五钱 铜绿五钱 蓖麻子不拘多少

【用法】 调匀，共捶千余下，成绿色，色匀为度，瓷瓶盛贮。遇患者，热水捏开贴之，先将苦茶洗净，用布缚紧，每日一洗，去药；上脓，又捏开再贴之即愈。

【主治】 内外臁疮。

13616 绿白散

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】 苦参不拘多少

【用法】 上为细末。用香油调涂。

【主治】 汤熨火烧疼痛。

13617 绿豆饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 绿豆不拘多少 盐少许

【用法】 绿豆宽汤煮糜烂，入盐或蜜亦可，待冰冷，或厚或稀或汤，任意饮食之。日服三四次不拘。此物性非苦寒，不伤脾气。

【功用】 解毒除烦，退热止渴，大利小水。

【主治】 热毒劳热，诸火热极，不能退者。

【宜忌】 若火盛口甘，不宜厚味，但略煮半熟清汤冷饮之。

13618 绿豆散

【方源】《永乐大典》卷一〇二七引《大方》。

【组成】 消石 大黄 绿豆各等分

【用法】 上为细末。每次用鸡子清调敷。

【主治】 小儿赤肿丹毒。

【加减】 如恶物所伤，更有点子，加入脑、麝、硇砂少许同贴。

13619 绿豆粥

【方源】《本草纲目》卷二十四引《普济方》。

【组成】 绿豆

【用法】 煮汁，煮作粥。

【功用】 ①《本草纲目》解热毒，止烦渴。②《长寿药粥谱》：消水肿，预防中暑。

【主治】 ①《本草纲目》：引《普济方》：消渴饮水。②《长寿药粥谱》：暑热烦渴，疮毒疖肿，老年浮肿，高热口渴。

13620 绿矾丸

【方源】 方出《医学纲目》卷二十一引《得效》，名见《医统》卷十八。

【组成】 绿矾六两（以米醋铁勺内炒七次，干为度，放地上出火气） 南星一两（咀炒黄色） 曲一两（炒黄色） 大皂角一斤（铁锅水煮烂，操出浓胶，滤去渣，净汁入锅，加枣肉，再熬成浓胶和前药用） 红枣六两（蒸，去皮，拨入皂角胶内用）

【用法】 上前三味为细末，和入皂角及枣胶内捣匀为丸，如梧桐子大。每服五丸，清晨下床用姜汤送下，夜卧上床再服。如身上发红斑，急煎枣汤解之自愈。

【主治】 黄胖。

【宜忌】 忌油腻煎炒。

13621 绿矾丸

【方源】《医学正传》卷六引《集验方》。

【组成】 五倍子半斤（炒黑） 绿矾四两（姜汁炒白） 针砂四两（醋炒红色） 神曲半斤（炒微黄色）

【用法】 上为细末，生姜汁煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，温酒送下；不能饮酒，米汤

送下亦可。

【主治】 黄肿病。

【宜忌】 终身忌食荞麦面。

13622 绿矾散

【方源】《济阳纲目》卷一〇七。

【组成】 五倍子（炒焦） 明矾 铜绿各一钱 麝香一分

【用法】 上为末，先以香油通口噙漱，觉无油气，吐去，更漱五七次，吐尽，更以沸汤入盐醋温漱，吐讫后，以药擦患处。

【主治】 走马牙疳。

13623 绿消煎

【方源】《普济方》卷三〇〇引《圣惠》。

【异名】 绿矾散（《圣济总录》卷一二九）。

【组成】 绿矾五两

【用法】 上药形色似朴消而绿色，置于铁板上。聚灰封之囊袋，吹令火炽，其矾即沸流出，色赤如熔金汁者是真也。候沸定汁尽，去火候冷，取出研为细末，似黄色收之。先以盐汤洗疮，帛裹干，用此敷之。或有虫有黄水，当日洗，汁断疮干。若患痛急，即涂少酥令润，每一遍，盐汤洗濯。有脓处常洗使净，其痂干不须近。每洗、干敷药如初，但急痛即涂酥，五日即觉上痂，渐剥起赤，依前洗敷药，十日即疮渐渐剥尽痂落。软处或更生白脓泡，即搽破敷药，自然总愈。

【主治】 甲疽。或因剔甲伤肌，或因甲长侵肉，遂成疮肿痛。后缘官靴研损，四边肿脓，黄水出，侵淫相染，五指俱烂，渐渐脚跌泡浆四边起，日夜倍增。

【临证举例】 甲疽 张侍郎得此病，卧经六十日，困顿不可复言，京中医并经造问，皆随意处方，无效验，惟此法得效如神，故录之。

13624 绿袍散

【方源】《医方类聚》卷七十引《施园端效方》。

【组成】 蝎尾二十五个（去毒用） 铜绿 青盐各二钱 轻粉一字

【用法】 上为细末。每用一钱，浆水一盏调洗，一日三次。

【主治】 风毒，眼连眶赤烂，拳毛倒睫。

13625 绿袍散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】 薄荷叶（去老梗） 荆芥穗各五钱 青黛 元明粉 硼砂各二钱半 百草煎 甘草各三钱

【用法】 上锉，焙干为末，元明粉、硼砂二味在乳钵内细杵，同前药末再杵匀。用一字至半钱，干点舌上令其自化；或新汲水入蜜调，点舌上亦好。

【主治】 ①《活幼心书》：重舌及满口内外疮毒，咽喉不利。②《麻科活人》：一切口疮腐烂。

13626 绿袍散

【方源】《卫生宝鉴》卷十一。

【异名】 绿云散（《普济方》卷二九九）。

【组成】 黄柏四两 甘草（炙）二两 青黛一两

【用法】 上前二味为末，入青黛研匀。每用半钱，干掺口内。

【主治】 老幼口疮，多时不效者。

【宜忌】 忌醋、酱、盐一二日。

13627 绿袍散

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】 黄柏 薄荷 芒消 青黛各等分

【用法】 上为末，入冰片少许。掩上牙床即止。

【主治】 齿缝出血。

13628 绿袍散

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷二

【组成】 黄柏（蜜炙）一两 青黛三钱 片脑二分

【用法】 上为末。掺患处，吐出涎即愈。

【功用】《北京市中药成方选集》：清胃热，消肿止痛。

【主治】 ①《东医宝鉴·外形篇》：口疮。②《北京市中药成方选集》：口舌生疮，胃热牙疳，口臭糜烂。

13629 绿袍散

【方源】《玉钥续编》。

【组成】 上铜青一钱 白芷一钱 甘草五分

【用法】 上为细末。同黄袍散吹之。

【主治】 口疳腐烂。

13630 绿袍散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】 薄荷五钱 青黛二钱五分 硼砂二钱五分 儿茶三钱 甘草三钱 黄柏一钱 铜青 冰片各一钱 元明粉 百草煎各二钱半 荆芥五钱

【用法】 上为细末。每用一字或二字，点舌上，令其自化，或井花水调点。

【主治】 痘疹误服辛热之药，以致热毒蕴结，咽喉肿痛，口舌生疮，赤眼肿痛。

13631 绿银散

【方源】《卫生总微》卷十七。

【组成】 铜绿 蜜陀僧各三钱 白及一个（烧存性）九钱

【用法】 上为细末。每用半钱，津唾调涂腋下，

三五日一次。以效为度。

【主治】 腋气。

13632 绿寒散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】 如圣无比散(《妇人良方》卷一)、绿云散(《普济方》卷三二九)。

【组成】 晚蚕沙一两（微炒） 伏龙肝半两

【用法】 上为极细末。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】 妇人崩中下血不止。

13633 绿千锤膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 土木鳖子（去壳）五个 嫩松香 125 克 铜绿（研细）3 克 乳香 6 克 没药 6 克 蓖麻子（去壳）21 克 巴豆仁 15 克 杏仁 3 克

【用法】 上药入石臼内捣千下成稠膏，用时隔水炖热，竹签挑药，在油纸上摊成膏药。稍烘热贴于疮上，三日一换，直至治愈。

【功用】 拔毒提脓。

【主治】 鳞拱头。

13634 绿云一醉散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【异名】 绿云散(《外科精要》卷下)。

【组成】 金星凤尾草四两（如新采者，即瓦上炒，叶背有细点，如金星相对者） 甘草四两（生锉，焙干）

【用法】 上为细末，分作四服。先以好酒二升煎三二沸，倾在一器中，更用冷酒一升相和，调药末二两令温，只作一服。食令尽，便以物枕着痛处睡，良久遂下毒气恶物，次日减药末并酒一半，再进一服。

【主治】 ①《杨氏家藏方》：五毒发背，及一切恶疮。②《赤水玄珠》：五发毒疮于背脑或手足。金石发疽。

13635 绿风还睛丸

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 甘草 白术 人参 茯苓 羌活 防风 菊花 生地黄 蒺藜 肉苁蓉 山药 牛膝 青葙子 密蒙花 菟丝子 木贼 川芎各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心清茶送下。

【主治】 内障，已成绿风不足证。

13636 琥珀丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】 琥珀一两（细研） 槟榔一两 木香一两 诃黎勒皮一两 陈橘皮一两（汤浸去白瓤，焙） 五味子半两 桂心一两 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川大黄一两（锉碎，微炒） 半夏一两（汤洗七遍去滑） 昆布半两（洗去咸味） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 白术一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎生姜、枣汤送下，不拘时候。

【主治】 五种膈气，喉咽不利，心胸壅塞，食少无力。

13637 琥珀丸

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 琥珀一两 安息香三分 朱砂三分（细研，水飞过） 木香三分 麒麟竭一两 败龟一两（涂醋，炙令黄） 没药三分 地龙一两（微炒） 雄黄半两（细研，水飞过） 当归一两（锉，微炒） 槟榔二两 麝香一分（细研）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每日二十丸，空心时以温酒送下，晚食前再服。

【主治】 妇人血风，身体骨节疼痛。

13638 琥珀丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】 琥珀三分（细研） 生干地黄半两 桂心三分 牛膝三分（去苗） 鳖甲二两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 当归半两（锉，微炒） 京三棱一两（微炮，锉） 延胡索半两 干漆一两（捣碎，炒令烟出） 芫花三分（醋拌，炒令干） 水蛭四十九枚（炒令黄） 虻虫四十九枚（炒令黄，去翅足） 槟榔三分 硇砂一两（研） 川大黄二两（锉碎，微炒） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】 上为末，醋煮硇砂为膏，入药末为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心以温酒送下。

【主治】 妇人积年血癥块不消，状若鬼胎之候。

13639 琥珀丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】 琥珀一两（细研） 没药一两 当归一两（锉，微炒） 赤芍药一两 京三棱一两 鳖甲一两（涂醋，炙微黄） 虻虫一两（去翅足，微炒） 水蛭一两（炒令黄）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每日十丸，空心以温酒送下。

【主治】 产后积聚成血瘕，致月水不通，小腹疼痛。

13640 琥珀丸

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】 干全蝎二枚 琥珀（另研） 铁粉（炒）

各二钱 轻粉 南星（炮） 白附子（炮）各一钱 龙脑半钱（研）

【用法】 上为末，酒糊为丸，如黍米大。每服一二丸，薄荷温汤送下，不拘时候。

【主治】 新生儿胎惊。此在母腹中时，因有所惊乃感，至生下百日之内，心神不宁，睡卧不醒，壮热躁烦，啼哭无时，面青赤，腰直身冷，搐缩口撮，或粪青黄水。

【备考】 如服此药，眼翻牙噤如鱼口者，乃死候也。

13641 琥珀丸

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】 人参（去芦） 远志（去心） 麦门冬（去心） 茯神（去木） 白茯苓（去皮） 龙齿（水飞） 车前子 乳香（别研） 地骨皮 山药 石菖蒲（去须，蒸） 朱砂（别研，水飞）各一两 熟干地黄（洗） 黄耆（蜜炙）各一两 琥珀（别研） 柏子仁（别研） 五味子各半两（去枝）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前、临卧枣汤送下。

【功用】 补心肾。

【主治】 忧愁思虑，内耗元气，醉饱房劳，下伤元脏，致令精血不固，神气大伤，心忡烦悸，梦寐不安，精神恍惚，足胫酸疼，小便白浊，情思不乐，多生恐怖，头目昏晕，阴痿阳弱，腰膝疼重，一切虚羸。

13642 琥珀丸

【方源】《济生》卷六。

【组成】 琥珀（别研） 白芍药 川乌（炮，去皮） 川牛膝（去芦，酒浸） 鳖甲（醋炙） 蓬莪术（炮） 当归（去芦，酒浸） 厚朴（姜制炒）各一两 木香（不见火） 泽兰叶 官桂（不见火）各半两 麝香（别研）五分

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心温酒、米饮任下。

【功用】《杏苑》：调顺气血。

【主治】 妇人血瘕，腹中有块，攻刺小腹，痛重，或腰背相引而痛，久而不治，黄瘦羸乏。

13643 琥珀丸

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】 琥珀（研如粉）不拘多少。

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，煎赤茯苓汤吞下，甚者，加丸数。

【主治】 老人小便不通。

13644 琥珀丸

【方源】《得效》卷十二。

【组成】 天南星二两（大者，掘地坑，深尺余，火煅令红去火，安南星在内，即以醋沃之，瓦盆盖一伏时，取出洗去灰土，焙干为末） 朱砂半两（别研） 琥珀二钱（通明者，别研） 真金箔十片

【用法】 上锉，以猪心血为丸，如梧桐子大。每服十五丸，临卧以人参或麦门冬汤送下。

【主治】 暗风百日内者。

13645 琥珀丸

【方源】《普济方》卷三三三。

【组成】 水蛭（石灰炒） 虻虫（去翅足，糯米炒） 琥珀半两 芫花（醋浸，焙干） 桃仁（汤浸，去皮尖） 当归（酒浸，去芦） 桂枝（不见火） 大黄各一两

【用法】 上为细末，大黄醋熬成膏为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心苏木酒送下。

【主治】 月经闭塞不通，腹中成块。

13646 琥珀丸

【方源】《广笔记》卷三。

【组成】 琥珀三钱 天竺黄二钱 人参三钱 茯神二钱 粉甘草三钱 朱砂一钱五分 山药一两 胆星二钱 莲肉三钱

【用法】 上炼蜜为丸，朱砂为衣。每服一钱，人参、圆眼汤送下。

【主治】 慢惊，兼治小儿一切虚证。

【临证举例】 小儿善哭 华虚舟五郎，尪甚善哭，周岁中，每哭即气绝，绝而苏，一饭时许矣；至三岁外，其病日深，哭而绝，绝而苏，甚至经时，初或一月一发，后则频发，有日再发者。投以此药，人参、桂圆汤下数丸，遂愈。

13647 琥珀丸

【方源】《玉案》卷五。

【组成】 大戟 芫花（醋炒） 海金沙（炒） 白丑（微炒，捣末，水牛尿浸，焙干）各二两 琥珀八钱 黄连（酒炒） 滑石各一两 肉桂五钱

【用法】 上为末，以木通一斤煎浓汤为丸。每服二钱，空心白滚汤送下。

【主治】 一切水肿，小便不通，大便溏泻，气喘。

13648 琥珀丸

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】 白矾一两 象牙一两 血竭三钱 乳香一钱 没药一钱 麝香三分 蜂窠（煅）一钱

【用法】 上为末，用黄蜡融化为丸。每服五七十丸，白滚汤送下，一日一次。

【功用】 干脓收口。

【主治】 痔漏孔穿开。

13649 琥珀丸

【方源】《证治汇补》卷三。

【组成】 沉香（镑） 木香 乳香（箬上炙） 没药各三钱（箬上炙） 琥珀一钱半（研） 白丑六钱（生用） 黑丑一钱六分（去头末，一半生用，一半用牙皂水浸） 槟榔一两（一半生，一半用牙皂煎汁浸，焙熟）

【用法】 上为末，牙皂水打糊为丸。每服二钱七分，砂糖汤送下。一服，稍行其水，即服补剂二三帖，再下琥珀丸一服，又去水后，仍复补剂二三帖，以行尽水为度。

【主治】 水肿。

13650 琥珀丸

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】 黄芩（炒黑） 制香附二两 当归 川芎各一两 三棱 琥珀各五钱

【用法】 上以黄米饭为丸。空心服。

【主治】 年老月行不止。

【备考】 方中黄芩用量原缺。

13651 琥珀丹

【方源】《幼幼新书》卷十引张涣方。

【组成】 琥珀 南星（腊月牛胆酿者） 天麻 朱砂（细研，水飞）各一两 白僵蚕 白附子 香白芷各半两（为细末） 龙脑（研）一钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，人参薄荷汤化下。

【功用】 安心神，镇惊邪。

【主治】 小儿一切惊风。

13652 琥珀汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】 琥珀 大黄（锉，炒） 滑石（碎） 车前子 车前叶各一两

【用法】 上为粗末。每服二钱匕，水一盏，葱白半分（拍碎），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 转胞。小便不利，烦闷。

13653 琥珀饮

【方源】《直指》卷十六。

【组成】 琥珀

【用法】 上为细末。每服二钱，加灯心一握，脑荷少许，煎汤调下。

【主治】 尿血。

13654 琥珀散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】 琥珀三分（细研） 桂心一两 当归三分（锉，微炒） 牛膝三分（去苗） 没药半两 麒麟竭半两 干漆半两（捣碎，炒令烟出） 延胡索半两 防风半两（去芦头） 羌活三分 羚羊角屑半两 川大黄三分（锉碎，微炒）

【用法】 上为散。每服一钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】 妇人血风走疰，疼痛，来往发歇。

13655 琥珀散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 琥珀三分（细研） 牛膝一两（去苗） 当归一两（锉，微炒） 延胡索三分 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 芎藭半两 赤芍药半两 桂心半两 川大黄三分（锉，微炒） 牡丹半两 水蛭一分（炒微黄）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】 妇人月水不通，脐下疞痛，腹胁妨闷。

13656 琥珀散

【方源】《鸡峰》卷十。

【异名】 琥珀汤（《普济方》卷二一五）。

【组成】 淋石二分 琥珀半两 当归半两

【用法】 上为细末。每服二钱匕，米饮调下。

【主治】 ①《鸡峰》：小便涩痛。②《普济方》：石淋。

13657 琥珀散

【方源】《本事》卷十。

【异名】 三棱当归散（《普济方》卷三三四）。

【组成】 荆三棱 蓬莪术 赤芍药 刘寄奴 牡丹皮 官桂 熟干地黄 菊花 真蒲黄 当归（干称）各一两（细锉）（一方不用菊花、蒲黄，用乌药、延胡索）

【用法】 上前五味用乌豆一升，生姜半斤（切片），米醋四升，同煮豆烂为度，焙干，入后五味，同为末。每服二钱，空心、食前温酒调下。若是寻常血气痛，只一服；产后血冲心，二服便下。

【主治】 ①《本事》：妇人月经壅滞，每发心腹脐疞痛不可忍；产后恶露不快，血上抢心，迷闷不省，气绝欲死。②《医碥》：臂痛。

【方论选录】《本事方释义》：荆三棱气味苦平，入足厥阴；蓬莪术气味辛温，入足厥阴；赤芍药气味苦平，入足厥阴，能行血中之滞；刘寄奴气味苦温，入足厥阴，能行血止疼、去癥瘕；牡丹皮气味辛平，入足少阳；官桂气味辛甘温，入足厥阴；熟地黄气味甘苦微寒，入足少阴；甘菊花气味辛凉，

入手太阴、足少阳、厥阴；蒲黄气味辛温，入足厥阴；当归气味辛甘微温，入手少阴、足厥阴；佐以乌豆之润而下行，生姜之辛温而通，米醋之酸而入肝，温酒送药引入经络。妇人经水壅滞及产后恶露不快，腹脐疼痛，血上抢心，迷闷欲绝者，此药治之。虽方中养血药少，行血疏滞药多，要不过欲其去故生新，遂大有功于妇人矣。

13658 琥珀散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】琥珀（研） 海金沙（研） 没药 蒲黄（研）各一两

【用法】上为细末。每服三钱，食前浓煎萱草根汤调下，一日二次。

【主治】五淋涩痛，小便有脓血出。

13659 琥珀散

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】琥珀二两 当归一两半 蒲黄二两 生地黄一两半 瞿麦一两 血余四两（烧灰） 栀子一两 大蓟 小蓟各一两半 甘草三钱 酸浆草自然汁五碗

【用法】上用好酸浆草汁和诸药晒干为末。每服三钱，空心米饮调下。

【主治】血淋。

13660 琥珀散

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】琥珀 人参 茯神 远志 菖蒲 乳香 枣仁 朱砂（为衣）

【用法】先进控涎丹以涌去痰涎，次进本方。

【功用】安神。

【主治】癫疾。

13661 琥珀散

【方源】《名家方选》。

【组成】琥珀 鳖甲 大黄各等分

【用法】上为末。每服二钱，温酒送下，一日二次。

【功用】消瘀血。

【主治】经闭血癖，腹痛。

13662 琥珀散

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】人参 白芍 煅磁石 琥珀各二钱 朱砂 钱 远志肉 石菖蒲各八分 牛黄四分

【用法】上为极细末。每服五分，姜汤送下。

【功用】安神镇静，补心清热。

【主治】怔忡癫痫，心烦口渴，言语失次，哭笑无常，神经错乱，惊悸失眠。

13663 琥珀膏

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】贴痞琥珀膏（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】大黄 朴消各一两

【用法】上为末，大蒜同捣为膏。贴之。

【主治】①《丹溪心法》：积聚痞块。②《杂病源流犀烛》：胠胁胁痛。

13664 琥珀膏

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】大黄二两 郁金 南星 白芷各一两

【用法】上为细末，用大蒜头去壳捣烂，入上药再捣稠，入酒一二匙，调匀。遍敷肿上纸盖，随有热痛，又有不痛，俱待药干便效。次日又有起泡，又有不起泡者，如有泡起挑去泡中黄水，膏贴之自效。

【主治】①《外科正宗》：一切皮色不变，漫肿无头，气血凝滞，结成流毒，毋论身体上下、年月新久，但未成脓者。②《疡科捷径》：鱼口便毒。

【备考】《疡科捷径》有琥珀。

13665 琥珀膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】锦纹大黄

【用法】上为末，捣大蒜调敷。即痛一二时，无妨。至次日去药，发斑或起泡，挑破流水，用月白珍珠散掺之即干，或用西圣膏贴之，以消余肿。

【主治】流注及瘀血顽痰，结成肿块。

13666 琥珀煎丸

【方源】《普济方》卷三三四。

【组成】当归 芎藭 熟地黄 赤芍药各一两 川楝子 玄胡索 蓬术 琥珀（另研）各半两 香附子一两半

【用法】上除琥珀外，用好陈酒一大碗，煮干焙过，研为细末，入琥珀，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心醋汤送下。

【主治】妇人经水不行，脐腹绞痛。

13667 琥珀止淋丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大黄四两 海金沙四两 甘草二两 琥珀四钱

【用法】上为细末，用鸡子清十三个，加冷开水泛为小丸，每十六两用滑石细粉四两为衣，陶亮。每服二钱，温开水送下，日服二次。

【功用】清利膀胱，疏通尿道。

【主治】膀胱邪热，小便赤涩，淋沥浑浊，尿道刺痛。

13668 琥珀多寐丸

【方源】《医统》卷七十。

【组成】真琥珀 真羚羊角（细镑） 人参 白茯神 远志（制） 甘草各等分

【用法】上为细末，猪心血和炼蜜为丸，如芡实子大，金箔为衣。每服一丸，灯心汤嚼下。

【功用】①《饲鹤亭集方》：清心养营，安神定魄。②《中药成方配本》：平肝安神。

【主治】①《医统》引《秘验》：健忘恍惚，神虚不寐。②《中药成方配本》：肝阳上僭，心神不守，惊悸怔忡。

【备考】《医钞类编》无白茯神，有茯苓。《外科传薪集》有白术。

13669 琥珀安神丸

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】琥珀 真珠 生地 甘草各一钱 当归 黄连各三钱 朱砂二钱

【用法】上为末，米糊为丸，如粟米大。每服三十丸，食后麦门冬汤送下。

【主治】病后虚烦不睡。

13670 琥珀导赤汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】琥珀一钱 天冬一钱五分 麦冬一钱五分 生地五钱 丹参二钱 丹皮二钱 赤芍一钱 木通一钱 甘草梢五分 淡竹叶十张 灯心三尺

【主治】心经之火，移于小肠，溲溺淋浊，或涩或痛。

13671 琥珀彻底汤

【方源】《古今名方》引史传恩家传方。

【组成】独活9克 三角将军（即三个角的屎官牛）3个（焙干） 人指甲3克（焙黄） 全蝎 僵蚕（炒）各7个 蝉蜕15克 天南星6克

【用法】水煎服。每日一剂，连服三日。服药前将朱砂粉1.5克，琥珀1.5克，赤金箔3张研细末，用开水或黄酒冲服。

【功用】祛风镇痉止痛。

【主治】破伤风。

13672 琥珀抱龙丸

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】抱龙丸（《婴童百问》卷三）、万金不换抱龙丹（《良朋汇集》卷四）。

【组成】真琥珀 天竺黄 檀香（细锉） 人参（去芦） 白茯苓（去皮）各一两半 粉草三两（去节） 枳壳（水浸润，去壳，锉片，麦麸炒微黄） 枳实（去瓤，锉片，麦麸炒微黄）各一两 朱砂五两（水飞，先以磁石引去铁屑，次用水乳钵内细杵，取浮者飞过，净器中澄清，去上余水，如此法一般精制作，见朱砂尽干用） 山药（去黑皮）一斤（锉作小块，慢火炒令热透，候冷用） 南星一两（锉碎，用腊月黄牛胆酿，经一夏用） 金箔百片（去护纸，取见成药一两，同在乳钵内极细杵，仍和匀前药末用）

【用法】上前十二味，除朱砂、金箔不入研，内余十味，檀香不过火，外九味或晒或焙，同研为末，和匀朱砂、金箔，每一两重，取新汲井水一两重，入乳钵内略杵匀，随手丸此○样大一粒，阴干，晴霁略晒，日色燥甚则捩折，宜顿放当风处，取其自干。用葱汤化服，不拘时候，或薄荷汤送下；痰壅嗽甚，淡姜汤送下；痘疮见形有惊，温净汤送下；心悸不安，灯心汤送下；暑天迷闷，麦门冬熟水送下；百日内婴孩，每丸分三次投；二岁以上者只一丸或二丸。常用瓦瓶入麝香同贮，毋使散泄气味。

【功用】祛风化痰，镇心解热，和脾胃，益精神。

【主治】①《活幼心书》：小儿诸惊；四时感冒风寒、温疫邪热，致烦躁不宁，痰嗽气急；疮疹欲出发搐。②《金鉴》：小儿急惊之后，余热尚在者。

【方论选录】①《活幼心书》：抱龙之义，抱者，保也；龙者，肝也。肝应东方青龙木，木生火，所谓生我者父母也。肝为母，心为子，母安则子安，况心藏神，肝藏魂，神魂既定，惊从何生？故曰抱龙丸。②《广嗣纪要》：抱者，养也；龙者，纯阳之象也。《易》曰：震为龙，一阳初生，乃少阳之气。震为乙木，内应守肝。小儿初生，纯阳之体，肝常有余，故立此方。以抱龙名者，所以保养阳气，使不致于暴泄，滋益阴精，令得制乎炎光也。

13673 琥珀抱龙丸

【方源】《准绳·幼科》卷二。

【组成】琥珀（二钱半包在精猪肉内煨过，取出，研末）二钱 牛胆南星一两六钱（腊月用牛胆作成者妙） 僵蚕二钱（炒） 雄黄 辰砂 人参 白茯苓各三钱 天竺黄五钱 钩藤（全用钩子）一两五钱 真正牛黄五分 真麝香一钱

【用法】上为极细末。用粉甘草八两（锉碎），以水四大碗，熬膏二盏，入药末为丸，每一丸五分重，金箔为衣，外用黄蜡包之，一料二百丸。周岁小儿服一丸，未及者半丸，连进一二丸。发热咳嗽作搐，痰喘惊悸，生姜薄荷汤送下；时行痘疹，发热呕吐惊跳，白汤送下；伤风发热咳嗽，鼻塞惊

哭，葱汤送下；因着惊发热，睡卧不宁，灯心汤送下；夏月发热呕吐，麦门冬汤送下；因母发热过乳，温热不宁，甘草汤送下；脾胃不和，头热，黄瘦，懒食，砂仁汤送下。

【功用】《医述》：祛风化痰，镇心解热。

【主治】小儿急慢惊风，发热咳嗽作搐，痰喘惊悸，时行痘疹，发热呕吐，惊跳；伤风发热咳嗽，鼻塞惊哭；著惊发热，睡卧不宁；夏月发热呕吐；因母发热过乳，温热不宁；脾胃不和，头热黄瘦。

【宜忌】忌食鱼腥、生冷。食乳者，乳母同忌。

13674 琥珀抱龙丸

【方源】《中药成方配本》。

【组成】琥珀五钱 全蝎三钱 僵蚕四钱 胆星二两一钱 天竺黄七钱 飞朱砂三钱 麝香五分 茯苓一两 川贝五钱

【用法】上各取净末和匀，用胆星化糊为丸，分做一百六十粒，每粒约干重四分，蜡壳封固。每用一丸，开水化服，重症加倍。

【功用】化痰定惊。

【主治】小儿发热惊惕，痰壅痉厥。

13675 琥珀抱龙丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】甘草五钱 天竺黄一两二钱 防风一两二钱 天麻一两五钱 茯苓一两五钱 羌活一两五钱 川贝母一两五钱 白附子（炙）一两五钱 蝉退一两五钱 胆星一两五钱 桔梗一两五钱 全蝎九钱 僵蚕（炒）九钱 钩藤九钱 人参（去芦）九钱（以上共为细粉，过罗） 牛黄五钱 珍珠（豆腐炙）五钱 琥珀一两 明雄黄六钱 朱砂六钱 麝香九钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重五分，金衣三十六开，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】清热化痰，镇惊安神。

【主治】内热痰盛，咳嗽喘促，惊吓失魂，惊风抽搐。

13676 琥珀金丝膏

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】黄连（去须）二两 草龙胆 黄柏（去粗皮） 山栀子各一两（以上三味一处捣碎） 青竹叶三百叶（大者，剪碎） 乳香一分（别研） 硼砂一分（别研） 白沙蜜半斤

【用法】上用水三升，同浸一伏时，子银石器内慢火熬至一升，退火放冷，用夹绢袋作五七次绞取药汁，滓脚不用，于不透风处放一伏时，澄下脚滓，又去之，次日再倾取清药汁，更于银器内再以慢火熬去一半，次入白沙蜜同搅，不得住手，候有蜜香，用杖子挑出药试之，放冷再挑起，有丝为度，用夹绢袋子又滤去滓，以瓷盒盛之，方入研细生脑子一字，用膏子搅令匀。每用少许，以铜箸点之。

【功用】退翳除昏。

【主治】一切眼疾。

13677 琥珀泽兰煎

【方源】《局方》卷九（宝庆新增方）。

【组成】紫巴戟（去心，糯米炒） 茴香（炒） 牡丹皮（去心） 刘寄奴草（去枝） 五味子（去梗） 白芷 五加皮（去心） 金钗石斛（去根，锉，酒浸，炒） 泽兰叶（去梗） 川芎 赤芍药 生干地黄（洗，去芦） 川当归（酒浸一宿） 人参（去芦） 白芍药 熟干地黄（洗去土） 艾叶（醋炒，糯米糊调成饼，焙干，为末） 附子（炮，去皮脐） 白术各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，早、晚用温酒磨下。漏胎刺痛，煮糯米饮送下；寒热往来，四肢烦疼，煎青蒿酒送下；妇人、室女经血不通，煎红花酒送下；血晕不省人事，童子小便和暖酒送下；催生，鸡子清和酒送下；血气、血块攻刺心腹，烧秤锤淬酒送下；伤寒及中风口噤，煎麻黄汤送下，用被盖出汗即愈；心惊悸及头疼，薄荷酒送下；咳嗽，煎桑白皮汤送下；血风攻注，浑身瘙痒，头面麻痹，炒黑豆浸酒送下；产前产后常服，不生诸疾。怀胎八月，一日一服，胎滑易产。

【主治】妇人三十八种血气，八风五痹，七癥八瘕，心腹刺痛，中风瘫痪，手足酸疼，乳中结瘀，妊娠胎动，死胎不出，产衣不下，败血凑心，头旋眼花，血注四肢，浑身浮肿，冲任久虚，绝产无嗣，或因有子，经脉不调，赤白带下，恶心呕逆，身体瘦倦。

13678 琥珀定智丸

【方源】《古今医鉴》卷八引刘尚书方。

【异名】琥珀定志丸（《回春》卷四）。

【组成】南星半斤（先将地作坑，用炭十斤在坑内烧红，去灰净，用好酒十余斤倾在坑内，大瓦盆盖覆，周围以炭火拥定，勿令泄气，次日取出，为末） 真琥珀一两（皂角水洗去油） 大朱砂二两（公猪心割开，入内，用线缚住，悬胎煮酒二碗） 干人乳（用姜汁制） 好拣参（去芦）三两 白茯苓（去皮）三两 白茯神（去皮木）三两 石菖蒲

二两（猪胆汁炒） 远志（水泡过，去心）二两（猪胆煮过，晒干，再用姜汁制）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，每夜卧时盐汤送下。

【功用】 补心生血，定魄安魂，扶肝壮胆，管辖神魂。

【主治】 惊战虚弱，气乏之病。

【备考】 晒干人乳法：用人乳数碗，入瓦盘内，莫搅动，四围晒干刮一处，干则再刮。乳干以姜汁拌晒用。方中干人乳用量原缺。

13679 琥珀养心丹

【方源】 《准绳·类方》卷五。

【组成】 琥珀（另研）二钱 龙齿（煅，另研）一两 远志（黑豆、甘草同煮，去骨） 石菖蒲 茯神 人参 酸枣仁（炒）各五钱 当归 生地黄各七钱 黄连三钱 柏子仁五钱 朱砂（另研）三钱 牛黄（另研）一钱

【用法】 上为细末，将牛黄、朱砂、琥珀、龙齿研极细，以猪心血为丸，如黍米大，金箔为衣。每服五十丸，灯心汤送下。

【主治】 气血虚弱，心神失养，惊悸怔忡，失眠健忘，气短体倦，自汗口干，头昏心烦，面色少华。

①《准绳·类方》：心血虚，惊悸，夜卧不宁，或怔忡心跳。②《十二经穴病候撮要》：心虚甚者，多短气自汗，坐卧不安，寐则易觉，多魇。③《全国中药成药处方集》（沈阳方）：气血两亏，失眠健忘，四肢倦怠，精神不爽，头晕心烦，口干液短，面黄肌瘦。

【方论选录】 《医略六书》：心虚热炽，心神失养，则心气不宁，故心跳不已，触事易惊焉。生地养心阴以制火，人参补心气以宁心，黄连清心火之妄动，龙齿定魂魄之飞扬，枣仁滋养心神，远志交通心肾，归身养血荣心，茯神安神定志，柏仁养心气，琥珀利心营，菖蒲开心气以通窍，牛黄凉心热以定惊，朱砂镇坠心气、安心神，更以猪心血引之入心，金箔制肝坠热，灯心泄热从小便去也。盖热从下泄，则心火自降而心气和平，安有心跳善惊之患乎？

13680 琥珀蜡矾丸

【方源】 《外科正宗》卷一。

【异名】 蜡矾丸（《全国中药成药处方集》吉林方）。

【组成】 白矾一两二钱 黄蜡一两 雄黄一钱二分 琥珀一钱（另研极细） 朱砂一钱二分 蜂蜜二钱（临入）

【用法】 上四味先研极细，另将蜜蜡铜杓内熔化，离火片时，候蜡四边稍凝时，方入上药搅匀，共成一块，以一人将药火上微烘，众手急丸，如小寒豆大，用朱砂为衣，瓷罐收贮。每服二三十丸，食后白汤送下，病甚者，早晚日进二次。

【功用】 ①《外科正宗》：护膜护心，散血解毒。②《外科大成》：祛毒化脓，生肌补漏。

【主治】 痈疽、发背、粉瘤、瘰疬、痰核、痔漏、杨梅结毒。

①《外科正宗》：痈疽、发背已成未成脓之际，恐毒气不能外出，必致内攻者。②《外科大成》：粉瘤，瘰疬，痰核，及遍身疮如蛇头，杨梅结毒，痔漏，鼻痣。③《全国中药成药处方集》（吉林方）：斑痧痘疹。

【方论选录】 《成方便读》：方中黄蜡、白矾，皆固涩之品，为护膜之主药，故以为君；雄黄、朱砂、琥珀，不特镇心神、安魂魄，且皆有解毒之功；白蜜甘平而润，护膜解毒，两擅其长。

13681 琥珀分清泄浊丸

【方源】 《中国医学大辞典》。

【异名】 琥珀分清丸（《全国中药成药处方集》沈阳方）。

【组成】 琥珀一两 锦纹大黄十两

【用法】 上为细末，用鸡蛋清二十四个杵为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三钱，空腹时熟汤送下。服后小便出如金黄色，三日后火毒消而淋浊自止，痔肿亦退。

【主治】 肝经湿热毒火下注，淋浊管痛，小溲不利，及下痔火盛，肿痛腐烂。

13682 琼玉膏

【方源】 《洪氏集验方》卷一引铁瓮先生方。

【异名】 神仙琼玉膏（《观聚方要补》卷二引《卫生家宝》）、生地黄膏（《直指》卷十七）、琼玉胶（《理虚元鉴》卷下）。

【组成】 新罗人参二十四两（舂一千下，为末） 生地黄十六斤（九月采，捣） 雪白茯苓四十九两（木舂千下，为末） 白沙蜜十斤

【用法】 上人参、茯苓为细末，蜜用生绢滤过，地黄取自然汁，捣时不得用铁器，取汁尽，去滓，用药一处拌，和匀，入银石器或好瓷器内，封用。如器物小，分两处盛，用净纸二三十重封闭，入汤内，以桑木柴火煮六日，如连夜火即三日夜，取出，用蜡纸数重包瓶口，入井内，去火毒，一伏时取出，再入旧汤内煮一日，出水气，取出开封。每

晨服一匙，以温酒化服；不饮者，白汤化之。一料分五处，可救五人痈疾；分十处，可救十人劳瘵。

【功用】 滋阴润燥，益气养血。

①《洪氏集验方》：填精补髓，发白变黑，返老还童，行如奔马，日进数食或终日不食亦不饥，遇关强记，日诵万言，神识高迈，夜无梦想。②《医学纲目》：补血补气。③《医方集解》：润燥。

【主治】 阴虚劳瘵，口干咽燥，干咳咯血。

①《洪氏集验方》：痈疾，劳瘵。②《东医宝鉴·内景篇》：痈疾。③《证治宝鉴》：里燥，口燥舌干，小便多而浊；吐利或病后胃中津液不足，大便不秘而消渴者。④《金鉴》：肺痿，干嗽咳涎滑。

【方论选录】 ①《医方考》：《易》曰：燥万物者，莫熯乎火。相火一熯，则五液皆涸。此干咳之由也。生地黄能滋阴降火；白蜜能润肺生津；损其肺者益其气，故用人参；虚则补其母，故用茯苓。又地黄、白蜜皆润，蜜两又多，茯苓甘而属土，用之以佐二物，此水位之下，土气乘之之义，乃立方之道也。②《古今名医方论》：丹溪以地黄为君，令水盛则火自息；又损其肺者益其气，故用人参以鼓生发之元；虚则补其母，故用茯苓以培万物之本；白蜜为百花之精，味甘归脾，性润悦肺，且缓燥急之火。四者皆温良和厚之品，诚堪宝重。郭机曰：起吾沉瘵，珍赛琼瑶，故有琼玉之名。③《医方集解》：此手太阴药也。地黄滋阴生水，水能制火；白蜜甘凉性润，润能去燥；金为水母，土为金母，故用参、苓补土生金，盖人参益肺气而泻火，茯苓清肺热而生津也。④《医方论》：人参、地黄气血并补，金水相生，又加茯苓以宁心而补土，则水升火降而咳嗽自除矣。

【临证举例】 血证 《泗溪医案》：平望镇张瑞五，素有血证，岁辛丑，余营葬先君，托其买砖灰等物，乡城往返，因劳悴而大病发，握手泣别，谓难再会矣。余是时始合琼玉膏未试也，赠以数两而去，自此不通音问者三四载。一日，镇有延余者，出其前所服方，问：何人所写？则曰：张瑞五。曰：今何在？曰：即在馆桥之右。即往候之，精神强健，与昔迥异。因述服琼玉膏后，血不复吐，嗽亦渐止，因涉猎方书，试之颇有效，以此助馆谷所不足耳。余遂导以行医之要，瑞书深以为然。后其道大行，遂成一镇名家，年至七十余而卒。

13683 琼玉膏

【方源】《医学正传》卷二引腰仙方。

【组成】 人参十二两 沉香 琥珀各五钱 白砂蜜五斤（煎沸，去沫） 白茯苓（去皮，净者）二十五两 生地黄（去芦，净者）十斤（洗净，银石器内杵细，取自然汁。大忌铁器）

【用法】 上人参、茯苓、沉香、琥珀俱为细末，先将地黄汁与白砂蜜搅匀，用密绢滤去细滓，入药末搅匀，入好瓷瓶或银瓶内，用绵纸十数层，外加箭箬包封，扎瓶口，入砂锅内或铜锅内，以长流水浸没瓶颈，用桑柴文武火煮三昼夜，取出，换蜡纸数重包扎瓶口，浸没井中半日，以出火毒，提起，仍入前锅内煮半日，以出水气，然后收藏。每日清晨及午前后，取一二匙，用温酒一盏调服；不饮酒人，白汤亦可。

【功用】《全国中药成药处方集》（杭州方）：滋阴润肺，安神降气。

【主治】 阴虚内热之虚劳干咳，咯血失音，腹中隐痛，潮热盗汗；消渴；血虚皮肤干燥。

①《医学正传》：虚劳，干咳嗽。②《证治汇补》：气散失音，干咳无痰，或见血线。③《张氏医通》：虚劳，肠中隐痛。④《医学六要》：血虚皮肤枯燥及消渴。⑤《全国中药成药处方集》（杭州方）：阴亏肺热，潮热盗汗。

【方论选录】 ①《医钞类编》：地黄滋阴生水，水能制火；白蜜甘凉性润，润能去燥；人参益肺气而泻火，茯苓清肺热而生津；腰仙加琥珀降肺宁心、沉香升降诸气。②《成方便读》：方中以地黄滋肾水，白蜜养肺阴，使金水相生而燥咳自止；用人参者，取土旺金生、虚则补母之义；茯苓色白入肺，使金令下行，即有浊痰，亦可随之而下矣；加沉香、琥珀者，一则流动其气，一则通达其血耳。

13684 琼花散

【方源】《外科大成》卷四。

【异名】 琼液散。

【组成】 闹羊花（洗净，焙干）

【用法】 上为末。每服三五分，壮者七分，黄酒调服，随饮至醉为度；或先饮酒至半酣，次服药，再饮至大醉为度，连服三次全愈，弱者间一日再服。静卧勿语，语则发麻，次日午时，其麻方解。盖卧避风。

【功用】 ①《外科大成》：消肿止痛。②《金鉴》：消瘀滞。

【主治】 跌打损伤，夹伤，掠伤，杖伤，并寒湿筋骨疼痛。

13685 琼珠散

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】 桑白皮四两 五味子二两 甘草二两（炙） 陈皮二两 粟壳一斤（去蒂膜，用醋浸三

宿，晒干；再入醋浸，晒干）

【用法】 上为末。用冷蜜汤调服。

【主治】 ①《赤水玄珠》：咳嗽，不问远近。②《仙拈集》：远近哮喘。

【宜忌】 忌煎煿、油腻、酒、咸、酸等物。

【备考】 本方方名，《仙拈集》引作"琼林散"。

13686 琼珠膏

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【异名】 止嗽琼珠膏（《济阳纲目》卷二十八）。

【组成】 栗壳二两（去盖筋穰） 桑皮七钱 贝母八钱 五味子五钱 玄参七钱 薄荷五钱 陈皮六钱 桔梗六钱 甘草四钱

【用法】 上为极细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，临睡以白滚汤送下。

【功用】 止嗽。

【主治】 ①《遵生八笺》：痨症。②《济阳纲目》：久嗽。

13687 琼脂膏

【方源】《医学正传》卷二引腦仙方。

【组成】 鹿角胶一斤 生地黄二十斤（洗净，细捣，取真汁，去滓） 白沙蜜二斤（煎一二沸，掠去上沫，净而止） 真酥油一斤 生姜二两（捣，取真汁）

【用法】 上先以文武火熬地黄汁数沸，以绢滤取净汁，又煎二十沸，下鹿角胶，次下酥油及蜜同煎，良久候稠如饧，以瓷器收贮。每服一二匙，空心温酒调下。

【功用】《简明医彀》：润燥通便。

【主治】 ①《医学正传》：血虚，皮肤枯燥及消渴。②《简明医彀》：秘结。

13688 琼液膏

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 闹羊花 红花 蒲黄 白芷 归尾各二两

【用法】 上以麻油一斤，浸药七日，爆枯，滤去滓，入黄蜡、白蜡各一两熔化，稍温，入乳香、没药末各六钱，冰片六分，和匀收用。

【功用】 止疼活血。

【主治】 夹拐所伤。

【备考】《金鉴》本方用法：摊贴。

13689 琼酥散

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】 蟾酥一钱 半夏六分 闹羊花六分 胡椒一钱八分 川椒一钱八分 荜茇一钱 川乌一钱八分

【用法】 上为细末。每服半分，黄酒调服。如欲大开，加白酒药一丸。服之开针不痛。

【功用】 麻醉止痛。

【主治】 一切肿毒等疮需开刀者。

13690 斑龙丸

【方源】《百一》卷四。

【异名】 斑龙脑珠丹（《续易简方论后集》卷四）、仙传斑龙丸（《万氏家抄方》卷四）。

【组成】 鹿角胶（以酒浸胶数日，煮糊丸众药） 鹿角霜（碾为细末） 菟丝子（净洗，酒浸两宿，蒸，研） 柏子仁（净者，别研） 熟地黄（好者，酒浸两宿，蒸焙，余酒入在胶内）各十两

【用法】 上先焙鹿角霜、菟丝子、地黄，干后研为细末，方入柏子仁在众药内研，却将鹿角胶酒约三四升煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至一百丸止，早、晚空心盐汤或酒任下。逐日早晚服，久之大有功效。

【功用】 平补阴阳，填精益髓，强壮筋骨，安神定志，驻颜益寿。

①《百一》：平补。②《万氏家抄方》：理百病，养五脏，补精髓，壮筋骨，益心志，安魂魄，令人悦泽驻颜，延年益寿。③《扶寿精方》：壮精神，养气血。④《医方集解》：补阳。

【主治】 虚劳，消渴。

①《百一》：虚劳。②《续易简方论后集》：消渴。③《赤水玄珠》：真阴虚极及老人、虚人。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手、足少阴药也。鹿角胶霜、菟丝、熟地皆肾经血分药也，大补精髓；柏子仁入心而养心气，又能入肾而润肾燥，使心肾相交。心志旺而神魂安，精髓充而筋骨壮，去病益寿，不亦宜乎？②《医方论》：鹿角、菟丝阴中之阳也；地黄阴中之阴也，用以补肾，不偏不倚。

13691 斑龙丸

【方源】《医学正传》卷三引《青囊集方》。

【异名】 仙传斑龙丸（《医统》卷四十八）、斑鹿丸（《何氏济生论》卷二）、青囊斑龙丸（《饲鹤亭集方》）。

【组成】 鹿角胶（炒成珠子） 鹿角霜 菟丝子（酒浸，研细） 柏子仁（取仁，洗净） 熟地黄各半斤 白茯苓 补骨脂各四两

【用法】 上为细末，酒煮米糊为丸，或以鹿角胶入好酒烊化为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心姜、盐汤送下。老人、虚人常服。

【功用】 滋肾填精，益气养血，升固奇经，通补

督脉，育子添嗣，延年益寿。

①《医学正传》引《青囊集方》：延年益寿。②《医统》：壮精神，除百病，养气血，补百损。③《东医宝鉴·杂病篇》：补肾脏气血精。④《证治宝鉴》：升固奇经。⑤《古方选注》：男服斑龙丸，通督脉之阴阳，补玉堂关下之穴。⑥《丸散膏丹集成》：育子嗣。⑦《北京市中药成方选集》：滋阴益肾，补气养血。

【主治】 虚劳肾虚，真阴亏损，精气不足，遗精滑精，阳痿腰痛，盗汗耳鸣，体倦心烦。

①《医学正传》：真阴虚损。②《证治宝鉴》：肝肾两虚，任督并伤，精滑日久。③《北京市中药成方选集》：肾虚气亏，阳事痿弱，精神短少，遗精盗汗。④《中药制剂手册》：腰痛耳鸣，体倦心烦。

【方论选录】《古方选注》：《乾宁记》云：鹿与游龙相戏，必生异角，故得称龙；鹿有文，故称斑。用其角为方，故名斑龙。鹿卧则口朝尾闾，故为奇经督脉之方。凡入房竭精，耗散其真，形神俱去，虽温之以气、补之以味，不能复也。故以有情之品，专走督脉，复以少阴、太阳之药治其合，乃能搬运精髓，填于骨空，大会于督脉之囟会而髓海充益。鹿角霜通督脉之气也，鹿角胶温督脉之血也，菟丝、骨脂温肾中之气也，熟地、柏仁补肾中之精也，柏仁属木性润，骨脂属火性燥，非但有木火相生之妙，而柏仁通心，骨脂通肾，并有水火既济之功。使以茯苓、性上行而功下降，用以接引诸药，归就少阴、太阳，达于督脉，上朝髓海，而成搬运之功。

【备考】 本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作"斑龙丹"。

13692 斑龙宴

【方源】《韩氏医通》卷下。

【组成】 鹿血

【用法】 此鹿不拘初生，但驯养壮鹿，或一二只，每日用人参一两，煎汤饮之，渣和草料饲之。每用预夜减食，次晨空心以布缚鹿于床，首低尾昂，用三棱针刺眼大眦前毛孔（名天池穴），银管三寸许，插向鼻梁，吮其血，和以药酒（任意，或八珍散加沉香、木香煮者），尽量。月可一度，鹿无恙。若有屠刺鹿血，乘热和酒一醉亦妙。

【功用】《本草纲目》：不拘男女老少，服之终身无疾而寿。

【主治】《增补内经拾遗方论》：脱荣，心血少；痨瘵。

【方论选录】《增补内经拾遗方论》：白斑曰斑；鹿与游龙相戏，必生异角，故得称龙；宴，饮也，刺血饮之，故曰宴。斑龙者，鹿也，气禀纯阳，活血补血，非金石草木之比。

13693 斑延丸

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 斑蝥一两　玄胡索二两

【用法】 上为末，蜜捣作挺，绵裹。纳阴中，留头外出，药深尺许。以恶物下为度。

【主治】 鬼胎，脉无常候者。

【方论选录】 妇人身感妖魅，腹怀异胎，疼痛攻绞，亦为鬼胎。斑蝥大毒之品，力能以毒攻邪；延胡破血之剂，性专活血通经。蜜捣、绵裹，深纳阴中，务使恶物尽去，则经脐廓清而血气无不调，何诸般怪疾之足患哉！

13694 斑蝥丸

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】 斑蝥一分（赤黑斑点者佳，去头翅足，炒）　猪牙皂一分（去黑皮，炙令黄）　蛇蜕皮半两（微炒）　乌蛇一两半（酒渍，去皮骨，炙令微黄）　天南星半两（炮裂，去皮）　露蜂房半两（烧灰）　川大黄三分（锉碎，微炒）　麝香一分（研）　威灵仙半两

【用法】 上为末，入麝香研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心时以粥饮送下。至辰、巳间，病下如虾蟆衣及诸恶物。

【主治】 瘰疬结核肿硬，相连如珠颗，头项肩胛烦疼。

13695 斑蝥丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】 斑蝥一两（糯米拌炒令黄，去翅足）　干漆一分（捣碎，炒令烟出）　麒麟竭一分　硇砂一分　没药一分　凌霄花一分　胎发一两（烧灰）　狗胆一枚（干者）

【用法】 上为末，熬醋和饭为丸，如绿豆大。每日五丸，空心时以桃仁汤送下。

【主治】 妇人月水不通，脐腹积聚疼痛。

13696 斑蝥水

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 砒霜0.5克　枯矾5克　斑蝥3克　白醋50毫升

【用法】 上将前三味药入醋泡七天，备用。用时震摇，以棉花沾药液涂患处，三天一次，连续三次。复发时再用。

【主治】 体癣。

13697 斑蝥酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 斑蝥 15 克　70%酒精 100 毫升

【用法】 上药浸泡一周。用棉签涂病灶。数小时后，即起水疱，用消毒针头刺破，敷料包扎，历三四天结痂而愈。

【主治】 神经性皮炎。

13698　斑蝥散

【方源】《洞天奥旨》卷十六。

【组成】 斑蝥（炒，去翅足，同米熟）　雄黄各等分

【用法】 上为细末。温酒调送。

【主治】 疯犬吠咬伤。

13699　斑蝥醋

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 （1）土槿皮 180 克　蛇床子 125 克　百部 125 克　斑蝥 3 克（布包）　（2）硫黄 125 克　樟脑 18 克　白信 18 克　轻粉 18 克（研成细末）

【用法】 先将（1）加入米醋 5000 毫升内，浸泡一月后去滓，再加入（2）。用时振荡，毛笔蘸水涂上。

【功用】 灭菌止痒。

【主治】 神经性皮炎，头癣，脚癣，体癣。

13700　斑龙二至丸

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】 鹿角（锯成段，长流水浸七日，入砂锅内，用桑柴火煮七日夜，取出，外去粗皮，内去血穰，研为细末）一斤　麋角（制法同前，净末）一斤　生地（酒浸一宿，晒干，为末）四两　黄柏（去皮，切粗片，酒炒老黄色，为末）半斤　熟地（酒浸一宿，晒干，为末）四两　天门冬（酒浸，去心，晒干）四两（为末）　知母（去皮，盐、酒炒老黄色，为末）半斤　麦门冬（酒浸，去心，晒干）四两　当归（酒洗，晒干，为末）二两　白茯苓（去皮，为末，用水淘去筋膜）二两　何首乌（去皮，人乳拌匀，九蒸九晒，为末）二两（勿犯铁器）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心时黄酒送下，或盐汤亦可。

【功用】 ①《摄生众妙方》：补养。②《医统》：补血，补阳。

【主治】 ①《扶寿精方》：诸虚。②《名医类案》：精血欠充，高龄无子。

【临证举例】 高龄无子　《名医类案》：少傅颍阳许相公，年五十八岁，如夫人年近三旬，从来十二年不孕。相公欲其有子，命宿诊视。六脉和缓，两尺大而有力（凡妇人两尺大而有力，皆有子）。告曰：此宜子之象也。尝诊相公，脉沉而缓，知精血欠充实耳。宜服大补精血药。市得麋鹿二角，煎胶，制斑龙二至丸一料。服未周年而孕，次年生公子。

【备考】 方中鹿角、麋角，《扶寿精方》作"鹿角霜"、"鹿角胶"。

13701　斑龙百补丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】 鹿角霜十两　鹿角胶四两　人参四两　杜仲三两（姜汁拌炒）　川牛膝四两（酒洗）　白茯苓四两　芡实四两（粉）　黄柏四两　川当归三两（酒洗）　干山药四两（炒）　黄耆四两（酒炒）　知母四两（盐水炒）　怀生地四两（酒洗）　五味子二两　枸杞三两

【用法】 炼蜜和胶为丸，如梧桐子大。每服百余丸，空心盐汤送下。

【功用】 ①《墨宝斋集验方》：补益。②《奇方类编》：固本保元，复天真，壮阳气，益五脏，助精神，强筋骨，美颜色，延寿算，通神明。

13702　斑龙固本丹

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】 人参（去芦）二两　干山药二两　怀生地黄二两　熟地黄（酒蒸）二两　天门冬（去心）二两　菟丝子（酒煨，捣饼，焙干）四两　山茱萸（酒蒸，去核）二两　巴戟（酒浸，去心）二两　甘枸杞子二两　麦门冬（去心）二两　杜仲（姜炒）二两　五味子二两　肉苁蓉（酒浸）二两　牛膝（酒洗，去芦）二两　远志（甘草水泡，去心）一两　覆盆子二两五钱　泽泻一两　地骨皮一两五钱　老川椒一两　白茯苓（去皮）二两　石菖蒲二两　车前子一两五钱　大附子（面裹煨，去皮脐，切片，童便浸炒）一两　木香二两　虎胫骨（酥炙）二两　柏子仁二两

【用法】 上为细末，用好酒化五仁斑龙胶为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心时温酒送下。服至半月，阳事雄壮；服至一月，颜如童子，目视十里，小便清滑；服至三月，白发至黑；久服神气不衰，身轻体健。

【功用】 大补虚寒。

【主治】 诸虚百损，五劳七伤，形容羸瘦，颜色衰朽，中年阳事不举，精神短少，未至五旬，发须先白，并左瘫右痪，步履艰辛，脚膝痿软，小腹疝气；妇人下元虚冷，久无孕育。

13703　斑蝥醋浸剂

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 全虫十六个　斑蝥十二个　皮消四钱　乌梅肉一两　米醋一斤

【用法】 上药入醋内浸泡七昼夜，过滤备用。涂于患处。

【功用】 杀虫止痒。

【主治】 神经性皮炎（顽癣），皮肤瘙痒症（瘾疹）。

【宜忌】 皮肤有损伤者勿用。

13704　斑龙二至百补丸

【方源】《医统》卷四十八。

【异名】 斑龙二至丸(《中药成方配本》)、斑龙百补丸(《全国中药成药处方集》青岛方)。

【组成】 鹿角五十两（新取连脑骨者佳，锯作二寸长段，长流水洗，米泔浸一宿，刷洗净，吹晒干，同后药和入瓷坛煮胶）　黄精八两　枸杞子四两（甘州者）　怀熟地黄四两　菟丝子四两（热水淘净）　金樱子四两（去毛子净）　天门冬（去心）二两　麦门冬（去心）二两　川牛膝二两（酒洗）　龙眼肉一两　楮实子二两（热水洗）

以上十味同角和匀，入净好金华坛内，层层放实，用新汲淡水注坛中平肩，以密棱布四层封口，以新砖压之，置大锅中井字架上，以木甑盖好，重汤煮三日夜，毋得间断火候。旁用小锅烧滚水，不时添注坛内井锅内，勿使干涸。日足，取起，滤去滓，将汁用罗底绢绞出，入净砂锅内，文火熬成膏，约一斤半。再炼蜜二斤（滴水成珠）掺入，调和后项药，杵烂为丸。

鹿角霜十两　人参五两　黄耆（蜜炒）四两　鸡头粉四两　白茯苓（去皮）四两　怀山药四两（炒）　山茱萸肉（连核者一斤，盐水洗过，取肉）四两　怀生地黄四两（酒洗，掐断，绢包，饭上蒸过）知母四两（盐水炒）　五味子一两（去梗）　夏月加川黄柏四两（炒褐色）

【用法】 上为细末，用前膏和匀为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心时淡盐汤送下。随用煮熟莲子肉或晒干枣数枚以压之，俾纳丹田也。

【功用】 固本保元，生精养血；培复天真，大补虚损。益五内而除骨蒸，壮元阳而多子嗣。充血脉，强健筋骸；美颜色，增延龄算。聪明耳目，玄润髭须。

【主治】 ①《中药成方配本》：老年精血亏损，元阳虚惫，腰膝痿软，畏寒足冷，夜溺频多。②《全国中药成药处方集》（杭州方）：肾虚腰痛，阳痿梦泄，精神衰弱，元气亏虚。

13705　替针丸

【方源】《三因》卷十四。

【组成】 雄雀粪二十七个（直者）　硇砂一字匕（别研）　陈仓米一字（为末）　没药一字（研）

【用法】 上研匀，以米饮为丸，如粟米大。每用一粒，贴在疮头，或疮眼中，即溃脓出。

【主治】 痈疽虽溃，而脓不出。

13706　替针丸

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】 白丁香　硇砂（另研）　真没药（另研）　乳香各等分　糯米四十粒（先用矿灰拳大一块，置瓷碗内，量入井水，待热气将息，以米排入灰中，良久，候米如水晶状，取出用之）

【用法】 上为末，各一匙，入糯米和匀，收贮，用时饭为丸，如麦粒大。每用一粒，水湿粘疮头。其脓自出。

【功用】 ①《景岳全书》：泄毒生肌敛疮。②《中国医学大辞典》：溃痈脓。

【主治】 痈疽，脓成不溃者。

13707　替针丸

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】 雄麻雀屎　乳香（去油）　没药（去油）各三分

【用法】 上为末，飞面为丸，如黍米大，晒干用。利针拨破疮头，粘上膏药盖之。即破。

【功用】 追脓去腐止痛。

【主治】 疮疡。

13708　替灸丸

【方源】《袖珍》卷四。

【组成】 茯苓　艾叶八两　香附子　当归四两　吴茱萸三两（炒）　川芎二两　白芍药二两

【用法】 上用醇醋五升，砂锅煮干，为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心用淡醋汤送下，一日二次。

【功用】 温中暖脐，调经脉，令人有子。

【主治】 妇人赤白带下，久冷肚腹疼痛，经脉不调，面色萎黄，手脚疼痛，四肢无力，久无子息。

【备考】 方中茯苓、香附子用量原缺。

13709　楮叶丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】 干楮叶（炒）　桑根白皮（锉，炒）　人参　白茯苓（去黑皮）　定粉各一两

【用法】 上为细末，取楮汁和丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎人参汤送下，不拘时候。

【主治】 消渴减食，饮水不休。

13710 楮叶散

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】蜗牛（焙干）半两 蛤粉 龙胆（去土） 桑根白皮（锉，炒）各一分

【用法】上为散。每服一钱匕，煎楮叶汤调下，不拘时候。

【主治】消渴久不愈。

13711 楮枝汤

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】细楮枝十两（锉） 黑豆一斗 细桑枝十两（锉）

【用法】上以水五斗，煎取一斗，去滓，别煎取三升，每服暖一小盏服之，一日三四次。

【主治】水蛊，遍身肿。

13712 楮实丸

【方源】《养老奉亲》。

【组成】楮实半斤（轻杵去白及膜，拣净，微炒） 鹿茸四两（茄子茸为上，其次亦得，净瓦上炙令黄色，如无则鹿角屑代之亦妙） 大附子四两（炮，去皮脐，出火毒） 怀牛膝四两（去芦头，酒浸二宿，焙） 紫巴戟四两（洗，去心） 金钗石斛四两（去根，拣净，细切） 川干姜二两（炮制，急于新水内净过） 肉桂二两（去粗皮）

【用法】上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【功用】驻颜轻身，补肾壮骨，暖胃进食。

【主治】积冷虚乏，一切气疾。

【宜忌】忌牛肉、豉汁。

13713 棱术饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】槟榔 三棱 莪术 草果各一钱 山楂 白芍 麦芽 陈皮 砂仁 广木香各一钱五分 甘草五分

【用法】水煎，热服。

【主治】饮食凝积，结聚肠胃，并有寒邪，满腹痛不可忍者。

13714 棱莪消积汤

【方源】《妇产科学》。

【组成】三棱 莪术 丹参 赤芍 延胡索 丹皮各三钱 桃仁四至五钱 苡仁四至五钱 红藤 败酱草各一两

【用法】根据病情进展情况，每日可给一至二剂，每剂二汁，每4～8小时一次。

【功用】破瘀理气，清化湿热。

【主治】盆腔炎癥瘕期。

【加减】检查包块大而腹痛甚者，加乳香、没药各一钱半；腹胀明显者，加木香一钱，川楝子四钱，香附四钱；脘闷，胃口不好者，加川朴、陈皮、建曲各三钱；便秘者，加枳壳、大黄各三钱，乌贼骨四钱；气虚者，加党参、白术、茯苓各三钱；血虚者，加当归三钱，川芎二钱，生地四钱。

【方论选录】方用三棱、莪术、桃仁破瘀散结；丹参、赤芍、延胡索活血散瘀，理气止痛；丹皮、苡仁、红藤、败酱草清利湿热。

13715 植芝汤

【方源】方出《医学纲目》卷三十五引丹溪，名见《济阴纲目》卷六。

【组成】当归一两（酒洗） 川芎七钱半 白芍 白术 半夏（汤泡） 香附 陈皮各一两 茯苓二两 甘草一两

【用法】上作十帖。每帖用姜三片，水煎，吞茂芝丸。

【主治】妇人肥盛，身中有脂膜闭塞子宫，以致经事不行，不能孕育者。

13716 椒仁丸

【方源】《普济方》卷二四三引《指南方》。

【组成】椒仁 商陆 橘皮 桑白皮各等分

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，以通为度。

【功用】《鸡峰》：通利小便。

【主治】脚气，血分，水肿。

①《普济方》引《指南方》：脚气。膝胫痿弱，胸中痞闷，小便不通。②《普济方》引《卫生家宝方》：血分。妇人经水断绝，继则四肢浮肿，小便不通。③《鸡峰》：足膝虚肿。

13717 椒仁丸

【方源】《全生指迷方》卷三。

【异名】治血分椒仁丸（《外科发挥》卷五）。

【组成】五灵脂 吴茱萸（炒） 延胡索（炒）各半两 芫花（醋浸一宿，炒）一分 续随子（去皮，研） 郁李仁（去皮，研） 牵牛（炒熟）各半两 石膏（火煅过）一分（研） 椒仁 甘遂（炒） 附子（炮，去皮脐） 木香各半两 胆矾一钱（研） 砒一钱（研）

【用法】上为细末，白面糊丸，如豌豆大。每服一粒，橘皮汤送下，早晨、日午、临卧服。

【主治】水肿。

①《全生指迷方》：身体及髀股胻皆肿，环脐而痛，不可动，动之为水，亦名伏梁。②《鸡峰》：石水，腹中如鼓，按之坚硬，腹中时痛，始起于日

下微肿，时喘，小便不利，四肢瘦削，其脉自沉，大便利则逆。③《女科百问》：因经水断绝后致四肢面目浮肿，小便不通，名曰血分，水化为血，血不通则为水矣。

【加减】 如妇人血分，去木香，加斑蝥、芫青各三十枚（去头足翅），炒当归半两

【临证举例】 妇人血分《女科撮要》：一妇人月经不调，晡热内热，饮食少思，肌体消瘦，小便频数，服济阴丸，月经不行，四肢浮肿，小便不通。余曰：此血分也。朝用椒仁丸，夕用归脾汤渐愈，乃以人参丸代椒仁丸，两月余将愈，专用归脾汤五十余剂而痊。

【备考】《普济方》有巴豆。《女科撮要》云："此方药虽峻利，所用不多，若畏而不服，有养病害身之患，常治虚弱之人亦未见其有误也。"

13718 椒术丸

【方源】《保命集》卷中。

【异名】 补本丸（《医学纲目》卷二十三）。

【组成】 苍术二两 小椒一两（去目，炒）

【用法】 上为极细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，或三十丸，食前温水送下。如小儿病，丸如黍米大。

【主治】 飧泄。

【加减】 恶痢久不愈者，加桂。

13719 椒目丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】 椒目一两半（微炒去汗） 汉防己一两半 消石二两 杏仁二两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，别研入）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前用煎桑枝汤送下。

【主治】 风水。面肿，小便涩。

13720 椒目丸

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】 椒目（微炒出汗） 牡蛎（煅） 葶苈（纸上炒） 甘遂（炒）各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服十丸，米饮送下。取利，利后服白米粥养之。

【主治】 水蛊，遍身洪肿。

13721 椒目丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷五。

【组成】 椒目 甘遂 附子 千金子 郁李仁 黑牵牛 五灵脂 吴萸 当归 延胡索各五钱 芫花一钱 青十枚（去头翅足，同米炒） 斑蝥十枚（制同蚘青） 胆矾一钱 石膏二钱

【用法】 上为细末，糊为丸，如芡实大。每服一丸，橘皮汤送下。

【主治】 血分肿胀。妇人经水为患，致四肢肿，小便不通。

13722 椒目散

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】 川椒目（沉水者，略炒）

【用法】 上为末。每服一钱，姜汤调下。

【主治】 水泛于肺，肺得水而浮，故喘不得卧。

13723 椒朴丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】 船上茴香（炒） 陈皮（去白） 青盐各四两 生姜（连皮） 厚朴各一斤（去粗皮） 大枣一百二十枚 川椒（去目合口者，净，炒出汗）半斤 黑附子二两（炮，去皮脐）

【用法】 上用水一斗二升，同入银石器内煮，大沸后用慢火煮令水尽，取出焙干，为细末，酒糊丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心米饮送下。

【主治】 脾胃虚冷，不思饮食，四肢倦怠，泄泻无时。

13724 椒朴丸

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】 川椒三两（炒，去闭口） 厚朴一两半（制） 干姜一两半（炒） 小茴三两（盐水炒） 茯苓三两 益智三两（盐水炒）

【用法】 上为末，酒糊丸。每服三钱，米饮送下。

【功用】 温中散冷。

【主治】 伤冷腹痛，泄泻，脉紧者。

【方论选录】 胃伤生冷，寒结于中，不能敷化精微四达，故泄泻腹痛不止焉。川椒补火温中以散冷，厚朴散满除湿以宽中，干姜暖胃止痛，茯苓渗湿止泻，小茴温经络化气，益智摄寒涎厚肠。酒丸以行药力，米饮以和胃气也。使生冷消化，则脾胃调和而敷化有权，腹痛泄泻有不止者乎？

13725 椒芩丸

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】 熟地黄（切，焙干） 川椒（去目及闭口者，微炒） 生地黄（切，焙干）各等分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐米饮送下。

【主治】 目昏多泪。

【临证举例】 目昏多泪 《审视瑶函》：江陵傅氏，家贫，鬻纸为业，好接待游士。一日，有客方巾布袍，邀博饮，傅目昏多泪，客教以此方，服不

一月，目能夜视物，享年八九十，聪明不衰。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典》引作"椒地丸"。

13726 椒红丸

【方源】《传信适用方》卷二。

【组成】 地黄二斤（洗净，焙干） 川椒一斤（去合口并目，焙干） 苍术三斤（米泔浸三日，焙干）

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒或盐汤送下，一日二次。服药旬日，黑花并除。

【主治】 眼生黑花。

13727 椒灵丹

【方源】《普济方》卷八十三引《家藏方》。

【组成】 青盐二两 川芎 防风 附子（炮）各一两 菊花半两 椒子四两（去蒂并子及有闭口者）

【用法】 上先将青盐、椒用好醋一碗，煮尽为度；后将四味药为细末，将椒裹药为丸。每服三十丸，空心盐汤送下。宜与飞灵丹相间服。

【主治】 眼见一物为二之证。

13728 椒附丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】 蜀椒（去目并闭口，炒出汗）一分 附子（炮裂，去皮脐）一两 木香（炮） 细辛（去苗叶）各半两

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午、临睡温酒送下。

【主治】 厥逆头痛，齿痛骨寒。

13729 椒附丸

【方源】《医方类聚》卷十引《济生》。

【组成】 椒红（炒出汗） 桑螵蛸（酒炙） 龙骨（生用） 山茱萸（取肉） 附子（炮，去皮） 鹿茸（酒蒸，焙）各等分

【用法】 上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】 肾脏虚寒之尿频，泄泻。

①《医方类聚》引《济生》：小肠虚冷，小便频多。②《丹溪心法》：五更泄泻，久而重，其人虚甚。③《济阳纲目》：肾脏虚寒，大便滑泻。

【方论选录】《医方考》：虚者，肾精不足也；寒者，命门火衰也。肾主二便，肾脏虚寒，则不能禁固，故令大便滑泻。味厚为阴中之阴，故用山茱萸、鹿茸以益肾家之阴；辛热为阳中之阳，故用椒红、附子以壮命门之火；味涩可以固脱，故用螵蛸、龙骨以治滑泻之脱。

13730 椒附丸

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验方）。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 川椒（去目，炒出汗） 槟榔各半两 陈皮（去白） 牵牛（微炒） 五味子 石菖蒲 干姜（炮）各一两

【用法】 上锉，以好米醋于瓷器内用文武火煮令干，焙为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，盐酒或盐汤空心食前吞下。妇人血海冷，当归酒送下；泄泻，饭饮送下；冷痢，姜汤送下；赤痢，甘草汤送下。

【功用】 补虚壮气，温和五脏，暖补下元。

【主治】 下经不足，内挟积冷，脐腹弦急，痛引腰背，四肢倦怠，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鸣，心忪短气，夜多异梦，昼少精神，时有盗汗，小便滑数，遗沥白浊，脚膝缓弱，举动乏力，心腹胀满，不进饮食；妇人血海冷，泄泻，冷痢，赤痢；肾气亏乏，腰疼。

13731 椒附丸

【方源】《得效》卷三。

【组成】 绵附一个（十二钱者） 胡椒一百粒

【用法】 上为末，姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，姜汤或盐汤空心吞下。

【主治】 脐下极冷，腹痛楚异常，手足亦冷，不任冷水冷食，面黄肌瘦，按之痛稍止者。

13732 椒附散

【方源】《本事》卷二。

【组成】 大附子一枚（六钱以上者，炮，去皮脐，末之）

【用法】 上每末二大钱，好川椒二十粒，用白面填满，用水一盏半，加生姜七片，同煎至七分，去椒入盐，通口空心服。

【主治】 肾气上攻，项背不能转侧。

【方论选录】《本事方释义》：附子气味咸辛大热，入手足少阴；川椒气味辛热，入足厥阴。病因下焦空虚，肾气不安其位，反上攻项背，不能转移。微佐以盐，使其引归经络。

【临证举例】 项背痛 《本事》：一亲患项筋痛，连及背胛不可转，服诸风药皆不效，予尝忆千金髓有肾气攻，背项强一证，处此方与之，两服顿瘥。自尔与人皆有验。

13733 椒茱汤

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】 花椒 吴茱萸各一两 蛇床子 藜芦 陈茶叶一撮 煨盐二两

【用法】 上以水五七升煎，乘热熏洗。

【主治】 妇人阴户痒不可忍。

【备考】 方中蛇床子、藜芦用量原缺。

13734 椒面粥

【方源】《养老奉亲》。

【异名】 椒面羹(《饮膳正要》卷二)。

【组成】 蜀椒一两（熬，捣为末） 白面四两

【用法】 上和椒拌匀即煮，空心食之，一日一次。

【功用】《药粥疗法》：暖胃散寒，温中止痛。

【主治】 脾胃虚寒，腹痛，泄泻，呕吐。

①《养老奉亲书》：老人脾胃虚弱冷痛，泄痢无常，不下食。②《圣济总录》：久患冷气，心腹结痛，呕吐不能下食。③《医统》：老人噎食，胸胁逆满，食不下。

【备考】《圣济总录》本方用法：将椒末于面内拌匀，于豉汁中煮令熟，空腹食之。

13735 椒桂汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 川椒（炒黑）六钱 桂枝六钱 良姜三钱 柴胡六钱 小茴香四钱 广皮三钱 吴茱萸（泡淡）四钱 青皮三钱

【用法】 上用急流水八碗，煮成三碗，温服一碗，覆被令微汗佳；不汗，服第二碗，接饮生姜汤促之；得汗，次早服第三碗，不必覆被再令汗。

【主治】 暴感寒湿成疝，寒热往来，脉弦反数，舌白滑，或无苔不渴，当脐痛，或胁下痛。

【方论选录】 此小邪中里证也。既有寒热之表证，又有脐痛之里证，表里俱急，不得不用两解。方以川椒、吴萸、小茴香直入肝脏之里，又芳香化浊流气；以柴胡从少阳领邪出表，病在肝治胆也；又以桂枝协济柴胡者，病在少阴，治在太阳也，所谓病在脏治其腑之义也，况又有寒热之表证乎！佐以青皮、广皮，从中达外，峻伐肝邪也；使以良姜，温下焦之里也，水用急流，驱浊阴使无留滞也。

13736 椒盐散

【方源】《直指》卷二十一。

【异名】 如神散(《局方》卷七续添诸局经验秘方)。

【组成】 川椒 白盐 露蜂房（炒）各等分

【用法】 上锉细。每服二钱，以井水、葱白煎，热含冷吐。

【主治】 风牙、虫牙疼痛，舌肿。

①《直指》：齿虫痛。②《局方》（续添诸局经验方）：新久风牙、虫牙，攻注疼痛，日夜不止，睡卧不安，或牙齿动摇，连颊浮肿。③《御药院方》：舌肿强，及龈肿不消。

【备考】《兰台轨范》本方用法：川椒、露蜂房二味炙灰，为末擦。

13737 椒粉散

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 肉桂二分 川椒 当归梢 猪苓各三分 蛇床子 黑狗脊各五分 麻黄根一钱 轻粉少许 红花少许 斑蝥二枚

【用法】 上为末。干掺上。

【主治】 前阴两丸湿痒痛，秋冬甚，夏月减。

【宜忌】 避风寒冷湿处坐卧。

【备考】 方中麻黄根，《医统》作麻黄。

13738 椒梅汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】 乌梅 花椒 槟榔 枳实 木香（另研） 香附 砂仁 川楝子（去核） 肉桂 厚朴 干姜 甘草各等分

【用法】 上锉一剂。加生姜一片，水煎服。

【主治】 虫痛。心腹痛，胃口有虫作痛者，时痛时止，面白唇红。

13739 椒梅汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】 黄连二钱 黄芩二钱 干姜二钱 白芍（生）三钱 川椒（炒黑）三钱 乌梅（去核）三钱 人参二钱 枳实一钱五分 半夏二钱

【用法】 水八杯，煮取三杯，分三次服。

【功用】 酸苦泄热，辅正驱邪。

【主治】 ①《温病条辨》：暑邪深入厥阴，正虚邪炽，舌灰，消渴，心下板实，呕恶吐蛔，寒热，下利血水，甚至声音不出，上下格拒者。②《镜京直指》：暑入肝，四肢麻痹。

13740 椒蟾散

【方源】《证治宝鉴》卷五。

【组成】 胡椒四十九粒

【用法】 上药入活虾蟆腹中，盐泥固，煅存性。卧时分五次好酒调服。

【功用】 劫寒痰。

【主治】 哮证遇冷即发，属中外皆寒者。

【宜忌】 有热者忌用。

13741 椒柏洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 川椒 15 克 黄柏 15 克 蛇床子 15 克 生苍术 12 克 石菖蒲 12 克 荆芥 9 克 银花 9 克

连翘9克 白芷6克 明矾6克 刺蒺藜6克 生甘草6克 蝉蜕9克

【用法】 水煎，熏洗。

【主治】 急性湿疹，初见皮肤潮红赤热，继起粟粒丘疹，易于湿润流水。

【加减】 慢性者，加大枫子。

13742 椒术养脾丸

【方源】《明医指掌》卷五。

【组成】 麦芽（炒）四两 白茯苓四两 人参（去芦）二两 苍术（米泔浸，晒干，炒燥）二两 白术（土炒）二两 干姜（炮）五钱 砂仁五钱 川椒（去目）三钱 甘草（炙）四钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，每两作八丸。每服一丸，细嚼，姜汤送下。

【主治】 ①《明医指掌》：脾胃虚冷，心腹胀闷，呕逆泄泻。②《证治汇补》：脾胃虚而着湿。

13743 椒目瓜蒌汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 椒目五十粒 瓜蒌果五钱（切） 桑皮二钱 葶苈子二钱 橘红一钱 半夏一钱五分 茯苓二钱 苏子一钱五分 蒺藜三钱 姜三片

【主治】 悬饮者，水流胁下，肝气拂逆，肺失清肃，咳而引痛也。

13744 椒朴健脾散

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【异名】 椒附健脾散（《百一》卷二）。

【组成】 川椒（去目，微炒出汗） 厚朴（去粗皮，姜汁制） 肉豆蔻（面裹煨熟） 诃子（煨，去核） 缩砂仁 丁香 木香 附子（炮，去皮脐） 高良姜 干姜（炮） 甘草（炙）各一两 草澄茄 赤石脂 半夏（生姜汁制） 陈橘皮（去白） 神曲（炒） 大麦芽（炒）各七钱半

【用法】 上㕮咀。每服四钱，以水一盏半，加生姜五片，大枣三枚，同煎至一盏，去滓，食前稍热服。

【功用】 ①《杨氏家藏方》：健脾温胃，消谷嗜食，育气养神，厚固脏腑。②《普济方》：理脾进食，和胃顺气。

【主治】《百一》：翻胃腹痛。

13745 椒红光明丸

【方源】《玉案》卷三。

【组成】 川椒 夜明砂 海金沙 菊花 石决明 川芎 蝉蜕 白蒺藜 防风 苍术 熟地 当归 车前子 川乌各一两 玄精石三钱 黄连 珍珠各五钱 人参八钱

【用法】 上为末，蜜为丸。每服三钱，空心木香汤送下。

【主治】 瞳仁黄风内障。

13746 椒红固肠丸

【方源】《普济方》卷二〇八引《瑞竹堂方》。

【组成】 神曲六两（锉作小块，炒香熟） 白术一两（锉，炒干） 川姜（去皮，炮）三两 川椒（去目，炒去汗，取干净）一两半 厚朴（去粗皮，姜炙）一两 肉豆蔻三两（面裹煨）

【用法】 上为细末，别用蒜不拘多少，湿纸裹煨香熟，剥净研如泥，热汤化开，滤去滓，少入面打糊和药为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心米饮汤送下，一日二次。

【主治】 脾胃积冷，肠鸣，大便滑泄，腹痛。

13747 椒附白通汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 生附子（炒黑）三钱 川椒（炒黑）二钱 淡干姜二钱 葱白三茎 猪胆汁半烧酒杯（去渣后调入）

【用法】 上水五杯，煮成二杯，分二次凉服。

【功用】 齐通三焦之阳，急驱浊阴。

【主治】 足太阴寒湿，舌白滑，甚则灰，脉迟，不食，不寐，大便窒塞，浊阴凝聚，阳伤腹痛，痛甚则肢逆。

【方论选录】 此苦辛热法复方也。苦与辛合，能降能通，非热不足以胜重寒而回阳。附子益太阳之标阳，补命门之真火，助少阳之火热。盖人之命门，与太阳之阳少阳之阳旺，行水自速。三焦通利，湿不得停，焉能聚而为痛，故用附子以为君，火旺则土强。干姜温中逐湿痹，太阴经之本药，川椒燥湿除胀消食，治心腹冷痛，故以二物为臣。葱白由内而达外，中空通阳最速，亦主腹痛，故以之为使。浊阴凝聚不散，有格阳之势，故反佐以猪胆汁，猪水畜，属肾，以阴求阴也；胆乃甲木，从少阳，少阳主开泄，生发之机最速。此用仲景白通汤，与许学士椒附汤，合而裁制者也。

13748 椒梅理中汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】 人参 白术二钱 干姜一钱 乌梅二个 川椒一钱（微炒）

【用法】 水煎服。一二剂后，蛔安，即服补脾药加使君子肉七个，或每早单服使君子肉五六个，但须每月初旬，虫头向上，服之即蛔下。

【主治】 伤寒吐蛔。

【备考】 方中人参用量原缺。《医家四要》有炮

姜、甘草，九干姜。

13749 棉子丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】棉子八两 升麻 炮姜各四钱 白术一两 半夏半钱

【用法】上用沙糖炒烊为丸。每服二钱，空心米汤送下。服至半月许，当有寒积如稀痰一般随大便下，以下尽为度，即勿服。再服健脾温中暖腹之剂。

【主治】寒积。感伤寒冷成积，腹中疼痛，必以手重按，或将物顶住稍可，口吐清水。

13750 棉柿丸

【方源】方出《种福堂方》卷二，名见《卫生鸿宝》卷二。

【组成】当归身一两 怀生地一两（竹刀切片，烘脆） 萸肉一两 真阿胶一两（将石膏二两研碎，和炒成珠，去石膏不用，候冷，研为细末） 棉子仁一斤（燎去外面花衣，然后入锅内炒至逐粒暴开，并至焦黑存性） 真柿霜（即柿饼上白霜也，不可经火，俟诸药研末后，方和入）

【用法】上药逐味炒焦如墨色，又各要存性，共研为细末，和入柿霜拌匀。每日空心服药末四钱，白滚汤一饭碗冲和，将箸调末，即半浮半沉，连汤饮下。若下血太甚，临晚再服三钱，俟粪色变黑，血渐止矣。

【主治】肠风下血。

【宜忌】忌食胡椒、烧酒辛热之物。

13751 棉裹散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】当归 黄连各一钱 铜青七分 枯矾四分 朴消

【用法】上为细末，用细绢包棉缚紧，每一个约龙眼核大。要用时将一个用白汤半盏泡洗，一日二次。

【主治】眼湿泪烂弦。

【备考】方中朴消用量原缺。

13752 棉花仁丸

【方源】《奇方类编》卷下。

【异名】棉花子丸（年氏《集验良方》卷二）。

【组成】棉花子十数斤（用滚水泡过，盛入蒲包内闷，一炷香取出，晒裂开，去壳取仁，并去外皮，用净仁三斤，去尽油，用火酒三斤，泡一夜收起，蒸一炷香，晒干为末） 故纸一斤（盐水泡一夜，炒干） 川杜仲一斤（去外粗皮，黄酒泡一夜，压干，姜汁炒去丝） 枸杞子一斤（黄酒浸蒸，晒干） 菟丝子一斤（酒煮，去丝为度）

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱。

【功用】乌发，暖肾，种子。

【宜忌】年氏《集验良方》：阳虚人宜此药。

13753 棉子乳香汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】棉花子（炒，研；取仁，焙用） 金银花 何首乌 白鲜皮 薏苡仁 防风 荆芥 当归 川芎 白芍 茯苓 槟榔 牛膝 木瓜 防己 乳香 没药俱减半 甘草少许 土茯苓量用

【用法】水煎服。三二日见效，十余剂霍然。

【主治】风毒疼痛，不可忍者。

13754 棕毛散

【方源】《普济方》卷三三一。

【组成】棕毛（烧灰存性） 蒲黄（炒）各等分

【用法】上每服三钱，空心、食前好酒调下。一日二次。

【主治】赤白带下，血崩漏下，胎气久冷，脐腹疼痛。

13755 棕灰散

【方源】《景岳全书》卷六十一引《百一》。

【组成】败棕不拘多少（烧灰存性）

【用法】上为细末。每服二钱，空心好酒或清米饮调服。

【主治】①《景岳全书》：大肠下血不止，或妇人崩漏下血。②《不居集》：内崩吐血。

13756 棕榈散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【异名】棕蒲散。

【组成】棕榈皮 蒲黄（俱炒黑存性）各二钱 归身（酒炒） 白芍（炒） 川芎 生地 黄芩 丹皮 秦艽 泽兰 杜仲

【主治】妇人经行，多则六七日，少则四五日，血海自净。若迟至半月或一月，尚淋漓不止，非冲任内虚，气不能摄血，即风冷外感，使血滞经络，故点滴不已，久则成经漏，为虚劳、血淋。若经行合房，以致血漏。

【方论选录】是方以棕灰、炒黑蒲黄二味为君，棕皮性涩，蒲黄炒黑，其性亦涩，黑则从水化，以治淋漓，尤为上品；秦艽、泽兰以祛风；丹皮、黄芩以清热；四物加杜仲以补血，引入厥阴血分。愈后兼进补中益气汤，气旺则能摄血，升荣上达，使不下陷而淋漓之症自除也。

【备考】方中归身、白芍、川芎、生地、黄芩、

丹皮、秦艽、泽兰、杜仲用量原缺。

13757 棘钩子散

【方源】 方出《百一》卷十二，名见《朱氏集验方》卷二。

【组成】 麝香

【用法】 上以酒濡之，作十许丸。以枳椇子作汤吞服。

【主治】 消渴，酒疸。

【方论选录】 消渴消中，皆脾弱肾败，上不能节汤水，肾液不上溯，乃成此疾。今诊脾脉极热而肾不衰，当由果实与酒过度，热在脾，所以饮食过人而多饮水，饮水既多不得不多溺，非消渴也。麝香能败瓜果，枳椇亦胜酒，故以此二物为药，以去生果酒之毒也。

【临证举例】 消渴 眉山杨颖臣，长七尺，健饮啖，倜傥人也。忽得消渴疾，日饮水数斗，食倍常而数溺，消渴药服之逾年，疾日甚，自度必死，治棺。余嘱其子延良医张耽隐之子（不记其名）为诊脉，笑曰：君几误死。取麝香当门子以酒濡之，作十许丸，用枳椇子作汤，吞之遂愈。

13758 酥蜜粥

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】 酥油 蜂蜜 粳米

【功用】 ①《本草纲目》：养心肺。②《药粥疗法》：补五脏，益气血，润燥。

【主治】《药粥疗法》：体弱羸瘦，虚劳低热，肺痿肺燥，咳嗽咯血，皮肤枯槁粗糙，大便干结。

【宜忌】《药粥疗法》：平素肥胖，或痰湿内盛，大便溏薄之人，不宜多服。

【备考】《药粥疗法》本方用法：先用粳米加水煮粥，待沸后加入酥油及蜂蜜，同煮为粥，温热食用。

13759 酥蜜煎

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】 酥一升 白蜜三升 芒消二两

【用法】 上合煎，欲渴即啜之，每日六七次。

【功用】 ①《千金翼》：益气力。②《圣惠》：除烦热。

【主治】 消渴。

【备考】《圣惠》本方用法：上于银器中以慢火熬成膏，收瓷器中。每服半匙，咽津，不拘时候。

13760 酥蜜煎

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】 藕汁五合 白蜜五合 生地黄汁一升

【用法】 上和，微火煎令如饴。空心缓缓含咽半匙。

【主治】 老人淋病，小便痛涩。

【宜忌】 忌热及炙物。

13761 酥蜜膏酒

【方源】《外台》卷十引《删繁方》。

【异名】 酥蜜膏（《张氏医通》卷十二）。

【组成】 酥 崖蜜 饴糖 生姜汁 生百部汁 大枣肉（研为脂） 杏仁（去皮尖）各一升（研） 柑皮五具（末）

【用法】 上合和，微火煎，常搅，三上三下约一炊久，俟姜汁及百部汁各减半则停。以温酒一升送服方寸匕，细细咽之，日二夜一。

【功用】 止气嗽，通声。

【主治】 ①《外台》引《删繁方》：肺虚寒，厉风所伤，声音嘶塞，气息喘急，咳唾。②《张氏医通》：寒郁热邪，声音不出。

【方论选录】《千金方衍义》：肺窍为风寒所袭而致喘咳上气，语声嘶塞。故用姜汁、杏仁、柑皮、百部温散肺络之结胶、饴、枣肉、乳酥、崖蜜通行脾肺之津，津回燥润，津自复矣。

【备考】 方中酥至杏仁用量原缺，据《千金》补。

13762 散风丹

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】 黄牛胆二钱 羌活 独活 防风 天麻 人参 荆芥穗 川芎 细辛各一钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，薄荷、紫苏泡汤调下。

【主治】 ①《直指小儿》：小儿风痫。②《医学入门》：肝痫，面青白窜，手足拳，抽掣反折，亦治则痉。

【备考】 方中黄牛胆，《袖珍小儿》作"胆南星"。《医学入门》有柴胡一钱，无薄荷。

13763 散火汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】 黄连（炒） 芍药（炒） 栀子（炒） 枳壳（去瓤） 陈皮 厚朴（去皮） 香附 抚芎各一钱 木香（另研） 砂仁 茴香各五分 甘草三分

【用法】 上锉一剂。加生姜一片，水煎服。

【主治】 腹痛属热痛者，作痛作止，脉数。

【加减】 痛甚不止，加玄胡索、乳香。

13764 散血膏

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 紫金皮 白芷 大黄 姜黄 南星 大

柏皮　赤小豆　寒水石

【用法】 上为细末，以生地黄汁调成膏。敷眼四围。

【主治】 目赤肿不能开，睛痛，热泪如涌。

13765　散疔散

【方源】 《青囊秘诀》卷上。

【异名】 散疔汤（《洞天奥旨》卷八）。

【组成】 夏枯草一两　紫花地丁一两　连翘三钱

【用法】 水煎服。一剂即消。

【主治】 疔疮。

13766　散郁丸

【方源】 《杏苑》卷四。

【组成】 苍术　香附子（童便浸，四制）　川芎各等分

【用法】 上为细末，炊饼糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前淡生姜汤送下。本方或咬咀，随六症加减煎服。

【主治】 气郁，胸胁疼痛，脉沉涩。

【备考】 本方治上证，须再加木香、缩砂仁。

13767　散痛饮

【方源】 《玉案》卷五。

【组成】 乌药　玄胡索　杜仲（盐水炒）　桃仁（去皮尖）各一钱五分　青皮　柴胡　穿山甲　牛膝　红花各一钱　甘草二分

【用法】 加生姜三片，水煎服。

【主治】 瘀血所滞，两胥作痛。

13768　散聚汤

【方源】 《三因》卷八。

【组成】 半夏（汤洗七次）　槟榔　当归各三分　橘皮　杏仁（麸炒，去皮尖）　桂心各二两　茯苓　甘草（炙）　附子（炮，去皮脐）　川芎　枳壳（麸炒，去瓤）　厚朴（姜汁制）　吴茱萸（汤洗）各一两

【用法】 上锉散。每服四钱，水一盏半，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】 久气积聚，状如癥瘕，随气上下，发作有时，心腹绞痛，攻刺腰胁，上气窒塞，喘咳满闷，小腹膨胀，大小便不利，或腹痛泄泻，淋沥无度，遗精白浊，状若虚劳。

【加减】 大便不利，加大黄。

【方论选录】 《医方考》：是方名曰散聚者，所以散六腑之聚气耳。盖中气之道，热则弛张，弛张弗聚也；寒则收引，收引则气斯聚矣。故桂心、附子、吴茱萸辛热之品也，半夏、陈皮辛温之品也，川芎、当归、杏仁辛润之品也，辛则能散聚，热则能壮气，温者能和中，润者能泽六腑；乃茯苓、甘草之甘平，可以使之益胃；而槟榔、枳壳、厚朴、大黄则皆推陈之品也。

【备考】 《医方考》有大黄。

13769　散瘕汤

【方源】 《杂病源流犀烛》卷十一。

【组成】 桃仁　枳实　山栀　山楂　泽泻　木通　赤苓

【主治】 疝瘕。因阳明受湿热，传入太阳，发热恶寒，小腹闷痛，及小肠膀胱气痛，不得小便者。

13770　散癥汤

【方源】 方出《千金》卷十一，名见《普济方》卷一七四。

【组成】 鸡屎一升　白米五合

【用法】 上合炒，令米焦，捣末。以水二升，顿服取尽。须臾吐出病如研米，若无米当出痰，永憎米，不复食。

【主治】 米癥，常欲食米，若不得米则胸中清水出。

13771　散热饮子

【方源】 《保命集》卷下。

【组成】 防风　羌活　黄芩　黄连各一两

【用法】 上锉。每服半两，水二盏，煎至一盏，食后温服。

【主治】 眼暴赤发肿。

【加减】 大便秘涩，加大黄一两；痛甚，加当归、地黄；烦躁不能眠睡，加栀子一两。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典》引作"散热散"。

13772　散风止痒汤

【方源】 《张皆春眼科证治》。

【组成】 麻黄 3 克　薏苡仁 6 克　茅根 15 克　红花 3 克　川乌头 1.5 克

【功用】 疏散风寒，清热利湿，止痒。

【主治】 脾胃湿热积于胞睑，外被寒风所束，目内奇痒，颗粒扁平而大，排列致密者。

【方论选录】 方中麻黄疏散风寒力猛，且有利湿之功，本病感受风寒较重，非麻黄不能驱散。薏苡仁、茅根能除脾胃湿热之邪，红花通经络以行血滞，川乌头既能散在表之邪，又能驱络脉之寒凝，且能止痒。麻黄配苡米、茅根，祛湿之中且有清热之意；麻黄配乌头，散风之中且有祛寒之功。

13773　散血消肿汤

【方源】 《医学入门》卷七。

【组成】 川芎一钱二分　当归尾　半夏各一钱

莪术　人参各七分　砂仁七枚　木香　五灵脂　官桂各五分　甘草四分　紫苏三分　芍药五分

【用法】 加生姜、大枣，水煎服。

【主治】 血胀。烦躁，漱水不咽，神思迷忘，小便利，大便黑。

13774　散血消胀汤

【方源】 《张氏医通》卷十三。

【组成】 归尾一钱五分　五灵脂　官桂　乌药　甘草（炙）　木香各六分　川芎一钱二分　半夏　蓬术（煨）各八分　紫苏三分　砂仁一钱（炒）　生姜五片

【用法】 水煎，食前温服。

【主治】 血胀。小便多，大便溏黑光亮。

13775　散血葛根汤

【方源】 《外科正宗》卷三。

【异名】 散瘀葛根汤（《金鉴》卷七十二）。

【组成】 干葛　半夏　川芎　防风　羌活　升麻　桔梗各八分　白芷　甘草　细辛　苏叶　香附　红花各六分

【用法】 水二钟，加葱三根，生姜三片，煎至八分，不拘时服。

【主治】 跌扑伤损，瘀血凝滞，结成流注，身发寒热者。

13776　散肿溃坚汤

【方源】 《兰室秘藏》卷下。

【异名】 散毒溃坚散（《普济方》卷二九一）。

【组成】 黄芩八钱（酒洗，炒一半，生用一半）　草龙胆（酒洗，各炒四遍）　瓜蒌根（锉碎，酒洗）　黄柏（酒制）　酒知母　桔梗　昆布各五钱　柴胡四钱　炙甘草　京三棱（酒洗）　广茂（酒洗，炒）　连翘各三钱　葛根　白芍药　当归梢　黄连各二钱　升麻六分

【用法】 上㕮咀。每服六钱，水二盏零八分，先浸多半日，煎至一盏，去滓，食后热服。于卧处伸足在高处，头低垂，每含一口，作十次咽。服毕依常安卧，取药在膈上停蓄故也。另攒半料作细末，炼蜜为丸，如绿豆大，每服百余丸，用此药汤留一口送下。

【功用】 《医方集解》：消坚散肿。

【主治】 马刀疮，结硬如石，或在耳下至缺盆中，或肩上，或于胁下，皆手足少阳经中；及瘰疬遍于颈，或至颊车，坚而不溃，在足阳明经中所出，或二经疮已破流脓水。

【加减】 加海藻五钱（炒）亦妙。

【方论选录】 《医方集解》：此手足少阳足阳明药也。柴胡、连翘清热散结，升麻、葛根解毒升阳，花粉、桔梗清肺排脓，归尾、芍药润肝活血，甘草和中化毒，昆布散痰溃坚，三棱、莪术破血行气，黄芩、柏、连、龙胆、知母大泻三焦之火，而桔梗又能载诸药而上行也。

【备考】 《外科经验方》有黄耆，无广茂；《外科理例》有土瓜根，无瓜蒌根。本方改为丸剂，名"散肿溃坚丸"（见《外科发挥》）。

13777　散结化痰汤

【方源】 《观聚方要补》卷七引《证治大还》。

【组成】 黄连　栀子　香附　贝母　抚芎　半夏　橘红　苏叶　青黛　枳壳　凤尾草　白豆蔻

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 梅核气。气留咽嗌，有如梅核，此噎膈之渐也。

【加减】 呕吐，加枇杷叶。

13778　散瘀见喜汤

【方源】 《千家妙方》。

【组成】 制香附 10 克　五灵脂 10 克　延胡索 10 克　春砂仁 6 克　晨童便一盅（兑服）

【用法】 水煎服，每日一剂。

【功用】 行气活血，化瘀通经。

【主治】 气滞血瘀，壅塞胞宫之原发性痛经，并不孕症。

13779　散瘀和伤汤

【方源】 《金鉴》卷八十八。

【组成】 番木鳖（油炸去毛）　红花　生半夏各五钱　骨碎补　甘草各三钱　葱须一两

【用法】 上以水五碗煎滚，入醋二两，再煎十数滚，熏洗患处，一日十数次。

【主治】 一切碰撞损伤，瘀血积聚。

13780　散瞖七宝丸

【方源】 《圣济总录》卷一一二。

【组成】 石决明（捣研）二两　人参　茺蔚子各一两　琥珀（捣研）三分　真珠（捣研）半两　龙脑（研）一分　熊胆半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至二十丸，食前茶清送下。先用针拨收之后，再用本方。

【主治】 内障冰瞖，如水冻坚结睛上。

13781　散瞖还睛散

【方源】 《金鉴》卷七十七。

【组成】 人参一钱　五味子五分　桔梗一钱　车前子二钱　茯苓一钱　细辛五分　防风二钱

【用法】 上为粗末。以水二盏，煎至一盏，去

滓，夜食后温服。宜先用金针拨其内翳后，再服本方，后用散翳补肝散收功。

【主治】 散翳，翳从瞳仁内透出，散如鳞点之状，乍青乍白，胞内起粟而烂，瞳仁痛楚。

13782 散翳补肝散

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 当归二钱 木贼一钱 防风一钱 熟地黄二钱 白芍药一钱 川芎五分

【用法】 上为粗末。以水二盏，煎至一盏，空心去滓温服。先服散翳还睛散，后用本方收功。

【主治】 散翳。翳从瞳仁内透出，散如鳞点之状，乍青乍白，胞内起粟而烂，瞳仁痛楚。

13783 散热消毒饮子

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】 牛蒡子（研，炒） 羌活 黄连 黄芩 苏薄荷 防风 连翘各等分

【用法】 上锉。以白水二钟，煎至八分，去滓，食后服。

【主治】 目赤痛，脾胀如杯覆。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典》引作"散热消毒饮"。

13784 散风燥湿解毒汤

【方源】《中医眼科临床实践》。

【组成】 银柴胡9克 黄芩9克 羌活9克 防风9克 白芷9克 陈皮9克 白术9克 金银花15克 蒲公英15克 连翘9克 赤芍9克 生地9克 枳壳9克 龙胆草9克 甘草3克

【用法】 水煎服。

【功用】 散风燥湿，清热解毒。

【主治】 眼睑湿疹，痒重痛轻属脾胃湿热者。

13785 散瘀清火止痛汤

【方源】《寿世新编》卷下。

【组成】 川楝子（去核）二钱 元胡索二钱 黄连（姜汁炒）八分 山栀仁（炒）一钱五分或二三钱 紫丹参三钱 香附米（四制）二钱 法半夏二钱 桃仁泥一钱 当归尾二钱 川郁金一钱 高良姜三五分 建泽泻二钱

【用法】 水煎服。服二三剂必经行痛止而痊。

【主治】 瘀挟郁火，心胃疼痛，脘中胀闷，不可按扪或呕吐紫黑血块，倒经逆行，或心中滚热，呕吐不食者。

13786 款气丸

【方源】《保命集》卷下。

【异名】 咳气丸（《赤水玄珠》卷七）。

【组成】 青皮（去白） 陈皮（去白） 槟榔 木香 杏仁（去皮尖） 郁李仁（去皮） 茯苓 泽泻 当归 广茂（炮） 马兜铃 苦葶苈各三两 人参 防己各五钱 牵牛（取头末）一两

【用法】 上为细末，生姜汁面糊为丸，如梧桐子大。每服一二十丸，加至五七十丸，食后生姜汤送下。

【主治】 久咳痰喘，肺气浮肿。

13787 款冬丸

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【异名】 款冬花丸（《普济方》卷一六一）。

【组成】 款冬花 麻黄（不去根节） 甘草（生） 杏仁（不去皮尖）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，含化。

【功用】 款肺气，化痰涎。

【主治】 寒壅咳嗽，语声不出。

13788 款花汤

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】 款花 五味子 麻黄 杏仁（去皮尖） 甘草各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 小儿久嗽。

13789 款冬花丸

【方源】《医心方》卷九引《效验方》。

【组成】 杏仁三分（熬） 干姜三两 甘皮一两 麻黄三两 甘草二两 款冬花二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。食前每服三丸，每日三次。

【主治】 三十年咳逆上气，面肿。

13790 款冬花丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】 款冬花半两（焙） 马兜铃 杏仁（去皮尖双仁，炒）各一分 苦葶苈（隔纸微炒）半两 桂（去粗皮）一钱

【用法】 上为细末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧温水送下。

【主治】 肺气不调，上膈痰滞，喘满气促，语声不出。

13791 款冬花丸

【方源】《普济方》卷二三一。

【组成】 葶苈 马兜铃 南星 半夏 枯矾 款冬花 佛耳草各等分

【用法】 上为细末，水糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后生姜、胡桃汤送下，日进二服。

【主治】 虚劳喘嗽，面目浮肿。

13792 款冬花汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】款冬花（去梗）二两 麻黄（去根节）三两 五味子（炒） 半夏（汤洗去滑，生姜汁制，焙干）各二两 紫菀（去苗土） 细辛（去苗叶）各一两 射干二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，加生姜半分，大枣二枚（劈），水一盏，煎至七分，去滓温服，日三夜一。

【主治】上气，咽中不利。

13793 款冬花散

【方源】《普济方》卷三八七。

【组成】款冬花 知母 贝母 阿胶（炒） 甘草各等分

【用法】上为粗末。三岁儿每服一钱，水半盏，煎至三分，去滓。

【主治】小儿久新咳嗽，气急不食。

13794 款冬花膏

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】款冬花 紫菀 百部各半两 人参（去芦头） 白术 甘草（炙）各一两 干姜二两（炮）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两作十五丸。每服一丸，食后、临卧含化。

【主治】肺气虚寒，咳嗽不止，痰唾并多，或吐血、咯血、劳嗽。

【备考】本方方名，据剂型，当作“款冬花丸”。

13795 韩相进灵丹

【方源】《准绳·类方》卷七。

【异名】进灵丹(《中国医学大辞典》)。

【组成】防风 石决明 威灵仙 薏仁 蛤粉 谷精草 枸杞子 苍术 甘草 菊花各一两。

【用法】上为末，用雄猪肝一具，竹刀劈开去膜，擂极烂，和药为丸，如绿豆大。每服三十丸，盐汤送下。

【功用】去内外障。

【主治】目内外障。

13796 朝真丹

【方源】《局方》卷六。

【组成】硫黄（生，研细）三十两 白矾（煅）七两半 朱砂（研，为衣）三两一钱

【用法】上研匀，水浸蒸饼为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，温米饮送下，不拘时候。

【主治】肠胃虚弱，内受风冷，或饮食生冷，内伤脾胃，泄泻暴下，日夜无度，肠鸣腹痛，手足厥寒。

13797 期颐饼

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生芡实六两 生鸡内金三两 白面半斤 白沙糖不拘多少

【用法】上先将芡实用水淘去浮皮，晒干，轧细，过罗；再将鸡内金轧细，置盆内浸以滚水半日许；再入芡实、白糖、白面，用所浸原水，和作极薄小饼，烙成焦黄色。随意食之。

【主治】老人气虚，不能行痰，致痰气郁结，胸次满闷，胁下作疼，诸气虚痰盛者；兼治疝气。

【方论选录】鸡内金以补助脾胃，大能运化饮食，消磨瘀积，食化积消，痰涎自除；再者，老人痰涎壅盛，多是下焦虚惫，气化不摄，痰涎随冲气上泛，芡实大能敛冲固气，统摄下焦气化，且与麦面同用，一补心、一补肾，使心肾相济，水火调和，而痰气自平矣。

13798 彭祖丸

【方源】《外台》卷十七引《古今录验》。

【异名】小丹(《元和纪用经》)。

【组成】柏子仁五合 石斛三两 天雄一两（炮） 巴戟天三两（去心） 续断三两 天门冬三两（去心） 泽泻二两 菟丝子五两 人参二两 干地黄四两 薯蓣二两 远志二两（去心） 蛇床子五合（取仁） 钟乳三两（炼，研成粉） 覆盆子五合 苁蓉六两 山茱萸二两 杜仲三两 菖蒲二两 五味子五两 桂心四两 茯苓二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八丸，渐加至十丸，酒送下，勿令醉，一日二次。先服药，斋五日，不食脂、肉、菜、五辛。服二十日断白沥，三十日渐脱，六十日眼瞳子白黑分明，不复泪出，溺血余沥断，八十日白发变黑，腰背不复痛，行步脚轻，一百五十日都愈，意气如年少时，诸病皆除，长服如神。

【功用】①《外台》引《古今录验》：延年益寿，通脏腑，安神魂，宁心意，固荣卫，开益智慧，令寒暑风湿气不能伤人。②《元和纪用经》：令目睛光明，冷泪不复出，筋力强健，悦泽肌肤。

【主治】①《外台》引《古今录验》：劳虚风冷百病。②《元和纪用经》：男女诸虚不足，老人精枯神耗。

【宜忌】忌鲤鱼、生葱、猪羊肉、冷水、酢物、芜荑、饧。

13799 彭祖麋角丸

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 麋角一对（炙黄） 槟榔（上二味另捣，取净末）二两 通草 秦艽 人参 菟丝子（酒浸，别捣） 肉苁蓉（酒浸，去腐） 甘草各二两（预散）

【用法】 上以麋角、槟榔二味，共煎一食时倾，药似稠粥即止火，稍待热气歇，即投后六味散，搅令相得，仍待少时，渐稠粘堪作丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹酒送下，日加一丸，至五十丸为度，日、暮各一服。服经一月，腹内诸疾自相驱逐，有微利勿怪。

【功用】 培理身心。

【方论选录】 麋角走督脉而补阴中之阳；槟榔行腹内而破阴中之滞，兼通草、秦艽通血脉而运周身之气，菟丝、苁蓉填补肾脏，人参以助诸味之力也。

【宜忌】 百日内忌房室。

13800 彭祖秘服接命丹

【方源】 年氏《集验良方》卷二。

【异名】 彭祖接命丹（《验方新编》卷十一）、接命丹（《中国医学大辞典》）。

【组成】 何首乌十两 白茯神十两 赤茯苓十两 菟丝子十两 牛膝十两 破故纸十两 覆盆子十两 当归十两

【用法】 上药不犯铁器，为细末，炼蜜调黄酒为丸，如梧桐子大。每服二钱，空心黄酒送下，早、午、晚进三服，服七日后每服三钱。

【功用】 添精补髓保真，固精不泄，善助元阳，滋润皮肤，壮筋骨，理腰膝，令人行走康健，气力倍添，通二十四道血脉，固身体，返老还童。

【主治】 下元虚冷，五劳七伤，半身不遂，或下部虚冷，膀胱病症，脚膝痿麻，阳事不举，妇人赤白带下，血崩，沙淋，下生疮疖。

【宜忌】 ①年氏《集验良方》：忌食血。②《验方新编》：忌服芸苔、菜子油、萝卜。

13801 葫芦化毒丹

【方源】 《外科大成》卷四。

【组成】 大黄 黄柏 远志各等分

【用法】 上为末，用猪胆汁和成锭，雄黄为衣，阴干。用时以米醋磨如墨，以鹅翎蘸药，频涂患处。

【主治】 一切肿毒热疖。

13802 葫芦糯米酒散

【方源】 《医学从众录》卷六。

【异名】 葫芦糯米酒饮（《寿世新编》卷下）。

【组成】 陈葫芦一个（要三四年者佳） 糯米一斗

【用法】 上作酒待熟，用葫芦瓢于炭火上炙热，入酒浸之，如此五六次，将瓢烧灰存性，为细末。每服三钱，酒送下。

【主治】 中满臌胀。

13803 蔵灵仙桂汤

【方源】 《外科大成》卷四。

【组成】 蔵灵仙 肉桂 木香 乳香 没药各二钱

【用法】 水二钟，煎八分服。

【主治】 产后经风，痛不可忍；并痢后风。

13804 蔵蕊收阴汤

【方源】 《辨证录》卷十二。

【组成】 蔵蕊二两 人参一两 白芍三钱 当归一两 柴胡五分

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人产后阴户内一物垂下，其形如帕，或有角或一歧，属肝痿者。

13805 葛花汤

【方源】 《济阳纲目》卷十一。

【组成】 葛根面 小豆花 藿香叶 白豆蔻 益智仁 缩砂仁 香附子 车前子 葛花 葛蕊 白檀 木香 丁香 沉香 橙皮 陈皮 姜屑 官桂 白术 泽泻 茯苓 人参 甘草各等分

【用法】 上为细末。汤点服，酒调亦得；或姜汁糊为丸，如梧桐子大，酒下之。服毕，但鼻准微汗，即解。

【功用】 上下分消酒湿。

【主治】 伤酒。

13806 葛花散

【方源】 《圣济总录》卷一四六。

【组成】 葛花一两

【用法】 上为散。每用一大钱匕，沸汤点服，不拘时候；亦可煎服。

【主治】 饮酒中毒。

13807 葛连丸

【方源】 《医学入门》卷七。

【异名】 葛黄丸（《古今医鉴》卷四）、葛花丸（《保命歌括》卷八）。

【组成】 葛花 黄连各四两

【用法】 上为末，用大黄末熬膏为丸，如梧桐子大。每服百丸，温水送下；或煎服。

【主治】 ①《医学入门》：饮酒过多，热蕴胸膈，以致吐、衄。②《古今医鉴》：时令酷暑，上焦积热，忽然吐血垂死者。

【备考】 本方改为散剂，名“葛黄散”（见《类证治裁》）。

13808 葛根汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】 葛根麻黄汤（《三因》卷七）、麻黄葛根汤（《杏苑》卷七）、干葛解肌汤（《症因脉治》卷二）、麻黄加葛根汤（《伤寒大白》卷一）。

【组成】 葛根四两 麻黄三两（去节） 桂枝二两（去皮） 生姜三两（切） 甘草二两（炙） 芍药二两 大枣十二枚（擘）

【用法】 上以水一斗，先煮麻黄、葛根减二升，去白沫，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升。覆衣被，取微似汗，余如桂枝法将息。

【功用】《伤寒附翼》：开表逐邪，调和表里。

【主治】 外感风寒表实，项背强，无汗恶风，或自下利，或血衄；痉病，气上冲胸，口噤不语，无汗，小便少，或卒倒僵仆。

①《伤寒论》：太阳病，项背强几几，无汗恶风者；太阳与阳明合病者，必自下利。②《金匮》：太阳病，无汗而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，欲作刚痉。③《明医指掌》：妇人妊娠二三月以来，忽然卒倒僵仆。④《症因脉治》：阳明郁热，无汗而衄血者。

【宜忌】 禁生冷、粘滑、肉、面、五辛、酒酪、臭恶等物。

【方论选录】 ①《伤寒附翼》：葛根味甘气凉，能起阴气而生津液，滋筋脉而舒其牵引，故以为君；麻黄、生姜能开玄府腠理之闭塞，祛风而出汗，故以为臣；寒热俱轻，故少佐桂、芍，同甘、枣以和里。此于麻、桂二方之间，衡其轻重而为调和表里之剂也。②《张氏医通》：此即麻黄、桂枝二汤合用，于中但去杏仁、增葛根，为阳明经证之专药，以其能辅麻黄大开肌肉也；去杏仁者，既开肌肉于外，不当复泄肺气于内也。③《金鉴》：是方也，即桂枝汤加麻黄、葛根。麻黄佐桂枝，发太阳营卫之汗；葛根君桂枝，解阳明肌表之邪。不曰桂枝汤加麻黄、葛根，而以葛根命名者，其意重在阳明，以呕利属阳明多也。二阳表急，非温服覆而取汗，其表未易解也。或呕或利，里已失和，虽啜粥而胃亦不能输精于皮毛，故不须啜粥也。此证比麻黄青龙二证较轻，然项强连背拘强更甚于项强无汗，不失为表，但脉浮不紧，故不从乎麻黄，而于桂枝方加麻黄倍葛根以去实，小变麻、桂之法也。盖葛根为阳明主药，凡太阳有阳明者，则佐入太阳药中；凡少阳有阳明者，则佐入少阳药中，无不可也。

【临证举例】 ①太阳伤寒 《经方实验录》：光华眼镜公司有袁姓少年，其岁八月，卧病四五日，昏不知人。其兄欲送之归，延予诊视以决之。余往诊，日将暮，病者卧榻在楼上，悄无声息。余就病榻询之，形无寒热，项背痛，不能自转侧。诊其脉，右三部弦紧而浮，左三部不见浮象，按之则紧，心虽知为太阳伤寒，而左脉不类。时其兄赴楼下取火，少顷至。予曰：乃弟沉溺于酒色者乎？其兄曰：否，惟春间在汕头一月，闻颇荒唐，宿某妓家，挥金且甚巨。予曰：此其是矣。今按其左脉不浮，是阴分不足，不能外应太阳也。然其舌苔必抽心，视之果然。予用葛根二钱，桂枝一钱，麻黄八分，白芍二钱，炙草一钱，红枣五枚，生姜二片。予微语其兄曰：服后微汗出则愈。若不汗，则非予所敢知也。临行，予又恐其阴液不足，不能达汗于表，令其药中加粳米一酒杯，遂返寓。明早，其兄来，求复诊。予往应之，六脉俱和。询之，病者曰：五日不曾熟睡，昨服药得微汗，不觉睡去，此醒时，体甚舒展，亦不知病于何时去也。随请开调理方。予曰：不须也，静养二三日足矣。闻其人十日后，即往汉口经商云。②周围性面瘫 《陕西中医学院学报》（1984；1:33）：采用葛根汤原方及其剂量，治疗周围性面神经麻痹16例。除1例因病程达14年之久而无效外，余皆痊愈，效果颇好。③荨麻疹 《中医杂志》（1984；9:57）：用葛根汤（葛根12克，麻黄6～9克，生姜6～9克，桂枝6克，甘草6克，白芍6克，大枣4～6枚。并适当随证加减），治疗荨麻疹51例，其中急性者46例，慢性者5例；发病后经西药治疗1周以上不愈者35例。结果，46例急性患者，经用药1～7天后全部治愈；5例慢性患者用药5～10天后全部治愈；总有效率为100%。随访半年无复发。④牙痛 《四川医学》（1982；6:337）：采用葛根汤加减（葛根18～24克，桂枝10克，麻黄6～10克，白芍10～15克，蜂房10克。大便干燥加大黄；疼痛甚，加细辛、白芷；胃热甚加川连、石膏；齿龋加乌梅、生地、萆茇、蜀椒；肾虚合玉女煎），治疗40例牙痛患者，疗效满意。40例中，急性牙髓炎3例，慢性牙髓炎6例，龋齿17例，冠周炎3例，牙槽脓肿9例，长智齿2例。按中医分型，肾虚牙痛9例，胃热牙痛20例，风寒牙痛11例。结果：痊愈36例，好转2例，无效2例，均属长智齿。

【现代研究】 对脑血管的作用 《中药药理与临床》（1987；4:14）：实验研究表明，葛根汤对麻醉

狗、猫具有显著的扩张脑血管、增加脑血流量、降低脑血管阻力的作用。此外能对抗 ADP 诱导的家兔血小板聚集。

13809 葛根汤

【方源】《外台》卷一引《小品方》。

【异名】葛根龙胆汤(《千金》卷九)。

【组成】葛根八两 生姜三两 龙胆 大青各半两 桂心 甘草(炙) 麻黄(去节)各二两 萎蕤一两 芍药 黄芩各二两 石膏(碎) 升麻各一两

【用法】上切,以水一斗,先煮葛根、麻黄取八升,掠去沫后,纳余药,煮取三升,分三服,日二夜一。

【主治】①《外台》引《小品方》:伤寒三四日不愈,身体热毒。②《圣济总录》:阳毒伤寒,头痛壮热未解,身体疼痛。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱。

13810 葛根汤

【方源】《外台》卷一引《崔氏方》。

【组成】葱白十四茎 豉一升(绵裹) 葛根三两(切)

【用法】上以水五升,煮取二升,分二次服。药后温覆取汗,汗不出更服。

【主治】伤寒服葱豉汤后不得汗者。

13811 葛根汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】葛根(锉)二两半 麻黄(去根节)一两 桂(去粗皮)三分 石膏(碎)三两 芍药一两一分 甘草(炙)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水一盏,煎至七分,去滓,不拘时候温服。

【主治】脾瘅。面黄口甘,烦渴不止。

13812 葛根汤

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】葛根(锉) 木通(锉) 桑根白皮 地骨白皮各一两半 白鲜皮一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,以水一盏半,煎至一盏,去滓,食后临卧温服。

【主治】眼痒睑急。

13813 葛根汤

【方源】《济生》卷三。

【异名】葛根豆豉汤(《赤水玄珠》卷十六)。

【组成】葛根二两 枳实(去瓤,麸炒) 栀子仁 豉各一两 甘草(炙)半两

【用法】上㕮咀。每服四钱,以水一盏半,煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《济生》:酒疸。②《普济方》:酒疸因下后,久久为黑疸,目青面黑,心中如啖蒜状,大便黑,小便赤或面黑,脉微而数。

【备考】本方加苍术,名"葛术汤"(见《东医宝鉴·杂病篇》)。

13814 葛根汤

【方源】《医学心悟》卷二。

【异名】葛根升麻汤(《不知医必要》卷一)。

【组成】葛根二钱 升麻 秦艽 荆芥 赤芍各一钱 苏叶 白芷各八分 甘草五分 生姜三片

【用法】水煎服。

【功用】解肌。

【主治】阳明经病,目痛,鼻干,唇焦,漱水不欲咽,脉长。

【加减】若无汗而口渴者,加知母;自汗而口渴者,加石膏、人参;自汗而口不渴者,乃阳明经中风,去苏叶,加桂枝,若春、夏之交,唯恐夹杂湿暑之邪,不便用桂枝,加白术一钱五分。

13815 葛根汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】葛根一钱半 当归三钱 川芎一钱 川贝二钱(去心) 石膏三钱 防己二钱 茯苓一钱半 独活一钱半 人参一钱半 防风一钱半

【用法】上为末。每服五钱,水煎,去滓服。

【主治】孕妇弥月发痉,脉浮数大。

【方论选录】妊娠弥月中风,遏热经腑,而营气暗伤,筋脉失养,故发痉昏不知人焉。独活疏少阳之风,葛根疏阳明之风,防风疏风于表,石膏清热于里,人参扶元补气以通血脉,当归养血荣经以荣筋脉,川芎活血行气,川贝解郁清心,防己泻血分湿热以清血室,茯苓泻气分湿热以清经气也。为末水煎,使风邪外解,则遏热顿清,而营血完复,筋脉得养,何发痉之有?其弥月之孕,无不及时分娩矣。

13816 葛根散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】葛根一两(锉) 甘草一两(炙微赤,锉) 桂心一两 大青三分 黄芩半两 石膏一两 赤芍药三分 麻黄二两(去根节)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒四日,头重身强,腰脊痛。

13817 葛根散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】葛根一两（锉） 黄芩一两 甘草半两（炙微赤，锉） 石膏一两 柴胡一两（去苗） 知母一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒。潮热，口干头痛，四肢烦疼。

13818 葛根散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】葛根（锉） 赤芍药 麻黄（去根节） 黄芩 石膏各一两 大青半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓，不拘时候热服。药后衣覆取汗。

【主治】时气一日，壮热，心神烦躁，头痛，四肢不利。

13819 葛根散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】葛根一两 石膏二两 栀子仁一两 柴胡一两（去苗） 赤芍药一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入淡竹叶二七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气，头痛壮热。

13820 葛根散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】葛根二两（锉） 赤芍药二两 麻黄二两（去根节） 白芷一两 柴胡一两（去苗） 黄芩一两 石膏二两 桂心一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一大盏，入葱白五寸，生姜半分，煎至五分，去滓热服，不拘时候。衣覆取汗。

【主治】热病一日，头痛项强，身热如火。

13821 葛根散

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】葛根（锉） 黄耆（锉） 甘草（炙，锉）各五两 山栀子仁八两 石膏（碎研）三两

【用法】上为散。每服二钱匕，新汲水入蜜调下。

【功用】退热。

【主治】伤寒烦躁。

13822 葛粉粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【异名】葛根粉粥（《长寿药粥谱》）。

【组成】葛粉四两 粟米半斤

【用法】上以水浸粟米经宿，来日漉出，与葛粉同拌令匀，煮粥食之。

【功用】《长寿药粥谱》：清热生津止渴，降血压。

【主治】①《圣惠》：胸中烦热，或渴，心躁。②《长寿药粥谱》：高血压、冠心病、心绞痛，老年性糖尿病、慢性脾虚泻利、夏季或发热期间口干烦渴者。

13823 葛豉粥

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】葛根二两（锉） 葱白五茎（并须白） 豉一合 生姜一两（切）

【用法】上以水三大盏，煎至一盏半，去滓；下粳米二合，煮作粥，乘热顿服。衣盖取汗。

【主治】热病一日，身体壮热，头痛，骨肉痠楚，背脊强，口鼻手足微冷，小便赤黄。

13824 葛母解酲汤

【方源】《病机沙篆》卷下。

【组成】葛根 知母 人参 茯苓 砂仁 豆蔻 青皮 陈皮 木香 神曲 猪苓 生姜

【用法】水煎服。

【主治】伤酒头痛。

13825 葛花清脾汤

【方源】《笔花医镜》卷二。

【组成】葛花一钱 枳椇子三钱 赤苓三钱 泽泻 茵陈 酒芩各二钱 山栀 车前子各一钱五分 甘草五分 橘红 厚朴各一钱

【主治】酒湿生热生痰，头眩头痛。

13826 葛花解毒饮

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】黄连（炒） 黑玄参 当归 龙胆草（炒） 茵陈 细甘草 葛花 熟地黄 茯苓 山栀仁 连翘 车前子各等分

【用法】上锉。白水二钟，煎至八分，去滓，食远服。

【功用】清湿热，解酒毒，滋肾水，降心火，明目。

【主治】睛黄视渺症。好酒，恣食热燥腥腻，湿热重，浊气熏蒸清阳之气，升入轮中，致风轮黄亮，如金之色，视亦昏渺。

13827 葛花解酲汤

【方源】《内外伤辨》卷下。

【异名】葛花解酒汤（《医方大成》卷三）、解酲汤（《脉因证治》卷下）、葛花汤（《不知医必要》卷

二)。

【组成】 白豆蔻仁 缩砂仁 葛花各五钱 干生姜 神曲（炒黄） 泽泻 白术各二钱 橘皮（去白） 猪苓（去皮） 人参（去芦） 白茯苓各一钱五分 木香五分 莲花青皮（去穰）三分

【用法】 上为极细末，和匀。每服三钱匕，白汤调下。但得微汗，酒病去矣。

【功用】 分消湿热，温中健脾。

《内外伤辨》：上下分消其湿。②《证治宝鉴》：温中利湿。③《全国中药成药处方集》：解积醒，固中气，使湿从下行。

【主治】 饮酒太过，呕吐痰逆，心神烦乱，胸膈痞塞，手足战摇，饮食减少，小便不利。或酒积，以致口舌生疮，牙疼，泄泻，或成饮癖。

①《内外伤辨》：酒客病。②《脾胃论》：饮酒太过，呕吐痰逆，心神烦乱，胸膈痞塞，手足战摇，饮食减少，小便不利。③《保婴撮要》：乳母酒醉后，乳儿遗热为患。④《口齿类要》：酒积，口舌生疮，或呕吐泄泻。⑤《医部全录》：嗜酒后牙疼。⑥《兰台轨范》：酒伤而成饮癖。

【方论选录】 ①《医方考》：葛花之寒，能解酒中之毒；茯苓、泽泻之淡，能利中酒之湿；砂仁、豆蔻、木香、青皮、陈皮之辛，能行酒食之滞；生姜所以开胃止呕，神曲所以消磨炙腻；而人参、白术之甘，所以益被伤之胃尔。②《杏苑》：用葛花解酒毒；以神曲、砂仁、白豆蔻等消宿食；茯苓、猪苓、泽泻等利小便，导湿热；人参、白术补中健脾；生姜、陈皮、青皮、木香等行郁气而除痞闷。③《医方集解》：此手足阳明药也。过饮无度，湿热之毒积于肠胃，葛花独入阳明，令湿热从肌肉而解，豆蔻、砂仁皆辛散解酒，故以为君，神曲解酒而化食，木香、干姜调气而温中，青皮、陈皮除痰而疏滞，二苓、泽泻能驱湿热从小便出，乃内外分消之剂，饮多则中气伤，故又加参、术以补其气也。④《冯氏锦囊·杂症》：曲芽之积，令人腹痛，盖中州受伤，气逆而湿郁也。豆蔻、砂仁推逆气有功，且兼辛散之力，葛花独入阳明，令湿热之毒从肌肉而解，故以三味为君，解上焦之酲也；茯苓、猪苓、泽泻令湿热之毒从小便而出，故以三味为臣，解下焦之酲也；参、术、木香、二皮、干姜，中气赖以调和，湿热捣其巢穴，解中焦之酲也。

【备考】 本方改为丸剂，名“葛花解酲丸”（见《丸散膏丹集成》）。

13828 葛根石膏汤

【方源】《伤寒总病论》卷四。

【组成】 葛根 麻黄各一两 石膏二两 黄芩 芍药 桂枝 甘草各半两

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏半，煎八分，温服。取小汗。

【功用】 解肌出汗。

【主治】 天行热毒未解，欲生豌豆疮，发热疼痛。

【加减】 自汗者，去麻黄。

13829 葛根白虎汤

【方源】《医级》卷七。

【异名】 防葛石膏汤。

【组成】 葛根 石膏 知母 防风 甘草 粳米

【主治】 阳明自汗恶热，外犹恶风寒，而内已烦渴者。

13830 葛根疏邪汤

【方源】《麻科活人》卷一。

【组成】 葛根 防风 荆芥 苏叶 牛蒡子 连翘 地骨皮 前胡 赤茯苓 枳壳 木通

【用法】 灯心为引，水煎服。

【主治】 麻出一日而又收，腹中作胀，喘急。

【加减】 麻疹已出而标不红，已现而发热转甚者，或头痛、身痛、烦躁者，加元参、麦冬，或更加连翘、地骨皮亦可。

【备考】 原书用本方治上症，加栝楼仁、石膏、枳实。

13831 葛根解肌汤

【方源】《肘后方》卷二。

【组成】 葛根四两 芍药二两 麻黄 大青 甘草 黄芩 石膏 桂各一两 大枣四枚

【用法】 上以水五升，煮取二升半，去滓，分为三服。微取汗。

【主治】 伤寒、时气、温病一二日者。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜、生葱、炙肉等。

13832 葛根解肌汤

【方源】《局方》卷二。

【异名】 葛根解毒汤（《伤寒图歌活人指掌》卷四）。

【组成】 葛根四两 麻黄（去节）三两 肉桂（去粗皮）一两 甘草（炙） 黄芩 芍药各二两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，入枣一枚（剥破），煎至八分，去滓，稍热服，不拘时候。取汗出为度。

【主治】 伤寒，温病，时行寒疫，头痛项强，发热恶寒，肢体拘急，骨节烦疼，腰脊强痛，胸膈烦

闷。

13833 葛根解肌汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】葛根 前胡 荆芥 鼠粘子 连翘 赤芍 蝉蜕 木通各等分 生甘草减半

【用法】水煎，热服。

【主治】麻疹初起，发热咳嗽，或乍凉乍热。

13834 葛根解肌汤

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】干葛 防风 桔梗 前胡 薄荷 山楂肉 陈皮 甘草

【用法】白水煎服。

【主治】发热，值岁气时行，防其出痘，未见点，疑似之间者。

13835 葛根牛蒡子汤

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】升麻 葛根 牛蒡子 麻黄 连翘 玄参 桔梗 甘草各等分（一方加贯仲、淡豆豉）

【用法】水二钟，加生姜二片，煎至八分，食远热服。

【主治】时毒。邪在表，脉浮数者。

13836 葛根加半夏汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】葛根半夏汤（《伤寒图歌活人指掌》卷四）。

【组成】葛根四两 麻黄三两（去节） 甘草二两（炙） 芍药二两 桂枝二两（去皮） 生姜二两（切） 半夏半升（洗） 大枣十二枚（擘）

【用法】上以水一斗，先煮葛根、麻黄减二升，去白沫，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升。覆取微似汗。

【主治】太阳与阳明合病，不下利，但呕者。

【方论选录】①《古方选注》：葛根汤，升剂也；半夏辛滑，芍药收阴，降药也；太阳、阳明两经皆病，升圆失机，故以升降法治之。麻、葛、姜、桂其性皆升，惟其升极即有降，理寓于其中。又有芍药、甘草奠安中焦，再加半夏以通阴阳，而气遂下，呕亦止，是先升后降之制也。②《伤寒今释》：葛根汤虽能运输消化管中之水液，然水在胃而不下降者，因胃无吸收水分之能力，必加半夏以止呕降逆，使水液下达于肠，然后葛根汤能成其运输之功也。

13837 葛根黄芩黄连汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】葛根汤（《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》）、黄连葛根汤（《普济方》卷三六九）、葛根黄连黄芩汤（《内台方议》卷三）、葛根黄芩汤（《伤寒全生集》卷三）。

【组成】葛根半斤 甘草二两（炙） 黄芩三两 黄连三两

【用法】上四味，以水八升，先煮葛根，减二升，纳诸药，煮取二升，去滓，分二次温服。

【功用】《疡科心得集》：解表清里。

【主治】身热下利，喘而汗出，或疹后身热不除，或项背强急，心悸而下利，以及外疡火毒内逼，协热下利。

①《伤寒论》：太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，喘而汗出者。②《保婴撮要》：疹后身热不除。③《方极》：项背强急，心悸而不利者。④《疡科心得集》：外疡火毒内逼，协热便泄。⑤《中国医学大辞典》：酒客热喘。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、冷水、海藻、菘菜。

【方论选录】①《内台方议》：用葛根为君，以通阳明之津而散表邪；以黄连为臣，黄芩为佐，以通里气之热，降火清金而下逆气；甘草为使，以缓其中而和调诸药者也。且此方亦能治阳明大热下利者，又能治嗜酒之人热喘者，取用不穷也。②《伤寒附翼》：君气轻质重之葛根，以解肌而止利；佐苦寒清肃之芩、连，以止汗而除喘；用甘草以和中。先煮葛根后纳诸药，解肌之力优，而清中之气锐，又与补中逐邪之法迥殊矣。③《医方集解》：此足太阳阳明药也。表证尚在，医反误下，邪入阳明之腑，其汗外越，气上奔则喘，下陷则利，故舍桂枝而用葛根，专治阳明之表，加芩、连以清里热，甘草以调胃气，不治利而利自止，不治喘而喘自止矣。又太阳表里两解之变法也。④《古方选注》：是方即泻心汤之变，治表寒里热。其义重在芩、连肃清里热；虽以葛根为君，再为先煎，无非取其通阳明之津；佐以甘草缓阳明之气，使之鼓舞胃气而为承宣苦寒之使。清上则喘定，清下则利止，里热解而邪亦不能留恋于表矣。

【临证举例】①痢疾 《江苏中医》（1960；5：33）：应用葛根黄芩黄连汤治疗急性细菌性痢疾40例，其中发病1日内者23例（占57.5%）。粪培养痢疾杆菌阳性者26例（其中福氏18例，施氏5例，宋内氏3例）；阴性者14例。采用本方水煎剂治疗后，平均退热时间为27.76小时，腹痛消失平均4.57日，里急后重消失平均3.47日，食欲恢复正常平均2.5日，便次恢复正常平均2.83日，粪检转阴平均4日，大便培养转阴平均3日，阴转率

69.3%。总有效率达72.5%。②小儿夏季腹泻《广西中医药》(1984；5:53)：使用葛根芩连汤和五苓散合方（葛根6克、川连3克、黄芩6克、甘草2克、茯苓6克、桂枝2克、白术6克、泽泻6克、猪苓6克）治疗小儿夏季腹泻60例。结果痊愈48例，好转11例，无效1例。③小儿麻痹症《中华儿科杂志》(1958；6:529)：按温病小儿中风例，采取清热解毒，熄风通络等法，用加味葛根芩连汤（葛根、黄芩、黄连、甘草、生石膏、银花、白芍、全蝎、蜈蚣）随症加减，治疗小儿麻痹症129例。结果：患肢呈深度完全麻痹，失去自主运动功能的重型患者52例中痊愈17例，好转35例；尚能自主活动，但不能走路，不能站立的中型患者67例，痊愈33例，好转34例；能自主活动，能站立行走，但肢体软弱无力的轻型患者10例全部治愈。一般中型及轻型病例，多在1个月左右痊愈，最快的1例仅1周而愈。

【现代研究】 ①抗菌降温作用 《中药通报》(1987；6:49)：体内实验表明，本方对肺炎双球菌、痢疾杆菌有显著的抗菌作用。同时对五联疫苗感染引起的高热家兔有显著的降温作用，其降温效果与阿斯匹林相比无明显差异。②抗缺氧作用《辽宁中医杂志》(1987；6:37)：实验结果表明，本方水醇法提取液，对氰化钾等引起的急性动物缺氧现象有不同程度的对抗作用，使急性缺氧的动物存活时间延长。③提高免疫功能 《河南中医》(1984；4:4)：运用本方为主治疗秋季幼儿腹泻，其有效病例经检测发现，E玫瑰花结形成率较治疗前有明显提高，平均增加22.4%，表明本方有较好的提高机体细胞免疫功能的作用。

【备考】 本方方名，《外台》引作“葛根黄连汤”。

13838 葆真丸

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】 鹿角胶半斤（锉作豆大，就用鹿角霜拌炒成珠，研细） 杜仲（去粗皮，切碎，用生姜汁一两同蜜少许拌炒断丝）三两 干山药 白茯苓（去粗皮，人乳拌，晒干，凡五七次） 熟地黄各二两 菟丝子（酒蒸，捣，焙） 山茱萸肉各一两半 北五味子 川牛膝（去芦，酒蒸） 益智仁（去壳） 远志（甘煮，去骨） 小茴香（青盐三钱同炒） 川楝子（去皮核，取净肉，酥炙） 川巴戟（酒浸，去心）各一两 破故纸 胡芦巴（同故纸入羊肠内煮，焙干）各一两 柏子仁（去壳，另研如泥）半两 川山甲（酥炙） 沉香各三钱 全蝎（去毒）一钱半

【用法】 上为极细末，以好嫩肉苁蓉四两（酒洗净，去鳞甲、皮垢，开心，如有黄白膜亦去之，取净二两），好酒煮成膏，同炼蜜和药末，捣千余下，为丸如梧桐子大。每服五十丸，淡秋石汤、温酒任下，以干物压之。渐加至百丸。服七日，四肢光泽，唇脸赤色，手足温和，面目滋润。

【功用】 补十二经络，起阴发阳，能令阳气入胸，安魂定魄，开三焦积聚，消五谷进食，强阴益子精，安五脏，除心中伏热，强筋骨，轻身明目，去冷除风。

【主治】 九丑之疾。茎弱而不振，振而不丰，丰而不循，循而不实，实而不坚，坚而不久，久而无精，精而无子，及治五劳七伤，无子嗣者。

13839 葆真丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 鹿角胶八两（即用鹿角霜拌炒成珠） 杜仲（盐水拌炒）三两 干山药（微焙） 白茯苓（人乳拌蒸，晒） 熟地黄 山茱萸肉各三两 北五味 益智仁（盐水拌炒） 远志（甘草汤泡，去骨） 川楝子（酒煮，去皮核） 川巴戟（酒炒） 补骨脂 胡芦巴（与补骨脂同羊肾煮，汁尽为度，焙干）各一两 沉香五钱（另为末，勿见火）

【用法】 上为细末，入沉香和匀，以肉苁蓉四两（洗去皮垢，切开，心有黄膜去之，取净二两），好酒煮烂，捣如糊，同炼蜜杵匀为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心温酒送下，以美物压之。

【主治】 房劳太过，肾气虚衰，精寒不能生子。

【加减】 精薄者，加鳔胶六两。

【方论选录】 此方不用桂、附壮火助阳，纯用温养精血之味，独以沉香，益智鼓其氤氲，又以楝子抑其阳气，引诸阳药归宿下元，深得广嗣之旨。

13840 葆真止泄丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】 水煮熟地 人参（秋石拌） 龙骨 杞子 五味子 山药 茯神 牛膝炭

【主治】 精伤，神离气怯，肾气失纳，阳浮不肯潜伏，致诸气皆升，络血随气上溢，肉瞤心悸，头面热，四末汗，两足跗肿冷，走动吸短欲喘，多梦而遗。

【备考】 本方改为汤剂，名“葆真止泄汤”（见《中国医学大辞典》）。

13841 葱术散

【方源】《传信适用方》卷一。

【组成】 苍术（洗净）一斤 葱（连根须洗净）

一斤 麻黄（不去节）四两 甘草二两（炙）

【用法】 上将葱、术入臼中杵，令葱涎相入盆中，坚捺令热，冬间半月，春夏五七日取出，锅中炒葱叶过焦，逐旋筛出，以术干为度，次入麻黄、甘草为末。每服二钱，水一盏，生姜三片，枣一个，煎七分，去滓热服；如要出汗，连进二三服，以衣盖之。常服解诸劳倦，行路缓急，最为先务。

【主治】 时行瘟疫及寻常风吹雨洒，头目昏重，四体热倦，行步少力，骨节疼痛，不论阴阳二证，染患浅深。

13842 葱号散

【方源】 方出《外台》卷三十五引刘氏方，名见《袖珍小儿》卷一。

【异名】 葱乳汤（《准绳·幼科》卷一）。

【组成】 人乳四合 葱白一寸

【用法】 上相和煎，分为四服。即小便利。

【主治】 ①《外台》：小儿初生不小便。②《准绳·幼科》：小儿初生不尿，脐腹肿胀，不饮乳者。

【备考】 本方方名，《卫生鸿宝》引作"葱白汤"。《袖珍小儿》本方用法：同捣如泥，敷儿口内，即与吮乳。

13843 葱白汤

【方源】 《外台》卷三十三引《集验方》。

【组成】 葱白（切）一升 阿胶（炙） 当归 续断 芎䓖各三两 银随多少

【用法】 上切。以水一斗，先煮银，取七升，去银，纳余药，煎取二升半，纳胶令烊。分三服，不愈更作。

【主治】 妊娠胎动不安，腹痛。

【备考】 本方方名，《医方类聚》引《胎产救急方》引作"续断葱白汤"。

13844 葱白汤

【方源】 《伤寒总病论》卷三。

【异名】 连须葱白汤（《活人书》卷十八）。

【组成】 连须葱白（寸切）半斤 生姜二两

【用法】 上以水二升，煮一升，去滓，温温作二三服。

【主治】 ①《伤寒总病论》：伤寒发汗后，或未发汗，头痛如破。②《妇人良方》：妊妇伤寒，憎寒发热。

13845 葱白汤

【方源】 《全生指迷方》卷四。

【组成】 橘皮（洗，切）三两 葵子一两 葱白三茎（切）

【用法】 上以水五升，煮取二升，分三服。

【主治】 卒暴小便不通，脐腹膨急，气上冲心，闷绝欲死，由忍尿劳役，或从惊恐，气无所伸，乘并膀胱，气冲脬系不正，脉右手急大。

【备考】 《普济方》引《指南方》有石韦。

13846 葱白散

【方源】 《局方》卷二（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 川芎 苍术（米泔浸） 白术各二两 甘草（炮） 石膏（煅） 干葛（焙）各一两 麻黄（去根节）三两

【用法】 上为细末。每服二钱，以水一盏，加生姜三片，葱白二寸，煎至七分，稍热服，不拘时候。

【主治】 四时伤寒，头痛壮热，项背拘急，骨节烦疼，憎寒恶风，肢体困倦，大便不调，小便赤涩，呕逆烦渴，不思饮食，又伤风感寒，头痛体热，鼻塞声重，咳嗽痰涎，及山岚瘴气，时行疫疠。

13847 葱白粥

【方源】 《圣济总录》卷一九〇。

【组成】 葱白一大握（去须叶，细切，烂研，生布绞取汁） 白粳米二合（净，淘）

【用法】 上以水二升半，煮米作粥，候粥将熟，下葱汁，更煮取熟。空心温食之。良久即便。

【功用】 《长寿药粥谱》：发汗散寒，温中止痛。

【主治】 ①《圣济总录》：五淋，小便不通。②《长寿药粥谱》：年老体弱者伤风感冒，发热恶寒，头痛，鼻塞流涕，腹痛泻痢等。

【宜忌】 《长寿药粥谱》：可供冬季风寒感冒的老人乘热服食，服后微微汗出即解，汗出病愈后停服。食葱白粥的同时，忌食蜂蜜。

13848 葱苏散

【方源】 《医级》卷七。

【组成】 苏叶 葱白 生姜 川芎

【主治】 胎前产后感邪，表症悉具者。

13849 葱豉汤

【方源】 《肘后方》卷二。

【异名】 葱白豉汤（《活人书》卷十九）。

【组成】 葱白一虎口 豉一升

【用法】 上以水三升，煮取一升，顿服取汗。不汗复更作，加葛根二两、升麻三两，水五升，煎取二升，分再服，必得汗；若不汗，更加麻黄二两，又用葱汤研米二合，水一升，煮之，少时下盐、豉，后纳葱白四物，令火煎取三升，分服取汗。

【主治】 伤寒初起，头痛身热，脉浮大。

①《肘后方》：伤寒初觉头痛，身热，脉洪。

②《医心方》引《新　方》：利兼吐逆及呕者。③《活人书》：妊娠热病。④《圣济总录》：服乳石，固食仓米臭肉发动者。⑤《济阳纲目》：酒病。

【方论选录】《医方集解》：此足太阳药也。葱通阳而发汗，豉升散而发汗，邪初在表，宜先服此以解散之。

13850　葱豉汤

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】葱白三茎（切）　麻黄一两（去根节，锉）　豉一合　生姜半两（拍碎）

【用法】上以水二大盏，煎至一大盏三分，去滓，分为三服，不拘时候，稍热频服。衣覆出汗。

【主治】伤寒初得一日，壮热头痛。

13851　葱归漏肿汤

【方源】《金鉴》卷六十二。

【异名】葱归汤（《仙拈集》卷四）。

【组成】独活三钱　白芷三钱　葱头七个　当归三钱　甘草二钱

【用法】上以水三大碗，煎至汤醇，滤去滓，以绢帛蘸汤热洗，如温再易之，以疮内热痒为度。

【主治】痈疽疮疡，初肿将溃之时。

13852　葱白七味饮

【方源】《外台》卷三引《许仁则方》。

【异名】葛根散（《圣惠》卷十四）。

【组成】葱白（连须，切）一升　干葛（切）六合　新豉一合（绵裹）　生姜（切）二合　生麦门冬（去心）六合　干地黄六合　劳水八升（此水以杓扬之一千过）

【用法】上用劳水煎之，三分减二，去滓，分三次温服，相去行八九里。如觉欲汗，渐渐覆之。

【主治】①《外台》引《许仁则方》：天行愈后劳复，状一如伤寒初有。②《圣惠》：伤寒病愈后，阴阳易，劳复如初。

【宜忌】忌芜荑。

【备考】本方方名，《活人书》引作"七味葱白汤"。

13853　葱白甘草汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】葱白二两　粉草五钱

【用法】上以水三碗，煎至二碗，每日洗净伤处瘀腐脓血，方用玉红膏搽之，黑膏盖之。

【功用】消瘀散肿。

【主治】咬伤后，焮肿疼痛，脓血淋漓，臭秽腐烂。

13854　葱白葛根汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【异名】葱白汤（《婴童百问》卷六）。

【组成】葛根　芍药　知母　川芎

【用法】加葱白、生姜，水煎服。

【主治】①《伤寒全生集》：伤寒已发汗，头疼甚而热不可解者。②《婴童百问》：小儿头疼不止，身疼，口渴，发热，小便赤黄，脉浮数，无汗。

【加减】头疼甚，加白芷；热甚，加柴胡；身体痛，加羌活；渴，加石膏、天花粉。

【备考】《婴童百问》本方用：葛根、芍药、知母各半两，川芎一两。上㕮咀。每服二钱，用水一小盏，加生姜二片，葱白三枚，煎至七分，去滓热服。

13855　葱豉白虎汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷十一。

【组成】鲜葱白三枚　豆豉三钱　生石膏四钱　知母三钱　细辛三分　生甘草五分　粳米三钱（荷叶包）

【主治】伤寒愈后，伏热未尽，复感新邪，邪郁于内，头痛发热，恶风或恶寒，舌燥口渴，或兼咳嗽烦躁者。

13856　葱豉桔梗汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】鲜葱白三枚至五枚　苦桔梗一钱至一钱半　焦山栀二钱至三钱　淡豆豉三钱至五钱　苏薄荷一钱至一钱半　青连翘一钱半至二钱　生甘草六分至八分　鲜淡竹叶三十片

【功用】辛凉发汗。

【主治】风温、风热初起。

【加减】咽阻喉痛，加紫金锭二粒（磨冲）、大青叶三钱；胸痞，原方去甘草，加生枳壳二钱，白蔻末八分（冲）；发疹，加蝉衣十二只，皂角刺五分，大力子三钱；咳甚痰多，加苦杏仁三钱，广橘红一钱半；鼻衄，加生侧柏叶四钱、鲜茅根五十支（去衣）；热盛化火，加条芩二钱，绿豆二两煎药；火旺就燥，加生石膏八钱，知母四钱。

【方论选录】《肘后》葱豉汤，本为发汗之通剂，配合刘河间桔梗汤，君以荷、翘、桔、竹之辛凉，佐以栀、草之苦甘，合成轻扬清散之良方。

13857　葱豉葛根汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷十一。

【组成】鲜葱白二枚　淡豆豉三钱　生葛根一钱半

【主治】伤寒愈后，伏热未尽，复感新邪，头痛发热，恶风或恶寒，舌燥口渴，或兼咳嗽。

13858 葶苈丸

【方源】《外台》卷十九引唐临方。

【异名】葶苈牵牛丸(《圣济总录》卷八十三)。

【组成】葶苈子七分（生用） 牵牛子 泽漆叶 海藻（洗去咸，炙） 昆布（如上炙） 桑根白皮（炙） 甘遂（熬） 椒目 郁李仁各三分（去皮） 桂心一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至二十丸，用桑白皮（切）五合，赤小豆一合，通草一两（切），水二升，煮取一升送下，一日二次。

【主治】水气及脚并虚肿。

【宜忌】忌生葱。

13859 葶苈丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】甜葶苈半两（炒令香） 郁李仁（汤浸，去皮尖，熬紫色，秤三分，二味别研如膏，令极匀） 白术半两 牵牛子半两（一半生，一半熟用） 赤茯苓（去皮） 桑白皮（蜜炙，锉） 羌活（洗去土） 汉防己 陈橘皮（去白） 泽泻各三分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服十丸，空心、晚食前以生姜、橘皮汤送下，一日二次。不知加至二三十丸，以知为度。

【主治】腹中有湿热气，目下作肿，如新卧起蚕之状，两足胫微肿。病在肾，肾者少阴也，标在肺，肺者太阴也。故中满气急咳嗽，喘息有音，每就卧则右胁有气上冲，肩腋与缺盆相牵引不快，少思饮食。

【方论选录】《本事方释义》：甜葶苈气味苦辛寒，入手太阴，性能行水下气；郁李仁气味辛平，入手足太阴、阳明；白术气味甘温，入足太阴；牵牛子气味苦寒，入手足阳明、足太阳，善能行水；桑白皮气味苦辛，入手太阴；赤茯苓气味甘平，淡渗，入足阳明、太阳；汉防己气味苦辛平，入足太阳，能行下焦，祛风利湿；羌活气味苦辛甘平，入足太阳，善能行水；陈橘皮气味辛温，入手足太阴；泽泻气味苦咸平，入足太阳。此药因湿热浮肿，本病在肾，标病在肺，致中满气急、咳喘不得卧者，非利湿行水，不能效也。送药以生姜、橘皮之辛通，则在上之邪从汗而去，在下之邪从溲而去也。

13860 葶苈丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】人参顺气饮子。

【组成】半夏（洗） 厚朴（炙） 石膏 青皮各五分 当归身七分 白豆蔻仁 缩砂 茵陈（酒制） 干葛各一钱 炙甘草 羌活 黄芩（一半酒洗，一半炒） 苦葶苈（酒洗，炒） 人参 柴胡 独活各三钱

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如米大。每服二钱，临卧用一口汤送下。

【主治】心下痞，胸中不利。

13861 葶苈丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】苦葶苈半两（微炒，研细） 郁李仁（去皮，研） 赤茯苓（去皮心） 桑白皮（锉，炙） 各三分 黑牵牛（生，取头末）半两 汉防己 川羌活 陈橘皮（汤浸洗，去白，焙干） 泽泻各二分 白术半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温水送下，不拘时候。

【主治】脾胃受湿，流于四肢，足胫浮肿，小便涩少。

13862 葶苈散

【方源】《济生》卷二。

【组成】甜葶苈（炒） 桔梗（去芦） 瓜蒌子 川升麻 薏苡仁 桑白皮 葛根各一两 甘草（炙）半两

【用法】上为散。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】过食煎煿，或饮酒过度，致肺壅喘不得卧；及肺痈，咽燥不渴，浊唾腥臭。

13863 葶苈散

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】甘葶苈（隔纸炒） 紫牵牛（略炒，取仁） 桑白皮（炒） 鸡心槟榔 川大黄（锉，焙） 各等分

【用法】上为末。每服半钱，水半盏，加生姜二片，蜜半匙，煎汤调下。或煎大流气饮研青木香丸灌下。

【主治】小儿水气肿满。

13864 葶苈散

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】葶苈（炒） 防己 甘遂 大戟各等分

【用法】上为末。三岁一钱，食前以桑白皮汤调下。

【主治】小儿水肿气粗。

13865 葶苈散

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】葶苈（隔纸炒） 牵牛（炒） 桑白皮

（炒） 槟榔各等分

【用法】 上为末。生姜蜜汤调下。

【主治】 小儿水肿。

13866 葶苈膏

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】 牛黄 麝香 龙脑各一分 昆布 海藻各二十分（洗） 牵牛 桂心各八分 椒目三分 葶苈六分（炒）

【用法】 上为末，别捣葶苈熬成膏，为丸，如梧桐子大。每服十丸，一日二次。稍利小便为度。

【主治】 水肿腹胀。

13867 葶苈大丸

【方源】《三因》卷十四。

【异名】 葶苈丸（《医学纲目》卷二十四）、小葶苈丸（《赤水玄珠》卷五）。

【组成】 甜葶苈（隔纸炒） 荠菜根各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，陈皮汤嚼下。只三丸，小便清；数丸，腹当依旧。

【主治】 肿满腹大，四肢枯瘦，小便涩浊。

13868 葶苈大枣汤

【方源】《金匮翼》卷七引元戎方。

【组成】 葶苈二两（炒紫色，杵成丸） 大枣二十枚

【用法】 上以水三升，煮取二升，去滓，纳麻黄、五味子各半两，取清，分二日服。一剂尽愈。

【主治】 痰实肺闭，气不得宣，呼吸壅滞，喘急妨闷，胸膈痞痛彻背者。

13869 葶苈木香散

【方源】《宣明论》卷八。

【异名】 葶苈木香汤（《普济方》卷一九一）。

【组成】 葶苈 茯苓（去皮） 猪苓（去皮） 白术各一分 木香半钱 泽泻 木通 甘草各半两 辣桂一分 滑石三两

【用法】 上为末。食前服三钱，白汤调下。

【功用】 下水湿，消肿胀，止泄泻，利小便。

【主治】 湿热内外甚，水肿腹胀，小便赤涩，大便滑泄。

【宜忌】 若小便不得通利，而反转泄者，此乃湿热痞闷极深，而攻之不开，是能反为注泄，此正气已衰，而多难救也，慎不可攻之。

【备考】《保命歌括》有桔梗，《医林绳墨》有栀子，均无辣桂。

13870 葶苈苦参散

【方源】《医学正传》卷六引《活人书》。

【组成】 苦参 黄连 瓜蒂 黄柏 大黄各一两 葶苈子二两

【用法】 上为细末。每服一钱匕，清米饮调下。以吐利为度。随时看虚实消息加减。

【主治】 久黄。湿热内甚，小便赤涩，大便时秘，饮食少进，诸药不效。

13871 葶苈苦酒汤

【方源】《活人书》卷十六。

【组成】 苦酒一升半（即米醋） 生艾汁半升（无生艾，煮熟艾汁，或用艾根捣取汁用） 葶苈一合（熬，杵膏）

【用法】 上煎取七合，作三服。

【主治】 ①《活人书》：伤寒七八日内热不解。②《准绳·类方》：发狂烦躁，面赤咽痛。

13872 葶苈茯苓丸

【方源】 方出《外台》卷二十引《救急方》，名见《普济方》卷一九二。

【组成】 葶苈子七两（熬） 茯苓三两 吴茱萸二两 椒目三两（沉水者） 甘遂五两（绝上者）

【用法】 上为末，蜜和为丸，如梧桐子大。每服五丸，以米饮送下，一日三次。不知，稍加丸，以利为度。

【主治】 水气，腹臌胀硬。

【宜忌】 禁食如药法，并酢物。

13873 葶苈猪苓散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】 葶苈 茯苓 猪苓 白术 苍术 泽泻 瞿麦 车前子 川芎 当归 赤芍 生地

【功用】 渗水利湿。

【主治】 水分。脾虚不能制水，血与水散于皮肤、肠胃之间，发为浮肿，小水不通，而后经水断绝。

【方论选录】 方以二术、二苓壮土制水，泽泻、车前、瞿麦、葶苈以行水消肿。水去则四肢皮肤、经络、肠胃之间，悉皆通利，经血乃循故道而复至矣。

13874 葶苈大枣泻肺汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 葶苈汤（《圣济总录》卷二十四）、葶枣散（《医学入门》卷七）、泻肺汤（《千金方衍义》卷十七）、葶苈大枣汤（《金鉴》卷六十七）。

【组成】 葶苈（熬令黄色，捣丸，如弹子大） 大枣十二枚

【用法】 先以水三升，煮枣取二升，去枣，纳葶苈煮取一升，顿服。

【主治】 肺痈，喘不得卧；肺痈，胸满胀，一身面目浮肿，鼻塞，清涕出，不闻香臭酸辛，咳逆上气，喘鸣迫塞；支饮胸满者。

【方论选录】 ①《千金方衍义》："肺痈已成，吐如米粥，浊垢壅遏清气之道，所以喘不得卧，鼻塞不闻香臭。故用葶苈破水泻肺，大枣护脾通津，乃泻肺而不伤脾之法，保全母气以为向后复长肺叶之根本。然肺胃素虚者，葶苈亦难轻试，不可不慎。②《删补名医方论》：肺痈喘不得卧及水饮攻肺喘急者，方中独用葶苈之苦，先泻肺中之水气，佐大枣恐苦其伤胃也。

【临证举例】 ①痰喘 《名医类案》：孙兆治一人病吐痰顷刻升余，喘咳不定，面色郁黯，精神不快。兆告曰：肺中有痰，胸膈不利，当服仲景葶苈大枣汤，泻中有补，一服讫，已觉胸中快利，略无痰唾也。②渗出性胸膜炎《贵阳中医学院学报》(1988；3:30)：用葶苈大枣泻肺汤为主，结合辨证加味治疗渗出性胸膜炎15例。方用葶苈子15～20克，大枣15～20克，痰多水多，体壮者重用。兼风寒表证者，加荆芥、防风、苏叶；兼风热表证者，加桑叶、菊花、银花、连翘；兼少阳证者，加柴胡、黄芩；偏热痰者，加黄芩、桑白皮等；胸痛明显者，加丹参、郁金等；胸水多，呼吸困难者，加甘遂末0.5～1克。结果15例患者全部临床治愈。发热一般在入院后一周内退热，胸腔积液在三周左右基本消失。

13875 蔺茹散

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】 水银一钱 好茶二钱 蔺茹三钱 轻粉少许

【用法】 上为细末。每用不以多少，油调搽之。

【主治】 疥，经年不愈。

13876 蔺茹膏

【方源】《疡科选粹》卷六。

【组成】 蔺茹一两 黄连 蛇床子 枯矾 水银各二两 黄蜡一两

【用法】 上用腊猪脂七两熬化，入蔺茹等三味，煮至焦紫色，去滓，入黄蜡溶开，出火稍凝，后下水银、枯矾，搅至匀，手指涂摩。

【主治】 手足疮疥，久而虫生，及无名恶疮、风癣之类。

13877 蒌贝散

【方源】《金鉴》卷六十六。

【组成】 栝蒌 贝母（去心，研） 南星 甘草（生） 连翘（去心）各一钱 （一方加青皮、升麻）

【用法】 水二钟，煎八分，澄渣，加酒二分，食远服。

【主治】 乳劳初肿气实者。

13878 蒌连丸

【方源】 方出《百一》卷十二，名见《医方类聚》卷一二五引《简易方》。

【组成】 栝蒌根 黄连

【用法】 上为细末，研麦门冬取自然汁，和药为丸，如绿豆大。每服十五至二十丸，熟水吞下。

【主治】 消渴。

13879 蒌贝养荣汤

【方源】《瘟疫论》（石楷校本）卷一。

【异名】 瓜贝养荣汤（原书同卷张以增校本）、栝贝养营汤（《温热暑疫全书》卷四）、清痰养荣汤（《会约》卷五）。

【组成】 知母 花粉 贝母 瓜蒌实 橘红 白芍 当归 紫苏子

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 瘟疫解后，痰涎涌甚，胸膈不清者。

13880 蒋氏化毒丹

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】 犀角 黄连 桔梗 玄参 薄荷叶 甘草（生） 大黄（生）各一两 青黛五钱

【用法】 上为细末，炼白蜜为丸，重六分。每服一丸，灯心汤化服。

【主治】 胎赤，因孕妇过食辛热之物，以致毒热凝结，蕴于胞中，致小儿生下头面、肢体赤若丹涂，热盛便秘者。

13881 落花生粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】 落花生45克（不去红衣） 粳米二两 冰糖适量（也可加入怀山药30克，或加百合15克）

【用法】 上先将花生洗净后捣碎，加入粳米、山药片或百合片，同煮为粥，待粥将成时，放入冰糖稍煮即可。

【功用】 健脾开胃，润肺止咳，养血通乳。

【主治】 肺燥干咳，少痰或无痰，脾虚反胃，贫血，产后乳汁不足。

13882 落翳神应方

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】 鹅不食草一钱 芎藭一个 蹄蹯花二分

【用法】 上为细末，吹入鼻中，三四次即落。

【主治】 一切翳膜。

13883 萱草膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】萱草花（晒干）七两　白蜜三两

【用法】上为细末，与蜜研令匀，入瓷盒中。每日洗面后看多少涂面上。

【主治】面粉皯痤瘙。

13884　萱草忘忧汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】桂枝五分　白芍一钱半　甘草五分　郁金二钱　合欢花二钱　广皮一钱　半夏一钱　贝母二钱　茯神二钱　柏子仁二钱

【用法】金针菜一两，煎汤代水。

【主治】忧愁太过，忽忽不乐，洒淅寒热，痰气不清。

13885　萹蓄汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】萹蓄一握

【用法】水一升，煎取五合，去滓，隔夜先不食，明晨空心饮之。虫即下。小儿同法。

【主治】肛门痒痛，甚或生虫，其痒难当。

13886　葵子汤

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】葵子　车前子　茯苓　白术　木通　赤芍药各等分

【用法】上为细末。每服二钱，酒调下。

【主治】小便凝涩不通。

13887　葵子汤

【方源】《济生》卷七。

【异名】葵花汤（《疡医大全》卷二十四）。

【组成】赤茯苓（去皮）　木猪苓（去皮）　葵子枳实（麸炒）　麦　木通（去节）　黄芩　车前子（炒）　滑石　甘草（炙）各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《济生》：膀胱实热，腹胀，小便不通，口舌干燥，咽肿不利。②《疡医大全》：膀胱有热，腹胀，阴囊肿胀而痛，小便不通。

13888　葵子散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】葵子一两　赤茯苓一两　白术一两　当归一两（锉，微炒）　木香半两　泽泻一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】冷淋，小便数，恒不利。

13889　葵子散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】葵子　石韦（去毛）　王不留行　滑石　当归（锉，微炒）　麦　赤芍药　琥珀　甘草（炙微赤，锉）各一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以大麦粥饮调下。

【主治】妇人五淋，小便涩，腹痛气闷。

13890　葵子散

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】葵子　车前子　木通　瞿麦　桑白皮（炒）　赤茯苓　山栀仁　甘草（微炙）各等分

【用法】上锉。每服一钱，井水一小盏，葱白二寸，煎至七分，食前温服。

【主治】小儿诸淋。

13891　葵子茯苓散

【方源】《金匮》卷下。

【异名】茯苓散（《圣济总录》卷一一五七）、茯苓汤（《鸡峰》卷十六）、葵子散（《宣明论》卷十五）、葵苓散（《女科指掌》卷三）、葵茯汤（《产科心法》上集）。

【组成】葵子一斤　茯苓三两

【用法】上为散。每服方寸匕，饮调下，一日三次。小便利则愈。

【功用】《金匮要略今释》：通窍利水。

【主治】妊娠有水气，身重，小便不利，洒淅恶寒，起则头眩。

【方论选录】《金匮要略心典》：葵子、茯苓滑窍行水，水气既行，不淫肌肤，身体不重矣；不侵卫阳，不恶寒矣；不犯清道，不头眩矣。

13892　粟壳散

【方源】《徐评外科正宗》卷八。

【异名】粟壳汤（《嵩崖尊生》卷十三）。

【组成】粟壳（温汤泡，去瓤蒂，切丝，蜜水拌炒）二钱　当归　陈皮　秦艽　黄芪　生地　熟地各一钱　黄柏　黄芩　人参　苍术　厚朴　升麻各六分　荷叶蒂七个　甘草五分　地骨皮一钱二分

【用法】上用水二茶钟，煎八分，食前服；或为细末，每服二钱，空心温酒调服。

【主治】诸痔作痛；及肠风下血，诸药不止者。

13893　焚香透膈散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】雄黄　佛耳草　鹅管石　款冬花各等分

【用法】上为末。每用药一钱，放香炉上焚烧令烟出，开口吸烟在喉中。

【主治】劳嗽，胸膈壅滞痞满。

13894 焚香透膈筒

【方源】《简明医彀》卷四。

【组成】 鹅管石一两 款冬花七钱 艾叶（搓软） 雄黄各五钱

【用法】 各研和匀，纸卷成筒，火点，令漏斗于上口，哈烟一口，淡姜汤咽下。

【主治】 风寒冷嗽，胸膈胀满。

【加减】 加佛耳草更佳。

13895 煮朴丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五引陆从老方。

【组成】 厚朴四两（去皮，锉作寸段，用生姜四两细切，水二碗，同煮水尽，去生姜，将厚朴再切，焙干） 附子二两（炮，去皮脐，锉，再炒微黄色） 川白姜四两（甘草二两，锉半寸长，水二碗，同煮水尽，去甘草） 舶上茴香二两（炒） 半夏曲一两

【用法】 上为细末，煮枣肉和丸，如梧桐子大。每服三十丸，温汤米饮送下。

【主治】 脾胃虚冷，不思饮食，四肢倦怠，泄泻无时。

13896 煮朴丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】 厚朴二两（去皮，锉，生姜四两切片，水二碗，煮干为度，去姜） 附子一两（炮，去皮脐） 诃子（纸裹蘸湿煨，去核）半两 肉豆蔻一两（面裹煨） 干姜半两（炮，洗）

【用法】 上为细末，姜汁煮面糊丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食前米饮送下。

【主治】 虚寒泄泻，注下不禁。

13897 煮肝散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】 木香一两 人参一两（去芦头） 桂心半两 胡椒一分 补骨脂半两 白术一两 白芍药一两 高良姜半两（锉） 干姜半两（炮裂，锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 缩砂半两（去皮）

【用法】 上为散。每服五钱，用猪猪肝一具切细，拌匀，入于铛子内，以浆水三大盏，入葱白五根，煮令烂熟，任意食之。

【主治】 虚劳不思食。

13898 煮肝散

【方源】《苏沈良方》卷二。

【组成】 紫菀 桔梗 苍术 芍药各等分

【用法】 上为末。每服四钱，羊肝半具，大竹刀切，勿犯水，勿令血散，入盐、醋、葱、姜、酒同煮熟，空腹食前服，一日三次。

【主治】 肝痿脚弱；及伤寒手足手小不随。

13899 煮肝散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 青蛤粉 夜明砂 谷精草各等分

【用法】 上为细末。每服五七钱，放猪肝内煮熟。细嚼，茶清送下。

【主治】 ①《儒门事亲》：雀目。②《卫生宝鉴》：小儿疳眼，翳膜羞明。

【备考】《卫生宝鉴》：上为细末，每服一钱，五七岁以上二钱，用猪猪肝一大片，劈开，掺药在内，摊匀，麻线缠定，以米泔水半碗煮肝熟，取出肝，汤倾碗内，熏眼；分肝作三次嚼吃，肝汤送下，一日三服，不拘时候。大人雀目，空心服，如患多时不效，日服二次。

13900 煮肝散

【方源】《成方便读》卷四。

【组成】 夜明砂（淘净） 蛤粉 谷精草 石决明各一两

【用法】 上为散。每服三钱，用猪肝以竹刀劈开，勿犯铁器，摊药在内，麻线缠定，米泔水一碗，煮肝至熟。先取出肝，倾汤碗内，熏眼，肝分三次细嚼，用煮肝汤热服，一日服尽。

【主治】 雀目羞明，疳眼翳障等证。

【方论选录】 雀目一证，至夜则昏如雾露，视物无光，皆由肝有滞浊，积结阴分，以致精津血液至交入阴分之时，不能上升于目，故夜视无光。小儿疳眼，亦因积滞起见，流虽异而源则一也。方中夜明砂，专入肝经，破滞化积；谷精草得谷之余气，养肝磨翳；蛤粉、决明，皆介类之品，引之以入阴分；以肝煮之者，使药性归之于肝也。

13901 煮附丸

【方源】《医方大成》卷六引《澹寮方》。

【组成】 香附子（去毛）一斤 老姜（不去皮）六两 盐二两（上三件安沙瓶内煮三昼夜，焙干） 茯神（去皮） 白茯苓（去皮）各四两 川椒（去目及闭口者，炒出汗） 北茴香（淘净，炒）各二两

【用法】 上为末，陈米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心煎紫苏汤送下；小便多者，研碎茴香浓煎汤下。

【主治】 气虚膨胀，或胸膈停痰滞气，小便赤，白浊。

13902 煮附丹

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】 附子七钱（重者一只，生用，去皮脐，分作四片） 厚朴（去粗皮，锉）二两 生姜六两（薄切） 益智（洗净） 半夏（汤洗七次） 川椒（去目及合口者，炒出汗） 青盐各一两

【用法】 上药用水五升，于银石器内慢火煮干，焙干为末，法酒面糊丸，如梧桐子大。每服三十至五十丸，空心、日午以温酒或米饮送下。

【主治】 脾虚脏寒，冷热积滞，气结肠间，虚胀脘痞，后重滑泄。

13903 逼毒散

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】 甘草一两 苍术二两

【用法】 同为粗末。每服四钱，水一盏，加葱白五寸，豉五十粒，同煎至六分，去滓热服。并二三服，取微汗。

【主治】 孕妇伤寒当汗者。

13904 越桃丸

【方源】《医方类聚》卷一〇三引《简要济众方》。

【组成】 山栀子一两（去皮，入蜜少许，炒） 草龙胆半两 甘草三分（炙） 赤茯苓一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧煎竹叶汤送下。

【主治】 上焦热，口苦咽干，胸膈痞闷。

13905 越桃散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】 川芎 羌活（去芦头） 防风（去芦头） 甘菊花 白蒺藜（炒，去刺） 甘草（炙）各一两 山栀仁三钱

【用法】 上为细末。每服二钱，食后茶清调下。

【主治】 汗出当风，外受风邪，面生齄疱。

13906 越婢汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 麻黄六两 石膏半斤 生姜三两 大枣十五枚 甘草二两

【用法】 上以水六升，先煮麻黄，去上沫，纳诸药，煮取三升，分温三服。

【主治】 风水恶风，一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热者。

【加减】 恶风者，加附子一枚（炮）；风水，加术四两。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足太阳药也，风水在肌肤之间，用麻黄之辛热以泻肺；石膏之甘寒以清胃；甘草佐之，使风水从毛孔中出；又以姜枣为使，调和荣卫，不使其太发散耗津液也。②《金匮要略方义》：本方为治疗风水而肺胃有郁热之主要方剂。风水为病，乃风邪外袭，肺气不宣，水道失调，风水相击于肌表所致。治当解表祛风，宣肺行水。方中以麻黄为君药，发汗解表，宣肺行水；佐以生姜、大枣则增强发越水气之功，不仅使风邪水气从汗而解，尤可藉宣肺通调水道之力，使水邪从小便而去。因肺胃有热，故加石膏以清其热。使以甘草，调和药性，与大枣相伍，则和脾胃而运化水湿之邪。综合五药，乃为发越水气，清泄里热之剂。

【临证举例】 风水《江苏中医》(1965；11:2)：陆某，年逾四旬，务农，1954年6月，时值仲夏，犹衣棉袄，头面周身悉肿，目不能启；腹膨若瓮，肤色光亮，恶风无汗，发热微渴，纳呆溺少，咳嗽痰多，气逆喘促，不能正偃，倚壁而坐，寸口肿甚，难辨脉浮沉。诊为风水用越婢加味，净麻黄18克，生石膏15克，粉甘草6克，飞滑石12克（分二次送服），鲜生姜4片，大枣12枚（劈），嘱服后厚覆取汗。药后一时许，周身透汗，三更内衣，小便亦多，气机转和，寒热消失，身肿腹胀消有十之八九，后以五苓散加味取愈。

13907 越婢汤

【方源】《千金》卷七。

【异名】 起脾汤（《外台》卷十六）、越婢加术附汤（《张氏医通》卷十六）。

【组成】 麻黄六两 石膏半升 白术四两 大附子一枚 生姜三两 甘草二两 大枣十五枚

【用法】 上㕮咀。以水七升，先煮麻黄再沸，掠去沫，入诸药，煮取三升，分温三服。覆取汗。

【主治】 风湿毒邪侵袭，津液耗伤，筋脉挛痹，脚膝痿弱，行立不便。

①《千金》：风痹脚弱；肉极，热则身体津液脱，腠理开，汗大泄，厉风气，下焦脚弱。②《圣惠》风毒脚气痹挛，行履不遂。③《永乐大典》引《卫生家宝》：风湿疼痹，脚弱不能行立。

【备考】《外台》引本方无白术。《圣惠》将本方捣罗为粗末，每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

13908 越鞠丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】 芎术丸（原书同卷）、越曲丸（《松崖医径》卷下）。

【组成】 苍术 香附 抚芎 神曲 栀子各等分

【用法】 上为末，水泛为丸，如绿豆大。

【功用】 解诸郁。

【主治】 六郁。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手足太阴手少阳药也。吴鹤皋曰：越鞠者，发越鞠郁之谓也。香附开气郁；苍术燥湿郁；抚芎调血郁；栀子解火郁；神曲消食郁。陈来章曰：皆理气也，气畅则郁舒矣。②《删补名医方论》：以气为本，若饮食不节，寒温不适，喜怒无常，忧思无度，使冲和之气升降失常，以致胃郁不思饮食，脾郁不消水谷，气郁胸腹胀满，血郁胸膈刺痛，湿郁痰饮，火郁为热，及呕吐、恶心，吞酸、吐酸、嘈杂、嗳气，百病丛生。故用香附以开气郁，苍术以除湿郁，抚芎以行血郁，山栀以清火郁，神曲以消食郁。五药相须，共收疏解五郁之效。

13909 越鞠汤

【方源】《易氏医案》。

【组成】 香附（醋炒）一钱 苏梗六分 连翘六分 苍术八分 神曲一钱 甘草三分 桔梗四分 黄芩八分 枳壳五分 山栀六分 抚芎六分

【用法】 水煎服。

【主治】 气秘。二便皆秘，脉两寸沉伏有力，两关洪缓无力，两尺不见。

【方论选录】 方用香附之辛，以快滞气；苏梗通表里之窍；连翘香辛升上，以散六经之郁火；苍术、神曲健脾导气，散中达于四肢；炙甘草以和中；少加桔梗引黄芩、枳壳，荡涤大肠之积；山栀去三焦屈曲之火而利小肠；抚芎畅达肝木，使上窍一通，则下窍随开，里气一顺，则表气自畅，是以周身汗出，二便俱利，正所谓一通百通也。夫气秘者病之本，便闭者病之标，本方唯治其本，故见效速也。

13910 越婢加术汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 麻黄六两 石膏半斤 生姜三两 大枣十五枚 甘草二两 白术四两

【用法】 上以水六升，先煮麻黄，去上沫，纳诸药，煮取三升，分温三服。

【主治】 里水。一身面目黄肿，其脉沉，小便不利。

【方论选录】《金匮要略方义》：本方乃越婢汤加白术而成。白术乃脾家正药，健脾化湿是其专长，与麻黄相伍，能外散内利，祛一身皮里之水。本方治证，乃脾气素虚，湿从内生复感外风，风水相搏，发为水肿之病。方以越婢汤发散其表，白术治其里，使风邪从皮毛而散，水湿从小便而利。二者配合，表里双解，表和里通，诸症得除。

13911 越鞠保和丸

【方源】《古今医鉴》卷四。

【异名】 越曲保和丸（《杂病源流犀烛》卷十八）。

【组成】 苍术（米泔浸三宿，炒）一两 抚芎（酒洗）一两 神曲（炒）一两 香附（童便浸，炒）一两 栀子（炒）五钱 陈皮一两 半夏（炮）一两 白茯苓一两 连翘五钱 莱菔子（炒）五钱 枳实（麸炒）一两 白术三两 黄连（酒炒）一两 山楂（去核）二两 木香五钱 当归（酒洗）一两

【用法】 上为末，姜汁泡蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，淡姜汤送下；或酒下亦可。

【功用】 扶脾开郁，行气消食，清热化痰。

【主治】《北京市中药成方选集》：忧思过度，损伤脾胃，郁结不舒，呃逆胸满。

13912 越婢加半夏汤

【方源】《金匮》卷上。

【组成】 麻黄六两 石膏半斤 生姜三两 大枣十五枚 甘草二两 半夏半升

【用法】 上以水六升，先煮麻黄，去上沫，纳诸药，煮取三升，分温三服。

【主治】 肺胀。咳而上气，其人喘，目如脱状，脉浮大者。

【方论选录】《金匮要略方义》：本方所治之肺胀，系饮热内蕴，复感风邪所致。风邪外束，肺气不宣，饮热内蕴，肺失通调，故上气喘咳，身形如肿，其目如脱。治当宣肺平喘，清热化痰。方中麻黄宣肺平喘，发散风邪；臣以石膏清泄内热；佐以半夏降逆散结，燥化痰湿；更以生姜之辛散，外配麻黄发越水气，内助半夏降逆化饮；大枣补脾制水，与生姜合用，调和营卫；使以甘草调和诸药，且缓麻黄之散，石膏之寒，使攻邪而不伤正。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“半夏汤”。

13913 趁风膏

【方源】《三因》卷二。

【组成】 川山甲（左瘫用左足，右瘫用右足）红海蛤（如棋子者） 川乌头（大者，生用）各二两

【用法】 上为末，每用半两，捣葱白汁，和成厚饼，约径一寸半，贴在患侧脚中心，用旧帛裹紧缚定，于无风密室中坐椅上，椅前放汤一盆，将贴药脚于汤内浸，候汗出即去了药。病未尽除，依此法隔半月二十天再做一次。

【主治】 中风，手足偏废不举。

【宜忌】 周身汗出，宜避风；忌口远欲以自养。

13914 趁痛丸

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【异名】 控涎丹(《三因》卷十二)、妙应丸(《保命歌括》卷九)、控痰丹(《便览》卷三)、子龙丸(《外科全生集》卷四)、控涎丸(《中国药典》一部)。

【组成】 甘遂 白芥子（微炒） 大戟各等分

【用法】 上为细末，滴水和作饼子，炙黄色，为细末，醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服十丸，冷酒送下，利则止后服。

【功用】《中国药典》：涤痰逐饮。

【主治】 痰饮停子胸胁，或流窜经络，致胸胁、腰背、手足、头项走窜疼痛，坐卧不安，饮食乏味；痰核瘰疬。

①《脚气治法总要》：脚气，毒攻两脚，痛不可忍者。②《三因》：人忽患胸背、手脚颈、腰胯隐痛不可忍，连筋骨牵引钓痛，坐卧不宁，时时走易不定；或令人头痛不可举，神意昏倦多睡，饮食无味，痰唾稠粘，夜间喉中声如锯，多流唾涎，手足重而冷痹，此乃痰涎伏在胸膈上下，或痹阻经络，脉气不通。③《中国药典》：痰涎水饮停子胸膈，胸胁隐痛，咳喘痛甚，痰不易出，瘰疬痰核。

【宜忌】《中国药典》：孕妇忌服，体弱者慎服。

【方论选录】《医方集解》：痰之本水湿也，得气与火则结为痰，痰随气升降，无处不到，入心则迷，入肺为咳为喘，入肝则胁痛寒热，入经络则痹痛，入筋骨则牵引钓痛，入皮肉则生瘰疬痈肿。方用大戟泄脏腑水湿，甘遂行经络水湿，白芥子散皮里膜外痰气。三物合用，使水湿化，痰饮除，脉气通和，则诸症自愈。

【备考】 按：本方用法，《中国药典》：将三味粉碎，过筛，混匀，另取米粉或黄米粉240克调稀糊泛丸。每服1～2克，一日1～2次，用开水或枣汤、米汤送服。

13915 趁痛丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】 草乌头（不去皮尖）三两 生干地黄（焙） 天南星 半夏（与南星用姜汁浸一宿，切，焙） 白僵蚕（炒） 乌药（锉）各半两

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大，晒干。每服五七丸，空腹、临卧温酒送下。如颠扑肿痛，用姜汁和酒研十数丸涂之；如卒中倒仆，以姜汁、茶清研五七丸灌之。

【主治】 ①《圣济总录》：历节风，疼痛不可忍。②《本事》：走注历节，诸风软痛；卒中倒地；跌扑伤损。

13916 趁痛丸

【方源】《宣明论》卷十二。

【组成】 甘遂 大戟 芫花 黑牵牛各等分

【用法】 上为末，以荞面同末和作饼子，抒切作棋子，煮熟。每服一钱，以利为度。相虚实加减。

【主治】 走注疼痛，妇人经脉注滞，水肿腹胀。

13917 趁痛丸

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 乳香 没药各一钱 白蒺藜子一两（炒黄） 乌梅一个 白粟米一抄（炒黄）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，空心温酒送下。

【主治】 打扑闪损，腰痛不可忍。

13918 趁痛丸

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】 五灵脂 赤芍药各半两 川乌一个 没药四钱 麝香一钱

【用法】 上为细末，酒糊为丸。空心温酒送下。

【主治】 腰臂痛。

13919 趁痛散

【方源】《产育保庆集》。

【异名】 二妙趁痛散(《万氏家抄方》卷五)。

【组成】 牛膝 当归 桂（去皮） 白术 黄耆 独活 生姜各半两 薤白 甘草（炙）各一分

【用法】 上为粗末。每服半两，水五盏，煎至二盏，去滓热服。

【主治】 产后气血虚弱，瘀血阻滞，筋脉失养，腰背拘急，头身疼痛，脉虚弦而涩者。

①《产育保庆集》：产后遍身疼痛者，②《准绳·女科》：产后气弱血滞，遍身疼痛，及身热头疼，③《济阴纲目》：产后气弱血滞，筋脉拘挛，腰背强直，遍身疼痛。④《医略六书》：产后身痛，脉软弦涩者。

【方论选录】《医略六书》：产后气弱血亏，寒邪袭入经络，不能统运营气子一身，故遍身疼痛不休。方中当归养血，营一身之经脉；黄耆补气，运一身之卫阳；白术健脾补气以生血；官桂温通经脉以散寒；独活通经络；牛膝壮筋脉；炙草益胃和中；生姜温胃散邪；薤白温通阳气，以活血脉，酒丸酒下，使脉气流通，寒邪外解，经脉融和，身痛痼除。

13920 趁痛散

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】 乳香 没药 桃仁 红花 当归 地龙（酒炒） 牛膝（酒浸） 羌活 甘草 五灵脂（酒淘） 香附（童便浸。或加酒芩、炒酒柏）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二十一丸，温酒送下。

【主治】 痛风走注，筋骨疼痛。

13921 硫朱丸

【方源】 《三因》卷十六。

【组成】 硫黄 川乌头（炮，去皮）各半两 朱砂（水飞）二两 天南星一两（炮制）

【用法】 上为末，姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，生姜、薄荷汤送下。

【主治】 肾厥，及痰厥头疼，诸药不效。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“硫朱丹”。

13922 硫矾散

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 硫黄 93 克 枯矾 93 克 煅石膏 500 克 青黛 31 克 冰片 6 克

【用法】 共为细末。菜油调涂子患处。

【主治】 急性湿疹，初起痦疱，继之破裂，溃烂流水，浸淫成片，瘙痒异常。

13923 硫黄丸

【方源】 《圣惠》卷五十九。

【组成】 硫黄一两 白矾二两（烧令汁尽）

【用法】 上为细末，以粳米饭和丸，如绿豆大。每服十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】 水泻不止，腹脏久冷，不思饮食。

13924 硫黄散

【方源】 《千金》卷三。

【组成】 硫黄 乌贼鱼骨各半两 五味子三铢

【用法】 上为末。以粉其上，一日三次。

【主治】 ①《千金》：妇人阴脱。②《景岳全书》：产后阳气虚寒，玉门不闭。

13925 硫黄散

【方源】 《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】 硫黄 川椒 石膏 白矾各等分

【用法】 上为细末。以生油调搽。

【主治】 疥。

13926 硫黄膏

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 硫黄 20 克 猪脂（或凡士林）80～100 克

【用法】 将硫黄研细，与猪脂或凡士林调匀成膏。搽擦患处。

【功用】 《中医外伤科学》：杀虫止痒。

【主治】 ①《中医皮肤病学简编》：头癣；②《中医外伤科学》：疥疮，玫瑰糠疹。

13927 硫痒膏

【方源】 《赵炳南临床经验集》。

【组成】 硫黄粉 一两 止痒药膏九两

【用法】 上药调匀，外敷患处。

【功用】 止痒杀虫，润肤收敛。

【主治】 神经性皮炎，慢性湿疹，阴囊湿疹。

【宜忌】 急性皮疹，及新鲜肉芽疮面勿用。

13928 硫椒蛋油

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 生硫黄 9 克 花椒 9 克 鸡蛋一个

【用法】 将鸡蛋一头打开，去蛋清，留蛋黄，将药装入鸡蛋内，混合搅拌，放瓦上慢火焙干，连壳研成细粉，以细罗罗去渣滓，用香油拌和，成褐色糊状软膏。外用。

【主治】 银屑病。

13929 硫黄不二散

【方源】 《外科正宗》卷三。

【异名】 硫花饮（《仙拈集》卷四。

【组成】 硫黄一钱 靛花一分

【用法】 上为细末。以凉水一大酒杯调服。

【主治】 杨梅结毒，发于咽内，腐烂疼痛，汤水难入者。

13930 雄朱丸

【方源】 《局方》卷一。

【组成】 雄黄（研） 朱砂（研） 龙脑（研） 麝香（研）各一钱 白僵蚕（去丝嘴，生） 白附子（生） 天南星（洗，生） 乌蛇（去皮骨，生）各半两

【用法】 上除研外，余皆为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。如中风涎潮，牙关不开，先用大蒜一瓣捣烂，涂在两牙关外腮上，次用豆淋酒化一丸，揩牙龈上即开，续用薄荷酒化下一两丸；如丈夫风气，妇人血风，牙关紧急者，只用豆淋酒化药，揩牙龈上即开；如头风目眩，暗风眼黑欲倒者，急嚼一两丸，薄荷酒送下。

【主治】 中风涎潮，咽膈作声，目眩不开，口眼㖞斜，手足不遂，及一切风疾。

13931 雄朱散

【方源】 《普济方》卷三七六。

【组成】 雄黄 朱砂各等分

【用法】 上为末。每服一钱，猪心血夹薄水调下。

【主治】 诸痫。口眼相引，上视涎流，手足抽

掣，头项反张，腰背强直。

13932 雄辛散

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】细辛 荜茇 雄黄 麝香各等分

【用法】上为细末。每服二钱，好酒调下。

【主治】恶蛇及疯狗所伤。

13933 雄灵散

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】雄黄半两（明好者。研） 五灵脂一两（真者。酒洗，去砂石，干用）

【用法】上为细末。每服二钱，酒调灌之，即以药末调涂疮口上。

【主治】毒蛇所伤，昏闷欲死者。

13934 雄矾散

【方源】《医级》卷八。

【组成】雄黄五分 瓜蒂二个 明矾 绿矾各一钱 细辛五分 麝香一分

【用法】上为末。绵裹塞鼻。数日自平。

【主治】鼻痈、鼻息及鼻内生疮。

13935 雄黄丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【异名】雄麝丸(《直指》卷四)。

【组成】雄黄半两（细研，水飞过） 麝香一分（细研） 天麻二两 乌蛇一两（酒浸，去皮骨，炙令微黄） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 当归三分 川乌头一两（炮裂，去皮脐） 芎藭一两 五灵脂一两半 独活二两 虎胫骨一两（涂酥，炙令黄） 天南星一两（炮裂） 败龟一两（涂酥，炙令黄） 干蝎一两（微炒） 白僵蚕三分（微炒） 安息香二两 桂心一两

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以温酒送下。

【主治】历节风，骨髓疼痛，挛急，久不愈。

【宜忌】忌猪、鸡、鱼、犬肉。

【备考】《直指》有地龙，无败龟。

13936 雄黄丸

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】全蝎 雄黄各二钱 盆硝一钱五分 乳香 没药各二钱 薄荷 川芎各一钱 冰片一分

【用法】上为末，口噙水，搐吹鼻内，一日二次。

【主治】偏正头风。

13937 雄黄油

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】雄黄（研末）6克 甘油20毫升

【用法】混合均匀，外涂。

【主治】女阴溃疡。

13938 雄黄酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】雄黄粉50克 冰片0.5克 酒精100毫升

【用法】混合外用。

【主治】带状疱疹，单纯疱疹。

13939 雄黄散

【方源】方出《肘后》卷五，名见《圣惠》卷四十四。

【组成】雄黄 矾石各二分（为末） 麝香半分

【用法】捣敷患处。

【主治】女子阴疮。

13940 雄黄散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】草乌头（肥实心白者，水浸两宿切作片子，慢火焙干）二两 干姜一两（炮） 防风（去芦头） 当归（洗焙） 天南星（炮） 藁本（去土） 肉桂（去粗皮） 甘草（炙） 川芎 雄黄（不夹石，通明者，别研） 白僵蚕（炒去丝嘴）各半两

【用法】上为细末，入雄黄研匀。每服一钱，先嚼煨葱三寸，入生姜汁五七点，食后茶清调下。

【主治】一切风虚气攻，偏正头疼，呕吐涎沫。

【宜忌】忌热物少时。

13941 雄黄散

【方源】《保命集》卷中。

【异名】天麻雄黄散(《玉机微义》卷四十二)。

【组成】南星三钱 半夏五钱 天麻五钱 雄黄二钱半

【用法】上为细末。每服一钱，温酒调下。

【主治】破伤风。

【加减】如有涎，于此药中加大黄为下药。

13942 雄黄散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】雄黄一钱（研） 巴豆一个（去皮研）

【用法】二味同研如泥，入乳香、没药少许，再研细，少上，恶肉自去。

【主治】诸疮有恶肉，不能去者。

13943 雄黄散

【方源】《普济方》卷四〇八。

【组成】雄黄（另研） 生半夏 川乌尖 干姜各等分

【用法】上为细末。干搽痛处。如痛不止，用醋调搽，其痛立止。

【主治】 蛇蝎蜈蚣所伤，痛不可忍。

13944 雄黄膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 雄黄一斤 如意金黄散十两 蟾酥二钱 生白矾十两 冰片二钱 凡士林十二斤

【用法】 各药研细面，调匀成膏。外敷患处。

【功用】 消肿止痛。

【主治】 带状疱疹、急性淋巴管炎。

【宜忌】 急性渗出性皮损慎用。

13945 雄黄膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 雄黄精 9 克 羌黄 6 克 滑石粉 18 克 儿茶 5 克 漳丹 9 克 黄柏 9 克 黄连 3 克 甘草 3 克 冰片 2 克

【用法】 上药共研细末，取其一份，与蜜陀僧三份，混合均匀，外用。

【主治】 慢性湿疹。

13946 雄黄膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 雄黄 10 克 硫黄 10 克 氧化锌 10 克 凡士林加至 100 克

【用法】 调膏外用。

【主治】 头癣。

13947 雄蛇散

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】 雄黄一钱 蛇蜕一条（煅存性）

【用法】 上共为末。麻油调敷。

【主治】 疬疡风。

13948 雄槟丸

【方源】《医方考》卷五。

【异名】 雄榔丸(《李氏医鉴》卷五)。

【组成】 雄黄 槟榔 白矾各等分

【用法】 上为细末，米饭为丸，如粟米大。每服五分，食远服。

【主治】 腹中干痛有时者，为虫痛也。

【方论选录】 干痛者，不吐不泻而但痛也；有时者，淡食而饥则病，厚味而饱则否也。《浮粟经》曰：腹疾干痛有时，当为虫。此之谓也。是方也，雄黄、白矾、槟榔，皆杀虫之良剂也，故主之。虫盛者，以吐、下驱虫之剂加之，视人虚实可也。

13949 雄漆丸

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】 真漆一两（入蟹黄五钱，拌匀晒之，渐渐去浮面上水） 明雄黄 牙皂各五钱

【用法】 上为末，和匀为丸，不可见日，阴干。每服三分，酒送下。

【主治】 大麻风。

13950 雄麝散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 麝香 3 克 雄黄 90 克

【制剂】 先将麝香入乳钵内加雄黄少许，先研和，再加其余雄黄，同研极细，装瓷瓶内，勿泄气。

【用法】 用药少许，撒在膏药上，烘烤外贴。

【功用】 消散肿毒。

【主治】 痈肿，流注。

13951 雄黄合剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 雄黄 9 克 吴萸 9 克 贝母 12 克 威灵仙 12 克 五灵脂 9 克 白芷 9 克 细辛 3 克

【用法】 上共研为细末。每次服 9 克，一日三次，用开水及酒送下。

【主治】 毒蛇咬伤。

13952 雄黄圣饼子

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】 雄黄五钱 巴豆一百个（去油、心膜） 白面十两（罗过）

【用法】 上药除白面入丸用，余药同为细末，共面和匀，用新汲水和作饼子，如手大。以水再煮，候浮于汤上。漉出，控，旋看硬软捣剂为丸，如梧桐子大，捏作饼子。每服五、七饼，加至十饼、十五饼，嚼食一饼利一行，二饼利二行，食前茶、酒任下。

【主治】 一切酒食所伤，心腹满不快。

13953 雄黄神金散

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】 雄黄 葶苈一两（用糯米和炒半熟，米不用） 泽泻二两 椒目半两 大戟 巴戟（去心） 茯苓（去黑皮） 芫花（醋五升，浸一日炒） 甘遂 桑白皮各一两

【用法】 上为末，从病发时随证加药一分，空心用井花水调下。每服一钱加至五钱，以利为度。

【主治】 水气。

【宜忌】 忌盐、酷、生冷、油腻之物。

【加减】 从脚肿，根在心，加葶苈；从肚肿，根在腹，加椒目；从阴肿，根在胸，加泽泻；从膝肿，根在肝，加芫花；从面肿，根在肺，加桑白皮；从心肿，根在肋，加雄黄；从肢肿，根在脾，加甘遂；从口肿，根在小肠，加巴戟；从腰肿，根在肾，加大戟；从四肢肿，根在胃，加茯苓。

【备考】 方中雄黄用量原缺。《普济方》：除椒目减半外，余均为各一两。《医统》：所主药加倍，余各等分，量人虚实加减。主治十种水肿证候。

13954 雄黄斑蝥酊

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 斑蝥 6 克 雄黄 2 克 鲜山楂 31 克 95%酒精 260 毫升

【用法】 上药浸于酒精内一周后，过滤，外用。

【主治】 神经性皮炎。

13955 雄黄款冬花散

【方源】 《普济方》卷二十七。

【组成】 款冬花半两 佛耳草半两 明雄黄一钱（研）

【用法】 上为末，置于碗内，停灰火上，铢药熏，纸盖碗口留眼。频嗅吸药烟。其嗽即止。

【主治】 肺痿喘嗽，痰涎壅盛。

13956 搽牙散

【方源】 《古今医鉴》卷十四。

【组成】 人中白（樟木尿桶中浊，瓦上焙干）五钱 枯矾一钱 白梅（烧，瓦碗盖存性）

【用法】 上为末。先用韭菜根、老茶浓煎，鸡毛刷洗去腐烂恶肉，见到鲜血，乃用药敷之，一日三次；烂至喉中者，以小竹筒吹入。

【主治】 走马牙疳，牙龈腐烂。

【宜忌】 忌油腻、鸡、鱼等发气热物。

13957 搽黄药粉

【方源】 《赵炳南临床经验集》。

【组成】 栀子一两 雄黄四钱 朱砂四钱 轻粉四钱

【用法】 上药细研。用黄瓜蒂、茄子皮或生姜片蘸药外搽；或配成 10%软膏外用。

【功用】 驱风止痒，剥脱上皮。

【主治】 神经性皮炎（干癣），慢性湿疹（顽湿疮）。

【宜忌】 溃疡勿用。

13958 揩齿散

【方源】 《圣惠》卷三十四。

【组成】 细辛 白蒺藜（微炒，去刺） 露蜂房（微炙） 川升麻 白矾（一半炒令汗尽，一半生用，研令细） 黄柏（锉）各半两 槐柳枝各三七茎（各用粗者，长二寸，烧勿令过火）

【用法】 上为细散，研令匀，分瓷合盛。用时先以热盐水漱口二五度后，取药揩齿。觉微痛即止，有津吐之。

【主治】 牙齿风痛，血出疼痛，牙齿虚浮。

13959 揩齿石膏散

【方源】 《圣济总录》卷一二一。

【异名】 石膏散（《普济方》卷七十）。

【组成】 石膏（研）一两 凝水石（研）二两 丹砂（研）一分 升麻半两 白芷一两 细辛（去苗叶） 藁本（去苗土）各半两 沉香一两（锉）

【用法】 上捣罗为散。每日用柳枝咬头令软，点药末揩齿。

【功用】 令齿鲜净，去除恶气。

【主治】 牙齿黄黑，及口臭。

【备考】 去恶气，入麝香少许甚佳。

13960 提肛散

【方源】 《回春》卷七。

【组成】 龙骨一钱半 诃子（煨，去核） 没石子 罂粟壳（去蒂瓤，醋炙） 赤石脂各等分

【用法】 上为末。食前米饮调服。将葱汤熏洗令软，缓缓托上。

【主治】 小儿大肠气虚，肛门脱出。

13961 提肛散

【方源】 《医林绳墨大全》卷八。

【组成】 川芎 归身 白术 人参 黄耆 陈皮 甘草各一钱 升麻 柴胡 黄芩 黄连 白芷各五分

【用法】 水煎，食远服。

【主治】 气虚，肛门下坠，脱肛便血，脾胃虚弱。

13962 提肩散

【方源】 《保命歌括》卷十五。

【组成】 羌活 防风 藁本 川芎 白芍各七分（炒） 黄连（酒炒） 黄芩各五分 甘草四钱

【用法】 上以水二盏，加生姜三片煎服。

【主治】 风热乘肺，肩背强直作痛。

【加减】 气虚，加人参五分；汗多，加炙黄耆一钱；血虚，加川归、地黄各五分；有湿，加防己、苍术、薏苡仁各五分。

13963 提毒丹

【方源】 《疡科遗编》卷下。

【组成】 漂东丹一两 巴豆肉二十粒 蓖麻仁二十粒 白丁香十粒

【用法】 上药先将巴豆去净油，再同诸药打和，阴干，研细。临用掺疮上。

【主治】 痈疽溃后，腐肉不去，新肉不生。

13964 搜风丸

【方源】 《理伤续断方》。

【组成】 何首乌 南星 骨碎补 川乌各半斤

土牛膝　芍药各五两（一云二两）　细辛三两　当归十两　白鲜皮

【用法】　上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒或盐汤吞下，不拘时候。

【主治】　风损腰痛，头痛。

【备考】　方中白鲜皮用量原缺。

13965　搜风丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】　天麻（去土皮净）三两二钱　玄参（去芦）　草薢（另研末）三两一钱　杜仲（去粗皮，酒拌炒去丝）三两五钱　附子（盐水浸，去皮）五钱　羌活七钱　牛膝（去芦）　独活（酒洗）各三两三钱　当归（酒洗）五钱　生地黄（忌铁，酒浸一日夜，捣成膏）一两

【用法】　上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八十丸或百丸，空心温酒送下。

【主治】　口眼㖞斜，左瘫右痪。

13966　搜风汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】　防风六钱　真辽人参四钱（别炖同服，可以野台参七钱代之，高丽参不宜用）　清半夏三钱　生石膏八钱　僵蚕二钱　柿霜饼五钱（冲服）麝香一分（药汁送服）

【主治】　中风。

【方论选录】　本方重用防风引以麝香深入脏腑以搜风。犹恐元气虚弱，不能运化药力以逐风外出，故用人参以大补元气，扶正即以胜邪也。用石膏者，因风蕴脏腑多生内热，人参补气助阳分亦能生热，石膏质重气轻性复微寒，其重也能深入脏腑，其轻也能外达皮毛，其寒也能祛脏腑之热，而即解人参之热也。用僵蚕者，徐灵胎谓邪之中人，有气无形，穿经入络，愈久愈深，以气类相反之药投之，则拒而不入，必得与之同类者和入诸药使为向导，则药至病所，而邪与药相从，药性渐发，邪或从毛孔出，从二便出，不能复留，此从治之法也。僵蚕因风而僵，与风为同类，故善引祛风之药至于病所成功也。用半夏、柿霜者，诚以此证皆痰涎壅滞，有半夏以降之，柿霜以润之，而痰涎自息也。

13967　搜风散

【方源】《程松崖眼科》。

【组成】　防风六分　荆芥六分　蕤仁八分　刺蒺藜一钱　菊花一钱　蝉蜕六分　甘草四分　谷精草六分　赤芍八分　车前子一钱

【用法】　上加生姜一薄片，煎汤内服，外点蕤仁膏。

【主治】　眼弦作痒及烂者。

13968　搜风止痛汤

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】　防风三钱　山甲片二钱（炙）　川乌头三钱　独活四钱　秦艽四钱　威灵仙四钱　明党参三钱　麻黄二钱　桂枝四钱　皂刺三钱　木瓜三钱　甘草二钱

【用法】　水煎，温服。

【主治】　白虎历节风，先痛后肿，四肢关节相互交替，此轻彼重。

【方论选录】　方以防风为君；以川乌、秦艽通行上下为臣；以独活、灵仙搜寻筋骨为佐；以桂枝、木瓜达其股肱，以山甲、皂刺、麻黄开启腠理为使，引风邪从汗孔而出；党参、甘草调其中宫，扶其元气，风邪去而痛自止矣。

13969　搜风顺气丸

【方源】《普济方》卷九十二。

【组成】　人参一两半　麻子仁　柏子仁　大黄各一两　皂角（不去皮）二两　黑牵牛（末）一两　威灵仙二两　朴消半两

【用法】　上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，温酒送下。

【主治】　风湿气，口眼㖞斜，大便结涩。

13970　搜风顺气丸

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】　车前子一两半　大麻子（微炒）二钱　大黄五钱（半生半熟）　牛膝（酒浸）　郁李仁　菟丝子（酒浸）　枳壳　山药各二钱

【用法】　上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【主治】　痔漏，风热闭结，老人燥秘。

13971　搜风除湿汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】　全虫二至四钱　蜈蚣三至五条　海风藤三至五钱　川槿皮三至五钱　炒黄柏三至五钱　炒白术三至五钱　威灵仙五钱至一两　炒薏米五钱至一两　炒枳壳三至五钱　白鲜皮五钱至一两

【功用】　搜风，除湿，止痒。

【主治】　慢性湿疹，慢性顽固性神经性皮炎，年久色素沉着，皮肤瘙痒症；皮肤淀粉样变；皮肤结节性痒疹。

13972　搜风流气饮

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】　荆芥9克　防风6克　菊花9克　僵蚕9克　白芷6克　当归9克　川芎6克　赤芍9克

乌药9克　陈皮6克

【功用】 疏风达邪，和营理气。

【主治】 赤白游风（血管神经性水肿），荨麻疹（肠胃型）。

13973　援土固胎汤

【方源】《傅青主男女科》。

【组成】 人参一两　白术二两（土炒）　肉桂二钱（去粗皮）　山药一两（炒）　制附子五分　炙甘草一钱　杜仲三钱（炒黑）　续断三钱　枸杞子三钱　山茱萸一两（蒸，去核）　菟丝子三钱（酒炒）　砂仁三粒（炒，研）

【用法】 水煎服。

【主治】 妊娠脾胃虚极，上吐下泻，胎动欲坠，腹痛难忍，急不可缓。

13974　握宣丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 槟榔　肉桂　干姜　附子　甘遂　良姜　韭子　巴豆各等分　硫黄一钱

【用法】 上为细末，软米和丸，如梧桐子大。早晨先用椒汤洗手，放温揩干，用生油少许泥手心，男左女右，磨令热握一丸，宣一二行。

【主治】 大小便难。

13975　握宣丸

【方源】《田氏保婴集》。

【组成】 巴豆一钱半　硫黄　良姜　附子　槟榔　甘遂各等分

【用法】 上为细末，粟米饭和丸，如绿豆大。用椒汤洗小儿，男左女右手握之，用绵裹定，看行数多少，洗去即止。

【主治】 小儿大小便难，呕吐，药食不下，命在顷刻。

13976　翘荷汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 薄荷一钱五分　连翘一钱五分　生甘草一钱　黑栀皮一钱五分　桔梗二钱　绿豆皮二钱

【用法】 上以水二杯，煮取一杯。顿服。一日二剂，甚者三剂。

【功用】 清上焦气分之燥热。

【主治】 燥气化火，清窍不利者。

【加减】 耳鸣者，加羚羊角、苦丁茶；目赤者，加鲜菊叶、苦丁茶、夏枯草；咽痛者，加牛蒡子、黄芩。

13977　紫丸

【方源】《千金》卷五。

【异名】 紫双丸（《圣惠》卷七十六）、紫霜丸（《局方》卷十）、紫霞丸（《幼科类萃》卷六）、紫丸子（《赤水玄珠》卷二十六）、四味紫丸（《杏苑》卷七）。

【组成】 代赭　赤石脂各一两　巴豆三十枚　杏仁五十枚

【用法】 上为末，巴豆、杏仁别研为膏，相和，更捣二千杵，当自相得。若硬，入少蜜同捣之，密器中收。三十日儿服如麻子大一丸，与少乳汁送下，食顷后与少乳，勿令多。至日中当小下热除，若未全除，明旦更与一丸。百日儿服如小豆大一丸，以此准量增减。夏月多热，喜令发疹，二三十日辄一服佳。紫丸虽下不虚人。

【功用】《小儿药证直诀》：消积聚。

【主治】 小儿变蒸，发热不解，并挟伤寒温壮，汗后热不歇；及腹中有痰癖，哺乳不进，乳则吐呕，食痛，先寒后热者。

【方论选录】 ①《医林纂要》：紫霜丸以治变蒸不解。盖脏气变动之际，宜镇定其心神，安固其气血，而随之以推陈致新也。二石可镇心神，固气血；杏仁、巴豆霜可推陈致新而用之有节也。②《小儿药证直诀类证释义》：此方巴豆攻下积聚，伍以赤石脂以缓之，代赭石、杏仁镇惊降逆，故能治小儿积聚以及惊痰诸证。由于此方巴霜较多，攻泄有余，是为治标之剂，实积及实热生痰者宜之。

13978　紫雪

【方源】《外台》卷十八引《苏恭方》。

【异名】 紫雪丹（《成方便读》卷三）、紫雪散（《全国中药成药处方集》天津方）。

【组成】 黄金百两　寒水石三升　石膏三斤　磁石三斤　滑石三斤　玄参一斤　羚羊角五两（屑）　犀角五两（屑）　升麻一升　沉香五两　丁子香一两　青木香五两　甘草八两（炙）

【用法】 上药以水一斛，先煮五种金石药，得四斗，去滓后纳八物，煮取一斗五升，去滓，取消石四升，芒消亦可，用朴消精者十斤投汁中，微火上煮，柳木箸搅，勿住手，有七升，投在木盆中，半日欲凝，纳研朱砂三两，细研麝香五分，纳中搅调，寒之二日成霜雪紫色。病人强壮者一服二分，当利热毒；老弱人或热毒微者，一服一分。脚气病经服石药发热毒闷者，水和四分服，胜三黄汤十剂，以后依旧方用麝香丸。

【功用】 ①《重订通俗伤寒论》：辟秽开窍，泻火散结。②《北京市中药成方选集》：镇惊安神，清心开窍。

【主治】 ①《外台》引《苏恭方》：脚气毒遍内

外，烦热，口中生疮，狂易叫走；诸石草热药毒发，邪热卒黄；瘴疫毒疠，卒死温疟，五尸五注，心腹诸疾，绞刺切痛，蛊毒鬼魅，野道热毒，小儿惊痫。②《全国中药成药处方集》（北京方）：温热不解，神昏谵语，口中生疮，狂躁不安，大便干，小便赤。

【宜忌】 ①《外台》引苏恭方：忌海藻、菘菜、生血。②《全国中药成药处方集》（北京方）：禁食油面厚味，孕妇忌服。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手足少阴、足厥阴、阳明药也。寒水石、石膏、滑石、消石以泻诸经之火，而兼利水为君；磁石、玄参以滋肾水，而兼补阴为臣；犀角、羚角以清心宁肝，升麻、甘草以升阳解毒，沉香、木香、丁香以温胃调气，麝香以透骨通窍，丹砂、黄金以镇惊安魂，泻心肝之热为佐使。诸药用气，消独用质者，以其水卤结成，性峻而易消，以泻火而散结也。②《新医学》（1976；7:444）：本方针对高热、神昏、狂躁，惊厥等四大热闭症状而设，立旨于清热开窍。方中以石膏、寒水石、滑石泻火退热而又甘寒生津，佐以玄参、升麻、炙甘草养阴透阳解毒；羚羊角退热熄风，佐以消石、芒消泄散热邪；又以麝香开窍，佐以丁香、沉香等行气宣通。总的来看，全方药物性类似乎繁杂，但主次仍属分明，以生津助泻火（针对热盛伤津）、升散泄热助解毒（针对热毒郁结）、重镇安神助熄风（针对狂躁谵语）、宣通行气助开窍（针对神志昏迷），结构仍属严谨，各药作用的目的最终是一致的。

13979 紫雪

【方源】《疡医大全》卷十七引窦太师方。

【组成】 青矾（不拘多少，火煅通红，取出放地上出火毒） 硼砂 元明粉 冰片 麝香

【用法】 上为极细末，放舌下或喉间。

【主治】 ①《疡医大全》引窦太师：咽痛。②《喉科秘钥》：重舌、莲花舌。

【备考】 方中青矾，《喉科秘钥》作“青盐”。

13980 紫膏

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】 旱莲草三斤 麦冬八两 阿胶四两 白蜜二斤

【用法】 先熬旱莲取汁，次熬麦冬去渣，下蜜再熬，投阿胶化匀。每服一二匙，白沸汤化下。

【主治】 内虚咽痛，或变喉癣。

13981 紫云膏

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】 紫草四两 大生地四两 云苓三两 麦冬三两 白果肉一百粒

【用法】 上药清水煎浓绞汁，用蜂蜜六两收膏。每服两匙，早、晚各一次。

【主治】 吐血，初患起照如常，若无所苦，久则成痨。

13982 紫石丸

【方源】《普济方》卷三十二。

【组成】 紫石英一两（细研，水飞过） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，去皮，炙令干） 白石英一两（细研，水飞过） 磁石二两（醋淬七遍，细研，水飞过） 鹿茸（去毛，酥炙干） 菟丝子二两（浸三日，晒干为末） 人参一两（去芦） 黄耆一两 钟乳粉二两 熟地黄二两 巴戟一两半 白茯苓一两 补骨脂一两（炒） 覆盆子一两 附子二两（炮，去皮脐） 杜仲一两（去皮，炒） 天门冬一两（去心） 当归二两 五味子一两 石斛二两 桂心一两 柏子仁一两 蛇床子一两 棘刺一两 牛膝二两（去心） 续断一两 腽肭脐一两（酒浸）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至五十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【功用】 补益气力，令人健。

【主治】 肾脏虚损，羸瘦，饮食不进，肌肤骨瘦无力，腰脚疼痛。

13983 紫苏汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】 紫苏茎叶一两半 吴茱萸（汤浸去涎，炒黄） 橘皮（汤浸，去白，焙）各一分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，入童便一合，温服。

【主治】 脚气冲心，闷乱不识人，呕逆，饮食不下。

13984 紫苏饮

【方源】《本事》卷十。

【异名】 七宝紫苏饮（《医方类聚》卷二二四引《管见良方》）、紫苏和气饮（《古今医鉴》卷十二）、紫苏散（《准绳·伤寒》卷七）、紫苏汤（《胎产要诀》卷上）。

【组成】 大腹皮 人参（去芦） 川芎（洗） 陈橘皮（去白） 白芍药各半两 当归（洗，去芦，薄切）三钱 紫苏茎叶一两 甘草一钱（炙）

【用法】 上各锉细，分作三服。每服用水一盏半，加生姜四片，葱白七寸，煎至七分。去滓，空心服。

【功用】 ①《准绳·伤寒》：能安活胎，亦下死胎。②《医学心悟》：催生顺产。

【主治】 妊娠子悬，浮肿；气结难产；妇人瘦弱而经闭；伤寒头痛发热，遍身疼痛。

①《本事》：妊娠胎气不和，怀胎近上，胀满疼痛，谓之子悬；兼临产惊恐，气结连日不产。②《准绳·伤寒》：伤寒头痛发热，遍身疼痛。③《郑氏家传女科万金方》：妇人瘦弱而月水不至，或面色萎黄，好吃茶；妊娠喘急，两胁刺痛胀满；孕妇背极痛。④《医略六书》：孕妇浮肿，胎动脉浮者。

【方论选录】 ①《医略六书》：胎气内壅，风邪外束，血气不足以养胎，故胎动浮肿焉。紫苏理血气以散肿，大腹理滞气以安胎；当归养血荣胎，白芍敛阴和血；川芎行血海善调血中之气，人参补脾肺长养胎息之元；陈皮利气和中，炙草缓中益胃；生姜散表邪，葱白通阳气。水煮，温服，使风邪外解，则血气清和而胎气自顺，胎得所养，胎动无不安，浮肿无不退矣。②《本事方释义》：紫苏茎叶气味辛温，入足太阳；大腹皮气味辛温，入足太阴、太阳；人参气味甘温，入足阳明；川芎气味辛温，入足少阳、厥阴；陈橘皮气味苦辛微温，入手足太阴；白芍药气味酸微寒，入足厥阴；当归气味辛甘微温，入手少阴、足厥阴；甘草气味甘平，入足太阴，通行十经络，能缓诸药之性；佐以生姜、葱白之辛通温散。此因胎气不和，腹中疼痛，上逆胀满，非调气养血，扶正疏滞不能效也。

【临证举例】 ①难产《本事》：曾有妇人累日产不下，服遍催生药不验。予曰：此必坐草太早，心下怀惧，气结而然，非不顺也。《素问》云：恐则气下。盖恐则精却，却则上焦闭，闭则气还，还则下焦胀，气乃不行矣。得此药一服便产。②子悬《妇人良方》：丁未六月间，罗新恩孺人黄氏有孕七个月，远出而归，忽然胎上冲心而痛，卧坐不安，两医治之无效，遂说胎已死矣，便将蓖麻子去皮研烂，加麝香调贴脐中以下之，命在垂危。召仆诊视，两尺脉沉绝，他脉平和。仆问二医者曰：契兄作何证治之？答曰：死胎也。何以知之？答曰：两尺脉绝，以此知之。仆问之曰：此说出在何经？二医无答。遂问仆曰：门下作何证治之？仆答曰：此子悬也。若是死胎，却有辨处。夫面赤舌青者，子死母活；面青舌青吐沫者，母死子活，唇口俱青者，母子俱死，是其验也。今面色不赤，舌色不青，其子未死；其证不安，冲心而痛，是胎上逼心，谓之子悬。宜紫苏饮子治。药十服，而胎近下矣。

【备考】 本方方名，《简易》引作"紫苏饮子"（见《医方类聚》）。方中白芍，《郑氏家传女科万金方》作赤芍；《胎产秘书》作白术。《女科指掌》有砂仁；《灵验良方汇编》有香附，无人参。

13985 紫苏饮

【方源】《医彻》卷一。

【组成】 紫苏一钱五分 防风 荆芥 柴胡 葛根 广皮 桔梗各一钱 甘草（炙）三分 山楂一钱五分

【用法】 加生姜三片，水煎。

【主治】 伤寒表症。

【加减】 头痛，加川芎五分；夹食，加厚朴一钱（姜制），枳壳一钱（麸炒）；如咳嗽，去柴胡，加前胡一钱。

【方论选录】 此方虽平易，虚者犹不能当，慎勿泛用多用，得汗即止。

13986 紫苏散

【方源】《本事》卷三。

【组成】 紫苏叶 桑白皮（洗净，蜜涂炙黄） 青皮（去白） 五味子（拣） 杏仁（去皮尖，炒） 麻黄（去节） 甘草（炙）各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，煎至七分，温服。

【主治】 肺感风寒作嗽。

【方论选录】《本事方释义》：紫苏子气味辛温发散，入手太阴、足太阳、阳明之表；桑白皮气味苦辛平，入手太阴；青皮气味苦辛温微酸，入足少阳、厥阴；五味子气味酸甘平苦咸，虽入肾，然研细用，五脏之味俱全，不专走一经也；杏子仁气味苦辛微温，入手太阳、阳明；麻黄气味辛温，入手太阴、足太阳之表；甘草气味甘平，入脾兼入十二经络，能和诸药之性。因肺经感冒风寒咳嗽者，唯恐涉及他经，以辛温理邪之药，专攻肺经留邪，既能散而诸经安适矣。

13987 紫沉丸

【方源】《保命集》卷中。

【异名】 紫沉香丸（《医统》卷二十四）。

【组成】 半夏曲三钱 乌梅二钱（去核） 代赭石三钱 杏仁一钱（去皮尖） 丁香二钱 缩砂仁三钱 沉香一钱 槟榔二钱 木香一钱 陈皮五钱 白豆蔻半钱 白术一钱 巴豆霜半钱（另研）

【用法】 上为细末，入巴豆霜令匀，醋糊为丸，如黍米大。每服五十丸，食后生姜汤送下，吐愈则止。小儿另丸。

【主治】 中焦吐食，由食积与寒气相假，故吐而

痛。

13988 紫金丸

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】 禹余粮二两（煅，醋淬，研） 白芍 当归 熟地 川芎 龙骨（煅） 四制香附 白芷 各一两 肉桂（或用官桂） 干姜（煨）各五分（一方加赤石脂，煨，另研细）

【用法】 上为末，醋为丸。温酒送下。

【主治】 妇女劳伤气血，冲任虚损，经水淋漓不止，腰腹疼痛。

【加减】 产后盗汗，加黄耆、麻黄根。

13989 紫金丹

【方源】《本事》卷二。

【异名】 定喘紫金丹（《痘疹金镜录》卷一）。

【组成】 信砒一钱半（研，飞如粉） 豆豉一两半（好者，水略润少时，以纸挹干，研成膏）

【用法】 上用膏子和砒同杵极匀，丸如麻子大。每服十五丸，临卧以腊茶清极冷送下。以知为度。

【主治】 多年肺气喘急，呕嗽，晨夕不得眠。

【方论选录】《古方选注》：信，白砒，有大毒，须煅炼得法，庶不伤人。凡白砒一钱，用石膏一两同研匀，贮熔银罐中，勿盖，阳煅通赤，俟其烟尽，飞去砒毒，仅取石膏，得白砒之性，复借豆豉挫砒毒之余威，兼领石膏中砒性上升，迅扫肺经痼积之沉寒，不使少留，一如太空廓清，疾返冲和气象，其愈痼之功，莫有过于此者。又按《必效方》治痰积齁喘，遇阴气触发，用砒与白矾为丸，冷茶送下，高枕仰卧即愈。治法虽同，而砒与矾能烂人肉，不及《本事方》佳。

13990 紫金丹

【方源】《医学发明》卷三。

【组成】 川乌头（炮） 草乌头（炮）各一两 五灵脂 木鳖子（去壳） 骨碎补 威灵仙 金毛狗脊 自然铜（醋淬七次） 防风 地龙（去土） 乌药 青皮（去白） 陈皮（去白） 茴香 黑牵牛 各半钱 乳香 没药 红娘子 麝香各二钱半 禹余粮石（醋炒）四两

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至二十丸，温酒送下，病在上食后，病在下食前。

【功用】《伤科汇纂》：定痛接骨。

【主治】《卫生宝鉴》：打仆损伤，伤折疼痛不可忍。

13991 紫金酒

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】 官桂 明乳香 没药 广木香 羊蹄蹯 川羌各五钱 川芎 玄胡索 紫荆皮 五加皮 丹皮 郁金 乌药各一两

【用法】 上为粗末，将好酒十斤，悬胎煮二炷香，分作十小瓶。每饮三五杯，立见痛止。若预饮之，跌伤亦不痛。

【功用】 移伤定痛，善通经络。

【主治】 一切风气，跌打损伤，寒湿疝气，血滞气凝。

13992 紫金散

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】 禹余粮（火煅，醋淬七遍） 赤石脂 龙骨各三两 白芍药 甘草（炙） 川芎各三分 附子（炮，去皮脐） 熟干地黄（洗，焙） 当归（洗，焙）各一两 干姜半两（炮） 肉桂（去粗皮）半两

【用法】 上为细末。每服二钱，入麝香少许，食前米饮调下。

【主治】 冲任虚损，月水崩下，淋漓不断，腰腹重痛，五种带病。

13993 紫金锭

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】 罂粟壳（净末）六两 闹羊花（火酒拌，晒干） 麻黄（去节，炒）各四两 自然铜（煅）一两五钱 寒水石（煅）一两 草乌（黑豆同煮，去豆） 乳香（去油） 全蝎（水洗，焙干） 川芎 当归 白芷 甘草各五钱

【用法】 上为细末，瓷瓶蜜贮；或用陈老米糊和捣为饼，重二三钱，阴干密贮。每用量人老弱壮实，用酒磨化，三四五分为率，热酒和服，取汗避风要紧。

【主治】 周身风湿，筋骨疼痛。

13994 紫金膏

【方源】《普济方》卷二九六引《卫生家宝方》。

【组成】 穿山甲一两（煨过） 乳香半钱（细研如粉） 没药二钱（细研如粉）

【用法】 上研匀。每用少许，以津调涂疮上。即愈。

【主治】 翻花痔。

13995 紫金膏

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】 芙蓉花叶二两（白花者佳） 紫金皮一两

【用法】 上生采，入生地黄同捣，或为末，以鸡子清入蜜少许和匀，调入生地黄，砍烂和敷。

【主治】 赤肿焮热者。

13996 紫金膏

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】 炉甘石（入大银罐内，盐泥封固，用炭火煅一炷香，以罐通红为度，取起为末，用黄连水飞过，再入黄芩、黄连、黄柏汤内，将汤煮干，以甘石如松花色）四两 黄丹（入锅内，炒黑色，用草试之，草灼提起，如此三次，研极细末，水飞）四两 硼砂（研细，飞过）二钱 朱砂（研细，飞过） 轻粉五分 青盐（水洗去泥）五分 珍珠三钱 白丁香（乳汁化开，去滓）五分 没药五分 乳香五分 海螵蛸（去皮，研细）二钱 枯矾五分 硇砂五分 当归（研细）五分 川芎（研细）五分 黄连（研细）五分 甘草（研细）五分 麝香五分 冰片五分

【用法】 如法炮制，各研极细无声，用好白蜜十五两，入锅内熬去沫，只用白蜜十两，先下炉甘石搅匀，次下黄丹搅匀，再下诸药，不住手搅匀，如紫金色，不粘手为度。外用。

【主治】 胬肉攀睛。

13997 紫金膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】 白芷六钱 闹洋花 三柰 大茴香 青皮 草乌 川乌 威灵仙 甘松 小茴香 大黄 独活各七钱 干蟾一个 乱头发三两

【用法】 麻油四十两，同药入锅，熬至发化，滴水成珠，再下密陀僧（研细）十一两，收成膏，再下松香、葱汁、姜汁、凤仙花汁，各煮一次，研细，五两，入膏化尽搅匀，倾在钵内，重汤炖化，再下：潮脑七钱，青黛、桂皮各六钱，丁香、雄黄各五钱，轻粉四钱，血竭、乳香（去油）、没药（去油）、儿茶各三钱三分，滑石三钱，龙骨二钱五分，麝香、冰片各五分，搅入和匀收贮。宜摊厚些贴。立刻止痛。

【主治】 寒湿气，漏肩风，诸般疼痛。

13998 紫泡散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 石膏3克 青黛3克 朱砂3克 硼砂3克 冰片15克 明矾15克 人中白15克 元明粉15克 山豆根15克

【用法】 上为细末。外撒创面，或外掺。

【主治】 下肢溃疡。

13999 紫参汤

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 紫参半斤 甘草三两

【用法】 上以水五升，先煮紫参取二升，纳甘草煮取一升半，分温三服。

【主治】 下利肺痛。

14000 紫茸膏

【方源】《疡医大全》卷十。

【异名】 紫草膏（《卫生鸿宝》卷二）。

【组成】 紫草 白芷各二钱 归身五钱 甘草一钱 麻油二两

【用法】 同熬，白芷黄色为度，滤清，加白蜡、轻粉各二钱。取膏涂之。

【主治】 眉风癣，小儿胎毒疥癣，两眉生疮，或延及遍身瘙痒，或脓水淋漓，经年不愈。

14001 紫草散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 钩藤钩子 紫草茸各等分

【用法】 上为细末。每服一字，或五分、一钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】 发斑疹。

【方论选录】《小儿药证直诀释义》：此方钩藤开泄散风，紫草清血解毒，以酒调服，是助其透泄，故为助正达邪之方。

14002 紫桂散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】 桂不拘多少（去粗皮）

【用法】 上为细末。唾津和调敷，每日三四次，涂敷之。甚妙。

【主治】 白癜风，白点渐长如癣。

14003 紫菊汤

【方源】 方出《广笔记》卷三，名见《洞天奥旨》卷十五。

【组成】 生甘菊（连根，打碎）一两五钱 紫花地丁五钱 甘草（水炙）三钱 鼠粘子（炒，研）一两五钱 栝楼根二钱 贝母（去心）三钱 金银花五钱 白芷一钱五分 怀生地三钱 白及三钱 连翘二钱五分 五爪龙五钱（即茜草）

【用法】 先用夏枯草六两，河水六碗，煎三大碗，去滓，入前药煎一碗。不拘时候服。

【主治】 疔疽，一切肿毒。

【加减】 溃后，加黄耆（盐水炒）五钱，麦门冬五钱，五味子一钱。

14004 紫菀丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】 紫菀（去土） 款冬花（去梗） 白前各二钱半 人参半两 甜葶苈（炒） 乌梅肉各半两 御米壳一两半（去蒂，蜜水拌匀，炒黄熟）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，食后生姜汤送下。

【主治】 远年近日咳嗽，痰涎不利。

14005 紫菀汤

【方源】《外台》卷十引《广济方》。

【组成】 紫菀 五味子 生姜（合皮，切） 白石英（研，绵裹） 款冬花 桂心 人参各二两 钟乳（研，绵裹） 麦门冬（去心） 桑根白皮各三两 大枣二十枚（擘） 粳米一合

【用法】 上切。水一斗五升，先煮桑根白皮、粳米，取九升，去滓，纳诸药，煎取三升。去滓，分温三服，每服相去如人行七八里久。

【主治】 肺气不足，逆气胸满，上迫喉咽，闭塞短气，连唾相属，寒从背起，口如含霜雪，语无音声，剧者唾血腥臭，或歌或哭，干呕心烦，耳闻风雨声，皮毛悴，而白。

【宜忌】 忌生葱、热面、炙肉。

14006 紫菀汤

【方源】《妇人良方》卷十三。

【组成】 甘草 杏仁各一分 紫菀一两 桑白皮一分 苦梗三分 天门冬一两

【用法】 上㕮咀。每服三钱，水一盏，竹茹一块，煎至七分，去滓，入蜜半匙，再煎二沸，温服。

【功用】《医方论》：清润肺气。

【主治】 妊娠咳嗽不止，胎不安。

【宜忌】《良朋汇集》：忌食鲤鱼。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手太阴药也。子嗽由于火邪，当以清火润肺为务，桔梗、桑皮之凉以泻之，天冬、竹茹之寒以清之，紫菀、炙草之温，杏仁、白蜜之泽以润之也。②《医林纂要》：肺气不足则生燥，胎热有余则烁金，故子嗽。肺燥润之，紫菀、天冬、杏仁、白蜜；肺热泄之，天冬、桑皮、桔梗、杏仁；炙草温之，竹茹散之，嗽可止矣。

14007 紫菀汤

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】 紫菀茸 贝母 真苏子（微炒） 杏仁（水浸，去皮，焙黄） 北梗 陈皮 麻黄（去节） 半夏曲 赤茯苓 桑白皮（炒） 甘草（微炙）各等分

【用法】 上锉细。每服一钱，加姜三片，紫苏三叶（并嫩梗），水煎服。

【主治】 小儿喘嗽。

14008 紫菀汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 生地五钱 紫菀二钱 阿胶三钱（蒲黄灰炒） 白芍一钱半（炒） 人参一钱半 麦冬三钱（去心） 桑叶一钱半 川贝二钱（去心） 米仁四钱（炒）

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 吐血，脉虚微数者。

【方论选录】 产后气阴两亏，虚阳内迫，扰动血室，而血不归经，故吐血不止焉。生地壮水以滋血室，人参扶元以固血海，阿胶补阴益肺以止血，白芍敛阴安脾以吸血，川贝清心化热痰，麦冬清心润肺燥，米仁渗湿热兼清脾肺，桑叶除虚热清利肺金，紫菀温润肺气以清血痰也。水煎温服，使气阴内充，则虚阳下蛰，而肺金肃清，血室宁静，何吐血之不痊哉。

14009 紫菀散

【方源】 方出《医心方》卷十三引《广利方》，名见《圣惠》卷十四。

【异名】 紫菀汤（《圣济总录》卷四十九）。

【组成】 紫菀头二十一枚 桔梗十二分（微炙） 天门冬八分 茯苓十二分 生百合三枚（洗） 生地黄汁二大合 知母六分

【用法】 上切。以水二大升，煮取九合，食后良久，分温三服，如人行五六里进一服。

【主治】 肺痿唾脓血腥臭，连连嗽不止，渐将羸瘦，形容枯悴。

【宜忌】 忌一切热肉、面、油腻、果子、鲤鱼。

【加减】 要利，加芒消八分（汤成下）。

【备考】《圣惠》有贝母，无茯苓。

14010 紫菀散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】 紫菀一两（洗去苗土） 五味子一两 款冬花一两 桂心一两 麦门冬二两（去心） 桑根白皮二两（锉）

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣二枚，粳米五十粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 肺气不足，逆满上气，咽喉中闭塞，寒从背起，口中如含霜雪，言语失声，甚者吐血。

14011 紫菀散

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【异名】 紫菀汤（《普济方》卷六十四）。

【组成】 紫菀（去苗土） 贝母（去心，炒） 桑根白皮（锉，炒） 桔梗（炒） 柴胡（去苗） 麦门冬（去心，焙） 赤茯苓（去黑皮） 百部各二分

甘草（炙，锉）一分　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）一两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】 咽喉痒，咳嗽。

14012　紫菀散

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】 紫菀茸　桑叶　人参（去芦头）　甘草（炙）各半两　杏仁（去皮尖，麸炒，别研细）桔梗（去芦头，微炒）各一两　麻黄（去根节，汤煮三二沸，焙干）三分

【用法】 上㕮咀。每服五钱，水一盏，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】 肺感寒邪，咳嗽不止，风壅相搏，头疼声重。

14013　紫菀散

【方源】《卫生宝鉴》引海藏方。

【异名】 紫菀汤（《医方集解》）、紫菀饮（《医碥》卷六）。

【组成】 人参　紫菀　知母　贝母　桔梗　甘草　五味子　茯苓　阿胶

【用法】 上为粗末。加生姜，水煎服。

【功用】《笔花医镜》：润肺止嗽。

【主治】 咳嗽，唾中有脓血；虚劳证，肺痿变痈。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手太阴药也，劳而久嗽，肺虚可知，即有热证，皆虚火也。海藏以保肺为君，故用紫菀、阿胶二药润肺补虚，消痰止嗽；以清火为臣，故用知母、贝母二药辛寒润燥消痰；以参、苓为佐者，扶土所以生金；以甘、桔为使者，载药上行脾肺，桔梗载诸药上行而能清肺，甘草辅人参补脾；五味子滋肾家不足之水，收肺家耗散之金，久嗽者所必收也。②《血证论》：取参、草、胶、菀以滋补肺阴；又用知母以清其火；五味以敛其气；桔梗、贝母、茯苓以利其痰。火、气、痰三者俱顺，则肺愈受其益，此较保和汤、救肺汤又在不清不浊之间，用方者随其择其。

【备考】《普济方》本方用量：各等分。《张氏医通》：有麦门冬，无知母。

14014　紫雪散

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】 紫雪丹（《囊秘喉书》卷下）。

【组成】 升麻　寒水石　石膏　犀角　羚羊角各一两　元参二两　沉香　木香各五钱　甘草八钱

【用法】 水五碗，同药煎至五碗，滤清，再煎滚，投提净朴消三两六钱，微火慢煎，水气将尽欲凝结之时，倾入碗内，下朱砂、冰片各二钱，金箔一百张，各预研细和匀，碗炖，水内候冷，凝成雪也。大人每用一钱，小儿二分，十岁者五分，徐徐咽之即效。病重者加一钱亦可，或用淡竹叶、灯心汤化服。

【主治】 ①《外科正宗》：小儿赤游丹毒，甚者肚腹膨胀，气急不乳，伤寒热躁发狂，及外科一切蓄毒在内，烦躁口干，恍惚不宁。②《金鉴》：重腭，舌疔，及小儿赤游丹失治，毒气入里，腹胀坚硬，声音嘶哑，吮乳不下咽者。

14015　紫银茶

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 牛蒡子　忍冬藤　紫花地丁草　白甘菊　各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 杨梅结毒，恶疮复发者。

14016　紫藏汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】 紫藏　天冬　百合　杜仲　黄芩　黄连　草蔻　牛膝　防风　菟丝子　蒺藜

【主治】 肝痿（又名筋痿）。肝热则胆泄，口苦，筋热血干，以致拘挛而成筋痿。

14017　紫藏散

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】 紫藏（凌霄花是也）　海藻（洗去咸，焙）　麻麦穗　牡蛎（煅，研成粉，左顾者真）　甘草（炙）各一两

【用法】 上为细散。每服一钱半，食后白汤调下，一日二次。

【主治】 项上瘰疬，如枣李核者。

14018　紫藏散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】 紫藏（凌霄花是也）　青橘皮（汤浸，去白，焙）　当归（切，焙）各半两　大麦芽（炒）　大黄（锉，炒）　没药　桂（去粗皮）　芎藭各一分

【用法】 上为散。每服一钱匕，食前温酒调下。

【功用】 通经止痛。

【主治】 室女月水不通。

14019　紫霞膏

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 绿膏药（《验方新编》卷六）。

【组成】 明净松香（净末）一斤　铜绿（净末）二两

【用法】 用麻油四两，铜锅内先熬数滚，滴水不

散，方下松香熬化，次下铜绿，熬至白烟将尽，其膏已成，候片时，倾入瓷罐。凡用时汤内炖化，旋摊旋贴。

【主治】 ①《外科正宗》：瘰疬初起，及诸色顽疮、臁疮、湿痰湿气、新久棒疮疼痛不已者。②《验方新编》：一切无名肿毒。

14020 紫石英丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】 紫石英三分 熟干地黄（洗，焙）四两 鹿茸（酒炙） 柏子仁 阿胶（锉碎，炒成珠子） 当归（洗，焙） 川芎 赤芍 续断 附子（炮，去皮脐）各一两 人参（去芦头）半两 白术半两 肉桂（去粗皮）半两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温酒送下。

【功用】 久服益血生发，令人有子。

【主治】 妇人血虚，头目眩晕，足如履空，呕吐不食，经脉不匀，心悸多忧。

14021 紫石英丸

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】 紫石英三两 人参一两半 熟地黄五两 当归身三两 川芎一两 川乌头一两（炮） 紫厚朴一两（制） 桂心一两半 吴茱萸一两（醋炒） 白干姜一两（炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服二三钱，温酒送下。

【主治】 血海久冷不孕，脉细涩者。

【方论选录】 血海久冷，冲任少薰育之权，故腹痛经迟，时发寒热而不能孕子焉。桂、附暖血海以逐冷，姜、朴温中气以散寒，当归养血脉，人参扶元气，秦艽活血通经，半夏化痰燥湿，白薇降泄以除寒湿热也。炼蜜以丸之，温酒以下之，俾血海温暖，则久冷顿消，而腹痛无不退，寒热无不除，何患天癸不调，不能孕子乎。

14022 紫石英散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 紫石英一两（细研，水飞过） 远志（去心） 赤小豆（炒熟） 附子（炮裂，去皮脐） 桂心半两 人参（去芦头） 干姜（炮裂，锉） 防风（去芦头） 龙骨（细研） 熟干地黄各半两 菖蒲一两 白术一两 白茯苓一两 黄耆一两（锉）

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】 心气不足，虚悸恐畏，悲怒恍惚，心神不定，惕惕而惊。

14023 紫苏子汤

【方源】《千金》卷七。

【异名】 苏子降气汤（《局方》卷三宝庆新增方）、降气汤（《普济方》卷一八三）、苏子降气饮（《杏苑》卷三）、紫苏汤（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】 紫苏子一升 前胡 厚朴 甘草 当归各一两 半夏一升 橘皮三两 大枣二十枚 生姜一斤 桂心四两

【用法】 上㕮咀，以水一斗三升，煮取二升半，分五次服，日三次，夜二次。

【功用】 ①《局方》（宝庆新增方）：常服清神顺气，和五脏，行滞气，进饮食，去湿气。②《千金方衍义》：降泄逆气。

【主治】 寒痰上壅，咳嗽气喘，胸膈满闷。

①《千金》：脚弱上气。②《局方》（宝庆新增方）：男女虚阳上攻，气不升降，上盛下虚，膈壅痰多，咽喉不利，咳嗽，虚烦引饮，头目昏眩，腰疼脚弱，肢体倦怠，腹肚疼刺，冷热气泻，大便风秘，涩滞不通，肢体浮肿，有妨饮食。③《三因》：阴阳交错，上重下虚，中满喘急，呕吐自汗。

【方论选录】 ①《医方集解》：此手太阴药也。苏子、前胡、厚朴、橘红、半夏皆能降逆上之气，兼能除痰，气行则痰行也，数药也能发表，既以疏内壅，兼以散外寒也；当归润以和血，甘草甘以缓中；下虚上盛，故又用肉桂引火归元也。②《千金方衍义》：脚气患者，浊气上攻，故以苏子、橘皮、前胡、厚朴辛温降气，半夏、生姜涤除痰湿，桂心、当归温散滞血，甘草、大枣调和中气，全以降泄逆气为主，故《局方》更名苏子降气汤。后世治虚阳上攻，痰涎壅盛，肺气喘满，服之气降即安。

14024 紫河车丸

【方源】《医略六书》二十七。

【组成】 紫河车一具（白酒洗，银针挑净紫筋） 大熟地八两 当归身四两 白芍药二两（酒炒） 冬白术四两（制） 淮山药四两（炒） 金香附二两（酒炒） 拣人参四两 紫石英四两（醋煅） 甘枸杞四两 蕲艾叶二两（醋炒） 川芎二两

【用法】 各药同河车人陈酒煮烂，收干晒脆，为细末，炼蜜为丸。每服三五钱，温酒送下。

【主治】 妇女虚寒不孕，脉软弱者。

【方论选录】 气血两亏，子宫不暖，致天癸衍期，无以孕育而生子焉。熟地补阴滋血，人参补气扶元，当归养血荣经，白术健脾生血，川芎行血海以调经，白芍敛阴血以和络，香附调气解郁，山药补脾益阴，蕲艾叶理血气以温血室，紫石英涩血气

以暖子宫，甘枸杞滋培肾脏，紫河车大补血气，入酒煮烂收焙，炼蜜以丸之，温酒以下之，俾血气内充，则子宫温暖而冲任融和，天癸无不调，自能孕育而生子矣。

14025 紫河车丹

【方源】《医学正传》卷三引《青囊方》。

【异名】混元丹(《东医宝鉴·杂病篇》卷四)。

【组成】男子胞衣（取首生，以皂角水洗净，次放铜铫子内，以米醋揉洗控干，做一小篾笼子盛之，围以纸，密糊之，不令泄气，以烈火焙干）人参一两五钱 白术一两 木香 白茯苓各五钱 茯神 川归 熟地黄各一两 乳香四钱（另研）没药四钱（另研） 朱砂二钱（另研） 麝香二分

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大，炼蜜为丸服亦可。每服五十丸，煎人参汤送下，空腹服之，一日三次。

【主治】飞尸鬼注，虚劳羸瘦，喘嗽痰气。

14026 紫草油膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】紫草根 20 克 当归 20 克 胡麻油 200 毫升

【用法】上药用文火煎枯，去滓，再加黄蜡30～40 克成膏。外用。

【主治】剥脱性皮炎。

14027 紫草茸油

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】紫草茸一斤 脂麻油五斤

【用法】将药置铜锅内，油浸一昼夜，文火熬至焦枯，离火过滤，去滓，取油贮瓷器内备用。敷患处。

【功用】活血散瘀，软坚。

【主治】下肢红斑结节类疾患（瓜藤缠），耳下腺炎及颌下淋巴腺炎早期，皮肤紫红斑块。

14028 紫萍合剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】紫背浮萍草 500 克（用新鲜的，晒干备用，贮藏超过一年失效，不可使用，且影响他药的协同作用） 夏枯草 500 克 海桐皮 250 克 老鹳草 250 克 当归 300 克

【用法】切碎洗净，煎煮，浓缩至 1.5 升（每 10 毫升含原生药 12.5～15.5 克），起锅后，每 1000 毫升加五十七度白酒 200 毫升，搅匀，装瓶备用。每次 10～20 毫升，一日三次。

【主治】麻风。

【加减】若长期反应，反复出现，原方加黄耆。

14029 紫菀茸汤

【方源】《济生》卷二。

【异名】紫菀汤(《赤水玄珠》卷七)。

【组成】紫菀茸（洗） 经霜桑叶 款冬花 百合（蒸，焙） 杏仁（去皮尖） 阿胶（蛤粉炒） 贝母（去心） 蒲黄（炒） 半夏（汤泡七次）各一两 犀角（镑） 甘草（炙）各半两 人参半两

【功用】《金鉴》：清补。

【主治】①《济生》：饮食过度，或叫呼走气，或食煎爆，邪热伤肺，咳嗽咽痒，痰多唾血，喘急，胸胁痛，不得安卧。②《金鉴》：肺痈溃处未敛，痈脓已溃，喘满、腥臭浊痰俱退，惟咳嗽咽干，咯吐痰血，胁肋微痛不能久卧者。

【加减】渴甚，去半夏，加石膏。

14030 紫菀茸汤

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】紫菀茸三钱 薇衔 白术（于潜者良，生用） 泽泻各一钱 牡丹皮 麦门冬（去心）各一钱半 犀角八分 甘草（炙）三分（生）二分 藕汁半杯

【用法】水煎，食远服。

【功用】《医略六书》：理中清营。

【主治】伤酒凑肺，发咳，痰中见血。

【加减】瘦人阴虚多火，忌用燥药，去白术，易白芍药一钱；兼伤肉食，胸膈膨胀，去犀角、芍药，加炮黑山楂肉三钱，炒枳实一钱。

【方论选录】《医略六书》：湿热凑肺，营阴暗伤，故痰中见血，发咳不止，谓之伤酒。紫菀开泄肺气以清痰血，泽泻通利膀胱以降浊阴，薇衔去营中湿热，生术利胃中湿热，犀角清心胃之热，麦冬润心肺之阴，牡丹皮凉血解热，生甘草缓中泻火，水煎冲池藕汁凉血化瘀以清痰中之血也，使湿热顿去，则肺气清肃而发咳无不除，瘀血无不化矣。此理中清营之剂，为湿热伤肺痰血之专方。

【备考】本方方名，《中国医学大辞典》引作“改定紫菀茸汤”。

14031 紫苏和气饮

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 人参 紫苏 陈皮 大腹皮 甘草

【用法】上锉。加生姜五片，葱白五寸，水煎，温服。

【主治】子肿。妊娠七八月前后，面目虚浮，肢体肿满。

【加减】腹痛，加香附、木香；咳嗽，加枳壳、

桑白皮；热，加黄芩；呕吐，加砂仁；泄泻，加白术（去芦，炒）、白茯苓（去皮）；感冒，加羌活、麻黄；伤食，加山楂、香附；气恼，加香附、乌药。

14032 紫草承气汤

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】 厚朴二两 大黄四两 枳实一两 紫草一两

【用法】 上为粗末。每服五钱，水半盏，煎至二分，温服。以利为度。

【主治】 身热，脉数，大便秘而腹胀，此热毒壅遏也；或疮半未出，而喘息腹胀，其人大便不通，烦躁作渴，谵语不安者。

【加减】 如未利，加芒消一字。

【方论选录】《古方选注》：紫草承气汤，大黄功专荡涤，为斩关夺门之将，痘科用之，盖为毒滞脾经而设，痘从命门出诸太阳经，逆上至脾俞，毒气太盛，即从脾经肆虐，若迅雷之不及掩，初起板而不松，紫而干滞，粒粒顶陷，叫哭抽掣，烦乱昏愦，此毒伏血中，不能载毒而出，转输各脏之俞，急急重用大黄，破脾经之实，泻血中之滞；复以紫草内通血脉，外达皮毛。洞泻者用之而反实，不食者用之而胃气开，有泻至数度而精神不减，有用至斤许而肌肉始松，然必是脾经毒壅者，方为至当。若毒闷命门不发，或转输肝肺，而用大黄，非理也。费建中曰：毒出郁伏而重者，重与之攻，而转与之散，此方是也。

14033 紫菀半夏汤

【方源】《普济方》卷一五八。

【组成】 紫菀（洗净） 麻黄（去节） 半夏（洗） 五味子（去枝梗） 干姜（炮） 桂（去粗皮） 赤芍药 甘草（炙）各等分

【用法】 上为粗末。每服二钱，以水一大盏，煎至七分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】 停寒饮冷，内伤肺经，咳嗽痰涎，久不愈者。

14034 紫参保肝冲剂

【方源】《常用中成药》。

【组成】 紫参 丹参 鸡血藤 当归 香附 郁金 红花 鳖甲

【用法】 制成颗粒冲剂，22克装袋。每服一袋，一日三次。

【功用】 利气舒肝，活血消肿。

【主治】 肝脾肿大。

14035 凿石丸

【方源】《古今名方》引湖南中医学院第二附属医院经验方。

【组成】 冬葵子 海金砂 滑石各15克 地龙 牛膝 茯苓 泽泻 赤芍各9克 火消 甘草梢各6克 琥珀 沉香各3克

【用法】 上为末，水为丸。每服15克，一日三次。

【功用】 通淋排石。

【主治】 泌尿系结石。

14036 掌中金

【方源】《百一》卷六。

【组成】 真蒲黄 黄药子各等分

【用法】 上为细末。用生麻油于手心内调，以舌舐之。

【主治】 吐血。

14037 喝起丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】 萆薢 杜仲（酥炒去丝） 葫芦巴（生脂麻炒） 破故纸（炒） 小茴香各一两（盐水浸一宿） 胡桃仁一两（汤去皮）

【用法】 将胡桃为末，同前五味药末为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心盐酒送下，或盐汤亦可。

【主治】 ①《瑞竹堂方》：小肠气及腰痛。②《嵩崖尊生》：疝气，横坚弦，绕脐走注，小腹攻刺。

【备考】 本方改为汤剂，名“喝起汤”（见《嵩崖尊生》）。

14038 喉痛饮

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 甘草 贝母 黄芩 黄连 薄荷 川芎各一钱 桔梗三钱 玄参二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 喉肿痛。

14039 喉痹散

【方源】《杂类名方》。

【组成】 僵蚕一两 大黄二两

【用法】 上为末，生姜汁为丸，如弹子大。井花水调蜜送下。

【主治】 大头病及喉痹。

14040 赐方鹿茸丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】 鹿茸（火燎去毛，酒浸，炙） 附子（炮，去皮脐） 五味子 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 牛膝（酒浸一宿）各一两 熟干地黄（洗，

焙）五两　干山药三两　杜仲一两半（炒，去丝）

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒或盐汤送下。

【主治】 真元虚惫，五劳七伤，小腹拘急，四肢痠痛，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鸣，心悸气短，精神困倦，喜怒无常，饮食无味，举动乏力，小便滑数，或时出血。

14041　蛤蚧丸

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】 蛤蚧一对（头尾全者，涂酥，炙令微黄）　汉防己半两　贝母半两（煨令微黄）　甜葶苈半两（隔纸炒令紫色）　桑根白皮一两（锉）　蝉蜕半两　猪苓半两（去黑皮）　赤芍药半两　陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）　人参三分（去芦头）　甘草一分（炙微赤，锉）　五味子半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以温粥饮送下。

【主治】 久肺气咳嗽，涕唾稠粘，上气喘急。

14042　蛤蚧丸

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】 蛤蚧（酥炙）一对　葶苈子（纸上炒，别研）　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各二两　款冬花　贝母（去心）　诃黎勒皮各一两　甘草（炙、锉）半两

【用法】 上除葶苈、杏仁外，为末，别研二味再研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后煎桑白皮汤送下。

【主治】 咳嗽喘急。

14043　蛤蚧丸

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】 蛤蚧一对（雌雄头尾全者，酥炙）　人参半两　半夏（汤洗七遍，切，焙）一分　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，蜜拌炒黄，研）一两　栝楼（大者）二枚（去皮子，取肉蒸熟，研）　阿胶（炙燥）半两　青橘皮（汤浸，去白，焙）一分　干枣（煮熟，去皮核，研）二两

【用法】 上药除研者外，为细末，合研匀，入生蜜少许为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心、临卧以糯米饮或熟水送下。

【主治】 久咳嗽。

14044　蛤蚧丸

【方源】《三因》卷十。

【组成】 蛤蚧一对（去口足，温水浸，去膜，刮了血脉，用好醋炙）　诃子（煨，去核）　阿胶（炒）　熟地黄　麦门冬（去心）　细辛（去苗）　甘草（炙）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如皂子大。每服一丸，含化，不拘时候。

【主治】 ①《三因》：积劳，久咳失音。②《普济方》引《大全良方》：肺间邪气，胸中积血作痛，失音。

【备考】 本方原名“蛤蚧散”，与剂型不符，据《普济方》改。

14045　蛤蚧散

【方源】《博济》卷二。

【异名】 人参蛤蚧散（《御药院方》卷五）。

【组成】 蛤蚧一对（新好者，用汤洗十遍，慢火内炙令香，研细末）　人参　茯苓　知母　贝母（去心，煨过，汤洗）　桑白皮各二两　甘草五两（炙）　大杏仁六两（汤洗，去皮尖，烂煮令香，取出，研）

【用法】 上为细末，入杏仁拌匀研细。每服半钱，加生姜二片，酥少许，水八分，煎沸热服。如以汤点，频服亦妙。

【主治】 ①《博济》：肺痿咳嗽，即肺壅嗽。②《御药院方》：三二十年间肺气上喘咳嗽、咯唾脓血，满面生疮，遍身黄肿。

【宜忌】《医学正传》：忌油腻、生冷、毒物。

14046　蛤蚧散

【方源】《三因》卷十二。

【组成】 蛤蚧一对（炙）　成炼钟乳　款冬花　肉桂　白矾（飞过，别研）　甘草（炙）各半两

【用法】 上为末。每服半钱，空心、食前用芦管吸之；或觉咽干，即用米饮调下。

【主治】 元气虚寒，上气咳嗽，久年不愈。

14047　蛤消散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 文蛤四两

【用法】 水五碗煎汤，入朴消四两，通手淋洗，至水冷方止。若觉热痛，用熊胆加冰片，水化涂之。

【主治】 脱肛。

14048　蛤粉丸

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】 蛤粉（好者，研极细）　黄蜡各等分

【用法】 上先熔蜡，入蛤粉为丸，如梧桐子大。用猪子肝一片，以箸扎作孔子，捏药丸入孔中，以麻缕缠系周遍，用清水煮熟，取出切作薄片，热吃。仍将煮药汤熏眼。

【主治】 ①雀目，不拘年月远近，但黄昏不见物

者。②《仙拈集》：肝虚。

【备考】 本方改为散剂，名蛤粉散（见《仙拈集》）、蜡肝散（见《经验广集》）。《仙拈集》本方用法：黄蜡熔汁，入蛤粉相和得所，每用刀切下二钱，以猪肝二两，剖开掺药在内，麻绳扎定，水一碗，入铫内煮熟，乘热熏之，至温并肝食之。

14049 蛤粉丸

【方源】《医学六要·治法汇》卷六。

【组成】 黄柏（炒） 知母 蛤粉各一斤

【用法】 上为末，粥为丸，青黛为衣。

【主治】 虚热遗滑。

14050 蛤粉散

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】 蛤石轻黄散（《惠直堂方》卷三）。

【组成】 蛤粉 石膏（煅）各一两 轻粉 黄柏（生研）各五钱

【用法】 上为细末。凉水调搽；冬月麻油调亦好。

【主治】 因日晒风吹暴感湿热，或因内餐湿热之物，风动火生所致黄水疮，于头面耳项忽生黄色，破流脂水，顷刻沿开，多生痛痒。

【备考】《古方汇精》有五倍子，无轻粉。

14051 蛤粉散

【方源】《异授眼科》。

【组成】 蛤粉一两 夜明砂一两五钱

【用法】 黄蜡化开为丸，如枣子大。用猪肝一具，入丸子内，麻线扎，井水煮熟，乘热熏眼至温，吃猪肝并汁。以愈为度。

【主治】 雀盲。

14052 蛤粉膏

【方源】《中华皮肤科杂志》（1958；3:214）。

【组成】 蛤粉五钱 轻粉二钱半 青黛一钱半 川黄柏二钱半 石膏（煅）五钱

【用法】 上为极细末，用芝麻油50或120毫升混合调匀，贮存备用。临用时，先以温热水洗脸，将药膏加入适量冷水调稀，涂患处，每日早晚各一次。

【主治】 酒渣鼻。

【临证举例】 酒渣鼻 本方治疗酒渣鼻40例，初步疗效结果：治愈（皮疹消失，皮肤与正常皮色同）14例；显著进步（新疹出现减少，潮红减退）25例；恶化（潮红加剧，新疹增多，有时兼见渗出、疼痛肿胀）1例。治愈率35%，有效率87.5%。治愈之14例疗程为1～3个月，有效之25例尚在治疗中。

14053 蛤蚧固金汤

【方源】《镜京直指》卷二。

【组成】 熟地六钱 淮山药三钱 冬虫夏草三钱 茜草根二钱 炙蛤蚧一钱五分（去头足） 白茯苓三钱 驴胶三钱（后下） 北沙参三钱 原川贝母一钱半 白石英四钱 女贞子四钱

【主治】 肺肾并亏，喘咳痰血，将成劳损。

14054 蛴螬散

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】 蛴螬七枚（研烂） 甘草（炙，为末，炒）五钱 没药（研） 乳香（研，各炒）各一钱

【用法】 上为末。分二次服，每服酒一盏，煎二三沸调下，不拘时候。

【主治】 白虎风疼痛，昼静夜发。

14055 跌打散

【方源】《温氏经验良方》。

【组成】 多年老石灰一斤（韭菜汁浸透，晾干） 血竭四两 松香六两（熬溶，浸于凉水内一昼夜，去火毒） 乳香二两（去油） 没药二两（去油）

【用法】 上为极细末，瓷瓶收好。用时掺于伤口。

【功用】 止血止痛。

【主治】 皮破血流，伤筋未伤骨者。

14056 跌打膏药

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【异名】 五香膏。

【组成】 川乌 草乌 三棱 蓬术 当归 生地 赤芍 大黄 川山甲 木鳖子 生南星 牙皂各二两 密陀僧四两（研） 铅粉（漂）一斤 丁香（研细末，下同） 肉桂 乳香（去油） 没药（去油） 甘松 山柰 川芎 白芷 川柏 大茴各二两

【用法】 用桐油、香油各二斤，将前十二味先熬枯滤净，再熬滴水成珠，入陀僧、铅粉熬成膏，离火再加后十味，再添麝香五钱搅匀，收贮摊用。

【主治】 诸损百病。

【宜忌】 孕妇忌用。

14057 跌打万金丸

【方源】《温氏经验良方》。

【组成】 乳香 苏木 没药 自然铜 地龙 无名异 当归 土鳖各二两 血竭 生军 硼砂 碎补 马钱子各一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。每服一钱，黄酒或淡醋汤送下，六小时一次。连服三料，断筋折骨，自然连接。

【主治】 跌打损伤，筋断骨折，疼痛不止，肉皮不破者。

【宜忌】 须戒房事三年。肉皮破者不可服。

14058 跌打活命丹

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】 泽兰叶 当归各五钱 红花一钱 丹皮三钱 青木香一钱半 桃仁（研）十粒 赤芍一钱半

【用法】 水煎，酒三服。

【主治】 跌打损伤。

【加减】 大便不通，加大黄。

14059 跌打损伤膏

【方源】《疡医大全》卷三十六引刘长随方。

【组成】 当归 三棱 莪术 独活 白芷 川芎 羌活 杜仲 川牛膝 防风 肉桂 红花 续断 防己 五加皮 骨碎补 赤芍药 刘寄奴 秦艽 葱头 土鳖虫各三钱 头发一握

【用法】 上药用麻油十斤浸七日，入锅将药熬枯，滤去滓，复入净锅内熬至滴水成珠，加后细药末：龙骨、乳香（去油）、没药（去油）、血竭各二两，麝香（另收，旋加），入油熬化，瓷钵收贮，每药油四两加制松香一斤同熬成膏，倾水缸内扯拔出火毒，收藏。凡摊膏时炖化摊好，放在地上一个时辰，再贴。得土气则土鳖虫有力，易于接骨故也。

【功用】 接骨。

【主治】 跌打损伤。

【宜忌】 如皮骨破损者，忌用麝香。

14060 跌打损伤药酒

【方源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】 当归 五加皮 生地各一两 破故纸 骨碎补（去毛） 十大功劳 薏苡仁 紫荆皮各五钱 广木香三钱 羌活三钱 川芎 杜仲各八钱 莪术 桃仁各三钱 虎骨（酥炙）一两二钱

【用法】 用好酒二十斤，入坛封固，隔水煮三炷香，取起退火一七，早、晚听饮。

【功用】《伤科汇纂》：秘风破疼，和气血，壮筋骨。

【主治】 跌打损伤。

14061 暑汤

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】 香薷三钱 藿香五钱 茯苓一两五钱 陈皮五钱 扁豆一两五钱（炒） 苍术八钱（炒） 厚朴四钱（制） 木瓜五钱 滑石一两 甘草五钱 檀香五钱 乌梅十枚 伏龙肝三两 黄耆三钱 麦冬一两 白术六钱（炒）

【用法】 以水熬汤。

【功用】 清暑益气，预防中暑。

【方论选录】 本方专为清宫发放暑汤而设，由《局方》香薷丸、香薷饮加味而来。妙在增入黄耆、白术、麦冬、乌梅等味，益气生津，酸收酸敛，与《伤暑全书》：暑病首用辛凉，继用甘寒，酸收酸敛，不必用下；《温热经纬》：暑伤气阴，以清暑热而益元气；无不应手取效之旨相合，亦清暑益气之法。

14062 暑风饮子

【方源】《医述》卷十四。

【组成】 防风 柴胡 香薷 连翘 赤苓 半夏 钩藤 石膏 扁荚叶 甘草

【主治】 暑风急惊。

【加减】 风胜，加羌活；热胜，舌如杨梅，加黄连；小便不利，加木通；人事昏迷，加鲜菖蒲。

14063 黑丸

【方源】《济生》卷一。

【异名】 黑丸子（《普济方》卷二二二引《瑞竹堂方》）。

【组成】 鹿茸（酒蒸） 当归（去芦，酒浸）各等分

【用法】 上为细末，煮乌梅膏为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【主治】 ①《济生》：精血耗竭，面色黧黑，耳聋目昏，口干多渴，腰痛脚弱，小便白浊，上燥下寒，不受峻补。②《杂病源流犀烛》：肝劳。

14064 黑散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】 天南星一枚重一两（锉） 皂荚二挺（不蚀者，寸截，二味同烧，令通赤，放冷，细研，称二两） 芎藭末一分 荆芥穗末半两

【用法】 上为散。每服一钱匕，腊茶调服，蜜水亦得，不拘时候。

【主治】 首风，头痛不可忍。

14065 黑膏

【方源】《肘后方》卷二。

【异名】 生地黄膏（《圣惠》卷十八）、地黄膏（《伤寒总病论》卷四）。

【组成】 生地黄半斤（切碎） 好豉一升 猪脂二斤

【用法】 合煎五六沸，令至三分减一，绞去滓，为末，雄黄、麝香如大豆者，纳中搅和。尽服之。毒从皮中出即愈。

【主治】 ①《肘后方》：温毒发斑，大疫难救。②《卫生鸿宝》：温毒发斑如锦纹，或咳，心闷但呕者。

【宜忌】《医方类聚》引《澹轩方》：忌芜荑。

14066 黑丸子

【方源】《理伤续断方》。

【异名】 和血定痛丸(《校注妇人良方》卷二十四)。

【组成】 白蔹一斤（焙） 白及四两（焙） 南星六两（焙） 芍药十两（焙） 土当归四两（焙） 骨碎补八两（焙） 川乌三两（焙） 牛膝六两（焙） 百草霜十两 赤小豆一斤

【用法】 除星、芍、归、补、膝、豆用土产者，草霜釜上取，共为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服二十至三十丸，用煨葱酒或茶任下。

【主治】 ①《理伤续断方》：打扑伤损，驴马跌坠，骨断筋碎，百节疼痛，瘀血不散，浮肿结毒，一切风疾，四肢疼痹，筋痿力乏，浑身倦怠，手足缓弱，行步不前，妇人诸般血风劳损。②《校注妇人良方》：外感风寒，肢体作痛，流注膝风。

【宜忌】 孕妇莫服。

14067 黑丸子

【方源】《济生》卷四。

【组成】 乌梅肉七个 百草霜三分 杏仁（去皮尖，别研）三七枚 巴豆（去壳并油）二枚 半夏（汤泡七次）九枚 缩砂仁三七枚

【用法】 上为细末，和匀，用薄糊为丸，如黍米大。每服十五丸，加至二十丸，用熟水送下，姜汤亦得。更看虚实，增损丸数。或因食生冷鱼脍等，用治中汤送下亦得。

【主治】 ①《济生》：中脘有宿食，吞酸恶心，口吐清水，嗳宿腐气，或心腹疼痛，及中虚积聚飧泄，赤白痢下。②《奇效良方》：脾胃怯弱，饮食过伤，留滞不化，遂成下痢。

14068 黑丸子

【方源】《得效》卷七。

【组成】 干姜 百草霜各一两 木馒头二两 乌梅 败棕 柏叶 油发各五分（各烧灰存性，再入后药） 桂心三钱 白芷五钱

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】 久年痔漏下血。

14069 黑玉丹

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】 槐花（炒） 一两 枳壳 地榆 黄耆 川芎各二两 五灵脂 五倍子各一两

【用法】 上为细末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】 吐血。先闻腥臊臭，出清液，胃胁支满，妨于食，日眩，时时前后失血。

14070 黑玉丹

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】 棕榈 头发（以皂角水洗净）各二两 刺猬皮 槐角各三两 牛骨髓四两（以上并烧存性） 生油麻 雷丸各一两 苦楝根一两一分 乳香半两 麝香二钱 猪蹄甲四十九个（炒） 榼藤子（炒香）一两一分

【用法】 上为末，酒、面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米饮送下。

【主治】 肠风下血，腹痛。

14071 黑龙丸

【方源】《圣济总录》卷九。

【异名】 资寿黑龙丸(《普济方》卷一一五引《简易》)。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐）二两 乌头（炮裂，去皮脐）四两 乌蛇（酒浸一宿，去皮骨，炙）二两 干蝎（炒）一两半 苍术（锉碎，麸炒）二两 防风（去叉）二两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙令香）二两 麻黄（去根节）三两 赤芍药（锉） 一两 白芷（锉）二两 芎藭（锉）二两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）二两 天南星（生用）半两 吴茱萸（净拣，用水淘七遍，微炒）一两 白术（锉碎）一两 自然铜一斤（杵碎，用生铁铫子内，以炭火一秤，渐以三二斤，逼药铫子，令通赤，徐添火，可半日以来，其药有微焰起，闻腥气，又似硫黄香，药乃成，放冷取出；如药有五色者，甚妙，然后安向净黄湿土，上著纸，先衬药，用盆合之，令密不得通风，一宿出火毒，乳钵内细研，以水净淘黑汁，浓者收取，次更细淘，又收浓者，三五次淘，澄定，去清水，用新瓦盆，内将纸封之，令泣干，如黑粉，称六七两用）

【用法】 将自然铜粉，入诸末相和匀，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，于腊月内合其妙。如中风瘫痪，半身不随，起止不能者，每日服一丸，空心临卧豆淋酒送下，六十日内必愈；或患筋骨腰脚疼痛，走注不定，坐即刺腰，卧即刺背，行即入脚，服药二十日定愈，亦豆淋酒送下，须臾以葱粥一盏投之，以衣被盖汗出，然后更服一丸，愈；如或患五七日间未得汗，亦如前法，才入口汗立出，安；若男子元脏气痛，脐下撮痛不可忍者，以槟榔

一枚，酒磨一半，以生姜汁少许，同煎五七沸，研二丸服之，须臾以小麦麸醋拌炒，热熨脐下便止；或男子、妇人患破伤风、瘫麻风、暗风、偏风，并豆淋酒送下一丸至二丸，立效；或患痃癖气，其病发时，牵痛其者，用槟榔一枚，中分破，一半生、一半炙令黄色，都一处碾为末，用酒一盏、葱白一握同煎，葱熟倾盏内，候酒温，先呷一二口，将葱白和药二丸嚼烂，以煎酒咽之，须臾分泄便止；些小风疾，口一服必愈。

【主治】 中风，由气血俱虚，腠理疏弱，风邪外中，真气失守，邪正相干，故半身不随，口眼㖞斜，手足拘挛，或生躁曳，语言謇涩，心多悸惊。

14072 黑龙丸

【方源】《本事》卷二。

【组成】 天南星 川乌各半斤（黑豆熏三次） 石膏半斤 麻黄（去根节） 干薄荷各四两 藁本（去芦、洗） 白芷（不见火）各二两 京墨一两半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷、茶汤嚼下。

【主治】 一切中风头痛。

【方论选录】《本事方释义》：天南星气味苦辛温，入手足太阴；川乌气味苦辛大热，入足太阳、少阴；石膏气味辛寒，入手足阳明；麻黄气味辛温，入足太阳；薄荷气味辛凉，入手太阴、少阴；藁本气味辛温，入足太阳、阳明；白芷气味辛温，入手足阳明；京墨气味辛温，能解诸药之毒。大凡中风头疼，而用丸剂攻病者，必非暴病也，辛热、寒凉表散之药，恐伤正气而病仍不去，故作丸药攻之，性缓而行至病所矣。

14073 黑龙丹

【方源】《三因》卷十八。

【异名】 琥珀黑龙丹（《局方》卷九吴直阁增诸家名方）、黑龙丸（《医学纲目》卷三十五）、神应黑龙丸（《同寿录》卷三）。

【组成】 当归 五灵脂 川芎 高良姜 干地黄（生者）各一两（上锉细，入一椽头沙盒内，赤石脂泥缝纸筋，盐泥固济，封合，炭火十斤煅通红，去火候冷，开取盒子，看成黑糟，乃取出细研，入后药） 百草霜（别研）五两 硫黄 乳香各一钱半 花乳石 琥珀各一钱

【用法】 上为细末，米醋煮糊为丸，如弹子大。每服一丸，炭火烧通红，生姜自然汁与无灰酒各一合，小便半盏，研开，顿服。

【主治】 妇人产后一切血疾垂死者。

①《三因》：产后一切血疾垂死者。②《局方》（吴直阁增诸家名方）：产后一切血疾，淋露不快，儿枕不散，积痕坚聚，按之攫手，疼痛攻心，困顿垂死者。③《普济方》：产后难生，或胎衣不下；产后血晕，不省人事，状如中风；血崩恶露不止，腹中血刺疼痛，血滞浮肿，血入心经，语言颠倒，如见鬼神，身热头痛，或类疟状，胎前、产后一切危急垂死。

【临证举例】 产后头痛 《妇人良方》：仲氏嫂金华君，在秦产七日而不食，始言头痛，头痛而心痛作，既而目睛痛如割，如是者更作更止，相去才瞬息间。每头痛甚欲取大石压，食久渐定；心痛作则以十指抓壁，血流掌；痛定，目复痛，又以两手自剜取之，如是者十日不已。国医二三辈、郡官中有善医者亦数人，相顾无以为计。余度疾势危矣，非神丹不可愈。黄昏进黑龙丹半粒，疾少间；中夜再服药下，瞑目寝如平昔；平旦一行三升许，如蝗虫子，三疾减半，已刻又行如前，则顿愈矣。遣判钗辈视之，奄殆无气，午后体方凉、气方属，乃微言索饮，自此遂平复。

14074 黑龙汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 龙胆草（炒黑） 柴胡 木通 甘草节 当归 金银花 皂刺 赤芍 防风 黄连 吴萸（水炒）各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 阴囊肿痛，溺涩，寒热作渴。

【加减】 一服肿痛止，后加川芎、茯苓。

14075 黑白散

【方源】《洁古家珍》。

【组成】 黑乌蛇（酒浸） 白花蛇（去头尾，酒浸） 雄黄二分 大黄（煨）半两

【用法】 上为极细末。每服一二钱，白汤调下，不拘时候。

【主治】 ①《洁古家珍》：大头病。②《证治要诀类方》：瘰疬。

【备考】 本方方名，《证治要诀类方》引作“黑白丹”，《本草纲目》引作“白花蛇散”。

14076 黑白散

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】 寒水石（生） 牡蛎（烧） 朴消 青黛 轻粉各等分

【用法】 上为极细末。新汲水或香油调，涂其上。

【主治】 火烧皮烂大痛。

14077 黑奴丸

【方源】《肘后方》卷二。

【异名】 水解丸。

【组成】 麻黄二两 大黄二两 黄芩一两 芒消一两 釜底墨一两 灶突墨二两 梁上尘二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，新汲水五合送下，顿服之。若渴，但与水，须臾寒了汗出便解；日移五赤不觉，更服一丸。

【主治】 ①《肘后方》：五六日胸中大热，口噤，坏病不可医治。②《外台》引《备急》：温毒发斑，赤斑者五死一生，黑斑者十死一生，大疫难救。

14078 黑圣散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】 草乌头三两（烧令赤，地上用碗合定，良久取出） 蓬砂（研）半两

【用法】 上为细末。每用一钱匕，沸汤点，先漱牙，后用药少许，揩牙齿动摇处，一日三五次。

【主治】 牙齿动摇。

14079 黑圣散

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】 当归 川芎 茯苓 地榆 槐花（焙） 败棕 艾叶（烧存性） 百草霜各等分

【用法】 上为末。每服二钱，食前陈米饮调下。

【主治】 肠风、脏毒、痔瘘及诸下血。

14080 黑灵药

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】 青果核（煅存性）七钱 冰片三分

【用法】 上为极细末。

【主治】 耳疳、鼻疳、疳疮不收口者。

14081 黑附汤

【方源】《直指小儿》卷二。

【异名】 黑附子汤（《准绳·幼科》卷二）。

【组成】 附子（炮，去皮）三钱 木香一钱半 白附子一钱 甘草（炙）半钱

【用法】 上为散，每服三字，加生姜五片，煎取其半，以匙送下。若手足暖而苏省，即止后剂。

【主治】 ①《直指小儿》：小儿慢脾风盛，四肢厥冷。②《得效》：慢脾风。阴气极盛，胃气极虚，面青额汗，舌短头低，眼合不开，睡中摇头吐舌，频呕腥臭，噤口咬牙，手足微搐不收，或身冷，或身温而四肢冷，其脉沉微。

14082 黑附散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】 干姜 乌梅各一两 棕榈二两（烧存性）

【用法】 上为细末。每服三钱，陈米饮调下；煎乌梅汤下亦得。如血过多，加阿胶、艾，水一盏，煎至七分，空心服。

【主治】 妇人产内用力过度，或产内使性气，或食生冷，血海虚损，淋沥不断，心腹疼痛。

14083 黑虎汤

【方源】《疡医大全》卷二十二。

【组成】 玄参一斤 柴胡三钱 生甘草一两

【用法】 煎汤十碗，再煎汁取三碗，分二日服完。未破者即消，已破者生肌自愈。

【主治】 无名肿毒。

【加减】 生头面者，加川芎二两，附子二钱；生身左右前后者，加当归二两，甘菊花一两，附子三分；生手足四肢者，加白术二两，茯苓一两，附子五分。

【方论选录】 玄参退浮游之火，得甘草之助，解其迅速之威；得柴胡之佐，能舒抑郁之气，又有引经之味，引至毒处，大为祛除。用至一斤，力量更大，又是补中兼散，则解阴毒，不伤阴气，所以建功。若些小之证与非阴证，不必用此重剂。

14084 黑虎汤

【方源】《河南中医》（1981；5:17）。

【组成】 白及 30 克 旱莲草 30 克 侧柏叶炭 20 克 地榆炭 20 克

【用法】 每日一剂或二剂，水煎服。

【功用】 止血。

【主治】 上消化道出血，一般常见的有上消化系溃疡，炎症，肿瘤，肝硬化门脉高压，以及药物刺激所引起的出血。

【加减】 如气脱，加红参；血热妄行，可加生地炭。

【病案举例】 吐血 杨某某，男，30 岁，教师，1977 年 4 月 18 日入院。患肝硬化四年，近日吐血，解黑便，经输血、止血（云南白药、安络血、止血敏），效不显，故拟上方。第一天日夜各一剂，第二天一剂，出血止；第四天大便化验隐血（－）。

14085 黑金丹

【方源】《古今医鉴》卷四引云莱弟方。

【组成】 黄连 黄芩 黄柏 山栀子 连翘 石膏 泽泻 赤芍药 大黄 枳壳 薄荷 牡丹皮 玄参 桔梗 防风 赤茯苓 荆芥各等分

【用法】 上大合一剂，水八碗，煎七碗，去滓，入芒消一斤于内化开，澄去泥水，将药入锅内煎至干，须慢火铲起，入新罐内，上用新灯盏一个盖住，入水于盏内，火煅，候干，水三盏为度，取出放地上，去火毒，研为细末，入甘草末五钱搅匀。

每服二钱，茶清送下。

【主治】 上焦邪热，咽喉肿痛，及牙齿疼痛；伤寒误补，大潮大热，声哑不出，胸膈作痛，鼻衄吐红；痰壅火盛，癫狂谵语，一切实热之证。

14086 黑油膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 龙骨 9 克 五倍子 18 克 轻粉 6 克 枯矾 9 克 生石膏 18 克 寒水石 18 克 蛤壳粉 18 克 冰片 1 克 薄荷脑 9 克

【用法】 上为细末，加凡士林 220 克，配成软膏。外用。

【主治】 婴儿湿疹。

14087 黑参丸

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 黑参 天门冬（去心，焙） 麦门冬（去心，炒）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，以绵裹，噙化咽津。

【主治】 口舌生疮久不愈。

14088 黑参汤

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】 黑参 黄芩 生地黄 赤芍药 菊花 青葙子 白蒺藜

【用法】 上为末。每服四钱，水煎服。

【主治】 眼目有黑花，茫茫如蝇翅者。

14089 黑参汤

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】 黑参 苦参 栀子（研） 菊花 黄连 枳壳（麸炒） 草决明 车前子 防风 大黄（炒） 升麻各二钱

【用法】 水煎，食后服。

【主治】 心经实火，大眦肉色深红，时觉疼痛。

14090 黑神丸

【方源】《本事》卷一。

【异名】 镇风丹（《袖珍》卷二）。

【组成】 草乌头（不去皮，生用） 五灵脂（拣如鼠粪）各等分

【用法】 上为末，六月六日滴水为丸，如弹子大。四十岁以下分六服；病甚一丸分二服，薄荷酒磨下，觉微麻为度。

【主治】 ①《本事》：一切瘫痪风。②《本草纲目》：风湿麻木。

【方论选录】《本事方释义》：草乌头气味苦辛大热，入足太阳、少阴，五灵脂气味甘温，入足厥阴。此因中风瘫痪年久不愈，五脏虽无伤，而经络四肢为邪痹阻，伸缩不能自如者，非辛热有毒之药及通瘀行血之品不能直走病所，故服药后欲其微知麻者，取其药性到也。

14091 黑神丸

【方源】《局方》卷一（宝庆新增方）。

【异名】 乌犀丸（《朱氏集验方》卷一）。

【组成】 熟干地黄（净洗） 赤小豆（生） 干姜（炮） 藁本（洗，去芦） 麻黄（锉，去节，汤去沫） 川芎各六两 羌活（不见火） 甘松（洗去土） 当归（洗，去芦）各三两 川乌（炮，去皮脐） 甘草（锉）各十八两 藿香（洗去土） 香墨（烧，醋淬）各半斤 草乌（炮，去皮尖）一斤 白芷十二两

【用法】 上为细末，以水煮面糊为丸，如龙眼大。每服一二丸，细嚼，茶、酒任下。

【主治】 左瘫右痪，脚手顽麻，腰膝疼痛，走注四肢百节疼痛；妇人血风，脚手疼痛；打扑损伤。

14092 黑神丹

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】 天麻（去芦） 蔓荆子 川芎各一两 防风（去芦头） 藁本（去土） 白茯苓（去皮）各七钱 细辛三钱半（去叶土） 川乌头二钱半（炮，去皮脐尖） 牛膝（酒浸一宿） 荆芥穗 甘草（锉，炒）各三钱 香白芷 赤芍药各一两三分 白僵蚕（炒去丝嘴） 细松烟墨（烧，醋淬）各四钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两作十丸。每服一丸，细嚼，温酒送下；荆芥汤亦得，不拘时候。

【主治】 一切风气上攻，口眼不正，肌肉瞤动；偏正头疼，头风。

14093 黑神散

【方源】《经效产宝续编》。

【异名】 黑桂散（《圣济总录》卷一六〇）、蒲黄黑神散（《卫生家宝产科备要》卷四）。

【组成】 雄黑豆（小者是，炒，去黑皮）二两 当归 芍药 甘草（炙） 干姜 蒲黄（用安石器内，炒赤色） 肉桂 熟地黄（温水洗）各等分

【用法】 焙干为末。每服二钱，空心温酒调下。

【主治】 死胎不下，产后血运，恶露不尽，腹痛。

①《经效产宝续编》：热病死胎腹中。②《圣济总录》：产后血气运闷，或身体肿满，发狂，泻痢，寒热。③《普济方》：产后虚羸，脐腹冷痛，淋露不止，或恶物不下。

【加减】 若三十岁以上生产少者，不用桂、姜，却以炒生姜、红花各二两。

【方论选录】 ①《医方考》：方中蒲黄能逐败血，熟地、芍药、当归能养新血，干姜、肉桂能引新血而逐败血，甘草、黑豆能调正气而逐败气。②《医方集解》：此足太阴、厥阴药也。熟地、归、芍之润以濡血，蒲黄、黑豆之滑以行血，桂心、干姜之热以破血，用甘草者缓其正气，用童便者散其瘀逆，加酒者，引入血分以助药力也。

14094 黑神散

【方源】《产育宝庆集》卷上。

【异名】 下胎乌金散(《医略六书》卷二十九)。

【组成】 桂心 当归 芍药 甘草（炙） 干姜（炮） 生地各一两 黑豆（炒，去皮）二两 附子（炮，去皮脐）半两

【用法】 上为末。每服二钱，空心温酒调下。须臾，胎气温暖即自出。

【主治】 热病胎死或胎损，体气虚寒，败血不散。

①《产育宝庆集》：热疾胎死腹中，产妇舌色青者。②《普济方》：败血不散，乍寒乍热。③《医学心悟》：热病胎损，隆冬寒月体气虚寒者。

【宜忌】《医学心悟》：药性燥烈，不宜于热病。

【方论选录】《医略六书》：产妇跌摸触损，胎死腹中，故脐腹冰冷，而腹内绞痛，面赤舌青，乃为的确之候，较难产更危。熟地补肾滋血，疗损伤之冲任；肉桂温经暖血，消胎死之阴翳。赤芍破瘀降浊以下胎；蒲黄破瘀通经以逐胎。当归养血荣经，专润胎燥；草霜温经摄血，力送死胎。黑豆补肾解毒，勿伤产母；炮姜温中逐冷，立挽回阳。甘草调和胃气以缓中州也。为散，温酒调下，俾阴翳消散，则腹中无不温暖，而阳和焕发，死胎其能羁留于腹中乎？

【备考】《医略六书》有百草霜。

14095 黑神散

【方源】《妇人良方》卷二十。

【组成】 当归 刘寄奴 苦梗各十二分 延胡索（别为末） 桂心 陈皮各四分 茯苓 芍药各八分

【用法】 上㕮咀。以水一升，煮取八分，调延胡索末，空心服。

【主治】 新产后腹痛，恶血不尽行；新产后七八日腹痛，两胁痛。

14096 黑散子

【方源】《直指》卷二十六。

【组成】 隔年莲蓬 败棕榈 头发（并烧存性） 各等分

【用法】 上为末。每服二钱，煎南木香汤调下，或只用棕榈烧灰，米汤调下亦可。

【主治】 诸窍出血。

14097 黑锡丸

【方源】《本事》卷二。

【组成】 黑铅 硫黄各二两（谓如硫黄与黑铅各用三两，即以黑铅约八两，铫内熔化，去滓苴净，尽倾净地上，再于铫内熔，以皮纸五重，撮四角如箱模样，倾黑铅在内，揉取细者于绢上罗过，大抵即损绢，须连纸放地上，令稍温，纸焦易之，下者居上，将粗铅再熔、再揉再罗，取细者尽为度，称重三两，即以好硫黄三两，研细拌铅砂令匀，于铫内用铁匙不住搅，须文武火不紧不慢，俟相乳入，倾在净砖上） 葫芦巴（微炒） 破故纸（炒香） 川楝肉（去核，微炒） 肉豆蔻各二两 巴戟（去心） 木香 沉香各半两

【用法】 上将砂子研细，余药末研匀入碾，自朝至暮，以黑光色为度，酒糊为丸，如梧桐子大，阴干，布袋内揉令光莹。急用枣汤吞一二百丸，但是一切冷疾，盐酒、盐汤空心吞下三四十丸；妇人艾醋汤下。

【功用】 调治荣卫，升降阴阳，安和五脏，洒除六腑，补损益虚，回阳返阴。

【主治】 丈夫元脏虚冷，真阳不固，三焦不和，上热下冷，夜梦交合，觉来盗汗，面无精光，肌体燥涩，耳内虚鸣，腰背疼痛，心气虚乏，精神不宁，饮食无味，日渐瘦悴，膀胱久冷，夜多小便；妇人月事愆期，血海久冷，恶露不止，赤白带下；及阴毒伤寒，面青舌卷，阴缩难言，四肢厥冷，不省人事。

【方论选录】《本事方释义》：黑铅气味甘寒入足少阴，硫黄气味辛热入右肾命门，舶上茴香气味辛温入肝肾，附子气味辛咸大热入心肾，葫芦巴气味辛温入肾，破故纸气味辛温入脾肾，川楝子性味苦微寒入手足厥阴，肉豆蔻气味辛温入脾，巴戟气味甘温入肝肾，木香气味辛温入手足太阴，沉香气味辛温入肾。此方主治元阳虚脱，痰逆厥冷，非重镇之药，佐以辛热之剂不能直达下焦，挽回真阳于无何有之乡，乃水火既济神妙之方也。

14098 黑锡丸

【方源】《三因》卷七。

【组成】 硫黄二两（椎如皂荚子大，候铅成汁，入硫黄在内，勿令焰起，候硫黄化，倾出于九重纸，纳入一地坑，以碗盖火出） 川楝子 黑铅

（不夹锡者，先熔成汁）各二两　阳起石（煅）　木香　沉香　青皮（炒）各半两　肉豆蔻一两　茴香（炒）　官桂（去皮，不见火）　附子（炮，去皮脐）　葫芦巴（炒）　破故纸（炒）各一两　乌药（去木，锉）　一分

【用法】　上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸至一百丸，食前浓煎人参、茯苓、姜、枣汤送下。

【主治】　阴阳不升降，上热下冷，头目眩晕，病至危笃，或服暖药，僭上愈甚者。

14099　黑锡丹

【方源】《局方》卷五（吴直阁增诸家名方）引桑君方。

【异名】　医门黑锡丹（《中药成方配本》）。

【组成】　沉香（镑）　附子（炮，去皮脐）　葫芦巴（酒浸，炒）　阳起石（研细，水飞）　茴香（舶上者，炒）　破故纸（酒浸，炒）　肉豆蔻（面裹，煨）　金铃子（蒸，去皮核）　木香各一两　肉桂（去皮）半两　黑锡（去滓称）　硫黄（透明者，结沙子）各二两

【用法】　上用黑盏，或新铁铫内，如常法结黑锡、硫黄沙子，地上出火毒，研令极细，余药并杵罗为细末，都一处和匀入研，自朝至暮，以黑光色为度，酒糊为丸，如梧桐子大，阴干，入布袋内，擦令光莹。每服三四十粒，空心姜盐汤或枣汤下；妇人艾醋汤下；风涎诸疾用此药百粒煎姜、枣汤灌之，压下风涎，即时苏醒。

【功用】　①《局方》（吴直阁增诸家名方）：克化饮食，养精神，生阳逐阴，消磨冷滞，除湿破癖，安宁五脏，调畅六腑。②《医门法律》：升降阴阳，补虚益元，坠痰。

【主治】　①《局方》（吴直阁增诸家名方）：脾元久冷，上实下虚，胸中痰饮，或上攻头目彻痛，目瞪昏眩；及奔豚气上冲，胸腹连两胁，膨胀刺痛不可忍，气欲绝者；及阴阳气上下不升降，饮食不进，面黄羸瘦，肢体浮肿，五种水气，脚气上冲；及牙龈肿痛，溃口生疮，齿欲落者；兼治脾寒心痛，冷汗不止；或卒暴中风，痰潮上膈，言语艰涩，神昏气乱，喉中痰响，状似瘫痪，曾用风药吊吐不出者；或触冒寒邪，霍乱吐泻，手足逆冷，唇口青黑；及男子阳事痿怯，脚膝痿软，行步乏力，脐腹虚鸣，大便久滑；及妇人血海久冷，白带自下，岁久无子，血气攻注头面四肢；兼疗膈胃烦壅，痰饮虚喘，百药不愈者。②《医门法律》：真元虚惫，阳气不固，阴气逆冲，三焦不和，冷气刺痛，饮食无味，腰背沉重，膀胱久冷，夜多小便；及阴证阴毒，不省人事。

【方论选录】《成方便读》：欲补真阳之火，必先回护真阴，故硫黄、黑铅二味，皆能入肾，一补火而一补水，以之同炒，使之水火交恋，阴阳互根之意；而后一派补肾壮阳之药，暖下焦逐寒湿，真阳返本，阴液无伤；寒则气滞，故以木香理之；虚则气泄，故以肉果固之；用川楝者，以肝肾同居下焦，肝有内火相寄，虽寒盛于下，恐肝家内郁之火不净耳。故此方治寒疝一证，亦甚得宜。

【备考】《普济方》引《海上方》无阳起石，有巴戟天；《普济方》引《如宜方》无木香。

14100　黑归脾丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】　熟地四两　人参　冬术　茯神　枣仁　远志各二两　黄耆一两五钱　当归一两　木香　炙草各五钱　桂元　生姜各一两　大枣五十枚

【用法】　炼蜜为丸服。

【功用】《中药成方配本》：补脾益肾，养心宁神。

【主治】　心肾不交，劳伤过度，精血虚损，怔忡健忘，惊悸盗汗，发热体倦，食少不眠，肠红痔血，三阴亏损，疟疾不愈，及妇人带下。

【备考】《中药成方配本》：将熟地、龙眼肉、枣子同炖烂，枣子炖烂后去皮核，与诸药打和晒干研末，用生姜煎汤泛丸，如绿豆大，约成丸十五两。每日二次，每次二钱，开水吞服。

14101　黑归脾汤

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】　归脾汤加大熟地

【用法】　加生姜、大枣，水煎服。

【主治】　阴虚血少。

14102　黑发仙丹

【方源】《串雅内编》卷三。

【组成】　熟地一斤　苡仁　山药　桑叶各八两　白术　生何首乌各二两　巨胜子　白果各三两　黑芝麻四两　北五味二两　花椒一斤　乌头皮四两　胡桃肉三两　参片三两（无亦可）

【用法】　炼蜜为丸。每服五钱，开水送下。

【功用】　黑发。

14103　黑地黄丸

【方源】《保命集》卷下。

【异名】　地黄丸（《活法机要》）。

【组成】　苍术一斤（泔浸）　熟地黄一斤　川姜冬一两，夏五钱，春七钱

【用法】 上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服一百丸至二百丸，食前米饮汤或酒送下。

【功用】 《医方集解》：健脾补肾。

【主治】 ①《保命集》：阳盛阴虚，脾肾不足，房室虚损，形瘦无力，面多青黄而无常色。②《兰台轨范》：脱血脾寒。

14104 黑花蛇散

【方源】 《金鉴》卷十五。

【组成】 麻黄一两（炙） 黑花蛇六钱（即乌蛇，酒浸） 天麻 白附子 干姜 川芎 附子（制） 草乌各五钱（泡，去皮） 蝎梢三钱五分

【用法】 上为细末。每服一钱，热黄酒调下，一日三次。

【主治】 破伤风，痰盛抽搐，身凉。

14105 黑附子散

【方源】 《医略六书》卷二十五。

【组成】 附子三两（焙黑） 滑石三两（姜汁炒） 半夏三两（姜汁制） 瞿麦二两（姜汁炒） 通草一两半

【用法】 每服三钱。加生姜三片，灯心三茎，煮汤去滓，入盐少许调服。

【功用】 补火通淋。

【主治】 冷淋涩痛，憎寒，脉弦细者。

【方论选录】 附子补火御冷，炮黑更能燥脬中之湿；滑石通闭利窍，姜制力可彻脬中之寒；半夏燥湿却水；瞿麦利水通淋；通草利小水以快小便也。生姜以散之，灯心以利之，二味煎汤，少入盐花送下，使之速归水府，则寒回春谷而憎寒自退，溲溺通调，淋数涩痛无不瘳矣。此补火通淋之剂，为冷淋涩痛憎寒之专方。

14106 黑矾洗剂

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 蛇床子 30 克 苦参 30 克 黑矾 30 克

【用法】 煎后熏洗阴部。

【主治】 阴部瘙痒。

14107 黑弩箭丸

【方源】 《瑞竹堂方》卷二。

【组成】 两头尖 五灵脂各一两 没药（另研） 当归 乳香各三钱（研）

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至五十丸，临卧温酒送下。

【主治】 风湿证。

【宜忌】 忌油腻、湿面；孕妇勿服。

14108 黑逍遥散

【方源】 《医宗己任篇》卷一。

【组成】 逍遥散加熟地

【用法】 水煎，去滓，微微温服。

【主治】 肝胆两经郁火，以致胁痛头眩，或胃脘当心而痛，或肩胛绊痛，或时眼赤痛，连太阳，无论六经伤寒，但见阳症；妇人郁怒伤肝，致血妄行，赤白淫闭，沙淋崩浊等症。

【方论选录】 《医略六书》：任劳多郁，亏损肝脾，致经气不调，经行失其常度而崩漏不已焉。生地壮水滋阴，兼能凉血止血；白术健脾燥湿，即可止漏定崩；白芍敛阴和血；当归养血归经；柴胡升阳解郁；茯苓渗湿和脾；甘草缓中和胃也。

14109 遇仙丹

【方源】 《摄生众妙方》卷一。

【异名】 牛郎串（《串雅内编》卷三）。

【组成】 白牵牛（头末）四两（半炒半生） 白槟榔一两 茵陈 莪术（醋煮）各五钱 三棱（醋煮） 牙皂（炙，去皮）各五钱

【用法】 上为末，醋糊为丸，如绿豆大。五更时用冷茶送下三钱。天明可看去后之物，此药有积去积，有虫去虫。数服行后，随以温粥啖之。

【功用】 涤饮攻积。

【主治】 邪热上攻，痰涎壅滞，翻胃吐食，十膈五噎，鸠哈，酒积，虫疾，血积，气块，诸般痞疾，热疮肿疼，或大小便不利，妇人女子面色萎黄，鬼产，食吞铜铁银物等症。

【宜忌】 服后忌食他物。孕妇勿服。

【方论选录】 《医略六书》：白丑涤饮攻痰，槟榔破滞攻积，三棱破气中之血，莪术破血中之气，茵陈祛湿热，牙皂搜痰涎，沉香降逆气以顺气也。醋丸茶下，使饮化气行，则血脉自活，而痰癖无不消，肢节肿痛无不瘳矣。此涤饮攻积之剂，为痰饮积结肿痛之专方。

【备考】 《张氏医通》有沉香五钱。《良朋汇集》有白术，无莪术。

14110 遇仙立效饮子

【方源】 《传信适用方》卷二。

【异名】 遇仙立效散（《局方》卷六吴直阁增诸家名方）。

【组成】 御米壳（择净，炒黄） 川当归（去土）四两 甘草各二两（炒） 赤芍药 酸榴皮 地榆各一两（炒）

【用法】 上为粗散。每服三大钱，水一盏半，煎七分，去滓，空心温服。小儿量大小加减。

【主治】 诸般恶痢，或赤或白，或脓血相杂，里急后重，脐腹绞痛，或下五色，或如鱼脑，日夜无

度，或噤口不食，诸药不效者。

【宜忌】 忌生冷、油腻、腥臊物。

14111 遗溺汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】 黄耆二钱 白术一钱 干姜八分 益智一钱 五味十粒 升麻三分 柴胡三分 山药一钱

【主治】 下陷遗溺。

14112 遗忘双痊丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】 人参三两 莲须二两 芡实三两 山药四两 麦冬三两 五味子一两 生枣仁三两 远志一两 菖蒲一两 当归三两 柏子仁（去油）一两 熟地五两 山茱萸三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服五钱，早、晚用白滚水送下。半料两症俱痊。

【主治】 遗精、健忘。

14113 铺脐药饼

【方源】《证治汇补》卷六。

【组成】 真轻粉二钱 巴豆四两 生硫黄一钱

【用法】 上为末，成饼。先以新绵铺脐上，次铺药饼，外以帛紧束之，如人行十里许，即下水，待行三五次，即去药，以温粥补之。一饼可治十人。

【主治】 胀满。

14114 锁阳丹

【方源】《三因》卷十三。

【组成】 桑螵蛸三两（瓦上焙燥） 龙骨一两（别研） 白伏苓一两

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食前煎茯苓盐汤送下。

【主治】 脱精，泄不禁。

14115 锁精丸

【方源】《女科指掌》卷一。

【组成】 补骨脂 白茯苓 五味子 青盐各等分

【用法】 上为末，酒糊为丸。每服五十丸，空心服。

【主治】 妇人带下。

14116 锁阳固精丸

【方源】《仙拈集》卷三引高仲白方。

【组成】 沙苑蒺藜八两 山萸 芡实 莲须各四两 覆盆子 菟丝子 枸杞 续断各三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三钱，空心淡盐汤送下。

【主治】 肾虚梦遗。

14117 锅焦丸

【方源】《仙拈集》卷三。

【异名】 锅宜丸（《中国医学大辞典》）。

【组成】 锅焦（炒黄）三斤 神曲 山楂 莲肉各四两 砂仁二两 鸡肫皮一两（炒）

【用法】 上为细末，加白糖、米粉和匀，焙作饼。食之。

【功用】《纲目拾遗》：健脾消食。

【主治】 小儿脾胃虚弱，疳积黄瘦，水泻。

①《仙拈集》：小儿脾胃病。②《文堂集验方》：黄瘦，大便不结，水泻。③《中国医学大辞典》：小儿面黄体弱，脾虚疳积，食积停滞。

14118 稀涎散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 猪牙皂角（不蛀者，去皮弦，炙）一两 绿矾 藜芦半两

【用法】 上为细末。每服半钱或一二钱，斡开牙关，浆水调下灌之。

【功用】 吐顽痰。

【主治】 ①《儒门事亲》：膈实中满，痰厥失音，牙关紧闭，如丧神守。②《赤水玄珠》：哮喘。

【方论选录】《医方考》：白矾之味咸苦，咸能软顽痰，苦能吐涎沫；皂角之味辛咸，辛能利气窍，咸能去污垢。名之曰稀涎，固夺门之兵也。

14119 稀涎散

【方源】《准绳·类方》卷一。

【组成】 江子仁六粒（每粒分作两半） 牙皂三钱（切片） 明矾一两

【用法】 先将矾化开，却入二味搅匀，待矾枯为末。每用三分，吹人。诸病皆愈。痰涎壅盛者以五分，灯心汤下，喉中之痰逆上者即吐，膈间者即下。凡中风口噤不能开，用白盐梅揩齿即能开。

【主治】 中风不语，牙关紧急，单蛾双蛾。

【方论选录】《丸散膏丹集成》：方用矾石之咸涩以消痰涎，牙皂之辛苦以搜风秘，俾涎散而风解。惟浊气风涌而上，清阳失位暴仆，以此先治其标，至咽喉疏通，能进汤药即止。若攻尽其痰，则液无以养筋，令人挛急筋骨，此为大戒。

【临证举例】 痰滞胸膈 《续名医类案》：定西侯蒋公患上气喘急，其脉寸口洪滑，此痰滞胸膈也。合先服稀涎散二钱，更以热火频频饮之（用代探吐法殊妙），则溢而吐其痰如胶，内有一长条，裹韭叶一根，遂愈。

14120 稀涎千缗汤

【方源】《古今名医方论》卷二。

【异名】 稀涎汤（《时方歌括》卷上）

【组成】 半夏（大者）十四枚 猪牙皂角一挺

（炙） 甘草一钱 白矾二钱

【用法】 上为末，用生姜自然汁少许冲温水一盏，调末一钱灌之。得吐痰涎即醒。

【主治】 风痰不下，喉中声如牵锯，或中湿肿满。

【方论选录】 柯琴曰：用生姜、半夏之辛以散之，甘草之甘以涌之，白矾之涩以敛之，牙皂之涌以开之，此斩关夺门之势，惟禀气素实而暂虚者可用。壅塞稍疏，续进他药，不可多用以伤元气。如平素虚弱者，又当攻补兼施，六君子汤加牙皂、白矾末以吐之，则庶几矣。若误作中风治之，去生便远。

14121 鹅实散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 鹅眼枳实（焙） 小茴香（炒）各等分

【用法】 上为末。每服二钱，用小黑豆同艾叶炒热，冲黄酒于内，去滓，调前末药，食前服之。

【主治】 胁痛，疝气痛。

14122 鹅黄散

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】 黄柏 石膏（煅）各等分

【用法】 上为细末。湿者干扑，干者用猪苦胆调搽。

【主治】 父母梅毒遗传，小儿初生无皮。

14123 鹅黄散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 绿豆粉 31 克 黄柏 93 克 轻粉 6 克 滑石粉 15 克 冰片 3 克

【用法】 上为细末。用猪油调成软膏。外用。

【主治】 痱子。

14124 鹅梨汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】 鹅管石五分（煅，研） 陈麻黄五分（蜜炙） 当归一钱五分 茯苓二钱 蒌仁四钱 苏子一钱五分 桑叶一钱 橘红一钱 半夏一钱 贝母二钱 杏仁三钱

【用法】 梨汁两大匙，姜汁两小匙，同冲服。

【功用】《重订通俗伤寒论》：缓通肺窍，以除积痰。

【主治】 ①《医醇剩义》：风痰入肺，久经吼咳者。②《重订通俗伤寒论》：痰随火升，上壅胸膈之哮病。

14125 鹅掌油

【方源】 方出《准绳·疡医》卷四，名见《洞天奥旨》卷十六。

【异名】 鹅掌皮散（《疡科捷径》卷中）

【组成】 鹅掌皮（烧灰存性）

【用法】 上为末，敷之。以桐油涂亦妙。

【主治】 ①《准绳·疡医》：脚指缝烂疡。②《疡科捷径》：脱疽。

【备考】《疡科捷径》本方用法：以麻油调敷。

14126 鹅掌风膏

【方源】《中国医学大辞典》引《济生》。

【组成】 凤仙花（连根花叶，晒干） 苍耳草（用嫩头）各四两 血余三两 鹿角屑（生刮） 络石 虎骨 百部 茜草 蒴草各二两 人指甲五钱 穿山甲 羌活 龙骨 麻黄 蕲艾 威灵仙各一两

【用法】 麻油一斤，同熬至滴水不散，绞去渣，离火，再下铅粉、银朱各四两，黄蜡、乳香各二两，和匀，瓷器收贮。隔汤炖化，摊贴患处。

【主治】 鹅掌风，风癞，顽癣，死肌，麻痹。

14127 鹅管眼药

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 甘石三两 琥珀二钱 朱砂一钱五分 牛黄五分 梅片三钱 雄黄一钱五分 珍珠一钱 麝香五分 青鱼胆五个 熊胆一钱 蕤仁一钱

【用法】 上为末，用黄连、大黄、甘草煎膏成条，阴干，入鹅管内封固。

【主治】 眼病。

14128 鹅掌风药水

【方源】《中国药典》。

【组成】 土荆皮 250 克 蛇床子 125 克 大风子仁 125 克 百部 125 克 防风 50 克 当归 100 克 凤仙透骨草 125 克 侧柏叶 100 克 吴茱萸 50 克 花椒 125 克 蝉蜕 75 克 斑蝥 3 克

【用法】 将斑蝥粉碎成细粉，其余土荆皮等十一味粉碎成粗粉，与斑蝥粉末混匀，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法，用乙醇三倍与冰醋酸一倍的混合液作溶剂，浸渍四十八小时后，缓缓渗漉，收集渗漉液 670 毫升，静置，取上清液，加人香精适量搅匀，即得。用时将患处洗净，一日搽三至四次。灰指甲应先除去空松部分，使药易渗人。

【功用】 祛风除湿，杀虫止痒。

【主治】 鹅掌风，灰指甲，湿癣，脚癣。

【宜忌】 外用药切忌入口，严防触及眼、鼻、口腔等粘膜处。

14129 黍粘子汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 昆布 苏木 生甘草 蒲黄 草龙胆各一分 黍粘子 连翘 生地黄 当归梢 黄芩 炙

甘草 黄连各二分 柴胡 黄耆各三分 桔梗三钱 桃仁三个 红花少许

【用法】 上锉如麻豆大，都作一服。水二盏煎至一盏，去滓稍热，食后服。

【主治】 耳痛生疮。

【宜忌】 忌寒药利大便。

14130 筒骨煎

【方源】《妇人良方》卷五。

【组成】 地骨皮 粉草 北柴胡 前胡 乌药 麻黄（不去节） 干葛 青蒿 苦梗 知母 天仙藤 北黄芩各一两 人参 生干地黄 秦艽 鳖甲 黄耆各半两 （一方加当归、白芍）

【用法】 上㕮咀，每服三钱，水一盏，酒一分，猪筒骨一茎（炙焦，分为四服），桃、柳枝各七寸，杏仁五粒（去皮尖，捶碎），煎至七分，去滓温服。加乌梅半个尤妙。

【主治】 诸虚劳疾，羸瘦乏力，腰背引痛，心烦喘嗽，唾脓呕血，颊涎壅盛，睡卧有妨，胸膈气促，夜多盗汗，发焦耳鸣，皮寒骨热，一切五劳七伤，骨蒸。

14131 筋骨药

【方源】《普济方》卷三十一。

【组成】 川乌一个 草乌二两（去皮，生用） 乳香 当归 天麻各半两 虎骨（醋炙） 没药 自然铜 乌药 川芎 萆薢 独活各一两

【用法】 上为细末，酒打面糊为丸，如梧桐子大。每服十数丸，温酒送下。

【主治】 一切疼痛及诸风。

14132 智意汤

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】 肉豆蔻 白术 益智 半夏 附子 桂 干姜各一两 藿香 甘草 茴香 人参 木香 丁香 大麦芽 破故纸 当归 曲各半两 青皮 陈皮 毕澄茄 细辛 良姜半两

【用法】 上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个（擘破），同煎七分，去滓，空心温服。

【主治】 脾胃虚弱，中满气痞，四肢怠惰，九窍不通，腰背疼痛，食下闷乱，昏倦嗜卧，愁忧伤意，胃中痞闷，饮食无味，不为肌肤，面色萎黄，大便秘涩不调，面目四肢时肿，身重，喜饥吞酸，呕逆痰水，不能消谷。

14133 集灵胶

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】 大冬 麦冬 生地 熟地 玄参 桔梗 甘草

【用法】 白蜜五斤收胶。

【主治】 虚劳内热骨蒸。

14134 集灵膏

【方源】《内经拾遗》卷一。

【组成】 生地 熟地各一斤十二两 人参（去芦） 枸杞子各一斤 麦门冬（去心）一斤四两 天门冬（去皮心） 牛膝各半斤

【用法】 上㕮咀，量入水，用桑柴火熬成膏。终日随意服之。

【功用】 滋心润肺，益卫养营。

【方论选录】 集，集聚也；灵，灵验也。集灵，集药之灵验也。

14135 集香丸

【方源】《局方》卷三（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 白豆蔻仁 缩砂仁 木香（不见火） 姜黄各四两 丁香（不见火）六两 香附子（炒去毛）四两八钱 麝香（研）八钱 甘草十六两（纳二两入药，十四两捣汁煎膏）

【用法】 上为细末，入麝香拌匀，用甘草膏搜和为丸，如梧桐子大。每服一二丸，细嚼咽津，不拘时候。

【功用】 宽中顺气，消宿酒，进饮食，磨积滞，去癥块。

【主治】 一切气疾，胸膈痛闷，胁肋胀满，心腹疼痛，噫气吞酸，呕吐恶心，不思饮食，或因酒过伤，脾胃不和。

14136 集效丸

【方源】《局方》卷八。

【组成】 大黄（锉，炒）十五两 木香（不见火） 槟榔 诃黎勒（煨，去核，酒浸，焙干） 附子（炮，去皮脐） 羌活（炒、研）（一本作芜荑） 鹤虱（炒） 干姜（炮）各十两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前橘皮汤送下；妇人醋汤送下。

【主治】 脏腑虚弱，或多食甘肥，致蛔虫动作，心腹攪痛，发作肿聚，往来上下，痛有休止，腹中烦热，口吐涎沫，即是蛔咬；又疗下部有虫，生痔痒痛。

【方论选录】《医方集解》：此手足阳明药也。虫喜温恶酸而畏苦，故有姜、附之热以温之，乌梅、诃皮之酸以伏之，大黄、槟榔、芜荑、鹤虱之苦以杀之，木香辛温以顺其气也。

【备考】 本方用法“食前橘皮汤下”，《医方集解》作“食前乌梅汤下”。

14137 集香宝屑

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】白豆蔻 缩砂仁 白茯苓 甘草 橘皮 香附子各等分

【用法】细锉和匀，入盐少许，时常细嚼。

【主治】胃口有痰恶心者。

14138 集成三仙丹

【方源】《幼幼集成》卷二。

【异名】三仙丹（原书同卷）。

【组成】五灵脂一钱 南木香五钱 巴豆仁四十粒

【用法】上将灵脂、木香研为细末听用，以巴豆剥去壳，取净肉四十粒，去其肉上嫩皮，纸包水湿，入慢火中煨极熟，取起，另以绵纸包之，缓缓捶去其油，纸湿则另换，以成白粉为度，谓之巴霜，与前二味和匀，醋打面糊为丸，如绿豆大，以朱砂为衣，晒干收贮。每服五丸，或七丸、九丸，量儿大小加减。合沆瀣丹二三丸同研烂，茶清调下。待其下后，其病立愈。

【主治】小儿纵口饮咸，食物过多，有形之物，填塞肠胃之间，不能转运传送，脾气抑郁，所以发热不退，眼闭难开，人事昏沉，四肢瘫软。

14139 集成沆瀣丹

【方源】《幼幼集成》卷二。

【异名】沆瀣丸（《麻疹全书》卷三）、沆瀣丹（《观聚方要补》卷十）。

【组成】杭川芎（酒洗） 锦庄黄（酒洗） 实黄芩（酒炒） 厚黄柏各九钱（酒炒） 黑牵牛（炒，取头末）六钱 薄荷叶四钱五分 粉滑石（水飞）六钱 尖槟榔七钱五分（童便洗，晒） 陈枳壳四钱五分（麸炒） 净连翘（除去心膈，取净） 京赤芍（炒）各六钱

【用法】依方炮制，和匀焙燥，研极细末，炼蜜为丸，如芡实大。月内之儿，每服一丸，稍大者二丸，俱用茶汤化服。但觉微有泄泻，则药力行，病即减矣；如不泄再服之，重病每日三服，以愈为度。此方断不峻厉，幸毋疑畏。

【主治】小儿一切胎毒，胎热胎黄，面赤目闭，鹅口疮，重舌木舌，喉闭乳蛾，浑身壮热，小便黄赤，大便闭结，麻疹斑瘰，游风癣疥，流丹隐疹，痰食风热，痄腮面肿，十种火丹。

【宜忌】胎寒胎怯面青白者忌之，乳母切忌油腻。

【方论选录】盖夫脏气流通者必不郁滞，或受毒于胎前，或感邪于诞后，遂尔中气抑郁，则见以前诸证。方内所用黄芩清上焦之热；黄柏清下焦之热；大黄清中焦之热，又藉其有推陈致新之功，活血除烦之力，能导三焦郁火从魄门而出。犹虑苦寒凝腻，复加槟榔、枳壳之辛散，为行气利痰之佐使。川芎、薄荷引头面风热从高而下趋；连翘解毒除烦；赤芍调营活血；牵牛利水，走气分而舒郁；滑石清润，抑阳火而扶阴，又能引邪热从小便而出。

14140 集成肥儿丸

【方源】《幼幼集成》卷四。

【异名】百选肥儿丸（《春脚集》卷四）。

【组成】建莲肉二两四钱（去心皮，炒） 西砂仁六钱（炒） 漂白术一两（土炒） 人参一钱（焙，切） 京楂肉（炒） 杭白芍（酒炒） 广陈皮（去筋，酒炒） 法半夏各四钱（炒） 白茯苓一两（乳汁蒸晒） 正雅连二钱（姜制） 苡仁（炒） 六神曲各六钱（炒） 炙甘草二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，弹子大。每服一丸，早、午晚米饮化下。

【主治】小儿脾胃虚弱，饮食不消，肌肤瘦削。

14141 集成三合保胎丸

【方源】《幼幼集成》卷一。

【组成】大怀地十二两（用砂仁三两，老姜三两，同地黄入砂锅内，先以净水煮两昼夜，俟地黄将烂，始入好酒煮之，总以地黄糜烂为度，将酒煮干取起，拣去砂仁，姜片不用，将地黄捣膏听用） 大当归（去头尾，取身切片）十二两（以好酒洗过，晒干听用） 漂白术（取净干片）十二两（以黄土研碎拌炒极黄取起，筛去土。孕妇肥白者气虚，加一两） 实条芩（枯飘者不用，取小实者切片）六两（酒炒三次，孕妇黑瘦者加一两，性躁者二两） 棉杜仲（切片）十二两（盐水拌炒，以丝断为度） 川续断（切片）十二两（酒炒）

【用法】上将后五味和为一处，火焙干燥，石磨磨细末，筛过。以前地黄膏和匀，少加炼蜜，入石臼内，捣千余杵，为丸如绿豆大。每早盐汤送三钱，晚临卧酒送三钱。每日如此，不可间断。孕妇素怯者，须两料亦可。自一月服起，过七个月方保无虞。

【主治】素惯堕胎。

【宜忌】三月内切忌房劳恼怒，犯之必堕。

【加减】至怯者，加人参。

【方论选录】因以古之内补丸、杜仲丸、白术散三方合凑，名三合保胎丸。以条芩清肝火而凉血，白术扶中气以健脾，当归养血宁心，熟地滋阴补

肾，续断填损伤而坚胞系，杜仲益腰膝而暖子宫，药虽平易，功胜神丹

14142 御风膏

【方源】 方出《圣惠》卷十九，名见《普济方》卷九十二。

【异名】 草麻膏。

【组成】 东西枝上蓖麻子七粒

【用法】 去壳研碎，涂在手心中，以一盂子，置在手心蓖麻子上，用熟水置盂中，正则急取盂子，左瘫涂右手心，右瘫涂左手心，口眼才正，急洗去药，只随病处左右贴亦可。又治产难者，烂研涂两脚心，生下便洗去。

【主治】 口眼㖞斜，由中风传入阳明经也。又治产难。

14143 御米丸

【方源】 《朱氏集验方》卷六。

【组成】 肉豆蔻 诃子 白茯苓 白术 石莲肉 当归各半两 罂粟壳一两半（蜜炙） 乳香三钱

【用法】 上为细末，水糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心用米饮送下。

【主治】 一切泻痢。

【加减】 如血痢，减豆蔻、白术，加当归、粟壳

14144 御痛汤

【方源】 《赤水玄珠》卷四。

【组成】 黄连（姜汁炒） 山栀仁（炒）各二钱 橘红 茯苓各一钱半 草蔻仁七分 半夏一钱 甘草四分

【用法】 加生姜三片，水煎，食前服

【主治】 火热腹痛。

14145 御寒汤

【方源】 《兰室秘藏》卷上。

【组成】 黄连 黄柏 羌活各二分 炙甘草 佛耳草 款冬花 白芷 防风各三分 升麻 人参 陈皮各五分 苍术七分 黄耆一钱

【用法】 上细切，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食后热服。

【主治】 寒气风邪，伤于皮毛，令鼻壅塞，咳嗽上喘。

【方论选录】 《医学入门》：黄连、黄柏降火，羌活、黄耆、人参补肺，甘草、款冬花，佛耳草消痰，白芷、防风、陈皮、升麻、苍术通寒气之壅塞。

14146 御米饮子

【方源】 《传信适用方》卷四。

【异名】 御米汤（《局方》卷六宝庆新增方）、御米饮（《魏氏家藏方》卷七）。

【组成】 罂粟壳半两 人参一分 厚朴一两（去粗皮，锉，姜汁炒熟） 白茯苓半两 干姜一分（炮） 乌梅三个（连核用） 甘草半两（炙）

【用法】 上为粗末。每用五钱匕，水一盏半，加生姜三片，枣一个，同煎至一盏，去滓温服。量儿大小，分作数服。

【主治】 ①《传信适用方》：赤白痢。②《局方》（宝庆新增方）：久患痢疾，或赤或白，脐腹疼痛，里急后坠，发歇无时，日夕无度，及下血不已，全不入食。

【加减】 若赤多者，加黑豆三十粒同煎。

14147 御院麝香散

【方源】 《医学纲目》卷十七。

【组成】 白矾（枯过，另研） 白龙骨（粘舌者，另研）各半两 麝香（另研）半字

【用法】 上为末。每用一字，先将冷水洗净鼻内血涕，然后吹药于鼻中；或以湿纸蘸药塞鼻，尤妙。

【主治】 鼻衄不止。

14148 御爱紫宸汤

【方源】 《普济方》卷一六七引《德生堂方》。

【组成】 良姜 丁香 甘草 陈皮各二两 藿香 官桂 茯苓 檀香各一两 木香半两 砂仁 葛花各一两 干葛一两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，煎至八分，去滓服，不拘时候。

【功用】 解宿酒。

【主治】 呕哕恶心，不进饮食。

14149 循络丸

【方源】 《杨氏家藏方》卷一。

【异名】 循络丹（《永乐大典》卷一三八七九引《可用方》）。

【组成】 没药（别研） 乳香（别研） 虎骨（酥炙焦） 败龟（酥炙） 当归（洗，焙） 五灵脂各二两 白附子（炮） 天麻（去苗，酒浸，焙） 全蝎（去毒，炒） 天南星（炮） 附子（炮，去脐皮） 川乌头（炮，去皮脐尖） 杜仲（去粗皮，炒） 地龙（去土炒） 威灵仙（去苗） 牛膝（去苗，酒浸一宿） 续断 乌蛇（酒浸，去皮骨，取肉，焙） 肉苁蓉（酒浸，炙） 朱砂（别研）各一两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】 风痹。气滞，血脉凝涩，筋脉拘挛，肢节腰膝强痛，行履艰难。

14150 舒肝丸

【方源】《中国药典》一部。

【组成】 川楝子 150g 延胡索（醋制）100g 白芍（酒炒）120g 片姜黄 100g 木香 80g 沉香 100g 豆蔻仁 60g 砂仁 80g 厚朴（姜制）60g 陈皮 80g 枳壳（炒）100g 茯苓 100g 朱砂 27g（水飞或粉碎成极细粉）

【用法】 上为细末，每 100g 粉末加炼蜜 170g～180g，制成大蜜丸，即得。每次服一丸，一日二～三次。

【功用】 舒肝和胃，理气止痛。

【主治】 肝郁气滞，胸胁胀满，胃脘疼痛，嘈杂呕吐，嗳气泛酸。

【宜忌】 孕妇慎用。

14151 舒肝饮

【方源】《医学集成》卷一。

【组成】 炒芍 当归 柴胡 白芥 莱菔 丹皮 炒枝 枳壳 桂心

【用法】 水煎服。

【主治】 杂证初起，肝郁气结，胸膈胀痛。

14152 舒郁丸

【方源】《玉案》卷四。

【组成】 香附 枳实 苍术各三两 沉香一两五钱 缩砂 山栀仁 抚芎 红曲 半夏各二两

【用法】 上为末，水为丸，每服三钱，空心，白滚汤下。

【主治】 一切郁证。

【加减】 气郁，加乌药、木香、槟榔、干姜、枳壳、桔梗；湿郁，加白术、白芷、赤茯苓、木通、苍术；痰郁，加南星、海石、瓜蒌仁、枳壳、桔梗、小皂荚；热郁，加黄连、青黛、连翘、山栀；血郁，加桃仁、红花、丹皮、当归、韭汁；食郁，加山楂、麦芽、神曲；伤冷食，胃脘痛，加草豆蔻、干姜；如春，加防风；夏，加苦参；秋、冬，加吴茱萸。

14153 舒经汤

【方源】《妇人良方》卷三。

【异名】 五痹汤（原书同卷）、舒筋散（《袖珍》卷二引《简易》）、舒筋汤（《校注妇人良方》卷三）、通气饮子（《医林绳墨大全》卷八）。

【组成】 片子姜黄四两 甘草 羌活各一两 白术 海桐皮 当归 赤芍药各二两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏半，煎至七分，去滓温服。如腰以下疾，空心服；腰以上疾，食后服。

【主治】 臂痛，亦治腰下疾。

14154 舒筋丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】 当归（洗，焙） 赤小豆（生用） 地龙（去土，炒） 甜瓜子 木瓜（去皮，切，焙） 威灵仙（去土） 白胶香（别研） 骨碎补（去毛） 海桐皮（去粗皮） 乌药 草乌头（去皮尖，炒） 五灵脂（炒） 芸薹子（炒）各等分

【用法】 上为细末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心、食前温酒或盐汤送下，一日二次。

【主治】 寒湿在经络，腰脚肿痛，行步艰难。

14155 舒筋丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 天麻 白附子（炮） 当归（去芦，酒浸） 川乌头（炮，去皮脐） 宣木瓜 防风（去芦）各半两 全蝎七个（用姜汁略浸过） 乳香（别研） 没药（别研） 川椒（去目，炒出汗） 肉桂（去粗皮）各一分

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸。黑豆酒送下，不拘时候。

【主治】 血弱气虚，风湿乘之，筋脉不舒，颈项紧痛，不能转侧，连耳皆痛。

14156 舒筋丸

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】 苍术（削成块子） 川牛膝（去芦头，锉） 肉苁蓉（锉） 木瓜（去瓤）各一两（并酒浸一宿，焙干） 虎胫骨一两（酥炙） 附子一两半（炮，去皮脐） 乳香（研） 没药（研） 官桂（不见火） 血竭（研细）各半两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大，每服五七十丸，空心温酒送下，一日二次。服之旬日，以手足轻，脚膝有力为验。

【功用】 生阳消阴，疏风去湿。

【主治】 半身不遂，手足无力，皆由饮食起居失节，阳气不敛，风邪所侵。

【宜忌】 可戒羊肉猪头动风气物。

14157 舒筋汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 羌活钱半 当归三钱 片姜黄钱半（酒炒） 炙草六分 白术钱半（炒） 海风藤三钱 赤芍钱半（酒炒） 生姜三片

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 产后拘挛，脉细弦浮涩滞者。

【方论选录】 产后血亏夹滞，寒邪袭人经络，故筋脉拘挛，手足疼痛，谓之挛痹。羌活开经气以疏邪，当归养血脉以营经，西赤芍泻血滞止痛，海风藤舒筋活络，白术健脾土以运动四肢，姜黄除痹气以引入手臂，炙草缓中和胃，生姜温胃散寒也。水煎，温服，使血气运行，则寒邪外散而筋脉得养，安有拘挛不舒，疼痛不止乎。

14158 舒筋饮

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】 羌活钱半 当归三钱 乳香二钱 片姜黄钱半 海桐皮三钱（酒炒） 米仁五钱（炒） 甘草六分

【用法】 水煎，去滓，入姜汁一匙，温服。

【主治】 产后筋脉拘挛，脉浮弦涩者。

【方论选录】 产后血虚挟滞，风湿伤于经络，故筋脉失养，拘挛疼痛不休焉。羌活散太阳之邪，除百节之痛，当归养厥阴之血，能舒拘挛，滴乳香活血止痛，海桐皮除挛祛风，米仁渗湿热以舒筋，姜黄行手臂以除痹，炙草以缓中益胃。水煎，入姜汁，以温散行经，使痹痛分解，能血活经和，而拘挛无不舒，切痛无不解矣。

14159 舒筋散

【方源】《校注妇人良方》卷四。

【组成】 玄胡索（炒） 杜仲（姜汁炒） 官桂（去皮） 羌活 芍药等分

【用法】 上为末。每服二钱，酒调下。

【主治】 风寒伤肾，膂作痛，或闪挫气滞血瘀。

14160 舒气释郁汤

【方源】《会约》卷六。

【组成】 香附 枳壳 川芎 陈皮各一钱 木香三四分 当归钱半 苏梗五分 柴胡（酒炒）八分 薄荷四分

【用法】 生姜五分为引。

【主治】 肝胆恚怒，气逆耳闭。

14161 舒肝溃坚汤

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】 夏枯草 僵蚕（炒）各二钱 香附子（酒炒） 石决明（煅）各一钱五分 当归 白芍（醋炒） 陈皮 柴胡 抚芎 穿山甲各一钱 红花 片子姜黄 甘草（生）各五分

【用法】 灯心五十寸为引，水三钟，煎一钟，食远温服。

【主治】 筋痨，石疽。

【加减】 便燥者，加乳香一钱；便溏者，加煅牡蛎一钱。

14162 舒筋保安散

【方源】《三因》卷一。

【异名】 舒筋保肝散（《医学从众录》卷四）。

【组成】 干木瓜 萆薢 五灵脂 牛膝（酒浸） 天麻 续断 白僵蚕（炒去丝） 松节 白芍药 乌药（去木） 威灵仙 黄耆 川当归 防风（去叉） 虎骨各一两

【用法】 用无灰酒一斗，浸上件药二十七日，紧封扎，日数足，取药焙干，捣为细末。每服二钱，用浸药酒半盏调下；吃酒尽，用米汤调下。

【功用】 宣导诸气。

【主治】 左瘫右换，筋脉拘挛，身体不遂，脚腿少力；干湿脚气，及湿滞经络，久不能立。

14163 猬艾丸

【方源】《玉案》卷六。

【组成】 艾叶 槐角 地榆 当归 川芎 刺猬皮 贯众各一两 头发（煅存性）三钱 猪后甲十个（炙焦）

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服三钱，空心米饮送下。

【主治】 一切痔疮出血，里急后重。

14164 猬皮丸

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】 槐花（微炒） 艾叶（炒黄） 枳壳（制） 地榆 当归 川芎 黄耆 白芍药 白矾（煅） 贯众各半两 猬皮一两（炙焦） 头发（烧存性）三钱 猪后蹄垂甲十枚（炙焦） 盈尺皂角一挺（去弦核，醋炙黄）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米饮送下。

【主治】 诸痔出血，里急疼痛。

14165 猬皮丸

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】 刺猬皮三四个（酒浸，焙） 经霜槐角子一斤 当归三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一二百丸，温酒送下。

【主治】 痔漏。

14166 猬皮灰散

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】 猬皮（烧存性） 黄耆（锉） 熟干地黄（焙） 续断 柏叶 地榆（锉） 白芷 黄连（去须）各等分

【用法】 上为散。每服二钱匕，食前温汤调下。

【主治】 大便下血。

14167 猴枣散

【方源】 方出《上海市中药成药制剂规范》名见《古今名方》。

【组成】 猴枣12克 羚羊角 月石 沉香 青礞石各3克 川贝母 天竹黄各六克 麝香1.2克

【用法】 上为末，混匀。每服0.3～0.6克，开水送下。

【功用】 清热化痰，镇惊开窍。

【主治】 小儿急惊风，四肢抽搐，痰多气急，发热烦躁，喉间痰鸣。

14168 腊茶散

【方源】 《外科大成》卷八。

【组成】 腊茶 文蛤各五钱 腻粉小许

【用法】 上为末。先用葱椒煎汤洗之，次以香油调敷，或紫苏叶煎汤洗之及紫苏末掺之托之。

【主治】 阴囊生疮，疼痛出水久不愈者。

14169 腊脂膏

【方源】 《外科启玄》卷十二。

【组成】 大风子肉二十个 木鳖子肉二十个 轻粉五分 枯矾五分 水银一钱

【用法】 上为末，用腊月猪脂调搽面上，一夜即愈。

【主治】 肺风疮。

14170 脾肾丸

【方源】 《杂病源流犀烛》卷一引《嵩崖尊生》。

【组成】 熟地黄 山药 山茱萸 茯苓 牡丹皮 泽泻 附子 肉桂 牛膝 砂仁 车前子 补骨脂 益智仁

【主治】 老人因虚衰而致喘者。

【备考】 《中国医学大辞典》本方用法：上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，熟汤送下。

14171 脾泄丸

【方源】 《医学启蒙》卷三。

【组成】 白术二两（饮上蒸） 白茯苓二两（蒸） 小茴香一两（炒） 肉豆蔻一两（面包煨） 破故纸二两（炒） 广木香五钱

【用法】 上为末，生姜煮红枣肉为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心米汤送下。甚，食前再服。

【主治】 脾虚久泻，每早晨溏泻一二次。

14172 脾积丸

【方源】 《直指》卷十五。

【异名】 莪术脾积丸（《医统》卷六十九）。

【组成】 蓬莪术三两 京三棱二两 良姜半两（以上用米醋一升，于瓷瓶内煮干，乘热切碎、焙） 青皮（去白）一两 南木香各半两 木蚍皂角三大梃（烧存性） 百草霜（深村锅底者佳）三匙

【用法】 上为细末，用川巴豆半两，只去壳，研如泥，渐入药末，研和得所，面糊为丸，如麻子大。每服五丸，加至十丸，以橘皮汤送下。

【主治】 饮食停滞，腹胀痛闷，呕恶吞酸，大便秘结。

14173 脾积丸

【方源】 《活人心统》卷一。

【组成】 丁香 木香（不见火） 巴豆（去壳） 高良姜（米醋煮）各半两 蓬术三两 荆三棱二两 青皮一两 皂角

【用法】 上入百草霜三匙，同研为末，面为丸，如麻子大。每服十丸至二十丸，脾积气，陈皮汤送下；口吐酸水，淡姜汤送下；呕吐，藿香甘草汤送下；小肠气，炒茴香酒送下；妇人血气刺痛，淡醋汤送下。

【主治】 食积，心腹膨胀作痛，口吐酸水，呕吐，小肠气，妇人血气刺痛。

【备考】 方中皂角用量原缺。

14174 脾肾双补丸

【方源】 《广笔记》卷二。

【组成】 人参（去芦）一斤 莲肉（去心，每粒分作八小块，炒黄）一斤 菟丝子（如法另末）一斤半 五味子（蜜蒸，烘干）一斤半 山茱萸肉（拣鲜红肉厚者，去核烘干）一斤 真淮山药（炒黄）一斤 车前子（米泔淘净，炒）十二两 肉豆蔻十两 橘红六两 砂仁六两（炒，最后入） 巴戟天十二两（甘草汁煮，去骨） 补骨脂（圆而黑色者佳，盐水拌炒，研末）一斤

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五钱，空心、饥时各一次。

【主治】 肾泄。

【宜忌】 忌羊肉、羊血。

【加减】 如虚而有火者，火盛肺热者，去人参、肉豆蔻、巴戟天、补骨脂。

【方论选录】 《饲鹤亭集方》：脾肾两亏，阴阳不固，以致虚寒飧泄，腹痛泻痢，食少神倦，或酒色过伤，脏真无火，此丸有健脾暖肾之功，故曰双补。

14175 腋臭散

【方源】 《赵炳南临床经验集》。

【组成】 密陀僧八两 枯矾二两

【用法】 用药粉干扑两腋下，每日一次。或用热马铃薯块、甘薯块去皮后蘸药夹于腋下，变凉为度。此法每周二次。手脚多汗，以药粉搓揉。

【主治】 腋臭、手脚多汗。

【宜忌】 此药切勿入口，对汞过敏者禁用。

14176 敦卓丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 木香 山楂 麦芽 皂角 丁香 乌药 青皮 陈皮 泽泻各五钱 巴霜一钱

【用法】 上共为末，用生蒜头一两研烂，加熟水取汁，浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服二三十丸，用汤饮送下。未愈，徐徐渐加。

【主治】 坚顽食积，停滞肠胃，痛剧不行。

14177 敦阜糕

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 白面（炒黄）二两 冬白术（炒黄）一两 破故纸（炒）五钱

【用法】 共为末，加白糖适量，制如糕法。用清滚汤食前调服。

【主治】 久泻久痢，肠滑不固，及妇人带浊。

【加减】 如胃寒者，每两末加炒干姜末五分至一钱；如气有不顺，或痛或呕，每两末加丁香一钱；如滑泄不禁者，每两加粟壳末（炒黄）一钱。

14178 敦厚散

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】 白术一两 半夏 人参各二钱 益智仁一钱 茯苓五钱 砂仁二粒

【用法】 水煎服。

【主治】 妇人脾虚湿盛，身体肥胖，痰多，不能受孕。

14179 敦复汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 野台参四钱 乌附子三钱 生山药五钱 补骨脂四钱（炒，捣） 核桃仁三钱 萸肉四钱（去净核） 茯苓一钱半 生鸡内金一钱半（捣细）

【功用】《古今名方》温肾补脾。

【主治】 下焦元气虚惫，相火微弱，致肾弱不能作强，脾弱不能健运，或腰膝痠疼，或黎明泄泻，一切虚寒诸证。

14180 童真丸

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】 真秋石 川贝母（去心）各等分

【用法】 上为末，煮红枣肉为丸。每服二钱，空腹薄荷汤送下。

【主治】 虚劳吐血，气虚喘嗽。

【加减】 如脉虚气耗，加人参；若脉细数阴虚，禁用人参，加牡丹皮；脾虚溏泻，加山药、茯苓、炙甘草。

14181 痞膏

【方源】《扶寿精方》。

【组成】 桐油五两 松香八两 当归一两 乳香 没药各一两 真阿魏三钱

【用法】 上先将松香、当归入桐油内熬枯，去滓，后入乳香、没药，将起火时入阿魏，熔化成膏，用红绢摊膏。用时先以煨生姜擦皮肤，后贴膏药，频以热手按摩，或炒盐熨之。

【主治】 痞块。

14182 痞气丸

【方源】《三因》卷八。

【组成】 大乌头一分（炮，去皮脐） 附子半两（炮，去皮脐） 赤石脂（煅，醋淬） 川椒（炒出汗） 干姜（炮）各二两 桂心半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。朱砂为衣。每服五七丸，渐加至十丸，米汤送下。

【主治】 脾积。在胃脘，覆大如盘，久久不愈，四肢不收，黄瘅，饮食不为肌肤，心痛彻背，背痛彻心，脉浮大而长。

14183 痞气丸

【方源】《东垣试效方》卷二。

【组成】 厚朴（去皮）四钱半 黄连（去须）八钱 吴茱萸（洗）三钱 黄芩二钱 白茯苓（去皮，另为末）一钱 泽泻一钱（另为末） 川乌头（炮，去皮）半钱 人参（去芦）一钱 茵陈（酒制，炒）一钱半 巴豆霜四分 干姜（炮）一钱半 白术二钱 缩砂仁（去皮）一钱半 桂（去皮）四分 川椒（炒）半钱

【用法】 上除巴豆霜、茯苓另研为末旋入外，同为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服二丸，每日加一丸，至便溏为度，食前淡甘草汤送下。

【主治】 脾积。在胃脘覆大如盘，久久不愈，令人四肢不收，发黄疸，饮食不为肌肤。

【宜忌】 积减大半勿服。

【加减】 秋、冬，加厚朴五钱半，减黄连一钱，黄芩一钱；黄疸，积大不能退，加巴豆霜一分，附子（炮）一钱，砒少许。

14184 痞块膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 大黄 朴消各一两

【用法】 上为末，以大蒜同打成膏。外贴。

【主治】 痞块。

14185 痞块神膏

【方源】《医方易简》卷七。

【组成】白芥子二斤 川山甲八两 真桐油二斤

【用法】将桐油入钢锅内先熬半晌，次入川山甲熬数沸，再次入白芥子，俟爆止，滤去滓，入飞净黄丹八两收之，离火再入麝香末四钱，去火气七日。用时隔汤化开，不可用火，摊贴。加阿魏四两更妙。

【主治】痞块。

14186 痢圣散子

【方源】《局方》卷六（吴直阁增诸家名方）。

【异名】圣散子(《医部全录》卷二六二)。

【组成】当归（去芦） 干姜（炮）各二两 黄柏皮（去粗皮） 甘草（炙） 枳壳（去瓤） 御米（即罂粟子） 罂粟壳（去蒂、盖）各四两

【用法】上为粗散。每服三钱，水一盏半，薤白二条（劈碎），同煎八分，去滓。食前温服。老人小儿加减服之。

【主治】远年近日赤白休息痢。

【宜忌】忌生冷、油腻之物。

14187 痢疾芩连丸

【方源】《医学碎金录》。

【组成】葛根二两 苦参三两 黄芩二两 黄连二两 赤白芍各二两 滑石十五两

【用法】以上研末，纳滑石（水飞极细）和匀；另用葛根二两，苦参三两，黄芩二两，青蒿四两，枳壳二两，乌药一两煎汤；再用鲜荷叶八两（捣），生萝卜子二两（研），鲜藿香三两（捣），鲜薄荷三两（捣），以上石臼捣融，加上药汤挤汁两次，再加净萝卜汁八两，泛成小丸，如绿豆大。每服三钱，一日二次。

【主治】细菌性痢疾、阿米巴痢疾、水泻等。

14188 痤愈汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】荆芥12克 防风9克 川芎6克 白芷4克 桔梗9克 枳壳9克 黄连6克 黄芩6克 栀子9克 连翘9克 当归9克 薄荷3克 甘草6克

【用法】水煎，内服。

【主治】痤疮。

14189 痫症镇心丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】犀角 胆星各一两 珍珠一钱五分 犀黄一钱 云苓 麦冬 枣仁各二两五钱 远志 黄连 菖蒲 甘草各五钱 辰砂三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，丸重八分，辰砂为衣，用蜡封口，每服一丸，姜汤化下。

【主治】心火炽甚，痰气昏迷，神识不清，癫痫狂疾，妄言见鬼，一切情志郁逆之症。

14190 痧药灵丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】茅术一两 木香一两二钱 丁香一两二钱 蟾酥一两 麝香九钱 犀黄二钱 腰黄四钱 朱砂三两五钱

【用法】上各取净粉，烧酒化蟾酥打和为丸。每服数丸，藿香汤送下。

【主治】暑热外感，寒食内停，肚腹绞痛，心胸饱闷，霍乱吐泻，转筋肢冷，二便闭塞，山岚瘴气，一切浊秽成痧等症。

【宜忌】孕妇忌服。

14191 痛风膏

【方源】《摄生秘剖》卷四。

【组成】姜汁一碗 葱汁一碗 广胶八两 牙皂一两 川椒一两 米醋一碗 乳香五钱 没药五钱 麝香一钱

【用法】将姜、葱汁同椒、皂煎熬，去滓，入醋再熬，再加广胶，慢火熬成膏，取起入乳没、麝香在内，和匀。每用绢或狗皮摊贴患处。

【功用】祛风散寒，行痰除湿。

【主治】痛风。

14192 痛风药酒

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】鳖甲（七轮者，醋炙） 甘菊花（净） 防风 杜仲 人参 甘杞子 粉丹皮 石菖蒲（去芦根） 秦艽 虎骨（酒炙） 川羌活 油松节 牛蒡子各一两 白术 黄耆 远志（去心，甘草水煮） 山萸肉 桔梗 苍耳子 僵蚕 白茯苓 牛膝 川萆薢 石蟹 天花粉 熟地 明天麻 白芍 白附子 独活 天南星（姜汁泡） 荆芥 广陈皮 白芷 茅苍术（米泔浸，炒） 川芎 当归各五钱

【用法】上以无灰酒二斗浸之，春、夏二七，秋、冬三七，封固勿泄气。每空心饮一杯，一日三次；药滓焙干，研细，好酒和丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心好酒送下。

【主治】四肢不举。

14193 痛风饼子

【方源】《兰台轨范》卷六引《圣惠》。

【组成】五倍子 全蝎 土狗各八分

【用法】上为末。醋丸作如钱大饼子。发时再用醋润透，炙热贴于太阳穴上，用帕子缚之，吸浓

茶。睡觉自愈。

【主治】 头痛。

14194 痛泄要方

【方源】 方出《丹溪心法》卷二，名见《医学正传》卷二引刘单窗方。

【异名】 白术防风汤(《叶氏女科》卷二)、防风芍药汤(《不知医必要》卷三)。

【组成】 炒白术三两 炒芍药二两 炒陈皮一两半 防风一两

【用法】 上锉，分八帖。水煎或丸服。

【主治】 ①《丹溪心法》：痛泄；②《医林纂要》：肝木乘脾，痛泻不止。

【加减】 久泻，加升麻六钱。

【方论选录】 ①《医方考》：泻责之脾，痛责之肝，肝责之实，脾责之虚。脾虚肝实，故令痛泻。是方也，炒术所以健脾，炒芍所以泻肝，炒陈所以醒脾，防风所以散肝。或问痛泻何以不责之伤食？余曰：伤食腹痛，得泻便减，今泻而痛不止，故责之土败木贼也。②《医方集解》：此足大阴厥阴药也，白术苦燥湿，甘补脾温和中；芍药寒泻肝火，酸敛逆气，缓中止痛；防风辛能散肝，香能舒脾，风能胜湿，为理脾引经要药；陈皮辛能利气，炒香尤能燥湿醒脾，使气行则痛止。数者皆以泻木而益土也。

【备考】 本方方名，《医统》引作"白术芍药散"。《医方考》引作"痛泻要方"《医林纂要》引作"痛泻丸"。

14195 惺惺散

【方源】《局方》卷十。

【组成】 瓜蒌根 人参 细辛（去叶） 茯苓（去皮） 白术 甘草（炙） 桔梗各一两半

【用法】 上为末，每服一钱，水一小盏，入薄荷三叶，同煎至四分，温服，不拘时候。如要和气，即入生姜煎服。

【主治】 ①《局方》：小儿风热疮疹，伤寒时气，头痛壮热，目涩多睡，咳嗽气粗，鼻塞清涕。②《阎氏小儿方论》：伤寒时气，风热痰壅，咳嗽及气不和。

14196 阑尾1号

【方源】《新急腹症学》。

【组成】 红藤 地丁草 川楝子

【功用】 清热解毒，理气止痛。

【主治】 瘀滞型阑尾炎。

14197 阑尾2号

【方源】《新急腹症学》。

【组成】 红藤 三颗针 大黄（后下） 丹皮 川楝子 芒消（冲服）

【功用】 清热解毒，祛瘀攻下。

【主治】 阑尾炎已成脓，或轻度破溃穿孔者。

14198 阑尾3号

【方源】《新急腹症学》。

【组成】 红藤 丹皮 皂角刺 炙山甲 银花 桃仁 川楝子

【功用】 清热排脓，活血消肿。

【主治】 脓肿型阑尾炎。

14199 阑尾炎汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 大黄15克（后下） 丹皮9克 冬瓜子18克 桃仁9克 元明粉9克（冲） 丹参30克 杭白芍24克 柴胡6克 金银花30克 连翘30克 败酱草15克 薏苡仁18克

【功用】 消炎止痛，活血通便。

【主治】 急性阑尾炎，尚未化脓，右下腹剧痛，反跳痛，甚则发热，呕吐，舌苔厚腻，脉洪数。

14200 阑尾化瘀汤

【方源】《新急腹症学》。

【组成】 川楝子 金银花各15克 延胡索 牡丹皮 桃仁 大黄（后下） 木香各9克

【用法】 水煎服。

【功用】 行气活血，清热解毒。

【主治】 瘀滞型阑尾炎初期，发热，腹痛，右下腹局限性压痛，反跳痛；或阑尾炎症消散后，热象不显著，而见脘腹胀闷，嗳气纳呆。

14201 焮肿膏

【方源】《金鉴·眼科》卷七十八。

【组成】 腻粉少许 黄蜡 代赭石（研）各五钱 细磁末 黄柏（细末） 麻油各一两

【用法】 上为极细末，于铜杓内入油蜡同煎为膏。涂患处。

【主治】 睑硬睛疼，初觉之时，时感疼胀，久则睑胞肿硬，睛珠疼痛，此缘膈中积热，肝经风毒上冲于目。

14202 滞下丸

【方源】《广笔记》卷一。

【组成】 川黄连（制）一斤 滑石末八两 槟榔四两 炙甘草三两 木香（为末，和水，隔汤焙）二两五钱 枳壳（炒）五两 白芍药（酒炒）五两

【用法】 上为细末，荷叶汤稍加姜汁糊丸，如绿豆大。每服三四钱，乌梅汤吞下。

【主治】 痢疾。

【加减】 若治白痢，加吴茱萸，白扁豆、陈皮各三两；燥热烦渴恶心者，勿用木香；元气虚弱者，勿用槟榔，枳壳；积滞多而后重者，用槟榔、枳壳；里急色赤者，用当归；久痢，加肉豆蔻。

14203 滞痛饮

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】 当归 赤芍 肉桂 牛膝各二两 红花 苏木各一两

【用法】 上为末。每服二钱，以酒送下。

【主治】 妇人月经不至，腰腿疼痛。

14204 湿郁汤

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】 苍术三钱 白术 香附 橘红 厚朴（姜汁炒） 半夏（制） 白茯苓 抚芎 羌活 独活各一钱 甘草五分

【用法】 上加生姜五片，水煎服。

【主治】 因雨露所袭，或岚气所侵，或坐卧湿地，或汗出衣衫，皆为湿郁，其状身重而痛，倦怠嗜卧，遇阴寒则发，脉沉而细缓者。

14205 湿毒膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 青黛150克 黄柏末310克 煅石膏末310克 煅炉甘石末180克 五倍子末90克

【用法】 先将青黛、黄柏研细，后加入后三种药末研和，再加入凡士林调成30%油膏。涂敷皮损上，每日一二次。

【功用】 收湿止痒。

【主治】 慢性湿疹，皲裂性湿疹。

14206 湿疹汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】 冬瓜皮30克 冬瓜子30克 赤小豆30克 薏苡仁24克 赤茯苓15克 滑石12克 银花15克 连翘15克 黄柏6克 苍术6克 胡黄连9克 甘草3克

【用法】 水煎服。

【功用】 利湿，清热，解毒。

【主治】 湿疹瘙痒，糜烂，流黄水。

14207 湿疹粉

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 煅石膏末310克 枯矾末150克 白芷末60克 冰片15克

【用法】 先将冰片、白芷研细，后加煅石膏末、枯矾末，同研极细。渗水多时，用药末外掺；流水少时，用植物油调如糊外搽，亦可加入其他药膏外用。

【功用】 收湿止痒。

【主治】 湿疹，脚湿气。

14208 湿疹膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 青黛60克 黄柏末60克 氧化锌620克 煅石膏末620克 麻油620克 凡士林930克

【用法】 先将青黛入乳钵内研细，加入黄柏末研和，加氧化锌研和，加煅石膏研和，最后加入凡士林、麻油调和成膏。薄涂皮损上。

【功用】 收湿止痒。

【主治】 婴儿湿疹，或亚急性湿疹，渗水不多者。

14209 湿痰丸

【方源】 方出《丹溪治法心要》卷二，名见《重订通俗伤寒论》。

【组成】 南星一两 半夏二两 蛤粉三两

【用法】 上为末。蒸饼为丸，青黛为衣。

【功用】 燥湿痰。

【主治】 湿痰。

【备考】《重订通俗伤寒论》本方用法：姜制南星、姜制半夏各一两、海蛤粉二两，上青黛二钱，共研细匀，神曲糊丸，如梧桐子大。朝、晚各服钱半或二钱，广皮汤送下。

14210 湿痰汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】 陈皮八分 半夏一钱 白术一钱 苍术八分 干姜八分 厚朴八分 草蔻一钱 乌药一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 湿痰。

14211 湿六合汤

【方源】《普济方》卷三二七。

【组成】 四物汤加白术 茯苓

【用法】 水煎服。

【主治】 中湿。身沉重无力，身凉微汗。

14212 湿热瘰遇汤

【方源】《古今名方》引《老中医经验选编》。

【组成】 甘草梢 生地各15克 桔梗 柴胡各6克 连翘 赤芍 桃仁各9克 当归12克 红花3克 土茯苓30克

【用法】 水煎服。

【功用】 清热解毒、活血利湿。

【主治】 狐惑病（口、眼、生殖器综合征）。眼红赤疼痛，口腔舌侧溃疡，生殖器或阴部亦有溃烂。

【加减】 若眼赤不退，加木贼草、刺蒺藜各9

克、车前子6克；目赤已退，适逢经至，去土茯苓、连翘，加川芎、益母草；阴部外用牛黄青黛散（人工牛黄、冰片各1.5克，青黛6克，橄榄核30克，煅存性，煅西月石9克，共研细末）外擦溃疡处。

14213 温中丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】温白丸(《鸡峰》卷二十四)。

【组成】人参（切去顶，焙） 甘草（锉，焙） 白术各二两

【用法】上为末，姜汁面和丸，如绿豆大。每服一二十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】①《小儿药证直诀》：小儿胃寒泻白，腹痛肠鸣，吐酸水，不思食；及霍乱吐泻。②《校注妇人良方》：中气虚热，口舌生疮，不喜饮冷，肢体倦怠，饮食少思。

14214 温中汤

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】白术 枣各半斤 厚朴五两 陈皮四两 甘草三两 干姜二两 藿香 茯苓各一两

【用法】上为粗末，每服二钱，水一盏，煎至六分，去滓。食前温服。

【主治】脾胃虚寒，腹中冷痛，饮食迟化，痰饮并多，寒气上奔，心胸刺痛；及伤寒阴盛脉细沉微，手足逆冷，霍乱吐泻。

14215 温中汤

【方源】《三因》卷十一。

【异名】温中厚朴汤(《普济方》卷二〇七)。

【组成】厚朴（去皮，细锉） 甘草（锉细） 生姜（洗，切） 青州枣（切）各等分

【用法】前二味捣令得所，入生姜杵匀，取出，同枣焙令微燥，入锅慢火炒令紫色，焙干为细末。每服一大钱，空腹生姜汤点服，以知为度。

【主治】虚人老人，饮啖生冷，多致腹胀，心下痞满，有妨饮食，或刺痛泄利，气痞滞闷。

14216 温中汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】良姜 官桂 益智仁 砂仁 木香（另研） 香附 厚朴 陈皮 茴香 当归 元胡索 甘草各等分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，水煎服。

【主治】①《回春》：虚痛。②《寿世保元》：食积腹痛，其脉弦，其痛在上，以手重按愈痛，甚欲大便，利后其痛减退。

14217 温中汤

【方源】《金匮翼》卷六。

【组成】厚朴（姜制） 一两 橘皮（去白） 一两 干姜七钱 甘草（炙） 草豆蔻 茯苓（去皮） 木香各半两

【用法】上为粗末，每服二钱，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去滓。食前温服。

【主治】土衰不运，又加客寒，聚为满痛。

14218 温风散

【方源】《直指》卷二十一。

【异名】温风汤(《寿世新编》卷下)。

【组成】当归 川芎 细辛 白芷 荜茇 露蜂房（炒） 藁本各等分

【用法】上锉。每服二钱。井水煎服，仍含漱。

【主治】①《直指》：风冷齿痛；②《寿世新编》：风牙，不甚肿痛，不怕冷热，牙关紧急难开，舌苔淡白，口不作渴，小便清长者。

14219 温白丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】天麻（生）半两 白僵蚕（炮） 白附子（生） 干蝎（去毒） 天南星（锉、汤浸七次，焙）各一分

【用法】上为末，汤浸寒食面和丸，如绿豆大，仍于寒食面内养七日取出。每服五七丸至二三十丸，空心煎生姜米饮送服。

【主治】小儿脾气虚困，泄泻瘦弱，冷痞洞利；及因吐泻或久病后成慢惊，身冷瘛疭。

14220 温冲汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生山药八钱 当归身四钱 乌附子二钱 肉桂（去粗皮，后入）二钱 补骨脂（炒，捣）三钱 小茴香（炒）二钱 核桃仁二钱 紫石英（煅，研）八钱 真鹿角胶二钱（另炖同服）

【用法】水煎服。

【主治】妇人血海虚寒不孕。

14221 温肝汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】当归 枸杞各二钱 茯苓 肉桂 乌药各一钱半 木香五分 小茴香五七分（炒） 吴茱萸一钱半（开水泡） 生姜七分

【用法】水煎，温服。

【主治】肝肾阴寒，阴缩。

【加减】或加附子。

14222 温辛散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十五。

【组成】木香 陈皮 羌活 苍术 紫苏 厚朴

【用法】 加生姜，葱，用水煎服。

【主治】 夏月感寒，寒热身重，昏眩，呕吐腹痛。

14223 温补汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】 人参 白术 川芎 当归 白芍 熟地 肉桂 木香 小茴 香附 元胡索

【主治】 少腹痛而喜按。

14224 温肾丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 巴戟二两 当归 菟丝子 鹿茸 益智仁 杜仲 生地 茯神 山药 远志 蛇床子 续断各一两 山茱萸 熟地各三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心温酒送下。

【功用】 种子。

【加减】 精虚，加钟乳粉，五味子；阳道衰，倍续断；精不固，加龙骨，牡蛎，倍鹿茸。

14225 温肾丸

【方源】《会约》卷十。

【组成】 熟地八两 山药（炒） 枣皮（醋蒸）各四两 泽泻一两二钱（盐水浸） 茯苓三两 补骨脂（酒炒）三两 菟丝子（淘去泥沙，酒蒸）四两 五味子（微炒）二两 肉桂四两 附子四五两

【用法】 先将地黄、枣皮捣成膏，后将各药研末，加入山药打糊为丸。

【功用】 补益真阴真阳，既济肾中水火。

【主治】 命门火衰，五更及天明发泄，多年不愈者。

14226 温肾散

【方源】《三因》卷八。

【组成】 熟干地黄一斤 苁蓉（酒浸） 麦门冬（去心） 牛膝（酒浸） 五味子 巴戟天（去心） 甘草（炙）各八两 茯神（去木） 干姜（炮）各五两 杜仲（去粗皮，姜汁淹，炒丝断）三两

【用法】 上为末。每服二钱，空心温酒调下，一日二三次。

【主治】 肾虚寒，阴痿，腰脊痛，身重缓弱，足腰不可以按，语音混浊，阳气顿绝。

14227 温金散

【方源】《三因》卷十。

【组成】 甘草（生用） 黄芩 桑白皮 防风（去叉） 杏仁（去皮尖）各一两（以上药物用米泔浸一宿，取出握干，略炒） 麦门冬一分（去心） 茯神半两

【用法】 上为末。每服二大钱，水一盏，入黄蜡一片，如指大，同煎至七分，食后热服。

【主治】 积劳，咳嗽喘闷，咯痰中有血。

14228 温金散

【方源】《妇人良方》卷五。

【组成】 甘草 黄芩 桑白皮 防风各一两 杏仁二十七粒（制） 人参（去芦） 茯神各半两 麦门冬一分

【用法】 上药前五味，用米泔浸一宿，晒干；次入人参、茯神，麦门冬三味，同为细末。每服二钱，水一盏，蜡一豆大，煎至八分，食后服。

【主治】 劳嗽。

【备考】 方中防风，《丹溪心法附余》引作“阿胶”。

14229 温肺丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】 紫菀 陈皮 附子 款冬花 半夏 杏仁各一两半 干姜 甘草 细辛 桂各一两 人参三分

【用法】 上为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前生姜汤送下。

【主治】 肺挟寒，上气咳嗽，胸满短气，呕吐痰涎，喘鸣肩息，全不嗜食；及寒毒痉嗽，咯吐脓血。

14230 温肺汤

【方源】《局方》卷四（绍兴续添方）。

【组成】 白芍药六两 五味子（去梗，炒） 干姜（炮） 肉桂（去粗皮） 半夏（煮熟，焙） 陈皮（去白） 杏仁 甘草（炒）各三两 细辛（去芦，洗）二两

【用法】 上锉粗散。每服三大钱，水一盏半，煎至八分，以绢滤取汁。食后服。两服滓再煎一服。

【主治】 肺虚，久客寒饮，发则喘咳，不能坐卧，呕吐痰沫，不思饮食。

14231 温肺汤

【方源】《直指》卷八。

【组成】 干姜 辣桂 甘草（炙） 半夏（制） 陈皮 北五味子 杏仁（去皮尖）各一两 细辛 阿胶（炒）各半两

【用法】 上为粗散。每服二钱半，加生姜，大枣水煎服。

【主治】 肺虚感冷，咳嗽，呕吐痰沫。

14232 温肺散

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】 细辛（去苗叶）二两 甘草（炙） 干

姜（炮） 五味子 白茯苓四两

【用法】 上为细散，每服一钱匕，食后，临卧沸汤调服。

【主治】 肺中寒，咳唾浊沫。

14233 温降汤

【方源】《衷中参西》上册。

【异名】 健胃温降汤（原书中册）。

【组成】 白术三钱 清半夏三钱 生山药六钱 干姜三钱 生赭石（轧细）六钱 生杭芍三钱 川厚朴一钱半 生姜二钱

【功用】 温补开通，降其胃气。

【主治】 吐衄，脉虚濡而迟，饮食停滞胃口不能消化，此因凉而胃气不降所致。

【临证举例】 吐血 一童子年十三四，吐血数日不愈，其吐之时，多由于咳嗽，其脉迟濡，右关尤甚，其脾胃虚寒，不能运化饮食，胃气不能下降。为拟此汤，一剂血止，数剂咳嗽亦愈。

14234 温经汤

【方源】《金匮》卷下。

【异名】 调经散（《直指·附遗》卷二十六）、大温经汤（《丹溪心法附余》卷二十）、小温经汤（《血证论》卷八）。

【组成】 吴茱萸三两 当归 芎藭 芍药 人参 桂枝 阿胶 生姜 牡丹皮（去心） 甘草各二两 半夏半斤 麦冬一升（去心）

【用法】 上以水一斗，煮取三升，分温三服。

【主治】 妇人年五十所，病下利数十日不止，暮即发热，少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥。此病属带下，瘀血在少腹不去。

【方论选录】 ①《金匮要略心典》：妇人年五十所，天癸已断而病下利，似非因经所致矣。不知少腹旧有积血，欲行而未得遽行，欲止而不能竟止，于是下利窘急，至数十日不止。暮即发热者，血结在阳，阳气至暮，不得入于阴，而反浮于外也。少腹里急腹满者，血积不行，亦阴寒在下也。手掌烦热病在阴，掌亦阴也。唇口干燥，血内瘀者，不外荣也。此为瘀血作利，不必治利，但去其瘀而利自止。吴茱萸、桂枝、丹皮人血散寒而行其瘀，芎、归、芍药、麦冬、阿胶以生新血，人参、甘草、姜夏，以正脾气。盖瘀久者荣必衰，下多者脾必伤也。②《金匮要略释义》：温经汤中以吴茱萸、生姜、桂枝温经暖宫，阿胶、当归、川芎、芍药、丹皮和营祛瘀，麦冬、半夏润燥降逆，甘草、人参补益中气。此为养正祛邪方剂，适用于老年妇女因瘀下利，日久不愈；及妇人腹寒不孕，月经不调等症。

14235 温经汤

【方源】《会约》卷十四

【组成】 当归二三钱 川芎一钱 炮姜五分 白芍（酒炒）一钱半

【用法】 水煎服。

【主治】 妇女血寒，月经后期者

14236 温胃汤

【方源】《千金》卷十六。

【组成】 附子 当归 厚朴 人参 橘皮 芍药 甘草各一两 干姜五分 蜀椒三合

【用法】 上㕮咀。以水九升，煮取三升，分三服。

【主治】 ①《千金》：胃气不平，时胀，咳不能食。②《奇效良方》：忧思聚结，脾肺气凝，阳不能正，大肠与胃气不平，胀满上冲，咳食不下，脉虚而紧涩。

14237 温胃汤

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】 干姜一钱半（炒） 厚朴八钱（制） 白豆蔻一钱（去壳，炒，研） 益智一钱半（炒） 姜黄一钱 甘草五分 人参八分 陈皮一钱半 砂仁一钱半（炒）

【用法】 水煎去滓，温服。

【主治】 胃脘痛，脉弦细者。

【方论选录】 胃虚寒滞，中气不能运化，故浊阴窒塞，胃脘作痛不止。白蔻宽胸快膈，厚朴散滞祛寒，干姜暖胃逐冷，陈皮利气和中，人参补胃虚，砂仁醒脾气，甘草缓中和胃，益智补火生土，姜黄调气以解寒滞。使滞化气调，则寒邪外解，而胃气融和，安有作痛之患。此温中散寒之剂，为胃虚寒滞作痛之专方。

14238 温胃饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 人参一二三钱或一两 白术（炒）一二钱或一两 扁豆（炒）二钱 陈皮一钱或不用 干姜（炒焦）一二三钱 炙甘草一钱 当归一二钱（滑泄者勿用）

【用法】 水二钟，煎七分，食远温服。

【主治】 中寒，呕吐吞酸，泄泻，不思饮食；及妇人脏寒呕吐，胎气不安。

【加减】 如下寒带浊者，加破故纸一钱；如气滞或兼胸腹痛者，加藿香、丁香、木香、白豆蔻、砂仁、白芥子之属；如兼外邪及肝肾之病者，加桂枝、肉桂，甚者加柴胡；如脾气陷而身热者，加升

麻五七分；如水泛为痰而胸腹痞满者，加茯苓一二钱；如脾胃虚极，大呕大吐不能止者，倍用参术，仍加胡椒二三分，煎熟，徐徐服之。

14239 温胃饮

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】人参一钱 白术二钱（土炒） 干姜一钱（炮） 甘草一钱 丁香五分 沉香一钱 柿蒂十四个 吴萸（酒洗）七分 附子一钱（制）

【用法】上加生姜三片，大枣二枚，用水三钟，煎八分，不拘时候服。

【主治】痢疽。脾胃虚弱，或内伤生冷，外感寒邪，致生呃逆，中脘疼痛，呕吐清水。

14240 温胃散

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】生姜半斤（洗，切，晒干，用盐二两腌一宿，炒过，续入陈曲末一两，同炒干） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 半夏（为末，生姜汁作饼，晒干）各一两 草豆蔻（大者，不去皮）三枚 甘草（炙，锉）二两 丁香一分

【用法】上为散。每服二钱匕，如茶点服。

【功用】顺气，消宿食。

【主治】留饮。

【加减】觉有胃寒，加附子半两（炮裂，去皮脐），半夏一两（汤浸，去滑七遍，切，焙）。

14241 温胆汤

【方源】《外台》卷十七引《集验方》。

【组成】生姜四两 半夏二两（洗） 橘皮三两 竹茹二两 枳实二枚（炙） 甘草一两（炙）

【用法】上切。以水八升，煮取二升，去滓，分三服。

【主治】大病后，虚烦不得眠，此胆寒故也。

14242 温胆汤

【方源】《三因》卷九。

【组成】半夏（汤洗七次） 竹茹 枳实（麸炒，去瓤）各二两 陈皮三两 甘草一两（炙） 茯苓一两半

【用法】上锉为散。每服四大钱，水一盏半，加生姜五片、大枣一枚，煎七分，去滓。食前服。

【主治】痰热内扰，心胆气虚，心烦不寐，触事易惊，或夜多异梦，眩悸呕恶，及癫痫等。

①《三因》：大病后，虚烦不得眠。②《易简》：心胆虚怯，触事易惊，或梦寐不祥，或异象眩惑，遂致心惊胆慑；气郁生涎，涎与气搏变生诸证，或短气悸乏，或复自汗，或四肢浮肿，饮食无味，心虚烦闷，坐卧不安。③《内经拾遗方论》：主胆虚，主头风，主失心，主小儿癫痫。④《医略六书》：痰气闭塞，耳窍不通，脉滑。

【方论选录】①《医方集解》：此足少阳阳明药也，橘、半、生姜之辛温，以之导痰止呕，即以之温胆；枳实破滞；茯苓渗湿；甘草和中；竹茹开胃土之郁，清肺金之燥，凉肺金之所以平甲木也。如是则不寒不燥而胆常温矣。《经》曰：胃不和则卧不安；又曰：阳气满不得入于阴，阴气虚故目不得瞑。半夏能和胃而通阴阳，故《内经》用治不眠。二陈非特温胆，亦以和胃也。②《成方便读》：夫人之六腑，皆泻而不藏，惟胆为清净之腑，无出无入，寄附于肝，又与肝相为表里。肝藏魂，夜卧则魂归于肝，胆有邪，岂有不波及肝哉。且胆为甲木，其象应春，今胆虚则不能遂其生长发陈之令，于是土不能得木而达也。土不达则痰涎易生。痰为百病之母，所虚之处，即受邪之处，故有惊悸之状。此方纯以二陈、竹茹、枳实、生姜和胃豁痰、破气开郁之品，内中并无温胆之药，而以温胆名方者，亦以胆为甲木，常欲得其春气温和之意耳。

14243 温胆汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】人参 白术（去芦） 茯神（去皮木） 当归（酒洗） 生地黄（酒洗） 酸枣仁（炒） 麦门冬（去心） 半夏（姜汁炒） 枳实（麸炒） 黄连（酒炒） 竹茹 山栀（炒）各等分 甘草三分 辰砂五分（临服研末调入）

【用法】上锉一剂。加生姜一片，大枣一枚，乌梅一个，水煎，去滓，入竹沥调辰砂末服。

【主治】内有痰火，惊惕不眠。

14244 温胆汤

【方源】《笔花医镜》卷二。

【组成】制半夏一钱五分 枳实八分 陈皮 茯苓各一钱半 人参一钱 熟地 炒枣仁各三钱 远志一钱 五味子一钱 甘草（炙）五分

【用法】上加生姜三片，大枣一枚，水煎服。

【主治】胆气虚寒，梦遗滑精。

14245 温胞散

【方源】《辨证录》卷十一。

【异名】温胞饮（《傅青主男女科》）。

【组成】人参三钱 白术一两 巴戟天一两 破故纸二钱 杜仲三钱 菟丝子三钱 芡实二钱 山药三钱 肉桂二钱 附子三分

【用法】水煎服。

【主治】妇人心肾火衰，胞胎寒冷，下身冰凉，非火不温，交感之时，阴中不见有温热之气。

14246 温脏丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参（随宜用，无亦可） 白术（米泔浸，炒） 当归各四两 芍药（酒炒焦） 茯苓 川椒（去合口者，炒出汗） 细榧肉 使君子（煨，取肉） 槟榔各二两 干姜（炮） 吴茱萸（汤泡一宿，炒）各一两

【用法】上为末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸或百丸，饥时白汤送下。

【功用】温健脾胃，逐杀诸虫。

【主治】脏气虚寒，诸虫积既逐而复生者。

【加减】如脏寒者，加制附子一二两；脏热者，加黄连一二两。

14247 温脑散

【方源】《传信适用方》卷一。

【组成】川芎二两 天麻 川乌（炮，去皮尖，碎锉，炒黄）各一两

【用法】上为细末。每服二钱，薄荷茶调下。

【主治】头风。

14248 温通汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】椒目八钱（炒，捣） 小茴香二钱（炒，捣） 威灵仙三钱

【主治】下焦受寒，小便不通。

【加减】凉甚者，酌加肉桂、附子、干姜；气分虚者，宜加人参，助气分以行药力。

14249 温清丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【异名】温六丸（《医学正传》卷二）。

【组成】干姜一两 滑石 甘草各二两

【用法】上为末，泛丸服。

【主治】①《丹溪心法》：翻胃。②《医学正传》：泄泻或兼呕吐者。

14250 温清散

【方源】《回春》卷六。

【组成】当归 白芍 熟地 川芎 黄连 黄芩 黄柏 栀子各一钱半

【用法】上锉一剂，水煎。空心服。

【主治】①《回春》：妇人经脉不住，或如豆汁，五色相杂，面色萎黄，脐腹刺痛，寒热往来，崩漏不止。②《女科切要》：血热暴崩。

14251 温脾丸

【方源】《外台》卷十六引《深师方》。

【组成】大黄二两 麦曲（熬） 干姜各三两 厚朴（炙） 附子（炮） 当归 甘草（炙） 桂心 人参 枳实（炙）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，增至二十丸，一日三次，食已服之。

【主治】宿寒，脾胃中冷，心腹胀满，食不消化。

【宜忌】忌猪肉、冷水、海藻、菘菜、生葱等。

【备考】无当归者，用芎藭一两代之。

14252 温脾丸

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】法曲 小麦芽各五合 吴茱萸三合 枳实三枚（炙） 人参 桔梗 麦门冬（去心） 干姜 附子（炮，去皮） 细辛各二两 桂心 厚朴（炙） 当归 茯苓 甘草（炙）各三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，空腹以饮送服，一日三次。

【功用】温中消谷，健脾益气。

【主治】胃气弱，大腹冷则下痢，小腹热即小便难，腹满气喘，干呕不得食。

【加减】亦可加大黄二两。

14253 温脾汤

【方源】《本事》卷四。

【组成】厚朴（去粗皮，姜制） 干姜（炮） 甘草 桂心（去皮，不见火） 附子（生，去皮脐）各半两 大黄四钱（生，碎切，汤一盏渍半日，搦去滓，煎汤时和滓下）

【用法】上细锉。水二升半，煎八合后，下大黄汁，再煎六合，去滓，澄去脚。不要晚食，分三服温服，自夜至晓令尽。不快，食前更以干姜丸佐之。

【主治】痼冷在肠胃间，连年腹痛泄泻，休作无时，服诸热药不效，宜先取去，然后调治易愈，不可畏虚以养病也。

14254 温脾汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】草果二钱 桂枝三钱 生姜五钱 茯苓五钱 蜀漆三钱（炒） 厚朴三钱

【用法】上用水五杯，煮取二杯。分二次温服。

【主治】太阴三疟，腹胀不渴，呕水。

【方论选录】三疟本系深入脏真之痼疾，现脾胃证，犹属稍轻。腹胀不渴，脾寒也，故以草果温太阴独胜之寒，辅以厚朴消胀；呕水者，胃寒也，故以生姜温胃降逆，辅以茯苓渗湿而养正；蜀漆性急走疟邪，导以桂枝外达太阳也。

14255 温脾散

【方源】《本事》卷二。

【组成】 舶上茴香（炒香） 青皮（去白） 陈艾 缩砂仁 桔梗（炒） 香白芷（不见火） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各一两 木香 白术 香附子（麸炒，春去皮）各半两 甘草一两半（炙） 红豆 良姜 麦芽 干葛各二两

【用法】 上为细末。每服一钱，水一盏半，加枣一个，煎至七分。食前温服。

【功用】 《丹溪心法附余》：开胃进食，温中利气，散寒湿。

【主治】 脾胃病。

14256 温脾散

【方源】 《回春》卷三。

【组成】 黄耆（蜜炙） 人参（去芦） 白术（土炒） 白茯苓（去皮） 山药（炒） 干姜（炒） 诃子（煨，去核） 肉蔻（煨去油） 粟壳（蜜炒） 草果（去皮） 丁香 肉桂 大附子（制） 黄连（姜汁炒） 砂仁 陈皮 甘草（炙） 厚朴（姜汁炒）各等分

【用法】 上锉一剂。加生姜、大枣，水煎、空心服。

【主治】 久泻。米谷不化，水谷入口，即时直下，下元虚冷，滑脱不禁。

14257 温解散

【方源】 《仙拈集》卷二。

【组成】 良姜一两五钱 吴萸四两 胡椒二两

【用法】 上为末。每服重者五分，轻者三分，温酒送下。

【主治】 心胃因冷气刺痛。

14258 温精汤

【方源】 《嵩崖尊生》卷七。

【组成】 人参 白术 当归 川芎 白芍 熟地黄各一钱 肉桂四分 木香三分 小茴香八分 香附 玄胡各四分

【主治】 小腹痛，喜按。

14259 温髓汤

【方源】 《圣济总录》卷五十三。

【组成】 附子（炮裂，去皮脐） 人参 黄耆 细辛（去苗叶） 桂（去粗皮）各一两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服三钱匕，用水一盏，煎至七分，去滓。空心、食前温服。

【主治】 髓虚骨寒。

14260 温中坐药

【方源】 《金鉴》卷四十九。

【组成】 远志 干姜 蛇床子 吴茱萸

【用法】 上为末。绵裹纳阴中，一日二易。内宜多服桂附地黄丸。

【主治】 妇人阴冷，由风寒乘虚客于子脏，久之血凝气滞，艰于受孕。

14261 温胃煮散

【方源】 《圣济总录》卷四十七。

【组成】 人参末二钱 生附子末半钱 生姜一分（切碎）

【用法】 上和匀。用水七合，煎至二合，以鸡子一枚，取清打转，空心顿服。

【主治】 胃中虚冷，中脘气满，不能转化，善饥不能食。

14262 温煦薄贴

【方源】 《疡科纲要》。

【组成】 鲜凤仙茎（连枝叶花蕊根荄，洗净，日晒半干）一斤许 大生地六两 当归须四两 急性子五两 大南星三两 川乌 草乌 干姜 羌活 独活各二两

【用法】 上各切片，用真麻油十五斤，煎沸，先入凤仙茎熬二十分钟，俟不爆，再入生地，又熬十余分钟，乃入诸药，煎枯滤净，另入净锅，文火熬沸，入筛净广丹、细淀粉各一斤半，柳木棍不住手搅极匀，滴入水中试老嫩得宜，膏成离火，入细麝香五钱、细乳香没药（去油）各一两、上安桂末、丁香末各二两，调匀，入水成团，入瓮中，清水养之，密封候用。油纸摊贴。

【主治】 阴发大证，形巨肿坚，痠痛彻骨，皮肉如故者；或但骨节痠楚，尚无形块者；及肚痈肠痈，坚块深邃；内伤跌扑；风寒湿邪三气痹着，支节痠痛、举动不利。

14263 温土消瘕汤

【方源】 《辨证录》卷七。

【组成】 白术一两 茯苓一两 肉桂二钱 枳实二钱 人参五钱 巴戟天五钱 山楂一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 温补命门，扶助脾土。

【主治】 脾气虚寒，又食寒物，结于小腹之间，久不能消，遂成硬块，已而能动。

14264 温土毓麟汤

【方源】 《傅青主女科》卷上。

【组成】 巴戟一两（去心，酒浸） 覆盆子一两（酒浸蒸） 白术五钱（土炒） 人参二钱 怀山药五钱（炒） 神曲一钱（炒）

【用法】 水煎服。

【主治】 妇女脾胃虚寒，饮食不运，胸膈胀满，时多呕泄，久不受孕者。

14265 温中化浊汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】炮姜五分 小茴香一钱 乌药一钱 木香五分 广皮一钱 厚朴一钱 当归一钱五分 茯苓二钱 白术一钱 佛手柑五分

【用法】水煎服。

【主治】感寒下痢，腹痛，手足冷，舌白，口不渴，脉沉细者。

【加减】病甚者加附子。

14266 温中化痰丸

【方源】《局方》卷四（吴直阁增诸家名方）。

【组成】干姜（炮） 半夏（煮）各一两 细辛（去叶，洗） 胡椒各半两 白术（焙）二两

【用法】上为细末。生姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，汤、饮任下，不拘时候。

【主治】停痰留饮，胸膈满闷，头眩目运，好卧减食，咳嗽呕吐，气短恶心；或饮酒过多，或引饮无度，或过伤生冷，痰涎并多，呕哕恶心。

14267 温中化痰汤

【方源】《李氏医鉴》卷二。

【组成】半夏 陈皮 茯苓 干姜

【用法】姜汁糊丸服。

【主治】胸膈寒痰不快。

14268 温中平胃散

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】炮姜五分 砂仁一钱 木香五分 谷芽三钱（炒） 神曲三钱（炒） 广皮一钱 茅术一钱 厚朴一钱 枳壳一钱 青皮一钱 陈香橼皮八分

【主治】胃胀腹满，胃脘痛，鼻闻焦臭，妨于食，大便难。

14269 温中当归汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】当归 人参 干姜 白术 厚朴 桂各二两 桔梗 白芍药各一两 附子 甘草 木香各半两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】寒留不去，与正气相搏，痛而不休，脉弦紧者。

14270 温中补脾汤

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】人参 黄耆（蜜炙） 白术（土炒） 干姜 附子（制） 半夏（姜制） 陈皮 茯苓 砂仁 肉桂（去粗皮，研） 白芍（炒焦） 甘草（炙） 丁香

【用法】煨姜为引，水煎服。

【功用】大补脾土，生胃回阳。

【主治】慢脾风。缘吐泻既久，脾气大伤，以致土虚不能生金，金弱不能制木，肝木强盛，惟脾是克，故曰脾风。其证闭目摇头，面唇青暗，额汗昏睡，四肢厥冷，舌短声哑，频呕清水。

14271 温中良姜丸

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【异名】温中丸（《医方类聚》卷八十九引《施圆端效方》）。

【组成】高良姜（炒）四斤 干姜（炮） 白术各二斤四两 肉桂（去粗皮）二十八两 甘草（爁）一斤

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两作十二丸。每服一丸，细嚼，空心、食前生姜、橘皮汤送下；米饮亦得。

【功用】温脾胃，顺三焦，美饮食，辟寒邪，养正气。

【主治】寒痰结聚，气壅不通，食即辄吐，咽膈噎闷，两胁疼痛，呕吐哕逆，噫醋恶心，中满短气，噎闻食臭；及留饮肠鸣，湿泄冷泻，注下不止。

14272 温中降气丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】京三棱（煨） 蓬莪茂 青皮（去白） 陈皮（去瓤） 干姜（炮） 良姜（锉） 吴茱萸（汤洗） 木香各一两

【用法】上为细末，水煮面糊和丸，如梧桐子大。每服六七十丸，食后生姜汤送下。

【功用】常服消痞快气，进美饮食。

【主治】脾胃不和，不思饮食，心腹满闷，腹胁刺痛，呕吐痰水，噫醋吞酸，饮食迟化，或逆气上冲，或中满虚痞，胸膈不利。

14273 温补鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）四两 人参 天雄（炮裂，去皮脐） 五加皮（锉） 五味子 牛膝（酒浸，切，焙） 防风（去叉） 远志（去心） 石斛（去根） 山芋 狗脊（去毛）各一两 肉苁蓉（去皱皮，酒浸，切、焙） 熟干地黄（焙）各三两 白茯苓（去黑皮） 菟丝子（酒浸，别捣）各一两一分 覆盆子 石龙芮各二两 萆薢 石南 蛇床子（炒，去皮） 白术各三分 巴戟天（去心，酒浸，焙） 天门冬（去心，焙） 杜仲（锉，炒）各

一两半　干姜（炮裂）　桂（去粗皮）　吴茱萸（炒）　附子（炮裂，去皮脐）　细辛（去苗叶）　蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）各三分

【用法】 上除菟丝子外共为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，空心，食前酒送下，一日三次。

【主治】 阳气虚，阴气盛，痹气内寒，如从水中出。

14274　温肾茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】 白茯苓（去黑皮）　干姜（炮）　泽泻各一两　桂（去粗皮）一两半

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，空心、食前、夜卧各一次温服。

【主治】 冷湿风虚，腰重不随，脚膝浮肿。

14275　温肾调气汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】 杜仲四钱　续断三钱　桑寄生五钱　台乌药二钱　破故纸二钱　菟丝子　焦艾各三钱　炒狗脊二钱

【用法】 水煎，温服。

【功用】 温肾安胎。

【主治】 妇女肾虚，妊娠数月，腰酸作胀，少腹疼痛有下坠感，小便多，白带较重，舌正常，苔白，脉沉缓。

14276　温肺止流丹

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 诃子一钱　甘草一钱　桔梗三钱　石首鱼脑骨五钱（煅存性，为末）　荆芥五分　细辛五分　人参五分

【用法】 水煎服。

【主治】 肺气虚寒，鼻流清涕，经年不愈。

14277　温经除湿汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】 冲和补气汤（《东垣试效方》卷九）。

【组成】 黄连一分　柴胡　草豆蔻　神曲（炒）木香各二分　麻黄（不去节）　独活　当归身　黄柏各一分　升麻五分　羌活七分　炙甘草　人参　白术　猪苓　泽泻各一钱　黄耆　橘皮　苍术各二钱　白芍药三钱

【用法】 上锉，如麻豆大，分作二服。用水二盏，煎至一盏。食远服。

【主治】 四肢痿厥无力，沉重疼痛，合眼肢麻，头眩醋心，恶风寒者。

14278　温经益元汤

【方源】《伤寒六书》卷四。

【组成】 熟地黄　人参　白术　黄耆　芍药　甘草　当归　生地　茯苓　陈皮　肉桂　大附子

【用法】 上以水二钟，加生姜三片，大枣一枚，糯米一撮，捶法煎之温服。

【主治】 伤寒汗后大虚，头眩振振欲擗地，肉瞤筋惕；及因发汗太过，卫虚忘阳，汗出不止；或下后痢不止，身疼痛者。

【加减】 如饱闷，加枳壳，去地黄；瘦人去芍药；有热，去附子、肉桂；利不止，加炒白术、升麻，陈壁土，去当归，地黄；呕者，加姜汁制半夏；渴者，加天花粉；汗后恶风寒，属表虚，去附子、肉桂、生地，加桂枝、胶饴。

14279　温经摄血汤

【方源】《傅青主女科》。

【组成】 大熟地一两（九蒸）　白芍一两（酒炒）川芎五钱（酒洗）　白术五钱（土炒）　柴胡五分　五味子三分　肉桂五分（去粗皮，研）　续断一钱

【用法】 水煎服。

【功用】 大补肾肝脾之精血，兼散寒解郁。

【主治】 妇女经水后期，经来量多者。

【加减】 倘元气不足，加人参一二钱。

14280　温胃化痰丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】 半夏三两　橘皮（去白）　干姜（炮）白术各二两

【用法】 上为细末，生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温生姜汤送下，不拘时候。

【主治】 膈间有寒，脾胃停饮，胸中不快，痰涎不尽。

14281　温脐化湿汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】 白术一两（土炒）　白茯苓三钱　山药五钱（炒）　巴戟肉五钱（盐水浸）　扁豆（炒，捣）三钱　白果十枚（捣碎）　建莲子三十枚（不去心）

【用法】 水煎，经来前十日服之。

【主治】 下焦寒湿相争，经水将来三五日前，脐下作痛，状如刀割，或寒热交作，所下如黑豆汁者。

【方论选录】 此方君白术以利腰脐之气，用巴戟、白果以通任脉，扁豆、山药、莲子以卫冲脉。所以寒湿扫除而经水自调。

14282　温脾止泻汤

【方源】《明医指掌》卷十。

【组成】 白术（土炒） 白茯苓各一钱 桂三分 肉果五分 甘草三分

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 寒泻。

14283 温精毓子丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】 人参二两 肉桂一两 五味子一两 菟丝子三两 白术五两 黄耆半斤 当归三两 远志二两 炒枣仁三两 山茱萸三两 鹿茸一对 肉苁蓉三两 破故纸三两 茯神二两 柏子仁一两 砂仁五钱 肉果一两

【用法】 上各为末，炼蜜为丸。每服一两，每日酒送下。

【功用】 温精毓子。

【主治】 男子精寒，阳衰不育。

14284 滑石汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】 滑石（研）四两 冬葵子二两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】 热淋，小便涩痛。

14285 滑石散

【方源】《得效》卷六。

【组成】 寒水石二两 白滑石一两 葵子一合 乱发灰 车前子 木通（去皮节）各一两

【用法】 上为散。水一斗，煮取五升，时时服一升，即利。

【主治】 转胞。胞为热所迫，或忍小便，俱令水气迫于胞，屈辟不得充张，外水应入不得入，内溲应出不得出，小腹急痛，不得小便，小腹胀。

14286 滑石粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】 滑石二两（碎） 粳米二合

【用法】 以水三大盏，煎滑石至二盏，去滓，下米煮粥。温温食之。

【功用】 导利九窍。

【主治】 ①《圣惠》：膈上烦热，多渴。②《仙拈集》：消渴。

14287 滑石粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】 滑石半两（别研） 瞿麦穗一两 粳米三合

【用法】 以水三升，先煎瞿麦，取二升半，滤去渣，将汁入米，煮如常粥，将熟时入盐少许，葱白三小，方入滑石末，煮令稀稠得所。分作三度食之。

【主治】 产后小便不利，淋涩。

14288 滑胎煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 滑胎散《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】 当归三五钱 川芎七分 杜仲二钱 熟地三钱 枳壳七分 山药二钱

【用法】 水二钟，煎八九分，食前温服。临月宜常服数剂，以便易生。

【主治】 胎气。

【加减】 如气虚体弱者，加人参、白术；如便实多滞者，加牛膝一二钱。

14289 滑石代赭汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 百合滑石代赭汤（《千金》卷十）、百合代赭汤（《伤寒全生集》卷四）、百合滑赭汤（《医学入门》卷四）。

【组成】 百合七枚（擘） 滑石三两（碎，绵裹） 代赭石一枚（如弹丸大，碎，绵裹）

【用法】 先以水洗百合，渍一宿，当日沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓，别以泉水二升煎滑石、代赭，取一升，去滓，后合和，重煎取一升五合，分温服。

【主治】 百合病下之后者。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》赵以德：百合安心定胆，益志五脏，为能补阴也；用滑石、代赭佐以救之，滑石开结利窍，代赭除脉中风痹瘀血。②《金匮要略心典》：百合病不可下而下之，必伤其里。百合味甘平微苦，色白入肺，治邪气，补虚清热；复以滑石、代赭者，盖欲因下药之势，而抑之使下，导之使出，也在下者引而竭之之意也。③《金匮要略释义》：以百合润肺而养阴，滑石清热而利小便，赭石重镇而降逆气。

14290 滑石白鱼散

【方源】《金匮》卷中。

【组成】 滑石二分 乱发二分（烧） 白鱼二分

【用法】 上为散。每服半钱匕，饮下，一日三次。

【主治】 ①《金匮》：小便不利。②《张氏医通》：消渴、小便不利，小腹胀痛有瘀血。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》赵以德：滑石利窍；发乃血之余，能消瘀血，通关便，本草治妇人小便不利，又治妇人无故溺血；白鱼去水气，理血脉，可见皆血剂也。②《金匮要略心典》：《别录》云：白鱼开胃下气，去水气；血余疗转胞，小

使不通；合滑石为滋阴益气，以利其小便者也。

14291 滑石藿香汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】飞滑石三钱 白通草一钱 猪苓二钱 茯苓皮三钱 藿香梗二钱 厚朴二钱 白蔻仁一钱 广皮一钱

【用法】水五杯，煮取二杯，分二次服。

【主治】滞下红白，舌色灰黄，渴不多饮，小溲不利。

14292 滑胎枳壳散

【方源】《本事》卷十引孙真人方。

【异名】枳壳散(《三因》卷十七)、枳壳汤(《卫生家宝·产科备要》卷六)、瘦胎饮(《杏苑》卷八)。

【组成】甘草一两（炙） 商州枳壳二两（去瓤，麸炒黄）

【用法】上为细末。每服二钱，空心、食前百沸汤点下，一日三次。凡怀孕六七个月以上即服。

【功用】①《本事》引孙真人方：令儿易生。②《三因》瘦胎易产。

【方论】《本事方释义》，枳壳气味苦寒，入足太阴，甘草气味甘平，入足太阴，通行十二经络，缓诸药之性，凡妇人肥胖者，怀孕六月以后，常宜服之，庶不致于难产也。

14293 滑翳决明丸

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】石决明一两 车前子一两 五味子半两 细辛半两 大黄一两 茯苓一两 知母一两 茺蔚子一两 黑参一两 防风一两 黄芩一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，食前茶清送下。

【功用】下利实热。

【主治】滑翳内障。瞳心内一点如水银银珠子之状，微含黄色，不痒不疼，无泪而遮蔽瞳神，渐渐失明，后则左右相牵俱损。

14294 滑翳补肝汤

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】茯苓一钱 桔梗一钱 茺蔚子二钱 黄芩一钱 防风二钱 川芎一钱 知母一钱 黑参一钱 当归身二钱 人参一钱

【用法】上为粗末。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【功用】清散虚热。

【主治】因肝风冲上，脑脂流下所致滑翳内障。瞳心内一点如水银珠子之状，微含黄色，不痒不疼，无泪而遮蔽瞳神，渐渐失明，后则左右相牵俱损。

14295 滋血汤

【方源】《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。

【组成】马鞭草 荆芥穗各四两 牡丹皮一两 枳壳（去瓤，麸炒） 赤芍药 肉桂（去粗皮） 当归（去苗，炒） 川芎各二两

【用法】上为粗末。每服四钱，乌梅一个，水二盏，煎至一盏，去滓，食前空心日四五服。服至半月或一月，经脉自通。

【功用】滋养通利。

【主治】妇人血热气虚，经候涩滞不通，致使血聚，肢体麻木，肌热生疮，浑身痛倦，将成劳瘵。

14296 滋血汤

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】人参 白茯苓（去皮） 川芎 当归 白芍药 干山药 黄耆 熟干地黄各一两

【用法】上为粗末，用马尾罗子罗。每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【功用】益气养血，调进饮食。

【主治】妇人皮聚毛落，心肺俱损，血脉虚弱，月水过期。

14297 滋阴汤

【方源】《会约》卷九。

【组成】熟地二钱 山药一钱五分 麦冬（去心，微炒）八分 当归（酒洗，去尾）一钱三分 白芍（酒炒）一钱 甘草（炙）六分 阿胶（蛤粉炒）一钱 茯苓一钱 杜仲（淡盐水炒）一钱 丹参一钱三分

【用法】水煎，早、晚服。

【主治】肝肾虚弱，不时失血，背痛咽干，咳嗽便短，倦怠遗精。

【加减】咽干而五心热者，加元参一钱二分；骨蒸多汗者，加地骨皮一钱三分；血热妄动者，加生地一钱五分，青蒿一钱；阴虚不宁者，加女贞子一钱五分；咳嗽有痰者，加款冬花一钱，川贝母（微炒，研末）一钱；血来盛者，童便一杯，藕节汁或丝茅根汁合服。服之而顺，可以多服，但中时必须以温脾汤以佐之。

14298 滋阴煎

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】熟地 生地各三钱 丹皮一钱 山萸肉二钱 麦冬一钱半（去心） 知母五分（盐水炒） 黄柏三分（盐水炒）

【用法】竹叶、灯心为引，水煎服。

【功用】滋阴凉血。

【主治】 虚热火盛，咳嗽吐沫，牙龈肿痛，饮食不便。

14299 滋肾丸

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】 当归 熟地 枸杞 白术 白芍 白茯苓 牛膝 胆草 覆盆子 肉苁蓉 川芎 玄参各一两 菟丝子一两半（酒煮） 苍术（米泔水浸） 防己 厚朴 远志 黄柏 知母 青葙子 石决明 蒺藜各七钱 香附 蒙花 磁石（煅，醋淬） 砂仁各五钱 甘草四钱 人参三钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，盐汤或酒下。

【主治】 乌风内障。不痒不痛，其瞳仁不开大，渐渐昏沉，又无翳障，是由气滞使然。

14300 滋肾散

【方源】《回春》卷四。

【组成】 川萆薢 麦门冬（去心） 远志（去心） 黄柏（酒炒） 菟丝子（酒炒） 五味子（酒炒）各等分

【用法】 上锉一剂。竹叶三片，灯草一团，水煎，空心服。

【主治】 白浊初起，或半月者。

14301 滋养丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】 肉苁蓉（酒浸） 山茱萸（去核） 柏子仁（炒） 当归（去芦，酒浸） 酸枣仁（炒） 干木瓜 鹿茸（燎去毛，酥炙） 白茯苓（去皮）各一两 附子半两（炮，去皮脐）

【用法】 上为细末，用生地黄自然汁熬成膏，搜和为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心、食前用猪腰子汤任下。

【主治】 妇人真血损惫，经络干枯，精髓既亏，肌肉瘦悴，百节倦疼。

14302 滋润汤

【方源】《证治汇补》卷一。

【组成】 当归二钱 杏仁一钱半 桃仁 橘红 枳壳 厚朴各一钱 苏子一钱 牛膝一钱半

【用法】 水煎，调白蜜三匙服。

【主治】 中脘便躁，人虚血少，不任下药者。

14303 滋膝饮

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生箭耆五钱 大生地一两 生怀山药一两 净萸肉五钱 生猪胰子三钱（切碎）

【用法】 上五味，将前四味煎汤，送服猪胰子一半，至煎滓时，再送服余一半。若遇中上二焦积有实热，脉象洪实者，可先服白虎加人参汤数剂，将实热消去强半，再服此汤。

【主治】 消渴。

14304 滋燥饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】 天冬 麦冬 生地 花粉 白芍 秦艽

【用法】 加蜜，童便服。

【主治】 肺燥。

14305 滋水开阴汤

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】 沙参二钱 知母 贝母各一钱 甘草 石菖蒲各三分 苏子 陈皮 升麻各七分 诃子肉五分 生姜一片 红枣二枚

【用法】 水煎服。

【主治】 未成痨瘵，遽然声哑，有痰嗽者。

14306 滋水清肝饮

【方源】《西塘感症》卷上。

【组成】 熟地 山药 萸肉 丹皮 茯苓 泽泻 柴胡 白芍 山栀 枣仁 归身

【主治】 火燥生风，发热，热甚而胁痛，头面手足似觉肿起者。

【临证举例】 胃痛 《东庄医案》：吴维师内患胃脘痛，叫号几绝，体中忽热忽止，觉有气逆左胁上，呕吐酸水，饮食俱出。或疑停滞，或疑感邪，或疑寒凝，或疑痰积。予脉之弦数，重按则濡，盖火郁肝血燥耳。与本方顿安。唯胃口犹觉劣劣，用加味归脾汤及滋肝补肾丸而愈。

14307 滋任益阴煎

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 炙龟版四钱（杵） 春砂仁三分（拌捣大熟地四钱） 猪脊髓一条（洗切） 生川柏六分（蜜炙） 白知母二钱（盐水炒） 炙甘草六分 白果十粒（盐炒）

【功用】 清肝滋任。

【主治】 肝阳下逼任脉，男子遗精，妇女带多，以及胎漏小产等症。

【方论选录】 任阴不固，冲阳不潜，故以龟版滋潜肝阳，熟地滋养任阴为君；臣以知、柏，直清肝肾，治冲任之源以封髓；佐以脊髓、炙草填髓和中；使以白果敛精止带。此为清肝滋任，封固精髓之良方。

14308 滋血百补丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】 地黄半斤（酒蒸） 菟丝半斤（酒浸） 当归（酒浸） 杜仲（酒炒）各四两 知母（酒炒）

黄柏（酒炒）各二两　沉香一两

【用法】 上为末，酒糊为丸服。

【功用】 ①《丹溪心法》：补损。②《东医宝鉴·杂病篇》：补血气，滋阴。

【备考】《东医宝鉴·杂病篇》本方用法：上为末，酒糊和丸，如梧桐子大。每服七十丸，盐汤送下。

14309　滋血润肠汤

【方源】《准绳·类方》卷三引《医学统旨》。

【组成】 当归（酒洗）三钱　芍药（煨）　生地黄各一钱半　红花（酒洗）　桃仁（去皮尖，炒）　大黄（酒煨）　枳壳（麸炒）各一钱

【用法】 上为末，以水一钟半，煎至七分，入韭菜汁半酒盏，食前服。

【主治】 血枯及死血在膈，饮食不下，大便燥结。

14310　滋阴八味丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十一。

【组成】 熟地黄八两（清水煮，捣烂入药）　山茱萸四两（去核，酒拌蒸，晒干炒）　牡丹皮三两（焙）　怀山药四两（炒黄）　茯苓三两（人乳拌透，晒干焙）　泽泻二两（淡盐水拌炒）　麦门冬三两（炒）　五味子一两（每个铜刀切成二片，蜜酒拌蒸，晒干焙）　肉桂（临磨刮去粗皮）一两（不见火）　制附子一两（切片焙）

【用法】 上为末，用熟地捣烂入药，加炼蜜杵好为丸。每服四钱，早晨空心送下。如肺气不足者，生脉散送服；有浮火未归源者，淡盐汤送服；如偏于阴虚者，独参汤送服，或白汤送服。

【主治】 劳瘵。

【加减】 如肾家偏于气分不足者，去麦冬，五味，加牛膝三两，杜仲三两（俱用盐、酒拌炒）。

14311　滋阴八味煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 知柏地黄汤（《金鉴》卷五十三）、滋阴八味汤（《证因方论集要》卷四）、知柏六味汤（《家庭治病新书》）。

【组成】 山药四两　丹皮三两　白茯苓三两　山茱萸肉四两　泽泻三两　黄柏（盐水炒）三两　熟地黄八两（蒸捣）　知母（盐水炒）三两

【用法】 水煎服。

【主治】 肝肾阴虚，虚火上炎，头昏目眩，耳鸣耳聋，喉痹，喘急；或阴虚火旺，下焦湿热而成之癃闭，尿频急痛，带下，阴痒，腰痠膝软，舌质红，尺脉旺。

①《景岳全书》：阴虚火盛，下焦湿热等证。②《金鉴》：肾虚火来烁金而喘急者。③《证因方论集要》：阴虚火动，骨痿髓枯，喉痹而尺脉旺者。

【临证举例】 ①尿潴留　《湖北中医杂志》（1985；3:27）：用本方去山茱萸，加苡仁米治疗4例尿潴留，其中脑血管意外后遗症，截瘫继发泌尿系感染各1例，前列腺肥大2例。曾用多种方法治疗无效，服本方5剂即愈，随访1～4年未复发。②耳痈　《陕西中医函授》（1988；2:40）：用本方加蚤休10克，水煎服，一日一剂。共治疗小儿顽固性耳痈14例。结果痊愈11例，有效2例，无效1例。

14312　滋阴八物汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 川芎　当归　赤芍　生地　牡丹皮　天花粉　甘草各一钱　泽泻五分

【用法】 上加水二钟，灯心二十根，煎八分，食前服。

【主治】 悬痈初起，状如莲子，红赤渐肿，悠悠作痛者。

【加减】 便秘者，加大黄一钱（蜜炒）。

14313　滋阴九宝饮

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 川芎　当归　白芍　生地　黄连　天花粉　知母　黄柏　大黄（蜜水拌炒）二钱

【用法】 上以水二钟，煎八分，空心服。

【主治】 悬痈。厚味膏粱，蕴热结肿，小水涩滞，大便秘结，内热口干，烦渴饮冷，六脉沉实有力者。

14314　滋阴内托散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 当归　川芎　白芍　熟地　黄耆各一钱半　皂角针　泽泻　穿山甲各五分

【用法】 上以水二钟，煎八分，食前服。

【主治】 囊痈已成，肿痛发热。

14315　滋阴平肝汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】 大熟地八钱　生地四钱　寸冬三钱　知母三钱　木贼三钱　蒺藜三钱（炒）　石决明五钱　栀子三钱　黄芩三钱　云苓三钱　胆草三钱　羚羊角五分　甘草一钱　车前子三钱（炒，外包）

【用法】 水煎服。

【主治】 枣花障症（角膜点状浸润）。风轮花翳四起，状如枣花，两眼酸涩，头疼流泪。

【临证举例】 枣花障症　曹州许某某，男。于

1937年秋，忽觉头疼目赤，瘦涩羞明，经他医治疗月余未效。按其脉，少阴沉细，厥阴虚数。乃肾水不足，肝木失养，虚火时常上冲，以致头疼流泪风轮生翳，初起白膜如米，久则渐大，黑珠尚露。先将睛明、四白、瞳子髎轮刺，内服滋阴平肝汤，连服十余剂，白膜略退，瞳孔始露。

14316 滋阴生光散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】大熟地八钱 五味子二钱 覆盆子三钱 生地五钱 知母四钱 黄柏三钱 车前子三钱（外包） 冬瓜子五钱 枸杞子四钱 甘草一钱 玄精石一钱半

【用法】水煎服。

【主治】神水将枯症（结膜干燥症）。两眼黑白尚分，气轮有皱襞，不红不疼，风轮灰白弥漫，惟水轮略带凹陷，眼泪不能润其表面，甚者无眵泪。

【临证举例】神水将枯症 叶某某，男，大名县人。壮年二目光彩；年近花甲，渐觉二目昏花。诊其脉，左尺沉细，惟左关虚数。是知肾水不足，肝木失养，虚火上冲，而水轮之神膏渐渐消耗而干枯。先服滋阴生光散，连服十余剂，月余后两目生津，又服杞菊地黄丸以巩固疗效。

14317 滋阴宁神汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地 人参 茯神 白术 远志各一钱 酸枣仁 甘草各五分 黄连（酒炒）四分

【用法】姜煎温服。

【主治】不时晕倒，搐搦痰壅。

【加减】有痰，加南星一钱。

14318 滋阴地黄丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】熟地黄（姜汁浸、焙）四两 山药一两 白茯苓（去皮） 牡丹皮（去皮） 泽泻（去毛）各一两半 天门冬（去心） 生地（酒洗） 麦门冬（去心） 知母（酒炒，去毛） 贝母（去心） 当归（酒洗） 山茱萸（酒蒸，去核） 香附米（童便浸、炒）各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心盐汤送下；痰吐，淡姜汤送下。

【主治】妇人经水不调，或不通，虚劳吐血、衄血、咳血、便血，发热咳嗽，盗汗痰喘，一切虚损瘦怯之病。

14319 滋阴地黄丸

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】熟地 山药 山萸 五味子 麦冬 当归 菊花 枸杞 肉苁蓉 巴戟各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心白滚汤下。

【主治】阴虚火燥，唇裂如茧。

14320 滋阴地黄汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】山药 山茱萸（去核） 当归（酒炒） 白芍（煨） 川芎各八分 牡丹皮 远志（去心） 白茯苓 黄柏（酒炒） 石菖蒲 知母（酒炒） 泽泻各六分 熟地黄一钱六分

【用法】上锉一剂。水煎，空心服。如作丸，用炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心盐汤送下，酒亦可。

【主治】色欲动相火，右耳聋，及大病后耳聋。

14321 滋阴百补丸

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】香附子一斤（炒去毛，分四制：酒浸四两，盐水浸四两，醋浸四两，童便浸四两，俱炒，焙干） 益母草半斤（端午日采去土） 当归六两（酒洗） 川芎四两 熟地黄四两（酒洗） 芍药三两（炒） 白术四两 人参 茯苓 玄胡索（炒）各二两 甘草（炙）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心缩砂汤或醋汤或酒或滚水任下。

【功用】《济阴纲目》：理气补虚，调经种子。

【主治】妇人劳伤，血气不足，阴阳不和，乍寒乍热，心腹疼痛，不思饮食，尪羸乏力。

14322 滋阴百补丸

【方源】年氏《集验良方》卷二。

【组成】鱼鳔一斤（蛤粉炒成珠，极焦为度） 菟丝子（酒煮透，晒干） 沙苑蒺藜（洗净，焙） 枸杞子（酒拌，焙） 肉苁蓉（酒煮透，晒干） 女贞子（酒浸） 覆盆子（酒浸，去底，焙） 锁阳（酒浸） 知母（酒浸） 麦门（去心） 远志肉（甘草水泡，去骨） 当归身（酒洗） 牛膝（酒浸） 柏子仁（去油） 枣仁（去壳，炒黑） 巴戟（酒浸去骨，焙） 莲须 芡实（去壳） 丹皮（酒浸，炒） 山萸肉（酒浸蒸，去核） 白茯苓各四两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心白汤送下。

【功用】《饲鹤亭集方》：养心神，清诸热，调和血气，疏肝明目。

【主治】①年氏《集验良方》：一切阴虚、肾水不足之证。②《饲鹤亭集方》：阴亏热炽，咳嗽，

眩晕。

14323 滋阴安神汤

【方源】《类证治裁》卷四。

【组成】熟地 白芍 当归 川芎 人参 白术 茯神 远志 南星各一钱 枣仁 甘草各五分 黄连四分

【功用】养阴。

【主治】①《类证治裁》：癫症，阴亏晕仆者。②《济阳纲目》：血气两虚，不时怔忡眩晕。

【备考】《济阳纲目》本方用法：上作一服。加生姜三片，水煎服。

14324 滋阴抑火汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】当归 生地 荆芥 防风 黄柏 知母 丹皮 甘草 灯心 白蒺藜

【主治】牙龈肿痛，头面不肿。

【加减】火甚，加丹参。

14325 滋阴补心汤

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】熟地三钱 当归 官桂 麦冬 生地 杏仁各一钱 白芍二钱五分 甘草 茯神各一钱 小麦一撮 大枣三枚

【主治】手少阴心经素禀原弱，日间劳心伤神，夜或房欲损精，精气怯而不能养神，以致火乘心经，患手心尾尻火热，或往或来，心跳不静，睡卧不安，惊惧不宁，睡至子时则醒，至天明反倦卧，舌心焦燥，两手小指有时忽热如电，时有时无，口鼻出入呼吸唯觉蒸热，干燥若渴，无焦腐之气，呻吟之声，但筋骨蒸热，无游行之状者。

14326 滋阴补肾丸

【方源】《准绳·伤寒》卷七。

【组成】熟地黄（酒蒸） 生地黄（酒浸） 白术各二两 人参 麦门冬（去心） 五味子 当归（酒浸） 白芍药（酒炒） 川芎 黄耆（盐水炙） 山药 蛤粉（另研极细） 茯神（去皮木） 砂仁各一两 知母（炒）一两半 黄柏（炒）二两

【用法】上为细末，炼蜜和成于石臼内杵千余下，丸如梧桐子大。每服五十丸，空心淡盐汤送下。

【功用】滋肾水，制虚火。

【主治】病后阴虚，精血不足，四肢少力，心神不宁，夜梦遗精，或虚热盗汗，饮食进少，不为肌肉，身体羸弱，面色青黄而无血色。

14327 滋阴补肾丸

【方源】《医林绳墨大全》卷四。

【组成】黄柏 知母各二两 熟地三两 归身二两 牛膝 茯苓 泽泻各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，白汤送下。

【功用】抑阳补肾。

【主治】手足有汗，遇天寒则汗多，阳盛其阴者。

14328 滋阴补髓汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】生地五钱 龟版八钱 黄柏一钱（盐水炒） 知母一钱（盐水炒） 虎胫骨一钱五分（炙） 枸杞三钱 当归二钱 党参四钱 茯苓二钱 白术一钱 金毛脊一钱五分 川断二钱 牛膝二钱

【用法】猪脊髓一条同煎。

【主治】骨痿。因远行劳倦则伤骨，逢大热而渴，或外感之热，或内蕴之热，皆消阴耗髓，故骨枯面痿，腰脊不举，足不任身。

14329 滋阴明目汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】大熟地五钱 知母三钱 黄柏二钱 当归三钱 女贞子三钱 车前子三钱（炒） 菟丝子四钱 石斛三钱 蒺藜三钱（炒） 菊花三钱 楮实子三钱 覆盆子三钱 青葙子三钱 枸杞三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】干涩昏花症（视神经调节衰弱）。两眼不红不疼，干涩昏花，瞳孔无异常人。

【临证举例】干涩昏花症 齐河骆某某，因素好看书，几年来视力不健，遂渐渐两目干涩，视物昏花。按其脉，他脉沉细无力，惟左关略带虚数。知年迈气衰，多伤于肺，肺伤肾亏，而肝胆之火乘虚上攻头目，以致干涩昏花难愈。不宜针刺，刺伤荣卫，更难治愈。先服本方，多加补肾之品，以培其本。隔年知骆某盲疾痊愈。

14330 滋阴固下汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生山药一两半 怀熟地一两半 野台参八钱 滑石五钱 生杭芍五钱 甘草二钱 酸石榴一个（连皮捣烂，若无，可用牡蛎煅研一两代之）

【用法】上药用水五钟，先煎酸石榴十余沸，去滓再入诸药，煎汤两钟，分二次温饮下。

【主治】温病外感之火已消，渴与泻仍未全愈，或因服开破之药伤其气分，致滑泻不止，其人或兼喘逆，或兼咳嗽，或自汗，或心中怔忡者。

【加减】汗多者，加山萸肉（去净核）六钱。

14331 滋阴定眩汤

【方源】《千家妙方》引刘强方。

【组成】珍珠母30克 菊花10克 沙参30克 白芍24克 枸杞15克 山茱萸15克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】滋补肝肾，平肝定眩。

【主治】肝肾阴虚，肝阳上亢，髓海不足，美尼尔氏综合征或高血压病。

【临证举例】李某某，女，49岁。头目眩晕，时作时止，且发作时伴耳鸣，呕吐，多梦，倦怠，口干。病已二年余，近日来又发作，症状较前为重。经临床诊断为美尼尔氏综合征，投以滋阴定眩汤，服药十余剂，其病获愈。

14332 滋阴降火丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】人参一两 生地黄二两 熟地黄二两 天冬二两（去心） 牡蛎（煅）一两 知母一两五钱 黄柏二两（蜜炒） 草薢一两 麦冬（去心）二两

【用法】上以人参、黄柏、草薢、牡蛎粉为末，余药俱洗净去心，以水酒洗净，捣膏蜜丸，如梧桐子大。每服八十丸，白汤送下。

【主治】三消。用心过度，水火不交，上渴下浊。

14333 滋阴降火汤

【方源】《医便》卷二。

【组成】当归一钱 川芎五分 白芍药（薄荷汁炒） 黄芩各七分 生地黄（姜汁炒） 黄柏（蜜水炒） 知母（酒炒）各八分 柴胡七分 熟地黄八分 麦冬八分

【用法】上用生姜一片，大枣一枚，水煎服。别以附子为末，唾津调贴涌泉穴。

【主治】阴虚火动，起于九泉。

【加减】气虚，加人参，黄耆各八分；咳嗽加阿胶，杏仁各七分，五味子三分；咯吐衄血，加牡丹皮八分，藕节自然汁三匙，犀角末五分。

【备考】《审视瑶函》有甘草梢四分。

14334 滋阴降火汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】当归 生地 白芍 白术各一钱 麦门冬 甘草各五分 知母 黄柏 远志 陈皮 川芎各六分

【用法】加生姜，水煎，温服。

【功用】养血降火。

【主治】潮咳汗血，遗精无泄者。

【加减】如有痰，加瓜蒌仁、贝母；咳嗽，加五味子、阿胶；梦遗，加芡实，石莲肉；有热，加秦艽、地骨皮；吐血，咯血，加茜草根、藕汁、玄参；气虚血少，加参、耆；久病者，去川芎。

14335 滋阴降火汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归（酒洗）一钱二分 白芍（酒洗）二钱三分 生地黄八分 熟地黄（姜汁炒） 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 白术（去芦）各一钱 陈皮七分 黄柏（去皮，蜜水炒） 知母 甘草（炙）各五分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，大枣一枚，水煎，临服入竹沥、童便、姜汁少许同服。

【主治】阴虚火动，发热咳嗽，吐痰喘急，盗汗口干。

【加减】骨蒸劳热者，加地骨皮、柴胡；如服药数剂不退，加炒黑干姜三分；盗汗不止者，加黄耆、炒酸枣仁；痰火咳嗽，气急生痰，加桑白皮、紫菀、片芩、竹沥；咳嗽痰中带血者，加片芩、牡丹皮、阿胶、栀子、紫菀、犀角、竹沥；干咳无痰，及喉痛生疮声哑者，加片芩、瓜蒌仁、贝母、五味子、杏仁、桑白皮、紫菀、栀子；咳嗽痰多，加贝母，款冬花、桑白皮；喉痛生疮，声音不清，或咽干燥，用山豆根磨水噙之，再用吹喉散，噙化丸；痰火作热，烦躁不安，气随火升，并痰火怔忡嘈杂，加酸枣仁、黄芩、炒黄连、竹茹、辰砂、竹沥；痰火惊惕同治；血虚腰痛，加牛膝、杜仲；血虚脚腿枯细，无力痿弱，加黄耆、牛膝、防己、杜仲，去天门冬；梦遗泄精者，加山药、牡蛎、杜仲、故纸、牛膝，去天门冬；小便淋浊，加车前、瞿麦、草薢、萹蓄、牛膝、山栀，去芍药；阴虚火动，小腹痛者，加茴香、木香少许，去麦门冬；阴虚火盛，足常热者，加山栀、牛膝，去麦门冬。

【备考】此方与六味地黄丸相兼服之，大补虚劳，神效。

14336 滋阴降火汤

【方源】年氏《集验良方》卷三。

【组成】百部三钱 生地 熟地 天冬 麦冬 知母 贝母 白术（炒） 白芍（酒炒） 白茯苓 黄耆（蜜炒） 地骨皮各一钱半

【用法】水煎服。

【主治】阴虚火动，发热咳嗽，吐痰喘急，盗汗口干。

【加减】骨蒸夜热，加鳖甲三钱；痰中带血，加真阿胶三钱，倍加熟地黄；盗汗不止，加炒枣仁二

钱，倍加黄膏；咽喉痒或痛，加桔梗、桑白皮，倍加贝母；咳嗽痰多喘急，加人参、沙参各二钱；遗精，加山药、芡实各五钱，牛膝二钱；小便淋闭，加车前子、萆薢各二钱；大便不实，加炒山药、扁豆各五钱。

14337 滋阴降火汤

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】 大补阴丸加麦冬 天冬 当归 白芍 炙草 缩砂

【主治】 阴虚火旺无制，妄行伤金，肺痿咳嗽。

【加减】 咳甚，加百合、五味子；盗汗，加地骨皮；咯血，加郁金；痰多，加川贝母；气虚，加人参、黄耆。

14338 滋阴养心丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 熟地二两（酒洗） 山药二两 归身一两五钱 茯神（去木）二两 枸杞子二两 牛膝二两 山萸肉一两 柏子仁一两 杜仲二两（炒） 远志一两 牡丹皮一两 辰砂三分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服七十丸，莲子汤送下。

【主治】 心肾不足，气血两虚，人倦气短。

14339 滋阴养荣汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】 当归二钱 人参 生地黄各一钱半 麦门冬 芍药 知母 黄柏各一钱 甘草四分 五味子十四粒

【用法】 水煎，温服。

【主治】 消渴。汗下过多，内亡津液，或病后水亏火炎，口燥咽干。

14340 滋阴退火汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】 熟地三五钱 生地 白芍 麦冬各二钱 女贞子一钱半 甘草七分 知母 地骨皮各一钱 黄芩 生石膏各二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 水亏挟火，脉浮大无力，躁扰如狂者。

14341 滋阴除湿丸

【方源】《外科集腋》卷四。

【组成】 熟地八两 丹皮 白茯苓 泽泻各三两 山萸肉 淮山药各四两 黄柏一两 芦荟五钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。每服三钱，白汤送下。

【主治】 八角虱（形如花蜘蛛）叮阴毛之上，发内亦生，由肝肾浊气不洁而生，更有玉茎之根痒甚，以沸汤沃之，稍止而复作，有三四窍黄水淋漓者。

14342 滋阴除湿汤

【方源】《朱仁康临床经验集》

【组成】 生地 30 克 元参 12 克 当归 12 克 丹参 15 克 茯苓 9 克 泽泻 9 克 白鲜皮 9 克 蛇床子 9 克

【功用】 滋阴养血，除湿止痒。

【主治】 亚急性湿疹，慢性阴囊湿疹，天疱疮等反复不愈，日久伤阴耗血，舌淡苔净或光者。

【方论选录】 方中生地、元参滋阴清热，当归、丹参养血和营，茯苓、泽泻除湿而不伤阴，白鲜皮、蛇床子除湿止痒。

14343 滋阴健脾丸

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】 人参二两 麦冬三两 五味一两 白术三两 白茯苓二两 甘草一两 山药二两 石斛一两 陈皮一两 山楂三两

【主治】 中宫有火，不能化物。

14344 滋阴健脾汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】 当归（酒洗）一钱 川芎五分 白芍（酒炒）八分 人参七分 白术一钱五分 生地（酒洗）八分 白茯苓（去皮） 陈皮（盐水洗，去白）各一钱 半夏（姜制） 甘草（炙）四分 麦冬（去心） 远志（去心） 白茯神（去皮木）各七分

【用法】 上锉一剂。加生姜、大枣，水煎，早、晚服。

【主治】 气血虚损，有痰作眩晕。

14345 滋阴清化丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】 熟地 生地 天冬 麦冬 当归 龟甲 阿胶 白芍 茯苓 山药 贝母 花粉 甘草 五味

【用法】 上为细末，炼蜜为丸。含化。

【功用】 润肺补脾。

【主治】 虚劳。阴虚火动，内热烁金而损肺，多服寒凉而伤脾者。

【备考】 原书本方治上症，加白术、建莲。

14346 滋阴清火汤

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】 怀熟地黄一钱五分 山茱萸（酒蒸去核）一钱 白茯苓（去皮）一钱 山药一钱 泽泻一钱 桔梗一钱 玄参一钱 牡丹皮一钱 黄柏

（蜜水炒）一钱　天门冬（去心）一钱　麦门冬（去心）一钱　甘草一钱

【用法】　上锉一剂。水煎温服。外用硼砂一味，噙化咽下。

【功用】　降痰消毒。

【主治】　喉痹肿痛，声哑不出，饮食不下，阴虚，相火上炎，咳嗽痰喘，潮热虚劳。

14347　滋阴清火汤

【方源】《喉科家训》卷二。

【组成】　大生地　粉丹皮　焦山栀　乌元参　奎白芍　女贞子　玉桔梗　南薄荷　云茯苓　生甘草

【用法】　水煎服。

【主治】　喉痹。因肾虚火旺，升腾上窍，上腭及扁桃腺内外粘膜红白细点，平坦无刺，声不哑，不咳嗽，两尺脉虚者。

【加减】　尺脉旺，加知母、黄柏（俱宜盐水炒）；男加龟版，女加鳖甲。

14348　滋阴清火散

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】　当归二钱　生地黄三钱　熟地黄三钱　黄柏二钱　知母二钱　黄芩三钱　黄连八分　木通三钱　桑白皮三钱

【用法】　上锉。上煎，空心温服。

【主治】　小便淋沥疼痛。

14349　滋阴清肺汤

【方源】《喉科家训》卷四。

【组成】　鲜生地　鲜金钗　京元参　剖麦冬　霜桑叶　川尖贝　湖丹皮　生甘草　枇杷叶　甜梨汁

【用法】　水煎服。

【主治】　疫疠喉症，转机之后，肺胃余热未清，肾阴不足，舌绛而干，喉虽清爽，燥痒无津，脉仍数者。

【临证举例】　白喉　《丁氏医案》：叶女。白喉四天，咽喉左右两关烂腐，蒂丁亦去其半，身热不壮，舌质淡红，中后薄黄，脉象濡数。四日之中，粒米未入。此乃疫疠之邪，熏蒸肺胃，心肝之火内烦，用滋阴清肺汤加川连、通草一剂，咽喉腐烂渐脱，反觉燥痛，此腐烂虽去，新肉未生，仍用原方加花粉，鲜石斛，因未大便，加生川军三钱开水泡，绞汁冲服，得大便甚畅，胃热下行，白喉随愈。

14350　滋阴清膈饮

【方源】《准绳·类方》卷三引《医学统旨》。

【异名】　滋阴清膈散（《证治汇补》）、滋血清肺散（《医略六书》卷二十二）。

【组成】　当归　芍药（煨）　黄柏（盐水炒）　黄连各一钱半　黄芩　山栀　生地黄各一钱　甘草三分

【用法】　上以水二钟，煎七分，入童便、竹沥各半酒盏，食前服。

【主治】　阴火上冲，或胃火太盛，致患反胃，食不入，脉洪数者。

【临证举例】　梅核气　《续名医类案》陈三农：山氏患咽喉噎塞如梅核，时时嗳气，足冷如冰，用散结化痰汤十数剂罔效，细思之，此阴火也。二阴至项而还，阴虚火炎，故嗳气噎塞足冷耳。用滋阴清膈饮数剂，诸证悉愈。

14351　滋肠五仁丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【异名】　五仁丸（《得效》卷六）。

【组成】　桃仁　杏仁各一两（麸炒，去皮尖）　柏子仁半两　松子仁半分　郁李仁一钱（麸炒）　陈橘皮四两（别为末）

【用法】　上共将五仁别研为膏，令与陈橘皮末同研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，食前米饮送下。要看虚实加减。

【主治】　老人及气血不足之人，大肠闭滞，传导艰难。

【备考】　本方去陈皮，改作汤剂，名“五仁汤”（见《杂病源流犀烛》卷十七）。

14352　滋补养荣丸

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《医方集略》。

【组成】　远志　白芍　黄耆　白术各一两半　熟地黄　人参　五味子　川芎　当归　山药各一两　陈皮八钱　白茯苓七钱　生干地黄五钱　山茱萸四钱

【用法】　上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，清米饮送下。

【功用】　专补肝血。

【主治】　虚劳。气血俱不足，精神短少，脾胃虚弱。

14353　滋肾生肝饮

【方源】《校注妇人良方》卷八。

【异名】　生肝饮（《医级》卷八）。

【组成】　山药　山茱萸肉各一两　熟地黄（自制）二钱　泽泻　茯苓　牡丹皮各七分　五味子（杵，炒）五分　柴胡　白术　当归　甘草各三分

【用法】　水煎服。

【主治】　郁怒伤肝脾，血虚气滞，小便淋沥不

利，月经不调，两胁胀闷，小腹作痛，或寒热往来，或胸乳作痛，或咽喉噎塞，或两脚筋挛，或肢节结核，面色青黄不泽，形气日瘦，左关弦洪，右关弦数。

14354 滋肾养心丸

【方源】《活人心统》。

【组成】肉苁蓉 家菊花 枸杞子 生地黄 芍药各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，白汤送下。

【主治】心肾气虚，胖弱血少，虚火上炎，口生疮，服凉药久不愈者。

14355 滋肾通耳汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】黄柏 黄芩 知母（各酒炒） 生地黄 白芍 当归 川芎 柴胡 白芷 香附各等分

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】肾虚耳聋而鸣。

【加减】胸膈不快，加青皮，枳壳少许。

【备考】本方改为丸剂，名"滋肾通耳丸"（见《杂病源流犀烛》卷二十三）。

14356 滋荣收带丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】当归（酒洗） 白芍（酒炒） 苍术（米泔制） 白茯苓（去皮） 黄柏（酒炒） 椿根皮（焙）各一两 白术二两 半夏（姜制）八钱 防风 青皮（醋炒） 升麻各五钱 本香 大甘草（炮）各四钱 川芎（盐汤浸，切）七钱 香附米（盐水浸，炒）六钱

【用法】上为末，酒打糊为丸，如梧桐子大。每服一百二十丸，空心盐汤、米汤，白汤任下。

【主治】崩后气下陷，或白带，小腹胀满痛甚。

14357 滋荣活络汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】川芎一钱半 当归 熟地 人参各二钱 黄耆 茯神 天麻各一钱 炙草 陈皮 荆芥穗 防风 羌活各四分 黄连八分（姜汁炒）

【主治】产后血少，口噤，项强，筋搐，类中风症。

【加减】有痰，加竹沥、姜汁、半夏；渴，加麦冬、葛根；有食，加山楂、砂仁以消肉食，神曲、麦芽以消饭食；大便闭，加肉苁蓉一钱半；汗多，加麻黄根一钱；惊悸，加枣仁一钱。

【备考】《胎产指南》有麦冬、草果，无甘草。《产宝》本方用法：用水二盏，煎至七分，稍热服。

14358 滋荣散坚汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】滋荣散血汤（《嵩崖尊生》卷六）。

【组成】川芎 当归 白芍 熟地 陈皮 茯苓 桔梗 白术 香附各一钱 甘草 海粉 贝母 人参 昆布各五分 升麻 红花各三分

【用法】水二钟，加生姜三片，大枣二枚，煎八分，食远服。

【主治】一切瘰疬，忧抑所伤，气血不足，形体瘦弱，潮热咳嗽，坚硬肿痛，不分新久，但未穿溃者。

【加减】身热，加柴胡、黄芩；自汗盗汗，去升麻，倍人参、黄耆；饮食无味，加藿香、砂仁；食而不化，加山楂、麦芽；胸膈痞闷，加泽泻、木香；咳嗽痰气不清，加杏仁、麦冬；口干作渴，加知母、五味子；睡卧不宁，加黄柏、远志、枣仁；惊悸健忘，加茯神、石菖蒲；有汗恶寒，加薄荷、半夏；无汗恶寒，加茅术、藿香；女人经事不调，加延胡索、牡丹皮；腹胀不宽，加厚朴、大腹皮。

14359 滋筋养血汤

【方源】《古今医鉴》卷十。

【异名】滋血养筋汤（《东医宝鉴·外形篇》卷四）。

【组成】川归一钱 熟地黄一钱五分 白芍药一钱五分 川芎七分半 人参八分 五味子九粒 麦门冬（去心）一钱 黄柏一钱 知母五分 牛膝（酒浸）一钱 杜仲（酒炒）一钱 苍术一钱 薏苡仁一钱 防风六分 羌活三分 甘草三分

【用法】上锉一剂。加姜、枣，煎服。

【主治】血气两虚，双足痿软，不能行动，久卧床褥。

【加减】筋骨痿软，加桂枝三分，陈皮八分；如觉心烦，加黄连六分，酸枣仁（炒）六分，白茯神（去木）一钱。

14360 滋燥养荣汤

【方源】《赤水玄珠》卷二。

【异名】滋燥养营汤（《成方便读》卷三）。

【组成】当归（酒洗）二钱 生地黄 熟地黄 白芍药 秦艽 黄芩各一钱五分 防风一钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】皮肤皴揭，筋燥爪干。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴足厥阴药也。前证为血虚而水涸，当归润燥养血为君。二地滋肾水而补肝，芍药泻肝火而益血为臣。黄芩泻肺

热，能养阴退阳；芄、防散肝风，为风药润剂，又杂芄能养血荣筋，防风乃血药之使；甘草甘平泻火，入润剂则补阴血为佐、使也。

14361 滋荣益气复神汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】人参三钱 黄耆一钱（蜜炙） 白术一钱（土炒） 当归三钱 炙草四分 陈皮四分 五味十粒 川芎一钱 熟地一钱 麦芽一钱

【用法】大枣一枚，水煎服。

【主治】产后发厥，块痛已除者。

【加减】手足冷，加附子五分；汗多，加麻黄根一钱，熟枣仁一钱；妄言妄见，加益智、柏子仁、龙眼肉；大便实，加肉苁蓉二钱。

【备考】《灵验良方汇编》有麦冬、苡仁，无麦芽。

14362 滋荣益气复神汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】黄耆 白术 麦冬 川芎 柏子仁 茯神 益智各一钱 人参 熟地各二钱 陈皮三分 炙草四分 枣仁（十粒）一钱 五味子十粒 莲子八枚 元肉八个

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】产后块痛已止，妄言妄见。

14363 曾青散

【方源】《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。

【组成】曾青四两 蔓荆子（去皮）二两 防风（去苗） 白姜（炮）各一两

【用法】上为细末。每用少许，搐入鼻中。

【主治】一切风热毒气上攻，两眼多生眵泪，怕日羞明，隐涩难开，眼烂赤肿，或痒或痛；及时行暴赤眼，睛昏涩痛。

14364 曾青膏

【方源】《秘传眼科龙木论》卷六。

【组成】曾青 秦皮 细辛 白芷 乳头香 龙脑各一分 黄连五分 诃子 木香各一两

【用法】上为末，研令匀细，以水二碗，浸三日后，煎至一盏，以束绵滤滓后，更入蜜四两，同煎为膏，盛瓷瓶中封之，勿令泄气。用之点眼立效。

【主治】眼黄膜上冲外障。因肾脏风冷，胃家极热，致眼初患之时，疼痛发歇，作时赤涩泪出，渐生黄膜，直露黑睛，难辨人物。

14365 普榆膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】生地榆面一两 普连软膏九两

【用法】混匀，涂敷患处。

【功用】解毒止痒，除湿消炎。

【主治】一度烧、烫伤，亚急性湿疹、皮炎、带状疱疹、神经性皮炎、阴囊湿疹等。

14366 普连软膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【异名】普连膏（《中西医结合皮肤病学》）。

【组成】黄柏面一两 黄芩面一两 凡士林八两

【用法】直接涂于皮损上，或用软膏摊在纱布上，敷于患处，或加入其他药粉作为软膏基质。

【功用】清热除湿，消肿止痛。

【主治】脓疱疮（黄水疮），急性亚急性湿疹（风湿病）、烫烧伤、单纯疱疹（火燎疱）、牛皮癣、红皮症。

14367 普济解疫丹

【方源】《丁甘仁家传珍方集》。

【组成】鲜生地一两八钱（捣汁） 淡豆豉八钱 板蓝根一两 天花粉四钱 金银花一两六钱 红紫草四钱 粪清（即金汁）一两 京玄参七钱 连翘一两 犀角二钱

【用法】诸药生晒为末，切忌火炒，研细，以犀角、地黄汁、粪清，和捣泛丸，切勿加蜜。每服三钱，开水送服，日二服，或用茶代。

【主治】温邪、温热、暑温、湿温，时疫，邪在气分，发热倦怠，胸闷腹胀，肢痠咽肿，斑疹身黄，颐肿口渴，溺赤便闭，吐泻疟痢，淋浊疮疡舌苔淡白，或厚腻，或干黄。

14368 普济消毒饮子

【方源】《东垣试效方》卷九。

【异名】普济消毒散（《温疫论》卷二）。

【组成】黄芩 黄连各半两 人参三钱 橘红（去白） 元参 生甘草各二钱 连翘 牛蒡子 板蓝根 马勃各一钱 白僵蚕（炒）七分 升麻七分 柴胡二钱 桔梗二钱

【用法】上为细末。半用汤调，时时服之；半蜜为丸，噙化之。或加防风、薄荷、川芎、当归身，㕮咀，如麻豆大。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，食后稍热，时时服之。

【功用】《医方论》：清热解毒，祛厉疫之气。

【主治】时毒，大头天行，初觉憎寒体重，次传头面肿盛，目不能开，上喘，咽喉不利，舌干口燥。

【加减】如大便硬，加酒煨大黄一钱或二钱以利之。肿势甚者宜砭刺之。

【方论选录】①《东垣试效方》：用黄芩、黄连味苦寒泻心肺间热以为君；橘红苦辛，玄参苦寒，

生甘草甘寒，泻火补气以为臣；连翘、黏粘子、薄荷叶苦辛平，板蓝根味苦寒，马勃、白僵蚕味苦平，散肿消毒定喘以为佐；新升麻、柴胡苦平，行少阳、阳明二经不得伸；桔梗辛温为舟楫，不令下行。②《成方便读》：大头瘟，其邪客于上焦。故以酒炒芩、连之苦寒，降其上部之热邪；又恐芩、连性降，病有所遗；再以升、柴举之，不使其速下；僵蚕、马勃解毒而消肿；鼠、元、甘、桔利膈以清咽；板蓝根解疫毒以清热；橘红宣肺滞而行痰；连翘、薄荷皆能轻解上焦，消风散热。合之为方，岂不名称其实哉！

【临证举例】 时毒 泰和二年四月，民多疫疠，初觉憎寒体重，次传头面肿盛，目不能开，上喘，咽喉不利，舌下口燥，俗云大头天行，亲戚不相访问，如染之多不救。张县丞姪亦得此病，至五六日医以承气加蓝根下之稍缓，翌日其病如故，下之又缓，终莫能愈，渐至危笃。或曰李明之存心于医，可清治之。遂命诊视。此邪热客于心肺之间，上攻头目，而为肿盛。以承气下之，泻胃中之实热，是诛罚无过，殊不知适其所至为故。遂处此方，服尽愈。

【备考】 本方方名，《医方集解》引作"普济消毒饮"。

14369 善应膏

【方源】《三因》卷十四。

【组成】 白芷 黄耆各一两 甘草二钱 黄蜡二两 黄丹二两半

【用法】 前三味为粗末，春秋用麻油四两半，夏四两，冬五两，熬药紫赤色，绵滤去滓，再入黄蜡黄丹，以柳枝不住手搅，滴水成珠，即止。用如常法。

【功用】 长肌敷瘢。

【主治】 痈疽溃后。

14370 善应膏药

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】 善应膏(《普济方》卷三一四)。

【组成】 黄丹二斤 南乳香（另研） 没药（另研） 当归 木鳖子（生用） 白蔹（生用） 白矾（生用） 官桂三寸 杏仁（生） 白芷各一两 新柳枝一斤

【用法】 上除黄丹、乳香、没药等外，八件用芝麻油五斤，浸一宿，用铁锅内煎令黄色，药不用。次入黄丹锅内，柳条搅令黄色，方可掇下，用柳枝搅，出大烟，入乳、没匀，令冷，倾在瓷盆内，候药硬，用刀子切作块，油纸裹。

【主治】 疮疡痈肿。

14371 寒水散

【方源】《医方类聚》卷二四二引《御药院方》。

【组成】 青黛一钱 大豆三钱（去皮） 马牙消二钱 黄连二钱 黄柏三钱

【用法】 上为细末。每用一钱，蜜少许，冷水调成膏。绯绢作花子，如小钱大，摊药于上，贴太阳穴，病左贴右，病右贴左。

【主治】 肝风暴赤，目睛偏视。

14372 寒冰散

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】 马牙消三两（研，入新竹筒中密封，入地埋四十九日，取出更研）

【用法】 每用一字，同黑豆末少许，以水调如糊，后同药调匀，摊纸花子上，贴太阳穴。及半月，其目必愈。

【主治】 目赤多眵，赪痛。

14373 寒降汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生赭石（轧细）六钱 清半夏三钱 葵仁（炒捣）四钱 生杭芍四钱 竹茹三钱 牛蒡子（炒捣）三钱 粉甘草一钱半

【主治】 吐血、衄血，脉洪滑而长，或上入鱼际，此因热而胃气不降也。

【临证举例】 吐血 一童子，年十四，陡然吐血，一昼夜不止，势甚危急，其父通医学，自设有药房，亦束手无策。时愚应其邻家延请，甫至其村，急求为诊视。其脉洪长，右部尤重按有力，知其胃气因热不降，血随逆气上升也。为拟此汤，一剂而愈，又服一剂，脉亦和平。

14374 寒通汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 滑石一两 生杭芍一两 知母八钱 黄柏八钱

【主治】 下焦蕴蓄实热，膀胱肿胀，溺管闭塞，小便滴沥不通。

【临证举例】 癃闭 一人，年六十余，溺血数日，小便忽然不通，两日之间滴沥全无。病人不能支持，自以手揉挤，流出血水少许，稍较轻松。揉挤数次，疼痛不堪揉挤。彷徨无措，求为诊治。其脉沉而有力，时当仲夏，身覆厚被，犹觉寒凉，知其实热郁于下焦，溺管因热而肿胀不通也。为拟此汤，一剂稍通，又加木通、海金沙各二钱，服两剂全愈。

14375 寒淋汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生山药一两　小茴香（炒捣）二钱　当归三钱　生杭芍二钱　椒目（炒捣）二钱

【主治】寒淋。寒热凝滞，寒多热少之淋，其证喜饮热汤，喜坐暖处，时常欲便，便后益抽引作疼。

14376　寒解汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生石膏（捣细）一两　知母八钱　连翘一钱五分　蝉退（去足土）一钱五分

【主治】周身壮热，心中热而且渴，舌上苔白欲黄，其脉洪滑，或头犹觉疼，周身犹有拘束之意者。

【临证举例】温病　一人，年四十余。为风寒所束不得汗，胸中烦热，又兼喘促。医者治以苏子降气汤，兼散风清火之品，数剂病益进。诊其脉，洪滑而浮，投以寒解汤，须臾上半身即出汗，又须臾，觉药力下行，至下焦及腿亦皆出汗，病若失。

14377　寒六合汤

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤加干姜　附子

【用法】上为粗末。水煎服。

【主治】虚寒脉微，自汗，气难布息，清便自调。

14378　寒水石散

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】寒水石　石膏　黄连　黄柏各一两

【用法】上为末。水调刷患处。

【主治】小儿丹毒游走不定，焮热，赤肿疼痛。

14379　寒水石散

【方源】《外科理例·附方》。

【组成】寒水石　朴消各等分

【用法】上为末。温水调服。

【主治】痔发热作痛。

14380　寒水石粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】寒水石二两（捣碎）　粳米二合　牛蒡根四两（切）

【用法】上以水四大盏，煎至二盏半，去滓，下米煮粥食之。

【主治】心下烦热多渴，恍惚。

14381　寒胀中满分消汤

【方源】《金鉴》卷四十一。

【组成】人参　黄耆　当归　茯苓　厚朴　半夏　吴萸　黄连　干姜　生姜　升麻　柴胡　川乌　麻黄　青皮　黄柏　泽泻　荜澄茄　草豆蔻　益智　木香

【主治】气虚胀病，形气虚少寒者。

14382　道人开障散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】蛇蜕（洗，焙，剪细）　蝉蜕（洗，焙）　黄连（去须）各半两　绿豆一两　甘草二钱（生用）

【用法】上锉细。每服二钱，食后、临卧新水煎服。

【主治】诸障翳。

14383　遂心丹

【方源】《本草纲目》卷十七引《济生》。

【异名】猪心汤（《直指小儿》卷二）、甘遂散（《得效》卷八）、朱砂甘遂丸（《万氏家抄方》卷二）、甘遂丸（《赤水玄珠》卷十四）。

【组成】甘遂二钱

【用法】上为末，用猪心取三管血和药，入猪心内缚定，纸裹煨熟，取末，人辰砂末一钱，分作四丸。每服一丸，将心煎汤调下。大便下恶物为效，不下再服。

【主治】风痰迷心，癫痫，及妇人心风血邪。

14384　强中丸

【方源】《三因》卷十三。

【异名】强中二姜丸（《普济方》卷一六七）。

【组成】高良姜　干姜（炮）　陈皮　青皮各一两　半夏（汤洗去滑）二两

【用法】上为末，用生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，生姜汤送下。

【功用】《普济方》：温脾胃，消寒痰、茶积。

【主治】胃脘虚寒，冷痰留滞，痞塞不通，气不升降，口苦无味，不思饮食，中满气痞者。

14385　强阳神丹

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】熟地一斤　肉桂三两　覆盆子三两　黄耆二斤　巴戟天六两　柏子仁三两（去油）　麦冬三两　当归六两　白术八两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服一两，白滚汤送下。

【主治】阳倒不举。

14386　巽顺丸

【方源】《张氏医通》卷十三。

【异名】乌鸡丸（《类证治裁》卷八）。

【组成】乌骨白丝毛鸡一只（男雌女雄，取嫩长者，溺倒，泡，去毛，竹刀剖胁，出肫肝，去秽，

留内金，并去肠垢、仍入腹内） 乌贼骨（童便浸，晒干为末，微炒黄，取净）四两 茹芦（去梢，酒洗，切片）一两 鲍鱼（切薄片）四两

【用法】 上三味入鸡腹内，用陈酒、童便各二碗，水数碗，砂锅中旋煮旋添，糜烂汁尽，捣烂熔干，骨用酥炙，共为细末，干由药末调糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心白芳水送下。

【主治】 妇人倒经，血溢于上，男子咳嗽吐血，左手关尺脉弦，背上畏寒，有瘀血者。

14387 犀角丸

【方源】《局方》卷一。

【组成】 黄连（去须） 犀角（镑）各十两 人参（去芦）二十两 大黄八十两 黑牵牛一百二十两（炒，别捣取粉六十两）

【用法】 上与牵牛粉合为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，临卧温水送下。

【功用】 除三焦邪热，疏一切风气。

【主治】 风盛痰实，头目昏重，肢节拘急，痰涎壅滞，肠胃燥涩，大小便难。

14388 犀角丸

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】 犀角末半两 赤石脂三两 朴消二两 白僵蚕一两 薄荷叶一两

【用法】 上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，温水送下，不拘时候，一日三次，如觉痰多即减丸数。

【主治】 风痫。日发作有时，扬手掷足，口吐痰涎，不省人事，暗倒屈伸。

【宜忌】 忌油腻物。

14389 犀角丸

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】 犀角 青皮 黑牵牛（半生，半炒） 陈皮各一两 连翘（去心）五钱 新薄荷二斤（捣取汁） 皂角二枚（去子皮弦，泡捶，以布绞取汁一碗）

【用法】 上为细末，用皂角汁，新薄荷汁同熬成膏，和入药末内为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后滚汤送下。

【主治】 诸般瘰疬，兼心火上攻，两目赤涩。

14390 犀角饮

【方源】《医方类聚》卷一六四引《吴氏集验方》。

【组成】 雄黄一分 麝香少许

【用法】 水煎，犀角汁研服。

【主治】 诸毒，或喉闭，邪气恶毒入腹。

14391 犀角散

【方源】《儒门事亲》卷十一

【组成】 黄连 大黄 芍药 犀角 甘草各等分

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《儒门事亲》：骨蒸发热，皮肤枯干，痰唾稠粘，四肢疼痛，面赤唇焦，盗汗烦躁，睡卧不安，或时喘嗽，饮食无味，困弱无力，虚汗黄瘦。②《普济方》：五脏积热。

14392 犀黄丸

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】 西黄丸（《治疗汇要》卷下）。

【组成】 犀黄三分 麝香一钱半 乳香 没药（各去油，研极细末）各一两 黄米饭一两

【用法】 上捣烂为丸，忌火烘，晒干。每服三钱，陈酒送下，患生上部临卧服，下部空心服。

【主治】 乳岩，横痃，瘰疬，痰核，流注，肺痈，小肠痈。

【宜忌】 本丸久服必损胃气，有虚火者勿宜；肺痈万不可用。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典》引作"西黄醒消丸"。

14393 犀角饮子

【方源】《济生》卷五。

【组成】 犀角（镑） 菖蒲 木通 元参 赤芍药 赤小豆（炒） 甘菊花（去枝梗）各一两 甘草（炙）半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 风热上壅，耳内聋闭，焮肿掣痛，脓血流出。

14394 犀连承气汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 犀角一钱 川水连一钱 生锦纹三钱 小枳实一钱半 元明粉二钱 真川朴五分

【功用】 清心通便开闭。

【主治】 伤寒实热而闭，身热口渴，烦躁而动，揭去衣被，扬手掷足，循衣摸床，便闭尿赤，舌质红绛，苔焦黄或黑糙，脉沉实而数。

14395 犀角大青汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷五。

【组成】 大青三分 栀子十枚 犀角屑二钱半 豉一撮

【用法】 分二服，每服水一盏半，煎至八分，去滓服。

【主治】 斑疮出，烦疼。

14396 犀角大黄汤

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】 犀角（镑末一钱，煎好。后入） 大黄（酒炒）一钱二分 牡丹皮 梅仁（去皮尖） 冬瓜仁二钱 薏苡仁 芒消 金银花三钱

【用法】 上㕮咀。水二钟煎，空心服。

【主治】 肠痈。腹内隐隐疼痛，大小便秘涩。

14397 犀角元参汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】 犀角 玄参 甘草 桔梗 升麻 黄芩 黄连 石膏 连翘 黄柏 山栀 薄荷 麝香

【用法】 水煎服。

【主治】 阳毒咽痛。

【加减】 大便闭，加大黄，芒消；若斑出，加大青，以青黛代之亦可。

14398 犀角升麻丸

【方源】《金鉴》卷六十三。

【组成】 犀角一两五钱 升麻一两 羌活一两 防风一两 白附子五钱 白芷五钱 生地黄一两 川芎五钱 红花五钱 黄芩五钱 甘草（生）二钱五分

【用法】 上为细末，合匀，蒸饼为小丸。每服二钱，食远、临卧用茶清送下。

【主治】 雀斑。

14399 犀角升麻汤

【方源】《本事》卷五。

【组成】 上等犀角一两一分 真川升麻一两 防风 羌活各三两 川芎 白附子 白芷 黄芩各半两 甘草一分

【用法】 上为粗末。每服四大钱，水一盏半，煎至八分，去滓，食后、临卧通口服，一日三四次。

【主治】 ①《本事》：鼻额间痛，或麻痹不仁。②《妇人良方》：阳明经热，风热牙痛，或唇颊肿痛，或手足少阳经风热，连耳作痛。

【临证举例】 鼻额痛 王检正希皋，昔患鼻额间痛，或麻痹不仁，如是者数年，忽一日连口唇、颊车、发际皆痛，不可开口，虽言语饮食亦相妨，左额与颊上常如糊急，手触之则痛，此足阳明经络受风毒，传入经络，血凝滞而不行，故有此证。或以排风、小续命、透冰丹之类与之，皆不效，予制此汤赠之，服数日而愈。

14400 犀角地黄汤

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】 犀角（镑） 生地黄 白芍药 黄芩（炒） 牡丹皮 黄连（炒）各一钱

【用法】 水煎服。

【主治】 上焦有热，口舌生疮发热，或血妄行，或吐血，或下血。

【加减】 若因怒而患，加柴胡、山栀。

14401 犀角解毒饮

【方源】《疡医大全》卷三十。

【组成】 防风 荆芥穗 黄芩各一钱 犀角（镑） 甘草各五分 牛蒡子（微炒）四钱

【用法】 水煎，频服。

【主治】 赤游丹。红肿，游走遍体，壮热不安。

14402 犀羚三汁饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 犀角尖一钱 带心连翘二钱 东白薇三钱 皂角刺三分 羚角片一钱半 广郁金三钱（杵） 天竺黄三钱（老式） 粉丹皮一钱半 淡竹沥两瓢 鲜石菖蒲汁两匙 生藕汁二瓢

【用法】 先用犀、羚二角，鲜茅根五十支（去衣），灯心五分，活水芦笋一两，煎汤代水，三汁和匀同冲。临服调入至宝丹四丸和匀化下。

【功用】 开窍透络，豁痰通瘀。

【主治】 邪陷包络，挟痰瘀互结清窍，症必痉厥并发，终日昏睡不醒，或错语呻吟，或独语如见鬼，目白多现红丝，舌虽纯红，兼罩粘涎。

【方论选录】 以犀、羚凉血熄风，至宝芳香开窍为君；臣以带心连翘宣包络之气郁，郁、丹通包络之血郁，白薇专治血厥，竺黄善开痰厥；尤必佐角刺，三汁轻宣辛窜，直达病所，以消痰瘀；使以芦笋、茅根、灯心，轻清透络。庶几痰活瘀散，而包络复其横通四布之常矣，此为开窍透络豁痰通瘀之良方。

14403 犀羚三黄汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 犀角 川连各一钱 羚角 铁粉 桃仁各二钱 鲜生地 丹参 石决明各五钱 琥珀 青黛各五分 西牛黄二分

【功效】 清心泻肝。

【主治】 发狂。面色赤亮，或色青赤不亮，日夜不寐，月余遂发狂言，逾垣上屋，经闭三月，脉搏长大有力，多从心火炽盛，燔胃烧肝，而为狂惑哭詈。

14404 隔纸膏

【方源】《赤水玄珠》卷二十九。

【组成】 当归 白芷 黄连 五倍子 雄黄 没药 海螵蛸 血竭 白及 白蔹 黄柏 厚朴各五

钱 黄丹 乳香二钱半（研） 轻粉一钱

【用法】 上为细末，用清油纸贴药，敷疮上，绢帛缚定；有脓水，解开，刮去不洁，再贴药。如此数次即愈。须先用烧盐汤洗净，片帛拭干，待片时，水气干，然后贴药。

【主治】 内外臁疮。

14405 隔纸膏

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】 龙骨二钱 血竭五分 轻粉五分 冰片一分 阿魏二分 乳香 没药各一钱 麝香一分 黄丹（飞）一两 生芝麻一合（捣末） 香油三两

【用法】 先将丹、油、芝麻熬数沸，再下细药。临取方下冰片、麝香搅匀，用甘草煮油纸，两面扎孔摊。贴之。

【主治】 久远臁疮，顽疮结毒。

14406 隔纸膏

【方源】《疡医大全》卷二十五。

【组成】 无名异（洗净，微炒）一两 龙骨 血竭 乳香 没药 雄黄 牛黄 阿胶 海螵蛸各二钱 赤石脂 郁金 黄柏 黄丹各五钱 轻粉

【用法】 上为细末，香油调，用黑伞纸刺孔，作隔纸膏。先用盐、葱、花椒汤洗净，拭干贴之，三日一换。

【主治】 臁疮。

【备考】 方中轻粉用量原缺。

14407 疏风汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】 荆芥 防风 柴胡 黄芩 升麻 葛根 当归 川芎 木通 生白芍 生地 木贼 蜜蒙 甘草 甘菊 黑小豆

【用法】 水煎服。

【功用】 疏风清热，凉血安胎。

【主治】 妊娠目赤肿痛，甚则痛不可忍，或眵泪羞明，或痒涩起赤障。

【方论选录】 是方荆、防、升、柴、葛、豆疏风清热以散火于上；芩、通、甘草泻火导热以降火于下；菊、蜜、木贼退赤而消肿；四物补血而滋肾，则风热清而胎安矣。

14408 疏风散

【方源】《直指》卷十五。

【组成】 枳壳（制）半两 防风 羌活 独活 槟榔 白芷 威灵仙 蒺藜（炒赤，去刺） 麻仁（炒，另研） 杏仁（汤洗，去皮尖，炒，另研） 甘草（炙）各一两

【用法】 上为散。每服二钱半，加生姜五片，蜜一匙，水一盏半，煎服。

【主治】 风毒秘结。

14409 疏肝饮

【方源】《鲁府禁方》。

【异名】 疏肝散（《寿世保元》卷五）。

【组成】 黄连（吴茱萸煎汁拌炒）二钱 当归 柴胡各一钱半 青皮一钱 桃仁（研如泥）一钱 川芎 白芍（酒炒）各一钱一分 红花五分

【用法】 水煎，食远温服。

【主治】 肝积。左胁下痛，或因怒气所伤，或跌闪所致。

14410 疏凿饮子

【方源】《济生》卷五。

【异名】 疏凿散（《杏苑》卷六）。

【组成】 泽泻 商陆 赤小豆（炒） 羌活（去节） 大腹皮 椒目 木通 秦艽（去芦） 茯苓皮 槟榔各等分

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 水气，通身洪肿，喘呼气急，烦躁多渴，大小便不利，服热药不得者。

【方论选录】 ①《医方集解》：此足太阳手足太阴药也。外而一身尽肿，内而口渴便秘是上下表里俱病也。羌活、秦艽解表疏风，使湿以风胜，邪由汗出，而升之于上；腹皮、苓皮、姜皮、辛散淡渗，所以行水于皮肤；商陆、槟榔、椒目、赤豆，去胀攻坚，所以行水于腹里；木通泻心肺之水，达于小肠，泽泻泻脾肾之水，通于膀胱。上下内外分清其势，亦犹神禹疏江凿河之意也。②《医宗金鉴》：以商陆为君，专行诸水。佐羌活、秦艽、腹皮、苓皮、姜皮行在表之水，从皮肤而散，佐槟榔、赤豆、椒目、泽泻、木通，行在里之水，从二便而出。上下、内外，分消其势，亦犹神禹疏凿江河之意也。

14411 疏气定痛汤

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】 制香附三钱 川楝子三钱 延胡索三钱 五灵脂三钱 没药一钱 枳壳一钱半 木香一钱半 当归三钱 乌药三钱

【功用】 行气活血，化瘀止痛。

【主治】 慢性盆腔炎腰腹疼痛，属于气滞血瘀者。

【方论选录】 方中香附、川楝子、延胡索、五灵脂、没药、乌药行气活血止痛；枳壳、木香理气；当归养血。全方共奏行气活血，化瘀止痛之效。

14412 疏风五苓散

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】防风 苍术（米泔水浸） 肉桂 羌活 猪苓 泽泻 赤茯苓 白术（土炒）

【用法】引用生姜，水煎服。

【主治】阴囊肿大，痒痛坠下。

14413 疏风清肝汤

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】当归尾 赤芍 荆芥穗 防风 川芎 菊花 生地 薄荷各一钱 柴胡 连翘（去心）各一钱五分 金银花二钱 甘草（生）五分

【用法】加灯心五十寸，水煎，食后服。

【主治】漏睛疮。

14414 疏风清热饮

【方源】《医宗金鉴》卷七十四。

【组成】苦参二钱（酒浸，蒸晒九次，炒黄） 全蝎（土炒） 皂刺 猪牙皂角 防风 荆芥穗 金银花 蝉蜕各一钱（炒）

【用法】酒、水各一钟，加葱白三寸，煎一钟，去滓热服。

【主治】面上风癣，初如痦瘰，或渐成细疮时作痛痒者。

14415 疏风散湿汤

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】赤芍药 黄连 防风各五分 铜绿（另入） 川花椒 归尾各一钱 轻粉一分（另入） 羌活 五倍子各三分 荆芥六分 胆矾 明矾各三厘

【用法】水三钟，煎至一半，去滓，外加铜绿泡化，后入轻粉搅匀，汤脚用绵纸滤过澄清。用手蘸洗目烂湿处。

【主治】眼眶湿烂，因风而作。

14416 疏邪实表汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】白术 赤芍各一钱 桂枝三分 防风 川芎 羌活各八分 甘草二分

【用法】水二钟，加生姜三片，大枣三枚（捶碎），加胶饴二匙煎之，温服。无汗不可服。

【主治】冬月正伤风，头痛发热，恶寒背强，脉浮缓，自汗。

【加减】汗不止，加麻黄；喘，加杏仁、柴胡。

14417 骗马丹

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】胡芦芭（盐炒黄色） 破故纸（盐炒香） 金刚骨（酒浸一宿，晒，盐炒） 骨碎补（去毛，盐炒） 甜瓜子（盐炒黄色） 胡桃仁（另研细）各一两 乳香（另研） 没药（另研） 自然铜（火煅醋蘸七次以上）各半两

【用法】上除另研外，共为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。病在上，食后服，病在下，食前服，一日三次。

【功用】补五脏，壮筋骨，补精髓，驻颜，黑发鬓，健行步。

【主治】寒湿脚气，四时疼痛。

14418 骗马丹

【方源】《普济方》卷九十二引《瑞竹堂方》。

【组成】真川乌（炮）二两 川芎七钱 真苏木 地龙（去土）各半两 白芷 草乌头（泡） 续断（浸酒） 牛膝（酒浸，去芦） 肉苁蓉（酒浸） 滴乳 明松香（研） 木鳖子（去壳，不去油） 虎胫骨（酒浸，炙） 骨碎补（酒浸） 自然铜（醋淬七次，水飞） 败龟版各一两（煅红，好醋制净令黄色） 全蝎三钱（去毒，炒）

【用法】上为细末。用煮酒打陈米粉为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后温酒送下。

【主治】中风，口眼喎斜，痰涎壅盛，语言謇涩，手足不仁，筋脉拘急，肢体不举；或寒湿相搏，肌肉顽麻，传入经络，筋骨疼痛，腰脚浮肿，难以屈伸；或寒湿脚气；或打扑损伤，筋骨体骱蹉跌，皮肤瘙痒，风毒疮疡。

14419 缓筋汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】羌活汤。

【组成】熟地黄一分 生甘草 柴胡 红花 炙甘草 苏木 独活各二分 藁本 升麻 黄芩 草豆蔻仁 酒黄柏 生地黄 当归身 麻黄各三分 羌活三钱 苍术五分

【用法】上为粗末，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，食远服。

【主治】两目如火肿痛，两足及伏兔筋骨痛，膝少力，身重腰痛，夜恶寒，痰嗽，颈项皆急痛，目外眦目丝急，食不下。

14420 缓肝理脾汤

【方源】《金鉴》卷五十七。

【组成】广桂枝 人参 白茯苓 白芍药（炒） 白术（土炒） 陈皮 山药（炒） 扁豆（炒，研） 甘草（炙）

【用法】煅姜、大枣为引，水煎服。

【主治】慢惊风。

14421 瑞金丹

【方源】《张氏医通》卷十二。

【组成】川大黄（酒拌，炒黑至黄烟起为度）真秋石各一两

【用法】上为细末，煮红枣肉为丸，如小豆大。空腹薄荷汤送下二钱；瘀在胃，吐血成盆者，犀角地黄汤送下。

【主治】虚劳，吐红瘀结者。

【加减】瘀在心包，不时惊悸，面赤神昏者，加真郁金（皮色如梧桐子，纹绉者真）三钱。

14422 瑞金散

【方源】《妇人良方》卷七。

【组成】片子姜黄四两 牡丹皮 莪术 红花 当归 赤芍药 川芎 桂心 延胡索各一两半

【用法】上为末。每服二钱，水一盏、酒三分，煎七分，温服，一日三次。

【主治】妇人血气撮痛，月经不行，预先呕吐、疼痛，及月信不通。

14423 瑞莲丸

【方源】《济生》卷四。

【异名】金莲丸(《医学入门》卷七)。

【组成】白茯苓（去皮） 石莲肉（炒，去心） 龙骨（生用） 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 远志（甘草水洗，去心） 柏子仁（炒，别研） 紫石英（火煅七次，研令极细） 当归（去芦，酒浸） 酸枣仁（炒，去壳） 龙齿各一两 乳香半两（别研）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服七十丸，空心温酒、枣汤任下。

【主治】思虑伤心，便下赤浊。

14424 瑞莲丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】酸枣仁（炒） 白术 人参 白茯苓 故纸（炒） 益智 大茴香 左顾牡蛎（煅）各等分

【用法】上为末，青盐酒为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【主治】小便白浊，出髓条。

14425 瑞莲丸

【方源】《古今医鉴》卷五引何春元方。

【组成】山药（炒）二两 莲肉二两 白术（土炒）二两 芡实二两 人参（去芦）一两 橘红一两 白茯苓一两 白芍药（酒炒）一两 甘草（炙）五钱

【用法】上为末，用雄猪胆一个，洗净煮烂，捣和药末为丸，如梧桐子大。每服一丸，空心米汤送下。

【功用】《鲁府禁方》：补元气，健脾胃，进饮食，止泄泻。

【主治】①《古今医鉴》：元气大虚，脾胃怯弱，泄泻不止，不思饮食。②《寿世保元》：虚劳发热，痰嗽喘汗，泄泻腹痛，脾胃虚弱，饮食少思，骨瘦如柴。

14426 填骨髓煎

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】白茯苓二两 山茱萸 当归 巴戟 五味子 人参 远志 桂心 附子 菟丝子 天门冬 大豆黄卷各一两 肉苁蓉二两 石斛 石韦各半两

【用法】上为细末，取生地黄汁二升，生瓜蒌根汁一升，白蜜三合，牛髓二合，入银锅中煎药，搅令匀，以慢火熬成膏，收入坩合中。每服食前以粥饮调下半匙。

【主治】虚劳干渴，羸瘦少力。

14427 填精益气汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】熟地二两 枸杞 菟丝 焦术 苁蓉各四钱 杜仲 故纸 当归 洋参 北耆各三钱 菖蒲 炙草各一钱 桂元 大枣

【主治】病后耳聋。

【加减】火衰，加桂、附，或启窍丹。

14428 塌气丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】胡椒一两 蝎尾（去毒）五钱 （一方有木香一钱）

【用法】上为细末，面为丸，如粟米大。每服五七丸至一二十丸，陈米饮送下，不拘时候。

【主治】小儿寒积腹胀。

①《小儿药证直诀》：虚胀。②《卫生总微》：脾虚腹胀，或面目四肢发肿。③《片玉心书》：寒胀者，因寒积郁结而胀，手足厥冷，面青气急。④《张氏医通》：肝气乘脾腹胀。

【加减】腹大者，加萝卜子，名褐丸子。

14429 塌气丸

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】全蝎一钱 黑牵牛四钱（一半炒熟，一半生用） 萝卜子四钱（一半炒熟，一半生用） 陈皮二钱（去白） 青皮（去瓤）二钱 京三棱二钱（炮，锉） 蓬莪术二钱（炮，锉。一方生用）

【用法】上为细末，面糊和丸，如萝卜子大。每服一二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】小儿脾胃气虚，腹胀满闷。

14430 塌气散

【方源】《博济》卷二。

【组成】舶上茴香（炒） 枳壳（去白，麸炒） 茯苓 人参各一两 陈皮（去白） 二两 青皮（去白）二两 甘草半两（炙） 苍术半两 丁香一分 干姜半两（炮） 高良一分

【用法】上同为末。每服一钱，水一盏，入生姜、大枣同煎至七分，热服，入盐如茶点服亦可

【功用】《御药院方》：顺气宽中，升降利膈。

【主治】①《博济》：虚气攻冲，心胸满闷，元气冷疼，及一切气不调顺。②《御药院方》：中脘痞滞，心腹坚胀，胁下紧硬，喘满短气，噫息不通，呕吐痰水，大便不调。

14431 塌痒汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】湿痒汤（《外科大成》卷二）。

【组成】苦参 威灵仙 蛇床子 当归尾 狼毒各五钱 鹤虱草一两

【用法】上用河水十碗，煎数滚，滤清，贮盆内，乘热先熏，待温后洗，临洗和入公猪胆汁二三枚同洗更妙。

【主治】妇人湿热下注，阴中作痒及内外生疮。

14432 椿皮散

【方源】《医统》卷四十二引李东垣方。

【组成】椿根白皮二两 槐角子四两 枯白矾二两 炙甘草一两

【用法】上为细末。每服三钱，米饮调下。

【主治】血痢及肠风下血。

14433 椿花散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】吴橘 鸡冠花 椿花各等分

【用法】上㕮咀。每用药末二两，水三升，煎五七沸，乘热淋渫。

【主治】痔疾。

14434 楂橘丸

【方源】《简明医彀》卷三。

【组成】山楂四两 橘核（炒） 山栀（炒）二两 柴胡 牡丹皮 桃仁（炒） 大小茴香（俱盐炒）各一两 吴茱萸（炮）半两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，盐汤送下。

【主治】诸疝痛。

14435 楝实散

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】楝实（锉，炒） 蓬莪茂（煨，锉） 京三棱（煨，锉） 芎藭 补骨脂（炒） 菟丝子（酒浸，别捣）各半两 木香 葫芦巴 茴香子（炒） 桂（去粗皮） 荜澄茄 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 丁香各 分

【用法】上为散 每服二钱匕，食前热酒或生姜汤调下。

【主治】小肠撮痛。

14436 楞薤煅蒌丸

【方源】《医级》卷九。

【组成】瓦楞子（醋煅） 鸡内金一两 延胡 没药 香附各五钱 桃仁 蒌仁 苏子 白芥子 萝卜子 薤白各三钱

【用法】先用顶大瓜蒌一个，开一孔，去仁，将香附、桃仁、三子、薤白、蒌仁七味和匀，装入蒌壳内将孔盖好，麻扎纸糊，外和熟黄泥厚涂，火煅三炷香，候烟将尽，即取起置泥地候冷出火，然后打开泥取炭药，研极细，再将楞、肫、延、没四味研极匀，以荞麦面糊作丸，如梧桐子大。每服三十丸，白汤送下。

【主治】癥瘕痰食，积滞留著，以致不时冲逆胸胁，攻注腹肋切痛。

14437 槐茶

【方源】《养老奉亲》。

【组成】槐叶（嫩者）五斤（蒸令熟，为片，晒干作茶，捣罗为末）

【用法】上每日煎如茶法，服之恒益。

【功用】明目，益气，除邪，利脏腑，顺气，除风。

【主治】老人热风下血，齿疼。

14438 槐子丸

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】槐实三两（微炒） 猬皮（焦炙） 当归（切，焙） 附子（炮裂，去皮脐） 连翘 干姜（炮） 续断 黄耆（炙，锉）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心米饮送下，日晚再服；稍加至三十丸。

【主治】牡痔。因醉饱筋脉横解，肠澼成痔，每下鲜血。

14439 槐子汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】槐米三钱 蒌仁三钱 枳壳一钱（蜜水炒） 天冬一钱五分 麦冬一钱五分 玉竹三钱 麻仁三钱 苏子三钱 杏仁三钱 甘草四分 金橘

饼一枚　白芝麻二钱

【主治】 肺经之火，移于大肠，大便硬秘，或肛门肿痛。

14440　槐子散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】 槐子　黄芩　木贼　苍术各等分

【用法】 上为细末。食后清茶调下。

【主治】 体肥气盛，风热上行，目昏涩者。

14441　槐子散

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】 槐子（炒黄）　管仲（炒黄）各等分

【用法】 上共为末。每服五钱，用严醋一钟，煎滚二五沸，去滓温服。

【主治】 血淋，并妇人血山崩漏不止。

14442　槐耳丸

【方源】《鸡峰》卷十五。

【异名】 槐耳白蔹丸（原书卷十七）。

【组成】 槐耳　白蔹　艾叶　蒲黄　白芷各一两　黄耆　人参　续断　禹余粮　当归　橘皮　茯苓　猬皮　干地黄各三两　牛角腮　马白蹄各四两　猪后悬蹄二十一个

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心酒送下，一日二服。

【主治】 女人白崩，及痔病连血脏，服诸药不愈者，及崩漏。

14443　槐花酒

【方源】《外科发挥》卷二。

【组成】 槐花四五两

【用法】 上微炒黄，乘热入酒二钟，煎十余沸，去滓，热服。未成者二三服，已成者一二服。

【主治】 发背及一切疮毒，不问已成未成，但觉痛者；及湿热疮疥，肠风痔漏。

【临证举例】 ①肿毒　《外科理例》：一人髀髀患毒痛甚，服消毒药不减。饮槐花酒一服，势随大退，再服托里消毒药而愈。②发背　《外科理例》：一人发背十余日，势危脉大，先饮槐花酒二服杀其势退，再服败毒散二剂，托里药数剂，渐溃，又用桑柴烧灸患处，每日灸良久，仍以膏药贴之，灸至数次，脓溃腐脱，以托里药白术、陈皮，月余而愈。③肩疽　《外科理例》：一人肩疽，脉数，用槐花酒一服，势顿退，更与金银花、黄耆、甘草十余服而平。

14444　槐花散

【方源】《苏沈良方》卷七。

【组成】 皂角（去皮，烧烟绝）　白矾（熬沸定）　槐花（炒黄黑色）　甘草（炙）各等分

【用法】 上为末。每服二钱，白汤调下。

【功用】 化胃膈热涎。

【主治】 ①《苏沈良方》：热吐。②《普济方》：膈热生涎，呕吐。

【临证举例】 呕吐　嘉兴李使君，曾病呕，每食讫辄吐，如此二月，服反胃药愈甚，或谓有痰饮，投半夏旋服之，亦皆不验。服之即时愈。又有一老青衣病呕，与服之，又愈。

14445　槐花散

【方源】《本事》卷五。

【异名】 槐花汤（《准绳·类方》卷三引《医学统旨》）。

【组成】 槐花（炒）　柏叶（烂杵，焙）　荆芥穗　枳壳（去瓤，细切，麸炒黄）各等分

【用法】 上为细末。用清米饮调下二钱，空心，食前服。

【主治】 肠风脏毒。

【方论选录】 ①《本事方释义》：槐花气味苦寒，入手足阳明、厥阴，柏叶气味苦辛微寒，入足太阴；荆芥穗气味辛温，入足太阳、少阳，枳壳气味苦寒，入足太阴。此脏毒肠风下血不止，纯用辛凉苦寒之药，以泄肠胃之热，血得凉而宁静，则病自然减耳。②《医方集解》：此手足阳明药也。侧柏养阴燥湿，最清血分；槐花疏肝泻热，能凉大肠；荆芥散瘀搜风；枳壳宽肠利气。

14446　槐花散

【方源】《奇效良方》卷六十。

【异名】 槐花一物散（《医方考》卷五）。

【组成】 槐花不以多少

【用法】 上晒干，研末。敷舌上；或火炒，出火毒，为末，敷。如舌肿，以真蒲黄末干掺之。

【主治】 舌出血不止。

【方论选录】《医方考》：诸见血皆是火证，槐花能疗血中之热，故愈。

14447　槐花散

【方源】《医统》卷四十二。

【组成】 黄连　枳壳各三分　槐花一两

【用法】 上以槐花炒二味药，去花不用，只将二味用水一盏半，煎七分，空心服。

【主治】 肠胃不调，下血不止。

14448　槐花散

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】 炒槐花　炒侧柏叶　醋炒枳壳　川黄连　炒荆芥穗

【用法】 上为末。乌梅汤调服。

【主治】 肠风、脏毒便血。热伤阴络，热与风合为肠风，下血多清；热与湿合为脏毒，下血多浊。

【加减】 肠风，加秦艽、防风；脏毒，加炒苦楝、炒苍术。

14449 槐芩散

【方源】《女科切要》卷二。

【组成】 炒槐米三两 黄芩二两

【用法】 上炒，研为末。每服五钱，霹雳酒调服。

【主治】 崩中不止。

14450 槐角丸

【方源】《局方》卷八（宝庆新增方）。

【异名】 地榆槐角丸(《全国中药成药处方集》南昌方)。

【组成】 槐角（去枝梗，炒）一斤 地榆 当归（酒浸一宿，焙） 防风（去芦） 黄芩 枳壳（去瓤，麸炒）各半斤

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，不拘时候，久服。

【功用】 ①《局方》（宝庆新增方）：止痒痛，消肿聚，驱湿毒。②《中国药典》：清肠疏风，凉血止血。

【主治】 五种肠风泻血。粪前有血名外痔，粪后有血名内痔，大肠不收名脱肛，谷道四面胬肉如奶，名举痔，头上有乳名瘘；及肠风疮内小虫，里急下脓血。

14451 槐角丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 槐角一斤（麸炒令焦，熟拣净） 黄耆（锉） 枳壳（麸炒，去瓤） 熟干地黄 当归 防风各四两 木香一两

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，温米饮送下，不拘时候。

【主治】 肠风痔疾，大便涩滞，气结不通，饮食衰少，面黄肌瘦，或下血不止，或在便前，或在便后者。

14452 槐角丸

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】 槐角三两（炒） 防风一两半 黄芩一两半（炒） 当归三两 枳壳八钱（炒） 升麻五钱 地榆三两（炒） 生草五钱

【用法】 上为末，醋为丸。每服三钱，米饮送下。

【主治】 肠风痔血，脉浮数者。

【方论选录】 方中槐角清大肠以凉血，地榆涩血室以止血，黄芩清热宽肠，防风疏风胜湿，当归养血脉，枳壳破滞气，生草缓中泻火，升麻散热升清也。醋丸米饮下，使热散气清则结化风消而广府肃清，何肠风痔血之不痊哉！此疏利之剂，为肠风痔血之专方。

14453 槐角丸

【方源】《血证论》卷八。

【组成】 槐角三钱 地榆二钱 黄连一钱 黄芩三钱 黄柏三钱 生地三钱 当归三钱 川芎一钱 防风二钱 荆芥二钱 侧柏二钱 枳壳二钱 乌梅三枚 生姜一钱（汁）

【功用】 清火和血。

【主治】 肠风下血。

【方论选录】 方中防风、生姜以祛外来之风，乌梅、荆芥以治内动之风。为肠风立法，本于仲景白头翁及葛根诸汤之意。

14454 槐枝汤

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】 槐枝（碎锉）二两 秦皮（锉） 黄连（去须） 蕤仁（去皮） 马牙消 黄柏（去粗皮、锉） 山栀子（去皮）各半两 古字钱十四文 食盐一分 淡竹叶一握（细切）

【用法】 上药除钱外，为粗末。每用五钱匕，水一盏，入钱煎取一盏半，滤去滓，放温，洗眼，冷则重暖再洗。

【主治】 暴赤目昏痛，泪出隐闷。

14455 槐枝膏

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【异名】 三枝膏。

【组成】 槐枝 柳枝 桑枝各半斤（半寸锉）

【用法】 上以水一斗，煎至三升，滤去滓，慢火熬膏，入后药末：青盐一两（研）、芎（末）、细辛（末）各半两，上同搅匀，以盒子盛。每用少许，揩牙。

【主治】 风热上攻，牙齿肿痛。

14456 槐枝膏

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】 槐枝 黄连（去须） 黄柏各二两 巴豆半两（去壳）

【用法】 上用好麻油一斤，入诸药煿令黄色，绵子滤去滓，次入黄蜡四两，熬作膏子，取出，更入腻粉半两，搅匀。擦之。

【主治】 疥疮瘙痒。

14457 槐金散

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】槐花（炒） 郁金（锉）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，煎木通汤调下，不拘时候。

【主治】小便出血。

14458 槐实散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】槐实（炒）八两 荆芥穗四两 甘草（炙）一两 防风（去叉）二两

【用法】上为散。每服一钱匕，食后茶、酒任调下。

【功用】清头目，化风痰。

【主治】风头痛。

14459 槐荆丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】槐花（微炒） 荆芥穗（去土） 枳壳（麸炒，去瓤）各一两 白矾（生） 薄荷叶 蓊金各半两

【用法】上为细末，水面糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，空心食前温粥饮送下，日进二服。

【主治】肠风痔漏，先脏腑，后便血。

14460 槐黄丸

【方源】《古今医鉴》卷八引周后峰方。

【组成】黄连四两（酒炒） 槐花四两（炒）

【用法】上为末，入猪大肠头，长一尺，内扎住，用韭菜二斤，水同煮烂，去菜用肠药，捣烂，丸如梧桐子大，如湿，加神曲丸。每服八十丸，空心米汤送下。

【主治】肠风，脏毒，便血，痔漏。

14461 槐黄汤

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷四引《必用方》。

【组成】槐花（炒） 生地黄 樗根白皮（炒）各一钱 防风 当归 白芍药 荆芥穗 川芎 黄连 枳壳各八分 地榆 乌梅 甘草各五分

【用法】上锉，作一帖。水煎，空心服。

【主治】肠风，脏毒。

14462 槐鹅散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】槐鹅 侧柏（炙微黄） 荆芥穗 棕榈（烧灰） 黄牛角鰓（烧灰） 牛膝（去苗）各半两

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，一日三四服。

【主治】小儿痔疾，下血不止，热毒气流注，发歇疼痛。

14463 槐榆散

【方源】《景岳全书》卷六十一。

【组成】槐花 地榆各等分（俱炒焦）

【用法】上用酒煎，饮之。

【主治】血崩及肠风下血。

14464 槐白皮散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】槐白皮 地骨皮各一两 松节一两（锉）

【用法】上为散。每用五钱，以浆一中盏，煎五七沸，去滓。热含冷吐。

【主治】齿风，疼痛不止。

14465 槐白皮散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】槐白皮半两 地骨皮 荜拨 五灵脂各半两 蛇床子（微炒） 乳香（另研）各二钱半 麝香半钱（另研）

【用法】上为细末，入研药令匀。每用少许贴牙病处，吐津，误咽不妨；如痛不已，用药末三钱，水一盏煎令沸，和滓热漱冷吐，并不拘时候。

【主治】牙齿动摇，不住寒热，嚼物隐痛，时发时止。

14466 槐角子丸

【方源】方出《本事》卷五，名见《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】皂角（去皮弦，醋炙） 黄耆（蜜炙） 荆芥穗 木香 露蜂房 猬皮（炙焦黄，锉） 鳖甲（淡醋煮，去裙膜，洗净，酸醋炙黄） 槐子 桔梗（炒） 穿山甲（锉碎，蛙粉炒） 芍药各一两 大黄（湿纸裹，甑上蒸）半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，食前温汤送下，一日三次。末知，加至五十丸。

【主治】痔有鼠乳结核，作渴疼痛。

14467 槐连四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】当归 川芎 赤芍药（炒） 生地黄 槐花 黄连（炒）各一钱 御米壳（去蒂，蜜炙）五分

【用法】上锉。水煎服。

【功用】《金鉴》：清热坚肠。

【主治】产后热滑血痢，脐腹疼痛。

【宜忌】《济阴纲目》汪祺：此止涩之剂，非滑勿投，慎之。

14468 槐角枳壳汤

【方源】《准绳·类方》卷六。

【组成】 槐角（炒） 枳壳（炒） 黄连 黄芩 当归 白芍药 赤茯苓 甘草 乌梅（烧存性）

【用法】 上入生地黄，煎服。

【主治】 痔漏下血。

14469 槐榆生地汤

【方源】 《顾松园医镜》卷十五。

【组成】 槐花 地榆 黄芩 银花 生地 白芍 生鸡子 甘草 荆芥（炒焦） 荷叶蒂

【用法】 水煎服。或用猪脏丸服（另用槐花填入脏中，煮烂，去槐花捣和丸药，取其引入大肠）。

【主治】 肠风脏毒下血，便血初起者。

【加减】 热甚，加犀角、黄连。

【方论选录】 方中槐花、地榆、黄芩、银花清热除湿；生地、白芍、生鸡子补阴凉血；甘草调和诸药；荆芥能入血分，性升上行；荷叶蒂补助脾胃，升发阳气。共奏清热除湿凉血，佐以升举之效。

14470 榆丁散

【方源】 《医宗金鉴》卷七十五。

【组成】 防风 地榆 紫花地丁 马齿苋各五钱

【用法】 上共研细末。每服三钱，温米汤调下。

【主治】 ①《医宗金鉴》：破伤风，头汗多出，而身无汗者。②《伤科汇纂》：破伤风，证在半表半里者。

14471 榆皮汤

【方源】 《外台》卷二十七引《小品》。

【异名】 榆白皮汤《普济方》卷二一四。

【组成】 榆皮半斤 滑石二两（一方一两） 黄芩一两（一方二两） 甘草（炙） 瞿麦各二两 葵子一升

【用法】 上切。以水一斗，煮取三升，温服一升，旦服。

【主治】 ①《外台》引《小品》：诸淋。②《普济方》：气淋结涩，泄便不利。

【宜忌】 忌海藻、菘菜。

14472 榆砂汤

【方源】 《医学入门》卷七。

【组成】 地榆四钱 砂仁七枚 生甘草一钱半 炙甘草一钱

【用法】 水煎，温服。

【主治】 结阴便血不止，渐渐极多者。

14473 榆白皮汤

【方源】 方出《圣惠》卷五十八，名见《圣济总录》卷九十六。

【组成】 榆白皮三两（锉） 葵子一合 滑石三两 石韦一两（去毛） 麦冬一两 生干地黄一两

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，入笔头灰二枚，搅匀，每食前温服。

【主治】 ①《圣惠》：血淋涩痛。②《圣济总录》：小便出血，水道中涩痛。

14474 榆白皮散

【方源】 《妇人良方》卷十六。

【组成】 榆白皮 甘草各二两 葵子一两

【用法】 上为粗末。每服二钱，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【功效】 滑胎易生。

【主治】 《医略六书》：产难窍道干涩，脉涩者。

【方论选录】 《医略六书》：方中榆白皮滑以去着，生甘草甘以泻热，冬葵子滑胎利窍以催生也。为散水煎，使窍道滑利则产门无干涩之患，而胎孕无留着之虞，何而生产艰难不顺哉！

14475 榆槐脏连丸

【方源】 《成方便读》卷三。

【组成】 川连二两 槐米 地榆炭各一两五钱 猪大肠二尺（洗净）

【用法】 先将地榆、槐米装入猪大肠内，用米泔水煮烂，和入川连，打为丸。

【主治】 湿热郁于大肠，逼于血分，症见新久痔漏，肠风下血，脱肛痛痒，肠痈脏毒。

【方论选录】 方中黄连之苦寒性燥，专除湿热者为君；而以地榆、槐米之凉血疏风者佐之；因病在大肠，故以猪大肠引之入肠，然后三药得以建其功而除其病耳。脏连丸一方，种种不同，似推此方为独得。

14476 鼓胀丹

【方源】 《内外验方秘传》。

【组成】 巴豆霜一钱 甘遂三钱 大戟一钱五分 芫花三钱 槟榔一两 青皮一两 陈皮一两 厚朴一两 皂角一两 良姜一两 黑白丑各一两 净轻粉一钱 小茴香八钱 莘荑子二钱

【用法】 上晒干，为细末。每早姜汤送下四分，壮者六分。

【主治】 鼓胀。

14477 鼓神汤

【方源】 《辨证录》卷十。

【组成】 熟地 麦冬各五钱 白芍 地骨皮 沙参各三钱 甘草 贝母各三分 人参 神曲各五分 白术三钱 丹皮一钱

【用法】 水煎服，日服一剂。服一剂，精神自旺，不困倦矣。

【主治】 疟夏。

14478 鼓腹遇仙丹

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】白丑头末四两（半生半炒） 白槟榔一斤 茵陈 莪术 三棱 牙皂角各五钱

【用法】上为末，醋糊为丸，如绿豆大。五更时冷茶送下三钱。行后随以温粥补之，忌食他物。

【主治】鼓胀。

【宜忌】壮实宜服，虚弱人不可轻用。

14479 蒜丸

【方源】《得效》卷七。

【组成】杜仲 川乌 破故纸 人参 巴戟各等分

【用法】上为末，蒜膏为丸，如梧桐子大。每服三十丸，盐汤温酒送下。

【主治】白浊。

14480 蒜连丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】黄连一两（去须，锉，用茱萸一两同炒，去茱萸）

【用法】上为细末，独头大蒜湿纸裹煨熟，研烂，搜黄连为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【主治】脏腑虚滑。

14481 蒜肚方

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】公猪肚一具 大蒜囊四十九枚

【用法】上去壳入肚内，以线扎口，水煮极烂，用盐、醋蘸肚，随便食之；气味甚者，用癞虾蟆一个入内同煮，肚烂去虾蟆、大蒜，用热酒食之。洗浴发汗，避风三日，其气顿改。

【主治】体气（胡气）。

14482 蒜豉丸

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】淡豆豉（为末） 大蒜（煨）

【用法】上捣和为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，空心用红枣、灯心汤送下。

【主治】阴汗湿痒。

14483 蓝叶散

【方源】《直指》卷二十四。

【组成】白芷 柴胡 知母 杏仁（去皮） 川芎 赤芍药 生地黄 川升麻 干葛 生甘草各一分 烂石膏 栀子仁各半分 蓝叶（日干）一分

【用法】上为细末。每次一钱半，新水煎服。

【主治】诸丹发热赤肿。

【加减】热甚，加黄芩、元参。

14484 蓝膏散

【方源】《直指》卷二十四。

【组成】蓝青 知母 甘草 杏仁（去皮尖）各五钱 黄芩 升麻 柴胡 寒水石 石膏 山栀 赤芍药各四钱 羚羊角三钱

【用法】上锉。每次三钱，水煎服。

【主治】一切丹毒赤肿。

14485 蓝药膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】青黛 15 克 海螵蛸 68 克 石膏末 125 克 冰片 3 克 凡士林 936 克

【用法】调膏。外用。

【主治】神经性皮炎，慢性湿疹。

14486 蓖麻丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】蓖麻子半两（去皮） 杏仁半两（汤浸，去皮尖） 桃仁半两（汤浸，去皮尖） 巴豆一两（二枚，去皮心） 食盐半两 附子一分（去皮脐，生用） 熏陆香二分 磁石一两 菖蒲一两 蜡四两 木通半两（锉）

【用法】上先捣菖蒲、食盐、磁石、木通、熏陆香、附子等，为末；次捣蓖麻子、杏仁、桃仁、巴豆四味，纳蜡同捣，丸如枣核大。用塞耳中，一日四五度，抽出重捻之，三日一易。以愈为度。

【主治】耳聋，三十年无所闻。

14487 蓖麻丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】蓖麻仁二十一粒 皂角（煨，取肉）五分 地龙（大者）二条 全蝎二个 远志肉 磁石（煅，飞） 乳香各二钱 麝香少许

【用法】上为末，溶黄蜡为丸。塞耳中。

【主治】久聋。

14488 蓖麻膏

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】蓖麻子（去壳）

【用法】研烂。左歪涂右，右歪涂左。一经改正，即速洗去。

【主治】口眼歪斜。

14489 蓖麻子丸

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】蓖麻子一千颗（半生用，半瓦内炒令烟起） 矾石一两（瓦上熔三五沸，放冷研） 黑豆六颗（三粒生用，三粒瓦上炒熟）

【用法】上并不得犯铁器，一处细杵匀烂，丸如皂子大。每服一丸，盐汤送下，妇人醋汤送下，不

拘时候。

【主治】 瘰疬。

14490 蓖麻子丸

【方源】 方出《直指》卷二十一，名见《普济方》卷五十四。

【异名】 革麻子丸(《准绳·类方》卷八)。

【组成】 蓖麻子二个（一个去油用） 远志（去心） 乳香 磁石（火烧，醋淬七次，研细，水飞）各一钱 皂角（煨，取肉）半铤 生地龙（中者）一条 全蝎二个（焙）

【用法】 上为细末，入蜡捣丸。柱入耳。

【主治】 久聋。

14491 蓬术丸

【方源】《准绳·幼科》卷八引《集验方》。

【组成】 三棱 莪蒁（并煨） 净陈皮 净香附（炒） 萝卜子（炒）各半两 砂仁 净青皮 净枳壳（麸炒） 胡黄连 芦荟各三钱 胡椒二钱半

【用法】 上为细末，糊为丸，如黄米大。每服三十丸，加至四五十丸，温米饮送下，一日二三次。

【主治】 乳食不化，心腹胀满，一切所伤。

【宜忌】 忌生冷硬物。

14492 蓬莪汤

【方源】《普济方》卷三一一。

【组成】 莪术五钱 没药一两 当归一两半（一方无没药）

【用法】 上为粗末。每服二钱，以水一盏，煎至七分，去滓温服，一日三次。若为细末，热酒调下亦得。

【主治】 伤扑疼痛。

14493 蓬煎丸

【方源】《局方》卷三（吴直阁增诸家名方）。

【异名】 蓬莪蒁丸(《圣济总录》卷一八七)。

【组成】 猪胰一具 京三棱 蓬莪蒁（二味醋煮令透，切，焙，为末）各四两（以上二味同猪胰入硇砂熬膏） 川楝子（去核） 山药 槟榔 枳壳（去瓤，麸炒） 茴香（炒） 附子（炮，去皮脐）各二两 硇砂半两

【用法】 上为细末，入猪胰硇砂膏，同醋糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，生姜汤送下，妇人淡醋汤送下，不拘时候。

【功用】 常服顺气宽中，消积滞，化痰饮。

【主治】 脾胃虚弱，久有伤滞，中脘气痞，心腹膨胀，胁下坚硬，胸中痞塞，噎气不通，呕吐痰水，不思饮食，或心腹引痛，气刺气急，及疗食癥酒癖，血瘕气块，时发疼痛，呕哕酸水，面黄肌瘦，精神困倦，四肢少力；又治女人血气不调，小腹疞痛。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“蓬术煎丸”。

14494 蒿皮四物汤

【方源】《笔花医镜》卷三。

【组成】 生地三钱 北沙参 炙鳖甲各二钱 归身 白芍 青蒿各一钱 地骨皮一钱五分 丹皮八分 甘草五分

【主治】 内热属阴虚者。

14495 蒿芩清胆汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 青蒿脑一钱半至二钱 淡竹茹三钱 仙半夏一钱半 赤茯苓三钱 青子芩一钱半至三钱 生枳壳一钱半 陈广皮一钱半 碧玉散（包）三钱

【功用】 和解胆经。

【主治】 足少阳胆与手少阳三焦湿遏热郁，三焦气机不畅，胆中相火炽，致胸闷作呕，寒热如疟。

【方论选录】 ①《重订通俗伤寒论》：足少阳胆与手少阳三焦合为一经，其气化一寄于胆中以化水谷，一发于三焦以行腠理。若受湿遏热郁，则三焦之气机不畅，胆中之相火乃炽，故以蒿、芩、竹茹为君，以清泄胆火；胆火炽，必犯胃而液郁为痰，故臣以枳壳、二陈，和胃化痰；然必下焦之气机通畅，斯胆中之相火清和，故又佐以碧玉，引相火下泄；使以赤苓，俾湿热下出，均从膀胱而去。此为和解胆经之良方，凡胸痞作呕，寒热如疟者，投无不效。②《中医大辞典·方剂分册》：方中青蒿、黄芩为君，清少阳胆热；配伍竹茹、陈皮、半夏、枳壳为臣，清胃降逆而化痰；合用赤茯苓、碧玉散为佐使者，既可导胆热下行，又能利湿和中调药。诸药合用，使少阳胆热可清，脾胃痰湿得化，则诸症自愈。

14496 蒺藜丸

【方源】《三因》卷十四。

【组成】 白蒺藜（微炒，去刺） 海藻（漫洗，去咸） 泽泻各一两 茴香（炒）一两半 桂心 木通 牛膝（锉，酒浸） 五味子 木香（煨） 槟榔各二两 茯神（去木） 人参 远志（水浸，去心，姜汁炒）各三两 川楝（去皮核，麸炒） 桃仁（去皮尖，炒，别研） 赤芍药 续断 山茱萸 苁蓉（酒浸） 青皮各四两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心、食前温酒或盐汤送下。

【主治】 囊核坚大，行动艰辛，发作牵连偏坠疼

痛。

14497 蒺藜丸

【方源】《医略六书》卷二十四。

【组成】蒺藜二两（去刺，炒） 乌头一两（姜汁炮） 山栀二两（姜汁炒）

【用法】上为末，淡盐水捣为丸。每服三钱，沸汤送下。

【主治】寒束湿热疝痛，脉弦数者。

【方论选录】寒束湿热之邪，闭遏经气，不能统运其流行之机，故邪结成疝，小腹疼痛不止焉。蒺藜疏厥阴之经，乌头逐外束之寒，山栀清内蕴湿热也。盐水丸，沸汤下，使湿热并化，则经气清和，而寒邪无不外解，疝气无不内消，何疼痛之不除哉？此分解之剂，为寒束湿热疝痛之专方。

14498 蒺藜子散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】蒺藜子半掬

【用法】上为细末，以水一小盏，煎至减半。令患者仰卧，满含饭一口，以药汁灌鼻中。不过再即嚏而气出。

【主治】鼻塞不闻香臭，水出不止。

14499 蒴藋煎

【方源】《中国接骨图说》。

【组成】忍冬 蒴藋 接骨木 艾 石菖 莲叶 折伤木各一两 食盐一合

【用法】上以水二升，煎取一升，洗损处。

【主治】打扑疼痛，肿不消。

14500 蒲公汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】薏仁 31 克 地丁 15 克 蒲公英 15 克 当归 15 克 牛膝 9 克 茯苓 9 克 紫背天葵 9 克 贝母 6 克 甘草 6 克

【用法】水煎，内服。

【主治】足跟溃疡。

14501 蒲灰散

【方源】《金匮》卷中。

【组成】蒲灰七分 滑石三分

【用法】上为散。每服方寸匕，饮调下，每日三次。

【主治】小便不利；厥而皮水者。

【方论选录】①《金匮玉函经二注》：膀胱血病湿滞，致气不化而小便不利也。蒲灰、滑石者，本草谓其利小便，消瘀血。蒲灰治瘀血为君，滑石利窍为佐。皮水，用蒲黄消经络之滞，利小便为君；滑石开窍通水，通以佐之，小便利则水下行，逆气降。②《金匮要略心典》：蒲，香蒲也，能去湿热，利小便，合滑石为清利小便之正法也。

【备考】本方方名，《张氏医通》引作"蒲黄散"。

14502 蒲茸散

【方源】《医级》卷八。

【组成】鹿茸（酥炙） 生地 当归各 两 蒲黄（炒） 一合 冬葵子二两（炒）

【用法】上为末。每服一钱，温酒调下；若炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，淡盐汤送下。

【主治】尿血日夜不止而不痛者。

14503 蒲黄散

【方源】《外台》卷二十五引《深师方》。

【异名】鹿茸散（《圣惠》卷七十三）。

【组成】蒲黄三合 当归一两 鹿茸一枚（烧）

【用法】上为散。每服方寸匕，食前饮调下，每日三次。

【主治】①《外台》引《深师方》：卒下血。②《千金》：妇人漏下不止。

14504 蒲黄散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】蒲黄三分 当归半两（锉，微炒） 人参半两（去芦头） 天门冬半两（去心，焙） 麦门冬半两（去心，焙） 甘草半两（生用） 黄耆一两（锉） 赤芍药半两 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 生干地黄一两

【用法】上为细散。每服一钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】肺壅热气逆，吐血。

14505 蒲黄散

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】木贼一两 蒲黄二两

【用法】上为末。每服二钱，米饮调下，不拘时候。

【主治】忧思之气不散而乘于血，或怒气伤肝，逆气上行，血溢流散，或饮酒过多，热入于阴而伤于血，以致纯下清血，日久不止，脉或散或涩。

14506 蒲黄膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】鲜蒲公英（洗净，捣泥状）125 克 雄黄 10 克 冰片 3 克

【用法】上药混合均匀。外用。

【主治】急性炎症非化脓期及淋巴腺结核。

【宜忌】药物保存时间，不要超过二十四小时。

14507 蒲公英汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】鲜蒲公英四两（根叶茎花皆用，花开残者去之，如无鲜者可用干者二两代之）

【用法】煎汤两大碗，温服一碗，余一碗乘热熏洗。

【主治】眼疾肿疼，或胬肉遮睛，或赤脉络目，或目睛胀疼，或目疼连脑，或羞明多泪，一切虚火实热之证。

【加减】目疼连脑者，宜用鲜蒲公英二两，加怀牛膝一两煎汤饮之。

14508 蒲公英酒

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】蒲公英一握

【用法】上捣烂。入酒半钟，取酒温服，滓贴患处。甚者不过三五服即愈。

【主治】乳痈、吹乳，不问已成未成。

14509 蒲黄通瘀煎

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】当归三钱　赤芍一钱半　肉桂一钱半（去皮）　泽兰三钱　荆芥一钱半（炒灰）　蒲黄三钱　五灵脂三钱　枳壳一钱半（炒）　炮姜一钱半　益母草三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】产后经寒气滞血瘀而恶露不通，身热胀满，腹痛势甚，脉涩大者。

【方论选录】当归养血和血以荣经，赤芍破血活血以降瘀，蒲黄破瘀通恶露，灵脂破瘀降浊阴，肉桂温经通血闭，泽兰泻热通经闭，荆芥散热和血，枳壳破滞化气，炮姜温中逐寒，益母去瘀生新。水煎温服，使经寒散而中气暖，则瘀血化而恶露自通，身热胀满无不退，腹中疼痛无有不除者。

14510 蒲公英忍冬酒

【方源】《医学纲目》卷十九。

【异名】蒲公英酒（《疡科选粹》卷四）。

【组成】蒲公英　忍冬藤

【用法】蒲公英细研，以忍冬藤浓煎汤，入少酒佐之。随手便欲睡，睡觉已失之矣。

【主治】大蛇头，乳痈。

【备考】《疡科选粹》本方用法：二药各一两，酒煎服，滓捣烂敷患处。

14511 蒸膝汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】生黄耆八两　金钗石斛二两　薏仁二两　肉桂三钱

【用法】水煎二碗，先服一碗，即拥被而卧，觉身中有汗意，再服第二碗，必两足如火之热，切戒不可坐起，任其出汗，至汗出到涌泉之下，始可缓缓去被，否则万万不可去也。一剂病去大半，再剂病全愈。

【主治】鹤膝风。足胫渐细，足膝渐大，骨中痠痛，身渐瘦弱，属水湿者。

【备考】《外科证治全书》有牛膝。

14512 蒸猪肚丸

【方源】《医抄类编》卷二十二。

【组成】木香五钱　黄连　生地　青皮　鳖甲（童便炙）　银柴胡各一两　猪肚一具

【用法】上药入肚内，线缝，悬瓦罐内极烂，取出，研细捣丸，如麻子大。米饮送下。

【主治】痟劳虚热。

14513 禁精汤

【方源】《千金》卷十九。

【组成】韭子二升　粳米一合

【用法】上于铜器中熬之。俟米黄黑，趁热以好酒一斗投之。绞取汁七升。每服一升，一日三次。尽二剂。

【主治】失精羸瘦。痠削少气，目视不明，恶闻人声。

【方论选录】《千金方衍义》：韭子能逐败精，助相火，为房劳禁之专药；加稻米则充胃气、利膀胱，以予败浊之出路。

14514 硼砂丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】硼砂一两（细研）　京三棱半两（煨，锉）　芫花半两（醋拌，炒令黄）　猪牙皂荚半两（去黑皮，涂酥，炙令黄）　巴豆半两（去皮心，研，纸裹压去油）　干漆半两（捣碎，炒令烟出）　干姜半两（炮裂，锉）　大戟半两（锉，炒令黄色）　川乌头半两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末，入研药令匀，于银锅子内，以头醋一升半，慢火熬，候可丸，即入油单内裹，旋丸如绿豆大。每服三丸，空心及临卧时以生姜橘皮汤送下。

【主治】食不消，结成癥癖，心腹胀痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作"芫花丸"、"硇砂丸"。方中硼砂，《普济方》引作"硇砂"。

14515 硼砂丸

【方源】《局方》卷七。

【组成】麝香一两（研）　鹏砂（研）　甘草（浸汁，熬膏）各十两　牙消（枯，研）二两　梅花脑（别研）三分　寒水石（烧通赤红）五十两

【用法】 上为末，用甘草膏子和搜为丸。每两作四百丸。每服一丸，含化咽津。

【功用】 化痰利膈，生津止渴。

【主治】 风壅膈热，咽喉肿痛，舌烦生疮，口干烦渴。

14516 硼砂丹

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】 硼砂（生研） 白矾（生研）各一钱 西牛黄 人爪甲（焙脆，研）各一分

【用法】 上为极细末，以烂白霜梅肉三钱研糊作丸，分作四丸。噙化。

【功用】 涌顽痰。

【主治】 缠喉风，风热喉痹。

14517 硼砂散

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【组成】 硼砂 僵蚕 百药煎 川芎各三钱 山豆根 盆消 薄荷 紫河车各半两 青黛一钱

【用法】 上为末。每用半钱，小儿一字，吹掺咽中，水调亦可。

【主治】 咽喉疮肿，闭塞不通。

14518 硼砂散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 南玄参 贯众 白茯苓（去皮） 缩砂仁 滑石（研） 荆芥穗 甘草（生用） 山豆根 青黛（研）各半两 硼砂（研）三两 蒲黄 薄荷叶各一两 寒水石（烧过，研）三两半

【用法】 上为细末，入研药匀。每服半钱，新汲水调下；或诸舌胀，掺在舌上，咽津无妨，不拘时候。

【主治】 心脾风毒热所发，咽喉生疮肿疼痛，或子舌胀，或木舌重舌，胀至肿闷塞，水浆不下。

14519 硼砂散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】 硼砂 蒲黄 净消 孩儿茶 薄荷 甘草各二钱 青黛一钱 片脑少许

【用法】 上为末。每用少许，敷点口中疮处。

【主治】 小儿口舌生疮，咽喉不利，重舌马牙。

14520 碎骨丹

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】 骨碎补九斤 白及片四斤 陈皮九斤 茄皮九斤 虎膝骨四双 冰片一斤 麝香八两 三七九斤 地鳖虫四斤 血竭四斤 乳香九斤 川断四斤 硼砂二斤 没药九斤 雌雄活鸡各二只（捣成泥）

【用法】 上为细末，用蜂蜜、冷水调成药膏。摊贴。

【主治】 骨折、骨碎、骨裂。

14521 感应丸

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【异名】 感应丹（《臞仙活人方》卷下）、威喜丸（《芝台轨范》卷一）。

【组成】 百草霜（用村庄家锅底上刮得者，细研）二两 杏仁（净者，去双仁）一百四十个（去尖，汤浸一宿，去皮，别研极烂如膏） 南木香（去芦头）二两半 丁香（新拣者）一两半 川干姜（炮制）一两 肉豆蔻（去粗皮，用滑皮仁子）二十个 巴豆七十个（去皮心膜，研细，出尽油如粉）

【用法】 上除巴豆粉、百草霜、杏仁三味外，余四味捣为细末，与前三味同拌，研令细，用好蜡匮和，先将蜡六两溶化作汁，以重绵滤去滓，以好酒一升，于银石器内煮蜡熔，数沸倾出，候酒冷，其蜡自浮，取蜡称用。凡春夏修合，用清油一两，于铫内熬令末散香熟，次下酒煮蜡四两，同化作汁，就锅内乘热拌和前项药末；秋冬修合，用清油一两半，同煎煮热作汁，和匮药末成剂，分作小铤子，以油单纸裹，旋丸如绿豆大。每服三、五粒，温水吞下。小儿每服如黍米大五丸，干姜汤送下，不拘时候。

【功用】 磨化积聚，消逐温冷，疗饮食所伤，快三焦滞气。常服进饮食，消酒毒，令人不中酒。

【主治】 虚中积冷，气弱有伤，停积胃脘，不能传化；或因气伤冷，因饥饱食，醉酒过多，心下坚满，两胁胀痛，心腹大疼，霍乱吐泻，大便频并，后重迟涩，久痢赤白，脓血相杂，米谷不消，愈而复发；中酒呕吐，痰逆恶心，喜睡头旋，胸膈痞闷，四肢倦怠，不欲饮食；妊娠伤冷，新产有伤，若久有积寒，吃热药不效者；久病形羸，荏苒岁月，渐致虚弱，面黄肌瘦，饮食或进或退，大便或秘或泄，不拘久新积冷；又治小儿脾胃虚弱，累有伤滞，粪白鲜臭，下痢水谷，连绵月日，用热药及取转不效者。

【方论选录】《医方集解》：此手足阳明药也。肉蔻逐冷消食，下气和中；丁香暖胃助阳，宣壅除癖；木香升降诸气，和脾疏肝；杏仁降气散寒，润燥消积；炮姜能逐痼冷而散痞通关；巴豆善破沉寒而夺门宣滞，寒积深痼，非此莫攻；百草霜和中温散，亦能消积治痢为佐也。

14522 感冒汤1号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】桑叶9克 桑枝30克 苇根30克 菊花9克 淡豆豉15克 山栀9克 连翘15克 金银花15克 忍冬藤24克 蔓荆子9克 薄荷6克 甘草3克

【用法】上为一剂，若病重者，可一日服二剂。分头煎、二煎，每隔四小时服一次。

【功用】辛凉解表。

【主治】风热型感冒。发热，汗出，头胀痛，周身骨节酸痛，鼻塞，流浊涕，口咽干，小便黄热，舌苔白或薄黄，脉浮数。

14523 感冒汤2号

【方源】《临证医案医方》。

【组成】麻黄3克 桂枝3克 荆芥穗6克 防风9克 羌活6克 辛夷6克 淡豆豉9克 苇根20克 甘草3克

【用法】水煎服。

【功用】辛温解表。

【主治】风寒型感冒。恶寒或微发热，无汗，头痛，周身骨节酸痛，鼻塞，流清涕，舌苔薄白，脉浮紧。

14524 雷火针

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白芷 独活 川芎 细辛 牙皂 川山甲（炮，倍用） 丁香 枳壳 松香 雄黄 乳香 没药 杜仲 桂枝各一钱 硫黄二钱 麝香酌量 熟艾二三两（一方有巴豆仁八分，斑蝥三钱，去头足翅）

【用法】上为粗末，取艾铺底，掺药于上，用好皮纸卷筒，先须用线绊约两头，防其伸长，然后加纸再擀，务令极实，粗如鸡子尖样，用鸡子清尽刷外层，卷而裹之，阴干。用时向灯上点着，随用纸三五层，或布亦可，贴盖患处，乘热按于纸上。

【主治】风寒湿毒之气留滞经络而为痛为肿，不能散者。

14525 雷火针

【方源】《疡医大全》卷二十九。

【异名】热熨针（《全国中药成药处方集》北京、南京方）。

【组成】蕲艾一两 朱砂二钱 穿山甲（土炙） 桃皮 草乌 川乌 乳香 雄黄 没药 硫黄各一钱 麝香五分

【用法】上为细末，以蕲艾铺粗纸上，入药末三钱捲成筒，如爆竹式，将药筒入瓶内，以箬叶、油纸封口，埋屋下地中四十九日取出。患处用青布或红布摺二十四层，将针灯上点着吹息，隔布针之。患内暖极即止。不过三次即愈。

【功用】祛风散寒，通经活络。

【主治】风寒湿气痰滞于经络血脉之中，闭塞不通而痛。

14526 雷岩丸

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】肉苁蓉一两 牛膝一两 巴戟一两（酒浸一宿，去皮心） 菊花二两 黑附子（青盐二钱，以河水二升同煮水尽为度，去皮脐）一两 枸杞子二两 川椒三两（去目）

【用法】上为末，原浸药酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心酒送下。

【功用】久服大补肾脏，添目力。

【主治】肾水不能溉济于肝，肝经不足，风邪内乘，上攻眼目，泪出，羞明怕日，多见黑花，生障，翳膜遮睛，睑生风粟，或痒或痛，隐涩难开；及久患偏正头痛，牵引两目，渐觉细小，视物不明者。

14527 摄生饮

【方源】《直指》卷三。

【组成】圆白南星（湿纸裹煨） 南木香 半夏（用白沸汤就铛蘸少顷）各一钱半 辣细辛 苍术（生） 甘草（生） 细节石菖蒲各一钱

【用法】上锉，分二服。每服以水盏半，加生姜七厚片，煎取其半，乘热调苏合香丸三丸。先以皂角肉为细末，管子揭些吹入鼻中，候喷嚏即灌药。牙噤者，用乌梅肉揉和南星、细辛末，以中指频擦自开。

【主治】一切卒中。中风、中寒、中暑、中湿及痰厥、饮厥、气厥等。

【加减】痰盛，加炙全蝎二枚。

【备考】《育婴秘诀》治大人、小儿卒中，以本方调惊气丸服。

14528 摄阴汤

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】熟地黄五钱 人参三钱 黄耆二钱 当归一钱五分 荆芥穗（炙） 棕榈皮（炙） 甘草（炙）各一钱 熟附子一钱五分

【用法】作一服。

【主治】血崩不止，唇青肉冷，汗出目瞑。

14529 摄真汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】鱼鳔 生龙骨 桑螵蛸 芡实 茯苓 五味子 秋石

【用法】 前六味水煎，秋石冲服。

【主治】 屡因嗔怒，肝阳升而上涌，气冲心热，呛咳失血，坠则遗精，暮热晨汗，脉象虚数，为阴阳枢纽失固者。

14530 摄脾丸

【方源】《养老奉亲》。

【组成】 木香 诃子（炮，去核） 厚朴（生姜汁炙） 五倍子 白术各等分

【用法】 上为末，用烧粟米饭为丸，如梧桐子大。每服十丸，米饮送下。

【主治】 老人乘秋，藏腑虚冷，滑泄不定。

14531 摄血固冲汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】 党参六钱 黄耆四钱 白术三钱 龙骨五钱 乌贼骨一两 阿胶珠 茜草根 龟版各三钱 广三七一钱 血余炭三钱

【用法】 水煎，温服。

【主治】 产后劳倦过度，阴道突然大出血，或动手术后出血不止，色红无块，腰微胀而腹不痛，舌苔正常，脉数无力。

14532 搐药

【方源】《洁古家珍》。

【异名】 搐鼻散（《医学纲目》卷十三）。

【组成】 薄荷叶二钱 青黛一钱 石膏一钱 芒消 川芎各半钱 细辛二钱 蔓荆子三分

【用法】 上为细末。鼻内搐之。

【主治】 ①《洁古家珍》：目疾。②《济阳纲目》：目外障。

14533 搐鼻药

【方源】《三因》卷十六。

【组成】 荜拨 良姜各一分 白芷一钱 细辛半钱

【用法】 上为末。每服一小字。先含水一口，分搐鼻内，吐水即止。

【主治】 八般头风，及眩晕、恶心吐逆、诸药不治者。

14534 搐鼻散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】 黄丹 牙消各一两 雄黄三钱 没药五分

【用法】 上为细末。先令患人口含温水，然后以管吹入鼻中，左目病则吹左鼻，右目病则吹右鼻。

【主治】 一切火眼及内障。

【宜忌】 久患眼疾而其者不可吹。

14535 搐鼻散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】 木鳖子一个（去壳）

【用法】 为末。绵裹塞鼻，左塞右，右塞左，其拳毛各分上下。

【主治】 拳毛倒睫。

14536 搐鼻散

【方源】《医林绳墨大全》卷五。

【组成】 细辛 川芎 石膏 皂角末各五分 雄黄 焰消各七分

【用法】 上为细末。先含温水一口，再吹药入鼻，左痛吹右，右痛吹左；或左痛竟吹左，右痛竟吹右。

【主治】 头痛。

14537 搐鼻散

【方源】《金匮翼》卷五。

【组成】 青黛 石膏 芒消 郁金 薄荷 牙皂

【用法】 上为末。搐鼻。

【主治】 湿热头痛。

14538 搐鼻开关药

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】 皂角（煨，去皮） 北细辛 南星（生用） 半夏（生用）各等分 麝香少许

【用法】 上为极细末。每用少许，以竹管盛药，吹入鼻中。牙关紧，用乌梅煎浓汁，调和药末，擦入两牙关内。搐而嚏者可医，不嚏者难治。

【主治】 惊风。

14539 搐鼻如圣散

【方源】《成方切用》卷三。

【组成】 皂角（去皮弦，炙） 白矾 雄黄 藜芦

【用法】 上为末。搐鼻。

【主治】 缠喉急痹，牙关紧闭。

14540 搐鼻通天散

【方源】《丹溪心法·附余》卷一。

【组成】 川芎 细辛 藜芦 白芷 防风 薄荷各一钱 猪牙皂角（刮去皮）三个

【用法】 上为细末。用芦筒纳药，每用少许，吹入鼻中。

【主治】 卒暗中风倒地，牙关紧急，人事昏沉。

14541 搐鼻通气散

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】 玄胡索 玄参各三钱 牙皂 川芎各二钱 细辛 藜芦 草乌各 钱 闹羊花六分

【用法】 上为末。用纸捻蘸药，送入鼻内，每日三次。取嚏为度，以嚏出脓者必愈，无嚏者不治。

【主治】 时毒嫩肿，咽喉不利者。

14542 搐鼻通顶散

【方源】《医方类聚》卷七十引《经验秘方》。

【组成】 金头蜈蚣二个 全蝎二个 滑石五钱 盆消二钱半 乳香 没药 川芎 石膏各一钱 细辛 藿香叶各半钱

【用法】 上为极细末。搐或芦管贮之，以鼻吸上，日三五服。

【主治】 偏正头痛，及眼目昏暗，暴赤甚者。

【加减】 治眼，加青黛、薄荷叶各一钱。

14543 搐鼻碧云散

【方源】《原机启微》卷下。

【异名】 搐鼻通气散(《内科摘要》卷下)。

【组成】 鹅不食草二钱 青黛 川芎各一钱

【用法】 上为细末。先噙水满口，每用如米许，搐入鼻内，以泪出为度，不拘时候。

【主治】 ①《原机启微》：眼目肿胀红赤，昏暗羞明，瘾涩疼痛，风痒鼻塞，头痛脑酸，外翳攀睛，眵泪稠粘。②《外科正宗》：结毒入于巅顶，以致头疼胀痛如破者。

【方论选录】 ①《原机启微》：以鹅不食草解毒为君；青黛去热为佐；川芎大辛，除邪破留为使。升透之药也，大抵如开锅盖法，常欲使邪毒不闭，令有出路。然力少而锐，搐之随效，宜常搐以聚其力，诸目病俱可用。②《成方便读》：青黛、川芎清肝火而疏肝郁，鹅不食草能开肺而取嚏。用治肺之药，吹入肺之窍，使金令下行，肝邪自愈，翳障自除耳。

【备考】 本方方名，《本草纲目》引作“碧云散”。

14544 鉴远汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 附子 北五味各一钱 熟地 葳蕤各一两 山茱萸五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 近视。

14545 暖下丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】 大附子二只（生，去皮脐） 生姜一斤 好丁香四七粒

【用法】 将生姜研细，取自然汁；煮附子，候软，切作片子，再慢慢煮，候附子九分熟，滤出焙干；入丁香同研为末，却将煮附子姜汁熬膏为丸，如小梧桐子大。每服三十丸至五十丸，食前煎沉香汤（香附、白茯苓、缩砂仁、甘草、沉香、姜、枣）送下。

【主治】 脏寒泄泻。

14546 暖中丸

【方源】《医学纲目》卷二十一。

【组成】 陈皮 苍术 厚朴（制） 三棱 白术 青皮各五钱 香附一斤 甘草二两 针砂十两（炒红，醋淬）

【用法】 上为末，醋糊为丸。每服五十丸，空心盐姜汤送下，晚食前酒下亦可。

【功用】 杀肝邪，舒脾气。

【主治】 黄胖。

【宜忌】 忌狗肉。气虚者不宜用。

14547 暖风汤

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】 细辛 五味子 防风 茺蔚子 藁本 知母 黄芩 川芎 龙胆草 蔓荆子 木贼 苍术 夏枯草 香附

【用法】 白水煎，食后服。

【主治】 充风泪出外障。

14548 暖肝煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 当归二钱 枸杞三钱 茯苓二钱 小茴香二钱 肉桂一钱 乌药二钱 沉香一钱（木香亦可）

【用法】 水一钟半，加生姜三五片，煎七分，食远温服。

【主治】 肝肾阴寒，小腹疼痛，疝气。

【加减】 如寒甚者，加吴茱萸、干姜；再甚者，加附子。

【方论选录】《谦斋医学讲稿》：本方以温肝为主，兼有行气、散寒，利湿作用。以当归、杞子温补肝脏，肉桂、茴香温经散寒，乌药、沉香温通理气，茯苓利湿通阳。凡肝寒气滞，症状偏在下焦者，均可用此加减。

14549 暖肾丸

【方源】《直指》卷十五。

【组成】 葫芦巴（炒） 故纸（炒） 川楝肉（用牡蛎炒，去牡蛎） 大熟地黄（洗，焙） 益智仁 鹿茸（酒炙） 山茱萸 代赭石（煮熟，醋蘸七次，研细） 赤石脂各三分 龙骨 海螵蛸 熟艾（米醋浸一宿，炙焦） 丁香 沉香 滴乳香各二分 禹余粮（煅，醋淬，碎为度，细研）三分

【用法】 上为细末，水煮糯米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前石菖蒲煎汤送下。

【主治】 肾虚多溺，或小便不禁而浊。

14550 暖肾散

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】 巴戟天（去心，麸炒黑） 甘遂（炒黄）各一分 槟榔（一枚生，一枚炮）二枚 木香 苦葶苈（纸上炒）各一分 大麦芽 芫花（醋浸，炒黄） 陈橘皮（去白炒）各半两 腻粉一钱 沉香（锉） 泽泻各一分

【用法】 上为散。每服二钱匕，用猪腰子一只，以竹刀子割开，去筋膜，作三片，掺药末在内，用湿纸裹，慢火煨令香熟，先煮葱白三茎，令熟细切，将葱与粟米同煮粥一碗，临卧先食粥一半，方食腰子，药后再食粥令尽，至五更大便并小便下赤黄恶物乃验。

【主治】 水气肿满。

14551 暖肺汤

【方源】《眼科龙木论》卷五。

【组成】 茺蔚子 细辛 五味子 干地黄各一两半 藁本一两半 知母 黄芩 芎藭各一两

【用法】 上为末。每用一钱，以水一盏，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】 冲风泪出外障。

14552 暖炉丹

【方源】《医学正印》卷上。

【组成】 潮脑（入碗升打三次如灰色）三钱 蛇床子五钱 牡蛎一钱 母丁香三钱 良姜一钱 紫梢花一钱

【用法】 上为细末，津唾为丸，如樱桃大。每次一丸，用丝绵裹纳子户中，留滞在外，坐定片时便觉温热，一日一换。

【主治】 妇人子宫寒冷，不能生育。

14553 暖胞丸

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】 吴茱萸三两（生用） 蛇床子三两（酒炒）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如枣核大。绢裹纳阴中。内服八味丸。

【主治】 阴中冰冷，脉紧细者。

【方论选录】 寒湿内袭，阴中冰冷，谓之阴冷，艰于孕育。吴茱萸温暖下元以祛寒湿，蛇床子祛除下湿以清胞脉，蜜丸绢纳，内服八味丸以暖子宫，何患阴冷不除，孕育不再。

14554 暖宫丸

【方源】《局方》卷九。

【组成】 生硫黄六两 禹余粮（醋淬，手捻为度）九两 赤石脂（火煅红） 附子（炮，去皮脐） 海螵蛸（去壳）各三两

【用法】 上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心、食前温酒或淡醋汤送下。

【主治】 冲任虚损，下焦久冷，脐腹疞痛，月事不调，或来多不断，或过期不至，或崩中漏血，赤白带下，或月内再行，淋沥不止，带下五色，经脉将至，腰腿沉重，痛连脐腹，小便白浊，面色萎黄，肢体倦怠，饮食不进，渐至羸弱；及治子宫久寒，不成胎孕。

14555 暖宫丸

【方源】《局方》卷九。

【组成】 沙参（净洗） 地榆 黄耆 桔梗 白薇 牛膝（酒浸一宿） 杜仲（去粗皮，姜汁炙） 厚朴（去粗皮，姜汁炒） 白芷各半两 干姜（炮） 细辛（去苗） 蜀椒（去目及闭目，炒出汗）各一分 附子（大者，炮，去皮脐）一个

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十至三十丸，空心温酒或枣汤吞下。

【主治】 冲任虚损，下焦久冷，脐腹疞痛，月事不调，或来多不断，或过期不至，或崩中漏血，赤白带下，或月内再行，淋沥不止，带下五色，经脉将至，腰腿沉重，痛连脐腹，小便白浊，面色萎黄，肢体倦怠，饮食不进，渐至羸弱；及治子宫久寒，不成胎孕。

14556 暖脏丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】 吴茱萸（汤泡七次，炒） 黄连（去毛，锉，炒令赤色）各等分

【用法】 上为细末，用大蒜头煨熟，研烂为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前米饮送下。

【主治】 泻痢。

14557 暖脐膏

【方源】 年氏《集验良方》卷二。

【组成】 韭子一两 蛇床子一两 附子一两 川椒三两 肉桂一两 独蒜一斤

【用法】 上用香油二斤浸十日，加丹熬膏。

【主治】 脾气不实，五劳七伤，命门火衰，阳痿精冷。

14558 暖脐膏

【方源】《中药成方配本》（苏州）。

【组成】 肉桂末三钱 公丁香末三钱 白胡椒末四钱 万应膏药肉八两

【用法】 将药肉炖化，搅入药末，用软红布薄摊，每张约一钱。贴脐上。

【功用】 温中散寒。

【主治】 脐腹受寒，腹痛泄泻。

14559 暖肝益肾汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】 熟地 当归 枸杞 杜仲 附子 沉香 丁香 吴萸 刀豆壳（炮）

【主治】 肝肾虚寒之呃逆。

14560 暖胃和中汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】 山药（炒）一钱半 茯苓一钱三分 扁豆（炒，研）二钱 乌药一钱二分 吴茱萸（开水泡一次）七分 陈皮八分 草豆蔻（煨，研）八分 木香三分 甘草（炙）八分

【用法】 水煎服。

【主治】 腹痛胀满，喜热恶食，脉沉紧者。

14561 暖宫万灵丸

【方源】《普济方》卷三二二引《德生堂方》。

【组成】 川芎 当归 芍药 熟地黄 生地黄各三两 白茯苓 牡丹皮 肉桂 玄胡 黄耆 泽兰 卷柏 牛膝（酒浸） 香附子（炒） 白术 甘草 没药（另研） 吴茱萸（炒）各二两 木香一两 薯蓣 山茱萸 桂心各一两 石斛一两半（去根） 钟乳粉三分 藁本 五味子各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】 冲任虚损，下元久冷，脐腹疞痛，月水不调，或前或后，或多或少，过期不来，或来时崩下，或月内再行，淋沥不止，带下五色，经脉时至，肢体倦怠，饮食不进，渐至羸瘦。及子宫久寒，不成孕。

14562 暖宫定痛汤

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】 橘核三钱 荔枝核三钱 小茴香三钱 胡芦巴三钱 延胡索三钱 五灵脂三钱 川楝子三钱 制香附三钱 乌药三钱

【功用】 疏散寒湿，温暖胞宫，行气活血，化瘀止痛。

【主治】 慢性盆腔炎属于下焦寒湿，气血凝结者，或宫冷不孕。

14563 暖宫蠲斯丸

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷十引《医方集略》。

【异名】 壬子丸（《摄生众妙方》卷十一）。

【组成】 厚朴一两二钱半 吴茱萸 白茯苓 白及 白蔹 石菖蒲 白附子 桂心 人参 没药各一两 细辛 乳香 当归（酒浸） 牛膝（酒洗）各七钱半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如小豆大。酒下一二十丸。壬子日修合。

【功用】 调经种子。

【主治】 妇人不孕。

14564 睡惊丹

【方源】《局方》卷十（绍兴续添方）。

【异名】 睡惊丸（《卫生总微》卷六）。

【组成】 蛇黄（火煅红，米醋淬五遍，再将醋煮干为度） 天南星（碾为粉，用薄荷汁为饼，炙熟） 茯苓（去皮） 铁粉（重罗） 使君子仁各半斤 脑子（别研）半两 麝香（别研）一两 银箔（研） 金箔（研）各一百片

【用法】 上为末，糯米糊为丸，如皂荚子大，朱砂为衣。每服一丸，五岁儿分二服，三岁以下儿分三、四服，薄荷汤磨下，更量岁数加减。

【功用】 安神镇心，定惊控痰。

【主治】 ①《局方》：小儿惊邪，风热痰壅，咽膈不利，夜卧不安，睡中啼哭，惊风搐搦。②《易简方》：因惊者泄泻，其色必青。

14565 蜈甲散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 蜈蚣（炙）七钱 鳖甲（炙）二钱

【用法】 上为末。每服三分，酒送下。至四五服，骨自出，再用药生肌收口。

【主治】 多骨疽。诸疮出脓后，因内有死骨而久不收口。

14566 蜈蚣丸

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】 白附子 天南星 赤脚蜈蚣 防风 半夏

【用法】 上锉。在地上掘一小窍，用炭火煅炼约半日，一日尤好，地脉透热，入黄子醋在窍，至八分满，随倾诸药煮之；再用瓷碗一只快捷盖住，以泥封四围，至次日相对方取出，焙干为末，以猪心血同炼蜜为丸，不拘丸子大小。量儿大小投药，薄荷汤送下。

【主治】 小儿惊风。

【备考】《普济方》诸药各等分。

14567 蜈蚣饯

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 桐油二两 独活 白芷 甘草 蜈蚣各一钱

【用法】 上药入桐油内煎滚。将臁疮洗净，用白

面水调作圈，围在疮之四边，毋令泄气走油，将脚放平，以茶匙挑油乘热渐渐加满，待油温取去，腐肉、风毒自然脱下。再用解毒紫金膏搽上，纸盖绢扎，三日一换。

【主治】 臁疮多年，黑腐臭烂作疼，诸药不效者。

【宜忌】《灵验良方汇编》：愈后忌发物，煎炒一年。

14568 蜈蚣散

【方源】《保命集》卷中。

【组成】 蜈蚣一对 鳔三钱 左蟠龙五钱（炒，烟尽为度。野鸽粪是也）

【用法】 上为细末。每服一钱，清酒调下。次当下之。

【主治】 破伤风。

【宜忌】 但有里证不可服。

【备考】《医学纲目》本方用法：上为细末，用防风汤调服。

14569 蜈硝散

【方源】《千家妙方》上册。

【组成】 蜈蚣 12 克 全蝎 56 个 火硝 6 克 甘草 6 克

【用法】 上为细末，分作二十八包。每日早、晚各一包，白凉开水送下。

【功用】 化腐生肌，解毒消肿。

【主治】 胸椎骨结核属阴毒内泛证者。

14570 蜈蚣油膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 蜈蚣一条（焙干，去头足）

【用法】 上为细末，用植物油 20 毫升搅拌均匀。外敷患处。

【主治】 淋巴腺结核。

14571 蜈蚣星风散

【方源】《金鉴》卷七十五。

【组成】 蜈蚣二条 江鳔三钱 南星 防风各二钱五分

【用法】 上为细末。每用二钱，黄酒调服，一日二次。

【功用】 搜风发汗。

【主治】 破伤风。

14572 蜈蚣矫正饮

【方源】《千家妙方》上册。

【组成】 蜈蚣 1 条（去头足） 地龙 12 克 当归 12 克 赤芍 10 克 鸡血藤 15 克 羌活 10 克 防风 10 克 白芷 10 克 川芎 9 克

【用法】 水煎服。每日一剂。

【功用】 祛风散寒，去瘀化痰，通经活络。

【主治】 面神经炎属风湿痰阻，瘀停经脉者。

14573 蜗牛丸

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】 蜗牛半碗 鸡苏半斤

【用法】 上同研极细，水浸宿蒸饼为丸，如梧桐子大。每服十五丸，疮未破者，浆水送下；已破者，薄荷汤送下，一日三次。

【主治】 瘰疬已破或未破者。

14574 蜗牛散

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】 蜗牛三七枚（烧灰，细研） 磁石（火煅，醋淬）一两（细研）

【用法】 上为细末。每服二钱匕，空心米饮调下，日午再服。

【主治】 痢后脱肛。

14575 蜗牛散

【方源】《三因》卷十五。

【组成】 蜗牛不拘多少（以竹索串，瓦上晒干，烧存性）

【用法】 上为末，入轻粉少许，猪脊髓调，用纸花量病人大小贴之。

【主治】 瘰疬，不论溃破与否。

14576 蜗牛膏

【方源】《济生》卷八。

【组成】 蜗牛一枚 麝香三分

【用法】 以小砂合子盛蜗牛，以麝香掺之，次早取汁。外涂痔处。

【主治】 痔疮。

14577 蜗牛膏

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 蜗牛

【用法】 上捣烂。外敷患处。

【功用】 止痛消肿。

【主治】 肿毒恶疮。

【加减】 加雄黄少许尤妙。

14578 蛾黄散

【方源】《济生》卷五。

【组成】 黄柏（去皮） 寒水石（烧）各等分

【用法】 上为细末。干贴患处。

【主治】 口疮，赤白疼痛，唇破；兼治热疮。

14579 蜂房汤

【方源】 方出《圣济总录》卷一二〇，名见《古方选注》卷下。

【组成】 猪牙皂荚（炙，去皮子） 露蜂房（炒） 蜀椒（去目并合口，炒） 细辛（去苗叶）各等分

【用法】 上为散。每服一钱匕，水一盏，煎沸，热含冷吐，不拘时候。

【主治】 风蛀牙齿疼痛。

【方论选录】《古方选注》：蜂房汤，风火湿蛋蛀虫之方也。蜂房、川椒去风而能杀虫，牙皂、细辛去风之功胜，蛇床子去湿之功多。风湿既去，虫自消灭。

【备考】《古方选注》有蛇床子。

14580 蜂房散

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】 露蜂房（烧灰）

【用法】 上为细末。每服二钱匕，水一盏，煎至六分，温服，不拘时候。

【主治】 妒乳。产后乳汁不出，蕴积在内，结成痈肿。

14581 蜂房散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】 露蜂房一个（以生盐筑满诸孔眼，火烧存性，去盐） 胆矾 天花粉 蝉蜕各等分

【用法】 上后三味为细末，用纸包三分，与蜂房同活鲫鱼一对以酒煮至鱼熟。子无风处细嚼，连刺饮酒，后痒自上而下，赶入四肢。

【主治】 白癜风。

14582 蜂窝散

【方源】《回春》卷五。

【组成】 马蜂窝 白蒺藜 花椒 艾叶 葱头 荆芥 细辛 白芷各等分

【用法】 上锉。醋煎，口噙漱良久，吐出再噙。

【主治】 牙痛或肿，风牙、虫牙，牙痛、牙长痛不可忍。

14583 蜂窝散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 蜂房一个 胡椒 川椒各适量 黄柏三片（如指大）

【用法】 在蜂房每孔内入胡椒、川椒各一粒，用碗盛之，入水令满，再加黄柏，以碟盖纸封固，重汤煮二炷香，取出。候温噙漱之，良久吐出。

【功用】 杀虫。

【主治】 疳蟹。由饮食余滓，积齿缝间，腐肉之气淹渍，致齿龈有孔，虫生其间，蚀一齿尽，又蚀一齿，致成此病。

14584 蜕螂散

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】 蜕螂（大者） 一个（小者）一个

【用法】 上以新瓦焙干存性，为末。用好酒调下；不能饮者，和滚水及酒各半调服。

【主治】 风痰壅塞，大便闭结，欲下不下者。

14585 罩胎散

【方源】《女科万金方》。

【异名】 罩胎饮（《郑氏家传女科万金方》卷二）、罩胎煎（《叶氏女科》卷二）。

【组成】 当归 白芍药各三钱 枳壳四钱 砂仁 川芎各二钱 甘草六分

【用法】 上锉散，分作二大服。每服以水一钟半，煎至七分，空心热服；滓再煎，分六服。

【主治】 孕妇禀气薄，或病后受胎，怀胎一月，头晕恶心，不思饮食，六脉浮紧。

【宜忌】 忌食生冷等物。

14586 蜀椒丸

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】 蜀椒（去目及闭口者）十两 厚朴（去粗皮）十两（以生姜汁炙令香，细锉） 盐花十两 附子（炮裂，去皮脐，锉碎）二两

【用法】 上以水一斗，于银石器内以文武火熬，候水尽为度，焙干为末，炼蜜同糯米粉糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心温酒送下；如大肠滑泄，生姜米饮送下。

【主治】 脾胃气虚弱，多困羸瘦，面黄口淡，不思饮食。

14587 蜀椒汤

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】 蜀椒（去目并闭口，炒出汗） 盐（研） 土蜂房各一分

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，以水三盏，入葱白三寸拍破，煎十余沸，热漱冷吐，一日三五次。

【主治】 牙齿疼痛。

14588 蜀椒汤

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】 蜀椒（去目及闭口者） 白芷 防风（去叉） 盐各一分 芎藭三分

【用法】 上锉。以水三升，煎至二升，去滓温洗，冷即再暖，频洗。

【主治】 冬月寒冻，面目手足肉裂。

14589 蜀椒散

【方源】 方出《圣惠》卷四十八，名见《圣济总录》卷九十四。

【组成】 川椒一分（去目及闭口者，微炒出汗）

附子一两（炮裂，去皮脐） 干姜半两（炮裂，锉） 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 甘草半两（炙微赤，锉） 桂心半两

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加粳米半分，生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 寒疝。心痛如刺，绕腹中尽痛，白汗出，气欲绝。

14590 蜀漆散

【方源】 《金匮》卷上。

【组成】 蜀漆（洗去腥） 云母（烧二日夜） 龙骨各等分

【用法】 上为散。未发前以浆水调下半钱，临发时服一钱匕。

【主治】 牡疟，疟多寒者。

【加减】 温疟，加蜀漆半分。

【方论选录】 ①《医方考》：病源于顽痰癥瘕者，此方主之。顽痰乃至阴所化，癥瘕乃凝结之阴，故令人有寒无热。蜀漆、云母、龙骨既经烧炼，则味涩而辛热，味涩可以固既脱之阳，辛热可以消固结之阴。仲景治火劫亡阳之证，于桂枝汤去芍药加蜀漆、龙骨辈，名曰救逆汤，是二物之为纯阳可知。云母烧二日夜，则寒性亦去而纯阳矣，宜仲景之用之也。②《金匮玉函经二注》：心者牡脏也，邪在心而成疟，故曰牡疟。何以言之？心肺居上，阳也，而心乃阳中之阳，今邪气结伏心下，则心虚。《内经》曰：心虚者，热收于内，则阳气不行于外，故外寒。积聚津液以成痰，是以牡疟反多寒也。用蜀漆和浆水以吐所结之痰邪；龙骨以疗气伏心下者；云母安脏补虚，以除内收之热。若夫温疟亦用是，少加蜀漆治者，亦为邪气结伏在心下，致伤气而不入于阴，反独盛在外，以成热而不寒，故亦以此去其所结也。③《张氏医通》：蜀漆性升，上涌顽痰最速，云母性温，开发阴邪最猛，二味相须，较之常山，阳起石更捷。又恐涌泄太过，即以龙骨敛固其津，仍取龙性纯阳，同气相求，佐上药以发越阴分伏匿之邪，则牡疟之寒自已。④《金匮要略心典》：疟多寒者，非真寒也。阳气为痰饮所遏，不得外出肌表，而但内伏心间。心，牡脏也，故名牡疟。蜀漆能吐疟痰，痰去则阳伸而寒愈；取云母、龙骨者，以蜀漆上越之猛，恐并动心中之神与气也。⑤《古方选注》：《金匮》云牡疟，《外台》曰牡疟，皆言心经之疟也。心为阴中之阳，邪气结伏于心下，心阳郁遏不舒，疟发寒多热少，不可谓其阴寒也。上之以蜀漆散，通心经之阳，开发伏气，而使营卫调和。蜀漆，常山苗也，苗性轻扬，生用能吐；云母在土中，蒸地气上升而为云，故能入阴分，逐邪外出于表；然邪气久留心主之宫城，恐逐邪涌吐，内乱神明，故佐以龙骨镇心宁神，则吐法转为和法矣。

14591 照水丸

【方源】 《圣济总录》卷一一一。

【组成】 龙脑 滑石 丹砂（通明者） 乌贼鱼骨（去甲）各一钱

【用法】 上各为细末，再同研匀。先用黄蜡（皂子大）二三块，纳新白瓷盏内，于慢火上熔，用纱帛子滤过，在净盏内再熔了，与前药末共同拌和，捏作饼子，如半破豌豆大，用薄绢或纱袋子盛了；以硇砂半两，放在净碗内，上交横安竹片，铺药饼，借硇砂气熏，用大棒一片，合碗口，勿令透气；掘一地坑，放药碗在坑内，用竹篦子一片盖了，然后以黄土盖之，七日取出，净瓷瓶中收药饼，硇砂不用。临卧将一饼扎在眼眦头，即睡至晓，用水一碗，向东觀水碗，其药自落在水中浮浴，却用绢帛子裹起，安洁净处，临卧依前再使，每饼可用半月，候药力慢时，方易一饼，如两目有疾，即用两饼。

【主治】 眼生翳障及一切目疾。

14592 照水丹

【方源】 《永乐大典》卷一一四一二引《卫生家宝》。

【组成】 轻粉一字 脑子半字 麝香半字 辰砂半钱 硼砂半钱 水银三字 硇砂半字 铜青半两 杏仁三粒（汤去皮尖）

【用法】 上为细末，用蜡一块（如弹子大）熔，用药和匀，以小盒盛，旋取作饼。睡时安眼头，天明以水一盏，照下，看膜，依前收，夜再用。

【主治】 翳膜。

14593 遣虫丸

【方源】 《永类钤方》卷二十。

【组成】 槟榔 芜荑（去皮） 雷丸 定粉 鹤虱（炒）各等分

【用法】 上为末，煎苦楝汤煮糊为丸，如绿豆大。每服三十丸，使君子煎汤送下。

【主治】 小儿虫动腹痛，啼叫吐涎沫。

14594 锡类散

【方源】 方出《金匮翼》卷五，名见《温热经纬》卷五。

【组成】 西牛黄五厘 冰片三厘 真珠三分 人指甲五厘（男病用女，女病用男） 象牙屑三分

（焙） 青黛六分（去灰脚，净） 壁钱二十个（焙。土壁砖上者可用，木板上者不可用）

【用法】 上为极细末。吹患处。

【主治】 ①《金匮翼》：烂喉痧。②《温热经纬》：烂喉时证，及乳蛾、牙疳、口舌腐烂，凡属外淫为患，诸药不效者。

【临证举例】 ①消化性溃疡 《广西中医药》(1987；3:13)：王氏用锡类散治疗消化性溃疡68例。每次用本方0.6克，氢氧化铝凝胶15毫升，颠茄合剂15毫升，混合后温开水送服，每晚1次，3周为一疗程。结果，三周内症状总缓解率为79.4%，溃疡痊愈率66.2%。②摄食性食管炎《江苏中医杂志》(1987;8:42)：郁氏用氢氧化铝凝胶30毫升，加锡类散1支均匀混合。每日临睡时，平卧后口服，服后不再进水，2周为一疗程，共治疗摄食性食管炎30例。结果显效15例，有效9例，无效6例，总有效率80%。③慢性非特异性溃疡性结肠炎 《山西中医》(1987；4:31)：袁氏用锡类散0.6～1.2克，加生理盐水100～200毫升保留灌肠（16例加庆大霉素4～8万单位），每晚睡前一次，15天为一疗程，治疗62例慢性非特异性溃疡性结肠炎。结果痊愈46例，显效11例，好转4例，无变化1例、总有效率98.3%。④宫颈糜烂《辽宁中医杂志》(1988；10:18)：王氏等用锡类散治疗宫颈糜烂170例。在病人非月经期及非妊娠期，用0.25g锡类散均匀喷涂于宫颈糜烂面上，每日一次。结果上药1～7次痊愈。其中1次痊愈94例，2～3次51例，4次以上21例，4例中断治疗。

14595 锡类散

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 西瓜霜料二钱 生硼砂二钱 生寒水石三钱 青黛六钱 冰片五分 珍珠（豆腐制）三钱 硇砂（炙）二钱 牛黄八分

【用法】 用药少许吹患处。

【功用】 清热利咽，消肿止痛。

【临证举例】 ①口腔溃疡 王某某，男，38岁。1972年6月17日初诊，口腔经常反复发作溃疡十四年。近一年来会阴部也出现溃疡。经诊断为“白赛氏综合症”。用滋阴降火内服汤药，外用锡类散治疗壹月余，溃疡完全愈合。随访三个月未再复发。②口腔扁平苔癣 王某，女，17岁，1971年9月20日初诊。舌面上起疙瘩五个多月，呈乳白色，如瓜子样大小，疼痛，诊断为口腔内扁平苔癣，用滋补肝肾，健脾利湿剂内服，外用锡类散涂患处。加减治疗三个多月后皮损完全消退。

14596 锦红片

【方源】《方剂学》引上海龙华医院方。

【组成】 生大黄 蒲公英 红藤 厚朴

【用法】 制成片剂。每服4片，一日三次。

【功用】 ①《方剂学》：清热解毒，活血消痈。②《中医外科学》：清热解毒，行气通腑，活血消肿。

【主治】 急性阑尾炎。

【备考】 本方改为汤剂，名“锦红汤”（见《中医外科学》）。

14597 锦鸠丸

【方源】《局方》卷七。

【异名】 羊肝丸(《圣济总录》卷一一二)、神驻锦鸠丸(《原机启微》卷下)。

【组成】 草决明子 蕤仁（去皮） 羌活（去芦） 瞿麦各三两 细辛（去苗） 牡蛎（洗，火煅取粉） 黄连（去须） 杜蘅藜（炒，去尖角） 防风（去芦） 肉桂（去粗皮） 甘菊花（净）各五两 白茯苓（去皮）四两 斑鸠一只（去皮、毛、肠、嘴、爪，用文武火连骨炙干） 羯羊肝一具（薄批，炙令焦） 蔓荆子二升（淘洗，绢袋盛，饭甑蒸一伏时，晒干）

【用法】 上为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心、日午、临卧以温水或温酒送下，一日三次。如久患内外障眼，服诸药无效者，渐加服五十丸；暴赤眼疼痛，食后用荆芥汤送下二十丸。

【主治】 肝经不足，风邪内乘上攻，眼暗泪出，怕日羞明，隐涩痒痛，瞻视茫茫，多见黑花，或生翳膜。

【方论选录】《原机启微》：方以甘菊花、草决明主明目为君；以蕤仁、牡蛎、黄连、蒺藜除湿热为臣；以防风、羌活、细辛之升上，瞿麦、茯苓之分下为佐；以斑鸠补肾，羊肝补肝，肉桂导群药入热邪为使。

14598 锦蓉散

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】 锦纹大黄十六两 白芷四两 芙蓉叶二两 元参二两

【用法】 各取净末，研至无声为度。用葱汁黄蜜调敷。

【主治】 一切外症初起，红热火症。

14599 锭子眼药

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】 黄丹一两（飞） 黄柏半两（去皮） 黄连半两（去须） 枯白矾半两 炉甘石半两（用黄连制） 铜绿半两 硇砂三钱 川乌三钱（炮） 干姜二钱 蝎梢一钱 信半钱（火煅） 乳香少许 没药少许

【用法】 上为细末，入豆粉四两，浇蜜和就如大麦许铤子。入眼大眦头，待药化，泪出为效。

【主治】 目外障。

14600 催生丹

【方源】《局方》卷九。

【异名】 神效催生丹（《卫生家宝产科备要》卷六）、顺生丹（《校注妇人良方》卷十七）、兔脑丸（《医学六要》卷七）、催生丸（《良朋汇集》卷四）、兔脑催生丹（《女科指掌》卷四）、催生兔脑丸（《灵验良方汇编》卷上）、手握丹（《胎产心法》卷四）、速产兔脑丸（《饲鹤亭集方》）。

【组成】 麝香（别研）一字 乳香（别研极细）一分 母丁香（取末）一钱 兔脑髓（腊月者，去皮、膜，研）

【用法】 上拌匀，以兔脑和丸，如鸡头瓤大，阴干，用油纸密封贴。每服一丸，温水送下。

【主治】 产妇生理不顺，产育艰难，或横或逆。

14601 催生汤

【方源】《回春》卷六。

【组成】 桃仁（炒，去皮） 赤芍 牡丹皮（净） 白茯苓（去皮） 官桂各一钱

【用法】 上锉一剂。水煎，热服。候产母腹痛、腰痛，见胞浆水下者方可服。

【主治】 ①《回春》：难产。②《医略六书》：血实产难，脉紧涩滞者。

【方论选录】《医略六书》：方内桃仁破瘀通经以运胎，官桂温经散寒以缓胎，赤芍破瘀活血以逐胎，赤苓渗湿利营以下胎，丹皮凉血泻热以防上僭也。水煎热服，俾经寒外散，则血瘀顿化而胎孕灵活，产门自开，何致生产艰难，不得顺下哉！

14602 催生饮

【方源】《回春》卷六。

【组成】 当归 川芎 大腹皮（洗） 枳壳（麸炒） 白芷各等分

【用法】 上锉一剂。水煎，温服。

【主治】 ①《回春》：燥涩紧敛，生产难者。②《医略六书》：临产血亏气滞，不能荣润其胎，故生产艰难，脉涩滞者。

【方论选录】《医略六书》：方中当归养血，以荣胎气；川芎活血，以行血气；白芷通经散滞；枳壳泻滞化气；大腹皮泻滞气，以推送胎元。水煎温服，使血活气行，则胎元运动而无阻遏之患，何致生产艰难不顺哉！

14603 催生散

【方源】《丹溪心法》卷五。

【异名】 催生神应黑散（《宋氏女科》）。

【组成】 白芷（灰） 百草霜 滑石

【用法】 上为末。用芎归煎汤调下，或姜汁服亦可。

【主治】 ①《丹溪心法》：难产。②《宋氏女科》：难产因坐草太早，努力过多，或已破水血干者，及月水不调，崩漏。

【宜忌】《灵验良方汇编》：候儿顺产门，方煎服。若未正先服，反催偏生。

【备考】《灵验良方汇编》本方用各等分，为末。每服二钱，煎芎归汤送下。

14604 催生立应散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】 车前子一两 当归一两 冬葵子三钱 牛膝二钱 白芷三钱 大腹皮二钱 枳壳二钱 川芎二钱 白芍一钱

【用法】 上锉。水煎熟，入酒少许服之。

【主治】 ①《古今医鉴》：难产及横生逆产。②《医略六书》：临产胞浆先破，产门干涩，致窍闭难产，脉弦涩。

【方论选录】《医略六书》：方内车前子清降通闭，冬葵子滑胎利产，香白芷开泄阳明，大腹皮疏利逆气，当归养血脉润胎，枳壳破滞逆泻气，川芎行血中之气，白芍敛阴中之血，牛膝逐胎下行以易产。为散，入酒煎，使血液内充，则滞气亦化，而沟满渠通窍道润泽，何有难产之患，乃致横生逆下哉。

14605 催生如意散

【方源】《妇人良方》卷十七。

【异名】 如意散（《准绳·女科》卷四）。

【组成】 人参（为末） 乳香各一钱 辰砂半钱

【用法】 上为细末。临产时，急用鸡子清一个调药末，再用生姜自然汁调开，冷服。如横生倒生，即时端顺，子母平善。

【主治】 ①《妇人良方》：横生倒生。②《医略六书》：产妇气虚血滞，胎虽弥月，临蓐未能转正，以用力太猛，故致横生倒产，心烦不宁，脉软涩者。

【宜忌】 临产腰疼方可服之。

【方论选录】《医略六书》：人参扶元补气以通血

脉；乳香散瘀活血以逐胎元；辰砂镇坠心气，安神定志，以除烦也。为散，更以蛋清调下，俾元气内充，则血脉运动，而心烦得宁，儿身转正，胎产无不顺，何致横生倒逆产哉。

14606 催生柞木饮

【方源】《本草纲目》卷三十六引《产宝》。

【异名】 催生柞木叶饮(《圣济总录》卷一五九)、催生柞木饮子(《妇人良方》卷十七)、柞木饮(《回春》卷六)、催生神柞散(《寿世保元》卷七)、柞木饮子(《济阴纲目》卷十)、催生神柞饮(《大生要旨》卷三)。

【组成】 大柞木枝一大握（长一尺，洗净） 大甘草五寸（并寸折）

【用法】 以新汲水三升半，同入新沙瓶内，以纸三重紧封，文武火煎至一升半。待腰腹重痛，欲坐草时，温饮一小盏，便觉心下开豁；如渴，又饮一盏，至三四盏，觉下重便生。

【主治】 ①《本草纲目》引《产宝》：妇人难产。②《圣济总录》：妇人横产倒生，死胎在腹，胀烂不出。

【宜忌】 切不可坐草太早，及坐婆乱为也。

【备考】 方中柞木枝，《圣济总录》用柞木叶一把（并细枝，锉）。

14607 催生神妙乳珠丹

【方源】《妇人良方》卷十七。

【异名】 神妙乳砂丹(《校注妇人良方》卷十七)。

【组成】 乳香（细研）

【用法】 上以猪心血为丸，如梧桐子大，朱砂为衣，晒干。每服一粒，如催生，冷酒化下。良久未下，再服一粒；如大段难产时，以莲叶心蒂七个，水二盏，煎至一盏，放温化下一粒，良久未下，亦可再服；如胞浆先破，恶水来多，胎干不得卧时，须先与四物汤及通真丸补养其血气，次更浓煎葱汤，放冷如体，令坐婆洗产户，须是款曲洗，令气上下通畅，仍更用酥调滑石末涂产户里，次服此药；如胎死不下者，用黑豆三合，好醋半升，煮令豆烂，取汁一盏放温，化下药一粒，须臾便下矣，万一未下，亦可再服；若胎横逆不顺，即先服如神散，再服此药，复以此药催之。

【功用】 催生。

【主治】 难产。胞浆先破，恶水来多，胎干不得卧，或胎横逆不顺，及胎死不下，或胎下胞衣未下。

【备考】 本方方名，《玉机微义》引作“催生乳香膏”、“乳朱丹”，《本草纲目》引作“开骨膏”。

14608 鼠屎汤

【方源】《外台》卷二引《古今录验》。

【组成】 鼠屎二十一枚 豉一升（绵裹） 栀子七枚（擘） 大黄三两（切）

【用法】 上以水五升，煎取二升七合，分三次服。微取汗，应小鸭溏下。

【主治】 伤寒劳复。

14609 鼠粘子汤

【方源】《活人书》卷二十一。

【异名】 消毒犀角饮(《局方》卷六吴直阁增诸家名方)、消毒犀角饮子(《御药院方》卷九)、消毒犀角散(《普济方》卷二七二)、鼠粘汤(《普济方》(卷四〇三)、消毒饮子(《明医指掌》卷六)、消毒犀角汤(《玉案》卷三)、鼠粘子散(《医略六书》卷二十)。

【组成】 鼠粘子四两（炒香） 甘草一两（炙） 防风半两 荆芥穗二两

【用法】 上为末。每服二钱，食后临卧沸汤点服，逐日三服。老幼皆宜服。

【功用】 ①《活人书》：利咽膈，化痰涎，止嗽。春、冬间常服免生疮疖。②《医略六书》：疏风散热。

【主治】 ①《活人书》：小儿疹痘欲出，未能得透皮肤，热气攻咽喉，眼赤心烦者。②《局方》(吴直阁增诸家名方)：大人、小儿内蕴邪热，咽膈不利，痰涎壅嗽，眼赤睑肿，腮项结核，痈肿毒聚，遍身风疹，瘴毒赤瘰，及疮疹已出未出，不能快透者。

【方论选录】《医略六书》：方中防风散风邪以胜湿，荆芥走血分以疏风，甘草缓中泻火，大力子力能疏散风热，以发痧疹也。水煎温服，使风散湿除，则遏热亦外泄而痧疹无不透矣，此疏风散热之剂，为痧疹不出之专方。

14610 鼠粘子汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 鼠粘子 桔梗 当归 甘草梢 赤芍 连翘 玄参 地骨皮 防风 天花粉 木通各一钱 大黄（炒）二钱

【用法】 水二钟，煎至八分，食前服，滓再煎服。

【主治】 鬓疽初起，热多寒少，头眩作痛，口燥咽干，渴常饮冷，二便秘涩，六脉沉实有力，烦闷疼痛者。

14611 愈风丹

【方源】《校注妇人良方》卷三。

【组成】 天麻 牛膝（同酒浸） 萆薢（另研细） 玄参各六两 杜仲七两 羌活十四两 当归 熟地黄 生地黄各一斤 独活五两 肉桂三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，梧桐子大。常服五七十丸，病甚至百丸，空心、食前温酒或白汤送下。

【主治】 妇人诸风肢体麻木，手足不遂，不能动履者。

【备考】 本方原名"愈风汤"，与剂型不符，据《准绳·类方》改。

14612 愈风汤

【方源】 《保命集》卷中。

【异名】 大愈风汤（《普济方》卷一一四）、羌活愈风汤（《洁古家珍》）。

【组成】 羌活 甘草 防风 蔓荆子 川芎 细辛 枳壳 人参 麻黄 甘菊 薄荷 枸杞子 当归 知母 地骨皮 黄耆 独活 杜仲 吴白芷 秦艽 柴胡 半夏 前胡 厚朴 熟地黄 防己各二两 茯苓 黄芩各三两 石膏四两 芍药三两 生地黄 苍术各四两 桂枝一两

【用法】 上锉。每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓温服；如遇天阴，加生姜煎，空心一服，临卧再煎药滓服，俱要食远服，空心一服，嚼下二丹丸，为之重剂，以安神；临卧一服，嚼下四白丹，为之轻剂，以清肺。

【功用】 行导诸经，安心养神，调阴阳。初觉风动，服此不致倒仆。

【主治】 中风证内邪已除，外邪已尽者；及小儿惊痫搐急，慢惊风；脾肾虚，筋弱语言难，精神昏懒；内弱风湿；一臂肢体偏枯，或肥而半身不随，或恐而健忘者。

【加减】 假令一气之微汗，用愈风汤三两，麻黄一两，均作四服，一服加生姜五片，空心服，以粥投之，得微汗则佳；如一旬之通利，用愈风三两，大黄一两，亦均作四服，如前煎，临卧服，得利则妙；常服之药，不可失四时之转，如望春大寒之后，加半夏二两（通四两），柴胡二两（通四两），人参二两（通四两），谓迎而夺少阳之气也；初夏三日，加石膏二两（通六两），黄芩二两（通五两），知母二两（通四两），谓迎而夺阳明之气也；季夏之月，加防己二两（通四两），白术二两，茯苓二两（通五两），谓胜脾土之湿也；初秋大暑后，加厚朴二两（通四两）藿香二两，桂一两（通二两），谓迎而夺太阴之气也；霜降之后望冬，加附子一两，桂一两（通二两），当归二两（通四两），谓胜少阴之气也，得春减冬，四时类此，虽立法于四时之加减，又宜临病之际，审病之虚实热寒，土地之宜，邪气之多少。

14613 愈风散

【方源】 《妇人良方》卷十九引华佗方。

【异名】 如圣散（《证类本草》卷二十八引《经验方》）、青金散（《产宝诸方》）、荆芥散（《卫生家宝产科备要》卷六）、再生丹（《续医说》卷九引《曾公谈录》）、独行散（《本草纲目》卷十四）、华佗愈风散（《准绳·女科》卷五）、举轻古拜散（《明医指掌》卷九）。

【组成】 荆芥（略焙为末）

【用法】 每服三钱，豆淋酒调下，用童子小便亦可，口噤者灌，齿龈噤者吹鼻中皆效。

【主治】 产后中风，口噤，牙关紧急，手足瘛疭如角弓状，血晕，四肢强直，不省人事。

14614 愈带丸

【方源】 《饲鹤亭集方》。

【组成】 熟地四两 白芍五两 当归三两 川柏 良姜各二两 川芎一两 椿根皮十五两

【用法】 米饮糊丸服。

【主治】 妇人冲任不固，带脉失司，赤白带下，经浊淋漓。

14615 愈浊丸

【方源】 方出《丹溪心法》卷五，名见《仙拈集》卷二。

【组成】 良姜 芍药 黄柏各二钱（炒成灰） 椿树根皮一两半

【用法】 上为末，粥为丸。每服四五十丸，空心服。

【主治】 带下赤白浊。

【备考】 方中良姜，《仙拈集》作"子姜"。

14616 愈黄丹

【方源】 《妇产科学》。

【组成】 水蛭三钱 虻虫二钱 制乳没各二钱 黄连二钱 蜂房三钱 黄柏三钱 丹皮四钱 龙胆草五钱

【用法】 上药研末，各取净粉，照方三十料混合后用银花三两煎汤，水泛为丸，雄黄三钱为衣（忌高温烘）。每次五分，一日二次，吞服。

【功用】 健脾化湿，清热解毒。

【主治】 湿毒下注之子宫颈癌。患者一般情况尚好，但有白带绵下，量多，伴有腥臭，或见红，口干苦，腹疼，苔薄腻或黄腻，舌质红，脉滑数。

14617 愈痛散

【方源】《医方类聚》卷九十二引《济生》。

【组成】 五灵脂（去砂石） 玄胡索（炒，去皮） 蓬莪术（煅，锉） 良姜（锉，炒） 当归（去芦，洗）各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，热醋汤调下，不拘时候。

【主治】 急心痛，胃痛。

【备考】《玉案》有甘草。

14618 愈风饼子

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 川乌半两（炮制） 川芎 甘菊 白芷 防风 细辛 天麻 羌活 荆芥 薄荷 甘草（炙）各一两

【用法】 上为细末，水浸蒸饼为剂，捏作饼子。每服三五饼子，细嚼，茶酒送下，不拘时候。

【主治】 雷头，胸中有寒痰，多沐，使头上赤肿核，或如生姜片酸枣之状；妇人头风眩晕，登车乘船亦眩晕眼涩，手麻发脱，健忘喜怒者。

14619 愈癣药酒

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 苦参子 槟榔 白及 洋樟 土槿皮 木通 方八 生姜 百部 花椒各一两

【用法】 高粱酒三斤浸之。涂患处。

【主治】 一切癣疾。

14620 愈风化痰丸

【方源】《直指·附遗》卷四。

【组成】 何首乌（酒浸） 僵蚕 光乌（酒浸，去皮） 全蝎 南星（姜制） 半夏（便煮） 桑寄生 荆芥 牙皂（瓦炒） 破故纸（炒） 陈皮（去白） 菟丝子（炒）各二两 地黄（去土）八两 木香一两 沉香一两半 白芍药（酒炒） 川乌（酒浸，去皮） 天麻一两二钱 黄芩（酒炒）二两 防风（去芦） 汉防己 白术（炒） 当归（酒洗）各二两 羌活 独活各一两五钱 杜仲（姜汁炒）四两 巴戟（去心）三两

【用法】 上共为细末，酒打米糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心、食前酒送下，日服二次。

【主治】 历节风。

14621 愈风换肌丹

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】 白花蛇二条（头尾全者，酒浸，二三日去骨阴干） 苦参四两 皂角五斤（去皮弦，用酒浸一宿，取出，以水熬膏）

【用法】 上为末，以皂角膏和丸，如梧桐子大。每服七十丸，以防风通圣散送下。

【主治】 疠风。手足麻木，毛落眉脱，满身癞疹，搔痒成疮。

14622 愈风润燥汤

【方源】《古今医鉴》卷二引孙尚书方。

【组成】 川芎一钱 当归一钱二分 熟地黄 生地黄（姜汁炒） 牛膝（酒炒） 红花各八分 羌活 防风各六分 南星（制） 天麻 半夏（制） 橘红（盐水洗） 白茯苓 黄芩各一钱半 桂枝五分 白术（炒）二钱 白芍药 酸枣仁 黄柏各七分 甘草（炙）四分

【用法】 上㕮咀。水煎，临服入竹沥、姜汁各三匙。

【功用】 半攻半补。

【主治】 诸风瘫痪，痿，痹。

14623 腻香散

【方源】《普济方》二九九引《旅舍方》。

【组成】 黄柏（蜜炙）一钱 腻粉 麝香各少许

【用法】 上研匀。贴之，一日三次。

【主治】 口舌唇吻等疮。

14624 腻粉散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】 腻粉一两 黄连一两（去根末） 胡粉一两（炒令微黄） 松脂一两

【用法】 上都细研。先以温浆盐水洗疮令净，拭干，以散敷之；如疮干，用生油调涂。以愈为度。

【主治】 月蚀疮。

14625 腰痛汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】 熟地二钱 当归一钱 黄耆一钱 杜仲一钱 香附一钱 川芎一钱 升麻三分 青盐三分

【主治】 肾虚腰痛。

14626 腰痛神方

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】 杜仲 补骨脂 牛膝 香附各三钱 青盐一钱半

【用法】 将雄猪腰二对，竹刀剖开去筋丝，每个内外拌药，用湿草纸包，灰火煨熟，去药，酒下。一醉即愈。

【主治】 腰痛。

14627 腰痛六合散

【方源】《回生集》卷上。

【组成】 杜仲（炒断丝） 肉苁蓉（酒洗，去鳞甲） 川巴戟 小茴香 补骨脂（盐汤净浮水面者掠去不用） 净青盐各等分

【用法】 上为细末听用。再用羊腰子二个，将竹

刀剖开，散药末在上，仍合住，外用熟面包好，微火煨熟，好酒送下。

【主治】 腰痛伛偻不能步履。

14628 腽肭脐丸

【方源】《局方》卷五。

【异名】 大腽肭脐丸(《圣济总录》卷一八六)、赐方腽肭脐丸(《杨氏家藏方》卷九)。

【组成】 腽肭脐一对（慢火酒炙令熟） 硇砂（研飞）二两 精羊肉（熟切碎烂，研） 羊髓（取汁）各一斤 沉香 神曲（炒）各四两

以上六味，用无灰好酒一斗，同于银器内，慢火熬成膏，候冷入下项药：

阳起石（用浆水煮一日，细研飞过，焙干用） 人参（去芦） 补骨脂（酒炒） 钟乳粉（炼成者） 巴戟（去心） 川芎 肉豆蔻（去壳） 紫苏子（炒） 枳壳（去瓤，麸炒） 木香 荜澄茄 葫芦巴（炒） 天麻（去苗） 青皮（去白） 丁香 茴香（舶上，炒）各二两 肉桂（去粗皮） 槟榔 蒺藜子（炒） 大腹子各二两半 山药一两半 苁蓉（洗，切片，焙）四两 白豆蔻（去壳）一两 大附子（炮，去皮，脐，用青盐半斤，浆水一斗五升煮，候水尽，切，焙干）八两

【用法】 上为末，入煎膏内搅成剂，于臼内捣千余杵，丸如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下；盐汤亦得。

【功用】 补虚壮气，暖背祛邪，益精髓，调脾胃，进饮食，悦颜色。

【主治】 五劳七伤，真气虚惫，脐腹冷痛，肢体酸疼，腰背拘急，脚膝缓弱，面色黧黑，肌肉消瘦，目暗耳鸣，口苦舌干，腹中虚鸣，胁下刺痛，饮食无味，心常惨戚，夜多异梦，昼少精神，小便滑数，时有余沥，房室不举，或梦交通，及一切风虚痼冷。

14629 腽肭脐丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】 腽肭脐一对（酒蒸熟，打和后药） 天雄（炮，去皮） 附子（炮，去皮脐） 川乌（炮，去皮尖） 阳起石（煅） 钟乳粉各二两 独体朱砂（研极细） 人参 沉香（不见火，别研） 鹿茸（酒蒸）一两

【用法】 上为细末，用腽肭脐膏入少酒，臼内杵和为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐酒盐汤任下。

【主治】 五劳七伤，真阳衰惫，脐腹冷痛，肢体酸疼，腰背拘急，脚膝缓弱，面色黧黑，肌肉消瘦，目眩耳鸣，口苦舌干，饮食无味，腹中虚鸣，胁下刺痛，心常惨戚，夜多异梦，昼少精神，小便滑数，大肠溏泄，时有遗沥，阳事不举，但是风虚痼冷。

14630 腽肭补天丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 腽肭脐 人参 白茯苓（姜汁煮） 当归 川芎 枸杞 小茴香各一两半 白术二两半 粉草（蜜炙） 木香 茯神各一两 白芍 黄耆 熟地黄 杜仲 牛膝 故纸 川楝 远志各二两 胡桃肉三两 沉香五钱

【用法】 上为末，用制腽肭酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空心盐酒送下。

【主治】 男妇亡阳失阴，诸虚百损，阴痿遗精，健忘白带，子宫虚冷。

【加减】 男，加知、柏；女，加附子。

14631 腹疝汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】 人参 黄耆 茯苓 白术 炮附子 沉香 木瓜 羌活 川芎 紫苏 甘草

【用法】 加姜煎服。

【功用】 通调脏气。

【主治】 疝气腹痛，即五脏疝不干睾丸者。

14632 腹痛广济散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】 人参一两半 厚朴八钱（制） 当归三两 陈皮一两半 茯苓一两半 炙甘草五钱 生姜七片 砂糖三两（炒灰）

【用法】 上为散。酒煎三钱，去滓温服。

【主治】 胁肋腹痛，脉软弦涩者。

【方论选录】 产妇努力太过，中气大伤，不能统运营血，故胁肋胀满，腹痛不止。人参补中气之虚，厚朴散腹胁之满，当归养血以荣经，陈皮利气以和胃，茯苓渗湿气，炙草益胃气，煨生姜温胃散滞气，砂糖灰去宿生新血以行血滞也。为散酒煎，务使中气内充，则血不复滞，而经脉清和，何患胁肋疼胀不去乎。

14633 解肌散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】 葛根一两（锉） 柴胡一两（去苗） 麻黄三分（去根节） 赤芍药半两 黄芩半两 甘草半两（炙微赤，锉） 桂心半两 石膏二两

【用法】 上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓，不拘时候温服之。

【主治】 时气五七日，头痛，余热不解。

14634 解肝煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】解恨煎(《笔花医镜》卷四)。

【组成】陈皮 半夏 厚朴 茯苓各一钱半 苏叶 芍药各一钱 砂仁七分

【用法】水一钟半，加生姜三五片，煎服。

【主治】肝郁气滞之胸胁胀满疼痛，泄泻，胎动不安。

①《景岳全书》：暴怒伤肝，气逆胀满阴滞。②《叶氏女科》：肝气滞逆胀满之胎动不安。③《医门八法》：气泻。肝木克土，脾气受伤，遇怒则泻。

【加减】如胁肋胀痛，加白芥子一钱；如胸膈气滞，加枳壳、香附、藿香之属。

【方论选录】《谦斋医学讲稿》：本方名为解肝，实际上除白芍养肝、苏叶兼能芳香舒气外，均属化湿行滞，调理脾胃之品，适应于土壅木郁的证候。因脾胃湿阻气滞，影响肝气条达，必须着重中焦治本，故方中不用柴胡疏肝而用苏叶，取其能舒肝郁，亦能和脾胃，脾胃健运则肝气自畅。故解肝的意义在于解肝之围，而不是直接治肝。

【备考】《不知医必要》有藿香，无半夏。

14635 解郁汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参一钱 白术五钱（土炒） 白茯苓二钱 当归一两（酒洗） 白芍一两（酒炒） 枳壳五分（炒） 砂仁三粒（炒，研） 山栀子三钱（炒） 薄荷二钱

【用法】水煎服。一剂而闷痛除，二剂而子悬定，至三剂而全安。去栀子，再多服数剂不复发。

【功用】开肝气之郁结，补肝血之燥干。

【主治】妊娠怀抱忧郁，肝气不通，以致子悬，胎动不安，两胁闷而疼痛，如弓上弦。

【加减】加薏仁三四钱尤妙。

14636 解毒丸

【方源】《医学正传》卷八。

【异名】清热解毒丸(《保婴撮要》卷九)。

【组成】寒水石（研） 石膏（研）各一两 青黛五钱

【用法】上以二石细研如粉，入青黛和匀，汤浸蒸饼为丸，如芡实大。每服一丸，食后茶汤或新汲水化下，或细嚼姜水下亦可，三岁儿服半丸，量岁数加减服之。

【主治】①《医学正传》：小儿痘疹，未出而先发搐，兼外感风寒之邪者。②《保婴撮要》：小儿五脏积热，毒气上攻，胸膈烦闷，咽喉肿痛，赤眼壅肿，头面发热，唇口干燥，两颊生疮，精神恍惚，心怯闷乱，坐卧不安；及伤暑毒，面赤身热，心烦躁而渴，饮食不下；中诸毒；及惊风潮热，痰涎壅塞，心胸烦躁，颊赤多渴，坐卧不稳。

【备考】《保婴撮要》本方用法：惊风潮热者，每服半粒。

14637 解毒丹

【方源】《药奁启秘》。

【组成】青黛二钱 黄柏二钱 熟石膏二两

【用法】上为末。麻油调敷。

【主治】湿疮痒痛红肿。

14638 解毒汤

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】荆芥 防风 牛蒡 羌活 连翘 甘草

【用法】水煎服；外用赤小豆研细，醋调敷肿。

【主治】疼腮肿毒。

14639 解毒汤

【方源】《血证论》卷八。

【组成】大黄一钱 黄连三钱 黄芩三钱 黄柏二钱 栀子（炒）三钱 赤芍二钱 枳壳一钱 连翘一钱 防风三钱 甘草一钱

【主治】脏毒。

【方论选录】解毒者，谓解除脏毒也。脏毒由火迫结在肛门，故用泄火之药极多。其用白芍者，兼行其血，血行则火无所著。用枳壳者，兼行其气，气行则火自不聚。而火势之煽，每挟风威，故以防风去风以熄火，且防风上行外达，使火升散，则不迫结肛门，此即仲景白头翁汤之意。

14640 解毒散

【方源】《济生》卷八。

【组成】寒水石二两 龙骨半两 黄连（去须） 黄柏各一两 轻粉一钱

【用法】上为细末，和鸡子清调。以鸡羽扫疮上。

【功用】去热肿，收赤晕。

【主治】疔疮、热疮有赤晕者。

【加减】若是热疮，加黄丹半两。

14641 解带汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】椿根皮（炒）二钱 醋香附 白芍 白术各一钱 侧柏 黄连 黄柏（俱酒炒） 各五分 白芷三分

【主治】带下由肝经湿热、怒气所致而腹不痛者。

【加减】 腰腿痛，加四物四钱，羌活、防风各一钱；肥人，加苍术、半夏、南星；腹痛者，是湿热郁结，加黑姜四分，吴萸一分，木香二分，玄胡五分。

14642 解语丸

【方源】《医学纲目》卷十引王海藏方。

【异名】 神仙解语丹（《杂病源流犀烛》卷十二）。

【组成】 白附子 石菖蒲 远志 全蝎 羌活 天麻 南星 白僵蚕

【用法】 上为细末，蜜为丸，如绿豆大。服之。

【主治】 中风语言不正。

【备考】《玉案》本方用：白附子、石菖蒲、远志各一两，全蝎三钱，羌活、天麻、僵蚕各五钱。上为细末，蜜丸如绿豆大。每服三十丸，空心生姜汤送下。

14643 解铃丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】 茴香一两（用青盐一两，研细同炒，和盐用） 蝎梢一分（去毒，炒） 蓬莪（用纸数重裹，油内浸，灯上烧过，研锉）一两

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前，温酒、盐汤送下。

【主治】 奔豚气疼痛，手足蹉缩，不可忍者。

14644 解悬汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】 黄耆二两 当归一两 人参三钱 川芎三钱 荆芥三分 益母草 生地黄各一钱 炮姜三分

【用法】 水煎服。

【功用】 补血荣筋。

【主治】 产后去血过多，气热血虚，肝筋缓弛，或乳少过服通乳之药，血不足于经脉而气虚，因儿之吮以下垂，则筋从所引而弛，致患乳悬证，两乳细小，下垂过腹，痛不可忍。

【方论选录】 黄耆、当归，此补血汤；人参宜大补中气；川芎以行血中之气；荆芥去血中风湿；益母草补肝和胃，燥湿行血；生地黄滋血而平热则筋自收，用当病情，难产后亦不忌；炮姜以和胃，亦以补肝。

14645 解酲丸

【方源】《医林纂要》卷六。

【组成】 葛花四两 砂仁二两 泽泻一两 白术（米炒）二两 人参二两 茯苓二两 黄连五钱 陈皮五钱 鹿衔草一两 枳椇六两

【用法】 捣枳椇汁，和酒曲为丸（无枳椇则煮地黄四两捣和）。每服五钱。

【主治】 酒积受伤，及因酒伤呕吐泄泻者。

【方论选录】 葛花轻虚上浮，以散湿热之气而救肺；砂仁辛温行气，以消酒食之积而和脾胃；泽泻微咸泻水，以通膀胱之道而利小便；白术、人参、茯苓，此即四君子汤，而白术、茯苓皆以燥湿，人参、甘草皆以补中，且人参最能解酒；黄连以去积热，以厚肠胃；陈皮以疏滞气，以行湿痰；鹿衔草以强肾气、以消积水，能固卫和荣，益精填髓，《内经》用此合术及泽泻以治酒后汗出漏风之证；枳椇甘寒，功专解酒，缓肝和胃，清心保肺，故用此为君。

14646 解酲汤

【方源】《普济方》卷二十四引《十便良方》。

【组成】 胡椒 桂心 丁香各一分 檀香二铢（三钱） 藿香半两（不见火） 甘草三两（炙） 白盐四两（炒）

【用法】 上为末。每取一钱，沸汤点服，不拘时候。

【主治】 饮酒过度，脾胃不健，不思饮食。

14647 解五蒸汤

【方源】《外台》卷十二引《古今录验》。

【组成】 甘草一两（炙） 茯苓三两 人参二两 竹叶二把 葛根 干地黄各二两 知母 黄芩各二两 石膏五两（碎） 粳米一合（一方无甘草、茯苓、人参、竹叶）

【用法】 上切。以水九升，煮取二升半，分为三服 亦可以水三升，煮小麦一升，乃煮药。

【主治】 虚劳骨蒸。

【宜忌】 忌海藻、菘菜、芜荑、火醋。

14648 解冤神丹

【方源】《疡医大全》卷二十五。

【组成】 人参八两 白术五两 川贝母 白芥子 白茯苓 生甘草 青盐各三两 半夏 白矾各二两

【用法】 上为末，米饮为丸。每服五钱，早、晚白汤送下，自然渐缩小而愈。

【主治】 人面疮。初起之时，臂痛发痒，以手搔之，渐渐长大，久则渐渐露形，大如茶钟，眼耳口鼻俱全，但无头发须眉。

14649 解渴饮子

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】 人参（去芦） 绵黄耆（蜜炙） 麦门冬（去心） 干葛（有粉者） 枇杷叶（刷去毛，蜜炙） 生木瓜（去皮）各二两 甘草一两半（炙） 乌梅肉 生姜各半两

【用法】 上细锉。用水约斗余，银石锅内煮百十沸，候欲饮时，温半盏许，自在饮之，须食后服。

【功用】 生津液，除烦躁，止渴。

【主治】 消渴。

14650 解下除湿汤

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】 海藻（洗） 黄柏 三棱 香附 青皮 栀子（炒） 连翘 槟榔 木通

【用法】 上用薄荷煎服。

【主治】 瘤。湿热郁结，血气凝滞，作核成瘤，在下部者。

14651 解肌升麻汤

【方源】《千金》卷九。

【组成】 升麻 芍药 石膏 麻黄 甘草各一两 杏仁三十枚 贝齿二枚（一作贝母十八铢）

【用法】 上㕮咀。以水二升，煮取一升，尽服。温覆发汗便愈。

【主治】 时气三四日不解。

【方论选录】《千金方衍义》：麻杏甘石汤本治发汗后汗出而喘无大热者，乃越婢汤之变方。此治时气三四日不解，亦用此汤加升麻以治疫瘴，芍药以护营血，贝齿以镇邪毒，取其咸润走血利水而镇摄时气之毒，非正伤寒例药也。

14652 解表升麻汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】 升麻 羌活 苍术各一钱 防风八分 柴胡 甘草各七分 当归 藁本各五分 橘皮三分

【用法】 上㕮咀，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓温服。后以葱醋汤发之，得微汗为效。

【主治】 遍身壮热，骨节疼痛。

【加减】 冬加麻黄（不去节），春加麻黄（去节）。

14653 解郁合欢汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 合欢花二钱 郁金二钱 沉香五分 当归二钱 白芍一钱 丹参二钱 柏仁二钱 山栀一钱五分 柴胡一钱 薄荷一钱 茯神二钱 红枣五枚 橘饼四钱

【主治】 郁火。所欲不遂，郁极火生，心烦意乱，身热而躁。

14654 解郁软坚汤

【方源】《千家妙方》卷下引李聪甫方。

【组成】 全当归10克 赤芍药10克 正川芎5克 北柴胡5克 川郁金6克 白蒺藜10克 漂昆布10克 净海藻10克 制香附6克 酒青皮5克 山慈菇5克 蒲公英13克 鹿角霜15克（先煎）

【用法】 水煎服，每日一剂。

【功用】 疏肝解郁，和血软坚。

【主治】 肝郁结滞之乳腺小叶增生。两乳肿块坚硬，推之不移，皮色如常，隐隐作痛，经前肿块变大，经后复小。

14655 解郁调胃汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】 白术一钱 陈皮（盐水洗）一钱 白茯苓（去皮）一两 归尾（酒洗）一钱二分 赤芍（酒浸）八分 川芎六分 生地黄（酒洗，姜汁拌，晒干）八分 香附米八分 神曲（炒）七分 栀子仁（盐水炒）一钱二分 麦芽（炒）七分 桃仁（去皮）四两 生甘草四分

【用法】 上锉一剂。加生姜三片，水煎，热服。

【主治】 郁证。因怒、忧、思、虑、劳心而致胃脘血液耗损，痰火内郁，水浆易下而食物难消，若噎膈之症；或气分之火壅遏于中而时作刺痛者。

【加减】 若胸膈刺痛，加姜黄（酒炒）八分；若胸噎闷，加枳壳（麸炒）七分；胸内烦热，加黄连六分；大便不利，加酒蒸大黄二钱二分；有痰，加半夏（姜汁炒）八分，去地黄；饮食不美，去地黄，加白术五分；呕吐，加藿香一钱，去地黄、川芎、桃仁。

14656 解毒大青汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 解毒清火汤（《外科大成》卷四）。

【组成】 元参 桔梗 知母 大青叶 升麻 石膏 山栀 人中黄 麦门冬 木通各一钱

【用法】 水二茶钟，淡竹叶、灯心各二十件，食远服。

【主治】 疔疮误灸，逼毒入里，致生烦躁，谵语不定者。

【加减】 便秘，加大黄；闷乱，加烧人粪。

14657 解毒天浆散

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 解毒大黄散（《薛崖尊生》卷六）。

【组成】 石决明（生研） 僵蚕 川山甲（土炒） 防风 连翘 羌活 乳香 甘草 金银花 黄连 归尾各一钱 大黄三钱 天花粉四两（新鲜未晒者，石器捣烂，投水一碗，搅匀绞去滓用）

【用法】 用花粉净汁一碗半，同药煎至八分，入酒一杯，空心热服。行过三次，方用饮食。

【主治】 脑疽积毒日深，坚肿木硬，口燥舌干，

恶心烦渴，六脉沉实有力，大便秘结不通者。

【宜忌】 忌食煎炒发物。

14658 解毒木通汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】 木通 黄连 龙胆草 瞿麦 滑石 山栀 黄柏 知母各一钱 芦荟 甘草各五分

【用法】 水二钟，灯心二十根，煎八分，食前服。

【主治】 下疳。男妇房术热药所伤，致玉茎、阴户痒痛，小水涩滞，白浊滑精，至夜阳物兴举，不得眠者。

14659 解毒内消汤

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】 连翘一两 金银花一两 蒲公英一两 败酱草一两 冬瓜子一两 赤芍二钱 丹皮二钱 川军一钱 赤小豆三钱 甘草节二钱 土贝母三钱 犀黄丸三钱（分两次吞服）

【功用】 清热解毒，活血化瘀，消肿止痛。

【主治】 盆腔脓肿属于热毒壅聚者。

【方论选录】 方中重用连翘、银花、蒲公英、败酱草清热解毒消痈；丹皮、赤芍清热凉血活血；川军活血破瘀而又清热解毒，三者均能除败血生新血，消肿排脓；冬瓜子，赤小豆入血分，清热消肿排脓；甘草节、土贝母清热解毒消肿；另配犀黄丸以加强活血消肿清热止痛之效。

14660 解毒六郁丸

【方源】《春脚集》卷四。

【组成】 香附（醋炒） 苍术（米泔水浸，炒） 抚芎 神曲 栀子（炒黑） 陈广皮 花粉 黄芩 各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，每丸重三钱。如遇各证，每日早晚用白滚汤各调送一丸；若乳妇奶胀硬作痛，或发寒热，用真广皮煎汤调服一丸。

【主治】 六郁。气郁、血郁、痰郁、火郁、食郁、湿郁，其中以气郁为主。及触受时行湿热之气，壅于四肢脉络，发为痈肿，焮热疼痛溃腐；及臁疮赤痛，乳妇奶胀硬作痛，或发寒热。

【宜忌】 忌食猪肝发物。

14661 解毒四物汤

【方源】《丹溪心法附余》卷二十。

【异名】 温清饮（《宋氏女科》）。

【组成】 黄连 黄柏 黄芩 山栀子 当归 川芎 白芍 熟地黄各一钱

【用法】 用水二钟，煎至一钟，去滓，食前温服。

【主治】 妇人经水不住，或如豆汁，五色相杂，面色痿黄，脐腹刺痛，寒热往来，崩漏不止。

14662 解毒四物汤

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】 当归（酒洗）八分 川芎五分 白芍（炒）六分 生地黄一钱 黄连（炒）六分 黄芩（炒）八分 黄柏（炒）七分 栀子（炒黑）七分 地榆八分 槐花（炒）五分 阿胶珠六分 柏叶（炒）六分

【用法】 水煎，空心服。

【主治】 大便下血，不问粪前粪后，肠风脏毒。

【加减】 腹胀，加陈皮六分；气虚，加人参三分、白术三分、木香三分；肠风，加荆芥五分；气下陷，加升麻五分；心血不足，加茯苓六分；虚寒，加炒干姜五分。

14663 解毒生化丹

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 金银花一两 生杭芍六钱 粉甘草三钱 三七二钱（捣细） 鸭蛋子（去皮，拣成实者）六十粒

【用法】 上先将三七、鸭蛋子用白沙糖化水送服，次将余药煎汤服，病重者，一日须服两剂始能见效。

【功用】 化腐生肌。

【主治】 痢久郁热生毒，肠中腐烂，时时切疼，后重，所下多似烂炙，具有腐败之臭。

【临证举例】 ①大便下血 一人年五十二。因大怒之后，中有郁热，又寝于冷屋之中，内热为外寒所束，愈郁而不散，大便下血。延医调治，医者因其得于寒凉屋中，谓系脾寒下陷，投以参、耆温补之药，又加升麻提之。服药两剂，病益增重，腹中切疼，常常后重，所便之物，多如烂炙。更延他医，又以为下元虚寒，而投以八味地黄丸，作汤服之，病益加重。后遇诊视，其脉数而有力，两尺愈甚。确知其毒热郁于肠中，以致肠中腐烂也。为拟此方，两剂而愈。②痢疾 一妇人，年五十许，素吸鸦片，又当恼怒之余，初患赤痢，滞下无度。因治疗失宜，渐至血液腐败，间如烂炙，恶心懒食，少腹切疼。其脉洪数，纯是热象。亦治以此汤，加知母、白头翁各四钱，当日煎滓。又另取鸭蛋子六十粒，三七二钱，送服，每日如此服药两次，三日全愈。

14664 解毒地黄汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】 鲜生地四钱 赤芍一钱半 丹皮一钱

犀角一钱　黄芩一钱　黄柏一钱　栀子一钱　川连六分　甘草八分（生）

【用法】 水煎服。

【主治】 上腭悬痈。

14665　解毒泻心汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 黄连　防风　荆芥　山栀　黄芩　牛蒡子　滑石　元参　知母　石膏各一钱　甘草　木通各五分

【用法】 水二钟，加灯心二十根，煎八分，食远服。

【主治】 心经火旺，酷暑时临致生天泡，发及遍身者。

14666　解毒泻脾汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 防风　牛子　山栀　石膏　黄芩　苍术　甘草　木通各一钱

【用法】 水二钟，灯心二十根，煎八分，量病上下，食前后服之。外先以线针挑破泄去毒水，太乙膏盖。

【主治】 脾经风湿攻注之田螺泡。多生手足，忽如火燃，随生紫白黄泡，不久渐大，胀痛不安。

14667　解毒承气汤

【方源】《寒温条辨》卷五。

【组成】 白僵蚕（酒炒）三钱　蝉蜕（全）十个　黄连一钱　黄芩一钱　黄柏一钱　栀子一钱　枳实（麸炒）二钱五分　厚朴（姜汁炒）五钱　大黄（酒洗）五钱　芒消三钱（另入）

【主治】 温病三焦大热，痞满燥实，谵语狂乱，不识人，热结旁流，循衣摸床，舌卷囊缩，及瓜瓢疙瘩温，上为痈脓，下血如豚肝，厥逆，脉沉伏者。

【加减】 痞满燥实坚结非常者，大黄加至两余，芒消加至五钱；虚极，加人参二钱五分，如无参，用熟地黄一两，归身七钱，山药五钱，煎汤入前药煎服。

14668　解毒活血汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】 连翘二钱　葛根二钱　柴胡三钱　当归二钱　生地五钱　赤芍三钱　桃仁八钱（研）　红花五钱　枳壳一钱　甘草二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 瘟毒吐泻转筋初得者。

【宜忌】 若见汗多，肢冷，眼塌不可用。

14669　解毒活血汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 银花9克　连翘6克　赤芍　牡丹皮　酒黄芩　天花粉各9克　荆芥　防风　枳壳各3克

【功用】 清热解毒，活瘀除风。

【主治】 椒疮。因脾胃积热，外受风热毒邪，结于胞睑，络脉不畅，气血瘀滞而致。睑内发生细小颗粒，色红而坚，状如花椒。

【加减】 热邪偏盛，血滞较重，胞睑肿硬者，可加酒大黄6克以清胃火，加红花3克以活血通络。

【方论选录】 方中银花、连翘清热解毒散结；酒黄芩、天花粉清除胃中积热；赤芍，牡丹皮活血凉血，祛瘀通络；枳壳行脾胃之气。

14670　解毒济生汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 川芎　当归　黄柏　知母　天花粉　金银花　麦门冬　远志　柴胡　黄芩　犀角　茯神各一钱　甘草　红花　升麻（手指加）　牛膝（足指加）各五分

【用法】 水二钟，煎八分，临服入童便一杯，随病上下服。

【主治】 脱疽初起，恶寒体倦，发热作渴，或肿或紫，或麻或痛，四肢倦怠，心志恍惚不宁者。

14671　解毒排脓汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 银花12克　连翘6克　天花粉9克　白芷3克　薏苡仁　赤芍各9克　甘草3克

【功用】 清热解毒，消肿排脓。

【主治】 土疡（亦叫土疳、针眼、眼疮）后期脓成，肿核局限，顶部变软或露出黄白色脓头。

【加减】 若患者禀赋虚弱，病势不重，当去花粉、连翘，加黄耆补气，当归补血以扶其正，避免疖肿连续发生。

【方论选录】 方中银花、连翘清热解毒，消肿散结，意在清除余邪使疖肿更加局限；天花粉、白芷、薏苡仁消肿排脓，薏苡仁且能补中，配甘草，意在邪去而不伤正。

14672　解毒雄黄丸

【方源】《局方》卷八。

【异名】 雄黄解毒丸（《丹溪心法》卷四）、金粟丹（《普济方》卷一六三引《经验良方》）、雄黄丸（《急救仙方》卷二）、雄金丸（《普济方》卷六十）、雄黄救命丹（《普济方》卷一一六）、益清雄黄丸（《嵩崖尊生》卷六）。

【组成】 郁金　雄黄（研飞）各一分　巴豆（去皮，出油）十四个

【用法】 上为末，醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服七丸，小儿服二丸或三丸，用热茶清送下。吐出顽涎，立便苏省，未吐再服。如笃死者，心头犹热，灌药不下，即刀、尺、铁匙斡开口灌之，吐泻些小无妨。

【功用】 ①《局方》解毒。②《普济方》：去积下热。

【主治】 ①《局方》：缠喉风及急喉痹，卒然倒仆，失音不语，或牙关紧急，不省人事；上膈壅热，痰涎不利，咽喉肿痛，赤眼痈肿，一切毒热；小儿喉咙赤肿及惊热痰涎壅塞。②《普济方》：中风卒然倒仆，牙关紧急，不省人事；哮喘。

14673 解毒雄黄散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 雄黄四两 硫黄八两

【用法】 上为细末。柏油调搽，纸盖之，三日一换。

【主治】 风湿流注腿脚，致生血风顽疮，紫黑搔痒者。

14674 解急蜀椒汤

【方源】《外台》卷七引《小品方》。

【异名】 蜀椒汤(《普济方》卷二四八)。

【组成】 蜀椒二百枚（炒出汗） 附子一枚（炮） 粳米半升 干姜半两 半夏十二枚（洗） 大枣二十枚 甘草一两（炙）

【用法】 上切。以水七升，煮取三升，澄清，热服一升，不愈，更服一升。

【功用】 解结逐寒。

【主治】 寒疝气，心痛如刺，绕脐腹中尽痛，白汗出，困急欲死者。

【宜忌】 忌猪、羊肉，饧，海藻，菘菜。

14675 解结舒气汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】 白芍一两 当归一两 炒枣仁一两 郁李仁二钱

【用法】 水煎服。

【功用】 补肝胆之血，解肝胆气结。

【主治】 惊悸之后，肝胆气结，致目张不能瞑。

14676 解酒化毒丹

【方源】《古今医鉴》卷四。

【组成】 白滑石（水飞）一片 白粉葛三两 大粉草三两

【用法】 上为末。每服三钱，不拘时候以冷水调下，日进两三次。

【主治】 饮酒过多，遍身发热，口干烦渴，小便赤少。

14677 解暑三白散

【方源】《局方》卷二（宝庆新增方）。

【异名】 三白散(《本草纲目》卷十九)、解暑三白饮(《丹溪心法附余》卷一)。

【组成】 泽泻 白术 白茯苓各等分

【用法】 上㕮咀。每服半两，水一盏，加生姜五片，灯心十茎，煎八分，去滓，不拘时候服。

【主治】 冒暑伏热，引饮过多，阴阳气逆，霍乱呕吐，小便不利，脏腑不调，恶心头晕。

14678 新瓦散

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】 多年瓦一片

【用法】 将瓦烧红，入驴尿内淬二十一次，研末，仓米饭焦为末，二分饭末，一分瓦末，蜡精和饭为丸，以驴尿和平胃散服之。

【主治】 反胃。

14679 新加三拗汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 带节麻黄六分 荆芥穗二钱 苦桔梗一钱 金橘饼一枚 苦杏仁一钱半 苏薄荷一钱 生甘草五分 大蜜枣一枚

【功用】 宣上发汗。

【主治】 风伤肺、寒伤太阳，头痛恶寒，无汗而喘，咳嗽白痰。

【方论选录】 何秀山：此方以麻黄汤去桂枝为君，而麻黄留节，发中有收；苦杏仁留尖取其发，留皮取其涩，略杵取其味易出；甘草生用，补中有散。三味与仲景法相拗，故名。俞氏佐以荆、薄疏风，桔、甘宣上，使以橘饼、蜜枣，辛甘微散，变仲景峻剂为平剂，以治风伤肺、寒伤太阳，头痛恶寒，无汗而喘，咳嗽白痰等症，效如桴鼓，可谓屡用达药，善于化裁者矣。

14680 新加木贼煎

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 木贼草一钱半 淡香豉三钱 冬桑叶二钱 制香附二钱 鲜葱白三枚 焦山栀三钱 粉丹皮二钱 夏枯草三钱 清炙草五分 鲜荷梗五寸

【功用】 和解偏重清泄。

【主治】 伤寒少阳证，热重寒轻。

【方论选录】 何秀山：木贼草味淡性温，气清质轻，色青中空，节节灵通，与柴胡之轻清疏达，不甚相远，连节用之，本有截疟之功，故张景岳代柴胡以平寒热，俞氏加减其间，君以木贼、葱、豉之辛通，从腠理而达皮毛，以轻解少阳之表寒；臣

以焦栀，领桑、丹之清泄，从三焦而走胆络，以凉降少阳之里热；佐以制香附，疏通三焦之气机，夏枯草轻清胆府之相火；使以甘草和之，荷梗透之。合而为和解少阳，热重寒轻之良方。

14681 新加玉女煎

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 生石膏六钱（研） 紫石英四钱（研） 淮牛膝一钱半 大熟地六钱（切丝） 灵磁石四钱（研） 东白薇四钱 石决明五钱（杵） 原麦冬二钱（朱染） 知母二钱（秋石一分化水炒） 青盐陈皮一钱

【用法】 先用熟地丝泡取清汤，先煎三石，百余沸，代水煎药。

【功用】 清肝镇冲，育阴潜阳。

【主治】 肝挟胆火，化风上翔，冲气上而冲心，心中痛热，甚则为气咳，为呃逆，为晕厥，名冲咳、冲呃、冲厥。

【方论选录】 何秀山：本方以三石、白薇镇逆纳冲为君；臣以牛膝、决明，降逆气而潜肝阳，麦冬、熟地养胃液以滋肾阴；佐以秋石水炒知母咸苦达下；使以青盐陈皮辛润疏中。此为清肝镇冲，育阴潜阳之良方。

14682 新加白虎汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 苏薄荷五分（拌研） 生石膏八钱 鲜荷叶一角（包） 陈仓米三钱 白知母四钱 益元散三钱（包煎） 鲜竹叶三十片 嫩桑枝二尺（切寸）

【用法】 先用活水芦笋二两，灯芯五分，同石膏半分，先煎代水。

【功用】 清肝胃，辛凉心肺。

【主治】 热汗烦渴，皮肤隐隐见疹，溺短赤热，甚则咳血昏狂。

【方论选录】 何秀山：本方以白虎汤法辛凉泄热，甘寒救液为君，外清肌腠，内清脏腑；臣以芦笋化燥金之气，透疹痘而外泄，益元通燥金之郁，利小便而下泄；佐以竹叶、桑枝通气泄热；使以荷叶、陈米清热和胃。妙在石膏配薄荷拌研，既有分解热郁之功，又无凉遏冰伏之弊，较长沙原方尤为灵活，此为辛凉甘寒，清解表里三焦之良方。

14683 新加香薷饮

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】 香薷二钱 银花三钱 鲜扁豆花三钱 厚朴二钱 连翘二钱

【用法】 上以水五杯，煮取二杯，先服一杯，得汗止后服，不汗再服，服尽不汗，再作服。

【主治】 手太阴暑温，形如伤寒，右脉洪大，左手反小，面赤口渴，但汗不出者。

14684 新加黄龙汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 细生地五钱 生甘草二钱 人参一钱五分（另煎） 生大黄三钱 芒消一钱 元参五钱 麦冬五钱（连心） 当归一钱五分 海参二条（洗） 姜汁六匙

【用法】 水八杯，煮取三杯，先用一杯，冲参汁五分，姜汁二匙，顿服之。如腹中有响声，或转矢气者，为欲便也，候一二小时不便，再如前法服一杯，候二十四刻不便，再服第三杯。如服一杯即得便，止后服。酌服益胃汤一剂，余参或可加入。

【主治】 阳明温病，应下失下，正虚邪实。

【方论选录】 此处方于无可处之地，勉尽人力，不肯稍有遗憾之法也。旧方用大承气加参、地、当归，须知正气久耗，而大便不下者，阴阳俱惫，尤重阴液消亡，不得再用枳、朴伤气而耗液。故改用调胃承气，取甘草之缓急，合人参补正；微点姜汁，宣通胃气，代枳、朴之用，合人参最宣胃气；加冬、地、元参，保津液之难保，而又去血结之积聚；姜汁为宣气分之用，当归为宣血中气分之用；再加海参者，海参咸能化坚，甘能补正，其液数倍于其身，其能补液可知，且蠕动之物，能走络中血分，病久者必入络，故以之为使也。

14685 新制通幽汤

【方源】《证治汇补》卷一。

【组成】 当归 红花 桃仁 韭汁 香附 牡丹皮 苏子 桔梗 陈皮

【用法】 水煎，磨槟榔五分，调和服。

【主治】 幽门不通，大便秘结，上冲吸门，呕食不下，肠燥胃闭，将成噎塞。

【方论选录】《医略六书》：血积津枯，不能濡润胃脘而将成噎塞，故便闭气冲，呕食不下。当归养血润燥，桃仁破郁开结，桔梗宣通肺气，苏子解郁润肠，香附理血中之气，丹皮凉血分之热，红花活血养血，陈皮利气和中，韭汁行血滞，槟榔通气闭也。俾血活气降，则燥润结开，而饮食自纳，安有噎塞将成之患？此润燥开结之剂，为血实气闭之专方。

14686 新制蠲痹汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】 苍术一钱半 羌活一钱半 白术一钱半（炒） 茯苓一钱半 官桂一钱半 泽泻一钱半 甘

草五分

【用法】 水煎，去滓，冲竹沥、姜汁各数匙热服。

【主治】 寒湿袭虚，关节不利，故身体沉重痠疼，天阴转甚，脉弦缓者，谓之冷痹。

【方论选录】 苍术燥湿强脾，甘草缓中和胃；羌活散寒湿，关节可利；白术健脾土，营卫可行；茯苓渗湿清脾肺，泽泻泻湿利膀胱，务使外着之湿自无复留之地。更以官桂温营散寒，竹沥、姜汁行经活络也。俾经府交通，则三阳皆泰而寒湿并散，身重痠疼，无不自退，阴晦乃天道之常，岂必病人乎。此温经燥湿祛寒之剂，为身重痠疼冷痹之专方。

14687 新法半夏汤

【方源】《局方》卷三（宝庆新增方）。

【组成】 陈皮（去白） 炒神曲 炮干姜各四两 丁皮 木香 白茯苓各七钱半 甘草四钱半 草果（煨，去皮） 半夏曲二两二钱（炒）

【用法】 上为细末。每服三钱点服，无时常服。

【功用】 温平破痰，开胃健脾，消酒进食。

【主治】 脾胃不和，中脘气滞，宿寒留饮，停积不消，心腹刺痛，胁肋膨胀，呕吐痰水，噫气吞酸，中酒吐酒，哕逆恶心，头痛烦渴，倦怠嗜卧，不思饮食。

【备考】 原书卷四（续添诸局经验秘方）“新法半夏汤”有桔梗、青皮，无神曲、木香、草果。主治相同。

14688 新定乌附丸

【方源】《金匮翼》卷六。

【组成】 天台乌药二两 白豆蔻五钱 沉香五钱 茯苓一两 香附四两 甘草一两

【用法】 上为细末。炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后淡生姜汤化下。

【主治】 心痛。气刺攻痛，但忍气即发者。

14689 新定龙骨散

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】 龙骨三钱 五倍子五钱

【用法】 上为极细末，醋和调。贴脐中，以纸盖其上。

【主治】 自汗盗汗。

14690 新定薏仁汤

【方源】《医学从众录》卷六。

【组成】 薏仁一两 附子一二钱 木瓜一钱五分 牛膝二三钱

【用法】 水煎，空心服。

【主治】 腰疼筋挛，难以屈伸者。

【加减】 如脉洪，重按有力，口中热，去附子，加白术五钱。

14691 新加甘麦大枣汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 生白芍 山萸肉各一钱半 淮小麦 红枣肉 白石英各三钱 清炙草一钱

【功用】 养心安神。

【主治】 其人数欠伸，喜悲伤欲哭，犹如神灵所作，妇女最多此病。

14692 新加瓜蒌薤白汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 瓜蒌仁（炒香）三钱 光桃仁七粒 干薤白（酒洗，捣）二钱 杜苍术八分 制香附 丹皮各一钱半 控涎丹七分 藏红花五分 韭白汁两匙 姜汁两滴（同冲）

【用法】 水煎，调香砂宽中散服。

【主治】 痰瘀成囊，脘腹虽多满痛，按之则呱呱有声，甚则肠间抽疼。

14693 新加金水六君丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 熟地四两 姜半夏 归身各一两半 茯苓三两 广橘红一两 炙黑甘草五钱 淡附子七钱 北细辛三钱 五味子二钱

【用法】 煮米仁浆糊丸，外用水澄生半夏、生姜二粉为衣。每服三钱，早、晚空心淡姜汤送下。

【主治】 积虚哮喘。

14694 新加耆桂五物汤

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】 黄耆 桂枝 芍药 当归 牛膝 桑寄生 薏苡 杜仲 生姜 大枣

【用法】 水煎服。

【主治】 血虚，痿躄不仁。

14695 新制阴阳攻积丸

【方源】《医宗必读》卷七。

【异名】 攻积丸（《杂病源流犀烛》卷十四）、阴阳攻积丸（《类证治裁》卷三）。

【组成】 吴茱萸（泡） 干姜（炒） 官桂（去皮） 川乌（炮）各一两 黄连（炒） 半夏（洗） 橘红 茯苓 槟榔 厚朴（炒） 枳实（炒） 菖蒲（忌铁） 玄胡索（炒） 人参（去芦） 沉香 琥珀（另研） 桔梗各八分 巴霜（另研）五钱

【用法】 上为细末，皂角六两，煎汁泛为丸，如绿豆大。每服八分，渐加一钱五分，生姜汤送下。

【主治】 五积六聚，七癥八瘕，痃癖虫积，痰

食，不问阴阳。

【备考】《张氏医通》引本方无橘红、槟榔、厚朴、枳实、菖蒲、桔梗，名"乔氏阴阳攻积丸"。

【方论选录】《医略六书》：虫、血、痰、食留滞，阴阳积结于中，皆能成积聚癥瘕痃癖，故胀满疼痛不已。吴萸温中散寒以开癥瘕，黄连清热燥湿以消痞结；厚朴散积聚之满，枳实消心下之痞；桔梗开提气血，槟榔化滞攻坚；干姜暖胃祛寒，官桂暖血散积；半夏燥湿痰，橘红利气痰；人参扶元气以助药力，菖蒲通窍门以开结气；琥珀散瘀血消积，沉香降逆气散聚；延胡活血滞，川乌透经络；茯苓渗湿和脾，巴霜攻坚荡实。皂角汁丸姜汤下，乃开其痰以散痃癖聚积也。使肠胃迅扫一空，则经络之积气自散，而胸中阳气敷布，阴霾顿灭，何患诸积不消，痛胀不去耶？此攻补热寒之剂，为夹攻阴阳诸积总方。

14696　新制橘皮竹茹汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】橘皮三钱　竹茹三钱　柿蒂七枚　姜汁三茶匙（冲）

【用法】水五杯，煮取二杯，分二次温服，不知再作服。

【主治】阳明湿温，气壅为哕者。

【加减】有痰火者，加竹沥、栝蒌霜；有瘀血者，加桃仁。

【方论选录】《金匮》橘皮竹茹汤，乃胃虚受邪之治，今治湿热壅遏胃气致哕，不宜用参、甘峻补，故改用柿蒂。柿成于秋，得阳明燥金之主气，且其形多方，他果未之有也，故治肺胃之病有独胜；柿蒂乃柿之归束处，凡花皆散，凡子皆降，凡降先收，从生而散而收而降，皆一蒂为之也，治呃逆之能事毕矣。

14697　新定加减锡类散

【方源】《疡科纲要》。

【组成】漂净人中白二两　西牛黄五钱　老月石二两　鸡爪川连一两　明雄黄一两五钱　真川贝广郁金各八钱　金余灰（即人指甲，洗净，炒松，弗焦，研细）六钱　上梅片四钱

【用法】各为极细末，和匀。点患处。极效。

【主治】咽喉腐烂，及口疳、牙疳、舌疮。

14698　新定拯阳理劳汤

【方源】《医宗必读》卷六。

【异名】拯阳汤（《证治汇补》卷二）、拯阳理劳汤（《金鉴》卷四十）、救阳理劳汤（《冯氏锦囊·杂证》卷一）。

【组成】黄耆二钱（酒炒）　人参二钱（去芦）　肉桂七分（去皮）　当归一钱半（酒炒）　白术一钱（土炒）　甘草五分（酒炒）　陈皮（去白）一钱　北五味四分（打碎）

【用法】水二钟，加生姜三片，枣肉二枚，煎一钟服。

【主治】劳伤气耗，倦怠懒言，动作喘乏，表热自汗，心烦，偏身作痛。

【加减】如烦热口干，加生地黄；气浮心乱，加丹参、枣仁；咳嗽，加麦门冬；夹湿，加茯苓、苍术；脉沉迟，加熟附子；脉数实，去桂，加生地黄；胸闷，倍陈皮，加桔梗；痰多，加半夏、茯苓；泄泻，加升麻、柴胡；口渴，加干葛；夏月，去肉桂；冬月，加干姜。

14699　新定拯阴理劳汤

【方源】《医宗必读》卷六。

【异名】拯阴汤（《证治汇补》卷二）、救阴理劳汤（《冯氏锦囊·杂证》卷一）、拯阴理劳汤（《杂病源流犀烛》卷二）。

【组成】牡丹皮一钱　当归身一钱（酒洗）　麦门冬一钱（去心）　甘草（炙）四分　苡仁三钱　白芍药七分（酒炒）　北五味三分　人参六分　莲子二钱（不去皮）　橘红一钱　生地黄二钱（忌铜铁器，酒、姜水炒透）

【用法】水二钟，加大枣一枚，煎一钟，分二次徐徐呷之。

【主治】阴虚火动，皮寒骨热，食少痰多，咳嗽短气，倦怠焦烦。

【加减】肺脉重按有力者，去人参；有血，加阿胶、童便；热盛，加地骨皮；泄泻，减归、地，加山药，茯苓；倦甚，用人参三钱；咳者，痰燥也，加贝母、桑皮；嗽者，湿痰也，加半夏、茯苓；不寐，加枣仁；汗多亦用。

14700　新定黄连香薷饮

【方源】《怡堂散记》。

【组成】香薷　黄连　厚朴　麦芽　生扁豆　木瓜　陈皮　半夏　茯苓　甘草

【用法】量儿大小煎服。

【主治】暑月吐泻初起。

14701　新定清中止呕方

【方源】《金匮翼》卷七。

【组成】半夏一钱　茯苓二钱　陈皮一钱　竹茹一钱　干葛五分　生姜五分　芦根五钱　枇杷叶三片　麦冬一钱　白凤米一百粒

【主治】胃热呕吐。

14702 新添半夏瓜蒌丸

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】半夏（生姜制） 瓜蒌 杏仁（去皮尖） 麻黄 白矾（枯） 款冬花各等分

【用法】上为末，生姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎生姜汤送下，不拘时候。

【主治】远近痰嗽，烦喘不止者。

14703 廓清饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】枳壳二钱 厚朴一钱半 大腹皮一二钱 白芥子五七分或一二钱 萝卜子（生捣）一钱（如中不甚胀，能食者，不必用此） 茯苓（连皮用）二三钱 泽泻二三钱 陈皮一钱

【用法】上以水一钟半，煎七分，食远温服。

【主治】三焦壅滞，胸膈胀满，气道不清，小水不利，年力未衰，通身肿胀，或肚腹单胀，气实非水等证。

【加减】如内热多火，小水热数者，加栀子、木通各一二钱；如身黄，小水不利者，加茵陈二钱；如小腹胀满，大便坚实不通者，加生大黄三五钱；如肝滞胁痛者，加青皮；如气滞，胸腹疼痛者，加乌药、香附；如食滞者，加山楂、麦芽。

14704 痱子粉

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】冰片一钱 薄荷冰一钱 甘石粉五钱 滑石粉一两 黄柏二钱

【用法】上研细粉。直接扑撒。

【功用】清热敛汗，解毒止痒。

【主治】痱子、尿布皮炎（湿尻疮）。

14705 痼冷丸

【方源】方出《千金》卷十六，名见《普济方》卷一二〇。

【组成】曲末二升 白术五两 干姜 桂心各三两 吴茱萸 蜀椒各二两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，米饮调下，一日二次，空腹服。不过五剂，诸冷顿愈。

【主治】心腹痼冷，百治不愈。

【备考】《普济方》本方用法：上为细末，蜜水糊为丸，如梧桐子大，每服五十丸或一百丸，米饮送下。

14706 瘀血汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】生地二钱 当归一钱 丹皮八分 栀子一钱 蒲黄八分 桃仁八分 元胡八分 川芎一钱

【用法】水煎服。

【主治】热瘀血。

14707 瘀血汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】黄耆一钱 白术一钱 香附二钱 川芎一钱 附子八分 干姜六分 桃仁八分 红花八分

【用法】水煎服。

【主治】寒瘀血。

14708 瘀滞型胆石汤

【方源】《外伤科学》。

【组成】金钱草一两 茵陈一两 威灵仙一两 郁金五钱 柴胡四钱 姜黄一钱五分 枳壳五钱 青皮三钱 木香八钱（后下）

【用法】水煎服。

【功用】疏肝利胆，行气化瘀。

【主治】胆绞痛或单纯性胆囊炎（瘀滞型）。

14709 痰火方

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【异名】痰火神丸（年氏《集验良方》卷四）。

【组成】广陈皮（去白）一两 好白术二两（陈壁土炒） 黑枳实一两（麦麸炒） 天花粉二两 陈枳壳一两（麦麸炒） 前胡二两 山楂肉一两 生甘草四钱 大半夏二两（用姜汁泡三次，一次约用姜三两，捶碎，用水一碗熬滚，入半夏炮；如此者三。共要炮一日，取起，晒干用） 大黄五两（用上好锦纹大黄一斤，将好水白酒五斤，入铁锅内煮，酒干为度，晒干，切片，再入锅内微火炒黑，细细夹碎，晒极干，同前药磨为末用）

【用法】上药共为末，用老米作糨为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，不拘清晨、晚间，用白滚汤送下。

【功用】清痰降火，止嗽定喘。少年服之无痨怯吐红之患，老年服之亦无中风痰厥之忧，解日用饮食煿炙五脏六腑之毒，兼消酒积，去皮里膜外湿痰。

【主治】男妇老幼一切痰火。

【加减】春月，加白芍药二两；夏月，加黄连二两（姜汁炒，秋冬不加）。

14710 痰饮丸

【方源】《常见病的中医治疗研究》。

【组成】苍术 白术 莱菔子各90克 肉桂30克 附片 甘草 白芥子各45克 苏子60克

【用法】共为细末，水泛为丸，每服6克，一日二次。

【功用】温肺散寒，理气化痰。

【主治】慢性咳嗽，气促，痰多稀薄，受寒易犯

病，可用于老年慢性支气管炎。

14711 痰郁汤

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】海石 香附 南星（姜制） 瓜蒌（一方无南星、瓜蒌，有苍术、川芎、栀子）

【主治】痰郁。

【加减】春，加芎；夏，加苦参；秋、冬，加吴茱萸。

【备考】本方为“六郁汤”之一。

14712 痰郁汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】苏子 半夏 前胡 炙草 当归 陈皮 沉香 瓜蒌（净仁） 胆星 枳实 香附 浮石

【主治】痰郁。动则喘满或嗽，寸脉沉而滑者。

【加减】如虚，加黄耆；寒冷，加肉桂。

14713 痰气俱安汤

【方源】《会约》卷十二。

【组成】陈皮（去白）二三钱 半夏二钱 胆星一二钱 海石二钱 白芥子（炒，研）七分 泽泻 木通各一钱三分

【用法】水煎，温服。

【主治】癫。因气逆痰滞，塞心窍，壅经络，僵仆搐搦，强直昏迷。

【加减】如大便闭结而火不下者，加大黄，不应加芒消；如痰盛，火不降者，加童便；如舌黄，小水不利者，加栀子；如口渴喜冷者，加生石膏；如胸胁痛者，加青皮；如痰因风鼓，加钩藤钩、姜蚕；如经络痰滞不活，加竹沥、姜汁。但所加者，分量宜重。

14714 痰火越鞠丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】海石（研，水飞）三两 胆星一两 瓜蒌仁三两 山栀（炒黑）三两 青黛（水飞过）八分 香附（童便浸）二两 抚芎二两 苍术（米泔水浸透，搓去黑皮，切片炒）二两

【用法】上为细末，汤泡蒸饼为丸，如绿豆大。每服一百丸，临卧白汤送下。

【主治】嘈杂。痰火内动，如阻食在膈，令人不自安。

14715 痰郁润下丸

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】胆星二两 黄连一两半 半夏一两半（制） 黄芩一两半 橘红一两半 白矾二两

【用法】上为末，姜汁、竹沥糊为丸，水飞朱砂为衣。每服三钱，银铺金箔汤化下。

【主治】痰郁变生怪症，脉滑沉数者。

【方论选录】痰郁心包，脾中之气不化，而堵塞神明，故变生诸般奇怪之证。胆星化热痰以清肝胆；半夏化湿痰以醒脾胃；黄连清热燥湿，以熄心包之火；橘红利膈除痰，以快膻中之气；黄芩清热于上，白矾消痰于中。丸以姜汁、竹沥，善搜经络之痰；衣以水飞朱砂，乃为镇心安神之助。夫肝藏魂，肺藏魄，金箔汤化，俾金能制木，则木火自平，而痰郁自解，魂魄俱安，怪证自痊。此豁痰清火之剂，洵为怪证属痰火之专方。

14716 煨肾丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】附子 葫芦巴 破故纸 茴香各一两（炒香熟）

【用法】上为细末，烂研羊腰子为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心温酒送下，食前亦得。

【主治】阳气衰弱，腰痛，脉冷，精滑，阴痿，脐腹疞刺，减食力劣。

14717 煨肾丸

【方源】《保命集》卷下

【异名】牛膝丸（《活法机要》）。

【组成】牛膝 萆薢 杜仲 苁蓉 防风 菟丝子 白蒺藜 胡芦巴 破故纸各等分 肉桂半之

【用法】上为细末，酒煮猪腰子捣为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心酒送下。

【功用】益精暖中，消谷。

【主治】肾肝损及脾损，谷不化，腰痛不起者。

【备考】本方方名，原书千顷堂本作“暖肾丸”。

14718 煨肾散

【方源】《医学正传》卷四引《局方》。

【组成】杜仲三钱（炒丝断）

【用法】上为细末，以猪腰子一只，薄批作五、七块，以椒、盐腌去腥水，掺药末在内，以荷叶包裹，更加湿纸二三重外包，慢火煨熟食之，无灰酒送下。

【主治】肾虚腰痛。

14719 煨肾散

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】甘遂半两（生） 木香一两

【用法】上为细末，每服用药二钱，以猪腰子一只，薄批开，去筋膜，掺药在内淹匀，用荷叶裹定，外用湿纸五重，以麻缕缠定，更用水蘸过，干湿得所，于文武火内煨熟，纸干为度，临卧细嚼，少用温酒送下。当下黄水。

【主治】肾经积水不散，流于经络，腿膝挛急肿

闷，往来疼痛。

14720 煨肾散

【方源】《袖珍方》卷三

【组成】杜仲（去粗皮，姜汁制炒） 茴香各五铢（炒） 沉香一铢 巴戟一两（去心）（一方无巴戟）

【用法】每早用猪肾子一个，切，入药末二钱，青盐少许，纸裹浸湿，炮令熟，和药嚼咽下，一日进一服。

【主治】肾气虚攻耳，耳有如蝉声、水声。

14721 煨肾散

【方源】《保命歌括》卷十三。

【异名】烧腰散(《嵩崖尊生》卷十三)。

【组成】杜仲（姜汁拌，炒断丝） 肉苁蓉（酒洗） 巴戟天（取肉） 破故纸（炒） 小茴香（炒，去沙土） 青盐（煅）各一两

【用法】上为末。每服二钱，用猪腰子一对，竹刀批开，每个装药一钱，绵纸包，放火中煨熟服，温酒咽下。

【主治】肾虚腰痛。

14722 煨姜丸

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【组成】附子 硇砂 木香 生姜

【用法】用大附子五十个，各重半两者，去皮脐，以尖刀子剜去心子，约容硇砂半钱，实之；却以附子末和面作饼子，裹附子，用文武火煨令黄，用木香如附子之半，同为细末，以水为丸，如芡实大；复以生姜一块，擘作两片，以药在内，湿纸裹，令煨，候姜熟，白汤嚼下，空心服。

【主治】本脏虚，饮食不化，或成痃癖，或发心痛，冷水积脾，结聚疼痛；一切冷气等疾。

14723 源泉汤

【方源】《会约》卷二。

【组成】当归一钱半 生地二钱（用大本支摘碎，酒浸一时） 熟地二钱 白芍一钱半（酒炒） 阿胶（蛤粉炒成珠）一钱半 枸杞一钱二分 青蒿七分 丹参二钱半 干姜（炒黑过心）五至七分 山药一钱半 元参一钱 陈皮七分 地骨皮一钱

【用法】水煎，日服一剂，或多服。

【主治】血虚劳热骨蒸，五心热，大便干燥，小便黄涩。

【加减】如尺脉弱，血虚有寒者，加肉桂一钱；如妇人产后，加益母草三钱；若五心不热，减元参；如骨不蒸热，去地骨皮；如胃寒作呕者，去生地。

14724 滚金丸

【方源】《百一》卷五

【组成】干姜（不炮） 真橘皮（不去白，洗） 天南星（生用） 半夏（不汤洗）各一两

【用法】先用生姜一两（不去皮）捣烂，制半夏、南星末作曲，却用余药共一处为末，以生姜自然汁为丸，如梧桐子大；又以雄黄少许为衣。每服三五十丸，姜汤送下，不拘时候。临卧服尤佳。

【主治】《普济方》：痰积中脘，眩瞑呕吐，头疼恶心，时吐酸水。

14725 滚痰丸

【方源】《玉机微义》卷四引《养生主论》。

【异名】沉香滚痰丸(《墨宝斋集验方》卷上)、礞石滚痰丸(《痘疹金镜录》卷上)。

【组成】大黄 黄芩各八两 沉香半两 青礞石（消煅）一两

【用法】上为细末，水丸，如梧桐子大。

【主治】①《玉机微义》引《养生主论》：痰证，变生千般怪症。②《摄生秘剖》：头风目眩，耳鸣，目眼蠕动，眉棱耳轮痛痒；四肢游风，肿硬；噫气吞酸，心下嘈杂，心气疼痛，梦寐奇怪，手麻臂痛，口糜舌烂喉闭，或绕项结核，胸腹间如二气交纽，噎塞烦闷，失志癫狂，心下怔忡，喘咳呕吐等证。

【方论选录】①《玉机微义》：此以大黄、黄芩为君，大泻阳明湿热之药，礞石以坠痰，沉香则引诸气上而至天，下而及泉为使也，以上二方有实热者可用。②《医方考》：大黄能推荡，黄芩能去热，沉香能下气，礞石能坠痰。是方乃攻击之剂，必有实热者始可用之，若与虚寒之人，则非宜矣。又礞石由焰消煅炼，必陈久为妙，若新煅火毒未除，则不宜服。③《摄生秘剖》：痰不自动，因气而动；气不自升，因火而升；积之既久，依附肠胃，回薄曲折，处以为楼，治之窠臼，谓之老痰。其变现之症，种种怪异，难以测识，莫可名状。非寻常药可能疗也。隐君见及此，故用大黄为君，以开下行之路；黄芩为臣，以押上潜之火；礞石慓悍之性，游行肠胃，踵其回薄曲折之处，荡而涤之，几于剖刮肠剖骨之神，故以为佐；奔驰于上中下三焦间、飞门、魄门之窍者，沉香之力，故以为使。必须服之得法，则效如响应，用水一口送过咽，即便仰卧，令药在咽膈间，徐徐而下，半日不可饮水，不可起身坐行言语，直待药气除逐上焦痰滞，然后动作。大抵服罢，喉间稠粘壅塞不利者，乃痰气泛上，药力相攻耳，少顷，药力既胜，自然宁贴。

【临证举例】 ①幻视 《古今医案按》：一妇病热，目视壁上，皆是红莲花满壁，医用滚痰丸下之，愈。②癫症 《南雅堂医案》：神呆，忽啼忽笑，言语无序，脉沉兼滑，系顽痰实火，胶结为患，症非虚寒可比，治法不嫌其峻。兹用滚痰法主之：青礞石三两，焰消一两，大黄八两（酒蒸），淡黄芩八两（酒洗），沉香一两（研）。先将上两味同入瓦罐内，以盐和泥封固。入火煅至石如黄金色为度，用清水飞净，和后药三味水泛为丸。每服二钱，姜汤送下。③痰饮喘咳 《扫叶庄医案》：高年久不更衣，痰气上窒。滚痰丸投之。④癫痫 《四川中医》（1983；6:39）：杨某某，男，8岁。两年前，突然昏倒，不省人事，牙关紧闭，吐血涎沫，四肢抽搐，甚则小便失禁。经服用苯妥英钠等，病情有所好转。但持续服用数月而出现痴呆，语无伦次，因而停药。近半年来又复发如初，现每日发作二三次。醒后神志恍惚，站立不稳，时喃喃自语，傻笑，答非所问，流涎，质粘稠，味臭秽。饮食一般，大便数日一行，干燥。舌质黄腻，脉滑数有力。此系痰火为患，宜重投泻火涤痰之剂。处方：大黄20克（后下），礞石（火消煅）20克，黄芩10克，沉香4克。服药三剂，痫证发作每日减为一次，发作持续时间也有所缩短，流涎大减，大便正常。以上方加法夏9克，贝母6克，白附子6克，枳实9克，菖蒲6克，胆星6克，僵蚕9克，朱茯神9克，远志6克，苦参9克，服药三剂，诸症大减，行走自如，未再流涎。有时夜间突发惊恐，但痫证未再发作。唯痴呆、傻笑仍同前。此病系痰火扰心，迷闷孔窍，日久损伤神明，非药物短时间所能奏效。遂嘱其服用成药定痫丸或紫金锭以根除病因。随访至今，未复发。

【备考】 本方原文为：甑里翻身甲挂金，于金头戴草堂深。相逢二八求斤正，消煅青礞倍若沉。十七两中零半两，水丸桐子意常斟。千般怪证如神效，水泻双身却不任。《伤寒大白》有黄柏。

14726 滚痰丸

【方源】 《准绳·类方》卷二引《养生主论》。

【异名】 神秘沉香丸（原书同卷）、沉香礞石滚痰丸（《不居集》下集卷八）。

【组成】 大黄（蒸少顷，翻过再蒸少顷，即取出，不可过） 黄芩各八两 青礞石（消煅如金色） 沉香 百药煎（此用百药煎，乃得之方外秘传，盖此丸得此药，乃能收敛周身顽涎，聚于一处，然后利下，甚有奇功，曰倍若沉者，言五倍子与沉香，非礞倍于沉之谓也）各五钱

【用法】 上为末，水为丸，如梧桐子大。食后、空心白汤送服。一切新旧失心丧志，或癫或狂，每服一百丸；气盛能食，狂甚者，加二十丸，临时加减消息之；一切中风瘫痪，痰涎壅塞，大便或通或结者，每服八九十丸，或加至百丸，永无秘结之患；一切阳证风毒脚气，遍身游走疼痛，每服八九十丸，未效，加至百丸；一切无病之人，遍身筋骨疼痛不能名者，或头疼牙痛，或摇或痒风注等证，风寒鼻塞，身体或疼或不疼，非伤寒证者，服八九十丸，痰盛气实者加之；一切吞酸嗳逆，膈气及胸中疼闷，腹中气块冲上，呕沫吐涎，状如反胃，心下恍惚，如畏人捕，怵惕不安，阴阳关格，变生乖证，食饥伤饱，忧思过虑，心下嘈杂，或痛或哕，或昼夜虚饱，或饥不喜食，急慢喉闭，赤眼，每用加减服；一切新旧痰气喘嗽，或呕吐，头运目眩，加减服之；一切腮颔肿硬，若瘰疬者，及口糜舌烂，咽喉生疮者，每服六七十丸，加蜜少许，一处嚼碎噙化，睡时徐徐咽之；一切男女大小虚实，心疼连腹，身体羸瘦，发时必呕绿水黑汁冷涎，乃至气绝，心下温暖者，量虚实加减服之；若事属不虞之际，至于百丸，即使回生，末至颠危者，虚弱疑似之间，只服三十丸或五十丸，立见生意，然后续续进之，以愈为度，兼服生津化痰，温中理气之药；一切荏苒疾病，凡男妇患非伤寒内外等症，或酒色过度，或吐血，或月事愆期，心烦志乱，或腹胀胁痛，劳倦痰眩，或暴行日中，因暑伏痰，口眼㖞斜，目痛耳愦鼻塞，骨节痠疼，干呕恶心，诸般内外疼痛，百药无效，众医不识者，依前法加减服之。大抵服药，须临卧在床，用熟水一口许咽下便卧，令药在喉膈间徐徐而下；如日间病出不测，疼痛不可忍，必欲急除者，须是一依前卧法服，大半日不可食汤水及不可起身行坐言语，直候药丸除逐上焦痰滞恶物，过膈入腹，然后动作，方能中病，每夜须连进二次，次日痰物既下，三五次者，仍服前数，下五七次或直下二三次而病势顿已者，次夜减二十丸；头夜所服，并不下恶物者，次夜加十丸；人壮病实者，多加至百丸，惟候虚实消息之。或服过仰卧，咽喉稠粘，壅塞不利者，痰气泛上，乃药病相攻之故也；少顷，药力即胜，自然宁贴。往往病久结实于肺胃之间，或只暴病全无泛滥者，服药下咽即仰卧，顿然百骸安静，五脏清宁，次早先去大便一次，其余遍数皆是痰涕恶物，看什么粪，用水搅之，尽是痰片粘涎，或稍稍腹痛，腰肾拘急者，盖有一种顽痰恶物，闭气滞肠，里急后重者，状如痢疾，片饷即已，若有痰涎易下者，快利

不可胜言，顿然满口生津，百骸爽快，间有片时倦怠者，盖因连日病苦不安，一时为药力所胜，气体暂和，如醉得醒，如浴方出，如睡方起，此药并不洞泄刮肠大泻，但取痰积恶物，自肠胃次第而下，腹中糟粕，并不相伤，其推下肠腹之粪，则药力所到之处，是故先去其粪，其余详悉，不能备述者，当自知之。

【主治】 痰之为病，或偏头风，或雷头风，或太阳头痛，眩晕如坐舟车，精神恍惚；或口眼瞤动，或眉棱耳轮俱痒，或颔腮四肢游风肿硬，似疼非疼；或浑身燥痒，搔之则瘾疹随生，皮毛烘热，色如锦斑；或齿颊似痒似痛而无定所，满口牙浮，痛痒不一；或嗳气吞酸，鼻闻焦臭，喉间豆腥气，心烦鼻塞，咽嗌不利，咯之不出，咽之不下，或因喷嚏而出，或因举动而吐，其痰如墨，又如破絮，或如桃胶，或如蜆肉；或心下如停冰铁，闭滞妨闷，嗳嚏连声，状如膈气；或寝梦刑戮刀兵剑戟，或梦入人家，四壁围绕，暂得一窦，百计得出，则不知何所；或梦在烧人地上，四面烟火枯骨，焦气扑鼻，无路可出；或不因触发忿怒悲啼下泪而寤；或时郊行，忽见天边两月交辉，或见金光数道，回头无有；或足膝酸软，或骨节腰肾疼痛，呼吸难任；或四肢肌骨间痛如击戳，乍起乍止，并无常所；或不时手臂麻疼，状如风湿，或卧如芒刺不安，或如毛虫所螫，或四肢不举，或手足重滞；或眼如姜蜜胶粘痒涩，开合甚难；或阴晴交变之时，胸痞气结闭而不发，则齿痒咽痛，口糜舌烂，及其奋然而发，则喷嚏连声，初则涕唾稠粘，次则清水如注；或眼前黑暗，脑后风声，耳内蝉鸣，眼睑肉跳。治之者或曰腠理不密，风府受邪；或曰上盛下虚，或曰虚，或曰寒，或曰发邪，病势之来，则胸腹间如有二气交纽，噎塞烦郁，有如烟上冲头面烘热，眼花耳鸣，痰涎涕泪，并从肺胃间涌起，凛然毛竖，喷嚏千百，然后遍身烦躁，则去衣冻体，稍止片时，或春、秋乍凉之时，多加衣衾，亦得暂缓，或顿饮冰水而定，或痛一醉而宁，终不能逐去病根。

14727 滂沱汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】 元参九钱 升麻二钱 黄芩四钱 麦冬七钱 防风三钱 天花粉三钱 苏叶一钱 青黛三钱 生甘草三钱 生地九钱 桑白皮五钱

【用法】 水煎服。

【主治】 伤寒发斑，身热，心内如火，口渴呼水，气喘舌燥，扬手出身；或中暑热之气，大渴饮水，数桶不止，汗如雨下，大喊狂呼，日重夜轻，此皆阳火。

14728 溢胆汤

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】 黄芩（去朽） 甘草（炙） 人参各二两 官桂一两 苦参 茯神各半两

【用法】 上为末。每服三钱，水一盏，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 谋虑不决，胆虚，气上冲口中，上溢则口苦，是清净之府浊扰之气上溢。

14729 溯源丹

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】 当归（酒洗） 熟地黄（酒蒸） 蕲艾（醋炒）各二两 香附（醋浸，炒）三两 川芎（米泔制） 人参各一两二钱 白芍（酒炒） 阿胶（蛤粉炒） 白术（去芦） 茅根各六钱 椿根皮（酒炒） 黄柏（酒炒）各一两 地榆七钱 白茯苓（去皮）八钱 白石脂七钱

【用法】 上为细末，米醋糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心米汤送下。

【主治】 妇人赤白带下。上热下寒，口出恶气，或咽干，或牙痛，或耳鸣，或遍身流注疼痛，发热憎寒，或口吐酸水，或心腹气痛，或下五色腥臭。

14730 粳米饮

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】 仓粳米（净淘，控干）四合 薤白七茎 羊肾脂五两 豉（用水四升，煎取二升，去滓澄清）

【用法】 上熬肾脂，煎薤白令熟，入豉汁与米同煮，空腹食之。

【主治】 冷痢寒结不散，日夜无度。

14731 粳米粥

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】 粳米（淘）一合 薤白七茎（细切） 豉二十五粒 枳壳（去瓤，麸炒，为末）一分 生姜汁半合 大枣（擘破）二枚 陈橘皮（去白，焙干，为末）一分

【用法】 上药除薤白、米外，以水三盏，先煎诸药至二盏，去滓，下薤、米再煮，以熟为度，空腹任意食之。

【主治】 反胃羸瘦，四肢萎弱。

14732 煎金饮

【方源】《普济方》卷二七六。

【异名】 代赭石散。

【组成】 代赭石

【用法】 以代赭石为细末，水飞极细，晒干。每服半钱或一钱，用真金煎汤调下，连进三服。

【主治】 小儿不拘阴阳证发痫者。

14733 慈云散

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】 番木鳖 川乌 土鳖虫 鹿角（煅）各二两 穿山甲一两六钱 明天麻 草乌 川芎 升麻 当归尾 闹羊花 生香附 僵蚕各一两 蜈蚣 斑蝥各四钱

【用法】 上各制毕，研极细末。重者服一钱，轻者用六分或八分，俱用无灰酒调服。盖被取汗，不可见风，必须汗干，然后出帏幕。

【功用】 接骨回生。

【主治】 跌打损伤，及痈疽疔肿大毒，初起即消，已成即溃。

14734 慈航膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 侧柏叶 125 克 大黄 31 克 当归 31 克 地榆 31 克 血余 46 克 露蜂房 10 克 黄蜡 93 克 香油 500 毫升

【用法】 常法炼膏。外用。

【主治】 烫火伤。

14735 塞耳丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【异名】 桃仁膏（《普济方》卷五十四）。

【组成】 桃仁一分（汤浸，去皮） 松脂一分 椒目末半分 巴豆七枚（去皮心）

【用法】 上药捣炼膏，拈为枣核大，绵裹一丸塞耳中，三日一易之。

【主治】 耳聋。

14736 塞耳丹

【方源】《普济方》卷五十四引《圣济总录》。

【异名】 塞耳丸（《济生》卷八）。

【组成】 石菖蒲一寸 巴豆一枚（去皮） 全蝎一枚（去毒）

【用法】 上为细末，葱涎打和为丸，如枣核大。绵裹，纳耳中。

【主治】 耳聋，气道壅塞，两耳聋聩；耳卒疼痛不能忍。

【备考】《青囊秘传》有麝香一字。

14737 塞耳散

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】 菖蒲 附子（炮裂，去皮脐）各一分

【用法】 上为细散，麻油调，绵裹如枣核大，塞耳中。

【主治】 耳卒痛，不能忍。

14738 塞鼻丹

【方源】《理瀹》。

【组成】 薄荷 细辛 巴霜 冰片末各等分

【用法】 上研末。棉裹塞鼻。 时头顶冰凉，咽喉即开。愈后鼻疮并无害，以银花甘草水洗之。

【主治】 喉痹、喉蛾溃烂，水浆不入。

14739 塞耳杏仁膏

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【异名】 蓖麻丸（《普济方》卷五十三）。

【组成】 杏仁（去皮尖双仁，别研） 蓖麻子（去皮，别研）各一两 食盐（别研）二分 乳香（别研）一分 巴豆（去皮心，别研）一分 附子（炮裂，去皮脐） 一分 桃仁（去皮尖双仁，别研）一两 磁石（火烧醋淬一七遍）一两 木通（锉）半两 蜡二两 菖蒲一两

【用法】 上除别研外，捣罗为末，后入别研者相和，捣丸，梧如枣核大。绵裹塞耳中，一日四五次。

【主治】 风聋久不愈者。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“杏仁膏”。

14740 塞耳硫黄散

【方源】 方出《圣惠》卷三十六，名见《普济方》卷五十四。

【组成】 雄黄一分 硫黄一分

【用法】 上为末，以绵裹纳耳中。以愈为度。

【主治】 耳聋。

14741 塞鼻瓜蒂散

【方源】 方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷三十六。

【组成】 瓜蒂半两 细辛一分

【用法】 上为细散，以绵裹豇豆大，塞鼻中。须臾通矣。

【主治】 鼻痛气息不通。

14742 塞鼻皂荚散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【异名】 皂荚散（《圣济总录》卷一一六）。

【组成】 皂荚 细辛 辛夷 川椒（去目及闭口者，微炒去汗） 附子（炮裂，去皮脐）各一分

【用法】 上为散。每取半钱，用棉裹，塞鼻中；以少许吹之亦得。

【主治】 塞鼻不通。

14743 鬱龙汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】 羚羊角一钱五分 牡蛎四钱 石斛三钱

麦冬一钱五分（青黛少许拌） 南沙参四钱 川贝二钱（去心研） 夏枯草一钱五分 丹皮一钱五分 黑荆芥一钱 薄荷炭一钱 茜草根二钱 牛膝二钱 茅根五钱 藕五大片

【主治】 鼻衄。

14744 辟风丹

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】 独活（洗去土，焙干） 防风（去芦头） 吴白芷 桂 藁本（去土） 麻黄（去节，微炒） 白芍药（去皮） 天麻各一两 川乌头（炮裂，去皮，捶碎炒黄）半两 藿香叶（去土）半两 川芎七钱 羌活（去苗）三钱 甘草（锉，炒）半两 白花蛇（酒浸，去皮骨）半两 白僵蚕（炒黄）三钱 全蝎（去毒，炒黄色）半两 朱砂（为衣）二两 白附子（炮制，捣碎，炒微黄）四钱 天南星（牛胆酿，炒黄）四钱 远志（汤浸，去心，焙）三钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每两作十丸，朱砂为衣。每服一丸，细嚼或化服，用生姜汤送下，麝香汤亦得；如破伤风，豆淋酒送下；急风痫病，人参汤送下，不拘时候。

【主治】 诸风疾，无问新久者。半身不遂，口眼喎斜，语言謇涩，精神昏愦，痰涎并多，咽嗌不利；及风虚头痛目眩，旋运欲倒，或心忪健忘，恍惚不宁，手足麻痹，颤掉无力，筋脉拘急，骨节烦疼，行步艰难。

【备考】 本方原名辟风汤，与剂型不符，据原书目录改。

14745 辟寒丹

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】 肉桂三钱 茯苓五钱 白术五钱 甘草一钱 橘核三钱 荔枝核三个（捣碎）

【用法】 水煎服。

【主治】 膀胱寒结，小水甚勤，睾丸缩入，遇寒天更痛者。

【方论选录】 此方用肉桂为君，既能温命门之火，复能祛膀胱之寒；白术、茯苓又是利水之剂；橘核、荔核又善定睾丸之痛，非肉桂相引，不能直入而散其寒结也。

14746 辟寒汤

【方源】《普济方》卷二十三引《十便良方》。

【组成】 茴香三两 高良姜二两 丁香一分 甘草二两（锉） 白盐三两（同甘草炒） 胡椒五钱

【用法】 上为细末。每服一钱，沸汤点服。不拘时候

【主治】 脾寒胃弱，呕逆恶心，腹胁胀痛。

14747 辟瘟丹

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】 紫苏二两 香附四两（童便、醋、盐水、酒四制） 苍术二两（土炒） 麦冬一两（去心） 木香一两（忌火） 白扁豆二两（炒黄色） 雄黄五钱（研末） 薄荷二两 管仲八两（洗净，煎膏） 连翘二两 山楂肉三两（炒黑） 广藿香叶一两（晒燥，研） 降香末二两

【用法】 上为细末，用生姜一斤，捣汁拌入药内，再用炼蜜为丸，朱砂飞净为衣，每丸重三钱。每服一丸，时症伤寒，山楂薄荷汤送下；疟疾，柴胡陈皮汤送下；痢疾，赤者当归汤送下，白者淡姜汤送下。小儿、孕妇，止服半丸。

【主治】 时症伤寒，四时瘟疫、疟疾。

【宜忌】 忌生冷、鱼腥、煎炒、油腻。

14748 辟瘟丹

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 麝香一两五钱 冰片二两 沉香一两五钱 公丁香二两 檀香一两五钱 降香一两五钱 麻黄三两二钱 细辛一两 天麻三两二钱 腰黄三两二钱 雌黄三两二钱 生月石三两二钱 山慈姑三两 大戟三两 五倍子三两 千金霜三两 肉桂一两 大黄四两 茅术三两二钱 鬼箭羽三两 飞朱砂六两 苏合香油一两五钱

【用法】 各取净末，一并和匀，加糯米粉十一两，调浆，将苏合香油烊入，打和为块，分做一千一百三十四块，每块约干重六分；或轧片，每片约干重二分五厘。每用一块至二块（片剂二片至四片），开水化服，小儿减半。

【功用】 辟秽解浊。

【主治】 感寒触秽，腹痛吐泻，头晕胸闷。

【宜忌】 孕妇忌服。

14749 辟恶启脾丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】 苍术一两 藿香 茯苓 广皮 半夏 砂仁 甘草 香附 白术 神曲 白蔻藜（以上各为末）各五钱 绿矾四两（醋炒七次，摊地出火毒，研） 皂角二两 红枣六两（蒸，去皮核）

【用法】 将皂角预煎汤一大碗，再投枣熬，搅如膏，入前末，杵作丸子。每服钱许，早晚生姜汤，白滚汤任下。若服后，身现红斑，急煎枣汤或银花甘草汤服；黄退肿消，可不必尽料；若犹未痊，日服减半可也。

【主治】 黄胖症。因受阴霾恶气，病发脾经，通

身黄肿，食则胸闷，小便自利，动则气浮。

14750 殿胞煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】殿胎煎(《一见知医》卷一)。

【组成】当归五七钱或一两 川芎 炙甘草各一钱 茯苓一钱 肉桂一二钱或五七分

【用法】水一钟，煎八分，热服。

【主治】产后儿枕疼痛。

【加减】如脉细而寒或呕者，加干姜（炒黄色）一二钱；如血热多火者，去肉桂，加酒炒芍药一二钱；如脉弱阴虚者，加熟地三五钱；如气滞者，加香附一二钱或乌药亦可；腰痛，加杜仲一二钱。

14751 缠金丹

【方源】《本事》卷二。

【组成】木香 丁香 沉香 槟榔 官桂（去粗皮，不见火） 胡椒 硇砂（研） 白丁香各一钱 肉豆蔻 飞矾各一分 马兜铃 南星（炮） 五灵脂（拣如鼠屎者，淘去沙石，晒干） 瓜蒌根 半夏（汤洗七次）各半两 朱砂三分（水飞，留半为衣）

【用法】上为细末，入二味研药和匀，生姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服三丸，生姜汤送下，或干嚼萝卜下。

【主治】五种积气及五噎，胸膈不快，停痰宿饮。

【方论选录】《本事方释义》：广木香气味辛温，入足太阴；丁香气味辛温，入手足太阴、少阴、阳明；沉香气味辛温，入足少阴；槟榔气味辛温，入足太阴，太阳；官桂气味辛温，入足厥阴；胡椒气味辛热，入足太阴，少阴、厥阴；硇砂气味咸苦微温，入足阳明、厥阴；白丁香气味苦辛温，入手太阴、阳明；肉豆蔻气味辛温，入足太阴，阳明；飞矾气味酸寒涩，入手太阴，足厥阴；马兜铃气味苦辛微温，入手太阴，最能宣壅痹；南星气味辛温，入足厥阴；五灵脂气味甘温，入手太阴、足厥阴，瓜蒌根气味苦寒，入手太阴、足阳明；半夏气味辛温，入足阳明；朱砂气味苦温，入手少阴。此治五种积气及五噎之病，痰饮停扰，胸膈不快，非一二处受病，乃十二经皆被病魔窃踞，生姜为丸为引，萝卜为引者，亦取其引药入内，分途走经络之意也。

14752 瑶池露

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】白芷 山奈 藿香 防风 细辛 荆芥 甘草 银花 黄柏 地骨皮 苦参各等分

【用法】煎汤，温温噙漱。

【主治】喉痈。咽中腐烂，臭秽难闻。

14753 静神丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】酒当归 酒生地 姜远志 茯神各五钱 石菖蒲 黄连各二钱半 朱砂二钱 牛黄一钱 金箔十五片

【用法】猪心血和丸，如黍米大，金箔为衣。每服五十丸，灯心汤送下。

【主治】忧思过度，令人惕然心跳动而不自安者。

【备考】本方改作散剂，名“静神散”（见《中国医学大辞典》）。

14754 静镇汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】白芍 黄芩 生地 陈皮 柴胡各一钱 甘草 防风 桂枝 紫苏各八分 当归一钱半

【用法】水煎，热服，服三四剂。

【主治】妇人经行时，因冒风寒，以致热入血室而夜不宁者。

【加减】如内热，加连翘；如口渴，加葛根；如热甚，加石膏、知母；如寒甚，加生姜。

14755 碧雪

【方源】《济生》卷五。

【异名】碧雪散(《普济方》卷六十引《仁存方》)。

【组成】蒲黄 青黛 硇砂 焰消 甘草各等分

【用法】为细末。每用手指捻，掺于喉中，津咽或呷少冷水送下，频频用之。

【主治】①《济生》：一切壅热，咽喉闭肿不能咽物，口舌生疮，舌根紧强，言语不正，腮项肿痛。②《片玉心书》：重腭、重舌、木舌。

14756 碧雪

【方源】《局方》卷六（续添诸局经验秘方）。

【异名】碧雪膏(《回春》卷五)、碧雪丹(《济阳纲目》卷二十五)、碧云散(《嵩崖尊生》卷六)。

【组成】芒消 青黛 石膏（煅过，研飞） 寒水石（研飞） 朴消 消石 甘草 马牙消各等分

【用法】将甘草煎汤二升去滓，却入诸药再煎，用柳木篦不住手搅，令消溶得所，却入青黛和匀，倾入砂盆内，候冷，结凝成霜，研为细末。每用少许，含化咽津，不拘时候；如喉闭壅塞不能咽物者，即用小竹筒吹药入喉中，频用神效。

【主治】一切积热，咽喉肿痛，口舌生疮，心中烦躁，咽物妨闷，或喉闭壅塞，水浆不下；天行时

疫，发狂昏愦。

【备考】 方中消石，《济阳纲目》作“滑石。”

14757 碧云散

【方源】 《兰室秘藏》卷中。

【异名】 搐药碧云散(《东垣试效方》卷五)。

【组成】 细辛 郁金 芒消各一钱 蔓荆子 川芎各一钱二分 石膏一钱三分 青黛一钱五分 薄荷叶二钱 红豆一个

【用法】 上为极细末。口噙水，鼻内搐之。

【主治】 ①《兰室秘藏》：头痛。②《普济方》：眼目赤痛。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“川芎散”。

14758 碧云散

【方源】 《金鉴》卷六十三。

【组成】 川芎 鹅不食草各一两 细辛 辛荑各二钱 青黛一钱

【用法】 上为细末。患者口噙凉水，令人以芦筒吹入左右鼻孔内，取嚏为效；或每用少许，鼻常吸之，其效缓。

【主治】 ①《金鉴》：头风，眉棱痠痛。②《药奁启秘》：脑漏，常流浊涕。

14759 碧云膏

【方源】 《医统》卷六十一。

【组成】 铅粉 铜绿各一两 乳香 没药各一钱 冰片一分

【用法】 上为细末，大黄熬膏作锭子用，晒干。用时以井水磨下，新笔涂眼四周，不得入目。

【主治】 倒睫及肿烂弦风。

14760 碧天丹

【方源】 《银海精微》卷下。

【组成】 铜青五钱 明矾四钱 五倍子一钱 白墙土一钱 海螵蛸一钱 薄荷叶五分

【用法】 上为末，用老姜汁搅和为丸，如圆眼核大。要用时，将一丸淡姜汤一盏泡散，洗眼弦，次日再洗。依此洗三四次即愈。

【主治】 远年近日烂弦风眼。

14761 碧玉丹

【方源】 《观聚方要补》卷十引《医意商》。

【组成】 天花粉 石膏各六钱 南星（姜、矾、牙皂汤煮熟） 胆南星各四钱 青黛二钱 冰片六厘

【用法】 上为细末，白蜜调匀。每服三四岁者，一钱五分，周岁者，一钱许。服后片时仰卧。

【主治】 顿嗽无时，连声不已，与食吐出而止。

14762 碧玉丹

【方源】 《重楼玉钥》卷上。

【组成】 胆矾三钱 白僵蚕六钱（炒去丝嘴，拣直者佳）

【用法】 上为细末，加麝香一分。每用少许，吹咽喉中。

【主治】 喉风急闭。

14763 碧玉散

【方源】 《普济方》卷六十三。

【组成】 僵蚕 青黛各一两 蒲黄 盆消 甘草各二两 薄荷三两

【用法】 上为末。每用少许吹咽喉内。咽之无妨，频用妙。

【主治】 咽喉肿痛。

14764 碧玉散

【方源】 《医统》卷八十一。

【组成】 青靛 黄柏末各二钱 滑石末二钱

【用法】 上二末以青靛调和如泥。用皂角针挑去泡水，次敷药。

【主治】 天疱疮。

14765 碧玉散

【方源】 《准绳·类方》卷七。

【组成】 蹄蹯花 脑荷 羌活 川芎 细辛 防风 荆芥 蔓荆子 白芷各一钱 风化消 石膏（煅） 青黛 黄连各三钱 鹅不食草二两

【用法】 上为细末。吹鼻中，一日吹二次。

【主治】 眼睛肿胀，红赤昏暗，羞明怕日，瘾涩难开，疼痛风痒，头重鼻塞，脑鼻痠疼，翳膜胬肉，眵泪稠粘，拳毛倒睫，一切眼证。

14766 碧玉散

【方源】 《金鉴》卷六十三。

【组成】 黄柏末 红枣肉（烧炭存性）各五钱

【用法】 共研极细末。香油调搽患处。

【主治】 燕窝疮，俗名羊胡子疮。生于下颏，初生小者如粟，大者如豆，色红热痒微痛，破津黄水，形类黄水疮，浸淫成片，但疙瘩如攒，由脾胃湿热而成；及黄水疮，初如粟米，痒而兼痛，破流黄水，浸淫成片，随处可生。

14767 碧玉散

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 黄柏（研末）20克 香油40毫升

【用法】 调成糊状，外敷。

【主治】 婴儿耳、鼻、口围湿疹。

14768 碧玉膏

【方源】 《疡医大全》卷七。

【组成】 蓖麻仁（去皮尖，捣烂） 杏仁（去皮，

捣烂）各四十九粒　铜绿二两七钱（用水一碗，将铜绿研细，投入水中，搅匀）　片松香五斤（研细）

【用法】 用真麻油十二两，入锅内熬滚，次下蓖麻、杏仁，熬至滴水成珠为度，夏布滤去滓，将油复入净锅内，用文武火熬滚，徐徐投下松香末，用桃槐枝不住手搅匀，倾入瓷盆内，候膏将凝，然后加水浸之，用手揉扯以去火毒，另用瓷罐或桐杓盛贮数月。用时以热汤炖化，摊贴。

【功用】 活血止痛，拔毒消肿，敛毒透脓，去腐生新。

【主治】 痈疽发背，瘰疬马刀，乳痈乳岩，流火流注，肿块风毒，横痃痔漏，囊痈，冬瓜痈，贴骨疽，一切腰背臀腿毒疖，多骨疽，蟠拱头，脚隐漏蹄。

14769　碧油膏

【方源】 《外科精要》卷下。

【组成】 桃枝　柳枝　桑枝　槐枝　乳香（另研）　血竭（研）各五钱　黄丹（净）四两

【用法】 用麻油十两，煎焦去滓，入丹再煎成膏，入乳香血竭。灸后用此。

【功用】 止痛排脓。

【主治】 一切疮疡。

14770　碧雪丹

【方源】 《喉科紫珍集》卷上。

【组成】 白萝卜苗（无苗时用鲜萝卜一斤代之）四两　荸荠苗（无苗时用鲜荸荠一斤代之）五两　鲜土牛膝根五两（干者用七两，又名天名精）　鲜银花叶四两（干者用六两）

上用囊盛之，入长流水浸一宿，取起，带水磨搅匀，澄清取粉，每粉一两为一料，配入后料：

远志（去心）八分（甘草水泡）　丹皮　人中黄　人中白各一钱　桔梗三钱　僵蚕（甘草水泡，去水上浮油）　硼砂　真川贝　马勃各五分　珍珠四分　西牛黄五厘　冰片三厘

【用法】 远志、丹皮、桔梗、僵蚕四味，用文火焙，其余八味各生研极细末，无声为度，并入前粉和匀。吹患处；或用土牛膝鲜者一两，和入乳汁半酒杯，捣汁，加当门麝三厘，和药为丸，如绿豆大，舌下含。

【主治】 一切风痹蛾癖，时行诸症。

【加减】 已经溃烂者，珍珠倍之，加琥珀四分，真紫金藤八分，俱要研极细。

14771　碧雪散

【方源】 《奇效良方》卷六十一。

【异名】 碧云散（《济阳纲目》卷一〇六）。

【组成】 灯芯灰二钱　硼砂一钱

【用法】 上为细末。每用少许，吹入喉中，有涎吐出。

【主治】 咽喉闭壅，一时不能言语，痰涎壅盛。

14772　碧绿散

【方源】 《医统》卷九十。

【组成】 绿豆粉半两　大黄末二钱

【用法】 上和匀。用姜汁、薄荷汁、蜜调涂患处。

【主治】 小儿赤游丹毒。

14773　碧霞丹

【方源】 《饲鹤亭集方》。

【组成】 飞青黛　硼砂　人中白（煅）　元明粉　儿茶　薄荷叶　川连　山豆根　天虫　马勃　胆星　金果榄各五钱　大梅片一钱五分

【用法】 共研至无声，瓷瓶密收。吹点。

【主治】 风火上郁，咽喉糜痛及牙痛。

14774　碧霞散

【方源】 《医方类聚》卷七十引《烟霞圣效方》。

【组成】 青黛一两　铜绿三钱　硇砂一钱

【用法】 上为细末。每服半钱，滚水调，临卧洗之。

【主治】 连眶赤烂，退翳。

14775　碧霞膏

【方源】 《准绳·类方》卷七。

【组成】 炉甘石　黄丹各四两　铜绿二两　黄连一两　当归尾二钱　乳香　没药　朱砂　硼砂　血竭　海螵蛸　青盐　白丁香　轻粉各一钱　麝香五分

【用法】 上为细末，黄连膏为丸，如皂角子大。每用一丸，新汲水半盏，于瓷盒内浸洗，每一丸可洗四五次。大病不过一月，小病半月，冷泪三日见效。

【主治】 目内外障。

14776　碧桃浸液

【方源】 《中医皮肤病学简编》。

【组成】 青嫩碧桃叶 50 克

【用法】 上浸于 75% 酒精 500 毫升，24～48 小时后，取出外用。

【主治】 荨麻疹。

14777　碧玉通神散

【方源】 《普济方》卷三六五。

【组成】 黄柏（蜜涂炙，取末）半两　青黛一分　脑子少许

【用法】 上和匀。候儿睡着，干掺口中，及置舌

下咽之。

【主治】 口疮。

14778 榼藤子丸

【方源】《宣明论》卷十二。

【组成】 黄耆 枳实 槐花 荆芥穗 凤眼草各二两 榼藤子一对（炙） 皂子三百个（炙）

【用法】 上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心酒送下；米饮亦得。

【主治】 肠风泻血，湿热内甚，因为诸痔久而不治，乃变成瘘。

【宜忌】 忌油腻、生冷、猪、鱼、臭血物等。

14779 榼藤子丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 榼藤子一个（重七钱者，酥炙，和皮用） 茴香（炒） 皂角刺（烧存性） 猬皮（烧存性） 枯白矾 白附子（炮） 枳壳（麸炒黄，去瓤） 槟皮（焙干）各半两 乳香二钱半

【用法】 上为细末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，食前温酒送下；如有痔疮疼痛，醋研五七丸，津唾涂患处。

【主治】 肠澼下血，痔漏结核疼痛。

14780 榧子煎

【方源】 方出《奇效良方》卷六十七，名见《医统》卷七十八。

【组成】 榧子四十九枚（去壳）

【用法】 上药以砂糖水半盏，砂锅煮干。熟食之，每月上旬平旦空心服七枚，七日服尽。

【功用】 化寸白虫为水。

【主治】 寸白虫。

14781 榧子贯众汤

【方源】《方剂学》。

【组成】 榧子 槟榔 红藤各一两 贯众五钱

【用法】 水煎取汁，分二次服。每次服药时随吃生大蒜二至三瓣。连用三天。

【功用】 驱钩虫。

【主治】 钩虫病。

【方论选录】 方中榧子、槟榔、贯众、大蒜都是驱虫药，其中榧子、贯众二味多用于驱钩虫；方中红藤一药，味苦性平，能入血分，清热解毒，散结消肿，常用以治肠痈，因钩虫寄生可使肠壁损伤和出血，故用为辅佐之品。

14782 榴灰散

【方源】《医级》卷八。

【组成】 石榴一个

【用法】 烧灰存性，为末。衄者，吹鼻；下血者，内服。

【主治】 血泄窍滑，鼻衄或下血。

14783 榴花散

【方源】《医方考》卷三。

【组成】 百叶榴花

【用法】 晒干，为末。吹入鼻中。

【主治】 衄不止者。

【方论选录】 榴花之红，有使入血；榴花之涩，可使止血。一夫当关，此药近之。

14784 槟连丸

【方源】《丹溪治法心要》卷三。

【组成】 白术 黄连 砂仁 陈皮 半夏曲 神曲 蓬术各一两 藿香 槟榔 青皮 丁香 麦芽 三棱 姜黄 良姜 白豆蔻 茯苓 桂花 连翘 山楂各五钱 川附半只 吴茱萸二钱

【用法】 上为末，姜糊为丸。每服七八十丸，姜汤或白汤送下，一日三次。

【主治】 翻胃，或朝食而暮出者，或下咽而吐者，或胃脘作痛者，或必得尽吐而爽者，或见食即吐者。

14785 槟苏散

【方源】《医方大成》卷五。

【异名】 槟榔散（《外科理例》）、槟苏败毒散（《吴氏医方汇编》）。

【组成】 紫苏 香附子各二两 陈皮 甘草 槟榔 木瓜各一两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏，加生姜、葱，水煎服。

【功用】 疏通气道。

【主治】 风湿脚痛。

14786 槟苏散

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】 苏槟散（《中国医学大辞典》）。

【组成】 槟榔 紫苏 木瓜 香附 陈皮 大腹皮各一钱 木香三分 羌活五分

【用法】 水二钟，生姜三片，葱白三茎，煎一钟，空心服。

【主治】 风湿流注，脚胫痠痛，或麻痹不仁，呕吐不食。

14787 槟榔丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】 槟榔一两 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 甘遂半两（煨令微黄） 汉防己半两 川朴消一两 当归一两（锉，微炒） 木通一两（锉） 川大黄一两（锉碎，微炒） 滑石二两 泽泻半两

猪牙皂莢半两（去皮，炙微黄） 商陆一两 牵牛子一两（微炒） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】 上为末，以醋饭为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以粥饮送下。以利为度，未得快利，即再服之。

【主治】 十种水气。腹胀喘嗽，大小便涩。

14788 槟榔丸

【方源】《本事》卷三。

【异名】 丁香半夏丸（《医学发明》卷一）。

【组成】 槟榔三分 丁香一分（不见火） 半夏一两（汤洗七次） 细辛（去叶） 干姜（炮） 人参各半两（去芦）

【用法】 上为细末，姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，姜汤送下，一日三服。

【主治】 心下停饮冷痰，头目晕眩，睡卧口中多涎。

【方论选录】《本事方释义》：槟榔气味苦辛温，入足太阴太阳，能消积下气；丁香气味辛热，入足阳明太阴；半夏气味辛温，入足阳明；细辛气味辛温，入足少阴；干姜气味辛温，入手足太阴；人参气味甘温，入足阳明；心下停饮冷痰，非辛温不能驱逐，非甘温补药不能养正气，正气大旺，停饮自去耳。

14789 槟榔汤

【方源】《本事》卷四。

【组成】 槟榔末三钱 生姜三片 紫苏七叶 陈皮三枚

【用法】 以水一大盏，煎七分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 脚气。

【方论选录】《本事方释义》：槟榔气味辛温，能下气，入足太阴、太阳；生姜气味辛温，入手足太阴；紫苏气味辛温，入足太阳；陈橘子气味辛温微酸，入足厥阴。脚气疼痛不能履地者，皆因风湿人络，气血凝滞不得流行，故以辛温疏其经络也。

【临证举例】 脚气 少府监韩正彦暴得疾，手足不举，诸医以为风，针灸臂腿不知痛。孙兆作脚气治，与此药乃愈。

14790 槟榔散

【方源】《千金》卷十五。

【组成】 槟榔八枚（皮子并用） 人参 茯苓 陈曲 厚朴 麦芽 白术 吴茱萸各二两（一方有橘皮一两半）

【用法】 上药治下筛。每服二方寸匕，食后酒调下，一日二次。

【主治】 脾寒，饮食不消，劳倦气胀噫满，忧恚不乐。

【方论选录】《千金方衍义》：脾寒，饮食不消，劳倦气胀噫满，虽用槟榔皮子、曲芽、厚朴，不得吴茱萸之温中下气，噫满必不能除；不得参、苓、白术之扶助胃气，冷食必不能化。尤妙在和滓酒服，以行温散之力也。

14791 槟榔散

【方源】《医方类聚》卷一二九引《王氏集验方》。

【组成】 茯苓皮 槟榔 枳壳 桑白皮 紫苏叶 大腹皮 猪苓（去黑皮） 泽泻 白术 川羌活 川芎 葶苈子（隔纸炒） 陈皮 甘草 商陆 木通 生姜皮各等分

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏半，煎至一盏，一日三服。

【主治】 水气浮肿。

14792 槟榔散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】 槟榔 牛膝 防己 独活 秦艽各一钱 青木香 天麻 赤芍各八分 桑枝二钱 当归五分

【用法】 水煎服。

【主治】 湿脚气。

14793 槟芍顺气汤

【方源】《瘟疫论》卷下。

【异名】 槟榔顺气汤（《杂病源流犀烛》卷二十）。

【组成】 槟榔 芍药 枳壳 厚朴 大黄

【用法】 加生姜，水煎服。

【主治】 下痢频数，里急后重，兼舌苔黄，得疫之里证者。

14794 酸枣汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 酸枣仁汤（《法律》卷六）。

【组成】 酸枣仁二升 甘草一两 知母二两 茯苓二两 芎藭二两

【用法】 以水八升，煮酸枣仁，得六升，纳诸药，煮取三升，分温三服。

【主治】 ①《金匮》：虚劳，虚烦不得眠。②《张氏医通》：盗汗。

【方论选录】 ①《法律》：虚劳虚烦，为心肾不交之病。肾水不上交心火，心火无制，故烦而不得眠。方用酸枣仁为君，而兼知母之滋肾为佐，茯苓、甘草调和其间，芎藭入血分，而解心火之躁烦也。②《古今名医方论》罗东逸：枣仁酸平，应少阳木化，而治肝极者，宜收宜补，用枣仁至二升，

以生心血，养肝血，所谓以酸收之，以酸补之是也。顾肝郁欲散，散以川芎之辛散，使辅枣仁通肝调营，所谓以辛补之。肝急欲缓，缓以甘草之甘缓，防川芎之疏肝泄气，所谓以土葆之。然终恐劳极，则火发于肾，上行至肺，则卫不合而仍不得眠，故以知母崇水，茯苓通阴，将水壮金清而魂自宁，斯神凝魂藏而魄且静矣。此治虚劳肝极之神方也。③《金匮要略心典》：虚劳之人，肝气不荣，则魂不得藏；魂不藏故不得眠。酸枣仁补肝敛气，宜以为君；而魂既不归容，必有浊痰燥火乘间而袭其舍者，烦之所由作也。故以知母、甘草清热滋燥，茯苓、川芎行气除痰，皆所以求肝之治而宅其魂也。④《古方选注》：虚烦、胃不和、胆液不足，三者之不寐，是皆虚阳溷扰中宫，心火炎而神不定也，故用补母泻子之法，以调平之。川芎补胆之用，甘草缓胆之体，补心之母气也；知母清胃热，茯苓泄胃阳，泻心之子气也；独用枣仁至二升者，取酸以入心，大遂其欲而收其缓，则神自凝而寐矣。⑤《成方便读》：凡有夜卧魂梦不安之证，无不皆以治肝为主；欲藏其魂，则必先去其邪。方中以知母之清相火，茯苓之渗湿邪；川芎独入肝家，行气走血，流而不滞，带引知、茯，搜剔而无余；然后枣仁可敛其耗散之魂，甘草以缓其急悍之性也。虽曰虚劳，观其治法，较之一子呆补者不同也。

【临证举例】 ①失眠 《医学と药学》(1986；1：185)：用酸枣仁汤提取物2.5g，一日三次，连续四周，对31例失眠症患者进行治疗。结果：对"入睡"、"熟睡感"二项指标的效果较显著，给药二周即有良好疗效。对于"睡中觉醒"、"醒后舒适感"、"白天精神"等也有明显改善。综合评定：获中等度以上改善者8例，占25.8%，轻度以上改善者20例，占64.5%。对病情轻者疗效较好。②卑怯症 《中医杂志》(1986；8：17)：以酸枣仁汤原方加大剂量，治愈卑怯症1例。患者表现为怠惰沉闷，日处内室，自愧无能，遇人则不胜赧颜，惭惧羞怯，或隐匿而避之，烦而少眠，易惊颤，爪甲枯白而凹，唇舌色淡，脉弦细。原方服30剂告愈。后依方制丸，巩固四个月。随访五年，再未复发。

【现代研究】 镇静、催眠作用 《国外医学·中医中药分册》(1983；6：368)：给正常人服用酸枣仁汤后，用多种波动描记器记录用药前后波动图，并以入睡度、熟睡度、觉醒时的爽快感等指标综合判定疗效，结果表明在整个实验期间，服药者的入睡度、熟睡度及觉醒爽快感均较好。提示本方确能改善睡眠及睡眠的质量。

14795 酸枣汤

【方源】《千金》卷十二。

【组成】 酸枣仁三升 人参 桂心 生姜各二两 石膏四两 茯苓 知母各三两 甘草一两半

【用法】 上㕮咀。以水一斗，先煮酸枣仁，取七升，去滓，下药煮，取三升，分三服，一日三次。

【主治】 虚劳烦扰，奔气在胸中，不得眠。

【方论选录】《千金方衍义》：《金匮》酸枣汤治虚劳虚烦不得眠。此治奔气在胸中，故退芎藭而进桂心，加人参助茯苓以降逆气；石膏佐知母以泄虚烦；生姜辛散，以行知母、石膏之性也。

14796 酸枣仁丸

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】 酸枣仁一两（微炒） 地榆皮一两 茯神一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，糯米粥饮送下，不拘时候。

【主治】 ①《圣惠》：胆虚不得睡。②《医方类聚》引《神巧万全方》：胆虚冷，神思昏沉，头旋目暗。

【备考】《医方类聚》引《神巧万全方》有朱砂一两。

14797 酸枣仁丸

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】 酸枣仁（炒） 地榆（和苗用）各一两 丹砂（研） 茯神（去木） 人参 菖蒲（锉）各半两

【用法】 上药除丹砂外，为细末，入丹砂令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】 ①《圣济总录》：胆气虚热，不睡。②《卫生宝鉴》：胆经不足，心经受热，精神昏愦，恐畏多惊，情思不乐，时有盗汗，虚烦不眠，朝愈暮剧，或发眩运。

14798 酸枣仁丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】 茯神（去木） 酸枣仁（炒，去壳） 远志仁（去心，炒） 柏子仁（炒，别研） 防风（去芦）各一两 生地黄（洗） 枳壳（去瓤）各半两 青竹茹二钱五分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，熟水送下，不拘时候。

【主治】 胆气实热，不得睡，神思不安。

14799 酸枣仁汤

【方源】 方出《本草纲目》卷三十六引《简便方》，名见《回春》卷四。

【组成】 酸枣仁 人参 茯苓各等分

【用法】 上为末。每服一钱，米饮调下。

【主治】 ①《本草纲目》引《简便方》：睡中汗出。②《回春》：多睡及不睡。

【备考】 本方用法，《回春》作：水煎服。如不要睡，即热服；如要睡，即冷服。

14800 酸枣仁汤

【方源】《金鉴》卷五十五。

【组成】 当归 白芍（炒） 生地 茯苓 酸枣仁（炒） 知母（炒） 黄柏（炒） 五味子 人参 黄耆（炙）

【用法】 水煎服。

【主治】 心虚，阴气不敛，盗汗，睡则多惊。

14801 酸枣仁散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】 酸枣仁三分（微炒） 薏苡仁三分 人参三分（去芦头） 黄松节三分（锉） 五加皮三分 茯神三分 桂心三分 羌活三分 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】 上为细末。每服一钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】 肝脏风，四肢筋脉抽掣疼痛，不欲饮食。

14802 酸枣仁散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】 酸枣仁 人参（去芦头） 黄耆（锉） 乌梅肉（微炒） 麦门冬（去心） 白茯苓各一两 覆盆子 栝楼 甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】 上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 虚劳。口舌干燥，心神烦渴，不得睡卧。

14803 酸枣仁粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】 酸枣仁半两（炒令黄，研末，以酒三合浸汁） 粳米三合

【用法】 先以粳米煮作粥，临熟下酸枣仁汁，更煮三五沸。空心食之。

【功用】 养肝宁心，安神止汗。

【主治】 ①《圣惠》：中风，筋骨风冷顽痹；或心脏烦热，躁渴不得睡卧。②《长寿药粥谱》：老年性失眠，心悸怔忡，自汗盗汗。

14804 酸枣茯神汤

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】 茯神 柏子仁 酸枣仁 熟地黄各一钱五分 桂心三分 人参一钱五分 五味子八分 白芍药六分 甘草（炙）四分 生姜三片

【用法】 上㕮咀。用水煎取八分，临卧热服。

【主治】 胆气虚怯，头痛目眩，心神恐畏，遇事多惊。

14805 嘉禾散

【方源】《局方》卷三。

【异名】 谷神散（原书同卷）、谷神嘉禾散（《得效》卷五）。

【组成】 枇杷叶（去毛尽，涂姜汁，炙令香熟为度） 薏苡仁（微炒） 白茯苓（去皮） 人参（去芦） 缩砂仁（去皮）各一两 大腹子（微炒） 随风子（如无，楝实，诃子亦得） 杜仲（去皮，用姜汁与酒合和涂，炙令香熟微焦） 石斛（细锉，酒拌，微炒） 藿香叶 木香 沉香 陈皮（去白）各三分 谷芽（微炒） 槟榔（炒） 丁香 五味子（微炒） 白豆蔻（微炒，去皮） 青皮（去瓤） 桑白皮（微炒）各半两 白术（炒）二两 神曲（微炒） 半夏（汤洗七遍，生姜一分，切作片子，与半夏同捣烂，作饼炙黄，各一分） 甘草（炙）一两半

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，入生姜二片，肥枣三枚，同煎至七分，温服，不拘时候。如疗五噎，入干柿一枚同煎，十服见效；如疗膈气，吐逆羸困，入薤白三寸，枣五枚同煎，妇人亦可服。

【功用】 常服育神养气，和补脾胃，进美饮食。

【主治】 中满下虚，五噎五膈，脾胃不和，胸膈痞闷，胁肋胀满，心腹刺痛，不思饮食，或多痰逆，口苦吞酸，胸满短气，肢体怠惰，面色萎黄；如中焦虚痞，不任攻击，脏气虚寒，不受峻补，或因病气衰，食不复常，禀受怯弱不能多食，尤宜服之。

14806 蔷薇根饮

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【异名】 蔷薇根散（《鸡峰》卷二十一）。

【组成】 蔷薇根皮一两 升麻三分 生干地黄 黄柏各半两 铅白霜（研）一钱

【用法】 上为末，入铅霜研匀。每服二钱匕，水一盏，入蜜半匙，煎至七分，稍温口，热漱咽嗌，冷即吐之，及时用药末掺疮上。

【主治】 喉咽生疮，连舌颊痛不可忍者。

14807 蔷薇根散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】蔷薇根一两（去泥土） 黄芩三分 地骨皮三分 桔梗三分（去芦头） 白蔹三分 川大黄三分（锉碎，微炒） 鼠李根白皮三分 赤芍药三分 续断三分 黄柏三分（锉） 黄耆三分（锉） 葛根三分 石龙芮三分 瓜蒌根一两

【用法】上为细散。每服一钱，以米饮调下，一日三四服。

【主治】口数生疮，连年不愈。

14808 蔓荆酒

【方源】《普济方》卷五十三。

【组成】蔓荆子（微炒）一升

【用法】上以酒二升浸，寒七日，暑三日，去滓，任性饮之。

【主治】耳聋。

14809 蔓荆散

【方源】《得效》卷十六。

【异名】小洗肝散。

【组成】土瓜根 蔓荆子 荆芥 甘草 栀子各等分

【用法】上为散。每服三钱，水一盏煎，先熏后服，食后用之。

【主治】目赤肿涩痛，多泪。

14810 蔓荆子汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】人参补胃汤（《东垣试效方》卷五）、人参益胃汤（《医方集解》）。

【组成】蔓荆子二钱五分 黄柏（酒拌炒四遍） 白芍药各三钱 黄耆 人参各一两 炙甘草八钱

【用法】上㕮咀。每服三五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，临卧温服。

【主治】劳役饮食不节，内障眼病。

【方论选录】《医方集解》：此足太阴阳明药也。参、耆、甘草大补中气以强脾胃，蔓荆升清阳而通九窍，白芍入厥阴而和荣血，黄柏除湿热而滋肾水。使精气足而清阳升，则脏腑和而障翳退矣。

14811 蔓荆子散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】蔓荆子三分 赤箭半两 细辛半两 麦门冬一两（去心，焙） 地骨皮半两 石膏一两 黄芩三分 防风三分（去芦头） 羚羊角屑三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 芎藭三分 茯神三分 甘菊花三分 甘草半两（炙微赤，锉） 半夏三分（汤洗七遍去滑）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风头旋，晕闷，起则欲倒。

【宜忌】忌热面、饴糖、羊肉。

14812 蔓荆子散

【方源】《直指》卷二十一。

【异名】蔓荆子汤（《准绳·幼科》卷三）。

【组成】川升麻 木通 赤芍药 桑白皮（炒） 麦门冬（去心） 生地黄 前胡 甘菊 赤茯苓 蔓荆子 甘草（炙）各等分

【用法】上锉散。每服三钱，加生姜、红枣煎，食后、临卧服。

【主治】内热，耳出脓汁。

14813 蔓荆子散

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】蔓荆子 粉干葛 赤芍药 信前胡 桑白皮 淮木通 怀生地 杭麦冬 赤茯苓各一钱 绿升麻 小甘草各五分

【用法】加灯心十茎，水煎服。

【主治】小儿肾气上冲，灌为聤耳。

14814 蔓荆实丸

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】蔓荆实（去浮皮）三分 防风（去叉） 羌活（去芦头） 桔梗（炒） 白附子（炮） 枳壳（去瓤，麸炒） 蒺藜子（炒去角）各半两 皂荚半斤（不蛀者，新水浸一宿，揉熟，绢滤去滓，入面少许，同煎成膏）

【用法】上为末，入膏中和捣，丸如梧桐子大。每服二十丸，食后熟水下。

【主治】皮痹不仁。

14815 蔓荆实汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】蔓荆实（去皮） 甘菊花 羌活（去芦头） 黄芩（去黑心） 芎藭 防风（去叉）各一两 石膏三两 甘草（炙锉）半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，以水一盏半，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】目睛疼痛，上连头疼。

14816 蔓荆实散

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】蔓荆实 何首乌各二两 羌活（去芦头） 威灵仙（去土） 荆芥穗 防风（去叉）各一两 苦参一分

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，一日三服，不拘时候。

【主治】风瘙瘾疹，手足麻木。

14817 蔓菁子丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 蔓菁子 五味子 枸杞子 地肤子 青葙子 决明子 楮实子（水淘去浮者，微炒） 茺蔚子 菟丝子（酒浸三日，晒干，别捣为末）各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、晚食前温酒送下。

【主治】 眼昏暗，不能远视。

14818 蔓菁子散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】 蔓菁子一斤（以水淘净） 黄精二斤（和蔓菁子九蒸九晒干）

【用法】 上为细散。每服二钱，空心以粥饮调下，日午、晚食后以温水再调服。

【功用】 补肝气，明目，延年益寿。

【主治】 眼昏暗不明。

14819 蔗浆粥

【方源】 方出《本草纲目》卷三十三引董氏方，名见《长寿药粥谱》。

【组成】 甘蔗汁一升半 青粱米四合

【用法】 煮粥。日食二次。

【功用】 ①《本草纲目》引董氏方：润心肺。②《长寿药粥谱》：补脾养胃，生津止渴，润燥止咳，解酒毒。

【主治】 ①《本草纲目》引董氏方：虚热咳嗽，口干涕唾。②《长寿药粥谱》：反胃呕吐，及老人热病后期津伤，口干舌燥。

【备考】《长寿药粥谱》青粱米作粳米。

14820 蔻附丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 肉豆蔻二两 附子一两半

【用法】 上为末。粥丸如梧桐子大。每服八十丸，莲子煎汤下。

【主治】 脏寒脾泻；及老人中气不足，久泻不止。

14821 蔻香丸

【方源】《普济方》卷二〇七引《家藏经验方》。

【组成】 本香 人参 甘草（炙）各一两 罂粟壳（盖房炒黑色）二两 肉豆蔻十枚（醋面裹，煨黄赤色，去面不用）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，随大小加减旋丸。清粥饮化下，不拘时服。寒热泄泻，惊风入脾，霍乱吐泻，不纳奶食，大便不消化，痢下赤白，石榴皮煎汤化下。

【功用】 和脾顺气，止泄痢。

【主治】 小儿腹疼，脏寒，大便青色，腹肚虚鸣，频并不止，及寒热泄泻，惊风入脾，霍乱吐泻，不纳奶食，大便不消化，痢下赤白。

14822 蔚金散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】 蔚金（即郁金） 滑石 川芎各半两

【用法】 上为细末。每服一二钱，量虚实加减，以韭汁调，空心服之。

【主治】 头痛眩晕，头风恶心，沐浴风；风寒湿三气合而为痹，及手足麻木不仁者。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“郁金散”。

14823 蓼花膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】 鲜白蓼花纯花（洗净）十斤

【用法】 上用净水八十斤，煎煮3小时后，过滤取汁，再煎煮浓缩至五十两成膏，加入等量蜂蜜贮存备用。每次服二钱，日服二次。

【功用】 祛风活血，退白斑。

【主治】 白癜风（白驳风），女阴白斑。

14824 聚仙丸

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】 沙苑蒺藜一斤（先去刺，为末，取净末四两，余滓用水泡三五日，取他汁浆，入锅内熬膏听用） 莲蕊须四两（黄色者） 芡实四两 枸杞二两 菟丝子饼二两 山萸肉（新者）四两 覆盆子（去蒂，酒拌蒸）二两 川续断（酒泡一宿，焙干）二两 金樱子（去外刺内瓤）三两 真龙骨（五色者，火煅，童便浸七次）五钱

【用法】 上为细末，合一处，同前蒺藜膏，为丸如梧桐子大。每服三钱，盐汤、黄酒任下；求速效者，日进二服。

【主治】 遗精。

【加减】 求种子者，龙骨倍量，加金樱子熬二两。

14825 聚金丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】 黄连四两（一两水浸晒干，一两炒，一两炭火炮，一两生用） 防风（去芦头） 黄芩各一两

【用法】 上为细末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，量意加减，以米泔浸枳壳水下，不拘时候。冬月入大黄一两，三时不须。

【主治】 因蓄热或酒毒，致大便下血，发热烦躁，腹中热痛，作渴喜忘，舌涩目昏，脉来弦数。

14826 聚宝丹

【方源】《瑞竹堂方》卷一。

【组成】白茯苓（去皮） 山茱萸（去核） 五味子 千山药 石莲肉 鸡头肉 金樱子 巴戟（去心） 破故纸（炒） 杜仲（去粗皮，炒断丝） 牛膝（酒浸） 熟地黄（酒浸，焙） 石菖蒲 远志（去心） 枸杞子（酒浸，焙） 龙骨 楮实 茴香（炒） 仙茅 肉苁蓉（酒浸，焙干） 沉香各一两

【用法】上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服五十丸，以朱砂为衣。空心温酒或盐汤送下；如有气滞不顺，用木香调气散，入盐少许，汤调送下。

【功用】温中正气，祛风活血，逐寒除湿，填精益髓，强阴壮阳，聪耳明目，开心益智，暖胃化食，消痰宽中，杀九虫，通九窍，补五脏，秘精气，止梦遗，除咳嗽，养肌肤。

【主治】五劳七伤，诸虚不足，腰膝疼痛。

14827 聚精丸

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】黄鱼鳔胶一斤（白净者，切碎，用蛤粉炒成珠，以无声为度） 沙苑蒺藜八两（马乳浸两宿，隔汤蒸一炷香久，取起焙干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心温酒、白汤任下，男子服。

【功用】养精种子。

【主治】《医略六书》：肾气虚衰，失子封藏，精滑不固，脉涩，不胜膩补者。

【方论选录】《医略六书》：鳔胶膏液之属，大滋肾脏脂膏，而脏腑咸受；其益沙藜秘涩之属，大封精气蛰藏，而诸窍无不秘密矣。炼蜜以润之，使肾脏内充则精气自固，而蓄泄有权，精滑有不止者乎？此聚精摄液之剂，洵为肾虚封藏不固之专方。

【宜忌】忌食鱼及牛肉。

14828 聚香饮子

【方源】《济生》卷三。

【组成】檀香 木香 乳香 沉香 丁香（并不见火） 藿香叶各一两 延胡索（炒去皮） 川乌（炮，去皮尖） 片子姜黄（炒） 桔梗（去芦，锉，炒） 桂心（不见火） 甘草（炙）各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，大枣一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】七情所伤，遂成七疝，心腹胀痛引腰胁连背，不可俯仰。

14829 聚香羊肉丸

【方源】《传信适用方》卷一。

【组成】木香（湿纸裹，微炮，锉）半两 丁香（去梗，不见火）半两 白豆蔻（去壳）半两 红豆（炒）半两 肉豆蔻（湿纸裹，炮，锉碎）半两 胡椒（炒）半两 附子（炮裂，沸汤泡，去皮脐，锉）半两 荜茇（炒）半两 干姜（锉，炒，洗净）半两 诃子肉（炮，去核）半两 高良姜（去芦，锉碎，洗，焙）半两 陈皮（汤泡，去白，焙干）半两 草果子（去壳并皮）半两 厚朴半两（去粗皮，以生姜半两杵碎，并厚朴半两，淹一宿，炒令黄色） 肉苁蓉（酒浸一宿，微炙，切片）一两 鹿茸（去皮毛，劈片，酥炙令紫黄色，洗净）一两 缩砂仁三两 精羊肉（去筋膜，净取）二斤（成片薄批，盐、酒、葱各少许淹两时辰，沸汤淖过，取出压干，研如糜脯，焙干入）

【用法】上为细末，别用神曲研为细末，做熟糊，丸如梧桐子大，候干。每服六十粒，食前米饮、温酒任便吞下。

【主治】脾元久虚，胸膈噎塞，呕逆恶心，痰逆，腹肚疼痛，脏腑泄泻，两胁胀闷，腹内虚鸣，饮食不进，面无颜色，渐成虚羸，精神不爽，四肢乏力，口苦舌干，老人久不思食。

14830 截风丸

【方源】《直指小儿》卷一。

【异名】截风丹（《活幼口议》卷十二）。

【组成】天麻 直僵蚕（炒） 南星（炮）各二钱 麝少许 赤蜈蚣一条（大者，酒浸，炙） 白附子（炮） 防风 朱砂 全蝎（焙）各一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，薄荷汤送下。

【主治】小儿惊风痰搐。

14831 截风散

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】天麻 白附子（泡，去皮） 半夏（制） 钩藤 茯神 胆星 僵蚕（炒，去丝） 石菖蒲 全蝎（净，炒） 黄芩

【用法】水煎，加竹沥、姜汁、沉香磨汁，调牛黄同服。

【主治】小儿急惊风。

14832 截疟煎

【方源】《医林绳墨大全》卷一。

【组成】常山一钱 槟榔二钱 柴胡七分 白术一钱 当归七分 陈皮五分 甘草三分 茯苓七分 黄耆一钱 人参五分

【用法】 水二钟，煎至八分服。截后以柴苓汤加青皮饮调理脾胃，消导。

【主治】 疟疾。

14833 截泻汤

【方源】《傅青主男女科·男科》卷下。

【组成】 薏仁二两 白芍二两 山药一两 车前子一两 黄连五钱 茯苓五钱 泽泻二钱 甘草二钱 肉桂三分 人参二钱

【用法】 水煎服。

【主治】 泄泻。一日五六十回，倾肠而出，完谷不化，粪门肿痛，如火之热。

14834 截黄丸

【方源】 方出《串雅内编》卷一，名见《青囊秘传》。

【组成】 青矾四两（煅成赤珠子） 当归四两（酒酿浸七日，焙） 百草霜三两

【用法】 上为末，以浸药酒打糊为丸，如梧桐子大。每服五丸至七丸，温汤送下。一月后黄去病愈。

【功用】 截黄。

【主治】 脾积黄肿。

14835 截水肿丸

【方源】 方出《串雅内编》卷一，名见《青囊秘传》。

【组成】 葶苈子四两（炒）

【用法】 上为末，以红枣肉为丸，如梧桐子大。每服十五丸，桑皮汤送下，一日三服。

【功用】 截水肿。

【主治】 遍身肿满，手按之仍起者。

【备考】《青囊秘传》：泻水，用苦葶苈；清肺热，用甜葶苈。

14836 截疟常山饮

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】 常山饮（《医统》卷三十七引《医学集成》）。

【组成】 穿山甲（炮） 草果 知母 槟榔 乌梅 甘草（炙） 常山

【用法】 上㕮咀。水酒一大碗，煎至半碗，露一宿，临发日早服。得吐为顺。

【主治】 疟疾。

【加减】 一云加半夏、柴胡，去穿山甲；如吐，加厚朴，或加青皮、陈皮。

14837 磁石丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】 磁石二两（烧，醋淬七遍，细研，水飞） 五味子一两 鹿茸一两（去毛，涂酥炙令黄） 菟丝子一两（酒浸一宿，焙干，别捣为末） 蛇床子一两 车前子一两 白茯苓一两 桂心一两 黄耆一两（锉） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 防风一两（去芦头） 阳起石一两（细研，水飞过） 附子一两（炮裂，去皮脐） 山茱萸一两 熟干地黄一两

【用法】 上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下，渐加至四十丸，晚食前再服。

【主治】 劳极，肾虚劳损，卧多盗汗，小便余沥，阴湿萎弱。

14838 磁石丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】 磁石（火煅，醋淬，研） 附子（炮裂，去皮脐） 补骨脂（炒） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，焙） 桂（去粗皮）各一两 续断 柴胡（去苗） 巴戟天（去心） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒） 白茯苓（去黑皮） 人参 山芋 木香 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 远志（去心） 当归（切，焙） 牛膝（酒浸一宿，切，焙） 黄耆（锉）各三分 羊肾一对（去筋膜，水煮熟，切，焙） 白蒺藜（炒去角） 蜀椒（去目并开口者，炒出汗） 枳壳（去瓤，麸炒）各半两 槟榔一枚（锉）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，空心、午前各一服。

【主治】 肾经虚惫，四肢无力，面体少色，恶风寒，手足冷，骨节痛，耳内蝉鸣。

14839 磁石丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】 磁石（烧令赤，醋淬五遍，水飞）五两 五味子 人参各一两 白茯苓（去黑皮）半两 桂（去粗皮）一分 黄耆（锉） 赤芍药 防风（去叉） 地骨皮各半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹米饮送下。

【主治】 虚劳，肾气内伤，小便余沥，阴下湿痒，四肢羸极，梦寐失精，夜有盗汗。

14840 磁石丸

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《万全方》。

【组成】 磁石（烧，醋淬七遍，飞）二两 猬皮（炙黄焦） 桂心 鳖甲（醋炙黄净） 卷柏各一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。三岁每服七丸，粥饮送下。

【主治】 脱肛。腹冷，肛痛。

14841 磁石丸

【方源】《普济方》卷三十三引《济生》。

【组成】 磁石（醋煅）二两 肉苁蓉（酒浸） 鹿茸（酒浸） 续断（酒浸） 杜仲（炒去丝） 柏子仁（炒，研） 赤石脂（火煅） 熟地（酒蒸） 山茱萸（取肉） 菟丝子（酒浸） 巴戟（去心） 韭子（炒）各一两

【用法】 上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心温酒、盐汤任下。

【主治】 精虚极。惊悸羸瘦，梦中遗泄，尿后便遗白浊，甚则阴痿，小腹里急。

14842 磁石丸

【方源】《永类钤方》卷十一引《石人屏曾氏家藏》。

【组成】 磁石三两（醋淬，水飞） 牛膝（酒浸） 巴戟（去心，酒浸） 肉桂 远志肉 干姜（炮） 附子（炮） 黄耆（蜜炙） 防风 覆盆子（炒） 柏子仁（炒，别研） 地骨皮（各制，净取）各一两 鹿茸（酒炙） 白茯苓 菟丝（酒蒸） 生干地黄 当归各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空心盐酒汤送下。

【主治】 肝肾不足，体弱眼昏，内障生花，不计远近。

14843 磁石汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【异名】 肾沥汤（《普济方》卷一八〇）。

【组成】 磁石六两（别捣如米粒，分为二十贴，每煎时取一贴，绵裹） 黄耆（细锉） 杜仲（去粗皮，炙） 人参 五味子各一两半 熟干地黄（焙）二两

【用法】 上除磁石外，粗捣筛，分为二十贴。每贴先用水三盏、羊肾一只（切作四片，去筋膜），与磁石一贴同煎至二盏，去磁石、羊肾，下药末，更同煎至一盏半，去滓，温分二服。

【主治】 消肾。小便白浊如凝脂，形体羸瘦。

14844 磁石汤

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】 磁石五两（杵捣，生绢袋盛，用水五升，煎取二升半，去磁石，方下诸药煎之） 黄耆 人参 沉香 芎劳 桂（去粗皮） 菖蒲 当归（焙） 补骨脂（炒） 熟干地黄（焙） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，炙） 附子（炮裂，去皮脐） 羌活（去芦头） 五味子 干姜（炮） 覆盆子各一两

【用法】 上药除磁石外，锉如麻豆大，拌令匀。每剂一两半，用大羊肾一对，去脂膜，细切，用磁石水三盏，煮羊肾令熟，次下药，煎取一盏半，去滓，分作二服。

【功用】 补诸不足。

【主治】 脾肾风虚，下元久冷，眼生黑花，或时昏暗。

14845 磁石酒

【方源】《千金》卷十九。

【组成】 磁石 石斛 泽泻 防风各五两 杜仲 桂心各四两 桑寄生 天雄 黄耆 天门冬各三两 石南二两 狗脊八两

【用法】 上㕮咀，酒四斗浸之。服三合，渐加至五合，一日二次，亦可单渍磁石服之。

【主治】 丈夫虚劳冷，骨中疼痛，阳气不足，阴下痛热。

【方论选录】《千金方衍义》：祛风逐湿，摄火归源，利骨强筋，虚劳之治法备矣。

14846 磁石酒

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】 磁石（捣碎，绵裹）半两 木通 菖蒲（米泔浸一二日，切，焙）各半斤

【用法】 上㕮咀，以绢囊盛，用酒一斗浸，寒七日，暑三日。每饮三合，一日二次。

【主治】 耳聋耳鸣，常如风水声。

14847 磁石散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】 磁石一两（捣碎，水淘去赤水） 沉香半两 山茱萸半两 黄耆半两（锉） 桂心半两 五味子半两 熟干地黄半两 肉苁蓉半两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 附子半两（炮裂，去皮脐） 萆薢半两（锉） 白茯苓半两 牛膝半两（去苗） 人参半两（去芦头）

【用法】 上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 肾耆腰痛，及膀胱气壅，不得宣通，致腿膝沉重。

14848 磁石散

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】 磁石（烧，醋淬，研） 肉豆蔻（去壳） 木香 槟榔（锉）各一两

【用法】 上为散。每服三钱匕，以生葱一茎，细切，热酒投调下。

【主治】 贲豚冷气，上冲昏乱，四肢软弱不收。

14849 磁石散

【方源】《本草纲目》卷十。

【组成】磁石（酒浸）半两　铁粉二钱半　当归五钱

【用法】上为末。每服二钱米，汤调下。

【主治】子宫不收。

14850　磁贝合剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】灵磁石 31 克　紫齿贝 31 克　代赭石 31 克　生牡蛎 31 克　地骨皮 31 克　红花 6 克　桃仁 9 克　怀牛膝 9 克　白芍 9 克　黄柏 4 克　山慈菇 4 克

【用法】水煎，内服，方中前四味药，需先煮半小时。成人与儿童剂量相同。

【主治】跖疣。

【加减】患部疼痛显著者，加石决明 31 克；质坚而厚者，加穿山甲 6 克；手部亦有者，加金银花藤 9 克。

【宜忌】孕妇忌服。

14851　磁石浸酒

【方源】《圣惠》卷三十六。

【异名】磁石酒（《杨氏家藏方》卷二十）。

【组成】磁石五两（捣碎，水淘去赤汁）　山茱萸一两　木通一两　防风一两（去芦头）　薯蓣一两　菖蒲二两　远志一两（去心）　天雄一两（炮裂，去皮脐）　蔓荆子一两　甘菊花一两　芎藭一两　细辛一两　肉桂一两（去皱皮）　熟干地黄三两　干姜一两（炮裂，锉）　白茯苓一两

【用法】细锉，拌和，用生绢袋盛，以酒二斗，浸经七日后，每日任性饮之，以愈为度。

【主治】风虚，耳中悾悾闹，便聋不闻人语声。

14852　磁石六味丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【异名】磁石地黄丸（《饲鹤亭集方》）。

【组成】磁石　熟地　山药　山萸　丹皮　茯苓　泽泻

【用法】为丸服。

【主治】老年耳聋。

14853　磁石羊肾粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】磁石半斤（捣碎，淘三遍，绵裹，置器中）　羊肾一对（去脂膜，研烂）　米三合

【用法】用水五升，先煮磁石，取汁二升，去磁石，下羊肾及米煮粥，临熟入酒一合，调和如常法。空腹服。

【功用】养肾脏，强骨气，益精髓，除烦热。

【主治】耳聋。

14854　磁石荠苨丸

【方源】《医略六书》卷二十二。

【组成】煅磁石二两　熟地四两　人参一两半　鹿茸二两　荠苨二两　茯苓一两半　大豆三两　元参一两半　地骨一两半　石斛一两半　花粉一两半　沉香三钱　猪肾一对

【用法】上为末，煮烂猪肾，捣蜜为丸。每服五钱，空心沸汤送下。

【主治】强中消渴，不交精泄，脉虚数细滑者。

【方论选录】阳虚热炽，阳强不能统运津液以上敷下蛰，故消渴于上，精泄于下。磁石引金入水，熟地滋肾补阳；盐茸壮阳补肾以充督脉，人参补气扶元以益肺虚；荠苨清肺金，肃肺气；茯苓渗脾湿，利肺气；大黑豆补肾虚润燥，元参清浮热存阴；金石斛平热益阴，天花粉清胃泻热；地骨皮清肌退热，贡沉香降气归肾；更用猪肾补肾虚，乃血肉之味，足以滋补形躯也。俾肾阴充足，则肾阳无不潜藏，而阴自柔和，安有强中精泄，消渴不止之患乎？此扶阳涤热之剂，为强中消渴精泄之专方。

14855　豨莶丸

【方源】《政类本草》卷十一引《成讷方》。

【异名】火轮丹（《普济方》卷二二〇引《鲍氏方》）、九蒸单豨莶丸（《医学入门》卷七）。

【组成】豨莶

【用法】九蒸九晒，捣末为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心温酒或米饮送下。服至二千丸，所患忽加，不得忧虑，是药攻之力；服至四千丸，必得复故；五千丸，当复丁壮。

【主治】中风。

【备考】江陵府节度使进豨莶丸方：臣有弟沂，年三十一，中风床枕五年，百医不差。有道人钟针者，因睹此患，曰：可饵豨莶丸，必愈。其药多生沃壤，高三尺许，节叶相对，其叶当夏五月以来收，每去地五寸剪刈，以温水洗泥土，摘其叶及枝头，凡九蒸九晒，不必大燥，但取蒸为度，仍熬，捣为末，为丸服。臣依法修合，与沂服，果如其言。钟针又言，此药与本草所述功效相异，盖出处盛在江东，彼土人呼猪为豨，呼臭为莶气，缘此药如猪莶气，故以为名。但经蒸晒，莶气自泯。每当服后，须吃饭三五匙压之。五月五日采者佳。奉宣付医院详录。

14856　豨莶酒

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】 豨莶草一二两

【用法】 酒、水各半煎服。被盖暖卧少顷，即可消散。能饮者纯用酒煎尤妙。

【主治】 破伤风，外邪初入，或风入于脏。

14857 豨桐丸

【方源】《济世养生集》。

【组成】 地梧桐（俗谓臭梧桐，不论花叶梗子俱可采取，切碎晒干，炒，磨末子）一斤 豨莶草（炒，磨末子）八两

【用法】 上药和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四钱，早、晚用白滚汤送下。

【主治】 男妇感受风湿，或嗜饮冒风，内湿外邪，传于四肢脉络，壅闷不舒，以致两足软瘦疼痛，不能步履，或两手牵绊，不能仰举。凡辛劳之人常患此症，状似风瘫。

【宜忌】 忌食猪肝、羊血、蕃茄等物。

14858 摧肝丸

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】 胆星 钩藤 黄连（酒炒） 滑石（飞） 铁华粉各一两 青黛三钱 僵蚕（炒）五钱 天麻（酒洗）二两 辰砂（飞）五钱 大甘草二钱

【用法】 上为末，以竹沥一碗，加姜汁少许打糊为丸，如绿豆大。每服一钱五分，食后及夜茶送下。

【功用】 镇火平肝，消痰定颤。

【主治】 颤振。

【宜忌】 鸡、羊。

14859 雌黄丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】 雌黄一分（研） 甘草半分（生）

【用法】 上为末，烂饭和丸，如梧桐子大。用五叶草、糯米同煎汤，送下四丸。

【主治】 胃反。呕吐不止，饮食不下。

14860 雌雄四黄散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 石黄 雄黄 硫黄 白附子 雌黄 川槿皮各等分

【用法】 上为细末。紫癜醋调，用竖槿木毛头蘸药擦患上；白癜用姜切开，蘸药擦之。

【主治】 紫白癜风皮肤作痒，日渐开大。

【宜忌】 擦后三日，忌下汤水；戒食鸡、鹅、牛、羊、煎炒、海腥、火酒等件，不复发。

14861 嗽烟筒

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】 佛耳草 款花各二钱 鹅管石 雄黄各半钱

【用法】 上为末。铺艾上，卷起，烧烟吸入口内，细茶汤送下。

【主治】 痰嗽久远者。

14862 赚气散

【方源】《博济》卷一。

【组成】 荆三棱五两 白术三两 蓬莪术五两（煨熟，杵末） 枳壳（去白）一两（麸炒） 木香半两

【用法】 上同为末。每服二钱，加生姜三片，水一盏，煎六分，温服；如和脾胃，即更入大枣同煎；若解伤寒，并三两服，汗出立愈。

【功用】 治气调中，和脾胃。

【主治】 ①《御药院方》：心胸痞闷，腹胁虚胀，饮食减少，气不宣通。②《得效》：伤寒两胁刺痛攻心。

14863 蜡苓丸

【方源】《直指》卷十七。

【组成】 黄蜡 雪白茯苓各四两

【用法】 上茯苓为末，熔蜡和丸，如弹子大。每服一丸，不饥饱细嚼下。

【功用】 补虚，治浊，止渴。

【主治】 ①《直指》：消渴。②《得效》：妇人血海冷，白带，白淫，白浊。

14864 蜡矾丸

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】 南星 大半夏各一两 明矾一两二分（半熟半生）

【用法】 上为末，好黄蜡二两化开候温，入前末搅匀，丸如梧桐子大。每服十五丸，卧时好酒送下。

【主治】 久年风痰咳嗽。

14865 蜡矾纸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 麻油二两 川椒四十九粒

【用法】 上用慢火煎枯黑，去滓，入槐枝四十九寸，煎枯黑去滓，入黄蜡一两，枯矾一钱，轻粉二钱，俟熔化，即用棉纸叠十二重，看疮大小，剪成方块，以纸捻钉住，入冷油内渗透，勿使焦黄，取起。贴时先用槐枝、葱、椒煎汤洗拭，取前纸贴之，外另用油纸绯绢紧缚，每周时取下近疮纸一重。候纸取尽，则疮痊愈，其效如神。

【主治】 赚疮，气虚脓多者。

14866 蜡油膏

【方源】《疡科选粹》卷六。

【组成】 猪板油二两 黄占 白占各四钱 乳香 没药 轻粉各一钱

【用法】 先以猪板油熬，去膜，滴水成珠，再下黄占、白占，化尽取起，又下乳香、没药、轻粉，调如膏药，涂疮上。

【主治】 脓疮，滋湿不愈。

14867 蜡香丸

【方源】 方出《赤水玄珠》卷三十，名见《卫生鸿宝》。

【组成】 黄蜡一两 松香末三分

【用法】 上将黄蜡熔化，投松香末，搅匀。每用少许，安刀头上，熔化，滴入折中。经宿即愈。

【主治】 ①《赤水玄珠》：冬月脚折皮裂，行步疼痛。②《卫生鸿宝》：牛程蹙。即脚后老皮内痛，起痕成漏，久不完口，不能著地。

【备考】 《卫生鸿宝》本方用法：看疮口大小，用药为丸，塞住漏眼，布裹勿动；十数日，漏干著地不痛，渐渐行动，漏内肉长，自将药顶出。

14868 蜡煎散

【方源】 《杨氏家藏方》卷八。

【异名】 蜡煎汤(《冯氏锦囊·杂症》卷十一)。

【组成】 百合（去苗） 人参（去芦头） 麦门冬（去心，焙） 干山药 贝母（去心，微炒） 白茯苓（去皮） 甘草（炙） 黄明鹿角胶（炙。如无，以阿胶代之） 杏仁（去皮尖双仁者不用，麸炒黄，别研）

【用法】 上各等分，㕮咀，将杏仁别研，拌匀。每服二钱，水一中盏，入黄蜡一皂子大，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】 久嗽不止，痰多气喘，或虚劳咯血。

14869 蜘蛛散

【方源】 《金匮》卷中。

【组成】 蜘蛛十四枚（熬焦） 桂枝半两

【用法】 上为散。每服八分一匕，饮和服，一日二次。蜜丸亦可。

【主治】 阴狐疝气者，偏有大小，时时上下。

【备考】 本方改为丸剂，名“蜘蛛丸”（见《普济方》）。

14870 蝉花散

【方源】 《小儿药证直诀》卷下。

【组成】 蝉花和壳 白僵蚕（直者，酒炒熟） 甘草（炙）各一分 延胡索半分

【用法】 上为末。每服一岁一字，四五岁半钱，食后蝉壳汤下。

【主治】 惊风夜啼，咬牙，咳嗽，及疗咽喉壅痛。

14871 蝉花散

【方源】 《局方》卷七（绍兴续添方）。

【异名】 蝉蜕散(《杏苑》卷六)。

【组成】 蝉蜕（洗净去土） 谷精草（洗去土） 白蒺藜（炒） 菊花（去梗） 防风（不见火） 草决明（炒） 密蒙花（去枝） 羌活 黄芩 蔓荆子（去白皮） 山栀子（去皮） 甘草（炒） 川芎（不见火） 木贼草（净洗） 荆芥穗各等分

【用法】 上为细末。每服二钱，食后、临卧用茶清调下；或用荆芩汤入茶少许调下亦得。

【主治】 肝经蕴热，风毒之气内搏，上攻眼目，翳膜遮睛，赤肿疼痛，昏暗，视物不明，眼涩难开，多生眵泪，内外障眼。

14872 蝉花散

【方源】 《直指》卷二十。

【组成】 蝉壳（洗，晒） 甘菊 川芎 防风 羌活 山栀子仁 白蒺藜（炒去刺） 草决明（炒） 荆芥穗 蔓荆子 谷精草（洗，晒） 密蒙花 木贼（去节，童尿浸，晒） 苍术（米泔浸，焙） 甘草（炙）各等分

【用法】 上为末。每服二钱，食后米泔、茶清任下。

【主治】 风眼、热眼，昏涩肿疼，渐生翳膜。

14873 蝉花散

【方源】 《银海精微》卷上。

【组成】 蝉蜕 菊花 蒺藜 蔓荆子 草决明 车前子 防风 黄芩 甘草各等分

【用法】 水煎服。

【主治】 黑睛生白翳，凹入不平成陷，羞明而不痛者。

14874 蝉退散

【方源】 《医统》卷六十四引《圣惠》。

【组成】 蝉退 蜂房 僵蚕 牛膝 草乌 荆芥 细辛 地松各等分

【用法】 上㕮咀。每服二钱，水一钟煎，漱牙，冷则吐出。

【主治】 风虫牙痛。

14875 蝉退散

【方源】 《得效》卷十二。

【异名】 蝉蜕散(《医统》卷九十)。

【组成】 蝉退半两

【用法】 水一碗，煎汤，洗肿处。其痛立止，肿亦消。再温再洗。后仍与五苓散加灯心煎服。

【主治】 多坐地为风或虫蚁咬着，阴囊忽肿。

14876 蝉蚕散

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】蝉蜕（去嘴脚，炙）四个 僵蚕（去丝嘴，焙）四条 全蝎（炙，去毒）一钱 茯苓五分 钩藤钩一钱 朱砂少许

【用法】上为末。每服一钱，竹沥调下。

【主治】小儿撮口，面目黄赤，舌强唇青，气息喘急，啼声不出，聚口皱面，不能饮乳；甚者腹胀青筋，挛急引痛。

14877 蝉蝎散

【方源】《直指小儿》卷二。

【异名】全蝎散（《婴童百问》卷三）。

【组成】全蝎七个（去尾尖） 蝉壳二十一个 甘草二钱半（炙） 大南星一个（炮香）

【用法】上为末。每服半钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】慢惊。

14878 蝉花饼子

【方源】《医方类聚》卷二十一引《修月鲁般经》。

【组成】川芎 甘草各二两 防风 天麻 细辛 半夏 蝉花（微炒，去土） 川乌（炮，去皮脐）各半两 南星 荆芥穗 干生姜（炮）各一两

【用法】上为末，汤浸蒸饼，捻作饼子。每服五七饼，食后茶汤下。

【主治】头风。

14879 蝉花无比丸

【方源】《明医指掌》卷八。

【异名】蝉花丸（《嵩崖尊生》卷六）、无比丸（《杂病源流犀烛》卷二十二）。

【组成】茯苓（去皮）四两 炙甘草四两 防风（去芦）四两 石决明二两 川芎二两 羌活（去芦）二两 当归二两（酒洗） 赤芍药二两 蒺藜（炒）一两 蝉退二两 苍术（米泔浸，晒干，炒）二两 蛇退一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，白汤送下。

【功用】明目退翳。

【主治】《杂病源流犀烛》：眼赤烂。

14880 蝉花无比散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】石决明（用东流水入盐煮一伏时，捣研如粉） 当归 防风 羌活各三两 蝉壳（洗，晒） 甘草（炙）各二两 蛇皮（皂角水洗，新瓦焙） 荆芥 细辛各一两 茯苓四两 蒺藜（炒去刺）八两 芍药 苍术（童便浸二宿，去皮，切，晒）各十两

【用法】上为细末。每服二钱，食后米泔、茶清任下。

【主治】风眼、气眼，昏、泪、痒、翳膜，或头风牵引，眼小胞烂。

14881 蝉花无比散

【方源】《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。

【异名】蝉蜕无比散（《异授眼科》）。

【组成】蛇蜕（微炙）一两 蝉蜕（去头足翅）二两 羌活 当归（洗，焙） 石决明（用盐同东流水煮一伏时漉出，捣研如粉） 川芎各三两 防风（去叉枝） 茯苓（去皮） 甘草（炙）各四两 芍药（赤者）十三两 蒺藜（炒去刺）半斤 苍术（浸，去皮，炒）十二两

【用法】上为末。每服三钱，食后米泔调下，茶清亦得。

【功用】常服祛风，退翳明目。

【主治】远年近日一切风眼、气眼攻注，眼目昏暗，睑生风粟，或痛或痒，渐生翳膜，侵睛遮障，视物不明；及久患偏正头风，牵搐两眼，渐渐细小，连眶赤烂；及小儿疮疹入眼，白膜遮睛，赤涩隐痛。

【宜忌】忌食发风毒等物。

14882 蝉花无比散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】苍术（童便浸一夜，切，晒） 白芍药各一两 白蒺藜八钱 茯苓四钱 蛇退（皂角水浸，焙） 荆芥 细辛各一钱

【用法】上为末。每服二钱，茶清下。

【主治】偏风牵引，风起喎偏，双目喎斜，频泪无翳，不痒不痛。

14883 蝉蜕钩藤饮

【方源】《婴童百问》卷二。

【异名】蝉退饮（原书卷十）、蝉蜕钩藤散（《兰台轨范》卷八）。

【组成】钩藤 天麻 茯苓 川芎 白芍药各二钱 甘草 蝉蜕各一钱

【用法】上为散。灯心煎，加木通、麦门冬、防风、羌活各一钱。

【主治】肚疼惊啼。

【备考】《兰台轨范》本方用法：每服一钱，灯心汤下。

14884 鹘突蕖

【方源】《证类本草》卷十四引《食医心鉴》。

【组成】 鲫鱼半斤

【用法】 将鱼细切作鲙，沸豉汁热投之，着胡椒、干姜、莳萝、橘皮（为末）。空心食之。

【主治】 脾胃气冷，不能下食，虚弱乏力。

14885 罂粟汤

【方源】《局方》卷六（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 艾叶（去梗） 黑豆（炒，去皮） 陈皮（去白） 干姜（炮） 甘草（炙）各二两 罂粟壳（去蒂，密炙）四两

【用法】 上为粗散。每服三钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，食前温服。

【主治】 肠胃气虚，冷热不调，或饮食生冷，内伤脾胃，或饮酒过度，脐腹疞痛，泄泻肠鸣，下痢或赤或白，里急后重，日夜频并，饮食减少，及肠胃受湿，膨胀虚鸣，下如豆汁，或下鲜血。

【宜忌】 忌生冷油腻等物。

14886 罂粟粥

【方源】《奇效良方》卷十八。

【组成】 白罂粟米二合 人参（为末）二钱 生山芋五寸长（细切）

【用法】 用水一升二合，煮取六合，入生姜自然汁及盐泥少许，搅匀，分二次服，不拘时候。

【主治】 翻胃，不下食。

14887 罂粟膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 麻油四两 罂粟花十五朵（无花以壳代之）

【用法】 将花（壳）浸油内，煎枯滤清，将油再入勺内，下白占三钱熬化，倾入罐内，待四边将凝时，下真轻粉细末二钱，搅匀，水内顿冷取起，临用将泡挑破，用抿脚挑膏，手心中捺化，搽患上，软绵纸盖扎，一日换二次。其疼即止。次日将软帛挹净腐皮，再搽之自愈。

【主治】 汤泼火烧，皮肉损烂，疼苦燃热，起泡，流水者。

14888 罂榆汤

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】 罂粟壳（去顶蒂瓤，蜜炒）半斤 赤芍药 陈皮（去白） 甘草（炙）各半两 地榆四两 五倍子一两

【用法】 上为粗末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，大枣一枚，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】 痢疾。

14889 毓麟丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 白棉花子仁二十四两（用秋石一两六钱，加水溶化，浸一日晒干，再用陈酒浸片刻，取出，入木甑内锅上蒸半日，取出晒干，再用此法蒸棉花子仁黑色为度） 熟地十二两 潼蒺藜 线鱼胶各六两 川萆薢 麦冬各四两 五味子 杜仲 补骨脂各二两四钱 杞子八两 当归 牛膝各三两二钱 茯苓五两 楮实子二两 柏子霜三钱

【用法】 上为细末，用羊肾四条，盐酒浸，打烂为丸。男妇均可服。

【功用】 填补精髓，妙合阴阳，求嗣得孕，益寿延年。

【加减】 如男有遗精，女有白带，去牛膝，加覆盆子二两四钱。

14890 毓麟膏

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】 人参一两 桑寄生一两 蚕沙一两五钱 生地 杜仲 续断 阿胶各一两 地榆五钱 当归二两 熟地二两 砂仁一两

【用法】 上药用麻油一斤半，按季浸，桑柴熬药枯去滓，下飞过红丹十二两，黄占二两成膏，离火，下紫石英（火煅，醋淬）七钱，赤石脂（煅）七钱，龙骨（煅）三钱，为末，入膏内搅匀，收贮。摊贴，如惯于三月堕者，先一个月预贴腰眼，七日一换，保过三月之期，以后半月一换，至十月满而止，万无一失；遗精淋带经闭，贴肾俞穴、下丹田；其余俱贴患处。

【功用】 能保胎十月无虞。

【主治】 妇人久惯小产；肾虚腰痛，遗精白浊；女人淋带，血枯经闭；诸疮久烂。

14891 箍药

【方源】《外科发挥》卷二。

【组成】 芙蓉叶 白芷 大黄 白及 山茨菇 寒水石（煅） 苍耳草 黄柏（炒）各等分

【用法】 上各另为末。用水调，搽四围，中如干，以水润之。

【主治】 发背毒甚，胀走不住。

14892 箍瘤膏

【方源】《理瀹》。

【组成】 大黄 海藻 昆布 芫花各二两

【用法】 上以青炭灰水加醋熬，入半夏、五倍、南星末各一两，石灰（炒红，研）二两收。

【功用】 初起箍之可消，已成箍过百日可不再大。

【主治】 瘤之初起者。

14893 箍毒神丹

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】 地榆二钱 天花粉一钱 菊花根一把 生甘草一钱 芙蓉叶十四片 蒲公英（鲜者）一把

【用法】 将干研末。捣鲜药取汁调之敷上。则毒不走开，内自化矣。

【主治】 手足丫毒疮。

14894 管仲散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 管仲 红藤各四两（上好者）

【用法】 上件同为粗末，分作四服，用绵包作四裹。每服一包，用好酒一升，煎至五沸，温服；药滓收着，候四服药滓一处，用水一碗半，熬至五沸，用小口器合内盛，放被儿内，熏着疮门，就热通手洗，如虫子死后，便不痒痛。

【主治】 肠风痔瘘。

14895 熏痔散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】 威灵仙三两

【用法】 上用水一斗半，煎至七八沸，去火，就盆上坐，令气熏之，候通手淋溻，冷即再暖。

【主治】 痔疾。

14896 熏膈丸

【方源】《本事》卷三。

【组成】 麦门冬（去心） 甘草（炙）各半两 人参（去芦） 桂心（不见火） 细辛（去叶） 川椒（去目并合口，微火炒，地上出汗） 远志（去心，炒） 附子（炮，去皮脐） 干姜（炮）各二钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。绵裹一丸，食后含化，日夜三服。

【主治】 胸膈闷塞作噎。

14897 熏陆香丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】 乳香（别研） 沉香 木香各一分 丁香二钱 肉豆蔻（面裹煨香） 人参（去芦头）各一分 青橘皮（去白）三分 延胡索（炒香） 当归（洗，焙）各二钱半 蓬莪茂（煨，切）一分 硇砂一钱（不夹石者，研细，用醋飞过） 甘草（微炙） 没药（别研） 血竭（别研）各二钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，每一两作三十丸。每服一丸，细嚼，炒生姜、盐汤送下，或用当归酒下，不拘时候。

【功用】 调经止痛，安和脏气。

【主治】 妇人血气凝涩，经候不行，有时作痛。

14898 熏痔立效方

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】 蛇蜕四两（细剪令碎） 蝉蜕四两（细剪令碎） 白矾（生研）一两 皂荚二梃（为末）

【用法】 上四味拌匀，分为六帖。每用一帖，瓷碗内如烧香法，盛入桶内，烧令烟出，就上坐熏之，烟尽即止。

【主治】 痔瘘久不愈者。

14899 僧矾散

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】 密陀僧二钱 枯矾一钱 冰片少许

【用法】 上为末。先用苦参汤，或防风、荆芥汤洗，再以上药敷患处。

【主治】 脱肛。

14900 鼻炎灵

【方源】《古今名方》。

【组成】 苍耳子（捣） 白芷 辛夷各60克 冰片粉6克 薄荷霜5克 芝麻油500毫升 液状石腊1000毫升

【用法】 将前三味与芝麻油同放锅内，浸泡24小时，加热，待炸成黑黄色捞出，再下余三味药，搅匀，冷却后过滤，分装眼药水瓶内。用时仰头滴鼻，每次滴1～2滴，日滴一至二次。

【功用】 疏风祛湿，芳香透窍，清热消肿，化瘀止痛，滋润粘膜，收缩息肉。

【主治】 慢性鼻炎、萎缩性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉等。症见鼻粘膜充血，或干燥萎缩，鼻塞流涕，嗅觉失灵等。

14901 鼻衄丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】 龙骨 蒲黄各一钱 茅针花五分 梅片二分

【用法】 上共为细末。吹于鼻中。

【主治】 鼻衄。

14902 鼻窦灌注液

【方源】《中医耳鼻喉科学》。

【组成】 辛夷花30克 白芷30克 黄耆60克 薄荷30克 羊藿叶30克 野菊花30克 桂枝30克 当归30克 栀子30克

【用法】 鼻窦内积脓经冲洗并排清积液后，将本方灌入2～3毫升。

【功用】 辛温祛风，消炎解毒，调和气血，培补正气。

【主治】 鼻渊，上颌窦炎。

14903 膈气散

【方源】《局方》卷三。

【组成】 肉豆蔻仁 木香 干姜 厚朴（去粗

皮，生姜汁制，炒） 青皮（去白） 甘草（炙）各五两 三棱（炮） 益智仁 莪蒿（炮） 肉桂（去粗皮） 陈皮（去瓤） 槟榔 枳壳（去瓤，麸炒）各十两

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，入生姜二片，大枣半个，同煎七分，和滓热服；如不及煎，入盐少许，沸汤点服亦得，不拘时候。

【功用】 常服顺气宽中，消痃癖积聚，散惊忧恚气。

【主治】 五种膈气。三焦痞塞，胸膈满闷，背膂引疼，心腹膨胀，胁肋刺痛，食饮不下，噎塞不通，呕吐痰逆，口苦吞酸，羸瘦少力，短气烦闷。

14904 膈噎膏

【方源】 《类证治裁》卷三引缪仲淳方。

【异名】 噎膈膏（《冷庐医话》卷三）。

【组成】 人参 牛乳 蔗汁 梨汁 芦根汁 龙眼肉汁 姜汁 人乳

【用法】 熬膏，蜜收。

【功用】 润燥。

【主治】 噎膈。

14905 膈下逐瘀汤

【方源】 《医林改错》卷上。

【组成】 灵脂二钱（炒） 当归三钱 川芎二钱 桃仁三钱（研泥） 丹皮二钱 赤芍二钱 乌药二钱 元胡一钱 甘草三钱 香附一钱半 红花三钱 枳壳一钱半

【用法】 水煎服。病轻者少服，病重者多服，病去药止，不可多服。

【功用】 《医林改错注释》：活血逐瘀，破癥消结。

【主治】 积聚痞块，痛不移处，卧则腹坠，及肾泻、久泻由瘀血所致者。

【加减】 病人气弱者，加党参三五钱。

【方论选录】 《医林改错注释》：方中当归、川芎、赤芍养血活血，与逐瘀药同用，可使瘀血祛而不伤阴血；丹皮清热凉血，活血化瘀；桃仁、红花、灵脂破血逐瘀，以消积块；配香附、乌药、枳壳、元胡行气止痛；尤其川芎不仅养血活血，更能行血中之气，增强逐瘀之力；甘草调和诸药。全方以逐瘀活血和行气药物居多，使气帅血行，更好发挥其活血逐瘀，破癥消结之力。

【临证举例】 ①胸膜粘连 《北京中医》（1987；4:24）：乔氏用本药加味治疗胸膜粘连60例。病程2～21年，其中重型（粘连在8cm以上者）15例，中型（粘连在5～8cm之间者）17例，轻型28例。兼风寒者加桂枝、荆芥、防风；风热者，加金银花、连翘、薄荷；胸中郁热，咳吐黄痰者，加黄芩、瓜蒌、桑白皮；胸中有寒痰，加干姜、细辛、五味子；气虚者，加黄耆，党参。服药32～64剂。结果：痊愈33例，显效23例，有效2例，总有效率为96.6%。②慢性盆腔炎 《江西中医药》（1988；2:28）：刘氏用本方加减治疗慢性盆腔炎64例。其中6个月～1年者19例，5年者35例，5～10年者7例，10年以上者3例。气虚者加黄耆、党参；血虚者加熟地、首乌；阴虚者加沙参、麦冬；阳虚者加熟附片、炮姜；兼湿热内蕴者加黄芩、泽泻；兼热毒蓄积者加双花、连翘。连续服药20～30剂。结果：痊愈21例，好转37例，总有效率90.6%。③小儿久泻 《新中医》（1981；12:26）：用本方加减治疗小儿久泻120例。病程2～6个月64例，6～9个月32例，9～12个月24例。方用灵脂1.5克，当归2克，川芎1.5克，桃仁2克，丹皮2克，赤芍2克，乌药1.5克，延胡1.5克，甘草2克，香附2克，红花1.5克，枳壳1.5克（此为1岁小儿一日水煎剂量，其他年龄适当增减），脾胃虚弱加白术、茯苓、黄耆；脾肾两虚加附子、肉桂、黄耆；大便次数多呈水样者可加诃子、苡仁。结果：痊愈46例，有效53例，无效21例。总有效率82.5%。

【实验研究】 ①抑制小鼠免疫功能 《中医药信息》（1987，4:39）：小鼠免疫特异性抗原结合细胞花结形成实验结果表明，给药组免疫特异性抗原结合细胞数量较对照组明显减少，说明本药对小鼠免疫反应的早期阶段有较强的抑制作用。另溶血空斑实验证明，给药组PFC数目明显少于对照组，说明本药对B细胞功能亦有较强的抑制作用。②刺激免疫作用 《中成药研究》（1987；9:29）：本药能促进小鼠腹腔巨噬细胞功能，与对照组比较，给药组巨噬细胞吞噬指数明显提高；小鼠脾脏酸性磷酸酶活性高于对照组，差异非常显著；腹腔巨噬细胞EA花环形成率给药组高于对照组。

14906 鲜石斛膏

【方源】 《北京市中药成方选集》。

【组成】 鲜石斛一百六十两 麦冬三十二两

【用法】 上药酌子切碎，水煎三次，分次过滤去滓，滤液合并，用文火煎熬，浓缩至膏状，以不渗纸为度，每两膏汁兑炼蜜一两成膏。每服五钱，日服二次，热开水冲服。

【功用】 养阴润肺，生津止渴。

【主治】 男女阴虚，肺热上攻，咽干口燥，烦闷

耳鸣。

14907 鲜生地露

【方源】《中药成方配本》。

【组成】鲜生地一斤

【用法】用蒸气蒸溜法，每斤吊成露二斤。每用四两，隔水温服。

【功用】养阴清血。

【主治】吐血，鼻血。

14908 鲜佛手露

【方源】《中药成方配本》。

【组成】鲜佛手一斤

【用法】用蒸气蒸溜法，每斤吊成露四斤。每用四两，隔水温服。

【功用】宽胸利气。

【主治】肝胃不和，胸闷气滞。

14909 鲜佩兰露

【方源】《中药成方配本》。

【组成】鲜佩兰一斤

【用法】用蒸气蒸溜法，每斤吊成露二斤。每用四两，隔水温服。

【功用】辟秽疏表。

【主治】暑湿头晕。

14910 鲜荷叶汤

【方源】《类证治裁》卷六。

【组成】鲜荷叶　青菊叶　夏枯草　黄芩　山栀　苦丁茶　蔓荆子　连翘

【用法】水煎服。

【主治】因暑邪闭窍致左耳聤痛者。

14911 鲜藿香露

【方源】《中药成方配本》。

【组成】鲜藿香一斤

【用法】用蒸气蒸溜法，每斤吊成露二斤。每用四两，隔水温服。

【功用】芳香宣浊。

【主治】暑湿气滞，胸闷呕恶。

14912 膏淋汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生山药一两　生芡实六钱　生龙骨（捣细）六钱　生牡蛎（捣细）六钱　大生地（切片）六钱　潞党参三钱　生杭芍三钱

【主治】膏淋之证，小便溷浊，更兼稠粘，便时淋涩作疼。

【方论选录】此证由肾脏亏损，暗生内热。损则蛰藏不固，精气易于滑脱；内热暗生，则膀胱薰蒸，小便改其澄清。久之，三焦之气化滞其升降之机，遂至便时牵引作疼，而混浊稠粘矣。故用山药，芡实以补其虚，而兼有收摄之功；龙骨、牡蛎以固其脱，而兼有化滞之用；地黄、芍药以清热利便，潞参以总提其气化，而斡旋之也。若其证混浊，而不稠粘者，是但出之溺道，用此方时，宜减龙骨、牡蛎之半。

14913 腐尽生肌散

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】儿茶　乳香　没药各三钱　血竭三钱　旱三七三钱　冰片一钱　麝香二分

【用法】上为末。撒之。

【主治】一切痈疽等诸毒，破烂不敛者。

【加减】有水，加龙骨（煅）一钱；欲速收口，加珍珠一两，蟹黄（用蟹蒸熟取黄，晒干听用）二钱，或用猪脂油（去渣）半斤，加黄蜡一两，溶化倾碗内，稍温，加前七味调成膏，摊贴之；若杖伤，则旱三七倍用。

14914 瘦胎丸

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】枳壳（麸炒）四两　白术　当归　甘草各一两

【用法】炼蜜为丸，辰砂为衣。每服五十丸，食前白汤送下。

【功用】防其难产。

【主治】孕妇八九月，形盛胎肥腹大，坐卧不安。

14915 瘦胎饮

【方源】《张氏医通》卷十五。

【异名】枳壳散。

【组成】黄芩一两（酒炒）　白术一两　枳壳（炒）七钱半

【用法】上为散。每服二钱，饥时砂仁汤送下，在九个月时服。不可多服，恐伤正气。

【主治】妊娠体肥，胎气不运。

【宜忌】瘦弱者勿服。

14916 瘦胎散

【方源】《女科万金方》。

【组成】当归二钱　白芍药　益母草各四钱　枳壳四钱　砂仁　香附子各三钱　甘草一钱　茯苓五钱　小茴香二钱五分

【用法】分三服。每服用水一钟半，煎七分，空心服。

【主治】妊娠五六月，困弱腹重贪睡，饮食不知气味，肚中膨胀，胎动。

14917 慢白汤

【方源】 方出《中医临证撮要》，名见《古今名方》。

【组成】 西党参9克 全当归9克 生白术9克 生黄耆15克 怀山药15克 云茯苓15克 熟枣仁15克 制首乌15克 银柴胡3克 炒白芍6克 大红枣6枚

【功用】 补气血，益脾肾。

【主治】 慢性白血病。头昏耳鸣，心悸气短，纳食不香，面色萎黄，浮肿，腰痠腰痛，疲乏无力，潮热，腹胀，大便时结时溏，舌苔淡薄，或薄白，脉象细濡涩，或沉微迟。

【加减】 骨蒸潮热，去生白术、当归、红枣，加生龟版、生鳖甲各24克，地骨皮、青蒿梗各9克；盗汗，去当归、银柴胡，加粉龙骨15克，牡蛎24克（先煎），麦冬12克，五味子3克。口干，去当归、白术、大枣，加北沙参9克，冬青子15克，粉丹皮6克；肝脾肿大，去生黄耆，加炙鳖甲24克（先煎），大丹参9克，粉丹皮6克颈部腋下瘰疬，去党参、黄耆、当归、白术、怀山药、红枣，加夏枯草12克，黑元参12克，川贝母9克，天花粉12克，生牡蛎24克，粉丹皮6克；鼻衄，去党参、黄耆、当归、白术、山药、银柴胡、大红枣，加焦山栀、肥知母各9克，侧柏叶、大生地、旱莲草、黑元参各12克，冬青子15克，京赤芍6克。

14918 慢脾散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】 白术 半夏 白附 全蝎 甘草各五分 人参 南星 茯苓各七分 木香二分 姜一片

【用法】 水煎服。

【主治】 小儿吐泻不止，作慢脾风，睡困昏沉，默默不食。

14919 熵肿膏

【方源】《秘传眼科龙木论》卷五。

【组成】 代赭石 黄蜡各半两 细瓷末 麻油各一两 腻粉少许 黄柏一两

【用法】 上为末，于铫子内入油蜡同煎为膏。涂睑上。

【主治】 睑硬睛疼外障。

14920 漆黄丸

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】 生漆 雄黄（另研） 皂角刺各四两 蟾酥 麝香（另研）各三钱

【用法】 以水三升，先入皂角刺至一升，去滓，下漆，煎沸如八成银花相似，候漆浮花尽，则水干不粘手，即离火；却下雄黄、麝香、蟾酥，木槌研匀为丸，如绿豆大。每服五十丸，午时、五更用热酒送下；木形人服之。身疮音哑者，急以生蟹捣汁频进，并涂患处以解之。

【主治】 疠风赤肿，硬痛不痒。

14921 漆雄丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 真生漆一斤（锅内溶化，麻布绞去滓，复入锅内熬干） 雄黄一两（为末）

【用法】 为丸如梧桐子大。每服四分，大麦芽煎汤送下。

【主治】 水蛊。

14922 漱风散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 荆芥穗 藁本 细辛 香附子各等分

【用法】 上为粗末。每用五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，热漱冷吐，不拘时候。

【主治】 牙齿疼痛，龈肿。

14923 漱毒散

【方源】《御药院方》卷九。

【异名】 败毒散《丹溪心法附录》卷十二。

【组成】 薄荷叶三钱 荆芥穗半两 细辛一钱 地骨皮（去粗皮）一两

【用法】 上为粗末。每用七钱，水二盏，煎至一盏半，去滓，食后温漱冷吐。

【主治】 风热上攻，牙齿疼痛，久而不愈。

14924 漱口地黄散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】 黄芩八两 甘草（生）二两半 荆芥穗一两 薄荷叶一两

【用法】 上为细末。每用二钱，水一盏，入薄荷少许，煎三两沸，去滓，热漱冷吐，不拘时候。

【主治】 脾热、风热上攻，咽喉肿痛生疮，闭塞不通，或舌胀。

【备考】 本方名漱口地黄散，但方中无地黄，疑脱。

14925 滴耳油

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】 核桃仁（研烂，取油）一钱

【用法】 兑冰片二分。每用少许，滴入耳内。

【功用】 消肿生肌。

【主治】 耳痔出脓。

14926 滴眼汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】 秦皮 升麻 黄连各半两

【用法】 上锉细。水二升，煎至一升，绵包箸头

温汤，滴入眼中，频频用之。

【主治】 内障不见物，由病后不慎酒、面、炙煿五辛所致者。

14927 滴鼻灵

【方源】 《中医耳鼻喉科学》。

【组成】 鹅不食草 650g 辛夷花 150 克

【用法】 煎水二次，药液混和，浓缩成 1.5L，加盐酸麻黄素粉 3.75g，葡萄糖粉 15g，过滤消毒，瓶装备用。滴入鼻中。

【主治】 鼻渊。

14928 滴鼻栀子仁煎

【方源】 《圣惠》卷三十七。

【异名】 栀子膏(《圣济总录》卷四十九)。

【组成】 栀子仁 苦参 木通（锉）各一两

【用法】 上锉细，以好酒四两，煎令香，去滓，倾于瓷盒中。旋以少许，滴入鼻中。

【主治】 风热，鼻内生疮。

14929 漏风汤

【方源】 《嵩崖尊生》卷八。

【组成】 黄耆六钱 甘草一钱 防风 麻黄根 桂枝各二钱

【主治】 醉后当风，不论冬夏，额上常有汗出。

14930 漏芦丸

【方源】 《准绳·疡医》卷五。

【组成】 漏芦一两 枳壳（麸炒，去瓤） 苦参 各三两 防风 川大黄 乌蛇

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后用温浆水送下。

【主治】 风瘾疹。

【备考】 方中后三药用量原缺。

14931 漏芦汤

【方源】 《圣济总录》卷一二六。

【组成】 漏芦（洗，焙）半两 海藻（洗，焙）半两 连翘一两 沉香（锉）半两 山栀子仁一分 玄参 丹参各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】 瘰疬久不愈，将欲破者。

14932 漏芦汤

【方源】 《圣济总录》卷一三五。

【异名】 漏芦散(《准绳·疡医》卷五)。

【组成】 漏芦（去芦头） 升麻 大黄（锉，醋炒） 黄芩（去黑心）各一两 蓝叶 玄参（黑坚者）各半两

【用法】 上为粗末。每服十五钱匕，水六盏，加竹叶二十一片，同煮至三盏，去滓，下芒消末半钱匕，空心、日午、夜卧分温三服。利即减，未利，即加服数。

【主治】 ①《圣济总录》：脏腑久有积热，发为毒肿，向夜疼痛。②《卫生宝鉴》：时疫疙瘩，头面红肿，咽嗌堵塞，水药不下，一切危恶疫疠。

14933 漏芦汤

【方源】 《外科精义》卷下。

【组成】 漏芦 白蔹 黄芩（去黑心） 麻黄（去节） 枳实（麸炒，去瓤） 升麻 芍药 甘草（炙） 朴消各一两 大黄二两

【用法】 上除消外，余㕮咀，与消同和匀。每服三钱，气实人五钱，水一盏半，文武火煎七沸，去滓，空心热服。

【主治】 一切恶疮，毒肿丹瘤，瘰疬疔肿，鱼睛五发，瘰疽。初觉一二日，便如伤寒，头痛烦渴，拘急恶寒，肢体疼痛，四肢沉重，恍惚闷乱，坐卧不宁，皮肤状热，大便秘涩，小便赤黄。

【宜忌】 妊身莫服。

14934 漏芦汤

【方源】 《外科大成》卷四。

【组成】 漏芦一钱五分 紫花地丁 荆芥 当归 连翘 薄荷 白芷 升麻各一钱 麻黄三钱 大黄二钱 生甘草四分

【用法】 水二钟，煎八分，食远温服，盖衣取微汗，渣再煎服。次日，麻黄用二钱，大黄用一钱半，甘草用六分，温服；第三日则麻黄、大黄、甘草各用一钱，温服；如肿尚未消尽，照第三日方再三二服，无不愈者。如不欲汗，则麻黄少用，温服之；如大便不实及不欲下者，则少用大黄，不用亦可；随病上下，在食前、食后服。如便毒，服利药，正气伤，皮厚未穿者服此一汗，不砭而穿。

【主治】 痈疽疔肿，不问阴阳初起者，及初溃红肿尚未消尽者，及湿烂疥疮等毒。

14935 漏芦散

【方源】 《局方》卷九。

【异名】 漏芦汤(《景岳全书》卷六十一)。

【组成】 漏芦二两半 蛇蜕十条（炙） 瓜蒌十个（急火烧令焦存性）

【用法】 上为细散。每服二钱，温酒调下。

【主治】 乳妇气脉壅塞，乳汁不行；及经络凝滞，乳内胀痛，留蓄邪毒，或作痈肿。

【备考】 方中瓜蒌，《景岳全书》作土瓜根。

14936 漏胎安胎饮

【方源】 《医略六书》卷二十八。

【组成】 熟地五钱 黄耆二钱（蜜炙） 当归三钱（醋炒） 川芎一钱 白芍一钱半（醋炒） 艾叶八分（醋炒黑） 阿胶二钱（血余灰炒） 地榆三钱（炒炭） 甘草五分 荷叶

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 漏胎脉软数者。

【方论选录】 妊娠气血两亏，冲任无操蓄之权，而血得漏泄于外，故漏胎下血不已。熟地补血以滋养其胎，黄耆补气以固摄其血；当归养血荣冲任，白芍敛阴止漏血；川芎行血海以升阳，阿胶补阴血以安胎；艾叶振冲任之阳，阳密则漏血自止；荷叶举阳明之阳，阳举则陷下可回；甘草缓中和胃；地榆涩血止漏。水煎，温服，俾气血内充，则冲任完固而胎得所养，何漏胎之足患哉？

【备考】 方中荷叶用量原缺。

14937 赛空青

【方源】 《眼科阐微》卷二。

【组成】 生白矾三分 雪梨一枚（去皮核）

【用法】 先将矾为细末，入梨片内共研，绢滤过成汁，加净蜜些许，搅匀，封固，重汤煮过，待冷。扫眼皮内外，一日五至七次。

【主治】 目内云翳退时，有热气目眵者。

14938 蜜煎

【方源】 《伤寒论》。

【组成】 食蜜七合

【用法】 于铜器内，微火煎，当须凝如饴状，搅之勿令焦著，欲可丸，并手捻作挺，令头锐如指大，长二寸许，当热时急作，冷则硬。以纳谷道中，以手急抱，欲大便时乃去之。

【主治】 阳明病，自汗出，若发汗，小便自利者，此为津液内竭，虽硬不可攻之。

【临证举例】 伤寒阳明便秘证 《伤寒九十论》：庚戌仲春，艾道先染伤寒近旬日，热而自汗，大便不通，小便如常，神昏多睡。诊其脉，长大而虚。用蜜煎导之三次，先下燥粪，次泄溏，已而汗解。

14939 蜜附汤

【方源】 《三因》卷九。

【异名】 蜜附子汤《易简》。

【组成】 附子（生，去皮脐，切作四片，以白蜜煎，令附子变色，以汤洗，去蜜，切）半两 桂心芍药各三分 甘草（炙）四钱

【用法】 上为散。每服四大钱，水一盏，加生姜五片，大枣二枚，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】 ①《三因》：心腹疼痛，或吐或泄，状如霍乱；及冒涉湿寒，贼风入腹，拘急切痛。②《易简》：疝气发作。

【加减】 大便秘结，加白蜜半匙同煎。

14940 蜜脂煎

【方源】 《医学入门》卷七。

【组成】 猪脂二斤（熬，去滓） 白蜜一斤

【用法】 再炼少顷，滤净，入瓷器内，俟成膏。每服一匙，不拘时候。

【功用】 常服润肺。

【主治】 暴失音声嘶。

14941 翠云锭

【方源】 《外科正宗》卷四。

【异名】 翠云锭子（《金鉴》卷六十五）。

【组成】 杭粉五两 铜绿末一两 轻粉一钱

【用法】 上为极细末。用黄连一两，同川米百粒，水一碗，煎一半，再熬折去二分，和药作锭，阴干。临时用清水少许，净砚上磨浓，鸡羽蘸搽，用针割后涂之。箍搽更效。

【功用】 《医钞类编》：疏脓长肌解毒。

【主治】 ①《外科正宗》：眼胞菌毒，烂弦风眼，或暴赤肿痛者。②《医钞类编》：一切菌毒痈疽。

14942 翠玉膏

【方源】 《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】 沥青一两 黄蜡 铜绿各二钱 没药乳香各一钱

【用法】 先研铜绿为末，入油调匀，又将黄蜡、沥青火上溶开，次下油，调铜绿搅匀，将没药旋入搅匀。用河水一碗，将药倾在内，用手扯拔匀，油纸裹。视疮大小，分大小块，口嚼，捻成饼子，贴于疮上，纸封，三日一易之。

【主治】 臁疮。

14943 鸷粥

【方源】 方出《类证本草》卷十九引《食医心镜》，名见《医统》卷八十九。

【异名】 鸭粥（《药粥疗法》）。

【组成】 青头鸭 粳米

【用法】 用青头鸭一只，细切，煮极熟，入粳米，加五味作粥食。

【功用】 补虚劳，滋阴血，健脾胃，消水肿。

【主治】 ①《证类本草》引《食医心镜》：十种水病。②《药粥疗法》：身体虚弱，骨蒸潮热。

14944 熊冰膏

【方源】 《医学入门》卷八。

【组成】 熊胆二分半 冰片半分（为末）

【用法】 用白雄鸡胆三个（取汁），或用蜗牛、田螺、井水，同调匀，入罐内，勿令泄气。临卧以

手指搽痔上。先以药水洗净，后上药有效。

【主治】 久年漏疮，或暂愈复发，或移于别处。

14945 熊胆冰黄散

【方源】 《囊秘喉书》卷下。

【组成】 胡黄连 儿茶 硼砂各三钱 熊胆 牛黄各七分 冰片三分

【用法】 上为末。吹喉中痛处。

【主治】 喉痹肿痛。

14946 缩舌散

【方源】 《玉案》卷三。

【组成】 冰片二钱 朱砂三钱

【用法】 上为细末。猪胆汁调敷。

【主治】 舌长过寸。

14947 缩汗煎

【方源】 《仙拈集》卷二。

【组成】 黄耆 白芍各五钱 桂枝三钱

【用法】 水煎，入酒温服。

【主治】 自汗、盗汗。

14948 缩砂丸

【方源】 《中藏经》卷下。

【异名】 缩砂丹(《普济方》卷一八二引《经效济世方》)。

【组成】 天南星四两（汤浸洗七遍，切，焙干） 良姜四两 缩砂仁二两

【用法】 上为细末，生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸或二十丸，擦生姜浸汤送下，不拘时候。

【功用】 ①《中藏经》：消积温中，顺气，利胸膈。②《局方》（淳祐新添方）：温中消滞，消饮进食。

【主治】 ①《中藏经》：风痰，伤生冷，呕逆，泄泻。②《局方》（淳祐新添方）：胸膈噎闷，心腹冷痛。

14949 缩砂丸

【方源】 《御药院方》卷七。

【组成】 缩砂仁 黄连（去须，微炒） 附子（炮，去皮脐） 吴茱萸（汤洗七次，焙干，微炒） 诃子皮 肉豆蔻各一两 干姜（炮） 木香各半两

【用法】 上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食前米饮送下。

【主治】 大便泄泻，米谷不化，腹中疼痛，不思饮食。

14950 缩砂汤

【方源】 《直指》卷十四。

【异名】 缩砂散(《准绳·类方》卷六)。

【组成】 缩砂 黄连 木贼

【用法】 上为末。每服二钱，米饮调下。

【主治】 大肠虚而挟热，脱肛红肿。

14951 缩砂汤

【方源】 《直指》卷二十六。

【组成】 缩砂 桑寄生各半两 当归 川芎 艾叶（炒） 阿胶（酥炒）各三钱 南木香 甘草（炙）各二钱

【用法】 上为散。每服三钱，加生姜五片，大枣二枚，水煎服。下血水者，更以真料理中汤加缩砂佐之。

【主治】 胎动，腹胁腰痛，或忍痛失气，胎又不动，血水间下。

14952 缩砂饮

【方源】 《朱氏集验方》卷四。

【组成】 缩砂仁 萝卜子（研自然汁，浸缩砂仁一宿，炒干又浸，又炒，不压。萝卜子汁多，浸数次炒干）

【用法】 以缩砂为细末。每服一大钱，米饮调下。

【主治】 气胀，气蛊。

14953 缩砂散

【方源】 《普济方》卷六十四。

【组成】 缩砂仁 甘草 贯众各等分

【用法】 上为粗末。如一切鲠，以绵裹少许含之，旋旋咽津，久则随痰出。

【主治】 骨鲠。

【临证举例】 骨鲠 滁州蒋教授，因食鲤鱼玉蝉羹为鱼肋所鲠。凡治鲠药，如象牙屑之属，用之者不效，或令服此药，连进三剂，至夜一咯而出，因戏云：此管仲之力也。

14954 缩泉丸

【方源】 《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 乌药 益智（炒） 川椒（去目并合口者，出汗） 吴茱萸（九蒸九晒）各等分

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，临卧盐汤送下。

【主治】 丈夫小便频数。

14955 缩泉汤

【方源】 《张春皆眼科证治》。

【组成】 熟地 枸杞子各12克 山萸肉 酒白芍各9克 五味子3克 巴戟天9克 细辛1.5克 车前子9克

【用法】 水煎服。

【功用】 补肝肾，固泪泉，助肾阳，温寒水。

【主治】 肝肾不足，泪泉不固，不时泪下；肾阳不足，流泪清冷。

【加减】 兼风邪，加防风3克。

【方论选录】 方中熟地、山萸肉、酒白芍、五味子滋补肝肾，以固泉敛液；巴戟天、枸杞子温补肾阳，以化寒水；细辛通泪窍，以疏泪液环流之道；车前子利水湿，以引水液下行。

14956 缩脾饮

【方源】 《局方》卷二（宝庆新增方）。

【组成】 白扁豆（去皮，炒） 干葛（锉）各二两 草果（煨，去皮） 乌梅肉（净） 缩砂仁 甘草（炙）各四两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一大碗，煎八分，去滓，以水沉冷服，或欲热欲温，任意服，代熟水饮极妙。

【功用】 解伏热，除烦渴，消暑毒，止吐利。

【主治】 ①《局方》（宝庆新增方）：霍乱之后，因服热药太多，致添烦渴者。②《得效》：伏暑热，烦渴躁闷，干湿霍乱。

【方论选录】 《杏苑》：大暑烦渴，吐泻霍乱，用砂仁、扁豆、草果消暑气，止吐泻霍乱；乌梅收肺热；佐葛根生津液。

【备考】 《得效》有生姜，无甘草。

14957 缩砂二陈汤

【方源】 《济阴纲目》卷八。

【组成】 半夏 陈皮（去白） 砂仁（炒）各一钱 白茯苓二钱 甘草（炙）五分

【用法】 加生姜三片，大枣一枚，乌梅肉少许，水煎服一二剂。后服茯苓丸。

【主治】 妊娠脾胃虚弱，饮食不化，呕吐不止。

14958 缩宫逐瘀汤

【方源】 《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】 当归 川芎 蒲黄 五灵脂 党参 枳壳 益母草

【用法】 水煎服。

【功用】 活血祛瘀。

【主治】 血瘀恶露不断。

14959 增半汤

【方源】 《医部全录》卷三三五引丹溪方。

【组成】 藿香二钱 半夏（汤泡，炒黄）三钱半 人参 丁香皮各一钱半

【用法】 加生姜七片，水煎服。

【主治】 胃虚中寒，停痰留饮，呕吐呃逆。

14960 增液汤

【方源】 《温病条辨》卷二。

【组成】 元参一两 麦冬八钱（连心） 细生地八钱

【用法】 用水八杯，煮取三杯，口干则与饮令尽，不使再作服。

【功用】 ①《温病条辨》：增水行舟。②《中医大辞典·方剂分册》：滋阴清热，润肠通便。

【主治】 ①《温病条辨》：阳明温病，无上焦证，数日不大便，当下之，若其人阴素虚，不可行承气者。②《中医大辞典·方剂分册》：阳明温病，津液不足，大便秘结，口渴，舌干红，脉细稍数或沉而无力。

【方论选录】 ①《温病条辨》：温病不大便，偏于阴亏液涸之半虚半实证。方取元参为君，其味苦咸微寒，壮水制火，通二便，启肾水上潮于天；麦冬治心腹结气，能补能润能通，故以为佐；生地亦主寒热积聚，逐血痹，用细者取其补而不腻，兼能走络也。三者合用，可收增水行舟之功。②《方剂学》：方中玄参养阴生津，清热润燥；麦门冬滋液润燥；生地养阴清热。三药合用则具增液润燥之功。

14961 增味二陈汤

【方源】 《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《医方集略》。

【组成】 半夏 陈皮 茯苓 栀子 炒黄连 炒香附子各一钱 枳实 川芎 苍术各八分 白芍药七分 神曲（炒）五分 甘草三分

【用法】 上锉作一帖。入生姜三片，水煎服。

【主治】 吞酸。

14962 增味五痹汤

【方源】 《直指》卷三。

【异名】 五痹汤（《普济方》卷一一八引《如宜方》）。

【组成】 羌活 防己 片子黄 白术 海桐皮 当归 白芍药各一两 甘草（炙）七钱半

【主治】 风寒湿合而为痹，肌体麻痹不仁。

14963 增味导赤散

【方源】 《直指》卷十六。

【异名】 加味导赤散（《普济方》卷三八八）。

【组成】 生干地黄（洗、晒） 木通 黄芩 生甘草 车前子 山栀仁 川芎 赤芍药各等分

【用法】 上为末。每服三钱，加竹叶十片，生姜三片，水煎服。

【主治】 ①《直指》：血淋，尿血。②《普济方》引《如宜方》：黄疸有热，小便赤涩，面目黄。

14964 增损三才丸

【方源】《医学纲目》卷三十五。

【组成】天门冬（酒浸，去心） 熟地黄（酒蒸） 人参（去芦） 远志（去心） 五味子 茯苓（去心，酒浸，焙干） 鹿角（酥炙）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空腹好酒送下。

【主治】妇人体瘦，宫内无血，不孕者。

【加减】一法加白马茎（酥炙）；年老欲补，加混元衣整个入药；一法加麦门冬，令人有力；一法加续断以续筋骨；一法加沉香，暖下焦虚冷；一法加附子，补相火不足。

14965 增损五积丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷四。

【组成】黄连肝积五钱，脾、肾积七钱，心、肺积一两半 厚朴肝、心、肺积五钱，脾、肾积八钱 川乌肝、肺积一钱，心、肾、脾积五分 干姜肝、心积五分，肺、脾、肾积一钱半 人参肝、心、脾、肺积二钱，肾积五分 茯苓一钱半 巴霜五分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服每次二丸，渐加，以微溏为度。

【主治】积块，不拘脐上下左右。

【加减】肝积，加柴胡一两，川椒四钱，莪术三钱，皂角、昆布各二钱半；心积，加黄芩三钱，肉桂、茯神、丹参各一钱，菖蒲五分；肺积，加桔梗三钱，天冬、陈皮、青皮、白豆蔻各一钱，紫菀、川椒各一钱半；脾积，加吴萸、黄芩、砂仁各二钱，泽泻、茵陈各一钱，川椒五分；肾积，加元胡索三钱，苦楝肉、全蝎、附子、独活各一钱，泽泻、菖蒲各二钱，肉桂三分，广香五分。

14966 增损五痹汤

【方源】《保命歌括》卷十五。

【组成】羌活 防己 白术 当归 白芍 防风 黄耆（炙） 片子姜黄各等分 炙草减半

【用法】上㕮咀。加生姜十片，水煎，看病在上下服。

【主治】风寒湿合而为痹，肌体麻痹不仁者。

14967 增损双解散

【方源】《寒温条辨》卷四。

【异名】加减双解散（《羊毛瘟症论》卷下）、增损双解汤（《古今名方》）。

【组成】白僵蚕（酒炒）三钱 全蝉蜕十二枚 广姜黄七分 防风一钱 薄荷叶一钱 荆芥穗一钱 当归各一钱 白芍一钱 黄连一钱 连翘（去心）一钱 栀子一钱 黄芩二钱 桔梗二钱 石膏六钱 滑石三钱 甘草一钱 大黄（酒浸）二钱 芒消二钱

【用法】水煎去滓。冲芒消，入蜜三匙，黄酒半酒杯，和匀冷服。

【功用】①《寒温条辨》：解散内外阴阳之毒；②《古今名方》：解郁散结，清热导滞，表里双解。

【主治】温毒流注，无所不至，上忤则颈痛，目眩耳聋；下流则腰痛足肿；注于皮肤，则发斑疹疮疡；壅于肠胃，则毒利脓血；伤于阳明，则腮睑肿痛；结于太阴，则腹满呕吐；结于少阴，则喉痹咽痛；结于厥阴，则舌卷囊缩。

【临证举例】温病 戊寅四月，商邑贡生刘兆平年八旬患温病，表里大热，气喷如火，舌黄口燥，谵语发狂，脉洪长滑数。予用双解散治之，大汗不止，举家惊惶，急易大复苏饮一服汗止。但本证未退，改制增损双解散，方两剂而病痊。

14968 增损四斤丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】牛膝 天麻 木瓜各半斤 全蝎四两（上各锉，用好酒二升浸三日，取出焙干） 乳香四两（别研）

【用法】上为细末，研匀，用浸药酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十至五十丸，食前温酒送下。

【主治】风寒湿冷客搏经络，或痛或不仁；及诸脚气痛。

14969 增损四物汤

【方源】《产育宝庆集》。

【组成】当归 人参 芍药 川芎 炮姜各一钱 甘草（炙）四钱

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏，姜三片，煎至六分。去滓热服。

【主治】①《产育宝庆集》：产后阴阳不和，乍寒乍热者。②《局方》（续添诸局经验秘方）：妇人气血不足，四肢怠惰，乏力少气，兼治产后下血过多，荣卫虚损，阴阳不和，乍寒乍热。

【方论选录】《济阴纲目》汪淇笺：夫血病治血，气病治气，人所易也。而血病补气，气病补血，人未尽知。故四物复有增损之法。盖以地黄滞气而损脾，非四肢怠惰，乏力少气者所宜，故当损；而人参、甘草，所以益脾也，故当增。若炮姜既能温中，又能引血以归气，此增损之妙也。

14970 增损四物汤

【方源】《保命集》卷下。

【异名】增味四物汤(《兰室秘藏》卷中)、加减四物汤(《医学纲目》卷二十五引东垣方)、加味四物汤(《会约》卷十四引《良方》)。

【组成】四物汤加广茂 京三棱 桂 干漆各一两

【用法】各依法制，如四物汤煎服。

【主治】①《保命集》：妇人血积。②《张氏医通》：停经血滞，少腹结痛。

14971 增损四物汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】人参一钱半 当归三钱 桂心一钱半 炮姜一钱半 白芍一钱半（酒炒） 川芎八分

【用法】水煎去滓。温服。

【主治】妇人产后冲任两虚，气血不足，寒邪乘虚陷伏经中，腹痛不止，脉紧细者。

【方论选录】方中用人参扶元补气以生血脉；当归养血荣经以益冲任；川芎行血中之气，善能举陷升阳；白芍敛营中之阴，力主和脾止痛；炮姜温中逐冷；桂心温经散寒。水煎，温服，使血气内充，则寒邪外散，冲任融和，则腹痛自除。

14972 增损白术散

【方源】《御药院方》卷二。

【组成】白术 葛根 茯苓（去皮） 藿香叶 人参 木香各一两 陈皮二两 干生姜一钱

【用法】上为粗末。每服五钱，水一大盏半，煎至七分，去滓温服，不拘时候；或凉服亦得。

【功用】生津止渴，顺气下痰。

【主治】《丹溪心法附余》：伤寒杂病后，一切吐泻烦渴，虚损气弱，及酒积呕哕。

14973 增损如圣散

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【组成】桔梗二两 甘草（炙）一两半 防风半两 枳壳（制）二钱半 黄芩 两

【用法】上为末。每服三钱，水煎，食后服。

【主治】上焦热壅，口舌生疮。

14974 增损启膈散

【方源】《古今名方》。

【组成】川贝母 郁金 当归 桃仁 沙参 蜣螂虫 急性子 昆布各9克 丹参 海藻各12克 红花6克

【功用】化痰软坚，活血散瘀。

【主治】食管癌中期，痰瘀互结。吞咽困难，甚则水饮难下，胸膈疼痛，泛吐粘痰，大便坚硬，或吐下如赤豆汁，形体消瘦，肌肤枯燥，舌红或青紫，脉细涩。

14975 增损流气饮

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】半夏 赤茯苓 陈皮各一钱 甘草（炙）五分 苏叶 香附 槟榔（大便溏去之） 木香 大腹皮 枳壳 桔梗各七分 人参一钱五分 肉桂 厚朴（姜制）各八分 生姜七片 红枣二枚（擘）

【用法】水煎，热服。

【主治】诸气郁滞，胸膈痞满，面目浮肿。

14976 增损通圣散

【方源】《奇效良方》卷五十九。

【组成】鼠粘子 桔梗 桑皮 紫菀各一钱半 荆芥穗二钱 甘草（生用）一钱

【用法】用水二钟，加生姜五片，煎一钟，食后服。

【主治】肺气不和，鼻塞不利。

14977 增损理中丸

【方源】《外台》卷三引《崔氏方》。

【异名】枳实理中丸(《活人书》卷十八)、加减理中丸(《圣济总录》卷二十五)。

【组成】人参二两 白术二两 甘草二两（炙） 干姜六分（炮） 枳实四枚 茯苓二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸，熟水送下，不歇复服。

【主治】时行四五日，大下后或不下，皆心中结满，两胁痞塞，胸中气急，厥逆欲绝，心胸高起，手不得近。

【宜忌】忌海藻、菘菜、酢物、桃李、雀肉。

【加减】渴者，当加栝楼根二两，不渴除之；下者，当加牡蛎（熬）二两，不下勿用。

【备考】本方改作汤剂，名“枳实理中汤”（见《易简方》）。

14978 增损黑锡丹

【方源】《得效》卷三。

【组成】黑锡丹头二两 川楝子 阳起石 木香 沉香 青皮（炒）各半两 白豆蔻 茴香 官桂（去粗皮，不见火） 绵附（炮，去皮脐） 葫芦巴 破故纸（炒）各一两 乌药（去木，锉）一分 磁石（火煅、醋淬七次，细研水飞）

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至七十丸，浓煎人参、茯苓、姜、枣汤空心吞下。

【主治】下虚，阴阳不升降，上热下寒，头目眩晕，病至危笃，或服暖药上僭愈甚者。

【备考】 方中磁石用量原缺。

14979 增减定志丸

【方源】《传信适用方》卷二。

【组成】 鹿茸半两（酥炙） 远志一两（去心，炒） 菖蒲（炒） 茯神（炒） 酸枣仁（炒） 干地黄（炒） 当归（炒）各一两 人参（炒） 白术（炒）各一两 麝香一分（研入）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。朱砂为衣。每服三十丸，人参汤送下。

【功用】 养心肾，安魂魄，滋元气，益聪明。

【主治】 健忘差谬，梦寐不宁，怔忡恍惚，精神昏眊。

14980 增液承气汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 增液汤加大黄三钱 芒消一钱五分

【用法】 上以水八杯，煮取三杯，先服一杯，不知再服。

【主治】 阳明温病，津液不足，无水舟停，下之不通，间服增液仍不下者。

14981 增损三黄石膏汤

【方源】《寒温条辨》卷四。

【组成】 石膏八钱 白僵蚕（酒炒）三钱 蝉蜕十个 薄荷二钱 豆豉三钱 黄连 黄柏（盐水微炒） 黄芩 栀子 知母各二钱

【用法】 水煎去滓，入米酒、蜜调，冷服。

【功用】《古今名方》：清热解毒，生津止渴。

【主治】 温病三焦大热，五心烦热，两目如火，鼻干面赤，苔黄唇焦，身如涂朱，烦渴引饮，神昏谵语。

【加减】 如腹胀痛，大便燥结，加大黄。

【方论选录】 寒能制热，故用白虎汤；苦能下热，故用解毒汤。佐以荷、豉、蚕、蝉之辛散升浮者，以温病热毒至深，表里俱实，扬之则越，降之则郁，郁则邪火犹存，兼之以发扬，则炎炎之势皆炽也。此内外分消之法，犹兵之分击者矣。

14982 增损普济消毒饮

【方源】《寒温条辨》卷四。

【组成】 元参三钱 黄连二钱 黄芩三钱 连翘（去心） 栀子（酒炒） 牛蒡子（炒，研） 兰根（如无，以青黛代之） 桔梗各二钱 陈皮 甘草（生）各一钱 全蝉蜕十二个 白僵蚕（酒炒） 大黄（酒浸）各三钱

【用法】 水煎去滓，入蜜、酒、童便冷服。

【主治】 大头瘟。初觉憎寒，壮热体重，次传头面肿甚，目不能开，上喘，咽喉不利，口燥舌干。

【方论选录】 芩、连泻心肺之热为君；元参、陈皮、甘草泻火补气为臣；翘、栀、蒡、兰、蚕、蜕消肿解毒定喘为佐；大黄泻热斩关，推陈致新为使；桔梗为舟楫载药上浮，以开下行之路也。

14983 增减旋覆代赭汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 旋覆花三钱（包煎） 吴茱萸一分（拌炒） 小川连六分 制香附二钱 代赭石三钱（拌） 仙半夏一钱半 新会皮一钱半 沉香汁二匙（冲）

【用法】 先用鲜刮淡竹茹四钱，鲜枇杷叶一两（去毛净，剪去大筋）煎汤代水。

【功用】 清降肝逆。

【主治】 肝气横逆，轻则嗳气胸痞，重则呃逆胃胀。

【加减】 呃逆甚者，加公丁香九支，柿蒂三十个，辛通苦涩以止呃；痞胀甚者，加真川朴一钱半，槟榔汁两匙（冲），辛开重降以宽胀；食滞者，加莱菔子一钱半拌炒春砂仁八分，消食和气以导滞；便秘者，加苏子一钱半拌捣郁李仁四钱，辛滑流气以通便。

【方论选录】 何秀山：方以旋、赭重降逆气为君；臣以茱、连、橘、半苦辛通降以清肝和胃；沉香，香附辛香流气以疏肝平逆；妙在佐以竹茹，使中结之肝气旁达；使以枇杷叶，令上逆之肝气清降。此为清肝降逆，佐金制木之良方。

14984 槿皮膏

【方源】《疡科选粹》卷六。

【组成】 川槿皮 白及各二两 百部五钱 大枫子七钱 槟榔四钱 草乌 文蛤各三钱 南星二钱 草果二个 蝉蜕一钱五分 轻粉三钱 硫黄二钱 雄黄五分 麝香五厘 枯白矾五分

【用法】 上轻粉以下五味各为极细末，川槿皮等十味用醋酒四大碗，慢火熬至一碗，滤去滓，再用慢火熬成膏，入轻粉等五味搅匀，收贮瓷瓶，以穿山甲爬破癣皮搽之。

【主治】 风癣。由风冷湿邪客于肌肤，搏于血气所生，初如钱大，渐渐长开，或圆或斜，有匡栏，抓搔顽痹，不知痛痒。

14985 槿花散

【方源】 方出《百一》卷十四，名见《普济方》卷二九六。

【组成】 木槿花不拘多少（采时不得用手，以竹箸就窠子摘，以细竹篾串眼在风头令干）

【用法】 用时以水煎沸数滚，用盆盛。先以气嘘，候通手洗之。

【主治】 肠风痔漏。

14986 横翳还睛丸

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 石决明一两 车前子一两 生地黄二两 黄芩一两 防风二两 细辛五钱 五味子半两 黑参一两 人参一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心茶清送下。

【主治】 内虚肝邪胃热，上冲于脑，脑脂下流入眼，致成内障，睛生横翳，又称剑脊翳，形如剑脊，自瞳中映出于外，中高边薄，横格于瞳人中心，色白如银。

14987 樗皮丸

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【异名】 樗根白皮散(《鸡峰》卷十六)。

【组成】 臭樗根皮（锉，炒）

【用法】 上为末，水和为丸，如枣核大，以面捏作小馄饨二七枚，煮熟，空腹吞之，一日二次。

【主治】 ①《圣济总录》：产后血痢不止。②《鸡峰》：妇人久痢及疳痢，诸方不愈者。

【宜忌】《鸡峰》：忌油腻、热面。

14988 樗皮丸

【方源】《医学纲目》卷三十四。

【异名】 樗树根丸(《摄生众妙方》卷七)、固下丸(《李氏医鉴》卷八)、椿根皮丸(《饲鹤亭集方》)。

【组成】 芍药五钱 良姜三钱（烧灰） 黄柏二钱（炒成炭） 椿根皮一两半

【用法】 上为末，以粥和丸。每服三五十丸，空腹米饮吞下。

【主治】 赤白带有湿热者。

14989 樗皮散

【方源】《医学六要·治法汇》卷一。

【组成】 樗根白皮二两 槐角仁四两 枯白矾二两 甘草（炙）

【用法】 上为细末。每服三钱，清米饮调下。

【主治】 下血及血痢，下后不止。

【备考】 方中甘草用量原缺。

14990 樗柏丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 樗白皮一两 黄柏三两 青黛 干姜各三钱 滑石 蛤粉 神曲各五钱

【用法】 上为末，神曲糊丸，如梧桐子大，每服七十丸，空心白汤送下；虚劳四物汤送下。

【主治】 湿热痰火白浊症，兼治便毒。

【加减】 痰甚，加南星、半夏。

14991 樗白皮丸

【方源】《便览》卷四。

【组成】 樗根白皮 山茱萸（去核） 苦参 香附各五钱 龟版 栀子各二两 黄柏一两 干姜 贝母各二钱 白术 白芍各七钱半 白葵花五钱

【用法】 上为末，酒糊为丸。每服七八十丸，空心温水送下。

【主治】 白带。

14992 樗白皮汤

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【异名】 樗白汤(《回春》卷六)

【组成】 樗白皮（即臭椿）二钱 枯芩一钱五分 熟地黄一钱 当归头一钱五分 地榆一钱 川芎一钱 芍药八分 生地黄七分 伏龙肝一钱 南艾叶六分（炒）

【用法】 上用水二钟，醋一匙，煎至八分，空心服。

【主治】 崩漏不止，血下无度。

14993 槲叶饮

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】 槲叶脉二两半（炙，锉） 地榆二两（锉） 阿胶（炒令燥） 青竹茹各一两

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，日二夜一。

【主治】 妇人经血不得止。

14994 樟冰散

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】 艾五分 川椒七粒（开口者） 樟脑三钱

【用法】 上药盛碗内，上用一碗对合扣紧，用纸封固，下以炭火如鸡子大一块炙之，佛香一寸为度，冷定开取升上碗内白霜。取少许纳牙内。

【主治】 牙痛。

【备考】 霜以白色为妙，若火猛则色红。一方川椒、樟冰、薄荷等分，升如上法亦妙。

14995 樟脑酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 土槿皮 6 克 樟脑 6 克 斑蝥 1.5 克 酒精 60 毫升

【用法】 先将土槿皮、斑蝥研成粉，加入酒精浸三天。过滤后，滤液加樟脑备用。每日外搽一次，

用消毒纱布包，以起水疱结痂自愈。

【主治】 神经性皮炎。

14996 樟雄散

【方源】《医级》卷八。

【组成】 樟脑 风化消 雄黄各等分

【用法】 上为末。掺擦牙缝。

【主治】 虫蛀牙痛。

14997 橄榄丸

【方源】《得效》卷十五。

【组成】 川百药煎 乌梅 甘草 石膏各等分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，噙化。

【功用】 止渴润咽喉。

【主治】 ①《普济方》：妇人口干烦躁。②《证治要诀》：咳嗽。

14998 橄榄散

【方源】《济生》卷五。

【组成】 橄榄不拘多少（烧灰）

【用法】 上为细末。以猪油调涂患处。

【主治】 唇紧，燥裂生疮。

14999 橄榄膏

【方源】《绛囊撮要》。

【异名】 痫症橄榄膏(《饲鹤亭集方》)。

【组成】 橄榄十斤

【用法】 砂锅内煮数滚，去核，入石臼内捣烂，仍入原汤煎腻出汁，易水再煎，煎至无味，去滓，以汁共归一锅，煎浓成膏，加白明矾八钱，研细入膏和匀。每服三钱，开水送服，早、晚各一次。初起轻者，取橄榄咬破一头，蘸矾末入口，味美易食，至愈为止。

【主治】 ①《绛囊撮要》：癫痫，及肝火上逆之症；②《饲鹤亭集方》：木火生痰，痰迷心窍，神昏痫厥，口吐涎沫者。

15000 聘耳散

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 鲜鳇鱼脑中枕骨（煅）

【用法】 上研末，每两加冰片一钱，研匀。用时拭干脓水，取少许吹入耳内。吹三四次立愈。

【主治】 耳内有脓作痛。

15001 聪耳丸

【方源】《本草纲目》卷十三引《龚氏经验方》

【组成】 细辛

【用法】 上为末，溶黄蜡为丸，如鼠屎大。绵裹一丸塞之。

【主治】 诸般耳聋。

【宜忌】 戒怒气。

15002 聪耳汤

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】 当归（酒洗）一钱 白芍（酒炒）一钱 川芎一钱 生地黄（酒洗）一钱 知母（酒炒）一钱 陈皮一钱 乌药一线 白芷一钱 防风（酒洗）一钱 羌活（酒洗）一钱 独活（酒洗）一钱 细辛七分 薄荷一钱 蔓荆子一钱 藁本（酒洗）一钱 黄柏（酒炒）一钱

【用法】 上作一剂。水煎，食后服。用药后头低睡一时。

【主治】 耳重听。

15003 聪明汤

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】 白茯神 远志肉（甘草水泡） 石菖蒲（去毛，一寸九节者）各三两

【用法】 上为极细末。每日三五钱，煎汤，空心食后服，不拘次数。

【主治】 不善记而多忘者。

15004 聪耳四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】 当归（酒洗） 川芎 赤芍 生地黄各一钱 石菖蒲 酸枣仁（炒） 白芷 木通 枳壳（麸炒） 青皮（去瓤） 荆芥 薄荷 藁本各七分 甘草二分

【用法】 上锉。水煎，食后服。

【主治】 耳闭。

15005 聪耳芦荟丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】 芦荟 大黄（蒸熟） 青黛 柴胡各五钱 龙胆 当归 山栀 青皮 黄芩各一两 木香二钱 南星三钱 麝香五分

【用法】 上为末，神曲糊为丸，如绿豆大。每服二十一丸，食后姜汤送下，一日三次。

【主治】 肝胆有火，耳内蝉鸣，渐至重听，不闻声息者。

15006 聪耳抑火汤

【方源】《何氏济生论》卷六。

【组成】 黄芩 柴胡 当归 香附 花粉各八分 木通 薄荷 枳壳各四分 贝母 菖蒲 甘草各六分 防风 桔梗各七分 黄连四分

【用法】 水煎服。

【主治】 痰火上升，耳窍闭塞不通者。

15007 聪耳益气汤

【方源】《增补内经拾遗》卷四。

【组成】 人参 白术 白茯苓 甘草 黄耆 当归 防风 荆芥 橘皮 升麻 柴胡 石菖蒲

【用法】 上㕮咀，作一服。水二钟，煎八分。空心温服。

【功用】 益气聪耳。

【主治】 精脱耳聋。

15008 赭遂攻结汤

【方源】《衷中参西录》上册。

【组成】 生赭石二两（轧细） 朴消五钱 干姜二钱 甘遂一钱半（轧细，药汁送服）

【用法】 水煎，送服甘遂末。若呕多者，可先用赭石一两，干姜半钱煎服，以止其呕。

【主治】 因饮食过度，或因恣食生冷，或因寒火凝结，或呕吐日久，胃气冲气皆上逆而不下降，宿食结于肠间，不能下行，大便多日不通。

【加减】 热多者，去干姜；寒多者，酌加干姜数钱。

【方论选录】 朴消虽能软坚，然遇大便燥结过甚，肠中毫无水分者，其软坚之力将无所施；甘遂辛窜之性，最善行水，能引胃中之水直达燥结之处，而后朴消因水气流通，乃得大施其软坚之力；特是甘遂力甚猛悍，以攻决为用，能下行亦能上达，若无以驾驭之，服后恒至吐泻交作，况此证多得之涌吐之余，或因气机不能下行，转而上逆，未得施其攻决之力，而即吐出者，故用赭石以镇逆，干姜以降逆；且干姜性热，朴消性寒，二药并用，善开寒火之凝结，使肠间停滞得以下行。

15009 醋泡方

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】 荆芥 18 克 防风 18 克 红花 18 克 地骨皮 18 克 皂角刺 30 克 大枫子 30 克 明矾 18 克

【用法】 上药用米醋 1500 毫升，放盆中泡三至五天备用。每天晚上将手或脚浸泡半小时，每剂药连续泡两周为一疗程，有效继续泡二至三个疗程。

【主治】 鹅掌风，千脚癣。

15010 醋黄散

【方源】《血证论》卷八。

【组成】 大黄一钱 郁金子一钱 降香一钱 三七一钱 当归三钱 牛膝二钱（上用醋炒）

【用法】 上为末。以酒、童便冲服。

【功用】 下瘀止血。

【主治】 吐血。血既止后，其经脉中已动之血，有不能复还故道者，上则着于背脊胸膈之间，下则着于胁肋少腹之际，着而不和必见疼痛之症，或流注四肢，则为肿痛；或滞于肌腠，则生寒热。

15011 醋煮三棱丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】 川芎二两（醋煮微软，切片） 京三棱四两（醋煮软，竹刀切片，晒干） 大黄半两（醋纸裹，火煨，切）

【用法】 上为末，水糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温水送下，不拘时候。

【主治】 远年近日一切积聚。

15012 醉仙丹

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】 麻黄一升（去节，水煮去沫，焙干，作末） 南星七个（大者） 大附子三个（黑者） 地龙七条（去土）

【用法】 上除麻黄外，先末之，次将麻黄末用醇酒一斤熬成膏，入药末和丸，如弹子大。每服一丸，食后、临卧以酒含化。汗出为度。

【主治】 五脏气虚，风寒暑湿蓄积于中，久而不散，偏枯不遂，皮肤不仁。

15013 醉乡宝屑

【方源】《传信适用方》卷三。

【组成】 陈皮四两 缩砂四两 红豆一两六钱 甘草二两四钱 生姜一斤（以上并㕮咀） 盐一两 丁香一钱（锉） 白豆蔻仁一两（碎）

【用法】 上同巴豆八粒（不去皮壳，用铁线串定）同用水煮，去巴豆不用，焙干。醉后随意服之。

【功用】 宽中化痰，解酲。

【主治】 醉酒后恶心呕吐。

15014 醉鸡仙方

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】 白头翁一斤（去叶，用根）

【用法】 上分四服，每服四两，用酒煎。一日三次，二日服尽。

【主治】 遍身疙瘩成块如核，不红不痛，皆痰流注而成结核。

15015 醉头风饼儿

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】 僵蚕（去丝嘴） 天南星各等分

【用法】 上为细末，生姜自然汁和作饼，如钱大，厚五分，阴干。每服一饼，用平胃散三钱，生姜五片，大枣二个，水三大盏，先煎一沸，次将饼捶碎入汤同煎一二沸。

【主治】 妇人头晕，挟痰多呕吐者，状若醉头风。

15016 敷痔神膏

【方源】《医方类聚》卷一八三引《卫生十全方》。

【组成】槐皮 槐花 楝实（切） 当归（切）各六钱 甘草 白芷 木鳖子各三钱 赤小豆半合

【用法】上用猪脂五两煎，候白芷赤黄色，用绵滤，停冷。羽毛刷敷患处。

【主治】痔漏。

15017 敷阳固精丸

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】人参二两 黄耆（酒炒）二两 官桂二两 熟附子一个 川芎一两 杜仲一两（姜炒） 山药（炒）四两 破故纸（炒）四两 小茴香（炒）四两 菟丝子八两（酒煮） 巴戟二两（去心，酒浸） 锁阳二两（酒煮）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心滚汤送下。

【主治】阳痿不举，肾虚不固，心肾不交。

15018 敷药合掌散

【方源】《普济方》卷二七二引《澹寮方》。

【异名】合掌散（《东医宝鉴·杂病篇》卷八）。

【组成】槟榔五个（为末） 硫黄五钱（生者，研细） 腻粉半钱

【用法】上和匀。每服一钱，安于手心内，油调，夜卧时涂外肾，不得洗手，拭令干。

【主治】身生疮，百药不效。

15019 敷药必效散

【方源】《保婴撮要》卷十四。

【组成】黄连 黄柏 龙胆草各一两 轻粉五分

【用法】上为末。油调搽。入片脑更效，若用当归膏调敷尤佳。

【主治】下疳腐溃作痛。

15020 敷鼻白矾膏

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】白矾一两（烧灰）

【用法】上为末，以羊脂旋和少许，敷着息肉上。

【主治】鼻中息肉，不闻香臭。

15021 敷鼻瓜蒂膏

【方源】《圣惠》卷三十七。

【异名】瓜蒂膏（《普济方》卷五十六）。

【组成】陈瓜蒂一分

【用法】上为末。以羊脂和少许，敷息肉上，一日三次。

【主治】鼻中息肉。

15022 蕤仁丸

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】蕤仁三两 芍药 防风（去叉）各三分 茺蔚子 青葙子 黄芩（去腐） 黄连（去须） 石决明各一两一分 枳壳（去瓤，麸炒） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为细末，枣肉和丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食前黄耆汤送下，一日二次。

【主治】眼生胬肉。

15023 蕤仁散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】蕤仁三分 决明子三分 黄连一两（去须） 柴胡一两（去苗） 蕨蕤一两 川大黄三分（锉碎，微炒） 黄耆一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼生花翳。

15024 蕤仁膏

【方源】《程松崖眼科》。

【组成】蕤仁（水浸，去皮）一两

【用法】上研烂，用水两碗，煮至一酒杯，滤去滓，炖热，再下研就极细真铜绿、胆矾各五分，搅匀。以鸭毛翎蘸点眼皮之下，内服搜风散。

【主治】眼弦作痒及烂者。

15025 蕲艾汤

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】蕲艾 薄荷 菊花各三钱 南星 全蝎各一钱半 细辛五钱 麝香一分

【用法】水煎，食后服。

【主治】雷头风，目内障。

15026 蕲蛇酒

【方源】《喻选古方试验》。

【组成】蕲蛇一条（酒洗，润透，去骨刺及近头三寸，只取肉）四两 羌活 归身 天麻 秦艽 五加皮各二两 防风一两

【用法】上以生绢袋盛之，入金华酒坛内，悬胎安置，入糯米生酒酷五壶，浸袋，箬衣密封，安坛于大锅中，水煮一日，取起，埋阴地七日取出。每饮一二杯。仍以滓晒干研末，酒糊为丸，如梧桐子大，每服五十丸，煮酒吞下。

【主治】中风伤酒，半身不遂，口目㖞斜，肤皮瘙痹，骨节疼痛；及年久疥癣，恶疮风癞。

【宜忌】切忌见风、近色及鱼、羊、鹅、面发风之物。

15027 震灵丹

【方源】《三因》卷八。

【组成】丁头代赭石 禹余粮石（拣红紫色无金丝者） 紫石英 赤石脂各四两

【用法】各为细末，并入砂合内，用赤石脂固口缝，以炭一簇顶煅，候火消及七分存三分火，取出合子令冷，开却合，先于地下掘一坑，深尺余，用厚纸两重衬定，倾药在上，以新瓦盆子覆之，四畔将黄土遍壅，一宿取出，再入乳香、没药二两、五灵脂二两，都为细末，一处将前药合和匀，再研极细，煮糯米糊和匀，杵数千下，丸如芡实大，再服二丸或五丸，空心浓煎姜、枣汤下。

【功用】补虚壮气，暖肾祛邪，益精髓，温脾胃，进饮食、悦颜色；常服育神养气、轻身延年。

【主治】真气虚惫，脐腹冷痛，肢体瘦疼，腰背拘急，脚膝缓弱，面色萎黄，目眩耳鸣，心怔气短，大便自利，小便频数，口干烦渴、饮食无味，大治妇人崩中带下三十六病，小儿惊痫，及一切痼冷风虚。

【宜忌】忌六畜血。

15028 震灵丹

【方源】《妇科大略》。

【异名】紫金丹。

【组成】乳香 五灵脂 没药（另研去砂）各二两 朱砂一两 禹余粮（醋淬，捻碎为度）

【主治】妇人气血不足，崩漏，虚损带下，子宫寒冷无子。

15029 撮风散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】赤脚蜈蚣半条（炙） 钩藤一分 朱砂 直僵蚕（焙） 蝎梢各一钱 麝一字

【用法】上为末。每服一字，用竹沥调下。

【主治】小儿撮口。

15030 撮口散

【方源】《袖珍》卷四。

【组成】蜈蚣（赤脚者，炙）半条 朱砂 虫梢（蝎尾） 僵蚕（炒）各一钱 麝香一字

【用法】上为末。每服一匙，竹沥调下。

【主治】小儿脐风撮口。

15031 撮肿汤

【方源】《医方类聚》卷七十三引《吴氏集验方》。

【组成】北细辛（去土） 独活 鹤虱各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏，煎至八分，放温漱口。

【主治】牙痛作肿。

15032 擒风汤

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】白附 僵蚕 全蝎各一钱（焙） 赤蜈蚣一个（去足，酒研生葱、生薄荷浸一宿；焙干） 川姜黄 炮南星 麻黄（去节） 羌活各一钱 牙消半钱

【用法】上为末。每服一字，薄荷汤调下。

【功用】定搐。

【主治】小儿急惊。

15033 擒虎丹

【方源】《医方类聚》卷九十八引《施圆端效方》。

【组成】五灵脂 荆芥 川乌（炮，去皮） 当归（切，焙） 白胶香 自然铜（醋浸烧二次）各二两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，食后热酒送下，日进二服。

【主治】寒湿走注，脚痹，腰膝痛重。

15034 擒虎散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】没药 当归 黑牵牛 生大黄各一两 甘草（生） 一钱

【用法】上为粗散，每服五钱匕，用皂角刺七个，捶碎，隔宿以酒一升浸之，来日取酒一盏，更加水一盏，纳瓜蒌子七粒，同煎至七分，去滓。取八分盏，食远温服。以利为度。

【功用】疏导肠胃中涩滞郁积之毒气。

【主治】三焦不和，胸膈痞闷，气不升降，饮食迟化，肠胃燥涩，大便秘硬。

15035 擒关饮子

【方源】《奇效良方》卷四十一。

【组成】丁香（不见火） 沉香（不见火） 砂仁（去壳） 白豆蔻（去壳） 三棱（炮） 香附（去毛） 乌药各一钱半 甘草（炙）半钱

【用法】上作一服。以水二盏，煎至七分，食远温服。

【主治】关格不通，气不升降，胀满者。

15036 擒气阿魏丸

【方源】《局方》卷三（绍兴续添方）。

【组成】茴香（炒） 青皮（去白） 甘草（炒） 蓬莪茂（炮） 川芎 陈皮（去白）各一两 白芷半两 丁香皮（炮） 一两 缩砂仁 肉桂（去皮）各半两 生姜四两（切作片子，用盐半两淹一宿，炒黑色） 胡椒 阿魏（醋浸一宿，以面同为糊）

各二钱半

【用法】 上为末，用阿魏糊和丸，如芡实大，每药丸一斤，用朱砂七钱为衣。丈夫气痛，炒姜盐汤送下一至二粒；妇人血气，醋汤送下；常服一粒，嚼烂，茶、酒任下。

【主治】 五种噎疾，九般心痛，痃癖气块，冷气攻刺，及脾胃停寒，胸满膨胀，腹痛肠鸣，呕吐酸水，丈夫小肠气，妇人血气，血刺等疾。

15037 噎膈仙方

【方源】《证治汇补》卷五。

【组成】 白硼砂一钱半 真青黛一钱 乌角沉香二钱

【用法】 上为细末。再用白马尿一斤（如反胃者用黑驴尿），白萝卜一斤取汁，生姜半斤取汁，共于铜锅内熬成膏。每服三茶匙，加前药末七厘，白汤调下，一日三次。

【主治】 噎膈。

15038 噙化丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】 拣参五钱 怀生地一两 生甘草二两 白桔梗三钱 山豆根八钱 片脑三分 南薄荷叶

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，分三次服，临卧时噙入口中，津液渐渐化下。

【主治】 咽喉肿痛，或声不清，或声哑，咽喉干燥，或生疮者。

15039 噙化丸

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】 咽津丹（《喉科紫珍集》卷上）。

【组成】 胆矾 硼砂 明矾 牙皂 雄黄各等分

【用法】 上为末，红枣煮烂取肉为丸，如芡实大。空心噙化一丸，温黄酒一杯过口。内服苏子降气汤。

【主治】 ①《外科正宗》：梅核气，乃痰气结子喉中，咽之不下，吐之不出，如毛草常刺作痒，新则吐酸妨闷，久成闭塞。②《青囊秘传》：喉痈喉蛾，一切气火上逆，冲塞咽喉，汤水难下。

15040 噙化丹

【方源】《医学六要·治法汇》卷六。

【组成】 百药煎 乌梅肉 紫苏心叶 人参 麦门冬 甘草

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每次噙化一丸。

【功用】 生津止渴。

【主治】 消渴。

15041 噙化仙方

【方源】《回春》卷四。

【组成】 甜梨汁 白萝卜汁 生姜汁 白糖各二两 辽五味（去梗）一两 款冬花 紫菀 桔梗各二两

【用法】 上共熬成膏，入人参末一钱和匀为丸，如弹子大，至晚噙化一丸。不过十丸，其病可痊。

【主治】 五劳七伤，吐脓、吐血、吐痰，咳嗽喘急。

15042 瞑眩膏

【方源】《三因》卷十二。

【组成】 大萝卜（切一指厚）四五片

【用法】 用好白蜜二两，萝卜蘸蜜安于净铁铲上，慢火炙，反复炙令软，蜜尽为度。候温细嚼，以盐汤一盏送下。

【主治】 诸淋，疼痛不可忍受；及沙石淋。

15043 蝎乌散

【方源】《得效》卷九。

【组成】 全蝎半两 天麻三钱 苍术一两（去皮，炒令黄） 草乌二钱（生用） 黑附子二钱（炮，去皮脐，炒）

【用法】 上为末。每服一钱匕，用黑豆炒热淋酒调，热服。药气所致麻痹少时，其病随安。

【主治】 经年腰脚虚弱，筋骨疼痛，难于屈伸者。

15044 蝎附丸

【方源】《医方类聚》卷八十一引《济生续方》。

【组成】 大附子一枚 全蝎（去毒）二个 钟乳粉二钱半

【用法】 上将附子挖去心，安全蝎在内，余附为末，同钟乳粉及面少许，水和作剂，包裹煨令熟，并为细末，捣葱涎为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前用椒盐汤送下。

【主治】 气虚头痛。

【备考】 本方改作散剂，名“乳附全蝎散”。见《医方类聚》引《澹寮》。

15045 蝎附散

【方源】《妇人良方》卷四。

【组成】 附子（炮，去皮脐） 川乌（炮，去皮尖） 麻黄（去节） 僵蚕（炒） 南星 防风各三钱 雄黄 朱砂 全蝎各一钱半 白芷 藁本各半两

【用法】 上为细末。每服半钱，葱茶调下，食后服。

【主治】 一切风邪头痛，夹脑风气，痰涎壅盛，

呕逆恶心，口吐清水，暗风眩晕，眼见黑花，牙关紧急，口眼㖞斜，面目瞤动，头项拘急，肩背引痛，耳痒目昏，四肢麻木；及洗头浴出暴感风邪，头目昏痛，两太阳穴痛，远年头风，乍愈乍发，服他药无效者。

【宜忌】 孕妇不可服。

15046 蝎附散

【方源】《直指》卷四。

【组成】 小附子（去皮） 生草乌头（炮，去皮脐） 苍术（炒） 牛膝（酒浸，焙） 川芎 当归 天麻各半两 防己 白芷 黄耆（蜜炙） 全蝎（焙）各一分

【用法】 上为末。每服一钱，食前黑豆淋酒调下，兼用核桃肉研酒下。

【主治】 肝肾气虚，风入筋骨，手足缓弱。

15047 蝎蚣散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】 全蝎一个 蜈蚣一条

【用法】 上研细粉，以鸡蛋一个搅拌，用香油或豆油炒熟吃下，每晨一个，不用铁锅，铝锅可用。

【主治】 淋巴腺结核。

15048 蝎梢丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 全蝎（黄色者佳） 延胡索（炒） 牡丹皮 川楝子（炮，去核） 当归（去芦） 茴香（淘去沙）各等分

【用法】 上药同炒黄色，共为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二三十粒，细嚼，茴香炒盐半钱，以酒送下，不拘时候。

【主治】 偏坠及颓气、小肠气。

15049 蝎梢散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】 白芷 当归身 柴胡各二分 桂枝 升麻 防风 藁本 黄耆各三分 羌活五分 草豆蔻皮一钱 麻黄（去节）一钱五分 蝎梢少许 羊胫骨灰二钱五分

【用法】 上为细末。先用温水漱口净，后擦之。

【主治】 大寒风犯脑，牙齿疼痛。

15050 蝎梢挺子

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】 川山甲一大片（以蛤粉炒赤） 蝎梢七个 麝香少许

【用法】 上共为末，以麻油化蜡和作挺子。棉裹塞之。

【主治】 耳卒鸣，且失聪。

15051 蝎麝白丸子

【方源】《得效》卷十三。

【组成】 半夏七两 川乌一两 白附子二两 天南星三两 天麻一两 全蝎五钱 防风一两 生麝香五分

【用法】 上为末，姜汁糯米糊丸，如梧桐子大。每服一二十丸，淡姜汤送下，不拘时候；瘫痪风，温酒送下，一日三服；小儿惊风，薄荷汤送下。

【功用】 除风化痰。

【主治】 男子妇人半身不遂，手足顽麻，口眼㖞斜，痰涎壅塞；及小儿惊风，大人头风，洗脑风，妇人血风。

15052 蝮蛇酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】 活蝮蛇一条（一方有人参）

【用法】 上以醇酒一斗，封埋马粪处，周年取出，蛇已消化。每服数杯。

【功用】《中医外科学》：祛风化湿，解毒定惊。

【主治】 ①《本草纲目》：恶疮，诸瘘，恶风顽痹，癫疾。②《中医外科学》：麻风，肌肉麻痹不仁，筋脉拘急，皮肤燥痒或破烂者。

15053 蝮蛇地丁酒

【方源】《中药制剂汇编》。

【组成】 蝮蛇一二条 紫花地丁一两

【用法】 取活蝮蛇置于瓶中，加入70%乙醇或60度白酒1000毫升，加紫花地丁，封口，置于阴凉处，约3个月后即可使用，放置时间愈长愈好，药液用完后可随时添加。用脱脂棉蘸取药液敷患处，再用塑料布盖于药棉之上，每日更换数次，保持药棉湿润。

【功用】 清热消炎。

【主治】 软组织化脓性感染。

15054 蝼蛄麝香散

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】 蝼蛄（活者）一枚

【用法】 上生研，入麝香少许，新汲水调下。

【主治】 小便不通，诸药无效者。

15055 蝙蝠散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 大蝙蝠一个 朱砂三钱

【用法】 将朱砂填入蝙蝠腹内，以新瓦盛火炙令酥为度，候冷为末。每个分作四服，体弱年幼者作五服，空心白汤送下。

【主治】 痫证。

15056 蹶蹐花丸

【方源】 方出《本草纲目》卷十七引《续传信方》，名见《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】 踯躅花 天南星

【用法】 上生捣作饼，甑上蒸四五遍，以稀葛囊盛之，临时取焙为末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三丸，温酒送下；腰脚骨痛，空心服，手臂痛食后服。

【主治】 风痰注痛。

15057 踯躅花油

【方源】 《金鉴》卷六十三。

【组成】 踯躅花根四两

【用法】 上捣烂，用菜油一碗，爆枯去滓，加黄蜡少许，布滤候冷。青布蘸擦，一日三次。毡帽戴之，勿令见风。

【功用】 驱虫止痒。

【主治】 秃疮，白癜垒迭，痒若虫行者。

15058 墨汁散

【方源】 《洞天奥旨》卷九引《保寿堂方》。

【组成】 旱莲草一把（根须洗净，石臼捣如泥）

【用法】 上以极热酒一盏冲入，取汁饮之，滓敷患处。

【主治】 痔漏。

15059 镇风汤

【方源】 《衷中参西录》上册。

【组成】 钩藤钩三钱 羚羊角一钱（另炖，兑服） 龙胆草二钱 青黛二钱 清半夏二钱 生赭石二钱（轧细） 茯神二钱 僵蚕二钱 薄荷叶一钱 朱砂二分（研细，送服）

【用法】 以磨浓生铁锈水煎服。

【主治】 小儿急惊风。其风猝然而得，四肢搐搦，身挺颈痉，神昏面热，或目睛上窜，或痰涎上壅，或牙关紧闭，或热汗淋漓。

15060 镇心丸

【方源】 《圣惠》卷四。

【组成】 紫石英（细研，水飞） 朱砂（细研，水飞） 白石英（细研，水飞） 龙齿（细研） 人参（去芦头） 细辛 赤箭 天门冬（去心，焙） 干熟地黄 白茯苓 犀角屑 沙参（去芦头） 菖蒲 防风（去芦头）各一两 远志半两（去心）

【用法】 上为末，都研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】 心风。恍惚，惊恐失常，或瞋恚悲愁，情意不乐。

15061 镇心丸

【方源】 《养老奉亲》。

【组成】 辰砂一两 桂一两 远志（去心） 人参各一两 茯苓二两 麦门冬（去心） 石菖蒲 干地黄各一两半

【用法】 上除辰砂外，并为末和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。朱砂为衣。每服十至十五丸，空心薄荷酒吞下。

【功用】 益心气，养心神，聪明耳目。

【主治】 老人心气不足，健忘。

15062 镇心丸

【方源】 《易简方》。

【组成】 人参 茯苓 甘草各五两 山药十五两 紫河车二两半（黑豆水煮饮，切片，焙干） 朱砂（研）十两 麝香五分 龙脑一两 牙消一两半

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如芡实大，用金箔一百二十片为衣。每服一丸，薄荷汤送下。

【功用】 镇心神。

【主治】 惊恐。

15063 镇心丸

【方源】 《魏氏家藏方》卷四。

【组成】 益智仁二两 龙骨（煅）半两 牡蛎粉 茯神（去木）各一两 龙齿一分

【用法】 上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹盐汤送下；妇人艾醋汤送下。

【主治】 白浊。

15064 镇心丸

【方源】 《眼科龙木论》卷三。

【组成】 石决明 人参 茯苓 大黄各一两 远志 细辛 干山药 防风各二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空腹茶清送下。

【主治】 膜入水轮，外障。

15065 镇心丸

【方源】 《审视瑶函》卷五。

【组成】 牛黄一钱（另研） 生地（酒洗，炒） 当归身（酒洗，炒） 远志肉（去心） 茯神各五钱 金箔十五片 石菖蒲（九节者佳） 川黄连各二钱半 辰砂二钱（另研）

【用法】 六味草药为细末，后入牛黄，辰砂为末，猪心血为丸，如黍米大，金箔为衣。每服五六十丸，煮猪心汤送下。

【主治】 心痫惊悸，忧愁思虑伤心，惕然心跳，动振不安，面赤吐舌，目瞪。

15066 镇心丸

【方源】 《医略六书》卷二十二。

【组成】 熟地八两 枣仁四两 茯神三两（去木） 人参四两 麦冬四两（去心） 五味二两 天冬四两（去心） 山药四两（炒） 远志二两 龙齿三两 肉桂三两（去皮） 朱砂一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每服五钱，米饮送下。

【主治】 怔忡不宁，脉弦数极者。

【方论选录】 怔忡乃阴虚为假热所迫，气不归原，松动而不宁。熟地补阴滋肾以吸九天之气，人参补气扶元以生九地之阴；枣仁养心气以下达，茯神清精府以定志；麦冬清心润肺，天冬润肺益阴；五味生津敛阴，远志通肾交心；山药补脾阴以媾水火；龙齿镇浮越以安魂魄；肉桂导火平肝，朱砂定心安神。丸以白蜜之甘润，汤以米饮之和胃，使脾胃调和，金水并益，而心气自降，假热潜藏，心阴充足，则怔忡自退哉。

15067 镇心丹

【方源】 《三因》卷九。

【组成】 光明辰砂（研） 白矾（煅汁尽）各等分

【用法】 上为末，水泛为丸，如芡实大。每服一丸，煎人参汤食后送服。

【主治】 心气不足，惊悸自汗，烦闷短气，喜怒悲忧，悉不自知，亡魂失魄，状若神灵所扰；及男子遗泄，女子带下。

15068 镇心丹

【方源】 《传信适用方》卷二。

【组成】 黄耆五两（炙） 干熟地黄二两半（洗） 五味子二两半（去枝梗） 柏子仁二两半（研） 远志二两半（去心） 白茯神五两（去木） 人参五两 酸枣仁五两（去皮，炒） 朱砂三两（别研）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，以朱砂为衣。每服三十丸，温酒或人参汤送下。恍惚惊悸，怔忡不止，煎人参、茯神汤送下；盗汗不止，麦麸汤送下；乱梦失精，人参、龙骨汤送下；卒暴心痛，乳香汤送下；肌热虚烦，麦门冬汤送下；大便下血，当归、地榆汤送下；中风不语，薄荷、牛黄汤送下。

【功用】 安镇心脏，补养心气。常服安神镇心，益寿延年。产后安胎，产后补虚。

【主治】 惊忧思虑过伤，心气不足，怔忡盗汗，乱梦失精，卒暴心痛，中风不语，风痫癫狂，客忤不省，悲哭无常，色脱神悴，飞尸鬼注，恍惚惊悸，吐血便血，虚劳羸瘦，病后虚烦，不得眠睡；及胎动不安，产后体虚。

15069 镇心丹

【方源】 《卫生家宝》引俞山人方（见《普济方》卷十六）。

【组成】 茯苓一两（焙干） 牛膝一两（细锉，酒浸，焙） 兔丝子一两（酒浸，煮研） 五味子半两（拣） 人参二两（去芦头） 山药二两 鹿角霜二两 远志二两（去心） 龙齿一两（飞） 黄耆半两（蜜炙） 茯苓二两（白者） 石菖蒲半两 茯神二两（同茯苓一处用柏叶裹定蒸九次）

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐米饮或酒盐汤吞下，渐加至四十丸；用辰砂为衣，食后人参汤下，闭目良久。

【功用】 常服安神，去百邪，调顺荣卫，补养真气。

【主治】 忧愁思虑过伤，心气不足，恍惚惊悸，骨热诸劳，失精乱梦，飞尸鬼疰，肌瘦色黄，食衰倦怠，心腑不利，以致大恐所伤，及吐血便血，种种心疾。

15070 镇心汤

【方源】 《扁鹊心书·神方》。

【组成】 人参 茯苓 石菖蒲（桑叶水拌炒） 远志 木香 丁香各一钱 甘草 干姜各五钱 大枣三枚

【用法】 水煎，空心服。

【主治】 心气不足，为邪气所乘，狂言多悲，梦中惊跳。

15071 镇包汤

【方源】 《一见知医》卷三。

【组成】 人参 茯神 远志 丹砂 生地 石斛 枣仁 麦冬 五味 柏子仁 甘草

【主治】 包络病，心中憺憺而动。

15072 镇阴煎

【方源】 《景岳全书》卷五十一。

【组成】 熟地一二两 牛膝二钱 炙甘草一钱 泽泻一钱半 肉桂一二钱 制附子五七分或一二三钱

【用法】 上用水二钟，速煎服；格阳喉痹，冷服。

【主治】 阴虚于下，格阳于上，真阳失守，则血随而溢，以致大吐大衄，六脉细脱，手足厥冷，危在倾刻，血不能止者。

【加减】 兼呕恶者，加干姜，炒黄芩一二钱；如气脱懒言，脉弱极者，宜速加人参，随宜用之。

15073 镇肝丸

【方源】 《局方》卷七。

【异名】 补肝丸(《医部全录》卷一四六)。

【组成】 蔓荆子（去白皮） 地肤子 人参 茺蔚子 决明子 白茯苓（去皮） 远志（去心） 防风（去芦叉）各一两 青葙子 地骨皮去土 柴胡（去芦） 山药 车前子 柏子仁（炒） 玄参 甘菊 甘草（炙）各半两 细辛（去苗）一分

【用法】 上为末，蜜水煮糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后米饮送下，一日二次。

【主治】 肝经不足，内受风热，上攻眼目，昏暗痒痛，隐涩难开，堆眵多泪，怕光羞明，时发肿赤，或生障翳。

15074 镇肝丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】 皂角六挺（去皮弦，二挺涂酥炙黄；二挺用陈皮末二两，水调涂，炙黄；二挺用青皮末二两，水调涂，炙黄）

【用法】 上为细末，用精羊肉汁为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至六十丸，食后、卧时用温水送下。

【功用】 内消。

【主治】 瘰疬结核肿硬。

15075 镇肝丸

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】 人参 白茯苓 五味子 石决明 细辛 山药 藁本 车前子 羌活 楮实子 夏枯草 石斛

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，茶清送下。

【主治】 肝脏劳热，沉翳内障，眼前常见黑花。

15076 镇肝饮

【方源】《玉案》卷三。

【组成】 菊花 旋覆花 石决明 茺蔚子各一钱 车前子 蔓荆子 枸杞子各一钱六分

【用法】 上加灯心三十茎，水煎，食后服。

【主治】 黑风内障。

15077 镇胃丸

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】 人参一钱 甘草一两 柴胡一两 黄芩五钱 生姜二两 半夏一两 青黛七钱（另研，为衣）

【用法】 上为末，姜汁浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食后姜汤送下。

【主治】 中气亏败，肝火上乘而作呕吐者。

15078 镇宫丸

【方源】《济生》卷十。

【组成】 代赭石（火煅，醋淬七次） 紫石英（火煅，醋淬七次） 禹余粮（火煅，醋淬七次） 附子（醋炙）各二两 阳起石（煅红，细研） 芎劳 鹿茸（燎去毛，醋蒸，焙） 茯神（去木） 阿胶（锉，蛤粉炒成珠子） 蒲黄（炒） 当归（去芦、酒浸）各一两 血竭（别研）半两

【用法】 上为细末，用艾煎醋汁，打糯米和丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心米饮调下。

【主治】 妇人崩漏不止，或下五色，或赤白不定，或如豆汁，或状若豚肝，或下瘀血，脐腹胀痛，头晕眼花，久久不止，令人黄瘦，口干心烦不食。

15079 镇逆汤

【方源】《衷中参西录》上册。

【组成】 生赭石六钱（轧细） 青黛二钱 清半夏三钱 生杭芍四钱 龙胆草三钱 吴茱萸一钱 生姜二钱 野台参二钱

【主治】 呕吐。因胆火上冲，胃气上逆者。

15080 镇惊丸

【方源】《医学纲目》卷三十六。

【组成】 琥珀二钱半 青黛半两 辰砂二钱半 天竺黄二两 天麻一两 真珠母二钱半 芦荟 柴胡各半两 青皮 甘草各二钱半 胆星二两 雄黄一钱半 乳香一两 青礞石（煅）半两

【用法】 上为末，甘草膏为丸，如芡实大。慢惊参术汤送下；急惊薄荷姜蜜汤送下。

【主治】 急慢惊风。

15081 镇惊丸

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】 茯神 麦冬各五钱（去心） 辰砂 远志（去心） 石菖蒲 枣仁各三钱（炒） 牛黄一钱半 川黄连三钱（生） 珍珠二钱 胆星五钱 钩藤钩五钱 天竺黄五钱 犀角三钱 甘草二钱（生）

【用法】 上共研细末，炼蜜为丸，每丸重五分。量儿大小与之，用淡姜汤送下。

【主治】 小儿惊痫。

15082 镇摄汤

【方源】《衷中参西录》上册。

【组成】 野台参五钱 生赭石五钱（轧细） 生芡实五钱 生山药五钱 萸肉五钱（去净核） 清半夏二钱 茯苓二钱

【主治】 胸膈满闷，其脉大而弦，按之似有力，非真有力，此脾胃真气外泄，冲脉逆气上下之证。

【加减】 服药数剂后，满闷见轻，去芡实，加白

术二钱。

15083 镇心至宝丹

【方源】《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】天南星（煨） 白附子（炮） 雄黄（研） 干蝎各半两 白僵蚕（去丝嘴，炒） 郁金各一两 龙脑（研） 麝香（研）各二钱五分 辰砂（研） 一分 腻粉二钱 滑石末二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如皂荚子大，金、银箔为衣。每服一丸，食后、临卧薄荷汤送下。

【功用】常服镇心神，凉咽膈。

【主治】小儿惊风搐搦，壮热涎多，鱼口鸦声，眼睛直视。

15084 镇心定痫汤

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】菖蒲 远志 黄连 胆星 半夏 竺黄 钩藤 僵蚕 龙齿

【用法】水煎，送服磁朱丸。

【主治】诸痫。

【加减】重症，加牛黄、全蝎。

15085 镇心爽神汤

【方源】《简易》引《叶氏方》（见《医方类聚》卷一五〇）。

【组成】石菖蒲（去毛）半两 甘草（炙黄）四钱 人参（去芦） 赤茯苓（去皮） 当归（酒浸）各三钱 南星（炮）一分 橘皮（去白） 干山药 紫菀（去芦） 半夏（汤洗七次） 川芎（不见火） 五味子（去梗） 细辛（去苗） 柏子仁（微炒） 枸杞子各二钱 酸枣仁（浸，去壳，炒） 通草 麦冬（去心） 覆盆子各一钱半

【用法】上为粗散。每服三钱，水一大盏，加蜜一匙，煎取五分，去滓，入麝香少许，再煎一二沸，放温服，不拘时候。

【功用】镇心安神。

【主治】心肾不交，上盛下虚，心神恍惚，多惊悸，小便频数，遗泄白浊。

15086 镇阴地黄汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】大熟地一两 山萸肉四钱 山药四钱 茯苓三钱 丹皮三钱 泽泻三钱 淡附子一钱 上肉桂一钱 怀牛膝三钱 牡蛎三钱（煅）

【用法】水煎，冷服。

【主治】阴火喉痹。

15087 镇肝固胆汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】何首乌五钱 生地四钱 熟地四钱 金石斛三钱 菟丝子三钱（炒） 芜蔚子三钱 甘草一钱 冬虫草五分 车前子三钱（炒，另包）

【用法】水煎服。

【主治】心脏衰弱，肾水不足，肝胆之精液不能上注于目，致生水晶障，两眼风轮色白清莹，膏厚满珠，头疼目酸，不时流泪。

15088 镇肝熄风汤

【方源】《衷中参西录》上册。

【组成】怀牛膝一两 生赭石一两（轧细） 生龙骨五钱（捣碎） 生牡蛎五钱（捣碎） 生龟版五钱（捣碎） 生杭芍五钱 玄参五钱 天冬五钱 川楝子二钱（捣碎） 生麦芽二钱 茵陈二钱 甘草一钱半

【主治】内中风证。其脉弦长有力，或上盛下虚，头目眩晕，或脑中作疼发热，或目胀耳鸣，或心中烦热，或时常嗳气，或肢体渐觉不利，或口眼渐形歪斜，或面色如醉，甚或颠仆，昏不知人，移时始醒，或醒后不能复元，精神短少，或肢体痿废，或成偏枯。

【加减】心中热甚者，加生石膏一两；痰多者，加胆星二钱；尺脉重按虚者，加熟地黄八钱，净萸肉五钱；大便不实者，去龟版、赭石，加赤石脂一两。

15089 镇逆白虎汤

【方源】《衷中参西录》上册。

【组成】生石膏三两（捣细） 知母一两半 清半夏八钱 竹茹粉六钱

【用法】上用水五盅，煎汁三盅。先温服一盅，病愈者，停后服；未愈者，过二时，再温服一盅。

【主治】伤寒温病，邪传胃腑，燥渴身热，白虎汤证俱，其人胃气上逆，心下满闷者。

15090 镇逆承气汤

【方源】《衷中参西录》上册。

【组成】芒消六钱 赭石二两（研细） 生石膏二两（捣碎） 潞党参五钱

【用法】上用水四盅，先煎后三味，汤将成加芒消，煎一二沸，取清汁二盅。先温服一盅，过三小时，若腹中不觉转动，欲大便者，再温服余一盅。

【主治】寒温阳明腑实，大便燥结，当用承气汤下之，而呕吐不能受药者。

15091 镇心省睡益智方

【方源】《千金翼》卷十六。

【组成】 远志五十两（去心） 益智子 菖蒲各八两

【用法】 上为末，每服方寸匕，醇酒送服。一百日有效。

【主治】 ①《千金翼》心风。②《医钞类编》：风湿多眠，狐惑多眠。

15092 镇肝明目羊肝丸

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】 羯羊肝一具（新瓦焙干，竹刀切片） 官桂 柏子仁 羌活 家菊花 白术（土炒） 五味子 细辛各五钱 川黄连（炒）七钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心、食远沸汤送下。

【主治】 青盲。

15093 黎洞丸

【方源】《金鉴》卷七十五。

【异名】 嵺峒丸（《外科全生集》卷四）、黎洞丹（《种福堂方》卷四）、嵺峒丹（《青囊秘传》）、嵺峒丸（《北京市中药成方选集》）。

【组成】 三七 生大黄 阿魏 孩儿茶 天竺黄 血竭 乳香 没药各二两 雄黄一两 山羊血（无真者，以小子羊鲜心血代之）五钱 冰片 麝香 牛黄各二钱五分（以上各研细末） 藤黄（以秋荷叶露泡之，隔汤煮十余次，去浮沉，取中，将山羊血拌入，晒干）二两

【用法】 取秋露水化藤黄，拌药捣千余下，如干，加炼蜜少许为丸，重一钱，黄蜡封固。每服一丸，黄酒化下，外敷亦用黄酒磨涂此药。如在夏天修和，取天落水拌之为丸。

【功用】《仙拈集》：续筋接骨，疏风活络。

【主治】 金疮跌扑伤，发背痈疽，恶疮，瘰疬，刑伤，疯犬咬伤，蜂、蛇、蝎毒。

【备考】《外科全生集》无山羊血、麝香。

15094 僵蚕丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】 白僵蚕（炒） 乌头（炮裂，去皮脐） 没药（研）各一两 蜈蚣（炙）半两

【用法】 上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，薄荷酒送下，一日三次。

【主治】 瘫痪风，手足不随，言语不正。

15095 僵蚕丸

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】 白僵蚕（炒） 明白矾（生）

【用法】 上为末，以白梅肉为丸，如皂子大。每服一丸，薄绵包入喉。少顷涎水出而愈。

【主治】 ①《直指》：喉风。②《杂病源流犀烛》：疫盛急喉闭。

15096 僵蚕散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】 白附子一两 僵蚕一两（炒） 半夏一两（制） 南星一两（制） 天麻一两（煨） 蝉衣一两

【用法】 上为散。每服五钱，水煎，去滓，加生姜汁一匙，温服。

【主治】 孕妇中风，痰涌口噤，脉滑者。

【方论选录】 白附子祛风开痹气，明天麻胜湿祛风邪；僵蚕疏风化痰，专行经络，蝉衣善脱衣肤，宣通元府；南星散风痰以快胸膈，半夏燥湿痰以醒脾胃也。为散水煎，加生姜汁以散豁痰涎，务使风邪外解，则痰涌自消，而经气清和，壅塞顿解，胸宇无不廓然，何有口噤痰逆之患，胎孕无不自安矣。

15097 鲤鱼汤

【方源】《千金》卷二。

【异名】 千金鲤鱼汤（《校注妇人良方》卷十五）。

【组成】 鲤鱼一头（重二斤） 白术五两 生姜三两 芍药 当归各三两 茯苓四两

【用法】 上㕮咀，以水一斗二升，先煮鱼熟，澄清，取八升，纳药煎，取三升，分五服。

【主治】 ①《千金》：妊娠腹大，胎间有水气。②《普济方》：妊娠小便不利，身重恶寒，起则眩晕及水肿。

【方论选录】《医略六书》：妊娠肝脾两虚，不能输化，以制其湿，故遍身浮肿，小便涩少焉。鲤鱼下气利水，橘红化气利肺，当归养肝血以营经，白芍敛肝阴以安胎，白术健脾制湿，茯苓清肺和脾。煮鱼汁入药，务使肝脾气化则湿运，气调而小水自快，何患浮肿不退，胎孕不安乎。

【宜忌】《普济方》：忌桃、李、雀肉、酢物。

【备考】 ①本方方名，《外台》卷三十三引作“生鱼汤”。②《三因》有陈皮少许。

15098 鲤鱼粥

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】 鲤鱼一头（可重一斤，去肠，洗净） 商陆二两（锉） 赤小豆三合 紫苏茎叶二两

【用法】 上于净锅中，着水五大盏，都候鱼烂熟，空腹食之。其汁入葱白、生姜、橘皮，及少醋，调和作羹食之，其豆亦宜吃。甚效。

【功用】 利小便。

【主治】 水肿。

15099 鲤鱼茯苓汤

【方源】 方出《肘后方》卷三，名见《普济方》卷二九三。

【异名】 鲤鱼泽漆汤(《金匮翼》卷四)。

【组成】 鲤鱼一头五斤 泽漆五两 茯苓三两 桑根白皮（切）三升 泽泻五两

【用法】 以水二斗煮鱼，取半斗，去鱼入药，煮取四升，分四服。服之小便当利，渐消也。

【主治】 ①《肘后方》：肿入腹，苦满急，害饮食。②《金匮翼》：石水。

【宜忌】 《金匮翼》：忌酢物。

15100 鲫鱼汤

【方源】 《千金》卷二。

【异名】 鲫鱼酒(《圣惠》卷八十一)。

【组成】 鲫鱼七寸 猪肪半斤 漏芦八两 石钟乳八两

【用法】 上切猪肪，鱼不须洗治，清酒一斗二升合煮，鱼熟药成，绞去滓，适寒温，分五服，其间相去须臾，一饮令药力相及。

【功用】 下乳汁。

【主治】 妇人产后乳汁不行。

15101 鲫鱼散

【方源】 《本事》卷四。

【组成】 大鲫鱼一个（去肠，留胆，纳绿矾末填满，缝口，以炭火炙令黄干，为末）

【用法】 每服一钱，陈米饮送下。

【功用】 引浊下行，扶中。

【主治】 反胃噎膈。

【方论选录】 鲫鱼气味甘温，入足阳明、太阴；绿矾气味咸酸微凉，能引浊下行；陈米饮送药，扶中气也。此亦治反胃之病，中宫虽有阴窃踞，不耐辛温之刚燥，甘温酸咸之品引浊下趋，即以陈米饮调中，勿使中土失职，真王道之药也。

15102 熟附丸

【方源】 《得效》卷十五。

【组成】 大川芎 当归 赤石脂（煅） 白龙骨 木贼（去节） 熟附子各等分

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下。渐安。

【主治】 崩漏。

【临证举例】 崩漏 《奇效良方》：一妇人年五十已上，经断七年，忽然经行，遂成崩漏，发热腹痛，两月不愈，予诊其脉，虚细疾数，予曰此乃阴虚而致，宜服此药。

15103 熟大黄汤

【方源】 《三因》卷十三。

【组成】 大黄（切如豆大） 生姜各半两（切）

【用法】 上同炒令焦黄，以水一大盏，浸一宿，五更去滓顿服。天明所下如鸡肝者，即恶物出。

【主治】 ①《三因》：坠堕闪肭，腰痛不能屈伸。②《得效》：打扑腰痛，恶血蓄瘀，痛不可忍。

15104 熟地黄丸

【方源】 《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】 熟地黄二两二分 山朱萸 白芜荑 干姜（炮） 代赭石（醋淬） 白芍（炒）各一两 厚朴（姜制） 白僵蚕（炒）各半两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，酒送下，一日三次。

【主治】 妇人月经不调，每行数日不止，兼有白带，渐渐瘦瘁，饮食少味，累年无子。

15105 熟地黄丸

【方源】 《便览》卷一。

【异名】 滋阴地黄丸、生熟地黄丸。

【组成】 熟地（酒浸，真者）一两 柴胡（去芦）八钱 天门冬（酒浸，去心） 甘草（炙） 枳壳 地骨皮 黄连 人参 五味子各三钱 防风 当归（酒洗，焙） 生地（真）各一两半

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，茶清送下。

【主治】 血少神劳，肾虚，眼目昏黑，瞳子散大。

15106 熟地黄汤

【方源】 《三因》卷十八。

【异名】 熟干地黄汤(《局方》续添诸局经验方卷九)、地黄汤(《普济方》卷三五三)、熟地黄散(《普济方》卷三五三)。

【组成】 熟地黄一两 人参三两 麦门冬二两 栝楼根四两 甘草半两

【用法】 上为散。每服四钱，水二盏，加糯米一撮，生姜三片，枣三枚，煎七分，去滓，食前服。

【主治】 产后虚渴不止，少气脚弱，眼昏头眩，饮食无味。

15107 熟地黄散

【方源】 方出《圣惠》卷七十九，名见《普济方》卷三五二。

【组成】 赤石脂一两 当归半两（锉，微炒） 牡蛎半两（烧为粉） 鹿茸半两（去毛，涂酥，炙令微黄） 熟干地黄一两

【用法】 上为细散。每服二钱，食前以粥饮下。

【主治】 产后崩中，下血不止，淋沥不绝，黄瘦

虚损。

15108 熟附子汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】 熟附子（去皮） 枯矾各一两

【用法】 上为末。每服三钱，米饮下。

【主治】 便血。下血虚寒，日久肠冷。

【备考】 本方原名"熟附子丸"，与剂型不符，据《中国医学大辞典》改。

15109 熟干地黄丸

【方源】 方出《本事》卷二，名见《普济方》卷二二四。

【组成】 熟地黄五两（酒酒，九蒸九晒，焙干） 菟丝子四两（酒浸，晒干，用纸条子同研别末） 鹿茸三两（酥炙黄，燎去毛） 附子二两（炮，去皮脐） 沉香一两

【用法】 上为细末，加麝香半钱研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，盐酒或盐汤送下。

【功用】 补益脾肾。

【主治】 风虚劳损挟毒，脚弱疼痹或不随，下焦虚冷，胸中微有客热，心虚惊悸不得眠，食少失气味，日夜数过，心烦迫不得卧，小便不利，又时复下。

【方论选录】 此方专补脾肾。熟地黄气味甘寒微苦，入肾；鹿茸气味甘温，入足少阴、太阳；菟丝子气味甘平，入足少阴、太阴；附子气味咸温，入手、足少阴；沉香气味辛温，入肾，能走下焦；再佐以麝香之走窍，盐酒之送药。盖高年中下两亏者，非此不能效也。

15110 熟干地黄丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】 滋阴地黄丸（《东垣试效方》卷五）、生熟地黄丸（《摄生众妙方》卷九）、干熟地黄丸《医方考》卷五）。

【组成】 人参二钱 炙甘草 天门冬（汤洗，去心） 地骨皮 五味子 枳壳（炒） 黄连各三钱 当归身（酒洗，焙干） 黄芩各五钱 生地黄（酒洗）七钱五分 柴胡八钱 熟干地黄一两

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，茶汤送下，一日二次。

【功用】 养血，凉血，收火之散大，除风之热。

【主治】 血弱阴虚，风热上攻头目，致偏头肿闷，瞳子散大，视物则花。

【宜忌】《原机启微》：忌食辛辣、寒冷。

【方论选录】《原机启微》：《内经》云：热淫所胜，平以咸寒，佐以苦甘，以酸收之。以黄连，黄芩大苦寒除邪气之盛为君；当归身辛温，生熟地黄苦甘寒养血凉血为臣；五味子酸寒，体轻浮上，收瞳子之散大，人参、甘草，地骨皮、天门冬，枳壳苦甘寒泻热补气为佐；柴胡引用为使也。

【备考】 ①本方方名，《丹溪心法》引作"熟地黄丸"。②改为汤剂，名"生熟地黄汤"（见《审视瑶函》）。

15111 熟干地黄汤

【方源】《妇人良方》卷二十一。

【组成】 熟干地黄二两 人参 北五味子 石斛 白茯苓 白术 鹿角胶 附子各一两 桂心 当归 川芎 泽兰叶 黄耆 续断各三分

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏，加生姜三片，大枣一枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 产后虚羸，短气不能食。

15112 熟干地黄散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】 熟干地黄一两半 磁石一两（捣碎，水淘去赤汁） 桂心一两半 附子半两（炮裂，去皮脐） 人参一两（去芦头） 牡荆子一两 当归一两（锉，微炒） 牡丹皮半两 白茯苓一两 芎藭半两

【用法】 上为散。每服先以水一大盏半，入羊肾一对（去脂膜，切），煎至一盏，去肾，入药五钱，加大枣三枚，生姜半分，同煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】 劳聋。肾气不足，耳无所闻。

15113 熟干地黄散

【方源】《局方》卷九。

【组成】 丹参（去芦头） 防风（去芦叉） 当归（去芦，微炒） 细辛（去苗） 藁本（去芦，洗） 芎藭各半两 人参（去芦） 熟干地黄（酒洒蒸，焙）各一两 白茯苓（去皮） 肉桂（去粗皮） 白术各一两 续断三分 附子（炮，去皮脐） 黄耆（去芦）各三分

【用法】 上为粗散。每服四钱，水一盏半，加生姜半分，大枣三个（擘破），煎至一盏，滤去滓，食前温服。

【主治】 妇人劳伤血气，脏腑虚损，风冷邪气乘虚客搏，肢体烦痛，头目昏重，心多惊悸，寒热盗汗，羸瘦少力，饮食不进。

15114 熟料五积散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 白芷 川芎 芍药 甘草 茯苓 当归 肉桂各三分 陈皮 麻黄各六分 厚朴 干姜各四

分　桔梗一分半　枳壳五分　半夏二分　苍术七分半

【用法】 除白芷、肉桂二味外，余十三味，用慢火炒令色变，摊冷，入桂、芷和匀。

【主治】 感冒寒邪，头疼身痛项强，拘急恶寒，呕吐腹痛；及伤寒发热，头痛恶风，内伤生冷，外感风寒，并寒湿客于经络，腰脚痠疼；及妇人经脉不调及腹痛带下。

【宜忌】 《产科发蒙》：产后大汗，泄泻或虚脱之证忌之。

【加减】 产后寒热，去麻黄，用乌药一钱，俱用淡醋炒过；寻常冬月，感寒无汗，量用麻黄同诸药干炒；半身不遂，或复麻痹及卒中风，加麝少许；四肢逆冷呕叶，加附子二分；久虚脾泻，加陈米一撮，乌梅一个；乳痈初作，加牛膝、生地各三分；产后及寻常气痛，加木香玄胡索各五分。

【方论选录】 《产科发蒙》：方名五积者，谓此方能去寒积、血积、气积、痰积、食积也。今产后之病怯正犯此五积，以五积之证投五积之方，岂非药病相值乎，犹虑药味辛散而以醋水拌炒，名熟料五积散，俾药性和缓，表而不发，消而不攻。方内所用肉桂解表逐寒，白芍和营诸卫，苍术、厚朴走阳明而散满，陈皮、半夏疏逆气以除痰，芎、归、姜、芷入血分而祛寒湿，枳壳、桔梗宽胸膈而利咽喉，茯苓去饮宁心，甘草和中补土。大虚大怯者加人参，微虚者可不用。共为温中散寒之妙剂，用于产后，无往非宜。

【备考】 《产科发蒙》本方用法：方中除白芷、肉桂不炒，余药合为一剂，用好醋小半盏，净水一杯，与醋和匀，将药润湿，入锅内炒至黄色为度，取起摊地上，去火毒，候冷，入白芷、肉桂在内，加生姜三片，红枣三枚，净水二碗，煎至一碗，热服。

15115　摩风膏

【方源】 《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】 黄耆　细辛　当归　杏仁各一两　白芷一两半　防风　松脂　黄蜡各一两　小麻油四两

【用法】 上为末，煎成膏。涂之。

【主治】 ①《秘传眼科龙木论》：风牵睑出外障。②《普济方》：鹘眼凝睛外障。

【备考】 《审视瑶函》本方用法：先将蜡、油溶化，前药共为细末，慢火熬膏搅入，退其火性。贴太阳穴。

15116　摩风膏

【方源】 《准绳·疡医》卷五。

【组成】 附子　川乌头　防风各二两　凌霄花　踯躅花　露蜂房各一两

【用法】 上锉细，用猪脂三斤煎炼，看药黄焦，去滓候冷，收瓷盒中。摩风癞上，以愈为度。

【主治】 白癜风。

15117　摩挲丸

【方源】 《局方》卷一。

【组成】 黑参（拣润者洗，焙干）　地榆（去苗）　川乌（炮，去皮脐）　木香　丁香各八两　天台乌药　熏陆香（用滴乳香别研）　雄黄（研，飞）　乌犀（镑，别研细）　龙脑（别研）　辰砂（研，飞）　自然铜（烧赤，醋淬）　麝香（别研）各四两　天麻（去苗）一斤　真珠末（细研）二两（缺，以龙齿代）

【用法】 上为末，研匀，炼蜜为丸，如楮实大。每服一丸，温酒化下，不拘时候。病重者服一月全安，轻者半月愈，初患五七服可安。

【主治】 中风瘫缓，半身不遂，口眼㖞斜，言语謇涩，精神昏塞，步履艰难，或肌肉偏枯，手足瘫曳，或筋脉拘挛，不得屈伸，及气痹并诸风身体疼痛。

【宜忌】 服讫，避风处衣被盖覆令汗出。

15118　摩腰膏

【方源】 《丹溪心法》卷四。

【组成】 附子尖　乌头尖　南星各二钱半　雄黄一钱　樟脑　丁香　干姜　吴茱萸各一钱半　朱砂一钱　麝香五粒（大者）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。每用一丸，姜汁化开如粥厚，火上顿热，置掌中，摩腰上，候药尽粘腰上，烘棉衣包敷定，随即觉热如火，日易一次。

【主治】 ①《丹溪心法》：老人虚人腰痛，并妇人白带。②《万氏家抄方》：寒湿腰痛。

【备考】 ①本方方名，《医学纲目》引作“摩腰丹”。《卫生鸿宝》引作“摩腰紫金膏”。②方中朱砂，《卫生鸿宝》作“蜀椒”。

15119　摩腰膏

【方源】 《张氏医通》卷十四。

【组成】 附子　川乌头　南星各二钱半　蜀椒　雄黄　樟脑　丁香各一钱半　干姜一钱　麝香一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每用一丸，生姜自然汁化开如糜，蘸手掌上，烘热摩腰中痛处，即以缓帛束定，少顷，其热如火。每日饱后用一丸。

【主治】 ①《张氏医通》：老人虚人腰痛，妇人

带下清水不臭者。②《霉疮证治》：霉毒筋挛骨痛。

15120 摩翳膏

【方源】《秘传眼科龙木论》卷六。

【组成】石决明 水晶 朱砂 龙脑 珍珠末各一分 琥珀二分

【用法】上为细末，后入酥为膏。每至夜后点眼。

【主治】①《秘传眼科龙木论》：眼小眦赤脉外障。②《普济方》：血灌瞳仁，渐生翳障。

15121 摩障灵光膏

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】黄连（锉如豆大，童便浸一宿，晒干，为末）一两 黄丹（水飞）三两 当归（酒洗）二钱 麝香五分 乳香五分 轻粉一钱 硇砂一钱 白丁香一钱 龙脑一钱 海螵蛸（俱另研细末）一钱 炉甘石（以黄连一两煎水，淬七次，研细）六两

【用法】先用好白蜜十两，熬五七沸，以净纸搭去蜡面，除黄丹外，下余药，用柳木搅匀，次下黄丹再搅，慢火徐徐搅至紫色，却将乳香、麝香、轻粉、硇砂和匀入上药内，以不粘手为度。点眼用。

【主治】①《金鉴》：混睛。②《中国医学大辞典》：目生翳障。

15122 憎爱丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【异名】忘杖丸。

【组成】黑牵牛（炒） 延胡索（炒） 当归（去芦）各一两 破故纸一两三分（酒浸一宿，瓦上炒熟）

【用法】上为细末，以独头蒜湿纸裹煨熟，研成膏子为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，空心、食前温酒送下，一日二次。

【主治】腰痛。

15123 潜龙汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】龙齿二钱 龟版八钱 生地五钱 龙骨二钱 知母一钱 黄柏一钱 人参一钱 玄参二钱 蛤粉四钱 肉桂四分

【用法】以鲍鱼一两，切片煎汤，代水煎药服。

【主治】肾火不蛰藏，飞腾于上，口燥咽干，面红目赤，耳流脓血，不闻人声。

15124 潜行散

【方源】《医学纲目》卷十二引丹溪方。

【组成】黄柏（酒浸，焙干）

【用法】上为末。生姜汁和酒调服，必兼四物等汤相间服妙。

【主治】①《医学纲目》引丹溪方：痛风。②《东医宝鉴·杂病篇》：血虚阴火痛风，及腰以下湿热注痛。

【备考】《济阳纲目》本方用法：每服三钱，煎四物汤调下，多服取效。

15125 潜阳填髓丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】熟地黄八两 石斛膏 线胶各四两 莲子 芡实各三两 麦门冬 茯神 五味子 沙苑蒺藜各二两 远志一两

【用法】上为细末，金樱膏为丸服。

【主治】肾脏精气亏，相火易动难制，致梦遗精浊，烦劳即发，频年不愈。

15126 澈膏膏

【方源】《保命歌括》卷二十九。

【组成】蔓荆子 细辛各一钱 薄荷叶 川芎各三钱 生甘草 炙甘草各五钱 藁本一两

【用法】上为细末。每用二钱，食后清茶下。

【主治】头痛风眩。

【备考】本方方名，据剂型，当作“澈膏散”。

15127 澄化汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生山药一两 生龙骨（捣细）六钱 牡蛎（捣细）六钱 牛蒡子（炒，捣）三钱 生杭芍四钱 粉甘草一钱半 生车前子（布包）三钱

【主治】小便频数，遗精白浊，或兼疼涩，其脉弦数无力，或咳嗽，或自汗，或阴虚作热。

15128 澄清饮

【方源】《得效》卷十一。

【组成】白矾二钱半 南星 半夏 蚌粉 知母 贝母 甘草各五钱 人参三钱

【用法】上为散。每服二钱，加生姜二片，乌梅半个，水煎，澄清。徐徐吸服。

【主治】痰壅咳嗽不止；亦治小儿因饮乳逆气，触于肺经作嗽久不止。

15129 澄清散

【方源】《回春》卷七。

【组成】白术 茯苓 白芍（炒） 黄连（姜汁炒） 泽泻 山楂（去子）各一钱 青皮四分 甘草（生）二分

【用法】上锉。水煎，空心服。

【主治】小儿大便白，小便浊，或澄之如米泔。

15130 鹤顶丹

【方源】《局方》卷十：

【组成】 麝香（研）二两半　朱砂（研，飞）一百两　牙消（枯研）一百二十五两　寒水石粉一百一十两　甘草（炒，为末）三十五两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，每一两二钱作十丸。大人每服一丸，以温生姜水化下。如治中暑，加生龙脑少许，同研细，以新水化下；小儿一丸分四次服，更量大小加减。小儿脏腑积热，心神不宁，夜卧狂叫，口舌生疮者，食后用薄荷自然汁化下。

【主治】 风壅痰实，咽膈不利，口干烦渴，睡卧不安；中暑头痛，躁渴不解。

15131　鹤虱丸

【方源】 《直指》卷二十一。

【组成】 猪牙皂角三钱　川椒一钱半　生明矾　鹤虱各一钱

【用法】 上为末，饭为丸，如麻子大。纳于虫牙孔中，有痰吐之。

【主治】 虫蚀齿痛。

15132　熨背散

【方源】 《千金》卷十三。

【组成】 乌头　细辛　附子　羌活　蜀椒　桂心各五两　芎䓖一两六铢

【用法】 上药治下筛。帛裹，微火炙令暖，以熨背上，至愈乃止。

【主治】 胸痹，胸背疼痛而闷。

【宜忌】 慎生冷。

【方论选录】 《千金方衍义》：背者，胸之腑，乌、附、蜀椒内服则温经络，外熨则通腠理，佐以辛、桂、芎䓖开导血气；羌活专行脊脉以予邪之出路，变乌头丸为熨法也。

15133　橘叶汤

【方源】 《奇效良方》卷六十一。

【组成】 臭橘叶

【用法】 煎汤连服。

【主治】 咽喉间生肉，层层相叠，渐渐肿起，不痛，多日乃有窍子，臭气自出，遂退饮食。

15134　橘叶散

【方源】 《医学正传》卷六引丹溪方。

【组成】 青皮　石膏　甘草节各五分　瓜蒌子一钱　当归头五分　皂角刺一钱半（去尖，略炒出汗）　金钱花五分　没药　蒲公英各五分

【用法】 上细切，作一服。加青橘叶一小握，以酒一盏半，煎至一盏，食后或临卧时服。

【主治】 妇人百不如意，久积忧郁，乳房内有核如鳖棋子。

15135　橘叶散

【方源】 《外科正宗》卷三。

【组成】 柴胡　陈皮　川芎　山栀　青皮　石膏　黄芩　连翘各一钱　甘草五分　橘叶二十片

【用法】 水二茶盅，煎八分，食远服。

【主治】 妇人有孕胎热为内吹，有儿吃乳为外吹，致乳结成肿痛，寒热交作，甚者恶心呕吐。

15136　橘皮汤

【方源】 《金匮》卷中。

【异名】 生姜橘皮汤（《活人书》卷十六）、小橘皮汤（《伤寒总病论》卷三）、小陈皮汤（《普济方》卷一八四）。

【组成】 橘皮四两　生姜半斤

【用法】 以水七升，煮取三升，温服一升，下咽即愈。

【功用】 《景岳全书》：行滞消痰，止呕吐。

【主治】 干呕哕，若手足厥者。

【方论选录】 ①《千金方衍义》：橘皮汤主呕哕厥冷良，由浊痰阻遏清阳，不得旁达四末。但须橘皮、生姜涤除痰垢，不得妄议温经也。②《金匮要略心典》：干呕哕非反胃，手足厥非无阳，胃不和，则气不至于四肢也。橘皮和胃气，生姜散逆气，气行胃和，呕哕与厥自已，未可便认阳虚而遽投温补也。

【备考】 本方方名，《赤水玄珠》引作"陈皮汤"。

15137　橘皮汤

【方源】 《千金》卷二。

【组成】 橘皮　竹茹　人参　白术各十八铢　生姜一两　厚朴十二铢

【用法】 上㕮咀。以水七升，煮取二升半，分三次服。不愈，重作。

【主治】 妊娠呕吐，不下食。

【方论选录】 《济阴纲目》：此方竹茹能平少火，厚朴能下逆气，橘皮、生姜所以开胃，人参、白术所以益脾。开胃益脾，欲其安谷云尔。

15138　橘皮汤

【方源】 《千金》卷十七。

【组成】 橘皮　麻黄各三两　干紫苏　柴胡各二两　宿姜　杏仁各四两　石膏八两

【用法】 上㕮咀。以水九升，煮麻黄两沸，去沫，下诸药，煮取三升，去滓，分三次服。不愈，与两剂。

【主治】 肺热气上，咳息奔喘。

【方论选录】 《千金方衍义》：肺满上气喘咳，当用麻黄、越婢、麻杏甘石等方，虑其甘草、大枣助

满，故易橘皮、紫苏以散上奔之气。胆欲大而心欲小之作用略见一斑。

15139 橘皮汤

【方源】《丹溪心法附余》卷八。

【组成】香附米（炒） 半夏 橘皮各二两 甘草七钱半

【用法】上㕮咀。水二盏，加生姜五片，大枣二枚，煎至一盏，通口服。

【主治】七情所伤，中脘不快，腹胁胀满。

15140 橘皮散

【方源】《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。

【组成】陈橘皮半两（去穰） 人参半两 生姜一分

【用法】上锉细。用水一大盏，煎至五分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】胃虚呕哕不止。

15141 橘皮粥

【方源】《药粥疗法》引《饮食辨录》。

【组成】橘皮10～20克（鲜者30克） 粳米1～2两

【用法】先把橘皮煎取药汁，去滓，然后加入粳米煮粥。或将橘皮晒干，研为细末，每次用3～5克，调入已煮沸的稀粥中，再同煮为粥。一般2～3天为一疗程。

【功用】顺气，健胃，化痰，止咳。

【主治】脾胃气滞，脘腹胀满，消化不良，食欲不振，恶心呕吐，咳嗽多痰，胸膈满闷。

【宜忌】本方适用于痰多咳嗽，对阴虚燥咳，或干咳无痰的病人不宜选用，吐血患者忌服。

15142 橘杏汤

【方源】《医宗必读》卷九。

【组成】杏仁（汤泡，去皮尖，炒黄）五钱 橘红（去白，净）二钱半

【用法】水一钟，加生姜三片，水煎七分服。

【主治】脉浮，气秘。

【加减】若脉沉为血秘，以桃仁代杏仁。

15143 橘苏散

【方源】《医方类聚》卷一一七引《济生》。

【异名】杏苏汤（《得效》卷五）、橘苏汤（《赤水玄珠》卷七）、橘苏饮（《杏苑》卷五）。

【组成】橘红 紫苏叶各一两 杏仁（去皮） 桑白皮（炙） 半夏（洗七次） 贝母（去心） 白术 五味子各二两 甘草（炙）五分

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏，加生姜五片，煎至七分，温服，不拘时候。

【主治】伤寒咳嗽，身热有汗，恶风，脉浮数，有热，服杏子汤不得者。

15144 橘核丸

【方源】《济生》卷三。

【异名】橘核疝气丸（《全国中药成药处方集》抚顺方）。

【组成】橘核（炒） 海藻（洗） 昆布（洗） 海带（洗） 川楝子（去肉，炒） 桃仁（麸炒）各一两 厚朴（去皮，姜汁炒） 木通 枳实（麸炒） 延胡索（炒，去皮） 桂心（不见火） 木香（不见火）各半两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐酒汤任下。

【功用】行气血，祛寒湿，止疼痛，软坚散结。

【主治】四种癞病，卵核肿胀，偏有大小，或坚硬如石，或引脐腹绞痛，其则肤囊肿胀，或成疮毒；轻则时出黄水，甚则成痈溃烂。

【加减】虚寒甚者，加炮川乌一两；坚胀久不消者，加硇砂二钱，醋煮旋入。

【方论选录】①《医方集解》：此足厥阴药也。橘核、木香能入厥阴气分而行气；桃仁、延胡能入厥阴血分而活血；川楝、木通能导小肠膀胱之热，由小便下行，所以去湿；官桂能平肝暖肾，补肾命之火，所以祛寒；厚朴、枳实，并能行结水而破宿血；昆布、藻、带，咸润下而软坚，寒行水以泄热，同为散肿消坚之剂也。②《中医大辞典·方剂分册》：方中橘核善于行气治疝，为君药；木香、川楝子行气止痛；桃仁、延胡索活血散结，同为臣药；桂心温肝肾以散寒邪；枳实、厚朴破气分积滞；海藻、昆布、海带咸润软坚散结；木通通利下焦湿邪，共为佐药。各药合用，可直达厥阴肝经，共奏行气血、祛寒湿、止疼痛、软坚散结之功。

15145 橘核丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】橘核子（盐酒炒）二两 川楝子（煨，去肉） 山楂子（炒） 香附（姜汁浸，炒）各一两五钱 荔枝核（煨，研） 小茴香（微炒）各一两

【用法】神曲四两，煮糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，淡盐水送下。

【主治】癥瘕痃癖，小肠膀胱气等。

【加减】寒甚，加附子五钱，肉桂三钱，当归一两。

15146 橘核散

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】 橘核 桃仁 栀子仁 川乌（细切，炒） 吴茱萸

【用法】 上为末。水煎服。

【主治】 诸疝。

【方论选录】 用栀子仁以除湿热，用乌头以散寒郁，况二药皆下焦之药，而乌头又为栀子所引，其性急速，不容胃中留也。

15147 橘叶栝楼散

【方源】《医宗金鉴》卷六十六。

【异名】 橘叶栝楼汤(《性病》)。

【组成】 橘叶二十个 栝楼（量证用）半个或一个 川芎 黄芩 栀子（生研） 连翘（去心） 石膏（煅） 柴胡 陈皮 青皮各一钱 甘草（生）五分

【用法】 水二钟，煎八分，食远服，滓再煎服。

【主治】 吹乳。

【加减】 紫肿焮痛，用石膏；红肿者去之。

15148 橘半枳术丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 橘皮 半夏 枳实各一两 白术二两

【用法】 上为末，荷叶煨饭为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，橘皮煎汤送下。

【主治】 饮食伤脾，停积痰饮，心胸痞闷等。

【加减】 如食不消者，加神曲、麦芽；气逆，加木香、白豆蔻；胃脘痛，加草豆蔻；气升，加沉香。

15149 橘皮干姜汤

【方源】《活人书》卷十八。

【组成】 橘皮 通草 干姜（炮） 桂心各二两 人参一两 甘草（炙）二两

【用法】 上锉，如麻豆大。每服四钱，水一盏，煎至六分，去滓温服，一日三次。

【主治】 ①《活人书》：哕。②《普济方》：胃中有寒咳逆。

15150 橘皮半夏汤

【方源】《局方》卷四（吴直阁增诸家名方）。

【组成】 陈皮（去白） 半夏（煮）各七两

【用法】 上为粗散。每服三钱，加生姜十片，水二盏，煎至一中盏，去滓温服，不拘时候。留二服滓并作一服，再煎服。

【主治】 肺胃虚弱，好食酸冷，寒痰停积，呕逆恶心，涎唾稠粘；或积吐，粥药不下，手足逆冷，目眩身重；又治伤寒时气，欲吐不吐，欲呕不呕，昏懵闷乱；或饮酒过多，中寒停饮，喉中涎声，干哕不止。

15151 橘皮竹茹汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】 竹茹汤(《医学入门》卷七)、陈皮汤(《医学纲目》卷十六)、竹茹橘皮汤(《中国医学大辞典》)。

【组成】 橘皮二斤 竹茹二升 大枣三十枚 生姜半斤 甘草五两 人参一两

【用法】 以水一斗，煮取三升，温服一升，一日三次。

【主治】 伤寒病后虚羸，哕逆不已；或吐利后，胃虚膈热呃逆；或产后呃逆；或四时伤风咳逆。

①《金匮》：哕逆。②《景岳全书》：吐利后，胃虚膈热呃逆。③《女科指掌》：产后呃逆。④《医学入门》：四时伤风冷湿，鼻塞喉鸣，上气不得下气而咳嗽。⑤《玉案》：大病后，中气不足，呃逆不已，脉来虚细。

【方论选录】 ①《医方考》：橘皮平其气，竹茹清其热，甘草和其逆，人参补其虚，生姜正其胃，大枣益其脾。②《成方切用》：此胃虚而冲逆为哕，然非真元衰弱之比，故以参、甘培胃中元气，而以橘皮、竹茹，一寒一温，下其上逆之气，以姜、枣宣其上焦，使胸中之阳渐畅而下达，谓上焦因受气于中焦，而中焦亦禀承于上焦，上焦既宣，则中气自调也。

【临证举例】 呃逆 《福建中医药》（1964；5：42）：林某，男，34 岁。呃逆已十余年，时好时坏，经常发作，曾经治疗无效。此次发作加剧，呃逆频发，恶心吐涎，口渴，上腹部疼痛，大便秘结，小溲短赤，脉弦，舌质红苔黄浊。西医诊断为神经性呃逆，中医诊为木土不和，肝阳有余，胃阴不足，肝胃火逆而致呃。以橘皮竹茹汤加减：橘皮 4.5 克，竹茹 9 克，玉竹 9 克，麦冬 6 克，炙草 3 克，石斛 9 克，大枣 3 枚，生姜 3 片，柿蒂 4.5 克。二诊，呃逆已减，晚能入眠，胸前痞闷。前方去大枣、柿蒂，加生栀子、豆豉除胸脘痞闷，蔻仁宽中理气，连翘清热散结。三诊，呃逆已止，诸症亦瘥，惟心中灼热，脉稍转缓，舌苔微黄。前方倍石斛以养胃阴，加知母滋阴清热泻火。连服三剂，痊愈出院。四个月后追访未再发作。

【备考】 本方方名，《医学纲目》引作“陈皮竹茹汤”。

15152 橘皮竹茹汤

【方源】《活人书》卷十六。

【组成】 橘皮二两 竹茹一升 甘草二两（炙）

人参半两　半夏一两（汤洗）

【用法】 上锉如麻豆大。每服五钱，加生姜六片，大枣一枚，以水二大盏，煎至一盏，去滓温服，一日三次。

【主治】 哕逆，呃逆，妊娠恶阻。

①《活人书》：哕逆。②《笔花医镜》：气郁火冲呃逆。③《女科指掌》：妊娠恶阻。

15153　橘皮竹茹汤

【方源】 《济生》卷二。

【异名】 麦门冬竹茹汤（《医统》卷二十七）。

【组成】 赤茯苓（去皮）　橘皮（去白）　枇杷叶（拭去毛）　麦门冬（去心）　青竹茹　半夏（汤洗七次）各一两　人参　甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《济生》：胃热多渴，呕哕不食。②《痢疟纂要》：体强新病，未经苦寒攻下，或误投热药滞药，脉见洪数滑实，呃逆声重相连者。

【方论选录】 《医方集解》：此足阳明药也。胃火上冲，肝胆之火助之，肺金之气不得下降，故呕。竹茹、枇杷叶、麦门冬皆能清肺而和胃，肺金清则肝气亦平矣；二陈所以散逆气；赤茯苓所以降心火；生姜呕家之圣药；久病虚羸，故以人参、甘草、大枣扶其胃气也。

15154　橘皮竹茹汤

【方源】 《金鉴》卷六十二。

【组成】 橘红二钱　竹茹三钱　生姜一钱　柿蒂七个　人参一钱　黄连一钱

【用法】 水二钟，煎八分，空心温服。

【主治】 溃疡，胃火上逆气冲，以致时时呃逆，身热烦渴，口干唇焦，此热呃也。

15155　橘皮防己汤

【方源】 《圣济总录》卷八十二。

【组成】 陈橘皮（汤浸，去白，焙）　防己　桑根白皮（锉）各二两　甘草（炙，锉）半两　吴茱萸（汤洗，焙干，炒）　槟榔（锉）各一两　大腹（并子锉）七枚　生姜（锉，炒）三两

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加葱白三茎（切），同煎至八分，去滓，空心、食前温服。

【主治】 脚肿满上气。

15156　橘皮枳术丸

【方源】 《内外伤辨》卷下。

【异名】 橘红枳术丸（《赤水玄珠》卷五）。

【组成】 橘皮　枳实（麸炒，去瓤）各一两　白术二两

【用法】 上为细末，荷叶烧饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，熟水送下。食远服。

【主治】 ①《内外伤辨》：老幼元气虚弱，饮食不消，或脏腑不调，心下痞闷。②《丹溪心法》：食积兼痞。

15157　橘皮枳壳汤

【方源】 《御药院方》卷三。

【组成】 枳壳（麸炒，去瓤）　半夏（不制）各二两　陈皮（不去白）三两　人参一两

【用法】 上各锉碎。每药一两，用泉水一升，生姜片子十余片，同煎至八分一盏，去滓，稍温服。如大便涩，入白蜜少许，食后大剂；如上喘，用东流河水更妙。此是半夏汤古方，上四味用泉水五大升，入白沙蜜四两调匀，用木勺扬药水二百四十遍，煮取一大升，去滓，分作三服，一日常服尽，食后服之。

【主治】 胸膈气痞，气短喘闷，不得升降。

15158　橘皮枳实汤

【方源】 《魏氏家藏方》卷二。

【组成】 橘皮（去白，炒）　枳实（去瓤，麸炒）各半两　人参七钱（去芦）　半夏一两（汤泡七次，焙）　吴茱萸二两（汤泡七次，炒）

【用法】 上㕮咀。每服三大钱，水一盏半，加生姜十片，大枣二个，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 寒痰咳嗽。

15159　橘红半夏汤

【方源】 《济阴纲目》卷十三。

【组成】 橘皮一两　半夏　甘草（炙）各半两　藿香三两

【用法】 上锉。每服五钱，加生姜五片，水煎服。

【主治】 产后胃虚呕逆。

15160　橘杏麻仁丸

【方源】 《直指》卷七。

【异名】 橘皮麻仁丸（《李氏医鉴》卷四）。

【组成】 橘皮（炙）　杏仁（去皮尖）　麻子仁（去壳）各三两　郁李仁（去壳）五钱

【用法】 橘皮为末，三仁俱捣成膏，用大枣去核入石臼内捣和丸，如梧桐子大。每服五六十丸，食前煎枳实汤送下。

【主治】 噎膈，大便燥结。

15161　橘连枳术丸

【方源】 《丹溪心法附余》卷七。

【组成】 白术二两（去梗） 枳实一两（去瓤，麸炒） 陈皮一两 黄连一两（酒浸，炒）

【用法】 上为末，荷叶煮汤，打米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后服。

【功用】 补脾和胃，泻火消痰。

【方论选录】《冯氏锦囊》：易老枳术丸方用白术二两补脾，枳实一两消痞，取其补多消少，至东垣加橘皮一两以和胃，名橘皮枳术丸，则补消相半也。今更用白术二两，枳实一两，陈皮一两，黄连一两，名橘连枳术丸，仍补多消少，又兼清热也。丹溪云：心下痞，须用枳实炒黄连，是也。

15162 橘半桂苓枳姜汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 半夏二两 小枳实一两 橘皮六钱 桂枝一两 茯苓块六钱 生姜六钱

【用法】 甘澜水十碗，煮成四碗，分四次，日三夜一服，以愈为度。

【主治】 饮家阴吹，脉弦而迟者。

15163 橘皮枳实生姜汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 橘皮汤（《圣济总录》卷六十一）、橘皮生姜汤（《三因》卷九）、治中汤（《医部全录》卷一八三）。

【组成】 橘皮一斤 枳实三两 生姜半斤

【用法】 以水五升，煮取二升，分温再服。

【功用】《中国医学大辞典》：行气开郁，和胃化饮。

【主治】 ①《金匮》：胸痹，胸中气塞，短气。②《三因》：胸痞，胸中噫塞，愊愊如满，习习如痒，喉中涩燥，吐沫。

【方论选录】 ①《金匮要略直解》：气塞短气，非辛温之药不足以行之，橘皮、枳实、生姜辛温，同为下气药也。《内经》曰：病有缓急，方有大小。此胸痹之缓者，故用君一臣二之小方也。②《中国医学大辞典》：重用橘皮、生姜之大辛大温者，散胸中之饮邪；枳实之圆转苦辛者，泄胸中之闭塞。③《金匮要略方义》：本方与茯苓杏仁甘草汤均治胸痹胸中气塞短气之证。前者是肺气不利，饮停胸膈，重在停饮，故治宜宣肺化饮，而用茯苓、杏仁；此方主治乃肺胃气滞，气阻饮停，重在气滞，治宜行气开郁。故方中以橘皮为君，行肺胃之气而宣通气机；臣以枳实，行气除满而利五脏；佐以生姜，散结气而降逆化饮。三者相合，行气开郁，和胃化饮，使气行痹散，胃气因和，而胸脘气塞之症自除。

【临证举例】 咳嗽 《中医杂志》（1964；6:22）：何某，男，34岁。咳嗽已五年，久治未愈。西医认为支气管炎，屡用棕色合剂、青霉素等药；中医认为“久嗽”常用半夏露、麦金杏仁糖浆等，皆不效。细询咳虽久而不剧，痰亦不多，其主要症状为入夜胸中似有气上冲至咽喉，呼吸作声，短气，胃脘胸胁及背部均隐隐作痛，畏寒，纳减，脉迟而细，苔薄白。颇似《金匮》胸痹胸中气塞短气症。乃以橘枳生姜汤加味治之。处方：橘皮12克，麸炒枳实9克，生姜15克，姜半夏12克，茯苓12克服药三剂后，诸症消退，胁背痛亦止。惟胃脘尚有隐痛，再拟原方出入，五年宿疾，基本痊愈。

【备考】 本方方名，《外台》引作“橘皮枳实汤”，《医学纲目》引作“橘枳姜汤”，《准绳·类方》引作“橘枳生姜汤”。

15164 醒风汤

【方源】《易简方》。

【异名】 三倍汤（《普济方》卷一〇四引《十便良方》）、省风汤（《直指》卷二）。

【组成】 南星二钱 防风二钱 甘草一钱

【主治】 中风痰壅，口眼喎斜，半身不遂，头晕目眩。

①《易简方》：卒中风痰壅。②《百一》：男子妇人左瘫右痪，口眼喎斜，中风口噤，全不能语；及半身不遂，手足顽麻，一切风疾，③《朱氏集验方》：诸风痰作，头目眩晕。

【备考】 ①本方方名，《医方类聚》引作“小省风汤”。②《百一》本方用法：为粗末。每服二大钱，水二盏，煎至一中盏，空心温服。

15165 醒风汤

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】 天麻（炮） 防风 人参 白附子（炮） 全蝎（去毒，炒） 僵蚕（去嘴，炒） 天南星 甘草（炙）

【用法】 上㕮咀。加生姜三片，冬瓜仁三十粒，同煎，不拘时候服。

【主治】 小儿吐泻后胃虚生风，手足搐搦惊悸。

15166 醒皮汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】 防风 荆芥 金银花 皂角刺 蛇床子 贯众 芫花 白鲜皮 鹤虱草 苦参各五分

【用法】 用水十碗，煎四碗，去滓，淋洗，俟皮肉和软，用透骨丹搽之，烘之。

【主治】 鹅掌风，并多年顽癣。

15167 醒消丸

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】乳香 没药（各去油）各一两 麝香一钱半 雄精五钱（各研极细） 黄米饭一两

【用法】上捣烂为丸，如莱服子大，晒干忌火烘。每服三钱，陈酒送下。醉，盖取汗，立愈。

【功用】消肿止痛。

【主治】痈肿及翻花起肛，久烂不堪者。

15168 醒脾丸

【方源】《本事》卷十。

【组成】厚朴（去粗皮，姜汁炙） 白术 舶上硫黄 天麻（去芦）各半两 全蝎（去毒） 防风（去叉股） 官桂（去粗皮，不见火）各一分 人参（去芦）五钱

【用法】上为细末，酒浸蒸饼为丸，如鸡头子大。每服一丸，捶碎，温米饮送下。

【主治】小儿慢脾风，因吐利后虚困昏睡，欲生风痫。

15169 醒脾汤

【方源】《宋氏女科》。

【组成】陈皮 厚朴 甘草 神曲 砂仁 枳实 干姜 麦芽 苍术

【用法】用水二钟，加生姜三片，煎服。

【主治】产后停食，胸膈饱闷，身发寒热，不思饮食者。

【加减】如大便泄泻，加白术，茯苓；如大便闭结，加桃仁，枳壳；如小便不通，加大腹皮。

15170 醒脾汤

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】人参 白术（土炒） 茯苓 天麻 半夏（姜制） 橘红 全蝎（去毒） 僵蚕（炒） 甘草（炙） 木香 仓米 胆南星

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】慢惊风，气虚而挟痰者；阴痫之轻者，手足厥冷，偃卧拘急，面色青白，口吐痰沫，声音微小，脉来沉细。

15171 醒脾散

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】全蝎（焙）半钱 白附子（炮） 天麻（焙） 甘草（炙） 人参 白茯苓 石菖蒲（细节者） 木香 石莲肉 白术各一钱

【用法】上为末。每服三字，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】①《直指小儿》：小儿吐泻，脾困不食。②《普济方》：痰作惊风。

【加减】有热者，去木香。

【备考】《幼科折衷》有干姜、半夏；《幼科指掌》有陈皮、藿香、半夏。

15172 醒脾散

【方源】《活幼口议》卷十四。

【异名】吉州醒脾散（《奇效良方》卷六十四）。

【组成】木香（炮）一钱 全蝎（炒）半钱 天麻（炒）一钱 人参一分 白茯苓一钱 白术（炒）一钱 甘草（炙）一钱 白僵蚕（炒）一钱 白附子（炮）一钱

【用法】上为末。每服半钱，大者加服，水少许，加枣子同煎至五七沸，通口服，不拘时候。

【主治】婴孩小儿吐泻不止，痰作惊风，脾困昏沉，默默不食。

15173 醒迷至宝丹

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】胆星三钱 朱砂三钱（水飞为衣） 金箔十张 生枣仁三钱 远志 茯神三钱 柴胡三钱 半夏曲二钱 川贝母二钱 广皮一钱 天花粉三钱 生甘草一钱 木香一钱 砂仁一钱

【用法】上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三四十丸，清晨清汤送下。多服除根。

【主治】痰迷心窍，呆痴狂癫，不论新久。

15174 醒脾升陷汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生箭耆四钱 白术四钱 桑寄生三钱 川续断三钱 萸肉（去净核）四钱 龙骨（煅捣）四钱 牡蛎（煅，捣）四钱 川萆薢二钱 甘草（蜜炙）二钱

【主治】脾气虚极下陷，小便不禁。

【方论选录】方中用黄耆、白术、甘草以升补脾气，即用黄耆同寄生、续断以升补肝气，更用龙骨、牡蛎、萸肉、萆薢以固涩小肠也。又人之胸中大气旺，自能吸摄全身气化，不使下陷，黄耆与寄生并用，又为填补大气之要药也。

15175 醒脾益胃汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】人参 陈皮 茯苓 半夏 山药 白术各一钱 苍术 厚朴 泽泻 麦芽 木香 山楂 苏子 猪苓各五分 老黄米（炒黄）一钱

【用法】水二钟，加生姜三片，灯心二十根，煎八分，食前服。

【主治】溃疡。脾胃虚弱，过分饮食生冷，以致胸膈不宽，四肢面目浮肿，及小水不利。

15176 颠倒散

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】 大黄三钱 滑石三钱 皂角三钱

【用法】 上为末。空心温酒调下。

【主治】 脏毒实热，或大便不通，或小便不通，或大小便俱不通。

【加减】 如大便不通，加大黄三钱；小便不通，加滑石三钱；大小便俱不通，加大黄、滑石各三钱。

15177 颠倒散

【方源】《金鉴》卷六十五。

【异名】 二黄散（原书卷七十）。

【组成】 大黄 硫黄各等分

【用法】 上为细末。以凉水调敷。

【主治】 酒渣，肺风粉刺。

15178 颠倒木金散

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】 木香 郁金

【用法】 上为末。每服二钱，老酒调下。

【主治】 气、血、热饮、老痰之胸痛。

【加减】 虚者，加人参；气郁痛者，以倍木香君之；血郁痛者，以倍郁金君之。

15179 薤白粥

【方源】《医统》卷二十八。

【组成】 薤白十茎 鸡蛋三枚（去黄） 上拣人参一两（水一升，煎三合） 白粟米三合

【用法】 上除人参汤，三味同煮熟搅匀，然后与温热人参汤相和调，顿服，不拘时候，如恶食，即与粟米粥饮渐加糯米和之。

【主治】 翻胃，无问新久冷热。

15180 薯蓣丸

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 大山蓣丸（《局方》卷五）、团参补气丸（《鸡峰》卷九）、山芋丸（《普济方》卷二三一）。

【组成】 薯蓣三十分 当归 桂枝 曲 干地黄 豆黄卷各十分 甘草二十八分 人参七分 芎藭 芍药 白术 麦门冬 杏仁各六分 柴胡 桔梗 茯苓各五分 阿胶七分 干姜三分 白蔹二分 防风六分 大枣一百枚（为膏）

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空腹酒送下，一百丸为剂。

【功用】 ①《局方》：补诸不足，久服养真气，益精补髓，活血驻颜。②《北京市中药成方选集》：调理脾胃，益气和荣。

【主治】 虚劳，气血俱虚，外兼风邪。头晕目眩，倦怠乏力，心悸气短，肌肉消瘦，不思饮食，微有寒热，肢体沉重，骨节痠痛。

①《金匮》：虚劳诸不足，风气百疾。②《局方》：诸虚百损，五劳七伤，肢体沉重，骨节痠疼，心中烦悸，唇口干燥，面体少色，情思不乐，咳嗽喘乏，伤血动气，夜多异梦，盗汗失精，腰背强痛，脐腹弦急，嗜卧少起，喜惊多忘，饮食减少，肌肉瘦瘁，风虚头目眩晕，心神不宁，及病后气不常复，渐成劳损。③《北京市中药成方选集》：气血不足，腰膝痠痛，经闭血块，蒸热作烧。

【方论选录】《金匮要略方论本义》：方中以薯蓣为主，专理脾胃，上损下损至此可以撑持；再以人参、白术、茯苓、干姜、大豆黄卷、大枣、神曲、甘草以除湿益气；以当归、芎藭、芍药、地黄、麦冬、阿胶以养血滋阴；以柴胡、桂枝、防风以升邪散热；以杏仁、桔梗、白蔹以下气开郁；惟恐虚而有热之人，资补之药，上拒不受，故为散其邪热，开其逆郁，而气血平顺，补益得纳，亦至当不易之妙术也。

【备考】 本方方名，《中国医学大辞典》引作“百疾薯蓣丸”。

15181 薯蓣丸

【方源】《外台》卷十七引《古今录验》。

【组成】 干薯蓣二两 苁蓉四两 牛膝二两 菟丝子二两（酒渍） 杜仲二两 赤石脂二两 泽泻二两 干地黄二两 山茱萸二两 茯苓二两 巴戟天二两（去心） 五味子一两半 石膏二两（研） 远志一两（去心） 柏子仁一两 白马茎筋（干之）二两（炙）

【用法】 上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空腹用酒送下，一日二次。

【功用】 补十二经脉，起发阴阳，通内制外，安魂定魄，开三焦，破积聚，厚肠胃，消五脏邪气，除心内伏热，强筋练骨，轻身明目，除风去冷。

【主治】 丈夫五劳七伤，头痛目眩，手足逆冷，或烦热有时，或冷痹骨疼，腰髋不随，食虽多不生肌肉，或少食而胀满，体涩无光泽，阳气衰绝，阴气不行。

【宜忌】 忌大酢、芜荑、蒜，陈臭物。

15182 薯蓣丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】 薯蓣一两 牛膝一两（去心） 远志三分（去心） 人参一两（去芦头） 桔梗三分（去芦头） 天门冬三分（去心，焙） 菖蒲三分 桂心三分 白茯苓一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 枸杞子一两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服

三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【功用】 补心益智，安神强记。

15183 薯蓣丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】 薯蓣一两 酸枣仁一两（微炒） 柏子仁三分 茯神三分 山茱萸三分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，米饮下也行，不拘时候。

【主治】 胆虚冷，精神不守，头目昏眩，恐畏不能独处。

15184 薯蓣汤

【方源】《三因》卷七。

【组成】 薯蓣 人参 麦门冬（去心）各四两 前胡 白芍药 熟地黄各二两 枳壳（麸炒，去瓤） 远志（去心，姜汁制炒）各三分 白茯苓 茯神各一两半 半夏（汤洗去滑）一两一分 甘草半两（炙） 黄耆一两（炙）

【用法】 上锉散。用千里流水一盏半，加生姜七片，秫米一撮，煎七分，去滓，食前服。

【主治】 七情致脏气不行，郁而生涎，结为饮，随气上厥，伏留阳经，心中忪悸，四肢缓弱，翕然面热，头目眩晕，如欲摇动。

15185 薯蓣半夏粥

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生山药一两（轧细） 清半夏一两

【用法】 先将半夏用微温之水淘洗数次，不使分毫有矾味，用做饭小锅（勿用药瓶）煎取清汤约两杯半，去滓，调入山药细末，再煎二三沸，其粥即成。和白沙糖食之。

【主治】 胃气上逆，冲气上冲，以致呕吐不止，闻药气则呕吐益甚，诸药皆不能下咽者。

【加减】 若上焦有热者，以柿霜代沙糖；凉者，用粥送服干姜细末半钱许。

15186 薯蓣芣苢粥

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生山药一两（轧细） 生车前子四钱

【用法】 上同煮，作稠粥服之，一日连服三次。

【功用】 利小便，固大便。

【主治】 阴虚肾燥，小便不利，大便滑泻；兼治虚劳有痰作嗽。

【方论选录】 山药能固大便，而阴虚小便不利者服之，又能利小便；车前子能利小便，而性兼滋阴，可为补肾药之佐使，又能助山药以止大便，况二药皆汁浆稠粘，同作粥服之，大能留恋肠胃，是以效也。治虚劳痰嗽者，车前宜减半，盖用车前者，以其能利水，即能利痰，且性兼滋阴，于阴虚有痰者尤宜，而仍不敢多用者，恐水道过利，亦能伤阴分也。

15187 薯蓣纳气汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生山药一两 大熟地五钱 萸肉（去净核）五钱 柿霜饼四钱（冲服） 生杭芍四钱 牛蒡子（炒，捣）二钱 苏子二钱（炒捣） 甘草二钱（蜜炙） 生龙骨（捣细）五钱

【主治】 阴虚不纳气，作喘逆。

15188 薏仁汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】 薏苡仁12克 茯苓9克 炒枳壳3克 酒黄芩9克 荆芥 防风各1.5克

【功用】 清热、除湿、祛风。

【主治】 脾胃湿热上攻，风邪外袭，眼目沙涩痛痒，羞明流泪，胞睑肿胀，颗粒稠密者。

【方论选录】 方中薏苡仁、茯苓除湿而无伤阴助火之弊；酒黄芩清热燥湿，炒枳壳行气破滞，配薏苡仁，茯苓以除结聚之湿邪，且不伤正；荆芥、防风疏散风邪，防风且有胜湿之功。

15189 薏米粥

【方源】《永乐大典》卷一三八七九引《十便良方》。

【异名】 薏苡仁散（《准绳·类方》卷五引《心印绀珠》）、薏苡粥（《得效》卷三）、薏苡仁粥（《本草纲目》卷二十二）。

【组成】 薏苡仁一升

【用法】 上为末，以水一升，煮三二匙匕，作粥。每日食三二顿。

【功用】 除胸中邪气，利肠胃，消水肿，久服轻身益气。

【主治】 筋骨拘挛，久风湿痹。

15190 薏苡散

【方源】《普济方》卷三七四引《全婴方》。

【组成】 薏苡仁三分 当归 桂心各一两 酸枣仁（去皮，炒） 甘草 防风 秦艽（去苗）各半两

【用法】 上为末。每服三岁一钱，水半盏，煎至三分，去滓服，不拘时候。

【主治】 小儿因肝气不足，内伤风邪，惊风及诸病之后，手挛不展。

15191 薏苡仁汤

【方源】《医方类聚》卷七十七引《济生》。

【异名】 苡仁汤（《杂病源流犀烛》卷二十三）。

【组成】 薏苡仁（炒） 防己 赤小豆（炒） 甘草（炙）各等分

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 风肿在脾，唇口瞤动，或生结核，或为浮肿。

15192 薏苡仁汤

【方源】《奇效良方》卷二。

【异名】 薏苡汤（《医门法律》卷三）。

【组成】 薏苡仁 当归 芍药 麻黄 官桂各一两 甘草（炙） 苍术（米泔浸一宿，去皮，锉，炒）各一两

【用法】 上锉。每服七钱，加生姜三片，水煎服。

【主治】 ①《奇效良方》：中风。手足流注疼痛，麻痹不仁，难以屈伸。②《增补内经拾遗》：寒痹疼痛。

15193 薏苡仁汤

【方源】《外科发挥》卷四。

【异名】 瓜子仁汤（《外科发挥》卷四）、瓜蒌仁汤（《医统》卷八）、瓜蒌子汤（《外科正宗》卷三）、薏苡汤（《金鉴》卷六十七）。

【组成】 薏苡仁 瓜蒌仁各三钱 牡丹皮 桃仁（去皮尖）各二钱

【用法】 作一剂，水二钟，煎八分，空心服。

【主治】 肠痈。腹中疼痛，或胀满不食，小便涩；妇人产后恶露不尽，或经后瘀血作痛，或肠胃停滞，瘀血作痛，或作痈患。

15194 薏苡仁酒

【方源】《医略六书》卷二十四。

【组成】 薏米仁五两（炒） 当归三两 防风一两半 白芍一两半（炒） 防己一两半 海桐皮二两 五加皮二两 杜仲三两 牛膝一两半

【用法】 入红酒一瓮，蒸，窖，空心随量温服。

【主治】 脚气疼痛而肿，脉浮弱者。

【方论选录】 米仁健脾气以泻湿，当归养血脉以荣经，防风散风胜湿，白芍敛阴和营，汉防己泻血分湿热，海桐皮疏气分湿热，牛膝壮筋骨，杜仲强腰脚，五加皮活络舒经以雄脚力。浸以红酒、助行药势，使风散湿消，则营血统运，而经气清和，何脚气痛肿之不痊哉。此养营分解之剂，为风湿脚气痛肿之专方。

15195 薏苡仁散

【方源】《本事》卷三。

【组成】 薏苡仁一两 当归（洗，去芦，薄切，焙干） 小川芎 干姜（炮） 甘草（炙） 官桂（去粗皮，不见火） 川乌（炮，去皮尖） 防风（去叉股） 茵芋（去梗，锉，炒） 人参（去芦） 羌活（去芦） 白术 麻黄（去根节） 独活（黄色如鬼眼者，洗，去芦，焙）各半两

【用法】 上为细末。每服二钱，空心、临卧温酒调下，一日三次。

【主治】 ①《本事》：湿伤肾，肾不养肝，肝自生风，遂成风湿、流注四肢筋骨，或入左肩髃，肌肉疾痛，渐入左指中。②《医学六要·治法汇》：脚气冲心。

【方论选录】《本事方释义》：薏苡仁甘平淡渗，入手、足太阴；当归辛甘微温，入足厥阴；小川芎辛温，入肝、胆；干姜辛温，入手、足太阴；甘草甘平，入脾；官桂辛温，入足厥阴；川乌苦辛大热，入足太阳、少阴；防风辛甘平，入足太阳；茵芋苦辛温，入手、足阳明、太阴；人参甘温，入足阳明；羌活辛甘平，入足太阳，善能行水；白术甘温，入手、足太阴；麻黄辛温，入足太阳之表；独活苦辛甘平，入足少阴、厥阴。引经之药，温酒调送。此三气之邪，流注经络，肌肉筋骨皆受邪困，是肝、脾、肾三脏皆受病，故以甘缓辛温之补药守护中焦，而以渗利行经表散之药驱逐流注之邪，则久郁之病可一旦扫除矣。

15196 薏苡竹叶散

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】 薏苡五钱 竹叶三钱 飞滑石五钱 白蔻仁一钱五分 连翘三钱 茯苓块五钱 白通草一钱五分

【用法】 上为细末。每服五钱，一日三次。

【主治】 湿郁经脉，身热身痛，汗多自利，胸腹白疹，内外合邪。

15197 薏苡附子散

【方源】《金匮》卷上。

【异名】 薏苡散（《圣济总录》卷六十一）。

【组成】 薏苡仁十五两 大附子十枚（炮）

【用法】 上为散。每服方寸匕，一日三次。

【主治】 ①《金匮》：胸痹，缓急者。②《金匮要略方义》：胸痹疼痛，拘急不舒，时缓时急，喜温喜按，口不渴，舌苔白，脉沉紧；寒湿痹证，腰膝重痛，筋脉拘急，屈伸不利，得热则减，遇寒则剧。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：胸痹缓急者，痹之急证也。寒饮上聚心膈，使阳气不达，危急为何如乎？故取薏苡逐水为君，附子之辛热为

佐，驱除寒结，席卷而下，又乌能不胜任而愉快耶。②《成方切用》：胸中与太空相似，天日照临之所，而膻中之宗气，又赖以苞举一身之气者也。今胸中之阳，痹而不舒，其经脉所过，非缓即急，失其常度，总由阳气不运，故致然也。用薏苡仁以舒其经脉，用附子以复其阳，则宗气大转，阴浊不留，胸际旷若太空，所谓化日舒长，曾何缓急之有哉。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“薏苡仁散”。《医学纲目》引作“薏苡仁附子散”，《赤水玄珠》引作“薏苡附子汤”。

15198 薏苡败酱汤

【方源】 方出《千金》卷二十三，名见《张氏医通》卷十四。

【异名】 薏米败酱汤(《集成良方三百种》卷下)。

【组成】 牡丹 甘草 败酱 生姜 茯苓各二两 薏苡仁 桔梗 麦门冬各三两 丹参 芍药各四两 生地黄五两

【用法】 上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三次服，一日三次。

【主治】 肠痈。

15199 薏苡附子败酱散

【方源】 《金匮》卷中。

【异名】 附子汤(《圣济总录》卷一二九)、薏苡附子散(《准绳·疡医》卷二)、败酱散(《校注妇人良方》卷二十四)、薏苡败酱汤(《张氏医通》卷十四)。

【组成】 薏苡仁十分 附子二分 败酱五分

【用法】 上为末。每取方寸匕，以水二升，煎减半，顿服。小便当下。

【功用】 《中医方剂学》：排脓消肿。

【主治】 肠痈之为病，其身甲错，腹皮急，按之濡如肿状，腹无积聚，身无热，脉数，此为肠内有痈脓。

【方论选录】 ①《金匮玉函经二注》：血积于内，然后错甲于外，经所言也。肠痈何故亦然耶？痈成于内，血泣而不流也。惟不流，气亦滞，遂使腹皮如肿，按之仍濡。虽其患在肠胃间，究非腹有积聚也。外无热而见数脉者，其为痈脓在里可知矣。然大肠与肺相表里，府病而或上移于脏，正可虞也。故以保肺而下走者，使不上乘。附子辛散以逐结，败酱苦寒以祛毒而排脓。务令脓化为水，仍从水道而出，将血病解而气亦开，抑何神乎。②《金匮要略心典》：薏苡破毒肿，利肠胃为君；败酱一名苦菜，治暴热火疮，排脓破血为臣；附子则假其辛热以行郁滞之气尔。

【备考】 本方方名，《本草纲目》引作“薏苡仁附子败酱散”，《中国医学大辞典》引作“薏苡败酱散”。

15200 薄肤膏

【方源】 《朱仁康临床经验集》。

【组成】 密陀僧末 620 克 白及末 180 克 轻粉 125 克 枯矾 30 克 凡士林 1870 克

【用法】 先将轻粉研细，至不见星为度，逐次加入密陀僧、白及末，最后加入枯矾研极细，加入凡士林调成油膏。涂擦于皮损上。

【主治】 慢性湿疹，皮损较厚者。

15201 薄荷粥

【方源】 《长寿药粥谱》。

【组成】 新鲜薄荷 30 克（或干薄荷 15 克）

【用法】 煎汤，候冷，以粳米 1～2 两煮粥，待粥将成时，加入冰糖适量及薄荷汤，再煮一二沸即可服。

【功用】 清热解暑，疏散风热，清利咽喉。

【主治】 中老年人风热感冒，头痛目赤，咽喉肿痛，并可作炎夏防暑解热饮料。

【宜忌】 可供夏季午后凉服，秋、冬不宜服；不宜多服久食。

15202 薄荷蜜

【方源】 《三因》卷十六。

【异名】 薄荷煎(《医统》卷六十四)。

【组成】 薄荷自然汁 白蜜各等分。

【用法】 先以生姜片蘸水揩洗竟，敷之。良。

【主治】 舌上生白苔，干涩，语话不真。

15203 薄荷煎丸

【方源】 《局方》卷一。

【组成】 龙脑薄荷（取叶）十斤 防风（去苗）川芎各三十两 桔梗五十两 缩砂仁五两 甘草（炙）四十两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，每两作三十丸。每服一丸，细嚼茶、酒任下。

【功用】 消风热，化痰涎，利咽膈，清头目。

【主治】 遍身麻痹，百节痠疼，头昏目眩，鼻塞脑痛，语言声重，项背拘急，皮肤瘙痒，或生隐疹，及肺热喉腥，脾热口甜，胆热口苦；又治鼻衄唾血，大小便出血，及伤风。

15204 薄荷白檀汤

【方源】 《宣明论》卷三。

【组成】 白檀一两 荆芥穗二两 薄荷叶四两 栝楼根一两 甘草四两（炙） 白芷二两 盐四两

缩砂仁半两

【用法】 上为末。每服一钱，百沸汤，食后临卧、稍热温服。

【功用】 消风化痰，清头目。

【主治】 风壅头目眩，鼻塞、烦闷、精神不爽。

【备考】 本方方名，《普济方》引作“新补薄荷白檀汤”。

15205 燕鼠膏

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】 全蝎（热水浸透，洗三次，晒干，净）二两 白芷 黄连 黄柏 黄芩 当归 山甲各一两 生地 赤芍各五钱 官桂二两 海藻二两五钱（洗三次，晒干） 番木鳖五钱（研碎）

【用法】 用麻油一斤四两，浸药五日，熬焦黑色，去滓，将净油称准，每油二两，用飞净黄丹一两，收滴水不散，先入白占一钱五分，黄占三钱，即下黄丹，再下杭粉一两，用桑枝不住手搅成膏，候冷入水浸三四日，再用文火熔化，再入没药三钱（去油），阿魏三钱，麝香一钱，血竭二钱，朝南燕窝泥五钱，雄黄一钱，朱砂一钱，两头尖七钱，白升丹四钱，上为极细末，入膏内搅极匀。用时隔汤溶化摊贴，勿见火。

【主治】 瘰疬痰核，痈疽发背肿毒。

15206 整骨丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】 白矾十三两（飞过） 黄蜡六两 黄丹 密陀僧（别研） 自然铜（别研为末）各四两 乳香（别研） 朱砂（别研） 没药（别研）各一两 猪脂十二两（腊月者）

【用法】 用银石器或新锅内，先下猪脂熬成汁，去筋膜滓；次下黄蜡候熔，退火，候稍冷，方下密陀僧、黄丹、自然铜末，添慢火熬，以柳木篦子搅，候滴水不散为度，抬下锅子于冷地上，入朱砂、乳香、没药、白矾、更以篦子搅匀为丸，如梧桐子大。每服二十丸，热葱酒送下（葱白切如丝，于热酒中以盏合少时，勿出气）。如昏困不能咽药者，即用葱酒化开灌下。仍将二三丸切开，子纸上以火炙之；如不化，入油少许，随所伤大小，摊成药膏，恐此药不粘，以云母膏涂膏周围贴之，良久麻木变成痒；若骨碎及蹉跌者，并皆平正，不成芦节，其伤破处便生肌肉；多年伤折，每遇阴晦发作疼痛者，亦可服，不拘时候。

【主治】 从高坠下，筋断骨折，内外俱损，疼痛难任，不问轻重。

15207 整痛膏

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】 草乌头（去尖皮，生用） 干姜（生用） 五灵脂（生用）各一两 浮麦（炒焦黑）一分

【用法】 上为细末，每用醋一盏，入药三钱匕，熬成膏。纸上摊药，敷疼处；又取麦麸拌醋，和得所，铫子内炒热，帛裹熨疼处；如患脚气，先烧砖热，将药在脚心贴定熨之。

【功用】 引脚中气，消肿止痛。

【主治】 脚气肿痛，行履无力，及打扑伤折，痛不可忍。

15208 整骨定痛散

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】 天花粉一斤（炒） 甘草二两半（炒） 没药 木香各一两 乳香一两半 陈皮二两半 当归一两半 血竭一两半 大附子一个（炮，去皮脐）

【用法】 上为细末。每服五钱，热酒调下，敷贴亦可。

【功用】 整骨定痛。

15209 赎猪肝丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】 赎猪肝一具可十两者

【用法】 以巴豆五十粒去皮，扎在肝内，米醋三碗，煮肝极烂，去巴豆，入京三棱末和得所，丸如梧桐子大。每服五丸，食前酒送下。

【主治】 积聚癥瘕、痃癖痞。

15210 噤口丹

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】 枇杷叶（蜜炙）十张 缩砂十个（末）

【用法】 熟蜜调，抹口上。

【主治】 噤口痢，呕不纳食；亦治痢吐食。

15211 螃蟹酒

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 蟹壳一个（炙脆）

【用法】 上为末。临睡黄酒冲服。即至重，二服全愈。

【主治】 肿毒初起。

15212 赞育丹

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 熟地八两（蒸捣） 白术（用冬术）八两 当归 枸杞各六两 杜仲（酒炒） 仙茅（酒蒸一日） 巴戟肉（甘草汤炒） 山茱萸 淫羊藿（羊脂拌炒） 肉苁蓉（酒洗，去甲） 韭子（炒黄）各四两 蛇床子（微炒） 附子（制） 肉桂各二两

【用法】 炼蜜为丸服。或加人参、鹿茸亦妙。

【主治】 阳萎精衰，虚寒无子。

15213 赞化血余丹

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 血余八两 熟地八两（蒸捣） 枸杞 当归 鹿角胶（炒珠） 菟丝子（制） 杜仲（盐水炒） 巴戟肉（酒浸，炒干） 小茴香（略炒） 白茯苓（乳拌，蒸熟） 肉苁蓉（酒洗，去鳞甲） 胡桃肉各四两 何首乌（小黑豆拌蒸七次，如无黑豆，或人乳、牛乳拌蒸俱妙）四两 人参（随便用，无亦可）

【用法】 炼蜜为丸。每服二三钱许，食前用滚白汤送下。

【功用】 大补气血，乌须发，壮形体，培元赞育。

【加减】 精滑者，加白术、山药各三两；便溏者，去从蓉，加补骨脂（酒炒）四两；阳虚者，加附子、肉桂。

15214 膨症神效散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】 炒麦芽 槟榔 甘遂各一钱

【用法】 上为细末。每服五分，黄酒冲服，到八十天用猪肝一付，去净白皮，以竹刀切片，放砂锅内焙干为末，开水冲服。到百天吃鲫鱼补养。

【主治】 膨症。

【宜忌】 忌盐、酪百日。

15215 鲛甲散

【方源】《产科发蒙》。

【组成】 穿山甲 皂刺 橘叶 当归 栝楼仁 木通各等分

【用法】 水煎，温服。

【主治】 乳痈。

15216 鲛鲤甲散

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】 鲛鲤甲（烧灰） 一两 瓜蒌一枚（烧灰）

【用法】 上为散。每服二钱匕，空心用葱酒调下，至晚再服。

【主治】 乳痈。结硬疼痛不可忍。

15217 磨云散

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】 荸荠粉二两 老月石六钱（川连汤制） 细芦甘石一两 冰片三钱

【用法】 上药各为极细末。和匀点眼。

【主治】 眼赤星翳。

15218 磨光散

【方源】《种福堂方》卷三。

【组成】 野荸荠粉（洗净去皮，石臼中捣烂，密绢绞汁，如做藕粉法，再用清井水飞，晒干） 芦甘石（用黄连、黄柏、黄芩、甘菊、薄荷煎水煅，再用童便煅一次，将药水飞，晒干） 珍珠（入豆腐内煮过，研细水飞）

【用法】 每荸荠干粉一两，配制过甘石五钱，珠末二钱，各将瓷瓶收贮。临用渐渐配合，加入冰片少许点之。

【功用】《纲目拾遗》：去目星翳肉翳障。

【主治】 ①《种福堂方》：风眼。②《纲目拾遗》：目星翳肉。

15219 磨积丸

【方源】《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】 干漆（炒）一两 京三棱（炮） 青皮（去白）各六两 丁香一两 蓬术半斤

【用法】 上为细末，水糊为丸，如粟米大。每二岁儿，每服五丸，淡姜汤送下，不拘时候。

【主治】 小儿脏腑怯弱，内受积冷，胁肋胀痛，呕吐痰逆，肠鸣泄泻，日夜频并，四肢困倦，面无颜色，肌肉消瘦，不进饮食；及疳气羸瘦，肚大青筋，口干烦渴，小便白浊，食不生肌，或发虚肿，寒热往来，或因食甘肥，虫动作痛，叫哭合眼。

15220 磨积丸

【方源】《瑞竹堂方》卷四。

【组成】 荆三棱 蓬莪术 陈皮（去白） 青皮（去白） 神曲（炒） 麦芽（炒） 川郁金 胡黄连 香附子（炒去毛，与三棱、莪术、陈皮、青皮五味一处，用好米醋煮一昼夜，焙干） 雷丸（白者） 使君子肉（切，焙） 芦荟各等分

【用法】 上为细末，米醋糊为丸，如豌豆大。每服三十丸，糯米汤送下；茶汤亦可。

【主治】 小儿疳积，泄泻。

【加减】 虚弱，加木香；虚极，加癞蛔蛾肉。

15221 磨积药

【方源】《赤水玄珠》卷十三。

【组成】 三棱（醋煮）一钱 青皮 枳实 桃仁 大黄各五钱 桂枝一钱半 海藻（醋煮）三钱

【用法】 神曲糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸。

【主治】 积聚。妇人胁下有块，大如掌，脉涩，时作热，此虚中有气积，服补虚药之后者。

15222 磨脾汤

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】 附子半两 白豆蔻 甘草 诃子 人参

茯苓 草豆蔻各一两 肉豆蔻 木香 麦芽各一两半 曲二两

【用法】 上为细末。每服二钱，入盐白汤点下，不拘时候。

【主治】 脾胃不和，食少倦怠。

15223 磨翳丸

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 木贼 黄连 川芎 谷精草 当归 白芷 赤芍药 蝉蜕 荆芥 防风 羌活 大黄 独活 黄芩 白菊花 生地黄 石膏（煅） 龙退 栀子 青葙子 蚕退 甘草 石决明（煅） 草决明 蔓荆子各等分

【用法】 上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后茶清送下。

【主治】 眼生诸般翳膜。

15224 磨翳水

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生炉甘石一两 硼砂八钱 胆矾二钱 薄荷叶三钱 蝉蜕三钱（带全足，去翅土）

【用法】 上药五味，将前三味药臼捣细，再将薄荷、蝉蜕煎水一大钟，用其水和所捣药末，入药钵内研至极细，将浮水者随水飞出，连水别贮一器，待片时，将浮头清水，仍入钵中，和所余药渣研细，仍随水飞出，如此不计次数，以飞净为度。若飞过者还不甚细，可再研再飞，以极细为度。制好连水贮瓶中，勿令透气。用时将瓶中水药调匀，点眼上，日五六次。

【主治】 目翳遮睛。

【加减】 若目翳甚厚，已成肉螺者，加真藏脑砂二分，另研调和药水中。

15225 磨翳散

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】 生炉甘石三钱 硼砂二钱 黄连一钱 人指甲五分（锅焙脆，无翳者不用）

【用法】 上药先将黄连捣碎，泡碗内，冷时两三日，热时一日，将泡黄连水过罗，约得清水半茶钟，再将余三味捣细，和黄连水入药钵中研之，如研前药之法，以极细为度。研好连水带药，用大盘盛之。白日置阴处晾之，夜则露之。若冬日微晒亦可。若有风尘时，盖以薄纸。俟干，贮瓶中，勿透气。用时凉水调和，点眼上，日三四次。

【主治】 目睛胀疼，或微生云翳，或赤脉络目，或目眦溃烂，或偶因有火视物不真。

【备考】 若有目翳，人乳调和点之；若目翳大而厚者，不可用黄连水研药，宜用蝉蜕（带全足，去翅土）一钱，煎水研之，盖微苦之翳，得清火之药即退；若其翳已遮睛，治以黄连成冰翳，而不能消矣。

15226 磨积三棱丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】 木香 麦芽 京三棱（炮） 广术 枳壳（麸炒） 石三棱（去皮） 杏仁（麸炒）各半两 干漆（炒烟尽）三钱 鸡爪三棱半两 葛根三钱 官桂二钱半 黑牵牛半两（半生半熟） 丁香 槟榔 香附子 青皮（去白）各二钱 缩砂三钱 白牵牛半两（半生半熟） 陈皮（去白）三钱

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后生姜汤送下，温水送下亦得，一日二次。病大者四十日消。

【功用】 常服进饮食。

【主治】 远年近日诸般积聚，癖坎气块，或气积酒积诸般所伤，无问男子妇人老幼并宜服之。

15227 磨障灵光膏

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】 黄连（锉如豆大）一两（童便浸一宿，晒，为末） 黄丹（水飞）三两 当归（取细末）二钱 麝香（另研） 乳香（另研）各五分 轻粉（另研） 硇砂（另研末） 白丁香（取末） 海螵蛸（取末）各一钱 龙脑少许（末） 芦甘石六两（另以黄连一两锉，置水中，烧芦甘石通红淬七次）

【用法】 先用好白沙蜜十两，或银器、砂锅内熬五七沸，以净纸搭去蜡面，除黄丹外，下余药，用柳木搅匀，次下黄丹，再搅，慢火徐徐搅至紫色，却将乳香、麝香、轻粉、硇砂和匀，入上药内，以不粘手为度。急丸如皂角大，以纸裹之。每用一丸，新汲水化开，旋入龙脑少许，时时点翳上。

【主治】 攀睛。阳跻受邪，内眦即生赤脉缕缕，根生瘀肉，瘀肉生黄赤脂，脂横浸黑睛，渐蚀神水，锐眦亦然。

【方论选录】 本方以黄连去邪热，主明目，为君；以黄丹除热除毒，芦甘石疗湿收散为臣；以当归和血脉，麝香、乳香诸香通气，轻粉杀疮，为佐；以硇砂之能消，海螵蛸之磨翳，白丁香之主病不移，龙脑之除赤脉，去外障为使也。

15228 瘰疬丸

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】 牡蛎（煅） 玄参（炒）各五两 土茯苓（炒）二两五钱

【用法】 上为细末，用酒打面糊为丸，如绿豆大。患在上身，每早酒送服二钱五分，晚服二钱；

患在下身，早服二钱，晚服二钱五分。

【功用】 渐消瘰疬。

【主治】 瘰疬。

15229 瘰疬煎

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】 大贝母一钱五分 半夏 当归尾 穿山甲（炒） 白附子 连翘各一钱 桔梗 广皮 枳壳各八分 白僵蚕一钱五分 甘草节五分 白茯苓一钱

【用法】 加灯心十根，水煎服。

【主治】 瘰疬初起。

15230 瘰疬神膏

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】 大当归五两 大穿山甲五两 陈皮三两 肉桂一两 木鳖子肉一两 大蜈蚣十条 象皮一两 黄柏五两 黄芩五两 川连一两 白花蛇一两 祈艾一两 金银花四两

【用法】 香油三斤浸半月，夏五日，春、秋十日，火熬至黑色，去滓，再熬，又下乳香、没药、儿茶、血竭、密陀僧（俱为末），各一两，搅匀，候温，入麝香一钱，搅入水中，去火气，摊贴。甚效。

【主治】 各种瘰疬。

【宜忌】 忌一切发物并房事。

15231 瘰疬酒药

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】 鹤虱草半斤 忍冬藤六两 野蓬蒿四两 野菊花四两 五爪龙三两 马鞭草一两五钱

【用法】 上切碎，用老酒十五斤，将药袋贮悬於酒内，封好罐口，煮三炷香为度，取起，水顿，浸一伏时。初服尽醉出汗为效，以后随便饮之。尽酒一料，病愈不发。

【主治】 久年瘰疬结核，串生满项，顽硬不穿破者。

15232 瘰疬疏肝丸

【方源】《饲鹤亭集方》引缪仲淳方。

【组成】 昆布四两 海石 川贝 牡蛎各二两 天葵子五钱

【用法】 上为细末，夏枯草汤为丸服。

【功用】 解郁结，清血热，涤痰火，消肿毒。

【主治】 忧思郁怒，气积于肝胃两经，而成瘰疬乳岩。

15233 瘿瘤破结散

【方源】《证治宝鉴》卷九。

【组成】 海藻（热水洗净） 昆布（洗净） 海带 海螵蛸 海粉（飞过） 海螺（醋制过） 甘草少

【用法】 炼蜜为丸。噙化。

【主治】 瘿瘤。

【备考】 本方方名，据剂型，当作“瘿瘤破结丸”。

15234 燔葱散

【方源】《局方》卷三（新添诸局经验秘方）。

【组成】 延胡索三两 苍术（米泔浸一宿，去皮） 甘草（炙）各半斤 茯苓（白者，去皮） 蓬莪术 三棱（煨） 青皮（去白）各六两 丁皮 缩砂（去皮） 槟榔各四两 肉桂（去粗皮） 干姜（炮）各二两

【用法】 上为末，每服二钱，水一盏，连根葱白一茎，煎七分，空心、食前稍热服。

【主治】 脾胃虚冷，攻筑心腹，连胁肋刺痛，胸膈痞闷，背膊连项拘急疼痛，不思饮食，时或呕逆，霍乱转筋，腹冷泄泻，膀胱气刺，小肠及外肾肿痛；及治妇人血气攻刺，癥瘕块硬，带下赤白，或发寒热，胎前产后恶血不止，脐腹疼痛；一切虚冷，不思饮食。

15235 燃照汤

【方源】《霍乱论》卷下。

【组成】 草果仁一钱 淡豆豉三钱 炒山栀二钱 省头草一钱五分 制厚朴 醋炒半夏各一钱 酒炒黄芩一钱五分 滑石四钱

【用法】 水煎，凉服。

【主治】 暑秽挟湿，霍乱吐下，脘痞烦渴，外显恶寒肢冷者。

15236 凝石散

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】 寒水石三两（煅成粉） 蛤粉一两

【用法】 上研匀。每用鸡子清入生油调稀，以翎毛搨药扫伤处。

【主治】 汤火所伤，皮肉溃烂，赤焮肿疼，脓水不干，或疮痂未退，肌肤急痛，应诸恶疮，悉能收敛。

15237 凝冰散

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】 绿豆粉 乳香（研）各一两

【用法】 上为散。实人分作四服，虚人分作八服，食后米饮调下。就有核处一边卧，尽剂必愈。

【功用】 大消肿痛。

【主治】 风热毒气，项下结核，及欲作痈疽、疮疖、发背等。

15238 凝真丹

【方源】《简易》引《诜诜书》（见《医方类聚》卷一四九）。

【组成】 益智仁二两

【用法】 治上丹不凝结，用饼饽药，搜面裹煨，令面焦，去面，为细末，每用少许搐鼻中。久用，清涕自止。治中丹不凝结，酸醋浸益智仁三宿，焙干，为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，盐汤送下。治下丹不凝结，以盐水浸益智仁三宿，焙干，为细末，盐煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心盐汤送下，不可用酒服，恐散真气。

【主治】 治丈夫三丹不凝结，致真气不固，精清精滑，饮食不美，四肢怠惰，昏困嗜卧。上丹不凝结，则常多感冒，鼻流清涕，头目昏疼。中丹不凝结，则发热自汗，心悸惊，恍惚健忘，不能饮食。下丹不凝结，则真气不固，梦遗白浊，胸中短气，面黄体虚，形瘦瘁，情思不乐，饮食减少，惊悸恍惚。

15239 凝唾汤

【方源】《千金》卷十九。

【异名】 茯苓汤。

【组成】 茯苓 人参各半两 前胡三两 甘草一两 大枣三十枚 麦门冬五两 干地黄 桂心 芍药各一两

【用法】 上㕮咀。以水九升，煮取三升，分温三服。

【主治】 虚损短气，咽喉凝唾不出，如胶塞喉。

15240 凝露散

【方源】《简明医彀》卷四。

【组成】 白及一两 黄连 黄柏 黄芩 大黄各二两

【用法】 上为末。香油调，鹅毛频搽，水出，干掺，结靥愈。

【主治】 汤泡火烧。

15241 凝神饮子

【方源】《得效》卷九。

【组成】 人参（去芦） 当归（去尾） 白芍药 白茯神 白茯苓 黄耆（去芦） 白术 半夏曲 五味子 熟地黄（洗，酒蒸） 甘草 莲肉（去心） 大麦门冬（去心） 桔梗各等分

【用法】 上为散。每服四钱，水一盏半，加乌梅、红枣各一个，煎服。

【主治】 劳瘵。憎寒发热，口干咽燥，自汗烦郁，咳嗽声重，唾中血丝，瘦剧倦乏。

【加减】 如嗽，加阿胶；虚极胸满者，加木香，（湿纸裹煨），沉香亦可；不思食，加扁豆。

15242 凝鹶通明散

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】 防风一钱半 羌蔚子一钱 人参一钱 茯苓一钱 黑参二钱 桔梗一钱 车前子二钱 柏子仁二钱

【用法】 上为粗末。以水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】 黑水凝翳内障。瞳人微大，瞳内微现青白色，大小眦头涩，眼中见花，黄黑不定，频频下泪。

15243 濒湖白花蛇酒

【方源】《本草纲目》卷四十三。

【组成】 白花蛇一条（取龙头虎口，黑质白花，尾有佛指甲，目光不陷者为真，以酒洗润透，去骨刺，取肉四两） 真羌活二两 当归身二两 真天麻二两 真秦艽二两 五加皮二两 防风一两

【用法】 各锉匀，以生绢袋盛之，入金华酒坛内，悬起，安置入糯米生酒醅五壶侵袋，箬叶密封，安坛于大锅内，水煮一日取起，埋阴地七日取出。每饮一二杯。仍以滓晒干，碾米酒糊丸，如梧桐子大。每服五十丸，用煮酒送下。

【主治】 中风伤酒，半身不遂，口眼㖞斜，肤肉瘈瘲，骨节疼痛；及年久疥癣，恶疮风癞。

【宜忌】 忌见风犯欲及鱼羊鹅面发风之物。

15244 糖贝饮

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】 贝母 冰糖各二两

【用法】 每早用三钱，白滚汤调鸡子清一个同服。

【主治】 劳嗽。

15245 糖煎散

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】 当归 赤芍 芎藭 防风 防己 甘草 荆芥 龙胆草 大黄 山乌豆

【用法】 上为细末。每服四钱，砂糖一块，白水煎服。

【主治】 飞尘入眼外障。

15246 避瘟丹

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】 乳香一两 苍术一两 细辛一两 甘松一两 川芎一两 真降香一两

【用法】 上为末，枣肉为丸，如芡实大，烧之。

【功用】 瘟疫不能传染。

15247 檀香汤

【方源】《局方》卷十（宝庆新增方）。

【组成】 川芎（不见火） 白芷（不见火）各二两 桔梗（焙）三十两 檀香（不见火）三两 甘草（炒）六两

【用法】 上为细末。每服一钱，入盐少许，沸汤点服。

【功用】 调中顺气，安神定志，清爽头目。

【主治】 精神不爽，头目昏眩，心忪烦躁，志意不定。

15248 檀香散

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】 白檀香（锉）半两 甘菊花（择）三两 芎藭二两 甘草（生用）一两

【用法】 上为散。每服一钱匕，温薄荷汤调下；茶清或沸汤调亦得。

【主治】 头面风。头目昏眩，肩背疼痛，头皮肿痒、头项拘急。

15249 藿苓汤

【方源】《保命歌括》卷三。

【组成】 香藿饮合五苓散

【用法】 水煎服。

【主治】 ①《保命歌括》：暑令泄泻，呕吐，烦渴饮水。②《幼幼集成》：小儿阳暑脉虚。

【备考】《幼幼集成》本方用法：加生姜一片，大枣一枚，灯心十茎为引，水煎服。

15250 藿藿汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】 香藿散合藿香正气散

【主治】 夏月感冒暑邪。

【备考】《医部全录》本方用法：上㕮咀，加生姜、大枣，水煎服。

15251 藁本散

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】 藁本 沉香 细辛 丁香各半分 凝水石各一两

【用法】 上为散。每早晨临卧时揩齿，令白洁。

【主治】 齿黄黑。

15252 藁本散

【方源】《证治宝鉴》卷一。

【组成】 藁本 白芷 川乌 草乌 木鳖子

【用法】 上为末。鳝鱼血调匀，涂面。

【主治】 口眼㖞斜。

15253 藁本细辛散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】 藁本 细辛 川芎 牡丹皮 人参 白术 当归 白芷 白茯苓 甘草 白芍药各等分

【用法】 上为末。每服一钱，温酒调下；米饮亦得。

【主治】 妇人因产，血不足，风邪客于皮肤，以手搔之随生隐疹。

15254 霜盐散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】 百草霜 青盐各等分

【用法】 上为末。井水调涂舌上。

【主治】 舌忽肿硬塞闷。

15255 擦牙散

【方源】《医便》卷五。

【组成】 细辛 石膏 故纸 熟地黄 地骨皮各一两六钱 龙骨二两 防风 旱莲草 青盐 当归 猪牙皂各一两 川椒 白芷各六钱 没石子一对 香附子六钱

【主治】 牙床肿痛，因食辛热之物所致。

15256 擦牙散

【方源】《广笔记》卷三。

【组成】 石膏半斤（火煨熟） 白蒺藜（去刺）四两

【用法】 上为极细末。每日擦牙漱口，牙痛时频频擦之。立愈。

【主治】 牙痛。

15257 擦面神丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】 野大黄四两（取汁） 穿山甲十片（烧存性） 川椒末五钱 生姜三两（取汁）

【用法】 上为末。生绢包擦。如干，入醋润湿，数次如初。

【主治】 火热所滞，面上紫块，如钱大，或满面俱有。

15258 擦牙固齿散

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷六。

【组成】 生软石膏五钱 骨碎补六钱（去毛，蜜水拌，微火焙） 青盐六钱 槐花五钱 寒水石五钱 没食子五钱（酒煮，火烘）

【用法】 为细末。每日擦牙。

【功用】 固齿。

15259 螵蛸丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】 桑螵蛸（炒）半两 菖蒲三分 山茱萸（微炒）半两 磁石（煅，醋淬，研）半两 附子（炮裂，去皮脐）三枚 续断三分 五味子 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，炙） 山芋 当归（切，焙） 沉香各半两 茴香子（炒）一分

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下；荆芥盐汤亦得。

【主治】 肾虚，耳聋胀满，腰脊强直，小便黄赤。

15260 螵蛸丸

【方源】《类证治裁》卷七。

【组成】 桑螵蛸（炙）三十个 鹿茸（酥炙） 炙黄耆各三两 煅牡蛎 赤石脂 人参各二两

【用法】 上为末，山药糊为丸。盐汤送下。

【主治】 下元虚冷，睡中自遗。

15261 螵蛸散

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】 桑螵蛸（十二月者，炙黄）

【用法】 上为散。每服半钱匕，莱菔汁调下。

【主治】 木舌肿强。

15262 螵蛸散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 海螵蛸（不必浸淡） 人中白（或人中黄，硼砂亦可）各等分

【用法】 上为细末。先以百草多煎浓汤，乘热熏洗后，以此药掺之；如干者，以麻油或熬熟猪油、或蜜水调敷之。

【主治】 湿热破烂、毒水淋漓等疮，或下部紧囊、足股肿痛、下疳诸疮。

【加减】 若肿而痛甚者，加冰片少许更妙；若湿疮脓水甚者，加密陀僧等分，或煅过官粉亦可，或煅制炉甘石更佳。

15263 螵蛸散

【方源】《医级》卷九。

【组成】 海螵蛸一两 枯矾 雄黄各三钱

【用法】 上为末。油调搽。

【主治】 阴疮。

15264 螵蛸一字散

【方源】《医方类聚》卷二十四引《施圆端效方》。

【组成】 草乌（生，去皮脐） 麻黄（去根节） 雄黄 明鳔（炮，存性） 白附子 防风各二钱 桑螵蛸一钱

【用法】 上为细末。每服一字，温酒调下，食后服，一日二三次。

【主治】 破伤风。

15265 螵灰散

【方源】《奇效良方》卷五十四。

【组成】 大田螺（连壳，烧存性）

【用法】 上为细末。破者干贴，未破者香油调敷。

【主治】 瘰疬。

15266 螵青散

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】 五倍子（去蛀末，拣净）不拘多少 螵儿青十分（五倍子一分）

【组成】 上为细末。白口疮，先以盐汁漱了，敷药；赤口疮，先以淡醋汤漱了，敷药。

【主治】 口疮。

15267 蹈胸汤

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】 枳实（去瓤，麸炒） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 桔梗（炒）各半两 甘草（炙）一分

【用法】 上为粗末。每服五钱匕，水二盏，加生姜半分、薤白少许，同煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 肝著。风寒客于肝经，膈脘痞塞，胁下拘痛，常欲蹈其胸上者。

15268 魏灵丹

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】 真阿魏 五灵脂各等分

【用法】 上为细末，用黄狗胆汁为丸，如绿豆大。每服五七丸，小儿三丸，白滚汤送下；有痰，生姜汤送下。

【主治】 噎食、转食、痞疾，中满中窄，贲豚伏梁，肥气癥瘕。

【宜忌】 忌生冷、葱、蒜、鱼、面。

15269 魏香散

【方源】《阎氏小儿方论》。

【异名】 魏术散（《医学入门》卷六）、魏莪散（《嵩崖尊生》卷十五）。

【组成】 蓬莪术半两 真阿魏一钱

【用法】 先用温水化阿魏，浸蓬莪术一昼夜，焙干，为细末。每服一字或半钱，煎紫苏米饮，空心调下。

【主治】 小儿盘肠、内吊，腹中极痛，干啼后便。

15270 黛柏散

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】 青黛3克 黄柏6克 冰片3克

【用法】 上为细末。用花生油调敷。

【功用】 消炎杀菌，除湿止痒。

【主治】 急性渗出性皮炎、脓疱疮等。

15271 黛蝎煎

【方源】《医级》卷八。

【组成】 青黛一钱 钩藤 荆芥 赤芍 连翘各一钱半 羚羊角 甘草各八分 山栀 木通各一钱 全蝎二个

【用法】 水煎服。

【主治】 肝经风热，挛搐惊悸，及郁火疹斑、疝瘕、疮症、厥阴风火之候。

15272 黛鹅黄散

【方源】《药奁启秘》。

【组成】 青黛二钱 黄柏二钱 熟石膏二两 六一散二两四钱

【用法】 上为末。麻油调敷。

【主治】 湿疮作痛。

15273 黛连芦荟丸

【方源】《袖珍小儿》卷五。

【组成】 胡黄连 芦荟五钱 神曲一两（炒） 阿魏 麝香少许（另研） 青黛一钱（另研） 黄连五钱（炒） 使君子五钱（去壳）

【用法】 上为末，稀糊为丸，如黍米大。清汤送下。

【主治】 小儿疳积。

15274 臁胀串

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】 三棱 莪术 苍术 青皮 陈皮各三钱 商陆二钱 泽泻 甘遂 木通 赤茯苓各二钱 胡椒二两 黑丑头末二两 桑皮五钱

【用法】 上为末，醋糊为丸，如绿豆大。每服十五丸至二十丸，要在五更服。二三夜三服，第一服，葱汤下；第二服，陈皮、桑皮汤下；第三服，射干汤下或姜汤下。

【主治】 水肿。

15275 臁症神效散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】 炒麦芽 槟榔 甘遂各一钱

【用法】 上为细末。每服五分，黄酒冲服。到八十天买猪肝一付，去净白皮，以竹刀切片，放沙锅内焙干，为细末，开水冲服；至一百天吃鲫鱼补之，而调料不忌矣。

【主治】 水肿胀满。

【宜忌】 忌盐、醋百日。

15276 臁疮膏

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】 轻粉 赤石脂 黄丹 甘草 黄柏（去粗皮，切，为末） 火龙丹（即煤炉口上烧红土，或用伏龙肝即灶心红土亦可）各等分

【用法】 先将五味研为极细末，后下轻粉，用真香油调匀，再用油单纸夹住，勿令药侵疮。贴上，绢带系住，一日三番，拭去疮上血沫。

【主治】 臁疮。

15277 臁疮膏

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】 白蜡一两 松香一两 铜绿五分（为末） 猪油二两 乳香一钱 轻粉一钱（为末）

【用法】 先将猪油熬去筋，入松香、乳香捣为膏，隔纸。药先将油纸照疮口略大，以针刺数百孔后，摊膏药，将纸背贴在疮口上，其疮先用葱一株，煎汤洗净脓血后，贴膏，一日换一个。

【主治】 内外臁疮。

15278 臁疮隔纸膏

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】 臁疮夹纸膏（《青囊秘传》）。

【组成】 黄占五两 飞丹 铅粉各四两 轻粉 乳香 没药各二钱 冰片三分 麻油（春、夏二两，秋、冬三两）

【用法】 先将占、油煎五六沸，下乳、没再二三沸，下轻粉，随下丹、粉，槐、柳枝搅十余沸，取起冷定后，下冰片搅匀，瓶盛，浸水中一宿，出火毒。先以苦茶洗疮净，将膏用薄油纸刺孔厚摊，间日翻背面贴之，三日一换，三贴即可愈。

【主治】 臁疮。

15279 蟲斯丸

【方源】《产乳备要》。

【异名】 赐子丸（《产乳备要》）、秦桂丸（《三因》卷十七）、白薇丸（《产乳备要》注引《施圆端效方》）、暖宫丸（《一盘珠》卷六）。

【组成】 附子（生，去皮脐） 白茯苓（去黑皮） 白薇 半夏（汤洗七次） 杜仲（去粗皮） 桂心 秦艽 厚朴（去粗皮）各二钱 防风 干姜（生） 牛膝 沙参各二钱 细辛（去苗）半两 人参四钱

【用法】 上为细末，炼蜜为丸，如小豆大。每日服五十丸，空心任下。如觉无益，稍加丸数为度；如服七日后，阴阳觉有娠，三日后不可更服。

【主治】 妇人无子。

【宜忌】《医学纲目》：忌食牛、马肉。

【方论选录】《中国医学大辞典》：此方削去干姜，易入当归，以和阳药之性，不致阳无以化，且免经水紫黑、胎息不育之虞。其秦艽、朴、夏，专理痰积；沙参、膝、薇，专清浊带，使子宫温和、阳施阴化，孕自成矣。

【临证举例】 不孕 臣妻年二十七岁，无子，服此药有娠；又残药与前太子中舍宇文妻李氏，年四

十岁无子，服此药十二日有娠。

【备考】 按：《医学入门》有香附，无附子。《东医宝鉴·杂病篇》有当归。

15280 螭斯丸

【方源】《广嗣纪要》卷四。

【组成】 当归 牛膝 续断 巴戟 苁蓉 杜仲（姜汁炒） 菟丝（酒蒸） 枸杞子 山萸肉 芡实 山药 柏子仁各一两 熟地黄二两 益智（去壳） 破故纸（黑麻油炒） 五味子各半两

【用法】 上各为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前酒送下。

【主治】 阴痿不起、其精易泄者。

15281 螭斯胜宝丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】 黄耆（蜜炙） 人参（去芦） 白术（去芦） 白茯苓（去皮） 当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 肉桂 大附子（面裹，火煨，去皮） 干姜（炒） 胡椒 小茴香（盐、酒炒） 破故纸（酒炒） 艾叶（醋炒） 乌药（炒）各二两 吴茱萸三两（盐水炒） 香附六两（醋炒） 苍术四两（米泔浸，炒） 甘草（炙）一两

【用法】 上锉作片，用白毛乌骨鸡一只，重一斤半或二斤者，吊死，水泡，去毛、肠屎并头、脚、翼尖不用；将鸡放砂锅里，将前药盖上，入好酒煮烂为度；取去骨，同药在锅焙干，为末，将煮鸡酒汁打稀米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心好酒吞下。

【主治】 妇人经水不调，脐腹冷痛，赤白带下，一切虚寒之疾，久无子嗣。

15282 燮理十全膏

【方源】《重庆堂医学随笔》卷上。

【组成】 人参（潞党参、西洋参酌宜代用） 黄耆（炙）各三两 白术六两 熟地八两 归身 白芍 川芎各二两 甘草一两（炙）

【用法】 上药熬膏，将成，入鹿角胶四两、龟板胶三两收之，盛瓷器内，窨去火气。每服数钱，开水调服。

【功用】 平补阴阳，调和气血。

【方论选录】 古人治无形之劳倦，必培以甘温，入参为君，白术为臣，黄耆为佐，甘草为使，使有形之劳倦，必助以辛温，归、芎是也，资以酸甘，芍、地是也，故以八味为章旨。而驱策以血肉之物，如鹿之动，能通督脉，挺走险阻而不疲，角戴阳而上升，禀乎刚健之用；龟之静，能通任脉，潜藏固蛰，抱阴负阳而善守，腹为阴而下降，禀乎柔顺之体。此二胶者，各禀一德，草木力微，赖之而神其用也。阴阳两虚者，服之无偏胜，无不及。或加陈皮、半夏以利枢机，允为王道之剂。

15283 蜃虫汤

【方源】《圣惠》卷三十六。

【异名】 蜃虫散（《圣济总录》卷一一九）。

【组成】 蜃虫七枚（微炒） 盐一两半

【用法】 上药以水一大盏，同煎五七沸，含冷吐，勿咽，一日三五次愈。

【主治】 舌肿满口，不得语。

15284 蜃虫散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】 蜃虫三十枚（微炒） 虻虫十枚（去翅足，微炒） 水蛭十枚（微炒） 桂心半两 桃仁五十枚（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】 上为粗散。每服三钱，以酒、水各半中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】 打损及伤坠，腹内有瘀血。

15285 麋角丸

【方源】《三因》卷九。

【组成】 麋角一斤（镑，酒浸一宿） 熟地黄四两 大附子（生，去皮脐）一两半

【用法】 用大麦米二升，以一半藉底、一半在上，以二布巾隔覆，炊一日，取出药与麦，别焙干，为末，以浸药酒，添清酒煮麦粉为糊，搜和得所，丸如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒、米汤任下。

【主治】 五痿。皮缓毛焠，血脉枯槁，肌肉薄著，筋骨羸弱，饮食不滋，庶事不兴，四肢无力，爪枯发落，眼昏唇燥，疲惫不能支持。

15286 麋茸丸

【方源】《本事》卷二。

【组成】 麋茸一两（治如鹿茸，无麋茸以鹿茸代） 舶上茴香半两（炒香） 菟丝子（酒浸晒干，用纸条子同碾取末） 一两

【用法】 上为末，以羊肾二对，法酒煮烂，去膜，研如泥，用上药为丸，如梧桐子大，阴干如肾膏，少入酒糊佐之。每服三五十丸，空心温酒、盐汤送下。

【主治】 肾经虚，腰痛不能转侧。

【方论选录】《本事方释义》：麋乃泽兽也，气味甘温，入足少阴；菟丝子气味甘平，入脾肾；舶上茴香气味辛温，入肝肾；羊肉肾气味辛甘温，入足少阴。此虽肾虚腰痛，必有水气阴湿之邪相感而

起，故补肾药中必兼补脾之药。

15287 燥土汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】白术一两 茯苓二两 肉桂二钱 人参二钱 破故纸一钱 山药五钱 芡实五钱 砂仁三粒 益智仁一钱 半夏二钱

【用法】水煎服。

【功用】补肾火。

【主治】脾寒少气身重，口吐清水、清痰。

15288 燥脾丸

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】羌活一两半 防风一两半 苍术一两半（制） 半夏一两半（制） 白芷一两半 陈皮一两半 柴胡八钱 升麻八钱 甘草五钱

【用法】上为末，滚水糊为丸。每服三钱，米饮送下。

【主治】风湿伤脾，两胞弦烂，脉浮缓者。

【方论选录】风湿伤脾，清阳下陷，不能敷化精微，故湿渍两胞，眼弦湿烂。羌活散风胜湿，苍、半燥湿强脾，白芷散阳明之邪，陈皮利太阴之滞，柴胡升少阳清气，升麻升阳明清气，甘草缓中州以和胃气也。使脾胃调和，则清阳上举，而风湿两除，眼胞眩烂无不愈矣。此散风燥湿之剂，为风湿伤脾弦烂之专方。

15289 燥湿汤

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】川黄连（炒）一钱 苍术（泔水制） 白术（土炒） 陈皮各八分 白茯苓 半夏 枳壳 栀仁（炒黑）各七分 细甘草三分

【用法】上锉。白水二钟，煎至八分，去滓热服。

【功用】补肾以泻心。

【主治】大眦之间生一漏，时流血而血色紫晕。

15290 燥痰汤

【方源】《金鉴》卷四十一。

【组成】枯黄芩 旋覆花 海石 天冬 橘红 风化芒消 枳壳 桔梗 贝母 瓜蒌霜

【主治】燥痰。

15291 燥湿化痰丸

【方源】《医统》卷十二。

【异名】愈风燥湿化痰丸（《景岳全书》卷五十四）。

【组成】羌活 独活 防风 防己 川乌 全蝎 南星 半夏 僵蚕（炒） 天麻 陈皮（去白） 猪牙皂角（瓦炒） 当归（酒洗） 生地黄 木香 沉香各五钱 白术（炒） 苍术（米泔水浸） 杜仲（姜汁炒）各二两 巴戟天（炒） 薏苡仁 牛膝（酒洗） 川芎 破故纸（炒）各一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心、食前酒送下，一日一次，食干物压之。

【主治】历节风。湿痰壅滞，昼夜疼痛无休者。

15292 燥湿痰星夏丸

【方源】方出《丹溪心法》卷二，名见《医学正传》卷二。

【组成】南星 半夏各一两 蛤粉二两

【用法】上为末，神曲糊丸，如梧桐子大，青黛为衣。每服五十丸，姜汤送下。

【主治】湿痰；亦治白浊因痰者。

【加减】湿痰，加苍术；食积痰，加神曲、麦芽、山楂；热，加青黛。

15293 濡肠丸

【方源】《普济方》卷一四三。

【组成】威灵仙 黑牵牛各等分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白饮送下。

【主治】少阴病，无热寒强，大便累日不通者。

15294 濡肠汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】熟地 当归各一两 升麻五分 牛膝三钱

【用法】水煎服。

【主治】肾虚大便闭结，口干舌燥，咽喉肿痛，头目昏晕，面红烦躁。

15295 濡脏汤

【方源】《千金》卷十五。

【组成】生葛根二升 猪膏二升 大黄一两

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取五升，去滓，纳膏，煎取三升，澄清。强人顿服，羸人再服。

【主治】大便不通六七日，腹中有燥屎，寒热烦迫，短气，汗出，胀满；亦治大小便不通。

15296 豁痰丸

【方源】《直指》卷七。

【组成】南星三两 半夏二两（各锉作大片，用浓皂角水浸一宿，焙干，为末） 白附子 川灵脂 直僵蚕（炒，去丝） 华阴细辛 白矾（煅枯）一两 全蝎三钱半（焙）

【用法】上为末，皂角浆煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，生姜汤送下。

【主治】①《直指》：顽痰壅盛。②《育婴秘

诀》：咳嗽痰涎壅塞。

15297 豁痰丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】瓜蒌霜五钱　花粉　射干　苦杏仁　茯苓　白前　当归各三钱　知母　川贝　枳壳　桔梗各二钱　生甘草一钱

【用法】加生姜汁少许，和竹沥为丸。每服三四钱。

【功用】轻清润降，搜涤痰涎。

【主治】痰火蕴结胃肠，恶心呕吐，胸膈壅塞，嘈杂脘满，便溏腹泄，或胸中、肠中辘辘有声者。

15298 藕粥

【方源】《老老恒言》卷五。

【组成】藕

【用法】切片，煮粥。

【功用】健脾止泄，开胃消食，散留血；久服令人心欢。

【主治】①《老老恒言》：热渴。②《长寿药粥谱》：年老虚弱，食欲不佳，大便溏薄，热病后口干烦渴。

15299 藕节丸

【方源】《普济方》卷一八八。

【组成】干藕节五两　人参一两半　款冬花　干莲肉　蛤粉各一两　干山药　杏仁各一两半　枣儿（去核皮）半斤

【用法】上为细末，加大萝卜一个，煮烂，和前药为丸，如梧桐子大。每服八十丸，临卧白汤送下。

【主治】伤力吐血。

【宜忌】忌酒。

15300 藕汁饮

【方源】《朱氏集验方》卷七。

【组成】生藕汁　生地黄汁　大蓟汁各三合　生蜜半匙

【用法】将药汁调和合匀。每服一小盏，细细冷呷之，不拘时候。

【主治】吐血、衄血不止。

15301 藕蜜膏

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】藕汁　白蜜各五合　生地汁一升

【用法】上药和匀，微火煎成膏。每服半匙，空心渐渐含化，食后又服。

【主治】小便长涩，痛闷之极。

【宜忌】忌煎炙。

15302 藕节地黄汤

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】藕节炭一两　生地黄六钱　白芍四钱　黄芩四钱　茅根四钱　滑石四钱　薏仁米六钱

【用法】水煎，温服。

【功用】除热滋阴，凉血止血。

【主治】虚弱吐血，忧劳吐血。

【方论选录】此方以藕节炭为君，惟藕节炭乃清凉之品，能祛瘀生新；佐以生地养阴清热，滑石清其结热，黄芩清其血热，茅根凉血，使血不妄行；白芍敛阴，使血能返本；薏仁米舒胃健脾。热减脾强，则血自止矣。

15303 藕汁茯苓饮

【方源】《金匮翼》卷二。

【组成】生藕汁　小蓟根汁　生地黄汁　茯苓　蒲黄（炒黑。后二味各等分）

【用法】上药后二味为末。每服二钱，用三汁调下。

【功用】清热，利瘀血。

【主治】虚人蓄血吐衄，未可下者。

15304 藜芦散

【方源】《景岳全书》卷六十。

【组成】藜芦（为末）

【用法】上为末。塞牙孔中。勿令咽汁，有涎吐之。

【主治】虫牙疼痛。

15305 藜芦软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】藜芦 10 克　硫黄 20 克　凡士林加至 100 克

【用法】外用。

【主治】癣疥。

15306 藤花酒

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】红藤一两许　紫花地丁一两许

【用法】红藤用好酒二碗煎一碗，饮醉卧，午后用紫花地丁一两许，亦以好酒煎服后，痛必渐止，再服。

【主治】肠痈。生于小肚角，微肿而小腹隐痛不止，皮色不变者。

15307 藤花散

【方源】《医方类聚》卷一七七引《施圆端效方》。

【组成】鹭鸶藤（茎叶花附）　黄耆　生甘草　栝楼根各半两

【用法】 上为粗末。每服五钱，酒一盏，同煎至一盏，去滓温服，一日三次，不拘时候。

【主治】 痈疽。

15308 覆杯汤

【方源】《外台》卷一（注文）引《范汪方》。

【组成】 麻黄四两（去节） 甘草（炙） 干姜 桂心 贝母各二两

【用法】 上切。以水八升，煮取二升，分二次服。

【主治】 上气。呼吸牵绳，肩息欲死。

【宜忌】 忌海藻、生菜、菘菜。

【临证举例】 上气 有人先有风患，兼有石热，取冷当风，饮酒，房室体虚，末春因天行病，至夏中愈，尚虚，有风热未除，兼药石势过，伤于胃气，因腹胀坚如石，气息不利，因自下后变四肢肿，游走无定，小便不通，积服利药，忽吐逆不下食，变哕，至掣动百脉，状如嘘唏，积日乃变上气，服此方加杏仁二两，与两剂，上气得止。

15309 覆盆子丸

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】 覆盆子 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 黄耆（炙，锉） 五味子 补骨脂（炒） 乌药 石斛（去根） 泽泻 荜澄茄 沉香（锉） 巴戟天（去心）各一两 熟干地黄（焙）一两半 芎藭 当归（切，焙） 赤芍药 山茱萸各三分 菟丝子（酒浸一日，捣，焙）二两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，食前温酒送下；米饮、盐汤亦得。

【功用】 温顺脏气，补益下经。

【主治】 元脏虚弱，脐腹疞痛，膝胫少力，百节痠疼，昏倦多睡，小便频浊，头眩痰唾，背脊拘急，饮食无味。

15310 礞石丸

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】 青礞石（捣碎）一两 焰消半两（同礞石入甘锅内，用炭火煅令通红，候冷）

【用法】 上为末，雪糕薄糊为丸，如绿豆大。每服二丸，急风，薄荷、荆芥泡汤调下；慢风，慢脾风，用南木香煎汤调下。

【功用】 利痰。

【主治】 急慢脾风。

【方论选录】 礞石、焰消、古文钱辈，虽能利痰，然其性非胃家所好，须以木香佐之。

15311 礞石滚痰丸

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】 明天麻一两（煨） 天竺黄五钱（取嫩） 雄黄三钱 礞石五钱（煨） 胆星一两 巴霜四钱 白附子六钱（泡） 生甘草三钱（去皮） 全蝎五钱（去毒） 防风三钱 麝香二分

【用法】 上为末，用竹沥一钟拌和，再研极细，入瓷瓶内，陈年许，量情而用。

【主治】 痰喘。

15312 蟠桃丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】 沉香三钱 木香三钱 乳香三钱（箬上炙） 没药三钱（炙） 琥珀一钱或五分 白丑八钱（生用头末） 黑丑八钱（用牙皂煎浓汁浸半日，铺锅底焙，一半生，一半熟，取出研末）八钱 槟榔一两（一半生，一半用牙皂煎汁浸透焙熟）

【用法】 上为细末，牙皂水打稀面糊为丸，如梧桐子大。每服二钱七分，五更清晨砂糖煎汤送下。

【主治】 男、妇浑身头面手足浮肿，肚腹胀满疼痛，上气喘急。

15313 蟠桃果

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】 芡实一斤（炒） 莲肉（去心）一斤 胶枣肉一斤 熟地一斤 胡桃肉（去皮）二斤

【用法】 以猪腰六个，掺大茴香蒸极熟，去筋膜，同前药捣成饼。每日服二个，空心、食前用滚白汤或好酒一二钟送下。

【功用】 补脾滋肾。

【主治】 遗精虚弱。

【加减】 凡人参、制附子，俱可随意加用。

15314 蟠葱散

【方源】《局方》卷三（续添诸局经验秘方）。

【组成】 延胡索三两 苍术（米泔浸一宿，去皮） 甘草（炮）各半斤 茯苓（白者，去皮） 莪茂术 三棱（煨） 青皮（去白）各六两 丁皮 缩砂（去皮） 槟榔各四两 肉桂（去粗皮） 干姜（炮）各二两

【用法】 上为末。每服二钱，水一盏，加连根葱白一茎，煎七分，空心、食前稍热服。

【主治】 脾胃虚冷，攻筑心腹，连胁肋刺痛，胸膈痞闷，背膊连项拘急疼痛，不思饮食，时或呕逆，霍乱转筋，腹冷泄泻，膀胱气刺，小肠及外肾肿痛；及妇人血气攻刺，癥瘕块硬，带下赤白，或发寒热，胎前产后恶血不止，脐腹疼痛，一切虚冷，不思饮食。

15315 瞿麦汤

【方源】《外台》卷二引《古今录验》。

【组成】瞿麦三两　甘草三两　滑石四两　葵子二合半　石韦三两（去毛令尽）

【用法】上切。以水八升，煮取二升半，分三服。

【主治】伤寒热甚，小便不利。

【宜忌】忌海藻、菘菜。

15316　瞿麦散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【异名】瞿麦汤（《圣济总录》卷九十八）、木通汤（《普济方》卷二一五）。

【组成】瞿麦一两　葵子半两　木通半两（锉）　冬瓜仁一两半　子芩一两　白茅根一握（锉）　滑石一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加竹叶二七片，煎至六分，去滓，食前温服，以利为度。

【主治】心热，小便卒淋涩赤痛。

15317　瞿麦散

【方源】《普济方》卷二一五。

【组成】瞿麦　滑石　生干地黄　郁金

【用法】上药治下筛。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】血淋及尿血，水道中涩痛，经络腑脏热甚，则血散其常经，而成血淋。

15318　鹭鸶嗽丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】鹭鸶咳丸（《中药制剂手册》）。

【组成】杏仁（去皮尖）二两　牛蒡子（炒）一两　生石膏二两　栀子（炒）二两　天花粉二两　紫苏（炒）二两　甘草四钱　瓜蒌皮二两　麻黄四钱　青黛一两　蛤壳二两　射干一两　白芥子（炒）四钱　细辛二钱（以上十四味，计十八两四钱，共研为细粉，过罗，每十八两四钱细粉总之）　龙延香五分　麝香二分

【用法】上药研细，混合均匀，炼蜜为丸，重四分，金衣三十六开，蜡皮封固。每服一丸，日服二次，温开水或梨汤送下。

【功用】宣解肺热，止嗽化痰。

【主治】小儿咳嗽不已，连作数十声，甚则呛血，音哑，面浮肿。

15319　翻胃平胃散

【方源】《医方类聚》卷一〇四引《必用全书》。

【组成】平胃散每加硇砂　姜

【用法】上为末。沸汤点服。当吐出恶物一块，黑色如石。

【主治】翻胃。

15320　藿连汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】正雅连七分（姜汁炒）　紫厚朴（姜汁炒）　藿香叶各一钱

【用法】加生姜三片，大枣三个，水煎，热服。

【主治】小儿热吐不止。热吐者，面赤唇红，吐次少而出物多，乳片已消，色黄，遍身发热而烦躁。夏月多此证。

15321　藿枇饮

【方源】《准绳·类方》卷五引戴氏方。

【异名】藿脾饮（《法律》卷六）。

【组成】藿香叶　枇杷叶（去毛）　桑白皮　陈皮　干葛　白茯苓　鸡距子各等分

【用法】水煎。下酒煮黄连丸。

【主治】酒疸。

15322　藿苓汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】藿香　白术　厚朴　陈皮　半夏　茯苓　白芷　桔梗　大腹皮　苏叶　甘草　泽泻　猪苓　官桂

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】①《伤寒全生集》：伤寒作泻口渴，小水不利。②《增补内经拾遗》引《医方选要》：霍乱内外两伤，吐泻交作。

【备考】《内经拾遗》引《医方选要》本方用量：藿、术、朴、苓各一钱二分，苏、腹、芷、桔、夏、陈各一钱，甘草五分，桂六分，猪、泽各一钱五分，加生姜三片，大枣二枚，煎服。

15323　藿香丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】藿香叶　木香各一两半　半夏（汤洗去滑）二两　丁香　槟榔（锉）各三分　白术一两　荜澄茄　红豆蔻（去皮）各半两

【用法】上为末。酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，橘皮汤送下，不拘时候。

【主治】反胃。吐逆，虚气上攻，心疼腹痛，多吐酸水。

15324　藿香汤

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】藿香叶三分　枇杷叶（炙去毛）　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　丁香各半两　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）二两　白茅根　干木瓜　麦门冬（去心）各一两　甘草（炙）一两半

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜二片，煎至七分，去滓，早、晚食前温服。

【主治】 霍乱吐逆，冷热不调，心膈烦满，咽干多渴。

15325 藿香汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】 藿香叶 厚朴各一两 青橘皮（汤浸去白，焙） 甘草（炙，锉）各三分 桂（去粗皮）半两 干姜（炮） 枇杷叶（炙去毛）各一分

【用法】 上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣三个（擘），煎至七分，去滓，稍热服。

【主治】 诸气不调，胸膈痞滞，升降不匀。

15326 藿香汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】 藿香 猪苓 泽泻各七分 茯苓一钱 半夏五分 干葛七分 花粉一钱 陈皮五分 姜连甘草各五分

【主治】 小儿暑月湿热，上吐下泻。

【加减】 小便不利，加滑石；腹痛，加白芍；暑，加香薷；虚弱，加人参、白术、茯苓、藿香、木香、干葛、炙草；久，加山药、扁豆、肉蔻；将成慢惊，加细辛二分，天麻一钱，白附八分，全蝎一个。

15327 藿香散

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】 藿香汤（《圣济总录》卷四十五）。

【组成】 藿香半两 诃黎勒半两（煨，用皮） 人参三分（去芦头） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 半夏半两（汤浸，洗七遍去滑） 赤茯苓三分 肉桂三分（去皱皮） 白术三分 草豆蔻一两（去皮） 枳实半两（麸炒微黄） 高良姜三分（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】 上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】 脾胃冷热不和，胸膈满闷，四肢无力，痰逆，不思饮食。

【宜忌】 忌生冷、油腻、饴糖。

15328 藿香散

【方源】《局方》卷四。

【异名】 藿香汤（《圣济总录》卷六十四）、藿香正气散（《普济方》卷二〇六引《指南方》）、藿脾饮（《证治要诀类方》卷二）、藿香脾饮（《准绳·类方》卷五）。

【组成】 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 甘草（炙） 半夏（切作四片，姜汁浸一宿，以粟炒黄） 藿香叶各一两 陈皮（去白）半两

【用法】 上为粗散。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个，同煎七分，去滓热服，一日二三次，不拘时候。

【功用】 温脾胃，化痰饮，消宿冷，止呕吐。

【主治】 ①《局方》：胸膈痞满，腹胁胀痛，短气噎闷，咳呕痰水，噫酸吞酸，哕逆恶心；及山岚瘴气。②《圣济总录》：留饮宿食不消。

15329 藿香散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】 藿香叶（去土） 半夏曲 甘草（炙）各一两 陈皮（去白） 厚朴（去粗皮，姜制）各二两 人参（去芦） 白术各半两

【用法】 上为细末。每服半钱或一钱，水一小盏，加生姜三片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 脾胃气不和，吐逆，心腹胀满。

15330 藿香散

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】 藿香 半夏 茯苓 陈皮 生姜各一钱半 丁香五分

【功用】 化痰。

【主治】 呕吐。

【加减】 虚人，加人参；内虚寒，加吴萸、草蔻、干姜；伤食，加砂仁、神曲；有热，加竹茹、干葛，或加姜汁炒黄连。

15331 藿薷汤

【方源】《准绳·类方》卷一。

【组成】 藿香正气散加香薷 扁豆 黄连

【用法】 上㕮咀。每服三钱，加生姜三片，大枣一个，水煎，热服。

【主治】 《准绳·类方》：伤寒头疼，憎寒壮热，或感湿气霍乱吐泻。常服除山岚瘴气，伏暑吐泻，脚转筋。

【备考】《成方切用》：藿香正气散合三味香薷饮，名藿薷汤。藿香辛温，理气和中，辟恶止呕，兼治表里为君；苏、芷、桔梗，散寒利膈，佐之以发表邪；厚朴、大腹，行水消湿；橘皮、半夏，散逆除痰，佐之以疏里滞；苍术、甘草，益脾去湿，以转正气为臣、使也，正气通畅，则邪逆自除矣。

15332 藿黄浸剂

【方源】《外伤科学》。

【组成】 藿香一两　黄精四钱　大黄四钱　皂矾四钱　醋一斤

【用法】 将药碾碎，入醋中浸泡，每日振荡数次，五至七天后滤去药滓即成，盛在砂盆中备用。将患病的手、足浸泡于醋中，根据条件，每日浸泡数十分钟，累计时间须在24小时以上。

【功用】 止痒，杀虫。

【主治】 手足癣及甲癣。

【宜忌】 甲癣及病情较重者，浸泡时间须延长。治疗期不用皂碱，甲癣应将病甲削薄后再次浸泡。最好在炎夏季节进行。

15333　藿朴胃苓汤

【方源】 方出《医原》卷下，名见《湿温时疫治疗法》。

【组成】 杏仁　蔻仁　半夏　厚朴　藿梗　苡仁　通草　茯苓　猪苓　泽泻

【功用】 ①《医原》：启上闸，开支河，导湿下行。②《医方发挥》：宣化畅中，芳香化湿。

【主治】 湿气内蕴，氤氲浊腻，证见面色混浊如油腻，口气浊腻不知味，或生甜水，舌苔白腻；膜原邪重则舌苔满布，厚如积粉，板贴不松，脉息模糊不清，或沉细似伏，断续不匀，神多沉困、嗜睡。

【加减】 兼风者，汗出恶风；兼寒者，恶寒无汗，前法酌加苏梗、桔梗、豆豉、葱白、生姜之类；邪在经络，一身掣痛，酌加桂枝、水炒防己、秦艽之类，以开毛窍经络之壅；兼暑者，面赤，口渴，心烦，前法去蔻仁，酌加扁豆花、鲜荷叶清香辟秽，连翘、山栀、滑石轻清微苦淡渗，以解暑湿热之结。

【方论选录】《中医方剂与治法》：方用香豉、藿香芳化宣透，以疏表湿，使阳不内郁，则身热自解；藿香、白蔻、厚朴芳香化湿；厚朴，半夏燥湿运脾，使脾能运化水湿，不为湿邪所困，则胸闷肢倦，苔滑口腻等证即愈；再用杏仁开泄肺气于上，使肺气宣降，则水道自调；茯苓、猪苓、泽泻、苡仁淡渗利湿于下，使水道畅通，则湿有去路，共奏开源洁流之功。全方用药照顾到上中下三焦，以燥湿芳化为主，开宣肺气，淡渗利湿为辅，与三仁汤结构略同。此方宣肺达表于上，淡渗利湿于下，体现上下分消之法。

【备考】 本方方名，《感证辑要》引作“藿朴夏苓汤”，方中通草，《感证辑要》作“淡豆豉”。又，本方剂量及用法，《湿温时疫治疗法》作：杜藿香一钱半至二钱，真川朴八分至一钱，姜半夏二钱至三钱，光杏仁二钱至三钱，白蔻仁八分（冲），生米仁四钱至六钱，带皮苓三钱至四钱，猪苓一钱半至二钱，建泽泻一钱半至二钱；先用丝通草三钱或五钱煎汤代水，煎上药服。

15334　藿香平胃散

【方源】《医学正传》卷三引李东垣方。

【组成】 藿香一钱　厚朴（姜制）一钱　苍术一钱五分　陈皮一钱　甘草（炙）三分　砂仁五分（研）　神曲五分（炒）

【用法】 上细切，作一服。加生姜五片，大枣一个，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】 内伤饮食，填塞太阴，呕吐不已。

15335　藿香正气汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 杜藿梗三钱　薄川朴一钱半　新会皮二钱　白芷二钱　嫩苏梗一钱半　姜半夏三钱　浙苓皮四钱　春砂仁八分（分冲）

【功用】 温中化浊。

【主治】 湿滞挟秽。

【方论选录】 秀按：吾绍地居卑湿，时值夏秋，湿证居十之七八，地多秽浊，人多恣食生冷油腻，故上吸秽气，中停食滞者甚多。方以藿、朴、二陈温中为君；臣以白芷、砂仁芳香辟秽；佐以苏梗、苓皮辛淡化湿。合而为温化芳淡，湿滞挟秽之良方。惟温热暑燥，不挟寒湿者，不可妄用。

15336　藿香正气散

【方源】《局方》卷二（续添诸局经验秘方）。

【异名】 正气散（《伤寒全生集》卷二）、藿香正气汤（《金鉴》卷五十三）。

【组成】 大腹皮　白芷　紫苏　茯苓（去皮）各一两　半夏曲　白术　陈皮（去白）　厚朴（去粗皮，姜汁炙）　苦梗各二两　藿香（去土）三两　甘草（炙）二两半

【用法】 上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个，同煎至七分，热服。如欲出汗，衣被盖，再煎并服。

【功用】 芳香化湿，解表和中。

①《准绳·类方》：除山岚瘴气。②《医方新解》：解表和中，理气化湿（健胃、止吐、止泻、利尿、抑菌、抑制流感病毒，祛痰、止咳）。③《中医方剂与治法》：芳香化湿，升清降浊。

【主治】 外感风寒，内伤食滞，或内伤寒湿，夏伤暑湿，山岚瘴疟诸证。

①《局方》：伤寒头疼，憎寒壮热，上喘咳嗽，五劳七伤，八般风痰，五般膈气，心腹冷痛，反胃呕恶，气泻

霍乱，脏腑虚鸣，山岚瘴疟，遍身虚肿，妇人产前、产后，血气刺痛；小儿疳伤。②《普济方》引《如宜方》：寒湿所伤，身重，腰脚痠疼，或浮肿。③《奇效良方》：小儿伤寒发呕。④《张氏医通》：水土不服，感冒时气夹食。⑤《医方新解》：外感风寒，内伤食滞，症见恶寒发热，头痛脘闷、呕吐腹痛、肠鸣泄泻、口淡、苔白腻等。

【方论选录】 ①《医方考》：凡受四时不正之气，憎寒壮热者，风寒客于皮毛，理宜解表。四时不正之气由鼻而入，不在表而在里，故不用大汗以解表，但用芬香利气之品以主之。白芷、紫苏、藿香、陈皮、腹皮、厚朴、桔梗皆气胜者也，故足以正不正之气；白术、茯苓、半夏、甘草，则甘平之品耳，所以培养中气，而树中营之帜者也；内伤、外感而成霍乱者，内伤者调其中，藿香、白术、茯苓、陈皮、甘草、半夏、厚朴、桔梗、大腹皮皆调中药也，调中则能正气于内矣；外感者疏其表，紫苏、白芷，疏表药也，疏表则能正气于外矣；若使表无风寒，二物亦能发越脾气，故曰正气。②《医方集解》：此手太阴足阳明药也。藿香辛温，理气和中，辟恶止呕，兼治表里为君；苏、芷、桔梗，散寒利膈，佐之以发表邪；厚朴、大腹行水消满，橘皮、半夏散逆除痰，佐之以疏里滞；苓、术、甘草益脾去湿，以辅正气为臣、使也。正气通畅，则邪逆自除矣。③《成方便读》：夫四时不正之气，与岚瘴疟疾等证，无不皆有中气不足者，方能受之，而中虚之人，每多痰滞，然后无形之气，挟有形之痰，互结为患。故此方以白术、甘草补土建中者，即以半夏、陈皮、茯苓化痰除湿继之。但不正之气，从口鼻而入者居多，故复以桔梗之宣肺，厚朴之平胃，以鼻通于肺，而口达乎胃也。藿香、紫苏、白芷，皆为芳香辛散之品，俱能发表宣里，辟恶祛邪；大腹皮独入脾胃，行水散满，破气宽中；加姜、枣以和营卫致津液，和中达表，如是则邪有不退气有不正者。④《实用方剂学》：寒燠不时，空气骤变，交互郁蒸，戾气流行，起居不慎，饮食失节，天时人事，两相感召，既不免疾病之侵临，而欲求健康之保障，则藿香正气之方尚矣。藿香芳香辛温，理气而宣内外，和中而止呕泄，善辟秽恶而解表里，故以为君。表里交错，上下交乱，而正气虚矣，故以苓、术、甘草，健脾培中以为臣，俾正气通畅，则邪气自除。况有苏、芷、桔梗散寒利膈，佐之以发表邪，朴、腹、二陈消满除痰，佐之以疏里气，更引以姜、枣以调营卫，则表里和而健康复矣。

【临证举例】 ①胃肠型过敏性紫癜 《烟台医药通讯》（1976；3:24）：患者男性，14岁。1970年夏发病，症见腹痛，黑色稀便，全身皮肤出现出血点，以四肢为著，先后住院三次，诊断为胃肠过敏性紫癜，此次复发症状同前。给予藿香正气散原方1剂后，恶心、呕吐、腹痛明显好转，能进饮食。5剂后症状大减，服10剂痊愈，迄今未再复发。②急性肝炎 《江苏中医》（1960；3:14）：介绍治疗急性传染性肝炎50例的临床体会。治疗方针以“治湿”和“理脾胃”为主，治湿有祛湿、利湿、化湿三法。其中祛湿一法的主方为藿香正气散，适用于湿邪在表，症见恶寒发热，头痛身楚者。治疗效果：临床症状全部消失，黄疸全部退净。黄疸消退时间最短者6日，最长者67日，平均25日。③急性肠炎 《广东中医》（1960；9:442）：藿香正气散加减治非特异性急性肠炎30例，西医30例对比组（足量磺胺类、碳酸钙等肠道收敛剂及颠茄酊等止疼剂）。7例轻微发热，热度在37～38℃之间。多数轻度腹疼，疼痛多在脐周围，伴肠鸣。腹泻昼夜4～8次。粪量较多是粥状或水样，淡黄色或有泡沫（部分病者粪中混有粘液，但无脓、无血）。无里急后重感。腹部稍鼓胀，有轻度压疼，肠鸣音亢进。

症状消失平均日数	中药组	西药组
腹泻	1.5日	2.7日
稀便	1.8日	3.1日
腹疼	1.3日	2.4日
腹胀	1日	2.2日
食欲不振	2.1日	3.3日
发热	2日	3日
平均治愈日数	1.4日	2.9日

【备考】 本方改为丸剂，名“藿香正气丸”（见《饲鹤亭集方》）。

15337 藿香左金丸

【方源】《霍乱论》卷下。

【组成】 藿香五钱 吴茱萸四钱 川连三钱 郁金二钱 枳壳二钱 厚朴二钱 制半夏二钱 砂仁二钱 茯苓二钱 猪苓二钱 车前子二钱 六一散三钱

【用法】 上为细末，香薷、生姜、木通各一两煎汤滴丸。每服一二钱，开水送下，轻二服，重加之。

【主治】 猝然痞痛，霍乱吐泻转筋。

15338 藿香半夏散

【方源】《局方》卷三。

【异名】 藿香半夏汤(《济阳纲目》卷十八)。

【组成】 丁香皮半两 藿香叶一两 半夏(汤浸洗七遍，微炒黄色)二两

【用法】 上为散。每服二钱，水一盏，加生姜七片，煎七分，去滓，食前温服。

【主治】 胃虚中寒，停痰留饮，哕逆呕吐，胸满喘痞，短气倦怠，不入饮食。

【备考】 本方改为丸剂，名"藿香半夏丸"(见《圣济总录》)。

15339 藿香安胃散

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】 藿香安胃汤(《医统》卷二十四)。

【组成】 藿香 丁香 人参各二钱五分 橘红五钱

【用法】 上为细末。每服二钱，水一大盏，加生姜一片，同煎至七分，和滓食前冷服。

【主治】 脾胃虚弱，不进饮食，呕吐不待腐熟。

【方论选录】 ①《杏苑》：法当补中气，和脾胃，是以用人参、橘红补中气，丁香、藿香温脾和胃，助生姜散郁以止呕。②《脾胃论注释》：方中用藿香醒脾和胃以化湿浊，丁香温中降逆而止呕吐，重用橘红，佐人参取其行足以助消化。药研极细，便于吸收。每服二钱，制小其剂，加生姜煎成冷服于食前，亦即《内经》"热因寒用"之法。

【备考】 本方改为丸剂，名"藿香安胃丸"(见《杏苑》)。

15340 藿香安胃散

【方源】《御药院方》卷四。

【异名】 藿香正气散(《医学纲目》卷三十三)、藿香平胃散(《赤水玄珠》卷四)。

【组成】 藿香叶一两 半夏二两(汤洗七次，焙干) 陈皮二两(去白) 厚朴一两(去粗皮、生姜汁制) 苍术三两(米泔浸一宿，焙干) 甘草二两(炙)

【用法】 上为粗末。每服五钱，水一盏，加生姜五片，大枣二个，同煎七分，去滓温服，一日三次。

【主治】 ①《御药院方》：呕吐不止。②《奇效良方》：小儿感寒吐泻。

【备考】 本方方名，《丹溪心法附余》引作"藿香养胃汤"。《奇效良方》有砂仁。

15341 藿香和中汤

【方源】《笔花医镜》卷三。

【组成】 藿香八分 厚朴 砂仁 陈皮 炙草各五分 生姜二片

【主治】 食积、痞积等。

【加减】 感寒停食，加苍术、白芷、苏梗、川芎、香附、楂炭、麦芽。

15342 藿香养胃汤

【方源】《三因》卷九。

【异名】 养胃汤(《嵩崖尊生》卷十三)。

【组成】 藿香 白术 白茯苓 神曲(炒) 乌药(去木) 缩砂仁 薏苡仁(炒) 半夏曲 人参各半两 荜澄茄 甘草(炙)各三钱半

【用法】 上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣二个，同煎七分。去滓服，不拘时候。

【主治】 ①《三因》：胃虚不食，四肢痿弱，行立不能，皆由阳明虚，宗筋无所养，遂成痿躄。②《普济方》：阳明经虚，不荣肌肉，阴中生疮不愈。

【方论选录】《医略六书》：胃虚气滞，挟寒湿下注阴中，经久不化，故阴内生疮不愈焉，藿香温中开胃，人参补气扶元，白术健脾燥湿，夏曲燥湿醒脾，茯苓渗湿气，神曲消滞气，乌药散浊气，荜茇温寒气，米仁健脾渗湿气，甘草和胃温中气，砂仁醒脾调胃气，姜、枣调和营气以振血气也。水煎温服，使脾胃调和则寒湿自化，而子室肃清，何阴内生疮之足患哉。

15343 藻药散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】 海藻(酒洗) 一两 黄药子二两(万州者佳)

【用法】 上为末。置掌中，以舌时时舐，以津咽下。消三分之二止药。

【主治】 气瘿。

【宜忌】 忌厚味，戒酒色。

15344 攒风散

【方源】《医方大成》卷五引卢陵欧阳康叔家传方。

【异名】 攒风汤(《证治宝鉴》卷十二)。

【组成】 麻黄(不去节) 甘草(不去皮) 淮乌 川萆薢 杏仁(不去皮尖)各等分

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏，煎服。

【功用】 发散寒湿。

【主治】 寒湿脚气。

【宜忌】 不可多进。

15345 蟾皮片

【方源】《妇产科学》。

【组成】 干蟾皮一两

【用法】 上为细末；或轧成片剂，每片1分。每

服5片，一日二次；或水泛为丸，每日一钱，分二次化服。

【主治】 血虚肝旺之外阴白斑症。

15346 蟾灰散

【方源】《幼幼新书》卷二十五引丁左藏方。

【组成】 干虾蟆一个（大者，烧存性） 五倍子各一钱 麝香少许

【用法】 上为末。蜜调，涂齿根。

【主治】 小儿走马疳。

15347 蟾酥丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【异名】 蟾酥解毒丸（《惠直堂方》卷三）。

【组成】 雄黄 乳香各一钱 蟾酥一厘

【用法】 上药用黄酒、熟面糊丸，如绿豆大。每服一丸，葱白汤送下。服之微汗即愈，不退再一服。

【主治】 ①《丹溪心法附余》：一切诸恶疮，已发未发。②《惠直堂方》：疔疮恶毒，走黄疔，耳疔。

【备考】《惠直堂方》本方用法：舌下噙之即黄出。

15348 蟾酥丸

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】 蟾酥二钱（人乳化） 雄黄一两 人指甲不拘多少（焙，研） 麝香二分

【用法】 上为极细末，入蟾酥内，和匀成丸，如粟米大。噙化一丸。恐口舌麻木，用人乳化开，鸡翎扫患处更妙。如治疮毒，量症大小，多则五六丸，酒煎葱白二寸送下。外用葱汤调敷。

【主治】 双单蛾。

15349 蟾酥丸

【方源】《霍乱论》卷下。

【组成】 杜蟾酥（烧酒化开） 明雄黄（水飞）各三钱 丁香 木香 沉香各二钱 茅山苍术（土炒焦）四钱 朱砂（飞）一钱五分 当门子一钱 西牛黄三分

【用法】 上为极细末，择净室中研匀，同蟾酥，加糯米粽尖五个，捣千余下，丸如椒子大，晒干，盛于瓷碗内；再用朱砂一钱五分，烧酒调涂碗内，盖好，用力摇一二千下，则光亮矣，密收瓷瓶内。每服三粒（轻者一粒，重者五粒），泉水送下。

【主治】 暑月食凉饮冷，食物不慎，兼吸秽恶，成痧胀腹痛，或霍乱吐泻。

15350 蟾酥丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【异名】 蟾酥痧药丸（《全国中药成药处方集》南京方）。

【组成】 苍术三两六钱 生军六两 麻黄三两 天麻三两 沉香五钱 檀香一两 丁香六钱 广木香一两五钱 麝香三钱 雄黄三两 朱砂一两二钱 甘草二两四钱 蟾酥六钱

【用法】 上为末，将蟾酥酒化为丸。

【功用】 祛暑辟邪，利湿开窍。

【主治】 心腹暴痛，兼受四时不正之气，山岚瘴毒，癫狂迷乱，五痢八疳。

【备考】《全国中药成药处方集》（南京方）本方用法：用高粱酒泛为小丸，每分约二十粒，朱砂为衣，放于烈日下晒燥，趁热装蜡袋中，打光至亮为度。每服一分至二分，开水送下。

15351 蟾酥膏

【方源】《奇效良方》卷五十四。

【组成】 蟾酥五片（汤浸湿） 腻粉一钱

【用法】 将蟾酥于盆中，以腻粉同和令匀。先用针拨破头边，以后涂药，密裹之。

【主治】 肉刺。

15352 蟾蜍饼

【方源】《外科十法》。

【异名】 蟾酥条（《全国中药成药处方集》吉林、哈尔滨方）、蟾酥锭（《全国中药成药处方集》北京方）。

【组成】 蟾蜍（酒化）一钱 轻粉五分 乳香 没药 雄黄 巴豆各二钱 麝香三分 朱砂一钱 樟脑一钱

【用法】 上各为细末，于五月五日午时，在净室中，用蟾蜍酒和药为丸，如绿豆大。每用一丸，口涎调涂，贴疔疮上，以膏盖之。

【主治】 疔毒、脑疽、乳痈、附骨疽、臀痈，一切患症，或不痛或大痛，或麻本。

15353 蟾酥合剂

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】 酒化蟾酥 腰黄 铜绿 炒绿矾 轻粉 乳香 没药 枯矾 干蜗牛各3克 麝香 血竭 朱砂 煅炉甘石 煅寒水石 硼砂 灯草灰各1.5克

【用法】 上药各研细末，和匀。蟾酥另以烧酒化开为糊，徐徐和入药末，混合研匀，晒干，研成极细末，收贮听用。在红肿初起时，用上药（亦可用煅石膏为赋形剂，成为30～50%蟾酥合剂）以烧酒调涂患处，外敷贴太乙膏，至红肿消失，腐肉与健康组织起一裂缝时，改用10%蟾酥合剂（即上

药一份，煅石膏九份），至腐肉脱落阶段，再改用5%蟾酥合剂（即上药一份，煅石膏九份，煅炉甘石五份，海螵蛸五份），亦可用吹药器将药喷入口腔，咽喉患处。

【功用】 驱毒，消肿，化腐。

【主治】 疔疮，白喉，走马牙疳。

15354 蟾酥走黄丹

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】 朱砂（研） 黄丹（飞） 白面各等分

【用法】 上为末，取蟾酥为丸，如麦粒大。先刺疮口，次按一粒在疮口内，仍以水沉膏贴之；又以五七丸，葱汤吞下。发汗即愈。

【主治】 疔疮走黄。

15355 蹲鸱丸

【方源】《济世养生集》。

【异名】 芋艿丸（《中国医学大辞典》）。

【组成】 真香梗芋艿十斤（取去皮者，慎勿烘炒，竹刀切片，晒极燥）

【用法】 上为末，以开水泛丸。早、晚每服三钱，甜酒送下。如不吃酒者，米汤送下，或吃燥片，酒过亦可。

【主治】 颈项、颏下、耳之前后结核，垒块连珠痨串，不疼不痛，或破微疼，皮赤溃烂，久不收口者；喉癣。

15356 蹲鸱丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】 山芋艿（煮）四两 川贝二两 左牡蛎四两 昆布一两 海藻一两 橘红五钱

【用法】 上为末，炼蜜为丸。每日早、晚温酒送下二钱。

【主治】 禀赋不足，痰痹于阳明、少阳之络，以致颈项颏下耳之前后凝结痰核，大小不一，皮色不变，无论新久。

15357 螵风散

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】 螵胶（微焙，杭粉炒黄色） 皂矾（炒黄色）各一两 朱砂三钱

【用法】 上为末。每服三钱，热酒送下。二服即愈。

【主治】 痫症。

15358 鳗鱼丸

【方源】《良方集腋》卷上。

【组成】 干地黄四两（炒） 女贞子一两五钱（蒸，晒） 龟腹版二两（刮白，盐水炙） 旱连草一两五钱（晒） 天门冬一两（去心，焙） 麦门冬一两五钱（焙，去心） 左牡蛎二两（另研极细） 川贝母一两五钱（去心） 云茯神二两（切片，晒） 淡苁蓉二两（漂净，切片炒） 人中白一两（漂淡，生用） 鳗鱼粉八两

【用法】 上为细末，用放胖旗参四两，川石斛三两，煎浓汁为丸。每服四钱，开水送下。

【功用】 杀蛲虫，疗劳瘵。

【主治】 三阴不足，阳明有余，阴虚火旺，吐血、咯血，传尸骨蒸。

【备考】 制鳗鱼粉法：用鳗鱼三斤，切，勿经水。锅内入百部一斤，同水煎蒸，甑上用薄荷叶、牡丹皮二味铺满，将夏布一方盖在药面，然后将鳗鱼置在布上，蒸一炷香，起甑捣烂，入淮山药粉拌匀做饼，烘干，磨末听用，配药合丸。

15359 鳗鲡鱼丸

【方源】《何氏济生论》卷二。

【组成】 生地黄 大门冬 五味子 白茯苓 牡丹皮 地骨皮 贝母 嫩黄耆 辽东参 当归身各二两 银柴胡 胡黄连各一两 鳗鱼（活大者）四斤（用陈尿壶一个，以鱼入内，将盐泥满身封固，笼糠火煨三昼夜为度）

【用法】 炼蜜为丸服。

【主治】 骨蒸劳热。

15360 鳗鲡鱼涂方

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】 鳗鲡鱼一头（肥者）

【用法】 上药炙令脂出。先洗白驳，用物揩拭之令小痛，然后用熟鱼脂涂。

【主治】 头项及面上白驳，浸淫渐长如癣状，但不成疮。

15361 鳗鲡鱼煎丸

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】 大白鳗鲡鱼三条（用醋汤洗净，段截后以无灰酒于银锅内慢火煮熟，滤出取肉，细研，再入酒二升，慢火煎成煎） 青蒿子 桔梗（锉，炒） 秦艽（去苗土） 柴胡（去苗） 知母（焙） 甘草（炙，锉） 鳖甲（九肋者，去裙襕，醋浸三日后，炙令黄熟） 人参 附子（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】 除鳗鲡鱼为煎外，余为末，以鱼膏拌和匀，更捣百十杵，为丸如梧桐子大。或干，更入炼蜜少许。每服二十丸，空心、午后、临卧用炒栝楼根酒送下。

【主治】 肺劳，咳嗽日久。

15362 蟹爪饮

【方源】 方出《千金》卷二，名见《圣济总录》

卷一五九。

【异名】 千金神造汤(《本草纲目》卷四十五)。

【组成】 蟹爪一升 甘草二尺 阿胶二两

【用法】 以东流水一斗，先煮二物得三升，去滓，纳胶令烊，顿服之；不能，分再服，若人困，拗口纳药，药入即活。煎药作东向灶，用苇薪煮之。

【主治】 动胎及产难；子死腹中；并妊两儿，一死一生，令死者出，生者安。

【方论选录】 ①《千金方衍义》：此即前下血方中蟹爪汤于中除去桂心，加用甘草、阿胶也。夫桂心温散之品，子死腹中正宜加用，而反去之，必本妇去血过多，恐复走血，而不便用，非此证之不当用桂也。此用阿胶专补荣血，甘草专培胃气。②《重庆堂医学随笔》：蟹爪尖专下死胎，甘草奠安中气，不使尸气上乘，阿胶滑利前阴。若双胎一死一生者，蟹爪又安生胎，阿胶专于育神，甘草培植生气，服之令死者出，生者安。

15363 蟹足散

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】 生蟹足骨（焙干） 白蔹各半两

【用法】 上为散。乳汁和，涂囟上，以愈为度。

【主治】 小儿解颅不合。

15364 蟹黄散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】 蟹黄一两 神曲三钱

【用法】 上为末。蜜调涂患处，湿则干搽。

【主治】 漆疮。

15365 麒麟散

【方源】《中医伤科学讲义》

【组成】 归尾四两 参三七五钱 炙乳没各一两 杜红花二两 黄麻炭一两半 血竭二两 地鳖虫一两 辰砂二钱 雄黄八钱 制大黄一两 冰片一钱 自然铜（煅）一两

【用法】 上为细末。每次五分，开水送下。

【主治】 一切跌打损伤。

15366 麒麟竭散

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】 麒麟竭 没药（研） 自然铜（煅、醋淬七遍、研） 赤芍药 当归（切，焙） 白芷 蒲黄 大黄（生用）各半两 桂（去粗皮） 细辛（去苗叶）各一两 骨碎补（去毛、炒）二两 千荷叶三分

【用法】 上为散。每服二钱匕，温酒调下，一日二次，不拘时候。

【主治】 筋骨损伤疼痛。

15367 麒麟竭散

【方源】《御药院方》卷一。

【异名】 血竭散(《瑞竹堂方》卷四)、麒麟散(《医学纲目》卷十二)。

【组成】 血竭 南乳香 没药 水蛭（杵碎，炒令烟尽） 麝香 白芍药 当归各一分 虎胫骨六分（涂酥、炙黄）

【用法】 上药各为细末。各抄一钱和匀，每服三钱，食前温酒调下。痛立止。痛甚者不过二服。

【主治】 ①《御药院方》：寒湿搏于经络，痛不可忍。②《瑞竹堂方》：妇人脐下血积疼痛。

15368 癣酒

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】 白槿皮 南星 槟榔各一两 樟脑 生木鳖各五钱 斑蝥三十个 蟾酥三钱

【用法】 上药浸滴花烧酒一斤。凡癣症，三日一剃一拂，至愈乃止。

【主治】 一节诸癣。

15369 癣药水

【方源】《中药成方配本》。

【组成】 土槿皮八两 百部二两 白及一两 樟脑一两 斑蝥一钱

【用法】 上药用高粱酒五斤，浸半月为度，约成溶液四斤。用笔蘸药水搽癣上，每日二次至三次。

【主治】 一切顽癣。

【宜忌】 不可入口。

15370 癣药水

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】 白及五两 槟榔五两 紫荆皮五两 川椒五两 大风子五两 百部十两 斑蝥二两

【用法】 上用白酒一百九十二两，先入白及、槟榔煎三十分钟，将药锅取下；候温再下荆皮、川椒煎十分钟，取下药锅；候温再下大风子、百部，将坛封口，浸泡一月，药力尽出方有效。于用药前三天将坛起封，再下斑蝥浸泡三天，速将药水滤清装瓶，每瓶重一两。用棉花浸湿，擦患处、每日一二次。

【功效】 杀虫止痒。

【主治】 一切癣症、干癣、湿癣、风癣、牛皮癣、松皮癣、脚气，皮肤病。

【宜忌】 谨防入口。三岁以下禁用。

15371 癣药酒

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】 苦参子一两 木通 两 方八一两 洋

樟一两　百部一两　槟榔一两　巴姜一两　花椒一两　龙衣一两　土荆皮一两　白及一两　斑蝥一两

【用法】 高粱酒三斤浸之。外搽。

【主治】 癣。

15372　鳖甲丸

【方源】 《圣惠》卷四十八。

【组成】 鳖甲一个（可重四两，净洗，以醋和黄泥固济背上厚三分令干）　京三棱三两（炮，锉）　川大黄三两（锉碎，微炒）　枳壳三两（麸炒微黄，去瓤）　木香二两半　桃仁三两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，细研如膏）

【用法】 上除鳖甲外为末，后泥一风炉子，上开口，可安得鳖甲，取前药末并桃仁膏，纳鳖甲中，用好米醋二升，时时旋取入鳖甲内，以慢火熬令稠，取出药，却将鳖甲净洗，去泥焙干，为末，与前药同和为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下，晚食前再服。

【主治】 肥气。体瘦无力，少思饮食。

15373　鳖甲丸

【方源】 方出《续本事》卷一，名见《医钞类编》卷六。

【组成】 北五味子二两　鳖甲三两（厚者）　地骨皮三两

【用法】 上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心、食前温酒或盐汤任下；妇人醋汤送下。

【主治】 ①《续本事》：劳嗽，鼻流清涕，耳作蝉鸣，眼见黑花，及一切虚证。②《杂病源流犀烛》：久咳肺阴虚者。

15374　鳖甲丸

【方源】 《医学入门》卷七。

【组成】 鳖甲二两　香附　三棱　莪术　海粉　青皮　红花　桃仁　神曲　麦芽各五钱（并用醋炙，晒干）

【用法】 上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】 疟母。

15375　鳖甲胶

【方源】 《北京市中药成方选集》。

【组成】 鳖甲一千六百两　阿胶二百四十两　冰糖八十两　黄酒四十八两　香油二十四两

【用法】 先将鳖甲浸泡七天，清水洗刷后取出，下锅煮之，和以上的原料浓缩成胶，装槽散热，凝固后再去槽，切成小块长方形，每斤干重一百一十块左右。每料鳖甲汁子百斤，下白矾二十四两，计头汁用矾四两，二汁四两，三汁三两，四汁二两，细汁五两，沫水四两，缸底二两。每服二至三钱，用黄酒炖化服，或白水亦可。

【功用】 养阴退烧，破癥瘕积聚。

【主治】 气虚血亏，骨蒸潮热，腹胀血块，午后发烧。

15376　鳖甲散

【方源】 《普济方》卷三七九引《汤氏宝书》。

【异名】 黄耆鳖甲散（《杏苑》卷六）。

【组成】 鳖甲（九肋者，沸汤洗，用童便涂炙）　黄连　黄耆　白芍各一两　生熟地黄　地骨皮　当归（去芦）　人参（去芦）各半两

【用法】 上为粗末。每服二钱，水半盏，煎至三分，去滓，不拘时候服。

【主治】 ①《普济方》引《汤氏宝书》：疳劳骨蒸。②《金鉴》：疳热，日久多虚者。

15377　鳖甲散

【方源】 《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】 银柴胡一钱半　胡连　秦艽　鳖甲（醋炙）　地骨　青蒿　知母各一钱　甘草五分　当归　白芍　生地各八两

【主治】 骨蒸热。

【加减】 嗽，加阿胶、麦冬、五味。

15378　鳖甲煎

【方源】 《妇人良方》卷五。

【组成】 雄鳖一个（重一斤者）　杏仁（去皮尖双仁，炒）　北柴胡　贝母（去心）　知母各四两

【用法】 上除鳖外，诸药细锉，以好酒五升入锅内，将活鳖置在中，以药和停围定，上用板子石压定，令鳖在药内吃酒药，来日即以慢火煮，候酒尽为度，却取鳖令患人吃尽，次将鳖甲用醋炙黄，入在前项诸药内焙为细末，用酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候，每日五次。

【主治】 ①《妇人良方》：妇人骨蒸劳。②《普济方》：妇人劳损，或时寒热，肌体倦疼。

15379　鳖头散

【方源】 方出《千金》卷二十四（注文）引《肘后方》，名见《圣惠》卷六十。

【异名】 猬皮散（《直指》卷十四）。

【组成】 磁石四两　桂心一尺　猬皮一个　鳖头一个

【用法】 上为末。每服方寸匕，饮送下，每日一次。

【主治】 肛出，妇人阴脱出。

【宜忌】 慎举重及急带衣，断房室周年乃佳。

15380 鳖血丸

【方源】《得效》卷十二。

【组成】人参半两 川芎 芫荑 北柴胡各一两 使君子二十一个 胡黄连 川黄连各二两

【用法】上药用鳖血一盏，吴茱萸一两，拌和二连，淹一宿，次早炒干透，出茱萸并血，只用二连，夹余药杵末，粟米粉糊为丸，如麻子大。每服二十丸，食前熟水送下。

【主治】①《得效》：小儿痨瘠。②《本草纲目》引《全幼心鉴》：小儿疳劳，潮热往来，五心烦躁，盗汗咳嗽。

15381 鳖甲煎丸

【方源】《金匮》卷上。

【异名】疟母煎(《活人书》卷十七)。

【组成】鳖甲十二分（炙） 乌扇三分（烧） 黄芩三分 柴胡六分 鼠妇三分（熬） 干姜三分 大黄三分 芍药五分 桂枝三分 葶苈一分（熬） 石苇三分（去毛） 厚朴三分 牡丹五分（去心） 瞿麦三分 紫葳三分 半夏一分 人参一分 䗪虫五分（熬） 阿胶三分（炙） 蜂窠四分（炙） 赤消十二分 蜣螂六分（熬） 桃仁二分

【用法】上为末，取煅灶下灰一斗，清酒一斛五斗浸灰，候酒尽一半，着鳖甲于中，煮令泛烂如胶漆，绞取汁，纳诸药煎为丸，如梧桐子大。空心服七丸，每日三次。

【功用】①《金匮要略心典》：行气逐血。②《中国药典》：活血化瘀，软坚散结。

【主治】①《金匮》：病疟，以月一日发，当以十五日愈；设不愈，当月尽解；如其不愈，结为癥瘕，名曰疟母。②《张氏医通》：一切痞积。

【宜忌】①《外台》：忌苋菜、生葱、胡荽、羊肉、饧等物。②《谦斋医学讲稿》：虚人忌用，体力较强者亦不宜久用。③《中国药典》：孕妇禁用。

【方论选录】①《医方考》：方中灰酒，能消万物，盖灰从火化也；渍之以酒，取其善行；鳖甲、鼠妇、䗪虫、蜣螂、蜂窠皆善攻结而有小毒，以其为血气之属，用之以攻血气之凝结，同气相求，功成易易耳；柴胡、厚朴、半夏散结气；桂枝、丹皮、桃仁破滞血；水谷之气结，则大黄、葶苈、石苇、瞿麦可以平之；寒热之气交，则干姜、黄芩可以调之。人参者，以固元于克伐之伤；阿胶、芍药以养阴于峻厉之队也。乌扇、赤消、紫葳攻顽散结。②《千金方衍义》：疟母必著于左胁，肝邪必结肝部也。积既留著客邪，内从火化，当无外散之理，故专取鳖甲伐肝消积。尤妙在灰煮去滓，后下诸药，则诸药咸得鳖甲引入肝胆部分。佐以柴胡、黄芩同蹑少阳区域；参、姜、朴、半助胃祛痰；桂、芍、牡丹、桃、葳、阿胶和营散血；蜣螂、蜂窠、虻虫、䗪虫、乌扇聚毒势攻；瞿、苇、藻、戟、葶苈、大黄利水破结。未食前服七丸，日服不过二十余粒。药虽峻而不骤伤元气，深得峻药缓攻之法。又易《金匮》方中赤消毒劣，则易之以藻、戟；鼠妇难捕，乃易之以虻虫。略为小变，不失大端。③《古方选注》：本方都用异类灵动之物，若水陆，若飞潜，升者降者，走者伏者咸备焉。但恐诸虫扰乱神明，取鳖甲为君守之，其泄厥阴破癥瘕之功，有非草木所能比者。阿胶达表熄风，鳖甲入里守神，蜣螂动而性升，蜂房毒可引下，䗪虫破血，鼠妇走气，葶苈泄气闭，大黄泄血闭，赤消软坚，桃仁破结，乌扇降厥阴相火，紫葳破厥阴血结，干姜和阳退寒，黄芩和阴退热，和表里则有柴胡、桂枝，调营卫则有人参、白芍，厚朴达原劫去其邪，丹皮入阴提出其热，石苇开上焦之水，瞿麦涤下焦之水，半夏和胃而通阴阳，灶灰性温走气，清酒性暖走血。统而论之，不越厥阴、阳明二经之药，故久疟邪去营卫而着脏腑者，即非疟母亦可借以截之。《金匮》惟此丸及薯芋丸药品最多，皆治正虚邪着久而不去之病，非汇集气血之药攻补兼施未易奏功也。④《成方便读》：方中寒热并用，攻补兼施，化痰行血，无所不备。而又以虫蚁善走入络之品，搜剔顽结之邪。柴桂领之出表，消黄导之降里。煅灶下灰清酒，助脾胃而温运。鳖甲入肝络而搜邪。空心服七丸，日三服者，取其缓以化之耳。

【临证举例】①血吸虫病肝脾肿大 《浙江中医杂志》(1957；4:153)：李氏用鳖甲煎丸配合阿魏消痞丸治疗晚期血吸虫病肝脾肿大41例。用法：鳖甲煎丸每次1.5～2克，阿魏消痞丸，每次3～5克，二方混合服用，每日三次，饭前半小时服，23天为一疗程。结果：41例中脾脏缩小1～3公分者20人，4～6公分者13人，不缩小但软化者7人，无效者1人，有效率80%以上；其中29例肝肿大者，缩小1～2公分者10人；3～5公分者4人；不增不减而软化者13人，无效2人。此外17例大便带脓血者，服药后均转为正常大便。②胃癌 《江苏中医杂志》(1982；6:36)：傅某，女64岁。胃脘隐痛，胃纳减退一年，伴大量呕血一次，黑粪多次及上腹部肿块，胃肠钡餐检查示：胃小弯癌性溃疡。体检：极度消瘦，中上腹可触及8×6厘米隆起之肿块，质坚硬，不易移动，舌紫暗，苔黄腻，

脉细弦。治以理气活血、消肿软坚法。方药：鳖甲煎丸，枸杞、枳壳、陈皮、橘叶、八月扎、香橼、丁香、佛手、玫瑰花、槟榔、丹参、赤芍、牡蛎、天龙、木香、香附、生熟苡仁，合欢皮，川楝子、茯苓，随证加减，并用云南白药，连续服用三年余（未用任何西药），胃小弯病变明显好转。7年后随访，病员仍健在。

【备考】 本方方名，《外台》引作"大鳖甲煎"。《千金》无鼠妇、赤消，有海藻、大戟、虻虫。

15382 鳖肉煎丸

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】 生鳖肉半斤（治如食法） 黄芩（去黑心） 柴胡（去苗） 蜣螂（去翅头足，炒）各半两 鼠妇（炒，去足） 干姜（炮） 大黄（生锉） 海藻（洗去咸汁，焙） 葶苈子（纸上炒） 桂（去粗皮） 牡丹皮 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉） 紫菀（切，焙） 麦（去梗） 半夏（汤洗去滑，焙） 人参 大戟（锉） 䗪虫（炒） 射干（炮） 阿胶（炙燥） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，别研） 石苇（去毛） 赤芍药各一分 桑螵蛸（炒）一两

【用法】 上为细末，取灶下灰三升，酒二升淋灰，取灰汁先煮鳖肉令烂，绞去鳖肉，后入诸药末，纳鳖肉汁，更煎成膏，可丸即止，丸如梧桐子大。每服二十丸，未发前温酒送下。

【主治】 疟久不愈，结为癥瘕，名曰疟母。

15383 鳖甲干漆散

【方源】《产科发蒙》附录。

【组成】 鳖甲 琥珀 大黄 干漆各等分

【用法】 上为散。每服二钱，酒送下。少时恶血即下。若妇人小肠中血下尽，即休服也。

【主治】 妇人血瘕癥癖。

15384 鳖甲大黄丸

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】 鳖甲（去裙襕，醋炙黄）二两 大黄（煨，锉） 槟榔 附子（炮裂，去皮脐） 麦芽（炒）各一两 乌药（锉） 诃黎勒（煨，去核） 木香 白术 桂（去粗皮） 蓬莪术（炮，锉） 京三棱（炮，锉）各三分 枳壳（去瓤，麸炒） 吴茱萸（炒）各半两

【用法】 上为末，后将硇砂三两（细研），醋三升（滤去滓），将前药末平分，一半入硇砂内搅和，于铫子内煎成膏，余药为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心炒生姜汤送下。

【功用】 健脾胃，消宿滞。

【主治】 癖积。

15385 鳖甲地黄汤

【方源】《济生》卷一。

【组成】 柴胡（去芦） 当归（去芦，酒浸） 麦门冬（去心） 鳖甲（醋炙） 石斛（去根） 白术 熟地黄（酒浸，焙） 茯苓（去皮） 秦艽（去芦）各一两 人参 肉桂（不见火） 甘草（炙）各半两

【用法】 上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，乌梅少许，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】 热劳。手足烦，心怔悸；妇人血室有干血，身体羸瘠，饮食不为肌肉。

【宜忌】 虚甚而多汗者，不宜服。

15386 鳖甲地黄汤

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】 鳖甲三钱（生，醋炙） 生地五钱 当归二钱 柴胡三分（盐水炒） 麦冬三钱（去心） 白术一钱半（制） 人参六分 茯苓一钱半 石斛二钱 甘草六分 乌梅一钱半

【用法】 水煎，去滓温服。

【主治】 虚劳。烦热羸瘦，脉弦濡数者。

【方论选录】 血气两虚，虚阳内郁而烦躁，潮热不解，故渐至羸瘦成痨焉。生鳖甲滋阴散结，生地黄壮水滋阴；当归身养营血以活血，麦门冬润肺气以清心；茯苓化气和脾，白术健脾生血；人参扶元补气，甘草和胃缓中；石斛平虚热兼益肾阴，柴胡疏肝胆能除蒸热；乌梅肉除烦热以收津液也。水煎温服，使血气内充，则虚阳得伸，而烦热自解，肌肉渐生，何虚痨之足虑哉。此滋阴疏补之剂，为虚劳烦躁潮热之专方。

15387 醴泉饮

【方源】《衷中参西》卷上。

【组成】 生山药一两 大生地五钱 人参四钱 玄参四钱 生赭石四钱（轧细） 牛蒡子三钱（炒、捣） 天冬四钱 甘草二钱

【主治】 虚劳发热、或喘或嗽，脉数而弱。

【方论选录】 阴虚之甚者，其周身血脉津液皆就枯涸。必用汁浆最多之药，滋脏腑之阴，即以溉周身之液，若方中之山药、地黄是也。然脉之数者，固系阴虚，亦系气分虚弱，有不能支持之象，犹人之任重而体颤也。故用人参以补助气分，与玄参、天冬之凉润者并用，又能补助阴分。且虑其升补之性，与咳嗽上逆者不宜，故又佐以赭石之压力最胜者，可使人参补益之力下行直至涌泉，而上焦之逆气浮火，皆随之顺流而下；更可使下焦真元之气，

得人参之峻补而顿旺，自能吸引上焦之逆气浮火下行也。至于牛蒡子与山药并用，最善止嗽，甘草与天冬并用，最善润肺，此又屡试屡效者也。

【临证举例】 咳喘 初制此方时，原无赭石，有丹参三钱，以运化人参之补力。后治一年少妇人，信水数月不行，时作寒热，干嗽连连，且兼喘逆，胸膈满闷，不思饮食，脉数几至七至。治以有丹参原方不效，遂以赭石易丹参，一剂咳与喘皆愈强半，胸次开通，即能饮食，又服数剂脉亦和缓，共服二十剂，诸病皆愈。

15388 糯米丸

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】 丝瓜叶 糯米粉

【用法】 丝瓜叶煮烂，糯米粉调蒸，作饼如圆眼。吃数日。即愈。

【主治】 雀目。

15389 糯米粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】 糯米（淘净） 大麻子各两合

【用法】 上二味，先以水三升，研麻子，生绢滤取汁，煮米作粥。空心食。

【主治】 大便秘涩。

15390 糯米阿胶粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】 糯米三合 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥，捣为末）

【用法】 先煎糯米作粥，临熟下阿胶末，搅匀食之。

【主治】 妊娠，胎动不安。

15391 露华汤

【方源】《传信适用方》卷四。

【组成】 干莲房（隔年者良）

【用法】 上为细末。每服二钱，空心食前，以麝香米饮送下。每日三次。不数日见效。去麝即不效，切勿减去。

【主治】 妇人赤白带下。

15392 露姜饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】 别直参三分 生姜二分

【用法】 用阴阳水二钟，煎成一钟，露一宿服。

【主治】 ①《重订通俗伤寒论》：胎疟。昼发而病在阳分气虚者，肢厥汗多。②《温病条辨》：太阴脾疟，脉濡、寒热，疟来日迟，腹微满，四肢不暖。

【方论选录】《成方便读》：此亦脾阳不足，疟邪留恋，邪少虚多之证。人参大补脾中之气，生姜辛温以散余邪，补而不滞，散而不泄。合成甘温方法。煎成露一宿服者，亦如常山饮水煎露宿之义。

15393 露桑散

【方源】《医级》卷八。

【组成】 桑叶（带露者采，晒炙炒）

【用法】 上为末。每服三钱，米饮调下。

【主治】 多汗、盗汗。

15394 露蜂房散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】 露蜂房一两 鹿角一两

【用法】 并烧为灰，细研。每服二钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】 吹奶。疼痛不止，或时寒热。

15395 露蜂房散

【方源】《普济方》卷六十五引《海上方》。

【组成】 露蜂房 道人头 紫菀花 细辛 良姜各半钱

【用法】 上为细末。煎汤漱口。

【主治】 牙痛。

15396 霹雳丸

【方源】《谢利恒家用良方》。

【异名】 雷公救疫丸。

【组成】 牙皂三两五钱 细辛三两五钱 白芷二两 薄荷二两 广藿香二两 广木香二两 枯矾一两五钱 苏合香二两 活贯众二两 制半夏二两 防风二两 桔梗二两 广皮二两 腰黄 朱砂各二两五钱（水飞）

【用法】 上药均生晒为细末，和匀，勿用火炒，水泛为丸，瓷瓶收贮。每服一钱，温开水送下，老幼减半。

【主治】 霍乱吐泻腹痛，及一切闷闭痧症。

【宜忌】 孕妇慎服。

15397 霹雳汤

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】 川附（炮去皮脐）五两 桂心（去皮尽）二两 当归二两 甘草一两

【用法】 上为细末。每服五钱，水一大盏，加生姜七片，煎至六分，和滓通口服。小儿止一钱。

【主治】 脾胃虚弱，因伤生冷成泄泻，米谷不化，或胀、或痛、或痞，胸胁连心痛，两胁作胀，单腹膨胀，霍乱吐泻；中风、半身不遂；脾疟；黄疸；阴疝，人蚀骨髓；痘疹黑陷，急慢惊风，气厥发昏；阴阳伤寒，诸般冷病寒气。

15398 霹雳酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】铁锤（烧赤）

【用法】浸酒饮之。

【主治】疝气偏坠；妇人崩中下血，胎产不下。

15399 霹雳散

【方源】《活人书》卷十六。

【异名】黑散子（《普济方》卷一三五）、霹雳煎（《准绳·类方》卷五）。

【组成】附子一枚（及半两者，炮熟，用冷灰焙之，去皮脐，为粗末） 真腊茶一大钱（细研）

【用法】上同和，分作二服。每服用水一盏，煎六分，临熟入蜜半匙，放温冷服之。须臾躁止，得睡，汗出即愈。

【主治】阴盛格阳。身冷，烦躁，面青唇黑，腹痛，大便自利，脉沉细欲绝。

①《活人书》阴盛格阳，烦躁不欲饮水。②《玉机微义》：腹痛，脉欲绝。③《医统》：身冷，脉沉。④《医学入门》：身冷反躁，欲投井中，肢体沉重，唇青面黑，渴欲水复吐，大便自利黑水，六脉沉细而疾或无。《赤水玄珠》：五脏寒。

15400 霹雳散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】熟附子 人参 甘草 白术 干姜 细茶一撮

【用法】水煎，入蜜二匙，麝香少许调，顿冷服下。须臾汗出，得睡躁止乃愈。

【主治】阴极发烦躁，阴极似阳，身热面赤，烦躁不能饮水，脉沉细或伏绝。

【加减】烦躁欲坐卧泥水井中者，阴盛故也，加辰砂、远志、茯神；面赤者，下虚故也，加葱白九茎；身热者，里寒故也，加桂枝；泻不止，加炒白术、人参；呕吐不止，加姜汁、半夏、陈皮、丁香；腹痛，加砂仁、吴茱萸、木香，甚不止，加乳、没；虚寒气逆上，加沉香、苏子；有痰，加半夏、橘红；无脉，加猪胆汁一匙调服。

【备考】药后如不得睡无汗，复加烦躁不安，身热下利不止，脉不出者，死。

15401 霹雳散

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】桂枝六两 公丁香四两 草果二两 川椒五两（炒） 小茴香四两（炒） 薤白四两 良姜三两 吴茱萸四两 五灵脂二两 降香五两 乌药三两 干姜三两 石菖蒲二两 防己三两 槟榔二两 荜澄茄五两 附子三两 细辛二两 青木香四两 薏仁五两 雄黄五钱。

【用法】上为细末。开水和服，大人每服三钱，病重者五钱；小人减半。再病甚重者，连服数次，以痛止厥回，或泻止筋不转为度。

【主治】中燥吐泻腹痛，甚则四肢厥逆，转筋，腿痛，肢麻，起卧不安，烦躁不宁；再甚则六脉全无，阴毒发斑，疝瘕；一切凝寒固冷积聚。

【宜忌】寒轻者，不可多服；寒重者，不可少服，以愈为度。非实在纯受湿、燥、寒三气阴邪者，不可服。

15402 鳢鱼汤

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】鳢鱼二斤（洗去鳞肠，令净） 赤茯苓一两 泽漆一两 泽泻一两 杏仁半两（汤浸去皮尖、双仁） 桑根白皮一两（锉） 紫苏茎叶一两

【用法】上锉细。先以水五升，煮鱼取汁三升，去鱼纳药，煮取二升，去滓。每于食前温服一中盏。其鱼亦宜食之。

【主治】卒身面浮肿，小肠涩，大便难，上气喘息。

15403 麝沉散

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】麝香（研） 沉香（锉）各一分

【用法】上为散。每服半钱或一钱匕，沸汤点服。

【主治】小儿哕逆。

15404 麝茸丹

【方源】《幼幼新书》卷六引张涣方。

【组成】麝香 茄茸（酥炙黄） 生地黄 当归（洗） 黄耆 虎胫骨（酥炙黄）各一两

【用法】上为末，羊髓四两，煮烂成膏和为丸，如黍米大。乳前服十粒，每日三次，磨沉香汤送下。

【主治】小儿数岁不能行者。

15405 麝香丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】草龙胆 胡黄连各半两 木香 蝉壳（去剑为末，干） 芦荟（去砂） 熊胆 青黛各一钱 轻粉 脑麝 牛黄各一钱（并别研） 瓜蒂二十一个（为末）

【用法】上猪胆为丸，如梧桐子及绿豆大。惊搐脏腑或秘或泻，清米饮或温水送下小丸五、七粒至一、二十粒；疳眼，猪肝汤送下；疳渴，焙猪汤或猪肉汤送下；惊风发搐，眼上，薄荷汤化下一丸，更水研一丸滴鼻中；牙根疮、口疮，研贴；虫痛，苦楝子或白芜荑汤送下；百日内小儿，大小便不

通，水研封脐中；虫候，加干漆、好麝香各少许，并入生油一两点，温水化下。大凡病急则研碎，缓则浸化。

【主治】 ①《小儿药证直诀》：小儿慢惊、疳病；牙根疮，口疮；虫痛；急惊痰热。②《卫生总微》：诸痫。

【宜忌】 小儿虚极慢惊者勿服。

15406 麝香丸

【方源】《本事》卷二。

【异名】 蠲痛丸（《医方类聚》卷二十一引《济生》）、全蝎丸（《医方类聚》卷九十八引《瀹寮》）、蠲痛丹（《本事方释义》卷二）。

【组成】 川乌（大八角者）三个（生） 全蝎二十一个（生） 黑豆二十一粒 地龙半两（生） 麝香半字

【用法】 上为细末，入麝香，糯米糊为丸，如绿豆大。每服七丸，甚者十丸，夜卧令膈空，温酒送下。微出冷汗一身，便愈。

【主治】 白虎历节诸风。疼痛游走无定，状如虫啮，昼静夜剧，及一切手足不测疼痛。

【方论选录】《本事方释义》：川乌气味苦辛大热，入足太阳、少阴；全蝎气味甘平，入足厥阴，善能走经络；黑豆气味苦平，入足少阴；地龙气味咸寒，入足阳明、厥阴，能行诸经络；麝香气味辛香微温，善能入窍。白虎历节诸风痛楚无时，流走无定，送药以酒，亦是引经，非辛香不能走窍，非辛热能行之药不能入络，非甘平咸寒及谷味不能调和正气，痛既蠲，病鲜不愈矣。

【临证举例】 历节风 在歙州日，有一贵家妇人，遍身走注疼痛，至夜则发，如虫啮其肌，多作鬼邪治。予曰：此正历节节病也。三服愈。

15407 麝香散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】 香附子 川椒目各等分 苍术 麝香各少许

【用法】 上为细末。吹鼻中。

【主治】 眼冷泪不止。

15408 麝香散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】 真麝香二钱 冰片三分 黄连一钱

【用法】 共为末。一日夜吹五六次。

【主治】 肺经蕴热，致生喉瘤。生于喉傍，形如圆眼，血丝相裹。

15409 麝香天麻丸

【方源】《局方》卷一。

【组成】 紫背干浮萍草（去土）四两 麻黄（去根节）二两 防风（去芦叉） 天麻（去芦，郓州者佳）各一两（上为细末） 没药（别研极细） 朱砂（研飞）各二两 安息香（别研细） 乳香（研） 麝香（研）各一两 血竭（别研极细）三两 槐胶（别研细） 一两半

【用法】 上药，除研药外，将碾出药同研拌匀，炼滤白沙蜜与安息香同熬过，搜成剂，入臼捣杵熟为丸如弹子大。空心服一丸，以温酒或荆芥汤化下。患处微汗为效，如不欲化服，即丸如梧桐子大，每服三十丸，依前汤使下。

【主治】 风痹。手足不随，或少力颤掉，血脉凝涩，肌肉顽痹，遍身疼痛，转侧不利，筋脉拘挛，不得屈伸。

15410 麝香鹿茸丸

【方源】《局方》卷五。

【组成】 鹿茸（火燎去毛，酒浸，炙）七十两 熟干地黄（净洗，酒浸，蒸，焙）十斤 附子（炮，去皮脐）一百四十个 牛膝（去苗、酒浸一宿，焙）一斤四两 杜仲（去粗皮，炒去丝）三斤半 五味子二斤 山药四斤 肉苁蓉（酒浸一宿）三斤

【用法】 上为末，炼蜜为丸，加梧桐子大，每一斤丸子，用麝香末一钱为衣。每服二十丸，食前用温酒送下；盐汤亦得。

【功用】 益真气，补虚惫。

【主治】 ①《局方》：治下焦伤竭，脐腹绞痛，两胁胀满，饮食减少，肢节烦痛，手足麻痹，腰腿沉重，行步艰难，目视茫茫，夜梦鬼交，遗泄失精，神情不爽，阳事不举，小便滑数，气虚肠鸣，大便自利，虚烦盗汗，津液内燥。②《医方类聚》：劳损虚冷，精血不足。房劳伤肾腰痛。

15411 麝香琥珀丸

【方源】《医学从众录》卷八。

【组成】 土鳖虫一两（炙存性） 血珀末五钱 麝香三钱

【用法】 酒打和为丸。每服三分。

【主治】 经闭。

15412 麝香琥珀膏

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】 大黄四两 朴硝四两 麝香一钱

【用法】 上为末，每服二两，以大蒜捣膏。敷患处。即令胀满断消。

【主治】 男女积聚，胀满血蛊。

15413 麝香雄黄散

【方源】《宣明论》卷十五。

【异名】麝香锭子(《洞天奥旨》卷十六)。

【组成】麝香 雄黄 乳香 硇砂各二钱 土蜂窝 露蜂窝(烧灰)各一钱

【用法】上为末，以醋调少许，涂咬着处，或不辨认得，多疑是恶疮，三五日不疗，即毒入心难愈。

【主治】恶虫咬伤，及疮肿者。

【宜忌】忌鸡鱼油腻物。

【备考】方中土蜂窝、露蜂窝用量原缺，据《百一》补。

15414 麝香猬皮丸

【方源】《普济方》卷二九七。

【组成】鸡冠花八两(微炒存性) 牛角腮(烧存性) 贯众(去毛净) 槐花(微炒) 油发灰 香白芷 当归 枳壳(去瓤) 玄参 黄连 黄耆 防风(去芦)各半两 鳖甲一钱(炙黄色) 麝香半钱(别研) 猬皮(烧存性)一个 诃子(去核，净微炒)半两 猪左悬蹄五个(烧存性)

【用法】上入麝香和末为丸，如梧桐子大。每服三十丸至四十丸，空心饮下。

【主治】肠风痔漏，疼痛不止，大便下血，时举发。

【宜忌】忌动风发病之物。

15415 麝香苏合香丸

【方源】《局方》卷三。

【组成】白术 青木香 乌犀屑 香附子(炒去毛) 朱砂(研，水飞) 诃黎勒(煨，去皮) 白檀香 安息香(别为末，用无灰酒一升熬膏) 沉香 麝香(研) 丁香 荜拨各二两 苏合香油(入安息香膏内)各一两 熏陆香(别研)一两

【用法】上为细末，入研药匀，用安息香膏并炼白蜜和剂为丸，如梧桐子大。早朝取井华水，空心化服四丸，温冷任意；老人，小儿可服一丸，温酒化服亦得。用蜡纸裹一丸如弹子大，绯绢袋盛，当心带之，一切邪神不敢近。

【主治】传尸骨蒸，殗殣肺痿，疰忤鬼气，卒心痛，霍乱吐利，时气鬼魅瘴疟，赤白暴利，瘀血月闭，痃癖丁肿惊痫，鬼杵中人，小儿吐乳，大人狐狸等病。

15416 癫狂梦醒汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】桃仁八钱 柴胡三钱 香附二钱 木通二钱 赤芍三钱 半夏二钱 腹皮三钱 青皮二钱 陈皮三钱 桑皮三钱 苏子四钱(研) 甘草五钱

【用法】水煎服。

【主治】癫狂。哭笑不休，詈骂歌唱，不避亲疏，许多恶态。

15417 癫狂霹雳散

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】雄黄 雌黄 冰片 西牛黄各五分 生山栀二十枚 白急性子一钱 生白砒四分 生绿豆一百八十粒

【用法】将绿豆冷水浸少顷，去皮，余药各生晒为末，另研入冰、黄。大人可服一钱，十五六岁者，用四分，白汤送下。再令食粉面糕饼等少许，当吐。如一时未吐，以硬鹅毛蘸桐油搅喉探吐，吐后人倦，安卧半日，欲食，少少进微温米饮，切勿多，亦勿热，越日方进米粥。吐后每多口渴，不可饮茶，即取清童便饮之，或服自己小便，名轮回酒，皆能洗涤余浊，兼解毒药。

【功用】化顽痰浊涎。

【主治】癫狂。见面色板钝，目神滞顿，迷妄少语，喜阴恶阳，饮食起居若无病者。多从屈郁不伸，而为失志痴呆。

15418 囊痈煎

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】枸橘一个 川楝 秦艽 陈皮 赤芍 甘草 防风 泽泻各一钱半

【用法】水煎，空心服。

【主治】囊痈。肾子作痛而不升上，外现红色者。

15419 蹒饮丸

【方源】《吴鞠通医案》卷三。

【组成】桂枝半斤 小枳实四两 干姜六两 苍术炭六两 茯苓斤半 半夏一斤 益智仁四两 广皮十二两 炙甘草六两

【用法】上为细末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，每日三次。

【主治】痰饮久聚。

15420 蹒毒饮

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】防风一钱 赤芍药 川芎 连翘 甘草 牛蒡子(炒研)各八分

【用法】上锉一剂。白水二钟，煎至八分，去滓温服。

【主治】水疳眼。忽生一珠，或在胞中，或在睛，疼痛甚如针刺，珠小属实症者。

15421 蹒疼汤

【方源】《王案》卷四。

【组成】 防风 羌活 苍术各一钱 木瓜 当归 威灵仙 乌药 生地各二钱 白芍 秦艽 川芎各八分

【用法】 水、酒各半煎服。

【主治】 周身作痛。

15422 蠲痛丸

【方源】《直指》卷十八。

【组成】 延胡索（略炒）一两 川楝（蒸去皮核） 舶上茴香（炒）各半两 牵牛（炒，取末） 当归 良姜 青皮（去白） 木香 天台乌药各一分 全蝎七个（焙）

【用法】 上为末，生姜自然汁浸糕为糊，丸如梧桐子大。每服三十丸，烧绵灰（存性）调酒送下。

【主治】 ①《直指》：小肠膀胱气痛。②《杂病源流犀烛》：癞疝及一切疝痛。

15423 蠲痛汤

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】 金毛狗脊（先用火燎去黄毛，令净，锉碎再炒，以香为度） 川萆薢（锉，微炒） 天麻（温水洗净，锉，焙） 大附子（炮，去皮脐） 薏苡仁（炒香） 酸枣仁（湿汤浴过，去皮，焙） 人参（去芦）各二两 杜仲（去粗皮，锉，文武火炒丝断为度）各一两半 白术 柏子仁（生） 甘草（炙）各三分 羌活 川续断（去苗，焙） 当归（温水洗净，切片，焙）各一两

【用法】 上㕮咀。每服四大钱，水一盏半，加生姜十片或七片，煎至七分，去滓，食前通口服，每日二次。

【主治】 湿痹，腰脚疼痛。

15424 蠲痛散

【方源】《妇人良方》卷七。

【组成】 荔枝核（烧存性）半两 香附子（去毛，炒）一两

【用法】 上为细末。盐汤、米饮调下二钱。不拘时候。

【主治】 ①《妇人良方》：妇人血气刺痛。②《袖珍方》：室女月经不通。

15425 蠲痹汤

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】 当归（去土，酒浸一宿） 羌活（去芦头） 姜黄 黄耆（蜜炙） 白芍药 防风（去芦头）各一两半 甘草半两（炙）

【用法】 上㕮咀。每服半两，水二盏，加生姜五片，同煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】 ①《杨氏家藏方》：风湿相搏，身体烦疼，项臂痛重，举动艰难，及手足冷痹，腰腿沉重，筋脉无力。②《增补内经拾遗》引《简易方》：风痹。风伤卫气，皮肤麻痹不仁。

【方论选录】 ①《医方考》：《内经》曰：荣气虚则不仁，卫气虚则不用，故用黄耆以实表气。然黄耆与防风相畏，用之者何？洁古云：黄耆得防风而功愈速，故并用之，欲其相畏而相使耳。羌活驱散风邪，得当归不至燥血；姜能攻痹血，得赤芍足以和肝；复用甘草调之，取其味平也。若湿气着于肌肉，则营卫之气不荣，令人痹而不仁，即为肉痿。肉痿即肉痹耳。是方也，防风、羌活，风药也，用之所以胜湿；《经》曰：营血虚则不仁，故用当归以养营；又曰：卫气虚则不用，故用黄耆以益卫，用夫赤芍、姜黄者，活其湿伤之血也；用夫甘草者，益其湿伤之气也。②《医方集解》：此足太阳厥阴药，辛能散寒，风能胜湿，防风、羌活除湿而疏风，气通则血活，血活则风散；黄耆、炙草补气而实卫，黄耆畏防风，合用而其功益大；当归、赤芍活血而和营，姜黄理血中之气，能入手足而祛寒湿也。③《古方选注》：蠲痹汤为治痹祖方，黄耆实卫，防风祛风，当归和营，羌活散寒，赤芍通脉络之痹，片子姜黄通经隧之痹，甘草和药性，姜枣和营卫。其义从营虚则不仁，卫虚则不用立法，岂非痹属内外因也乎？④《成方便读》：此方用黄耆益卫气，而以防风、羌活之善走者辅之，使之补而不滞，行而不泄，且两功并建，相得益彰。归、芍和营血，而以片子姜黄之走血行气、能除寒而燥湿者佐之，然后三气之邪自无留着之处。甘草和诸药而缓中补虚，姜、枣通营卫而生津达腠。故此方之治痹非关肝肾虚，筋骨为病者服之，效如桴鼓。立方之意，真所谓尽美耳。

【备考】 本方改为丸剂，名“蠲痹丸”（见《饲鹤亭集方》）。

15426 蠲饮万灵汤

【方源】《重订通俗伤寒论》卷二。

【组成】 芫花五分（酒炒） 煨甘遂八分 姜半夏六钱 浙茯苓八钱 大戟一钱（酒炒） 大黑枣十枚 炒广皮三钱 鲜生姜二钱

【功用】 急下停饮。

【主治】 停饮。

【方论选录】 何秀山按：停饮为患，轻则痞满呕吐，重则腹满肢肿，甚则化胀成臌，非峻逐之，无以奏功。此方君以芫花之辛辣，轻清入肺，直从至高之分，去郁陈莝；又以甘遂、大戟之苦泄，配大枣甘而润者缓攻之，则自胸及胁腹之饮，皆从二便

出矣，此仲景十枣汤之功用也。俞氏臣以二陈汤去甘草者，遵仲景痰饮以温药和之之法，佐以生姜之辛，合十枣之甘，则辛甘发散，散者散，降者降，停饮自无容留之地矣。名曰万灵，洵不愧也。

15427 蠲饮枳实丸

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【异名】蠲饮枳术丸(《袖珍》卷二)。

【组成】枳实（麸炒，去瓤） 半夏（汤洗，浸一宿，切，焙干） 陈橘皮（去白）各二两 黑牵牛半斤（取头末三两，余不用）

【用法】上为细末。煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【功用】逐饮消痰，导滞清膈。

【主治】①《杨氏家藏方》：痰饮。②《卫生宝鉴》：饮伤脾胃。

【方论选录】《脾胃论注释》：方中枳实麸炒以减其攻破之性，治积滞内阻所致的痞满胀痛；半夏燥湿除痰，和胃降逆；陈皮芳香健胃，行气化痰，牵牛决三焦壅滞，其性滑利，有通便泻水的作用。为丸饭后服，以减轻药物的副作用。姜汤送服，既解半夏之毒，又制牵牛之寒。面粉和生姜均为保护胃气而设。

15428 蠲痛无忧散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】苍术（米泔水浸，焙） 半夏（姜汁浸，焙） 川山甲（陈土炒） 川乌（黑豆酒煮，去皮尖） 草乌（生姜汁煮） 苦实（麻油炸浮） 当归（酒洗） 甘草各二两 麻黄三两 威灵仙一两 闹羊花（醋浸，炒黄色）四两

【用法】上药各为末，和匀。每服五七分至一钱，无灰酒调服，再饮以醉为度。盖卧出汗，避风。

【主治】一切肿毒痛。筋骨痛，头风痛，风寒湿痹，遍身疼痛，脚气痛风，及大麻风。

15429 蠲痛乳香丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】乳香（别研） 肉桂（去粗皮） 茴香（炒） 川楝干肉 青橘皮（去白） 陈橘皮（去白） 黑牵牛（炒）各一两 草乌头（去皮尖，锉，盐炒令黄，去盐不用） 槟榔 木香各半两

【用法】上为细末，用无灰酒煮面糊为丸，如梧桐子大。食前服四十丸，温酒或盐汤送下。

【功用】疏通经络，不发脚气。

【主治】寒湿脚气。足下隐痛，行履艰难，筋骨疼痛。

15430 蠲痛活络丹

【方源】《重订通俗伤寒论》卷九。

【组成】川乌 草乌 地龙各五钱 杜胆星六钱 明乳香 净没药各三钱 炒黑丑四十九粒 全蝎七只 麝香五分

【用法】酒糊为丸，每丸重四分。轻用一丸，重用二丸，姜汁竹沥送服。

【功用】搜涤络痰。

【主治】痰注。湿痰挟瘀流注经络，致手足牵引，四肢麻木，骨节串疼，或肿而痛者。

异名方索引

（一　画）

一

一气膏　12316
一母丸　11925
一扫光　00001
一扫光　12022
一奇散　04594
一服散　00022
一座香　10256
一黄散　10505
一粒金　00043
一捻金散　00029
一六甘露饮　02945
一六甘露散　02945
一味白术酒　03790
一物瓜蒂散　00057
一品花蛇酒　06587
一济生肾气丸　04637
一二三层茴香丸　00862

（二　画）

二

二木散　01813
二气丸　00066
二气散　03336
二丹丹　00070
二龙散　03830
二仙胶　07329
二仙散　00086
二圣散　03336
二圣膏　00178
二至丸　01424
二连丸　13034
二灵丹　08647
二陈丸　00095
二矾散　00104
二奇散　04594
二贤汤　00106
二物汤　03071
二和丸　10254
二和丹　05184
二和汤　00112
二油膏　00750
二宜汤　00950
二宜散　09961
二参丸　00070
二参丹　00070
二神丸　09848
二神汤　06430
二神汤　06646
二黄丸　00140
二黄丸　00566
二黄散　00145
二黄散　15177
二十八宿散　00272
二术五苓散　06682
二石荠苨汤　13053
二冬二母汤　00171
二圣救苦丹　00170
二百花草膏　00185
二陈二术汤　00159
二妙苍柏散　06646
二妙香良散　00022
二妙趁痛散　13919
二味左金丸　03191
二味苦参丸　08209
二味拔毒散　00177
二味败毒散　00177
二味参苏饮　09304
二味枳术丸　09548
二味香连丸　01078
二味桔梗汤　11074
二味消风散　11646
二味消毒丸　10712
二物乌头煎　02596
二炒苍柏散　06646
二味茯苓粉散　00186
二物大乌头煎　02596
二十四味流气饮　02199
二十四制青麟丸　08127
二陈加栀连生姜汤　00191

十

十子散　04071
十水丸　11908
十全饮　00199
十补汤　00199
十枣汤　03082
十奇散　02392
十味汤　00564
十宣散　02392
十全大补汤　00199
十全大补散　00199
十全大补膏　00199
十全内托散　02392
十味芎苏散　04935
十味芦荟丸　06699
十味托里散　02392
十味参苏饮　09305
十味香薷散　00233
十味保和散　00234
十宣内补散　02392
十一味木香散　01828
十一味异功散　01828
十三味败毒散　10813
十六味桔梗汤　11082
十七味大建中汤　12747
十八味丁沉透膈散　00246

丁

丁香丸　00247
丁香丸　00249
丁香丸　01446
丁香丸　11691
丁香丸　07281
丁沉透膈汤　00246
丁香半夏丸　03765

丁香半夏丸 14788
丁香半夏汤 01897
丁香痛气丸 05586
丁香柿蒂汤 00292
丁香柿蒂汤 00299

七

七气汤 04302
七气汤 06810
七白膏 00352
七阳散 00339
七味丸 00354
七物汤 00328
七沸汤 00321
七宝汤 00328
七宝散 00328
七宝散 07071
七香丸 01447
七味白术汤 03811
七味白术散 03811
七味连翘汤 02135
七味肥儿丸 08913
七味渗湿汤 13518
七味葱白汤 13852
七物厚朴汤 10130
七宝吹喉散 00332
七宝洗心散 10511
七宝美髯丸 00359
七宝紫苏饮 13984
七珍至宝丹 00359
七情手拈散 02412
七情交感丹 05693
七味肉豆蔻丸 05405
七味人参白术散 03811
七味龙胆泻肝汤 03275

八

八风丸 00364
八风汤 00365
八正汤 00366
八仙丸 08411
八仙丹 06764
八仙糕 11417
八味丸 02744
八味丸 08411
八味汤 08411
八味饮 08411
八物汤 00391
八宝丹 09517
八珍丸 00391
八珍汤 00391
八珍散 00366
八珍糕 08926
八将散 00395
八煎散 10609
八月束胎丸 06890
八仙长寿丸 00404
八仙长寿丹 00404
八仙庆寿酒 00371
八圣种子丹 00380
八味地黄丸 08411
八味地黄汤 08411
八味肾气丸 07613
八味肾气丸 08411
八味茴香丸 05341
八味逍遥散 04489
八味理中汤 00410
八味排脓汤 12833
八味排脓散 12833
八味黑神散 05397
八物附子汤 07927
八物顺气汤 00408
八宝红灵丹 06317
八宝红灵散 06317
八宝坤顺丹 08157

人

人丹 02260
人乳膏 03360
人参丸 04214
人参丸 06040
人参汤 12261
人参汤 00468
人参汤 00469
人参汤 00477
人参汤 00538
人参汤 01497
人参汤 01528
人参汤 07740
人参汤 10437
人参汤 11249
人参饮 00501
人参散 00442
人参散 00453
人参散 03779
人中白散 08121
人参芦汤 09303
人参煮散 00465
人参煮散 00502
人马平安散 10162
人参一捻金 00029
人参八味汤 00382
人参三白散 00508
人参化斑汤 04059
人参石膏汤 04059
人参平肺汤 00519
人参平肺饮 00519
人参归脾丸 03316
人参四顺汤 03483
人参四逆汤 03483
人参生脉散 03613
人参白术散 00526
人参白术散 03811
人参白虎汤 04059
人参当归饮 00538
人参当归散 00538
人参竹叶汤 05467
人参苏木散 09304
人参利膈丸 07198
人参羌活汤 00554
人参补肺散 00576
人参补胃汤 14810
人参补虚汤 00557
人参附子汤 07927
人参抱龙丸 08365
人参胡桃汤 06280
人参荆芥汤 00571
人参胃风汤 10190
人参前胡散 00564
人参前胡散 09305
人参养荣丸 10632
人参养荣汤 10632
人参消风散 11644
人参润肺散 11885
人参益胃汤 14810

人参资生丸 10360
人参通气散 00578
人参理中丸 12256
人参理中汤 12261
人参救肺汤 12894
人参救肺散 12894
人参鹿茸丸 00432
人参清肺饮 00601
人参清肺散 00601
人参款花膏 00620
人参蛤蚧散 14045
人参樗皮散 00480
人参蠃蛸散 12152
人参顺气饮子 13860
人参柴胡饮子 11303
人参黄芩黄连干姜汤 00896

九

九龙丸 00634
九龙丸 00635
九仙丹 00628
九仙丹 00632
九宝汤 00645
九宝饮 00645
九宝饮 00646
九厘散 00631
九龙败毒丸 00635
九转黄精丸 00657
九味羌活丸 00661
九味理中汤 12264
九味清脾汤 13406
九品扶阳散 00653
九蒸单豨莶丸 14855

（三 画）

三

三才丹 00672
三才汤 00672
三才膏 00672
三子汤 00832
三仁汤 07310
三仁粥 00693
三仙丸 00075
三仙丸 08523
三仙丹 14138
三仙串 00846
三仙散 00718
三生汤 00696
三白散 14677
三圣丹 00846
三圣散 00106
三圣散 00679
三合汤 00679
三合散 00679
三豆汤 00822
三豆饮 00822
三枝膏 14455
三物汤 00747
三物汤 03783
三物汤 10131
三和汤 00748
三星散 00204
三品锭 00849
三神汤 09803
三神汤 00764
三神散 10115
三蛇散 00678
三倍汤 15164
三消丸 00810
三黄丸 00732
三黄汤 09026
三黄汤 12704
三黄散 00785
三脘汤 00798
三棱丸 00809
三棱散 00805
三禁汤 01497
三五七汤 00818
三五七散 01139
三五七散 04590
三仁合剂 00675
三豆子汤 00822
三豆饼子 00822
三物白散 03741
三乙承气汤 00828
三才封髓丹 00672
三丰伐木丸 05442
三豆稀痘丹 00822
三层茴香丸 00862
三味牛黄丸 02422
三味参萸汤 07107
三味消毒饮 11677
三味消毒散 11677
三物小白散 03741
三物桃花汤 11128
三物猪苓散 13024
三建二香汤 00180
三黄石膏汤 03140
三黄金花丸 09705
三黄泻心汤 09026
三黄独活汤 00785
三黄解毒汤 12704
三蛇愈风丹 00797
三棱当归散 13657
三味天浆子散 01698
三物大建中汤 01068

干

干荷散 00885
干葛汤 02549
干地黄丸 03673
干地黄散 03676
干姜甘草汤 03063
干姜理中汤 12261
干葛解肌汤 13808
干熟地黄丸 15110
干姜芩连人参汤 00896
干姜黄连人参汤 00896
干姜黄连黄芩汤 00896
干葛参苓白术散 03811

寸

寸金 10505
寸金丸 08890
寸金丹 08890

下

下气汤 02398
下气散 02398
下胎乌金散 14094

大

大圣丹 10842
大红升 06296

大补丸 00201
大青汤 09103
大枣汤 00204
大枣汤 03082
大枣汤 00204
大枣汤 03082
大荣煎 00956
大通散 01190
大黄丸 00998
大黄丸 01209
大黄汤 09696
大黄汤 01169
大黄汤 01175
大黄散 01384
大黄散 04835
大黄散 09696
大智丸 09008
大七气汤 00302
大三脘散 00798
大山蒲丸 15180
大川芎丸 01361
大川芎汤 03384
大牛膝丸 02441
大化气汤 00302
大乌头汤 02596
大乌头煎 02596
大乌鸡丸 02606
大乌鸡丸 02647
大正气汤 01203
大甘桔汤 03034
大甘露饮 03061
大白前汤 03895
大半夏汤 01526
大芎辛汤 04939
大异功散 01037
大利膈丸 07197
大利膈丸 07198
大羌活汤 00661
大羌活汤 07465
大补阴丸 00934
大灵砂丹 07783
大阿魏丸 07832
大苦参丸 08210
大肾着汤 08423
大固脬丸 08530
大金花丸 09705
大建中汤 00243
大茴陈汤 09914
大荡胞汤 04864
大省风汤 01136
大追风散 10391
大活络丹 01186
大养脾丸 10642
大姜煎丸 07940
大健脾丸 11496
大消痞丸 11704
大粉草膏 08959
大理中丸 12256
大黄薄贴 00670
大续命汤 05016
大温中丸 11704
大温中汤 01116
大温经汤 14234
大蓟饮子 01009
大愈风汤 14612
大腹皮汤 01126
大腹皮饮 01126
大鳖甲煎 15381
大三七五散 04590
大三棱煎丸 00825
大无肥儿丸 08913
大圣枕中方 02797
大全大补丸 00199
大补十全散 00199
大补全鹿丸 05641
大补滋肾丸 12179
大青四物汤 00937
大枣甘草汤 03082
大造固真丹 01160
大效油煎散 09024
大海金砂散 11821
大菟丝子丸 12364
大黄豆卷散 06529
大黄备急丸 00846
大黄桃仁丸 00961
大黄黄连酒 01176
大黄黄柏汤 01175
大黄蠹虫丸 00913
大腿胸脐丸 14628
大牛黄清心丸 02470
大附子当归散 07903
大黄牡丹皮汤 01169
大聪明枕中方 02797
大圣玉屑无忧散 02989
大黄附子细辛汤 01170
大黄黄连泻心汤 09026
大圣夺命玉雪无忧散 02989
大黄黄柏栀子芒消汤 01175
大黄黄柏皮栀子消石汤 01175

万

万安丸 01603
万应丸 01210
万应膏 01245
万金汤 10460
万金饮 01217
万金散 01585
万病丸 01201
万病丸 10848
万氏牛黄丸 02471
万寿地芝丸 04710
万应太乙膏 01238
万应内伤膏 01238
万应红毛膏 01238
万应紫菀丸 02347
万病无忧酒 03500
万病回春丹 05365
万病回春丹 10848
万病解毒丸 10848
万病解毒丹 02194
万病解毒丹 10848
万氏牛黄清心丸 02471
万金不换抱龙丹 13672

与

与点丸 13288

上

上清散 01264
上清连翘散 07026

口

口疮煎 06830

山

山芋丸 01603
山芋丸 15180
山药丸 01603

千

千金汤 09191
千金散 00199
千捶膏 10826
千里水汤 01329
千金三黄汤 00785
千金不换方 01597
千金苇茎汤 06573
千金定喘汤 09191
千金指迷丸 09148
千金保孕丸 06498
千金神曲丸 10768
千金神造汤 15362
千金流水汤 01329
千金解毒丸 02194
千金磁朱丸 10768
千金鲤鱼汤 15097
千金麦门冬汤 06390

乞

乞力伽丸 05333

川

川乌散 01368
川归丸 04923
川芎汤 04594
川芎散 12253
川芎散 14757
川楝散 01387
川芎三黄汤 01391
川芎甘菊散 01367
川芎石膏散 01392
川芎当归汤 04594
川芎茯苓汤 10062
川芎茶调饮 01397
川羌肉桂汤 01395

久

久泻丸 03401

广

广笔牛子汤 01408

门

门冬饮 01412
门冬膏 13236
门冬饮子 01415
门冬饮子 06410
门冬饮子 06430
门冬饮子 06431

己

己椒苈黄丸 06171

卫

卫生宝 10848

女

女科八珍丸 00391
女科柏子仁丸 09649

小

小丹 13798
小麦汤 03082
小连丸 09413
小金丸 01436
小蓟汤 01514
小蓟饮 01514
小三黄丸 00776
小乌鸡丸 02610
小白术散 03781
小白薇丸 03927
小半夏汤 01526
小半夏汤 03719
小芎黄汤 04969
小竹沥汤 05442
小羊肉汤 05318
小投杯汤 07001
小羌活汤 07466
小阿魏丸 07831
小陈皮汤 15136
小抱龙丸 08363
小金花丸 09705
小参苏饮 09304
小承气汤 01071
小承气汤 12104
小驻车丸 09413
小茯苓汤 04247
小省风汤 15164
小独活汤 10445
小洗肝散 14809
小活络丸 10540
小活络丹 10540
小柴胡汤 01528
小柴胡汤 11356
小调经汤 12054
小调经散 12054
小黄龙丸 11639
小葶苈丸 13867
小温经汤 10150
小温经汤 14234
小蓟根汤 01442
小橘皮汤 15136
小儿回春丹 05365
小儿启脾丸 07759
小乌鸡煎丸 02610
小半夏茯苓汤 01526
小半夏茯苓汤 04247
小柴胡桂姜汤 11356
小儿万病回春丹 05365
小柴胡加生地黄汤 01528
小青龙去麻黄加杏子汤 01536

飞

飞龙化坚膏 01547
飞龙夺命丹 05048

马

马齿莱粥 01549
马兜铃汤 01560

子

子龙丸 13914

（四 画）

云

云盖三仙散 00691

元

元胡散 00717
元精丹 04170
元胡索散 04174
元胡索散 05577
元霜雪梨膏 04190
元霜紫雪膏 04190

无

无比丸 14879
无价散 05055
无名丹 00043
无忧散 02989
无忧散 07235
无比山药丸 01603

天

天乙丸 01606
天水散 11917
天水散 06955
天冬丸 01666
天冬汤 01670
天冬汤 01671
天冬饮 01702
天华散 01615
天花丸 02949
天疗散 01607
天竺散 01683
天真散 01623
天麻丸 06053
天雄散 01139
天一水串 01606
天仙藤饮 01680
天仙藤散 10261
天花粉丸 02949
天竺黄散 01683
天南星丸 01141
天麻煎丸 01717
天王补心丹 01703
天麦二冬膏 00079
天麻雄黄散 13941
天然透邪丹 09872
天地人三才丸 00672
天下受拜平胃散 02868

开

开心丸 09169
开关散 12182
开关膏 11449
开骨膏 14607
开结散 03846
开滞散 11897
开关利膈丸 07198
开郁导饮丸 01760
开郁种子汤 01750
开明银海丹 10165
开结导引丸 01760
开结导饮丸 01760
开结导痰汤 01747
开结舒筋汤 01761
开菀二陈汤 01748

不

不二散 05078
不老丹 06898
不换金正气散 01769
不换金拨云丹 01772

木

木瓜丸 06600
木瓜汤 01783
木瓜汤 09965
木瓜散 01781
木瓜煎 01778
木茱汤 09965
木香汤 01449
木香汤 01833
木香散 01813
木香散 02010
木通汤 15316
木通汤 01868
木通散 01862
木防己汤 06131
木防己汤 06132
木香煮散 01829
木瓜茱萸汤 09965
木香化气汤 02331
木香化滞汤 11244
木香化滞散 11244
木香匀气散 02673
木香导滞丸 09608
木香利膈丸 07104
木香枳实丸 01905
木香顺气散 02673
木香神效散 01928
木香真珠丸 11152
木香流气饮 02199
木香调气饮 02673
木香调气散 02673
木香人参干姜枳术丸 01939
木防己汤去石膏加茯苓芒消汤 01938

瓦

瓦垄子丸 01940

王

王氏连朴饮 07017
王母四童散 05022

五

五九散 11584
五仁丸 14351
五仁汤 14351
五叶汤 02112
五皮饮 01969
五圣汤 01967
五利汤 00971
五饮煎 01977
五灵散 01984
五苓汤 01988
五苓散 09918
五矾散 08956
五拗散 01992
五味丸 02078
五味汤 02088
五味散 01184
五物汤 12773
五物散 09495
五宝丹 02093
五宝散 02093
五香饼 10259
五香鸭 02011
五香散 02009

五香散 02010
五香散 02132
五香膏 14056
五淋汤 01298
五淋散 01298
五痫丹 00811
五蒸饮 02040
五蒸散 02040
五痹汤 04361
五痹汤 14153
五痹汤 14962
五痹散 04361
五膈汤 02045
五膈散 02048
五噎汤 02047
五噎散 02045
五马破曹 02961
五加皮酒 01965
五灵脂丸 01985
五灵脂散 07787
五苓饮子 01988
五味子汤 01560
五味子汤 01998
五味子散 00361
五味子膏 01999
五子五皮饮 02106
五汁玉泉丸 02944
五利大黄汤 00971
五苓茵陈散 09918
五虎斩劳汤 01995
五味当归散 05218
五味血竭散 05614
五味安胎丸 05217
五味异功散 05959
五味细辛汤 08251
五味香薷饮 02130
五味消毒汤 02129
五物香薷饮 02130
五宝圣灵丹 02093
五疳芜荑丸 08912
五疳保童丸 02030
五疳消积丸 02142
五兽三匮丸 02146
五痫神应丸 02037
五福化毒丸 02150
五芝地仙金髓丸 05785

牙

牙宣散 02162
牙痛一粒笑 00032

车

车狗散 12841
车前散 10535
车前粥 02173
车前子散 02169
车前子散 10535
车前子粥 02173

太

太乙丹 10848
太乙膏 02178
太白散 11917
太极丸 01517
太极丸 02485
太乙膏丸 02178
太乙玉枢丹 02194
太乙玉枢丹 10848
太乙灵应膏 02178
太乙清凉膏 02178
太乙紫金丹 02194
太乙紫金锭 02194
太乙紫金锭 10848
太山盘石丸 02198
太医常山饮 12918

巨

巨胜丸 02442
巨胜浸酒 02201

止

止血汤 13605
止汗汤 02211
止涎汤 07444
止衄丹 07445
止痛散 05748
止血四生汤 03383
止血定痛丹 02234
止疼没药散 07380
止痛没药散 07380
止痛良附丸 07763
止渴润燥汤 05310
止嗽琼珠膏 13686

少

少林截血丹 10505

中

中白散 00497
中和汤 05708

内

内托散 01218
内托散 02392
内托散 07004
内补丸 01228
内补方 02300
内补散 02300
内补散 02392
内消丸 12912
内消散 04769
内障丸 05900
内伤膏药 01238
内障神方 10768
内外复煎散 02293
内托安神汤 02290
内托护心散 02268
内托香粉散 02268
内托复煎汤 02293
内托青柴汤 02295
内托酒煎汤 12781
内托酒煎散 12781
内托黄耆饮 02298
内护排脓散 12832
内补十宣散 02392
内补当归丸 02273
内补当归汤 02312
内补当归散 02300
内补建中汤 02312
内补黄耆散 02302
内补鹿茸丸 13102
内障升麻汤 11373
内托青柴酒煎汤 02295
内托黄耆柴胡汤 02295
内托黄耆酒煎汤 12781

贝

贝母汤 02317
贝齿汤 02322

见

见睍丹 02325

仁

仁丹 02260

化

化气散 02331
化虫丹 02335
化毒丸 02148
化斑汤 04059
化痞丸 02352
化滞丸 11406
化水种玉丹 02372
化腐生肌散 03703
化腐紫霜膏 02390
化毒排脓内补散 02392
化毒排脓内补十味散 02392

仓

仓公酒 02399
仓廪散 02397
仓公下气散 02398
仓公当归酒 02399

分

分气散 02400
分清饮 02404
分清饮 12359
分清散 02403
分清散 12359
分气紫苏汤 02408

壬

壬子丸 14563

手

手拈丸 02411
手握丹 14600

牛

牛郎串 14109
牛郎顶 02436
牛黄丸 02470
牛黄丸 02471
牛黄散 05055
牛黄散 00029
牛黄散 02428
牛膝丸 14717
牛膝散 02065
牛膝膏 04798
牛蒡子饮 02456
牛蒡子散 02456
牛蒡子散 02458
牛黄夺命散 05055
牛黄清心饮 13252
牛膝四物汤 02477

升

升麻汤 02503
升麻汤 02538
升麻汤 02549
升麻汤 06029
升麻饮 02506
升麻散 02506
升麻散 02549
升麻散 06029
升麻煎 02503
升气和中汤 10378
升阳发表汤 02535
升阳防风汤 02560
升阳补胃汤 02536
升阳和血汤 02559
升阳泄火汤 07754
升阳泄阴丸 02523
升阳泄阴汤 02523
升阳泻热汤 02480
升阳泻湿汤 02480
升阳降火汤 07754
升阳除湿汤 02517
升阳除湿汤 02560
升阳益胃汤 02516
升阳益胃汤 11980
升阳益胃散 12690
升阳调经汤 02520
升阳滋血汤 02524
升阳燥湿汤 07083
升苍荷叶散 02494
升麻白芷汤 05714
升麻附子汤 02558
升麻除湿汤 02519
升麻荷叶散 02494
升麻柴胡汤 00591
升麻调经汤 02527
升翘六合汤 02531
升阳去湿和血汤 02559
升阳除湿和血汤 02559
升麻去湿和血散 02559
升麻龙胆草饮子 03255
升阳泄阴羌活柴胡补阳汤 02523

长

长春丸 02564
长将散 03096
长春补药方 02569
长胎白术丸 03770

反

反魂丹 02643

乌

乌龙丸 10842
乌龙丹 10842
乌龙丹 12788
乌龙串 00043
乌头丸 06780
乌头丸 10842
乌头汤 02656
乌头汤 08360
乌头粥 01360
乌附汤 01452
乌鸡丸 14386
乌鸡汤 03644
乌金丸 02612
乌金丸 10847
乌金散 05397
乌金散 08029
乌药散 01161
乌贼丸 03488

乌梅丹 02622
乌梅汤 09701
乌犀丸 14091
乌头煮散 02594
乌头煎丸 02460
乌鸡煎丸 02610
乌骨丸 03488
乌鱼骨丸 03488
乌头桂枝汤 08360
乌苓通气汤 02660
乌药顺气汤 02662
乌药顺气散 00408
乌须至补丹 07864
乌须健阳丹 00359
乌贼鱼骨丸 03488
乌贼蔷茹丸 03488
乌梅三物散 00747
乌梅安胃丸 02622
乌蛇苦参丸 08205
乌头赤石脂丸 06780

丹

丹栀逍遥丸 04489
丹栀逍遥散 04489

月

月白珍珠散 09512

凤

凤髓丹 02916

六

六一散 11917
六丁丸 10257
六仙散 00497
六合汤 02698
六合汤 02720
六合汤 07930
六味丸 04718
六味汤 04718
六柱汤 02722
六柱饮 02722
六神丸 02725
六神散 02726
六黄汤 05257
六君子丸 02731
六磨饮子 02730
六一甘露散 02945
六气经纬丸 05273
六味地黄丸 04718
六味地黄汤 04718
六味回阳饮 09907
六味肥儿丸 08915
六味茯苓汤 10005
六和豆蔻汤 02014
六神通圣散 02741
六味栀子仁汤 09687
六味竹叶石膏汤 05468

文

文蛤膏 02750

火

火龙丸 03206
火齐汤 00784
火轮丹 14855
火剂汤 12704
火府丸 02758

斗

斗门丸 02757

双

双枝散 07527
双和散 02774
双美丸 08969
双解散 11917
双鳖丸 11712
双解金桂丸 02783

引

引风汤 02695

孔

孔子枕中散 02797
孔圣枕中丹 02797
孔子大圣枕中方 02797
孔子大圣枕中汤 02797
孔子大圣知枕中方 02797

巴

巴豆三味丸 00846
巴豆三棱丸 01886

水

水芝丹 02819
水沉汤 02820
水肿饮 01680
水解丸 14077
水陆二仙丹 02821
水溶金丝膏 02836

（五 画）

正

正一丹 05184
正元丹 02901
正元汤 02899
正元汤 02901
正元汤 08526
正元饮 05188
正气散 02903
正气散 05962
正气散 15336
正阳散 02899
正气天香汤 02918
正诚露珠丹 02909
正骨紫金丸 02921

玉

玉正散 02948
玉龙汤 07865
玉龙膏 05376
玉贞散 02948
玉血饮 02549
玉红膏 03702
玉枢丹 02194
玉枢丹 10848
玉泉散 01615
玉泉煎 02945
玉泉膏 02944
玉真丹 02948
玉真散 05183
玉壶丸 02385

玉壶丹 02385
玉壶丹 12226
玉容粉 02959
玉容散 02988
玉屑散 02962
玉绣球 00006
玉匙散 02942
玉锁丹 11421
玉锁匙 02942
玉锁散 11421
玉糊膏 13398
玉露丸 02977
玉露饮 02977
玉露散 13394
玉容肥皂 08924
玉补正心丹 02884
玉容肥皂丸 08924
玉锁九真丹 02992

甘

甘连散 06830
甘草汤 01059
甘草汤 03082
甘草汤 03084
甘草汤 04069
甘草汤 05931
甘草汤 08958
甘草汤 10083
甘草汤 11074
甘草酒 03031
甘草散 03023
甘莲散 11186
甘桔汤 09803
甘菊汤 03058
甘遂丸 14383
甘遂散 14383
甘露饮 03052
甘露饮 03061
甘露散 02977
甘露饮子 13314
甘麦大枣汤 03082
甘连大黄丸 08159
甘草大枣汤 10082
甘草桔梗汤 11074
甘草黑豆汤 03081
甘姜苓术汤 03084
甘露消毒丸 03080

世

世传茯苓丸 09148

艾

艾附丸 02848
艾叶地黄汤 04985

节

节斋化痰丸 02364

平

平气散 02852
平胃丸 02868
平肝止血汤 02892
平胃五苓散 10192
平胃枳术丸 02881

术

术附汤 07918
术苓汤 10192

石

石韦饮 03096
石杏膏 03102
石莲散 11182
石斛丸 08847
石碱丸 01468
石膏汤 09477
石膏散 13959
石燕丸 03170
石决明散 01035
石榴根汤 03134
石燕子丸 03170
石子荠苨汤 13053
石斛万病散 13510
石斛夜光丸 08970
石膏竹叶汤 05467

左

左龙丸 05759
左关煎 07227

龙

龙荟丸 03244
龙骨汤 11058
龙胆丸 03256
龙胆汤 03275
龙胆汤 03276
龙胆汤 03447
龙胆饮 03237
龙射丸 02285
龙脑饮 03257
龙黄散 03867
龙眼膏 02938
龙胆草汤 03276
龙胆草散 09880
龙脑饮子 03255
龙牙清魂散 03265
龙肝凤髓丸 03196
龙骨牡蛎汤 11058
龙胆泻肝丸 03274
龙胆泻肝汤 04631
龙胆清肝汤 03276
龙脑黄连膏 12472

戊

戊己汤 04897

归

归芎汤 10843
归杞汤 03298
归灵散 03301
归参丸 09295
归神丸 03309
归葛煎 03313
归脾丸 03316
归脾饮 03316
归脾散 03316
归姜枣汤 03308
归术破癥汤 03320
归母苦参丸 05317
归芍六君丸 03330
归芍六君汤 03330
归灵内托散 03301
归脾养荣汤 03316
归芍六君子丸 03330

卢

卢氏感应丸 03335

史

史国公酒 03500
史国公药酒 03500
史国公浸酒良方 03500
史国公百病无忧药酒 03500

四

四七汤 04302
四七饮 04302
四生丸 03383
四生饮 00696
四仙饮 03311
四汁饮 02017
四圣汤 03362
四圣汤 03366
四圣汤 03779
四君汤 03779
四灵丹 03421
四妙丸 03375
四妙汤 10831
四苓丸 03381
四苓汤 03381
四物丸 03384
四物汤 01163
四物汤 04915
四物汤 07930
四金刚 10831
四顺汤 03483
四顺饮 03483
四顺饮 04596
四顺散 03406
四顺散 04596
四逆汤 05321
四神丸 05417
四神丹 03400
四神丹 07226
四神汤 03311
四神汤 03406
四神汤 05967
四神煎 00337
四神煎 07107
四调膏 10398
四黄散 10505
四兽汤 03422
四等散 03407
四温汤 03424
四蒸丸 03472
四磨汤 03429
四磨汤 07417
四磨饮 03428
四七气汤 03345
四君子丸 03779
四君子汤 03779
四味紫丸 13977
四顺饮子 04596
四连二物汤 00173
四味人参汤 00896
四味升葛汤 02549
四味白术汤 03817
四味地榆散 09106
四味回阳饮 03483
四味连香丸 03444
四味阿魏丸 07831
四味肥儿丸 08912
四味茱连丸 03445
四制茱萸丸 05044
四味香薷饮 10820
四味排脓散 12832
四物甘草汤 13212
四物芩连汤 03478
四物补血汤 03456
四物补肝汤 03456
四物附子汤 03066
四物知柏汤 02718
四物香薷饮 10820
四物消风散 03461
四物解肌汤 04915
四物解毒汤 03478
四制枳壳丸 03387
四制香附丸 06263
四炒枳壳丸 03387
四顺理中丸 12256
四顺清凉饮 04596
四顺清凉饮 13426
四逆茱萸汤 05321
四逆萸姜汤 05321
四配清中饮 04596
四味大黄饮子 04596
四味肉苁蓉丸 05417
四物加竹沥汤 03499
四顺清凉饮子 04596
四逆加猪胆汤 12252
四时加减柴胡汤 03489
四味升麻葛根汤 02549
四逆加吴茱萸汤 09976
四逆加猪胆汤 12252
四蜀石刻安肾丸 05023
四物加芩连姜夏汤 03493
四物加桃仁红花汤 04386
四物加黄芩白术汤 12619
四物加黄芩黄连汤 03478
四乌贼一藘茹二妙丸 03488
四君子加竹沥姜汁方 03495
四君子加姜汁竹沥方 03495
四逆加吴茱萸生姜汤 05321
四逆散加五味干姜汤 03497
四君子加白芍药高良姜汤 03494
四物加桃仁红花竹沥姜汁方 03499

代

代灸散 02272
代参膏 02938
代赭石散 14732
代抵当汤丸 03515
代赭旋覆汤 13080

仙

仙膏 05711
仙术散 03525
仙灵酒 03544
仙茅丸 02563
仙灵脾酒 03544
仙遗粮汤 11444
仙方活命饮 10813
仙传化毒汤 05337
仙传保命丹 11028
仙传斑龙丸 13690
仙传斑龙丸 13691
仙传保产无忧散 01597

外

外台走马汤 01543
外台茯苓饮 10008
外科硇砂膏 12809
外科清心汤 13250

冬

冬瓜粥 03560
冬葵散 03571
冬葵子汤 03569
冬葵子散 03563
冬瓜子仁散 03565
冬味地黄丸 00404
冬味地黄汤 00404

失

失笑丸 03578
失笑膏 03578

生

生地粥 04770
生肌散 03703
生肌散 11806
生肌膏 03702
生肝饮 14353
生乳丹 12198
生鱼汤 15097
生胃丸 03610
生脉汤 03613
生脉饮 03613
生津汤 10566
生犀汤 03625
生犀散 03623
生地黄丸 04717
生地黄丸 04724
生地黄汤 03649
生地黄汤 04734
生地黄汤 11614
生地黄粥 04770
生地黄膏 13682
生地黄膏 14065
生附子散 03664
生铁落汤 03666
生干地黄散 03633
生地八味汤 03685
生地芩连汤 03734
生地黄连汤 03689
生地黄连汤 03734
生地黄饮子 03649
生地黄饮子 04827
生血润燥饮 03699
生麦门冬汤 06408
生津甘露饮 03736
生津麦冬汤 06410
生姜枳实汤 11053
生姜橘皮汤 15136
生料五苓散 01988
生料五积散 02026
生料正元饮 02900
生料平胃散 02868
生料鸡苏散 08000
生料固本丸 00566
生料调气散 02673
生料鹿茸丸 13103
生料鹿茸丸 13104
生精种子丸 03737
生熟地黄丸 15105
生熟地黄丸 15110
生熟地黄汤 15110
生津地黄饮子 04827
生姜汁半夏汤 03719

白

白丸子 08144
白术丸 03815
白术丸 12256
白术汤 03422
白术汤 03789
白术汤 03809
白术汤 03811
白术汤 03817
白术汤 04038
白术汤 04039
白术汤 09119
白术汤 09235
白术汤 09550
白术饮 03790
白术散 01722
白术散 03779
白术散 03780
白术散 03781
白术散 03789
白术散 09380
白术煎 06132
白龙散 01553
白龙散 03867
白皮散 05008
白芷丸 03850
白芷散 03838
白芷散 09132
白花散 04857
白灵药 03885
白附散 02948
白附散 02948
白附散 03980
白矾散 00086
白蔹汤 03919
白蔹散 12493
白薇丸 15279
白氏眼药 04056
白龙骨散 09538
白归脾丸 03316
白头翁汤 04069
白芍药汤 04881
白花蛇散 01190
白花蛇散 04819
白花蛇散 14075
白花蛇膏 08034
白茅根汤 03984
白降雪丹 03988
白茯苓丸 06894
白茯苓粥 10018
白鲜皮汤 04015
白玉化痰丸 03880
白术芍药散 14194
白术防风汤 14194
白术助胃丹 03821
白术附子汤 11067
白术附子汤 03004
白术附子汤 03066
白术和胃丸 02865
白术茯苓汤 11064
白术调元散 09380
白术黄耆汤 04031

白虎人参汤 04059
白虎化斑汤 04059
白虎加苍汤 04060
白虎加桂汤 04062
白虎苍术汤 04060
白虎解毒汤 04063
白果定喘汤 09191
白术半夏天麻汤 04312
白术茯苓泽泻汤 03812
白虎合黄连解毒汤 04063
白通加人尿猪胆汁汤 04068

瓜

瓜丁散 09438
瓜子汤 01169
瓜子汤 07310
瓜莲丸 00810
瓜蒂汤 00057
瓜蒂膏 15021
瓜蒌散 11097
瓜子仁汤 15193
瓜蒌子汤 15193
瓜蒌仁汤 15193
瓜蒌实丸 04078
瓜贝养荣汤 13879
瓜蒌半夏丸 04243
瓜蒌牡蛎散 11104
瓜蒌乳香散 04083
瓜蒌桂枝汤 11106
瓜蒌薤白汤 11110
瓜蒌瞿麦丸 11108
瓜蒌根桂枝汤 11106
瓜蒌半夏白酒汤 11110
瓜蒌薤白白酒汤 11109
瓜蒌薤白半夏汤 11110

乐

乐令建中汤 04100
乐令大黄煮汤 04100

立

立应散 00022
立应散 04225
立胜煎 04118
立退丸 11414
立效汤 04123
立效散 04121
立效散 04924
立效散 04954
立消丹 04145
立消散 04145
立消膏 04143

玄

玄门丹 04159
玄归散 05225
玄附汤 05570
玄武汤 11151
玄参汤 04182
玄参汤 10533
玄参饮 04157
玄胡酒 04166
玄胡散 04173
玄菟煎 04169
玄蝎散 01587
玄胡索丸 04168
玄胡索汤 04189
玄胡索汤 05576
玄胡索散 05576
玄明春雪膏 09534
玄参甘草汤 04182
玄参泻肝散 06397
玄胡当归散 05225
玄精紫雪膏 04190
玄胡索苦楝汤 04189

兰

兰香饮子 03056

半

半星丸 08391
半桃丸 04281
半夏丸 01459
半夏丸 06948
半夏汤 01329
半夏汤 01460
半夏汤 04298
半夏汤 04311
半夏汤 11076
半夏汤 13912
半夏散 04298
半术天麻汤 04312
半夏丁香丸 00285
半夏天麻丸 04312
半夏天麻汤 04312
半夏生姜汤 01460
半夏苍术汤 07599
半夏苦酒汤 08226
半夏茯苓汤 01526
半夏桂甘汤 04246
半夏秫米汤 04245
半夏藿香丸 00285
半湿半热汤 04310
半夏东流水汤 04311
半夏加茯苓汤 01526
半夏天麻白术汤 04312
半夏茯苓天麻汤 04312
半夏桂枝甘草汤 04246

头

头风散 04232

汉

汉防已汤 01877
汉防已汤 06132
汉防已散 04106

宁

宁志丸 04199
宁嗽金丹 02183
宁肺桔梗汤 11082
宁神固精丸 08536
宁神定志丸 04197
宁嗽太平丸 02183

必

必胜散 11677

出

出声散 00745

加

加味二妙丸 04351
加味八味丸 04451
加味八味丸 04533

加味八珍汤 00199
加味三补丸 04352
加味三黄丸 07283
加味平胃散 02867
加味龙胆汤 04631
加味归脾汤 03316
加味四七汤 04341
加味四君汤 04582
加味四味汤 04387
加味四物汤 02713
加味四物汤 14970
加味生脉散 02082
加味地黄丸 00404
加味地黄汤 08411
加味芎归汤 04422
加味安志丸 04415
加味导赤散 14963
加味枳术丸 12010
加味荆黄汤 11673
加味姜附汤 09921
加味神应丸 05867
加味逍遥丸 04489
加味逍遥散 04489
加味润下丸 11860
加味理中饮 04505
加味麻黄汤 13196
加味清胃汤 04515
加味葵子散 04628
加味解毒饮 04528
加味僵黄丸 02286
加味藿香饮 04530
加减八味汤 04533
加减三黄丸 10765
加减三黄汤 00785
加减双解散 14967
加减四斤丸 04380
加减四物汤 14970
加减抱龙丸 08363
加减固本丸 00070
加减参附汤 04469
加减栀子汤 09692
加减桂枝汤 04062
加减理中丸 14977
加减黄连散 04549
加减解毒丸 02194
加味消毒饮子 04496
加味龙胆泻肝汤 04631
加味葵子茯苓汤 04628
加减八味地黄丸 04533
加减金匮肾气汤 04451

对

对金饮子 10192
对星香散 10185

圣

圣后丹 10848
圣效方 04648
圣散子 14186
圣援丹 10848
圣功川芎汤 10843

发

发汗散 12025
发背膏 04687

母

母丁香饼 04691

（六 画）

戎

戎盐汤 10069

地

地龙丸 04704
地龙汤 04704
地龙散 05221
地仙丹 09473
地黄丸 14103
地黄丸 00566
地黄丸 00879
地黄丸 03724
地黄丸 04710
地黄丸 04746
地黄丸 07509
地黄丸 08411
地黄汤 00881
地黄汤 01528
地黄汤 03633
地黄汤 03733
地黄汤 04718
地黄汤 04899
地黄汤 11614
地黄汤 15106
地黄饮 04765
地黄饮 04826
地黄饮 04827
地黄饮 04828
地黄散 03646
地黄散 04744
地黄煎 04747
地黄膏 03647
地黄膏 04765
地黄膏 04778
地黄膏 14065
地榆汤 04794
地榆散 09106
地髓汤 03384
地髓汤 08399
地骨皮汤 04818
地黄饮子 04746
地黄煎丸 01201
地黄煎丸 04717
地黄当归汤 02273
地黄茵陈汤 04743
地黄清肺饮 13309
地榆防风汤 04846
地榆槐角丸 14450
地骨皮枳壳散 04818

朴

朴消散 07072

耳

耳鸣丸 05038

芋

芋艿丸 15355
芋艿粥 04865

共

共殿香 10256

芍

芍药汤 01478

芍药汤 04889
芍药汤 04893
芍药汤 04897
芍药汤 05217
芍药散 04909
芍药解肌汤 04915
芍药附子甘草汤 04914

芒

芒消丸 04867

芎

芎乌散 01368
芎术丸 13908
芎归汤 04422
芎归汤 04927
芎归汤 04954
芎归汤 04999
芎归汤 10843
芎归饮 10843
芎归散 03406
芎归散 04943
芎归散 10843
芎芷丸 04968
芎芷散 03151
芎芷膏 04968
芎苏饮 04935
芎辛汤 01462
芎辛汤 04942
芎辛散 04939
芎辛散 04940
芎羌汤 04943
芎附汤 04945
芎附散 04944
芎香散 04944
芎活汤 04948
芎劳丸 04968
芎劳汤 04940
芎劳汤 04999
芎劳汤 10843
芎劳汤 13410
芎劳散 03791
芎劳散 04594
芎劳散 04928
芎劳散 04943
芎劳散 10843
芎黄汤 01032
芎犀散 04973
芎归补中汤 04995
芎归补血汤 04995
芎归泻心汤 04988
芎芷香苏散 04935
芎椒白术散 03791
芎归加芍药汤 04999
芎劳加芍药汤 04999
芎劳汤加芍药方 04999

吉

吉州醒脾散 15172

老

老奴丸 05002

再

再生丸 08890
再生丹 01544
再生丹 14613
再造饮 05030
再造散 12229
再生活血止痛散 10233

西

西黄丸 14392
西黄醒消丸 14392

在

在乌头桂枝汤 02656

百

百水散 05079
百生丸 08890
百合丸 05081
百合汤 05122
百花膏 03851
百花膏 05091
百花膏 05244
百谷丸 01091
百药煎 09213
百部饮 05119
百部酊 05107
百解散 11726
百草霜散 05117
百合代赭汤 14289
百合固金丸 05125
百合滑赭汤 14289
百补全鹿丸 05641
百补交精丸 05128
百补鹿胎丸 10840
百选肥儿丸 14140
百病无忧散 02026
百疾薯蓣丸 15180
百解发汗散 11726
百合生地黄汤 05122
百合鸡子黄汤 05123
百合滑石代赭汤 14289

托

托里散 02268
托里散 02392
托里散 09174
托里散 10831
托脐饼 07306
托里十补散 02392
托里十宣散 02392
托里护心散 02268
托里护心散 05139
托里和中汤 05156
托里定痛汤 05147
托里荣卫汤 02292
托里消毒饮 05153
托里益黄汤 05156
托里黄耆汤 12781
托里黄耆汤 02302
托里温中散 05162

扫

扫虫散 05168

过

过街笑 08962

夺

夺命丸 05042
夺命丸 11028
夺命丹 03885

夺命丹 05183
夺命丹 11028
夺命散 02396
夺命散 05183
夺命散 11249
夺命无忧散 02989
夺命独参汤 11249

达

达原丸 05077
达原散 05077

至

至宝膏 05179
至圣还原丸 05077
至妙立消膏 04145

当

当归丸 04923
当归汤 02399
当归汤 03406
当归汤 04954
当归汤 04596
当归汤 05226
当归汤 05228
当归汤 05318
当归汤 10843
当归散 02274
当归散 02300
当归散 03406
当归散 04888
当归散 04985
当归散 05204
当归散 05207
当归散 05211
当归散 12146
当归膏 11422
当面可 09852
当归头散 05233
当归煎丸 05242
当归二黄散 05249
当归止痛汤 05289
当归龙荟丸 03244
当归龙胆丸 03244
当归地黄汤 10674
当归芍药片 05273
当归芍药汤 00538
当归芍药汤 04881
当归芍药汤 05273
当归合气散 12865
当归导气散 05277
当归没药丸 05191
当归灵没丸 05191
当归和血汤 05290
当归和血饮 05303
当归和血散 05303
当归建中汤 02312
当归茵陈汤 05265
当归茯苓散 05273
当归复元汤 10233
当归独活汤 10459
当归活血丸 05305
当归消毒饮 10813
当归润燥汤 11896
当归黄耆散 05313
当归赤小豆散 06821

光

光明丹 10165
光明散 05323

吐

吐痰散 12907

岁

岁旦屠苏酒 13579

团

团参丸 05346
团参汤 05235
团参汤 05348
团参散 05235
团参饮子 05345
团参补气丸 15180

回

回令丸 03191
回头散 05367
回阳饮 00406
回阳饮 03483
回疔丹 04148
回金丸 03191
回春丸 05341
回疮锭 05371
回生锭子 05371
回阳玉龙丹 05376
回阳玉龙膏 06987
回阳返本汤 05380
回阳急救汤 05380
回毒银花散 05383
回疮银花汤 05383
回毒金银花汤 03311
回毒金银花汤 05383
回疮金银花散 05383

肉

肉附丸 05401
肉蔻丸 05404
肉苁蓉丸 11869
肉苁蓉丸 06600
肉豆蔻丸 05408
肉桂七味饮 00354

竹

竹叶汤 05467
竹叶汤 06401
竹皮汤 05450
竹沥丸 05482
竹沥水 05445
竹沥汤 05445
竹沥汤 05463
竹茹汤 05464
竹茹汤 13514
竹茹汤 15151
竹茹散 05458
竹叶防风汤 05424
竹叶麦冬汤 05431
竹叶泻肝汤 05473
竹叶泻肝散 05473
竹叶恒山汤 05476
竹叶黄耆汤 05472
竹沥化痰丸 06005
竹沥运痰丸 05482
竹茹麦冬汤 05451
竹茹麦冬汤 05489

竹茹橘皮汤 15151
竹叶加生姜汤 05467

朱

朱沉丹 05499
朱矾散 10343
朱砂丸 05517
朱砂丹 10723
朱子读书丸 11947
朱衣滚痰丸 05526
朱附钟乳丸 05501
朱砂五苓散 06945
朱砂甘遂丸 14383
朱砂芦荟丸 06895
朱砂益元散 06955
朱砂滚涎散 05525
朱砂滚痰丸 05525
朱砂酸枣仁乳香散 06940

伏

伏龙肝汤 12402
伏龙肝散 05333
伏龙肝散 05334
伏龙肝散 10416
伏龙肝散 12402

仲

仲景百劳丸 05092

伤

伤原活血汤 10233

华

华盖汤 05554
华陀愈风散 14613

延

延寿丸 08890
延寿丹 02844
延寿丹 06907
延寿丹 08890
延寿丹 11423
延寿汤 12559
延灵丹 07226
延胡散 00717
延胡散 04173
延胡散 05580
延胡散 05581
延胡索饮 05578
延胡索散 00717
延胡索散 05225
延年益寿丹 06898
延年益嗣丹 06898
延寿不老丹 06898
延胡四物汤 04188
延胡苦楝丸 04189
延胡苦楝汤 04189
延龄广嗣丸 05594
延龄护宝丹 05588
延龄固本丸 05589
延龄育子丸 05591
延龄育子方 05590
延年益寿不老丹 06898

血

血竭散 15367
血癥丸 07448
血府逐瘀丸 05617
血竭内消丸 02309

行

行气香苏饮 05624
行气香苏饮 05628

舟

舟车神祐丸 05633

全

全阳汤 05638
全身汤 05639
全蝎丸 15406
全蝎散 05654
全蝎散 05661
全蝎散 06277
全蝎散 14877
全生白术散 03809
全真益气汤 05660
全蝎五痫丸 00811
全蝎生皮丸 05661
全蝎延胡散 05054
全蝎观音散 06277

会

会六合汤 07930

合

合明丸 05671
合掌散 15018
合欢皮散 05669

杀

杀虫乌梅丸 02622

刘

刘庭瑞通圣散 06155

交

交感地黄丸 05696

冲

冲元汤 05708
冲和汤 00661
冲和汤 09305
冲和散 05711
冲和膏 05711
冲和补气汤 14277
冲和养胃汤 11373
冲和赶毒散 05711

决

决阴煎 05728
决明子丸 05718
决明夜光散 05733

冰

冰王散 05747
冰石散 03019
冰硼散 05351
冰螺捻 05751
冰螺散 05751

汗

汗斑散 05757

江

江鳔散 05759

汤

汤泡散 10527
汤火至圣膏 05176

壮

壮元汤 05773
壮阳丹 01590
壮阳种子丸 05778
壮阳种子方 09344

守

守中汤 05789

安

安中汤 05793
安老丹 05796
安志膏 09317
安肾丸 05808
安和饮 05866
安荣丸 05812
安荣汤 05812
安胃丸 02622
安胃散 05818
安胎丸 05217
安胎饮 05852
安胎饮 06615
安胎散 02198
安宫丸 05869
安神丸 05517
安神散 02290
安神散 05831
安珠散 02401
安蛔丸 05845
安寝丸 05517
安攘丸 11028
安息香丸 05333
安胎万全汤 05884
安胎白术散 03791
安胎利气饮 05866
安胎和气饮 05866
安宫牛黄散 05869
安睡如神汤 05859
安胎万全神应汤 05884

羊

羊肉汤 05275
羊肉汤 05318
羊肝丸 05942
羊肝丸 14597
羊肝羹 05906
羊肾丸 12324
羊肾汤 05947
羊乳丸 12439
羊肺汤 11887
羊胡散 11547
羊胫炭丸 05934
羊脊髓粥 05926

异

异功散 00239
异功散 02026
异功五积散 02026

导

导气汤 05986
导气散 05974
导水丸 10765
导水汤 05978
导赤汤 05981
导滞丸 09608
导气枳实丸 09608
导气除湿汤 13060
导气通经汤 06004
导气通幽汤 12207
导赤泻心汤 06001
导滞通幽汤 12207
导赤泻心各半汤 06001

阳

阳旦汤 10990
阳旦散 06011
阳和丸 06014
阳和膏 06028
阳燧锭 06025
阳八味汤 08411
阳起石丸 03936
阳明二妙丸 00096
阳毒栀子汤 09686
阳毒玄参升麻汤 04182

阴

阴阳丹 06907
阴阳散 05711
阴痫散 06033
阴鹫丸 05442
阴阳攻积丸 14695
阴毒升麻汤 02553
阴痫附子散 06033
阴虚生内热汤 06039
阴毒升麻鳖甲汤 02553

防

防己丸 04102
防己丸 06171
防己汤 01877
防己汤 04103
防己汤 05446
防己汤 06131
防己汤 06132
防己散 04105
防风丸 06157
防风汤 06096
防风汤 06097
防风汤 06110
防风汤 09141
防风汤 12232
防风饮 06069
防风散 05183
防风散 06068
防风散 06077
防风散 06091
防风散 07026
防己煮散 04106
防己桂枝汤 01877
防己椒芳丸 06171
防己椒芳汤 06171
防风子芩丸 06157
防风天麻丸 06136
防风天麻汤 06136
防风芍药汤 14194
防风当归汤 06144
防风当归饮 06144
防风当归饮 06169

防风明目汤 10835
防风茯神散 06109
防风通气汤 12232
防风通圣丸 06155
防风散结散 06160
防椒芳黄丸 06171
防椒芳黄汤 06171
防葛石膏汤 13829
防己加茯苓汤 06131
防风羚羊角汤 06145
防己加茯苓芒消汤 01938

收

收呆汤 12902
收肠丸 06197
收肠散 06181
收带丸 06196
收胎散 06179
收脂汤 06189
收呆至神汤 12902
收犀白玉膏 03759
收肠养血和气汤 06197

如

如圣丸 06214
如圣丹 06203
如圣汤 11074
如圣饮 06204
如圣散 06208
如圣散 06236
如圣散 10403
如圣散 14613
如胜散 06215
如神丸 02237
如神丸 06214
如神丸 06237
如神汤 00717
如神散 00717
如神散 06215
如神散 06233
如神散 13736
如意散 14605
如圣饮子 06204
如圣无比散 13632
如金解毒汤 06254
如神木香丸 03335
如神止泻丸 02237
如神宁嗽膏 04213
如意通圣汤 06262
如圣麦门冬散 06204
如圣胜金锭子 06251

妇

妇科乌贼丸 03488
妇科妇宝丹 06264
妇科大黄䗪虫丸 01179

观

观音散 06277
观音散 06280
观音应梦饮 06280
观音应梦散 03052
观音应梦散 06280
观音梦授丸 05901
观音梦授方 05901
观音梦感参桃汤 06280

红

红药 08756
红膏 06331
红玉散 11125
红玉散 06198
红白散 11125
红花汤 05629
红灵散 06317
红矾散 06326
红油膏 06290
红宝丹 10505
红绵散 06303
红绵散 11125
红棉散 06328
红平安散 00503
红豆蔻汤 06342
红蓝花散 06343
红花归尾散 06349
红花当归散 06348
红花当归散 06349
红桃四物汤 04386

约

约菜煎 06358

（七 画）

麦

麦冬汤 06386
麦冬汤 06387
麦冬汤 06390
麦冬汤 06397
麦冬汤 06400
麦冬汤 06401
麦冬饮 06430
麦地煎 06430
麦枣汤 03082
麦昧丸 00404
麦昆煎 08476
麦硫散 06371
麦煎汤 06375
麦煎汤 07169
麦煎散 07169
麦门冬丸 01388
麦门冬汤 05431
麦门冬汤 06408
麦门冬汤 06437
麦门冬饮 01412
麦门冬饮 06430
麦门冬饮 06431
麦门冬散 06397
麦门冬散 06401
麦门冬散 06431
麦冬饮子 06410
麦门冬饮子 01415
麦门冬饮子 06410
麦甘大枣汤 03082
麦冬清肺饮 01415
麦冬清肺饮 06432
麦昧地黄丸 00404
麦昧地黄汤 00404
麦门冬竹茹汤 15153

戒

戒烟丸 06442

进

进灵丹 13795
进食丹 03119
进食汤 06446

远

远志丸 09169
远志散 01729
远志散 07580
远志引子 06474

攻

攻积丸 14695

坏

坏证夺命散 11249

坎

坎宫锭 06490
坎离丸 06493
坎离丸 12179
坎离砂 06489

杜

杜仲散 06503
杜续丸 06498
杜牛膝散 11120
杜仲浸酒 06505

杞

杞菊六味汤 06516
杞菊地黄丸 06516

劫

劫劳汤 06524

豆

豆淋酒 00930
豆蔻丸 06538
豆蔻丸 09881
豆蔻散 09892
豆淋紫酒 00930
豆蔻木香丸 06548
豆蔻分气散 06545
豆蔻香连丸 10254

丽

丽泽通气散 06550

芙

芙蓉膏 13394
芙蓉外敷法 13394
芙蓉菊花膏 06557

芫

芫花丸 14514

芷

芷芎散 04932
芷辛散 06655
芷黄散 06655

花

花蕊散 06590
花柳九龙丹 00635

苁

苁沉丸 11869
苁蓉丸 01603
苁蓉丸 05412
苁蓉丸 05417
苁蓉散 02300
苁蓉大补丸 00933
苁蓉润肠丸 11869
苁蓉菟丝子丸 06614

芩

芩连四物汤 03478
芩连四物汤 03493
芩连清心汤 06634

苍

苍术丸 06672
苍龙丸 05002
苍耳丸 06655
苍耳汤 06653
苍耳散 02761
苍耳散 06653
苍耳糜 06661
苍防汤 06669
苍附丸 06660
苍柏散 06646
苍耳子丸 06652
苍耳子散 06655
苍耳草散 06655
苍术五苓散 06682
苍术白虎汤 04060
苍术羌活汤 07501
苍白二陈汤 00159
苍防二妙汤 06669
苍柏二妙丸 00096
苍莎导痰丸 06660

芦

芦根散 06710

苏

苏方散 06732
苏合丸 05333
苏合丸 06733
苏麻丸 13174
苏麻粥 13174
苏葶丸 06742
苏解丸 06730
苏合香丸 05333
苏子降气汤 14023
苏子降气饮 14023
苏子麻仁粥 13174
苏沈九宝汤 00645
苏陈九宝汤 00645

苡

苡仁汤 06747
苡仁汤 15191

走

走马汤 01543
走马散 01543
走马通圣散 03071

赤

赤小豆汤 06821
赤小豆汤 13089
赤小豆散 06821

赤芍药汤 06795
赤芍地黄丸 04724
赤豆当归汤 06821
赤豆当归散 06821
赤豆苡仁汤 06822
赤豆薏苡汤 06822
赤石脂禹余粮汤 10416

杏

杏子汤 06834
杏仁丸 00950
杏仁丸 06847
杏仁汤 06826
杏仁汤 06827
杏仁膏 06847
杏仁膏 14739
杏苏汤 15143
杏苏散 06858
杏医丸 06948
杏参汤 06862
杏参饮 06863
杏仁煎丸 06843
杏仁煎丸 06847
杏仁薏苡汤 13213

李

李氏五香连翘散 02133

两

两收丹 06885

束

束胎饮 05073
束胎饮 08576
束胎散 05073
束胎和气饮 08576

还

还少丸 05024
还少丹 02844
还少丹 05024
还魂散 06911
还睛散 00407
还精丹 07226
还阴救苦汤 12893

辰

辰砂丹 06938
辰砂化痰丸 06936
辰砂六一散 06955
辰砂羌活丸 07783
辰砂妙香散 07985
辰砂益元散 06955

来

来苏丸 08890
来苏丹 08890
来复丸 05184
来复丹 05184

扶

扶桑丸 06974
扶桑煎 12126
扶老理中汤 06970
扶阳益胃汤 06971

拒

拒风丹 06978

抑

抑气汤 06983
抑气散 01452
抑阳散 10505
抑阴丸 04724
抑气养荣汤 10296
抑阴地黄丸 04724
抑肝开郁汤 06989

投

投杯汤 07370
投杯麻黄汤 07370

护

护心丹 08698
护心散 02268
护心散 05078
护心散 08698
护命丹 07226
护膜丸 08286
护心托里散 02268

连

连罗丸 03853
连理丸 07020
连翘饮 03314
连翘饮 07038
连翘散 07026
连花乳散 03360
连翘饮子 03314
连翘饮子 11599
连柏益阴丸 09089
连须葱白汤 13844
连翘消毒散 11599
连翘散毒散 07046
连翘溃坚汤 07051
连翘橘叶汤 07038
连翘赤小豆汤 13211

医

医王汤 07682
医痫丸 02037
医门黑锡丹 14099
医痫无双丸 02037

坚

坚牙散 07056

吹

吹口散 07057
吹喉散 10833
吹喉回生丹 05351

吴

吴萸汤 07107
吴蓝汤 07097
吴茱萸汤 01883
吴茱萸汤 05321
吴茱萸汤 09964
吴茱萸散 05321
吴萸六一散 09975
吴茱萸加减汤 07112

牡

牡丹丸 11028
牡丹汤 07151

牡丹汤 07311
牡丹散 02498
牡丹散 07146
牡砒丹 07174
牡蛎汤 01089
牡蛎饮 07169
牡蛎散 07184
牡蛎散 12585
牡丹皮散 07146
牡丹皮散 07151

利

利膈散 07199

何

何首乌散 04597
何首乌粥 03522

佐

佐金丸 03191

皂

皂针散 07264
皂角丸 07252
皂角散 07259
皂荚散 14742
皂荚膏 07249
皂角子丸 07242
皂荚刺散 07264
皂荚摩膏 07249

佛

佛手散 04594
佛手散 10843

彻

彻清煎 07269

返

返魂丹 00846
返魂丹 08890

谷

谷神散 14805
谷神嘉禾散 14805

龟

龟甲散 02797
龟首丸 07328
龟胸丸 07323
龟鹿二胶 07329
龟鹿二仙丸 07329
龟鹿二仙膏 07329
龟台王母四童散 05022

免

免怀散 07330

辛

辛夷散 06655
辛夷清肺汤 07338
辛夷清肺散 07338

忘

忘杖丸 15122

疗

疗疮膏 04153
疗毒回生汤 07348

疗

疗肾滋本丸 07350

快

快气散 01481
快膈散 07354
快中饮子 07356

沐

沐头汤 07365

沆

沆瀣丸 14139
沆瀣丹 14139

沉

沉香汤 07393
沉香汤 12073
沉香煎 07407
沉醉香散 07403
沉乳感应丸 07407
沉香天麻丸 07408
沉香白牙散 07403
沉香均气散 07416
沉香降气丸 07428
沉香降气散 07428
沉香消化丸 11640
沉香堕痰丸 01459
沉香滚痰丸 14725
沉香化滞定痛丸 07425

沈

沈氏解雷汤 07451

羌

羌附汤 07503
羌青散 07481
羌活丸 07477
羌活汤 00564
羌活汤 07457
羌活汤 07473
羌活汤 07501
羌活汤 10906
羌活汤 14419
羌活饮 07464
羌活散 00554
羌活散 00661
羌活膏 07484
羌麻汤 07465
羌活人参汤 07462
羌活石膏汤 07465
羌活冲和汤 00661
羌活导气汤 07498
羌活导湿汤 07498
羌活导痰汤 07498
羌活选奇汤 10319
羌活胜湿汤 07505
羌活退翳汤 05262
羌活退翳散 05262
羌活除翳汤 07510
羌活黑附汤 07503
羌活愈风汤 14612
羌活防风除翳汤 07510

完

完肺汤 07521
完肺散 07521

牢

牢牙齿散 07529

诃

诃子饮 07541
诃子散 07535
诃子散 07541
诃附丸 07532
诃参散 09211
诃黎勒汤 07553
诃黎勒汤 07556
诃子甘桔汤 07534
诃子青黛丸 07540
诃子清音汤 07534

补

补元丸 07561
补元煎 01052
补气丸 02089
补气汤 04901
补气汤 09289
补心丸 07578
补心汤 02797
补本丸 13718
补血汤 05280
补阴丸 00934
补阴丸 07612
补肝丸 15073
补肝散 07595
补肾丸 09416
补金膏 01224
补肺汤 07634
补肺散 07822
补虚丸 00428
补脬饮 08532
补脾散 11945
补漏丸 02442
补髓丹 00208
补骨脂丸 04726
补骨脂丸 07674
补骨脂散 07674
补中益气丸 07682
补中益气片 07682
补心神效丸 01054
补阳固真汤 07727
补阴降火汤 07593
补阴种子丸 07587
补肾八味丸 08411
补肾地黄丸 04718
补肺阿胶汤 07822
补肺阿胶散 07822
补养还元丹 06897
补养肥儿丸 08918
补真利经汤 07727
补真固经汤 07727
补真润肠汤 07083
补损当归散 05219
补益黄耆丸 12508
补虚威喜丸 10140
补脾人参汤 07740
补肝肾地黄丸 04718

启

启窍丹 07758

改

改定三痹汤 00814
改定紫菀茸汤 14030

灵

灵仙丸 10141
灵龟丹 01211
灵苑丹 06940
灵宝散 02244
灵仙除痛饮 13187
灵苑辰砂散 06940

局

局方至宝散 05179

君

君臣散 04954

阿

阿胶汤 00937
阿胶汤 09639
阿胶散 07810
阿胶散 07815
阿魏丸 00825
阿胶大青汤 00937
阿胶黄连丸 07841
阿胶蕲艾汤 04985
阿魏五香膏 07835
阿魏化坚膏 01547
阿魏红丸子 06294

陈

陈元膏 06683
陈平汤 02861
陈平饮 02861
陈皮汤 15136
陈皮汤 15151
陈橘皮汤 07858
陈氏二神丸 09848
陈氏木香散 01828
陈氏异功散 00239
陈皮竹茹汤 15151

附

附子丸 00649
附子汤 01089
附子汤 03066
附子汤 07903
附子汤 11067
附子汤 11068
附子汤 15199
附子散 06941
附子散 07923
附子散 10413
附参汤 09311
附香饮 07923
附硫丸 01508
附子七味丸 00319
附子八味丸 08411
附子八味汤 07927
附子大顺散 00950
附子白术丸 07940
附子白术汤 11067
附子芎劳汤 09451
附子补中汤 07941

附子泻心丸 07934
附子细辛汤 09463
附子细辛汤 13208
附子芮除汤 09929
附子麻黄汤 13207
附桂八味丸 08411
附益类仙丹 10810

妙

妙功丸 01759
妙应丸 13914
妙贴散 11164
妙效丸 01759

忍

忍冬膏 08773
忍冬花露 08822
忍冬藤丸 07989

鸡

鸡子汤 05123
鸡子汤 08226
鸡子汤 08226
鸡矢酒 07994
鸡矢醴 08024
鸡苏饮 07999
鸡肝散 08001
鸡冠散 12462
鸡屎散 08024
鸡醴饮 07994
鸡屎醴饮 08024
鸡脞脛丸 08015
鸡脞脛散 08025
鸡壳苦酒汤 08226
鸡鸣定喘丸 08005

驱

驱疟饮 08037
驱风散热汤 08046
驱风解毒散 04496

（八 画）

青

青六丸 13240
青六散 13240
青甘散 08143
青龙丹 03089
青龙汤 01469
青红汤 13409
青金丸 08077
青金丸 13288
青金丸 13289
青金汤 13291
青金散 14613
青金膏 06331
青空膏 13331
青衿丸 08089
青娥丸 06497
青蒿丸 09869
青蒿膏 08136
青蛾丸 06497
青蛾丸 08095
青敷药 08087
青黛丸 02148
青黛饮 08117
青黛散 00497
青黛散 13611
青膻汤 13422
青露散 13394
青竹茹汤 05449
青竹茹汤 05464
青州白露丸 08144
青娥不老丸 08095
青娥不老丹 08095
青蒿鳖甲煎 08149
青囊斑龙丸 13691

武

武候行军散 05625

坤

坤膏 11952
坤草膏 11952

枇

枇杷散 08170
枇杷散 08171
枇杷膏 08175
枇杷叶汤 08166
枇杷叶饮 08171
枇杷叶散 08164
枇杷叶煎 08172

杵

杵楝丸 01138

松

松柏实丸 08186

枕

枕中丸 02797
枕中丹 02797

苦

苦杖散 04798
苦杖散 08399
苦参丸 05317
苦参丸 07288
苦酒汤 12780
苦竹叶粥 05437

若

若玉散 11917

英

英人戒烟丸 08241

苓

苓砂散 06945
苓桂汤 10083
苓姜术甘汤 03084
苓桂术甘汤 10083
苓桂甘枣汤 10082
苓桂味甘汤 11057
苓甘味姜辛汤 08251
苓桂术甘草汤 10083
苓甘味姜辛夏汤 11070
苓甘姜味辛夏汤 11070
苓桂五味甘草汤 11057
苓甘味姜辛夏仁汤 08253
苓甘五味姜辛半夏汤 11070
苓甘味姜辛夏仁黄汤 08252

茅

茅根汤 03982

茅根汤 08265

枣

枣信丹 06774
枣麦甘草汤 03082

矾

矾石散 03864
矾石散 11735
矾郁丸 03880
矾消散 11735
矾蛎散 08283
矾蜡丸 08286
矾石兑丸 08273
矾石消散 11735
矾石消石散 11735
矾石滑石散 08281

郁

郁矾丸 03880
郁矾散 03880
郁金丸 03880
郁金散 03841
郁金散 14822
郁李仁汤 05316

奇

奇效八宝丹 09517

拔

拔疔散 05963

拈

拈疼散 10811
拈痛汤 05289

抽

抽刀散 05062
抽刀散 07787
抽风散 08345

抵

抵圣备急丸 00846
抵当乌头桂枝汤 02656

抱

抱龙丸 13672

拨

拨云丸 08381
拨云退翳丹 08381

转

转胎汤 08383
转厥安产汤 09311

斩

斩龙剑子手 10816
斩龙剑子手 12313

软

软金丸 08389
软金丸 08390

虎

虎杖散 08395
虎潜丸 07587
虎骨木瓜丸 03348
虎骨四斤丸 03348

肾

肾气丸 04545
肾气丸 06497
肾气汤 04451
肾气汤 08411
肾沥丸 08417
肾沥汤 14843
肾沥散 08417
肾着汤 03084
肾着散 09120

败

败毒散 00564
败毒散 05113
败毒散 07046
败毒散 14923
败蒲散 02210
败蒲煎 00970
败酱散 15199
败毒至圣散 12910

明

明目地黄丸 11975
明目还睛丸 06916
明目流气饮 11859
明目滋石丸 10768

昆

昆布丸 07276

易

易老天麻丸 01636

罗

罗青散 10176
罗汉应梦丸 05901

国

国老汤 11074
国老散 08485
国老煎 08485

固

固下丸 14988
固本丸 00566
固本丸 11405
固阳汤 11151
固金丸 05125
固脬汤 07449
固脬饮 08532
固精丸 11405
固髓丹 11405
固本养荣丸 08548
固本健阳种子丹 08549

钓

钓藤饮 10223
钓藤散 08563
钓藤膏 08563
钓藤膏 10220
钓藤饮子 10223

和

和中丸 02865

和中汤 08572
和气饮 02538
和解散 01497
和中桔梗汤 11080
和血归经汤 08596
和血定痛丸 14066
和血润肠汤 11874
和血通经丸 08596
和血通经散 08596
和血散瘀汤 08597
和营散坚丸 08599

知

知母丸 11925
知母汤 04062
知母汤 08608
知母汤 08611
知母散 08608
知命丸 08890
知命丹 08890
知柏八味丸 02744
知柏六味汤 14311
知柏归地汤 08628
知柏四物汤 02718
知柏地黄丸 02744
知柏地黄汤 14311
知母黄柏滋肾丸 12179

制

制半夏白术天麻汤 04312

的

的奇丹 08076

乳

乳汁膏 03360
乳朱丹 14607
乳岩散 09174
乳香散 02268
乳香散 04083
乳香膏 02032
乳附全蝎散 15044
乳香万全散 02268
乳香万全散 07004
乳香定痛丸 08661
乳香定痛散 08711
乳粉托里散 02268

金

金丹 10505
金刀散 06250
金龙丸 08056
金华丸 08736
金华散 09033
金花丸 09705
金枣丸 08749
金枣丹 06774
金矾丸 03880
金矾丸 08293
金狗散 08751
金钥匙 08791
金莲丸 14423
金铃散 08819
金黄丸 00778
金黄散 06260
金粟丹 14672
金锁丹 08784
金锁匙 08756
金鼠氏 01205
金蝉丸 03880
金樱丸 08824
金刚骨丸 08892
金沸草汤 08814
金莲子散 05761
金银花汤 05383
金银花汤 08773
金银花酒 08773
金银花酒 08821
金银花散 10831
金银花膏 08773
金锁子丸 08784
金锁匙丹 08784
金樱子煎 08824
金刀如圣散 10403
金水六君丸 08832
金衣抱龙丸 08363
金沙益元散 08747
金疮迎刃散 08839
金疮降真散 08840
金疮神效散 08851
金疮琢合散 08851
金黄如意散 06260
金匮肾气丸 04451
金匮肾气丸 08411
金匮肾气汤 04451
金锁思仙丹 11459
金箔镇心丹 08876
金箔镇心丹 08877
金蟾退壳酒 08879
金不换正气散 08811
金水六君子丸 08832
金莲种子仙丹 08883
金匮加减肾气丸 04451

受

受拜平胃散 02868

肺

肺血丸 10177
肺痈汤 08906
肺痈饮 08906

兔

兔肝丸 07594
兔骨粥 08938
兔脑丸 14600
兔脑催生丹 14600

备

备急丸 00846
备急丹 00846
备急三物丸 00846
备急大黄丸 00846
备急四神丸 03396
备急竹叶常山汤 05476

炙

炙粉甘草膏 08959

周

周卫汤 12028

刻

刻欢丹 08962

夜

夜光丸 08544
夜合汤 12488
夜明散 08354
夜光柳红散 08977

变

变通丸 09961

疟

疟母煎 15381

净

净腑丸 05633

泄

泄肾丸 12179
泄热汤 01171
泄肺通窍汤 09100

河

河车大造丸 00951
河车六味丸 09017

泻

泻心汤 00786
泻心汤 04295
泻心汤 07934
泻心汤 12670
泻甘汤 09038
泻白丸 09036
泻白散 09035
泻肝丸 09064
泻肝汤 09053
泻肝汤 03274
泻肝散 06397
泻肝散 09045
泻肝散 09052
泻肝散 09064
泻青汤 09064
泻金丸 13288
泻肺汤 09036
泻肺汤 13874
泻肺散 09036
泻胆散 09047
泻黄丸 09080
泻黄汤 09080
泻黄汤 09082
泻黄饮 09081
泻黄散 04549
泻脾散 09080
泻黄饮子 09081
泻心二黄汤 00786
泻心导赤汤 09093
泻白消毒饮 09094
泻阴火升阳汤 07754

泽

泽泻饮 09119
泽泻散 09119
泽术麋衔散 09121

治

治中汤 12261
治中汤 15163
治耳油 05033
治痔丸 06187
治痰丸 13412
治瘊汤 09137
治癥丸 02368
治风六合汤 07595
治血分椒仁丸 13717

单

单煮大黄汤 00973

定

定风散 05183
定风散 05686
定志丸 01477
定志丸 09162
定志丸 11414
定命丸 09175
定命散 05058
定肺汤 03613
定胃散 01449
定振丸 11409
定喘汤 09179
定癌散 09174
定癫汤 10755
定志小丸 10020
定心化痰丸 03880
定神补气丸 01054
定喘紫金丹 13989
定斋草果饮子 09896

实

实胎散 07116
实脾丸 09232
实脾饮 09237

刷

刷牙散 09250

建

建中汤 01478
建中加柴胡木瓜汤 09266

降

降子散 09267
降气汤 11425
降气汤 14023
降补丹 09273

参

参术丸 00436
参术丸 13018
参术汤 09292
参术汤 09293
参术饮 09293
参术饮 09380
参术散 09291
参归汤 05235
参麦饮 09298
参麦散 03613
参芦散 00484
参苏丸 09305
参苏汤 09305
参苏散 09304
参苓散 09314
参胡汤 06280
参柴丸 09337
参砂丸 09300
参香散 10837

参桃汤 06280
参耆汤 09289
参耆汤 10325
参耆饮 10325
参耆饮 12554
参萸汤 07107
参蒲丸 09313
参蒲散 02394
参山漆丸 09339
参术地黄膏 09294
参术姜附汤 10705
参术益胃汤 11939
参归腰子丸 09344
参麦五味饮 03613
参苏夺命丹 09304
参苏理肺丸 09305
参附理中汤 07941
参苓平胃散 02867
参苓白术丸 09380
参苓白术散 03811
参苓白术膏 09380
参苓莲术散 09381
参茯琥珀汤 09384

绀

绀珠正气天香汤 02918

细

细辛汤 09451
细辛散 05177
细辛散 07482
细辛散 12084
细辛五味汤 01469

经

经进地仙丹 09473
经验失笑散 03578
经验矾蜡丸 08286
经验金樱丸 08799
经验秘真丹 11404
经验猪肚丸 13018
经验对金饮子 10192
经验水陆二仙丹 02821
经验加味二妙丸 04351
经验远志养心丹 11458

承

承气汤 12104

（九 画）

珍

珍珠母丸 09520
珍珠母丸 11153
珍珠十宝散 09513
珍珠生肌散 09517
珍珠生肌散 09518
珍珠犀黄八宝丹 09517

珊

珊瑚蒸 12735

春

春雪眼药膏 09533

枯

枯骨丸 03488
枯痔散 08960
枯痔散 09537

枳

枳壳丸 09596
枳壳汤 11410
枳壳汤 14292
枳壳散 09560
枳壳散 14292
枳壳散 14915
枳芩散 09561
枳实汤 09550
枳壳煮散 09560
枳术二陈汤 11460
枳术导滞丸 09608
枳朴大黄汤 10132
枳壳川连汤 11410
枳实大黄汤 09696
枳实白术汤 09550
枳实栀子汤 09619
枳实消痞丸 03577
枳实理中丸 14977
枳实理中汤 14977
枳实薤白汤 09620
枳桔二陈汤 09617
枳梗半夏汤 11076
枳实大黄栀子豉汤 09696

柞

柞木饮 14606
柞木散 09621
柞木饮子 09621
柞木饮子 14606

柏

柏子丸 09649
柏叶散 08642
柏皮汤 09662
柏皮汤 09707
柏皮散 09707

栀

栀子汤 09692
栀子汤 09696
栀子汤 12315
栀子散 09674
栀子膏 14928
栀豉汤 09692
栀子仁汤 09718
栀子仁散 09687
栀子仁散 09718
栀子豉汤 09718
栀子五物散 09698
栀子升麻散 09699
栀子石膏汤 09688
栀子豆豉汤 09692
栀子金花丸 08736
栀子茯苓汤 01041
栀子香豉汤 09692
栀豉枳实汤 09619
栀子豉加甘草汤 09718
栀子枳实豉大黄汤 09696

枸

枸杞丸 09736
枸杞酒 03709
枸杞子丸 05562
枸杞子酒 03709

枸杞叶粥 09728

柳

柳叶散 09748
柳花散 09749

故

故纸四神丸 03401

胡

胡桐泪散 09785
胡氏夺命散 05183
胡连闭管丸 12657
胡椒红丸子 06294

封

封髓丹 02916

荆

荆芥汤 01634
荆芥散 09803
荆芥散 14613
荆黄汤 11484
荆防泻白汤 09818
荆防菊花散 12387

茸

茸蒐丹 09835

荜

荜良汤 09861
荜澄茄丸 01937
荜澄茄散 09861

草

草果饮 09874
草蔻丸 09883
草乌头散 09449
草四神煎 00337
草果饮子 09873
草果饮子 09896

茵

茵陈汤 01301
茵陈汤 09914
茵陈汤 09926
茵陈散 09918
茵陈蒿丸 09902
茵陈大黄汤 09914
茵陈五苓散 09918
茵陈附子汤 09929
茵陈姜附汤 09920
茵陈姜附汤 09921
茵陈退黄散 10869
茵陈蒿五苓汤 09918
茵陈栀子大黄汤 09914
茵陈附子干姜甘草汤 09921

茴

茴香丸 05341
茴香丸 08785
茴香汤 09941
茴香煎 09933
茴香子丸 09946
茴香乌药丸 08847
茴香楝实丸 09955

茱

茱连丸 03191
茱苓丸 07096
茱连丸 09961
茱连丸 09963
茱萸丸 09965
茱萸丸 09967
茱萸汤 07107
茱萸汤 09961
茱萸人参汤 07107
茱萸矾石丸 07101

茯

茯苓丸 09148
茯苓丸 10058
茯苓丸 10081
茯苓汤 06131
茯苓汤 06813
茯苓汤 10008
茯苓汤 10064
茯苓汤 10073
茯苓汤 10079
茯苓汤 10082
茯苓汤 10083
茯苓汤 13891
茯苓汤 15239
茯苓散 01526
茯苓散 03994
茯苓散 10083
茯苓散 13891
茯苓煎 09982
茯神丸 10682
茯神汤 03217
茯神散 02906
茯神散 10035
茯菟丸 04169
茯菟丹 04169
茯苓饮子 10008
茯苓白术汤 10083
茯苓白术汤 11064
茯苓半夏汤 01526
茯苓半夏汤 03784
茯苓半夏汤 04298
茯苓半夏汤 04299
茯苓导水汤 05998
茯苓杏仁汤 10079
茯苓指迷丸 09148
茯苓桂甘汤 10064
茯苓桂甘汤 10082
茯苓桂枝汤 10082
茯苓燥湿汤 13423
茯苓五味子汤 11057
茯苓甘桂大枣汤 10082
茯苓苍术难名丹 06672
茯苓茵陈栀子汤 10080
茯苓桂甘大枣汤 10082
茯苓桂甘白术汤 10083
茯苓桂术甘草汤 10083
茯苓桂枝甘枣汤 10082
茯甘姜味辛夏仁黄汤 08252
茯苓干姜白术甘草汤 03084
茯苓甘草五味姜辛汤 08253
茯苓白术桂枝甘草汤 10083
茯苓桂枝五味甘草汤 11057
茯苓甘草五味辛夏仁汤 08253
茯苓桂心甘草五味子汤 11057
茯苓桂枝五味子甘草汤 11057
茯苓五味甘草去桂加姜

辛夏汤 11070
茯桂五味甘草去桂加干姜
细辛半夏汤 11070

茶

茶调汤 01397
茶调散 01397

荠

荠龙汤 13053

荛

荛蔚子丸 10089

荡

荡胞散 04864

赴

赴筵散 10100

牵

牵牛酒 07994
牵正丸 10115
牵正膏 07772
牵牛妙酒 07994

厚

厚朴丸 10128
厚朴汤 04302
厚朴汤 10131
厚朴汤 10139
厚朴七味汤 10130
厚朴人参汤 10139
厚朴石膏汤 10136
厚朴半夏汤 04302
厚朴枳实散 10135
厚朴半夏甘参汤 10139
厚朴姜夏草参汤 10139
厚朴半夏甘草人参汤 10139
厚朴生姜人参甘草半夏汤 10139

威

威喜丸 14521
威灵仙饮 10144

面

面饼丸 10791

指

指迷丸 09148
指迷茯苓丸 09148
指迷铁落饮 03665

拯

拯阳汤 14698
拯阴汤 14699
拯阳理劳汤 14698
拯阴理劳汤 14699

点

点翳膏 10612

韭

韭子丸 12004

省

省风汤 15164

咽

咽津丹 15039
咽醋丸 09963
咽喉异功散 05963
咽喉独圣散 05012

响

响圣破笛丸 05623
响声破笛丸 05623

咳

咳气丸 13786

贴

贴喉异功散 05963
贴痞琥珀膏 13663

显

显仁丸 07987

星

星斗丸 05044
星半汤 08391
星香汤 10185
星香饮 10185

胃

胃风煎 10190
胃苓散 10192

种

种子丹 11450

秋

秋莲散 11370

钟

钟乳粉丸 10209
钟乳人参丸 10207
钟乳薯蓣汤 10215

钩

钩肠丸 08560
钩胶汤 10220
钩藤丸 12001
钩藤饮 08562
钩藤饮 08563
钩藤饮 08567
钩藤饮 10223
钩藤散 08564
钩藤散 10223
钩藤饮子 08567
钩藤钩饮 10223

复

复元汤 10233
复阴汤 03063
复明汤 10227
复明膏 07511
复脉汤 04553
复脉汤 08958
复脉汤 11249
复煎散 12690
复聪散 10232
复元通气汤 10233
复元通气汤 10236
复元通气散 10233

复元通圣散 10234
复元通圣散 10235
复原通气散 10234
复原通气散 10235

香

香朴丸 10246
香连丸 01078
香连散 10254
香附汤 07923
香附散 00022
香附散 01680
香矾散 06326
香枳丸 10277
香莪散 10244
香脂丸 10257
香薷丸 10295
香薷汤 10290
香薷饮 10289
香薷饮 10290
香薷饮 10820
香遍满方 00247
香橘皮丸 10285
香连化滞丸 10300
香砂六君丸 10318
香砂六君汤 10318
香砂胃苓丸 10310
香砂养胃丸 10312
香砂养胃丸 10313
香砂理中汤 10314
香豉栀子汤 09692
香砂六君子丸 10318

便

便产神方 01597

保

保元丹 10325
保元汤 04510
保元汤 12554
保气丸 10327
保气饮 10327
保孕丸 06498
保全散 05226
保安散 05226
保安煎 01597
保肝丸 08363
保灵丹 06907
保和丸 10340
保和丸 10342
保肺汤 10340
保胎丸 01345
保真汤 10340
保瞳丸 12925
保命金丹 01183
保生无忧散 01596
保生无忧散 01597
保产无忧汤 01597
保产无忧散 01596
保产无忧散 01597
保产无虞散 01597
保产神效方 01597
保命当归汤 05205

顺

顺气丸 00998
顺气汤 02516
顺气散 00408
顺气散 10364
顺生丹 14600
顺味丸 12256
顺元煮散 10364
顺气煮散 10367
顺气手拈散 02411
顺气益肝汤 10385

追

追风丸 10390
追风丹 10388
追虫散 10393
追命丹 08890
追毒丸 10848
追毒丹 02194
追魂丹 00846
追魂汤 06910
追魂汤 06911
追毒锭子 10397
追风活络丹 10540
追疗夺命丹 10409

禹

禹粮丸 10413
禹余粮散 07819
禹余粮散 10413

鬼

鬼箭羽散 10421

独

独圣散 09537
独圣散 09764
独圣散 11203
独行丸 00846
独行散 14613
独连丸 11639
独参汤 11249
独柱汤 11249
独活汤 10460
独蝉散 11429
独活寄生丸 10460

胆

胆连丸 06696

胜

胜金散 03407
胜湿汤 07506
胜湿汤 13519

胎

胎热地黄汤 03636

急

急风丹 10490
急救稀涎散 12907

疮

疮科流气饮 00242

炼

炼阴丹 05574

洪

洪宝膏 10505

洞

洞天膏 10507
洞天嫩膏 10507

洗

洗肝饮 10518
洗面散 10522
洗面玉容丸 02957
洗眼金丝膏 10532

活

活血丸 10537
活络丹 01186
活血止痛汤 08706
活血定痛丸 01548
活血润肠丸 10557
活肠散毒丹 10562
活命羊肝丸 05900
活血润燥生津饮 10566

济

济阴丹 07274
济阴丹 10505
济生肾气丸 04451

将

将军饮 00980

前

前胡汤 10592
前胡汤 10594
前胡汤 10602
前胡汤 10608
前胡饮 10599

首

首乌粥 03522
首乌延寿丹 11423
首乌补益丸 00359

养

养中汤 10620
养正丹 05184
养胃汤 15342
养真丸 10639
养真丹 01456
养脏汤 08050
养脏散 08050
养血返精丸 07272
养血祛风汤 07701
养阴清肺膏 10665
养荣承气汤 09498
养胃进食汤 10669
养阴清肺糖浆 10665
养血当归地黄汤 10674

举

举轻古拜散 14613
举卿古拜饮 10679
举卿古拜散 10679

宣

宣化丸 05102
宣郁调经汤 10688

美

美髯丹 00359

姜

姜附汤 00891
姜附汤 12243
姜附散 00022
姜桂汤 11005
姜桂汤 11356
姜橘散 10719
姜桂饮子 11356
姜附归桂汤 07951
姜附白通汤 07952
姜附赤石脂丸 10723
姜苓五味细辛汤 11070

送

送胎汤 10724

祛

祛风散 10115
祛湿散 10739
祛湿软膏 10740
祛痰火丸 08391

祖

祖传固本还睛丸 08544

神

神祐丸 00842
神祐丸 05633
神术丸 06638
神术丸 10761
神术汤 10761
神白散 11917
神让散 10417
神圣散 08705
神芎丸 07987
神助散 05183
神助散 10841
神应丸 02037
神应散 00717
神应膏 03540
神妙散 10780
神金散 10764
神香散 10096
神珠丸 11566
神珠丹 11566
神效丸 05190
神效丸 10757
神效丸 10791
神效散 10831
神授汤 06280
神授汤 10781
神犀丸 10793
神解散 00661
神功托里散 10831
神功活命汤 10813
神功黄耆痨 10839
神仙一块气 00016
神仙不老丹 10802
神仙太一膏 02178
神仙太乙丹 10848
神仙巨胜丸 10847
神仙追毒丸 10848
神仙黄矾丸 08286
神仙琼玉膏 13682
神仙紫金锭 02194
神仙解毒丸 10848

神仙解语丹 14642
神仙蜡矾丸 08286
神圣香薷饮 10820
神芎导水丸 10765
神曲白术丸 03764
神应异功散 00239
神应黑龙丸 14073
神妙佛手散 10843
神妙乳砂丹 14607
神秘左经汤 01189
神效太乙膏 02178
神效平胃散 02868
神效四圣散 03362
神效生肌散 03595
神效瓜蒌散 03362
神效瓜蒌散 11097
神效当归膏 05244
神效吹口药 10833
神效金黄散 06260
神效参术散 10837
神效参苓散 10837
神效黄矾丸 08286
神效黄耆汤 12560
神效催生丹 14600
神验续骨丸 13587
神验锦鸠丸 14597
神授羊肝丸 05901
神授香苏散 10253
神授保生丹 13583
神仙附益丸丹 10810
神仙枸杞子酒 09737
神效大活络丹 01082
神仙万病解毒丸 10848
神仙太乙紫金丹 10848
神仙解毒万病丹 10848
神仙截伤寒四季加减百解散 10807

扁

扁鹊玉壶丸 12226
扁鹊玉壶丹 12226

既

既济汤 02718
既济解毒丸 09705
既济解毒汤 12704

退

退翳羊肝丸 05901
退热桔梗饮子 11077

除

除湿汤 03084
除湿汤 09143
除湿汤 10905
除热饮子 10883
除热蠲痛汤 10902
除湿羌活汤 10905
除湿补气汤 05974
除湿和血汤 02559
除湿捐痹汤 10902
除湿蠲痹汤 10902
除湿热和血汤 02559

绛

绛雪 06317
绛雪 11124
绛宫丸 02758
绛雪散 11124

（十 画）

珠

珠宝丹 00628

耘

耘苗丹 02253

素

素丹 00699

秦

秦艽汤 01087
秦艽饮 04821
秦皮散 10531
秦桂丸 15279
秦艽饮子 04821
秦川剪红丸 13556
秦艽白术汤 10951
秦艽鳖甲饮 10955
秦皮洗眼汤 10531
秦皮汤洗眼方 10531

泰

泰山磐石散 02198

盏

盏落汤 10958

桂

桂心汤 01478
桂心汤 11017
桂心散 05396
桂心散 08423
桂花散 10999
桂辛散 10999
桂附汤 10971
桂附汤 11025
桂附汤 11068
桂附散 07897
桂枝汤 10994
桂枝汤 11049
桂苓饮 10995
桂香散 10999
桂姜丸 02679
桂姜汤 11356
桂心枳实汤 11053
桂心茯苓丸 11028
桂芍知母汤 11054
桂附八味丸 08411
桂附八味汤 08411
桂附地黄丸 08411
桂附地黄汤 08411
桂附理中丸 07953
桂枝大黄汤 11042
桂枝五物汤 12773
桂枝乌头汤 02656
桂枝六合汤 07930
桂枝白术汤 11040
桂枝芍药汤 01478
桂枝牡蛎汤 11058
桂枝皂荚汤 11061
桂枝附子汤 03066
桂枝附子汤 11045
桂枝枳实汤 11053

桂枝柴胡汤 11032
桂枝救逆汤 11069
桂枝越婢汤 11052
桂枝新加汤 11071
桂苓术甘汤 10083
桂苓甘术汤 10083
桂苓甘枣汤 10082
桂苓甘露饮 11039
桂苓甘露饮 11040
桂苓甘露散 11038
桂苓甘露散 11040
桂苓白术汤 11040
桂苓白术散 11039
桂珀调经散 01501
桂麻各半汤 11056
桂枝加人参汤 11016
桂枝加干葛汤 11049
桂枝加瓜蒌汤 11106
桂枝加朴杏汤 11059
桂枝加桂枝汤 11021
桂苓甘草五味汤 11057
桂心生姜枳实汤 11053
桂甘龙骨牡蛎汤 11063
桂附八味地黄丸 08411
桂枝二越婢一汤 11052
桂枝人参芍药汤 11071
桂枝甘草附子汤 03066
桂枝龙骨牡蛎汤 11058
桂枝龙骨牡蛎汤 11063
桂枝芍药大黄汤 11042
桂枝芍药当归汤 05204
桂枝汤加乌头汤 02656
桂枝汤加附子方 11045
桂枝柴胡各半汤 11330
桂枝去桂加苓术汤 11064
桂枝加芍药大黄汤 11042
桂枝加芍药当归汤 05204
桂枝加厚朴杏仁汤 11059
桂枝加黄耆五两汤 11048
桂姜枣草黄辛附汤 11068
桂姜草枣黄辛附汤 11068
桂甘姜枣麻辛附子汤 11068
桂甘姜枣麻附细辛汤 11068
桂枝加葛根瓜蒌根汤 11060
桂枝芍药人参生姜汤 11071
桂枝芍药人参新加汤 11071
桂枝附子去桂加术汤 11067
桂枝去芍加茯苓白术汤 11066
桂枝去芍加麻辛附子汤 11068
桂枝加人参芍药新加汤 11071
桂枝加芍药人参新加汤 11071
桂枝加芍药生姜人参汤 11071
桂枝附子去桂加白术汤 11067
桂枝附子汤去桂加术汤 11067
桂枝去芍药加黄辛附子汤 11068
桂枝去芍药加麻辛附子汤 11068
桂枝附子去桂枝加白术汤 11067
桂枝蜀漆牡蛎龙骨救逆汤 11069
桂枝五味甘草去桂加姜辛汤 08251
桂枝加芍药生姜人参新加汤 11071
桂枝汤去芍药加茯苓白术汤 11066
桂苓五味甘草去桂加姜辛夏汤 11070
桂枝去芍药加龙骨牡蛎救逆汤 11069
桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤 11068
桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎汤 11069
桂苓五味甘草去桂加姜辛半夏汤 11070
桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤 11069

桔

桔梗白散 03741
桔梗甘草汤 11074
桔梗白术汤 11075
桔梗半夏汤 11076

栝

栝石汤 04073
栝楼汤 04081
栝楼汤 04082
栝楼汤 09723
栝楼散 04083
栝楼散 11093
栝楼根汤 09723
栝贝养营汤 13879
栝楼根桂枝汤 11106
栝楼薤白桂枝汤 09620

桃

桃仁散 11115
桃仁散 11116
桃仁膏 14735
桃奴丸 11123
桃红散 11131
桃花散 11120
桃花散 11125
桃杏散 11897
桃仁承气汤 11147
桃仁承气汤 11148
桃红四物汤 04386
桃桂当归丸 07375

真

真武丸 11151
真珠丹 11153
真珠散 09510
真珠母丸 11153
真珠粉丸 09521
真人夺命饮 10813
真人还少丹 05024
真人活命饮 10813
真人活命散 10813
真人养肠汤 08050
真人养脏散 08050
真君妙贴散 11164
真方不换金正气散 01769

莲

莲心饮 11179
莲子六一散 11186
莲子清心饮 13435

莳

莳萝丸 11190

莴

莴苣子粥 11191

莪

莪术脾积丸 14172

莎

莎芎散 04944

盐

盐水饮 11203

耆

耆归汤 05280
耆桂酒 12780
耆芍桂酒汤 12780
耆芍桂苦酒汤 12780

恶

恶疮方 08828

栗

栗粉丸 11763

贾

贾同知通圣散 06155

速

速产兔脑丸 14600

赶

赶毒散 05711

起

起脾汤 13907
起痿丹 11431
起祖三棱丸 00825

顾

顾步保脱汤 11231

破

破血丹 10505
破血散 11238
破血散 11247
破阴丹 07271
破郁汤 11236
破积丸 11239
破棺丸 11240
破棺散 01732
破棺散 04275
破故纸丸 07673
破血消痛汤 11247
破血散痛汤 11247
破证夺命汤 11249
破证夺命散 11249
破积导引丸 11250
破棺急救丹 11240

夏

夏枯膏 11251
夏枯草散 11251
夏枯草散 11252
夏枯草膏 11251

逐

逐湿汤 06132
逐痰丸 07963

捏

捏头散 12849

捉

捉虎丸 00043
捉虎丹 00043

换

换脚丸 11412
换腿丸 11412

热

热熨针 14525
热疮寒膏药 09755

柴

柴平汤 02873
柴平饮 11287
柴平煎 11287
柴苓汤 11288
柴苓散 11288
柴苓煎 11291
柴胡汤 11327
柴胡汤 01497
柴胡汤 11288
柴胡饮 00038
柴胡饮 11299
柴胡饮 11303
柴胡散 09686
柴胡升阳汤 02528
柴胡升麻汤 02528
柴胡升麻汤 11314
柴胡石膏汤 11314
柴胡归芎汤 11318
柴胡四物汤 11312
柴胡半夏汤 07599
柴胡加桂汤 11330
柴胡抑肝散 11321
柴胡复明汤 11328
柴胡胜湿汤 13409
柴胡姜桂汤 11356
柴胡退翳丸 07509
柴胡桂枝汤 11356
柴胡桂姜汤 11356
柴胡益肝散 11321
柴胡陷胸汤 11302
柴胡梅连汤 10609
柴胡梅连散 10609
柴胡清肝饮 11337
柴胡舒肝散 11341
柴胡疏肝汤 11341
柴胡解肌汤 11350
柴前梅连散 10609
柴桂干姜汤 11356
柴磁地黄丸 05038
柴胡加桂枝汤 11330
柴胡黍粘子汤 12781
柴胡龙骨牡蛎汤 11357

紧

紧皮丸 00640

逍

逍遥丸 11360
逍遥丸 11363
逍遥汤 11360

鸭

鸭粥 14943
鸭掌散 05065

罢

罢惊丸 00999

圆

圆翳防风散 06118

钱

钱氏白术散 03811

钻

钻胃丸 00128

铁

铁井栏 11377
铁井槛 11377
铁刷散 11379
铁扇散 08852
铁笛丸 05621
铁笛丸 05623
铁液酒 11375
铁落饮 03665
铁箍散 11386

秋

秋米半夏汤 04245

积

积肥丸 13018

秘

秘元丹 11402
秘真丸 11404
秘真丹 11402
秘精丸 11402
秘精丹 11402
秘方夺命散 10813
秘方拔毒散 08334
秘方定振丸 11409
秘方香连丸 10254
秘传三仙糕 11417
秘传斗门方 11419
秘传地仙丹 04708
秘传羊肝丸 05898
秘传保和丸 11427
秘传捉虎丹 00043
秘传涌泉散 11907
秘制清宁丸 08126
秘本加味清胃散 04515
秘传千金种子方 11450

透

透顶散 05177
透脓汤 11476
透体气口丸 11480

倍

倍槐丸 11488

健

健运丸 11491
健步膏 11492
健步虎潜丸 08407
健胃温降汤 14233

射

射干汤 11515
射干连翘汤 07029
射干连翘散 07029
射干麻黄丸 11517

息

息贲丸 11522

徒

徒薪散 12997

胶

胶艾汤 04985
胶艾四物汤 04985
胶艾芎归汤 11544
胶艾当归散 11544

高

高良姜汤 11561

疳

疳积丸 11571

烧

烧腰散 14721

凌

凌霄花散 06349
凌霄花散 11583
凌霄花散 11584

凉

凉肝丸 09064
凉肾丸 11590
凉膈丸 11595
凉八味丸 02744

酒

酒连丸 11639
酒煮当归丸 00298
酒煮黄连丸 11639
酒煎大黄汤 00980

消

消石散 11735
消坚丸 07144
消矾散 11735
消肿丹 11662
消毒汤 11662
消毒饮 02129
消毒饮 11677
消枳丸 03853
消胃汤 13349
消疠丸 11713
消疠汤 11713
消黄汤 01175
消解散 11680
消翳散 03255
消毒饮子 14609
消上瘀血汤 13428
消风败毒散 09813
消风顺气丸 00998
消风犀角散 11759
消毒圣神汤 11755

消毒托里散 05153
消毒流气饮 00242
消毒犀角汤 14609
消毒犀角饮 14609
消毒犀角散 14609
消疳退云散 11770
消暑十全散 11777
消痞大成膏 06480
消痰茯苓丸 09148
消瘰化坚汤 12903
消瘿五海散 11787
消毒犀角饮子 14609

海

海龙粉 03601
海桐散 11828
海蛤散 11813
海桐皮酒 02446
海浮石丸 05187
海藻消瘿汤 11834
海藻散坚丸 11238
海藻散坚丸 11838

涂

涂凶麝香散 11840

涤

涤热汤 09914
涤痰丸 11464
涤痰丸 11857
涤痰散 11857
涤痰散 00106

流

流气饮 00242

润

润下丸 00106
润肺汤 11885
润麻丸 11871
润燥汤 05310
润燥汤 11873
润肺百花膏 05091

浚

浚川散 01146

粉

粉乳托里散 02268

益

益元散 06955
益母丸 07274
益欢散 08806
益肾膏 11935
益胃汤 02525
益黄汤 11945
益智汤 11932
益智散 11935
益智散 11955
益元凉肌散 06955
益气左金汤 11966
益气固肠丸 06196
益阴补气丸 11975
益清雄黄丸 14672

兼

兼提汤 05885

宽

宽中散 02152
宽胸片 11994
宽中进食丸 12001
宽咽救生散 06214

浆

浆水饮 12012

资

资生丸 00664
资生丸 10360
资政丸 02996
资生肾气丸 04451
资寿黑龙丸 14071
资寿解语汤 10971

烫

烫火散 12017

诸

诸葛行军散 05625
诸葛行军散 10162
诸葛行军散 12025

调

调卫散 12028
调元汤 12554
调中丸 12256
调气丸 09496
调气散 12039
调气散 02673
调生丸 09248
调经汤 12054
调经饮 12054
调经散 01501
调经散 14234
调荣散 12058
调胃丸 12104
调敷散 01584
调元地黄汤 12030
调中健胃汤 02026
调中益气汤 10378
调中疏邪汤 12033
调气和胃散 12080
调经化瘀丸 11766
调经固真汤 12090
调经种子汤 12092
调经活血汤 06349
调经琥珀汤 12096
调荣活络饮 12099
调胃承气丸 12104
调营养气汤 12103
调经升阳除湿汤 02520
调经升麻除湿汤 02520

陷

陷胸丸 01096
陷胸汤 01097
陷胸汤 01502

桑

桑皮汤 12118
桑麻丸 06974
桑椹膏 02745
桑寄生汤 12148
桑寄生散 07316

桑螵蛸龙骨散 12156

通

通云散 11125
通气丸 08472
通气丸 12206
通圣丸 06155
通圣散 06155
通耳散 12175
通声煎 12185
通灵丸 02799
通明散 12195
通乳煎 12210
通草丸 12206
通草膏 12206
通音丸 12211
通神散 02906
通嗌散 12217
通解散 02781
通膈散 12223
通气饮子 14153
通气防风汤 01264
通气防风汤 07506
通气防风散 02781
通气防风散 07506
通气祛风汤 00578
通耳红棉散 06329
通关滋肾丸 12179
通灵玉粉散 12226
通经活络丹 08701
通脉四逆加减汤 12243
通脉加减四逆汤 12243

(十一画)

理

理中丸 07940
理中汤 06970
理中汤 07941
理中汤 12296
理中煎 12261
理营煎 12276
理脾丸 05934
理脾散 06445
理中丁香汤 12296
理中安蛔丸 12285
理中安蛔散 12285
理气止瘀汤 12291

梅

梅连丸 02624
梅花丸子 12314
梅花五炁丹 12312
梅花点舌丸 12314
梅花聚香汤 12313

乾

乾坤一炁膏 06480

勒

勒马听徽丝 12317

菝

菝瓢散 12323
菝葜汤 12323
菝葜饮 12323

菖

菖乌散 12332
菖蒲汤 12546
菖蒲散 07259
菖蒲煎 07285
菖蒲浸酒 12331

萝

萝卜饮 11171
萝卜子丸 06877

萎

萎蕤散 12342
萎蕤犀角散 12436

萸

萸连丸 03191

萆

萆麻膏 14142
萆薢饮 12359
萆薢散 12359
萆麻子丸 14490
萆薢分清丸 12359
萆薢分清饮 02403
萆薢分清饮 12359

菟

菟丝丸 01523
菟丝丸 12369
菟丝子丸 01523

菊

菊花丸 04723
菊花散 10533
菊青丸 12392

黄

黄药 10505
黄土散 12402
黄云膏 05711
黄甘饮 12404
黄龙丸 11639
黄龙汤 01497
黄龙汤 12408
黄龙膏 01441
黄甲串 01307
黄芩汤 00848
黄芩汤 12435
黄连丸 04723
黄连汤 09028
黄连汤 12452
黄连汤 12468
黄连汤 12602
黄连散 13161
黄矾丸 08286
黄神丹 12610
黄耆汤 04100
黄耆汤 10839
黄耆汤 12323
黄耆汤 12573
黄耆汤 12579
黄耆汤 12580
黄耆汤 12581
黄耆汤 12583
黄耆汤 12720
黄耆汤 12745
黄耆汤 12773

黄耆汤 12777
黄耆饮 12720
黄耆散 06081
黄耆散 07169
黄蜡丸 08286
黄精丹 00657
黄连饮子 09102
黄芩半夏汤 12774
黄芩芍药汤 04881
黄芩芍药汤 12416
黄芩泻肺汤 12635
黄芩清肺汤 12637
黄芩清肺饮 12635
黄芩清肺散 12635
黄连内疏汤 02311
黄连升麻汤 12646
黄连六一散 12648
黄连甘石散 12762
黄连戊己汤 03291
黄连生肌散 03593
黄连地黄汤 11461
黄连安神丸 05517
黄连安神丸 05518
黄连羊肝丸 05898
黄连羊乳丸 12439
黄连阿胶丸 09639
黄连阿胶汤 09639
黄连鸡子汤 12663
黄连柏皮汤 09640
黄连香薷汤 10820
黄连香薷饮 10820
黄连香薷饮 12685
黄连香薷散 12685
黄连独活散 12690
黄连消毒汤 12690
黄连消毒饮 12690
黄连消痈饮 12690
黄连黄柏汤 12704
黄连猪肚丸 13015
黄连清化丸 12643
黄连清心汤 12699
黄连清痰丸 12643
黄连葛根汤 13837
黄耆五物汤 12773
黄耆白术散 12728
黄耆芍桂酒 12780
黄耆当归汤 05280
黄耆当归散 12733
黄耆防己汤 06132
黄耆补血汤 05280
黄耆补血汤 06975
黄耆补血汤 12740
黄耆补胃汤 02479
黄耆苦酒汤 12780
黄耆建中丸 12745
黄耆建中汤 12535
黄耆建中汤 12717
黄耆建中汤 12777
黄耆建中散 12717
黄耆姜桂汤 12535
黄耆柴胡汤 12781
黄耆鳖甲汤 12757
黄耆鳖甲散 15376
黄耆鳖甲煎 12757
黄病绛矾丸 10913
黄芩加半夏汤 12774
黄耆四君子汤 12725
黄耆枳壳煎丸 12531
黄耆芍药桂酒汤 12780
黄耆桂枝苦酒汤 12780
黄耆芍药桂心酒汤 12780

梦

梦熊丸 08883

硇

硇砂丸 12811
硇砂丸 14514

掩

掩脐方 12821

捷

捷验酒 08879

排

排风饮 12824
排脓散 02274
排脓散 12835
排脓内补十宣散 02392

接

接命丹 13800
接骨丹 02443
接骨丹 12852
接骨丹 12865
接骨金丹 13587
接骨如神丹 12874

控

控涎丸 13914
控涎丹 12877
控涎丹 13914
控痰丸 12877

探

探胞汤 12253
探胎汤 12253
探胎饮 12253

救

救肺饮 12894
救脉散 12894
救逆汤 11069
救阳理劳汤 14698
救阴理劳汤 14699
救呆至神丹 12902
救苦化坚丸 12903
救苦胜灵丹 12903
救苦胜灵汤 12903
救绝止喘汤 12896

雀

雀粥 12913

常

常山饮 14836
常山饮子 12918

崔

崔宣武通圣散 06155

银

银朱散 12969
银杏散 12974

银粉丸 11152
银花甘草汤 07990
银翘解毒丸 12972
银翘解毒片 12972
银翘解毒散 12972
银翘解毒膏 12972
银翘马勃射干牛蒡汤 12976

移

移险膏 12983

甜

甜瓜子散 04072

得

得道丸 08890

敛

敛肌散 03594

猪

猪心汤 14383
猪肝散 08954
猪肚丸 12695
猪苓汤 13024
猪苓汤 13025
猪苓散 01988
猪苓散 13021
猪肾汤 13049
猪肚丸 11536
猪腰汤 13049
猪腰饮 13049
猪腰粥 13049
猪肚儿丸 13015
猪腰子粥 13030
猪肚黄连丸 13015

旋

旋覆花汤 13079
旋覆花汤 04943
旋覆葱绛汤 13072
旋覆代赭石汤 13080
旋覆花代赭石汤 13080

鹿

鹿茸散 14503
鹿胶丸 13112
鹿茸四神丸 13122
鹿茸补漏丸 07663

麻

麻子汤 07366
麻仁丸 13168
麻甘汤 03071
麻肌散 13126
麻苏粥 13174
麻肺丹 13127
麻沸散 13127
麻桂汤 13138
麻黄汤 01995
麻黄汤 03071
麻黄汤 13198
麻子仁粥 13130
麻仁苏子粥 13174
麻仁脾约丸 13168
麻仁滋脾丸 13168
麻杏石甘汤 13212
麻杏苡甘汤 13213
麻黄甘草汤 03071
麻黄石膏汤 07001
麻黄白术汤 13184
麻黄白术散 13183
麻黄白术散 13184
麻黄芍药汤 11056
麻黄苍术汤 03013
麻黄杏仁汤 13212
麻黄连翘汤 13211
麻黄复煎汤 13194
麻黄宣肺酒 13195
麻黄桂枝汤 13206
麻黄根散粉 13173
麻黄射干汤 11517
麻黄葛根汤 13808
麻黄解肌汤 13140
麻黄加独防汤 13210
麻黄加葛根汤 13808
麻黄吴茱萸汤 13193
麻黄草豆蔻丸 13185
麻杏薏苡甘草汤 13213
麻黄甘草附子汤 13207
麻黄杏子草膏汤 13212
麻黄附子细辛汤 13208
麻黄桂枝合半汤 11056
麻黄杏仁薏苡仁汤 13213
麻黄杏子甘草石膏汤 13212
麻黄杏子薏苡甘草汤 13213
麻黄杏仁甘草薏苡汤 13213

痎

痎疟饮 05005

清

清宁散 03811
清郁汤 13280
清金丹 08077
清金汤 07631
清金散 08081
清肺汤 13309
清肺饮 07822
清肺饮 12635
清肺饮 13327
清肺饮 13425
清肺散 13308
清肺散 13425
清空汤 13331
清胃汤 13348
清胃汤 13349
清骨散 10609
清音汤 13477
清神汤 13374
清凉饮 04596
清凉油 13398
清凉散 00628
清凉散 04596
清凉散 13394
清凉散 13395
清脾饮 13406
清魄散 13410
清震汤 02494
清燥汤 13497
清露散 13394
清肺饮子 06431
清凉饮子 04596
清脾饮子 13406
清肝保脑丸 08324
清肝益营汤 13446

清金保肺丸 13456
清咽利膈汤 13472
清热三黄丸 00776
清热解郁散 13484
清热解毒丸 14636
清暑益气丸 13491
清痰养荣汤 13879

混

混元丹 06583
混元丹 14025

淮

淮南八公石斛散 13510

渊

渊然真人夺命丹 01544

渗

渗湿汤 09376

羚

羚羊散 13529
羚羊角汤 13529
羚羊角汤 06802
羚羊钩藤汤 13540

断

断欲丸 04724
断痫丹 13551
断弓弦散 03578

剪

剪红丸 13547

寄

寄生散 12148
寄生葱豉汤 12146

屠

屠苏 13579
屠苏饮 13579

蛋

蛋黄油 05755

续

续杜丸 06498
续命汤 05018
续断丸 10198
续断丹 13592
续断散 13605
续断止痢汤 13605
续断葱白汤 13843

绿

绿云散 13626
绿云散 13632
绿云散 13634
绿矾散 13623
绿袍散 13611
绿膏药 14019

(十二画)

琥

琥珀丸 01717
琥珀丸 06438
琥珀汤 13656
琥珀散 01161
琥珀散 10843
琥珀分清丸 13681
琥珀寿星丸 06438
琥珀抱龙丸 08363
琥珀定志丸 13678
琥珀黑龙丹 14073

琼

琼玉散 13682
琼林散 13685
琼液散 13684

斑

斑龙丹 13691
斑鹿丸 13691
斑龙二至丸 13704
斑龙百补丸 13704
斑龙脑珠丹 13690

椒

椒目丸 06171
椒地丸 13725
椒曲丸 05385
椒面羹 13734
椒附健脾散 13744
椒姜通经丸 12201

棉

棉花子丸 13752

棕

棕浦散 13756

酥

酥蜜膏 13761

散

散生散 04275
散疗汤 13765
散毒汤 11074
散热散 13771
散肿溃坚丸 13776
散毒溃坚散 13776
散热消毒饮 13783
散瘀葛根汤 13775

款

款花散 07630
款冬花丸 13787
款冬花丸 13794

彭

彭祖接命丹 13800

葫

葫芦糯米酒饮 13802

藏

藏蕤散 12342
藏灵仙丸 10142

葛

葛术汤 13813
葛花丸 13807
葛花汤 13827
葛根汤 00894

葛根汤 02549
葛根汤 13837
葛根散 13852
葛黄丸 13807
葛黄散 13807
葛根粉粥 13822
葛花解酒汤 13827
葛花解酲丸 13827
葛根升麻汤 02549
葛根升麻汤 13814
葛根龙胆汤 13809
葛根半夏汤 13836
葛根竹茹汤 05452
葛根豆豉汤 13813
葛根黄芩汤 13837
葛根黄连汤 13837
葛根麻黄汤 13808
葛根解肌汤 11350
葛根解毒汤 13832
葛根黄连黄芩汤 13837

葆

葆真止泄汤 13840

葱

葱归汤 13851
葱白汤 13842
葱白汤 13854
葱豆汤 12821
葱附丸 00935
葱乳汤 13842
葱涎丸 00935
葱豉汤 13141
葱白豉汤 13849

葶

葶苈丸 08232
葶苈丸 10771
葶苈丸 12989
葶苈丸 13867
葶苈汤 13874
葶苈散 09151
葶苈散 10841
葶苈散 12992
葶枣散 13874
葶苈大枣汤 13874
葶苈木香汤 13869
葶苈防己丸 12989
葶苈牵牛丸 13858
葶苈薏苡泻肺汤 08906

落

落盏汤 10957
落痔汤 11224

葵

葵子散 13891
葵花汤 13887
葵苓散 13891
葵茯汤 13891

粟

粟壳汤 13892

越

越曲丸 13908
越鞠丸 05609
越曲保和丸 13911
越婢加术附汤 13907

硫

硫半丸 04281
硫朱丹 13921
硫花饮 13929
硫黄丸 01692

雄

雄风散 11644
雄金丸 14672
雄黄丸 14672
雄榔丸 13948
雄麝丸 13935
雄黄救命丹 14672
雄黄解毒丸 14672

搜

搜风顺气丸 00998

紫

紫丸子 13977
紫双丸 13977
紫石汤 02695
紫石散 02695
紫苏汤 13984
紫苏汤 14023
紫苏饮 05073
紫苏散 13984
紫金丸 01604
紫金丸 03578
紫金丹 02194
紫金丹 10848
紫金丹 15028
紫金锭 02194
紫金锭 10848
紫金膏 06331
紫草膏 14000
紫菀汤 13300
紫菀汤 14009
紫菀汤 14011
紫菀汤 14013
紫菀汤 14029
紫菀饮 14013
紫菀散 11517
紫雪丹 13978
紫雪丹 14014
紫雪散 13978
紫霜丸 13977
紫石英丸 10414
紫石煮散 02695
紫苏饮子 13984
紫沉香丸 13987
紫金锭子 05185
紫苏和气饮 13984
紫苏麻仁粥 13174

喝

喝起汤 14036
喝起散 02761

赐

赐子丸 15279
赐方腽肭脐丸 14628

赔

赔赈散 02485

蛤

蛤蚧散 00609
蛤粉散 14048
蛤石轻黄散 14050

黑

黑丸子 14063
黑龙丸 14073
黑白丹 14075
黑神丹 08077
黑神散 05397
黑桂散 14093
黑散子 15399
黑锡丹 05184
黑三棱丸 08965
黑附子汤 14081
黑风羚羊饮 13536

遇

遇仙立效散 14110

锁

锁金丹 08785

锅

锅宜丸 14117

稀

稀涎汤 14120
稀涎饮 12907
稀涎散 12907

鹅

鹅掌皮散 14125

黍

黍米寸金丹 08890

御

御米汤 14146
御米饮 14146

循

循络丹 14149

舒

舒经汤 02042
舒筋汤 00717
舒筋汤 14153
舒筋散 00717
舒筋散 14153
舒筋三圣散 00717
舒筋保肝散 14162

猬

猬皮散 15379

脾

脾约丸 13168
脾约麻仁丸 13168
脾肾双补汤 02773

痢

痢下白术汤 03783
痢疾乳香散 08672

痈

痈证橄榄膏 14999

痛

痛泻丸 14194
痛泻要方 14194

惺

惺惺散 00554

温

温中丸 01113
温中丸 14271
温中汤 03779
温中散 00292
温风汤 14218
温六丸 14249
温白丸 14213
温经汤 01513
温经汤 10150
温胃汤 11941
温胃散 11941
温胆汤 01329
温胞饮 14245
温清饮 14661
温液汤 03023
温中厚朴汤 14215
温证解毒散 02485

滑

滑石散 05127
滑胎散 14288

游

游山方 02411
游山散 02411

滋

滋肾丸 12179
滋肾汤 00518
滋血养筋汤 14359
滋血清肺散 14350
滋阴八味丸 02744
滋阴八味汤 14311
滋阴大补丸 05024
滋阴万病丸 01228
滋阴地黄丸 02744
滋阴地黄丸 07509
滋阴地黄丸 15105
滋阴地黄丸 15110
滋阴降火汤 07593
滋阴养血丸 01228
滋阴清膈散 14350
滋肾通耳丸 14355
滋肾通关饮 12179
滋降降火丸 06484
滋荣散血汤 14358
滋燥养营汤 14360

善

善应膏 14370

普

普连膏 14366
普济消毒饮 14368
普济消毒散 14368
普济解毒饮 03080
普济解疫丹 03080

寒

寒疮热膏药 11146

强

强中丸 01448
强胃汤 02516
强中二姜丸 14384

犀

犀角地黄汤 04899

疏

疏肝散 14409
疏凿散 14410
疏解散 06730

(十三画)

椿

椿皮丸 07321
椿根皮丸 14988

楝

楝根粥 08234

槐

槐花汤 14445
槐花散 05290
槐耳白蔹丸 14442
槐花一物散 14446

榆

榆白皮汤 14471

蓖

蓖麻丸 14739

蓬

蓬术煎丸 14493
蓬莪茂丸 14493

蒲

蒲黄散 03570
蒲公英酒 14570
蒲黄黑神散 14093

蒙

蒙花散 13570

感

感应丹 14521
感喜丸 10140

雷

雷公救疫丸 15396

搐

搐鼻散 14532
搐鼻通气散 14543

暖

暖下丸 07674
暖肾丸 14717
暖宫丸 15279

睡

睡惊丸 14564

罩

罩胎饮 14585
罩胎煎 14585

蜀

蜀椒汤 14674
蜀椒救中汤 12884

锦

锦红汤 14596

催

催生丸 14600
催生汤 02026
催生汤 07698
催生乳香膏 14607
催生兔脑丸 14600
催生神柞饮 14606
催生神柞散 14606
催生柞木叶饮 14606
催生柞木饮子 14606
催生神应黑散 14603
催生神妙佛手散 10843

鼠

鼠粘汤 14609
鼠粘子散 14609

愈

愈风汤 10679
愈风汤 14611
愈风燥湿化痰丸 15291

腽

腽肭脐真方 05591

解

解肌汤 02549
解郁汤 11236
解毒丹 10848
解毒汤 04899
解毒汤 12704
解毒散 04899
解恨煎 14634
解语丹 10818
解语汤 10971
解语散 10971
解雷汤 07451
解酲汤 13827
解毒二贤饮 11677
解毒大黄散 14657
解毒万病丹 10848
解毒消火汤 14656
解暑三白饮 14677

新

新加汤 11071
新添三黄丸 08734
新绛旋覆花汤 13072
新加附子理中汤 10493
新补薄荷白檀汤 15204
新定牛黄清心丸 05869

瘀

瘀血汤 00913

痰

痰火神丸 14709

溻

溻痒汤 14431

溏

溏泄散 02092

塞

塞耳丸 14757
塞里散 05138
塞鼻菖蒲散 07259

辟

辟谷丹 01613

殿

殿胎煎 14750

(十四画)

静

静神散 14753

碧

碧云散 14543
碧云散 14756
碧云散 14771
碧玉丸 10176
碧玉散 10176
碧雪丹 14756
碧雪散 14755
碧雪膏 14756

槟

槟苏散 14786
槟榔散 10013
槟榔散 14785
槟苏败毒散 14785
槟榔顺气汤 14793

酸

酸枣散 02254
酸枣仁汤 11448
酸枣仁汤 14794

蔷

蔷薇根散 14806

蔓

蔓荆子汤 14812

蔚

蔚金丸 03880

聚

聚气汤 00302
聚宝丸 10834

截

截风丹 14830
截血膏 10505
截癫丸 03880
截疟七宝饮 00328

磁

磁石丸 07719
磁石丸 10768
磁石酒 14851
磁石散 10968
磁朱丸 10768
磁砂丸 10768
磁石千金方 00435
磁石地黄丸 14852

蜡

蜡肝散 14048
蜡矾丸 08286
蜡矾丸 13680
蜡煎汤 14868

蜘

蜘蛛丸 14869

蝉

蝉壳饮 08567
蝉花丸 14879
蝉退饮 14883
蝉蜕散 14871
蝉蜕散 14875
蝉蜕无比散 14881
蝉蜕钓藤散 14883

踊

踊乌散 10630

鲜

鲜陈汤 01460

敲

敲枕散 00487

青

青发煎 13050

瘦

瘦胎饮 14292

漏

漏芦汤 14935
漏芦散 14932

蜜

蜜附子汤 14939
蜜渍柏皮 12502
蜜渍黄柏汁 12502

翠

翠云锭子 14941

缩

缩舌膏 06235
缩砂丹 14948
缩砂散 14950
缩泉丸 08523
缩胎丸 06890
缩胎丸 06891
缩胎饮 05073
缩砂香附汤 11990

(十五画)

增

增补引火汤 02790

增味四物汤 14970
增损双解汤 14967
增损理中散 12270

樗

樗白汤 14992
樗参散 00480
樗白皮散 00480
樗树根丸 14988
樗白固经丸 08513
樗根白皮散 14987

蕤

蕤仁汤 10533
蕤仁春雪膏 09533

喳

喳膈膏 14904

噙

噙化三黄丸 00780
噙化太平丸 02183

镇

镇风丹 14090
镇心丸 01131
镇心丸 12115
镇心丹 01131
镇心丹 02884
镇风润气丸 00998

黎

黎洞丹 15093

僵

僵蚕散 06214

鲤

鲤鱼泽漆汤 15099

鲫

鲫鱼酒 15100
鲫鱼羹 11199

熟

熟地黄丸 03724
熟地黄丸 04723
熟地黄丸 15110
熟地黄散 15106
熟附子丸 15108
熟铜末散 12957
熟干地黄汤 15106
熟料五积散 02026

摩

摩风膏 07917
摩腰丹 15118
摩腰紫金膏 15118

激

激音散 15126

鹤

鹤顶丹 03346
鹤龄丹 07326

(十六画)

橘

橘皮汤 01132
橘皮汤 15163
橘苏汤 15143
橘苏饮 15143
橘枳汤 09587
橘枳姜汤 15163
橘叶栝楼汤 15147
橘皮生姜汤 15163
橘皮半夏汤 01461
橘皮竹茹汤 01132
橘皮枳实汤 15163
橘皮麻仁丸 15160
橘红枳术丸 15156
橘枳生姜汤 15163
橘核疝气丸 15144
橘核消肾丸 11658
橘皮五味子汤 08058

醒

醒风汤 10175

薤

薤白汤 12315
薤白散 12315
薤白栀子汤 12315

薇

薇衔汤 09121

薏

薏苡汤 15192
薏苡汤 15193
薏苡散 15197
薏苡粥 15189
薏苡仁汤 04057
薏苡仁汤 07310
薏苡仁汤 13213
薏苡仁散 15189
薏苡仁散 15197
薏苡仁粥 15189
薏米败酱汤 15198
薏苡瓜瓣汤 07310
薏苡附子汤 15197
薏苡附子散 15199
薏苡败酱汤 15199
薏苡败酱散 15199
薏苡麻黄汤 13213
薏苡仁附子散 15197
薏苡仁附子败酱散 15199

薄

薄荷煎 15202

瘰

瘰疬千捶膏 10826

瘿

瘿瘤破结丸 15233

(十七画)

魏

魏术散 15269
魏莪散 15269

黛

黛蛤散 11912

臁

臁疮夹纸膏 15278

蜃

蜃虫散 15283

麋

麋衔汤 09121

（十八画）

藕

藕汁膏 03360

礞

礞石滚痰丸 14725

嶝

嶝峒丸 15093
嶝峒丹 15093

瞿

瞿麦丸 11108
瞿麦汤 06793
瞿麦汤 15316

鹭

鹭鸶咳丸 15318

翻

翻肛散 11365

（十九画以上）

藿

藿香汤 15327
藿香汤 15328
藿胆丸 08324
藿脾饮 15321
藿脾饮 15328
藿香脾饮 15328
藿朴夏苓汤 15333
藿香正气丸 15336
藿香正气汤 15336
藿香正气散 15328
藿香正气散 15340
藿香平胃散 15340
藿香半夏丸 15338
藿香半夏汤 15338
藿香安胃丸 15339
藿香安胃汤 15339
藿香养胃汤 15340

攒

攒风汤 15344

蟾

蟾砂散 08806
蟾香散 08806
蟾酥条 15352
蟾酥锭 15352
蟾蜍丸 05048
蟾酥疗药丸 15350
蟾蜍解毒丸 15347

麒

麒麟散 15367

鳖

鳖甲散 01972

霹

霹雳酒 07787
霹雳煎 15399

麝

麝香锭子 15413
麝香大戟丸 01003

癫

癫痫汤 02695

蠲

蠲痛丸 15406
蠲痛丹 15406
蠲饮枳术丸 15427

主治病证索引

一、内科病证

（一）急证

卒死
06910 06911
溺死
05552
缢死
05552
雷震死
05552
中毒
05179 05180 07984 08152 10848 13138
14390
中酒毒
01689 01929 02130 03143 03609 05875
06741 07431 13805 13806 13824 13827
14646 14676 15013
中药毒
02194 03081
中乳石毒
00786 04860 13978
中蛊毒
02194 03023
昏迷
13252
厥证
00690 02673 04350 06725 06910 06912
08953 09183 09401 09412 10506 11223
12080 12715
气厥
00155 00408 02103 06247 11057 11219
73461
血厥
03930 04981 12220
阴厥
07707
阳厥
03665 05294 12677
痰厥
01733 02196 04076 05365 05448 05989
11219 11438 12183 12337 14118
煎厥
00442 01280 06999 12714
蛔厥
02622 03070 05881 07043 12104 12285
肝厥
01066 08564
风厥
12561
暑厥
13491
寒厥
03905
厥逆
06754
脱证
00406 01051 01061 02735 02765 05358
05359 05561 09311 09349 09372 09395
10437 10676 10857 11026 11249 12850
13603

（二）外感病症

感冒
00124 00156 00743 00823 01044 01059
01576 02026 02414 02483 02544 02782
02786 02917 02946 02985 03541 03785
04359 04475 04934 04935 04974 04990
04991 05628 06011 06089 06206 06281
06317 06369 06378 06726 06728 06730
06854 06950 06979 07334 07483 07497
08363 08814 09233 09305 09818 10253
10279 10590 10601 10683 10761 10990
11019 11023 11064 11196 11284 11314
11330 11348 11349 11726 12025 12883
12972 13177 13847 13854 14222 14416
14522 14523 14652 15114 15201
流行性感冒
07518 13140

伤寒
00170 00564 00574 00661 00838 01086 01769 01771 02094 02904 04898 04914 04915 04990 06492 06955 07984 08036 08154 08435 08588 08815 08881 08885 09027 09699 10275 10605 10763 10807 10991 10993 11025 11067 11289 11303 11320 11357 11916 12103 13138 13141 13201 13831 13871
伤寒太阳证
01059 01188 03516 06149 11034 11049 11051 11052 11056 11059 11062 11064 11066 11071 12552 13140 13147 13188 13808 13837
伤寒少阳证
01497 01540 11305 11307 11330 11356
伤寒阳明证
00893 00894 02733 02945 03531 04052 04070 06168 07107 12104 13212 13814 13829
伤寒阳明经证
01110 03877 03878 04054 04059 15089
伤寒阳明府证
15090
伤寒太阳阳明合病
01531 13836
伤寒少阳阳明合病
01090 01533
伤寒三阳合病
01484 11350
伤寒太阴证
04505 07941 11042 11043
伤寒少阴证
01529 03023 03393 03395 03497 03905 04068 04246 04265 06001 07107 07109 07340 07842 07882 11151 12243 12663 13021 13032 13207 13208 15293
伤寒厥阴证
07107 07134 09976 13179
伤寒阴证
00417 00508 00753 02899 02900
伤寒阴盛格阳
15399
伤寒无阳证
05030
伤寒两感
01049 01081 06887
伤寒过经不解
00540 09386 09388 11354
伤寒表证
01536 10589 10604 13199 13816 13850 13985
伤寒无汗
01364 04870 06032 13152 13205 13810
伤寒阳虚
05892
伤寒发热
02781
伤寒恶寒发热
15336
伤寒壮热
02786
伤寒烦热
10606
伤寒头痛
00521 00577 02535 13154 13202 13832 13844 13854 15331
伤寒身痛
06031
伤寒手足肿痛
08395
伤寒尺脉迟弱
12777
伤寒鼻衄
05454 08768
伤寒吐血
01567 04149 08740
伤寒口舌生疮
12453 12502
伤寒壮热
02786
伤寒壮热头痛
09680 13153 13846
伤寒潮热
13817
伤寒余热
12343
伤寒烦躁
05477 05488 10065 13821 15400
伤寒烦渴

06942 12336
伤寒烦热
10606
伤寒虚烦
00700
伤寒胸痞
00235 03068 03720 04295 07934 09559
09585 12671
伤寒支结
11301
伤寒干呕
05453
伤寒吐蛔
13748
伤寒呃逆
09861
伤寒谵语
01192 02482 04061 05179 05180 06806
伤寒发斑
04365 09371 09704 09813 12634 14727
伤寒发狂
09547 12670 13386
伤寒腹痛
12445
伤寒便秘
05102 09496 14394 14938
伤寒下利
04407 06823 11016
伤寒小便不利
05983 13310 15315
伤寒蓄血
04371 04734 05297 05309 06352 11112
11147 11148
伤寒结胸
00061 02194 03741 04322 05319 05736
09614 10067 10093 11302 11326 12112
伤寒血结胸
11816
伤寒热入血室
00038 01528 01535 02434 04576 11315
11354 12044
伤寒心下有水气
01537 01538
伤寒心悸
10064
伤寒热结膀胱
10998
伤寒阴中伏阳
11234
伤寒夹阴
09373
伤寒夹湿
06739
伤寒夹痞
01922
伤寒表里同病
03140 06945 12250 14682
伤寒表里俱虚
00509
伤寒发汗不解
00937
伤寒汗后身痛
12749
伤寒汗后烦热
12431
伤寒汗后热不解
00462
伤寒下后身热不退
09693
伤寒汗下后筋惕肉瞤
14278
伤寒汗吐下后虚烦懊侬
09692 09718 09719
伤寒汗吐下后心下痞硬
13080
伤寒痉病
11106
伤寒刚痉
06820 13198 13210 13808
伤寒柔痉
10978
伤寒阳毒
02041 03145 04824 06029 09686 14397
伤寒阴毒
01582 02553 02561 02592 02620 03394
03806 05360 06905 06918 07271 07888
07897 07903 10607 13809 14097
伤寒劳复
05478 06367 06387 09619 09720 11319
14608

伤寒食复
09717 11319
伤寒阴阳易
04097 05478 06506 11577 13852
伤寒百合病
04487 05086 05116 05122 05123 05126
05127 11104 11319 14289
伤寒狐惑
03068 03595 04607 06821 14212 15091
赤膈伤寒
14403
伤寒后吐泻
14972
伤寒后神昏
08437
伤寒后烦渴
06416
伤寒后虚烦
09701
伤寒后惊悸
06409 10032 12510
伤寒后气津两伤
05467
伤寒后脾胃虚弱
06542
伤寒后复感新邪
13855 13857
热病头痛
13820
热病壮热头痛
12433
热病烦渴
12434
热病衄血
12435
热病发狂
01684 12815
热病便秘
09497
热病小便不通
06809
热病阴伤
03654
热病阴虚阳越
06491
热病喉痹
01854
天行
07984 11292 13831 14651
天行壮热
10574 13142
天行壮热头痛
03145 13818 13819
天行壮热烦闷
04688
天行头痛
02741 06807 09681 13241 14633
天行咳喘
00525
天行便秘
09496
天行小便不通
06808
天行口渴
06711
天行疙瘩
05045
天行结胸
14977
天行口疮
12604
天行头面赤肿
09687
天行劳复
06705 13852
瘟疫
00170 00214 00499 00564 00583 00684
00773 01548 01769 02194 02468 02485
02829 03623 04990 06281 08048 08363
08843 09144 09374 09498 10793 10807
10896 11294 11314 11339 11604 13138
13841 13879 14065 14367 14668
瘟疫太阳证
06727
瘟疫阳明证
01534
瘟疫头痛发热
10761
瘟疫烦躁
05445

瘟疫应下失下
12406
瘟疫发斑
02945 05151
瘟疫呕吐
04309
预防瘟疫
13578 13579 15246
温病
00554 03184 04899 07012 07298 08626
09499 11351 13201 13823 13831 14367
温病阳明证
02469 03573 04553 06002 07958 10687
11317 11940 12971 13222 13403 14684
14696 14980
温病少阳证
06321 12129
温病太阴证
01961 02357 04059 12981 13367 13747
温病初起
13411
温病壮热烦躁
01507
温病壮热口渴
14376
温病表里俱热
01105 11598
温病发斑
08238
温病热入心包
02115 02471 05869 09502
温病神昏谵语
05182 13978 14981
温病热入血室
07011 11352
温病结胸
00061 12186
温病便秘
09496
温病泄泻
14330
温病热结旁流
14667
温病热邪深入下焦
00165
下焦温病便溏
00047
温病阴亏
03133
温病气阴两伤
00167
温病虚风内动
00835 01066
温病夜热早凉
08149
温病呃逆
01475
温病伏邪夹瘀
00158
温病误汗伤津
12895
温病误汗发狂
01491
中暑
00057 00503 00504 00528 00673 00950
01205 01709 01989 02130 02194 02260
02720 02832 03257 03613 03739 03877
04059 06945 06955 07020 07021 07270
07363 07446 08170 08362 09106 09530
10288 10289 11039 11040 11195 11311
11313 11777 11778 11917 12023 12024
12065 12685 12686 12703 12882 13490
13491 13492 13619 13739 14527 14677
15130 15249
预防中暑
14061
暑湿
01532
伏暑
00233 00360 03381 04065 04479 05184
10316 10820 12691 12978 12979 12980
疰夏
03613 06377 07055 14477
秋温
07339
湿温
00060 00555 00675 00757 00863 01135
02112 02197 03007 03080 06665 06679
08242 08247 10060 10316 10683 14367
湿温阳明证

04060
湿温气分证
10684 11466
湿温身痛
12638
湿温伤气
13492
湿温湿郁下焦
10691
湿温咽痛
12976
湿温神昏
13504
湿温邪留膜原
15333
中湿
00017 01645 02868 03004 03473 03496
03707 03790 04484 04531 05808 06307
07494 07506 07941 10066 10718 10886
12079 12621 13184 13194 13213 13518
13519 13520 14204 14211 14527 15335
秋燥
01728 01962 02299 02993 06859 07369
09410 13976
疟疾
00328 00812 02094 02873 03422 04233
05529 06344 07219 08588 08881 08996
09873 09897 11069 11287 11330 12235
12918 12920 13138 14254
肺疟
06836
寒疟
11049 78546
温疟
04062 04067 05476 11315 11316
湿疟
03005 11287
食疟
02861 06295 11287
瘴疟
04935 10848 13406
久疟
05004 05005 08037
疟母
05004 08994 08995 09139 11717 15374
15381 15382
胎疟
15392
劳疟
12919
痢疾
00349 00445 00480 00495 00709 00732
00747 00751 00764 00859 00980 01078
01089 01119 01176 01196 01217 01237
01549 01592 01745 01769 01789 01801
01842 01843 01894 01899 01900 02038
02173 02270 02360 02361 02536 02623
02624 02628 02720 02733 02838 02839
02840 02935 03007 03009 03085 03290
03299 03335 03407 03409 03423 03444
03468 03474 03490 03635 03816 03946
03949 04028 04030 04069 04094 04228
04229 04469 04585 04795 04845 04881
04890 04895 04900 04905 05056 05079
05096 05112 05290 05851 05973 05986
06208 06241 06630 06668 06767 07010
07020 07114 07163 07219 07547 07850
07871 08050 08201 08504 08672 08780
08846 08897 08984 09033 09147 09308
09380 09488 09608 09623 09640 09669
09760 09888 09977 10191 10254 10273
10300 10355 10837 10983 11038 11042
11043 11128 11277 11406 11426 11540
11576 11613 11639 11853 12315 12345
12400 12416 12443 12446 12447 12449
12454 12492 12602 12654 12665 12682
12822 12906 13010 13387 13402 13543
13545 13550 13837 14067 14110 14143
14146 14186 14202 14252 14265 14291
14521 14556 14663 14989
赤痢
02559 04661 04788 04873 06000 07384
09626 09635 09838 09841 12491 13263
13557 14432
白痢
01624 02651 03135 03721 04033 07546
08275 10701
气痢
01802 02625 07552 07557 07799 09792
冷痢

00121 00551 01826 03168 03721 04787
05174 07129 07876 07889 13549
热痢
03947 12662
毒痢
02762
水谷痢
01492 06781 12616
五色痢
03467 07841 09410 11548
噤口痢
02397 02762 03118 03119 03162 03195
04547 04620 05418 09331 09368 09369
09370 11177 11419 11750 15210
休息痢
03398 05190 05904 07548 07799 08368
09299 09351 14186
恶痢
04904 13718
蛊痢
76077 95140
细菌性痢疾
14187
阿米巴痢疾
14187
霍乱
00044 00503 00592 00770 01012 01017
01235 01423 01504 01771 01778 01779
01781 01785 01988 01989 02130 02196
02197 02720 02820 02867 02900 03147
03191 03192 03396 03483 03492 03799
03811 04040 04120 04479 05099 05180
05333 05464 05625 06281 06317 06704
07017 07363 07433 07537 07940 07941
08076 08171 08394 08587 09131 09143
09387 10073 10288 10289 10290 10368
10492 10493 10494 10760 10780 10820
10905 10935 10964 11038 11039 11203
11205 11206 11282 11563 11579 12243
12252 12256 12257 12258 12260 12261
12269 12630 12667 12684 12685 13490
13517 13581 14190 14521 14956 15234
15235 15322 15324 15331 15337 15349
15396 15397
干霍乱
12026 12884
痧胀
00504 01546 02328 05362 05625 06317
06319 08981 10162 10492 14190 15349
痉病
03260 05220 06144 06996 10679 12562
13386 13413
斑疹
00564 02356 04182 04528 04574 04899
05239 05365 05660 06166 08071 09694
09695 11754 12104 12704 12782 13251
14001 14077
流行性出血热
05467 11330
流行性乙型脑炎
05869
钩端螺旋体病
13495

（三）肺系病证

咳嗽
00079 00080 00089 00343 00387 00397
00422 00437 00458 00487 00489 00529
00530 00543 00561 00571 00575 00581
00601 00617 00620 00638 00644 00646
00672 00707 00714 00742 00832 00868
00975 01027 01056 01092 01142 01248
01262 01439 01478 01498 01558 01559
01560 01637 01670 01677 01678 01964
01988 02084 02227 02247 02256 02363
02364 02451 02678 02706 02715 02841
02842 02852 02861 02925 02928 02930
02940 02953 03051 03243 03244 03719
03768 03780 03888 03925 04154 04190
04193 04202 04209 04211 04212 04213
04219 04233 04234 04243 04280 04398
04456 04504 04595 04772 05015 05093
05105 05108 05109 05113 05119 05121
05129 05338 05342 05348 05482 05483
05554 05555 05559 05572 05809 05836
05837 05860 05917 05918 05923 06279
06404 06432 06484 06595 06740 06827
06835 06845 06846 06848 06863 06865
06877 07368 07806 07809 07823 07863
07964 07998 08151 08174 08175 08251

08603 08720 08779 08812 08854 08882
08898 08903 09039 09180 09213 09227
09282 09283 09310 09445 09463 09467
09642 09794 10083 10136 10357 10457
10574 10591 10598 10608 11070 11113
11172 11512 11591 11860 11880 11885
11886 11912 12121 12135 12300 12401
12429 12745 12989 12992 12993 12998
13146 13159 13186 13258 13261 13288
13291 13295 13298 13301 13305 13306
13308 13313 13314 13315 13364 13416
13432 13455 13460 13494 13499 13501
13685 13787 13788 13793 13794 13894
13986 14004 14011 14012 14033 14124
14231 14298 14322 14681 14710 14997
15128 15143 15158 15296 15318
心咳
00585 02764 04155 10000 10504
肝咳
07802 09590 12158
肾咳
01283 03898 13208
胆咳
05014
干咳
00172 12820 13881
久咳
00453 01401 02248 02316 02853 02864
04424 05087 05345 06525 06566 07000
07278 07535 07632 07633 07821 12307
12967 12988 13003 13297 13686 13786
14043 14044
冷嗽
01835 02087 02862 06832
热嗽
12644
气嗽
00468
劳嗽
00313 00595 01941 04728 05615 05657
07540 07634 10154 12819 13893
食积咳嗽
05390 05392
咳喘
00029 00088 00110 00361 00433 00476
00556 00568 00588 00645 00647 01177
01414 01469 01510 01617 01685 01759
01917 01992 01993 01995 02089 02199
02313 02315 02318 02661 02718 02720
02769 02828 02863 02932 02982 03090
03334 03342 03388 03532 03618 03787
03851 03894 03895 03938 03939 04000
04023 04104 04111 04200 04201 04218
04225 04242 04306 04423 04548 05091
05103 05104 05345 05832 05835 05907
06134 06207 06246 06386 06403 06565
06693 06714 06721 06723 06735 06736
06829 06834 06839 06840 06843 06844
06847 06857 06867 06873 06948 07197
07198 07210 07371 07627 07628 07631
07635 07805 07822 07866 08005 08058
08077 08079 08252 08305 08411 08622
08811 08832 08842 08956 09036 09099
09128 09129 09179 09190 09191 09212
09279 09301 09366 09367 10207 10211
10592 10786 10792 10966 10996 11065
11073 11121 11149 11170 11517 11556
11866 11882 12991 13038 13140 13145
13160 13190 13191 13233 13289 13290
13299 13300 13311 13497 13761 13789
13791 14005 14007 14010 14023 14041
14042 14046 14145 14227 14229 14230
14232 14679 14699 14702 14712 14725
15041 15138 15387
哮喘
00054 00459 00741 01341 01437 01469
01996 01998 02124 03879 04080 04641
05065 06005 06495 08078 08816 09014
09191 09193 10212 11517 12624 13212
13332 13685 13740 14118 14693
喘证
00089 00317 00466 00576 00907 01098
01134 01314 02026 02317 02383 02393
02489 02789 03405 03428 03429 04394
04609 05188 05375 05802 05880 06280
06734 06744 06837 06838 06858 06862
06879 06985 07001 07252 07258 07362
07370 07551 07555 07567 07610 07715
07895 07938 09037 09189 09192 09211
09222 09278 09298 09304 09407 09408

09423 09433 09581 10602 10781 10782
11059 11072 11084 11085 11151 11175
11249 11881 12140 12276 12301 12754
12896 13156 13292 13302 13467 13722
13790 13792 13862 13989 14170 15187
15308 15311
寒喘
02086 02221 12264
痰喘
01323 07485 09220 09221 13868 13874
久喘
01985 02969
肺炎
08909 08910
大叶性肺炎
08901
急性支气管炎
11334
肺痿
00519 00582 00623 01667 01676 02183
03023 03029 03063 03083 03674 03745
03747 03749 03896 03902 04190 04519
04773 04844 05106 05345 05347 05557
06049 06204 06386 06408 06428 06524
06596 06712 06826 06864 06871 07804
07817 08624 08627 08904 08908 08958
10340 10341 10358 10362 10432 10666
10953 11061 11230 11858 13090 13129
13454 13463 13682 13955 14009 14045
14337 15415
肺胀
01127 01527 09100 11632 11800 13912
肺虚证
03796
肺结核
02209 04381 05125 13464
胸膜炎
07369 11534 11535 13874

（四）脾胃病证

脾实证
10599
脾胃虚弱
00229 00252 00268 00282 00289 00316
00327 00410 00460 00514 00587 00664
01023 01076 01085 01287 01798 01828
01880 01891 02014 02076 02182 02514
02519 02525 02726 02731 03330 03375
03506 03584 03585 03610 03764 03779
03792 03794 03819 03973 03999 04045
04263 04470 04552 05408 05484 05774
05775 05820 05926 05959 05965 06342
06444 06445 06446 06530 06970 07085
07088 07089 07122 07241 07286 07353
07356 07394 07423 07432 07433 07436
07437 07438 07440 07570 07658 07660
07682 07740 07828 07873 07935 07937
07941 07953 07976 08249 08568 08574
08919 08920 08926 08982 09256 09260
09289 09316 09353 09356 09380 09845
09859 09863 09881 09883 09891 09954
10108 10119 10122 10134 10139 10304
10308 10314 10360 10375 10635 10642
10643 10669 10672 10979 10980 11002
11183 11199 11417 11490 11498 11559
11578 11654 11939 11949 11963 12010
12072 12074 12077 12085 12256 12259
12261 12283 12288 12297 12414 12542
12570 12713 12760 13043 13517 13723
13734 13742 13895 13902 14117 14132
14140 14213 14214 14255 14264 14429
14493 14586 15339 15397
脾胃不和
00246 00264 00284 00297 00502 00513
01888 01892 02408 02409 02732 02868
03671 03974 04043 04264 05789 06537
07412 07413 07414 07431 07439 08269
08572 08573 08578 08585 09254 09264
10147 10285 10312 10313 10318 14272
15222 15327 15329
呕吐
00080 00159 00191 00250 00251 00259
00261 00279 00286 00287 00288 00293
00431 00455 00500 00507 00542 00544
00613 00872 01164 01182 01526 01574
01838 01896 01897 01902 01907 02734
02866 02893 03020 03105 03174 03328
03615 03617 03721 03735 03763 03765
03767 03777 03784 03793 03812 03970
04236 04247 04287 04305 04319 04321

04691 04826 04854 05175 05452 05456
05469 05486 05813 05821 06363 06389
06400 06415 06533 06622 06737 06785
07086 07107 07416 07987 08160 08163
08166 08172 08570 08622 09290 09326
09328 09593 09892 10016 10068 10192
10257 10597 10719 10967 11080 11360
12261 12297 12445 13024 13075 13079
13081 13420 13475 13987 14148 14444
14701 14724 15077 15079 15140 15153
15185 15297 15330 15340

干呕

01831 03414 04288 07856 08131 08580
09703 10894 15136

吞酸

00255 00277 00471 00665 00775 02760
02851 02886 02893 03191 03445 03802
04323 05076 05792 05794 06656 07040
07106 07107 07111 07135 09337 09875
09958 09963 09975 09992 10124 10315
10336 10337 10338 10379 10543 11337
12270 12643 12668 13280 13341 13412
13452 13475 14701 14725 14961

食欲不振

00128 00339 00390 02867 05690 05817
08592 09678 09786 09995 10193 10367
10600 12001 12043 12793

厌食

02865

食积

00016 00254 00278 00294 00436 00691
00803 00804 00806 00858 00861 00867
00924 01062 01091 01290 01468 01494
01512 01592 01760 01806 01905 01906
01907 01929 01939 02282 02332 02378
02414 02720 02966 03415 03769 04076
04078 04138 04291 04292 04296 04649
04903 05391 06294 07229 07287 07357
07421 07531 07759 07830 07980 08569
08951 09354 09383 09594 09602 09609
09610 09612 09857 10128 10131 10291
10306 10309 10336 10337 10339 10477
10770 11203 11281 11406 11437 11496
11653 11682 11683 11684 11685 11691
11708 11738 11760 11793 12111 12410
13259 13713 13952 14067 14172 14173
14176 14216 14251 15156 15328 15334

劳倦

00579

胃脘痛

00022 00127 00263 00280 00372 00467
00649 00844 00869 01309 01452 01526
01710 01747 01791 01966 02011 02131
02204 02223 02411 02578 02666 02681
02777 03013 03061 03063 03318 03428
03440 03578 03608 03720 03968 04018
04045 04168 04177 04320 04341 04342
04376 04516 04573 04998 05085 05184
05197 05628 05847 06531 06736 06966
06971 07123 07344 07382 07417 07425
07537 07763 07765 07767 07768 07784
07922 07936 07940 08340 08342 08593
08683 08819 08950 10256 10258 10311
10434 10483 10693 10769 10775 10780
10789 10822 10981 10982 11016 11376
11380 11560 11563 11579 11941 12073
12261 12544 12648 12773 12789 12807
13185 13226 13228 13280 13429 13556
13581 13785 14217 14237 14268 14269
14525 14617 14939 15350

胃及十二指肠溃疡

02573 02576 04295

胃扩张

03720

寒疝

00101 00766 00862 01823 02266 02396
02589 02596 02656 05198 05223 05264
05318 05967 05975 07099 07136 07144
07397 07947 08360 10150 10776 11347
14589

腹痛

00037 00212 00253 00326 00346 00431
00669 00846 01016 01048 01068 01170
01269 01335 01418 01478 01479 01480
01495 01759 01807 01819 01886 01931
02184 02537 02618 02656 02673 02920
03350 03386 03406 03451 03798 03971
04305 04866 04897 05062 05400 05938
06233 06487 06489 07121 07443 07452
08156 08367 08575 08579 08817 08888

09230 09292 09601 09615 09876 09886
09934 10131 10150 10307 10317 10370
10418 10778 10973 10990 11018 11046
11134 11207 11208 11261 11410 11566
11708 11709 11710 11855 13273 13279
13724 13731 13749 13763 14144 14272
14560 14692 14948 15309
小腹痛
01736 14223 14258 14548
胀满
00216 00436 00461 00927 01031 01133
01165 01473 01481 01522 01584 01592
01753 01912 01914 01926 02199 02265
02266 02267 02380 02484 02524 02663
02802 02872 03396 03415 03772 03969
04034 04040 04303 04326 04862 04867
05187 05776 05995 06171 07110 07115
07421 07757 07858 08128 09487 09560
09565 09591 09938 09939 09944 09996
10117 10121 10130 10131 10137 10246
10286 10382 10594 10721 11000 11076
11244 11397 11561 11573 11667 11999
12032 12080 12207 12276 12768 12823
12843 13442 13475 14113 14215 14236
14381 14430 14634 14703 15139 15141
呃逆
00270 00281 00291 00292 00299 00475
00553 00622 00716 00760 01425 03116
03294 04507 05617 05666 05818 07107
07405 07861 07948 08174 09286 09303
09713 09761 10381 10853 11149 12296
12656 13332 13911 14559 14681 14959
14983 15149 15151 15152 15153 15154
嗳气
00234 05792 05991 08391 10262 11236
11453 14983
噎膈
00016 00067 00171 00215 00216 00221
00248 00257 00267 00296 00310 00345
00469 00470 00491 00549 00552 01012
01128 01129 01138 01351 01446 01573
01734 01739 01754 01812 01824 01832
01836 01919 01946 01950 02045 02047
02048 02052 02116 02153 02154 02181
02405 02416 02480 02594 02868 03117
03187 03328 03715 03800 04092 04274
04395 05029 05049 05061 05306 05353
05500 05933 06248 06305 06946 07104
07128 07211 07392 07401 07409 07419
07556 07761 07846 07859 07860 07945
07980 08172 08469 08473 08474 08586
08881 08891 08966 09277 09324 09406
09535 09558 09907 10099 10125 10172
10174 10708 10780 10844 10956 11374
11436 11449 11460 11472 11480 11513
11639 11862 11899 11988 12035 12063
12190 12225 12271 12794 12847 12922
13056 13077 13234 13236 13636 14109
15036 15037 15101 15160 15268
气膈
00429 02152 07391
忧膈
02152
恚膈
02152
寒膈
02152
热膈
02152
反胃
00084 00221 00248 00266 00310 00438
00452 00491 00493 00566 00573 00865
00954 00979 01028 01029 01030 01084
01247 01351 01449 01460 01503 01734
01808 01902 01911 01946 01986 02181
02182 02594 02685 02867 02868 02911
03052 03187 03336 03432 03616 03618
03619 03681 03715 03721 03972 04284
04304 04363 04580 05049 05061 05406
05407 05794 05816 05846 05856 05951
06248 06305 06422 06562 06946 07101
07410 07427 07623 07911 07926 08047
08075 08167 08171 09182 09329 09341
09406 09759 09860 10073 10123 10173
10174 10257 10374 10379 10777 10834
11177 11380 11460 11639 11750 12190
12704 12922 13039 13056 13556 13744
14109 14249 14350 14678 15101 15179
15319 15323
胃炎

02204 03720 11497
胃下垂
03393
脾瘅
08604 08842 12703 13811 15203
口臭
00258 00260 00344 02545 03612 04443
04805 04968 05672 06538 07281 07403
09444 09458 10766 11479 11480 13238
13347 13349 13959
胃肠作痒
02355
吐泻
01821 02349 02601 02736 02901 03430
03494 06541 10620 14700 15401
泄泻
00020 00073 00128 00135 00367 00378
00379 00382 00702 01078 01106 01310
01376 01451 01464 01482 01843 01901
01918 01935 01977 01988 02049 02152
02155 02237 02479 02487 02521 02525
02560 02578 02618 02722 02838 02839
02840 02875 02890 03007 03050 03291
03381 03393 03423 03771 03778 03807
04029 04038 04129 04152 04281 04295
04355 04384 04443 04460 04477 04538
04571 04583 04795 04853 04916 05070
05112 05295 05385 05387 05391 05405
05423 05940 06527 06528 06545 06548
06642 06668 06669 06788 06900 06962
06966 06988 07227 07307 07532 07536
07538 07541 07546 07549 07550 07553
07659 07662 07749 07849 07880 07906
07920 07926 07936 07943 07949 07956
08050 08072 08248 08250 08275 08320
08487 08505 08506 08508 08509 08510
08529 08577 08590 08651 08825 08835
08954 08957 08991 09009 09091 09093
09104 09134 09231 09232 09235 09290
09307 09337 09357 09380 09381 09385
09417 09608 09856 09888 09907 09961
09967 10004 10078 10120 10190 10191
10192 10193 10245 10305 10310 10317
10336 10415 10526 10702 10983 10992
11277 11576 11638 11761 11799 11964
12012 12261 12281 12304 12416 12445
12647 12657 12683 12823 13017 13020
13021 13041 13042 13240 13387 13515
13724 13796 13837 13896 13923 13999
14171 14177 14179 14194 14213 14234
14249 14271 14480 14545 14949 15249
冷泻
00551 01804 03135 12265 14282
热泻
03380 06627 09640
脾泄
02981 07300 09969 12415
肾泄
02078 02080 02092 03402 04343 04408
05404 13729 14174 14225
水泻
03513 06200 06232 06782 13511
气泻
01013
飧泄
06306
久泻
00550 01844 02213 02510 03821 06963
10263 13002 14256
滑泄
01845 02248 02271 04851 04852 05401
06536 06540 07545 07558 08648 09847
12150 14530
洞泄
03168 06547
肠炎
15336
过敏性结肠炎
02525 03402
急性胃肠炎
03483
肠鸣
05792 11919
便秘
00029 00065 00122 00490 00693 00834
00921 00957 00965 00968 01104 01173
01346 01506 01803 01948 01951 02111
02131 02425 02431 02515 02560 02689
02730 02952 03047 03086 03393 03462
03566 03758 04099 04172 04281 04596

04699 05256 05316 05971 05997 06155
06156 06169 06335 06478 06606 06608
06611 06613 06723 06895 06896 07084
07198 07243 07245 07261 07461 07595
07843 07851 07853 07907 08114 08126
08127 08159 08759 09117 09287 09338
09555 09556 09557 09564 09568 09660
09661 09706 10099 10142 10557 10567
10686 10765 11482 11549 11758 11773
11866 11868 11869 11870 11871 11872
11873 11874 11875 11876 11877 11894
11895 11896 11897 11898 11973 11990
11992 12114 12197 12207 12208 12209
12557 12653 13132 13133 13134 13135
13136 13168 13175 13183 13259 14302
14351 14408 14439 14584 14685 14960
15008 15034 15142 15295 15389

大便燥结
03704

脱肛
01910 02096 03011 03300 03774 06181
06183 06197 06360 07016 07318 07541
07682 07766 09235 09243 09350 10436
10525 10677 11260 11489 11536 11624
11878 12618 12736 13066 13960 13961
14047 14450 14475 14574 14950 15379

食亦
00880 02495 03234 09313 12062

关格
00099 00491 00533 00987 00995 01816
01855 02015 02738 04513 05707 05970
06448 06472 08306 08308 08589 09618
10112 11180 11388 11485 11524 12016
12041 12172 12659 12821 12841 13909
13974 15035

大小便不利
03998 13975

误吞金银铜铁
14109 08798 09389 10055 13221 82574
13678

（五）心系病证

惊悸
02470 03217 03219 05874 06040 09165
09171 09215 15062

心悸
01067 01703 01704 01705 01706 01707
02909 03509 04307 04377 04378 05506
05514 05883 07578 07584 08958 09317
10768 11017 11069 13048

怔忡
00092 00219 01613 02798 02891 03202
03203 03262 03310 03315 03316 03441
03452 03453 04197 04200 04210 04415
04462 04463 04532 05517 05518 05689
05871 05872 05873 06804 07575 07591
07794 08267 08985 08999 09166 09168
09170 09318 09344 09645 10061 10622
10623 10633 10660 10723 11448 11937
11938 12766 13421 13662 14323 14979
15066 15068 15071

惊悸
00092 00348 00426 00427 00430 00443
00473 00482 00547 00548 02428 02891
03199 03231 03266 03309 03316 03441
03992 05283 05508 05693 05801 05848
05871 05873 05877 05878 06078 06289
06438 06452 06454 06456 06459 06460
06554 06886 06947 06949 07985 08493
08781 08876 08877 08998 09142 09164
09832 10007 10026 10041 10051 10632
10637 10653 10963 11063 11924 13247
13668 13679 14100 15067 15069 15085
15271

心掣
07582

胸痞
00112 00249 00277 00403 00784 01264
01760 02881 03577 04076 06994 07426
08480 09119 09276 09548 09581 09615
11053 11087 11704 12223 12627 12674
12692 12739 13279 13860 15156 15157
15161 15163

胸痹
01799 03424 04082 04238 04251 04260
04269 04270 06534 06801 07125 07855
07857 08368 09030 09437 09447 09549
09574 09575 09587 09611 09613 09620
09676 09890 10079 11090 11098 11109
11110 12086 12256 12261 12773 15132

15197
胸痛
04882 11995 13193 15178
胸膈痛
04499
胸胁痛
09715
心痛
00040 00071 00119 00256 01300 01588
01809 01815 01820 02071 02106 02583
02584 02681 02766 02767 02902 03361
03797 04115 04174 04366 05571 06520
06780 06783 06943 07019 07126 07132
07373 07429 07583 07786 07795 07846
07915 08338 08339 08559 08578 08763
08819 09092 09215 09856 09885 09964
09966 10342 10482 10704 10713 10854
10969 11139 11174 11205 11206 11239
11379 11564 11812 12008 12039 12346
12404 12679 12796 13196 13484 13581
14099 14257 14681 14688 15036
急心痛
01583 04114 04176 07098 07788 10711
10790 10985 14617 15068
久心痛
00262
胃心痛
09858
虫心痛
05393
冷心痛
00280
厥心痛
02691 04026 10824
热厥心痛
00843 13229
冠心病
00340 07792 10564 11110 11356
冠心病心绞痛
10237 10849 10850 10851 11994 13822
风湿性心脏病
08958
心动过缓
03483
心肌梗塞
03393
心肌炎
03613
失眠
00236 00728 01329 01593 01705 01707
01720 02719 02791 02793 03278 03344
04194 04245 04295 04312 04464 04521
05517 05519 05617 05691 05849 05858
05859 07305 07578 07985 08927 08975
08998 09149 09170 09184 09660 09998
10023 10036 10495 10623 10625 10632
10633 10645 10646 10768 11063 11285
11565 11938 12007 12394 12663 12703
13281 13669 13679 14241 14242 14243
多梦
09832 10647 11957 14726
多寐
04757
健忘
00070 00203 00070 00203 00309 00427
00477 00547 01067 01094 01612 01703
01704 01706 01707 01729 01765 02690
02797 02891 02909 03218 03251 03258
03266 03309 03315 03316 03333 03441
03628 03937 03992 04199 04415 04546
05072 05514 05872 05873 05878 06452
06468 06554 07317 07454 07794 08985
08998 09164 09168 09169 09170 10020
10021 10622 10637 10646 10963 11493
11924 11947 11979 12027 13668 14100
14112 14630 14979 15003 15061 15182
癫痫
00052 00081 00718 01131 01145 01466
01619 01720 01740 01743 02037 02147
02415 02470 02481 02643 02695 02797
02798 02905 03153 03164 03201 03244
03259 03309 03327 03576 03667 03880
03881 04196 04197 04199 04207 04208
04215 04295 04300 04301 04346 04433
04492 04529 04840 05294 05365 05504
05513 05525 05526 05664 05830 05876
06109 06125 06129 06259 06634 06939
06940 07053 07693 07728 07794 07965
07973 07986 08040 08042 08292 08359
08361 08366 08562 08616 08647 08731

08876 09012 09015 09194 09195 09217
09300 09325 09462 09986 10094 10218
10225 10363 10478 10538 10732 10736
10737 10755 10768 10909 10918 11330
11356 11357 11385 11555 12082 12282
12877 12921 12935 13369 13371 13584
13608 13660 13662 13762 13931 14189
14323 14383 14713 14725 14725 14999
15052 15055 15068 15084 15357 15416
15417
心痫
15065
花癫
04639
风痫
01958 02423 02433 02435 02639 04240
07963 10029 10333 10406 12928 12970
13149 13552 14388
食痫
13481 13977
心风
00572 05507 10053 15060 15091
狂证
00604 00621 01054 01707 02346 02415
02916 03207 03244 03309 03665 03880
04076 04181 04192 04199 04215 04314
04494 05293 05294 05526 06109 06129
06634 06802 07965 08042 08203 08292
08630 08863 09012 09183 09194 09511
10028 10094 10538 10909 11385 12082
13009 13246 13871 14402 15173 15416
15417
精神分裂症
12703
老年性精神病
13167
精神失常
02462 03265 04568 12824
痴呆
00236 05528 06439 06932 07762 08385
08993 09519 10149 11264 12902
心神不宁
04199
神不守舍
04439 10443 13480
烦躁
04514 06475 12113
心烦
05517
心躁
04568
烦闷
13514
烦渴
02943 03027 14380
谵妄
01976 07581 12115 12541
恐惧症
00348 10021
焦虑症
12663
喜笑不休
02912 03200 03231 04076
恍惚
02684 04415 04464 05878 06455 08493
10023 10026 10045 10047 12334 12399
12569 14726 15069 15085
心虚证
05501 06466 09650 10023 10072
心气不足证
01432 01477 01516 02992 05545 06954
07579 07580 07581 07582 10058 10823
14022
舞蹈病
11357
口吃
10661

（六）肾系病证

遗精
00203 00381 00629 00634 00699 00765
00830 00934 00951 01022 01343 01456
01578 01660 01661 01707 01713 01999
02077 02095 02109 02151 02157 02768
02821 02880 02898 02916 02927 02939
02964 02971 02972 02975 02995 03122
03190 03269 03270 03275 03283 03293
03302 03326 03377 03427 03737 03953
04154 04169 04601 04638 04718 04907
05023 05111 05693 05704 05782 05802

05857 05981 06330 06485 06597 06685
06901 06953 07157 07214 07326 07329
07533 07562 07564 07578 07668 07669
07673 07694 07731 07733 07735 07746
07748 07985 08027 08201 08245 08285
08316 08320 08426 08496 08499 08502
08521 08524 08534 08535 08536 08537
08554 08558 08784 08785 08786 08787
08789 08790 08792 08799 08803 08823
08824 08825 08826 08866 08867 08868
08869 08945 09145 09163 09172 09216
09417 09474 09520 09652 09665 09738
10022 10025 10077 10140 10151 10168
10170 10179 10206 10326 10329 10572
10644 10814 10814 10940 11058 11063
11149 11161 11176 11182 11400 11402
11403 11404 11421 11446 11450 11452
11459 11500 11802 11803 11928 11953
12004 12154 12300 12316 12361 12374
12375 12699 12785 12786 12916 12996
13015 13018 13027 13097 13105 13114
13119 13125 13242 13243 13248 13281
13282 13435 13505 14049 14112 14114
14116 14297 14307 14326 14334 14513
14630 15067 15125 15127 15238 15313
15410
滑精
01565 01881 02711 03084 06023 06361
09725 09865 10723 10784 12151 14244
漏精
10648
血精
00694
早泄
06597 06685 07678
阳痿
00020 00218 00357 00400 00653 00744
00876 00885 00951 00956 01160 01249
01658 01660 01662 02109 02202 02570
03126 03188 03529 03544 04344 04369
05076 05379 05409 05410 05419 05462
05587 05641 05676 05766 05768 05769
05770 05778 05781 06017 06330 06451
06560 06607 06973 07081 07090 07214
07326 07733 08526 08945 10215 10639
10830 10840 11006 11176 11221 11229
11890 11928 11946 11977 12310 12375
12916 12946 13095 13106 13167 13409
13507 13838 14385 14557 14630 14716
15017 15212 15280 15410
强中
04536 10086 10171 11483 12696 13015
13053
阴缩
02656 05366 11220 14221
阴冷
04189 05366 07295 07296 07297 07600
14553
淋证
00129 01298 01813 01814 01856 01857
01860 01864 01865 02034 02035 02145
02173 02174 02322 02744 02759 02962
03099 03171 04121 04123 04714 04718
04798 05115 05981 06155 06156 06413
06672 06813 07349 07867 08262 08400
08554 08747 08755 08845 09384 09675
10293 10334 10492 10716 10932 11096
11433 11439 11821 11824 11897 12139
12228 12358 12426 13021 13418 13658
13667 13670 13681 13760 13847 13889
13890 14348 14375 14471 15042 15301
15317
石淋
00331 00366 00478 00749 02036 03096
03170 04628 08258 08399 08746 08778
08940 09209 10109 11917 12247 12321
12829 13512 13656 14035
气淋
06815 07402 07868 09123 09952 10009
11820 12138 12995
血淋
00366 00384 00837 01514 01524 01858
01933 01945 02450 03097 03570 03984
04679 05095 05213 05536 05606 05985
06768 07815 07999 08021 08296 08301
09757 09762 09763 10076 10785 12273
12437 13379 13512 13659 14441 14473
14963
冷淋
01825 01991 02036 03664 05415 07396

07398 07406 09123 13888 14105
热淋
00366 02036 03862 03982 05317 14284
劳淋
01868 02566 03098 03632 04736 06748
膏淋
02176 02927 07395 08533 11822 12353
12369
浊证
00175 00883 03305 04385 09522 10932
12004 12426 14615
赤浊
02835 04514 04812 06818 11186 13379
13436 14423
白浊
00381 00435 00699 00765 01075 01578
01947 02304 02403 02404 02821 02834
02835 02927 03216 03220 03261 03426
03937 03943 03953 03987 03994 04169
04379 04727 05095 05524 05703 05910
05934 06483 06672 06720 07153 07157
07171 08027 08316 08523 08534 08784
08787 08792 08823 08824 08826 08866
08867 08868 09122 09145 09172 09417
09520 09521 09988 10025 10126 10140
10151 10168 10169 10179 10206 10479
10940 10959 11161 11182 11188 11403
11404 11405 11421 11446 11450 11500
11937 12155 12359 12373 12374 12530
13125 13435 14300 14424 14479 14990
15063 15127 15238
赤白浊
04199 07977 10572 10924 11439 12358
13901
乳糜尿
13021
转胞
07212 07435 07837 09291 13652 14285
癃闭
00125 00492 00817 00963 01197 01856
01869 02341 02445 03049 03142 04706
04802 04857 04918 05977 05978 05979
05996 06050 06793 06803 07192 07193
07910 08316 08846 09122 09126 09359
10680 11108 11128 11484 11650 11823
11917 12144 12170 12171 12179 12849
13022 13307 13425 13643 13845 13887
14248 14290 14311 14374 15054
多尿
09834 10210 14549
小便频数
01304 02819 03063 03226 03413 04598
04838 05417 05919 06180 06609 07153
07156 07166 07891 07938 08025 08027
09932 11803 12153 12154 12352 13729
14954 15127
小便滑数
00421 09835 12322 12373
夜多小便
00202 01947 11953 14097
小便失禁
02079 03994 04689 04694 07523 09662
09953 10723 10855 11402 11405 14549
15174
尿痛
12724
不育
00276 00300 00359 00597 00637 01403
02262 02562 02564 02569 02742 02753
02995 03732 04440 05002 05284 05462
05583 05590 05591 05594 05621 05643
05678 05694 05698 06022 06482 06560
06648 07215 07326 07328 07329 07750
08547 08549 08556 08557 09020 09021
09156 09289 09480 10205 10847 12015
12316 12787 13508 13600 13607 13700
13752 13838 14224 14283 15212
阳物细小
05041 12110
肾着
02679 03084 08423
肾炎
11108
急性肾炎
08424
慢性肾炎
04451 08425
肾盂肾炎
00076
白淫

00337 00634 02819 02850 03220 03940
04379 05701 07921 11185 11402 11404
12699
肾结核
00934
肾虚证
01774 02085 03161 03190 04533 04751
05802 06020 07716 07745 12523 14226
15186 15259
尿路结石
08830
输尿管结石
08860
肾绞痛
12179
慢性前列腺炎
10610 11147 12359
阴痛
04379 05333

（七）肝胆病证

肝着
13070 13072 13075 15267
肝风
01630 01634 04610
肝血不足证
13445
眩晕
00095 00199 00207 00231 00365 00819
00911 01139 01272 01282 01305 01306
01366 01462 01643 01689 01705 01715
01716 01718 01720 01759 01988 02177
02187 02216 02385 02417 02698 03004
03060 03063 03066 03139 03190 03384
03408 03431 03719 03836 03910 03979
04001 04027 04038 04058 04293 04302
04312 04324 04498 04644 04718 04921
04954 04971 04989 04994 05251 05388
05599 05617 05785 06053 06056 06058
06095 06112 06124 06169 06944 06978
06981 06983 07243 07467 07477 07595
07701 07783 07905 08042 08138 08362
08550 08697 08854 09119 09148 09185
09261 09603 09823 10027 10050 10303
10319 10364 10440 10453 10731 10735
11213 11366 11367 11423 11445 12117
12378 12394 12521 13074 13078 13080
13124 13204 13224 13274 13332 13373
13430 13540 13825 14098 14108 14317
14322 14323 14344 14533 14725 14726
14978 15015 15184 15247
晕车晕船
02260
美尼尔氏综合征
14331
帕金森氏综合征
11357
黄疸
00113 00792 00991 01074 01175 01247
01301 01457 01478 01512 01530 02354
02869 02889 03041 03061 03981 04064
04075 04226 04357 04527 04549 04669
04828 06335 06707 06869 07044 07097
07186 07985 08017 08073 08127 08246
08259 08281 08846 09026 09393 09674
09689 09697 09700 09707 09708 09902
09903 09906 09907 09908 09911 09913
09916 09917 09918 09923 09926 09930
10034 10074 10075 10192 10869 10887
10943 11048 11291 11355 11379 11703
12214 12455 12589 12610 12750 12815
13021 13024 13050 13209 13211 13266
13870 14963
阳黄
09927
阴黄
01068 01489 04860 09920 09921 09925
09929 10913 12256 12298 13192
急黄
09905
酒黄
01113 04310 05265 06294 06796 07185
09696 09901 09904 09919 09928 13757
13813 15321
谷疸
01113 03272 04471 06295 07185 07288
07289 08202 08237 08591 09580 09924
10080
黑疸
01488

女劳疸
01170 03272 08420 11145 11735 13050
肝炎
10321 11735
急性黄疸型肝炎
13269
病毒性肝炎
09914
急性传染性肝炎
03080 15336
慢性肝炎
00023 03395 07522 07688 10553
肝硬化
07688
肝硬化腹水
09034
肝昏迷
04626
肝胃不和
14150
肝脾不和
06636
肝脾肿大
15381
胁痛
00023 01458 01873 02347 02674 02683
02859 03274 03442 03458 04086 04311
04368 04972 05059 05255 05312 05709
05990 05992 06990 06991 07228 07595
07637 08342 08581 08583 08858 08935
09552 09553 09584 09588 09589 09598
10994 11094 11232 11318 11324 11341
12046 12107 12844 12845 12846 12878
13446 13663 14108 14121 14306
胁胀
02858 09655
木肾
01903 09736 10539 11838
疝气
00016 00023 00036 00037 00039 00174
00182 00212 00298 00322 00323 00667
00701 00755 00758 00796 00862 01140
01311 01342 01377 01381 01400 01543
01587 01710 01840 01904 01928 01937
02331 02621 02660 02811 02941 02987
02996 02997 03364 03391 03399 03443
03578 03581 04126 04132 04133 04500
05044 05054 05114 05198 05254 05341
05364 05570 05571 05574 05644 05649
05945 05975 06489 06666 06692 06943
07112 07343 07390 07404 07411 07441
07872 08128 08129 08130 08344 08470
08475 08566 08676 08681 08707 08716
08761 08762 08818 08819 08859 08997
09008 09204 09424 09679 09716 09780
09781 09782 09931 09935 09940 09943
09946 09950 09951 09955 09971 09972
10064 10096 10097 10236 10250 10260
10281 10284 10425 10822 10824 11004
11114 11122 11138 11190 11204 11205
11206 11207 11528 11657 11658 11668
11669 11798 11954 12294 12795 12797
13735 13797 14037 14121 14434 14435
14496 14497 14548 14631 14674 14939
15048 15145 15146 15269 15398 15422
心疝
00027 01837 04868 10957 11111
肾疝
05586
气疝
02184
血疝
00322 02184 02951
癫疝
01003 01387
冲疝
05053
厥疝
01811 05053
水疝
02520 09956
筋疝
03081 03281
疝瘕
06242 13769 15401
偏坠
01903
中风
00180 00315 00408 00439 00440 00537
00578 00616 00676 00695 00696 00697

00717 00728 00753 00785 00930 00998
01021 01034 01077 01082 01087 01088
01102 01107 01108 01136 01145 01183
01189 01190 01205 01453 01454 01455
01465 01609 01611 01622 01627 01629
01632 01633 01647 01649 01650 01652
01657 01663 01690 01713 01718 01720
01732 01733 01759 01767 02007 02063
02067 02196 02323 02420 02421 02448
02470 02478 02616 02635 02643 02644
02670 02906 03017 03103 03214 03241
03357 03495 03543 03698 03742 03752
03790 03825 03864 03876 03961 04053
04183 04449 04485 04563 04588 04592
04600 04664 04752 04799 04871 04949
05017 05028 05043 05179 05180 05201
05222 05333 05356 05357 05442 05443
05445 05447 05646 05660 06005 06036
06045 06061 06079 06108 06136 06159
06219 06471 06592 06661 06769 06773
07244 07249 07253 07462 07650 07739
07772 07775 07848 07892 07904 07912
07923 07997 08384 08404 08697 08703
08753 09023 09160 09358 09395 09476
09500 09745 10115 10153 10175 10184
10185 10363 10368 10403 10405 10450
10461 10489 10621 10640 10674 10726
10818 10821 10878 10939 10950 10971
11163 11218 11219 11256 11278 11389
11390 11428 11438 11451 11500 11857
11867 11974 12024 12182 12183 12227
12246 12329 12716 12735 12773 12788
12824 12826 12907 13143 13478 13480
13582 13583 13585 13604 13644 13913
13915 13930 13966 14071 14119 14418
14540 14611 14622 14642 15026 15051
15068 15088 15117 15164 15192 15243
15397

中风闭证
00718

肺中风
02088

肾中风
03959 06060 12356

风瘧
06097

音痱
04746 12365

腘腿风
02055 06065

急风
12953

柔风
02649 03538 03964

贼风
02399

类中风
01921 03711

中痰
01205 12024

中气
00408 03008 05173 05333 05356 05357

中恶
01543 02197 02601 05179 05180 06733
08394 10763

瘫痪
00085 00193 00371 01159 01238 01390
01631 01642 01687 01699 02177 02333
02602 02695 02705 03193 03206 03285
03546 04015 04590 05016 05530 06098
06258 06347 06583 06587 06757 07226
07472 07780 08057 08138 08144 08584
08659 08699 08710 08750 08777 09157
09484 09541 10156 10363 10456 10495
10536 10805 10825 10842 10911 11382
11418 11553 11825 12002 12005 12131
12180 12316 12521 12737 13677 13682
13800 13965 14090 14091 14162 14622
15046 15094

半身不遂
00873 01242 01573 01829 02633 02634
02662 03024 03129 03495 03499 03500
03544 04665 05114 05479 05481 05639
05814 05854 05928 06090 06101 06102
06239 06772 07015 07463 07702 08403
08829 10153 10274 10448 10565 11213
11265 11273 11382 11977 12348 13116
14156 15012

口眼歪斜
00678 00818 01723 02327 02913 03285

03546 05651 06110 07773 08829 10225
12002 12231 13264 13386 13969 14092
14142 14488 14572 15252
拘挛
01643 01782 02327 02586 03500 03965
04057 04540 04723 04744 05547 07770
07886 10458 10537 12009 13592 15271
筋缓
02066
转筋
07894 08022 08668 53262 09266 83352
筋惕肉瞤
01640 12722
颤振
04843 06288 09290 11409
癫疯
00231 00374 00590 00941 10444 10563
10624 12277 13601
高血压病
00076 01720 03393 06594 07792 13822
14331
急性脑出血昏迷
05869
低血压
03613
夜游症
04614
离魂症
05674 11153
胆虚证
01277 02081 02254 02329 07729 10048
10052 14728 15183
胆瘅
04608 09074
胆囊炎
07194 07207 10466 10468 10469 10470
10471 10472 10473 11334 14708
胆道感染
11333
胆石症
10466

（八）气血津液病证

气病
00295 00301 00302 00418 00630 01137
01885 01890 01893 01916 01929 02331
02406 03213 03392 03975 05967 05994
07191 07351 07531 10376 14135 15325
冲气
02436 11057 15082
郁证
00303 01011 01751 01756 01915 02103
02407 02717 04091 04198 04489 05714
06519 06984 06989 07303 07355 07402
07428 07573 07655 09340 10046 10622
11283 11284 11321 11337 11359 11360
11630 11989 12193 12301 12311 13500
13766 13884 13908 14151 14152 14353
14655 14660
气郁
01887 01920 05964 12292 14975
血郁
05298 05609 05610
水郁
06980
火郁
02756 05293 14653
痰郁
02511 04098 14711 14715
湿郁
15196
酒郁
12755
食郁
10426 10427
瘀证
01019 01940 03515 03517 05304 06304
07383 09981 10251 11141 11241 11242
11909 12057 14234 14309 14707
吐血
00130 00139 00150 00196 00484 00488
00501 00654 00746 00836 00856 00993
01008 01056 01410 01411 01415 01470
01486 01613 01669 01671 01957 01963
02017 02208 02233 02340 03146 03198
03243 03315 03316 03323 03383 03483
03537 03626 03633 03640 03651 03694
03903 03983 04171 04190 04206 04223
04468 04532 04747 04758 04793 04885
04899 05199 05330 05331 05332 05450

05458 05533 05535 05602 05634 05907
05952 06157 06345 06405 06584 06590
06792 06794 07628 07639 07730 07779
07810 07852 07998 08000 08148 08184
08295 08528 08642 08643 08766 08842
09026 09095 09322 09339 09490 09628
09640 09641 09667 09714 09760 09840
10088 10340 10505 10852 10908 10938
11171 11370 11401 11606 11617 12402
12429 12584 12704 12819 12894 13033
13206 13225 13609 13610 13612 13785
13807 13981 14008 14036 14069 14233
14373 14386 14400 14504 15010 15072
15299 15300 15302 15303

呕血

00195 04422 05439

咳血

00152 00195 00196 01057 01613 02340
03342 04150 04512 05125 05343 05346
05634 06390 07588 07816 07823 07839
08079 08174 08260 09068 10177 10340
13295 13303 13317 14030

咯血

00195 00524 01219 01669 01670 02053
03323 03537 03738 03748 04021 04022
04223 04532 05634 08077 10369 10432
11370 12401 12819 13469 13794

唾血

05634 06434 11370

尿血

00120 00746 00888 01020 01289 02028
02190 02340 02477 02962 03562 03643
03652 03677 03678 04173 04599 04678
04720 04733 05294 05450 05502 05602
06157 06237 06419 07812 07820 07836
08263 08264 08266 08296 08303 08767
09629 09631 10785 12420 13113 13117
13272 13275 13318 13653 14457 14502
14963

便血

00150 00196 00654 00746 00781 01520
01683 01769 01790 01848 01974 02027
02038 02275 02340 02560 02600 02616
02626 02629 02823 02888 02935 03136
03254 03315 03316 03383 03454 03562
03633 03648 03649 03660 03738 04535
04582 04670 04848 04869 04886 04908
05532 05534 05605 05985 06146 06157
06211 06335 06358 06359 06388 06651
06667 07018 07037 07138 07313 07321
07342 07800 07930 07987 08050 08355
08435 08639 08642 09242 09245 09321
09469 09495 09562 09571 09637 09638
09758 10088 10190 10322 10773 10806
10852 11410 11488 11536 11537 11540
11624 11983 12273 12279 12306 12308
12402 12432 12448 12461 12531 12642
12704 13379 13451 13468 13547 13548
13605 13750 13755 14070 14079 14166
14432 14437 14445 14447 14448 14450
14451 14452 14453 14460 14461 14463
14469 14472 14505 14639 14662 15108

鼻衄

00021 00501 00671 00779 00792 00856
01299 01313 01391 01415 01568 01613
01683 01957 02031 02208 02217 02233
03257 03323 03383 03530 03537 03626
03633 03639 03651 03656 03687 03689
03694 03738 03889 04223 04503 04532
04680 04681 04716 04740 04755 04765
04829 04841 04899 04944 05199 05212
05455 05458 05470 05533 05535 05537
05602 05634 06174 06405 06427 06429
06430 06664 06975 07068 07445 07811
07852 07998 08000 08100 08198 08199
08200 08261 09493 09641 09707 09839
09842 10430 10908 10938 11045 11171
11401 11617 11923 12402 12429 12628
12704 12730 12894 13225 14147 14373
14400 15072 15203 15300

齿衄

00118 06195 06664 08298 13348 13350
13627

舌衄

02749 04655 04756 07006 07811 07826
08297 08729 08744 10264 11839 12494
14446

耳衄

02205

眼衄

11608 11629
肌衄
03889 04841 05058 05450 05455 08271
08490 10487
九窍出血
14096
大衄
03642 05487 07818
遍身出血
01979
失血
01973 01977 02922 04666 04667 08127
10987
白细胞减少症
04615
紫斑
13535
紫癜
08988 08989 11610 15336
血小板减少性紫癜
04899
痰饮
00103 00106 00159 00285 00695 00713
00825 01068 01440 01459 01460 01461
01526 01715 01758 01877 01949 01980
01988 02123 02362 03077 03773 03782
04037 04038 04039 04076 04248 04250
04252 04259 04271 04278 04297 04308
05385 05386 05920 06546 06624 06638
06742 06993 07096 07210 07352 07354
07764 07964 08138 08168 08244 08387
08600 09148 09252 09268 09314 09346
09422 09466 09550 09551 09592 09599
09606 09617 09959 09982 09991 10008
10083 10148 10189 10474 10543 10593
10700 10890 10974 10995 11010 11020
11036 11037 11057 11068 11070 11235
11487 11501 11562 11655 12075 12277
12282 12286 12296 12708 12770 12991
12996 13073 13076 13494 13797 13901
13914 14099 14137 14209 14210 14266
14267 14280 14493 14687 14726 15148
15150 15419 15426 15427
风痰
00364 00531 06937 09990 12970 14120
14387 14948 15056 15130
冷痰
08274
热痰
01626 05763 06287 07332 07415 11346
12643 12658 13431 14709
湿痰
00095 13521 15292
燥痰
11883 13237 15290
食痰
00531 01266
老痰
05006
顽痰
15296
溢饮
01059 01469
支饮
01938 03766 06797 08251 08253 09119
09566 10005 10132 12159 13071
悬饮
00204 13743
留饮
03077 03803 04984 09576 09595 11817
11852 14240 14271 15328
水肿
00057 00105 00153 00160 00192 00204
00210 00312 00511 00515 00606 00651
00674 00730 00748 00842 00898 00916
00928 00945 00966 01001 01002 01004
01005 01103 01111 01133 01181 01227
01251 01383 01433 01490 01577 01591
01600 01623 01797 01839 01872 01876
01884 01968 01969 01970 01988 02106
02107 02372 02400 02436 02472 02653
02805 02822 02837 03040 03042 03044
03046 03071 03079 03080 03439 03556
03559 03815 03991 03997 04025 04075
04103 04104 04106 04451 04474 04511
04584 04617 04637 04650 04652 04879
05170 05232 05633 05715 05896 05998
06004 06041 06042 06047 06544 06563
06683 06775 06776 06777 06779 06798
06799 06812 06814 06816 06828 06870

06976 07105 07184 07202 07203 07479
07507 07944 07994 08232 08304 08310
08312 08313 08314 08352 08717 08911
08992 09119 09128 09129 09130 09236
09237 09238 09281 09355 09423 09483
09982 10003 10012 10013 10018 10071
10088 10111 10114 10116 10118 10196
10243 10295 10298 10365 10412 10424
10484 10500 10771 10841 11038 11068
11129 11151 11166 11195 11257 11368
11660 11661 11663 11664 11718 11739
11741 11795 11808 11809 11810 11813
11815 11841 11908 12042 12119 12132
12142 12143 12226 12340 12611 12840
12990 13083 13084 13085 13086 13087
13088 13099 13131 13144 13176 13183
13189 13602 13619 13647 13649 13717
13858 13859 13861 13863 13864 13865
13866 13867 13869 13873 13910 13916
13953 14099 14410 14550 14943 15098
15274 15275 15312 15402
风水
00929 00931 06107 06132 06778 09813
10190 13130 13157 13180 13719 13906
皮水
04105 06046 06131 09813 14501
阳水
01146
石水
11811 12136 12162 15099
气肿
03090 07994 12840
鼓胀
00132 00222 00238 00353 00771 00820
01004 01007 01109 01115 01203 01342
01950 02102 02105 02106 02107 02264
02402 02436 02731 02826 03090 03340
03341 03387 03552 03557 03991 04035
04451 04637 05403 05633 05773 07422
07479 07869 07994 08007 08010 08024
08030 09223 09478 11030 11699 11720
11750 11791 12000 12184 12341 13802
14476 14478 15214
气鼓
01592 01797 01884 08030 14952
血鼓
01180 12221 12798 15412
虫鼓
02843 11736
水鼓
05729 07306 08030 13711 13720 13872
气胀
00444 01037 02264 14952
血胀
00535 11126 13773 13774
水胀
02264
心胀
11567
肝胀
08066
胆胀
05632
三焦胀
12173
热胀
09578 09605
单腹胀
01927 02334 05630 12840
消渴
00456 00472 00494 00512 00526 00546
00776 00810 00962 01187 01388 01430
01614 01615 01668 01681 01686 01701
02944 02949 02968 03056 03196 03338
03360 03558 03560 03669 03736 03829
04019 04079 04102 04169 04203 04375
04533 04545 04717 04718 04813 04827
04850 05310 05412 05414 05430 05523
05705 05921 05931 06380 06382 06383
06384 06393 06394 06408 06423 06424
06526 06603 06620 06706 06800 07154
07372 08015 08207 08411 08414 08417
08418 08607 08613 08614 08938 09140
09271 09333 09345 09403 09505 09722
09723 09733 09933 09994 09997 10682
10783 10787 10791 10816 10914 11089
11091 11092 11101 11154 11172 11384
11395 11399 11461 11639 11703 12134
12313 12320 12323 12339 12403 12430
12438 12444 12456 12524 12537 12545

12550 12556 12577 12579 12612 12645
12696 12720 12764 13015 13016 13037
13052 13101 13244 13553 13619 13683
13687 13690 13709 13710 13757 13759
13878 14286 14290 14303 14332 14339
14649 15040
上消
00077 00522 00541 01682 03713 03716
04059 04413 04775 05429 06410 06580
06586 08605 08621 11558 12543 12564
中消
02263 02994 03685 03811 04537 04817
07165 09962 10024 10087 12104 12418
12489 12515 12652
下消
00432 00486 01303 02860 02994 04478
09735 09767 09941 09942 09979 11099
11383 12441 12516 12517 12565 12578
12693
口渴
03064 15298
暴渴
04808
口干
03022 12476
口唇干裂
08841
汗证
02090 02228 02229 06507 07160 07686
09121 10987 10990 11047 11737 11911
12029
自汗
00845 01162 02101 02210 02230 02750
02985 03827 03833 04466 04589 05584
05595 06085 06178 06373 07007 07172
07954 08623 09133 10438 11058 11210
12028 12555 12561 12606 12607 12743
12744 12890 13000 13001 14689 14947
盗汗
00186 02101 02750 02903 03012 03190
03225 03258 03657 03827 04508 04589
05235 05257 05344 05348 05641 05961
06178 07007 07162 07705 09315 09651
10272 10438 10832 11058 11189 11210
11929 12539 12555 12585 12606 12720
14097 14326 14689 14947 15393
黄汗
09915 11033 11048 11209 12717 12750
12780
头汗
07319
额汗
14929
脚汗
07054 13061
阴汗
07173 07600 07960 09003 09005 09514
11160 14482
漏风
06178
汗出不止
13173
内燥证
02986 10566
喜唾
00864 02666 12256
流涎
07444
痞块
00290 00347 00363 00680 01212 01354
01467 01737 02277 02342 02351 02352
02359 02370 02780 03045 05336 05616
06240 07022 07793 07835 07844 07847
07981 09573 09896 10180 11250 11705
11706 11707 11723 11742 11763 11765
11797 12005 13663 14185 14263 14964
气痞
01922
气块
01796 14109
血块
02342
痃癖
00181 00434 00801 00805 00959 00986
01247 01800 01827 01889 02366 02367
04045 04281 06242 06315 07127 07776
07781 07846 07976 08963 08964 09560
10573 11397 12509 12812 14722 15036
15145 15209 15384
酒癖

00866 00961 04290 05098 11487 11636
11655
茶癖
10182
水癖
12611
饮癖
05515 09550 09551
寒癖
09937
血癖
01125 04188
癥瘕积聚
00044 00210 00802 00805 00808 00809
00960 01226 01336 01407 01409 01759
01818 01822 01908 01924 01957 02325
02368 02382 02391 02611 02648 03547
03853 04164 04481 05075 05225 05993
06256 06294 06478 06764 07181 07448
07832 07833 07972 07975 07980 08388
08967 10091 10113 10277 10332 10556
10564 10701 11000 11398 11501 11532
11692 11762 11764 11779 11780 11792
12274 12275 12292 12796 12834 12924
13555 13677 13768 14144 14436 14514
14695 15011 15145 15209 15221 15234
15314 15383
食癥
01795 06241 08965
米癥
13770
蛇癥
00972
虫瘕
06341
血瘕
00826 03137
息贲
01794 01985 02024 04253 07257 09577
09582 09604 11522 12059
伏梁
01386 02024 05531 15268
肥气
01793 02024 08921 08922 08923 14409
15268 15372
奔豚气
00039 00323 01155 01252 01379 01810
01833 01936 02024 02436 03240 05842
06810 06880 07120 07131 07404 07441
08227 08309 08317 08318 08952 09188
14099 14643
痞气
00799 02024 04567 06535 14182 14183
14184
气积
01592 02184 03415 07829
血积
02184 03415 10477
酒积
01592 01909 10339 10477 14645
茶积
01592
肉积
07829 07830 07831 10770
息积
01920 02331
鱼蟹积
10253
虚劳
00015 00090 00126 00148 00165 00168
00188 00190 00197 00199 00200 00201
00202 00208 00217 00225 00228 00243
00244 00245 00265 00319 00354 00368
00369 00383 00388 00391 00401 00402
00464 00465 00485 00496 00557 00558
00566 00567 00569 00586 00594 00598
00599 00600 00609 00612 00614 00643
00657 00712 00715 00752 00768 00827
00829 00877 00933 00952 00953 01033
01052 01053 01069 01070 01099 01100
01123 01151 01156 01185 01195 01228
01238 01246 01256 01284 01285 01288
01422 01476 01478 01521 01523 01590
01623 01658 01661 01662 01666 01674
01675 01700 01757 01944 01965 01981
01982 02078 02151 02158 02183 02191
02253 02439 02442 02507 02562 02569
02571 02572 02605 02650 02722 02763
02771 02772 02774 02775 02776 02804
02806 02807 02808 02810 02844 02844

02883 02908 02938 02974 03125 03126
03131 03172 03190 03210 03264 03289
03306 03312 03325 03372 03404 03434
03522 03523 03543 03589 03625 03644
03646 03653 03710 03757 03795 03808
03824 03827 03911 03933 03936 03942
03955 03956 03993 04044 04072 04087
04100 04103 04170 04255 04450 04545
04742 04748 04754 04767 04770 04778
04786 04809 04814 04816 04831 04875
04911 05002 05024 05091 05094 05286
05318 05409 05410 05411 05413 05419
05420 05421 05422 05563 05564 05568
05573 05589 05637 05641 05656 05660
05683 05765 05782 05783 05793 05889
05894 05906 05908 05913 05916 05929
05941 05946 06030 06105 06245 06253
06376 06379 06381 06395 06396 06418
06453 06457 06458 06461 06482 06484
06521 06601 06602 06605 06610 06612
06684 06883 06894 06898 06908 07082
07124 07152 07164 07169 07220 07226
07326 07329 07361 07371 07420 07434
07442 07561 07562 07571 07572 07577
07587 07613 07620 07621 07625 07640
07647 07649 07656 07665 07667 07674
07676 07679 07680 07690 07709 07710
07713 07731 07733 07734 07744 07747
07748 07753 07792 07854 07875 07878
07883 07890 07896 07899 07913 07955
07995 08002 08003 08051 08092 08105
08106 08109 08110 08111 08112 08161
08411 08412 08415 08416 08522 08525
08531 08538 08541 08585 08612 08615
08618 08734 08774 08783 08801 08802
08847 08865 08870 08888 08936 08968
08999 09016 09017 09018 09133 09241
09255 09257 09258 09262 09263 09265
09270 09280 09296 09313 09319 09327
09365 09382 09391 09400 09409 09418
09468 09473 09481 09726 09728 09729
09730 09731 09737 09742 09743 09790
09799 09833 09836 09889 09933 09987
10036 10133 10208 10214 10265 10325
10350 10351 10595 10603 10614 10621
10632 10803 10814 10929 10955 10961
11179 11187 11297 11299 11315 11343
11344 11345 11422 11425 11446 11640
11831 11900 11920 11932 11944 12066
12102 12137 12276 12299 12300 12364
12374 12483 12508 12513 12514 12520
12526 12527 12532 12535 12572 12573
12574 12575 12586 12588 12597 12598
12608 12695 12711 12720 12721 12726
12742 12745 12746 12747 12756 12757
12867 12868 12913 12916 12945 13091
13102 13104 13109 13111 13119 13121
13459 13506 13509 13607 13641 13683
13690 13691 13700 13701 13702 13704
13712 13730 13758 13798 13799 13800
13838 13840 13897 13982 14025 14040
14063 14101 14103 14130 14133 14134
14180 14301 14308 14321 14325 14333
14335 14336 14338 14340 14345 14352
14421 14425 14426 14529 14557 14628
14629 14647 14698 14723 15041 15109
15113 15180 15181 15239 15373 15386
15387 15410 15415

肺劳

01665 01790 11592 11961 12536 12587
13463 14053 14228 15244 15361

心劳

00447 00448 00983 03169 05791 06464
06474 06791 12426

肝劳

04442 08055 09727 09984 10081 12529
13596

脾劳

03789 05626 12511

肾劳

00560 02057 02744 05909 05947 06019
06958 11590

热劳

00449 03144 06494 12419 13617 15385

气劳

09846

急劳

08137

干血劳

01179 10774

六极
00428 00435 00778 00875 01101 02091
03613 04256 04257 04258 04591 04830
05018 05425 05461 06402 07544 07874
10049 10586 11593 12512 12536 12571
13094 13155
骨蒸
01673 02040 04391 04709 04718 04763
04773 04804 04818 04825 05342 05656
05657 06375 06420 06841 09739 09869
10037 10154 10352 10609 11300 12518
12528 13358 13359 13476 14391 15375
15377 15378
劳瘵
03062 03750 04783 04829 05092 05347
05557 05655 06081 06486 06488 06493
06733 06965 06972 07593 07608 08136
09010 09013 09253 09306 09336 10809
10848 12013 12274 13018 13357 13456
13457 15241 15358 15359
传尸
06733 10037
风注
05855
劳风
04910 07265
干瘦病
04643
解㑊
05082 12194
瘿瘤
01547 02144 02310 02366 02716 03600
03897 04273 05788 06477 06833 07276
07279 08286 08471 08472 08477 08478
10544 10751 10975 11238 11254 11465
11711 11716 11783 11784 11786 11804
11818 11819 11834 11835 11836 11837
12165 12166 12504 15233 15343
气瘿
00133 00227
石瘿
11834
气瘤
03232 03945 11787
甲状腺肿大
03471
脱发
00075 00359 00685 00721 03574 23269
04622 07365 56833 10059 10529 10616
10907 12246 85486
头发早白
00359 01375 01424 01564 02597 02619
02664 02995 03522 04072 04170 07139
07864 08062 08140 08511 08932 09648
09868 09870 10059 10356 10617 10847
12117 13752 14102
头发枯黄
02574 11027

（九）肢体经络病证

头痛
00012 00159 00273 00275 00632 00698
00720 00727 00761 00819 00935 01139
01265 01317 01319 01361 01369 01397
01399 01635 01691 01714 01720 02186
02187 02189 02245 02333 02464 02599
02634 02670 02842 03076 03138 03149
03151 03152 03186 03285 03346 03408
03726 03831 03841 03843 03980 04165
04224 04232 04235 04279 04332 04364
04404 04658 04702 04922 04932 04938
04939 04942 04944 04947 04959 04971
04982 04989 04993 04994 05282 05367
05617 05650 05726 05831 06012 06100
06152 06155 06156 06169 06229 06234
06247 06249 06671 06757 06944 06969
07074 07075 07107 07162 07243 07260
07269 07336 07430 07477 07480 07481
07482 07503 07504 07516 07530 07783
07785 07919 08125 08361 08656 08666
08699 08701 08705 08709 08844 08854
09210 09274 09426 09451 09453 09810
10084 10085 10161 10187 10252 10267
10319 10378 10391 10428 10511 10655
10767 10788 10796 10958 10976 10999
11158 11445 11644 12078 12164 12397
12410 12752 12885 13161 13267 13330
13331 13360 13373 13728 13825 13940
13964 14064 14072 14092 14193 14399
14458 14526 14536 14537 14542 14726

15044 15045 15126
肾厥头痛
01692 02947 13921
厥阴头痛
06991 07118 07456
痰厥头痛
00531 00718 04312 04313 04992 06106
13414 13921
热厥头痛
07568 13427
偏头痛
01367 01694 03230 04066 04282 04819
04973 05177 06217 09446 09850 10976
12994 13260 13570 14542
头风
00307 00632 00639 00761 01015 01080
01220 01253 01281 01330 01372 01620
02177 02189 02700 03150 03822 04325
04405 04659 04931 04933 04943 05114
05648 05650 05654 06005 06234 06249
07336 07496 08343 08742 08828 08946
09825 09826 09830 10098 10181 10247
10248 10747 10762 10764 10822 11158
12003 12380 13936 14247 14533 14726
脑风
03148 03183 03977 04230 04819 04937
04956 07460
雷头风
00536 02188 02494 02588 04517 07451
09053 09059 13419 14618 14726 15025
首风
01363 02641 06091 10030
眉棱骨痛
00069 01265 03149 03724 03978 04543
04702 04957 04992 06073 06148 06579
06617 07455 08041 12384 12622
三叉神经痛
12737
手足拳挛
02645
颈项强痛
11734 14155
项强
01784
臂热
05389
手臂痛
03967 04294 04318 04550 05368 06347
06670 07664 10542 10717 14153 14725
肩胛痛
02074 13997
肩臂痛
00220 01639 06128 12126 12161
肩背痛
00591 09186 10949 10988 12232 13962
背恶寒
04510
项背痛
13732
脊骨痛
14159
驼背
05807
肥大性脊柱炎
10203
骨质增生
13069
腰冷
10447
腰痛
00058 00128 00355 00446 00656 00659
00686 00734 00917 01395 01599 01776
01792 02109 02114 02446 02679 02714
02995 03016 03188 03190 03427 03507
03527 03607 03692 04068 04109 04110
04117 04125 04131 04188 04328 04386
04735 04961 05172 05194 05416 05767
05772 05803 05911 06167 06233 06496
06497 06500 06502 06503 06504 06508
06659 06749 07231 07464 07508 07514
07588 07592 07614 07621 07664 07670
07673 07738 07742 07900 07918 08095
08096 08128 08153 08319 08329 08411
08422 08430 08499 08627 08892 08895
09120 09768 09782 09936 10157 10197
10198 10209 10366 10442 10445 10480
10570 10707 10733 10734 10836 10960
11006 11008 11013 11135 11213 11275
11486 11580 11802 11997 12048 12100
12101 12106 12147 12354 12355 12357

12363 12370 12792 13054 13092 13093
13100 13560 13594 13597 13917 13918
13964 14037 14625 14626 14627 14690
14716 14717 14718 14721 15118 15119
15122 15286
腰背痛
02705
腰脊痛
04704 10199
腰胁痛
04893
腰腿痛
00708 02419 02440 04175 04450 05550
05613 06487 06489 06553 06640 06643
06644 06646 07470 07902 07950 10230
11227 11271 11412 11474 11491 12226
腰膝痛
03412 05268 06064 09945 10885 14179
14719
腰膝无力
11492
腰脚痛
02118 02438 02467 02593 02712 03205
03535 03548 10630 12986
坐骨神经痛
03438 10564
腿痛
00735 03307 04146 05779
脚痛
13591
脚膝痛
01777 10199
脚气
00043 00198 00734 00798 00998 01025
01034 01209 01549 01773 01780 01783
01829 01867 01882 01883 01952 02026
02138 02258 02441 02588 02644 02657
02660 02661 02712 03108 03109 03110
03209 03472 03645 04109 04289 04316
04334 04441 04453 04590 04651 04929
04935 05444 05802 05976 06048 06147
06600 06639 06722 06762 06876 07108
07224 07463 07498 07674 08006 08031
08364 08410 08693 08707 09268 09965
09968 10827 10885 11412 11702 12122
12439 13060 13716 13914 13978 13983
14099 14417 14968 15033 15043 15155
15194 15207 15344 15370 15429
脚气冲心
04254 08277 09150 15195
足胫痛
02061
硬皮病
07232
皮肤不仁
00010 13589
肉苛
04016 06093
肢体麻木
00370 00559 00589 01213 01608 01640
01688 01723 01761 01983 02006 02587
02632 02636 02770 03401 04345 04370
04386 04497 04560 04612 07092 07137
07209 07267 07751 08020 08206 10485
10728 10839 10937 11211 11213 11259
11265 11423 11473 11922 13488 15203
面目麻木
04047
舌麻
10384
口舌头面麻木
02240
手指麻木
04329
两腿麻木
05974
脧痛
11865
身痛
02199 02245 03708 04700 06008 06103
07345 07374 07778 08019 09157
鸡爪风
01371 06757
肥胖症
10158 11195
刺风
01628 04005
蛊风
02670
痹证

00043 00068 00098 00187 00220 00311
00356 00396 00636 00688 00724 00813
00814 00818 01050 01166 01186 01189
01211 01230 01257 01360 01496 01541
01636 01648 01659 01718 01722 01759
01878 01959 01984 02042 02059 02113
02138 02443 02447 02585 02590 02658
02662 02697 02699 02701 02739 02754
02882 03004 03006 03010 03066 03067
03128 03194 03208 03253 03348 03354
03355 03449 03472 03500 03507 03519
03528 03546 03848 03950 03958 03967
04351 04361 04590 04594 04651 04945
05009 05027 05289 05398 05550 05551
05627 05631 05663 05956 06010 06070
06080 06129 06130 06136 06225 06274
06587 06599 06653 06669 06671 06747
06756 07268 07457 07498 07507 07513
07515 07770 07774 07884 07916 07927
07931 07972 08139 08183 08255 08321
08325 08341 08406 08409 08597 08655
08657 08660 08686 08689 08697 08699
08700 08701 08702 08704 08712 08836
08887 08894 09148 09197 09198 09200
09205 09376 09441 09778 09900 10141
10202 10229 10271 10389 10407 10446
10460 10541 10548 10717 10725 10756
10829 10888 10905 10960 10970 10989
11006 11025 11197 11217 11251 11309
11435 11455 11475 11647 11830 12349
12568 12727 13140 13181 13200 13213
13510 13583 13590 13677 13907 13993
14066 14131 14149 14154 14262 14274
14524 14525 14686 14962 14966 14968
15195 15367 15421 15425

心痹
10031

肺痹
12123

脾痹
03776 12567

肝痹
00161 00733

肾痹
09019 11740

皮痹
01653 03551 06082 12753

脉痹
00427 04872 12540

筋痹
13530 13533

肌痹
06082 09428 09440

气痹
01374

血痹
05206 05263 05611 06082 06083 06143
12350 12773

行痹
01356 01646 01863 02058 02064 02195
02657 03166 03629 03963 04002 05206
06068 06086 06262 07458 07471 07476
07495 07877 10452 15409

痛痹
03028 03197 07495 10001 10902 11150
12927 15192

着痹
01863 02201 06130 10062 10685 10903
10906 12354 15189 15423

热痹
03634 10906

周痹
03287

肠痹
01830 06479 06682 07130 07553 09563

胞痹
02809 03084 07196

历节风
00043 00441 00917 00944 01065 01642
01863 02588 02595 02754 03379 03534
03775 04101 04387 04625 04701 04902
05221 05396 06043 06057 06063 06068
06226 06357 06576 07459 07468 07473
07790 07834 07887 07927 08031 08181
08182 08185 08187 08398 08405 08650
08685 08829 09199 09414 09476 09899
10054 10143 10144 10167 10283 10540
10656 10745 10897 10944 10972 11054
11418 11643 11827 11829 12128 12192
12239 12538 13158 13915 13920 13935

13968 14054 14191 14192 14620 15124
15291 15406
风湿性关节炎
05321 05886 05887
类风湿性关节炎
11054
痿证
00074 00096 00199 00873 01775 02043
02146 02933 02995 03014 03092 03115
03276 03349 03378 03705 04380 04388
05684 05764 05806 06657 06671 06673
07587 07589 07591 07612 07652 07666
07696 07700 07732 08401 08407 08730
09273 09362 10208 10266 10671 10675
10812 10821 10904 10906 11228 11273
11274 11494 11499 11500 11901 12069
12236 12351 12362 13112 13122 13423
13588 13898 14277 14328 14359 14694
15285 15342
筋痿
02060 02642 02833 14016
骨痿
02744 11431 12368
脉痿
00732
肉痿
08158
四肢不举
04579
蛔虫病
02335 02339 02894 03070 03679 05677
05797 05798 05799 05844 05845 08234
12268 13231 14136
胆道蛔虫病
02622 03070 03244 03395 47658
黄胖病
00996 01113 01114 01215 01604 03904
04518 04551 05542 05953 06322 07187
07188 07189 07251 07447 10865 10868
10913 11381 11750 11913 12506 12507
12758 12759 13620 13621 14546
绦虫病
08038
寸白虫
02894 03134 04225 04648 09492 10396
10882
丝虫病乳糜尿
03575
象皮肿
07232

（十）诸寒诸热

中寒
01205 03008 03015 04068 05333 05357
07341 07433 07924 07941 07946 07951
07952 07957 09978 10706 12024 12261
13150 14238 14527
痼冷
01623 01817 01879 02269 02757 02813
03332 03404 03976 04032 05062 05200
05802 05853 06241 06532 07100 07393
07407 07419 07436 07452 07909 07914
07940 07941 08018 08501 08986 10210
11948 13731 13746 14099 14245 14253
14259 14273 14377 14558 14705 15027
上焦寒证
04239
脾寒证
15287
胃寒证
05581 12270 12296 14261 14384 15338
积热
00786 00788 01268 03141 03286 03622
04180 04596 04762 05427 05522 06117
06155 06169 06437 06476 06698 06811
07283 07791 07984 08297 08348 09108
09690 09705 11155 11599 11600 12383
12450 12484 12626 12641 12661 12702
12704 12997 13110 13259 13388 13822
14343
上焦热证
03178 12222 13227 13904
肺热证
03032 04807 05521 09036 12429
大肠热证
09035
心热证
00981 01338 01431 02758 02759 04815
05982 06003 06391 06398 06425 06805
07367 10010 12170 12452 13245 13435

15316

脾热证

01000 03655 04459 04883 06340 09075 09081 09082 11893

胃热证

03025 04320 04321 04473 04509 05815 09073 09740 09993 11594 11888 12440 12655 13349

胃热肠寒证

07974

肝热证

03274 03280 05259 09044 09054 09096 10033

胆热证

04261 04311 10056

肾热证

13422 15123

膀胱热证

00982 11986

内伤发热

00053 00173 00852 02039 02516 02525 02528 02547 02755 03489 04041 04489 04533 04777 04909 05280 05285 06039 07682 07754 09040 10866 11362 12367 13435 14494 01579 01943 02646 03508 03520 05968 6514 06842 07646 07677 13167 15213

（十一）补养

养生延年

01291 01903 02046 02108 02200 02203 02461 02563 02567 03421 03526 04707 04708 05022 05562 05565 05566 05567 05568 05569 05585 05589 05591 05592 05593 05594 06513 06522 06523 06686 06897 06902 06907 06909 06930 06974 06977 07216 07272 07329 07347 07418 08928 08929 08931 08933 09156 09348 09418 09485 09734 09741 09744 09775 09867 09870 10356 10798 10802 10847 11178 11417 11423 11802 11977 11978 12014

二、妇科病证

（一）月经病证

月经先期

00732 03478 05810 06358 06618 06884 11588 11611

月经后期

00321 04429 05241 06660 06677 07041 10301 10545 11542 12060 12088 12276 12290 14235 14279 14296

月经过期不行

13437

月经过多

03837 07320 12619

月经过少

03476 03590 08019

经行不止

04737 04738 04790 14993

月经不调

00066 00224 00226 00232 00412 00419 00423 00668 00710 00920 01064 01093 01118 01161 01513 02026 02604 02606 02609 02650 02659 02692 02693 02847 02848 02918 02950 03315 03316 03384 03457 03460 03464 03479 03491 03578 03755 03756 04347 04386 04397 04402 04489 04760 04975 04997 05120 05171 05210 05215 05217 05229 05252 05261 05267 05291 05305 05492 05493 05576 05577 05687 05688 05695 05879 05984 06116 06141 06215 06263 06264 06269 06270 06271 06308 06312 06349 06350 06447 06959 07079 07113 07181 07379 07388 07929 08020 08513 08628 09109 09181 09240 09392 09482 09503 09848 09980 10042 10150 10414 10488 10714 10720 10840 10884 11001 11144 11216 11337 11360 11363 11952 11971 11980 11981 12049 12053 12064 12089 12651 13333 13650 14318 14554 14555 14561 15104 15281

闭经

00066 00143 00173 00523 00902 00989 00990 01150 01201 01337 01420 01748 01749 01866 02001 02382 02610 02611 02677 02693 02713 02827 02848 03320

03488 04074 04108 04432 04490 04492
04891 05189 05192 05207 05225 05234
05321 05629 05633 06267 06343 06349
06353 06366 06629 06798 07143 07146
07147 07178 07204 07424 07661 07706
08273 08396 08628 09111 09405 09649
10419 10422 10423 10546 10955 10984
10997 11055 11112 11115 11120 11121
11123 11140 11147 11192 11237 11243
11290 11361 11363 11583 11585 11623
11766 11843 12013 12050 12052 12055
12094 12096 12201 12202 12203 12204
12274 12275 12318 12319 12790 13645
13655 13657 13661 13666 14018 14203
14295 14422 14970 15411 15424
痛经
00212 00384 00762 00978 01147 01509
01710 02252 02330 02538 02659 02848
03063 03384 03485 04178 04315 04390
04437 05193 05321 05617 05728 05987
06267 06268 06270 06348 06961 06982
07102 07119 07145 07150 07379 07388
08819 09472 10090 10373 10688 11006
11121 11143 11310 12095 12097 12220
12241 12290 12791 13778 14281 14422
倒经
02910 04478 04587 14386
逆经
02788 03561
错经
02410 10386
经行感冒
04575
经行身痛
07381
经行乳胀
02692
经期泄泻
07522 12266
月经攻眼
12056
经水先断
11936
经绝复来
11930
崩漏
00130 00194 00196 00922 01058 01316
01370 01442 01443 01520 01566 01787
01847 01973 02029 02068 02073 02098
02208 02218 02219 02272 02454 02517
02518 02519 02579 02606 02609 02610
02612 02614 02617 02650 02692 02718
02847 02880 02892 02935 03215 03221
03223 03227 03243 03261 03315 03316
03351 03373 03383 03384 03450 03514
03635 03755 03927 03951 04128 04134
04216 04448 04634 04703 04791 04796
04849 04877 04887 04925 04960 04962
04985 05131 05233 05270 05271 05355
05538 05539 05541 05588 05602 05618
05700 05796 05800 05967 06021 06157
06215 06264 06269 06688 06758 06787
06789 07155 07159 07181 07645 07648
07681 07687 07709 07787 08257 08322
08484 08489 08491 08496 08512 08542
08640 08641 08751 09167 09335 09470
09625 09630 09632 09646 09654 09656
09668 09807 09821 10179 10183 10334
10414 10416 10429 10633 10852 11407
11440 11546 11614 11619 12407 12423
12428 12772 13040 13072 13096 13103
13107 13115 13220 13435 13479 13541
13544 13606 13632 13754 13755 13756
13992 14250 14356 14441 14449 14463
14503 14528 14554 14555 14561 14661
14992 15028 15078 15102 15398
白崩
7167 10856 14442

（二）带下病证

带下
00241 00903 01117 02098 02609 02692
03084 03847 03927 04216 04399 04483
04797 05010 05261 05355 06024 06264
06269 06628 06635 06675 06680 06681
06687 07562 07644 07671 08228 08257
08498 08502 08503 08514 08554 08558
08825 08944 09240 10924 11188 11441
12996 13005 13018 13435 13992 14115
14234 14561 14615 14641 15028 15067

15281 15391
赤带
04048 08638 13441
白带
00596 00734 02215 02304 03168 03352
03893 03917 03928 04049 04189 05230
05271 05399 05699 06888 07083 07297
07522 07727 07925 08095 08520 08645
08715 09632 09970 10618 10908 10986
12090 13118 13257 13522 14356 14630
14991 15118
青带
07206
黄带
08482
黑带
04455 11012
五色带
07819

（三）妊娠病证

妊娠恶阻
00050 00095 00457 00505 00506 00527
00895 03720 03817 04262 04285 04298
04299 04333 04522 05449 05451 05457
05819 05823 05861 06294 06708 06709
06713 06882 07862 09342 09343 09561
09989 10002 10044 10330 10331 10385
10577 10596 11071 12263 13082 14957
15137 15152
妊娠心痛
04167 13230
妊娠腹痛
00580 01419 03436 04421 05866 06616
07882 09684 10244 11544 12034 12267
14275
妊娠心腹痛
04272
妊娠胸痞
04036 12272
妊娠腹胀
02398 04863
妊娠伤胎
01500 01597 03222 03770 05884 12908
妊娠胎漏
02249 03366 04478 04483 04770 04985
09561 12566 12580 13561 13595 14307
14936 96059
妊娠胎萎
02846 03791 04382 04403 05203 12581
妊娠胎动不安
00474 02273 02718 03384 03663 03727
03791 03804 03805 03916 04955 04986
05217 05226 05261 05807 05824 05825
05826 05827 05829 05862 05863 06498
06615 06619 06691 07993 12425 12427
12553 13029 13558 13843 13973 14238
14951 15390
妊娠胎动下血
03672 04892 04924 05868 06501
妊娠头痛
11645
妊娠腰痛
01326 02054 10349 12168 13026
妊娠泄泻
00847 02522 03811 05394 05867 07539
09874
妊娠痢疾
00847 00892 03295 03783 05269 07803
11551 12493 12680
妊娠便秘
01163 11976
妊娠小便不通
03571 11959
妊娠尿频
07559
妊娠小便短少
01126
妊娠二便不通
03567
妊娠鼻衄
04488 04976
妊娠吐血
03631 04488 04642 12637
妊娠尿血
03695 07590 07838 08488 13598
妊娠中风
01651 03627 05463 06051 06052 06115
06162 15096
妊娠发痉

06163 13815
妊娠心悸
01144
妊娠心惊胆怯
05435
妊娠感冒
04476 04936 06703 11022 13848
妊娠伤寒
02532 03175 05204 05308 07486 07930
08150 08155 09698 09702 10299 10578
10579 10580 10581 11298 11312 12615
12712 13903
妊娠热病
09688
妊娠带下
03892 06620 12964
妊娠黄肿
00584
妊娠失明
01702
子嗽
01672 05089 06412 09617 14006
子肿
01124 01572 01679 01680 01969 01970
03809 03810 04356 06763 06881 10070
10261 10876 11014 13089 13559 13891
13984 14031 15097
子满
08576
子痫
03288 03493 04948 05446 08093 09150
10224 13370 13529 13534 13540
子烦
04427 05431 05434 05436 05447 05658
06368 06401 06406 06414 08606 08608
08610 09666 11925 13513
子鸣
06967 07643 11969 12851
子狂
11523
子淋
01571 02168 03568 03569 03614 04360
04431 04803 04835 05317 05811 05812
05841 06577 08413 08629 11814 12216
子悬
01569 01570 03437 05864 05967 10253
13984 14635
妊娠过期不产
07698
鬼胎
05728 10401 13693
畸形胎
05784
小产
00593 00839 00839 01036 01239 01239
01286 01326 01345 01353 02198 02794
04739 04978 04995 04996 05142 05217
05292 05575 05852 05882 06440 06499
07103 07116 07190 07201 07296 07814
08192 08492 08516 08517 08518 08540
08941 09022 09248 10328 10347 10348
10359 10662 12068 12375 12740 14141
预防流产
00884 05822
难产
00949 01596 02001 04445 04954 05179
06231 06255 06278 06960 07315 08383
08481 08939 09267 10779 12887 12889
14142 14600 14601 14602 14603 14604
14605 14607 15362
预防难产
01597 05073 05074 05217 14292 14474
死胎
00909 02610 02887 05397 06278 07315
10843 11017 11028 14093 14094 14594
14607 15362
验胎
12253
养胎
05494 06889 06890 06891 07585

（四）产后病证

产后胞衣不下
02444 02688 03583 05204 05696 06310
06312 07274 13064 14607
产后恶露不行
00624 03578 03582 04166 07375 12800
13657 14509
产后恶露不尽
00772 02070 02134 02252 02381 02452

02612 02615 04722 05248 05397 07177
07274 08440 09597 10297 10559 10843
11028 11587 11952 12274 12275 14958
产后瘀血
05305
产后瘀血冲心
03001 04275 04988 05046 05681 09113
09658 11193
产后血晕
01365 01419 02449 02612 03410 03486
03693 05179 05273 05349 05582 06311
06731 06906 06912 06959 07691 09246
09361 10433 11181 13410
产后眩晕
13562
产后发厥
14361
产后郁冒
00063 03712
产后头痛
00018 01368 03321 04406 04919 04941
04946 05280
产后身痛
00889 07148 13803 13919
产后腰痛
02134 05296 05939 07881 08439 08665
11117 13562
产后关节痛
04083
产后筋脉拘挛
14157 14158
产后心痛
01060 02412 10977
产后腹胀
01040 07684 08353 10138
产后腹痛
00351 00650 01348 01895 02919 03588
04178 04953 05318 05577 05697 05891
05893 06575 06750 07308 07379 07699
08437 08665 09607 10270 10412 10431
10715 12284 14095 14971
产后小腹痛
05582 06346
产后儿枕痛
00624 01018 03582 05228 05580 05581
10488 11587 14073
产后感冒
05659
产后伤寒
09259 10582
产后发狂
00049 04977 05696 06957 08268 09114
10014
产后积聚
09949 11009
产后崩漏
01083 02512 02530 03463 03477 03697
04750 04999 07801 07807 08515 08637
09218 11965 12905 14082 14531 15107
产后小便不通
01859 01871 06510 12424
产后尿频
02526 12157
产后遗尿
01152 08026 11102 12152 12156
产后小便失禁
07449 07717 08532
产后淋证
03094 03861 04401 05227 08265 09293
14287
产后便秘
01930 07093 07840 08311 10649 10668
11902 13174
产后尿血
01444 05612
产后便血
13293
产后发热
03370
产后虚劳
00615 00679 00816 01987 02312 03319
04353 06179 06899 07237 07653 07737
09110 09297 11970 13019 13028 13123
15111
产后薄劳
00848 02609 02650 03093 05275 06374
07654 10017 12519 12534 13049
产后阴虚火旺
13234
产后中风

01641 03317 04963 05424 05686 05687
05696 06087 06145 06467 06949 10459
13540 14357 06088 03121 04349 10006
产后惊悸
03132 03954 05795 05888 06462 07487
07576 09219 10015 10057 10455 10962
产后怔忡
04412 04438
产后惊病
03995
产后心神不安
10626
产后谵妄
06399 09985 10045 58515 14362
产后恍惚
03455 05834
产后言语不清
04412 04438
产后心烦
00539 04906
产后烦闷
00538 05466 13514
产后烦躁
03740
产后烦渴
12582
产后口渴
00545 04093 04400 05426 05472 06436
06710 11100 11130
产后伤食
15169
产后呕吐
15159
产后呃逆
00271 03120 10302
产后咳喘
09471
产后气短
07689 12909
产后自汗
00483 00563 03224 03308 05249 09375
09475 09798 12548 12559 12741 13171
13172
产后盗汗
02211 07176 11844 13988
产后乳悬
01293
产后霍乱
12278
产后泄泻
01923 04410 06549 06784 07798 09378
10837 11507
产后痢疾
04069 05927 07808 11548 12549 12811
14467
产后浮肿
00882 01095 01501 04645 07274 09802
10070 02979 04389 05320 09347 09402
12199 12210 13044
产后乳汁不通
00914 03448 04393 12198 12200 12238
13045 13046 13047 14935 15100
产后乳汁溢出
11960
断乳
05363 05381
产后阴痛
10743
产后玉门不闭
04420 04489

（五）妇科杂病

不孕
00189 00226 00300 00423 00532 00608
01404 01426 01713 01750 02016 02151
02252 02486 02509 02513 02562 02569
02606 02607 02608 02610 02850 02897
03544 03927 03929 04048 04221 04330
04340 04440 04483 04523 04534 04621
04864 05001 05496 05590 05594 05621
05668 05885 06018 06265 06267 06269
06270 06481 06648 06678 06983 07094
07296 07565 07750 07756 07978 08558
08715 08855 08856 08883 09021 09486
09664 09843 09960 10092 10140 10481
10568 10638 10673 10810 10948 11794
11856 11971 11993 12049 12051 12083
12091 12092 12093 12105 13476 13607
13702 13708 13715 13778 14020 14021
14024 14178 14220 14260 14264 14552

14554 14555 14561 14562 14964 15028
15279
宫外孕
03582 10564 10694 10695 11148
子宫脱垂
00134 02529 04569 04631 04926 05218
05313 06189 07682 07685 07865 08825
08893 13804 13924 15379
子宫久冷
06330
慢性子宫颈炎
10692
盆腔炎
02252 11028 13714 14411 14562
盆腔脓肿
14659
外阴白斑
03111 15345
阴吹
05274 13050 15162
阴痒
03274 03275 04926 06469 06700 07295
11142 69278 12947 12965 13449 13737
14106
脏躁
03082 04467 05600 11063 14691
更年期综合征
00076
石瘕
08596 11692
肠覃
07312 07847 11031
妇人血风
00010 00570 01394 01622 02072 02478
02616 02643 02662 02700 02761 04760
05191 05966 06770 07243 07381 09024
09844 13637 13654 15051
妇人心腹痛
05579
妇人腹痛
04130 05288 06344 07117 15367 15424
妇人血肿
01010 04878 09583 13716 13721
妇科通治方
02647 08157

三、儿科病证

麻疹
00625 01413 01712 02324 02376 02485
02541 02552 03035 03036 03073 03690
03691 04055 04063 04187 04559 04562
05471 05660 06154 06433 06435 06729
07493 08431 08433 08436 08443 09094
09764 09765 09820 10652 10690 10893
11049 11308 11469 11481 11516 11607
11732 12660 12775 13148 13163 13326
13384 13458 13483 13830 13833
风痧
09773
烂喉痧
00102 00335 00939 01199 02476 02553
02723 04566 06320 07073 08718 08745
09819 10927 10930 11631 13212 13319
14594
痘疮
00239 00822 00938 02044 02094 02392
02531 02556 02781 02977 05140 05660
06037 06730 07514 09045 09501 11035
11288 11627 11677 12554 12771 12776
12779 13065 13197 13828 14032 14195
14395 14609 14636
痘疮入眼
10038 12801
小儿惊风
00011 00941 00999 01141 01435 01463
01517 01518 01519 01606 01622 01717
01805 02196 02471 02700 03292 05064
05180 05185 05646 05843 06938 07490
07491 07984 08127 08363 08365 08389
08390 08874 09064 09158 09178 09506
10765 10925 11039 11093 11424 11451
11840 12554 13651 13672 13674 13675
14538 14564 14566 15051 15083
小儿急惊风
00554 01862 05055 05097 05181 07488
09208 10388 13526 14062 14167 15032
15059
小儿慢惊风
01689 01698 01719 01725 02672 03004
06276 06277 06941 08527 08875 09176

10189 10223 12262 13646 14081 14420
15165 15170 15171 15172
小儿慢脾风
00610 01508 01844 02671 09824 14270
15168
小儿惊痫
00811 01733 02695 05445 07408 08987
12934 13551 15081
小儿惊热
02422 05512
小儿惊泻
11984
小儿疳证
08634
小儿心疳
01158 08809 11597
小儿脾疳
01041 01042 01043 01487 02023 02025
02142 02143 02358 02422 06697 07760
08016 09788 09789 10394 11152 11281
11427 11569 11570 11772 11914 11945
12405 15220 15273
小儿肝疳
06694 06717 06997 07301 11338
小儿肾疳
00791 04822
小儿鼻疳
06702 13296 14080
小儿干疳
09787
小儿蛔疳
08116
小儿冷疳
14219
丁奚疳
00359 00562
哺露疳
00056
小儿无辜疳
03091 08916
小儿疳痢
02141 03466 07385 12926
小儿疳渴
03811
小儿疳眼
04686 05732 05905 08001 08008 10689
11696 11770 12669 12926 13482 13899
小儿疳劳
07796 14512 15376 15380
小儿胎惊
13640
小儿胎黄
04743 14139
小儿胎赤
13880
小儿胎寒
03899
小儿胎痫
07489 09161
小儿胎毒
08302
初生儿两目不开
03363
初生儿无皮
14122
初生儿不尿
13842
小儿脐风
00009 01047 02686 03828 04107 05840
06956 09647 09797 15029 15030
小儿脐湿
03228 03869 06626 07453 12881 13516
14563
小儿脐疮
03228
小儿天钓
00011 05503 10834
小儿内钓
02671 10220 10221 10222
小儿五迟
04605 04718
小儿行迟
01971 02065 07714 12030
小儿齿迟
04970 07714 12030
小儿语迟
07714 12030
小儿五软
04718
项软

01971
新生儿硬肿症
04557
小儿解颅
00534 01505 01696 03731 03746 04286
04718 04719 04729 05667 06094 07714
08896 09065 09450 09659 09795 09827
12030 12814 15363
小儿囟陷
00879 02603
小儿囟填
03849
小儿鸡胸
00964 03416 05081 07724 08833 11991
13316 13321 13322
小儿龟背
00658 08602 08833 11931 13139
小儿夜啼
04124 05706 05833 06945 08563 08565
08566 10220 13368 14564
小儿脚拳
03673
小儿手拳
15190
小儿麻痹症
04627 13837
小儿鹤膝节
04416
百日咳
05923 11286
小儿肺炎
13212
小儿气喘
05055
小儿流涎
01898 08519 12295 13407
小儿重腭
01697 04780
小儿鹅口疮
00042 02139 02432 03389 03871 04780
05752 05754 08081 14139
小儿弄舌
09080 13351
小儿中风
02687 08032 12901
小儿搐搦
02907
小儿虚损
04624
小儿尿如白浊
15129
小儿头汗
00186
小儿自汗
13423
小儿伤食
12770 14138
小儿伤乳
14491
小儿乳癖
01429 01435
小儿癖疾
08282 11915
小儿厌食
10670
小儿呕吐
00154 03813 05402 05499 06426 08164
08749 09214 12778 12962 15320
小儿吐乳
08169 08649
小儿吐泻
03811 05662 05959 05962 06539 10287
12613 15326
小儿呃逆
15403
小儿腹胀
14428
小儿腹痛
02675 04425 08664
小儿盘肠气痛
12036
小儿发热
00777 07026 12408 13034
小儿变蒸
01725 10585 13977
小儿潮热
04821
小儿脑热鼻干
02491
小儿烦躁

00611

四、眼科病证

针眼
10863 12224 13408 14671
胞生痰核
02365 02373 13343 13354 13473
眼胞肉胶凝
09435
椒疮
01762 13493 14669
睑弦赤烂
00008 00185 01148 01405 01406 01605
02326 02824 03039 03875 04656 05326
05329 05790 06323 06585 06919 06935
08033 08084 08760 09004 10165 10204
10501 10502 10531 10727 10835 10899
12398 12462 12475 12762 12765 13285
13523 13624 13751 13967 14363 14415
14941 15024 15288
风赤疮痍
07966
上胞下垂
02502 09724 10754 11962
胞肿如球
03002 04561 07512 11676 12109 13391
睥翻粘睑
08977
眼睑肿硬
09088 09442 14201
眼睑瘙痒
05301 08725 11649
眼睑湿疹
13784
目赤
01601 02464 03058 03356 03638 04010
04089 04715 05278 05325 05329 05433
05437 06072 06155 09041 10861 10862
12468 12472 12640 13433 14372
天行赤眼
04118 04122 10371 10528 10697 12687
14363
目赤涩痛
03212
目赤肿痛
00209 00976 01035 01762 02149 02474
02923 03057 03061 03236 03248 03621
04157 04606 04723 04761 04771 04784
05178 05322 05510 05730 05731 06272
06585 06860 06878 06916 07074 07291
07364 07604 08028 08046 08098 08103
08300 08351 08372 08376 08462 08677
09042 09050 09052 09061 09064 09525
09534 09677 09683 09691 09866 09879
09880 10163 10164 10165 10166 10178
10280 10320 10324 10475 10517 10518
10519 10533 10535 10561 10587 10748
10811 10858 10945 10946 10947 11729
11747 11851 12469 12478 12681 12900
13394 13397 13570 13630 13764 13783
14089 14407 14454 14507 14534 14542
14543
暴风客热
00151 00362 00398 02193 02238 02326
04056 04785 05012 05236 05717 05761
08080 08347 08377 08455 08465 08466
08468 08679 08752 09102 10464 11411
12381 12698 12891 12893 13323 13771
14371
赤丝虬脉
04759 10867 11884 13304
白睛肿胀
00967 00984 01934 02175 12118
金疳
09070
火疳
04554 10513 10928
水疳
15420
鱼子石榴症
02353 04480
黄膜上冲
12248
涩翳
06922 11904 11905
白涩症
12383
倒睫拳毛
11502
两睑粘睛

12825 12827
眼胞菌毒
11633 13385 14941
赤脉贯睛
04876 07505 07692 09051 09058 10516
10864 11157 12233 12395 12761
胬肉攀睛
00142 00330 01157 01601 02171 02321
02490 04009 04635 05323 05727 05898
06339 06919 06927 07069 07239 07240
07290 07360 08033 08370 08378 08379
08381 08382 08466 08675 08735 09002
09162 09532 09710 09879 10532 10945
11078 11789 12382 12473 12614 13574
13996 14507 15022 15218 15227
漏睛
01978 02388 03246 03874 04158 06074
07741 09087 10900 12563 14413
流泪证
02235 02235 02708 05216 06184 09436
13725
目眵
12499
眼眦赤涩
10510
大眦赤症
12678
目痒
00704 00815 06926 13812
黑睛浮肿
03237
黑睛胀大
02877
玉翳浮满
07969
翳障
00072 00107 00333 00336 00350 00362
00407 00416 00454 00841 00878 00919
01193 01359 01392 01396 01601 01741
01742 01762 01772 02021 02022 02122
02167 02169 02523 02707 02792 02815
03000 03059 03112 03156 03157 03400
03403 03447 03469 03475 03525 03826
03912 04145 04156 04542 04618 04654
04657 04662 04668 04723 04725 04763
04855 04856 05007 05101 05169 05205
05262 05322 05326 05511 05527 05718
05721 05722 05724 05942 06118 06148
06273 06515 06589 06824 06851 06915
06917 06919 06923 06927 06934 07013
07058 07239 07246 07291 07380 07481
07496 07500 07505 07510 07511 07601
07604 07638 07752 07967 08103 08133
08134 08369 08371 08373 08374 08375
08376 08377 08378 08380 08381 08382
08448 08450 08455 08458 08463 08465
08466 08726 08727 08728 08776 08955
08990 09006 09032 09043 09059 09060
09071 09089 09247 09508 09515 09525
09532 09534 09880 10089 10165 10320
10323 10512 10516 10517 10523 10524
10527 10530 10532 10575 10611 10612
10697 10859 10864 10872 10873 10874
10883 11156 11157 11169 11215 11245
11279 11372 11416 11443 11478 11595
11782 11790 11801 11910 12195 12237
12293 12387 12388 12390 12421 12422
12623 12783 12784 12838 12839 12892
13011 13012 13035 13270 13284 13498
13570 13574 13780 13781 13782 13795
13882 14293 14294 14315 14382 14496
14526 14532 14543 14547 14591 14592
14597 14599 14937 14986 15023 15064
15073 15075 15120 15217 15223 15224
青盲
02056 04713 05723 05898 05899 05900
06637 08467 08973 09239 10039 10226
10921 12084 15092
失明
00314 04071 05734 06516 06934 07605
09249 11408 11645 12287
视瞻昏渺
00304 00413 00831 02664 03314 03400
03564 03724 04089 04419 05716 05777
06645 06913 07031 07302 07350 07594
07606 07711 08132 08135 08452 08457
08464 08827 08838 08969 09415 09416
09721 10228 10628 10646 11162 11618
11859 12047 12366 12391 12392 12400
12925 13120 14440 14597

视瞻有色
02554
血灌瞳神
02167 02169 02401 03675 05720 08726
12176 12205
内障
00324 02707 03154 03158 03159 03446
04430 04524 05900 05901 05903 06075
06385 06512 06515 06825 07014 07273
07481 07509 07586 07596 07598 07603
07610 07720 07721 09746 10227 10335
10521 10881 10921 11373 11967 11975
12196 12396 12633 12784 13012 13635
13795 14534 14926 15076 15242
枣花内障
08270 13580
高风内障
04613 05733
五风内障
01172
黄风内障
01172 02655 02879 04730 06925 07602
07609 07615 08141 08142 09055 11933
13525 13527 13536 13745 14299
垂廉障
04555
混睛障
04768 10871 15121
冰瑕障
13389 13390 13528
偃月障
02159 02874 07619
凝脂翳
06738
旋螺突出
06920 08315 09062 09090 11414 11670
12898 12899
睛黄视渺症
13826
花翳白陷
01553 04480 05253 07697 08617 09101
10520 10551 13466
蟹睛
00062 06071 06150 06918 12436 12625
12838 13283
角膜炎
10549 10555
神水将枯症
07704 14316
如银内障
07607 07611 07618
滑翳内障
05719
瞳神紧小
06995 10839 11926 13453
瞳神散大
02665 03624 03725 05205 05900 05944
07304 08545 09066 11950 12037 12081
13414 15110
瞳神干缺
02002 02003
瞳神欹侧
03160
瞳神颠倒
12379 13532
视正反斜
02523 07586 09663
视一为二
07597 13727
视小为大
06892
抱轮红
12395
云雾移睛
00304 00841 01602 04195 04618 04725
04951 05716 05725 06170 06516 06921
06928 06933 07478 07492 07617 08451
08453 08460 08468 09067 09415 10768
11413 11982 13023 13726 14088
雀目
02120 03130 03155 03456 04801 05008
05324 05328 05671 05900 05943 06164
06212 07290 07293 08354 08973 08974
08976 10521 11768 13013 13899 13900
14048 14051 15388
视远怯近
04541
视近怯远
14544
月珠突出

04917
辘轳转关
01724
风牵偏视
02018 04118 09404 10451 12386 12827
通睛
02104 02426 06113
鹘眼凝睛
15115
羞明
00871 01324 04940 05281 05307 08456
08458 08459 09533 11328 11618 12233
13570 13572
目生息肉
12344
视物颠倒症
09303
目痛
01738 02245 03843 04010 04163 05214
05281 05307 07505 11634 12442 12477
13007 13325 13329 13538 14507 15073
异物入目
15245
明目
06919 08449 13798
眼科通治方
05327 13676 14127

五、耳鼻喉科、口腔科病证

（一）耳科病证

聋耳
00887 01552 02212 02817 03854 03867
03918 03985 03986 04741 05033 05034
05035 05036 05037 06299 06328 06329
06356 06998 07059 07611 08280 08419
09539 09712 10413 11125 11341 11375
11889 12457 12466 12932 13249 15000
耳肿痛
09816 11514 13262
耳痒
09815 13262 13372
耳鸣
00117 00223 00400 01139 01145 01279
01730 02177 02212 02222 02394 02417
02800 03127 03204 03692 04601 04967
05038 05416 05645 05915 05922 05949
06604 07613 07621 07622 07718 07719
07744 08415 08416 08942 10383 10796
10968 10999 11342 11468 11644 12331
12332 12333 12400 12521 13031 13372
13375 13417 13496 13540 14097 15050
耳闭
09427 15004 15006
耳聋
00405 00942 01139 01279 01339 01340
01664 01852 01853 02165 02177 02394
02799 02801 03048 03235 03250 03274
04368 04498 04726 04745 04820 04932
04967 05038 05039 05040 05260 05645
05912 05914 05915 05948 06283 06303
06598 06604 07070 07208 07719 07722
07758 07905 07908 08193 08447 08543
08942 09460 09653 10232 10234 10968
10999 11342 11375 11468 11575 11921
11935 12167 12169 12174 12175 12213
12324 12327 12330 12331 12332 12335
12347 12546 12897 12929 13030 13031
13363 13375 13417 13496 14160 14311
14320 14355 14393 14427 14486 14487
14490 15001 15007 15112
重听
15002 15005
耳疖
05032
耳疮
00824 03271 12546 14129
月蚀疮
03870 09624 10698 14624

（二）鼻科病证

鼻塞
01194 01225 01846 01850 04965 04966
09829 12700 14976
鼻渊
01238 01397 01398 01560 01625 03182
03185 03744 04435 04446 06284 06551
06655 07333 07335 07651 08195 08324
08948 09390 09433 09459 09872 10186
10576 10794 11462 11552 12163 12769

12879 13212 13235 13320 14498 14927
鼻鼽
01378 03043 03173
鼻干
12629
鼻疳
13296 14080
鼻息肉
00274 00738 01850 03367 03873 03908
04457 07067 07337 07338 08080 08276
08299 09438 09439 09771 09948 10155
11700 12206 12411 12805 12806 15020
15021
鼻中生疮
12617 13376 13934
鼻痛
03842 03923 04779
鼻中臭气
13380
酒渣鼻
00923 01786 02958 02998 03743 03823
03872 06084 06325 08162 08173 08177
08189 08288 08737 08899 09295 09531
09670 09685 11518 11586 11612 11625
12098 12246 13195 14052 14169 15177
鼻中作痒
13328
鼻毛粗长
05543

（三）喉科病证

喉痹
00025 00086 00206 00332 00334 00602
00780 00859 01014 01121 01221 01236
01258 01261 01270 01295 01297 01434
01554 01618 01683 01733 01735 01992
02004 02009 02437 02456 02474 02506
02555 02580 02929 02942 02961 02984
02989 02991 03033 03061 03242 03245
03247 03249 03257 03511 03741 03888
03996 04112 04141 04183 04186 04372
05012 05025 05048 05438 05497 05607
05692 05742 05746 05752 05754 05960
05963 06005 06199 06213 06214 06222
06251 06252 06755 06951 06986 07028
07033 07062 07063 07065 07071 07072
07235 07238 07280 07284 07517 08049
08065 08074 08086 08089 08101 08208
08386 08428 08756 08765 08791 09029
09153 09284 09527 09528 09540 09803
10011 10176 10511 10712 10815 10819
10916 10917 10925 10927 10931 11005
11074 11081 11083 11124 11511 11599
11602 11672 11675 11677 11746 11756
12104 12230 12314 12481 12689 12886
13008 13223 13337 13339 13364 13365
13374 13392 13469 13470 13471 13472
13613 13630 14038 14039 14085 14311
14346 14515 14516 14518 14539 14945
15038 15086
喉风
01586 01735 02194 02250 02580 02723
02990 04769 05013 05057 05746 05963
06320 07061 08101 10833 11088 13546
15095
缠喉风
00086 00332 00334 02456 02989 04112
04373 05619 05739 05960 06199 06214
06251 06252 06766 07236 09527 10848
12605 12968 14516 14539 14672
喉痈
01333 02580 02703 02723 02990 08053
09516 11430 12690
喉疔
05739
喉癣
01408 02371 02703 03931 04570 05100
05744 06746 08070 11892 12211 12818
13278 13980
喉疳
00417 01231 06291 14347
喉菌
05100
喉瘤
11785 11966
喉内结核
11680
咽干
03717
咽喉炎

13338
喉喉不利
10915 [illegible]
咽喉[illegible]
0037 [illegible]15 01581 02437 02455 02493
032[illegible] 676 05741 06204 06830 07064
070 199 07200 08052 08082 08113
08 [illegible]9749 11079 11165 11434 12217
1[illegible] 14517 14697
[illegible]异物梗阻
[illegible]9 02989 08561 08848 14953
[illegible]气
[illegible]33 02501 03345 03428 04249 04267
[illegible]302 04331 04374 05491 05624 06936
07554 08178 08476 09148 09616 11263
11341 11454 11998 13777 14350 15039
失音
00109 00463 00518 00603 00740 00745
00830 01849 01861 02313 02424 03163
03988 04454 04684 04774 05080 05130
05370 05623 05752 06846 06848 07285
07534 07895 08074 08294 08429 08834
09025 10231 10965 11072 11266 11387
11891 12185 12211 13032 13208 13277
13306 13364 13365 13366 13477 14305
14940
喉证通治方
01589 01594 05351 08069 08121

（四）口腔科病证

口疮
00030 00042 00087 00092 00111 00230
00940 01006 01171 01273 01434 01550
02148 02149 02474 02496 02500 02503
02504 02506 02532 02539 02555 02703
02816 02929 02961 02989 03021 03030
03061 03108 03238 03620 03659 03706
03839 04159 04276 04434 04515 04596
04764 04782 04950 05468 05509 05614
05742 05745 05754 06114 06169 06470
06830 06951 07072 07235 07277 07282
07939 07942 08011 08099 08102 08673
08736 09080 09461 09504 09672 09748
09750 09751 09791 09796 10101 10102
10104 10105 10912 11826 11722 12170
12412 12417 12426 12459 12460 12471
12474 12498 12500 12646 12955 12999
13243 13349 13356 13415 13611 13625
13626 13628 13630 14087 14354 14400
14519 14578 14595 14623 14973 15266
口糜
00498 00936 00948 00977 01274 01275
01347 03068 04443 05981 06316 08127
08248 09093 09103 10710 12481 12955
12984
口疳
00078 00497 02703 03089 05384 05747
06316 10925 10926 13629 14697
口丫疮
05603 07213 09033 09769 14623
唇疮
02097 02627 09080 11805 12458 14998
唇裂
14319
口唇肿痛
01499
唇生肿核
04776 06076 11212
唇风
02787 12737 12959
舌肿痛
04326 04858 06222 11626 12503 15254
15283
舌疮
01260 01683 02005 02474 02496 02503
02506 02539 02540 02555 02631 02816
02929 02961 03108 03659 03839 04434
04782 05437 05468 05745 06316 07961
12450 12676 13249 13630 14087 14519
14623 14697 14973
舌强
02540 12940 13362
舌疳
00078 02831
舌缩
07525
舌纵
12231
舌麻
10384

舌痛
01333
重舌
00042 02429 03089 04780 04860 05752
06252 08120 09031 09080 10176 10833
12503 12673 13472 13979 14139 14518
木舌
00042 00662 00985 04161 05739 05752
06252 08272 09031 10176 10833 12673
13472 14139 14518 15261
舌断
03661 12869
牙痛
00013 00032 00041 00048 00272 00719
01744 02160 02162 02166 02476 02505
02534 03304 03415 03521 03579 03580
03650 03753 03838 03845 04127 04137
04147 04436 04516 04693 04810 04952
05647 05742 05748 05803 05804 05805
06077 06121 06139 06564 06757 06868
07025 07399 07400 07482 07528 07530
07782 07789 08298 08497 08552 08553
08627 08658 08671 08684 08844 08962
09132 09159 09202 09203 09225 09226
09250 09425 09429 09430 09431 09432
09434 09454 09455 09477 09752 09783
09801 09804 09806 09849 09851 09854
09864 09877 09893 09910 10103 10278
10294 10399 10696 10767 10796 11044
11360 11371 11415 11442 11471 11601
11648 12620 12813 13232 13342 13349
13352 13356 13360 13587 14218 14324
14399 14437 14455 14464 14582 14587
14994 15031 15049 15255 15256 15395
龋齿
02934 07527 08663 08680 08705 09187
09425 09452 09456 09458 09852 09853
13736 14996 15131 15304
牙疳
00375 01550 02163 02164 02466 02793
03601 04063 05614 05742 06316 06571
06753 09516 10757 10922 10925 11767
13628 13958 14697
走马牙疳
00498 02141 02255 02967 02999 03331
03913 05026 05340 06244 06326 06719
06774 08083 08091 08113 09749 12011
12317 12958 13355 13566 13622 13956
15346 15353
青腿牙疳
04335
牙宣
01445 09449 09456 09785 12303 13225
牙痈
03279
牙龈肿痛
00094 00626 02464 02474 02533 03061
03114 03176 03647 08059 09706 09912
10454 13340 13345 13346 14298
牙龈溃烂
02970 04515 13349
牙齿黄黑
00329 03539 03753 03754 09251 15251
牙齿动摇
04418 07056 07526 09449 14078 14465
牙齿脱落
09431
牙齿无力
07529
牙关紧急
01731
骨槽风
02165 02257 02488 06026 06244 08088
09784 09912
12690 12842 13353 13439 13440
固齿
02613 08062 08511 08552 08553 08884
10356 12957 15258

（五）肿瘤

癌
02170 04081 05354
肺癌
05125 07736
食道癌
11721 14974
胃癌
15381
结肠癌
07736

膀胱癌
07736
鼻咽癌
10636
鼻腔肿瘤
06477
皮肤癌
01994 12393 13569
宫颈癌
00849 07736
盆腔肿瘤
02252
失荣
01547
瘤
05069 05334 05336 09545 09546 12234
13444 14650
骨瘤
06014 12067
气瘤
03232 03945 11787
血瘤
06621
脂瘤
11787
肉瘤
00227 10377
石瘤
01441
白血病
10201
急性白血病
10491

六、外科病证

（一）急腹证

肠梗阻
00846 07314 10240 10241
蛔虫性肠梗阻
08045
麻痹性肠梗阻
03296 03297
粘连性肠梗阻
12406
痞结型瘀结型肠梗阻
12289
肠痈
00318 00769 01169 01352 01870 01874
02121 02676 03362 03368 04088 04792
06336 06817 06822 07149 07151 07310
07311 08013 08127 10559 10562 10831
11537 11854 12191 12305 12830 12831
12833 12910 12987 13255 13276 14262
14392 14396 14475 15193 15198 15199
15306
阑尾炎
02778 11694 14196 14197 14198 14200
急性阑尾炎
02251 07309 14199 14596
慢性阑尾炎
03395
阑尾脓肿
11671
胰腺炎
11306 11533
急性胰腺炎
01090 09077 13381 13382

（二）内痈

肺痈
02183 02498 02499 03104 03741 04185
04317 04486 04504 04823 05083 05084
05090 05345 05460 05556 05669 06227
06392 06432 06572 06573 06596 06831
07521 07636 08067 08900 08902 08905
08906 08907 08949 09038 09151 09489
10346 10358 11074 11075 11082 11086
12280 12305 12488 12832 12844 12973
13312 13464 13487 13862 13874 14013
14029 14045 14392 15041
胃痈
02676 06562 06822 07310 07663 12975
13474

（三）痈疽、疮疡

痈疽
00002 00026 00116 00213 00242 00389
00395 00415 00420 00425 00516 00564
00648 00670 00794 00795 00926 00971

00973 01079 01112 01153 01207 01218
01222 01223 01243 01245 01255 01321
01385 01421 01472 01545 01770 01954
01967 01994 02000 02010 02012 02085
02129 02133 02136 02170 02178 02180
02274 02278 02281 02287 02293 02302
02303 02307 02311 02392 02710 02724
02729 02784 02818 02936 03023 03087
03088 03362 03382 03481 03503 03523
03540 03596 03601 03702 03759 03885
03886 03922 03924 04081 04139 04143
04151 04339 04362 04411 04426 04781
04839 05003 05066 05078 05114 05138
05139 05143 05145 05147 05148 05149
05150 05155 05157 05159 05160 05161
05163 05164 05244 05334 05335 05337
05354 05437 05474 05475 05708 05710
05711 05957 06016 06025 06034 06193
06250 06260 06261 06300 06317 06337
06355 06465 06511 06555 07004 07009
07046 07047 07140 07142 07250 07262
07989 07990 08012 08087 08124 08286
08323 08334 08337 08432 08442 08445
08601 08661 08691 08711 08772 08773
08793 08794 08795 08862 09001 09201
09275 09294 09394 09420 09621 09711
09813 09828 09894 09999 10235 10276
10398 10402 10409 10410 10799 10801
10813 10848 10885 10989 11007 11164
11251 11336 11377 11378 11392 11393
11432 11463 11476 11477 11662 11698
11745 11833 12218 12242 12309 12713
12734 12808 12809 12835 12836 12837
12904 12912 12982 13004 13287 13394
13396 13680 13705 13706 13851 13950
13963 13995 14003 14239 14314 14369
14598 14934 15167 15205 15237 15307
脑痈
05957 06014
脑疽
00756 01493 02136 02303 03311 04283
05140 06015 12312 12690 12694 14657
发脑
02133 02709 03267 04081
石疽
02497 07377 10296 14161
石痈
00988 05376
鬓疽
05140 09377 11336 13450 14610
发鬓
02709 03267 12694
发眉
02709 04081
搭手
02298
发背
00420 00670 01112 01207 01243 01357
01544 01727 02000 02133 02170 02274
02301 02303 02307 02390 02709 02783
02784 02999 03100 03267 03540 03591
03702 03885 03886 03924 04081 04139
04162 04283 04362 04687 05003 05139
05140 05140 05186 05244 05335 05337
05354 05374 05376 05474 05711 06025
06193 06250 06260 06557 08012 08013
08123 08394 08661 08772 08773 08808
08820 08821 08831 08890 09294 10759
10831 10845 11251 11386 11391 11755
12312 12734 12763 12809 12837 13287
13377 13396 14443 15205 15237
穿骨疽
07005
手丫发
06314
井疽
07005
心痈
02551
肺疽
01009
乳痈
00870 01276 01875 02000 02319 02458
02508 02682 03100 03597 03846 03926
04083 04084 04085 04095 04244 04698
04987 05137 05145 05337 05376 05712
06300 07038 07052 07248 08012 08240
08582 08652 08682 08690 08719 08748
08770 08820 09397 09812 09831 10234
10507 10808 10831 11095 11097 11103

11105 11168 11641 11659 11674 12948
13098 14508 14510 15135 15147 15215
15352 15394
乳疽
02458 02508 03597 06026 11097 11103
11105
乳癖
05398 05617 06477 07038 11356 11364
14654
乳核
01763 02144 02288 02308 02682 03151
03550 06014 06578 10380 10758 11690
11748 15134
乳芳
13877
乳发
03597 04081
乳硬
01752
乳漏
03597
乳甚
04493 04924 14644
胁痈
07005 08934
腹皮痈
05665 07199
臀痈
02246 02291 07005
骑马痈
00782 02298 03031 04631 06929 08485
08959 14312 14313
肛门痈
00034 02297 02307 11615 12688
鹳口疽
08594
囊痈
05999 13447 15418
鹤膝风
00093 00677 01038 02062 02754 03376
04577 05376 06014 06903 07714 07775
10411 10485 10804 12856 14511
骨疽
08548
附骨疽
02132 02132 02291 02295 02296 03026
07346 07931 08147 08438 08890 10846
12690 12781 13181 15352
黄鳅痈
02137
甲疽
05560 08669 13623
脱疽
01039 03438 06035 06318 08044 11231
13377 14125 14670
血栓闭塞性脉管炎
03438 05263
恶脉
02010
下肢静脉曲张
07232
静脉炎
03438
浅层静脉炎
10560
栓塞性静脉炎
02137
瘰疽
02170
阴疽
00754 01436 02293 05374 05495 06012
06026 06028 08411 14262
预防痈疽
04533 08698
疮疡
00102 00177 00376 00857 01206 01474
01788 02026 02033 02135 02148 02149
02150 02244 02276 02278 02279 02292
02293 02301 02311 02389 02473 02543
02568 02721 02728 02731 02781 02856
02924 02980 03106 03311 03420 03594
03686 03700 03759 03882 03960 04096
04823 04913 05141 05156 05158 05162
05289 05303 05383 06120 06137 06155
06156 06216 06298 06332 06355 06480
06490 06558 06588 06987 07026 07389
07520 07524 07683 07893 07942 07972
08014 08290 08688 08691 08694 08696
08793 08861 08864 09224 09302 09396
09398 09809 09814 10235 10705 10709

10826 10923 11130 11240 11527 11599
11666 11757 11806 12490 12709 12737
12831 12835 13151 13250 13426 13485
13564 13689 13707 13851 13942 14370
14637 15018 15053 15211 15272 15413
面疮
02375 03108 56683 12522
痄腮
03834 04277 04496 04640 05960 07518
10507 11340 11572 12230 13335 14638
时毒
02557 05153 07049 07077 12694 13835
14541
发颐
02170 02294 02457 02475 02709 04081
05154 06633 07045 07050 08117 12694
12719
大头瘟
00140 02286 02485 02785 04142 04373
05153 06260 06632 12672 12767 13334
13489 14039 14075 14368 14982
猫眼疮
13438
金腮疮
00115
羊胡疮
00051 06625 11547
手丫发
06314
乳疖
02319 02508 03846 09529 11972
乳肿痛
02682
坐板疮
00145 02008 02019 12021 12486
睾丸肿痛
05339 13767
阴囊肿痛
03277 04458 04631 14074
阴囊生疮
14168
阴疮
02100 03909 04013 04046 04631 05377
05638 05749 06852 06856 10515 10901
10910 11527 11590 12467 12588 12650
12933 12937 12960 12966 13937 13939
14431 15263
阴肿
02747 03038 03866 04358 04392 13448
13449
阴痒
03274 03275 04926 06469 06700 07295
11142 12947 12965 13449 13737 14106
痔瘘
00097 00141 00146 00157 00205 00642
00763 00849 00850 01267 01768 01790
01910 01972 02099 02285 02309 03015
03338 03340 03499 03555 03606 03702
03723 03775 04004 04396 04495 04525
04582 04794 04923 05316 05317 05569
05702 05925 06153 06182 06187 06194
06211 06351 06480 06490 06509 07016
07254 08029 08081 08236 08286 08333
08483 08560 08889 08960 08961 09473
09537 09542 09543 09544 09561 09569
09570 09761 09794 09809 10250 10535
10627 10851 10869 10876 10951 10952
10954 11224 11365 11519 11537 11538
11539 11540 11541 11589 11616 11701
11712 11752 11774 12116 12530 12656
12724 12847 13035 13039 13065 13214
13215 13216 13217 13218 13219 13294
13461 13648 13892 13970 14068 14079
14163 14164 14165 14379 14433 14442
14443 14450 14451 14452 14459 14460
14462 14468 14475 14576 14985 15016
15058 15414
肛门瘙痒
04673 12371 13885
人面疮
08210 14648
臁疮
00147 00178 00325 00641 00706 00774
00910 01417 02704 03390 03425 03611
03751 03760 03761 03762 03852 03884
04140 05132 05133 05134 05135 05136
05334 05582 05954 06301 06866 08687
10269 10344 10503 11132 11200 11504
11679 12360 12480 12482 12588 12593
12594 12650 13006 13563 13615 13998

14404 14405 14406 14567 14942 15276
15277 15278
田螺泡
14666
鸡眼
01318 02630 08857 12802 13059 15351
远行足肿
01328
热疮
03371 03658 05167 09755 11146 14640
湿疮
00641 14206
顽疮
05133 05136 06291 06301 14405
恶疮
01254 01607 02133 02178 02268 02287
02836 03505 03523 03540 03596 03924
03961 04151 04362 04666 04832 05048
05139 05144 05336 05474 05608 05614
06301 06331 06465 07234 08123 08714
08821 09643 09809 10311 10397 10400
10813 10817 11164 12463 12533 12862
12904 12927 13394 13634 13876 14577
14933 15052 15347
溺皮疮
05661
漏疮
01994 02261 02309 03592 03662 05382
07663 08336 10838 10875 14944 15052
翻花疮
02261 03069
刺疮
08326
烧伤
00855 01178 02224 03123 03417 03419
03751 04116 04179 04833 05176 05244
05245 05682 05753 05755 05762 06332
06790 08064 08094 08397 08743 09107
09288 10344 10353 10750 10920 10923
11173 11369 11574 12017 12018 12019
12479 12495 13395 13398 13399 13426
13616 14076 14365 14366 15236 15240
疔疮
00342 00395 00415 00628 01544 01545
01607 01954 01967 01994 02010 02129
02283 02290 02303 02374 02723 03088
03885 03886 04148 04153 04646 04696
04697 05020 05078 05139 05354 05371
05490 05640 06260 06317 06333 06650
06752 06795 06893 07046 07141 07348
08056 08327 08328 08330 08711 08754
08772 08796 08808 10409 10826 10845
10846 11396 11568 11656 11678 11743
12314 12479 12804 12809 13377 13765
14003 14640 14656 14933 14934 15353
15354
耳疔
12690
牙疔
01334 08329
蛇头疔
85075 14510
黑疔
01997
红丝疔
01997 05052 11846
肿毒
02284
疖肿
00789 00824 01474 02392 02473 02963
04685 05167 06968 08189 12939 13426
13619 13801
蟮拱头
13633
气肿
03090 07994 12840
风肿
15191
溃疡
00386 00414 00854 02895 03019 03606
03703 03887 04663 05280 05755 06191
06296 06297 06324 09513 09517 09518
09523 09524 10354 11127 11133 11554
12720 12836 12880 14500 15175
疮口不敛
02855 03065 03593 03595 03599 03602
03603 03857 03935 05955 06193 07563
预防疮疡
14609
手术麻醉

01746 06286 06517 13127 13128

（四）瘰疬、结核、流注

瘰疬
00064 00660 00737 00849 00912 00932
00943 01241 01322 01436 01616 01656
01685 01851 01917 01954 01994 02132
02133 02144 02276 02289 02292 02305
02306 02310 02350 02527 02548 02727
02740 02745 02951 02999 03271 03465
03598 03900 03906 03926 03948 04090
04222 04388 04530 04539 04593 04596
04865 04983 05145 05150 05258 05336
05369 05377 05398 05608 05653 05751
06025 06028 06165 06238 06300 06333
06477 07023 07024 07029 07030 07034
07038 07048 07051 07242 07247 07263
07264 07502 07845 07933 07982 08012
08056 08392 08479 08764 09064 09397
09420 10259 10410 10496 10544 10664
10826 10845 11136 11238 11252 11253
11254 11322 11364 11665 11686 11688
11689 11713 11714 11715 11751 11783
11807 11836 12005 12006 12240 12799
12808 12903 12911 12938 13055 13057
13265 13614 13680 13694 13776 13914
14017 14019 14075 14161 14358 14389
14392 14489 14506 14570 14573 14575
14931 14933 15047 15074 15205 15228
15229 15230 15231 15232 15265 15355
15356
马刀
06623 11322 11332 11335 11662
结核
01747 02009 02350 06028 11690 11744
11783 13446 15014
气核
02261
痰核
00082 01349 02137 02743 04354 05114
05369 05482 07845 08291 10496 10544
11687 11713 12809 14392 15205
骨与关节结核
06014 14569
流注
01382 01436 01917 02128 02754 04983
05145 05150 05376 05711 06014 06026
07928 07983 07992 08117 08444 09420
10805 10845 10989 12071 12087 12723
13187 13664 13665 14392 14967

（五）动物咬（螫）伤

人咬伤
13853
狂犬咬伤
02948 04847 05183 06964 07777 08828
10392 10404 12888 13698 13932
守宫咬伤
12803
蛇虫咬伤
02075 02178 03593 03844 06260 08152
08394 10730 13932 13933 13943 13951

七、皮肤科病证

粉刺
00083 02565 02896 02957 02960 02965
02988 02998 03920 04604 05757 06119
06198 06292 06849 07032 07771 08035
08162 08173 08177 09295 10509 10522
11201 11202 11625 12636 13883 14188
15177
黯黯
00308 00352 06849 06850 10213 10509
10522 10699
雀斑
01024 02161 02914 02957 02958 02959
02965 03859 05757 05924 07039 07078
07771 08043 10919 14398
面黑
03572 03957 04220
面皯疱
03850 04004
面部紫块
09007 15257
黑痣
03359 03901 05068 08196 08924 12808
面游风
10659
皮炎
02232 04672 08176 14365

接触性皮炎
03229 10738 10739
过敏性皮炎
03282 10901
藜日光皮炎
02384 08179
日光性皮炎
00899
剥脱性皮炎
14026
药物性皮炎
02377 08873
稻田皮炎
11531
脂溢性皮炎
00655 04204 08213 08221 11621 11733
漆性皮炎
02379 03124 04414 05753 11214 15364
神经性皮炎
01120 02220 02231 02668 02696 02803
02812 02825 04675 04677 05598 05635
05937 08724 12599 12951 12961 13697
13699 13703 13927 13954 13957 14485
尿布皮炎
14704
湿疹
00096 00655 00681 00683 00705 00739
00899 01327 01555 01562 01953 02033
02127 02231 02232 02348 02849 03229
03282 03821 03855 03856 04632 04672
04673 04676 04685 04789 05635 05636
06188 06689 07042 07959 08061 08122
08176 09822 10738 10739 10942 11336
11504 11520 11530 11728 12600 12603
12949 12950 12961 13741 13922 13927
13945 13971 14205 14207 14342 14365
14366 14485 15200
婴儿湿疹
00091 02051 02575 02751 05021 08289
12956 14000 14086 14208
荨麻疹
00199 00396 01073 01654 02242 02668
02669 02680 03282 03384 04006 04204
04205 04367 04447 04472 04502 04811
04836 05107 05118 05196 05321 05679
06111 06116 06223 06652 06855 07469
08204 08539 09309 09554 09572 09776
09800 09805 09811 10095 10508 10509
10552 10657 10936 11470 11503 11621
11644 11697 11731 11845 11848 12583
13184 13203 13213 13239 13808 13972
14930 15253
毛发红糠疹
06649 11622
玫瑰糠疹
04629
带状疱疹
00340 00627 02980 03107 03277 04143
04632 04800 08180 10898 11525 13400
13938 13944
阴囊湿疹
03177 03180 05118 07133 07174 07175
08014 08068 08695 10749 12020 12942
12943
阴囊瘙痒
00885 10800 13409
癣疮
00269 00373 00797 00901 00905 00994
02093 02538 03353 03356 03823 03863
03868 04113 04348 05936 05937 06054
06202 06593 06649 06701 07225 07484
07783 08034 10107 10740 10741 10797
10889 10933 10934 10942 11518 11725
12451 13696 14619 15305 15368 15370
15371
风癣
02587 14984
顽癣
03952 05334 05930 10746 15166 15369
湿癣
12021
干癣
00019 05936
头癣
00007 02008 02575 02694 05168 05558
06224 06371 07035 07217 07520 08189
08233 10344 10800 11863 12464 13699
13926 13946 15057
手癣
00046 00104 00750 01932 03952 04011

05936 06290 09898 10499 10742 11582
11879 14128 15009 15166 15332
脚癣
00046 02140 03229 07962 13058 13568
13699 14125
股癣
05937
吹花癣
06282
牛皮癣
00899 01932 01956 02463 03856 04050
04051 05110 07672 10499 10659 11525
11581 13401 15370
蛇皮癣
07292 11879 12588
松皮癣
11879 15370
桃花癣
14414
疥疮
00001 00005 00006 00137 00138 00373
00797 01955 02008 02194 02538 02575
03524 05167 05246 05673 06054 06209
06569 07225 07484 07783 08034 08209
08217 08223 09332 09772 09774 10268
10497 10498 10508 10752 10889 10942
11518 11679 12021 12022 12254 12255
12465 12505 12830 12927 13164 13165
13166 13875 13876 13925 14443 14456
14934 15026 15305
风疥
00010
阴虱疮
06716 12974
痱子
00166 02954 06786 08122 14123 14704
白癜风
00723 00790 02413 02636 02657 03167
03252 03860 03914 03962 06067 07002
07672 07917 08222 08225 08800 10144
10242 10390 11390 11845 12246 12372
12487 12810 12954 13575 14002 14581
15116 15360
紫癜风
05950 07170 07225 12127 12246
汗斑
00164 00399 01764 02020 02591 02652
03418 04020 04597 05757 05758 06228
06654 06761 08211 08254 10746 11849
13063 13567
痨疡风
02637 02638 13947
扁平苔癣
02668
白疕
10106 10238 11620 11628 12487
银屑病
01294 08853
冻疮
03919 05263 05321 06028 06236 06318
07358 07359 08191 09878 10439 11044
11133 11137 12501 13401
脓疱疮
00091 00385 00641 00736 00783 01621
02033 02093 02348 02542 04685 04695
07036 08122 09770 10698 10752 12413
12485 12497 12601 12650 12710 14050
14366 15270
脓窝疮
07222 07870 10800 13165
浸淫疮
03854 04674 11159
白斑
08924
血风疮
00750 04749 09814 11610 14673
瓜藤缠
11610
红斑性狼疮
04556
疣子
12808 13213 13446
寻常疣
01318 09136 10159
扁平疣
08235 09137 10292
狐臭
00767 02013 03113 07218 07996 08039
13565 13631 14175 14481
身臭

00344 07218
七窍臭气
00247
脚臭
07054
香身
00211 11479
皮肤肥厚
11506
皮肤皲裂
01766 02963 07358 11505 13577 14360
手足皲裂
14588
皮肤枯燥
01412 09116
皮肤疙瘩
02069
皮肤瘢痕
02069 02343 02896 03901 10160
皮肤角化症
08947
皮肤瘙痒
03353 03536 04007 04008 04676 06066
06658 07569 08231 09567 10405 10421
10654 10663 10744 10941 11304 11646
11832 12951 13178 13488 13971 15203
人身忽长鳞甲
12592
丹毒
00793 00794 00795 00897 01045 01606
02132 02150 02379 02550 02980 03461
04834 05540 05747 06126 06138 06338
06558 08012 08331 08332 08335 08434
08678 08738 08741 09636 11610 11628
11642 11644 11759 13400 13618 13972
14014 14378 14401 14483 14484
面游风
10659
梅毒
00176 00782 00787 00906 01556 02093
02702 03301 04520 06142 06291 06301
06518 06931 07991 07991 08013 08836
08872 08879 09526 09816 10019 11200
11280 11444 11447 11730 11749 12249
12969 13680 13929 14015 14543 14658
下疳
00237 00687 00910 00915 03279 03858
03883 03935 04458 05149 05925 06291
07542 09008 09049 09510 09512 10269
10571 11769 12969 13681 15019 15262
横痃
00635 01307 06354 06559 12718 13664
14392
便毒
00635 00663 01307 02465 06025 06354
06732 09135 11168 12218 12718 13664
14990
预防梅毒
07003
麻风
00045 00059 00163 00169 00177 00338
00633 00797 00918 02538 02591 03962
04710 04753 05031 05063 05165 06203
06662 07223 07255 08034 08190 08205
08209 08211 08212 08224 08653 08871
09072 09627 09634 10817 11276 11584
11847 12229 12302 12927 12941 13169
13949 14028 14621 15052

八、伤科病证

破伤风
00014 00424 01032 01122 01358 01638
01655 01687 01695 02185 02641 02948
03915 04031 04073 04526 04581 04846
04969 05050 05071 05183 05652 05759
05786 06156 07465 07466 07499 07782
07898 08828 09177 09363 10144 10387
10403 10449 10674 10822 10860 11390
11429 13062 13671 13941 14104 14470
14568 14571 15264
破伤湿
03790
金疮
00108 00341 01229 01726 02178 02206
02234 02300 02936 03101 03102 03830
03932 04275 05019 05552 05682 05738
05958 06210 06244 06250 06332 06591
07519 08706 08732 08758 08828 08839
08840 08849 08850 08851 08852 09523
10505 11131 13067 15093

跌打损伤
00340 00390 00394 00607 00631 00821
00857 00970 01063 01208 01214 01240
01726 02026 02032 02074 02117 02207
02243 02268 02280 02344 02670 02699
02729 02778 02921 02937 03101 03209
03369 03504 03598 04096 04136 04544
04572 04704 04888 05000 05019 05051
05202 05211 05219 05224 05243 05248
05276 05277 05336 05373 05498 05549
05552 05553 05578 05596 05597 05626
05780 05897 05988 06006 06007 06009
06260 06293 06302 06309 06365 06556
06591 07180 07230 07331 07376 07386
07657 07901 08056 08659 08660 08667
08707 08708 08711 08840 08887 09112
09196 09206 09207 10233 10236 10536
10540 10547 10550 10729 11115 11123
11131 11147 11247 11295 11652 11724
12070 12099 12852 12853 12854 12860
12863 12864 12871 12872 12873 12876
13126 13398 13428 13684 13688 13775
13779 13917 13991 14055 14056 14057
14058 14059 14060 14066 14077 14492
14499 15093 15103 15206 15207 15208
15284 15365 15366
骨折
00002 00024 00900 00925 01428 02581
02924 03555 05546 06364 06372 07387
09285 10188 10547 11420 12855 12857
12858 12859 12861 12864 12865 12866
12869 12870 12874 12875 13068 13587
13990 14520
断筋
13599
脱臼
05546 12857
下颏脱臼
02616 04578
脚跟骨脱臼
04653
脑外伤
00393
脑震荡后遗症
05548
眼外伤
00033 00393 06186 06190 11233 12177
胞脬受伤
09399
闪挫伤
10152 10629 14159
扭伤
05551
落枕
11049
预防外伤疼痛
10417

古今度量衡对照

重量

年　　代	朝代	1 斤/市两	1 两/市两	1 两/克
公元前 1066～前 221 年	周	7.32	0.46	14.18
公元前 221 年～前 206 年	秦	8.26	0.52	16.13
公元前 206 年～23 年	西汉			
公元 25 年～220 年	东汉	7.13	0.45	13.92
公元 220 年～265 年	魏			
公元 265 年～420 年	晋			
公元 420 年～589 年	南朝 刘宋	10.69	0.67	20.88
	南朝 南齐	7.13	0.45	13.92
	南朝 梁	7.13	0.45	13.92
	南朝 陈			
公元 386 年～581 年	北朝 北魏	7.13	0.45	13.92
	北朝 北齐	14.25	0.89	27.83
	北朝 北周	8.02	0.50	15.66
公元 581 年～618 年	隋（开皇）	21.38	1.34	41.76
	隋（大业）	7.13	0.45	13.92
公元 618 年～907 年	唐	19.10	1.19	37.30
公元 907 年～960 年	五代			
公元 960 年～1279 年	宋			
公元 1279 年～1368 年	元			
公元 1368 年～1644 年	明			
公元 1644 年～1911 年	清			

古代斤、两之间多为 16 进制，即 1 斤 = 16 两

容量

年　代	朝代	1升/市升	1升/毫升
公元前1066～前221年	周	0.1937	193.7
公元前221年～前206年	秦	0.3425	342.5
公元前206年～23年	西汉		
公元25年～220年	东汉	0.1981	198.1
公元220年～265年	魏	0.2023	202.3
公元265年～420年	晋		
公元420年～589年	南朝 南宋 南朝 南齐 南朝 梁 南朝 陈	0.2972 0.1981 0.1981	297.2 198.1 198.1
公元386年～581年	北朝 北魏 北朝 北齐 北朝 北周	0.3963 0.3963 0.2105	396.3 396.3 210.5
公元581年～618年	隋 （开皇） （大业）	0.5944 0.1981	594.4 198.1
公元618年～907年	唐	0.5944	594.4
公元907年～960年	五代		
公元960年～1279年	宋	0.6641	664.1
公元1279年～1368年	元	0.9488	948.8
公元1368年～1644年	明	1.0737	1073.7
公元1644年～1911年	清	1.0355	1035.5

尺度

年　代	朝代	1尺/市尺	1尺/厘米
公元前1066～前221年	周	0.5973	19.91
公元前221年～前206年	秦	0.8295	27.65
公元前206年～23年	西汉		
公元25年～220年	东汉	0.6912	23.04
公元220年～265年	魏、西晋	0.7236	24.12
公元265年～420年	东晋	0.7335	24.45
公元420年～589年	南朝 刘宋 南齐 梁 陈	0.7353	24.51
公元386年～581年	北朝 北魏 北齐 北周	0.8853 0.8991 0.7353	29.51 29.97 24.51
公元581年～618年	隋 (开皇) (大业)	0.8853 0.7065	29.51 23.55
公元618年～907年	唐	0.9330	31.10
公元907年～960年	五代		
公元960年～1279年	宋	0.9216	30.72
公元1279年～1368年	元		
公元1368年～1644年	明	0.9330	31.10
公元1644年～1911年	清	0.9600	32.00

特殊计量

单　位	涵　　义	折　　算
方寸匕	量器，古尺1平方寸。形如刀匕	容量约2.7毫升，重量约：金石药2克，草木药1克
钱匕	计量单位。即汉代五铢钱。抄取药物不落为度	为方寸匕的6/10～7/10
钱五匕	同上。但仅将药末盖住钱上的“五”字	为1钱匕的1/4
刀圭	量器。形如刀头的圭角。端尖，中低	约1方寸匕的1/10
字	计量单位。即古铜钱“开元通宝”之四个铸字。计量时以药末填没一字	
铢	重量单位	汉代为100粒黍米的重量，24铢为1两。晋代为10粒黍米的重量，6铢为1分，4分为1两

主要引用书目

书名	本书简称	作者	成书年代
黄帝内经素问	素　　问	王　冰校注	B.C.221
黄帝内经灵枢经	灵　　枢	不　详	B.C.221
伤寒论		张仲景	206
金匮玉函经	玉　　函	张仲景	206
金匮要略	金　　匮	张仲景	206
肘后救卒方	肘后方	葛　洪	363
刘涓子鬼遗方	鬼　　遗	刘涓子	499
备急千金要方	千　　金	孙思邈	650
千金翼方	千金翼	孙思邈	680
外台秘要	外　　台	王　焘	752
元和纪用经		王　冰	762
仙授理伤续断方	理伤续断方	蔺道人	841
经效产宝并续集	产　　宝	昝　殷	847
师巫颅囟经	颅囟经	师　巫	907
医心方		丹波康赖	984
太平圣惠方	圣　　惠	王怀隐	992
博济方	博　　济	王　衮	1047
简要济众方	简要济众	周　应	1051
苏沈良方		沈括、苏轼	1075
神巧万全方	神巧万全	刘元宾	1076
养老奉亲书	养老奉亲	陈　直	1078
脚气治法总要	脚气治法	董　汲	1078
传家秘宝脉证口诀并方	传家秘宝	孙用和	1085
太平惠民和剂局方	局　　方	陈师文	1078
史载之方		史　堪	1085
经史证类备急本草	证类本草	唐慎微	1086
伤寒微旨论	伤寒微旨	韩祇和	1086
小儿斑疹备急方论	斑疹备急	董　汲	1093
万全护命方	护　　命	杨子建	1098
伤寒总病论		庞安时	1100
类证活人书	活人书	朱　肱	1108
本草衍义		寇宗奭	1116
圣济总录		赵　佶	1111
全生指迷方		王　贶	1119
阎氏小儿方论	阎氏小儿方	阎孝忠	1119
小儿药证直诀		钱　乙	1119
华氏中藏经	中藏经	华佗（宋代医家伪托）	1127
产育宝庆集	产育宝庆	郭稽中	1131

幼幼新书		刘　昉	1132
鸡峰普济方	鸡　峰	张　锐	1133
注解伤寒论		成无己	1144
普济本事方	本　事	许叔微	1145
本事方续集	续本事	许叔微	1150
小儿卫生总微论方	卫生总微	无名氏	1156
伤寒明理论		成无己	1156
孙真人海上方		钱　竿	1165
产宝诸方		王卿月	1166
洪氏集验方		洪　遵	1170
卫济宝书			1170
黄帝素问宣明论方	宣明论	刘完素	1172
三因极一病证方论	三　因	陈　言	1174
杨氏家藏方		杨　倓	1178
传信适用方		吴彦夔	1180
卫生家宝方	卫生家宝	朱端章	1184
伤寒直格	直格	刘完素	1186
伤寒标本心法类萃	伤寒标本	刘完素	1186
素问病宜气机保命集	保命集	刘完素	1186
三消论		刘完素	1186
医学启源		张元素	1186
洁古家珍		张元素	1186
易简方	易　简	王　硕	1191
近时十便良方	十便良方	郭　坦	1195
集验背疽方		李　迅	1196
是斋百一选方	百　一	王　璆	1196
医　说		张　杲	1224
备急炙法		闻人耆年	1226
魏氏家藏方		魏　峴	1227
儒门事亲		张从正	1228
内外伤辨惑论	内外伤辨	李　杲	1231
阴证例略		王好古	1236
妇人大全良方	妇人良方	陈自明	1237
续易简方论	续易简	施　发	1243
脾胃论		李　杲	1249
兰室秘藏		李　杲	1251
活法机要		李　杲	1251
医学发明		李　杲	1251
济生方		严用和	1253
陈氏小儿病源方论	小儿病源	陈文中	1254
陈氏小儿痘疹方论	小儿痘疹	陈文中	1254
仁斋直指方论	直　指	杨士瀛	1264
仁斋直指小儿方论	直指小儿	杨士瀛	1264
女科万金方		薛古愚	1265
类编朱氏集验医方	朱氏集验医方	朱　佐	1265

东垣试效方	试效方	李　杲	1266
御药院方		许国祯	1267
管见大全良方	管见良方	陈自明	1270
走马急疳真方	走马疳急方	滕伯祥	1275
岭南卫生方		李　璆、张致远、释继洪	1279
内经拾遗方论	内经拾遗	骆龙吉	1279
卫生宝鉴		罗天益	1281
医垒元戎	元　　戎	王好古	1291
活幼口议		曾世荣	1294
寿亲养老新书	寿亲养老	邹　铉	1307
云岐子注脉并方		张　璧	1308
云岐子保命集论类要	云岐子保命集	张　璧	1308
杂类名方		杜思敬	1308
此事难知		王好古	1308
济生拔萃		杜思敬	1315
保婴集		(佚名)	1315
心印绀珠	绀　　珠	罗知悌	1325
瑞竹堂经验方	瑞竹堂方	沙图穆苏	1326
饮善正要		忽思慧	1330
永类钤方		李仲南	1331
外科精义		齐德之	1335
世医得效方	得效	危亦林	1337
伤寒图歌活人指掌		吴　恕	1337
类编南北经验医方大成	南北经验方	孙允贤	1343
丹溪心法		朱震亨	1347
局方发挥		朱震亨	1347
格致余论		朱震亨	1347
劳症十药神书	十药神书	葛乾孙	1348
脉因症治		朱震亨	1358
麻疹全书		滑　寿	1364
医经溯洄集	溯洄集	王　履	1368
原机启微		倪惟德	1370
仙传外科集验方	外科集验方	杨清叟	1378
医学纲目		楼　英	1389
普济方		朱　橚	1930
袖珍方		李　恒	1391
玉机微义		刘　纯	1396
刊京本活人心法	丽仙活人心方	朱　权	1398
袖珍小儿方	袖珍小儿	徐用宣	1403
永乐大典医药集		解　缙	1408
金镜内台方议	内台方议	许　宏	1422
卫生易简方		胡　濙	1423
伤寒全生集		陶　华	1445
痈疽神验秘方	痈疽验方	陶　华	1445
伤寒六书		陶　华	1445

医方类聚		金礼蒙	1445
奇效良方		董　宿	1470
松崖医径		程　介	1484
丹溪纂要		卢　和	1484
外科集验方		周文采	1498
明医杂著		王　纶	1502
婴童百问		鲁伯嗣	1506
医学正传		虞　搏	1515
万氏家抄济世良方	万氏家抄方	万　表	1520
韩氏医通		韩　悉	1522
跌损妙方		异远真人	1523
外科心法		薛　已	1528
口齿类要		薛　已	1528
外科发挥		薛　已	1528
外科经验方		薛　已	1528
正体类要		薛　已	1528
痘治理辨		汪　机	1531
外科理例		汪　机	1531
幼科类萃		王　銮	1534
医学统旨		叶文龄	1534
扶寿精方		吴　旻	1534
丹溪心法附余		方　广	1536
活人心统		吴　球	1537
医学原理		汪　机	1539
丹溪治法心要		朱震亨	1543
怪证奇方		李　楼	1544
内科摘要		薛　已	1545
外科枢要		薛　已	1545
校注妇人良方		陈自明	1547
女科撮要		薛　已	1548
痘疹世医心法	痘疹心法	万　全	1549
名医类案		江　瓘	1549
万氏家传广嗣纪要	广嗣纪要	万　全	1549
体仁汇编		彭用光	1549
解围元薮		沈之问	1550
撮生众妙方		张时彻	1550
急救良方		张时彻	1550
疠疡机要		薛　已	1554
保婴撮要		薛　已	1555
古今医统大全	古今医统	徐春甫	1556
陈素庵妇科补解		陈素庵	1522
银海精微		孙思邈（明代医家伪托）	1566
医便		王三才	1569
疮疡经验全书		窦汉卿	1569
慎斋遗书		周慎斋	1573

医学入门		李　梴	1575
本草纲目		李时珍	1578
万氏秘传外科心法		万　全	1579
万氏家传育婴秘诀	育婴家秘	万　全	1579
万氏家传片玉痘疹	片玉痘疹	万　全	1579
万氏家传保命歌括	保命歌括	万　全	1579
万氏家传片玉心书	片玉心书	万　全	1579
万氏家传点点经	点点经	万　全	1579
伤寒摘锦		万　全	1579
养生四要		万　全	1579
万氏家传幼科发挥	幼科发挥	万　全	1579
万氏家传幼科指南心法	幼科指南	万　全	1579
痘疹金镜录	痘疹金镜	翁仲仁	1579
种杏仙方	种杏	龚廷贤	1581
医旨绪余	医旨	孙一奎	1584
医方考		吴　琨	1584
赤水玄珠全集	赤水玄珠	孙一奎	1584
医学六要		张三锡	1585
仁术便览		张　浩	1585
万病回春	回春	龚廷贤	1587
伤寒论条辨	伤寒条辨	方有执	1589
古今医鉴		龚　信	1577
遵生八笺		高　濂	1591
应急良方		不　详	1592
鲁府禁方		龚廷贤	1594
慈幼心传		朱惠明	1594
痘疹传心录		朱惠明	1594
增补内经拾遗方论	增补内经拾遗	骆龙吉	1599
证治准绳·杂病	准绳·杂病	王肯堂	1602
证治准绳·类方	准绳·类方	王肯堂	1602
证治准绳·伤寒	准绳·伤寒	王肯堂	1604
外科启玄		申斗垣	1604
证治准绳·幼科	准绳·幼科	王肯堂	1607
证治准绳·女科	准绳·女科	王肯堂	1607
疹科正传		吕　坤	1608
证治准绳·疡科	准绳·疡医	王肯堂	1608
瘴疟指南		郑全望	1609
墨宝斋集验方		郑　泽	1609
杏苑生春	杏苑	芮　经	1610
东医宝鉴		许　浚	1610
宋氏女科秘书	宋氏女科	宋林皋	1612
痘疹要诀		吴东圆	1613
寿世保元		龚廷贤	1615
奇效医述		聂尚恒	1616
活幼心法大全	活幼心法	聂尚恒	1616

明刊穷乡便方	穷乡便方	不　详	1617
医贯		赵养葵	1617
外科正宗		陈实功	1617
疡科选粹		陈文治	1618
外科百效全书	外科百效	龚居中	1618
幼科百效全书	幼科百效	龚居中	1618
绿竹堂集验方	绿竹堂方	姚太傅	1619
摘星楼治痘全书	治痘全书	朱一麟	1619
济阴纲目		武之望	1620
先醒斋医学广笔记	广笔记	缪希雍	1622
明医指掌		皇甫中	1622
婴童类萃		王大纶	1622
伤暑全书		张凤逵	1623
本草汇言		倪朱谟	1624
景岳全书		张介宾	1624
济阳纲目		武之望	1626
简明医彀		孙志宏	1629
痘科类编释义	痘科类编	翟　良	1630
伤寒六书纂要辨疑		童学养	1632
霉疮秘录		陈司成	1632
胤后方		俞　政	1634
妙一斋医学正印种子编	医学正印	岳甫嘉	1635
丹台玉案	玉案	孙文胤	1636
慎柔五书		胡慎柔	1636
医宗必读		李中梓	1637
摄生秘剖		洪　基	1638
祖剂		施沛然	1640
幼科折衷		秦景明	1641
症因脉治		秦景明	1641
幼科金针		秦景明	1641
瘟疫论		吴有性	1642
秘传眼科七十二症全书	眼科全书	袁学渊	1644
理虚元鉴		汪绮石	1644
痎疟论疏		卢之颐	1644
痘疹仁端录		徐　谦	1644
一草亭目科全书	一草亭	郑　苑	1644
慈幼新书		程云鹏	1644
审视瑶函		傅仁宇	1644
上池杂说		冯元成	1644
尚论张仲景伤寒论重编397法	尚论篇	喻　昌	1648
伤寒括要		李中梓	1649
医灯续焰		王绍隆	1650
证治宝鉴		潘　楫	1652
病机沙篆		李中梓	1655
医学入门万病衡要	衡要	洪中立	1655

秘方集验		王梦兰	1657
医门法律	法律	喻　昌	1658
救偏琐言		费启泰	1659
医学启蒙		翟　良	1659
诚书		谈金章	1661
医衡		沈时誉	1661
伤寒缵论		张　璐	1662
侣山堂类辨		张隐庵	1663
医宗说约		蒋示吉	1663
外科大成		祁　坤	1665
伤寒绪论		张　璐	1667
伤寒来苏集		柯　琴	1669
医家心法		高鼓峰	1670
伤寒论后条辨		程郊倩	1670
金匮要略论注		徐　彬	1671
伤寒论翼		柯　琴	1674
伤寒附翼		柯　琴	1674
三朝名医方论		骆龙吉	1675
疠疡全书		释传杰	1675
尤氏喉科秘书		尤　乘	1675
古今名医方论		罗　美	1675
痧胀玉衡		郭志邃	1675
广瘟疫论		戴天章	1675
何氏济生论		何　镇	1676
医林绳墨大全		方　隅	1677
伤寒辨证		陈尧道	1678
温热暑疫全书		周杨俊	1679
伤寒辨注		汪　琥	1680
医方集解		汪　昂	1682
傅青主女科		傅　山	1684
胎产全书		单养贤	1684
傅青主男女科合编	傅青主男女科	傅　山	1684
痧证全书		王　凯	1686
胎产指南		单南山	1686
证治汇补		李用粹	1687
辨证录		陈士铎	1687
石室秘录		陈士铎	1687
伤寒三注		周杨俊	1689
郑氏家传女科万金方		郑元良	1689
沈注全匮要略		沈明宗	1692
易简方论		程履新	1693
洞天奥旨		陈士铎	1694
冯氏锦囊秘录	冯氏锦囊	冯兆张	1694
张氏医通		张　璐	1695
本经逢原		张　璐	1695

痘疹正宗		宋麟祥	1695
幼科铁镜		夏　鼎	1695
李氏医鉴		李文来	1696
嵩崖尊生全书	嵩崖尊生	景日昣	1696
证治大还		陈　治	1697
救产全书		谢文详	1697
千金方衍义		张　璐	1698
医学真传		高世栻	1699
医学传灯		陈　岐	1700
眼科秘诀		王覆方	1701
眼科阐微		马云从	1701
重订通俗伤寒论		俞根初	1701
医宗承启		吴人驹	1702
西塘感证		董废翁	1706
伤寒溯源集		钱　潢	1707
幼科指掌		叶其蓁	1708
幼科证治大全		下津众寿	1709
良朋汇集		孙　伟	1711
伤寒大白		秦之桢	1714
达生篇		亟斋居士	1715
顾松园医镜		顾松园	1718
奇方类编		吴世昌	1719
胎产秘书		钱　氏	1722
女科指掌		叶其蓁	1724
年氏集验良方		年希尧	1724
古今图书集成·医部全录	医部全录	蒋廷锡	1726
幼科直言		孟介石	1726
古方集解		徐大椿	1727
产宝		倪枝维	1728
灵验良方汇编		田间来	1729
金匮要略心典		尤　怡	1729
胎产心法		阎纯玺	1730
村居救急方		魏东澜	1730
痘学传真		叶大椿	1732
医学心悟		程国彭	1732
绛雪园古方选注	古方选注	王晋三	1732
外科十法		程国彭	1733
惠直堂经验方	惠直堂方	陶承熹	1734
不居集		吴　澄	1739
外科证治全生集	外科全生集	王维德	1740
女科指要		徐大椿	1741
杂病证治		徐大椿	1741
医略六书		徐大椿	1741
种痘新书		张　琰	1741
删补名医方论		吴　谦	1742

医宗金鉴	金鉴	吴　谦	1742
绛囊撮要		云川道人	1744
痘科正宗		仰　企	1745
本事方释义		叶　桂	1745
方氏脉症正宗	脉症正宗	方肇权	1746
叶氏女科证治	叶氏女科	叶　桂	1746
麻科活人全书	麻科活人	谢玉琼	1748
伤寒悬解		黄元御	1748
金匮悬解		黄元御	1748
伤寒贯珠集		尤　怡	1749
医方一盘珠	一盘珠	洪金鼎	1749
金匮翼		尤　怡	1749
幼幼集成		陈复正	1750
医碥		何梦瑶	1751
四圣悬枢		黄元御	1752
种福堂公选良方	种福堂方	叶　桂	1752
四圣心源		黄元御	1753
天花精言		袁　句	1753
活人方		林开燧	1753
杂症会心录		汪蕴谷	1754
仙拈集		李文炳	1754
经验广集		李文炳	1754
方极		东洞吉益	1755
幼科摘要		黄惕斋	1756
方症会要		不　详	1756
蕙怡堂经验方	蕙怡堂方	陈大缙	1757
喉科指掌		张宗良	1757
医学源流论		徐大椿	1757
医林纂要探源	医林纂要	汪　绂	1758
串雅内编		赵学敏	1759
串雅外编		赵学敏	1759
伤寒类方		徐大椿	1759
疡医大全		顾世澄	1760
盘珠集胎产证治	盘珠集	严　洁	1761
成方切用		吴仪洛	1761
类聚方		东洞吉益	1762
同寿录		曹　氏	1762
大生要旨		唐千顷	1762
兰台轨范		徐大椿	1764
医贯砭		徐灵胎	1764
沈氏女科辑要		沈文彬	1764
文堂集验方		何　京	1765
本草纲目拾遗	纲目拾遗	赵学敏	1765
产论		贺川子玄	1765
沈氏经验方		沈维基	1767

慎疾刍言		徐大椿	1767
女科要诀		舒　诏	1770
霉疮证治秘鉴	霉疮证治	桔尚贤	1772
女科切要		吴本立	1773
老老恒言		曹廷栋	1773
杂病源流犀烛		沈金鳌	1773
妇科玉尺		沈金鳌	1773
幼科释迷		沈金鳌	1773
沈氏尊生		沈金鳌	1773
痢疟纂要		熊立品	1776
痘麻绀珠		熊立品	1776
瘟疫传症汇编		熊立品	1776
外科选要		唐　赓	1776
福幼编		庄一夔	1777
遂生编		庄一夔	1777
医级		董西园	1777
疝癥积聚编		大桥尚因	1778
名家方选		山田元伦	1780
产科心法		汪　哲	1780
家塾方		东洞吉益	1780
寒温条辨		杨栗山	1784
霉疠新书		片仓元周	1786
竹林女科证治	竹林女科	竹林寺僧	1786
宁坤秘籍		竹林寺僧	1786
痘疹会通		曾　鼎	1786
松峰说疫		刘　奎	1789
罗氏会约医镜	会约	罗国纲	1789
问生集		陈　杰	1789
吴医汇讲		唐大烈	1792
胎产新书		竹林寺僧	1793
疫疹一得		余　霖	1794
重楼玉钥	玉钥	郑梅涧	1795
羊毛瘟症论		随　霖	1795
产科发蒙		片仓元周	1795
医略抄		丹波元简	1795
伤寒指掌		吴坤安	1796
洗冤录集证		王又槐	1796
疯门全书		萧晓亭	1796
风痨臌膈四大证治	风痨臌膈	姜　礼	1796
温病条辨		吴　瑭	1798
济急丹方		宁寿堂	1799
慈航集三元普济方	慈航集	王于圣	1799
济众新编		康命吉	1799
温证指归		周　魁	1799
救急选方		丹波元简	1801

时方歌括		陈修园	1801
疫痧草		陈耕道	1801
古方汇精		爱虚老人	1804
喉症全科紫珍集	喉科紫珍集	朱翔宇	1804
续名家方选		平安村上	1804
疡科心得集		高秉钧	1805
采艾编翼		叶茶山	1805
中国接骨图说	接骨图说	二宫彦可	1806
古今医彻	医彻	怀抱奇	1808
方剂辞典		平岗嘉言	1808
伤科补要		钱秀昌	1808
重庆堂随笔		王学权	1808
医学实在易		陈修园	1808
银海指南		顾养吾	1809
观聚方要补		丹波元简	1810
异授眼科		不　详	1811
方机		吉益为则	1811
痘科辨要		池田瑞仙	1811
履霜集		臧达德	1814
外科集腋		张景颜	1814
喉科指掌		包永泰	1815
伤科汇纂		胡廷光	1815
医述		程文囿	1816
接骨入骱全书	接骨入骱	王承业	1817
医略		钱一桂	1818
眼科捷径		不　详	1820
医学从众录		陈修园	1820
女科要旨		陈修园	1820
眼科集成		陈善堂	1820
痧症汇要		孙　玘	1821
女科辑要		周纪常	1823
笔花医镜		江笔花	1824
串雅补		鲁　照	1825
医门棒喝		章　楠	1825
伤寒广要		丹波元坚	1825
疡科遗编		沈志裕	1828
原痘要论		袁　氏	1828
眼科锦囊		木庄俊笃	1829
外科辑要		邵　澍	1829
医林改错		王清任	1830
产孕集		张耀孙	1830
医钞类编		翁　藻	1830
奇正方		贺古寿	1830
外科证治全书		许克昌	1831
疡科捷径		时世瑞	1831

幼科心法		不　详	1833
外科图说		高文晋	1834
保赤存真		余含葵	1834
外科真诠		邹　岳	1838
随息居重订霍乱论	霍乱论	王士雄	1838
证因方论集要		汪汝麟	1839
类证治裁		林佩琴	1839
格物堂经验良方	经验良方	西胁典	1839
医略十三篇		蒋宝素	1840
集验良方拔萃	集验良方	恬　素	1841
良方集腋		谢元庆	1841
卫生鸿宝		祝补斋	1844
验方新编		鲍相璈	1846
春脚集		孟文瑞	1846
喉科心法		沈善谦	1847
重订囊秘喉书	囊秘喉书	杨龙九	1850
内科摘录		文　晟	1850
妇科杂症		文　晟	1850
急救便方		文　晟	1850
医方易简新编	医方易简	龚自璋	1851
柳州医话良方	柳州医话	魏之琇	1851
鸡鸣录		王士雄	1852
痧法备旨		欧阳调律	1852
行军方便便方	行军便方	罗世瑶	1852
温热经纬		王士雄	1852
救伤秘旨		赵廷海	1852
喉科心法		刘序鹓	1853
潜斋简效方		王士雄	1853
麻疹备要方论		吴亦鼎	1853
杂病广要		丹波元坚	1853
四科简效方		王士雄	1854
医学辑要		吴　烨	1854
痢疾明辨		吴士瑛	1857
保赤全生录	治疹全书	不　详	1858
增广大生要旨		唐千顷	1858
妇科胎前产后良方注评	胎产良方	不　详	1858
冷庐医话		陆以湉	1858
刺疔捷法		应侣笙之祖	1860
许订外科正宗		陈实功著 许楣增订	1860
易简方便医书	易简方便	周茂五	1861
脚气钩要		今村亮	1861
医原		石寿堂	1861
随息居饮食谱	饮食谱	王士雄	1861
医方歌括		王旭高	1862

王旭高医书六种		王旭高	1862
医事启原		今村亮	1862
医醇剩义		费伯雄	1863
时疫白喉捷要	白喉捷要	张绍修	1864
理瀹骈文	理瀹	吴尚先	1864
医方论		费伯雄	1865
喉科秘钥		郑西园	1868
一见知医		陈　鄂	1868
焦氏喉科枕秘	喉科枕秘	金德鉴	1868
应验简便良方		黄翼升	1871
痧喉证治汇言	痧喉汇言	施小桥	1872
急救应验良方		费友棠	1872
引经证医		程　梁	1873
医学集成		刘仕廉	1873
疫喉浅论		夏　云	1874
王氏医存		王燕昌	1875
重订刺疔捷法		吴韵仙	1876
女科要略		潘　蔚	1877
喉科心法		沈吉斋	1878
梅氏验方新编		梅启照	1878
医学金针		陈修园	1878
广温热论		戴北山著	1675
		陆懋修删订	1878
医学举要		徐　镛	1879
麻症集成		朱丹山	1879
喉舌备要秘旨	喉舌备要	不著撰人	1879
医门八法		刘鸿恩	1880
不知医必要		梁廉夫	1880
（集选）奇效简便良方	简便良方	丁尧臣	1880
时病论		雷　丰	1882
世补斋不谢方		陆懋修	1882
蠢子医		龙之章	1882
白喉全生集		李纪方	1882
医门补要		赵　濂	1883
青囊立效秘方		李彭年	1883
外科医镜		张　正	1883
医方简义		王清原	1883
血证论		唐容川	1884
黄氏青囊全集秘旨	青囊全集	黄廷爵	1886
眼科秘书		月潭禅师	1886
喉症指南		寄鲁渔父	1887
医寄伏阴论		田云槎	1888
揣摩有得集		张东川	1888
眼科撮要		曾国宾传	1890
医宗己任编	己任编	高鼓峰	1891

青囊秘传		马培之	1892
外科传薪集		马培之	1892
饲鹤亭集方		凌　奂	1892
寿世新编		万潜斋	1892
外科方外奇方		凌　奂	1893
医学摘粹		庆云阁	1895
疑难急症简方		罗越峰	1895
增订治疗汇要		过　铸	1896
医略传真		马培之	1896
白喉条辨		陈葆善	1897
症疾论		韩善徵	1897
经验各种种秘方辑要		王松堂	1898
经验奇方		周子芗	1898
六经感症要义		周　岩	1898
增订伤暑全书		张凤逵原著	1623
		叶　霖增订	1898
喉科种福		易　方	1899
痘疹心法		段希孟	1899
柳选四家医案		柳宝诒选评	1900
鼠疫约编		郑肖岩	1901
医学探骊集		康宿卿	1902
温病指南		娄　杰	1903
成方便读		张秉成	1904
太占瘠科要略	瘠科要略	黄维熊	1907
镐京直指医方	镐京直指	黄镐京	1907
女科指南		郑　璿	1908
疠科全书		梁希曾	1909
医学衷中参西录	衷中参西录	张锡纯	1909
千金珍秘方选		巢崇山	1909
烂喉丹痧方		未著撰人	1910
伏温症治实验谈		蒋壁山	1910
外科学讲义		刘吉人	1911
喉科金钥全书		袁仁贤	1911
秘传大麻风方		不　详	1911
眼科金镜		刘耀先	1911
秋疟指南		林天佑	1912
人己良方		唐世泰	1912
市隐庐医学杂著	医学杂著	王德森	1913
黄氏三世良方集		黄维熊	1915
通俗内科学		张拯滋	1916
中风斠诠		张山雷	1917
疡科纲要		张山雷	1917
喉科家训		刁步忠	1918
感证辑要		严鸿志	1919
女科证治约旨	女科证治	严鸿志	1920

喉科秘诀		黄真人	1922
谢利恒家用良方	家用良方	谢　观	1923
陈氏幼科秘诀	幼科秘诀	苏州世医陈氏传	1923
伤科方书		江考卿	1923
丁甘仁家传珍方		丁甘仁	1924
医学体用		王普耀	1924
少林寺伤科秘方	伤科秘方	少林寺僧	1924
治痢捷要新书	治痢捷要	丁国瑞	1924
吉人集验方		周吉人	1924
眼科纂要		黄　岩	1925
热病学		恽铁樵	1925
中国医学大辞典		谢　观	1926
鳞爪集		恽铁樵	1926
喉痧证治概要	喉痧证治	丁甘仁	1927
卒中厥证辑要		姚济苍	1928
药庵医学丛书		恽铁樵	1928
药衣启秘		许半龙	1928
汉药神效方	汉药神效	石原保秀	1929
家庭治病新书		张拯滋	1929
痧疫指迷		费养庄	1930
经验奇效良方		杨鹏先	1933
性病		茹十眉	1933
顾氏医径读本	顾氏医径	顾恩湛	1934
眼科菁华录	眼科菁华	康维恂	1935
增订胎产心法		阎纯玺原撰　沈　棪增订	1935
温热经解		沈　鳞	1936
丸散膏丹集成		郑显庭	1937
内外科百病验方大全	内外科百病验方	洪春圃	1938
中国麻风病学		俞慎初	1940
集成良方三百种		蓬莱山樵	1940
外科十三方考		张觉人	1947
秘传跌打损伤方	跌打损伤方	不　详	1949
医学碎金录		沈仲圭	1957
简明中医妇科学		南京中医学院妇科教研组	1958
中医外科学讲义		上海中医学院外科教研组	1960
北京市中药成方选集		北京市公共卫生局	1960
中医妇科治疗学		卓雨农	1961
全国中药成药处方集		冉小峰　胡长鸿	1962
眼科临证笔记		路际平	1963
谦斋医学讲稿		秦伯未	1964
中药制剂手册		中医研究院中药研究所	1964
外伤科学		广州中医学院	1974

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985

临证偶拾		张梅冀	1974
赵炳南临床经验集		北京市中医院	1974
刘奉五妇科经验		北京市中医院等	1976
中医皮肤病学简编		程运乾	1978
朱仁康临床经验集		中医研究院广安门医院	1978
中医妇科学		湖北中医学院	1979
临证录		杨作楫	1979
张皆春眼科证治		周奉建整理	1980
中医大辞典方剂分册		中医大辞典编辑委员会	1980
中药制剂汇编		曹春林	1981
慈禧光绪医方选议		陈可冀	1981
千家妙方		李文亮　齐　强等	1982
长寿药粥谱		王　水　陆仲灵等	1982
孟河四家医案		张元凯等	1984
中华人民共和国药典	中国药典	中华人民共和国药典委员会	1985
中医儿科学		江育仁	1985
中西医结合皮肤病学		边天羽　俞锡纯	1985