永樂大典

卷九百八十一

二支
一百二十八

南海康氏萬木草堂
寶藏康有為題 丸子二千
四百六十六年乙卯
七月二十四日

秘籍网 www.miji8.com

VE RI TAS
Harvard College Library

顧顧行先
陳白沙學規

永樂大典卷之九百八十一

兒 小兒證治十四

小兒慢脾風論

幼幼新書茅先生方小兒生下有中慢脾風候時時吐嘔頻咬齒手足掣瘛舌卷頭低兩眼上視先頭低而次第高此候久瀉痢而下冷藥只止瀉痢不治得脾虛弱藏腑乘虛故此所治先用匀氣散調一日後便下一醉膏通下後用治脾散夾鎮心丸建脾散常服之即令五硬如角弓風死候表裏便即宣利臟腑更使冷熱藥相通故小兒發搐眼不倒脾困極不醒手足不收此病但回陽腥脾調治方愈若更吐瀉必定損命事方治小兒有陽癇陰癇慢脾風三證皆搐搦上視陽癇者俗所謂急驚也陰癇者俗所謂慢驚也皆可隨證治之惟慢脾因吐瀉脾胃受風為難治雖得藥近世多用生附子及青州白丸子金液丹合用之如醒脾丸皆

是書藏北京物林院庚子亂散出昔立已秋
見之甲寅九月以八十金購回海內再世之寶也康有為

秘籍网 www.miji8.com

要藥也楊仁齋直指方慢脾風之候面青額汗舌短頭低眼合不開困睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不收或身冷或身温而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若療驚則無驚可療但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯然爾世所謂慢風難療者慢脾風是也然慢脾一名虛風凡小兒或吐或瀉之後面色虛黃大勢虛損若因虛而發熱繼此必得慢脾風纔見搖頭斜視以手摸人昏困喜睡額上汗多身亦粘汗其聲沉小而焦即是脾風之證不必皆由急慢風傳次而至又當識之治法大要生胃回陽黑附湯川烏散金液丹白丸子各半生附四君子湯可斟酌用胃氣漸復則異功散華温平而調理之如蝎附散陰癇散靈砂震靈等亦可參用若其眼半開半合手足不冷證候尚在慢驚則勿用回陽或已入慢脾而陽氣未甚脫者亦不可用硫黃附子凡服回陽湯劑手足漸煖者仍以醒脾散等繼其後以調之慢脾下痰輕者神保既濟丹白僵蠶丸重者辰砂膏甚則七寶妙砂矣慢驚慢脾逆忤證候諸藥不效者如有太衝脉則取百會穴灸之此治慢脾風之大要法也灸百會穴詳具于後慢脾身冷粘汗

秘籍网

www.miji7.com
www.miji8.com
www.miji9.com

扫码关注公众号

扫码添加微信

:1575389080

:13175635983

十万册、武、易、道、医、奇
等各类江湖失传秘籍和功法

直卧如尸喘嗽頭軟大小便不禁背強口噤頭搖者最難為力演山省翁活幼口議慢脾風候治法截要議曰慢脾風候即是慢驚風所傳元由吐瀉脾虛驚與風傳入故曰脾風謂其脾家受風若更逐風無風可逐若也退驚無驚可療但有療涎虛熱来去兒病至此所以難醫蓋由證與候驚與風傳經已極總歸虛處惟脾所受何故不曰胃風胃屬陽其病即傳陰臟故無胃候兒既尚有胃氣可以一向生胃無與回陽即漸甦醒若更一向攻擊驚風脾亦不受而又傳散諸經不可得而加藥若見眼合即是脾風宜服下項藥　議治慢脾風乃是不得已而設其疾危如燈無油漸見昏滅錢氏所用金液丹又青州白丸子各半細研和匀飯飲薄荷湯下一錢半錢許此乃截風回陽又一方以四君子湯加黑附子末四分之二腳手冰冷者用和對半生薑棗子煎與服此方古人用之豈不同常所較下項良方亦盡世之善也　議治慢驚慢脾須禁脳麝臟粉水銀粉霜之類及寒凉動臟腑等或以藥熱但不可用只宜回陽醒脾湯使與服議慢脾風候十箇孩兒九箇以艾灸之須當斟酌病候有已未脉絶之理若也一臟絶即不可用藥謂如眼無光指甲黑四肢垂彈五體俱冷並不可勉強下藥　議慢驚風候至於痰涎在膈之時諸臟皆虛喉中聲如拽鋸一二

秘籍网 www.miji8.com

日之間不散但只閉目此乃虛之盛也只是虛痰飽養其氣未有所知之者直便下去痰涎其兒隨時化去宜用下項妙砂丹服之乃良議嬰孩所患急驚慢驚慢脾三者皆由風痰所作以漸傳及未有初得病而便慢脾或急驚傳来或即吐瀉而得久利其氣虛脫而得傷寒表裏俱虛傳入陰證亦成慢候久嗽成癇亦傳慢候霍亂吐利亦傳慢候脾困久睡亦作慢候吐血亦傳慢候蠱積衝心亦傳慢候肝風筋急亦傳慢候大小便閉亦作慢候心虛煩燥亦作慢候煩渴引飲亦傳慢候腹肚疗痛亦傳慢候睡裏咬牙亦傳慢候日夜汗出亦傳慢候走馬疳急亦傳慢候諸般丹毒亦傳慢候龍帶纏腰亦傳慢候膀胱弔疝卵腫莖曲亦傳慢候莖曲陰莖勾曲四體浮腫亦傳慢候以上小兒所患諸疾皆能傳作慢驚風候由慢驚乃傳作慢脾脾氣既絕胃氣已盡無可得而治療故也　議嬰孩五臟易冷易熱易虛易實醫方並不治腑受病曰脾不病耳曰非也小兒在腑有疾自愈者有之在臟不可不治臟者陰屬腑者陽屬謂小兒先陰而後陽又曰小兒乃純陽之氣在腑則順在臟則逆故前賢皆理其臟未言治腑也又腎一臟常主虛不可攻療若有腎臟患但清心肺緣心與腎即既濟也肺與腎乃子母也無與腎藥及諸補藥若治腎臟即他病發生故戒止

不可療　議嬰孩慢候皆由臟虛陽虧陰盛應小兒所患臟病陽虛陰盛者無不入慢候而斃惟吐與瀉利與積致入慢候其證速也虛又速也宜用良方治法循其次第無不獲安然其慢驚慢脾無令速愈頓瘳之理既和且平更用調脾養胃萬萬不可過劑用冷熱湯藥若失之即吁哉幼幼

新書芽先生方　小兒受慢脾風歌　四肢逆冷體沉迷因宣吐瀉補還遲脾胃冷而涎擁肺心生毒熱面青時如此呼為慢脾候更加喘嗽不通醫

小兒形證論四十八候慢驚傳慢脾歌　慢脾只因傷取轉吐瀉虛涎脾胃存四肢逆冷頻頻嘔沉困難醒豈易明脣紅目閉手微搐病行心藏及脾神醫者鎮心為上法更開關竅細詳論莫令加喘頭先軟眼白濛濛命不存　此病是驚風傳入胃胃無有虛涎下大青丹一二服更將搐鼻散開關大青丹方見急驚風門搐鼻散方見本門次用醒脾散方見本門中又四十八候慢脾將死候歌　驚入風癇轉在脾直眠不動卧如尸搐搦已休牽掣定為他安好不生疑便通大小難收乳遍體如冰汗若泥瞑目不開長似睡睡中不覺赴幽期　又四十八候慢脾侵肺歌　慢脾多睡重重取吐瀉傳脾胃轉虛逆冷四肢多重困虛涎脾伏盛難除生風肺藏添邪擁任喚千聲氣不舒莫使目瞑無項軟十中難保一人甦湯民望嬰

秘籍网 www.miji8.com

孩妙訣總要吐瀉成虛風歌吐瀉才生便惡心胃虛脾弱汗相侵舌出唇緋雙眼閉搖頭髮直起如針膈悶氣脅兩脇動口生瘡白命難任未生此證宜先治有瘡胃閉命須沉又歌曰未發慢脾先要困睡中吐舌更搖頭吐妳作腥生氣息額頭千顆汗珠流睡裏多驚驚哭起面黃脉細最堪憂醒脾助胃成功効傷妳依前命也休吐後生驚歌曰吐乳從来胃氣實妳滿胃中生吐逆吐多遍身有風生驚邪本是從斯得吐定無過腦後温吐出妳来無變色先與定吐後祛風如此醫流無費力又歌曰慢脾之候脉微微舌白只睡難辯之或若搖頭并口噤萬中無有一能醫凡有此疾先用奪命散青州白丸末煎如稀糊入蚕調控下涎然後服祛風醒脾等藥經濟小兒保命方書慢脾風證歌脾風先要睡吐舌更搖頭面青毛髮直脚手曲如鉤吐妳腥臊氣千顆淚珠流表汗通腸効只恐瀉不休慢脾風證若是急驚傳来而尚有陽證其陽即斷不必回陽又不可治陽只可截風調胃均平陰陽可冷可熱可緩可急是也慢脾死證此病屬陰因吐瀉胃氣虛變成慢驚慢脾風四肢逆冷面色青黃沉困氣喘此是陰盛後了陽氣不舒脾胃空虛生涎肺藏受風氣胸膈脹滿此慢驚也不得下涼藥取吐先用發汗藥迴陽後下驚藥如加白癜

上眼睛若更氣急瀉下黑色嘔逆不治死候　慢驚慢脾二證歌　長呼多困面青黃喉乳痰生胃氣傷風盛涎多驚瘈瘲醒脾利膈藥為良　若有此等形證可下竹瀝散及通關梅花飲子兼與龍麝鵬砂膏小歸命散次與引氣調胃藥

方

茅先生方　活脾散治小兒慢脾驚風

羊糞二十一箇焙　丁香一百粒　胡椒五十粒

右為末每服半錢用多年東日照處壁土煎湯調下

醒脾散治小兒慢脾風

馬芹子　白殭蠶　丁香

右三味等分為末每服一錢用炙橘皮湯調下

一醉膏治小兒慢脾風

花蛇舅　蝎尾　天南星心　川烏臍

大附子側　蜈蚣蟲肚

右六味各半錢生用使棗肉五十箇用前藥研成一塊子以臍麝滴水和丸黍米大每一丸用薄荷自然汁磨化下後通下可服依形候

秘籍网 www.miji8.com

用一串藥子調理。

四十八候醒脾散方

天南星一箇去皮臍用朱砂入在南星臍內令滿以麵裹慢火炮令黃 白朮一分

右為末每服半錢更入麝少許煎冬瓜子湯調下如為丸以生葱涎丸如粟米大每服十丸鵝砂湯下後與調胃散方見積熟門中

四十八候擂鼻散

瓜蒂一錢 細辛一錢

右為末用半字吹入鼻中打噦噦下候眼開便將大青丹下積熱并下驚涎後調氣大青丹方見急慢驚風門

惠眼觀證沒石散慢脾候此藥醒脾

沒石子二箇 朱砂三錢 滑石研 白礬

丁香各二錢 半夏一兩 生薑三兩搥爛同浸水一椀將半夏擘碎又以水同煮乾取出以麵一錢乳鉢內搥爛搜作餅子炙熟為末

右為末每服半錢以冬瓜子煎湯調下不拘時候

劉氏家傳治小兒慢脾初生者皆可服其狀困睡不醒或啼不已

全蝎兩箇以竹針穿微火炙香熟末之　麝少許

朱砂　西壁土西昭父年者壁泥各半錢細研

右和勻乳汁調下一字二三歲已上量添至半錢或三字亦得又濃煎金銀湯調下又蜜湯亦得

胃虛餅子治小兒吐瀉後生風慢脾者多效久瀉者亦治

丁香五十粒　藿香葉秤一分　木香　韶粉

大附子炮各一棊子大一云各二錢

右為末攪勻生薑自然汁作餅子〇用麻燈盞內水煮軟化開服或要急用作散子入棗子一枚煎

羌活膏治小兒急慢驚風或因吐瀉後脾胃虛傳作慢脾之疾

羌活　獨活　人參　白茯苓

肉桂　木香　防風已上各三錢

水銀　硫黃　全蝎各二錢　金銀箔各三十片

真麝香一錢

右為細末蜜和為膏每服一黃豆大薄荷湯化下

秘籍网 www.miji8.com

張氏家傳醒脾去虛風

大附子一錢去皮臍炮　大全蝎七箇　大白附子三箇炮
天麻二錢

右件為細末每服半錢濃煎冬瓜子湯調下

鈎藤飲子治小兒因吐或瀉體虛發搐作慢脾魚口直視睡不醒眼目不開

鈎藤　防風　麝香　麻黄各一分去節用
蝎梢　蟬殼各半分

右為細末每服一字半錢一錢大小加減薄荷湯調入醋一滴調勻服如四梢厥逆入附子三兩片同水五分薄荷一葉煎二分熱服連進三二服或吐瀉體冷多睡用附子半錢炮去皮臍為末或作對散白朮一錢肉豆蔻一箇甘草炙一寸棗一箇水六分慢火煎至三分温二服作兩服體便暖只煎四君子湯加沉香橘皮喫五六分更喫暖驚藥三兩服乳母忌口不得再驚

莊氏家傳小續命丸治慢脾風

附子火一枚　硫黄棗許大　蝎梢七枚

右為末生薑麵糊丸黃米大量兒加減十丸至百丸治小兒久瀉尪羸尤妙

治慢脾極妙黑散子

乾薑半兩　甘草一分

右同於一甕合子內用火煅存性為末煅須恰好過則力太慢不及則性大烈每服一錢或半錢濃煎烏梅湯調下臨時更看男女大小加減服之須是目垂面白慢脾形候即與喫

孔氏家傳治小兒慢脾驚風

右以代赭石不拘多少細研水飛過研冬瓜仁湯調下量兒大小與半錢或一錢小兒因轉瀉後眼戴上三日不乳目睛通黃如金色氣將消絶止服三服全愈

王氏手集治小兒慢脾風萬安散方

厚朴去麤皮以水一盞煮盡後細切焙乾　乾蝎七箇尾梢全者每箇用大葉薄荷裹上用浸着黃麻纏了微以薑汁再浸以竹節上炙令表裏焦黃色

白朮湯浸半日切片子用密塗炙香黃色

朱砂各一分研　麻黃半分長直者以熱湯浸軟用

秘籍网 www.miji8.com

薑汁浸半日

右並擣羅極細再入乳鉢內與朱砂研千百遍每服半錢或一字煎金銀薄荷湯調下但小兒服藥後微汗出是效凡小兒欲作慢驚必先壯熱多睡頻吐若吐止即驚止吐不定作慢驚號為難治有此吐證以金液丹主之此方傳與人必不信但只與藥金液丹研開令細以滴水為丸黃米大用朱砂青黛為衣每服五十丸以上以下不濟事用米飲下定吐救生丹亦甚佳然有十三四不能止者此方百無一失若有雖止已成慢脾者萬安散救之亦無失者但費心力耳不然十有八九不救此二方不可具述千萬祕之非至誠好事者不可妄傳

吉氏家傳朱砂散治慢脾風

朱砂　天麻各一錢　殭蠶七箇　天南星一箇

白花蛇頂下肉一塊皂子大　麝少許　蜈蚣一條

右為細末每服一字薄荷湯下

活脾散治小兒脾困成慢脾風

天南星去皮　半夏　白附子各等分

右為末每服半錢一錢小者一字用冬瓜子七粒薄荷二片酒少許或入水少許同煎

朱氏家傳蝎梢膏治小兒久病後或吐瀉生驚轉成慢脾候

蝎梢不以多少為細末一兩用新好者

右用石榴一枚開作瓶子去子以無灰酒半盞調蝎末入石榴以蓋子蓋定坐文武火上時時攪動熬成膏子取出放冷每服一錢用金銀薄荷湯調下急驚勿服

治小兒慢脾風吐妳霍亂吐瀉

丁香一錢　藿香三分

右為末鍊蜜為丸如菜豆大每服三丸或大段吐瀉米飲下半錢

安師傳治小兒慢脾風藥方小兒衆醫不效用此藥全可

附子炮裂去臍　木香不見火　肉豆蔻煨　生硫黃用燒水同煮赤者不用其間夾石者須去

右等分為細末每用冬瓜子四十九粒水六合煎至三合入藥一錢再煎至一合為一服治身冷汗出至虛緩搐者

長沙醫者毛彬傳銀白散治小兒胃虛吐瀉煩渴成慢脾者

乾葛　人參去蘆　白茯苓　山藥
白豬苓各半兩半夏一分湯洗去滑薑製成餅炒黃
糯米一合淘洗薑汁浸一宿炒黃
右件同為細末每服二錢水八分生薑二片同煎六分溫服

長沙醫者鄭愈傳　醒脾散治小兒吐瀉脾虛生風已上二十二方出幼幼新書

藿香葉　人參　白茯苓各一錢　天南星一箇重七錢者去心入縮沙一錢丁香一錢在南星內上面却用星心末封口慢火煨熟切碎
右件為細末每服半錢入冬瓜子少許同煎至三五沸溫服

許叔微普濟本事方　醒脾丸治小兒脾風因吐利後虛困昏睡欲生風癎
厚朴　白术　舶上硫黃　天麻各半兩
全蝎　防風　人參　官桂各一分
右為末酒浸蒸餅和丸如鷄頭大每服一丸搥研溫米飲下

又方
全蝎二箇青薄荷葉包煨　白术指面大二塊

麻黃長五寸十箇去節

右細末二歲以下一字三歲以上半錢薄荷湯下量大小加減服

人參散治脾風多困

人參　冬瓜仁各半兩　天南星一兩切片用漿水薑汁煮存性

右細末每服一錢水半盞煎二三分溫服

蝎稍丸治小兒胎虛氣弱吐利生風昏困嗜卧或潮搐

全蝎微炒　白附子煨裂各半兩　通明硫黃一兩

半夏一兩切片薑汁製焙乾

右為末薑汁糊丸如麻子大每服三十粒荊芥湯下更看大小加減服

濟急捷用單方

萬靈散治小兒吐瀉變為慢脾風百療不能治者但覺纔吐瀉即與服

右用天南星可一兩者先築地為一深坑子可數寸深以炭火二三斤煅令地赤以酒一盞許沃之乘熱置天南星於坑中急以椀覆令密候冷取出為末以防風煎湯調一字或半字量兒大小虛實與服

極有殊効須得天南星破裂乃可用

李樸小兒保生要方羌活膏治小兒胃虛吐瀉生風

羌活　天麻　防風各半兩　人參
白茯苓　蝎酒炒　桂各二錢半　朱砂一錢研

水銀一錢　硫黃一錢重與水銀同研如泥

右先將八味為細末入水銀硫黃勻煉蜜為膏每服一皂子大用荊芥薄荷湯化下食前服更量度加減

楊倓家藏方銀白散治小兒吐瀉之後脾胃虛弱貪睡露睛漸生虛風

人參去蘆頭　白茯苓去皮　白朮
天麻　全蝎去毒微炒　白穞豆炒七味各一兩　山藥

甘草一分炙

右件㕮咀每服二錢水六分盞生薑一片棗一枚同煎至三分去滓溫服乳食空

醒脾散治小兒脾困昏睡面色青白內生虛風不進乳食

人參去蘆頭　白朮　白穞豆炒　白附子炮
天麻　酸棗仁生用已上六味各等分

右件為細末每服半錢煎生薑棗湯調下乳食前

湯民望嬰孩妙訣總要凡有此疾宜暫斷乳控令胃乾飢甚當用藥令乳母釀其妳與之十救一二釀乳法

人參　木香　藿香　沉香

橘皮　神麯　麥蘗　丁香減半餘各等分

右件㕮咀每服秤四錢水一椀薑十片紫蘇十葉棗三枚砂瓶內煮至半椀乳母食後揑去妳汁盡方澄服半盞許即仰卧霎時令藥入乳之絡次令兒喫數口不過飽此乃良法也嘔定一日了急宜截風

宜服八仙散兩日後醒脾方錄于後

八仙散方治虛風

天麻　白附子　防風去蘆

南星炮　半夏麯　花蛇肉　冬瓜子　全蝎各等分

加川烏尤妙

右件㕮咀每服一錢水半盞生薑二片煎至二分加棗子煎去滓有熱加薄荷

又方

真川烏一枚 生去皮臍　全蝎等分　人參二錢
甘草炙一錢

右四件細切分三服水二盞生薑二十片煎至半盞逐旋服

吉州傳醒脾散方用之累驗

白朮　人參去蘆　橘紅　甘草炙
白茯苓　全蝎已上各半兩　白附子炮

南星二枚炮　半夏麴一分　木香一分　倉陳米二百粒

右為細末每服一錢水半盞生薑二片棗子半枚煎至二分逐旋服之不可頓服之必吐

又方定吐

青州白丸子　金液丹各半貼五靈脂一錢　青皮末一錢

右四件一處和劑餅糊丸如黍米大湯加減送下

又方治脾風

附子炮一錢　蝎七枚　白附子三箇炮

南星炮二錢

右末每服半錢水三分盞生薑一片冬瓜子五粒擘破同煎至半分

盞大小加減

十便良方 溫白丸治小兒脾胃氣虛泄瀉瘦弱冷疳洞利及因吐瀉或久病後成慢驚身冷瘈瘲

天麻二分　白殭蠶　白附子　乾蝎

天南星各一分

右為末湯浸寒食麵和丸如菜荳大於寒食麵內養七日取出不瞅養亦得每服七丸漸加至三十丸空心薑米飲下即效

魏氏家藏 蝎附散治小兒吐瀉日久或大病後生風時發搐搦瞷目睛邪視手足瘈瘲胃悶昏塞身體強硬角弓反張史越王授大父文節

天南星一枚大者重二兩搥碎附子一枚重七錢搥碎

已上二味生薑四兩取汁及好酒一盞於銀石器中同煮令汁盡焙乾

白附子七枚炮　全蝎七枚炮　辰砂半兩別研　代赭石二兩火煅研細

右件為末麝香腦子少許煎薄荷湯調下不拘時候少時再進一服小兒身上有小紅班點出即驗也

醒脾散治小兒慢驚脾困及大患後全不進乳食

大天南星一兩每箇切作五六塊用生薑一兩切片厚朴一兩剉碎水三升煮令南星透揀去厚朴生薑只用南星薄切焙乾

冬瓜子一百二十粒鄭愈方用三十粒　白茯苓半兩去皮

右為細末每服一錢水半盞生薑一片煎三分温服或用蟬殼煎湯調下亦得

郭彌明方便集人參温脾散治慢脾風大治脾虛胃冷作吐瀉此藥極温調脾胃

人參　白茯苓　白朮炮　肉豆蔻麵煨

木香　黃芪剉　白附子　藿香

陳皮湯浸去白焙乾　白殭蠶直者佳　防風

羌活　冬瓜子仁微炒取仁　山藥

芎藭已上各半兩　北南星半兩每箇破作四分同醋塗黃土煮內一點黃豆大白為度洗出泥用　甘草一錢炙微赤

右為細末三歲兒每用一錢水一盞薑三片淮棗一箇煎至五分去滓温服不計時候量兒大小加減又宜服四君子湯

楊仁齋直指方黑附湯治慢脾風盛四肢厥冷生胃回陽

附子炮去皮三錢　木香一錢半　白附子一錢

甘草炙半錢

右剉散每服三字薑五片煎取其半以匙送下若手足煖而蘇省即止後劑

川烏散驅風回陽

真川烏生一分全蝎　木香各半分

右為末每服三字薑四片煎取其半旋滴入口中嘔吐者加丁香

金液丹方見痼冷類白丸子等分祛風回陽二藥為末每服半錢陳米飲調下

生附四君子湯助胃回陽四君子湯加生附子末四分之一厥逆者對加

每服半錢薑五片慢火熟煎以匙送下

蝎附散回陽氣豁風痰

全蝎七箇　附子炮二錢　南星炮　白附子炮

木香各一錢

右為末每服半錢薑四片慢火熟煎旋服

陰癇散祛風豁痰回陽正胃

白附子　黑附子　南星　半夏已上並生各一分半

右為末井水浸七日逐日換水浸訖控乾次入全蝎末二錢每服一字生薑湯調下

靈砂正胃回陽能止嘔吐温利痰涎但瀉者宜用為細末以少許米飲調下或用糕糊丸如粟米大兒兩三丸米飲灌下

震靈丹方見痼冷類治慢脾風吐瀉不止每服一丸研細入參南木香煎湯乘熱調下

已上諸藥温熱並乳食前服

神保既濟丹方見傳慢驚門

白僵蠶丸方傳慢脾陽氣未甚脫者可用亦能截風

牛膽釀南星二錢　全蝎悟　直僵蠶炒

錢子地龍乾　五靈脂各一錢

右為末水煮生半夏糊丸麻子大每服五丸薑湯下

辰砂膏治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐

黑附子一枚八錢重者去皮臍頂上刻一孔入辰砂末一錢重用附子末塞之以炭火三斤燒存性為度　南星炮半兩

白附子炮　川五靈脂　蝎梢各一分

右為末煉蜜丸桐子大每服一丸生薑汁泡湯調下

七寶妙砂丹利痰奇效慢驚慢脾通用須以木香佐之開元通寶錢背後上下有兩月片者其色淡黑頗小諸錢以一箇放鐵匙頭於炭火內燒少頃四圍上下各出黃白珠子將出候冷傾入盞中只作壹服南木香煎湯送下人參煎湯亦得

本事人參散治慢脾風神昏痰盛

人參半兩　丸白天南星一兩切片以生薑汁并煖水各半慢火煮帶性曬

右末每一錢水一盞薑三片冬瓜仁擂細少許同煎取半盞作兩三次灌下

木香湯治慢風慢脾得效

南星濕紙煨　白附子焙　天麻　木香

橘皮　白茯苓　石蓮肉各一分　黃耆

白朮　石菖蒲　甘草炙各半分

右為麤末每服半錢薑棗煎服

助胃膏治慢風吐瀉不進乳食

人參　白朮　石蓮肉各二錢　丁香

檀香　舶上茴香炒　白豆蔻　木香

甘草炙各一錢

右為末粟米糊丸桐子大每一丸陳米飲調下脾困不醒用冬瓜子仁煎湯下

沉附湯治慢脾風厥冷吐瀉

沉香　丁香　木香　黑附子炮

白附子焙　全蝎焙　藿香　天麻各等分

右為末每半錢炙甘草生薑煎湯調下身温則去附子

演山省翁活幼口議白殭蠶丸治嬰孩慢脾風候痰涎潮盛不化宜與此方

製半膳五味者一分

五靈脂川者　全蝎炒　白殭蠶去絲炒　錢子地龍

半夏末各一錢用生薑汁浸

右件為末水煮半夏末糊丸如麻子大每服三十丸煎金銀薄荷湯下　議曰脾家有風乃虛所致驚搐所由生也痰涎是故作也陰癇不暴其實駭醫若也意急投之衝烈愈見害重誠為不可所以禁却腦麝通利關竅之藥悉無利益治者所宜者令選用妙方頓以活人

白僵蠶丸一味去痰尤能截風既已傳入慢脾則風痰混致驚熱交臨醫工看候藥用當權未敢決之可否候未脫去陽者直宜與服之若陽虧陰盛至尼至急候變非常精神色脉駭於人情者當服下項良方

附硾丸治嬰孩小兒慢脾風候四肢冷厥服之尤佳

黑附子火二箇去皮生用　蝎梢七箇　熟硾黃末一錢匕

右件為細末生薑自然汁和丸如菜豆大每一歲二十丸米飲下

黑附湯治慢脾痰盛四肢逆冷

黑附子炮取末二錢重　白朮一錢　南星炮一錢

甘草炙　半夏各一錢湯洗七次

右㕮咀每服二錢水小小盞生薑三小片棗一箇煎至半去滓通口以匙挑與服所覺手足煖其候漸醒藥即止之

辰砂膏治嬰孩小兒慢驚風傳慢脾風候有冷痰在胸潮作不散此疾虛久不可頓下其兒搐緩昏困至重者宜服此方

大黑附子一箇八九錢重者去皮臍項上刻一孔入粉霜礬砂各半錢內在孔中用附末塞燒灰存性　天南星炮半兩

蝎梢　羌活各一分　朱砂半兩飛過

右為末以朱砂和勻煉蜜為丸雞頭子大每服一丸至兩丸煎金銀薄荷湯入酒五滴點化與服　議曰此三方皆用黑附子直不可執謂性熱兒在幼小疑與服之其兒患脾風腳手冷者有微有暴審其輕重輕即用湯盛即以丸重即以膏服之皆效須候手足煖腸氣回即為之快矣既以温煖更以醒脾正胃藥兼服除是慢驚傳入慢脾候方可與服之硫黃其功甚速又且逐風化痰醒脾正胃温煖臟腑補益腸胃奪命回陽省活危困至良至驗切不可倉皇妄投丸散或爾大過不及之時則致咎于後方宜孚受不至誣誕故也

七寶妙砂丹治嬰孩小兒慢驚風及慢脾候神情昏困胷上有虛痰不能得化不可服巴豆輕粉恐動臟腑只將神仙所留妙方與服其痰須吏自下良久神情已定眼目微開漸與温平藥調理胃氣兼順理驚風藥與服

勿更攻擊其方乃一文開元通寶銅錢其錢背上下有兩月子只有一箇月子者不用錢色淡黑頗小諸錢將錢頓鐵匙頭於炭火內燒霎時四維上下各出黃白珠子遍弦都是將出候冷傾放茶盞中入朱砂末少許只作一服煎金銀薄荷湯送下多收此錢准備緩急或先燒成珠子收拾亦得此方墜下小兒虛痰別無它作證候者用之乃保十全功效無可疑訝

錢樣 (一百)

議曰調治嬰孩小兒慢脾風候無過前件藥對證尅效須審慢脾已傳未傳之理其兒眼開未合尚在慢驚脚手不冷之時未可便與回陽且與七寶妙砂丹一二服眼合沉困陰證極盛者方可與服回陽凡服回陽醒脾湯劑手足漸煖仍與觀音全蝎散及醒脾散無服凡慢脾風候最為惡證只可全方調治雖曰緊急不得併雜用之泛泛不惟無益枉勞其功虛延其候閑養其疾此疾傳陰陰重病盛如燈無油只見次第脫去若不助陽生胃只知截風去驚兒疾轉見增重且兒陰證未至十分與藥加其寒涼攻得陰重陽虧難以救療若也失其陽氣隨陰而化所謂制之在始無在於末醫慢脾風證候如其所

述用藥猶可救治若鄙夫意見不同難以省活噓哉

備急纂要方 救小兒慢脾風及脾積炙方

黃連 草麻 乳香 各等分

右三味為末捻成餅子臍心內炙五七壯腹內響可治不響則難治也

又方 來復丹十四粒青州白丸子二十八粒硃砂一鷄頭大麝香當門子一箇

右研為細末燈子煮棗子二箇取肉為丸如蘿蔔子大每服三十丸

温熟水下量大小加減之

經濟小兒保命方書 治小兒嬰孩因驚而發吐瀉住後外證多睡眼慢不能開變成慢驚慢脾之候四稍微冷目睛碧色或因天弔急驚搐擲久則傳成慢候也若有前項形證宜便下竹瀝散

全蝎十四枚每箇用薄荷兩葉裹定以黃麻酒浸軟纏定用竹筯夾在火上炙令黃去索只用蝎 南星一箇重二錢研碎 用良薑一分青皮一分同南星炒令黃只用南星 辰砂一分 犀角一分 鐵粉好者二錢重 牛黃半錢 腦子 麝香各一字

右作末以磁合收之凡小兒有前項形證半歲一字一二歲半錢燒

竹瀝數滴湯荷湯放温温調匀灌下服此藥後目開四稍温煖可相夾保壽散赤霞散匀氣散白朮散與調理更下一二服通關梅花飲子龍麝鵬砂膏則疾自除不再作也

艾元英如宜方 全蝎散治因吐利成驚風胃虛神昏困乏搐搦欲成慢脾

黄耆炙　人參　天麻各二錢　木香
甘草炙　蓮肉製各一錢　稆豆炒二錢　茯苓一錢半
白芷　全蝎　防風　羌活各一錢

右㕮咀棗煎不拘時温服

孫氏仁存方 小来復丹治小兒慢脾驚風似搐而不搐此名瘈瘲似睡而四肢與口中氣温合睡露睛或啼哭如鴉聲此病得之於大病之餘吐瀉之後或誤取轉藥致脾胃虛損風邪乘之此證已危矣其脉過命關難治法當與通關竅進乳食為先 方在泄瀉類

太白再生丸治證如前

陽起石煨酒淬　生硃黄　南星　大附子炮去皮臍

右等分為末用蒸餅為丸如菜豆大陳米飲下五丸至七丸

丁沉散治證如前

丁香　沉香　人參　白茯苓
白朮炒　白稍豆炒

右等分為末每服半錢飯飲調下看大小加減

曾世榮活幼心書固真湯主吐瀉痢後胃虛脾慢四肢口鼻氣冷沉困不省人事

人參去蘆　附子湯浸炮裂去皮臍　白茯苓去皮
白朮四味各二錢半　山藥去黑皮　黃耆審水塗炙
肉桂去麤皮　甘草濕紙裹煨透四味各二錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空心溫服或無時

天麻飲治慢脾風搐不省人事

天麻明亮者　川烏炮裂去皮臍二味各半兩

右件咬咀每服二錢水一盞薑三片慢火煎若稀糊無時勤與溫服

危亦林得効方黑附湯治慢脾風面青額汗舌短頭低眼合不開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐不收或身冷或身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若療驚則無驚可

瘧但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯而然爾世所謂慢風難療者慢脾風是也

附子 炮去皮 三錢　木香 一錢半　白附子 一錢
甘草 炙 半錢

右剉散每服三錢水一盞生薑五片煎取一半以熩送下若手足暖而蘇者即止

川烏散驅風回陽

真川烏 生一分 全蝎 去毒　木香 各半分

右為末每服三字生薑四片煎取其半旋滴入口中嘔吐加丁香

金液丹青州白丸子祛風回陽理痰二藥等分為末每服半錢陳米飲調下 方見大方科痼冷類 青州白丸子 方見風科通治類

生附四君子湯助胃回陽

右以四君子湯加生附子末四分之一厥逆者對加每服半錢薑五片慢火熟煎以熩送下

蝎附散回陽氣豁風痰

全蝎 七箇去毒 附子 炮二錢　南星 炮　白附子 炮

木香各一錢

右剉散每服半錢水一盞生薑四片慢火熟煎旋服

靈砂正胃回陽能止嘔吐温利痰涎傷瀉者勿用研為末以少許米飲調下或米糕丸如粟米大小兒兩三丸米飲灌下方見大方科痼冷類

震靈丹治慢脾風吐瀉不止每服一丸研人參南木香煎湯乘熱調下

表當時大方 濟生散治吐瀉後壯熱多睡眼目上視時發驚悸手足瘈瘲成慢脾風庸醫輩妄呈銀粉下之頃時作定復作如故十無一存

厚朴去麤皮用甘草五寸拍破水二碗文火煮令水減半去甘草不用只用厚朴千木一錢

人參一兩　陳皮去白　五味　白术片切麩炙黃色一錢　紫苑

乾薑炮　甘草炙各半兩　杏仁各七錢半去皮尖雙仁　肉桂去麤皮

右為細末每服三錢水一盞生薑三片棗子一箇煎至七分食前温服

人參散治脾風多困

人參　冬瓜仁各半兩　南星一兩切片漿水薑汁煮存性

右為細末每服一錢沸湯調下

小兒慢肝風

論

幼幼新書治小兒形證論四十八候慢肝風歌孩兒眼澀羞明日舂不宣
亏夏不通秋被毒風傷肺得次傳肝腎別尋蹤先調五臟患方退退得肝
風便有功蓋為小兒元氣壯此名立號慢肝風　此病肺與肝相克見日
眼不開未出月有目腫者或出血者

方

甘膽湯四十八候慢肝風羞日目腫出血　甘草一截以豬膽塗炙

右為末每服半錢米泔調下

四十八候云又欲去血目澀不開方

蒼术不以多少入在膽中線縛定煮熟將藥氣衝眼後更嚼藥以汁
咽吐滓尤妙

小兒胎驚

論

和劑局方論小兒胎驚證胎驚風者因乳母觸冒寒暑邪氣傷入於胎中

生兒之後洗浴當風冷觸於臍邪氣不除變成胎驚之候百日之內頻頻煩躁啼哭無時目睛上視睡中搐搦或身冷頭面赤囊如青黃水者可與保生散每服一字薄荷乳汁調下更用琥珀丸調理乳母更用服和氣藥調理張渙醫方妙選謹按嬰兒在母胎中之時腑臟未具神氣微弱動靜喘息莫不隨母母有所動胎必感之母若調適失宜食飲不節喜怒不常坐卧當風遇酒房勞一切禁忌致生下兒形多怯弱頭顱開解或乳養失理洗浴當風則令兒壯熱吐哯心神不寧手足抽掣身體強直眼目反張此乃胎驚風病也飛仙論胎驚候說云凡母懷胎之日曾受驚氣傳入胎中致孩兒生下青紅色口唇時動夢裏多驚五心常熱顖門不合動多驚叫身體壯熱此胎驚候也楊仁齋直指方其有初生百日頻頻吐哯呵欠噴去睡裏多驚眼翻肚脹手足緩怠煩躁多啼者當作胎驚風裏之夫胎驚風以胎婦調適乖常飲酒嗜欲忿怒驚撲母有所觸胎必感之或外挾風邪有傷於胎故子乘母氣生下即病也其候月內溫壯翻眼握拳噤口咬牙身腰強直延潮嘔吐搐掣驚啼腮縮顖開或頰赤或面青眼合胎風眼合不可誤作慢脾妄用溫藥其有着噤撮口之類亦此一種之所發也視其眉間氣色紅赤鮮明者可治若黯黑青黑者不治虎口指紋曲入裏

者可治紋反出外者不治治法解散風邪利驚化涎調氣貼顖甚則以朱銀丸利之石壁經三十六種胎驚候歌　未出胎中一月來母驚成患子臨胎腰宜哭時先口撮面青拳搐縮雙腮眼閉咬牙筋脉急鳳髓經云眼閉膠生注云眼有睛此是受氣之時若陰氣弱則胎易驚而落也陽氣弱則胎難驚而落也陽弱則手足細肌肉瘦陰弱則肉稍甚然皆不能盡其天年若日月滿因驚而落者使口撮腮臉起如拳鼻多塞口噤不開甚不可作驚風醫先當微發汗次治驚調氣乳母當服調氣藥孩兒貼顖門去邪任喚千聲眼不開醫者見形須問母方知此患所從來退却風涎為治療涎去驚邪自不回失次則目瞑不開若先治驚則作吐或瀉在秋夏必作脾風始初見之亦不可作脾風治恐汗不出而作別候也鳳髓經歌括一同仍注云與烏犀膏次與生銀丸二方與玉訣同並見急慢驚風門中小兒形證論四十八候胎驚歌一同後說云此患在胎中時母受驚生下後二十五日發是也若不定或三十五日別日者不是胎驚醫人不識多作驚風悞矣目閉腰直腮縮拳握只與蜘蛛丸下涎方見一切癇門中或下半丸大青丹方見急慢驚風門中湯氏望嬰孩妙訣總要胎驚歌　纔出胎中一月來母驚成患子臨胎面青拳搐牙關緊腰直身強哭泣哀身

熱涎潮難得睡睛斜眼閉不忺開欲知病本源因母累及孩兒帶得來退熱鎮驚為妙手風涎墜下命須迴經濟小兒保命方書胎中驚憂懼胎中累受驚生来緣此病停心身肌軟弱唇乾縮戰慄多啼睡不寧臉鼻淡青無目碧印堂浮紫患將深靈丹次第安心府免致孩兒性命傾小兒胎中累受驚則心氣不足矣若有此候當用安神壓驚鎮心丸散撿方主之若有印堂浮紫痰涎吐沫上搐搦不時者皆為惡候也

方

顱顖經牛黃丸治小兒胎驚及癇或心熱

牛黃　龍齒　馬牙硝　鐵熁粉各一分

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每日乳食前熱水調破一丸灌下令母忌口

張渙醫方妙選聖星丹凡諸癇皆宜服之曾經大効

天南星揀四十九箇一般大者五月五日取活蝎四十九箇用瓦器內盛以鹽泥固濟弔於淨室中至臘日取出揀天南星蝎蜇着處有小竅子者其餘不用只將蝎蜇天南星以酒浸一宿焙乾碾為細末次用好辰州朱砂一分細研水飛真牛黃麝香龍腦各一

錢研細

右件再一處研拌勻用生薑汁和如梧桐子大每服一粒至二粒煎人參薄荷湯化下神驗

白金散治諸癇潮發不省者

好白殭蠶半兩揀淨湯洗炒微黃色搗羅為細末次用
天竺黃一分細研　真牛黃一錢　麝香

龍腦各半錢並細研

右件同拌勻每服半錢用生薑自然汁調放温灌之

烏金膏治胎癇潮發頻併

烏梢蛇一條水浸去皮骨酒浸一宿焙乾　蠶紙一張燒灰

蟬殼半兩　全蝎半兩

已上搗羅為細末次用

好朱砂半兩細研水飛　龍腦
金箔二十片細研　麝香各半錢細研

右件一處研勻煉蜜和成膏如皂皂大每服一粒煎人參薄荷湯化下

大一散凡胎癇病差亦宜常服
天漿子二十一箇乾者微炒　乾蝎梢二十一箇
防風半兩剉　天麻半兩
已上擣羅為細末次入
朱砂半兩細研水飛　麝香一錢細研
右件再研細每服半錢乳汁調下

天南星煎方治胎癇潮發遲省
天南星一兩微炮　白附子一兩　乾蝎半兩炒
白花蛇一兩酒浸去皮骨炙令黃　天麻半兩
已上擣羅為細末用好酒兩大盞攪令勻於慢火上熬不住手攪以
酒盡為度次入
好朱砂半兩細研水飛　臘粉一分　牛黃半錢
麝香半錢　龍腦半錢並細研
右件都入膏子內一處和看硬軟成膏如皂皂大每服一粒取竹瀝
化下不計時候
祛風散治胎癇多啼叫

胡黃連半兩取末　全蝎一分取細末
犀角一分屑取末　天竺黃一分別研

麻黃一分去節為末

右件都研令勻細每服半錢研入麝香一字乳汁調下

鐵粉散驚風或多面赤口乾大便不利尤宜服

鐵粉半兩研　真珠末一分別研　麝金一分研

胡黃連取末一分　牛黃一分研

右件拌勻研細每服一字溫蜜湯調下

羌活膏治胎癇昏困不省

羌活一兩　烏蛇肉一兩酒浸一宿焙乾　獨活一兩

天麻半兩　全蝎半兩　白殭蠶半兩微炒

人參半兩去蘆頭

右件擣羅為細末煉蜜和成膏每服一皂皂大用麝香荊芥湯化下

麝香膏治胎癇不得安卧

麝香一分研　牛黃一分　全蝎二十一箇取末

白附子一分取末　蠶蛾一分微炒取末

白殭蠶一分微炒取末

右件都拌勻研細煉蜜和膏如皂皂大每服一粒煎人參荊芥湯化下

銀珠丹治胎癇昏困涎盛

乾蝎一分微炒天漿子一分微炒露蜂房一分微炒

已上三味擣羅為細末次用

朱砂半兩細研水飛　水銀一分用黑鉛一分同結為砂子細研

牛黃一錢細研　麝香一錢細研

右件都一處拌勻研細用白麵糊和如黍米大每服五粒煎金銀薄荷湯下乳後

朱砂膏治胎驚

朱砂　粉霜　輕粉　水銀砂子各一錢

乳香　牙硝各半錢

右為末入麝香少許棗肉為膏如皂角子大前胡湯化下

幼幼新書孔氏家傳治小兒胎驚涎盛不飲乳

半夏一枚灰火內炮令黃色研令細生薑自然汁為丸如粟大乳

汁下一丸無時服

王氏手集 如聖消驚丸治新生兒在胎中之時其母宿挾驚憂喜怒舉動驚胎致兒生後常饒驚悸眠睡不穩精神恍惚搖頭上視溫壯多睡反折啼叫口眼相引

羚羊角屑　犀角末　麝香各一分　牛膽釀天南星四兩　天麻　人參　白茯苓各一兩

白殭蠶炒　全蝎炒各半兩　朱砂一兩三錢半　龍腦一錢

右件為細末煉蜜為丸一兩作八十丸一方加朱砂一兩牛黃一分每服一丸麝香湯化下兒小塗乳上令吮之常服磨一切驚癇右方載幼幼新書

湯氏望嬰孩妙訣總要 胎癇曰胎驚者兒在母腹中十相具足或妊婦驚怪攘撲失驚而心主血脉應之於胎故生下未滿月而發驚者是也初生嬰兒難以用藥凡有此候急取猪乳細研辰砂牛黃各少許調抹口中功効不可具述此法諸家方書並不曾載自余傳之始東宮吳觀察新得一子及一月病此因用之驗今已一周又入麝香當門子尤佳

又方胎癇驚風皆可服
全蝎頭尾全者用生薄荷葉裹外以麻線纏火上炙燥為度碾為末別研生朱麝香各少許煎麥門冬湯調下

楊仁齋直指方太一散治胎驚

天漿子去殼微炒　南星　白附子各微炮
天麻　防風　茯苓各二錢　全蝎
朱砂各一錢　麝少許
右為末每服半錢乳汁化下

參蝎散治胎驚定心神

天漿子　天竺黃　人參　朱砂
全蝎　天麻　蟬殼等分　麝少許
右為末煉蜜丸桐子大每服一丸金銀湯下

猪乳膏治胎驚最妙

琥珀　防風一錢　朱砂半錢
右為末猪乳調一字拭入口中

全蝎散治諸驚胎癇

全蝎一箇焙　琥珀　朱砂各少許
右為末每服一字麥門冬煎湯調下

獨活湯治胎驚發散風邪
羌活　獨活各一分　檳榔　天麻
麻黃去節　甘草炙半分
右剉散每服半錢水煎服於內加南星末蜜調可貼顖用

朱銀丸治胎風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之毒亦治驚積但量用之
水銀一錢蒸棗肉研加泥　白附子一錢半　蝎一錢
南星一分　朱砂一分　天麻子　牛黃
蘆會各半分　鉤藤　腦子一字
麝半錢　直僵蠶炒七箇
右為末粟米糊丸芥子大每一丸薄荷湯下如未通利加至二丸

千金龍膽湯治胎驚月中痰盛發熱凡臍風撮口壯熱皆可用
龍膽草　柴胡
北梗　赤芍藥　茯苓　黃芩　甘草炙各半兩

蜣螂二枚去翅足炙　大黃二分濕紙煨

右為末每服一錢北棗煎服或加防風麥門冬以導心熱黃芩減半用

朱麝散治胎風心熱痰壅

人參　牙硝　鐵粉各半分　麝少許　朱砂各一分　牛膽南星　天竺黃

右為末每服一字生薑薄荷湯調下

危亦林得効方治兒在胎中受驚故生未滿月而發驚

右用朱砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中入麝香當門子尤妙

小兒驚悸

論

太平聖惠方論曰夫小兒驚悸者由心藏壅熱為風邪所乘邪搏於心則令多驚不安驚不已則悸動不定也聖濟總錄論曰心藏神而惡熱小兒體性多熱若感風邪則風熱搏於府藏其氣鬱憤內乘于心令兒神志不寧故發為驚若驚甚不已則悸動不寧是為驚悸之病演山省翁活幼口議恐悸喘息議曰驚悸屬心喘息得同而言否愚曰非心主之若心所受

其疾不作喘發是知肝臟毫肺臟毫毫毫不安恐悸傷乎肝肺肺受其驚而受其喘須求水飲肝受其驚發喘細細若張口大喘者肝肺俱不利鎮心安神調氣定喘必未盡善當於損益毫毫丸散瀉心補肝立見功效所述疑難是請探賾毋蹶高志經濟小兒保命方書驚悸客忤證歌累累連驚恐心虛膽積憂額青浮碧色津液出唇流目上牙微噤脊背似搦潮安神無正胃早治自然瘳小兒驚悸客忤乃累遭驚撲氣虛而作也只是此證辨虛實檢方對藥調理若見四肢悚悶不止面色黑目上視無光涎流不收牙噤氣冷此證不治

方

外臺必效方鉤藤湯療小兒壯熱時氣驚悸并熱瘡出

鉤藤　人參　蚱蟬炙　子芩各一分

蛇蛻皮炙三寸　龍齒四分碎　防風　澤瀉各二分

石膏一兩碎　竹瀝三合

右十味切以水二升并竹瀝煎取七合細細服之以差為度

又方

茯神二分　蚱蟬炙二分　人參三分　鉤藤一分

牛黃兩大豆許研　杏仁十二枚去皮研
龍齒碎　麥門冬去心各四分　蛇蛻皮三寸炙末之
右九味切以水二升煎取六合去滓下牛黃末分六服消息服之令盡差

太平聖惠方茯神散治小兒心熱驚悸煩亂

茯神三分　龍齒半兩　寒水石一兩　川升麻三分
石膏一兩　麥門冬一兩去心焙　甘草半兩炙微赤剉
右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一兩沸量兒大小以意加減

人參散治小兒驚悸情思不安

人參半兩去蘆頭　麥門冬一兩去心焙
龍骨一兩　茯神三分　甘草半兩炙微赤剉
犀角屑半兩
右件藥搗麤羅為散每散一錢以水一小盞煎至五分去滓入地黃汁半合更煎一兩沸量兒大小以意加減温服

蚱蟬散治小兒風熱驚悸

蚱蟬半兩去翅足微炒　龍齒三分細研
麥門冬半兩去心焙　人參三分去蘆頭
鉤藤三分　牛黃二錢細研　杏仁二分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃
蛇蛻皮五寸燒灰

右件藥搗細羅為散入研了藥都研令勻每服以新汲水調下半錢量兒大小加減服之

遠志煎治小兒身體壯熱驚悸心神不寧宜安心神

遠志去心　羚羊角屑　茯神　甘草炙微赤剉
杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　紫苑洗去苗土
龍骨　防風去蘆頭已上各半兩　龍膽一分去蘆頭
蚱蟬一分去翅足　牛黃一分細研
麝香一分細研　川升麻三分　川大黃一兩剉微炒
酥三兩　蜜半斤

右件藥先研牛黃麝香二味為粉除酥蜜等二味麤搗用水三升入銀鍋內煎至半升以新綿濾去滓却入鍋內下牛黃麝香酥蜜等以柳篦不住手攪慢火熬如稠餳方止入瓷合內盛每服取兩豆許大

用温水調服日三四服量兒大小加減服之

鐵粉煎治小兒心熱多驚悸晝差夜甚象鬼神所著

鐵粉一兩　牛黃一分細研　菖蒲三分　酥三兩
犀角屑　人參去蘆頭　茯神　百合
防風去蘆頭　川大黃剉碎　青黛細研　細辛
遠志去心　芎藭　麻黃去根節　薯蕷
甘草炙微赤剉已上各半兩　蜜半斤

右件藥先麤搗諸藥用水三升入銀鍋中煎至半升以新綿濾去滓却入銀鍋內入研了藥及酥蜜以慢火熬不住手以柳篦攪如稠餳收於瓷合中每服以温水調二大豆許日三四服量兒大小加減服之

金泥煎治小兒心熱多驚悸

金薄七十五片　水銀一兩半　遠志一兩去心　菖蒲三分
龍膽三分去蘆頭　龍齒三分　人參三分去蘆頭
赤茯苓三分　青黛一分　酥四兩　麝香一分
虎睛一對微炙　牛黃一分　甘草一分炙微赤剉
蚱蟬三枚去足翅　蜜半斤　釣藤二分

右件藥水銀金薄同研如泥又別研麝香虎睛牛黃青黛四味如粉其餘藥搗篩為散入銀鍋中先以水二升文火煎取半升以新綿濾去滓再入鍋內下酥蜜及金泥并研了藥等慢火煎不住手以柳篦攪如稠餳入瓷合內盛每服取二大豆許以溫水調服日三四服量兒大小加減服之

天竺黃丸治小兒驚悸壯熱黃瘦不思乳食

天竺黃細研　黃連去鬚　柴胡去苗　羚羊角屑
蔓荊子　犀角屑　防風去蘆頭　子苓

川升麻　麥門冬去心焙　甘草炙微赤剉　玄參
白蒺藜微炒去刺　朱砂細研　木香已上各一分

龍腦細研　麝香細研　牛黃細研已上各一錢

右件藥搗羅為末與研了藥都研令勻煉蜜和丸如菜豆大每服以溫水化下五丸量兒大小以意加減

牛黃丸治小兒驚悸壯熱黃瘦髮豎

牛黃一錢細研　朱砂半兩細研水飛過　犀角屑
天竹黃細研　白附子炮裂　茯神　黃連去鬚

羚羊角屑　防風去蘆頭　玄參
甘菊花　人參去蘆頭　黃耆剉　枳殼麩炒微黃去瓤
黃芩已上各一分　甘草炙微赤剉

右件藥搗羅為末入研了藥都研令勻煉蜜和丸如菉豆大每服以淡竹葉湯研下五丸日三四服量兒大小加減服之

天竺黃丸治小兒壯熱驚悸不得眠睡

天竺黃細研　黃連去鬚　川大黃剉碎微炒
牡礪粉　黃芩　梔子仁　遠志去心已上各半兩

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如菉豆大每服以新汲水下五丸量兒大小加減服之

竹瀝磨犀角飲子治小兒心熱驚悸

竹瀝二合　犀角

右件藥將犀角於竹瀝內磨令濃量兒大小分減服之日三四服

靈苑方抱龍丸解一切熱化風痰治大人小兒風癇驚癎陽毒狂躁及心熱驚悸夜卧不安胷膈壅痰厥頭痛心神恍惚等疾翰林院方

天南星一斤生　朱砂細研水飛　紫石英研飛　白石英研飛
犀角鎉末各一兩　牛黃研　阿膠對碎炒如珠子
藿香　麝香研各半兩　金箔五十片　雄黃水磨通明者
四兩研

右件一十一味擣羅細研為末更入乳鉢內研如粉以黃牛膽四十五箇取汁和丸如櫻桃大每服一丸以鹽一捻和藥細嚼新水吞下如牛膽少以煎水相和諸疾服之心膈清涼如冰雪便覺精神爽快也

辰未虎睛丸壓驚悸鎮心藏無治小兒諸驚癇此方相温恭進過甚有功效
辰錦朱砂　白茯苓　黃芩　山梔子仁
人參各一兩　虎睛一對用人牛黃　腦麝
犀角屑各一分　釣藤　大黃用濕紙裹煨熟各四兩

右件一十二味並擣羅為細末以煉蜜為丸如雞頭肉子大每服一丸至二丸用金銀湯下人參湯亦得已上二方載幼幼新書

聖濟總錄紫金散治小兒驚悸不安
鐵粉　龍腦　石膏　牛黃並研如粉

甘草生用各一分

右五味先搗龍齒石膏為末與諸藥同研如粉每服半錢匕用淡竹瀝調服三四歲兒每服一錢匕日三服早晨午間日晚各一量兒大小以意加減

鉤藤湯治小兒壯熱時氣驚悸并熱瘡出

鉤藤一兩　人參一兩　蚱蟬微炙去翅足一兩
黃芩去黑心一兩　蛇蛻皮微炙令黃色三寸
龍齒研如粉一兩　防風去叉半兩　澤瀉半兩

右八味麤麤搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞入竹瀝半合石蜜少許同煎至四分去滓分温二服空心午後各一服更量兒大小以意加減

人參湯治小兒壯熱驚悸并熱瘡出

人參三分　茯神去木半兩　龍齒研如粉一兩
鉤藤一分　蚱蟬去足頭翅微炙二枚　麥門冬去心焙一兩
杏仁去雙人皮尖熬炒令熟一兩半　蛇蛻皮微炙令黃二寸

右八味麤麤搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞煎至三分去滓入牛黃

一豆許大分温二服空心午後各一量兒大小以意加減

牛黄散治小兒心熱驚悸

牛黄研一分　天竺黄研半兩　白茯苓去黒皮半兩　鉛白霜研半兩
玄明粉研一兩　人參半兩

右六味擣羅人參茯苓為末同牛黄等研為散一二歲兒每服半錢匕用薄荷湯調服三四歲兒每服一錢匕日三服早晨午間日晚各一量兒大小以意加減

大丹砂丸鎮心神凉咽膈壓驚悸退壯熱化風涎

丹砂研水飛過甘草炙　白茯苓去黒皮各二兩
人參一兩　馬牙消研一分　蓬砂研三錢　牛黄研半錢
龍腦研　麝香研各一錢

右九味擣研為末鍊蜜和丸如鷄頭大每服一丸用竹葉湯化下食後臨睡服大小以意加減之

丹砂丸治驚悸退壯熱止涎嗽利咽膈除眠睡不穩

丹砂二兩細研水飛　半夏湯洗七遍二兩
乳香研半錢　人參　白茯苓去黒皮各半兩

天南星炮裂一兩　牛黃研三錢　龍腦研一錢
右八味搗研為末用白麵糊和丸如麻子大三歲兒服十丸至十五丸不拘時用竹葉乳香湯下量兒大小加減

天竺黃散治小兒驚熱筋脉抽掣夜卧驚悸四肢煩熱

天竺黃研半兩　鬱金煨水煮一分　粉霜研一分
鉛白霜研一分　山梔子仁半兩
右五味搗研為散一二歲兒每服半錢匕用新汲水調服三四歲兒每服一錢匕日二早晨日晚各一更量兒大小以意加減

麥門冬湯治小兒虛熱驚悸睡中時叫

麥門冬去心焙一兩半　人參半兩　龍骨一兩
茯神去木三分　甘草炙一分　犀角屑半兩
右六味麄搗篩二一歲兒每服一錢匕水七分入生地黃汁少許同煎至四分去滓温服日三四服量兒大小以意加減

茯神湯治小兒風熱驚掣心忪恐悸

茯神去木一分　龍齒半兩　寒水石研一分　升麻三分
石膏研一兩　麥門冬去心焙三分

右六味麁擣篩一二歲兒每服一錢匕水七分入竹瀝少許煎至四分去滓温服日三夜一量兒大小以意加減

真珠丸治小兒風熱心神驚悸睡卧不安

真珠末　羌活去蘆頭　防風去叉　釣藤
龍膽　天竺黄研　升麻　牛黄各一分
茯神去木　人參　羚羊角屑　犀角屑各一兩
鉛霜　龍腦　麝香各一錢研

右一十五味擣研爲末鍊蜜丸如菜豆大每服用荆芥薄荷湯研下五丸日三四服常服化一切驚涎

大鎮心丸治小兒精神不爽寢寐多驚心忪恐悸四肢戰掉舉動欲倒狀類暗風或煩躁多啼退驚風化痰壯心氣益精神

生犀角鎊末一兩　羚羊角鎊末　龜甲鎊末
赤箭各半兩　牛黄研　茯神去木　遠志去心
真珠末研　人參　桂去麁皮　天竺黄研
蛇脫皮炙令焦黄　龍腦研各一分　鐵粉研一兩
麝香研　菖蒲各半兩　丹砂研半分　金薄研

銀薄 研
右一十九味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服一丸至二丸食後
臨卧薄荷湯化下更量大小加減

金薄丸治小兒驚悸眠睡不穩

金薄 四十九片　丹砂　水銀　臙粉 各半兩
麝香　牛黄　白僵蠶 直者炒　蟬殼 去土
天麻 酒浸一宿焙乾　白附子　乾蝎 去土炒
麻黄 去節　天南星 炮各一分　犀角末

右一十五味青黛已上七味研勻餘者搗羅為末同七味再細研用生蜜和勻成劑旋丸如梧桐子大每服一丸薄荷自然汁化下量兒大小加減

鄭端友全嬰方寧心膏治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭如人將捕眠睡驚魘常服鎮心除百病

人參　白朮　白茯苓　茯神
山藥　羌活　甘草 炙各一錢　朱砂 二錢
腦麝各一字

右為末煉蜜丸如鷄頭大二歲一丸薄荷湯化下

李樫小兒保生要方朱砂膏安神鎮心去痰熱小兒常用

人參　茯神　防風　山藥
甘草炙　黄耆蜜炙　麥門冬去心各半兩

朱砂六錢研　麝香半字

右為細末研勻煉蜜丸如櫻珠大金箔為衣每服半粒或一粒薄荷湯化下不拘時候

七寶丹治驚悸安睡去風

人參半兩　紫河車一分　白茯苓一分　龍齒一分
甘草一分炙　麝香一錢研

右同為細末煉蜜丸如雞頭大每服半丸薄荷湯化下不拘時候

楊倓家藏方百枝膏治小兒稟賦怯弱易感驚邪心神恍惚眠睡不安常服安心神壓驚悸

人參去蘆頭　防風去蘆頭　天麻三味各一兩
白附子炮　麥門冬湯浸去心焙乾秤　白僵蠶炒去絲嘴
羌活去蘆頭　石菖蒲五味各半兩　朱砂二錢別研

麝香一錢別研

右件為細末次入朱砂麝香研勻煉蜜為丸每一兩作四十丸每服一丸温荆芥湯化下食後臨卧

酸棗仁丸治小兒心神不安眠睡不穩常服壓驚邪寧眠睡

酸棗仁炒 人參去蘆頭 朱砂別研 乳香別研四味各二錢 白茯苓去皮 真珠末二味各一錢

右件為細末煉蜜為丸每一兩作四十丸每服一丸荆芥湯化下二歲以上兒服二丸食後

魏氏家藏方安神丸治小兒驚鎮心藏熱化痰涎小兒常服永無驚悸之疾

琥珀如無以茯神代之 人參去蘆 遠志去心 天麻 白附子炮 花蛇肉酒浸去骨 大川烏炮去皮臍 麻黄去節 羌活 南木香不見火 真珠末 蟬蛻洗去土并去白筋 全蝎生薑汁炙各半兩 白僵蠶直者炒去絲 金銀薄各三十片別研入 朱砂二錢別研

麝香一錢別研

右為細末煉蜜為丸如龍眼大朱砂為衣一丸作四服用薄荷湯下

治小兒鎮心壓驚墜涎

朱砂細研忽水飛過　白僵蠶炒去絲取直者洗淨用

白附子濕紙裹煨候冷取出切片　天南星炮乱去麤皮各半兩　麝香半錢別研　乾蝎一兩慢火炒令熟

右為細末麵糊為丸如粟米大每服十丸煎金銀薄荷湯下如遇驚取下痰涎後且以此藥服一二服無不効驗或有虛汗用麻黃根煎湯下

龍腦青金丸鎮心壓驚退潮熱治盜汗殺疳蟲療腹大鬠瀉痢安五臟益顏色治瘡疥長肌膚

腦麝一字別研　青黛別研　雄黃水飛別研　朱砂別研　胡黃連　蘆會　臘粉別研各一分

右為細末猪膽浸蒸餅為丸如菜豆大臘乾入麝臍內貯之每服二丸至三丸一切驚悸體熱瘡疥薄荷湯下一切疳氣瀉痢蟲蟲米飲下常服百病不生

辰砂安驚丸理風熱涎盛身體拘急睡中不穩鎮心止驚

天麻　甘草炙　白附子炮各一分

人參去蘆　防風去蘆　茯神去木各半兩

川芎二錢　朱砂二錢半留為衣子

右為細末煉蜜為丸如鷄頭大每服一丸至兩丸用薄荷荊芥湯下

大朱砂丸治小兒心氣不足不省人事多恐懼

朱砂別研　人參去蘆　石菖蒲　遠志去心

麥門冬去心　甘草炙　茯神去木各半兩

酸棗仁去皮炒別研　全蝎石灰炒去毒

杏仁去皮尖各一分　麝香少許別研

右為末煉蜜丸如鷄頭大每服半丸煎木香麥門冬湯化下

八物參朮丸平補心氣安神鎮驚除胷熱痰實

麥門冬去心　遠志去心　菖蒲

白茯苓去皮各一兩　白朮半兩炒　茯神去木

人參一兩去蘆頭

牛黃二錢別研

右同為細末次研入牛黃煉蜜丸如黍米以朱砂為衣每服二三十

丸熟水下

小定志丸治嬰孩稟賦不足心神睡卧不寧常服壓驚邪止夜啼

酸棗仁去皮炒　人參去蘆　白茯神各二錢去木
遠志去心水洗微炒一錢　乳香半錢別研

右為末煉蜜為丸如粟米大每服二十粒別研生朱砂為衣人參湯下

陳自明管見大全良方金箔鎮心丸治小兒風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴唇焦頰赤夜卧不安譫語狂妄

朱砂研飛一百兩　麝香五兩研　龍腦十兩
牙消枯過一十五兩　金箔一千二百片為衣
人參洗去苗　茯苓去皮　甘草各五十兩　山藥伯五十兩

煮河車用黑豆水煮軟切片焙乾二十五兩

右為細末煉蜜為丸每一兩半作五十丸以金箔為衣每服一丸薄荷湯化下含化亦得食後臨卧常服安心鎮神散邪熱涼咽膈止驚啼

五福化毒丹治小兒蘊積毒熱驚惕狂躁頰赤咽乾口熱生瘡夜卧不寧譫語煩渴頭面身體多生瘡癖

玄參洗焙　桔梗各六兩　茯苓去皮五兩　人參去蘆
牙硝枯過　青黛研各二兩　甘草剉炒一兩半
麝香研半錢　金銀箔各八片為衣
右為細末入研藥勻煉蜜為丸每兩作十二丸一歲兒一丸分四服
薄荷湯化下及瘡疹後餘毒上攻口齒涎血臭氣生地黃自然汁化
一丸用鷄翎掃在口內熱疳肌肉黃瘦雀目夜不見物陳粟米泔化
下食後臨卧服

楊仁齋直指方溫膽湯治驚悸煩痰

半夏製　枳實各二錢半　茯苓半兩　橘紅
甘草各一錢半　酸棗仁溫湯浸去殼二錢半
右剉散每服一錢入竹茹少許用薑棗煎服

定心丸治驚悸煩躁

北參　遠志薑製焙　伏神
犀角各一分　防風　朱砂一錢　麝香一字　天麻
右為末煉蜜丸皂子大金箔為衣每服一丸薄荷湯調下

御藥院方安神丹治小兒心神不寧困卧多睡及痰涎壅塞恍惚不定

朱砂　人參各二錢半　南乳香半兩　酸棗仁炒去皮一兩
遠志去心一錢半　用淨数

右五味為細末蜜丸如楝子大金箔為衣每服一丸人參湯下每兩作三十丸

丹砂鎮心丸治小兒心神不寧有時驚悸目睛偏視痰涎不利甚則瘈瘲服之安鎮心神罷驚止搐

朱砂一兩飛研　牛黃一錢　生龍腦　麝香各一錢
鉛白霜　天竺黃各二錢並細研　天麻明者二兩

人參　茯苓白者去黑皮　甘草炙各半兩

右一十味為細末與研藥同研勻細煉蜜丸如鷄頭實大每服一丸煎金銀薄荷湯化下

曾世榮活幼心書茯神湯治心氣不足虛而驚悸日常煩哭及嬰孩生下羸瘦多驚宜子母同服自然有效

茯神去皮木根一兩　人參去蘆　當歸去蘆尾酒洗
二味各半兩　甘草炙三錢

右件㕮咀每服二錢水一盞煎七分無時温服有微熱煩躁入麥門

冬去心同煎

表當時大方安神丸治上焦多熱驚悸不已

麥門冬各半兩去心　馬牙硝
乾山藥　寒水石　朱砂一兩　白茯苓去皮
龍腦一字　甘草

右為細末煉蜜丸如芡實大每服半丸砂糖水調下

永樂大典卷之九百八十一

pfMS Chinese 6
THE HOUGHTON LIBRARY
*61M-172 PF

重録總校官侍郎臣高拱

學士臣瞿景淳

分校官編修臣王希烈

書寫儒士臣宣鵠

圈點監生臣敖河

臣李纘文

表當時大方安神丹治上焦多熱驚悸不已

麥門冬各半兩去心
乾山藥
寒水石
朱砂一兩
甘草
白茯苓去皮
龍腦一字
右為細末蜜丸如芡實大每服半丸砂糖水調下

pfMS Chinese 6
THE HOUGHTON LIBRARY
*61M-172 PF

吾為敬雅堂藏抄本之圖書集成為清朝巨典之一初及於世以永樂大典中禁地人間所見自經庫子之外國余亟欲一睹而吾友雅堂必有以永樂原本抄之而實之歟 更生記