小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

广西中草药

第二册

广西中草药

R281.467
106

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

广西中草药

第二册

广西壮族自治区革命委员会
卫生管理服务站编

广西人民出版社出版

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

广西中草药

第二册

★


广西壮族自治区革命委员会
卫生管理服务站编

广西人民出版社出版
新华书店发行
广西民族印刷厂印刷

1970年10月第1版
1971年2月第2次印刷
书号 14113·2 定价：平0.50元 精0.70元

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



毛主席为延安中国医大题词(1941.7.7日)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

目　录

常用中草药选

一、解表药（适应感冒、流感、疟疾等疾病）

细叶香茶菜……2
细叶香薷……4
藿香……6
狭叶荠苎……8
紫苏……10
山香……12
露兜簕……14
蔓荆……16
兰香草……18
常山……20
粉葛……22
牡蒿……24

二、清热解毒药（适应各种炎症、热性病、中毒、痢疾、疔疮等疾病）

榄核莲……26
马蓝……28
刺黄连……30
阔叶十大功劳……32
钩藤……36
耳草……38
牛白藤……40
虎尾兰……42
毛大丁草……44
细叶鼠菊草……46

5／494　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茅莓 ……48
蛇莓 ……50
粗叶悬钩子 ……52
翻白草 ……54
水槟榔 ……56
余甘子 ……58
铁苋菜 ……60
铁扫帚 ……62
山豆根 ……64
红花鸡距草 ……66
鸦胆子 ……68
白蔹 ……70
金锦香 ……72
三筒管 ……74
紫草 ……76
野甘草 ……78
田字草 ……80
草决明 ……82
木棉 ……84
紫万年青 ……86
草龙 ……88
无根藤 ……90
杨梅 ……92
酸藤子 ……94
贯众 ……96
金古楼 ……98
黄藤 ……100

三、清热利湿药（适应急慢性肝炎、胆囊炎、急性肾炎、肠胃炎、白带等疾病）

红毛毡 ……102
圆叶马兜铃 ……104
黄牛木 ……106
蔊菜 ……108
相思藤 ……110
丁葵草 ……112
白背叶 ……114
阴行草 ……116

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鸡屎藤……118
排钱草……120
石榴……122
溪黄草……124
赛葵……126
蓝花柴胡……128
算盘子……130

四、化痰止咳药（适应急慢性气管炎、哮喘、肺结核、百日咳等疾病）

前胡……132
天南星……134
石橄榄……138
华凤仙……140
三十六荡……142
橄榄……144
木蝴蝶……146
灯笼草……148
小芸木……150
猪仔笠……152
石油菜……154
猫爪草……156

五、利水通淋药（适应各种水肿、尿路感染、泌尿系结石等疾病）

商陆……158
通草……160
岗松……162
过路黄……164
马蹄金……166
山扁豆……168
合萌……170

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

六、祛风除湿药（适应风湿骨痛、腰腿痛等疾病）

槟子藤……172
宽筋藤……174
铁带藤……176
血风藤……178
大血藤……180
四方藤……182
小叶买麻藤……184
小果蔷薇……186
姜黄……188
大高良姜……190
千年健……192
黑老虎……194
山药……198
木姜子……200
海桐皮……202
横经席……204
四块瓦……206
光叶海桐……208
铺地蜈蚣……210
威灵仙……212
竹叶艾……214
穿破石……216
半枫荷……218
臭茉莉……220
鹅掌柴……222
白桐树……224

七、止痛药（适应各种痛症）

毛药……226
通城虎……228
金耳环……230
乌药……232
阴香……234
竹叶椒……236

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

吴茱萸……238
石蟾蜍……240
华千金藤……242
石菖蒲……244

八、活血止血药（适应内外伤出血、月经不调、月经过多、血崩、吐血、衄血、便血、尿血等疾病）

田七……246
大叶紫珠……248
茜草……250
地榆……252
月季花……254
大蓟……256
落地生根……258
伽蓝菜……260
麻疯树……262
槐树……264
猫尾草……266
假烟叶……268

九、补益强壮药（适应病后虚弱、产后血虚、营养不良等疾病）

黄精……270
杜仲……272
狗脊……274
五加……276
三叶五加……278
羊乳……280
牛大力……282
锦鸡儿……284
三叶鸡血藤……286
黄花倒水莲……292
大叶千斤拔……294
板栗……296
杜仲藤……298

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十、健胃消滞药（适应消化不良、小儿疳积等疾病）

饿蚂蝗……300
霜坡虎……302
布渣叶……304

十一、跌打驳骨药（适应跌打、骨折、扭挫伤等疾病）

接骨金粟兰……306
接骨木……308
紫金牛……310
菜豆树……312
苏木……314
蝉翼藤……316
假茶辣……318
楮花……320
巴豆……322
博落回……324
美丽胡枝子……326
山小桔……328
盐肤木……330
飞龙掌血……332
姜叶三七……334

十二、汤火伤药（适应烧伤、汤伤等疾病）

酸枣……336
水枇杷……338
山竹子……340

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十三、蛇虫咬伤药（适应各种毒蛇、毒虫咬伤、黄蜂螫伤等）

寮刁竹……342
芸香……344
竹节蓼……346
望江南……348
香茶菜……350
齿叶泥花草……352
小叶三点金草……354
半枝莲……356
大叶半枝莲……358
狗脚迹……360
毛麝香……362

十四、拔毒止痒药（适应各种痈疮疔毒、疥癣、皮肤搔痒等疾病）

枫杨……364
铁海棠……366
落葵……368
茅瓜……370
火殃勒……374
白饭树……376
白花蛇舌草……378
苦参……380
黄药……382
雀梅藤……384
八角莲……386
木鳖子……388
仙人掌……390
黄葵……392
木菠萝……394
白粉藤……396
地丁……398
毛果算盘子……400
虎耳草……402
红背叶……404

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十五、其　他

枸骨……406
飞机草……408
黑草……410
华风车子……412

常见疾病
中草药防治处方选

一、疾病预防

感冒、流行性感冒 414
流行性脑脊
髓膜炎……414
流行性乙型脑炎…415
痢疾……415
麻疹……416
白喉……416
百日咳……416

二、内科疾病

感冒……417
流行性感冒……418
流行性乙型脑炎…418
伤寒……418
细菌性痢疾……419
阿米巴痢疾……420
急性传染性肝炎…420
慢性肝炎……421
疟疾……422
肺结核……422
支气管炎……423
肺脓疡……423

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

肺炎……424
急性胃肠炎……424
慢性胃炎……425
胃、十二指肠溃疡425
便秘……426
蛔虫病……426
急性肾炎……427
泌尿系感染……427
泌尿系结石……428
风湿性关节炎……428
贫血……429
高血压……430
神经衰弱……430
食物中毒……430

三、外科疾病

创伤出血……431
铁打扭伤……431
骨折……432
汤火伤……433
疮疡……433
急性乳腺炎……434
淋巴结核……435
阑尾炎……435
痔疮……436
脱肛……436
毒蛇咬伤……436
毒虫咬螫伤……437

四、妇科疾病

月经不调、痛经…438
闭经……438
月经过多……438
血崩……439
白带……439
妊娠呕吐……440
子宫脱垂……440
胎盘滞留……440

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五、小儿科疾病

小儿上呼吸道炎…441
白喉……441
百日咳……441
流行性腮腺炎……442
消化不良……442
小儿疳积……443
小儿臀红……444

六、五官科疾病

急性结膜炎……444
中耳炎……444
扁桃体炎、
咽喉炎……445
口腔炎……445
牙痛……446
鼻衄……446
骨卡喉……446

七、皮肤科疾病

湿疹……447
脓疱疮……448
过敏性皮炎……448
癣……448
荨麻疹……449

附　录

正名及别名索引 ……450
学名索引 ……467

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

毛主席语录

在生产斗争和科学实验范围内，人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。因此，人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

转摘自《周恩来总理在第三届全国人民代表大会第一次会议上的政府工作报告》。
一九六四年十二月三十一日《人民日报》

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一、解表药

（适应感冒、流感、疟疾等疾病）

1 细叶香茶菜

别名 三姐妹、三托艾。

识别 灌木或亚灌木，全株密被白色绒毛。茎方形，直立，有分枝。叶对生或三叶轮生，近无柄，长椭圆形至披针形，长 3—9 厘米，宽 1—3厘米，顶端渐尖，边缘有锯齿，上面毛较少，背面密被白色绒毛，叶脉明显。秋季开白花，唇形；聚伞花序集成圆锥花序状。果细小，三角形。

生长环境 生于山坡、旷野草丛中。

采集加工 药用全草。秋季采集，洗净阴干备用或鲜用。

性味功用 味微苦，性温。发散风寒，解毒消肿，止痛。

主治用法 流行性感冒，用五钱至一两，水

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

煎服。青蛇咬伤，肿胀疼痛，用一至二两，水煎冲酒服；外用鲜草适量，水煎洗患处。




图 1　细叶香茶菜(唇形科)
Plectranthus ternifolius D. Don

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

2 细叶香薷（华荠苧）

别名 土香薷、土香草、石艾。

识别 一年生草本，有浓厚的香气。茎纤细，近方形，多分枝，紫褐色，密被白色短绒毛。叶对生，线形至线状披针形，宽不及8毫米，顶端急尖，基部楔形，边近全缘，两面有白色短绒毛和橙红色腺点。秋季开小花，淡紫色，排成腋生或顶生的短穗状花序。果小，球形，有皱纹，褐色。

生长环境 生于山坡、旷野，亦有栽培。

采集加工 药用全草。夏秋采集，鲜用或阴干备用。

性味功用 味微辛，气香，性温。解毒清暑，疏风解表，宽胸理气。

主治用法 感冒暑热，急性肠胃炎，毒蛇咬伤，用三至五钱，水煎服。阴部湿疹，用全草煎水洗患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图 2　细叶香薷(唇形科)
Mosla chinensis Maxim.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

3 藿　香

别名　青茎薄荷。

识别　多年生直立草本，有香气。茎方形，淡红色，有腺点，稍被柔毛，分枝有节。叶对生，具柄，卵形至卵状心形，长2—9厘米，宽1—6厘米，顶端尾状渐尖，边缘有不整齐锯齿，上面散生腺点，背面被短柔毛。夏秋开花，淡紫红色，唇形；聚伞花序轮状排列，集成顶生总状花序。果卵状，棕黄色，顶端有短毛，基部有一小凸起。

生长环境　多为栽培。

采集加工　药用全草。秋季采集，略晒后阴干备用。

性味功用　味辛，气香，性微温。祛风解表，芳香化湿，和中止呕，消肿止痛。

主治用法　感冒发热，胸闷腹胀，呕吐腹泻，风湿骨痛，用三至五钱，水煎服。皮肤湿疹，搔痒，外用全草，煎水洗患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图 3　藿　香(唇形科)
Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

4 狭叶荠苨

别名 野荆芥、假荆芥、土荆芥。

识别 一年生草本，有浓烈的芳香气。茎直立，四方形，上部多分枝，暗绿色或紫红色，幼枝密被白色细毛。叶对生，具柄，长卵圆形至阔披针形，长1.5—4厘米，宽1—2厘米，顶端尖，基部阔楔形，边缘具小锯齿，两面绿色有腺点。夏季开小花，淡红紫色，唇形；总状花序长而顶生。果球形，暗棕色，表面有网纹。

生长环境 生于沟边、村边、路旁湿润草地。

采集加工 药用茎、叶。秋季采集，晒干备用。

性味功用 味辛，气香，性温。发散风寒，燥湿止痒，止血止痛。

主治用法 感冒风寒，用一至三钱，水煎服。热痱，湿疹，用鲜草适量，水煎熏洗患处。外伤出血，用鲜草捣烂敷患处。鼻出血，用鲜叶揉烂塞鼻孔。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图 4　狭叶荠苎(唇形科)
Orthodon lanceolatus (Benth.) Kudo

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

5 紫　苏

别名　红紫苏。

识别　一年生草本，全株有香气。茎方形，稍被毛，紫色或淡红色。叶对生，具长柄，卵圆形，顶端渐尖，基部近圆形，边缘有锯齿，上面绿色，背面紫色，或两面均为紫色，被疏柔毛。夏秋开花，淡红色或紫红色，为腋生或顶生的总状花序。果倒卵圆形，棕黄色或暗褐色，有皱纹。

生长环境　多为栽培，也有野生。

采集加工　药用全草。叶（紫苏），夏秋采集，切段阴干备用。种子（苏子），秋末成熟时，割取果枝，晒干后，抖下果实，簸去包壳，取净果备用。茎（苏梗），将晒取果实后的枝梗剔净丫枝，切片备用。

性味功用　味辛，气香，性温。叶，发散风寒，行气健胃，解鱼蟹毒。茎，理气宽胸，解郁安胎。子，降气平喘，祛痰止咳，温中开郁。

主治用法　伤风感冒，肠鸣腹胀，咳逆气喘，呕吐，鱼蟹中毒，用全草三至五钱，或用茎二至四钱，或用子一至二钱，水煎服。刀伤出血，毒虫咬伤，用鲜叶捣烂外敷患处。

附注　1.本品含紫苏醛、柠檬烃、蒎烯等。

2.白苏Perilla frutescens (L.)Britt.与本种相似，惟茎、叶绿色，香味较差。功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图 5　紫　苏(唇形科)
Perilla frutescens (L.) Britt. Var. Crispa (Thunb.) Decne.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

6 山　　香

别名　毛老虎。

识别　一年生草本，全株被毛，揉之有浓烈的香气。茎分枝，粗壮，直立。叶对生，卵形，长4—9厘米，茎上部的叶较小，顶端钝，基部近圆形或浅心形，边缘有小锯齿，两面绿色而被疏毛；叶柄长1—4厘米。秋季开花，蓝色，唇形，腋生，具柄，2—4朵排成总状花序或圆锥花序；花萼裂齿尖而直。

生长环境　多生于村边，路旁、旷野草地。

采集加工　药用全草。夏秋采集，阴干备用或鲜用。

性味功用　味辛苦，气香，性平。散瘀止痛，止血，祛风解表。

主治用法　跌打肿痛，刀伤出血，蜈蚣咬伤，用鲜叶捣烂敷患处。感冒发热，用二至四钱，水煎服，并用鲜草适量水煎洗身。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图 6　山　香(唇形科)
Hyptis suaveolens (L.) Poir.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

7 露兜簕

别名 野菠萝、假菠萝。

识别 直立、分枝、有刺灌木。幼时主茎不明显，茎有节，粗大。叶多数，聚生于枝顶，质坚硬，长披针形或线状披针形，顶端渐尖呈长尾状，边缘及背面中脉有钩刺。夏季开花，白色，密集呈肉穗状花序。果大，单生，椭圆形或球状，熟时黄红色，由多数小核果聚合而成，有短刺，形似菠萝，故称“假菠萝”。

生长环境 生于村边、路旁、山坡或海边。

采集加工 药用全株。根、叶全年可采，冬季采果。

性味功用 味甘淡，性凉。发汗解表，清热利尿，化痰止咳。

主治用法 感冒，肾炎水肿，用全草五钱至一两；感冒咳嗽，用果三至五钱，或用花一至三钱，水煎服。（本品有强烈发汗作用，用时宜注意）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图 7　露兜簕(露兜树科)
Pandanus tectorius Soland. ex Balf. f.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

8 蔓 荆

别名 蔓荆子、水稔子、白背杨。

识别 灌木，高约3米。茎直立或披散；幼枝近方形，老枝圆形，近无毛。叶对生，通常三出复叶，少有单叶，具柄；小叶通常倒卵形，长3—6.5厘米，宽2—4厘米，顶端微尖，基部阔楔形，全缘，两面被绒毛，上面绿色，背面灰白色，揉烂有香气。夏季开花，淡紫色，花萼密被灰色绒毛；叉状聚伞花序顶生。果球形，熟时黑色。

生长环境 生于山坡、路旁、海滨滩头灌木丛中。

采集加工 药用叶、果实。夏季采叶，秋季采果，晒干备用。

性味功用 味辛，气香，性平。驱风散热，止痛镇静。

主治用法 感冒风热，神经性头痛，眩晕，目痛，小儿惊搐，风湿骨痛，用果实一至三钱，水煎服。跌打肿痛，痈疮肿毒，外用鲜叶适量捣烂加酒热敷患处。

附注 单叶蔓荆 *Vitex rotundifolia L.* 的叶为单叶，与本品功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图 8　蔓　荆(马鞭草科)
Vitex trifolia L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

9 兰香草

别名 山薄荷、九层楼。

识别 直立小灌木。茎近圆形，密被灰色柔毛。叶对生，具短柄，矩圆形或卵状矩圆形，长2—5厘米，宽1.5—2.7厘米，顶端钝，基部近圆形，边缘有粗锯齿，两面密被灰色短柔毛，背面毛更密且有亮黄色腺点。夏季开蓝色小花，束生，具柄；聚伞花序，轮状排列于枝上部叶腋，常有九节，故称“九层楼”。果小，球形。

生长环境 生于山坡、旷野灌木丛中。

采集加工 药用全草。夏秋采集，鲜用或阴干备用。

性味功用 味辛，气香，性微温。祛风除湿，行气止痛，散瘀消肿。

主治用法 感冒发热，风湿骨痛，用三至五钱，水煎服。跌打肿痛，用鲜草适量捣烂外敷患处。湿疹，皮肤搔痒，用鲜草捣烂取汁外涂患处，或水煎洗患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图 9　兰香草(马鞭草科)
Caryopteris incana Miq.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

10 常　山

别名　黄常山、鸡骨常山、蜀漆。

识别　落叶灌木，高1—2米。根木质，圆柱形，表面黄棕色，断面黄色。茎无毛或幼嫩部微被柔毛。叶对生，具柄，椭圆形，倒卵状椭圆形或披针形，顶端渐尖，基部渐狭，边缘有小锯齿，两面无毛或有极少的小柔毛。夏季开蓝色小花，顶生及腋生圆锥状聚伞花序。浆果小，球形，熟时蓝色。

生长环境　生于山谷溪边林下。

采集加工　药用根（常山）及嫩枝、叶（蜀漆）。全年采根，洗净，除去须根，切片晒干备用。夏秋采嫩枝及叶，晒干备用。

性味功用　根味苦，性寒；嫩枝及叶味辛，性平。根、叶均有小毒。截疟，祛痰，清热。嫩枝及叶祛痰效力较强。

主治用法　各种疟疾及痰饮，用根或叶二至五钱，水煎服。

附注　本品含常山硷甲、乙、丙。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图10 常 山(绣球科)
Dichroa febrifuga Lour.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

11 粉　葛

别名　葛根。

识别　缠绕藤本。块根粗大，纺锤形，粉质。茎被黄褐色毛。羽状复叶互生，具长柄；小叶3枚，中间小叶卵状菱形，全缘或三裂，两侧小叶斜阔卵形，全缘或二裂，两面均被伏贴毛；托叶盾状着生，有毛；小托叶线状。秋季开花，腋生总状花序；花紫蓝色，蝶状。荚果线形，扁平，密被黄褐色长毛。

生长环境　多为栽培，也有野生。

采集加工　药用根（葛根）、花（葛花）。根，全年可采，但在冬、春季生长肥壮时采挖更好，洗净切片晒干备用。秋季采刚开的花或花苞，晒干备用。

性味功用　根味甘淡，性平。解表退热，生津止渴。花味甘，性平。退热解酒毒。

主治用法　热病初起、发热口渴、项背强，泄泻及痘疹初起未透，用根一至三钱，水煎服。酒醉，肠风下血，用花三至五钱，水煎服。

附注　另有一种野葛 Pueraria thunbergiana (S. et Z.) Benth. 亦称葛根，野生于山坡疏林中，形态相似。功用类同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图11　粉　葛(蝶形花科)
Pueraria thomsoni Benth.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

12 牡　蒿

别名　土柴胡、菊叶柴胡。

识别　多年生草本。茎直立，有分枝，无毛。基生叶丛生，匙形，长3.5—8厘米，宽0.3—0.8厘米；茎上部叶较小，楔状匙形，顶端分裂成牙齿状，基部渐狭，上面近无毛，背面被柔毛。夏秋开淡黄色花，头状花序卵圆形，组成顶生圆锥花序。果灰白色。

生长环境　生于路边、山坡、旷野草丛中。

采集加工　药用全草。夏秋采集，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用　味淡，气香，性平。发表祛风，行气散瘀，止痛。

主治用法　感冒发热，用三至五钱，水煎服。跌打损伤，刀伤出血，痈疮肿毒，用鲜草捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图12　牡　蒿(菊科)
Artemisia japonica Thunb.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

二、清热解毒药

（适应各种炎症、热性病、中毒、痢疾、疔疮等疾病）

13 榄 核 莲

别名 穿心莲、四方莲。

识别 一年生草本。茎直立，方形，绿色，多分枝，节膨大。叶对生，椭圆形或椭圆状披针形，宽不及2.5厘米，顶端渐尖或尾状，基部楔形，边缘有浅齿，两面绿色无毛。夏秋开白花；圆锥花序顶生或腋生。蒴果椭圆形，顶端尖，形似橄榄核状，长约1.6厘米，宽约4毫米，中间有纵沟。

生长环境 多为栽培，亦有野生。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净晒干备用或鲜用。

性味功用 味苦，性寒。清热解毒，消肿止痛，止血凉血，拔毒生肌。

主治用法 菌痢，胃肠炎，流感，流脑，肺炎，肺脓疡，腮腺炎，扁桃腺炎，喉炎，口腔炎，结膜炎，疮疡肿毒，毒蛇咬伤，用三至五钱，水煎服。外用适量，捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附注 1.本品含甙类、酚类、生物碱类、香精类及其衍生物。

2.本品对肺炎双球菌、溶血性链球菌有抑制作用。




图13 榄核莲(爵床科)
Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

14 马　蓝

别名　板蓝根、大青叶、大蓝、蓝靛、地蓝。

识别　多年生灌木状草本。根圆柱形，表面土黄褐色。茎直立，节膨大。叶对生，长椭圆形，顶端渐尖，基部楔形，边缘有浅锯齿，两面绿色，背面主脉稍被柔毛。冬季腋生穗状花序；花淡紫红色或淡紫色；苞片叶状，匙形。果倒披针形，具四稜。

生长环境　多为栽培，或野生于村边、路旁，山坡湿润地。

采集加工　药用根，叶。根（板蓝根），全年可采，洗净切片晒干备用；叶（大青叶），随用随采。

性味功用　味苦，性寒。凉血止血，清热解毒。

主治用法　乙脑，流感，流脑，肝炎，腮腺炎，咽喉炎，口腔炎，扁桃体炎，丹毒，毒蛇咬伤，用五钱至一两，水煎服。外用鲜叶适量，捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图14　马　蓝(爵床科)
Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

15 刺 黄 连

别名 三颗针、土黄连。

识别 落叶小灌木。茎直立；幼枝绿色，微有棱纹；老枝灰褐色，棱纹较深，断面鲜黄色，通常有刺3枚，居中者较长。叶生于刺腋内，新枝2—3枚聚生，老枝5—9枚簇生，卵圆形，先端钝或有小尖刺，全缘，边缘微显红色，叶背有时显红晕，带白色。春夏开黄花，总状花序。果圆形，红色。

生长环境 多生于山地灌木丛中。

采集加工 药用根、茎。夏秋采集，洗净，除去枝叶，切片晒干备用。

性味功用 味苦，性寒。清热解毒。

主治用法 细菌性痢疾，肠胃炎，咽喉炎，口腔炎，尿道炎，消化不良，用二至五钱，水煎服。急性结膜炎，疮疡溃烂，用五钱至一两，水煎洗患处。本品可预防流脑。

附注 本品含小檗碱，含量高达9%左右。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图15　刺黄连(小檗科)
Berberis virgetorum C. K. Schn.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

16 阔叶十大功劳

别名 土黄连、黄连树。

识别 常绿灌木，高达4米。茎表面土黄色或褐色，粗糙，断面黄色，味苦。奇数羽状复叶互生；小叶9—15枚，无柄，阔卵形或矩圆形，顶端渐尖有锐刺，基部多数截形而不对称，边缘每侧有2—5个刺齿，两面光滑，硬革质。夏季顶生直立总状花序，粗壮；花小，黄色，芳香。浆果卵圆形，熟时蓝黑色，外面有白粉。

生长环境 生于山坡或石山灌木丛中。

采集加工 药用根，茎。全年可采。洗净切片晒干备用。

性味功用 味苦，性寒。清热解毒，化痰止咳，健肠胃。

主治用法 痢疾，急性肠胃炎，肝炎，肺结核，急性结膜炎，用三至六钱，水煎服。外用适量。

附注 1.本品根、茎含小檗碱。

2.另一种光叶十大功劳 Mahonia shenii Chun 与本品功用基本相同。其识别特征为小叶全缘。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图16　阔叶十大功劳(小蘗科)
Mahonia bealei (Fort.) Carr.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附：细叶十大功劳

本品与阔叶十大功劳的功用基本相同。其形态区别点为奇数羽状复叶有7—13枚小叶，边缘每侧具5—15个刺齿。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图16－1　细叶十大功劳(小蘗科)
Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

17 钩　藤

别名　桂钩藤、孩儿茶、方钩藤。

识别　藤状灌木。枝褐色，四方形，具细纵棱，节上有钩1—2个；钩扁平，下弯，顶端尖，基部稍宽，紫红色。叶对生，具柄，椭圆形，顶端渐尖，基部近圆形，全缘，上面无毛，背面有短毛；托叶二纵裂，锥尖。夏季开花，淡黄绿色，管状；头状花序具长柄，单生于叶腋或顶生。果椭圆形，被柔毛，熟后二裂。

生长环境　生于山谷林下、溪边灌木丛中。

采集加工　药用带钩的茎。全年可采，以秋冬采较好，蒸熟晒干备用。

性味功用　味甘，性微寒。清热，镇痉，平肝，息风。

主治用法　高热抽搐，高血压，头晕，头痛，目眩，用二至五钱，水煎服。

附注　尚有类钩藤 Uncaria rhynchophylloides How和大叶钩藤Uncaria macrophylla Wall. 等，与本品功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图17 钩 藤(茜草科)
Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jackson

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

18 耳　草

别名　节节花、散血草。

识别　一年生草本，高达50厘米。茎近直立或平卧，平滑或粗糙；幼枝四棱形，被短毛。叶对生，卵形至椭圆状披针形，长3—7厘米，宽1—2厘米，顶端渐尖，基部楔形，上面粗糙，背面被柔毛；托叶膜质，顶端具长刺毛5—7条。夏秋开花，白色无柄，聚生于叶腋。果小，球形，不开裂，灰白色，被毛。

生长环境　生于村边、路旁、坡地草丛中。

采集加工　药用全草。全年可采，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用　味苦，性凉。清热解毒，凉血消肿。

主治用法　感冒发热，肺热咳嗽，喉痛，肠炎，痢疾，蛇咬伤，跌打损伤，痈疮肿毒，用二至五钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图18 耳 草(茜草科)
Oldenlandia auricularia (L.) F. Mueller

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

19 牛白藤

别名 脓见消、斑痧藤。

识别 多年生藤状灌木，高3—5米。茎有分枝，老枝圆柱形，幼枝四棱形。叶对生，具柄，卵形或卵状披针形，长4—10厘米，宽2—4厘米，顶端渐尖，基部近圆形或阔楔形，全缘，上面粗糙，背面被柔毛；托叶截头状，顶端有刺毛4—6条。秋季开小白花，密集成复伞形花序，腋生或顶生。果近球形，开裂，顶端突起。

生长环境 生于旷野、山坡、灌木丛中。

采集加工 药用全株。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味甘淡，性凉。清血，解毒，止咳。

主治用法 中暑，感冒咳嗽，胃肠炎，痔疮出血，用五钱至一两，水煎服。痈疮肿毒，用鲜叶捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图19　牛白藤(茜草科)
Oldenlandia hedyotidea (DC.) Hand.-Mazz.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

20 虎 尾 兰

别名 老虎尾。

识别 多年生草本。叶根生，通常2枚，或3—6枚成束，直立，厚肉质，狭长披针形，顶端有硬尖头，基部渐狭，全缘，边缘绿色，两面有绿白色和深绿色的斑纹。冬季开花，淡绿色或绿白色。果球形。

生长环境 多为栽培。

采集加工 药用叶。全年可采。

性味功用 味酸，性凉。清热解毒，去腐生肌。

主治用法 感冒咳嗽，支气管炎，跌打损伤，痈疮肿毒，毒蛇咬伤，用五钱至一两，水煎服。外用适量，捣烂敷患处。

附注 金边虎尾兰Sansevieria trifasciata Hort. ex Prain var. laurentii N. E. Brown 与本种相似，惟叶边缘为金黄色。功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图20　虎尾兰(龙舌兰科)
Sansevieria trifasciata Hort. ex Prain

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

21 毛大丁草

别名 一枝花、一枝香、白眉。

识别 多年生草本。根细长，黄白色。叶根生，具柄，通常4—6枚，椭圆形或短圆形，长5—8厘米，宽2—5厘米，顶端近圆形，基部阔楔形，全缘，上面绿色，背面密被灰白色长绵毛。春季开花，淡红色；头状花序具长柄，柄被柔毛。

生长环境 生于山坡、旷野、村边草丛中。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净晒干备用，或鲜用。

性味功用 味苦，性凉。清热解毒，消滞化痰，凉血散瘀。

主治用法 感冒发热，咳嗽痰多，小儿食滞，痢疾，用二至五钱，水煎服。跌打肿痛，毒蛇咬伤，疔疮肿毒，用鲜草捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一九七一年一月十八日　勐




图21　毛大丁草(菊科)
Gerbera piloselloides Cass.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

22 细叶鼠菊草

别名 神仙眼镜草，天青地白。

识别 多年生草本，高不及25厘米。茎细弱，被白色绵毛，基部稍倾斜。基生叶丛生，线状倒披针形，长3—8厘米，宽2—6毫米，顶端钝，全缘，上面亮绿色，散生绵毛，背面密被白色绵毛；茎生叶较小，互生，无柄，线状披针形。秋冬开黄花，头状花序聚生于茎顶。果椭圆形，顶端有毛。

生长环境 生于路旁、旷野、旱田中。

采集加工 药用全草。夏秋采集，洗净晒干备用，或鲜用。

性味功用 味甘淡，性平。清肝明目，消炎，止血，利尿。

主治用法 结膜炎，感冒发热，喉炎，尿道炎，小便出血，扁桃腺炎，用三至五钱，水煎服。痈疮红肿，用鲜草捣烂敷患处。

附注 尚有鼠菊草 Gnaphalium multiceps Wall. 其叶两面密被白色绵毛，花金黄色。功用相似。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图22　细叶鼠菊草(菊科)
Gnaphalium japonicum Thunb.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

23 茅　莓

别名　拦路蛇、三月泡、野鸡泡。

识别　落叶藤状灌木；枝及叶柄密被柔毛，有小钩刺。羽状复叶互生；小叶3枚，有时5枚，卵圆形，边缘有缺刻，顶端一枚较大，上面绿色无毛或有疏毛，背面密被灰白色绒毛；托叶2枚，线形。春季枝顶或叶腋开粉红色花，花柄及花萼上有小刺。果球形，由多数小核果聚合而成，熟时红色，肉质，味酸甜，基部有花萼。

生长环境　生于村边、路旁、旷野灌木丛中或草丛中。

采集加工　药用全草。全年可采，切片晒干备用。

性味功用　根味苦，性平；茎、叶味淡涩，性凉。散瘀，止痛，凉血，清热。

主治用法　跌打损伤，产后瘀痛，感冒发热，咳嗽，痢疾，尿道炎，结膜炎，牙痛，湿疹，疮疖，用五钱至一两，水煎服。外用适量，煎水洗或捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图23 茅 莓(蔷薇科)
Rubus parvifolius L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

24 蛇　莓

别名　地杨梅、落地杨梅。

识别　多年生葡卜草本，全株有毛。掌状复叶互生，有托叶；茎下部叶具长柄，上部叶柄渐短；小叶通常3枚，少数5枚，无柄或具短柄，倒卵形，上部边缘有粗齿，基部楔形而全缘。春季开黄色小花，单生于叶腋。果半球形，由多数小瘦果聚合而成。熟时鲜红色，状似杨梅果，故称“地杨梅”。基部尚存花萼。

生长环境　生于田边、沟边、溪边湿润地。

采集加工　药用全草。夏秋采集，鲜用或晒干备用。

性味功用　味甘淡，性凉，有小毒。清热解毒，止血，除湿消肿。

主治用法　疟疾，痢疾，黄疸，用五钱至一两，水煎服。疔毒疮疡，蛇虫咬伤，用鲜草适量捣烂敷患处。

附注　本品捣碎，加水20倍浸两日后，可用于杀灭孑孓和蝇蛆。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图24　蛇　莓(蔷薇科)
Duchesnea indica (Andr.) Focke

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

25 粗叶悬钩子

别名 八月泡、牛尾泡、大𣏌坛。

识别 藤状灌木，全株密被锈色绒毛，枝及叶柄有小钩刺。叶互生，近圆形，边缘3—7裂，裂片顶端钝圆或急尖，叶基部浅心形，上面粗糙，通常有小瘤状突起，疏生粗毛，背面密被灰白色绒毛。夏秋开小白花，成顶生及腋生圆锥花序或总状花序，少数为腋生头状花束。果球形，由多数小核果聚合而成，熟时鲜红色，肉质，味微甜。

生长环境 生于山坡、路旁、旷野灌木丛中。

采集加工 药用根、叶。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用 味甘淡，性平。清热，消肿，止血，散瘀。

主治用法 肝炎，肝脾肿大，口腔炎，乳腺炎，用五钱至一两，水煎服。外伤出血，用叶研粉撒患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图25　粗叶悬钩子(蔷薇科)
Rubus alceaefolius Poir.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

26 翻白草

别名 天青地白、白头翁、鸡爪风、金线吊葫芦。

识别 多年生草本，全株被白色绵毛。根有分枝，纺锤形，表面暗褐色，断面粉白色。茎细弱，斜升。基生羽状复叶具长柄，小叶5—9枚，茎生三出复叶近无柄；小叶长圆形或狭长圆形，边缘有锯齿，上面绿色，背面白色，故称“天青地白”。春夏开黄花。瘦果小，多数，淡黄色，外围有花萼。

生长环境 生于山坡、路旁草丛中。

采集加工 药用根。秋季挖取，洗净切片晒干备用。

性味功用 味甘微苦，性平。清热解毒，凉血止血。

主治用法 疟疾，阿米巴痢疾，吐血，鼻衄，子宫出血，痛经，用二至三钱，水煎服。本品有人用于预防白喉。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图26　翻白草(蔷薇科)
Potentilla discolor Bunge

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

27 水 槟 榔

别名 屈头鸡。

识别 常绿攀援状灌木。幼枝密生棕褐色短毛；老枝褐色，光滑。叶互生，矩圆形，顶端短尖，全缘，通常两面无毛；叶柄基部有短刺2枚，下弯，骨质。春末夏初开黄花。果球形，成熟时黄红色，表面有不规则纵皱突起，内有黄白色或腥红色种子数粒，干后红棕色至灰黄色，形似鸡头，故称“屈头鸡”。

生长环境 生于深山脚或山沟湿润处。

采集加工 药用种仁。秋季果实褐色时采收，破开取出种仁，洗去假种皮，晒干备用。

性味功用 味甘，微苦，性凉。清热，消食，生津止渴。

主治用法 喉头炎，暑热口渴，用二至三粒嚼烂，含咽药液。食滞胀满，用一至三钱，水煎服。

附注 马槟榔 Capparis masaikai Levl. 果实表面粗糙，无纵皱突起，熟时黄色，种子表面为暗灰褐色。也有生津止渴的功用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图27　水槟榔(白花菜科)
Capparis pterocarpa Chun

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

28 余甘子

别名 喉甘子、牛甘果。

识别 灌木或小乔木。叶革质，线状矩圆形，长不超过2厘米，互生于纤细的小枝上，排成二列，几无柄，极似羽状。春季开小黄花，数朵簇生于叶腋。果球形，肉质，淡黄色，光亮，味初酸涩苦，后渐变甘，故有“余甘子”之称。

生长环境 生于山坡，旷野灌木丛中。

采集加工 药用果、根、叶。根全年可采，夏秋采叶，晒干备用。秋季采果，晒干或以开水汤透，也可用盐水浸后晒干备用。

性味功用 果，味苦涩，微甘，性凉。清热解毒，生津消滞。根、叶，味淡涩，性平。解郁定痛，清湿热。

主治用法 喉头炎，暑热口渴，风火牙痛，用鲜果或盐渍果五至七粒，嚼食。高血压，支气管炎，胃炎，用根五钱至一两，水煎服。皮肤湿疹，蜈蚣咬伤，用鲜叶或树皮适量，捣烂取汁涂患处。

附注 根有降压作用；鲜果富含维生素丙，可用于坏血病。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图28　余甘子(大戟科)
Phyllanthus emblica L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

29 铁苋菜

别名 含珠草、叶里藏珠、海蚌含珠。

识别 一年生草本。茎直立，被白色柔毛。叶互生，具长柄，卵状菱形或卵状椭圆形，顶端钝或尖，基部圆形或阔楔形，边缘有浅锯齿。夏季开花，花极小，排成腋生的穗状花序；花序基部有一叶片状苞片，闭合时如蚌壳，结果时将果实包藏，故称“海蚌含珠”。蒴果近球形，有三钝角，被毛。

生长环境 生于路边、旷野湿润处。

采集加工 药用全草。夏季采集，洗净晒干备用或鲜用。

性味功用 味苦涩，性凉。清热解毒，利湿止血。

主治用法 痢疾，肠炎，吐血，衄血，血淋，用一至二两，水煎服。

附注 本品含铁苋菜碱。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图29　铁苋菜(大戟科)
Acalypha australis L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

30 铁扫帚

别名 蛇脚草、鱼串草。

识别 草本，基部木质，上部分枝，微被柔毛。羽状复叶互生，有托叶；小叶3枚，线状楔形，顶端截形或钝，有小尖头，全缘，上面通常无毛，背面被灰色伏贴毛。秋季开花，1—4朵簇生于叶腋；花小，黄白色，有紫纹，蝶状。荚果卵圆形，褐色，内含1枚种子。

生长环境 生于村边、路旁、旷野草丛中或疏林下。

采集加工 药用全草。全年可采，晒干备用。

性味功用 味甘涩，性凉。清热解毒，去湿杀虫。

主治用法 痢疾，腹泻，尿路结石，小儿疳积，蛇咬伤，用一至二两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图30　铁扫帚(蝶形花科)
Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

31 山豆根（柔枝槐）

识别 灌木，多分枝，嫩枝密被柔毛。根黄褐色，味极苦。奇数羽状复叶互生；小叶11—21枚，对生，卵形、卵状披针形或椭圆形，顶端尖或钝，基部圆形，全缘，上面疏生伏贴毛或无毛，背面及叶轴密被黄褐色伏贴毛。初夏顶生及腋生总状花序，被毛；花淡黄色，蝶状。荚果念珠状。

生长环境 生于石山脚及石隙中。

采集加工 药用根。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味苦，性寒。清热解毒，利咽喉，

主治用法 咽喉肿痛，肺热咳嗽，用三至五钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图31　山豆根(蝶形花科)
Sophora subprostrata Chun et T. Chen

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

32 红花鸡距草

别名 护心胆。

识别 草本，高25—40厘米。地下块茎球形，如指头大，表面黑色。茎绿色或褐红色，有细条纹。叶为二回羽状复叶，每小叶3—5浅裂，略似芹菜叶。春季开紫红色花，花瓣一端唇形，一端延长成尾状，排列成总状花序。蒴果线状长圆形。

生长环境 多生于石山的石缝中。

采集加工 药用全草。春夏采集，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味苦，性寒，有小毒。消炎解毒，消肿止痛。

主治用法 痈疮肿毒，目赤肿痛，毒虫、毒蛇咬伤，用鲜草捣烂敷患处。胃热痛，用块根一至二钱，嚼服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图32　红花鸡距草(紫堇科)
Corydalis suaveolens Hance

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

33 鸦胆子

别名 老鸦胆、小苦楝。

识别 灌木或小乔木，全株密被淡黄色柔毛；树皮味苦。奇数羽状复叶互生；小叶5—11枚，对生，卵形至卵状披针形，顶端渐尖，基部阔楔形，略不对称，边缘有粗锯齿。夏季开暗紫色小花，腋生圆锥花序。核果椭圆形，黑色，有网纹，味极苦。

生长环境 生于村边、路旁或旷野。

采集加工 药用果仁、根。果，秋冬采集，晒干，用时去壳取仁（不要破碎）。根，全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用 味苦，性寒。清热燥湿，杀虫。

主治用法 阿米巴痢疾，用果仁十粒，入桂圆肉内吞服，日二次，一周为一疗程。疟疾，果仁十粒，按上法吞服，日三次，第三日后减半量，连服五日，或用根五钱，水煎服。鸡眼，用胶布一小块，剪一小洞眼，外贴患处周围健康皮肤，露出鸡眼部位，果仁捣烂敷之，包扎固定，连用数日。早期血吸虫病，果仁十粒，日二次，连服四、五天。（孕妇和小儿慎用）

附注 1.本品果含鸦胆子素甲、乙、丙及鸦胆子甙。叶捣烂可杀蝇蛆和孑孓。

2.个别地区以牛耳枫 Daphniphyllum

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

calycinum Benth. 误作本品，其叶全缘，长卵圆形，背面粉绿色；核果被白粉；味微苦，可以识别。



图33　鸦胆子(苦木科)
Brucea javanica (L.) Merr.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

34 白　蔹

别名　九牛薯、九莲灯、铁老鼠。

识别　藤本。块根卵形或纺锤形，表面易破裂，淡棕色至深棕色，断面粉白色。茎有点状皮孔，小枝有细条纹，无毛，淡紫色。卷须与叶对生；掌状复叶互生，具柄，有小叶3—5枚；小叶片羽状分裂或羽状缺刻；裂片卵形或椭圆状卵形，顶端渐尖，基部楔形，边缘有锯齿或缺刻，两面绿色无毛。夏季开淡黄绿色小花，聚伞花序与叶对生，花序柄长达5厘米，缠绕状。浆果球形，蓝色。

生长环境　生于山坡、旷野、攀援于灌木上。

采集加工　药用根。春、秋采挖，洗净切片晒干备用。

性味功用　味苦，性凉。清火解毒，生肌止痛。

主治用法　疔疮痈肿，淋巴结炎，痔漏，赤白带，汤火伤，用一钱五分至三钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图34　白　蔹(葡萄科)
Ampelopsis japonica (Thunb.) Mak.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

35 金 锦 香

别名 细叶金香炉、仰天钟、独脚地稔。

识别 多年生草本，高30—60厘米。茎直立，少分枝，四棱形，有伏贴的粗毛。叶对生，披针形，长2—5厘米，有纵脉3—5条，两面被伏贴粗毛。夏季开花，紫红色或粉红色，无柄，数朵聚生于枝顶。蒴果钟形，故称“仰天钟”，果萼无毛；种子细小，肾形或马蹄形。

生长环境 生于山坡、路旁及旷野草丛中。

采集加工 药用全草。秋冬采集，洗净晒干备用。

性味功用 味淡涩，气微香，性平。清湿热，逐瘀血，止血，解毒。

主治用法 痢疾，产后恶露不下，跌打损伤，咳血，肠炎腹泻，用三钱至一两，水煎服。痈疮肿毒，外伤出血，用鲜草捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图35　金锦香(野牡丹科)
Osbeckia chinensis L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

36 三 筒 管

别名 白金古榄。

识别 多年生缠绕藤本。块根为球形或长柱形，常数个相连，类似金古榄，表面灰白色，故称“白金古榄”，横切面呈菊花心。茎有锈色粗毛，老时脱落。叶互生，披针形或线状披针形，长9—20厘米，宽2—4厘米，顶端渐尖，基部心形，背面粉绿色，有小柔毛，叶脉明显凸起；叶柄短，密生锈色毛或秃净。春季开花，暗紫色，单生于叶腋。蒴果。

生长环境 生于深山林中。

采集加工 药用块根。夏秋采集，洗净切片晒干备用。

性味功用 味苦，性寒。清热解毒。

主治用法 菌痢，急性肠胃炎，疮疖肿痛，用三至五钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图36　三筒管(马兜铃科)
Aristolochia championii Merr. et Chun

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

37 紫　草

别名　紫根。

识别　多年生草本，全株密被粗硬毛。根长椭圆形，表面紫红色，干后暗紫色，呈鳞片状剥离，有纵沟，质脆，断面中间淡褐色。茎直立，上部分枝。叶互生，无柄，椭圆状披针形，长3—6厘米，宽6—13毫米，顶端渐尖，基部渐狭，全缘，两面密被粗糙硬毛。夏季开花，管状，淡黄白色；聚伞花序顶生。果小，卵形，平滑骨质，有光泽，灰白色。

生长环境　生于向阳的山坡或山谷草丛中。

采集加工　药用根。秋季采集，洗净晒干备用。

性味功用　味甘咸，性寒。清热凉血，解毒透疹，滑肠通便。

主治用法　血热毒盛，痘疹欲出不畅，丹毒，大便燥结，用一至三钱，水煎服。汤火伤，刀伤，毒虫咬伤，湿疹，用鲜品捣烂敷患处。

附注　本品含乙酰紫草素。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图37 紫 草(紫草科)
Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

38 野 甘 草

别名 土甘草、假甘草、鱼花草。

识别 直立分枝草本，高不及1米；枝、叶有甜味。茎方形，青绿色，无毛。叶对生或轮生，椭圆形或披针形，长0.5—2.5厘米，宽不及1厘米，顶端短尖，基部渐狭，边缘有疏散小锯齿。夏秋开小白花，具柄，通常1—2朵生于叶腋。果小球形，黄棕色。

生长环境 生于旷野、村边、路旁等地。

采集加工 药用全草。夏秋采集，洗净晒干备用。

性味功用 味甘，性平。清热解毒，祛风止痒，生津止渴。

主治用法 小儿外感风热，肠炎，小便不利，用五钱至一两，水煎服。湿疹，热痱，用鲜草捣烂取汁外擦。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图38　野甘草(玄参科)
Scoparia dulcis L

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

39 田字草（苹）

别名 四叶草、十字草、水对菜。

识别 水生草本。根状茎纤细，长而横走，节上生根和叶。不育叶浮于水面或伸出水面，具长柄，有叶片四枚，呈十字形排列；叶片倒三角形，顶端圆形或截形，基部楔形，全缘，幼时有毛；能育叶变为孢子果，卵形或椭圆形，通常2—5个簇生，具短柄。

生长环境 生于水田、水沟中。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味甘，性寒。清热解毒，利水消肿。

主治用法 乳腺炎，痈疮肿毒，淋巴结炎，痔疮肿痛，用鲜草捣烂敷患处。毒蛇咬伤，牙龈肿痛，急性结膜炎，用鲜草二至三两捣烂绞汁服，渣敷患处。肝胆火旺，心烦不寐，水湿浮肿，小便赤痛，用五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图39　田字草(苹科)
Marsilea quadrifolia L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

40 草决明

别名 羊尾豆、夜拉子、夜关门。

识别 一年生草本。茎直立，基部木质，圆柱形，有分枝，绿色。羽状复叶互生，叶轴上每对小叶间有腺体一枚；小叶2—3对，倒卵形，有小尖头，基部略不对称，全缘，上面几无毛，背面被伏贴柔毛，揉烂有腐败气味；叶柄粗壮。夏秋开黄花，1—3朵生于叶腋。荚果线形，略弯曲；种子光亮，形似绿豆。

生长环境 生于村边、路旁、旷野草丛中。

采集加工 药用种子。秋季采成熟豆荚，晒干除去豆荚取种子备用。

性味功用 味苦，性凉。清肝明目，利尿通便。

主治用法 高血压头痛，急性结膜炎，肝炎，大便秘结，夜盲，用三至五钱，水煎服。

附注 本品含大黄素。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图40　草决明(苏木科)
Cassia tora L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

41 木　棉

别名　英雄树、木棉花、生丁木。

识别　落叶大乔木。树干与枝有粗刺，呈扁圆锥形，枝平展。掌状复叶互生；小叶通常5枚，长椭圆状披针形，顶端渐尖，全缘；叶柄长8—12厘米。春季先开花后生叶，花大，肉质，火红色，单朵或数朵簇生在近枝顶处，极为壮丽，故有“英雄树”之称。蒴果椭圆形，内有丝状棉毛。

生长环境　野生于山谷、河边，也有栽培。

采集加工　药用根皮、花。春季采花，晒干备用。全年采根，洗净剥取皮，晒干备用或鲜用。

性味功用　味淡，性微寒。去湿热，除痰火，解疮毒。

主治用法　痢疾，肠炎，热咳多痰，用根皮或花五钱至一两，水煎服。痈疮肿痛，用鲜根皮捣烂敷患处。花可作暑天清凉饮料。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图41　木　棉(木棉科)
Gossampinus malabarica (DC.) Merr.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

42 紫万年青

别名 蚌花、蚌兰。

识别 多年生粗壮草本，高不及50厘米。茎短而粗，肉质而分枝。叶簇生，披针形至阔剑形，长15—30厘米，宽2.5—6厘米，顶端渐尖，基部鞘状抱茎，上面深绿色，背面紫色，质脆易折断，肉质。夏季开白花，多朵聚生，藏于二枚对生的苞片内；苞片淡紫色，肉质而大，稍压扁，两瓣张开而呈蚌壳状，故称“蚌花”。

生长环境 喜生于阴湿肥沃地，也有栽培。

采集加工 药用花、叶。全年可采，一般鲜用或晒干备用。

性味功用 味淡，性凉。凉血解毒，化痰止咳。

主治用法 菌痢，便血，肺热咳嗽，咳血，淋巴结核，百日咳，鼻衄，用鲜叶一至二两，或干花20—30朵，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图42　紫万年青(鸭跖草科)
Rhoeo discolor (L' Herit.) Hance

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

43 草　龙

别名　水仙桃、田浮草、香须公。

识别　一年生直立草本，全株无毛，高20—60厘米，分枝多。茎黄绿色或淡紫色，有3—4棱。叶互生，披针形，长2—10厘米，宽5—10毫米，顶端急尖，基部渐狭，全缘；叶柄短或无柄。夏秋开小黄花，单生于叶腋，无柄，针筒状。蒴果绿色或淡紫色。

生长环境　生于湿润地、稻田中。

采集加工　药用全株。夏秋采集，晒干备用或鲜用。

性味功用　味淡，性凉。清热解毒，去腐生肌。

主治用法　感冒发热，咽喉肿痛，口腔炎、溃疡，痈疮疖肿，用五钱至一两，水煎服。外用适量。

附注　毛草龙 Jussiaea suffruticosa L. 与本种形态相似，惟全株有白色柔毛，功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图43 草 龙(柳叶菜科)
Jussiaea linifolia Vahl

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

44 无根藤

别名 无娘藤、飞天藤、雾水藤。

识别 缠绕寄生草本，借盘状吸根攀附它物，茎线状，绿色或黄绿色，被毛或无毛。夏季开小白花，穗状花序。浆果小，球形。

生长环境 寄生在灌木或树上。

采集加工 药用全草。全年可采，晒干备用或鲜用。采集时应注意，不要采寄生在大茶药、鱼藤、羊角扭、夹竹桃等有毒植物上的，以防误服中毒。

性味功用 味淡，性凉。清热解毒，散瘀消肿，滑肠通便，止血，止痒。

主治用法 咯血，衄血，黄疸，便秘，急性结膜炎，用五钱至一两，水煎服。跌打损伤，外伤出血，用鲜藤捣烂，敷患处。皮肤湿疹，疮疡溃烂，水煎洗患处。（孕妇忌服）

附注 本品含卫矛醇。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图44　无根藤(樟科)
Cassytha filiformis L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

45 杨　梅

别名　火杨梅、火梅木、厚皮英。

识别　常绿灌木或乔木，高可达10米。叶常聚生于小枝顶端，倒卵状披针形或倒披针形，长5—12厘米，宽不及3厘米，顶端钝，基部楔形，全缘，两面均无毛，背面有小斑点。春季开黄红色花；穗状花序生于叶腋。果球形，成熟时外皮通常暗红色至紫红色，由多数囊状体组成，多汁。有少数果为青白的，称“水晶杨梅”。

生长环境　栽培或野生于山坡杂木林中。

采集加工　药用根皮、树皮和果。树皮、根皮，全年可采，去粗皮洗净晒干备用。果，夏季成熟时采集，洗净鲜用或晒干，或盐渍备用。

性味功用　味酸甘，性平。清湿热，收敛，止痛，止痒。

主治用法　痢疾，头风痛，用干果三钱至五钱研末，日分二次服。汤火伤，用果煅存性研末，以茶油调涂患处。皮肤搔痒，用盐渍果卤水洗患处。胃肠气痛，取根皮二至三钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图45　杨　梅(杨梅科)
Myrica rubra Sieb. et Zucc.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

46 酸藤子

别名 酸藤果、鸡母酸、挖不尽。

识别 藤状灌木，全株无毛。根粗壮，长而弯曲，表面黑色。茎圆柱形，有圆点状皮孔。叶互生，稍肉质，有酸味，倒卵形或狭长圆形，顶端钝或圆，基部楔形，全缘，叶柄短。春季开淡黄色小花，数朵组成腋生或侧生的短总状花序。浆果球形，熟时红色或紫黑色，味酸甜。

生长环境 生于村边、路边或旷野向阳处。

采集加工 药用根、叶。根全年可采，洗净切片晒干备用，叶随用随采。

性味功用 味酸涩，性平。消炎杀菌，活血散瘀，收敛止泻。

主治用法 口腔炎，咽喉炎，跌打肿痛，痛经，闭经，肠炎腹泻，用五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图46　酸藤子(紫金牛科)
Embelia laefa (L.) Mez.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

47 贯 众（乌毛蕨）

别名 铁蕨、黑蕨猫。

识别 多年生草本。根状茎粗壮，直立，木质，密被线形褐色鳞片。叶簇生，一回羽状复叶；小叶片多数，互生，无柄，阔线形或线状披针形，长16—23厘米，宽1—1.5厘米，顶端尾状，基部下延，边全缘或微波状，两面绿色无毛，近革质。孢子囊群着生在小叶片背面中肋两侧，紧贴于中肋呈一连续的长线形。

生长环境 生于山谷沟边、山坡林下阴湿地。

采集加工 药用根茎。全年可采，削去外皮，洗净切片晒干备用。

性味功用 味微苦，性凉。清热解毒，杀虫，止血。

主治用法 流感，流脑，乙脑，斑疹伤寒，蛔虫病，钩虫病，鼻衄，吐血，血崩，腮腺炎，用一至四钱，水煎服。

附注 1.本品可预防流感，流脑，乙脑。

2.1：800贯众水溶液，对流感病毒有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图47　贯　众(乌蕨科)
Blechnum orientale L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

48 金古榄（青牛胆）

别名 地苦胆、黄金古。

识别 多年生缠绕藤本。块根连珠状，长达1米多，有5—9个球形结节，形似成串的榄果，金黄色，故名“金古榄”。茎有条纹，幼时有疏短毛。叶互生，卵形或披针形，顶端渐尖，基部箭形或戟状，嫩时两面有疏短毛，老时脱落。夏季开花。核果红色。

生长环境 生于石山石缝中或疏林下。

采集加工 药用块根。全年可采，洗净切片晒干或研粉备用。

性味功用 味苦，性寒。清热解毒，利咽，止痛。

主治用法 急性胃肠炎，痢疾，咽喉炎，口腔炎，疮疡肿毒，毒蛇咬伤，用一至二钱，水煎服，或用干粉三至五分冲开水服。外用适量。

附注 和本品功用相同的有圆角金古榄 Tinospora capillipes Gagnep. 和复瓦叶金古榄 Tinospora imbricata S. Y. Hu 两种。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图48　金古槐(防己科)
Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

49 黄　藤

别名　藤黄连。

识别　木质藤本。根圆柱形，有淡黄色突起的皮孔，断面黄色，呈“风车”状。茎粗壮，表面有不规则纵裂，断面黄色，有菊花心。叶互生，卵圆形或长椭圆形，长10—21厘米，宽5—11厘米，顶端短尖，基部圆形或近截形，全缘，基出叶脉3条；叶柄长4—11厘米，基部膨大，呈曲膝状。春末夏初开绿白色小花；复总状花序，单生自叶腋抽出。核果长椭圆形。

生长环境　多生在山谷密林中。

采集加工　药用根、茎。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用　味苦，性寒。清热解毒，清心火，利小便。

主治用法　痢疾，急性胃肠炎，急性扁桃体炎，咽喉炎，结膜炎，黄疸，肺结核，用二至四钱，水煎服。疮疖，汤火伤，用根磨汁外用。本品可预防流脑。

附注　1.本品含棕榈碱1—3%。及非防己碱。为提取棕榈碱的原料。

2.大叶藤 Tinomiscium tonkinense Gagnep.又名“假黄藤”，形态与黄藤相似，但功用有差别。其识别点：大叶藤鲜叶撕裂时有粘丝，

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

根、茎断面灰白色至淡黄色，味不甚苦；黄藤叶无粘丝，根、茎切面黄色，味苦。



图40 黄 藤(防己科)
Fibraurea tinctoria Lour.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

三、清热利湿药

（适应急慢性肝炎、胆囊炎、急性肾炎、肠胃炎、白带等疾病）

50 红毛毡

别名 铺地毡、老虎舌、红毛过江、毛凉伞。

识别 常绿矮小灌木，高10—30厘米。茎幼嫩部被暗红色长毛。叶聚生于枝顶，具柄，椭圆形，边缘微波状，上面有小瘤状突起，两面均被红色长毛。夏季开粉红色小花，组成伞形花序。果球形，基部有花萼，熟时红色，被红色长毛。

生长环境 生于山谷密林下阴湿处。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味苦辛，性凉。清热利湿，活血止血。

主治用法 痢疾，黄疸，跌打，风湿，咳

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

血，吐血，外伤出血，痛经，月经不调，用三至五钱，水煎服。



图50　红毛毡(紫金牛科)
Ardisia mamillata Hance

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

51 圆叶马兜铃

别名 金银袋、大百解薯、大总管、圆叶山总管。

识别 木质藤本。块根纺锤形、圆球形或数个连成念珠状，表面棕褐色，外皮厚而松软，龟裂，断面黄白色，有菊花纹。茎密生锈色长柔毛。叶互生，近圆形，长11—27厘米，宽 9—27厘米，顶端尖，基部心形，边缘密生锈色睫毛，上面皱缩，有柔毛，后渐脱落，背面密生淡棕色或白色短毛，叶脉明显凸起。花腋生。蒴果。

生长环境 生于山坡，石缝或沟边肥沃松土中。

采集加工 药用块根。夏秋采集，洗净切片晒干或研末备用。

性味功用 味苦，性寒。清热解毒，止血，止痛。

主治用法 急性肠胃炎，胃及十二指肠溃疡，咽喉炎，用干粉五分至一钱，开水送服。刀伤出血，用干粉撒患处。痈疮肿毒，用鲜块根捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图51　圆叶马兜铃(马兜铃科)
Aristolochia shukangii Chun et How, Mss.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

52 黄 牛 木

别名 满天红、黄芽木、鹧鸪木、黄牛茶。

识别 灌木或小乔木，高2—10米；树皮黄色，光滑，似黄牛皮，故名“黄牛木”。叶对生，革质，椭圆形或长椭圆形，长5—9厘米，宽2—3厘米，先端急尖，基部楔形，两面无毛，背面有黑色细小的腺点，具短柄。夏初开花，粉红色，2—3朵腋生或侧生。蒴果椭圆形；种子一侧有翅。

生长环境 生于山坡、旷野灌木丛中。

采集加工 药用嫩叶。全年可采，晒干或炒干备用。

性味功用 味甘淡微苦，性平。健胃消滞，解暑除湿。

主治用法 感冒发热，暑热烦渴，肠炎腹泻，用三至五钱，水煎服。也可作暑天清凉饮料。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图52　黄牛木(金丝桃科)
Cratoxylon ligustrinum (Spach) Bl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

53 蕹　菜

别名　鸡肉菜、塘葛菜、假葶苈。

识别　一年生草本。茎直立或卧伏状，基部带紫色，有纵棱。叶互生，基生叶及茎下部叶匙形，通常琴状羽裂，有柄，抱茎；茎上部叶卵形，少分裂或不分裂，边缘有不整齐的锯齿。春季开黄花，花瓣四片，呈十字形。长角果线状。

生长环境　生于园地、旷野、路旁。

采集加工　药用全草。全年可采，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用　味淡微辛，性凉。清热利尿，凉血解毒。

主治用法　感冒发热，肺炎，小便不利，咳血，风火牙痛，咽喉炎，用五至八钱，水煎服。汤火伤，用鲜草捣烂取汁涂患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图53　蔊　菜(十字花科)
Nasturtium montanum Wall.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

54 相思藤（相思子）

别名 山甘草、土甘草。

识别 缠绕木质藤本。偶数羽状复叶互生，叶轴顶端有细尖头；小叶8—15对，矩圆形或倒卵形，顶端截形，有小尖头，基部圆形或阔楔形，全缘，上面无毛，背面疏生伏贴毛；托叶小。春夏开花，顶生及腋生总状花序；花小，紫色，蝶状。荚果矩圆形，膨胀，被伏贴短毛，顶端有短喙；种子椭圆形，一端红色，一端黑色。

生长环境 生于山坡、旷野灌木丛中或疏林下。

采集加工 药用根、藤。夏秋采集，洗净晒干备用。

性味功用 味甘，性平。清热利尿。

主治用法 咽喉肿痛，肝炎，支气管炎，用三至五钱，水煎服。

附注 本品种子含多种毒性蛋白，有强烈毒性，服0.5毫克可致中毒。中毒症状是腹泻、呕吐、虚脱、尿闭、幻视及溶血，重者可致死亡。用时须特别慎重。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图54　相思藤(蝶形花科)
Abrus precatorius L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

55 丁葵草

别名 人字草，铺地草、金线吊虾蟆。

识别 多年生草本。茎纤细，卧地或斜升。复叶互生；小叶2枚，卵状椭圆形至披针形，着生于叶柄顶端，开展如人字；托叶2枚，盾状着生，纺锤形。夏秋自叶腋开黄花，蝶状，2—10朵组成穗状花序，每朵小花有苞片2枚。荚果3—6节，有小刺和柔毛。

生长环境 生于旷野稍干旱处。

采集加工 药用全草。夏秋采集，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味甘，性凉。清热解毒，散瘀消积。

主治用法 感冒，咽喉炎，急性肠胃炎，急性肝炎，小儿疳积，用三钱至一两，水煎服。跌打肿痛，痈疮肿毒，结膜炎，用鲜草适量捣烂外敷患处。毒蛇咬伤，内服外敷并用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图55　丁葵草(蝶形花科)
Zornia diphylla (L.) Pers.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

56 白背叶

别名 白背娘、白吊粟。

识别 落叶灌木或小乔木；老枝无毛，嫩枝密被灰白色粉状毛。茎皮纤维丰富，坚韧。叶互生，具长柄，阔卵形，顶端急尖，基部截形或浅心形，全缘或有浅齿，有时三浅裂，上面绿色，基部有一对微凹陷的圆形小腺体，背面灰白色，与叶柄均被粉状毛，两面叶脉明显。夏季开灰白色小花，顶生穗状花序。蒴果被长毛，多个密集而下垂，呈狗尾状。

生长环境 生于山坡、旷野灌木丛中。

采集加工 药用根、叶。全年可采，洗净鲜用或将根切片晒干备用。

性味功用 味微苦涩，性平。收濇固脱，散瘀消肿，止血止痛。

主治用法 慢性肝炎，子宫脱垂，脱肛，白带，淋浊，疝气，产后风瘫，用五钱至一两，水煎服。刀伤出血，疮疖，用鲜品捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图56 白背叶(大戟科)
Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

57 阴行草

别名 土茵陈、草茵陈。

识别 一年生草本，全株密生柔毛，黄绿色，干后变黑色。茎直立，近方形，上部多分枝。叶对生，羽状深裂，基部下延而近无柄。秋季叶腋开黄花。果筒状，表面有纵棱，被柔毛，长约1.2厘米，内含多数种子。

生长环境 生于山坡、丘陵草丛中。

采集加工 药用全草。夏季采收，洗净晒干备用或鲜用。

性味功用 味苦，性寒。清热解毒，利湿消肿。

主治用法 黄疸，湿热腹泻，水肿，用五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图57　阴行草(玄参科)
Siphonostegia chinensis Benth.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

58 鸡屎藤

别名 臭藤。

识别 柔弱藤本。茎分枝，基部木质；枝、叶揉烂有似鸡屎臭气，故称“鸡屎藤”。叶对生，具柄，椭圆形或矩圆形，顶端短尖，基部通常近圆形，全缘，两面均无毛；托叶三角形。秋季开花，白紫色，花多数，圆锥花序腋生或顶生。果球形，成熟时草黄色，有光泽。

生长环境 生于山坡、路旁、沟边草丛中。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味微甘涩，气臭，性平。消食化积，祛痰止咳，祛风散寒，散瘀消肿。

主治用法 小儿疳积，胃肠积气，支气管炎，百日咳，风湿骨痛，肝炎，痢疾，用一至二两，水煎服。跌打损伤，痈疮肿毒，鲜用捣烂外敷。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图58　鸡屎藤(茜草科)
Paederia scandens (Lour.) Merr.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

59 排 钱 草

别名 串钱草、叠钱草。

识别 直立小灌木。羽状复叶互生，有托叶；小叶3枚，中间小叶卵状长椭圆形，长6—12厘米，两侧小叶卵形，长约为中间小叶的一半，顶端钝或尖，基部圆形，边缘稍呈波状，上面近无毛，背面疏生小柔毛。夏季开白花，蝶状，包藏于2枚圆形苞片内，苞片整齐排列在顶生及腋生的总状花序轴上，状如排钱。荚果有二节。

生长环境 生于旷野灌木丛中或疏林下。

采集加工 药用全株，但以根较为常用。夏、秋两季采集，晒干备用。

性味功用 味淡涩，性凉。祛风清热，活血散瘀。

主治用法 感冒发热，疟疾，跌打肿痛，风湿骨痛，赤白带下，血崩，用五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图59　排钱草(蝶形花科)
Desmodium pulchellum (L.) Benth.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

60 石　榴

别名　珍珠石榴。

识别　落叶灌木或小乔木，全株无毛。基部分枝，幼枝四棱形，枝端常有短刺。叶对生或簇生，长圆形或长圆状披针形，顶端急尖、钝或微缺，上面光亮，全缘，叶柄短。夏季开花，顶生或腋生，钟形，红色或淡黄色。果球形，顶端有残存的花萼，熟时黄色或带红色，种子坚硬。

生长环境　多为栽培。

采集加工　药用果皮、花、根皮、树皮。夏秋采花果；根皮及树皮全年可采，洗净晒干备用。

性味功用　味甘酸，微苦涩，性平。驱虫，止泻，止血。

主治用法　绦虫病，蛔虫病，蛲虫病，腹痛腹泻，痢疾，便血，脱肛，用根皮或果皮三至五钱，水煎服。吐血，衄血，用花一至三钱，水煎服。

附注　本品含生物碱，如石榴皮碱（有驱虫功效）、伪石榴皮碱、甲基石榴皮碱等，此外尚含熊果叶酸。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图60　石　榴(安石榴科)
Punica granatum L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

61 溪黄草（线纹香茶菜）

别名 土黄连，熊胆草。

识别 多年生草本，高达60厘米。茎直立，方形，分枝，稍被毛。叶对生，卵形至卵状披针形，长3—5厘米，宽2—3厘米，纸质，顶端短尖，边缘具波浪形粗齿，两面无毛，揉烂有黄色液汁，叶柄长达5厘米。花细小，白色而微带紫色，聚伞花序集成疏散的圆锥状花序。

生长环境 喜生于溪边、水沟旁。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味苦，性寒。清热利湿，凉血散瘀。

主治用法 急性传染性肝炎，急性胆囊炎，跌打瘀肿，用五钱至一两，鲜用二至三两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图61　溪黄草(唇形科)
Plectranthus striatus Benth.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

62 蒌　　蒿

别名　黄花棉。

识别　多年生直立草本，高不及1米。嫩枝有粗伏毛。叶卵状披针形至长圆形，顶端钝，基部近圆形，边缘有不规则锯齿，上面叶脉下凹，侧脉平行，两面疏被伏贴毛，叶柄密生长伏毛。四季开花，黄色，单生于叶腋，顶生花排列呈短总状花序。蒴果，扁球形，上半部被粗毛；分果8—13个，肾形，每个有短刺三枚。

生长环境　生于村边、路旁或旷野。

采集加工　药用全草。全年可采，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用　味微甘，性凉。清热利湿，去瘀消肿。

主治用法　黄疸，痢疾，疟疾，小儿食滞，肺热咳嗽，喉头炎，用二至四两，水煎服。疮疖肿痛，用鲜叶适量捣烂敷患处。跌打肿痛，用鲜草捣烂，酒炒敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图62　赛　葵(锦葵科)
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

63 蓝花柴胡（脉叶香茶菜）

别名 大叶蛇总管。

识别 多年生直立草本，高达2.5米。茎方形，有纵沟，紫色或淡紫绿色，稍被短毛。叶对生，具柄，卵状椭圆形或卵状披针形，长3—11厘米，宽1.5—5厘米，顶端渐尖，基部阔楔形而下延，边缘有粗锯齿，两面被短柔毛，上面叶脉明显，呈淡紫色。秋季开花，蓝色或淡红色，多朵组成腋生的圆锥花序。果褐色，有腺点。

生长环境 生于山脚、沟边潮湿地，也有栽培。

采集加工 药用茎、叶。夏秋采集，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味苦，性寒。清热解毒，除湿消肿。

主治用法 急性传染性肝炎，毒蛇咬伤，用五钱至二两，水煎服。毒蛇咬伤用鲜叶捣烂敷伤口周围。脓疱疮，湿疹，皮肤搔痒，用鲜草水煎洗患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图63　蓝花柴胡(唇形科)
Plectranthus nervosus Hemsl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

64 算盘子

别名 野南瓜。

识别 落叶灌木；枝被短柔毛。叶互生，排成二列，长椭圆形或披针形，顶端钝或尖，基部楔形，全缘，上面除中脉外近无毛，背面被短柔毛；叶柄短。春夏开淡绿色小花，数朵簇生于叶腋。蒴果扁球形，有纵槽，被柔毛，状如算盘子，熟时红褐色；种子红色。

生长环境 生于山坡、旷野灌木丛中。

采集加工 药用全株。全年可采，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味微苦涩，性凉。清热，利湿，散瘀，消肿，解毒。

主治用法 痢疾，疟疾，腹泻，咽喉炎，白浊，白带，闭经，脱肛，淋巴腺炎，感冒发热口渴，大便下血，用五钱至一两，水煎服。跌打肿痛，蜈蚣咬伤，疮疖肿痛，用鲜叶适量捣烂敷患处。（孕妇慎服）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图64　算盘子(大戟科)
Glochidion puberum (L.) Hutch.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

四、化痰止咳药

（适应急慢性气管炎，哮喘、肺结核、百日咳等疾病）

65 前　胡（紫花前胡）

别名　马连鞍，土独活。

识别　多年生草本。根粗壮，有香气。茎直立，上部分枝，下部节上有叶鞘残余。根生叶及茎下部叶具长柄，柄基部扩大抱茎，上部叶柄渐短，膨大成紫色叶鞘；叶片一或近二回羽状分裂，下面一对裂片具柄，顶端裂片与侧裂片基部连合，有时顶端裂片三裂而基部呈翅状下延，小裂片长椭圆形，边缘有齿。秋季开深紫色小花，顶生及腋生复伞形花序，有毛。果卵圆形，扁平，有翅边。

生长环境　生于山坡草丛中或疏林下。

采集加工　药用根。春秋采集，除去须根及茎叶，洗净晒干备用。

性味功用　味苦辛，性微寒。发散风热，降气下痰，止咳。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治用法 感冒咳嗽，风热郁肺，痰喘咳逆，用一至三钱，水煎服。

附注 本品含前胡甙、挥发油及鞣质等。



图65 前 胡(伞形科)
Peucedanum decursivum (Miq.) Maxim.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

66 天南星

别名 南星。

识别 多年生草本。块茎扁球形，表面黄褐色，断面粉白色。基生叶1枚，具长柄，柄似茎状，直立或稍弯，肉质，绿色，顶生小叶7—15枚或更多；小叶掌状排列，狭线状披针形，顶端长丝状，基部狭楔形，边全缘，两面绿色。肉穗花序，夏季抽出，佛焰苞长尾状，绿色或紫红色；花小，灰白色或淡绿色。果熟时红色。

生长环境 生于山谷溪边或林下阴湿处。

采集加工 药用块茎。秋冬采集，去皮洗净，用明矾水浸泡，每日换水，20天后滤出阴干即为生南星，多为外用。内服，要用姜汁或牛胆汁（猪胆汁也可）泡制过。

性味功用 味苦辛，性温，有毒。燥湿祛痰，祛风解痉，散瘀止痛。

主治用法 小儿惊痫，破伤风，中风麻痹，顽痰咳嗽，哮喘，用一至二钱，水煎服。跌打损伤，急性炎症，皮肤疮疡，疥癣，毒蛇咬伤，取适量捣烂外敷。（孕妇忌服）

附注 本品含皂甙等。有大毒，如误服中毒，可立即用生姜汁解之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图66　天南星(天南星科)
Arisaema consanguineum Schott

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附：异叶天南星

本品的块茎与天南星形状相似，不同点为叶片鸟趾状全裂；小叶长圆形，顶端短尖，功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图66－1　异叶天南星(天南星科)
Arisaema heterophyllum Bl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

67 石 橄 榄

别名 石仙桃、石穿盘、上石蒜、石上莲。

识别 多年生草本。根状茎粗短，匍匐状，多须根。茎膨大，形似橄榄，附生于石上，故称“石橄榄”。叶1—2枚，倒卵状椭圆形或矩圆形，顶端短尖，基部楔形，全缘。夏季开花，绿白色，总状花序顶生，有花8—20朵。果椭圆形，具纵棱6条。

生长环境 附生于深山沟边的岩石或大树上。

采集加工 药用茎叶。全年可采，剪去须根，晒干备用。

性味功用 味甘淡，性凉。清热养阴，止咳，利尿。

主治用法 肺热咳嗽，小便不利，湿热浮肿，小儿疳积，用三至五钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图67　石橄榄(兰科)
Pholidota chinensis Lindl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

68 华 凤 仙

别名 水指甲花、象鼻花。

识别 一年生草本。茎下部伏地，上部直立。叶对生，线状或线状长圆形至倒卵形，长2—9厘米，基部钝圆或近心形，边缘有疏小硬尖齿，叶柄极短或无柄。夏季开花，腋生，粉红色或白色，外面的萼片延伸成细尾状，并内弯成钩形，花梗长。蒴果椭圆形，中部膨大，无毛，种子黑色或棕褐色，无毛，光亮。

生长环境 喜生于潮湿地或水边。

采集加工 药用茎、叶。全年可采，多为鲜用。

性味功用 味微苦辛，性平。清热解毒，活血散瘀，消肿拔脓。

主治用法 肺结核，用鲜草一至二两，同瘦猪肉或猪骨炖服。蛇头指疮，痈疮肿毒，用鲜草捣烂敷患处。（孕妇慎服）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图68　华凤仙(凤仙花科)
Impatiens chinensis L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

69 三十六荡（卵叶娃儿藤）

别名 老虎须、落地蜘蛛、落地金爪。

识别 木质小藤本，全株有白色乳汁。根簇生，须状，粉质，淡黄白色，有芳香气。茎密被柔毛。叶对生，卵圆形或长卵形，顶端尖，基部浅心形或圆形，全缘，上面疏生柔毛或无毛，背面密被柔毛。夏季开淡黄绿色小花，成腋生的聚伞花序。蓇葖果二枚，对生，熟时一侧开裂。种子顶端有白色丝状毛。

生长环境 生于山坡、山脚草丛或灌木丛中。

采集加工 药用根。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味辛，性温，有小毒。祛风除湿，散瘀止痛，化痰定喘，催吐。

主治用法 风湿骨痛，跌打肿痛，哮喘，用一至三钱，水煎服。（孕妇及体弱者慎服）

附注 本品含生物碱，有一定的毒性。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图69　三十六荡(萝藦科)
Tylophora ovata (Lindl.) Hook. et Steud.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

70 橄　榄

别名　黄榄。

识别　常绿大乔木，高达10余米，含芳香的树脂。奇数羽状复叶互生，具长柄，小叶11—15枚，革质，矩圆状披针形，顶端渐尖，基部不对称，全缘，两面纲脉明显，无毛。夏季开白色小花，圆锥花序顶生或腋生，短于叶。核果卵形，熟时黄白色。

生长环境　多为栽培。

采集加工　药用果实。秋季在果实饱满而未完全成熟时采集，晒干备用。

性味功用　味酸甘涩，性平。清肺利咽，生津止渴。

主治用法　喉头炎，咳血，暑热烦渴，肠炎腹泻，用一至三钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图70　橄　榄(橄榄科)
Canarium album (Lour.) Raeusch.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

71 木蝴蝶

别名 千层纸、土黄柏。

识别 乔木；树皮灰色，有纵裂纹，小枝有突起皮孔和叶痕。叶对生，2—3回羽状复叶；小叶卵形或卵状椭圆形，长5—14厘米，顶端短尖或渐尖，基部圆形或稍不对称，边全缘，两面绿色无毛。夏秋开花，肉质而大，淡紫红色。果大，长可达90厘米，果瓣木质，扁平，边缘稍弯呈剑状。种子薄，重迭多层，周围有白色半透明膜翅。

生长环境 生于山坡、路旁。

采集加工 药用种子，树皮。冬季采集种子晒干备用；皮，随用随采。

性味功用 味微苦甘，性凉。种子，润肺止咳，止痛。树皮，清热凉血。

主治用法 支气管炎，喉炎，肺结核咳嗽，百日咳，胃痛，用二至三钱，水煎服。肝炎，膀胱炎，用树皮五钱至一两，水煎服。痈疮溃烂，湿疹，用鲜皮捣烂外敷；或煎水洗患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图71　木蝴蝶(紫葳科)
Oroxylum indicum (L.) Vent.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

72 灯笼草（小酸浆）

别名 水灯笼、打额泡。

识别 一年生直立草本，高40—90厘米。叶互生，形似辣椒叶，长3—10厘米，宽2—5厘米，有柔毛，边缘有小齿。花单生于叶腋或分枝交叉处，钟形，黄色；花萼膨大有稜，象灯笼，故名“灯笼草”。

生长环境 生于村边，路旁，旷野草丛中。

采集加工 药用全草。夏秋采集，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味苦，性凉。清热解毒，化痰止咳。

主治用法 感冒发热，支气管炎，咽喉肿痛，睾丸炎，腮腺炎，用五钱至一两，水煎服。脓疱疮，湿疹，疮疖肿痛，用鲜草捣烂外敷患处，或水煎外洗。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图72　灯笼草(茄科)
Physalis minima L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

73 小 芸 木

别名 鸡屎木、山黄皮。

识别 灌木或小乔木。嫩枝、叶轴及花轴密被黄色短柔毛。奇数羽状复叶互生，小叶7—15枚，斜卵形至斜卵状披针形，顶端尖，基部圆或钝，不对称，边全缘或微呈波状，两面无毛或叶脉上被短柔毛，密布透明腺点。冬春开小白花，顶生伞房状圆锥花序。浆果椭圆形，熟时金黄色或红色，有油腺点。

生长环境 生于山地丛林中。

采集加工 药用全株。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味苦辛，性温。行气祛痰，祛风除湿，散瘀止痛。

主治用法 感冒咳嗽，胃痛，风湿骨痛，用根三至五钱，水煎服。跌打肿痛，用根研末酒调或用鲜叶捣烂敷患处。（孕妇慎服）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图73　小芸木(芸香科)
Micromelum integerrimum (Buch.-Ham.)Roem.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

74 猪仔笠

别名 鸡头薯、山黄薯。

识别 多年生草本。块根纺锤形，表皮暗褐色，刮破现鲜黄色，断面呈三圈，外圈淡紫色，中圈粉白色，内面淡黄白色，粉质，味微甜。茎直立，通常不分枝，被褐色毛。叶互生，具短柄，线形或线状披针形，全缘，上面疏生长毛，背面密被灰白色绒毛；托叶2枚，线形。初夏自叶腋开黄花，花冠蝶状。荚果矩圆形，膨胀，被褐色长毛，内含2枚种子。

生长环境 生于丘陵、坡地干旱处。

采集加工 药用块根。四、五月采集，洗净晒干备用。

性味功用 味甘淡，性平。清心肺，生津止渴。

主治用法 肺热咳嗽，湿热腹痛，热病烦渴，用三至五钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图74　猪仔笠(蝶形花科)
Eriosema chinense Vog.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

75 石 油 菜

别名 石苋菜、肥猪菜、打不死。

识别 多年生披散草本。茎柔嫩而肉质，绿色，光滑无毛，多分枝。叶对生，肉质，卵圆形至近圆形，大小不等，长1.5—2厘米，宽1.5—1.8厘米，顶端钝，基部阔楔形或近圆形，全缘，基出脉三条，两面亮绿色，无毛。春末开小花，淡绿色或绿色，透明，排成腋生的聚伞花序。果卵形。

生长环境 喜生于石山脚阴湿处。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味淡，性凉。清热解毒，润肺止咳，消肿。

主治用法 肺热咳嗽，肺结核，用鲜草一至二两，水煎服。跌打损伤，汤火伤，疮疖红肿，用鲜草适量捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图75　石油菜(荨麻科)
Pilea cavaleriei Levl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

76 猫爪草（小毛茛）

识别 多年生小草本。小块根纺锤状，数个聚集，形似猫爪。基生叶有长柄，通常三深裂，少数不分裂，边缘有不等的疏浅裂；茎生叶互生，近无柄，三深裂，裂片线形。夏季开黄色花，单生于茎顶，与叶对生。瘦果卵形，细小，顶端有短嘴，多个聚成球形。

生长环境 多生于潮湿的草地和田边。

采集加工 药用根。秋冬采集，剪去须根，洗净晒干备用。

性味功用 味酸甘，性平。清火化痰。

主治用法 淋巴结核，淋巴结炎，咽喉炎，五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图76　猫爪草(毛茛科)
Ranunculus ternatus Thunb.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五、利水通淋药

（适应各种水肿、尿路感染、泌尿系结石等疾病）

77 商　陆

别名　山萝卜。

识别　多年生草本，全株无毛。根粗壮，肉质，圆锥形，多分枝，切断面有数层同心环纹。茎圆柱形，绿色或紫红色，有纵槽。叶互生，椭圆形，全缘。夏季开花，初白色，后变淡红色，多朵排成顶生或与叶对生的总状花序。浆果熟时紫黑色，扁球形，通常由8个分果组成；种子肾形，黑色，光亮。

生长环境　多为栽培，也有野生。

采集加工　药用根。全年可采，洗净鲜用或切片晒干备用。

性味功用　味苦，性寒，有毒。逐水消肿。

主治用法　水肿胀满，用一至三钱同鲤鱼煎汤服，或取鲜根二至三两，捣烂，敷肚脐。痈疮肿毒，用鲜根适量，加食盐少许同捣烂，敷患处。（脾胃虚弱及孕妇忌服）

附注　1.本品有毒，但部分地区误称为“红参”、“朝鲜红参”，两者功用明显不同，不能

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

混用。“红参”叶为掌状复叶，小叶边缘有细密锯齿；种子淡黄色或淡棕黄色；根有芦头、横切面呈菊花心，与本品截然不同。

2.根含商陆素、皂角甙、生物硷及硝酸钾。



图77 商 陆(商陆科)
Phytolacca acinosa Roxb.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

78 通　草（通脱木）

别名　大通草。

识别　灌木或小乔木。嫩枝、叶柄及花序密被黄褐色或褐色绒毛。茎心有白色松软的髓。叶大型，聚生于茎顶，卵圆形，长可达半米以上，掌状分裂，基部心形，上面无毛，背面密被黄褐色绒毛，叶脉掌状；托叶2枚，基部与叶柄合生成鞘状抱茎。冬季开黄白色小花，多朵组成伞形花序，复由此花序组成大型圆锥花序。核果扁球形，熟时黑色。

生长环境　生于山野沟谷。

采集加工　药用茎髓。秋季采收，将其茎干锯成尺长小段，用木棒捅出髓心，晒干即成。或将其纵剖，剥开外皮剜出髓心也可。

性味功用　味甘淡，性寒。清热利水，催乳。

主治用法　水肿，尿路感染，湿热小便不利，乳少，用五分至一钱五分，水煎服。

附注　本品含环己六醇等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图78 通　草(五加科)
Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

79 岗　松

别名　扫把枝。

识别　矮小灌木，高30—60厘米。茎直立，多分枝，无毛，茎皮红褐色或灰黄色，常片状剥离。叶细小，线状锥形，直立或扩展，长5—10毫米，宽不及1毫米，如松针状，故名“岗松”。夏季开小白花，单生于叶腋。蒴果极小，干后红褐色。

生长环境　多生于山坡、旷野旱地。

采集加工　药用全株。全年可采，洗净阴干备用。

性味功用　味苦，气香，性微凉。祛风行气，利水通淋，解毒，止痒。

主治用法　胃痛，肠炎腹泻，风湿骨痛，膀胱炎，用根五钱至一两，水煎服。湿疹搔痒，皮炎，用全草适量，水煎，熏洗患处。蛇虫咬伤，用鲜叶适量，捣烂敷患处。

附注　本品含挥发油，曾分离出小茴香醇。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图79　岗　松(桃金娘科)
Baeckea frutescens L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

80 过路黄

别名 金钱草。

识别 匍匐状草本。茎纤细，稍被柔毛，绿色。叶对生，卵圆形或心脏形，长2—3.5厘米，顶端钝，基部圆形或心形，全缘，两面绿色，有紫黑色斑点，叶柄长2—3厘米。夏季开黄花，单生于叶腋。果球形，五裂；种子小，多数。

生长环境 生于路边、村边阴湿地。

采集加工 药用全草。春夏采集，洗净晒干备用或鲜用。

性味功用 味淡，性平。利尿消炎，凉血解毒。

主治用法 尿路结石，胆结石，用五钱至一两，水煎服。汤火伤，用鲜草捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图80　过路黄(报春花科)
Lysimachia christinae Hance

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

81 马蹄金

别名 黄胆草、小金钱草。

识别 多年生草本。茎纤细，伏地，被灰色柔毛，节上生须根。叶互生，具长柄，圆形或肾形，长0.5—2厘米，顶端圆或稍凹，基部深凹，似马蹄形，故名“马蹄金”，边全缘，两面绿色，背面被柔毛。春季开黄花，钟形，具柄，单生于叶腋。果球形。

生长环境 多生于沟边、田边湿润地。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味辛，性平。清热利尿，活血止血。

主治用法 急性黄胆型肝炎，急性胆囊炎，尿路结石，肺出血，用五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图81　马蹄金(旋花科)
Dichondra repens Forst.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

82 山 扁 豆

别名 假牛甘。

识别 草本，高约半米。茎直立，基部木质，多分枝，被柔毛。偶数羽状复叶互生，具柄，柄上有一扁圆形腺体，小叶25—50对，近无柄，线形，长3—5毫米，顶端尖；托叶2枚，线状锥尖。夏秋开黄花，1—2朵生于叶腋。荚果线形，扁平，被毛，内含10—16枚种子。

生长环境 生于山坡、旷野草丛中。

采集加工 药用全草。夏秋采集，洗净晒干备用。

性味功用 味甘淡，性平。清热解毒，消积。

主治用法 毒蛇咬伤，小儿疳积，用一至二两，水煎服。

附注 大叶山扁豆 Cassia mimosoides L. var. wallichiana DC. 与本种极相似，惟小叶仅14—25对，功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图82　山扁豆(苏木科)
Cassia mimosoides L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

83 合　萌

别名　田皂角、磨地牛甘。

识别　一年生草本。茎基部木质，直立，多分枝，淡绿色。奇数羽状复叶互生，小叶41—61枚或更多，紧接对生，线状矩圆形，长2—10毫米，全缘；托叶2枚，披针形。夏末秋初叶腋生总状花序，有小花1—4朵；花黄色带紫，蝶状。荚果线形，有节，熟时逐节断裂。

生长环境　喜生于水边。

采集加工　药用全草。秋季采集，洗净晒干备用。

性味功用　味苦涩，性微寒。清热，利尿，解毒。

主治用法　尿路感染，毒蛇咬伤，小儿疳积，疮疖，用五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图83　合　萌(蝶形花科)
Aeschynomene indica L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

六、祛风除湿药

（适应风湿骨痛、腰腿痛等疾病）

84 槲 子 藤

别名 过山龙、过江龙、左右扭。

识别 常绿大藤本。老茎扁形，螺旋状扭曲，常缠绕在大树上。二回羽状复叶互生，顶端有卷须；羽片二对，每羽片有小叶2—4对；小叶椭圆形，基部不对称，全缘。春季开淡黄色小花，排成穗状花序。荚果长带状，扁平，长达1米；种子坚硬，扁圆形，黑褐色，光亮。

生长环境 生于山谷密林中。

采集加工 药用藤及种子。藤，全年可采，洗净切片蒸过晒干备用。种子(仁)，冬春采集，剥去外壳，蒸熟晒干备用。

性味功用 藤，味微苦涩；种仁，味微甘涩，性平。通经络，祛风湿，解毒，止血。

主治用法 风湿骨痛，跌打损伤，用藤三钱至一两，水煎服，或浸酒服，并煎水外洗患处。青竹蛇咬伤，用藤三至五钱研末，酒调涂伤处。黄疸，脚气水肿，用种仁一至二个，水煎服。小儿脱肛，痔疮，便血，用种仁煅炭研末，用一

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

钱，开水冲服。

附注 茎皮及种子含皂素。茎皮浸出液有强刺激性，有催吐泻下作用，误入眼中可引起结膜炎。




图84 榼子藤(含羞草科)
Entada phaseoloides (L.) Merr.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

85 宽筋藤

别名 软筋藤、吊天藤、伸筋藤、圆宽根藤。

识别 缠绕木质藤本。茎有粘液。幼枝有毛，老茎褐色，有“十”字形白色小突点和突起的叶痕，干后表皮皱缩而易分离，膜质。叶互生，阔卵形，顶端短渐尖，基部浅心形，全缘，两面被短柔毛，背面毛较密；叶柄长，有柔毛。春季开花，总状花序。核果椭圆形。

生长环境 生于村边灌木丛中或疏林下。

采集加工 药用茎。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用 味微苦，性凉。祛风除湿，舒筋活络。

主治用法 风湿性关节炎，慢性腰腿痛，用五钱至一两，水煎服；外用适量，煎水洗患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图85　宽筋藤(防己科)
Tinospora sinensis (Lour.) Merr.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

86 铁带藤

别名 扁担藤、扁骨风。

识别 大藤本。茎木质而坚硬，有节，扁平，扁担状，故称“扁担藤”，横切面呈肾形。卷须长而缠绕状，与叶对生。叶互生，具长柄，指状五小叶；小叶具柄，卵状椭圆形，长6—17厘米，宽3—7厘米，顶端突尖，基部阔楔形，边近全缘或浅波状，两面绿色无毛。春季开花，淡绿色，伞房状聚伞花序腋生。果卵圆形，肉质，熟时黄色。

生长环境 生于深山山谷密林中。

采集加工 药用根、藤。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用 味酸涩，性平。祛风湿，舒筋络。

主治用法 风湿性关节炎，腰腿痛，用五钱至一两，水煎服或浸酒服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图86　铁带藤(葡萄科)
Tetrastigma planicaule (Hook.) Gagnep.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

87 血风藤（翼核果）

别名 青藤、铁牛入石。

识别 木质藤本。根粗壮，外皮暗紫红色，易脱落，切断面淡黄色。茎多分枝，有细纵纹，幼枝绿色。叶互生，具柄，革质，卵形至卵状披针形，长4—8厘米，宽2—3.5厘米，顶端渐尖，基部阔楔形或近圆形，边近全缘，两面绿色无毛，背面侧脉极明显。夏季开花，绿白色，聚伞花序腋生。果熟时红褐色，翅状，顶端有长方形的膜翅，翅长3—5厘米。

生长环境 生于山野、沟谷林下或灌木丛中。

采集加工 药用根、茎。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用 味淡，性微温。补血，驱风，舒筋活络，强壮筋骨。

主治用法 贫血，风湿性关节炎，腰肌劳损，月经不调，用五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图87　血风藤(鼠李科)
Ventilago leiocarpa Benth.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

88 大 血 藤

别名 血藤、红藤。

识别 木质藤本。茎圆柱形，褐色，扭曲，有条纹，砍断时整个断面均有红色液汁渗出，故称“大血藤”。三出复叶互生，具柄；小叶近无柄，侧生小叶较大，斜卵形，顶生小叶菱状卵形。春季开花，黄色或黄绿色，总状花序腋生。果卵状长圆形，表面有白粉，熟时暗蓝色。

生长环境 生于深山疏林中。

采集加工 药用藤、根。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用 味苦涩，性平。祛风除湿，通经活血，驱虫。

主治用法 跌打损伤，风湿性关节炎，阑尾炎，闭经，蛔虫病，用五钱至一两，水煎服（跌打，风湿也可浸酒服）。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图88　大血藤(大血藤科)
Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

89 四方藤

别名 方藤、红四方藤。

识别 藤本。茎四方形，故称“四方藤”，下部木质，上部草质，绿色或淡紫红色，干后呈灰棕色或褐色，嫩枝稍肉质，折断后通常有液汁。卷须与叶对生，顶端分叉；叶互生，卵形或卵状心形，大小不等，一般长约10厘米，顶端急尖，基部心形，边缘有小凸起，两面绿色，幼时下面叶脉稍被柔毛。夏季开花，紫红色，聚伞花序生于枝顶，通常与叶对生。果肉质，圆球形，熟时紫黑色。

生长环境 生于山谷林下。

采集加工 药用藤茎。秋季采集，切片晒干备用。

性味功用 味微酸涩，性平。祛风湿，舒筋活络，活血消肿。

主治用法 风湿性关节炎，跌打内伤，筋络拘挛，用三至五钱，水煎服。

附注 六方藤 Cissus hexangularia Thorel ex Planch. 的茎六棱形，与本品功用相似。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图89　四方藤(葡萄科)
Cissus pteroclada Hayata

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

90 小叶买麻藤

别名 大节藤、麻骨风。

识别 常绿木质藤本，常缠绕于树上，干时变黑色。茎灰褐色，有膨大的节。叶对生，具柄，椭圆形或卵状长椭圆形，长4—10厘米，宽2.5—3.5厘米，顶端钝尖，基部楔形或稍圆，边全缘。夏季开花，穗状花序生于叶腋。种子卵圆形或长椭圆形，长约2厘米，顶端有小尖头，表面黄褐色或黑棕色。

生长环境 生于山地或丘陵灌木丛中。

采集加工 药用藤。全年可采，鲜用，或晒干备用。

性味功用 味苦，性温。祛风活血，消肿止痛。

主治用法 风湿骨痛，跌打损伤，毒蛇咬伤，用五钱至一两，鲜用一至二两，水煎服。

附注 另有一种买麻藤Gnetum montanum Markgr. 形态与本种相似，惟叶形较大，长10—20厘米，成熟种子具短柄，功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图90　小叶买麻藤(买麻藤科)
Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Cheng

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

91 小果蔷薇

别名 小金樱、白花刺、藤钩椒。

识别 藤状灌木，茎枝有小钩刺。奇数羽状复叶互生；小叶3—7枚，卵形或卵状披针形，顶端渐尖或钝头，基部钝圆，边缘有细锯齿，两面光滑无毛，叶柄具刺。春末夏初开白花，成顶生伞房状聚伞花序。果小，球形，熟时红色。

生长环境 生于山坡、村边、路旁灌木丛中。

采集加工 药用根、果。根，全年可采，洗净切片晒干备用。果，秋冬采集。

性味功用 根味苦辛涩，性温。消肿止痛，祛风除湿，健胃止泻，止血。

主治用法 跌打损伤，风湿性关节炎，劳倦，用二至三两，浸酒一斤，每次服一两，日服一至二次。小便出血，疮疖肿痛，用五钱至一两，水煎服。风痰咳嗽，用鲜果二至三两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图91　小果蔷薇(蔷薇科)
Rosa cymosa Tratt.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

92 姜　黄

别名　黄姜。

识别　多年生直立草本。根状茎形似生姜，表面暗棕色，断面深黄色至黄红色，有浓烈的芳香气。叶自根茎抽出，二列，具长柄，长椭圆形，两面无毛，叶脉羽状平行。夏末秋初开花，穗状花序；苞片顶端淡红色，每苞内有数朵淡黄色花。蒴果膜质，球形。

生长环境　多为栽培，也有野生。

采集加工　药用根茎。全年可采，洗净切片，蒸熟，晒干备用。

性味功用　味辛苦，性温。破血行气，通经止痛。

主治用法　瘀血阻滞，胸腹疼痛，月经不调，肩臂痹痛，用一至三钱，水煎服。

附注　本品根部末端的椭圆形块根，中药称“郁金”。表面土黄色，质坚硬，断面平滑，黄色而有光泽，有浓姜味。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图92 姜 黄(姜科)
Curcuma longa L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

93 大高良姜

别名 红豆蔻、山姜、良姜。

识别 多年生直立草本，高1—2米。根状茎粗壮而横走，淡棕红色，有膜质叶鞘，形成环节，稍有香气。叶2列，长椭圆形或矩圆状阔披针形，顶端急尖，基部楔形，两面无毛，叶鞘长而抱茎。夏末秋初开花，白色，有淡粉红色条纹，圆锥花序顶生。果肉质，通常不开裂，熟时橙红色，中药称“红豆蔻”，矩圆形，顶端有白色管状残萼，果皮易破碎；种子为不等的三角形，外被淡黄色假种皮，剥除后可见深棕色种皮，有香气。

生长环境 多生于山谷草丛中。

采集加工 药用根茎、果仁。根茎，全年可采；果秋季采，晒干备用。

性味功用 味辛，性温。温中散寒，行气止痛。

主治用法 脘腹胀痛，呕吐，噎膈反胃，腹泻，用根三至五钱，果仁一至二钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图93　大高良姜(姜科)
Alpinia galanga (L.) Swartz

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

94 千 年 健

别名　一包针。

识别　多年生草本。根状茎横走，长圆柱形，表面粗糙，棕红色，折断后有多数针刺状纤维，故称“一包针”，淡棕色至棕红色，气芳香。叶具长柄，基部扩大呈鞘状，叶片卵状心形，长8—17厘米，宽6—15厘米，顶端尖，基部心形，全缘。夏季开花，肉穗花序；花单性，雄花黄白色，雌花绿白色。

生长环境　多生于山谷溪边，林下阴湿处。

采集加工　药用根茎。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用　味辛苦，性温。祛风湿，强筋骨，止痛。

主治用法　风湿骨痛，四肢麻木，筋脉拘挛，用三至五钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图94　千年健(天南星科)
Homalomena tonkinensis Engl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

95 黑老虎（冷饭团）

别名 入地射香。

识别 常绿木质藤本。根紫褐色，干后皮易断裂而露出木心，有香气。茎皮棕褐色，干后黑褐色，稀有白麻点，茎、叶均含粘液。叶互生，长椭圆形或卵状披针形，长8—17厘米，宽3—6厘米，上面深绿色，光亮，近革质。春夏开花，黄色或黄红色，雌雄异株，单生于叶腋。果肉质，近圆球形，熟时紫黑色。

生长环境 生于半阴湿的山坡灌木丛中或林下。

采集加工 药用根或老藤，全年可采，洗净阴干备用。

性味功用 味辛，气香，性微温。活血散瘀，行气止痛，祛风湿。

主治用法 跌打损伤，风湿骨痛，痛经，产后腹痛，用五钱至一两，水煎冲酒服。急慢性胃肠炎，用三至五钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图95　黑老虎(五味子科)
Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Sm.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附：梅花钻（异形南五味子）

梅花钻，又名风藤、大饭团，与黑老虎功用相似。区别点为老藤茎皮有松而厚的软木塞样的栓皮，叶缘有疏小齿。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图95— 1　梅花钻(五味子科)
Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

96 山　　药

别名　石蓣、穿壁风。

识别　木质藤本，全株有芳香气。茎圆柱形，稍有棱，节膨大，常生不定根。叶互生，近革质，卵形或卵状披针形，顶端渐尖或急尖，基部楔形，有时两侧明显不对称，两面无毛或背面有稀疏短柔毛。春夏开黄绿色小花，穗状花序与叶对生。浆果小球形，光滑，黄色。

生长环境　生于沟谷林中，攀援于树上或石上。

采集加工　药用全株。全年可采，洗净切段晒干备用。

性味功用　味辛，性温。祛风湿，强腰膝，止咳止痛。

主治用法　风湿骨痛，手足麻痹，感冒风寒，咳嗽气喘，腹寒痛，用五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图96 山 蒟(胡椒科)
Piper hancei Maxim.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

97 木 姜 子

别名 山苍子、豆豉姜、土澄茄、满山香。

识别 灌木或小乔木，高达5米，全株有浓烈的姜味。根圆锥形，灰白色，质硬。幼枝黄绿色，有突起的白色点状皮孔，老枝灰褐色。叶互生，纸质，披针形或长椭圆形，上面绿色，背面粉绿色，干后变黑色。春季开淡黄色小花，花先开或与叶同时开放。果如黄豆大，基部有六齿的残萼，熟时黑色，芳香。

生长环境 多生于山坡疏林中或路旁向阳处。

采集加工 药用全株。根、茎、叶全年可采；果实，秋季采集，阴干备用。

性味功用 味辛辣，气芳香，性温。祛风散寒，消肿止痛，行气消积。

主治用法 感冒头痛，风湿骨痛，用根、茎五钱至一两，水煎服，或用鲜枝叶水煎温洗全身。胃寒冷痛，用果一钱至二钱，水煎服。

附注 1.本品含挥发油。主要成份为柠檬醛、高级醇等。

2.中药毕澄茄是胡椒科毕澄茄 Piper cubeba L. 的果实，现在常以本品果实代用，二者外形相似，不同点为前者果实基部无6齿的残萼。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图97　木姜子(樟科)
Litsea cubeba (Lour.) Pers.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

98 海桐皮（刺桐）

别名 青桐木、有鏪青桐。

识别 落叶大乔木，高达15米，树皮灰色，有圆锥形刺。羽状复叶互生，具长柄，小叶3枚，中间小叶阔卵形或菱状卵圆形，长可达15厘米，两侧小叶斜卵形，较小；托叶2枚，线形，小托叶变成乳头状腺体。春季发叶前开花，红色，排成总状花序。荚果念珠状。

生长环境 多为栽培，也有野生。

采集加工 药用树皮、叶。树皮，全年可采；叶，夏秋采集，晒干备用。

性味功用 味苦，性平。祛风湿，通经活络，驱虫。

主治用法 风湿性关节炎，用树皮三至五钱，水煎服或浸酒服。蛔虫病，用干叶粉一至二钱，开水冲服。

附注 个别地区误将木棉 Gossampinus malabarica (DC.) Merr. 和刺楸 Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai 的树皮作“海桐皮”使用，前者叶为掌状复叶，通常有小叶5枚；后者叶为单叶，掌状分裂，应与本种相区别。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图98　海桐皮(蝶形花科)
Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

99 檵经席（薄叶红厚壳）

别名 梳篦木、独角风、篦子王。

识别 灌木或小乔木，高1—5米。幼枝四棱形，有狭翅。叶对生，薄革质，长圆形至披针形，两面显光泽，干时叶缘略反卷，上面中脉微凸起，侧脉细密，平行排列呈篦子形，故叫“梳篦木”。夏季开花，白色或微带粉红色，通常3朵或数朵排成聚伞花序。核果卵状长圆形，顶端有短尖头。

生长环境 生于山地林中。

采集加工 药用根、叶。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味微苦，性平。祛风湿，壮筋骨，活血止痛。

主治用法 风湿腰腿痛，跌打损伤，月经不调，痛经，用一至二两，水煎服。外伤出血，用鲜叶捣烂敷患处，或用干叶研末撒患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图99 横经席(藤黄科)
Calophyllum membranaceum Gardn. et Champ.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

100 四块瓦

别名 土细辛。

识别 多年生草本，直立，高20—30厘米。地下根茎横生，根密生，细长，黑色。茎叶明显，有鳞片状小叶。叶对生，常两对生于茎端，近四叶轮生，故称“四块瓦”，叶片椭圆形，长4—12厘米，宽2—7厘米，顶端短尖或渐尖，基部广楔形，边缘有粗锯齿，每齿尖有一腺体，两面叶脉明显，叶柄长约1厘米。夏季开花，单枝顶生穗状花序。果倒卵形。

生长环境 生于深山密林下阴湿处。

采集加工 药用根或全草。洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味辛，性温，有小毒。驱风镇痛，活血散瘀，消肿解毒。

主治用法 风湿性关节炎，急性肠胃炎，菌痢，咳嗽，用根一至二钱，水煎服。跌打肿痛，疮疖肿毒，用鲜草捣烂敷患处。（孕妇慎服）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图100 四块瓦(金粟兰科)
Chloranthus fortunei (A. Gray) Solms

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

101 光叶海桐

别名 满山香、牙包树、五托鸡。

识别 常绿小乔木，高3—4米，上部小枝有时轮生。单叶互生，幼枝顶端呈轮生，长椭圆状披针形，两端尖，边缘略反卷，背面中脉明显突出，两面光滑。夏季开花，淡黄色，疏散顶生。蒴果卵形，顶端有短嘴，成熟时三瓣开裂；种子深红色，藏于油质果肉内，呈不规则多面体。

生长环境 生于山坡疏林或灌木丛中。

采集加工 药用根、叶。根全年可采，洗净切片晒干备用。叶多鲜用。

性味功用 味甘苦辛，气香，性微温。祛风活络，止血止痛，解毒消肿。

主治用法 风湿骨痛，跌打骨折，产后风瘫，胃痛，牙痛，用三至五钱，水煎服。毒蛇咬伤，疮疖肿毒，用鲜叶捣烂外敷或煎水外洗。外伤出血，用叶研粉撒患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图101 光叶海桐(海桐花科)
Pittosporum glabratum Lindl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

102 铺地蜈蚣

别名 收鸡草、伸筋草、地松柏。

识别 多年生常绿草本。茎细长，下部伏地，分枝斜上。营养叶（不生孢子）密生，多行螺旋状排列，线状锥尖，长2—3毫米，全缘，绿色稍带浅黄色；生殖叶（长孢子）三角形，顶端渐尖，边缘有睫毛，浅黄色，孢子囊穗无柄，着生于小枝顶端，圆柱形，长不及2厘米；孢子囊肾形。

生长环境 生于山坡草丛中。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味微甘涩，性平。舒筋活络，止血生肌，清肝明目。

主治用法 风湿骨痛，用五钱至一两，水煎服。鼻衄，吐血，用干品煅炭三至五钱，水煎服。刀伤出血，用炭末撒伤处。夜盲，用炭末蒸猪肝或鸡肝吃。疮疖肿毒，痈疮溃烂，用鲜草水煎洗患处。

附注 尚有石松 Lycopodium clavatum L. 与本品形态相似，惟孢子囊穗具柄，着生于枝顶的总梗上，总梗长5—20厘米，穗长2—5厘米，功用相似。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图102 铺地蜈蚣(石松科)
Lycopodium cernuum L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

103 威灵仙（铁脚威灵仙）

别名 黑须公、老虎须。

识别 多年生缠绕藤本，全株干后变黑色。根多数，须状，表面淡黄色，因干后变黑色，故称“黑须公”。茎细长，多分枝。奇数羽状复叶对生，小叶通常5枚，少数为3枚，卵形或披针形，顶端短尖或渐尖，基部浅心形或近圆形，全缘，基出叶脉三条，叶柄卷曲攀援它物。秋季腋生或顶生圆锥花序，花小，白色或白绿色。瘦果扁卵形，顶部有白色的丝状羽毛。

生长环境 生于村边、坡地、疏林及灌木丛中。

采集加工 药用根。秋季采集，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味辛，性温，有小毒。祛风除湿，通经活络，利尿，止痛。

主治用法 风湿骨痛，黄疸浮肿，小便不利，偏头痛，跌打内伤，用三至五钱，水煎服。鱼骨哽喉，用根二至三钱，水煎加醋慢慢吞咽。鲜叶捣烂外敷可作发泡药，为冷灸的材料。

附注 本品含白头翁素和白头翁醇。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图103　威灵仙(毛茛科)
Clematis chinensis Osbeck

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

104 竹叶艾

别名 假简蒿。

识别 一年生直立草本。茎绿色，有纵纹，被粗毛，上部分枝，小枝柔弱。叶互生，长椭圆形或倒披针形，顶端短尖，基部狭，边缘有缺刻状齿，两面被柔毛。春季开花，色白带紫；头状花序具柄，集成圆锥花序。果扁平，顶端有刺毛。

生长环境 生于路边、山坡、旷野草丛中。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味辛，性温。祛风湿，杀虫，止血。

主治用法 风湿骨痛，用鲜草捣烂酒炒敷患处，或水煎外洗。外伤出血，用鲜叶捣烂敷患处。龋齿痛，用茎煅炭研末，填塞虫孔。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图104 竹叶艾(菊科)
Erigerou canadensis L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

105 穿破石（黄芝）

别名 筋路子、饭团筋。

识别 直立或藤状灌木，全株有白色乳汁。根表皮橙黄色或土黄色，干后片状脱落，质硬，横切面暗棕色或淡红棕色。茎有粗壮锐刺。叶互生，椭圆形或矩圆状卵形，长3—9厘米，宽2—4厘米，顶端渐尖，基部浑圆，边全缘，幼叶两面被柔毛，背面更密。头状花序单生或成对，腋生。果肉质，被毛，粉绿色，熟时黄色。

生长环境 生于村边、路旁、旷野灌木丛中。

采集加工 药用根。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用 味淡，性微凉。活血散瘀，通经，舒筋活络，祛风湿。

主治用法 跌打扭伤，风湿性腰腿痛，用五钱至一两，水煎或浸酒服。肺结核，闭经，用五钱至一两，水煎服。跌打扭伤，疮疖肿痛，用鲜根皮或叶捣烂敷患处。（孕妇慎服）

附注 另一种双藤 Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur. 亦称“穿破石”，叶卵形或三浅裂，先端突尖或长尖，功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图105 穿破石(桑科)
Cudrania cochinchinensis (Lour.)
Kudo et Masam.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

106 半枫荷（翻白叶树）

别名 铁巴掌。

识别 高大乔木。树皮灰褐色，幼枝密生黄色绒毛。叶互生，二形，幼枝上的叶为盾形，3—5掌状分裂，形似枫叶，叶柄长达12厘米；老枝上的叶为长圆形，顶端短尖或渐尖，基部钝形、截形或斜心形，叶柄长1—2厘米。背面均密生锈色短绒毛。夏季开花，青白色。蒴果长圆形，有褐色毛。

生长环境 多生于山坡林中。

采集加工 药用根、叶。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用 味甘淡，性微温。祛风除湿，舒筋活络，活血消肿。

主治用法 风湿骨痛，手足麻痹，产后风瘫，跌打肿痛，用五钱至一两，水煎服或浸酒服。外伤出血，用鲜叶捣烂敷患处，或焙干研末撒患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图106 半枫荷(梧桐科)
Pterospermum heterophyllum Hance

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

107 臭 茉 莉

别名 臭牡丹、过墙风。

识别 亚灌木，高1—2米，揉碎有特殊臭气。茎直立，分枝，稍被毛。叶对生，具长柄，阔卵形或卵状心形，长10—15厘米，顶端渐尖，基部心形，边缘有粗齿，上面近无毛，背面有腺点，稍被毛。春末至初冬开花，白色或淡粉红色，管状，有香气，聚伞花序顶生，花密集如绣球状。核果肉质。

生长环境 生于村边、路旁，亦有栽培。

采集加工 药用根、叶。全年可采，洗净切片晒干备用或鲜用。

性味功用 味微苦，气臭，性平。驱风活血，杀菌消肿。

主治用法 风湿骨痛，脚气水肿，白带，高血压，支气管炎，用五钱至一两，水煎服。皮肤搔痒，疥疮疱疹，用鲜叶适量，煎水洗患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图107 臭茉莉(马鞭草科)
Clerodendron fragrans Vent.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

108 簕　　欓

别名　花椒、山胡椒、画眉跳。

识别　常绿灌木或小乔木。根横走，表皮黄色，粉质。老茎灰黑色，密布圆锥形刺，嫩枝绿色，刺尖锐，红褐色。奇数羽状复叶互生，具柄；小叶5—23枚，卵形至卵状披针形，顶端钝，基部楔形，略不对称，边缘微波状，有透明腺点，揉烂有香气。夏秋开小白花，顶生圆锥花序。果紫红色，有油腺点。种子黑色，光亮。

生长环境　生于山脚、路边疏林下或灌木丛中。

采集加工　药用根。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用　味微辛，性微温。祛风除湿，散瘀消肿，行气止痛。

主治用法　风湿骨痛，跌打肿痛，腹寒痛，用根一至二两，水煎服或浸酒服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图108　簕　欓(芸香科)
Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

109 白桐树

别名 丢了棒。

识别 灌木或小乔木；幼枝被柔毛。叶互生，阔卵形至卵状椭圆形，长9—20厘米，宽6—13厘米，顶端钝或尖，基部圆形或阔楔形，边缘有小锯齿；叶柄长，顶端有2枚小腺体。夏秋自叶腋开绿白色小花，排成细长的总状花序。蒴果球形，有三钝角，被柔毛，熟时红色，三裂。

生长环境 生于山坡、旷野灌木丛中或疏林下。

采集加工 药用根、叶。秋季采集，洗净晒干备用。

性味功用 味微苦辛，性平，有毒。祛风除湿，消肿止痛。

主治用法 风湿性关节炎，腰腿痛，跌打瘀肿，脚气水肿，用五钱至一两，水煎或浸酒服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图109 白桐树(大戟科)
Claoxylon polot (Burm. f.) Merr.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

七、止痛药

（适应各种痛症）

110 毛　　茛

别名　小毛茛、小墙风。

识别　常绿小藤本，全株有浓烈的香气。茎纤细，密被短柔毛，节膨大，常生不定根。叶互生，纸质，心脏形或卵状心形，长1.5—5厘米，宽1.5—4.5厘米，基部耳状心形，多数不对称，上面疏生小刺毛，老时近无毛，背面疏被短柔毛，叶脉5—7条，基生或近基生；叶柄长1.5—4厘米，密被短柔毛。夏季开淡绿色花。果椭圆形，密集成穗状。

生长环境　喜生于山沟林下阴湿处，铺地或爬在石壁上。

采集加工　药用全株。全年可采，洗净阴干备用。

性味功用　味辛，性温。祛风活血，行气止痛。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治用法 风湿性腰腿痛，跌打损伤，用一至二钱水煎冲酒服。胃痛，腹痛，用五分至一钱，水煎服或研末开水送服。




图110 毛 蒟(胡椒科)
Piper puberulum (Benth.) Maxim.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

111 通 城 虎

别名 定心草、五虎通城。

识别 多年生缠绕藤本。根细长，淡黄色，断面“风车”状。茎纤细，淡绿色。叶互生，长卵形或心形，长4—10厘米，宽3—8厘米，顶端渐尖或长尖，基部耳垂状，叶面皱缩，绿色，背面绿白色，网脉明显凸出，脉上有细小短柔毛。夏季开花，暗紫色。蒴果短圆柱形，呈马铃状。

生长环境 常生于岩壁下或山脚肥沃湿润处。

采集加工 药用根。夏秋采集，洗净切片晒干备用。

性味功用 味苦辛，性温，有小毒。祛风止痛，消肿解毒。

主治用法 心胃气痛，风湿骨痛，跌打损伤，小儿惊风，毒蛇咬伤，用二分至一钱，水煎服。外用适量。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图111 通城虎(马兜铃科)
Aristolochia fordiana Hemsl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

112 金耳环

别名 土细辛。

识别 多年生草本。根茎短，须根细长，灰黄色，较粗壮，干时易折断，断面粉白色，有香气。叶基生，卵状三角形或箭形，顶端渐尖，基部耳垂状，全缘，上面被疏短毛，背面叶脉有疏长毛。春季开花，单朵，自基部抽出，紫红色。蒴果。

生长环境 多生于深山溪林下阴湿处。

采集加工 药用全草。夏秋采集，洗净晒干备用。

性味功用 味辛，性温。祛风散寒，平喘止咳，行气止痛，解毒消肿。

主治用法 风寒咳嗽，支气管哮喘，腹寒痛、龋齿痛，毒蛇咬伤，跌打肿痛，用一至二钱，水煎服。龋齿痛兼用根研末，填塞虫孔，毒蛇咬伤，跌打肿痛，兼用鲜草捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图112 金耳环(马兜铃科)
Asarum longipedunculatum O. C. Schmidt

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

113 乌　药

别名　鸡骨香、千打锤、吹风散。

识别　常绿灌木或小乔木。根粗壮，质硬，略成念珠状。幼枝密被锈色柔毛，后变无毛，芽与幼叶有银白色绢毛。叶互生，革质，阔椭圆形至卵形，顶端尾尖，上面亮绿色，背面粉绿色，有柔毛，基出脉三条。春季开花，黄绿色，为腋生伞形花序。果球形，熟时黑色。

生长环境　生于山坡疏林中。

采集加工　药用根。秋冬采集，洗净切片晒干备用。

性味功用　味辛，气香，性温。温中散寒，行气止痛，散瘀消肿。

主治用法　心腹胃气诸痛，宿食不化，疝气，中风，哮喘，夜尿症。用一至三钱，水煎服。风湿性关节炎，跌打肿痛，用鲜叶捣烂酒炒敷患处。

附注　1.本品含乌药硷甲、乌药硷乙、乌药醇、乌药酸及龙脑等。

2.另有一种乌药Lindera chunii Merr.与本品形态相似，其识别点，老叶背面被近铜色或银色的密毛，有光泽。功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图113 乌　药(樟科)
Lindera strychnifolia F.-Vill.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

114 阴　香

别名　山玉桂、假玉桂、香胶叶。

识别　常绿乔木，高可达10余米，树皮灰褐色，光滑，有玉桂味。叶互生，革质，卵形或长椭圆形，长6—10厘米，宽2.5—4厘米，全缘，上面亮绿色，背面粉绿色，离基三出脉。初春腋生或顶生圆锥花序，花小，淡绿色。果小，卵形，成熟时暗紫色。

生长环境　生于山谷林中，也有栽培。

采集加工　药用根皮、树皮、叶。全年可采，7—8月采为佳，阴干备用。

性味功用　味辛微甘，气香，性温。祛风行气，消肿止痛、止血。

主治用法　跌打肿痛，疮疖肿毒，用树皮研末酒调涂患处。创伤出血，用树皮或叶研末敷患处。水泻，胃痛，用根皮一至三钱，水煎服。

附注　1.本品功用与玉桂相同，惟功效略差。

2.本品树皮含挥发油，其主要成分是桂醛、丁香酚和黄樟油素。叶主要含丁香酚及芳樟醇。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图114 阴　香(樟科)
Cinnamomum burmanni (Nees) Bl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

115 竹叶椒

别名 土花椒、山花椒。

识别 常绿灌木或小乔木，全株有芳香气；枝、叶轴及叶背中脉有扁刺。奇数羽状复叶互生，具柄，叶轴有狭翅；小叶3—9枚，对生，无柄，披针形，少数为卵形，全缘，有透明腺点。夏季开淡黄色小花，腋生聚伞圆锥花序。果球形，红色，有凸起的油腺点。种子黑色，光亮。

生长环境 生于山坡、山脚、路旁灌木丛中。

采集加工 药用根、叶、果。根，全年可采，洗净晒干备用；叶，随用随采；果，夏秋间采。

性味功用 味辛，性温，有小毒。祛风行气，散寒去湿，散瘀消肿。

主治用法 腹寒痛，风湿疼痛，跌打损伤，毒蛇咬伤，用根三至五钱，水煎服或浸酒服。感冒发热，用鲜叶水煎洗身。毒蛇咬伤兼用鲜叶捣烂敷伤口周围。（孕妇忌服）

附注 毛竹叶椒 Zanthoxylum planispinum S. et Z. f. ferrugineum (Rehd. et Wils.) Huang 与本种形态相似，惟叶柄上有毛。功用相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图115 竹叶椒(芸香科)
Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

116 吴茱萸

别名 茶辣、吴萸。

识别 落叶大灌木；幼枝、叶轴及花序密被黄褐色柔毛。奇数羽状复叶互生，具柄；小叶5—9枚，对生，椭圆形或卵形，全缘，两面被柔毛，背面毛较密，有黑褐色腺点。夏末秋初开小白花，花多而密集，组成顶生圆锥状聚伞花序。蒴果紫红色，有油腺点。种子黑色，光亮。

生长环境 多为栽培，也有野生。

采集加工 药用果实。秋季当果实呈黄绿色近成熟时采摘，连枝剪下暴晒，干后去枝柄备用。

性味功用 味辛苦，性温，有小毒。温中祛寒，开郁下气，健胃止痛。

主治用法 脘腹胀痛，肝气郁滞，呕恶嗳酸，疝气冷痛，月经痛及风湿痹痛，用五分至一钱五分，水煎服；或研末吞服，每次二至三分。

附注 1.本品含挥发油、吴萸碱等。

2.石虎 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang 和野吴萸 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang与本种相似，功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图116 吴茱萸(芸香科)
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

117 石 蟾 蜍

别名 山乌龟、铜秤锤。

识别 多年生缠绕藤本。根圆柱状，有时块状，外皮淡棕色或棕褐色，有横纹和裂纹。茎细软，光滑无毛。单叶互生，阔三角状近圆形，直径6厘米左右，顶端有小凸尖，基部截形或略显心形，全缘，背面粉绿色，两面均有短柔毛；叶柄盾状着生，长与叶片相等。春末夏初开小黄花。核果球形，熟时红色。

生长环境 生于溪边疏林下或石山脚灌木丛中。

采集加工 药用根茎。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味苦辛，性寒，有小毒。祛风除湿，利尿通淋，解毒。

主治用法 脚气浮肿，风湿性关节炎，毒蛇咬伤，痈疮肿毒，用三至五钱，水煎服。外用适量，捣烂敷患处。

附注 1.本品经加工即为中药“粉防己”之一。

2.根含粉防己碱、去甲基防己碱及酚性生物碱等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图117 石蟾蜍(防己科)
Stephania tetrandra S. Moore

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

118 华千金藤

别名 石琴薯、山乌龟、独脚乌桕、金不换。

识别 多年生木质缠绕藤本，全株无毛。块根大，呈不规则球形，大者重达100—200斤，表面褐色，断面肉质。茎有条纹。叶互生，纸质，阔三角状近圆形，长6—15厘米，顶端有小凸尖，基部平截或近圆形，上面绿色，背面粉绿色，叶脉放射状。春末夏初开小花，单性异株，排列成伞状。核果倒卵形。

生长环境 生于大山石缝或溪边。

采集加工 药用块根。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用 味苦，性寒。清热解毒，散瘀消肿，健胃止痛。

主治用法 急性胃肠炎，菌痢，胃痛，牙痛，上呼吸道感染，用三至五钱，水煎服。痈疮肿毒，跌打肿痛，用鲜根捣烂外敷。

附注 本品可作提取延胡索乙素的原料。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图118 华千金藤(防己科)
Stephania sinica Diels

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

119 石 菖 蒲

别名 野韭菜、水蜈蚣、水剑草、香草。

识别 多年生草本。根状茎横走，圆柱形，稍扁，密生环节，多须根，表面黄褐色，断面类白色至淡棕色，有香气。叶丛生，线形或线状剑形，全缘，叶脉平行，无明显中脉。夏秋开花，肉穗花序无柄，花小而密集，淡黄绿色。

生长环境 喜生于沟谷，溪边石上。

采集加工 药用根茎。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味辛，性温。芳香开窍，祛风除湿，理气止痛。

主治用法 癫狂，惊痫，痰厥昏迷，耳聋，健忘，胸腹胀闷或疼痛，用一至三钱，水煎服。

附注 水菖蒲Acorus calamus L. 与本种相似，惟叶较宽，中脉明显，功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图119 石菖蒲(天南星科)
Acorus gramineus Soland. ex Ait.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

八、活血止血药

（适应内外伤出血、月经不调、月经过多、血崩、吐血、衄血、便血、尿血等疾病）

120 田　七

识别　多年生直立草本。块根圆锥形或纺锤形，有分枝及须根。春季抽茎，绿色，无毛。掌状复叶轮生于茎顶，具长柄；小叶5—7枚，椭圆形或倒卵状披针形，顶端渐尖，基部楔形，边缘有锯齿，两面叶脉上有长硬毛；两侧小叶较小。7—10月开黄白色小花，成顶生的伞形花序。浆果肾形，鲜红色。

生长环境　栽培。

采集加工　药用全草。根，在农历大暑及冬至前后采收，洗净晒干备用；叶，随用随采。

性味功用　味甘微苦，性温。活血止血，去瘀止痛。

主治用法　咳血，吐血，便血，尿血，鼻

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

衄，崩漏，产后恶露不尽，田七粉五分至一钱，冲水服。跌打损伤，宜冲酒服，也可用药粉酒调敷患处，或用鲜叶捣烂外敷。（孕妇慎服）



图120 田　七(五加科)
Panax sanchi Hoo, Mss.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

121 大叶紫珠

别名 白骨风、大风叶。

识别 直立灌木。茎方形，被灰白色或黄褐色绒毛。叶对生，长椭圆形或椭圆状披针形，长10—27厘米，宽5—12厘米，顶端渐尖，基部楔形，边缘有锯齿，上面绿色被绒毛，背面密被灰白色粉状毛。夏季开花，紫色，腋生聚伞花序，花序柄长达4厘米。果小，球形，熟时紫红色。

生长环境 生于山坡、丘陵、村边灌木丛中。

采集加工 药用叶。夏秋采集，晒干研粉备用或鲜用。

性味功用 味微辛苦，性平。止血，止痛，散瘀消肿，生肌埋口。

主治用法 咯血，吐血，衄血，便血，用五钱至一两，水煎服。外伤出血，用药粉撒患处。扭伤肿痛，用鲜叶捣烂敷患处。

附注 紫珠有多种，如裸花紫珠 Callicarpa nudiflora Hook. et Arn. 和尖尾风 Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr. 等均有止血作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图121 大叶紫珠(马鞭草科)
Callicarpa macrophylla Vahl

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

122 茜　草

别名　茜根、四轮草。

识别　多年生蔓性草本。根细长，圆柱形，灰黄色或微紫红色，干后表面棕色或红棕色，有细纵纹，断面黄红色或淡红色。茎方形，有倒生刺毛。叶通常4枚轮生，具柄，卵状心形或卵状披针形，顶端尖，基部心形或圆形，边全缘，上面粗糙，背面中脉有倒生刺毛。秋季开淡黄绿色花；聚伞花序排成圆锥状。果球形，熟时黑色。

生长环境　生于山坡、沟谷林下或灌木丛中。

采集加工　药用根。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用　味苦，性寒。活血止血，散瘀通经。

主治用法　咯血，吐血，衄血，尿血，跌打肿痛，闭经，用三至五钱，水煎服。止血多炒成炭用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图122 茜　草(茜草科)
Rubia cordifolia L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

123 地　榆

别名　马连鞍。

识别　多年生草本。根粗壮，圆柱形，有分枝，表面棕褐色。茎直立，光滑无毛。奇数羽状复叶互生，基生叶具长柄，茎生叶近无柄，柄基部鞘状抱茎；小叶5—17枚，矩圆形至线状矩圆形，边缘有尖圆锯齿，无毛或背面被柔毛；托叶及小托叶呈叶状，边缘有齿。夏秋开紫红色小花，成顶生圆柱形穗状花序。瘦果小，褐色。

生长环境　生于山坡、旷野草丛中。

采集加工　药用根。秋季采集，洗净切片晒干备用。

性味功用　味苦，性微寒。凉血止血，消炎，收敛。

主治用法　胃肠出血，痔疮出血，月经不止，痢疾，狂犬病，用五钱至二两，水煎服。汤火伤，疮疡，外伤出血，用鲜药捣烂，外敷患处，或用根研粉同茶油调涂敷患处。

附注　1.本品含地榆皂甙及鞣质。

2.本品对结核杆菌、宋内氏痢疾杆菌、变形杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、霍乱弧菌、金黄色葡萄球菌及绿脓杆菌等均有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图123 地　榆(蔷薇科)
Sanguisorba officinalis L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

124 月季花

别名 月月红、四季红。

识别 常绿灌木；枝绿色，有小钩刺。奇数羽状复叶互生，具柄；小叶3—7枚，卵形或卵状椭圆形，顶端短渐尖，基部近圆形或钝，边缘有锐齿；托叶与叶柄合生，边缘有腺毛。四季开花，红色或玫瑰红色，无香气或微有香气，重瓣，萼片外反，羽状深裂，内面被白色绒毛。果卵形，熟时红色。

生长环境 常栽培于庭园和村边，也有野生。

采集加工 药用根、花。根全年可采，洗净切片晒干备用，春季采花，阴干或烘干备用。

性味功用 味甘，性温。活血通经，调经止痛，消肿散结。

主治用法 痛经，闭经，月经不调，赤白带，腰腿痛，用干花三至五钱，或用根五钱至一两，水煎服。淋巴结核，跌打损伤，用嫩叶捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图124 月季花(蔷薇科)
Rosa chinensis Jacq.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

125 大　蓟

别名　老虎刺、刺青菜。

识别　多年生草本，高不及1米。块根纺锤形或圆锥形，肉质，表面棕褐色，断面黄白色。茎直立，被灰白色长毛，多分枝。叶无柄，基部抱茎，长椭圆形或倒披针形，羽状深裂，裂片边缘有裂齿和针状刺，两面散生长毛。夏季开花，淡紫红色，成顶生头状花序。

生长环境　生于村边、荒野、山坡。

采集加工　药用根。春秋采集，洗净晒干备用或鲜用。

性味功用　味甘，性凉。凉血散瘀，消肿止痛。

主治用法　吐血，衄血，尿血，肺脓疡，用三钱至一两，水煎服。跌打扭伤，疮疖肿痛，用鲜根捣烂敷患处。汤火伤，用根研末调香油涂患处。黄疸用鲜根一至二两，水煎冲糖服。

附注　小蓟 Cirsium chinense Gardn. et Champ. 与本种相似，惟叶羽状分裂较浅，背面密被灰白色长绵毛。功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图125 大　蓟(菊科)
Cirsium japonicum DC.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

126 落地生根

别名 叶生根。

识别 多年生肉质草本。茎直立，圆柱形，节明显，中空，上部紫红色。单叶或羽状复叶，复叶有3—5小叶，椭圆形或长椭圆形，厚而肉质，边缘有圆锯齿，叶落地可发芽生根。冬春开淡紫红色花，钟形，下垂。

生长环境 野生于山坡、沟谷、路边，也有栽培。

采集加工 药用鲜叶。随用随采。

性味功用 味淡微酸涩，性寒。凉血，止血，消肿，拔毒，生肌。

主治用法 外伤出血，痈疮肿毒，汤火伤，急性结膜炎，用鲜叶捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图126 落地生根(景天科)
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

127 伽蓝菜

别名 土三七、鸡爪三七。

识别 多年生肉质草本，直立，高达1米。叶对生，肉质，羽状深裂，裂片披针形，全缘或不规则羽状浅裂，顶生叶均为披针形。四季开黄色或橙红色花，高脚蝶形，为顶生聚伞花序。

生长环境 多为栽培。

采集加工 药用茎、叶。全年可采，常为鲜用。

性味功用 味甘淡，微苦辛，性微寒。凉血止血，散瘀消肿，止痛，解毒。

主治用法 跌打损伤，毒蛇咬伤，用鲜草一至二两，捣烂酒调取汁服，渣敷伤处。外伤出血，疮疡肿痛，汤火伤，湿疹，用鲜叶捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图127 伽蓝菜(景天科)
Kalanchoe laciniata (L.) Pers.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

128 麻 疯 树

别名 青桐木。

识别 灌木或小乔木，全株有灰白色乳汁。小枝绿色，光滑无毛，老枝有半月形叶痕。叶互生，具长柄，卵圆形或近圆形，全缘或有3—5角，基部心形，叶脉掌状，形似油桐叶。春夏开淡绿色小花；聚伞花序腋生，具长柄。蒴果球形，熟时黄色，三裂。

生长环境 常栽培于园边作绿篱。

采集加工 药用鲜叶。随用随采。

性味功用 味涩，性微寒，有毒。散瘀消肿，止血，止痛，杀虫止痒。

主治用法 跌打瘀肿，创伤出血，用鲜叶适量捣烂敷患处。皮肤搔痒，湿疹，用鲜叶置火上烤热至叶柔软时揉烂擦患处。本品有毒。仅作外用，不能内服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图128 麻疯树(大戟科)
Jatropha curcas L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

129 槐　树

别名　槐花米。

识别　落叶乔木，高达16米；树皮灰色，粗糙，内皮鲜黄色，有臭味。奇数羽状复叶互生；小叶7—15枚，卵形至卵状披针形，顶端尖，基部圆或楔形，全缘，上面绿色，背面粉绿色。夏秋顶生圆锥花序；花白色或淡黄色，蝶形。荚果肉质，念珠状，内含1—6枚种子。

生长环境　多为栽培。

采集加工　药用花和果实。花（槐花），5—7月含苞待放时采收，蒸过，晒干备用。果实（槐实），秋季采收，用开水汤过，晒干备用。

性味功用　味苦，性寒。泻热，凉血，止血。

主治用法　胃肠出血，小便出血，鼻衄，痔疮出血，痢疾，目赤肿痛，高血压头痛，用花或果实二至三钱，水煎服。

附注　本品花含芸香甙等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图129 槐　树(蝶形花科)
Sophora japonica L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

130 猫 尾 草

别名 狐狸尾、狼狗尾、九子莲花。

识别 直立亚灌木；枝被短柔毛。奇数羽状复叶互生，具长柄；小叶3—7枚，矩圆形，卵状披针形或卵形，长4—10厘米，宽2—5.5厘米，顶端钝圆或急尖，基部圆形，全缘，背面网脉凸起；托叶长三角形，小托叶针状。夏季开紫色蝶形花，顶生总状花序长达20厘米，花多而密集，状如猫尾。荚果小，椭圆形。

生长环境 生于山坡、路旁、村边灌木丛中。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味淡，性凉。散瘀止血，清热止咳。

主治用法 吐血，咯血，尿血，刀伤出血，肺热咳嗽，子宫脱垂，脱肛，用一至二两，水煎服。（孕妇慎服）

附注 长穗猫尾草 Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. var. macrostachya Wall. 与本种相似，惟花序长达30厘米以上，功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图130 猫尾草(蝶形花科)
Uraria crinita (L.) Desv. ex DC.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

131 假 烟 叶

别名 野烟叶。

识别 直立灌木，高1—5米，全株有灰白色粉状毛。叶互生，有时对生，阔卵形，长10—23厘米，略似烟叶，揉烂有特殊臭气，背面苍白，密被柔毛。花序顶生或近顶生，花白色。秋冬结果，浆果球形有小指头大，成熟时淡黄色。种子多，象辣椒子。

生长环境 生于村边、路旁、旷野灌木丛中。

采集加工 药用根、叶。夏秋采叶，冬季采根，洗净晒干备用。

性味功用 味苦微辛，性温，有毒。清热消肿，杀虫，止痒，止血。

主治用法 痈疮肿毒，湿疹，皮炎，外伤感染，用鲜品适量，捣烂外敷，或煎浓汁外洗患处。外伤出血，用叶捣烂外敷，或用干粉撒伤口。

附注 本品有毒，含龙葵甙，中毒后口腔、咽喉，食道及胃有烧灼感，重则神经错乱，呼吸急促，脉搏减缓，甚至呼吸衰竭而死亡。解救法：立即给催吐剂，洗胃并内服鞣酸水及对症治疗。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图131 假烟叶(茄科)
Solanum verbascifolium L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

九、补益强壮药

（适应病后虚弱、产后血虚、营养不良等疾病）

132 黄　精

别名　德保黄精。

识别　多年生草本。根状茎横走，结节块状，形似生姜，表面黄白色或青绿色。茎下部有紫色斑点。叶4—8枚轮生，长椭圆状披针形或线形，顶端内卷，边全缘，两面绿色无毛。夏季开花，紫红色，2—4朵聚生于叶腋。浆果球形，熟时黑色。

生长环境　生于山地林下或阴湿的灌木丛中。

采集加工　药用根茎。全年可采，以秋季采较好，洗净，蒸过晒干备用。

性味功用　味甘，性平。补脾润肺，益气滋阴。

主治用法　脾胃虚弱，肺虚咳嗽，病后虚弱，产后气血虚弱等症。用三至六钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附注 尚有多花黄精 Polygonatum multiflorum (L.) All. 竹叶黄精 Polygonatum cirrhifolium (Wall.) Royle 长叶假万寿竹 Disporopsis longifolia Graib 等，功用均相同。




图132 黄　精(百合科)
Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

133 杜　仲

别名　扯丝皮，丝棉皮。

识别　落叶乔木，高达10余米；树皮、枝、叶、果皮均含银白色胶质，折断有弹性的胶丝；树皮具皮孔，有纵裂槽纹，淡褐色或黄褐色。叶互生，具柄，椭圆形或卵状椭圆形，顶端渐尖，基部圆形，边缘有锯齿，两面绿色。春末开花，单生于苞腋。果长椭圆形，四周有薄翅，中部稍凸起，内有一粒线形种子。

生长环境　生于向阳山坡或山麓旷野地，亦有栽培。

采集加工　药用树皮。夏季采集，刮去粗皮，晒干备用。用时切片，加些盐水炒断丝用。

性味功用　味甘，微辛，性平。补肝肾，壮筋骨，安胎。

主治用法　肾虚腰痛，高血压，体质虚弱，先兆流产，用三至五钱，水煎服。鲜皮捣烂外用治跌打损伤，疖肿。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图133 杜　仲(杜仲科)
Eucommia ulmoides Oliv.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

134 狗脊（金毛狗脊）

别名 黄狗头。

识别 多年生蕨类植物。根状茎粗大，横走，木质，密被金黄色长柔毛。叶大，簇生，具长柄，三回羽状分裂，近革质，上面绿色，干后变褐色，背面灰白或灰蓝色，两面均无毛，末回裂片线形，边缘有浅锯齿。孢子囊群着生于裂片背面边缘，圆形，1—5对；囊群盖坚硬、棕褐色，熟时两瓣张开形似蚌壳状。

生长环境 生于山脚沟边林下阴湿处。

采集加工 药用根茎及黄毛。全年可采，削去外皮，洗净切片蒸熟晒干备用；黄毛在未削去外皮前，先将黄毛拔下，除去杂质，烘干备用。

性味功用 味苦，性温。补肝肾，壮筋骨，祛风湿。

主治用法 肾虚腰痛，风湿骨痛，用根三钱至一两，水煎服。外伤出血，用黄毛敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图134 狗 脊(蚌壳蕨科)
Cibotium barometz (L.) J. Sm.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

135 五　加

别名　五加皮。

识别　灌木；枝无刺或有钩刺。掌状复叶互生，具长柄，柄光滑或有小刺；小叶通常5枚，近无柄，倒卵形或倒卵状披针形，顶端渐尖，基部楔形，边缘有细锯齿，两面无毛或背面叶脉上有毛。夏季开小白花，成腋生的伞形花序。浆果球形，紫黑色。

生长环境　生于山坡、沟谷林边或灌木丛中。

采集加工　药用根皮。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用　味辛，性温。祛风湿，壮筋骨。

主治用法　风湿，跌打，用根皮一至二两，浸酒服。体虚劳损，脚气，阳萎，用根皮三至五钱，水煎服。跌打骨折，用根皮捣烂，酒炒外敷患处。

附注　本品含维生素甲、维生素乙、鞣质及挥发油。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图135 五　加(五加科)
Acanthopanax gracilistylus W. W. Sm.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

136 三叶五加

别名 三加皮、白簕根。

识别 藤状灌木；枝有小钩刺。掌状复叶互生，具长柄，柄通常有刺；小叶3枚，无柄，卵圆形或长椭圆形，边缘有浅齿，两面无毛或叶脉上有刺毛。秋季枝顶开白色小花，多朵组成伞形花序，复由此花序组成总状花序或复伞形花序。浆果球形，熟时黑色。

生长环境 生于山坡、溪边灌木丛中。

采集加工 药用根、叶。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用 味辛苦，性微温。祛风湿，散瘀止痛。

主治用法 风湿，跌打，用根一至二两，水煎或浸酒服。骨折，刀伤，疖肿疮疡，用鲜叶或根皮捣烂外敷。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图136 三叶五加(五加科)
Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

137 羊　乳

别名　四叶参、奶参。

识别　多年蔓生草本，有白色乳汁。根肉质，纺锤形，表面淡黄褐色，断面白色。茎淡紫色，细长。叶2—4枚，近轮生或对生，椭圆形或卵状披针形，顶端短尖，基部楔形，全缘，上面绿色，背面灰绿色。秋季开花，黄绿色，有紫褐色斑点，1—2朵生于枝顶。果圆锥形，顶端三裂。

生长环境　生于山坡、荒野灌木丛中。

采集加工　药用根。全年可采，洗净蒸透切片晒干备用。

性味功用　味甘，性平。祛痰排脓，生津催乳。

主治用法　肺脓肿，痈疮肿毒，产后缺乳。用五钱至一两，水煎服。

附注　本品含皂甙。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图137 羊　乳(桔梗科)
Codonopsis lanceolata Benth. et Hook.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

138 牛大力（美丽崖豆藤）

别名 山莲藕、大力牛。

识别 藤状灌木；小枝、叶轴及花序密被绒毛。根粗壮而横走，粉质，外皮灰黄色。奇数羽状复叶互生，具长柄；小叶7—17枚，对生，长圆形至长圆状披针形，顶端钝或尖，基部圆形，全缘，上面无毛，背面被伏贴长柔毛；托叶及小托叶锥尖。秋季开白色花，蝶形，为腋生总状花序。荚果线形，扁平，密被锈色绒毛。

生长环境 生于山坡、沟谷灌木丛中或疏林下。

采集加工 药用根。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味甘，性平。益气润肺，强筋活络。

主治用法 病后体虚，肺虚咳嗽，风湿痹痛，用一至二两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图138 牛大力(蝶形花科)
Millettia speciosa Champ.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

139 锦 鸡 儿

别名 土黄芪、阳雀花。

识别 落叶灌木，高达2米，全株无毛。偶数羽状复叶互生，具柄；小叶2对，上面一对较大，倒卵形，顶端圆或微凹，有小尖头，基部楔形，全缘，近革质；叶轴脱落或变成硬刺；托叶2枚，刺状。春末夏初开花，黄色而带红，蝶状，单生于叶腋。荚果线形，略扁平，无毛。

生长环境 生于山坡灌木丛中。

采集加工 药用根。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味甘，性平。滋补强壮，健脾利湿。

主治用法 病后虚弱，头晕耳鸣，用根五钱至一两，水煎服。白带，配白鸡冠花、牛膝各四钱，共醋炒，加水、醋各半煎汤服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图139 锦鸡儿(蝶形花科)
Caragana sinica (Buchoz) Rehd.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

140 三叶鸡血藤（密花豆）

别名 鸡血藤、猪血藤、九层风。

识别 木质大藤本，长达数十米。老茎扁圆柱形，砍断后有鸡血状粘液渗出，呈数圈偏心环。羽状复叶互生，具长柄；小叶3枚，中间小叶卵形，侧生小叶斜卵形，全缘，两面几无毛，背面叶脉明显。夏末秋初开小白花，蝶形，多朵组成圆锥花序，生于枝顶叶腋。荚果扁平，刀状，被绒毛。

生长环境 生于山谷丛林中。

采集加工 药用藤。全年可采，切片晒干备用。

性味功用 味微苦甘涩，性平。行血补血，通经活络。

主治用法 贫血，月经不调，风湿骨痛，遗精，白浊，用五钱至一两，水煎服。

附注 厚果鸡血藤 Millettia pachycarpa Benth. 又名毒鱼藤，含有毒素鱼藤酮，不可混用，禁内服，可用于杀灭蝇蛆和孑孓。羽状复叶有小叶7—13枚，易与本种区别。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图140 三叶鸡血藤(蝶形花科)
Spatholobus suberectus Dunn

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附1　鸡血藤

鸡血藤，又称白骨藤、马下消，功效甚佳，惟本区使用不如三叶鸡血藤普遍。羽状复叶有小叶 7 — 9 枚，圆锥花序柔软而下垂，花紫红色。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图140—1　鸡血藤(蝶形花科)
Millettia reticulata Benth.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附2　亮叶鸡血藤

亮叶鸡血藤，亦称鸡血藤。老茎圆柱形，断面仅有一圈鸡血状粘液渗出；羽状复叶有小叶5枚，小叶两面光亮无毛。另有一种山鸡血藤 Millettia dielsiana Harms ex Diels 与本种形态极相似，惟叶背有毛，均可代用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图140—2　亮叶鸡血藤(蝶形花科)
Millettia nitida Benth.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

141 黄花倒水莲

别名 鸡仔树、黄花参。

识别 灌木，高1—3米，全株有甜味。根粗壮，淡黄色，肉质。叶互生，膜质，披针形或倒卵状披针形，顶端渐尖，两面疏生短柔毛。夏季开鲜黄色小花，顶生穗状花序，下垂。果阔肾形，成熟时两侧开裂。种子密被短柔毛，一端平截，一端突起，象初生的小鸡，故又称“鸡仔树”。

生长环境 生于山谷、溪边林中。

采集加工 药用根、叶。根全年可采，叶夏秋采，洗净晒干备用。

性味功用 味甘，性平。补气血，壮筋骨。

主治用法 病后虚弱，产后血虚，肾虚腰痛，脾虚水肿，子宫脱垂，月经不调，用根五钱至一两，水煎服。外伤出血，用鲜叶捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图141 黄花倒水莲(远志科)
Polygala aureocauda Dunn

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

142 大叶千斤拔

别名 千斤力、大猪尾。

识别 直立亚灌木；嫩枝密被伏贴毛。掌状复叶互生；小叶3枚，阔披针形或长椭圆形，长6.5—15厘米，宽3—7厘米，顶端渐尖，基部楔形，全缘，基出叶脉三条，侧生小叶不对称，基出叶脉二条；叶柄长，有狭翅，被毛。夏秋开花，蝶形，紫红色；总状花序腋生，长3—6厘米。荚果椭圆形，被毛，内含1—2枚种子。

生长环境 生于山坡、旷野草丛或灌木丛中。

采集加工 药用根。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用 味甘淡涩，性平。舒筋活络。强腰壮骨。

主治用法 腰肌劳损，偏瘫痿痹，风湿骨痛，气虚脚肿，劳伤久咳，用一至二两，水煎服。

附注 千斤拔 Moghania philippinensis (Merr. et Rolfe) H. Y. Li 与本种形态相似，不同点为后者叶宽2—3厘米，花序长2—2.5厘米。功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图142 大叶千斤拔(蝶形花科)
Moghania macrophylla (Willd.) Kuntze

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

143 板　栗

别名　毛栗壳。

识别　落叶乔木，高达10余米；树皮暗褐色，幼枝被毛。叶互生，具短柄，椭圆形或矩圆状披针形，长8—17厘米，顶端渐尖，基部近圆形，边缘有锯齿，刺端内弯，上面绿色无毛，背面密被短柔毛。夏季开小花，淡黄褐色，葇荑花序圆柱形。果壳草黄色，密生针状刺，熟时裂开四瓣，散出坚果1—3个，坚果扁圆形，光亮，暗褐色。

生长环境　栽培。

采集加工　药用果实、果壳及叶。秋季采果实、果壳，夏季采叶。

性味功用　果实味甘性平。补中益气。壳味微甘，性平。清火，化痰散结。叶味微甘，性平。驱风止痒，止咳。

主治用法　果实为滋养强壮剂，通常作食品，用量不拘。咳嗽，痰火瘰疬，用果壳一至二两，水煎服。防治百日咳，用叶三至五钱，水煎服。漆疮，用鲜叶适量，煎水外洗。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图143 板　栗(山毛榉科)
Castanea mollissima Bl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

144 杜仲藤

别名 藤杜仲、土杜仲。

识别 木质藤本，全株有白色乳汁。茎皮含橡胶，折断后有白色的弹性胶丝。叶对生，具柄，椭圆形或矩圆形，顶端渐尖，基部急尖或圆形，全缘，两面无毛。春末夏初开小花，白色稍带红色，多朵组成圆锥状聚伞花序，生于小枝上部叶腋。蓇葖果2枚，状似小羊角，熟时一侧开裂；种子顶端有白色丝状毛。

生长环境 生于深山山谷、溪边疏林中。

采集加工 药用藤茎。全年可采，切片晒干备用。

性味功用 味苦辛，性平。强筋骨，补腰肾，祛风湿，通经络。

主治用法 腰腿痛，肾虚腰痛，风湿性关节炎，用三钱至一两，水煎或浸酒服。

附注 毛杜仲藤 Parabarium huaitingii Chun et Tsiang 与本种功用相同，形态相似，区别点为嫩枝及叶的两面均密被柔毛。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图144 杜仲藤(夹竹桃科)
Parabarium micranthum (wall.) Pierre

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十、健胃消滞药

（适应消化不良、小儿疳积等疾病）

145 饿蚂蝗

别名 山蚂蝗、粘身草。

识别 灌木，全株被柔毛，有丝绢光泽。羽状复叶互生，具柄；小叶3枚，椭圆状倒卵形或阔披针形，全缘，上面近无毛，背面叶脉上被柔毛；托叶披针形，小托叶钻状。夏秋开花，顶生或腋生总状花序；花小，白色，蝶状。荚果线形，扁平，有节，密被小钩毛。

生长环境 生于山坡、溪边草丛中或树林边缘。

采集加工 药用根或全株。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味甘，性平。消食止痛，解蛇毒。

主治用法 胃痛，小儿疳积，毒蛇咬伤，用三钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图145 饿蚂蝗(蝶形花科)
Desmodium sambuense (G. Don) DC.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

146 霜坡虎

别名 地瓜藤、爬地牛奶、钻地龙。

识别 蔓性灌木，全株有白色乳汁。茎藤状而爬地，故称“爬地牛奶”，茎节伏地生褐色须根。单叶互生，具柄，柄基部有2枚膜质棕色托叶，叶片卵状椭圆形，或倒卵形，长3—5厘米，宽2—4厘米，先端钝尖，基部近圆形或稍不对称，边缘有波状锯齿，上面绿色而粗糙，背面淡绿色，脉上被毛。夏季雌花与雄花同着生于囊状花托内。果扁球形，红褐色。

生长环境 生于山坡、路边、旷野草丛中。

采集加工 药用全草。全年可采。

性味功用 味苦，性平。健脾利湿，清肺止咳。

主治用法 小儿消化不良，湿热黄疸，风热咳嗽，风湿骨痛，用五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图146 霜坡虎(桑科)
Ficus tikoua Bureau

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

147 布渣叶（破布叶）

别名 布包木。

识别 灌木或小乔木，高2—4米；树皮灰黑色，具纤维性。叶互生，纸质，卵形或长圆形，长7—16厘米，宽3—8厘米，顶端渐尖，基部近圆形，边缘有不明显锯齿，幼叶两面均被毛，叶柄无毛或被毛，托叶2枚，线状披针形。夏季开花，淡黄色，顶生或生于叶腋。核果近球形，或倒卵形，黑褐色，无毛。

生长环境 生于山谷、旷野灌木丛中。

采集加工 药用叶。全年可采，晒干备用。

性味功用 味微酸涩，性平。清热消滞。

主治用法 感冒食滞，食慾不振，用五钱至一两，水煎服。此品可作凉茶配料。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图147 布渣叶(椴树科)
Microcos paniculata L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十一、跌打驳骨药

（适应跌打、骨折、扭挫伤等疾病）

148 接骨金粟兰

别名 驳骨草、接骨茶、九节风、鸡骨香、山鸡茶。

识别 亚灌木，高达70厘米。根须状，干后表面变黑色，有香气。茎直立，有膨大的节。叶对生，具短柄，椭圆形或卵状椭圆形，长5—13厘米，宽2—6厘米，顶端渐尖，基部楔形，边缘有锯齿，每齿尖有一腺体，硬骨质，叶柄长5—15毫米。夏季开黄色或黄绿色花，顶生短穗状花序，1—3条聚生。核果球形，熟时鲜红色。

生长环境 生于山谷、溪边林下。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味苦，性平。祛风活血，散瘀消肿。

主治用法 跌打损伤，骨折，风湿性关节

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

炎，用鲜草捣烂酒炒敷患处，或用根五钱至一两，浸酒服。伤口溃烂，用茎、叶适量，水煎外洗。外伤出血，用鲜叶捣烂敷患处。




图148 接骨金粟兰(金粟兰科)
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

149 接骨木（蒴藿）

别名 走马风、黑节风、鸭爪风、过墙风。

识别 多分枝亚灌木。根横走，黄白色。茎有纵棱，易折断，断面有白色松软髓心，嫩枝被柔毛。奇数羽状复叶对生；小叶5—7枚，椭圆状披针形，顶端渐尖，基部近圆形，边缘有细锯齿，嫩叶略被柔毛。夏季开白花，成顶生伞房状花序。果卵形，熟时红色。

生长环境 生于村边、旷野灌木丛中。

采集加工 药用全草。全年可采，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味微苦，性平。祛风湿，消水肿，舒筋活络，散瘀接骨。

主治用法 风湿性关节炎，跌打损伤，腰肌劳损，用根一至二两，水煎服，或用鲜根或茎叶捣烂敷患处。肾炎水肿，用茎、叶一至二两，水煎服，或用茎、叶，水煎洗。痈疮肿毒，用鲜叶捣烂敷患处。风疹搔痒，用全草水煎洗患处。（孕妇慎服）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图149 接骨木(忍冬科)
Sambucus javanica Reinw. ex Blume

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

150 紫 金 牛

别名 铺地凉伞、小阳伞、矮茶、不出林。

识别 常绿矮小灌木，高不及30厘米。地下茎细长而横走，暗红色；地上茎不分枝，棕褐色。叶常数枚聚生于茎顶，椭圆形或阔椭圆形，顶端锐尖，边缘有细锯齿，除主脉被毛外，两面无毛。夏秋开小白花，数朵组成腋生的短总状花序。核果球形，熟时红色，经久不落。

生长环境 生于山坡、沟谷、村旁林下阴湿处。

采集加工 药用根。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味辛，性平。活血散瘀，舒筋活络。

主治用法 肺结核，咯血，跌打损伤，风湿性关节炎，痛经，月经不调，用五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图150 紫金牛(紫金牛科)
Ardisia japonica (Thunb.) Bl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

151 菜豆树

别名 豆角树、白鹤参、牛尾树。

识别 落叶乔木，高5—12米。根直，皮厚而白色。树皮锈黑色。2—3回奇数羽状复叶；小叶多枚，对生，卵形至卵状披针形，顶端尾状急尖，基部近圆形，边全缘，两面绿色无毛。夏季开白花，喇叭形。果似豆角，长圆柱形，通常扭曲，下垂，熟时二纵裂；种子扁平，膜状，灰白色。

生长环境 多生于山地灌木丛或疏林中，也有栽培。

采集加工 药用根、叶、果。根全年可采；叶，夏秋采；果，冬季采，鲜用或晒干备用。

性味功用 味苦，性寒。散瘀消肿，清热解毒。

主治用法 跌打损伤，用根一至二两，水煎或浸酒服。伤暑发热，用鲜叶适量，水煎外洗全身。毒蛇咬伤，用鲜叶或果捣烂敷头部囟门（先剃去头发）处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图151 菜豆树(紫葳科)
Radermachera sinica (Hance) Hemsl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

152 苏　木

别名　红苏木。

识别　小乔木，有时为藤状灌木；枝有短刺和圆点状皮孔。二回偶数羽状复叶互生，有羽片7—13对，每个羽片有小叶9—17对；小叶无柄，矩圆形，顶端钝而微凹，基部不对称，以斜角着生于叶轴上，全缘。夏秋开黄花，顶生圆锥花序。荚果木质，刀状，顶端有短喙，内含种子3—5枚。

生长环境　野生于山谷丛林中，也有栽培。

采集加工　药用树干。全年可采，削去外皮及边材，切片或劈碎晒干备用。

性味功用　味甘咸，性平。行血去瘀，消肿止痛。

主治用法　产后瘀血腹痛，闭经，跌打瘀肿，痈疮肿毒，用一至三钱，水煎服。外伤出血，研粉撒患处。（月经过多者及孕妇慎服）

附注　本品含苏木素、巴西苏木素及挥发油。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图152 苏　木(苏木科)
Caesalpinia sappan L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

153 蝉翼藤

别名 五味藤、一摩消、五马巡城、丢了棒、象皮藤。

识别 木质藤本。根丛生，横走，长可达3—5米，表面灰白色或土黄色，有瘤状突起，断面皮部厚，木心淡黄色，有众多细孔，可通气。叶互生，椭圆形或矩圆形，顶端急尖，基部近圆形，上面有疏短毛，背面被伏贴短柔毛。夏季开花，玫瑰红色。果有长翅，状似蝉翼，故名“蝉翼藤”。

生长环境 多生于密林中。

采集加工 药用根。全年可采，洗净切片晒干或研粉备用。

性味功用 味辛、甘、苦、酸、咸，性微寒。活血散瘀，消肿止痛，清热利尿。

主治用法 跌打损伤，用根浸酒搽患处，或用粉末酒调涂患处。急性肠胃炎，用根一至二钱，水煎服，或用粉末五分至一钱，开水送服。（孕妇忌服）

附注 本品含皂甙等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图153 蝉翼藤(远志科)
Securidaca inappendiculata Hassk.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

154 假茶辣（灰毛浆果楝）

别名 鱼胆木、大苦木、软柏木。

识别 灌木或小乔木；小枝、叶柄及花序密被灰黄色绒毛。奇数羽状复叶互生，具长柄；小叶9—17枚，上部小叶较大，卵形或卵状长圆形，顶端渐尖，基部不对称，全缘或有粗锯齿，两面被柔毛，背面毛更密。夏秋开小黄花，腋生圆锥花序。核果小球形，有5浅槽，熟时红棕色。

生长环境 喜生于河边疏林中或灌木丛中。

采集加工 药用根、叶。根全年可采，洗净晒干备用，叶随采随用。

性味功用 味辛苦，性微温。祛风化湿，行气止痛。

主治用法 风湿，跌打，腹痛，痢疾，疟疾，用根三至五钱或鲜叶一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图154 假茶辣(楝科)
Cipadessa cinerascens (Pell.) Hand.-Mazz.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

155 榧　花

别名　白花树、罗汉木。

识别　常绿灌木或小乔木。茎直立，深褐色，幼枝被灰褐色柔毛。叶互生，具短柄，椭圆形至卵圆形，长1.5—3.5厘米，宽1—2.5厘米，顶端短尖，基部偏斜而浑圆，全缘，两面有毛。春季开白色花，6—8朵聚生于小枝顶端。果卵圆形，熟时褐色，外面被棕色短柔毛，顶端开裂。种子黑褐色。

生长环境　生于山坡、丘陵、溪边、路旁。

采集加工　药用全株。全年可采，洗净晒干备用，或研末备用。

性味功用　味苦涩，性平。活血止血，祛瘀生新，清热利湿。

主治用法　痢疾，腹泻，跌打损伤，吐血，用三至五钱，水煎服。外伤出血，用粉末撒患处，或用鲜叶捣烂敷患处。（孕妇慎服）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图155 檵　花(金缕梅科)
Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

156 巴　豆

别名　双眼龙、八百力。

识别　小乔木。叶互生，具长柄，卵圆形，边缘有浅齿，基部有一对凹陷的小腺体，基出叶脉3条。春夏开花，成顶生总状花序。蒴果球形，有三钝角，内含3枚淡黄褐色种子。

生长环境　野生于山谷、溪边林中，也有栽培。

采集加工　药用全株。全年可采，根切片，叶阴干备用。

性味功用　味辛，性热，有大毒。散瘀消肿，止血，止痛，抗毒杀虫。

主治用法　跌打损伤，风湿骨痛，用根皮浸酒外擦，或用种仁捣烂敷患处，待局部起泡后除去，注意保护创面。毒蛇咬伤，用根捣烂外敷。外伤出血，用叶研末，撒伤处。带状泡疹，用鲜叶捣烂同淘米水调涂患处。

附注　1.种子含毒性蛋白巴豆脂。误服可出现强烈的口腔炎，咽喉炎，胃肠疼痛，出血性下痢及虚脱，重者1～3日死亡。救治法：先用粘滑剂、镇痛剂及止泻剂，后用鞣酸或硫酸铁，必要时可皮下注射樟脑、咖啡因等。

2.种子或叶，可杀孑孓、蝇蛆、钉螺及臭虫。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图156 巴　豆(大戟科)
Croton tiglium L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

157 博落回

别名 三钱三、号筒杆、翻牛白、狮子爪。

识别 多年生高大草本，全株破损时有黄色汁液流出。茎直立，粗壮，圆柱形，中空，表面有白粉。单叶互生，阔卵形，通常5—8掌状分裂，每裂片又为不整齐的浅圆裂，似狮爪状，上面绿色，背面粉白色，密生短细毛。夏季开白色或淡红色花。蒴果，狭长椭圆形，顶端有残存的柱头。

生长环境 生于向阳的山坡、路边。

采集加工 药用全株。夏秋采集，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味苦辛，性温，有大毒。散瘀消肿，祛风镇痛，杀虫止痒。

主治用法 跌打瘀肿，风湿关节痛，用鲜叶或鲜根捣烂酒炒敷患处。皮肤搔痒，用鲜叶捣烂取汁涂患处。痈疮溃烂，用叶研末撒患处。（本品有大毒，忌内服）

附注 本品含延胡索素丙，白屈菜碱，类白屈菜碱和血根碱。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图157 博落回(罂粟科)
Macleaya cordata (Willd.) R. Br. ex G. Don

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

158 美丽胡枝子

别名 三妹木、假蓝根、碎蓝木、沙牛木、把守天门。

识别 直立草本，基部木质，枝被柔毛。羽状复叶互生，具长柄，有托叶；小叶3枚，椭圆形或倒卵圆形，顶端圆而微凹，有小尖头，基部近圆形或阔楔形，全缘，上面绿色无毛，背面灰绿色，密被短柔毛。秋末冬初开花，腋生总状花序；花紫红色，蝶状。荚果卵圆形，略扁，被伏贴毛，内含1枚种子，基部有残存花萼及花冠。

生长环境 生于山坡、沟谷、村旁向阳地。

采集加工 药用根。全年可采，洗净切片晒干备用。

性味功用 味微辛涩，性微温。活血散瘀，消肿止痛。

主治用法 跌打肿痛，风湿骨痛，用五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图158 美丽胡枝子(蝶形花科)
Lespedeza formosa Koehne

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

159 山 小 桔

别名 山柑子、野沙柑、酒饼木。

识别 灌木，全株无毛。茎直立，多分枝。叶互生，单叶或为2—3小叶的羽状复叶；小叶长椭圆形或矩圆状披针形，顶端钝或尖，基部楔形，全缘，有透明腺点。夏秋开小白花，成腋生的小圆锥花序。浆果小，球形，淡红色，略透明，味甜可食。

生长环境 生于村边、路旁、山坡疏林下或灌木丛中。

采集加工 药用根、叶。全年可采，洗净鲜用或阴干备用。

性味功用 味微辛苦，气香，性平。行气祛痰，散瘀消肿，祛风消积。

主治用法 感冒咳嗽，食积腹痛，用根三至八钱，水煎服。跌打肿痛，用鲜叶捣烂酒调敷患处。（孕妇忌服）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图159 山小桔(芸香科)
Glycosmia citrifolia (Willd.) Lindl.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

160 盐肤木

别名 五倍子树。

识别 灌木或小乔木；小枝、叶轴及花序密被小柔毛。奇数羽状复叶互生，叶轴有狭翅；小叶7—13枚，对生，无柄，卵形或卵状椭圆形，顶端渐尖，基部楔形或近圆形，稍不对称，边缘有圆锯齿，上面略被毛，背面密被短柔毛。有的叶上寄生瘤状虫瘿，称“五倍子”。秋季开白花，顶生圆锥花序。核果小，扁球形，有毛，熟时红色。

生长环境 生于路边、村旁或旷野灌木丛中。

采集加工 药用根、叶。根，全年可采，洗净晒干备用；叶，多为鲜用。

性味功用 味咸，性凉。凉血解毒，活血散瘀。

主治用法 咳嗽吐血，感冒发热，喉炎，毒蛇咬伤，食滞腹泻，用根一至二两，水煎服。跌打肿痛，创伤出血，黄蜂螫伤，用鲜根皮或鲜叶捣烂外敷。皮肤湿疹，用根皮或叶水煎洗，或研粉撒患处。

附注 1.本品虫瘿含鞣质50—70%。

2.滨盐肤木 Rhus chinensis Mill. var. roxburghii(DC.) Rehd. 与本种极相似，惟叶轴无翅或仅上部具极狭的翅。功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图160 盐肤木(漆树科)
Rhus chinensis Mill.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

161 飞龙掌血

别名 画眉跳、散血丹、小金藤。

识别 常绿藤状灌木；枝有小钩刺。根表皮淡黄色，刮破现红色，断面黄色。掌状复叶互生，具长柄；小叶3枚，倒卵形或长圆形，边缘有浅齿，有透明腺点，揉烂有臭气。冬春开黄色小花，组成腋生及顶生的圆锥花序。果扁球形，有钝棱，大如豌豆，熟时橙黄色。

生长环境 生于村边、路旁、山脚灌木丛中。

采集加工 药用根、叶。全年可采，根，洗净晒干备用；叶，鲜用。

性味功用 味辛苦，性温。祛风除湿，活血散瘀，消肿止痛。

主治用法 风湿骨痛，跌打损伤，感冒风寒，胃气痛，用根三至五钱，水煎服。疮疖肿痛，用鲜叶捣烂敷患处。（孕妇忌服）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图161 飞龙掌血(芸香科)
Toddalia asiatica (L.) Lam.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

162 姜叶三七

别名 姜七、内消子、土三七、打不死。

识别 多年生草本，高15—35厘米。根状茎圆形或椭圆形，表面棕褐色，有膜质叶鞘，断面棕黄色，粉质，芳香而有辛辣味。叶通常2—3枚丛生，具长柄，纸质，长椭圆形，顶端尖，基部狭楔形，两面无毛，上面叶脉稍突起。

生长环境 野生于山谷沟边阴湿地，也有栽培。

采集加工 药用块根。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用 味辛，性温。活血散瘀，消肿止痛。

主治用法 跌打损伤，用一至三钱，水煎服或浸酒内服，外用酒炒热敷患处。吐血，衄血，月经过多，用晒干块根煅存性，用一至三钱，水煎服。外伤出血，用炭粉适量撒患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图162 姜叶三七(姜科)
Stahlianthus hainanensis (Hayata)
T. L. Wu in sched.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十二、汤火伤药

（适应烧伤、汤伤等疾病）

163 酸　枣

别名　五眼果。

识别　落叶乔木，树皮灰黑色，刮破现粉红色，有皮孔；小枝有半月形叶痕。奇数羽状复叶互生；小叶7—15枚，卵形或卵状长圆形，顶端尖尾状，基部略不对称，全缘，上面绿色，背面近苍白色，幼叶淡紫色。春季在上部叶腋开淡紫色小花，雌花单生，雄花成圆锥状花序。核果椭圆形，黄色，味酸，有粘液，核顶端有4—5个孔。

生长环境　生于村旁或山岭疏林中。

采集加工　药用树皮或根皮及果。果，夏季熟时采，鲜用。树皮及根皮，全年可采，洗净去粗皮，晒干备用，或水煎浓缩成膏用。

性味功用　味酸涩，性寒。清热毒，杀虫收敛，消食滞。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治用法 汤火伤，用膏涂或用果核煅炭研末调香油涂患处。食滞腹满，用鲜果二至三枚，嚼食。疮疡溃烂，疝气，用根适量水煎外洗。



图163 酸 枣(漆树科)
Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

164 水枇杷（水东哥）

别名 水牛奶、红毛树。

识别 灌木或小乔木；幼枝密被锈色鳞片状粗伏毛，老时脱落。叶长圆形或倒卵状长圆形，长10—28厘米，宽4—11厘米，幼叶上面疏被短绒毛，叶脉上有鳞片状粗伏毛，背面更密，老时渐少或无毛，边缘有刺状小锯齿。春夏开花，紫红色或粉红色，腋生或由老枝的叶痕内长出。浆果近球形，有白色乳汁。

生长环境 生于山谷、溪边或林下阴湿处。

采集加工 药用根、叶。秋冬采集，洗净切片晒干备用。叶晒干研粉或水煎浓缩成膏备用。

性味功用 味微苦，性凉。清热解毒，止咳，止痛。

主治用法 风热咳嗽，风火牙痛，用根三至五钱，水煎服。汤火伤，用叶粉调香油或用药膏外搽患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图164 水枇杷(水东哥科)
Saurauia tristyla DC.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

165 山竹子（多花山竹子）

别名 山桔子、木竹果。

识别 常绿乔木或灌木，高3—12米；树皮灰白色，枝上常有叶痕。叶对生，具短柄，厚革质，卵状长圆形或倒卵状长圆形，长6—13厘米，宽2—8厘米，顶端渐尖或短尖，钝头，全缘，干后稍反卷，侧脉多数，纤细。夏季开花，橙黄色，花心有粘液；花单生或多朵组成聚伞花序或总状花序。果球形，熟时黄色。

生长环境 生于山地林中。

采集加工 药用树皮、果。树皮，全年可采，除去粗皮，晒干研粉备用。果，冬季熟时采，鲜用或取果核晒干研末或榨油备用。

性味功用 树皮，味涩微苦，性凉；果，味甘酸，性凉，有小毒。消炎止痛，收敛生肌。

主治用法 烧伤，汤伤，湿疹，口腔炎，牙周炎，痈疮溃烂，用树皮或果核粉末撒患处；或用果核油涂患处。铁砂入肉不出，用鲜果捣烂敷患处。

附注 岭南山竹子 Garcinia oblongifolia Champ. 与本品功用相仿。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图165 山竹子(藤黄科)
Garcinia multiflora Champ.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十三、蛇虫咬伤药

（适应各种毒蛇、毒虫咬伤、黄蜂螫伤等）

166 赛 刁 竹

别名 瑶山竹、竹叶细辛。

识别 多年生草本，全株有白色乳汁，无毛。根簇生，须状，淡黄白色，粉质，有芳香气。茎直立，细圆柱形，常不分枝。叶对生，线形或线状披针形，全缘，背面中脉凸起。夏秋开黄色小花，成顶生或腋生的聚伞花序。蓇葖果状似小羊角。种子顶端有白色丝状毛。

生长环境 生于干燥的山坡、荒野草丛中。

采集加工 药用根。夏秋采集，洗净，晒至半干后阴干备用。

性味功用 味辛，性温，有小毒。解毒消肿，祛风止痛。

主治用法 毒蛇咬伤，风湿骨痛，跌打肿

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痛，胃痛，牙痛，用二至四钱，水煎服。（孕妇慎服）。



图166 寮刁竹(萝藦科)
Pycnostelma paniculatum (Bunge) K. Schum

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

167 芸　香

别名　臭草、小香草、荆芥七。

识别　多年生草本，全株无毛，粉绿色，有强烈特殊香气。茎直立，多分枝。叶互生，2—3回羽状分裂，小裂片长圆形至匙形，全缘，有透明腺点。春季开小黄花，顶生聚伞花序。蒴果小，熟时四裂。

生长环境　多为栽培。

采集加工　药用茎叶。全年可采，多为鲜用，随用随采。

性味功用　味微苦，性寒。祛风解毒，凉血散瘀。

主治用法　感冒发热，月经不调，用鲜草五钱至一两，捣烂冲开水，取汁服。跌打损伤，毒蛇咬伤，痈疮肿毒，用鲜草一两捣烂冲酒服，渣敷患处。鼻衄，用鲜叶揉烂塞鼻孔。（孕妇慎服）

附注　1.本品含挥发油、芸香甙及黄碱素类化合物。

2.本品1比1的酒提取液，对金黄色葡萄球菌有较强的抑制作用；其1比1的水或酒提取液对溶血性链球菌有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图167 芸　香(芸香科)
Ruta graveolens L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

168 竹节蓼

别名 百足草、飞天蜈蚣、蜈蚣竹。

识别 多年生直立草本。茎基部圆柱形，木质，上部扁平，带状，节明显，节处略收缩，宽7—20毫米，两面深绿色，有光泽及线纹。叶多生于新枝上；单叶互生，无柄，菱状卵形，全缘或基部有一对锯齿。夏秋开小白花，生于节上。瘦果三角形，包于红色肉质的花被内。

生长环境 多为栽培。

采集加工 药用茎、叶。全年可采，鲜用或晒干备用。

性味功用 味酸微甘，性平。清热解毒，行血去瘀，消肿止痛。

主治用法 痈疮肿毒，跌打损伤，毒蛇及蜈蚣咬伤，用鲜草一至二两，水煎服。外用适量。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图168 竹节蓼(蓼科)
Homalocladium platycladum
(F. Muell.) Bailey

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

169 望江南

别名 假决明、羊角豆、夜关门、头晕菜。

识别 多年生草本或小灌木，全株无毛。偶数羽状复叶互生，具长柄，柄基部有一枚乳头状腺体；小叶4—6对，卵形或椭圆状披针形，顶端渐尖，基部楔形或圆形，全缘。夏秋开黄花，顶生及腋生伞房状总状花序。荚果线形略扁，稍弯曲；种子小，卵形。

生长环境 生于村边、路旁、旷野草丛中。

采集加工 药用全草。夏秋采茎、叶，秋冬采种子，晒干备用。

性味功用 味苦，性平，有小毒。清热，健脾，润肠，通便，解蛇毒。

主治用法 习惯性便秘，消化不良，高血压头痛，结膜炎，用种子五钱至一两，水煎服。毒蛇、毒虫咬伤，用鲜叶二至三两捣烂绞汁服，渣敷伤口周围。

附注 全株含单宁，种子含大黄素。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图169 望江南(苏木科)
Cassia occidentalis L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

170 香茶菜

别名 蛇总管、小叶蛇总管。

识别 一年生草本。茎直立，四方形，基部木质，灰棕色，上部淡紫色或绿色，有条纹，中空，分枝有节，被短柔毛。叶对生，卵形，长3—6厘米，宽2—5厘米，茎上部叶较小，顶端短尖，基部狭长，边缘有钝齿，两面均被柔毛，背面叶脉明显。秋季开淡紫色花，唇形，二歧聚伞花序腋生或顶生，集成疏散的圆锥状。果圆形，有小斑点，灰褐色。

生长环境 生于山坡，旷野，亦有栽培。

采集加工 药用茎叶。秋季开花时割取地上部，晒干备用或鲜用。

性味功用 味辛苦，气香，性凉。散瘀消肿，解蛇毒。

主治用法 跌打肿痛，毒蛇咬伤，用三至五钱，水煎服，并用鲜草捣烂外敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图170 香茶菜(唇形科)
Plectranthus amethystoides Benth.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

171 齿叶泥花草

别名 锯齿草、五月莲。

识别 一年生披散草本，高10—20厘米，秃净。茎分枝，下部常伏地，有细条纹。叶对生，无柄，矩圆形至矩圆状椭圆形，长1.5—3.5厘米，宽5—10毫米，顶端钝或短尖，边缘密生锐利小锯齿，两面绿色无毛。夏秋开花，紫红色，花对生，具柄，排成顶生总状花序。蒴果小，线状圆柱形，长约1厘米，宽约1.2毫米。

生长环境 生于水沟边、稻田、路旁阴湿处。

采集加工 药用全草。夏秋采集，多为鲜用。

性味功用 味淡，性平。清热解毒，逐瘀破血，消肿止痛。

主治用法 毒蛇咬伤，跌打肿痛，用鲜草三至四两，捣烂绞汁冲酒服，渣敷伤处。疮疖肿毒，用鲜草适量加食盐少许捣烂敷患处。产后腹痛，用鲜草一至二两同鸡肉二两煎汤服。

附注 旱田草Ilysanthes ciliata (Colsm.) O. Ktze. 与本品相似，惟叶具柄，蒴果较粗壮，长约2厘米。功用基本相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图171 齿叶泥花草(玄参科)
Ilysanthes serrata (Roxb.) Urban

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

172 小叶三点金草

识别 卧地草本。茎纤细，有分枝。羽状复叶互生，具细柄；小叶3枚，中间小叶较两侧小叶大，长椭圆形，倒卵形或近圆形，两端圆，顶端有时微凹，全缘，上面无毛，背面被伏贴毛；托叶2枚，披针形。夏秋开花，顶生及腋生总状花序；花蝶状，粉红色。荚果扁平，被毛，有2—5节，荚节近圆形，熟时逐节断裂。

生长环境 生于旷野草丛中。

采集加工 药用全草。夏秋采集，洗净晒干备用。

性味功用 味甘，性平。解毒，散瘀，消食，利尿。

主治用法 毒蛇咬伤，跌打损伤，用根一至二两浸酒服。黄疸，劳伤咳嗽，小儿疳积，用根三钱至一两，水煎服。疥疮，痈疮溃烂，用全草水煎洗患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图172 小叶三点金草(蝶形花科)
Desmodium microphyllum (Thunb.) DC.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

173 半 枝 莲

别名 耳挖草。

识别 一年生草本。茎方形，少分枝，下部通常淡紫色。叶对生，狭卵形至披针形，长1—2.8厘米，宽不及2厘米，顶端钝，基部稍凹或截形，全缘，上面绿色，背面淡绿色或淡红色。春夏开蓝色花，花萼背面有一圆形外反附属物，状似耳挖杓，故称“挖耳草”；总状花序顶生，花偏向花序轴一侧。果极小球形。

生长环境 生于水沟边、田边、荒野湿地，也有栽培。

采集加工 药用全草。夏秋采集，鲜用或阴干备用。

性味功用 味辛，性平。散瘀，解毒，消肿，行气止痛。

主治用法 跌打损伤，毒蛇咬伤，用五钱至一两，水煎服。或用鲜草二两捣烂绞汁冲酒服。胃气痛，用一两与猪肚（胃）加水酒各半炖服。吐血，咯血，用鲜草二两捣烂绞汁冲蜜糖服。（孕妇慎服）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图173 半枝莲(唇形科)
Scutellaria barbata Don

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

174 大叶半枝莲

别名 笑花草、耳挖草。

识别 多年生草本，高10—25厘米。茎方形，被柔毛，上部直立，下部淡紫色而常伏地。叶对生，具柄，卵圆形，长1.3—2.7厘米，顶端钝圆，基部微心形，边缘有波浪钝齿，两面略被柔毛。春夏开紫蓝色花，芳香，唇形，花萼背面有一耳挖状附属物；顶生总状花序，花偏向于花序轴一侧，状如牙刷。果小，圆形，有小凸点。

生长环境 生于沟边、田边、坡地阴湿草丛中，亦有栽培。

采集加工 药用全草。三、四月采，洗净晒干备用，或鲜用。

性味功用 味辛，性平，无毒。散瘀，消肿，解毒止痛。

主治用法 跌打损伤，毒蛇咬伤，疮疖肿痛，用三至五钱，水煎服。鲜草捣烂外敷患处。（孕妇慎服）。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图174 大叶半枝莲(唇形科)
Scutellaria indica L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

175 狗脚迹（梵天花）

别名 小痴头婆、铁包金、乌云盖雪。

识别 小灌木，高约1米，多分枝，全株有绒毛。茎皮纤维丰富，坚韧。叶互生，掌状三至五裂，形似狗的脚迹，上面绿色，叶心有黄绿色斑块，背面中脉基部有一小腺体。夏季至冬季开花，似桃花。果扁球形，有钩刺。

生长环境 生于村边、路旁或旷野。

采集加工 药用全株。全年可采，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用 味苦，性平。解毒消肿，散瘀止痛，化痰止咳。

主治用法 毒蛇咬伤，跌打损伤，肺热咳嗽，疮疡肿毒。用根五钱至一两水煎服。外用鲜叶捣烂敷患处。

附注 红花地桃花 Urena lobata L. 与本种功用相似，其识别点，叶厚而不分裂，叶面无黄绿色斑块。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图175 狗脚迹(锦葵科)
Urena sinuata L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

176 毛麝香

别名 香草、蓝花草。

识别 一年生草本，被粘质长毛。茎直立灰褐色，有分枝。叶对生，具柄，卵形或卵状椭圆形，长3—8厘米，宽2—4厘米，茎上部叶渐小，顶端尖，基部近圆形或阔楔形，边缘有锯齿，两面绿色，背面有橙色腺点，揉烂有麝香气，故称“毛麝香”。夏初开花，紫蓝色，通常单生于上部叶腋，成顶生疏散的总状花序。蒴果圆锥形。

生长环境 生于村边、路旁、山地草丛中。

采集加工 药用全草。夏秋采集，洗净阴干备用。

性味功用 味辛，气芳香，性微温。消肿止痛，散瘀止血，杀虫止痒。

主治用法 跌打刀伤，疮疡肿痛，荨麻疹，毒蛇咬伤，用三至五钱，水煎服。外用适量，捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图176 毛麝香(玄参科)
Adenosma glutinosum (L.) Druce

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十四、拔毒止痒药

（适应各种痈疮疔毒、疥癣、皮肤搔痒等疾病）

177 枫　杨

别名　臭杨柳。

识别　落叶乔木；幼枝有毛。奇数羽状复叶互生，叶轴有狭翅；小叶9—25枚，纸质，近无柄，长椭圆形，顶端钝圆，基部稍不对称，边缘有细锯齿；叶柄有毛。春季发叶时开花，花极小，单性同株，多朵组成柔荑花序，雄花序生于老枝叶腋，雌花序生于新枝顶端。坚果有翅一对，呈蝶状，多个密接成串而下垂。

生长环境　喜生于溪边。

采集加工　药用叶。夏秋采集，多鲜用。

性味功用　味苦辛，性温，有毒。杀虫止痒。

主治用法　脚癣，用鲜叶捣烂，擦患处。（本品有毒，勿内服！）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图177 枫　杨(胡桃科)
Pterocarya stenoptera DC.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

178 铁 海 棠

别名 龙骨。

识别 灌木，全株有白色乳汁。茎直立或稍呈藤状，有棱，棱上有硬刺。叶少数，肉质，倒卵形或倒卵状披针形，全缘。秋末至春初开红花，2—8朵组成二叉状的聚伞花序。

生长环境 多为栽培。

采集加工 药用根、茎、树液。随用随采。

性味功用 味苦涩，性凉，有小毒。拔毒消肿。

主治用法 痈疮肿毒，用鲜根适量，捣烂同酒糟炒热敷患处。竹木刺入肉不出，用树液数滴，滴患处，待竹木刺露出皮肤即可拔出。

附注 本品服后可致腹泻，如泻不止，可服甘草水。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图178 铁海棠(大戟科)
Euphorbia splendens Boj ex Hook.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

179 落　葵

别名　胭脂、红藤菜、软筋菜。

识别　缠绕草质藤本。全株肉质，无毛，揉烂有粘液。茎绿色或淡紫色，光滑。叶互生，肉质肥厚，阔卵形，顶端渐尖而钝头，基部微心形，全缘，上面深绿色，有光泽。春夏开花，淡红色，穗状花序生于叶腋。果圆球形，熟时暗紫色，肉质。

生长环境　多有栽培，也有野生。

采集加工　药用全草。全年可采，晒干备用或鲜用。

性味功用　味淡，性凉。清热毒，凉血，润肠。

主治用法　大便秘结，汤火伤，用一至二两，水煎服。痈疮肿毒，用鲜叶捣烂敷患处。

附注　本品含维生素 A_3、维生素 B_3、皂素及胶质。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图179 落　葵(落葵科)
Basella rubra L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

180 茅　瓜

别名　老鼠拉冬瓜。

识别　多年生草质藤本。茎纤细，有不分枝的卷须。叶形变异较大，狭三角状披针形至阔三角状卵形，3—5深裂，基部一对裂片横伸或向后延伸成心形或戟形，边缘有疏离小齿，两面粗糙；叶柄远较基部裂片为短，长5—10毫米。夏季开白花。果长2—4厘米，形似冬瓜，熟时橙红色。

生长环境　生于路边、荒地、溪边灌木丛中。

采集加工　药用根或全草。秋季采集，洗净切片晒干备用。

性味功用　味甘苦微涩，性微寒。消肿拔毒，化瘀散结。

主治用法　痈疮疖肿，咽喉肿痛，结膜炎，淋巴结核，用五钱至一两，水煎服。外用鲜根捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图180 茅　瓜(葫芦科)
Melothria heterophylla (Lour.) Cogn.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附：马 胶 儿

马胶儿，又称“老鼠拉冬瓜”，与本品功用相似。其识别点为叶三角状卵形，果长不及2厘米。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图180—1 马胶儿(葫芦科)
Melothria indica Lour.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

181 火殃筋

别名 龙骨树、羊不挨。

识别 灌木，全株无毛，有白色乳汁。老茎圆柱形或有稜，小枝肉质，绿色，有3—5条波状翅边，在翅边的凸起处有两枚小刺。叶少数，肉质，倒卵状披针形，着生于翅边上。春季翅边上开黄花。蒴果光滑无毛。

生长环境 多栽培于园边作绿篱。

采集加工 药用鲜茎。全年可采，去刺鲜用或切片加米同炒至焦黄色备用。

性味功用 味苦涩，性温，有毒。消肿，止痛，拔毒。

主治用法 急性肠胃炎，用鲜茎一至二两，切碎加米一两同炒至焦黄色，水煎服。无名肿毒，痈疮肿痛，指头疔，用鲜茎适量，捣烂，同酒糟炒热，敷患处。（儿童及孕妇忌服）

附注 1.本品有毒，必须同米炒成焦黄色，方可内服。

2.乳汁不可入眼。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图181 火殃簕(大戟科)
Euphorbia antiquorum L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

182 白 饭 树

别名 鱼眼木。

识别 灌木，高达4米，全株无毛。叶互生，具短柄，倒卵形或椭圆形，长1.5—7厘米，宽1—3.5厘米，顶端钝，有小尖头，基部楔形，全缘，上面绿色，背面苍白色。夏末秋初开极小的淡黄色花，多朵簇生于叶腋。果肉质，小球形，熟时白色，状似鱼眼珠，内含种子3—6枚。

生长环境 生于山坡、旷野灌木丛中或疏林下。

采集加工 药用全株。多鲜用，随用随采。

性味功用 味苦、微涩，性凉，有小毒。祛风除湿，清热解毒，杀虫止痛，拔脓敛疮。

主治用法 风湿关节疼痛，湿疹，脓泡疮，疮疖溃烂痒痛，用鲜品适量，水煎洗患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图182 白饭树(大戟科)
Fluggea virosa (Roxb. ex Willd.) Baill.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

183 白花蛇舌草

别名 蛇舌草、蛇脷草。

识别 披散小草本，高10—60厘米。根白色，细长，分枝。茎纤细，多分枝，基部常匍匐状，无毛。叶对生，无柄，线形至线状披针形，长1—4厘米，宽2—4毫米，顶端渐尖，基部与托叶连结，边全缘，两面无毛。夏秋开花，白色，具短柄，单朵生于叶腋。果扁球形，灰褐色，膜质，开裂。

生长环境 生于田边、沟边、路旁湿润地。

采集加工 药用全草。夏秋采集，洗净晒干备用。

性味功用 味甘淡，性凉。清热解毒，活血利尿。

主治用法 毒蛇咬伤，疮疡肿毒，尿路感染，扁桃体炎，咽喉炎，阑尾炎，肝炎，痢疾，小儿疳积，用一至二两，水煎服。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

附注 伞房花耳草 Oldenlandia corymbosa L.与本种相似，区别点为花2—5朵组成伞房花序。功用相同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图183 白花蛇舌草(茜草科)
Oldenlandia diffusa (Willd.) Roxb.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

184 苦　参

识别　落叶亚灌木，高达2米。茎直立，有分枝，小枝有柔毛。根圆柱形，表面黄色，断面黄白色，味极苦。奇数羽状复叶互生，具柄；小叶7—23枚，卵状椭圆形至长圆状披针形，顶端尖，基部圆形或阔楔形，全缘，背面被伏贴柔毛；托叶2枚，线形。夏秋开花，顶生总状花序；花淡黄白色，蝶状。荚果线形，种子间缢缩成节；种子球形，黑色。

生长环境　生于山坡，旷野向阳处。

采集加工　药用根。秋季采，洗净切片晒干备用。

性味功用　味苦，性寒。清热解毒，去湿，杀虫。

主治用法　肠炎，痢疾，痔疮出血，赤白带下，咽喉肿痛，用三至五钱，水煎服。外用治皮肤疮疥，湿疹。

附注　1.本品含苦参碱及金雀花碱。

2.本品鲜根切碎，热水浸两日后，制成20倍药液，可杀孑孓；茎、叶磨碎撒入粪坑，亦可杀蝇蛆。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图184 苦　参(蝶形花科)
Sophora flavescens Ait.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

185 黄　药

别名　铁包金、苦里根。

识别　落叶灌木或小乔木。根表面棕褐色，断面黄色。枝表面褐色，断面黄色，幼枝被锈色短柔毛。叶互生，具柄，矩圆状卵形或卵状椭圆形，叶形变异较大，顶端突尖或渐尖，基部近圆形或阔楔形，边缘有不明显小锯齿，上面绿色，近无毛，背面密被短柔毛或仅叶脉上被柔毛。夏季开花，紫色，聚伞花序腋生。果近球形，熟时由红变黑色。

生长环境　生于山坡、路旁灌木丛中。

采集加工　药用全株。全年可采，洗净鲜用或晒干备用。

性味功用　味苦涩，性寒，有毒。杀虫止痒，消炎收敛。

主治用法　皮肤湿疹，疥癣，脓疱疮，用根或全株适量，水煎外洗患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图185 黄　药(鼠李科)
Rhamnus crenata Sieb. et Zucc.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

186 雀梅藤

别名 对节刺、米碎木。

识别 藤状灌木。小枝灰褐色，幼枝略被柔毛，有针刺状短枝。叶互生或近对生，卵形或椭圆形，长1—4厘米，顶端圆形，基部浑圆，边缘有小锯齿，两面绿色无毛。秋末冬初开花，淡黄色，被毛，芳香，排成穗状花序。果近球形。味酸带甜，可食。

生长环境 生于山坡，路旁灌木丛中。

采集加工 药用根、叶。四季可采，洗净晒干备用或鲜用。

性味功用 味甘淡，性平。叶，拔毒生肌。根，降气化痰。

主治用法 疮疡肿毒，用鲜叶打烂外敷或煎水外洗。咳嗽气喘，用根三至五钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图186 雀梅藤(鼠李科)
Sageretia theezans Brongn.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

187 八角莲

别名 独叶一枝花，一把伞。

识别 多年生草本。根状茎横走，结节状，鲜时浅黄色，干后变棕黄色，根须状。茎直立，粉绿色。叶通常1片，很少2片，盾状着生，似伞形，径达33厘米，有4—9浅裂，边缘有不整齐的小齿，上面绿色，中央常有白斑，幼叶疏生短毛。春末开花，枣红色；花序着生在茎顶叶腋，倒垂形，花柄有长毛。果卵圆形，熟时黑色。

生长环境 生于深山密林下阴湿处。

采集加工 药用全株。夏秋采集，鲜用或晒干备用。

性味功用 味微苦甘，性凉，有小毒。消炎解毒，散瘀止痛。

主治用法 痈疮肿毒，淋巴结炎，腮腺炎，用鲜草适量捣烂，同酒糟调匀，外敷患处。毒蛇咬伤，用根三至五钱，捣烂冲酒服，渣敷伤处周围，带状泡疹，单纯性泡疹，用根研末，醋调涂患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图187 八角莲(小檗科)
Dysosma pleianthum (Hance) Woods.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

188 木 鳖 子

别名 木鳖藤。

识别 多年生草质藤本。茎有纵棱及卷须。叶互生，圆心形，3—5掌状深裂，基部心形，近叶柄顶端两侧有1—3个凸起的腺体。春夏开花，白色或淡黄色。果肉质，长椭圆形，熟时橙红色，表面有软刺；种子扁平，不规则多角形，灰黑色，形似鳖，故有“木鳖子”之称。

生长环境 生于山坡林缘或灌木丛中，也有栽培。

采集加工 药用根、叶和种子。根、叶，夏秋采集，多为鲜用。种子，秋季果熟时采摘，除去果壳及瓤，洗净晒干备用。

性味功用 根、叶，味苦微甘，性寒；种子，味甘微苦，性温，有毒。消炎解毒，消肿止痛。

主治用法 痈疮疔毒，无名肿毒，淋巴结炎，用鲜根或叶，加盐少许捣烂外敷患处，或用种子磨醋涂患处。

附注 本品种子含皂甙等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图188 木鳖子(葫芦科)
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

189 仙人掌

识别 肉质有刺植物，常丛生呈灌木状。茎下部圆柱形，近木质，上部肉质，分节，茎节扁平，椭圆形或卵形，幼时鲜绿色，老时变灰绿色，散生多数小瘤体，瘤体上簇生褐色锐刺及短刺毛。夏季开黄花。浆果肉质，卵圆形，无刺，红色或红紫色。

生长环境 多栽培于村边，也有野生。

采集加工 药用全茎。全年可采，洗净去皮刺，鲜用或切片晒干备用。

性味功用 味苦，性凉。消肿解毒，镇咳，止泻。

主治用法 腮腺炎，乳腺炎，痈疮肿毒，汤火伤，用鲜品去刺捣烂或切片外敷。肠炎腹泻，咳嗽，心胃气痛，用五钱至一两，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图189 仙人掌(仙人掌科)
Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

190 黄　葵

别名　野芙蓉、假棉花。

识别　一年生或二年生草本，高约1米，全株有扩展的粗硬毛。叶互生、掌状深裂，裂片椭圆状披针形，有时3—5浅裂，顶端渐尖，基部心形或近戟形，两面均有粗毛。夏季开花，花瓣黄色，中央暗紫色。蒴果卵状长圆形，果皮薄革质；种子肾形，破损后有似麝香的特殊香气。

生长环境　生于路边、旷野草丛中。

采集加工　药用全草。多为鲜用。

性味功用　味微甘，性凉。解毒消肿，排脓止痛。

主治用法　痈疮肿痛，无名肿毒，蛇头疮。用鲜根或鲜叶捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图190 黄　葵(锦葵科)
Abelmoschus moschatus (L.) Medic.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

191 木 菠 萝

识别 常绿乔木，高达15米，有乳汁，木部黄色。叶互生，具柄，倒卵状椭圆形，长7—15厘米，宽3—7厘米，顶端短尖，基部楔形，全缘，上面亮绿色，无毛，背面稍粗糙。雌花序生于茎上或枝条上，春季可见。果大，圆柱状，淡黄色，外皮硬，有瘤状突起，被毛；种子外面具淡黄色的肉，芳香可食。

生长环境 栽培。

采集加工 药用树液、果仁。树液，随用随采，采时用利器刺破树干皮待有乳白色样树液流出，用盛器装好备用。果实，于夏秋间成熟时采集。

性味功用 树液，味淡涩；果仁，味甘，气香，性平。树液，散结消肿，止痛。果仁，滋养益气，生津止渴，通乳。

主治用法 疮疖红肿，或疮疖红肿引起的淋巴结炎，用鲜树液涂患处。产后乳少或乳汁不通，用果仁二至四两，炖肉服，或水煎服，并食果仁。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图191 木菠萝(桑科)
Artocarpus heterophyllus Lam.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

192 白粉藤

别名 白薯藤。

识别 攀援状藤本。茎圆形带节，无毛，有细线纹，被白粉，故称“白粉藤”，嫩茎稍肉质，白色。卷须与叶对生，缠绕状；叶具长柄，互生，膜质，阔心形，顶端渐尖，基部心形，边缘有疏离小突尖，两面绿色无毛。夏秋开花，淡绿色，聚伞花序与叶对生，具柄。果倒卵形，肉质。

生长环境 生于山坡、沟谷灌木丛中。

采集加工 药用根、茎、叶。全年可采。

性味功用 根味淡微辛，性凉。清热消肿，止痛。茎、叶味苦性寒，有小毒。拔毒消肿。

主治用法 痰火瘰疬，肾炎，痈疮肿毒，毒蛇咬伤，用根三至五钱，水煎服。茎、叶一般多外用，捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图192 白粉藤(葡萄科)
Cissus repens (Wight et Arn.) Lamb.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

193 地 丁（华南龙胆）

别名 土地丁，紫花地丁。

识别 矮小草本，高不及8厘米。茎紫色，稍被柔毛，少分枝。叶对生，无柄，卵状椭圆形或倒卵形，长5—15毫米，宽4—8毫米，顶端短尖，边全缘具白色小睫毛，两面粗糙，绿色，干后变灰绿色。春季开花，花冠外面黄绿色，内面紫蓝色，单生于枝顶。果压扁状倒卵形。

生长环境 生于山坡草地。

采集加工 药用全草。春夏采集，洗净晒干备用。

性味功用 味苦性寒。清热解毒。

主治用法 痈疮肿毒，无名肿毒，用二至三钱，水煎服；或用鲜草捣烂敷患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图193 地　丁(龙胆科)
Gentiana loureiri (D. Don) Griseb.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

194 毛果算盘子

别名 毛七公、漆大伯。

识别 落叶灌木；枝密被黄色粗毛。叶互生，排成二列，卵形至卵状披针形，顶端渐尖，基部圆形或阔楔形，全缘，两面均密被粗毛；叶柄短；托叶2枚，锥尖。夏季叶腋开小花，单性同株，雄花数朵簇生，具细柄；雌花单生，无柄。蒴果扁球形，有五纵槽，密被灰白色粗毛。种子红色。

生长环境 生于山坡、旷野灌木丛中。

采集加工 药用全株。全年可采，鲜用或晒干备用。

性味功用 味苦甘涩，性平。清热解毒，舒筋活络，利湿止痒。

主治用法 急性肠胃炎，痢疾，脱肛，牙痛，风湿性关节痛，用五钱至一两，水煎服。漆过敏，皮肤湿疹，稻田皮炎，用鲜枝叶水煎外洗患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图194 毛果算盘子(大戟科)
Glochidion eriocarpum Champ. ex Benth.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

195 虎耳草

别名 铜钱草、石耳朵、金线吊芙蓉。

识别 常绿多年生草本。匍匐茎似丝状，红紫色，枝端往往长幼苗，全株有白色至红紫色长毛。叶丛生，由茎部发出，圆形或肾形，基部心形或近截形，边缘浅裂，有睫毛，并有小锯齿，表面绿色，密被长毛，叶腋处有时具白色斑纹，背面有多数淡紫色或红紫色凸起的小圆点。花茎由叶丛中抽出，春末夏初开白花，小花瓣有淡红色或红黄色斑点。蒴果卵圆形。

生长环境 生于溪边林下或阴湿的石上。

采集加工 药用茎、叶。全年可采，洗净鲜用。

性味功用 味微苦辛，性寒，有小毒。凉血，止血，解毒，消肿。

主治用法 外伤出血，疮疖肿毒，腮腺炎，冻疮红肿，汤火伤，耳廓溃烂，用鲜草捣烂敷患处。中耳炎，用鲜草捣烂取汁滴耳。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图195 虎耳草(虎耳草科)
Saxifraga stolonifera Meerb.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

196 红背叶（红背山麻杆）

别名 红背娘、红帽顶。

识别 灌木或小乔木；嫩枝有毛。叶互生，具长柄，阔心脏形或卵圆形，顶端渐尖，基部浅心形或近截形，边缘有小齿，上面近无毛，背面被柔毛，基出叶脉3条，叶基有2—4个红色腺体和2条线状附属物，幼叶紫红色，老叶背面有时红色。春夏开花，腋生及顶生总状花序。蒴果近球形，被灰白色绒毛。

生长环境 生于山坡或荒地灌木丛中，石灰岩地区常见。

采集加工 药用根、叶。全年可采，鲜用或晒干备用。

性味功用 味甘，性凉。解毒，除湿，止血，杀虫。

主治用法 痢疾，尿路结石或炎症，血崩，白带，用五钱至一两，水煎服。风疹，疮疖，脚癣，用叶适量水煎洗患处。龋齿痛，用鲜叶适量加盐少许同捣烂塞虫孔。外伤出血，用鲜叶捣烂敷伤处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图196 红背叶(大戟科)
Alchornea trewioides (Benth.) Muell.-Arg.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十五、其　他

197 枸　骨

别名　老鼠刺、猫儿刺、山猫象、散血丹。

识别　常绿灌木或小乔木；树皮灰白色，无毛，枝条密生而开展。叶具短柄，互生，厚革质，矩圆形或长椭圆形，长4—7厘米，宽2—4厘米，顶端有3枚硬针刺，基部截头状，两侧各有1—2枚硬针刺，两面绿色无毛。春末夏初开花，绿白至黄色，簇生于叶腋。核果球形，熟时鲜红色。

生长环境　生于山坡、沟谷丛林中。

采集加工　药用根、叶。全年可采，洗净晒干备用。

性味功用　味微苦，性凉，疏散风热，上清头目，除烦解渴。

主治用法　头痛，牙痛，中耳炎，结膜炎，肺结核咳血，用叶二至五钱，水煎服。淋巴管

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

炎，荨麻疹，用根一至二两，水煎服。痈疮肿毒，用鲜叶捣烂敷患处。

附注 本品枝、叶含咖啡碱。



图197 枸　骨(冬青科)

Ilex cornuta Lindl. et Paxt.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

198 飞 机 草

别名 香泽兰。

识别 多年生草本。茎有细纵纹，被柔毛，绿色部常有腺点，断面白色。叶对生，具柄，卵形至卵状三角形，长3—10厘米，顶端渐尖，基部圆或阔楔形，边缘有疏齿，两面绿色被毛，背面毛较密，离基三出脉，揉碎有香气。秋冬开粉红色花，头状花序排成伞房状。果有棱，顶端有毛。

生长环境 生于山坡、旷野、村边、路旁草丛中。

采集加工 药用全草。春夏采集，洗净鲜用。

性味功用 味微辛，气微香，性微温。杀虫，止血。

主治用法 杀灭钩端螺旋体，把全草切碎撒入水田中，沤1—2日即可杀菌，同时又可增加绿肥。预防旱蚂蝗咬伤，用鲜叶揉烂涂下肢。旱蚂蝗咬伤后流血不止，用鲜叶揉烂涂伤口。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图198 飞机草(菊科)
Eupatorium odoratum L.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

199 黑　草

别名　鬼羽箭。

识别　一年生直立草本，干时黑色。茎坚挺，圆形，被柔毛，通常不分枝。根生叶无柄，卵形或倒卵形，长2—3.5厘米，宽1—3厘米，顶端钝，两面被柔毛；茎生叶对生，近无柄，疏离，下部叶矩圆形，上部叶小而线形，边近全缘，两面粗糙，被毛。秋季开花，紫蓝色；穗状花序顶生，长不及3厘米，顶端渐尖，形似箭头。

生长环境　生于山坡、山谷、旷野草丛中。

采集加工　药用全草。秋季采集，洗净晒干备用。

性味功用　味淡微苦，性凉。清热解毒。

主治用法　流感，蛛网膜下腔出血，腹痛，暑热口渴，荨麻疹，用四至八钱，水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



图199 黑　草(玄参科)
Buchnera cruciata Ham.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

200 华风车子

别名 水番桃。

识别 藤状灌木。小枝近方形，灰褐色，密被锈色绒毛和橙黄色的鳞片，老时脱落。叶近对生，薄革质，长椭圆形，背面叶脉突起，密生短柔毛。夏初开花，为腋生穗状花序，花小，白色，花心有金黄色的粗毛。果近圆形或梨形，有四翅，纸质，有横条纹，光亮，熟时红色。

生长环境 生于山脚、灌木丛中或村旁竹林中。

采集加工 药用叶。秋冬采集，阴干备用。

性味功用 味甘淡微苦，性平。健胃，驱虫。

主治用法 蛔虫，鞭虫，用干叶三至六钱，或鲜叶一两，水煎日分二次空腹服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com




图200 华风车子(使君子科)
Combretum alfredii Hance

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

常见疾病
中草药防治处方选

一、疾病预防

感冒、流行性感冒

1. 红花地桃花10斤　山芝麻10斤　金樱子5斤　百部5斤　紫苏2斤　两面针5斤　糖5斤　上药切碎加水50斤，煎成20斤，去渣加糖备用。每日3次，每次10毫升，小儿酌减。

2. 鲜山芝麻5斤　鲜青蒿5斤　加水100斤，煮沸半小时，供100人服1天，分2次服，连服7天为1疗程。

3. 贯众10斤　鲜黄皮叶3斤　加水100斤煎成50斤，供100人1次服，每日1次，连服3天。

4. 山芝麻　紫苏各5钱　水煎服，连服3—5天。

流行性脑脊髓膜炎

1. 大叶桉树叶1斤　加水7斤，煮沸半小时，供7人1天量，分2次服，连服5—7天。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

2. 贯众3斤 加水100斤，煎成浓茶样，供100人1天量，每日1次，连服5—7天，隔3天再服5—7天。（孕妇忌服）

3. 板蓝根4斤 银花3斤 贯众4斤 甘草1斤 加水100斤，煎成60斤，供100人1天量，分2次服。（孕妇忌服）

4. 板蓝根3斤 贯众5斤 加水100斤，煎成60斤，供100人1天量，分2次服。（孕妇忌服）

5. 黄藤1斤（或刺黄连） 加水5斤，煮沸30—40分钟，滤出药液，每日喷喉2—3次。每日滴鼻2—3次，每次2—3滴。内服每天1次，每次30毫升，最好三者结合。

流行性乙型脑炎

1. 板蓝根3—5钱（10岁以下用3钱，10岁以上用5钱）每日一剂，水煎服，连服3—5天。

2. 大青叶2两（鲜） 水煎1次内服（小儿酌减），隔日或3日1次。

3. 大青叶1斤 葫芦茶2斤 加水50斤，煎成25斤，供50人1天量。

痢 疾

1. 番桃叶5斤 大叶桉树叶3斤 加水100

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

斤，煮沸半小时，供100人1天量，连服3—5天。

2. 大蒜适量，每餐送饭吃。

3. 火炭母　凤尾草　银花藤各5—10斤，加水100斤、煎成50—70斤，供100人代茶饮，连服3天。痢疾多发季节可间断服用。

麻　疹

1. 银花藤3斤　玉叶金花3斤　甘草2两加水20斤，煎取10—13斤，每日服3次，连服3天。1—3岁，每次1—2毫升。4—5岁，每次3—4毫升。

2. 紫草或夏枯草各2钱　水煎，日分2次服，间日再服，连服5天。

白　喉

六月雪根　翻白草各等量1—2两　加水2斤，煮沸当茶饮，每日一剂。

百日咳

1. 板栗叶3—5钱　水煎冲糖分2次服，连服3—5天。（也可作治疗用）

2. 一箭球3—5钱　鱼腥草3—5钱　水煎代茶饮。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

二、内科疾病

感　冒

1. 山芝麻　青蒿　红花地桃花各3钱　两面针根5分　水煎，日分2次服。

2. 山芝麻1两　青蒿2钱　水煎，日分2次服。

3. 山芝麻　青蒿　豆稔根各4钱　黄皮叶两面针各2钱　水煎，日分2次服。

4. 山芝麻　古羊藤根各5钱　两面针根3钱　路兜簕8钱　水煎，日分2—3次服。

5. 淡竹叶　牡蒿　野菊花　青蒿　山芝麻羊咪青叶各用鲜品半斤　加水12斤，煎成3斤，每日服3次，每次15—20毫升。

6. 青蒿4钱　南蛇簕3钱　古羊藤2钱　火炭母3钱　两面针3钱　水煎，分2次服。

7. 水杨梅1两　野甘草1钱　水煎，日分2次服。

8. 野芥兰　野菊花　金银花各5钱—1两　水煎，日分1—2次服。

9. 生姜3钱　葱头5钱，薄荷叶（或紫苏）2钱　豆豉2钱　共捣烂冲热粥，一次服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

流行性感冒

1. 救必应皮1—2两　山芝麻根1两　淡竹叶　白茅根各1—2两　薄荷叶3钱（均用鲜药）水煎，日分3次服。

2. 山芝麻根　人字草　雷公根　酸味草　白背叶根各3钱　每日1—2剂，水煎服。

3. 南蛇簕茎或叶3钱　甘草5分　水煎，日分1—3次服。

4. 野芋头5钱—1两　山芝麻2钱　用盐炒野芋头后放山芝麻加水煎，分3次服。

流行性乙型脑炎

板蓝根2—4两（12岁以下用2两），加水500毫升，煎成100毫升，分1—2次服，每日一剂，连服二星期。

附注：1.退烧后仍需卧床休息，不宜过早活动。

2.如有后遗症，应结合新针治疗。

伤　寒

1. 大叶桉树叶　番桃叶各1斤(均用鲜药)加水5斤煎成1斤，每日服3次，每次20毫升。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

2. 野芋头（切片）4—8两加米1两炒至微黄，或加锈铁钉2枚炒黄，加水4斤，慢火煎成2碗，1日分3次服，每日一剂，连服6—7天。

细菌性痢疾

1. 大飞扬草3—5两 水煎服。

2. 火炭母 马齿苋 刺苋菜各1两 水煎服。

3. 火炭母 爆牙郎各1两 水煎服。

4. 凤尾草 红花地桃花根 火炭母 旱莲草各5钱 水煎分3次服。有高热者，加露兜簕5钱，有恶寒者，加青蒿3钱，水煎服。

5. 凤尾草 野芥兰各2两 火炭母1两 水煎，日分2次服。

6. 鲜凤尾草3两 水煎加糖适量，日分二次服。

7. 金砂蕨 竹夹菜各1两 凤尾草 鼠菊草各5钱（均用鲜品） 水煎，日分2次服。

8. 十大功劳7钱 地桃花根 鸭脚菜根各5钱 水煎服。

9. 枫树叶2两 水煎服。

10. 榄核莲3—5钱 水煎，日分3次服。

11. 茅莓 黄花母根各1两 水煎，日分2

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

次服。

12. 鲜羊咪青叶 8 两　水煎，日分2次服。

13. 金古榄　研末，每日1—3钱，分 3 次服。

14. 鲜野芥兰 4 两　鸭蛋2只　加水 4 碗共煎，蛋熟后取出，去壳，再煎成 1 碗，药汁和蛋分1—2次服，每日 1 剂。

15. 火炭母　凤尾草　银花　铁脚蕨各5钱　水煎，日分1—2次服。

16. 番桃树皮　马齿苋　凤尾草各 3 钱　水煎，日分 3 次服。

阿米巴痢疾

1. 鲜铁苋菜 1 — 2 两　水煎，日分 2 次服，每日一剂，连服 3 — 5 天。

2. 芭蕉花蕾适量　捣烂取汁，每天服 3 次，每次20毫升。

3. 火炭母 3 钱　用蜜糖炒后，水煎 1 次服。

急性传染性肝炎

1. 豨签草 3 — 5 钱　山枝子 2 钱　锈铁钉 2 枚　水煎，日分 3 次服。

2. 赛葵 1 两（鲜用 2 两）　水煎服。

3. 溪黄草　白糖各 1 两　水煎，日分 2 次

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

服，每日一剂，连服20—30天。

4. 虾钳草 十大功劳各3钱 人字草 豨签草各5钱 红糖适量 水煎，日分3次服。

5. 虎杖根 山枝根各1两 姜黄根 射干根各5钱（均用鲜药）煲猪骨分1—2次吃。

6. 金钱草 黑脚蕨各1两 葫芦茶5钱 田基黄 野甘草3—5钱 水煎冲白糖分2—3次服。

7. 田基黄 鸡骨草 阴行草各1两 红枣5枚 水煎，日分2次服。

8. 满天星2两 发烧者加山芝麻7钱，水煎加糖适量，作茶饮。

9. 蓝花柴胡2两 加水3—4斤，煎浓汁小半碗，冲蜜糖1两，1次服，每日一剂，或隔2—3天服一剂。

慢性肝炎

1. 鸡骨草 瘦猪肉各2两 用洗米水1斤煎成半斤，分2次服。

2. 田基黄1斤半 旱莲草1斤 鸡骨草 葫芦茶各2斤 香附草 甘草各半斤 加水40斤煎取25斤药液，加防腐剂，每日服3次，每次15—20毫升。（本方也可治急性肝炎）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

3.耳草1两　甘草5钱　水煎，日分1—2次服。（降低转氨酶效果显著）

疟　疾

1. 鹅不食草3两　水煎，日分3次服，每日一剂，连服三天。（适用间日疟）

2. 黄皮叶16—20张　慢火水煎1次服，连服至愈为度。（疟疾发作前服）

3. 红花地桃花　一箭球各5钱　五指风3钱　水煎，疟疾发作前2小时服。

肺结核

1. 华凤仙5钱—1两（鲜用2两）　适量瘦猪肉或猪骨同煲，慢火煲2—3小时，不放油盐，1次服，每日一剂，20—30天为一疗程。

2. 十大功劳5钱　虎杖2钱　野甘草1钱半水煎，日分2次服。

3. 千斤拔1两　石仙桃3钱　石油菜5钱与猪骨煲水服，每日一剂，连服一个月。

4. 榄核莲　十大功劳各3—4钱　牛大力1两　水煎，日分2次服，每日一剂，15—30天为一疗程。

5. 野马蹄草2两　水煎冲白糖分2次服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（适用肺结核咯血）

6. 红铁树叶 白背叶各2两 白茅根 侧柏叶各1两 水煎，日分3次服。（适用肺结核咳血）。

支气管炎

1. 臭茉莉根2钱 鹅不食草1钱 水煎冲白糖分2次服。

2. 鱼腥草5钱 一匹绸5钱 薄荷1钱 鹅不食草1钱 柠檬叶1钱(均用鲜药) 水煎，日分2次服。

3. 枇杷叶4—5钱 野芥兰5钱 水煎，日分2—3次服。（适于慢性支气管炎）

4. 鲜鱼腥草1两半 百合 山栀根各1两 天冬 麦冬 鲜紫苏各5钱 水煎，日分2次服。

5. 紫万年青5钱 木蝴蝶(种子)1钱 水煎，日分2次服。（适于慢性支气管炎）

肺脓疡

1. 鱼腥草2—4两 苇茎 苡米各1两 冬瓜仁2两 桃仁3钱（均用鲜药） 水煎服。

2. 鲜野芥兰 鲜鱼腥草 百部各1两 鲜

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

败酱草3两　野菊花5钱　白芨3钱　水煎服。

肺　炎

1. 榄核莲5钱　地龙3钱　桔叶2钱　水煎，日分1—2次服。

2. 百部10斤　十大功劳5斤　枇杷叶3斤　甘草1斤半　加水40斤煎成20斤，过滤后加入适量糖，每日服3次，每次20—30毫升。

3. 野芥兰　一箭球　鱼腥草　石橄榄　石油菜各1两（均用鲜药）水煎，日分3次服。（适于大叶性肺炎）

急性胃肠炎

1. 鲜豨莶草1—2两　水煎服。

2. 古羊藤根干粉2—3钱　日分3次冲水服。或鲜根1—2两，水煎服。

3. 樟树根1两　古羊藤根5钱　水煎分2次服。

4. 野芥兰　铁苋菜各2斤　番桃树叶1斤半　加水20斤煎成10斤，过滤后加黄糖2斤，苯甲酸10克（先用少量酒精溶解），搅匀装瓶，高压消毒备用。每日服3次，每次20—30毫升。

5. 火炭母　爆牙郎各3钱　水煎，日分2

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

次服。

6. 车前草 稔子树各1两 辣蓼草5钱 水煎，日分2次服。有呕吐者加藿香2钱；樟树皮2钱，水煎服。

7. 金古榄3钱 研细末，分2次温开水送服。

8. 古羊藤根 金线风根 水田七根各3钱 樟树根2钱 水煎，日分2—3次服。

慢性胃炎

1. 毛蕊3分—1钱 水煎分2次服。或研粉，每日服3次，每次3分。

2. 木姜子（果）3—7粒 口嚼服。

3. 水田七根9份 两面针根1份 共研末，每日服3次，每次3分，温开水送服。

胃、十二指肠溃疡

1. 华千金藤块根 研细末，每次服5分—1钱。

2. 饿蚂蝗1两 椿芽子2钱 水田七3钱 香附子3钱 决明子3钱 水煎，日分2次服。

3. 饿蚂蝗3钱 水田七1钱 两面针3钱 鸡血藤3钱 水煎，日分2次服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

4. 大叶紫珠 研细末，每服5分—1钱，每日3次。

或大叶紫珠叶1两 水煎，日分2次冷服。（用于胃出血）

5. 侧柏叶3两 仙鹤草3两 白茅3两 血余炭1两 共研细末，每次1钱，每日3次。（用于胃出血）

6. 菜豆树根5钱 仙鹤草5钱 大蓟3钱 蒲黄炭3钱 侧柏炭3钱 地榆炭3钱 水煎，日分2次冷服。（用于胃出血）

便 秘

1. 落葵叶适量 煮作菜吃。
2. 虎杖根1两 水煎服。
3. 红薯叶半斤 煮作菜吃。

蛔 虫 病

1. 华风车子叶1两 加水1碗煎成半碗，空腹一次服。每日一剂，连服2天。（服药后可能有肠鸣或打呃现象）

2. 苦楝树（二层白皮）1两（成人量），水煎1小时以上，空腹1次服完，如排虫少，第二天可再服1次。能用根皮效力更佳。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

急性肾炎

1. 野芥兰 金钱草 草鞋根各5钱 土牛七1两 水煎，日分2—3次服。

2. 金线风 车前草 土茯苓各1两 水煎，日分2次服。

3. 石菖蒲2钱 野苡仁根2两，芦根1两水煎，日分2次服。

4. 野芥兰 车前草 叶下珠各1两 白茅根 木贼各5钱 通草3钱 水煎，日分2次服。

5. 磨盘根 金钱草各1两 金线风 草鞋根各5钱 水煎服。

泌尿系感染

1. 野芥兰 车前草各5钱 白茅根3钱 甘草2钱 水煎，日分3次服。

2. 叶下珠 白花蛇舌草 葫芦茶 白茅根各1两 车前草5钱 甘草1钱半（均用鲜药）水煎，日分2次服。

3. 金钱草1两 车前草 虾蚶草各5钱 金砂蕨4钱 水煎，日分2—3次服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

泌尿系结石

1. 鲜粪箕笃1两　鲜透骨消　桃仁　穿破石各5钱　水煎服。

2. 磨盘根　地桃花　金钱草各1两　金线风7钱　草鞋根3钱　甘草2钱　水煎，日分3次服。

3. 粪箕笃3两　金钱草　车前草各1两　穿破石5钱（均用鲜药）　水煎服。

4. 白花蛇舌草　叶下珠　车前草　金砂蕨各1两　水煎，日分2次服，7天为一疗程。

5. 荠菜2两　金钱草　鸡内金各1两　水煎服。

风湿性关节炎

1. 三叉苦根　五指牛奶根　金刚头根　大力王　九龙藤　鸭脚木皮各5钱　水煎，日分2次服。

2. 野芥兰1两　两面针3钱　捣烂加入40%酒精适量外敷。

3. 木姜子1两　鹰不扑5钱　煲猪骨吃。

4. 鲜莪术　鲜香附根各适量　捣烂加酒局部外敷。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

5. 鹤党1两　小果蔷薇1两　竹叶椒5钱　用三花酒1斤浸七天后可服，每日一次，每次1—2两。并外搽患处。

6. 紫花前胡　土牛七　五指牛奶　骨碎补　威灵仙　四方藤各4钱　狗脊3钱　水煎，日分2—3次服。

7. 半枫荷茎　切片晒干，每斤药浸5斤酒，10天可用。药酒适量擦患部皮肤至发红为度，日3次。

8. 九龙藤　千斤拔　杜仲各5钱　水煎服。

贫　血

1. 稔子果　淮山各1两　瘦猪肉2两　煲水吃汤和肉。

2. 血风藤　土党参　黄花倒水莲　鸡血藤各1两　水煎服。

3. 鸡血藤30斤　加水适量煎，去渣，浓缩至500毫升，再加米酒100毫升即成，每日服3次，每次15—20毫升。

4. 首乌　黄精各1两　大枣　黑豆各5钱　水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

高 血 压

1. 萝芙木根6钱　救必应5钱　马鞭草　乌尾丁各3钱　草决明　桑叶各2钱　水煎，日分2次服。

2. 雷公根　旱莲草各3钱　地桃花　路边菊　勾藤各2钱　水煎，日分2次服。

3. 臭茉莉（茎、根）粪箕笃各1两　萝芙木5钱　水煎服。

神 经 衰 弱

1. 稔子树2两　十大功劳1两　金樱子5钱　桑螵蛸3钱　水煎服。（适于遗精）

2. 鲜田字草2—3两　水煎服。（适于肝胆火旺，心烦不眠）

3. 桑叶　芝麻各4两　白糖适量　前二药研末，共调匀，每次3—5钱，开水送服。（适于失眠头痛）

食 物 中 毒

1. 鲜鸡谷草2—4两　捣烂水煎服。适于木薯中毒。

2. 雷公根1两　红糖2两　水煎服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

3．葫芦茶1—2两　水煎服。

4．萝卜叶适量　水煎服。以上3方适于木薯及野山薯中毒。

5．绿豆1—2两　甘草5钱　水煎服。适于木薯中毒。

6．银花1两　甘草5钱　水煎服。适于毒菌中毒。

7．小金花草1两　水煎服。

三、外科疾病

创伤出血

1．大叶紫珠　狗脊毛各等量　晒干研末装瓶备用。用时把药撒于伤口。

2．山香1份　假烟叶2份　共研细末，外撒患处，用消毒纱布包扎。

3．血余炭（即头发灰）拔牙后创面出血，将药粉撒患处。

跌打扭伤

1．鹅不食草　大叶酢浆草　韭菜根　冬青叶　旱莲草　均鲜药各用5钱—1两，共捣烂加

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

酒炒热敷患处，每天换药一次。

2. 跌打酒：九里香（茎、叶）半斤　透骨消1斤　泽兰2斤　大驳骨（茎、叶）3斤　上药切碎浸75%酒精或米双酒，泡过药面，待半个月后使用。外搽患处。

3. 黑老虎根皮2斤　救必应根皮1斤　樟脑粉3两　上药研细末（樟脑另研），用凡士林适量调成软膏敷患处。

4. 三叉苦叶适量　捣烂加酒敷患处，每日1次，敷6—8小时。

5. 小果蔷薇根3两　米双酒1斤　浸七天，取药酒适量内服，每日1—3次，外搽数次。

6. 七叶莲　鸭脚菜　泽兰　旱莲草各等量捣烂浸酒，内服每次20毫升，每日3次，外用适量。

骨　折

1. 大驳骨　小驳骨　榕树叶（或须）　透骨消各适量，捣烂加酒炒热敷患处。

2. 大驳骨　小驳骨　榕树叶（或须）　爬山虎　五加皮　各适量，捣烂加酒炒热敷患处。

3. 蝉翼藤　大驳骨叶　小驳骨叶　一箭球　鹅不食草　泽兰（茎、叶）　宽筋藤叶各适量捣烂加三花酒或双酒炒热外敷，一天换药1次。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附注　跌打骨折，先复位，后固定再选用上药外敷。

汤火伤

1．鲜酸枣树二层皮　用水煎2—3小时，煮成黑黄色，去渣，将药水熬成胶状浓汁，反复外涂患处。

2．金樱根　金花草各适量　先用金英根煎水待冷洗患处，后用金花草研细末撒伤处。或金英根煎成浓汁湿敷。

3．岭南山竹子4份　黄柏1份　研末调香油涂患处。

4．毛果算盘子5钱　蚂蚱簕5钱　金银花1钱半　黄连（或黄柏）1钱半　水煎成2斤，外洗或湿敷患处。

5．芦荟　大飞扬草等量　捣烂外敷，每日换药1次。

疮　疡

1．雾水葛适量　捣烂敷患处。

2．野芥兰2—4钱　路边菊1—3钱　水煎日分3次服。

3．红母猪藤块根　三白草根　石菖蒲根各

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

适量　均用鲜药捣烂外敷患处。

4. 八角莲根　金古榄　饿蚂蝗根各适量，共磨醋成浓汁涂患处。

5. 金银花1两　野菊花5钱　蒲公英5钱　犁头草3钱　了哥王根3钱　水煎日分2次服。

6. 红龙船叶　了哥王叶各等量　加酒糟捣烂外敷。（无酒糟可加黄糖）

7. 野菊花　田基黄　银花藤　野芥兰各1两　十大功劳5钱　水煎服。

8. 九里明　野芥兰　黄糖　捣烂外敷患处。（适于蛇头指疮）

急性乳腺炎

1. 大飞扬草　了哥王　黄糖各适量捣烂外敷，每日换药1—2次。

2. 假葡萄藤（根、叶）　先用叶煎水洗，后用根1斤磨醋或酒成浆糊状，敷擦患处。

3. 苧麻根　黄糖各适量　捣烂外敷，每日换药1—2次。

4. 鲜蒲公英　鲜犁头草　各适量加黄糖少量共捣烂敷患处。

5. 白花蛇舌草5钱　路边菊1两　大力王1两　六耳棱1两　野甘草2钱　水煎内服兼外洗。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

淋巴结核

1. 盐蛇 烘干研末，每次3—5分，每日1次，拌稀粥吃，连服3—4周。或去内脏剁烂加盐调味蒸服，每日1次，每次1—3条，连服3—4周。

2. 鹰不扑（根、皮） 马齿苋 将两药捣烂调甜酒糟煨热敷数小时后除药，间隔1小时后再用原药煨热敷患处。

3. 猫爪草1—3两 水煎服。另用猫爪草 夏枯草各适量 加酒糟捣烂外敷。

阑尾炎

1. 野芥兰 鱼腥草 野菊花各2两（均用鲜药） 水煎，日分2次服。

2. 白花蛇舌草 虾蚶草各2两 野芥兰1两 水煎服。

3. 鲜山苦荬半斤 古羊藤1两 银花（全草）2两 元胡3钱 甘草3钱 水煎，日分2—3次服。

附注 上三方有清热解毒、散瘀止痛之效，适应于阑尾炎早期。对于病情危重及小儿患者，宜施行手术治疗。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痔　疮

1. 卷柏5钱　水煎服

2. 苦参　鱼腥草　酸味草各1两　水煎内服或外洗。

3. 淡竹叶　六耳棱各1两　旱莲草5钱　水煎服。

4. 野菊花　六耳棱　大力王　野甘草各1两　白花蛇舌草5钱　水煎内服并外洗。

脱　肛

1. 红蓖麻根　槐花各1两　煲瘦猪肉吃。

2. 金樱子1两　车前子3钱　水煎，日分2次服。

3. 灯笼草（茎、叶）　蒸瘦猪肉吃。

4. 七叶一支花　磨冷开水成浓汁涂患处。

毒蛇咬伤

1. 紫背金牛　半边莲　耳草　山扁豆各等量浸酒，七天后用，内服每次20—30毫升，隔3小时服1次，连服1—2天，并用药酒从上而下擦患肢（忌搽伤口）

2. 六月雪3两　帆船草1两　细叶香茶菜

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

3两（均用鲜药）捣烂取汁冲冷开水1—2碗内服，药渣敷伤口周围。或加鲜紫背金牛1两　寮刁竹根2—5钱，加三花酒2—3两蒸服。

3．红乌桕根1两　紫背金牛5钱　捣烂冲酒内服，渣搽伤口周围。

4．鲜小叶买麻藤1—2两　捣烂冲二流米水服，渣敷患处，留伤口，每天1—2次。

毒虫咬螫伤

1．假海芋根适量　去粗皮搽患处。（适于黄蜂螫伤）

2．两面针根250克　十大功劳100克　虎杖150克　95%酒精1000毫升　将上药浸酒精，一周后取清液加适量薄荷脑，日服3次，每次2毫升，外用适量。（适于毒虫咬伤）

3．酸蕹头捣烂取汁擦伤口。（适于黄蜂螫伤）

4．生红薯或鲜红薯叶适量，加黄糖捣烂敷患处。（适于蜈蚣咬伤）

5．余甘子叶或树皮适量　捣烂擦伤处。（适于蜈蚣咬伤）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

四、妇科疾病

月经不调、痛经

1. 鲜月季花根5—8钱　鸡蛋2只　水煎后食蛋及汤。

2. 七叶莲5钱　两面针3钱　水煎，日分2次服（适于痛经）。

3. 益母草1两　鸡蛋1只　水煎1次服。

4. 香附子5钱　益母草6钱　木姜子5钱水煎，日分2次服。

闭　经

1. 益母草1两　月季花根1两　紫茉莉根3钱　香附3钱　三棱3钱　莪术3钱　水煎，日分2次服。

2. 凤仙花5钱　煲猪骨，日分二次服。

3. 鸡血藤1两　穿破石1两　水煎服。

4. 土党参5钱　五指牛奶1两　首乌5钱千斤拔1两　益母草3钱　水煎服，或煲鸡蛋食。

月经过多

1. 鸡血藤1两　首乌5钱　艾叶2钱　金

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

樱根5钱　干稔子4钱　水煎服。

2．大风艾1两　一匹绸5钱　益母草5钱　水煎，日分2次服。

3．益母草1两　杨桃树嫩叶1两　鸡蛋2只　水煎服。

4．稔子树根1两　艾叶2钱　鸡肉适量，水煎，日分2次服。

血　崩

1．鲜旱莲草　鲜龙芽草各1两　水煎冲血余炭1钱待冷一次服，每日一剂，连服3天。

2．铁海棠鲜花10余朵　水煎或炖肉类吃。

3．干稔子5钱　走马胎3钱　鸡蛋2只　水煎一次服。

4．苧麻嫩叶2—4两　鸡蛋4只　先将前味捣烂煮沸，再加蛋共煮，一次服。

5．酸藤子根1—2两　水煎服，或煲鸡肉服。

白　带

1．向日葵根2两　每日一剂，水煎，日分3次服，连服3—4剂。

2．鸡冠花1两　一匹绸叶1两　小叶榕树须5钱　瘦猪肉适量　水煎，日分2次服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

3. 五指牛奶根1两，苧麻根一两　瘦肉适量　水煎，日分2次服。

4. 白背叶根5钱　海螵蛸8钱　鸡冠花3钱　野菊花8钱　水煎，日分2次服。

妊娠呕吐

1. 鸡蛋1只　白糖1两　米醋2两　共煲服。

2. 鲜葫芦茶1两　灶心土1两　水煎，日分2次服。

3. 紫苏1钱半　生姜2片　水煎服。

子宫脱垂

1. 金樱根5钱　白胡椒8分　土党参1两　红枣5钱　水煎冲甜酒服。

2. 金樱根4两　狗脊2两（均用鲜药）水煎服。

胎盘滞留

1. 红蓖麻子10—20粒（去壳）　或红蓖麻根适量　或红蓖麻嫩叶适量　捣烂煨热敷两脚心涌泉穴。胎盘排出即除净药。

2. 藕叶2两　龙衣灰1钱　水煎，日分2次服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五、小儿科疾病

小儿上呼吸道炎

1. 野芥兰3钱　红花地桃花1两　蚂蚱箭5钱　石仙桃3钱　水煎，日分3次服。

2. 一箭球1—2两　水煎，日分三次服，或当茶饮。

3. 紫苏2钱　野菊花3钱　葫芦茶3钱水煎服。

4. 雷公根5钱　丁葵草3钱　白点秤3钱草鞋根3钱　水煎服。

5. 桑叶2钱　银花藤5钱　野菊花5钱　雷公根5钱　鱼腥草4钱　水煎服。

白　喉

1. 六月雪　板蓝根各1两　每日1剂，水煎分2次服。

2. 土牛七根1两　酸味草1两　野芥兰5钱　每日1剂，水煎分3次服，连服3—5日。

百　日　咳

1. 鲜一箭球2两　每日1剂，水煎分2次

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冲糖服。

2.野菊花1两　鱼腥草5钱　水煎，日分2—3次服。

3.金古榄　研末，每次1—2分，每日2—3次，糖水送服。

4. 鱼腥草5钱　柠檬叶1钱　薄荷1钱　水煎服。（不需久煎）

5. 鸡屎藤3—5钱　水煎，冲糖，日分2—3次服。

草鞋根　野芥兰　百部　天冬　黄藤各三钱　甘草2钱　水煎，日分2—3次服。

流行性腮腺炎

1. 仙人掌适量　去刺切成薄片贴患处，或捣烂敷患处，每日2次。

2. 了哥王叶捣烂敷患处。

3. 板蓝根　白点秤各5钱　夏枯草8钱　每日一剂，水煎服，连服2—3天。

消化不良

1. 铁苋菜5钱　豨签草5钱　人字草1两（均用鲜药）　水煎，日分3—4次服。

2. 鲜番桃叶5钱　红花地桃花根1两　火

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

炭母5钱　凤尾草3钱　水煎，日分3次服。

3．红花地桃花根5钱　火炭母3钱　古羊藤根3钱　排钱草3钱　水煎，日分2—3次服。

4．大飞扬草1两　马齿苋3钱（均用鲜药）　水煎，日分3次服。

5．稔子树根3钱　南天竹根3钱　水煎，日分2—3次服。

6．霜坡虎3斤　加水20斤，煎成6斤，1岁以内小儿，每日2次，每次20—30毫升。（两天即停药）

小儿疳积

1．鹅不食草1两　独脚疳1两　金钱草2两　铁扫帚1两　晒干研粉，蒸猪肝，鸡肝吃或冲开水服，每次5分—1钱。

2．紫背金牛5钱　塘角鱼适量，蒸服，连服3—5天。

3．独脚疳1钱　金钱草5钱　共研末，蒸瘦肉或猪肝服。

4．叶下珠　晒干研粉，蒸瘦肉或猪肝服，每次3—5分。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小儿臀红

1. 雷公根适量　水煎外洗，每日2—3次。

2. 狗肝菜　野菊花各适量　水煎外洗，日1—2次。

3. 榄核莲　排钱草各适量　水煎外洗，日2—3次。

六、五官科疾病

急性结膜炎

1. 九里明3两　路边菊1两　水煎后去渣乘热薰患眼，后温洗之。

2. 野芥兰5钱—1两　桑叶5钱　野菊花1两　水煎服。

3. 榄核莲2钱　水煎内服兼外洗。

4. 黄藤5钱　水煎内服兼外洗。

中耳炎

1. 肾蕨块根　捣烂取汁滴入患耳内，一日数次。

2. 香附粉　十大功劳各100克　酸醋适量

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

浸酸醋一周去渣，再加酸醋至500毫升，先洗净患耳，拭干，取药液滴患耳，每日3次，每次2滴。

3. 白花草 白矾 冰片 酒各适量 白花草捣烂取原汁，过滤后加入白矾、冰片，酒各适量备用。先洗净患耳，拭干，取药液数滴滴患耳，每日3—4次。

4. 榄核莲鲜叶 捣烂取汁 先洗净患耳，拭干，取药液数滴滴患耳，每日3—4次。

扁桃体炎、咽喉炎

1. 山豆根6份 甘草1份 晒干研粉压片，每片含0.1克，每次3—6克，每日3—4次。

2. 金线风根5分 含服。

3. 金古榄适量 切片含咽。

4. 六月雪根5钱 野芥兰1两 百部4钱 水煎，日分2次服，连服3天。

5. 金线风5钱 白点秤5钱 十大功劳5钱 甘草2钱 水煎，日分多次服。

6. 银花藤1两 板蓝根5钱 野菊花1两 射干5钱 水煎，日分2次服。

口 腔 炎

1. 冬青树叶适量 嚼烂，敷于溃疡处，每

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

日1次，或水煎，含漱用。

2. 白点秤根1两　橄榄肉2钱　水煎，内服或含漱。

牙　痛

1. 两面针鲜叶　苍耳草鲜叶　共捣烂塞进龋齿洞内。

2. 两面针根3两　切片浸于1斤95%酒精中，24小时后使用，用时用棉签蘸药液涂患牙处。

3. 番桃嫩叶　食盐少许　共捣烂，捻成小丸，填塞患牙。或用番桃叶煲酸醋含漱。

4. 苦楝木皮　桃树根各1两　水煎含漱。

鼻　衄

1. 茅根2两　莲叶1两（均鲜药）水煎，日分2—3次冷服。

2. 旱莲草1—2两　水煎冷服。

3. 茅根5钱—1两　侧柏3钱　山栀子3钱　水煎冷服。

4. 山栀子1—2两（炒黑）　水煎服。

骨卡喉

1. 凤仙花（根、茎）1两　水煎成半杯，

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冲酸醋半杯含服。

2. 威灵仙3—5钱 水煎，加酸醋适量含服。

3. 威灵仙5钱 草果3钱 硼砂3钱 水煎含服。

4. 鲜虾蚶草4两 水煎，含漱慢慢吞下。

七、皮肤科疾病

湿 疹

1. 水杨梅叶 三角泡 蚂蚱簕 苦楝树叶 葫芦茶 乌桕叶各等量 晒干研粉备用。用时，先将上药水煎外洗患处，然后再用此药粉撒患处，每日1次，连用5—7日。

2. 九里明 爬山虎 蚂蚱簕各适量 水煎浓液，外洗患处，每日1—2次。

3. 萝芙木根、叶 每天用根5钱—1两，水煎服，用叶捣烂敷患处。

4. 桉树叶 毛果算盘子叶各等量 焙干共研末备用。或水煎外洗亦可。

5. 鲜虎耳草适量 捣烂配茶油敷患处。或配冰片1分，枯凡5分，共捣烂敷患处。（适于烂耳背）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

脓疱疮

1. 奶汁草　乌桕叶等量　水煎外洗。

2. 五色花　松针各适量　水煎外洗。

3. 地稔叶　白饭树　耳草　盐肤木　余甘子叶　红乌桕各适量　水煎外洗，每日2次。

4. 蚂蚱翁1两　三角泡5钱　乌桕叶5钱　毛果算盘子3钱　水煎外洗。

过敏性皮炎

1. 毛果算盘子（茎、叶）适量　水煎外洗，每日2次（适于漆过敏）

2. 草鞋根　羊咪青　凤尾草各适量　水煎服。

3. 羊咪青适量　水煎外洗。

4. 韭菜适量　捣烂外搽。

癣

1. 苍耳草　九里明　苦楝树叶各1斤　了哥王　大叶桉树叶　五色花各半斤　水煎去渣，浓缩成膏，外敷患处。

2. 十大功劳（茎）适量　浸醋（以泡过药面为度）五天可用。外擦患处。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

3. 大飞扬草适量　捣烂取汁，外擦患处，每日2—3次。

4. 五色花　五指风　十大功劳　了哥王各等量　水煎外洗。

蓖麻疹

1. 桉树叶1斤　水煎外洗　每日2次。

2. 虾蚶草　奶汁草　大飞扬草　旱莲草各等量　水煎外洗，或上药各用2—3钱，水煎服。

3. 红背叶适量　水煎外洗。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附 录

正名及别名索引

一 划

一包针……192
一把伞……386
一枝花……44
一枝香……44
一摩消……316

二 划

十字草……80
丁葵草……112
八月泡……52
八百力……322
八角莲……386
人字草……112
入地射香……194
九子莲花……266
九牛薯……70
九节风……306
九层风……286
九层楼……18
九莲灯……70

三 划

三十六荡……142
三月泡……48
三加皮……278
三叶五加……278
三叶鸡血藤……286
三托艾……2
三妹木……326
三姐妹……2

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

三钱三……324
三筒管…… 74
三颗针…… 30
土三七……334,260
土甘草…… 110,78
土地丁……398
土杜仲……298
土花椒……236
土香草……4
土香薷……4
土独活……132
土细辛……206,230
土茵陈……116
土柴胡…… 24
土黄芪……284
土黄连……30,32,124
土黄柏……146
土澄茄……200
大力牛……282
大风叶……248
大节藤… ……184
大叶山扁豆……168
大叶千斤拔……294
大叶半枝莲……358
大叶钩藤…… 36
大叶蛇总管……128
大叶紫珠……248
大叶藤……100
大血藤……180
大百解薯……104
大饭团……196
大青叶…… 28
大苦木……318
大总管……104
大高良姜……190
大通草……160
大菟丝子…… 90
大猪尾……294
大蓝…… 28
大蓟……256
大蒜坛…… 52
飞天蜈蚣……346

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

飞天藤…… 90
飞龙掌血……332
飞机草……408
小毛茛……156
小毛蒟……226
小叶三点金草……354
小叶买麻藤……184
小叶蛇总管……350
小阳伞……310
小芸木……150
小苦楝…… 68
小果蔷薇……186
小金钱草……166
小金藤……332
小金樱……186
小香草……344
小痴头婆……360
小蓟……256
小酸浆……148
小墙风……226
上石蒜……138
山小桔……328
山乌龟……240,242
山玉桂……234
山甘草……110
山竹子……340
山豆根…… 64
山花椒……236
山苍子……200
山鸡血藤……290
山鸡茶……306
山扁豆……168
山姜……190
山柑子……328
山香…… 12
山胡椒……222
山桔子……340
山蚂蝗……300
山茛菪……152
山莲藕……282
山黄皮…… …150
山萝卜……158

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山猫象……406
山药……198
山薄荷…… 18
千斤力……294
千斤拔…… ..294
千打锤……232
千年健……192
千层纸……146
马下消……288
马连鞍…… …132,252
马槟榔…… 56
马蹄儿……372
马蓝…… 28
马蹄金……166

四　划

方藤……182
方钩藤…… 36
六方藤……182
火杨梅…… 92
火梅木…… 92
火殃筋……374
天南星…… ……134
天青地白……46,54
无根藤…… .. 90
无娘藤…… 90
五马巡城……316
五虎通城……228
五加……276
五月莲…… ..352
五加皮……276
五味藤……316
五倍子树……330
五托鸡……208
五眼果……336
木姜子……200
木竹果……340
木菠萝……394
木蝴蝶……146
木棉…… 84
木棉花…… 84
木鳖子……388

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

木鳖藤……388
不出林……310
双眼龙……322
双藤……216
巴豆……322
水牛奶……338
水东哥……338
水对菜……80
水仙桃……88
水菖蒲……244
水番桃……412
水枇杷……338
水灯笼……148
水剑草……244
水蜈蚣……244
水槟榔……56
水稔子……16
水指甲花……140
内消子……334
牛大力……282
牛甘果……58
牛耳枫……68
牛白藤……40
牛尾树……312
牛尾泡……52
毛七公……400
毛大丁草……44
毛老虎……12
毛竹叶椒……236
毛杜仲藤……298
毛果算盘子……400
毛草龙……88
毛凉伞……102
毛栗壳……296
毛蒟……226
毛麝香……362
月月红……254
月季花……254
风藤……196
乌药……232
乌毛蕨……96
乌云盖雪……360

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五　划

头晕菜……348
兰香草…… 18
半枫荷……218
半枝莲…… ……356
牙包树……208
打不死……154,334
打额泡…… ……148
左右扭……172
石上莲……138
石艾……4
石仙桃……138
石耳朵……402
石苋菜……154
石油菜……154
石松……210
石虎…… ……238
石穿盘……138
石蒿蒲……244
石榴……122
石琴薯……242
石蒜……198
石橄榄……138
石蟾蜍……240
布包木……304
布渣叶……304
龙骨……366
龙骨树……374
对节刺……384
叶生根……258
叶里藏珠…… 60
号筒杆……324
田七…… 246
田字草…… 80
田皂角…… ……170
田浮草…… 88
四方莲…… 26
四方藤……182
四叶草…… …… 80
四叶参……280
四轮草…… …… 250

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

四季红……254
四块瓦……206
节节花…… 38
生丁木…… 84
仙人掌……390
白头翁…… 54
白吊粟……114
白花刺……186
白花树……320
白花蛇舌草……378
白金古榄…… 74
白背叶……114
白背娘……114
白背杨…… 16
白眉…… 44
白苏…… 10
白桐树……224
白骨风……248
白骨藤……288
白粉藤…… …396
白薇…… 70
白饭树……378
白薯藤……396
白鹤参……312
白鲫根……278
丝棉皮……272

六　划

羊不挨……374
羊角豆……348
羊尾豆…… 82
羊乳…… ……280
米碎木……384
灯笼草…… …148
地丁…… …398
地瓜藤……302
地松柏……210
地苦胆…… 98
地杨梅…… 50
地蓝…… 28
地榆…… …252
老虎舌…… …102

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

老虎尾…… 42
老虎刺……406
老虎须……142,212
老鸦胆…… 68
老鼠刺……256
老鼠拉冬瓜……370
耳草…… 38
耳挖草……356,358
过山龙……172
过江龙……172
过墙风……220,308
过路黄……164
扫把枝……162
毕澄茄……200
灰毛浆果楝……318
百足草……346
有鲠青桐……202
买麻藤……184
异叶天南星……136
异形南五味……196
阳雀花…… ….284
阴行草……116
阴香……234
尖尾风……248
光叶十大功劳…… 32
光叶海桐……208
吊天藤……174
收鸡草……210
长叶假万寿竹……271
长穗猫尾草……266
合萌……170
竹叶艾……214
竹叶细辛……342
竹叶椒……236
竹叶黄精……271
竹节蓼……346
丢了棒……224,316
多花山竹子……340
多花黄精……271
血风藤……178
血藤……180
华千金藤……242

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

华凤仙……140
华风车子……412
华南龙胆……398
华荠蓁……4
仰天钟…… 72
红毛过江……102
红毛树……338
红毛毡……102
红四方藤……182
红豆蔻……190
红苏木……314
红花鸡距草…… 66
红花地桃花……360
红背山麻杆……404
红背叶……404
红背娘……404
红帽顶……404
红紫苏…… 10
红藤……180
红藤菜……368
奶参……280
伞房花耳草……378

七　划

冷饭团……194
沙牛木……326
良姜……190
豆角树……312
豆豉姜……200
杜仲……272
杜仲藤……298
护心胆…… 66
扯丝皮……272
把守天门……326
走马风……308
鸡爪三七……260
鸡爪风…… 54
鸡仔树……292
鸡母酸…… 94
鸡血藤……286
鸡头薯……152
鸡肉菜……108

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鸡骨香……306,232
鸡骨常山…… 20
鸡屎木……150
鸡屎藤……118
驳骨草……306
吹风散……232
吴萸……238
吴茱萸……238
串钱草……120
苏木……314
芸香……344
花椒……222
旱田草……352
岗松……162
余甘子…… 58
含珠草…… 60
伸筋草……210
伸筋藤……174
伽蓝菜……260
牡蒿…… 24
饭团藤……216
卵叶娃儿藤……142

八 划

定心草……228
夜关门…… 82,348
夜拉子…… 82
单叶蔓荆…… 16
青牛胆…… 98
青茎薄荷……6
青桐木……202,262
青藤……178
刺青菜……256
刺桐……202
刺黄连…… 30
刺楸……202
拦路蛇…… 48
板栗……296
板蓝根…… 28
枫杨……364
软柏木……318
软筋菜……368

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

软筋藤……174
画眉跳……222,332
屈头鸡…… 56
虎耳草……402
虎尾兰…… 42
齿叶泥花草……352
苦里根……382
苦参……380
英雄树…… 84
茅瓜……370
茅莓…… 48
苹…… 80
罗胭木……320
岭南山竹子……340
金不换……242
金毛狗脊… ……274
金古榄…… 98
金边虎尾兰……42
金耳环……230
金线吊芙蓉……402
金线吊虾蟆……112
金线吊葫芦…… 54
金钱草……164
金银袋……104
金锦香…… 72
肥猪菜…… ….154
鱼花草…… 78
鱼串草…… 62
鱼胆木……318
鱼眼木…… ……376
狗脊……274
狗脚迹……360
狐狸尾……266
爬地牛奶……302
细叶十大功劳…… 34
细叶金香炉…… 72
细叶香茶菜……2
细叶香薷……4
细叶鼠菊草…… … 46
线纹香茶菜……124
杨梅…… 92

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

九 划

穿心莲…… 26
穿破石……216
穿壁风……198
扁担藤……176
扁骨风……176
亮叶鸡血藤……290
美丽胡枝子……326
美丽崖豆藤……282
姜七……334
姜叶三七……334
姜黄……188
前胡……132
类钩藤…… 36
珍珠石榴……122
毒鱼藤……286
挖不尽…… 94
相思子……110
相思藤……110
贯众…… 96
枸骨……406
厚皮英…… 92
厚果鸡血藤……286
南星……134
孩儿茶…… 36
柔枝槐…… 64
茜草……250
茜根……250
草龙…… 88
草决明…… 82
草茵陈……116
茶辣……238
荆芥七……344
威灵仙……212
钩藤…… 36
香泽兰……408
香茶菜……350
香草……244,362
香须公…… 88
香胶叶……234
脉叶香茶菜……128

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

狭叶荠苨……8
独叶一枝花……386
独角风……204
独脚乌桕……242
独脚地稔……72
狮子爪……324
复瓦叶金古榄……98

十 划

宽筋藤……174
神仙眼镜草……46
酒饼木……328
海蚌含珠……60
海桐皮……202
粉葛……22
盐肤木……330
桂钩藤……36
梅花钻……196
鸦胆子……68
破布叶……304
通草……160
通城虎……228
通脱木……160
鸭爪风……308
圆角金古榄……98
圆叶山总管……104
圆叶马兜铃……104
圆宽筋藤……174
蚌兰……86
蚌花……86
胭脂……368
脓见消……40
鬼羽箭……410
狼狗尾……266
笑花草……358
馒蚂蝗……300
钻地龙……302
铁牛入石……178
铁巴掌……218
铁包金……360,382
铁老鼠……70
铁扫帚……62

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

铁苋菜…… 60
铁海棠……366
铁带藤……176
铁脚威灵仙……212
铁蕨…… 96
臭杨柳……364
臭茉莉……220
臭牡丹……220
臭草……344
臭藤……118

十一划

麻骨风……184
麻疯树……262
密花豆……286
商陆……158
望江南……348
粘身草……300
粗叶悬钩子…… 52
接骨木……308
接骨茶……306
接骨金粟兰……306
排钱草……120
槲花……320
梳篦木……204
梵天花……360
黄牛木……106
黄牛茶……106
黄花参……292
黄花棉……126
黄花倒水莲……292
黄连树…… 32
黄芽木……106
黄金古…… 98
黄狗头……274
黄姜……188
黄药……382
黄胆草……166
黄常山…… 20
黄葵……392
黄榄……144
黄精……270

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄藤……100
菜豆树……312
常山…… 20
野甘草…… 78
野鸡泡…… 48
野沙柑……328
野芙蓉……392
野吴萸……238
野南瓜……130
野荆芥……8
野烟叶……268
野菠萝…… 14
野韭菜……244
野葛…… 22
雀梅藤……384
蛇舌草……378
蛇总管……350
蛇莓…… 50
蛇咽草…… 62,378
铜钱草……402
铜秤锤……240
假牛甘……168
假蓝根……326
假玉桂……234
假甘草…… 78
假决明……348
假茶辣……318
假荆芥……8
假烟叶……268
假黄藤……100
假菠萝…… 14
假筒蒿……214
假棉花……392
假葶苈……108
猫儿刺……406
猫爪草……156
猫尾草……266
猪仔笠……152
猪血藤……286

十二划

斑蝥藤…… 40

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

博落回……324
散血丹……332.406
散血草……38
菊叶柴胡……24
落地生根……258
落地金爪……142
落地杨梅……50
落地蜘蛛……142
落葵……368
蔓芝……216
紫万年青……86
紫金牛……310
紫苏……10
紫花地丁……398
紫花前胡……132
紫草……76
紫根……76
喉甘子……58
黑节风……308
黑老虎……194
黑须公……212
黑草……410
黑蕨猫……96
铺地凉伞……310
铺地毡……102
铺地草……112
铺地蜈蚣……210
阔叶十大功劳……32
葛根……22

十三划

裸花紫珠……248
溪黄草……124
滨盐肤木……330
雾水藤……90
蓝花草……362
蓝花柴胡……128
蓝靛……28
蔓子王……204
蒴藋……308
塘葛菜……108
榄核莲……26

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

碎蓝木……326
蜀漆…… 20
蜈蚣竹……346
锦鸡儿……284
矮茶……310
象鼻花……140
象皮藤……316
鼠菊草…… 46
锯齿草……352
叠钱草…… 120

十四划

赛葵……126
满天红……106
满山香……200，208
漆大伯……400
瑶山竹……342
槐花米……264
槐树……264
榼子藤……172
蔓荆…… 16
蔓荆子…… 16
酸枣……336
酸藤子…… 94
酸藤果…… 94
蝉翼藤……316
算盘子……130
薤菜……108
熊胆草……124

十五划

寮刁竹……342
德保黄精……270
横经席……204

十六划

鹤鸪木……106
磨地牛甘……170
薄叶红厚壳……204
橄榄……144

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十七划

翼核果……178
霸坡虎……302
筋路子……216
筋棱……222

十八划

藤杜仲……298
藤钩椒……186
藤黄连……100
翻牛白……324
翻白草…… 54
翻白叶树……218

十九划

藿香……6

二十一划

露兜簕…… 14

学名索引

A

Abelmoschus moschatus 黄葵……392
Abrus precatorius 相思藤……110
Acalypha australis 铁苋菜 ……80
Acanthopanax gracilistylus 五加……276
Acanthopanax trifoliatus 三叶五加……278
Acorus calamus 水菖蒲……244

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Acorus gramineus 石菖蒲……244
Adenosma glutinosum 毛麝香……362
Aeschynomene indica 合萌……170
Agastache rugosa 藿香……6
Alchornea trewioides 红背叶……404
Alpinia galanga 大高良姜……190
Ampelopsis japonica 白蔹……70
Andrographis paniculata 榄核莲……26
Ardisia japonica 紫金牛……310
Ardisia mamillata 红毛毡……102
Arisaema consanguineum 天南星……134
Arisaema heterophyllum 异叶天南星……136
Aristolochia championii 三筒管……74
Aristolochia fordiana 通城虎……228
Aristolochia shukangii 圆叶马兜铃……104
Artemisia japonica 牡蒿……24
Artocarpus heterophyllus 木菠萝……394
Asarum longipedunculatum 金耳环……230

B

Baeckea frutescens 岗松……162
Baphicacanthus cusia 马蓝……28
Basella rubra 落葵……368

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Berberis virgetorum 刺黄连……30
Blechnum orientale 贯众……96
Brucea javanica 鸦胆子……68
Buchnera cruciata 黑草……410

C

Caesalpinia sappan 苏木……314
Callicarpa longissima 尖尾凤……248
Callicarpa macrophylla 大叶紫珠……248
Callicarpa nudiflora 裸花紫珠……248
Calophyllum membranaceum 横经席……204
Canarium album 橄榄……144
Capparis masaikai 马槟榔……56
Capparis pterocarpa 水槟榔……56
Caragana sinica 锦鸡儿……284
Caryopteris incana 兰香草……18
Cassia mimosoides 山扁豆……168
Cassia mimosoides var. wallichiana
大叶山扁豆……168
Cassia occidentalis 望江南……348
Cassia tora 草决明……82
Cassytha filiformis 无根藤……90
Castanea mollissima 板栗……296

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Chloranthus fortunei 四块瓦……208
Choerospondias axillaris 酸枣……336
Cibotium barometz 狗脊……274
Cinnamomum burmanni 阴香……234
Cipadessa cinerascens 假茶辣……318
Cirsium chinense 小蓟……256
Cirsium japonicum 大蓟……256
Cissus hexangularia 六方藤……182
Cissus pteroclada 四方藤……182
Cissus repens 白粉藤……396
Claoxylon polot 白桐树……224
Clematis chinensis 威灵仙……212
Clerodendron fragrans 臭茉莉……220
Codonopsis lanceolata 羊乳……280
Combretum alfredii 华风车子……412
Corydalis suaveolens 红花鸡距草……66
Cratoxylon ligustrinum 黄牛木……106
Croton tiglium 巴豆……322
Cudrania cochinchinensis 穿破石……216
Cudrania tricuspidata 双藤……216
Curcuma longa 姜黄……188

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

D

Daphniphyllum calycinum 牛耳枫……68
Desmodium microphyllum 小叶三点金草……354
Desmodium pulchellum 排钱草……120
Desmodium sambuense 饿蚂蝗……300
Dichondra repens 马蹄金……166
Dichroa febrifuga 常山……20
Disporopsis longifolia 长叶假万寿竹……271
Duchesnea indica 蛇莓……60
Dysosma pleiantha 八角莲……386

E

Embelia laeta 酸藤子……94
Entada phaseoloides 榼子藤……172
Erigeron canadensis 竹叶艾……214
Eriosema chinense 猪仔笠……152
Erythrina variegata var. orientalis 海桐皮……202
Eucommia ulmoides 杜仲……273
Eupatorium odoratum 飞机草……408
Euphorbia antiquorum 火殃簕……374
Euphorbia splendens 铁海棠……366
Evodia rutaecarpa 吴茱萸……238

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Evodia rutaecarpa var. bodinieri 野吴萸……238
Evodia rutaecarpa var. officinalis 石虎……238

F

Fibraurea tinctoria 黄藤……100
Ficus tikoua 霉坡虎……302
Fluggea virosa 白饭树……376

G

Garcinia multiflora 山竹子……340
Garcinia oblongifolia 岭南山竹子…… 340
Gentiana loureiri 地丁……398
Gerbera piloselloides 毛大丁草……44
Glochidion eriocarpum 毛果算盘子……400
Glochidion puberum 算盘子……130
Glycosmia citrifolia 山小桔……328
Gnaphalium japonicum 细叶鼠菊草……46
Gnaphalium multiceps 鼠菊草…… 46
Gnetum montanum 买麻藤…… 184
Gnetum parvifolium 小叶买麻藤……184
Gossampinus malabarica 木棉……84

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

H

Homalocladium platycladum 竹节蓼……346
Homalomena tonkinensis 千年健……192
Hyptis suaveolens 山香……12

I

Ilex cornuta 枸骨……406
Ilysanthes ciliata 旱田草……352
Ilysanthes serrata 齿叶泥花草……352
Impatiens chinensis 华凤仙……140

J

Jatropha curcas 麻疯树……262
Jussiaea linifolia 草龙……88
Jussiaea suffruticosa 毛草龙……88

K

Kadsura coccinea 黑老虎……194
Kadsura heteroclita 梅花钻……196
Kalanchoe laciniata 伽蓝菜……260
Kalanchoe pinnata 落地生根……258
Kalopanax pictus 刺楸……202

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

L

Lespedeza cuneata 铁扫帚……62
Lespedeza formosa 美丽胡枝子……326
Lindera chunii 乌药……232
Lindera strychnifolia 乌药……232
Lithospermum erythrorhizon 紫草……76
Litsea cubeba 木姜子……200
Loropetalum chinense 檵花……320
Lycopodium cernuum 铺地蜈蚣……210
Lycopodium clavatum 石松……210
Lysimachia christinae 过路黄……164

M

Macleaya cordata 博落回……324
Mahonia bealei 阔叶十大功劳……32
Mahonia fortunei 细叶十大功劳……34
Mahonia shenii 光叶十大功劳……32
Mallotus apelta 白背叶……114
Malvastrum coromandelianum 赛葵……123
Marsilea quadrifolia 田字草……80
Melothria heterophylla 茅瓜……370
Melothria indica 马胶儿……372

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Microcos paniculata 布渣叶……304
Micromelum integerrimum 小芸木……150
Millettia dielsiana 山鸡血藤……290
Millettia nitida 亮叶鸡血藤……290
Millettia pachycarpa 厚果鸡血藤……286
Millettia reticulata 鸡血藤……288
Millettia speciosa 牛大力……282
Moghania macrophylla 大叶千斤拔……294
Moghania philippinensis 千斤拔……294
Momordica cochinchinensis 木鳖子……388
Mosla chinensis 细叶香薷……4
Myrica rubra 杨梅……92

N

Nasturtium montanum 蔊菜……108

O

Oldenlandia auricularia 耳草……38
Oldenlandia corymbosa 伞房花耳草……378
Oldenlandia diffusa 白花蛇舌草……378
Oldenlandia hedyotidea 牛白藤……40
Opuntia dillenii 仙人掌……390
Oroxylum indicum 木蝴蝶……146

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Orthodon lanceolatus 狭叶荠苨……8
Osbeckia chinensis 金锦香……72

P

Paederia scandens 鸡屎藤……118
Panax sanchi 田七……246
Pandanus tectorius 露兜簕……14
Parabarium huaitingii 毛杜仲藤……298
Parabarium micranthum 杜仲藤……298
Perilla frutescens 白苏……10
Perilla frutescens var. crispa 紫苏……10
Peucedanum decursivum 前胡……132
Pholidota chinensis 石橄榄……138
Phyllanthus emblica 余甘子……58
Physalis minima 灯笼草……148
Phytolacca acinosa 商陆……158
Pilea cavaleriei 石油菜……154
Piper cubeba 毕澄茄……200
Piper hancei 山蒟……198
Piper puberulum 毛蒟……226
Pittosporum glabratum 光叶海桐……208
Plectranthus amethystoides 香茶菜……350
Plectranthus nervosus 蓝花荠胡……128

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Plectranthus striatus 溪黄草……124
Plectranthus ternifolius 细叶香茶菜……2
Polygala aureocauda 黄花倒水莲……292
Polygonatum cirrhifolium 竹叶黄精……271
Polygonatum kingianum 黄精……270
Polygonatum multiflorum 多花黄精……271
Potentilla discolor 翻白草……54
Pterocarya stenoptera 枫杨……364
Pterospermum heterophyllum 半枫荷……218
Pueraria thomsoni 粉葛……22
Pueraria thunbergiana 野葛……22
Punica granatum 石榴……122
Pycnostelma paniculatum 寮刁竹……342

R

Radermachera sinica 菜豆树……312
Ranunculus ternatus 猫爪草……156
Rhamnus crenata 黄药……382
Rhoeo discolor 紫万年青……86
Rhus chinensis 盐肤木……330
Rhus chinensis var. roxburghii 滨盐肤木……330
Rosa chinensis 月季花……254
Rosa cymosa 小果蔷薇……186

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Rubia cordifolia 茜草……250
Rubus alceaefolius 粗叶悬钩子……52
Rubus parvifolius 茅莓……48
Ruta graveolens 芸香……344

S

Sageretia theezans 雀梅藤……384
Sambucus javanica 接骨木……308
Sanguisorba officinalis 地榆……252
Sansevieria trifasciata 虎尾兰……42
Sansevieria trifasciata var. laurentii
金边虎尾兰……42
Sarcandra glaber 接骨金粟兰……306
Sargentodoxa cuneata 大血藤……180
Saurauia tristyla 水枇杷……338
Saxifraga stolonifera 虎耳草……402
Scoparia dulcis 野甘草……78
Scutellaria barbata 半枝莲……356
Scutellaria indica 大叶半枝莲……358
Securidaca inappendiculata 蝉翼藤……316
Siphonostegia chinensis 阴行草……116
Solanum verbascifolium 假烟叶……268
Sophora flavescens 苦参……380

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Sophora japonica 槐树……264
Sophora subprostrata 山豆根……64
Spatholobus suberectus 三叶鸡血藤……286
Stahlianthus hainanensis 姜叶三七……334
Stephania sinica 华千金藤……242
Stephania tetrandra 石蟾蜍……240

T

Tetrapanax papyriferus 通草……160
Tetrastigma planicaule 铁带藤……176
Tinomiscium tonkinense 大叶藤……100
Tinospora capillipes 圆角金古榄……98
Tinospora imbricata 复瓦叶金古榄……98
Tinospora sagittata 金古榄……98
Tinospora sinensis 宽筋藤……174
Toddalia asiatica 飞龙掌血……332
Tylophora ovata 三十六荡……142

U

Uncaria macrophylla 大叶钩藤……36
Uncaria rhynchophylla 钩藤……36
Uncaria rhynchophylloides 类钩藤……36
Uraria crinita 猫尾草……266

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Uraia crinita var. macrostachya长穗猫尾草……266
Urena lobata 红花地桃花……360
Urena sinuata 狗脚迹……360

V

Ventilago leiocarpa 血风藤……178
Vitex rotundifolia 单叶蔓荆……16
Vitex trifolia 蔓荆……16

Z

Zanthoxylum avicennae 簕欓……222
Zanthoxylum planispinum 竹叶椒……236
Zanthoxylum planispinum var. ferrugineum
毛竹叶椒……236
Zornia diphylla 丁葵草……112

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com