小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

国家“十五”重点图书

中草药与民族药药材图谱

主编　黄璐琦



北京大学医学出版社

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

责任编辑：李小云
封面设计：田重红


本图谱以国家科技基础性工作项目“中草药与民族药标本的收集、整理和保存”（该项目荣获 2004 年中华中医药学会科学技术二等奖）收集的药材标本为依据，按照“文－图－标本”三位一体、互为印证的思路，进行文字描述和照片拍摄，在编纂过程中得到了我国中药研究方面著名学者的支持和指导，并担任了本图谱的顾问。

本图谱共收载中草药与民族药药材 910 种，每一种论述了其来源、主产地、性状特征、品质、性味功效、附注、鉴定人和编号等。本图谱具有以下特色：（1）全面性和系统性：图谱中收载药材品种数量较大，品种较全，特别是包括了一些民族药，如苗药和藏药等；（2）权威性：图谱中每份药材标本均注有专家鉴定人的姓名；（3）可查阅性：图谱中每份标本均注有统一编号，并同时标注了所收集的该品种腊叶标本的编号，编号中具有标本的序号、科、属、种、收藏单位等信息，据此，可以得知该标本的存放地点，便于查阅和研究。因此本图谱是从事中药材研究、生产和利用的重要参考书。









ISBN 7-81071-747-2
9 787810 717472 >

ISBN 7-81071-747-2/R • 747
定价：280.00 元

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

国家“十五”重点图书

中草药与民族药药材图谱

顾　问（以姓氏笔画为序）

王永炎　李振吉　肖培根　诚静容

姚乃礼　姚达木　桑国卫　曹洪欣

主　编　黄璐琦

副主编　邵爱娟　陈虎彪

编　审　谢宗万

编　委（以姓氏笔画为序）

王　敏　冯学锋　付桂芳　杜　江

吴志刚　何希荣　邵爱娟　陈　敏

陈虎彪　林淑芳　郝近大　格小光

崔光红　黄璐琦

北京大学医学出版社

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

ZHONGCAOYAO YU MINZUYAO YAOCAI TUPU

图书在版编目（CIP）数据

中草药与民族药药材图谱／黄璐琦主编．—北京：北京大学医学出版社，2005.4
国家“十五”重点图书
ISBN 7-81071-747-2

Ⅰ.中… Ⅱ.黄… Ⅲ.中草药－图谱
Ⅳ.R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 002917 号

中草药与民族药药材图谱

主　　编：黄璐琦
出版发行：北京大学医学出版社（电话：010-82802230）
地　　址：（100083）北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内
网　　址：http://www.pumpress.com.cn
E-mail：booksale@bjmu.edu.cn
印　　刷：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
经　　销：新华书店
责任编辑：李小云　　责任校对：何上茹　　责任印制：张京生
开　　本：889mm × 1194mm　1/16　印张：24　字数：816 千字
版　　次：2005 年 6 月第 1 版　2005 年 6 月第 1 次印刷　　印数：1-2100 册
书　　号：ISBN 7-81071-747-2 / R·747
定　　价：280.00 元

版权所有，违者必究
（凡属质量问题请与本社发行部联系退换）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

国家科技基础性工作项目

“中草药与民族药标本的收集、整理和保存”项目组成员

课 题 组 长　黄璐琦

课题副组长　周　兴　邵爱娟

项目组成员　（以姓氏笔画为序）

王　敏　付桂芳　冯学锋　刘　毅　何希荣

何顺志　吴志刚　张瑞贤　杜　江　杨京玉

陈虎彪　陈　敏　林淑芳　罗永明　郝近大

钟国跃　胡成刚　格小光　格桑索朗　秦松云

崔光红　黄明贵　舒　抒　瞿显友

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

项目组组长及主编简介



黄璐琦：1968年生。1995年获北京大学医学部（原北京医科大学）博士学位，现任中国中医研究院中药研究所所长；国家药典委员会委员；世界卫生组织传统医学（中药）合作中心主任；中国中西医结合研究会中药研究专业委员会主任委员；中国生态学会中药资源生态专业委员会主任委员；中华中医药学会中药鉴定专业委员会常务副主任委员；国家药品监督管理局药品审评委员会委员；国家药典委员会委员；中华医学科技奖和中华医学青年奖评审委员会委员；国家科技评估中心咨询专家；国家中医药管理局中药学学科带头人；《中国中药杂志》副主编；《中国实验方剂学杂志》副主编。主要从事中药资源和分子生药学的研究，先后主持国家级课题和部局级课题二十余项，曾获国家科学技术进步二等奖一项、中华中医药学会科技二等奖一项、中华医学会科技进步二等奖一项、北京市科技进步二等奖一项、国家中医药管理局中医药基础研究二等奖一项。曾获“卫生部有突出贡献中青年专家”、“中央国家机关十大杰出青年”，“中央国家机关优秀青年”等称号。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

前　言

中草药和民族药是我国的瑰宝，在我国医药卫生保健事业中占据十分重要的位置，随着人类保健需求的提高，医学模式的转变，知识产权的保护和天然药物市场的巨大潜力，中草药和民族药将面临着更大的机遇和挑战。

在关系中医药和民族药发展的诸多问题中，有一项最基础的工作，就是中草药和民族药标本的收集、整理和编目（保存）。究其原因主要有：（1）标本是真实的凭证，是辨认药物的第一手材料，也是永久性的考察资料。如马王堆中中医书记述简略，可辨认的药物很少，但其中有些标本被保存下来，为确定医书中记载的药物提供了依据。这样的例子很多，至今一些本草中的药物无法考证或有争议，原因之一就是缺乏标本。(2）药材的品种是变异的，这种现象普遍存在。药物品种的变迁存在着双向性，对临床应用和新药开发造成困难。需要把不同时期标本保存下来，以便对比分析。(3）地方习用品种和伪品问题。各地药材同名异物者极多，况有不法分子利用伪品进行欺诈。对此应有药材的标准品——标本作为鉴定依据。(4）“新兴品种”的出现。例如紫草，传统正品为紫草科紫草属植物紫草 Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc 的根。而在新疆发现同科软紫草属植物新疆紫草（软紫草）Arnebia euchroma（Royle）Johnst的根，其质量较正品更优。这需要随时进行保存，作为持续发展的基础。(5）有些标本因资金和管理问题面临损坏的危险。

总之，中草药和民族药标本的收集、整理和保存是中医药持续发展的需要，是拯救民族医药的需要，是保存和整理中医药学和民族医药学宝贵遗产的基础工作，具有非常的重要性和紧迫性，并有深远的历史意义。

为此 2000 年在国家科技基础性工作项目中专门立项“中草药与民族药标本的收集、整理和保存”，该项目由中国中医研究院中药研究所牵头、参加单位有重庆中药研究院、贵州省中医药研究院民族医药研究所、江西中医学院、北京大学药学院、西藏自治区药品检验所等。该项目通过对代表性和权威性书籍中收载药材品种的确定，共收集、整理和鉴定了中草药与民族药腊叶标本4189种，药材标本1050种（包括民族药腊叶标本 810 种、民族药药材标本 192 种），其中涵盖了《中华人民共和国药典》（2000版）收载的主要品种及常用的中草药与民族药品种，同时制定标本保存方法及操作规范（SOP），建立标本计算机管理系统和保存操作系统。目前该项目获 2004 年中华中医药学会科学技术二等奖，在此基础上编撰了《中草药与民族药药材图谱》。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本图谱对项目收集的标本进行了筛选，共收载中草药与民族药药材910种，按照“文－图－标本”三位一体、互为印证的思路，进行文字描述和照片拍摄，每一种论述了其来源、主产地、性状特征、品质、性味功效、附注、鉴定人和编号等。在编纂过程中得到了王永炎、李振吉、肖培根、诚静容、姚乃礼、姚达木、桑国卫、曹洪欣等著名学者的支持和指导，并担任了本图谱的顾问。陈虎彪教授负责了全书药材图片的拍摄工作。本图谱具有全面性、系统性、权威性以及可查阅性等特点，因此是从事中药材研究、生产和利用的重要参考书。

由于我们水平所限，这本图谱中难免存在着缺点和错误，殷切希望广大读者批评指正。

黄璐琦

2004 年 12 月

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

编写说明

一、内容编排

1. 图谱收载《中华人民共和国药典》(2000 版) 中常用的中药材品种和苗、藏等民族药材珍稀品种。图谱中药材按药用部位依次划分为根茎类、藤木类、皮类、叶类、花类、果实及种子类、全草类、动物类、矿物类和其他类。共计 910 种。

2. 正文药材品种的编排是药用部位分类后，按每类中文笔画顺序排列。

3. 每个药材品种记载的内容包括：来源、主产地、性状特征、品质、性味功效、附注、鉴定人和编号。

二、名称

1. 图谱中药材的中文名称、拉丁学名主要参考《中华人民共和国药典》(2000 版)、《中华本草》、《中国植物志》、《中华本草》、《全国中草药汇编》、《中药大辞典》、《新编中药志》、《中国民族药志》、《藏药志》等中药材书籍。

2. 多来源的品种中文名称一般采用其原植物名称。

三、各项内容的记载原则

1. 图谱中多来源的品种均单独进行描述，重点放在其区别点上，并配以相应的照片。

2. 来源包括药材原植(动)物的科名、中文名、拉丁学名和药用部位；矿物药包括该矿物的类、族、矿石名或岩石名。

3. 主产地记述药材的主产省、市或自治区名称。道地药材或著名产区注明所产市、县名，并指明道地产地。

4. 性状特征指药材的形、色、质地、气味等特征的描述，但以鉴别特征为主。

5. 品质记述药材经验鉴别中认为品质最佳的特点。

6. 性味功效描述药材的性味和主要的功能主治，原则上使用中医功能术语及病症名称。

7. 附注主要说明药材在使用中需要注意的问题，如为民族药则注明了使用民族的名称。

8. 鉴定人标注的是鉴定该药材的专家姓名。

9. 编号标注的是每一种药材标本的编号和该品种腊叶标本的编号。本项目未收集到相应腊叶标本的药材，则只注明药材标本的编号。药材标本和腊叶标本的编号由标本标识、序号、标本代码和标本保藏单位代码四部分组成。其中：

(1) 药材标本标识以英文字母 M 表示，为英文 medicinal material 的字首。腊叶标本标识，以英文字母 H 表示，为英文 herbarium 的字首。

(2) 序号由 4 位阿拉伯数字（××××）组成，为项目收集标本的序列号。药材标本序列号按药材名笔画顺序排列。腊叶标本序列号以标本的学名拉丁字母顺序排列。

(3) 药材标本代码由 9 位数字和字母组成，(×　×××　×××　××) 第 1 位是类号，2～4 位是科号，5～7 位是种号，8～9 位是药用部位代码。类号由一位数字组成，1 为藻类，2 真菌类，3 地衣类，4 苔藓类，5 蕨类，6 裸子植物，7 被子植物，8 动物类，9 矿物类。科号由 3 位数字组成，种号由 3 位数字组成；科号、种号及矿物药的编码，均参照《全国中草药名鉴》(谢宗万 1996) 的编码顺序。药用部位代码由 2 位数字组成。第 1 位是部位标识；2 位是补充标识，当药材为同物种同一部位类下又有区分时，用阿拉伯数字加以区别，一般以 0 表示。部位标识：R 为根及根茎类 (rhizome, root)，S 果实种子类(fruit, seed)，F 花类(flower)，

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

B 皮类(bark)，V 藤木类(stem, vine)，L 叶类(leaf)，H 全草类(herb)，FH 民间药(folk herb)，A 动物类(animal)，M 矿物类(mineral)，O 其他类(other)。

腊叶标本代码由 13 位数字（× ××× ××× ×××× ××）组成，第 1 位是类号，2～4 位是科号，5～7 为属号，8～11 为种号，12～13 为种下号，不足位以 0 补齐。类号由一位数字组成，1 表示藻类，2 真菌类，3 地衣类，4 苔藓类，5 蕨类，6 裸子植物，7 被子植物。科号由 3 位数字组成，蕨类植物按秦仁昌系统排列，裸子植物按《中国植物志》（简称《植物志》）第七卷顺序排列，被子植物按哈钦松系统排列，藻类、真菌类、地衣类、苔藓类参考《全国中草药名鉴》（简称《名鉴》）编码。属号由 3 位数字组成，种号由 4 位数字组成，种下号由 2 位数字组成，均参照《代码》编码。《代码》中没有编码的，按项目编码原则进行编码。

(4) 单位代码为收藏标本单位的标识，由 2～4 位英文字母（大写）组成。CMMI 代表中国中医研究院中药研究所标本室，SM 代表重庆中药研究院标本室，GYCM 代表贵阳中医学院标本室，XZDC 代表西藏自治区药品检验所标本室。

四、参考文献及索引

编著本图谱的参考文献主要有《中华人民共和国药典》(2000 版)、《中国植物志》、《中华本草》、《全国中草药汇编》、《中药大辞典》、《新编中药志》、《中国民族药志》、《藏药志》、《中国药材学》、《中国中药材真伪鉴别图典》、《中国本草图录》以及有关书刊。

本图谱中文名索引系按药材中文名汉语拼音字母先后顺序排列；药材拉丁学名索引按拉丁字母顺序排列。

2004 年 12 月

《中草药与民族药药材图谱》编委会

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

目　录

根及根茎类 …… 1

九节菖蒲 …… 3
人参 …… 3
八角枫根 …… 3
三七 …… 4
三加皮 …… 4
三白草根 …… 4
三角叶黄连 …… 5
三棱 …… 5
千年健 …… 5
土木香 …… 6
土牛膝 …… 6
土贝母 …… 6
土茯苓 …… 7
大三叶升麻 …… 7
大头翁 …… 7
大花红景天 …… 8
大狼毒 …… 8
大黄 …… 8
大蒜 …… 9
小青藤香 …… 9
小根蒜 …… 9
小秦艽 …… 10
小萱草根 …… 10
山豆根 …… 10
山柰 …… 11
山药 …… 11
山慈姑 …… 11
川乌 …… 12
川木香 …… 12
川牛膝 …… 12
川贝母 …… 13
川白芍 …… 13
川白芷 …… 13
川芎 …… 14
川赤芍 …… 14
川明参 …… 14
川党参 …… 15
干姜 …… 15
广西莪术 …… 15
广防己 …… 16
飞龙掌血 …… 16
马蹄大黄 …… 16
中麻黄根 …… 17
丹参 …… 17
乌药 …… 17
云连 …… 18
云南重楼 …… 18
升麻 …… 18
双边天花粉 …… 19
天冬 …… 19
天花粉 …… 19
天麻 …… 20
天葵子 …… 20
太子参 …… 20
太白米 …… 21
太白参 …… 21
巴山虎 …… 21
巴戟天 …… 22
木香 …… 22
片姜黄 …… 22
牛膝 …… 23
长春七 …… 23
长鞭红景天 …… 23
丛菔 …… 24
东北天南星 …… 24
东北铁线莲 …… 24
仙茅 …… 25
北沙参 …… 25
北苍术 …… 25
北豆根 …… 26
半夏 …… 26
对叶百部 …… 26
平贝母 …… 27
玄参 …… 27
玉竹 …… 27
甘松 …… 28
甘肃贝母 …… 28
甘草 …… 28

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

甘遂 …… 29
生地黄 …… 29
生姜 …… 29
白及 …… 30
白头翁 …… 30
白术 …… 30
白花前胡 …… 31
白附子 …… 31
白茅根 …… 31
白药子 …… 32
白首乌 …… 32
白鲜 …… 32
白薇 …… 33
石菖蒲 …… 33
辽藁本 …… 33
龙胆 …… 34
仰天钟 …… 34
伊贝母 …… 34
光果甘草 …… 35
光慈姑 …… 35
兴安升麻 …… 35
华东蓝刺头 …… 36
华重楼 …… 36
地榆 …… 36
多刺天冬 …… 37
延胡索 …… 37
异叶天南星 …… 37
当归 …… 38
朱砂根 …… 38
朱砂莲 …… 38
百合 …… 39
百部 …… 39
祁白芷 …… 39
祁州漏芦 …… 40
竹叶椒根 …… 40
竹节参 …… 40
红大戟 …… 41
红芪 …… 41
红参 …… 41
羊角参 …… 42
西洋参 …… 42
西藏胡黄连 …… 42
防风 …… 43
两头尖 …… 43
两面针 …… 43
何首乌 …… 44
坚龙胆 …… 44
抚芎 …… 44
条叶龙胆 …… 45
羌活 …… 45
芦根 …… 45
芫花叶白前 …… 46
苎麻根 …… 46
赤地利 …… 46
赤芍 …… 47
远志 …… 47
附子 …… 47
鸡爪大黄 …… 48
鸡脚刺 …… 48
麦冬 …… 48
京大戟 …… 49
刺五加 …… 49
刺梨 …… 49
刺梨根 …… 50
卷丹 …… 50
垂序商陆 …… 50
岩菖蒲 …… 51
明党参 …… 51
杭白芍 …… 51
杭白芷 …… 52
松贝 …… 52
板蓝根 …… 52
泽泻 …… 53
炉贝 …… 53
狗脊 …… 53
狗脊贯众 …… 54
直立百部 …… 54
知母 …… 54
细叶百合 …… 55
细花滇紫草 …… 55
胀果甘草 …… 55
苦参 …… 56
虎杖 …… 56
虎掌南星 …… 56
虎掌草 …… 57
软紫草 …… 57
郁金 …… 57
金刚藤 …… 58

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金果榄 …… 58
金荞麦 …… 58
金铁锁 …… 59
青木香 …… 59
青牛胆 …… 59
鸢尾 …… 60
南沙参 …… 60
南苍术 …… 60
南柴胡 …… 61
姜黄 …… 61
威灵仙 …… 61
柳叶白前 …… 62
独活 …… 62
独蒜兰 …… 62
狭叶竹节参 …… 63
禹白芷 …… 63
禹州漏芦 …… 63
穿山龙 …… 64
茜草根 …… 64
草乌 …… 64
草麻黄根 …… 65
荚果蕨贯众 …… 65
荞麦七 …… 65
韭根 …… 66
香附 …… 66
骨碎补 …… 66
毫白芍 …… 67
党参 …… 67
夏天无 …… 67
宽叶羌活 …… 68
射干 …… 68
峨参 …… 68
徐长卿 …… 69
拳参 …… 69
柴胡 …… 69
桃儿七 …… 70
桔梗 …… 70
浙贝母 …… 70
珠子参 …… 71
秦艽 …… 71
粉甘草 …… 71
粉防己 …… 72
粉萆薢 …… 72
粉葛 …… 72
素花党参 …… 73
高良姜 …… 73
匙叶甘松 …… 73
商陆 …… 74
常山 …… 74
猫爪草 …… 74
盘龙七 …… 75
粗茎秦艽 …… 75
续断 …… 75
绵马贯众 …… 76
绵萆薢 …… 76
银柴胡 …… 76
雪山一枝蒿 …… 77
麻花秦艽 …… 77
黄山药 …… 77
黄甘草 …… 78
黄芩 …… 78
黄连 …… 78
黄苞南星 …… 79
黄药子 …… 79
黄脚鸡 …… 79
黄精 …… 80
喜马拉雅紫茉莉 …… 80
塔黄 …… 80
棉团铁线莲 …… 81
温郁金 …… 81
温莪术 …… 81
湖北麦冬 …… 82
硬紫草 …… 82
紫花前胡 …… 82
紫茉莉根 …… 83
紫菀 …… 83
紫萁贯众 …… 83
萱草根 …… 84
葛根 …… 84
隔山撬 …… 84
黑骨藤 …… 85
滇黄芩 …… 85
滇黄精 …… 85
福参 …… 86
蒙古黄芪 …… 86
蓬莪术 …… 86
蛾眉蕨贯众 …… 87
算盘子根 …… 87

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膜荚黄芪 …… 87
蔓生白薇 …… 88
蜘蛛香 …… 88
熟地黄 …… 88
薤白 …… 89
螃蟹甲 …… 89
藁本 …… 89
藏木香 …… 90
藏茜草 …… 90
藏菖蒲 …… 90
藏紫草 …… 91
藕节 …… 91
藜芦 …… 91

藤木类 …… 93

丁公藤 …… 95
大叶钩藤 …… 95
大血藤 …… 95
小木通 …… 96
小通草 …… 96
山桃枝 …… 96
川木通 …… 97
无柄果钩藤 …… 97
毛青藤 …… 97
水柏枝 …… 98
仙人掌 …… 98
功劳木 …… 98
四川寄生 …… 99
石南藤 …… 99
关木通 …… 99
华钩藤 …… 100
竹茹 …… 100
老鼠刺 …… 100
忍冬藤 …… 101
杨柳枝 …… 101
沉香 …… 101
皂角刺 …… 102
苏木 …… 102
鸡矢藤 …… 102
鸡血藤 …… 103
夜交藤 …… 103
昌都锦鸡儿 …… 103
松笔头 …… 104
降香 …… 104
青风藤 …… 104
青荚叶小通草 …… 105
南藤 …… 105
柽柳 …… 105
络石藤 …… 106
钩藤 …… 106
鬼箭羽 …… 106
宽筋藤 …… 107
桂枝 …… 107
桃枝 …… 107
桑枝 …… 108
海风藤 …… 108
通草 …… 108
紫苏梗 …… 109
槐枝 …… 109
槲寄生 …… 109
樟木 …… 110
檀香 …… 110

皮类 …… 111

土荆皮 …… 113
大接骨木 …… 113
大黄檗 …… 113
川黄柏 …… 114
川楝皮 …… 114
五加皮 …… 114
木棉皮 …… 115
凹叶厚朴 …… 115
合欢皮 …… 115
地枫皮 …… 116
地骨皮 …… 116
尖叶白蜡树皮 …… 116
红毛五加皮 …… 117
肉桂 …… 117
杜仲 …… 117
牡丹皮 …… 118
刺楸树皮 …… 118
苦枥白蜡树皮 …… 118
苦树皮 …… 119
苦楝皮 …… 119
厚朴 …… 119
祖师麻 …… 120
香加皮 …… 120
桑白皮 …… 120

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

秦皮 …… 121
秦岭白蜡树皮 …… 121
宿柱白蜡树皮 …… 121
黄柏 …… 122
棕板 …… 122
椿白皮 …… 122
椿皮 …… 123
楮木 …… 123

叶类 …… 125

人参叶 …… 127
大青叶 …… 127
山矾叶 …… 127
山栀茶 …… 128
川莓 …… 128
白背叶 …… 128
艾叶 …… 129
有柄石韦 …… 129
庐山石韦 …… 129
巫山淫羊藿叶 …… 130
枇杷叶 …… 130
细叶十大功劳叶 …… 130
罗布麻叶 …… 131
苦丁茶 …… 131
枸骨叶 …… 131
狭叶番泻叶 …… 132
桑叶 …… 132
荷叶 …… 132
淡竹叶 …… 133
野柿叶 …… 133
野烟 …… 133
银杏叶 …… 134
紫苏叶 …… 134
蓼大青叶 …… 134

花类 …… 135

丁香 …… 137
山银花 …… 137
月季花 …… 137
木棉花 …… 138
四叶厚朴花 …… 138
打箭菊 …… 138
玉兰 …… 139
红花 …… 139
红腺忍冬 …… 139
西红花 …… 140
芫花 …… 140
苏铁 …… 140
谷精草 …… 141
鸡冠花 …… 141
垂头菊 …… 141
松花粉 …… 142
武当玉兰 …… 142
玫瑰花 …… 142
金银花 …… 143
闹羊花 …… 143
厚朴花 …… 143
洋金花 …… 144
重冠紫菀花 …… 144
凌霄花 …… 144
夏枯草 …… 145
峨眉蔷薇花 …… 145
荷花 …… 145
密蒙花 …… 146
旋覆花 …… 146
望春花 …… 146
梅花 …… 147
菊花 …… 147
野菊花 …… 147
麻花秦艽花 …… 148
黄报春花 …… 148
款冬花 …… 148
槐米 …… 149
藏紫菀 …… 149
蘘生马先蒿花 …… 149

果实及种子类 …… 151

八月札 …… 153
刀豆 …… 153
千金子 …… 153
大风子 …… 154
大皂角 …… 154
大豆黄卷 …… 154
大麦 …… 155
大枣 …… 155
大粒车前子 …… 155
大腹皮 …… 156
女贞子 …… 156

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小决明子 …… 156
小茴香 …… 157
小粒车前子 …… 157
山杏仁 …… 157
山里红 …… 158
山茱萸 …… 158
山桃仁 …… 158
山楂 …… 159
川楝子 …… 159
广陈皮 …… 159
马尿泡 …… 160
马钱子 …… 160
马兜铃 …… 160
马蔺子 …… 161
乌梅 …… 161
五味子 …… 161
分心木 …… 162
化橘红 …… 162
双边瓜蒌 …… 162
双边瓜蒌子 …… 163
双边瓜蒌皮 …… 163
天仙子 …… 163
天师栗 …… 164
巴豆 …… 164
木瓜 …… 164
木蝴蝶 …… 165
木鳖子 …… 165
水红花子 …… 165
火麻仁 …… 166
牛蒡子 …… 166
王不留行 …… 166
长柄扁桃仁 …… 167
丝瓜络 …… 167
冬瓜子 …… 167
冬瓜皮 …… 168
冬葵果 …… 168
北葶苈子 …… 168
母丁香 …… 169
瓜蒂 …… 169
瓜蒌 …… 169
瓜蒌子 …… 170
瓜蒌皮 …… 170
白色牵牛子 …… 170
白芥子 …… 171
白果 …… 171
白扁豆 …… 171
石虎吴茱萸 …… 172
石莲子 …… 172
石榴子 …… 172
石榴皮 …… 173
辽杏仁 …… 173
龙眼肉 …… 173
亚麻子 …… 174
光皮木瓜 …… 174
决明子 …… 174
地仙桃 …… 175
地肤子 …… 175
红豆蔻 …… 175
肉豆蔻 …… 176
西青果 …… 176
阳春砂 …… 176
余甘子 …… 177
佛手片 …… 177
吴茱萸 …… 177
杏仁 …… 178
沙苑子 …… 178
沙棘 …… 178
芡实 …… 179
芥子 …… 179
芫荽 …… 179
花椒 …… 180
芸苔子 …… 180
苍耳子 …… 180
补骨脂 …… 181
诃子 …… 181
谷芽 …… 181
豆豉姜 …… 182
豆蔻 …… 182
赤豆 …… 182
连翘 …… 183
陈皮 …… 183
麦芽 …… 183
使君子 …… 184
刺蒺藜 …… 184
单叶蔓荆子 …… 184
欧李仁 …… 185
波棱瓜子 …… 185
罗汉果 …… 185

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苘麻子 …… 186
苦楝子 …… 186
郁李仁 …… 186
金樱子 …… 187
青皮 …… 187
青果 …… 187
青椒 …… 188
青葙子 …… 188
南山楂 …… 188
南五味子 …… 189
南瓜子 …… 189
南葶苈子 …… 189
南酸枣 …… 190
南鹤虱 …… 190
急性子 …… 190
枳壳 …… 191
枳实 …… 191
枳椇子 …… 191
枸橼 …… 192
柏子仁 …… 192
柿蒂 …… 192
栀子 …… 193
珍珠杆 …… 193
相思豆 …… 193
胖大海 …… 194
胡桃仁 …… 194
胡椒 …… 194
茶子心 …… 195
莞蔚子 …… 195
草豆蔻 …… 195
草果 …… 196
荔枝核 …… 196
荜茇 …… 196
荜澄茄 …… 197
韭菜子 …… 197
香圆 …… 197
鸦胆子 …… 198
圆叶牵牛子 …… 198
娑罗子 …… 198
桃仁 …… 199
桑椹 …… 199
梧桐子 …… 199
浮小麦 …… 200
益智仁 …… 200
莱菔子 …… 200
莲子 …… 201
莲子心 …… 201
莲房 …… 201
莲须 …… 202
淡豆豉 …… 202
猪牙皂 …… 202
甜瓜子 …… 203
绿豆 …… 203
菟丝子 …… 203
蛇床子 …… 204
野鸦椿 …… 204
野萝卜子 …… 204
黄皮酸橙枳壳 …… 205
楮实子 …… 205
疏毛吴茱萸 …… 205
紫苏子 …… 206
葫芦巴 …… 206
葱子 …… 206
黑色牵牛子 …… 207
黑芝麻 …… 207
黑豆 …… 207
黑种草子 …… 208
槐角 …… 208
蓖麻子 …… 208
路路通 …… 209
锦灯笼 …… 209
榧子 …… 209
槟榔 …… 210
缩砂仁 …… 210
罂粟壳 …… 210
蔓荆子 …… 211
酸枣仁 …… 211
酸橙枳壳 …… 211
酸橙枳实 …… 212
稻芽 …… 212
薤仁 …… 212
鹤虱 …… 213
橘红 …… 213
橘络 …… 213
橘核 …… 214
薏苡仁 …… 214
藏茴香 …… 214
覆盆子 …… 215

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

全草类 …… 217

一扫光 …… 219
九子连环草 …… 219
三尖杉 …… 219
三花龙胆 …… 220
千里光 …… 220
大蓟 …… 220
大二郎箭 …… 221
大车前草 …… 221
大叶紫珠 …… 221
大肺筋草 …… 222
大茅香 …… 222
大籽蒿 …… 222
小龙胆草 …… 223
小晕药 …… 223
广金钱草 …… 223
广藿香 …… 224
马鞭草 …… 224
中麻黄 …… 224
乌奴龙胆 …… 225
乌韭 …… 225
乌脚枪 …… 225
六月寒 …… 226
六棱菊 …… 226
凤仙透骨草 …… 226
天青地白 …… 227
木贼 …… 227
木贼麻黄 …… 227
毛叶地瓜儿苗 …… 228
毛梗豨莶 …… 228
水母雪莲花 …… 228
水皂角 …… 229
牙疳药 …… 229
牛蒡草 …… 229
见血清 …… 230
车前草 …… 230
仙鹤草 …… 230
兰石草 …… 231
北刘寄奴 …… 231
半边莲 …… 231
半枝莲 …… 232
平车前草 …… 232
打破碗花花 …… 232
瓜子金 …… 233
甘青青兰 …… 233
甘青铁线莲 …… 233
田基黄 …… 234
白马骨 …… 234
白毛藤 …… 234
白牛胆 …… 235
白花蛇舌草 …… 235
白蒿 …… 235
石吊兰 …… 236
石竹 …… 236
石香薷 …… 236
石莽草 …… 237
节裂角茴香 …… 237
辽细辛 …… 237
龙葵 …… 238
光石韦 …… 238
全缘马先蒿 …… 238
全萼龙胆 …… 239
华细辛 …… 239
吉祥草 …… 239
地柏枝 …… 240
地蜂子 …… 240
地锦草 …… 240
多刺绿绒蒿 …… 241
杠板归 …… 241
朱砂草 …… 241
灯心草 …… 242
百两金 …… 242
红毛对筋草 …… 242
老鹳草 …… 243
肉苁蓉 …… 243
观音草 …… 243
问荆 …… 244
阴地蕨 …… 244
仲筋草 …… 244
杓儿茶 …… 245
束花石斛 …… 245
角蒿 …… 245
连钱草 …… 246
麦瓶草 …… 246
乳突果 …… 246
佩兰 …… 247
侧柏叶 …… 247

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

刮筋板 …… 247
委陵菜 …… 248
岩参 …… 248
环草石斛 …… 248
细梗香草 …… 249
肿节风 …… 249
苞叶雪莲 …… 249
苦地丁 …… 250
茅膏菜 …… 250
轮叶棘豆 …… 250
金钗石斛 …… 251
金挖耳 …… 251
金钱草 …… 251
青蒿 …… 252
青藏龙胆 …… 252
鱼眼草 …… 252
鱼腥草 …… 253
垫状卷柏 …… 253
柔毛淫羊藿 …… 253
独一味 …… 254
穿心莲 …… 254
胡荽 …… 254
茱苓草 …… 255
茵陈蒿 …… 255
荆芥 …… 255
草灵芝 …… 256
草麻黄 …… 256
圆叶花锚 …… 256
展毛翠雀 …… 257
峨眉雪莲花 …… 257
流苏石斛 …… 257
浮萍 …… 258
海金沙草 …… 258
海桐叶白英 …… 258
益母草 …… 259
积雪草 …… 259
粉苞苣 …… 259
绢毛菊 …… 260
绣线菊 …… 260
臭牡丹 …… 260
通天蜡烛 …… 261
铁皮石斛 …… 261
铁线蕨 …… 261
鸭儿芹 …… 262
假蒟 …… 262
假楼斗菜 …… 262
匙叶翼首草 …… 263
婆婆纳 …… 263
淫羊藿 …… 263
牻牛儿苗 …… 264
猪鬃草 …… 264
盘龙参 …… 264
绵头雪莲花 …… 265
绵参 …… 265
绿绒蒿 …… 265
菊苣 …… 266
蛇莓草 …… 266
蛋不老 …… 266
野老鹳草 …… 267
雪山林 …… 267
雪灵芝 …… 267
鹿蹄草 …… 268
黄帚橐吾 …… 268
黄金凤 …… 268
斑鸠窝 …… 269
普通鹿蹄草 …… 269
朝鲜淫羊藿 …… 269
硬水黄连 …… 270
紫花地丁 …… 270
紫葳茎叶 …… 270
萹蓄 …… 271
酢浆草 …… 271
锁阳 …… 271
鹅不食草 …… 272
黑草乌茎叶 …… 272
滨蒿 …… 272
矮地茶 …… 273
矮紫堇 …… 273
腺梗豨莶 …… 273
蒲公英 …… 274
蓝布正 …… 274
零陵香 …… 274
榜嘎 …… 275
漆姑草 …… 275
獐牙菜 …… 275
翠云草 …… 276
膜缘柴胡 …… 276
蕹菜 …… 276

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

墨斗菜 …… 277
墨旱莲 …… 277
暴格蚤 …… 277
箭叶淫羊藿 …… 278
蝴蝶花 …… 278
薄荷 …… 278
爵床 …… 279
藏党参 …… 279
藏蒲公英 …… 279
瞿麦 …… 280
糯米藤 …… 280

动物类 …… 281

九香虫 …… 283
三角帆蚌 …… 283
三斑海马 …… 283
大刀螂 …… 284
大连湾牡蛎 …… 284
小刀螂 …… 284
干蟾皮 …… 285
广地龙 …… 285
马氏珍珠贝 …… 285
乌梢蛇 …… 286
五灵脂 …… 286
凤凰衣 …… 286
文蛤 …… 287
日本海马 …… 287
毛蚶 …… 287
长牡蛎 …… 288
龙虱 …… 288
全蝎 …… 288
地鳖 …… 289
尖海龙 …… 289
杂色鲍 …… 289
羊鲍 …… 290
近江牡蛎 …… 290
阿胶 …… 290
鸡内金 …… 291
龟甲 …… 291
刺海马 …… 291
夜明砂 …… 292
泥蚶 …… 292
金钱白花蛇 …… 292
青娘子 …… 293
青蛤 …… 293
鱼脑石 …… 293
南方大斑蝥 …… 294
柳叶蚂蟥 …… 294
独角蜣螂虫 …… 294
穿山甲 …… 295
虻虫 …… 295
蚂蟥 …… 295
海螵蛸 …… 296
皱纹盘鲍 …… 296
蚕砂 …… 296
望月砂 …… 297
羚羊角 …… 297
蛇蜕 …… 297
鹿茸 …… 298
黄黑小斑蝥 …… 298
紫贝齿 …… 298
紫河车 …… 299
紫草茸 …… 299
紫梢花 …… 299
蛤蚧 …… 300
蜂蜡 …… 300
蜈蚣 …… 300
熊胆 …… 301
僵蚕 …… 301
蕲蛇 …… 302
冀地鳖 …… 302
蟾酥 …… 303
鳖甲 …… 303
麝香 …… 303

矿物类 …… 305

大青盐 …… 307
五花龙骨 …… 307
方解石 …… 307
白矾 …… 308
白硇砂 …… 308
石膏 …… 308
石燕 …… 309
龙齿 …… 309
龙骨 …… 309
朱砂 …… 310
红粉 …… 310
自然铜 …… 310

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

芒硝 …… 311
皂矾 …… 311
花蕊石 …… 311
金精石 …… 312
金礞石 …… 312
青礞石 …… 312
禹余粮 …… 313
胆矾 …… 313
钟乳石 …… 313
寒水石 …… 314
滑石 …… 314
滑石粉 …… 314
琥珀 …… 315
硫磺 …… 315
紫石英 …… 315
紫硇砂 …… 316
雄黄 …… 316
煅石膏 …… 316
硼砂 …… 317
磁石 …… 317
赭石 …… 317

其他类 …… 319

儿茶 …… 321
大马勃 …… 321
大叶海藻 …… 321
小叶海藻 …… 322
干漆 …… 322
中国芦荟 …… 322
天竺黄 …… 323
太白花 …… 323
冬虫夏草 …… 323
半夏曲 …… 324
白石花 …… 324
龙血竭 …… 324
冰片（机制冰片） …… 325
百草霜 …… 325
库拉索芦荟 …… 325
没药 …… 326
没食子 …… 326
肚倍 …… 326
角倍 …… 327
赤芝 …… 327
阿魏 …… 327
乳香 …… 328
昆布 …… 328
青黛 …… 328
神曲 …… 329
茯苓 …… 329
海金沙 …… 329
海带 …… 330
猪苓 …… 330
脱皮马勃 …… 330
雪茶 …… 331
紫色马勃 …… 331
紫芝 …… 331
雷丸 …… 332
樟脑 …… 332

中文名索引（按笔画排序） …… 333

中文名索引（按拼音排序） …… 343

拉丁学名索引 …… 353

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

根及根茎类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

九节菖蒲

【来源】 毛茛科植物阿尔泰银莲花 Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey.的干燥根茎。

【主产地】 主产于陕西、河南。陕西太白、洛南、华县、华阴、宝鸡、蓝田等地为其道地产区。

【性状特征】 根茎长纺锤状，略弯曲，长1～4 cm，直径3～5 mm。表面黄棕色至暗棕色，具多数半环状突起的节，其上有鳞叶痕，斜向交互排列，并有突起的细根痕。质坚脆，断面平坦，白色至淡黄色，粉性，可见淡黄色小点（维管束）6～12个，排列成环。气微，味淡微酸。

【品质】 本品以肥大、色棕黄、断面色白者为佳。

【性味功效】 辛，温。开心利窍，祛风湿，除痰消积。用于癫狂，惊痫，痰厥昏迷，四肢湿痹，头痛耳鸣等症。



【编号】 M00047015143R0CMMI H02867015005000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

人参


【来源】 五加科植物人参Panax ginseng C. A. Mey.的干燥根（栽培品）。

【主产地】 主产于吉林、辽宁、黑龙江等地。

【性状特征】 主根呈纺锤状或圆柱状，长3～15 cm，直径1～2 cm。上端连接较细的根茎（芦头），长1～4 cm，具稀疏的凹窝状茎痕（芦碗），下部分出2～4个支根，并着生多数细长的须根，须根上常有不明显的细小疣状突起（珍珠点）。表面灰黄色，有疏浅断续的粗横纹及明显的纵皱。质硬脆，断面浅黄色，显粉性，形成层环纹棕黄色，皮部有黄棕色的点状树脂道及放射状裂隙。气微香而特异。

【品质】 本品以条粗、质硬、皮细、无破痕者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，平。大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津，安神。用于体虚欲脱，肢冷脉微，脾虚食少，肺虚喘咳，津伤口渴，内热消渴，久病虚羸，惊悸失眠，阳萎宫冷；心力衰竭，心源性休克。



【编号】 M00077212066R0CMMI H28027213016000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

八角枫根

【来源】 八角枫科植物八角枫 Alangium chinense (Lour.) Harms的干燥根。

【主产地】 主产于南方各地。

【性状特征】 根呈圆柱状，略弯曲，直径2～8 mm，有侧根及众多纤细须状根或根痕。表面灰黄色至棕黄色，栓皮常有纵纹或剥脱。质坚脆，断面纤维性，淡黄色。气微，味淡而辛。

【品质】 本品以干燥、无杂质、须根多者为佳。

【性味功效】 辛，微温，有小毒。祛风除湿，舒筋活络，散瘀止痛。用于风湿痹痛，麻木瘫痪，跌扑损伤。



【编号】 M00117210001FHCMMI H01757211001000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

三七

【来源】 五加科植物三七 Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chen 的干燥根。


【主产地】 主产于云南、广西；云南文山和广西靖西等地为三七的道地产区。

【性状特征】 主根呈类圆锥状，长 1～6 cm，直径 1～4 cm。表面灰黄色或黑棕色，具蜡样光泽，顶端残留根茎痕，周围有瘤状突起，全体有断续的纵皱纹及支根痕。体重，质坚实，断面灰绿色、黄绿色或灰白色，木部微显放射状纹理，皮部与木部易分离。气微，味苦而回甜。

【品质】 本品以个大、皮细有小“钉头”、体重质坚、断面色棕黑、无裂痕者为佳。

【性味功效】 甘、微苦。活血止血，散瘀止痛。用于咳血，吐血，便血，衄血，崩漏，外伤出血，跌扑肿痛。

【附注】 三七自古用作止血及伤科要药。



【编号】 M00127212071R0CMMI H28067213016000300SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

三加皮

【来源】 五加科植物白笪 Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr. 的干燥根。

【主产地】 主产于四川、贵州、广西、广东等地。

【性状特征】 干燥的根呈长圆柱状，长 8～12 cm，直径 0.4～1.5 cm。表面灰褐色至深褐色，有纵向稍扭曲的沟纹及横向长圆皮孔。皮部与木质部极易剥离，断面黄白色，中心有髓，放射状纹理明显或不明显，剥去皮部的木心显柴性。有清香气。

【品质】 本品以粗壮、皮厚、香气浓者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。祛风利湿，舒经活血。用于风湿性关节炎，跌扑损伤。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M00137212019H0GYCM H00327213001002300GYCM

【鉴定人】 陈谦海

三白草根

【来源】 三白草科植物三白草 Saururus chinensis (Lour.) Baill. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于江苏、浙江、湖南、广东等地。

【性状特征】 根茎呈圆柱状，略扁，稍弯曲，长短不等。表面浅棕色或灰褐色，粗糙，有环状节及细的纵皱纹，节上有根痕，节间长约 2 cm。质脆易断，断面类白色，粉性。气微香，味甘而微辛。

【品质】 本品以条粗长、色浅棕、断面色白、气微香者为佳。

【性味功效】 甘、辛，寒。清热解毒，利尿消肿。用于小便不利，淋沥涩痛，白带，尿路感染，肾炎水肿；外治疮疡肿毒，湿疹。



【编号】 M00147029004R0SM H34967029003000100CMMI

【鉴定人】 陈俊华

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

三角叶黄连

【来源】 毛茛科植物三角叶黄连 Coptis deltoidea C.Y.Cheng et Hsiao 的干燥根茎。

【主产地】 主产于四川。均为栽培品，少有野生。

【性状特征】 根茎多为单枝，略呈圆柱状，微弯曲，长4～8 cm，直径5～10 mm。表面灰黄色或黄棕色，粗糙，有不规则结节状隆起、须根及须根残基，有的节间表面平滑如茎杆，习称“过桥”，“过桥”较长，顶端有少许残茎。质轻而脆，易折断，断面较平坦，黄棕色。气微，味极苦。

【品质】 本品以身干、粗壮、无须根、形如蚕者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。用于湿热痞满，呕吐吞酸，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衄，目赤，牙痛，消渴，痈肿疔疮；外治湿疮，湿疹，耳道流脓。

【附注】 本品作为“黄连”入药。



【编号】 M08867015283R0CMMI H11287015019000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

三棱

【来源】 黑三棱科植物黑三棱Sparganium stoloniferum Buch.-Ham. 的干燥块茎。

【主产地】 主产于江苏、河南、山东、江西、安徽等地。

【性状特征】 块茎呈圆锥状，略扁，上圆下尖，下端稍弯曲，长2～6 cm，直径2～4 cm。表面黄白色或灰黄色，有刀削痕，须根痕小点状，略呈横向环状排列，两侧的根痕较粗，多凹凸不平。体重，质坚实，难碎断，入水下沉。碎断面灰黄色或浅棕色，有多数散在的小点及条状横纹。气微，味淡，嚼之略有麻辣感。

【品质】 本品以个匀、体重、质坚实、去净外皮、表面色黄白者为佳。

【性味功效】 辛、苦，平。破血行气，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘀血经闭，食积胀痛。



【编号】 M00167304003R0CMMI H37227304001000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

千年健

【来源】 天南星科植物千年健Homalomena occulta (Lour.) Schott 的干燥根茎。

【主产地】 主产于广西、云南等地。

【性状特征】 根茎圆柱状，稍弯曲，有的略扁，长15～40 cm，直径0.8～2 cm。表面红棕色至黄棕色，粗糙，有多数扭曲的纵沟纹、圆形根痕及黄色纤维束。质硬而脆，易折断，断面红棕色，黄色针状纤维束多而明显，另一断面散布去除纤维后所留下的针眼状小孔，可见深褐色具光泽的油点。气香，味辛、微苦。

【品质】 本品以条粗、色红棕、质硬、香气浓烈者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温。祛风湿，健筋骨。用于风寒湿痹，腰膝冷痛，下肢拘挛麻木。



【编号】 M00177302081R0CMMI H20327302019000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

土木香

【来源】 菊科植物土木香 Inula helenium L.的干燥根。

【主产地】 主产于河北。

【性状特征】 根呈长圆锥状，稍弯曲，少数为圆锥状短段或不规则的块片，长 10～22 cm，直径 0.4～3 cm。表面黄褐色，具纵皱纹及须根痕。根头稍膨大，顶端有凹陷的茎痕及红棕色叶柄残基，周围有圆柱形支根。质坚硬，不易折断，断面不平坦，黄白色。形成层环状明显，木质部略显放射状纹理。气微香，味辛、微苦，有麻舌感。

【品质】 本品以条粗、质坚硬、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。健脾和胃，调气解郁，止痛安胎。用于脘腹、胸胁胀痛，呕吐泻痢，胸胁挫伤，疝气作痛，胎动不安。



【编号】 M00217238387R0CMMI H21377239123000900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

土牛膝

【来源】 苋科植物柳叶牛膝 Achyranthes longifolia Makino 的干燥根。

【主产地】 主产于陕西、湖南、湖北、贵州等地。

【性状特征】 根多数成簇，有的带有茎基，也有单条者，呈长圆柱状，有时具分枝，长 10～15 cm，直径 2～7 mm。表面灰棕色或红棕色，有细纵皱纹。质柔，易折断，断面灰棕色或带粉红色，维管束排列成环，约 1～4 层。无臭，味初甜而后苦涩。

【品质】 本品以粗壮、皮细、不带地上部分及须根者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。凉血止血，化瘀止痛。用于跌扑损伤。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M00227063007H0GYCM H00497063001000300SM

【鉴定人】 陈谦海

土贝母


【来源】 葫芦科植物土贝母 Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franqnet 的干燥块茎。

【主产地】 主产于河南、陕西、山西、河北等地。

【性状特征】 块茎呈不规则的块状、多角状或三棱状，大小不等，常中部宽阔，厚 0.5～1.5 cm，宽 0.7～2 cm。表面淡红棕色至暗棕色，凹凸不平，煮透者呈半透明样，腹面常有一纵凹沟，背面多隆起。质坚硬，不易折断，断面角质样，光亮而平滑。气微，味微苦。

【品质】 本品以个大、质坚实、色红棕、半透明、断面角质样者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。散结，消肿，解毒。用于乳痈，瘰疬，疮疡肿毒及蛇虫毒；乳腺炎，颈淋巴结结核，慢性淋巴结炎，肥厚性鼻炎。



【编号】 M00237103005R0CMMI H06667103004000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

土茯苓

【来源】 百合科植物光叶菝葜 Smilax glabra Roxb. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于广东、湖南、湖北、浙江、四川、安徽等地。

【性状特征】 根茎略呈圆柱状，稍扁或呈不规则条块，长 5～22 cm，直径 2～5 cm。表面黄棕色或灰褐色，微有光泽，凹凸不平，有坚硬的根残基，有结节状隆起，具短侧根，侧根顶端有圆形茎痕，有的外皮现不规则裂纹，并有残留鳞叶。质坚硬，不易折断。气微，味微甘。

【品质】 本品以断面色淡红、粉性足者为佳。

【性味功效】 甘、淡，平。除湿，解毒，通利关节。用于湿热淋浊，带下，痈肿，瘰疬，疥癣，梅毒及汞中毒。



【编号】 M00247293318R0CMMI H36657293047002300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大三叶升麻

【来源】 毛茛科植物大三叶升麻 Cimicifuga heracleifolia Kom.的干燥根茎。


【主产地】 主产于辽宁、吉林、黑龙江等地。

【性状特征】 根茎呈不规则长块状，多分枝呈结节状，长5～20 cm，直径 2～4 cm。表面灰褐色，粗糙，上有数个深的圆形空洞，洞的直径可达 2 cm，洞的内壁显网状纹理。体轻质坚，不易折断，断面纤维性，木质部呈放射状纹理，髓部灰褐色。气微，味苦。

【品质】 本品以个大、整齐、外皮色黑、无细根、断面色灰者为佳。

【性味功效】 辛、微甘，微寒。发表透疹，清热解毒，升举阳气。用于风热头痛，齿痛，口疮，咽喉肿痛，麻疹不透，阳毒发斑；脱肛，子宫脱垂。

【附注】 本品作为“升麻”入药。



【编号】 M01407015195R0CMMI H09637015015000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大头翁

【来源】 毛茛科植物大火草 Anemone tomentosa (Maxim.) Pei 的干燥根。

【主产地】 主产于四川、青海、甘肃、陕西、湖北、河南、河北、山西等地。

【性状特征】 根呈圆柱状，稍弯曲，长10～20 cm，直径1～2 cm。上端可见茎基、干枯的叶基或棕褐色毛状物。表面棕褐色，粗糙，有扭曲的纵皱纹，根端常分为数股。质松脆，易折段，断面棕色，略平坦。气微，味苦、辛。

【品质】 本品以表面色棕褐、质松脆者为佳。

【性味功效】 苦，温。化痰，散瘀，消食化积，截虐，解毒，杀虫。用于劳伤咳喘，跌扑损伤，小儿疳积，疟疾，疮疖痈肿，顽癣。



【编号】 M00367015164FHCMMI H02957015005004900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大花红景天


【来源】 景天科植物大花红景天 Rhodiola crenulata (Hook.f. et Thoms.) H. Ohba 的干燥根。

【主产地】 主产于西藏、青海、四川、云南等地。

【性状特征】 根茎呈类圆柱状，粗壮，多分枝，枝长 3～20 cm，直径 1～5 cm，表面棕色，具较大膜质鳞叶，节间不规则，具众多粗壮的茎基，直径约 4 mm。 体轻，疏松，断面红棕色，有一环纹，主根粗短，侧根细长，长 10～40 cm，质脆，断面橙红色。具有玫瑰香气，鲜时更浓郁，味微涩。

【性味功效】 甘、涩，寒。清肺，益气。用于肺结核咳嗽，咯血，肺炎，支气管炎。

【附注】 本品作为“红景天”入药。



【编号】 M03657045021R0XZDC H32967045007001200XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

大狼毒

【来源】 大戟科植物大狼毒 Euphorbia nematocypha Hand.-Mazz. 的干燥根。


【主产地】 主产于云南、西藏。

【性状特征】 干燥的根呈圆锥状或圆柱状，长 15～30 cm，直径 1～3 cm，外皮褐色或黄褐色，不分枝或有少数支根。栓皮易剥落而显棕黄色或棕红色，切面黄白色，可见异型维管束形成的同心环纹。质轻泡，味辛辣，有大毒。

【品质】 本品以根条粗壮、肥厚、质轻、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦，温；大毒。化瘀止血，杀虫止痒。用于创伤出血，跌扑肿痛，瘰疬，疥癣。

【附注】 本品毒性较大，不可内服。



【编号】 M07617136090R0XZDC H17017136033002600XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

大黄

【来源】 蓼科植物掌叶大黄 Rheum palmatum L. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于甘肃、青海、西藏、四川等地。

【性状特征】 根和根茎呈圆锥状或圆柱状，或一面隆起一面平坦的纵剖片，长 4～8 cm，直径 2～4 cm。其性状特征与马蹄大黄极为相似，其锦纹明显，断面有棕黄色或棕红色弯曲线纹。根茎近顶端横切面星点为 2 环，其下 1 环或散在，根的横切面无星点。韧皮部黏液腔少。

【品质】 本品以外表色黄棕、星点明显、体重、质坚实、气清香、味苦而微涩、嚼之粘牙者为佳。

【性味功效】 苦、寒。泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽肿，肠痈腹痛，痈肿疔疮，瘀血经闭，跌扑损伤；外治水火烫伤，上消化道出血。



【编号】 M08987057114R0CMMI H32927057012000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大蒜


【来源】 百合科植物大蒜 Allium sativum L. 的鳞茎。

【主产地】 全国各地均产。

【性状特征】 鳞茎类球状，直径 3～6 cm，由 6～12 个小鳞茎着生在扁平木质鳞茎盘上抱合而成，外包 1～3 层白色或淡紫色膜质鳞叶，中央有干缩的花葶残基，基部有多数黄白色须根痕。小鳞茎瓣长卵圆形，顶端略尖，背面略隆起，外被膜质鳞叶，内为白色肥厚的肉质鳞叶。气特异，味辛辣。

【品质】 本品以个大、肥厚、味辛辣者为佳。

【性味功效】 辛，温。解表，健胃，杀虫，消癥结。用于防治感冒，痢疾，痈肿疮疡。现代研究大蒜有降血脂，抗肿瘤作用。



【编号】 M00497293028R0CMMI H02057293002007300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

小青藤香

【来源】 防己科植物轮环藤 Cyclea racemosa Oliv. 的干燥根。


【主产地】 主产于湖北、四川、贵州。

【性状特征】 根粗壮，圆柱状，外表灰褐色，粗糙，稍扭曲，在扭曲处缢缩成横沟而略显结节状，有时可见少数支根或支根痕；长 10～20 cm，直径 0.8～2 cm。质坚脆，易折断，断面粉性，有浅棕色的木质部束，呈放射状排列。气微，味苦。

【品质】 本品以粗壮、坚实、断面粉性足者为佳。

【性味功效】 性热，入冷经、半边经。祛风通络，利湿止痛，为治疗风湿病之要药。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M00567023012R0GYCM H12677023006000100GYCM

【鉴定人】 陈德媛

小根蒜

【来源】 百合科植物小根蒜 Allium macrostemon Bge.的干燥鳞茎。

【主产地】 主产于东北、河北、江苏、湖北等地。以江苏产的质量佳。

【性状特征】 鳞茎呈不规则卵圆状，高 0.5～2 cm，直径0.5～1.8 cm。表面黄白色或淡黄棕色，皱缩，半透明，有类白色膜质鳞片包被，底部有突起的鳞茎盘，质坚硬，角质样，断面黄白色。具蒜臭，味微辣。

【品质】 本品以粒大、饱满、匀称整齐、质坚、色黄白、半透明、无外层膜质鳞叶、味辛者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。通阳散结，行气导滞。用于胸痹疼痛，痰饮咳嗽，泄痢后重。

【附注】 本品作为“薤白”入药。



【编号】 M10257293021R0CMMI H02007293002005100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小秦艽

【来源】 龙胆科植物小秦艽 Gentiana dahurica Fisch.的干燥根。

【主产地】 主产于河北、内蒙古、陕西等地。

【性状特征】 根呈圆锥状或圆柱状，长8～20 cm，直径2～9 mm。表面棕黄色，有纵向或扭曲的沟纹，已去外皮者表面黄色。根头较细，单一，偶有二分叉，表面有横向纹理，顶端残存茎基及短纤维状叶鞘。主根通常1个，下部多分枝。质松脆，易折断，断面黄白色。气微，味苦、涩。

【品质】 本品以质实、色棕黄、断面色黄白者为佳。

【性味功效】 辛、苦，平。祛风湿，清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸痛，小儿疳积发热。

【附注】 本品作为“秦艽”入药。



【编号】 M00597239018R0CMMI H18337240007005100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

小萱草根

【来源】 百合科植物小萱草Hemerocallis minor Mill. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等地。

【性状特征】 根茎略短，根较细而多，丛生于根茎上，长5～15 cm，直径2～3 mm。表面灰棕色或灰黄棕色，具细密横纹。具韧性，不易折断，断面灰白色。

【品质】 本品以表面色灰黄、质充实、去尽地上部分者为佳。

【性味功效】 甘，凉。清热利湿，凉血止血，解毒消肿。用于黄疸，水肿，淋浊，带下，衄血，便血，崩漏，瘰疬，乳痈。



【编号】 M00637293170R0CMMI H19857293024000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

山豆根

【来源】 豆科植物越南槐 Sophora tonkinensis Gapnep. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于广西。

【性状特征】 根茎呈不规则的结节状，顶端常残存茎基或茎痕，其下着生根数条。根呈长圆柱状，常有分枝，略弯曲，直径0.7～1.5 cm。表面棕色至棕褐色，有不规则的纵皱纹及横向皮孔。质坚硬，难折断，断面略平坦，皮部浅棕色，木部淡黄色。有豆腥气，味极苦。

【品质】 本品以条粗、表面色棕褐、质坚、味苦者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有毒。清热解毒，消肿利咽。用于火毒蕴结，咽喉肿痛，齿龈肿痛。



【编号】 M00657148575R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山柰

【来源】姜科植物山柰 Kaempferia galanga L.的干燥根茎。

【主产地】主产于广西、广东、云南、福建、台湾等地。

【性状特征】根茎横切片为圆或近圆状，直径 1 ～ 2 cm，厚 3 ～ 5 mm。外表浅褐色或黄褐色，皱缩，有的有根痕或残存须根。切面类白色，显粉性。常略鼓凸，习称“缩皮凸肉”。质脆，易折断。香气特异，味辛辣。

【品质】本品以色白、粉性足、气香浓、味辛辣者为佳。

【性味功效】辛，温。行气温中，消食，止痛。用于胸膈胀满，脘腹冷痛，饮食不消。



【编号】M00667290094R0CMMI H22007290014000200SM

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

山药

【来源】薯蓣科植物薯蓣 Dioscorea opposita Thunb. 的干燥根茎。

【主产地】主产于河南。

【性状特征】根茎呈圆柱状，两端平齐，长 9 ～ 18 cm，直径 1.5 ～ 3 cm。表面光滑，细腻，有微细维管束浅纹，白色或黄白色。体重，质坚实，不易折断，断面白色，颗粒状，粉性。味淡，微酸，嚼之发粘。

【品质】本品以条粗、质坚实、粉性足、色洁白者为佳。

【性味功效】甘，平。补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少，久泻不止，肺虚咳喘，肾虚遗精，带下，尿频，虚热消渴。



【编号】M00697311025R0CMMI H14537311001003500CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

山慈姑


【来源】兰科植物杜鹃兰 Cremastra appendiculata (D. Don) Makino 的干燥假鳞茎。

【主产地】主产于四川、贵州等地。

【性状特征】假鳞茎呈不规则扁球状或圆锥状，长 1.8～3 cm，膨大部直径 1～2 cm。顶端渐突起，基部有须根痕。表面黄棕色或棕褐色，有纵皱纹或纵沟，中部有 2～3 条微突起的环节，节上有鳞片叶干枯腐烂后留下的丝状纤维。质坚硬，难折断，断面灰白色或黄白色，略呈角质。气微，味淡，有黏性。

【品质】本品以个大、质坚硬者为佳。

【性味功效】甘、微辛，凉。清热解毒，化痰散结。用于痈肿疔毒，瘰疬痰核；淋巴结结核，蛇虫咬伤。



【编号】M12097326038000100SM

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

川乌


【来源】 毛茛科植物乌头 Aconitum carmichaeli Debx. 的干燥母根（栽培品）。

【主产地】 主要栽培于四川。

【性状特征】 母根呈尖圆锥状，稍弯曲，顶端常有残茎，中部多向一侧膨大，长 2～7.5 cm，直径 1.2～2.5 cm。表面棕褐色或灰棕色，皱缩，有小瘤状侧根及子根脱落后的痕迹。质坚实，断面类白色或浅黄色，形成层环纹呈多角状。气微，味辛辣，麻舌。

【品质】 本品以个匀、饱满、质坚实、断面色白者为佳。

【性味功效】 辛、苦，热；有大毒。祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛。



【编号】 M00747015021R2CMMI H00577015001002500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

川木香

【来源】 菊科植物川木香 Vladimiria souliei (Franch.) Ling 的干燥根。

【主产地】 主产于四川、西藏等地。

【性状特征】 根呈圆柱状或有纵槽的半圆柱状，稍弯曲，长 10～30 cm，直径 1～3 cm。表面黄褐色或棕褐色，具纵皱纹，外皮脱落处可见丝瓜络状细筋脉。根头偶有黑色发黏的胶状物，习称“油头”。体较轻，质硬脆，易折断，断面黄白色或黄色，有深黄色稀疏油点及裂隙，木部宽广，有放射状纹理，有的中心呈枯朽状。气微香，味苦，嚼之粘牙。

【品质】 本品以条粗、富油性、裂隙少、质坚实、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。行气止痛。用于脘腹胀痛，肠鸣腹泻，里急后重，两胁不舒，肝胆疼痛。



【编号】 M00757238711R0CMMI H41317239221001100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

川牛膝


【来源】 苋科植物川牛膝 Cyathula officinalis Kuan 的干燥根。

【主产地】 主产于四川、云南、贵州等地。

【性状特征】 根呈近圆柱状，微扭曲，向下略细，有的有少数分枝，长 30～60 cm，直径 0.5～3 cm。表面黄棕色或灰褐色，具纵皱纹、支根痕和多数横向突起的皮孔。质柔韧，不易折断，断面浅黄色或棕黄色，维管束点状，排列成数轮同心圆。气微，味甜。

【品质】 本品以条粗、质柔韧、分枝少、断面色浅黄者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，平。逐瘀通经，通利关节，利尿通淋。用于经闭癥瘕，胞衣不下，关节痹痛，足痿筋挛，尿血血淋，跌扑损伤。



【编号】 M00787063027R0CMMI H12637063008000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

川贝母

【来源】 百合科植物川贝母 Fritillaria cirrhosa D. Don 的干燥鳞茎。

【主产地】 主产于西藏、四川、云南等地。

【性状特征】 鳞茎呈圆锥状或卵圆状，顶端稍尖或钝圆，直径1～1.5 cm，高1～1.3 cm。表面淡黄白色，光滑，外层两枚鳞叶形状大小近似，相对抱合不紧。质硬而脆，断面白色，富粉性。味微甜而苦。

【品质】 本品以质坚实、粉性足、色白者为佳。

【性味功效】 苦、甘，微寒。清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。



【编号】 M00797293107R0CMMI H17987293020000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

川白芍

【来源】 毛茛科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall. 的干燥根。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 根略呈圆柱状或圆锥状，多弯曲，长6～15 cm，直径0.6～1.5 cm。表面粉红色，光滑无沟纹，侧根痕较大而多，木化程度较强。质坚实而重，不易折断，断面灰白色或微带棕色，角质样，木部成放射状。气无，味微苦而酸。

【品质】 本品以粗长匀直、皮色光洁、质坚实、无白心或裂隙者为佳。

【性味功效】 苦、酸，微寒。平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。

【附注】 本品作为“白芍”入药。



【编号】 M00807015376R2CMMI H27947015034000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

川白芷

【来源】 伞形科植物杭白芷 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. formosana (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 根呈圆锥状，长10～20 cm，直径2～5 cm。根头近方形或类方形，表面灰褐色或棕褐色，有纵向的细皱纹，亦有横长皮孔，但较杭白芷少，凸起较小。体形圆而具四条棱脊，顶端有凹陷的茎痕。质硬较重，断面白色，粉性足，根上部的形成层环近方形，皮部密布棕色油点。气芳香，味辛、微苦。

【品质】 本品以独支、条粗壮、质硬、体重、粉性足、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 辛、温。散风除湿，通窍止痛，消肿排脓。用于感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞，鼻渊，牙痛，白带，疮疡肿毒。

【附注】 本品作为“白芷”入药。



【编号】 M00817213015R0CMMI H03067214005000703CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

川芎


【来源】 伞形科植物川芎 Ligusticum chuanxiong Hort. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于四川。四川灌县、崇庆等地为其道地产区。

【性状特征】 根茎为不规则结节状拳形团块，直径2～7 cm。表面黄褐色，粗糙皱缩，有多数平行隆起的轮节，顶端有凹陷的类圆形茎痕，下侧及轮节上有多数小瘤状根痕。质坚实，不易折断，断面黄白色或灰黄色，全体散有黄棕色油室，形成层呈波状环纹。香气浓郁而特异，味苦、辛，稍有麻舌感，微回甜。

【品质】 本品以个大饱满、质坚实、外皮色黄褐、断面色黄白、油性大、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛，温。活血行气，祛风止痛。用于月经不调，经闭痛经，癥瘕腹痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。



【编号】 M00827213176R0CMMI H23267214052003100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

川赤芍

【来源】 毛茛科植物川赤芍 Paeonia veitchii Lynch 的干燥根。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 根呈圆柱状，稍弯曲，长5～20 cm，直径0.7～2.5 cm。表面棕红色或暗棕色，有纵皱纹，偶有落皮层形成的斑痕。刮去外皮者表面淡紫红色或肉白色。质松，易折断，断面平坦，显粉性，皮部黑褐色，木部黄白色，木化程度小。味微苦、涩。

【品质】 本品以条粗长、外皮易脱落、断面色粉白、粉性大者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。清热凉血，散瘀止痛。用于温毒发斑，吐血衄血，目赤肿痛，肝郁胁痛，闭经痛经，癥瘕腹痛，跌扑损伤，痈肿疮疡。

【附注】 本品作为“赤芍”入药。



【编号】 M00837015386R0CMMI H28007015034001100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

川明参


【来源】 伞形科植物川明参 Chuanmingshen violaceum Sheh et Shan 的干燥根。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 根呈长圆柱状，长7～30 cm，直径0.5～1.2 cm，头尾粗细略相等，多不分枝。表面淡黄棕色或灰棕色，细致平坦，外表无粗皮，有极稀疏似环带状的环纹。质极细，坚实，易折断，断面黄白色，显粉性，呈半透明或微透明状，并可见淡黄色小油点。皮部约占半径的一半，具2～3个白色断续同心环纹，木部有浅色辐射纹理。气微味淡。

【品质】 本品以质坚实、粉性、半透明者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，凉。养阴清肺，健脾助运。用于热病伤阴，肺燥咳嗽，脾虚食少，病后体虚。



【编号】 M00847213097R0CMMI


【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

川党参


【来源】 桔梗科植物川党参Codonopsis tangshen Oliv. 的干燥根。
【主产地】 主产于四川、湖北、陕西、贵州等地。
【性状特征】 根呈长圆柱状，稍弯曲，少有分枝，长10～45 cm，直径0.5～2 cm。表面灰黄色至黄棕色，有明显不规则的纵沟。质较软而结实，断面裂隙较少，皮部浅黄色，木部黄色，其外围有一圈浅棕色环。有特殊香气，味微甜。
【品质】 本品以根条肥大粗壮、肉质柔润、香气浓、甜味重、嚼之无渣者为佳。
【性味功效】 甘，平。补中益气，健脾益肺。用于脾肺虚弱，气短心悸，食少便溏，虚喘咳嗽，内热消渴。
【附注】 本品作为“党参”入药。



【编号】 M00857243067R0CMMI H10987244006003300CMMI
【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

干姜


【来源】 姜科植物姜 Zingiber officinale Rosc. 的干燥根茎。
【主产地】 主产于四川、贵州等地。
【性状特征】 根茎呈不规则扁平块状，具指状分枝，长3～7 cm，厚1～2 cm。表面灰黄色或浅灰黄色，粗糙，具纵皱纹及明显的环节。分枝处常有鳞叶残存，分枝顶端有茎痕或芽。质坚实，断面黄白色或灰白色，粉性或颗粒性，内皮层环纹明显，维管束及黄色油点散在。气香特异，味辛辣。
【品质】 本品以质结实、断面色黄白、粉性足、气味浓者为佳。
【性味功效】 辛，热。温中散寒，回阳通脉，燥湿消痰。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，肢冷脉微，痰饮喘咳。



【编号】 M00897290118R2CMMI H41797290023002200CMMI
【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

广西莪术

【来源】 姜科植物广西莪术Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang 的干燥根茎。
【主产地】 主产于广西。
【性状特征】 根茎呈长圆状或长卵状，长3.5～7 cm，直径1.5～3 cm，基部圆钝，顶端钝尖。表面黄棕色至灰色，光滑，环节明显或不见，有点状须根痕或残留须根，两侧各有一列下陷的芽痕和侧生根茎痕，侧生根茎痕较大，位于下部。质坚重，不能折断，击破面浅棕色，往往附黄白色粉末，皮层与中柱易分离。气香，味微苦辛。
【品质】 本品以质坚实、光滑、气香浓者为佳。
【性味功效】 辛、苦，温。行气破血，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘀血经闭，食积胀痛，早期宫颈癌。
【附注】 本品作为“莪术”入药。



【编号】 M00937290068R0CMMI
【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

广防己

【来源】 马兜铃科植物广防己 Aristolochia fangchi Y. C. Wu ex L. D. Chou et S. M. Hwang 的干燥根。

【主产地】 主产于广东、广西等地。广东肇庆、高要栽培的质量较好。

【性状特征】 根呈圆柱状或半圆柱状，长6～20 cm，直径3～6 cm，略弯曲，在弯曲处可见明显横沟。栓皮很厚，约3～5 cm。未刮皮者表面灰棕色，粗糙，有纵沟纹，无明显的横向皮孔。除去粗皮者表面灰黄色，有刀刮的痕迹，并有浅棕色不规则的纵向及横向纹理。体重而坚硬，不易折断，断面有灰棕色与黄白色相间连续排列的车轮纹，多成片状凸起，由中心辐射至皮部周边。气微香，味微苦而涩。

【品质】 本品以块大、质坚实、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦、辛，寒。祛风止痛，清热利水。用于湿热身痛，风湿痹痛，下肢水肿，小便不利。



【编号】 M00947024012R0CMMI H03947024002001000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

飞龙掌血

【来源】 芸香科植物飞龙掌血 Toddalia asistica (L.) Lam. 的干燥根。


【主产地】 主产于贵州、广西、云南。

【性状特征】 干燥的根呈棒状，茎约2～3 cm。表面灰棕色，有细纵纹及多数疣状突起；突起处栓皮多脱落，露出鲜黄色或红黄色皮层，质粗糙；剥去栓皮，可见木质中柱，纹理平直细密。质硬，不易折断，断面平坦。气微味淡。

【品质】 本品以皮层色黄、质硬而坚实者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。散瘀止痛，接骨，解表。用于跌扑损伤，伤风咳嗽，腹绞痛等。

【附注】 苗族医习用药材。其叶亦作药用，功能散瘀止血，祛风除湿，消肿解毒。



【编号】 M01007194113R0GYCM H39157195028000100GYCM

【鉴定人】 袁家谟

马蹄大黄

【来源】 蓼科植物药用大黄 Rheum officinale Baill. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 根和根茎呈圆柱状或类圆柱状的横切段，一端稍大形似马蹄，长6～10 cm，直径4～10 cm。除尽外皮者表面红棕色，可见类白色网状纹理，习称“锦纹”。未除去外皮者表面棕褐色，有横皱纹及纵沟。根茎近顶端横切面有星点凸起，成环或散在。韧皮部未见黏液腔。新断面在紫外灯下显棕色荧光。质坚实，不易折断，断面淡红棕色或黄棕色，多空隙，富有纤维性。气清香，味苦而微涩，嚼之粘牙，有沙粒感，并使唾液染成黄色。

【品质】 本品以外表色黄棕、星点明显、体重、质坚实、气清香、味苦而微涩、嚼之粘牙者为佳。

【性味功效】 苦、寒。泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽肿，肠痈腹痛，痈肿疔疮，瘀血经闭，跌扑损伤；外治水火烫伤，上消化道出血。

【附注】 本品作为“大黄”入药。



【编号】 M00467057112R0CMMI H32917057012000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中麻黄根

【来源】 麻黄科植物中麻黄 Ephedra intermedia Schrenk et C.A. Mey. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于甘肃、青海、内蒙古、新疆等地。

【性状特征】 根多呈圆柱状，略弯曲，长8～25 cm，直径0.5～1.5cm。上端较粗，偶有膨大的根头，下部较细，常扭曲。表面红棕色或灰棕色，有纵皱纹及根痕。外皮粗糙，易成片状剥落。根茎粗细均匀，具突起的节，节间长 0.7 ～ 2 cm，表面有横长突起的皮孔。体轻，质硬而脆，易折断，断面皮部黄白色，木部淡黄色或黄色，射线放射状，中心有髓。无臭，味微苦。

【品质】 本品以质硬、外皮色红棕、断面色黄白者为佳。

【性味功效】 甘，平。止汗。用于自汗，盗汗。

【附注】 本品作为“麻黄根”入药。



【编号】 M08766010005R0CMMI H15786010001000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

丹参


【来源】 唇形科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bge.的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于四川、山西、陕西、河北、江苏、安徽、山东等地。

【性状特征】 根茎短粗，顶端有时残留茎基。根数条，长圆柱状，略弯曲，有的分枝并具须状细根，长10～20 cm，直径0.3～1 cm。表面棕红色或暗棕红色，粗糙，具纵皱纹。老根外皮疏松，多显紫棕色，常呈鳞片状剥落。质硬而脆，断面疏松，有裂隙或略平整而致密，皮部棕红色，木部灰黄色或紫褐色。气微，味微苦涩。

【品质】 本品以条粗壮、色紫红者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。祛瘀止痛，活血通经，清心除烦。用于月经不调，经闭痛经，癥瘕积聚，胸腹刺痛，热痹疼痛，疮疡肿痛，心烦不眠；肝脾肿大，心绞痛。



【编号】 M01187264299R0CMMI H34507265087004700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

乌药

【来源】 樟科植物乌药 Lindera aggregata (Sims) Kosterm. 的干燥块根。

【主产地】 主产于浙江、湖南、江西。浙江天台为其道地产区。

【性状特征】 块根多呈纺锤状，略弯曲，有的中部收缩成连珠状，称“乌药珠”。长 6～15 cm，直径 1～3 cm。表面黄棕色或黄褐色，有纵皱纹及稀疏的细根痕。质坚硬，不易折断，断面不平坦，淡棕色或淡红棕色，皮部薄，棕色，木部有放射状纹理及环纹。气香，味微苦、辛，有清凉感。

【品质】 本品以连珠状、质嫩、折断后香气浓郁者为佳。

【性味功效】 辛，温。顺气止痛，温肾散寒。用于胸腹胀痛，气逆喘急，膀胱虚冷，遗尿尿频，疝气，痛经。



【编号】 M01207011041R0CMMI H23537011013000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

云连

【来源】 毛茛科植物云连 Coptis teeta Wall. 的干燥根茎。


【主产地】 主产于云南、西藏等地。

【性状特征】 根茎略呈连珠状的圆柱形，较细小，多弯曲呈钩状，长 2 ～ 5 cm，直径 2 ～ 4 mm。表面棕黄色，常有“过桥”。质轻而脆，易折断，断面较平坦，黄棕色。气微，味极苦。

【品质】 本品以干燥、条细、节多、须根少、色黄者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。用于湿热痞满，呕吐吞酸，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衄，目赤，牙痛，消渴，痈肿疔疮。外治湿疹，湿疮，耳道流脓。

【附注】 本品作为“黄连”入药。



【编号】 M01247015288R0CMMI H11307015019000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

云南重楼

【来源】 百合科植物云南重楼 Paris polyphylla Smith var. yunnanensis （Franch..）Hand.-Mazz. 的干燥根茎。


【主产地】 主产于云南、四川、贵州、广西等地。

【性状特征】 根茎类圆状，多直立，长4.5～12 cm，直径1.2～6 cm。表面黄棕色，少数灰褐色，环节较稀疏，茎痕半圆形或扁圆形，不规则排列。质坚硬，不易折断，断面粉性。气微，味微苦、麻。

【品质】 本品以身干、条粗大、质坚实、断面色白、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦，微寒；有小毒。清热解毒，消肿止痛，凉肝定惊。用于疔疮痈肿，咽喉肿痛，毒蛇咬伤。跌扑伤痛，惊风抽搐。

【附注】 本品作为“重楼”入药。



【编号】 M06937293252R0CMMI H28237293037000307CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

升麻

【来源】 毛茛科植物升麻 Cimicifuga foetida L. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于四川、陕西、青海等地。

【性状特征】 根茎呈不规则块状，分枝较多，大小相差悬殊，长 3～13 cm，直径 0.7～3.5 cm。表面灰棕色至暗棕色，有多数圆形空洞状的茎基痕，洞径较大三叶升麻和兴安升麻小，通常在 1 cm 以下，周围及下面须根较多，坚硬而刺手。体轻，质坚硬，不易折断，断面不平坦，有裂隙，纤维性，木部黄绿色。气微，味微苦。

【品质】 本品以个大、体轻、内色绿、质坚者为佳。

【性味功效】 辛、微甘，微寒。发表透疹，清热解毒，升举阳气。用于风热头痛，齿痛，口疮，咽喉肿痛，麻疹不透，阳毒发斑；脱肛，子宫脱垂。



【编号】 M01397015192R0CMMI H09627015015000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

双边天花粉

【来源】葫芦科植物中华栝楼 Trichosanthes rosthornii Harms 的干燥根。


【主产地】主产于四川。

【性状特征】根呈不规则圆柱状、纺锤状或瓣块状，长8～16 cm，直径1.5～5.5 cm。去皮者表面浅灰黄色至棕黄色，带皮者显灰棕色，有网状皱纹，纤维较多。质坚实，不易折断，断面淡灰黄色，筋脉较多，粉性稍差。气无，味苦涩。

【品质】本品以块大、色白、具粉性、质坚而细腻者为佳。

【性味功效】甘、微苦，微寒。清热生津，消肿排脓。用于热病烦渴，肺热燥咳，内热消渴，疮疡肿毒。

【附注】本品作为“天花粉”入药。



【编号】M01497103100R0SM H39497103030002500CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

天冬


【来源】百合科植物天冬 Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 的干燥块根。

【主产地】主产于贵州、四川、广西、浙江、云南等地。贵州的湄潭、赤水、望漠为其道地产区。

【性状特征】块根呈长纺锤状，略弯曲，长5～18 cm，直径0.5～2 cm。表面黄白色至淡黄棕色，半透明，光滑或具深浅不等的纵皱纹，偶有残存的灰棕色外皮。质硬或柔润，有黏性，断面角质样，中柱黄白色。气微，味甜，微苦。

【品质】本品以肥满、致密、色黄白、半透明者为佳。

【性味功效】甘、苦，寒。养阴润燥，清肺生津。用于肺燥干咳，顿咳痰黏，咽干口渴，肠燥便秘。



【编号】M01457293046R0CMMI H04787293005000400CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

天花粉

【来源】葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 的干燥根。

【主产地】主产于河南、山东、河北等地。河南安阳为其道地产区。

【性状特征】根呈不规则圆柱状、纺锤状或瓣块状，长8～16 cm，直径1.5～5.5 cm。表面黄白色或淡棕黄色，有纵皱纹、细根痕及略凹陷的横长皮孔，有的残留黄棕色外皮。质坚实，不易折断。横切面白色或淡黄色，富粉性，可见黄色筋脉纹点，略呈放射状排列。纵切面可见黄色条状的筋脉纹。气无，味微苦。

【品质】本品以色白、质细嫩、粉性足者为佳。

【性味功效】甘、微苦，微寒。清热生津，消肿排脓。用于热病烦渴，肺热燥咳，内热消渴，疮疡肿毒。



【编号】M01477103093R0CMMI H39457103030001400CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天麻

【来源】 兰科植物天麻 Gastrodia elata Bl. 的干燥块茎。

【主产地】 主产于四川、云南、湖北、陕西、贵州等地。

【性状特征】 块茎呈椭圆状或长条状，略扁，皱缩而稍弯曲，长3～15 cm，宽1.5～6 cm，厚0.5～2 cm。表面黄白色至淡黄棕色，微透明，有纵皱纹及由潜伏芽排列而成的横环纹多轮，有时可见棕褐色菌索。顶端有红棕色至深棕色鹦嘴状的芽或残留茎基，另一端有圆脐形疤痕。质坚硬，不易折断，断面较平坦，黄白色至浅棕色，角质样。嚼之发脆而有黏性。气微，味甘。

【品质】 本品以质坚实、有鹦嘴状芽、断面半透明、无空心者为佳。

【性味功效】 甘，平。平肝息风止痉。用于头痛眩晕，肢体麻木，小儿惊风，癫痫抽搐，破伤风。



【编号】 M01537326126R0CMMI H18217326061000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

天葵子


【来源】 毛茛科植物天葵 Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino 的干燥块根。

【主产地】 主产于湖南、湖北、江苏等地。

【性状特征】 块根呈不规则短柱状、纺锤状或块状，略弯曲，长1～3 cm，直径0.5～1 cm。表面暗褐色至灰黑色，具不规则的皱纹及须根或须根痕。顶端常有茎叶残基，外被数层黄褐色鞘状鳞片。质较软，易折断，断面皮部类白色，木部黄白色或黄棕色，略呈放射状。气微，味甘、微苦辛。

【品质】 本品以个大、质轻、皮黑内白者为佳。

【性味功效】 甘、苦，寒。清热解毒，消肿散结。用于痈肿疔疮，乳痈瘰疬，毒蛇咬伤。



【编号】 M01547015424R0CMMI H36027015038000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

太子参


【来源】 石竹科植物孩儿参 Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm. 的干燥块根。

【主产地】 主产于江苏、山东、安徽等地。

【性状特征】 块根呈细长纺锤状或细长条状，稍弯曲，长3～10 cm，直径2～6 mm。表面黄白色，较光滑，微有纵皱纹，凹陷处有须根痕。顶端有茎痕，下部细长呈尾状。质硬而脆，断面平坦，淡黄白色，角质样。晒干者类白色，有粉性。气微，味微甘。

【品质】 本品以条粗、有粉性、色黄白、无须根者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，平。益气健脾，生津润肺。用于脾虚体倦，食欲不振，病后虚弱，气阴不足，自汗口渴，肺燥干咳。



【编号】 M01557053060R0CMMI H31727053023000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

太白米

【来源】 百合科植物假百合 Notholirion hyacinthinum (Wils.) Stapf 的鳞茎。

【主产地】 主产于山西、甘肃、四川、西藏等地。

【性状特征】 小鳞茎呈卵状，两头尖，直径3～5 mm，鳞茎皮膜质，未成熟时白色，成熟后呈淡褐色至褐色，表面有8条纵棱，内表面有数层肉质鳞片紧抱如米粒状。下面有须根，上生有珠芽。

【品质】 本品以质坚实、粉性足者为佳。

【性味功效】 辛、苦，微温。理气和胃，祛风止咳。用于脘腹胀痛，呕吐，风寒咳嗽。



【编号】 M01567293218FHCMMI H27007293034000400SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

太白参


【来源】 玄参科植物美观马先蒿 Pedicularis decora Franch. 的干燥根。

【主产地】 主产于陕西、甘肃、湖北、四川等地。

【性状特征】 根呈长圆锥状或圆柱状，具支根或多次分枝，长10～20 cm，直径1～2 cm。表面棕褐色至黑色，顶端芦头长1～2 cm，主根上端具明显细密环纹，支根易断离，根痕棕褐色。质硬脆，易折断，断面皮部黑褐色，木部呈黄褐色菊花心，不呈纤维性。气微，味甜、微苦。

【品质】 本品以色黑、质硬脆者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，温；有小毒。滋阴补肾，益气健脾。用于脾肾两虚，骨蒸潮热，关节疼痛，不思饮食。



【编号】 M01587252090FHCMMI H28527253037006300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

巴山虎

【来源】 茄科植物刺天茄 Solanum indicum L. 的干燥根。

【主产地】 主产于福建、台湾、广东、四川、云南等地。

【性状特征】 根呈不规则圆柱状，多扭曲，有分枝，长达30 cm，直径0.7～5 cm。表面灰黄色或棕黄色，粗糙，可见突起细根痕及斑点，皮薄，有的剥落，剥落处显淡黄色。质硬，断面淡黄色或黄白色，纤维性。

【性味功效】 苦，凉；有毒。祛风，清热，解毒，止痛。用于头痛，鼻渊，牙痛，咽痛，淋巴结炎，胃痛，风湿关节痛，跌扑损伤，痈疮肿毒。



【编号】 M05687250073FHCMMI H36797251021004300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

巴戟天


【来源】 茜草科植物巴戟天 Morinda officinalis How 的干燥根。

【主产地】 主产于广东、广西等地。

【性状特征】 根呈扁圆柱状，略弯曲，长短不等，直径0.5～2 cm。表面灰黄色或暗灰色，具纵纹及横裂纹，有的皮部横向断裂露出木部。质韧，断面皮部厚，紫色或淡紫色，易与木部剥离，木部坚硬，黄棕色或黄白色，直径1～5 mm。气无，味甘而微涩。

【品质】 本品以条粗壮、连珠状、肉厚、色紫者为佳。

【性味功效】 甘、辛，微温。补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳萎遗精，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛，风湿痹痛，筋骨痿软。



【编号】 M01617232116R0CMMI H26357233043000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

木香

【来源】 菊科植物木香 Aucklandia lappa Decne. 的干燥根。

【主产地】 主产于云南。

【性状特征】 根呈圆柱状或枯骨状，长5～10 cm，直径0.5～5 cm。表面黄棕色至灰褐色，有明显的皱纹、纵沟及侧根痕。质坚，不易折断，断面略平坦，灰褐色至暗褐色，周边灰黄色或浅棕黄色，形成层环棕色，有放射状纹理及散在的褐色点状油室。老根中央多枯朽。气香特异，味微苦。

【品质】 本品以条匀、质坚实、油性足、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。行气止痛，健脾消食。用于胸脘胀痛，泻痢后重，食积不消，不思饮食。



【编号】 M01677238184R0CMMI H05497239028000100SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

片姜黄

【来源】 姜科植物温郁金 Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling 的干燥根茎纵切片。


【主产地】 主产于浙江。

【性状特征】 根茎片呈长圆状或不规则的片状，大小不一，长3～6 cm，宽1～3 cm，厚1～4 mm。外皮灰黄色，粗糙皱缩，有时可见环节及须根痕。切面黄白色至棕黄色，有一圈环纹及多数筋脉小点。质脆而坚实，断面灰白色至棕黄色，略显粉性。气香特异，味微苦而辛凉。

【品质】 本品以片大、色黄白、质坚实、显粉性者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。破血行气，通经止痛。用于血滞经闭，行经腹痛，胸胁刺痛，风湿痹痛，肩臂疼痛，跌扑损伤。

【附注】 浙江地区将郁金根茎在鲜时切片晒干，名“片姜黄”。



【编号】 M01837290073R1CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

牛膝

【来源】 苋科植物牛膝 Achyranthes bidentata Bl. 的干燥根。
【主产地】 主产于河南。以河南栽培的怀牛膝质量最好。
【性状特征】 根细长圆柱状，稍弯曲，上端略粗，下端较细，长15～50 cm，直径0.4～1 cm。表面灰黄色或淡棕色，有略扭曲而细微的纵皱纹、横长皮孔及稀疏的细根痕。质硬而脆，易折断，受潮则变柔软，断面平坦，黄棕色，微呈角质样而油润，中心维管束木部较大，黄白色，其外围散有多数点状维管束，排列成2～4轮。气微，味微甜而稍苦涩。
【品质】 本品以条细长、皮细肉肥、色黄白者为佳。
【性味功效】 苦、酸，平。补肝肾，强筋骨，逐瘀通经，引血下行。用于腰膝酸痛，筋骨无力，经闭癥瘕，肝阳眩晕。



【编号】 M04077063004R0CMMI H00487063001000200CMMI
【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

长春七

【来源】 伞形科植物岩风 Seseli giraldii Diels 的干燥根。
【主产地】 主产于新疆、宁夏、甘肃、陕西、四川等地。
【性状特征】 根呈圆柱状，上粗下细，直径1～2 cm。表面灰褐色，上部有横细纹，顶端有多数枯鞘纤维，下部可见支根或支根痕。质硬，断面纤维状。气微香，味微辛、甘。
【品质】 本品以表面色灰褐、质硬者为佳。
【性味功效】 辛、甘，温。发表散寒，祛风除湿，消肿止痛。用于风寒感冒，头痛，牙痛，风湿痹痛，筋骨麻木，跌扑损伤。



【编号】 M02017213277FHCMMI
【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

长鞭红景天

【来源】 景天科植物长鞭红景天 Rhodiola fastigiata (Hook. f. et Thoms.) S. H. Fu 的干燥根及根茎。
【主产地】 主产于西藏、青海、四川等地。
【性状特征】 根及根茎呈细长圆柱状，下部分枝，根茎膨大，有茎基残留，外被黑色鳞片。表面具稀疏横长的皮孔和圆形突起的须根痕。皮部较光滑，棕褐色，内面深红棕色，与木部分离。质硬而脆，断面粉红色。气微，味微苦、涩。
【品质】 本品以表面色棕褐、断面色粉红者为佳。
【性味功效】 苦、涩，凉。清肺热，滋补强身，养阴，除口臭。用于肺病，气管炎，口臭，神经麻痹症。
【附注】 常用藏药。本品作为“红景天”入药。



【编号】 M02027045062R0XZDC
【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丛菔

【来源】 十字花科植物丛菔 Solms-Laubachia eurycarpa (Maxim.) Botsch. 的干燥根。

【主产地】 主产于西藏、青海、甘肃。

【性状特征】 根呈圆柱状，稍肉质，长达 16 cm，直径 1.1 cm。根头部分枝，并具致密的环纹，其上留有叶柄残基。表面黄棕色，粗糙，有明显的皱纹及纵沟，并有侧根痕。质坚脆，易折断，断面不整齐，周边与中心部显灰白色与黄色相间的花纹。气淡微香，味微苦。

【品质】 本品以根条粗壮、坚实、色黄棕者为佳。

【性味功效】 甘、涩，寒。清肺热，退热，祛痰止咳。用于肺热病之咳嗽，发热，气短，痰中带血。

【附注】 藏医习用药材，《晶珠本草》有载。



【编号】 M02037039097H0XZDC H37007039080000300XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

东北天南星

【来源】 天南星科植物东北天南星 Arisaema amurense Maxim.的干燥块茎。


【主产地】 主产于东北、山东、河北等地。

【性状特征】 块茎呈扁圆状，直径 1.5～4 cm，厚 1～2 cm。表面类白色或淡棕色，较光滑，中心茎痕大而较平坦，环纹少呈浅皿状，麻点根痕细而不整齐，周围有微突出的小侧芽。质坚实，不易破碎，断面不平坦，白色，粉性。气微辛，味麻辣。

【品质】 本品以个大、色白、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温；有毒。燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。用于顽痰咳嗽，风痰眩晕，中风痰壅，口眼㖞斜，半身不遂，癫痫，惊风，破伤风。生用外治痈肿，蛇虫咬伤。

【附注】 本品作为“天南星”入药。



【编号】 M02047302020R0CMMI H03767302008000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

东北铁线莲

【来源】 毛茛科植物东北铁线莲 Clematis manshurica Rupr. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于东北各省。

【性状特征】 根茎柱状，长 1～11 cm，直径 0.5～2.5 cm，表面淡棕黄色，顶端残留茎基，质较坚韧，断面纤维性，下侧着生多数细根。根较密集，细长如马尾状，表面棕黑色或棕褐色，有多数明显的细皱纹，质硬脆，易折断，断面木部近圆形，较细小，皮部白色。气微，味辛辣。

【品质】 本品以条均匀、质坚硬、断面色白者为佳。

【性味功效】 辛、咸，温。祛风除湿，通络止痛。用于风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，屈伸不利，骨哽咽喉。

【附注】 本品作为“威灵仙”入药。



【编号】 M06247015274R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

仙茅

【来源】 石蒜科植物仙茅 Curculigo orchioides Gaertn. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 根茎呈圆柱状，略弯曲，长3～10 cm，直径4～8 mm。表面黑褐色或棕褐色，粗糙，有细孔状的须根痕及纵横皱纹。质硬而脆，易折断，断面不平坦，淡褐色或棕褐色，近中心处色较深。气微香，味微苦辛。

【品质】 本品以条粗、表面色黑褐、质坚脆者为佳。

【性味功效】 辛，热；有毒。补肾阳，强筋骨，祛寒湿。用于阳萎精冷，筋骨痿软，腰膝冷痹，阳虚冷泻。



【编号】 M02077306005R0CMMI H12497306005000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

北沙参


【来源】 伞形科植物珊瑚菜 Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq. 的干燥根。

【主产地】 主产于山东、河北、江苏等地。其中山东莱阳胡城村产最为著名。

【性状特征】 根呈细长圆柱状，偶有分枝，长15～45 cm，直径0.4～1.2 cm。表面淡黄白色，略粗糙，偶有残存外皮，不去外皮者表面黄棕色。全体有细纵皱纹及沟纹，并有棕黄色点状细根痕。顶端常留有黄棕色根茎残基，上端稍细，中部略粗，下部渐细。质脆，易折断，断面皮部浅黄色，木部黄色。气特异，味微甘。

【品质】 本品以条匀、色白、质坚、味甜者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，微寒。养阴清肺，益胃生津。用于肺热燥咳，劳嗽痰血，热病津伤口渴。



【编号】 M02187213128R0CMMI H18777214043000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

北苍术

【来源】 菊科植物北苍术 Atractylodes chinensis (DC.) Koidz. 的干燥根茎。


【主产地】 主产于河北、山西、陕西等地。

【性状特征】 根茎呈疙瘩块状或结节状、圆柱状，长4～9 cm，直径1～4 cm。表面黑棕色，有圆形茎痕及根痕，除去外皮者黄棕色。质软疏松，断面纤维性，浅黄色，有散在的黄棕色油点。香气较淡，味辛苦。

【品质】 本品以个大、坚实、无毛须、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。燥湿健脾，祛风散寒，明目。用于脘腹胀满，泄泻，水肿，脚气痿蹙，风湿痹痛，风寒感冒，夜盲。

【附注】 本品作为“苍术”入药。



【编号】 M02197238182R0CMMI H05407239027000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

北豆根


【来源】 防己科植物蝙蝠葛 Menispermum dauricum DC. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于东北、华北及陕西等地。

【性状特征】 根茎呈细长圆柱状，弯曲，有分枝，长可达50 cm，直径3～8 mm。表面黄棕色至暗棕色，多有弯曲的细根，并可见突起的根痕及纵皱纹，外皮易脱落。质韧，不易折断，断面不整齐，纤维细，木部淡黄色，呈放射状排列，中心有类白色的髓。气微，味苦。

【品质】 本品以条粗长、外皮色黄棕、断面色浅黄者为佳。

【性味功效】 苦、寒；有小毒。清热解毒，祛风止痛。用于咽喉肿痛，肠炎痢疾，风湿痹痛。



【编号】 M02207023020R0CMMI H25937023011000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

半夏


【来源】 天南星科植物半夏 Pinellia ternata (Thunb.) Breit. 的干燥块茎。

【主产地】 主产于四川、湖北、河南、贵州、安徽等地，以四川质量好。

【性状特征】 块茎呈类球状，有的稍偏斜，直径1～1.5 cm。表面白色或浅黄色，顶端有凹陷的茎痕，周围密布麻点状根痕，下面钝圆，较光滑。质坚实，断面洁白，富粉性。气微，味辛辣、麻舌而刺喉。

【品质】 本品以个大、色白、质坚实、粉性足者为佳。

【性味功效】 辛、温，有毒。燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。用于痰多咳喘，痰饮眩悸，风痰眩晕，痰厥头痛，呕吐反胃，胸脘痞闷，梅核气。生用外治痈肿痰核。



【编号】 M02237302088R0CMMI H29537302023000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

对叶百部

【来源】 百部科植物对叶百部 Stemona tuberosa Lour. 的干燥块根。

【主产地】 主产于湖北、湖南、广东、福建、四川、贵州等地。

【性状特征】 块根呈长纺锤状或长条状，长8～24 cm，直径0.8～2 cm。表面浅黄棕色至灰棕色，具浅纵皱纹或不规则纵槽。质坚实，断面微呈角质状，中柱较大，类白色。气微，味苦。

【品质】 本品以条粗壮、质坚实、色黄白者为佳。

【性味功效】 苦，微温。润肺下气止咳，杀虫。用于新久咳嗽，肺痨咳嗽，百日咳。外用于头虱，蛲虫病，阴痒。

【附注】 本品作为“百部”入药。



【编号】 M02247310007R0CMMI H37717310002000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

平贝母

【来源】 百合科植物平贝母 Fritillaria ussuriensis Maxim. 的干燥鳞茎。

【主产地】 主产于黑龙江、吉林、辽宁等地。黑龙江五常、尚志和吉林桦甸为其道地产区。

【性状特征】 鳞茎呈扁球状，高0.5～1 cm，直径0.6～2 cm。表面乳白色或淡黄色，外层鳞叶两瓣，肥厚，大小相近或一片稍大，抱合，顶端略平或微凹入，常稍开裂，中央鳞片小。质坚实而脆，断面粉性。气微，味苦。

【品质】 本品以大小均匀、饱满、色白、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦、甘，微寒。清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。



【编号】 M02257293149R0CMMI H18057293020001800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

玄参


【来源】 玄参科植物玄参 Scrophularia ningpoensis Hemsl. 的干燥根。

【主产地】 主产于浙江。

【性状特征】 根呈类圆锥状，中间略粗或上粗下细，有的微弯曲，长6～20 cm，直径1～3 cm。表面灰黄色或灰褐色，有不规则的纵沟、横向皮孔及稀疏的横裂纹和须根痕。质坚实，不易折断，断面略平坦，黑色，微有光泽，以水浸泡，水呈墨黑色。气特异似焦糖，味甘，微苦。

【品质】 本品以条粗壮、质坚实、断面色黑者为佳。

【性味功效】 甘、苦、咸，微寒。凉血滋阴，泻火解毒。用于热病伤阴，舌降烦渴，温毒发斑，津伤便秘，骨蒸劳嗽，目赤，咽痛，瘰疬，白喉，痈肿疮毒。



【编号】 M02297252149R0CMMI H35637253048002300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

玉竹

【来源】 百合科植物玉竹 Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 的干燥根茎。

【主产地】 主产于湖南、河南、江苏、浙江等地。浙江新昌为玉竹的道地产区。

【性状特征】 根茎呈长圆柱状，略扁，少有分枝，长4～18 cm，直径0.3～1.6 cm。表面黄白色或淡黄棕色，半透明，具纵皱纹及微隆起的环节，有白色圆点状的须根痕和圆盘状茎痕。干者质硬脆，易吸潮复软，易折断，断面角质样或显颗粒性，黄白色或淡棕黄色，可见散列的筋脉小点。气微，味甘，嚼之发粘。

【品质】 本品以条长、肥壮、色黄白、半透明、味甜者为佳。

【性味功效】 甘，微寒。养阴润燥，生津止渴。用于肺胃阴伤，燥热咳嗽，咽干口渴，内热消渴。



【编号】 M02307293282R0CMMI H30337293040002200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

甘松


【来源】 败酱科植物甘松 Nardostachys chinensis Batal. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 根及根茎略呈圆锥状，多弯曲，长5～18 cm。根茎短小，上端有茎叶残基，呈狭长的膜质片状或纤维状。外层黑棕色，内层棕色或黄色。根单一或数条交结，分枝或并列，直径0.3～1 cm。表面棕褐色，皱缩，有细根及须根。质松脆，易折断，断面粗糙，皮部深棕色，常成裂片状，木部黄白色。气特异，味苦而辛，有清凉感。

【品质】 本品以条长、根粗、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、甘，温。理气止痛，开郁醒脾。用于脘腹胀满，食欲不振，呕吐；外治牙痛，脚肿。



【编号】 M02367235001R0CMMI H26797236001000100XZDC

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

甘肃贝母

【来源】 百合科植物甘肃贝母 Fritillaria przewalskii Maxim. 的干燥鳞茎。


【主产地】 主产于甘肃、青海、四川等地。

【性状特征】 鳞茎细小，呈圆锥状、心状至长卵圆状，直径2～4 mm，高2.5～5 mm。表面类白色或淡黄白色，外层两枚鳞叶大小悬殊，紧密抱合，无裂隙。质硬而脆，断面白色，富粉性。味微甜。

【品质】 本品以质坚实、粉性足、色白者为佳。

【性味功效】 苦、甘，微寒。清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。

【附注】 本品作为“川贝母”入药。



【编号】 M02407293136R0CMMI H18017293020001400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

甘草

【来源】 豆科植物甘草 Glycyrrhiza uralensis Fisch. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于内蒙古、甘肃、新疆等地。内蒙古的伊盟、巴盟及甘肃、宁夏的阿拉善旗为其道地产区。

【性状特征】 根呈圆柱状，不分枝，长25～100 cm，直径0.6～3.5 cm。表面红棕色或灰棕色，具显著的纵皱纹、沟纹、皮孔及稀疏的细根痕。外皮松紧不一。质坚实而重，断面略显纤维性，黄白色，粉性，形成层环明显，射线放射状，有的有裂隙。根茎呈圆柱状，表面有芽痕，断面中部有髓。气微，味甜而特异。

【品质】 本品以身干、皮细紧、色红棕、断面色黄白、粉性足者为佳。

【性味功效】 甘，平。补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。



【编号】 M02427148330R0CMMI H18897148072000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

甘遂

【来源】 大戟科植物甘遂 Euphorbia kansui T. N. Liou ex T. P. Wang 的干燥块根。

【主产地】 主产于陕西、河南、山西、宁夏、甘肃等地。

【性状特征】 块根呈椭圆状、长圆柱状或连珠状，长1～5 cm，直径0.5～2.5 cm。表面类白色或黄白色，凹陷处有棕色外皮残留。质脆，易折断，断面粉性，白色，木部微显放射状纹理，长圆柱状者纤维性较强。气微，味微甘而辣。

【品质】 本品以肥大、色白、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有毒。泻水逐饮。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆喘咳，二便不利。



【编号】 M02437136079R0CMMI H16947136033000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

生地黄


【来源】 玄参科植物地黄 Rehmannia glutinosa Libosch. 的干燥块根。

【主产地】 地黄主要为栽培。主产于河南、山东、陕西、河北等地。河南武陟、温县、博爱、修武、沁阳等地为其道地产区。

【性状特征】 块根多呈不规则的团块状或长圆状，中间膨大，两端稍细，有的细小，长条状，稍扁而扭曲，长6～12 cm，直径3～6 cm。表面棕黑色或棕灰色，极皱缩，具不规则的横曲纹。体重，质较软而韧，不易折断，断面棕黑色或乌黑色，有光泽，具黏性。气微，味微甜。

【品质】 本品以块大、体重、断面乌黑者为佳。

【性味功效】 甘，寒。清热凉血，养阴生津。用于热病舌绛烦渴，阴虚内热，骨蒸劳热，内热消渴，吐血，衄血，发斑发疹。



【编号】 M02447252136R0CMMI H32747253044000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

生姜


【来源】 姜科植物姜 Zingiber officinale Rosc. 的鲜根茎。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 新鲜根茎呈不规则块状，略扁，具指状分枝，长4～18 cm，厚1～3 cm。表面黄褐色或灰棕色，有明显的环节，分枝顶端有茎痕或芽。质脆，易折断，断面浅黄色，折断时有液汁渗出，纤维性强，内皮层环纹明显，维管束散在。气香特异，味辛辣。用时切片。

【品质】 本品以个大、分枝少、味辛辣、质嫩者为佳。

【性味功效】 辛，微温。解表散寒，温中止呕，化痰止咳。用于风寒感冒，胃寒呕吐，寒痰咳嗽。



【编号】 M02457290118R1CMMI H41797290023002200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白及

【来源】 兰科植物白及 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f. 的干燥块茎。

【主产地】 主产于贵州、四川、湖南、湖北、安徽、河南、浙江、陕西等地。贵州安龙、兴义、都匀为其道地产区。

【性状特征】 块茎呈不规则扁圆状或菱状，多有2～3个爪状分枝，长1.5～5 cm，厚0.5～1.5 cm。表面灰白色或黄白色，有细皱纹，上面有凸起的茎痕，下面有连接另一块茎的痕迹，以茎痕为中心，有数个棕褐色同心环纹，环上残留棕色点状的须根痕。质坚硬，不易折断，断面类白色，半透明，角质样。气无，味苦，嚼之有黏性。

【品质】 本品以个大、饱满、色白、半透明、质坚实者为佳。

【性味功效】 苦、甘、涩，微寒。收敛止血，消肿生肌。用于咳血吐血，外伤出血，疮疡肿毒，皮肤皲裂，肺结核咳血，溃疡病出血。



【编号】 M02487326010R0CMMI H06447326018000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

白头翁

【来源】 毛茛科植物白头翁 Pulsatilla chinensis (Bge.) Regel 的干燥根。

【主产地】 主产于吉林、黑龙江、辽宁、河北、山东、山西、陕西、江苏、河南、安徽等地。

【性状特征】 根呈类圆柱状或圆锥状，稍扭曲，长6～20 cm，直径0.5～2 cm。表面黄棕色或棕褐色，具不规则纵皱纹或纵沟，皮部易脱落，露出黄色的木部，有的有网状裂纹或裂隙，近根头处常朽蚀成凹洞。根头部稍膨大，有白色绒毛，有的可见鞘状叶柄残基。质硬而脆，断面皮部黄白色或淡黄棕色，木部淡黄色。气微，味微苦涩。

【品质】 本品以条粗长、质坚实者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，凉血止痢。用于热毒血痢，阴痒带下，阿米巴痢。



【编号】 M02517015392R0CMMI H32027015036000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

白术


【来源】 菊科植物白术 Atractylodes macrocephala Koidz. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于浙江、安徽、湖南等地。

【性状特征】 根茎呈不规则的肥厚团块，长3～13 cm，直径1.5～7 cm。表面灰黄色或灰棕色，有瘤状突起及断续的纵皱和沟纹，并有须根痕，顶端有残留的茎基和芽痕。质坚硬，不易折断，断面不平坦，黄白色至淡棕色，有棕黄色的点状油室散在，烘干者断面角质样，色较深，有裂隙。膨大部分的横断面油室较多且明显。气清香，味甘，微辛，嚼之略带黏性。

【品质】 本品以个大、质坚实、断面色黄白、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、甘，温。健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。用于脾虚食少，腹胀泄泻，痰饮眩悸，水肿，自汗，胎动不安。



【编号】 M02527238183R0CMMI H05437239027000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白花前胡

【来源】 伞形科植物白花前胡 Peucedanum praeruptorum Dunn 的干燥根。


【主产地】 主产于浙江、湖南、四川等地。

【性状特征】 根近圆柱状、圆锥状或纺锤状，稍扭曲，下部常有分枝，长 3～15 cm，直径 1～2 cm。根头部多有茎痕及纤维状叶鞘残基，表面黑褐色或灰黄色，上部有密集的细环纹，下部具纵沟、纵皱纹及横向皮孔。质较柔软，干者质硬，可折断，断面不整齐、疏松，淡黄白色，皮部散有多数棕黄色油点，形成层环纹棕色，射线放射状。气芳香，味微苦、辛。

【品质】 本品以身干、条粗壮、质柔软、断面色黄白似菊花心、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛，微寒。散风清热，降气化痰。用于外感风热，肺热痰郁，咳嗽痰多，疾热喘满，咯痰黄稠。

【附注】 本品作为“前胡”入药。



【编号】 M06057213216R0CMMI H28877214060002500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

白附子

【来源】 天南星科植物独角莲 Typhonium giganteum Engl. 的干燥块茎。

【主产地】 主产于河南、甘肃、湖北、山西、四川等地。河南禹县为白附子的道地产区。

【性状特征】 块茎呈椭圆状或卵圆状，长2～5 cm，直径1～3 cm。去净外皮者表面淡黄白色，略粗糙，须根痕形成较规律的环状圈，顶端有圆形下凹的茎痕。未去净外皮者表面粗糙，灰棕色或灰黄色，多皱缩，密生薄膜状鳞叶。质坚硬，断面白色，粉性。气无，味淡，麻辣刺舌。

【品质】 本品以个大、质坚实、色白、粉性足者为佳。

【性味功效】 辛，温；有毒。祛风痰，定惊搐，解毒散结止痛。用于中风痰壅，口眼㖞斜，语言涩謇，痰厥头痛，偏正头痛，喉痹咽痛，破伤风。外治瘰疬痰核，毒蛇咬伤。



【编号】 M02587302108R0CMMI H39967302034000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

白茅根


【来源】 禾本科植物白茅 Imperata cylindrica Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. 的干燥根茎。

【主产地】 全国各地均产。

【性状特征】 根茎呈长圆柱状，通常不分枝，长 30～60 cm，直径 2～4 mm。表面黄白色或淡黄色，微有光泽，具纵皱纹，环节明显，稍突起，节间长短不等，通常 1.5～3 cm，节上可见残留的鳞叶、根及芽痕。体轻，质略脆，断面皮部白色，多有裂隙，放射状排列，中柱淡黄色，易与皮部剥离。气无，味微甜。

【品质】 本品以色白、条粗肥、无须根、味甜者为佳。

【性味功效】 甘，寒。凉血止血，清热利尿。用于血热吐血，衄血，尿血，热病烦渴，黄疸，水肿，热淋涩痛，急性肾炎水肿。



【编号】 M02617332086R0CMMI H21117332123000101CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白药子


【来源】 防己科植物金线吊乌龟 Stephania cepharantha Hayata 的干燥块根。

【主产地】 主产于湖南、浙江等地。

【性状特征】 饮片呈类圆状、长圆状或不规则厚片，直径2～7 cm，厚3～8 mm。切面类白色或灰白色，维管束呈环状、点状或花纹状排列。周边黄褐色或暗褐色，具皱纹及凹下的圆点状须根痕。质硬而脆，易纵向掰开掰断，断面粉性。气微，味苦。

【品质】 本品以片大、断面色白、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦、辛，凉；有小毒。清热解毒，祛风止痛，凉血止血。用于咽喉肿痛，热毒痈肿，风湿痹痛，腹痛，泻痢，吐血，衄血，外伤出血。



【编号】 M02657023032R0CMMI H37757023017000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

白首乌

【来源】 萝藦科植物耳叶牛皮消 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight 的干燥块根。


【主产地】 主产于山东、江苏。

【性状特征】 块根呈圆柱状，稍弯曲，长约10～20 cm，直径2～3 cm。外表黄褐色或红棕色，栓皮粗糙，有明显纵皱纹，皮孔横长突起，栓皮破裂处露出黄白色的木质部。质坚硬，断面淡黄棕色，粉质，有辐射状花纹及鲜黄色孔点。气无，味先苦而后甜。

【品质】 本品以粗壮厚实、断面色黄、粉性足者为佳。

【性味功效】 和性药。养阴补虚，健脾消食。用于虚损劳伤，疳积，胃痛饱胀，白带，疮癣等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M02667231022R0GYCM H12837232013000600GYCM

【鉴定人】 陈德媛

白薇


【来源】 葡萄科植物白薇 Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino 的干燥块根。

【主产地】 主产于河南、安徽、江西、湖北等地。

【性状特征】 块根呈纺锤状，多纵切成两瓣、四瓣或斜片。纵切瓣长4～10 cm，直径1～2 cm，切面周边常向内卷曲，中部有一凸起的棱线，外皮红棕色或红褐色，有纵皱纹、细横纹及横长皮孔，易层层脱落，脱落处呈淡红棕色。体轻，质硬脆，易折断，折断时有粉尘飞出，断面白色或淡红色。气微，味甘。

【品质】 本品以肥大、断面色粉白、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。清热解毒，消痈散结。用于痈疽发背，疔疮，瘰疬，水火烫伤。



【编号】 M02697193015R0CMMI H02667194001000500SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白薇

【来源】 萝藦科植物白薇 Cynanchum atratum Bge. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于安徽、湖北、辽宁等地。

【性状特征】 根茎呈类圆柱状，有结节，多弯曲，长1.5～5 cm，直径0.5～1.2 cm，上面有圆形凹陷的茎痕，下面及两侧簇生多数细长的根，形似马尾状。根呈圆柱状，略弯曲，长5～20 cm，直径1～2 mm，表面黄棕色至棕色，平滑或具细皱纹。质脆，易折断，断面平坦，皮部黄白色，中央木部小，黄色。气微，味微苦。

【品质】 本品以根粗壮、色棕黄、断面色白实心者为佳。

【性味功效】 苦、咸，寒。清热凉血，利尿通淋，解毒疗疮。用于瘟邪伤营发热，阴虚发热，骨蒸劳热，产后血虚发热，热淋，血淋，痈疽肿毒。



【编号】 M02727231021R0CMMI H12827232013000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

石菖蒲

【来源】 天南星科植物石菖蒲 Acorus tatarinowii Schott 的干燥根茎。

【主产地】 主产于四川、浙江、江苏、湖南等地。

【性状特征】 根茎呈扁圆柱状，多弯曲，常有分枝，长3～20 cm，直径0.3～1 cm。表面棕褐色或灰棕色，粗糙，有疏密不匀的环节，节间长2～8 mm，具纵皱纹，残留有须根或圆点状根痕，叶痕呈三角形，左右交互排列，有的其上有毛鳞状的叶基残余。质硬脆，易折断，断面纤维性，类白色或微红色，内皮层环纹明显，可见多数维管束小点及棕色油点。气芳香，味苦、微辛。

【品质】 本品以条粗、断面色类白、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。化湿开胃，开窍豁痰，醒神益智。用于脘痞不饥，噤口下痢，神昏癫痫，健忘耳聋。



【编号】 M02877302006R0CMMI H00897302001000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

辽藁本

【来源】 伞形科植物辽藁本 Ligusticum jeholense Nakai et Kitag. 的干燥根茎及根。


【主产地】 主产于河北、辽宁、山西、内蒙古、山东、吉林等地。

【性状特征】 根茎呈不规则圆柱状或团块状，长2～10 cm，直径0.5～1.5 cm。表面棕褐色，上端有数个丛生的叶基及突起的节，下端有多数细长而弯曲的根，根茎及根均有点状须根痕。体轻，质较硬，易折断，断面黄色或黄白色，纤维状。气浓香，味辛、苦、微麻。

【品质】 本品以身干、整齐、质坚、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、温。祛风，散寒，除湿，止痛。用于风寒感冒，巅顶疼痛，风湿肢节痹痛。

【附注】 本品作为“藁本”入药。



【编号】 M02947213182R0CMMI H23297214052001700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

龙胆

【来源】 龙胆科植物龙胆 Gentiana scabra Bge. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等地。

【性状特征】 根茎多横生，呈不规则块状，长 1～3 cm，直径 3～8 mm，表面暗灰棕色或深棕色，上端有茎痕或残留茎基，周围和下端着生多数细长的根，常多于20条。根呈细长圆柱状，略扭曲，长 10～20 cm，直径 2～5 mm，表面淡黄色或黄棕色，上部多有显著的横皱纹，下部较细，有纵皱纹及须根痕。质脆，易折断，断面略平坦，皮部黄白色或淡黄棕色，木部色较浅，呈点状环列，易吸潮变软。气微，味极苦。

【品质】 本品以条粗长、色黄棕，味苦者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿，泻肝胆火。用于湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，强中，湿疹瘙痒，目赤，耳聋，胁痛，口苦，惊风抽搐。



【编号】 M02997239047R0CMMI H18447240007018600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

仰天钟

【来源】 野牡丹科植物朝天罐 Osbeckia crinita Benth. ex C. B. Clarke 的干燥根。


【主产地】 主产于广东、广西、贵州。

【性状特征】 根头部常膨大呈块状，顶端有茎痕或茎基。根呈长圆锥状或近圆柱状，弯曲，棕色，有皱纹及细裂纹，外皮易脱落。质硬，不易折断，断面白色或浅灰白色，粗糙，可见 2 ～ 3 条棕色环纹。

【品质】 本品以粗壮、不带须根、质硬者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。补肺益肾，止咳止血。治肺痨咳嗽吐血，痢疾等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M03057120033R0GYCM H27597120012000300GYCM

【鉴定人】 陈德媛

伊贝母

【来源】 百合科植物伊犁贝母 Fritillaria pallidiflora Schrenk 的干燥鳞茎。


【主产地】 主产于新疆。

【性状特征】 鳞茎呈圆锥状或卵状圆锥形，较大，高 0.8～1.8 cm，直径 1～2.3 cm。表面淡黄色或类白色，稍粗糙，有时可见黄棕色斑点或斑块，外层两枚鳞叶心脏形或新月形，肥厚，近等大或一片较大，抱合，顶端稍尖，少有开裂，基部微凹陷。质坚而脆，断面白色，粉性。气微，味微苦。

【品质】 本品以质坚实、粉性足、味苦者为佳。

【性味功效】 苦、甘，微寒。清热润肺，化痰止咳。用于肺热咳嗽，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。

【附注】 伊贝母在新疆有较长的药用历史。



【编号】 M03067293133R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

光果甘草

【来源】 豆科植物光果甘草 Glycyrrhiza glabra L. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于新疆。

【性状特征】 根呈长圆柱状，长 30～100 cm，直径 0.6～3.5 cm。表面灰棕色或灰褐色，皮孔横长或呈点状突起，横切面形成层环及纤维束淡棕色。质较坚实，断面纤维性，裂隙较少，粉性小。根茎节处有芽痕，中央有髓，粗根茎髓呈棕色或颓废呈空洞。气微，味甜。

【品质】 本品以身干、皮细而紧、质坚、体重者为佳。

【性味功效】 甘，平。补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

【附注】 本品作为“甘草”入药。



【编号】 M03097148326R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

光慈姑


【来源】 百合科植物老鸦瓣 Tulipa edulis (Miq.) Baker 的干燥鳞茎。

【主产地】 主产于安徽、河南、山东、江苏等地。

【性状特征】 鳞茎呈卵形圆锥状，顶端渐尖，基部圆平，中央凹入，高 1～2 cm，直径 0.5～1 cm。表面类白色或黄白色，光滑，一侧有纵沟，自基部伸向先端。质硬而脆，断面白色，粉质，内有一圆锥形心芽。气微，味淡。

【品质】 本品以质硬、色白、粉性足者为佳。

【性味功效】 甘、辛，寒；有小毒。清热解毒，散结消肿。用于咽喉肿痛，瘰疬结核，瘀滞疼痛，痈疖肿毒，蛇虫咬伤。



【编号】 M03107293357R0CMMI H39797293055000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

兴安升麻

【来源】 毛茛科植物兴安升麻 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. 的干燥根茎。


【主产地】 主产于黑龙江、河北、山西、内蒙古等地。

【性状特征】 根茎与大三叶升麻极为相似，但多分枝，多结节，多空洞窟窿，长 6～15 cm，直径 1.5～2 cm。表面棕褐色至黑褐色，上有数个圆洞状茎基，洞内壁显纵向或网状沟纹，下有坚硬的细根或残基。质坚而轻，断面极不平坦，木质部纤维性，黄绿色，具裂隙。气微，味较苦。

【品质】 本品以肥大、外皮色黑褐、无须根、断面色微绿者为佳。

【性味功效】 辛、微甘，微寒。发表透疹，清热解毒，升举阳气。用于风热头痛，齿痛，口疮，咽喉肿痛，麻疹不透，阳毒发斑；脱肛，子宫脱垂。

【附注】 本品作为“升麻”入药。



【编号】 M01387015191R0CMMI H09617015015000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

华东蓝刺头

【来源】 菊科植物华东蓝刺头 Echinops grijisii Hance 的干燥根。

【主产地】 主产于江苏、浙江、江西、安徽等地。

【性状特征】 根圆柱状，根头较膨大，通常不分枝，长10～30 cm，直径0.5～1.5 cm。表面黄棕色，具扭曲的纵皱纹，近根头部有细密的横环纹，顶端有较长而密集的纤维状棕色硬毛。质硬，不易折断，断面纤维状，皮部褐色，木质部显黄黑相间的花纹。气微，味微涩。

【品质】 本品以枝条粗长、表面色土棕、质坚实、长短整齐者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，排脓止血，消痈下乳。用于诸疮痈肿，乳痈肿痛，乳汁不通，瘰疬疮毒。

【附注】 本品作为“禹州漏芦”入药。



【编号】 M06577238316R0CMMI H15287239084000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

华重楼

【来源】 百合科植物华重楼 Paris polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara的干燥根茎。


【主产地】 主产于江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广东、广西、福建、贵州等地。

【性状特征】 根茎呈结节状扁圆柱形或半圆柱形，略弯曲，长2～12 cm，直径1～3 cm。表面黄棕色或棕褐色，具斜向环节，全体有粗环纹密生，上侧有半圆形或椭圆形凹陷的茎痕，下侧有稀疏的须根或残留的须根痕，顶端膨大具凹陷的茎残基及鳞叶。质坚实，易折断，断面平坦，白色至浅黄棕色，角质。气微，无臭，味微苦、麻。

【品质】 本品以身干、条粗大、质坚实、断面色白、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦，微寒；有小毒。清热解毒，消肿止痛，凉肝定惊。用于疔疮痈肿，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，跌扑伤痛，惊风抽搐。

【附注】 本品作为“重楼”入药。



【编号】 M06927293249R0CMMI H28217293037000303CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

地榆


【来源】 蔷薇科植物地榆 Sanguisorba officinalis L. 的干燥根。

【主产地】 主产于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西、陕西、河南、甘肃、山东、贵州等地。

【性状特征】 根呈圆柱状，稍弯曲或扭曲，长5～25 cm，直径0.5～2 cm。表面灰褐色、棕褐色或暗紫色，粗糙，有纵皱纹、横裂纹及支根痕。质硬，断面较平坦，皮部有众多黄白色至黄棕色绵状纤维，木部黄色或黄褐色，略呈放射状排列。气微，味微苦涩。

【品质】 本品以条粗、质硬、断面色红者为佳。

【性味功效】 苦、酸、涩，微寒。凉血止血，解毒敛疮。用于便血，痔血，血痢，崩漏，水火烫伤，痈肿疮毒。



【编号】 M03267143369R0CMMI H34697143045000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

多刺天冬


【来源】 百合科植物多刺天门冬Asparagus myriacanthus Wang et S. C. Chen 的干燥块根。

【主产地】 主产于西藏、云南等地。

【性状特征】 块根中部膨大，呈纺锤状，簇生，长6～12 cm，直径1～2 cm。表面黄白色至棕黄色，半透明，光滑或具深浅不等的纵皱纹，偶有残存的灰棕色外皮。质硬或柔润，有黏性，断面角质样。气微，味甜、微苦。

【品质】 本品以致密、色黄白、半透明者为佳。

【性味功效】 甘、苦，寒。养阴润燥，清肺生津。用于肺燥干咳，顿咳痰黏，咽干口渴，肠燥便秘。



【编号】 M01467293055R0XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

延胡索

【来源】 罂粟科植物延胡索Corydalis yanhusuo W. T. Wang 的干燥块茎。

【主产地】 主产于浙江、湖北、湖南、江苏等地。

【性状特征】 块茎呈不规则的扁球状，直径0.5～1.5 cm。表面黄色或黄褐色，有不规则网状皱纹，底部微凹处有茎痕或根痕，其周围有数个小突起，上部或侧面有数个大小不一的疙瘩状侧块茎，块茎上部中央凹陷处有茎痕及芽，有的块茎成“分瓣”状。质硬而脆，难折断，断面黄色，角质样，有蜡样光泽。气微，味苦。

【品质】 本品以个大、饱满、质坚实、断面色黄者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。活血，利气，止痛。用于胸胁、脘腹疼痛，经闭痛经，产后瘀阻，跌扑肿痛。



【编号】 M03337032104R0CMMI H11777032004002700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

异叶天南星

【来源】 天南星科植物异叶天南星 Arisaema heterophyllum Bl. 的干燥块茎。

【主产地】 主产于湖北、湖南、四川、贵州、河南、安徽、江苏、浙江、江西等地。

【性状特征】 块茎呈稍扁的圆球状，高1～2 cm，直径1.5～4 cm。中心茎痕深陷，周围有一圈1～3列显著的根痕，周边偶有少数微凸起的小侧芽，有时已磨平。质坚硬，不易破碎，断面不平坦，白色，粉性。气微辛，味麻辣。

【品质】 本品以个大、色白、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温；有毒。燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。用于顽痰咳嗽，风痰眩晕，中风痰壅，口眼㖞斜，半身不遂，癫痫，惊风，破伤风。生用外治痈肿，蛇虫咬伤。

【附注】 本品作为“天南星”入药。



【编号】 M03347302041R0CMMI H03857302008003900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

当归


【来源】 伞形科植物当归 Angelica sinensis (Oliv.) Diels 的干燥根。

【主产地】 主产于甘肃、云南等地。

【性状特征】 根略呈圆柱状，长 15～25 cm，表面黄棕色至棕褐色，具纵皱纹及横长皮孔。根头略膨大，直径 1.5～4 cm，具环纹，上端圆钝，有紫色或黄绿色的茎及叶鞘残基。主根表面凹凸不平，下部有支根 3～5 条或更多，支根直径 0.3～1 cm，上粗下细，多扭曲，有少数须根痕。质柔韧，断面黄白色或淡黄棕色，皮部厚，有裂隙及多数棕色油点，木部色较淡，形成层环棕色。有浓郁的香气，味甘、辛，微苦。

【品质】 本品以主根粗长、油润、外皮色黄棕、断面色黄白、气浓香、味甜者为佳。

【性味功效】 甘、辛，温。补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。



【编号】 M03357213033R0CMMI H03137214005003200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

朱砂根

【来源】 紫金牛科植物朱砂根 Ardisia crenata Sims 的干燥根。

【主产地】 主产于浙江、安徽、湖南等地。

【性状特征】 根茎略膨大。根丛生，多为 8 条支根组成。支根略呈纺锤状，稍弯曲，长短不一，直径 3～10 mm，表面暗棕色或暗褐色，具纵皱纹及横向断裂痕。质硬而脆，易折断，断面皮部易与木部分离，皮部约占断面 1/2～1/3，类白色或粉红色，有散在的紫色“朱砂点”，木部淡黄色。气微，味微苦辛。

【品质】 本品以粗壮、干燥、断面“朱砂点”多者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。消炎止痛，活血散瘀，祛风除湿。用于咽喉肿痛，跌扑损伤等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M03387223012R0GYCM H03597224002001600GYCM

【鉴定人】 何顺志

朱砂莲

【来源】 马兜铃科植物四川朱砂莲 Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu 的干燥块根。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 块根不规则结节状，长 6～18 cm，直径 3～8 cm。表面棕黄色至棕红色，具不规则瘤状突起和深皱纹，外皮破裂处呈红棕色。体重，质坚，断面棕色或红棕色，角质样。气微闷臭，味极苦。

【性味功效】 苦、辛，寒。清热解毒，理气止痛。用于痈疡肿毒，暑邪痧气，腹泻痢疾，胸腹疼痛，牙痛，喉痛，吐血，蛇伤。



【编号】 M03397024007FHCMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

百合


【来源】 百合科植物百合 Lilium brownii F.E.Brown var. viridulum Baker 的干燥肉质鳞叶。

【主产地】 主产于湖南、浙江、江苏、陕西、四川、安徽等地。以湖南产品质最好。

【性状特征】 肉质鳞叶呈长椭圆状，长1.5～3 cm，宽0.5～1 cm，中部厚约至4 mm。表面类白色、棕色、淡黄色或微带紫色，有脉纹3～5条，有的不明显。顶端稍尖，基部较宽，边缘薄，微波状，常向内卷曲。质硬而脆，易折断，断面较平坦，角质样。无臭，味微苦。

【品质】 本品以肉厚、质硬、色白者为佳。

【性味功效】 甘，寒。养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠，多梦，精神恍惚。



【编号】 M03427293182R0CMMI H23437293028000401CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

百部


【来源】 百部科植物蔓生百部 Stemona japonica (Bl.) Miq. 的干燥块根。

【主产地】 主产于浙江。总生物碱含量以浙江杭州产者最高。

【性状特征】 块根呈纺锤状，两端稍狭细，长8～24 cm，直径约1 cm。表面黄白色或淡棕黄色，多有不规则皱褶及横皱纹。质脆，易折断，断面平坦，角质样，淡黄棕色或黄白色，皮部较宽，中柱扁缩。气微，味甘、苦。

【品质】 本品以条粗壮、质坚实者为佳。

【性味功效】 甘、苦，微温。润肺下气止咳，杀虫，灭虱。用于新久咳嗽，肺结核咳嗽，百日咳；外用于蛲虫病，阴痒，头、体虱。



【编号】 M03477310002R0CMMI H37687310002000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

祁白芷

【来源】 伞形科植物白芷 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 的干燥根。


【主产地】 主产于河北。

【性状特征】 根呈圆锥状，长7～24 cm，直径1.5～2 cm。表面灰黄色至黄棕色，光滑，有支根痕，皮孔样横向突起散生，顶端有凹陷的茎芽。质硬略轻，断面灰白色，显粉性，皮部散有多数棕色油点。形成层环圆形，棕色。气芳香，味辛、微苦。

【品质】 本品以独支、条粗壮、质硬、粉性、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 辛、温。散风除湿，通窍止痛，消肿排脓。用于感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞，鼻渊，牙痛，白带，疮疡肿毒。

【附注】 本品作为“白芷”入药。



【编号】 M03497213015R0CMMI H03037214005000700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

祁州漏芦

【来源】 菊科植物祁州漏芦 Rhaponticum uniflorum (L.) DC. 的干燥根。


【主产地】 主产于河北、辽宁、山西。河北产量最大。

【性状特征】 根圆锥状或扁片块状，多扭曲，长短不一，直径1～2.5 cm。表面暗棕色、灰褐色或黑褐色，粗糙，具不规则的纵沟及菱形的网状裂隙。外层易脱落，根头部膨大，有残基及鳞片状叶基，顶端有灰白色绒毛。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，灰黄色，有裂隙，中心有的呈星状裂隙，灰黑色或棕黑色。气特异，味微苦。

【品质】 本品以条粗、色棕褐、质坚实、不碎裂者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，消痈，下乳，舒筋通脉。用于乳痈肿痛，痈疽发背，瘰疬疮毒，乳汁不通，温痹拘挛。

【附注】 本品作为“漏芦”入药。



【编号】 M09867238516R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

竹叶椒根

【来源】 芸香科植物竹叶椒 Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc. 的干燥根。


【主产地】 主产于四川、贵州、云南、广西等地。

【性状特征】 根呈圆柱状，略弯曲，长5～20 cm，直径0.3～2 cm，表面黄棕色，粗糙，有纵向不规则沟纹，木栓层易脱落，质坚硬，不易折断，断面纤维性，木部黄色，皮部黄棕色。气微，味微苦而麻。

【品质】 本品以粗壮、坚硬、色黄、口尝麻辣者为佳。

【性味功效】 辛，温。 祛风止痛，镇咳止血。用于虫牙痛，风湿痛，咳嗽，顽癣等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M03517194117R0GYCM H41667195029001000GYCM

【鉴定人】 陈谦海

竹节参


【来源】 五加科植物竹节参 Panax japonicus C.A.Mey. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于云南、四川、贵州等地。

【性状特征】 根茎呈竹鞭状、扁圆柱状，稍弯曲，有的具肉质侧根，长5～22 cm，直径0.8～2.5 cm。表面黄色、黄褐色或灰棕色，粗糙，有致密的纵皱纹和根痕。节明显，密集，节间长0.8～2 cm，每节上方有一圆形凹陷的茎痕。质硬脆，易折断，断面黄白色至淡黄棕色，上有排列成环的黄白点状维管束。无臭，气微香，味苦、后微甜。

【品质】 本品以条粗、质硬、断面色黄者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，温。滋补强壮，散瘀止痛，止血祛痰，健胃。用于病后虚弱，咳嗽痰多，肺结核咯血，吐血，跌扑损伤，支气管炎，消化不良。



【编号】 M03527212067FHCMMI H28047213016000200JXCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

红大戟

【来源】 茜草科植物红大戟 Knoxia valerianoides Thorel et Pitard. 的干燥块根。

【主产地】 主产于广西、云南、广东、贵州等地。

【性状特征】 块根稍呈纺锤状，偶有分枝，略弯曲，长3～12 cm，直径0.4～1.2 cm。表面红棕色、红褐色或灰棕色，粗糙，有扭曲的纵沟纹，顶端可见茎痕。质坚实而易折断，断面皮部红褐色或红棕色，木部棕黄色，遇水显黏性。无臭，味甘、微辛，有刺喉感。

【品质】 本品以根长饱满、色红褐、质坚者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有小毒。泻水逐饮，攻毒消肿散结。用于胸水，腹水，二便不利，痈肿疮毒，瘰疬痰核。



【编号】 M03567232098R0CMMI H22127233035000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

红芪

【来源】 豆科植物多序岩黄芪 Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz. 的干燥根。

【主产地】 主产于甘肃、四川。

【性状特征】 根呈圆柱状，少分枝，上端略粗，长10～50 cm，直径0.6～2 cm。表面灰红棕色，上具纵皱纹、少量支根痕及横长皮孔，外皮易脱落，露出处淡黄色。质坚硬而韧，难折断，断面纤维性，色浅，富粉性，皮部黄白色，木部淡黄棕色，射线放射状，形成层环浅棕色。气微而特异，味微甜，嚼之有豆腥味。

【品质】 本品以粉性大、味甘者为佳。

【性味功效】 甘，微温。补气固表，利尿托毒，排脓，敛疮生肌。用于气虚乏力，食少便溏，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，痈疽难溃，血虚萎黄，内热消渴；慢性肾炎蛋白尿，糖尿病。



【编号】 M03607148351R0CMMI H19687148077000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

红参


【来源】 五加科植物人参Panax ginseng C. A. Mey. 的栽培品经蒸制后的干燥根。

【主产地】 主产于吉林省抚松、辑安、靖宇、敦化、安图。

【性状特征】 根呈圆柱状或纺锤状，长3～20 cm，直径0.7～2 cm。表面红棕色或淡棕色，半透明，有光泽，具纵沟、皱纹及细根痕，偶有不透明的暗黄褐色斑块；上部有断续的不明显环纹，下部有2～3条扭曲交叉的支根，并带弯曲的须根或须根残痕。顶端根茎（芦头）土黄色，长1～2 cm，上有数个碗状茎痕（芦碗），有的带有1～2条完整或折断的不定根。质硬而脆，断面平坦，棕红色，角质样，中有浅色圆心。气微香而特异，味甘、微苦。

【品质】 本品以身长、支大、芦（根茎）长者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，温。大补元气，复脉固脱，益气摄血。用于体虚欲脱，脉微肢冷，气不摄血，崩漏下血；心力衰竭，心源性休克。



【编号】 M03637212066RPCMMI H28027213016000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

羊角参

【来源】 百合科植物轮叶黄精 Polygonatum verticillatum (L.) All. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于新疆。

【性状特征】 根茎横走，肉质肥厚，呈羊角状分枝，分枝基部稍膨大，上部细尖，长 3～7 cm，直径 3～5 mm。表面黄白色或淡黄色，有明显的纵皱纹与大小不等的茎痕及根痕。质较软，断面淡黄白色或类白色。气无、味微苦。

【性味功效】 甘、微苦，凉。补脾润肺，养肝，解毒消痈。用于脾胃虚弱，阴虚肺燥，咳嗽咽干，肝阳上亢，头晕目眩，疮痈肿痛。



【编号】 M03707293290FHCMMI H30387293040003000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

西洋参

【来源】 五加科植物西洋参 Panax quinquefolium L. 的干燥根。

【主产地】 主产于美国及加拿大，以美国威斯康辛州产者最为著名。我国引种西洋参主产区在华北、东北等地。

【性状特征】 根呈圆柱状或短圆柱状，下部为分歧状支根，无支根者则呈圆锥状或纺锤状，长 1.5～12 cm，直径 0.5～3 cm。表面淡黄褐色或淡黄色，可见横向环纹及线状皮孔，另具细密浅纵皱纹及须根痕。体重，质坚硬，难折断，断面淡黄色，平坦，有棕色或棕黄色环，略显粉性，皮部有黄棕色或橙红色点状树脂道及放射状裂隙。微具特异香气，味微苦、甘。

【品质】 本品以条匀、横纹紧密、体轻质硬、气香味浓者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，凉。补气养阴，清热生津。用于气虚阴亏火旺，咳嗽痰血，虚热烦倦，消渴，口燥咽干。



【编号】 M03877212073R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

西藏胡黄连

【来源】 玄参科植物西藏胡黄连 Picrorhiza scrophulariiflora Pennell 的干燥根茎。

【主产地】 主产于西藏、云南。

【性状特征】 根茎圆柱状，略弯曲，偶有分枝，长 3～12 cm，直径 0.3～1 cm。表面灰棕色至暗棕色，粗糙，有较密的环状节，具稍隆起的芽痕或根痕，上端密被暗棕色鳞片状的叶柄残基。体轻，质硬而脆，易折断，断面略平坦，淡棕色或暗棕色，木部有 4～10 个排列成环的类白色点状维管束。气微，味极苦。

【品质】 本品以条粗、质脆、苦味浓者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清湿热，除骨蒸，消疳热。用于湿热泻痢，黄疸，痔疾，骨蒸潮热，小儿疳热。



【编号】 M06717252133R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

防风


【来源】 伞形科植物防风 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. 的干燥根。

【主产地】 主产于黑龙江、吉林、辽宁等地。以黑龙江产者质量佳。

【性状特征】 根呈长圆锥状或长圆柱状，下端渐细，有的稍弯曲，长 15～30 cm，直径 0.5～2 cm。表面灰棕色或棕色，粗糙，有纵皱纹、多数横长皮孔及点状突起的细根痕。根头部有明显密集的环纹，有的环纹上残存棕褐色毛状叶基。体轻，质松，易折断，断面不平坦，皮部浅棕色或棕黄色，有裂隙，散生黄棕色油点，木部浅黄色，占根的绝大部分。气特异，味微甘。

【品质】 本品以条粗壮、外皮细而紧、断面皮部色浅棕、木部色浅黄者为佳。

【性味功效】 辛、甘，温。解表祛风，胜湿止痛，解痉止痒。用于外感风寒，头痛耳痛，风湿痹痛，关节酸痛，风疹瘙痒，疮疡初起，破伤风。



【编号】 M03907213258R0CMMI H34857214075000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

两头尖

【来源】 毛茛科植物多被银莲花 Anemone raddeana Regel 的干燥根茎。

【主产地】 主产于吉林、山东。

【性状特征】 根茎类长纺锤状，两端尖细，微弯曲，其中近一端处较膨大，长 1～3 cm，直径 2～7 mm。表面棕褐色至棕黑色，有微细纵皱纹，膨大部位常有 1～3 个呈鱼鳍状突起的支根痕，偶见不明显 3～5 环节。质硬脆，易折断，断面略平坦，类白色或灰褐色，略角质样。气微，无臭，味先淡后微苦而麻辣。

【品质】 本品以质硬、断面色类白者为佳。

【性味功效】 辛，热；有毒。祛风湿，消痈肿。用于风寒湿痹，四肢拘挛，骨节疼痛，痈肿溃烂。



【编号】 M03927015157R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

两面针


【来源】 芸香科植物两面针 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC. 的干燥根。

【主产地】 主产于福建、湖南、广西、广东、云南、台湾等地。

【性状特征】 根圆柱状，稍弯曲，长 2～20 cm，直径 0.5～6 cm。表面深黄棕色至浅棕色，具粗纵皱纹，有时具横向裂隙，皮孔突起，类圆形，鲜黄色或黄褐色。横断面栓皮薄，皮部浅棕色，有稍具光泽的深黄色斑点，木部灰黄色，可见同心性环纹及密集的小孔。商品多切成不规则的块或段。质坚硬，气微香，味辛辣、麻舌而苦。

【品质】 本品以根皮厚、气味浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛，平；有小毒。行气止痛，活血化瘀，祛风通络。用于气滞血瘀引起的跌扑损伤，风湿痹痛，胃痛，牙痛，毒蛇咬伤；外治汤火烫伤。



【编号】 M03937194134R0CMMI H41657195029000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

何首乌


【来源】 蓼科植物何首乌Polygonum multiflorum Thunb. 的干燥块根。

【主产地】 主产于河南、湖北、广西、广东、贵州、四川、江苏等地。

【性状特征】 块根团块状或不规则纺锤状，长6～15 cm，直径4～12 cm。表面红棕色或红褐色，皱缩不平，有浅沟，有横长皮孔及细根痕。体重，质坚实，不易折断，断面浅黄棕色或浅红棕色，粉性，皮部有4～11个类圆形异型维管束环列，形成云锦状花纹，木部较大，有的呈木心。气微，味微苦而甘涩。

【品质】 本品以体重、质坚实、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦、甘、涩，温。解毒，消痈，润肠通便。用于瘰疬疮痈，风疹瘙痒，肠燥便秘，高血脂。



【编号】 M03957057062R0CMMI H30647057010001500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

坚龙胆

【来源】 龙胆科植物坚龙胆 Gentiana rigescens Franch.的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于云南、四川、贵州等地。

【性状特征】 根茎极短，结节状，上有多个圆柱形残茎，基部可见残存的鳞叶，下有4～30余条根，根细长纺锤状，长可达20 cm，直径1～4 mm，略弯曲。根表面淡棕色或深棕色，无横皱纹，外皮膜质，易脱落。质硬脆，断面近平坦，木部黄白色，易与皮部分离。气微，味极苦。

【品质】 本品以条粗长、质柔、色黄或黄棕、味极苦者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿，泻肝胆火。用于湿热黄疸，小便淋痛，阴肿阴痒，湿热带下，湿疹瘙痒，强中，目赤，耳聋，胁痛，口苦，惊风抽搐。

【附注】 本品作为“龙胆”入药。



【编号】 M04047239042R0CMMI H18417240007018000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

抚芎

【来源】 伞形科植物抚芎 Ligusticum chungxiong Hort. cv. Fuxiong的干燥根茎。


【主产地】 主产于江西武宁、瑞昌等地。

【性状特征】 根茎呈不规则结节状团块，直径1.5～7 cm。表面灰黄褐色至黄褐色，粗糙皱缩，带有多数须根痕，并有数个瘤状突起，顶部中央有突起的圆形茎痕不凹陷。质坚实，不易折断，断面不整齐，黄白色或灰黄色，可见波状环纹或不规则多角形的纹理。有特异香气，味苦辛。

【品质】 本品以个大、坚实、饱满、香气浓、油性大者为佳。

【性味功效】 辛，温。活血行气，祛风止痛。用于头痛，胸胁痛，经闭腹痛，风湿痛，跌扑损伤。

【附注】 本品为正品川芎 Liguisticum chungxiong Hort. 的栽培变种，在一些地区与川芎同等入药用，但习惯认为其质量不如正品川芎好。



【编号】 M04107213177R0CMMI H23267214052003100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

条叶龙胆

【来源】 龙胆科植物条叶龙胆 Gentiana manshurica Kitag. 的干燥根及根茎。


【主产地】 主产于江苏、浙江、安徽等地。

【性状特征】 根茎多直生，呈块状或长块状，长0.5～1.5 cm，直径4～7 mm，表面暗灰棕色或深棕色，下面丛生多数细长的根，常少于10条。根呈细长圆柱状，略扭曲，长约15 cm，直径2～4 mm，表面黄棕色或灰棕色，有扭曲的纵皱纹，上部细密横纹明显，并有少数突起的支根痕。质脆，易折断，断面略平坦，皮部黄白色或淡黄棕色，木部色较浅，呈点状环列，易吸潮变软。气微，味极苦。

【品质】 本品以条粗长、色黄棕、味苦者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿，泻肝胆火。用于湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，强中，湿疹瘙痒，目赤，耳聋，胁痛，口苦，惊风抽搐。

【附注】 本品作为“龙胆”入药。



【编号】 M02987239029R0CMMI H18377240007012800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

羌活

【来源】 伞形科植物羌活 Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎及根。

【主产地】 主产于四川阿坝藏族自治州小金、松潘、黑水，云南丽江地区腾冲等地的称川羌；主产于西北地区甘肃的天祝、岷县，青海的海北、黄南等地的称西羌。川羌中多为蚕羌，西羌中多为大头羌、竹节羌、条羌。

【性状特征】 根茎圆柱状，略弯曲，长3～13 cm，直径0.6～2.5 cm，顶端具茎痕。表面棕褐色至黑褐色，外皮脱落处黄色。节间缩短，呈紧密隆起的环状，形似蚕，习称“蚕羌”；或节间延长，形如竹节状，习称“竹节羌”。节上具多数点状或瘤状突起的根痕及棕色破碎鳞片。体轻，质脆，易折断，断面不平整，具多数裂隙，皮部黄棕色至暗棕色，油润，有棕色油点，木部黄白色，射线明显，髓部黄棕色。气香，味微苦而辛。

【品质】 本品以条粗壮、有横节如蚕形、表面色棕、断面质紧密、朱砂点多、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 辛、苦，湿。散寒，祛风，除湿，止痛。用于风寒感冒头痛，风湿痹痛，肩背酸痛。



【编号】 M04277213193R0CMMI H27057214056000200SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

芦根

【来源】 禾本科植物芦苇 Phragmites communis Trin. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于安徽、江苏、浙江、湖北等地。

【性状特征】 根茎呈扁圆柱状。表面黄白色，有光泽，外皮疏松可剥离。节处较硬，红黄色，节间有纵皱纹。质轻而柔韧。无臭，味微甘。

【品质】 本品以条粗均匀、色黄白、有光泽、无须根者为佳。

【性味功效】 甘，寒。清热生津，除烦，止呕，利尿。用于热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽，肺痈吐脓，热淋涩痛。



【编号】 M04297332118R0CMMI H29147332175000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

芫花叶白前

【来源】 萝藦科植物芫花叶白前Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz. 的干燥根茎及根。

【主产地】 主产于浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西等地。

【性状特征】 根茎斜生呈圆柱状，表面灰绿色或灰黄色，节明显，节间长1～2 cm。质较柳叶白前坚硬，折断面无髓腔或较小。根细长，稍弯曲，长5～15 cm，直径约1 mm，表面黄棕色或灰棕色，质轻而脆，易折断，断面平坦，白色至黄白色。气微，味微甜。

【品质】 本品以根茎粗壮、须根长者为佳。

【性味功效】 辛、苦，微温。降气，消痰，止咳。用于肺气壅实，咳嗽痰多，胸满喘急。

【附注】 本品作为“白前”入药。



【编号】 M02637231030R0CMMI H12897232013002000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

苎麻根

【来源】 荨麻科植物苎麻 Boehmeria nivea（L.）Gaud. 的干燥根和根茎。

【主产地】 主产于浙江、江苏、安徽等地。

【性状特征】 根茎不规则圆柱状，略弯曲，长4～30 cm，直径0.4～5 cm。表面灰棕色，有纵纹及多数皮孔，并有多数疣状突起及残留须根。质坚硬，不易折断，断面纤维性，皮部棕色，木部淡棕色，有的中间有数个同心环纹，中央有髓部或中空。根略呈纺锤状，长约10 cm，直径1～1.3 cm；表面灰棕色，有纵皱纹及横长皮孔；断面粉性。气微，味淡，有黏性。

【品质】 本品以色灰棕、无空心者为佳。

【性味功效】 甘，寒。凉血止血，清热安胎，利尿，解毒。用于血热妄行所致的咯血，吐血，衄血，血淋，便血，崩漏，紫癜，胎动不安，胎漏下血，小便淋沥，痈疮肿毒，虫蛇咬伤。



【编号】 M04397169008R0CMMI H06597169002000700SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

赤地利

【来源】 蓼科植物金荞麦 Fagopyrum cymosum (Trev.) Meisn 的干燥根。


【主产地】 主产于河南、安徽、江苏等地。

【性状特征】 根呈不规则块状，常具瘤状突起或分枝，直径1～4 cm。表面灰褐色，有环节及纵皱纹，并密布点状皮孔，有凹陷的圆形根痕及须根残余。瘤状分枝顶端棕色。断面黄色或棕黄色，有放射状纹理，中央有髓。气微，味微涩。

【品质】 本品以粗壮、无须根、断面色黄者为佳。

【性味功效】 用于消化不良，小儿流涎等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M05727057006R0GYCM H17307057005000300GYCM

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

赤芍


【来源】 毛茛科植物赤芍 Paeonia lactiflora Pall. 的干燥根。

【主产地】 主产于内蒙古、辽宁、河北、黑龙江、吉林等地。

【性状特征】 根圆柱状，稍弯曲，长5～40 cm，直径0.5～3 cm。表面棕褐色，粗糙，有纵沟及皱沟，并有须根痕及横向凸起的皮孔，有的外皮易脱落。质硬而脆，易折断，断面粉白色或粉红色，皮部窄，木部放射状纹理明显，有的有裂隙。气微香，味微苦、酸涩。

【品质】 本品以条粗长、断面色粉白、粉性大者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。清热凉血，散瘀止痛。用于湿毒发斑，吐血衄血，目赤肿痛，肝郁胁痛，经闭痛经，癥瘕腹痛，跌扑损伤，痈肿疮疡。



【编号】 M04527015376R1CMMI H27947015034000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

远志

【来源】 远志科植物远志 Polygala tenuifolia Willd. 的干燥根。

【主产地】 主产于山西、陕西、吉林、河南等地。

【性状特征】 根圆柱状，略弯曲，长3～15 cm，直径3～8 mm。表面灰黄色至灰棕色，有较密并深陷的横皱纹、纵皱纹及裂纹，老根的横皱纹较密更深陷，略呈结节状。质硬而脆，易折断，断面皮部棕黄色，木部黄白色，皮部易与木部剥离。气微，味苦、微辛，嚼之有刺喉感。

【品质】 本品以粗壮、皮细、肉厚、去净木心者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温。安神益智，祛痰，消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦，健忘惊悸，神志恍惚，咳痰不爽，疮疡肿毒，乳房肿痛。



【编号】 M04597042024R0CMMI H30257042002000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

附子


【来源】 毛茛科植物乌头Aconitum carmichaeli Debx.(栽培品)去除须根的侧根（盐附子）。

【主产地】 主产于四川、陕西。

【性状特征】 盐附子圆锥状，长4～7 cm，直径3～5 cm。表面灰黑色，被盐霜，顶端有凹陷的茎痕，周围有瘤状突起的支根或支根痕。体重，横切面灰褐色，可见充满盐霜的小空隙及多角形的形成层环纹，环纹内侧导管束排列不整齐。气微，味咸而麻，刺舌。

【品质】 本品以个大、质坚实、色灰黑、表面光滑者为佳。

【性味功效】 辛、甘，大热；有毒。回阳救逆，逐风寒湿邪。用于亡阳虚脱，肢冷脉微，阳萎，宫冷，心腹冷痛，虚寒吐泻，阴寒水肿，阳虚外感，寒湿痹痛。



【编号】 M04657015021R1CMMI H00577015001002500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鸡爪大黄

【来源】 蓼科植物唐古特大黄Rheum tanguticum Maxim. ex Balf. 的干燥根及根茎。


【主产地】 主产于青海、甘肃、西藏、四川等地。

【性状特征】 根和根茎呈圆锥状、纺锤状、尖圆柱状，长3～17 cm，直径5～11 cm。其性状特征与马蹄大黄极为相似，其锦纹不明显，根茎近顶端横切面星点1～2环，其下为1环，渐成散在。韧皮部黏液腔排列成环。

【品质】 本品以外表色黄棕、星点明显、体重、质坚实、气清香、味苦而微涩、嚼之粘牙者为佳。

【性味功效】 苦、寒。泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽肿，肠痈腹痛，痈肿疔疮，瘀血经闭，跌扑损伤；外治水火烫伤，上消化道出血。

【附注】 本品作为“大黄”入药。



【编号】 M07157057119R0CMMI H32937057012000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

鸡脚刺

【来源】 小檗科植物三颗针 Berberis julianae Schneid. 的干燥根。


【主产地】 主产于贵州、四川、云南。

【性状特征】 根呈类圆柱状，稍弯曲，有少数分枝，长短粗细不一。表面灰棕色至棕褐色，有细纵纹，栓皮易剥落。质坚硬，不易折断，折断面纤维性，鲜黄色，髓部颜色较深而呈黄褐色，有较明显的放射状纹理。气微，味苦。

【品质】 本品以粗壮、坚实、断面颜色鲜黄者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热燥湿，泻火解毒。用于痢疾，肠炎，黄疸，上呼吸道感染，目赤，急性中耳炎等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M04717019045R0GYCM H06007019001007000GYCM

【鉴定人】 何顺志

麦冬

【来源】 百合科植物麦冬 Ophiopogon japonicus（Thunb.）Ker-Gawl. 的干燥块根。

【主产地】 主产于浙江、四川。

【性状特征】 块根呈纺锤状，两端略尖，长1.5～3.5 cm，中部直径3～7 mm。表面黄白色或土黄色或淡黄色，具细纵纹。质柔韧，断面黄白色，半透明，中柱细小，新鲜时可抽出。气微香，味甘、微苦。

【品质】 本品以肥大、色淡黄白、半透明、质韧、嚼之有黏性者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，微寒。养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，虚劳咳嗽，津伤口渴，心烦失眠，内热消渴，肠燥便秘，咽白喉。



【编号】 M04727293229R0CMMI H27337293035001300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

京大戟


【来源】 大戟科植物大戟 Euphorbia pekinensis Rupr. 的干燥根。

【主产地】 主产于江苏。

【性状特征】 本品根为不整齐的长圆锥状，略弯曲，常有分枝，长 10～20 cm，直径 0.5～4 cm。近根头部偶有膨大，有多数茎基及芽痕。表面灰棕色或棕褐色，粗糙，有纵皱纹、横向皮孔及支根痕。质坚硬，不易折断，断面类白色或淡黄色，纤维性。气微，味微苦涩。

【品质】 本品以条粗、断面色白者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有毒。泻水逐饮。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆喘咳，二便不利。



【编号】 M04787136093R0CMMI H17027136033001300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

刺五加

【来源】 五加科植物刺五加 Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms 的干燥根及根茎或茎。

【主产地】 主产于辽宁、吉林、黑龙江、河北、陕西等地。

【性状特征】 根茎呈结节状不规则圆柱形，直径1.4～4.2 cm，有分枝。根呈圆柱状，多扭曲，长3.5～12 cm，直径0.3～1.5 cm；表面灰褐色或黑褐色，粗糙，具皱纹及细纵沟，皮较薄，有的剥落，剥落处呈灰黄色。质硬，断面黄白色，纤维性。香气特异，味微辛、稍苦、涩。茎呈长圆柱状，多分枝，长短不一，直径0.5～2 cm。表面浅灰色，老枝灰褐色，具纵裂沟，无刺；幼枝黄褐色，密生细刺。质坚硬，不易折断，断面皮部薄，黄白色，木部宽广，淡黄色，中心有髓，气微，味微辛。

【品质】 本品以条状、质硬、断面色黄白、气清香者为佳。

【性味功效】 辛、微苦，温。益气健脾，补肾安神，活血通络。用于脾肾阳虚，腰膝酸痛，体虚乏力，食欲不振，失眠多梦，风寒湿痹，跌扑肿痛。



【编号】 M04857212012R0CMMI H00297213001001500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

刺梨

【来源】 蔷薇科植物刺梨 Rosa roxburghii Tratt.f. normalis Rehd. et Wils. 的干燥根。


【主产地】 主产于四川、云南、贵州。

【性状特征】 根呈长圆柱状，少弯曲，长 30～50 cm，直径 0.5～1.5 cm。表面棕色或灰棕色，可见明显的支根痕，有纵向沟纹。质硬，不易折断，断面细密，黄色至黄棕色，栓皮易翘起或脱落，脱落处可见木部表面呈明显的细纵裂纹。气微，味淡。

【品质】 本品以根粗壮、坚实而硬、断面色黄者为佳。

【性味功效】 和性药。收敛固涩，消食健脾。用于慢性胃炎，胃痛，遗精，遗尿等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M04867143268R0GYCM H33567143043006301GYCM

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

刺梨根

【来源】 蔷薇科植物刺梨 Rosa roxburghii Tratt.f. normalis Rehd. et Wils. 的干燥根。

【主产地】 主产于贵州、四川、陕西、甘肃、湖南、湖北、广西、江西等地。

【性状特征】 根呈圆柱状，长 15～30～50 cm，直径 0.5～2 cm 或粗，表面棕褐色，具细纵纹及侧根痕，少数有细须根残存。皮部薄，易剥落，皮脱落处表面呈棕红色。质坚硬，不易折断，断面纤维性，木部呈浅红棕色与黄白色间杂的放射状纹理。气微，味涩。

【性味功效】 甘、苦、涩，平。健胃消食，止痛，收涩，止血。用于胃脘胀满疼痛，牙痛，喉痛，久咳，泻痢，遗精，带下，崩漏，痔疮。



【编号】 M06747143268FHCMMI H33567143043006301GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

卷丹

【来源】 百合科植物卷丹 Lilium lancifolium Thunb. 的干燥肉质鳞叶。


【主产地】 主产于湖南、浙江、江苏、陕西、四川、安徽等地。以湖南产者质量最好。

【性状特征】 肉质鳞叶呈长椭圆状，长2～3.5 cm，宽1～1.5 cm，中部厚 1～3 mm。表面类白色或淡黄棕色，光滑、半透明，有纵直脉纹约3～8条。顶端较尖，基部较宽，边缘薄，微波状，略向内卷曲。质硬脆，易折断，断面较平坦。无臭，味微苦。

【品质】 本品以肉厚、质硬、色白者为佳。

【性味功效】 甘，寒。养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠，多梦，精神恍惚。

【附注】 本品作为“百合”入药。



【编号】 M03437293194R0CMMI H23467293028001600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

垂序商陆

【来源】 商陆科植物垂序商陆 Phytolacca americana L.的干燥根。

【主产地】 主产于山东、浙江、江西等地。

【性状特征】 根呈不规则圆锥状，分枝接近根茎处，长10～30 cm，直径 3～13 cm。表面深棕色或暗棕色，皱缩，有明显、较密的横条状或瘤状皮孔和纵沟纹。药材商品为横切或纵切的块片，较大，外皮深棕色。横切片椭圆状或不规则圆状，直径2.5～8 cm，厚 0.2～1.5 cm；切面浅黄色或土黄色，隆起的同心形环轮较粗糙，粉性较低，略具纤维性。质硬，不易折断，断面粗糙而带纤维性。气微，鲜品具特殊刺激性气味，味稍甜，久嚼麻舌。

【品质】 本品以块片大、色白者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有毒。逐水消肿，通利二便，解毒散结。用于水肿胀满，二便不通；外治痈肿疮毒。

【附注】 本品作为“商陆”入药。



【编号】 M08117059002R0CMMI H29377059001000200SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

岩白菜

【来源】 虎耳草科植物岩白菜 Bergenia purpurascens (Hook.f.et Thoms.) Engl. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于西藏、云南、四川、贵州等地。

【性状特征】 根茎类圆柱状而稍扁，略弯曲，有时可见分枝，长10～30 cm，直径0.5～2 cm。表面黑棕色或棕灰色至棕黑色，具密集而稍隆起的环节，节间长6～11 mm，节上具残存的褐色鳞片或棕黑色叶基，并有皱缩条纹和凹点状或突起的根痕，除去外皮者浅棕色至棕褐色。质坚而脆，易折断，断面类白色、灰白色或粉红色，粉性，边缘有类白色点状维管束环列，有的折断面可见部分组织枯朽多成棕黑色。气微，味苦涩。

【品质】 本品以粗壮、折断面色类白或粉红者为佳。

【性味功效】 苦、涩，平。健胃止泻，生肌止血。用于胃痛，食积，泄泻，便血，跌扑损伤，外伤出血。

【附注】 岩白菜为民间草药和少数民族（藏族、维吾尔族、纳西族等）用药。



【编号】 M05007047011H0XZDC H06207047003000400CMMI

【鉴定人】 格桑索朗

明党参

【来源】 伞形科植物明党参 Changium smyrnioides Wolff 的干燥根。

【主产地】 主产于江苏、安徽、浙江等地。

【性状特征】 根细长圆柱状、长纺锤状（两端渐细，稍扭曲）或不规则条块，长6～20 cm，直径0.4～2.5 cm。表面黄白色或淡棕色，光滑，半透明，或有纵沟纹及须根痕，有的具红棕色斑点。质坚硬而脆，断面角质样，皮部黄白色，较薄，易与木部剥离，木部类白色。气微，味淡。

【品质】 本品以条细长均匀、色泽明亮、质坚实、被称为“银芽”者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，微寒。润肺化痰，养阴和胃，平肝，解毒。用于肺热咳嗽，呕吐反胃，食少口干，目赤眩晕，贫血，妇女白带，疔毒疮疡。



【编号】 M05047213095R0CMMI H09187214022000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

杭白芍

【来源】 毛茛科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall. 的干燥根。

【主产地】 主产于浙江。

【性状特征】 根呈圆柱状，平直或稍弯曲，两端平整，大小均匀，长10～20 cm，直径1.5～2.6 cm。表面棕色或淡棕色，全体光洁，栓皮未去净处显棕褐色斑痕，有明显的纵皱纹及须根痕。质坚实，不易折断，断面颗粒性，类白色或微带棕红色，木部成放射状。气微，味微苦、酸。

【品质】 本品以粗长匀直、皮色光洁、质坚实无白心或裂隙者为佳。

【性味功效】 苦、酸，微寒。平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。

【附注】 本品作为“白芍”入药。



【编号】 M05057015376R2CMMI H27947015034000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

杭白芷

【来源】 伞形科植物杭白芷 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. formosana (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根。

【主产地】 主产于浙江。

【性状特征】 根呈圆锥状，长 10～15 cm，直径 2～5 cm。顶端近方形或类方形，表面灰棕色，有多数较大的皮孔样横向突起，排列成近四纵行，俗称“疙瘩丁”。体形圆而具四条棱脊，顶端有凹陷的茎痕。质坚实，断面白色，粉性足，根上部的形成层环近方形，皮部密布棕色油点。气芳香，味辛、微苦。

【品质】 本品以独支、条粗壮、质硬、体重、粉性足，香气浓郁者为佳。

【性味功效】 辛，温。散风除湿，通窍止痛，消肿排脓。用于感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞，鼻渊，牙痛，白带，疮疡肿毒。

【附注】 本品作为“白芷”入药。



【编号】 M05067213015R0CMMI H03067214005000703CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

松贝

【来源】 百合科植物暗紫贝母 Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia 的干燥鳞茎。

【主产地】 主产于四川、青海等地。四川阿坝藏族自治州，青海同仁、班马、达日、甘达等地为其道地产区。本品是川贝母的主要来源。

【性状特征】 鳞茎呈类圆锥状或近球状，直径 0.4～1 cm，高 0.5～1 cm。表面类白色，光滑，外层鳞叶两瓣大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，习称“怀中抱月”。顶部闭合，钝圆或稍尖，内有心芽和小鳞叶 1～2 枚，底部平，微凹入，能直立放稳，中心有一灰褐色的鳞茎盘，偶有残存须根。质硬而脆，断面白色，富粉性。气微，味微苦。

【品质】 本品以质坚实、粉性足、色白者为佳。

【性味功效】 苦、甘，微寒。清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。

【附注】 本品作为“川贝母”入药。



【编号】 M05077293148R0CMMI H18047293020001700SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

板蓝根

【来源】 十字花科植物菘蓝 Isatis indigotica Fort. 的干燥根。

【主产地】 主产于河北、江苏、安徽、河南等地。现各地均有栽培。

【性状特征】 根圆柱状，稍弯曲，长 10～20 cm，直径 0.3～1.2 cm。表面淡灰黄色或浅棕黄色，有纵皱纹及支根痕，皮孔横长。根头略膨大，可见暗绿色或暗棕色轮状排列的叶柄基和密集的疣状突起。体实，质略软，断面皮部黄白色，木部黄色，气微，味微甜后苦涩。

【品质】 本品以条长、粗大、体实者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，凉血利咽。用于温毒发斑，舌绛紫暗，疙腮，喉痹，烂喉丹痧，大头瘟疫，丹毒，痈肿。



【编号】 M05117039064R0CMMI H21647039047000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

泽泻

【来源】 泽泻科植物泽泻 Alisma orientalis (Sam.) Juzep. 的干燥块茎。

【主产地】 主产于福建、四川、江西等地，多系栽培品。

【性状特征】 块茎类球状、椭圆状或卵圆状，长 2～7 cm，直径 2～6 cm。表面黄白色或淡黄棕色，有不规则的横向环状浅沟纹及多数细小突起的须根痕，底部有的具瘤状芽痕。质坚实，断面黄白色，粉性，有多数细孔。气微，味微苦。

【品质】 本品以块大、色黄白、光滑、质充实、粉性足者为佳。

【性味功效】 甘，寒。利小便，清湿热。用于小便不利，水肿胀满，泄泻尿少，痰饮眩晕，热淋涩痛，高血脂。



【编号】 M05217267003R0CMMI H01937267001000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

炉贝

【来源】 百合科植物梭砂贝母 Fritillaria delavayi Franch. 的干燥鳞茎。


【主产地】 主产于青海、四川、云南、西藏等地。

【性状特征】 鳞茎呈长圆锥状，直径0.8～1.3 cm，高1.2～2 cm。表面黄白色，稍粗糙，常有黄棕色斑块，习称“虎皮贝”，外层鳞叶两瓣，形状及大小相近，顶端开裂而略尖，露出内部细小鳞叶或心芽。基部多凸出略呈锥形，不能放平直立，有的鳞茎盘残留须根。质硬而脆，断面白色，富粉性。味微苦。

【品质】 本品以质坚实、粉性足、色白者为佳。

【性味功效】 苦、甘，微寒。清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。

【附注】 本品作为“川贝母”入药。



【编号】 M05227293111R0CMMI H17997293020000400SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

狗脊

【来源】 蚌壳蕨科植物金毛狗脊 Cibotium barometz (L.) J. Sm. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于福建、四川。

【性状特征】 根茎为不规则的长块状，长 10～30 cm，直径 2～10 cm。表面深棕色，残留金黄色绒毛，上面有数个红棕色的木质叶柄，下面残存黑色细根。质坚硬，不易折断。无臭，味淡、微涩。

【品质】 本品以肥大、质坚实无空心、外表略有金黄色茸毛者为佳。

【性味功效】 苦、甘，温。补肝肾，强腰膝，祛风湿。用于腰膝酸软，下肢无力，风湿痹痛。



【编号】 M05245019001R0CMMI H09565019001000100SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

狗脊贯众

【来源】 乌毛蕨科植物单芽狗脊蕨 Woodwardia unigemmata (Makino) Nakai 的干燥根茎。

【主产地】 主产于湖南、云南、贵州、四川、甘肃等地。

【性状特征】 根茎长圆柱状或削成方柱状、柱状，挺直或弯曲，上端较粗钝，下端较尖，长 6～30 cm，直径 2～7 cm，红棕色至黑褐色。根茎粗壮，密被短粗的叶柄基，鳞片红棕色，全缘披针形，细根棕黑色。叶柄基坚硬，断面半圆形，具黄白色分体中柱 5～8 个。气微弱，味微苦、涩。

【性味功效】 苦，凉。清热解毒，杀虫，止血，祛风湿。用于风热感冒，时行瘟疫，恶疮痈肿，虫积腹痛，小儿疳积，痢疾，便血，崩漏，外伤出血，风湿痹痛。



【编号】 M05615042008R0CMMI H41455042007001200SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

直立百部

【来源】 百部科植物直立百部 Stemona sessilifolia (Miq.) Miq. 的干燥块根。

【主产地】 主产于安徽、江苏、湖北、浙江、山东等地。

【性状特征】 块根呈纺锤状，上端较细长，皱缩弯曲，长5～17 cm，直径0.5～1 cm。表面黄白色或浅棕黄色，具不规则深纵沟，间或有横皱纹。质脆，易折断，断面平坦，角质样，淡黄棕色或黄白色，皮部较宽，中柱扁缩。气微，味甘、苦。

【品质】 本品以条粗壮、质坚实者为佳。

【性味功效】 甘、苦，微温。润肺下气止咳，杀虫灭虱。用于新旧咳嗽，肺痨咳嗽，百日咳；外用于头虱，蛲虫病，阴痒。

【附注】 本品作为“百部”入药。



【编号】 M05277310006R0CMMI H37707310002000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

知母

【来源】 百合科植物知母 Anemarrhena asphodeloides Bge. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于河北、山西、陕西 、内蒙古等地。以河北易县产者质量最好。

【性状特征】 根茎扁圆长条状，微弯曲，偶有分枝，长3～15 cm，直径0.8～1.5 cm，一端有浅黄色的茎叶残痕。表面黄棕色至棕色，上面有一凹沟，具紧密排列的环状节，节上密生黄棕色的残存叶基，由两侧向根茎上方生长；下面隆起而略皱缩，并有凹陷或突起点状根痕。质硬，易折断，断面黄白色。气微，味微甜、略苦，嚼之带黏性。

【品质】 本品以条粗、质硬、断面色黄白者为佳。

【性味功效】 苦、甘，寒。清热泻火，生津润燥，止渴除烦。用于外感热病，高热烦渴，肺热烦咳，骨蒸潮热，虚烦不眠，肠燥便秘，消渴淋浊。

【附注】 毛知母为带皮的干燥根茎；光知母为去皮的干燥根茎。

【编号】 M05287293043R0CMMI H02857293004000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

细叶百合

【来源】 百合科植物细叶百合 Lilium pumilum DC. 的干燥肉质鳞叶。

【主产地】 主产于湖南、浙江、江苏、陕西、四川、安徽等地；全国大部分地区均产。以湖南产者质量最好。

【性状特征】 肉质鳞叶呈长椭圆状，长至5.5 cm，宽2.5 cm，中部厚至3.5 mm。表面类白色或淡黄棕色，色较暗，脉纹不明显。顶端较尖，基部较宽，边缘薄，微波状，略向内卷曲。质硬而脆，易折断，断面较平坦。无臭，味微苦。

【品质】 本品以肉厚、质硬、色白者为佳。

【性味功效】 甘，寒。养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠，多梦，精神恍惚。

【附注】 本品作为“百合”入药。



【编号】 M03447293200R0SM H23477293028002600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

细花滇紫草

【来源】 紫草科植物细花滇紫草 Onosma hookeri C. B. Clarke 的干燥根。

【主产地】 主产于西藏、云南。

【性状特征】 根呈类圆柱状或长圆柱状，稍扭曲。长约7～10 cm，直径2～10 mm。根头部具数个残留茎基，下部略细，中下部常可见侧根痕。表面紫红色或暗紫色，略粗糙，有不规则的纵沟及皱纹，外皮薄，多呈膜质鳞片剥落，放大镜下可见多数硬毛。体轻质软，易折断，断面肉质，木质部黄白色。气特异，味淡、微甜。

【品质】 本品以粗壮、特异香气浓、外表色紫红者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，凉。用于肺病，吐血。

【附注】 本品为藏药“知毛”入药品种之一。



【编号】 M05297249047R0XZDC H27247250039001400XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

胀果甘草

【来源】 豆科植物胀果甘草 Glycyrrhiza inflata Bat. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于新疆、甘肃、内蒙古等地。

【性状特征】 根及根茎木质粗壮，有的分枝，外皮粗糙。表面灰棕色至灰褐色，有粗的纵皱纹和沟纹，皮孔明显。质坚硬，易潮，折断面纤维性强，淡黄色或黄色，粉性小，断面形成层环浅棕色，常可见木质部呈偏心性。根茎不定芽多而粗大。气微，味甜而后略带苦。

【品质】 本品以身干、皮细而紧、质坚、体重者为佳。

【性味功效】 甘，平。补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

【附注】 本品作为“甘草”入药。



【编号】 M05377148327R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苦参


【来源】 豆科植物苦参 Sophora flavescens Ait. 的干燥根。

【主产地】 全国各地均产。

【性状特征】 根呈长圆柱状，下部常分枝，长 10～30 cm，直径1～2.5 cm。表面灰棕色或棕黄色，有明显纵皱纹及横生皮孔，栓皮薄，多破裂反卷，易剥落，露出黄色、光滑的内皮。质硬，难折断，折断面纤维性，具放射状纹理和裂隙，有的可见年轮环纹。气微，味极苦。

【品质】 本品以条匀、断面色黄白、味极苦者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿，祛风杀虫，利尿。用于湿热泻痢，肠风便血，黄疸尿闭，赤白带下，阴痒，湿疹，湿疮，疥癣麻风，皮肤瘙痒；外治滴虫性阴道炎。



【编号】 M05477148569R0CMMI H37077148135000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

虎杖


【来源】 蓼科植物虎杖 Polygonum cuspidatum Sieb.et Zucc. 的干燥根茎和根。

【主产地】 主产于江苏、安徽、浙江、广东、广西、四川、贵州、云南等地。

【性状特征】 根茎和根多为圆柱状短段，长 1～7 cm，直径 0.5～2.5 cm。外皮棕褐色，有纵皱纹及须根痕，断面皮部较薄，木部宽广，棕黄色，射线放射状，皮部与木部易分离。根茎髓中有膈或呈空洞状。质坚硬，不易折断。气微，味微苦、涩。

【品质】 本品以粗壮、坚实、断面色黄者为佳。

【性味功效】 微苦，微寒。祛风利湿，散瘀定痛，止咳化痰。用于关节痹痛，湿热黄疸，经闭，癥瘕，水火烫伤，跌扑损伤，痈肿疮毒，咳嗽痰多。



【编号】 M05567057035R0CMMI H30517057010000900GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

虎掌南星

【来源】 天南星科植物虎掌 Pinellia pedatisecta Schott 的干燥块茎。

【主产地】 主产于河南、河北、山东、安徽、江苏等地。

【性状特征】 块茎呈扁平而不规则的类圆状，由主块茎及多数附着的小块茎组成，形如虎的脚掌，直径1.5～5 cm。表面淡黄色或淡棕色，每一块茎中心都有一茎痕，周围有点状须根痕。质坚实而重，断面不平坦，色白，粉性。气微，味辣，有麻舌感。

【品质】 本品以个大、色白、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温；有毒。祛风止痉，化痰散结。用于中风疾壅，口眼㖞斜，半身不遂，手足麻痹，风痰眩晕，癫痫，惊风，破伤风，咳嗽多痰，痈肿，跌扑损伤，毒蛇咬伤。



【编号】 M05577302085R0CMMI H29527302023000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

虎掌草

【来源】 毛茛科植物草玉梅 Anemone rivularis Buch.-Ham. 的干燥根。

【主产地】 主产于贵州、云南、西藏。

【性状特征】 根呈长圆柱状或类圆锥状，稍弯曲，有的扭曲或分枝，长 5～12 cm，直径 2～3 cm。表面黑褐色或棕褐色，粗糙，具不规则的裂纹及皱纹，根头部略膨大，有残留的叶基、茎痕及灰白色绒毛。质硬脆，折断面不整齐，皮部略呈黄色。气微，味微苦。

【品质】 本品以粗壮、干燥、断面色黄者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经；有毒。清热解毒，止咳化痰。用于咽喉肿痛，咳嗽痰多，淋巴结炎等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M05587015159R0GYCM H02937015005003200GYCM

【鉴定人】 谢德文

软紫草

【来源】 紫草科植物新疆紫草 Arnebia euchroma (Royle) Johnst. 的干燥根。


【主产地】 主产于新疆。

【性状特征】 根长圆柱状，不规则，多扭曲，长 7～20 cm，直径 1～2.5 cm。表面紫红色或紫褐色，皮部极疏松，呈条形片状，常 10 余层重叠，易剥落。有的顶端可见分歧的茎残基。体轻，质松软，易折断，断面不整齐，木质较小，黄白色或黄色。气特异，具腥臭味，味微苦、涩。

【品质】 本品以条粗大、色紫、质软、外皮成层剥离者为佳。

【性味功效】 甘、咸，寒。凉血，活血，解毒透疹。用于血热毒盛，斑疹，麻疹，湿疹，疮疡，吐血，衄血，水火烫伤。

【附注】 本品作为“紫草”入药。



【编号】 M09557249002R0CMMI H04147250004000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

郁金


【来源】 姜科植物姜黄 Curcuma longa L. 的干燥块根。

【主产地】 主产于四川温江及乐山地区。

【性状特征】 块根呈纺锤状，偶有椭圆状或圆锥状，一端细长，一端肥大，长 2.5～4.5 cm，直径 1～1.8 cm。表面棕灰色或灰黄色，具细皱纹。质坚硬，断面橙黄色，外周棕黄色至棕红色，略呈透明状，角质样。气芳香，味辛辣。

【品质】 本品以个大、质坚实、外皮皱纹细、断面色黄者为佳。

【性味功效】 辛、苦，寒。行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。用于经闭痛经，胸腹胀痛，刺痛，热病神昏，癫痫发狂，黄疸尿赤。



【编号】 M05657290070R0SM H12537290008000800CMMI

【鉴定人】 陈俊华

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金刚藤

【来源】 百合科植物菝葜 Smilax china L. 的干燥根茎。


【主产地】 主产于江苏、浙江、江西、湖南。

【性状特征】 根茎呈圆柱状，微弯，结节状，有不规则的凹陷，长约 5～15 cm，直径约 2～4 cm。外表褐紫色，微有光泽，结节膨大处常有坚硬的须根残基及芽痕，或留有坚硬弯曲的细根。质坚硬，难折断，断面浅黄色至黄棕色，平坦。

【品质】 本品以粗壮、硬实、不带须根者为佳。

【性味功效】 性热，入冷经。用于风湿疼痛及风湿麻木。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M05677293309R0GYCM H36637293047001100GYCM

【鉴定人】 袁家谟

金果榄


【来源】 防己科植物金果榄 Tinospora capillipes Gagnep. 的干燥块根。

【主产地】 主产于贵州、四川、湖南、湖北、广西等地。

【性状特征】 块根不规则圆块状，长 5～10 cm，直径 3～6 cm。表面棕黄色或淡褐色，粗糙不平，具深皱纹，有时可见横长的皮孔。质坚硬，不易击碎、破开，横断面淡黄色，导管束略呈放射状排列，色较深。无臭，味苦。

【品质】 本品以体重、质坚实、表面及皮部均呈黄色荧光者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，利咽，止痛。用于咽喉肿痛，痈疽疔毒，泄泻，痢疾，脘腹热痛。



【编号】 M05707023061R0CMMI H39107023019000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

金荞麦

【来源】 蓼科植物金荞麦 Fagopyrum dibotrys（D.Don）Hara 的干燥根茎。

【主产地】 主产于江苏、浙江。

【性状特征】 根茎呈不规则团块或圆柱状，常有瘤状分枝，顶端有的有茎残基，长 3～15 cm，直径 1～4 cm。表面棕褐色，有横向环节及纵皱纹，密布点状皮孔，并有凹陷的圆形根痕及残存须根。质坚硬，不易折断，断面淡黄白色或淡棕红色，有放射状纹理，中央髓部色较深。气微，味微涩。

【品质】 本品以个大、质坚硬者为佳。

【性味功效】 微辛、涩，凉。清热解毒，排脓祛瘀。用于肺脓疡，麻疹肺炎，扁桃体周围脓肿。



【编号】 M05737057006R0SM H17317057005000400CMMI

【鉴定人】 钟国跃

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金铁锁

【来源】 石竹科植物金铁锁 Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C.Y. Wu 的干燥根。


【主产地】 主产于云南、贵州。

【性状特征】 根呈细长圆锥状，有的略扭曲，长约8～25 cm，直径约0.5～1.5 cm。表面黄白色，有多数纵皱纹及褐色横孔纹。质硬，易折断，断面不平坦，呈粉质状，维管束明显排列成黄色密集的放射状纹理。气微，味辛、麻，尝之刺激喉舌。

【品质】 本品以支大、粗壮者为佳。

【性味功效】 性热，入冷经；有小毒。散瘀，消炎，祛风湿，止痛。用于跌扑损伤，风湿痹痛，胃寒痛，蛇虫咬伤等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M05767053059R0GYCM H31697053022000100GYCM

【鉴定人】 陈谦海

青木香


【来源】 马兜铃科植物马兜铃 Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. 的干燥根。

【主产地】 主产于江苏、安徽、浙江。

【性状特征】 根圆柱状或扁圆柱状，稍弯曲，长3～5 cm，直径0.5～1.5 cm。表面黄褐色或灰棕色，粗糙不平，具纵皱纹和须根痕。质坚脆，易折断，断面不平坦，皮部淡黄色，木部宽广，射线类白色，呈放射状排列，形成层环明显，呈黄棕色。香气特异，味苦。

【品质】 本品以条粗、质坚实、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，寒。平肝止痛，解毒消肿。用于眩晕头痛，胸腹胀痛，痈肿疔疮，蛇虫咬伤。



【编号】 M05867024011R0CMMI H03937024002000800GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

青牛胆

【来源】 防己科植物青牛胆 Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep. 的干燥块根。


【主产地】 主产于广西、湖南、贵州、四川等地。

【性状特征】 块根不规则长纺锤状或团块状，长5～10 cm，直径3～6 cm。表面黄棕色或淡棕色，皱缩不平，有不规则深皱纹，两端常可见细根残基。质坚硬，击破面黄白色，粉性。气无，味苦。

【品质】 本品以体重、质坚实者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，口舌糜烂，白喉，疟腮，热咳失音，痈疽疔毒，泻痢，脘腹疼痛，毒蛇咬伤。

【附注】 本品作为“金果榄”入药。



【编号】 M05697023065R0SM H39127023019000100CMMI

【鉴定人】 秦松云

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鸢尾

【来源】 鸢尾科植物鸢尾 Iris tectorum Maxim. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于四川、贵州、湖南、广西。

【性状特征】 根茎呈不规则结节状、扁长条状或扁块状，长3～9 cm，直径1～2 cm。表面棕色至淡黄色，稍皱缩，有残留的须根及凹陷突起的圆点状根痕。体轻质硬，断面类白色。气微，味苦。

【品质】 本品以干燥、质硬、不带须根或须根少者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。泻热通便，利水消肿。用于大便不通，水肿；外用治疗无名肿毒。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M06037307029R0GYCM H21627307007005200GYCM

【鉴定人】 袁家谟

南沙参


【来源】 桔梗科植物杏叶沙参 Adenophora stricta Miq. 的干燥根。

【主产地】 主产于安徽、江苏、浙江等地。

【性状特征】 根圆锥状或圆柱状，略弯曲，长7～27 cm，直径0.8～3 cm。表面黄白色或棕黄色，凹陷处常有残留粗皮，上部多有深陷横纹，呈断续的环状，下部有纵纹及纵沟。顶端具1或2个根茎。体轻，质松泡，易折断，断面不平坦，黄白色，多裂隙。无臭，味微甘。

【品质】 本品以粗细均匀、肥壮、色白者为佳。

【性味功效】 甘，微寒。养阴清肺，化痰，益气。用于肺热燥咳，阴虚劳嗽，干咳痰黏，气阴不足，烦热口干。



【编号】 M06117243021R0CMMI H01167244001003500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

南苍术

【来源】 菊科植物南苍术 Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于湖北、江苏、河南等地。

【性状特征】 根茎呈不规则连珠状或结节状圆柱形，略弯曲，偶有分枝，长3～10 cm，直径1～2 cm。表面灰棕色，有皱纹、横曲纹及残留须根，顶端具茎痕或残留茎基。质坚实，易折断，断面稍不平，黄白色或灰白色，散有多数橙黄色或棕红色油室，暴露稍久，可析出白色细针状结晶。气香特异，味微甘、辛、苦。

【品质】 本品以质坚实、断面朱砂点多、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。燥湿健脾，祛风散寒，明目。用于脘腹胀满，泄泻，水肿，脚气痿躄，风湿痹痛，风寒感冒，夜盲。

【附注】 本品作为“苍术”入药。



【编号】 M05537238181R0CMMI H05427239027000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

南柴胡

【来源】 伞形科植物狭叶柴胡 Bupleurum scorzonerifolium Willd. 的干燥根。


【主产地】 主产于辽宁、吉林、黑龙江、陕西、内蒙古、河北、江苏、安徽等地。

【性状特征】 根较细，长圆锥状，常弯曲，顶端有多数细毛状枯叶纤维，下部少分枝，长 5～14 cm，直径 2～8 mm。表面红棕色或黑棕色，近根头处多具细密环纹，皮孔明显。质稍软，易折断，断面较平坦，淡棕色，不显纤维性，形成层环色略深，中间有油点。具败油气。

【品质】 本品以身干、条粗长、整齐、无残留茎、叶及须根者为佳。

【性味功效】 苦、辛，微寒。和解表里，疏肝，升阳。用于外感发热，寒热往来，胸胁胀满，月经不调，子宫脱垂，脱肛。

【附注】 本品作为“柴胡”入药。



【编号】 M06497213080R0CMMI H07227214012003000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

姜黄

【来源】 姜科植物姜黄 Curcuma longa L. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于四川、福建、江西等地。

【性状特征】 根茎呈不规则卵圆状、圆柱状或纺锤状，常弯曲，有的具短叉分枝，长 2～5 cm，直径 1～3 cm。表面深黄色，粗糙，有皱缩纹理和明显环节，有圆形分枝痕及须根痕。质坚实，不易折断，断面棕黄色至金黄色，角质样，有蜡样光泽，内皮层环纹明显，维管束呈点状散在。气香特异，味苦、辛。咀嚼时唾液染黄色。

【品质】 本品以质坚实、断面色金黄、气味浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。破血行气，通经止痛。用于胸胁刺痛，闭经，癥瘕，风湿肩臂疼痛，跌扑肿痛。



【编号】 M06207290070R0CMMI H12537290008000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

威灵仙

【来源】 毛茛科植物威灵仙 Clematis chinensis Osbeck 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于江苏、浙江、江西、湖南、湖北、四川等地。

【性状特征】 根茎圆柱状，长 1.5～10 cm，直径 0.3～2.5 cm。表面淡棕黄色，顶端残留茎基。质较坚韧，断面纤维性，下侧着生多数细根。根呈细长圆柱状，稍弯曲，长 7～15 cm，直径 1～3 mm。表面黑褐色，有细皱纹，有的皮部脱落，露出黄白色木部。质硬脆，易折断，断面皮部较广，木部淡黄色，略呈方形，皮部与木部间常有裂隙。气微，味淡。

【品质】 本品以根粗大、条均匀、断面色灰白、质坚硬、无地上残茎者为佳。

【性味功效】 辛、咸，温。祛风除湿，通络止痛。用于风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，屈伸不利，骨哽咽喉。



【编号】 M06217015209H0SM H10277015017001700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

柳叶白前

【来源】 萝藦科植物柳叶白前 Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl. 的干燥根茎及根。

【主产地】 主产于浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西等地。

【性状特征】 根茎横生呈细长圆柱状，有分枝，稍弯曲，长4～15 cm，直径1.5～4 mm。表面黄白色或黄棕色，节明显，节间长1.5～4.5 cm，顶端有残茎。质脆易断，断面白色，中空。节处簇生纤细弯曲的根，长可达10 cm，直径不及1 mm，有多次分枝呈毛须状，常盘曲成团。气微，味微甜。

【品质】 本品以根茎粗壮、须根长者为佳。

【性味功效】 辛、苦，微温。降气，消痰，止咳。用于肺气壅实，咳嗽痰多，胸满喘急。

【附注】 本品作为“白前”入药。



【编号】 M06367231039R0CMMI H12977232013004100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

狭活


【来源】 伞形科植物重齿毛当归 Angelica pubescens Maxim. f. biserrata Shan et Yuan 的干燥根。

【主产地】 主产于四川、湖北、陕西。

【性状特征】 根略呈圆柱状，下部有2～3个或更多的分枝，长10～30 cm，直径0.5～1.5 cm。根头部膨大，圆锥状，多横皱纹，直径1.5～4 cm，顶端有茎、叶的残基或凹陷。表面灰褐色或棕褐色，粗糙，具纵皱纹，有隆起的横长皮孔及稍突起的细根痕。质较硬，受潮变软，断面皮部灰白色，有裂隙及多数散生的棕色油室，木部灰黄色至黄棕色，形成层环棕色。有特异香气，味苦、辛、微麻舌。

【品质】 本品以条粗壮、油润、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛，微温。祛风除湿，通痹止痛。用于风寒湿痹，腰膝疼痛，少阴伏风头痛，齿痛。



【编号】 M06477213301R0CMMI H03127214005004200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

独蒜兰

【来源】 兰科植物独蒜兰 Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe 的干燥假鳞茎。


【主产地】 主产于贵州。

【性状特征】 假鳞茎呈圆锥状或不规则瓶颈状团块，直径1～2 cm，高1.5～2.5 cm。顶端渐尖，尖端断头处呈盘状，基部膨大且圆平，中央凹入，有1～2条环节，多偏向一侧。去外皮者表面黄白色，带皮者浅棕色。表面较光滑，有不规则皱纹。质坚硬，不易折断，断面浅黄色，角质，半透明。气微，味淡，微苦，稍有黏性。

【品质】 本品以个大、质坚硬者为佳。

【性味功效】 甘、微辛，凉。清热解毒，化痰散结。用于痈肿疔毒，瘰疬痰核，淋巴结结核，蛇虫咬伤。

【附注】 本品作为“山慈姑”入药。



【编号】 M00717326223R0CMMI H29967326108000100SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

狭叶竹节参


【来源】 五加科植物狭叶竹节参 Panax japonicus C.A.Mey.var. angustifolius (Burk.) Chung et Chu 的干燥根茎。

【主产地】 主产于云南、四川、贵州。

【性状特征】 根茎长而粗大，可见明显的竹节状结节，每节有茎痕。根、部分侧根肥厚呈纺锤状乃至近球状，其余侧根呈圆锥状或长条状，尾段细小，常有一至数个分枝。表面棕黄色，有纵皱纹及不明显的断续环纹。质坚实，断面淡黄色或淡棕色，有菊花心。无臭，味甜、微苦。

【品质】 本品以根茎粗壮、坚实、色棕黄者为佳。

【性味功效】 微苦、甘，温。散瘀止血，活血定痛，解毒消肿。用于咯血，吐血，衄血，尿血，便血，崩漏，产后出血过多，瘀血腹痛，经闭，跌打瘀肿，外伤出血，疮疡肿毒，蛇伤。



【编号】 M07247212068FHCMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

禹白芷

【来源】 伞形科植物白芷 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 的干燥根。


【主产地】 主产于河南。

【性状特征】 根呈圆锥状，长 7～24 cm，直径 1.5～2 cm。表面灰黄色至黄棕色，光滑，有支根痕，皮孔样横向突起散生，顶端有凹陷的茎芽。质硬略轻，断面灰白色，显粉性，皮部散有多数棕色油点，形成层环圆形，棕色。气芳香，味辛、微苦。

【品质】 本品以独支、条粗壮、质硬、粉性、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 辛，温。散风除湿，通窍止痛，消肿排脓。用于感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞，鼻渊，牙痛，白带，疮疡肿毒。

【附注】 本品作为“白芷”入药。



【编号】 M06567213015R0CMMI H03037214005000700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

禹州漏芦


【来源】 菊科植物蓝刺头 Echinops latifolius Tausch 的干燥根。

【主产地】 主产于内蒙古、河南、江西等地。

【性状特征】 根类圆柱状，稍扭曲，长10～25 cm，直径0.5～1.5 cm。表面灰黄色或灰褐色，粗糙，具纵皱纹，顶端有纤维状棕色硬毛。质坚而脆，断面粗纤维状，皮部棕色，木部具黄黑色相间的放射状花纹。气微，味微涩。

【品质】 本品以枝条粗长、质坚实者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，排脓止血，消痈下乳。用于诸疮痈肿，乳痈肿痛，乳汁不通，瘰疬疮毒。



【编号】 M06587238318R0CMMI H15297239084000700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

穿山龙


【来源】 薯蓣科植物穿龙薯蓣 Dioscorea nipponica Makino 的干燥根茎。

【主产地】 主产于辽宁、吉林、黑龙江、河北、内蒙古、山西、陕西等地。

【性状特征】 根茎尖圆柱状，略弯曲，常分枝，长10～15 cm，直径0.3～1.5 cm。表面黄白色，具不规则纵沟，并有点状根痕及偏于一侧的突起根痕，偶见膜状浅棕色外皮和细根。质坚硬，断面平坦，白色或黄白色，散有淡棕色维管束点。气微，味苦涩。

【品质】 本品以粗长、色土黄、质坚硬者为佳。

【性味功效】 苦，平。祛风除湿，活血舒筋，止咳平喘。用于风湿痹痛，筋骨麻木，胸痹心痛，慢性气管炎，跌扑损伤，闪腰岔气，咳嗽喘息，疟疾，痈肿。



【编号】 M06617311022R0 H14507311001003300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

茜草根


【来源】 茜草科植物茜草 Rubia cordifolia L. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于陕西、河南、安徽、河北、山东等地。以陕西渭南、河南嵩县产量大且品质优。

【性状特征】 根茎结节状，丛生粗细不等的根。根圆柱状，略弯曲，长 10～30 cm，直径 0.1 ～ 1 cm。表面红棕色或暗棕色，有细纵皱纹及少数须根痕。皮、木部较易分离，脱落处呈黄红色。质脆，易折断，断面平坦，皮部狭，红棕色，木部宽，浅黄色或粉红色，具众多导管孔。无臭，气微，味微苦，久嚼刺舌。

【品质】 本品以条粗长、表面色红棕、内色深红、分枝少者为佳。

【性味功效】 苦，寒。凉血，止血，活血化瘀，通经止疼。用于血热咯血，吐血，衄血，尿血，便血，外伤出血，崩漏，经闭瘀阻，关节痹痛，跌扑肿痛。



【编号】 M06737232165R0CMMI H33677233057000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

草乌

【来源】 毛茛科植物北乌头 Aconitum kusnezoffii Reichb.的干燥块根。

【主产地】 主产于黑龙江、吉林、辽宁、河北等地。

【性状特征】 块根为不规则长圆锥状，略弯曲，形如乌鸦头，长 2 ～ 7 cm，直径 0.6 ～ 1.8 cm，顶端常有残茎和少数不定根残基。表面灰褐色或黑棕褐色，皱缩，有纵皱纹、点状须根痕和数个瘤状侧根。质硬，难折断，断面灰白色或暗灰色，有裂隙，形成层环纹多角形或类圆形，髓部较大或中空。无臭，味辛辣、麻舌。

【品质】 本品以个大、质坚实、断面色灰白者为佳。

【性味功效】 辛、苦，热；有大毒。祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹，关节疼痛，寒疝作痛，麻醉止痛。



【编号】 M06827015064R0CMMI H00697015001009200CMMI


【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

草麻黄根

【来源】麻黄科植物草麻黄Ephedra sinica Stapf的干燥根及根茎。
【主产地】主产于河北、山西、新疆、内蒙古等地。
【性状特征】根多呈圆柱状，略弯曲，长8～25 cm，直径0.5～1.5 cm，上端较粗，偶有膨大的根头，下部较细，常扭曲。表面红棕色或灰棕色，有纵皱纹及根痕，外皮粗糙，易成片状剥落。根茎粗细均匀，具突起的节，节间长0.7～2 cm，表面有横长突起的皮孔。体轻，质硬而脆，易折断，断面皮部黄白色，木部淡黄色或黄色，射线放射状，中心有髓。无臭，味微苦。
【品质】本品以质硬、外皮色红棕、断面色黄白者为佳。
【性味功效】甘，平。止汗。用于自汗，盗汗。
【附注】本品作为“麻黄根”入药。



【编号】M08786010014R0CMMI H15846010001001200CMMI
【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

荚果蕨贯众


【来源】球子蕨科植物荚果蕨 Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro的干燥根茎。
【主产地】主产于黑龙江、吉林、辽宁、河北、北京、河南、陕西等地。
【性状特征】根茎椭圆状、倒卵状或长圆状，上部钝圆，下部稍尖，略弯曲，长10～16 cm，直径4～8 cm，棕褐色，全体密被叶柄残茎、须根及少量鳞片。叶柄基上部扁平，向下渐窄，背部微隆起，中央有一条纵棱，近上端可见“V”或“M”形突皱纹。质硬而脆，易折断，断面略平坦，有黄白色分体中柱2个，呈八字排列。叶柄基部生有1～3条须根，多分枝，有时具棕色绒毛。气微而特异，味涩。
【性味功效】苦，微寒。清热解毒，杀虫，止血。用于热病发斑，腮腺炎，湿热疮毒，蛔虫腹痛，蛲虫病，赤痢便血，尿血，吐血，衄血，崩漏。



【编号】M05605041003R0CMMI H25545041001000300SM
【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

荞麦七

【来源】蓼科植物翼蓼 Pteroxygonum giraldii Dammer et Diels 的干燥块根。
【主产地】主产于陕西、四川、河北等地。
【性状特征】块根近圆柱状，长约10 cm，直径2～8 cm。根头部留有突起的茎基或支根残基，凹凸不平，有的已切成块片。表面棕红色至棕色，光滑或皱缩，剖面可见纵横走向的维管束及纤维。质坚硬，难折断。气微，味苦。
【性味功效】苦、涩、辛，凉。清热解毒，凉血，止血，除湿止痛。用于咽喉肿痛，疮疖肿毒，烧伤，吐血，衄血，便血，崩漏，泄泻，痢疾，风湿痹痛。



【编号】M06897057099FHCMMI H31917057011000100CMMI
【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

韭根

【来源】 百合科植物韭菜 Allium tuberosum Rottl. 的干燥根茎及根。

【主产地】 全国各地均有出产。

【性状特征】 根茎呈扁圆柱状，表面棕褐色，生有多数须根。上有1～3个丛生的鳞茎，呈卵状圆柱形。须根棕黄色细圆柱状，表面皱缩不平。质脆易折断。具强烈的臭味。

【品质】 本品以根茎粗壮、须根繁密者为佳。

【性味功效】 性热，入冷经。温中，补气，散瘀。用于胸痹，食积腹胀，赤白带下，吐血，衄血，癣疮等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M06997293033R0GYCM H02097293002009000GYCM

【鉴定人】 陈谦海

香附

【来源】 莎草科植物莎草 Cyperus rotundus L. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于山东、浙江、福建、湖南、河南等地。

【性状特征】 根茎多呈纺锤状，有的稍弯曲，长2～3.5 cm，直径0.5～1 cm。表面棕褐色或黑褐色，具不规则纵皱纹，有6～10个略隆起的明显环节，节上有众多未除净的棕色毛须及须根痕；去净毛须者较光滑，有细密纵脊纹，环节不明显。质坚硬，经蒸煮者断面黄棕色或红棕色，角质样；生晒者断面色白而显粉性，内皮层环纹明显，中柱色较深，点状维管束散在。气香，味微苦。

【品质】 本品以个大、质坚实、色棕褐、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、微苦、微甘，平。行气解郁，调经止痛，安胎。用于肝郁气滞，胸、胁、脘腹胀满，消化不良，胸脘痞闷，寒疝腹痛，乳房胀痛，月经不调，经闭痛经，崩漏带下，胎动不安。



【编号】 M07037331036R0CMMI H13097331006003000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

骨碎补


【来源】 水龙科植物槲蕨 Drynaria fortunei (Kunze) J. Sm. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于湖南、浙江、江西。

【性状特征】 根茎扁平长条状，略弯曲，有分枝，长5～15 cm，宽1～1.5 cm，厚2～5 mm。表面密被深棕色至暗棕色的小鳞片，柔软如毛，经火燎者呈棕褐色或暗褐色，两侧及上表面均具凸起或凹下的圆形叶痕，少数有叶柄残基及须根残留。体轻，质脆，易折断，断面红棕色，维管束呈黄色点状排列成环。无臭，味淡、微涩。

【品质】 本品以条粗大、色棕者为佳。

【性味功效】 苦，温。补肾强骨，续伤止痛。用于肾虚腰痛，耳鸣耳聋，牙齿松动，跌扑闪挫，筋骨折伤；外治斑秃，白癜风。



【编号】 M07085057004R0CMMI H15095057002000200GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

毫白芍

【来源】 毛茛科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall. 的干燥根。

【主产地】 主产于安徽。

【性状特征】 根呈圆柱状，根条顺直或弯曲，长 10～15 cm，直径0.6～1.5 cm。表面类白色，有纵向刀削痕，较粗糙而不光滑，偶见细根痕。质坚实，不易折断，断面灰白色或类白色，质地细腻较平坦，粉性足。气微，味微苦、酸。

【品质】 本品以粗长匀直、质坚实、粉性足、无白心或裂隙者为佳。

【性味功效】 苦、酸，微寒。平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。

【附注】 本品作为“白芍”入药。



【编号】 M07117015376R2CMMI H27947015034000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

党参

【来源】 桔梗科植物党参 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. 的干燥根。

【主产地】 西党，主产于陕西、甘肃；东党，主产于黑龙江、吉林、辽宁；潞党，主产于山西，多为栽培品。

【性状特征】 根长圆柱状，稍弯曲，少分枝，长 10～35 cm，直径0.4～2 cm。表面黄棕色至灰棕色，根头部有多数疣状突起的茎痕及芽，每个茎痕的顶端呈凹下的圆点状；根头下有致密的环状横纹，向下渐稀疏，有的达全长的一半，栽培品环状横纹少或无；全体有纵皱纹及散在的横长皮孔，支根断落处常有黑褐色胶状物。质稍硬或略带韧性，断面较平坦，有的呈角质样，有裂隙或放射状纹理，皮部淡黄白色至淡棕色，木部淡黄色。有特殊香气，味微甜，嚼之无渣。

【品质】 本品以条粗壮、肉质柔润、香气浓、甜味重、嚼之无渣者为佳。

【性味功效】 甘，平。补气益气，健脾益肺。用于脾肺虚弱，气短心悸，食少便溏，虚喘咳嗽，内热消渴。



【编号】 M07127243060R0CMMI H10957244006002700XZDC

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

夏天无


【来源】 罂粟科植物伏生紫堇Corydalis decumbens (Thunb.) Pers. 的干燥块茎。

【主产地】 主产于江西。

【性状特征】 块茎类球状、长圆状或不规则块状，长0.5～3 cm，直径0.5～2.5 cm。表面灰黄色、暗绿色或黑褐色，有瘤状突起和不明显的细皱纹，顶端钝圆，可见茎痕，四周有淡黄色点状叶痕及须根痕。质硬，断面黄白色或黄色，颗粒状或角质样，有的略带粉性。无臭，味苦。

【品质】 本品以个大、质坚、断面色黄白者为佳。

【性味功效】 苦、微辛，温。活血通络，行气止痛，用于中风偏瘫，跌扑损伤，风湿性关节炎，坐骨神经痛。



【编号】 M07177032032R0CMMI H11597032004000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

宽叶羌活

【来源】 伞形科植物宽叶羌活 Notopterygium forbesii Boiss. 的干燥根茎及根。

【主产地】 主产于四川阿坝藏族自治州小金、松潘、黑水等地的称川羌；主产于西北地区甘肃天祝、岷县，云南丽江地区滕冲等地的称西羌。

【性状特征】 根茎类圆柱状，顶端具茎及叶鞘残基，根类圆锥状，有纵皱纹及皮孔。表面棕褐色，近根基处有较密的环纹，长 8～15 cm，直径 0.6～3 cm，习称“条羌”。有的根茎粗大，不规则结节状，顶端有数个茎基残留痕，根较细，习称“大头羌”。质松脆，易折断，断面较平坦，皮部浅棕色，木部黄白色或淡黄色。气味较淡。

【品质】 本品以条粗长、有横节、表面色棕黄或紫棕、断面质紧密、呈菊花纹、朱砂点多、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。散寒，祛风，除湿，止痛。用于风寒感冒头痛，风湿痹痛，肩背酸痛。

【附注】 本品作为“羌活”入药。



【编号】 M00357213191R0CMMI H27037214056000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

射干

【来源】 鸢尾科植物射干 Belamcanda chinensis (L.) DC. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于湖北、河南、江苏、安徽等地。

【性状特征】 根茎呈不规则结节状，时有短分枝，长 3～10 cm，直径 0.5～3 cm。表面黄褐色、棕褐色或黑褐色，皱缩，有密集的环纹。上面有数个大小不等的圆盘状凹陷的茎痕，偶有茎基残存，下面及两侧有残留的须根及根痕。质硬，断面黄色，颗粒性。气微，味苦、微辛。

【品质】 本品以粗壮、质硬、断面色黄者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，消痰，利咽。用于热毒痰火郁结，痰涎壅盛，咽喉肿痛，咳嗽气喘。



【编号】 M07227307001R0CMMI H05887307001000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

峨参

【来源】 伞形科植物峨参 Anthricus sylvestris (L.) Hoffm. 的干燥根。

【主产地】 主产于四川、湖南、江苏、云南等地。

【性状特征】 根呈圆锥状，稍弯曲，多分叉，长 3～12 cm，中部粗，直径 1～1.5 cm，下部渐细，半透明。表面黄棕色或灰褐色，有不规则的纵皱纹，上部有细密环纹及突起的横长皮孔，有的侧面具疔疤。质坚实，沉重，断面黄色或黄棕色，角质性。气微，味微辛，微麻。

【品质】 本品以质坚实、色白黄、条粗及环纹细致者为佳。

【性味功效】 甘、辛，微温。益气健脾，活血止痛。用于脾虚腹胀，乏力食少，肺虚咳喘，体虚自汗，气虚水肿，老人夜尿频数，劳伤腰痛，头痛，痛经，跌扑瘀肿。



【编号】 M07257213039FHCMMI H03257214006000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

徐长卿

【来源】 萝藦科植物徐长卿Cynanchum paniculatum (Bge.) Kitag. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于江苏、浙江、安徽、山东、湖北、湖南、河南等地。

【性状特征】 根茎不规则柱状，有的盘状，长0.5～3.5 cm，直径2～4 mm。有的顶端有残茎，呈圆柱状，长约2 cm，直径1～2 mm，中空。根簇生于根茎节处，呈细长圆柱状，弯曲状，长10～16 cm，直径1～1.5 mm。表面淡黄白色至淡棕色或棕色，具微细纵皱纹和纤细的须根。质脆，易折断，断面粉性，皮部类白色或黄白色，形成层环淡棕色，木部细小。气香，味微辛凉。

【品质】 本品以香气浓者为佳。

【性味功效】 辛，温。祛风化湿，止痛止痒，解毒消肿。用于风湿痹痛，胃痛胀满，牙痛，腰痛，跌扑伤痛，小便不利，湿疹，荨麻疹。



【编号】 M07277231037R0CMMI H12957232013003600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

拳参


【来源】 蓼科植物拳参 Polygonum bistorta L. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于华北、西北、山东、江苏、湖北等地。

【性状特征】 根茎扁长条状或扁圆柱状而弯曲，两端略尖，或一端渐细，有的对卷弯曲，长6～13 cm，直径1～2.5 cm。表面紫褐色或紫黑色，粗糙，一面隆起，一面稍平坦或略具凹槽，全体密具粗环纹，有残留须根或根痕。质硬，断面浅棕色或棕红色，维管束呈黄白色点状，排列成环。无臭，味苦、涩。

【品质】 本品以粗大、坚硬、断面色浅红棕者为佳。

【性味功效】 苦、涩，微寒。清热解毒，消肿，止血。用于赤痢，热泻，肺热咳嗽，痈肿，瘰疬，口舌生疮，吐血，衄血，痔疮出血，毒蛇咬伤。



【编号】 M07287057022R0CMMI H30457057010000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

柴胡


【来源】 伞形科植物柴胡 Bupleurum chinense DC. 的干燥根。

【主产地】 主产于东北及河南、河北、陕西等地。

【性状特征】 根呈长圆锥状或圆柱状，长6～15 cm，直径3～8 mm。根头膨大，顶端有残留的3～15个茎基或纤维状的残存叶基，下部分枝。表面浅棕色或黑褐色，具纵皱纹、侧根痕及皮孔，质韧而硬不易折断，断面纤维性，皮部浅棕色，木部黄色。气微香，味微苦辛。

【品质】 本品以主根粗大、须根少、质硬者为佳。

【性味功效】 苦、微寒。解表退热，疏肝解郁，升阳。用于外感发热，寒热往来，疟疾，胸胁胀痛，头痛头眩，月经不调，脱肛，子宫脱垂，胃下垂。



【编号】 M07297213049R0CMMI H07137214012000700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


桃儿七

【来源】 小檗科植物桃儿七 Sinopodophyllum hexandrum (Royle) Ying 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于四川、陕西、甘肃。为地区性药材。

【性状特征】 根茎不规则结节块状，每一结节类球形，直径 0.8～1.2 cm。表面棕褐色，有不明显的环节及众多须根痕。须根圆柱状，直径 1～3 mm，表面棕黄色，平滑，有细皱纹。质硬，折断面黄色，纤维状，横断面皮部平坦，木质部突起，环状排列，髓部小，约占直径的 1/4。气微，味苦。

【性味功效】 苦、微辛，温；有毒。祛风除湿，活血止痛，祛痰止咳。用于风湿痹痛，跌扑损伤，月经不调，痛经，脘腹疼痛，咳嗽。



【编号】 M07317019144FHCMMI H36537019011002200SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

桔梗


【来源】 桔梗科植物桔梗 Platycodon grandiflorum（Jacq.）A.DC. 的干燥根。

【主产地】 全国大部分地区均产。以山东、华北产量最大，称“北桔梗”；以华东产的质量较好，称“南桔梗”。

【性状特征】 根呈圆柱状或略纺锤状，下部渐细，有的分枝，略扭曲，长 7～20 cm，直径 0.7～2 cm。表面白色或淡黄白色，微有光泽，不去外皮者表面黄棕色至灰棕色，具纵扭皱沟，并有横长的皮孔样斑痕及支根痕，上部有横纹。有的顶端有较短的根茎或不明显，其上有数个半月形茎痕。质硬脆，易折断，断面不平坦，形成层环棕色，皮部类白色，有裂隙，木部淡黄白色。气微，无臭，味微甜后苦。

【品质】 本品以根肥大、色白、质充实、味苦者为佳。

【性味功效】 苦、辛，平。宣肺，利咽，祛痰，排脓。用于咳嗽痰多，胸闷不畅，咽痛，音哑，肺痈吐脓，疮疡脓成不溃。



【编号】 M07447243100R0CMMI H29947244014000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

浙贝母

【来源】 百合科植物浙贝母 Fritillaria thunbergii Mig.的干燥鳞茎。

【主产地】 主产于浙江。

【性状特征】 完整的鳞茎呈扁球状，直径 1～2.5 cm，高 1～1.5 cm。表面类白色，外层两枚鳞片肥厚，略似肾形，互相抱合，内有小鳞片 2～3 枚及干缩的残茎。质结实而脆，易折断，断面白色，富粉性。气微，味苦。

【品质】 本品以鳞叶肥厚、质坚实、粉性足、断面色白者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热散结，化痰止咳。用于风热犯肺，痰火咳嗽，肺痈，乳痈，瘰疬，疮毒。



【编号】 M07477293140R0CMMI H18037293020001600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


珠子参

【来源】 五加科植物珠子参 Panax japonicus C.A.Mey. var. major (Burk.) C.Y.Wu et K.M.Feng 的干燥根茎。

【主产地】 主产于云南丽江、迪庆、怒江、大理、楚雄、昭通等地。

【性状特征】 根茎略呈扁球状、圆锥状或不规则菱角状，偶呈连珠状，直径0.5～2.8 cm。表面棕黄色或黄褐色，有明显的疣状突起及皱纹，偶有圆形凹陷的茎痕。有的一侧或两侧有残存细的节间。质坚硬，不易折断，断面不平坦，淡黄白色，粉性。气微，味苦、微甘，嚼之刺喉。蒸煮品断面黄白色或黄棕色，略显角质样，味微苦、微甘，嚼之不刺喉。

【性味功效】 苦、甘，微寒。补肺，清热养阴，散瘀止血，消肿止痛。用于烦热口渴，气阴两虚，虚劳咳嗽，咳血，吐血，关节疼痛，跌扑损伤，外伤出血。



【编号】 M07627212070R0SM H28057213016000203XZDC

【鉴定人】 钟国跃

秦艽

【来源】 龙胆科植物秦艽 Gentiana macrophylla Pall. 的干燥根。

【主产地】 主产于陕西、甘肃。以甘肃产量最大，质量最好。

【性状特征】 根类圆柱状或圆锥状，上粗下细，扭曲不直，长7～30 cm，直径1～3 cm。表面棕黄色或灰黄色，具纵向或扭曲的纵沟。根头部常膨大，有残存茎基及纤维状叶鞘。质坚脆，易折断，断面略显油性，皮部黄色或棕黄色，木部黄色。气特异，味苦而微涩。

【品质】 本品以质实、色棕黄、气味浓厚者为佳。

【性味功效】 辛、苦，平。祛风湿，清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸痛，骨节潮热，小儿疳积发热。



【编号】 M07717239027R0CMMI H18367240007012400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

粉甘草


【来源】 豆科植物甘草 Glycyrrhiza uralensis Fisch. 去掉栓皮的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于内蒙古、甘肃、新疆等地。以内蒙古阿拉善杭旗一带的产者品质最佳，新疆产量最大。

【性状特征】 根及根茎圆柱状，长25～100 cm，直径0.6～3.5 cm。表面淡黄色，平坦，有刀削及纵裂纹。质坚实，断面略显纤维性，黄白色，具粉性，形成层环明显，呈放射状射线排列，少有裂隙。气微，味甜而特殊。

【品质】 本品以色淡黄、光滑、质坚实、断面色黄白、粉性足者为佳。

【性味功效】 甘，平。补脾和胃，益气复脉。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心动悸，脉结代，补中益气，缓急止痛。



【编号】 M07757148330R0CMMI H18897148072000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

粉防己

【来源】 防己科植物粉防己 Stephania tetrandra S. Moore 的干燥根。

【主产地】 主产于浙江、安徽、湖北、湖南、江西等地。

【性状特征】 根为不规则圆柱状、半圆柱状或块状，多弯曲，长5～10 cm，直径1～5 cm。表面淡灰黄色，在弯曲处常有深陷横沟而成结节状的瘤块样。体重，质坚实，断面平坦，灰白色，富粉性，有排列稀疏的放射状纹理。气微，味苦。

【品质】 本品以质坚实、内色白、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦，寒。利水消肿，祛风止痛。用于水肿，脚气，小便不利，湿疹疮毒，风湿痹痛，高血压。



【编号】 M07767023056R0CMMI H37827023017000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

粉萆薢

【来源】 薯蓣科植物粉背薯蓣 Dioscorea hypoglauca Palibin 的干燥根茎。

【主产地】 主产于浙江、安徽、江西、湖南等地。

【性状特征】 切片为不规则的薄片，边缘不整齐，大小不一，厚约0.5 mm，有的有棕黑色或灰棕色的外皮。切面黄白色或灰棕色，平坦，细腻，维管束呈小点状散在。质松，略有弹性，易折断。气微，味辛、微苦。

【品质】 本品以片大而长、切面色黄白者为佳。

【性味功效】 苦，平。利湿祛浊，祛风除痹。用于膏淋，白浊，白带过多，风湿痹痛，关节不利，腰膝疼痛。



【编号】 M07777311008R0CMMI H14487311001005300SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

粉葛

【来源】 豆科植物甘葛藤 Pueraria thomsonii Benth. 的干燥根。


【主产地】 主产于广西、广东。

【性状特征】 根呈圆柱状、类纺锤状或半圆柱状，长与直径皆不等；有的纵切或斜切为厚片，大小不一。除去外皮的表面黄白色或淡黄色或淡棕色，未去外皮的呈灰棕色。横切面可见由纤维形成的浅棕色同心性环层，纵切面可见纤维与粉质相间形成的数条纵纹，纤维性较弱，有的呈绵毛状。质坚硬而重，富粉性。气微，味微甜。

【品质】 本品以块肥大、质坚实、色白、粉性足、纤维少者为佳。

【性味功效】 甘、辛，平（凉）。解肌退热，生津止渴，发表透疹，升阳止泻。用于外感发热，头项胀痛，温病口渴，消渴，麻疹不透，痢疾，泄泻；高血压颈项痛及冠心病心绞痛。

【附注】 本品作为“葛根”入药。



【编号】 M07787148549R0CMMI H31997148124000700SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

素花党参

【来源】 桔梗科植物素花党参 Codonopsis pilosula Nannf. var. modesta（Nannf.）L.T.Shen 的干燥根。

【主产地】 主产于甘肃、陕西及四川西北部。以四川南坪、松潘，甘肃义县产者质量最佳。

【性状特征】 根长圆柱状，稍弯曲，长10～35 cm，直径0.5～2.5 cm。表面黄白色至灰黄色，根头下致密的环状横纹常达全长的一半以上，栓皮粗糙，多缢缩或扭曲，油点多。质坚韧，断面不甚平整，裂隙较多，皮部灰白色至淡棕色，木部淡黄色。有特异香气，味微甜，嚼之有渣。

【品质】 本品以根肥大、色白、质充实、味苦者为佳。

【性味功效】 苦、辛，平。宣肺，利咽，祛痰，排脓。用于咳嗽痰多，胸闷不畅，咽痛，音哑，肺痈吐脓，疮疡脓成不溃。

【附注】 本品作为“党参”入药。



【编号】 M07797243062R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

高良姜

【来源】 姜科植物高良姜 Alpinia officinarum Hance 的干燥根茎。

【主产地】 主产于广东、海南、广西。以广东产质佳。

【性状特征】 根茎圆柱状，多弯曲，有分枝，长4～9 cm，直径1～1.5 cm。表面棕红色至暗褐色，有细密纵皱纹和灰棕色波状环节，节间长0.2～1 cm，一面具圆形的根痕。质坚韧，不易折断，断面灰棕色或红棕色，纤维性，中柱约占1/3，内皮层环较明显，散有维管束点痕。气香，味辛辣。

【品质】 本品以分枝少、色红棕、气香浓、味辣者为佳。

【性味功效】 辛，热。温胃散寒，消食止痛。用于脘腹冷痛，胃寒呕吐，嗳气吞酸。



【编号】 M08047290025R0CMMI H02267290002003400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

匙叶甘松

【来源】 败酱科植物匙叶甘松 Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 根及根茎略呈圆锥状，多弯曲，长5～18 cm。根茎短小，上端密被叶鞘纤维。外层黑棕色，内层棕色或黄色。根单一或数条交结，分枝或并列，直径0.3～1 cm。表面棕褐色，皱缩，有细根及须根。质松脆，易折断，断面粗糙，皮部深棕色，常成裂片状，木部黄白色。气特异，味苦而辛，有清凉感。

【品质】 本品以条长、根粗、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、甘，温。理气止痛，开郁醒脾。用于脘腹胀满，食欲不振，呕吐；外治牙痛，脚肿。

【附注】 本品作为“甘松”入药。



【编号】 M02377235002R0XZDC H26817236001000200XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

商陆


【来源】 商陆科植物商陆 Phytolacca acinosa Roxb. 的干燥根。

【主产地】 主产于河南、安徽、湖北等地。

【性状特征】 根圆锥状，有多数分枝，长 10～20 cm，直径 1.5～10 cm。表面灰棕色或灰黄色，皱缩，有明显的横向条状皮孔及纵沟纹。药材商品为横切或纵切的不规则块片，大小厚薄不等，外皮灰黄色或灰棕色。横切片弯曲不平，边缘皱缩，直径2～8 cm；切面浅黄棕色或黄白色，带粉性，木部隆起，形成数个突起的同心形环轮。纵切片弯曲或卷曲，长 5～8 cm，宽 1～2 cm，表面凹凸不平，木部呈平行条状突起。质硬，不易折断。气微，鲜品略有轻微的刺激性气味，味稍甜，久嚼麻舌。

【品质】 本品以块片大、色白者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有毒。逐水消肿，通利二便，解毒散结。用于水肿胀满，二便不通；外治痈肿疮毒。



【编号】 M08107059001R0CMMI H29367059001000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

常山

【来源】 虎耳科植物常山 Dichroa febrifuga Lour. 的干燥根。

【主产地】 主产于四川、贵州。以四川产量最大，质量最佳。

【性状特征】 根圆柱状，常弯曲，有分枝，长 9～15 cm，直径 0.5～2 cm。表面棕黄色，具细纵纹，外皮易剥落而露出淡黄色木部。质坚硬，不易折断，折断时有粉尘飞扬，断面不整齐，横切面黄白色，有放射状纹理。气微，无臭，味苦。

【品质】 本品以色淡黄、质坚、体重者为佳。

【性味功效】 苦、辛，寒；有毒。截疟，祛痰。用于疟疾。



【编号】 M08147047039R0CMMI H14227047009000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

猫爪草

【来源】 毛茛科植物小毛茛 Ranunculus ternatus Thunb. 的干燥块根。

【主产地】 主产于河南及长江中游各地。

【性状特征】 块根纺锤状，多5～6个簇生，形似猫爪，长 3～10 mm，直径 2～3 mm，顶端有黄褐色残茎或茎痕。表面黄褐色或灰黄色，久存色泽变深，微有纵皱纹，并有点状须根痕和残留须根。质坚实，断面类白色或黄白色，空心或实心，粉性。气微，味微甘。

【品质】 本品以身干、色黄褐、体饱满、质坚实者为佳。

【性味功效】 甘、辛，温。散结，消肿。用于瘰疬未溃，淋巴结结核。



【编号】 M08347015422R0CMMI H32627015037008400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


盘龙七

【来源】 虎耳草科植物秦岭岩白菜 Bergenia scopulosa T.P.Wang 的干燥根茎。

【主产地】 主产于西藏。

【性状特征】 根茎近圆柱状，一端稍细，直径 2.5～4 cm。表面褐色，密被褐色鳞片及残存叶鞘，并有棕红色细根痕。质坚硬，难折断，断面棕红色，显粉性。气微，味涩、微苦。

【性味功效】 涩、微苦，平。补益脾胃，收涩固肠，利水活血。用于急慢性肠胃炎，痢疾，浮肿，淋症，白带，崩漏，黄水疮，秃疮，疥癣。



【编号】 M08367047012FHCMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

粗茎秦艽

【来源】 龙胆科植物粗茎秦艽Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk. 的干燥根。

【主产地】 主产于甘肃、青海、四川、云南等地。

【性状特征】 根略圆柱状，较粗大，多不分枝，少互相纽绕，长 12～20 cm，直径 1～3.5 cm。表面黄棕色或暗棕色，有粗的纵皱纹。根头有淡黄色叶柄残基及纤维状的叶基维管束。质较坚实，断面木质部与韧皮部间有棕色环。味苦、涩。

【品质】 本品以质实、色棕黄、气味浓厚者为佳。

【性味功效】 辛、苦，平。祛风湿，清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸痛，骨节潮热，小儿疳积发热。

【附注】 本品作为“秦艽”入药。



【编号】 M08397239016R0CMMI H18327240007004300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

续断


【来源】 川续断科植物川续断 Dipsacus asperoides C. Y. Cheng et T. M. Ai 的干燥根。

【主产地】 主产于湖北、四川、贵州。

【性状特征】 根圆柱状，略扁，有的微弯曲，长 5～15 cm，直径 0.5～2 cm。表面灰褐色或黄褐色，有稍扭曲或明显扭曲的纵皱纹及沟纹，可见横裂的皮孔及少数须根痕。质软，久置干燥后变硬，易折断，断面不平坦，皮部墨绿色或棕色，外缘褐色或淡褐色，木部黄褐色，导管束呈放射状排列。气微香，味苦、味甜而后涩。

【品质】 本品以条粗、质软、皮部色绿褐者为佳。

【性味功效】 苦、辛，微温。补肝肾，强筋骨，续折伤，止崩漏。用于腰膝酸软，风湿痹痛，崩漏，胎漏，跌扑损伤。



【编号】 M08407236001R0CMMI H14727237001000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

绵马贯众

【来源】 鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨 Dryopteris crassirhizoma Nakai 的干燥根茎及叶柄残基。

【主产地】 主产于东北、内蒙古、河北、甘肃等地。

【性状特征】 根茎长倒卵状，略弯曲，上端钝圆或截形，下端较尖，有的纵剖为两半，长 7～20 cm，直径 4～8 cm。表面黄棕色或黑褐色，密被排列整齐的叶柄残基及鳞片，并有弯曲的须根。叶柄残基呈扁圆形，长 3～5 cm，直径 0.5～1 cm；表面有纵棱线，质硬而脆，断面略平坦，棕色，有黄白色环列维管束 5～13 个；每个叶柄残基的外侧常有 3 条须根，鳞片条状披针形，全缘，常脱落。质坚硬，断面略平坦，深绿色至棕色，有黄白色环列维管束 5～13 个，其外散有较多的叶迹维管束。气特异，味初淡而微涩，后渐苦、辛。

【品质】 本品以个大、质坚实、叶柄断面色棕绿者为佳。

【性味功效】 苦，微寒；有小毒。清热解毒，凉血止血，驱虫杀虫。用于虫积腹痛，疮疡，风热感冒，湿热斑疹，吐血，咳血。绵马贯众炭止血，用于崩漏。



【编号】 M08415045022R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

绵萆薢


【来源】 薯蓣科植物绵萆薢 Dioscorea septemloba Thunb. 的干燥根茎切片。

【主产地】 主产于浙江、江西、福建。

【性状特征】 根茎切片为不规则的斜切片或纵切片，大小不一，厚 2～5 mm，边缘不整齐。外皮黄棕色至黄褐色，较厚，有稀疏的呈圆锥形突起的须根残基，周边多卷曲。切面灰白色至浅灰棕色，粗糙，黄棕色点状维管束散在。质疏松，略呈海绵状，易折断。气微，味微苦。

【品质】 本品以片大、色白者为佳。

【性味功效】 苦，平。利湿去浊，祛风通痹。用于淋病白浊，白带过多，湿热疮毒，腰膝痹痛，湿痹。



【编号】 M08447311033R0CMMI H14567311001004200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

银柴胡


【来源】 石竹科植物银柴胡 Stellaria dichotoma L. var. lanceolata Bge.的干燥根。

【主产地】 主产于宁夏、甘肃、内蒙古等地。宁夏为道地产区。

【性状特征】 根类圆柱状，偶有分枝，长 15～40 cm，直径 0.5～2.5cm。表面浅棕黄色至浅棕色，有扭曲的纵皱纹及支根痕，多具孔穴状或盘状凹陷，习称“砂眼”，从“砂眼”处折断可见棕色裂隙中有细砂散出。根头部略膨大，有密集的呈疣状突起的芽苞、茎或根茎的残基，习称“珍珠盘”。质硬而脆，易折断，断面不平坦，较疏松，有裂隙，皮部甚薄，木部有黄、白色相间的放射状纹理。气微，味甘。

【品质】 本品以根条细长、表面色黄白并显光泽、顶端有“珍珠盘”、质细润者为佳。

【性味功效】 甘，微寒。清虚热，除疳热。用于阴虚发热，骨蒸劳热，小儿疳热。



【编号】 M08627053094R0CMMI H37607053029000301CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

雪山一枝蒿

【来源】 毛茛科植物伏毛铁棒锤 Aconitum flavum Hand.-Mazz. 的干燥块根。

【主产地】 主产于云南、四川。

【性状特征】 块根圆柱状，长 6～8 cm，直径 1～1.5 cm。表面棕色或灰棕色，光滑或有浅皱纹及侧根痕。质脆，易折断，断面乳白色，粉性。气微，味苦麻，有毒。

【品质】 本品以质硬脆、断面色白、粉性足者为佳。

【性味功效】 苦、平，温。活血祛瘀，祛风除湿，消肿止痛。用于跌扑损伤，骨折瘀肿疼痛，风湿腰痛，痈肿恶疮，无名肿痛，瘰疬未溃者，毒蛇咬伤，冻疮。



【编号】 M08657015043R0XZDC H00637015001006000XZDC

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

麻花秦艽

【来源】 龙胆科植物麻花秦艽 Gentiana straminea Maxim. 的干燥根。


【主产地】 主产于甘肃、青海、四川、湖北等地。

【性状特征】 根类圆锥状，长 8～18 cm，直径 1～3 cm，多由数个小根纠聚交错扭转而膨大，略成网状或麻花状，直径可达 7 cm。表面棕褐色，粗糙，具深的网状孔纹裂隙。质松脆，易折断，断面多呈枯朽状。气特殊，味苦而微涩。

【品质】 本品以质实、色棕黄、气味浓厚者为佳。

【性味功效】 辛、苦，平。祛风湿，清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸痛，骨节潮热，小儿疳积发热。

【附注】 本品作为“秦艽”入药。



【编号】 M08737239058R0SM H18467240007020300XZDC

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦


黄山药

【来源】 薯蓣科植物黄山药 Dioscorea panthacia Prain et Burkill 的干燥根茎。

【主产地】 主产于云南。

【性状特征】 根茎圆柱状，有的略弯曲。直径 2～3 cm。表面黄棕色，具纵皱纹和呈深棕色的须根痕或须根。质硬而韧，断面白色绒毛状，散布有很多黄色点状维管束。气微，味微甜。

【性味功效】 甘、微辛，平。解毒消肿，止痛。用于外治淋巴结结核。



【编号】 M08797311027R0SM H14547311001003600SM

【鉴定人】 秦松云

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄甘草

【来源】 豆科植物黄甘草 Glycyrrhiza eurycarpa P. C. Li 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于新疆、甘肃等地。

【性状特征】 根茎表面淡黄色或灰黄色，有鳞片，带有芽痕，断面中部有髓。根呈长圆柱状，直径 3～7 mm，外皮褐色至深褐色，有显著的纵皱纹、沟纹及较规则的横生皮孔。横断面黄色或黄白色，可见放射状纹理，有粉性，质不坚实，嚼之多纤维，味甜。

【品质】 本品以根条粗壮、身干、粉性足者为佳。

【性味功效】 甘，平。和中缓急，润肺，解毒，调和诸药。用于脾胃虚弱，腹痛便溏，劳倦发热，肺痿咳嗽。

【附注】 本品在产区亦作甘草入药用，但其质量稍次于正品甘草。



【编号】 M08817148325R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

黄芩

【来源】 唇形科植物黄芩 Scutellaria baicalensis Georgi 的干燥根。

【主产地】 主产于东北、河北、山西、河南、陕西、内蒙古等地。以山西产量最大，河北承德质量最好。

【性状特征】 根圆锥状，扭曲，长 8～25 cm，直径 1～3 cm。表面棕黄色或深黄色，有稀疏的疣状细根痕，上部较粗糙，有扭曲的纵皱纹或不规则的网纹，下部有顺纹和细皱。质硬而脆，易折断，断面黄色，中间红棕色，老根中心枯朽或中空，呈暗棕色或棕黑色。气微，味苦。

【品质】 本品以条长、质坚实、色黄者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿温、暑湿胸闷呕恶，湿热痞满，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热吐衄，痈肿疮毒，胎动不安。



【编号】 M08827264335R0CMMI H35677265090000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

黄连


【来源】 毛茛科植物黄连 Coptis chinensis Franch. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于四川、湖北。

【性状特征】 根茎多集聚成簇，常弯曲互抱，形似鸡爪，单枝根茎长 3～6 cm，直径 3～8 mm。表面灰黄色或黄棕色，粗糙，有不规则结节状隆起、须根及须根残基，有的节间表面平滑如茎杆，习称“过桥”。上部多残留褐色鳞叶，顶端常留有残余的茎或叶柄。质硬，断面不整齐，皮部橙红色或暗棕色，木部鲜黄色或橙黄色，呈放射状排列，髓部有的中空。气微，味极苦。

【品质】 本品以身干、条粗壮、残留叶柄及须根少、连珠形、质坚实、断面色红黄、有菊花心者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。用于湿热痞满，呕吐吞酸，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衄，目赤，牙痛，消渴，痈肿疔疮；外治湿疮，湿疹，耳道流脓。



【编号】 M08847015281R0CMMI H11267015019000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


黄苞南星

【来源】 天南星科植物黄苞南星 Arisaema flavum (Forsk.) Schott. 的块茎。

【主产地】 主产于西藏、四川西南部、云南西北部。

【性状特征】 块茎呈扁球状，长 1～2 cm，直径 1.5～6.5 cm。表面类白色或淡棕色，较光滑，顶端有凹陷的茎痕，周围有麻点状根痕，有的块茎周边有小扁球状侧芽。质坚硬，不易破碎，断面不平坦，白色，粉性。气微辛，味麻辣。

【性味功效】 辛、消化后苦，轻、糙而锐、温。驱虫，消肿散结，解毒，祛腐肉。用于蛲虫病，蛔虫病，骨质增生，骨肿瘤，中毒症。



【编号】 M08887302038R0XZDC H03837302008003200XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

黄药子

【来源】 薯蓣科植物黄独 Dioscorea bulbifera L. 的干燥块茎。

【主产地】 主产于湖北、湖南、江西等地。

【性状特征】 块茎多为圆状或正圆状，直径 2.5～10 cm，厚 0.3～1.5 cm。外皮薄，易脱落，表皮棕黑色，皱缩，有众多黄白色或白色或棕黄色的突起的须根痕，或有弯曲残留的细根。切面黄白色至黄棕色，平坦或呈颗粒状凹凸不平。质坚脆，易折断，断面色黄白颗粒状。气微，味苦。

【品质】 本品以外皮棕黑色、断面色黄白者为佳。

【性味功效】 苦，寒。散结消瘿，清热解毒，止血凉血。用于瘿瘤，喉痹，痈肿疮毒，肿瘤，吐血，衄血咯血，百日咳，肺热咳喘。



【编号】 M08937311004R0CMMI H14417311001001100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

黄脚鸡

【来源】 百合科植物剑叶假万寿竹 Disporopsis pernyi (Hua) Diels 的干燥根茎。

【主产地】 主产于贵州。

【性状特征】 根茎呈圆柱状，弯曲，长 5～20 cm，直径 2～7 mm。表面黄棕色至棕褐色，每隔 2～4 cm 有一圆盘状茎痕，黄棕色，直径 2～6 mm，在两个茎痕之间，有隆起的浅棕色环节，节间疏密不等，并有小圆点状的细根痕散在。质较坚硬，易折断，断面角质状，有明显的内皮层环。气无，味微甘，稍苦，具黏性。

【品质】 本品以根茎粗壮、坚实、断面角质状明显者为佳。

【性味功效】 和性药。养阴润燥，生津止渴。用于热病咽干，干咳少痰，糖尿病等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M08947293089R0GYCM H14757293014000400GYCM

【鉴定人】 何顺志

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄精

【来源】 百合科植物黄精 Polygonatum sibiricum Red. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于河北、内蒙古、陕西。

【性状特征】 根茎呈结节状弯柱形，一端粗，类圆盘状，一端渐细，全形略似鸡头，长 2.5～ 11 cm，粗端直径 0.5～1.5 cm，常有短分枝，上有明显茎痕，茎痕圆形，直径 5～8 mm，细端直径 5～10 mm，环节明显，节间距离 5～15 mm，有较多须根或须根痕。表面黄白色或灰黄色，半透明，有纵皱纹。质硬脆或稍柔韧，易折断，断面黄白色，颗粒状，有众多黄棕色维管束小点。气微，味微甜。

【品质】 本品以块大、肥润、色黄、断面透明者为佳。

【性味功效】 甘，平。补气养阴，健脾，润肺，益肾。用于脾胃虚弱，体倦乏力，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，内热消渴，肾亏腰膝酸软，阳萎遗精，耳鸣目暗，须发早白，风癫癣疾。



【编号】 M08957293286R0CMMI H30377293040002700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

喜马拉雅紫茉莉


【来源】 紫茉莉科植物喜马拉雅紫茉莉 Mirabilis himalaica (Edgew.) Heim. 的干燥根。

【主产地】 主产于陕西、甘肃、四川、云南、西藏等地。

【性状特征】 根圆柱状，常横切或纵切成大小不规则的块片。横切者类圆柱状或圆片状，直径达 4 cm，栓皮表面棕褐色或灰褐色，粗糙，有纵沟纹、横长皮孔样突起及支根痕。质坚实，不易折断，断面灰白色，有凹凸不平的同心环纹，纵剖面有纵条纹，具粉性。微有土腥气，味辛、涩，嚼之有刺喉感。

【性味功效】 甘、微辛，微温。温阳，利尿，生肌，排石，干“黄水”。用于胃寒，肾寒，下身寒，阳萎，浮肿，膀胱结石，腰痛，关节痛，淋症，“黄水”病。

【附注】 藏族习用药材。《八支》、《鲜明注释》、《蓝琉璃》、《晶珠本草》、《甘露本草明镜》等皆有记载。



【编号】 M08967083004R0XZDC H26177083003000200XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

塔黄

【来源】 蓼科植物高山大黄 Rheum nobile Hook.f.et Thoms. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于西藏。

【性状特征】 根茎圆锥状或类圆锥状，长 8～20 cm，直径 3～8 cm，顶端留有残基，栓皮褐棕色，粗糙具多横皱纹。断面棕褐色，无星点。新断面在紫外灯下显紫色荧光。质硬，味苦涩。

【性味功效】 苦，寒。泻热，导滞，散结，消肿。用于实热便秘，谵语发狂，食积痞滞，痢疾，湿热发黄，目赤头痛，闭经，癥瘕，痈肿疔毒。



【编号】 M03367057111R0XZDC H32907057012000700XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

棉团铁线莲

【来源】 毛茛科植物棉团铁线莲Clematis hexapetata Pall. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于辽宁、吉林、黑龙江、山东等地。

【性状特征】 根茎短柱状，长1～4 cm，直径0.5～1 cm。表面淡棕黄色，顶端残留茎基。质较坚韧，断面纤维性，下侧着生多数细根。根较少，长4～20 cm，直径1～2 mm。表面棕褐色至棕黑色。质硬脆，易折断，断面木部圆形细小，占根直径的1/2以下，与皮部间常有裂隙。气微，味咸。

【品质】 本品以条均匀、质坚实、皮黑肉白者为佳。

【性味功效】 辛、咸，温。祛风除湿，通络止痛。用于风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，屈伸不利，骨哽咽喉。

【附注】 本品作为“威灵仙”入药。



【编号】 M0623701535R0CMMI H10347015017005100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

温郁金

【来源】 姜科植物温郁金Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling的干燥块根。


【主产地】 主产于浙江。

【性状特征】 块根长圆状或卵圆状，稍扁，有的微弯曲，两端渐尖，长3～7 cm，直径1～2.5 cm。表面灰褐色或灰棕色，具不规则的纵皱纹，纵纹隆起处色较浅。质坚实，断面灰棕色或灰绿色，具蜡样光泽，角质样，内皮层环明显。气微香，味微苦。

【品质】 本品以个大、质坚实、外皮皱纹细、断面色黄者为佳。

【性味功效】 辛、苦，寒。行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。用于经闭痛经，胸腹胀痛、刺痛，热病神昏，癫痫发狂，黄疸尿赤。

【附注】 本品作为“郁金”入药。



【编号】 M09057290073R3CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

温莪术

【来源】 姜科植物温郁金Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling的干燥根茎。

【主产地】 主产于浙江。

【性状特征】 根茎长卵圆状或长圆状或纺锤状，顶端长尖，基部多钝圆，长3.5～8 cm，直径2～4.5 cm。表面灰棕色或灰黄色，粗糙，上部环节凸起，基部有下陷的须根痕，芽痕及侧生根茎痕不明显，有刀削痕。质坚实，断面黄棕色至棕褐色，角质样，常附有淡黄色至黄棕色粉末，有点状或条状维管束。气微香，味微苦而辛。

【品质】 本品以质坚实、气香者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。行气破血，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘀血经闭，食积胀痛。

【附注】 本品作为“莪术”入药。



【编号】 M09067290073R2CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

湖北麦冬


【来源】 百合科植物湖北麦冬 Liriope spicata (Thunb.) Lour. var. prolifera Y. T. Ma 的干燥块根。

【主产地】 主产于湖北襄阳、老河口、谷城等地，均为栽培。

【性状特征】 块根呈纺锤状，两端渐尖，长 1.2～3 cm，直径 4～7 mm。表面淡黄色至棕黄色，具不规则的纵皱纹。质柔韧，干后质硬脆，易折断，断面淡黄色至棕黄色，角质样，中柱细小。气微，味甜，嚼之发黏。

【品质】 本品以肥大、色淡黄白、半透明、质柔、嚼之发黏者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，微寒。养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，虚劳咳嗽，津伤口渴，心烦失眠，肠燥便秘。



【编号】 M09077293214R0CMMI H23837293029000601SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

硬紫草

【来源】 紫草科植物紫草 Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc. 的干燥根。


【主产地】 主产于东北、华北。

【性状特征】 根圆锥状，扭曲，有分枝，长 7～14 cm，直径 1～2 cm。表面紫红色或紫黑色，粗糙有纵纹，皮部薄，易剥落。质硬而脆，易折断，断面皮部深紫色，木部较大，灰黄色。气特异，微臭，味酸、甜。

【品质】 本品以条粗长、肥大、色紫、皮厚、木心小者为佳。

【性味功效】 甘、咸，寒。凉血，活血，解毒透疹。用于血热毒盛，斑疹，麻疹，湿疹，疮疡，吐血，衄血，水火烫伤。

【附注】 本品作为“紫草”入药。



【编号】 M09167249024R0CMMI H23887250027000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

紫花前胡

【来源】 伞形科植物紫花前胡 Peucedanum decursivum Maxim. 的干燥根。

【主产地】 主产于江西、安徽。

【性状特征】 根圆柱状或圆锥状，有少数支根，长 7～15 cm，直径 0.8～1.7 cm。根头顶端有的具残留茎基，茎基周围常有膜状叶鞘基部残留。表面棕色至黑棕色，有浅直细纵皱纹，并有灰白色横向皮孔及点状须根痕。质较柔软，可折断，断面类白色，射线不明显，皮部易与木部分离。气芳香，味微苦、辛。

【品质】 本品以条粗壮、质柔软、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛，微寒。散风清热，降气化痰。用于外感风热，肺热痰郁，咳嗽痰多，疾热喘满，咯痰黄稠。

【附注】 本品作为“前胡”入药。



【编号】 M06047213017R0SM H28847214065003900JXCM

【鉴定人】 舒光明

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紫茉莉根

【来源】紫茉莉科植物紫茉莉 Mirabilis jalapa L. 的干燥根。

【主产地】全国各地均产。

【性状特征】根长圆锥状或圆柱状，有的压扁，有的可见支根，长 5～10 cm，直径 1.5～5 cm。表面灰黄色，有纵皱纹及须根痕，顶端有茎基痕。质坚硬，不易折断，断面不整齐，可见纤维状断头，略成同心环状排列。经蒸煮者断面角质样。无臭，味淡，有刺喉感。

【性味功效】甘、淡，微寒；有小毒。清热利湿，解毒活血。用于热淋，白浊，水肿，赤白带下，关节肿痛，痈疮肿毒，乳痈，跌扑损伤。



【编号】M09257083005FHCMMI H26187083003000100GYCM

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

紫菀

【来源】菊科植物紫菀 Aster tataricus L. f. 的干燥根及根茎。

【主产地】主产于河北、安徽。

【性状特征】根茎不规则块状，大小不一，长 2～5 cm，直径 1～3 cm，顶端有茎、叶的残基。质稍硬，断面较平坦，显油性。根茎簇生多数细根，长 6～15 cm，直径 1～3 mm，多编成辫状。表面紫红色或灰红色，有纵皱纹。质较柔韧，易折断，断面淡棕色，边缘一圈显紫红色，中央有细小木心。气微香，味甜、微苦。

【品质】本品以根长、色紫红、质柔韧者为佳。

【性味功效】苦、辛，温。润肺下气，消痰止咳。用于痰多喘咳，新久咳嗽，劳嗽咳血。



【编号】M0930723817R0CMMI H05137239025008100CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

紫萁贯众

【来源】紫萁科植物紫萁 Osmunda japonica Thunb. 的干燥根茎及叶柄残基。

【主产地】主产于河南、甘肃、山东、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、四川、云南、贵州等地。

【性状特征】根茎呈圆锥状、近纺锤状、类球状或不规则长球状，稍弯曲，先端钝，有时具分枝，下端较尖，长 10～30 cm，直径 4～8 cm。表面棕褐色，密被斜生的叶柄基部和黑色须根，无鳞片。叶柄残基呈扁圆柱状，长径 7 mm，短径 3.5 mm，背面稍隆起，边缘钝圆，耳状翅易剥落，多已不存或呈撕裂状。质硬，折断面呈新月形或扁圆形，多中空，可见一个“U”字形的中柱。气微弱而特异，味淡、微涩。

【性味功效】苦，微寒；有小毒。清热解毒，祛瘀止血，杀虫。用于流感，流脑，乙脑，腮腺炎，痈疮肿毒，麻疹，水痘，痢疾，吐血，衄血，便血，崩漏，带下，绦虫、钩虫等肠道寄生虫病。



【编号】M09315013004H0GYCM H27665013001000500GYCM

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

萱草根

【来源】 百合科植物萱草 Hemerocallis fulva L. 的干燥根茎及根。

【主产地】 主产于东北及华北地区。

【性状特征】 根茎呈短圆柱状，长 1～1.5 cm，直径约 1 cm，有的顶端留有叶残基。根簇生，多数已折断，完整的根长5～15 cm，上部直径3～4 cm，中下部膨大成纺锤形块根，直径0.5～1 cm，多干瘪纵皱，有多数纵皱纹及少数横纹，表面淡黄色或淡灰棕色。体轻，质松软，稍有韧性，不易折断，断面灰棕色或暗棕色，有多数放射状裂隙。气微香，味苦。

【品质】 本品以根粗壮而密、色淡黄者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经，有毒。清热，利尿，消肿。用于浮肿，小便不利等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M09347293165R0GYCM H19827293024000500GYCM

【鉴定人】 何顺志

葛根


【来源】 豆科植物野葛 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 的干燥根。

【主产地】 主产于湖南、河南、广东、浙江、四川等地。

【性状特征】 根完整者呈圆柱状，常斜切、纵切或横切成片块，大小不一。纵切的长方形片块长 5～35 cm，厚 0.5～1 cm，宽 4～15 cm。表面褐色或浅棕色，具纵皱纹，可见横向皮孔及须根痕。切面黄白色，粗糙，纹理不明显。质韧，纤维性强，略具粉性。气微，无臭，味淡、微甜。

【品质】 本品以块肥大、质坚实、色白、粉性足、纤维少者为佳。

【性味功效】 甘、辛，平（凉）。解肌退热，生津止渴，发表透疹，升阳止泻。用于外感发热头疼、项背强痛，温病口渴，消渴，麻疹不透，痢疾，泄泻；高血压颈项痛及冠心病心绞痛。



【编号】 M09367148544R0CMMI H31967148124000200SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦


隔山撬

【来源】 萝藦科植物耳叶牛皮消 Cynanchum auriculatum Royle ex Wight 的干燥根。

【主产地】 主产于山东、河北、河南、陕西、甘肃、西藏、安徽、江苏等地。

【性状特征】 根类圆柱状，大小不等。表面黑褐色，有横长皮孔。折断面白色，多小点。味先苦后甜。

【性味功效】 甘、微苦，平。 补肝肾，益精血，强筋骨，止心痛，健脾益气。用于肝肾阴虚所致的头昏眼花，失眠健忘，须发早白，腰膝酸软，筋骨不键，胸闷心痛，消化不良。



【编号】 M09477231022FHCMMI H12837232013000600GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黑骨藤

【来源】 萝藦科植物西南杠柳 Periploca forrestii Schltr. 的干燥根或枝叶。

【主产地】 主产于贵州、云南、西藏。

【性状特征】 根呈长圆柱状，直径 0.3～2 cm，常呈不规则弯曲或螺旋状，具分枝，有的顶端粗大。表面黑褐色或浅棕色，有较深的皮孔及支根痕。栓皮呈鳞片状剥离。内皮白色，粉质。木部发达，淡黄色，较平滑，具旋钮状纹。质坚硬，易折断，断面黄白色，不整齐。气微香，味苦。茎枝细长，纤维性强。叶对生，呈狭披针形，长 2.3～6 cm，宽 0.4～1 cm，先端尖，基部阔楔形，全缘，两面均光滑，叶柄短。

【品质】 本品以粗壮、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经，有小毒。通经络，祛风湿，活血，消炎。用于跌扑损伤，风湿关节痛，月经不调，口腔炎，乳腺炎，疮痈等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M09547231096R0GYCM H28797232035000300GYCM

【鉴定人】 陈德媛

滇黄芩

【来源】 唇形科植物滇黄芩 Scutellaria amoena C. H. Wright 的干燥根。

【主产地】 主产于云南、四川、贵州等地。

【性状特征】 根呈圆锥形的不规则条状，常有分枝，长5～20 cm，直径 1～1.6 cm。表面黄褐色或棕黄色，常有粗糙的栓皮，有皱纹，下端有支根痕。质硬而脆，易折断，断面纤维状，鲜黄色或微带绿色。气微，味苦。

【品质】 本品以条长、质坚实、色黄者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿温、暑湿胸闷呕恶，湿热痞满，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热吐衄，痈肿疮毒，胎动不安。



【编号】 M09607264333R0CMMI H35667265090000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

滇黄精

【来源】 百合科植物滇黄精 Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl. 的干燥根茎。


【主产地】 主产于广西、云南、贵州。

【性状特征】 根茎呈肥厚肉质的结节块状或串珠状，结节长可达 10 cm 以上，宽 3～6 cm，厚 2～3 cm。表面淡黄色至黄棕色，具环节，有不规则皱纹及须根痕，结节上茎痕呈圆盘状，圆周凹入，中部突出。质坚实而韧，不易折断，断面淡黄色至黄棕色，角质样。气微，略带焦糖气，味甜，嚼之有黏性。

【品质】 本品以块大、肥润、色黄、断面透明者为佳。

【性味功效】 甘，平。补气养阴，健脾，润肺，益肾。用于脾胃虚弱，体倦乏力，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，内热消渴，肾亏腰膝酸软，阳萎遗精，耳鸣目暗，须发早白，风癞癣疾。

【附注】 本品作为“黄精”入药。



【编号】 M09617293279R0CMMI H30317293040001800SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

福参

【来源】 伞形科植物福参 Angelica morii Hayata 的干燥根。

【主产地】 主产于福建。

【性状特征】 根纺锤状或圆锥状，长8～12 cm，上部直径2～3 cm。表面淡黄棕色或黄灰色，具纵沟纹及少数横皱纹。质坚硬，可折断，断面黄白色。具香气。

【性味功效】 辛、甘、苦，温。温中益气。用于脾虚泄泻，虚寒咳嗽。



【编号】 M09667213022FHCMMI H03107214005002200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蒙古黄芪

【来源】 豆科植物蒙古黄芪 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.) Hsiao 的干燥根。

【主产地】 主产于山西、内蒙古、吉林、河北等地。以宁夏固原、河北安国、山东泰安、内蒙固阳等地栽培面积较大。

【性状特征】 根呈圆柱状，极少分枝，上端较粗，长30～90 cm，直径1～3.5 cm。表面灰黄色至淡棕褐色，有明显不规则的纵皱纹及横生皮孔，栓皮较坚实不易脱落。质硬而韧，可折断，断面纤维性及粉性。横切面皮部黄白色，厚度约为半径的1/2，有时可见裂隙，形成层呈灰褐色的环，木质部淡黄色，具放射状纹理，俗称“菊花心”。气微，味微甜，嚼之微有豆腥味。

【品质】 本品以条粗壮、皱纹少、质坚而绵、断面色黄白、粉性足、味甜者为佳。

【性味功效】 甘，温。补气固表，利尿，脱毒排脓，敛疮生肌。用于气虚乏力，脾虚泄泻，肺虚咳嗽，表虚自汗，体虚浮肿，久泻脱肛，便血崩漏，痈疽难溃，久溃不敛，血虚萎黄，内热消渴；慢性肾炎蛋白尿，糖尿病。

【附注】 本品作为“黄芪”入药。



【编号】 M01337148066R0CMMI H05327148017001001CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蓬莪术

【来源】 姜科植物蓬莪术 Curcuma phaeocaulis Val. 的干燥块根。


【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 块根呈卵圆状、长卵状、圆锥状或长纺锤状，顶端多钝尖，基部钝圆，长2～8 cm，直径1.5～4 cm。表面灰黄色至灰棕色，上部环节凸起，有圆形微凹的须根痕或残留的须根，有的两侧各有一列下陷的芽痕和类圆形的侧生根茎痕，有的可见刀削痕。体重，质坚实，断面灰褐色至蓝褐色，蜡样，常附有灰棕色粉末，皮层与中柱易分离，内皮层环纹棕褐色。气微香，味微苦而辛。

【品质】 本品以质坚实、气香者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。行气破血，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘀血经闭，食积胀痛，早期宫颈癌。

【附注】 本品作为“莪术”入药。



【编号】 M09747290071R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蛾眉蕨贯众

【来源】 蹄盖蕨科植物蛾眉蕨 Lunathyrium acrostichoides (Sw.) Ching 的干燥根茎。

【主产地】 主产于北京、甘肃、四川。

【性状特征】 根茎呈长卵圆状，上端钝圆，下端较尖，长10～16 cm，直径6～10 cm，黑褐色。叶柄残基上部较宽而扁，向下渐细，两侧边缘具有明显的刺状突起，基部较窄常呈菱方形。质硬而脆，易折断，断面平坦，维管束2条，呈“八”字形排列，维管束中间，常有一个暗色点或已成空洞。气微而特异，味涩或苦、辛。

【品质】 本品以粗大、整齐、须根少者为佳。

【性味功效】 苦、涩，微寒。清热解毒，杀虫，止血。用于痢疾，蛔虫病，蛲虫病，绦虫病，崩漏，便血，流感。



【编号】 M05595036019R0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

算盘子根

【来源】 大戟科植物算盘子 Glochidion puberum (L.) Hutch. 的干燥根。

【主产地】 主产于四川、贵州、福建等地。

【性状特征】 根呈圆柱状，直径1～3 cm，顶端残留茎痕，表面灰棕色，栓皮粗糙，极易剥落，有细纵纹及横裂。质坚硬，不易折断，断面浅棕色。气微，味涩。

【品质】 本品以粗壮、坚实、质干者为佳。

【性味功效】 苦，凉；小毒。清热，利湿，行气，活血，解毒消肿。用于感冒发热，咽喉肿痛，咳嗽，牙痛，湿热泻痢，黄疸，淋浊，带下，风湿痹痛，痛经，闭经，跌扑损伤，蛇虫咬伤。



【编号】 M09907136128R0CMMI H18797136036000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

膜荚黄芪

【来源】 豆科植物膜荚黄芪 Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. 的干燥根。

【主产地】 主产于黑龙江、吉林、内蒙古、河北等地。

【性状特征】 根呈圆柱状，常有分枝，上端稍粗，长30～90 cm，直径0.7～3 cm。表面灰黄色、黄棕色至淡褐色，纵皱纹较深，略呈沟状。质硬，不易折断。味微甜，有豆腥味。

【品质】 本品以条粗壮、皱纹少、质坚而绵、断面色黄白、粉性足、味甜者为佳。

【性味功效】 甘，温。补气固表，利尿，脱毒排脓，敛疮生肌。用于气虚乏力，脾虚泄泻，肺虚咳嗽，表虚自汗，体虚浮肿，久泻脱肛，便血崩漏，痈疽难溃，久溃不敛，血虚萎黄，内热消渴；慢性肾炎蛋白尿，糖尿病。

【附注】 本品作为“黄芪”入药。



【编号】 M09947148065R0CMMI H05317148017001000SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蔓生白薇

【来源】 萝藦科植物蔓生白薇Cynanchum versicolor Bge. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于辽宁、河北、河南、山西、山东、安徽等地。

【性状特征】 根茎与白薇相似呈圆柱状，较细，长2～6 cm，直径4～8 mm，残存的茎基也较细，直径在5 mm以下，下面及两侧簇生多数细长的根。根的数目较少，不及白薇繁密，呈圆柱状，弯曲，长5～20 cm，直径1～2 mm，表面黄棕色至棕色。质脆，易折断，断面平坦。气微，味微苦。

【品质】 本品以根粗壮、色棕黄者为佳。

【性味功效】 苦、咸，寒。清热凉血，利尿通淋，解毒疗疮。用于瘟邪伤营发热，阴虚发热，骨蒸劳热，产后血虚发热，热淋，血淋，痈疽肿毒。

【附注】 本品作为“白薇”入药。



【编号】 M02737231043R0CMMI H12997232013004800SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蜘蛛香

【来源】 败酱科植物心叶缬草 Valeriana jatamansii Jones 的干燥根茎及根。

【主产地】 主产于贵州、四川、陕西。

【性状特征】 根茎略呈扁圆柱状，稍弯曲，少有分枝，长2～8 cm，直径0.5～2 cm。表面灰褐色，有明显紧密的不规则环节及突起的点状根痕。顶端具茎、叶残基。质坚实，易折断，断面灰棕色或棕褐色，可见筋脉点（维管束）断续排列成环。根呈圆柱状，稍弯曲，直径1～2 mm，表面黄棕色，有纵皱纹，质硬脆，折断面平坦，灰棕色。具特异香气，味微苦、辛。

【品质】 本品以根茎及根粗壮、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 性热，入冷经。理气止痛，消炎止泻，祛风除湿。用于脘腹胀痛，消化不良，腹泻，痢疾，风湿痹痛，腰膝酸软。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M10007235017R0GYCM H40297236003000800GYCM

【鉴定人】 何顺志

熟地黄


【来源】 玄参科植物地黄 Rehmannia glutinosa Libosch.干燥块根的炮制加工品。

【主产地】 全国大部分地区均产。以河南温县、博爱、孟县等地产量大，质量佳。

【性状特征】 本品为不规则的块片、碎块，大小、厚薄不一。表面乌黑色，有光泽，黏性大。质柔软而带韧性，不易折断，断面乌黑色，有光泽。无臭，味甜。

【品质】 本品以根肥大、软润、内外乌黑有光泽者为佳。

【性味功效】 甘，微温。滋阴补血，益精填髓。用于肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血，眩晕，耳鸣，须发早白。



【编号】 M10137252136RPCMMI H32747253044000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

薤白

【来源】 百合科植物薤 Allium chinensis G. Don 的干燥鳞茎。

【主产地】 主产于湖南、浙江、江苏、安徽等地。以浙江产者较优。

【性状特征】 鳞茎呈略扁的长卵状，高1～3 cm，直径0.3～1.2 cm。表面淡黄棕色或棕褐色，具浅纵皱纹，质较软，断面可见鳞叶2～3层，嚼之粘牙。

【品质】 本品以粒大、饱满、匀称整齐、质坚、色黄白、半透明、无外层膜质鳞叶、味辛者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。通阳散结，行气导滞。用于胸痹疼痛，痰饮咳嗽，泄痢后重。



【编号】 M10247293014R0CMMI H01967293002001500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

螃蟹甲


【来源】 唇形科植物螃蟹甲 Phlomis younghusbandii Mukerjee 的干燥块根。

【主产地】 主产于西藏。

【性状特征】 块根不规则球状或长椭圆状，长3～8 cm，直径1～3 cm，两端略突起成尖，有细根及根痕。表面黄色或黄褐色，有纵皱纹或明显抽沟。质轻脆，断面白色，粉性。气微，味甜。

【品质】 本品以个大、饱满、质较实者为佳。

【性味功效】 甘，平。疏风清热，止咳化痰，生肌敛疮。用于风热感冒，咳嗽痰多，疮疡久溃不敛。



【编号】 M10267264219R0XZDC H29067265079004300XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

藁本

【来源】 伞形科植物藁本 Ligusticum sinense Oliv. 的干燥根茎及根。

【主产地】 主产于四川、湖北、湖南、陕西、江西、甘肃等地。

【性状特征】 根茎及根呈不规则结节状圆柱形，稍扭曲，略有分枝，长3～10 cm，直径1～2 cm。表面棕褐色或暗棕色或黄棕色，粗糙，有纵皱纹，栓皮易剥脱，上侧残留数个凹陷的圆形茎基，下侧有多数点状突起的根痕及残根。体轻，质较硬，易折断，断面黄色或黄白色，纤维性。气浓香，味辛、苦、微麻。

【品质】 本品以个大体粗、根苗少、质坚、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 辛，温。祛风，散寒，除湿，止痛。用于风寒感冒头痛，巅顶疼痛，风湿肢节痹痛，寒湿泄泻，腹痛。



【编号】 M10297213186R0CMMI H23317214052002900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藏木香

【来源】 菊科植物总状土木香 Inula racemosa Hook. f. 的干燥根。

【主产地】 主产于西藏。

【性状特征】 根呈圆锥状，略弯曲，有多数支根，长5～20 cm，支根直径1～3 cm。表面暗棕色，具纵皱纹及细根痕，栓皮易脱落。质坚硬，不易折断。根头部较膨大，多为纵切、横切或斜切成的截形或楔形片状，切面灰黄色至黄白色，随处可见凹点状油室及少数白色光亮的细针状结晶。气微香，味苦辛。

【品质】 本品以条粗、色棕黄、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。健脾和胃，调气解郁，止痛安胎。用于脘腹、胸胁胀痛，呕吐泻痢，胸胁挫伤，疝气作痛，胎动不安。

【附注】 常用藏药，《晶珠本草》、《间语银鉴》、《甘露之池》、《宝库》等均有记载。本品作为“土木香”入药。



【编号】 M10307238387R0XZDC H21437239123001800XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

藏茜草

【来源】 茜草科植物光茎茜草 Rubia wallichiana Decne.的干燥根。

【主产地】 主产于西藏、青海、甘肃。

【性状特征】 根呈圆柱状，有的弯曲，完整的老根留有较粗的根茎，长15～20 cm，直径1～1.5 cm。表面红褐色，有细纵皱纹及细根痕，有时皮部剥落而显黄红色。质脆，易折断，断面粉红色，平坦。气微，味淡。

【品质】 本品以根粗壮、表面色红褐者为佳。

【性味功效】 苦，平。清热凉血。用于血病扩散伤热，肺肾热邪，大小肠热。



【编号】 M09957232182R0XZDC H33757233057001200XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

藏菖蒲

【来源】 天南星科植物藏菖蒲 Acorus calamus L. 的干燥根茎。

【主产地】 主产于西藏，全国各地也有。

【性状特征】 根茎扁圆柱状，略弯曲，长4～20 cm，直径0.8～2 cm，表面灰棕色至棕褐色，节明显，节间长0.5～1.5 cm，具纵皱纹，一面具密集圆点状根痕；叶痕呈斜三角形，左右交互排列，侧面茎痕周围常残留有鳞片状叶基和毛发状须根。质硬，断面淡棕色，内皮层环明显，有多数小空洞及维管束小点。气浓烈而特异，味辛。

【品质】 本品以根茎粗大、表面色黄白、去尽鳞叶及须根者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温、燥、锐。温胃，消炎止痛。用于补胃阳，消化不良，食物积滞，白喉，炭疽。

【附注】 藏族习用药材。



【编号】 M10357302001R0SM H00867302001000100XZDC

【鉴定人】 李泉森

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藏紫草

【来源】 紫草科植物长花滇紫草 Onosma hookeri Clarke var. longiflorum Duthie 的干燥根。

【主产地】 主产于西藏。

【性状特征】 根呈圆柱状，或略成槽状，弯曲或微弯曲，一侧常有开口，长3～20 cm，外皮呈薄片状，易剥落，均呈紫褐色。剥去外皮，表皮呈紫红色，有纵皱。质脆，易折断，断面淡黄棕色。气微，味微酸。

【性味功效】 甘、微苦，凉。清热凉血，养肺。用于肺炎，空洞结核，高山多血症。

【附注】 藏族习用药材。《度母本草》、《宇妥本草》、《蓝琉璃》、《晶珠本草》、《神奇金穗》、《甘露本草明镜》等均有记载。



【编号】 M10367249031R0XZDC H27237250039001402XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

藕节

【来源】 睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥根茎节部。

【主产地】 主产于浙江、江苏、安徽。

【性状特征】 根茎节部呈短圆柱状，中部稍膨大，长2～4 cm，直径约2 cm。表面灰黄色至灰棕色，有残存的须根及须根痕，偶见暗红棕色的鳞叶残基。两端有残留小藕，表面皱缩有纵纹。质硬，节部坚硬，不易折断，断面有多数类圆形的孔。气微，味微甘、涩。

【品质】 本品以节部色黑褐、两头色白、干燥、无须根、无泥土者为佳。

【性味功效】 甘、涩，平。止血，消瘀。用于吐血，咯血，衄血，尿血，崩漏。



【编号】 M10437018003R0CMMI H26847018003000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

藜芦

【来源】 百合科植物藜芦 Veratrum nigrum L. 的干燥根及根茎。

【主产地】 主产于山西、河南、山东、辽宁等地。

【性状特征】 根茎圆柱状或圆锥状，长1～4 cm，直径0.5～1.5 cm，表面棕黄色、棕褐色或土黄色，上端残留茎基、叶基及黑色纤维，四周着生多数须根。根细长略弯曲，长10～20 cm，直径1～5 mm，表面黄白色或黄褐色，有细密的横皱纹。体轻，质坚脆，易折断，断面类白色，中心有淡黄色细木心，易与皮部分离。气微，味苦、辛，有刺喉感，粉末有强烈的催嚏性。

【品质】 本品以条粗壮、外皮色土黄、质轻脆、断面粉性者为佳。

【性味功效】 辛、苦，寒；有毒。涌吐风痰，杀虫疗疮。用于中风痰壅，喉痹不通，癫痫，疟疾，疥癣，恶疮。



【编号】 M10447293377H0CMMI H40367293057000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藤木来

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

`

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丁公藤

【来源】 旋花科植物丁公藤 Erycibe obtusfolia Benth. 的干燥藤茎。


【主产地】 主产于广西、广东等地。

【性状特征】 藤茎呈圆柱状，直径1～3 cm。商品多为斜切的段或片。外皮灰黄色、灰褐色或浅棕褐色，稍粗糙，有浅沟槽及不规则纵裂纹或龟裂纹。皮孔点状或疣状，黄白色。老的栓皮呈薄片剥落。质坚硬，纤维较多，不易折断。断面椭圆形，黄褐色或浅黄棕色，异型维管束呈花朵状或块状，木质部的导管呈点状。无臭，味淡。

【品质】 本品以质硬、径宽、色灰黄、灰褐或浅棕褐者为佳。

【性味功效】 辛，温；有小毒。祛风除湿，消肿止痛，用于风湿痹痛，半身不遂，跌扑肿痛。

【附注】 为壮族治疗风湿骨痛的传统药物。



【编号】 M00017251032V0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大叶钩藤

【来源】 茜草科植物大叶钩藤 Uncaria macrophylla Wall. 的干燥带钩茎枝。

【主产地】 主产于云南、广西等地。

【性状特征】 茎枝呈方柱状，直径1.1～1.5 mm。表面灰棕色至棕色。两侧有较深的纵沟，被褐色毛，尤以节部及钩端较多，钩长1.7～3.5 cm，向内深弯几成半圆形，末端膨大成小球形。基部扁平。断面髓部通常中空，偶有髓。质坚韧。无臭，味淡。

【品质】 本品以质坚、色褐棕、有钩者为佳。

【性味功效】 甘，凉。清热平肝，息风定惊。用于头痛眩晕，感冒夹惊，惊痫抽搐，妊娠子痫；高血压。

【附注】 本品作为“钩藤”入药。



【编号】 M06957232201V0SM H40037233069000100CMMI

【鉴定人】 秦松云

大血藤


【来源】 木通科植物大血藤 Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils. 的干燥藤茎。

【主产地】 主产于湖北、四川、江西、河南、福建、广东、浙江、安徽等地。

【性状特征】 藤茎切片呈不规则圆形，直径1～3 cm。表面灰棕色，粗糙，外皮常呈鳞片状剥落，剥落处显暗红棕色，有的可见膨大的节及略凹陷的枝痕或叶痕。质硬，断面皮部红棕色，有数处向内嵌入木部，木部黄白色，有多数细孔状导管，射线呈放射状排列。气微，味微涩。

【品质】 本品以质坚韧、粗大、断面纹理明显者为佳。

【性味功效】 苦、平。清热解毒，活血，祛风。用于肠痈腹痛，经闭痛经，风湿痹痛，跌扑肿痛。



【编号】 M00377021013V0SM H34917021004000100CMMI

【鉴定人】 瞿显友

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小木通

【来源】 毛茛科植物小木通 Clematis armandii Franch. 的干燥藤茎。


【主产地】 主产于四川、湖南、陕西、湖北、贵州等地。

【性状特征】 藤茎呈长圆柱状，略弯曲，长 20～100 cm，直径 0.8～3 cm。表面淡黄棕色或灰黄褐色，有纵棱脊，多呈撕裂状，易与木质部剥离，有的带有撕裂出来的束状纤维，节部多膨大，有侧枝痕。质坚硬，不易折断。断面黄白色，呈放射性裂片状，有多数排列紧密、大小不一的小孔（即导管），中心髓部较小，类白色。无臭，味淡。

【品质】 本品以干燥、条匀、色黄、无黑心者为佳。

【性味功效】 淡、苦，寒。清热利尿，通经下乳。用于水肿，淋病，小便不通，关节痹痛，闭经乳少。

【附注】 本品作为“川木通”入药。



【编号】 M00767015205V0SM H10247015017001000CMMI

【鉴定人】 秦松云

小通草

【来源】 旌节花科植物喜马山旌节花Stachyurus himalaicus Hook. f.et Thoms. 的干燥茎髓。

【主产地】 主产于陕西、甘肃、江西、广西、湖南、贵州、四川、云南等地。

【性状特征】 茎髓呈圆柱状，长 30～50 cm，直径 0.5～1.2 cm。表面白色或淡黄色，无纹理。体轻，质松软，捏之能变形，有弹性，易折断，断面平坦，无空心，显银白色光泽。水浸后有黏滑感。无臭，无味。

【品质】 本品以色白、条匀、无斑点者为佳。

【性味功效】 甘、淡，寒。清热，利尿，下乳。用于小便不利，乳汁不下；尿路感染。



【编号】 M00627150003V0CMMI H37507150001000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

山桃枝

【来源】 蔷薇科植物山桃 Prunus davidiana (Carr.) Franch. 的干燥嫩枝。

【主产地】 全国大部分地区有栽培。

【性状特征】 枝条呈圆柱状，长短不一，直径 0.5～1 cm。表面红褐色，较光滑，有类白色点状皮孔。质脆，断面黄白色，木部占大部分，中央有白色髓部。气微，味微苦、涩。

【品质】 本品以质脆、表面色红褐、断面色黄白者为佳。

【性味功效】 苦，平。活血通络，解毒，杀虫。用于心腹疼痛，风湿关节痛，腰痛，跌扑损伤，疮癣。

【附注】 本品作为“桃枝”入药。



【编号】 M07347143012V0SM H31607143037000900SM

【鉴定人】 瞿显友

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

川木通


【来源】 毛茛科植物绣球藤Clematis montana Buch.-Ham.的干燥藤茎。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 藤茎呈长圆柱状，略弯曲，长50～100 cm，直径2～3.5 cm。表面黄棕色或黄褐色，有纵沟及棱脊，有的外皮呈纵向撕裂；节处稍膨大，有叶痕及枝痕。质坚硬，不易折断，断面边缘不整齐，内皮黄棕色。木质部由若干大小相间、放射状排列的木质部束组成，但大的木质部束外端又被淡黄色的次生射线纹理分为两束。木质部浅黄棕色或浅黄色，呈放射形裂片状，有排列紧密、大小不等的小孔导管，髓部类白色或黄棕色。无臭，味淡。

【品质】 本品以干燥、条匀色黄、无黑心者为佳。

【性味功效】 淡、苦，寒。清热利尿，通经下乳。用于水肿，淋病，小便不通，关节痹痛，闭经乳少。



【编号】 M00777015251V0CMMI H10427015017007600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

无柄果钩藤

【来源】 茜草科植物无柄果钩藤 Uncaria sessilifructus Roxb. 的干燥带钩茎枝。


【主产地】 主产于广东、广西、云南等地。

【性状特征】 茎枝呈方柱状，直径1.2～4 mm。表面棕黄色，四面均有一纵沟。被褐色毛，尤以节部及钩端较多，钩长1.3～1.8 cm，弯曲度较圆，向内深弯几成半圆形，基部扁平，断面黄白色。质坚韧。无臭，味淡。

【品质】 本品以质坚、色棕黄、有钩者为佳。

【性味功效】 甘，凉。清热平肝，息风定惊。用于头痛眩晕，感冒夹惊，惊痫抽搐，妊娠子痫；高血压。

【附注】 本品作为“钩藤”入药。



【编号】 M06977232205V0SM H40067233069000500CMMI

【鉴定人】 秦松云

毛青藤

【来源】 防己科植物毛青藤 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.var.cinereum Rehd.et Wils. 的干燥藤茎。

【主产地】 主产于西南、中南和华东等地。

【性状特征】 藤茎呈长圆柱状，常微弯曲，长20～70 cm或更长，直径0.5～2 cm。切段多长1～3 cm。表面绿褐色至棕褐色，有的灰褐色，有细纵纹及皮孔。节部稍膨大，有分枝。体轻，质硬而脆，易折断，断面不平坦，灰黄色或淡灰棕色，皮部窄，木部射线呈放射状排列，髓部淡黄白色或黄棕色。气微，味苦。

【性味功效】 苦、辛，平。祛风湿，通经络，利小便。用于风湿痹痛，关节肿胀，麻痹瘙痒。

【附注】 本品作为“青风藤”入药。



【编号】 M05887023029V0SM

【鉴定人】 秦松云

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水柏枝

【来源】 柽柳科植物水柏枝 Myricaria germanica (L.) Desv. 的干燥嫩枝。

【主产地】 主产于西藏、青海、甘肃、陕西、四川、山西、云南等地。

【性状特征】 枝条呈圆柱状，分枝较多，直径3～6 mm，表面蓝棕褐色，有细密的纵皱纹，节明显，小枝痕盘状，芽隆起紫色。小枝纤细，直径约1 mm，黄绿色，节甚密，互生条状小叶，长1～3 mm，黄绿色，背面密布白色小点。气清香，味淡，微苦。

【品质】 本品以香气浓郁、色蓝棕褐或黄绿者为佳。

【性味功效】 涩、甘，凉。清热解毒。用于中毒症，黄水病，血热病，瘟病时疫，脏腑毒热。

【附注】 藏药。《晶珠本草》、《蓝琉璃》等有记载。



【编号】 M01787098003V0XZDC H26707098001001200XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

仙人掌

【来源】 仙人掌科植物仙人掌 Opuntia dillenii Haw. 的干燥茎。


【主产地】 全国各地均有出产。

【性状特征】 本品为不规则切片。纵切片厚2～5 mm。外表面已刮除，色白，切面黄白色，粉性，有黄色筋脉点（导管）分布。质脆，易折断。气微，味淡。

【品质】 本品以肉质肥厚、粉性足者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。行气止痛，疏肝解郁。用于消化性溃疡病等；外治烧烫伤，急性乳腺炎及疮痈疖肿等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M02067107013H0GYCM H27377107006000100GYCM

【鉴定人】 陈谦海

功劳木

【来源】 小檗科植物阔叶十大功劳 Mahonia bealei (Fort.) Carr. 的干燥茎。

【主产地】 主产于浙江、安徽、江西、广东等地。

【性状特征】 茎为不规则的块片，大小不等。外表面灰黄色至棕褐色，有明显的纵沟纹及横向细裂纹，有的外皮较光滑，有光泽，或有叶柄残基。断面皮部薄，棕褐色，木部黄色，可见数个同心性环纹及排列紧密的放射状纹理，髓部色较深，质硬。无臭，味苦。

【品质】 本品以条匀、内色鲜黄者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。用于湿热泻痢，黄疸，目赤肿痛，胃火牙痛，疮疖，痈肿，痢疾，黄疸型肝炎。



【编号】 M02157019117V0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

四川寄生

【来源】 桑寄生科植物四川寄生 Taxillus sutchuenensis（Lecomte）Danser 的干燥带叶茎枝。

【主产地】 主产于四川、贵州、云南、湖北、湖南、江西等地。

【性状特征】 带叶茎枝呈圆柱状，有分枝，长30～50 cm，粗枝直径约 1 cm，细枝和枝梢 2～3 mm。表面黑褐色或灰褐色，具多数点状纵裂皮孔，嫩枝被棕褐色星状毛，较细的枝具纵皱纹。质坚硬，易折断，断面不平坦，木部黄褐色或淡红棕色。髓射线明显，髓部色较深。气微，味淡，微涩。

【品质】 本品以外层色黑褐、条匀者为佳。

【性味功效】 苦，平。祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。用于风湿痹痛，腰膝酸软，胎动不安。



【编号】 M07397185029V0CMMI H38517186009001100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

石南藤

【来源】 胡椒科植物石南藤 Piper wallichli（Miq.）Hand.-Mazz. var. hupehense（C.DC.）Hand.-Mazz. 的干燥茎。

【主产地】 主产于四川、湖南、云南等地。

【性状特征】 茎呈扁圆柱状，表面灰褐色或灰棕色，有细纹，节膨大，具不定根，节间长 7～9 cm；有的带有叶片，叶多皱缩，展平后呈卵圆形，上表面灰绿色至灰褐色，下表面灰白色，有5条明显突起的叶脉。质轻而脆。横断面呈放射状排列，中心有灰褐色的髓。气清香，味辛辣。

【品质】 本品以条匀、色灰褐、叶片完整者为佳。

【性味功效】 辛、甘，温。祛风湿，强腰膝，补肾壮阳，止咳平喘，活血止痛。用于风寒湿痹，腰膝酸痛，阳萎，咳嗽气喘，痛经，跌扑肿痛。



【编号】 M02827028032V0CMMI H29717028002005801SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

关木通

【来源】 马兜铃科植物东北马兜铃 Aristolochia manshuriensis Kom. 的干燥藤茎。

【主产地】 主产于吉林、黑龙江、辽宁等地。

【性状特征】 藤茎呈长圆柱状，稍扭曲，长1～2m，直径1～8 cm。表面灰黄色或棕黄色，有浅纵沟及棕褐色残余粗皮的斑点。节部稍膨大，有1枝痕。体轻，质硬，不易折断，断面黄色或淡黄色，皮部薄，木部宽广，有多层整齐环状排列的导管，射线放射状，髓部不明显。摩擦残余粗皮，有樟脑样臭。气微，味苦。

【品质】 本品以条匀、表面色黄、断面色鲜黄、无粗皮、内心无黑圈者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有毒。清心火，利小便，通经下乳。用于口舌生疮，心烦尿赤，水肿，热淋涩痛，白带，经闭乳少，湿热痹痛。

【附注】 20世纪五六十年代，天然野生的三叶木通等木通资源出现紧缺状况，导致以马兜铃科植物关木通代替木通科木通的应对情况发生。故在20世纪70年代以后出版的《中国药典》仅收载马兜铃科关木通和毛茛科川木通。从20世纪七八十年代起，欧洲各国、日本、美国等国家就不断有关于马兜铃科植物所含马兜铃酸导致人体肾中毒及致癌的报道。现在，欧洲各国及美国、日本等国家已将关木通药材及含有这些药材的成药列入严禁进口商品名单。药典委员会已将木通科三种木通收载入2002年药典增补本中。2005年版《中国药典》已不收载关木通。



【编号】 M03147024026V0CMMI H04007024002002300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

华钩藤

【来源】 茜草科植物华钩藤 Uncaria sinensis (Oliv.) Havil. 的干燥带钩茎枝。


【主产地】 主产于四川昭化、宜宾等地。

【性状特征】 茎枝呈方柱状，直径2～5 mm。四角有棱。表面灰棕色或灰白色，粗糙，被褐色毛。钩长1.3～2.8 cm，弯曲成长钩状。钩基部枝上常留有半圆形反转或不反转的托叶，基部圆或微扁平。体轻，质松。断面髓部白色。无臭，味淡。

【品质】 本品以色灰棕、有钩者为佳。

【性味功效】 甘，凉。清热平肝，息风定惊。用于头痛眩晕，感冒夹惊，惊痫抽搐，妊娠子痫；高血压。

【附注】 本品作为“钩藤”入药。



【编号】 M06987232206V0CMMI H40077233069000700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

竹茹

【来源】 禾本科植物淡竹 Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendle 的茎秆的干燥中间层。

【主产地】 主产于河南、山东及长江流域各省。

【性状特征】 茎秆的干燥中间层为卷曲成团的不规则丝条或呈长条形薄片状。宽窄厚薄不等，浅绿色或黄绿色。体轻松，质柔韧，有弹性。气微，味淡。

【品质】 本品以色浅黄绿、质柔韧、有弹性者为佳。

【性味功效】 甘，微寒。清热化痰，除烦止呕。用于痰热咳嗽，胆火挟痰，烦热呕吐，惊悸失眠，中风痰迷，舌强不语，胃热呕吐，妊娠恶阻，胎动不安。



【编号】 M03557332133V0CMMI H29287332176002801SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

老鼠刺

【来源】 小檗科植物功劳木 Mahonia bealei (Fort.) Carr. 的干燥茎。


【主产地】 主产于贵州、四川、云南。

【性状特征】 本品为不规则的块片，大小不等。外皮灰黄色至棕褐色，有明显的纵沟纹和横向细裂纹，有的外皮较光滑，有光泽，或有叶柄残基。切面皮部薄，棕褐色，木部黄色，可见数个同心环纹及排列紧密的放射状纹理，髓部色较深，质硬。无臭，味苦。

【品质】 本品以断面色鲜黄者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经、快经。清湿热，解毒。用于痢疾，黄疸型肝炎，感冒，支气管炎，目赤肿痛，烧烫伤等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M02147019117V0GYCM H25227019008000100GYCM

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

忍冬藤

【来源】 忍冬科植物忍冬 Lonicera japonica Thunb. 的干燥茎枝。

【主产地】 主产于浙江、四川、江苏、河南、山东、广西等地。以江苏产的质量最佳。

【性状特征】 茎枝呈长圆柱状，多分枝，直径 1.5～6 mm。表面棕红色至暗棕色，有的灰绿色，光滑或被茸毛；外皮易剥落。枝上多节，节间长 6～9 cm，有残叶及叶痕。质脆，易折断，断面黄白色，中空。无臭，老枝味微苦，嫩枝味淡。

【品质】 本品以表面色棕红、枝嫩者为佳。

【性味功效】 甘，寒。清热解毒，疏风通络。用于温病发热，热毒血痢，痈肿疮疡，风湿热痹，关节红肿热痛。



【编号】 M04067233028V0SM H24177234007004000GYCM

【鉴定人】 刘毅

杨柳枝

【来源】 杨柳科植物杨柳 Salix babylonica L. 的干燥枝叶。

【主产地】 全国各地均有出产。

【性状特征】 枝条长而直，褐色无毛，幼枝微有毛。干燥的叶片多卷曲或破碎，完整者展平后呈披针形至线状披针形，长 9～16 cm，宽 5～15 mm，先端渐尖，基部楔形，边缘具细锯齿，上面绿色，下面带白色，侧脉 15～30 对，叶柄长 6～12 mm。

【品质】 本品以枝叶鲜嫩、色褐、有光泽者为佳。

【性味功效】 祛风，利湿，止痛，消肿。用于风湿痹痛，淋病，白浊，小便不通，传染性肝炎，丹毒，龋齿等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M06377156019V0GYCM H34357156003001600GYCM

【鉴定人】 何顺志

沉香

【来源】 瑞香科植物白木香 Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg 含有树脂的木材。

【主产地】 主产于广东陆丰、陆河、鹤山、惠东等地。主要为栽培品。

【性状特征】 木材呈不规则块、片状或盔帽状，有的为小碎块。表面凹凸不平，有刀痕，偶有孔洞，可见黑褐色树脂与黄白色木部相间的斑纹，孔洞及凹窝表面多呈朽木状。质较轻、较坚实，不易折断，断面刺状。大多不沉水或半沉水。气芳香，味苦。

【品质】 本品以色黑、质重、入水下沉者为佳。

【性味功效】 辛、苦，微温。行气止痛，温中止呕，纳气平喘。用于胸腹胀闷疼痛，胃寒呕吐呃逆，肾虚气逆喘急。



【编号】 M04167081002V0CMMI H03327081001000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

皂角刺

【来源】 豆科植物皂荚 Gleditsia sinensis Lam. 的干燥棘刺。

【主产地】 主产于河南、江苏、湖北、广西等地。

【性状特征】 棘刺有 1～2 次的分枝，主刺长 3～15 cm，直径 0.3～1 cm；分枝刺长 1～6 cm，刺端锐尖。表面紫棕色或棕褐色。体轻，质坚硬，不易折断。商品多切成斜薄片，一般呈长披针形，长 2～6cm，宽 3～7mm，厚 1～3mm。常带有尖细的刺端，切面木质部黄白色，髓部疏松，淡红棕色；质脆，易折断。无臭。味淡。

【品质】 本品以个大、质坚、色紫棕者为佳。

【性味功效】 辛，温。消肿托毒，排脓，杀虫。用于痈疽初起或脓成不溃；外治疥癣麻风。



【编号】 M04257148319V0CMMI H18767148070000500SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

苏木

【来源】 豆科植物苏木 Caesalpinia sappan L. 的干燥心材。

【主产地】 主产于广西、云南、台湾、广东、海南等地，国外主产于印度及马来西亚。

【性状特征】 心材呈长圆柱状或对剖半圆柱状，长8～100 cm，直径3～12 cm。表面黄红色至棕红色，具刀削痕，常见纵向裂缝。横断面略具光泽，年轮明显，有的可见暗棕色、质松、带亮星的髓部。质坚硬。无臭，味微涩。

【品质】 本品以质坚硬、色黄红至棕红者为佳。

【性味功效】 甘、咸，平。行血祛瘀，消肿止痛。用于经闭痛经，产后瘀阻，胸腹刺痛，外伤肿痛。



【编号】 M04417148119V0CMMI H07367148022001400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

鸡矢藤

【来源】 茜草科植物鸡屎藤 Paederia scadens (Lour.) Merr. var. tomenlosa (Blume) Hand.-Mazz. 的干燥藤茎。


【主产地】 主产于云南、贵州、四川。

【性状特征】 茎呈扁圆柱状，直径2～5 mm，两面有槽。老茎灰白色，无毛，有纵皱纹或横裂纹，嫩茎黑褐色，被柔毛；质嫩，不易折断，断面纤维性，平坦，灰黄色或浅绿色。残存的叶片多卷缩或破碎，完整的叶片展平后呈卵型或椭圆状披针形，长5～10 cm，宽3～6 cm；先端尖，基部圆形，全缘，两面被柔毛或仅下表面被毛，主脉明显。气特异，味甘、涩。

【品质】 本品以茎藤粗壮、断面色黄者为佳。

【性味功效】 和性药。除湿，消食，止痛，解毒。用于消化不良，胆绞痛，脘腹疼痛，湿疹，疮疡肿毒等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M04707232144V0GYCM H27897233051000201CMMI

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鸡血藤

【来源】 豆科植物密花豆 Spatholobus suberectus Dunn 的干燥藤茎。

【主产地】 主产于广西的武鸣、宁明、平南、荔浦、柳州、百色、梧州等地。

【性状特征】 藤茎呈扁平的板状圆柱形或圆柱形，稍弯曲，直径2～7 cm。通常多切成椭圆形、长矩圆形或不规则的斜切片，厚0.2～3 cm。栓皮灰棕色，有的可见灰白色斑，栓皮脱落处显红棕色。切面木部红棕色或棕色，导管孔多数；韧皮部有树脂状分泌物呈红棕色至黑棕色，与木部相间排列呈3～8个偏心性半圆形环；髓部偏向一侧。质坚硬。气微，味涩。

【品质】 本品以树脂状分泌物多者为佳。

【性味功效】 苦、甘，温。补血、活血，通络。用于月经不调，血虚萎黄，麻木瘫痪，风湿痹痛。



【编号】 M04687148580V0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

夜交藤


【来源】 蓼科植物何首乌 Polygonum multiflorum Thunb. 的干燥藤茎。

【主产地】 主产于浙江、湖北、江苏、河南、湖南等地。

【性状特征】 藤茎呈长圆柱状，稍扭曲，具分枝，长短不一，直径3～7 mm。药材（商品）切段长1～3 cm。表面紫红色至紫褐色，粗糙，具扭曲的纵皱纹，有侧枝痕，外皮菲薄，可剥离。质脆，易折断，断面皮部紫红色，木部黄白色或淡棕色，导管孔明显，髓部疏松，类白色。无臭，味微苦涩。

【品质】 本品以枝条粗壮、均匀、外皮色紫红者为佳。

【性味功效】 甘、平。养血安神，祛风通络。用于失眠多梦，血虚身痛，风湿痹痛；外治皮肤瘙痒。



【编号】 M07017057062V0CMMI H30647057010001500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

昌都锦鸡儿

【来源】 豆科植物昌都锦鸡儿 Caragana changduensis Liou f. 的干燥木部心材。

【主产地】 主产于西藏昌都、青海玉树。

【性状特征】 本品为外表栓皮多已除净的心材，呈圆柱状或不规则块片，略弯曲，长20～40 cm，直径可达5 cm。表面有刀斧痕，平滑，有纵向弯曲的细纵纹或网状纹理和小枝的疤痕，有的显黄白色木纹。茎枝残基处可见黄白色的内皮及深棕色木栓层。质坚硬而致密，难折断。切断面可见年轮。无臭，味淡微辛。

【品质】 本品以致密、坚硬、色黄白、不带栓皮者为佳。

【性味功效】 苦，凉。活血化瘀，降压。用于多血症，高血压，月经不调。

【附注】 昌都锦鸡儿为藏药“佐摸兴”的入药品种。



【编号】 M10397148140V0XZDC H08037148028002000XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

松笔头

【来源】 松科植物马尾松 Pinus massoniana Lamb. 的干燥幼枝叶尖端。

【主产地】 主产于贵州、广西、云南。

【性状特征】 小枝常轮生，黄棕色，表面有纵皱纹，具宿存鳞片状叶枕，常翘起，较粗糙；冬芽长椭圆形，芽鳞红褐色，叶针形，二针一束，细长而柔韧，长13～20 cm，叶缘具细锯齿；叶鞘膜质，灰白色。质脆，折断面不完整。味苦涩。

【品质】 本品以细嫩、干燥者为佳。

【性味功效】 活血止痛，补虚。用于跌扑损伤，小便淋痛，神经衰弱，血栓性脉管炎等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M05096004041V0GYCM H29576004007001900GYCM

【鉴定人】 谢德文

降香

【来源】 豆科植物降香檀Dalbergia odorifera T. Chen树干的干燥心材。

【主产地】 主产于海南。

【性状特征】 心材呈类圆柱状或不规则块状。表面紫红色或红褐色，切面有致密的纹理。质硬，有油性。气微香，味微苦。

【品质】 本品以色紫红、坚硬、不带白色边材、油润、香气浓、入水下沉者为佳。

【性味功效】 辛，温。行气活血，止痛，止血。用于脘腹疼痛，肝郁胁痛，胸痹刺痛，跌扑损伤，外伤出血。



【编号】 M05857148234V0CMMI H13237148047000700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

青风藤

【来源】 防己科植物青藤 Sinomenium acutum（Thunb.）Rehd. et Wils. 的干燥藤茎。

【主产地】 主产于江苏、浙江、湖北等地。

【性状特征】 藤茎呈长圆柱状，常微弯曲，长20～70 cm或更长，直径0.5～2 cm。表面绿褐色至棕褐色，有的灰褐色，有细纵纹及皮孔。节部稍膨大，有分枝。体轻，质硬而脆，易折断，断面不平坦，灰黄色或淡灰棕色，皮部窄，木部射线呈放射状排列，髓部淡黄白色或黄棕色。气微，味苦。

【性味功效】 苦、辛，平。祛风湿，通经络，利小便。用于风湿痹痛，关节肿胀，麻痹瘙痒。



【编号】 M05877023028V0CMMI H36527023016000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

青荚叶小通草

【来源】 山茱萸科植物青荚叶Helwingia japonica (Thunb.) Dietr. 的干燥茎髓。


【主产地】 主产于四川、贵州、陕西、广西、江西、湖北等地。

【性状特征】 茎髓呈细圆柱状，直径0.5～1 cm，白色或米黄色，表面有浅纵条纹。体轻，质较硬，捏之不易变形，断面平坦，有白色光泽。水浸后无黏滑感。无臭，无味。

【品质】 本品以色白、条匀、无斑点者为佳。

【性味功效】 甘、淡，寒。清热，利尿，下乳。用于小便不利，乳汁不下；尿路感染。

【附注】 本品作为“小通草”入药。



【编号】 M00607209017V0SM H19807210006000300SM

【鉴定人】 秦松云

南藤

【来源】 胡椒科植物毛蒟 Piper puberulum (Benth.) Maxim. 的干燥带叶茎枝。

【主产地】 主产于四川、湖南、云南、贵州、广东、广西、湖北等地。

【性状特征】 茎枝扁圆柱状，长约 30 cm，直径 1～3 mm。表面灰褐色或灰棕色，有纵纹，节膨大，上生不定根，节间长7～9 cm。质轻而脆，横断面韧皮部窄，维管束与射线相间放射状排列，木部有许多小孔，中心有灰褐色的髓。叶灰绿色，皱缩。气清香，味辛辣。

【品质】 本品以枝条均匀、叶片完整、色灰褐者为佳。

【性味功效】 辛，温。祛风散瘀除湿，行气活血止痛。用于风湿头痛，风寒头痛，脘腹头痛，疝痛，痛经，跌扑肿痛。



【编号】 M06637028027V0SM H29687028002004100SM

【鉴定人】 陈俊华

柽柳

【来源】 柽柳科植物柽柳 Tamarix chinensis Lour. 的干燥细嫩枝叶。

【主产地】 主产于河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北、广东、福建、云南等地。

【性状特征】 茎枝呈细圆柱状，直径0.5～1.5 mm。表面灰绿色，有多数互生的鳞片状小叶。稍粗的枝表面红褐色，叶片常脱落而残留突起的叶基。质脆，易折断，断面黄白色，中心有髓。气微，味淡。

【品质】 本品以枝叶细嫩、色绿者为佳。

【性味功效】 甘、辛，平。散风，解表，透疹。用于麻疹不透，风湿痹痛。



【编号】 M03847098009V0CMMI H38407098003000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

络石藤

【来源】 夹竹桃科植物络石 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 的干燥带叶藤茎。

【主产地】 主产于江苏、安徽、山东、湖北。

【性状特征】 藤茎呈圆柱状，弯曲，多分枝，长短不一，直径1～5 mm。表面红褐色，有点状皮孔及不定根。质硬，断面淡黄白色，常中空。叶对生，有短柄，展平后叶片呈椭圆形或卵状披针形，长1～8 cm，宽0.7～3.5 cm，全缘，略反卷，上表面暗绿色或棕绿色，下表面色较淡，革质。气微，味微苦。

【品质】 本品以叶多而色绿者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。祛风通络，凉血消肿。用于风湿热痹，筋脉拘挛，腰膝酸痛，喉痹，痈肿，跌扑损伤。



【编号】 M06647230086V0CMMI H39327231042000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

钩藤


【来源】 茜草科植物钩藤 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks. 的干燥带钩茎枝。

【主产地】 主产于广西、江西、湖南、浙江、福建等地。以广西产量大。

【性状特征】 茎枝呈圆柱状或类方柱状，长2～3 cm，直径2～5 mm。表面红棕色至紫红色，具细纵纹，光滑无毛。多数枝节上对生两个向下弯曲的钩（不育花序梗），或仅一侧有钩，另一侧为凸起的疤痕。钩略扁或稍圆，先端细尖，基部较阔，钩基部的枝上可见叶柄脱落后的窝点状痕迹和环状的托叶痕。质坚韧，断面黄棕色，皮部纤维性，髓部黄白色或中空。无臭，味淡。

【品质】 本品以茎细、带钩、质嫩、色红棕或紫红者为佳。

【性味功效】 甘，凉。清热平肝，息风定惊。用于头痛眩晕，感冒夹惊，惊痫抽搐，妊娠子痫；高血压。



【编号】 M06967232203V0CMMI H40047233069000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

鬼箭羽

【来源】 卫矛科植物卫矛 Euonymus alatus（Thunb.）Sieb. 的干燥枝翅或带翅嫩枝。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 枝翅呈扁平长形薄片，一般长至4 cm，宽4～10 mm，着生于枝条的一边厚约至2 mm，向外渐薄似刀片。表面灰棕色，微有光泽，有微细致密纵直纹或微波状弯曲纹理，有时有横向凹纹。质轻脆，断面平整，棕黄色。气微，味微苦。

【品质】 本品以条匀、色灰棕、羽状物齐全者为佳。

【性味功效】 苦，寒。破血，止痛，杀虫。用于经闭，产后瘀血腹痛，虫积腹痛，白带过多；外治过敏性皮炎。



【编号】 M07097173022V0CMMI H16517174004000200SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

宽筋藤


【来源】 防己科植物中华青牛胆 Tinospora sinensis (Lour.) Merr. 的干燥茎。

【主产地】 主产于广东、海南、广西、云南等地。

【性状特征】 茎呈类圆柱状，直或稍弯曲，直径 0.5～2 cm。表面黄棕色或淡棕色，光滑，具纵沟纹和横裂纹，皮孔呈疣状突起，有圆形凹陷的枝痕，栓皮易成片脱落。质硬，断面有淡黄色、白色相间的放射状纹理，并有众多小孔，中心有髓。气微，味苦。

【品质】 本品以条均匀、外皮完整、色黄棕或淡棕者为佳。

【性味功效】 微苦，凉。祛风止痛，舒筋活络。用于风湿痹痛，腰肌劳损，跌扑损伤。



【编号】 M07217023068V0XZDC H39137023019000300XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

桂枝

【来源】 樟科植物肉桂 Cinnamomum cassia Presl 的干燥嫩枝。

【主产地】 主产于广东、广西。以广东产量最大。

【性状特征】 嫩枝呈长圆柱状，多分枝，长 30～75 cm，粗端直径 0.3～1 cm。表面红棕色至棕色，有纵棱线、细皱纹及小疙瘩状的叶痕、枝痕、芽痕，皮孔点状。质硬而脆，易折断，断面皮部红棕色，木部黄白色至浅黄棕色，髓部略呈方形。有特异香气，味甜、微辛，皮部味较浓。

【品质】 本品以枝嫩细而均匀、色红棕、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、甘，温。发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降气。用于风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮，水肿，心悸，奔豚。



【编号】 M07307011018V0CMMI H09727011006000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

桃枝

【来源】 蔷薇科植物桃 Prunus persica (L.) Batsch 的干燥幼枝。

【主产地】 全国大部分地区有栽培。

【性状特征】 枝条呈圆柱状，长短不一，直径 0.5～1 cm。表面红褐色，较光滑，有类白色点状皮孔。质脆，断面黄白色，木部占大部分，中央有白色髓部。气微，味微苦、涩。

【品质】 本品以色红褐、断面色黄白者为佳。

【性味功效】 苦，平。活血通络，解毒，杀虫。用于心腹疼痛，风湿关节痛，腰痛，跌扑损伤，疮癣。



【编号】 M07357143018V0SM H31647143037001300SM

【鉴定人】 瞿显友

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

桑枝

【来源】 桑科植物桑 Morus alba L. 的干燥嫩枝。

【主产地】 主产于江苏、浙江、安徽、湖南、河北、四川等地。

【性状特征】 嫩枝呈长圆柱状，少有分枝，长短不一，直径0.5～1.5 cm。表面灰黄色或黄褐色，有多数黄褐色点状皮孔及细纵纹，并有灰白色略呈半圆形的叶痕和黄棕色的腋芽。质坚韧，不易折断，断面纤维性，皮部较薄，木部黄白色，射线放射状，髓部白色或黄白色。气微，味淡。

【品质】 本品以质嫩、断面色黄白者为佳。

【性味功效】 微苦，平。祛风湿，利关节。用于肩臂、关节酸痛麻木。



【编号】 M07387167075V0CMMI H26387167012000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

海风藤

【来源】 胡椒科植物细叶青蒌藤 Piper kadsura（Choisy）Ohwi 的干燥藤茎。

【主产地】 主产于福建、台湾、浙江等地。

【性状特征】 藤茎呈扁圆柱状，微弯曲，长 15～60 cm，直径 0.2～2 cm。表面灰褐色或褐色，粗糙，有纵向棱状纹理及明显的节，节间长 3～12 cm，节部膨大，上生不定根。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，皮部窄，木部宽广，灰黄色，导管孔多数，射线灰白色，放射状排列，皮部与木部交界处常有裂隙，中心有灰褐色髓。气香，味微苦、辛。

【品质】 本品以条匀、质坚实、有香气者为佳。

【性味功效】 辛、苦，微温。祛风湿，通经络，止痹痛。用于风寒湿痹，关节疼痛，筋脉拘挛，跌扑损伤。



【编号】 M07517028017V0CMMI H29647028002002000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

通草

【来源】 五加科植物通脱木 Tetrapanax papyriferus (Hook.) K.Koch 的干燥茎髓。

【主产地】 主产于云南、贵州、广西、四川、台湾等地。

【性状特征】 茎髓呈圆柱状，长 20～60 cm，直径 1～3 cm。表面白色或淡黄色，有浅纵沟纹。体轻，质松软，稍有弹性，易折断，断面平坦，显银白色光泽，中部有直径 0.3～1.5 cm 的空心或半透明的薄膜，纵剖面呈梯状排列，实心者少见。无臭，无味。

【品质】 本品以条粗、色洁白者为佳。

【性味功效】 甘、淡，微寒。清热利尿，通气下乳。用于湿热尿赤、淋病涩痛，水肿尿少，乳汁不下。



【编号】 M07997212094V0CMMI H38597213021000100CMMI


【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紫苏梗

【来源】 唇形科植物紫苏 Perilla frutescens (L.) Britt. 的干燥茎。
【主产地】 主产于江苏、浙江、河北等地。
【性状特征】 茎呈方柱状，四棱钝圆，直径0.5～1.5 cm，表面紫棕色或暗紫色，四面有纵沟及细纵纹，节部稍膨大，有对生的枝痕和叶痕。体轻，质硬，断面裂片状。断面木部黄白色，射线细密，呈放射状，髓部白色，疏松或脱落。气微香，味淡。
【品质】 本品以茎完整、色紫、香气浓者为佳。
【性味功效】 辛，温。理气宽中，止痛，安胎。用于胸膈痞闷，胃脘疼痛，嗳气呕吐，胎动不安。



【编号】 M09237264204V0CMMI H28757265077000100CMMI
【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

槐枝


【来源】 豆科植物槐 Sophora japonica L. 的干燥嫩枝。
【主产地】 全国各地均产。以黄土高原和华北平原为多。
【性状特征】 嫩枝呈类圆状，外表面灰棕色或暗绿色，切断面浅黄色或黄白色，质坚硬。气臭，味微苦。
【品质】 本品以枝嫩、色灰棕或暗绿者为佳。
【性味功效】 苦，平。散瘀止血，清热燥湿，祛风杀虫。用于崩漏，赤白带下，痔疮，阴囊湿痒，心痛，目赤，疥癣。



【编号】 M09597148570V0SM H37087148135000400CMMI
【鉴定人】 秦松云

槲寄生

【来源】 桑寄生科植物槲寄生 Viscum coloratum (Komar.) Nakai 的干燥带叶茎枝。
【主产地】 主产于河北、辽宁、吉林、内蒙、安徽、湖南、浙江、河南等地。
【性状特征】 茎枝呈圆柱状，2～5叉状分枝，长约30 cm，直径0.3～1 cm。表面黄绿色、金黄色或黄棕色，有纵皱纹，节膨大，节上有分枝或枝痕。体轻，质脆，易折断，断面不平坦，皮部黄色，木部色较浅，射线放射状，髓部常偏向一边。叶对生于枝梢，易脱落，无柄。叶片呈长椭圆状披针形，长2～7 cm，宽0.5～1.5 cm，先端钝圆，基部楔形，全缘。表面黄绿色，有细皱纹，主脉5出，中间3条明显。革质。无臭，味微苦，嚼之有黏性。
【品质】 本品以枝嫩、色黄绿、叶多者为佳。
【性味功效】 苦，平。祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。用于风湿痹痛，腰膝酸软，胎动不安。



【编号】 M10087185036V0CMMI H41117186011000300CMMI
【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

樟木

【来源】 樟科植物樟树 Cinnamomum camphora (L.) Presl 的干燥心材。


【主产地】 主产于广东、广西、云南、贵州。

【性状特征】 心材呈长圆状或对剖半圆柱状或不规则片状，长5～20 cm，直径2～10 cm。表面黄白色，带皮者皮部黄绿色或黄棕色，有细皱纹及横长皮孔。横断面淡黄白色，放射状纹理及年轮明显。质坚硬，具樟脑气，味淡，口尝有清凉感。

【品质】 本品以块大、完整、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 性热，入冷经。祛风止痛，和中理气。用于风湿疼痛，感冒头痛。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M10097011017V0GYCM H09717011006000700GYCM

【鉴定人】 裴盛基

檀香

【来源】 檀香科植物檀香 Santalum album L. 树干的心材。

【主产地】 主产于印度、印度尼西亚等地。以印度老山质佳。

【性状特征】 心材为长短不一的圆柱形木段，有的略弯曲，一般长约1m，直径10～30 cm。外表面灰黄色或黄褐色，光滑细腻，有的具疤节或纵裂，横截面呈棕黄色，显油迹；棕色年轮明显或不明显，纵向劈开纹理顺直。质坚实，不易折断。气清香，燃烧时香气更浓，味淡，嚼之微有辛辣感。

【品质】 本品以体重质坚、显油迹、香气浓郁而持久、烧之气香者为佳。

【性味功效】 辛，温。行气温中，开胃止痛。用于寒凝气滞，胸痛，腹痛，胃痛食少；冠心病，心绞痛。



【编号】 M10277186006V0CMMI H34797187006000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

皮来

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

土荆皮


【来源】 松科植物金钱松 Pseudolarix kaempferi Gord. 的干燥根皮或近根树皮。

【主产地】 主产于江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖南等地。

【性状特征】 根皮呈不规则的长条状，扭曲而稍卷，厚2～5 mm。外表面灰黄色，粗糙，有皱纹及灰白色横向皮孔，栓皮常呈鳞片状剥落，剥落处红棕色；内表面黄棕色，平坦，有细致的纵向纹理。质韧，折断面呈裂片状，可层层剥离。气微，味苦而涩。树皮大多呈条状或片状，厚约1厘米，外表暗棕色，作龟裂状，外皮甚厚；内表面较根皮为粗糙。

【品质】 本品以片大、色黄褐、无栓皮者为佳。

【性味功效】 辛，温；有毒。杀虫，止痒。用于疥癣瘙痒。



【编号】 M00256004059B0CMMI H31716004008000100SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大接骨木

【来源】 山茱萸科植物齿叶叼里木 Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms) Hu 的干燥根皮。

【主产地】 主产于贵州、云南。

【性状特征】 根皮呈内向卷曲的筒状或半筒状，也有双筒状和不规则的碎片，长短不一。外表面为黄棕色或红棕色，有纵向扭曲的纵沟及横向长圆形皮孔；内表面呈紫黑色或紫棕色，有纵纹。质脆，易折断，断面不平坦，断面外层黄色，内层紫黑色。气辛，味微苦麻。

【品质】 本品以皮厚、整齐不破碎、辛辣气浓者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。活血祛瘀，舒筋接骨。用于骨折，跌扑损伤，干血劳伤，扁桃腺炎，哮喘。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M01757209028B0GYCM H39227210009000101GYCM

【鉴定人】 陈谦海

大黄檗

【来源】 小檗科植物大黄檗 Berberis francisci-ferdinandi Schreid. 的干燥茎皮。

【主产地】 主产于西藏、青海。

【性状特征】 茎皮呈窄长条状，皮薄，略弯曲。外表面灰黄色，具纵皱纹，可见不甚明显长圆形的皮孔；内表面颜色较深，呈黄绿色，纵皱纹细密呈纤维样。质脆，易折断，断面略平坦，并有粉尘飞起。气微，味苦。

【品质】 本品以色黄、皮薄、质干者为佳。

【性味功效】 苦，凉。清热解毒，敛黄水。用于小肠热病，热邪入侵肌肉，黄疸病等。

【附注】 藏医习用药材。



【编号】 M00477019027B0XZDC H05977019001001600XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

川黄柏

【来源】 芸香科植物黄皮树 Phellodendron chinense Schneid.的干燥树皮。


【主产地】 主产于四川、贵州、陕西、湖北、云南等地，以四川、贵州产量大，质量佳，称川黄柏。

【性状特征】 树皮呈板片状或浅槽状，厚3～6 mm。外表面黄褐色或黄棕色，平坦或具纵沟纹，有的可见皮孔痕及残存的灰褐色栓皮。内表面暗黄色或淡棕色，具细密的纵棱纹。体轻，质硬，断面纤维性，呈裂片状分层，深黄色。气微，味甚苦，嚼之有黏性。

【品质】 本品以皮厚、色黄者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸，带下，热淋，脚气，痿躄，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹瘙痒。

【附注】 本品作为“黄柏”入药。



【编号】 M08917194099B0CMMI H28977195021000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

川楝皮

【来源】 楝科植物川楝 Melia toosendan Sieb.et Zucc.的干燥树皮。


【主产地】 主产于四川、湖北、湖南、贵州等地。

【性状特征】 树皮呈不规则块片状、槽状或卷筒状，厚2～7 mm。外表面灰褐色或灰棕色，粗糙，有交织的纵皱纹及点状灰棕色皮孔。老皮的皮孔少而不明显；幼皮平坦，皮孔多而明显。除去栓皮者淡黄色，内表面黄白色。质韧，不易折断，断面纤维性，呈层片状，易剥离。无臭，味苦。

【品质】 本品以外皮光滑、不易剥落、皮孔多的幼嫩树皮为佳。

【性味功效】 苦，寒；有毒。驱虫，疗癣。用于蛔虫病，蛲虫病，虫积腹痛；外治疥癣瘙痒。

【附注】 本品作为“苦楝皮”入药。



【编号】 M05517197015B0CMMI H25837198010000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

五加皮

【来源】 五加科植物细柱五加 Acanthopanax gracilistylus W.W. Smith 的干燥根皮。

【主产地】 主产于湖北、河南、安徽。

【性状特征】 根皮呈不规则卷筒状，长5～15 cm，直径0.4～1.4 cm，厚约2 mm。外表面灰褐色，有稍扭曲的纵皱纹及横长皮孔；内表面淡黄色或灰黄色，有细纵纹。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，灰白色。气微香，味微辣而苦。

【品质】 本品以粗长、皮厚、气香、无木心者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。祛风湿，补肝肾，强筋骨。用于风湿痹痛，筋骨痿软，小儿行迟，体虚乏力，水肿，脚气。



【编号】 M01257212004B0CMMI H00257213001000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

木棉皮

【来源】 木棉科植物木棉 Gossampinus malabarica (DC.) Merr. 的干燥树皮。

【主产地】 主产于广东、广西等地。

【性状特征】 树皮呈条片状或卷筒状，长 5～6 cm，宽 2～3 cm，厚 0.3～1.5 cm。外表面灰黄棕色或红棕色，粗糙，密生椭圆形钉刺，乳头状微凸，钉刺上有层纹，不易剥落，有时刺尖被磨去；内表面红棕色，有纵向纹理。质坚韧，不易折断，断面纤维状。有微弱香气，味淡。

【品质】 本品以有微弱香气、色灰黄棕或红棕者为佳。

【性味功效】 辛、苦，凉。清热解毒，散瘀止血。用于风湿痹痛，泄泻，痢疾，慢性胃炎，胃溃疡，崩漏下血，疮疖肿痛。



【编号】 M01717131001V0SM H19097131005000100SM

【鉴定人】 秦松云

凹叶厚朴

【来源】 木兰科植物凹叶厚朴 Magnolia officinalis Rehd.et Wils. var.biloba Rehd.et Wils. 的干燥干皮。


【主产地】 主产于浙江、福建。

【性状特征】 干皮呈卷筒状或双卷筒状，长 30～35 cm，厚 2～7 mm，习称“简朴”；近根部的干皮一端展开如喇叭口，长 13～25 cm，厚 3～8 mm，习称“靴筒朴”。外表面灰棕色或灰褐色，粗糙，有时呈鳞片状，较易剥落，有明显椭圆形皮孔和纵皱纹，刮去粗皮者显黄棕色；内表面紫棕色或深紫褐色，较平滑，具细密纵纹，划之显油痕。质坚硬，不易折断，断面颗粒性，外层灰棕色，内层紫褐色或棕色，有油性，有的可见多数小亮星。气香，味辛辣、微苦。

【品质】 本品以皮厚、油性大、断面色紫棕有亮光、香气浓厚、味辣而甜者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温。燥湿消痰，下气除满。用于湿滞伤中，脘痞吐泻，食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳。

【附注】 本品作为“厚朴”入药。



【编号】 M06157001046B0CMMI H25187001006001001SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

合欢皮

【来源】 豆科植物合欢 Albizia julibrissin Durazz. 的干燥树皮。

【主产地】 主产于湖北、江苏、浙江、安徽等地。

【性状特征】 树皮呈卷曲筒状或半筒状，长 40～80 cm，厚 1～3 mm。外表面灰棕色至灰褐色，稍有纵皱纹，有的成浅裂纹，密生明显的椭圆形横向皮孔，棕色或棕红色，偶有突起的横棱或较大的圆形枝痕，常附有地衣斑；内表面淡黄棕色或黄白色，平滑，有细密纵纹。质硬而脆，易折断，断面呈纤维性片状，淡黄棕色或黄白色。气微香，味淡、微涩，稍刺舌，而后喉头有不适感。

【品质】 本品以皮嫩、皮孔明显、内表面色白者为佳。

【性味功效】 甘，平。解郁安神，活血消肿。用于心神不安，忧郁失眠，肺痈疮肿，跌扑伤痛。



【编号】 M03177148023B0CMMI H01797148007000900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

地枫皮

【来源】木兰科植物地枫 Illicium difengpi K. I. B. et K. I. M. 的干燥树皮。

【主产地】主产于广西都安、马山、德保等地。

【性状特征】树皮呈卷筒状或槽状，长5～15 cm，直径1～4 cm，厚2～3 mm。外表面灰棕色至深棕色，有的可见灰白色地衣斑，栓皮易剥离或脱落，脱落处棕红色；内表面棕色或棕红色，具明显的细纵皱纹。质松脆，易折断，断面颗粒状。气微香，味微涩。

【品质】本品以质松脆、气芳香者为佳。

【性味功效】微辛、涩，温；有小毒。祛风除湿，行气止痛。用于风湿痹痛，腰肌劳损。



【编号】M03237001004B0CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

地骨皮

【来源】茄科植物枸杞 Lycium chinense Mill. 的干燥根皮。

【主产地】主产于山西、河南、浙江、江苏、河北、宁夏。江苏、浙江产的质量佳。

【性状特征】根皮呈筒状或槽状，长3～10 cm，宽0.5～2 cm，厚1～3 mm。外表面灰黄色至棕黄色，粗糙，有不规则纵裂纹，易成鳞片状剥落；内表面黄白色至灰黄色，较平坦，有细纵纹。体轻，质脆，易折断，断面不平坦，外层黄棕色，内层灰白色，有时可见棕色斑点。气微，味微甘而后苦。

【品质】本品以块大、皮厚、整齐、无木心及碎片者为佳。

【性味功效】甘，寒。凉血除蒸，清肺降火。用于阳虚潮热，骨蒸盗汗，肺热咳嗽，咯血，衄血，内热消渴。



【编号】M03257250034B0CMMI H24427251011000200CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

尖叶白蜡树皮

【来源】木犀科植物尖叶白蜡树 Fraxinus szaboana Lingelsh. 的干燥干皮。


【主产地】主产于陕西渭南、华县、华阳、长武等地。

【性状特征】干皮多呈长卷筒状或槽状，长30～100 cm，厚3～6 mm。外表面灰褐色或灰黑色，有细密的纵向细皱纹。较老的干皮具龟裂皮鳞（落皮层）。皮孔密布，圆点状或横长椭圆形，皮孔处有圆形或椭圆形凹点，有的凹点处残留红棕色物，皮孔周边灰白色，中心红棕色；除去皮鳞者，外表较平滑。内表面较平滑，黄白色至黄棕色。质较坚硬，可折断，断面黄白色，纤维性，并显层片状，层离片在放大镜下可见网纹及射线干裂后形成的小孔。气微，味苦。

【品质】本品以条长、外皮薄而光滑、色灰白、苦味浓者为佳。

【性味功效】苦、涩，寒。清热燥湿，收涩，明目。用于热痢，泄泻，赤白带下，目赤肿痛，目生翳膜。

【附注】本品作为“秦皮”入药。



【编号】M07707229024B0CMMI H17967230004001200SM

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

红毛五加皮

【来源】 五加科植物红毛五加 Acanthopanax giraldii Harms 的干燥茎皮或根皮。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 茎皮呈卷筒状，长 20～30 cm，筒径 0.5～1.5 cm，厚0.5～1 mm。外表面黄色或黄棕色，密生黄棕色、红棕色或棕黑色的皮刺。皮刺向下，细长针形，长 3～7 mm，基部直径约 0.5 mm；节部有芽痕及叶柄痕。内表面黄绿色或淡棕色，平滑。体轻质脆，易折断，断面纤维性。气微，味淡。

【品质】 本品以体轻质脆、色黄或黄棕者为佳。

【性味功效】 辛、微苦，温。祛风湿，强筋骨，活血利水。用于风寒湿痹，拘挛疼痛，筋骨痿软，足膝无力，心腹疼痛，疝气，跌扑损伤，骨折，体虚浮肿。



【编号】 M03577212003FHCMMI H00247213001000700SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

肉桂


【来源】 樟科植物肉桂 Cinnamomum cassia Presl 的干燥树皮。

【主产地】 主产于广西、广东等地。国外主产于越南。

【性状特征】 树皮呈槽状或卷筒状，长 30～40 cm，宽或直径 3～10 cm，厚 2～8 mm。外表面灰棕色，稍粗糙，有不规则的细皱纹及横向突起的皮孔，有的可见灰白色的斑纹；内表面红棕色，略平坦，有细纵纹，划之显油痕。质硬而脆，易折断，断面不平坦，外层棕色而较粗糙，内层红棕色而油润，两层间有 1 条黄棕色的线纹。气香浓烈，味甜、辣。

【品质】 本品以皮厚、体重、油性大、香气浓、味甜辣、嚼之渣少者为佳。

【性味功效】 辛、甘，大热。补火助阳，引火归源，散寒止痛，活血通经。用于阳萎，宫冷，腰膝冷痛，肾虚作喘，阳虚眩晕，目赤咽痛，心腹冷痛，虚寒吐泻，寒疝，奔豚，经闭，痛经。



【编号】 M03787011018B0CMMI H09727011006000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

杜仲

【来源】 杜仲科植物杜仲 Eucommia ulmoides Oliv. 的干燥树皮。

【主产地】 主产于贵州、陕西、湖北、四川、河南等地；贵州遵义、毕节，陕西西乡、宁强等地为道地产区。

【性状特征】 树皮呈片状或两边稍向内卷，大小不一，厚 3～7 mm。外表面淡棕色或灰褐色，具不规则纵裂槽纹，并有斜方形皮孔；内表面暗紫色或紫褐色，光滑。质脆，易折断，断面有细密富弹性的银白色橡胶丝相连。气微，味稍苦。

【品质】 本品以皮厚、完整、去净粗皮、断面丝多者为佳。

【性味功效】 甘，温。补肝肾，强筋骨，安胎。用于腰膝酸痛，阳萎，尿频，小便余沥，胎动不安，妊娠流产。



【编号】 M04147152001B0CMMI H16477152001000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

牡丹皮

【来源】 毛茛科植物牡丹 Paeonia suffruticosa Andr.的干燥根皮。

【主产地】 主产于安徽、四川、山东等地。安徽铜陵所产的质量最佳。

【性状特征】 根皮呈筒状或半筒状，有纵剖开的裂缝，略向内卷曲或张开，长5～20 cm，直径0.5～1.4 cm，厚1～4 mm。外表面灰褐色或黄褐色，有多数横长皮孔及细根痕，栓皮脱落处粉红色，内表面淡灰黄色或浅棕色，有明显的细纵纹，常见发亮的结晶。质硬而脆，易折断，断面较平坦，淡粉红色，粉性。气芳香，味微苦而涩。

【品质】 本品以条粗长、皮厚、断面色白、粉性足、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛，微寒。清热凉血，活血化瘀。用于温毒发斑，吐血衄血，夜热早凉，无汗骨蒸，经闭痛经，痈肿疮毒，跌扑伤痛。



【编号】 M04237015382B0CMMI H27977015034000900CMM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

刺楸树皮


【来源】 五加科植物刺楸 Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.的干燥树皮。

【主产地】 主产于江苏、浙江、安徽、湖南、四川、贵州等地。

【性状特征】 树皮呈卷筒状或弧状弯曲条块状，厚1.3～3.5 mm。外表面灰白色至灰褐色，粗糙，有灰黑色纵裂隙及横向裂纹，散生黄色圆点状皮孔，不明显；皮上有钉刺，长1～ 3 cm，基部纵向延长呈椭圆形，直径1～1.7 cm，先端扁平尖锐，钉刺脱落可露出黄色内皮。内表面棕黄色或紫褐色，光滑，有明显细纵纹。质坚韧，不易折断，折断面外部灰棕色，内部灰黄色，强纤维性，呈明显片层状。气微香，味苦。

【品质】 本品以身干、皮厚、钉刺多、色灰白至灰褐者为佳。

【性味功效】 辛、苦，凉。祛风除湿，活血止痛，杀虫止痒。用于风湿痹痛，脚气，腰膝痛；外用于皮肤疥癣，牙痛。



【编号】 M04897212058FHCMMI H22047213011000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

苦枥白蜡树皮

【来源】 木犀科植物苦枥白蜡树 Fraxinus rhynchophylla Hance 的干燥干皮。

【主产地】 主产于辽宁抚顺、本溪、丹东；吉林浑江等地。

【性状特征】 干皮为长条状块片，长10～100 cm，厚3～6 mm。外表面灰棕色，具龟裂状沟纹及红棕色圆形或横长的皮孔，有细密的纵向细皱纹，可见较多白色地衣斑，斑块较大；内表面较平滑，黄白色至黄棕色。质坚硬，可折断，断面黄白色，纤维性较强，显层片状，层离片在放大镜下可见网纹及射线干裂后形成的小孔。气微，味苦。

【品质】 本品以条长、外皮薄而光滑、色灰白、苦味浓者为佳。

【性味功效】 苦、涩，寒。清热燥湿，收涩，明目。用于热痢，泄泻，赤白带下，目赤肿痛，目生翳膜。

【附注】 本品作为“秦皮”入药。



【编号】 M07677229022B0CMMI H17947230004001000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苦树皮


【来源】 苦木科植物苦木 Picrasma quassioides (D.Don) Benn. 的干燥茎皮。

【主产地】 主产于广东、广西等地。

【性状特征】 茎皮呈卷状、槽状或长片状，长 20～55 cm，宽 2～10 cm，多已除去栓皮。未去栓皮的幼皮表面棕绿色，皮孔细小，淡棕色，稍突起；未去栓皮的老皮表面棕褐色，圆形皮孔纵向排列，中央下凹，四周突起，常附有白色地衣斑纹。内表面黄白色，平滑。质脆，易折断，折断面略粗糙，可见微细的纤维。气微，味苦。

【品质】 本品以质脆、味苦、色棕者为佳。

【性味功效】 苦，寒；小毒。清热解毒，燥湿杀虫。用于感冒发热，急性胃肠炎，痢疾，胆道感染，蛔虫病，疮疖，疥癣，湿疹，烫伤，毒蛇咬伤。



【编号】 M05427195010V0SM H29387196004000100CMMI

【鉴定人】 秦松云

苦楝皮

【来源】 楝科植物苦楝 Melia azedarach L. 的干燥树皮。

【主产地】 主产于华北、华南及四川等地。

【性状特征】 树皮呈不规则块片状、槽状或卷筒状，厚2～7 mm。外表面灰褐色或灰棕色，粗糙，有交织的纵皱纹及点状灰棕色皮孔。老皮的皮孔少而不明显；幼皮平坦，皮孔多而明显。除去粗皮者淡黄色；内表面红棕色。质韧，不易折断，断面纤维性，呈层片状，易剥离。无臭，味苦。

【品质】 本品以外皮光滑、不易剥落、皮孔多的幼嫩树皮为佳。

【性味功效】 苦，寒；有毒。驱虫，疗癣。用于蛔虫病，蛲虫病，虫积腹痛；外治疥癣瘙痒。



【编号】 M05507197012B0CMMI H25827198010000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

厚朴


【来源】 木兰科植物厚朴 Magnolia officinalis Rehd. et Wils. 的干燥干皮。

【主产地】 主产于湖北、四川、浙江、安徽等地。四川、湖北产者称“川朴”，质量较佳。

【性状特征】 干皮呈卷筒状或双卷筒状，长 30～35 cm，厚 2～7 mm，习称“筒朴”；近根部的干皮一端展开如喇叭口，长 13～25 cm，厚 3～8 mm，习称“靴筒朴”。外表面灰棕色或灰褐色，粗糙，有时呈鳞片状，较易剥落，有明显椭圆形皮孔和纵皱纹，刮去粗皮者显黄棕色，内表面紫棕色或深紫褐色，较平滑，具细密纵纹，划之显油痕。质坚硬，不易折断，断面颗粒性，外层灰棕色，内层紫褐色或棕色，有油性，有的可见多数小亮星。气香，味辛辣、微苦。

【品质】 本品以皮厚、油性大、断面色紫棕有亮光、香气浓厚、味辣而甜者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温。燥湿消痰，下气除满。用于湿滞伤中，脘痞吐泻，食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳。



【编号】 M06147001045B0CMMI H25177001005001000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

祖师麻

【来源】 瑞香科植物黄瑞香 Daphne giraldii Nitsche 的干燥茎皮和根皮。

【主产地】 主产于陕西、甘肃、四川、青海、宁夏、河南、山西、江西等地。

【性状特征】 茎皮和根皮呈长条状，卷曲，厚0.5～2 mm。茎皮外表面褐黄色或灰褐色，较光滑，具纵皱纹及横长皮孔，栓皮易成片脱落，根皮外表面红棕色，较粗糙；内表面浅黄色至淡棕色，有纵长纹理。质韧，不易折断，断面具绒毛状纤维。气微，味微苦，有麻舌感。

【品质】 本品以条宽长、皮厚、有香气者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温；有小毒。祛风通络、散瘀止痛。用于风湿痹痛，四肢麻木，头痛，胃痛、腰痛，跌扑损伤。



【编号】 M06557081011FHCMMI H13337081002000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

香加皮

【来源】 萝藦科植物杠柳 Periploca sepium Bge. 的干燥根皮

【主产地】 主产于河北、山东、山西、陕西、甘肃、河南等地。

【性状特征】 根皮呈卷筒状或槽状，少数呈不规则的块片状，长3～10 cm，直径1～2 cm，厚2～4 mm。外表面灰棕色或黄棕色，栓皮松软常呈鳞片状，易剥落；内表面淡黄色或淡黄棕色，较平滑，有细纵纹。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，黄白色。有特异香气，味苦。

【品质】 本品以皮厚、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温；有毒。祛风湿，强筋骨。用于风寒湿痹，腰膝酸软，心悸气短，下肢浮肿。

【附注】 香加皮古代充五加皮药用，称北五加皮。《中国药典》(1977年版一部）改称为现名。



【编号】 M07027231097B0CMMI H28807232035000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

桑白皮

【来源】 桑科植物桑 Morus alba L. 的干燥根皮。

【主产地】 主产于河南、安徽、浙江、江苏、河北、湖南、广东、四川等地。以安徽产的“亳桑皮”质量佳。

【性状特征】 根皮呈扭曲的卷筒状、槽状或板片状，厚1～6 mm。外表面白色或淡黄白色，较平坦，有的残留橙黄色或棕黄色鳞片状栓皮；内表面黄白色或灰黄色，有细纵纹。体轻，质韧，纤维性强，难折断，易纵向撕裂，撕裂时有粉尘飞出。气微，味微甘。

【品质】 本品以色白、皮厚、粉性足者为佳。

【性味功效】 甘，寒。泻肺平喘，利水消肿。用于肺热喘咳，水肿胀满尿少，面目肌肤浮肿。



【编号】 M07377167075B0CMMI H26387167012000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

秦皮


【来源】 木犀科植物白蜡树 Fraxinus chinensis Roxb. 的干燥干皮。

【主产地】 主产于四川峨眉、夹江等地。

【性状特征】 干皮呈长条块片状、卷筒状或槽状，厚3～6 mm。外表面灰棕色，具龟裂状沟纹及红棕色圆形或横长的皮孔，有细密的纵向细皱纹，无白色地衣斑，常具绿色和黑色斑块；内表面较平滑，黄白色至黄棕色。质较坚硬，可折断，断面黄白色，纤维性较强，显层片状，层离片在放大镜下可见网纹及射线干裂后形成的小孔。气微，味苦。

【品质】 本品以条长、外皮薄而光滑、色灰白、苦味浓者为佳。

【性味功效】 苦、涩，寒。清热燥湿，收涩，明目。用于热痢，泄泻，赤白带下，目赤肿痛，目生翳膜。



【编号】 M07667229008B0CMMI H17927230004000900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

秦岭白蜡树皮

【来源】 木犀科植物秦岭白蜡树 Fraxinus paxiana Lingelsh. 的干燥枝皮。

【主产地】 主产于陕西、四川、湖北等地。

【性状特征】 枝皮呈卷筒状或槽状长条形，长30～70 cm，直径1.5～3 cm，厚约3 mm。表面灰褐色或灰黑色，外皮不光滑，有浅色斑点；内表面黄白色或棕色，有光泽。质硬，易折断，断面黄白色，纤维性。无臭，味苦。

【品质】 本品以整齐、长条呈筒状者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿、平喘止咳，明目。用于细菌性痢疾，肠炎，白带，慢性气管炎，目赤肿痛，迎风流泪，牛皮癣。

【附注】 本品作为“秦皮”入药。



【编号】 M07737229018B0CMMI H17937230004000700SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

宿柱白蜡树皮

【来源】 木犀科植物宿柱白蜡树 Fraxinus stylosa Lingelsh. 的干燥干皮。

【主产地】 主产于陕西渭南、华县、华阴、长武等地。

【性状特征】 干皮为长条状块片，长10～100 cm，厚3～6 mm。外表面灰白色，具龟裂状沟纹及红棕色圆形或横长的皮孔，有细密的纵向细皱纹，少见白色地衣斑；内表面较平滑，黄白色至黄棕色。质较坚硬，可折断，断面黄白色，纤维性较强，并显层片状，层离片在放大镜下可见网纹及射线干裂后形成的小孔。气微，苦味较浓。

【品质】 本品以条块长、外皮薄而光滑、色灰白、苦味浓者为佳。

【性味功效】 苦、涩，寒。清热燥湿，收涩，明目。用于热痢，泄泻，赤白带下，目赤肿痛，目生翳膜。

【附注】 本品作为“秦皮”入药。



【编号】 M07687229023B0CMMI H17957230004001100SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄柏


【来源】 芸香科植物黄柏 Phellodendron amurense Rupr. 的干燥树皮。

【主产地】 主产于辽宁、吉林、河北等地，以辽宁产量大，称关黄柏。

【性状特征】 树皮呈板片状，厚2～4 mm。外表面黄绿色或淡棕黄色，较平坦，有不规则的纵裂纹，皮孔痕小而少见，偶有灰白色的栓皮残留；内表面黄色或黄棕色。体轻，质较硬，断面鲜黄色或黄绿色，纤维性，可成片剥离。气微，味苦。

【品质】 本品以皮厚、色黄者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸，带下，热淋，脚气，痿躄，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹瘙痒。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺，盗汗骨蒸。



【编号】 M08907194098B0CMMI H28967195021000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

棕板

【来源】 棕榈科植物棕榈 Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H.Wendl. 削去外面纤维、晒干的叶柄。

【主产地】 主产于江西、江苏、安徽、浙江、福建、广东、广西、四川、贵州、云南等地。

【性状特征】 叶柄呈长条板状，红棕色，基部较宽而扁平，或略向内卷曲，向上则渐窄而厚，背面中央隆起，成三角形，两侧平坦，上有厚密的红棕色毛茸，腹面平坦，或略向内凹，有左右交叉的纹理。撕去表皮后，可见坚韧的纤维。质坚韧，不易折断。切面平整，有多数淡黄色维管束散生成点状。气无，味淡。

【品质】 本品以有厚密的红棕色毛茸、色红棕者为佳。

【性味功效】 苦、涩，平。收敛止血。用于吐血，衄血，便秘，尿血，血崩，外伤出血。



【编号】 M09017314027B0CMMI H39347314028000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

椿白皮


【来源】 楝科植物香椿 Toona sinensis (A. Juss.) Roem. 的干燥树皮。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 树皮呈半卷筒状或片状，厚2～6 mm。外表面红棕色或棕褐色，有纵纹及裂隙，有的可见圆形细小皮孔；内表面棕色，有细纵纹。质坚硬，断面纤维性，呈层状。有香气，味淡。

【品质】 本品以有香气、色红棕或棕褐者为佳。

【性味功效】 苦、涩，微寒。清热燥湿，涩肠，止血，止带，杀虫。用于泄泻，痢疾，肠风便血，崩漏，带下，蛔虫病，丝虫病，疮癣。



【编号】 M07047197028B0CMMI H39187198015000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

椿皮

【来源】 苦木科植物臭椿 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 的干燥根皮或干皮。


【主产地】 主产于浙江、河北、江苏、湖北、北京、天津等地。

【性状特征】 根皮呈不整齐的片状或卷片状，长宽不一，厚0.3～1 cm。外表面灰黄色或黄褐色，粗糙，有多数突起的纵向皮孔及不规则纵、横裂纹，除去粗皮者显黄白色；内表面淡黄色至淡棕黄色，较平坦，密布梭形小孔或小点。质硬而脆，断面不平坦，外层颗粒性，内层纤维性，棕黄色。气微，味苦。

干皮呈不规则板片状，厚0.5～2 cm。外表面暗灰色至灰黑色，极粗糙，有深裂。有时刮去栓皮露出淡棕黄色皮层。其他与根皮相同。

【品质】 本品以肉厚、块大、无粗皮、色黄白者为佳。

【性味功效】 苦、涩，寒。清热燥湿，收涩止带，止泻，止血。用于赤白带下，湿热泻痢，久泻久痢，便血，崩漏。



【编号】 M09567195001B0CMMI H01527196001000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

楤木

【来源】 五加科植物楤木 Aralia chinensis L. 的干燥根皮。

【主产地】 主产于甘肃、四川、贵州等地。

【性状特征】 根皮呈剥落状，粗糙不平，有纵皱及横纹，并散生坚硬的针刺。外表面灰白色至灰褐色，内表面黄白色而光滑；断面呈纤维性。气微香，嚼之带黏液性。

【品质】 本品以皮厚、外表粗糙而内皮光滑、除尽木部者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清泻肝热，益胃健脾。用于胃及十二指肠溃疡，慢性胃炎等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M02397212025B0GYCM H03437213002000600GYCM

【鉴定人】 袁家谟

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

叶

柔

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

人参叶


【来源】五加科植物人参 Panax ginseng C. A. Mey. 的干燥叶。

【主产地】主产于吉林、辽宁、黑龙江等地。

【性状特征】叶常扎成小把，呈束状或扇状。掌状复叶带有长柄，小叶通常5枚，偶有7或9枚，呈卵形或倒卵形，基部的小叶长2～8 cm，宽1～4 cm；上部的小叶，长4～16 cm，宽2～7 cm，基部楔形，先端渐尖，边缘具细锯齿及刚毛，上表面叶脉生刚毛，下表面叶脉隆起。纸质，易碎。气清香，味微苦而甘。

【品质】本品以气清香者为佳。

【性味功效】苦、甘，寒。补气，益肺，祛暑，生津。用于气虚咳嗽，暑热烦躁，津伤口渴，头目不清，四肢倦乏。



【编号】M00087212066L0CMMI H28027213016000100CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

大青叶

【来源】十字花科植物菘蓝 Isatis indigotica Fort. 的干燥叶。

【主产地】主产于江苏、安徽、河北等地。

【性状特征】叶多皱缩卷曲，有的破碎。完整叶片展平后呈长椭圆形至长圆状倒披针形，长5～20 cm，宽2～6.5 cm；上表面暗灰绿色，有的可见色较深稍突起的小点；全缘或微波状，先端钝，基部狭窄下延至叶柄呈翼状；叶柄长4～10 cm，淡棕黄色。质脆。气微，味微酸、苦、涩。

【品质】本品以叶大、不破碎、叶无柄、色黑绿者为佳。

【性味功效】苦，寒。清热解毒，凉血消斑。用于温邪入营，高热神昏，发斑发疹，黄疸，热痢，疔腮，喉痹，丹毒，痈肿。



【编号】M00437039064L0CMMI H21647039047000200CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

山矾叶

【来源】山矾科植物白檀 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq. 的干燥叶。


【主产地】主产于四川、云南等地。

【性状特征】叶多皱缩、破碎，草绿色至淡黄色。完整叶片呈椭圆形，两侧向内稍卷曲，顶端急尖，基部楔形；中脉明显，向背凸起，侧脉对称，细弱，边缘有细锐齿。气微，味微苦。

【品质】本品以叶片完整、色草绿至淡黄者为佳。

【性味功效】苦，平。清热。用于肺热病，肾热病，扩散伤热病。

【附注】藏药。《晶珠本草》有记载。



【编号】M10517225009L0CMMI

【鉴定人】格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山栀茶

【来源】 海桐花科植物海金子 Pittosporum illicoides Makino 的干燥叶。

【主产地】 主产于贵州、四川、湖南。

【性状特征】 叶片薄革质，窄矩圆形或倒卵状披针形，长5～10 cm，宽2～3.5 cm，先端渐尖，基部窄楔形，常向下延，边缘微波状。上面绿色，发亮，下面淡绿色，无毛。干燥的叶片多呈棕褐色。

【品质】 本品以叶片完整、厚实者为佳。

【性味功效】 性热，入冷经、快经。清利湿热。治疗黄疸，子宫脱出等症。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M00677088011L0GYCM H29807088001001200GYCM

【鉴定人】 陈谦海

川莓

【来源】 蔷薇科植物川莓 Rubus setchuenensis Bur. et Franch 的干燥叶。

【主产地】 主产于贵州、四川、云南。

【性状特征】 叶多破碎或皱缩成团，完整叶展平后呈近圆形或宽卵形，直径6～17 cm，先端急尖或圆钝，基部心形，边缘有不整齐的锯齿，常5浅裂或不明显的7裂，上表面黄绿色或红褐色，粗糙，下表面灰绿色，网脉上有绒毛。叶柄长3～7 cm，无刺。质脆，易破碎。气微，味微酸涩。

【品质】 本品以叶片完整、破碎少、色绿者为佳。

【性味功效】 和性药。祛风除湿，活血止呕。用于劳伤吐血，瘰疬，口有腥气等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M00867143353L0GYCM H34057143044015700GYCM

【鉴定人】 谢德文

白背叶

【来源】 大戟科植物白背叶Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg. 的干燥叶。

【主产地】 主产于安徽、浙江、江西、福建、河南、湖南、广西、广东、四川等地。

【性状特征】 单叶互生，具长柄，叶片阔卵形，长7～12 cm，宽5～12 cm，先端渐尖，基部近截形或短截形，具2腺点，全缘或不规则3浅裂，上面近无毛，下面被灰白色，密被星状毛，有细密棕色腺点。气微，味苦涩。

【性味功效】 苦，平。清热解毒，祛湿，止血。用于蜂窝织炎，化脓性中耳炎，鹅口疮，湿疹，跌扑损伤，外伤出血。



【编号】 M08567136146L0CMMI H25317136044000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

艾叶

【来源】 菊科植物艾 Artemisia argyi Levl.et Vant. 的干燥叶。

【主产地】 主产于安徽、山东、湖北、河北、河南等地。以湖北蕲州产最著名。

【性状特征】 叶多皱缩、破碎，有短柄。完整叶片展平后呈卵状椭圆形，羽状深裂，裂片椭圆状披针形，边缘有不规则的粗锯齿；上表面灰绿色或深黄绿色，有稀疏的柔毛及腺点；下表面密生灰白色绒毛。质柔软。气清香，味苦。

【品质】 本品以叶背面色灰白、绒毛多、质软、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温；有小毒。散寒止痛，温经止血。用于少腹冷痛，经寒不调，宫冷不孕，吐血，衄血，崩漏经多，妊娠下血；外治皮肤瘙痒。



【编号】 M02927238065L0CMMI H04227239024001000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

有柄石韦

【来源】 水龙骨科植物有柄石韦 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching 的干燥叶。

【主产地】 主产于四川、贵州、云南、陕西等地。

【性状特征】 叶片多卷曲成筒状，展平后呈卵圆状长圆形或宽披针形，长 3～8 cm，宽 1～3 cm。先端钝尖，基部楔形，下延成柄，对称，全缘，上表面灰棕色，无毛或有星状毛，散布有黑色圆形小凹点；下表面密被星芒状鳞毛，全部着生孢子囊群，上面有一条纵浅沟，内生密毛。叶革质。气微，味微苦涩。

【品质】 本品以叶厚、整齐、洁净者为佳。

【性味功效】 苦、甘，凉。利水通淋，清肺泄热。用于淋痛，尿血，尿路结石，肾炎，崩漏，肺热咳嗽，慢性气管炎。

【附注】 本品作为“石韦”入药。



【编号】 M02745056092L0CMMI H32255056020005200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

庐山石韦

【来源】 水龙骨科植物庐山石韦 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching 的干燥叶。

【主产地】 主产于江西、浙江、江苏、湖北等地。

【性状特征】 叶片多皱缩，展平呈长圆披针形，长 15～30 cm，宽 3～5 cm，先端渐尖，锐尖头，基部阔楔形至圆形或近心形或稍呈耳状，显著不对称，边缘全缘，多向内卷曲。上表面黄绿色或淡灰绿色，散布有黑色圆形小凹点，下表面密被淡棕色，中心具棕红色点的星芒状鳞毛，毛较细。叶柄呈钝圆三棱形，长 10～20 cm，直径 1.5～4 mm，有纵槽。叶片革质。气微，味苦涩。

【品质】 本品以叶大、质厚、背面有毛者为佳。

【性味功效】 苦、甘，凉。利水通淋，清肺泄热。用于淋痛，尿血，尿路结石，肾炎，崩漏，肺热咳嗽，慢性气管炎。

【附注】 本品作为“石韦”入药。



【编号】 M02765056094L0CMMI H32265056020005900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

巫山淫羊藿叶

【来源】 小檗科植物巫山淫羊藿 Epimedium wushanense T.S.Ying 的干燥叶。

【主产地】 主产于陕西、四川、贵州等地。

【性状特征】 叶片披针形至狭披针形，长9～23 cm，宽2～4.5 cm；先端渐尖或长渐尖，边缘具刺齿。上表面黄绿色，下表面灰绿色，被绵毛或秃净。无臭，味微苦。

【品质】 本品以叶片完整、色绿者为佳。

【性味功效】 甘、淡，寒。清热除烦，利尿。用于热病烦渴，小便赤涩淋痛，口舌生疮。



【编号】 M08297019112L0SM H15987019005001300SM

【鉴定人】 钟国跃

枇杷叶


【来源】 蔷薇科植物枇杷 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 的干燥叶。

【主产地】 主产于广东、广西、江苏、浙江等地，以江苏产量大，称“苏杷叶”；广东质量佳，称“广杷叶”。

【性状特征】 叶呈长圆形或倒卵形，长12～30 cm，宽4～9 cm。先端尖，基部楔形，边缘有疏锯齿，近基部全缘。上表面灰绿色、黄棕色或红棕色，较光滑；下表面密被黄色绒毛，主脉于下表面显著突起，侧脉羽状；叶柄极短，被棕黄色绒毛。革质而脆，易折断。无臭，味微苦。

【品质】 本品以叶大、完整、色灰绿或红棕者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。清肺止咳，降逆止呕。用于肺热咳嗽，气逆喘急，胃热呕逆，烦热口渴。



【编号】 M05127143100L0CMMI H16177143020000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

细叶十大功劳叶

【来源】 小檗科植物细叶十大功劳 Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde 的干燥叶片。

【主产地】 主产于浙江、安徽、江西等地。

【性状特征】 叶多向一面卷曲，展平后呈狭披针形，边缘两侧各具6～13个刺状齿，齿尖向叶背微弯，上面紫绿色，有光泽，下面黄绿色。质硬而脆。气微弱，味淡。

【品质】 本品以叶片完整、色绿而有光泽者为佳。

【性味功效】 苦，凉。清热补虚，止咳化痰。用于肺痨咳嗽，骨蒸潮热，头晕耳鸣，腰酸腿软，心烦，目赤。



【编号】 M04887019126FHCMMI H25247019008001000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

罗布麻叶

【来源】夹竹桃科植物罗布麻 Apocynum venetum L. 的干燥叶。

【主产地】主产于辽宁、吉林、内蒙古、安徽、陕西等地。

【性状特征】叶多皱缩卷曲，有的破碎，完整叶片展平后呈椭圆状披针形或卵圆状披针形，长 1～5 cm，宽 0.5～2 cm，淡绿色或灰绿色，先端钝，有小芒尖，基部钝圆或楔形，边缘具细齿，常反卷，两面无毛，叶脉于下表面突起；叶柄细，长约 4 mm。质脆。气微，味淡。

【品质】本品以叶完整、色绿者为佳。

【性味功效】甘、苦，凉。平肝安神，清热利水。用于肝阳眩晕，心悸失眠，浮肿尿少；高血压，神经衰弱，肾炎浮肿。



【编号】M05327230017L0CMMI H03317231008000100CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

苦丁茶

【来源】木犀科植物粗壮女贞 Ligustrum robustum (Roxb.) Blume 的干燥叶片。

【主产地】主产于贵州、云南、广西。

【性状特征】叶片多已破碎、皱缩或部分数片黏连，呈绿褐色或棕褐色。完整的叶片呈椭圆形、卵状椭圆形至卵状披针形，长 4～10 cm，宽 1.5～4 cm，先端渐尖，基部楔形或圆形，全缘，革质，上面平滑光亮，下面主脉突起，质脆。微具焦糖气，味苦回甜。

【品质】本品以叶片厚、完整、气味浓郁者为佳。

【性味功效】性冷，入热经。清热，解毒。用于火眼，口疳，乳痈，肿毒，烫火伤等。

【附注】苗族医习用药材。



【编号】M05407229063L0GYCM

【鉴定人】陈谦海

枸骨叶

【来源】冬青科植物枸骨 Ilex cornuta Lindl. ex Paxt. 的干燥叶。

【主产地】主产于江苏、河南、湖北、湖南、安徽、浙江、江西、福建等地。

【性状特征】叶呈类长方形或矩圆状长方形，长 3～8 cm，宽 1～4 cm。先端具 3 枚较大的硬刺齿，顶端 1 枚常反曲，基部平截或宽楔形，两侧有时各具刺齿 1 ～ 3 枚，边缘稍反卷；上表面黄绿色或绿褐色，有光泽，下表面灰黄色或灰绿色。叶脉羽状，叶柄较短。革质，硬而厚。无臭，味微苦。

【品质】本品以叶大、色绿者为佳。

【性味功效】苦，凉。清热养阴，平肝，益肾。用于肺痨咯血，骨蒸潮热，头晕目眩；高血压。



【编号】M06347171006L0CMMI H20867172001000700CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

狭叶番泻叶

【来源】 豆科植物狭叶番泻Cassia angustifolia Vahl的干燥小叶。

【主产地】 主产于印度。

【性状特征】 叶呈长卵形或卵状披针形，长1.5～5 cm，宽0.4～2 cm，全缘，先端急尖，基部稍不对称。上表面黄绿色，下表面浅黄绿色，无毛或近无毛，叶脉稍隆起。革质。气微弱而特异，味微苦，稍有黏性。

【品质】 本品以叶大、完整、梗少、色绿者为佳。

【性味功效】 甘、苦，寒。泻热行滞，通便，利水。用于热结积滞，便秘腹痛，水肿胀满。

【附注】 番泻叶原产国外，清代以后引入我国药用。狭叶番泻叶作为“番泻叶”入药。



【编号】 M09127148157L0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

桑叶

【来源】 桑科植物桑 Morus alba L. 的干燥叶。

【主产地】 主产于安徽、浙江、江苏、四川、湖南等地。

【性状特征】 叶多皱缩、破碎。完整者有柄，叶片展平后呈卵形或宽卵形，长8～15 cm，宽5～13 cm；先端渐尖，基部截形、圆形或心形，边缘有锯齿或钝锯齿，有的不规则分裂。上表面黄绿色或浅黄棕色，有的有小疣状突起；下表面颜色稍浅，叶脉突出，小脉网状，脉上被疏毛，脉基具簇毛。质脆。气微，味淡、微苦涩。

【品质】 本品以叶大、完整、无斑点、色黄绿者为佳。

【性味功效】 甘、苦，寒。疏散风热，清肺润燥，清肝明目。用于风热感冒，肺热燥咳，头晕头痛，目赤昏花。

【附注】 桑叶以经霜者为好，称“霜桑叶”或“冬桑叶”。



【编号】 M07367167075L0CMMI H26387167012000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

荷叶

【来源】 睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥叶。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 叶呈半圆形或折扇形，展开后呈类圆形，直径20～50 cm，全缘或稍呈波状。上表面深绿色或黄绿色，较粗糙，下表面淡灰棕色，较光滑，有粗脉21～22条，自中心向四周射出；中心有突起的叶柄残基。质脆，易破碎。稍有清香气，味微苦。

【品质】 本品以叶大、色绿、无斑点、不破碎者为佳。

【性味功效】 苦，平。清热解暑，升发清阳，凉血止血。用于暑热烦渴，暑湿泄泻，脾虚泄泻，血热，便血崩漏。



【编号】 M07857018003L0CMMI H26847018003000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

淡竹叶

【来源】 禾本科植物淡竹叶 Lophatherum gracile Brongn.的干燥茎叶。

【主产地】 主产于浙江、安徽、湖南、四川、湖北、广东、江西等地。以浙江产量大、质量优，称“杭竹叶”。

【性状特征】 茎呈圆柱状，长 25～30 cm，直径 1.5～2 mm；表面淡黄绿色，有节，节上抱有叶鞘，叶鞘开裂，断面中空。叶片披针形，有的皱缩卷曲，长 5～20 cm，宽 1～3.5 cm；表面浅绿色或黄绿色。叶脉平行，具横行小脉，形成长方形的网格状，下表面尤为明显。体轻，质柔韧。气微、味淡。

【品质】 本品以叶大、色绿、不带根及花穗者为佳。

【性味功效】 甘、淡，寒。清热除烦，利尿。用于热病烦渴，小便赤涩淋痛，口舌生疮。



【编号】 M08217332097L0CMMI H24277332140000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

野柿叶

【来源】 柿树科植物野柿 Diospyros kaki Thunb. var. silvestris Makino 的干燥叶片。

【主产地】 主产于贵州。

【性状特征】 叶片多皱缩卷曲或破碎。完整者展平后呈卵状椭圆形至宽卵形或近圆形，长 10～15 cm，宽 6～10 cm。先端渐尖或钝，基部楔形至圆形，全缘，边缘微反卷。上表面灰绿色或黄棕色，较光滑，下表面颜色较淡。叶柄长 8～20 mm。气微，味微苦涩。

【品质】 本品以叶大而质嫩、完整不破碎者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清肺止咳，凉血止血，活血化瘀，降血压。用于咳喘，肺气肿，各种出血症，高血压，冠心病及脑动脉硬化症等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M06387221010L0GYCM

【鉴定人】 陈谦海

野烟

【来源】 菊科植物天名精 Carpesium abrotanoides L. 的干燥叶。

【主产地】 主产于河南、山西、陕西等地。

【性状特征】 叶单叶互生，干燥的叶片多卷曲皱缩，褐绿色，展平后呈卵状椭圆形，被毛，下面微显腺点，边缘具不整齐的钝齿。气微，味微涩。

【品质】 本品以叶多、茎梗少、质干者为佳。

【性味功效】 辛，寒。清热解毒，祛痰，止血。用于乳蛾，喉痹，咽喉肿痛，疔疮肿毒，痒疹，蛇虫咬伤。



【编号】 M08577238227FHCMMI H08307239046000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

银杏叶

【来源】 银杏科植物银杏 Ginkgo biloba L.的干燥叶。

【主产地】 主产于广西、四川、湖北、浙江、江苏、山东等地。

【性状特征】 叶多皱褶或破碎，完整者呈扇形，长3～12 cm，宽5～15 cm。黄绿色或浅棕黄色，上缘呈不规则的波状弯曲，有的中间凹入，深者可达叶长的4/5。具二叉状平行叶脉，细而密，光滑无毛，易纵向撕裂。叶基楔形，叶柄长2～8 cm。体轻，气微，味微苦。

【品质】 本品以叶完整、色黄绿者为佳。

【性味功效】 甘、苦、涩，平。敛肺，平喘，活血化瘀，止痛。用于肺虚咳嗽；冠心病，心绞痛，高血脂。



【编号】 M08606002001L0CMMI H18706002001000100GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

紫苏叶


【来源】 唇形科植物紫苏 Perilla frutescens (L.) Britt. 的干燥叶(或带嫩枝)。

【主产地】 主产于湖北、河南、四川、江苏、广西、山东、广东、浙江、河北、山西等地。

【性状特征】 叶片多皱缩卷曲、破碎，完整者展平后呈卵圆形，长4～11 cm，宽2.5～9 cm。先端长尖或急尖，基部圆形或宽楔形，边缘具圆锯齿。两面紫色或上表面绿色，下表面紫色，疏生灰白色毛，有多数凹点状的腺鳞。叶柄长2～7 cm，紫色或紫绿色。质脆。带嫩枝者，枝的直径2～5 mm，紫绿色，断面中部有髓。气清香，味微辛。

【品质】 本品以叶完整、香气浓、色紫者为佳。

【性味功效】 辛，温。解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒。



【编号】 M09227264204L0CMMI H28757265077000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蓼大青叶

【来源】 蓼科植物蓼蓝 Polygonum tinctorium Ait. 的干燥叶。

【主产地】 主产于华北、东北等地。

【性状特征】 叶多皱缩、破碎，完整者展平后呈椭圆形，长3～10 cm，宽2～5 cm。蓝绿色或黑蓝色，先端钝，基部渐狭，全缘。叶脉浅黄棕色，于下表面略突起。叶柄扁平，偶带膜质托叶鞘。质脆。气微，味微涩而稍苦。

【品质】 本品以叶厚、无枝梗、色蓝绿者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，凉血消斑。用于温病发热，发斑发疹，肺热喘咳，喉痹，疙腮，丹毒，痈肿。



【编号】 M09967057094L0CMMI H30827057010002700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

花来

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丁香

【来源】 桃金娘科植物丁香 Eugenia caryophyllata Thunb. 的干燥花蕾。

【主产地】 主产于坦桑尼亚的桑哈巴尔岛以及马来西亚、斯里兰卡、印度尼西亚等地。我国海南、广东、广西、云南等地有栽培。

【性状特征】 花蕾略呈研棒状，长 1～2 cm。花冠圆球状，直径 3～5 mm，有 4 片花瓣，呈覆瓦状排列，棕褐色至褐黄色，花瓣内为多数雄蕊和粗壮直立的花柱，搓碎后可见众多黄色细粒状的花药。萼筒圆柱状，略扁，有的略弯曲，长 0.7～1.4 cm，直径 3～6 mm，红棕色或棕褐色，上部有 4 枚三角状的萼片，十字状分开。质坚实，富油性。香气浓，味辛辣、有麻舌感。

【品质】 本品以个大、粗壮、色红棕、油性足、能沉于水、香气浓郁、无碎末者为佳。

【性味功效】 辛、温。温中降逆，补肾助阳。用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷 痛，肾虚阳萎。



【编号】 M00027118014S1CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

山银花

【来源】 忍冬科植物山银花 Lonicera confusa DC. 的干燥花蕾或带初开的花。

【主产地】 主产于广东、广西。

【性状特征】 花蕾呈棒状，略弯曲，长1.3～5 cm，直径0.5～2 mm。表面红棕色或灰棕色，被倒生短粗毛，腺毛较多。萼齿通常长三角形，萼齿与萼筒均密被灰白色或淡黄色毛。子房有毛。气清香，味淡、微苦。

【品质】 本品以花蕾不开放、色红棕或灰棕、无杂质者为佳。

【性味功效】 甘，寒。清热解毒，凉散风热。用于痈肿疔疮，喉痹，丹毒，热毒血痢，风热感冒，瘟病发热。

【附注】 本品作为“金银花”入药。



【编号】 M00707233018F0CMMI H24137234007001800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

月季花

【来源】 蔷薇科植物月季 Rosa chinensis Jacq. 的干燥花。

【主产地】 主产于江苏、湖北、山东、河北、天津、北京等地。以江苏产量大，品质佳。

【性状特征】 花多呈圆球状，直径1.5～2.5 cm，有的杂有散碎花瓣。花托倒圆锥状或倒卵状，长 5～7 mm，直径 3～5 mm，棕紫色，基部较尖。萼片 5 枚，暗绿色，先端尾尖；花瓣 5 片或重瓣，覆瓦状排列，长 2～2.5 cm，宽 1～2.5 cm，紫红或淡红色。雄蕊多数，黄色，卷曲。雌蕊多数，有毛。体轻，质脆。气清香，味淡、微苦。

【品质】 本品以半开放的花蕾、不散瓣、气清香、色紫者为佳。

【性味功效】 甘，温。活血调经。用于月经不调，痛经。



【编号】 M01647143238F0CMMI H33477143043001600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

木棉花


【来源】 木棉科植物木棉 Gossampinus malabarica (DC.) Merr.的干燥花。

【主产地】 主产于海南、广西、四川、云南等地。

【性状特征】 花常皱缩成团。花萼厚，杯状，顶端3～5浅裂，裂片钝圆形，反曲。外表面棕褐色，内表面灰黄色，密被短绒毛。花瓣5片，分离，椭圆状倒卵形或披针状椭圆形，长6～8 cm，宽2.5～3.5 cm，外表面灰褐色，密被短星状毛，内表面紫棕色，有疏毛；雄蕊多数，卷曲；花柱稍粗，略长于雄蕊。质脆。气微，味淡、微涩。

【品质】 本品以花大、完整、色鲜者为佳。

【性味功效】 甘，凉。清热，利湿，解毒，止血。用于泄泻，痢疾，血崩，疮毒，金疮出血。



【编号】 M01707131001F0CMMI H19097131005000100SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

凹叶厚朴花

【来源】 木兰科植物凹叶厚朴 Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. biloba Rehd. et Wils. 的干燥花蕾。

【主产地】 主产于浙江、福建。

【性状特征】 花蕾呈长圆锥状，长4～8 cm，基部直径1.5～3 cm。红棕色至棕褐色。花被多为12片，肉质，外层的呈长方倒卵形，内层的呈匙形。雄蕊多数，花药条形，淡黄棕色，花丝宽而短。心皮多数，分离，心皮长3～4 mm，宽1～1.5 mm，先端稍尖，螺旋状排列于圆锥形的花托上。花梗长0.5～2 cm，直径约5 mm，密被灰黄色绒毛。质脆，易破碎。气香，味淡。

【品质】 本品以完整、色棕红、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦，微温。理气，化湿。用于胸脘痞闷胀满，纳谷不香。

【附注】 本品作为“厚朴花”入药。



【编号】 M06157001046B0CMMI H25187001006001001SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

打箭菊

【来源】 菊科植物川西小黄菊 Pyrethrum tatsienense (Bur.et Franch.) Ling et Shih 的干燥花。


【主产地】 主产于青海、四川、云南、西藏等地。

【性状特征】 花序皱缩成团，直径约10 mm。花序梗微弯曲，具纵棱，密被白色丝光毛，或毛脱落呈紫色。总苞半球形，苞片多数，3～4层，披针状条形，外层背面密被白色长柔毛。舌状花1层，舌片多皱缩，先端3齿裂，上面橘黄色，下面橘红色。管状花深黄棕色，两性，雄蕊5枚，聚药，雌蕊柱头2裂，黄棕色。体轻，质软。气香，味微苦。

【品质】 本品以花冠色橘黄至橘红、气香者为佳。

【性味功效】 苦，寒。活血散瘀，祛风除湿，消炎止痛。用于头痛，头伤，跌扑损伤，湿热，疮疡，伤口流黄水，黄水疮，肝炎。

【附注】 藏药。《晶珠本草》有记载。



【编号】 M02277238514H0XZDC H32097239174001600XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

玉兰

【来源】 木兰科植物玉兰 Magnolia denudata Desr. 的干燥花蕾。


【主产地】 主产于安徽安庆。

【性状特征】 花蕾呈长卵形状，似毛笔头，长 1.5～3 cm，直径 1～1.5 cm。基部常具短梗，枝梗较粗壮，梗上有浅棕色皮孔。苞片 2～3 层，每层 2 片，两层苞片间有小鳞芽，苞片外表面密被灰白色或灰绿色茸毛，内表面类棕色，无毛。花被片 9，黄棕色，内外轮同型，外轮花被片 3，条状，约为内两轮长的 1/4，呈萼片状，内两轮花被片 6，每轮 3，轮状排列。雄蕊和雌蕊多数，螺旋状排列。体轻，质脆。气芳香，味辛凉而稍苦。

【品质】 本品以完整未开花蕾、内瓣紧密、色绿、无枝梗、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛，温。散风寒，通鼻窍。用于风寒头痛，鼻塞，鼻渊，鼻流浊涕。

【附注】 本品作为“辛夷”入药。



【编号】 M04557001037F0CMMI H25137001005000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

红花

【来源】 菊科植物红花 Carthamus tinctorius L. 的干燥花。

【主产地】 主产于河南、安徽、四川、江苏、浙江和新疆等地。以河南封丘、延津为道地产区。

【性状特征】 管状花长 1～2 cm，表面红黄色或红色。花冠筒细长，先端 5 裂，裂片呈狭条形，长 5～8 mm。雄蕊 5，花药聚合成筒状，黄白色。柱头长圆柱形，顶端微分叉。质柔软。气清香，味微苦。

【品质】 本品以花瓣长、色红黄、鲜艳、质柔软、无枝刺者为佳。

【性味功效】 辛，温。活血通经，散瘀止痛。用于经闭，痛经，恶露不行，癥瘕痞块，跌扑损伤，疮疡肿痛。



【编号】 M03617238237F0CMMI H08357239047000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

红腺忍冬

【来源】 忍冬科植物红腺忍冬 Lonicera hypoglauca Miq. 的干燥花蕾或带初开的花。

【主产地】 主产于广西。

【性状特征】 花蕾呈棒状，长 1～5 cm，直径 0.8～2 mm，表面黄白至黄棕色，无毛或疏被毛。萼筒无毛，先端 5 裂，裂片长三角形，被毛。开放者花冠上唇常不整齐，花柱下部多密被长柔毛。气清香，味甘微苦。

【品质】 本品以花蕾不开放、色黄白至黄棕、无杂质者为佳。

【性味功效】 甘，寒。清热解毒，凉散风热。用于痈肿疔疮，喉痹，丹毒，热毒血痢，风热感冒，温病发热。

【附注】 本品作为“金银花”入药。



【编号】 M05777233026F0CMMI H24167234007003600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

西红花

【来源】 鸢尾科植物番红花 Crocus sativus L. 的干燥柱头。

【主产地】 主产于西班牙。国内主产于上海、浙江、江苏、山东等地。

【性状特征】 柱头呈线形，三分枝，长约3 cm。暗红色，上部较宽而略扁平，顶端边缘显不整齐的齿状，内侧有一短裂隙，下端有时残留一小段黄色花柱。体轻，质松软，无油润光泽，干燥后质脆易断。气特异，微有刺激性，味微苦。

【品质】 本品以细长弯曲、色红棕稍显黄棕、鲜艳滋润、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 甘，平。活血化瘀，凉血解毒，解郁安神。用于经闭癥瘕，产后瘀阻，温毒发斑，忧郁痞闷，惊悸发狂。



【编号】 M03837307004F0CMMI H12167307003000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

芫花

【来源】 瑞香科植物芫花 Daphne genkwa Sieb. et Zucc. 的干燥花蕾。

【主产地】 主产于安徽、江苏、四川、河南等地。

【性状特征】 花蕾常3～7朵簇生于短花轴上，基部有苞片1～2片，多脱落为单朵。单朵呈棒槌状，常弯曲，长1～1.7 cm，直径约1.5 mm；花被筒表面淡紫色或灰绿色，密被短柔毛，先端4裂，裂片淡紫色或黄棕色。质软。气微，味甘、微辛。

【品质】 本品以花蕾色淡紫、外披短柔毛、无杂质者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温；有毒。泻水逐饮，解毒杀虫。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆喘咳，二便不利；外治疥癣秃疮，冻疮。



【编号】 M04307081010F0CMMI H13327081002000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

苏铁


【来源】 苏铁科植物苏铁 Cycas revoluta Thunb. 的大孢子叶。

【主产地】 主产于广东、福建等地。

【性状特征】 大孢子叶呈扁平状，长14～22 cm，表面密生黄褐色长绒毛，上部顶片宽卵状，呈羽状分裂，其下方两侧着生数枚近球形的胚珠，大小不等。

【品质】 本品以个大、体厚、色黄褐者为佳。

【性味功效】 甘、酸，微温。理气止痛，活血止血。用于肝胃气痛，胃炎，胃溃疡，经闭，吐血。



【编号】 M04426001003FHCMMI H12656148001000700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

谷精草

【来源】 谷精草科植物谷精草 Eriocaulon buergerianum Koern.的干燥带花茎的头状花序。

【主产地】 主产于浙江、湖北、江苏等地。浙江、江苏产的质量佳。

【性状特征】 头状花序呈半球状，直径4～5 mm；底部有苞片层层紧密排列，苞片淡黄绿色，有光泽，上部边缘密生白色短毛；花序顶部灰白色。揉碎花序，可见多数黑色花药及细小黄绿色未成熟的果实。花茎纤细，直径不及1 mm，淡黄绿色，有数条扭曲的棱线。质柔软。无臭，味淡。

【品质】 本品以花序（珠）多、大而紧密、色灰白；花茎短、色青绿、无根叶及杂质者为佳。

【性味功效】 辛、甘、平。疏散风热，明目，退翳。用于风热目赤，肿痛羞明，眼生翳膜，风热头痛。



【编号】 M04507285002F0CMMI H16187285001000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

鸡冠花

【来源】 苋科植物鸡冠花 Celosia cristata L.的干燥花序。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 花序为穗状花序，多扁平而肥厚，呈鸡冠状，长8～25 cm，宽5～20 cm，上缘宽，具皱褶，密生线状鳞片，下端渐窄，常残留扁平的茎。表面红色、紫红色或黄白色。中部以下密生多数小花，每花宿存的苞片及花被片均呈膜质。体轻，质柔韧。无臭，味淡。

【品质】 本品以朵大而扁、色泽鲜明者为佳。习惯认为白色者质优。

【性味功效】 甘、涩，凉。收敛止血，止带，止痢。用于吐血，崩漏，便血，痔血，赤白带下，久痢不止。



【编号】 M04697063024F0CMMI H08767063006000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

垂头菊

【来源】 菊科植物条叶垂头菊 Cremanthodium lineare Maxim.的干燥花序。

【主产地】 主产于甘肃、青海、四川、西藏等地。

【性状特征】 花序皱缩成团，冠毛白色，多数，与总苞片近等长。直径1.2～1.7 cm，总苞片墨绿色，披针状，长10～12 mm；舌状花1层，黄色，完整的舌片为披针形条状，长1.5～3 cm，有浅棕色平行直脉纹数条；筒状花长5～6 mm，黑褐色，先端5浅裂，雄蕊5，聚药，暗紫色；雌蕊柱头2裂，紫褐色。体轻，质软。气芳香，味微甘。

【品质】 本品以色黄、气芳香者为佳。

【性味功效】 甘、苦，平。清热消肿，健胃止呕。用于高热惊风，咽喉肿痛，脘腹胀痛，呕吐。



【编号】 M04947238282F0XZDC H12077239069003100XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

松花粉


【来源】 松科植物马尾松 Pinus massoniana Lamb.的干燥花粉。

【主产地】 主产于浙江、江苏、辽宁、吉林、湖北等地。

【性状特征】 花粉为淡黄色的细粉，体轻，不沉于水，易飞扬，手捻有滑润感。气微，味淡。

【品质】 本品以体轻、匀细、色淡黄、无杂质者为佳。

【性味功效】 甘，温。燥湿，收敛止血。用于湿疹，黄水疮，皮肤糜烂，脓水淋漓，外伤出血；尿布性皮炎。



【编号】 M05106004041F0CMMI H29576004007001900GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

武当玉兰

【来源】 木兰科植物武当玉兰 Magnolia sprengeri Pamp. 的干燥花蕾。

【主产地】 主产于四川、湖北、陕西等地。以四川产量大，质量佳。

【性状特征】 花蕾呈长圆状，长 2～4 cm，直径 1～2 cm。基部常具短梗，枝梗粗壮，梗上有红棕色皮孔。苞片 2～3 层，每层 2片，两层苞片间有小鳞芽，苞片外表面密被淡黄色或淡黄绿色茸毛，有的最外层苞片茸毛已脱落呈黑褐色。花被片 9～15，内外轮无明显差异。雄蕊和雌蕊多数，螺旋状排列。体轻，质脆。气芳香，味辛凉而稍苦。

【品质】 本品以完整未开花蕾、内瓣紧密、色绿、无枝梗、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛，温。散风寒，通鼻窍。用于风寒头痛，鼻塞，鼻渊，鼻流浊涕。

【附注】 本品作为“辛夷”入药。



【编号】 M04567001055F0CMMI H25217001006001800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

玫瑰花

【来源】 蔷薇科植物玫瑰 Rosa rugosa Thunb. 的干燥花蕾。

【主产地】 主产于浙江、江苏、山东、安徽，以浙江湖州产者最佳。

【性状特征】 花蕾略呈半球状或不规则团状，直径1～2.5 cm。花托半球状，与花萼基部合生；萼片5，披针形，黄绿色或棕绿色。被有细柔毛。花瓣多皱缩，展平后宽卵状，呈覆瓦状排列，紫红色，有的黄棕色。雄蕊多数，黄褐色。体轻，质脆。气芳香浓郁，味微苦涩。

【品质】 本品以花朵大、完整、色紫红、不露蕊、香气浓者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，温。行气解郁，和血，止痛。用于肝胃气痛，食少呕恶，月经不调，跌扑伤痛。



【编号】 M05257143270F0CMMI H33577143043006500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金银花

【来源】 忍冬科植物忍冬 Lonicera japonica Thunb.的干燥花蕾或带初开的花。

【主产地】 主产于河南、山东。河南密县、巩县、荥阳所产称“密银花”，山东平邑、费县所产称“东银花”，均为道地药材。

【性状特征】 花蕾呈棒状，上粗下细，略弯曲，长2～3 cm，上部直径约3 mm，下部直径约1.5 mm。表面黄白色或绿白色（储久色渐深），密被短柔毛。偶见叶状苞片。花萼绿色，先端5裂，裂片有毛，长约2 mm。开放者花冠筒状，先端二唇形；雄蕊5个，附于筒壁，黄色；雌蕊1个，子房无毛。气清香，味淡、微苦。

【品质】 本品以花蕾不开放、色黄白或绿白、无杂质者为佳。

【性味功效】 甘，寒。清热解毒，凉散风寒。用于痈肿疔疮，喉痹，丹毒，热毒血痢，风热感冒，温病发热。



【编号】 M05797233028F0CMMI H24177234007004000GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

闹羊花

【来源】 杜鹃花科植物羊踯躅 Rhododendron molle G. Don 的干燥花。

【主产地】 主产于江苏、浙江、安徽、湖北、湖南等地。

【性状特征】 花多朵簇生于一总柄上，多脱落为单朵，灰黄色至黄褐色，皱缩。花萼5裂，裂片半圆形至三角形，边缘有较长的细毛；花冠钟状，筒部较长，约至2.5 cm，顶端卷折，5裂，花瓣宽卵形，先端钝或微凹；雄蕊5，花丝卷曲，等长或略长于花冠，中部以下有茸，花药红棕色，顶孔裂；雌蕊1，柱头头状；花梗长1～2.8 cm，棕褐色，有短茸毛。气微，味微麻。

【品质】 本品以色黄、完整不破碎者为佳。

【性味功效】 辛，温；有大毒。祛风除湿，散瘀定痛。用于风湿痹痛，跌扑损伤，皮肤顽癣。



【编号】 M05847215056F0CMMI H33117216018016800SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

厚朴花

【来源】 木兰科植物厚朴 Magnolia officinalis Rehd. et Wils.的干燥花蕾。

【主产地】 主产于浙江、福建。

【性状特征】 花蕾呈长圆锥状，长4～8 cm，基部直径1.5～3 cm。红棕色至棕褐色。花被多为12片，肉质，外层的呈长方倒卵形，内层的呈匙形。雄蕊多数，花药条形，淡黄棕色，花丝宽而短。心皮多数，分离，心皮长3～4 mm，宽1～1.5 mm，先端稍尖，螺旋状排列于圆锥形的花托上。花梗长0.5～2 cm，直径约5 mm，密被灰黄色绒毛。质脆，易破碎。气香，味淡。

【品质】 本品以完整、色棕红、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦，微温。理气，化湿。用于胸脘痞闷胀满，纳谷不香。



【编号】 M06167001045F0CMMI H25177001005001000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

洋金花

【来源】 茄科植物白曼陀罗 Datura metel L. 的干燥花。

【主产地】 主产于江苏、海南、广东、福建等地。

【性状特征】 花多皱缩成条状，完整者长9～15 cm。花萼呈筒状，长为花冠的2/5，灰绿色或灰黄色，先端5裂，基部具纵脉纹5条，表面微有茸毛；花冠呈喇叭状，淡黄色或黄棕色，先端5浅裂，裂片有短尖，短尖下有明显的纵脉纹3条，两裂片之间微凹；雄蕊5，花丝贴生于花冠筒内，长为花冠的3/4；雌蕊1，柱头棒状。烘干品质柔韧，气特异；晒干品质脆，气微，味微苦。

【品质】 本品以身干、花大、色黄棕、无破碎者为佳。

【性味功效】 辛，温；有毒。平喘止咳，镇痛，解痉。用于哮喘咳嗽，脘腹冷痛，风湿痹痛，小儿慢惊；外科麻醉。



【编号】 M06417250023F0CMMI H13487251008000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

重冠紫菀花

【来源】 菊科植物重冠紫菀 Aster diplostephioides (DC.) C.B.Clarke 的干燥花序。

【主产地】 主产于青海、四川、云南、西藏、甘肃等地。

【性状特征】 花皱缩成团。总苞半球形，黄绿色，直径8～17 mm，总苞片被黑色腺毛，宽1～3 mm。头状花序单生于茎顶；管状花黄色，上端常紫褐色。气香，味淡。

【品质】 本品以身干、完整、色黄绿、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，止咳化痰。用于流行性感冒，气管炎，癣症，痉挛。

【附注】 藏药。《晶珠本草》有记载。



【编号】 M10327238153R0XZDC H05067239025001600XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

凌霄花

【来源】 紫葳科植物凌霄 Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum. 的干燥花。

【主产地】 主产于江苏、浙江、江西、湖北等地。以江苏产的质优。

【性状特征】 花多皱缩卷曲，黄褐色至棕褐色，完整花朵长4～5 cm。萼筒钟状，长2～2.5 cm，裂片5，裂至中部，萼筒基部至萼齿尖有5条纵棱。花冠先端5裂，裂片半圆形，下部联合呈漏斗状，表面可见细脉纹，内表面较明显。雄蕊4，着生在花冠上，2长2短，花药个字形，花柱1，柱头扁平。气清香，味微苦、酸。

【品质】 本品以完整、色黄棕者为佳。

【性味功效】 甘、酸，寒。凉血，化瘀，祛风。用于月经不调，经闭癥瘕，产后乳肿，风疹发红，皮肤瘙痒，痤疮。



【编号】 M07137257001F0CMMI H07827258001000100GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

夏枯草

【来源】 唇形科植物夏枯草 Prunella vulgaris L. 的干燥果穗。

【主产地】 主产于江苏、安徽、浙江等地。以江苏、安徽产量大，江苏南京产的质量佳。

【性状特征】 果穗呈棒状，略扁，长1.5～8 cm，直径0.8～1.5 cm，棕色至淡紫褐色。全穗由数轮至10数轮宿萼与苞片组成，每轮有对生苞片2片，呈扇形，先端尖尾状，脉纹明显，外表面有白毛。每一苞片内有花3朵，花冠多已脱落，宿萼二唇形，内有小坚果4枚，卵圆形，棕色，尖端有白色突起。体轻。气微，味淡。

【品质】 本品以穗大、色棕紫者为佳。

【性味功效】 辛、苦，寒。清火，明目，散结，消肿。用于目赤肿痛，目珠夜痛，头痛眩晕，瘰疬，瘿瘤，乳痈肿痛；甲状腺肿大，淋巴结结核，乳腺增生，高血压。



【编号】 M07187264232S0CMMI H31577265082000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

峨眉蔷薇花

【来源】 蔷薇科植物峨眉蔷薇 Rosa omeiensis Rolfe 的干燥花瓣。

【主产地】 主产于四川、云南、西藏、贵州、青海、甘肃等地。

【性状特征】 花瓣多皱缩卷曲。完整的花瓣呈倒广卵形至扇形，长 1.2～2.5 cm，宽 1.2～2.3 cm。暗黄色或黄白色，先端微凹，浅裂或钝圆，基部有 10 余条花脉，呈放射状排列。纸质，体轻。气芳香，味微苦、甜。

【品质】 本品以身干、花瓣完整、色黄白、香气浓者为佳。

【性味功效】 甘、酸，凉。清热解毒，活血调经。用于肺热咳嗽，吐血，血脉瘀痛，月经不调，赤白带下，乳痈。

【附注】 藏药。《四部医典》、《度母本草》、《宇妥本草》、《蓝琉璃》、《晶珠本草》等有记载。



【编号】 M09997143265F0XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

荷花


【来源】 睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥花蕾。

【主产地】 主产于湖南、湖北、福建、江苏、浙江、安徽、江西等地。

【性状特征】 花蕾圆锥状，长 2.5～5 cm，直径 2～3 cm。表面灰棕色，花瓣多层。花瓣卵形或椭圆形，皱缩或折褶，表面具多数细脉，光滑柔软。花瓣中心有幼小的莲蓬，顶端平坦，上面有小孔十余个，基部渐窄，周围着生多数雄蕊。气香，味微涩。

【品质】 本品以色灰棕、气香者为佳。

【性味功效】 苦、甘，平。散瘀止血，去湿消风。用于跌损呕血，血淋，崩漏下血，天疱疮，疥疮瘙痒。



【编号】 M07867018003F1CMMI H26847018003000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

密蒙花


【来源】 马钱科植物密蒙花 Buddleja officinalis Maxim.的干燥花蕾及其花序。

【主产地】 主产于湖北、四川、陕西、河南等地。以湖北、四川等地产量较大。

【性状特征】 花蕾及其花序多为花蕾密集的花序小分枝，呈不规则圆锥状，长 1.5～3 cm。表面灰黄色或棕黄色，密被茸毛。花蕾呈短棒状，上端略大，长 0.3～1 cm，直径 1～2 mm；花萼钟状，先端 4 齿裂；花冠筒状，与萼等长或稍长，先端 4 裂，裂片卵形；雄蕊4，着生在花冠管中部。质柔软。气微香，味微苦、辛。

【品质】 本品以身干、色灰黄或棕黄、花蕾排列紧密、质柔软、有香气、无枝叶杂质者为佳。

【性味功效】 甘，微寒。清热养肝，明目退翳。用于目赤肿痛，多泪羞明，眼生翳膜，肝虚目暗，视物昏花。



【编号】 M08137228011F0CMMI H07077229001000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

旋覆花


【来源】 菊科植物旋覆花 Inula japonica Thunb.的干燥头状花序。

【主产地】 主产于河南、河北、江苏、浙江等地。

【性状特征】 头状花序呈扁球状或类球状，直径 1～2 cm，多松散。总苞半球状，由多数苞片组成，呈覆瓦状排列，苞片披针形或条形，灰黄色，长 4～11 mm；总苞基部有时残留花梗，苞片及花梗表面被白色茸毛，舌状花 1 列，黄色，长约 1 cm，多卷曲，常脱落，先端 3 齿裂；管状花多数，棕黄色，长约 5 mm，先端 5 齿裂；子房顶端有多数白色冠毛，长 5～ 6 mm。有的可见椭圆形小瘦果。体轻，易散碎。气微，味微苦。

【品质】 本品以头状花序整齐、花瓣鲜黄者为佳。

【性味功效】 苦、辛、咸，微温。降气，消痰，行水，止呕。用于风寒咳嗽，痰饮蓄结，胸膈痞满，喘咳痰多，呕吐噫气，心下痞硬。



【编号】 M08187238391F0CMMI H21397239123001300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

望春花

【来源】 木兰科植物望春花 Magnolia biondii Pamp.的干燥花蕾。

【主产地】 主产于安徽安庆县。

【性状特征】 花蕾呈长卵状，似毛笔头，长 1.2～2 cm，直径 0.8～1.5 cm。基部常具短梗，长约 5 mm，梗上有类白色点状皮孔。苞片 2～3 层；每层 2 片，两层苞片间有小鳞芽，苞片外表面密被灰白色或灰绿色茸毛，内表面类棕色，无毛。花被片 9，类棕色，外轮花被片 3，条形，约为内两轮长的 1/4，呈萼片状，内两轮花被片 6，每轮 3，轮状排列，雄蕊和雌蕊多数，螺旋状排列。体轻，质脆，气芳香，味辛凉而稍苦。

【品质】 本品以完整未开花蕾、内瓣紧密、色绿、无枝梗、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛，温。散风寒，通鼻窍。用于风寒头痛，鼻塞，鼻渊，鼻流浊涕。

【附注】 本品作为“辛夷”入药。



【编号】 M04547001030F0CMMI H25107001006001300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

梅花

【来源】 蔷薇科植物梅 Prunus mume (Sieb.) Sieb. et Zucc.的干燥花蕾。

【主产地】 主产于江苏、浙江。

【性状特征】 花蕾呈类球状，直径3～6 mm，有短花梗。苞片数层，鳞片状，棕褐色，有短毛。花萼5，灰绿色或棕红色。花瓣5或多数，阔卵圆形，黄白色或淡粉红色。雄蕊多数；雌蕊1，子房着生于凹陷的花托上，表面密被细柔毛。体轻。气清香，味微苦、涩。

【品质】 本品以身干、色棕褐、有香气、无杂质者为佳。

【性味功效】 微酸、涩、平。开郁和中，化痰，解毒。用于郁闷心烦，肝胃气痛，梅核气，瘰疬疮毒。



【编号】 M08207143022F0CMMI H31627143037001100JXCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

菊花


【来源】 菊科植物菊 Chrysanthemum morifolium Ramat. 的干燥头状花序。药材按产地和加工方法不同，分为“亳菊”“滁菊”“贡菊”、“杭菊”，本品为“滁菊”。

【主产地】 滁菊主产于安徽滁县。

【性状特征】 头状花序呈不规则球状或扁球状，直径1～2.5 cm。总苞片外层条状三角形，中层长三角形，内层长卵形。花托半圆状。舌状花白色或类白色，斜升，上部反折，边缘稍内卷而皱缩，通常无腺点。管状花少，位于头状花序中央，花冠先端5～6裂；雄蕊5枚，聚药，黄色，伸出花冠筒外2 mm。香气浓，味甘、微苦。

【品质】 本品以身干、色白、完整、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 甘、苦，微寒。散风清热，平肝明目。用于风热感冒，头痛眩晕，目赤肿痛，眼目昏花。



【编号】 M08487238305F0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

野菊花

【来源】 菊科植物野菊 Chrysanthemum indicum L. 的干燥头状花序。

【主产地】 主产于江苏、四川、广西、山东等地。

【性状特征】 头状花序呈类球状，直径0.3～1 cm。总苞半球形，总苞片4～5层，外层苞片卵形或条形，外表面中部灰绿色或淡棕色，通常被有白毛，边缘膜质；内层苞片长椭圆形，膜质，外表面无毛。总苞基部有的残留总花梗。舌状花1轮，黄色，皱缩卷曲；管状花多数，深黄色。体轻。气芳香，味苦。

【品质】 本品以完整、色黄、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛，微寒。清热解毒。用于疔疮痈肿，目赤肿痛，头痛眩晕。



【编号】 M08587238301F0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

麻花秦艽花

【来源】 龙胆科植物麻花秦艽 Gentiana straminea Maxim. 的干燥花。

【主产地】 主产于甘肃、青海、四川、西藏等地。

【性状特征】 花为带花茎的皱缩的筒形花朵。花茎圆柱状，直径1～2 mm，黄绿色或紫色具细纵纹，节部膨大，有对生鞘状苞片及花柄。花多已破碎，长2.5～4.5 cm，直径4～9 mm；基部及喉部有绿色或淡紫褐色斑点；花萼长约1 cm，淡黄色或紫色，膜质，一侧开裂，萼齿2～5枚不等长，齿状或浅状钻形；花冠淡黄绿色或淡棕色；花内可见5枚雄蕊及1枚矩圆形子房；花柱极短，柱头2裂。气微，味苦。

【品质】 本品以花完整、色绿或紫者为佳。

【性味功效】 苦，平。解热消肿。用于胆热病，腑热病，扁桃体炎，荨麻疹，肠胃炎，肝炎，胆囊炎症。

【附注】 藏药。《晶珠本草》有记载。



【编号】 M08727239058R0CMMI H18467240007020300XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

黄报春花

【来源】 报春花科植物黄花报春 Primula sikkimensis Hook.的干燥花序。

【主产地】 主产于西藏、青海、四川、云南等地。

【性状特征】 花序卷曲，皱缩，花梗长短不等，具纵棱，微被白粉，苞片绿色或灰绿色，卷曲皱缩，位于小花梗基部。花6～14朵。花萼浅黄色，管状钟形，稍皱缩，具5棱，萼齿5，卷曲皱缩，黄色或浅褐色，花柱长约2 mm，柱头头状。体轻，质软。气清香、味微苦。

【品质】 本品以清香浓郁、色黄至黄绿者为佳。

【性味功效】 苦、甘，凉。清热，消肿，止泻，活血。用于筋脉疼痛，血脉不畅，小儿热痢，水肿，腹泻。

【附注】 藏药。《四部医典》、《度母本草》、《宇妥本草》、《蓝琉璃》、《晶珠本草》等有记载。



【编号】 M10337240090F0XZDC H31507241010024200XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

款冬花

【来源】 菊科植物款冬 Tussilago farfara L. 的干燥花蕾。

【主产地】 主产于陕西、山西、河南、河北、甘肃、青海、内蒙古等地。以甘肃灵台、陕西榆林所产的质量最佳。

【性状特征】 花蕾呈长圆棒状。单生或2～3个基部连生，长1.5～3 cm，直径0.3～1 cm。上端较粗，下端渐细或带有短梗，外面被有多数鱼鳞状苞片。苞片外表面紫红色或淡红色，内表面密被白色絮状茸毛。体轻，撕开后可见白色茸毛。气香，味微苦而辛。

【品质】 本品以干燥、蕾大、肥壮、色紫红、三个花序连在一起、花梗短者为佳。

【性味功效】 辛、微苦，温。润肺下气，止咳化痰。用于新久咳嗽，喘咳痰多，劳嗽咳血。



【编号】 M09047238688F0CMMI H39877239219000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

槐米

【来源】 豆科植物槐 Sophora japonica L. 的干燥花蕾。

【主产地】 主产于河北、山东、河南、江苏、天津、北京等地。以河北、山东、河南产量大。

【性状特征】 花蕾略呈卵状或椭圆状，长 2～8 mm，直径约 2 mm。花萼约占全长2/3，少数为1/3，萼筒黄绿色或灰棕色，有纵脉纹，先端5浅裂，基部稍尖，有时连有短柄。未开放花冠扁圆状，外露 2～4 mm，黄白色或棕黄色，内有雄蕊 10 枚及雌蕊 1 枚。体轻，手捻即碎。无臭，味微苦涩。

【品质】 本品以个大、紧缩、色黄绿者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。凉血止血，清肝泻火。用于便血，痔血，血痢，崩漏，吐血，衄血，肝热目赤，头痛眩晕。



【编号】 M09577148570F0CMMI H37087148135000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

藏紫菀

【来源】 菊科植物缘毛紫菀 Aster souliei Franch. 的干燥头状花序。


【主产地】 主产于青海、西藏、四川、云南等地。

【性状特征】 花序皱缩成团，有时小花散落露出花盘，花盘短圆锥形，着生管状花的萼管群残基。总苞半球形，直径1.2～2 cm，黄绿色。总苞片3层，近等长，条状披针形，先端尖，具白色长缘毛。舌状花舌片细长，皱缩，紫色至灰紫色，长1.5～2.5 cm，宽约 1 mm；管状花两性，黄色。有时可见瘦果卵圆状，长 1～2 mm，密被白色糙毛。气香，味淡。

【品质】 本品以花色兰紫、气香者为佳。

【性味功效】 微苦，寒。清热解毒，止痛。用于瘟疫热毒，头痛，眼痛。

【附注】 常用藏药。载于《晶珠本草》。



【编号】 M10377238167R0XZDC H05117239025007400XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

藓生马先蒿花

【来源】 玄参科植物藓生马先蒿 Pedicularis muscicola Maxim.的干燥花。

【主产地】 主产于青海、甘肃、陕西、山西、湖北等地。

【性状特征】 花多皱缩，棕褐色或浅紫红色。花梗黑褐色，细长。萼圆筒状，前方三裂，具明显的数条主脉，其上被毛；萼齿5枚，向上渐细，叶状，间或有锯齿。花冠近基部扭转，前方渐细卷曲成“S”形的长喙；下唇大，长圆形，花丝无毛，花柱稍伸出于喙。气微香，味淡，微苦。

【品质】 本品以朵大、色棕褐或淡紫红者为佳。

【性味功效】 苦、凉。敛毒，生肌，清胃热。用于肉食中毒，热性腹泻，痞瘤，肺病，脉病。

【附注】 藏药。《四部医典》、《度母本草》、《宇妥本草》、《蓝琉璃》、《晶珠本草》等有记载。



【编号】 M10407252109H0XZDC H28607253037018300XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

果实及种子类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

八月札


【来源】 木通科植物三叶木通 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、陕西、江西等地。江西婺源为道地产区。

【性状特征】 果实呈肾状或长椭圆状，稍弯曲，长 3～9 cm，直径 1.5～3.5 cm。表面黄棕色或黑褐色，有不规则的深皱纹，顶端钝圆，基部有果梗痕。质硬，破开后，果瓤淡黄色或黄棕色；种子多数，扁长卵状，黄棕色或紫褐色，具光泽，有条状纹理。气微香，味苦。

【品质】 本品以完整、肥壮、质重、色土黄、皮皱、大小均匀、不开裂者为佳。

【性味功效】 苦，寒。舒肝理气，活血止痛，利尿，杀虫。用于脘胁胀痛，经闭痛经，小便不利，蛇虫咬伤。



【编号】 M08017021005S0CMMI H01737021001000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

刀豆


【来源】 豆科植物刀豆 Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于江苏、湖北、安徽等地。

【性状特征】 种子为扁卵状或扁肾状，长2～3.5 cm，宽1～2 cm，厚 0.5～1.2 cm。表面淡红色至红紫色，微皱缩，略有光泽。边缘具眉状黑色种脐，长约 2 cm，上有白色细纹 3 条。质硬，不易破碎。种皮革质，内表面棕绿色而光亮；子叶 2，黄白色，油润。无臭，味淡，嚼之有豆腥味。

【品质】 本品以粒大、饱满、色淡红者为佳。

【性味功效】 甘、温。温中，下气，止呃。用于虚寒呃逆，呕吐。



【编号】 M00297148135S0CMMI H07917148027000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

千金子

【来源】 大戟科植物续随子 Euphorbia lathyris L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于河北、河南、浙江等地。

【性状特征】 种子呈椭圆状或倒卵状，长约 5 mm，直径 4 mm。表面灰棕色或灰褐色，具不规则网状皱纹。皱纹凹陷处灰黑色，形成细斑点。一侧有纵沟状种脊，顶端为突起的合点，基部有类白色突起的种阜或具脱落后的疤痕。种皮薄脆，种仁白色或黄白色，富油质。气微，味辛。

【品质】 本品以粒饱满、油性足者为佳。

【性味功效】 辛，温；有毒。逐水消肿，破血消癥。用于水肿，痰饮，积滞胀满，二便不通，血瘀经闭；外治顽癣，疣赘。



【编号】 M00207136082S0CMMI H16957136033000900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大风子


【来源】 大风子科植物大风子 Hydnocarpus anthelminticus Pierre 的成熟种子。

【主产地】 主产于泰国、越南、印度尼西亚、印度、柬埔寨等地。

【性状特征】 种子略呈不规则卵圆状，或呈3～4面状，稍有钝棱；长1～2.5 cm，直径1～2 cm。表面灰棕色至黑棕色，全体有细的纵纹。较小端有凹纹延伸至种子1/3处，较大端有细小点状隆起。种皮坚硬，厚1.5～2 mm，内表面淡黄棕色；种仁与种皮分离，外被红棕色或黑棕色薄膜，较小端略皱缩，并有一环纹；胚乳乳白色至淡黄色，富油质；子叶2枚，浅黄色或黄棕色，心形，胚根圆柱形。气微，味淡。

【品质】 本品以个大、饱满、色白润、含油足者为佳。

【性味功效】 辛、热；有毒。祛风燥湿，攻毒杀虫。用于麻风，杨梅疮，疥癣，酒渣鼻，痤疮。



【编号】 M00317093010S0CMMI H20447093009000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大皂角

【来源】 豆科植物皂荚树 Gleditsia sinensis Lam. 的成熟果实。

【主产地】 主产于河北、山西、河南、山东等地。

【性状特征】 果实呈扁长条状或剑鞘状，略弯曲，于种子处稍隆起，长12～25 cm，宽2～4 cm，厚1～1.5 cm；表面紫红色或深棕色，被灰白色蜡粉，擦去后有光泽，顶端锐，基部渐狭，有短果柄或果柄痕，两侧有明显的纵棱线，摇之有响声；质硬，断面黄色，纤维性。种子多数，卵圆形，长1～1.4 cm，直径约8 mm，黄棕色，光滑。气特异，具强烈刺激性，易引起喷嚏，味辛辣。

【品质】 本品以肥厚、饱满、坚实者为佳。

【性味功效】 辛、咸，温；有小毒。祛痰止咳，开窍通闭，杀虫散结。用于痰咳喘满，中风口噤，痰涎壅盛，神昏不语，癫痫，喉痹，二便不利，痈肿疥癣。



【编号】 M00387148319S1CMMI H18767148070000500SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大豆黄卷

【来源】 豆科植物大豆 Glycine max (L.) Merr. 的种子发芽后晒干而成。

【主产地】 全国各地均产。

【性状特征】 种子椭圆状，稍扁，长0.6～1.4 cm，直径4～8 mm。表面灰黄色、黑褐色或紫褐色，光亮，有横向皱纹；一侧有黄色长圆形的种脐，长2～3 mm。种皮多裂开，破碎或脱落，子叶2片，肥厚，淡黄色或棕黄色，胚根细长，弯曲，长0.5～1 cm，质脆易断。气微，味淡，有油腻感。

【品质】 本品以粒大、饱满、有皱纹、芽短者为佳。

【性味功效】 甘，平。清热透表，除湿利气。用于湿温初起，暑湿发热，湿滞脘痞，湿痹，筋挛，骨节烦疼，水肿胀满，小便不利。



【编号】 M00397148321S1CMMI H18847148071000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大麦


【来源】 禾本科植物大麦 Hordeum vulgare L. 的颖果。

【主产地】 全国各地均有栽培。

【性状特征】 颖果两端狭尖略呈梭状，长 8～12 mm，直径 2.5～4.5 mm。表面淡黄色，背面浑圆，为外稃包围，具5脉，先端长芒已断落；腹面为内稃包围，腹面有1条纵沟。质硬，断面粉性，白色。气微，味微甘。

【品质】 本品以饱满、色淡黄者为佳。

【性味功效】 甘，凉。健脾和胃，宽肠，利水。用于腹胀，食滞泄泻，小便不利。



【编号】 M00407332083S0SM H20347332117001100CMMI

【鉴定人】 陈善塘

大枣

【来源】 鼠李科植物枣 Ziziphus jujuba Mill. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于河南、山东。河南质量最佳。

【性状特征】 果实呈椭圆状或球状，长2～3.5 cm，直径1.5～2.5 cm。表面暗红色或紫红色，略带光泽，有不规则皱纹。一端凹陷，有短果梗。外果皮薄，中果皮棕黄色或淡褐色，肉质，柔软，富糖性而油润。果核纺锤状，两端锐尖，质坚硬。气微香，味甜。

【品质】 本品以个大、色紫红、肉厚、油润者为佳。

【性味功效】 甘、温。补中益气，养血安神。用于脾虚食少，乏力便溏，妇人脏躁。



【编号】 M00417190058S0CMMI H41837191015000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大粒车前子

【来源】 车前科植物车前 Plantago asiatica L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于江西、河南。

【性状特征】 种子呈椭圆状、不规则长圆形或三角状长圆形，略扁，长约2 mm，宽约1 mm。表面黄棕色至黑褐色，有细皱纹，一面有灰白色凹点状种脐。质硬。气微，味淡。

【品质】 本品以粒大、均匀饱满、质坚硬、色黑者为佳。

【性味功效】 甘，微寒。清热利尿，渗湿通淋，明目，祛痰。用于水肿胀满，热淋涩痛，暑湿泄泻，目赤肿痛，痰热咳嗽。

【附注】 本品作为“车前子”入药。



【编号】 M01947242001S0CMMI H29847243001000100GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大腹皮

【来源】 棕榈科植物槟榔 Areca catechu L. 的干燥果皮。

【主产地】 主产于海南、云南。

【性状特征】 果皮对半纵剖略呈椭圆状或长卵形瓢状，长4～7 cm，宽 2～3.5 cm，厚 2～ 5 mm。外果皮深棕色至近黑色，具不规则的纵皱纹及隆起的横纹，顶端有花柱残痕，基部有果梗及残存萼片。内果皮凹陷，褐色或深棕色，光滑呈硬壳状。体轻，质硬，纵向撕裂后可见中果皮纤维。气微，味微涩。

【品质】 本品以色深棕、质柔韧、无杂质者为佳。

【性味功效】 辛，微温。下气宽中，行水消肿。用于湿阻气滞，脘腹胀闷，大便不爽，水肿胀满，脚气浮肿，小便不利。



【编号】 M00487314002S1CMMI H03697314002000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

女贞子

【来源】 木犀科植物女贞 Ligustrum lucidum Ait. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于江苏、浙江、湖南、福建、广西、四川、江西等地。

【性状特征】 果实呈卵状、椭圆状或肾状，长 6～8.5 mm，直径 3.5～5.5 mm。表面黑紫色或棕黑色，皱缩不平，基部有果梗痕或具宿萼及短梗。体轻。外果皮薄，中果皮较松软，易剥离，内果皮木质，黄棕色，具纵棱，破开后种子通常 1 粒，肾形，紫黑色，油性，横切面子房 2 室。无臭，气微，味甘、微苦涩。

【品质】 本品以粒大、饱满、色黑紫者为佳。

【性味功效】 甘、苦，凉。滋阴补肾，明目乌发。用于眩晕耳鸣，腰膝酸软，须发早白，目暗不明。



【编号】 M00517229059S0CMMI M00517229059S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

小决明子

【来源】 豆科植物小决明 Cassia tora L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于安徽、江苏、四川等地。

【性状特征】 种子呈短圆柱状，长 3～5 mm，宽 2～3 mm。表面绿棕色或暗棕色，平滑有光泽。一端较平坦，另端斜尖，背腹面各有 1 条突起的棱线，棱线两侧各有 1 片宽广的浅黄棕色带。种脐位于尖端处。质坚硬，不易破碎。种子薄，子叶 2，黄色，呈“S”形折曲并重叠。气微，味微苦。

【品质】 本品以籽粒饱满、色绿棕者为佳。

【性味功效】 甘、苦、咸，微寒。清热明目，润肠通便。用于目赤涩痛，羞明多泪，头痛眩晕，目暗不明，大便秘结。

【附注】 本品作为“决明子”入药。



【编号】 M00537148177S0CMMI H08547148029002200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小茴香

【来源】 伞形科植物茴香 Foeniculum vulgare Mill. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于山西、内蒙古、黑龙江等地。内蒙古托克托县等地产品质优。

【性状特征】 果实为双悬果，呈圆柱状，有的稍弯曲，长4～8 mm，直径1.5～3 mm。表面黄绿色或淡黄色，两端略尖，顶端残留有黄棕色突起的柱基，基部有时有细小的果梗。分果呈长椭圆形，背面有纵棱5条，接合面平坦而较宽，有纵皱纹，有的可见白色线状心皮柄附着。横切面略呈五边形，背面四边约等长。有特殊香气，味微甜、辛。

【品质】 本品以饱满、色黄绿、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛，温。散寒止痛，理气和胃。用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛经，少腹冷痛，脘腹胀痛，食少吐泻，睾丸鞘膜积液。



【编号】 M00577213127S0CMMI H17797214042000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

小粒车前子

【来源】 车前科植物平车前 Plantago depressa Willd. 的干燥成熟种子。


【主产地】 主产于江西、河南。

【性状特征】 种子呈椭圆形、不规则长圆形或三角状长圆形，略扁，长1～1.5 mm，宽不足1 mm。表面黄棕色至黑褐色，有细皱纹，一面有灰白色凹点状种脐。质硬。气微，味淡。

【品质】 本品以粒大、均匀饱满、质坚硬、色黑者为佳。

【性味功效】 甘，微寒。清热利尿，渗湿通淋，明目，祛痰。用于水肿胀满，热淋涩痛，暑湿泄泻，目赤肿痛，痰热咳嗽。

【附注】 本品作为“车前子”入药。



【编号】 M01957242005S0CMMI H29857243001000200GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

山杏仁

【来源】 蔷薇科植物山杏 Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于河北、山西、陕西等地。

【性状特征】 与“杏仁”相似。

【品质】 本品以粒大、饱满、完整者为佳。

【性味功效】 苦，微温；有小毒。降气止咳平喘，润肠通便。用于咳嗽气喘，胸满痰多，血虚津枯，肠燥便秘。

【附注】 本品作为“苦杏仁”入药。



【编号】 M05457143029S0CMMI H31597143037000801SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山里红

【来源】 蔷薇科植物山里红 Crataegus pinnatifida Bge. var. major N. E. Br. 的干燥成熟果实。


【主产地】 主产于河北、山东、河南、辽宁等地。

【性状特征】 果实类球状，直径1～2.5 cm。表面深红色或紫红色，具皱纹，有光泽，满布细小灰白色斑点。商品切片呈圆形片，皱缩不平，直径1～2.5 cm，厚2～4 mm。果肉深黄色至浅棕色。中部横切片具5粒浅黄色果核，但核多脱落而中空。有的片上可见短而细的果梗或花萼残迹。质坚硬。气微清香，味酸、微甜。

【品质】 本品以个大、皮红、果肉厚、核小者为佳。

【性味功效】 酸、甘，微温。消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞，胃脘胀痛，泻痢腹痛，瘀血闭经，产后瘀阻，心腹刺痛，疝气疼痛；高脂血症。

【附注】 本品作为“山楂”入药。



【编号】 M00737143085S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

山茱萸

【来源】 山茱萸科植物山茱萸 Cornus officinalis Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉。

【主产地】 主产于浙江。以浙江临安、淳安等地为道地产区，量大质优。

【性状特征】 肉质果皮呈不规则的片状或囊状，长1～1.5 cm，宽0.5～1 cm。表面紫红色至紫黑色，皱缩，有光泽。顶端有的有圆形宿萼痕，基部有果梗痕。质柔软。气微，味酸、涩、微苦。

【品质】 本品以无核、果肉厚、色红、柔润者为佳。

【性味功效】 酸、涩，微温。补益肝肾，涩精固脱。用于眩晕耳鸣，腰膝酸痛，阳萎遗精，遗尿尿频，崩漏带下，大汗虚脱，内热消渴。



【编号】 M00687209007S0CMMI H11507210004000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

山桃仁

【来源】 蔷薇科植物山桃 Prunus davidiana (Carr.) Franch. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于河南、河北、山东、山西、陕西、四川等地。

【性状特征】 种子呈类卵圆状，较小而肥厚，边缘不薄，长9～15 mm，宽约7 mm，厚约5 mm。表面红棕色或黄棕色，表面颗粒状突起较粗而密。其他特征均与“桃仁”相似。

【品质】 本品以粒饱满、种仁白、完整者为佳。

【性味功效】 苦、甘，平。活血祛瘀，润肠通便。用于经闭，痛经，癥痼痞块，跌扑损伤，肠燥便秘。

【附注】 本品作为“桃仁”入药。



【编号】 M07327143012S0CMMI H31607143037000900SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山楂


【来源】 蔷薇科植物山楂 Crataegus pinnatifida Bge. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于河北、山东、河南、辽宁等地。

【性状特征】 果实球形，直径1～1.5 cm，外皮棕红色，具皱纹，有灰白色小斑点。山楂片呈圆形片，皱缩不平，直径1～1.5 cm，厚2～4 mm。果肉深黄色至浅棕色。中部具5粒浅黄色果核，但核多脱落而中空。有的片上可见短而细的果梗或花萼残迹。质坚硬。气微清香，味酸、微甜。

【品质】 本品以个大、皮红、果肉厚、核小者为佳。

【性味功效】 酸、甘，微温。消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞，胃脘胀痛，泻痢腹痛，瘀血闭经，产后瘀阻，心腹刺痛，疝气疼痛；高脂血症。



【编号】 M00727143084S0CMMI H11997143014001100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

川楝子

【来源】 楝科植物川楝 Melia toosendan Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于四川、云南等地。以四川产量大质优。

【性状特征】 果实呈类球状，直径2～3.2 cm。表面金黄色至棕黄色，微有光泽，少数凹陷或皱缩，具深棕色小点。顶端有花柱残痕，基部凹陷，有果梗痕。外果皮革质，与果肉常成空隙，果肉松软，淡黄色，遇水润湿显黏性。果核球状或卵圆状，质坚硬，两端平截，有6～8条纵棱，内分6～8室，每室含黑棕色长圆形种子1粒。种子表面具细小突起。气特异，味酸、苦。

【品质】 本品以个大、外皮全色黄、肉色黄白、厚而松软者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有小毒。舒肝行气止痛，驱虫。用于胸胁、脘腹胀痛，疝痛，虫积腹痛。



【编号】 M00877197015S0CMMI H25837198010000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

广陈皮


【来源】 芸香科植物茶枝柑 Citrus reticulata ‘Chachi’（为芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 的栽培变种）的干燥成熟果皮。

【主产地】 主产于广东新会、四会等地。

【性状特征】 广陈皮常3～4瓣相连，裂瓣多向外反卷，形状整齐，厚度均匀，约1 mm。表面橙红色或棕紫色，显皱缩。内面白色。点状油室较大，对光照视，透明清晰。质较柔软。气香，味辛、苦。

【品质】 本品以片大、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温。理气健脾，燥湿化痰。用于胸脘胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。



【编号】 M00957194035S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

马尿泡

【来源】 茄科植物马尿泡 Przewalskia tangutica Maxim. 的根及果实。

【主产地】 主产于西藏、四川、青海等地。

【性状特征】 根呈长圆柱状，稍有弯曲，长10～25 cm，直径1.3～3 cm，少数呈不规则块状。根茎部分短，长2～3 cm，表面暗棕色或淡棕黄色，顶端有数个圆柱状的茎基痕及少数叶柄残痕，近根尖处长有明显环状。主根粗壮，表皮淡黄色，中部以下有2～3分支，具细纵皱纹，并有多数明显横长的皮孔。质较硬，断面粗糙而疏松，呈类白色至黄白色的菊花心，并有放射状的裂隙。气微，味苦。果实为蒴果，球状，直径1～2 cm；果萼椭圆状或卵状，近革质，网纹凸起，先端平截，不闭合。种子近肾形稍扁，长约3 mm，宽约2.5 mm。表面黑褐色，有蜂窝状突起。气微，味苦。

【性味功效】 苦、辛，寒；有毒。解痉止痛，消肿。用于胃痛，胆绞痛，急、慢性胃肠炎，无名肿毒。



【编号】 M01017250062R0XZDC H31687251020000100CMMI

【鉴定人】 格桑索朗

马钱子


【来源】 马钱科植物马钱 Strychnos nux-vomica L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于印度、印度尼西亚、越南、缅甸、泰国、柬埔寨、斯里兰卡等地。

【性状特征】 种子呈圆板形纽扣状，常一面隆起，一面稍凹下，直径1.5～3 cm，厚3～6 mm。表面密被灰棕或灰绿色绢状茸毛，自中间向四周呈辐射状排列，有丝样光泽。边缘稍隆起，较厚，有突起的珠孔，底面中心有突起的圆点状种脐。质坚硬，难破碎，平行剖面可见淡黄白色胚乳，角质状，子叶心形，叶脉5～7条，胚根约长4 mm。无臭，味极苦。

【品质】 本品以个大、质坚肉厚、色灰黄、有光泽者为佳。

【性味功效】 苦，温；有大毒。通络止痛，散结消肿。用于风湿顽痹，麻木瘫痪，跌扑损伤，痈疽肿痛；小儿麻痹后遗症，类风湿性关节痛。



【编号】 M01077228023S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

马兜铃


【来源】 马兜铃科植物北马兜铃 Aristolochia contorta Bge. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于黑龙江、河北、山东及陕西等地。

【性状特征】 果实为蒴果，呈卵圆状，长3～7 cm，直径2～4 cm。表面黄绿色，有纵棱线12条，由棱线分出多数横向平行的细脉纹，顶端平钝，基部有细长果梗。果皮轻而脆，易裂为6瓣，果梗也分裂为6条。果皮内表面平滑而光泽，有较密的横向脉纹。果实分6室，每室种子多数，平叠整齐排列。种子扁平而薄，钝三角形或扇形，长6～10 mm，宽8～12 mm，边缘有翅，淡棕色。气特异，味微苦。

【品质】 本品以个大、饱满、色黄绿、不破裂、无杂质者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。清肺降气，止咳平喘，清肠消痿。用于肺热喘咳，痰中带血，肠热痔血，痔疮肿痛。



【编号】 M01087024008S0CMMI H03927024002000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

马蔺子

【来源】 鸢尾科植物马蔺 Iris lactea Pall. var. chinensis Koidz. 的种子。

【主产地】 主产于江苏、辽宁、河北等地。

【性状特征】 种子呈不规则卵状、或扁卵状，长3～6 mm，宽3～4 mm。表面红棕色或深棕色，略有皱纹，边缘稍隆起，基部有淡色种脐。质坚硬。胚乳肥厚，灰白色，角质。气微，味淡。

【品质】 本品以质坚硬、色红棕或深棕者为佳。

【性味功效】 甘，平。清热利湿，解毒杀虫。用于黄疸，淋浊，小便不利，肠痈，虫积，疟疾，风湿痛，喉痹，牙痛，吐血，衄血，便血，崩漏，疮肿，瘰疬，疝气，痔疮，烫伤，蛇伤。



【编号】 M01097307021S0CMMI H21597307007002501SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

乌梅


【来源】 蔷薇科植物梅 Prunus mume (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的近成熟果实。

【主产地】 主产于福建、四川、浙江、湖南、广东等地。以福建、浙江产最佳，四川产量最大。

【性状特征】 果实为核果，类球状或扁球状，直径2～3 cm。表面棕黑色或乌黑色，于放大镜下可见毛茸，果肉干缩凹凸不平，可剥离；基部有圆形果柄痕。果核坚硬，椭圆状，棕黄色，表面有凹点，内含淡黄色、扁卵状种子1枚。带焦酸气，味极酸而涩。

【品质】 本品以个大、肉厚、核小、外皮色乌黑、味酸者为佳。

【性味功效】 酸，平。敛肺止咳，涩肠止泻，止血，生津，安蛔，治疮。用于久咳不止，久泻久痢，尿血便血，崩漏，虚热烦渴，蛔厥腹痛，疮痈胬肉。



【编号】 M01227143022S0CMMI H31627143037001100JXCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

五味子

【来源】 木兰科植物五味子 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于辽宁、黑龙江、吉林等地。

【性状特征】 果实呈不规则的球状或扁球状，直径5～8 mm。表面红色、紫红色或暗红色，皱缩，显油润；有的表面呈黑红色或出现“白霜”。果肉柔软，种子1～2，肾状，长4～5 mm，宽3～4 mm，表面棕黄色，有光泽。种皮薄而脆。种仁肾状，淡黄色，富油质。果肉气微，味酸；种子破碎后有香气，味辛、微苦。

【品质】 本品以粒大、果皮色紫红、肉厚、有油性及光泽、柔润者为佳。

【性味功效】 酸、甘，温。收敛固涩，益气生津，补肾宁心。用于久咳虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗，盗汗，津伤口渴，心悸失眠。



【编号】 M01287001081S0CMMI H35367001011000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

分心木

【来源】 胡桃科植物胡桃 Juglans regia L. 果核的木质隔膜。

【主产地】 主产于河北、山西、山东及北京等地。

【性状特征】 木质隔膜呈薄片状，多弯曲，破碎而不整齐。表面淡棕色至棕褐色，或棕黑色，略有光泽。质脆，易折断。气微，味微苦。

【品质】 本品以块大、色黄、质薄者为佳。

【性味功效】 苦、涩，平。涩精缩尿，止血止带，止泻痢。用于遗精滑泄，尿频遗尿，崩漏，带下，泄泻，痢疾。



【编号】 M01367207008S1CMMI H21887208005000400GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

化橘红


【来源】 芸香科植物化州柚 Citrus grandis 'Tomentosa' 的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。

【主产地】 主产于广东、广西。以广东化州为道地产区。

【性状特征】 外果皮呈对折的七角或展平的五角星状，单片呈柳叶形。完整者展平后直径 15～28 cm，厚 2～5 mm。外表面黄绿色，密布茸毛，有皱纹及小油室，内侧稍柔而有弹性。气芳香，味苦、微辛。

【品质】 本品以色绿、茸毛多、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。散寒，燥湿，利气，消痰。用于风寒咳嗽，喉痒痰多，食积伤酒，呕恶痞闷。



【编号】 M01377194019S0CMMI H10067195006000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

双边瓜蒌

【来源】 葫芦科植物中华栝楼 Trichosanthes rosthornii Harms 的干燥成熟果实。


【主产地】 主产于四川、江西、湖北等地。

【性状特征】 果实呈类球状或宽椭圆状，长 7～15 cm，直径 6～10 cm。表面橙红色或橙黄色，皱缩或较光滑，顶端有圆形的花柱残基，基部略尖，具残留的果梗。轻重不一。质脆，易破开，内表面黄白色，有红黄色丝络，果瓤橙黄色，黏稠，与多数种子粘结成团。具焦糖气，味微酸、甜。

【品质】 本品以完整、皱缩、皮厚、糖性足者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，寒。清热涤痰，宽胸散结，润燥滑肠。用于肺热咳嗽，痰浊黄稠，胸痹心痛，结胸痞满，乳痈，肺痈，肠痈肿痛，大便秘结。

【附注】 本品作为“瓜蒌”入药。



【编号】 M01417103100S1CMMI H39497103030002500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

双边瓜蒌子

【来源】 葫芦科植物中华栝楼 Trichosanthes rosthornii Harms 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于四川、江西、湖北等地。

【性状特征】 种子呈扁平椭圆状，较大而扁，长15～19 mm，宽8～10 mm，厚约2.5 mm。表面棕褐色，平滑，沿边缘有1圈较为明显的沟纹，环边较宽。顶端较平截，有种脐，基部钝圆或较狭。种皮坚硬；内种皮膜质，灰绿色，子叶2，黄白色，富油性。气微，味淡。

【品质】 本品以饱满、油性足者为佳。

【性味功效】 甘，寒。润肺化痰，滑肠通便。用于燥咳痰黏，肠燥便秘。

【附注】 本品作为“瓜蒌子”入药。



【编号】 M02337103100S2CMMI H39497103030002500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

双边瓜蒌皮

【来源】 葫芦科植物中华栝楼 Trichosanthes rosthornii Harms 的干燥成熟果皮。

【主产地】 主产于四川、江西、湖北等地。

【性状特征】 果皮饮片常切成2至数瓣，边缘内卷曲，长6～12 cm。外表面橙红色或橙黄色，皱缩，有的有残存果梗；内表面黄白色。质较脆，易折断。具焦糖气，味淡，微酸。

【品质】 本品以外表面色橙红、内表面色黄白、皮厚者为佳。

【性味功效】 甘，寒。清热化痰，利气宽胸。用于痰热咳嗽，胸闷胁痛。

【附注】 本品作为“瓜蒌皮”入药。



【编号】 M02357103100S3CMMI H39497103030002500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

天仙子


【来源】 茄科植物莨菪 Hyoscyamus niger L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于河北、河南、内蒙古及东北、西北各地。

【性状特征】 种子呈类扁肾状或扁卵状，直径约1 mm。表面棕黄色或灰黄色，有细密的网纹，略尖的一端有点状种脐。剖面灰白色，油质，有胚乳，胚弯曲。无臭，味微辛。

【品质】 本品以颗粒饱满、均匀、无瘪粒、无杂质者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温；有大毒。解痉止痛，安神定喘。用于胃痉挛疼痛，喘咳，癫狂。



【编号】 M01437250027S0CMMI H20647251009000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天师栗

【来源】 七叶树科植物天师栗 Aesculus wilsonii Rehd. 的干燥成熟种子。


【主产地】 主产于四川、湖北、贵州等地。

【性状特征】 果实球状或卵圆状，表面斑点较稀，果壳干后厚约1 mm，较苏罗子为薄。种子断面多呈淡棕色。其他特征均与娑罗子（七叶树）相似。

【品质】 本品以大小均匀、饱满、断面色黄白者为佳。

【性味功效】 甘，温。理气宽中，和胃止痛。用于胸腹胀满，胃脘疼痛。

【附注】 本品作为“娑罗子”入药。



【编号】 M07207198a05S0CMMI H01407199001001100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

巴豆

【来源】 大戟科植物巴豆 Croton tiglium L. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于四川、广西、云南、贵州等地。以四川产量最大。

【性状特征】 果实呈卵圆状，一般具三棱，长1.8～2.2 cm，直径1.4～2 cm。表面灰黄色或稍深，粗糙，有纵线6条，顶端平截，基部有果梗痕。破开果壳，可见3室，每室含种子1粒。种子呈略扁的椭圆状，长1.2～1.5 cm，直径6～9 mm，表面棕色或灰棕色，一端有小点状的种脐及种阜的疤痕，另端有微凹的合点，其间有隆起的种脊；外种皮薄而脆，内种皮呈白色薄膜；种仁黄白色，油质；子叶2枚，菲薄。无臭，味辛辣。

【品质】 本品以个大、饱满、种仁色黄者为佳。

【性味功效】 辛，热；有大毒。外用蚀疮，用于恶疮疥癣，疣痣。



【编号】 M01607136053S0CMMI H12337136024000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

木瓜


【来源】 蔷薇科植物贴梗海棠 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于四川、湖北、安徽、浙江等地。以安徽宣城、湖北资丘、浙江淳安所产质优。

【性状特征】 果实呈长圆状，多纵剖成两半，长4～9 cm，宽2～5 cm，厚1～2.5 cm。外表面紫红色或红棕色，有不规则的深皱纹；剖面周围向内卷曲，果肉红棕色，中心部分凹陷，棕黄色；种子扁长三角状，多脱落。质坚硬，气微清香，味酸。

【品质】 本品以质坚实、味酸者为佳。

【性味功效】 酸，温。平肝舒筋，和胃化湿。用于湿痹拘挛，腰膝关节酸重疼痛，吐泻转筋，脚气水肿。



【编号】 M01657143055S0XZDC H09137143009000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

木蝴蝶


【来源】 紫葳科植物木蝴蝶 Oroxylum indicum (L.) Vent. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于云南、广西、贵州等地。

【性状特征】 种子呈蝶形薄片，除基部外三面延长成宽大菲薄的翅，长5～8 cm，宽3.5～4.5 cm。表面浅黄白色，翅半透明，有绢丝样光泽，上有放射状纹理，边缘多破裂。体轻，剥去种皮，可见一层薄膜状的胚乳紧裹于子叶之外。子叶2，蝶形，黄绿色或黄色，长径1～1.5 cm。无臭，味微苦。

【品质】 本品以张大、色白、翼柔软如绸者为佳。

【性味功效】 苦、甘，凉。清肺利咽，疏肝和胃。用于肺热咳嗽，喉痹，音哑，肝胃气痛。



【编号】 M01727257020CMMI H27537258014000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

木鳖子


【来源】 葫芦科植物木鳖 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于湖北、广西及四川等地。

【性状特征】 种子呈扁平圆板状，中间稍隆起或微凹陷，直径2～4 cm，厚约5 mm。表面黑棕色或黑褐色，有网状花纹，在边缘较大的一个齿状突起上有浅黄色种脐。外种皮质硬而脆，内种皮灰绿色，绒毛样。种仁扁圆形或椭圆形。子叶2，肥厚，黄白色，富油性。有特殊的油腻气，味苦。

【品质】 本品以饱满、外壳无破裂、种仁色黄白者为佳。

【性味功效】 苦、微甘，凉；有毒。散结消肿，攻毒疗疮。用于疮疡肿毒，乳痈，瘰疬，痔漏，干癣，秃疮。



【编号】 M01737103058S0CMMI H26227103022000200GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

水红花子

【来源】 蓼科植物红蓼 Polygonum orientale L. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于东北及内蒙古、河北、山西、甘肃、山东、江苏等地。

【性状特征】 果实呈扁圆状，直径2～3.5 mm，厚1～1.5 mm。表面棕黑色或红棕色，有光泽，两面微凹，中部略有纵向隆起。顶端有突起的柱基，基部有浅棕色略突起的果梗痕，有的膜质花被残留。质硬。气微，味淡。

【品质】 本品以粒大、饱满、色黑者为佳。

【性味功效】 咸，微寒。散结消癥，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘿瘤肿痛，食积不消，胃脘胀痛。



【编号】 M01767057066S0CMMI H30697057010001700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

火麻仁

【来源】 桑科植物大麻 Cannabis sativa L. 的干燥成熟果实。

【主产地】 产于全国各地。

【性状特征】 果实呈卵圆状，长4～5.5 mm，直径2.5～4 mm。表面灰绿色或灰黄色，微有光泽，有细微的白色或棕色网纹，两边有棱，顶端略尖，基部有1圆形果梗痕。果皮薄而脆，易破碎。内有种子1枚，类圆状，种皮绿色，子叶2，乳白色，富有油性。气微，味淡。

【品质】 本品以粒饱满、种仁乳白者为佳。

【性味功效】 甘，平。润肠通便。用于血虚津亏，肠燥便秘。



【编号】 M01827167011S0CMMI H07937167005000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

牛蒡子

【来源】 菊科植物牛蒡 Arctium lappa L. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于东北、浙江等地。以东北产量最大，称作“关力子”。浙江产者质佳，称作“杜大力”。

【性状特征】 果实呈长倒卵状，两端平截，微弯曲，长5～7 mm，宽2～3 mm。表面灰褐色，带紫黑色斑点，有数条纵棱，通常中间1～2条较明显。顶端钝圆，稍宽，顶面有圆环，中间具点状花柱残迹；基部略窄，着生面色较淡。果皮较硬，子叶2，淡黄白色，富油性。无臭，味苦后微辛而稍麻舌。

【品质】 本品以粒大、饱满、色青白、有明显花纹者为佳。

【性味功效】 辛、苦，寒。疏散风热，宣肺透疹，解毒利咽。用于风热感冒，咳嗽痰多，麻疹，风疹，咽喉肿痛，疔腮丹毒，痈肿疮毒。



【编号】 M01877238054S0CMMI H03547239021000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

王不留行


【来源】 石竹科植物麦蓝菜 Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于黑龙江、辽宁、河北、山东、山西、湖北等地。河北产量最大。

【性状特征】 种子呈球形状，直径约2 mm。表面黑色，少数红棕色，略有光泽，有细密颗粒状突起，一侧有1凹陷的纵沟，质硬。胚乳白色，弯曲成环，子叶2。无臭。味微涩苦。

【品质】 本品以粒饱满、色黑者为佳。

【性味功效】 苦，平。活血通经，下乳消肿。用于乳汁不下，经闭，痛经，乳痈肿痛。



【编号】 M01897053106S0CMMI H40227053032000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

长柄扁桃仁

【来源】 蔷薇科植物长柄扁桃 Prunus pedunculata Maxim. 的干燥成熟种子，习称大李仁。


【主产地】 主产于内蒙古。

【性状特征】 种子长6～10 mm，直径5～7 mm。表面黄棕色，具皱纹，一端尖，另端钝圆。尖端一侧有线形种脐，圆端中央有深色合点，自合点处向上具多条纵向维管束脉纹。种皮薄，子叶2，乳白色，富油性。气微，味微苦。

【品质】 本品以粒饱满、完整、色黄白者为佳。

【性味功效】 辛、苦、甘，平。润燥滑肠，下气，利水。用于津枯肠燥，食积气滞，腹胀便秘，水肿，脚气，小便不利。

【附注】 本品作为“郁李仁”入药。



【编号】 M05647143017S0CMMI H31637143037001200SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

丝瓜络

【来源】 葫芦科植物丝瓜 Luffa cylindrica (L.) Roem. 的干燥成熟果实的维管束。

【主产地】 全国各地均产，以江苏、浙江所产者为佳。

【性状特征】 维管束丝状交织而成，多呈长棱状或长圆筒状，略弯曲，长30～70 cm，直径5～10 cm。表面淡黄白色，粗糙，有数条浅纵沟，有时可见残存的果皮和膜质状果肉。体轻，质韧，有弹性，不易折断。横切面可见子房3室，呈空洞状。偶见残留黑色种子。气微，味淡。

【品质】 本品以个大、筋粗、色黄白、无种子者为佳。

【性味功效】 甘，平。通络，活血，祛风。用于痹痛拘挛，胸胁胀痛，乳汁不通。



【编号】 M02057103056S0CMMI H24357103021000100SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

冬瓜子

【来源】 葫芦科植物冬瓜 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 的种子。

【主产地】 全国各地均产。以河北、河南、安徽、江苏、浙江和四川产量最大。

【性状特征】 种子呈长椭圆状或卵圆状，扁平，长1～1.5 cm，宽0.5～1 cm，厚约2 mm。表面黄白色，略粗糙，边缘光滑或两面外缘各有环纹。一端稍尖，有2个小突起，较大的突起上有珠孔，较小的为种脐，另一端钝圆。种皮稍硬而脆，剥去种皮可见子叶2枚，白色，肥厚，胚根短小。体轻，富油性。气无，味微甜。

【品质】 本品以饱满、色黄白者为佳。

【性味功效】 甘，微寒。清肺化痰，消痈排脓，利湿。用于痰热咳嗽，肺痈，肠痈，白浊，带下，脚气，水肿，淋证。



【编号】 M02097103002S1CMMI H05897103002000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬瓜皮

【来源】 葫芦科植物冬瓜 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 的干燥外层果皮。

【主产地】 全国各地均产。

【性状特征】 外果皮呈不规则的碎片，常向内卷曲，大小不一。外表面灰绿色或黄白色，被有白霜，有的较光滑不被白霜；内表面较粗糙，有的可见筋状维管束。体轻，质脆。无臭，味淡。

【品质】 本品以皮薄、条长、色灰绿者为佳。

【性味功效】 甘，凉。利尿消肿。用于水肿胀满，小便不利，暑热口渴，小便短赤。



【编号】 M02107103002S2CMMI H05897103002000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦


冬葵果

【来源】 锦葵科植物冬葵 Malva verticillata L. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于河北、陕西、甘肃、青海、四川等地。

【性状特征】 果实呈盘形扁圆状，直径 4～7 mm。外被膜质宿萼，宿萼钟状，黄绿色或黄棕色，有的微带紫色，先端 5 齿裂，裂片内卷，其外有条状披针形的小苞片 3 片。果梗细短。果实由分果瓣 10～12 枚组成，在圆锥形中轴周围排成 1 轮，分果类扁圆状，直径 1.4～2.5 mm。表面黄白色或黄棕色，具隆起的环向细纹脉。种子肾形，棕黄色或黑褐色。气微，味涩。

【性味功效】 甘、涩，凉。清热利尿，消肿。用于尿闭，水肿，口渴；尿路感染。



【编号】 M02137132045S0XZDC H25427132010000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

北葶苈子

【来源】 十字花科植物独行菜 Lepidium apetalum Willd. 的干燥成熟种子。


【主产地】 主产于河北、辽宁、内蒙古等地。

【性状特征】 种子呈扁卵状，长 1～1.5 mm，宽 0.5～1 mm。表面棕色或红棕色，微有光泽，具纵沟 2 条，其中一条较明显。一端钝圆，另端尖而微凹，类白色，种脐位于凹入端。无臭，味微辛辣，黏性较强。

【品质】 本品以粒饱满、表面色红棕、有光泽、黏性较强者为佳。

【性味功效】 辛、苦，大寒。泻肺平喘，行水消肿。用于痰涎壅肺，胸胁胀满，不得平卧，胸腹水肿，小便不利，肺源性心脏病水肿。

【附注】 本品作为“葶苈子”入药。



【编号】 M09417039068S0CMMI H22727039049000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

母丁香

【来源】 桃金娘科植物丁香 Eugenia caryophyllata Thunb. 的干燥近成熟果实。

【主产地】 主产于马来西亚、印度尼西亚及东非沿岸国家。以桑给巴尔产量最大，质量佳。

【性状特征】 果实呈长倒卵状至长圆状；长 2～2.5 cm，直径 0.6～1 cm。先端有齿状萼片 4 枚，向中央弯曲，基部具果柄残痕。表面棕褐色，粗糙，有多数细皱纹。果皮与种皮薄壳状，质脆，易破碎脱落，有的已无果皮或种皮，仅为种仁。种仁倒卵形，暗棕色，由两片肥厚的子叶抱合而成，子叶形如鸡舌，不规则抱合，中央有一条细杆状的胚根，由子叶的中央伸至较宽的先端。质坚硬，难破碎。气微香，味辛辣。

【性味功效】 辛，温。温中散寒。用于胃冷呕逆，小儿疳积，外治口臭舌疮，龋齿疼痛。



【编号】 M02287118014S2CMMI

【鉴定人】 谢宗万　黄璐琦

瓜蒂

【来源】 葫芦科植物甜瓜 Cucumis melo L. 的果柄。

【主产地】 全国各地均产。

【性状特征】 果柄细圆柱状，稍扭曲，长3～6 cm，直径 2～4 mm。连接瓜的一端略膨大，直径约8 mm，有纵沟纹；外表面灰黄色，有稀疏的短毛茸。带果皮的果柄较短，长 0.3～2.6 cm，略弯曲或扭曲，有纵沟纹。果皮部分近圆盘形，直径约 2 cm，外表面暗黄色至棕黄色，皱缩，边缘薄而内卷，内表面黄白色至棕色，果柄质轻而韧，不易折断。断面纤维性，中空，气微，味苦。

【品质】 本品以色黄、味苦者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有小毒。催吐，除湿退黄。用于热痰壅盛，咽喉闭塞，停食腹胀，湿热黄疸。



【编号】 M05417103007S1CMMI　H12397103007000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万　黄璐琦

瓜蒌


【来源】 葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于山东、山西、河北、浙江、江苏等地。以山东为道地产区。

【性状特征】 果实呈类球状或宽椭圆状，长7～15 cm，直径6～10 cm。表面橙红色或橙黄色，皱缩或较光滑，顶端有圆形的花柱残基，基部略尖，具残留的果梗。轻重不一。质脆，易破开，内表面黄白色，有红黄色丝络，果瓤橙黄色，黏稠，与多数种子粘结成团。具焦糖气，味微酸、甜。

【品质】 本品以完整、皱缩、皮厚、糖性足者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，寒。清热涤痰，宽胸散结，润燥滑肠。用于肺热咳嗽，痰浊黄稠，胸痹心痛，结胸痞满，乳痈，肺痈，肠痈肿痛，大便秘结。



【编号】 M02317103093S1CMMI　H39457103030001400CMMI

【鉴定人】 谢宗万　黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瓜蒌子

【来源】 葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于山东、山西、河北、浙江、江苏等地。以山东为道地产区。

【性状特征】 种子呈扁平椭圆状，长12～15 mm，宽6～10 mm，厚约3.5 mm。表面浅棕色至棕褐色，平滑。顶端较尖，有种脐，基部钝圆或较狭。种皮坚硬；内种皮膜质，灰绿色，子叶2，黄白色，富油性。气微，味淡。

【品质】 本品以饱满、油性足者为佳。

【性味功效】 甘，寒。润肺化痰，滑肠通便。用于燥咳痰黏，肠燥便秘。



【编号】 M02327103093S2CMMI H39457103030001400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

瓜蒌皮

【来源】 葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. 的干燥成熟果皮。

【主产地】 主产于山东、安徽、河南、浙江等地。以山东长清等地为道地产区。

【性状特征】 果皮常切成2至数瓣，边缘向内卷曲，长6～12 cm。外表面黄白色或橙黄色，皱缩，有的有残存柱基或果梗残迹；内表面黄白色。质较脆，易折断。具焦糖气。味淡、微酸。

【品质】 本品以外表面色橙红、内表面色黄白、皮厚者为佳。

【性味功效】 甘，寒。清热化痰，利气宽胸。用于痰热咳嗽，胸闷胁痛。



【编号】 M02347103093S3CMMI H39457103030001400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

白色牵牛子

【来源】 旋花科植物裂叶牵牛 Pharbitis nil (L.) Choisy 的干燥成熟种子。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 种子似橘瓣状，长4～8 mm，宽3～5 mm。表面淡黄白色，背面有1条浅纵沟，腹面棱线的下端有一点状种脐，微凹。质硬，横切面可见淡黄色或黄绿色皱缩折叠的子叶，微显油性。无臭，味辛、苦，有麻感。

【品质】 本品以粒饱满者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有毒。泻水通便，消痰涤饮，杀虫攻积。用于水肿胀满，二便不通，痰饮积聚，气逆喘咳，虫积腹痛，蛔虫、绦虫病。

【附注】 本品作为“牵牛子”入药。



【编号】 M06447251057S0CMMI H28907252019000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白芥子

【来源】 十字花科植物白芥 Sinapis alba L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 产于全国各地。

【性状特征】 种子呈球状，直径 1.5～1.8 mm。表面灰白色至淡黄色，具细微的网纹，有明显的点状种脐。种皮薄而脆，破开后内有白色折叠的子叶，有油性。无臭，味辛辣。

【品质】 本品以粒大、饱满、色黄白者为佳。

【性味功效】 辛，温。温肺豁痰利气，散结通络止痛。用于寒痰喘咳，胸胁胀痛，痰滞经络，关节麻木、疼痛，痰湿流注，阴疽肿毒。

【附注】 本品作为“芥子”入药。



【编号】 M02547039093S0CMMI H36487039077000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

白果


【来源】 银杏科植物银杏 Ginkgo biloba L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于广西、四川、河南、山东、湖北、辽宁等地。

【性状特征】 种子略呈椭圆状，一端稍尖，一端钝，长1.5～2.5 cm，宽 1～2 cm，厚约 1 cm。表面黄白色或淡棕黄色，平滑，具 2～3 条棱线。中种皮（壳）骨质，坚硬。内种皮膜质，种仁宽卵球状或椭圆状，一端淡棕色，另一端金黄色，横断面外层黄色，胶质样，内层淡黄色或淡绿色，粉性，中间有空隙。无臭，味甘、微苦。

【品质】 本品以个大、壳色黄白、种仁饱满、断面色淡黄者为佳。

【性味功效】 甘、苦、涩，平；有毒。敛肺定喘，止带浊，缩小便。用于痰多喘咳，带下白浊，遗尿尿频。



【编号】 M02596002001S0CMMI H18706002001000100GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

白扁豆

【来源】 豆科植物扁豆 Dolichos lablab L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 全国各地栽培。主产于安徽、陕西、湖南、河南、山西等地。

【性状特征】 种子呈扁椭圆状或扁卵圆状，长 8～13 mm，宽 6～9 mm，厚约 7 mm。表面淡黄白色或淡黄色，平滑，略有光泽，一侧边缘有隆起的白色眉状种阜。质坚硬。种皮薄而脆，子叶2，肥厚，黄白色。气微，味淡，嚼之有豆腥气。

【品质】 本品以粒饱满、色白者为佳。

【性味功效】 甘，微温。健脾化湿，和中消暑。用于脾胃虚弱，食欲不振，大便溏泻，白带过多，暑湿吐泻，胸闷腹胀。



【编号】 M02647148280S0CMMI H14937148053000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石虎吴茱萸

【来源】 芸香科植物石虎 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang 的干燥近成熟果实。

【主产地】 主产于浙江、江西、湖北、湖南、广西、四川、贵州等地。

【性状特征】 果实呈五角形球状，直径2～4 mm。表面绿褐色至暗褐色，无点状突起，有多数凹下的油室。花萼及果柄疏被灰白色毛茸或脱落。其他特征均与吴茱萸相似。

【品质】 本品以饱满、坚实、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，热；有小毒。散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。用于厥阴头痛，寒疝腹痛，寒湿脚气，经行腹痛，脘腹胀痛，呕吐吞酸，五更泄泻；外治口疮，高血压。

【附注】 本品作为“吴茱萸”入药。



【编号】 M040371940765S0SM H17247195009000502CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

石莲子

【来源】 睡莲科植物睡莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 老熟的果实。

【主产地】 主产于湖南、湖北、福建、江苏、浙江、江西等地。以湖南产的“湖莲子”质较佳。

【性状特征】 果实呈卵圆状椭圆形，两端略尖，长1.5～2 cm，直径0.8～1.3 cm。表面灰棕色至黑棕色，平滑，有白色霜粉，先端有圆孔状柱基或有残留柱基，基部有果柄痕。质坚硬，不易破开，破开后内有1颗种子，卵形，种皮黄棕或红棕色，不易剥离，子叶2枚，淡黄白色，粉性，中心有一暗绿色的莲子心。气微，味微甘，胚芽苦。

【品质】 本品以个大、饱满者为佳。

【性味功效】 甘、涩、微苦，寒。清湿热，开胃进食，清心宁神，涩精止泄。用于噤口痢，呕吐不食，心烦失眠，遗精，尿浊，带下。



【编号】 M02857018003S1CMMI H26847018003000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

石榴子

【来源】 石榴科植物石榴 Punica granatum L. 的干燥种子。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 种子多数呈倒卵状，带棱角，有时由多数种子粘连成块状。外种皮干缩于种子表面，黄红色至暗褐色，具黏性，味甜。内种皮亚骨质，淡红棕色，质较硬。种仁乳白色，子叶重叠卷曲。气微，味酸、甜。

【性味功效】 酸、甘，温、润。助消化，温胃肾。用于胃寒引起的食欲不振，消化不良以及肾腰疼痛。



【编号】 M02887075001S0CMMI H32067075001000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石榴皮

【来源】 石榴科植物石榴 Punica granatum L. 的干燥果皮。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 果皮呈不规则的片状或瓢状，大小不一，厚 1.5～3 mm。外表面红棕色、棕黄色或暗棕色，略有光泽，粗糙，有多数疣状突起，有的有凸起的筒状宿萼及粗短果梗或果梗痕。内表面黄色或红棕色，有隆起呈网状的果蒂残痕。质硬而脆，断面黄色，略显颗粒状。无臭，味苦涩。

【品质】 本品以果皮大、整洁者为佳。

【性味功效】 酸、涩，温。涩肠止泻，止血，驱虫。用于久泻，久痢，便血，脱肛，崩漏，带下，虫积腹痛。



【编号】 M02897075001S0CMMI H32067075001000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

辽杏仁

【来源】 蔷薇科植物辽杏 Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于东北、河北、山西等地。

【性状特征】 种子类圆锥状，长 0.8～1.1 cm，宽 8～9 mm，厚约 8 mm。其他特征与“杏仁”相似。

【品质】 本品以粒大、仁白、饱满、完整者为佳。

【性味功效】 苦，微温；有小毒。降气止咳平喘，润肠通便。用于咳嗽气喘，胸满痰多，血虚津枯，肠燥便秘。

【附注】 本品作为“苦杏仁”入药。



【编号】 M05467143021S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

龙眼肉

【来源】 无患子科植物龙眼 Dimocarpus longan Lour. 的假种皮。

【主产地】 主产于福建、广西。

【性状特征】 假种皮为纵向破裂的不规则薄片，常数片粘结，长约 1.5 cm，宽 2～4 cm，厚约 1 mm。棕褐色，半透明。一面皱缩不平，一面光亮而有细纵皱纹。质柔润，气微香，味甜。

【品质】 本品以肉厚、质柔润、色棕褐、半透明、味浓甜者为佳。

【性味功效】 甘，温。补益心脾，养血安神。用于气血不足，心悸怔忡，健忘失眠，血虚萎黄。



【编号】 M03027198008S0CMMI H14387199008000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

亚麻子

【来源】 亚麻科植物亚麻 Linum usitatissimum L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于东北地区。

【性状特征】 种子呈扁平卵圆状，一端钝圆，另端尖而略偏斜，长4～6 mm，宽2～3 mm。表面红棕色或灰褐色，平滑有光泽，种脐位于尖端的凹入处；种脊浅棕色，位于一侧边缘。种皮薄，胚乳棕色。薄膜状；子叶2，黄白色，富油性。无臭，嚼之有豆腥味。

【品质】 本品以饱满、光滑、色棕红者为佳。

【性味功效】 甘、平。润燥，祛风。用于肠燥便秘，皮肤干燥瘙痒，毛发枯萎脱落。



【编号】 M03047065005S0CMMI H23727065003000200SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

光皮木瓜

【来源】 蔷薇科植物光皮木瓜 Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne 的果实。

【主产地】 主产于陕西、山东、安徽、江苏、浙江、江西、广西等地。

【性状特征】 果实长圆状，常纵剖两半，长4～8 cm，直径4～6 cm，果肉厚1～1.5 cm。外表面紫红色，平滑不皱缩，于放大镜下可见极细微的浅皱纹；剖开面果肉淡黄棕色，颗粒性，中央有凹陷的子房室及隔壁，每室平迭排列红棕色扁三角形种子20～30粒；质坚实而重。

【品质】 本品以质坚实、味酸者为佳。

【性味功效】 酸、涩，平。和胃舒筋，祛风湿，消痰止咳。用于吐泻转筋，风湿痹痛，咳嗽痰多，泄泻，痢疾，跌扑伤痛，脚气水肿。



【编号】 M03087143054S0CMMI H09127143009000300SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

决明子


【来源】 豆科植物决明 Cassia obtusifolia L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于广西、云南等地。

【性状特征】 种子略呈菱方形或短圆柱形，两端平行倾斜，长3～7 mm，宽2～4 mm。表面绿棕色或暗棕色，平滑有光泽。背腹面各有1条突起的棱线，棱线两侧各有1条斜向对称而色较浅的线形凹纹。其他特征与决明子相似。

【品质】 本品以籽粒饱满、色绿棕者为佳。

【性味功效】 甘、苦、咸，微寒。清热明目，润肠通便。用于目赤涩痛，羞明多泪，头痛眩晕，目暗不明，大便秘结。



【编号】 M03167148171S0CMMI H08507148029002300JXCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


地仙桃

【来源】 紫草科植物梓木草 Lithospermum zollingeri DC. 的果实。

【主产地】 主产于台湾、浙江、江苏、安徽、贵州、四川、陕西及甘肃等地。

【性状特征】 果实呈椭圆状或斜卵球状，长3～3.5 mm，腹面中线凹陷成纵沟。表面乳白色，光滑润泽。质坚硬，破碎后可见种子，种皮与果壳愈合，棕黑色，种仁灰白色而稍黄。富油质。

【性味功效】 甘、辛，温。温中散寒，行气活血，消肿止痛。用于胃脘冷痛作胀，泛吐酸水，跌扑肿痛，骨折。



【编号】 M03217249028FHCMMI H23907250027000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

地肤子


【来源】 藜科植物地肤 Kochia scoparia (L.) Schrad. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于江苏、河南、河北、山东等地。

【性状特征】 果实呈五角星形扁球状，直径1～3 mm。外被宿存花被，表面灰绿色或浅棕色，周围具膜质小翅5枚，背面中心有微突起的点状果梗痕及放射状脉纹5～10条；剥离花被，可见膜质果皮，半透明。种子1枚，扁卵状，长约1 mm，黑色。气微，味微苦。

【品质】 本品以充实饱满、色灰绿、无杂质者为佳。

【性味功效】 辛、苦，寒。清热利湿，祛风止痒。用于小便涩痛，阴痒带下，风疹，湿疹，皮肤瘙痒。



【编号】 M03247061021S0CMMI H22137061029000700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

红豆蔻

【来源】 姜科植物大高良姜 Alpinia galanga Willd. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于广东、河南等地。

【性状特征】 果实呈长球状，中部略细，长0.7～1.2 cm，直径5～7mm。表面红棕色或暗红色。略皱缩，顶端有黄白色管状缩萼，基部有果梗痕。果皮薄，易破碎。种子6，扁圆形或三角形多面状，黑棕色或红棕色，外被黄白色膜质假种皮，胚乳灰白色。气香，味辛酸。

【品质】 本品以粒大、饱满、不破碎、气味浓者为佳。

【性味功效】 辛，温。燥湿化痰，醒脾消食。用于脘腹冷痛，食积胀满，呕吐泄泻，饮酒过多。



【编号】 M03627290011S0CMMI H02237290002001500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

肉豆蔻

【来源】 肉豆蔻科植物肉豆蔻 Myristica fragrans Houtt. 的干燥种仁。

【主产地】 主产于印度尼西亚、马来西亚等地。

【性状特征】 种仁呈卵圆状或椭圆状，长2～3 cm，直径1.5～2.5 cm。表面灰棕色或灰黄色，全体有浅色纵行沟纹及不规则网状沟纹。种脐位于宽端，呈浅色圆形突起，合点呈暗凹陷。种脊呈纵沟状，连接两端。质坚，断面显棕黄色相杂的大理石花纹，宽端可见干燥皱缩的胚，富油性。气香浓烈，味辛。

【品质】 本品以个大、体重、质坚实、破裂后油性足、香气浓、味辛酸、花纹明显者为佳。

【性味功效】 辛，温。温中行气，涩肠止泻。用于脾胃虚寒，久泻不止，脘腹胀痛，食少呕吐。



【编号】 M03767014003S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

西青果

【来源】 使君子科植物诃子 Terminalia chebula Retz. 的幼果。

【主产地】 主产于云南临沧和德宏地区。

【性状特征】 幼果呈长卵状，略扁，一端较大，另端略小，钝尖，下部有一果柄痕。有的稍弯曲。长1.5～3 cm，直径0.5～1.2 cm。表面黑褐色，具明显的纵皱纹。质坚硬，断面褐色，有胶质样光泽，核不明显，常有空心，小者黑褐色，无空心。无臭，味苦涩，微甘。

【品质】 本品以身干、质坚实、断面无空心者为佳。

【性味功效】 苦、微甘、涩，凉。清热生津，利咽解毒。用于阴虚白喉，扁桃体炎，喉炎，痢疾，肠炎。



【编号】 M03857121012S0CMMI H38547121006000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

阳春砂

【来源】 姜科植物阳春砂 Amomum villosum Lour. 的干燥成熟果实。


【主产地】 主产于广东、广西、云南等地。以广东阳春为道地产区。

【性状特征】 果实呈椭圆状或卵圆状，有不明显的三棱，长1.5～2.5 cm，直径1～1.5 cm。表面棕褐色，密生刺状突起，顶端有花被残基，基部常有果梗。果皮薄而软。种子集结成团，具三钝棱，中有白色隔膜，将种子团分成3瓣，每瓣有种子5～26粒。种子为不规则多面体，直径2～3 mm；表面棕红色或暗褐色，有细皱纹，外被淡棕色膜质假种皮；质硬，胚乳灰白色。气芳香而浓烈，味辛凉、微苦。

【品质】 本品以个大、坚实、仁饱满、气味浓者为佳。

【性味功效】 辛，温。化湿开胃，湿脾止泻，理气安胎。用于湿浊中阻，脘痞不饥，脾胃虚寒，呕吐泄泻，妊娠恶阻，胎动不安。

【附注】 本品作为“砂仁”入药。



【编号】 H0252729000300800CMMI M06547290055S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

余甘子


【来源】大戟科植物余甘子 Phyllanthus emblica L. 的干燥成熟果实。

【主产地】主产于云南。

【性状特征】果实呈球状或扁球状，直径 1.2～2 cm。表面棕褐色至墨绿色，有浅黄色颗粒状突起，具皱纹及不明显的6棱，果梗长约 1 mm。外果皮厚 1～4 mm，质硬而脆。内果皮黄白色，硬核样，表面略具6棱，背缝线的偏上部有数条筋脉纹，干后可裂成 6 瓣，种子 6，近三棱形，棕色。气味，味酸涩，回甜。

【品质】本品以个大、肉厚、回甜味浓者为佳。

【性味功效】甘、酸、涩，凉。清热凉血，消食健胃，生津止咳。用于血热血瘀，消化不良，腹胀，咳嗽，喉痛，口干。



【编号】M03967136163S0SM H29217136052000100CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

佛手片

【来源】芸香科植物佛手 Citrus medica L. var. sarcodactylis(Noot.) Swingle 的干燥果实。

【主产地】主产于四川、广东等地。

【性状特征】果实呈类椭圆状，常皱缩或卷曲，长 6～10 cm，宽 3～7 cm，厚 2～4 mm。顶端稍宽，常有 3～5 个手指状的裂瓣，基部略窄，有的可见果梗痕。外皮黄绿色或橙黄色，有皱纹及油点。果肉浅黄白色，散有凹凸不平的线状或点状维管束。质硬而脆，受潮后柔韧。气香，味微甜后苦。

【品质】本品以果大、绿皮白肉、香气浓厚者为佳。

【性味功效】辛、苦、酸，温。舒肝理气，和胃止痛。用于肝胃气滞，胸胁胀痛，胃脘痞满，食少呕吐。



【编号】M03997194030S2CMMI H10097195006000501SM

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

吴茱萸

【来源】芸香科植物吴茱萸 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. 的干燥成熟果实。

【主产地】主产于陕西、甘肃、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南、四川等地。

【性状特征】果实呈球形或略呈五角形扁球状，直径 2～5 mm。表面暗黄绿色至褐色，粗糙，有多数点状突起或凹下的油点。顶端有五角星状的裂隙。基部残留被有黄色茸毛的果梗。质硬而脆，横切面可见子房5室，每室有淡黄色种子1粒。气芳香浓郁，味辛辣而苦。

【品质】本品以饱满、坚实、香气浓者为佳。

【性味功效】辛、苦，热；有小毒。散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。用于厥阴头痛，寒疝腹痛，寒湿脚气，经行腹痛，脘腹胀痛，呕吐吞酸，五更泄泻；外治口疮，高血压。



【编号】M04007194073S0CMMI H17227195009000500CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

杏仁

【来源】 蔷薇科植物杏 Prunus armeniaca L. 的干燥成熟种子。


【主产地】 主产于我国北方各地。以山东产为佳。

【性状特征】 种子呈扁心状，长1～1.9 cm，宽0.8～1.5cm，厚5～8 mm。表面黄棕色至深棕色，一端尖，另端钝圆，肥厚，左右不对称。尖端一侧有短线形种脐，圆端合点处向上具多数深棕色的脉纹。种皮薄，子叶2，乳白色，富油性。无臭，味苦。

【品质】 本品以粒大、饱满、完整者为佳。

【性味功效】 苦，微温；有小毒。降气止咳平喘，润肠通便。用于咳嗽气喘，胸满痰多，血虚津枯，肠燥便秘。

【附注】 本品作为“苦杏仁”入药。



【编号】 M04127143028S0CMMI H31587143037000800SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

沙苑子


【来源】 豆科植物扁茎黄芪 Astragalus complanatus R. Br. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于陕西。

【性状特征】 种子略呈肾状而稍扁，长2～2.5 mm，宽1.5～2 mm，厚约1 mm。表面光滑，褐绿色或灰褐色，边缘一侧微凹处具圆形种脐。质坚硬，不易破碎。子叶2，浅黄色，胚根弯曲，长约1 mm。无臭，味淡，嚼之有豆腥味。

【品质】 本品以粒大饱满、色绿褐者为佳。

【性味功效】 甘，温。温补肝肾，固精，缩尿，明目。用于肾虚腰痛，遗精早泄，白浊带下，小便余沥，眩晕目昏。



【编号】 M04177148051S0CMMI H05277148017000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

沙棘

【来源】 胡颓子科植物 Hippophae rhamnoides L. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于华北、西北及四川等地。

【性状特征】 果实呈类球状或扁球状，有的数个粘连，单个直径5～8 mm。表面橙黄色或红棕色，皱缩，顶端有残存花柱，基部具短小果梗或果梗痕。果肉油润，质柔软。种子斜卵状，长约4 mm，宽2 mm；表面褐色，有光泽，中间有一纵沟；种皮较硬，种仁乳白色，有油性。气微，味酸、涩。

【品质】 本品以粒大、肉厚、油润者为佳。

【性味功效】 酸、涩，温。止咳祛痰，消食化滞，活血化瘀。用于咳嗽痰多，消化不良，食积腹痛，瘀血经闭，跌扑瘀肿。



【编号】 M04187191024S0CMMI H20237192002000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

芡实

【来源】 睡莲科植物芡 Euryale ferox Salisb. 的干燥成熟种仁。

【主产地】 主产于江苏、安徽、湖南、湖北、山东等地。

【性状特征】 种仁呈类球状，多为破粒，完整者直径 5～8 mm。表面有棕红色内种皮，一端黄白色，约占全体 1/3，有凹点状的种脐痕，除去内种皮显白色。质较硬，断面白色，粉性。无臭，味淡。

【品质】 本品以粒大完整、粉性足、无皮壳者为佳。

【性味功效】 甘、涩，平。益肾固精，补脾止泻，祛湿止带。用于梦遗滑精，遗尿尿频，脾虚久泻，白浊，带下。



【编号】 M042870180025S0CMMI H17177018002000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

芥子


【来源】 十字花科植物芥 Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. 的干燥成熟种子。

【主产地】 产于全国各地。

【性状特征】 种子呈球状，直径 1～2 mm。表面黄色至棕黄色，少数呈暗红棕色。具细微的网纹，有明显的点状种脐。种皮薄而脆，破开后内有白色折叠的子叶，有油性。研碎后加水浸湿，则产生辛烈的特异臭气，味辛辣。

【品质】 本品以粒大、饱满、色黄者为佳。

【性味功效】 辛，温。温肺豁痰利气，散结通络止痛。用于寒痰喘咳，胸胁胀痛，痰滞经络，关节麻木、疼痛，痰湿流注，阴疽肿毒。



【编号】 M10527039014S0CMMI H06847039011000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

芫荽

【来源】 伞形科植物芫荽 Coriandrum sativum L. 的果实。

【主产地】 主产于江苏、湖北、安徽等地。

【性状特征】 果实为双悬果，呈圆球状，直径 2.5～5 mm。表面淡黄棕色或黄棕色，较粗糙，有明显的纵棱及不甚明显的波状弯曲纵脊线各 10 条，两者相间排列，顶端残存短小花柱基及萼齿 5 片，基部有时连接小果柄。分果半球形，接合面略凹陷。气香，味微苦，辛。

【品质】 本品以籽粒饱满、无杂质者为佳。

【性味功效】 辛，温。发表透疹，健胃。用于麻疹初期不易透发，食滞胃痛，痞闷，痔疮，齿痛。



【编号】 M04317213109H0XZDC H11457214029000100GYCM

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

花椒

【来源】 芸香科植物花椒 Zanthoxylum bungeanum Maxim. 的干燥成熟果皮。

【主产地】 主产于四川、山西、河北等地。以四川汉源为道地产区。

【性状特征】 果实为多年生蓇葖果，直径4～5 mm。外表面紫红色或棕红色，散有多数疣状突起的油点，直径0.5～1 mm，对光观察半透明；内表面淡黄色。香气浓，味麻辣而持久。

【品质】 本品以色红、无梗、皮细、颗粒均匀整齐者为佳。

【性味功效】 辛，温。温中止痛，杀虫止痒。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛，蛔虫症；外治湿疹瘙痒。



【编号】 M04337194122S0CMMI H41567195029000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

芸苔子

【来源】 十字花科植物油菜 Brassica campestris L. 的种子。

【主产地】 全国各地均产。以长江流域地区产量最大。

【性状特征】 种子近球状，直径1.5～2 mm。表面红褐色或黑褐色，放大镜下观察具网状纹理，一端具黑色圆点种脐。破开种皮内有子叶2片，肥厚，乳黄色，富油质，沿中脉相对摺，胚根位于两纵摺的子叶之间。气微，味淡。

【品质】 本品以籽粒饱满、色泽光亮者为佳。

【性味功效】 辛、甘，平。活血化瘀，消肿散结，润肠通便。主治产后恶露不尽，瘀血腹痛，痛经，肠风下血，血痢，风湿关节肿痛，痈肿丹毒，乳痈，便秘，粘连性肠梗阻。



【编号】 M04377039009S0CMMI H06827039011000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

苍耳子

【来源】 菊科植物苍耳 Xanthium sibiricum Patr. 的干燥成熟带总苞的果实。

【主产地】 产于全国各地。

【性状特征】 果实呈纺锤状或卵圆状，长1～1.5 cm，直径4～7 mm。表面黄棕色或黄绿色，全体有钩刺，顶有2枚较粗的刺，分离或相近，基部有果梗痕。质硬而韧，横切面中央有纵隔膜，2室，各有1枚瘦果。瘦果略呈纺锤状，一面较平坦，顶端具1突起的花柱基，果皮薄，灰黑色，具纵纹。种皮膜质，浅灰色，子叶2，有油性。气微，味微苦。

【品质】 本品以粒大、饱满、色黄棕者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温；有毒。散风除湿，通鼻窍。用于风寒头痛，鼻渊流涕，风疹瘙痒，湿痹拘挛。



【编号】 M04387238720S0CMMI H41467239224000300SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

补骨脂


【来源】 豆科植物补骨脂 Psoralea corylifolia L. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于四川、河南、山西、安徽等地。

【性状特征】 果实呈肾状，略扁，中央凹陷，长 3～5 mm，宽 2～4 mm，厚约 1.5 mm。表面黑色、黑褐色或灰褐色，具细微网状皱纹。顶端圆钝，有一小突起，凹侧有果梗痕。质硬。果皮薄，与种子不易分离；种子 1 枚，子叶 2，黄白色，有油性。气香，味辛、微苦。

【品质】 本品以粒大、饱满、坚实、色黑褐者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。补肾助阳，纳气，止泻。用于阳萎遗精，遗尿尿频，腰膝冷痛，肾虚作喘，五更泄泻；外用治白癜风，斑秃。



【编号】 M04437148537S0CMMI H31767148121000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

诃子

【来源】 使君子科植物诃子 Terminalia chebula Retz. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于云南、广东、广西等地。以云南临沧、德宏为道地产区。

【性状特征】 果实呈长圆状或卵圆状，长2～4 cm，直径2～2.5 cm。表面黄棕色或暗棕色，略具光泽，有 5～6 条纵棱线及不规则的皱纹，基部有圆形果梗痕。质坚实。果肉厚 2～4 mm，黄棕色或黄褐色。果核长 1.5～2.5 cm，直径 1～1.5 cm，浅黄色，粗糙，坚硬。种子狭长，纺锤状，长约 1 cm，直径 2～4 mm，种皮黄棕色，子叶 2，白色，相互重叠卷旋。无臭，味酸涩后甜。

【品质】 本品以肉厚、质坚实、表面色黄棕者为佳。

【性味功效】 苦、酸、涩，平。涩肠敛肺，降火利咽。用于久泻久痢，便血脱肛，肺虚喘咳，久嗽不止，咽痛音哑。



【编号】 M04487121012S0CMMI H38547121006000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

谷芽


【来源】 禾本科植物粟 Setaria italica (L.) Beauv. 的成熟颖果经发芽干燥而得。

【主产地】 主产于我国黄河中上游地区。

【性状特征】 果实呈细小球状，直径约 1 mm。表面淡黄色，为壳状的外稃与内稃包围，多数已裂出，露出初生的细须根，长约 3～6 mm。去外壳后可见淡黄色的果实，光滑，基部有黄褐色的胚。质坚，断面粉质。无臭，味微甘。

【品质】 本品以粒饱满、均匀、有芽、色黄者为佳。

【性味功效】 甘，温。消食和中，健脾开胃。用于食积不消，腹胀口臭，脾胃虚弱，不饥食少。



【编号】 M04497332170S0CMMI H36237332209000900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

豆豉姜


【来源】 樟科植物山鸡椒 Litsea cubeba (Lour.) Pers. 的果实。

【主产地】 主产于广西、浙江、四川等地。以广西产品质量最佳。

【性状特征】 果实呈类球状，直径4～6 mm；表面红黑色或黑色，果皮皱缩成不规则网状隆起皱纹，基部常有果柄疤痕，有时连有细果柄，直径约1 mm，成分叉状或伞状；顶端稍膨大，为盘状的宿萼；果皮富油质，胚根极小，位于一端。具特异强烈窜透性的香气，味辛、凉。

【品质】 本品以个大饱满、气味浓厚、有油质者为佳。

【性味功效】 辛、微苦，温。温中止痛，行气活血，平喘，利尿。用于脘腹冷痛，食积气胀，反胃呕吐，中暑止痛，泄泻痢疾，寒疝腹痛，哮喘，寒温水膨，小便不利，小便浑浊，疮疡肿毒，牙痛，寒湿痹痛，跌扑损伤。



【编号】 M045170110650S0SM H239370110140011000GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

豆蔻


【来源】 姜科植物白豆蔻 Amomum kravanh Pierre ex Gagnep. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于泰国。我国云南、海南有少量引种。

【性状特征】 果实呈类球状，直径1.2～1.8 cm。表面黄白色至淡黄棕色，有3条较深的纵向槽纹，顶端有突起的柱基，基部有凹下的果柄痕，两端均具有浅棕色绒毛。果皮体轻，质脆，易纵向裂开，内分3室，每室含种子均10粒；种子呈不规则多面体，背面略突起，直径3～4 mm，表面暗棕色，有皱纹，并被有残留的假种皮。气芳香，味辛凉。

【品质】 本品以粒大、完整、饱满、果皮薄而色洁白、气味浓者为佳。

【性味功效】 辛，温。化湿消痞，行气温中，开胃消食。用于湿浊中阻，不思饮食，湿温初起，胸闷不饥，寒湿呕逆，胸腹胀痛，食积不消。



【编号】 M02577290044S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

赤豆


【来源】 豆科植物赤豆 Phaseolus angularis Wight 的干燥成熟种子。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 种子呈短圆柱状，两端稍平截或钝圆，长5～7 mm，直径4～6 mm。表面暗棕红色，有光泽。一侧有线形不突起的种脐，偏向一端，白色，约为全长2/3，中间凹陷成纵沟；另侧有1条不明显棱脊。质硬，不易破碎。子叶2，乳白色。无臭，味微甘。

【品质】 本品以身干、粒饱满、色紫红发暗者为佳。

【性味功效】 甘、酸，平。利水消肿，解毒排脓。用于水肿胀满，脚气肢肿，黄疸尿赤，风湿热闭，痈肿疮毒，肠痈腹痛。



【编号】 M04537148510S0CMMI H28927148110000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

连翘

【来源】 木犀科植物连翘 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 的干燥果实。

【主产地】 主产于山西、河南、陕西、山东等地。以晋南、豫西为道地产区。

【性状特征】 果实呈长卵状至卵状，稍扁，长 1.5～2.5 cm，直径 0.5～1.3 cm。表面有不规则的纵皱纹及多数凸起的小斑点，两面各有 2 条明显的纵沟。顶端锐尖，基部有小果梗或已脱落。青翘多不开裂，表面绿褐色，凸起的灰白色小斑点较少；质硬；种子多数，黄绿色，细长，一侧有翅。老翘自顶端开裂或裂成两瓣，表面黄棕色或红棕色，内表面多为浅黄棕色，平滑，具一纵隔；质脆；种子棕色，多已脱落。气微香，味苦。

【品质】 老翘以身干、色黄、壳厚、枝柄剔净、果瓣开裂者为佳；青翘以身干、色灰绿、完整不裂口、无杂质者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。清热解毒，消肿散结。用于痈疽，瘰疬，乳痈，丹毒，风热感冒，温病初起，温热入营，高热烦渴，神昏发斑，热淋尿闭。



【编号】 M046272290003S0CMMI H17827230003000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

陈皮


【来源】 芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮。

【主产地】 主产于广东、四川、浙江、福建、江西、湖南等地，以广东新会、四会等地所产“广陈皮”为道地。

【性状特征】 果实常剥成数瓣，基部相连，有的呈不规则片状，厚 1～4 mm。外表面橙红色或红棕色，有细皱纹及凹下的点状油室；内表面浅黄白色，粗糙，富黄白色或黄棕色筋络状维管束。质稍硬而脆。气香，味辛，苦。

【品质】 本品以片大、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温。理气健脾，燥湿化痰。用于胸脘胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。



【编号】 M046671940345S1CMMI H101071950060006005M

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

麦芽

【来源】 禾本科植物大麦 Hordeum vulgare L. 的成熟果实经发芽干燥而得。

【主产地】 全国产麦区均产。

【性状特征】 果实呈梭状，长 8～12 mm，直径 3～4 mm。表面淡黄色，背面为外稃包围，具 5 脉；腹面为内稃包围。除去内外稃后，腹面有 1 条纵沟；基部胚根处生出幼芽及须根，幼芽长披针状条形，长约 5 mm。须根数条，纤细而弯曲。质硬，断面白色，粉性。无臭，味微甘。

【品质】 本品以质充实、色淡黄、有胚芽者为佳。

【性味功效】 甘，平。行气消食，健脾开胃，退乳消胀。用于食积不消，脘腹胀痛，脾虚食少，乳汁郁积，乳房胀痛，妇女断乳。



【编号】 M047373320833S0CMMI H203473321170011005CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

使君子

【来源】 使君子科植物使君子 Quisqualis indica L. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于四川、广东、广西、福建等地。以四川合川产量最大。

【性状特征】 果实呈椭圆状或卵圆状，具5条纵棱，偶有4～9棱，长 2.5～4 cm，直径约 2 cm。表面黑褐色至紫黑色，平滑，微具光泽。顶端狭尖，基部钝圆，有明显的果梗痕。质坚硬，横切面多呈五角星形，棱角处壳较厚，中间呈类圆形空腔。种子长椭圆状或纺锤状，长约 2 cm，直径约 1 cm；表面棕褐色或黑褐色，有多数纵皱纹；种皮薄，易剥离；子叶2，黄白色，有油性，断面有纵裂纹。气微香，味微甜。

【品质】 本品以个大、饱满、表面色紫黑、具光泽、仁饱满者为佳。

【性味功效】 甘，温。杀虫消积。用于蛔虫病，蛲虫病，虫积腹痛，小儿疳积。



【编号】 M04807121006S0CMMI H32407121005000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

刺蒺藜


【来源】 蒺藜科植物蒺藜 Tribulus terrestris L. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于河南、河北、山东、安徽、江苏、四川、陕西、山西等地。

【性状特征】 果实为复果，多由5个分果瓣组成，放射状排列成五角棱形球状，直径0.7～2 cm。商品常裂为单一的分果瓣，斧形三角状。长3～10 mm，淡黄绿色，背部隆起，有纵棱及多数小刺，并有对称的长刺和短刺各一对，成八字形分开，两侧面粗糙，有网纹，灰白色；果皮坚实，木质，内含种子3～4粒。种子卵圆状，稍扁，淡黄绿色，有油性。气微，味苦。

【品质】 本品以果粒均匀、饱满坚实、色灰白者为佳。

【性味功效】 辛、苦，平；有小毒。平肝，解郁，祛风明目。用于头痛，眩晕，胸胁胀痛，乳房胀满，乳闭不通，经闭，癥瘕，目赤翳障，风疹瘙痒，白癜风，疮疽，瘰疬。



【编号】 M04907066010S0CMMI H39417066004000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

单叶蔓荆子

【来源】 马鞭草科植物单叶蔓荆 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于山东、江西、浙江、福建等地。

【性状特征】 果实呈球状，直径 4～6 mm。表面灰黑色或黑褐色，被灰白色粉霜状茸毛，有纵向浅沟4条，顶端微凹，基部有灰白色宿萼及短果梗。萼长为果实的 1/3～2/3，5齿裂，其中2裂较深，密被茸毛。体轻，质坚韧，不易破碎。横切面可见4室，每室有种子一枚。气特异而芳香，味淡、微辛。

【品质】 本品以粒大、饱满、气香者为佳。

【性味功效】 辛、苦，微寒。疏散风热，清利头目。用于风热感冒头痛，齿龈肿痛，目赤多泪，目暗不明，头晕目眩。

【附注】 本品作为“蔓荆子”入药。



【编号】 H41207264021001203CMMI H41207264021001203CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

欧李仁

【来源】 蔷薇科植物欧李 Prunus humilis Bge. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于东北及内蒙古、河北、山东等地。

【性状特征】 种子呈卵状至长卵状，少数圆形球状，长6～7 mm，直径3～4 mm。表面黄棕色，一端尖，另端钝圆。尖端一侧有线形种脐，圆端中央有深棕色合点，直径0.7 mm。自合点处向上具多条纵向维管束脉纹。种皮薄，子叶2，乳白色，富油性。气微，味微苦。

【品质】 本品以粒饱满、完整、色黄白者为佳。

【性味功效】 辛、苦、甘，平。润燥滑肠，下气，利水。用于津枯肠燥，食积气滞，腹胀便秘，水肿，脚气，小便不利。

【附注】 本品作为“郁李仁”入药。



【编号】 M056271430375S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

波棱瓜子

【来源】 葫芦科植物波棱瓜 Herpetospermum caudigerum Wall. 的种子。

【主产地】 主产于西藏、云南等地。

【性状特征】 种子略呈扁长方体，长1～1.5 cm，宽4～7 mm，厚2～3 mm。表面棕褐色至黑褐色，具凹凸不平的雕纹呈类人字形，类圆形，不规则形沟纹及点状突起；一端有三角形突起，另端渐薄，略呈楔形，而在中央微凹（种脐）；两侧稍平截，其边缘微突起呈微波状弯曲，中间有1条纵棱。种皮革质，种仁外被暗绿色薄膜，内有子叶2片，乳白色，富油性。气微，味苦，有恶心感。

【性味功效】 苦，寒。清肝利胆，健脾助运。用于黄疸型传染性肝炎，胆囊炎，消化不良。

【附注】 藏医习用药。



【编号】 M051771030475S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

罗汉果

【来源】 葫芦科植物罗汉果 Momordica grosvenori Swingle 的干燥果实。

【主产地】 主产于广西。

【性状特征】 果实呈卵状、椭球状或球状，长4.5～8.5 cm，直径3.5～6 cm。表面褐色、黄褐色或绿褐色，有深色斑块及黄色柔毛，有的有6～11条纵纹。顶端有花柱残痕，基部有果梗痕。体轻，质脆，果皮薄，易破。果瓤（中、内果皮）海绵状，浅棕色。种子扁圆状，多数，长约1.5 cm，宽约1.2 cm；浅红色至棕红色，两面中间微凹陷，四周有放射状沟纹，边缘有槽。气微，微甜。

【品质】 本品以个大、完整、色黄褐、摇之不响者为佳。

【性味功效】 甘，凉。清热润肺，滑肠通便。用于肺火燥咳，咽痛失音，肠燥便秘。



【编号】 M053371030645CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苘麻子

【来源】 锦葵科植物苘麻 Abutilon theophrasti Medic. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于四川、河南、江苏、湖北等地。

【性状特征】 种子呈三角形肾状，长 3.5～6 mm，宽2.5～4.5 mm，厚 1～2 mm。表面灰黑色或暗褐色，有白色稀疏绒毛，凹陷处有类椭圆状种脐，浅棕色，四周有放射状细纹。种皮坚硬，子叶 2，重叠折曲，富油性。气微，味淡。

【品质】 本品以籽粒饱满、色灰褐者为佳。

【性味功效】 苦，平。清热利湿，解毒，退翳。用于赤白痢疾，淋病涩痛，痈肿，目翳。



【编号】 M05387132014S0CMMI H00167132002000900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

苦楝子


【来源】 楝科植物楝 Melia azedarach L. 的果实。

【主产地】 主产于山西、甘肃、山东、江苏、浙江、湖南、广东、广西、云南、湖北、贵州等地。

【性状特征】 果实为核果，呈长圆状至近圆状，长1.2～2 cm，直径 1.2～1.5 cm。外表面棕黄色至灰棕色，微有光泽，干皱。先端偶见花柱残痕，基部有果梗痕。果肉较松软，淡黄色，遇水浸湿显黏性。果核卵圆状，坚硬，具4～5棱，内分4～5室，每室含种子 1 枚。气特异，味酸、苦。

【品质】 本品以个大、饱满、果肉色黄白者为佳。

【性味功效】 苦，寒；小毒。行气止痛，杀虫。用于脘腹肋胁疼痛，疝痛，虫积腹痛，头癣，冻疮。



【编号】 M05497197012S0CMMI H25827198010000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

郁李仁

【来源】 蔷薇科植物郁李 Prunus japonica Thunb. 的干燥成熟种子，习称“小李仁”。

【主产地】 主产于河南、山东等地。

【性状特征】 种子呈长卵形，长5～8 mm，直径3～5 mm。表面红棕色，平滑，顶端略尖，基部钝圆，尖端一侧有线形种脐，圆端中央有深棕色合点，直径约1 mm。自合点处向上具多条纵向维管束脉纹。种皮薄，子叶2，乳白色，富油性。气微，味微苦。

【品质】 本品以粒饱满、完整、色黄白者为佳。

【性味功效】 辛、苦、甘，平。润燥滑肠，下气，利水。用于津枯肠燥，食积气滞，腹胀便秘，水肿，脚气，小便不利。



【编号】 M05637143038S0CMMI H31617143037001000SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金樱子


【来源】 蔷薇科植物金樱子 Rosa laevigata Michx. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西等地。

【性状特征】 果实为花托发育而成的假果，呈倒卵状，长2～3.5 cm，直径1～2 cm。表面红黄色或红棕色，微有光泽，有凸起的棕色小点，系毛刺脱落后的残基。顶端有盘状花萼残基，中央有黄色柱基，下部渐尖。质硬。切开后，花托壁厚1～2 mm，内有多数坚硬的小瘦果，内壁及瘦果均有淡黄色绒毛。无臭，味甘、微涩。

【品质】 本品以果大、色红黄、去净毛刺者为佳。

【性味功效】 酸、甘、涩，平。固精缩尿，涩肠止泻。用于遗精滑精，遗尿尿频，崩漏带下，久泻久痢。



【编号】 M05827143251S0CMMI H33527143043004000SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

青皮


【来源】 芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 及其栽培变种的干燥幼果或未成熟果实的果皮。

【主产地】 主产于广东、四川、福建、浙江、广西等地。

【性状特征】 个青皮呈类球状，直径0.5～2 cm。表面灰绿色或黑绿色，微粗糙，有细密凹陷的油室，顶端有稍突起的柱基，基部有圆形果梗痕。质硬，断面果皮黄白色或淡黄棕色，厚1～2 mm。外缘有油室1～2列。瓤囊8～10瓣，淡棕色。饮片为类圆形薄片或不规则丝状，外表面灰绿色或墨丝色，内表面黄白色。气清香，味酸、苦、辛。

【品质】 本品以个均、皮色青黑、果皮厚、坚实、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温。疏肝破气，消积化滞。用于胸胁胀痛，疝气，乳核，乳痈，食积腹痛。



【编号】 M05897194034S0SM H10107195006000600SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

青果

【来源】 橄榄科植物橄榄 Canarium album Raeusch. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于广东、广西、福建、四川等地。

【性状特征】 果实呈纺锤状，两端钝尖，长2.5～4 cm，直径1～1.5 cm。表面棕黄色或黑褐色，有不规则皱纹。果肉灰棕色或棕褐色，质硬。果核梭状，暗红棕色，具纵棱；内分3室，各有种子1粒。无臭，果肉味涩，久嚼微甜。

【品质】 本品以个大、坚实、色灰绿、肉厚、味先涩后甜者为佳。

【性味功效】 甘、酸，平。清热，利咽，生津，解毒。用于咽喉肿痛，咳嗽，烦渴，鱼蟹中毒。



【编号】 M05917196005S0CMMI H07907197001000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

青椒

【来源】 芸香科植物青椒 Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果皮。

【主产地】 主产于东北及江苏、广东等地。

【性状特征】 果实多为2～3个上部离生的蓇葖果。集生于小果梗上，蓇葖果球形，沿腹缝线开裂，直径3～4 mm。外表面灰绿色或暗绿色，散有多数油点及细密的网状隆起皱纹；内表面类白色，光滑。内果皮常由基部与外果皮分离。残存种子呈卵状，长3～4 mm，直径2～3 mm，表面黑色，有光泽。气香，味微甜而辛。

【品质】 本品以色青绿、皮厚、香气浓、无细梗者为佳。

【性味功效】 辛，温。温中止痛，杀虫止痒。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛，蛔虫症；外治湿疹瘙痒。

【附注】 本品作为“花椒”入药。



【编号】 M04347194142S0CMMI H41687195029001100SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

青箱子


【来源】 苋科植物青葙 Celosia argentea L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 种子呈扁圆肾状，直径1～1.5 mm。表面黑色或红黑色，光亮，中间微隆起，侧边微凹陷处有种脐。种皮薄而脆。无臭，无味。

【品质】 本品以颗粒饱满、色黑、光亮者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。清肝，明目，退翳。用于肝热目赤，眼生翳膜，视物昏花，肝火眩晕。



【编号】 M05937063023S0CMMI H08757063006000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

南山楂

【来源】 蔷薇科植物野山楂 Crataegus cuneata Sieb. et Zucc. 的果实。

【主产地】 主产于浙江、江苏、云南、四川等地。

【性状特征】 果实球状，直径0.8～1.4 cm，表面棕色或红棕色，有灰白色小点，顶端有圆形凹窝状宿存花萼，基部有短果柄或果柄痕。果皮常皱缩。果肉薄，深黄色至浅棕色。具5粒浅黄色果核。质坚硬。气微，味酸、涩，微甜。

【品质】 本品以个大、皮红、果肉厚、核小者为佳。

【性味功效】 酸、甘，微温。消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞，胃脘胀痛，泻痢腹痛，瘀血闭经，产后瘀阻，心腹刺痛，疝气疼痛；高脂血症。



【编号】 M06077143079S0CMMI H11967143014000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

南五味子

【来源】 木兰科植物华中五味子 Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于河南、陕西、甘肃等地。

【性状特征】 果实呈球状或扁球状，直径4～6 mm。表面棕红色至暗棕色，干瘪，皱缩，果肉常紧贴种子上。种子1～2，肾状，表面棕黄色，有光泽，种皮薄而脆。果肉气微，味微酸。

【品质】 本品以色红、粒大、肉厚、有油性及光泽者为佳。

【性味功效】 酸、甘，温。收敛固涩，益气生津，补肾宁心。用于久咳虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗，盗汗，津伤口渴，短气脉虚，内热消渴，心悸失眠。



【编号】 M06087001097S0CMMI H35417001011000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

南瓜子

【来源】 葫芦科植物南瓜 Cucurbita moschata (Duch.) Poiret 的干燥种子。


【主产地】 全国大部分地区均有出产。

【性状特征】 干燥成熟的种子，呈扁椭圆状。一端略尖，外表黄白色，边缘稍有棱，长约 1.2～2 cm，宽 0.7～1.2 cm，表面带有毛茸，边缘较多。种皮较厚，种脐位于尖的一端；除去种皮，可见绿色菲薄的胚乳。气香，味微甘。

【品质】 本品以干燥、籽饱满、外壳色黄者为佳。

【性味功效】 和性药。补气，润肠，杀虫。用于虫积腹痛，消渴病等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M06107103011S0GYCM H12417103008000300GYCM

【鉴定人】 陈谦海

南葶苈子

【来源】 十字花科植物播娘蒿 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 的干燥成熟种子。


【主产地】 主产于江苏、安徽、山东等地。

【性状特征】 种子呈长圆状略扁，长约1mm，宽约0.5mm。表面棕色或红棕色，微有光泽，具纵沟2条，其中一条较明显。一端钝圆，另端微凹或较平截。种脐位于凹入端。味微辛、苦，略带黏性。

【品质】 本品以粒饱满、表面色红棕、有光泽、黏性较强者为佳。

【性味功效】 辛、苦，大寒。泻肺平喘，行水消肿。用于痰涎壅肺，胸胁胀满，不得平卧，胸腹水肿，小便不利，肺源性心脏病水肿。

【附注】 本品作为“葶苈子”入药。



【编号】 M09407039048S0CMMI H13897039029000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

南酸枣

【来源】 漆树科植物南酸枣 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill 的干燥成熟果实。


【主产地】 主产于广东。

【性状特征】 果实呈椭圆状或近卵状，长2～3 cm，直径1.4～2 cm。表面黑褐色或棕褐色，稍有光泽，具不规则的皱褶，基部有果梗痕。果肉薄，棕褐色，易剥离，质硬而脆。核近卵形，黄棕色，顶端有5（偶有4或6）个明显的小孔，每孔内各含种子1枚。种子坚硬，狭长圆形，棕色或红棕色；种皮光滑，膜质；种仁黄白色，富油性。气微，无臭，味酸。

【品质】 本品以个大、肉厚、色黑褐者为佳。

【性味功效】 甘、酸，平。行气活血，养心，安神。用于气滞血瘀，胸痹作痛，心悸气短，心神不安。

【附注】 蒙古族习用药材。



【编号】 M00967205003S0SM H09477206003000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

南鹤虱

【来源】 伞形科植物野胡萝卜 Daucus carota L.的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于江苏、浙江、安徽、湖北等地。

【性状特征】 果实为双悬果，呈椭圆状，多裂为分果，分果长3～4 mm，宽1.5～2.5 mm。表面淡绿棕色或棕黄色，顶端有花柱残基，基部钝圆。背面隆起，具4条窄翅状次棱，翅上密生1列黄白色钩刺，刺长约1.5 mm，次棱间的凹下处有不明显的主棱，其上散生短柔毛，接合面平坦，有3条脉纹，上具柔毛。种仁类白色，有油性。体轻。搓碎时有特异香气，味微辛、苦。

【品质】 本品以籽粒充实、种仁色类白、有油性者为佳。

【性味功效】 苦、辛，平；有小毒。杀虫消积。用于蛔虫病，蛲虫病，绦虫病，虫积腹痛，小儿疳积。



【编号】 M06137213113S0CMMI H13517214037000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

急性子


【来源】 凤仙花科植物凤仙花 Impatiens balsamina L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于江苏、浙江、河北、安徽等地。

【性状特征】 种子呈椭圆状、扁圆状或卵圆状，长2～3 mm，宽1.5～2.5 mm。表面棕褐色或灰褐色，粗糙，有稀疏的白色或浅黄棕色小点，种脐位于狭端，稍突出。质坚实，种皮薄，子叶灰白色，半透明，油质。无臭，味淡、微苦。

【品质】 本品以颗粒饱满者为佳。

【性味功效】 微苦、辛，温；有小毒。破血软坚，消积。用于癥瘕痞块，经闭，噎膈。



【编号】 M06257071003S0CMMI H21037071002000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枳壳


【来源】 芸香科植物代代花 Citrus aurantium“Daidai”的近成熟果实。

【主产地】 主产于江苏苏州及浙江金华等地。

【性状特征】 果实球形，直径3～5.5 cm。外皮绿褐色或棕褐色，略粗糙。顶端微凹，基部有时带有残存宿萼及果柄残基。横剖面果皮厚0.4～1cm，黄白色，较光滑，略向外翻，有维管束散布，边缘有棕黄色油点1～2列，瓤囊9～13瓣，中轴宽0.5～1cm。汁囊干缩呈棕色至棕褐色，内藏种子。质坚硬，不易折断。气清香，味苦、微酸。

【品质】 本品以个大、外皮色青绿、肉厚、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛、酸，温。理气宽中，行滞消胀。用于胸胁气滞，胀满疼痛，食积不化，痰饮内停；胃下垂，脱肛，子宫脱垂。



【编号】 M06307194011S0CMMI H10057195006000101CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

枳实


【来源】 芸香科植物甜橙 Citrus sinensis Osbeck 的干燥幼果。

【主产地】 主产于四川、江西、湖南等地。

【性状特征】 果实呈圆球或半球状，直径1～2.5 cm。外果皮棕绿色或棕色，较细致，散有众多小油点（油室），基部具圆盘状果柄痕或点状突起的花柱基痕。横切面中果皮略隆起，淡棕色，较薄，约占1/3，厚2～4 mm，边缘有1～2列油室，瓤囊9～11瓣，灰棕色。质坚硬。气清香，味苦、微酸。

【品质】 本品以皮色青黑、肉厚、瓤小、质坚实、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛、酸，温。破气消积，化痰散痞。用于积滞内停，痞满胀痛，泻痢后重，大便不通，痰滞气阻胸痹，结胸；胃下垂，脱肛，子宫脱垂。



【编号】 M06327194052S0CMMI H10127195006000700SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

枳椇子

【来源】 鼠李科植物枳椇 Hovenia dulcis Thunb. 的带有肉质果柄的果实或种子。

【主产地】 主产于陕西、湖北、浙江、江苏、安徽、福建等地。

【性状特征】 种子扁圆状，背面稍隆起，腹面较平坦，直径3～5 cm，厚1～2 cm。表面红棕色、棕黑色或绿棕色，有光泽，于放大镜下可见散在的凹点；基部凹陷处有点状淡色种脐，顶端有微凸的合点，沿腹面有线形隆起的种脊。种皮坚硬，除去后可见乳白色胚乳及淡黄绿色子叶，均富油质。味微涩。

【品质】 本品以粒大、饱满肥厚、色棕红者为佳。

【性味功效】 甘，平。解酒毒，止吐，利尿。用于热病烦渴，呕吐，小便不利，醉酒不醒。



【编号】 M06337190017S0CMMI H20397191004000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枸橼

【来源】 芸香科植物枸橼 Citrus medica L.的干燥成熟果实。


【主产地】 主产于云南、四川、广西等地。

【性状特征】 果实圆状，切片为长圆形片，直径4～10 cm，厚2～5 mm。横切片外果皮黄色或黄绿色，边缘呈波状，散有凹入的油点；中果皮厚1～3 cm，黄白色，有不规则的网状突起的维管束；瓤囊10～17室。纵切片中心柱较粗壮。质柔韧。气清香，味微甜而苦辛。

【品质】 本品以片色黄白、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦、酸，温。舒肝理气，宽中，化痰。用于肝胃气滞，胸胁胀痛，脘腹痞满，呕吐噫气，痰多咳嗽。

【附注】 本品作为“香橼”入药。



【编号】 M07067194029S0CMMI H10087195006000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

柏子仁

【来源】 柏科植物侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco 的干燥成熟种仁。

【主产地】 主产于山东、辽宁、河南、河北等地。

【性状特征】 种仁呈长卵状或长椭圆状，长4～7 mm，直径1.5～3 mm。表面黄白色或淡黄棕色，外包膜质内种皮，顶端略尖，有深褐色小点，基部钝圆。质软，富油性。气微香，味淡。

【品质】 本品以粒充实、色微黄、油性大而不泛油者为佳。

【性味功效】 甘，平。养心安神，止汗，润肠。用于虚烦失眠，心悸怔忡，阴虚盗汗，肠燥便秘。



【编号】 M06356006017S0CMMI H29936006006000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

柿蒂

【来源】 柿树科植物柿 Diospyros kaki Thunb.的干燥宿萼。

【主产地】 主产于河南、山东等地。

【性状特征】 宿萼呈扁圆状，直径1.5～2.5 cm。中央较厚，微隆起，有果实脱落后的圆形疤痕，边缘较薄，4裂，裂片多反卷，易碎；基部有果梗或圆孔状的果梗痕。外表面黄褐色或红棕色，内表面黄棕色，密被细绒毛。质硬而脆。无臭，味涩。

【品质】 本品以个大、质坚实、色红黄者为佳。

【性味功效】 苦、涩，平。降逆下气。用于呃逆。



【编号】 M06397221008S0CMMI H14627222001002300GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

栀子

【来源】 茜草科植物栀子 Gardenia jasminoides Ellis 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于湖南、湖北、江西、浙江、福建、四川等地。

【性状特征】 果实呈长椭圆状或椭圆状，长 1.5～3.5 cm，直径 1～1.5 cm。表面红黄色或棕红色，具 6 条翅状纵棱，棱间常有 1 条明显的纵脉纹。顶端残存萼片，基部稍尖，有残留果梗。果皮薄而脆，略有光泽；内表面色较浅，有光泽，具 2～3 条隆起的假隔膜。种子多数，扁卵圆状，集结成团，深红色或红黄色，表面密具细小疣状突起。气微，味微酸而苦。

【品质】 本品以皮薄、饱满、色红黄者为佳。

【性味功效】 苦，寒。泻火除烦，凉血解毒。用于热病心烦，黄疸尿赤，血淋涩痛，血热吐衄，目赤肿痛，火毒疮疡；外治扭挫伤痛。



【编号】 M06407232053S0CMMI H18187233025000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

珍珠杆


【来源】 蔷薇科植物绒毛悬钩子 Rubus idaeus L. 的果实。

【主产地】 主产于吉林、河北。

【性状特征】 聚合果呈不规则半圆球状。长 0.5～1.2 cm，直径 0.6～1 cm。表面灰棕色，幼果绒毛较密，显绢样光泽，成熟后绒毛渐脱落，可见颗粒状核果，其颗粒较大，淡棕色，表面具有浅格状纹理，宿萼裂片状。

【品质】 本品以个大、饱满、粒完整者为佳。

【性味功效】 甘、酸，微温。补肝益肾，固精缩尿，明目。用于阳萎早泄，遗精滑精，宫冷不孕，带下清稀，尿频遗溺，目视昏暗，须发早白。



【编号】 M06527143316S0SM H33907143044007600SM

【鉴定人】 陈俊华

相思豆


【来源】 豆科植物相思子 Abrus precatorius L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于广东、海南、云南等地。

【性状特征】 种子为椭圆状，少数近球状，长 5～7 mm，直径 3～5 mm。表面红色。种脐凹陷，白色，椭圆形，位于腹面的一端，周围呈乌黑色，占种皮表面积的 1/4～1/3，种脊位于种脐一端，呈微凹的直线状。质坚硬，不易破碎，破开后内有浅黄色的胚根和半圆形的子叶 2 片。具青草气，味微苦涩。

【品质】 本品以粒大、饱满、坚实、红黑分明、色鲜光亮者为佳。

【性味功效】 苦，平；有小毒。清热解毒，祛痰，杀虫。用于癣疥，痈疮，湿疹，腮腺炎。



【编号】 M06537148003S0CMMI H00147148001000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

胖大海

【来源】 梧桐科植物胖大海 Sterculia lychnophora Hance 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于越南、泰国、印度尼西亚等地。

【性状特征】 种子呈纺锤状或椭圆状，长2～3 cm，直径1～1.5 cm。先端钝圆，基部略尖而歪，具浅色的圆形种脐，表面棕色或暗棕色，微有光泽，具不规则的干缩皱纹。外层种皮极薄，质脆，易脱落。中层种皮较厚，黑褐色，质松易碎，遇水膨胀呈海绵状。断面可见散在的树脂状小点。内层种皮可与中层种皮剥离，稍革质，内有2片肥厚胚乳，广卵形；子叶2枚，菲薄，紧贴于胚乳内侧，与胚乳等大。气微，味淡，嚼之有黏性。

【品质】 本品以个大、质坚、色棕、有细皱纹及光泽者为佳。

【性味功效】 甘，寒。清热润肺，利咽解毒，润肠通便。用于肺热声哑，干咳无痰，咽喉干痛，热结便闭，头痛目赤。



【编号】 M06667130028S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

胡桃仁


【来源】 胡桃科植物胡桃 Juglans regia L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于河北、山西、山东、北京等地。

【性状特征】 完整种子呈类球状，直径2～3 cm，由两片呈脑纹状的子叶构成，皱缩凹凸不平，一端有三角状突起的胚根。商品大多两瓣裂或破碎成不规则块状。表面淡棕色或黄褐色，种皮菲薄，膜状。有深棕色脉纹（维管束），子叶乳白色或黄白色，富油质。气微，味微甘；种皮味涩、微苦。

【品质】 本品以个大、饱满、色黄、断面色白者为佳。

【性味功效】 甘，温。温补肺肾，定喘化痰，润肠涩精。用于虚寒咳嗽，肾虚腰痛脚软，遗精，阳萎，大便燥结。



【编号】 M06677207008S2CMMI H21887208005000400GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

胡椒


【来源】 胡椒科植物胡椒 Piper nigrum L. 的干燥近成熟或成熟的果实。

【主产地】 主产于马来西亚、印度尼西亚、印度、泰国、越南等地。

【性状特征】 果实呈球状，直径3.5～5 mm。表面灰白色或淡黄白色，平滑，顶端有细小花柱残迹，基部有自果轴脱落的疤痕。顶端与基部间有多数浅色线状条纹。质硬。外果皮可剥离，内果皮灰白色或淡黄色，硬脆。断面黄白色，粉性，中有小空隙。气芳香，味辛辣。

【品质】 本品以个大、色白、气味强烈者为佳。

【性味功效】 辛，热。温中散寒，下气，消痰。用于胃寒呕吐，腹痛泄泻，食欲不振，癫痫痰多。



【编号】 M06727028024S0CMMI H29667028002003200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茶子心

【来源】山茶科植物油茶 Camellia oleifera Abel 的成熟种子。

【主产地】主产于四川、安徽、福建等地。

【性状特征】果实为蒴果，近球状，直径 3～5 cm，果皮厚，被细毛，木质，室背 2～3 裂。外表面棕褐色，内表面黄棕色，多数开裂，内有种子 1～3 枚，种子扁圆状，背面圆形隆起，腹面扁平，长 1～2.5 cm，一端钝圆，另一端凹陷，表面淡棕色，富含油质。气香，味苦涩。

【品质】本品以种子粒大、饱满、含油脂多者为佳。

【性味功效】苦、甘，平。行气，润肠，杀虫。用于气滞腹痛，肠燥便秘，蛔虫病，钩虫病，疥癣瘙痒。



【编号】M06797108022S0SM H077471080040012000CMMI

【鉴定人】秦松云

茺蔚子

【来源】唇形科植物益母草 Leonurus japonicus Houtt. 的干燥成熟果实。

【主产地】全国各地均产。

【性状特征】果实呈三棱状，长 2～3 mm，宽约 1.5 mm。表面灰棕色至灰褐色，有深色斑点，一端稍宽，平截状，另一端渐窄而钝尖。果皮薄，子叶类白色，富油性。无臭，味苦。

【品质】本品以粒大、饱满者为佳。

【性味功效】辛、苦，微寒。活血调经，清肝明目。用于月经不调，经闭，痛经，目赤翳障，头晕胀痛。



【编号】M06807264114S0CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

草豆蔻

【来源】姜科植物草豆蔻 Alpinia katsumadai Hayata 的干燥近成熟种子。

【主产地】主产于海南、广西等地。

【性状特征】种子呈类球状的种子团，直径 1.5～2.7 cm。表面灰褐色，中间有黄白色的隔膜，将种子团分成 3 瓣，每瓣有种子多数，粘连紧密，种子团略光滑。种子为卵圆状多面体，长 3～5 mm，直径约 3 mm，外被淡棕色膜质假种皮，种脊为一条纵沟。一端有种脐；质硬，将种子沿种脊纵剖两瓣，纵断面观呈斜心形，种皮沿种脊向内深入部分约占整个表面积的 1/2；胚乳灰白色。气香，味辛、微苦。

【品质】本品以个大、完整、饱满、质坚实、气味浓者为佳。

【性味功效】辛，温。燥湿健脾，温胃止呕。用于寒湿内阻，脘腹胀满冷痛，嗳气呕逆，不思饮食。



【编号】M06837290019S0CMMI H022572900020025000CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

草果

【来源】 姜科植物草果 Amomum tsao-ko Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于云南、广西、贵州等地。

【性状特征】 果实呈长椭圆状，具三钝棱，长 2～4 cm，直径 1～2.5 cm。表面灰棕色至红棕色，具纵沟及棱线，顶端有圆形突起的柱基，基部有果梗或果梗痕。果皮质坚硬，易纵向撕裂。剥去外皮中间有黄棕色隔膜，将种子团分成3瓣，每瓣有种子多为8～11粒。种子呈圆锥状多面体，直径约5 mm；表面红棕色，外被灰白色膜质的假种皮，种脊为一条纵沟，尖端有凹状的种脐；质硬。胚乳灰白色。有特异香气，味辛、微苦。

【品质】 本品以个大、饱满、色红棕、气味浓者为佳。

【性味功效】 辛，温。燥湿温中，除痰截疟。用于寒湿内阻，脘腹胀痛，痞满呕吐，疟疾寒热。



【编号】 M06847290054S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

荔枝核

【来源】 无患子科植物荔枝 Litchi chinensis Sonn. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于福建、广东、广西等地。

【性状特征】 种子呈长圆状或卵圆状，略扁，长1.5～2.2 cm，直径1～1.5 cm。表面棕红色或紫红色，平滑，有光泽，略有凹陷及细波纹，一端有类圆形黄棕色的种脐，直径约7 mm。质硬，子叶2，棕黄色。气微，味微甘、苦、涩。

【品质】 本品以粒大、饱满、光亮者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，温。行气散结，祛寒止痛。用于寒疝腹痛，睾丸肿痛。



【编号】 M06867198016S0CMMI H23847199016000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

荜茇


【来源】 胡椒科植物荜茇 Piper longum L. 的干燥近成熟或成熟果穗。

【主产地】 主产于海南、云南等地。国外产于印度、尼泊尔、斯里兰卡、马来西亚等地。

【性状特征】 果穗呈圆柱形，稍弯曲，由多数小浆果集合而成，长 1.5～3.5 cm，直径 3～5 mm。表面黑褐色或棕色，有斜向排列整齐的小突起，基部有果穗梗残存或脱落。质硬而脆，易折断，断面不整齐，颗粒状。小浆果球形，直径约 1 mm。有特异香气，味辛辣。

【品质】 本品以条肥大、饱满、质坚、气味浓者为佳。

【性味功效】 辛，热。温中散寒，下气止痛。用于脘腹冷痛，呕吐，泄泻，偏头痛；外治牙痛。



【编号】 M06877028020S0CMMI H29657028002002500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

荜澄茄


【来源】 樟科植物山鸡椒 Litsea cubeba (Lour.) Pers. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于广西、浙江、四川等地。以广西产质量最佳。

【性状特征】 果实呈类球状，直径4～6 mm。表面棕褐色至黑褐色，有网状皱纹。基部偶有宿萼及细果梗。除去外皮可见硬脆的果核，种子1，子叶2，黄棕色，富油性。气芳香，味辣而微苦。

【品质】 本品以个大饱满、气味浓厚、有油质者为佳。

【性味功效】 辛，温。温中散寒，行气止痛。用于胃寒呕逆，脘腹冷痛，寒疝胀痛，寒湿郁滞，小便浑浊。



【编号】 M06887011065S0CMMI H23937011014001100GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

韭菜子


【来源】 百合科植物韭菜 Allium tuberosum Rottl. 的干燥成熟种子。

【主产地】 全国各地均产。以河北、山西、吉林、河南、山东、安徽等地产量最大。

【性状特征】 种子呈平圆状，略扁，长2～4 mm，宽1.5～3 mm。表面黑色，一面凸起，粗糙，有细密的网状皱纹，另一端微凹，皱纹不甚明显。顶端钝，基部稍尖，有点状突起的种脐。质硬。气特异，味微辛。

【品质】 本品以粒饱满、色黑、无杂质者为佳。

【性味功效】 辛、甘，温。温补肝肾，壮阳固精。用于阳萎遗精，腰膝酸痛，遗尿尿频，白浊带下。



【编号】 M07007293033S0CMMI H02097293002009000GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

香圆

【来源】 芸香科植物香圆 Citrus wilsonii Tanaka 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于浙江、江苏等地。

【性状特征】 果实类球形、半球形，切片为圆片，直径4～7 cm。表面黑绿色或黄棕色，密被凹陷的小油点及网状隆起的粗皱纹，顶端有花柱残痕及隆起的环圈，基部有果梗残基。质坚硬。剖面或横切薄片边缘油点明显；中果皮厚约5 mm；瓤囊9～11室，棕色或淡红棕色，间或有黄白色种子。气香，味酸而苦。

【品质】 本品以个大、皮厚、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦、酸，温。舒肝理气，宽中，化痰。用于肝胃气滞，胸胁胀痛，脘腹痞满，呕吐噫气，痰多咳嗽。

【附注】 本品作为“香橼”入药。



【编号】 M07077194053S0CMMI H10137195006000800SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鸦胆子

【来源】 苦木科植物鸦胆子 Brucea javanica (L.) Merr. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于广东、广西等地。

【性状特征】 果实呈卵状，长 6～10 mm，直径 4～7 mm。表面黑色或棕色，有隆起的网状皱纹，网眼呈不规则的多角形，两侧有明显的棱线，顶端渐尖，基部有凹陷的果梗痕。果壳质硬而脆，种子卵状，长 5～6 mm，直径 3～5 mm，表面类白色或黄白色。具网纹；种皮薄，子叶乳白色，富油性。无臭，味极苦。

【品质】 本品以质坚、仁白、油性足者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有小毒。清热解毒，截疟，止痢，腐蚀赘疣。用于痢疾，疟疾；外治赘疣，鸡眼。



【编号】 M07107195066S0CMMI H07017196002000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

圆叶牵牛子

【来源】 旋花科植物圆叶牵牛 Pharbitis purpurea (L.) Voigt. 的干燥成熟种子。


【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 种子似橘瓣状，长 4～8 mm，宽 3～5 mm。表面灰黑色或淡黄白色，背面有 1 条浅纵沟，腹面棱线的下端有一点状种脐，微凹。质硬，横切面可见淡黄色或黄绿色皱缩折叠的子叶，微显油性。无臭，味辛、苦，有麻感。

【品质】 本品以粒饱满者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有毒。泻水通便，消痰涤饮，杀虫攻积。用于水肿胀满，二便不通，痰饮积聚，气逆喘咳，虫积腹痛，蛔虫病，绦虫病。

【附注】 本品作为“牵牛子”入药。



【编号】 M06437251058S0SM H28917252019000300CMMI

【鉴定人】 陈善墉

娑罗子

【来源】 七叶树科植物七叶树 Aesculus chinensis Bge. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于陕西、河南等地。

【性状特征】 果实近球状或倒卵状，直径 3～4.5 cm，顶端微具突尖，基部广楔形，存在白色或黄棕色的果柄痕迹，表面灰黄色，粗糙，密布黄棕色斑点，有纵向沟纹 3 条，自顶端延至果柄处，形成三瓣状，果壳干后厚 4～5 mm。种子 1 颗，呈扁球状或类球状，似板栗，直径 1.5～4 cm。表面黄棕色或棕褐色，多抽皱，凹凸不平，略具光泽；种脐色较浅，近圆形，约占种子面积的 1/2 至 1/4；其一侧有 1 条突起的种脊，有的不甚明显。种皮硬而脆，子叶 2，肥厚，坚硬，形似栗仁，黄白色或淡棕色，粉性。无臭，味先苦后甜。

【品质】 本品以大小均匀、饱满、断面色黄白者为佳。

【性味功效】 甘，温。理气宽中，和胃止痛。用于胸腹胀满，胃脘疼痛。



【编号】 M07197198a01S0CMMI H01397199001000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

桃仁

【来源】 蔷薇科植物桃 Prunus persica (L.) Batsch 的干燥成熟种子。

【主产地】 产于全国大部分地区，主产于四川、云南、陕西、山东、河北、山西、河南、北京等地。

【性状特征】 种子呈类卵圆状，长1.2～1.8 cm，宽4～8 mm，厚约2～4 mm。表面黄棕色至红棕色，密布颗粒状突起。一端尖，中部膨大，另端钝圆稍偏斜，边缘较薄。尖端一侧有短线形种脐，圆端有颜色略深、不甚明显的合点，自合点处散出多数纵向维管束。种皮薄，子叶2，类白色，富油性。气微，味微苦。

【品质】 本品以粒饱满、种仁白、完整者为佳。

【性味功效】 苦、甘，平。活血祛瘀，润肠通便。用于经闭，痛经，癥瘕痞块，跌扑损伤，肠燥便秘。



【编号】 M07337143018S0CMMI H31647143037001300SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

桑椹


【来源】 桑科植物桑 Morus alba L. 的干燥果穗。

【主产地】 主产于我国南方育蚕区。

【性状特征】 果穗为聚花果，有多数小瘦果集合而成，呈长圆状，长1～2 cm，直径5～8 mm。黄棕色、棕红色至暗紫色，有短果序梗。小瘦果卵圆状，稍扁，长约2 mm，宽约1 mm，外具肉质花被4枚。气微，味微酸而甜。

【品质】 本品以个大、饱满、色暗黄、糖性大、完整者为佳。

【性味功效】 甘、酸，寒。补血滋阴，生津润燥。用于眩晕耳鸣，心悸失眠，须发早白，津伤口渴，内热消渴，血虚便秘。



【编号】 M07407167075S0CMMI H26387167012000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

梧桐子

【来源】 梧桐科植物梧桐 Firmiana simplex (L.) W. F. Wight 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于江苏、浙江等地。

【性状特征】 种子呈球状，直径5～9 mm。表面淡棕绿色或黄棕色，微具光泽，有明显隆起的网状皱纹。质轻而硬，外层种皮较脆，易破裂。内层种皮坚韧。种仁圆锥状，胚乳肥厚，黄白色。富油质。子叶2，菲薄，紧贴于胚乳。气微，味微甜。

【品质】 本品以饱满、完整、色淡绿者为佳。

【性味功效】 甘，平。顺气和胃，健脾消食，止血。用于胃脘冷痛，伤食腹泻，疝气，须发早白，小儿口疮鼻衄。



【编号】 M07467130006S0CMMI H17707130007000400GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

浮小麦

【来源】 禾本科植物小麦 Triticum aestivum L. 的干瘪颖果。

【主产地】 全国产麦区均产。

【性状特征】 颖果长圆状，两端略尖，长至6 mm，直径1.5～2.5 mm。表面浅黄棕色或黄色，稍皱缩，腹面中央有一纵行深沟，顶端具黄白色柔毛。质硬，断面白色，粉性。气弱，味淡。商品有时带有未脱净的颖片及稃，颖片革质，具锐脊，顶端尖突；外稃膜质，顶端有芒，内稃厚纸质，无芒。气微，味淡。

【品质】 本品以粒均匀、轻浮、无杂质者为佳。

【性味功效】 甘，凉。益气，除热，止汗。用于阴虚发热，盗汗，自汗。



【编号】 M07487332192S0CMMI H39707332240000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

益智仁

【来源】 姜科植物益智 Alpinia oxyphylla Miq. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于海南、广东等地。以广东所产为道地。

【性状特征】 果实呈椭圆状，两端略尖，长 1.2～2 cm，直径 1～1.3 cm。表面棕色或灰棕色，有纵向凹凸不平的突起棱线13～20条，顶端有花被残基，基部常残存果梗。果皮薄而稍韧，与种子紧贴，种子集结成团，中有隔膜将种子团分为3瓣，每瓣有种子6～11粒。种子呈不规则的扁圆状，略有钝棱，直径约3 mm，表面灰褐色或灰黄色，外被淡棕色膜质的假种皮；质硬，胚乳白色。有特异香气，味辛、微苦。

【品质】 本品以个大、饱满、气味浓者为佳。

【性味功效】 辛，温。温脾止泻，摄唾涎，暖胃，固精缩尿。用于脾寒泄泻，腹中冷痛，口多唾涎，肾虚遗尿，小便频数，遗精白浊。



【编号】 M07657290026S0CMMI H02277290002003500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

莱菔子


【来源】 十字花科植物萝卜 Raphanus sativus L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 全国各地均产。

【性状特征】 种子呈类卵圆状或椭圆状，稍扁，长2.5～4 mm，宽2～3 mm。表面黄棕色、红棕色或灰棕色。一端有深棕色圆形种脐，一侧有数条纵沟。种皮薄而脆，子叶2，黄白色，有油性。无臭，味淡、微辛苦。

【品质】 本品以粒大、饱满、坚实、色红棕、无杂质者为佳。

【性味功效】 辛、甘，平。消食除胀，降气化痰。用于饮食停滞，脘腹胀痛，大便秘结，积滞泻痢，痰壅喘咳。



【编号】 M07907039085S0CMMI H32637039075000200GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

莲子

【来源】睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥成熟种子。

【主产地】主产于湖南、湖北、福建、江苏、浙江、江西等地。

【性状特征】种子略呈椭圆状或类圆状，长 1.2～1.8 cm，直径 0.8～1.4 cm。表面浅黄棕色至红棕色，有细纵纹和较宽的脉纹。一端中心呈乳头状突起，深棕色，多有裂口，其周边略下陷。质硬，种皮薄，不易剥离。子叶 2，黄白色，肥厚，中有空隙，具绿色莲子心。无臭，味甘、微涩；莲子心味苦。

【品质】本品以个大、饱满者为佳。

【性味功效】甘、涩，平。补脾止泻，益肾涩精，养心安神。用于脾虚久泻，遗精带下，心悸失眠。



【编号】M07917018003S1CMMI H26847018003000100CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

莲子心

【来源】睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥成熟种子中的干燥幼叶及胚根。

【主产地】主产于湖南、湖北、福建、江苏、浙江等地。

【性状特征】幼叶及胚根略呈细棒状，长 1～1.4 cm，直径约 2 mm。幼叶绿色，一长一短，卷成箭形，先端向下反折，两幼叶间可见细小胚芽。胚根圆柱状，长约 3 mm，黄白色。质脆，易折断，断面有数个小孔。气微，味苦。

【品质】本品以个大、色青绿、未经煮者为佳。

【性味功效】苦，寒。清心安神，交通心肾，涩精止血。用于热入心包，神昏谵语，心肾不交，失眠遗精，血热吐血。



【编号】M07927018003S2CMMI H26847018003000100CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

莲房

【来源】睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥花托。

【主产地】主产于湖南、湖北、福建、江苏、浙江等地。

【性状特征】花托呈倒圆锥状或漏斗状，多撕裂，直径5～8 cm，高 4.5～6 cm。表面灰棕色至紫棕色，具细纵纹及皱纹，顶面有多数圆形孔穴，基部有花梗残基。质疏松，破碎面海绵样，棕色。气微，味微涩。

【品质】本品以个大、完整、色紫棕者为佳。

【性味功效】苦、涩，温。化瘀止血。用于崩漏，尿血，痔疮出血，产后瘀阻，恶露不尽。



【编号】M07937018003F2CMMI H26847018003000100CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

莲须

【来源】 睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥雄蕊。

【主产地】 主产于湖南、湖北、福建、江苏、浙江、江西等地。

【性状特征】 雄蕊呈条状。花药扭转，纵裂，长1.2～1.5 cm，直径约1 mm，淡黄色或棕黄色。花丝纤细，稍弯曲，长1.5～1.8 cm，淡紫色。气微香，味涩。

【品质】 本品以完整、细长、色淡黄、质柔软者为佳。

【性味功效】 甘、涩，平。固肾涩精。用于遗精滑精，带下，尿频。



【编号】 M07957018003F3CMMI H26847018003000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

淡豆豉

【来源】 豆科植物大豆 Glycine max (L.) Merr. 的成熟种子的发酵加工品。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 本品呈椭圆状，略扁，长0.6～1 cm，直径5～7 mm。表面黑色，皱缩不平，无光泽，一侧有棕色的条状种脐，珠孔不明显。子叶2片，肥厚。质柔软，断面棕黑色。气香，味微甘。

【品质】 本品以质疏松、有香气、色黑、附有膜状物者为佳。

【性味功效】 苦、辛，凉。解表，除烦、宜发郁热。用于感冒，寒热头痛，烦躁胸闷，虚烦不眠。



【编号】 M08227148321S2CMMI H18847148071000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

猪牙皂

【来源】 豆科植物皂荚 Gleditsis sinensis Lam. 的干燥不育果实。

【主产地】 主产于山东、四川、云南、贵州、陕西、河南等地。

【性状特征】 果实呈圆柱状，略扁而弯曲，长5～11 cm，宽0.7～1.5 cm。表面紫棕色或紫褐色，被灰白色蜡质粉霜，擦去后有光泽，并有细小的疣状突起及线状或网状的裂纹。顶端有鸟喙状花柱残基，基部具果梗残痕。质硬而脆，易折断，断面棕黄色。中间疏松，有淡绿色或淡棕黄色的丝状物，偶有发育不全的种子。气微，有刺激性，味先甜而后辣。

【品质】 本品以个小饱满、色紫黑、有光泽、无果柄、质坚硬、肉多而黏、断面色淡绿者为佳。

【性味功效】 辛、咸，温；有小毒。祛痰开窍，散结消肿。用于中风口噤，昏迷不醒，癫痫痰盛，关窍不通，喉痹痰阻，顽痰喘咳，咯痰不爽，大便燥结；外治痈肿。



【编号】 M08317148319S2CMMI H18767148070000500SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

甜瓜子

【来源】 葫芦科植物甜瓜 Cucumis melo L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 全国各地均产。

【性状特征】 种子呈长卵状，扁平，长 6～8 mm，宽 3～4 mm，厚约 1 mm。一端稍狭，顶端平截，有不明显的种脐，另一端钝圆；表面黄白色至淡棕色，平滑，稍具光泽，放大镜下可见细密纵纹理。质较硬而脆，除去种皮后，有白色膜质的胚乳，包于子叶之外；子叶白色，富油性。气微，味淡。

【品质】 本品以粒饱满、色黄白者为佳。

【性味功效】 甘，寒。清肺，润肠，消瘀，排脓。用于肺热咳嗽，口渴，大便秘结，肠痈，肺痈。



【编号】 M08357103007S2CMMI H12397103007000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

绿豆

【来源】 豆科植物绿豆 Phaseolus radiatus L. 的种子。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 种子呈短矩圆状，长 4～6 mm，表面绿黄色或暗绿色或绿棕色，光滑而有光泽。种脐位于种子的一侧，白色，条形，均为种子长的 1/2。种皮薄而坚韧，剥离后露出浅黄绿色或黄白色 2 片肥厚的子叶。气微，嚼之有豆腥气。

【品质】 本品以粒大、饱满、色绿者为佳。

【性味功效】 甘，寒。清热，消暑，利水，解毒。用于暑热烦渴，感冒发热，霍乱吐泻，痰热哮喘，头痛目赤，口舌生疮，水肿尿少，疮疡痈肿，风疹丹毒，药物及食物中毒。



【编号】 M08457148514S0CMMI H28947148110000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

菟丝子

【来源】 旋花科植物菟丝子 Cuscuta chinensis Lam. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于东北及山东、河南等地。

【性状特征】 种子呈类球状，直径 1～1.5 mm。表面灰棕色或黄棕色，具细密突起的小点，一端有微凹的线形种脐。质坚实，不易以指压碎。气微，味淡。

【品质】 本品以干燥、种子饱满、无杂质者为佳。

【性味功效】 甘，温。滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。用于阳萎遗精，尿有余沥，遗尿尿频，腰膝酸软，目昏耳鸣，肾虚胎漏，胎动不安，脾肾虚泻；外治白癜风。



【编号】 M08507251022S0CMMI H12567252007000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蛇床子

【来源】 伞形科植物蛇床 Cnidium monnieri (L.) Cuss. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于河北、山东、江苏、浙江、四川等地。

【性状特征】 果实为双悬果，呈椭圆状，长 2～4 mm，直径约 2 mm。表面灰黄色或灰褐色，顶端有 2 枚向外弯曲的柱基，基部偶有细梗。分果的背面有薄而突起的纵棱 5 条，接合面平坦，有 2 条棕色略突起的纵棱线。果皮松脆，揉搓易脱落，种子细小，灰棕色，显油性。气香，味辛凉，有麻舌感。

【品质】 本品以籽粒饱满、色黄绿、手搓之有辛辣香气者为佳。

【性味功效】 辛、苦，微温；有小毒。温肾壮阳，燥湿，祛风，杀虫。用于阳萎，宫冷，寒湿带下，湿痹腰痛；外治外阴湿疹，妇人阴痒，滴虫性阴道炎。



【编号】 M08527213102S0CMMI H10797214025000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

野鸦椿

【来源】 省沽油科植物野鸦椿 Euscaphis japonica (Thunb.) Dipp. 的干燥枝、果。

【主产地】 主产于河南、陕西、江苏等地。

【性状特征】 小枝及芽红紫色，枝叶揉碎后发出恶臭味。奇数羽状复叶对生，小叶 7～11 对；小叶片厚纸质，长卵形至卵状椭圆形，长 4～8 cm，宽 2～4 cm，先端渐尖，基部圆形至阔楔形，边缘具细锯齿，小叶柄长 1～2 mm，小托叶线形。干燥的果实呈倒卵形或卵圆形，长 1～1.5 cm，直径 5～10 mm。表面紫红色或棕红色，果皮有纵皱纹，顶端留有花柱残基，基部常有短的果柄，果皮软革质。内含种子 1～3 粒，种子扁圆状，黑色，稍有光泽。气无，味微涩。

【品质】 本品以枝叶质嫩、叶片多而完整、果实多者为佳。

【性味功效】 性热，入冷经。止咳化痰，治疗咳嗽。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M08557204001S0GYCM H17187205001000200GYCM

【鉴定人】 袁家谟

野萝卜子

【来源】 十字花科植物野萝卜 Raphanus raphanistrum Linn. 的干燥角果。

【主产地】 主产于贵州。

【性状特征】 干燥的角果呈圆柱状，长 3～5 cm，直径 3～5 mm，肉质，内含种子数枚。外表黄色或灰黄色，在种子处稍向内溢缩，先端具较长的尖喙。种子呈卵圆状而微扁，直径约 3 mm，红褐色。

【品质】 本品以种子饱满、干燥、不带茎枝者为佳。

【功效】 治疗胃腹饱胀。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M07897039087S0GYCM

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黄皮酸橙枳壳

【来源】 芸香科植物黄皮酸橙Citrus aurantium “huangpi” 的近成熟果实。

【主产地】 主产于四川、江西、湖南、浙江等地。四川产者称川枳壳，江西产者称江枳壳。

【性状特征】 果实直径4～5 cm。外果皮棕黄色或绿黄色，有微隆起的网状皱纹，顶端微凸。横切面果皮厚5～9 mm，瓤囊8～10瓣，中轴宽4～8 mm。其他特征与代代花枳壳相似。

【品质】 本品以个大、外皮青绿色、肉厚、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛、酸，温。理气宽中，行滞消胀。用于胸胁气滞，胀满疼痛，食积不化，痰饮内停；胃下垂，脱肛，子宫脱垂。

【附注】 本品作为“枳壳”入药。



【编号】 M062871940l3S0SM H10047195006000100SM

【鉴定人】 秦松云

楮实子

【来源】 桑科植物构树 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于河南、湖北、湖南、山西、甘肃等地。

【性状特征】 果实略呈球状或卵圆状，稍扁，直径约1.5 mm。表面红棕色，富油性。无臭，味淡。

【品质】 本品以色红、饱满者为佳。

【性味功效】 甘，寒。补肾清肝，明目，利尿。用于腰膝酸软，虚劳骨蒸，头晕目昏，目生翳膜，水肿胀满。



【编号】 M090371670l0S0CMMI H07007167004000200SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

疏毛吴茱萸

【来源】 芸香科植物疏毛吴茱萸 Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang 的干燥成熟果实。


【主产地】 主产于江西、湖南、广东、广西、贵州等地。

【性状特征】 果实呈五角形球状，直径2～3 mm。表面黄绿色至褐绿色，粗糙，无点状突起，有凹下的油点。基部残留被有黄白色茸毛的果梗。其他特征与吴茱萸相似。

【品质】 本品以饱满、坚实、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，热；有小毒。散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。用于厥阴头痛，寒疝腹痛，寒湿脚气，经行腹痛，脘腹胀痛，呕吐吞酸，五更泄泻；外治口疮，高血压。

【附注】 本品作为“吴茱萸”入药。



【编号】 M04017194074S0SM H17237195009000501SM

【鉴定人】 秦松云

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紫苏子

【来源】 唇形科植物紫苏 Perilla frutescens (L.) Britt. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于江苏、湖北、江西、浙江、山东、四川等地。

【性状特征】 果实呈卵圆状或类球状，直径约1.5 mm。表面灰棕色或灰褐色，有微隆起的暗紫色网纹，基部稍尖，有灰白色点状果梗痕。果皮薄而脆，易压碎。种子黄白色，种皮膜质，子叶2，类白色，有油性。压碎有香气，味微辛。

【品质】 本品以粒饱满、色紫黑、无杂质者为佳。

【性味功效】 辛，温。降气消痰，平喘，润肠。用于咳嗽气喘，肠燥便秘。



【编号】 M04407264204S0CMMI H28757265077000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

葫芦巴


【来源】 豆科植物葫芦巴 Trigonella foenum-graecum L. 的种子。

【主产地】 主产于安徽、四川、河南等地。

【性状特征】 种子略呈棱状，长3～4 mm，宽2～3 mm，厚约2 mm。表面黄绿色至淡黄棕色，两侧各有一深斜沟，种脐点状，位于两沟相连接处，质坚硬，不易破碎。气微，味微苦。

【品质】 本品以粒大、饱满、坚实者为佳。

【性味功效】 苦，温。温肾阳，逐寒湿，止痛。用于腹胁寒气胀痛，寒湿脚气，疝气，阳萎。



【编号】 M09377148603S0CMMI H39597148146000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

葱子


【来源】 百合科植物葱 Allium fistulosum L. 的种子。

【主产地】 全国各地皆产，山东产量最大。

【性状特征】 种子三角形扁卵状，一面微凹，另一面隆起，有棱线1～2条，长3～4 mm，宽2～3 mm。表面黑色，多光滑，偶有疏皱纹，基部有两突起，较短者顶端灰棕色或灰白色为种脐，较长者顶端为珠孔。体轻，质坚硬。气特异，嚼之有葱味。

【品质】 本品以粒大、饱满、坚实、表面色黑者为佳。

【性味功效】 辛，温。补肾明目。用于阳萎，目眩。



【编号】 M09387293017S0CMMI H01997293002003000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黑色牵牛子

【来源】 旋花科植物裂叶牵牛 Pharbitis nil (L.) Choisy 的干燥成熟种子。


【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 种子似橘瓣状，长4～8 mm，宽3～5 mm。表面灰黑色，背面有1条浅纵沟，腹面棱线的下端有一点状种脐，微凹。质硬，横切面可见淡黄色或黄绿色皱缩折叠的子叶，微显油性。无臭，味辛、苦，有麻感。

【品质】 本品以粒饱满者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有毒。泻水通便，消痰涤饮，杀虫攻积。用于水肿胀满，二便不通，痰饮积聚，气逆喘咳，虫积腹痛，蛔虫病，绦虫病。

【附注】 本品作为“牵牛子”入药。



【编号】 M06457251057S0CMMI H28907252019000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

黑芝麻

【来源】 脂麻科植物脂麻 Sesamum indicum L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于山东、河南、湖北、四川、安徽、江西、河北等地。

【性状特征】 种子呈扁卵圆状，长约3 mm，宽约2 mm。表面黑色或棕褐色，平滑或有网状皱纹。尖端有棕色点状种脐。种皮薄，子叶2，白色，富油性。气微，味甘，有油香气。

【品质】 本品以籽粒大、饱满、色黑者为佳。

【性味功效】 甘，平。补肝肾，益精血，润肠燥。用于头晕眼花，耳鸣耳聋，须发早白，病后脱发，肠燥便秘。



【编号】 M09507258001S0CMMI H36177259001000100SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

黑豆


【来源】 豆科植物大豆 Glycine max (L.) Merr. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于山东、河南、湖北、四川、安徽、江西、河北等地。

【性状特征】 种子呈椭圆状、略扁，长6～10 mm，直径5～7 mm。表面黑色，一侧有棕色的条状种脐，珠孔不明显。子叶2片，肥厚。质较坚硬，气微，具豆腥味。

【品质】 本品以籽粒大、饱满、色黑者为佳。

【性味功效】 甘，平。活血，利水，祛风，解毒。用于水肿胀满，风毒脚气，黄疸浮肿，风痹筋挛，产后风痉、口噤，痈肿疮毒；解药毒。



【编号】 M09517148321S3CMMI H18847148071000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黑种草子

【来源】 毛茛科植物瘤果黑种草 Nigella glandulifera Freyn 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于新疆。

【性状特征】 种子呈三棱形卵状，长 2.5～3 mm，宽约 1.5 mm。表面黑色，粗糙，顶端较狭而尖，下端稍钝，有不规则的突起。质坚硬，断面灰白色，有油性。气微香，味辛。

【品质】 本品以粒大、色黑、饱满、味辛、无杂质者为佳。

【性味功效】 甘、辛，温。补肾健脑，通经，通乳，利尿。用于耳鸣健忘，经闭乳少，热淋，石淋。

【附注】 维吾尔族习用药材。在《新疆中草药》、《维吾尔药志》、傣族、藏族的民族药志中均有记载。



【编号】 M09527015368S0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

槐角

【来源】 豆科植物槐 Sophora japonica L. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于天津、北京、河南、山东、江苏、陕西等地。

【性状特征】 果实圆柱状，有时弯曲，于种子间缢缩呈连珠状，长 3～6 cm，直径 0.6～1 cm。表面黄绿色或黄褐色，皱缩而粗糙，背缝线一侧呈黄色。质柔润，干燥皱缩，易在收缩处折断，断面黄绿色，有黏性。种子 1～6 粒，肾形，长约 8 mm，表面光滑，棕黑色，一侧有灰白色圆形种脐；质坚硬，子叶 2，黄绿色。果肉气微，味苦，种子嚼之有豆腥气。

【品质】 本品以饱满、色黄绿、质柔润者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热泻火，凉血止血。用于肠热便血，痔肿出血，肝热头痛，眩晕目赤。



【编号】 M09587148570S0CMMI H37087148135000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蓖麻子

【来源】 大戟科植物蓖麻 Ricinus communis L. 的干燥成熟种子。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 种子呈椭圆状或卵状，稍扁，长 0.9～1.8 cm，宽 0.5～1 cm。表面光滑，有灰白色与黑褐色或黄棕色与红棕色相间的花斑纹。一面较平，一面较隆起，较平的一面有一条隆起的种脐；一端有灰白色或浅棕色突起的种阜。种皮薄而脆。胚乳肥厚，白色，富油性，子叶 2，菲薄。无臭，味微苦辛。

【品质】 本品以个大、粒饱满者为佳。

【性味功效】 甘、辛，平；有毒。消肿拔毒，泻下通滞。用于痈疽肿毒，喉痹，瘰疬，大便燥结。



【编号】 M09717136175S0CMMI H33337136054000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

路路通

【来源】 金缕梅科植物枫香树 Liquidambar formosana Hance 的干燥成熟果序。

【主产地】 主产于江苏、安徽、浙江、福建、湖南、湖北、陕西等地。

【性状特征】 果序呈圆球状，直径2～3 cm，基部常有短果梗。表面灰棕色或棕褐色，有多数尖刺状宿存萼齿及鸟嘴状花柱，长0.5～1 cm，常折断或弯曲。小蒴果顶部开裂，呈蜂窝状小孔。体轻，质硬，不易破开。气微，味淡。

【品质】 本品以个大、色黄、无泥、无果柄者为佳。

【性味功效】 苦，平。祛风活络，利水通经。用于关节痹痛，麻木拘挛，水肿胀满，乳少经闭。



【编号】 M09797151015S0CMMI H23767151010000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

锦灯笼


【来源】 茄科植物酸浆 Physalis alkekengi L. var franchetii（Mast.）Makino 的干燥宿萼或带果实的宿萼。

【主产地】 主产于江苏。

【性状特征】 宿萼膨大而薄，略呈灯笼状，多压扁，长3～4.5 cm，宽2.5～4 cm。表面橙红色或橙黄色，有5条明显的纵棱，棱间有网状的细脉纹。顶端渐尖，微5裂，基部略平截，中心凹陷有果梗。体轻，质柔韧，中空，或内有棕红色或橙红色果实。果实球状，多压扁，直径1～1.5 cm，果皮皱缩，内含种子多数。气微，宿萼味苦，果实味甘、微酸。

【品质】 本品以个大、整齐、洁净、色鲜红者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，利咽，化痰，利尿。用于咽痛音哑，痰热咳嗽，小便不利；外治天疱疮，湿疹。



【编号】 M09807250054S0CMMI H29327251018000101SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

榧子


【来源】 红豆杉科植物榧 Torreya grandis Fort. 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于浙江。

【性状特征】 种子呈卵圆状或长卵圆状，长2～3.5 cm，直径1.3～2 cm。表面灰黄色或淡黄棕色，有纵皱纹，一端钝圆，可见椭圆形的种脐，另端稍尖。种皮质硬，厚约1 mm。种仁表面皱缩，外胚乳灰褐色，膜质；内胚乳黄白色，肥大，富油性。气微，味微甜而涩。

【品质】 本品以身干、粒大、种仁淡黄、不走油、无虫蛀者为佳。

【性味功效】 甘，平。杀虫消积，润燥通便。用于钩虫病，蛔虫病，绦虫病，虫积腹痛，小儿疳积，大便秘结。



【编号】 M09836009006S0CMMI H39257304004000200JXCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

槟榔


【来源】 棕榈科植物槟榔 Areca catechu L.的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于台湾、海南、福建、广东、云南等地。

【性状特征】 种子呈扁球状或圆锥状，高1.5～3.5 cm，底部直径1.5～3 cm。表面淡黄棕色或淡红棕色，具稍凹下的网状沟纹，底部中心有圆形凹陷的珠孔，其旁有1明显疤痕状种脐。质坚硬，不易破碎，断面可见棕色种皮与白色种胚相间的大理石样花纹。气微，味涩、微苦。

【品质】 本品以个大、体重、质坚、无破裂者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温。杀虫消积，降气，行水，截疟。用于绦虫病，蛔虫病，姜片虫病，虫积腹痛，积滞泻痢，里急后重，水肿脚气，疟疾。



【编号】 M09847314002S2CMMI H03697314002000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

缩砂仁

【来源】 姜科植物绿壳砂Amomum villosum Lour. var. xanthioides T. L. Wu et Senjen 的干燥成熟果实。


【主产地】 主产于云南，或从越南、缅甸、泰国、印度尼西亚进口。

【性状特征】 果实呈椭圆状或卵圆状，有不明显的三棱，长1.5～2.5 cm，直径1～1.5 cm。表面棕色、黄棕色或褐棕色，密被略扁平的刺状突起，顶端有花被残基，基部常有果梗。果皮内表面淡黄色或褐黄色，质薄而软。种子集结成团，具三钝棱，中有白色隔膜，将种子团分成3瓣，每瓣有种子5～26粒。种子为不规则多面体，直径2～3 mm；表面棕红色或暗褐色，有细皱纹，外被淡棕色膜质假种皮；质硬，胚乳灰白色。气芳香而浓烈，味辛凉、微苦。

【品质】 本品以个大、坚实、仁饱满、气味浓者为佳。

【性味功效】 辛，温。化湿开胃，温脾止泻，理气安胎。用于湿浊中阻，脘痞不饥，脾胃虚寒，呕吐泄泻，妊娠恶阻，胎动不安。

【附注】 本品作为“砂仁”入药。



【编号】 M09917290057S0CMMI H02537290003003802CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

罂粟壳

【来源】 罂粟科植物罂粟 Papaver somniferum L. 的干燥成熟果壳。

【主产地】 主产于云南、贵州。

【性状特征】 果壳呈椭圆状或瓶形卵状，多已破碎呈片状，长3～7 cm，直径1.5～5 cm。外表面黄白色、浅棕色至淡紫色，平滑，略有光泽，有纵向或横向的割痕。顶端有6～14条放射状排列呈圆盘状的残留柱头，基部有短柄。体轻，质脆。内表面淡黄色，微有光泽。有纵向排列的假隔膜，棕黄色，上面密布略突起的棕褐色小点。气微清香，味微苦。

【品质】 本品以体轻、质脆、色黄白、浅棕至淡紫者为佳。

【性味功效】 酸、涩，平；有毒。敛肺，涩肠，止痛。用于久咳，久泻，脱肛，脘腹疼痛。



【编号】 M09927032150S0CMMI H28147032016000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蔓荆子

【来源】 马鞭草科植物蔓荆 Vitex trifolia L. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于广东、海南、广西、云南等地。

【性状特征】 果实呈球状，直径 4～6 mm。表面灰黑色或黑褐色，被灰白色粉霜状茸毛，有纵向浅沟4条，顶端微凹，基部有灰白色宿萼及短果梗。萼长为果实的 1/3～2/3，5 齿裂，其中 2 裂较深，密被茸毛。体轻，质坚韧，不易破碎。横切面可见4室，每室有种子 1 枚。气特异而芳香，味淡、微辛。

【品质】 本品以粒大、饱满、气香者为佳。

【性味功效】 辛、苦，微寒。疏散风热，清利头目。用于风热感冒头痛，齿龈肿痛，目赤多泪，目暗不明，头晕目眩。



【编号】 M09987263104S0CMMI H41197264021001200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

酸枣仁

【来源】 鼠李科植物酸枣 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于河北、北京、天津、辽宁、山东、陕西、甘肃、湖北等地。

【性状特征】 种子呈扁圆状或扁椭圆状，长 5～9 mm，宽 5～7 mm，厚约3 mm。表面紫红色或紫褐色，平滑有光泽，有的有裂纹。一面较平坦，中央有一条隆起的纵线纹；另一面微隆起。一端凹陷，可见线形种脐；另端有细小凸起的合点。种皮较脆，胚乳白色，子叶 2，浅黄色，富油性。气微，味淡。

【品质】 本品以粒大、饱满、外皮色紫红、种仁色黄白者为佳。

【性味功效】 甘、酸，平。养肝，宁心，敛汗，生津。用于虚烦不眠，惊悸多梦，体虚多汗，津伤口渴。



【编号】 M10047190060S0CMMI H41857191015000404CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

酸橙枳壳

【来源】 芸香科植物酸橙 Citrus aurantium L.及其栽培变种的干燥近成熟果实。


【主产地】 主产于四川、江西、湖南、浙江等地。四川产者称川枳壳，江西产者称江枳壳。

【性状特征】 外果皮绿褐色或棕褐色，有颗粒状突起，突起的顶端有凹点状油室；有明显的花柱残迹或果梗痕。横切面果皮厚 0.6～1.2 cm，瓤囊 9～13 瓣，少数至 15 瓣，中轴宽度 5～9 mm。其他特征与枳壳相似。

【品质】 本品以个大、外皮色青绿、肉厚、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛、酸，温。理气宽中，行气消胀。用于胸胁气滞，胀满疼痛，食积不化，痰饮内停；胃下垂，脱肛，子宫脱垂。

【附注】 本品作为“枳壳”入药。



【编号】 M06297194010S1CMMI H10047195006000100SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

酸橙枳实

【来源】 芸香科植物酸橙 Citrus aurantium L.的干燥幼果。

【主产地】 主产于四川、江西、湖南等地。

【性状特征】 果实呈球形或半球形，直径1～3 cm，少数有5 cm。外果皮黑绿色或暗棕绿色，粗糙，具颗粒状突起和缩纹，有明显的花柱残迹或果梗痕。横切面中果皮黄白色，约占2/3，厚度0.5～1.2 cm，瓤囊棕褐色。其他特征与枳实相似。

【品质】 本品以皮色青黑、肉厚、瓤小、质坚实、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛、酸，温。破气消积，化痰散痞。用于积滞内停，痞满胀痛，泻痢后重，大便不通，痰滞气阻胸痹，结胸，胃下垂，脱肛，子宫脱垂。

【附注】 本品作为“枳实”入药。



【编号】 M06297194010S1CMMI H10047195006000100SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

稻芽


【来源】 禾本科植物稻 Oryza sativa L. 的成熟果实经发芽干燥而得。

【主产地】 全国产稻区均产。

【性状特征】 谷芽呈扁长椭圆状，两端略尖，长7～9 mm，直径约3 mm。外稃黄色，有白色细茸毛，具5脉。一端有2枚对称的白色条形浆片，长2～3 mm，于一个浆片内侧伸出弯曲的须根1～3条，长0.5～1.2 cm。质硬，断面白色，粉性。无臭，味淡。

【品质】 本品以粒饱满、均匀、色黄、无杂质者为佳。

【性味功效】 甘，温。消食和中，健脾开胃。用于食积不消，腹胀口臭，脾胃虚弱，不饥食少。



【编号】 M10147332106S0SM

【鉴定人】 于再柏

蕤仁

【来源】 蔷薇科植物蕤核Prinsepia uniflora Batal.的干燥成熟果核。

【主产地】 主产于山西、陕西、甘肃等地。

【性状特征】 果核呈类卵圆状，稍扁，长7～10 mm，宽6～8 mm，厚3～5 mm。表面淡黄棕色或深棕色，有明显的网状沟纹，间有棕褐色果肉残留，顶端尖，两侧略不对称。质坚硬。种子扁平卵圆状，种皮薄，浅棕色或红棕色，易剥落。子叶2，乳白色，有油脂。无臭，味微苦。

【品质】 本品以色淡棕、颗粒饱满肥厚、表面纹理清楚者为佳。

【性味功效】 甘，微寒。养肝明目，疏风散热。用于目赤肿痛，睑弦赤烂，目暗羞明。



【编号】 M10157143205S0CMMI H31557143036000300SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鹤虱

【来源】 菊科植物天名精 Carpesium abrotanoides L. 的干燥成熟果实。

【主产地】 主产于河南、山西、陕西、甘肃、贵州等地。

【性状特征】 果实呈圆柱状，细小，长3～4 mm，直径不及1 mm。表面黄褐色或暗褐色，具多数纵棱。顶端收缩呈细喙状，先端扩展成灰白色圆环；基部稍尖，有着生痕迹。果皮薄，纤维性，种皮菲薄透明，子叶2，类白色，稍有油性。气特异，味微苦。

【品质】 本品以粒均匀、饱满者为佳。

【性味功效】 苦、辛，平。杀虫消积。用于蛔虫病，蛲虫病，绦虫病，虫积腹痛，小儿疳积。



【编号】 M10187238227S0CMMI H08307239046000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

橘红

【来源】 芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮。

【主产地】 主产于福建、浙江、江西、四川等地。

【性状特征】 果皮呈长条状或不规则薄片状，边缘皱缩向内卷曲。外表面黄棕色或橙红色，存放后呈棕褐色，密布黄白色突起或凹下的油室。内表面黄白色，密布凹下透光小圆点。质脆易碎。气芳香，味微苦、麻。

【品质】 本品以片薄均匀、气味浓者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。散寒，燥湿，利气，消痰。用于风寒咳嗽，喉痒痰多，食积伤酒，呕恶痞闷。



【编号】 M10197194034S3CMMI H10107195006000600SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

橘络


【来源】 芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 及其栽培变种的干燥果皮内层的筋络。

【主产地】 主产于福建、浙江、江西、四川等地。

【性状特征】 筋络呈长条形的网络状。上端与蒂相连，其下则筋络交叉而顺直。蒂呈圆形帽状。多为淡黄白色，陈久则变成棕黄色。每束长约6～10 cm，宽约0.5～1 cm。十余束或更多束紧压为长方形块状者为“凤尾橘络”；呈不整齐的松散状，长短不一，与蒂相混连者为“金丝橘络”；筋络多疏散碎断，并连带少量橘白，呈白色片状小块，有时夹带橘蒂及少量肉瓢碎片者为“铲络”。

【品质】 凤尾橘络以整齐、均匀、络长不碎断、色黄者为佳。其他均以筋络多、蒂及橘白少者为佳。

【性味功效】 甘、苦，平。通络，理气，化痰。用于筋络气滞，久咳胸痛，痰中带血，伤酒口渴。



【编号】 M10207194034S4CMMI H10107195006000600SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

橘核

【来源】 芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 及其栽培变种的干燥成熟种子。

【主产地】 主产于福建、浙江、江西、四川等地。

【性状特征】 种子略呈卵状，长0.8～1.2 cm，直径4～6 mm。表面淡黄白色或淡灰白色，光滑，一侧有种脊棱线，一端钝圆，另端渐尖成小柄状。外种皮薄而韧，内种皮菲薄，淡棕色，子叶2，黄绿色，有油性。气微，微苦。

【品质】 本品以色白、饱满、子粒均匀者为佳。

【性味功效】 苦，平。理气，散结，止痛。用于小肠疝气，睾丸肿痛，乳痈肿痛。



【编号】 M10217194034S5CMMI H10107195006000600SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

薏苡仁


【来源】 禾本科植物薏苡 Coix lacryma-jobi L. var. ma-yuen (Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁。

【主产地】 主产于福建、河北、辽宁等地。

【性状特征】 种仁呈宽卵状或长椭圆状，长4～8 mm，宽3～6 mm。表面乳白色，光滑，偶有残存的黄褐色种皮。一端钝圆，另端较宽而微凹，有1淡棕色点状种脐。背面圆凸，腹面有一条较宽而深的纵沟。质坚实，断面白色，粉性。气微，味微甜。

【品质】 本品以身干、粒大、饱满、色白、无破碎者为佳。

【性味功效】 甘、淡，凉。健脾利湿，除痹止泻，清热排脓。用于水肿，脚气，小便不利，湿痹拘挛，脾虚泄泻，肺痈，肠痈；扁平疣。



【编号】 M10237332038S0CMMI H11057332054000301SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

藏茴香

【来源】 伞形科植物葛缕子 Carum carvi L.的干燥果实。

【主产地】 主产于西藏、青海、四川西部等地。

【性状特征】 果实为双悬果，呈细圆柱状，两端略尖，微弯曲，长2～5 mm，直径1.5～2 mm。表面黄绿色或灰棕色，顶端残留柱基，基部有细果梗。分果长椭圆状，背面有纵脊线5条，合生面平坦，有沟纹，质硬，横断面略呈五边或六边形，中心白色，具油性。气香特异，口尝有麻辣感。

【品质】 本品以饱满、色黄亮、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、涩，温。理气，止痛，健胃，解毒。用于眼病，食欲不振，胃痛，腹痛，疝气等。

【附注】 藏茴香为藏药和维吾尔药，《月王药诊》、《四部医典》、《晶珠本草》中均有记载。



【编号】 M10317213092R0XZDC H08377214015000400XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

覆盆子

【来源】 蔷薇科植物华东覆盆子 Rubus chingii Hu 的干燥果实。

【主产地】 主产于浙江、福建、湖北等地。

【性状特征】 果实为聚合果，由多数小核果聚合而成，呈圆锥状或扁圆锥状，高 0.6～1.3 cm，直径 0.5～1.2 cm。表面黄绿色或淡棕色，顶端钝圆，基部中心凹入。宿萼棕褐色，下有果梗痕。小果易剥离，每个小果呈半月状，背面密被灰白色茸毛，两侧有明显的网纹，腹部有突起的纵棱。体轻，质硬。气微，味微酸涩。

【品质】 本品以粒完整、饱满、色黄绿、具酸味者为佳。

【性味功效】 甘、酸，温。益肾，固精，缩尿。用于肾虚遗尿，小便频数，阳萎早泄，遗精滑精。



【编号】 M10467143291S0CMMI H33827143044002500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

全草

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一扫光

【来源】 菊科植物一扫光 Senecio dianthus Franch. 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏。

【性状特征】 茎直立，全株被白色短柔毛。叶互生，长圆形至广披针形，长 4～12 cm，宽 1～3.5 cm，先端渐尖，基部楔形，边缘具规则的三角形锯齿，有叶柄。头状花序组成圆锥花序，顶生，花黄色。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 苦，寒。祛风除湿，清热解毒，止痒。用于急性结膜炎，疮疖，皮炎，跌扑损伤。



【编号】 M01427238583H0XZDC H36067239185000800XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

九子连环草

【来源】 兰科植物虾脊兰 Calanthe discolor Lindl. 的干燥全草。

【主产地】 主产于华东、西南等地。

【性状特征】 全草长 25～30 cm。地下茎呈假鳞茎状，节多，须根长。叶片呈倒披针状长圆形，长约 14～20 cm，宽 3～5 cm，先端钝尖，基部渐狭呈柄状，2～3 枚相抱合折叠。花茎长 20～30 cm，小花外表紫褐色，内花被淡紫色或红紫色。

【品质】 本品以茎叶完整、质嫩者为佳。

【性味功效】 甘、辛，温。解毒，散结，活血，舒筋。用于瘰疬，扁桃体炎，痔疮，跌扑损伤。



【编号】 M00037326023FHCMMI H07407326022000700SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

三尖杉

【来源】 三尖杉科植物三尖杉 Cephalotaxus fortunei Hook. f. 的干燥枝叶。

【主产地】 主产于广西、贵州、四川。

【性状特征】 叶呈螺旋状着生，2 列。叶片呈线状披针形，通常弯曲，长 5～10 cm，宽 3～5 mm，先端具长尖头，基部近圆形或宽楔形，近无柄，下面具 2 条白色气孔带。

【品质】 本品以叶片细嫩、色绿、带种子多者为佳。

【性味功效】 和性药。用于食积，驱蛔。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M00156008002H0GYCM H08906008001000100GYCM

【鉴定人】 吴家荣

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

三花龙胆

【来源】 龙胆科植物三花龙胆 Gentiana triflora Pall. 的干燥全草。

【主产地】 主产于东北。

【性状特征】 株高35～80 cm，全株光滑。根状茎短，黄白色，有越冬芽1～5个，粗壮，长可达25 cm，紫红色。叶纸质，披针形或长圆状披针形，长5～10 cm，宽1.2～2.5 cm，先端锐尖，边缘不反卷。花3～5朵簇生于茎顶，蓝紫色，无花梗，花萼筒状钟形。

【品质】 本品以茎叶整齐带根者为佳。

【性味功效】 苦，寒。泻肝胆实火，除下焦湿热。用于肝经热盛，惊痫狂躁，乙型肝炎，目赤，咽痛，黄疸，热痢。



【编号】 M03007239064H0SM H18487240007022700CMMI

【鉴定人】 陈俊华

千里光

【来源】 菊科植物千里光 Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don 的干燥全草。

【主产地】 主产于江苏、浙江、广西、四川等地。

【性状特征】 全草长60～100 cm，或切成2～3 cm长的小段。茎圆柱形，表面棕黄色。质坚硬，断面髓部发达，白色。叶多皱缩，破碎。呈三角形或卵状披针形，基部戟形或截形，边缘有不规则缺刻，暗绿色或灰棕色，质脆。有时枝梢带有枯黄色的头状花序。

【品质】 本品以茎枝完整、叶多、无杂质者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热，解毒，杀虫，明目。用于各种急性炎症性疾病，风赤火眼，目翳，扁桃体炎，肠炎，黄疸。



【编号】 M00187238605H0CMMI H36117239185002600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大蓟

【来源】 菊科植物蓟 Cirsium japonicum DC. 的干燥全草或根。

【主产地】 主产于安徽、山东、河北、江苏等地。

【性状特征】 全草，茎直立，呈圆柱形，长约1m。直径0.5～1.5 cm。表面褐色、绿褐色或棕褐色。有数条纵棱，密被灰白色丝状毛。质松而脆，折断面髓部白色，中空或疏松。完整叶展平后呈倒披针形或倒卵状椭圆形，羽状深裂，边缘具不等长的黄白色针刺。花冠管状，通常已脱落，露出羽状冠毛，灰白色或黄白色。气微臭，味甘淡。根，呈长纺锤形或长椭圆形，常簇生而扭曲，长5～15 cm，直径2～8 mm。表面灰黄色、灰褐色或暗褐色，有不规则的纵皱纹及细横皱纹。质坚而脆，易折断，断面粗糙，皮部薄，棕褐色，有小裂隙，木部灰黄色或灰白色。气特异，味甘、微苦涩。

【品质】 全草以色灰绿、叶多者为佳。根以条粗、无须根及芦头者为佳。

【性味功效】 甘，凉。凉血止血，祛瘀消肿，解毒消痈。用于衄血，吐血，尿血，便血，崩漏，外伤出血，痈肿疮毒。

【附注】 现代各地用药习惯不同，华北地区及山东、江苏、安徽、四川、浙江、福建等地多用全草；中南及西南地区多用根。考诸历代本草记载，应以用根为主，故有“土人参”、“土洋参”之名。



【编号】 M00507238254H0CMMI H09947239061002300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大二郎箭

【来源】 马鞭草科植物过江藤 Phyla nodiflora (L.) Greene 的干燥全草。

【主产地】 主产于华南、华中及西南各地。

【性状特征】 全草长 15～90 cm，茎分枝，被小粗毛，节上生有须根。叶对生，近无柄，倒卵形，长 1～2.5 cm，先端钝或浑圆，基部楔尖，边缘在中部以上有利齿。穗状花序卵形或圆柱形，极稠密，花冠粉红色。

【品质】 本品以新鲜、质嫩者为佳。

【性味功效】 酸、甘、微苦，寒。祛风，清热，解毒，消肿。用于咽痛喉蛾，痈疽肿毒，热痢，淋病。

【附注】 本品在产地多鲜用。



【编号】 M00287263074FHCMMI H29187264011000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大车前草

【来源】 车前草科植物大车前 Plantago major L. 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、贵州、云南及西北地区。

【性状特征】 干燥的全草多卷曲皱缩，展平后的叶片呈卵形或宽卵形，先端圆钝，边缘波状或有不整齐锯齿，两面有短或长柔毛。花葶数条，长 8～20 cm，穗状花序长 4～9 cm，花密生，花萼无柄，花冠裂片椭圆形或卵形。

【品质】 本品以叶片大而整齐、不破碎、带花序者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。利水，通经。治疗水肿，闭经及蚂蚱症。

【附注】 苗族医习用药材。本属多个品种均作为“车前草”使用。



【编号】 M01997242011H0GYCM H29877243001000500CMMI

【鉴定人】 陈谦海

大叶紫珠

【来源】 马鞭草科植物大叶紫珠 Callicarpa macrophylla Vahl. 的干燥叶、枝。


【主产地】 主产于广东、广西、贵州。

【性状特征】 干燥的叶片多皱缩、破碎。完整的叶片展开后呈长椭圆形至椭圆状披针形，长 10～23 cm，宽 5～11 cm，先端渐尖，基部楔形或钝圆，边缘有锯齿。上表面灰绿色或棕褐色，有短毛，表面密生灰白色绒毛，叶脉突起。叶柄长 1～2 cm，密生灰白色绒毛。茎枝亦被黄褐色星毛。质脆。气微，味辛、微苦。

【品质】 本品以叶片完整、不破碎、质嫩者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。止血，止痛，散瘀消肿。用于吐血，咯血，衄血，便血，外伤出血。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M00347263023H0GYCM H07567264002002900GYCM

【鉴定人】 吴家荣

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大肺筋草

【来源】 伞形科植物薄片变豆菜 Sanicula lamelligera Hance 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、贵州等地。

【性状特征】 干燥全草矮小，多皱缩卷曲、破碎。完整的植株，长 13～30 cm，无毛。叶柄较长，可达 6～7.5 cm。完整的叶片 3 全裂呈复叶状，中间叶片近于倒卵形，基部楔形，两侧裂片斜椭圆形，基部斜阔楔形，长 2～5 cm，宽 1.5～2.5 cm，边缘有深缺裂，裂齿先端有刺毛，上面绿色，叶柄与下面带紫红色。小伞形花序排列成复伞形花序，花瓣白色或淡紫色。

【品质】 本品以茎叶完整、叶片多、色绿者为佳。

【性味功效】 辛、甘，平。散风，清肺，化痰，行血。用于感冒，咳嗽，哮喘，经闭。



【编号】 M05347213253FHCMMI H34767214074000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大茅香

【来源】 菊科植物羊耳菊 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC. 的干燥全草。

【主产地】 主产于华东、华中、西南各地。

【性状特征】 全草长约 1m，枝茎粗壮，被绵毛。单叶互生，狭矩圆形至近倒卵形，长 7～10 cm，先端渐尖至钝形，边缘有小锯齿，叶面绿色，有腺点，被粗毛，背白色，密被绢毛或绵毛。头状花序顶生或腋生，组成稠密的伞房花丛。

【品质】 本品以新鲜、质嫩者为佳。

【性味功效】 苦，微辛。祛风，利湿，行气，化滞。用于风湿关节疼痛，胸膈痞闷，痢疾，泄泻，痔疮，疥癣。

【附注】 本品在产地多鲜用。



【编号】 M00427238386FHCMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大籽蒿

【来源】 菊科植物大籽蒿 Artemisia sieversiana Ehrh. ex Willd. 的干燥全草。

【主产地】 主产于东北、华北及甘肃、陕西等地。

【性状特征】 全草长50～150 cm。茎被白毛，多分枝。单叶互生，有柄，2～3 回羽状深裂或全裂，终裂片宽线形、线形或近披针形，先端常钝，上面绿色，毛较少，下面灰绿色，密生白毛；茎上部叶羽状分裂或不分裂，近无柄。头状花序半球形，直径5～7 mm，有梗，下垂，排列成圆锥状花序。

【品质】 本品以新鲜、叶多、质嫩者为佳。

【性味功效】 甘，平。祛风，除湿，解毒，除邪气。用于风寒湿痹，黄疸，热痢，疥癞恶疮。

【附注】 本品在产地多鲜用。



【编号】 M00457238126H0XZDC H04487239024014200XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小龙胆草

【来源】 龙胆科植物青鱼胆草 Gentiana rhodantha Franch. 的干燥全草。

【主产地】 主产于贵州、云南。

【性状特征】 全草长 30～60 cm。根细条形，稍肉质，表面浅棕色或黄白色，直径约 1 mm。茎具棱，直径约 1～2 mm，黄绿色或带紫色，质脆，断面中空。基生叶丛生，披针形或卵状匙形；茎生叶对生，卵形或卵状三角形，长 0.7～2cm，宽 0.5～1.5 cm，先端尖，边缘有细锯齿，反卷，基部无柄抱茎。花单生于枝顶及上部叶腋，花萼筒状，花冠喇叭状，淡紫红色或浅黄棕色，有深紫色条纹。气微清香，茎叶味微苦，根味极苦。

【品质】 本品以茎枝整齐、叶片完整、带根者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清湿热，消炎，止痛。用于肝炎，支气管炎，小便不利。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M00527239041H0GYCM H18407240007017900GYCM

【鉴定人】 何顺志

小晕药

【来源】 蓼科植物华缺腰叶蓼 Polygonum runcinatum Buch.-Ham. var. sinense Hemsl. 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、湖北、湖南、陕西等地。

【性状特征】 全草长30～50 cm。根茎细弱黄色，须根黑棕色。茎纤细，稍分枝，紫色，有节及细白毛。叶互生，卵形或三角状卵形，长 5～8 cm，宽 3～5 cm，先端长渐尖，基部近截形，常具 2 圆裂片，叶片两面均被长柔毛，托叶鞘的缘毛甚短近无毛。头状花序，小形，通常数个生于枝条顶端。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 酸、苦、微辛，寒。清热解毒，活血消肿。用于痢疾，白带，血热头痛，崩漏，经闭，乳痈疮疖。

【附注】 小晕药与同属植物缺腰叶蓼 Polygonum runcinatum Buch.-Ham 同为赤胫散的多来源品种。



【编号】 M00587057082FHCMMI H30767057010002001CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

广金钱草

【来源】 豆科植物金钱草 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr. 的干燥枝叶。

【主产地】 主产于广东、广西、福建、湖南等地。

【性状特征】 株高 30～90 cm。茎直立，枝圆柱形，密被伸展的黄色短柔毛。顶端小叶圆形，革质，先端微凹，基部心形，长 1.8～3.4 cm，宽 2.1～3.6 cm，上面无毛，下面密被贴伏的茸毛；侧生小叶存在或脱落，若存在则远较顶生的小叶为小，圆形或椭圆形，长 1～1.6 cm，叶柄长 1～1.8 cm。总状花序顶生或腋生，极稠密，花小，紫色，有香气。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 甘、淡，平。清热祛湿，利尿通淋。用于尿路感染，泌尿系结石，胆囊结石，肾炎浮肿，黄疸，疳积，痈肿。



【编号】 M00987148272H0CMMI H14057148051001600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

广藿香

【来源】 唇形科植物广藿香 Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 的干燥地上部分。

【主产地】 原产菲律宾，现我国广州石牌、高要、肇庆、海南省万宁、云南临沧等地均有栽培。传统认为产于广州石牌的藿香质量最佳。

【性状特征】 全草长30～60 cm，老茎略呈方柱形，四角钝圆，灰棕色，木质而坚硬，有对生节痕，断面中心有白色髓部。嫩茎呈方柱形，密被毛茸，质微带韧性，折断面稍平坦，呈灰黄绿色。叶片对生，多皱缩或破碎，灰绿色、黄绿色或黄棕色，两面密被毛茸，质柔软。香气浓郁，味微苦而凉。

【品质】 本品以茎枝青绿、叶多、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 辛，微温。芳香化湿，祛暑解表，和胃止呕。用于外感邪气，内伤饮食，头痛寒热，胸脘痞闷，腹痛吐泻，痢疾，口臭。



【编号】 M10477264225H0CMMI H30137265081000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

马鞭草

【来源】 马鞭草科植物马鞭草 Verbena officinalis L. 的干燥全草或带根全草。


【主产地】 主产于湖北、江苏、贵州、广西等地。

【性状特征】 茎四棱形，棱上或节上有白色透明刚毛。叶对生，基生叶有柄，茎生叶无柄，叶片倒卵形至长圆形，多数作深三裂；大裂片复作不规则羽状分裂，最终裂片披针形，边缘有粗齿，两面有粗毛。夏秋开花，穗状花序顶生或腋生于茎上部的叶腋，长至30 cm，类似马鞭状。全草气微，味微苦。

【品质】 本品以色青绿、带花穗、无杂质者为佳。

【性味功效】 苦，凉。破血，通经，杀虫，消胀，清血。用于女子月经不通，肿瘤腹胀，下部湿疮阴肿，久疟。近年，广西有用全草作茶饮用以预防传染性肝炎的报道。

【附注】 各地马鞭草的伪品及易混品种较多，应特别注意鉴别应用。



【编号】 M01137263092H0CMMI H40427264020000100GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

中麻黄

【来源】 麻黄科植物中麻黄 Ephedra intermedia Schrenk et C. A. Mey. 的干燥草质茎。

【主产地】 主产于甘肃、青海、内蒙古、新疆等地。

【性状特征】 茎长圆柱状，多分枝，直径1.5～3 mm，常带较多的棕色木质茎。节间长2～6 cm，表面绿黄色或黄色，细纵棱线较明显，手触之有粗糙感。膜质鳞叶长2～3 mm，裂片3（稀2），裂片锐三角形或三角状披针形，先端微反曲。断面髓部常成三角状圆形。气微香，味涩、微苦。

【品质】 本品以色淡绿或黄绿、内心色红棕、手拉不脱节、味苦涩者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。发汗，散寒，平喘，利水。用于风寒感冒，喘咳，支气管哮喘，支气管炎，水肿。

【附注】 本品作为“麻黄”入药。



【编号】 M08746010005H0CMMI H15786010001000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乌奴龙胆

【来源】 龙胆科植物乌奴龙胆 Gentiana urnula H. Smith 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏。

【性状特征】 叶密集对生，似轮生状，叶片扇形，全缘，无柄。花1～3朵顶生，蓝紫色，并带有紫黑色条纹，花萼呈管状，5裂，花冠钟形，先端5裂，裂片全缘，雄蕊5，子房上位。

【品质】 全草以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，止泻。用于流感发热，咽喉肿痛，黄疸，热性腹泻。



【编号】 M01197239065H0XZDC H18507240007023000XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

乌韭

【来源】 鳞始蕨科植物乌蕨 Stenoloma chusanum (L.) Ching 的干燥全草。

【主产地】 主产于长江以南各地。

【性状特征】 全草长25～60 cm。根茎横生，密被赤褐色钻状鳞片。叶近生，3～4回羽状分裂，披针形，叶柄长达25 cm，黄绿色，稍有光泽。下部羽片卵形或披针形，斜展；小羽片矩圆形或披针形，末回羽片楔形，先端截形，有牙齿，基部楔形，下延。叶脉下面明显，孢子囊群顶生，每裂片1～2枚，囊群盖灰棕色，半环形，宽与叶缘等长，向外开裂。气微，味苦。

【品质】 本品以叶片整齐、色绿、孢子囊群多者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经、快经。清热解毒，利湿止血。用于风热感冒，中暑发痧，泄泻，痢疾，白浊，白带，咳嗽，吐血，衄血，牙疳，痈肿。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M00325023004H0GYCM H37725023003000200GYCM

【鉴定人】 何顺志

乌脚枪


【来源】 铁线蕨科植物扇叶铁线蕨 Adiantum flabellulatum L. 的干燥全草。

【主产地】 主产于云南、四川、贵州、广东、广西等地。

【性状特征】 根茎短而直立，被狭披针形的鳞片。叶柄簇生，坚韧，深褐色至紫黑色，光亮，基部具鳞片；叶片革质，两面均裸净，呈不整齐的阔卵形，长约20 cm，宽约15 cm，为2回或3回不对称的二叉分枝，中央羽片最大，呈线状披针形，小羽片斜方状椭圆形至扇形，交错生于叶轴两侧。孢子囊群椭圆形，生于小羽片的上缘或外缘的叶脉顶端。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 苦、辛，凉。清热，利湿，散瘀，消肿。用于急性传染性肝炎，痢疾，腹泻，砂淋，吐血，便血，瘰疬，烫伤，创伤出血。



【编号】 M01235031009FHCMMI H01275031001001500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

六月寒

【来源】 马鞭草科植物三花莸 Caryopteris terniflora Maxim. 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、陕西、甘肃等地。

【性状特征】 茎被白色柔毛，嫩枝四棱形。叶对生，宽卵形，长约 3 cm，宽约 2.5 cm，边缘有粗锯齿，被白色柔毛；叶柄长约 7 mm。聚伞花序腋生，花萼钟状，花冠淡紫红色，5 裂，左右对称，上面 4 裂片相等，最下 1 片较大，且具紫红色斑点。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 辛、微苦，平。解表宣肺。用于外感头痛，咳嗽，外障目翳，烫伤。

【附注】 本品在产地多鲜用。



【编号】 M01317263040FHCMMI H08437264003001300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

六棱菊

【来源】 菊科植物六棱菊 Laggera alata (Rorb.) Sch.-Bip. 的干燥全草。

【主产地】 主产于华南、华中及西南等地。

【性状特征】 老茎粗壮，直径约 6 mm，灰棕色，有不规则的纵皱纹；茎枝具翅 4～6 条，灰绿色至黄绿色，被有短腺毛；质坚而脆，断面中心有髓。叶互生，多破碎，灰绿色至黄棕色，被黄色短腺毛。气香，味微苦辛。

【品质】 本品以叶多、色青黄、无根者为佳。

【性味功效】 辛，温。祛风，除湿，化滞，散瘀，消肿，解毒。用于感冒咳嗽身痛，腹痛泻痢，风湿关节痛，妇女闭经，跌扑损伤，疔痈瘰疬，湿毒瘙痒。



【编号】 M01327238433FHCMMI H22297239133000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

凤仙透骨草

【来源】 凤仙花科植物凤仙 Impatiens balsamina L. 的干燥全草。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 茎粗壮，肉质。叶互生，披针形，长约 10 cm，先端长尖，边缘有深锯齿，基部楔形，叶柄有腺体。两性花腋生，花色有粉红色、红色、紫色、白色或杂色多种，单瓣或重瓣。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。祛风，活血，消肿，止痛。用于关节风湿痛，跌扑损伤，瘰疬痈疽，疔疮。



【编号】 M01347071003H0SM H21037071002000300CMMI

【鉴定人】 刘毅

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天青地白

【来源】 菊科植物日本鼠曲草 Gnaphalium japonicum Thunb. 的干燥全草。

【主产地】 主产于华东、西南等地。

【性状特征】 茎纤细，丛生，有白色绵毛。基部叶呈莲座状，线状倒披针形，长2.5～10 cm，宽4～7 mm，先端钝，基部窄细，全缘，上面绿色或稍有白色绵毛，下面有白色绒毛，茎部叶逐渐短小。头状花序多数，簇生于顶端，全部为管状花，棕红色。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 甘，凉。清热解表，明目，利尿。用于感冒发热，咳嗽头痛，咽痛，目赤翳障，小便热闭，淋浊，痈肿。

【附注】 本品在产地多鲜用。



【编号】 M01517238360FHCMMI H18957239107000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

木 贼


【来源】 木贼科植物木贼 Equisetum hiemale L. 的干燥地上部分。

【主产地】 主产于东北三省、陕西、湖北等地。以辽宁产者质佳。

【性状特征】 地上部分为带有鞘状叶的茎，茎呈长管状，不分枝。长20～60 cm，直径约2～6 mm。表面灰绿色或黄绿色，有20～30条细纵棱，平直排列。节明显，节间长2.5～9 cm。节上着生鳞片状合生的筒状叶鞘，上部棕灰色，叶鞘基部和先端具2圈深棕色或棕黑色较宽的环。质脆，易折断，断面中空，边缘有20～30个近圆形的小空腔，排列成环状，内有灰白色或浅绿色的薄瓤。气微，味甘淡、微苦涩。嚼之有沙石感。

【品质】 本品以茎粗长、表面色绿、不脱节者为佳。

【性味功效】 甘、苦，平。疏风散热，解肌，退目翳。用于迎风流泪，目生云翳，肠风下血，血痢，脱肛，痈肿。



【编号】 M01685006007H0CMMI H16045005002000300SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

木贼麻黄

【来源】 麻黄科植物木贼麻黄 Ephedra equisetina Bge. 的干燥草质茎。


【主产地】 主产于华北、西北等地。

【性状特征】 茎呈细长圆柱形，分枝较多，茎较细，直径约1～1.5 mm。表面草绿色至黄绿色，有纵走棱线。以手触之无粗糙感，节间长1.5～3 cm。节上有鞘状膜质鳞片，通常2裂，钝三角形。

【品质】 本品以干燥、粗壮、色淡绿、内心充实、味苦涩者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。发汗，平喘，利水。用于伤寒表实，发热恶寒，无汗，头痛鼻塞，骨节疼痛，风水浮肿，小便不利，风疹瘙痒。

【附注】 本品作为“麻黄”入药。



【编号】 M01696010002H0CMMI H15766010001000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

毛叶地瓜儿苗

【来源】 唇形科植物毛叶地瓜儿苗 Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel 的干燥全草。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 干燥的全草长 50～100 cm，或切成段。茎四方，直径 2～5 mm，有明显的节，茎及节上均有白色茸毛，节处尤为密集，表面黄褐色或微带紫色，每侧面有一纵沟。质轻脆，易折断，断面中央有白色的髓或中空。叶对生，叶片披针形，暗绿色，上面密被刚毛状硬毛，叶缘具缘毛，下面主要在脉上被刚毛状硬毛，两端渐狭，边缘具锐齿。气无，味淡。

【品质】 本品以叶多、色绿、不破碎、茎短、质嫩者为佳。

【性味功效】 苦、辛，微温。活血，行水。用于经闭，癥瘕，产后瘀滞腹痛，身面浮肿，金疮，痈肿。

【附注】 本品与同属植物地瓜儿苗 Lycopus lucidus Turcz. 同为“泽兰”的入药正品。



【编号】 M05207264134H0CMMI H24597265056000301CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

毛梗豨莶

【来源】 菊科植物毛梗豨莶 Siegesbeckia glabrescens Makino 的干燥地上部分。

【主产地】 主产于湖南、湖北、江苏等地。

【性状特征】 茎呈圆柱状，多分枝，长 30～50 cm，表面灰绿色至紫褐色，有纵沟及细纵纹，少被柔毛；节明显，略膨大；质脆，易折断，断面黄白色，髓部宽广，中空。叶对生，叶片多皱缩、卷曲，展平后呈卵圆形，灰绿色，边缘有钝锯齿。有的可见黄色头状花序。气微，味微苦。

【品质】 本品以叶多、枝嫩，色深绿者为佳。

【性味功效】 辛、苦，寒。祛风湿，利关节，解毒。用于风湿痹痛，筋骨无力，腰膝酸软，四肢麻痹，半身不遂，风疹湿疮。

【附注】 本品作为“豨莶草”入药。



【编号】 M10027238623H0CMMI H36357239189000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

水母雪莲花

【来源】 菊科植物水母雪莲花 Saussurea medusa Maxim. 的干燥全草。

【主产地】 主产于青海、甘肃、四川、云南、西藏等地。

【性状特征】 全株形似绵球状或圆柱状。主根长约 15 cm，直径约 2 cm，表面黑褐色或黄褐色，质脆，易折断，断面不平整，类白色至黄白色。根茎细长，上部有残存黑色膜质叶基。茎中部至顶部的叶片密集，皱缩卷曲，密被白色长绵毛。完整叶片长卵形或长椭圆形，全缘或有条裂。头状花序集生茎顶，呈半圆球形；花紫色或紫红色。稀见瘦果，冠毛白色，内层羽状。气淡，味微苦涩。

【性味功效】 苦，温。清热解毒，祛风除湿，通经活络，壮阳补血。用于炭疽病，中风，风湿关节炎，崩漏带下，月经不调，妇女小腹冷痛，经痛，肾虚腰痛，遗精阳萎。

【附注】 本品作为“雪莲花”入药。



【编号】 M08687238547H0XZDC H35087239180003200XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水皂角

【来源】 豆科植物豆茶决明 Cassia nomame (Sieb.) Kitag. 的干燥全草。

【主产地】 主产于贵州、四川等地。

【性状特征】 干燥的全草，茎枝呈圆形，棕黄色，基部灰黑色，表面有纵纹及疣状皮孔，质硬易折断，断面色白，松泡中空。叶多卷曲或脱落，棕绿色或灰绿色，质脆易碎。残存的荚果呈棕褐色。气微，味淡。

【品质】 本品以质干、叶多、色绿者为佳。

【性味功效】 甘、苦，平。清肝明目，和脾利水。用于眼目昏花，夜盲，偏头痛，水肿，脚气，黄疸。



【编号】 M01777148170FHCMMI H08497148029001500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

牙疳药

【来源】 茜草科植物长节糙叶耳草 Hedyotis uncinella Hook. et Arn. var. scabrida Franch. 的干燥全草。

【主产地】 主产于广西、云南等地。

【性状特征】 茎丛生，直立，方柱形，有槽，全体被有短毛。单叶互生，叶柄短或近无柄，托叶三角形，叶片革质而粗糙，长椭圆形或卵状矩圆形，长 2～5 cm，宽 1～1.5 cm，先端渐尖或较钝，全缘，上面绿色，下面淡绿色。聚伞花序密集成头状，紫红色，腋生或顶生。

【品质】 本品以枝叶完整、色绿、质嫩者为佳。

【性味功效】 甘、辛，凉。祛风利湿，健脾消积，清热解毒。用于风湿关节痛，小儿疳积，久泻，痢疾，牙疳，结膜炎，皮肤瘙痒。



【编号】 M01847232085FHCMMI H19657233029002301CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

牛蒡草

【来源】 菊科植物牛蒡 Arctium lappa L. 的干燥茎叶。

【主产地】 全国各地均产，一般为栽培品。

【性状特征】 根生叶丛生，茎生叶互生，叶片大，有长叶柄，表面有纵沟，叶片呈广卵形或心脏形，下部的叶长 40～50 cm，宽 30～40 cm，在茎上部的叶逐渐变小，先端钝圆而具一小尖头，基部心形，边缘稍带波状呈齿牙状，上面深绿色，光滑，下面密生灰白色短绒毛。头状花序丛生，生于枝端，排列成伞房状。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 甘，凉。祛风，通脉，除邪气，止痒。用于头风痛，烦闷，金疮，乳痈，皮肤瘙痒。

【附注】 本品在产地多鲜用。



【编号】 M01887238054H0SM H03547239021000100CMMI

【鉴定人】 秦松云

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

见血清

【来源】 兰科植物脉羊耳兰 Liparis nervosa (Thunb.) Lindl. 的干燥全草。

【主产地】 浙江、广东、四川、贵州等地。

【性状特征】 假鳞茎数枚，短，呈肉质，基部稍厚，高2.5～7 cm，表面有节。叶2～3枚，薄，卵形至矩圆形，长5～10 cm，先端渐尖，全缘，基部呈鞘状抱茎。总状花序疏散，长7～15 cm，花瓣绿紫色。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 苦，寒。凉血止血，清热解毒。用于吐血，咯血，肠风下血，血崩，手术出血，小儿惊风，热毒疮疡，蛇咬伤。

【附注】 本品在产地多鲜用。



【编号】 M01937326171FHCMMI H23747326075001500SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

车前草

【来源】 车前草科植物车前 Plantago asiatica L. 的干燥全草。

【主产地】 全国各地均有出产。

【性状特征】 根丛生，须状。叶全部基生，叶片广卵形或椭圆状卵形，长4～12 cm，宽3～9 cm，先端钝头或稍尖，基部圆形或广楔形，边缘全缘，波状，上面深绿色，下面淡色，两面无毛。花葶从叶丛中挺出，连同花序高达20～50 cm，有短柔毛。穗状花序狭长。无臭，味淡。

【品质】 本品以色绿、质嫩者为佳。

【性味功效】 甘，寒。利水，清热，明目，祛痰。用于小便不通，淋浊，带下，尿血，黄疸，水肿，热痢，泻泄，目赤肿痛。



【编号】 M01967242001H0CMMI H29847243001000100GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

仙鹤草

【来源】 蔷薇科植物龙芽草 Agrimonia pilosa Ledeb. 的干燥全草。

【主产地】 主产于浙江、江苏、湖北等地。

【性状特征】 干燥的全草，茎基部木质化，淡棕褐色至紫红色，径4～6 mm，光滑无毛，茎节明显，上疏下密，有时有残存托叶，上部茎绿褐色，或淡黄棕色，被白色柔毛，叶灰绿色，皱缩卷曲。偶可见花枝或果枝。气微，味苦涩。

【品质】 本品以梗色紫红、枝嫩、叶完整者为佳。

【性味功效】 苦、辛，平。止血，健胃。用于咯血，吐血，尿血，便血，赤白痢疾，崩漏带下，劳伤脱力，痈肿，创伤出血。



【编号】 M02087143005H0CMMI H01487143002000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

兰石草

【来源】 玄参科植物兰石草 Lancea tibetica Hook. f. et. Thoms. 的带根全草。

【主产地】 主产于西藏。

【性状特征】 植株矮小，高在 10 cm 以下。根茎细长，多横生，有节，节上生纤维状须根。叶6～10片，对生于极短的茎上，倒卵形至倒卵状长圆形或匙形，近革质，近全缘，基部下延成柄，有翅。花3～5朵排列成总状花序，花萼钟状，花冠深蓝紫色。果实浆果状，肉质，近球形，熟时黑紫色。

【品质】 本品以茎叶粗壮、带根者为佳。

【性味功效】 甘、苦，寒。清肺，祛痰，解毒。用于肺炎，肺脓疡，流感，痢疾，咽喉肿痛。

【附注】 藏医常用药材。



【编号】 M03777252036F0XZDC H22377253017000200SM

【鉴定人】 格桑索朗

北刘寄奴

【来源】 玄参科植物阴行草 Siphonostegia chinensis Benth. 的干燥全草。

【主产地】 主产于江苏、安徽、浙江等地。

【性状特征】 干燥的全草长 30～60 cm，枝表面紫褐色，被黄白色短柔毛，基部毛较少近于无毛，质坚实而硬，折断面黄白色，中央有髓。残留的叶片为黑褐色，多破碎不全，皱缩卷曲，质脆而易脱落。花序着生在枝端，花冠多数已萎缩，花萼黄褐色，宿存，内萼通常藏有多数棕褐色的种子。

【品质】 本品以干燥无根、色棕紫者为佳。

【性味功效】 苦，凉。清热利湿，活血祛瘀。用于黄疸，小便不利，水肿腹胀，跌损瘀痛，血痢，白带过多，月经不调。



【编号】 M02177252151H0CMMI H36547253049000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

半边莲

【来源】 桔梗科植物半边莲 Lobelia chinensis Lour. 的干燥带根全草。

【主产地】 主产于安徽、江苏、浙江等地。

【性状特征】 干燥的带根全草，多皱缩成团。根细长，圆柱形，带肉质，表面淡棕黄色，光滑或有细纵纹，生有须根。茎细长多节，灰绿色，靠近根茎部呈淡紫色，有皱缩的纵向纹理，节上有时残留有不定根。叶互生，狭长，表面光滑无毛，多皱缩或脱落。花基部筒状，花瓣5片。气微，有刺激性，味初微甘，后稍辛辣。

【品质】 本品以干燥、叶色绿、根色黄者为佳。

【性味功效】 甘，平。利水，消肿，解毒。用于黄疸，水肿，臌胀，泄泻，痢疾，蛇伤，疔疮，湿疹。



【编号】 M02217243082H0CMMI H24047244010000200GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

半枝莲


【来源】 唇形科植物半枝莲 Scutellaria barbata D. Don 的干燥全草。

【主产地】 主产于江苏、江西、福建等地。

【性状特征】 干燥全草，叶片多已脱落，为带有花穗的茎与枝，长 15～25 cm，四棱形，表面黄绿色或紫棕色，光滑，质柔软，折断面纤维状，中空，残留的叶片深黄绿色，多破碎不全，皱缩卷曲，质脆而易脱落，花穗着生在枝端，黄绿色。气微弱，味微咸苦。

【品质】 本品以干燥、枝叶完整、花穗多者为佳。

【性味功效】 辛，平。清热，解毒，散瘀，止血，定痛。用于吐血，衄血，血淋，赤痢，黄疸，咽喉肿痛，肺痈，疔疮，蛇咬伤。



【编号】 M02227264338H0CMMI H35687265090000800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

平车前草

【来源】 车前草科植物平车前 Plantago depressa Willd. 的干燥全草。

【主产地】 主产于东北、华北、西北等地。

【性状特征】 主根为圆柱形，直而长。叶片长椭圆形或椭圆状披针形，长 4～14 cm，宽 2～4 cm，先端钝尖，边缘有稀而不规则的浅齿，基部长而渐狭成柄，上面绿色，下面淡绿色，无毛或稍有毛，纵脉 5～7 条。

【品质】 本品以色绿、质嫩者为佳。

【性味功效】 甘，寒。利水，清热，明目，祛痰。用于小便不通，淋浊，带下，尿血，黄疸，水肿，热痢，泻泄，目赤肿痛。

【附注】 本品作为“车前草”入药。



【编号】 M01987242005H0CMMI H29857243001000200GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

打破碗花花

【来源】 毛茛科植物打破碗花花 Anemone hupehensis Lem. 的干燥或新鲜的全草。

【主产地】 主产于四川、陕西、甘肃等地。

【性状特征】 根呈长圆柱状，平直或弯曲，直径 0.5～2 cm，长 5～15 cm；表面灰棕色；质坚硬，不易折断。根茎部有 1 至数个茎基。茎纤细，长 40～80 cm，下部较粗，直径约 4 mm；表面密生短柔毛。基生叶为三出复叶或单叶，小叶卵形或狭卵形；茎生多单叶，长 4～8 cm，宽 1～8 cm，上表面深绿色，下表面灰绿色，均被细毛茸，边缘有锯齿。聚伞花序顶生，2 至 3 回分枝或成单花。

【性味功效】 苦，凉；有小毒。清热，杀虫。用于顽癣，秃疮。



【编号】 M08597015151FHCMMI H02897015005002000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瓜子金

【来源】远志科植物瓜子金 Polygala japonica Houtt. 的干燥全草

【主产地】主产于广东、广西、四川等地。

【性状特征】干燥的带根全草，长约20 cm。根圆柱状而弯曲，长短不一，多折断，粗约2～3 mm，外表灰褐色、暗黄棕色，有纵皱、横裂纹及结节，支根纤细。茎细，径不及1 mm，自基部丛生，灰褐色或稍带紫色，质脆易断。叶上面绿褐色，下面色浅或稍带红褐色，稍有毛茸。

【品质】本品以全株完整、连根、干燥者为佳。

【性味功效】辛、苦，平。镇咳，化痰，活血，止血，安神，解毒。用于咳嗽痰多，吐血，便血，怔忡，失眠，咽喉肿痛，痈疽疮毒，蛇咬伤。



【编号】M04577042015FHCMMI H30237042002001300CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

甘青青兰

【来源】唇形科植物甘青青兰 Dracocephalum tanguticum Maxim. 的干燥全草。

【主产地】主产于西藏自治区。

【性状特征】茎呈方柱状。表面灰绿色或蓝紫色，四面有纵沟，具节，质脆。断面有髓或中空。叶对生，多破碎，完整者长2～5 cm，羽状深裂至全裂，裂片常皱缩扭曲呈针状，展平后呈狭披针形，灰绿色，叶柄长0.2～1.4 cm，具5齿。花冠2唇形，蓝色，长2～3 cm。气清香，味辛，微苦。

【品质】本品以茎杆粗壮、色绿、无泥土杂质者为佳。

【性味功效】辛、微苦，寒。疏肝和胃，清热，利水。用于胃炎，溃疡病，肝炎，肝肿大，慢性气管炎。

【附注】藏医常用药物。



【编号】M02417264053H0XZDC H15027265025002900XZDC

【鉴定人】格桑索朗

甘青铁线莲

【来源】毛茛科植物甘青铁线莲 Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. 的干燥全株或茎叶。

【主产地】主产于新疆、西藏、甘肃等地。

【性状特征】缠绕茎藤或切成段。茎圆柱状，具纵棱，绿褐色，节部稍膨大。羽状复叶对生，小叶5～7片，顶端小叶较大，叶片披针形或狭长圆形，先端渐窄，边缘有不规则锐齿。花荷苞状，枯黄色。果序绒球形或扁绒球形，瘦果倒卵状，长约4mm，具长柔毛。质薄脆，常破碎。气微，味微苦、辛。

【性味功效】微苦、辛，平。健胃消积，解毒化湿。用于食积不化，腹满痞塞，腹痛腹泻，痈疮，湿疮。

【附注】常用藏药。《晶珠本草》收载。



【编号】M07167015272H0XZDC H10497015017011200XZDC

【鉴定人】格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

田基黄

【来源】 金丝桃科植物地耳草 Hypericum japonicum Thunb. 的干燥全草。

【主产地】 主产于广东、广西、四川、云南等地。

【性状特征】 干燥全草，茎略呈四棱柱状，光滑，粗约 1.5 cm，外表淡黄棕色或暗红棕色，节间长约 1～2 cm，易折断。叶片黄褐色或灰青色，皱缩，纸质，易碎，以放大镜观察，有细小透明油点。花序多折断而不完整，花萼花瓣干缩，黄棕色，或脱落。

【品质】 本品以干燥、枝叶完整、无杂质者为佳。

【性味功效】 苦、甘，凉。清热利湿，消肿解毒。用于传染性肝炎，泻痢，小儿惊风，疳积，喉蛾，肠痈，疖肿，蛇咬伤。



【编号】 M02467123016FHCMMI H20727123004002600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

白马骨

【来源】 茜草科植物白马骨 Serissa serissoides (DC.) Druce 的干燥全草。

【主产地】 主产于湖南、湖北、四川、贵州等地。

【性状特征】 干燥的枝叶呈深灰色。茎枝表面有细纵隙，栓皮往往剥离。嫩枝浅灰色，节处围有膜质的托叶，花丛生枝顶，花萼呈灰白色，5 裂，膜质。枝质稍硬，折断面带纤维性。叶大部脱落，绿黄色，薄革质，展平后呈倒卵形或倒披针形，长1.5～3 cm，宽 5～15 mm，先端渐尖，全缘，基部渐狭而成 1 短柄。

【品质】 本品以叶片多、色灰绿者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热解毒，舒筋活络。用于刀伤，瘫痪，男女弱症等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M02477232186H0GYCM H36157233061000100GYCM

【鉴定人】 陈谦海

白毛藤

【来源】 茄科植物白英 Solanum lyratum Thunb. 的干燥全草。

【主产地】 全国各地均有出产。

【性状特征】 茎呈圆柱状，分枝少，长1～1.2 m，直径2～7 mm。外表黄绿色或棕绿色，密被灰白色柔毛，主茎较粗处毛较少，质坚硬，易折断，断面纤维性，中上部分中空。叶互生，叶柄长 1～3 cm；叶片多皱缩卷曲，展开后呈戟形或琴形，长2.4～7.5 cm，宽 1.2～3.6 cm，表面密被毛茸。果实黄绿色或暗红色。气微，味苦。

【品质】 本品以茎枝粗壮、叶片多而完整、色绿者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热利湿，祛风解毒。用于黄疸，淋病，风湿关节炎等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M02497250075H0GYCM H36817251021001900GYCM

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白牛胆

【来源】 菊科植物羊耳菊 Inula cappa (Buch.-Ham.) DC. 的干燥全草。

【主产地】 主产于贵州、云南、广西。

【性状特征】 干燥的全草多卷曲、皱缩。根略呈圆柱形，有分枝，长 2～20 cm，直径 0.1～1.5 cm，表面深褐色，断面黄白色，有的中部黑色。茎圆柱状，少分枝，直径 0.3～1 cm，表面黄绿色或黄棕色，密被茸毛。叶互生，有短柄；叶片长椭圆形至披针形，长 10～15 cm，宽 3～5 cm；先端渐尖，基部楔形，边缘有疏齿，上表面深绿色，下表面密被灰白色茸毛。头状花序多数，排成圆锥状，花淡黄色。气微，味苦微甜。

【品质】 本品以根及茎粗壮、叶多而完整、色绿者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经、快经。散风清热，解毒消肿。用于感冒发热，咽喉肿痛，风湿疼痛，痈疖疔疮，乳腺炎等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M02507238368H0GYCM H21367239123000200GYCM

【鉴定人】 陈谦海

白花蛇舌草

【来源】 茜草科植物白花蛇舌草 Hedyotis diffusa Willd. 的干燥全草。

【主产地】 主产于长江以南各地。

【性状特征】 干燥全草多扭缠成团状，灰绿色或灰棕色。有主根 1 条，须根纤细。茎细而卷曲，质脆易折断，中央有白色的髓部。叶多破碎，极皱缩，易脱落，有托叶，长 1～2 mm。花腋生，多具梗。气微，味淡。

【品质】 本品以质嫩、茎叶完整、茎髓部饱满者为佳。

【性味功效】 微苦、微甘，凉。清热，利湿，解毒，抗癌。用于肺热喘咳，湿热黄疸，肠炎，热毒疮疡，多种癌肿。



【编号】 M02567232071H0CMMI H19597233029001000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

白蒿

【来源】 菊科植物大籽蒿 Artemisia sieversiana Ehrh. ex Willd. 的干燥全草。

【主产地】 主产于东北、华北等地区。

【性状特征】 干燥的全草，叶多皱缩卷曲，绿色或深绿色，茎被白毛，并有纵棱。完整叶展平后呈 2～3 回羽状深裂或全裂，终裂片宽线形、线形或近披针形，先端常钝，上面毛较少，下面密生白毛；茎上部的叶羽状分裂或不分裂；近无柄。头状花序半球形，总苞片密被白毛，灰黄绿色；小花皆为管状，黄色，表面有腺点。

【品质】 本品以茎叶鲜嫩、叶片完整、色绿者为佳。

【性味功效】 和性药。用于风寒湿痹，黄疸，热痢。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M05957238126H0GYCM H04487239024014200XZDC

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石吊兰

【来源】 苦苣苔科植物石吊兰 Lysionotus pauciflorus Maxim. 的干燥全草。

【主产地】 主产于贵州、四川、广西、广东。

【性状特征】 本品的茎呈圆柱状，长 25～60 cm，直径 2～5 mm。表面淡棕色或灰褐色，有纵皱纹，节膨大，常有不定根。质脆，易折断，断面黄绿色至黄棕色，中心有空隙。叶轮生或对生，有短柄；叶片宽披针形或狭卵形，长 1.5～6 cm，边缘反卷，上部有明显的大锯齿，两面灰绿色至灰棕色。气微，味苦。

【品质】 本品以叶片完整而不破碎、色绿者为佳。

【性味功效】 和性药。软坚散结，止咳化痰。用于淋巴结结核，慢性气管炎等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M02817256076H0GYCM H24947257034002100GYCM

【鉴定人】 王文采

石竹

【来源】 石竹科植物石竹 Dianthus chinensis L. 的干燥地上部分。

【主产地】 主产于河北、四川、湖北、湖南、浙江、江苏等地。

【性状特征】 全长 30～50 cm。茎圆柱状，表面淡绿色或黄绿色，基部略带紫色，光滑无毛，节膨大；质坚脆，易折断，断面中空。叶对生，线形或线状披针形，长 3～5 cm，宽约 5 mm。枝顶有 2～3 个宿萼，黄绿色，表面具纵细纹，有时残存皱缩破碎的花瓣，棕紫或棕黄色，先端浅裂呈锯齿状，完整全花长约3 cm，萼筒长约为全花的 1/2；萼下有数枚小苞片，长约为萼筒的 1/2，苞片先端呈尾状渐尖。气微，味淡。

【品质】 本品以色黄绿、穗及叶多者为佳。

【性味功效】 苦，寒。利尿通淋，破血通经。用于热淋，血淋，石淋小便不通，淋沥涩痛，月经闭止。

【附注】 本品作为“瞿麦”入药。



【编号】 M10417053026H0CMMI H14167053007000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

石香薷

【来源】 唇形科植物石香薷 Mosla chinensis Maxim.的干燥地上部分。

【主产地】 主产于江西。

【性状特征】 全草长 26～40 cm。茎方柱状或近圆柱状，直径 1～2 mm，基部紫棕色，上部黄绿色，节间长3～5 cm。叶对生，多皱缩或脱落，灰绿色，展开后叶片呈披针形，边缘有疏齿，两面被疏柔毛及腺点。总状花序头状。质脆易碎。气香，味辛凉。

【品质】 本品以质嫩、穗多、气香浓者为佳。

【性味功效】 辛，微温。发汗解表，和中利湿。用于暑湿感冒，恶寒发热，头痛无汗，腹痛吐泻，小便不利。



【编号】 M02837264173H0CMMI H26457265066000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石茶草

【来源】 蓼科植物头花蓼 Polygonum capitatum Ham. ex D. Don 的干燥全草。

【主产地】 主产于广西、云南、贵州。

【性状特征】 茎呈圆柱形，红褐色，茎节处生柔毛，断面中空。叶互生，平展后为椭圆形，长2～5 cm，宽1～2 cm，先端钝尖，基部楔形，全缘，具红色缘毛，上面绿色，常有人字形红晕，下面绿色带紫红色，两面均被褐色疏柔毛；叶柄短或无柄，基部有草质耳状片；拖曳鞘筒状，膜质。花序头状，顶生或腋生。瘦果卵形，3棱，黑色。气微，味微苦涩。

【品质】 本品以茎叶繁茂、叶片完整不碎、带花序者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经、快经。解毒，散瘀，利尿通淋。用于痢疾，肾炎，膀胱炎，尿路结石，风湿痛，跌扑损伤，疮疡湿疹等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M02867057026H0GYCM H30477057010003200GYCM

【鉴定人】 何顺志

节裂角茴香

【来源】 罂粟科植物节裂角茴香 Hypecoum leptocarpum Hook. f. et Thoms. 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏、四川、甘肃、青海等地。

【性状特征】 干燥的全草，多皱缩卷曲，表面深棕色或棕褐色。全株长约30～60 cm，外表有白粉。根直，呈圆柱形。完整的叶展平后长6～20 cm，具柄稍长，叶片轮廓为矩圆形，2回羽状全裂，1回裂片3～6对，小裂片披针形或狭倒卵形。花茎多数，花瓣淡紫色或白色。

【品质】 本品以茎叶完整、带根者为佳。

【性味功效】 苦，寒。解热镇痛，消炎解毒。用于伤风感冒，头痛，四肢关节疼痛，胆囊炎，食物中毒。

【附注】 藏医常用药材。



【编号】 M04467032119H0SM H20667032013000200XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

辽细辛

【来源】 马兜铃科植物辽细辛 Asarum heterotropoides Fr. Schm. var. mandshuricum (Maxim.) Kitag. 的干燥带根全草。

【主产地】 主产于东北三省。

【性状特征】 叶片1～2枚，下连根茎及根，有时可见花或果实。叶柄长，有纵纹，叶片多皱缩或破碎，质薄，灰绿色，有时带黄色，质脆易碎。花单一，暗紫褐色，呈碗状。根茎为不规则圆柱状，纤细弯曲，具分枝，长1～4 cm，直径2～4 mm，灰棕色，粗糙，有节，节间约2～3 mm。根细长，密生节上，灰棕色，表面光滑，或有微细纵皱纹，下端常有细须根。质脆易断，断面平坦，黄白色，气甚芳香。

【品质】 本品以根色灰黄、叶色绿、味辛辣而麻舌者为佳。

【性味功效】 辛，温。祛风，散寒，行水，开窍。用于风冷头痛，鼻渊，齿痛，痰饮咳逆，风湿痹痛。

【附注】 本品作为“细辛”入药。



【编号】 M02937024056H0CMMI H04677024003001201CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

龙葵

【来源】 茄科植物少花龙葵 Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima 的干燥全草。

【主产地】 主产于贵州、四川、云南。

【性状特征】 茎呈圆柱状，有分枝，长 20～60 cm，直径 0.2～1 cm。表面绿色或黄绿色，皱缩成沟槽状。质硬而脆，断面黄白色，中空。叶对生，皱缩或破碎，完整者展平后呈卵形，长 2.5～10 cm，宽 1.5～5 cm，暗绿色，全缘或有不规则的波状粗齿，两面光滑或疏被短柔毛。花已脱落，存留者为侧生的聚伞花序，花冠棕黄色。

【品质】 本品以茎叶繁茂、叶片完整而不碎、色绿者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经、快经。清热解毒，消肿散结，消炎利尿。用于疮疖肿痛，尿路感染，小便不利，肿瘤等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M03037250080H0GYCM H36857251021004500CMMI

【鉴定人】 陈谦海

光石韦

【来源】 水龙骨科植物光石韦 Pyrrosia clavata (Bak.) Ching 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、云南、贵州等地。

【性状特征】 根茎短粗，密被鳞片，鳞片呈线状披针形，褐色，边缘不整齐。叶簇生，叶柄长 5～9 cm，幼嫩时被毛，叶片呈披针形，长 20～50 cm，宽 2～4 cm，先端渐尖，基部渐狭，全缘，叶片厚革质，淡绿色，上面有黑点，有时被少许星状毛，下面被白色星状毛。孢子囊群分布在叶片中部以上。

【品质】 本品以新鲜、叶片多而厚、质嫩者为佳。

【性味功效】 苦、微辛，微寒。清热，除湿，利水，止血。用于咳嗽，吐血，小便不利。

【附注】 本品在产地多鲜用。



【编号】 M01855056082FHCMMI H32195056020000900SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

全缘马先蒿

【来源】 玄参科植物全缘马先蒿 Pedicularis integrifolia Hook. f. ssp. integrrima (Pennel et Li) Tsoong. 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏。

【性状特征】 干燥的全草矮小，呈黑色，茎叶多卷曲皱缩。带有较粗壮的根茎，根呈纺锤状，肉质。茎密被短毛。叶对生，叶片呈狭长圆状披针形或长圆状三角形，全缘，长 1～2 cm，两面被毛，基生叶具长柄，柄长 2～4.5 cm，具狭翅，茎生叶无柄。花紫红色，聚生于茎端。

【品质】 本品以茎叶完整、不破碎或破碎少者为佳。

【性味功效】 藏医认为：本品可干燥骨黄水，能愈合疮口；利尿，可治小便不通。

【附注】 藏医常用药物。为藏药“浪那”入药品种之一。



【编号】 M03117252099F0XZDC H28577253037012601XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

全萼龙胆

【来源】 龙胆科植物全萼龙胆 Gentiana lhassica Burkill. 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏、青海、云南等地。

【性状特征】 株高10～25 cm，基部有枯柄纤维。带有多数须根。茎丛生，叶丛生，呈莲座状，叶片披针形或线状椭圆形，长5～15 cm，宽8～14 mm，两端渐狭，叶柄膜质；茎生叶少，线形至线状披针形，较小。聚伞花序顶生或腋生，花萼筒膜质，常带紫红色；花冠蓝色，无斑点，花常单生。

【品质】 本品以茎叶完整而多、不破碎者为佳。

【性味功效】 苦，温。清热，消炎。用于扁桃体炎，荨麻疹，炭疽，风湿关节炎。

【附注】 藏医常用药。为藏药“解吉那保”入药品种之一。



【编号】 M07887239124H0XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

华细辛

【来源】 马兜铃科植物华细辛 Asarum sieboldii Miq. 的干燥带根全草。

【主产地】 主产于陕西。

【性状特征】 叶片1～2枚，下连根茎及根，有时可见花或果实。叶柄长，有纵纹，叶片多皱缩或破碎，质薄，灰绿色，有时带黄色，质脆易碎。花单一，暗紫褐色，呈碗状。根茎较长，为不规则圆柱状，纤细弯曲，具分枝，长3～8 cm，直径5～8 mm，灰棕色，粗糙，有节，节间极短，仅约1 mm。根细长，密生节上，灰棕色，表面光滑，或有微细纵皱纹，下端常有细须根。质脆易断，断面平坦，黄白色，香气及辛辣味较弱，而麻木烧灼感较强。

【品质】 本品以根色灰黄、叶色绿、味辛辣而麻舌者为佳。

【性味功效】 辛，温。祛风，散寒，行水，开窍。用于风冷头痛，鼻渊，齿痛，痰饮咳逆，风湿痹痛。

【附注】 本品作为“细辛”入药。



【编号】 M05307024075H0CMMI H04757024003002800CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

吉祥草

【来源】 百合科植物吉祥草 Reineckia carnea (Andr.) Kunth 的干燥全草。

【主产地】 主产于贵州、四川、云南、广东。

【性状特征】 本品根茎细长，呈圆柱状，长短不一，直径2～5 mm，表面黄棕色或黄绿色，节明显，节间短缩，有纵皱纹。节稍膨大，常有残留的膜质鳞叶和弯曲卷缩的须状根。根上密布白色毛状物。叶簇生于茎顶或节处，叶片绿褐色或浅棕褐色，多皱缩，湿润展开后呈条状披针形，全缘。气微，味苦。

【品质】 本品以根粗壮、色棕或色绿、叶片完整者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清肺，止咳，理血，补肾，解毒，接骨。用于肺热咳嗽，吐血，肺结核，急慢性支气管炎，哮喘，黄疸型肝炎，慢性肾盂肾炎，遗精，骨折等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M03197293292H0GYCM H32777293041000100GYCM

【鉴定人】 袁家谟

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

地柏枝

【来源】 卷柏科植物江南卷柏 Selaginella moellendorfii Hieron 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、湖南、福建、广东、广西等地。

【性状特征】 干燥的全草多皱缩或扭曲，表面黄褐色至深褐色。下部茎不分枝，其上叶疏生，贴伏，钻状卵圆形，具短芒；上部枝着生的叶较密，羽状分枝，全部呈卵状三角形，长5～12 cm；叶小，排成4行，两行侧叶的叶片不对称，两行中叶的叶片卵圆状椭圆形，渐尖，有芒，中脉明显，边缘白色。孢子囊单生于枝顶。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 甘、辛，平。止血，解热，利湿。用于吐血，便血，血崩，创伤出血，黄疸。



【编号】 M01155004013FHCMMI H35985003001003500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

地蜂子

【来源】 蔷薇科植物三叶委陵菜 Potentilla freyniana Bornm 的干燥全草。

【主产地】 生产于四川、贵州、湖北。

【性状特征】 主根短而粗，状如蜂子，须根多数。茎细长柔软，有柔毛。3出复叶；基生叶的小叶椭圆形、矩圆形或斜卵形，长1.5～5 cm，宽1～2 cm，基部楔形，边缘有钝锯齿，近基部全缘，下面沿叶脉处有较密的柔毛；叶柄细长，也有柔毛；茎生叶小叶片较小，叶柄短或无毛；托叶卵形，被毛。顶生总状聚伞花序，花小，黄色。结小瘦果，黄色，卵形，无毛，有小皱纹。

【品质】 本品以茎叶繁茂、色深绿、根粗壮者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。止痢，止血，用于红白痢。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M03277143174H0GYCM H31107143035002800GYCM

【鉴定人】 谢德文

地锦草

【来源】 大戟科植物地锦草 Euphorbia humifusa Willd. 的干燥全草。

【主产地】 主产于浙江、安徽、江苏、江西等地。

【性状特征】 干燥的全草多皱缩卷曲，根细小。茎细，呈叉状分枝，表面带紫红色，光滑无毛或疏生白色细柔毛，质脆，易折断，断面黄白色，中空。单叶对生，具淡红色短柄或几无柄；叶片多皱缩或已脱落，展平后呈长椭圆形，长5～10 mm，宽4～6 mm；绿色或带紫红色，通常无毛或疏生细柔毛，边缘具小锯齿或微呈微波状。杯状聚伞花序腋生，较小。

【品质】 本品以茎叶完整、色绿或紫红、无杂质者为佳。

【性味功效】 苦、辛，平。清热解毒，活血，止血，利湿。用于热毒泻痢，便下脓血，衄血，痔疮出血，崩漏。

【编号】 M03287136076H0SM H16907136033000600CMMI

【鉴定人】 秦松云

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

多刺绿绒蒿

【来源】 罂粟科植物多刺绿绒蒿 Meconopsis horridula Hook.f. et Thoms. 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏、青海、四川等地。

【性状特征】 根呈圆柱状。茎高30～100 cm。鲜品茎叶折断，有黄色叶汁；干燥药材多皱缩卷曲。全体除花序外密生黄色硬刺。基生叶和茎下部叶多数，叶片倒披针形或狭倒卵形，长7～25 cm，宽1～4 cm，先端微尖或钝，基部渐狭成柄。边全缘或波状。茎上部叶较小。总状花序通常有多数花，只下部生苞片，蓝紫色。

【品质】 本品以茎叶完整、带根、色绿、无杂质泥土者为佳。

【性味功效】 苦，寒；有小毒。活血化瘀，镇痛。用于跌扑损伤。

【附注】 藏医常用药材。



【编号】 M03297032125H0XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

杠板归

【来源】 蓼科植物扛板归 Polygonum perfoliatum L. 的干燥茎叶。

【主产地】 主产于江苏、浙江、福建及贵州。

【性状特征】 本品的茎呈方状，有棱角，多分枝，直径可达2 mm，表面紫红色或紫棕色，棱角上有倒钩刺，节略膨大，节间长2～6cm，断面纤维性，黄白色，有髓或中空。叶互生，有长柄，盾状着生；叶片多皱缩、破碎、脱落，残留的叶呈焦黄绿色，展平后呈近等三角形，下表面叶脉及叶柄均有倒钩刺。花穗着生在顶端或生于上部叶腋，花小，多萎缩或脱落。气微，茎味淡，叶味酸。

【品质】 本品以叶多而完整、茎粗壮者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热解毒，止咳化痰。用于外感咳嗽，百日咳，咽喉肿痛及小儿高热惊风等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M04157057072H0GYCM H30717057010001900GYCM

【鉴定人】 何顺志

朱砂草

【来源】 唇形科植物血盆草 Salvia cavaleriei Lévl. var. simplicifolia Stib. 的干燥带根全草。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 茎四棱状，被细柔毛。单叶对生，展开完整叶片呈心形或心状三角形，先端锐尖或钝，边缘圆齿形，上面暗紫色，下面紫红色。轮伞总状花序。气微，味微苦。

【性味功效】 微苦，凉。凉血止血，活血消肿，清热利湿。用于咳血，吐血，闭血，崩漏，创伤出血，跌扑伤痛，疮痈疖肿，湿热泻痢，带下。



【编号】 M08387264281H0CMMI H34447265087001602CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

灯心草


【来源】 灯心草科植物灯心草 Juncus effusus L. 的干燥茎髓或全草。

【主产地】 主产于四川、贵州、云南等地。

【性状特征】 干燥的茎髓，呈细长圆柱状，一般长50～60 cm，也有达1m以上者。表面乳白色至淡黄白色，粗糙，有细纵沟纹。用放大镜观察，可见表面有许多丝状物，相互交织成网，外表面多呈短毛状。质轻软如海绵状，略有弹性，易折断，断面不平坦，白色。气微，味淡。

【品质】 本品以表面色白、条长、粗细均匀、有弹性者为佳。

【性味功效】 甘、淡，寒。清心降火，利尿通淋。用于淋病，水肿，小便不利，湿热黄疸，心烦不寐，小儿夜啼，喉痹。



【编号】 M03407327005V0CMMI H21907327001000500SM

【鉴定人】 格桑索朗

百两金

【来源】 紫金牛科植物百两金 Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. 的干燥全草。

【主产地】 主产于华东、华南、西南等地。

【性状特征】 茎常不分枝，或于近茎梢处有细分枝。叶互生，披针形或广披针形，长9～20 cm，宽1.5～5 cm，先端渐尖，边缘近于全缘，或具微波状锯齿，上面深绿色，下面浅绿色，叶柄长8～15 mm。花由茎梢叶腋间抽出，多数，排列成伞房花序，花冠带紫红色，钟状。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 苦、辛，凉。清热，祛痰，利湿。用于咽喉肿痛，肺病咳嗽，咯痰不畅，湿热黄疸，肾炎水肿。

【附注】 本品在产地多鲜用。



【编号】 M01627223014FHCMMI H03617224002001700CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

红毛对筒草

【来源】 报春花科植物狭叶排草 Lysimachia trientaloides Hemsl. 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、贵州。

【性状特征】 须根多数，呈淡黄色至黄褐色。茎丛生，不分枝，近基部红色，有柔毛。上部绿色，节稍膨大，有短柔毛。茎下部叶退化，很小，如鳞片状，对生；茎顶叶轮生，多为4～7片，大小不等，圆形至倒卵形，长4～14 cm，宽2～10 cm，先端急尖，全缘，稍呈皱波状，无柄或柄极短。花簇生于茎顶；花萼合生成球状，淡绿色；花冠黄色。蒴果球形。

【品质】 本品以须根多、叶片完整而大者为佳。

【性味功效】 性热，入冷经。祛风，活血。治风湿痹痛，半身不遂，跌扑损伤，小儿惊风。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M03587240059H0GYCM H24927241007013500GYCM

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

老鹳草

【来源】 牻牛儿苗科植物牻牛儿苗 Erodium stephanianum Willd. 的干燥全草。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 茎长 30～50 cm，直径 3～7 mm，多分枝，节膨大，表面灰绿色或带紫色，有纵沟纹及稀疏的茸毛，质脆，断面黄白色。叶对生，具长叶柄及托叶，叶片皱缩或破碎脱落，完整者为二回羽状深裂，裂片宽 3 mm 以下、蒴果长圆形，长 0.5～1 cm，具长柄，生于叶腋。花萼宿存，5 裂，花柱宿存，长 2.5～4 cm，形似鹳喙，成熟后常成 5 裂瓣，呈螺旋状卷曲而露出里面棕色的毛。无臭，味淡。

【品质】 本品以身干、色灰绿、叶花果实多者为佳。

【性味功效】 苦、辛，平。祛风，活血，清热解毒。用于风湿疼痛，拘挛麻木，痈疽，肠炎，痢疾。



【编号】 M03727067002H0CMMI H16267067002000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

肉苁蓉

【来源】 列当科植物肉苁蓉 Cistanche deserticola Y. C. Ma 的干燥肉质茎。

【主产地】 主产于内蒙古、甘肃、青海、新疆等地。

【性状特征】 肉质茎扁圆柱形，稍弯曲。长 10～30 cm，宽 2～8 cm，厚 1.5～4 cm。表面暗棕色、灰棕色或黑棕色。密被呈瓦状排列的类三角形的肉质鳞片，通常鳞片先端已断或鳞片已脱落而留下横长短线状鳞片痕。体重，质坚实而硬，回软后而有韧性，不易折断。断面暗棕色或黑棕色，有淡棕色点状维管束排列成波状环纹，有时中空。气微，味甜微苦。

【品质】 本品以条粗壮、密被鳞片、色棕褐、质柔润者为佳。

【性味功效】 甘、咸，温。补肾益精，润燥滑肠。用于男子阳萎，女子不孕，带下，血崩，腰膝冷痛，血枯便秘。



【编号】 M03757253007H0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

观音草

【来源】 百合科植物吉祥草 Reineckia carnea (Andr.) Kunth 的干燥全草。

【主产地】 主产于云南、贵州、广东、广西等地。

【性状特征】 干燥的全草呈黄褐色，根茎细长，节明显，节上有残留的膜质鳞叶，并有少数弯曲卷缩的须状根。叶多皱缩破碎或脱落，展平完整的叶片呈长线形、卵状披针形或线状披针形，无毛、全缘、无柄，基部平阔，长 7～50 cm，宽 10～28 mm。圆锥花序生于叶腋，长达 15 cm，无毛，花被片内面淡粉红色或白色，外面紫红色。

【品质】 本品以茎叶完整、色黄褐、带根及根茎者为佳。

【性味功效】 甘，凉。清肺，止咳，理血，解毒。用于肺热咳嗽，吐血，衄血，便血，跌扑损伤，疮毒，赤眼，疳积。



【编号】 M03887293292FHCMMI H32777293041000100GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

问荆

【来源】 木贼科植物问荆 Equisetum arvense L. 的干燥全草。

【主产地】 主产于陕西、四川、贵州。

【性状特征】 干燥的全草长约30 cm，茎多分枝，呈轮状着生，但分枝常脱落。茎圆柱状或略扁，浅绿色，有纵棱数条，节明显，节间较长，节上有退化成硬膜质的鳞叶，其下部联合呈鞘状，先端有齿裂，色较深，黑褐色，边缘较浅。基部有时带有部分根，黑褐色，气微。

【品质】 本品以茎粗长、色绿、质厚、不脱节者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热明目，接骨。治风热目赤，骨折。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M03895006001H0GYCM H16025005002000100GYCM

【鉴定人】 何顺志

阴地蕨

【来源】 阴地蕨科植物阴地蕨 Sceptridium ternatum (Thunb.) Lyon 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、浙江、福建、贵州。

【性状特征】 茎细长，长15～40 cm，直径2～3.5 mm，表面灰褐色，下部簇生数条须根。根长约5 cm，直径约2 mm，常弯曲，表面黄褐色，具横向皱纹；质脆易断，断面白色，粉性。叶片卷缩，黄绿色或灰绿色，展开后呈阔三角形，3回羽裂，侧生羽片3～4对；叶脉不明显。孢子叶柄黄绿色或淡红棕色；孢子囊穗棕黄色。气微，味微甘而微苦。

【品质】 本品以叶片多而完整、茎粗壮者为佳。

【性味功效】 和性药。止咳化痰，补虚。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M03915008009H0GYCM H35275008003000400GYCM

【鉴定人】 何顺志

伸筋草

【来源】 石松科植物石松 Lycopodium japonicum Thunb. 的干燥全草。

【主产地】 主产于湖北、浙江、贵州、四川等地。

【性状特征】 匍匐根茎横走，呈细圆柱状，细长而弯曲。长30 cm，可达2 m，直径2～5 mm，分枝。表面黄色、黄绿色或浅绿色，质柔韧，不易折断，断面浅黄色或近白色，中央有白色木心。直立茎上面生有二歧或分枝茎。鳞叶皱缩而弯曲，密生于根茎及茎上，线形或线状披针形，呈螺旋状排列，长3～5 mm，宽0.3～1 mm，表面黄绿色、黄色或淡黄棕色，无毛，叶端渐尖，呈芒状，全缘或有微锯齿，易破碎，叶脉不明显。枝端有时具1直立棒状孢子囊穗。气微，味淡。

【品质】 本品以茎长、色黄绿者为佳。

【性味功效】 微苦、辛，温。祛风除湿，舒筋活络，散寒止痛。用于风寒湿痹，关节酸痛，跌扑损伤。



【编号】 M03945003008H0CMMI H24515002004000900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枸儿茶

【来源】 菊科植物烟管头草 Carpesium cernuum L. 的干燥全草。

【主产地】 全国大部分地区均有出产。

【性状特征】 茎呈圆柱状，具细纵纹，质硬，不易折断。茎下部叶长椭圆形，长6～12cm，宽4～6cm，多皱缩，易碎，绿色或绿褐色，两面均被白色或淡黄色柔毛和腺点（在放大镜下），中、上部叶较小。头状花序单生于茎端或枝端，下垂；苞叶2～3枚，长2～4cm；总苞直径0.8～1.8cm，总苞片4层，外层苞片叶状，披针形，与内苞片等长，草质或基部干膜质。微有香气，味苦。

【品质】 本品以新鲜、色绿、无老茎者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热解毒，消肿止痛。用于感冒发热，咽喉肿痛，牙痛等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M04137238228H0GYCM H08317239046000200GYCM

【鉴定人】 何顺志

束花石斛

【来源】 兰科植物黄草石斛 Dendrobium chrysanthum Wall.的干燥茎。


【主产地】 主产于广西、贵州、云南、西藏等地。

【性状特征】 本品为石斛类中茎较长大者，干燥的茎长均在30 cm以上。茎呈圆柱状，肉质肥厚，略弯曲，表面金黄色或淡褐色，有纵沟槽。节明显，节间长2～5 cm，节处可见叶鞘脱落后留下的鳞秕状斑点。折断面纤维性，嚼之有黏性。

【品质】 本品以茎粗壮、肥厚、多汁、致密者为佳。

【性味功效】 甘、淡、微咸，寒。生津益胃，清热养阴。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热，阴伤目暗。

【附注】 本品作为“石斛”入药。



【编号】 M08927326087H0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

角蒿

【来源】 紫葳科植物全缘角蒿 Incarvillea compacta Maxim.的带根全草。

【主产地】 主产于西藏、青海、甘肃、四川、云南等地。

【性状特征】 根呈长短不等的圆柱状，长15～20 cm，直径2～3 cm，表面淡黄色至黄褐色，断面类白色至淡黄色。茎短缩。羽状复叶，小叶多脱落，暗绿色至淡黄色。花序总状；花皱缩，淡紫色或黑褐色。完整花漏斗状，先端5浅裂，雄蕊4，二强。种子卵圆状，扁压，深灰色，长3 mm左右，宽2 mm左右，边缘有翅。气微、味微苦。

【品质】 本品以根粗壮坚实、叶黄绿、花多者为佳。

【性味功效】 苦、微甘，平。清热，解毒，燥湿，消食。用于发热，黄疸，中耳炎，消化不良，胃痛，腹胀便秘。

【附注】 藏药。《月王药诊》、《四部医典》、《蓝琉璃》、《晶珠本草》等有记载。



【编号】 M04477257008H0XZDC H21137258007000400XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

连钱草

【来源】 唇形科植物活血丹 Glechoma longituba (Nakai) Kupr. 的干燥全草。

【主产地】 主产于江苏、广东、四川等地。

【性状特征】 干燥的全草多皱缩成团，茎细长，方形，常扭曲，具纵棱线，灰绿色或微带紫色，有短毛，断面中空。叶多卷曲，展平后呈肾形或心形，长达 2.5 cm，宽与长略相等，先端钝或稍尖，边缘具圆齿，被细毛，下面有腺点，质脆易碎。叶柄长 4～44 mm，多扭曲。花、果通常不见。气微香，味辛凉。

【品质】 本品以茎叶完整、叶片多、色绿者为佳。

【性味功效】 苦、辛，凉。清热，利尿，镇咳，消肿，解毒。用于黄疸，水肿，膀胱结石，肺痈，咳嗽，吐血，淋浊，带下，风湿痹痛，小儿疳积，疮癣，湿疹。

【附注】 本品同名异物较多。



【编号】 M04617264089H0SM H18757265036000400GYCM

【鉴定人】 尹国萍

麦瓶草

【来源】 石竹科植物麦瓶草 Silene conoidea L. 的干燥全草。

【主产地】 主产于西北、华北等地。

【性状特征】 株高 20～50 cm，全株密生腺毛。主根细长，略木质。茎直立或下部倾斜，中上部分枝较多。叶对生，基生叶略呈匙形，中上部叶披针形，先端尖，基部阔，半抱于茎。聚伞花序顶生，花萼钟状，花瓣紫色。蒴果圆卵状或圆锥状，种子肾状。

【品质】 本品以茎叶完整而多、不带根者为佳。

【性味功效】 甘、微苦，凉。养阴，和血。用于虚劳咳嗽，咯血，衄血，月经不调。



【编号】 M04747053070FHCMMI H36407053026000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

乳突果

【来源】 萝藦科植物乳突果 Adelostemma gracillimum (Wall. et Wigtt.) Hook. f. 的干燥全草。

【主产地】 主产于云南、贵州、广西。

【性状特征】 全株除花外无毛。叶对生，叶片呈心脏卵形，长 3.5～6cm，宽 2.5～4.5cm，膜质。伞房状花序腋生，花萼 5 裂，外面被短柔毛，花冠白色，钟状。蓇葖果常单生，顶端渐尖，基部膨大，外果皮具乳头状突起，种子扁圆形，边缘膜质，顶端具白绢样或丝状长毛。

【品质】 本品以藤茎粗壮、叶片多而完整、带果实及种子者为佳。

【性味功效】 和性药。消食健胃，理气止痛。治疗食积饱胀，胸腹胀痛，胃脘疼痛，消化不良。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M04767231001H0GYCM

【鉴定人】 陈德媛

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

佩兰

【来源】 菊科植物佩兰 Eupatorium fortunei Turcz. 的干燥地上部分。

【主产地】 主产于江苏、河北、浙江、安徽、山东等地。以江苏产量较大。

【性状特征】 茎平直，不分枝，长短不等，下部光滑无毛。节明显，节间长约 7 cm。表面黄绿色或黄棕色，有的略带紫色，有细纵纹理。质脆，易折断。断面纤维状，类白色，木部有疏松的孔。叶对生，有柄，叶片多皱缩破碎或脱落，黄绿色。完整叶3裂或不分裂，分裂者，长椭圆形或长圆状披针形；不分裂完整的叶呈披针形，长圆状披针形或长椭圆形，先端渐尖，基部楔形，边缘有锯齿，质脆，易破碎，无腺点。气芳香，味微苦。揉之有香气。

【品质】 本品以质嫩、叶多、色绿、未开花、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、平。芳香化湿，发表解暑。用于湿阻中焦，外感暑热。



【编号】 M04797238341H0CMMI H16757239095000600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

侧柏叶

【来源】 柏科植物侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco 的干燥枝叶。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 干燥的枝叶，长短不一，分枝稠密。叶为细小鳞片状，贴伏于扁平的枝上，交互对生，青绿色。小枝扁平，线形，外表棕褐色。质脆，易折断。微有清香气，味微苦，微辛。

【品质】 本品以叶嫩、色青绿、无碎末者为佳。

【性味功效】 苦、涩，寒。凉血，止血，祛风湿，散肿毒。用于吐血，衄血，尿血，血痢，肠风，崩漏，风湿痹痛。



【编号】 M04816006017L0CMMI H29936006006000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

刮筋板

【来源】 大戟科植物草沉香 Excoecaria acerifolia F. Didr. 的干燥幼嫩全株。

【主产地】 主产于四川、云南等地。

【性状特征】 株高 30～60 cm。枝干平滑，有多数皮孔，皮层内含乳液，切伤后即流出。单叶互生，半革质，叶片倒卵形或椭圆状披针形，长6～9 cm，先端渐尖，边缘有细微锐齿，基部楔形，上面绿色，下面淡绿色，叶柄长 4～6 mm，紫红色。花黄绿色，雌雄同株，花序为直立的穗状花序，雄花在上，雌花在下。

【品质】 本品以枝叶鲜嫩、叶多而色绿者为佳。

【性味功效】 苦、辛，温。行气，破血，消积。用于癥瘕积聚，臌胀，食积，黄疸，吐血。



【编号】 M04827136113H0CMMI H17277136034000100SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

委陵菜

【来源】 蔷薇科植物委陵菜 Potentilla chinensis Ser. 的干燥带根全草。

【主产地】 主产于山东、辽宁、安徽等地。

【性状特征】 干燥的带根全草，根呈圆柱状，偶有弯曲，长短不一，直径0.5～1 cm，外表红棕色或暗棕色，具有不规则的纵裂纹，栓皮多呈片状剥落，质坚硬，折断面不平坦，皮部与木部极易分离，皮部淡红棕色，木部棕白色。根头部较粗大，并丛生多数黄棕色的叶基部分。羽状复叶，皱缩，小叶多向内对折，边缘向外反卷，背面的绵毛密而长。气微弱，味微苦而涩。

【品质】 本品以干燥、无花茎者为佳。

【性味功效】 苦，平。祛风湿，解毒。用于痢疾，风湿筋骨疼痛，瘫痪，癫痫，疮疥。



【编号】 M04997143168H0CMMI H31077143035001300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

岩参

【来源】 菊科植物岩参 Cicerbita macrorhiza (Royle) Beauv. 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏、云南西北部等地。

【性状特征】 株高20～40 cm，鲜时折断处有乳汁。主根呈圆锥状，肉质。茎多数从根端发出，有分枝。茎生叶长6～12 cm，羽状全裂，顶生裂片广卵形至椭圆形，先端钝，基部心形，全部叶裂片边缘波状至全缘，叶柄长2～5 cm，基部膨大抱茎。头状花序多数，生于分枝顶端；花全部舌状，蓝色、淡紫色至紫红色。

【品质】 本品以茎叶完整、带根者为佳。

【性味功效】 苦、微甘，凉。用于黄疸，胆囊炎，脉病，结膜炎，疖肿及传染病引起的热病。

【附注】 为藏药“杂赤”入药品种之一。



【编号】 M05017238244H0XZDC H09577239229000100XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

环草石斛

【来源】 兰科植物环草石斛 Dendrobium loddigesii Rolfe 的干燥茎。

【主产地】 主产于广东、广西、云南等地。

【性状特征】 干燥的茎一般长约30 cm以下，直径约2～3 mm，多弯曲盘绕成团，表面有细密纵纹理，金黄色而略带绿色，有光泽，节间长约1～1.5 cm。断面类圆形，略带粉性。

【品质】 本品以卷曲、节密、色金黄、高粉性、嚼之有甘凉味、黏性足者为佳。

【性味功效】 甘、淡、微咸，寒。生津益胃，清热养阴。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热，阴伤目暗。

【附注】 本品作为“石斛”入药。



【编号】 M05267326102H0CMMI H13827326044001500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

细梗香草

【来源】 报春花科植物细梗香草 Lysimachia capillipes Hemsl. 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、贵州、云南。

【性状特征】 下部的茎匍匐地面而生，茎节上生须根并分出直立的枝。茎细长，呈四角或五角形，无毛。单叶互生，叶片呈卵形或卵状披针形，长3～6cm，宽7～17 mm，先端渐尖，全缘，基部楔形，羽状脉每侧4～5条，淡绿色，纸质；叶柄长2～6 mm。花单生于叶腋，花梗甚细，长2～3cm，花黄色。全株有香气。

【品质】 本品以茎枝纤细、叶片多而完整、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 和性药。祛风活血，益气补虚。用于感冒，咳嗽，风湿病，月经不调。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M05317240019H0GYCM H24717241007001300CMMI

【鉴定人】 陈谦海

肿节风

【来源】 金粟兰科植物接骨金粟兰 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 的干燥全草。


【主产地】 主产于四川、贵州、湖南。

【性状特征】 干燥的嫩枝叶，茎枝有明显膨大的节，圆形，棕色。叶对生，薄革质，长圆形卵状或长圆形披针状，棕色或绿褐色，边缘除基部外有粗锯齿，齿尖有硬骨质。气微味淡。

【品质】 本品以枝叶鲜嫩、叶片完整厚实者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。退热，排毒，接骨。用于夏季湿病，骨折。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M05357030014H0GYCM H34867030003000100GYCM

【鉴定人】 何顺志

苞叶雪莲

【来源】 菊科植物大苞雪莲 Saussurea obvallata (DC.) Sch.-Bip 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏、青海、四川、甘肃等地。

【性状特征】 株高7～30 cm。根茎部残留有枯存叶柄。茎直，淡紫色，具细条棱。叶片长圆形，长2～6 cm，宽1～3 cm，先端渐尖，边缘具细锯齿，齿间密生头状腺毛或白色柔毛，叶两面密生腺毛，基生叶的叶柄细长，长2～5 cm，茎生叶的叶柄短，扁平，淡紫色。头状花序1～5，簇生于茎端；外被苞叶，黄色；总苞被腺毛和短毛；花全部管状，蓝紫色。

【品质】 本品以茎叶完整、叶片多而不破碎者为佳。

【性味功效】 苦、辛，寒；有小毒。清热解表，解毒，清心凉血，祛风湿，止痛。用于感冒发烧，肠炎，风湿性关节炎，传染病引起的热症，痢疾，麻疹。

【附注】 藏医常用药材。



【编号】 M05397238549H0XZDC H35097239180003700XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苦地丁

【来源】 罂粟科植物地丁紫堇 Corydalis bungeana Turcz. 的干燥全草。

【主产地】 主产于辽宁、山东、河北及西北等地。

【性状特征】 干燥的全草多皱缩，长5～10 cm，叶具长柄，叶片展平后呈3回羽状深裂，裂片狭细。在叶腋处可见淡紫色小花，或长椭圆形扁平的荚果，表面灰绿色，内含数粒扁圆形、黑色的种子。味苦。

【品质】 本品以茎叶完整、色青绿、带花或果实多者为佳。

【性味功效】 苦、辛，寒。清热解毒。用于温病高热烦躁，流感，传染性肝炎，肾炎，瘰疬，腮腺炎，疔疮及其他化脓性感染。



【编号】 M05447032018H0CMMI H11567032004000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

茅膏菜

【来源】 茅膏菜科植物茅膏菜 Drosera peltata Smith var. lunata (Buch-Ham.) C. B. Clarke 的干燥全草。

【主产地】 主产于长江流域以南各省及西藏南部。

【性状特征】 全草高6～25 cm。根球状。茎直立，纤细，单一或上部分枝。根生叶细小，圆形，花时枯萎；茎生叶互生，有细柄，长约1 cm，叶片呈弯月形，基部呈凹状，边缘及叶面有多数细毛，分泌黏液，有时呈露珠状。总状花序短，着生于枝梢，花瓣白色。

【品质】 本品以新鲜、叶多而嫩绿者为佳。

【性味功效】 甘、辛，平。止血，镇痛，止痢，消积。用于赤白痢，小儿疳积，吐血，胃痛，跌扑损伤。

【附注】 有报道，本品的叶有毒，可引起皮肤灼痛及发炎。



【编号】 M05547048007H0XZDC H15067048002000403XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

轮叶棘豆

【来源】 豆科植物轮叶棘豆 Oxytropis chiliophylla Royle 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏。

【性状特征】 根粗壮，根皮暗褐色。茎极短，外面被宿存的托叶。羽状复叶密集，长5～20 cm，托叶披针形，与叶柄基部连合，密被白色绵毛。叶很小，多而密，每3～6小叶轮生，卵型或近圆形，长约3～5 mm，下面疏被绵毛和疣状腺体。总状花序有5～15朵花，花梗与复叶近等长，密被白色绵毛，花冠蓝紫色。

【品质】 本品以新鲜、茎叶繁茂者为佳。

【性味功效】 苦，凉。止血消炎，止泻镇痛。用于创伤出血，疮疖发炎，肠炎腹泻。

【附注】 藏医常用药材。



【编号】 M07877148492H0XZDC H27797148104002100XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金钗石斛

【来源】 兰科植物金钗石斛 Dendrobium nobile Lindl. 的干燥茎。

【主产地】 主产于四川、贵州、云南等地。

【性状特征】 茎丛生直立，长约30 cm，呈圆柱形或扁圆柱状。表面黄绿色或黑绿色，光滑，有细纵纹，具明显的节，节的颜色较深，节上有膜质叶鞘。质肥嫩而多汁，易折断。无臭，嚼之微苦而有黏性。

【品质】 本品以身长、色金黄、质致密、有光泽者为佳。

【性味功效】 甘、淡、微咸，寒。生津益胃，清热养阴。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热，阴伤目暗。

【附注】 本品作为“石斛”入药。



【编号】 M05717326106H0CMMI H13847326044001900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

金挖耳

【来源】 菊科植物金挖耳 Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc. 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、福建、湖南等地。

【性状特征】 干燥的全草，茎细而长，通体被有丝光毛，幼嫩处尤为浓密，灰绿色至暗棕色。叶多皱缩破碎，卵状长圆形，灰绿色至棕绿色。茎基丛生细根，长约5～10 cm，暗棕色。有时带有头状花序，呈枯黄色。有青草气，味涩。

【品质】 本品以茎叶完整、叶多而嫩绿者为佳。

【性味功效】 苦、辛，凉。清热解毒，利咽喉。用于喉科诸证，头风目疾，风火赤眼，劳伤目黄，诸虫螫伤。



【编号】 M06277238229FHCMMI H08327239046000400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

金钱草

【来源】 报春花科植物过路黄 Lysimachia christinae Hance 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 干燥的全草多皱缩成团。根纤细，淡黄色；茎扭曲，暗红棕色，表面多细纵沟纹，径约1 mm，无毛；断面外圈深红色，中心淡黄色；下部茎节处有须根。叶对生，多皱缩，卵形或心形，上面棕绿色，下面较浅，质脆易碎。花果一般不见。气微香，味淡微酸。

【品质】 本品以茎叶完整、叶片多、色青绿者为佳。

【性味功效】 甘、淡，平。清热，利湿，消肿，解毒。用于黄疸，水肿，胆结石，肾结石，膀胱结石，反胃噎嗝，疔疮肿毒。



【编号】 M05757240022H0CMMI H24727241007001900CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

青蒿

【来源】 菊科植物黄花蒿 Artemisia annua L. 的干燥全草。

【主产地】 我国大部分地区均有分布。据报道，南方生长的青蒿普遍比北方出产的青蒿素含量要高；海南岛、四川、广西等地所产者，其青蒿素的含量均较高。

【性状特征】 全株具较强挥发油气味。茎直立，具纵条纹，多分枝，光滑无毛。基生叶平铺地面，开花时凋谢；茎生叶互生，幼时绿色，老时变为黄褐色，无毛，有短柄，向上渐无柄；叶片通常为三回羽状全裂，裂片短细，有极细小的粉末状短柔毛，上面深绿色，下面淡绿色，具细小的毛或粉末状斑点；头状花序细小，球形，多数繁密的头状花序组成圆锥状。

【品质】 本品以身干、色青绿、质嫩未开花、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 辛、苦，凉。清暑，除热，截疟，杀虫。用于伤暑，疟疾，潮热，小儿惊风，热泻，恶疮疥癣。



【编号】 M05947238061H0CMMI H04197239024000800GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

青藏龙胆

【来源】 龙胆科植物祁连龙胆 Gentiana przewalskii Maxim. 的干燥带根全草。

【主产地】 主产于西藏、青海、甘肃等地。

【性状特征】 根单一散在，或数条根连接在茎基部，多皱缩，圆柱状，长3～5cm，直径约2mm，表皮淡黄色，质稍韧，断面不平整。叶片皱缩易破碎，完整的叶呈长匙形，长4～8cm。花皱缩易破碎，完整的花，花萼呈钟状；顶端5浅裂，裂片线形；花冠倒锥状圆筒形，长5～6cm，淡黄色有蓝色条纹，褶淡黄色，顶平截，雄蕊贴生于冠筒下部，上部线形；子房长圆形，柱2裂。味苦，气清香。

【品质】 本品以花多、带根、无枯叶及杂质者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒。用于喉病，热病，黑疤痘疮。

【附注】 本品为藏药“榜间那保”的入药品种之一。



【编号】 M05967239032H0XZDC H18387240007024900XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

鱼眼草

【来源】 菊科植物小鱼眼草 Dichrocephala benthamii C. B. Clarke 的干燥全草。

【主产地】 主产于云南、贵州。

【性状特征】 干燥的全草常皱缩成团状。茎高10～25cm，略带紫色，密被白色柔毛。叶片展平后呈倒卵形或矩圆状椭圆形，长3.5～7cm，宽1.2～2.4cm，先端锐尖，基部渐狭成耳形，边缘有不规则齿缺，在茎中部以下者常成琴状羽裂，两面均被柔毛；无柄。头状花序极小，排列成圆锥花序，球状或半球状，类似鱼眼。

【品质】 本品以茎叶鲜嫩、叶片多、带花序者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热解毒，消食化积。外用治疔疮毒，内服治疗小儿消化不良。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M06017238307H0GYCM H14247239078000200GYCM

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鱼腥草

【来源】 三白草科植物蕺菜 Houttuynia cordata Thunb. 的干燥地上部分。

【主产地】 主产于浙江、江苏、安徽、湖北等地。

【性状特征】 茎干枯，呈扁圆柱状，皱缩而扭曲，细长，长20～35 cm，直径2～3 mm。表面棕黄色、淡棕色或暗棕色，节环状明显，节间长1.5～4.5 cm，具纵向条纹，下部节上有残存的须根。叶互生，叶片卷曲皱缩，展平完整者呈心形；上表面暗黄绿色、黄绿色至暗棕色，下表面灰绿色、绿褐色或灰褐色。叶片具明显淡色小凹点，揉搓后有鱼腥气。

【品质】 本品以叶多、色绿、有花穗、鱼腥气浓者为佳。

【性味功效】 辛，寒。清热解毒，利尿消肿。用于肺痈咳吐脓血，肺炎，痈肿疮毒，热淋，小便涩痛。



【编号】 M06027029003H0CMMI H20377029002000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

垫状卷柏

【来源】 卷柏科植物垫状卷柏 Selaginella pulvinata (Hook.et Grev.) Maxim. 的干燥全草。

【主产地】 主产于广西、福建、四川、陕西等地。

【性状特征】 全草卷缩似拳状，长3～10 cm。表面绿色或黄绿色，向内卷曲。茎短，枝丛生，形扁而有分枝，绿色或棕黄色，向内卷曲，枝上密生鳞片状小叶。叶片近卵形，长1.5～2.5 mm，宽约1 mm，先端锐尖，具长芒，叶基平截。中叶（腹叶）2行，卵状披针形，直向上排列。叶片左右2侧不等，内缘较平直。外缘常因内折而加厚，呈全缘状。全草基部散生多数须根。气微，味淡。

【品质】 本品以色青绿、不带大根、叶多完整者为佳。

【性味功效】 辛，平。破血，活血，止血。用于经闭，咯血，吐血，便血，尿血，跌扑损伤。

【附注】 本品作为“卷柏”入药。



【编号】 M06195004019H0CMMI H35995003001004300XZDC

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

柔毛淫羊藿

【来源】 小檗科植物柔毛淫羊藿 Epimedium pubescens Maxim. 的干燥地上部分。

【主产地】 主产于四川、陕西、甘肃等地。

【性状特征】 茎细圆柱状，长20～60 cm，表面黄绿色或淡黄色。茎生叶对生，二回三出复叶；小叶片卵形至披针形，长3～20 cm，宽2～8 cm；先端渐尖，基部深或浅心形，边缘具刺齿；上表面有光泽，下表面密被灰柔毛或卷毛，叶脉及叶柄处尤多，叶片革质。无臭，味微苦。

【品质】 本品以梗少、叶多、色黄绿、不碎者为佳。

【性味功效】 辛、甘，温。补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳萎遗精，筋骨痿软，风湿痹痛，麻木拘挛；更年期高血压症。

【附注】 本品作为“淫羊藿”入药。



【编号】 M08267019108H0CMMI H15967019005000900SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

独一味

【来源】 唇形科植物独一味 Lamiophlomis rotata (Benth.) Kudo 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、西藏、甘肃等地。

【性状特征】 干燥的全草，以叶片、花序为主。叶片多卷曲或破碎不整。完整者呈圆肾形或菱状圆形，质厚，径6～12 cm，边缘具圆齿，下面网脉多凹陷，密被绒毛，叶柄宽。轮伞花序组成头状或短穗状，长3.5～7 cm，花萼紫绿色，漏斗状。长约8 mm，疏被粗硬毛，具短裂齿，花冠小，淡紫红色，唇形。

【品质】 本品以叶片完整而厚、色绿者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。活血，行瘀，消肿，止血。用于跌伤筋骨，闪腰挫气，关节积黄水。



【编号】 M06467264108H0XZDC H22347265048000100XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

穿心莲

【来源】 爵床科植物穿心莲 Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees 的干燥全草。

【主产地】 主产于广东、福建。

【性状特征】 干燥的全草多皱缩卷曲，叶片多破碎脱落。茎呈方柱状，多分枝，长50～70 cm，节稍膨大，质脆，易折断。单叶对生，叶柄短或近无柄。完整的叶片展开后呈披针形或卵状披针形，长3～12 cm，宽2～5 cm，先端渐尖，基部楔形下延，全缘或波状，上表面绿色，下表面灰绿色，两面光滑。气微，味极苦。

【品质】 本品以茎叶完整、叶片多、色青绿者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，凉血消肿。用于急性菌痢，胃肠炎，感冒，流脑，气管炎，肺炎，百日咳，肺结核，肺脓疡，胆囊炎。



【编号】 M06627259007H0CMMI H02807260004000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

胡荽

【来源】 伞形科植物芫荽 Coriandrum sativum L. 的干燥全草。

【主产地】 主产于江苏、安徽、湖北。

【性状特征】 全株长20～100 cm。根圆锥状，细长，外表淡棕色，具纵横皱纹，断面有棕色小油点。茎圆柱状，多分枝，黄绿色。基生叶有长柄，下部扩展成鞘状，叶片1～2回羽状全裂，羽片广卵形或半裂扇形，边缘有钝齿、缺刻或深裂；茎生叶无柄，3回或多回羽状分裂，末回裂片狭线形，直径3～5 mm。气香而浓烈，味甘、微辛。

【品质】 本品以茎叶鲜嫩、叶片完整、色绿、香气浓郁者为佳。

【性味功效】 性热，入冷经、半边经。解表，透疹，除湿。用于麻疹不出及半边经引起的肢体麻木。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M06697213109H0GYCM H11457214029000100GYCM

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茱苓草

【来源】 龙胆科植物茱苓草 Gentiana apiata N. E. Brown 的干燥全草。

【主产地】 主产于陕西。

【性状特征】 全草矮小，株高20～35 cm。花茎直立，圆柱形，黄绿色，无毛。基生叶较短，叶对生，呈倒披针形，长约3cm，宽4～7 mm，先端渐尖，基部渐狭，全缘，两面无毛。单花着生于枝梢叶腋处，枝顶生的则3朵为一簇，且密集呈头状，花冠黄色，并杂有绿色小点。有时可见长圆形的蒴果，有短柄，熟时2瓣裂。种子细小，多数。

【品质】 本品以茎叶完整、叶片多、色青绿者为佳。

【性味功效】 苦，平。调经活血，清热明目，利小便。用于月经不调，痛经，头晕，失眠，小便不利，淋病，崩漏，白带，痢疾，腹痛。



【编号】 M06767239010FHCMMI H18297240007001400CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

茵陈蒿

【来源】 菊科植物茵陈蒿 Artemisia capillaris Thunb.的干燥全草。

【主产地】 主产于我国东部与南部沿海等地。

【性状特征】 根分枝，常斜生，或为圆锥形而直生。茎常数个丛生，斜上，第一年生长者常单生，基部较粗壮，茎枝木化程度较强。有时中部毛管状小裂片挺直而低，长可达 2.5 cm，外层的雌花 4～12 枚，常为 7 枚左右。瘦果较大，长圆形，无毛。

【品质】 本品以质嫩、绵软如绒、色灰白或灰绿、无杂草、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛，凉。清热利湿，利胆退黄。用于湿热黄疸，小便不利，风痒疮肿。

【附注】 茵陈蒿入药品种及各地习用品种、易混品种较多，应注意加以鉴别。本品作为“茵陈”入药。



【编号】 M06777238072H0CMMI H04237239024002600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

荆芥

【来源】 唇形科植物荆芥 Schizonepeta tenuifolia Briq. 的干燥地上部分。

【主产地】 主产于江苏、浙江、江西、河北、湖北等地。

【性状特征】 茎呈方柱，上部有分枝，长 50～80 cm，直径 2～4 mm； 表面淡黄绿色或淡紫红色，被短柔毛；体轻，质脆，断面类白色。叶对生，多已脱落，叶片3～5羽状分裂，裂片细长。穗状轮伞花序顶生，长2～9 cm，直径约7 mm；宿萼钟状，先端5齿裂，淡棕色或黄绿色，被短柔毛。小坚果棕黑色。气芳香，味微涩而辛凉。

【品质】 本品以茎细、色紫、穗多而密、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛，微温。解表散风，透疹，用于感冒，头痛，麻疹，风疹，疮疡初起。



【编号】 M06817264329H0CMMI H35457265088000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

草灵芝

【来源】 杜鹃花科植物岩须 Cassiope selaginoides Hook. f. et Thoms. 的干燥全株。

【主产地】 主产于四川、云南、西藏等地。

【性状特征】 茎圆柱状，直径 2～2.4 cm，分枝较多。叶交互对生或脱落，多卷曲皱缩，展平呈披针形或披针状距圆形，长 2～3 cm，宽 0.7～1 cm，叶片较厚，基部 2 浅裂。花单生叶腋，皱缩成团，花冠淡黄色，花梗长 1～2 cm，有长柔毛。蒴果类球形。

【性味功效】 辛、微苦，平。行气，活血，止痛，安神。用于肝胃气滞，胁肋脘腹胀痛，风湿痹痛，跌扑损伤，失眠。



【编号】 M08667215005FHCMMI H08557216004001000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

草麻黄

【来源】 麻黄科植物草麻黄 Ephedra sinica Stapf 的干燥草质茎。


【主产地】 主产于河北、山西、新疆、内蒙古等地。

【性状特征】 茎呈细长圆柱状，少分枝；直径 1～2 mm。有的带少量棕色木质茎。表面淡绿色至黄绿色，有细纵脊线，触之微有粗糙感。节明显，节间长 2～6 cm。节上有膜质鳞叶，长 3～4 mm；裂片 2（稀 3），锐三角形，先端灰白色，反曲，基部联合成筒状，红棕色。体轻，质脆，易折断，断面略呈纤维性，周边绿黄色，髓部红棕色。气微香，味涩、微苦。

【品质】 本品以色淡绿或黄绿、内心色红棕、手拉不脱节、味苦涩者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。发汗，散寒，平喘，利水。用于风寒感冒，喘咳，支气管哮喘，支气管炎，水肿。

【附注】 本品作为“麻黄”入药。



【编号】 M08756010014H0CMMI H15846010001001200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

圆叶花锚

【来源】 龙胆科植物椭圆叶花锚 Halenia elliptica D. Don 的干燥全草。

【主产地】 主产于青海、贵州、云南等地。

【性状特征】 茎直立，有分枝，具棱，绿色，高 30～50 cm。单叶对生，长椭圆形或卵状披针形，长 2～2.5 cm，先端钝，基部浑圆或阔楔形，全缘，无叶柄。聚伞花序顶生及腋生，花梗细，花小，直径 6～7 mm，黄绿色。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 苦，寒。疏风，清热，镇痛。用于风热头痛，头晕，中暑腹痛。

【附注】 本品在产地多鲜用。



【编号】 M04357239080H0XZDC H19447240010000200XZDC

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

展毛翠雀

【来源】 毛茛科植物展毛翠雀 Delphinium kamaonense Huth var. glabrescens (W. T. Wang) W. T. Wang 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏、四川、甘肃、青海等地。

【性状特征】 根圆柱状，长 2～6 cm，直径 1～5 mm，表面棕褐色。茎被白色长柔毛。叶展平后呈圆五角形，三全裂。复总状花序，萼片 5，蓝色，外被毛，距钻形长于萼片；花瓣 2，退化雄蕊 2，子房密被长柔毛。蓇葖果长约 1 cm；种子四棱状，沿棱有翅。气微，味辛、苦。

【性味功效】 苦，微寒。清热燥湿，止痢。用于湿热痢疾，肠炎腹泻。

【附注】 常用藏药。以夏冈哇名收载于《晶珠本草》。



【编号】 M07237015324H0XZDC H13667015020006202XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

峨眉雪莲花

【来源】 报春花科植物峨眉报春 Primula sonchifolia Franch.的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、云南等地。

【性状特征】 须根众多，灰棕色，根头部有莲花状的鳞叶，鳞叶卵形或椭圆形，外表绿色或棕色带紫，有纵皱，内表面具黄粉，无毛。鳞叶内层有正常叶，叶多皱缩卷曲，展开为倒阔披针形，灰绿色至暗绿色。伞形花序。

【性味功效】 苦、辛，凉。除湿热，止汗。用于五淋癃闭，男子白浊及女子白带。



【编号】 M07267240092FHCMMI H31517241010025200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

流苏石斛

【来源】 兰科植物马鞭石斛 Dendrobium fimbriatum Hook. var. oculatum Hook. f.的干燥茎。


【主产地】 主产于广西、云南、贵州等地。

【性状特征】 本品为石斛类中最长而粗大者。茎近圆柱状，有时呈纺锤形，基部膨大呈蛇头状，干燥的茎长多在40 cm以上，节间长 2.5～4 cm，有纵槽。表面黄色或黄绿色，有光泽，横切断面类圆形，边缘有多数角棱，形成齿轮状。叶片矩圆形或椭圆形，长 8～12 cm，宽 2～4 cm，先端渐尖。

【品质】 本品以条匀、色黄而亮、致密者为佳。

【性味功效】 甘、淡、微咸，寒。生津益胃，清热养阴。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热，阴伤目暗。

【附注】 本品作为“石斛”入药。



【编号】 M01127326094H0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

浮萍


【来源】 浮萍科植物紫萍 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 的干燥全草。

【主产地】 主产于湖北、江苏、浙江、福建、四川等地。

【性状特征】 扁平叶状体呈卵状或卵圆状，长径2～5 mm。上表面淡绿色至灰绿色，偏侧有一小凹陷，边缘整齐或微卷曲；下表面紫绿色至紫棕色，着生数条须根。体轻，手捻易碎。气微，味淡。

【品质】 本品以身干、色绿、背紫、完整无杂质者为佳。

【性味功效】 辛，寒。宣散风热，透疹，利尿。用于麻疹不透，风疹瘙痒，水肿尿少。



【编号】 M09337303003H0CMMI H37417303002000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

海金沙草

【来源】 海金沙科植物海金沙 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 的干燥全草。

【主产地】 主产于安徽、江苏、贵州等地。

【性状特征】 茎藤呈长圆柱状，直径2～4 mm，表面光滑，棕黄色，质地较柔软，断面皮部棕色，髓部黄白色。叶对生，二型，不育叶尖三角形2回羽状复叶，小叶阔线形或基部分裂成不规则的小羽片，边缘具小钝齿。能育叶1～2回羽状复叶，羽片卵状三角形，边缘有锯齿或不规则分裂，叶背边缘有成穗状排列的孢子囊群2列，孢子囊盖鳞片状，卵形。气、味均微。

【品质】 本品以茎叶完整、孢子囊多、无杂质者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热解毒，利水通淋。用于尿路感染，尿路结石，小便不利，肾炎水肿，湿热黄疸，白浊带下等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M07535017003H0GYCM H24636017001000400CMMI

【鉴定人】 何顺志

海桐叶白英

【来源】 茄科植物海桐叶白英 Solanum pittosporifolium Hemsl. 的干燥全草。

【主产地】 主产于河北、安徽、浙江等地。

【性状特征】 全株光滑无毛，小枝纤细，有棱角。叶片展平后呈披针形至卵状披针形，长3.5～11 cm，宽1.5～3.5 cm，顶端渐尖，基部圆形或楔形，全缘，两面均无毛。花序聚伞状，腋外生；花萼杯状，5浅裂；花冠白色或稀为紫色。浆果球状，直径8～12 mm，成熟时红色。

【品质】 本品以质嫩、叶色绿、带果实者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热利湿，祛风解毒。用于黄疸，淋病，风湿关节炎等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M07547250081H0GYCM H36867251021002600GYCM

【鉴定人】 何顺志

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

益母草

【来源】 唇形科植物益母草 Leonurus japonicus Houtt. 的干燥全草。

【主产地】 主产于东北、华北等地。

【性状特征】 茎四棱状，四面凹下有纵沟，有稀疏的分枝，直径至6 mm，表面黄绿色，密被倒生细毛。折断面中心有大形白色的髓部，叶多脱落或残存，顶端的叶呈条形而不分裂。花生于上部叶腋间成轮状排列，有刺状苞片；花冠二唇形，淡紫色而皱缩，花萼筒状。气微，味甘而微苦。

【品质】 本品以质嫩、叶多、色灰绿者为佳。

【性味功效】 辛、苦，凉。活血，祛瘀，调经，消水，为妇科要药。用于月经不调，产后血滞，腹痛及崩漏下血。



【编号】 M07647264114H0CMMI H22677265051001300SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

积雪草

【来源】 伞形科植物积雪草Centella asiatica (L.) Urb.的干燥全草。

【主产地】 主产于江苏、浙江、福建、江西、广东、广西等地。

【性状特征】 全草常卷缩成团状。根圆柱状，长2～4 cm，直径1～1.5 mm，表面浅黄色或灰黄色。茎细长弯曲，黄棕色，有细纵皱纹，节上常着生须状根。叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈近圆形或肾形，直径1～4 cm，灰绿色，边缘有粗钝齿，有扭曲长叶柄。伞形花序腋生，短小。双悬果扁圆状，有明显隆起的纵棱及细网纹。气微，味淡。

【品质】 本品以叶多、色绿者为佳。

【性味功效】 苦、辛，寒。清热利湿，解毒消肿。用于湿热黄疸，中暑腹泻，砂淋血淋，痈肿疮毒，跌扑损伤。



【编号】 M07747213094H0SM H08827214017000100CMMI

【鉴定人】 尹国萍

粉苞苣

【来源】 菊科植物粉苞苣 Ixeris gracilis (DC.) Stebb. 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏、广西等地。

【性状特征】 株高 10～20 cm。茎直立，基部分枝呈簇生状。叶互生，叶片呈披针形，长5～8 cm，宽约5 mm，全缘，几无柄。头状花序顶生，排列成聚伞花序，总苞片2层，花黄色。瘦果具多棱，顶具1喙，喙顶有白色不分枝的冠毛。

【品质】 本品以新鲜、叶嫩绿者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。清热解毒，消炎止痛。用于黄疸型肝炎，结膜炎，疖肿，痨咳。

【附注】 藏医常用药材。



【编号】 M05487238404H0XZDC H21727239124000500CMMI

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

绢毛菊

【来源】 菊科植物绢毛菊 Soroseris gilii (S. Moore.) Stebb. 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏、青海等地。

【性状特征】 根圆锥状，表面淡黄色，质脆，易折断，断面类白色。茎扭曲，中空，表面黄绿色至棕黄色，有细纵棱。叶片线形，长4～7 cm，宽2～4 mm，先端钝圆，基部下延成叶柄，全缘。花序头状集生茎顶，花全部舌状花，淡黄色，顶端稍带紫红色。气清香，味微苦。

【性味功效】 苦、微辛，平。清热解毒，凉血止血。用于感冒发热，咽喉肿痛，支气管炎，疮疡肿毒，乳腺炎，风湿痹痛，衄血，崩漏，带下，跌扑损伤。

【附注】 常用藏药。《晶珠本草》收载。



【编号】 M07807238725H0XZDC H3718739194000100XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

绣线菊

【来源】 蔷薇科植物粉花绣线菊 Spiraea japonica Linn. f.的干燥全草。

【主产地】 主产于华中与华东各省。

【性状特征】 干燥的枝叶绿色或淡绿色，枝嫩时或有短柔毛。茎呈圆柱状，上部有花枝。叶互生，多皱褶，半开后呈卵状长椭圆形，长3～8 cm，先端尖，叶柄长1～3 mm。复伞房花序，花淡红色或深粉红色，有的为白色。气微，味微苦。

【品质】 本品以叶片多而不碎、带花序者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。消肿解毒，去腐生肌，止痛调经。用于疮痈肿痛，慢性骨髓炎，闭经，月经不调，便结腹胀等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M07817143407H0GYCM H37357143051002200CMMI

【鉴定人】 陈谦海

臭牡丹

【来源】 马鞭草科植物臭牡丹 Clerodendron bungei Steud. 的干燥全株。

【主产地】 主产于广东、广西、云南、湖南、湖北、浙江等地。

【性状特征】 根茎呈圆柱状，直径0.3～1 cm，外表灰黄色至灰褐色，稍扭曲。茎表面有突起的点状皮孔，节处可见叶柄痕；质坚硬，不易折断；断面皮部棕黄色，木质部较宽，乳白色或灰黄色，髓部有光泽。叶多皱缩，破碎，纸质；展平后完整者呈宽卵形，长9～19 cm，宽6～15 cm；先端渐尖，基部截形或心形，表面棕褐色至棕黑色，基部脉腋处可见黑色疤痕状的腺体，边缘有锯齿；有长叶柄。气微，味淡。

【品质】 本品以枝嫩、叶多者为佳。

【性味功效】 辛，温；有小毒。祛风除湿，消肿降压。用于风湿关节炎，高血压，腰痛，湿疹，月经不调，子宫脱垂。



【编号】 M07827263042FH H10587264004000300GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

通天蜡烛

【来源】 蛇菰科植物蛇菰 Balanophora japonica Makino 的干燥全草。

【主产地】 主产于华南及西南各地。

【性状特征】 干燥的全草为肉质草本，高 10～15 cm。茎为球形块状，粗厚肥大，不规则分裂，淡黄褐色，具淡白色星状小突起；花茎粗壮而直立，红色，由块茎顶端抽出，高 8～12 cm，直径 1～1.5 cm。叶呈螺旋互生，着生于花茎上，退化成鳞片状，卵形、阔卵形或狭卵形，橙黄色。

【品质】 本品以粗壮、红润者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热解毒，补气壮阳。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M07977189009H0GYCM H05617190001000900SM

【鉴定人】 陈谦海

铁皮石斛

【来源】 兰科植物铁皮石斛 Dendrobium officinale Kimura et Migo 的干燥或新鲜茎。

【主产地】 主产于安徽、浙江、陕西等地。


【性状特征】 干燥茎呈细条状，多扭曲盘绕成团，茎大多单个分离并碎断，也有为数枝丛生于小形根茎上，根茎下方尚有须根残留，茎长短不一，多数长 8～12 cm，直径约 1～2 mm，外表黄色或暗黄色，表面有扭曲的细纵纹，节间较短，质柔韧。

鲜铁皮石斛外表呈黑绿色，茎较粗壮，粗细均匀，节略弯曲；叶片瓜子形，质厚，叶鞘紧包于节间。嚼之有浓厚黏性，味淡。

【品质】 鲜品以外表色深绿或青绿、肥厚多汁、嚼之发黏者为佳。

【性味功效】 甘、淡、微咸，寒。生津益胃，清热养阴。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热，阴伤目暗。

【附注】 本品作为“石斛”入药。



【编号】 M03747326086H0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

铁线蕨

【来源】 铁线蕨科植物铁线蕨 Adiantum capillus-veneris Linn. 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、贵州、广东、广西。

【性状特征】 全草长15～40 cm。叶柄纤细，质硬，长9～15 cm，棕黑色，有光泽，形似猪鬃。1～3回羽状复叶，羽片及小羽片均为互生，微皱缩，展平后呈斜扇形或斜方形，长、宽为1～2 cm，先端3～5浅裂，边缘具尖齿，基部楔形。孢子囊着生于羽片背面上部边缘，是叶缘反卷而成孢子囊盖，长方形，横向延长，略弯向外侧，表面棕色，具白边。气微，味淡。

【品质】 本品以茎叶鲜嫩、叶片完整、孢子囊多者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。利尿通淋。用于尿闭。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M08005031003H0GYCM H01255031001000400SM

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鸭儿芹

【来源】 伞形科植物鸭儿芹 Cryptotaenia japonica Hassk. 的干燥全草。

【主产地】 产于长江以南各地。

【性状特征】 根细长簇生。三出复叶，叶片皱缩，黄绿色，展开呈阔卵形，长 5～10 cm，宽 2.5～7 cm，先端短尖，基部楔形，边缘锯齿状；多有长叶柄。复伞形花序圆锥状，小伞形花序有花 2～4 朵，花白色。果实线状长卵形。质脆，易破碎。

【性味功效】 辛、苦，平。消炎解毒，活血，消肿。用于肺炎，肺脓肿，淋病，疝气，风火牙痛，痈疽疔肿，带状疱疹，皮肤瘙痒。



【编号】 M08057213110FHCMMI H12377214033000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

假蒟

【来源】 胡椒科植物假蒟 Piper sarmentosam Roxb. 的干燥茎叶或全草。

【主产地】 主产于福建、广东、广西、云南、贵州等地。

【性状特征】 茎枝圆柱状，稍弯曲，表面有细纵棱，节上有不定根。叶多皱缩，展开后呈阔卵形或近圆形，长 6～14 cm，宽 5～13 cm，基部浅心形，上面棕绿色，下面灰绿色，有细腺点，7 条叶脉于叶背突出，脉上有极细小的粉状短柔毛，叶柄长 2～5 cm，叶鞘长为叶柄的一半。有时可见与叶对生的穗状花序。气香，味辛辣。

【性味功效】 苦，温。温中，行气，祛风，消肿。用于胃寒痛，腹痛气胀，风湿腰痛，产后气虚脚肿，跌扑肿痛，外伤出血。



【编号】 M08077028030FHCMMI H29697028002004500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

假耧斗菜

【来源】 毛茛科植物拟耧斗菜 Paraquilegia microphylla (Royle) Dru mm. et Hutch.的全草。

【主产地】 主产于西藏、云南、四川、青海、甘肃等地。

【性状特征】 全株被毛，叶基生，多皱缩，灰绿色至黄色，展平后呈心形至菱形，长 0.4～1.5 cm，宽 0.4～1.9 cm，三全裂，中间裂片菱形，侧裂片斜扇形，每裂片再 2～3 细裂，叶柄长。花葶长3～18 cm，花萼5，淡紫色或淡紫红色，蓇葖果长 6～11 mm。质脆，体轻。气微，味辛苦涩。

【性味功效】 苦、涩，寒。祛瘀，止血，镇痛。用于下死胎，子宫出血。

【附注】 藏药。《晶珠本草》收载，名益毛代金。



【编号】 M08087015388H0XZDC H28167015035000200XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

匙叶翼首草

【来源】 川续断科植物匙叶翼首草 Pterocephalus hookeri (C. B. Clarke) Höeck 的干燥全草。

【主产地】 主产于青海、四川、云南、西藏等地。

【性状特征】 根呈类圆柱状，长 5～20 cm，直径 1～2 cm，表面棕褐色至黑褐色，外皮易脱落，顶端常有数个扭曲状的根茎丛生；体轻，质脆，易折断，断面不平坦，木部白色。叶基生，灰绿色，多已破碎，完整叶片长披针形至长椭圆形，全缘或羽状全裂，两面均被粗毛。花茎被毛，头状花序近球形，直径1.5～2.5 cm；花白色至淡红色；萼片为羽毛状，多数。气微，味苦。

【性味功效】 苦、辛，平。清热解毒，祛风除湿，止痛。用于感冒发烧及各种传染病所引起的热症，心热，血热，热病烦躁，泄泻痢疾，风湿热痹。

【附注】 匙叶翼首草载于《四部医典》，名榜姿多沃，《晶珠本草》亦收载，为常用藏药。



【编号】 M08097236011H0XZDC H31907237003000200CMMI

【鉴定人】 格桑索朗

婆婆纳

【来源】 玄参科植物纤毛婆婆纳 Veronica ciliata Fisch. 的干燥全草。

【主产地】 主产于西北及四川、西藏等地。

【性状特征】 茎圆柱状，直径2～3 mm，被灰白色细柔毛。叶对生，无柄，叶片展开完整者呈卵形至长圆状披针形，长1.5～3 cm，宽 0.5～2 mm，两端急尖，全缘或具锯齿。总状花序假顶生，花序各部被柔毛，花冠蓝色。蒴果卵状，长6～8 mm。气微，味苦。

【性味功效】 苦、涩，寒。清热解毒，祛风利湿。用于外感发热，肝炎，胆囊炎，风湿热痹，荨麻疹。

【附注】 藏药。载于《晶珠本草》，名为草本哇夏嘎。



【编号】 M08127252169H0XZDC H40487253055001400XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

淫羊藿

【来源】 小檗科植物淫羊藿 Epimedium brevicornum Maxim. 的干燥地上部分。

【主产地】 主产于山西、广西等地。

【性状特征】 茎细圆柱状，长约 10～20 cm，有纵棱，黄绿色。茎生叶对生，二回三出复叶；小叶片卵圆形，长 3～8 cm，宽 2～6 cm；先端微尖，顶生小叶基部心形，两侧小叶较小，偏心形，外侧较大，呈耳状，边缘具黄色刺毛状细锯齿；上表面黄绿色，略有光泽，下表面灰绿色，叶脉突出，主脉基部有稀疏细长毛。叶片近革质。无臭，味微苦。

【品质】 本品以梗少、叶多、色黄绿、不碎者为佳。

【性味功效】 辛、甘，温。补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳萎遗精，筋骨痿软，风湿痹痛，麻木拘挛；更年期高血压症。



【编号】 M08237019101H0CMMI H15937019005000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

牻牛儿苗

【来源】 牻牛儿苗科植物牻牛儿苗 Erodium stephanianum Willd. 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、贵州、云南、陕西。

【性状特征】 全株被白色柔毛，茎长30～50 cm，有的截成6～8 cm的小段。茎类圆状，直径1～7 mm；表面灰绿色或带紫色，有分枝，节明显而稍膨大，具纵沟及稀疏茸毛；质脆，折断后显纤维性。叶片卷曲皱缩，质脆易碎，完整者为2回羽状深裂，裂片狭线形，全缘或有1～3粗齿。无臭，味淡。

【品质】 本品以茎粗壮、叶片多而完整者为佳。

【性味功效】 和性药。益肺止咳，止血止痛。用于肺痨咳嗽，跌扑损伤。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M08307067002H0GYCM H16267067002000300CMMI

【鉴定人】 陈谦海


猪鬃草

【来源】 铁线蕨科植物白背铁线蕨 Adiantum davidii Franch. 的干燥全草。

【主产地】 主产于甘肃、四川、云南等地。

【性状特征】 根茎细长，先端被卵状披针形鳞片，暗棕色，下面生须状短根。叶柄长10～20 cm，紫褐色；3回羽状复叶，顶片下有3～5对羽片，末次有小羽片1～4对；小羽片扇形，长宽各4～7 mm，圆头，边缘为具芒的锯齿状，厚革质，上面绿色，下面被粉，叶脉扇状分歧。孢子囊在每末次小羽片上1枚，囊群盖棕色，圆肾形，长2～3 mm。

【性味功效】 苦，凉。清热，祛风，利尿，消肿。用于咳嗽吐血，风湿痹痛，淋浊，带下，痢疾，乳肿，风痒湿疹。



【编号】 M08335031006FHCMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

盘龙参

【来源】 兰科植物绶草 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames 的干燥全草。

【主产地】 主产于贵州、云南、广东、广西等地。

【性状特征】 干燥的茎呈圆柱状或皱缩成不规则状，略扭曲，长10～35 cm，直径1.5～3.5 cm；表面黄棕色或棕褐色，有纵棱纵沟及节。质脆易折断，断面中间白色或中空。茎基部叶披针形椭圆状，长5～12 cm，宽4～8 mm，全缘，先端渐尖，基部鞘状抱茎；上部叶较小。花序顶生，长4～10 cm，呈螺旋状排列。根3～6条丛生，呈圆锥状，质脆易折断，断面白色角质状。

【品质】 本品以茎叶粗壮、带根、叶片完整不破碎者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。滋阴凉血，泻火解毒，益气生津。用于咽喉肿痛，肺结核咳嗽吐血，病后体虚，神经衰弱等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M08377326238H0GYCM H37407326125000100CMMI

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

绵头雪莲花

【来源】 菊科植物绵头雪莲花 Saussurea laniceps Hand.-Mazz. 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川西部、西藏东部及云南西北部等地。

【性状特征】 全株密被交织的白色或淡黄色长棉毛，根茎粗壮，表面棕褐色，有褐色残存叶柄。茎中部至顶部的叶片密集，皱缩卷曲，密被白色长绵毛。完整叶片披针形或长卵形，边缘全缘或有条裂。头状花序集生茎顶，呈半圆球形；花管紫色或紫红色。稀见瘦果，长约3 mm，具白色或灰白色长冠毛，密集成毡状，形似灰白色的绒球。气微，味淡。

【性味功效】 苦，温。清热解毒，祛风除湿，通经活络，壮阳补血。用于炭疽病，中风，风湿关节炎，崩漏带下，月经不调，妇女小腹冷痛，经痛，肾虚腰痛，遗精阳萎。

【附注】 本品作为“雪莲花”入药。



【编号】 M08677238542H0XZDC H35067239180002600XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

绵参


【来源】 唇形科植物绵参Eriophyton wallichii Benth. 的干燥全草。

【主产地】 主产于云南、西藏、青海等地。

【性状特征】 全株皱缩似绵球状。根圆锥状，长4～6 cm，黑褐色或棕黑色，质脆，易折断，断面不平整，黄白色。茎四棱状，有节。叶对生，茎下部鳞片状，中上部叶密集，叶片卵圆形，顶端急尖，基部宽楔形，上部边缘有锯齿，两面被灰白色绵毛，网脉粗糙明显。轮伞花序隐藏在叶丛中；花萼淡绿色，花冠淡紫色至粉红色或淡黄色。气微，味淡。

【性味功效】 苦，寒。清热解毒，止咳。用于流行性感冒，瘟病，肝炎，肺炎，肺脓肿，肺结核，肺热咳嗽，传染性热症。

【附注】 常用藏药，名邦餐布加，《月王药诊》、《四部医典》、《蓝琉璃》等均有记载。



【编号】 M08427264081H0XZDC H16237265030000100XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

绿绒蒿

【来源】 罂粟科植物全缘绿绒蒿Meconopsis integrifolia (Maxim.) Franch.的干燥全草。

【主产地】 主产于甘肃、四川、云南、西藏等地。

【性状特征】 全草皱缩，破碎，主根长10～20 cm，直径0.5～1 cm，表面棕褐色。茎单一，直径0.6～1.5 cm，密被棕黄色长柔毛，质脆，易折断。基部叶簇生，皱缩，完整叶呈倒披针形或倒卵形，长约30 cm，宽约4 cm，先端急尖或钝，主脉3～5条，表面枯绿色，密被长毛，叶柄与叶片等长。花单生或呈总状，花瓣黄色，多脱落。气微，味苦。

【性味功效】 甘、涩，寒；有小毒。清热利湿，镇咳平喘。用于肺炎咳嗽，肝炎，胆绞痛，胃肠炎，湿热水肿，白带痛经。

【附注】 常用藏药。《晶珠本草》收载，名欧贝赛保。



【编号】 M08467032129H0XZDC H25597032015000300XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

菊苣

【来源】 菊科植物毛菊苣 Cichorium glandulosum Boiss. et Hout. 的地上部分。

【主产地】 主产于东北、华北、西北及山东、江西等地。

【性状特征】 全体被硬毛。茎呈圆柱状，稍弯曲，表面灰绿色或带紫色，具纵棱；断面黄白色，中空。叶多破碎，灰绿色，茎中部的完整叶片呈大头羽裂。头状花序5～13个成短总状排列，总苞圆筒状，直径5～6 mm；苞片2层，外层稍短或近等长，有腺毛；舌状花蓝色。瘦果倒卵状，有棱，顶端截形，被鳞片状冠毛，长1～2 mm，黄褐色或棕褐色。气微，味咸、微苦。

【性味功效】 微苦、咸，凉。清肝利胆，健胃消食，利尿消肿。用于湿热黄疸，胃痛食少，水肿尿少。



【编号】 M08497238245H0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蛇莓草

【来源】 蔷薇科植物蛇莓 Duchesnea indica (Andr.) Focke 的干燥全草。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 全草多缠绕成团，被白色毛茸，具匍匐茎。三出复叶互生，基生叶柄长6～10 cm，小叶皱缩，完整者呈倒卵形，长1.5～4 cm，宽1～3 cm，基部偏斜，边缘有钝齿，表面黄绿色，上面近无毛，下面被疏毛。花单生于叶腋，具长柄。聚合果棕红色，瘦果小，花萼宿存。气微，味微涩。

【性味功效】 甘、苦，寒。有毒。清热，凉血，消肿，解毒。用于热病，惊痫，咳嗽，吐血，咽喉肿痛，痢疾，痈肿，疔疮，蛇虫咬伤，烫火伤。



【编号】 M08537143095FHCMMI H15157143019000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蛋不老

【来源】 大戟科植物广东地构叶 Speranskia cantoniensis (Hance) Pax et Hoffm.的干燥全草。

【主产地】 主产于陕西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。

【性状特征】 茎圆柱状，全体密被柔毛。单叶互生卵状，矩圆形边缘有稀钝齿，下面被毛。总状花序顶生，花单性，雄花位于花序上部，雌花位于下部。蒴果被瘤状突起。

【性味功效】 苦，平。祛风湿，通经络，破瘀止痛。用于风湿痹痛，癥瘕积聚，瘰疬，疥疮，肿毒，跌扑损伤。



【编号】 M08837136188H0CMMI H37277136064000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

野老鹳草

【来源】 老鹳草科植物野老鹳草 Geranium carolinianum L. 的干燥全草。

【主产地】 主产于江苏、安徽、浙江等地。

【性状特征】 茎全株被白色毛，有时全体盘曲成团或成长短不一的段。茎细，表面微紫红色或灰褐色，有明显的细纵棱；质脆，断面髓不中空。叶对生，具长柄；叶片多卷曲皱缩，完整的叶片呈圆肾形，长 2～3 cm，宽 3～6 cm，5～7 深裂，每裂又 3～5 裂，小裂片条形，宽在 3 mm 以下，锐尖头。果实连同喙长约 2 cm。气微弱，味淡。

【品质】 本品以身干、色灰绿、叶花果实多者为佳。

【性味功效】 苦、辛，平。祛风，活血，清热解毒。用于风湿疼痛，拘挛麻木，痈疽，肠炎，痢疾。

【附注】 本品作为“老鹳草”入药。



【编号】 M03737067005H0CMMI H18527067003000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

雪山林

【来源】 黄杨科植物粉蕊黄杨 Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc. 的干燥带根全草。

【主产地】 主产于甘肃、陕西、四川、湖北、浙江等地。

【性状特征】 鲜品茎肉质，干品多纵皱，表面被极细毛，下部根茎状，长约 30 cm，布满长须状不定根。叶薄革质，在茎上每隔 2～4 cm，有 4～6 叶接近着生似簇生状，叶片菱状倒卵形，长 2.5～5 cm，宽 1.5～3 cm，上部边缘有齿牙，基部楔形，叶脉有微毛，叶柄长 1～3 cm。气微，味苦、微辛。

【性味功效】 苦、微辛，凉。除风湿，清热解毒，调经活血，止带。用于风湿性筋骨痛，白带，月经过多，烦躁不安。



【编号】 M08647154011FHCMMI H27877154002000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

雪灵芝


【来源】 石竹科植物甘肃蚤缀 Arenaria kansuensis Maxim. 的干燥全草。

【主产地】 主产于甘肃、青海及四川西部等地。

【性状特征】 全草呈垫状半圆球形，直径达 15 cm。主根圆柱状，长约 20 cm，灰棕色，质脆，易折断，断面黄白色，木部浅黄色。叶针状线形，基部膜质微抱茎。花单生枝顶，白色。气微，味淡。

【性味功效】 微甘、苦，寒。清热止咳，利湿退黄，蠲痹止痛。用于外感发热，肺热咳嗽，黄疸，淋浊，风湿痹痛，高血压病。

【附注】 常用藏药。《月王药诊》、《四部医典》、《晶珠本草》等均有收载。



【编号】 M06917053007H0XZDC H03707053003000300XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鹿蹄草

【来源】 鹿蹄草科植物鹿蹄草 Pyrola calliantha H. Andres 的干燥全草。

【主产地】 主产于浙江、安徽、贵州、陕西、黑龙江、四川等地。

【性状特征】 根茎细长。茎圆柱状或具纵棱，长 10～25 cm。叶基生，圆形或长卵圆形，长2～5 cm，上面紫红色，少有棕绿色，先端圆或稍尖，全缘或有稀疏的小锯齿，边缘略反卷，上表面有时沿脉具白色的斑纹，下表面有时具白粉。总状花序有9～13朵卷缩的棕色花。蒴果扁球状，直径7～10 mm，棕褐色。气微，味淡、微苦。

【品质】 本品以身干、色紫红或紫褐者为佳。

【性味功效】 甘、苦，温。祛风湿，强筋骨，止痛。用于风湿痹痛，腰膝无力，月经过多，久咳劳嗽。

【附注】 本品作为“鹿衔草”入药。



【编号】 M08707215a10H0SM H32117216008000300CMMI

【鉴定人】 陈善墉

黄帚橐吾

【来源】 菊科植物黄帚橐吾Ligularia virgaurea (Maxim.) Mattf.的干燥嫩苗。

【主产地】 分布青海、甘肃、四川、云南西北部地区。

【性状特征】 根多数，条状，黑褐色。根茎部密被褐色纤维状枯存叶柄。茎中空，具纵皱沟，光滑或被白色蛛丝状毛。叶片多破碎，完整者展开呈长圆状披针形；茎下部叶下延成翅柄。头状花序总状排列，花黄色。瘦果长圆形。气特异，味微苦而稍凉。

【性味功效】 甘、苦，凉。用于消化病，培根和赤巴合并病，骨龙病，陈旧疫疠，黄水病。

【附注】 藏药。《晶珠本草》收载，名日肖。



【编号】 M08877238479H0XZDC H23237239143010800XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

黄金凤

【来源】 凤仙花科植物黄金凤 Impatiens siculifer Hook. f. 的干燥全草。

【主产地】 主产于贵州、四川、湖北。

【性状特征】 茎高 30～60 cm，干燥的药材黄色或黄绿色，茎细弱，不分枝或少分枝，质脆，易折断。叶片多皱缩、破碎，展平后呈卵状披针形或椭圆状披针形，长 5～13 cm，宽 2.5～5 cm，先端急尖或渐尖，基部楔形，边缘有粗圆齿，齿间有小刚毛；下部叶的叶柄长1.5～3 cm，上部叶近无柄。总状花序由5～8朵小花组成，黄色。

【品质】 本品以质嫩、叶多、色绿者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热解毒，消肿止痛，接骨。治疗烧烫伤，跌扑损伤，骨折。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M08897071018H0GYCM H21097071002002200GYCM

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

斑鸠窝

【来源】 豆科植物百脉根 Lotus corniculatus L. 的干燥全草。

【主产地】 分布西南及陕西、甘肃、湖南、湖北、广西、西藏等地。

【性状特征】 茎丛生。羽状复叶，5小叶，3枚位于顶部，2枚在基部，小叶革质，卵形或倒卵形，长5～20 mm，宽3～12 mm。3～4朵花在枝顶排成伞形花序，花蝶形，黄色。

【性味功效】 淡辛，平。清热，止咳，平喘，消痞满。用于风热咳嗽无痰，胃痞满疼痛，痔疮，下乳。



【编号】 M08997148423H0CMMI H24307148087000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

普通鹿蹄草

【来源】 鹿蹄草科植物普通鹿蹄草 Pyrola decorata H. Andras 的干燥全草。

【主产地】 主产于浙江、安徽、贵州、陕西、黑龙江、四川等地。

【性状特征】 根茎细长。茎圆柱状或具纵棱，长14～30 cm。叶基生，椭圆形或长卵圆形，长2～8 cm，暗绿色或紫褐色，先端钝尖，有小突尖头，叶基广楔形向下沿，主脉明显向叶背突出。花葶较粗硬，总状花序有5～8朵棕色花；或有扁球形蒴果。气微，味淡、微苦。

【品质】 本品以身干、色紫红或紫褐者为佳。

【性味功效】 甘、苦，温。祛风湿，强筋骨，止痛。用于风湿痹痛，腰膝无力，月经过多，久咳劳嗽。

【附注】 本品作为“鹿衔草”入药。



【编号】 M08717215a13H0SM H32127216008000700CMMI

【鉴定人】 陈善墉

朝鲜淫羊藿

【来源】 小檗科植物朝鲜淫羊藿 Epimedium koreanum Nakai 的干燥地上部分。


【主产地】 主产于陕西、湖南、辽宁等地。

【性状特征】 茎细圆柱状，长约20～30 cm，表面黄绿色或淡黄色，具纵棱。茎生叶对生，二回三出复叶；小叶卵状心形，较大，长4～10 cm，宽3.5～7 cm；先端长尖，顶生小叶基部心形，两侧小叶较小，偏心形，外侧较大，呈耳状，边缘具黄色刺毛状细锯齿；上表面黄绿色，光滑，有光泽，下表面灰绿色，叶脉突起，疏生棕黄色柔毛。叶片较薄。无臭，味微苦。

【品质】 本品以梗少、叶多、色黄绿、不碎者为佳。

【性味功效】 辛、甘，温。补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳萎遗精，筋骨痿软，风湿痹痛，麻木拘挛；更年期高血压症。

【附注】 本品作为“淫羊藿”入药。



【编号】 M08257019106H0CMMI H15957019005000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

硬水黄连

【来源】 毛茛科植物短梗箭头唐松草 Thalictrum simplex L. var. brevipes Hara 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川。

【性状特征】 根茎较粗，须根众多，细长，呈马尾状，外表灰棕色或灰黄色，断面鲜黄色，根茎上方有茎残基。二至三回三出复叶，小叶楔状倒卵形，小裂片狭三角形，顶端锐尖。圆锥花序，花梗长 1～4 mm。萼片 4，早落。瘦果狭椭圆状。气微，味苦。

【性味功效】 苦，寒。清湿热，解毒。用于治黄疸，痢疾，哮喘，麻疹合并肺炎，鼻疳，目赤，热疮。



【编号】 M09157015472FHCMMI H38837015040005502CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

紫花地丁

【来源】 堇菜科植物紫花地丁 Viola yedoensis Makino 的干燥全草。

【主产地】 主产于江苏、安徽、浙江、陕西、上海等地。

【性状特征】 全草多皱缩成团。主根长圆锥状，直径 1～3 mm；淡黄棕色，有细纵皱纹。叶基生，灰绿色，展平后叶片呈披针形或卵状披针形，长 1.5～6 cm，宽 1～2 cm；先端钝，基部截形或稍心形，边缘具钝锯齿，两面有毛；叶柄细，上部具明显狭翅。花茎纤细；花瓣 5，紫堇色或淡棕色；花距细管状。蒴果椭圆状或 3 裂，种子多数，淡棕色。气微，味微苦而稍黏。

【品质】 本品以色绿、完整、根色黄者为佳。

【性味功效】 苦、辛，寒。清热解毒，凉血消肿。用于疔疮肿毒，痈疽发背，丹毒，毒蛇咬伤。



【编号】 M09207040037H0CMMI H41087040004011500SM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦


紫葳茎叶

【来源】 紫葳科植物凌霄 Gampsis grandifora (Thunb.) K. Schum. 的干燥茎叶。

【主产地】 主产于江苏、浙江。

【性状特征】 茎黄褐色，具棱状网裂。单数羽状复叶互生，小叶 7～9，顶端小叶较大，小叶卵形或卵状披针形，长 4～9 cm，宽 2～4 cm，先端渐尖，基部不对称，边缘有锯齿。

【性味功效】 苦，平。清热，凉血，散瘀。用于血热生风，身痒，风疹，手脚酸软麻木，咽喉肿痛。



【编号】 M07147257001H0SM

【鉴定人】 刘毅

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

萹蓄

【来源】 蓼科植物萹蓄 Polygonum aviculare L. 的干燥地上部分。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 茎呈圆柱状而略扁，有分枝，长 15～40 cm，直径 2～3 mm，表面灰绿色或棕红色，有细密微突起的纵纹；节部稍膨大，有浅棕色膜质的托叶鞘；质硬，易折断，断面髓部白色。叶互生，近无柄或具短柄，叶片多脱落或皱缩、破碎，完整者展平后呈披针形，全缘，两面均呈棕绿色或灰绿色。无臭，味微苦。

【品质】 本品以质嫩、叶多、色灰绿者为佳。

【性味功效】 苦，微寒。利尿通淋，杀虫，止痒。用于膀胱热淋，小便短赤，淋沥涩痛，皮肤湿疹，阴痒带下。



【编号】 M09357057019H0CMMI H30427057010000200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

酢浆草

【来源】 酢浆草科植物酢浆草 Oxalis corniculata L. 的干燥全草或鲜品。

【主产地】 主产于贵州、四川、云南。

【性状特征】 根呈圆柱状，略弯曲，有分枝，表面棕色或棕红色，具纵纹，根头稍不膨大，质硬，易折断。断面灰白色。叶互生，掌状复叶，有柄，拖曳与叶柄连生，小叶 3 枚，倒心脏形，长 5～10 cm，无柄。蒴果卵状，长 1～1.5 cm，有棱。气微香，味酸。

【品质】 本品以茎叶繁密、叶片完整、气清香者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热利湿，凉血散瘀，消肿解毒。用于泄泻，痢疾，赤白带下，咽喉肿痛，疔疮，痈肿，跌扑损伤等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M09457069008H0GYCM H27727069003000100GYCM

【鉴定人】 陈谦海

锁阳


【来源】 锁阳科植物锁阳 Cynomorium songaricum Rupr. 的干燥肉质茎。

【主产地】 主产于内蒙古、甘肃、新疆等地。

【性状特征】 茎呈扁圆柱状，微弯曲，长5～15 cm，直径1.5～5 cm。表面棕色或棕褐色，粗糙，具明显纵沟及不规则凹陷，有的残存三角形的黑棕色鳞片。体重，质硬，难折断，断面浅棕色或棕褐色，有黄色三角状维管束。气微，味甘而涩。

【品质】 本品以条粗、体重、质硬、断面显油性者为佳。

【性味功效】 甘，温。补肾阳，益精血，润肠通便。用于腰膝痿软，阳萎滑精，肠燥便秘。



【编号】 M09467211b01H0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鹅不食草

【来源】 菊科植物鹅不食草 Centipeda minima (L.) A. Braun et Aschers. 的干燥全草。

【主产地】 主产于浙江、湖北、江苏、广东等地。

【性状特征】 全草扭集成团。须根纤细，淡黄色。茎细，质脆，断面黄白色。叶小，多皱缩或破碎，完整者展平后呈匙形。表面灰绿色或棕褐色，边缘有3～5个锯齿。头状花序黄色或黄褐色。气微香，久闻有刺激感，味苦、微辛。

【品质】 本品以色灰绿、刺激性强者为佳。

【性味功效】 辛，温。通鼻窍，止咳。用于风寒头痛，咳嗽痰多，鼻塞不通，鼻渊流涕。



【编号】 M09497238240H0CMMI H08837239050000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

黑草乌茎叶

【来源】 毛茛科植物铁棒锤 Aconitum szechenyianum Gay. 的干燥茎叶。

【主产地】 产于陕西、甘肃、青海、河南、四川、云南、西藏等地。

【性状特征】 叶互生，宽卵形，掌状3全裂，裂片再作2～3深裂，小裂片线形，宽1～2.2 mm。被稀疏毛茸；叶柄长4～5 mm，或近无柄。

【性味功效】 苦、辛，温。有毒。解毒，消肿止痛。用于跌扑损伤，刀伤，痈肿疮疖。



【编号】 M09537015086H0SM

【鉴定人】 秦松云

滨蒿

【来源】 菊科植物滨蒿 Artemisia scoparia Waldst. et Kit. 的干燥全草。

【主产地】 主产于陕西、河北、山西等地，陕西产者称西茵陈，质量最佳。

【性状特征】 全草幼时被灰白色绢毛，成长后高45～100 cm。茎常单一，偶2～4，基部常木化。表面紫色或黄绿色，有纵条纹，多分枝，老枝近无毛，幼嫩枝被灰白色绢毛，有时具叶较大而密集的不育枝。叶密集；下部叶与不育枝的叶同形，有长柄，叶片矩圆形，长1.5～5 cm，二或三次羽状全裂，最终裂片倒披针形或线形，顶端尖，常被绢毛或上面较稀；中部叶长1～2 cm，二次羽状全裂，基部抱茎，裂片线形或毛管状，有毛或无毛，上部叶无柄，三裂或不裂，裂片短，毛管状。头状花序极多数。

【品质】 本品以质嫩、绵软如绒、色灰白或灰绿、香气浓者为佳。

【性味功效】 苦、辛，凉。清热利湿，利胆退黄。用于湿热黄疸，小便不利，风痒疮肿。

【附注】 本品作为“茵陈”入药。



【编号】 M06787238122H0CMMI H04467239024013600CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

矮地茶

【来源】 紫金牛科植物矮地茶 Ardisia japonica (Hornst.) Bl. 的干燥全草。

【主产地】 主产于湖南、贵州。

【性状特征】 根茎呈匍匐状，疏生须根。茎略呈扁圆柱形，干燥后多弯曲或缠绕，长 10～30 cm，直径 2～5 mm；表面红棕色，有细纵纹、叶痕及节；质硬，易折断。叶互生，集生于茎梢；叶片卷曲或破碎，完整者展平后呈椭圆形，长 3～7 cm，宽 1.5～3 cm，灰绿色、棕褐色或浅红棕色，先端尖，基部楔形，边缘具细锯齿；近革质。有时可见花梗或带宿萼和花柱的紫黑色球形小果。气微，味微辛。

【品质】 本品以茎色红棕、叶色绿者为佳。

【性味功效】 化痰止咳，利湿，活血。用于新久咳嗽，痰中带血，慢性支气管炎，湿热黄疸，跌扑损伤。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M02267223027H0GYCM H03637224002003400GYCM

【鉴定人】 何顺志

矮紫堇


【来源】 罂粟科植物矮紫堇 Corydalis hendersonii Hemsl. 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏。

【性状特征】 根呈类圆柱状或长纺锤状，稍弯曲，长 6～15 cm，直径 2～10 mm；表面棕红色至暗褐红色，顶端常存有干枯破碎的叶茎残基，根上部有细密而略突起的环纹，下部有纵沟纹；质脆，易折断；折断面橙红色，中心黄色；茎短不明显。叶簇生，叶片多皱缩破碎，暗绿色或黄绿色，湿润展开完整叶呈二回或一回三出羽状分裂，长 1～2 cm，叶柄基部鞘状。花少见。蒴果长圆状，长约 5 cm，表面紫红色或黄红色，有明显的纵纹。无臭，味苦、微酸。

【性味功效】 凉，苦。清热消炎。用于多血症，溃疡，脉管炎，肠炎。

【附注】 矮紫堇收载于《晶珠本草》，为常用藏药，名热衮巴。



【编号】 M09137032047HOXZDC

【鉴定人】 格桑索朗

腺梗豨莶

【来源】 菊科植物腺梗豨莶 Siegesbeckia pubescens Makino 的干燥地上部分。

【主产地】 全国大部分地区均有野生。主产于湖南、湖北、江苏等地。

【性状特征】 茎略呈方柱状，多分枝，长 30～110 cm，直径 0.3～1 cm；表面灰绿色或黄棕色，有纵沟及细纵纹，被灰色柔毛；节明显，略膨大；质脆，易折断，断面黄白色或带绿色，髓部宽广。叶对生，叶片多皱缩、卷曲，展平后呈卵圆形，灰绿色，边缘有钝锯齿，两面皆有白色柔毛，主脉 3 出。有的可见黄色头状花序，总苞片匙形。气微，味微苦。

【品质】 本品以叶多、枝嫩，色深绿者为佳。

【性味功效】 辛、苦，寒。祛风湿，利关节，解毒。用于风湿痹痛，筋骨无力，腰膝酸软，四肢麻痹，半身不遂，风疹湿疮。

【附注】 本品作为“豨莶草”入药。



【编号】 M10037238625H0CMMI H36377239189000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蒲公英

【来源】 菊科植物蒲公英Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. 的干燥全草。

【主产地】 全国各地均产。

【性状特征】 主根圆锥状，长4～10 cm，直径3～8 mm；表面棕色或紫棕色，具深纵纹及皱纹；质脆，断面平坦。基生叶，多皱缩卷曲，灰绿色至绿褐色，展平后完整叶片呈倒披针形，边缘不规则羽状分裂，裂片齿牙状或三角形。花茎柔细，常有不完整的头状花序；偶见长椭圆形瘦果。气微，味微苦。

【品质】 本品以叶多、色绿、根长者为佳。

【性味功效】 苦、甘，寒。清热解毒，消肿散结，利尿通淋。用于疔疮肿毒，乳痈，瘰疬，目赤，咽痛，肺痈，肠痈，湿热黄疸，热淋涩痛。



【编号】 M09677238675H0CMMI H38437239209000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蓝布正

【来源】 蔷薇科植物柔毛水杨梅 Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle 的干燥带根全草。

【主产地】 主产于云南、贵州、广西。

【性状特征】 根茎粗短，长1～2.5cm，有多数须根，均为棕褐色。茎圆柱形，被毛或近无毛。基生叶有长柄，羽状全裂或近羽状复叶，顶裂片较大，卵形或宽卵形，边缘有锯齿，两面被毛；侧生裂片小，边缘有不规则的粗齿；茎生叶互生，卵形，3浅裂或羽状分裂。花顶生，常脱落。聚合瘦果近球形。气微，味辛、微苦。

【品质】 本品以叶片多而完整、茎枝粗壮有毛、带根者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。益气补血，养阴，健脾胃，润肺化痰。用于虚损劳伤，虚弱咳嗽，白带等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M09737143115H0GYCM H18687143024000201GYCM

【鉴定人】 何顺志

零陵香

【来源】 报春花科植物灵香草 Lysimachia foenum-gracum Hance 的带根全草。

【主产地】 主产于广西、广东等地。

【性状特征】 茎近方柱状，长30～50 cm，直径1～5 mm，表面灰黄色至淡棕色，四角薄翅状，具纵深沟，茎的下半部常呈葡萄状，节上生细根。叶皱缩成团，黄绿色或灰绿色，展平呈椭圆形，先端微尖，全缘。气浓香，味微辛。

【品质】 本品以叶色绿、香气浓者为佳。

【性味功效】 辛、甘，温。散风寒，辟瘟疫岚瘴。用于风寒，感冒，头痛，胸腹胀满，下痢，鼻塞，牙痛。



【编号】 M00997240035H0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

榜嘎

【来源】 毛茛科植物甘青乌头 Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf 的干燥全草。

【主产地】 主产于西藏、青海、四川等地。

【性状特征】 根呈细小圆柱形，黄棕色，长3～4 cm，直径0.5～1 cm，质脆易折断，断面白色，粉性，可见4个点状维管束。茎圆柱状，表面黄白色，直径2～4 cm，质坚硬，断面白色，中央呈空洞或略呈海绵状。叶略呈肾形，多数卷曲皱缩，展平后每个裂片边缘呈3深裂，上表面深绿色，下表面灰绿色，质稍厚。气微，味苦。

【性味功效】 苦，凉；有小毒。清热解毒。用于传染病发热，肝、胆热病，肺热，肠热，流行性感冒，食物中毒。

【附注】 常用藏药。在《月王药诊》，《四部医典》、《晶珠本草》中均有记载。



【编号】 M09827015117H0XZDC H00827015001018500XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

漆姑草

【来源】 石竹科植物漆姑草 Sagina japonica (Sweet) Ohwi 的干燥全草。

【主产地】 主产于华东、华中及西南等地。

【性状特征】 茎丛生，高2～15 cm。叶对生，线形，长5～9 mm，基部有薄膜相连成短鞘状。花顶生和腋生，白色而小，直径约3 mm，花萼绿色，边缘膜质，无毛，花瓣与萼片同数而互生，萼片卵圆形，长约2.5 mm，宽约1 mm，雄蕊5，子房上位，卵形，花柱5，外展呈星形，柱头上有毛状突起。气微，味淡。

【品质】 本品以新鲜、茎叶多而质嫩者为佳。

【性味功效】 苦、辛，凉。清热，解毒，利小便。用于漆疮，瘰疬，龋齿，小儿乳积，跌扑内伤。



【编号】 M00547053065FHCMMI H34317053024000100GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

獐牙菜

【来源】 龙胆科植物獐牙菜 Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms. 的干燥全草。

【主产地】 全国大部分地区均有出产。

【性状特征】 根较多，根茎环节甚密。茎基部通常圆柱状，茎上部具四棱；茎表面黄绿色或灰褐色，茎节略膨大，断面纤维性，黄白色，中空或中部有白髓。叶和花多已皱缩，叶展平后呈矩圆形或披针形，长3.5～9 cm，宽1.5～4 cm，先端长渐尖，叶全缘。复总状聚伞花序顶生或腋生，花梗亦具四棱。种子多数，球形。气微，味苦。

【品质】 本品以茎叶繁茂、叶片完整、带根者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热，健胃，利湿。用于腹痛，咽喉炎，消化不良等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M09887239094H0GYCM H38067240020000800GYCM

【鉴定人】 陈德媛

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

翠云草

【来源】 卷柏科植物翠云草 Selaginella uncinata (Desv.) Spring 的干燥全草。

【主产地】 主产于广东、广西、贵州、云南。

【性状特征】 主茎纤细，长 30～60 cm，灰黄色至棕黄色，有纵沟，节上带根；呈叉状分枝，小枝呈羽状。叶异形，下面深绿色，上面带碧蓝色，卵状椭圆形，长 2～3 mm，宽 1～3 mm，顶端近短尖，边缘透明，全缘；生于主茎上的叶最大，斜椭圆形，边缘透明，全缘，基部近心形。孢子囊穗四棱形，长 6～12.5 mm；孢子叶密生，卵状三角形。

【品质】 本品以叶片多而整齐、深绿色、孢子囊多者为佳。

【性味功效】 和性药。用于劳伤，内伤出血，跌扑损伤，咳嗽等。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M09935004027H0GYCM H36015003001006200CMMI

【鉴定人】 陈谦海

膜缘柴胡

【来源】 伞形科植物膜缘柴胡 Bupleurum marginatum Wall. ex DC. 的干燥带根全草。

【主产地】 主产于浙江、福建、湖南及西南等地。

【性状特征】 全草高大，茎高可达 120 cm。根木质化，直根发达，外皮深红棕色，纺锤形，有细纵皱纹及稀疏的小横突起，长 10～15 cm，直径 5～8 mm，根的顶端常有一段红棕色的地下茎，有时扭曲缩短与根较难区分。地上茎绿色，硬挺，带棕紫色，茎上有淡绿色的粗条纹，实心。叶革质或近革质，披针形或线形，先端具 1mm 锐尖头。伞形花序多数。

【品质】 本品以质干、茎色绿而带棕紫色、主根粗壮无须根者为佳。

【性味功效】 苦，凉。和解表里，疏肝，升阳。用于寒热往来，胸满胁痛，口苦，头痛目眩，疟疾，下利脱肛，月经不调，子宫下垂。



【编号】 M03507213072H0SM H07187214012002400XZDC

【鉴定人】 陈俊华

蔊菜

【来源】 十字花科植物印度蔊菜 Rorippa indica (L.) Hiern 的干燥全草。

【主产地】 主产于华东、中南及西南各地。

【性状特征】 全草长 15～35 cm，淡绿色。根较长，弯曲，直径 1.5～3 cm，表面淡黄色，有不规则纵皱及须根痕；质脆，易折断，断面黄白色，木部黄色。茎近基部有分枝，淡绿色，有时为紫红色。叶多卷曲皱缩或已破碎、脱落，完整的叶呈长椭圆形，羽状分裂。总状花序顶生或侧生，花小，黄色。角果线形。稍弯曲。无臭，味淡。

【品质】 本品以茎粗壮、叶多而完整者为佳。

【性味功效】 性热，入冷经。治疗无名肿毒，黄疸。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M09977039091H0GYCM H33407039076000600CMMI

【鉴定人】 陈谦海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

墨斗菜

【来源】 菊科植物醴肠 Eclipta prostrata L. 的干燥全草。

【主产地】 主产于江苏、浙江、江西。

【性状特征】 全草被白色茸毛。茎圆柱状，有纵棱，长可达50 cm，直径2～5 mm。表面墨绿色或绿褐色，有节，质脆易折断，断面中央有白色的髓。叶对生，近无柄，叶片常皱缩、卷曲或已破碎，完整的叶呈椭圆状披针形或披针形，墨绿色，全缘或具细小锯齿，两面均被白色短毛。头状花序，直径0.4～1 cm，花梗及苞片上均被毛。气微弱，味微咸。

【品质】 本品以叶完整、色绿、质干者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。凉血，止血，止痢。用于吐血，便血，咳血，刀伤出血。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M10067238323H0GYCM H15317239085000100GYCM

【鉴定人】 何顺志

墨旱莲


【来源】 菊科植物鳢肠 Eclipta prostrata L. 的干燥全草。

【主产地】 主产于江苏、浙江、江西、湖北、广东等地。

【性状特征】 全体被白色茸毛。茎呈圆柱状，有纵棱，直径2～5 mm，表面绿褐色或墨绿色。叶对生，近无柄，叶片皱缩卷曲或破碎，完整者展平后呈长披针形，全缘或具浅齿，墨绿色。头状花序直径2～6 mm。瘦果椭圆状而扁，长2～3 mm，棕色或浅褐色。气微，味微咸。

【品质】 本品以身干、色绿、叶多者为佳。

【性味功效】 甘、酸，寒。滋补肝肾，凉血止血。用于牙齿松动，须发早白，眩晕耳鸣，腰膝酸软，阴虚血热，吐血，尿血，血痢，崩漏下血，外伤出血。



【编号】 M10067238323H0GYCM H15317239085000100GYCM

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

爆格蚤

【来源】 紫金牛科植物铁仔 Myrsine africana L.的干燥茎或枝叶。

【主产地】 主产于湖北、四川、云南、贵州等地。

【性状特征】 小枝圆柱状，常有棱角，被褐色柔毛。叶多皱缩，展开完整者呈椭圆形或倒卵形，长0.5～3 cm，宽0.3～1 cm，先端近圆形，常有小尖头，基部楔形，中部以上近边缘有腺点，羽状脉，上面深绿色，近革质。气微，味苦、涩。

【性味功效】 苦、微甘，凉。祛风止痛，清热利湿，收敛止血。用于风湿痹痛，牙痛泄泻，痢疾，血崩，便血，肺结核咳血。



【编号】 M10077223062FHCMMI H26727224005000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

箭叶淫羊藿

【来源】 小檗科植物箭叶淫羊藿 Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim. 的干燥地上部分。


【主产地】 主产于湖北、四川、浙江等地。

【性状特征】 茎细圆柱状，长约20～30 cm，表面棕色或棕黄色。茎生叶对生，一回三出复叶；小叶片长卵形至卵状披针形，长4～12 cm，宽2.5～5 cm；先端渐尖，两侧小叶基部明显偏斜，外侧呈箭形。表面棕绿色或灰绿色，有光泽，下面灰绿色，密被白色伏毛。叶片革质。无臭，味微苦。

【品质】 本品以梗少、叶多、色黄绿、不碎者为佳。

【性味功效】 辛、甘，温。补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳萎遗精，筋骨痿软，风湿痹痛，麻木拘挛；更年期高血压症。

【附注】 本品作为“淫羊藿”入药。



【编号】 M08287019109H0CMMI H15977019005001000CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蝴蝶花

【来源】 鸢尾科植物蝴蝶花 Iris japonica Thunb. 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、云南、贵州等地。

【性状特征】 株高40～50 cm。根茎匍匐，黄褐色，有较密集的结节。叶互生，2列，剑形，长30～60 cm，宽约2.5～4 cm，革质。花茎较叶为长，花数朵组成疏松的总状花序，花淡紫色。蒴果有6棱，种子多数。

【品质】 本品以茎叶完整、叶片厚、色青绿者为佳。

【性味功效】 苦，寒。解毒，消肿，止痛。用于肝炎，肝肿大，肝痛，喉痛，胃痛。



【编号】 M06267307019FHCMMI H21587307007002200CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

薄荷

【来源】 唇形科植物薄荷 Mentha haplocalyx Briq. 的干燥全草。

【主产地】 主产于江苏、安徽、江西、河南等地。江苏产苏薄荷为道地。

【性状特征】 茎方柱状，长15～35 cm，直径2～4 mm，黄褐色带紫，被白色绒毛；质脆，易折断，断面类白色，中空。叶对生，叶片卷曲皱缩，多破碎，展开完整者长卵形或阔披针形，上面深绿色，下面浅绿色，被白色绒毛，边缘细锯齿。枝顶轮伞花序。气香，味辛凉。

【品质】 本品以叶多、色深绿、气味浓者为佳。

【性味功效】 辛，凉。宣散风热，清头目，透疹。用于风热感冒。



【编号】 M10227264152H0CMMI H25957265060000500CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爵床

【来源】 爵床科植物爵床 Rostellularia procumbens (L.) Nees 的干燥全草。

【主产地】 主产于四川、云南、贵州及广东。

【性状特征】 全草长20～60 cm。根细而弯曲，茎多具纵棱6条，表面绿黄色至浅黄色，有毛，节膨大，茎基部节上有须状根，质韧，叶对生，具柄，叶片多皱缩，以水浸泡，展平后呈椭圆形或卵形，长1～3.5 cm，宽0.5～2 cm，浅绿色，先端尖，全缘，有毛。穗状花序顶生或腋生，苞片条状披针形，被白色长毛，蒴果长卵形，上部有种子4粒，下部实心似柄状。气微，味微苦。

【品质】 本品以茎叶繁茂、带花序、叶不破碎者为佳。

【性味功效】 性冷，入热经。清热解毒，利湿消滞，活血止痛，止痒杀虫。用于感冒发烧，咽喉肿痛，小儿疳积，腰背痛，脚癣，阴痒，皮肤瘙痒，蚊虫叮咬。

【附注】 苗族医习用药材。



【编号】 M10287259065H0GYCM H33647260035000100GYCM

【鉴定人】 何顺志

藏党参

【来源】 桔梗科植物藏党参Codonopsis mollii Chipp. 的干燥全株。

【主产地】 主产于西藏。

【性状特征】 根呈圆锥状，长约10～20 cm，直径0.5～2 cm，表面灰褐色。茎圆柱状，稍弯曲，直径1～3 cm，表面黄绿色，疏生白色短毛；质轻，易折断，断面皮部浅黄，木部黄色。叶多皱缩，展开后呈卵状心形或卵形，近全缘，表面灰绿色，两面密被白色短毛。花多破碎，花萼裂片5，有疏毛，花冠蓝紫色。气微，味淡。

【性味功效】 甘，平。补中益气，健脾益肺。用于脾胃虚弱，气短心悸，食少便溏，虚喘咳嗽，内热消渴。

【附注】 常用藏药，收载于《晶珠本草》，名芦堆多吉。



【编号】 M10347243068H0XZDC H10937244006004000XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

藏蒲公英

【来源】 菊科植物锡金蒲公英Taraxacum sikkimense Hand.-Mazz. 的干燥全草。

【主产地】 产于青海、四川西部、云南西北部、西藏等地。

【性状特征】 主根圆锥状，长4～10 cm，直径3～8 mm；表面棕色或紫棕色，具深纵纹及皱纹；质脆，断面平坦。基生叶多皱缩卷曲，灰绿色至绿褐色，展平后完整叶片呈倒披针形，边缘不规则羽状分裂，裂片三角形或针状披针形。花茎柔细，常有不完整的头状花序；偶见长椭圆状瘦果。气微，味微苦。

【性味功效】 苦、甘，寒。清热解毒，消肿散结，利尿通淋。用于培根木保病，瘟病时疫，血病，赤巴病。

【附注】 常用藏药，收载于《晶珠本草》，名库尔芒。



【编号】 M10387238681H0XZDC H38467239209001100XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瞿麦

【来源】 石竹科植物瞿麦 Dianthus superbus L. 的干燥地上部分。

【主产地】 主产于河北、四川、湖北、湖南、浙江、江苏等地。

【性状特征】 茎圆柱状，长30～60 cm；表面淡绿色或黄绿色，光滑无毛，节明显，略膨大，断面中空。叶对生，多皱缩，展平叶片呈条形至条状披针形。枝端具花及果实。花全长3～4 cm，花萼筒状，长约为全花的3/4，苞片4～6，宽卵形，先端急尖，长约为萼筒的1/4；花瓣棕紫色或棕黄色，卷曲，先端深裂成丝状。蒴果长筒状，与宿萼等长。种子细小，多数。无臭，味淡。

【品质】 本品以色黄绿、穗及叶多者为佳。

【性味功效】 苦，寒。利尿通淋，破血通经。用于热淋，血淋，石淋小便不通，淋沥涩痛，月经闭止。



【编号】 M10427053034H0CMMI H14177053007000300CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

糯米藤

【来源】 荨麻科植物糯米团 Gonostegia hirta（Bl.）Miq.的干燥带根全草。

【主产地】 产于四川、贵州、福建、广西、浙江等地。

【性状特征】 根粗壮，圆锥状，有支根。表面浅红棕色，肉质，不易折断，断面略粗糙，呈浅棕黄色。茎黄褐色。叶多破碎，暗绿色，粗糙有毛，润湿展平后，3条基脉明显，背面网脉明显。有时可见簇生的花或瘦果，果实卵形，顶端尖，约具10条细纵棱。气微，味淡。

【性味功效】 甘、微苦，凉。清热解毒，健脾消积，利湿消肿，散瘀止血。用于乳痈，肿毒，痢疾，消化不良，食积腹痛，疳积，带下，水肿，小便不利，痛经，跌扑损伤，咳血，吐血，外伤出血。



【编号】 M10497149049FHCMMI H19057169011000100CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

动物来

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

九香虫

【来源】 蝽科昆虫九香虫Aspongopus chinensis Dallas的干燥体。

【主产地】 主产于四川、贵州。

【性状特征】 虫体略呈六角状扁椭圆形，长1.6～2 cm，宽约1 cm。表面棕褐色或棕黑色，略有光泽。头部小，与胸部略呈三角形，复眼突出，卵圆状，有单眼1对，触角1对各5节，多已脱落。背部有翅2对，外面的1对基部较硬，内部1对为膜质，透明。胸部有足3对，多已脱落。腹部棕红色至棕黑色，分5～6节，有油光，每节近边缘处有突起的小点。质脆，折断后腹内有浅棕色的内含物。气特异，味微咸，臭如茴香。

【品质】 本品以肢体均匀、油性大、无虫蛀者为佳。

【性味功效】 咸，温。理气止痛，温中助阳。用于胃寒胀痛，肝胃气痛，肾虚阳萎，腰膝酸痛。



【编号】 M00068613701A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

三角帆蚌

【来源】 蚌科动物三角帆蚌Hyriopsis cumingii (Lea)的贝壳。


【主产地】 主产于江苏、浙江。

【性状特征】 贝壳大而扁平，略呈不等边四角状。壳顶部低而平坦，位于贝壳背缘前方。壳面不平滑，刻有粗大的肋脉，生长轮呈同心环状排列。后背缘向上突起，形成大的三角形帆状后翼，此帆状部脆弱易于折断。壳内面平滑，外套痕明显，珍珠层为乳白色。前闭壳肌痕呈卵圆形，后闭壳肌痕略呈三角形。左右壳均具两枚不同大的拟主齿，左壳具2枚长条形侧齿，右壳具1枚长条形侧齿，具光泽。质坚硬。气微腥，味淡。

【品质】 本品以块整、色白、酥松而不碎者为佳。

【性味功效】 咸，寒。平肝潜阳，定惊明目。用于头痛眩晕，烦躁失眠，肝热目赤，肝虚目昏。

【附注】 本品作为“珍珠母”入药。



【编号】 M06508506614A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

三斑海马

【来源】 海龙科动物三斑海马Hippocampus trimaculatus Leach的干燥体。

【主产地】 主产于广东、海南、福建、台湾。

【性状特征】 全体呈扁长形而弯曲，体长10～23 cm。黄褐色或黑褐色，并有似瓦楞子之节纹。头略似马头，有冠状突起，前方有1管状长吻，口小，无牙。两眼深陷。躯干部七棱形；尾部四棱形，渐细卷曲。体上有瓦楞形的节纹并具短棘，体侧背部第1、4、7节的短棘基部各有一大黑色圆斑。体轻，骨质坚硬，难折断。气微腥，味微咸。

【品质】 本品以色黄褐、个大、头尾齐全、干爽洁净者为佳。

【性味功效】 甘，温。温肾壮阳，散结消肿。用于阳萎，遗尿，肾虚作喘，癥瘕积聚，跌扑损伤，创伤出血；外治痈肿疔疮。

【附注】 本品作为“海马”入药。



【编号】 M07498924710A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大刀螂

【来源】 螳螂科昆虫大刀螂Tenodera sinensis Saussure的干燥卵鞘。


【主产地】 主产于河北、天津、甘肃、湖北、湖南、广西、云南、辽宁。

【性状特征】 卵鞘略呈圆柱状或半圆柱状，由多层膜状薄片叠成，长2.5～4 cm，宽2～3 cm。表面浅黄褐色，上面带状隆起不明显，底面平坦或有凹沟。体轻，质松而韧，横断面可见外层为海绵状，内层为许多放射状排列的小室，室内各有一细小椭圆形卵，深棕色，有光泽。气微腥，味淡或微咸。

【品质】 本品以身干、个整不破、色黄、幼虫未出、体轻而带韧性、无树枝草梗等杂物者为佳。

【性味功效】 甘、咸，平。益肾固精，缩尿，止浊。用于遗精滑精，遗尿尿频，小便白浊。

【附注】 本品作为“桑螵蛸”入药。



【编号】 M07428612705A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大连湾牡蛎

【来源】 牡蛎科动物大连湾牡蛎Ostrea talienwhanensis Crosse 的贝壳。

【主产地】 主产于河北、山东、辽宁。

【性状特征】 贝壳呈类三角状，背腹缘呈“八”字形。右壳外面淡黄色，具疏松的同心鳞片，鳞片起伏成波浪状，内面白色。左壳同心鳞片坚厚，自壳顶部放射肋数个，明显，内面凹下呈盒状，铰合面小。质坚硬，不易破碎，断面层状，洁白。无臭，味微咸。

【品质】 本品以个大、整齐、不破碎者为佳。

【性味功效】 咸，微寒。重镇安神，潜阳补阴，软坚散结，收敛固涩。用于惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰疬痰核，癥瘕痞块，自汗盗汗，遗精崩带，胃痛泛酸。

【附注】 本品作为“牡蛎”入药。



【编号】 M04248506410A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

小刀螂

【来源】 螳螂科昆虫小刀螂 Statilia maculata (Thunberg)的干燥卵鞘。

【主产地】 主产于安徽、湖北、山东、江苏、浙江。

【性状特征】 卵鞘略呈长条状，一端较细，长约2.5～5 cm，宽1～1.5 cm。表面灰黄色，上面带状隆起明显，带的两侧各有一条暗棕色浅沟及斜向纹理，底面平坦或凹入。质硬而脆。断面可见多数小形卵室，呈放射状排列。每室中有一细小椭圆形或长圆形卵，黄棕色，有光泽。气微腥，味淡或微咸。

【品质】 本品以身干、个整不破、色黄、幼虫未出、体轻而带韧性、无树枝草梗等杂物者为佳。

【性味功效】 甘、咸，平。益肾固精，缩尿，止浊。用于遗精滑精，遗尿尿频，小便白浊。

【附注】 本品作为“桑螵蛸”入药。



【编号】 M07418612706A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

干蟾皮

【来源】 蟾蜍科动物中华大蟾蜍 Bufo bufo gargarizans Cantor 除去内脏的干燥全体。

【主产地】 主产于河北、四川、湖南、山东、江苏、浙江等地。

【性状特征】 全体呈干瘪状，身长约10 cm左右，宽约4～6 cm。全体拘挛抽皱，纵面有棱角，四肢完整，屈曲或伸缩不一。灰绿色、绿棕色或黑褐色，并带有小形棕色突起的瘰疣。在两眼后侧各有一微隆起的长圆形棕褐色的肉瘤，其上有多数麻点，蟾酥即从该处挤出。前肢较后肢为短，前肢五趾中三趾较长，后肢则四趾较长。腹面灰黄色或土褐色，并有黑斑，可见骨骼及皮膜。微有腥气，味辛。

【品质】 本品以个大、身干、完整、无内脏者为佳。

【性味功效】 甘、辛，温；有毒。除湿热，解毒，消肿，止痛。用于无名肿毒，痈疽发背，疔毒，咽喉肿痛，小儿痨瘦痼疾。



【编号】 M00918930103A1CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

广地龙

【来源】 钜蚓科动物参环毛蚓 Pheretima aspergillum (E.Perrier)的干燥体。

【主产地】 主产于广东、广西。以广东产质量最佳。

【性状特征】 全体呈长条状薄片，弯曲，边缘略卷，长15～20 cm，宽1～2 cm。全体具环节，背部棕黑色、棕褐色至紫灰色，腹部浅黄棕色或淡褐色。第14～16环节为生殖带，习称“白颈”，较光亮。体前端稍尖，中央有小圆孔，尾端钝圆，刚毛圈粗糙而硬，色稍浅。雄生殖孔在第18环节腹侧刚毛圈一小孔突上，外缘有数环绕的浅皮褶，内侧刚毛圈隆起，前面两边有横排（一排或二排）小乳突，每边10～20个不等。受精囊孔2对，位于7/8～8/9节间一椭圆形突起上，约占节周5/11。体轻，略呈革质，不易折断。断面黄白色，肉薄。气腥，味微咸。

【品质】 本品以体干燥、条大、肥壮、不碎者为佳。

【性味功效】 咸，寒。清热定惊，通络，平喘，利尿。用于高热神昏，惊痫抽搐，关节痹痛，肢体麻木，半身不遂，肺热喘咳，尿少水肿；高血压症。



【编号】 M00928402101A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

马氏珍珠贝

【来源】 珍珠贝科动物马氏珍珠贝 Pteria martensii (Dunker) 的贝壳。

【主产地】 主产于广西、广东、海南。

【性状特征】 贝壳呈斜四方状，后耳大，前耳小，背缘平直，腹缘圆。生长线极明显，成片状。壳表面淡黄色或黄褐色，具黑色放射条纹，壳顶位于前方，较为平滑。边缘鳞片层紧密，末端稍翘起，片薄而脆，多已脱落。壳内面珍珠层厚，色白或带淡黄色，光泽强。闭壳肌痕大，长圆形，具一凸起的长形主齿。气微腥，味淡。

【品质】 本品以块整、色淡黄、酥松而不碎者为佳。

【性味功效】 咸，寒。平肝潜阳，定惊明目。用于头痛眩晕，烦躁失眠，肝热目赤，肝虚目昏。

【附注】 本品作为“珍珠母”入药。



【编号】 M06518505904A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乌梢蛇


【来源】 游蛇科动物乌梢蛇Zaocys dhumnades (Cantor)的干燥体。

【主产地】 主产于浙江、江苏。

【性状特征】 全体呈圆盘状。多卷成，盘径约16 cm。表面黑褐色或绿黑色，密被菱形鳞片；背中央有2～4行鳞片强烈起棱，形成两条纵贯全体的黑线。是我国蛇类中背鳞唯一具偶数行的种类。头盘在中间，扁圆形，大多眼大不陷而有光泽；颊鳞1枚，较小，眼后鳞2枚。脊部高耸成屋脊状。腹部剖开边缘向内卷曲，脊肌肉厚，黄白色或淡棕色，可见排列整齐的肋骨。尾部渐细而长，尾端插入外缘的腹腔内。剥皮者仅留头尾之皮鳞，中段较光滑。气腥，味淡。

【品质】 本品以体干、皮色黑褐、肉色黄白、脊背有棱、质坚实者为佳。

【性味功效】 甘，平。祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风症，麻风疥癣，瘰疬恶疮。



【编号】 M01218931630A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

五灵脂


【来源】 鼯鼠科动物复齿鼯鼠Trogopterus xanthipes Milne-Edwards的干燥粪便。

【主产地】 主产于山西、河北。

【性状特征】 粪便由许多粪粒与尿凝结而成的不规则团块状。灰褐色、黑褐色或红褐色。粪粒呈长椭圆柱形，其表面多破裂，裂碎面呈黄褐色或黄棕色，显纤维性。质较硬，较易破碎，断面不平坦，可模糊地看出粪粒的形状，有黑豆大小的粒纹痕迹。气腥臭，味苦咸。

【品质】 本品以块状、色黑褐、内面色黄褐者为佳。

【性味功效】 甘，温。活血散瘀，通血脉，除寒止痛。用于月经不调，痛经，产后血瘀腹痛，肠疝痛。



【编号】 M01268937212A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

凤凰衣

【来源】 雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson的鸡蛋内膜衣。

【主产地】 全国各地均产。

【性状特征】 膜衣呈皱褶状之纸样薄膜。大小不等，边缘不整齐。表面白色或淡黄色，略有光泽，不透明，具棕色线样条纹。内表面淡黄白色或类白色，无光泽，并附有血丝。质轻松易破碎，略有韧性。无臭，味微甘。

【品质】 本品以色白、片整、洁净、无杂质者为佳。

【性味功效】 甘，平。养阴清肺益气。用于咳嗽日久气结、气喘，头眩，目疾。



【编号】 M01358933008A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

文蛤

【来源】 帘蛤科动物文蛤 Meretrix meretrix Linnaeus 的贝壳。


【主产地】 主产于广东、海南、山东。

【性状特征】 贝壳呈扇状或类圆状，背缘略呈三角形，腹缘呈圆弧形，两壳大小相等，壳长略大于壳高，壳长5～12 cm，高3～10 cm，两壳扣合宽3～6 cm。壳顶突出，位于背面稍靠前方，微向腹面弯曲，小月面狭长，盾面宽大，卵圆形，纽带黑褐色短粗，凸出壳面。壳表面膨胀光滑，被有一层黄褐色光亮如漆的壳皮，同心生长纹清晰。由壳顶开始常有环形的褐色色带，表面花纹小型个体变化较多，大型个体较为恒定，一般为灰黄色底，被有褐色环带，通常在背部有锯齿状或波纹状褐色花纹。壳内面白色，平滑而有光泽。边缘无齿纹，前后壳缘有时略带紫色或青紫色，绞合部较宽，右壳有主齿3个及前侧齿2个；左壳有主齿3个及前侧齿1个。质坚硬，断面分层。无臭，味淡。

【品质】 本品以个大、壳面色黄褐、内壳色白、光滑者为佳。

【性味功效】 苦，咸，寒。清热化痰，软坚散结，制酸止痛。用于痰火咳嗽，胸胁疼痛，痰中带血，瘰疬瘿瘤，胃痛吞酸；外治湿疹，烫伤。

【附注】 本品作为“蛤壳”入药。



【编号】 M09438506911A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万　黄璐琦

日本海马

【来源】 海龙科动物日本海马 Hippocampus japonicus Kaup 的干燥体。


【主产地】 主产于广东、海南、福建、台湾。

【性状特征】 全体形状与海马相似，但体形小，长7～10 cm。黄褐色或黑褐色，未去净皮膜。节纹及短棘均较细小，不具硬而长的刺。体轻，骨质坚硬，难折断。气微腥，味微咸。

【品质】 本品以色灰褐、头尾齐全、干爽洁净者为佳。

【性味功效】 甘，温。温肾壮阳，散结消肿。用于阳萎，遗尿，肾虚作喘，癥瘕积聚，跌扑损伤，创伤出血；外治痈肿疔疮。

【附注】 本品作为“海马”入药。



【编号】 M07558924707A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万　黄璐琦

毛蚶

【来源】 蚶科动物毛蚶 Arca subcrenata Lischke 的贝壳。

【主产地】 主产于山东、江苏、河北。

【性状特征】 贝壳略呈三角形或扇形，长4～5 cm，高3～4 cm。壳外面隆起，有棕褐色茸毛或已脱落；壳顶突出，向内卷曲；自壳顶向腹面延伸的放射肋纹30～34条，壳内面平滑，白色或乳白色，壳缘有与壳外面直楞相对的凹陷，铰合部具小齿1列。质坚，可砸碎，断面白色。无臭，味淡。

【品质】 本品以块整、干净、无残肉者为佳。

【性味功效】 甘、咸，平。消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。用于顽痰积聚，黏稠难咯，瘿瘤，瘰疬，癥瘕痞块，胃痛泛酸。

【附注】 本品作为“瓦楞子”入药。



【编号】 M01918505603A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万　黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

长牡蛎

【来源】 牡蛎科动物长牡蛎 Ostrea gigas Thunberg 的贝壳。

【主产地】 主产于河北、广东、福建、山东、辽宁等地。

【性状特征】 贝壳呈长片形，背腹缘几乎平行。贝壳极长，长10～50 cm，宽4～15 cm，右壳较小，鳞片坚厚，壳外面平坦或具数个凹陷，淡紫色、灰白色或黄褐色，壳内表面瓷白色，平滑，有光泽，壳顶二侧无小齿。左壳凹下很深，鳞片较右壳粗大，壳顶附着面小。质坚硬，不易破碎，断面层状，洁白。无臭，味微咸。

【品质】 本品以个大、整齐、不破碎、无杂质者为佳。

【性味功效】 咸，微寒。重镇安神，潜阳补阴，软坚散结，收敛固涩。用于惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰疬痰核，癥瘕痞块，自汗盗汗，遗精崩带，胃痛泛酸。

【附注】 本品作为“牡蛎”入药。



【编号】 M02008506405A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

龙虱

【来源】 龙虱科动物龙虱 Cybister tripunctatus orientalis Gschew. 的干燥虫体。

【主产地】 主产于湖南、江苏。

【性状特征】 虫体呈长卵状或长圆状，前狭后宽，长1.5～2 cm。头近扁平，中央微隆起。黑色或黑绿色，有一对较厚的鞘翅，鞘翅有3行不明显的纵点线，边缘有棕黄色狭边。腹面红褐色或黑褐色。有足3对，黄褐色，生有金黄色长毛，前足2对较小，后足1对较大，胫节短阔，胫端两侧生刺。质松脆。气腥，味微咸。

【品质】 本品以身干、整齐、干净者为佳。

【性味功效】 咸，寒；有毒。破瘀血，通经，缩尿。用于妇女血瘀经闭，癥瘕腹痛，跌扑损伤，老人夜溺频繁。



【编号】 M02968616102A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

全蝎


【来源】 钳蝎科动物东亚钳蝎 Buthus martensii Karsch 的干燥体。

【主产地】 主产于河南、山东、辽宁。以河南禹县为道地药材。

【性状特征】 虫体头胸部与前腹部呈扁平长椭圆形，后腹部呈尾状，皱缩弯曲，完整者体长约6 cm。头胸部呈绿褐色，头部有1对短小的螯肢及1对较长大的钳状脚须，形似蟹螯，背面覆有梯形背甲，腹面有足4对，均为7节，末端各具2爪钩；前腹部由7节组成，第七节色深，背甲上有5条隆脊线。背面绿褐色，后腹部棕黄色，6节，节上均有纵沟，末节有锐钩状毒刺，毒刺下方无距。后腹部中空。干燥者体轻，质脆，气微腥，味咸。

【品质】 本品以体整、个大、色黄褐、盐霜少者为佳。

【性味功效】 辛、平；有毒。熄风镇痉，攻毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，中风口㖞，半身不遂，破伤风症，风湿顽痹，偏正头痛，疮疡，瘰疬。



【编号】 M03138610901A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

地鳖

【来源】 鳖蠊科昆虫地鳖 Eupolyphaga sinensis Walker 的雌虫干燥体。

【主产地】 主产于山西、河北、河南、安徽、湖北、山东、江苏、浙江等地。以河南产量最大。江苏、浙江品质最优。

【性状特征】 虫体呈扁平卵形，长 1.3～3 cm，宽 1.2～2.4 cm。前端较窄，后端较宽，背部紫褐色，具光泽，无翅。前胸背板较发达，盖住头部。腹背板 9 节，呈覆瓦状排列。腹面红棕色，头部较小，有丝状触角 1 对，常脱落，胸部有足 3 对，弯曲，具细毛和刺。腹部有横环节。质松脆，易破碎。破碎后腹内有灰黑色物质。气腥臭，味微咸。

【品质】 本品以个整、不破碎、油润光泽、无泥土者为佳。

【性味功效】 咸，寒；有小毒。破瘀血，续筋骨。用于筋骨折伤，血瘀经闭，癥瘕痞块。

【附注】 本品作为“土鳖虫”入药。



【编号】 M00268612501A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

尖海龙

【来源】 海龙科动物尖海龙 Syngnathus acus Linnaeus 的干燥体。

【主产地】 主产于广东、台湾、辽宁。

【性状特征】 全体细长，呈鞭状，长 10～30 cm，未去皮膜。表面黄褐色，中部略粗，直径 0.5～1 cm，尾端渐细而略弯曲，头部前方具 1 管状长吻，口小，无牙，两眼圆而深陷，头与体轴呈钝角。有的腹面可见育儿囊，全体骨环不甚明显，尾长约为躯干的 2 倍。有尾鳍，尾端不卷曲。质较脆弱，易撕裂。气微腥，味微咸。

【品质】 本品以条大、身干、色黄褐、头尾整齐不碎者为佳。

【性味功效】 甘，温。温肾壮阳，散结消肿。用于阳萎，遗尿，肾虚作喘，癥瘕积聚，跌扑损伤；外用痈肿疔疮。



【编号】 M03328924713A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

杂色鲍

【来源】 鲍科动物杂色鲍 Haliotis diversicolor Reeve 的贝壳。


【主产地】 主产于广东、海南、福建、台湾等地。

【性状特征】 贝壳呈长卵圆状，内面观略呈耳状，长 7～9 cm，宽 5～6 cm，高约 2 cm。表面暗红色，略平坦而平滑，有多数不规则螺肋和细密生长线，螺旋部小，体螺部大，从螺旋部壳顶处开始向右排列有 20 余个疣状突起，末端有 6～9 个开孔，孔口与壳面平，壳内面光滑，具珍珠样彩色光泽。壳较厚，质坚硬，不易破碎。无臭，味微咸。

【品质】 本品以个大、外壳洁净、壳内表面有彩色光泽者为佳。

【性味功效】 咸，寒。平肝潜阳，清肝明目。用于头痛眩晕，目赤翳障，视物昏花，青盲雀目。

【附注】 本品作为“石决明”入药。



【编号】 M02788502805A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

羊鲍

【来源】 鲍科动物羊鲍 Haliotis ovina Gmelin 的贝壳。


【主产地】 主产于广东、海南、台湾。

【性状特征】 贝壳呈近圆状，长 4～8 cm，宽 2.5～6 cm，高 0.8～2 cm。壳顶位于近中部而高于壳面，表面灰黄色或灰棕色，壳外表面不规则的弧形螺肋条纹，生长不明显，有小海螺或苔藓类等附着物。螺旋部与体螺部各占 1/2，从螺旋部边缘有 2 行整齐的突起，尤以上部较为明显，末端4～5个开孔，呈管状，孔口与壳面平。壳内表面光滑，有珍珠样彩色光泽。质坚硬，不易破碎。气微，味微咸。

【品质】 本品以个大、外壳洁净、壳内表面有彩色光泽者为佳。

【性味功效】 咸，寒。平肝潜阳，清肝明目。用于头痛眩晕，目赤翳障，视物昏花，青盲雀目。

【附注】 本品作为“石决明”入药。



【编号】 M02808502808A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

近江牡蛎

【来源】 牡蛎科动物近江牡蛎 Ostrea rivularis Gould 的贝壳。


【主产地】 主产于河北、广东、海南、福建、山东、浙江、辽宁。

【性状特征】 贝壳呈圆状、卵圆状或三角状等。右壳外面稍不平，有灰、紫、棕、黄等色，环生同心鳞片，幼体者鳞片层层相叠，内面白色，边缘有时淡紫色。质坚硬，不易破碎，断面层状。无臭，味微咸。

【品质】 本品以个大、整齐、不破碎者为佳。

【性味功效】 咸，微寒。重镇安神，潜阳补阴，软坚散结，收敛固涩。用于惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰疬痰核，癥瘕痞块，自汗盗汗，遗精崩带，胃痛泛酸。

【附注】 本品作为“牡蛎”入药。



【编号】 M04588506409A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

阿胶


【来源】 马科动物驴 Equns asinus Linnaeus 的皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。

【主产地】 主产于山东。以山东东阿产为道地。

【性状特征】 固体胶长方块状或方块状，黑褐色，有光泽。质硬而脆，断面光亮，碎片对光照视呈棕色半透明。气微，味微甘。

【品质】 本品以乌黑、断面光亮、质脆味甘、无腥气者为佳。

【性味功效】 甘，平。补血滋阴，润燥，止血。用于血虚萎黄，眩晕心悸，肌痿无力，心烦不眠，虚风内动，肺燥咳嗽，劳嗽咯血，吐血尿血，便血崩漏，妊娠胎漏。



【编号】 M046389398010O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鸡内金


【来源】 雉科动物家鸡Gallus gallus domesticus Brisson的干燥沙囊内壁。

【主产地】 全国大部地区均产。

【性状特征】 沙囊内壁为不规则卷片，大小不一。厚约2 mm。表面黄色或黄绿色，薄而半透明，具明显条棱状纹，呈波浪状。质脆，易碎，断面角质样，有光泽。气微腥，味微苦。

【品质】 本品以色黄、完整、洁净者为佳。

【性味功效】 甘，平。健胃消食，涩精止遗。用于食积不消，呕吐泻痢，小儿疳积，遗尿，遗精。



【编号】 M04678933008A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

龟甲


【来源】 龟科动物乌龟 Chinemys reevesii (Gray) 的背甲及腹甲。

【主产地】 主产于安徽、湖北、湖南、江苏、浙江。

【性状特征】 背甲及腹甲由甲桥相连，背甲稍长于腹甲，与腹甲常分离。背甲呈长椭圆形拱状，前部略窄于后部，外表面棕褐色或黑色，前端有颈角板1块，脊背中央有椎角板5块，两侧各有对称肋角板4块，边缘每侧具角板11块，尾部具臀角板2块。腹甲呈板片状，近长方椭圆形，外表面淡黄棕色至棕色，角板12块，每块具紫褐色放射状纹理，内表面黄白色至灰白色，有的略带血迹或残肉，除净后可见骨板9块，呈锯齿状嵌接。前端钝圆或平截，后端具三角形缺刻，两侧均有呈翼状向斜上方弯曲的甲桥（墙板）。质坚硬。气微腥，味微咸。

【品质】 本品以质干、板上有血斑、块大无腐肉者为佳。

【性味功效】 咸、甘，微寒。滋阴潜阳，益肾强骨，养血补心。用于阴虚潮热，骨蒸盗汗，头晕目眩，虚风内动，筋骨痿软，心虚健忘。



【编号】 M04758930601A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

刺海马


【来源】 海龙科动物刺海马 Hippocampus histrix Kaup 的干燥体。

【主产地】 主产于河北、福建、山东、辽宁、广东、海南。

【性状特征】 全体呈扁长状而弯曲，体长15～20 cm，头略似马头，黄白色，前方有1冠状长吻，口小，无牙，两眼深陷的眼睛生于基部两旁，旁有圆形凹陷处为腮，无齿。躯干部7棱形，直径约2.3 cm，尾部4棱形，直径约1 cm，渐细卷曲。体上环节具有瓦楞形的节纹及发达的硬刺，刺长2～4 mm。体轻，骨质坚硬，难折断。气微腥，味微咸。

【品质】 本品以色白、个大、头尾齐全、干爽洁净者为佳。

【性味功效】 甘，温。温肾壮阳，散结消肿。用于阳萎，遗尿，肾虚作喘，癥瘕积聚，跌扑损伤；外治痈肿疔疮。



【编号】 M04878924706A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

夜明砂

【来源】 菊头蝠科动物菊头蝠 Rhinolophus ferrum-equinum Schreber 的干燥粪便。

【主产地】 主产于甘肃、河南、江西、广西、浙江、江苏、辽宁。

【性状特征】 粪便呈长椭圆形小颗粒，两端略尖，长 5～7 mm，直径 2 mm。表面粗糙或破碎，棕褐色或黑褐色，并带有绿色有亮光的小粒。置放大镜下可见黄棕色或棕色有光泽的昆虫头、眼及小翅。质轻软不刺手。无臭，味微苦而辛。

【品质】 本品以色棕褐、身干、无砂土者为佳。

【性味功效】 辛，寒。破积活血，明目去翳。用于夜盲症，目生翳障，腹中胀气痛，惊风，小儿疳疾。



【编号】 M04978936202A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

泥蚶

【来源】 蚶科动物泥蚶 Arca granosa Linnaeus 的贝壳。

【主产地】 主产于江苏、山东、河北。

【性状特征】 贝壳略呈三角形或扇形，两壳相等，长 2.5～5 cm，高 2～3 cm。壳外面隆起，无棕褐色茸毛，自壳顶至腹面边缘有延伸的放射肋纹 18～21 条，肋上具有颗粒状突起，肋间沟较肋纹为宽。壳内面平滑，呈白色或乳白色。壳内面边缘有与肋纹相对应的凹陷，铰合部具小齿 1 列。质坚，可砸碎，断面白色。无臭，味淡。

【品质】 本品以块整、干净、无残肉及泥土者为佳。

【性味功效】 甘、咸，平。消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。用于顽痰积聚，黏稠难咯，瘿瘤，瘰疬，癥瘕痞块，胃痛泛酸。

【附注】 本品作为“瓦楞子”入药。



【编号】 M01908505601A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

金钱白花蛇


【来源】 眼镜蛇科动物银环蛇 Bungarus multicinctus multicinctus Blyth 的幼蛇干燥体。

【主产地】 主产于广西、广东。

【性状特征】 全体呈圆盘状，盘径 3～6 cm，蛇体直径 2～4 mm。头盘在中间，尾细，常纳口内，口腔内上颌骨前端有毒沟牙 1 对，鼻间鳞 2 片，无颊鳞，上下唇鳞通常各为 7 片。背部黑色或灰黑色，有白色环纹 45～58 个，黑白相间，白环纹在背部宽 1～2 行鳞片，向腹面渐增宽，黑环纹宽 3～5 行鳞片，背正中明显突起一条脊棱，脊鳞扩大呈六角形，背鳞细密，通身 15 行，尾下鳞单行。气微腥，味微咸。

【品质】 本品以头尾齐全、有花斑纹、有光泽者为佳。

【性味功效】 甘、咸，温；有毒。祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口㖞，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风症，麻风疥癣，瘰疬恶疮。



【编号】 M05748931702A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

青娘子


【来源】 芫青科动物绿芫青 Lytta caraganae Pallas 的干燥体。

【主产地】 主产于江苏、浙江。

【性状特征】 虫体呈长圆状，长 1～2 cm，宽 3～5 mm。头略呈三角形，蓝紫色或蓝绿色，有光亮。眼小，微突出。背部有一对柔软的鞘翅，呈亮绿色、蓝紫色或红紫色，具美丽的光泽。鞘翅下有淡棕色膜翅一对，4 条脉纹明显。足 3 对，多数已脱落。气微臭。

【品质】 本品以身干、完整、色青绿鲜艳者为佳。

【性味功效】 辛，微温；有毒。祛瘀散结，解毒利尿。用于淋病，癥瘕积聚，经闭，狂犬病；外用治疥癣恶疮，瘰疬，淋巴结核。



【编号】 M05928616213A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

青蛤

【来源】 帘蛤科动物青蛤 Cyclina sinensis Gmelin 的贝壳。


【主产地】 主产于福建、浙江、江苏、山东等地。

【性状特征】 贝壳薄，呈类圆状，两壳大小相等，壳长与壳高近相等，约 3～6 cm，两壳扣合宽 2～4 cm。壳顶突出，位于背侧近中部，尖端向前弯曲。无明显的小月面，盾面狭长，韧带黄褐色，不突出壳面。壳表面极突出，淡黄色或棕红色，同心生长纹在顶端排列紧密，不显著，至腹面渐粗，凸出壳面呈环肋状。壳内面白色或淡红色，平滑而有光泽。边缘常带紫色并有整齐的小齿纹，绞合部狭长而平，左右两壳均具主齿 3 个，无侧齿。体轻，质坚硬，断面层纹不明显。无臭，味淡。

【品质】 本品以个大、壳面色黄白、内壳色白、光滑者为佳。

【性味功效】 苦、咸，寒。清热化痰，软坚散结，制酸止痛。用于肺热咳嗽，胸胁疼痛，痰中带血，瘰疬瘿瘤，胃痛吞酸；外治湿疹，烫伤。

【附注】 本品作为“蛤壳”入药。



【编号】 M09428506902A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

鱼脑石


【来源】 石首鱼科动物大黄鱼 Pseudosciaena crocea (Richardson) 耳中的耳石。

【主产地】 主产于浙江及东海、南海。以浙江舟山群岛最多。

【性状特征】 耳石略呈三棱形长卵状，长 1.5～2.8 cm，宽 0.8～1.5 cm。前端宽圆，后端狭尖，中间宽，里缘及外缘弧形。全体白色，具瓷样光泽。背面向一侧隆起，其下方可见细长纹理及横行嵴棱。腹面较平坦，前后端稍翘起，有一“蝌蚪”形印迹，伸达前缘。尾端扩大，中央有一圆形突起，尾部直达后缘。边缘沟宽短而显著，位于腹面里侧缘。质坚硬，难破碎。气微弱，味稍涩。

【品质】 本品以色白、个大、坚硬如石者为佳。

【性味功效】 咸，平。化石，通淋，消炎。用于石淋，小便不利，中耳炎，鼻炎，脑漏。



【编号】 M06008926209A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

南方大斑蝥

【来源】 芫青科昆虫南方大斑蝥 Mylabris phalerata Pallas 的干燥体。


【主产地】 主产于河南、安徽、湖南、四川、云南、贵州、广西、江苏。

【性状特征】 全体呈长圆状，长 1.5～2.5 cm，宽 1～5 mm。头及口器向下垂，有1对较大的复眼及触角，触角多已脱落。背部具革质鞘翅1对，黑色，有3条黄色或棕黄色的横纹；鞘翅下面有棕褐色薄膜状透明的内翅2片。胸腹乌黑色，胸部有3对足。有特殊的臭气，味初辛后苦。触及皮肤则发红，刺痛，重则发泡。

【品质】 本品以身干、个大、颜色鲜明、有黄色花斑、完整者为佳。

【性味功效】 辛，热；有大毒。破血消癥，攻毒蚀疮，引赤发泡。用于癥瘕肿块，积年顽癣，瘰疬，赘疣，痈疽不溃，恶疮死肌。

【附注】 本品作为“斑蝥”入药。



【编号】 M06098616221A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

柳叶蚂蟥

【来源】 水蛭科动物柳叶蚂蟥 Whitmania acranulata (Whitman)的干燥体。


【主产地】 主产于山东微山湖、南阳湖、东平，江苏苏州、吴县等地。

【性状特征】 全体形体狭长而扁，长5～12 cm，宽1～5 mm。背腹两面呈黄褐色、茶褐色或黑棕色。表面凹凸不平，有黑褐色斑点构成的5条纵纹，体节明显或不明显。两端稍细，各具1个吸盘，前吸盘不显著，后吸盘圆较大，两端经过加工后穿有小孔，因此吸盘不易辨认。质脆，易折断，折断面不平坦，无光泽。有土腥气。

【品质】 本品以身干、体大、无泥者为佳。

【性味功效】 咸，苦，平；有毒。破血，逐瘀，通经。用于癥瘕痞块，血瘀经闭，跌扑损伤。

【附注】 本品作为“水蛭”入药。



【编号】 M01798402303A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

独角蜣螂虫

【来源】 独角仙科动物独角仙 Allomyrina dichotoma Linnaeus 的干燥雄虫。


【主产地】 主产于山西、河北、四川、贵州、安徽、湖北、湖南、江西、广东、广西、江苏、上海、浙江、福建、台湾。

【性状特征】 虫体呈红棕色、棕褐色或黑褐色，长4～6 cm，宽2.4～3.3 cm。全体光亮，尤其鞘翅部分。雄虫头顶中央具有长角状突起一支，长约1.7～3 cm，角上端二回分叉。头部较小，左右有眼各一对。前胸背板扩大，占体长1/3，背部中央有一前弯的短角突，长约1 cm，末端分歧为二。小盾片明显，前翅革质长大，棕色或棕褐色，后翅膜质，黄色或黄棕色。臂板短阔。腹面有光泽，被黄褐色纤毛。足3对发达，前足基节方有一突起，顶端平滑呈弧形线。质松脆。有臭气。

【品质】 本品以身干、完整、色棕褐或黑褐者为佳。

【性味功效】 咸、寒；有毒。镇惊，破瘀止痛，攻毒。用于惊痫癫狂，小儿惊风。外用治痔漏，疔疮肿毒。

【附注】 本品作“蜣螂虫”入药。



【编号】 M10538617107A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

穿山甲


【来源】 鲮鲤科动物穿山甲 Manis pentadactyla Linnaeus 的鳞甲。

【主产地】 主产于湖南、贵州、云南、广西、广东、海南、福建、台湾。

【性状特征】 鳞甲呈扇面形状、三角状、菱状或盾形的扁平片状或半折合状，中间较厚，边缘较薄，大小不一，长宽各为0.7～5 cm。外表面黑褐色或黄褐色，有光泽，宽端有数10条排列整齐的纵纹及数条横线纹；窄端光滑。内表面色较浅，中部有1条明显突起的弓形横向棱线，其下方有数条与棱线相平行的细纹。角质，半透明，坚韧而有弹性，不易折断。气微腥，味淡。

【品质】 本品以片整、色黑褐或黄褐、无腥气、不带皮肉之净甲片者为佳。

【性味功效】 咸，微寒。通经下乳，消肿排脓，搜风通络。用于经闭癥瘕，乳汁不通，痈肿疮毒，关节痹痛，麻木拘挛。



【编号】 M06608936901A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

虻虫

【来源】 虻科动物复带虻 Tabanus bivittatus Matsumura 的干燥雌虻虫体。

【主产地】 主产于河北、山西、陕西、新疆、河南、安徽、山东、江苏。

【性状特征】 虫体呈长椭圆状，长约4～8 mm。头部为黑褐色，有凸出的两眼及长形吸盘。身躯为黄褐色或黑灰色，有节纹，背部上面有透明的双翅及一条由头部延长下来的黑褐色棱线。胸部有足3对，或已断掉。腹部末端钝尖。体轻质脆。破开腹部，内有灰黑色糟朽物。臭弱，味苦咸。

【品质】 本品以个大、身干、背部不破者为佳。

【性味功效】 苦、微寒；有毒。通经破血，消癥软坚。用于经闭癥瘕，胸腹恶血坚痞。



【编号】 M06908615201H0SM

【鉴定人】 陈俊华

蚂蟥

【来源】 水蛭科动物蚂蟥 Whitmania pigra (Wihitman) 的干燥体。


【主产地】 主产于山东、江苏。以山东微山湖产量最大。

【性状特征】 全体呈扁平纺锤状，有多数环节，长4～10 cm，宽0.5～2 cm。背部黑褐色或黑棕色，稍隆起，用水浸后，可见黑色斑点排成5条纵纹；腹面平坦，棕黄色，两侧棕黄色，前端略尖，后端钝圆，两端各具1吸盘，前吸盘不显著，后吸盘较大。质脆，易折断，断面有光泽似胶质状。气微腥。

【品质】 本品以身干、体大、无泥者为佳。

【性味功效】 咸，苦，平；有毒。破血，逐瘀，通经。用于癥瘕痞块，血瘀经闭，跌扑损伤。

【附注】 本品作为“水蛭”入药。



【编号】 M01818402307A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

海螵蛸

【来源】 乌贼科动物金乌贼 Sepia esculenta Hoyle 的干燥内壳。

【主产地】 主产于福建、广东、山东、江苏、浙江、辽宁。

【性状特征】 内壳呈扁长椭圆状，中间厚，边缘薄，长13～23 cm，宽约至6.5 cm，背部白色或微带淡黄色，有明显的疣点，略呈层状排列；腹面的细密波状横层纹占全体大部分，中间有纵向浅槽；尾部角质缘渐宽，向腹面翘起，末端有1骨针，多已断落。质松脆，易折断，断面粉质，显疏松层纹。气微腥，味微咸，入口后初嚼带砂性，不久即溶化。

【品质】 本品以体大、身干、色白、完整者为佳。

【性味功效】 咸，涩，温。收敛止血，涩精止带，制酸，敛疮。用于溃疡病，胃酸过多，吐血衄血，崩漏便血，遗精滑精，赤白带下，胃痛吞酸；外治损伤出血，疮多脓汁。



【编号】 M07568507803A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

皱纹盘鲍

【来源】 鲍科动物皱纹盘鲍 Haliotis discus hannai Ino 的贝壳。

【主产地】 主产于山东、辽宁。

【性状特征】 贝壳呈长椭圆状，长 8～12 cm，宽 6～8 cm，高 2～3 cm。表面灰棕色，壳外表面有多数粗糙而不规则的皱纹，生长线明显。壳较薄，常有苔藓虫、石灰虫或苔藓类等附着物，因而呈绿色或灰黄色，凹凸不平，自第2螺层开始至边缘有20余个逐渐增大的椭圆形突起，末端有4～5个开孔，孔口突出于壳面，壳较薄。壳内表面光滑，有珍珠样彩色光泽。质坚硬，火煅易破碎。气微，味微咸。

【品质】 本品以个大、外壳洁净、壳内表面有彩色光泽者为佳。

【性味功效】 咸，寒。平肝潜阳，清肝明目。用于头痛眩晕，目赤翳障，视物昏花，青盲雀目。

【附注】 本品作为“石决明”入药。



【编号】 M02778502804A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蚕砂

【来源】 蚕蛾科动物家蚕 Bombyx mori Linnaeus 的干燥粪便。

【主产地】 主产于陕西、四川、河南、安徽、湖北、湖南、江西、江苏、浙江。

【性状特征】 粪便呈短圆柱形小粒状，长 5～8 mm，直径约 2～5 mm。黑色、灰黑色或暗绿色，粗糙。两端略平坦，纵向有六条明显的纵棱，横向有3～4条浅沟，显麻纹状。质坚而脆，用手搓可碎，遇潮后易松散。微有青草气。

【品质】 本品以身干、色黑、大小均匀者为佳。

【性味功效】 咸、辛，平。祛风燥湿，清热明目。用于风湿痛，关节麻木，腰脚冷痛，风热赤眼。



【编号】 M07968614301A1CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

望月砂

【来源】 兔科动物蒙古兔 Lepus tolia Pallas 的干燥粪便。

【主产地】 主产于河北、内蒙古、宁夏、甘肃、黑龙江、吉林、辽宁。

【性状特征】 粪便呈圆球状而略扁，长约 3～4 cm，直径约 2～3 cm。表面粗糙有草质纤维，内外均呈浅棕色或灰黄色。体轻松，易碎。手搓即破碎成乱草状，此为尚未消化的杂草。无臭，味微苦而辛。

【品质】 本品以圆球形、色浅棕、不破碎者为佳。

【性味功效】 辛，平。解毒，杀虫，明目。用于疳疾，目赤翳障，痔漏。



【编号】 M08198937107A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

羚羊角

【来源】 牛科动物赛加羚羊 Saiga tatarica Linnaeus 的角。

【主产地】 主产于新疆、甘肃、青海、西藏、内蒙古。

【性状特征】 角呈长圆锥状，略呈弓形弯曲，长 15～33 cm。表面光滑，类白色或黄白色，基部稍呈青灰色。嫩枝对光透视有“血丝”或紫黑色斑纹，光润如玉，无裂纹。老枝则有细纵裂纹。除尖端部分外，有 10～16 个隆起环脊，间距约 2 cm。用手握之，四指正好嵌入凹处。角的基部横截面圆形，直径 3～4 cm，内有坚硬质重的角柱，习称“骨塞”，骨塞长约占全角的 1/2 或 1/3。表面有突起的纵棱与其外面角鞘内的凹沟紧密嵌合，从横端面观，其结合部呈锯齿状。除去“骨塞”后，角的下半段成空洞，全角呈半透明，对光透视，上半段中央有一条隐约可辨的细孔道直通角尖，习称“通天眼”。质坚硬，不易折断。气无，味淡。

【品质】 本品以色类白、质嫩、有光泽、无裂纹、有鲜红血斑者为佳。

【性味功效】 咸，寒。平肝熄风，清肝明目，散血解毒。用于高热惊痫，神昏痉厥，子痫抽搐，癫痫发狂，头痛眩晕，目赤翳障，温毒发斑，痈肿疮毒。



【编号】 M08478940319A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蛇蜕

【来源】 游蛇科动物锦蛇 Elaphe carinata (Guenther) 蜕下的干燥表皮膜。

【主产地】 主产于陕西、四川、云南、贵州、广西、广东、河南、安徽、湖北、湖南、福建、浙江等地。

【性状特征】 皮膜呈圆筒状，多压扁而皱缩，完整者形似蛇，长可达 1 m 以上。背部银灰色或淡灰棕色，有光泽，鳞迹菱形或椭圆形，衔接处呈白色，略抽皱或凹下；腹部乳白色或略显黄白色，鳞迹长方形，呈覆瓦状排列。体轻，质微韧，手捏有滑润感和弹性，轻轻搓揉，沙沙作响。气微腥，味淡或微咸。

【品质】 本品以条长、身干、色银灰、有光亮、无泥沙者为佳。

【性味功效】 咸、甘，平。祛风，定惊，解毒，退翳。用于小儿惊风，抽搐痉挛，角膜出翳，喉痹，疔疮疥癣，皮肤瘙痒。



【编号】 M08548931605A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鹿茸

【来源】 鹿科动物梅花鹿 Cervus nippon Temminck 的雄鹿未骨化密生茸毛的幼角。

【主产地】 主产于黑龙江、吉林、辽宁。

【性状特征】 幼角呈圆柱状分枝，具一个分枝者习称“二杠”，主枝习称“大挺”，长 17～20 cm，锯口直径 4～5 cm，离锯口约 1 cm 处分出侧枝，习称“门庄”，长 9～15 cm，直径较大挺略细。外皮红棕色或棕色，多光润，表面密生红黄色或棕黄色细茸毛，上端较密，下端较疏；分岔间具 1 条灰黑色筋脉，皮茸紧贴。锯口黄白色，外围无骨质，中部密布细孔。体轻，气微腥，味微咸。具二个分枝者，习称“三岔”，大挺长 23～33 cm，直径较二杠细，略呈弓形，微扁，枝端略尖，下部多有纵棱筋及突起疙瘩；皮红黄色，茸毛较稀而粗。

二茬茸与头茬茸相似，但挺长而不圆或下粗上细，下部有纵棱筋。皮灰黄色，茸毛较粗糙，锯口外围多已骨化。体较重。无腥气。

【品质】 本品以粗大、顶端丰满、皮色红棕、毛细、质嫩、油润光亮者为佳。

【性味功效】 甘、咸，温。壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。用于阳萎滑精，宫冷不孕，羸瘦，神疲，畏寒，眩晕耳鸣耳聋，腰脊冷痛，筋骨痿软，崩漏带下，阴疽不敛。



【编号】 M08698940205A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

黄黑小斑蝥

【来源】 芫青科昆虫黄黑小斑蝥 Mylabris cichorii Linnaeus 的干燥体。


【主产地】 主产于河南、安徽、湖南、四川、云南、贵州、广西、江苏。

【性状特征】 虫体呈长圆状，长1～1.5 cm。头及口器向下垂，有1对较大的复眼及触角，触角多已脱落。背部具革质鞘翅1对，黑色，带有3条黄色或棕黄色的横纹；鞘翅下面有棕褐色薄膜状透明的内翅2片。胸腹部乌黑色，胸部有3对足。有特殊的臭气，味初辛后苦。触及皮肤则发红，刺痛，重则发泡。

【品质】 本品以身干、颜色鲜明、无败油气味者为佳。

【性味功效】 辛，热；有大毒。破血消癥，攻毒蚀疮，引赤发泡。用于癥瘕肿块，积年顽癣，瘰疬，赘疣，痈疽不溃，恶疮死肌。

【附注】 本品作为“斑蝥”入药。



【编号】 M09008616220A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

紫贝齿


【来源】 宝贝科动物紫贝齿 Mauritia arabica (Linnaeus) 的贝壳。

【主产地】 主产于广东、海南、台湾。

【性状特征】 贝壳呈卵圆状，前宽后窄。长约 2～7 cm，宽约 1～4 cm，高 0.8～2 cm。壳表面紫色或紫棕色，上有类白色斑点或圆形小点，或暗紫棕色与灰白色交错的斑纹，平滑而有光泽。背部隆起，腹部较扁平，壳口两边缘向内卷曲形成细长的沟，沟的两侧有锯齿，两端各有一凹入呈圆口状。底部散有紫黑色点。壳内蓝白色。质坚硬。无臭，无味。

【品质】 本品以壳厚、色紫棕、不碎者为佳。

【性味功效】 咸，平。清热解毒，平肝明目。用于惊悸心烦，目赤翳障，头晕目眩，小儿斑疹。



【编号】 M09178503709A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紫河车


【来源】 健康人的干燥胎盘。

【主产地】 全国各地均产。

【性状特征】 胎盘呈圆状或蝶形椭圆状，直径9～15 cm，厚薄不一。黄色、黄棕色或紫黑色，一面凹凸不平，有不规则沟纹，另一面较平滑，边缘向内卷曲，常附有残余的脐带痕迹，其四周有细血管。质硬脆，折断面黄色或黄棕色。有腥气。

【品质】 本品以干燥完整、色黄、洁净者为佳。

【性味功效】 甘、咸，温。温肾补精，益气养血。用于虚劳羸瘦，骨蒸盗汗，咳嗽气喘，食少气短，阳萎遗精，不孕少乳。



【编号】 M09248936801A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

紫草茸

【来源】 胶蚧科昆虫紫胶虫Laccifer lacca Kerr 雌体分泌的胶质。

【主产地】 主产于云南思茅、玉溪，四川甘孜、阿坝、凉山等地。

【性状特征】 呈槽状或半圆柱状，长3～7 cm，宽0.5～2 cm，表面红棕色或紫褐色，凹凸不平，有皱纹和小虫眼孔隙，附着于树枝处凹陷，周边钝圆形。质硬而脆，断面半透明，有光泽，有平行排列的长圆形或圆形虫窝，由多室构成，室内常见白粉末或紫黑色的虫尸。气微，味微涩。

【品质】 本品以块大、色紫、质坚者为佳。

【性味功效】 苦，凉。凉血，和血，敛疮。用于月经过多；外用外伤出血，湿疹，溃疡不敛。



【编号】 M092786134010O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

紫梢花


【来源】 淡水海绵科动物淡水脆针海绵 Spongilla fragilis Lecidy 的干燥群体。

【主产地】 主产于河南南阳，江苏苏州、震泽等地。

【性状特征】 全体呈不规则团块状，形似蒲棒，长约4～16 cm，直径约2～4 cm，中央有水草或树枝。灰黄色、灰绿色或黄绿色。有很多小孔，呈海绵状而稍硬，里面包含有许多灰黄色圆形小颗粒（芽球）。质轻而松泡，捻之易碎。折断面呈放射性网纹状，网眼内有灰黄色或黄绿色类圆形小颗粒，即芽球，振摇易脱落。无臭，味淡。

【品质】 本品以块大、身干、柔软、轻松、色黄绿者为佳。

【性味功效】 甘，温。补肾，强精助阳。用于肾阳虚，遗精白浊，小便不禁，阴囊湿疹，妇阴腹冷痛。



【编号】 M09288200202A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蛤蚧


【来源】 壁虎科动物蛤蚧 Gekko gecko Linnaeus 的干燥体。

【主产地】 主产于广西、广东。

【性状特征】 全体呈扁片状，头颈部和躯干部长9～18 cm，头颈部约占1/3，腹背部宽6～11 cm，尾长6～12 cm。头略呈扁三角状，两眼多凹陷成窟窿，口内有细齿，生于颚的边缘，无异型大齿。吻部半圆形，吻鳞不切鼻孔，与鼻鳞相连，上鼻鳞左右各1片，上唇鳞12～14对，下唇鳞（包括颏鳞）21片。腹背部呈椭圆形，腹薄。背部呈灰黑色或银灰色，有黄白色或灰绿色斑点散在或密集成不显著的斑纹，脊椎骨及两侧肋骨突起。四足均具5趾，趾间仅具蹼迹，足趾底有吸盘。尾细而坚实，微显骨节，与背部颜色相同，有6～7个明显的银灰色环带。全身密被圆形或多角形微有光泽的细鳞。质坚韧。气腥，味微咸。

【品质】 本品以体大、尾全而粗长、不破碎者为佳。

【性味功效】 咸，平。补肺益肾，纳气定喘，助阳益精。用于虚喘气促，劳嗽咳血，阳萎遗精。



【编号】 M09448931102A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蜂蜡

【来源】 蜂蜜科昆虫中华蜜蜂 Apis cerana Fabricius 分泌的蜡质，经加工而成的块状物。

【主产地】 全国各地均产。

【性状特征】 蜂蜡呈不规则硬块，具有浓厚的蜂蜜样香气。呈黄色、黄白色或暗棕色，不透明，上表面平坦光滑，下表面有水纹。冷却时质脆易碎，断面不光滑，显非晶形的砂性颗粒状。用手搓捏能软化。体较轻，蜡质，能浮于水面，但不溶于水，能溶于有机溶剂。嚼之细腻，无渣，可粘成团块而不碎。味微甘。

【品质】 本品以色黄、有油腻感、有浓厚的蜂蜜气味者为佳。

【性味功效】 甘，微温。收涩，敛疮，生肌，止痛。外用于溃疡不敛，臁疮糜烂，创伤，烧、烫伤。



【编号】 M09758617601A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

蜈蚣

【来源】 蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣 Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch 的干燥体。

【主产地】 主产于陕西、河南、安徽、湖北、江苏、浙江等地。

【性状特征】 虫体呈扁平长条状，长9～15 cm，宽0.5～1 cm。由头部和躯干部组成，全体共22个环节。头部暗红色或红褐色，略有光泽，有头板覆盖，头板近圆形，前端稍突出，两侧贴有颚肢一对，前端两侧有触角一对。躯干部第一背板与头板同色，其余20个背板为棕绿色或墨绿色，具光泽，自第四背板至第二十背板上常有两条纵沟线；腹部淡黄色或棕黄色，皱缩；自第二节起，每节两侧有步足一对；步足黄色或红褐色，偶有黄白色，呈弯钩形，最末一对步足尾状，故又称尾足，易脱落。质脆，断面有裂隙。气微腥，有特殊刺鼻的臭气，味辛微咸。

【品质】 本品以身干瘪、头红、身色黑、腿全者为佳。

【性味功效】 辛，温；有毒。熄风镇痉，功毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，中风口㖞，半身不遂，破伤风，风湿顽痹，疮疡，瘰疬，毒蛇咬伤。



【编号】 M09768611904A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熊胆

【来源】熊科动物黑熊 Selenarctos thibetanus G.Cuvier 的干燥胆。

【主产地】主产于青海、新疆、西藏、四川、云南、贵州、黑龙江、吉林等地。

【性状特征】胆呈长扁卵状。上部狭细，中空，下部膨大呈囊状或扁卵圆状，大小不一，一般长约10～20 cm，宽约5～8 cm。外皮有皱褶或有筋肉薄膜，黑色、棕黑色、灰褐色或黄绿色，深浅不一，有光泽。囊皮薄，有皱褶，对光照上半部呈半透明状。囊内贮藏干燥的胆汁，俗称“胆仁”，呈块状、颗粒状或稠膏状，呈黄色习称“金胆”或“铜胆”、黄绿色习称“菜花胆”；黑色或绿黑色习称“铁胆”或“墨胆”。质坚硬而脆，有玻璃样光泽但不混浊。破开后，断面显纤维性。胆皮微有腥气，胆仁气清香，味极苦，入口溶化而不粘牙。

【品质】本品以身干个大、皮薄胆仁多、味苦回甘清凉者为佳。

【性味功效】苦，寒。清心火，平肝明目，杀虫。用于热病惊痫，小儿惊风，目赤翳障，黄疸，胆囊炎，恶疮痈肿。



【编号】M09878939001A0CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

僵蚕


【来源】蚕蛾科昆虫家蚕 Bombyx mori Linnaeus 4～5龄的幼虫感染(或人工接种)白僵菌Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. 而致死的干燥体。

【主产地】主产于江苏镇江、无锡，浙江吴兴、德清及四川、广东、陕西。

【性状特征】虫体略呈圆柱状，多弯曲皱缩。长2～5 cm，直径5～7 mm。表面灰黄色或黄白色，被有白色粉霜状的气生菌丝和分生孢子。头部较圆，两侧有眼1对，体腹面两侧有足8对，呈突起状。体节明显，尾部略呈二分歧状。质硬而脆，易折断，断面平坦，外层白色，中间有亮棕色或亮黑色的丝腺环4个。气微腥，味微咸。

【品质】本品以条直肥壮、色白质硬、断面有光泽者为佳。

【性味功效】咸，辛，平。祛风定惊，化痰散结。用于惊风抽搐，咽喉肿痛，颌下淋巴结炎，面神经麻痹，皮肤瘙痒。



【编号】M10058614301A2CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蕲蛇

【来源】 蝰科动物五步蛇 Agkistrodon acutus（Guenther）除去内脏的干燥体。

【主产地】 主产于浙江温州、丽水及安徽、湖北、湖南、江西、广西、福建等地。

【性状特征】 蛇体卷曲成圆盘状，盘径 17～34 cm，体长可达 2 m，直径约 3 cm。头盘在中间稍向上，呈三角形而扁平，鼻尖向上翘起，习称“翘鼻子”，口较宽大，习称“龙头虎口”。上腭有管状毒牙一对，中空尖锐。背部两侧各有黑褐色与浅棕色组成的“V”形大斑纹 24 个，其“V”形的两上端在背中线上相接，习称“24 方胜纹”，偶有左右两侧不相接，而是交错排列。腹部撑开或不撑开，灰白色，鳞片较大，有黑色类圆形的斑点，习称“连珠斑”，腹内壁黄白色或浅黄色，两侧具有多数肋骨。脊椎骨的棘突较高，呈刀片状上突，前后椎体下突基本同形，多为弯刀状，向后倾斜，尖端明显超过椎体后隆面。尾部骤细而短，末端有一长三角形深灰色的角质鳞片一枚。习称“佛甲指”。气腥，味微咸。

【品质】 本品以头尾齐全、身干、鳞片明显、内色洁白者为佳。

【性味功效】 甘、咸，温；有毒。祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼㖞斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风疥癣。



【编号】 M10168931907A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

冀地鳖

【来源】 鳖蠊科昆虫冀地鳖 Steleophaga plancyi (Boleny)的雌虫干燥体。


【主产地】 主产于河北、北京、陕西、甘肃、青海。

【性状特征】 虫体呈扁平卵形，长 2.2～3.7 cm，宽 1.4～2.5 cm。前端较窄，后端较宽，背部黑棕色，通常在边缘带有淡黄褐色斑块及黑色小点，具光泽，无翅。前胸背板较发达，盖住头部。腹背板 9 节，呈覆瓦状排列。腹面红棕色，头部较小，有丝状触角 1 对，常脱落，胸部有足 3 对，弯曲，具细毛和刺。腹部有横环节。质松脆，易破碎。破碎后腹内有灰黑色物质。气腥臭，味微咸。

【品质】 本品以个整、不破碎、油润光泽、无泥土者为佳。

【性味功效】 咸，寒。破瘀血，续筋骨。用于筋骨折伤，血瘀经闭，癥瘕痞块。

【附注】 本品作为“土鳖虫”入药。



【编号】 M00278612502A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蟾酥

【来源】 蟾蜍科动物中华大蟾蜍 Bufo bufo gargarizans Cantor 的干燥分泌物。

【主产地】 主产于河北、四川、湖南、山东、江苏、浙江等地。

【性状特征】 干燥分泌物呈扁圆形饼状。棕褐色或紫红色。直径7～8 cm，厚约1 cm。表面光滑平坦。质脆易折断，断面棕褐色，角质状，微有光泽。气微腥，味初甜而后有持久的麻辣感，粉末嗅之作嚏不止，遇水即起白色乳状液。

【品质】 本品以圆饼状、色紫红、明亮如胶、沾水即泛白色者为佳。

【性味功效】 甘、辛；有毒。解毒，止痛，开窍醒神。用于痈疽疔疮，咽喉肿痛，中暑神昏，腹痛吐泻。



【编号】 M01168930103A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

鳖甲


【来源】 鳖科动物鳖 Trionyx sinensis Wiegmann 的背甲。

【主产地】 主产于河南、安徽、湖北、湖南、江西、浙江等地。

【性状特征】 背甲呈椭圆状或卵圆状，背面隆起，长10～15 cm，宽9～14 cm。外表面黑褐色或墨绿色，略有光泽，具细网状皱纹及灰黄色或灰白色斑点，中间有一条纵棱，两侧各有左右对称的8条横凹纹，外皮脱落后，中间具8块类长方形椎板，纵向排列。两侧有左右对称肋板8块，可见锯齿状嵌接缝。内表面类白色，中部有突起的脊椎骨，颈骨蝶状向内卷曲，其外侧与第二肋骨相连，两侧各有肋骨8条，肋骨呈齿状伸出边缘。质坚硬。气微腥，味淡。

【品质】 本品以身干、甲厚、无残肉、无腥臭味者为佳。

【性味功效】 咸，微寒。滋阴潜阳，软坚散结，退热除蒸。用于阴虚发热，骨蒸劳热，经闭，癥瘕，热病后期伤阴抽搐。



【编号】 M10488930902A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

麝香

【来源】 鹿科动物马麝 Moschus sifanicus Przewaleki 成熟雄麝香囊中的干燥分泌物。

【主产地】 主产于青海、新疆、西藏、甘肃、四川、云南等地。

【性状特征】 毛壳麝香为圆状、扁圆状或类椭圆状的囊状体，直径3～7 cm，厚2～4 cm。开口面的皮革质，棕褐色，略平，密生或疏生灰白色、灰棕色或棕褐色细短毛，从四周围绕中心呈漩涡状排列，中间有1小囊孔，直径2～3 mm。另一面为棕褐色略带紫色的皮膜，无毛，微皱缩，偶显肌肉纤维，略有弹性。剖开后可见中层皮膜呈银灰色或灰褐色，半透明，习称“银皮”，内层皮膜呈棕色或棕红色，习称“油皮”或“里衣子”，内含颗粒状、粉末状的麝香仁和少量细毛及脱落的内层皮膜。质较柔软，有特异的香气。

麝香囊内贮满麝香仁，含量占全囊的49%～65%。其中颗粒状呈不规则的圆状或扁平状，表面多呈酱褐色或紫黑色团块状颗粒，习称“当门子”，油润有光亮，微有麻纹；粉末状多呈棕红色、棕褐色或棕黑色细小的粉末，习称“黄香”。质柔软，有油性。气香浓烈而特异，味微辛、微苦略咸。

【品质】 本品以身干、色棕褐、质柔软、香气浓烈持久者为佳。

【性味功效】 辛，温。开窍醒神，活血通经，消肿止痛。用于热病神昏，中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，经闭，癥瘕，难产死胎，心腹暴痛，痈肿瘰疬，咽喉肿痛，跌扑伤痛，痹痛麻木。



【编号】 M10508940214A0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

矿物采

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大青盐


【来源】 氯化物矿物盐湖的结晶，主含氯化钠（NaCl）。

【主产地】 主产于青海、内蒙古。

【性状特征】 本品呈正方骸子状或不规则多棱状的结晶体颗粒，状似冰糖，直径1～2 cm。全体青白色至暗白色，无色透明或半透明。多数颗粒表面均有一至数个小形孔洞，孔洞为圆形或不规则形。质硬，但可砸碎，断面洁净而有光亮。具吸湿性，易溶于水。气微，味咸。

【品质】 本品以颗粒大、纯净、无色透明、无杂质者为佳。

【性味功效】 咸，寒。清热凉血，解毒消炎，止血。用于脏腑症结，目赤肿痛，淋疾隆闭，吐血衄血，齿龈出血，尿血，疥癣痈疮。



【编号】 M00449113001M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

五花龙骨


【来源】 古代大型哺乳动物象类、犀类、三趾马、羚羊、牛类、鹿类等的骨骼化石或象类门齿化石，主含碳酸钙（$CaCO_3$）。

【主产地】 主产于内蒙古、山西、河北、四川、山东等地。

【性状特征】 本品呈不规则的块状、圆筒状或破开的圆筒状。长5～12 cm，宽3～7 cm，厚1.6～3 cm。全体呈牙白色、淡灰白色或淡黄白色，杂有灰黑色、蓝灰色或棕红色的斑块、条纹和松枝样花纹，深浅粗细不同，略似大理石条纹。表面光滑，略有光泽，时有小裂隙。断面多粗糙，吸水性强，质硬而脆，易碎，易风化，易层层剥落而散碎，有五色花纹，捻之可碎。无臭，无味。吸湿性强，以舌舔之，可吸附于舌上。

【品质】 本品以色白、体轻质硬、有五色花纹、舔之粘舌者为佳。

【性味功效】 甘、涩，平。镇惊安神，敛汗涩精，止血涩肠，生肌敛疮。用于神志不清，怔忡健忘，惊悸不眠，自汗盗汗，遗精淋浊，崩漏，赤白带下，泻痢脱肛，溃疡久不收口。



【编号】 M01279300006M2CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

方解石

【来源】 碳酸盐类矿物方解石族方解石矿石，主含碳酸钙（$CaCO_3$）。

【主产地】 主产于河南、四川、安徽、湖北、江苏、浙江等地。

【性状特征】 本品为斜方柱状或平板形块状结晶，呈不规则的菱面体，有棱角。全体白色或黄白色，少数显浅红色、浅黄色或浅棕褐色。表面和底面均平滑，具有波状皱纹，其他形状者粗糙。多数透明或略透明，具玻璃样光泽。质坚硬，易砸碎，碎块多为方状或长方形板状。断面平坦，光滑。无臭，味淡，易潮解。遇盐酸发生大量气泡。用小刀刻划成痕，但不能刻划玻璃。

【品质】 本品以色白、透明、有光泽、击碎后呈方形、具棱角者为佳。

【性味功效】 辛、咸，寒。清热降火，除烦止渴，和胃制酸。用于热病烦渴，口干舌燥，咽喉肿痛，吐酸口渴。



【编号】 M01639106005M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白矾


【来源】 硫酸盐类矿物明矾石经加工提炼制成，主含含水硫酸铝钾〔$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$〕。

【主产地】 主产于安徽、福建、浙江。

【性状特征】 本品呈不规则的结晶形块状、板状或颗粒状，大小不一。无色、灰白色或淡黄白色，有的浅灰、浅黄或浅红色。表面略平滑或凹凸不平，无色透明或白色半透明。具细密纵棱，有玻璃样光泽，常附有白色的细粉末。质硬而脆，易砸碎。气微，味酸、微甘而极涩。

【品质】 本品以色白、透明、质硬而脆、无杂质者为佳。

【性味功效】 酸、涩，寒。外用解毒杀虫，燥湿止痒；内服止血止泻，祛除风痰。外治用于湿疹，疥癣，聍耳流脓；内服用于癫痫发狂，久泻不止，便血，崩漏。



【编号】 M02609102001M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

白硇砂


【来源】 氢氯酸与铵或铵的化合物，经人工合成为氯化铵矿石，主含氯化铵（NH_4Cl）。

【主产地】 主产于青海、新疆。

【性状特征】 本品呈不规则块状、颗粒状或粉末状结晶体。全体白色，有的稍带淡黄色，有光泽。质重而较脆，易打碎，用指甲即可刮下白色粉末，断面显束针状纹理。微臭，味咸而苦，刺舌，易溶于水。

【品质】 本品以块整、色白、有光泽、无杂石者为佳。

【性味功效】 咸、苦、辛，温。软坚消积化痰，散瘀消肿。用于内积饱胀，噎嗝反胃，痰稠咳逆，经闭癥瘕，痈肿疮毒。



【编号】 M02679400007M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

石膏


【来源】 硫酸盐类矿物硬石膏族石膏，主含含水硫酸钙（$CaSO_4 \cdot 2H_2O$）。

【主产地】 主产于西藏、河南、安徽、湖北等地。

【性状特征】 本品呈纤维状的结晶集合体，呈长块状、板块状或不规则块状。全体白色、灰白色或淡黄色，透明或半透明。体重，质松，易分成小块。用指甲可刻划出白色条痕。纵断面不平坦，常顺纵纹裂开，具纤维状纹理，并有绢丝样光泽。无臭，味淡。遇盐酸不发生气泡。

【品质】 本品以块整、色白、质松、纤维状、无杂石者为佳。

【性味功效】 甘、辛，大寒。清热泻火，除烦止渴。用于外感热病，高热烦渴，肺热喘咳，胃火亢盛，头痛，牙痛。



【编号】 M02909106010M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石燕


【来源】 古生代腕足类石燕子科中华弓石燕Cytiospirifer sinensis (Graban.) 的化石及近缘动物的化石，主含碳酸钙（$CaCO_3$）。

【主产地】 主产于湖南零陵、湘乡、宁乡、湘江等地。

【性状特征】 本品为肾状而扁，形状似蚶而小。全体青灰色、土黄色或土棕色，长2～3 cm，宽1.5～4 cm，厚1～2 cm。两壳间有铰合部，两面中央隆起有褶壁，具银杏叶般的纹理。其中一面在隆起的中部有一纵沟，一端较细向下略弯曲作鸟啄状，在其下面亦有一条横沟通向两侧。壳内有圆锥形螺旋状腕骨一对，质坚如石，不易破碎。砸开后，断面呈青灰色至棕色，或有部分为白色碎石堆集呈颗粒状。气微，味淡。不溶于水，能溶于酸，并产生大量二氧化碳气泡。

【品质】 本品以状如蚶、色青灰、质坚硬者为佳。

【性味功效】 甘，凉。除湿热，利小便，明目。用于淋病，小便不利，湿热带下，目翳内障。



【编号】 M02919300003M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

龙齿


【来源】 古代大型哺乳动物象类、犀类、三趾马、羚羊、牛类、鹿类等的牙齿化石，主含碳酸钙（$CaCO_3$）。

【主产地】 主产于山西、陕西、河南、内蒙古等地。以山西产量大。

【性状特征】 本品为不规则块状，少数较完整。完整者可分为犬齿与臼齿。犬齿呈不整齐的圆锥状，先端略弯而稍尖，断面中空，长约7 cm，直径约3.5 cm。臼齿呈圆状或方柱状，一端较细，略弯曲，长约2～20 cm，宽1～9 cm，具深浅不一的沟棱。牙表面白色、青灰色、黑褐色或红白色，粗糙或有时微显珐琅质。断面均凹凸不平或有不规则突起棱线，摸之粗糙，往往分为两层，外层厚约1 cm，微显纤维状层纹，内面色较深。内层为类白色、淡黄色或淡棕色，具蓝青色或棕色的条纹或斑点。质坚硬。无臭，无味。有吸湿性，可吸舌。

【品质】 本品以体完整而不带牙床、色暗灰、有青色条纹、吸水性强者为佳。

【性味功效】 涩，凉。镇惊安神，除烦热。用于惊悸癫狂，心神不宁，烦闷，失眠多梦。



【编号】 M02979300001M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

龙骨

【来源】 古代哺乳动物如三趾马、犀类、鹿类、牛类、象类等的骨骼化石或象类门齿的化石，主含碳酸钙（$CaCO_3$）。

【主产地】 主产于内蒙古、山西、河北、四川、山东等地。

【性状特征】 本品为不规则的块状、圆筒状或破开的圆筒状，大小不一，长10～17 cm，宽7～10 cm。表面白色、类白色至淡棕色，较光滑，有的具纹理与纵裂隙或具棕色条纹和斑点。关节处膨大。断面粗糙，有多数蜂窝状小孔，色白，有的中空，摸之细腻如粉质。吸湿力亦强。质坚硬，不易破碎。无臭，无味。

【品质】 本品以色白、质坚体重、吸湿性强者为佳。

【性味功效】 甘、涩，平。镇惊安神，敛汗涩精。用于夜卧盗汗，惊悸不眠，自汗盗汗，梦遗滑精，崩漏，赤白带下，溃疡久不收口。



【编号】 M03019300006M1CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

朱砂


【来源】 硫化物类矿物辰砂族辰砂，主含硫化汞（HgS）。

【主产地】 主产于湖南、四川、贵州、云南等地。

【性状特征】 本品为粒状或块状集合体，呈颗粒状或细粉状。鲜红色或暗红色，条痕红色至褐红色，具光泽。体重，质脆。片状者易破碎，粉末状者有闪烁的光泽。按其形状可分碎渣或小颗粒状，不掺杂细粉，色红明亮者，习称“珠宝砂”；不规则板片状、条形或斜方形，边缘不齐，大小厚薄不一，色红而鲜艳，光亮而微透明者，习称“镜面砂”；块较大，方圆形或多角形块状，大小不等，颜色发暗或呈灰色者，习称“豆瓣砂”。无臭，无味。朱砂色红触之不染手。

【品质】 本品以色鲜红、有光泽、不染手、质脆、无杂石者为佳。

【性味功效】 甘，微寒；有毒。清心镇惊，安神解毒。用于心悸易惊，失眠多梦，小儿惊风，视物昏花，口疮，喉痹，疮疡肿毒。



【编号】 M03379109004M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

红粉


【来源】 人工炼制的红氧化汞（HgO）。

【主产地】 主产于天津、湖北、湖南、江苏等地。

【性状特征】 本品为橙黄色或橙红色片状或粉末状结晶，片状的一面光滑，稍具光泽，另一面较粗糙，呈蜂窝状。粉末橙色。质硬，性脆；无臭。遇光颜色逐渐变深。

【品质】 本品以色红、片状、纯净有光泽者为佳。

【性味功效】 辛，热；有大毒。拔毒，除脓，去腐，生肌。用于痈疽疔疮，梅毒下疳，一切恶疮，肉暗紫黑，腐肉不去，窦道瘘管，脓水淋漓，久不收口。



【编号】 M03649109005M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

自然铜


【来源】 硫化物类矿物黄铁矿族黄铁矿，主含二硫化铁（FeS_2）。

【主产地】 主产于河北、四川、湖南、云南、广东等地。

【性状特征】 本品呈晶形多为立方体，集合体呈致密块状，似骨股。通常0.5～2 cm。表面平坦，亮黄色或淡黄色，有金属光泽，酷似黄铜块，并可见细纹及砂眼。有的表面呈黄棕色或棕褐色，无金属光泽。具条纹，条痕绿黑色或棕红色。体重，质坚硬或稍脆，易砸碎，断面亮黄白色，有金属光泽，或断面呈棕褐色，可见银白色亮星。气味均无。

【品质】 本品以块整齐、色黄亮、质重、表面光滑、断面白亮者为佳。

【性味功效】 辛，平。散瘀，接骨，止痛。用于跌扑肿痛，筋骨折伤。



【编号】 M03799107007M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

芒硝


【来源】 硫酸盐类矿物芒硝族芒硝，经加工精制而成的结晶体，主含含水硫酸钠($Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$)。

【主产地】 主产于山西、河北、河南、安徽、山东、江苏等地。

【性状特征】 本品为棱柱状、长方状或不规则块状及粒状。无色透明或类白色半透明。质松脆，易破碎。破碎后呈玻璃样光泽。无臭，味咸。贮藏久或置空气中较长时间易风化，表面逐渐变为白色粉末。温度高达32℃时可自行溶化成液体。

【品质】 本品以块状结晶、色洁白、透明、无杂质者为佳。

【性味功效】 咸、苦，寒。泻热通便，润燥软坚，清火消肿。用于实热便秘，大便燥结，积滞腹痛，肠痈肿痛；外治乳痈，痔疮肿痛。



【编号】 M03809113004M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

皂矾


【来源】 硫酸盐类矿物水绿矾的矿石或化学合成品，主含含水硫酸亚铁（$FeSO_4 \cdot 7H_2O$）。

【主产地】 主产于陕西、甘肃、新疆、河南、安徽、湖南、山东等地。

【性状特征】 本品为纤维状、颗粒状、肾状结晶的集合体，呈不规则柱状或板状。全体绿色、翠绿色或黑绿色。具垂直条纹，条纹苹果绿色。透明或半透明，有金刚石样或玻璃样光泽。质坚而脆，易打碎，断面浅绿色，呈贝壳状。无臭，味酸涩。

【品质】 本品以块整、色绿、透明、无杂质者为佳。

【性味功效】 酸、涩，凉。燥湿化痰，消积杀虫，止血补血，解毒敛疮。用于咽喉肿痛，喉痹口疮，小儿疳积，久痢便血，血虚萎黄，湿疮疥癣，眼目生翳。



【编号】 M04269108007M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

花蕊石

【来源】 变质岩类岩石蛇纹大理岩，主含碳酸钙（$CaCO_3$）。

【主产地】 主产于河南、四川、江苏、浙江等地。

【性状特征】 本品为粒状和致密块状的集合体， 呈不规则的块状，多具棱角，而不锋利。表面不平坦，白色或浅灰白色，其中夹有点状或条状的蛇纹石，具蜡质样光泽，呈浅绿色或淡黄色，习称“彩晕”，对光观察有闪星状光泽。有时一面呈灰白色石灰质样而粗糙。体重，坚硬，不易破碎，击碎后断面不整齐。无臭，味淡。加20%硫酸，即发泡。

【品质】 本品以块整、质重、白底、夹有黄绿色斑纹者为佳。

【性味功效】 酸、涩，平。化瘀止血。用于咯血，吐血，外伤出血，跌扑伤痛。



【编号】 M04369106013M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金精石

【来源】 硅酸盐类矿物水金云母的矿石，主含铝硅酸镁铁 $(Mg, Fe)_3[(Si, Al)_4O_{10}](OH)_2 \cdot 4H_2O$。

【主产地】 主产于内蒙古、山西、陕西、河南、四川、湖南、山东等地。

【性状特征】 本品为不规则的薄云母片状。长2～6 cm，厚约5 cm。金黄色、黄褐色、暗棕色至墨绿棕色。表面光滑，有网状纹理，呈金属样光泽。质柔软，表面可用指甲刻划并留浅色痕迹。断面层状，无光泽。亦可用刀劈开或剥离成薄片，薄片不透明，无弹性，而具可塑性，可随意挠屈，甚至用手撕断。气微，味淡。灼热后迅速膨胀。

【品质】 本品以块大、色金黄，质柔软、无杂质者为佳。

【性味功效】 咸，寒；有小毒。镇惊安神，明目去翳。用于心悸，失眠，角膜云翳。



【编号】 M05819206031M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

金礞石


【来源】 变质岩类蛭石片岩或水黑云母片岩，主含二氧化硅 (SiO_2)。

【主产地】 主产于山西、河南。

【性状特征】 本品为鳞片状集合体，呈不规则块状、厚板状或碎片。碎片直径1～8 mm；块状长2～10 cm，宽2～5 cm，厚0.6～1.5 cm，无明显棱角。表面棕黄色或黄褐色，带有金黄色或隐蔽银白色光泽。质脆，易碎成小颗粒或金黄色闪光小片散开。用手捻之松软，具滑腻感。气微，味淡。可在硬纸上书写，留下淡棕色划痕。如加热即层裂或散裂，迅速膨胀2～5倍，色泽变浅，体重减轻，可浮于水面。

【品质】 本品以整齐、色金黄、有星点、无杂质者为佳。

【性味功效】 甘、咸，平。坠痰下气，平肝镇惊。用于顽痰胶结，咳逆喘急，烦躁胸闷，癫痫发狂，惊风抽搐。



【编号】 M05839206019M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

青礞石

【来源】 变质岩类黑云母片岩或绿泥石化云母碳酸盐片岩，主含二氧化硅（SiO_2）。

【主产地】 主产于湖北、江苏。

【性状特征】 本品为鳞片状或片状集合体，呈不规则的扁块状或长斜块状，无明显棱角。表面褐黑色或绿黑色，夹有银色或淡黄色鳞片，具有玻璃样光泽。体重，质松软，易碎。断面呈较明显的层片状，具有闪闪发光的星点。用指甲即可划下粉末，粉末为绿黑色鳞片或颗粒（黑云母）。气微，味淡。遇稀盐酸产生气泡，加热后泡沸激烈。

【品质】 本品以整齐、色青绿、碎末有星点、无杂质者为佳。

【性味功效】 甘、咸，平。坠痰下气，平肝镇惊。用于顽痰胶结，咳逆喘急，烦躁胸闷，癫痫发狂，惊风抽搐。



【编号】 M05999206018M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

禹余粮


【来源】 氢氧化物类矿物褐铁矿，主含碱式氧化铁〔FeO(OH)〕。

【主产地】 主产于河南、江苏。

【性状特征】 本品为块状集合体，呈不规则的块状物或斜方块状。长5～10 cm，宽3～5 cm，厚1～3 cm。表面红棕色、灰棕色或浅棕色，多凹凸不平或附有黄色粉末。断面显深棕色与淡棕色或浅黄色相间的层纹，各层硬度不同，深棕色的部分质较硬，不易折断，但可砸碎，砸碎面不整齐而光滑；淡棕色部分质较松，用指甲可划动。体重，质硬。无臭，无味，具土腥气，嚼之无砂粒感。

【品质】 本品以整齐不碎、色红棕、断面显层纹、无杂石者为佳。

【性味功效】 甘、涩，微寒。涩肠止泻，收敛止血。用于久泻，久痢，崩漏，白带。



【编号】 M06599108005M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

胆矾


【来源】 硫酸盐类矿物胆矾的结晶体或人工制成的含水硫酸铜的结晶，主含含水硫酸铜（$CuSO_4 \cdot 5H_2O$）。

【主产地】 主产于山西、云南。

【性状特征】 本品为不规则的碎块状结晶体。全体深蓝色、天蓝色或微浅绿色，常附有白色粉霜。表面略光滑或粗糙，半透明，似玻璃样光泽。质较重，性脆易碎，断面深蓝色或蓝色，有较强的光泽，光亮似水波纹。能溶于水；露置于干燥空气中易缓缓风化；用火烧之，则失去结晶水变为白色；遇水后则又变蓝。无臭，味涩。

【品质】 本品以块大、色深蓝、透明、质脆、无杂质者为佳。

【性味功效】 酸、涩，寒；有小毒。化痰消积，催吐，燥湿杀虫。用于风痰喉痹，咳逆上气，壅塞咽喉，食物中毒，胃脘腹痛，风眼赤烂。



【编号】 M06659107115M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

钟乳石


【来源】 碳酸盐类矿物方解石族方解石，主含碳酸钙（$CaCO_3$）。

【主产地】 主产于贵州、云南、广西。

【性状特征】 本品为圆锥状或圆柱状的块段，似冰柱，大小不等。表面洁白色、灰白色或棕黄色，粗糙，凹凸不平。质重坚硬，难以折断。断面较平整，白色或浅灰白色，有自中心向外作放射的纹理，对光观察具有闪星状的亮光，底面近中心常有一圆孔，圆孔周围有多数浅橙黄色同心环层。无臭，味微咸。加稀盐酸有大量气泡产生。

【品质】 本品以色白或灰白、有光泽、无杂石者为佳。

【性味功效】 甘，温。助阳，强壮，温肺，平喘，制酸，通乳。用于寒痰喘咳，阳虚冷喘，腰膝冷痛，阳萎泄精，胃痛泛酸，乳汁不通。



【编号】 M06949106015M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

寒水石


【来源】 硫酸盐类硫酸钙矿石（红石膏），主含硫酸钙（$CaSO_4 \cdot 2H_2O$）。

【主产地】 主产于内蒙古、山西、河北、甘肃、山东、吉林、辽宁等地。

【性状特征】 本品为不规则的扁平块状或片状。粉白色、粉红色或肉红色。表面凹凸不平，不透明，略有光泽。侧面有纵纹理。质硬而脆，易砸碎。大块者可折断，断面不平坦，粉红色或肉红色，显细纤维状纵纹理，对光照可见散在的微小亮星。有土腥气，气无，味淡，嚼之显粉性。

【品质】 本品以薄片状、色肉红、有细丝纹、具光泽、纯净者为佳。

【性味功效】 辛、咸，寒。清热降火，除烦止渴，固齿消肿。用于胃热消渴，腹中积聚，口干舌燥，口舌生疮，牙痛。



【编号】 M08979106011M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

滑石


【来源】 硅酸盐类矿物滑石族滑石，主含含水硅酸镁〔$Mg_3(Si_4O_{10})(OH)_2$〕。

【主产地】 主产于江西、山东、辽宁。以江西产者为最佳。

【性状特征】 本品多为集合体，呈不规则块状。白色或黄白色，半透明或不透明，有蜡样光泽，质软细腻，手摸有肥皂样滑润感。质坚实，体重易砸碎，用指甲可刮下白粉。用滑石块书写，可见白色条痕。无吸湿性，置水中不崩散。无臭，无味。以舌舔之，则感微凉而不粘舌。

【品质】 本品以色青白、细腻、润滑、无杂色杂石者为佳。

【性味功效】 甘、淡，寒。利尿通淋，清热解暑，祛湿敛疮。用于热淋，石淋，尿热涩痛，暑湿烦渴，湿热水泻；外治湿疹，湿疮，痱子。



【编号】 M09089206029M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

滑石粉

【来源】 滑石经精选，净化，粉碎，干燥制成。

【生产地】 主产于江西、山东、辽宁。以江西产者为最佳。

【性状特征】 本品为白色、类白色或青白色，微细、无砂性的粉末，手摸有滑腻感。无臭，微凉。本品在水、稀盐酸或稀氢氧化钠溶液中均不溶解。

【品质】 本品以色青白、细腻、滑润、无杂色者为佳。

【性味功效】 甘、淡，寒。利尿通淋，清热解暑，祛湿敛疮。用于热淋，石淋，尿热涩痛，暑湿烦渴，湿热水泻；外治湿疹，湿疮，痱子。



【编号】 M09099206029M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

琥珀


【来源】 古代松树、枫树或其他松科植物树上渗出的树脂，埋藏于地层下，经年久转化而成的化石样物质。

【主产地】 主产于河南、云南、广西、辽宁等地。

【性状特征】 本品为不规则的块状或颗粒状，块大者可长达6cm。表面不平坦，黄棕色或深绿黄色，有松脂样光泽，微透明或不透明。质松而脆，易碎，捻之即成粉末。断面贝壳状极为明显，具玻璃样光泽，有的内部包含少量泥沙、植物或昆虫等物。气微，味淡。嚼之易碎，作沙沙声，但无砂砾感。燃烧则膨胀稍冒黑烟，熄灭时冒白烟，具爆裂声，有松脂气味。摩擦能生电，可吸灯草或薄纸。

【品质】 本品以整齐、色红、断面光亮、质松脆、手捏易成粉者为佳。

【性味功效】 甘，平。安神定惊，通淋化瘀。用于心神不宁，寐则多梦，惊风抽搐，癫痫，淋病尿血，产后瘀血，阻滞腹痛及金疮损伤。



【编号】 M09119300008M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

硫磺


【来源】 自然元素类矿物硫族自然硫，主含硫（S）。

【主产地】 主产于陕西、河南、四川、内蒙古。

【性状特征】 本品为不规则块状或粉状。全体黄色或黄绿色，少带有浅绿色或浅棕黄色。表面不平坦，具脂肪样光泽，常有多数细砂小孔及麻纹。用手握紧置于耳旁，可闻轻微的爆裂声。体轻，质松脆易碎，断面蜂窝状，纵断面可见粗针状结晶形，有光泽。具特异之臭气，味淡。遇火易燃，燃烧时冒青蓝色火焰，二氧化硫的臭气更甚，并有刺激性。

【品质】 本品以色黄、光亮、块整、无杂质者为佳。

【性味功效】 酸，温；有毒。外用解毒杀虫疗疮；内服补火助阳通便。外治用于疥癣，秃疮，阴疽恶疮；内服用于阳萎足冷，虚喘冷哮，虚寒便秘。



【编号】 M09149205001M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

紫石英


【来源】 氟化物类矿物萤石族萤石，主含氟化钙（CaF_2）。

【主产地】 主产于湖北、江西、福建、山东、江苏、浙江。

【性状特征】 本品为块状或粒状集合体，呈不规则块状，偏斜而多具棱角。紫色或绿色，深浅不匀。表面常有裂纹，条痕白色。半透明至透明，具有玻璃样光泽。质坚脆，易砸碎，断面不齐或锋利如刀。无臭，味淡。

【品质】 本品以块整、色纯紫、无杂石者为佳。

【性味功效】 甘，温。镇心安神，温肺，暖宫。用于失眠多梦，心悸易惊，肺虚咳喘，宫寒不孕。



【编号】 M09189204001M0CMMI


【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紫硇砂


【来源】 卤化物类矿物中提炼的紫色石盐，主含氯化钠（NaCl）。
【主产地】 主产于青海、新疆。
【性状特征】 本品为不规则的块状，有棱角或凹凸不平，有的显不规则小孔。表面暗紫色或紫红色，稍有光泽，附有少量黄白色硫磺粉末。质坚重而脆，断面平滑光亮，具玻璃样光泽。用手摸有凉感。臭气浓，味咸。可溶于水，遇水后微有涩感。
【品质】 本品以色紫红、断面明亮、有臭气、无杂石者为佳。
【性味功效】 咸、苦、辛，温。软坚消积化痰，散瘀消肿。用于内积饱胀，噎嗝反胃，痰稠咳逆，经闭癥瘕，痈肿疮毒。



【编号】 M09299113002M0CMMI
【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

雄黄

【来源】 硫化物类矿物雄黄族雄黄，主含二硫化二砷（As_2S_2）。
【主产地】 主产于甘肃、湖北、湖南、云南、贵州。
【性状特征】 本品为块状或粒状集合体，呈不规则块状或扁块状。红黄色、深红色或橙红色，条痕淡橘红色。不透明，微有光泽，显金属样光泽的夹杂物。表面常附有橙黄色细粉末，手触之易被污染成淡橘红色。体重，质松脆易碎。断面粗糙，色红更鲜艳，有树脂样光泽。手捏即成粉，粉末及条痕均为深黄色或橙黄色，无光泽。微有特异的臭气，味淡，有毒。
【品质】 本品以块大、色橙红、质松脆、有光泽、无石性者为佳。
【性味功效】 辛，温；有毒。解毒杀虫，燥湿祛痰，截疟。用于痈肿疔疮，蛇虫咬伤，虫积腹痛，疟疾，小儿惊痫。



【编号】 M09489201004M0CMMI
【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

煅石膏

【来源】 石膏的炮制品。
【主产地】 主产于西藏、河南、安徽、湖北等地。
【性状特征】 本品为白色的粉末状或酥松的小块状。块状表面透出微红色的光泽，不透明。崩裂处表面变黯。体较轻，质软，易碎，捏之成粉。无臭，味淡。
【品质】 本品以色白、粉细、无杂质杂色者为佳。
【性味功效】 甘、辛、涩，寒。收湿，生肌，敛疮，止血。外治溃疡不敛，湿疹瘙痒，水火烫伤，外伤止血。



【编号】 M09639106010M0CMMI
【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

硼砂

【来源】 天然产硼酸盐类矿物硼砂，经制而成的结晶体，主含四硼酸钠（$NaB_4O_7 \cdot 10H_2O$）。

【主产地】 主产于青海、西藏、四川。

【性状特征】 本品为菱状、柱状或粒状结晶组成的不整齐块状物，大小不一。表面无色透明或白色半透明，具玻璃样光泽，外形似明矾。久置则风化成白色粉末，不透明，微有脂肪样光泽。体轻，质脆易碎。无臭，味咸苦。易溶于水，燃烧易熔融，初则体积膨大酥松如絮状，继而熔化成透明的玻璃球状。

【品质】 本品以无色、透明、洁净、质松、能溶于水者为佳。

【性味功效】 甘、咸，凉。清热解毒，化痰。用于热痰咳嗽，咽喉肿痛，口舌生疮，齿龈溃疡，目赤翳障。



【编号】 M09649202001M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万　黄璐琦

磁石

【来源】 氧化物类矿物尖晶石族磁铁矿，主含四氧化三铁（Fe_3O_4）。

【主产地】 主产于安徽、广东、江苏、辽宁。

【性状特征】 本品为块状集合体，呈不规则块状或略带方形，多具棱角。灰黑色或深褐色，条痕黑色，不透明，具有金属样光泽，有的粗糙并具少许针眼状孔隙。体重，质坚硬，难以破碎，砸碎后断面不整齐。有土腥气，无味。死磁石不具吸铁能力；活磁石具磁性，有吸铁能力，铁粉被吸附其上，则成毛状直立。

【品质】 本品以色铁黑、有光泽、吸铁能力强者为佳。

【性味功效】 咸，寒。平肝潜阳，聪耳明目，镇惊安神，纳气平喘。用于头晕目眩，视物昏花，耳鸣耳聋，惊悸失眠，肾虚气喘。



【编号】 M09899108006M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万　黄璐琦

赭石

【来源】 氧化物类矿物刚玉族赤铁矿，主含三氧化二铁（Fe_2O_3）。

【主产地】 主产于山西、河北、河南、四川、湖南、山东。

【性状特征】 本品为豆状或肾状集合体，多呈不规则的扁平块状。暗棕红色或灰黑色，不平坦，条痕樱红色或红棕色，有的显金属样光泽。一面有圆形的乳头状突起，习称“钉头”，此突起的直径约 1 cm。另一面与突起相对应处有同样大小的凹窝。体重，质坚硬。横向可劈开，砸碎后，纵面显层叠状，且每层均依钉头而呈波涛状弯曲。气微，味淡。用手抚摸有棕红色粉末沾手，在砖地上摩擦显红棕色。

【品质】 本品以色赤红、钉头明显、质重而脆、断面显层叠状者为佳。

【性味功效】 苦，寒。平肝潜阳，降逆，止血。用于眩晕耳鸣，呕吐，噫气，呃逆，哮喘，吐血，衄血，崩漏下血。

【编号】 M10179108004M0CMMI

【鉴定人】 谢宗万　黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其他来

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

儿茶

【来源】 豆科植物儿茶 Acacia catechu (L. f.) Willd. 的去皮枝、干的干燥煎膏。

【主产地】 主产于云南西双版纳州。

【性状特征】 煎膏方状或不规则块状，大小不一。表面棕褐色或黑褐色，光滑而稍有光泽，有时可见龟裂纹。质硬，易碎，断面不整齐，具光泽，有细孔，遇潮有黏性。无臭，味涩、苦，略回甜。

【品质】 本品以色黑略带色棕、不焦不碎、味微苦而涩者为佳。

【性味功效】 苦、涩，微寒。收湿生肌敛疮。用于溃疡不敛，湿疹，口疮，跌扑伤痛，外伤出血。



【编号】 M00097148006O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大马勃

【来源】 灰包科真菌大马勃 Calvatia gigantea (Batsch ex Pers.) Lloyd 的干燥子实体。


【主产地】 主产于甘肃、内蒙古、青海、河北等地。

【性状特征】 担子果扁球状或压扁呈不规则状，不孕基部很小或无。包被光滑，质硬而脆，成块脱落，残留的包被两层，外包被黄棕色，膜状，内包被较厚，灰黄色。孢体浅青褐色，手捻有润滑感。气微，味微苦涩。

【品质】 本品以个大、饱满、色深者为佳。

【性味功效】 辛，平。清肺利咽，止血。用于风热郁肺咽痛，咳嗽，音哑；外治鼻衄，创伤出血。

【附注】 本品作为“马勃”入药。



【编号】 M00302024007O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

大叶海藻

【来源】 马尾藻科植物海蒿子 Sargassum pallidum (Turn.) C. Ag. 的干燥藻体。

【主产地】 主产于山东、辽宁等地。

【性状特征】 全体皱缩卷曲，黑褐色，有的被白霜，长30～60 cm，主干呈圆柱状，具圆锥状突起，主枝自主干两侧生出，侧枝自主枝叶腋生出，具短小的刺状突起。叶披针形、倒卵形或条形，叶腋间有着生条状叶的小枝。气囊生于细分枝上，黑褐色，球形或卵圆形。质脆，潮润时柔软；水浸后膨胀，肉质，黏滑。气腥，味微咸。

【品质】 本品以身干、色黑褐、盐霜少、枝嫩无砂石者为佳。

【性味功效】 苦、咸，寒。软坚散结，消痰，利水。用于瘿瘤，瘰疬，睾丸肿痛，痰饮水肿。

【附注】 本品作为“海藻”入药。



【编号】 M07591015010O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小叶海藻

【来源】 马尾藻科植物羊栖菜 Sargassum fusiforme (Harv.) Setch. 的干燥藻体。


【主产地】 主产于浙江、福建、广东等地。

【性状特征】 全体皱缩卷曲，较小，棕黑色，有的被白霜，长 15～40 cm。分枝互生，无刺状突起。叶条形或细匙形，先端稍膨大，中空。气囊腋生，纺锤状或球状，囊柄较长。质较硬。气腥，味微咸。

【品质】 本品以身干、色黑褐、盐霜少、枝嫩无砂石者为佳。

【性味功效】 苦、咸，寒。软坚散结，消痰，利水。用于瘿瘤，瘰疬，睾丸肿痛，痰饮水肿。

【附注】 本品作为“海藻”入药。



【编号】 M075710150040O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

干漆


【来源】 漆树科植物漆树 Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl. 的树脂经加工后的干燥品。

【主产地】 全国大部分地区均产。

【性状特征】 不规则块状，黑褐色或棕褐色，表面粗糙，有蜂窝状细小孔洞或呈颗粒状。质坚硬，不易折断，断面不平坦。具特殊臭气。

【品质】 本品以块整、色黑、坚硬、漆味重者为佳。

【性味功效】 辛，温；有毒。破瘀血，消积，杀虫。用于妇女闭经，瘀血，虫积腹痛。



【编号】 M009072050360O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

中国芦荟

【来源】 百合科植物芦荟 Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berger. 的叶中汁液煎煮浓缩干燥物。

【主产地】 广东、海南、广西、福建、四川等地有栽培。

【性状特征】 呈不规则块状，常破裂为多角形，大小不一。表面呈深褐色，无光泽。体轻，质硬，不易破碎，断面粗糙或显麻纹，富吸湿性。有特殊臭气，味极苦。

【品质】 本品以色棕黑、气味浓、溶于水后无杂质者为佳。

【性味功效】 苦，寒。清肝热，通便。用于便秘，小儿疳积，惊风；外治湿癣。

【附注】 本品多作保健品、化妆品原料。



【编号】 M011772930420O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天竺黄


【来源】 禾本科植物青皮竹 Bambusa textilis McClure 秆内的分泌液干燥后的块状物。

【主产地】 主产于云南屏边、麻栗坡、西双版纳；广东宁东、阳江；广西等地。

【性状特征】 本品呈不规则的片块或颗粒，大小不一。表面灰蓝色、灰黄色或灰白色，有的洁白色，半透明，略带光泽。体轻，质硬而脆，易破碎，吸湿性强。无臭，味淡。

【品质】 本品以身干、块大、色灰白、体轻质硬而脆、吸湿力强者为佳。

【性味功效】 甘，寒。清热豁痰，凉心定惊。用于热病神昏，中风痰迷，小儿痰热惊痫，抽搐，夜啼。



【编号】 M01507332027O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

太白花

【来源】 石蕊科植物雀石蕊Cladonia alpestris (L.) Rabenh.的干燥枝状体。

【主产地】 产于东北、内蒙古、新疆、陕西、甘肃、云南等地。

【性状特征】 地衣体长5～8 cm，子器柄圆柱形。分枝稠密，枝腋有小穿孔。上半部黄绿色，下半部灰白色，基部逐渐腐朽。子器顶生，褐色。干时稍硬，易碎，湿时海绵状。

【性味功效】 淡，平。平肝明目，止血调经。用于风阳上亢，头晕目眩，偏头痛，目疾，鼻衄，月经不调，白带。



【编号】 M01573005013FHCMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

冬虫夏草


【来源】 麦角菌科真菌冬虫夏草 Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. 寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的子座及幼虫尸体的复合体。

【主产地】 主产于四川西北部、青海、甘肃、西藏、云南等地。

【性状特征】 由虫体与从虫头部长出的真菌子座相连而成。虫体似蚕，长3～5 cm，直径3～8 mm；表面深黄色至黄棕色，有环纹20～30个；头部红棕色，足8对，中部4对较明显；质脆，易折断，断面略平坦，淡黄白色。子座细长圆柱形，长4～7 cm，直径约3 mm，表面深棕色至棕褐色，有细纵皱纹，上部稍膨大；质柔韧，断面类白色。气微腥，味微苦。

【品质】 本品以身干、虫身色黄发亮、丰满肥壮、断面类色白、子座短、味香者为佳。

【性味功效】 甘，平。补肺益肾，止血化痰。用于久咳虚喘，劳嗽咯血，阳萎遗精，腰膝酸痛。



【编号】 M02112005013O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com


小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

半夏曲

【来源】 为半夏加面粉、姜汁混和经发酵制成的加工品。

【性状特征】 本品呈长方形块状，长约3.5 cm，宽约2 cm，厚1 cm。质硬，色白，上面印有品名，底面平滑。

【性味功效】 苦辛，平。化痰止咳，清食积，用于泄泻。



【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

白石花


【来源】 梅花衣科植物白石花 Parmelia tinctorrum Despr.的叶状体。

【主产地】 主产于陕西、四川等地。

【性状特征】 叶状体多皱，近圆状，径约30 cm，上面灰白色，边缘分裂成多数不规则浅裂片，裂片先端圆形，边缘着生粉芽，平滑，微有光泽，中央针芽密生，黑色，较粗糙；下面边缘部分平滑，褐色，有光泽，中央部分黑色，无光泽，有假根。子器少，杯状，径约1 cm，带短柄；孢子椭圆形。

【品质】 本品以叶状体齐整、质干、无碎片或少碎片者为佳。

【性味功效】 甘，凉。凉血，解毒。用于无名肿毒。



【编号】 M02533008029H0XZDC

【鉴定人】 格桑索朗

龙血竭

【来源】 百合科植物剑叶龙血树Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen 的树脂。


【主产地】 主产于云南。

【性状特征】 本品呈四方形或不定形块状，大小不等。表面棕黑色，断面有光泽或粗糙，破碎面黑红色，研成粉末血红色。无臭，味淡。

【品质】 本品以色黑如铁、研粉红如铁、火燃呛鼻者为佳。

【性味功效】 甘、咸，平。散瘀活血止痛，止血生肌。用于跌扑损伤，瘀血作痛，妇女闭经，产后瘀阻，金疮出血，疮疡不敛。

【附注】 宋代以前血竭用龙血树属植物木部树脂，称木血竭。明清以来血竭一般从新加坡进口，为棕榈科植物血竭Daemonorops draco Bl.果实渗出树脂，原产印度尼西亚。



【编号】 M06067313010O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冰片（机制冰片）

【来源】以松节油、樟脑等为原料加工的合成品。


【主产地】上海、广州、天津等地均有制造。

【性状特征】本品呈白色半透明的片状结晶，整碎不一，边缘不整齐，洁白如雪。质松脆，有层可剥离成薄片。点燃发生黑烟，灭后无残留。气清香，味辛、凉。

【品质】本品以片大质薄、颜色洁白、质松脆、气清香纯正者为佳。

【性味功效】辛，苦，微寒。开窍醒神，清热止痛。用于热病神昏，痉厥，中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，目赤，口疮，咽喉肿痛，耳道流脓。

【附注】天然冰片一般进口，为龙脑树（Dryobalanops aromatica Gaertner f.）树干蒸馏所得结晶。



【编号】M031571160020OCMMI

【鉴定人】谢宗万　黄璐琦

百草霜


【来源】杂草经燃烧后附于锅底或烟筒中的烟灰。

【主产地】全国各地均产。

【性状特征】本品为黑色粉末，或黏结成小颗粒状。体轻，质细似霜，入水漂浮而分散，触之不粘手，无油腻感。气无，味淡微辛。

【品质】本品以色乌黑、体轻质细、无杂质者为佳。

【性味功效】辛，温。散瘀止血，消积聚，化滞气。用于诸血症，伤寒发狂，咽痛，口疮，吐衄血，脏毒下血，崩带。



【编号】M034692020010OCMMI

【鉴定人】谢宗万　黄璐琦

库拉索芦荟

【来源】百合科植物库拉索芦荟 Aloe barbadensis Miller 叶的液汁浓缩干燥物。

【主产地】主产于南美洲北岸附近的库拉索、阿律巴、博尔内小岛。现在我国南方部分地区有栽培。

【性状特征】本品呈不规则块状，常破裂为多角状，大小不一。表面呈暗红褐色或深褐色，无光泽。体轻，质硬，不易破碎，断面粗糙或显麻纹，富吸湿性，有特殊臭气，味极苦。

【品质】本品以色棕黑、气味浓、溶于水后无杂质者为佳。

【性味功效】苦，寒。清肝热，通便。用于便秘，小儿疳积，惊风；外治湿癣。

【附注】本品作为“芦荟”入药。



【编号】M040572930380OCMMI

【鉴定人】谢宗万　黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

没药


【来源】 橄榄科植物没药树 Commiphora myrrha Eugl.茎干皮部渗出的树胶脂。

【主产地】 主产于非洲索马里和埃塞俄比亚。

【性状特征】 本品呈不规则颗粒性团块，大小不等，大者长达6 cm。表面黄棕色或红棕色，有的半透明，部分显棕黑色，富油性，被有黄色粉尘。质坚而脆，破碎面不整齐。有特异香气，味苦而有黏性。

【品质】 本品以色黄棕、破碎面微透明显油润、香气浓、味苦而有黏性者为佳。

【性味功效】 苦、辛，平。行气活血，消肿定痛。用于痈疽肿痛，损伤瘀血，经闭癥瘕，胸腹诸痛。外用敛疮生肌。



【编号】 M041971960110O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

没食子

【来源】 壳斗科植物没食子树 Quercus infectoria Olivier 幼枝上所生的虫瘿，由没食子蜂 Cynips gallae-tinctoriae Olivier 雌虫产卵刺伤没食子树幼芽所致。

【主产地】 主产于土耳其、阿拉伯各国、伊朗、印度等地。

【性状特征】 本品呈不规则圆球状，直径1～2.5 cm，附着树枝有短柄。表面灰绿色，有10～15个瘤状突起。质坚硬，断面不平坦，黄白色或淡黄色，有光泽。中央有一圆形孔隙，系通往表面的孔道，内遗留有虫壳。无臭，味涩而苦。

【品质】 本品以个大体重、色灰者为佳。

【性味功效】 养血，固气，涩精，安神，敛肺，止血。用于大肠虚滑，泻痢不止，便血，遗精，阴汗，咳嗽，咯血，齿痛，创伤出血，疮疡久不收口。



【编号】 M042071630470O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

肚倍

【来源】 漆树科植物青麸杨 Rhus potaninii Maxim.叶上的虫瘿，主要由倍蛋蚜 Melaphis peitan Tsai et Tang 寄生而成。

【主产地】 主产于四川、贵州、云南、湖南、陕西、河南等地。

【性状特征】 肚倍呈长圆状或纺锤形囊状，长2.5～9 cm，直径1.5～4 cm。表面灰褐色或灰棕色，微有柔毛。质硬而脆，易破碎，断面角质样，有光泽，壁厚2～3 mm，内壁平滑，有黑褐色死蚜虫及灰色粉状排泄物。气特异，味涩。

【品质】 本品以个大、壁厚、完整者为佳。

【性味功效】 酸、涩，寒。敛肺降火，涩肠止泻，敛汗止血，收湿敛疮。用于肺虚久咳，肺热痰嗽，久泻久痢，盗汗，消渴，便血痔血；外伤出血，痈肿疮毒，皮肤湿烂。

【附注】 本品作为“五倍子”入药。



【编号】 M012972050200O0SM

【鉴定人】 陈俊华

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

角倍

【来源】漆树科植物盐肤木 Rhus chinensis Mill. 叶上的虫瘿，主要由五倍子蚜 Melaphis chinensis (Bell.) Baker 寄生而成。

【主产地】主产于四川、贵州、云南、湖北、湖南、陕西、河南、浙江等地。

【性状特征】本品呈菱状，具不规则的角状分枝，长3～12 cm，直径2～6 cm，表面黄棕色至灰棕色，密被灰白色柔毛。质硬而脆，易破碎，断面角质样，有光泽，壁较薄1～2mm，内壁平滑，腔内有黑褐色死蚜虫及灰色粉状排泄物。气特异，味涩。

【品质】本品以个大、壁厚、完整者为佳。

【性味功效】酸、涩，寒。敛肺降火，涩肠止泻，敛汗止血，收湿敛疮。用于肺虚久咳，肺热痰嗽，久泻久痢，盗汗，消渴，便血痔血；外伤出血，痈肿疮毒，皮肤湿烂。

【附注】本品作为“五倍子”入药。



【编号】M013072050220O0SM

【鉴定人】秦松云

赤芝

【来源】多孔菌科真菌赤芝 Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.的干燥子实体。

【主产地】主产于浙江、江西，全国大部分地区人工栽培。

【性状特征】菌盖半圆状、肾状或重叠不规则状，直径多为5～10 cm，边缘薄，中间厚达0.4～1.8 cm，表面红褐色有光泽，环纹明显，时有放射纹，硬如木质，纵切面米黄色至浅褐色，菌管层棕褐色；菌盖下面浅黄色，可见极细小的针眼状（菌管口）。菌柄侧生，扁圆柱状，常弯曲，红褐色，长3～11 cm。气微，味苦。

【品质】本品以无虫蛀、无霉变者为佳。

【性味功效】淡，温。安神健胃，滋补强壮。用于神经衰弱，失眠，食欲不振，久病体虚。

【附注】本品作为“灵芝”入药。



【编号】M042220170220O0CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

阿魏

【来源】伞形科植物新疆阿魏 Ferula sinkiangensis K. M. Shen 的树脂。

【主产地】主产于新疆维吾尔自治区伊犁州。

【性状特征】本品呈不规则的块状和脂膏状。颜色深浅不一，表面蜡黄色至棕黄色。块状者体轻、质地似蜡，断面稍有孔隙；新鲜切面颜色较浅，放置后色渐深。脂膏状者黏稠，灰白色。具强烈而持久的蒜样特异臭气，味辛辣，嚼之有灼热感。

【品质】本品以凝块状表面色蜡黄、气味浓厚、纯净无杂质者为佳。

【性味功效】苦、辛，温。消积，散痞，杀虫。用于肉食积滞，瘀血癥瘕，腹中痞块，虫积腹痛。

【附注】阿魏以往多由伊朗、阿富汗、印度等国进口。



【编号】M046472131250O0CMMI

【鉴定人】谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乳香

【来源】 橄榄科植物卡氏乳香树 Boswellia carterii Birdw.的树干伤口渗出的树脂。

【主产地】 主产于非洲索马里、埃塞俄比亚等地。

【性状特征】 本品呈长卵形滴乳状、类圆状颗粒或不规则块状物。长 0.5～3 cm，淡黄色微带绿色或棕红色，半透明，被黄白色粉尘。质坚脆，断面蜡样，少数有玻璃样光泽。气微芳香，味微苦，嚼之初散成砂粒状，续之软化呈乳白色胶块。

【品质】 本品以色淡黄白、断面半透明、质硬而脆、香气浓厚者为佳。

【性味功效】 辛、苦，温。调气活血，定痛，消肿，生肌。用于气血瘀滞，心腹疼痛，痈疮肿毒，跌扑损伤，风湿痹痛，经闭痛经，产后瘀血刺痛。



【编号】 M047771960030OCMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

昆布

【来源】 翅藻科植物昆布Ecklonia kurome Okam. 的干燥叶状体。

【主产地】 主产于福建。

【性状特征】 本品卷曲皱缩成不规则团块状。全体呈灰黑色，外被白色盐霜，较薄。用水浸软则膨胀呈扁平的叶状，长宽均为 16～26 cm，厚约1.6 mm；两侧呈羽状深裂，裂片呈长舌状，边缘有小齿或全缘。质柔滑。气微腥，味咸。

【品质】 本品以色黑棕、身干整齐、无杂质者为佳。

【性味功效】 咸，寒。软坚散结，消痰，利水。用于瘿瘤，瘰疬，睾丸肿痛，痰饮水肿。



【编号】 M050210130010OCMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

青黛


【来源】 爵床科植物马蓝Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek. 的叶或茎叶经加工制得的干燥粉末或团块。

【主产地】 主产于福建、江苏、安徽。福建仙游为青黛道地产区，历史悠久。

【性状特征】 本品为深蓝色的粉末，体轻，易飞扬；或呈不规则多孔性的团块，用手搓捻即成细末。微有草腥气，味淡。

【品质】 本品以体质轻松、色深蓝、粉粒细、能浮于水面、燃烧生紫红色火焰者为佳。

【性味功效】 咸，寒。清热解毒，凉血，定惊。用于温毒发斑，血热吐血，胸痛咳血，口疮，疳腮，喉痹，小儿惊痫。



【编号】 M059772590110OCMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

神曲

【来源】 面粉、麸皮与辣蓼、青蒿、杏仁等药物混合后经发酵而成的曲剂。

【主产地】 全国各地均产。各地制曲加入的药物不同，以福建产的建曲为道地。

【性状特征】 本品原料组成不同，性状有所不同。如面粉含量多则黄白色，质地较硬，表面较平滑。麸皮含量多的则土黄色，质地酥松，表面粗糙不平。具陈腐气。

【品质】 本品以身干、无恶臭、无虫蛀者为佳。

【性味功效】 辛、甘，温。消食行气，健脾养胃。



【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

茯苓

【来源】 多孔菌科真菌茯苓 Poria cocos (Schw.) Wolf 的干燥菌核。

【主产地】 主产于云南、安徽、湖北等地。以云南丽江、维西、保山的“云苓”，安徽金寨、霍山产的“安苓”质优。

【性状特征】 菌核呈类球状、椭圆状或不规则团块，大小不一。外皮薄而粗糙，棕褐色至黑褐色，有明显的皱缩纹理。体重，质坚实，断面颗粒性，有的具裂隙，外层淡棕色，内部白色，少数淡红色，有的中间抱有松根。无臭，味淡，嚼之粘牙。茯苓块为去皮后切制的茯苓，呈块片状，大小不一。白色、淡红色或淡棕色。

【品质】 本品以质重坚实、外皮黑亮、无裂隙、断面色白细腻、粘齿力强者为佳。

【性味功效】 甘、淡，平。利水渗湿，健脾宁心。用于水肿尿少，痰饮眩悸，脾虚食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠。



【编号】 M067520170430O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

海金沙


【来源】 海金沙科植物海金沙 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 的干燥成熟孢子。

【主产地】 主产于广东、浙江等地。

【性状特征】 孢子呈粉末状，棕黄色或浅棕黄色。体轻，手捻有光滑感，置手中易由指缝滑落。气微，味淡。

【品质】 本品以身干、色黄棕、质轻、光滑、能浮于水者为佳。

【性味功效】 甘、咸，寒。清利湿热，通淋止痛。用于热淋，砂淋，血淋，膏淋，尿道涩痛。



【编号】 M075250170030O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

海带

【来源】 海带科植物海带 Laminaria japonica Aresch. 的干燥叶状体。

【主产地】 主产于辽宁、山东、浙江、福建、广东等地。

【性状特征】 本品卷曲折叠成团状，或缠结成把。全体呈黑褐色或绿褐色，表面附有白霜。用水浸软则膨胀成扁平长带状，长 50～150 cm，宽 10～40 cm，中部较厚，边缘较薄而呈波状。类革质，残存柄部扁圆柱状。气微腥，味咸。

【品质】 本品以色黑棕、身干整齐、无杂质者为佳。

【性味功效】 咸，寒。软坚散结，消痰，利水。用于瘿瘤，瘰疬，睾丸肿痛，痰饮水肿。

【附注】 本品作为“昆布”入药。



【编号】 M050310120030O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

猪苓


【来源】 多孔菌科真菌猪苓 Polyporus umbellatus (Pers.) Fries 的干燥菌核。

【主产地】 主产于陕西、云南、河南、河北、山西。以陕西产者质量最佳。

【性状特征】 菌核条状、类圆状或扁块状，有的有分枝，长 5～25 cm，直径 2～6 cm。表面黑色、灰黑色或棕黑色，皱缩或有瘤状突起。体轻，质硬，断面类白色或黄白色，略呈颗粒状。气微，味淡。

【品质】 本品以外皮乌黑光润、断面洁白、体较重者为佳。

【性味功效】 甘、淡，平。利水渗湿。用于小便不利，水肿，泄泻，淋浊，带下。



【编号】 M083220170270O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

脱皮马勃

【来源】 灰包科真菌脱皮马勃 Lasiosphaera fenzlii Reich. 的干燥子实体。


【主产地】 主产于安徽、江苏、广西、甘肃等地。

【性状特征】 担子果扁球状或类球状，无不孕基部，直径 15～20 cm 或更大。包被常脱落，内包被灰棕色至黄褐色，纸质，常破碎呈块片状。孢体灰褐色或浅褐色，有弹性，用手撕之，内有灰褐色棉絮状的丝状物。触之则孢子呈尘土样飞扬，手捻有细腻感。气似尘土，无味。

【品质】 本品以个大饱满、松泡、色深者为佳。

【性味功效】 辛，平。清肺利咽，止血。用于风热郁肺咽痛，咳嗽，音哑；外治鼻衄，创伤出血。

【附注】 本品作为“马勃”入药。



【编号】 M010420240090O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

雪茶

【来源】 地茶科植物地茶 Thamnolia vermicularis (Ach.) Asahina 的干燥地衣体。

【主产地】 主产于云南、四川、陕西等地。

【性状特征】 地衣体呈圆管状，长 2～7 cm，直径 2～4 mm，稍弯曲，两端渐细，少数有分枝，表面灰白色，有的灰绿白色。质轻泡，易折断。断面呈空心管状，内壁白色或淡绿色。气微，味微苦。

【品质】 本品以条匀、色白、无杂质者为佳。

【性味功效】 苦、淡，凉。清热生津，醒脑安神。用于中暑，心烦口渴，肺热咳嗽，阴虚潮热，癫痫，失眠，目疾。



【编号】 M01593002002FHCMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

紫色马勃

【来源】 灰包科真菌紫色马勃 Calvatia lilacina (Mont. et Berk.) Lloyd 的干燥子实体。

【主产地】 主产于广东、江苏、安徽、湖北、广西等地。

【性状特征】 担子果呈陀螺状，或已压扁呈扁圆状，直径5～12 cm，不孕基部发达。包被薄，两层，紫褐色，粗皱，有圆形凹陷，外翻，上部常裂成小块或已部分脱落。孢体紫色。体轻泡，有弹性，用手捻有大量的孢子飞扬。气微，味淡。

【品质】 本品以个大、饱满、色紫者为佳。

【性味功效】 辛，平。清肺利咽，止血。用于风热郁肺咽痛，咳嗽，音哑；外治鼻衄，创伤出血。

【附注】 本品作为“马勃”入药。



【编号】 M09192024008O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

紫芝

【来源】 多孔菌科真菌紫芝 Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang 的干燥子实体。

【主产地】 主产于河北、河南、山东、浙江、江西、福建、广东、广西等地。

【性状特征】 菌盖半圆状、肾状、不规则状或分枝状，表面紫黑色，有光泽，具明显同心环沟，边缘钝圆。质硬，断面黑褐色；纵切面棕褐色，菌管层黄褐色。菌盖下方有皮壳覆盖，有时脱落，可见菌管口。菌柄侧生，紫黑色有光泽。气微，味苦。

【品质】 本品以无虫蛀、无霉变者为佳。

【性味功效】 淡，温。安神健胃，滋补强壮。用于神经衰弱，失眠，食欲不振，久病体虚。

【附注】 本品作为“灵芝”入药。



【编号】 M10542017020O0SM

【鉴定人】 钟国跃

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

雷丸


【来源】 白蘑科真菌雷丸 Omphalia lapidescens Schroet. 的干燥菌核。

【主产地】 主产于四川、云南、广西、贵州、陕西等地。

【性状特征】 菌核为类球状或不规则团块，直径1～3 cm。表面黑褐色或灰褐色，有略隆起的网状细纹。质坚实，不易破裂，断面不平坦，白色或浅灰黄色，似粉状或颗粒状，常有黄棕色大理石样纹理。无臭，味微苦，嚼之有颗粒感，微带黏性，久嚼无渣。

【品质】 本品以身干、个大、饱满、质坚重、断面色白者为佳。

【性味功效】 微苦，寒。杀虫消积。用于钩虫病，蛔虫病，虫积腹痛，小儿疳积。



【编号】 M09812017041O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

樟脑


【来源】 樟科植物樟 Cinnamomum camphora （L.）Sieb. 的根、树干、枝及叶经加工提取制成的颗粒状结晶，主含右旋樟脑（d-camphor，$C_{10}H_{16}O$）。

【主产地】 主产于四川、贵州、广西、江西、福建、台湾等地。以台湾产量最大，质量亦佳。

【性状特征】 本品纯品为雪白色结晶性粉末或无色透明结晶硬块及碎片。表面洁白色或暗白色，发亮光，形似白砂糖。粗制品灰白色或略带黄色，有光亮。有特殊浓烈而带窜透性的樟木香气，味辛辣而后清凉。在常温下易挥发，点燃能产生多烟而有光的火焰。不溶于水，易溶于有机溶剂中。露置空气中自然挥散不留余渣。

【品质】 本品以纯净、干爽、洁白、透明、有光泽、无水分杂质者为佳。

【性味功效】 辛、热；有小毒。通窍除湿，利滞气，杀虫，防腐。用于霍乱，心腹痛，寒湿脚气，疥癣瘙痒。



【编号】 M10107011017O0CMMI

【鉴定人】 谢宗万 黄璐琦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中文名索引（按笔画排序）

INDEX

一画

一扫光 219

二画

丁公藤 95
丁香 137
九子连环草 219
九节菖蒲 3
九香虫 283
人参 3
人参叶 127
儿茶 321
八月札 153
八角枫根 3
刀豆 153

三画

三七 4
三加皮 4
三白草根 4
三尖杉 219
三花龙胆 220
三角叶黄连 5
三角帆蚌 283
三斑海马 283
三棱 5
千年健 5
千里光 220
千金子 153
土木香 6
土牛膝 6
土贝母 6
土茯苓 7
土荆皮 113
大二郎箭 221
大刀螂 284
大三叶升麻 7
大马勃 321
大车前草 221
大风子 154
大叶钩藤 95
大叶海藻 321
大叶紫珠 221
大头翁 7
大血藤 95
大皂角 154
大花红景天 8
大豆黄卷 154
大连湾牡蛎 284
大麦 155
大枣 155
大肺筋草 222
大茅香 222
大青叶 127
大青盐 307
大籽蒿 222
大狼毒 8
大接骨木 113
大粒车前子 155
大黄 8
大黄檗 113
大腹皮 156
大蒜 9
大蓟 220
女贞子 156
小刀螂 284
小木通 96
小叶海藻 322
小龙胆草 223
小决明子 156
小青藤香 9
小茴香 157
小晕药 223
小根蒜 9
小秦艽 10
小通草 96
小粒车前子 157
小萱草根 10
山杏仁 157
山豆根 10
山里红 158
山奈 11
山矾叶 127
山栀茶 128
山茱萸 158
山药 11
山桃仁 158

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山桃枝 96
山银花 137
山慈姑 11
山楂 159
川乌 12
川木香 12
川木通 97
川牛膝 12
川贝母 13
川白芍 13
川芷 13
川芎 14
川赤芍 14
川明参 14
川党参 15
川莓 128
川黄柏 114
川楝子 159
川楝皮 114
干姜 15
干漆 322
干蟾皮 285
广地龙 285
广西莪术 15
广防己 16
广陈皮 159
广金钱草 223
广藿香 224
飞龙掌血 16
马氏珍珠贝 285
马尿泡 160
马钱子 160
马兜铃 160
马蔺子 161
马蹄大黄 16
马鞭草 224

四画

中国芦荟 322
中麻黄 224
中麻黄根 17
丹参 17
乌奴龙胆 225
乌药 17
乌韭 225
乌梢蛇 286
乌梅 161
乌脚枪 225
云连 18
云南重楼 18
五加皮 114
五灵脂 286
五花龙骨 307
五味子 161
六月寒 226
六棱菊 226
凤仙透骨草 226
凤凰衣 286
分心木 162
化橘红 162
升麻 18
双边天花粉 19
双边瓜蒌 162
双边瓜蒌子 163
双边瓜蒌皮 163
天仙子 163
天冬 19
天师栗 164
天花粉 19
天竺黄 323
天青地白 227
天麻 20
天葵子 20
太子参 20
太白米 21
太白花 323
太白参 21
巴山虎 21
巴豆 164
巴戟天 22
文蛤 287
方解石 307
无柄果钩藤 97
日本海马 287
月季花 137
木瓜 164
木香 22
木贼 227
木贼麻黄 227
木棉皮 115
木棉花 138
木蝴蝶 165
木鳖子 165
毛叶地瓜儿苗 228
毛青藤 97
毛梗豨莶 228
毛蚶 287
水母雪莲花 228
水红花子 165
水皂角 229
水柏枝 98
火麻仁 166
片姜黄 22

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

牙疳药 229
牛蒡子 166
牛蒡草 229
牛膝 23
王不留行 166
见血清 230
车前草 230
长牡蛎 288
长春七 23
长柄扁桃仁 167
长鞭红景天 23

五画

丛菔 24
东北天南星 24
东北铁线莲 24
丝瓜络 167
仙人掌 98
仙茅 25
仙鹤草 230
兰石草 231
冬瓜子 167
冬瓜皮 168
冬虫夏草 323
冬葵果 168
凹叶厚朴 115
凹叶厚朴花 138
功劳木 98
北刘寄奴 231
北沙参 25
北苍术 25
北豆根 26
北葶苈子 168
半边莲 231
半枝莲 232
半夏 26
半夏曲 324
四川寄生 99
对叶百部 26
平贝母 27
平车前草 232
打破碗花花 232
打箭菊 138
母丁香 169
玄参 27
玉兰 139
玉竹 27
瓜子金 233
瓜蒂 169
瓜蒌 169
瓜蒌子 170
瓜蒌皮 170
甘松 28
甘肃贝母 28
甘青青兰 233
甘青铁线莲 233
甘草 28
甘遂 29
生地黄 29
生姜 29
田基黄 234
白马骨 234
白及 30
白毛藤 234
白牛胆 235
白头翁 30
白术 30
白石花 324
白色牵牛子 170
白芥子 171
白花前胡 31
白花蛇舌草 235
白附子 31
白果 171
白矾 308
白茅根 31
白扁豆 171
白背叶 128
白药子 32
白首乌 32
白硇砂 308
白蒿 235
白蔹 32
白薇 33
石吊兰 236
石竹 236
石虎吴茱萸 172
石南藤 99
石香薷 236
石莲子 172
石莽草 237
石菖蒲 33
石榴子 172
石榴皮 173
石膏 308
石燕 309
艾叶 129
节裂角茴香 237
辽杏仁 173
辽细辛 237
辽藁本 33
龙血竭 324
龙虱 288

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

龙齿 309
龙胆 34
龙骨 309
龙眼肉 173
龙葵 238

六画

亚麻子 174
仰天钟 34
伊贝母 34
光皮木瓜 174
光石韦 238
光果甘草 35
光慈姑 35
全缘马先蒿 238
全萼龙胆 239
全蝎 288
关木通 99
兴安升麻 35
冰片 325
决明子 174
华东蓝刺头 36
华细辛 239
华重楼 36
华钩藤 100
合欢皮 115
吉祥草 239
地仙桃 175
地枫皮 116
地肤子 175
地柏枝 240
地骨皮 116
地榆 36
地蜂子 240
地锦草 240
地鳖 289
多刺天冬 37
多刺绿绒蒿 241
尖叶白蜡树皮 116
尖海龙 289
延胡索 37
异叶天南星 37
当归 38
有柄石韦 129
朱砂 310
朱砂草 241
朱砂根 38
朱砂莲 38
杂色鲍 289
灯心草 242
百合 39
百两金 242
百草霜 325
百部 39
祁白芷 39
祁州漏芦 40
竹叶椒根 40
竹节参 40
竹茹 100
红大戟 41
红毛五加皮 117
红毛对筋草 242
红芪 41
红花 139
红豆蔻 175
红参 41
红粉 310
红腺忍冬 139
羊角参 42
羊鲍 290
老鼠刺 100
老鹳草 243
肉苁蓉 243
肉豆蔻 176
肉桂 117
自然铜 310
芒硝 311
西红花 140
西青果 176
西洋参 42
西藏胡黄连 42
观音草 243
问荆 244
防风 43
阳春砂 176
阴地蕨 244

七画

两头尖 43
两面针 43
伸筋草 244
何首乌 44
余甘子 177
佛手片 177
吴茱萸 177
坚龙胆 44
庐山石韦 129
库拉索芦荟 325
忍冬藤 101
抚芎 44
杏仁 178
杓儿茶 245

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

杜仲 117
束花石斛 245
杠板归 241
条叶龙胆 45
杨柳枝 101
沉香 101
沙苑子 178
沙棘 178
没药 326
没食子 326
牡丹皮 118
皂角刺 102
皂矾 311
羌活 45
肚倍 326
芡实 179
芥子 179
芦根 45
芫花 140
芫花叶白前 46
芫荽 179
花椒 180
花蕊石 311
芸苔子 180
苍耳子 180
苎麻根 46
苏木 102
苏铁 140
补骨脂 181
角倍 327
角蒿 245
诃子 181
谷芽 181
谷精草 141
豆豉姜 182
豆蔻 182
赤地利 46
赤芍 47
赤芝 327
赤豆 182
近江牡蛎 290
远志 47
连钱草 246
连翘 183
阿胶 290
阿魏 327
附子 47
陈皮 183
鸡内金 291
鸡爪大黄 48
鸡矢藤 102
鸡血藤 103
鸡冠花 141
鸡脚刺 48
麦冬 48
麦芽 183
麦瓶草 246
龟甲 291

八画

乳突果 246
乳香 328
京大戟 49
佩兰 247
使君子 184
侧柏叶 247
刮筋板 247
刺五加 49
刺梨 49
刺梨根 50
刺海马 291
刺楸树皮 118
刺蒺藜 184
单叶蔓荆子 184
卷丹 50
垂头菊 141
垂序商陆 50
夜交藤 103
夜明砂 292
委陵菜 248
岩参 248
岩菖蒲 51
巫山淫羊藿叶 130
昆布 328
昌都锦鸡儿 103
明党参 51
杭白芍 51
杭白芷 52
松贝 52
松花粉 142
松笔头 104
板蓝根 52
枇杷叶 130
欧李仁 185
武当玉兰 142
波棱瓜子 185
泥蚶 292
泽泻 53
炉贝 53
狗脊 53
狗脊贯众 54
玫瑰花 142
环草石斛 248

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

直立百部 54
知母 54
细叶十大功劳叶 130
细叶百合 55
细花滇紫草 55
细梗香草 249
罗布麻叶 131
罗汉果 185
肿节风 249
胀果甘草 55
苘麻子 186
苞叶雪莲 249
苦丁茶 131
苦地丁 250
苦参 56
苦栃白蜡树皮 118
苦树皮 119
苦楝子 186
苦楝皮 119
茅膏菜 250
虎杖 56
虎掌南星 56
虎掌草 57
轮叶棘豆 250
软紫草 57
郁李仁 186
郁金 57
金刚藤 58
金果榄 58
金钗石斛 251
金挖耳 251
金荞麦 58
金钱白花蛇 292
金钱草 251
金铁锁 59
金银花 143
金精石 312
金樱子 187
金礞石 312
闹羊花 143
降香 104
青木香 59
青牛胆 59
青风藤 104
青皮 187
青果 187
青荚叶小通草 105
青娘子 293
青椒 188
青葙子 188
青蛤 293
青蒿 252
青藏龙胆 252
青黛 328
青礞石 312
鱼脑石 293
鱼眼草 252
鱼腥草 253
鸢尾 60

九画

南山楂 188
南五味子 189
南方大斑蝥 294
南瓜子 189
南沙参 60
南苍术 60
南柴胡 61
南葶苈子 189
南酸枣 190
南鹤虱 190
南藤 105
厚朴 119
厚朴花 143
垫状卷柏 253
姜黄 61
威灵仙 61
急性子 190
枳壳 191
枳实 191
枳椇子 191
枸骨叶 131
枸橼 192
柏子仁 192
柔毛淫羊藿 253
柳叶白前 62
柳叶蚂蝗 294
柽柳 105
柿蒂 192
栀子 193
洋金花 144
独一味 254
独角蜣螂虫 294
独活 62
独蒜兰 62
狭叶竹节参 63
狭叶番泻叶 132
珍珠杆 193
相思豆 193
祖师麻 120
神曲 329
禹白芷 63
禹州漏芦 63

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

禹余粮 313
穿山甲 295
穿山龙 64
穿心莲 254
络石藤 106
胆矾 313
胖大海 194
胡桃仁 194
胡荽 254
胡椒 194
茜草根 64
茯苓 329
茅苓草 255
茵陈蒿 255
茶子心 195
荛蔚子 195
荆芥 255
草乌 64
草灵芝 256
草豆蔻 195
草果 196
草麻黄 256
草麻黄根 65
荔枝核 196
荚果蕨贯众 65
荜茇 196
荜澄茄 197
荞麦七 65
虻虫 295
蚂蟥 295
重冠紫菀花 144
钟乳石 313
钩藤 106
韭根 66
韭菜子 197
香加皮 120
香附 66
香圆 197
骨碎补 66
鬼箭羽 106
鸦胆子 198

十画

毫白芍 67
党参 67
凌霄花 144
圆叶花锚 256
圆叶牵牛子 198
夏天无 67
夏枯草 145
娑罗子 198
宽叶羌活 68
宽筋藤 107
射干 68
展毛翠雀 257
峨参 68
峨眉雪莲花 257
峨眉蔷薇花 145
徐长卿 69
拳参 69
柴胡 69
桂枝 107
桃儿七 70
桃仁 199
桃枝 107
桑叶 132
桑白皮 120
桑枝 108
桑椹 199
桔梗 70
梧桐子 199
流苏石斛 257
浙贝母 70
浮小麦 200
浮萍 258
海风藤 108
海金沙 329
海金沙草 258
海带 330
海桐叶白英 258
海螵蛸 296
珠子参 71
皱纹盘鲍 296
益母草 259
益智仁 200
秦皮 121
秦艽 71
秦岭白蜡树皮 121
积雪草 259
粉甘草 71
粉防己 72
粉苞苣 259
粉萆薢 72
粉葛 72
素花党参 73
绢毛菊 260
绣线菊 260
臭牡丹 260
荷叶 132
荷花 145
莱菔子 200
莲子 201
莲子心 201

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

莲房 201
莲须 202
蚕砂 296
通天蜡烛 261
通草 108
铁皮石斛 261
铁线蕨 261
高良姜 73
鸭儿芹 262

十一画

假蒟 262
假楼斗菜 262
匙叶甘松 73
匙叶翼首草 263
商陆 74
婆婆纳 263
宿柱白蜡树皮 121
密蒙花 146
常山 74
旋覆花 146
望月砂 297
望春花 146
梅花 147
淡竹叶 133
淡豆豉 202
淫羊藿 263
牻牛儿苗 264
猪牙皂 202
猪苓 330
猪鬃草 264
猫爪草 74
甜瓜子 203
盘龙七 75
盘龙参 264
粗茎秦艽 75
续断 75
绵马贯众 76
绵头雪莲花 265
绵参 265
绵菴蘼 76
绿豆 203
绿绒蒿 265
羚羊角 297
脱皮马勃 330
菊花 147
菊苣 266
菟丝子 203
蛇床子 204
蛇莓草 266
蛇蜕 297
蛋不老 266
野老鹳草 267
野柿叶 133
野鸦椿 204
野烟 133
野菊花 147
野萝卜子 204
银杏叶 134
银柴胡 76
雪山一枝蒿 77
雪山林 267
雪灵芝 267
雪茶 331
鹿茸 298
鹿蹄草 268
麻花秦艽 77
麻花秦艽花 148
黄山药 77
黄甘草 78
黄皮酸橙枳壳 205
黄报春花 148
黄芩 78
黄连 78
黄帚橐吾 268
黄苞南星 79
黄金凤 268
黄柏 122
黄药子 79
黄脚鸡 79
黄黑小斑蝥 298
黄精 80

十二画

喜马拉雅紫茉莉 80
塔黄 80
寒水石 314
斑鸠窝 269
普通鹿蹄草 269
朝鲜淫羊藿 269
棉团铁线莲 81
棕板 122
楮实子 205
款冬花 148
温郁金 81
温莪术 81
湖北麦冬 82
滑石 314
滑石粉 314
琥珀 315
疏毛吴茱萸 205
硫磺 315

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

硬水黄连 270
硬紫草 82
紫贝齿 298
紫石英 315
紫色马勃 331
紫芝 331
紫花地丁 270
紫花前胡 82
紫苏子 206
紫苏叶 134
紫苏梗 109
紫河车 299
紫茉莉根 83
紫草茸 299
紫梢花 299
紫硇砂 316
紫菀 83
紫萁贯众 83
紫葳茎叶 270
萱草根 84
萹蓄 271
葛根 84
葫芦巴 206
葱子 206
蛤蚧 300
酢浆草 271
锁阳 271
隔山撬 84
雄黄 316
鹅不食草 272
黑色牵牛子 207
黑芝麻 207
黑豆 207
黑种草子 208
黑草乌茎叶 272
黑骨藤 85

十三画

椿白皮 122
椿皮 123
楤木 123
槐米 149
槐角 208
槐枝 109
滇黄芩 85
滇黄精 85
滨蒿 272
煅石膏 316
矮地茶 273
矮紫堇 273
硼砂 317
福参 86
腺梗豨莶 273
蒙古黄芪 86
蒲公英 274
蓖麻子 208
蓝布正 274
蓬莪术 86
蛾眉蕨贯众 87
蜂蜡 300
蜈蚣 300
路路通 209
锦灯笼 209
零陵香 274
雷丸 332

十四画

榜嘎 275
榧子 209
槟榔 210
漆姑草 275
熊胆 301
獐牙菜 275
磁石 317
算盘子根 87
缩砂仁 210
罂粟壳 210
翠云草 276
膜荚黄芪 87
膜缘柴胡 276
蓼大青叶 134
蔊菜 276
蔓生白薇 88
蔓荆子 211
蜘蛛香 88
酸枣仁 211
酸橙枳壳 211
酸橙枳实 212

十五画

僵蚕 301
墨斗菜 277
墨旱莲 277
暴格蚤 277
槲寄生 109
樟木 110
樟脑 332
熟地黄 88
稻芽 212
箭叶淫羊藿 278
薤仁 212

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蕲蛇 302
蝴蝶花 278
赭石 317
鹤虱 213

十六画

冀地鳖 302
橘红 213
橘络 213
橘核 214
薄荷 278
薏苡仁 214
薤白 89
螃蟹甲 89

十七画

檀香 110
爵床 279
藁本 89
藏木香 90
藏茜草 90
藏茴香 214
藏党参 279
藏菖蒲 90
藏紫草 91
藏紫菀 149
藏蒲公英 279
蘚生马先蒿花 149

十八画

瞿麦 280
藕节 91
藜芦 91
覆盆子 215

十九画以上

蟾酥 303
鳖甲 303
糯米藤 280
麝香 303

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中文名索引（按拼音排序）

INDEX

A

阿胶 290
阿魏 327
矮地茶 273
矮紫堇 273
艾叶 129
凹叶厚朴 115
凹叶厚朴花 138

B

八角枫根 3
八月札 153
巴豆 164
巴戟天 22
巴山虎 21
白背叶 128
白扁豆 171
白矾 308
白附子 31
白果 171
白蒿 235
白花前胡 31
白花蛇舌草 235
白及 30
白芥子 171
白蔹 32
白马骨 234
白毛藤 234
白茅根 31
白硇砂 308
白牛胆 235
白色牵牛子 170
白石花 324
白首乌 32
白术 30
白头翁 30
白薇 33
白药子 32
百部 39
百草霜 325
百合 39
百两金 242
柏子仁 192
斑鸠窝 269
板蓝根 52
半边莲 231
半夏 26
半夏曲 324
半枝莲 232
榜嘎 275
苞叶雪莲 249
暴格蚤 277
北苍术 25
北豆根 26
北刘寄奴 231
北沙参 25
北葶苈子 168
荜茇 196
荜澄茄 197
蓖麻子 208
萹蓄 271
枸儿茶 245
鳖甲 303
滨蒿 272
槟榔 210
冰片 325
波棱瓜子 185
亳白芍 67
薄荷 278
补骨脂 181

C

蚕砂 296
苍耳子 180
草豆蔻 195
草果 196
草灵芝 256
草麻黄 256
草麻黄根 65
草乌 64
侧柏叶 247
茶子心 195
柴胡 69
蟾酥 303
昌都锦鸡儿 103
长鞭红景天 23
长柄扁桃仁 167

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

长春七 23
长牡蛎 288
常山 74
朝鲜淫羊藿 269
车前草 230
沉香 101
陈皮 183
柽柳 105
匙叶甘松 73
匙叶翼首草 263
赤地利 46
赤豆 182
赤芍 47
赤芝 327
茺蔚子 195
臭牡丹 260
楮实子 205
川白芍 13
川白芷 13
川贝母 13
川赤芍 14
川党参 15
川黄柏 114
川楝皮 114
川楝子 159
川莓 128
川明参 14
川木通 97
川木香 12
川牛膝 12
川乌 12
川芎 14
穿山甲 295
穿山龙 64
穿心莲 254
垂头菊 141
垂序商陆 50
椿白皮 122
椿皮 123
磁石 317
刺海马 291
刺蒺藜 184
刺梨 49
刺梨根 50
刺楸树皮 118
刺五加 49
葱子 206
楤木 123
丛菔 24
粗茎秦艽 75
酢浆草 271
翠云草 276

D

打箭菊 138
打破碗花花 232
大车前草 221
大刀螂 284
大豆黄卷 154
大二郎箭 221
大肺筋草 222
大风子 154
大腹皮 156
大花红景天 8
大黄 8
大黄檗 113
大蓟 220
大接骨木 113
大狼毒 8
大粒车前子 155
大连湾牡蛎 284
大马勃 321
大麦 155
大茅香 222
大青盐 307
大青叶 127
大三叶升麻 7
大蒜 9
大头翁 7
大血藤 95
大叶钩藤 95
大叶海藻 321
大叶紫珠 221
大枣 155
大皂角 154
大籽蒿 222
丹参 17
单叶蔓荆子 184
胆矾 313
淡豆豉 202
淡竹叶 133
蛋不老 266
当归 38
党参 67
刀豆 153
稻芽 212
灯心草 242
地柏枝 240
地鳖 289
地枫皮 116
地蜂子 240
地肤子 175
地骨皮 116
地锦草 240

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

地仙桃 175
地榆 36
滇黄精 85
滇黄芩 85
垫状卷柏 253
丁公藤 95
丁香 137
东北天南星 24
东北铁线莲 24
冬虫夏草 323
冬瓜皮 168
冬瓜子 167
冬葵果 168
豆豉姜 182
豆蔻 182
独活 62
独角蜣螂虫 294
独蒜兰 62
独一味 254
杜仲 117
肚倍 326
煅石膏 316
对叶百部 26
多刺绿绒蒿 241
多刺天冬 37

E

峨参 68
峨眉蔷薇花 145
峨眉雪莲花 257
鹅不食草 272
蛾眉蕨贯众 87
儿茶 321

F

方解石 307
防风 43
飞龙掌血 16
榧子 209
分心木 162
粉萆薢 259
粉葛藤 72
粉防己 72
粉甘草 71
粉葛 72
蜂蜡 300
凤凰衣 286
凤仙透骨草 226
佛手片 177
茯苓 329
浮萍 258
浮小麦 200
福参 86
抚芎 44
附子 47
覆盆子 215

G

干蟾皮 285
干姜 15
干漆 322
甘草 28
甘青青兰 233
甘青铁线莲 233
甘松 28
甘肃贝母 28
甘遂 29
杠板归 241
高良姜 73
藁本 89
葛根 84
蛤蚧 300
隔山撬 84
功劳木 98
钩藤 106
狗脊 53
狗脊贯众 54
枸骨叶 131
枸橼 192
谷精草 141
谷芽 181
骨碎补 66
瓜蒂 169
瓜蒌 169
瓜蒌皮 170
瓜蒌子 170
瓜子金 233
刮筋板 247
关木通 99
观音草 243
光慈姑 35
光果甘草 35
光皮木瓜 174
光石韦 238
广陈皮 159
广地龙 285
广防己 16
广藿香 224
广金钱草 223
广西莪术 15
龟甲 291

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鬼箭羽 106
桂枝 107

H

海带 330
海风藤 108
海金沙 329
海金沙草 258
海螵蛸 296
海桐叶白英 258
寒水石 314
蔊菜 276
杭白芍 51
杭白芷 52
诃子 181
合欢皮 115
何首乌 44
荷花 145
荷叶 132
鹤虱 213
黑草乌茎叶 272
黑豆 207
黑骨藤 85
黑色牵牛子 207
黑芝麻 207
黑种草子 208
红参 41
红大戟 41
红豆蔻 175
红粉 310
红花 139
红毛对筋草 242
红毛五加皮 117
红芪 41
红腺忍冬 139
厚朴 119
厚朴花 143
胡椒 194
胡荽 254
胡桃仁 194
湖北麦冬 82
葫芦巴 206
槲寄生 109
蝴蝶花 278
虎掌草 57
虎掌南星 56
虎杖 56
琥珀 315
花椒 180
花蕊石 311
华东蓝刺头 36
华钩藤 100
华细辛 239
华重楼 36
滑石 314
滑石粉 314
化橘红 162
槐角 208
槐米 149
槐枝 109
环草石斛 248
黄柏 122
黄苞南星 79
黄报春花 148
黄甘草 78
黄黑小斑蝥 298
黄脚鸡 79
黄金凤 268
黄精 80
黄连 78
黄皮酸橙枳壳 205
黄芩 78
黄山药 77
黄药子 79
黄帚橐吾 268
火麻仁 166

J

鸡冠花 141
鸡脚刺 48
鸡内金 291
鸡矢藤 102
鸡血藤 103
鸡爪大黄 48
积雪草 259
吉祥草 239
急性子 190
冀地鳖 302
荚果蕨贯众 65
假蒟 262
假耧斗菜 262
尖海龙 289
尖叶白蜡树皮 116
坚龙胆 44
见血清 230
箭叶淫羊藿 278
姜黄 61
僵蚕 301
降香 104
角倍 327
角蒿 245
节裂角茴香 237

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

芥子 179
金钗石斛 251
金刚藤 58
金果榄 58
金精石 312
金礞石 312
金钱白花蛇 292
金钱草 251
金荞麦 58
金铁锁 59
金挖耳 251
金银花 143
金樱子 187
锦灯笼 209
近江牡蛎 290
京大戟 49
荆芥 255
九节菖蒲 3
九香虫 283
九子连环草 219
韭菜子 197
韭根 66
桔梗 70
菊花 147
菊苣 266
橘核 214
橘红 213
橘络 213
卷丹 50
绢毛菊 260
决明子 174
爵床 279

K

苦参 56
苦地丁 250
苦丁茶 131
苦栃白蜡树皮 118
苦楝皮 119
苦楝子 186
苦树皮 119
库拉索芦荟 325
宽筋藤 107
宽叶羌活 68
款冬花 148
昆布 328

L

莱菔子 200
兰石草 231
蓝布正 274
老鹳草 243
老鼠刺 100
雷丸 332
藜芦 91
荔枝核 196
连钱草 246
连翘 183
莲房 201
莲须 202
莲子 201
莲子心 201
两面针 43
两头尖 43
辽藁本 33
辽细辛 237
辽杏仁 173
蓼大青叶 134
凌霄花 144
羚羊角 297
零陵香 274
流苏石斛 257
硫磺 315
柳叶白前 62
柳叶蚂蝗 294
六棱菊 226
六月寒 226
龙齿 309
龙胆 34
龙骨 309
龙葵 238
龙虱 288
龙血竭 324
龙眼肉 173
庐山石韦 129
芦根 45
炉贝 53
鹿茸 298
鹿蹄草 268
路路通 209
绿豆 203
绿绒蒿 265
轮叶棘豆 250
罗布麻叶 131
罗汉果 185
络石藤 106

M

麻花秦艽 77
麻花秦艽花 148
马鞭草 224

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

马兜铃 160
马蔺子 161
马尿泡 160
马钱子 160
马氏珍珠贝 285
马蹄大黄 16
蚂蟥 295
麦冬 48
麦瓶草 246
麦芽 183
蔓荆子 211
蔓生白薇 88
芒硝 311
牻牛儿苗 264
猫爪草 74
毛梗豨莶 228
毛蚶 287
毛青藤 97
毛叶地瓜儿苗 228
茅膏菜 250
没食子 326
没药 326
玫瑰花 142
梅花 147
虻虫 295
蒙古黄芪 86
密蒙花 146
绵菴藓 76
绵参 265
绵马贯众 76
绵头雪莲花 265
棉团铁线莲 81
明党参 51
膜荚黄芪 87
膜缘柴胡 276
墨斗菜 277
墨旱莲 277
母丁香 169
牡丹皮 118
木鳖子 165
木瓜 164
木蝴蝶 165
木棉花 138
木棉皮 115
木香 22
木贼 227
木贼麻黄 227

N

南苍术 60
南柴胡 61
南方大斑蝥 294
南瓜子 189
南鹤虱 190
南沙参 60
南山楂 188
南酸枣 190
南藤 105
南葶苈子 189
南五味子 189
闹羊花 143
泥蚶 292
牛蒡草 229
牛蒡子 166
牛膝 23
女贞子 156
糯米藤 280

O

欧李仁 185
藕节 91

P

盘龙参 264
盘龙七 75
螃蟹甲 89
胖大海 194
佩兰 247
硼砂 317
蓬莪术 86
枇杷叶 130
片姜黄 22
平贝母 27
平车前草 232
婆婆纳 263
蒲公英 274
普通鹿蹄草 269

Q

漆姑草 275
祁白芷 39
祁州漏芦 40
蕲蛇 302
千金子 153
千里光 220
千年健 5
芡实 179
茜草根 64
羌活 45
荞麦七 65

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

秦艽 71
秦岭白蜡树皮 121
秦皮 121
青藏龙胆 252
青黛 328
青风藤 104
青蛤 293
青果 187
青蒿 252
青荚叶小通草 105
青椒 188
青礞石 312
青木香 59
青娘子 293
青牛胆 59
青皮 187
青葙子 188
苘麻子 186
瞿麦 280
全萼龙胆 239
全蝎 288
全缘马先蒿 238
拳参 69

R

人参 3
人参叶 127
忍冬藤 101
日本海马 287
柔毛淫羊藿 253
肉苁蓉 243
肉豆蔻 176
肉桂 117
乳突果 246
乳香 328
软紫草 57
蕤仁 212

S

三白草根 4
三斑海马 283
三花龙胆 220
三加皮 4
三尖杉 219
三角帆蚌 283
三角叶黄连 5
三棱 5
三七 4
桑白皮 120
桑椹 199
桑叶 132
桑枝 108
沙棘 178
沙苑子 178
山慈姑 11
山豆根 10
山矾叶 127
山里红 158
山柰 11
山桃仁 158
山桃枝 96
山杏仁 157
山药 11
山银花 137
山楂 159
山栀茶 128
山茱萸 158
商陆 74
蛇床子 204
蛇莓草 266
蛇蜕 297
射干 68
麝香 303
伸筋草 244
神曲 329
升麻 18
生地黄 29
生姜 29
石菖蒲 33
石吊兰 236
石膏 308
石虎吴茱萸 172
石莲子 172
石榴皮 173
石榴子 172
石莽草 237
石南藤 99
石香薷 236
石燕 309
石竹 236
使君子 184
柿蒂 192
疏毛吴茱萸 205
熟地黄 88
束花石斛 245
双边瓜蒌 162
双边瓜蒌皮 163
双边瓜蒌子 163
双边天花粉 19
水柏枝 98
水红花子 165
水母雪莲花 228

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水皂角 229
丝瓜络 167
四川寄生 99
松贝 52
松笔头 104
松花粉 142
苏木 102
苏铁 140
素花党参 73
宿柱白蜡树皮 121
酸橙枳壳 211
酸橙枳实 212
酸枣仁 211
算盘子根 87
娑罗子 198
缩砂仁 210
锁阳 271

T

塔黄 80
太白参 21
太白花 323
太白米 21
太子参 20
檀香 110
桃儿七 70
桃仁 199
桃枝 107
天冬 19
天花粉 19
天葵子 20
天麻 20
天青地白 227
天师栗 164
天仙子 163
天竺黄 323
田基黄 234
甜瓜子 203
条叶龙胆 45
铁皮石斛 261
铁线蕨 261
通草 108
通天蜡烛 261
土贝母 6
土茯苓 7
土荆皮 113
土木香 6
土牛膝 6
菟丝子 203
脱皮马勃 330

W

王不留行 166
望春花 146
望月砂 297
威灵仙 61
委陵菜 248
温莪术 81
温郁金 81
文蛤 287
问荆 244
乌脚枪 225
乌韭 225
乌梅 161
乌奴龙胆 225
乌梢蛇 286
乌药 17
巫山淫羊藿叶 130
无柄果钩藤 97
吴茱萸 177
梧桐子 199
蜈蚣 300
五花龙骨 307
五加皮 114
五灵脂 286
五味子 161
武当玉兰 142

X

西藏胡黄连 42
西红花 140
西青果 176
西洋参 42
喜马拉雅紫茉莉 80
细梗香草 249
细花滇紫草 55
细叶百合 55
细叶十大功劳叶 130
狭叶番泻叶 132
狭叶竹节参 63
夏枯草 145
夏天无 67
仙鹤草 230
仙茅 25
仙人掌 98
薤生马先蒿花 149
腺梗豨莶 273
相思豆 193
香附 66
香加皮 120
香圆 197

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小刀螂 284
小根蒜 9
小茴香 157
小决明子 156
小粒车前子 157
小龙胆草 223
小木通 96
小秦艽 10
小青藤香 9
小通草 96
小萱草根 10
小叶海藻 322
小晕药 223
薤白 89
兴安升麻 35
杏仁 178
雄黄 316
熊胆 301
绣线菊 260
徐长卿 69
续断 75
萱草根 84
玄参 27
旋覆花 146
雪茶 331
雪灵芝 267
雪山林 267
雪山一枝蒿 77

Y

鸦胆子 198
鸭儿芹 262
牙疳药 229
亚麻子 174
延胡索 37
芫花 140
芫花叶白前 46
芫荽 179
岩参 248
岩菖蒲 51
羊鲍 290
羊角参 42
阳春砂 176
杨柳枝 101
洋金花 144
仰天钟 34
野菊花 147
野老鹳草 267
野萝卜子 204
野柿叶 133
野鸦椿 204
野烟 133
夜交藤 103
夜明砂 292
一扫光 219
伊贝母 34
异叶天南星 37
益母草 259
益智仁 200
薏苡仁 214
阴地蕨 244
茵陈蒿 255
淫羊藿 263
银柴胡 76
银杏叶 134
罂粟壳 210
硬水黄连 270
硬紫草 82
有柄石韦 129
余甘子 177
鱼脑石 293
鱼腥草 253
鱼眼草 252
禹白芷 63
禹余粮 313
禹州漏芦 63
玉兰 139
玉竹 27
郁金 57
郁李仁 186
鸢尾 60
圆叶花锚 256
圆叶牵牛子 198
远志 47
月季花 137
云连 18
云南重楼 18
芸苔子 180

Z

杂色鲍 289
藏菖蒲 90
藏党参 279
藏茴香 214
藏木香 90
藏蒲公英 279
藏茜草 90
藏紫草 91
藏紫菀 149
皂矾 311
皂角刺 102
泽泻 53

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

展毛翠雀 257
獐牙菜 275
樟木 110
樟脑 332
胀果甘草 55
赭石 317
浙贝母 70
珍珠杆 193
知母 54
栀子 193
蜘蛛香 88
直立百部 54
枳椇子 191
枳壳 191
枳实 191
中国芦荟 322
中麻黄 224
中麻黄根 17
钟乳石 313
肿节风 249
重冠紫菀花 144
皱纹盘鲍 296
朱砂 310
朱砂草 241
朱砂根 38
朱砂莲 38
茱苓草 255
珠子参 71
猪苓 330
猪牙皂 202
猪鬃草 264
竹节参 40
竹茹 100
竹叶椒根 40
苎麻根 46
紫贝齿 298
紫草茸 299
紫河车 299
紫花地丁 270
紫花前胡 82
紫茉莉根 83
紫硇砂 316
紫萁贯众 83
紫色马勃 331
紫梢花 299
紫石英 315
紫苏梗 109
紫苏叶 134
紫苏子 206
紫菀 83
紫葳茎叶 270
紫芝 331
自然铜 310
棕板 122
祖师麻 120

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

拉丁学名索引
INDEX

A

Abrus precatorius L. 193
Abutilon theophrasti Medic. 186
Acacia catechu (L. f.) Willd. 321
Acanthopanax giraldii Harms 117
Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith 114
Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms 49
Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr. 4
Achyranthes bidentata Bl. 23
Achyranthes longifolia Makino 6
Aconitum carmichaeli Debx. 12, 47
Aconitum flavum Hand.-Mazz. 77
Aconitum kusnezoffii Reichb. 64
Aconitum szechenyianum Gay. 272
Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf 275
Acorus calamus L. 90
Acorus tatarinowii Schott 33
Adelostemma gracillimum (Wall. et Wigtt.) Hook. f. 246
Adenophora stricta Miq. 60
Adiantum capillus-veneris Linn. 261
Adiantum davidii Franch. 264
Adiantum flabellulatum L. 225
Aesculus chinensis Bge. 198
Aesculus wilsonii Rehd. 164
Agkistrodon acutus (Guenther) 302
Agrimonia pilosa Ledeb. 230
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 123
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz 153
Alangium chinense (Lour.) Harms 3
Albizia julibrissin Durazz. 115
Alisma orientalis (Sam.) Juzep. 53
Allium chinensis G. Don 89
Allium fistulosum L. 206
Allium macrostemon Bge. 9
Allium sativum L. 9
Allium tuberosum Rottl. 66, 197
Allomyrina dichotoma Linnaeus 294
Aloe barbadensis Miller 325
Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berger. 322
Alpinia galanga Willd. 175
Alpinia katsumadai Hayata 195
Alpinia officinarum Hance 73
Alpinia oxyphylla Miq. 200
Amomum kravanh Pierre ex Gagnep. 182
Amomum tsao-ko Crevost et Lemaire 196
Amomum villosum Lour. 176
Amomum villosum Lour. var. xanthioides T. L. Wu et Senjen 210
Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino 32
Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees 254
Anemarrhena asphodeloides Bge. 54
Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey. 3
Anemone hupehensis Lem. 232
Anemone raddeana Regel 43
Anemone rivularis Buch.-Ham. 57
Anemone tomentosa (Maxim.) Pei 7
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 39, 63
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. formosana (Boiss.) Shan et Yuan 13, 52
Angelica morii Hayata 86
Angelica pubescens Maxim. f. biserrata Shan et Yuan 62
Angelica sinensis (Oliv.) Diels 38
Anthricus sylvestris (L.) Hoffm. 68
Apis cerana Fabricius 300
Apocynum venetum L. 131
Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg 101
Aralia chinensis L. 123
Arca granosa Linnaeus 292
Arca subcrenata Lischke 287
Arctium lappa L. 166, 229
Ardisia crenata Sims 38
Ardisia crispa (Thunb.) A. DC. 242
Ardisia japonica (Hornst.) Bl. 273
Areca catechu L. 156, 210
Arenaria kansuensis Maxim. 267
Arisaema amurense Maxim. 24
Arisaema flavum (Forsk.) Schott. 79
Arisaema heterophyllum Bl. 37
Aristolochia cinnabarina C. Y. Cheng et J. L. Wu 38
Aristolochia contorta Bge. 160
Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. 59
Aristolochia fangchi Y. C. Wu ex L. D. Chou et S. M. Hwang 16
Aristolochia manshuriensis Kom. 99
Arnebia euchroma (Royle) Johnst. 57
Artemisia annua L. 252
Artemisia argyi Levl.et Vant. 129
Artemisia capillaris Thunb. 255
Artemisia scoparia Waldst. et Kit. 272
Artemisia sieversiana Ehrh. ex Willd. 222, 235

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Asarum heterotropoides Fr. Schm. var. mandshuricum (Maxim.) Kitag. 237
Asarum sieboldii Miq. 239
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 19
Asparagus myriacanthus Wang et S. C. Chen 37
Aspongopus chinensis Dallas 283
Aster diplostephioides (DC.) C. B. Clarke 144
Aster souliei Franch. 149
Aster tataricus L. f. 83
Astragalus complanatus R. Br. 178
Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. 87
Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.) Hsiao 86
Atractylodes chinensis (DC.) Koidz. 25
Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 60
Atractylodes macrocephala Koidz. 30
Aucklandia lappa Decne. 22

B

Balanophora japonica Makino 261
Bambusa textilis McClure 323
Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek. 328
Belamcanda chinensis (L.) DC. 68
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 167, 168
Berberis francisci-ferdinandi Schreid. 113
Berberis julianae Schneid. 48
Bergenia purpurascens (Hook. f. et Thoms.) Engl. 51
Bergenia scopulosa T. P. Wang 75
Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f. 30
Boehmeria nivea (L.) Gaud. 46
Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franqnet 6
Bombyx mori Linnaeus 296, 301
Boswellia carterii Birdw. 328
Brassica campestris L. 180
Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. 179
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 205
Brucea javanica (L.) Merr. 198
Buddleja officinalis Maxim. 146
Bufo bufo gargarizans Cantor 285, 303
Bungarus multicinctus multicinctus Blyth 292
Bupleurum chinense DC. 69
Bupleurum marginatum Wall. ex DC. 276
Bupleurum scorzonerifolium Willd. 61
Buthus martensii Karsch 288

C

Caesalpinia sappan L. 102
Calanthe discolor Lindl. 219
Callicarpa macrophylla Vahl. 221
Calvatia gigantea (Batsch ex Pers.) Lloyd 321
Calvatia lilacina (Mont. et Berk.) Lloyd 331
Camellia oleifera Abel 195
Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum. 144
Canarium album Raeusch. 187
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 153
Cannabis sativa L. 166
Caragana changduensis Liou f. 103
Carpesium abrotanoides L. 133, 213
Carpesium cernuum L. 245
Carpesium divaricatum Sieb. et Zucc. 251
Carthamus tinctorius L. 139
Carum carvi L. 214
Caryopteris terniflora Maxim. 226
Cassia angustifolia Vahl 132
Cassia nomame (Sieb.) Kitag. 229
Cassia obtusifolia L. 174
Cassia tora L. 156
Cassiope selaginoides Hook. f. et Thoms. 256
Celosia argentea L. 188
Celosia cristata L. 141
Centella asiatica (L.) Urb. 259
Centipeda minima (L.) A. Braun et Aschers. 272
Cephalotaxus fortunei Hook. f. 219
Cervus nippon Temminck 298
Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne 174
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai 164
Changium smyrnioides Wolff 51
Chinemys reevesii (Gray) 291
Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill 190
Chrysanthemum indicum L. 147
Chrysanthemum morifolium Ramat. 147
Chuanmingshen violaceum Sheh et Shan 14
Cibotium barometz (L.) J. Sm. 53
Cicerbita macrorhiza (Royle) Beauv. 248
Cichorium glandulosum Boiss. et Hout. 266
Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. 35
Cimicifuga foetida L. 18
Cimicifuga heracleifolia Kom. 7
Cinnamomum camphora (L.) Presl 110
Cinnamomum camphora (L.) Sieb. 332
Cinnamomum cassia Presl 107, 117
Cirsium japonicum DC. 220
Cistanche deserticola Y. C. Ma 243
Citrus aurantium L. 211, 212
Citrus aurantium “Daidai” 191
Citrus aurantium “huangpi” 205
Citrus grandis ‘omentosa’ 162
Citrus medica L. 192
Citrus medica L. var. sarcodactylis (Noot.) Swingle 177
Citrus reticulata Blanco 183, 187, 213, 214
Citrus reticulata ‘Chachi’ 159
Citrus sinensis Osbeck 191

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Citrus wilsonii Tanaka 197
Cladonia alpestris (L.) Rabenh. 323
Clematis armandii Franch. 96
Clematis chinensis Osbeck 61
Clematis hexapetata Pall. 81
Clematis manshurica Rupr. 24
Clematis montana Buch.-Ham. 97
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. 233
Clerodendron bungei Steud. 260
Cnidium monnieri (L.) Cuss. 204
Codonopsis mollii Chipp. 279
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. 67
Codonopsis pilosula Nannf. var. modesta (Nannf.) L.T.Shen 73
Codonopsis tangshen Oliv. 15
Coix lacryma-jobi L. var. ma-yuen (Roman.) Stapf 214
Commiphora myrrha Eugl. 326
Coptis chinensis Franch. 78
Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao 5
Coptis teeta Wall. 18
Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. 323
Coriandrum sativum L. 179, 254
Cornus officinalis Sieb. et Zucc. 158
Corydalis bungeana Turcz. 250
Corydalis decumbens (Thunb.) Pers. 67
Corydalis hendersonii Hemsl. 273
Corydalis yanhusuo W. T. Wang 37
Crataegus cuneata Sieb. et Zucc. 188
Crataegus pinnatifida Bge. 159
Crataegus pinnatifida Bge. var. major N. E. Br. 158
Cremanthodium lineare Maxim. 141
Cremastra appendiculata (D. Don) Makino 11
Crocus sativus L. 140
Croton tiglium L. 164
Cryptotaenia japonica Hassk. 262
Cucumis melo L. 169, 203
Cucurbita moschata (Duch.) Poiret 189
Curculigo orchioides Gaertn. 25
Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling 81
Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang 15
Curcuma longa L. 57, 61
Curcuma phaeocaulis Val. 86
Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling 22, 81
Cuscuta chinensis Lam. 203
Cyathula officinalis Kuan 12
Cybister tripunctatus orientalis Gschew. 288
Cycas revoluta Thunb. 140
Cyclea racemosa Oliv. 9
Cyclina sinensis Gmelin 293
Cynanchum atratum Bge. 33
Cynanchum auriculatum Royle ex Wight 32, 84
Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz. 46
Cynanchum paniculatum (Bge.) Kitag. 69
Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl. 62
Cynanchum versicolor Bge. 88
Cynips gallae-tinctoriae Olivier 326
Cynomorium songaricum Rupr. 271
Cyperus rotundus L. 66

D

Dalbergia odorifera T. Chen 104
Daphne genkwa Sieb. et Zucc. 140
Daphne giraldii Nitsche 120
Datura metel L. 144
Daucus carota L. 190
Delphinium kamaonense Huth var. glabrescens (W. T. Wang) W. T. Wang 257
Dendrobium chrysanthum Wall. 245
Dendrobium fimbriatum Hook. var. oculatum Hook. f 257
Dendrobium loddigesii Rolfe 248
Dendrobium nobile Lindl. 251
Dendrobium officinale Kimura et Migo 261
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 189
Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr. 223
Dianthus chinensis L. 236
Dianthus superbus L. 280
Dichroa febrifuga Lour. 74
Dichrocephala benthamii C. B. Clarke 252
Dimocarpus longan Lour. 173
Dioscorea bulbifera L. 79
Dioscorea hypoglauca Palibin 72
Dioscorea nipponica Makino 64
Dioscorea opposita Thunb. 11
Dioscorea panthacia Prain et Burkill 77
Dioscorea septemloba Thunb. 76
Diospyros kaki Thunb. 192
Diospyros kaki Thunb. var. silvestris Makino 133
Dipsacus asperoides C. Y. Cheng et T. M. Ai 75
Disporopsis pernyi (Hua) Diels 79
Dolichos lablab L. 171
Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen 324
Dracocephalum tanguticum Maxim. 233
Drosera peltata Smith var. lunata (Buch-Ham.) C. B. Clarke 250
Drynaria fortunei (Kunze) J. Sm. 66
Dryopteris crassirhizoma Nakai 76
Duchesnea indica (Andr.) Focke 266

E

Echinops grijisii Hance 36
Echinops latifolius Tausch 63
Ecklonia kurome Okam. 328
Eclipta prostrata L. 277
Elaphe carinata (Guenther) 297

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Ephedra equisetina Bge. 227
Ephedra intermedia Schrenk et C. A. Mey. 17, 224
Ephedra sinica Stapf 65, 256
Epimedium brevicornum Maxim. 263
Epimedium koreanum Nakai 269
Epimedium pubescens Maxim. 253
Epimedium sagittatum (Sieb. et Zucc.) Maxim. 278
Epimedium wushanense T. S. Ying 130
Equisetum arvense L. 244
Equisetum hiemale L. 227
Equns asinus Linnaeus 290
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 130
Eriocaulon buergerianum Koern. 141
Eriophyton wallichii Benth. 265
Erodium stephanianum Willd. 243, 264
Erycibe obtusfolia Benth. 95
Eucommia ulmoides Oliv. 117
Eugenia caryophyllata Thunb. 137, 169
Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. 106
Eupatorium fortunei Turcz. 247
Euphorbia humifusa Willd. 240
Euphorbia kansui T. N. Liou ex T. P. Wang 29
Euphorbia lathyris L. 153
Euphorbia nematocypha Hand.-Mazz. 8
Euphorbia pekinensis Rupr. 49
Eupolyphaga sinensis Walker 289
Euryale ferox Salisb. 179
Euscaphis japonica (Thunb.) Dipp. 204
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. 177
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. bodinieri (Dode) Huang 205
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. officinalis (Dode) Huang 172
Excoecaria acerifolia F. Didr. 247

F

Fagopyrum cymosum (Trev.) Meisn 46
Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara 58
Ferula sinkiangensis K. M. Shen 327
Firmiana simplex (L.) W. F. Wight 199
Foeniculum vulgare Mill. 157
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 183
Fraxinus chinensis Roxb. 121
Fraxinus paxiana Lingelsh. 121
Fraxinus rhynchophylla Hance 118
Fraxinus stylosa Lingelsh. 121
Fraxinus szaboana Lingelsh. 116
Fritillaria cirrhosa D. Don 13
Fritillaria delavayi Franch. 53
Fritillaria pallidiflora Schrenk 34
Fritillaria przewalskii Maxim. 28
Fritillaria thunbergii Mig. 70
Fritillaria unibracteata Hsiao et K. C. Hsia 52
Fritillaria ussuriensis Maxim. 27

G

Gallus gallus domesticus Brisson 286, 291
Gampsis grandifora (Thunb.) K. Schum. 270
Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst. 327
Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang 331
Gardenia jasminoides Ellis 193
Gastrodia elata Bl. 20
Gekko gecko Linnaeus 300
Gentiana apiata N. E. Brown 255
Gentiana crassicaulis Duthie ex Burk. 75
Gentiana dahurica Fisch. 10
Gentiana lhassica Burkill. 239
Gentiana macrophylla Pall. 71
Gentiana manshurica Kitag. 45
Gentiana przewalskii Maxim. 252
Gentiana rhodantha Franch. 223
Gentiana rigescens Franch. 44
Gentiana scabra Bge. 34
Gentiana straminea Maxim. 77, 148
Gentiana triflora Pall. 220
Gentiana urnula H. Smith 225
Geranium carolinianum L. 267
Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Bolle 274
Ginkgo biloba L. 134, 171
Glechoma longituba (Nakai) Kupr. 246
Gleditsia sinensis Lam. 102, 154, 202
Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq. 25
Glochidion puberum (L.) Hutch. 87
Glycine max (L.) Merr. 154, 202, 207
Glycyrrhiza eurycarpa P. C. Li 78
Glycyrrhiza glabra L. 35
Glycyrrhiza inflata Bat. 55
Glycyrrhiza uralensis Fisch. 28, 71
Gnaphalium japonicum Thunb. 227
Gonostegia hirta (Bl.) Miq. 280
Gossampinus malabarica (DC.) Merr. 115, 138

H

Halenia elliptica D. Don 256
Haliotis discus hannai Ino 296
Haliotis diversicolor Reeve 289
Haliotis ovina Gmelin 290
Hedyotis diffusa Willd. 235
Hedyotis uncinella Hook. et Arn. var. scabrida Franch. 229
Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz. 41
Helwingia japonica (Thunb.) Dietr. 105
Hemerocallis fulva L. 84
Hemerocallis minor Mill. 10

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Herpetospermum caudigerum Wall. 185
Hippocampus histrix Kaup 291
Hippocampus japonicus Kaup 287
Hippocampus trimaculatus Leach 283
Hippophae rhamnoides L. 178
Homalomena occulta (Lour.) Schott 5
Hordeum vulgare L. 155, 183
Houttuynia cordata Thunb. 253
Hovenia dulcis Thunb. 191
Hydnocarpus anthelminticus Pierre 154
Hyoscyamus niger L. 163
Hypecoum leptocarpum Hook. f. et Thoms. 237
Hypericum japonicum Thunb. 234
Hyriopsis cumingii (Lea) 283

I

Ilex cornuta Lindl. ex Paxt. 131
Illicium difengpi K. I. B. et K. I. M. 116
Impatiens balsamina L. 190, 226
Impatiens siculifer Hook. f. 268
Imperata cylindrica Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. 31
Incarvillea compacta Maxim. 245
Inula cappa (Buch.-Ham.) DC. 222, 235
Inula helenium L. 6
Inula japonica Thunb. 146
Inula racemosa Hook. f. 90
Iris japonica Thunb. 278
Iris lactea Pall. var. chinensis Koidz. 161
Iris tectorum Maxim. 60
Isatis indigotica Fort. 52, 127
Ixeris gracilis (DC.) Stebb. 259

J

Juglans regia L. 162, 194
Juncus effusus L. 242

K

Kaempferia galanga L. 11
Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. 118
Knoxia valerianoides Thorel et Pitard. 41
Kochia scoparia (L.) Schrad. 175

L

Laccifer lacca Kerr 299
Laggera alata (Rorb.) Sch.-Bip. 226
Laminaria japonica Aresch. 330
Lamiophlomis rotata (Benth.) Kudo 254
Lancea tibetica Hook. f. et. Thoms. 231
Lasiosphaera fenzlii Reich. 330
Leonurus japonicus Houtt. 195, 259
Lepidium apetalum Willd. 168
Lepus tolia Pallas 297
Ligularia virgaurea (Maxim.) Mattf. 268
Ligusticum chuanxiong Hort. 14
Ligusticum chungxiong Hort. cv. Fuxiong 44
Ligusticum jeholense Nakai et Kitag. 33
Ligusticum sinense Oliv. 89
Ligustrum lucidum Ait. 156
Ligustrum robustum (Roxb.) Blume 131
Lilium brownii F. E. Brown var. viridulum Baker 39
Lilium lancifolium Thunb. 50
Lilium pumilum DC. 55
Lindera aggregata (Sims) Kosterm. 17
Linum usitatissimum L. 174
Liparis nervosa (Thunb.) Lindl. 230
Liquidambar formosana Hance 209
Liriope spicata (Thunb.) Lour. var. prolifera Y. T Ma 82
Litchi chinensis Sonn. 196
Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc. 82
Lithospermum zollingeri DC. 175
Litsea cubeba (Lour.) Pers. 182, 197
Lobelia chinensis Lour. 231
Lonicera confusa DC. 137
Lonicera hypoglauca Miq. 139
Lonicera japonica Thunb. 101, 143
Lophatherum gracile Brongn. 133
Lotus corniculatus L. 269
Luffa cylindrica (L.) Roem. 167
Lunathyrium acrostichoides (Sw.) Ching 87
Lycium chinense Mill. 116
Lycopodium japonicum Thunb. 244
Lycopus lucidus Turcz. var. hirtus Regel 228
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 258, 329
Lysimachia capillipes Hemsl. 249
Lysimachia christinae Hance 251
Lysimachia foenum-gracum Hance 274
Lysimachia trientaloides Hemsl. 242
Lysionotus pauciflorus Maxim. 236
Lytta caraganae Pallas 293

M

Magnolia biondii Pamp. 146
Magnolia denudata Desr. 139
Magnolia officinalis Rehd. et Wils. 119, 143
Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. biloba Rehd. et Wils. 115, 138
Magnolia sprengeri Pamp. 142
Mahonia bealei (Fort.) Carr. 98, 100
Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde 130

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg. 128
Malva verticillata L. 168
Manis pentadactyla Linnaeus 295
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro 65
Mauritia arabica (Linnaeus) 298
Meconopsis horridula Hook. f. et Thoms. 241
Meconopsis integrifolia (Maxim.) Franch. 265
Melaphis chinensis (Bell.) Baker 327
Melaphis peitan Tsai et Tang 326
Melia azedarach L. 119, 186
Melia toosendan Sieb. et Zucc. 114, 159
Menispermum dauricum DC. 26
Mentha haplocalyx Briq. 278
Meretrix meretrix Linnaeus 287
Mirabilis himalaica (Edgew.) Heim. 80
Mirabilis jalapa L. 83
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 165
Momordica grosvenori Swingle 185
Morinda officinalis How 22
Morus alba L. 108, 120, 132, 199
Moschus sifanicus Przewaleki 303
Mosla chinensis Maxim. 236
Mylabris cichorii Linnaeus 298
Mylabris phalerata Pallas 294
Myricaria germanica (L.) Desv. 98
Myristica fragrans Houtt. 176
Myrsine africana L. 277

N

Nardostachys chinensis Batal. 28
Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. 73
Nelumbo nucifera Gaertn. 91, 132, 145, 172, 201, 202
Nigella glandulifera Freyn 208
Notholirion hyacinthinum (Wils.) Stapf 21
Notopterygium forbesii Boiss. 68
Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang 45

O

Omphalia lapidescens Schroet. 332
Onosma hookeri C. B. Clarke 55
Onosma hookeri Clarke var. longiflorum Duthie 91
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl. 48
Opuntia dillenii Haw. 98
Oroxylum indicum (L.) Vent. 165
Oryza sativa L. 212
Osbeckia crinita Benth. ex C. B. Clarke 34
Osmunda japonica Thunb. 83
Ostrea gigas Thunberg 288
Ostrea rivularis Gould 290
Ostrea talienwhanensis Crosse 284
Oxalis corniculata L. 271
Oxytropis chiliophylla Royle 250

P

Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc. 267
Paederia scadens (Lour.) Merr. var. tomenlosa (Blume) Hand.-Mazz. 102
Paeonia lactiflora Pall. 13, 47, 51, 67
Paeonia suffruticosa Andr. 118
Paeonia veitchii Lynch 14
Panax ginseng C. A. Mey. 3, 41, 127
Panax japonicus C. A. Mey. 40
Panax japonicus C. A. Mey. var. angustifolius (Burk.) Chung et Chu 63
Panax japonicus C. A. Mey. var. major (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng 71
Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen 4
Panax quinquefolium L. 42
Papaver somniferum L. 210
Paraquilegia microphylla (Royle) Dru mm. et Hutch. 262
Paris polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara 36
Paris polyphylla Smith var. yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz. 18
Parmelia tinctorrum Despr. 324
Pedicularis decora Franch. 21
Pedicularis integrifolia Hook. f. ssp. integrrima (Pennel et Li) Tsoong. 238
Pedicularis muscicola Maxim. 149
Perilla frutescens (L.) Britt. 109, 134, 206
Periploca forrestii Schltr. 85
Periploca sepium Bge. 120
Peucedanum decursivum Maxim. 82
Peucedanum praeruptorum Dunn 31
Pharbitis nil (L.) Choisy 170, 207
Pharbitis purpurea (L.) Voigt. 198
Phaseolus angularis Wight 182
Phaseolus radiatus L. 203
Phellodendron amurense Rupr. 122
Phellodendron chinense Schneid. 114
Pheretima aspergillum (E. Perrier) 285
Phlomis younghusbandii Mukerjee 89
Phragmites communis Trin. 45
Phyla nodiflora (L.) Greene 221
Phyllanthus emblica L. 177
Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis (Mitf.) Stapf ex Rendle 100
Physalis alkekengi L. var franchetii (Mast.) Makino 209
Phytolacca acinosa Roxb. 74
Phytolacca americana L. 50
Picrasma quassioides (D. Don) Benn. 119
Picrorhiza scrophulariiflora Pennell 42
Pinellia pedatisecta Schott 56

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Pinellia ternata (Thunb.) Breit. 26
Pinus massoniana Lamb. 104, 142
Piper kadsura (Choisy) Ohwi 108
Piper longum L. 196
Piper nigrum L. 194
Piper puberulum (Benth.) Maxim. 105
Piper sarmentosam Roxb. 262
Piper wallichli (Miq.) Hand.-Mazz.var. hupehense (C. DC.) Hand.-Mazz. 99
Pittosporum illicoides Makino 128
Plantago asiatica L. 155, 230
Plantago depressa Willd. 157, 232
Plantago major L. 221
Platycladus orientalis (L.) Franco 192, 247
Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. 70
Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe 62
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 224
Polygala japonica Houtt. 233
Polygala tenuifolia Willd. 47
Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl. 85
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 27
Polygonatum sibiricum Red. 80
Polygonatum verticillatum (L.) All. 42
Polygonum aviculare L. 271
Polygonum bistorta L. 69
Polygonum capitatum Ham. ex D. Don 237
Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. 56
Polygonum multiflorum Thunb. 44, 103
Polygonum orientale L. 165
Polygonum perfoliatum L. 241
Polygonum runcinatum Buch.-Ham. var. sinense Hemsl. 223
Polygonum tinctorium Ait. 134
Polyporus umbellatus (Pers.) Fries 330
Poria cocos (Schw.) Wolf 329
Potentilla chinensis Ser. 248
Potentilla freyniana Bornm 240
Primula sikkimensis Hook. 148
Primula sonchifolia Franch. 257
Prinsepia uniflora Batal. 212
Prunella vulgaris L. 145
Prunus armeniaca L. 178
Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim. 157
Prunus davidiana (Carr.) Franch. 96, 158
Prunus humilis Bge. 185
Prunus japonica Thunb. 186
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne 173
Prunus mume (Sieb.) Sieb. et Zucc. 147, 161
Prunus pedunculata Maxim. 167
Prunus persica (L.) Batsch 107, 199
Przewalskia tangutica Maxim. 160
Psammosilene tunicoides W. C. Wu et C. Y. Wu 59
Pseudolarix kaempferi Gord. 113
Pseudosciaena crocea (Richardson) 293
Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm. 20
Psoralea corylifolia L. 181
Pteria martensii (Dunker) 285
Pterocephalus hookeri (C. B. Clarke) Höeck 263
Pteroxygonum giraldii Dammer et Diels 65
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 84
Pueraria thomsonii Benth. 72
Pulsatilla chinensis (Bge.) Regel 30
Punica granatum L. 172, 173
Pyrethrum tatsienense (Bur. et Franch.) Ling et Shih 138
Pyrola calliantha H. Andres 268
Pyrola decorata H. Andras 269
Pyrrosia clavata (Bak.) Ching 238
Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching 129
Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching 129

Q

Quercus infectoria Olivier 326
Quisqualis indica L. 184

R

Ranunculus ternatus Thunb. 74
Raphanus raphanistrum Linn. 204
Raphanus sativus L. 200
Rehmannia glutinosa Libosch. 29, 88
Reineckia carnea (Andr.) Kunth 239, 243
Rhaponticum uniflorum (L.) DC. 40
Rheum nobile Hook. f. et Thoms. 80
Rheum officinale Baill. 16
Rheum palmatum L. 8
Rheum tanguticum Maxim. ex Balf. 48
Rhinolophus ferrum-equinum Schreber 292
Rhodiola crenulata (Hook. f. et. Thoms.) H. Ohba 8
Rhodiola fastigiata (Hook. f. et. Thoms.) S. H. Fu 23
Rhododendron molle G. Don 143
Rhus chinensis Mill. 327
Rhus potaninii Maxim. 326
Ricinus communis L. 208
Rorippa indica (L.) Hiern 276
Rosa chinensis Jacq. 137
Rosa laevigata Michx. 187
Rosa omeiensis Rolfe 145
Rosa roxburghii Tratt.f. normalis Rehd. et Wils. 49, 50
Rosa rugosa Thunb. 142
Rostellularia procumbens (L.) Nees 279
Rubia cordifolia L. 64
Rubia wallichiana Decne. 90
Rubus chingii Hu 215
Rubus idaeus L. 193

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Rubus setchuenensis Bur. et Franch 128

S

Sagina japonica (Sweet) Ohwi 275
Saiga tatarica Linnaeus 297
Salix babylonica L. 101
Salvia cavaleriei Lévl. var. simplici-folia Stib. 241
Salvia miltiorrhiza Bge. 17
Sanguisorba officinalis L. 36
Sanicula lamelligera Hance 222
Santalum album L. 110
Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. 43
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 249
Sargassum fusiforme (Harv.) Setch. 322
Sargassum pallidum (Turn.) C. Ag. 321
Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils. 95
Saururus chinensis (Lour.) Baill. 4
Saussurea laniceps Hand.-Mazz. 265
Saussurea medusa Maxim. 228
Saussurea obvallata (DC.) Sch.-Bip 249
Sceptridium ternatum (Thunb.) Lyon 244
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 161
Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils. 189
Schizonepeta tenuifolia Briq. 255
Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch 300
Scrophularia ningpoensis Hemsl. 27
Scutellaria amoena C. H. Wright 85
Scutellaria baicalensis Georgi 78
Scutellaria barbata D. Don 232
Selaginella moellendorfii Hieron 240
Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim. 253
Selaginella uncinata (Desv.) Spring 276
Selenarctos thibetanus G. Cuvier 301
Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino 20
Senecio dianthus Franch. 219
Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don 220
Sepia esculenta Hoyle 296
Serissa serissoides (DC.) Druce 234
Sesamum indicum L. 207
Seseli giraldii Diels 23
Setaria italica (L.) Beauv. 181
Siegesbeckia glabrescens Makino 228
Siegesbeckia pubescens Makino 273
Silene conoidea L. 246
Sinapis alba L. 171
Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. 104
Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils. 97
Sinopodophyllum hexandrum (Royle) Ying 70
Siphonostegia chinensis Benth. 231
Smilax china L. 58
Smilax glabra Roxb. 7
Solanum indicum L. 21
Solanum lyratum Thunb. 234
Solanum photeinocarpum Nakamura et Odashima 238
Solanum pittosporifolium Hemsl. 258
Solms-Laubachia eurycarpa (Maxim.) Botsch. 24
Sophora flavescens Ait. 56
Sophora japonica L. 109, 149, 208
Sophora tonkinensis Gapnep. 10
Soroseris gilii (S. Moore.) Stebb. 260
Sparganium stoloniferum Buch.-Ham. 5
Spatholobus suberectus Dunn 103
Speranskia cantoniensis (Hance) Pax et Hoffm. 266
Spiraea japonica Linn. f. 260
Spiranthes sinensis (Pers.) Ames 264
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 258
Spongilla fragilis Lecidy 299
Stachyurus himalaicus Hook. f. et Thoms. 96
Statilia maculata (Thunberg) 284
Steleophaga plancyi (Boleny) 302
Stellaria dichotoma L. var. lanceolata Bge. 76
Stemona japonica (Bl.) Miq. 39
Stemona sessilifolia (Miq.) Miq. 54
Stemona tuberosa Lour. 26
Stenoloma chusanum (L.) Ching 225
Stephania cepharantha Hayata 32
Stephania tetrandra S. Moore 72
Sterculia lychnophora Hance 194
Strychnos nux-vomica L. 160
Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. f. et Thoms. 275
Symplocos paniculata (Thunb.) Miq. 127
Syngnathus acus Linnaeus 289

T

Tabanus bivittatus Matsumura 295
Tamarix chinensis Lour. 105
Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. 274
Taraxacum sikkimense Hand.-Mazz. 279
Taxillus sutchuenensis (Lecomte) Danser 99
Tenodera sinensis Saussure 284
Terminalia chebula Retz. 176, 181
Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch 108
Thalictrum simplex L. var. brevipes Hara 270
Thamnolia vermicularis (Ach.) Asahina 331
Tinospora capillipes Gagnep. 58
Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep. 59
Tinospora sinensis (Lour.) Merr. 107
Toddalia asistica (L.) Lam. 16
Toona sinensis (A. Juss.) Roem. 122
Torreya grandis Fort. 209
Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms) Hu 113

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl. 322
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 106
Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl. 122
Tribulus terrestris L. 184
Trichosanthes kirilowii Maxim. 19, 169, 170
Trichosanthes rosthornii Harms 19, 162, 163
Trigonella foenum-graecum L. 206
Trionyx sinensis Wiegmann 303
Triticum aestivum L. 200
Trogopterus xanthipes Milne-Edwards 286
Tulipa edulis (Miq.) Baker 35
Tussilago farfara L. 148
Typhonium giganteum Engl. 31

U

Uncaria macrophylla Wall. 95
Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks. 106
Uncaria sessilifructus Roxb. 97
Uncaria sinensis (Oliv.) Havil. 100

V

Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke 166
Valeriana jatamansii Jones 88
Veratrum nigrum L. 91
Verbena officinalis L. 224
Veronica ciliata Fisch. 263
Viola yedoensis Makino 270
Viscum coloratum (Komar.) Nakai 109
Vitex trifolia L. 211
Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham. 184
Vladimiria souliei (Franch.) Ling 12

W

Whitmania acranulata (Whitman) 294
Whitmania pigra (Wihitman) 295
Woodwardia unigemmata (Makino) Nakai 54

X

Xanthium sibiricum Patr. 180

Z

Zanthoxylum bungeanum Maxim. 180
Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC. 43
Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc. 40
Zanthoxylum schinifolium Sieb. et Zucc. 188
Zaocys dhumnades (Cantor) 286
Zingiber officinale Rosc. 15, 29
Ziziphus jujuba Mill. 155
Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chou 211

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com