

湖 南 农 村 文 库



HUNAN RURAL LIBRARY

中草药单方 验方选编

◆ 湖南省中医药研究院 / 编
◆ 湖南科学技术出版社
◆ 湖南人民出版社



湖南农村文库

中草药单方验方选编

编者：湖南省中医研究院

责任编辑：石 洪

出版发行：湖南科学技术出版社

湖南人民出版社

社 址：长沙市展览馆路 66 号

印 刷：湖南省新华印刷二厂

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：邵阳市双坡岭

邮 编：422001

经 销：湖南省新华书店

出版日期：1999 年 1 月第 1 版第 1 次

开 本：787mm×1092mm 1/32

印 张：4.75

字 数：100000

印 数：1—6050

书 号：ISBN 7—5357—2520—1/S·367

51册套价：249.90 元（本册 4.90 元）

（版权所有·翻印必究）

编写说明

一、本书以防治常见病、多发病为重点，一般采用现代医学病名或症状名，也包括少数中医病名。适当参考中西医对疾病的分类方法，共列 6 个科的 85 种病症，收载疗效较好而又容易采到的中草药单、验方 384 个。

二、中草药治病的特点是辨证施治，使用单、验方亦必须根据病人的具体情况，如体质强弱、病性寒热和病情缓急等不同情况来选择。

三、剂量采用公制。除极少数有说明者和儿科疾病外，一律为成人用量。因此使用时要按年龄大小、病情轻重和药品干鲜斟酌。

四、使用草药，既要依花、茎、叶、根的不同功能，也要根据季节条件，如春用叶，夏用花、茎，冬用根。

五、药有正名、俗名，为了便于读者查找方便和使用时不致混淆，在书末附有索引，刊载大部分草药的正名、学名、别名。

六、为节约篇幅，本书仅按“处方”、“制法”、“用法”、“疗效”、“说明”为序予以介绍，对其治疗验案，则不一一列举。

七、书中绝大部分单、验方为各基层医疗单位提供，但已不可能一一查考，为保持体例的统一，献方者的单位、姓名一律不录。

关注田野

——《湖南农村文库》总序

当我们满怀信心准备迈进又一个千年之门时，中国改革开放 20 年展现的一幅幅壮美画卷令世人瞩目。蓦然回首，我们为之骄傲；昂首展望，我们充满憧憬！

在历史的长河中，20 年仅仅是一个瞬间，但对中国这个长期徘徊在农业文明的国家来说，这 20 年所走过的路却是如此的不平凡。源于农民伟大创造的家庭联产承包责任制极大地解放和发展了生产力，农民的主动性、积极性和创造精神得到了空前的发挥；乡镇企业异军突起，农村经济实力不断壮大，农民生活水平迅速提高；生产方式、生活方式正在改变，价值观念正在更新，科技思想、市场观念、开放和法制意识逐步增强，农村和农民发生了令人欣喜的巨大变化。然而，无须讳忌，摆在人们面前的另一方面的事实同样令人惊诧：地区发展不平衡；城乡差别在扩大；农民的科学文化素质还很低，闯市场、致富奔小康的本领还不高，全国还有数千万农民尚未“脱贫”。对于湖南来说，更是需要给予关注，湖南农村人口占全省人口的 80% 以上，土地肥沃，资源丰富，但资源的综合利用和农产品的深度开发不够，农村经济效益偏低，农民收入增长缓慢，全省至今仍有 290 多万人没有“脱贫”，文盲和半文盲在成年农民中也

还占有较大比例，农民素质亟待提高。

农村的相对贫困，固然源于经济发展水平的落后，同时又是文化落后的必然结果。摆脱贫穷，走向富裕，既要改善经济条件，更要提高农民的思想道德和科学文化素养，使他们适应市场经济的规范和运作方式，实现从传统向现代、从封闭向开放的根本转变。可以毫不夸张地说，农民自身素质不提高，脱贫致富就没有希望，即使一时一地脱了贫，也仍然存在返贫的可能性。从一定意义上讲，精神上的贫困比物质上的贫困更加可怕。因此，文化扶贫就成了扶贫工作的重要内容，也是引导农民脱贫致富的前提条件。

去年，在省委、省政府领导高度重视和各方面的大力支持下，省文化扶贫委员会正式成立了。一年来，省文化扶贫委员会按照实施文化扶贫工程、总结文化扶贫工作经验，指导、协调全省文化扶贫工作的服务宗旨，配合全省农村精神文明阵地建设“五个一工程”（乡镇一个文化站、一个广播站、一个图书室、一个业余剧团、一个电影队；村级一个学习室、一个广播室、一个图书室、一个文艺活动室、一个篮球场）的实施，不断推出文化扶贫项目，加大文化扶贫力度，做了一些实实在在的工作，使农村精神文明建设不断朝着务实、规范、有序的方向发展。

现在，农民普遍反映，书店里、地摊上书很多，但真正适合农民口味、适应农业和农村需要的书却很少，而随着农村物质生活条件的改善，农民对精神文化生活提出了越来越高的要求，为了满足农民群众日益增长的精神文化生活的需要，为农民提供更多、更好的精神食粮，这次省文化扶贫委员会又推出了《湖南农村文库》大型系列丛书，这套丛书以邓小平理论和党的十五大精神为指导，立足于当前湖南农业生产和农民生活

的实际需要，突出农业、农民、农村特色，既有农业科技方面的，又有农村社会文化方面的，作者在写作上，始终坚持内容简明扼要，论述通俗易懂的原则，注重操作性，直接回答农民所关心和需要解答的问题，力求使农民看得懂、学得会、用得上、买得起，帮助农民增强脱贫致富的本领，懂得生活做人的道理。出版这套丛书，是我省文化扶贫工作的重要举措，也是全省农村精神文明建设的一件实事、好事，必将在三湘大地产生深远的影响。作为农民的儿子，我为此事感到特别高兴。同时也相信，这套丛书的出版，一定会得到广大农民朋友的热烈欢迎。借此机会，希望全省各级党委宣传部门、文化扶贫委员会的成员单位、农业和农村工作部门、全省各级新华书店发挥各自的优势，宣传好、发行好、使用好这套丛书，使之进入全省乡村图书室，进入千千万万农户家中，让更多的农民了解它、学习它，真正成为农民生活的伙伴，致富的帮手。

农业、农村和农民问题，始终是中国革命和建设的关键问题。铁的事实反复昭示人们：没有农村的小康，就没有全社会的小康；没有农村的稳定，就没有全社会的稳定；没有农村的文明，就没有全社会的文明；没有农村的现代化，就没有全社会的现代化。让我们更密切地关注田野，让它永远充满生机，永远充满希望！

是为序。

文选德

1998年10月于长沙蓉园

目 录

一、传染科疾病

流行性感冒	(1)
流行性脑脊髓膜炎	(4)
流行性乙型脑炎	(6)
白喉	(7)
细菌性痢疾	(8)
阿米巴痢疾	(12)
急性黄疸型肝炎	(13)
钩端螺旋体病	(15)
疟疾	(16)
血吸虫病	(18)
麻风	(19)

二、内科疾病

慢性气管炎	(21)
肺结核	(22)
风湿性心脏病	(22)
冠状动脉硬化性心脏病	(23)
高血压病	(23)
胃和十二指肠溃疡病	(25)
上消化道出血	(27)
便血	(28)
肠炎	(29)

慢性肝炎	(31)
再生障碍性贫血	(32)
血小板减少性紫癜	(33)
心、肾性水肿	(34)
肝硬化腹水	(35)
急性肾炎	(37)
糖尿病	(38)
姜片虫病	(39)
胆道蛔虫病	(39)
中暑	(40)
风湿性关节炎	(41)
腰痛	(44)
坐骨神经痛	(45)
三叉神经痛	(45)
癫痫	(46)
农药中毒	(47)
药物中毒	(48)
食物中毒	(49)

三、外科疾病

出血	(51)
烧、烫伤	(55)
跌打损伤	(63)
慢性骨髓炎	(66)
颈淋巴结核	(68)
疔疮	(72)
痈疖	(73)
乳痈	(74)
急性阑尾炎	(75)
肠梗阻	(77)

泌尿道感染	(7 7)
胆石症	(7 7)
血栓闭塞性脉管炎	(7 9)
皮肤慢性溃疡	(8 0)
荨麻疹	(8 1)
湿疹	(8 1)
冻疮	(8 2)
漆疮	(8 3)
神经性皮炎	(8 4)
稻农皮炎	(8 5)
牛皮癣	(8 6)
皮肤癌	(8 8)
狐臭	(8 8)
汗斑	(8 9)
毒蛇咬伤	(8 9)
狂犬咬伤	(9 5)
蜈蚣咬伤	(9 6)

四、妇科疾病

血崩	(9 7)
白带	(9 8)
葡萄胎	(9 8)
胎动不安	(9 9)
脱脐	(9 9)
子宫颈糜烂	(100)
滴虫性阴道炎	(101)

五、儿科疾病

惊厥	(104)
小儿肺炎	(104)
百日咳	(105)

腮腺炎	(106)
小儿腹泻	(107)
蚕豆黄	(107)
疳积	(108)
脱肛	(110)
六、五官科疾病	
急性扁桃体炎	(111)
急性结膜炎	(112)
中耳炎	(113)
鼻渊	(114)
牙痛	(115)
附：草药索引	(117)

一、传染科疾病

流行性感冒

【预防用药】

(一)

处方 华荠苎

制法 将鲜华荠苎全草除根切细晒干，置于球形瓶中，加水略低于药面，安装冷凝装置。加热，冷凝收取馏液，分出挥发油，置瓶中密封保存。我们采用民间蒸酒的土方法馏取挥发油，500 克药物可馏取挥发油 10 毫升。

用法 用 1 毫升华荠苎挥发油加入 1000 毫升冷开水中，充分震荡使成乳液状，名为华荠苎混悬剂。喷喉，每日 2 次，连喷 2 天。

(二)

(八味四防饮)

处方 常山 桂枝 水灯草 白茅根 桑白皮 桃树皮 陈皮 竹茹各 60~90 克

制法 上药切碎，每剂加水 30 公斤煎成 23 公斤。

用法 每人每日服 1 次 (100 毫升)，连服 3 天。

(三)

处方

(1) 田边菊 9 克 黄荆叶 15 克 矮地茶 12 克

(2) 山薄荷 9 克 野南瓜 15 克 凤尾草 15 克 路边荆 15 克

用法 任选一方，水煎服。

说明 对防治流感和感冒风热型均有效。

(四)

处方

(1) 紫苏 15 克 黄豆 30 克 葱白 5 个

(2) 岗梅 10 克 枇杷叶 6 克 紫苏 6 克

用法 任选一方，煎水代茶饮。

(五)

处方 万年青 金银花 升麻 益母草 胡颓子各 1000 克

紫苏 荆芥 臭牡丹 虎杖 酸浆草 苦荞各 500 克 十大

功劳 黄荆 五加皮 藿麻草 生姜各 250 克

制法 洗净切细，加水煮沸后，再煎 15 分钟左右，滤渣存液即成。

用法 每次服 250~300 毫升。

【治疗用药】

(一)

处方 马鞭草 9 克 淡竹叶 6 克 生石膏 24 克 大青叶 9 克

沙参 9 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方适用于流感风热型。

(二)

处方 积雪草 15 克 大青叶 12 克 夏枯草 9 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方适用于流感风热型。对咽炎、急性扁桃体炎亦有效。

(三)

处方 川芎 黄芩 葛根 甘草各 9 克 葱白 5 个

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。如寒热往来加柴胡 9 克；咳甚加川贝、知母各 6 克；痰多加前胡 6 克。

(四)

处方 紫苏 2 克 荆芥 3 克 川芎 3 克 葱（连须用）3 个 生姜 3 片 大枣 3 枚 红糖 30~60 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。

说明 本方适用于流感风寒型。

(五)

处方 路边荆 12 克 野菊花 9 克 茜草 9 克 仙鹤草 9 克
车前草 6 克 一枝黄花 9 克 岗梅 9 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

疗效 观察 195 例，有效 186 例，有效率为 95.3%。其中一天好转或痊愈率为 28.2%，两天好转或痊愈率为 62.3%，三天痊愈率为 4.8%。

说明 本方适用于流感风热型。

流行性脑脊髓膜炎

【预防用药】

(一)

处方 黄豆 250 克 马尾松枝 1 束

用法 水煎。每天服 1 碗，连服 3 天。

(二)

处方 马鞭草 水灯草 水菖蒲 骨碎补 忍冬藤 木贼各
15 克

用法 煎水当茶喝。

(三)

处方 金银花 12 克 大青叶 6 克 甘草 3 克 明矾 3 克

用法 共研细末，开水送服。每日 2 次，每次 3 克，连服 3 天。

(四)

处方 贯众 甘草 金银花 连翘 板蓝根 黄柏 生石膏各
9 克

用法 水煎服。每日 2~3 次。

(五)

处方 金银花 500 克 大青根 1000 克 夏枯草 1000 克 芦根
1500 克 岗梅 1500 克 (均用干品)

制法 上五味以水 6000 毫升煎两次，用 4 层纱布过滤，再将两

次滤液合并浓缩到 3000 毫升，加适量糖精及高级食用香精矫味，并加 0.5% 苯甲酸钠防腐。

用法 每日服 1 次，每次 20~30 毫升，连服 3 天。

【治疗用药】

(一)

处方 生石膏 滑石 薄荷 青黛 朱砂 淡竹叶 栀子 连翘 甘草各 9 克

用法 水煎当茶饮。

说明 本方适用于流行性脑脊髓膜炎初起。

(二)

处方 生地 白芍 丹皮 黄芩 薄荷 菊花 知母 生石膏 蔓荆 僵蚕 贯众 蝉蜕 板蓝根 钩藤 连翘各 6 克

用法 水煎。每日 1 剂，煎服 2 次。

说明 本方适用于流行性脑脊髓膜炎的菌血症期。

(三)

处方 金银花 生石膏 芦根 知母 甘草 钩藤 葛根 僵蚕 玉竹 连翘 苦参 栝楼根 玄参 丹皮 黄连各 9 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方适用于脑脊髓膜炎的脑膜炎期。

(四)

处方 癩蛤蟆 蚯蚓泥 雄黄各等份

用法 上 3 味和成团，敷脐上。

说明 本方适用于流行性脑脊髓膜炎的脑膜炎期。

(五)

处方 麦冬 6 克 忍冬藤 9 克 青木香 3 克 菊花 6 克 七叶一枝花 9 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

流行性乙型脑炎

【预防用药】

处方 鲜牛筋草 30 克

用法 煎水当茶饮，连服 3 天。隔 10 天后再连服 3 天。

【治疗用药】

(一)

处方 路边荆 15~30 克 七叶一枝花 6~8 克 鸭跖草 90~120 克

用法 先将路边荆、鸭跖草煎水，后把七叶一枝花磨水兑服（或研细末吞服）。

(二)

处方 七叶一枝花 八角莲（均用根）

用法 各磨服 3 克。

说明 主要用于退热镇惊。单服 1 味亦可。

(三)

处方 海金沙根（或藤） 紫花地丁 钩藤 银花根（或藤）
白菊花 生石膏各 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

(四)

处方 山乌龟 120 克 燕子窝泥 500 克

制法 山乌龟（以根块粗糙的新鲜品为佳）挖回埋土中备用。用时捣烂，与冷大米饭少许混合捣匀，再加燕子窝泥用冷水调成糊状，制成药饼两个。

用法 将病人置阴凉地面，侧卧，剪去头发，取药敷后头部（面积约半个头部大）。地上铺荷叶，让病人不敷药的那侧贴在荷叶上。所敷药饼若有热感，即更换一个。药饼干后，可用少量凉水淋湿调匀再用，直至体温恢复正常（一般约需半小时至 1 小时，重病人约 2 小时）。然后改为每日换 3 次。一般病人从敷药到清醒需 3~4 天。在这保护性抑制期，要注意以下 4 点：

1. 极严重的病人，昏迷 2~3 天后，可适当补充营养；
2. 病人需服用其他药物时，可酌情鼻饲，一般不要插胃管；
3. 使用此药，不能同时使用鲁米那；
4. 高烧病人体温超过 40℃，易引起抽搐、惊厥，可酌情加用退热药。

白 喉

(一)

处方 鲜白牛膝 60 克 壁钱（形像蜘蛛，有 4 对长脚，卵囊白而圆扁，固着于墙壁屋角）数个

用法 鲜白牛膝捣烂取汁，冲入开水 1 碗即服，然后将壁钱置

瓦上焙干研细末吹入咽喉。

(二)

处方 马鞭草

制法

(1) 取新鲜马鞭草叶、茎 60 克，捣烂至出汁，然后再加第二次淘米水 1000 毫升，充分搅拌，去渣取汁。

(2) 取干马鞭草 30 克，加水 1000 毫升煎熬至 300 毫升左右。

用法 每次 150 毫升，每日 2 次，连服 3~5 天。

(三)

处方 西瓜霜 瓜子金各 9 克 地虱婆 2.4 克 (焙) 偷油婆 20 只 (去足焙) 人指甲 3 克 (焙) 硼砂 6 克 人中白 3 克 雄黄 4.5 克 朱砂 3 克 麝香 2.4 克 梅片 9 克

制法 西瓜霜 (大西瓜一个，取孔去瓢，将玄明粉研细，装满瓜内，仍将取孔之皮补上盖严，置阴暗无风之处，过数日瓜上起霜刮下) 与诸药共研细末，瓶贮备用。

用法 取药末吹喉，每日 2 次。

说明 此方系谢天锡之父生前从几个治喉医师得授真传，毕生屡验之方。

细菌性痢疾

【急性菌痢】

(一)

处方 雀舌草 6 株

用法 水煎服。每日 2~3 次。

说明 此草治急性菌痢及肠炎效果甚佳。捣烂外敷，可治烫伤。

(二)

处方 黄荆子 1000 克 酒曲（酒药子）60 克 白糖 500 克

用法 上药炒黄为末。每日服 3 次，每次 6~9 克。5~7 天为 1 疗程。

说明 郴州传染病院用本方治疗 184 例，治愈率达 98%。对慢性痢疾、肠炎亦很有效。

(三)

处方 马齿苋 30 克 凤尾草 30 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。红痢加地榆 15 克；白痢加牛皮冻（牛皮消）9 克。

说明 马齿苋惯用于治痢，凤尾草亦有治痢效果。但须与俗名叫凤尾草而无治痢功效的地刷子及沙氏鹿茸草相区别。

(四)

处方 地榆 15 克 夜关门 30 克 野南瓜 30 克 瓜子金 15 克

用法 水煎。每天 1 剂，分 2~3 次服。

说明 道县防治院用本方治愈百余例。

(五)

处方 辣蓼草 15~30 克 蛇莓 15 克 马鞭草 15~30 克

用法 加水 500 毫升，煮沸后浓缩至 200 毫升。每日 1 剂，分 2 次服。

(六)

处方 美丽獐牙菜

制法 取美丽獐牙菜全草洗净晒干或烤干，研极细末，装成胶囊。

用法 每天服 3~4 次，每次服 0.5 克，连服 1~3 天。亦可取全草 6 克煎服，日服 3 次，连服 2~3 天。

(七)

处方 水杨梅（茜草科）

用法

(1) 水剂：取水杨梅花果序干品 15 克，煎服或开水冲泡 15 分钟后去渣服用。

(2) 片剂（浸膏片）：每次服 1.5~2 克，每日 3~4 次。

(3) 灌肠：用口服量的加倍量溶于 200 毫升温水中保留灌肠，每日 1~2 次。

疗效 经 5 年多的实验和临床观察，对 666 例急性菌痢患者及 172 例慢性患者的治疗，有效率达 98.8%。证明对菌痢和肠炎有显著疗效。外用对阴道滴虫也有较好效果。

(八)

处方 葛根 30 克 贯众 30 克 陈茶叶 30 克 红、白糖各 15 克 萝卜菹 3 个（炒枯） 艾叶 30 片 乌梅 3 个

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。

【慢性菌痢】

(一)

处方 地榆 30 克 桃金娘 20 粒 海蚌含珠 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

(二)

处方 薜荔 9 克 野南瓜根 30 克 鸡屎藤（牛皮消）9 克 枫
树球 6 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

(三)

处方 水杨梅（茜草科）30 克 乌梅 3 个 干姜 3 克 黑豆 60
克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方适用于慢性菌痢虚寒型。

(四)

处方 黄瓜藤 麻油

用法 黄瓜藤烧灰存性，调麻油敷脐上。

(五)

处方 乌药 车前草 七姊妹（白蔹） 葛根 青木香 乌不
落 石菖蒲各 10 克

用法 车前草用全草，余药用根。水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

阿米巴痢疾

(一)

处方 鸦胆子肉 18 克 山药 60 克 薏苡仁 60 克 滑石 60 克

用法 共研细末，每次服 6 克，米汤送服，日服 2 次。

(二)

处方 蛇骨头适量

用法 洗净，焙至黄色，研末后再炒至黑色，红糖开水冲服。每日 3 次，每次 3~9 克。

(三)

处方 桃树皮 白头翁 香椿树根皮各 9 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。

(四)

处方 蛇蜕 60 克

用法 烧灰存性。日服 2 次，每次 3 克。

急性黄疸型肝炎

(一)

处方 满天星 凤尾草 海金沙 木贼草 车前草各 9 克
用法 每日 1 剂，加水 800 毫升煎至 400 毫升，分 2 次服。

(二)

处方

(1) 茵陈 30 克 金钱草 30 克 海金沙 15 克

(2) 茵陈 鸡骨草 枸骨 十大功劳各 30 克

(3) 茵陈 鸡骨草 枸骨 十大功劳各 30 克 海金沙 15 克

用法 任选一方，水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

(三)

(舒肝合剂)

处方 桃金娘 60 克 白背叶 30 克 矮地茶 60 克 白糖适量

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。肝痛较甚加川楝、青皮、白芍、延胡索、佛手；食纳减少加山楂、鸡内金、陈皮、炒麦芽；头痛失眠加远志、枣仁、夜交藤、龙齿。

(四)

处方 凤尾草 60 克 白芍 30 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 4 次服。1 个月为 1 疗程，一般服用 1~2 个疗程。症状严重，进食极少者，适当配合输液等对症疗法。

(五)

处方 田基黄 60 克 茵陈 30 克 夏枯草 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。20~30 天为 1 疗程。

(六)

处方 马鞭草 9 克 十大功劳 6 克 甘草 6 克

用法 上药加水 500 毫升，煎至 300 毫升。每日 1 剂，分 2 次服。

(七)

处方 溪黄草 马鞭草 丁癸草各 15 克

用法 水煎服。每日 1 剂。7~12 天为 1 疗程。

(八)

处方 茅莓 30 克 溪黄草 15 克 白背叶 30 克 十大功劳 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

(九)

处方 满天星（天胡荽）15 克 溪黄草 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

(十)

处方 黄花菜根 60 克 梔子 60 克 乌泡根 15 克 山蚂蝗（小槐花）根 5 克 牙郎树（构树）皮 12 克

用法 共研细末，加米粉 500 克，丸如梧子大。日服 3 次，每

次 5 粒，逐日加 1 粒，至每次服 10 粒时即不再加量。

(十一)

处方 十大功劳 30 克 白茅根 30 克 白糖适量

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

钩端螺旋体病

【预防用药】

(一)

处方 香泽兰

用法 把香泽兰切碎撒于稻田内（田内存水不宜太多），一天后即可下田劳动。

(二)

处方 桐油 500 克 雄黄 30 克

用法 调匀后擦双脚。

说明 据芷江县介绍，此方预防本病有一定效果。

【治疗用药】

处方 丝瓜络半个（烧灰存性） 红糖 30 克

用法 丝瓜络灰用红糖水兑服。

说明 本方用以治本病所致的肿痛疮毒。

疟 疾

【预防用药】

(一)

处方 黄荆叶 90 克 半夏 90 克 生姜 90 克

用法 煎水供 10 人服，每人日服 1 次，每次 100 毫升。

说明 黄荆俗名土常山，民间常用其叶防治疟疾。煎服或研末水泛为丸均可。

(二)

处方 野南瓜根

用法 浸在水缸内作饮水消毒。

【治疗用药】

(一)

处方 白术 茯苓 法夏各 9 克 广皮 6 克 常山 15 克 青蒿 15 克 黄荆叶 30 克（或黄荆子 9 克炒） 生姜 3 片 大枣 3 枚

用法 水煎。必须在疟疾发作之前 2 小时服之，日服 1 剂，连服数剂。

说明 对一日疟、间日疟、三日疟皆有效。

(二)

处方 西氏毛茛 3 根

用法 捣敷内关穴，以起泡为度（穴上垫铜钱，药放入铜钱孔

中，外用布包扎）。

（三）

处方 石菖蒲 1 根

用法 捣烂，敷于腕上内关部位。男左女右。

（四）

处方 鹅不食草 15～30 克

用法 水煎，于发作前顿服。并在发作前 2 小时用此药塞入鼻孔内。

（五）

处方 乌梅 2 个 槟榔 常山 大枣 鳖甲 甘草各 6 克 生姜 3 片

用法 水煎，于疟疾发作前 1 小时服。

（六）

处方 常山 草果各 6 克 槟榔 当归各 9 克 大枣 4 枚 黑豆 7 粒

用法 煎水。每日 1 次，分 2 次服。

（七）

处方 青蒿叶

用法 晒干研末瓶贮备用。每次用 30 克，于病发前用开水或浓茶泡服。

(八)

处方 草果 2 克

用法 将草果籽研末，用纱布卷好在发病前 1 小时塞入鼻孔中。

(九)

处方 雄黄 黄丹各 1.5 克

用法 于发作前 2 小时 1 次顿服。

血 吸 虫 病

(一)

处方 艾叶 60 克 樟脑 丁香 陈皮 木香 肉桂 独活

羌活 细辛 苍术 山奈各 9 克 麝香 0.3 克

用法 将艾叶捣成绒，余药研成细末。将艾绒与药末以皮纸卷成结实的灸条 3 根。每日早晚灸气海、肾俞穴各 1 次，每次各灸半小时至 1 小时。

说明 本方制成的艾条主要作用为消腹水，亦可治疗风湿。一般在灸 10~12 天后，症状明显改善，疼痛减轻，食欲增进，精神好转，20 天后尿量增加。

(二)

处方 老鸦蒜 4 粒 蓖麻子 40 粒

用法 捣烂，外敷双侧涌泉穴。

说明 主治顽固性腹水，以及腹内有症结者。一般在敷药 10 小时后尿量即增加。

(三)

处方 山奈

用法 将山奈研细末，撒于痞块部，以纱布沾醋敷于痞块腹面，再以酒精洒在纱布上，周围以湿布绕成圈，保护皮肤，然后点燃纱布，直至病人感到灼热即灭掉。以布盖住，反复数次，病人有舒适感，痞块可逐渐变软。

疗效 治疗晚期血吸虫病肝硬化效果较好。

麻 风

(一)

处方 活毒蛇 1 条 稻谷 90 克 白母鸭 1 只

用法 将毒蛇以绳子穿鼻孔挂起，剥皮后在蛇肛门约 6 厘米处用刀划开，取出蛇胆囊。将蛇胆汁及蛇肉（剁碎）拌于谷内，喂鸭子吃，关在笼内。第二天杀鸭，除去整个内脏后炖烂。给病人服用，只吃 1 次。

说明 本方是农村一蛇医所献，治麻风效果很好。

(二)

(复方苍耳丸)

处方 苍耳子 1500 克 黄柏 首乌 胡麻仁 牛蒡子 苍术
独活 活血藤 石南藤 贯众 竹根七 万年青 十大功
劳 蛇不过各 1000 克 南蛇根 仙鹤草 五爪龙 黄连
山豆根 蓖麻子 薏苡仁 炮甲珠 松香 没药各 500 克
雄黄 150 克 癞蛤蟆 60 克

制法 将上药水打成丸。

用法 每日服 2 次，每次服 9 克。

(三)

(复方红藤丸)

处方 红藤根 1500 克 活血藤 1000 克 小血藤 八角枫 土
牛膝 常春藤 络石藤 朱砂莲各 500 克

制法 将上药水打成丸。

用法 每日服 2 次，每次 9 克。

二、内科疾病

慢性气管炎

(一)

处方 夜关门(全草 60 克,鲜品可用至 90 克) 天门冬 百部
各 18 克

用法 加水 600 毫升,煎成 200 毫升。每日服 2 次,每次 100 毫升,连服 10 天为 1 疗程(煎熬时用陶器为佳)。

(二)

处方 矮地茶 60 克 盐肤木皮 30 克 胡颓子根 30 克 沙参
30 克

制法 以上均用干药,加水煎 2 次,将两次药液混合,文火浓缩至 100 毫升,加适量白糖和防腐剂,瓶装备用。

用法 每次服 50 毫升,每日 2 次,10 天为 1 疗程。

(三)

处方 矮地茶 30 克 黄芩 15 克 麻黄 9 克 炒地龙 9 克 甘草
9 克

用法 以上为 1 日量,煎煮加糖浓缩成膏,分 3 次服。10 天为 1 疗程,连服 2 个疗程。

肺 结 核

处方 紫河车（以无传染病产妇的第一胎男孩最好）4 个 百部 500 克 白及 250 克 母鸡 1 只

制法 将紫河车焙焦黄，连同百部、白及共研细末，将未生过蛋约 1 公斤重的母鸡去皮及内脏，切成块，放适量水浓煎，去骨及渣，以浓汤和药末为丸，如黄豆大。

用法 每日早晚各服 9 克，以蛋汤或猪精肉汤送服。

疗效 治疗 7 例，痊愈（经 X 线透视病灶纤维化）4 例，近愈（症状消失，X 线透视有显著改善）2 例。

风湿性心脏病

（一）

处方 鲜万年青叶 18 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。

（二）

处方 老茶叶树根（粗壮新鲜的）90 克 甜酒 500 克

用法 水煎。每晚临睡前温服。

（三）

处方 朱砂根 1 莖 活血莲（囊吾）1 莖 皂角刺 5 个 川芎 9 克 白胡椒 7 粒

用法 上药炖猪心吃并内服药汁，每日 1 剂。如有水肿，上方

蒸鲜鲤鱼内服。

冠状动脉硬化性心脏病

处方 毛冬青

用法

(1) 口服：毛冬青浸膏糖衣片，每日 3 次，每次 6 片（每日剂量相当于生药 90 克）。

(2) 肌内注射：毛冬青针剂。每次 2 毫升，每日 1~2 次。

疗效 用毛冬青治疗冠状动脉硬化性心脏病 256 例，其中据 143 例临床观察，近期有效率为 96.5%。出院后 6~12 个月随访 110 例，疗效巩固的达 89%。

高血压病

(一)

处方 (1) 内服：鲜土杜仲（野扇花）60 克 夏枯草 15 克
桑寄生 15 克 玉米轴 30 克 鲜臭牡丹 15 克

(2) 外敷：苦瓜藤 30 克 苦蕒 60 克

用法

(1) 方水煎，每日 1 剂，连服 12 天；

(2) 方捣烂外敷头额或头顶顶部。

(二)

处方 臭梧桐叶 15 克 牛膝 9 克 杜仲 9 克 菊花 5 克 丹皮 9 克 白芍 9 克 天麻 5 克 丹参 9 克 钩藤 9 克 青木

香 5 克 石决明 12 克 夜交藤 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。

说明 原方无剂量，方中剂量乃编者酌定的。

(三)

处方 玉米须 30 克 水牛角尖 15 克

用法 水煎玉米须，水牛角尖磨水兑入。临服加红糖 60 克。

(四)

处方 地米荠（葶荠）30 克 绿壳鸭蛋 1 个 枫树球 7 个 大枣 10 枚 天丁 6 克 红、白糖适量

用法 水煎。每天 1 剂，分 3 次服。

(五)

处方 桑寄生 15 克 夏枯草 15 克 生杜仲 9 克 生白芍 30 克 黄芩 15 克 首乌 15 克 生地 30 克 生牡蛎 15 克 生龟板 15 克 黑芝麻 30 克 龙胆草 15 克 生赭石 15 克

用法 共研细末，炼蜜为丸。每日 3 次，每次 9 克，开水送服。

说明 本方适用于高血压病肝阳上亢型。

(六)

处方 槐角 25 公斤 冬青 15 公斤 熟地 7.5 公斤 桑枝 12.5 公斤 臭牡丹 10 公斤 夏枯草 15 公斤 白糖 25 公斤

制法 将前 6 味洗净拌匀，用纱布袋装好投入陶器缸内，加 3 倍量水（以淹没生药水面高出 30 厘米为度），浸泡 30 分钟，煮沸 2 小时，如此反复 3 次，分别过滤，合并药液加入糖浆，浓缩至 57000 毫升即得。每公斤降压膏相当于生药 1.5 公斤。

用法 每次 1 调羹（约 20 毫升），日服 3 次，2 个月为 1 疗程。

疗效 治疗 127 例，临床观察证明降压膏对各期高血压都有一定疗效，尤其对改善高血压患者的各种症状更能收到较为满意的效果。

胃和十二指肠溃疡病

（一）

处方 地雷

制法 取块根洗净，晒干，研细末，水泛为丸如胡椒子大。

用法 每日 2 次，每次 2 克，温开水送服。

疗效 治疗胃痉挛性疼痛 256 例，均收到迅速止痛的效果。对某些应用阿托品、普鲁卡因封闭无效的病例也能奏效。

（二）

处方 土茯苓 150 克 乌药 白背叶各 90 克

制法 上药各研极细末，过筛混匀。

用法 每服 3 克，空腹时用温开水送服。

（三）

处方 白胡椒 30 克 白芥子 36 克 生甘草 9 克 橘子树根皮 9 克，

用法 上药共研细末，兑甜酒冲服。每天 1 剂，分早、中、晚 3 次服完。

疗效 门诊治疗观察胃痛属寒性者 478 例，一般 3~5 剂疼痛即可缓解。

(四)

处方 乌贼骨 60 克 浙贝 9 克

用法 共研细末。每次 6~9 克，开水冲服，每日 3 次。

说明 本方对胃及十二指肠溃疡病有效。

(五)

处方 石菖蒲 青木香 金钱草 香附子 橙树根皮各 30 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方治胃痛偏于寒性者。处方用量均为鲜药，如用干药，则用量减半。

(六)

处方 青木香 9 克 木香 9 克 陈皮 3 克 隔山消(牛皮消)

四方消(六棱菊)各 12 克 散血莲(凤丫蕨) 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

(七)

(肝胃百合汤)

处方 柴胡 10 克 黄芩 10 克 百合 15 克(体虚者用 30 克)

丹参 15 克 乌药 10 克 川楝 10 克 郁金 10 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。若胃脘热痛拒按加蒲公英 15 克；胃脘冷痛喜按加高良姜 3 克；泛酸明显加乌贼骨 10 克；神疲、气短、乏力加明党参 12 克；痛处固定，舌质见瘀斑加桃仁 6 克；胃脘痛而大便色暗或如柏油样加生蒲黄 10 克；便秘加火麻仁 15 克；胸背胀或胸痛彻背加九香虫 3 克；胃脘挛急而痛加白芍 15 克、甘草 10 克；上腹隆胀、呕甚、得

呕则舒加枳实 10 克、白术 10 克。

说明 本方是夏度衡教授治疗胃与十二指肠溃疡，急、慢性胃炎等病属于中医肝胃不和兼淤滞型的经验方。三十余年来用于临床取得较好疗效。

禁忌 酒、笋子。

上消化道出血

(一)

处方 白及 白芍 紫珠草各 15 克 甘草 3 克

用法 每日 1 剂，煎水 200~300 毫升，分 3 次服。痛甚加乌贼骨、浙贝；血虚加熟地、阿胶。

(二)

处方 大蒜 芒硝（用量三比一）

制法 将上药捣烂混合。

用法 先于患者一侧足心涂上一层凡士林油膏，然后将药用纱布包好，敷上整个足心，厚度约 1 厘米。每次敷 3 小时，每日 1 次。平均用 4~5 天，至大便隐血试验为阴性，症状消失为度。

疗效 治疗 15 例，呕血 1 例，便血 5 例，呕血便血同时并见者 9 例。敷药后，呕血便血停止。

(三)

处方 桤木（全株）

制法

(1) 丸剂：将桤木研成细末，取 500 克加蜜 2 倍拌匀，烤干后，做成丸子，每粒重 0.3 克，干燥包装备用。

(2) 片剂：取桤木粉 500 克加入淀粉液 100~200 毫升，做成颗粒，烤干后压片，每片重 0.25 克。

(3) 水煎剂：将桤木洗净切片，取 500 克，加水 2500 毫升煮沸，连续 3 次。然后将 3 次药液混合后过滤，浓缩成 400 毫升，再过滤即成。

用法 丸剂每次服 1 丸；片剂每次服 4 片；水剂每次服 10 毫升，均为每日 3 次。

疗效 收治 16 例，其中溃疡病出血 11 例，门静脉高压所致食管静脉曲张破裂出血 4 例，下肢血管瘤 1 例。治愈 15 例。

便 血

(一)

处方 椿根白皮 60 克 白芷 6 克 栗壳 3 克 车前草 2 莴

用法 先将椿根白皮蜂蜜拌炒，栗壳洗净蜂蜜炒，然后将 4 味用清水同煎。分 3 次服，连服 2 剂。

(二)

处方 干柿子 白萝卜

用法 用干柿 3 枚烧炭，和蜜拌萝卜食之。

说明 本方适用于肠风便血，大便干燥者。

(三)

处方 乌梅肉 45 克 僵蚕 30 克

制法 上二味放新瓦上用火焙枯存性，共研细末储瓶内备用。用时将药末放碗内，加热米饭调和，搓为小丸如梧桐子大。

用法 每日3次，每次10克，食前开水吞服。

说明 本方适用于先便后血，大便正常，肛门无痔，久治不愈者。

肠 炎

(一)

处方 路边荆 18.3 公斤 夜关门 3.7 公斤 野南瓜 11.3 公斤
安息香酸 75 克

制法 将前3味药根切片，放锅内加水超过药面约10厘米，分别煎3次，每次熬存三分之一。再将3次药液混合浓缩成12000毫升，过滤、冷却，将安息香酸75克溶于3000毫升纯酒精，倒入药液中搅匀。

用法 每日服2~3次，每次10毫升。

疗效 本方经宜章县迎春公社卫生防治站临床观察，疗效确实很好。

(二)

处方 地丸子（三叶翻白草）10份 樟树根 1份

制法 将上2味药根切片、烘干、研粉、过筛、按比例混合。

用法 每日3次，每次3~6克。

疗效 本方治肠炎有显效，治菌痢亦有效。

(三)

处方 马齿苋 15 克 陈茶叶 9 克 种萝卜菹 9 克 水灯草 90 克 灶心土 1 块（煨红）

用法 水煎。每日 1 剂，日服 3 次。

(四)

处方 黄荆

用法 取根、茎、叶均可。鲜的 30～60 克捣烂取汁服；干药 15～30 克煎水服。每日 2～3 次。

(五)

处方 仙鹤草 海蚌含珠 乌泡 石榴皮 金银花 地榆各 9 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

(六)

处方 没食子（煨）2 个 陈皮 9 克 泽泻 9 克 党参 9 克 灶心土 30 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。若呕吐加黄连须 6 克 木通 9 克；寒泻加炮姜 1.5 克 附片 6 克 桂枝 6 克；呕吐蛔虫加乌梅 1 个、川楝 3 个。

(七)

处方 土黄连（细叶十大功劳） 辣蓼草各 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方治慢性肠炎效果较好。

(八)

处方 陈茶叶 9 克 生姜 5 克 煨姜 5 克 酒药子 (炒黄) 24 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方治慢性肠炎颇有效验。

慢 性 肝 炎

(一)

(疏肝理脾丸)

处方 柴胡 茜草 当归 赤芍 枳实 蒲黄 灵脂 地龙各 2330 克 鳖甲 7390 克 鸡内金 1560 克 猪肝 7800 克 青皮 1165 克 白糖适量

制法 取鲜猪肝用沸水稍烫，使稍稍变硬，切片，烘干，然后将猪肝与其他药物共研细粉，蜜丸如梧子大，用白糖粉上衣或按上糖衣法上衣，以 90~120℃ 温度干燥 4~6 小时，取出冷却即得。

用法 每日 3 次，每次 9 克，饭前 1 小时吞服。

疗效 临床用于治疗慢性肝炎（淤阻型）以及早期肝硬化，均获得较好疗效。

(二)

处方 满天星适量 白公鸡 1 只

用法 杀刚开叫的白公鸡，留鲜血（不放盐），去毛、头、足、翅及肝脏以外的内脏，洗净。再将满天星全草洗净，捆成小

把，填满鸡腹，封好，蒸熟。先食新鲜鸡血，后吃鸡肉。

疗效 编者走访经治疗的病例，皆称有效。

(三)

处方 白背叶 12 克 茵陈 30 克 夏枯草 12 克 麦冬 12 克

用法 上药加水 500 毫升，煎至 200 毫升。每日上、下午各服 1 次。

(四)

处方 溪黄草 150 克 田基黄 150 克 白背叶 30 克 茅莓根 30 克 牛大力 150 克 十大功劳 90~150 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。10~15 天为 1 疗程，一般 2~4 个疗程奏效。

(五)

处方 西氏毛茛 2 株

用法 把西氏毛茛全草洗净捣碎，拌红糖 30 克，敷腕关节掌侧 24 小时。

再生障碍性贫血

(一)

处方 阿胶 生地 藕节 鸡血藤各 12 克 黄芪 白芍 地骨皮 参须 麦冬 当归各 9 克 黄花倒水莲 6 克 花蕊石 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。

说明 适用于再生障碍性贫血的早期阶段。

(二)

处方 黄瓜香（匍匐堇）30 克 母鸡 1 只

用法 先将母鸡去头、足、翅和内脏，然后将黄瓜香洗净、捣烂，放在母鸡腹中，炖熟后连鸡及汤同服，3 次服完。在服药前，须先服桐油炒的黄豆，如有呕吐、腹泻者方可服上药。

血小板减少性紫癜

(一)

处方 田边菊 半边莲各 12 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

(二)

处方 牛腿骨

用法 取鲜牛腿骨一根（勿用病牛骨），不加油盐，炖汤喝，一般两天服完。

(三)

处方 鲜马尾松针 60 克 鲜茅根 藕节各 30 克 仙鹤草 15 克。

用法 水煎 2 次，分 3 次服完，每日 1 剂。服至症状消失 1 周以上。

心、肾性水肿

(一)

处方 生巴豆（去壳）60克 苦荞子 250克

制法 将上药共研细末，用热米汤调和为丸如饭豆大。

用法 视体质强弱，每次用开水送服3~5粒，每日服2~3次。

说明 本方还可治肝硬化腹水，但用药后常水泻厉害，因此要注意观察，防止失水、酸中毒及昏迷发生，应适可而止。

禁忌 服药后48天内忌食生、冷、油，低盐。

(二)

处方 金钱草 3克 万年青 6克 天仙藤 9克 白茅根 5克
虎刺 9克 海金沙 18克

用法 水煎。每日1剂，分2次服。

(三)

处方

(1) 内服：海金沙 30克 水菖蒲 木通 天花粉 水杨柳
(柳叶白前) 各 15克

(2) 外洗：陈稻草 栗树皮 芭蕉树

用法 内服方每日1剂，分2次服。然后以外洗方煎水洗浴。

(四)

处方 海金沙 9克 白术 120克 黑牵牛 45克 甘草 15克

用法 共研细末，每日3次，每次6克，开水送服。

禁忌 低盐 120 天。

肝硬化腹水

(一)

处方 马鞭草 60 克 半边莲 半枝莲 田基黄 白花蛇舌草
各 30 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方以马鞭草为主，其他各药根据不同情况斟酌加减。

(二)

处方 癭蛤蟆 5 个 大蒜 49 瓣 猪肚 1 个

用法 把癭蛤蟆去头及肠杂，同大蒜一起放入一个猪肚内炖。分多次服。

(三)

处方 四月花（紫薇）根 500 克 七叶黄荆（牡荆）根 18 克
车前草 3 株 山楂树根 60 克 野南瓜树根 120 克 梔子根
30 克 路边荆 30 克 水灯草 9 克

用法 第一剂煎后放甜酒少量；第二剂煮豆腐两小块；第三剂煮猪小肠 30~60 厘米；第四剂起加煮瘦猪肉。一般以水 10 碗煎成 1 碗，头煎当天晚餐后服，二煎次晨空腹服。重者连服 15 剂以上，轻者 10 剂左右，腹水消后再以本方加艾 3 根煎水蒸黄鸡。

禁忌 禁鱼、虾、笋。

(四)

处方 鲜土鳖虫 7 个 白糖 24 克 甜酒水 1 杯

用法 先用甜酒送服土鳖虫，再服白糖。20 天为 1 疗程。

(五)

处方 梔子根 15~30 克 白茅根 30 克 鸡爪糖树（枳椇）根 30 克 山蚂蝗（小槐花）根 15 克 土茯苓 15~30 克 黄檀树根 9 克 酸枣树根 15~30 克 细叶水杨柳（柳叶白前）9 克 虎杖 12 克 老鸦风（白珠树）根 15 克 乌泡树根 15 克 岗梅根 15 克

用法 先以水煎服 2~3 剂、每日 1 剂。以后则放猪脚炖服。

(六)

处方 腹水草 60 克 葱白 9 克 生姜皮 3 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

禁忌 用药时忌盐。

(七)

处方 红大戟（京大戟）90 克 紫草根 120 克 冬葵子 90 克 大枣 750 克

用法 上药用砂锅煮 4~6 小时，煮干后放水再煮。然后取大枣阴干，每日吃 3 次，在 7 天内吃完。煮后剩下的药水约 1 茶杯，1 次服完。

(八)

(消水丸)

处方 甘遂 大黄 陈皮 槟榔 黑牵牛 白牵牛 牙皂各等份

制法 共研极细末，炼蜜为丸。

用法 每次服 6 克，每日 1 次，于早晨空腹时用淡姜汤送下，10 天为 1 疗程。在治疗前及治疗期间，均辅以酵母、多种维生素口服，高渗葡萄糖加维生素 C 静脉推注，并配合高营养无盐饮食。

急性肾炎

(一)

处方 益母草 30 克 白茅根 车前草 木通 三颗针 叶下珠 旱莲草各 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，每剂煎煮 2 次。加红糖少许为引，分 2 次服。治疗期间，需口服多种维生素，无盐饮食。血尿明显者加荠菜 30 克，倍用茅根。

(二)

(四根汤)

处方 棕树根 黄栀子根 白茅根各 30 克 尿珠子根 60 克 路边荆 15 克

用法 上药煎成合剂 250 毫升，加入适量的防腐剂，瓶装备用。或临时煎服。

(三)

(肾炎合剂)

处方 车前草 白茅根各 30 克 积雪草 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

(四)

处方 白花蛇舌草 白茅根 旱莲草 车前草 夏枯草各 9~15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

糖 尿 病

(一)

处方 鸡屎白 7 份 谷芽 3 份

制法 将新鲜鸡屎白放瓦上焙枯存性，加入烤焦的谷芽，共研细过筛，加适量白糖为丸，每丸重 0.5 克。

用法 每日 3 次，每次 1 丸，热酒兑服。

(二)

处方 高丽参 5 克 生石膏 30 克 麦冬 9 克 沙参 15 克 竹叶 10 克 知母 15 克 法夏 9 克 淮山 15 克 甘草 3 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 5 次服。

姜片虫病

处方 槟榔 30 克 雷丸 榧子 乌梅 乌药各 9 克 川楝 15 克 花椒 6 克 枳实 9 克 沉香 3 克
用法 水煎。每天 1 剂，上、下午各服 1 次，饭前服。
禁忌 孕妇忌服。有严重贫血者慎服。

胆道蛔虫病

(一)

处方 乌梅 11 克 十大功劳 15 克 地锦 15 克 川椒 5 克 木香 3 克 两面针 12 克 枳壳 大黄各 5 克 延胡索 川楝各 6 克
用法 水煎。每日 1 剂半。

(二)

处方 苦楝根白皮适量
用法 晚上把上药切碎捣烂，以饭作饼敷胸口。

(三)

(安蛔汤)

处方 藿香 9 克 乌梅 15 克 黄连 5 克 川楝 3 克 白矾 1 克
用法 水煎。每日 1 剂。并发感染合四逆散（柴胡、白芍、枳壳、甘草）；呕吐加旋覆花、代赭石；腹痛甚加玄胡索、七叶

莲；大便秘加大黄、玄明粉。

疗效 本方与乌梅汤治疗观察 430 例，除 3 例转外科手术外，其余全部治愈。治愈率为 99%。平均疼痛消失为 3 天。

中 暑

(一)

处方 青木香 30 克 老君须 30 克

用法 研细末，每次 9 克，开水泡服。

说明 本方名“镇痛散”，治中暑腹痛。

(二)

处方 木姜子 15 克 青木香 15 克 辣蓼草 15 克 土细辛（杜衡）15 克

用法 上药洗净晒干，共研细末，每次服 3 克，开水冲服。

说明 本方适用于中暑上吐下泻且腹痛者。

(三)

处方 泽兰叶 9 克 大米 30 克

用法 上药共捣烂，同淘米水内服。

说明 本方适用于中暑胸闷、昏迷者。原方缺剂量，现剂量乃编者所加。

风湿性关节炎

(一)

处方 边河枫（白半枫荷）根 60 克 蓖荑树（卫矛）根 30 克

用法 煎汤兑酒服，或炖猪脚吃。每日 1 剂，分 3 次服。

说明 本方主治全身风湿痛。

(二)

处方 鲜桑枝 木防己 金钱草各 30 克 豨荑草 土细辛（徐长卿）各 60 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。连服 8 剂。

(三)

处方 当归 12 克 豨荑草 12 克 糯米 500 克 甜酒药子适量

用法 前 2 味共研细末。将米煮熟，与药末和匀，再加甜酒药子调匀，做成酒。每天 3 次，每次 1 杯，冲鸡蛋服。

(四)

处方 露蜂房 1 个 白酒 250 毫升

用法 将蜂房浸入酒内，10 天后，用以擦患处。

(五)

处方 紫荆皮 15 克 独活 12 克 白芷 白芍 制草乌各 9 克
制川乌 6 克 红花 石菖蒲各 9 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。服药前先喝酒适量。

说明 本方适用于风湿性关节炎寒湿型。

(六)

处方 皂荚 细辛 高良姜 生草乌 生川乌各 1.6 克 丁香 1 克 肉桂 1.2 克 樟脑 30 克

用法 共研细末，撒在“伤湿止痛膏”上，贴患处。

说明 本方近期疗效好，远期疗效尚待观察。

(七)

处方 牛膝 天冬 薏苡仁 鸡血藤 活血藤 骨碎补 制川乌 制草乌 钩藤各 9 克 木瓜 隔山香（金鸡爪）各 15 克 千年健 芫花 威灵仙各 6 克 黄芪 30 克 当归 45 克 石南藤 15 克

用法 上药浸酒 3 公斤，浸 10 天后，每日服药酒 30 毫升。

(八)

(活血安痛酊)

处方 桑寄生 当归 桂枝各 3 公斤 丹参 熟地各 4 公斤 老鹳草 苍术 活血藤 安痛藤 续断 赤芍 木瓜 川牛膝各 2 公斤 桃仁 500 克 乌梢蛇 皮子药各 1000 克 红花 制草乌各 250 克 蜈蚣 120 克 白糖 40 公斤 95%酒精 150 公斤

制法 先将酒精稀释成 75% 的浓度，取各药（除白糖外）混合均匀，捣成粗料，白布袋装，用蒸馏水或开水将药洒润，扎紧袋口，投入酒精中，将缸密封，每隔 10 天翻动揉搓 1 次，1 个月后加入蒸馏水将酒精稀释成 50 度，再浸泡 20 天，除去药渣，然后取白糖加水入锅溶化，煮沸，倾入药缸中，不断

搅拌 10~15 分钟，使其静置 2~3 天，倾取上层清液，调整为 40 度（药渣用蒸馏法收回酒精、以备再次浸药之用）。以 200 毫升瓶装，封固即得。

用法 每日 1~3 次，每次 30 毫升。

禁忌 孕妇忌服。

（九）

处方 地下明珠

用法 将上药烘干研末备用。用时以冷开水或白酒调湿，捏成绿豆大一团，敷于痛点或穴位上，外用胶布固定，12~24 小时后取去。敷药后局部有烧灼刺痛感，局部大多数皮肤变紫或起水泡。如有水泡，可用消毒针刺破，一般 2~3 天结痂，局部色素亦逐渐消退。

疗效 共治疗风湿性关节炎、坐骨神经痛，腰腿痛、三叉神经痛等 100 余例，一般痛点明显而固定的，用药后 90% 以上都有明显的止痛效果以至好转或近愈。

（十）

（青藤汤）

处方 青风藤 30~45 克 秦艽 寻骨风各 15 克 首乌 30 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。风胜型加威灵仙、羌活；寒胜型加附片、桂枝、制川乌；湿胜型加苡仁、苍术；热胜型加丹皮，生地；虚弱型加桑寄生、黄芪、刺五加皮。此外，还可按病变部位，选加不同药物，如头部加藁本、粉葛根，上肢加桑枝、姜黄；下肢加牛膝、木瓜；背部加威灵仙；腰部加徐长卿、狗脊。

疗效 治疗 180 例，基本控制（对早期患者，肿胀消退，功能

恢复；对晚期患者的关节畸形及功能障碍，不作完全恢复要求）24例；显效（临床症状大部消失）72例；有效（临床症状部分缓解）66例；无效（症状无变化）18例。总有效率为90%。

说明 本方服后有的自觉发热（体温正常），皮肤发红，周身发痒起荨麻疹，此反应约持续2小时，一般不需用药即可恢复正常。初服药者偶有头目眩晕，呕吐，不思食，水肿，多尿。未发现远期副作用。为了防止此副作用，用量可由少逐渐加多。

（十一）

处方 生半夏 30克 生山栀 60克 黄柏 15克 大黄 15克
桃仁 10克 红花 10克

用法 上药共研极细末，醋调敷患处。

说明 本方适用于膝部关节红肿灼热而痛（即中医所谓“鹤膝风”），一般敷药10分钟止痛，1~3天消肿，疗效确实。

腰 痛

处方 大伸筋 9克 枸骨 菝葜 八棱麻（八楞木） 活血藤
各 18克 五加皮 当归 木瓜各 12克 威灵仙 9克 川牛
膝 15克 红花 6克

用法 水煎。每日1剂，分2次温服。

坐骨神经痛

(一)

处方 狗胫骨 500 克 当归 千年健 威灵仙 百步拿 大枣
各 120 克 川乌 草乌各 9 克 细辛 15 克

制法 狗胫骨焙焦存性，大枣去核，与诸药共研细末，炼蜜为丸，如黄豆大。

用法 每日早晚各服 1 次，每次 15~20 丸，开水送服。如感恶心舌麻，是川、草乌的毒性反应，用生姜 15 克捣汁开水兑服以解之。

禁忌 孕妇、阴虚发热、消化道溃疡均忌服。

(二)

(雪花丸)

处方 雪冻花 碘化钾

制法 雪冻花根皮烘干，研细末，装入胶囊，每颗重 0.4 克；碘化钾亦另装胶囊，每颗重 0.6 克。

用法 每天服雪冻花、碘化钾胶囊各 1 颗。连服 3 天为 1 剂，2 剂为 1 疗程，病程长者可服 2 个疗程。现在已将剂型作了改进，即先将雪冻花研粉后再加入碘化钾，加工成糖衣片，每片含雪冻花、碘化钾各 0.15 克。每日饭后服 3 次，每次 2 片。

三叉神经痛

处方 白芍 30 克 生牡蛎 30 克 丹参 15 克 甘草 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

说明 本方是夏度衡教授治疗原发性三叉神经痛属于中医肝阳化风型的经验方。近三十年来用于临床取得较好疗效。

癲 癇

(一)

处方 川贝 18 克 枯矾 9 克 法夏 12 克 制南星 12 克 紫河车 1 个

用法 紫河车洗净焙干，与诸药共研细末。每日 3 次，每次 3 克，开水吞服。

(二)

处方 吴茱萸 9 克 朱砂 5 克 广香 5 克 紫河车（焙研）1 个 生姜 9 克

用法 前 3 味煎，生姜捣汁和紫河车粉冲药服。

(三)

处方 石菖蒲 茯神 制南星 法夏 白芥子 天竺黄 钩藤 独活各 9 克 远志（炙） 细辛各 3 克 天麻 广皮 桂枝尖 牙皂 前胡各 6 克 生姜汁 9 克

用法 前 15 味水煎 2 次，去渣，将 2 次药汁和匀，分成 2 份，兑生姜汁服。

说明 本方曾治愈多人，唯发作时遗尿者无效。

(四)

处方 鱼鳔 60 克 青矾(煅) 10 克 朱砂 10 克 天竺黄 10 克

用法 上药共研细末，炼蜜为丸。每次 10 克，每日早晚各 1 次，白酒送服。

农药中毒

(一)

处方 贯众 30 克

用法 上药捣烂放干净纱布上用冷开水冲滤，流出水与泡沫。内服泡沫及水。

说明 本方可解砒、磷中毒。

(二)

处方 野百合叶

用法 研末，每次 3~6 克，冷开水调服。

说明 野百合即民间所称之“化草”，解砒、磷中毒效果良好，也是治食物中毒及骨梗喉的有效药物。

(三)

处方 蛇莓 60 克 生绿豆 60 克

用法 捣烂，冷开水泡后绞汁内服。

说明 本方可解雷公藤及砒、磷中毒。

(四)

处方 小叶凤尾草（日本乌蕨）250 克 活血藤 15 克 小活血
（南五味子）15 克 青木香 15 克 广香 15 克 冰片 3 克
用法 凤尾草捣烂取汁，余药研末。分 3~4 次兑服。
说明 本方能解各种农药中毒。

(五)

处方 大黄 30 克 防风 30 克 甘草 30 克
用法 水煎顿服。
说明 解六六六中毒。

(六)

处方 乌柏根 30 克
用法 捣烂，兑第二次淘米水服。
说明 解六六六中毒。

药 物 中 毒

(一)

处方 青蒿适量
用法 水煎顿服。
说明 解斑蝥中毒。

(二)

处方 生姜适量

用法 捣烂取汁内服。

说明 解半夏中毒。

(三)

处方 芭蕉莧适量

用法 将芭蕉莧捣烂，加入第二次淘米水，取汁内服。2~3 小时服 1 次。

说明 解巴豆中毒。湖南省安仁县人民医院曾用此方治愈一例重症患者。

(四)

处方 羊血 1 碗

用法 生饮。转危为安后，复饮 1 杯。

说明 解雷公藤和砒中毒。

(五)

处方 臭娘子叶 90 克 水杨梅（茜草科）叶 90 克 芭蕉莧适量
量 麝香 0.3 克

用法 前 3 味捣烂取汁加麝香。黄土水兑服。

说明 解雷公藤中毒。

食 物 中 毒

(一)

处方 地浆水

用法 在黄土地上挖一个 1 米深的坑，灌水。搅混澄清后喝 1~

2 碗。

说明 解野果、野菜、鱼类中毒。

(二)

处方 茵陈 30 克 大黄 15 克

用法 水煎。寒证加附子 9 克；热证加黄柏 9 克。

说明 治蚕豆中毒（即蚕豆黄）。

(三)

处方 金银花叶 500 克 地浆水适量

用法 把鲜金银花叶捣烂，用地浆水兑服。

说明 解野蕈中毒。

(四)

处方 绿豆 120 克

用法 煎浓汁服。

说明 解野蕈中毒。

(五)

处方 鲜金鸡尾（乌韭）120 克

用法 捣碎，用米泔水 1 碗浸，去药渣后服。

说明 解野蕈中毒，亦可解砒中毒。

三、外科疾病

出 血

(一)

处方 田边菊 乌泡叶 蒿菜巴(茼蒿) 救兵粮(火把果)
毛蜡烛(香蒲) 各等份

制法 将上药分别焙至黑黄色，共研细末备用。

用法 压敷伤处。

说明 有人将兔子的股动脉切开，用本药末压敷 20 秒钟，出血即止。

(二)

处方 姜炭 无名异 白及各 30 克 鸡肫皮 15 克 冰片 3 克

用法 上药共研极细末，瓶装密封备用。用时取适量撒伤口包扎。

说明 有关单位择方中主药作动物实验(兔股动脉切开)，证实可在 7 分钟内止血。

(三)

处方 棕榈树适量

用法 棕榈树干品洗净、去粗皮，烧灰存性，研细贮瓶。用时

撒伤口。

说明 本方治开放性骨折出血。有人用此药治疗多例，止血效果良好，并能促进骨折愈合。

(四)

处方 石飞丝（松萝） 水蛭

用法 上药焙枯各等份，研细瓶装密封。用时以适量撒伤口。

说明 某草医用此方治疗动脉损伤出血多例，效果很好。

(五)

处方 桤木嫩叶适量

制法 把桤木嫩叶用水拌湿，磨成细粉，布包洗出稠汁，沉淀取净粉（布包内的粗渣不要）。

用法 敷扎伤口。

(六)

处方 乌泡叶 鸭嘴皮 地榆根各等份

用法 共捣烂，或干燥研细末。用时取适量敷伤口上。

说明 主治一般外伤出血，对动脉损伤出血效果亦好。

(七)

处方 蒲黄适量

用法 焙灰存性瓶储。用时敷伤口上。

说明 对一般外伤出血有较好的疗效。

(八)

处方 苧麻叶 500 克 冰片少许

用法 苧麻叶去叶脉烘干，研成细末，加冰片瓶储。用时撒伤口上。

说明 本方止血生肌效果良好，某地仅用苧麻叶一味，亦收止血之效。

(九)

处方 马尾松（花粉或根皮）蔓苧麻各等份

用法 马尾松（上半年用松花粉，下半年用松树根白皮）同蔓苧麻一起用石器捣烂，敷伤口上。

说明 本方能止血、续筋、生肌，敷一次即可。嚼敷效力更好。

(十)

处方 水蛭 陈石灰各等份

用法 将水蛭焙存性，与陈石灰一起研细末瓶储。用时取适量敷伤口。

(十一)

处方 鸡血若干滴 鸡皮适量

用法 割鸡颈取血，临用取鸡皮。先用热鸡血淋伤处，后敷上鸡皮，包扎固定。

说明 本方主治腹壁创伤出血。

(十二)

处方 苏木

用法 焙干研细末撒伤口。

(十三)

处方 乌贼骨 金鸡尾（凤尾草） 陈石灰 白及 韭菜 桤木叶 雷公藤 马兰 泽兰 苧麻叶 毛蜡烛（香蒲） 侧柏炭 血余炭各等份

用法 共研细末，撒敷伤处。

(十四)

处方 陈石灰 500 克 大黄 120 克

制法 有 4 种：（1）二味同炒，至石灰变红色为度，去大黄，筛极细末备用。（2）石灰水浸大黄 3 天，去大黄，取石灰晒干研末。（3）石灰水浸大黄 3~5 天，取大黄晒干研末备用。（4）石灰、大黄炒成桃红色，共研细末备用。

用法 取细末敷患处。

说明 本方源于中医古方桃花散，止血效果甚好，唯各地制法不同，一并选录，提供研究。

(十五)

处方 韭菜根 30 克 童尿 1 杯

用法 将韭菜根捣烂取汁兑童便服，渣敷患处。

说明 此方确有效。

(十六)

处方 陈石灰 150 克 丝瓜叶 30 克 韭菜叶 30 克

用法 共捣烂敷患处。

说明 某卫生院用于临床，证实对静脉、微血管及小动脉出血有较快的止血作用。

(十七)

处方 马尾松 1 把 见血散（飞龙掌血）根适量

用法 如出血不止，用马尾松嚼烂外敷；如出血不多，用见血散嚼烂外敷。

(十八)

处方 蔓苧麻 金鸡尾（乌韭）各适量

用法 捣烂外敷。

说明 某卫生院用本方治三例较严重之外伤出血，止血效果满意。

(十九)

处方 冬青叶 金樱子树嫩尖 金鸡尾（凤尾草） 雷公稿
（山胡椒）叶 桤木叶各等份

用法 嚼烂外敷。

烧、烫 伤

(一)

处方

内服方：大叶金花草（乌韭） 山桂枝（阴香） 虎杖 土大黄
十大功劳叶 光叶海桐各 9~15 克

外洗方：光叶海桐 十大功劳叶 银锁匙（百解藤）

外敷方：生地榆 土黄芩（南天竹） 苦参

用法 先煎服内服方；再以水煎外洗方洗伤面。然后把外敷方

诸药共研细末，加冰片少许，麻油调膏外涂，日数次。

(二)

处方 漆大伯（毛果算盘子）15 克 蛇不过 15 克 金银花 5 克
山黄连（南天竹）5 克

用法 本方可制成洗剂或粉剂外用。

(1) 洗剂：上药用水 1500 毫升，煎成 1000 毫升。外洗和湿敷伤面。

(2) 粉剂：混合研细，蒸汽消毒。取干粉撒布伤面。

说明 本方系某军医院在学习民间用漆大伯治疗漆疮经验，并用以治一例剥脱性皮炎取得疗效后，在原方中加入山黄连，用于治疗烧、烫伤，取得明显效果。据临床资料介绍：

(1) 本方有较明显的抗菌作用。经临床和实验观察，对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、大肠杆菌等都有抑制作用，对绿脓杆菌作用更加明显。已化脓的创面，用湿敷法可使脓液很快消失，伤面变新鲜。

(2) 有较强的收敛作用。湿敷或撒粉后，伤面两天内就变清洁、干燥，同时肿胀也消退。

(3) 有明显的生肌作用。Ⅱ度烧伤伤面上药后，上皮生长较快；严重感染或较深的伤面，湿敷后肉芽生长也很好，给植皮创造了有利条件。

(4) 有一定的止痛作用。

(5) 早期使用有控制或延缓败血症发生的作用。

(三)

处方 陈石灰 5 公斤 生石膏 30 克 艾绒 30 克 纯茶油适量

制法 将生石膏研细混入石灰加井水 7 公斤搅拌，除去悬浮物，

澄 8 分钟。将澄清液与茶油按 1 : 1 的比例相混合，不断搅拌至淡黄糊状（若澄清液不够，可再在前所制的沉淀物中加井水搅拌澄清后继续使用）。上药和匀后，加入艾绒再充分搅匀（若伤面无感染者，可不加艾绒）。

用法 把药液涂于大小适当的纱布上，覆盖伤面。第一天前 6 小时的换药次数，以保持伤面湿润为度。以后 14 小时内换药 7 次，第二天换药 8 次；第三天至痊愈每天换药 2~4 次。用药时应注意：如敷料粘于伤面，不要强行撕揭，可再贴上一层敷药纱布，稍候，即可取下。如伤面出现绿色分泌物时，加强换药即可自行消除。上药后有人会出现短时寒战，但不久即会自愈。

（四）

处方 桐子树（油桐）花 120 克 桐油 500 克

制法 将从桐子树上落下的桐树花（未沾水、干净的）浸在桐油里，存阴凉处，离地 30 厘米高，放数月。

用法 鸭毛开水烫过，蘸桐花油搽伤面，每日数十次，以保持湿润为度。

（五）

处方 雄鸡血

用法 雄鸡断颈取血，用血淋伤面，然后包扎。过两天，鸡血变黑，可不再换药，至痊愈。

（六）

处方 黄连 黄芩 黄柏各等份 冰片少许

用法 前 3 味晒干研细末，加总量五分之一的冰片，用凡士林

调匀。涂患处。

(七)

处方 生石膏 大黄 连翘 儿茶各等份

用法 共研细末过筛，用麻油调药末，每日搽伤面 4~6 次。如伤面有水泡，可用消毒针刺破，排出水液，再涂药。

说明 本方止痛效果好，化脓率低，疗效较快。对于中、小面积Ⅰ、Ⅱ度烧伤的，不管伤面有脓无脓，均可使用。

(八)

处方 脚踏莲（筋骨草）叶 火伤泡（蔷薇莓）叶各适量

用法 捣烂外敷，每日换药 1 次。

说明 本方治烫伤效果较好。以火伤泡根用米泔水磨浓汁频擦，亦可治烫伤。

(九)

处方 黄连 地榆各等份

用法 共研末。用时将药末撒伤面，一日数次。

(十)

处方 煅牡蛎 井内青苔（焙干） 野水鸭毛（烧成灰） 海金沙（焙干）各等份

用法 共研细末，鸭蛋清调涂。愈合慢的可加适量鸡内金、老丝瓜皮、血余炭、柿蒂、乌贼骨、冰片等。

说明 本方可治大面积烧伤。

(十一)

处方 河蚌壳 人乳各适量

用法 将河蚌壳煨成灰，研细，人乳调搽患处 2~3 次即愈。

(十二)

处方 红蚯蚓数条 白糖适量 冰片少许

用法 将蚯蚓洗净，放白糖中，待蚯蚓变黑，白糖溶化后，去蚯蚓残体，加入少许冰片外搽。

说明 本方治中小面积烧、烫伤很有效。有的地方则不用冰片。

(十三)

处方 冬青树皮 90 克 乌泡根皮 60 克 金樱子根皮 30 克

用法 上 3 味均去粗皮，用内皮加水煎成浓汁涂患处。

(十四)

处方 大黄 30 克 黄连 3 克 地榆 120 克 进口苦（苦树）叶 18 克 轻粉 6 克 冰片 1 克

用法 共研细末，麻油调搽。亦可用干药末撒在分泌物较多的伤面上。

说明 本方治烫伤效佳。

(十五)

处方

内服方：

①烧伤 1 号：金银花 甘草 鱼腥草 马齿苋各 30 克

②烧伤 2 号：①方加十大功劳、柴胡各 15 克

③烧伤 3 号：蛇莓 60 克 蒲公英 30 克 柴胡 甘草 金银花各 15 克

④地马合剂：地锦 马鞭草各 500 克

外用方：

①外用 1 号：煅炉甘石 500 克 硼砂 10 克 氯霉素粉 5 克 冰片 9 克

②外用 2 号：煅炉甘石 500 克 硼砂 20 克 白及 400 克 氯霉素粉 10 克 冰片 20 克 血竭 50 克

③外用 4 号：炉甘石 200 克 松香 100 克 冰片 20 克 马齿苋 100 克 甘草 100 克 珍珠母 100 克 草河车 80 克 十大功劳 100 克 丹参 100 克 金银花 100 克

④外用 5 号：丹参 地榆 金银花 白芷各 175 克 十大功劳 200 克 松香 40 克 黄蜡 冰片各 16 克 麻油 1500 毫升

制法

(1) 外用 1 号：上药分研细末，过筛后混合，用瓶储存。

(2) 外用 2 号：先将白及置烤箱中 120°C 2 小时，冷后研细末过筛，同诸药混合瓶储；亦可制成 30% 的麻油混悬液使用。

(3) 外用 4 号：炉甘石用 140 目筛过筛后，置烤箱中， 170°C 加热 3 小时；将珍珠母、丹参、金银花、草河车烘干研末，过 120 目筛，再置烤箱 100°C 加热 3 小时。将冰片、松香分别研细过 120 目筛。然后将上药拌匀即可。

(4) 外用 5 号：将丹参、地榆、银花、白芷、十大功劳与油混合放置一夜，用火熬 1 个半小时（文武火交替，以白芷变焦黄为止），冷至 80°C 以下，纱布过滤，约得液体 800 毫升，再加黄蜡小火溶化搅拌，冷至 70°C 时加松香（先过 120

目筛)搅匀,冷却成膏备用。

用法 内服外用配合使用。

内服:

- ①、②方加水煎成 400 毫升,每次 50~150 毫升,日服 2 次;
- ③方加水煎成 400 毫升,每次 100 毫升,每日 2 次;
- ④方加水煎成 500 毫升,每次 100 毫升,日 2 次(亦可外用以药水棉球洗创面)。

外用:

首先将创面洗净,然后把外用药粉置于纱布袋内,将药粉均匀撒在创面上,行暴露疗法。外用 5 号主要用涂深Ⅱ度或经久不愈的陈旧肉芽创面。

(十六)

(紫草膏)

处方 当归 防风 生地 白芷各 45 克 紫草 150 克 黄丹 1 克 冰片 9 克 麻油 1 公斤 凡士林 2 公斤

制法 先将麻油入锅煮沸,加入当归等前四味药,约熬 10 分钟后,加入紫草(先用温水泡湿后拧干),再熬约 15~20 分钟,以白芷呈淡黄色为度,去药渣过滤,取药液入凡士林溶化。离火待稍冷后加入黄丹、冰片粉末拌匀,冷却即成。

用法 进院后,在纠正休克的同时进行清创。一般用生理盐水或 1/1000 呋喃西林液冲洗伤口 3~4 次,去除已游离之表皮。继用 1/1000 新洁尔灭溶液洗创面。清洗后用紫草膏涂布于棉垫上覆盖创面或直接涂擦创面。感染创面每天换 1 次,清洁创面隔天换 1 次。

全身治疗可酌情进行补液输血及抗生素治疗。较大面积烧伤及创面感染并发全身中毒症状者均内服“三黄汤”加养

阴、生津、健胃的中药。

(十七)

处方 芭蕉树汁（最好是冬季取）30 毫升 新石灰汁 200 毫升
麻油 30 克

制法 将芭蕉树捣烂，用布包绞汁，将新石灰 500 克放入 1 公斤清水里搅动后，泡 10 分钟以上，除掉水面上泡沫与水底沉淀，取出清亮水。另将芭蕉树汁和麻油拌匀，使其混合后，再将石灰清亮水慢慢渗进去，边渗边搅，使其成白色浆糊状膏。

用法 先用银针将水泡刺破，使水流出，再用鸭毛将药膏涂患处，每日 3~4 次。

(十八)

处方 虎杖

用法 晒干研末撒创面。

(十九)

处方 蛇蜕 3 张 血余炭 60 克 生地榆 500 克 煅石膏 240 克 冰片 9 克 桐油 2 公斤

制法 取乱发 1.5 公斤，洗净烘干烧灰 60 克。蛇蜕先用桐油少量炸熔化，然后倒入 2 公斤桐油，待油热，掺入血余炭及地榆、石膏、冰片细末，搅匀、煎沸，离火后冷却成膏，装瓶备用。

用法 局部外涂。伤重者酌情内服消炎败毒药。

(二十)

处方 生地榆 1 个 蜈蚣 4 条 冰片 15 克

制法 生地榆捶成泥状，后二味共研细末，混合后加麻油调匀。

用法 先清洗疮面，然后敷上药适量包扎。初起每天换药 1 次，以后每 3~4 天换药 1 次。治疗期间禁吃生、辣食品。

跌打损伤

(一)

处方 骨碎补 生石膏 大黄各 30 克 红花 茜草 磁石
土鳖虫 自然铜各 15 克 樟脑 9 克

制法 共研细末，过筛备用。

用法 白酒调药敷伤处；如皮肤破裂，关节脱出者均只宜用桐油调敷，日换 1 次。骨折初期，每隔 3 天换药 1 次。敷药后，用纱布绷带包扎固定。

(二)

处方 黄栀子 60 克 川乌 草乌 生姜黄 香附子各 15 克
柑子树叶 30 克

用法 柑子树叶和香附子均用鲜品捣烂，其他药晒干研细末，一起加酒、面粉调和敷伤处。

疗效 治疗 20 例，一般外敷 1~2 次即愈。

(三)

处方 鹅不食草 30 克 土鳖虫 15 克

制法 焙干研成细末，储瓶备用。

用法 每日 2~3 次，每次 3 克，温热甜酒送服。

疗效 治疗跌打损伤腰痛患者 100 多例均有效，对陈旧性腰扭

伤、打伤疼痛亦有一定的疗效。

(四)

处方 接骨木 飞天蜈蚣 合叶三七 见血散各 30 克

制法 共研细末，以 45% 酒精浸泡 7 天后即可用。

用法 用棉球蘸药液揉患处，每天 4~5 次。

(五)

处方 鸭公青 9~25 克

用法 鸭公青根用猪油炒后，水煎服。每天 1 剂。可酌情加续断、骨碎补、凤尾草、金腰带等。外用捣烂敷患处。

疗效 本方治挫伤、扭伤、骨折等 125 例，复查 84 例，治愈 72 例，好转 12 例。

(六)

处方 沙梨树叶 杨柳叶 芭岩散（地构叶） 大散血（银铃花） 小散血（过路黄） 田边菊 鹅不食草

制法 诸药各适量放少许凉水，捣烂取汁，瓶储备用。

用法 先复位，后敷上药，药上放灯草，再以杉树皮固定；每天由灯草处滴入上药汁，每周换药 1 次。

说明 本方用于开放性骨折效果较好。

(七)

处方 紫花地丁 车前草 积雪草 马鞭草 夏枯草 腹水草
延胡草（水苏） 黄瓜香（匍伏堇）各适量

用法 先用金银花、水菖蒲、艾煎水洗患处。复位后将上药捣烂外敷，以杉树皮固定，每天滴入上药汁，每周换药 1 次。

说明 开放性和闭合性骨折均可用。

(八)

处方 芫花根皮 威灵仙根各 1 条

用法 二物结成辫状腰带，系腰部沾人汗气（越久越好），然后取辫带用白酒（童便亦可）磨服 3 克，每天 1 次。

说明 本方主治跌打损伤。

(九)

处方 散血莲（凤丫蕨）根 茜草根 朱砂根各等份

用法 上药用酒磨，搽断骨处。可同时内服“蟹壳存性酒”（将蟹壳焙干研末浸酒中），每日 3~5 次，每次 1 小杯。饭前服。

禁忌 孕妇忌用。

(十)

处方 南瓜蒂 骨碎补 紫花地丁 夏枯草 金钱草 金鸡尾（凤尾草） 金银花 腹水草尖 鸡屎藤 田边菊 山蚂蝗（小槐花）叶各适量

用法 先将南瓜蒂、骨碎补捣烂敷伤口，退硝磺毒 1 夜，然后再将其他 9 味药捣烂外敷伤口。

说明 本方治枪伤，亦可治疗各种炸药伤。

(十一)

处方 了哥王叶 250 克 黄芩 120 克 血竭 冰片各 30 克

制法 先将前 2 味烘干，研成细末，过筛，再与后 2 味混合，瓶装备用。

用法 对断指创面，尽量少用生理盐水冲洗，如污染严重可先

用双氧水冲洗后，再用生理盐水冲洗，拭干，对创面断裂的皮肤肌腱一般不清除，按解剖部位对合断指，间断缝合断指3~4针，再用新火柴盒皮（药皮）包围伤口，在火柴盒皮外敷本方药。再用4块小夹板固定患指。一般3~5天观察1次伤口，如无感染，不需换药；如有感染，可用50%桉叶水冲洗伤口后，将鸡蛋白调本方药外敷，每两天换药一次。还可结合具体情况，做如下辅助治疗：

(1) 用破伤风抗毒素 1500~3000 单位做预防治疗；

(2) 适当应用 5 天左右抗生素，控制感染；

(3) 内服：半枝莲 乌泡刺 路边荆各 15 克 十大功劳 18 克

苏叶 12 克 木通 12 克 水煎，日 1 剂，连服 5~6 剂。

疗效 治疗 8 例不完全离断指，均已接活。其中 7 例无功能障碍，1 例因伤及关节，活动受到影响。

慢性骨髓炎

(一)

处方 炉甘石 500 克 冰片 60 克 雄黄 广丹 白及各 30 克
铜绿 血竭各 15 克

制法 将炉甘石放入炭火烧红的砂罐内，煅红，以童便淬之，冷后研末过筛，加入诸药，共研末备用。

用法 取蜡纸一张，按患处大小用针密刺小孔。然后把适量药末与生猪油和成膏涂在蜡纸小孔上，以有孔的一面贴患处，每两天换 1 次。如已成瘻管者，可用白降丹 15 克，麝香 0.3 克，磺胺粉 60 克和匀，分多次掺入瘻管内，使管壁破坏，创面扩大，脓液容易流出；或用麻油 60 毫升煎沸，加松香 6 克，黄

蜡 60 克，冷后成膏，加磺胺粉适量，取膏涂纱布上敷患处。
说明 有人曾用此方治疗慢性骨髓炎数十例，一般在 1~2 个月内痊愈。

(二)

处方

内服方：猫骨 猪骨 鸡骨 蛇骨 猴骨各 9 克

外用方：破纸伞（去把烧灰）60 克 百草霜 60 克 密陀僧 30 克（共研细末）

用法 以水煎内服方，每日 2 次，连服 7 天，继之用上药煎水兑甜酒服。另外，以蜜调外用药末敷患处，每日 1 次。

(三)

处方 冬青叶 白及各适量

用法 除去患处脓汁和死骨，把上药嚼烂敷患处。

疗效 治疗下肢慢性骨髓炎 3 例，均痊愈。其中 1 例系溆浦县江口风水湾人，左脚腓骨疼痛，穿孔流黄水两年多，敷药 5 次即愈。

(四)

处方 千年老鼠屎（紫背天葵） 紫花地丁 蒲公英 木芙蓉花叶各适量

用法 上药均用鲜者嚼烂外敷患处。

(五)

处方

内服方：石菖菜（商陆）莖 12 克 青木香 6 克 八角莲 3 克

水煎服，每日 1 剂。

外洗方：艾叶适量 食盐少许 水煎洗。

外敷方：乌贼骨（去硬壳） 血余炭 鸡肫皮（焙） 三药共研细末敷伤口。

外纳方：千层楼（千层塔）根（去粗皮） 生半夏 水射干 各适量 共研末纳入疮口一、二次，然后再用收口药。

用法 上四方配合使用。

（六）

处方 黄花倒水莲（吊吊黄） 金银花 野百合 夏枯草 淡竹叶各适量

用法 上药水煎。每日 1 剂。同时以泽兰、煅蚌壳研粉外敷。

颈淋巴结核

（一）

处方 水银 青矾 明矾 牙硝 食盐各 30 克 冰片 9 克 麝香 0.9 克

制法 共研极细末，放入小罐内（不加水），用文火加热熔化至倒立小罐内药物不出为度，按制降丹法制备（时间约 3.5 小时）。

用法 取上药适量，放在光滑的木板上与数十个地古牛（鼠妇虫），少数白饭共捣，做成甘草片大小的丹药与第二方同用。

（二）

处方 麻油 250 克 黄丹 120 克 冰片 6 克 麝香 0.9 克

制法 按一般制膏药法制备。

用法 将第一方丹药适量放在淋巴结核的尖硬处，外敷此膏药即可。

(三)

处方 麻油 250 克 黄丹 120 克 海马 1 个 冰片 红花 白芷 三七 乳没各 1.5 克 麝香 0.3 克

制法 按一般制膏药法制备。

说明 以上三方适用于淋巴结核初期。

(四)

处方 过山虎（大花卫矛）60~90 克 木槿根 白毛藤（白英）各 9 克

用法 水煎。每两日 1 剂。

禁忌 此方峻烈，孕妇禁用。

(五)

处方

内服方：杨桃藤根 500 克 水煎加雄鸡血滴入兑服。

外用方：杨桃藤根 500 克 枇杷树根 500 克捣烂敷患处。

用法 内服外敷结合使用。

(六)

处方 铁板消（小槐花）30 克

用法 煎汤煮鸡蛋，每日 1 次，连服 3~4 次。

(七)

处方 米浆树（笑靥花）根 15 克 梔子 9 克 忍冬藤 30 克

虎刺 9 克 夏枯球 6 克 凤尾草 6 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。连服 2 天后，即单用米浆树根 15 克煮瘦猪肉吃。

(八)

处方 玄参 12 克 贝母 12 克 牡蛎 12 克

制法 将前二味蒸熟，牡蛎煅后醋淬共为末，炼蜜为丸如绿豆大。

用法 每日 3 次，每次服 5 克，饭前开水送服。

(九)

处方 海藻 昆布 乳香 没药 炮甲珠各 45 克 蜗牛 75 克

皂刺 1.5 克 土狗（蝼蛄）50 个

用法 共研细末。每次 3 克，临睡时以开水加白酒少量送服。

禁忌 服药期间禁食鸡蛋、甘草，禁同房。孕妇忌服。

(十)

处方 癞蛤蟆 1 只 鸡蛋 1 个

制法 秋冬之交，取活癞蛤蟆剖开去内脏，置鸡蛋一个缝合于内，清水煮熟。

用法 去壳食蛋，7 天 1 次，连服 3 次。

说明 癞蛤蟆本名蟾蜍，系毒品，切切不可过量。

(十一)

处方 大戟 芫花 甘遂 白芥子 山慈姑 龟板 (炙酥)

七叶一枝花 穿石阳各等份

制法 共研细末过筛，调凡士林或依此膏和匀备用。

用法 加醋或葱汤调外敷。每日或间日换药 1 次。上方加樟脑少许，疗效更佳；上方去白芥子加甘草可治阴疽和无名肿毒坚硬如石者。

禁忌 痈疽疮毒、结核瘰癧已溃；疮疮红肿灼热；皮肤有过敏反应者。

(十二)

处方

内服方：

(1) 山豆根 30 克 夏枯草 15 克 凤凰衣 3 个 薄荷 6 克

(2) 扁豆 120 克 湘曲 60 克 芡实 薏苡仁 莲肉各 30 克 黄豆 270 克

外用方：生地 当归尾 赤芍各 60 克 香白芷 120 克 冰片 1.8 克 麝香 4 克 黄丹 180 克 朱砂适量 黄蜡 白蜡各 120 克 活鲫鱼 1 条 (约 120 克) 猪油 麻油各 250 克

制法

内服 (2) 方：先将黄豆、扁豆炒半熟，和其他药共研细末。

外用方：将猪油、麻油放锅内熬开，放入鲫鱼，炸至枯焦捞出；将黄蜡和白蜡放油内熔化后，将生地、当归尾、白芷、赤芍研极细末倾入搅动，然后放黄丹搅匀，把锅端离火，至温热时放入冰片、麝香、朱砂拌匀成膏。

用法 先内服 (1) 方，每日 1 剂，水煎，连服 3 剂。接服内服

(2) 方，服时将药末入饭米粉子（即饭焙黄后研成粉子）适量，米汤调和煮熟服之，每次 30 克，每日早晚各 1 次。在此同时，以香墨、冰片加入白酒适量捣浓制成针剂，以梅花针蘸针剂刺患处 0.3 厘米深，针后将膏药敷贴患处，每隔 3 天换药 1 次。敷膏药时须注意：淋巴结未穿孔者，在膏药内先撒樟脑 1 克、白胡椒（5 粒）之粉末，再敷上膏药；淋巴结红肿者，只蘸上樟脑后敷上膏药；淋巴结穿孔者，用芫花根白皮放尿内浸 5~7 天，取出去粗皮做成引线，蘸冰片粉末，深插孔内，外留 0.3 厘米长（以便更换时取出），再贴上膏药。引线 3 天换 1 次。

疔 疮

（一）

处方

内服方：乳香 没药（均用陈土炒存性） 四方麻 生地
熟地 花粉 炙黄芪 生黄芪 连翘 鱼腥草 虎耳草
白蜡 黄蜡各 30 克 人中黄 12 克 朱砂 15 克 母丁香
3 克 蜂蜜 250 克

外用方：麝香 0.3 克 冰片 母丁香各 3 克 扫粉 海浮石
水龙骨 象皮 文蛤各 6 克

制法

内服方：上药除黄、白蜡熔化，朱砂、丁香另研外，其他药物共研细末过筛，加入黄白蜡，炼蜜为丸，如黄豆大，再以朱砂、丁香粉末为衣，晒干备用。

外用方：上药共研极细粉末，瓷瓶收储。

用法 内服药每日 2 次，每次 3~5 丸，或 7~9 丸，搗碎，生甘草 30~60 克煎水泡服。同时将少许外用药涂患处（初期可先用五虎白降丹点在疔头上）。

说明 本方系家传，内服药可使毒自内消，外涂可使毒不扩散，内外配合，其效颇佳。

（二）

处方 积雪草 紫花地丁 木芙蓉花 桃叶各 10 克

用法 上药均用鲜品捣烂外敷 1~2 天。

说明 本方适用于疔疮初起未溃者。

疔 痛

（一）

处方

（1）苍耳虫

（2）山苦瓜虫

制法

（1）秋季采捉苍耳虫后，即用麻油浸泡储用，浸泡愈久，疗效愈好。

（2）秋末挖取山苦瓜根块，剥出虫后，泡于食醋中备用。

用法 患处清洁消毒后，取苍耳虫或山苦瓜虫一条敷于疮口和疮口周围，再涂抹浸泡液，用凡士林纱布敷盖，固定包扎。每日换药 1 次，好转后隔日 1 次。

(二)

处方 马鞭草 田皂角各 1 莧 片糖适量

用法 前 2 味各煎数沸，去渣，混合，加片糖。以此代茶，日服 2~3 次。

禁忌 脾胃虚弱者勿服。

(三)

处方 活癩蛤蟆 1 只 雄黄适量

制法 将雄黄灌入癩蛤蟆腹内，以腹满为度，再以绳捆扎如圆墨形，悬屋檐下阴干。

用法 用麻油磨癩蛤蟆取浓汁搽敷，日数次。

说明 本方适用于疔子或无名肿毒未穿溃者。一般 2~3 天即愈。

乳 痛

(一)

处方 矮地茶 金银花 蒲公英各 30 克 红花 9 克

用法 水煎服。每日 1 剂，每剂煎 2 次。

说明 本方用于急性乳腺炎。

(二)

处方 木芙蓉 紫花地丁 酢酱草 田边菊 野菊花各适量

用法 木芙蓉（夏秋采花叶，冬春采根皮），余诸药均采鲜品，洗净，捣烂。先用浓茶或淡盐开水洗患部，将药敷上，保持

湿润。日 1 换。

说明 本方对乳腺炎有显效，亦可治腮腺炎、指疔、痈肿、疮疖和一切化脓性皮肤病。

(三)

处方 公丁 细辛各 60 克 蜂房 120 克 百草霜 60 克

制法 先把蜂房切碎焙黄研细末，再把其余 3 味研细末，混合后瓶储备用。

用法 撒药末 1.5 克～3 克于万应膏上，贴肿处，可自行消散。

说明 本方用于乳痛初起，坚硬肿痛而不红者。

(四)

处方 生半夏 天南星各 10 克 葱白 3 克(以上 3 药以新鲜者为佳)

制法 上药洗净，混合后捣烂如泥，用纱布包好。

用法 放鼻孔下嗅 15 分钟，每日 5～8 次。一般 2～4 天可愈。

急性阑尾炎

(包括阑尾周围脓肿)

(一)

处方 鲜白骨树根 15 克 鲜蛇莓 60～120 克

用法 每天 1～2 剂，水煎，分 2 次服。阑尾脓肿者加皂角刺 9 克；合并局限性或弥漫性腹膜炎者加隔山香 30 克、摇竹消 15 克、广香、桃仁、赤芍各 9 克；病情严重者配合鲜铁扁担根 15 克磨水成浆顿服，或用甘遂末 1 克水冲服。

(二)

处方

外敷方：生大蒜（去皮）120 克 芒硝 30 克 熟大黄粉适量

内服方：白花蛇舌草 田基黄各 30 克 黄芩 大黄各 15 克
岗梅 9 克

用法 外敷配合内服。

外敷：前 2 味共捣烂，外敷腹部患处，两小时后去掉，以熟大黄粉加酱油调成糊状，外敷 6~12 小时。

内服：水煎，每日 1 剂，分 2 次服。阑尾穿孔或阑尾脓肿者加冬瓜子或薏苡仁；恶心呕吐者加竹茹、柿蒂。

说明 外敷法适用于单纯性阑尾炎、化脓性阑尾炎全身情况较好者。外敷的部位以病变部位为中心，稍超过压痛的范围，厚度不低于 1 厘米。外敷药不能直接接触皮肤，必须垫 2~4 层凡士林纱布保护。

(三)

处方 红藤 地丁各 30 克 金银花 连翘各 12 克 乳香 没药各 9 克 玄胡 6 克 大黄 5 克 甘草 6 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

(四)

处方 败酱草 蒲公英各 30 克 薏苡仁 15 克 秦皮 连翘 大黄 皂角刺各 9 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

疗效 对阑尾周围脓肿有显著疗效，一般在服药 3~4 剂后症状好转，体温、白细胞下降，肿块缩小。

肠 梗 阻

处方

(1) 铁扁担 30 克

(2) 甘遂末 1 克 芒硝 大黄各 9 克

用法

(1) 磨成糊状，开水冲服。

(2) 大黄煎水，冲服甘遂、芒硝。

服药后 2~3 小时，用第二次煎药水或温盐水灌肠，以诱导排便。蛔虫性肠梗阻，先用哌嗪驱虫，过 12~24 小时再服上药。

泌尿道感染

处方 鱼腥草 矮地茶 海金沙 车前草（子）各 30 克

用法 水煎。每日 1 剂。

疗效 治疗 12 例，痊愈 6 例，好转 6 例。

说明 本方对急性泌尿道感染效果较好。

胆 石 症

(一)

(利胆排石汤 2 号)

处方

蛇莓 60 克 柴胡 隔山香 十大功劳 茵陈蒿各 30 克 大

黄 15 克（后下）

用法 入院后，口服利胆排石汤 2 号，每天 1~2 剂，服药 2 小时后，用电针刺鸠尾、胆俞（或阳陵泉）30 分钟。然后口服 50% 硫酸镁，15 分钟后肌肉注射“654-2”（脉搏过快者可不使用）。以上用法简称“总攻”。第一个 24 小时内可“总攻”2~3 次，以后根据情况每 1~2 天“总攻”1 次。“总攻”前必须纠正水、电解质及酸碱平衡紊乱。

（二）

处方 白花蛇舌草 茵陈 金钱草各 30 克

用法 水煎。分 2 次服。本方可按中医辨证加减，部分症状严重者可结合输液、抗菌药物及对症治疗。

（三）

处方 翠云草 虎杖 蒲公英 黄芩 黄柏 广香 枳壳 茵陈 凤尾草 柴胡各 500 克 大黄 郁金各 250 克 赭石 150 克

制法 上药共煮 3 次，约为 15000 毫升，再浓缩成 8000 毫升，以瓶分装高压消毒后备用。

用法 每次服 20~30 毫升，每日 3 次。

（四）

处方 郁金 6 克 白矾 5 克 火硝 1.8 克 滑石 9 克 甘草 3 克

制法 上药共研极细末，瓷瓶储。

用法 上药共分 3 次服，日服 1 次，温开水送服。

禁忌 有肺结核者勿用。

血栓闭塞性脉管炎

处方

内服方：

(1) 金银花 玄参 薏苡仁各 30 克 当归 25 克 牛膝

红花各 9 克 甘草 12 克

(2) 千斤拔 1 公斤 白酒 10 公斤

外用方：

木芙蓉叶 野菊花 白蔹 马鞭草 牛蒡子（全草）各 30

克 紫花地丁 18 克 当归 白芷 知母各 15 克 地榆

25 克 黄柏 15 克 儿茶 龙骨 青黛各 12 克 乳香

没药各 18 克 血竭 15 克 扫粉 9 克 红粉 3 克 铅

粉 黄蜡各 30 克 白蜡 45 克

制法

外用方：用麻油 1 公斤浸泡前 11 味，5 天后，用火熬至药枯，去渣，滴水成珠，下黄、白蜡，待油成凝固状，再将儿茶、龙骨、乳香、没药、血竭、青黛、扫粉、红粉、铅粉等药研成粉末，下入搅匀，即成药膏。

用法 内服配合外用。

内服：(1)、(2) 两方同时服用。(1) 方水煎，每天 1 剂，分 2 次服；(2) 方浸泡 1 周后每日 3 次，每次 15~20 毫升。

外用：纱布棉垫涂药膏敷之。一般每天换药 1 次，脓液过多者，每天换药 2 次。

皮肤慢性溃疡

(一)

处方 枯矾 乌贼骨 冰片 地锦 夜关门 木芙蓉叶各适量

制法 将枯矾 乌贼骨 冰片研极细末，地锦、夜关门、木芙蓉叶三味中任选一味晒干研末和上三味研匀，瓶装密封。

用法 用淡盐水或明矾水清洁创面后，再用药末适量撒敷。夏天每日换药 1 次，冬天间隔 2~3 天换药 1 次。外用消毒纱布包扎。如果创面红肿疼痛，则先用木芙蓉花叶或鲜犁头草捣烂涂敷，拔除脓毒，再敷药末。

(二)

处方 龙骨 寒水石（煨）各 3 克 炉甘石 玉竹各 4.5 克
象皮 6 克 冰片 0.3 克 蛇蜕 白蜡各 1.5 克

用法 共研细末，干撒新肉上，外包以纱布，日换 1 次。

疗效 本方用于手术后伤面溃疡，久不愈合，一般撒 3 次即生效，屡试不爽。

(三)

处方 蛇皮 麻油

制法 蛇皮用火焙干，研成细粉末后用小麻油调成糊状备用。

用法 创面消毒后，敷药，纱布覆盖，1~2 天换药 1 次。

荨 麻 疹

(一)

处方 赭石 15 克 青壳鸭蛋 2 个 冰糖 30 克

用法 水煎。日服 1 次，以 3~5 次为 1 疗程。

禁忌 虾、蟹。

(二)

处方 玉兰花 1 朵 鸡蛋 2 个

用法 将鲜玉兰花切碎，与鸡蛋混合，用茶油煎食。

(三)

处方 桂枝 8 克 白芍 6 克 麻黄 6 克 苦杏仁 6 克 甘草 5 克 生姜 3 片 大枣 3 枚

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。

说明 此方乃《伤寒论》桂枝麻黄各半汤，用治荨麻疹，疗效可靠。

湿 疹

(一)

处方 滑石 虎杖各 12 克 石膏（煨）9 克 炉甘石（煨）6 克
冰片 3 克 氯霉素 1 克 强的松 25 毫克 凡士林 30~40 克

制法 研极细末，和凡士林配成软膏。

用法 每日涂 1 次。

(二)

处方 百草霜 50 克

用法 以沸水泡药，澄清，用鹅毛蘸百草霜水涂洗，每日 3 次。

(三)

处方 松香 6 克 铅粉 3 克 冰片 1 克

用法 研细末，用桐油调擦。

说明 本方屡试屡验，取效甚捷。

冻 疮

(一)

处方 生地 地榆 紫草 归尾 黄柏各 150 克 甘草 90 克
冰片 黄蜡 白蜡各 60 克 麻油 2.5 公斤

制法 将麻油熬开，前六味倒入油内熬焦，用纱布滤去药渣，放入黄蜡、白蜡搅溶，稍凉后再放冰片搅匀，放瓷罐内备用。

用法 外涂患处，每日 2 次。

说明 一般只需用 3~4 次即可愈。本药膏对烫伤亦有较好效果。

(二)

处方 大戟 芫花各 12 克 甘草 8 克

用法 水煎，乘热洗患处，洗过后用生姜频擦，每日 2 次。

说明 本方适应于冻疮未溃期。

(三)

处方 蜂蜜 50 克 生猪油 100 克

制法 二味调和拌匀。

用法 外涂患处，每日数次。

说明 本方适应于冻疮溃烂期。亦可用黄柏 20 克、白及 7 克共研细末，麻油调涂患处。

(四)

处方 猪脚指甲 120 克 桐油 1 公斤 广丹 120 克 白及 120 克（研细） 松香 1 公斤 樟脑少许

制法 先将桐油煮沸，放猪脚指甲煎枯，取出研细，入松香熬至滴水成珠，再入猪脚指甲细末、白及末调匀，入广丹、樟脑即成。

用法 用时烤熔滴入皲裂内。每日 2 次。

漆 疮

处方 贯众 白前各 60 克 桑枝 黄柏各 15 克

用法 水煎服，每日 1 剂。药渣加水再煎洗浴。

说明 本方为宁乡县城关镇医院刘晓明祖传秘方。湖南省中医药研究所詹永康医师用此方治疗 120 多例，一般 2 剂痊愈，个别患者服至 5 剂痊愈。

神经性皮炎

(一)

处方 斑蝥 150 克 通草 150 克 硼砂 300 克

制法 将斑蝥用 95% 酒精 1000 毫升浸泡 3 天左右；将通草和硼砂加水约 3000 毫升煎至 2000 毫升。两种液体按 1 : 1 和 2 : 1 配制即成。

用法 根据患部皮肤角化的程度，选择不同比例的药水外洗，每日 3 次。

疗效 治疗 23 例，21 例痊愈，2 例有效。此外，本方对各类癣病（除头癣）、阴囊湿疹均有显效。如龚××，男，55 岁。两下肢及胸窝部患神经性皮炎达 8 年之久，奇痒难忍，多方医治无效。经用浓度为 2 : 1 的本方及单纯性斑蝥浸液外搽，5 天后复诊时患处已愈 60%，奇痒显著减轻，再用本方 2 次即愈，至今未复发。

(二)

处方 密陀僧 乌贼骨 雄黄各 1 份 枯矾半份

制法 共研极细末，用凡士林调成 60% 的软膏，装瓶备用。

用法 先用温开水洗净患处，将少许药膏搓揉患处，再在患处涂一层药膏。

说明 此药膏治神经性皮炎有显效。亦可治铜钱癣。

稻 农 皮 炎

【预防用药】

(一)

处方 凡士林 500 克 松香 雄黄粉各 90 克 樟脑 60 克

制法 将凡士林加温熔化，入松香粉末不断搅匀，待松香完全熔化后，离火降温至 40~50℃，再投入雄黄、樟脑充分搅拌，在冷凝中，温度越降，搅拌越勤，以雄黄、樟脑不沉淀为止。

用法 下水田前，涂手脚，上、下午各 1 次。

(二)

处方 蛇不过根 45 克 石菖蒲根 30 克

用法 煎水洗手足。

(三)

处方 韭菜汁 桐油

用法 任选一药，下水前搽手脚。

【治疗用药】

(一)

处方 石膏 2 份 硫磺 1 份 明矾 4 份 聋桐树叶 1 份

制法 分别研细末，混合瓶装备用。

用法 每晚睡前洗净患处，撒下药末，轻轻揉擦，使之粘合。

疗效 治疗 160 例，大多数只用药 1~2 次，局部渗液减少，肿胀消退，结痂而愈。少数用药 3~4 次而愈，效果满意。

(二)

处方 苦楝根皮 九里光各 2500 克 旱烟杆 250 克 号筒杆
(全草) 5000 克 大柳树叶枝 2500 克

制法 上药加水 50 公斤，煎至 10 公斤，过滤备用。

用法 擦患处。

(三)

处方 盐肤木 蛇床子各 30 克

用法 煎水洗。每日 2 次。

(四)

处方 明矾 茶叶各 60~90 克

用法 煎水洗。每日 2 次。

(五)

处方 浮萍 地肤子 苍耳子各 60 克

用法 煎水洗。每日 2 次。

牛 皮 癣

(一)

处方

内服方：生首乌 30 克 土茯苓 15 克 蓖麻 蝉蜕 僵虫

苦参 甘草 桃仁各 9 克 乌梢蛇 15 克

外用方(皮新 6 号药水)：紫草 石榴皮 喜树子 菝葜 补

骨脂 羊蹄 苦参各 250 克

用法 内服外搽配合。

内服方：水煎服，每日 1 剂。

外用方：上药混合，用 95% 酒精 2500 毫升浸泡 10 天后外擦患处。

说明 控制牛皮癣有一定疗效。

(二)

处方

内服方：花椒（根、叶）120 克 包金七层楼（多头苦苣菜）120 克

外用方：蜈蚣（烧灰） 明矾各 9 克 黑砂 白芷 寒水石各 6 克 花椒 黄柏 冰片各 3 克 樟脑 15 克

用法 内服、外洗、外擦同用。

内服方：水煎，第一次内服，第二次外洗。两天 1 剂。

外用方：白芷、花椒、黄柏焙枯与其他药共研细末，麻油调匀，擦患处。

禁忌 酸腥、发物。

(三)

处方 生巴豆（去壳）30 克 雄黄 15 克

用法 共研成半糊状擦患处，擦后可起小疱，待小疱萎退后，第二次擦痒处，一般 2 次可愈。

禁忌 忌涂于正常皮肤上。

皮 肤 癌

处方 五虎丹：水银 白矾 牙硝各 180 克 青矾 食盐各 90 克

制法 上药在乳钵内共研至不见水银珠为度，放入炼铜砂罐内加温，蒸发水分，使成“丹胎”。然后将砂罐倒置于一瓷碗内，盐水石膏封口，盛放入荷叶水缸口上，缸内盛水约 10 公斤，罐上放炭火约 2 小时，瓷碗冷却后取丹，以白色结晶为佳。

用法

- (1) 糊剂：将五虎丹结晶研成粉末，用浆糊调，视癌大小粘涂，一次粘涂面积不宜过大，应分次进行。
- (2) 钉剂：将五虎丹结晶粉末，加入少量蟾酥、红娘、斑蝥，用米饭搓成钉状，阴干备用（无红娘时，只用斑蝥亦可。每根钉直径约 2~3 毫米，长约 2~3 厘米，视肿瘤大小一次嵌入 1~6 根。隆突较高的肿瘤可插其基根部，致使大块坏死脱落。癌组织经用五虎丹腐蚀脱落，遗留之创面，改用红升丹撒之，每 2 天 1 次，直到收口为止。五虎丹、红升丹换药均应敷贴普通外科膏药，密闭创口。

狐 臭

(一)

处方 大蜘蛛 2 个 冰片 2 克

用法 黄泥裹蜘蛛烧熟去泥，和冰片研细末，调擦腋下。

(二)

处方 黄连 15 克 石炭酸 25 毫升 普鲁卡因 25 克

制法 取生理盐水 975 毫升，加上药，搅拌过滤分装，10 磅高压灭菌备用。

用法 双腋窝用碘酒、酒精消毒，用 7 号针在腋毛区皮下组织缓慢注入上药 15~20 毫升（注射时要先做普鲁卡因皮试，还要注意回血，勿将药液注入血管内）。

汗 斑

处方 密陀僧 硫磺各 9 克 花椒 5 克 海螵蛸 3 克 水银 5 克

制法 前 4 味共研细末，再加水银研。

用法 生姜切片，蘸药擦患处，每日 3 次。

毒 蛇 咬 伤

(一)

处方 毛茛藨

用法

(1) 局部处理

先扩创排毒：清洗伤口，然后用三棱针或手术刀以牙痕为中心行“米”字形扩创，以利毒排出（但对五步蛇咬伤患者不用此法）。

再敷药解毒：将鲜“毛茛藨”捣烂调敷伤口周围，解除局

部组织中的余毒以预防感染（此法仅用于煎服法治疗的部分病例）。

（2）具体方法

煎服法：轻、中型患者，每日煎服干毛茛藜30～50克，分2次服；重型、危重型患者，每日煎服干毛茛藜50～60克，分2次服，待病情好转后，酌减用量。

肌内注射法：轻、中型患者，肌内注射毛茛藜注射剂2毫升×1支（含生药20克/次），每日2次；重型和危重型患者，每日肌内注射增至4～6次。首次剂量酌加，小儿剂量酌减。

（二）

处方 （百步丹）

（1）△半边莲 △地耳草 △叶下珠 △犁头草 瓜子金
犁头角 合百草 七叶一枝花 毛瓜 矮地茶根 一枝黄花 鹅不食草各100～200克鲜药（本方主要用于解蛇毒）

（2）△积雪草 △满天星 海蚌含珠 狗牙半枝莲 野菊花
白花蛇舌草 苦胆草 大青叶 四方马兰 小金钱草各50～100克（本方主要用于清热、消炎、止痛）

（3）△矮桃草 △丁癸草 奶浆草 叫子草 一把针 鸭跖草 水杨柳 车前草 扁蓄 水灯草 海金沙各50～100克（本方主要用于利尿、消肿）

（4）△伏地草 △乌柏叶 △盐肤木叶 △天花粉
蛇不过 土牛膝 田皂角 旱莲草各50～100克（本方主要用于通经、活络、消肿）

用法 以上各方因地制宜采取1～2种（每方应有1～2味主药，

共 4~8 种) 鲜品即可。采取后, 用清水洗净、捣烂, 加冷开水适量, 反复捣汁, 共约 500~1000 毫升, 加雄黄 9 克、白酒适量, 混合均匀, 将药汁分成两等份, 一份加糖适量内服, 每天 1 剂, 分 2 次服; 一份不加糖外敷伤口。敷伤口时, 按一般清洗、扩创、排毒处理后, 用纱布浸渍药汁围敷肿痛以上 7~10 厘米处(近心端), 松紧适宜。应保持纱布湿润, 时将药汁浇涂纱布上。伤口任其暴露, 如伤口闭合, 应用三棱针或小刀片作“—”或“×”形开口, 以利排毒, 但开口又不宜过深, 以免伤及血管, 出血不止。

此外, 还应根据不同情况, 加用药物:

如出现头昏、视力模糊、瞳孔缩小等神经中毒症状者, 加蜈蚣 3 条、白芷 15 克, 共研细末或煎汁兑入;

如伤口出血不止, 全身出现瘀斑, 甚至口鼻出血者, 加白茅根、侧柏叶、仙鹤草, 或旱莲草鲜品捣烂取汁兑入;

如出现顽固性肿胀者, 用石菖蒲、盐肤木各 60 克。青木香、乌柏根皮各 30 克, 共捣烂取汁兑入, 并可乘热熏洗肿处;

如长期溃烂不收口者, 用九里光、蛇不过各等量煎水, 每天洗 1 次伤口, 并用纱布浸药汁湿敷。待长新肉芽时, 用红升丹、轻粉各 1 克、青黛 4.5 克、鸡内金 6 克、飞甘石 15 克、熟石膏 15 克, 共研细末撒伤口上;

如高烧不退, 加龙胆草、土柴胡水煎服;

如恶寒战抖者, 加马鞭草、黄荆叶各 30 克共捣烂取汁或水煎服;

如二便不通者, 加车前草、海金沙、水灯草、生石膏、大黄各适量, 水煎服;

如呕吐不止者, 加姜半夏 12 克、灶心土 60 克水煎服;

如起水泡者, 用天泡草、薜荔捣汁点水泡上, 或用蛇莓 30 克

捣汁，一半内服，一半涂泡上；

如上肿至胸腹部，或头、胸背部被咬伤者，应以内服为主，加重方（3）剂量，使毒从小便出。还可将纱布浸药汁敷伤处末端，以加速肿的消退。

说明 处方中凡标△者，是在治疗过程中使用机会最多、最常用的药。

（三）

处方 白醋 300 毫升 五灵脂 15 克 雄黄 7.5 克 白酒 60 毫升

用法 白醋内服，五灵脂、雄黄和白酒冲服，然后用雄黄外敷伤口周围。

说明 本方具有防止蛇毒扩散和蛇毒攻心的作用。

（四）

处方 九斤花 九斤角 水菖蒲 土细辛 八角莲 岩丸子
血蜈蚣 雄黄连 七叶一枝花 青木香各 9 克 四两麻 3 克

用法 晒干研末。每次一汤匙加烟油（即烟斗水）调服；亦可用醋调药末外敷。

说明 本方治各种毒蛇咬伤。

（五）

处方 山苦瓜 九龙胆 七叶一枝花 黄疸草 半边莲 青木香
蛇不过 隔山消各等份

用法 各药均取鲜品捣烂外敷。

说明 本方治各种毒蛇咬伤。

(六)

处方 山苦瓜(王瓜) 童尿

制法 把山苦瓜先放童尿内浸泡七昼夜,再放瓦屋上露七昼夜,备用。

用法 嚼烂敷伤处。

说明 此方治好毒蛇咬伤 300 多例,各地均反映效果良好,似为治毒蛇咬伤的首选方。

(七)

处方 金银花叶 蛇莓 母野烟叶各适量

用法 上药取鲜品,加少许凉水捣烂取汁。从近心端向伤口处抹,每日 5 次。如出现肿大难消者,先用瓦针刺伤出血;如出现全身症状者,则内服药汁半碗,同时外抹。

疗效 某草医治疗 1000 多例,无一例失败。

(八)

处方

内服方:九牛子 三叶拿 竹叶姜(山姜)各 9 克 山豆根 30 克

外用方:南蛇吐剑(虎掌) 雄黄

用法 内服与外用配合。

内服方:诸药研末水煎兑酒服。每日 3 次,每次 6 克。

外用方:捣烂敷伤口。

(九)

处方 七叶一枝花 七叶黄荆(牡荆)

用法 二药各取鲜品适量捣烂外敷，亦可单用七叶一枝花 9 克点米泔水磨浓汁内服。

(十)

处方 半边莲 30 克

用法 口嚼外敷，亦可用水煎内服。

说明 民谣：“家有半边莲，可以伴蛇眠”，说明本药治蛇咬伤是有一定的实践基础。

(十一)

处方 一枝箭（杏香兔耳风）15 克 七叶一枝花 15 克

用法 水煎内服，亦可嚼敷伤口。

(十二)

处方 帽子苞（蔷薇莓） 路边荆各适量

用法 上药捣烂用二道淘米水浸，浸汁少许内服，然后用浸汁由上向下擦伤肢，最后以药渣敷之。

说明 本方对各种毒蛇咬伤均有效，反复用 3、4 次即愈。

(十三)

处方 雄黄适量 大蒜 3 株

用法 捣烂内服。

说明 本方适用于蛇毒攻心者。

(十四)

处方 鸭跖草 60 克

用法 鲜草揉水兑白糖适量内服。

说明 本方适用于蛇咬伤吐血者。

(十五)

处方 鹅不食草 60 克

用法 捣汁，撬开牙齿灌服。

说明 本方适用于蛇毒封喉，不能进食者。

(十六)

处方 细叶金鸡尾（乌韭） 小血藤（南五味子）叶 岗梅
金樱子叶各 30 克

用法 上药均用鲜品捣烂敷患处。

说明 本方适用于蛇咬伤后伤口感染者。

狂 犬 咬 伤

处方

内服方：

(1) 鲜紫竹根 120 克 生地榆 飞滑石 党参各 15 克 射干 生地 银花各 12 克 鲜白茅根 60 克 甘草 柴胡 赤芍 酒大黄 杏仁各 9 克 琥珀 1.5 克 斑蝥 3 个（虫蛀者不用，去头足翅，糯米两调羹同炒至米黄为度，去米）

(2) 鲜万年青叶 30 克

(3) 大黄 9 克 活土鳖 8 个 桃仁 6 克 杏仁 4.5 克

外用方：犁头草 半边莲 金疮小草 车前草 土牛膝叶 木芙蓉叶 天葵草（全草）各适量

用法

内服方：

方(1)：水煎，分6次服，两天1剂，连服3~8剂。

方(2)：水煎，分2次服，每日1剂，连服4剂；也可以同方(1)交替使用。

方(3)：诸药一同捣烂，加入清水100毫升，用瓦罐煎至60毫升后，用洁净纱布过滤，取汁。将上药煎好过滤的药汁调入适量蜂蜜顿服。服后，大便中如未泻出污秽物，再服1~2剂，至泻出污秽物为止。

外用方：诸药均用鲜者捣烂。先用浓茶水或甘草煎水冲洗伤口再敷药，每日换1次。外敷药中，加入鲜八角枫叶、吴茱萸叶同捣烂，以防止破伤风。

疗效 治疗14例，其中经外用方治疗者9例；内服方者5例，均控制了发病。

蜈蚣咬伤

(一)

处方 鲜红辣蓼草1把

用法 洗净，捣烂涂敷伤口，并用该药从咬伤部位上方向伤口处搓揉。

疗效 经用此方治疗20余例均获显效。

(二)

处方 癞蛤蟆1个

用法 腹部剖开，不要破胆，敷患处。

四、妇 科 疾 病

血 崩

(一)

处方 蚕沙

用法 炒炭存性，每次用9克，以适量黄酒兑服。

禁忌 生冷。

(二)

处方 陈棕皮 头皮

用法 二味适量，烧灰兑酒服。

(三)

处方 百草霜30克 乌贼骨60克 鸡蛋2个

用法 鸡蛋搅碎，加入百草霜同煮，去药渣，再入乌贼骨研细末兑服。

(四)

处方 百草霜9克 陈精制墨（磨浓汁）1酒杯 海螵蛸（炒黄）9克 当归9克 生地30克 贯众炭15克

用法 水煎调红砂糖服1茶盅，每日3次。

白 带

(一)

处方 当归 川芎 柴胡 杜仲 广皮 鸡血藤各 9 克 木通
菊花 五加皮各 12 克 通草 3 克 肉桂 1.5 克 甘草 6
克 生姜 3 片

用法 水煎服，每日 1 剂。赤白带下加鸡冠花 蒙花 木槿花。

说明 本方在慈利县江垭区一带民间流传已近百年，对赤白带下、腰痛者疗效显著。

(二)

处方 蛇床子 90 克 五味子 雄黄各 60 克 海螵蛸 枯矾各
30 克

用法 共研细末，每次用 3 克，用消毒纱布分裹成小团，塞入
阴道，3 天更换 1 次，连用 2、3 次即愈。外用艾叶煎水，每
晚洗 1 次，连洗 7 晚。

葡 萄 胎

处方 五灵脂 12 克 生蒲黄 9 克 水蛭 2 条 蜈蚣 1 条 党
参 24 克 白术 9 克 茯苓 9 克 甘草 6 克 当归 15 克 川
芎 6 克 白芍 12 克 熟地 12 克

用法 水煎，分 2 次服。气血虚甚者，先以归脾汤健心脾，待
气血充足时再攻；瘀积过甚者，先以桃红四物汤合失笑散化
瘀。一般服上方 3~5 剂后，即可排出囊状葡萄物，而后继服

归脾汤加熟地 15 克、枸杞 9 克调理善后。

胎 动 不 安

(一)

处方 陈南瓜蒂 3 个 鲜苧麻根 90 克 陈紫苏莢 15 克 陈艾叶 10 克 鸡蛋 3 个

用法 将南瓜蒂（亦可用陈莲蓬蒂）切片炒香，和其他药物连同鸡蛋一起水煮，去药渣取汁约 450 毫升，每日 1 剂，分 3 次服，蛋同食，连服 2~3 剂。不发热、不烦渴、常呕吐清水者，加伏龙肝 60 克；胃热呕吐者加竹茹 9 克。

(二)

处方 炙黄芪 12 克 党参 炒白术、熟地、续断各 9 克 白芍 6 克 川芎 砂仁 黄芩各 3 克 甘草 5 克 糯米 1 勺

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服，连服 3~5 天。

说明 本方既治胎动不安，亦治习惯性流产，屡用皆效。

脱 脐

(一)

处方 矮地茶 白及 枯矾各等份

制法 研细末，混匀，高压消毒备用。

用法 婴儿出生 6 小时后，将脐带平脐轮剪断，敷上药粉。

疗效 使用 1045 例，无一例发生出血、感染或其他并发症。

(二)

处方 枯矾 槐花各等份

制法 共研细末，瓶装加盖，高压消毒（保持 15 分钟）后备用。

用法 新生儿出生后，用止血钳紧靠脐轮处压挫脐带 3~5 分钟，然后于压挫处剪断，并剪除全部白色胶质，用 5% 碘酒消毒，撒上断脐粉末，覆盖无菌纱布加压包扎。观察 1 小时，如有渗血者，再加适量药粉；如脐带残留过长，再将脐轮重剪，撒药包扎。

疗效 共用 125 例，无 1 例出血，脐轮回缩良好，残端干燥，没有感染，操作简便，不需换药，能提前出院。

说明 对有出血素质产妇之新生儿和脐带太粗者忌用；对高血压产妇之新生儿及严重窒息的新生儿慎用。

子宫颈糜烂

处方 黄柏 地榆 儿茶 白芷 甘草 冰片各等份

制法 上药烘干共研成粉末，经高压消毒后瓶装备用。

用法 每日用新洁尔灭冲洗阴道后上药 1 次，将药粉喷布于宫口，或用棉球沾药粉后塞入宫颈口，每日换药 1 次。

滴虫性阴道炎

(一)

(苦虎灭滴膏)

处方 苦楝子粉 100 克 虎杖粉 100 克 虎杖浓缩液 500 毫升
桐油 300 毫升

制法 苦楝子去核、烘干、研粉过筛；虎杖根洗净、切碎、烘干、研粉过筛；再取鲜虎杖根 5 公斤，切碎，加水煎熬 3 次，直至虎杖煎烂为止，3 次煎液混合，再煎熬浓缩至 500 毫升。将苦楝子粉和虎杖粉加入虎杖浓缩液中调匀，再加桐油 300 毫升，调成糊状即成。

用法 用消毒干棉球抹净阴道内白带，再用棉球蘸虎杖根浓缩液反复涂抹阴道壁、穹窿及外阴后，以长棉签蘸浓缩液涂宫颈管。然后取苦虎灭滴膏约 20 毫升，放入阴道内，最后在阴道内放置一带线尾的阴道塞以防灭滴膏流出。2 天后患者可自行拔掉，7~10 天后复查。病程长、久治不愈者，每 4~5 天上药 1 次，连续 2~3 次。每次月经干净后需复查 1 次，连续复查 3 个月。复查后上药 1 次，以求根治。

(二)

(双百灭滴净)

处方 百部 500 克 95% 农用敌百虫 10 克 (或畜用敌百虫 20 片)

制法 将百部加水 2500 毫升煎熬，去渣过滤后得药液 1000 毫升，冷却后加入敌百虫，再加酒精 50 毫升防腐，摇匀后密封

保存备用。

用法 首次上药时，将 50 厘米长、7 厘米宽的消毒纱布条浸透药液，填满阴道，保留一夜。另将重 1.5 克的带线消毒纱球 4 个装入自备瓶内，倒入药液浸透纱球，嘱患者每晚睡前坐浴后，自塞一个纱球于阴道后穹窿部，线头留在外面，以便次日取出，连续 5 天为 1 疗程。

疗效 观察 100 例，均只 1~3 个疗程痊愈。

(三)

处方 鸦胆子 20 粒

制法 将药放入 100 毫升水中，用砂罐煎成约 20 毫升备用。

用法 每次取 20 毫升，用注射器套上导尿管注入阴道内，每日 1 次。

疗效 治疗 6 例，经 2~3 次用药即愈，随访 1 年多未见复发。

(四)

处方 九里光

制法 将九里光全草洗净切碎，煮沸 2 次，再将这 2 次液体用文火浓缩成 1:1 (即 500 克药最后煮成 500 毫升药液)。

用法 以清水洗净阴道后，用带线尾的棉花纱布塞蘸药放入阴道内，24 小时后自行取出。滴虫多者还可先用棉签或棉花涂药，抹洗阴道壁，再放纱布塞。5 次为 1 疗程，隔日 1 次，月经期暂停治疗。

疗效 治疗 120 例，痊愈 99 例，占 82.5%；好转 15 例，占 12.5%；复发 6 例，占 5%。有效率为 95%。

(五)

处方 蛇床子 60 克 雄黄 9 克 枯矾 3 克

用法 水煎，洗外阴部，每日 1~2 次。

(六)

处方 猪肝

用法 将猪肝蒸熟，削成条状，在一端钻数孔，另一端用线扎好。晚上将钻孔的一端先塞入阴道，白天取出。

说明 阴道内滴虫为猪肝香味所诱而钻附猪肝孔中，白天掉出，即可将滴虫逐步消灭，数次可愈。

(七)

处方 雄黄 1.5 克 桃仁 30 克

用法 捣烂和匀做条，塞入阴道。

五、儿 科 疾 病

惊 厥

(一)

(熄风止惊汤)

处方 当归 15 克 白芍 6 克 全蝎 1.5 克 蝉衣 1.5 克 钩藤 4 克 熟地 6 克 川芎 3 克 蜈蚣 1 条 菊花 6 克 甘草 3 克

用法 水煎服，每日 1 剂。临床症状消失后，再服 2~3 剂以巩固疗效。

说明 经临床 30 例初步观察，本方对婴儿手足搐搦症、高烧惊厥及癎病惊厥均有较好的疗效。

(二)

处方 地龙 7 条 生姜 4.5 克 鲜葛根 30 克

用法 活地龙洗净，与其他 2 味一起捶烂，用开水泡汁，纱布过滤，服药汁。

小 儿 肺 炎

处方 癩蛤蟆 2 只

用法 上药洗净置桶内，用冷水浸 8 分钟。先取一只抹干，将癩蛤蟆肚皮覆盖于患儿剑突下（心窝部），使其头朝上，用手扶住或纱布固定约 15 分钟后，癩蛤蟆周身灼热时取下放置桶内，另换一只如前法敷于小儿剑突下。如此每隔 15 分钟轮换 1 次，连续 1~2 小时，重症可连敷 3 小时以上。

百 日 咳

（一）

处方 白蜡树茎根 4 公斤 鱼腥草 1 公斤 白茅根 1.5 公斤
土冬花 1 公斤 甘草 1.5 公斤

制法 上药共洗净切碎，加水 5000 毫升，煎 2 小时，取出药液再煎一次，将两次药液合并浓缩至 2000 毫升，加入防腐剂备用（如无土冬花，以枇杷叶代）。

用法 1 岁以内每次 5 毫升，5 岁以上每次 10 毫升，15 岁以上每次 15~20 毫升。每日 3 次，连服 3~5 天。

疗效 共治疗 58 例，治愈 38 例，好转 15 例，无效 5 例（其中 3 例并发肺炎）。

（二）

处方 黄豆 90 克 车前草 30 克 陈茶叶 30 克 冰糖 30 克

用法 以水 1000 毫升先熬前三味，熬至 500 毫升时，滤去渣纳入冰糖溶化。分 6 次服，每隔 3 小时 1 次，连服 7 天。

（三）

处方 蛭干 15 克

用法 加水适量蒸，连汤服之。

说明 蛭干本为滋补食品，味道鲜美，小儿喜食。唯百日咳初起不宜用。

腮 腺 炎

(一)

处方 鱼腥草 犁嘴草 车前草各 30~60 克

用法 水煎服，每日 1 剂。红肿严重者，另用鱼腥草、蒲公英鲜品适量捣烂外敷，每日换药 1 次。

疗效 治疗 135 例，资料完整者 45 例，痊愈 39 例，占 86.6%；好转 6 例，占 13.4%。对有密切接触者，采用本方预防，服药后，均未发病。

(二)

处方 马兰（全草） 山苦瓜根各等份

制法 研极细末，用凡士林配制成 30%~50% 软膏。

用法 外敷患处，每日换药 1 次。

疗效 治疗 116 例，全部有效。平均 2~3 天治愈。

(三)

处方 黄柏 黄芩各 12 克 毛茛 9 克

用法 共研细末，调鸡蛋清涂患处。

小 儿 腹 泻

(一)

处方 地锦 45 克 青木香 9 克 甘草 9 克

用法 水煎成 100 毫升。小于 3 岁者，每次 10 毫升；大于 3 岁者，每次 15 毫升，每日服 3 次。

疗效 治疗小儿腹泻 300 例，有效率 89.7%，尤其对急性肠炎有显著疗效。

(二)

处方 生姜 1.5 克 葛根 3 克 海蚌含珠 2 克

制法 研成粉剂。

用法 开水冲服。每日 3 次，连服 7~10 天。

(三)

处方 陈米适量 艾绒 1 丸 胡椒 7 粒(研末) 酒药饼 1 个

用法 先将米放瓦罐内煮熟捣烂，再入后三味合捣成饼敷肚脐。

蚕 豆 黄

处方 当归 生地各 15 克 白芍 9 克 白茅根 仙鹤草各 30 克 藕节 9 克 大枣 5 枚 马尾松针适量

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

疳 积

(一)

处方 雷丸（去黑皮） 石燕（刮去尘土炭火煨醋淬7次） 川椒·蒺藜（炒去节刺） 使君肉 木贼 石蟹（制法同石燕） 文蛤（炒）各30克

用法 共研细末。每次用药末3~6克加于鸡肝（猪肝亦可）内蒸服。或用上药末与猪肝粉和匀，开水冲服。

禁忌 香咸食物。

(二)

处方 榧子 木鳖各30克 夜明砂60克

制法 分别炒枯至黑褐色为度，然后研末过细筛，瓶装密封。

用法 以药末3克蒸不沾水的鸡肝（雄鸡较好。未阉割干净的“公鸡”及病鸡之肝不可用）一具，蒸熟服，服后不要喝茶或吃糖果。如眼起云翳或眼睑红肿不能睁开，或兼有腹胀、便秘、发热等临床症状，须配合下方煎水内服：使君子、芦荟、煨石决、杭菊、湘曲、麦芽各9克，黄连、南木香各2.4克、厚朴、生地、夏枯草各3克、枳实、槟榔、山楂肉、炒香附、桑白皮各6克，黑山栀1.5克（此为7岁以上小孩剂量，7岁以下酌减）。

(三)

处方 鸽屎15克 谷精草 石决明 炉甘石（火煨童便淬）

鸡内金 夜明砂 槟榔 使君肉 五谷虫（炒）各9克 胡

黄连 椒目（炒）各 3 克

用法 共研细末，分数次放入猪肝内，蒸熟，入盐少许，连猪肝和汤食。

（四）

处方 疳积草（爵床）30 克

用法 水煎服。每日 1 剂。痰热加淡竹叶；腹泻加海蚌含珠，严重者加辣蓼草；食欲不振口渴加四方草（陌上菜）；眼生白翳者，用满天星捣烂塞鼻，日换 1 次，左右鼻孔交替塞药。

禁忌 用本方时忌食酸、腥、猪血。

（五）

处方 癞蛤蟆 1 个 砂仁 9 克（研细末）

用法 将癞蛤蟆剖开去肠杂，用酒洗净，放砂仁末于腹内扎紧，外以黄泥包好，用火煨熟，去泥焙干研末。每日服 3 次，每次服 1.5 克，开水调下。

说明 《本草纲目》卷 42 “蟾蜍”：“主小儿劳瘦、疳积最良。”

（六）

处方 金线吊白米（粉条儿菜）15 克 老君树（白薇）根 30 克
山蚂蝗（小槐花）根 24 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 2 次服。

（七）

处方 疳积草（爵床） 苦蕒 青蒿 酒药草 夜关门 田边菊 茵陈 海蚌含珠各 9 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。脾疳加山药；心疳加土黄

芩（南天竹）、土黄连（乌韭）；肝疳 加谷精草、夜明砂（以蒸猪肝或鸡肝为主）；肺疳 加金线吊白米（粉条儿菜）、白茅根、桑白皮；肾肝加女贞子、牛膝、车前草。

脱 肛

（一）

处方 鸡蛋 1 个 升麻 1 克

用法 将鸡蛋空端敲一小孔，插入升麻，上复以皮纸，直立于待蒸之饭上蒸熟。去蛋壳及升麻食之。每日 1 个。

（二）

处方 陈芋茎 猪大肠 陈壁土

用法 将陈壁土捣细，开水冲后搅和，澄清后去土煮后二味，连汤吃。

（三）

处方 黄连 3 克 五倍子 9 克 鳖头 1 个（焙）

用法 共研细末，用麻油调搽。

六、五官科疾病

急性扁桃体炎

(一)

处方 生石膏 12 克 十大功劳 朱砂根 岗梅 黄栀子 淡竹叶 木通 射干 甘草各 9 克

用法 用砂罐加水至药面，煎 2 次，约 100 毫升，分 2 次服。

疗效 几年来治疗小儿急性扁桃体炎 1000 余例，收到较好效果。其中系统观察 50 例，1~2 天内体温恢复正常，扁桃体肿大消失者占 90% 以上。

(二)

处方 儿茶 白芷各 2 克 明雄黄 郁金 硼砂 朱砂各 15 克 珍珠 青黛 薄荷各 9 克 甘草 5 克

用法 共研细末，吹喉。

(三)

处方 马鞭草 7.5 公斤 瓜子金 10 公斤 七叶一枝花 2.5 公斤

制法 洗净、切碎，用水浸泡 1 小时后再加水浸过药面，煎煮 2 次，用纱布过滤，滤液浓缩至 10000 毫升，加防腐剂，放置

3~5 天，滤去沉淀，加糖煮沸，用 3 层纱布过滤，冷却后加入适量薄荷油（先用酒精溶解），不断搅拌，再放置 2~3 天，布袋吊滤，分装备用。

用法 每次 5~10 毫升，每 2 小时 1 次，晚上睡觉时不服，即每日 8 次。

疗效 几年来治疗急性扁桃体炎数百例，收到较好的效果。其中系统观察 100 例，以用药 3 天评定效果，痊愈 48 例，占 48%；好转 44 例，占 44%；无效 8 例，占 8%；总有效率为 92%。

（四）

（菊蓝汤）

处方 野菊花 板蓝根各 15 克 蒲公英 30 克 麦冬 9 克 桔梗 9 克 甘草 5 克

用法 水煎。每天 1 剂，分 2 次服。

急性结膜炎

（一）

处方 生地 12 克 黄柏 黄芩 龙胆草 草决明 白菊花 车前草各 9 克

用法 每日 1 剂，水煎服。连服 3 天为 1 疗程。

（二）

处方 三颗针 200 克 忍冬藤 250 克 猪苦胆 5 个 冰片少许
制法 前二味洗净，加水 1500 毫升，煎至 1000 毫升，用 7 层

纱布过滤，入后二味，瓶装备用。

用法 每日滴眼 3~5 次。

疗效 10 年来治疗急性结膜炎 100 余例，除少数加服磺胺药外，一般点 10 次好转，15 次痊愈。

(三)

(梅青液)

处方 乌梅 500 克 青黛 10 克

制法 将青黛粉溶于 100 毫升蒸馏水中，加热至 80℃，过滤，即得 10% 的青黛液，其酸碱度 (pH) 7.5。再将乌梅加水 2000 毫升，煮沸 2 小时，过滤，又加水 2000 毫升，煮沸 1 小时，过滤，将 2 次滤液合并浓缩成浸膏状，然后加 95% 酒精 800 毫升提取 1 次，过滤，回收酒精即得乌梅浸膏。将 10% 青黛液加入适量乌梅浸膏中，使最终溶液的酸碱度 (pH) 为 4~4.5，即得梅青液。过滤、消毒后，分装备用。

用法 一般每 2 小时滴药 1 次，重者每小时滴药 1 次。

中 耳 炎

(一)

处方 麝香 血竭 梅片各 0.15 克 铜绿 红粉 青黛各 0.3 克

用法 共研极细末，以细料纸 3 层，密刺小孔，将药末撒纸上卷捻，插入耳内。

(二)

处方 千层石榴花适量 冰片少许

用法 将花晒干，和冰片研极细末，吹入耳内，3~5次即效。

(三)

处方 白背叶

制法 取鲜白背叶，用稀酒精提取有效成分，即酒精为100毫升，白背叶为100克；再加白背叶根的水提浓缩液（其浓度相当于100克白背叶根水提浓缩成100毫升），另加氢化可的松0.2%。含酒精为40%。

用法 每天滴耳3次。

注意 本方只对化脓性中耳炎（单纯型）效果好。

鼻 渊

(一)

处方 辛夷花3克 麝香0.3克

用法 辛夷花去外衣晒干燥，研极细末，和入麝香研匀，瓶装勿泄香气，每日用洗净香葱茎蘸药末点入鼻内，促使鼻内流出腥臭浊液。另外，每天用岗梅根30克水煎内服。

说明 治鼻渊屡用皆效。

(二)

处方 辛夷3克 黄瓜菹6克 丝瓜菹21克

用法 水煎服。每日1剂。

牙 痛

(一)

处方 毛茛 1000 克

制法 取鲜毛茛全草洗净捣烂，用纱布包好绞汁约 500 毫升，加 95% 酒精 15 毫升，置阴凉处静放 3 天后过滤，滤液瓶装备用。

用法 用棉签沾药水擦痛牙，亦可用毛茛鲜叶捣烂，胶布固定于印堂穴（切忌水流入眼中），痛止取去，以免起泡。

疗效 共治 253 例，均于 2~3 分钟内止痛。

(二)

处方 熟地 30 克 牛膝 10 克 细辛 3 克 生石膏 30 克 麦冬 10 克 大青叶 12 克 蒲公英 15 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。

说明 本方适用于实火牙痛。

(三)

处方 熟地 24 克 荔枝 30 克

用法 水煎。每日 1 剂，分 3 次服。

疗效 聂×，老药工，年近花甲，肾精不藏，数日前患牙痛，自服清胃火之剂未愈。某医见其齿根松动，牙龈不红肿，知为老年肾亏，虚火上炎，告以此方，1 剂痛减，2 剂痛止。

说明 本方适用于肾虚牙痛，若胃火牙痛，慎勿服用。

(四)

处方 蜂房 1 个 生石膏 80 克 食盐适量

用法 将石膏、食盐填满蜂房内焙枯，研细擦牙。

说明 本方适用于风火牙痛。

• 附 • 草药索引

(一 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
一枝黄花	菊 科	<i>Solidago virgo-aurea</i> L.	满山黄、金锁匙、黄花草
一朵云根	海 桐 科	<i>Pittosporum sahnianum</i> Gowda.	崖花海桐
一包针	水龙骨科	<i>Microsorium fortunei</i> (Moore.) Ching.	连贴草、七星剑
一把针	菊 科	<i>Bidens pilosa</i> L.	鬼针草

(二 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
十大功劳	小 蘗 科	<i>Mahonia japonica</i> DC.	猫儿头、部瓜山树、土黄柏、刺黄连
丁 癸 草	蝶形花科	<i>Zornia diphylla</i> (L.) pers.	丁贵草、人字草、地丁
七 叶 莲	五 加 科	<i>Schefflera arboricola</i> Hayata.	鹅掌藤、汉桃叶
七叶一枝花	百 合 科	<i>Paris polyphylla</i> Smith.	蚤休、重楼
八 角 莲	小 蘗 科	<i>Dysosma pleianthum</i> (Hance) Woods.	八角盘、独角莲
八 角 枫	八角枫科	<i>Alangium chinense</i> (Lour.) Rehd.	华瓜木、八角梧桐
八 棱 麻	忍 冬 科	<i>Sambucus javanica</i> Reinw.	接骨草

续表

药 名	科 名	学 名	别 名
人 苋	大 戟 科	<i>Acalypha australis</i> L.	海蚌含珠、珍珠草、 血见愁
人 字 草	蝶形花科	即丁癸草	
九 斤 花	蓼 科	<i>Polygonum chinense</i> Linn.	火炭母、老蛇头
九 斤 角	萝 藦 科	<i>Cynanchum atratum</i> Bunge.	白薇、土白前
九 龙 胆	防 己 科	<i>Tinospora sagittata</i> (Oliv.) Gagnep.	青牛胆、金果榄、 山慈菇
九 里 光	菊 科	<i>Senecio scandens</i> Buch. —Ham.	千里光、九里明
了 哥 王	瑞 香 科	<i>Wickstroemia indica</i> C. A. Mey.	九信草、铁伞骨

(三 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
三 爪 龙	薔 薇 科	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke.	蛇莓、蛇泡草
三 颗 针	小 蘗 科	<i>Berberis chengii</i> Chen.	土黄连
三 叶 木 通	木 通 科	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	三叶拿、羊开口
三叶翻白草	薔 薇 科	<i>Potentilla freyniana</i> Borum.	地丸子
土 贝	葫 芦 科	<i>Bulbostemma</i> <i>Paniculatum</i> (Max.) Franquet.	藤贝
土 大 黄	蓼 科	<i>Rumex daiwoo</i> Makino.	金不换
土 牛 膝	苋 科	<i>Eupatorium chinense</i> L.	兰草、六月霜

续表 1

药 名	科 名	学 名	别 名
土 冬 花	薔 薇 科	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.	枇杷花
土 丹 参	唇 形 科	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge.	紫丹参、鼠尾草
土 柴 胡	菊 科	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	
土 茵 陈	玄 参 科	<i>Siphonostegia</i> <i>chinensis</i> Benth.	阴行草
土 黄 连	水龙骨科	<i>Phymatopsis hastata</i> (Thunb.) Kitagawa.	金鸡脚、鸭脚草
大 钻	五味子科	<i>Kadsura coccinea</i> (Lem.) A. C. Sm.	小血藤、小活血、 冷饭团
大 叶 桉	桃金娘科	<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	
大 血 藤	大血藤科	即红藤	
大 罗 伞	紫金牛科	<i>Aradisia crenata</i> Sims.	山豆根、朱砂根
大 果 榆	榆 科	<i>Ulmus macrocarpa</i> Hance.	黄榆、山榆
大 青 根	马鞭草科	<i>Clerodendron cyrtoph</i> <i>yllum</i> Turcz.	板蓝根、臭叶树
大金钱草	报春花科	<i>Lysimachia christinae</i> Hance.	过路黄
山 奈	藜 荷 科	<i>Kaempferia galanga</i> L.	山辣
山 姜	藜 荷 科	<i>Alpinia japonica</i> Miq.	箭骨风、竹叶姜
山 麻	荨 麻 科	<i>Boehmeria Platanifolia</i> (Maxim.) Fr. et Sav.	背伏毛
山 乌 龟	防 己 科	<i>Stephania cephalantha</i> Hayata.	白药子

续表 2

药 名	科 名	学 名	别 名
山 苦 瓜	葫 芦 科	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.	王瓜、苦瓜莲、土瓜
山 桤 苦	芸 香 科	<i>Evodia lepta</i> (Spreng.) Merr.	三丫虎、白芸香
山 高 粱	禾 本 科	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	看麦娘、牛头猛
山 胡 椒	樟 科	<i>Lindera glauca</i> Bl.	见风消子
山 薄 荷	马鞭草科	<i>Caryopteris incana</i> Miq.	山荆芥、兰香草
山 梗 菜	桔 梗 科	<i>Sophora subprostrata</i> Chu et T.	水苋菜、苦菜
小 通 草	旌节花科	<i>Stachyurus praecox</i> S. et Z.	旌节花
小 槐 花	豆 科	<i>Desmodium caudatum</i> (Thunb.) DC.	山蚂蝗、水蛭草
小金钱草	旋 花 科	<i>Dichondra repens</i> Forst.	黄疸草、马蹄金
万 年 青	百 合 科	<i>Rohdea japonica</i> Roth.	开喉箭、冬不凋草
千 斤 拔	豆 科	<i>Moghania prostrata</i> (Roxb.) Wang. et Tang.	蔓性千斤拔
千 年 健	天南星科	<i>Homalomena</i> aff. <i>sagittaeifolia</i> Jungh.	一包针
千 年 矮	黄 杨 科	<i>Buxus microphylla</i> sieb. et Zucc. var. <i>sinica</i> Rehd. et Wils.	黄杨木
千 层 塔	石 松 科	<i>Lycopodium serratum</i> Thunb.	矮罗汉、狗牙菜
千 金 藤	防 己 科	<i>Stephania hernandifolia</i> (Willa.) Walp.	山乌龟

续表 3

药 名	科 名	学 名	别 名
卫 矛	卫 矛 科	Evonymusalata (Thunb.) Regel.	六月凌、鬼箭羽
马 兰	菊 科	Aster trinervius Roxb.	田边菊、鱼鳅串
马 桑	马 桑 科	Coriaria sinica Maxim.	蛤蟆树、上天梯
马 蓝	爵 床 科	Strobilanthes flaccidifolius Nees.	板蓝根、百花草
马 齿 苋	马齿苋科	Portulaca oleracea L.	瓜子菜
马 尾 松	松 科	Pinus massoniana Lamb	枞树
马 鞭 草	马鞭草科	Verbenaofficinalis L.	龙牙草、铁马鞭、 紫顶龙芽
飞天蜈蚣	菊 科	Achillea sibirica Ledeb.	蓍草、一枝蒿
飞龙掌血	芸 香 科	Toddalia aculeata pers.	见血散、三百棒

(四 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
天 葵	毛 茛 科	Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino.	千年老鼠屎、散血 珠
天 胡 荽	伞 形 科	Hydrocotyle rotundi- folia Roxb.	破铜钱、满天星
天 泡 草	茄 科	Physalis pubescens Linn.	苦蕒、灯笼草
王 瓜	葫 芦 科	即山苦瓜	
木 槿	锦 葵 科	Hibiscus syriacus L.	木荆花、灯盏花

续表 1

药 名	科 名	学 名	别 名
木 姜 子	樟 科	<i>Litsea pungens</i> Hemsl.	山胡椒
木 芙 蓉	锦 葵 科	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	山苧麻 三变花
五 爪 龙	葡 萄 科	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	乌菰莓、猪娘藤
牛 大 力	蝶形花科	<i>Millettia speciosa</i> champ.	山莲藕
牛 皮 消	萝 藦 科	<i>Cynanchum caudatum</i> Maxim.	牛皮冻、隔山消、 见肿消
牛 尾 菜	百 合 科	<i>Smilax riparia</i> A. DC.	伸根草
牛 筋 草	禾 本 科	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	鸭脚草
云 实	豆 科	<i>Caesalpinia sepiaria</i> Roxb.	鸟不落、黄牛刺
毛 瓜	葫 芦 科	<i>Melothria heterop-</i> <i>hylla</i> (Louv.) Cogn.	大种老鼠拉冬瓜
毛 茛	毛 茛 科	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	毛芥菜
毛 冬 青	冬 青 科	<i>Ilex pubescens</i> Hook. et Arn.	毛披树、茶叶冬青
毛 萝 藦	萝 藦 科	<i>Marsdenia sinensis</i> hemsl.	
毛果算盘子	大 戟 科	<i>Glochialon eriocarpum</i> champ.	漆大伯、毛漆
乌 芋	莎 草 科	<i>Eleocharis planpaginea</i> R. Br.	荸荠、地栗
乌 泡	薔 薇 科	<i>Rubus tephordes</i> Hance.	倒水莲、八月泡
乌 韭	林 蕨 科	<i>Stenoloma chusana</i> (L.) Ching.	金花草、孔雀草
乌 柏	大 戟 科	<i>Sapium sebiferum</i> Roxb.	蜡子树、赶山鞭

续表 2

药 名	科 名	学 名	别 名
乌 荻 莓	葡 萄 科	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	五爪龙
长叶冻绿	鼠 李 科	<i>Rhamnus crenatus</i> Sieb. et Zucc.	茜木根、土黄柏
凤 丫 蕨	裸子蕨科	<i>Coniogramme</i> <i>japonica</i> (Thunb) Diels.	散血莲、活血莲
凤 尾 草	凤尾蕨科	<i>Pteris multifida</i> Poir.	小凤尾、金鸡尾
日本乌蕨	中国蕨科	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb) Kunze.	土黄连、金鸡尾、 凤尾草
六 棱 菊	菊 科	<i>Laggera alata</i> (DC.) Schultz. -Bip.	四方消、六耳棱
六 角 英	爵 床 科	<i>Justcia procumbens</i> L.	爵床、疳积草
火 把 果	蔷 薇 科	<i>Pyracantha Fortuneana</i>	救兵粮
火 炭 母	蓼 科	<i>Polygonum chinense</i> L.	荞麦三七
水 王 孙	水 鳖 科	<i>Hydrilla verticil</i> <i>lata</i> Casp. var.	虾公草、黑藻
水 灯 草	灯芯草科	<i>Juncus effusus</i> L.	灯芯草、龙须草、土 麻黄
水 龙 骨	水龙骨科	<i>Polypodium niponi-</i> <i>cum</i> Mett.	光棍树、石伸筋
水 菖 蒲	天南星科	<i>Acorus calamus</i> L.	菖蒲、泥菖蒲
水 杨 梅	蔷 薇 科	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	小益母
水 杨 梅	茜 草 科	<i>Adina rubella</i> Hance.	沙荆子、穿鱼串
水 黄 连	龙 胆 科	<i>Swerta chinensis</i> Hemsl. et Forbes.	当药
水 杨 柳	萝 藦 科	<i>Cynanchum stauntoni</i> (Decne.) Hand. —Mazz.	柳叶白前、白前

(五 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
玉 兰 花	木 兰 科	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	百花果、洋玉兰
打 不 死	菊 科	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	细叶鼠、鞠草
石 蒜	石 蒜 科	<i>Lycoris radiata</i> Herb.	龙爪草、一枝箭
石 吊 兰	苦 苣 苔 科	<i>Lysionotus pauciflora</i> Maxim.	还阳丹、肺红草
石 胡 荽	菊 科	<i>Centipeda minime</i> (L.) A. Braun. et Aschers.	鹅不食草、大救驾
石 南 藤	胡 椒 科	<i>Piper wallchii</i> (Miq.)	石南
石 猴 子	葡 萄 科	<i>Tetratigma hemsley-</i> <i>anum</i> Diels. et. Gilg.	小扁藤、拦山虎
石 蟾 蜍	防 己 科	<i>Stephania tetrandra</i> S. Moore.	猪大肠、山乌龟
叶 下 珠	大 戟 科	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	珍珠草
叫 子 草	藤 黄 科	<i>Hypericum sampsonii</i> Hance.	元宝草
号 桐 杆	罂 粟 科	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br.	博落回
田 边 菊	菊 科	<i>Aster trinervius</i> Roxb.	马兰丹、泥鳅草
田 基 黄	金丝桃科	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	地耳草、防蚊草
打破碗花花	毛 茛 科	<i>Anemone vitifolia</i> Buch. -Ham.	野棉花、青水胆
四 方 麻	玄 参 科	<i>Calovhabados</i> <i>Cauloptera</i> Hance.	青鱼胆、四方消

续表 1

药 名	科 名	学 名	别 名
四 叶 葎	茜 草 科	<i>Galium gracile</i> Bunge.	
四 两 麻	马兜铃科	<i>Asarum forbesii</i> Maxim.	杜衡、马蹄细辛
四 块 瓦	金粟兰科	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	及己
四方马兰	唇 形 科	即半枝莲	
兰 香 草	马鞭草科	即山薄荷	
半 边 莲	桔 梗 科	<i>Lobelia radicans</i> Thunb.	急解索、细米草
半 枝 莲	唇 形 科	<i>Scutellaria barbata</i> Don.	四方马兰、并头草
皮 子 药	芸 香 科	即红总管	
瓜 子 金	远 志 科	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	紫背金牛、金锁匙、 散血丹
鸟 不 企	五 加 科	<i>Aralia decaisneana</i> Hance.	老鸦怕、鸟不落
冬 青	冬 青 科	<i>Ilex chinensis</i> Sim.	一口血
冬 葵	冬 葵 科	<i>Malva verticillata</i> L.	冬苋菜
白 英	茄 科	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	蜀羊泉、毛秀才、 白毛藤
白 勒	五 加 科	<i>Acanthopanax</i> <i>trifoliatum</i> (L.) Merr.	五虎进、刺三加
白 背 叶	大戟科	<i>Mallotus apelta</i> (Lour.) Muell —Arg.	白叶野桐、毛桐

续表 2

药 名	科 名	学 名	别 名
白 面 风	菊 科	<i>Inula cappa</i> DC.	白牛胆
白 蜡 树	木 犀 科	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	女贞
白 狼 毒	大 戟 科	<i>Euphorbia fischeriana</i> steud.	狼毒大戟、狼毒
白叶野桐	大 戟 科	即白背叶	
白半枫荷	五 加 科	<i>Dendropanax proteus</i> Benth.	河边枫、三把叉
白骨树根	大 戟 科	即乌柏	
白花蛇舌草	茜 草 科	<i>Oldenlandia diffusa</i> (Willd.) Roxb.	

(六 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
地 锦	大 戟 科	<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	奶浆草、仙桃草
地 雷	毛 茛 科	<i>Clematis henryi</i> Oliv.	单叶铁线莲
地 沟 叶	大 戟 科	<i>Speranskia cantonensis</i> (Hance.) Pax. et Hoffm.	巴岩散、黄鸦胆
地 虱 婆	鼠 妇 科	<i>Armadillidium</i> <i>vulgare</i> (Latreille.)	鼠妇虫(动物)
地 耳 草	藤 黄 科	即田基黄	
地下明珠	茅 膏 菜 科	<i>Drosera peltata</i> Sm. var <i>lunata</i> Clarke.	内宝珠、金老鼠
地瓜儿苗	唇 形 科	<i>Lycopus lucidus</i> . Turcz.	泽兰

续表 1

药 名	科 名	学 名	别 名
老 鸛 草	牻牛儿苗科	<i>Geranium wilfordi</i> Maxim.	一颗针、藤五爪
百 解	冬 青 科	<i>Ilex asprella</i> Champ.	岗梅、梅叶冬青
百 步 拿	唇 形 科	<i>Glechoma hedeveacea</i> L.	连钱草
西氏毛茛	毛 茛 科	<i>Ranunculus sieboldi</i> Miq.	黄花草、毛芹菜
吊 黄	远 志 科	<i>Polygala aureocaudata</i> Dunn.	黄花倒水莲、吊吊黄
光叶海桐	海 桐 科	<i>Pittosporum glabratum</i> Lindl.	麻口皮子药、过山虎
尖 尾 枫	马鞭草科	<i>Callicarpalongissima</i> (Hemsl.) Merr.	紫珠树
安 石 榴	安石榴科	<i>Punica granatum</i> L.	石榴
羊 蹄	蓼 科	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	
羊 躑 躅	杜 鹃 科	<i>Rhododendron molle</i> G. Don.	闹羊花、八里麻 黄杜鹃
关 公 须	唇 形 科	<i>Salvia plebeia</i> R. Br.	雪见草
阴 香	樟 科	<i>Cinnamomum burmanni</i> Bl.	山桂枝、土桂枝
阴 地 蕨	瓶尔小草科	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	破天云、散血叶
血 蜈 蚣	秋海棠科	<i>Begonia pedatifida</i> Leveille.	裂叶秋海棠、水蜈蚣
伏 石 蕨	水龙骨科	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> presl.	瓜子草、瓜子金
伏 地 草	茜 草 科	<i>Oldenlandia chrysotricha</i> (Palibin.) Chun.	地蜈蚣、对叶寸节草

续表 2

药 名	科 名	学 名	别 名
竹 叶 椒	芸 香 科	<i>Zanthoxylum planispinum</i> sieb. et Zucc.	臭花椒、四两麻
竹叶细辛	萝 藦 科	<i>Pycnostelma paniculatum</i> (Bunge.) K. Schum.	寮刁竹、徐长卿
过 路 黄	报春花科	<i>Lysimachia christinae</i> Hance.	铜钱草、蜈蚣草 小散血
红 藤	大血藤科	<i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd. et Wils.	大血藤、活血藤
红 总 管	芸 香 科	<i>Zanthoxylum simulans</i> var. <i>podocarpum</i> Huang.	麻口皮子药、野花椒
红辣蓼草	蓼 科	<i>Polygonum hydropiper</i> Linn.	水蓼
合 百 草	葫 芦 科	<i>Actinostemma lobatum</i> (Maxim) Maxim.	合子草、无白草
朱 砂 根	紫金牛科	<i>Ardisia crenata</i> Sims.	山豆根、金锁匙、 铁凉伞
朱 砂 莲	薯 芋 科	<i>Dioscorea cirrhosa</i> Lour.	薯蓣、红孩儿、 红药子
华 茅 苧	唇 形 科	<i>Mosla chinensis</i> Maxim.	细叶香薷
多头苦蕒菜	菊 科	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.	包金七层楼

(七 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
苧 麻	荨 麻 科	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud.	野麻
芙 蓉 叶	锦 葵 科	即木芙蓉	

续表 1

药 名	科 名	学 名	别 名
芸 苔 子	十字花科	Semen. Brassicae campestris.	油菜子
花 榈 木	豆 科	Ormosia henryi prain.	相思树、鸭屎菜、鸭公青
杜 衡	马兜铃科	Asarum blumei Duch.	土细辛、马蹄香
杜 鹃 花	杜鹃花科	Rhododendron simsii planch.	映山红、山踯躅
杠 板 归	蓼 科	Polygonum perfoliatum L.	蛇不过、蛇倒退
杜 仲 藤	夹竹桃科	Parabarium micranthum (Wall.) Pierre.	土杜仲、飞天驳
麦 斛	兰 科	Bulbophyllum inconspicuum Maxim	石仙桃、瓜子莲
两 面 针	芸 香 科	Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.	上山虎、野花椒
连 钱 草	唇 形 科	Glechoma hederacea L.	铜钱草、满天星、半边莲
杏香兔耳风	菊 科	Ainsliaea fragrans champ.	山豆根、肺形草、七厘丹
岗 梅	冬 青 科	即百解	
岗 稔	桃金娘科	Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.	桃金娘、水刀莲
尿珠子根	禾 本 科	Coix lachrymajobi L.	薏苡
鸡 血 藤	豆 科	Mucuna birdwoodiana Tutch.	大血藤、血枫藤
鸡 冠 花	苋 科	Celosa cristata L.	鸡头
牡 荆	马鞭草科	Vitex cannabifolia Sieb. et Zucc.	黄荆、土常山、野牛膝

(八 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
青 风 藤	防 己 科	<i>Sinomrnum acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils.	青藤、寻风藤
苦 树	苦 木 科	<i>Picrasma quassioides</i> (D. Don.) Bennett.	进口苦、黄楝树
苦 苣	茄 科	<i>Physalis pubescens</i> Linn.	天泡子、灯笼草
苦 胆 草	唇 形 科	即金疮小草	
苦 楝 树	楝 科	<i>Melia azedarach</i> L.	
刺 黄 柏	小 蘗 科	即阔叶十大功劳	
茅 莓	薔 薇 科	<i>Rubus parvifolius</i> Linn.	三月泡、种田满
松 萝	松 萝 科	<i>Usnea longissima</i> Ach.	石飞丝
抱 石 莲	水龙骨科	<i>Lepidogrammitis</i> <i>drymoglossoides</i> (Bak) Ching.	瓜子莲、瓜子金
岩 丸 子	秋海棠科	<i>Begonia sinensis</i> A. DC.	中华秋海棠、阴阳子
枫 香	金缕梅科	<i>Liquidambar formos-</i> <i>ana</i> Hance.	枫树(果实名路路通)
虎 杖	蓼 科	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.	大叶蛇总管、酸筒杆、土大黄
虎 刺	茜 草 科	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaerth. fil.	十大功劳、绣花针
虎 掌	天南星科	<i>Arisaema thunbergii</i> Bl.	土南星、南蛇吐剑
虎 舌 红	紫金牛科	<i>Ardisia mamillata</i> Hance.	红毛毡、老虎台
京 大 戟	大 戟 科	<i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr.	将军草、龙虎草

续表 1

药 名	科 名	学 名	别 名
油 桐	大戟科	<i>Aleurites fordii</i> Hemsl.	桐子树、罌子桐
泡 桐	玄参科	<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.	白桐、水桐
夜 关 门	豆 科	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum. Cours.) G. Don.	铁扫帚
闹 羊 花	杜鹃花科	<i>Rhododendron molle</i> G. Don.	羊躑躅、黄杜鹃
金 果 榄	防己科	<i>Tinospora sagittata</i> (Oliv.) Gagnep.	山慈姑、青牛胆
金 挖 耳	菊 科	<i>Carpesium divarica-</i> <i>tum sieb. et Zucc.</i>	铁骨消、翻天印
金 鸡 爪	伞 形 科	<i>Angelica citriodora</i> Hance.	隔山香、香白芷 鸡爪参
金疮小草	唇 形 科	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	青鱼胆、伏地筋骨 草、苦胆草
构 树	桑 科	<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	楮实子树、纱子树
鱼 腥 草	三白草科	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	蕺菜、臭菜
细 叶 十大功劳	小 檗 科	<i>Mahonia Fortunei</i> Fedde.	猫公头、土黄连
狗 牙 莲 半 枝	景 天 科	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge.	垂盆草

(九 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
芥 菜	十字花科	<i>Capsella bursa pasto-</i> <i>ris</i> (Linn.) Medic.	地菜、野芥菜

续表 1

药 名	科 名	学 名	别 名
草 河 车	唇 形 科	<i>Salvia chinensis</i> Benth.	紫参、石见穿
珍 珠 草	大 戟 科	<i>phyllanthus urinaria</i> L.	叶下珠、日开夜闭
怪 柳	怪 柳 科	<i>Tamarix chinensis</i> Lour.	观音柳、西河柳
枸 骨	冬 青 科	<i>Ilex cornuta</i> Lindl. et paxt.	狗公刺
南 天 竹	小 蘗 科	<i>Nandina donestia</i> Thunb.	珍珠盖凉伞、土黄 芩、山黄连
南 蛇 藤	卫 矛 科	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	过山龙、钻骨风
南五味子	五味子科	<i>Kadsura longipedun-</i> <i>culata</i> Finet. et Gagnep.	小活血、内风消、 小血藤
胡 颓 子	胡颓子科	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	蔷薇树、甜棒锤
穿 心 莲	爵 床 科	<i>Andrographis</i> <i>paniculata</i> (Burm. f.) Nees.	一见喜、苦胆草
穿 石 阳	桑 科	<i>Cudrania cochinch-</i> <i>inensis</i> (Louv.) Kudo et Mats.	穿破石、畏芝
兗州卷柏	卷 柏 科	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring.	凤凰草、金不换
香 椿	楝 科	<i>Cedrela sinensis</i> Juss.	青叶花
香 蒲	香 蒲 科	<i>Typha latifolia</i> L.	毛蜡烛、蒲黄
急 解 索	兰 科	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames.	盘龙参、绶草
匍 伏 堇	堇 菜 科	<i>Viola diffusa</i> Ging.	野薄荷、散血丹、 黄花草
络 石 藤	夹竹桃科	<i>Trachelospermum</i> <i>jasminoides</i> L.	爬壁藤

续表 2

药 名	科 名	学 名	别 名
娃 儿 藤	萝 藦 科	<i>Tylophora floribunda</i> Miquel.	老君须
除 虫 菊	菊 科	<i>Chrysanthemum</i> <i>cinerariaefolium</i> Vis.	

(十 画)

药 名	科 名	学 名	别 名
桤 木	金缕梅科	<i>Loropetalum chinense</i> Oliv.	榿花
盐 肤 木	漆 树 科	<i>Rhus semialata</i> Murr.	五倍子、天蜈蚣
破 铜 钱	伞 形 科	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	积雪草、马蹄草
鸭 公 青	豆 科	即花榈木	
鸭 跖 草	鸭跖草科	<i>Commelina Communis</i> L.	竹叶菜
海 金 沙	海金沙科	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	斑鸠窝、满天云
粉条儿菜	百 合 科	<i>Alettris spicata</i> (Thunb.) Franch.	肺风草、金线吊白 米、蛆蛆草
海蚌含珠	大 戟 科	即人苋	
铁 扫 帚	豆 科	即夜关门	
铁 扁 担	鸢 尾 科	<i>Iris japonica</i> Thunb.	开喉见、扁竹根

续表

药 名	科 名	学 名	别 名
积雪草	伞形科	即破铜钱	
臭牡丹	马鞭草科	Clerodendron bungei Steud.	大红袍、臭梧桐
臭娘子	马鞭草科	premna microphylla Turcz.	臭常山、铁箍散
鬼针草	菊 科	Bidens bipinnata L.	盲肠草、婆儿针
笑靥花	蔷薇科	Spiraea prunifolia Sieb. et Zucc.	米浆树
缺腰叶蓼	蓼 科	Polygonum runcinatum Hamilt. var. sinense Hemsl	九斤花、田枯七、脚肿草

(十一画)

药 名	科 名	学 名	别 名
菝葜	百合科	Smilax China Linn.	金刚刺
黄荆子	马鞭草科	Vitex negundo L.	土常山、荆巴柴、姜子叶
黄疸草	旋花科	即小金钱草	
黄花倒水莲	远志科	Polygala aureocauda Dunn.	吊吊黄
雪冻花	瑞香科	Daphne odora Thunb.	瑞香、雪花皮、山棉皮
接骨木	忍冬科	Sambucus racemosa L.	舒筋树、木蒴藿
葶桐树	夹竹桃科	Wrightia pubescens R. Br.	倒吊笔、墨柱、根刀柄
蛇 莓	蔷薇科	Duchesnea indica (Andr.) Focke.	地锦、蛇泡草、三仙草

续表 1

药 名	科 名	学 名	别 名
蛇 含	薔 薇 科	Fotentilla kleiniana Wight et Arn.	五爪莲、五虎草、 五叶藤
蛇 不 过	蓼 科	即杠板归	蛇倒退
蛇 葡 萄	葡 萄 科	Ampelosis brevipedun- culata koehne.	假葡萄、爬山虎
野 百 合	豆 科	Crotalaria sessiliflora L.	化草、化骨草
野 花 椒	芸 香 科	即竹叶椒	
野 南 瓜	大 戟 科	Glochidion puberum Hutch.	算盘子、馒头果
野 扇 花	黄 杨 科	Sarcococca ruscifolia stapf.	土杜仲、大风消、 土丹皮
野 茄 子	菊 科	Xanthium strumarium L.	苍耳
眼 子 菜	眼子菜科	Potamogeton Franch- etii A. Benn. et Baag.	鸭嘴皮
常 春 藤	五 加 科	Hedera sinensis Tobl.	
麻 首 风	买麻藤科	Gnetum parvifolium (warb.) C. Y. Cheng.	狗果藤
麻口皮子药	芸 香 科	即红总管	
盘 龙 草	菊 科	Aster scaber Thunb.	土苍术、东风菜
犁 头 角	旋 花 科	Calystegia hederacea Wall.	小旋花
犁 头 草	堇 菜 科	Viola japonica Langsd.	犁嘴草、紫花地丁、 箭头叶
雀 舌 草	石 竹 科	Stellaria Alsine Grimm.	青鱼草

续表 2

药 名	科 名	学 名	别 名
银 铃 花	报春花科	Lysimachia decurrens G.	大散血
猕 猴 桃	猕猴桃科	Actinidia chinensis pranch.	藤梨树、钻地风
猪 娘 藤	葡 萄 科	即五爪龙	

(十二画)

药 名	科 名	学 名	别 名
蓖 麻	大戟科	Ricinus Communis L.	润肠、大麻子
萎 蒿	菊 科	Artemisia Vulgaris L. var.	千粒米
萱 花	百 合 科	Hemerocallis fulva L.	黄花菜、金针菜
落地生根	景 天 科	Kalanchoe pinnata (Lam.)pers.	打不死、土三七
博 落 回	罂 粟 科	即号桐杆	
喜 树	珙 桐 科	Camptotheca acumina- ta Decne.	
棣 棠 花	薔 薇 科	Kerria japonica DC.	兑棠花、橡皮树
紫 葳	紫 葳 科	Campsis chinensis Voss.	凌霄花、过江龙、 过山龙、搜骨风
紫 薇	千屈菜科	Lagerst roemia indica L.	宝幡花、四月花、 羊屎树
紫 竹 根	禾 本 科	Phyllostachys nigra Munro.	黑竹根
紫 珠 草	马鞭草科	Callicarpa pedunculata R. Br.	
酢 酱 草	酢酱草科	Oxalis corniculata I.	老鸦酸、三叶酸

续表

药 名	科 名	学 名	别 名
阔叶 十大功劳	小 蘗 科	Mabonia bealei Carr.	土黄柏、刺黄柏
筋 骨 草	唇 形 科	Ajuga decumbens Thunb.	脚踏莲、青鱼胆
隔 山 香	伞 形 科	Angelica citriodora Hance.	过山香、香白芷、 枸橼当归
铺地蜈蚣	茜 草 科	即伏地草	
铺地蜈蚣	石 松 科	Lycopodium cernuum L.	合金草、路伸筋
雄 黄 连	防 己 科	Stephania Sp.	一点血
鹅不食草	菊 科	即石胡荽	

(十三画)

药 名	科 名	学 名	别 名
蒲 公 英	菊 科	Taraxacum mongoli- cum H. -M.	黄花地丁
摇 竹 消	萝 藦 科	即竹叶细辛	
雷 公 藤	卫 矛 科	Tripterygium Wilfordii Hook. F.	水莽草、断肠草、 三棱
满 天 星	伞 形 科	Hydrocotyle sibthor- pioides Lam.	天胡荽
溪 黄 草	唇 形 科	Plectranthus striatus Benth.	熊胆草、风血草
路 边 荆	茜 草 科	Serissa foetida Comm.	六月雪、千年矮
辣 蓼 草	蓼 科	Polygonum flaccidum Meisn.	旱蓼
鼠 曲 草	菊 科	Gnaphalium multiceps Wall.	水蚊子、佛耳草、 水蒿、黄花草

续表

药 名	科 名	学 名	别 名
腹 水 草	玄 参 科	Botryoplcuron axillare Hemsl.	吊线风、金鸡尾、倒挂风、老君丹
矮 地 茶	紫金牛科	Ardisia japonica (Thunb.) Bl.	紫金牛、平地木
矮 桃 草	报春花科	Lysimachia fortunei Maxim.	星宿菜
蓍 草	菊 科	即飞天蜈蚣	

(十四画)

药 名	科 名	学 名	别 名
蔓 苧 麻	苧 麻 科	Momoralis hirta Wedd.	糯饭藤
蔓 陀 罗	茄 科	Datura metel L. f. alba.	闹羊花、羊金花
酸 浆	茄 科	Physalis alkekengi L.	红天泡子
薔 薇 莓	薔 薇 科	Rubus rosaefolius Sm.	火伤泡、四月泡
蜘蛛抱蛋	百 合 科	Aspidistra elatior Blume.	竹根七、一寸十八节、赶山鞭
翠 云 草	卷 柏 科	Selaginella uncinata (Desv.) Spring.	

(十五画以上)

药 名	科 名	学 名	别 名
缬 草	败 酱 科	Valeriana officinalis L.	山麝
薜 荔	桑 科	Ficus pumila L.	凉粉子、爬壁藤、络石藤

续表

药 名	科 名	学 名	别 名
薯 蓣	薯 蓣 科	即朱砂莲	
橐 吾	菊 科	Ligularia tussilaginea Makino.	铁冬苋、活血莲、 马蹄草
爵 床	爵 床 科	即六角英	
藿 麻 草	荨 麻 科	Urtica Sp.	