刺 梨 *Rosa roxburghii* Tratt.

基 源 蔷薇科植物刺梨的根及果实入药。

原植物 落叶灌木，全株疏生小刺。单数羽状复叶互生，小叶9~15，椭圆形，基部宽楔形，边缘有细锐锯齿。花单生或2~3朵生于短枝顶端，萼片先端渐尖，有羽状裂片，内密被绒毛，外密被针刺；花冠淡红色，花瓣重瓣至半重瓣，倒卵形。果扁球形，绿红色，外密生针刺，萼片宿存。花期5~7月，果期8~10月。

生境分布 生于山坡及灌丛中。分布于陕西、江苏、湖北、广东、广西、贵州、四川、云南等省区。

采收加工 夏季采果，秋季挖根，晒干或鲜用。

性味功能 味酸、涩，性平。根有消食健脾，收敛止泻的功能。果有解暑，消食的功能。

主治用法 根用于食积腹胀，痢疾，肠炎，自汗盗汗，遗精，白带，月经过多，痔疮出血。果实用于红崩白带，小儿积食，维生素C缺乏病，并用于作防癌抗衰老药。用量，根15~30g。果实3~5枚。

应 用

1. 食积腹胀：刺梨根，红糖各30g，水煎服。
2. 痢疾：刺梨根，仙鹤草，马兰各500g，加水煎成1500 ml，每服50~100 ml，每日2次。

蔷薇科 Rosaceae



玫 瑰（玫瑰花） *Rosa rugosa* Thunb.

基 源 玫瑰花为蔷薇科植物玫瑰的花蕾或初开放的花。

原植物 落叶灌木。茎直立，密生短绒毛，有皮刺或针刺。羽状复叶，小叶5~9，椭圆形或椭圆状倒卵形，先端急尖，基部圆形或宽楔形，边缘有钝锯齿。叶柄与叶轴具绒毛，并疏生小皮刺和刺毛。托叶披针形，边缘锯齿。花单生或3~6朵聚生，芳香，花梗密生绒毛和腺毛。花瓣紫红色、红色，单瓣或重瓣。聚合果扁球形，暗橙红色，具宿萼。花期6~8月，果期6~9月。

生境分布 生于丛林及沟谷中。全国各地普遍栽培。

采收加工 4~6月间采摘花蕾或初开的花，花冠向下，用文火速烘干或阴干。

性味功能 味甘、微苦，性温。有舒肝理气，和血调经的功能。

主治用法 用于胸闷，胃脘胀痛，风痹，咳嗽痰血，吐血，咯血，月经不调，赤白带下，泄泻，痢疾。

应 用

1. 心绞痛：玫瑰花9g，水煎服。
2. 糖尿病：玫瑰花9g。水煎服。
3. 隐性冠心病，胸闷隐痛：鲜玫瑰花30g，蜂蜜沸水冲服。
4. 月经不调，痛经：玫瑰花，月季花各9g，益母草，丹参各15g。红糖沸水泡饮服。

蔷薇科 Rosaceae





掌叶覆盆子（覆盆子） *Rubus chingii* H. H. Hu

基　　源 覆盆子为蔷薇科植物掌叶覆盆子的干燥聚合果。

原 植 物 别名：华东覆盆子、种田泡

落叶灌木。茎直立，枝条细长，红棕色；幼枝绿色，具白粉，有倒生弯曲皮刺。单叶互生，近圆形，掌状5深裂，中裂片菱状卵形，基部近心形，边缘有重锯齿，两面脉上有白色短柔毛；花单生于短枝顶端；萼片5，卵形；花瓣5，白色。聚合果卵球形，红色，下垂；小核果密生灰白色柔毛，果肉柔嫩多汁，可食。花期4~5月，果期6~7月。

生境分布 生于溪边或山坡灌丛、林缘及乱石堆中。分布于安徽、江苏、浙江、江西、福建、湖南、湖北等省。

采收加工 6~8月间采收未成熟的青色聚合果，沸水中稍浸后，置烈日下晒干。

性味功能 味甘、酸，性温。有补肾固精、助阳缩尿的功能。

主治用法 用于肾虚遗精、阳萎、遗尿、尿频。用量6~12g。

应　　用

1. 尿频、夜尿、男性不育症：覆盆子、桑螵蛸、益智仁、芡实。水煎服。
2. 阳萎、遗精：覆盆子、枸杞子、菟丝子、五味子、莲子各4.5g。水煎服。
3. 肺虚寒：覆盆子发，取汁作煎为果，加蜜服。



茅　莓（茅莓根） *Rubus parvifolius* L.

基　　源 茅莓根为蔷薇科植物茅莓的干燥根。

原 植 物 别名：红梅消、虎梅刺、红瑞梅

落叶小灌木。有短毛和有倒生皮刺。叶互生，复叶，小叶通常3，偶见5，上面深绿色，白色毛，小叶宽菱形至宽倒卵形；托叶针状。聚伞花序合成伞房状；花小，花瓣紫红色或粉红色。聚合果球形，成熟时红色。花期5~6月，果期7~8月。

生境分布 生于山坡、路旁、荒地灌丛和草丛中。分布于河北、山西、陕西、四川以及中南和华东各省。

采收加工 秋冬季挖根，晒干或鲜用。

性味功能 味甘、酸，性平。有清热凉血，散结止痛，利尿，消肿，杀虫的功能。

主治用法 用于肠炎，肝脾肿大，跌打肿痛，痈肿，风湿痹痛，泌尿系统感染等。用量30~60g。

应　　用

1. 泌尿系结石：茅莓鲜根120g，洗净切片，加米酒120g，水适量，煮1小时，去渣取汁，2次分服，每日1剂。服至排出结石或症状消失为止。
2. 过敏性皮炎：茅莓根煎汤，加入明矾适量，外洗患处，每日1次。



地　榆　*Sanguisorba officinalis* L.

基　　源	为蔷薇科植物地榆的根。
原 植 物	别名：黄瓜香、马猴枣 多年生草本。根茎粗壮，生多数纺锤形或长圆柱形根。单数羽状复叶，基生叶有长柄，小叶卵圆形或长圆状卵形，边缘粗锯齿，小叶柄基部有小托叶；茎生叶有短柄，小叶长圆形或长圆状披针形，有齿。穗状花序近球形或短圆柱形，花暗紫色。瘦果暗棕色，包于宿存萼内。花果期6~9月。
生境分布	生于山坡、林缘、草原、灌丛或田边。分布于东北、华北、陕西、甘肃、河南、山东、及长江以南各地区。
采收加工	春季返青或秋季枯萎后采挖，除去根茎及须根，洗净，晒干或趁鲜切片，晒干。
性味功能	味苦、酸，性微寒。有凉血止血，清热解毒，生肌敛疮功能。
功能主治	用于便血，痔疮出血，血痢，尿血，崩漏，水火烫伤，痈肿疮毒。用量9~15g。
应　　用	同长叶长榆。



长叶地榆（地榆）

Sanguisorba officinalis L. var. *longifolia* Yu et Li

基　　源　地榆为蔷薇科植物长叶地榆的根。

原 植 物　别名：绵地榆

根富纤维性，折断面呈细毛状。基生小叶线状长圆形至线状披针形，基部微心形至宽楔形，茎生叶与基生叶相似，但较细长。穗状花序圆柱形，长2~6cm，花果期 8~11 月。

生境分布　生于山坡、草地、溪边、灌丛、湿草地。分布于东北及河北、山西、河南、山东及长江以南各地区。

采收加工　春季采挖，洗净，晒干或趁鲜切片，晒干。

性味功能　味苦、酸，性微寒。有凉血止血，清热解毒，生肌敛疮功能。

功能主治　用于便血，痔疮出血，血痢，尿血，崩漏，水火烫伤，痈肿疮毒。用量 9~15g。

应　　用

1. 结肠炎，慢性菌痢，便血、血痢：地榆（炒炭）、鲜生地各12g，白芍、丹皮各6g，炒山栀9g，荆芥炭、川连各 3g，木香(后下)1.5g，水煎服。
2. 痔疮出血：地榆、槐花、黄芩、火麻仁。水煎服。
3. 烧伤：地榆、漆大姑、黄柏，加油调成糊剂，加热煮沸后，晾凉后敷伤处。
4. 痈肿疮疡，烫伤，皮炎：地榆研末涂敷患处。

蔷薇科 Rosaceae



珍珠梅 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Brown

基　　源　蔷薇科植物珍珠梅的茎、叶、花及果穗入药。

原 植 物　落叶灌木。单数羽状复叶互生，小叶 11~17，披针形，基部阔楔形，边缘有尖锐重锯齿。圆锥花序顶生，大而密集；总花梗及花梗被星状毛及柔毛，苞片卵状披针形或线状披针形，萼筒钟状，萼片三角状卵形，花瓣 5，白色。蓇葖果长圆形，有顶生弯曲花柱，萼片宿存，反折。花期 7~8 月，果期 9 月。

生境分布　生于山坡疏林、溪边、河谷，村边灌木丛中。分布于东北、华北及陕西等省区。

采收加工　春、秋季采茎皮，枝条，晒干。叶、花夏夏季采，晒干。秋、冬采果穗，晒干。

性味功能　味苦，性寒，有毒。有活血散瘀，消肿止痛的功能。

主治用法　用于骨折，跌打损伤，关节扭伤红肿疼痛，风湿性关节炎。果穗研粉吞服。用量，枝条 9~15g，茎皮、果穗或叶花 1~1.5 g。外用研粉调敷。

应　　用

1. 骨折，跌打损伤：珍珠梅茎皮或果穗 3g，五加皮 9g，穿山龙 6g，鳖甲 15g，共研细粉，每次 3g，以黄酒送下。
2. 风湿性关节炎：珍珠梅枝条、穿 山龙、接骨木各 15g，煎水服。

蔷薇科 Rosaceae



花 楸 *Sorbus pohuashanensis* (Hance) Hedl.

基　　源 蔷薇科植物花楸的果实和茎皮入药。

原 植 物 乔木。单数羽状复叶，托叶大，近半圆形，有粗大锯齿；小叶5~7对，卵状披针形至披针形，先端渐尖，基部圆形，偏斜，边缘有细锯齿，有时具重锯齿，上面无毛，下面苍白色，有稀疏柔毛或沿中脉有密集的柔毛。复伞房花序，密集花；花梗密被白色绒毛，萼筒钟状，萼片三角形，内外密生绒毛；花瓣白色。果实近球形，红色或桔红色，顶端宿存萼片闭合。花期6月，果期9~10月。

生境分布 生于山坡和山谷杂木林中。分布于东北、华北及甘肃、山东等省区。

采收加工 秋季采收，晒干备用。

性味功能 味甘、苦，性平。果实有健胃补虚的功能。茎皮有镇咳祛痰，健脾利水功能。

主治用法 果实用于胃炎，维生素A、C缺乏症，水肿等。茎皮用于慢性气管炎，肺结核，哮喘，咳嗽，水肿等。用量：果实30~60g；茎皮9~15g。

应　　用

1. 浮肿：花楸成熟果实25g，水煎服。
2. 肺结核：花楸树皮15g，水煎服，日服一次。
3. 慢性气管炎：花楸树皮制成糖衣片（每片含生药2.7g），每次服6~7片，每日三次。

蔷薇科 Rosaceae



合 欢（合欢皮） *Albizia julibrissin* Durazz.

基　　源 合欢皮为含羞草科植物合欢的干燥树皮。

原 植 物 别名：绒花树、芙蓉花

落叶乔木。2回羽状复叶互生；羽片5~15对；每羽片小叶10~30对，镰刀状长圆形，全缘，有短柔毛。头状花序腋生或顶生伞房状；花淡红色。荚果扁平，黄褐色。扁种子椭圆形，褐色，光滑。花期6~8月。果期8~10月。

生境分布 生于山谷、林缘，栽培。分布于辽宁、河北、甘肃、宁夏、陕西、山东、河南及长江以南各省区。

采收加工 夏、秋二季采收，剥取树皮，晒干。

性味功能 味甘，性平。有解郁安神，活血消肿的功能。

主治用法 用于心神不安，忧郁失眠，健忘，肺脓疡，咯脓痰，痈肿，心胃气痛，风火眼疾，咽痛，瘰疬，跌扑伤痛。

应　　用

1. 神经衰弱，失眠，抑郁：合欢皮30g，丹参、夜交藤各15g，柏子仁9g，水煎服。
2. 关节肌肉慢性劳损性疼痛：合欢皮、乳香、没药、木瓜、赤芍、红枣等，水煎服
3. 骨伤：合欢皮、白蔹各9g，研末，酒调外敷患处。
4. 筋骨损伤：合欢皮、芥菜子，炒后研细末，酒调，临卧服酒，药渣敷患处。

附注：合欢花为其干燥花序。味甘，性平。有解郁安神的功能。用于心神不安，忧郁失眠。用量4.5~9g。

含羞草科 Mimosaceae



儿　茶 *Acacia catechu* (L.) Willd.

基　　源 为含羞草科植物儿茶的心材水煎干膏。

原 植 物 乔木。树皮棕色。二回偶数羽状复叶，互生，叶轴上被灰色柔毛，着生羽片10~20对，小叶片20~50对，小叶线形，两面被疏毛。总状花序腋生，萼先端5裂，花瓣5，黄色或白色。雄蕊多数；雄蕊子房上位。荚果扁而薄，紫褐色，有光泽。花期8~9月，果期10~11月。

生境分布 多生于路边。分布于云南西双版纳傣族自治区，广东、广西有栽培。

采收加工 冬季采收枝、干，除去外皮，砍成大块，加水煎煮，浓缩成糖浆状，稍冷，置于特制的模型中，阴干。

性味功能 味苦，涩，性微寒。有清热，生津，化痰的功能。外用有收涩，敛疮，止血的功能。

主治用法 用于痰热咳嗽，咯血，腹泻，小儿消化不良。外用于溃疡久不收口，湿疹口疮，痔疮，外伤出血。用量3g。

应　　用

1. 口腔炎：儿茶6g，银花、连翘各9g。水煎含漱。
2. 鼻衄：儿茶，研末，浸水，棉花浸药水作鼻孔压迫止血。
3. 痔疮出血：儿茶7.5g，桂皮1.5g，研末，沸水浸半小时后外洗痔疮。
4. 皮肤湿疹、溃疡：儿茶9g，冰片0.6g，轻粉6g，花骨9g，炉甘石，研末水调外敷。
5. 肺结核咯血：儿茶30g，明矾24g，共研细末，水调服。

含羞草科 Mimosaceae



金合欢 *Acacia farnesiana* (L.) Willd.

基　　源 为含羞草科植物金合欢的干燥全株。

原 植 物 有刺灌木或小乔木。枝条回折，有一对由托叶变成的锐刺。二回羽状复叶，羽片4~8对，小叶10~20对，细小，狭矩圆形，无毛。头状花序单生或2~3个簇生，腋生，花黄色，有香味。荚果圆筒形，直或微弯，暗棕色，无毛，表面密生斜纹。

生境分布 生于山坡，河边，或栽培。分布于浙江、福建、台湾、广东、广西、四川、云南等地。

采收加工 夏秋季采收全株，晒干。

性味功能 味微酸、涩，性平。有消痈排脓，收敛止血的功能。

主治用法 用于肺结核，冷性脓肿，风湿性关节炎。用量15~24g。

应　　用

1. 体弱乏力：金合欢15g，加豆腐或鸡、鸭肉炖汤服。
2. 疟疾：金合欢15g，水煎服。
3. 痔疮出血：金合欢15g，研末，沸水浸半小时后外洗痔疮。
4. 肺结核咯血：金合欢15g，研细末，水调服。

含羞草科 Mimosaceae



藤金合欢 *Acacia sinuata* Merr.

基　　源 为含羞草科植物藤金合欢的干燥叶。

原 植 物 别名：南蛇公、小样南蛇勒

木质藤本，高 5m；幼枝有柔毛；枝和叶柄有多数散生的倒钩刺。二回羽状复叶，羽片 6~10 对或更多；叶柄近基部有一个大腺体；在叶轴上部有 1~2 个腺体；小叶片 15~25 对，条状矩圆形，被毛。头状花序数个再组成腋生的大型圆锥花序；花黄色或白色；萼漏斗状。荚果条形，颈直，稍肉质，干后有皱纹，两侧边缘浅波状，种子多数。

生境分布 生于山坡疏林中、灌丛及河边。分布广东、广西。

采收加工 夏秋季采收叶，晒干。

性味功能 味甘、淡，性凉。有解毒消肿的功能。

主治用法 用于腹痛急剧。

应　　用

1. 急剧腹痛：鲜藤金合欢嫩叶捣烂取汁，冲酒服。
2. 牙痛：鲜藤金合欢嫩叶捣烂，雄黄、酒、水各一半，放于鸡蛋壳内在炉上加热外擦。
3. 跌打肿痛：藤金合欢适量，研末，沸水浸半小时后洗敷患处。

含羞草科 Mimosaceae



云　实（云实皮）*Caesalpinia decapetala* (Roth) Alston

基　　源 云实皮为云实科植物云实的根皮。种子也可供药用。

原 植 物 藤本。枝、叶轴及花序均被柔毛和钩刺。2 回羽状复叶，互生，羽片 3~10 对，对生，托叶小，斜卵形，基部有刺 1 对；小叶 8~2 对，长圆形，两端近圆钝，全缘，两面均被短柔毛。总状花序顶生，直立，花多数；总花梗具多刺，花萼下有关节，萼片 5，长圆形，被短柔毛；花瓣 5，黄色，盛开时反卷，基部有短柄；雄蕊 10，离生，2 轮排列。荚果长圆状舌形，沿腹缝线有狭翅，先端有尖喙，成熟时沿腹缝线开裂，。花期 4~6 月，果期 6~10 月。

生境分布 生于山坡灌丛中，丘陵，平原或河岸。分布于河北、陕西、甘肃、河南及长江以南各省区。

采收加工 根全年均可采挖，挖出后洗净，剥取根皮，晒干。

性味功能 味苦、辛，性微温。有解表散寒，祛风除湿，止咳化痰的功能。种子有止痢，驱虫的功能。

主治用法 根皮用于风寒感冒，淋病，肝炎，肝硬化腹水，胃痛，支气管炎，风湿疼痛，跌打损伤，毒蛇咬伤。

应　　用

1. 淋病：云实皮 30g，三白草、积雪草各 15g，水煎服。
2. 肝炎：云实 60g，白芍、白英各 9g，木香 5g，红枣 10 枚，水煎，调白糖服。

云实科 Caesalpiniaceae



苏　木 *Caesalpinia sappan* L.

基　　源 为云实科植物苏木的干燥心材。

原 植 物 别名：红苏木、苏方木、红柴
小乔木。2回复数羽状复叶互生，小叶长圆形，先端钝圆或微凹，基部截形，全缘，有腺点。圆锥花序顶生或腋生，花黄色。荚果，扁斜状倒卵圆形，厚革质,红棕色，有短柔毛，背缝线处明显，不裂。种子椭圆形，褐黄色。花期4~6月，果期8~11月。

生境分布 生于坡地。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、四川、云南等省区。

采收加工 5~7月，将树干砍下，取心材，晒干。


性味功能 味甘、咸、微辛，性平。有活血通经，消肿止痛的功能。

主治用法 用于经瘀血腹刺痛，产后瘀阻，慢性肠炎，吐血，黄疸型肝炎，痢疾，贫血，尿路感染，刀伤出血。

应　　用

1. 跌打损伤所致瘀肿疼痛：苏木、乳香、没药、桃仁、红花，水煎服。
2. 筋骨折伤已愈合，关节强直，肌肉挛缩：苏木、赤芍、没药、乳香、刘寄奴各9g，归尾12g，泽兰6g，一边熏洗，一边按摩。
3. 产后流血过多，头晕，目眩：苏木、党参、麦冬。
4. 血滞经闭腹痛：苏木、红花、香附、归尾、赤芍、牛膝、桃仁、生地、琥珀、五灵脂，水煎服。

云实科 Caesalpiniaceae



腊肠树 *Cassia fustula* L.

基　　源 为云实科植物腊肠树的果实。根、叶、花及种子也供药用。

原 植 物 落叶乔木。双数羽状复叶，小叶3~4对对生，薄革质，宽卵形、卵形或长圆形，先端短渐尖，基部楔形，全缘。总状花序长达30 cm，疏散下垂，花与叶同时开放；无苞片；萼片5，长卵形，开放时反折；花瓣5，黄色，倒卵形，有明显的脉。荚果圆柱形，黑褐色，不开裂，具槽纹3条。种子多数，为横隔膜所分开。花期6~8月。果期10月。

生境分布 生于山地，丘陵地或河岸。台湾、福建、广东、海南、云南等省区有栽培。


采收加工 秋季果实成熟时采摘，晒干。根、树皮，全年可采取，晒干，叶花夏季采收。

主治用法 根用于腹泻，便秘，痢疾，热病高烧，心痛。叶用于皮肤病，轮癣，风温病，中风。花用于便秘，果实用于骨蒸痨热，胃烷病，便秘，胃酸过多，食欲不振等。外用于风湿性疼痛，毒蛇咬伤，胸部闭塞，风痛。种子用于催吐。

应　　用

胃脘痛：取腊肠果制成煎剂，每10ml含鲜果约50g，为1次量，每日服3次，7天为1疗程。

云实科 Caesalpiniaceae



含羞草决明 *Cassia mimosoides* L.

基　　源 为云实科植物含羞草决明的干燥全草。

原 植 物 别名：软肝草、黄瓜香、水皂角、山扁豆
亚灌木状草本。茎多分枝，分枝瘦长，斜升或四散，多少被短毛。双数羽状复叶互生，托叶线形，长尖；小叶25~60对，镰刀状线形，先端短尖。单一或数朵排成短总状花序，花萼5，花瓣5，黄色；雄蕊10；子房线形而扁，花柱内弯。荚果扁平条形，有毛。种子16~25，深褐色，平滑有光泽。花期8~9月，果期9~10月。

生境分布 生于山坡，路旁、草丛中。分布于华北、南延至广东、广西、贵州、云南、台湾等省区。

采收加工 夏、秋季采集全草，晒干或焙干。

性味功能 味甘，性平。有清肝利湿，散瘀化积的功能。

主治用法 用于湿热黄疸，暑热吐泻，水肿，劳伤积瘀，小儿疳积，疔疮痈肿。用量6~25g。

应　　用

1. 黄疸型肝炎：含羞草决明100g，地星宿25g，煨水服。
2. 暑热吐泻：含羞草决明50g，水煎服。
3. 水肿、热淋：含羞草决明、萹蓄各50g，煨水服。
4. 疔疮：鲜含羞草决明叶适量，捣烂，加盐少许，外敷患处。

云实科 Caesalpiniaceae



豆茶决明（山野扁豆）

Cassia nomame Kitagawa

基　　源 山野扁豆为云实科植物豆茶决明的干燥全草。

原 植 物 别名：江芒决明、关门草、山扁豆
一年生草本。茎直立或铺散，多少被毛。双数羽状复叶互生，小叶8~30对，长方披针形，先端圆或急尖，具短尖，基部圆，偏斜，叶缘常有纤毛，晚上小叶闭合，故称“关门草”。花黄色，单生或2至多朵排成短总状花序，腋生；花萼5，分离，外面疏被毛；花瓣5；雄蕊4；子房密被短柔毛。荚果扁平条形，有毛。种子6~12，近菱形，平滑。花期7~8月，果期9~10月。

生境分布 生于山坡，路旁、草丛中。分布于东北、华东、山东等省区。

采收加工 夏、秋季采集全草，晒干，切碎。

性味功能 味甘、微苦，性平。有健脾利湿，止咳化痰的功能。

主治用法 用于慢性肾炎，咳嗽痰多，慢性便秘。用量9~18g。

云实科 Caesalpiniaceae



望江南 *Cassia occidentalis* L.

基　　源 为云实科植物望江南的成熟种子。

原 植 物 一年生半灌木状草本或多年生小灌木。茎有分枝，基部木质化。双数羽状复叶互生，小叶3~5对；叶柄基部有腺体；小叶卵形或椭圆状披针形，先端渐尖，基部圆，全缘。伞房状总状花序；萼5裂；花瓣5，黄色，倒卵形；雄蕊10，上面3个不育。荚果略扁，圆柱形，形似羊角，黄棕色。种子多数，扁卵形。花期7~8月，果期9~10月。

生境分布 生于路旁、草丛或灌丛中。常有栽培。分布于华东、华南、四川等省区。

采收加工 秋季采收成熟果实，脱粒除去杂质，晒干。

性味功能 味甘、苦，性凉；有毒。有清肝明目、健胃润肠、解毒的功能。

主治用法 用于目赤肿痛，头晕头胀，消化不良，胃痛，腹痛，痢疾，便秘。用量6~9g。

应　　用

1. 目赤肿痛，视物不明：望江南15g，冰糖50g，冲开水炖服。
2. 疟疾：望江南9g。炒后研末，冲服。
3. 高血压：望江南3g。炒焦研末，砂糖适量，冲开水代茶常服。



铁刀树 *Cassia siamea* Lam.

基　　源 为云实科植物铁刀树的根、叶、花及种子。

原 植 物 乔木，高10 m。双数羽状复叶，小叶对生，6~10对；革质，长圆形或长圆状椭圆形，先端圆钝，常微凹，有短尖头，基部圆形，全缘，上面光滑无毛，下面粉白色。总状花序生于枝顶叶腋，排成伞房花序状；苞片线形；萼筒短，萼片5，近圆形，不等长，花瓣5，黄色，阔倒卵形，有短柄。荚果扁平，边缘加厚，被柔毛，紫褐色。花期10~11月，果期12月至翌年1月。

生境分布 生于丘陵地、平原、河谷、村边杂木林中或栽培。分布于台湾、广东、海南、广西、云南等省区。

采收加工 根全年可采挖，晒干或鲜用。叶夏、秋季收，晒干。

性味功能 味苦，性平。有祛瘀消肿，利湿消肿的功能。

主治用法 根用于风湿性关节炎，痞满腹胀，头晕，跌打损伤，脚扭伤。叶、花、种子用于腹胀，便秘等。用量，根9~15g。外用适量。叶、花、种子6~9g。

应　　用

1. 风湿性关节炎：铁刀树根9~15g，水煎服或泡酒服。
2. 跌打损伤，脚扭伤：用铁刀树鲜根适量，捣烂，调敷患处。每日换1次药。
3. 便秘腹痛：铁刀树叶9g，水煎服，每日早服1次。



槐叶决明（决明子） *Cassia sophera* L.

基　　源 决明子为云实科植物槐叶决明的种子。

原 植 物 别名：茳芏决明、豆瓣叶、望江南、野苦参
与望江南很接近，但本种的叶较小，有5~10对，椭圆状披针形，顶端急尖或短渐尖。荚果较短，长5~10cm，初时扁而稍厚，成熟时近圆筒形而多少膨胀。花期7~9月，果期10~12月。

生境分布 生于村边、路旁。分布于我国中部、东南部、南部及西南各省区。

采收加工 秋季采收成熟果实，晒干，打下种。

性味功能 味苦，性寒。有消炎，止痛，健胃的功能。

主治用法 用于痢疾，胃痛，肺脓疡，喉炎，淋巴腺炎；用量10~15g。外用于阴道滴虫，烧烫伤，外用适量，煎水熏洗。

应　　用

1. 喉炎，淋巴腺炎：决明子15g。水煎服。
2. 滴虫、阴道炎：决明子适量，煎水熏洗。
3. 烧烫伤：决明子适量，煎水熏洗，并压汁，调红花油，敷患处。
4. 肝火上升头痛、头昏：决明子、钩藤、夏枯草各9g，龙胆草3g，珍珠母6g。水煎服。
5. 火眼红痛，怕光流泪：决明子、木贼、刺蒺藜、菊花各9g。水煎服。



小决明（决明子） *Cassia tora* L.

基　　源 决明子为云实科植物小决明的种子。

原 植 物 一年生草本，全体被短柔毛。叶互生，双数羽状复叶；叶柄上面有沟，下面两对小叶间各有1腺体；小叶3对，倒卵形或倒卵状长圆形，先端圆形，有微突尖，基部广楔形或近圆形，偏斜，全缘。花成对腋生；总花梗被柔毛；萼片5，卵圆形，外面被柔毛；花瓣5，黄色，倒卵形，有短爪，最下面的2瓣稍长；荚果线形、四棱柱形，稍扁，被疏柔毛。种子多粒，菱形，灰绿色，有光泽。花期6~8月，果期9~10月。

生境分布 生于村边、路旁、山坡等地。分布于台湾、广西、云南等省区。

采收加工 秋季采收成熟果实，晒干，收集种子。

性味功能 味苦、甘、咸，微寒。有清肝明目，润肠通便的功能。

主治用法 用于高血压，头痛，眩晕，目赤涩痛，目暗不明，急性眼结膜炎，角膜溃疡，视物不清，青光眼，大便秘结，痈疖疮疡。用量10~15g。

应　　用

同槐叶决明。

紫　荆（紫荆皮）　*Cercis chinensis* Bge.

基　　源　紫荆皮为云实科植物紫荆的茎皮。

原 植 物　落叶灌木或乔木。单叶互生，近革质，三角状圆形，先端急尖，基部心形，全缘。花先叶开放，幼枝上的花与叶同时开放，4~10 花簇生于老枝上或主茎上；花萼钟状，深紫红色，具5钝齿；花冠假蝶形，紫红色或粉红色，花瓣5下面1花瓣最大。荚果扁长椭圆形或狭倒披针形，沿腹缝线有狭翅，顶端有喙，不裂。花期4~5月。果期8~10月。

生境分布　栽培于庭园，屋旁或野生于溪边。分布于辽宁，陕西、甘肃及华北、华东、中南、西南等省区。

采收加工　春、秋季采集，砍下茎或老枝，剥取皮部，晒干。

性味功能　味苦，性平。有活血通经，消肿止痛，清热解毒的功能。


主治用法　用于经闭腹痛，月经不调，痛经，淋病，风湿性关节炎，跌打损伤，咽喉肿痛，牙痛。6~g。外用于痔疮肿痛，虫蛇咬伤，狂犬咬伤，煎水洗或研粉调敷患处。外用适量。

应　　用

1. 风湿性关节炎：紫荆皮6g，水煎服。
3. 筋骨疼痛、湿气流痰：紫荆皮、秦当归、川牛膝、川羌活、木瓜合用。
4. 产后诸淋：紫荆皮15g，半酒半水煎，温服。

附注：花也可供药用。

云实科 Caesalpiniaceae



皂　荚（猪牙皂，皂角刺）

Gleditsia sinensis Lam. (*Gleditsia officinalis* Hemsl.)

基　　源　猪牙皂为云实科植物皂荚的干燥畸形果实；其干燥棘刺为皂角刺。

原 植 物　别名：皂角、天丁

落叶乔木。树干有坚硬的棘刺，刺圆柱形，常分枝。偶数羽状复叶，近革质，长卵状或卵形，总花序顶生或腋生，荚果长条状，肥厚，膨起，紫黑色，有灰色粉霜。或稍弯曲呈新月形，内无种子，称猪牙皂。

生境分布　生于山坡、溪谷等地。分布于全国大部分地区。

采收加工　秋季采收荚果，干燥。皂角刺：全年可采，干燥。

性味功能　味辛，性温；有小毒。猪牙皂有开窍，祛痰，消肿散结的功能。皂角刺有活血消肿，排脓通乳的功能。

主治用法　猪牙皂用于突然昏厥，中风牙关紧闭，喘咳痰壅，癫痫等。皂角刺用于痈肿疮毒，乳汁不下，急性扁桃腺炎等。用量4.5~9g。孕妇忌用。

应　　用

1. 中风牙关紧闭：猪牙皂、明矾，研末，温水调灌。
2. 湿痰壅滞，胸闷咳喘：猪牙皂角1g，焙干研末，红枣汤调服。
3. 疔疮：皂角刺、酢酱草各60g。捣烂敷患处。
4. 痈疽肿毒，疮疡将溃未溃：皂角刺、穿山甲、当归、黄芪、川芎。研细末，调油外涂敷患处。

云实科 Caesalpiniaceae



酸 角 *Tamarindus indica* L.

基 源 为云实植物酸角的果实。

原植物 乔木。双数羽状复叶，互生；小叶10~20对，长圆形，基部偏斜。总状花序顶生，花黄色或有紫红色条纹，小苞片2，花前紧包花蕾；萼齿4，花后反折；花瓣5，后方3片发育，皱折，前方2片小；荚果圆柱状长圆形，肿胀，棕褐色，直或弯拱状，有缢缩。种子3~4，褐色，有光泽。花期5~8月，果期12至翌年5月。

生境分布 生于杂木林中，村边。我国台湾、福建、广东、海南、广西、云南等省区常见栽培。

采收加工 春季采摘，除去种子，晒干。

性味功能 味甘、酸，性凉。有解热消暑，消食化积的功能。

主治用法 用于中暑，发热口喝，食欲不振，腹痛，小儿疳积，妊娠呕吐，便秘，疟疾，蛔虫病和抗坏血病的作用。用量15~30g。

应 用

1. 便秘，食欲不振，妊娠呕吐：酸角15~30g，煎水服或生嚼。
2. 小儿疳积，蛔虫病，腹痛，疟疾：酸角15~30g，煎水服。
3. 发热口喝，预防中暑：酸角15~30g，加红糖适量，泡开水冲服。

附注：民间用本品作蜜饯或制成各种调味酱及泡菜。果汁加糖水是很好的清凉饮料。

云实科 Caesalpiniaceae



广州相思子（鸡骨草） *Abrus cantoniensis* Hance

基 源 鸡骨草为蝶形花科植物广州相思子的全草。

原植物 小灌木，有浅棕黄色短粗毛。双数羽状复叶互生，托叶线状披针形；小叶8~12对，小叶柄短，小托叶刺毛状；小叶膜质，长圆形或倒卵形，先端平截，有小尖头，基部宽楔形或圆形，上面被疏毛，下面有紧贴粗毛，小脉两面凸起。总状花序腋生，3~5花聚生于花序总轴短枝上，花萼杯状，黄绿色；花冠淡紫红色，旗瓣宽椭圆形，翼瓣狭，龙骨瓣弓形。荚果扁长圆形，有黄色短毛，先端有喙。花期7~8月，果期8~9月。

生境分布 生于旱坡地区性灌丛边或草丛中。分布于广东、广西等省区。

采收加工 全年均可采挖，除去泥沙及荚果，晒干。

性味功能 味微甘，性凉。有清热利湿，舒肝止痛，活血散瘀的功能。

主治用法 用于慢性肝炎，肝硬化腹水，胃痛，小便刺痛，风湿骨痛，跌打损伤，毒蛇咬伤，乳腺炎。用量30~60g。

应 用

同毛鸡骨草。

蝶形花科 Fabaceae



毛鸡骨草（鸡骨草） *Abrus mollis* Hance

基　　源 鸡骨草为蝶形花科 植物毛鸡骨草的全草。

原 植 物 别名：油甘藤

缠绕藤本。全株密被黄色长柔毛，偶数羽状复叶，小叶11~16对，小叶片长圆形，最上的一对常为倒卵形，先端平截，有小尖头，小脉不明显。总状花序腋生。雄蕊9，花丝合生成一管。荚果长圆形，扁平，先端有喙。花期7~8月，果期8~9月。

生境分布 生于丘陵坡地灌丛中或林下。分布于广东、广西等省区。

采收加工 全年均可采挖，除去泥沙及荚果，晒干。

性味功能 味微甘，性凉。有清热利湿，舒肝止痛，活血散瘀的功能。

主治用法 用于慢性肝炎，肝硬化腹水，胃痛，小便刺痛，风湿骨痛，跌打损伤，毒蛇咬伤，乳腺炎。用量30~60g。

应　　用

1. 急性黄疸型传染性肝炎：鸡骨草（去果荚及种子）、茵陈、地耳草各30g，山栀子15g，水煎服。
2. 胆囊炎，肝硬化腹水，黄疸，胃痛：鸡骨草（去果荚及种子），水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



相思子 *Abrus precatorius* L.

基　　源 为蝶形花科植物相思子的干燥种子；根、藤、叶也可入药。

原 植 物 缠绕藤本。茎丛生，疏生贴伏细刚毛。叶互生，偶数羽状复叶，叶轴被稀毛；小叶片近长方形至倒卵形，先端钝圆，具细尖，基部广楔形或圆形，全缘，上面无毛，下面被贴伏细刚毛。总状花序腋生，花小，淡紫色；花萼钟状、萼齿4裂花冠蝶形；荚果黄绿色，先端有短喙，表面被白色细刚毛，种子椭圆形，上部红色，基部近种脐部分黑色，有光泽。花期3~5月，果期5~6月。

生境分布 生于干燥的丘陵路旁或近海岸灌丛中。分布于广东、广西、云南、福建、台湾等省区。

采收加工 夏、秋季摘收成熟果荚，晒干、打出种子，除净杂质、再晒干。


性味功能 味苦、性平，有大毒。有涌吐、杀虫的功能。

主治用法 用于疥癣等皮肤病。本品不宜内服，以防中毒。外用适量，捣烂涂敷患处。

应　　用

1. 癣疥，痈疮，湿疹：相思子（炒），研粉调油涂患处。
2. 皮肤癌：相思子，捣烂涂敷皮肤癌患处。

蝶形花科 Fabaceae



沙冬青 *Ammopiptanthus mongolicus* Cheng f.

基　　源 为蝶形花科植物沙冬青的茎、叶。

原 植 物 别名：蒙古黄花木、冬青

常绿小灌木，高达2m。树皮幼时淡黄褐色，后变灰色，小枝密被贴覆的灰白色柔毛。三出复叶互生，有短柄；托叶极小，与短叶柄合生抱茎；小叶无柄，小叶1~3，长椭圆形或菱状椭圆形，先端急尖或圆形，全缘，基部楔形。短总状花序顶生，花8~10，黄色；萼钟形，疏被柔毛；花冠蝶形；雄蕊分离；子房条形。荚果扁，长方扁柱状。种子4，肾形。花期4~5月。

生境分布 生于沙丘、河边或山坡开阔处。分布于内蒙古、甘肃及宁夏等省区。

采收加工 随用随采，鲜用。


性味功能 味辛、苦，性温；有毒。有祛风除湿，活血散瘀的功能。

主治用法 用于冻伤，慢性风湿性关节痛。

应　　用

1. 冻伤：沙冬青鲜茎叶、茄根，煎洗患处，并熬5小时成浓缩膏涂敷患处。
2. 慢性风湿性关节痛：沙冬青鲜枝叶、侧柏叶各500g，沙红柳、麻黄各1000g，小白蒿1500g。煎水熏洗患处。

蝶形花科 Fabaceae



小沙冬青 *Ammopiptanthus nanus* Cheng f.

基　　源 蝶形花科植物小沙冬青的茎、叶。

原 植 物 与沙冬青相似，区别在于：

叶通常为单叶，稀三出复叶；小叶阔椭圆形或近卵形。荚果矩圆形，微膨胀。

生境分布 生于沙丘、河边或山坡开阔处。分布于新疆地区。

采收加工 随用随采，鲜用。


性味功能 味辛、苦，性温；有毒。有祛风除湿，活血散瘀的功能。

主治用法 用于冻伤。

应　　用

1. 冻伤：沙冬青鲜茎叶、茄根，煎洗患处，并熬5小时成浓缩膏涂敷患处。
2. 慢性风湿性关节痛：沙冬青鲜枝叶、侧柏叶各500g，沙红柳、麻黄各1000g，小白蒿1500g。煎水熏洗患处。

蝶形花科 Fabaceae



扁茎黄芪（沙苑子） *Astragalus complanatus* Bunge

基　　源 沙苑子为蝶形花科植物扁茎黄芪的干燥成熟种子。

原 植 物 别名：蔓黄芪

多年生草本。茎稍扁，多分枝，基部倾斜。羽状复叶互生；小叶9~21，椭圆形，先端钝或微缺，基部圆形，全缘。总状花序腋生，花3~9朵；花萼钟状，萼齿5；花冠蝶形，旗瓣近圆形，先端凹，基部有短爪，翼瓣稍短，龙骨瓣与旗瓣等长。荚果纺锤形，稍膨胀，先端有喙，腹稍扁，疏生短毛。种子20~30粒，圆肾形。花期8~9月。果期9~10月。

生境分布 生于路边潮湿地、阳坡或灌丛中。分布于东北、华北及陕西、宁夏、甘肃等省区。

采收加工 秋末冬初果实成熟尚未开裂时，采收种子，晒干。

性味功能 味甘、性温。有补肾，固精，缩尿，养肝明目的功能。

主治用法 用于头晕目昏，肾虚腰痛，遗精早泄，白浊带下，遗尿，尿频，小便余沥，尿血，痔漏等症。用量6~9g。

应　　用

1. 肝肾不足所致视力减退：沙苑子、枸杞子、熟地，水煎服。
2. 老年性白内障：沙苑子、石菖蒲、女贞子、生地黄、菟丝子、夜明砂各2g，研细末，水煎服。
3. 腰膝酸软，遗精：沙苑子、菟丝子各15g，枸杞子、补骨脂、炒杜仲各9g，水煎服。
4. 肾虚腰痛：沙苑子50g，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



膜荚黄芪（黄芪）

Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.

基　　源 黄芪为蝶形花科植物膜荚黄芪的干燥根。

原 植 物 别名：条芪

直立，多年生草本。奇数羽状复叶。托叶条状披针形，小叶13~ 31，椭圆形、椭圆状卵形，先端钝圆或稍凹，基部圆形。总状花序腋生。萼钟状。花冠黄色或淡黄色旗瓣倒卵形，先端稍凹，基部有短爪。子房有柄，有柔毛。荚果半椭圆形，有短伏毛。果皮膜质，稍　膨胀。花期7~8月，果期8~9月。

生境分布 生于林缘、灌丛、林间草地及疏林下。分布于东北、华北、西北及山东、四川等省区。

采收加工 春、秋二季采挖，晒至半干，堆放1~2天后继续晒至干透。

性味功能 味甘，性微温。有补气固表，利水消肿，托毒排脓、生肌的功能。炙用有补中益气的功能。

主治用法 用于气短心悸，乏力，虚脱，自汗，盗汗，体虚浮肿，慢性肾炎，久泻，脱肛，子宫脱垂，痈疽难溃，疮口久不愈合。用量9~30g，煎服。

应　　用

同蒙古黄芪。

蝶形花科 Fabaceae





蒙古黄芪（黄芪）

Astragalus membranaceus (Fisch.) Beg. var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao

基　　源 黄芪为蝶形花科植物蒙古黄芪的干燥根。

原 植 物 别名：白皮芪

多年生草本。主根长而粗壮，根条较顺直。茎直立，有分枝。奇数羽状复叶，小叶12~18对；小叶宽椭圆形、椭圆形或长圆形，两端近圆形。总状花序腋生，长于叶，有花5~20朵；花萼钟状，密生短柔毛；萼齿5；花冠蝶形，黄色或淡黄色，雄蕊10；子房光滑无，结果时延伸突出萼外。荚果膨胀，膜质，半卵圆形，果皮光滑无毛。花期6~7月，果期7~9月。

生境分布 生于向阳草地及山坡。分布于黑龙江、吉林及华北、西北。

采收加工 春、秋二季采挖，除去须根及根头，晒干。


性味功能 味甘，性微温。有补气固表，利水消肿，脱毒排脓、生肌的功能。炙用有补中益气的功能。

主治用法 用于气短心悸，乏力，虚脱，自汗，盗汗，体虚浮肿，慢性肾炎，久泻，脱肛，子宫脱垂。用量9~30g。

应　　用

1. 糖尿病：黄芪、淮山药、生地、天花粉、五味子，水煎服。
2. 肾炎蛋白尿阳性：黄芪30g，水煎服。
3. 自汗：黄芪、防风各3g，白术6g，姜三片，水煎服。
4. 脱肛、子宫脱垂：生黄芪200g，防风120g，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



紫云英 *Astragalus sinicus* Linn.

基　　源 为蝶形花植物紫云英的干燥根、全草和种子。

原 植 物 别名：苕子草、沙蒺藜、红花草、翘摇

一年生草本。单数羽状复叶，互生，小叶3~6对，宽椭圆形或倒卵形。花紫红色，总状花序排列紧密，呈半圆形，花萼钟状，花冠蝶形，旗瓣紫红色，翼瓣白色；雄蕊二体；子房有短柄。荚果长方条形，微弯，带黑色。花期8~10月。

生境分布 生于田坎、草地。分布于陕西、河南、江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、广东、贵州、四川及云南等省区。广泛栽培。

采收加工 夏、秋季采收，晒干或鲜用。

性味功能 味微辛、微甘，性平。有祛风明目，健脾益气，解毒止痛的功能。

主治用法 根用于肝炎，营养性浮肿，白带，月经不调。全草用于急性结膜炎，神经痛，带状疱疹，疮疖痈肿，痔疮。外用适量，鲜草捣烂敷患处，或干草研粉调服。

应　　用

1. 肝炎，营养性浮肿：鲜紫云英根90g，水煎服。
2. 白带，月经不调：鲜紫云英根90g，水煎服。
3. 急性结膜炎：紫云英全草，水煎熏洗眼部。
4. 带状疱疹，疮疖痈肿：鲜紫云英全草适量，捣烂敷患处。

蝶形花科 Fabaceae



木　豆　*Cajanus cajan* Millsp.

基　　源	为蝶形花科植物木豆的干燥根。
原 植 物	别名：豆蓉、三叶豆、野黄豆 灌木，高1~3m，全体灰绿色。小枝有灰色短柔毛。三出复叶互生，披针形，先端渐尖，两面被丝状白毛，下面毛密并有黄色腺点。总状花序腋生，有花数朵，花蝶形，黄色；萼钟形，5齿，内外生短柔毛并有腺点；旗瓣背面有紫褐色纵线纹，基部有丝状短爪，爪顶有一对弯钩状附属体；雄蕊10；心皮1。荚果扁条形，有线状长喙，被黄色柔毛，果皮在种子间有凹陷的斜槽稍呈扭曲状。种子3~5，近圆形，暗红色，有时有褐色斑点。花期6~7月。
生境分布	江苏、广东、广西、四川、云南等省区有栽培。
采收加工	秋冬采挖根部，切段晒干。
性味功能	味辛、涩，性平。有利湿消肿，散瘀止痛的功能。
主治用法	用于黄疸型肝炎，风湿关节痛，跌打损伤，瘀血肿痛，便血，衄血。用量9~15g，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.

基　　源 为蝶形花科植物刀豆的干燥成熟种子。

原 植 物 一年生草质藤本。三出复叶，卵形，先端渐尖，基部宽楔形，全缘，侧生小叶基部圆形，偏斜。总状花序腋生，2~3朵簇生花序轴上；萼管上唇2裂，下唇3裂；花冠蝶形，淡红色或淡紫色，旗瓣顶端凹入，基部有耳及宽爪，翼瓣和龙骨瓣具向下的耳。荚果线形，扁而弯曲，先端弯曲或钩状，边缘有隆脊。种子椭圆形，粉红色、红色或褐色。花期6~9月，果期8~11月。

生境分布 栽培于温暖地带。分布于江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、广东、广西、陕西、四川等省区。

采收加工 秋季种子成熟时采收荚果，剥取种子，晒干。

性味功能 味甘，性温。有温中下气，益肾补元的功能。

主治用法 用于虚寒呃逆，呕吐，肾虚腰痛，痰喘。用量4.5~9g。

应　　用

1. 小儿疝气：刀豆4.5g，研粉，开水冲服。
2. 气滞呃逆，膈闷不舒：刀豆6g，开水送服。
3. 百日咳：刀豆二粒，甘草3g。加冰糖适量，水煎服。
4. 鼻渊：刀豆9g，文火研干为末，酒服。

附注：刀豆的果壳有通经活血，止泻的功能，用于腰痛，久痢，闭经。根有散瘀止痛的功能，用于跌打损伤，腰痛。用量30~60g。

蝶形花科 Fabaceae



响铃豆 *Crotalaria albida* Heyne ex Roth

基　　源 为蝶形花科植物响铃豆的根及全草。

原 植 物 别名：黄花地丁、小响铃、马口铃

多年生簇生草本或半灌木状，高30~150cm，全株有白色丝毛。主根圆柱形，扭曲，多纵纹。叶互生，倒卵状针形或倒披针形，先端钝圆，有小突尖，基部楔形，上面光滑，下面生疏柔毛。总状花序顶生或腋生，黄色，萼深裂，上面2齿，下面3齿，有短毛；花冠蝶形，较萼稍长；雄蕊10，合生。荚果圆柱形，膨胀，光滑。种子6~12，风吹摇动即响，故名“响铃豆”。花期5~7月。

生境分布 生于山坡草丛、灌丛或坡地路旁。分布于华东、华南及西南等地区。

采收加工 夏、秋季采集全草，切碎，晒干。

性味功能 味苦、辛，性凉。有清热解毒，止咳平喘，截疟的功能。

主治用法 用于尿道炎，膀胱炎，肝炎，胃肠炎，痢疾，支气管炎，肺炎，哮喘，疟疾；外用于痈肿疮疡，乳腺炎。用量9~15g。外用适量，鲜叶捣烂外敷患处。

应　　用

1. 尿道炎，膀胱炎：响铃豆30~45g，水煎，白酒为引内服。
2. 痈肿疮疡，乳腺炎：鲜响铃豆叶，捣烂外敷患处。
3. 胃肠炎，痢疾：响铃豆30g，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



假地兰 *Crotalaria ferruginea* Grah. ex Benth.

基　　源 蝶形花科植物假地兰的带根全草入药。

原 植 物 别名：响铃草、野花生、荷猪草、马响铃
多年生直立草本，根长达60cm以上。茎、枝分枝多，有稍长而扩展的丝光质毛，略粗糙。单叶互生，矩形，长卵形或长椭圆形，先端钝或微尖，基部窄或略呈楔形，两面有柔毛。总状花序顶生或腋生，花2~6朵；萼筒很短，花冠，蝶形，黄色，旗瓣有爪，翼瓣倒卵状长圆形，龙骨瓣与翼瓣等大，向内弯曲。荚果膨胀成膀胱状。种子20~30，肾形。花期6~10月。

生境分布 生于山坡、荒地。分布于全国各地，以西南为多见。

采收加工 夏、秋季采集全草，切段，晒干。

性味功能 味苦、微酸，性寒。有敛肺气，补脾肾，利小便，消肿毒的功能。

主治用法 用于久咳痰血，耳鸣，耳聋，梦遗，慢性肾炎，膀胱炎，肾结石，扁桃腺炎，淋巴腺炎，疔毒，恶疮。

应　　用

1. 久咳，痰中带血：假地兰蜜炙30g，水煎服。
2. 气虚耳鸣：假地兰24g，猪耳朵一对，加盐炖服。
3. 疔毒，痈肿疮疡，乳腺炎：鲜假地兰，捣烂外敷患处。
4. 病后耳聋：假地兰24g，石菖蒲9g，水煎服。
5. 夜梦遗精：假地兰、夜寒苏、爬岩龙、毛药各15g，双肾草9g，炖肉服。

蝶形花科 Fabaceae



野百合（农吉利） *Crotalaria sessiliflora* L.

基　　源 农吉利为蝶形花植物野百合的的全草。

原 植 物 一年生草本，被紧贴粗糙毛。单叶互生，着生较密，有刚毛状小托叶，叶片条形或条状披针形，两端均窄，先端长渐尖，有束状毛，基部楔形，下延成不明显短柄，下面有丝光毛。总状花序顶生和腋生，花萼2深裂呈二唇形；花冠蝶形，紫色或淡蓝色；雄蕊10，花药二型；子房无毛。荚果下垂，长椭圆形，包于宿存花萼内，暗紫褐色。种子肾形。花期7~8。

生境分布 生于村边、路旁及溪沟草丛中。分布于华东、中南及西南各地区。

采收加工 秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。


性味功能 味淡，性平；有毒。有清热、利湿、解毒的功能。

主治用法 用于疔疮、皮肤鳞状上皮癌、食道癌、宫颈癌。用量15~30g，必要时增至60g；外用，鲜品捣烂或干品研末醋调外敷。

应　　用

1. 疔疮：鲜农吉利适量，捣烂外敷患处。或水煎外洗。
2. 毒蛇咬伤：鲜农吉利适量，捣烂外敷患处。
3. 喘息型慢性气管炎：农吉利100g，文火浓煎，加糖适量，口服。
4. 皮肤鳞状上皮癌：农吉利鲜品适量捣烂，直接外敷或干草研粉，用水调糊外敷。

蝶形花科 Fabaceae



广东金钱草（广金钱草）

Desmodium styracifolium Merr.

基　　源　广金钱草为蝶形花科植物广东金钱草的干燥全草。

原 植 物　别名：金钱草、落地金钱、铜钱草

半灌木状草本。茎基部木质，枝与叶柄密被黄色短柔毛。叶互生，小叶1~3，中间小叶大，圆形，侧生小叶长圆形，较小，先端微凹，基部浅心形或近平截，全缘，上面无毛，下面密被银白色丝毛，侧脉羽状，平行，约为10对，小托叶钻形。总状花序腋生或顶生，苞片卵状三角形，每个苞片内有花2朵，花小；花萼被粗毛，萼齿披针形；花冠蝶形，紫色。荚果线状长圆形，被短柔毛和钩状毛。花期6~9月，果期7~10月。

生境分布　生于山坡草地或丘陵灌丛中。分布于福建、湖南、广西和广东等省区。

采收加工　夏、秋两季割取地上部分，切段，晒干或鲜用。

性味功能　味甘、淡，性微寒。有清热，利尿，排石功能。

主治用法　用于泌尿系感染，泌尿系结石，胆石症，急性黄疸型肝炎。用量15~60g。孕妇忌服。

应　　用

1. 泌尿系感染：广金钱草24g，车前草、金银花、海金沙各15g。水煎服。
2. 黄疸型肝炎，湿热黄疸：广金钱草、茵陈蒿、栀子。各9g水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



鹦哥花（海桐皮）　*Erythrina arborescons* Roxb.

基　　源　海桐皮为蝶形花科植物鹦哥花的干燥树皮或根皮。

原 植 物　乔木，高7~8 m，茎干有粗锐硬刺。复叶互生，小叶3，肾状扁圆形，基部近圆形或截形，小叶柄粗短，有腺体。总状花序腋生，密生于总花梗上部；花萼钟状，2唇形；花冠红色，旗瓣矩圆状椭圆形，翼瓣短小，龙骨连合，菱形。荚果棱形，种子1~2粒，肾形，黑色有光泽。花期8~9月，果期10月。

生境分布　生于山坡、沟谷或栽培作行道树。分布于四川、贵州、云南等省。

采收加工　全年可砍枝或挖根，剥下树皮或根皮，晒干。


性味功能　有祛风湿，通经络，止痒的功能。

主治用法　用于风湿痹痛，腰膝疼痛。外用治疥癣、湿疹。用量6~12 g，外用适量。

应　　用

同刺桐。

蝶形花科 Fabaceae



刺 桐（海桐皮） *Erythrina variegata* L.

(*Erythrina variegata* L. var. *orientalis* (L.) Merr.)

基　　源　海桐皮为蝶形花科植物刺桐的干燥树皮或根皮。

原 植 物　高大乔木。枝上有叶痕及皮刺。复叶互生，密集枝端，基部有一对膨大密槽；小叶3，菱状肾形，顶端尖，基部圆，稍偏斜，基出脉3条。总状花序顶生，密生黄色星状柔毛；花萼佛焰苞状，萼齿3~5；花冠蝶形鲜红色，旗瓣倒卵状披针形，翼瓣与龙骨瓣近等长。荚果串珠状，木质，肥厚，长达30cm。种子圆肾形，红褐色。花期3~9月，果期4~10月。

生境分布　生于山地、村旁、山坡林中，也有栽培。分布于浙江、福建、湖南、湖北、广东、广西、贵州及云南等省区。

采收加工　全年可砍枝或挖根，剥下树皮或根皮后晒干。


性味功能　有祛风湿，通经络，止痒的功能。

主治用法　用于风湿痹痛，腰膝疼痛。外用于疥癣，湿疹。用量6~12g；外用适量。

应　　用

1. 跌打肿痛，风湿性腰腿痛：海桐皮9g，酒浸二周，外揉患处研粉。
2. 小儿疳积、蛔虫病：海桐皮3g，冲服。
3. 中恶霍乱：海桐皮，煮汁服。
4. 产后关节风痛：海桐皮9g，五加皮、钻地风适量，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



大　豆（大豆黄卷） *Glycine max* (L.) Merr.

基　　源　大豆黄卷为蝶形花科植物大豆的种子经发芽干燥而成。

原 植 物　一年生草本，全株密被黄褐色长硬毛。三出复叶，卵形、长卵形，先端钝或急尖，基圆形、宽楔形或截形，全缘。总状花序腋生，花2~10朵；花萼绿色，钟状，5齿裂；花冠蝶形，白色，淡红色或紫色；雄蕊10，9枚联合1枚离生。荚带状矩形，具短柄，下垂，黄绿色或黄褐色，密生长硬　毛。种子卵圆形或近球形，种皮黄色、绿色褐色、黑色等。花期6~7月，果期7~9月。

生境分布　全国各地均有栽培。以东北、华北栽培面积最广。

采收加工　春秋二季取籽粒饱满的大豆，用水浸泡至膨胀，将水放出，用湿布覆盖，每日用清水冲洗一次，等芽长至0.5~1cm时，摊开，晒干。

性味功能　味甘，性平。有清热，利湿，解表的功能。

主治用法　用于暑湿发热，胸闷不舒，肢体疼痛，水肿胀满。用量9~15 g。

应　　用

1. 高血脂、高血压、动脉硬化：大豆黄卷，水煎服。
2. 水肿胀满，大小便涩：大豆黄卷（醋拌炒干）、大黄、橘皮，水煎服。
3. 头风湿痹，暑湿发热：大豆黄卷，温水服。
4. 感冒发痛，头痛：大豆黄卷、葱白各9g，生姜4.5g，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



光果甘草（甘草） *Glycyrrhiza glabra* L.

基　　源 甘草为蝶形花科植物光果甘草的根及根茎。

原植物 多年生草本。根茎圆柱形。茎直立，稍木质，密生淡黄色褐腺点和鳞片状腺体，部分有白霜，无腺毛。羽状复叶，互生，小叶11~19片，长椭圆形或狭长卵形，下面密生腺点。花序穗状，花稀疏。果序与叶等长或稍长。荚果扁而直，多为长圆形，光滑或有少许不明显腺瘤。种子3~4粒。花期6~8月，果期7~8月。

生境分布 生于荒漠、半荒漠或带盐碱草原、荒地。分布于新疆北部、青海、甘肃等省区。

采收加工 春、秋两季采挖，捆好，晒干。也有将栓皮削去，称为粉甘草。生用或蜜炙用。

性味功能 味甘，性平。有补脾益气，止咳祛痰，清热解毒，缓急定痛，调和药性的功能。

主治用法 用于脾胃虚弱，中气不足，咳嗽气喘，食少倦怠，心悸气短，咽喉肿痛，痈疽疮毒，缓和药物烈性。用量1.5~9g；清热应生用，补中宜炙用。

应　　用

1. 传染性肝炎：甘草9g，大枣9枚，水煎服。
2. 血小板减少性紫癜：甘草50g，水煎服。
3. 烫火灼疮：甘草，水煎，调蜜涂患处。
4. 胃及十二指肠溃疡：甘草，乌贼骨、瓦楞子、陈皮、蜂蜜，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



胀果甘草（甘草） *Glycyrrhiza inflata* Batal

基　　源 甘草为蝶形花科植物胀果甘草的根及根茎。

原植物 多年生草本，有密集成片的淡黄褐色鳞片状腺体。根茎粗壮木质。羽状复叶，互生，小叶3~5，偶有7片，卵形、椭圆形至长圆形，边缘波卷状，有皱褶，上面暗绿色，有黄褐色腺点。总状花序腋生，一般与叶等长；花萼5裂；花冠蝶形，紫色。荚果较短，直而膨胀，无腺毛，光滑或具腺体状刺毛。种子1~4。花期5~7月。果期6~10月。

生境分布 生于盐渍化壤土，一般表层盐化、强盐化或盐渍化芦苇滩草原上。分布于甘肃、青海、新疆等省区。

采收加工 春、秋两季采挖，除去残茎、须根，按根粗细、大小分等级，捆好，晒干。也有将栓皮削去，称为粉甘草。生用或蜜炙用。

性味功能 味甘，性平。有补脾益气，止咳祛痰，清热解毒，缓急定痛，调和药性的功能。

主治用法 用于脾胃虚弱，中气不足，咳嗽气喘，食少倦怠，心悸气短，四肢挛急疼痛，腹痛便溏，脏燥，咽喉肿痛，痈疽疮毒，解药毒，缓和药物烈性。用量1.5~9g；清热应生用，补中宜炙用。反大戟、芫花、甘遂、海藻。

应　　用

同光果甘草。

蝶形花科 Fabaceae



甘　草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch

基　　源 为蝶形花科植物甘草的根及根状茎。

原 植 物 别名：乌拉尔甘草、甜草、生甘草

多年生草本。根粗壮，味甜，外皮红棕色或暗棕色。茎直立，被白色短毛和刺毛状腺体。单数羽状复叶互生；小叶卵状椭圆形，先端钝圆，基部浑圆，两面被腺体及短毛。总状花序腋生；花萼钟状，被短毛和刺毛状腺体；蝶形花冠淡红紫色。荚果条状，呈镰状以至环状弯曲，密被棕色刺毛状腺体。花期6~7月，果期7~8月。

生境分布 生于草原及山坡。分布于东北、华北、西北等地区。

采收加工 秋季采挖，分等打成小捆，于通风处风干。

性味功能 味甜，性平。有补脾益气，止咳化痰，清热解毒，缓急定痛，调和药性的功能。

主治用法 用于脾胃虚弱，中气不足，咳嗽气短，痈疽疮毒，缓和药物烈性，解药毒。用量1.5~9g。清热应生用，补中宜炙用。反大戟、芫花、甘遂、海藻。

应　　用

同光果甘草。

蝶形花科 Fabaceae



米口袋（甜地丁）

Gueldenstaedia verna Boriss. subsp. *multiflora* Tsui

基　　源 甜地丁为蝶形花科植物米口袋的干燥全草。

原 植 物 多年生草本，全株被白色柔毛，果期后毛渐少。根茎短，主根长圆锥形或圆柱形。叶丛生，多数，奇数羽状复叶，广椭圆形、卵形或近披针形，基部圆形或广楔形，先端钝或微凹，具细尖，全缘。伞形花序梗从叶丛中抽出，顶端有花2~5(8)朵，小花梗极短，花萼钟形，5裂；花冠蝶形，紫堇色，基部渐窄成爪，翼瓣长圆形，上端稍宽，基部有细爪；雄蕊10枚，二体；子房密被柔毛。荚果圆筒状。种子肾形。花期4~5月，果期5~6月。

生境分布 生于向阳草地、山坡、田野、路旁。分布于全国各地。

采收加工 4~5月间挖取全草，洗去泥土，晒干。

性味功能 味甘、苦，性寒。有清热解毒，凉血消肿的功能。

主治用法 用于痈肿疔疮，湿热黄疸。用量6~30g。外用适量。

应　　用

1. 前列腺炎：甜地丁、紫参、车前草各15g，海金沙50g，水煎服。
2. 痈疽发背、疔疮、恶疮：鲜甜地丁，捣烂绞汁，敷患处。
3. 化脓性感染，淋巴结核：甜地丁、蒲公黄、半边莲各15g，水煎服。
4. 湿热黄疸：甜地丁、虎杖各3g，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae





多序岩黄芪（红芪） *Hedysarum polybotrys* Hand.-Mazz.

基　　源 红芪为蝶形花科植物多序岩黄芪的干燥根。

原 植 物 多年生草本。主根粗壮，暗红褐色。奇数羽状复叶互生，小叶3~12对，卵状长圆形，先端具小尖头，基部圆钝，下面被贴伏柔毛。总状花序腋生，花多数，花萼斜宽钟状；花冠淡黄色，旗瓣倒长卵形，微凹，翼瓣线形，龙骨瓣长于旗瓣。荚果3~5荚节，被短柔毛，节荚近圆形具网纹和狭翅。花期6~8月，果期7~9月。

生境分布 生于阳坡或灌丛。分布宁夏、甘肃南部和四川西部等。

采收加工 10月中旬深挖根部，堆起发热，晒至柔软时，用手揉搓理顺根条，扎成小把，晾晒至干透即可。

性味功能 味甘，性微温。有补气升阳，固表止汗，利水消肿，托毒排脓，生肌的功能。

主治用法 用于气短心悸，乏力，虚脱，自汗，盗汗，体虚浮肿，慢性肾炎，久泻，脱肛，子宫脱垂，痈疽难溃，疮口久不愈合。用量9~30g。补气宜炙用，止汗、利尿、托毒排脓，生肌宜生用。

应　　用

1. 脱肛、子宫脱垂，崩漏：红芪、炙甘草各6g，党参12g，白术4.5g，当归、陈皮、升麻、柴胡各3g，水煎服。
2. 糖尿病：红芪、淮山药、生地、天花粉、五味子，水煎服。
3. 急、慢性肾炎：红芪、防已、白术、甘草，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae

木　蓝（青黛） *Indigofera tinctoria* L.

基　　源 青黛为蝶形花科植物木蓝的叶或茎叶的加工品。

原 植 物 灌木。茎直立，幼枝有棱，有白色短毛。单数羽状复叶，互生；小叶7~15，对生；小叶倒卵状椭圆形，先端钝圆，有小尖头，基部楔形，全缘，两面有丁字毛；叶干时带蓝黑色。总状花序，腋生；花萼较小，斜形，有毛，上部5齿裂；花冠蝶形，红黄色，旗瓣宽倒卵形，背面有毛，翼瓣卵圆形，龙骨瓣匙形，爪上有距。荚果条状圆柱形，稍弯曲，棕黑色，无毛。花期5~6月，果期7~8月。

生境分布 生于山坡草丛或灌丛中。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、湖北、四川、云南等省区。

采收加工 夏、秋茎叶，入缸内，用清水浸2~3昼夜，至叶烂脱枝时，捞去枝条，每10斤叶加入石灰1斤，充分搅拌，至浸液成紫红色时，捞出叶面泡末，晒干。

性味功能 味咸，性寒。有清热解毒，凉血消斑的功能。

主治用法 用于肺热咳嗽，咽疮喉肿，流行性腮腺炎，病毒性肝炎，高热惊痫，热毒发斑，衄血，吐血，咯血，疮肿，丹毒等。用量1.5–3g。外用适量，干撒或调敷。

应　　用

1. 乙型脑炎：青黛50g，水煎服。
2. 腮腺炎：青黛50g，水煎服。并加醋捣烂绞汁，涂敷患处。

蝶形花科 Fabaceae



扁　豆（白扁豆）

Lablab purpureus Sweet *(Dolichos ablab* L.)

基　　源　白扁豆为蝶形花科植物扁豆的干燥成熟种子。

原 植 物　别名：茶豆（江苏）、白眉豆（安徽）
一年生缠绕草本。三出复叶互生；顶生小叶菱卵形，先端急尖、突尖或渐尖，基部宽楔形或圆形，全缘，两面有短硬毛；侧生小叶斜卵形。总状花序腋生，直立；花2~20朵丛生；花萼宽钟状，萼齿5；花冠蝶形，白色；雄蕊10，2体；子房条形，生柔毛，基部有腺体。荚果扁平，镰刀状半月形或长圆形，边缘弯曲或直，先端有尖喙。种子2~5粒，肾形，黑色、紫色或白色。花期6~8月。果期8~10月。

生境分布　全国各地均有栽培。

采收加工　秋、冬二季采收成熟果实，晒干，取出种子，再晒干。

性味功能　味甘，性平。有健脾化湿，和中消暑的功能。

主治用法　用于脾胃虚弱，食欲不振，大便溏泻，白带过多，暑湿吐泻，胸闷腹胀。用量9~15g。

应　　用

1. 夏季胃肠型感冒、急性胃肠炎、消化不良：白扁豆（炒）18g，香薷4.5g，厚朴6g，水煎服。
2. 慢性腹泻：白扁豆，炒熟，研粉，调服。
3. 淋浊，白带过多：白扁豆50g，炒香，研末，米汤调服。
4. 砒霜中毒：白扁豆，生研，水绞汁饮。

蝶形花科 Fabaceae



亮叶崖豆藤　*Millettia nitida* Benth.

基　　源　为蝶形花植物亮叶崖豆藤的藤茎。

原 植 物　攀援大藤本。幼枝被锈色短柔毛。单数羽状复叶，互生，小叶5，革质，宽卵状长椭圆形，宽披针形或长卵形，先端钝或短渐尖，基部圆楔形，全缘，上面无毛，光亮，下面被灰白色柔毛，叶脉明显。圆锥花序顶生，花多而密集，花萼钟状，密被绢毛，萼片5；花冠蝶形，紫色，旗瓣，被绢毛，基部有2个胼胝体腺状附属物。荚果扁平，条状长圆形，种子间不缢缩，被锈色绒毛，果瓣木质，开裂。花期6~7月。果期10~11月。

生境分布　生于林缘或沟边。分布于台湾、广东、广西等省区。

采收加工　全年均可采，去枝叶，晒干或切片晒干。

性味功能　味苦，性温。有活血补血，通经活络的功能。

主治用法　用于贫血，产后虚弱，头晕目眩，月经不调，风湿痹痛，腰膝酸痛，麻木瘫痪，血虚经闭，痛经。水煎服或浸酒服。外用于乳痈，煎水洗，每日数次。用量9~15g。鲜品30~50g。外用适量。

应　　用

1. 风湿痹痛，腰膝酸痛，麻木瘫痪：亮叶崖豆藤50g。水煎服或浸酒服。
2. 月经不调，贫血，痛经，经闭：亮叶崖豆藤制成浸膏片，每片含生药1g。口服。

蝶形花科 Fabaceae

排钱树

Phyllodium pulchellum Desv.*(Desmodium pulchellum* Benth.*)*

基　　源 为蝶形花科植物排钱树的根、枝和叶。

原 植 物 半灌木。三出复叶互生，椭圆状卵形，先端稍钝，基部宽楔形，边缘浅波状，下面脉上被短柔毛，两侧小叶较小。花序长达30cm，叶状苞片约30对排为总状，两两对生，好像两串钱；苞片近圆形，每对苞片内着生由2至数朵花组成的伞形花序；蝶形花冠白色。荚果仅2荚节，荚节处紧缩，先端有长喙，边缘被毛。种子细长，近矩形。花期秋季。

生境分布 生于山坡林下、路旁及灌丛中。分布于广西、广东、云南、福建、台湾等省区。

采收加工 夏、秋采收，洗净切碎，鲜用或晒干。


性味功能 味淡、涩，性凉。有小毒。有清热利湿，活血祛瘀，软坚散结功能。

主治用法 用于感冒发热，疟疾，肝炎，肝硬化腹水，血吸虫病肝脾肿大，风湿疼痛，跌打损伤。用量枝、叶9~18g；根15~30g。孕妇忌服。

应　　用

1. 感冒发热：排钱树叶9~18g水煎服。
2. 疟疾，肝脾肿大，风湿骨痛，跌打瘀肿：排钱树根15~50g，水煎服。
3. 妇女血崩：排钱树根炭15~50g，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



补骨脂 *Psoralea corylifolia* L.

基　　源 为蝶形花科植物补骨脂的果实。

原 植 物 别名：破故纸、怀故子、川故子

一年生草本。被柔毛及腺点。单叶互生，阔卵形或三角状卵形，基部斜心形或截形，边缘具稀疏粗齿，均具黑色腺点，叶脉及缘处有毛。花多数，密集成穗状总状花序腋生，花萼淡黄褐色，基部连合成钟状；蝶形花冠淡紫色或黄色，雄蕊10，连成一体。荚果椭圆状肾形，有宿存花萼。花期7~8月，果期9~10月。

生境分布 生长于山坡、溪边或田边，有栽培。分布于河南、山西、安徽、江西、陕西、四川、贵州、云南等省。

采收加工 秋季果实成熟时采收果序，晒干，搓出果实，除去杂质。

性味功能 味苦、辛，性温。有补阳、固精、缩尿、止泻的功能功能。

主治用法 用于腰膝冷痛，阳痿滑精，遗尿，尿频，黎明泄泻，虚寒喘咳；外治白癜风。用量3~10g。

应　　用

1. 白癜风，牛皮癣，秃发：补骨脂50g，加乙醇75%，浸泡一周，取滤液煮沸浓缩，涂搽患处。
2. 肾虚腰痛：补骨脂、核桃仁各150g，金毛狗脊100g。共研细粉，每服9g，温开水送服。
3. 脾肾虚寒泄泻：补骨脂、肉豆蔻各9g，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



野 葛（葛根） *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi

基 源 葛根为蝶形花科植物野葛的干燥根。

原植物 多年生藤本，生黄褐色长硬毛。块根肥厚圆柱形。三出复叶互生，叶柄长托叶盾状着生；顶生小叶菱状卵形，3浅裂或不裂，侧生小叶斜卵形。总状花序腋生或顶生，每节1~3朵花簇生在具节瘤状突起的花序轴上。花萼钟状有黄色柔毛；花冠蝶形，蓝紫色或紫红色；雄蕊10；子房线形。荚果线形扁平，有黄褐色硬毛。种子卵圆形，褐色。花期5~9月，果期8~9月。

生境分布 生于山坡草丛、路旁及疏林阴湿地方。分布于全国大部分地区。

采收加工 秋、冬二季采挖，趁鲜切成厚片或小块，干燥。


性味功能 味甘，性平。有解表退热，生津止渴，止泻的功能。

主治用法 用于表症发热，无汗，口渴，头痛项强，麻疹不透，泄泻，痢疾。用量5~10g。

应 用

1. 高血压，心绞痛，心肌梗塞，心律失常：葛根9g，水煎服。
2. 饮酒过度，头痛，烦渴，胃胀，呕吐：葛根、葛花，水煎服。
3. 荨麻疹：葛根，水煎服。
4. 糖尿病：葛根、山药、党参、黄芪、黄精，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



甘葛藤（葛根） *Pueraria thomsonii* Benth.

基 源 葛根为蝶形花科植物甘葛藤的根。

原植物 别名：粉葛

藤本，被黄褐色短毛或杂有长硬毛。根肥大，粉性大。3出复叶，具长柄；托叶盾状；小叶片常3裂，总状花序形；花萼钟状，萼齿5，披针形，较萼筒长，被黄色长硬毛；花冠紫色，长2cm以。荚果长扁平，密被黄褐色长硬毛。种子肾形或圆形。花期6~9月，果期8~10月。

生境分布 生于山野灌木丛中或疏林中。有栽培。分布于广东、广西、四川、云南等省区。

采收加工 秋后至第二年春末挖根，刮去外皮，纵切厚，晒干或微火烘干。


性味功能 味甘、辛，性平。有解表退热，生津止渴，止泻的功能。

主治用法 用于表症发热，无汗，口渴，头痛项强，麻疹不透，泄泻，痢疾。用量5~10g。退热生用，止泻煨用。

应 用

同野葛。

蝶形花科 Fabaceae





白刺花 *Sophora davidii* Skeels(*Sophora viciifolia* Hance)

基　　源 为蝶形花科植物白刺花的根、叶、花及种子。

原植物 落叶灌木。单数羽状复叶互生，椭圆形，先端微凹，有小尖，基部近圆形，全缘，下面被疏柔毛。花6~12成总状花序顶生；花萼钟状蓝色，密被短柔毛；花冠蝶形，白色或蓝白色，旗瓣匙形，反曲，龙骨瓣2瓣。荚果细长，种子间缢缩成念珠状，密被白色平伏长柔毛。花期5~6月。果期7~8月。

生境分布 生于山坡、路旁或灌木丛中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、河南、江苏、浙江、湖北、贵州、四川、云南等省。

采收加工 根全年均可采挖，晒干。叶、种子夏秋季采，晒干。

性味功能 味苦，性寒。有清热解毒，消炎杀虫，利尿消肿，凉血止血的功能。

主治用法 根用于胃痛，痢疾，肠炎，扁桃腺炎，气管炎，肝炎，水肿，蛔虫，衄血，尿血，便血。花用于清凉解暑。种子用于消化不良，胃腹痛，驱虫，白血病。用量9~15g。水煎服或研末冲服。外用适量。

应　　用


1、便血：白刺花根、苦参各10g，水煎服。

2、痢疾、膀胱炎、血尿、水肿：白刺花根3~9g，水煎服。

3、阴道滴虫疮疖：白刺花根适量，水煎，洗患处。

4、白刺花冲泡代茶饮为清凉解署的的饮料。

蝶形花科 Fabaceae



苦　参 *Sophora flavescens* Ait.

基　　源 为蝶形花科植物苦参的干燥根。

原植物 别名：野槐、山槐、地参

草本或亚灌木。根圆柱形，黄色，味苦。茎具纵棱，幼时疏被柔毛，后无毛。奇数羽状复叶，叶轴被细毛；托叶披针状线形，小叶6~12对，线状披针形或窄卵形，互生或近对生，纸质，上面无毛，下面被灰白色短柔毛或近无毛。总状花序顶生，花淡黄白色。荚果圆柱形，种子间稍缢缩，呈不明显串珠状，先端有长喙。种子1~5粒，近球形，棕黄色。花期6~7月，果期8~9月。

生境分布 生于山地、平原。分布于全国大部分地区。

采收加工 春、秋季采挖，趁鲜切片，干燥。

性味功能 味苦，性寒。有清热利尿，燥湿，杀虫的功能。

主治用法 用于血痢，便血，黄疸，浮肿，小便不利，肠炎；外用于湿疹，湿疮，皮肤瘙痒；滴虫性阴道炎。用量3~10g，水煎服。外用适量，煎水洗患处。

应　　用

1. 热毒痢疾：苦参30g、木香、生甘草各3g，水煎服。

2. 黄疸，尿赤：苦参、龙胆草各3g，生栀子9g，水煎服。

3. 外阴瘙痒、急性湿疹：苦参50g，水煎熏洗。

4. 急性菌痢，阿米巴痢疾：苦参9g，水煎服。

5. 荨麻疹：苦参10g，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



槐（槐花，槐角） *Sophora japonica* L.

基　　源 槐花为蝶形花科植物槐的干燥花及花蕾，其果实为槐角。

原 植 物 大落叶乔木。树皮暗灰色或黑褐色，成块状裂。小叶7~15，卵状长圆形或卵状披针形，长宽1.2~3cm，先端急尖，基部圆形或宽楔形，下面有伏毛及白粉；圆锥花序顶生，有柔毛。花黄白色，有短梗。萼长有柔毛。花冠蝶形，旗瓣近圆形，先端凹，基部具短爪，有紫脉纹，翼瓣与龙骨瓣近等长，同形，具2耳。荚果，念珠状，皮肉质不裂有粘性。种子1~6粒，肾形，黑褐色。花期7~8月，果期10月。

生境分布 生于山坡、平原或栽培于庭院，全国各地有种植。

采收加工 槐花：夏季花开放或花蕾形成时采收，干燥。
槐角：冬季采收，除去杂质，干燥。

性味功能 味苦，性寒。有凉血止血，清肝明目的功能。

主治用法 用于吐血，衄血，便血，痔疮出血，血痢，崩漏，风热目赤，高血压。用量9~15g。

应　　用

1. 头癣：槐花，炒后研末，油调成膏，涂敷患处。
2. 痔疮出血：槐花、侧柏叶、地榆，水煎服。
3. 急性泌尿系感染：槐角浸膏。内服。
4. 高血压病：槐角，旱莲草，桑椹，女贞子。水煎浓缩，烘干制成颗粒，每服3~4片，每日3次。

蝶形花科 Fabaceae



越南槐（广豆根） *Sophora tonkinensis* Gagnep

基　　源 广豆根为蝶形花科植物越南槐的根及根茎。

原 植 物 别名：山豆根
小灌木，直立或平卧。根圆柱状，皮黄褐色。茎分枝少，密被短柔毛。奇数羽状复叶，椭圆形或长圆状卵形，顶端小叶较大，先端急尖或短尖，基部圆形，上面疏被短柔毛，下面密被灰棕色短柔毛。总状花序顶生，密被短毛；花萼阔钟状，外被疏毛，先端5齿；花冠黄白色，荚果密被长柔毛，于种子间缢缩成念珠状。花期5~6月，果期7~8月。

生境分布 生于石灰岩山地或岩石缝中。分布于江西、广东、广西、贵州、云南等省区。

采收加工 秋季挖根，除去地上茎叶，洗净泥土，晒干。


性味功能 味苦、性寒。有清火解毒、消肿止痛的功能。


主治用法 用于咽喉牙龈肿痛、肺热咳嗽烦渴及黄疸、热结便秘等症。外用于诸热肿痛，毒蛇咬伤。用量3~10g，外用适量。

应　　用

1. 热毒咽喉肿痛：广豆根、玄参、牛蒡子各9g，桔梗、生甘草各3g，水煎服。
2. 肺热咳嗽，咽喉燥痛：广豆根、枇杷叶、前胡各9g，桔梗4.5g，生甘草3g，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae





密花豆（鸡血藤） *Spatholobus suberectus* Dunn

基　　源 鸡血藤为蝶形花科植物密花豆的干燥藤茎。

原 植 物 别名：猪血藤、血龙藤、紫梗藤

攀援木质大藤本。老茎扁圆柱形，砍断后有鲜红色汁液流出。叶互生，近革质，小叶 3；顶生小叶阔椭圆形，先端短渐尖，基部圆楔形，全缘。圆锥花序生于枝顶叶腋，萼片 5，二唇形，肉质；蝶形花冠黄白色；雄蕊 10；子房上位，密被白色短毛；荚果扁平，顶端圆形。花期 7 月，果期 8~10 月。

生境分布 生于疏林或灌丛中。分布于广西、广东和福建等省区。

采收加工 秋、冬二季采收藤茎，切片或切段，晒干。

性味功能 味苦、甘，性温。有补血，活血，通络的功能。

主治用法 用于月经不调，血虚萎黄，麻木瘫痪，风湿痹痛。

应　　用

1. 慢性风湿痹痛：鸡血藤、当归、枫香寄生、海风藤、豆豉姜各 15g，半枫荷 30g，牛膝 9g，水煎服。
2. 月经不调，经闭腹痛：鸡血藤、地黄各 12g，白芍各 9g，川芎 3g，水煎服。
3. 肿瘤患者放化疗过程中引起的白细胞减少：鸡血藤 30g，黄芪 15g，大枣 5 枚，水煎服。
4. 再生障碍性贫血：鸡血藤 30g，首乌 24g，丹皮 9g，熟地、云苓、白术各 15g，当归 12g，五爪龙、地稔各 30g，水煎服。

蝶形花科 Fabaceae

葫芦茶

Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi

(*Desmodium triquetrum* (L.) DC.)

基　　源 为蝶形花科植物葫芦茶的干燥全草。

原 植 物 别名：田刀柄、双剑草

直立亚灌木。枝三棱，棱上被短硬毛，后脱落。叶互生，卵状椭圆形，先端急尖，基部浅心形或圆形，全缘，叶柄有阔翅。总状花序顶生或腋生；花淡紫色；萼阔钟状，旗瓣近圆形，先端凹入，龙骨瓣镰刀状，雄蕊 10，2 体。荚果有近四方形的荚节 4~8 个，被糙伏毛，顶端有尖喙。花期 7 月，果期 8~10 月。

生境分布 生于荒山坡地、草丛、路旁。分布于福建、江西、两广、贵州、云南等省区。

采收加工 夏、秋季采挖全草，鲜用或晒干。

性味功能 味甘、涩微苦，性凉。有清热解毒，利湿，消滞的功能。

主治用法 用于暑热烦渴，感冒，咽喉肿痛，肺病咳血，肠炎，肾炎水肿，痢疾，风湿骨痛，小儿疳积，钩虫病，妊娠呕吐，痈疮 肿毒。用量 15~30g。鲜用 30~60g。孕妇忌用。

应　　用

1. 鹅口疮：葫芦茶 50g，煎浓汁，蘸液搽口腔。
2. 颈淋巴结核：葫芦茶 50g，猪肉 200g，炖服。
3. 中暑：葫芦茶 50g，水煎加红糖服。

蝶形花科 Fabaceae

葫芦巴 *Trigonella foenum-graecum* L.

基　　源 为蝶形花科植物胡芦巴的种子。

原 植 物 别名：苦豆、芦巴子、香豆子

一年生草本，全株有香气。叶互生，三出羽状复叶，小叶片长卵形，先端钝圆，基部楔形，上部边缘有锯齿，下部全缘，疏柔毛生。花1~2朵生于叶腋，花萼筒状，有白色柔毛；花冠蝶形，淡黄白色或白色；基部稍带堇色；雄蕊10，9枚合生成束，1枚分离。荚果条状圆筒形，先端成尾状，被疏柔毛，具纵网脉。种子长圆形，黄棕色。花期4~7月，果期7~9月。

生境分布 全国大部分地区有栽培。

采收加工 8~9月种子成熟时，割取全株，晒干、搓下种子。

性味功能 味苦，性温。有温肾阳，逐寒湿，止痛的功能。

主治用法 用于肾脏虚冷，小腹冷痛，小肠疝气，寒湿脚气，阳痿等症。用量3~10g。孕妇慎用。

应　　用

1. 膀胱炎：葫芦巴、茴香子、桃仁(麸炒)各等分，以酒糊丸，空心食前服。
2. 肾脏虚冷，腹胁胀满：葫芦巴100g，附子、硫黄各0.9g，酒煮面糊丸，盐汤下。
3. 高山反应：葫芦巴叶晒干研细粉，炼蜜为丸。

蝶形花科 Fabaceae



赤　豆（赤小豆）

Vigna angularis Ohwi et Ohashi (*Phaseolus angularis* Wight)

基　　源 赤小豆为蝶形花科植物赤豆的干燥成熟种子。

原 植 物 一年生草本。三出羽状复叶。顶生小叶菱卵形或卵形，先端，基部宽楔形或圆形，全缘或三浅裂。侧生小叶斜卵形。总状花序腋生。花冠蝶形黄色。荚果圆柱形稍扁，近 无毛。种子长圆形，暗红色。花期6~7月，果期8~9月。

生境分布 全国各地栽培。主要分布于吉林、北京、河北、陕西、安徽、江苏、浙江、江西、广东、四川、云南等省区。

采收加工 秋季果实成熟时，打下种子，除去杂质，晒干。

性味功能 味甘、酸，性平。有利水除湿，消肿解毒，和血排脓的功能。

主治用法 用于水肿胀满，脚气浮肿，黄疸尿赤，泻痢，便血，风湿热痹，痈肿疮毒，肠痈腹痛。用量9~30g。外用适量，研末调敷患处。

应　　用

同赤小豆。

蝶形花科 Fabaceae







绿　豆 *Vigna radiata* Wilczek (*Phaseolus radiatus* L.)

基　　源 为蝶形花科植物绿豆的种子。

原 植 物 一年生草本，被淡褐色长硬毛。小叶3，阔卵形至棱状卵形，侧生小叶偏斜，先端渐尖，基部圆形或截形。总状花序腋生；花黄绿色；旗瓣肾形，翼瓣有渐狭爪，龙骨瓣截形，其中1片龙骨瓣有角；雄蕊10，2束。荚果圆柱形，被稀长硬毛。种子短矩形，绿色或暗绿色。花期6~7月，果期8月。

生境分布 全国大部分地区有栽培。

采收加工 秋季种子成熟时采收种，晒干。

性味功能 味甘，性凉。有清热解毒，消暑，利水的功能。

主治用法 用于暑热烦渴，水肿，泻痢，丹毒，痈肿，解热药毒，烫伤，跌打损伤。用量5~15 g。

应　　用

1. 霍乱呕吐：绿豆，研粉，白糖水冲服。
2. 砒石毒：绿豆研粉，寒水石，板兰根。水煎服。
3. 疮毒肿痛初起：绿豆研粉，炒黄，猪牙皂研末，米醋调敷患处。
4. 误服热剂所致烦躁闷乱，呕吐、狂渴：绿豆研粉，黄连、甘葛、甘草各25g，焙干研末，温汤调服。

蝶形花科 Fabaceae

赤小豆

Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi et Ohashi

(*Phaseolus calcaratus* Roxb.)

基　　源 为蝶形花科植物赤小豆的干燥成熟种子。

原 植 物 一年生草本。三出羽状复叶，披针形，先端渐尖，基部圆形或近截形。总状花序腋生或顶生，有2~3朵花。花冠黄色。荚果细圆柱形，种子6~10粒，长圆形而稍扁，紫红色，无光泽，种脐凹陷成纵沟。花期6~7月，果期8~9月。

生境分布 全国各地栽培。主要分布于吉林、北京、河北、陕西、安徽、江苏、浙江、江西、广东、四川、云南等省区。

采收加工 秋季果实成熟时，打下种子，除去杂质，再晒干。

性味功能 味甘、酸，性平。有利水消肿，解毒排脓的功能。

主治用法 用于水肿胀满，脚气浮肿，黄疸尿赤，风湿热痹，痈肿疮毒，肠痈腹痛。用量9~30g。

应　　用

1. 水肿胀满，脚气浮肿：赤小豆、薏苡仁、防己、甘草各15g，水煎服。
2. 湿热黄疸，发热，无汗：赤小豆、连翘各15g，麻黄9g，水煎服。
3. 肝硬化腹水：赤小豆、鲤鱼，同煮食。
4. 流行性腮腺炎：赤小豆，捣烂研粉与鸡蛋清调敷患处。

蝶形花科 Fabaceae



紫　藤　*Wisteria sinensis* Sweet

基　　源　为蝶形花科植物紫藤的根、茎皮、花及种子。

原 植 物　缠绕落叶藤木。单数羽状复叶互生，有长柄，托叶线状披针形，早落。叶轴被疏柔毛；小叶3~6对，小叶柄极短，被密柔毛，小叶卵形或卵状披针形，先端渐尖，基部圆形或宽楔形，全缘被柔毛，总状花序生于枝顶，下垂，花密集；花萼钟形，密被毛，5裂齿；花冠大，蝶形，蓝色或深紫色，旗瓣大，外反，内面近基部有2个胼胝体状附属物，翼瓣基部有耳，龙骨瓣镰状；荚果扁，宽线形，密生黄色绒毛。花期3~4月。果期5~6月。

生境分布　生于向阳山坡疏林边，溪谷旁或栽培于庭园中。分布于辽宁、陕西、甘肃及华北和长江以南各省区。

采收加工　夏、秋季采，分别晒干。

性味功能　甘、苦，性温。有小毒。根有祛风通络的功能。茎皮有和胃、驱虫、止吐泻的功能。花及种子有止痛、杀虫的功能。

主治用法　根用于内湿痹痛，水肿，利小便。茎皮用于腹痛，腹泻，呕吐，蛲虫病；花及种子外用于防腐，恶疮，外用捣烂外敷或煎水洗。种子用于蛲虫病。用量根15g，茎皮3g。外用适量。

应　　用

1. 风湿痹痛：紫藤根15g，锦鸡儿根15g，水煎服。
2. 痛风：紫藤根15g，与其他痛风药同煎服。
3. 关节炎：紫藤根、枸骨根、菝葜根各50g(均鲜品)，水煎米酒兑服。
4. 食物中毒，腹痛，吐泻，蛲虫病：紫藤种子3g(炒熟)，鱼腥草12g，醉鱼草21g。水煎服。

蝶形花科 Fabaceae



沙　枣（沙枣叶）　*Elaeagnus angustifolius* L.

基　　源　沙枣叶为胡颓子科植物沙枣的叶。

原 植 物　别名：银柳、桂香柳

落叶灌木或小乔木。幼枝被银白色鳞片，老枝栗褐色，光滑无毛，皮孔明显。叶互生，长圆状披针形或狭披针形，先端渐尖或钝，基部宽楔形或近圆形，全缘或稍呈微波形，两面被白色鳞片，有光泽。花1~3朵生于小枝下部叶腋内；花被管状钟形，顶端4裂，裂片长三角形；浆果黄色，密被银白色星状鳞片。花期6~7月。果期8~9月。

生境分布　生于沙漠地区。分布于东北、华北、西北及河南、山东等省区，多为栽培。

性味功能　味辛，涩，性凉。有清热解毒，抗菌消炎，活血止血的功能。

主治用法　用于细菌性痢疾，肠炎腹泻，慢性气管炎，冠心病等。用量15~30g。

应　　用

1. 烧烫伤：沙枣叶120g，黄柏30g，水煎，用药液喷洒或湿敷创面。
2. 白带：沙枣叶15g，水煎服。
3. 外伤出血：沙枣叶适量，研粉外敷。

附注：沙枣果实亦供药用。果味酸、微甘，有健脾止泻的功能。用于消化不良，细菌性痢疾等。肠炎腹泻：沙枣30g，水煎服。

胡颓子科 Elaeagnaceae



胡颓子（胡颓子叶）　*Elaeagnus pungens* Thunb.

基　　源　胡颓子叶为胡颓子科植物胡颓子的叶。

原 植 物　别名：天青地白、羊奶奶、甜棒子

灌木。全株被锈色鳞片。叶互生，革质，广椭圆形，全缘或微波状，下面被银白色星状毛。花1~5朵腋生，无花瓣；雄蕊4；子房上位，柱头不裂。核果圆形，外包肉质花托，棕红色，味酸甜而涩。花期10~11月。果期11月～翌年5月。

生境分布　生于林下或灌木丛中。分布于陕西、安徽、江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、贵州、四川等省区。

采收加工　夏、秋季采摘叶，晒干或切成细丝，晒干。

性味功能　味酸，性平。有敛肺，平喘，止咳的功能。

主治用法　用于肺虚，咳嗽气喘，咯血，肾炎，肾结石等症。

应　　用

1. 慢性气管炎：胡颓子叶、鬼针草各15g，水煎服。
2. 虚寒咳嗽，哮喘：胡颓子叶研粉，文火炒至微黄，热米汤送服。
3. 肺结核咯血：鲜胡颓子24g，冰糖15g，开水炖服。
4. 慢性支气管炎，支气管哮喘：胡颓子叶、枇杷叶各15g，水煎服。

附注：树皮、根、果实也供药用。根用于风湿性关节炎，跌打损伤，吐血，咯血，便血，痔疮，病毒性肝炎，小儿疳积；外用洗疮毒。果实用于肠炎痢疾，食欲不振。花用于皮肤瘙痒。

胡颓子科 Elaeagnaceae



中国沙棘（醋柳果）

Hippophae rhamnoides L. subsp. *sinensis* Rousi.

基　　源　醋柳果为胡颓子科植物中国沙棘的果实。

原 植 物　落叶灌木或乔木，棘刺较多，幼枝密被褐锈色鳞片，老枝灰黑色，粗壮。叶互生或近对生，纸质，狭披针形或长圆状披针形，两端钝尖或基部近圆形，全缘，上面被星状柔毛，下面被白色鳞片。花小，淡黄色，先叶开放，短总状花序腋生于小枝基部；花单性，雌雄异株；花被短筒状，先端2裂。果实肉质近球形或卵球形，橙黄色或橘红色。种子阔椭圆形或卵形，黑色或紫黑色。花期4~5月。果期9~10月。

生境分布　生于高山、河流两岸及草原上。分布于辽宁、河北、内蒙古、陕西、山西、甘肃、青海、四川等省区。

采收加工　秋季果实成熟后采收，鲜用或晒干。

性味功能　味酸涩，性温。有活血散瘀，化痰宽胸，补脾健胃，生津止渴，清热止泻的功能。

主治用法　用于跌打损伤瘀肿，咳嗽痰多，呼吸困难，消化不良，高热津伤，支气管炎，肠炎，痢疾。用量9~15g。

应　　用

1. 慢性疮疡，辐射损伤，烧伤：沙棘油，外敷患处。
2. 增强免疫力，预防肿瘤，抗衰老：沙棘果汁，常饮。
3. 冠心病，心绞痛，血脂高：沙棘果汁，常饮。
4. 胃溃疡，消化不良：沙棘冲剂，冲服。

胡颓子科 Elaeagnaceae



紫　薇（紫薇根）　*Lagerstroemia indica* L.

基　　源　紫薇根为千屈菜科植物紫薇的根，其叶、花也入药。

原 植 物　灌木或小乔木。枝四棱，有狭翅。单叶对生或近对生，上部叶常互生，纸质，椭圆形至倒卵形，先端钝或稍尖，基部宽楔形或倒卵形，近无毛或沿背面中脉有毛。圆锥花序顶生，花淡红色或紫色，有时为白色，被柔毛；花萼半球形，绿色，平滑无毛，先端6浅裂，裂片三角形；花瓣6，呈皱缩状，边缘有不规则缺刻，基部有长爪；蒴果椭圆状球形，6瓣裂，具宿存萼。花期6~8月，果期7~9月。

生境分布　多为栽培，少有野生，生于山野丘陵地或灌木丛中。分布于河北、陕西及华东、中南、西南各省区。

采收加工　根全年可采，切片晒干。叶夏、秋季采，晒干或鲜用。

性味功能　味微苦、涩，性平。有清热利湿，凉血止血，解毒消肿的功能。

主治用法　用于各种出血，骨折，乳腺炎，湿疹，肝炎，黄疸痢疾，痈疖肿毒，湿疹。捣烂敷或煎水洗患处。用量根15~30g。叶外用适量。

应　　用

1. 咯血、吐血、便血：紫薇30g，加水180ml，蒸至80ml，每日两次，每次30~40ml。
2. 骨折：紫薇、枇杷树根皮各30g，鲜白芨、川续断各15g，煅自然铜10g，共研细粉，每日两次，每次3g。
3. 乳腺炎：鲜紫薇叶适量，捣烂外敷。

千屈菜科 Lythraceae



千屈菜 *Lythrum salicaria* L.

基　　源 为千屈菜科植物千屈菜的全草。

原 植 物 多年生草本，高 30~100 cm。茎直立，四棱形，多分枝。单叶对生或轮生，无柄，叶片宽披针形或窄披针形，先端钝或短尖，基部微心脏形，稍抱茎，全缘或微呈波状。长穗状花序着生于枝顶；花紫色，花萼长管状，上部 4~6 裂，裂片间有长线形附属体；花冠 4~6 裂；雄蕊一般为花冠裂瓣的 2 倍。蒴果卵形，全包于宿萼内。花期夏、秋季。

生境分布 生于水沟边及湿润的草丛中。分布于全国各地。亦有栽培。

采收加工 夏、秋季采集，除去泥沙，晒干或鲜用。


性味功能 味苦，性寒。有清热解毒，凉血止血的功能。

主治用法 用于肠炎，痢疾，便血；外用于外伤出血。用量 6~12g；外用适量，研末敷患处。孕妇忌服。

应　　用

1. 痢疾：千屈菜 9g。水煎服。
2. 溃疡：千屈菜叶、向日葵盘，晒干，研末，先用蜜搽患处，再用药末敷患处。
3. 外伤出血：千屈菜，研粉，敷伤口处。

千屈菜科 Lythraceae



白木香（沉香） *Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg J

基　　源 沉香为瑞香科植物白木香含有树脂的木材。

原 植 物 别名：土沉香（海南）、女儿香（广东）

高大常绿乔木。叶互生，革质，长卵形、椭圆形，先端渐尖，有光泽，基部楔形，全缘。伞形花序顶生和腋生，花黄绿色；雄蕊 10 枚，着生于花被筒喉部；子房上位。蒴果木质，扁倒卵形，下垂，密被灰色毛，花被宿存。种子 1，基部有长于种子两倍的角状附属体，棕红色。花期 4~5 月。果期 7~8 月。

生境分布 生于平地、丘陵。分布于广东、海南、广西省自治区。

采收加工 全年均可采收，在树干上顺砍数刀，待其分泌树脂，数年后，即可割取含树脂的木材，即“沉香”。


性味功能 味辛、苦，性微温。有行气止痛，温中止呕，纳气平喘、暖肾的功能。

主治用法 用于胸腹胀闷疼痛，胃寒呕吐呃逆，肾虚气逆喘急。

应　　用

1. 月经不调：沉香 2.4g（冲），台乌、槟榔各 9g，木香 3g（后下），延胡索 6g，香附 3g，水煎服。
2. 支气管哮喘：沉香 1.5g，侧柏叶 3g，研末，睡前水冲服。
3. 急性胃炎：沉香、丁香、肉桂，水煎服。
4. 血管神经性水肿：沉香、冬葵子、白头翁，水煎服。
5. 气虚便秘：沉香、肉苁蓉，水煎服。

瑞香科 Thymelaceae



芫 花 *Daphne genkwa* Sieb. et Zucc.

基　　源 为瑞香科植物芫花的花蕾。

原 植 物 别名：南芫花、闷头花

落叶灌木。枝条稍带紫褐色，幼时有绢状柔毛。叶对生，偶为互生，椭圆形至长椭圆形，稍革质，全缘，先端尖，叶柄短，密布短柔毛。花先叶开放，淡紫色，3~7簇生于顶端叶腋。核果革质，白色。花期3~4月。

生境分布 生于路旁，山坡，或栽培于庭园。分布于河北、陕西、河南、山东、安徽、福建、浙江、江苏、湖北、湖南、四川等省区。

采收加工 春季4月当花未开放前采摘花蕾，拣去杂质，晒干或烘干，炮制后用。

性味功能 味辛、苦，性温，有毒。有泻下逐水，祛痰解毒的功能。

主治用法 用于痰饮癖积，喘咳，水肿，胁痛，心腹症结胀痛，痈肿、肺癌结块。用量1.5~3g，水煎或入丸、散。

应　　用

1. 肝硬化腹水，肾炎水肿：醋炒芫花。水煎服。或配白蜜煎服。
2. 冻疮：芫花、甘草。水煎，外洗。

瑞香科 Thymelaceae



瑞 香 *Daphne odora* Thunb.

基　　源 为瑞香科植物瑞香的根、树皮、叶及花。

原 植 物 别名：雪冻花、雪花皮、对雪开、雪地开花

常绿灌木，高2m左右。树皮纤维强韧，小枝略带褐紫色。叶互生，质厚，长椭圆形或倒披针形，先端钝，基部楔形，全缘，上面深绿色，有光泽，下面淡绿色，光滑无毛。多花密集枝顶成圆头状，白色或淡红色，芳香，无总梗，基部有数枚小苞片；花被细长管状，先端4裂，外面带红紫色，内面白色；雄蕊8；子房上位。浆果状核果红色，有宿存小苞片。花期冬末春初。

生境分布 生于山野、溪旁的阴湿处；多栽培。分布于浙江、江西、湖南、四川、贵州等省。

采收加工 全年可采，晒干或鲜用。

性味功能 味辛、甘，性温。有祛风除湿，活血止痛的功能。

主治用法 用于风湿性关节炎，坐骨神经痛，咽炎，牙痛，乳腺癌初起，跌打损伤，毒蛇咬伤。用量6~12g。

应　　用

1. 毒蛇咬伤：瑞香根，用烧酒磨成浓汁，涂伤口周围及肿胀部分，干后再涂。
2. 风湿病：瑞香茎叶，煎水洗。
3. 坐骨神经痛：瑞香花0.4g，研粉装入胶囊，每次2粒。

瑞香科 Thymelaceae



瑞香狼毒（狼毒） *Stellera chamaejasme* L.

基　　源 狼毒为瑞香科植物瑞香狼毒的根。

原植物 多年生草本。根粗大，圆柱形，木质，外皮棕色，断面淡黄色，有绵性纤维。茎直立，数茎丛生。叶互生，无柄，披针形至椭圆状披针形，全缘，无毛。圆头状花序顶生，未开时像一束火柴头；总苞绿色；花黄色或白色、淡红色；花被管状细瘦，基部稍膨大，先端5裂，裂片有紫红色网纹；雄蕊10，几无花丝，成2轮着生于花被管中；子房上位。果实圆锥形，为花被管基部所包。花期夏季。

生境分布 生于高山及草原上。分布于东北及河北、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、西藏等省区。

采收加工 秋季采挖，洗净，切片，晒干。

性味功能 味苦、辛，性平。有大毒。有散结，逐水，止痛，杀虫的功能。

主治用法 用于水气肿胀，淋巴结结核；外用于疥癣，杀蝇、蛆。用量0.9~2.4g；外用适量，煎水洗或研粉敷患处。

应　　用

1. 疥癣：狼毒适量，煎水洗患处；或研粉敷撒患处。
2. 外伤出血：狼毒，捣烂研粉外敷或干者研末敷患处。
3. 牛皮癣：狼毒，水煎煮浓缩至一定粘度，冷后涂布患处。
4. 蝇、蛆：狼毒、白狼毒、藜芦各适量，加水浸七日，喷洒。

瑞香科 Thymelaeaceae



河朔荛花（黄芫花叶）

Wikstroemia chamaedaphne Meissn.

基　　源 黄芫花叶为瑞香科植物河朔荛花的干燥叶和幼嫩枝梢。

原植物 落叶小灌木，枝细长，老枝棕紫色，嫩枝绿色。枝皮折断时可见绵状纤维。单叶对生，叶柄短。披针形，光滑无毛，灰绿色，全缘，先端尖，基部楔形或渐尖。顶生伞形花序，常数个集合成圆锥花序。花被筒状，黄色，先端4裂，外被白色毛；雄蕊8，两轮着生于花被管内；子房下位，椭圆形，柱头短，圆形。核果卵圆形。花期6~8月，果期7~9月。

生境分布 生于干旱阳坡、草地、路边灌丛中。分布于内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃等省区。

采收加工 6~8月间花蕾期，收集叶和幼嫩枝梢，晒干。

性味功能 有小毒。有泻下逐水的功能。

功能用法 用于水肿胀满，痰饮咳喘，急慢性肝炎，精神分裂症，癫痫。并用于人工引产。用量1.5~3g，内服，发热，体弱，溃疡病患者及孕妇忌用。不宜与甘草用。

应　　用

1. 妄想型精神分裂症，神经官能症：黄芫花研粉，3~4.5g，饭前服。
2. 急、慢性传染性肝炎：黄芫花水浸膏片，内服。
3. 牙痛：黄芫花。研为末，擦痛处令热。

瑞香科 Thymelaeaceae



了哥王 *Wikstroemia indica* (L.) C. A. Mey.

基　　源 为瑞香科植物了哥王的根。

原 植 物 别名：南岭荛花、山络麻、红灯笼

半常绿小灌木。茎皮多长韧纤维。单叶对生，薄革质，倒卵形或长椭圆形，先端钝圆或短尖，基部楔形，全缘，侧脉多数，极纤细，干时褐色。花绿黄色，数朵簇生于枝端；无苞片，花被管状，先端4裂；雄蕊8，成上下二轮着生于花被管内，花丝短，花药椭圆形；花盘2深裂或成4个鳞片；子房倒卵形，1室，柱头圆头状。浆果状核果卵形或椭圆形，红色。花期5~9月，果期6~12月。

生境分布 生于山坡草地、灌木丛中。分布于长江流域以南各地及西南地区。

采收加工 全年采挖，洗净晒干或剥取皮部晒干。


性味功能 味苦、辛，性寒。有清热解毒，消肿散结、止痛的功能。

主治用法 用于瘰疬，痈肿，风湿痛，肺炎，气管炎，跌打损伤等。用量3~9g。外用适量。

应　　用

1. 跌打损伤：了哥王根皮9g，研粉制成蜜丸。
2. 肺炎，气管炎：了哥王根皮注射液肌注，每次2ml。
3. 子宫颈炎：了哥王适量，水煎冲洗阴道，并宫颈湿敷。
4. 外伤出血：了哥王、断肠草各等量，水煎浓缩成浸膏，贴敷伤口，包扎。

瑞香科 Thymelaeaceae



乌　菱（菱角） *Trapa bicornis* Osbeck

基　　源 菱角为菱科植物乌菱的果壳、果柄及果茎。

原 植 物 别名：水菱角、风菱

一年生浮水草本，根生于泥中。茎上部直立，节较密，无根状叶，顶端丛生浮水叶，下部沉水叶根状对生，羽状细裂；柄中部海绵质，膨大部分成长纺锤形；叶片宽菱形或卵状菱形；被软毛，有锯齿。花白色，单生叶腋，有梗；花萼4裂；花瓣4。果实绿色或带红色，扁倒三角形，先端二角具短刺且下弯，基部粗厚。花期7~10月。果期9~10月。

生境分布 栽培于池塘中。全国各地多有栽培。

采收加工 秋末采集，除果实鲜用外，其余均晒干备用。

性味功能 味甘、涩，性平。有健胃止痢，解毒消肿，止血的功能。

主治用法 用于胃溃疡，痢疾，乳房结块，便血，月经过多，肿瘤。菱柄外用于皮肤多发性疣赘；菱壳烧灰外用于黄水疮，痔疮。用量30~60g。生食或煮熟。

应　　用

1. 胃癌，食管癌：菱角、薏苡、紫藤、诃子各20g。水煎服，每日1剂。
2. 脱肛：菱角壳，水煎洗。
3. 头面黄水疮，无名肿毒及天泡疮：菱角壳，烧存性，麻油调敷患处。

菱科 Trapaceae



岗松 *Baeckea frutescens* L.

基　　源 岗松为桃金娘科植物岗松的叶及嫩枝，根。

原 植 物 灌木。多分枝，茎皮褐色，片状剥落，枝圆柱形。叶对生，线形或线状锥形，先端急尖，基部渐狭，全缘，有油点。花单生于叶腋；萼管与子房贴生，萼片5，三角形，膜质，宿存；花瓣5，黄白色，倒卵圆形；雄蕊10或有时8，成对地与花瓣互生。蒴果细小半圆形，上部开裂。花期6~8月。果期9~11月。

生境分布 生于丘陵地区或荒坡地。分布于江西、福建、台湾、广东、广西、海南等省区。

采收加工 夏秋季采收带花果的嫩枝叶，阴干或鲜用。

性味功能 味辛、苦，性寒。有清利湿热，杀虫止痒的功能。根有祛风除湿，解毒利尿的功能。

主治用法 嫩枝、叶用于急性肠胃炎，细菌性痢疾，肝炎。外用于滴虫性阴道炎，皮肤湿疹，毒蛇咬伤，烧、烫伤；根用于感冒发热，黄疸型肝炎，胃痛，肠炎，风温性关节痛，脚气，膀胱炎，小便不利。

应　　用

1. 烧、烫伤：岗松叶研末调茶油涂患处。
2. 毒蛇咬伤：岗松鲜叶捣烂，敷伤口周围。
3. 风湿性关节痛，胃痛，腹泻：岗松根25~50g。水煎服。
4. 皮肤湿疹、皮炎、滴虫性阴道炎：鲜岗梅叶捣烂敷患处。或煎水洗。

桃金娘科 Myrtaceae



柠檬桉（桉叶油） *Eucalyptus citriodora* Hook. f.

基　　源 桉叶油为桃金娘科植物柠檬桉叶的挥发油。

原 植 物 高大乔木；幼叶叶柄盾状着生，披针形，有腺毛，基部圆形；成熟叶狭披针形，有黑腺点，具香味。圆锥花序腋生，花蕾长倒卵形，萼管长倒卵形；帽状体长约1.5cm，先端圆，有小尖突。蒴果壶形，果瓣藏于萼管内。花期4~9月。

生境分布 栽培于广东、广西及福建南部。

采收加工 秋季采叶，用水蒸汽蒸馏，所得挥发油用乙醚萃取，用无水硫酸钠脱水后，回收乙醚，即得桉叶油。


性味功能 味苦、辛，性凉。有疏风解热，祛湿解毒的功能。


主治用法 用于感冒，流感，肠炎，腹泻，神经痛，烧伤。用量9~15g。外用适量。

应　　用

1. 急性扁桃体炎：桉叶，水煎服。
2. 霉菌性阴道炎，外阴湿疹，瘙痒：桉叶油软膏外搽。
3. 烧伤：桉叶水煎服，并桉叶油涂敷患处。
4. 细菌性痢疾：桉叶、白芍、甘草、木香各3g，水煎服。

桃金娘科 Myrtaceae





蓝 桉（桉叶油） *Eucalyptus globulus* Labill.

基　　源 桉叶油为桃金娘科植物蓝桉的挥发油。

原 植 物 常绿大乔木。树皮灰蓝色，片状剥落，嫩枝略有棱，有腺点，枝上具窄翼。叶两型，老树着生正常叶；叶片镰状披针形，先端长渐尖，有时稍成尾状，基部宽楔形且略偏斜；幼株及新枝着生异常叶，单叶对生，叶片椭圆状卵形，无柄抱茎，先端短尖，基部浅心形，两种叶下面均密披白粉而呈绿灰色，两面有明显腺点。花通常单生叶腋或2~3朵聚生；萼筒有棱及小瘤体，具蓝白色腊被；花瓣与萼片合生成一帽状体，淡黄白色。蒴果杯状，有4棱及不明显瘤体或沟纹，果缘厚，果瓣4。种子多数，细小，棕色。

生境分布 栽培于福建、广东、广西、云南、贵州、四川等省区。

采收加工 秋季采叶，用水蒸汽蒸馏，所得挥发油用乙醚萃取，用无水硫酸钠脱水后，回收乙醚，即得桉叶油。

性味功能 味微辛、苦，性平。具疏风解热，祛湿解毒的功能。

主治用法 用于感冒，肠炎，腹泻，神经痛，并可治烧伤，除蚊虫。用量9~15g。外用适量。

应　　用

1. 流脑、流感、钩虫病：蓝桉叶9g，水煎服。
2. 烧烫伤，外伤出血：蓝桉叶研粉撒伤处。
3. 肠炎：蓝桉叶、马齿苋、地锦草、茶叶，煎服。
4. 烧伤、烫伤：桉叶油，涂敷患处。

桃金娘科 Myrtaceae

桉 树（桉叶油） *Eucalyptus robusta* Smith

基　　源 桉叶油为桃金娘科植物桉树的挥发油。

原 植 物 别名：大叶桉

常绿大乔木，幼态叶对生，成熟叶互生，卵状披针形，先端渐尖，基部稍不对称，全缘，有透明腺点，有香味。伞形花序粗大，有花4~8朵，帽状体约与萼管等长，先端收缩成喙；花药椭圆形，纵裂。蒴果卵状壶形，上半部略收缩，蒴口稍扩大，果瓣3~4。花期4~9月。

生境分布 生于平原、山坡和路旁。我国华南及西南有栽培。

采收加工 秋季采叶，水蒸汽蒸馏，所得挥发油用乙醚萃取，用无水硫酸钠脱水，回收乙醚，即得桉叶油。

性味功能 味微辛、苦，性平。有疏风解热，祛湿解毒的功能。

主治用法 用于感冒，流感，肠炎，腹泻，神经痛，并可治烧伤，除蚊虫。用量9~15g。外用适量。

应　　用

1. 感冒：鲜大叶桉、桑叶，浓缩成流浸膏状，加入野菊花粉末干燥，加白糖适量。开水冲服。
2. 水田皮炎：鲜大叶桉叶、鲜乌桕叶捣烂成浸膏，搽敷患处。
3. 疖肿，皮肤溃疡：大叶桉，水煎浓缩，加凡士林调匀，外敷患处。
4. 脓疱疮，湿疹：大叶桉、苦楝树皮，煎水外洗。

桃金娘科 Myrtaceae

丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb.

基　　源 为桃金娘科植物丁香的花蕾。

原 植 物 别名：母丁香、公丁香

常绿小乔木。叶对生，革质，长圆状倒卵形，先端尖，基部渐狭至叶柄，全缘。聚伞状圆锥花序顶生，芳香；花萼肥厚，绿色后转淡紫色，长管状，先端4裂；花冠白色，带淡紫色，短管状，4裂。浆果红棕色，长方椭圆形，有光泽，先端宿存花萼，裂片肥厚，有香气。种子长方形，与果皮分离。花期6~7月。果期8~9月。

生境分布 我国广东、海南有栽培。

采收加工 9月至次年3月，花蕾由青转为鲜红时采摘，晒干。

性味功能 味辛，性温。有温中降逆，补肾助阳，止痛的功能。

主治用法 用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿，小儿吐乳，腰膝酸痛，阴冷等症。用量1~3g。

应　　用

1. 胃寒呕逆：丁香、柿蒂各3g，生姜6g，党参12g。
2. 急性胃肠炎，消化不良：丁香、砂仁、白术、党参、陈皮、生姜。水煎服。
3. 胃痛：丁香6g，肉桂，木香，乌药各12g。共研细粉，每服2g，每日3次。
4. 头癣、体癣、手癣等：丁香，水煎，涂擦患处。

附注：母丁香为丁香的干燥果实。系在果实近成熟果采摘。

桃金娘科 Myrtaceae



番石榴 *Psidium guajava* L.

基　　源 为桃金娘科植物番石榴的叶和果。

原 植 物 小乔木。单叶对生，革质，长圆形至椭圆形，先端急尖或钝，基部近圆形，全缘，上面稍粗糙，下面有毛。花单生或2~3排成聚伞花序，花萼较厚，萼管钟形；花冠白色，芳香，花瓣4~5，长椭圆形，先端短尖。浆果球形、卵圆形或梨形，萼片宿存，淡黄色或淡红色，光滑，果肉白色或胭脂红色。花期5~6月，果期9~10月。

生境分布 生于原野，林缘或栽培。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、云南等省区。

采收加工 春、夏采叶，秋季采果，晒干备用。

性味功能 味甘、涩，性平。有收敛止泻，消炎止血的功能。

主治用法 用于急、慢性肠炎，痢疾，小儿消化不良；外用于跌打扭伤，外伤出血，疮疡久不愈合。用量25~50g。外用适量。

应　　用

1. 急性胃肠炎，腹泻：番石榴叶30g，切碎和米一起炒黄后，加水煎服。
2. 小儿消化不良：番石榴叶，大田基黄(红根草)各30g，红茶9~12g，炒米粉15~30g。煎服。
3. 跌打损伤、外伤出血、疮痛不愈：鲜番石榴叶，捣烂敷患处。

桃金娘科 Myrtaceae



桃金娘（桃金娘根）

Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.

基　　源 桃金娘根为桃金娘科植物桃金娘的根及根茎。

原 植 物 别名：山稔、岗稔

常绿灌木,幼枝常呈红色，密被柔毛。单叶对生；叶革质，椭圆形或倒卵形，先端钝，基部楔形，全缘，上面深绿色，光滑，下面灰绿色，密被柔毛，离基三出脉。聚伞花序腋生，有1~3花，紫红色；小苞片2，卵圆形；萼筒钟形，顶端5裂，裂片圆形，不等长；花瓣5，倒卵形。浆果球形或卵形，熟时暗紫色，顶端有宿存花萼。浆果球形或卵形。花期5~7月。果期7~9月。

生境分布 生于丘陵地或路边。分布于华南各地及西南地区。

采收加工 秋季采挖，鲜用或切片晒干。

性味功能 味甘、涩，性平。有祛风活络，收敛止泻的功能。

主治用法 用于肝炎，风湿疼痛，腰肌劳损，肾炎，胃痛，消化不良，痢疾，脱肛。用量15~30g，水煎服。

应　　用

1. 急慢性肝炎：桃金娘根水煎液，经处理后或膏状，干燥，与虎杖的提取物合并而成的片剂。每次2片，每日3次。
2. 小儿消化不良：桃金娘根，南天竹根各3~6g。水煎服。

桃金娘科 Myrtaceae



石　榴（石榴皮）　*Punica granatum* L.

基　　源 石榴皮为石榴科植物石榴的干燥果皮。

原 植 物 落叶灌木或小乔木。叶对生或簇生，长圆状披针形或长圆状椭圆形，先端尖或微凹，基部渐狭，全缘。花单生或数朵生于小枝顶端或叶腋，花大；花萼钟状，肥厚，花瓣与萼片同数，红色。浆果球形，果皮肥厚革质，红色或带黄色，顶端有宿存花萼，内有薄隔膜。种子多数，有红色肉质多汁外种皮，可食。花期5~6月。果期7~8月。

生境分布 栽培于向阳，肥沃土壤。分布于全国大部分地区。

采收加工 秋季果实成熟后，采摘，除去种子及隔瓤，切瓣，晒干或微火烘干。

性味功能 味酸涩，性温。有涩肠止泻，止血，驱虫的功能。

主治用法 用于慢性腹泻，久痢，便血，脱肛，崩漏，白带，虫积腹痛。用量3~9g。水煎服。

应　　用

1. 细菌性痢疾：石榴皮15g，红糖适量，水煎服。
2. 久泻，久痢，脱肛：石榴皮6g，研末冲服。或可与黄连等配用。
3. 阿米巴痢疾：石榴皮15g，苦木1g，竹叶椒根9g，水煎，分2次服。
4. 急慢性气管炎、肺部感染、淋巴结炎、胆道感染等多种感染性炎症：石榴皮15g，水煎服。

石榴科 Punicaceae



锁 阳 *Cynomorium songaricum* Rurr.

基　　源 为锁阳科植物锁阳的肉质地上部。

原 植 物 别名：铁捧锤、锈铁棒、锁严

多年生寄生肉质草本，暗紫红色或棕红色。地下茎粗短，吸收根瘤状。茎圆柱状，埋入沙中，顶端露出地上，基部膨大，多皱缩，有纵沟，残存三角形黑棕色鳞片。穗状花序顶生，肉质，棒状，暗紫色。坚果球形。花期5~6月。果期8~9月。

生境分布 生于干燥多沙地区，多寄生于白刺的根上。分布于内蒙古、宁夏、山西、甘肃、新疆、青海等省区。

采收加工 春季采挖，除去花序，趁鲜切片晒干。

性味功能 味甘，性平。有补肾助阳，益精，润肠的功能。

主治用法 用于阳痿，遗精，不孕，腰膝痿弱，神经衰弱，血枯便秘等。用量9~15g。

应　　用

1. 周围神经炎：锁阳、枸杞子、五味子、黄柏、知母、干姜、炙龟板。研末，酒湖为丸，盐汤送下。
2. 阳痿不孕：锁阳、肉苁蓉、枸杞各6g，菟丝子9g，淫羊藿15g。水煎服。
3. 肾虚滑精，腰膝酸弱，阳痿：锁阳、苁蓉、桑螵蛸、茯苓各9g，龙骨3g。研末，炼蜜为丸。
4. 心脏病：锁阳。油炸后，经常冲茶服。
5. 阳痿、早泄：锁阳、党参、山药、覆盆子。水煎服。

锁阳科 Cynomoriaceae

使君子 *Quisqualis indica* L.

基　　源 为使君子科植物使君子的果实。

原 植 物 别名：留球子、索子果

落叶藤状灌木，高2~8m。叶对生，薄纸质；叶柄下部有关节，有毛，基部刺状；叶长椭圆状披针形，先端渐尖，基部圆形或微心形，全缘，两面有黄褐色短柔毛。10余朵花成穗状花序顶生，下垂；花瓣5，初放时白色，后渐转紫红色。果实橄榄状，稍木化，黑褐色或深棕色，有5棱，横断面五角星状。花期5~9月。果期6~10月。

生境分布 生于山坡、林缘或灌木丛中，亦有栽培。分布于江西、福建、台湾、湖南、广东、广西、贵州、四川、云南等省区。

采收加工 秋季果实成熟未开裂时采收，晒干或微火烘干。

性味功能 味甘，性温，有毒。有杀虫，消积，健脾的功能。


主治用法 用于虫积腹痛，小儿疳积，乳食停滞，腹胀，泻痢等症。用量4.5~9g。捣碎入煎剂。小儿减半。

应　　用

1. 蛔虫病：使君子9g，槟榔4.5g，水煎，空腹服。
2. 疳积：使君子、胡黄连、芜荑。水煎服。
3. 蛲虫病：使君子。炒熟，于饭前半小时嚼食。
4. 腹大痞块，肌瘦面黄，渐成疳积：使君子9g，木鳖子15g。研末，为丸，蒸熟，空心食。

使君子科 Combretaceae







诃　子　*Terminalia chebula* Retz.

基　　源　为使君子科植物诃子的果实。

原 植 物　别名：诃黎勒、藏青果

落叶乔木，叶有锈色短柔毛，顶端处有2腺体；叶卵形、椭圆形或长椭圆形，先端短尖，基部钝圆或楔形。穗状花序组成圆锥花序；淡黄色；花萼杯状，5齿裂，无花瓣；雄蕊10；子房下位。核果卵形或椭圆形，粗糙，灰黄色或黄褐色，有5~6条纵棱及纵皱纹，基部有圆形果柄痕。果核易剥离，长纺锤形，浅黄色，粗糙，种子1，白色。花期4~5月。果期7~9月。

生境分布　生于林缘。分布于广东、海南、广西、云南等地。

采收加工　秋冬季果实成熟时采摘，烫5分钟，晒干或烘干。

性味功能　味苦、酸、涩，性温。有涩肠，止血，化痰的功能。

主治用法　用于久泻，久痢，脱肛，便血，白带，慢性气管炎，哮喘，慢性喉炎，溃疡病，久咳失音等症。用量3~5g。

应　　用

1. 久痢脓血：诃子，五倍子，乌梅，樗根白皮。
2. 肺结核之干咳、痰血：诃子，海浮石，瓜蒌皮。
3. 慢性咽喉炎久咳失音：诃子4个，桔梗、甘草各30g。共研末，每次6g，水煎服。
4. 慢性支气管炎合并肺气肿之久咳：诃子3g，五味子9g，猪肺。同煮极烂，食肺喝汤。

使君子科 Combretaceae



绒毛诃子（诃子）

Terminalia chebula Retz. var. *tomentella* Kurt.

基　　源　诃子为使君子科植物绒毛诃子的干燥成熟果实。

原 植 物　别名：微毛诃子

落叶乔木。树皮灰黑色至灰白色。幼枝全被铜色伏长柔毛，老时在叶背脱落殆尽；叶互生或近对生，叶柄粗壮，近顶处有腺体；叶卵形或椭圆形，先端短尖，基部钝圆或楔形，偏斜，全缘或微波状。腋生或顶生穗状花序组成圆锥花序，花全为两性。苞片长过于花。萼外无毛；果卵形，长不足2.5cm。

生境分布　生于阳坡林缘。分布于云南、广西等省区。

采收加工　冬秋季果实成熟时采摘，烫5分钟，取出晒干或烘干。

性味功能　味苦、酸，涩，性温。有涩肠止血，敛肺化痰。

主治用法　慢性肠炎，慢性支气管炎，哮喘，慢性喉头炎，溃疡病，便血，脱肛，痔疮出血。用量6~9g。

应　　用

1. 大叶性肺炎：诃子肉、瓜蒌各15g，百部9g。水煎服。
2. 细菌性痢疾：诃子。制成胶囊，口服。
3. 白喉带菌者：诃子。水煎服，并含漱。
4. 结膜炎：诃子、栀子、楝子各1g。研末，水煎服。

使君子科 Combretaceae

八角枫 *Alangium chinense* (Lour.) Marms

基　　源 为八角枫科植物八角枫的细根。

原 植 物 落叶灌木或小乔木。茎灰绿色，“之”字形曲折。叶互生，绿色或带红色；叶形变异较大，卵形或椭圆形，先端长渐尖或短渐尖，基部不对称，全缘或2~7掌裂，幼叶具毛茸，老叶仅叶背脉腋有簇毛。聚伞花序腋生，花序轴及苞片被毛，花两性，白色，萼钟状，被疏毛，6~8裂，裂片三角状短齿形，口部有纤毛；花瓣与萼片同数，线形，顶端钝圆，内外均有细毛，外卷；核果卵圆形，熟时黑色，花萼宿存。花期6~7月，果期10月。

生境分布 生于山谷，溪边或丘陵中。分布于陕西、甘肃、河南及长江以南各省区。

采收加工 全年可采，以9~10月份为好，挖出后，除去泥沙，晒干。切忌水洗。

性味功能 味辛，性微温，有小毒。有祛风除湿，舒筋活络，散瘀止痛的功能。

主治用法 用于风湿痹痛，麻木瘫痪，跌打损伤。用量3~9g。

应　　用

1. 风湿性关节痛：八角枫侧根30g，白酒1kg，浸7天，每日早晚各服15g。
2. 跌打损伤：八角枫1.5g，牛膝30g，混和醋炒，水煎服。

八角枫科 Alangiaceae



喜　树（喜树果） *Camptotheca acuminata* Decne

基　　源 喜树果为蓝果树科植物喜树的果实。根、树皮、枝也可供药用。

原 植 物 落叶乔木。单叶互生，椭圆形，全缘或微波状，边缘有纤毛。花集成球形头状花序排成总状，单性同株；雌花顶生，其下为雄花；苞片3，被短柔毛；花萼5浅裂；花瓣5，淡绿色，外被密短柔毛；雄花雄蕊10，不等长；雌花子房下位，花盘明显，柱头3裂，先端外卷。果实集成圆球状复果，瘦果条形，花柱宿存。花期8月。果期10~11月。

生境分布 生于疏林中或栽培于路边。分布于长江以南各省区。

采收加工 秋季采收果实，晒干。根、树皮、枝全年可采，晒干。

性味功能 味苦，涩，性寒，有毒。有抗癌，散结，化瘀的功能。

主治用法 用于胃癌，直肠癌，膀胱癌，急、慢性粒细胞性白血病，绒毛膜上皮癌，恶性葡萄胎，淋巴肉瘤，血吸虫病引起肝脾肿大、牛皮癣。临床上多用喜树碱，每日10~20mg。

应　　用

1. 慢性粒细胞白血病：喜树根注射液，肌注，每日4~8ml(每ml含喜树根浸膏250mg)。
2. 牛皮癣：外用20%喜树果软膏涂患处，每日1次，树皮、枝切碎，水煎浓缩，调成细膏搓。

蓝果树科 Nyssaceae





西藏青荚叶（小通草）

Helwingia himalaica Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke

基　　源　小通草为山茱萸科植物西藏青荚叶的干燥茎髓。

原植物　别名：西域青荚叶

落叶灌木。叶互生，纸质，披针形，倒披针形或椭圆披针形，顶端渐尖或尾状渐尖，基部楔形，边缘具刺状的疏齿，两边均无毛。花单性，雌雄异株；雄花10余朵排成聚伞花序，生于叶面上或生于嫩枝上；雌花淡绿色，2~5朵排成聚伞花序；无不育雄蕊；子房下位，柱头呈星状的3~5裂。浆果状核果近球形，暗红色，有3~4棱，有时5棱。

生境分布　生于林缘。分布于四川、贵州、云南、广西、广东等省。

采收加工　夏、秋季采收，将枝截成30~50cm长一段，趁新鲜时用细竹棒由小端向大端顶出髓部，理直，阴干或晒干。或用刀纵剖，剥去皮部及木质部，取出髓部，晒干。


性味功能　味苦、微涩，性凉。有清热利尿，下乳的功能。

主治用法　用于小便不利，尿路感染，乳汁不下。用量2.5~4.5g。孕妇慎用。

应　　用

1. 热病小便赤黄或尿闭：小通草3g。水煎服。
2. 水肿，小便不利：小通草3g。水煎服。
3. 乳汁不下：小通草6g，山甲珠12g，猪蹄2个。共煮吃汤食肉。

山茱萸科 Cornaceae



青荚叶（小通草）*Helwingia japonica* (Thunb.) Dietr.

基　　源　小通草为山茱萸科植物青荚叶的干燥茎髓。

原植物　落叶灌木。单叶互生，纸质，椭圆形或卵形，边缘有细锯齿，托叶钻形，早落。单性花、雌雄异株；雄花5~12朵排成密聚伞花序，雄花花瓣3~5，卵形，具雄蕊3~5；雌花具梗，单生或2~3朵簇生于叶上面中脉的中部或近基部，花瓣3~5，三角状卵形；子房下位，3~5室，花柱3~5裂，胚珠单生。浆果状核果黑色，球形，具3~5棱。花期4~5月，果期6~8月。

生境分布　生于山坡林缘。分布于陕西、河南、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵川等省区。

采收加工　秋季割取茎，截成段，趁鲜取出髓部，理直，晒干。

性味功能　味苦微涩、性凉。有清热，利尿，下乳的功能。

主治用法　用于小便不利，乳汁不下，尿路感染。用量3~9g。

应　　用

1. 产后缺乳、乳汁不下：小通草6g，炙山甲、王不留行各9g，猪蹄90g，水炖服。
2. 淋症：小通草、滑石、生地、淡竹叶。水煎服。
3. 伤寒后呕哕：小通草、生芦根、橘皮、粳米。水煎服。

山茱萸科 Cornaceae



山茱萸 *Macrocarpium officinale* Nakai (*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc)

基　　源	为山茱萸科植物山茱萸的干燥成熟果肉。
原 植 物	落叶灌木或乔木。叶对生，卵形至椭圆形，先端渐尖，基部楔形，上面疏生平贴毛，下面毛较密，侧脉6~8对，脉腋具黄褐色髯毛。伞形花序先叶开放，腋生，总苞片4；花瓣4，黄色；雄蕊4；花盘环状，肉质；子房下位。核果长椭圆形，深红色，有光泽，果梗细长，外果皮革质，中果皮肉质，内果皮骨质。种子1，长椭圆形。花期3~4月。果期9~10月。
生境分布	生于向阳山坡、溪旁的杂木林中，或栽培。分布于陕西、山西、河南、山东、安徽、浙江、四川等省区。
采收加工	秋末果皮变红时采收，文火烘或置沸水稍烫后，除去果核，晒干。
性味功能	味酸、涩，性微温。有补益肝肾，涩精固脱的作用。
主治用法	用于眩晕耳鸣，腰酸痛，阳痿遗精，遗尿尿频，崩漏带下，大汗虚脱，内热消渴。用量6~15g。
应　　用	1. 肝肾不足所致高血压：山茱萸、杜仲、石菖蒲、鸡血藤等。水煎服。 2. 自汗、盗汗：山茱萸，党参各15g，五味子9g。水煎服。

山茱萸科 Cornaceae



檀香 *Santalum album* L.

基　　源 为檀香科植物檀香树干的心材。

原 植 物 常绿乔木。具寄生根。树皮棕灰色，粗糙或有纵裂，多分枝，枝柔软，开展，幼枝圆形。单叶对生，革质，椭圆状卵形或卵状披针形，先端渐尖，基部楔形，全缘，上面绿色，下面苍白色。三歧或聚伞状圆锥花序，花小，初为淡黄花后变为紫黄色，花被钟形，先端4裂，裂片卵圆形，蜜腺4枚，呈圆形，着生于花被管中部与花被片互生。核果球形，成熟时黑色，肉质多汁，内果皮坚硬，具3短棱。花期为6~7月。

生境分布 印度、澳大利亚、印度尼西亚和南亚野生或栽培。我国广东、海南、云南等省有引种。

采收加工 采伐木材后，切成段，除去树皮和边材即得。

性味功能 味辛，性温。有理气，和胃，止痛的功能。

主治用法 用于寒凝气滞，胸腹疼痛，胃寒作痛，气逆，呕吐，冠心病，心绞痛。用量：3~6g。或入丸散。

应　　用

1. 心腹冷痛：檀香9g，干姜15g。开水泡饮。
2. 噎膈饮食不入：檀香4.5g，茯苓、橘红各6g。研极细末，用人参汤调服。

檀香科 Santalaceae



百蕊草 *Thesium chinensis* Turcz.

基　　源 为檀香料植物百蕊草的带果干燥全草。

原 植 物 别名：青龙草、风芽蒿、石菜子

多年生半寄生草本，根上有吸器。基部分枝丛生，嫩枝有明显棱条。叶互生，线状披针形，先端渐尖，基部渐窄，全缘，光滑。小花腋生，绿白色，基部有2枚小苞片；花被筒状，5裂，顶端近锐尖而反折；雄蕊5、子房下位。坚果球形或椭圆形，有核桃壳样雕纹，先端有花被残基。花期4月，果期5月。

生境分布 生于山坡草丛、田野和砂地边缘。分布于华北、华中、华东、华南和西南各省区。

采收加工 夏秋季拔取全草，去净泥土，晒干。

性味功能 味辛、苦，性温。有清热解毒，补肾涩精，解暑，消积，利湿的功能。

主治用法 用于急性乳腺炎，肺炎，扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎，肺脓疡等。用量15~30g。

应　　用

1. 急性乳腺炎、肺炎、肺脓疡、扁桃体炎、上呼吸道感染：百蕊草50g，水煎服。
2. 肾虚腰痛头晕：百蕊草50g，泡酒服。
3. 小儿疳积：百蕊草、马蹄香各3g，吴萸1.5g，水煎服。
4. 血吸虫病：百蕊草15g，水煎服。

檀香科 Santalaceae



油茶离瓣寄生(桑寄生) *Helixanthera sampsoni* Danser

基　　源 桑寄生为桑寄生科植物油茶离瓣寄生的带叶茎枝。

原 植 物 小灌木。幼枝、叶密被锈色星状毛，后脱落。叶对生，卵形、椭圆形或卵状披针形，先端尖，基部宽楔形或楔形。总状花序1~2腋生，具2~4(5)花，苞片卵形，被毛；花红色，被星状毛，花托坛状；副萼环状；花瓣4。果卵球形，红或橙色，顶部骤窄，平滑。花期4~月，果期8~10月。

生境分布 生于常绿阔叶林中或林缘，寄生于油茶、山茶或樟科、柿科、大戟科等植物上。分布于福建、广东、海南、广西、云南等省区。

采收加工 夏季砍下枝条，晒干；或沸水捞过后，再晒干。


性味功能 味苦，性平。有祛风湿，补肝肾，强筋骨，降血压，安胎下乳的功能。

主治用法 用于风湿痹痛，腰膝酸软，高血压，胎动不安，产后乳少等症。用量9~15g。

应　　用

1. 冠心病心绞痛：桑寄生15g。制成冲剂，口服。
2. 冻伤：桑寄生适量，煮沸熬膏，涂敷患处。或研末，加甘油调敷。
3. 风湿关节疼痛，腰膝酸软：桑寄生、独活、续断、当归各9g。水煎服。
4. 胎动不安，心腹刺痛：桑寄生、艾叶、阿胶。水煎服。

桑寄生科 Loranthaceae



红花寄生（寄生） *Scurrula parasitica* L.

基　　源 寄生为桑寄生科植物红花寄生的带叶茎枝。

原 植 物 常绿小灌木。叶对生，卵形或长卵形，顶端钝，基部宽楔形或圆形，主脉两面突起，花红色，2~3朵成腋生的聚伞花序，被褐色星状毛，总花梗短；苞片卵状三角形；花托陀螺状，副萼环状；花冠蕾时管状，弯曲，纤细，开放时下部稍膨胀，顶端4裂，裂片外折。果梨形，红黄色，有毛，长约1cm，下部渐狭成柄状。花果期10月至竖年4月。

生境分布 寄生于柚、桔、油茶、夹竹桃等多种植物上。分布于福建、台湾、广东、广西、湖南、江西、贵州、四川、云南等省区。

采收加工 夏季砍下枝条，晒干，扎成捆。

性味功能 有祛风湿，补肝肾，强筋骨，降血压，安胎下乳的功能。

主治用法 用于风湿痹痛，腰膝酸软，高血压，胎动不安，产后乳少等症。用量9~15g。

应　　用

1. 风湿关节疼痛，腰膝酸软：桑寄生、独活、续断、当归各9g。水煎服。
2. 高血压：桑寄生9g。水煎服。

桑寄生科 Loranthaceae



广寄生（寄生） *Taxillus chinensis* (DC.) Danser

基　　源 桑寄生为桑寄生科植物广寄生的带叶茎枝。

原 植 物 别名：寄生

常绿寄生小灌木。老枝无毛，茎黄绿色或绿色，常2~3叉状分枝，节部膨大，节间圆柱形，具灰黄色皮孔。叶对生或近对生，卵形或卵圆形，顶端钝或圆，基部圆形或阔楔形，全缘。花1~3朵排列成聚伞花序，1~2个生于叶腋，被红褐色星状毛，总花梗长4~5mm，苞片小，鳞片状；花萼近球形，花冠狭管状，柔弱，稍弯曲，紫红色，顶端卵圆形，裂片4，外展。果椭圆形，具小瘤体及疏毛。花期4~10月。

生境分布 寄生于多种树上。分布于福建、台湾、广东、广西省区。

采收加工 在夏季砍下枝条，晒干，扎成捆。

性味功能 味苦，性平。有祛风湿，补肝肾，强筋骨，降血压，安胎下乳的功能。

主治用法 用于风湿痹痛，腰膝酸软，高血压，胎动不安，产后乳少等症。用量9~15g。

应　　用

1. 妊娠胎动不安：寄生150g，艾叶25g，阿胶50g，水煎服。
2. 高血压：桑寄生9g。水煎服。
3. 风湿关节疼痛，腰膝酸软：桑寄生、独活、续断、当归各9g。水煎服。

桑寄生科 Loranthaceae



四川寄生 *Taxillus sutchuenensis* Danser

基　　源 为桑寄生科植物四川寄生的带叶茎枝作桑寄生入药。

原 植 物 别名：桑寄生、毛叶寄生

常绿寄生小灌木嫩枝被褐色或红褐色叠生星状毛，小枝黑色或灰褐色。单叶对生或近对生，革质，全缘，卵形、长卵形或椭圆形，顶端钝圆，基部楔形，成长叶上面无毛，下面被茸毛。总状花序腋生，2~3朵花，密集成伞状，密被茸毛；花红色，花冠具冠筒，冠筒顶部分裂成4裂片。果长圆形，黄绿色，具颗粒状体和疏毛，干后赤褐色。花期6~8月。

生境分布 寄生于桑树等多种植物上。分布于四川、云南、贵州、福建、广西、广东、湖南省、江西等省。

采收加工 夏季砍下枝条，晒干或沸水捞过后，再晒干。

性味功能 味苦，性平。有祛风湿，补肝肾，强筋骨，降血压，安胎下乳的功能。

主治用法 用于风湿痹痛，腰膝酸软，高血压，胎动不安，产后乳少等症。用量9~15g。

应　　用

1. 高血压：四川寄生9g。水煎服。
2. 尿少，水肿：四川寄生9g。水煎服。
3. 风湿关节疼痛，腰膝酸软：四川寄生、独活、续断、当归各9g。水煎服

桑寄生科 Loranthaceae



槲寄生 *Viscum coloratum* (Kom.) Nakai.

基　　源 为槲寄生科植物槲寄生的茎叶。

原 植 物 别名：北寄生、冻青、飞来草

常绿半寄生小灌木。茎枝圆柱状，黄绿色或绿色，稍有肉质，2~3叉状分枝，各分枝处膨大成节，单叶对生，生于枝端节上分枝处，无柄；叶近肉质，椭圆状披针形或倒披针形，先端钝圆，基部楔形，全缘，主脉5出，中间3条显著。雌雄异株，生于枝端或分叉处，雄花3~5朵，米黄色；雌花1~2朵生于粗短的总花梗上。浆果圆球形，半透明，熟时橙红色。花期4~5月。

生境分布 寄生于各种树上。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、江苏、湖北、湖南、四川等省区。

采收加工 全年可采，切碎，晒干备用。

性味功能 味甘、苦，性平。有补肝肾，强筋骨，祛风湿，滋阴养血的功能。

主治用法 用于风湿关节痛、腰背酸痛，原发性高血压，胎动不安，咳嗽，冻伤等。并用于骨瘤、泌尿系肿瘤等。用量20~30g。

应　　用

1. 风湿关节疼痛，腰膝酸软：槲寄生、独活、续断、当归各9g。水煎服。
2. 胎动不安、先兆流产：槲寄生、白芍、当归、续断各3g。水煎服。

槲寄生科 Viscaceae



苦皮藤 *Celastrus angulatus* Maxim.

基　　源 为卫矛科植物苦皮藤的根、根皮和茎皮。

原 植 物 藤状灌木根皮淡褐色至黄褐色，具纵皱纹。小枝常4~6锐棱，红褐色，发亮，密生细小皮孔。单叶互生，革质，矩圆状宽卵形或近圆形，先端短尖；基部圆形或近截形，边缘有锯齿。聚伞状圆锥花序顶生，雌雄异株；花梗粗壮有棱；花小，多而密生，绿白色或黄绿色，5数；雄花萼片三角状卵形，花瓣边缘锯齿。蒴果，近球形，黄色3瓣裂；种子每室2粒，被红色假种皮。花期4~6月，果期8~10月。

生境分布 生于山坡灌丛中。分布于陕西、甘肃、河南、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、云南等省区。

采收加工 全年可采，洗净，剥取根皮或茎皮，晒干。

性味功能 味辛、苦，性凉。有小毒。有清热解毒，消肿，杀虫，透疹，调经，舒筋活络的功能。

主治用法 根用于风湿痛。根皮或茎皮用于黄水疮，头癣秃疮，头虱，骨折肿痛，跌打损伤。用量25~ 50g。外用适量。

应　　用

1. 经闭：苦皮藤50g、大过路黄根50g。煨水服，用酒为引。
2. 秃疮：苦皮藤、盘龙七、黄柏各适量。共研细末，菜油调敷。
3. 黄水疮：苦皮藤研粉，菜油调敷患处。

卫矛科 Celastraceae



南蛇藤 *Celastrus orbiculatus* Thunb.

基　　源 为卫予科植物南蛇藤的藤茎、根、叶。

原 植 物 叶互生，近圆形至广倒卵形，先端尖，基部楔形，边缘有钝锯齿，下面叶脉隆起。短聚伞花序腋生，花淡黄绿色，雌雄异株，花萼裂片5；花瓣5，卵状长椭圆形；雄花雄蕊5，花药2室，纵裂；子房上位，柱头3裂。蒴果球形，种子卵形至椭圆形。花期4~5月，果期9~10月。

生境分布 生于丘陵、山沟及山坡的灌木丛中。分布于东北、华北、华东及湖北、湖南、四川、贵州、云南、西北等省区。

采收加工 根及茎全年可采，叶夏季采，晒干或鲜用。

性味功能 根、茎味辛，性温。根、茎有祛风除湿，活血行脉，消肿解毒的功能。叶味苦，性平。有解毒散瘀的功能。

主治用法 根、茎用于筋骨疼痛，四肢麻木，小儿惊风，痢疾、跌打损伤，痧气呕吐腹痛，痈疽肿毒。叶用于湿疹，痈疖，蛇咬。用量茎：10~15g。根：25~50g。叶：外用适量。

应　　用

1. 风湿性关节炎：南蛇藤根50g，酒水各半炖服。
2. 蛇咬伤：鲜南蛇藤叶，捣烂绞汁冲酒服，渣敷伤处。
3. 带状疱疹：南蛇藤根15g，研末，醋调搽敷。
4. 痢疾：南蛇藤茎25g。水煎服。

卫矛科 Celastraceae



卫　矛（鬼箭羽） *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb.

基　　源 鬼箭羽为卫矛科植物卫矛带翅状物的枝或翅状物。

原 植 物 别名：鬼羽愁、四棱麻

落叶灌木。小枝四棱形，棱上有2~4条扁条状木栓质翅。单叶对生，窄倒卵形或椭圆形，先端尖，基部楔形或圆形，边缘具细锯齿。聚伞花序，腋生，常具3~9花。花小，淡黄绿色；花瓣4，近圆形。蒴果，带紫色，4深裂。种子椭圆形。花期5~6月，果期9~10月。

生境分布 生于山坡灌丛中或草地。分布于河北、陕西、甘肃、山东、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、贵州等省。

采收加工 夏、秋两季割取木质的嫩枝，除去细枝及叶等杂质，晒干，扎成捆或收集其翅状物，晒干。

性味功能 味苦，性寒。有行血通经，散瘀止痛，杀虫的功能。

主治用法 用于月经不调，产后瘀血腹痛，跌打损伤，虫积腹痛，过敏性皮炎等症。用量5~10g，水煎服。

应　　用

1. 月经不调、产后瘀血腹痛：鬼箭羽、当归各10g，益母草12g，水煎服。
2. 跌打损伤瘀血肿痛：鬼箭羽50g，赤芍15g，红花、桃仁各10g，大黄3g，共研细粉，每日3次，每次3g。
3. 产后血运欲绝：鬼箭羽100g，当归50g。水煎服。
4. 糖尿病：鬼箭羽。水煎服。

卫矛科 Celastraceae



昆明山海棠 *Tripterygium hypoglaucum* (Lévl.) Hutch.

基　　源 为卫矛科植物昆明山海棠根皮或全草。

原 植 物 落叶灌木。根圆柱状，黄红色。小枝有棱，红褐色，有圆形小瘤状突起。单叶互生，卵形或宽椭圆形，长6~12cm，宽3~6cm，先端渐尖，基部圆，边缘有细锯齿，叶上面绿色，下面粉白色，两面突起。圆锥花序顶生，总花梗长10~15cm，有灰褐色毛；花白色，花萼、花瓣、雄蕊均为5；心皮3。膜质翅果具3翅，宽大、赤红色，中脉明显，侧脉稍短，与中脉密接。花期夏季。

生境分布 生于山野向阳沟边灌木丛或疏林中。分布于湖南、广西及西南各省区。

采收加工 全年可采，洗净，剥取根皮晒干。

性味功能 有大毒。有祛风除湿，活血散瘀，续筋接骨的功能。

主治用法 用于风湿性关节炎，跌打损伤，半身不遂，腰肌劳损，外用于骨折，外伤出血。用量根9g或全草30g，泡酒0.5kg。

应　　用

1. 外伤出血：昆明山海棠根，研粉撒敷。
2. 骨折：昆明山海棠根皮，加糯米饭捣烂敷患处。
3. 风湿性关节炎，腰肌劳损：昆明山海棠根9g，浸酒500g，每次服5ml。

卫矛科 Celastraceae



雷公藤 *Tripterygium wilfordii* Hook. f.

基　　源 为卫矛科植物雷公藤的根；叶、花及果实也入药。

原 植 物 落叶蔓性灌木，长达3m。根内皮橙黄色。小枝棕红色，有4~6棱，密被瘤状皮孔及锈色短毛。单叶互生，椭圆形或宽卵形，先端短尖，基部近圆形或阔楔形，边缘具细锯齿，上面光滑，下面淡绿色，主、侧脉在上面均稍凸出，脉上疏生锈褐色柔毛。聚伞圆锥花序顶生或腋生，被锈毛；花白绿色，杂性，5数；子房三角形，柱头6浅裂。蒴果具3片膜质翅，翅上有脉5条斜生。种子1，细柱状，黑色。花期夏季。

生境分布 生于山地林缘阴湿处。分布于长江流域以南各地及西南地区。

采收加工 根秋季采，叶夏季采，花、果夏秋采收，晒干。

性味功能 味苦、辛、性凉。有大毒。有祛风，解毒，杀虫功能。

主治用法 外用于风湿性关节炎，皮肤发痒，杀蛆虫，子孑，灭钉螺，毒鼠。不可内服。

应　　用

1. 头癣：雷公藤根皮研粉，调凡士林，涂患处。
2. 灭钉螺：雷公藤根皮，拌粘土、草木灰、烟草粉，撒入钉螺区。

附注：本品因有剧毒，内服必须在医师指导下进行，而且根皮必须除去，木质部用文火煎煮2小时以上方可。外用适量，捣烂敷患处，或捣汁搽患处，敷药时间不可超过半小时，否则起泡。

卫矛科 Celastraceae





秤星树（岗梅根）

Ilex asprella (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth.

基　　源　岗梅根为冬青科植物秤星树的根。

原植物　别名：岗梅、梅叶冬青

落叶灌木。根细长，黄白色。单叶互生，卵形或卵状椭圆形，先端渐尖或急尖，基部宽楔形或近圆形，边缘有小锯齿，鲜时折断中脉胶状细丝相连。花小，白色或黄绿色，雌雄异株；雄花2~3朵簇生或单于叶腋或鳞片腋内；花4~5数，萼片卵形，边缘有睫毛；雌花单生于叶腋，4~6数，子房近圆形。浆果球形，红色，有纵棱，花柱宿存。花期4~5月，果期7~8月。

生境分布　生于荒山坡、疏林下或灌木丛中。分布于江西、福建、湖南、广东、广西等省区。

采收加工　全年均可采挖，洗净，晒干或切片后晒干。

性味功能　味苦，甘，性寒。有清热解毒，生津，活血的功能。

主治用法　用于感冒发热，舌干口喝，扁桃腺炎，咽喉炎，气管炎，百日咳，肠炎，痢疾，传染性肝炎；外用于跌打损伤，痈疖肿毒等。用量15~30 g。外用适量。

应　　用

1. 流行性感冒：岗梅根400g，大叶桉叶、甘草各50g。水煎浓缩成500ml，加防腐剂，装瓶备用，每次服30~50 ml，每日3次。
2. 咽喉炎，扁桃腺炎，感冒：岗梅喉片。1~2小时含服1~2片。

冬青科 Aquifoliaceae

枸　骨（枸骨叶）　*Ilex cornuta* Lindl.

基　　源　枸骨叶为冬青科植物枸骨的干燥叶。

原植物　别名：功劳叶、八角刺、苦丁茶、鸟不宿

常绿灌木或小乔木。单叶互生，硬革质，四角状长方形，先端宽，有2~3个硬尖刺齿，中央的刺向下反卷，两侧各有1~2个硬刺，基部平截。大树上叶有短柄；叶圆形或长圆形，全缘，边缘无刺尖。伞形花序腋生。花小，黄绿色，杂性，雄花与两性花同株；花瓣4。核果球形，鲜红色。花期4~5月。

生境分布　生于山坡、溪间、路旁的杂木林或灌丛中。多有栽培。分布于甘肃、河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、广东、广西、四川等省区。

采收加工　冬、春两季剪取叶，去净枝梗，晒干。

性味功能　味苦，性微寒。有滋阴清热，益肾，止咳化痰的功能。

主治用法　用于虚劳发热咳嗽，劳伤失血，腰膝痿弱，风湿痹痛，跌打损伤，风湿性关节炎，头晕耳鸣，高血压，白癜风等症。用量9~15g。

应　　用

1. 头痛：枸骨叶制成茶。泡饮。
2. 风湿性关节炎：鲜枸骨叶120g，浸酒饮。
3. 肺痨：枸骨嫩叶50g。烘干，开水泡，当茶饮。
4. 小儿急性扁桃体炎：枸骨叶、朱砂根、岗梅根、栀子、淡竹叶、木通、射干、甘草各9g，生石膏12g。

冬青科 Aquifoliaceae

救必应（铁冬青） *Ilex rotunda* Thunb.

基　　源 铁冬青为冬青科植物救必应的干燥根皮或树皮。

原 植 物 别名：白兰香、冬青子

常绿小乔木。树皮淡绿灰色，平滑，内皮黄色。茎枝灰绿色，圆柱形，有棱。单叶互生，椭圆形或卵圆形，先端短尖，基部楔形，全缘，薄革质，上面深绿色，有光泽，下面淡绿色，两面均无毛，侧脉6~8对，埋于叶肉间而不明显，中脉显著。雌、雄异株，伞形花序腋生，雄花4~6枚，雌花5~7枚，子房球形。果为浆果状核果，红色，花柱宿存，种子5个。花期5~6月，果期9~10月。

生境分布 生于荒山疏林中、丘陵或溪边。分布于江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广东、广西、福建、台湾、云南等省区。

采收加工 全年可采，去掉外层粗皮，切片，晒干或鲜用。


性味功能 味苦，性寒。有清热解毒，消肿止痛的功能。

主治用法 用于感冒、扁桃体炎、咽喉炎、急性肠胃炎、痢疾、骨痛等。外用于跌打损伤、痈疖疮疡，外伤出血、烧伤、烫伤等。用量9~30g。外用适量，煎浓汤涂敷患处。

应　　用

1. 烧伤、疮疡：铁冬青9~15g。水煎服，或研末调油涂患处。
2. 跌打损伤：鲜铁冬青叶捣烂外敷。

冬青科 Aquifoliaceae



匙叶黄杨（黄杨木） *Buxus harlandii* Hance

基　　源 黄杨木为黄杨科植物匙叶黄杨的根、叶。

原 植 物 别名：雀舌黄杨、细叶黄杨、锦熟黄杨

灌木或小乔木，幼枝有棱，无毛；叶对生，革质，披针形至宽披针形，先端钝头或急尖头，基部宽楔形，无毛，边缘稍反卷，软骨质。花序腋生，每花序顶生一雌花，其余为雄花；花序基部有覆瓦状排列的干膜质的苞片；无花瓣；雄花萼片4；雌花萼片6，蒴果近球形，室间开裂，果瓣顶部有2角。

生境分布 生于湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川、贵州、广西等省。

采收加工 全年可采，晒干。

性味功能 味苦、辛，性平。有祛风除湿，行气活血止痛的功能。

主治用法 用于风湿关节痛，痢疾，胃痛，疝痛，腹胀，牙痛，跌打损伤，疮痈肿毒。用量9~12g，水煎服或泡酒服；外用适量，捣烂敷患处或干草研粉调服。

应　　用

1. 风湿关节痛，筋骨痛：黄杨根15g，煎酒服。
2. 跌打损伤：黄杨木50g，水龙骨15g，嫩竹叶、厚朴各9g。水煎，早晚空腹服。
3. 牙痛：黄杨木适量。研粉，水调嗽口，并敷痛牙处。
4. 目赤肿痛：黄杨根50g。水煎，冲蜂蜜，早晚空腹服。

黄杨科 Buxaceae



雀舌黄杨（黄杨根）

Buxusmicrophylla Sieb. et Zucc. subsp. *sinica* Hatusima

基　　源 黄杨根为黄杨科植物雀舌黄杨的根，其枝叶也入药。

原 植 物 常绿灌木或小乔木。茎枝4棱形，小枝被柔毛。叶对生，革质，倒卵形、倒卵状长椭圆形或长圆形，先端圆钝，稍凹，基部楔形或狭楔形，全缘，花簇生叶腋或小枝顶端，单性，雌雄同株；顶端有雌花1朵，其余均为雄花；雄花萼片4，黄色，细小，无花瓣；雌花萼片6，排成2轮。蒴果球形，熟时黑色，沿室背3瓣裂。花期4~5月。果期6~7月。

生境分布 栽培于庭园、街旁或屋边。分布于东北、华北、西北及山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南等省区。

采收加工 根、叶全年均可采，洗净，晒干。叶采后晒干或鲜用。

性味功能 味苦、辛，性平。有祛风除湿，行气活血的功能。

主治用法 用于风湿关节痛，痢疾，胃痛，腹痛，牙痛，疝痛。外用于跌打损伤，疮痈肿毒。水煎服或泡酒服。外用鲜叶捣烂敷患处。用量9~15g。外用适量。

应　　用

1. 风湿关节痛：黄杨根9~15g，酒水煎服。
2. 跌打损伤：黄杨枝叶9~12g，浸酒服。
3. 胃火上逆和胃阴不足引起的呃逆：黄杨枝叶30g，水煎服。

黄杨科 Buxaceae

顶花板凳果 *Pachysandra terminalis* Sieb. et Zucc.

基　　源 为黄杨科植物顶花板凳果的全草。

原 植 物 别名：顶蕊三角咪、雪山苓、上天梯、土桔梗
灌木状草本，匍匐斜升。茎肉质，有分枝，无毛。单叶互生或簇生于枝端；革质，倒卵形或菱状卵形，先端钝，基部窄楔形，上部边缘有粗锯齿，上面有光泽，基部3出脉。穗状花序顶生，花白色，单性同株，萼片4或更多，无花瓣；雄花生于花序上端，萼片有缘毛，雄蕊4~6个，花丝肥厚，伸出萼外；雌花子房2~3室，花柱2~3，长而开展。浆果状核果卵形，稍带白色，具3角。花期7~8月。

生境分布 生于山间密林或灌木丛阴湿处。分布于陕西、甘肃、浙江、湖北、四川等省。

采收加工 全年可采，洗净切段，晒干。

性味功能 味苦、微辛，性平。有祛风止咳，舒筋活络，调经止带的功能。

主治用法 用于慢性气管炎，风湿性关节炎，小腿转筋，白带，闭经，精神病，烦躁不安。用量6~15 g。

应　　用

老年慢性气管炎：顶花板凳果。水煎熬成膏，干燥后压片，每片相当于生药2.2g，每次2片，每日3次。

黄杨科 Buxaceae





铁苋菜 *Acalypha australis* L.

基　　源 为大戟科植物铁苋菜的干燥全草。

原 植 物 别名：人苋、血见愁、海蚌含珠、野麻草

一年生草本。茎直立，有纵条纹，具灰白色细柔毛。单叶互生，膜质，卵形至卵状菱形或近椭圆形，先端稍尖，基部广楔形，边缘有钝齿，粗糙，有白色柔毛。花序腋生，单性，雌雄同序，无花瓣；雄花序在雌花序上面，穗状；雌花序藏于对合的叶状苞片内，苞片开展时呈三角状肾形，合时如蚌。蒴果小，三角状半圆形，淡褐色，被粗毛。

生境分布 生于山坡、草地、路旁及耕地中。分布几遍全国。

采收加工 夏、秋季采收全草，晒干。

性味功能 味苦、涩，性凉。有清热解毒，止痢，止血的功能。

主治用法 用于肠炎，细菌性痢疾，阿米巴痢疾，小儿疳积，肝炎，疟疾，吐血，衄血，尿血，便血，子宫出血；外用于外伤出血，湿疹，皮炎，毒蛇咬伤。用量15~30。

应　　用

1. 细菌性痢疾：铁苋菜60g。水煎服。
2. 性肠炎、细菌性痢疾：铁苋菜、凤尾草各60g，榴皮15g。水煎服。
3. 小儿疳积：铁苋，猪肝煎煮，吃肝喝汤。
4. 疟疾：铁苋菜150g。水煎，于发作前2~3小时服。连服1~3次。

大戟科 Euphorbiaceae



山麻杆 *Alchornea davidii* Franch.

基　　源 为大戟科植物山麻杆的茎、皮及叶。

原 植 物 别名：野火麻、桂圆树

灌木，高1~2m；幼枝密被茸毛。叶互生，阔卵形至扁圆形，先端短尖，基部心形，下面密被茸毛。花小，单性，雌雄同株，无花瓣；雄花密生，圆柱形穗状花序，位于雄花序下面，子房3室，柱头3，线形。镊合状；雄蕊8；雌花疏生长4~5cm的穗状花序，萼4裂，外密被短柔毛。蒴果扁球形，密被短柔毛。

生境分布 生于阴山坡。分布于江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、贵州、四川及陕西。

采收加工 春夏季采收，晒干。


性味功能 味淡，性平。有解毒，杀虫，止痛的功能。

主治用法 用于疯狗咬伤，蛔虫病，腰脚痛。用量3~6g，外用适量，鲜品捣烂敷患处。

应　　用

1. 疯狗咬伤：鲜山麻杆，捣烂绞汁敷患处。
2. 蛔虫病：山麻杆6g，水煎服。
3. 湿疹、疖肿：山麻杆茎叶，煅存性，研末，麻油调涂。
4. 毒蛇咬伤：鲜山麻杆适量，捣烂敷患处。

大戟科 Euphorbiaceae



巴 豆 *Croton tiglium* L.

基　　源 为大戟科植物巴豆的干燥成熟果实。

原 植 物 别名：猛子仁、巴仁

小乔木。叶卵形至矩圆状卵形，顶端渐尖，掌状3出脉，被稀疏星状毛，基部两侧各有1无柄腺体。总状花序顶生；花小，单性，雌雄同株；萼片5；雄蕊多数；雌花无花瓣，子房3室，密被星状毛。蒴果矩圆状，有3棱，种子长卵形，淡褐色。花期3~6月。果期6~9月。

生境分布 生于山谷、林缘、溪旁或密林中，常栽培。分布于浙江、江苏、福建、台湾、湖南、湖北、广东、广西、云南、贵州、四川等省区。

采收加工 秋季果实成熟时采收，堆置2~3天，摊开，干燥。


性味功能 味辛，性热，有大毒。有泻下祛积，逐水消肿的功能。

主治用法 用于寒积停滞，胸腹胀痛，腹水肿胀，喉痹。外用于疮毒，顽癣。巴豆种子有大毒。内服务必去油用(巴豆霜)。用量巴豆霜0.15~0.3g各入丸、散剂。

应　　用

1. 恶疮疥癣：巴豆，碾轧成细泥状，去油，涂敷患处。
2. 神经性皮炎：巴豆50g，去壳，雄黄3g，磨碎用纱布包裹，擦患处。
3. 腹水膨胀，二便不通，实症水肿：巴豆90枚，杏仁60枚，去皮心炙黄，捣烂为丸，每服1丸。

大戟科 Euphorbiaceae



月腺大戟（狼毒） *Euphorbia ebracteolata* Hayata

基　　源 狼毒为大戟科植物月腺大戟的根。

原 植 物 多年生草本。根肥厚肉质，有黄色乳汁。叶生，无柄，茎下部叶小，长圆状披针形，先端钝,基楔形，全缘。总花序腋生或顶生，基部具卵状披针形的叶状苞片5，每伞梗再二叉状分枝，分枝处有三角卵形苞片2，分枝先端具2片较小苞片及1杯状聚伞花序；杯状总苞具5裂片，先端浅裂，腺体4，半月形，小花梗与花丝有节。雌花1，雌蕊1，伸出总苞下垂；花柱3，2裂。蒴果无毛。花期4~6月，果 期5~7月。

生境分布 生于山坡、草地或林下。分布于河南、山东、陕西、江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、四川、福建等省区。

采收加工 春、秋季采挖，洗净，切片，晒干。

性味功能 味苦、辛，性平，有毒。有散结、杀虫的功能。

主治用法 用于水肿腹胀，食、虫积，心腹疼痛，慢性气管炎，咳嗽，气喘，淋巴结、结核，疥癣，痔瘘。用量1.5~2.4g。

应　　用

1. 牛皮癣、神经性皮炎、慢性湿疹：狼毒切碎，水煎煮，至浓缩至一定浓度，冷后涂布敷患处。
2. 结核病：狼毒、大枣3:4制成狼毒枣，服枣10粒。
3. 慢性气管炎：狼毒0.5g。水煎服。

大戟科 Euphorbiaceae





泽漆 *Euphorbia helioscopia* L.

基　　源 为大戟科植物泽漆的全草。

原 植 物 别名：猫眼草、五凤草、五朵云

一年或二年生草本，肉质，富含乳汁，光滑无毛。茎分枝多而倾斜，下部淡紫红色，上部淡绿色。叶互生，无柄，倒卵形或匙形，先端钝圆或微凹，基部广楔形或突然狭窄而成短柄状，边缘在中部以上有细锯齿。多歧聚伞花序顶生，有5伞梗，每伞梗再生3小伞梗，每小伞梗又分为2叉；杯状花序钟形，黄绿色，总苞顶端4浅裂，裂间有4腺体；子房3室，花柱3。蒴果无毛。种子卵形，表面有凸起的网纹。

生境分布 生于路旁、田野，沟边等处。分布于宁夏、山东、江苏、江西、福建、河南、湖南、四川、贵州等省区。

采收加工 春、夏采集全草，晒干，切成段状。

性味功能 味辛、苦，性凉，有毒。有逐水消肿，散结，杀虫的功能。

主治用法 用于水肿，肝硬化腹水，细菌性痢疾等；外用于淋巴结结核，结核性瘘管，神经性皮炎。用量3~9 g；外用适量。

应　　用

1. 流行性腮腺炎：泽漆15g，水煎服。
2. 细菌性痢疾：泽漆9 g，水煎服。
3. 无黄疸型传染性肝炎：泽漆，水煮成膏，饭后服。
4. 淋巴结结核、无名肿毒：泽漆全草，熬膏，涂敷患处。

大戟科 Euphorbiaceae



飞扬草 *Euphorbia hirta* L.

基　　源 为大戟科植物飞扬草的全草。

原 植 物 别名：大飞杨草、大乳汁草

一年生草本，全株被粗毛，茎有白色乳汁。叶对生，披针状长圆形至近菱形，边缘有细锯齿，中部常有紫斑，两面被柔毛，下面及沿脉上的毛较密；托叶线状披针形。杯状花序多数，密集成腋生头状花序。蒴果卵状三棱形。

生境分布 生于荒地、路旁、田野或村边。分布于浙江、江西、湖南、福建、台湾、广东、广西等省区。

采收加工 夏秋季生长茂盛时采割全草，晒干。

性味功能 味微辛、酸，性凉，有小毒。有清热解毒，利湿止痒的功能。

主治用法 消化不良，支气管炎。用量15~30g。

应　　用

1. 细菌性痢疾、急性肠炎、消化不良、肠道滴虫：飞扬草60~300g。水煎服。
2. 慢性支气管炎：鲜飞扬草120g，桔梗9g。水煎2次，每次煎沸2小时，过滤，两次滤液混合浓缩至60ml，加白糖适量。每次服20ml，每日3次。

大戟科 Euphorbiaceae

地锦 *Euphorbia humifusa* Willd.

基　　源 为大戟科植物地锦的干燥全草。

原植物 一年生草本。茎纤细带红色，多分枝，平卧。叶对生，长圆形，先端钝圆，基部偏斜，叶缘具细齿。杯状聚伞花序，单生叶腋。总苞倒圆锥形，顶端4裂；裂片膜质，裂片间有腺体，腺体扁椭圆形，具花瓣状附属物。蒴果，近球形。种子卵形。花期6~9月，果期7~10月。

生境分布 生于荒地、路旁、田间。分布于全国大部分地区。

采收加工 夏、秋二季采收，除去杂质，晒干。

性味功能 味甘，性温。有清热解毒，凉血止痛止血的功能。

主治用法 用于痢疾，肠炎，咳血，尿血，便血，崩漏，疮疖痈肿，湿热黄疸，乳汁不下。用量9~20g。

应　　用

1. 痢疾、肠炎及肠道传染病：鲜地棉草100g，水煎服。
2. 慢性支气管炎：地棉草9g。，水煎服。
3. 咯血、咳血、吐血、崩漏：地棉草9g，水煎服。
4. 湿热黄疸：地棉草15g，水煎服。

大戟科 Euphorbiaceae



甘遂 *Euphoriba kansui* Liou

基　　源 为大戟科植物甘遂的根。

原植物 别名：猫儿眼、胜于花

多年生草本，全体含乳汁。根部分呈连珠状或棒状，棕褐色。叶互生，狭披针形，先端钝，基部阔楔形，全缘。杯状聚伞花序成聚伞状排列，5~9枚簇生于茎端，基部苞片轮生叶状，从茎上部叶腋抽出1花枝，先端再生出1~2回聚伞式3分枝，萼状总苞先端4裂，腺体4枚，新月形；花单性，雄花仅有雄蕊1，雌花位于花序中央，雌蕊1。蒴果圆形。花期6~9月。

生境分布 生于山荒。分布于河北、陕西、山西、甘肃等省区。

采收加工 春季或秋末，采挖根部，除去外皮，晒干。

性味功能 味苦、甘，性寒；有毒。有泻水饮，破积聚，通二便的功能。

主治用法 用于水肿满，留饮，结胸，癫痫，噎隔，症瘕，积聚，二便不通等症。甘遂有大毒。加工及使用应慎重。

应　　用

1. 腹水胀满，二便不通：甘遂1g，牵牛子4.5g，红枣5个。水煎服。
2. 胸腔积水：甘遂、红大戟各1g。研细粉，大枣10枚煎汤送服。

大戟科 Euphorbiaceae





续随子（千金子） *Euphorbia lathyris* L.

基　　源 千金子为大戟科植物续随子的成熟种子。

原 植 物 别名：仙人对座草、百药解

二年生草本，具白色乳汁。单叶交互对生，卵状披针形，基部近心形抱茎，全缘。聚伞状总花序顶生，有2~4伞梗，基部有2苞片；总苞4~5裂，腺体4，新月形，两端有短而钝的角；花单性，无花被；子房3室，花柱3裂；雌花梗受粉后总苞下垂；蒴果近球形，无毛。种子长圆形。花期4~7月。果期7~8月。

生境分布 生于向阳山坡，多栽培。分布于全国大部分省区。

采收加工 夏、秋二季果实成熟时采收，除去杂质，干燥。

性味功能 味辛，性温，有毒。有行水消肿，破血散瘀的功能。

主治用法 用于水肿，痰饮积滞胀满，二便不通，血瘀闭经，外用于顽癣、疣赘。用量1.5~3g。外用研敷。

应　　用

1. 肝硬化腹水，晚期血吸虫病腹水：千金子，捣成泥状，装入胶囊，每次6g，早晚空服。
2. 毒蛇咬伤：千金子20粒。捣烂，用米泔水调服。
3. 水肿胀满，小便不利：千金子30g，党参、木香、汉防己、赤茯苓、槟榔、海金沙、葶苈子各120g。研细末，枣肉为小丸，每服20~30丸。用桑白皮12g煎汤送下。
4. 顽癣、疣赘，跌打损伤：千金子。研粉，调油外涂。

大戟科 Euphorbiaceae



斑地锦（地锦草） *Euphorbia maculata* L.

基　　源 地锦草为大戟科植物斑地锦的干燥全草。

原 植 物 一年生匍匐小草本，含白色乳汁。茎纤细，带淡紫色，密被白色细柔毛。叶对生，或2列，先端短尖，基部偏斜，边缘疏生细齿，上面中央有长线状紫红色纹。杯状聚伞花序，单生于枝腋和叶腋，暗红色；腺体4，并有花瓣状附属物；总苞中含雄花数朵，中间有雌花1朵。蒴果三棱状卵球形。花期5~6月，果期8~9月。

生境分布 生于荒地、路旁、田间。分布于山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、广东等省区。

采收加工 夏、秋二季采收全草，除去杂质，晒干。

性味功能 味辛，性平。有清热解毒，凉血止血，利湿通乳的功能。

主治用法 用于痢疾肠炎，咳血，吐血，尿血，便血，崩漏，疮疖痈肿，湿热黄疸，乳汁不下，产后瘀血，跌打肿痛。用量9~20g，鲜品30~60g。外用适量，捣烂外敷患处。

应　　用

1. 痢疾、肠炎：鲜地棉草100g。水煎服。
2. 慢性支气管炎：地棉草9g。水煎服。
3. 咯血、咳血、吐血、崩漏：地棉草9g。水煎服。
4. 疣赘：鲜地棉草，捣汁外敷。

大戟科 Euphorbiaceae