中医中药论坛独家首发：bbs.zhong-yao.net

中华药大典

QUINTESSENCE OF MATERIA MEDICA

原色中草药植物图鉴





主编 陈士林 林余霖 中国医学科学院药用植物研究所



军事医学科学出版社

中医中药论坛独家首发：bbs.zhong-yao.net

责任编辑／孙　宇
封面设计／刘迎春







内容提要≫

《中草药大典》—原色中草药植物图鉴，本书收载我国所产较为常见的中草药之原植物，其中1000余种。全书文字精练，分类科学，图片清晰真实。中草药以植物基源、原植物、生境分布、采收加工、性味功能、主治用法、应用、科别。由十多位专家多年悉心编写而成。更为可贵的是，该书的植物名及植物拉丁学名，体现最新的植物分类学成果，对于国内外开展中药研究交流具有很好的参考价值。

Quintessence Of Materia Medica

ISBN 7-80121-884-1

9 787801 218841 >

ISBN 7-80121-884-1/R·877
定价：460.00 元（上下册）

中医中药论坛独家首发：bbs.zhong-yao.net



QUINTESSENCE OF MATERIA MEDICA

中草药大典（下）

·原色中草药植物图鉴·

主 编 陈士林 林余霖
中国医学科学院药用植物研究所

军事医学科学出版社

中医中药论坛独家首发：bbs.zhong-yao.net



一叶荻

Flueggea suffruticosa Baill. (*Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd.)

基　　源　为大戟科植物一叶荻的叶及花。

原 植 物　别名：叶底珠

灌木。单叶互生，椭圆形或卵状椭圆形，先端短尖，基部楔形，全缘或具波状齿或微锯齿。夏季开淡黄色小花，雌雄异株，3~12朵簇生于叶腋；无花瓣，萼片5，卵形；雄花花盘腺体5，分离，2裂，雌花花盘几不分裂；蒴果三棱状扁球形，熟时红褐色，无毛，裂成3瓣。花期6~7月。果期8~9月。

生境分布　生于山坡或路旁。分布于东北及河北、陕西、山东、台湾、河南、湖北、广西、四川等省区。

采收加工　春季开花前采收晒干。

性味功能　味甘、苦，性平。有毒。有祛风活血，补肾强筋的功能。

主治用法　用于面神经麻痹，小儿麻痹后遗症，眩晕，耳聋，神经衰弱，嗜睡症，阳痿等症。用量3~6g。

应　　用

1. 面神经麻痹：硝酸一叶荻碱3~4 mg/日，注射面部穴位，12次为一疗程。
2. 小儿麻痹后遗症：硝酸一叶荻碱0.2~0.3mg/kg体重，穴位注射。
3. 眩晕、耳聋，兴奋性降低的神经衰弱，嗜睡症：硝酸一叶荻碱2mg，皮下或肌肉注射，每日1次。

大戟科 Euphorbiaceae



算盘子 *Glochidion puberum* (L.) Hutch.

基　　源　为大戟科植物算盘子的根和叶。

原 植 物　别名：算盘珠、野南瓜、果盒仔

灌木。单叶互生，纸质或近革质，长圆形、长圆状卵形或披针形，先端钝，基部宽楔形，全缘，上面仅脉上被疏短柔毛或几无毛，下面粉绿色，密被短柔毛；托叶三角形。花单性，雌雄同株或异株，黄绿色，无花瓣。蒴果扁球形，形如算盘珠。花期夏、秋季。

生境分布　生于山坡灌丛中。分布于长江流域及以南各省区。

采收加工　根全年可采，切片晒干。叶夏秋采集，晒干。

性味功能　味微苦、涩，性凉。有清热利湿，祛风活络的功能。

主治用法　用于感冒发热，咽喉痛，疟疾，急性胃肠炎，消化不良，痢疾，风湿性关节炎，跌打损伤。用量15~30g。

应　　用

1. 急性胃肠炎、消化不良：算盘子叶、桃金娘叶各等量，研粉。每服1g，每日3次。
2. 细菌性痢疾：算盘子根、六月雪根各30g，铁扫帚根、甘草各15g，陈皮、陈芋头叶柄各9g，萹蓄60g。水煎服。

大戟科 Euphorbiaceae

中医中药论坛独家首发：bbs.zhong-yao.net



白背叶 *Mallotus apelta* Muell.

基　　源 为大戟科植物白背叶的根、叶。

原 植 物 灌木或乔木。单叶互生，近革质，长圆状卵形，先端渐尖，全缘或3浅裂，灰白色，被星状毛，具2腺体。花单性，雌雄异株，雄花穗状花序顶生，被灰白色星状毛；雌花穗状花序顶生或侧生；花萼3~6裂，外密被柔毛，无花瓣。蒴果近球形，密生羽毛状软刺及星状毛。花期5~6月。果期7~9月。

生境分布 生于山坡、灌丛。分布于我国南方大部分省区。

采收加工 根全年可采挖，切片晒干。叶夏秋采集，晒干或鲜用。

性味功能 味微苦，涩，性平，根有小毒。有清热平肝，健脾化湿，收敛固脱的功能。叶有清热利湿，消炎解毒，止血止痛的功能。

主治用法 根用于急慢性肝炎，肝脾肿大，胃痛，消化不良，风湿关节痛，目赤。叶外用于中耳炎，疖肿，湿疹，跌打损伤，外伤出血。用量15~30g。

应　　用

1. 急、慢性肝炎：白背叶鲜根50g，水煎服。
2. 妊娠水肿：白背叶根、相思豆全草(除去种子)、大风艾。水煎服。
3. 化脓性中耳炎：白背叶，水煎，先用白醋洗耳，拭干，滴入药液擦涂。

大戟科 Euphorbiaceae



粗糠柴 *Mallotus philippinensis* (Lam.) Muell.-Arg.

基　　源 为大戟科植物粗糠柴的果实表面粉状毛茸和根入药。

原 植 物 常绿小乔木。小枝被棕褐色星状柔毛。单叶互生，近革质，长圆状卵形或卵状披针形，先端渐尖，基部圆或宽楔形，全缘或有波状齿，上面深绿色，下面密被短星状毛及红色腺点，近叶柄处有2腺体。花单性，雌雄同株；穗状花序顶生或生于枝上部叶腋内，花序梗密被星状柔毛及腺点；雄花黄白色，无花瓣；雌花萼管状，4~5裂齿；子房外被红色颗粒状腺点。蒴果球形，密被鲜红色粉状茸毛。花期3~4月，果期7~8月。

生境分布 生于山坡丛林中。分布于四川、贵州、浙江、湖北、湖南、云南、广东、广西、福建、海南、台湾等省区。

采收加工 根全年可采。果实秋季采，收取腺毛及毛茸晒干。

性味功能 根味微苦，微涩，性凉。有清热利湿的功能。果毛(腺体粉)，有毒。有驱虫的功能。

主治用法 根用于急慢性痢疾，咽喉肿痛。腺体粉末用于驱绦虫，蛲虫，蛔虫。用量根15~30g。腺体粉末成人6~9g，小儿1.5g。

应　　用

1. 绦虫：腺体粉末4.5g，咖啡碱2.1g，石榴皮碱0.9g，蓖麻油4.5g，混合装入胶囊，每服1~2g。
2. 疮疡溃烂久不收口：叶煎水外洗或用叶研粉撒敷患处。

大戟科 Euphorbiaceae

中医中药论坛独家首发：bbs.zhong-yao.net



余甘子 *Phyllanthus emblica* L.

基　　源 为大戟科植物余甘子的果实。

原植物 别名：柚柑、滇橄榄

落叶灌木。单叶互生，密集为二列，形似羽状复叶；先端钝，基部圆或偏斜，全缘。花单性，雌雄同株，花小，黄色，3~6朵呈团伞花序，簇生叶腋，每花簇有1朵雌花和数朵雄花。蒴果球形或扁圆形，淡黄色或紫红色，6棱，干后裂成6片。种子6，褐色，稍3棱形。花期4~5月。果期9~11月。

生境分布 生于林下、灌丛中或山坡阳处。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南等省、自治区。

采收加工 秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

性味功能 味甘、酸、涩，性凉。有清热凉血，消食健胃，生津止咳的功能。

主治用法 用于高血压，消化不良，咳嗽，喉痛，口干，烦渴，牙痛，维生素C缺乏症。用量3~9g。多入丸散服。

应　　用

1. 喉热，咽喉炎：鲜余甘子，含嚼。
2. 高血压，高血脂：余甘子，水煎服。
3. 糖尿病：余甘子，嚼服。
4. 感冒发热、咳嗽、口干烦渴：鲜余甘子30枚，水煎服。

附注：其根、叶亦供药用。味辛，性平。根用于高血压，胃痛，肠炎，淋巴结结核。叶用于水肿，皮肤湿疹，用量9~18g。

大戟科 Euphorbiaceae



叶下珠 *Phyllanthus urinaria* L.

基　　源 为大戟科植物叶下珠的全草。

原植物 别名：珍珠菜、叶下珍珠、叶后珠

一年生小草本。茎直立，分枝，通常带赤红色。单叶互生，呈二列，极似羽状复叶，具短柄或近于无柄；叶片长椭圆形，先端斜尖或钝或有小凸尖，基部圆形或稍偏斜，全缘。花单性，雌雄同株，无花瓣。蒴果扁球形。花期秋季。

生境分布 生于山坡、路旁或田坎较干燥的地方。分布于长江流域至南部各省区。

采收加工 夏、秋季采集全草，去杂质，晒干。

性味功能 味微苦、甘，性凉。有清热利尿，明目，消积的功能。

主治用法 用于肾炎水肿，泌尿系感染、结石，肠炎，痢疾，黄疸型肝炎；外用于青竹蛇咬伤。用量15~30g。

应　　用

1. 急性肾炎：叶下珠、白花蛇舌草各9g，紫珠草、石韦各15g。水煎服。
2. 肾盂肾炎：叶下珠、白花蛇舌草各60g，广金钱草30g，水煎服。
3. 青竹蛇咬伤：鲜叶下珠，捣烂涂敷患处。

大戟科 Euphorbiaceae

中医中药论坛独家首发：bbs.zhong-yao.net



蓖麻（蓖麻子） *Ricinus communis* L.

基　　源 蓖麻子为大戟科植物蓖麻的干燥成熟种子。

原 植 物 一年生草本。茎直立，中空。叶盾形；掌状5~11裂，裂片缘具齿。花单性，雌雄同株，无花瓣；聚伞圆锥花序，顶生或与叶对生。雄花的萼3~5裂；雌花萼5裂。蒴果长圆形或近球形，稍扁，有灰白色、黑棕色或黄棕色交错的大理石样纹理，平滑，有光泽。种皮硬脆，较薄。种仁白色。花期7~8月，果期9~10月。

生境分布 全国各地均有栽培。

采收加工 秋季采摘成熟果实，晒干，除去果壳，收集种子。

性味功能 味甘、辛，性平。有毒。有消肿，排脓，拔毒，润肠通便的功能。

主治用法 外用于疮疖，肿毒。种仁油内服用于大便秘结。外用适量。

应　　用

1. 面神经麻痹：蓖麻子，捣烂外敷。
2. 疮疡化脓未溃、淋巴结核：蓖麻子，捣烂成膏状，外敷。
3. 烫伤，烧伤：蓖麻子、蛤粉等份，研膏，油调涂敷患处。
4. 胃下垂，子宫脱垂：蓖麻子适量，捣烂，做成饼状，贴敷头顶百会穴。

大戟科 Euphorbiaceae



乌桕 *Sapium sebiferum* (L.) Roxb.

基　　源 大戟科植物乌桕的根皮，树皮及叶入药。

原 植 物 落叶乔木，有乳汁。幼枝淡黄绿色。单叶互生，纸质，菱状卵形或菱状卵圆形，先端长渐尖，基部宽楔形，全缘，两面无毛。穗状花序顶生；花单性，雌雄同株，无花瓣及花盘，雄花生于花序上部，雌花1~4，生于花序基部；着生处两侧各有肾形腺体1枚，花萼3深裂；子房光滑，3室，柱头3裂。蒴果卵球形或椭圆形，先端尖，室背开裂成3瓣。花期4~5月。果期8~10月。

生境分布 生于村边、堤岸、溪边或山坡上。分布于陕西、河南及华东、中南、华南、西南等省区。

采收加工 根皮或树皮全年可采，切片晒干。叶夏秋季采，鲜用。

性味功能 味微苦，性寒，有小毒。有破积逐水杀虫解毒的功能。

主治用法 用于血吸虫病，肝硬化腹水，传染性肝炎，大小便不利，毒蛇咬伤。外用于疔疮，鸡眼，乳腺炎，跌打损伤，湿疹，皮炎。用量，根皮或树皮3~9g。叶9~15g。外用适量。

应　　用

1. 传染性肝炎：乌桕鲜根30g，加红糖炖服。
2. 疔疮：乌桕树内皮捣烂(或烤干研粉)，加少量冰片，用蛋清调匀外敷。
3. 血吸虫病：乌桕叶9~30g，水煎服，20~30天1个疗程。
4. 湿疹、皮炎：外用鲜叶捣烂敷患处或煎水洗。

大戟科 Euphorbiaceae

中医中药论坛独家首发：bbs.zhong-yao.net



山乌桕 *Sapium discolor* (Champ. ex Benth.) Muell.-Arg.

基　　源 大戟科植物山乌桕的根皮、树皮及叶入药。

原 植 物 落叶乔木。叶互生，纸质，长椭圆形，基部宽楔形，全缘。叶柄顶端有1~2腺体。穗状花序顶生；花单性，雌雄同株，大部分为雄花，花萼杯状，无花瓣及花盘。花序近基部有雌花。萼片3，三角形。蒴果近球形，黑色，有3棱。花期5~6月。果期7~8月。

生境分布 生于山坡疏林中，河谷或杂木林中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、海南、广西、贵州等省区。

采收加工 根皮或树皮全年可采，晒干。叶夏秋季采，晒干或鲜用。


性味功能 味苦，性寒，有小毒。有泻下逐水，散瘀消肿的功能。叶有散瘀消肿，祛风止痒的功能。

主治用法 根皮、树皮用于肾炎水肿，肝硬化腹水，大小便不利，痔疮，皮肤湿疹。叶外用于乳痈，跌打肿痛，湿疹，过敏性皮炎，带状疱疹，毒蛇咬伤。孕妇及体虚者忌服。用量，根皮、树皮3~9g。叶外用适量。鲜叶捣烂敷患处或煎水洗。

应　　用

1. 大便秘结：山乌桕根50g，水煎服。
2. 痔疮，皮肤湿痒：山乌桕根、金银花等各适量，水煎洗患处。
3. 毒蛇咬伤：山乌桕根9~15g，水煎冲酒服，并用鲜叶捣烂敷伤口周围。

大戟科 Euphorbiaceae



龙脷叶 *Sauropus spatulifolius* Beille

基　　源 为大戟科植物龙脷叶的干燥叶。

原 植 物 别名：龙舌叶、龙味叶、牛耳叶

常绿小灌木。叶互生，纸质，长倒卵形或卵状披针形，先端微凹，中间具一小棘尖，基部渐狭，全缘，被疏柔毛；托叶三角形。总状花序腋生；花小、单性，暗紫色；雄花花萼6裂，雄蕊3，花丝结合；雌花与雄花同形，花柱3，子房3室。蒴果具短柄，肾形，几为增长的萼所包藏。

生境分布 生于山谷丛林中，多为栽培。分布于广东、海南、广西等省区。

采收加工 于5~6月开始采集青绿色老叶，晒干或鲜用。通常每株每次采4~5片，每隔15天采一次。

性味功能 味甘、淡，性平。有清热化痰，润肠通便的功能。

主治用法 用于肺燥咳嗽，咯血，急性支气管炎，喉痛，大便秘结。用量6~15g。

应　　用

1. 肺炎咳嗽：龙脷叶15g，猪肉，水煎服。
2. 急性支气管炎，上呼吸道炎，支气管哮喘：龙脷叶12g。水煎服。
3. 大便秘结：龙脷叶15g。研末，蜂蜜冲服。

大戟科 Euphorbiaceae

中医中药论坛独家首发：bbs.zhong-yao.net



地构叶（透骨草） *Speranskin tuberculata* (Bge.) Baill.

基　　源 透骨草为大戟科植物地构叶的干燥地上部分。

原 植 物 别名：珍珠透骨草、竹格叉
多年生草本。叶披针形或长圆状披针形，先端渐尖，基部钝圆，边缘有钝齿，两面有毛。花单性，雌雄同株，成顶生的总状花序，雄花在上，花瓣白色；雌花在下，花瓣极小。蒴果，扁球状三角形，具毛和乳头状突起。花期6~8月。果期7~9月。

生境分布 生于山坡及草地。分布于吉林、辽宁、河北、河南、山东、山西、江苏、安徽、陕西、甘肃、四川等省区。

采收加工 夏、秋季生长茂盛时割取地上部分，晒干。

性味功能 味辛、苦，性温。有散风祛湿，活血止痛的功能。

主治用法 用于风湿疼痛，筋骨拘挛，阴囊湿疹，疮疡肿毒。用量6~15g，水煎服。

应　　用

1. 风湿疼痛：透骨草、穿山甲、防风、当归、白芍、白蒺藜、海风藤、生地、甘草。研末，炼蜜丸，酒送服。
2. 风湿性关节痛，筋骨拘挛：透骨草9g，制川乌、制草乌各3g，伸筋草6g。水煎服。
3. 肿毒初起：透骨草、漏芦、防风、地榆。煎水，用棉花蘸，敷涂患处。
4. 阴囊湿疹，疮疡肿毒：透骨草、蛇床子、白藓皮、艾叶。水煎洗。

大戟科 Euphorbiaceae



油　桐 *Vernicia fordii* (Hemsl.) Ary-Shaw.

基　　源 大戟科植物油桐的根、叶、花、果壳及种子入药。

原 植 物 乔木。单叶互生，卵状心形，先端急尖，基部心形，全缘或3浅裂，密生细毛，顶端有2腺体。聚伞状圆锥花序顶生；花单性，雌雄同株，先叶开放；花萼2~3裂，花瓣5，白色稍带红色。核果近球形，有短尖头，光滑。种子阔卵圆形，种皮厚壳状。花期4~5月。果期6~10月。

生境分布 生于山坡、路旁、村边。分布于陕西、甘肃、河南及江南各省区。

采收加工 根全年可采，切片晒干。叶夏秋季采，晒干。花凋落时收集。果实秋冬季采摘，晒干。

性味功能 根味辛，性温，有小毒。有消食利水，化痰，杀虫的功能。叶有杀虫的功能。花有清热解热，生肌的功能。种子有大毒，有催吐，消肿毒的功能。


主治用法 根用于黄疸，风湿筋骨痛。叶用于痈肿，漆疮，肠炎。花用于烧烫伤，新生儿湿疹，秃疮毒疮，天疱疮。果外用于癣疥，烫伤，脓疮。果壳用于丹毒。种子用于疥癣，瘰疬。用量6~12g。

应　　用

1. 黄疸：油桐根、柘树根各30g，水煎服。
2. 烫火伤：生油桐适量，加花生油适量，调涂患处。
3. 新生儿湿疹，天疱疮：油桐花，麻油调敷患处。
4. 疥癣，瘰疬：油桐子适量，煎水洗。

大戟科 Euphorbiaceae

中医中药论坛独家首发：bbs.zhong-yao.net



云南勾儿茶（鸭公青）

Berchemia yunnanensis Franch.

基　　源 鸭公青为鼠李科植物云南勾儿茶的干燥根、叶。

原 植 物 别名：鸭公藤

攀援灌木。茎紫红色，幼枝黄褐色，光滑。单叶互生，纸质，卵形或椭圆形，先端有明显小芒尖，基部圆形或近心形，全缘，上面绿色光滑，下面淡绿色有乳头状突起。花黄色，2~3束生成窄圆锥花序或总状圆锥花序顶生，花瓣和雄蕊5；子房半藏于花盘内。核果近圆柱状。花期6~9月。

生境分布 生于山坡或山谷林缘或灌木丛中。分布于江西、湖北、湖南、广西、广东、贵州、四川、云南等省区。

采收加工 秋季采根，夏采叶，晒干。

性味功能 味甘、淡，性平。有清热利湿，祛风活络，活血止痛的功能。

主治用法 用于黄疸，肾炎水肿，痢疾，红崩，白带，风湿关节痛，痛经；外用于骨折，跌打损伤，痈肿疮毒。用量30~60g，水煎或泡酒服；外用适量，鲜品捣烂敷患处。

应　　用

1. 骨折，跌打损伤：鲜鸭公青适量，捣烂敷患处。
2. 风湿关节痛：鸭公青60g。泡酒服。
3. 白带，痛经，红崩：鸭公青30g。水煎服。

鼠李科 Rhamnaceae



北枳椇（枳椇子）*Hovenia dulcis* Thunb.

基　　源 枳椇子为鼠李科植物北枳椇的种子。果实、树皮也供药用。

原 植 物 别名：北拐枣

落叶乔木。叶互生，卵形或卵圆形，先端渐尖，基部圆形或心形，边缘有锯齿，复聚伞花序腋生或顶生；花杂性，淡黄绿色，萼片5，花瓣5。果实近球形或广椭圆形，灰褐色，无毛，不裂；花序轴于果熟时肥厚，红褐色，味甜。种子扁圆形，红褐色，有光泽。花期5~6月。果期9~10月。

生境分布 生于沟边、路旁或山谷林中，亦有栽培。分布于华北、华东、中南及陕西、贵州、四川、云南等省区。

采收加工 种子于果实成熟后采摘，洗净，晒干，碾碎果壳收取种子。树皮全年均可采。

性味功能 味甘，性平。有止渴除烦，清湿热，解酒毒的功能。

主治用法 种子用于热病烦渴，呃逆，呕吐，小便不利，酒精中毒。用量9~15g。

应　　用

1. 热病烦渴，小便不利：枳椇子，知母各9g，金银花24g，灯心草3g，水煎服。
2. 醉酒：枳椇子12g，葛花9g，水煎服。

附注：果实，也供药用，有健胃，补血的功能。树皮味甘，性温。有活血，舒筋，解痉的功能。用于腓肠肌痉挛，风湿，食积，中毒。

鼠李科 Rhamnaceae



枣（大枣） *Zizyphus jujuba* Mill.

基　　源 为鼠李科植物枣的果实。

原植物 小乔木。小枝具刺。叶互生，卵形，先端稍钝，基部歪斜，边缘有细锯齿。聚伞花序腋生；花瓣5，淡黄绿色。核果卵形至椭圆形，深红色，果肉肥厚，味甜；果核纺锤形，两端锐尖。花期4~5月。果期7~9月。

生境分布 全国大部分省区栽培。

采收加工 秋季成熟果实时采收，晒干。

性味功能 味甘，性温。有补脾和胃，益气生津，养心的功能。

主治用法 用于脾虚食小，体倦乏力，营卫不和，便溏，心悸，失眠，盗汗，血小板减少性紫癜。中满痰多者忌用。

应　　用

1. 血小板减少症，过敏性紫癜：大枣100g，煎汤服。
2. 脾胃湿寒，饮食减少，泄泻，完谷不化：大枣250g（煮熟），白术120g，干姜、鸡内金各60g，共捣成泥，作饼当点心吃。
3. 输血反应：大枣50g，地肤子、炒荆芥各9g。水煎，输血前服。
4. 急慢性肝炎，肝硬化血清转氨酶较高：大枣、花生、冰糖各50g，水煎汤，睡前服。
5. 自汗：大枣10g，乌梅肉9g，桑叶12g，浮小麦15g，水煎服。

鼠李科 Rhamnaceae



酸　枣（酸枣仁）

Ziziphus jujuba Mill. var. *spinosa* Hu ex H. F. Chou

基　　源 酸枣仁为鼠李科植物酸枣的干燥成熟种子。

原植物 灌木或小乔木。枝上有刺。叶互生，椭圆形，先端钝，基部圆形，边缘具细齿形。花2~3朵簇生于叶腋；花瓣5，黄绿色。核果近球形或广卵形，暗红褐色，果皮薄。花期6~7月。果期9~10月。

生境分布 生长于山坡、山谷、丘陵地。分布于辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、安徽、江苏。

采收加工 秋末采收果实，收集种子，晒干。

性味功能 味甘、酸，性平。有养肝宁心，安神，敛汗的功能。

主治用法 用于神经衰弱，虚烦不眠，惊悸多梦，体虚多汗，津少口渴。用量9~15g。

应　　用

1. 心脏神经官能症：酸枣仁24g，茯神12g，龙眼肉、党参、知母、夜合欢各9g，白芍12g，川芎、甘草各3g。水煎服。
2. 体弱多汗，头昏：酸枣仁（炒）15g，五味子6g，党参9g，白芍12g。水煎服。
3. 惊悸多梦，失眠：酸枣仁、丹参各9g。水煎服。
4. 神经衰弱，心悸，心烦不眠：炒酸枣仁15g，知母，茯苓各9g，甘草、川芎各6g。水煎2次，睡前1小时分服。

鼠李科 Rhamnaceae

滇刺枣 *Ziziphus mauritiana* Lam.

基　　源 鼠李科植物滇刺枣的干燥成熟种子作酸枣仁入药。

原植物 别名：滇枣红

幼枝及叶背面有毛；核果熟时黑色。果实扁圆形或近桃形，灰黄色或棕黄色，一面平坦，中央无明显隆起纵线纹，种皮较薄，味微酸涩。

生境分布 生长于向阳或干燥的山坡、山谷、丘陵等地。分布于云南。

采收加工 秋末冬初采收成熟果实，除去果肉及核壳，收集种子，晒干。

性味功能 味微酸涩，性平。有补肝，宁心，安神，敛汗，生津的功能。

功能主治 用于虚烦不眠，惊悸多梦，体虚多汗，津少口渴。用量9~15g。

应　　用

同酸枣。

鼠李科 Rhamnaceae



乌头叶蛇葡萄 *Ampelopsis aconitifolia* Bunge

基　　源 为葡萄科植物乌头叶蛇葡萄的干燥块根。

原植物 别名：过山龙

木质藤本，幼枝稍带红紫色，卷须与叶对生，二分叉。叶掌状3~5全裂，裂片披针形或菱状披针形，小叶不具关节及窄翅。花两性，二歧聚伞花序与叶对生，花小，黄绿色，花盘边缘平截。浆果近球形，橙黄色或橙红色。

生境分布 生于山坡地边、灌丛或草地，分布于吉林、辽宁、河北、山西、陕西、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川等。

采收加工 春、秋二季采挖，除去泥沙及细根，切成纵瓣或斜片，晒干。

性味功能 味苦，味微寒。有清热解毒，生肌止痛水肿，消痈散结的功能。

主治用法 用于风寒湿痹，跌打瘀肿，痈疽肿痛。用量4.5~9g。

葡萄科 Vitaceae



葎叶蛇葡萄（七角白蔹）

Ampelopsis humulifolia Bge.

基　　源 七角白蔹为葡萄科植物葎叶蛇葡萄的根皮。

原 植 物 别名：小接骨丹、葎叶白蔹、活血丹、葎叶山葡萄
木质藤本，卷须与叶对生，分叉。叶坚韧，宽卵圆形，3~5中裂或深裂，基部心形或近平截，边缘具粗锯齿，上面有光泽，鲜绿色，光滑，下面苍白色，无毛或脉上微有毛。聚伞花序与叶对生，疏散，总花梗细长；花淡黄色；萼杯状；花瓣5；雄蕊5，与花瓣对生；子房2室，着生于明显的花盘上。果淡黄色或淡紫色。

生境分布 分布于东北、华北、西北，南至安徽。

采收加工 夏秋采挖根，剥取根皮，晒干。

性味功能 味辛，性热。有活血散瘀，消炎解毒，生肌长骨，祛风除湿的功能。

主治用法 用于跌打损伤，骨折，疮疖肿痛，风湿关节炎。用量9~15g。

应　　用

1. 风湿关节炎：七角白蔹3g，研粉，酒冲服。
2. 跌打损伤，骨折：鲜七角白蔹适量，捣烂敷患处。
3. 疮疖肿痛：七角白蔹适量，水煎洗敷患处。

葡萄科 Vitaceae

白　蔹 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Makino.

基　　源 为葡萄科植物白蔹的干燥块根。

原 植 物 别名：猫儿卵、山地瓜
木质藤本。块根纺锤形。卷须与叶对生，枝端卷须常渐变成花序。叶为掌状复叶，小叶3~5，羽状分裂或缺刻；叶轴和小叶柄有狭翅，裂片基部有关节，无毛。聚伞花序，花序梗细长；花小，黄绿色；花萼5浅裂，花瓣5。浆果球形，蓝色或白色，有凹点。花期6~7月。

生境分布 生于荒山灌木丛中。分布于全国大部分省区。

采收加工 春、秋二季采挖，切成纵瓣或斜片，晒干。

性味功能 味苦、甘、辛，性凉。有清热解毒，消痈散结，生肌，止痛的功能。

主治用法 用于痈肿疮毒，发背，疔疮，瘰疬，烫伤，扭伤，血痢，肠风。用量4.5~9g。

应　　用

1. 急性炎症，瘰疬，热痱，烫伤，烧伤：白蔹，研粉，酒精调糊涂敷患处。
2. 肿疖，痈肿疮毒：白蔹、白芨、络石藤各15g，研末，干撒疮上。
3. 扭挫伤，肿痛：白蔹加食盐。捣烂外敷。
4. 冻疮溃烂：白蔹、黄柏各15g。研末，先以汤洗疮，后用香油调涂。

葡萄科 Vitaceae





三叶崖爬藤（三叶青）

Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg.

基　　源　三叶青为葡萄科植物三叶崖爬藤的块根或全草。

原植物　别名：金线吊葫芦、丝线吊金钟

多年生草质攀援藤本。着地部分节上生根，块根卵形或椭圆形。茎细弱，卷须不分枝与叶对生。叶互生；小叶3，草质，卵状披针形，顶端渐尖，边缘疏生小锯齿；两侧小叶基部偏斜。聚伞花序腋生；花瓣4，黄绿色。浆果。花期初夏。

生境分布　生于山谷疏林中或阴处石壁上。分布于长江流域至南部各省区。

采收加工　根或全草全年可采，晒干或鲜用。

性味功能　味微苦，性平。有清热解毒，祛风化痰，活血止痛的功能。

主治用法　用于白喉，小儿高热惊厥，肝炎，痢疾；外用于毒蛇咬伤，跌打损伤等。用量9~15g；外用适量。

应　　用

1. 小儿高烧：三叶青块根、射干、仙鹤草各15g，白头翁6g，钩藤3g。水煎服。
2. 病毒性脑膜炎：三叶青块根15g(儿童9g)。水煎服。
3. 慢性迁延型肝炎：三叶青注射剂，每次肌注2~4ml，每日2次。20~40天为1个疗程。

葡萄科 Vitaceae



葡　萄（白葡萄干）*Vitis vinifera* L.

基　　源　白葡萄干为葡萄科植物葡萄的干燥果实。

原植物　落叶木质藤木。卷须长10~20cm，分枝。叶圆形或卵圆形，3~5深裂，基部心形，边缘具粗锯齿。圆锥花序，与叶对生；花小，黄绿色，两性或杂性；萼盘状，全缘或不明显5裂；花瓣顶端合生，花后成帽状脱落。浆果，卵状长圆形，紫黑色被白粉，或红而带青色，富含液汁。花期6月，果熟8~9月。

生境分布　我国各地普遍栽培。主要产于新疆、甘肃、陕西、山西、河北、山东等省区。

采收加工　夏末秋初果熟时采收，阴干。


性味功能　味甘，性平。有补气血，强筋骨，利小便的功能。

主治用法　用于气血虚弱，肺虚咳嗽，心悸盗汗，风湿痹痛，淋病，浮肿。用量适量。

应　　用

1. 热淋，小便涩少：白葡萄汁、藕汁、生地黄汁，合蜜服。
2. 筋骨湿痹：白葡萄干，常食；或饮白葡萄酒。
3. 疮疹不发：白葡萄干，研末，兑酒饮。
4. 腰痛，骨痛，精神疲惫，血虚心跳：白葡萄数粒，口嚼。

葡萄科 Vitaceae



亚　麻（亚麻子）　*Linum usitatissimum* L.

基　　源　亚麻子为亚麻科植物亚麻的成熟种子。

原 植 物　别名：野胡麻、胡麻仁、大胡麻

一年生草本。茎直立，基部稍木质。互生，线形或线状披针形，先端锐尖，基部渐窄，全缘。花单生于枝顶及上部叶腋；萼片5；花瓣5，蓝色或白色；雄蕊5。蒴果球形，稍扁，淡褐色，5瓣裂。种子扁平卵圆形，黄褐色，有光泽，一端钝圆，另端尖而略偏斜。花期6~7月。果期7~9月。

生境分布　全国各地有栽培。主要分布于东北、华北及内蒙古、山东、湖北、陕西、四川、云南。

采收加工　秋季果实成熟时采收种子，除去杂质，晒干。


性味功能　味甘，性平。有润燥，通便，养血，祛风的功能。

主治用法　用于皮肤干燥瘙痒，麻风，眩晕，便秘，疮疡湿疹，毛发枯萎脱落等。用量4.5~9g。

应　　用

1. 溢脂性脱发：亚麻子、鲜柳枝各50g。水煎洗。
2. 老人皮肤干燥，起鳞屑：亚麻子、当归各6g，紫草3g。研末，制蜜丸，开水送服。
3. 过敏性皮炎，皮肤瘙痒：亚麻子、白鲜皮、地骨皮各3g。制蜜丸。开水送服。
4. 肠燥便结：亚麻子9g，火麻仁15g，郁李仁12g。水煎服。

亚麻科 Linaceae



瓜子金　*Polygala japonica* Houtt.

基　　源　为远志科植物瓜子金的全草。

原 植 物　别名：小金不换（广西）、小金盆（四川）

多年生草本。叶互生，卵形至卵状披针形，先端短尖，基部圆形或楔形，全缘，叶脉和叶缘均被细柔毛；叶柄短，有柔毛。总状花序腋生；苞片小；萼片5，有细毛，外面3片小，内面2片大，花瓣状；花瓣3，紫色，偶白色，中间龙骨瓣有鸡冠状附属物。蒴果圆而扁，顶端凹。花期4~5月。

生境分布　生于平原、山坡荒野等处。分布于全国大部分省区。

采收加工　春、夏、秋季采全株，晒干或鲜用。

性味功能　味辛、苦，性平。有祛痰止咳，活血消肿，解毒止痛，安神的功能。

主治用法　用于咳嗽痰多，心悸失眠，跌打损伤，疔疮疖肿，毒蛇咬伤。用量15~30g，水煎服。

应　　用

1. 小儿疳积：瓜子金30g，猪肝60g。加水蒸熟，去药渣吃肝喝汤，连服3剂。
2. 泌尿系结石：鲜瓜子金60，鲜水田七30g。水煎服。
3. 毒蛇咬伤：瓜子金、半边莲、犁头草干粉各等量，水泛为丸，每服15g，1日3次。

远志科 Polygalaceae





西伯利亚远志（远志） *Polygala sibirica* L.

基　　源 远志为远志科植物西伯利亚远志的根或根皮。

原 植 物 别名：宽叶远志、卵叶远志

多年生草本。根圆柱形。单叶互生，卵形，先端钝，具短尖头；上部叶大，披针形或椭圆状披针形，被短柔毛。总状花序腋外生或假顶生，花蓝紫色，龙骨瓣具流苏状、鸡冠状附属物。蒴果近倒心形，具狭翅，疏生短睫毛；花期4~7月。果期5~8月。

生境分布 生于向阳山坡或砂质干燥地。分布于全国大部分地区。

采收加工 春、秋季采挖，晒干。


性味功能 味苦、辛，性温。有安神化痰，消痈肿的功能。

主治用法 用于神经衰弱，惊悸健忘，多梦失眠，寒痰咳嗽，痰湿痈肿，支气管炎，腹泻，膀胱炎等症。用量3~9g。

应　　用

同远志。

远志科 Polygalaceae



远　志 *Polygala tenuifolia* Willd.

基　　源 为远志科植物远志的根或根皮。

原 植 物 别名：细叶远志、小草、小草根

多年生草本。根圆柱形。叶互生，线形或线状披针形，全缘，无毛。总状花序侧生小枝顶端，淡蓝色或蓝紫色。花瓣3；中央1瓣呈龙骨瓣状，下面顶部有鸡冠状附属物。蒴果近圆形，顶端凹陷。种子2粒，长圆形。花期5~7月，果期6~9月。

生境分布 生于向阳或砂质干山坡、路旁或河岸谷地。有栽培。分布于东北、华北、西北及河南、山东、安徽、江苏、浙江、江西等省区。

采收加工 春、秋季采挖根部，晒至皮部稍皱缩，用手揉搓抽去木心，晒干，为远志筒。将皮部剖开，除去木部，为远志肉；不去木部，为远志棍。

性味功能 味苦、辛，性温。有安神化痰，消痈肿的功能。

主治用法 用于神经衰弱，惊悸健忘，多梦失眠，寒痰咳嗽，支气管炎，腹泻，膀胱炎等症。用量3~9g。

应　　用

1. 神经衰弱，健忘心悸，失眠：远志3g，研粉，米汤冲服。
2. 慢性气管炎：远志、甘草、曼陀罗浸膏，蜂蜜制丸，早晚服。
3. 咳嗽痰多：远志、紫菀、杏仁各9g，桔梗、生甘草各3g。水煎服。
4. 寒痰喘咳：远志、川贝、半夏、茯苓。水煎服。

远志科 Polygalaceae

龙 眼（龙眼肉） *Dimocarpus longan* Lour.

基　　源 龙眼肉为无患子科植物龙眼的假种皮。

原 植 物 别名：桂圆、桂元肉

常绿大乔木。双数羽状复叶，互生，小叶2~6对，革质，长椭圆形或长椭圆状披针形，先端钝尖或钝，基部偏斜，全缘或波状。顶生或腋生圆锥花序，密生锈色星状毛；花瓣5，淡黄色。核果球形，果皮薄，干后近木质，黄褐色。种子球形，黑色有光泽，外有白色、肉质、甜味的假种皮。花期3~4月。果期7~9月。

生境分布 生于热带和亚热带，栽培。分布于福建、台湾、广东、广西、云南、贵州、四川等省区。

采收加工 7~9月果实成熟时采收，去果皮及核，晒干。

性味功能 味甘，性温。有补心脾，益气，益血，安神的功能。

主治用法 用于病后体虚，神经衰弱，健忘，心悸，失眠，食少体倦，贫血，便血，月经过多等。用量10~15g。

应　　用

1. 神经衰弱：龙眼肉、黄芪、白术、党参、茯神、酸枣仁各9g，当归6g，广木香1.5g（后下），远志3g，炙甘草、生姜各4.5g，红枣15g。水煎服。
2. 崩漏，久泻：龙眼肉30g，大枣15g。水煎服。
3. 血小板低，贫血：龙眼肉9g，花生米（连红衣）15g。水煎服。
4. 产后血虚，浮肿：龙眼肉、生姜、大枣。水煎服。

无患子科 Sapindaceae

野鸦椿 *Euscaphis japonica* (Thunb.) Dippel

基　　源 为省沽油科植物野鸦椿的根和果实。

原 植 物 落叶小乔木或灌木。枝叶揉碎后有恶臭气味。叶对生，单数羽状复叶，小叶5~9，厚纸质，长卵形或椭圆形，先端渐尖，基部钝圆，边缘具疏短锯齿，齿尖有腺体，仅背面沿脉有白色小柔毛。圆锥花序顶生，花梗长达21cm，花多，较密集，黄白色；萼片与花瓣为5，椭圆形，萼片宿存，花盘盘状。蓇葖果长1~2cm，每朵花发育为1~3个蓇葖，果皮软革质，紫红色，有纵脉纹。花期5~6月，果期8~9月。

生境分布 生于向阳山坡灌木丛或阔叶林中。分布于除西北各省区外的全国大部分省区。

采收加工 根、果秋季采集，分别晒干。

性味功能 根：味微苦，性平。有解表，清热，利湿功能。

果：味辛，性温。有祛风散寒，行气止痛的功能。

主治用法 根用于感冒头痛，痢疾，肠炎。果用于月经不调，疝痛，胃痛。用量根15~30g；果9~15g。

应　　用

1. 头痛：野鸦椿子15~30g，外感加解表药，水煎服。
2. 妇女血崩：野鸦椿根60g，桂圆15g，水煎服。

附注：野鸦椿树皮亦入药，功效与果实相似。其花入药，用于头痛，目眩。

省沽油科 Staphyleaceae







栾　树（栾树花）*Koelreuteria paniculata* Laxm.

基　　源　栾树花为无患子科植物栾树的花。

原 植 物　落叶乔木或灌木。单数羽状复叶，有时2回或不完全2回羽状复叶，小叶7~15，卵形或卵状披针形，先端渐尖，基部宽楔形。聚伞圆锥花序大型，顶生，多分枝，广展，有柔毛；花淡黄色，中心紫色；花萼5，卵形，边缘具腺状缘毛；花瓣4，被长柔毛；蒴果圆锥形，具三棱。种子近球形，黑色。花期6~8月。果期9~10月。

生境分布　生于杂树林或灌木林中，为常见的绿化树种。分布于东北、华北、华东、西南及陕西、甘肃等省区。

采收加工　7~8月花期时采收将开的花，晒干。

性味功能　味苦，性寒。有清肝明目，消炎去肿，疏风清热的功能。


主治用法　用于目肿赤烂，目痛流泪，疝气痛，腰痛等症。用量3~9g。

应　　用

1. 目肿赤烂：栾树花、黄连，煎汤内服。
2. 风热咳嗽：栾树花3~9g，煎水服。

附注：根用于风湿痹痛：根9~15g，水煎或浸黄酒服。果实用于疝气痛，腰痛。

无患子科 Sapindaceae



荔　枝（荔枝核）*Litchi chinensis* Sonn.

基　　源　荔枝核为无患子科植物荔枝的种子。

原 植 物　常绿乔木。双数羽状复叶互生；革质，长椭圆形，先端渐尖，基部楔形，全缘。圆锥花序顶生，绿白色或淡黄色，杂性；花被杯状，4裂，密被锈色柔毛。核果卵圆形，果皮干硬而薄，有瘤状突起，红色。种子外被白色假种皮，肉质。种子长圆形，有光泽。花期2~3月。果期6~7月。

生境分布　福建、广东、海南、广西、四川等省区有栽培。

采收加工　6~7月果皮变红时采摘，除去果皮及果肉，晒干。

性味功能　味甘、涩，性温。有理气，祛寒，散结止痛的功能。

主治用法　用于胃脘痛，疝气痛，妇女气滞血瘀，腹痛。用量4.9~9g。

应　　用

1. 血气刺痛：荔枝核烧存性25g，香附子50g，研末，盐酒送下。
2. 疝气，睾丸炎：荔枝核、陈皮、小茴香。研末糊丸，空心酒服。
3. 心腹胃脘久痛：荔枝核3g，木香24g。研末，水调服。
4. 脾虚久泻：荔枝核、大枣各7枚，山药、鸡内金各6g，水煎服。

附注：荔枝根及果肉也供药用。根有消肿止痛的功能。果肉味甘，酸，性温。有益气补血的功能。用于病后体虚，脾虚久泻，血崩等。


无患子科 Sapindaceae



无患子 *Sapindus mukorosii* Gaertn.

基　　源	为无患子科物无患子的果实。
原 植 物	高大落叶乔木。双数羽状复叶互生；小叶 8~16，互生或近对生，纸质，卵状披针形或长圆状披针形，先端尖，基部偏楔形，稍不对称，无毛。圆锥花序顶生，被短柔毛，花小，杂性同株；花瓣 5，黄白色或淡黄色，边缘有睫毛。核果球形，肉质，有棱，黄色或棕黄色。种子球形，黑色，坚硬。花期 5~6 月。果期 10~11 月。
生境分布	生于山坡疏林中，村边向阳处或有栽培。分布于长江以南各省区。
采收加工	果实秋、冬季采摘，晒干。
性味功能	味苦，微辛，性寒，有小毒。有清热祛痰，利咽止泻的功能。
主治用法	用于白喉，咽喉炎，扁桃体炎，支气管炎，百日咳，急性肠胃炎（煅炭用）。用量 6g。
应　　用	1. 白喉，扁桃体炎：无患子。多次蒸晒去毒，研粉。 2. 滴虫性阴道炎：无患子。水煎浓液，冲洗阴道。

无患子科 Sapindaceae



文冠果（文冠木） *Xanthoceras sorbifolia* Bge.

基　　源 文冠木为无患子科植物文冠果的枝条木部。

原 植 物 落叶小乔木。单数羽状复叶互生，小叶9~19，膜质，狭椭圆形至披针形，边缘有尖锐锯齿。花先叶或同时开放，圆锥花序，杂性；花瓣5，白色，基部红色或黄色，内面有紫红色斑点；花盘5裂，裂片背面有角状橙色附属体。蒴果，壳硬，绿色，背裂成3瓣，果皮厚，木栓质。种子圆形，暗褐色，坚硬，光滑。花期4~5月。果期7~8月。

生境分布 生于山坡、河谷、黄土地或干旱丘陵地。分布于东北、华北、西北及山东等省区。

采收加工 春季结合森林抚育砍取枝条，去皮晒干或切碎鲜用。

性味功能 味甘，微苦，性凉。有清热燥湿，祛瘀止痛，敛干黄水的功能。

主治用法 用于风湿性关节炎，风湿内热，皮肤风湿，疥癣，痈肿，瘀血紫斑等。水煎服或膏服。用量9~15g。

应　　用

1. 风湿性关节炎：文冠木3g。水煎服，或熬膏敷患处。
2. 小儿夜尿症：文冠木，水煎服。文冠5粒，去皮生吃。

无患子科 Sapindaceae



凤仙花（急性子） *Impatiens balsamina* L.

基　　源 急性子为凤仙花科植物凤仙花的干燥成熟种子。

原 植 物 别名：指甲花

一年生草本。茎肉质，节部带紫红色。叶互生，披针形，先端渐尖，基部楔形，边缘有尖锐锯齿。花腋生，基部有长距，花瓣5，红色、粉红色、白色或紫红色。蒴果椭圆形，有白色短绒毛，果皮有弹力，果熟时开裂，弹出种子。种子多数，稍扁球形，赤褐色或棕色，粗糙而有短条纹。花期7~9月。果期9~10月。

生境分布 多栽培观赏。全国各地均有栽培。

采收加工 9~10月果实成熟前采收未开裂的果实，晒干，打出种子。

性味功能 味微苦，性温。有小毒。有软坚消积，活血通经的功能。

主治用法 用于经闭，难产，腹部肿块，骨硬咽喉，噎膈。用量6~9g。孕妇忌服。

应　　用

1. 催产：急性子1.5g。研末，温开水冲服。
2. 丝虫病，淋巴管炎：急性子1.5g，蜈蚣、苍术各1.2g，蛇蜕3g。研末，温开水送服。
3. 消化道癌：急性子、石风穿、半枝莲各30g，红枣10枚。水煎服。
4. 经闭，痛经：急性子3g。研末，制蜜丸，当归9g，水煎服。

凤仙花科 Balsaminaceae



七叶树（娑罗子） *Aesulus chinensis* Bge.

基　　源 娑罗子为七叶树科植物七叶树的干燥成熟种子。

原 植 物 高大乔木。掌状复叶，有长柄，小叶5~7，较厚，上面无毛，长椭圆形或长椭圆状卵形，先端渐尖，基部广楔形。聚伞圆锥花序，连总梗长45cm，无毛，花萼具白色短柔毛，花瓣4，白色；雄蕊花丝甚长。果蒴近球形，果壳较厚，顶端微尖或圆钝，3瓣裂。花期5~6月。

生境分布 生于低海拔的丛林中，多为栽培。分布于河北、河南北部、山西南部及陕西南部等地。

采收加工 秋季果实成熟时采收，除去果皮，晒干或低温干燥。

性味功能 味甘，性温。有理气宽中，和胃止痛，截疟，杀虫的功能。

主治用法 用于胃脘胀痛，疳积，痢疾，疟疾。用量3~9g。

应　　用

1. 胃痛：娑罗子。去壳，捣碎煎服。
2. 心痛：娑罗子。烧灰，冲酒服。
3. 胸脘胀痛：娑罗子、八月札、青皮各9g。水煎服。
4. 乳房小叶增生：娑罗子9g，水煎代茶饮。

七叶树科 Hippocastanaceae



浙江七叶树（娑罗子）

Aesculus chinensis Bge. var. *chekingensis* (Hu et Fang) Fang

基　　源 娑罗子为七叶树科植物浙江七叶树的果实。

原 植 物 落叶乔木，高达25 m，小枝光滑。掌状复叶，叶片5~7，长椭圆形或长椭圆状卵形，长8~15 cm，先端渐尖，基部广楔形，背面绿色，微有白粉；侧脉显著，有18~22对；小叶柄常无毛，较长，中间小叶的小叶柄长1.5~2cm，旁边的长0.5~1 cm。圆锥花序较长而狭窄，长30~36cm，基部直径2.4~3 cm；花萼无白色短柔毛。蒴果的果壳较薄，干后仅厚1~2 mm，种脐白色，较小，占种子面积的1/3以下。花期6月，果期10月。

生境分布 生于低海拔丛林中。分布于江苏南部、浙江北部。

采收加工 秋季果实成熟时采收，除去果皮，晒干或低温干燥。

性味功能 味甘，性温。有理气宽中，通络止痛，杀虫的功能。

主治用法 用于胃寒作痛，胸脘胀痛，疳积，疟疾，痢疾。用量3~9g。

应　　用

同七叶树。

七叶树科 Hippocastanaceae



天师栗（娑罗子） *Aesculus wilsonii* Rehd.

基　　源 娑罗子为七叶树科植物天师栗的果实。

原植物 别名：猴板栗

落叶乔木。幼枝有长柔毛。掌状复叶对生，小叶5~7，长圆状倒卵形或长圆状倒披针形，边缘有细锯齿，上面仅在主脉上疏生细柔毛，下面密生细柔毛，叶侧脉20~25对。聚伞圆锥花序顶生，较大，圆筒形，花疏生；花杂性同株，雄花生于上部，两性花生于下部；花瓣4，白色，倒长卵形或椭圆形，外被柔毛，顶端圆，基部楔形，边缘具纤毛；两性花子房卵圆形，被黄色绒毛。蒴果卵圆形，黄褐色，顶端具短尖头，有斑点，果壳薄，3裂。种子1，近球形，棕褐色。花期4~5月，果熟期9~10月。

生境分布 生于阔叶林中。分布于陕西、河南、江西、湖北、湖南、广东、贵州、四川、云南等省。

采收加工 9~10月摘取成熟果实，除去果皮，晒干。

性味功能 味甘，性温。有理气宽中，通络止痛，杀虫的功能。

主治用法 用于胃寒作痛，胸脘胀痛，疳积，疟疾，痢疾。用量3~9g。

应　　用

同七叶树。

七叶树科 Hippocastanaceae



橄　榄（青果） *Canarium album* Raeusch.

基　　源 青果为橄榄科植物橄榄的果实。

原植物 常绿乔木。树干有胶粘性芳香树脂。单数羽状复叶互生，小叶9~15对生，革质，椭圆状披针形，先端渐尖，基部偏斜，全缘。圆锥花序顶生或腋生；花小，两性或杂性；花萼杯状，3~5裂；花瓣3~5，白色或绿白色，花盘明显。核果卵状纺锤形，青绿色或黄绿色，光滑；果核坚硬，纺锤形，有棱及槽。花期5~7月。果期8~11月。

生境分布 栽培于杂木林中或山坡上。分布于福建、台湾、广东、广西、海南、四川及云南等省区。

采收加工 秋季果实成熟时采摘，生用或晒干或阴干。

性味功能 味甘、酸，性平。有清热解毒，利咽，生津的功能。


主治用法 用于咽喉肿痛，暑热烦咳，肠炎腹泻，预防脑膜炎；用量3~9g。鲜果汁用于河豚、鱼、蟹中毒，用量不限。

应　　用

1. 细菌性痢疾：鲜橄榄100g，水煎服。
2. 唇裂生疮：橄榄。炒黄，研末，油调涂患处。
3. 咽喉肿痛：鲜橄榄、鲜莱菔子，水煎服。
4. 湿疹皮炎，女阴溃疡，渗出性红斑：橄榄捣烂，文火煎煮，用滤液湿敷患处。

附注：根味淡，性平。有舒筋活络，祛风除湿的功能。用于风湿腰腿酸痛，产后风瘫，手脚麻木。用量9~15g。

橄榄科 Burseraceae



乌榄 *Canarium pimela* Leenh.

基　　源 为橄榄科植物乌榄的干燥根和叶。

原 植 物 别名：木威子、黑榄

常绿大乔木。树皮灰白色。单数羽状复叶，小叶15~11片，矩圆形或卵状椭圆形，先端锐尖，基部偏斜，全缘，上面网脉明显，下面平滑。花白色。圆锥花序顶生或腋生，花萼杯状，3~5裂；花瓣3~5，长约为萼片3倍；雄蕊6。核果卵形或椭圆形，两端钝，成熟时紫黑色。花期夏季。

生境分布 生于低海拔山地林中。分布于我国南部地区。

采收加工 全年可采收根部，切片晒干。秋季采收叶晒干。

性味功能 根味淡，性平。有舒筋活络，祛风除湿的功能。叶微苦、微涩，性凉。有清热解毒，消肿止痛的功能。

主治用法 根用于风湿腰腿痛，手足麻木；用量15~30g。叶用于感冒，上呼吸道炎，肺炎，多发性疖肿；用量9~18g。

应　　用

1. 上呼吸道炎，肺炎，多发性疖肿：乌榄叶切碎，水煎浓缩成浸膏，再制成片剂，口服。
2. 风湿腰腿痛：乌榄根15g。水煎服；并研末，油调涂敷腰腿痛处。

橄榄科 Burseraceae



南酸枣（广枣）

Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill

基　　源 广枣为漆树科植物南酸枣的果实。

原 植 物 落叶乔木。单数羽状复叶互生，小叶7~15，对生，长圆形或披针形，全缘。花杂性，雌雄异株，雄花和假两性花排成聚伞圆锥花序，淡紫红色；雌花单生于上部叶腋内；萼片杯状，5裂；花瓣5。核果状浆果椭圆形或近卵形，顶端有5个小孔，黄色。花期3~5月。果期8~10月。

生境分布 生于村边或山间沟谷疏林中。分布于浙江、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州、四川、云南等省区。

采收加工 秋季果实成熟时采摘，晒干。

性味功能 味甘、酸，性平。有行气活血，养心安神的功能。

主治用法 用于气滞血瘀，心区作痛，心跳气短，心神不安。用量1.5~2.5g。

应　　用

1. 食滞腹满：广枣鲜果2~3枚，嚼食。
2. 心跳气短，心神不安：广枣鲜果2~3枚，嚼服。

附注：根皮外用疮疡溃烂，煎水外洗。树皮味酸、涩，性凉。有解毒，止痛，收敛，止血的功能。用于细菌性痢疾。外用于烧、烫伤，外伤出血，牛皮癣，阴囊湿疹，热膏涂患处。

漆树科 Anacardiiaceae



黄栌（黄栌叶）

Cotinus coggygria Scop. var. *inerea* Engl.

基　　源　黄栌叶为漆树科植物黄栌的嫩枝及叶；根也供药用。

原植物　落叶灌木或小乔木。单叶互生，卵圆形或倒卵形，先端圆或微凹，基部近圆形或宽楔形，全缘，两面被灰色柔毛。圆锥花序顶生，被柔毛，花杂性；花萼5，裂片卵状三角形；花瓣5，黄绿色，卵形或卵状披针形。果序紫绿色。核果肾形，熟时红色。花期4~5月，果期6~7月。

生境分布　生于向阳山坡、疏林中或栽培。分布于华北及山东、浙江、湖北、贵州、四川、云南等省。

采收加工　夏季枝叶茂盛时砍下枝条，摘下叶晒干。

性味功能　味辛，苦，性凉。有清热解毒，散瘀止痛的功能。

主治用法　用于急性黄疸型肝炎，慢性肝炎，无黄疸型肝炎，麻疹不出。外用水、火烫伤，漆疮，丹毒，煎水洗患处。用量15~30g。外用适量。

应　　用

1. 急性黄疸型肝炎：制成黄栌糖浆，水丸或片剂。成人每次3g，儿减半，或枝叶30g，水煎服。
2. 漆疮，烫伤：枝叶适量，煎水洗患处。



芒　果　*Mangifera indica* L.

基　　源　为漆树科植物芒果的果实、果核及叶。

原植物　常绿大型乔木。单叶聚生枝顶，革质，长圆形至长圆状披针形，先端短尾尖或渐尖，基部宽楔形，边缘呈波浪形。圆锥花序顶生，具柔毛；花小，杂性，芳香，黄色或带红色；萼片5，花瓣5，花盘肉质，5裂。核果椭圆形或肾形，微扁，黄色，可食，内果皮坚硬，被粗纤维。花期3~4月。果期5~6月。

生境分布　栽培种。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、云南等省区。

采收加工　叶全年可采，果实夏季采收，鲜用或晒干。

性味功能　味酸、甘，性凉。果、果核有止咳，健胃，行气的功能。叶有止痒的功能。

主治用法　果、果核用于咳嗽，食欲不振，睾丸炎，坏血病等症。鲜叶外用于湿疹瘙痒。用量核15~30g。叶外用适量，鲜叶煎水洗。

应　　用

1. 疝气及小儿食滞：芒果核、龙眼核、柚子核、核桃和黄皮核，煎汤内服。
2. 食滞，咳嗽：芒果核、布渣叶、水煎内服。
3. 皮肤湿疹瘙痒：鲜芒果叶。煎水外洗敷患处。



盐肤木（五倍子）*Rhus chinensis* Mill.

基　　源 五倍子为漆树科植物盐肤木受瘿绵蚜科昆虫角倍蚜寄生后形成的虫瘿，称角倍。

原 植 物 落叶乔木。单数羽状复叶互生，小叶5~13，卵形、长卵形，先端尖，基部楔形，边缘有粗锯齿，密被淡褐色短柔毛。圆锥花序顶生；两性花萼片5，绿黄色；花瓣5，白色。果序直立；核果扁圆形，橙红色至红色，被灰白色短柔毛，种子1，扁圆形。花期6~9月，果期9~11月。

生境分布 生于山坡上、荒野、灌丛中。分部于四川、贵州、云南、湖南、湖北、陕西、河南、浙江等省区。

采收加工 秋季采摘，置沸水中略煮或蒸至表面呈灰色，杀死蚜虫，取出，干燥。

性味功能 味酸、涩，性寒。敛肺降火，涩肠止泻，敛汗止血，收湿敛疮的功能。

主治用法 用于肺虚久咳，肺热痰嗽，久泻久痢，盗汗，消渴，便血，痔血；外用于外伤出血，痈肿疮毒，皮肤湿烂。用量3~6g，水煎服。外用：适量，研末撒敷或调敷。

应　　用

1. 久泻久痢：五倍子、茯苓各等份。研细末，炼蜜为服。
2. 便血：五倍子3g，槐花、地榆各6g。水煎服。
3. 外伤出血：五倍子适量。研末敷伤口处。
4. 崩漏，血崩后虚脱：五倍子、龙骨、牡蛎。水煎服。

漆树科 Anacardiaceae



青麸杨（五倍子）*Rhus potanini* Maxim.

基　　源 五倍子为漆树科植物青麸杨受瘿绵蚜科昆虫肚倍蚜寄生后形成的虫瘿，称肚倍。

原 植 物 落叶乔木。单数羽状复叶小叶5~9，椭圆形或椭圆状披针形，先端渐尖，基部圆形或广楔形，偏斜，全缘或幼时有粗锯齿。圆锥花序顶生，被细柔毛；花小，杂性，白色，花药黄色。果序下垂，核果近球形，血红色，密生细短毛，有宿存花柱。花期5~6月，果期7~9月。

生境分布 生于山坡干燥处灌木丛中。分布于陕西、甘肃、山西、河南、湖北、湖南、贵州、四川、西藏、云南等省区。

采收加工 秋季采摘，置沸水中略煮或蒸至表面呈灰色，杀死蚜虫，取出，干燥。

性味功能 味酸、涩，性寒。有敛肺降火，涩肠止泻，敛汗止血，收湿敛疮的功能。

主治用法 用于肺虚久咳，肺热痰嗽，久泻久痢，盗汗，消渴，便血痔血；外伤出血，痈肿疮毒，皮肤湿烂。用量3~6g，水煎服。外用适量，研末撒敷或调敷。

应　　用

同盐肤木。

漆树科 Anacardiaceae



红麸杨（五倍子）

Rhus punjabensis Stewort var. *sinica* (Diels) Rehd. et Wils.

基　　源　五倍子为漆树科植物红麸杨受瘿绵蚜科昆虫肚倍蚜寄生后形成的虫瘿，称肚倍。

原 植 物　落叶乔木，小枝有短毛。奇数羽状复叶，小叶5~13枚，卵状长椭圆形至椭圆形，先端渐尖，基部圆形或近心形，全缘或中上部具疏锯齿，上面光滑无毛，下面沿叶脉有短柔毛；无小叶柄。圆锥花序顶生，花杂性，白色，花药紫色。果序下垂，核果近圆形，深红色，密生细柔毛。花期6~7月，果期8~9月。

生境分布　生于向阳山坡疏林下或灌木丛中。分布于湖北、湖南、陕西、甘肃、云南、贵州、四川、西藏等省区。

采收加工　秋季采摘，置沸水中略煮，杀死蚜虫，取出，干燥。

性味功能　味酸，性平。具有敛肺降火，涩肠止泻，敛汗，止血，收湿敛疮的功能。

主治用法　用于肺虚久咳，肺热痰嗽，久泻久痢，盗汗，消渴，便血痔血；外伤出血，痈肿疮毒，皮肤湿烂。用量3~6g。外用适量。

应　　用

同盐肤木。

漆树科 Anacardiaceae



漆 树（干漆）

Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl.

基　　源　干漆为漆树科植物漆树的树脂加工后的干燥品。

原 植 物　高大乔木。树皮灰白色，粗糙不规则纵裂。小枝粗壮，淡黄色。奇数羽状复叶互生；小叶9~15，卵形至长圆状卵形，全缘，先端渐尖，基部圆形或宽楔形，两面叶脉上有棕色短毛。圆锥花序腋生，具短柔毛。花杂性，或雌雄异株。花密而小，黄绿色。果序下垂；核果，扁球形或肾形，外果皮棕黄色，有光泽，熟后不裂。花期5~6月，果期7~10月。

生境分布　生于山坡。分布于甘肃、陕西、山西、河南、山东、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、贵州、广东、四川、云南等地。

采收加工　采收漆树的树脂加工后干燥。

性味功能　味辛，性温。有毒。有破瘀调经，消积杀虫的功能。

主治用法　用于闭经，月经水调，风湿痛，虫积腹痛。用量2.4~4.5g。

应　　用

1. 小肠膀胱气痛：干漆。研末，炼丸，温酒吞服。
2. 跌打损伤：干漆3g。研末，调敷患处。

漆树科 Anacardiaceae



臭 椿（椿皮） *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle

基　　源 椿皮为苦木科植物臭椿的干燥根皮或干皮。

原 植 物 别名：樗木

落叶乔木。小枝褐色至褐红色，疏生灰黄色皮孔，有短柔毛。奇数羽状复叶互生，小叶13~15，具小叶柄，卵状披针形，先端渐尖，基部宽歪斜，一侧方圆，一侧楔形，近基部有2~4粗齿，齿端各具1腺体，揉碎有臭气。圆锥花序顶生，花少，绿白色，杂性，花瓣5~6；雄花雄蕊10；两性花雄蕊较短。翅果长圆状椭圆形。

生境分布 野生或栽培于山坡、庭院。分布于全国各地。

采收加工 春季剥取根皮或干皮，刮去或不刮去外面粗皮，晒干。

性味功能 味苦、涩，性寒。有清热燥湿，涩肠止泻，止血的功能。

主治用法 用于赤白带下，湿热泻痢，便血，崩漏。用量6~9g。

应　　用

1. 赤白痢疾：椿皮9g。水煎服。
2. 妇女湿热白带：椿皮、滑石各3g。共研末，开水调服。
3. 久痢，便血：椿皮焙干研粉，每服9g。温水送下。

苦木科 Simaroubaceae



鸦胆子 *Brucea javanica* (L.) Merr.

基　　源 为苦木科植物鸦胆子的成熟种子。

原 植 物 别名：苦参子、老鸦胆

灌木或小乔木，全体被黄色柔毛。单数羽状复叶互生，小叶5~11，卵状披针形，基部宽楔形而偏斜，顶端短渐尖，边缘有粗锯齿。圆锥花序腋生，雌雄异株，雌花序长为雄花序的一半左右；花小，暗紫色。核果椭圆形稍扁，黑色，有皱纹，顶端有花柱残基。种子1，卵形，乳白色或黄白色，顶端短尖呈鸟嘴状，种皮薄，气微特异，味极苦。花期3~8月。果期4~10月。

生境分布 生于灌丛、林缘。分布于福建、台湾、海南、广西、云南。

采收加工 8~10月果实成熟时采收果实，晒干。临用时除去果皮。

性味功能 味苦，性寒，有毒。有清热燥湿，杀虫，解毒，止痢，止疟的功能。

主治用法 用于阿米巴痢疾，疟疾。外用赘疣，鸡眼等。用量0.5~2g。外用适量。捣烂敷患处。

应　　用

1. 阿米巴痢疾：鸦胆子2g。水煎服。
2. 溃疡性结肠炎，阴道炎：鸦胆子2g。水煎服。
3. 间日疟：鸦胆子仁，放入胶囊或桂圆肉中饭后吞服。
4. 皮肤赘疣，足底鸡眼：鸦胆子仁研成糊状，外敷患处。

苦木科 Simaroubaceae

苦木 *Picrasma quassioides* (D. Don) Benn.

基　　源 为苦木科植物苦木的根及树皮。

原植物 别名：苦皮树、苦胆木、苦皮子

落叶小乔木或灌木。树皮有灰色皮孔和斑纹，单数羽状复叶互生：小叶9~15，对生；卵形或卵状椭圆形，先端锐尖，基部楔形，偏斜，边缘有钝锯齿。聚伞花序腋生，有花6~8朵；花杂性异株，黄绿色，簇生，萼片4~5，花瓣4~5。核果倒卵形，3~4个并生，蓝绿色至红色。花期5~6月。果期8~9月。

生境分布 生于山坡、林缘及路旁。分布于全国大部分地区。

采收加工 全年可采。可将木材切成片或剁成碎片，晒干。

性味功能 味苦，性寒，有毒。有清热燥湿，解毒，杀虫的功能。

主治用法 用于菌痢，胃肠炎，胆道感染，蛔虫病，急性化脓性感染，疥癣、湿疹，烧伤、毒蛇咬伤等症。用量0.35~1.5g。外用适量，捣烂外敷或煎水洗。

应　　用

1. 阿米巴痢疾：苦木1g、石榴皮15g，竹叶椒根9g、水煎，分2次服。
2. 菌痢：苦木61g研粉，分3~4次吞服。
3. 痈疖肿毒，疥癣：苦木适量，煎水外洗患处。
4. 烧伤、毒蛇咬伤：苦木，研末涂敷患处。

苦木科 Simaroubaceae

米仔兰 *Aglaia odorata* Lour.

基　　源 为楝科植物米仔兰的花及枝、叶。

原植物 常绿小乔木。枝多，幼嫩部分常被星状锈色鳞片，树冠呈半圆形。单数羽状复叶互生，叶柄上有黑色腺点，叶轴上稍有叶翅；小叶3~5片，无柄，薄革质，有光泽，顶端1片较长，两侧的小叶较小，基部的1对更小，窄椭圆形至窄椭圆披针形，先端钝或钝尖，基部楔形而下延，全缘或呈微波状。花单性与两性同株，为腋生疏散的圆锥花序，花多而小，圆球形，甚芳香，花径约2mm，具短梗，花萼5，绿色，花瓣5，黄色。浆果卵形或近球形。花期7~8月。

生境分布 野生于林中，常栽培于宅旁或庭园。分布于广东、广西、福建、台湾、四川、云南等地。

采收加工 夏季待花开放时，摘下，收集晒干。枝叶全年可采。


性味功能 花：味甘、辛，性平。有行气解郁，醒酒清肺的功能。枝、叶：味辛，性微温。有活血散瘀，消肿止痛的功能。


主治用法 花用于感冒，气郁胸闷，食滞腹胀。枝叶用于跌打骨折，风湿关节痛，痈疮。用量：花3~9g。枝叶9~12g。

应　　用

跌打骨折，风湿关节痛：米仔兰枝叶9g，研粉敷患处。

楝科 Meliaceae





灰毛浆果楝 *Cipadessa cinerascens* Hand-Mazz.

基　　源 为楝科灰毛浆果楝的根、叶。

原 植 物 别名：假茶辣、大苦木、臭子

灌木或小乔木，小枝被茸毛。单数羽状复叶，叶柄被茸毛；小叶9~17对，对生或近对生，卵形或卵状矩圆形，先端稍窄尖，基部偏斜，全缘或有齿，两面被紧贴的灰黄色柔毛。圆锥花序腋生，小花黄色；萼5裂，外面柔毛；花瓣5，外面柔毛；雄蕊10，花丝联合成短筒；子房球形。核果球形，外皮略肉质，干后有5棱。花期8~10月。

生境分布 生于山间、河岸，路边等疏林中或灌木丛中。分布于广西、四川、贵州、云南等省。

采收加工 根全年可采，切片，晒干。叶夏秋采收，鲜用或晒干。

性味功能 味苦，性凉。有清热解毒，行气通便，截疟的功能。

主治用法 用于感冒，发热不退，疟疾，大便秘结，腹痛，痢疾，风湿关节痛；外用于小儿皮炎，皮肤瘙痒，烧烫伤。用量9~15g。

应　　用

1. 小儿皮炎，皮肤瘙痒：灰毛浆果楝、桃叶各适量，煎水洗患处。
2. 烧烫伤：灰毛浆果楝根，研末，涂敷患处。
3. 风湿关节痛：灰毛浆果楝根15g，水煎服。

楝科 Meliaceae



苦　楝（苦楝皮） *Melia azedarach* L.

基　　源 苦楝皮为楝科植物苦楝的树皮及根皮。

原 植 物 别名：楝树、楝

高大落叶乔木。树皮纵裂，小枝绿色，有星状细毛，老枝紫褐色。叶互生，2~3回羽状复叶，卵形或椭圆形，先端长尖，基部圆形，两侧常不等，边缘有锯齿。圆锥伞形花序腋生或顶生；花淡紫色或紫色；花萼5，有柔毛；花瓣5，宽线形或倒披针形，平展或反曲，有柔毛。核果椭圆形或球形，淡黄色；内果皮坚硬。种子线状棱形，黑色。花期4~5月。果期10~11月。

生境分布 生于山坡、路旁、田野。多有栽培。分布于河北、陕西、甘肃、河南、山东及长江以南各地区。

采收加工 春、秋季剥取树皮，除去粗皮，晒干。

性味功能 味苦，性寒。有毒。有清热，燥湿，杀虫的功能。

主治用法 用于蛔虫病，钩虫病，蛲虫病，阴道滴虫病，风疹，疥癣等症。用量4.5~9g；外用适量，研末，用猪脂调敷患处。肝炎，肾炎患者慎用。

应　　用

1. 胆道蛔虫病：苦楝皮，水煎服。
2. 小儿蛔虫性肠梗阻：苦楝皮，水煎服。
3. 蛇咬伤：苦楝皮、韭菜各200g，米酒250g，醋200g，炖热放凉，药酒外擦，药渣外敷，内服少许药酒。
4. 顽固性湿癣：苦楝皮。烧灰，调茶油涂抹患处。

楝科 Meliaceae



川楝（川楝子） *Melia toosendan* Sieb. et Zucc.

基　　源 川楝子为植物川楝的果实。

原植物 高大落叶乔木。2回羽状复叶；小叶5~11，狭卵形或长卵形，先端渐尖，基部圆形，偏斜，全缘或小有疏齿，幼时两面密被黄色星状毛。圆锥花序腋生；花萼5~6；花瓣5~6，紫色或淡紫色。核果椭圆形或近圆形，黄色或黄棕色；内果皮木质坚硬，有棱。种子扁平，长椭圆形，黑色。花期3~4月。果期9~11月。

生境分布 生于平原，丘陵地或栽培。分布于陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、贵州、四川、云南等省区。

采收加工 果实成熟呈黄色时采，晒干。

性味功能 味苦，性寒，有小毒。有清肝火，除湿热，止痛，杀虫的功能。

主治用法 用于热症脘腹胁肋诸痛，虫积腹痛，疝痛，痛经。用量4.5~9g。外敷治秃疮。

应　　用

1. 慢性肝炎，尤其肝区疼痛、自觉痛处有热者：川楝子、延胡索各6g，研末，温开水送服。
2. 睾丸鞘膜积液、小肠疝气所致疼痛：川楝子9g，小茴香、吴茱萸各4.5g，木香3g（后下）。水煎服。
3. 头癣：川楝子。烤黄研末，调油成膏，外擦患处。
4. 胆石病：川楝子、木香、枳壳、黄芩各9g，金钱30g，生大黄6g，水煎服。

附注：树皮及根皮作苦楝皮药用。有杀虫的功能。用于蛔虫病。

楝科 Meliaceae



香椿 *Toona sinensis* (A. Juss.) Roem.

基　　源 为楝科植物香椿的根皮、叶、嫩枝及果实。

原植物 乔木。双数羽状复叶，互生，有特殊香气；小叶5~11对，对生；纸质，长圆形或披针状长圆形，先端长渐尖，基部偏斜不对称，一边圆形，另一边楔形，边缘有疏细锯齿或近全缘，圆锥花序顶生或腋生，常下垂，花两性；萼片短小；花瓣5，白色或绿白色。果序下垂，蒴果狭椭圆形，5瓣开裂。种子椭圆形，一边有膜质长翅。花期6~7月。果期8~9月。

生境分布 生于村边、路旁、宅院等，多为栽培。分布于华北、华东、中南及西南等省区。

采收加工 根皮全年均可采剥，洗净，晒干。嫩枝、叶夏、秋季采，晒干。果实秋、冬季采摘，晒干。

性味功能 味苦、涩，性温。有祛风利湿，止血止痛的功能。

主治用法 根皮用于痢疾，肠炎，泌尿感染，便血，白带，血崩，风湿腰腿痛。嫩枝及叶用于痢疾。果实用于胃及十二指肠溃疡，慢性胃炎。

应　　用

1. 急性细菌性痢疾：香椿15g，水煎服。
2. 唇上生疔：鲜香椿叶捣烂，和酒饮服。
3. 小儿头生白秃，发不生出：香椿、楸叶、桃叶，捣烂取汁敷患处。

楝科 Meliaceae



降真香 *Acronychia pedunculata* (L.) Miq.

基　　源 为芸香科降真香的树干心材、根、果实。

原 植 物 别名：山橘、山油柑

乔木，高10m。单叶对生，矩圆形或长椭圆形，先端微圆或钝且微凹，基部窄尖，全缘，上面青绿色，光亮；叶柄顶端有1结节。聚伞花序近顶部腋生，萼片、花瓣均4，青白色，花瓣两侧边缘内卷，内面密被毛；雄蕊8；子房密被毛。核果黄色，平滑，半透明。种子黑色，有肉质胚乳。花期8~9月。

生境分布 生常绿阔叶林中。分布于广西、广东、云南等省区。

采收加工 全年可采，晒干或阴干。秋冬果实成熟时采收果实。

性味功能 味甘，性平。心材、根、叶：有祛风活血，理气止痛的功能。果实：有健脾消食的功能。

主治用法 心材、根、叶：用于风湿腰脚痛，跌打肿痛，支气管炎，骨痛，疝气痛。果实：用于食欲不振，消化不良。用量9~15g。

应　　用

1. 跌打损伤：降真香、乳香、没药、三七、自然铜。研极细末，水调服，并外敷患处。
2. 冠心病所致心绞痛：降真香、赤芍、川芎、红花各15g，丹参30g。制冲剂，水冲服。
3. 食欲不振，消化不良：降真香、枳壳、橘红各15g。水煎服。

芸香科 Rutaceae



石椒草 *Boenninghausenia sessilicarpa* Lévl.

基　　源 为芸香科植物石椒草的干燥或新鲜全草。

原 植 物 别名：九牛二虎草、细绿草、羊不吃

多年生常绿草本，全株有强烈的气味。主根圆柱形，木质，表面有纵纹及黑色圆形小突起。茎直立，带紫红色。叶互生，2~3回三出羽状复叶；小叶纸质，倒卵形至矩圆形，先端浑圆或微凹，基部阔楔形，全缘，上面绿色，下面淡绿带红色，有透明腺点。圆锥花序式的聚伞花序顶生；花小；花萼4裂；花瓣4，白色，有透明腺点。果由3~5个蒴果状的果瓣组成，熟时腹缝开裂。花期6~9月，果期8~10月。

生境分布 生于山坡、林边或灌丛中。分布于云南，四川西南部。

采收加工 夏、秋采收全株，晒干或鲜用。

性味功能 味苦、辛，性温。有小毒。有清热解毒，活血止痛功能。


主治用法 用于感冒，扁桃体炎，腮腺炎，支气管炎，胃痛腹胀，血栓闭塞性管炎，腰痛，跌打损伤。用量6~15g。

应　　用

1. 预防感冒、流感：石椒草9g，杏叶防风、黄芩（炒）各6g，水煎服。
2. 风寒感冒，脘腹胀痛，痈肿疮毒，跌打痨伤：石椒草9g，水煎服。
3. 皮肤瘙痒，风疹：石椒草、九里光、臭牡丹、杏叶防风各适量，煎水熏洗。

芸香科 Rutaceae





臭节草 *Boenninghausenia albiflora* Reichb. ex Meisn.

基　　源 为芸香科植物臭节草的全草。

原 植 物 别名：白虎草、松风草、臭草、岩椒草

多年生宿根草本，全株有强烈气味。茎基部木质，嫩枝髓部大，中空。二回三出羽状复叶，薄纸质或膜质，倒卵形至椭圆形，先端圆或微凹，基部楔形，全缘，有细腺点。聚伞花序顶生；花萼4，花瓣4，白色，有透明腺点；雄蕊8。蒴果，由顶端沿腹缝开裂。种子肾形，黑褐色，有瘤状突起。花期7~9月，果期8~10月。

生境分布 生于石灰岩山地，阴湿林缘或灌木丛中。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、广东、贵州、云南，四川等省区。

采收加工 夏、秋采收全株，阴干或鲜用。

性味功能 味苦、辛，性温。有清表截疟，活血散瘀，解毒的功能。

主治用法 用于疟疾，感冒发热，支气管炎，跌打损伤；外用于外伤出血，痈疽疮疡。用量9~15g。或泡酒服。外用适量，捣烂敷患处。

应　　用

1. 疟疾：臭节草、柴胡、青蒿、艾叶各9g，水煎，于发作前4小时服。或鲜臭节草于发作前2小时，捣烂敷大椎穴。
2. 跌打肿痛，痈肿疮毒：臭节草15g。泡酒适量，口服。
3. 外伤出血：臭节草。研粉，撒敷伤口。

芸香科 Rutaceae



代代花（枳壳） *Citrus aurantium* L. cv. *daidai* Engl.

基　　源 枳壳为芸香科植物代代花的果实。

原 植 物 常绿灌木或小乔木。单身复叶互生，叶柄有宽倒心形；叶革质，椭圆形或卵状长圆形，边缘具波状锯齿，有半透明油腺点。花单生或数朵簇生于叶腋；花萼杯状，顶端5裂，具缘毛，花后花萼增长变厚；花瓣5，长圆形，白色；柑果近扁球形，橙黄色(留在树上的果实至次年夏间又转为污绿色)，有增大的宿存花萼，顶端有一圈环纹；瓤囊约10瓣。花期5~8月。果期11~12月。

生境分布 生于丘陵、低山地带、江河湖沿岸或平原。主产于江苏、安徽、台湾、福建的低山地区。

采收加工 7~8月摘取未成熟的绿色果实，自中部横切两瓣，晒干或烘干。

性味功能 味苦、辛、酸，性微寒。有行气宽中，消食，化痰的功能。

主治用法 用于胸腹满闷，腹胀腹痛，食积不化，痰饮内停，胃下垂，脱肛，子宫脱垂等症。用量3~9g。孕妇慎用。

应　　用

1. 子宫下垂：枳壳15g，升麻3g。水煎服。
2. 小儿秘涩：枳壳(煨、去瓤)、甘草各3g。以水煎服。

芸香科 Rutaceae

酸　橙（枳实，枳壳）

Citrus aurantium L. *Citrus aurantium* L.

基　　源　枳实为芸香科植物酸橙的干燥幼果；其未成熟果实作枳壳入药。

原 植 物　别名：枸头橙

常绿小乔木。茎枝有长刺。叶互生，革质；叶柄有狭长形或倒心形叶翼；叶倒卵状椭圆形或卵状长圆形，先端短钝、渐尖或有微凹头，基部阔楔形或圆形，全缘或有微波状锯齿，有半透明油点。总状花序簇生叶腋，白色；花瓣5；雄蕊多数。果皮粗糙，橙黄色，汁酸。花期4~5月。果熟期11月。

生境分布　多栽培于丘陵、低山地带。分布于我国长江流域地区。

采收加工　枳实：5~6月收集自落果实，切半，晒干。

枳壳：于7月果皮尚绿时采收，切半，晒干。

性味功能　味苦、酸，性微寒。有行气宽中，消食化痰的功能。

主治用法　用于胸胁胀痛，食积不化，痰饮，胃下垂，子宫脱垂等症。用量3~9g。

应　　用

1. 产后子宫脱垂：枳壳30g。水煎服。
2. 男子疝气及脱肛：枳壳15g。水煎服。
3. 急性结膜炎：枳壳、防风、荆芥、黄芩、连翘各3g。水煎服。
4. 肺气肿喘嗽：枳壳、苏子、半夏、陈皮。水煎服。

芸香科 Rutaceae



黎　檬　*Citrus limonia* Osbeck

基　　源　为芸香科植物黎檬的果与根。

原 植 物　小乔木或灌木，具尖锐刺。单数复叶互生，宽椭圆形或长圆形，先端圆钝，边缘有钝齿；翼叶在春梢上为线形或仅有痕迹，夏梢上叶翼叶较明显。花簇生或单生叶腋，3~5朵组成总状花序；花萼5裂；花瓣5，淡紫色，内面白色。柑果扁圆形至圆球形，果皮薄，光滑，淡黄或橙红色，稍难剥离，瓢囊9~11，果肉淡黄或橙红色，味极酸，瓢囊壁厚且韧。种子长卵形，细小，平滑无棱。花期4~5月。果期9~10月。

生境分布　生于较干燥坡地或河谷两岸坡地。分布于福建、台湾、湖南、广东、广西和贵州西南部、云南南部。

采收加工　果秋冬季熟时采收，鲜用或切开晒干。根全年可采，鲜用或切片晒干。

性味功能　果：味酸、甘，性平。有化痰止咳，生津健胃的功能。根：味辛、苦，性温。有行气止痛，止咳平喘的功能。


主治用法　果用于支气管炎，百日咳，食欲不振，维生素C缺乏症，中暑烦渴。根用于胃痛，疝气痛，睾丸炎，咳嗽，支气管哮喘。水煎服。用量鲜果15~30g，根30~60g。

应　　用

1. 支气管炎，百日咳：黎檬果实适量，煎水服。
2. Vc缺乏症：黎檬果加冰糖煮食。

芸香科 Rutaceae





柚（化橘红） *Citrus grandis* (L.) Osbeck

基　　源 化橘红为芸香科植物柚的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。

原 植 物 小乔木。小枝扁，有棱，具枝刺。单生复叶，椭圆形或卵状椭圆形，先端钝或稍凹，基部宽楔形或圆形，有钝圆锯齿。叶柄的翅倒卵状三角形。花簇生叶腋。花瓣近匙形，开花时反曲，白色。柑果扁球形，直径10~25cm，果皮平滑，黄色或黄绿色。花期5月。

生境分布 栽培于丘陵或低山地带。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

采收加工 夏季果实近成熟时采收，沸水烫后，将果皮割成5或7瓣，除去果瓤及部分中果皮，压制成形，干燥。

性味功能 味苦，辛，性温。有散寒理气，燥湿化痰的功能。

主治用法 用于风寒咳嗽，喉痒多痰，食积伤酒，胸隔胀闷，暖气吐水等症。用量3~9g。

应　　用

1. 咳嗽痰多，胸闷腹滞：化橘红、半夏、杏仁、贝母、茯苓、麦冬、生石膏、瓜蒌皮、陈皮、生地、桔梗、紫菀、款冬花、苏子、甘草。制丸，温开水送服。
2. 小儿喘咳：柚子皮、艾叶各6g、甘草3g，水煎服。
3. 气滞腹胀：柚子皮、鸡屎藤、糯米草根、隔山撬各9g。水煎服。

芸香科 Rutaceae



香　橼 *Citrus medica* L.

基　　源 为芸香科植物香橼的果实。

原 植 物 别名：枸橼

小乔木或灌木。枝具短硬棘刺。叶互生，无叶翅；叶革质，卵状长圆形，先端钝或短锐尖，基部宽楔形，边缘有锯齿，有半透明油腺点。总状花序或3~10朵簇生于叶腋；花萼浅杯状，5浅裂；花瓣5，内面白色，外面淡紫色。柑果长圆形、卵圆形，顶端有一乳头状突起，熟时柠檬黄色，芳香；果汁黄色，味极酸而苦。花期4月。果期10~11月。

生境分布 栽培于低山带或丘陵。分布于江苏、浙江、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南等省区。

采收加工 秋季采摘果实，放置2~3日，果皮稍干时切成片，或趁鲜切成片状，晒干或低温烤干。

性味功能 味辛、苦、酸，性温。有理气，舒肝，和胃，化痰的功能。

主治用法 用于胸胁脘腹胀痛，嗳气，呕吐，痰多咳嗽等。用量4.5~9g。

应　　用

1. 痰饮咳嗽：香橼（去核切片），酒煮令熟烂，蜜拌匀，呷服。
2. 脘腹胀痛：香橼1枚，砂仁6g，各煅存性为散，砂糖拌调，空心顿服。


芸香科 Rutaceae



佛　手　*Citrus medica* L. var. *sarcodactylis* Swingle

基　　源	为芸香科植物佛手的果实。
原 植 物	常绿小乔木。枝有短硬刺。叶互生，革质，有透明油点，长椭圆形或倒卵状长圆形，先端钝或凹缺，基部近圆形或楔形，叶缘有浅波状钝锯齿。花单生，簇生或为短总状花序；花瓣5，内面白色，外面紫色。柑果卵形、长圆形或矩圆形，分裂如拳状或指状，橙黄色，粗糙，果肉淡黄色。花期4~5月。果熟期10~12月。
生境分布	生于热带、亚热带，栽培。分布于浙江、江西、福建、广东、云南、四川等。
采收加工	秋季果实尚未变黄或变黄时采收，纵切成薄片，干燥。
性味功能	味辛、苦、酸，性温。有舒肝和胃，行气止痛，消食化痰的功能。
主治用法	用于胸闷气滞，胸胁胀痛，食欲不振，胃脘疼痛，呕吐，痰饮咳喘等症。用量3~9g。
应　　用	
	1. 消化不良：佛手、枳壳、生姜各3g，黄连0.9g，水煎服。
	2. 痰气咳嗽：佛手9g。水煎服。

芸香科 Rutaceae



橘（陈皮，橘红，橘核） *Citrus reticulata* Blanco

基　　源 陈皮为芸香科植物橘的成熟果皮；橘红为其外层果皮；橘核为其种子。

原 植 物 常绿小乔木。叶互生，革质，披针形或椭圆形，全缘或有细钝齿，有半透明油点。花单生或数朵生于枝端和叶腋，白色或带淡红色；花瓣5。柑果圆形，红色、橙黄色或淡红黄色，果皮疏松，易剥离。花期3~4月。果期10~11月。

生境分布 栽培于丘陵、山地或平原。分布于长江以南各省区。

采收加工 陈皮：9~12月采收成熟果实，剥去果皮，晒干。
橘红：阴干或晒干。橘核：收集种子，晒干。

性味功能 味苦、辛，性温。陈皮有理气，健脾，燥湿，化痰的功能。橘红有散寒，燥湿，利气，消痰的功能。橘核有理气散结，止痛的功能。

主治用法 陈皮用于胸脘胀满，嗳气呕吐，食欲不振，咳嗽痰多。橘红用于风寒咳嗽，食积伤酒，呕恶痞闷。橘核用于小腹疝气，乳痈肿痛。用量3~9g。

应　　用

1. 风寒感冒，咳嗽痰多：陈皮、前胡、杏仁各9g，紫苏叶4.5g。水煎服。
2. 胸痞作呕：陈皮、半夏、茯苓各9g，甘草3g。水煎服。
3. 呕吐哕逆：陈皮、生姜3g，旋覆花、姜半夏各9g。

芸香科 Rutaceae



甜　橙 *Citrus sinensis* (L.) Osbeck

基　　源 甜橙为芸香科植物甜橙的果皮。

原 植 物 常绿小乔木或灌木，枝少刺或近于无刺。单数复叶互生，卵形至椭圆形，先端短尖或钝，基部楔形或宽楔形，全缘，具透明油点。花单生叶腋或数朵成总状花序；花萼5裂；花瓣5，白色。柑果圆球形、扁圆形或椭圆形，橙黄至橙红色，果皮较难剥离，瓢囊9~12瓣，果肉淡黄、橙红或紫红色，味甜或稍带酸。花期3~5月。果期10~12月。

生境分布 均为栽培。分布于长江以南各省区。

采收加工 10~12月收集食后剥下的果皮，晒干或烘干。

性味功能 味辛、微苦，性温。有理气化痰，健脾导滞的功能。

主治用法 用于感冒咳嗽，痰稠而粘，食欲不振，胸腹胀满，肠鸣泻泄，乳痛初起等。用量5~15g，外用适量。

应　　用

1. 消化不良，食欲不振：甜橙（粗粉）制成酊剂，口服1次2~15 ml，每日2~3次。
2. 咳嗽，谈稠：甜橙皮切细丝，煮烂，加蜜拌匀，常食。
3. 小儿咳喘：甜橙皮，加冰糖水炖服。

芸香科 Rutaceae



香圆（香橼） *Citrus wilsonii* Tanaka

基　　源 香橼为芸香科植物香圆的干燥成熟果实。

原 植 物 常绿乔木，分枝较多，有短刺。叶互生，革质，单身复叶，阔翼倒心形；叶长椭圆形，先端短钝或渐尖，基部钝圆，全缘或有波状锯齿。柑果圆形、长圆形或扁圆形，直径5~7cm，顶端有乳头状突起，橙黄色，果皮粗糙而有皱纹或平滑，有香气，味酸苦。种子多数，扁卵形。花期4~5月。果期10~11月。

生境分布 栽培。分布于陕西、江苏、浙江、江西、湖北、四川等省。

采收加工 秋季果实成熟时采收，切片，晒干。

性味功能 味辛、苦、酸，性温。有理气，舒肝，和胃止痛，化痰功能。

主治用法 用于胸胁脘腹胀痛，胃脘痞满，食欲不振，嗳气，气逆呕吐，痰多咳嗽，胃痛，消化不良等。用量4.5~9g。

应　　用

1. 胸胁满闷，胃脘胀痛，恶心呕吐，食欲不振：香橼、厚朴、香附、党参、茯苓、神曲各9g，陈皮6g，豆寇仁3g。水煎服。
2. 咳嗽：香橼，煮烂，用蜜拌匀，常食。
3. 脾胃湿热，大便泄泻：香橼、白术各4.5g，黄连3g，黄芩6g。水煎服。
4. 痢疾腹痛：香橼、大黄、白芍各9g，厚朴4.5g。水煎服。

芸香科 Rutaceae



黄皮 *Clausena lansium* (Lour.) Skeels

基　　源 芸香科植物黄皮的根、叶、果实及种子入药。

原 植 物 常绿灌木或乔木。幼枝、叶柄和花序上常有瘤状突起的腺体。叶互生，奇数羽状复叶，阔卵形、椭圆形至披针形，先端钝，基部宽楔形，常偏斜，全缘或呈波状，密布透明腺点，揉之有柑桔香气。圆锥花序顶生或腋生，直立、由基部分枝；花黄白色，萼5，短三角状，外被短毛；花瓣5，匙形，开放时反展；雄蕊9~10；子房有柄，外被淡褐黄色的柔毛。果实球形，肉质，黄色，果皮具腺点及柔毛。花期4月。果期6~7月。

生境分布 贵州、云南、广东、广西、福建、海南等地栽培。

采收加工 根、叶全年可采，晒干。

性味功能 叶味苦、辛，性平。有解表散热，顺气化痰的功能。根性微温，有行气止痛，健胃消肿的功能。

主治用法 叶用于流感，脑脊髓膜炎，疟疾。根及种子用于胃痛，腹痛，风湿骨痛。果实用于食积胀满，痰饮咳喘。用量9~15g。果实15~30g。

应　　用

1. 流行性感冒：黄皮叶（阴干）500g，水煎2次，浓缩至1500 ml。每次服30 ml，连服3~6天。
2. 疟疾：黄皮叶水煎，浓缩至35%每次服15~30 ml，每日3次，连服7天。

芸香科 Rutaceae



白鲜（白鲜皮） *Dictamnus dasycarpus* Turcz.

基　　源 白鲜皮为芸香科植物白鲜的根皮。

原 植 物 多年生草本，全株有特异的刺激味。根木质化，数条丛生，外皮淡黄白色。单数羽状复叶互生；小叶9~11，卵形至长圆状椭圆形，边缘有细锯齿，密布腺点，叶两面沿脉有柔毛，至果期脱落，有叶柄，叶轴有铁翼。总状花序，花轴及花梗混生白色柔毛及黑色腺毛；花梗基部有线状苞片1枚；花淡红色而有紫红色线条；萼片5；花瓣，倒披针形或长圆形，基部渐细呈柄状。蒴果，密生腺毛，5裂，每瓣片先端有一针尖。花期4~5月。果期5~6月。

生境分布 生于山坡林中。分布于辽宁、内蒙古、陕西、甘肃、河北、山东、河南、安徽、江苏、江西、四川、贵州等省区。

采收加工 春、秋季采挖，纵向割开，抽去木心，晒干。

性味功能 味苦、咸，性寒。有祛风燥湿，清热，解毒的功能。

主治用法 用于湿热疮毒、黄水疮、湿疹、风疹、疥癣、疮癞、风湿痹、黄疸尿赤等症。用量4.5~9g。外用适量，煎汤洗或研粉敷。

应　　用

1. 风热瘙痒：白鲜皮、防风、沙参、知母、人参各30g，黄芩3g。水煎服。
2. 黄疸尿赤：白鲜皮、茵陈各9g。水煎服。

芸香科 Rutaceae



三叉苦 *Euodia lepta* (Spreng) Merr.

基　　源 为芸香科植物三叉苦的枝、叶及根。

原 植 物 灌木或小乔木，全株味苦。树皮灰白色或灰绿色，有淡黄色皮孔。三出复叶对生，纸质，长圆状披针形或长椭圆形，先端短渐尖，基部渐狭，侧生小叶基部稍偏斜，全缘或波状，叶面有腺点，叶干后褐绿色。伞房状圆锥花序腋生；花单性，花萼4深裂，花瓣4，黄白色，有腺点；果2~3，外果皮暗黄褐色或红褐色。花期4~7月，果期8~11月。

生境分布 生于丘陵地、林缘或灌丛中。分布于广东、广西、福建、台湾、海南、云南等省区。

采收加工 夏秋季枝叶繁茂时采，晒干。根全年可采挖，洗净切片，晒干。

性味功能 味苦，性寒。有清热解毒，祛风除湿，散瘀止痛的功能。

主治用法 用于腰腿痛，疟疾，黄疸，胃痛，咽喉肿痛，流行性感冒，乙型脑炎，扁桃体炎。用量根9~30g。枝叶9~15g。

应　　用

1. 流行性脑脊髓膜炎，流行性乙型脑炎，流行性感冒：三叉苦20g，野菊花，金银花各15g。水煎服。
2. 流行性感冒，高热，畏寒：三叉苦根或茎，鸭脚木根或茎各500g。加水煎浓缩，分服。

芸香科 Rutaceae



吴茱萸 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth.

基　　源 为芸香料植物吴茱萸的干燥近成熟果实。

原 植 物 别名：吴萸、曲药子、气辣子

小乔木。单数羽状复叶对生，小叶5~9，椭圆形或卵形，具淡褐色长柔毛及透明油点。聚伞状圆锥花序顶生，雌雄异株；花瓣5，黄白色。蒴果五角状扁球形，暗黄绿色至褐色，粗糙，有点状突起或油点，顶端有五角星状裂隙，其部残留果梗，紫红色，有油腺点。花期6~8月。果期9~11月。

生境分布 生于林下或林缘。分布于陕西、甘肃及长江以南各地区。

采收加工 8~11月果实未裂时，剪下果枝，晒干或微火炕干。


性味功能 味辛、苦，性热。有温中散寒，疏肝止痛的功能。

主治用法 用于脘腹冷痛，呃逆吞酸，厥阴头痛，经行腹痛，呕吐腹泻，疝痛，痛经。外治口疮。用量1.5~4.5g。有小毒，阴虚火旺者忌服。

应　　用

1. 高血压病：吴茱萸适量，研末，每晚醋调敷两脚心。
2. 湿疹、神经性皮炎黄水疮：吴茱萸研末，凡士林调成软膏，搽患处。
3. 慢性胃炎，胃溃疡：吴茱萸6g，党参12g，生姜15g，大枣5枚。水煎服。
4. 疝痛：吴茱萸、橘核。水煎服。

芸香科 Rutaceae



波氏吴茱萸（吴茱萸）

Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. *bodinieri* (Dode) Huang

基　　源 吴茱萸为芸香科植物波氏吴茱萸的果实。

原 植 物 别名：疏毛吴茱萸

与吴茱萸相似，区别在于：小枝被黄锈色或丝光质的疏长毛。叶轴被长柔毛，小叶5~11，叶形变化较大，长圆形、披针形、卵状披针形至倒卵状披针形，面脉上被短柔毛，沿脉清晰，油腺点小。花期7~8月，果期9~0月。

生境分布 生于村边路旁、山坡草地丛中。分布于江西、湖南、广东、广西及贵州等省区。

采收加工 8~11月果实未裂时，剪下果枝，晒干或微火炕干。

性味功能 味辛、苦，性热，有小毒。有温中散寒，疏肝止痛的功能。

主治用法 用于脘腹冷痛，呃逆吞酸，厥阴头痛，经行腹痛，呕吐腹泻，疝痛，痛经。外治口疮。用量1.5~4.5g。阴虚火旺者忌服。

应　　用

同吴茱萸。

芸香科 Rutaceae



石 虎（吴茱萸）

Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang

基　　源 吴茱萸为芸香料植物石虎的干燥近成熟果实。

原 植 物 本种与吴茱萸极相似。区别点为本种具有特殊的刺激性气味。小叶3~11，叶片较狭，长圆形至狭披针形，先端渐尖或长渐尖，各小叶片相距较疏远，侧脉较明显，全缘，两面密被长柔毛，脉上最密，油腺粗大。花序轴常被淡黄色或无色的长柔毛。成熟果序生于枝顶，不及正种密集。种子带蓝黑色。花期7~8月，果期9~10月。

生境分布 生于山坡草丛中。亦有种植。分布于湖北、广西、贵州、四川、浙江、江西、湖南等。

采收加工 8~11月果实未裂时，剪下果枝，晒干或微火炕干。

性味功能 味辛、苦，性热，有小毒。有温中散寒，疏肝止痛的功能。

主治用法 用于脘腹冷痛，呃逆吞酸，厥阴头痛，经行腹痛，呕吐腹泻，疝痛，痛经。外治口疮。用量1.5~4.5g。阴虚火旺者忌服。

应　　用

同吴茱萸。

芸香科 Rutaceae



金　橘 *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle

基　　源 芸香科植物金橘的根、叶、果实及种子入药。

原 植 物 常绿灌木。单生复叶互生，翼叶狭，与叶片连接处有关节，叶质厚，披针形或长圆形，全缘或有细锯齿，下面散生细腺点。花单生或2~3花生于叶腋，白色，芳香，有短梗；花萼4~5裂，裂片卵圆形；花瓣5，宽椭圆形。柑果长圆形或倒卵圆形，橙黄色或橙红色，顶端圆形，基部稍狭，光滑，果皮味甜，果肉味酸。花期3~5月。果期10~12月。

生境分布 多为栽培。分布于浙江、江西 、福建、台湾、湖北、广东、海南、广西、四川等省区。

采收加工 根全年均可采挖，切片，晒干。叶夏、秋季采，晒干。果实秋季采摘，鲜用、晒干或文火烘干。

性味功能 根味苦、辛，性温。有行气散结，健脾开胃，舒筋活络的功能。叶性微寒。有舒肝解郁，理气散结的功能。果实味辛、酸甘，性温。有理气解郁，化痰，醒酒的功能。种子性平。有明目，散结的功能。

主治用法 根用于胃气痛，食积胀满，痰滞气逆，疝气，醒酒。叶用于噎嗝，瘰疬。果实用于胸闷郁结，食滞，多痰。种子用于目疾喉痹，瘰疬结核。

应　　用

1. 食积胀满：金橘根15g，水煎服。
2. 疝气：金橘根15g，荔枝核5个，酒水炖服。
3. 食滞，多痰：鲜金橘果实适量，煎水服。

芸香科 Rutaceae



山小橘 *Glycosmis citrifolia* Lindl.

基　　源 芸香科植物山小橘的根、叶和果实入药。

原 植 物 别名：野沙柑、饭汤木、酒饼木

直立灌木。幼枝及芽被锈色毛。叶互生，单叶及羽状复叶杂见，小叶3，少为2，小叶片窄椭圆形，基部楔形，全缘，有透明腺点。小花腋生，圆锥花序，花序轴薄被锈色毛，近无梗，花5数，花瓣白色，雄蕊10，花盘肥厚。小浆果肉质，球形，略偏斜，淡红色或较深，透明。花期夏、秋季。

生境分布 生于山坡、灌丛、丘陵。分布于广西、广东等省区。

采收加工 夏季采叶，鲜用或阴干。根全年可挖，切片，晒干或阴干。深秋摘果，用开水烫过后，再晒干。

性味功能 根：味辛、性温；叶：味甘，性温。有祛痰止咳，理气消积，散郁消肿的功能。

主治用法 用于感冒咳嗽，消化不良，食欲不振，疝痛；外用于跌打瘀血肿痛。用量9~15g；外用鲜叶捣烂敷患处。

应　　用

1. 跌打肿痛：山小橘鲜叶，捣烂酒调敷患处。
2. 感冒咳嗽：山小橘15g。水煎服。
3. 冻疮：山小橘鲜叶，水煎洗，并捣烂酒调敷患处。

芸香科 Rutaceae



千里香（九里香） *Murraya paniculata* (L.) Jack.

基　　源 九里香为芸香料植物千里香的叶或带叶嫩枝。

原 植 物 别名：七里香、七路香

灌木。单数羽状复叶互生；小叶3~9，革质，卵形或倒卵形，全缘，有透明腺点。聚伞花序顶生或腋生；花小，白色，芳香，花梗细；萼片5，宿存；花瓣5，有细柔毛；雄蕊10；子房2室。浆果卵形或球形，鲜红色，先端尖。花期4~6月。果期9~11月。

生境分布 生于山坡疏林中。有栽培。分布于福建、台湾、广东、海南、广西、贵州、云南等省区。

采收加工 全年可采。叶阴干；枝和根切段，晒干或阴干。

性味功能 味辛、微苦，性温，有小毒。有行气止痛，活血散瘀，祛风活络，除湿，麻醉，镇惊，解毒消肿的功能。

主治用法 用于胃痛，风湿痛，跌打肿痛，风湿骨痛，牙痛，破伤风，流行性乙型脑炎，蛇虫咬伤，局部麻醉。用量根、叶9~15g（鲜品15~30g）。外用鲜品适量。

应　　用

1. 慢性腰腿痛：九里香15g，续断9g，水煎服。
2. 胃痛：九里香3g，香附9g。水煎服。
3. 跌打瘀积肿痛，风湿骨痛，毒蛇咬伤：鲜九里香，捣烂敷患处。
4. 皮肤湿疹：鲜九里香，水煎，擦洗患处。

附注：根、花也供药用。

芸香科 Rutaceae



黄　柏（关黄柏）　*Phellodendron amurense* Rupr.

基　　源　关黄柏为芸香科植物黄柏的树皮。

原 植 物　高大落叶乔木。树皮具厚栓皮，有弹性，内层鲜黄色。单数羽状复叶对生；小叶5~13，长圆状披针形、卵状披针开或近卵形，有波状细钝锯齿及缘毛，齿缘有腺点，中脉基部有白色长柔毛。聚伞状圆锥花序顶生，花轴及花枝有毛；花单性，雌雄异株；花瓣5，黄白色。浆果状核果圆球形，紫黑色，有特殊香气。花期5~6月。果期9~10月。

生境分布　生于杂木林或山间河谷有栽培。分布于东北、华北及山东、江苏、浙江等省区。

采收加工　3~6月间剥取树皮，晒至半干，压平，刮净外层栓皮至露出黄色内皮，晒干。

性味功能　味苦，性寒。有清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮的功能。

主治用法　用于湿热泻痢，黄疸，带下，热淋，脚气，风湿性关节炎，泌尿系感染，骨蒸劳热，盗汗，遗精。用量3~12 g。外用于疮疡肿毒，湿疹，瘙痒，口疮，黄水疮，烧、烫伤。外用适量。

应　　用

1. 热痢：黄柏、白头翁、秦皮。水煎服。
2. 湿热黄疸：黄柏、栀子各6g，甘草3g。水煎服。
3. 皮肤湿疹，泌尿系感染：黄柏、苦参、荆芥、苏叶，水煎服，并水煎洗患处或湿敷。
4. 流行性结膜炎：黄柏。水煎，洗眼。

芸香科 Rutaceae



川黄柏（黄柏）　*Phellodendron chinense* Schneid.

基　　源　黄柏为芸香科植物川黄柏的干燥树皮。

原 植 物　别名：黄皮树

高大落叶乔木。树皮灰棕色，木栓层厚，内层薄，鲜黄色，有粘性。小枝通常暗红棕色或紫棕色，无毛。奇数羽状复叶对生，小叶7~15，长圆状披针形至长圆状卵形，全缘，下面有长柔毛。花序圆锥状；花小，黄绿色，5数，雌雄异株。果轴及果枝密生短毛。浆果状核果球形，密集成团，紫黑色。花期5~6月，果期10月。

生境分布　生于杂木林中，有栽培。分布于陕西、浙江、江西、湖北、四川、贵州、云南等省。

采收加工　夏至，剥取树皮后，趁鲜除去粗皮，晒干。

性味功能　味苦，性寒。有清热燥湿，泻火除蒸，解毒，消炎杀菌，镇咳祛痰的功能。

主治用法　用于湿热泻痢，黄疸，风湿性关节炎，泌尿系感染，遗精，赤白带下，盗汗，热淋，骨蒸劳热，痔疮，便血，足膝肿痛，目赤肿痛，口舌生疮，痈肿疮毒，湿疹瘙痒等症。用量3~12g。

应　　用

同黄柏。

芸香科 Rutaceae



枳（枳实，枳壳） *Poncirus trifoliata* (L.) Raf.

基　　源 枳实、枳壳分别为芸香科植物枳的幼果及成熟果实。

原 植 物 别名：枸橘、枸桔

灌木或小乔木，茎枝有粗大棘刺。三出复叶互生，顶生小叶倒卵形或椭圆形，先端微凹，基部楔形，有小细锯齿；侧生小叶较小。花单生或对生叶腋，先叶开放，白色，香气；花瓣5。柑果球形，橙黄色，短柔毛及油腺点。花期4~5月。果期7~10月。

生境分布 多栽培。分布于河北、河南、山东及长江以南各省区。

采收加工 7~9月采未熟（枳实）或成熟果实（枳壳）切两半或整个晒干。

性味功能 味苦、酸，性温。有健胃消食，理气止痛的功能。

主治用法 用于胃痛，消化不良，胸腹胀痛，便秘，子宫脱垂，脱肛，睾丸肿痛，疝痛。用量9~15g。

应　　用

1. 术、香附各9g，槟榔6g。水煎服。
2. 胃下垂：枳实，水煎服。
3. 急性胃肠炎、细菌性痢疾：枳实、生大黄、白术、茯苓、神曲各9g，黄芩、泽泻各6g，川连4.5g。水煎服。
4. 子宫脱垂：枳实30g，益母草、炙黄芪各15g，升麻6g，水煎服。

芸香科 Rutaceae



芸　香 *Ruta graveolens* L.

基　　源 为芸香科植物芸香的全草。

原 植 物 别名：臭草

多年生木质草本，有强烈刺激气味，各部无毛但多腺点。叶2~3回羽状全裂或深裂；裂片倒卵状矩圆形、倒卵形或匙形，全缘或微有钝齿，茎叶上面粉绿色。聚伞花序顶生；花金黄色，萼片4~5，宿存；花瓣4~5，边缘细撕裂状；雄蕊8~10；心皮3~5，上部离生。蒴果4~5室。种子有棱，种皮有瘤状凸起。花期初夏。

生境分布 生于沟谷、溪边、路旁的草丛中。分布于广东、广西、福建等省区。

采收加工 全年可采，洗净阴干备用或鲜用。

性味功能 味辛、微苦，性凉。有清热解毒，散瘀止痛的功能。

主治用法 用于感冒发热，牙痛，月经不调，小儿湿疹；疮疖肿毒，跌打损伤。用量6~15g，外用适量。

应　　用

1. 小儿惊风：鲜芸香15g，开水炖服。
2. 腹内蛔虫：芸香适量。清油煎，捣烂敷脐上。
3. 小儿头上小疖：鲜芸香叶。捣烂取汁，和青黛搽敷患处。
4. 疮疖肿毒，跌打损伤：鲜芸香。捣烂冲温酒服；并用鲜叶捣烂敷患处。

芸香科 Rutaceae

椿叶花椒（浙桐皮）

Zanthoxylum ailanthoides Sich et Zucc.

基　　源 浙桐皮为芸香科植物椿叶花椒的树皮。

原 植 物 别名：樗叶花椒

落叶乔木。树皮具粗壮锐刺，髓部中空。单数羽状复叶互生，小叶11~27，对生，纸质，椭圆状长圆形，先端渐尖，基部圆形，不对称，边缘具锯齿，有透明腺点。花单性，伞房状圆锥花序顶生；花小而多，淡青或白色，花萼5；花瓣5，长椭圆形。蓇葖果红色，顶端有喙嘴。花期7~8月。果期10~11月。

生境分布 生于山坡疏林及溪流旁。分布于浙江、福建、台湾、广东、广西等省区。

采收加工 5月剥下树皮晒干。果实：秋季采收，晒干。

性味功能 味平，性温。有祛风湿，通经络，止痛的功能。

主治用法 用于风湿痹痛，腰膝疼痛。外用疥癣等症。用量9~15g。外用适量。

应　　用

风湿痹痛，腰膝疼痛：树皮6~12g，水煎服或酒浸服。或研粉调敷患处。

附注：叶、根、果实也供药用。根味苦，性平。有小毒，有祛风通络，活血散瘀，解毒的功能。外用于跌打损伤，风湿关节痛。果实味辛，性温。有温中燥湿，止痛，杀虫的功能。用于心腹冷痛，寒饮，泄泻，冷痢，温痹。

芸香科 Rutaceae



竹叶花椒（花椒） *Zanthoxylum armatum* DC.

基　　源 花椒为芸香科植物植物竹叶花椒的干燥果皮。

原 植 物 别名：竹叶椒

灌木或小乔木。枝有弯曲而基部扁平的皮刺，老枝皮刺基部木栓化。单数羽状复叶互生，叶轴具翅，下面有皮刺；小叶3~9，对生，纸质，叶上面有长尖皮刺，叶披针形，先端渐尖，基部楔形，边缘有细钝锯齿。聚伞圆锥花序腋生，细小，单性，淡黄绿色，花被6~8。果实红色，有粗大凸起的腺点。种子卵形，黑色。

生境分布 生于低山林下或灌丛中。分布于东南至西南各省。

采收加工 秋季采果，除去杂质，晒干。

性味功能 味辛，性温。有散寒除湿发汗，通血淋，暖胃消食，健脾，止痛，杀虫，止痒的功能。

主治用法 用于风寒咳嗽，留饮宿食，腹痛虫疾，呕吐泻痢，蛔虫，蛲虫，疝气。外用于湿疹瘙痒。用量3~6g。

应　　用

1. 脘腹冷痛：花椒、干姜各6g，党参12g，加糖温服。
2. 寒湿泄泻：花椒、苍术、陈皮、木香。水煎服。
3. 虫积腹痛：花椒、生姜、榧子。水煎服。
4. 皮肤湿疹瘙痒：花椒、地肤子、苦参、白矾。煎水熏洗。

芸香科 Rutaceae



花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim.

基　　源 为芸香科植物花椒的果皮。

原 植 物 别名：川椒、红椒、蜀椒

小乔木。茎上有皮刺及皮孔。奇数羽状复叶互生，有小叶翼；小叶5~9，对生，纸质，卵形或卵状长圆形。顶生聚伞状圆锥花序，单性异株。蓇葖果球形，自顶端沿腹背缝线开裂，成基部相连的两瓣状，红色至紫红色，极皱缩，外面密生疣状突起的腺体。种子圆球形，黑色，有光泽。花期3~5月。果期7~10月。

生境分布 生于山坡灌木丛或路旁，栽培于庭园。分布于河北、甘肃、陕西、河南、山东、江西、湖北、湖南、广东、广西及西藏等省治区。

采收加工 秋季果实成熟时采摘，晒干。

性味功能 味辛，性温。有温中助阳，散寒燥湿，止痒，驱虫的功能。

主治用法 用于脘腹冷痛，呕吐，腹泻，阳虚痰喘，蛔虫、蛲虫病。外用于皮肤瘙痒、疮疥等。用量3~6g。水煎服。

应　　用

1. 脘腹冷痛：花椒、干姜各6g，党参12g，加糖温服。
2. 寒湿泄泻：花椒、苍术、陈皮、木香。水煎服。
3. 虫积腹痛：花椒、生姜、榧子。水煎服。
4. 皮肤湿疹瘙痒：花椒、地肤子、苦参、白矾。煎水熏洗。

芸香科 Rutaceae



两面针 *Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC.

基　　源 为芸香科植物两面针的根。

原 植 物 别名：光叶花椒

木质藤本。植株密生皮刺，老茎有皮孔。单数羽状复叶互生，小叶7~11对生，卵形或卵状长圆形，边缘有疏圆齿或近全缘。伞房状圆锥花序腋生，花单性；萼片4，宽卵形；花瓣4，卵状长圆形。蓇葖果1~4，紫红色，有粗大油腺，顶端有短喙。种子卵圆形，黑色光亮。花期3~4月。果期9~10月。

生境分布 生于山野向阳的杂木林中。分布于福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南等省区。

采收加工 根全年可采挖，除去枝叶及泥土，晒干。

性味功能 味辛、苦，性微温。有小毒。有活血，行气，祛风止痛，解毒消肿的功能。

主治用法 用于风寒湿痹，胃痛，腹痛，疝痛，咽喉肿痛，牙痛，跌打损伤，毒蛇咬伤。用量根9~15g。外用适量。

应　　用

1. 闭经：两面针9g，甘草3g。水煎服。
2. 风湿性关节炎，腰肌劳损：两面针9g，了哥王根皮6g。酒精浸泡一周，外搽患处。
3. 牙痛，风湿骨痛：两面针根15g。研粉，敷患处。
4. 毒蛇咬伤，烫火伤，跌打损伤：两面针根15g。研细粉，敷患处。

芸香科 Rutaceae



青椒（花椒） *Zanthoxylum schinifolium* Sieb. *et* Zucc.

基　　源 花椒为芸香科植物青椒的干燥成熟果皮。

原植物 别名：香椒子、天椒、山椒、川椒、香花椒

小灌木，生硬皮刺。奇数羽状复叶，互生，叶轴具狭窄的翼，中间下陷成小沟状，小叶15~21，对生或近对生，不对称卵形至椭圆状披针形，先端急尖，有钝头，基部楔形，有时歪斜不整齐，边缘有细钝锯齿，齿间有腺点，小叶柄极短。伞房状圆锥花序顶生，单性，雌雄异株或杂性，花小而多；花萼5；花瓣5，青色。蓇葖果草绿色至暗绿色，有细皱纹，腺点色深呈点状下陷，先端有极短的喙状尖。种子卵圆形，黑色，有光泽。花期8~9月，果期10~11月。

生境分布 生于林缘、灌木丛中或坡地石旁。分布于辽宁、河北、河南、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、广东、广西等地。

采收加工 秋季果实成熟时采摘，晒干。


性味功能 味辛，性温。有温中助阳，散寒燥湿，止痒，驱虫的功能。

主治用法 用于脘腹冷痛，呕吐，腹泻，阳虚痰喘，蛔虫症，蛲虫病。外用于皮肤瘙痒、疮疥等。用量3~6g。水煎服。

应　　用

同花椒。

芸香科 Rutaceae



骆驼蓬 *Peganum harmala* L.

基　　源 蒺藜植物骆驼缝的全草或种子入药。

原植物 多年生草本。茎由基部散生，稍肉质，上部斜生，茎枝圆形有棱。叶互生，肉质，2~3回羽状全裂，裂片线状披针形；托叶刺毛状。花单生与叶对生，白色或淡黄绿色；花萼5，花瓣5。蒴果近球形，褐色，3室，3瓣裂。种子三棱状肾形，黑褐色。花期6月。果期7~8月。

生境分布 多生于沙丘山坡、路旁、戈壁滩等干旱草地及盐碱化荒地。分布于华北、西北各省区。

采收加工 夏秋季采收全草，种子成熟时采集，晒干或鲜用。

性味功能 味苦，性温。有毒。有镇咳平喘，祛风除湿的功能。

主治用法 用于咳嗽气喘，风湿痹痛，四肢麻木及关节酸痛，小便不利等。用量0.6~3g，研末开水冲服。外用适量，榨油外涂。孕妇及体弱者慎用。

应　　用

1. 咳嗽气喘，小便不利：骆驼蓬子0.6~1.2g为末，加白糖或蜂蜜适量，开水冲服。
2. 无名肿痛：骆驼蓬，煎水洗患处。
3. 急性风湿性关节炎：鲜骆驼蓬全草，捣烂敷患处。

蒺藜科 Zygophyllaceae



蒺藜 *Tribulus terrester* L.

基　　源 为蒺藜科植物蒺藜的干燥成熟果实。

原 植 物 别名：刺蒺藜、硬蒺藜

一年生草本。茎平卧，被长柔毛或长硬毛，枝长 20~60cm，偶数羽状复叶，小叶对生，矩圆形或斜短圆形，先端锐尖或钝，基部稍偏斜，被柔毛，花腋生花黄色；萼片5，宿存；花瓣5；基部有鳞片状腺体，子房5棱，柱头5裂，每室3~4胚珠。果有分果瓣5，无毛或被毛，中部边缘及下部各有锐刺2枚。

生境分布 生于沙地、荒地、山坡等。全国各地均有分布。

采收加工 秋季果实成熟时采割植株，晒干，打下果实。

性味功能 味苦、辛，性温。有平肝解郁，活血祛风，明目，止痒的功能。

主治用法 用于头痛眩晕，胸胁胀痛，乳汁不下，目赤翳障，皮肤瘙痒，经闭。用量 6~9g。孕妇慎用。

应　　用

1. 老年慢性气管炎：蒺藜，制糖浆服。
2. 风疹瘙痒：蒺藜、防风、蝉蜕各9g，白鲜皮、地肤子各 12g。水煎服。
3. 急性结膜炎：蒺藜 12g，菊花 6g，青葙子、木贼、决明子各 9g。水煎服。
4. 高血压，目赤多泪：蒺藜 15g，菊花 12g，决明子 30g，甘草 6g。水煎服。

蒺藜科 Zygophyllaceae



阳桃 *Averrhoa carambola* L.

基　　源 酢浆草科植物阳桃的根、枝叶、花及果实入药。

原 植 物 常绿乔木。单数羽状复叶，互生；叶柄及总轴被短柔毛；小叶5~11，叶卵形或椭圆形，先端短尖，基部圆截形，全缘，圆锥花序生于茎枝上；花小，钟形，萼片5，红紫色；花瓣5，白色或淡紫色。浆果肉质，绿色有5翅状棱角。花期5~10月。果期6~11月。

生境分布 福建、台湾、广东、海南、广西、云南等省区有栽培。

采收加工 根、枝叶全年均可采。花春末夏初采摘。果实秋季采摘，鲜用或晒干。

性味功能 味酸、涩，性平。有涩精，止血，止痛的功能。枝性凉。有祛风利湿，消肿止痛的功能。花味甘，性平。有清热的功能。果实有生津止咳的功能。

主治用法 根用于遗精，鼻衄，慢性头痛，关节疼痛。枝叶用于风热感冒，急性胃肠炎，小便不利，产后浮肿；外用于跌打损伤，痈疽肿毒。果实用于风热咳嗽，咽喉痛，脾脏肿大，疟疾。用量 15~30g。外用适量。

应　　用

1. 慢性头痛：鲜阳桃根 30g，豆腐 200g 共同炖服。
2. 跌打损伤，痈疽肿毒：鲜阳桃叶适量捣烂敷患处。能止血，止痛，散热拔毒。

酢浆草科 Oxaridaceae





感应草 *Biophytum sensitivum* (L.) DC.

基　　源 为酢浆草科植物感应草的干燥全草。

原 植 物 别名：罗伞草、降落伞

多年生草本，高5~20cm；茎单一，生稀疏短毛。双数羽状复叶，多数聚生于茎顶端，叶轴被毛；小叶8~14对，矩圆形或矩圆状倒卵形，稍偏斜，无毛。聚伞花序排成伞形花序状，顶生；苞片小；萼片5；花瓣5，黄色；雄蕊10。蒴果椭圆状倒卵形，短于宿存萼，开裂后果瓣与中轴分离。

生境分布 生于疏林或灌木丛中。分布于台湾、广西、贵州、云南等省区。

采收加工 夏秋季采收全草，晒干。

性味功能 味甘、微苦，性平。有消积，利水的功能。

主治用法 用于小儿疳积，水肿。用量9~15g。

应　　用

1. 小儿疳积：鲜感应草9g。洗净与肝尖或瘦肉蒸熟后，食肉喝汤。
2. 水肿：感应草15g。水煎服，或与猪骨炖服。

酢浆草科 Oxalidaceae



熏倒牛（狼尾巴蒿）

Biebersteinia heterstemon Maxim.

基　　源 狼尾巴蒿为牦牛儿苗科植物熏倒牛的果实。

原 植 物 别名：狼尾巴蒿、臭花椒、臭蒿

一年生草本。根直立，细圆柱状，红褐色。全体有棕褐色密腺毛和白色短柔毛。叶互生，矩圆状披针形，向基部渐变狭，三回羽状分裂；小裂片披针形，尖头，有疏微柔毛；叶搓碎时，发出难闻的气味。圆锥花序顶生；花黄色，整齐，多数；萼片卵形，短渐尖；花瓣淡黄色，顶端波状。蒴果不开裂，顶端无喙，成熟时果瓣不向上反卷。

生境分布 生于山坡、沟边、田边。分布于新疆东部、甘肃、青海东部、西藏北部。

采收加工 果实成熟时，采摘果实，晒干。

性味功能 味辛，性凉。有清热镇惊的功能。

主治用法 用于小儿惊风高热，手足抽搐痉挛；腹胀腹痛，预防感冒。用量15g。

应　　用

1. 小儿惊风高热，手足抽搐痉挛：狼尾巴蒿15g。水煎服。
2. 预防感冒：狼尾巴蒿果10枚，贯众9g。水煎服。
3. 腹胀腹痛：狼尾巴蒿果5枚，当茶饮。

牦牛儿苗科 Geraniaceae



紫地榆 *Geranium strictipes* R. Knuth

基　　源 为牦牛儿苗科植物紫地榆的根。

原 植 物 别名：隔山消、赤地榆

多年生草本，被白色柔毛。基生叶少数，叶柄被长硬毛，叶肾状五角形，掌状5深裂，3深裂达中部，深裂片再2~3浅裂，先端具小尖头；茎生叶对生，狭披针形，后变淡红色。聚伞花序腋生，有2花；花序被伸展、透明的长硬毛和混生长腺毛；苞片钻形。花瓣红紫色，有深色的脉，宽倒卵形，先端微凹或全缘，基部具长柔毛。花果期6~8月。

生境分布 生于林下、灌丛或草丛。分布于四川、云南等省区。

采收加工 秋季采挖，洗净切片晒干。

性味功能 味苦、涩，性寒。有清热利湿，活血止血的功能。

主治用法 用于肠炎，痢疾，消化不良，慢性胃炎，月经不调，鼻衄，外用治跌打损伤。用量9~15g。

应　　用

1. 跌打损伤：鲜紫地榆，捣烂外敷；或研粉，水调敷患处。
2. 肠炎，痢疾：紫地榆15g。水煎服。
3. 月经不调：紫地榆，浸酒服。
4. 风湿痹痛，腰扭伤，拘挛麻木：紫地榆、苏木各15g。酒水各半煎，擦敷患处。



老鹳草 *Geranium wilfordii* Maxim.

基　　源 为牦牛儿苗科植物老鹳草地上部分。

原 植 物 别名：短嘴老鹳草

多年生草本。茎直立，下部稍匍匐，密生细柔毛。叶对生，叶片3~5深裂，略呈五角形，中央裂片倒卵形，有缺刻或浅裂，先端尖，两面有毛。花对生于叶腋，腋生花梗上着生花2朵，花瓣5，淡红色。蒴果球形，成熟时由下向上开裂。种子长圆形。

生境分布 生于山坡草丛中、路旁或林下。分布于东北、华北及湖南等地区。

采收加工 夏秋季果实近成熟时采收地上部，捆成把，晒干。

性味功能 味苦、辛，性平。有祛风，活血，清热解毒的功能。

主治用法 用于风湿痹痛，拘挛麻木，痈疽肿毒，跌打损伤，肠炎痢疾。用量9~15g。

应　　用

牦牛儿苗。



楤木 *Aralia chinensis* L.

基　　源	为五加科植物楤木的根皮和茎皮。
原 植 物	灌木或小乔木。茎枝有散生角状刺，小枝密生褐色茸毛和叶刺。叶互生，2~3回单数羽状复叶，小叶7~15，卵圆形 或宽卵形，先端钝尖，基部近心形不对称，边缘具锯齿，被黄色或灰色短柔毛。伞状花序集成顶生疏大圆锥花序，长30~60cm，花序轴密生黄棕色或灰色短柔毛，并有针刺；花5数，白色。果实圆卵形，具5棱，紫黑色。花期7~8月，果期9~10月。
生境分布	生于山坡林缘，溪边或向阳山坡。分布于黄河以南至长江流域各省。
采收加工	全年可采，剥皮，截成小段，晒干。
性味功能	味甘、微苦，性平。有祛风除湿，利尿消肿。活血止痛的功能。
主治用法	用于肝炎，肾炎，水肿，糖尿病，风湿关节痛，跌打损伤，腰腿痛。用量9~20g。外用适量，鲜品捣烂敷患处。
应　　用	
	1. 关节风气痛：楤木15g，黄酒、水各半。煎服。
	2. 肾炎水肿：楤木50g。水煎服。

五加科 Araliaceae



五　加（五加皮）

Eleutherococcus gracilistylus S. Y. H

(*Acanthopanaxgracilistylus* W. W. Smith)

基　　源　五加皮为五加科植物五加的根皮。

原 植 物　别名：细柱五加、南五加皮

灌木。枝节上疏生反曲扁刺。小叶5，长枝上互生，短枝上簇生，倒卵形，基部楔形，边缘有细钝齿。伞形花序单个或2个腋生或顶生于短枝上，花多数；花瓣5黄绿色。果实扁球形，黑色，花柱宿存。花期4~8月，果期6~10月。

生境分布　生于灌木丛。分布于山西、陕西及长江以南各省区。

采收加工　夏、秋季采挖根部，剥皮，晒干或切片晒干。

性味功能　味微苦，辛，性温。有祛风湿，补肝肾，强筋骨的功能。

主治用法　用于风湿痹痛，腰腿酸痛，半身不遂，跌打损伤，水肿。用量9~15g。外用适量。

应　　用

1. 小儿发育迟缓、筋骨萎弱：五加皮15g，牛膝、桑寄生、续断各7.5g。研末，每服1.5g。
2. 水肿、小便不利：五加皮12g，茯苓15g，大腹皮9g，生姜皮、陈皮各6g，开水送服。
3. 风湿性关节炎：五加皮15g，苍术、秦艽、烯莶草各9g，老鹳草12g，水煎服。
4. 风湿性关节炎，四肢关节疼痛：五加皮60g，浸酒服。

五加科 Araliaceae



糙叶五加（五加皮）　*Eleutherococcus henryi* Oliv.

基　　源　五加皮为五加科植物糙叶五加的干燥根皮。

原 植 物　落叶灌木，高1~3m；枝疏生粗壮的略下弯的刺，小枝密被短柔毛，后脱落。掌状复叶；小叶5，稀3，椭圆形或卵状披针形，先端尖或渐尖，基部楔形，边缘或仅中部以上有细锯齿，上面粗糙，下面脉上有短柔毛。伞形花序数个顶生；萼几全缘；花瓣5；雄蕊5；子房下位，5室，花柱合生成柱状。果椭圆形，5棱，黑色。

生境分布　生于灌木丛林，山坡路旁。分布于山西、陕西、安徽、河南、湖北、四川等地。

采收加工　夏、秋季采挖根部，剥皮，晒干或切片晒干。


性味功能　味微苦，辛，性温。有祛风湿，补肝肾，强筋骨的功能。

主治用法　用于风湿痹痛，腰腿酸痛，半身不遂，跌打损伤，水肿。用量9~15g。外用适量。

应　　用

同五加。

五加科 Araliaceae



刺五加 *Eleutherococcus senticosus* Maxim.

基　　源 为五加科植物刺五加的根及根状茎。

原 植 物 灌木；密生直而细长针状刺。掌状复叶互生，小叶5，稀3，纸质，椭圆状倒卵形或长圆形，先端渐尖，基部阔楔形；边缘有锐利重锯齿。伞形花序单个顶生或2~6个组成稀疏圆锥花序，花多数；总花梗长5~7cm，无毛；花紫黄色；花瓣5，卵形；雄蕊5；子房5室，花柱全部合生成柱状。果实球形或卵球形，5棱，黑色。花期6~7月。果期8~10月。

生境分布 生于森林或灌丛中。分布东北及河北和山西等省。

采收加工 春、秋二季刨取根部，晒干。

性味功能 味辛，微苦，性温。有益气健脾，补肾安神的功能。

主治用法 用于脾肾阳虚，腰膝酸软，体虚乏力，失眠，多梦，食欲不振。跌打损伤，水肿。用量9~15g。

应　　用

1. 腰痛：刺五加、杜仲（炒）。研末，酒糊丸，温酒送服。
2. 骨节皮肤肿湿疼痛：五加皮、远志各200g，以酒糊丸，温酒送服。
3. 神经衰弱、失眠、心悸、健忘、乏力：刺五加20g。水煎服。
4. 高血压、高血脂：刺五加适量。水煎服。

五加科 Araliaceae



无梗五加（五加皮）

Eleutherococcus sessiliflorus S. Y. Hu

基　　源 五加皮为五加科植物无梗五加的根皮。

原 植 物 灌木或小乔木。叶掌状复叶3，稀5小叶，纸质，倒卵形或长圆状倒卵形至长圆状披针形，先端渐尖，基部楔形，边缘有锯齿，稀重锯齿状。头状花序，球形，花多数，5~6个组成顶生圆锥花序或复伞形花序，总花梗密生短柔毛；花无梗；萼密生白色绒毛，边缘有5小齿；花瓣5，浓紫色，有短柔毛，后脱落；果实倒卵状椭圆球形，黑色，稍有棱，花柱宿存。花期8~9月，果期9~10月。

生境分布 生于森林或灌丛中。分布于东北及河北和山西等省区。

采收加工 夏、秋季采挖根部，剥皮，晒干或切片晒干。

性味功能 味微苦、辛，性温。有祛风湿，补肝肾，强筋骨的功能。

主治用法 用于风湿痹痛，腰腿酸痛，半身不遂，跌打损伤，水肿。用量9~15g。外用适量。

应　　用

同五加。

五加科 Araliaceae



白勒（三加皮） *Eleutherococcus trifoliatus S. Y. Hu*

基　　源　三加皮为五加科植物白勒的根皮。

原 植 物　别名：刺五加、刺三加

攀援灌木，枝铺散，小钩刺。叶互生，3小叶组成掌状复叶，长卵形或长椭圆形，先端尖，基部楔形或圆钝形，边缘有锯齿。伞形花序圆锥花序组成顶生，黄绿色，总花梗长2~7cm；花5数。果扁球形，黑色。花期8~11月，果期9~12月。

生境分布　生于灌木丛中、林缘，亦有栽培。分布于陕西、山西及长江以南各省区。

采收加工　四季可采，剥皮，晒干。


性味功能　味苦、辛，性凉。有清热解毒，祛风利湿，舒筋活血的功能。

主治用法　用于感冒高热，咳痰带血，风湿性关节炎，黄疸，跌打损伤，疖肿疮疡等。用量30~60g，水煎服。

应　　用

1. 黄疸：三加皮200g，鲜白萝卜100g，冰糖15g。水煎服。
2. 跌打损伤，风湿骨痛：三加皮、半枫荷、黑老虎、异形南五味藤、大血藤各15g，炖猪骨服。
3. 风湿性关节炎：三加皮15g，苍术、秦艽、豨莶草各9g，老鹳草12g，水煎服或泡酒服。

五加科 Araliaceae



常春藤

Hedera nepalensis K. Koch var. *sinensis* (Tobl.) Rehd.

基　　源　为五加科植物常春藤的茎、叶。

原 植 物　常绿攀援灌木，有气生根；嫩枝有锈色鳞片。单叶互生，革质，二型，营养枝上叶为三角状卵形或三角状长圆形，花枝上叶椭圆状卵形至椭圆状披针形，先端渐尖，基部楔形。伞形花序1~7顶生；总状排列或伞房状排列成圆锥花序，有花5~40朵，淡黄白色或淡绿白色，芳香；萼密生棕色鳞片；花数5。果实球形，红色或黄色。花期9~11月，果期次年3~5月。

分布生境　攀援于林缘、林下、岩石和房屋壁上；有栽培。分布华中、华南、西南及甘肃和陕西等省区。

采收加工　全年可采，切段晒干或鲜用。

性味功能　味苦、辛，性凉。有祛风利湿，活血消肿，平肝，解毒的功能。

主治用法　用于风湿性关节炎，肝炎，头晕，腰痛，跌打损伤，急性结膜炎，肾炎水肿，闭经。外用于痈肿疮毒，荨麻疹，湿疹，外伤出血，骨折。用量9~15g。

应　　用

1. 肝炎：常春藤、败酱草，煎水服。
2. 皮肤瘙痒：常春藤500g。水煎洗。
3. 急性结膜炎：常春藤15~30g，水煎服。

附注：果实(常春藤子)亦供药用。味甘，性温。用于腰腿痿软。

五加科 Araliaceae



刺楸（川桐皮） *Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz.

基　　源 川桐皮为五加科植物刺楸的树皮。

原 植 物 落叶乔木，枝干有粗大硬刺。单叶在长枝上互生，短枝上簇生，叶片直径7~20cm，或更大，掌状5~7裂，裂片三角状卵圆形至椭圆卵形，先端渐尖或长尖，边缘有细锯齿，无毛或下面基部脉腋有簇毛，叶柄长30~60cm。伞形花序聚生为顶生圆锥花序；花白色或淡黄绿色，花萼5齿；花瓣5；雄蕊5，花丝长于花瓣1倍以上；子房下位，2室，花柱2，合生成柱状，顶端分离。果球形，成熟时蓝黑色，直径约5mm。花期7~8月，果期9~10月。

生境分布 生于山谷、溪旁、林缘或疏林中。分布于东北、华北、华中、华南和西南。

采收加工 全年可采，多在初夏。剥取树皮，洗净，晒干。


性味功能 有小毒。有祛风，除湿，通络，止痛，杀虫的功能。

主治用法 用于风湿痹痛、腰膝酸痛；外治皮肤湿疹、疥癣。用量9~15g，外用适量。

应　　用

1. 风湿痹痛、腰膝酸痛：川桐皮9g。水煎服。
2. 皮肤湿疹、疥癣：川桐皮适量，水煎洗患处。

五加科 Araliaceae



人　参 *Panax ginseng* C. A. Mey.

基　　源 为五加科植物人参的根。

原 植 物 别名：园参，山参，棒槌

多年生草本。主根粗壮，肉质，纺锤形，黄白色。掌状复叶轮生茎端，每年递增1叶，多达6片复叶。小叶长椭圆形，边缘有细锯齿，脉上有疏刚毛。伞形花序顶生，花小，多数；淡黄绿色；核果浆果状，扁球形，鲜红色。花期6~7月。果期7~9月。

生境分布 生于阴湿山地针、阔叶林或杂木林下。分布于东北。多栽培。

采收加工 秋季采，晒干，称生晒参。蒸熟再晒干，称红参。

性味功能 味甘、微苦，性温。有大补元气，固脱，生津，安神益智的功能。

主治用法 用于体虚欲脱，气短喘促，自汗肢冷，精神倦怠，食少吐泻，久咳，津亏口渴，失眠多梦，惊悸健忘。用量1.5~9g。反藜芦，畏五灵脂。

应　　用

1. 糖尿病：人参6g，熟地18g，枸杞子、泽泻各12g，天冬、山萸肉各9g。水煎服。
2. 阳痿：人参6g，巴戟天、枸杞子各9g，肉苁蓉。
3. 心肌营养不良：人参6g。研粉，调蜜冲服。
4. 心肺功能不全：人参6g，熟地、胡桃肉各12g，熟附片9g，蛤蚧1对，五味子6g。水煎服。

五加科 Araliaceae



珠子参

Panax japonicus C. A. Mey. var. *major* (Burk.) C. Y. Wu et K. M.Feng

基　　源　为五加科植物珠子参的根茎。

原 植 物　别名：疙瘩七、钮子七、扣子七

多年生直立草本。根茎细长，弯曲横卧，节膨大成珠状或纺锤状，形似钮扣，节间细长，或部分结节密生呈竹鞭状。掌状复叶3~5轮生茎顶，小叶5，两侧较小，叶椭圆形或椭圆状卵形，先端长渐尖，基部近圆形或楔形，边缘具细密锯齿及两面散生刺毛。伞形花序顶生，单一或下生多个小伞形花序，小花多数，弯齿5，先端尖；花瓣5。浆果状，核果圆球形，鲜红色。花期7~8。

生境分布　生于山地林下阴湿处。分布于山西、陕西、宁夏、甘肃、河南、湖北、湖南及西南等省区。

采收加工　秋季采挖根茎，除去粗皮及须根，干燥；或蒸透后干燥。

性味功能　味苦、甘，性微温。有舒筋活络，补血止血的功能。

主治用法　生品用于腰腿疼痛，月经不调，吐血，便血，跌打损伤，外伤出血等；熟品用于气血双亏，虚劳咳嗽等。用量3~9g；外用适量，研末敷患处。

应　　用

1. 跌打痨伤：珠子参适量，泡酒内服。
2. 小儿惊风：珠子参0.5g。研粉，水冲服。

五加科 Araliaceae



羽叶三七（珠子参）

Panax japonicum C. A. Mey var. *bipinnatifidus* (Seem.) C. Y. Wu et Feng ex C. Chow

基　　源　珠子参为五加科植物羽叶三七的根茎。

原 植 物　别名：疙瘩七、钮子三七、竹根七

多年生草本。根状茎的节膨大呈疙瘩状或串珠状。茎上疏生刺毛。掌状复叶，3~6叶疏生茎顶，有长柄，小叶5~7长方披针形，羽状分裂，边缘具锯齿，齿及脉上疏生刚毛。

生境分布　生于高山针叶林及阔叶林或混交林下。分布于云南、四川陕西、甘肃、西藏等省自治区。

采收加工　秋季采挖根茎，晒干；除去外层粗皮，蒸透后干燥。

性味功能　味苦、甘，性微寒。有舒筋活络，补血养阴的功能。

主治用法　用于跌打损伤，外伤出血，腰腿疼痛，月经不调，吐血，便血；熟品用于气血双亏，虚劳咳嗽。用量3~9g。

应　　用

1. 小儿惊风：珠子参0.5g。研末，水冲服。
2. 毒蛇咬伤：珠子参9g。研末敷患处。
3. 肺结核吐血、咯血：珠子参、白茅根、茜草根、麦冬、天冬各9g。水煎服。
4. 跌打损伤：珠子参、当归、川芎各9g，红花、桃仁各6g。水煎服。
5. 痔疮：珠子参适量。研末，水煎熏洗，末敷患处。

五加科 Araliaceae



竹节参 *Panax japonicus* C. A. Mey

基　　源 为五加科植物竹节参的根茎。

原 植 物 别名：竹节人参、竹根七、萝卜七、峨三七

多年生草本。根茎横卧，竹鞭状，肉质，节间具茎基痕；侧面生出圆锥状肉质根。掌状复叶3~5，轮生于茎端；薄膜质，倒卵状椭圆形，先端尖，基部阔楔形，具锯齿。伞形花序单一顶生，花萼5齿状；花瓣5，淡绿色。核果浆果状，球形，红色，顶端常黑色。种子2~3粒。花期5~6月，果期7~9月。

生境分布 生于高山灌丛中。分布于河南、安徽、浙江、江西、湖北、广西、四川、贵州、云南、西藏等省区。

采收加工 秋季采挖肉质根茎，洗净，晒干或阴干。

性味功能 味甘、微苦，性温。有滋补强壮，散瘀止痛，止血，祛痰，镇痛的功能。

主治用法 用于肺结核咯血，咳嗽痰多，跌打损伤。用量6~9g。

应　　用

1. 跌打损伤：竹节参、当归、川芎各9g，红花、桃仁各6g。水煎服。
2. 肺结核吐血：竹节参、白茅根、茜草根、麦冬、天冬各9g。水煎服。
3. 咳嗽多痰：竹节参9g，川贝母6g，鼠曲草、藕节各15g。水煎服。
4. 痈肿初起：鲜竹节参适量。捣烂敷患处。

五加科 Araliaceae



三　七 *Panax notoginseng* (Burk.) F. H. Chen

基　　源 为五加科植物三七的根。

原 植 物 别名：参三七、田七

多年生草本。根茎短；主根粗壮肉质，倒圆锥形或圆柱形，有分枝和多数支根。茎直立，单生，掌状复叶3~4轮生茎顶；叶柄基部有多数披针形或卵圆形托叶状附属物；小叶5~7，膜质，长椭圆状倒卵形或长圆状披针形，基部1对较小，先端长渐尖，基部近圆形，叶缘有密锯齿，齿端有小刚毛，沿脉疏生刚毛。伞形花序单个顶生，浆果状核果，近肾形，红色。花期6~8月。果期8~10月。

生境分布 生于山坡丛林下。分布于江西、广西、四川、云南等省区。多栽培。

采收加工 秋季采收3年以上的植株，剪下芦头、侧根及须根，分别晒干。主根晒至半干时，边晒边用手搓，至全干。

性味功能 味甘、微苦、性温。有止血散瘀，消肿定痛的功能。

主治用法 用于吐血，咯血，衄血，血痢，产后血晕，跌扑肿痛，外伤出血，痈肿。内服用量3~9g；外用粉末适量。

应　　用

1. 吐血、衄血、咯血：三七3g。口嚼，米汤送下。
2. 产后出血多，崩漏：三七3g。研末，米汤冲服。
3. 跌扑肿痛，外伤出血，刀伤：三七、乳香、血竭、没药、降香末各等份，搽敷患处。

五加科 Araliaceae



西洋参 *Panax quinquefolium* L.

基　　源 为五加科植物西洋参的根。

原 植 物 别名：花旗参、洋参

多年生草本。主根纺锤形，肉质，有分枝。茎单一，5出掌状复叶，3~4轮生于茎端，膜质，广卵形或倒卵形，先端急尖，基部楔形，边s缘有粗锯齿。伞形花序顶生，花瓣5，绿白色。浆果扁球形，鲜红色，果柄长。花期7~8月。果期9月。

生境分布 原产美国、加拿大。现吉林、北京、河北、陕西、山东等省区有栽培。

采收加工 秋季采挖生长4年的参根，切去分枝、须尾，晒干。

性味功能 味甘、微苦，性凉。有益肺阴，清虚火，生津液，除烦倦的功能。

主治用法 用于肺虚久咳，失血，咽干口渴，虚热烦倦。用量6~9g。水煎服，或泡茶饮。反藜芦。

应　　用

1. 冠心病：西洋参、三七各25g，灵芝50g。研末，温开水冲服。
2. 糖尿病：西洋参、天花粉、麦冬各等份。研末，炼蜜丸。
3. 白内障，肝虚眼昏：西洋参、决明子各15g，枳壳10g，黄芪、覆盆子、菟丝子各20g。水煎服。
4. 慢性咽炎，喉炎：西洋参3g，桔梗、甘草各15g，冰糖10g。水煎服。

五加科 Araliaceae



鹅掌藤（七叶莲） *Schefflera arboricola* Hayata

基　　源 七叶莲为五加科鹅掌藤的茎叶。

原 植 物 别名：鹅掌柴、汉桃叶、七叶藤

常绿蔓性灌木，全株有香气。茎圆柱形，绿色，有细纵纹。掌状复叶，互生，总叶柄长7~9cm，基部扩大，托叶在叶柄基部与叶柄合生；小叶7，长椭圆形，先端钝，基部钝圆，全缘，花小，绿白色，伞形花序集成总状花序状，顶生；花萼常5~6；花瓣5~6，分离，卵形。核果球形，橙黄色。花期4~5月。果期6~7月。

生境分布 生于沟谷常绿阔叶林中。分布于江西、福建、台湾、广东、广西等省区。

采收加工 全年均可采集，洗净，晒干或切段晒干，或鲜用。

性味功能 味苦、甘，性温。有止痛散瘀，消肿的功能。

主治用法 茎：用于跌打损伤，风湿关节痛，胃及十二指肠溃疡。叶外用于外伤出血。孕妇忌服。用量6~18g。水煎服。外用适量，鲜叶捣烂敷患处。

应　　用

1. 跌打损伤：七叶莲、酒糟各适量。共捣烂，用芭蕉叶包好煨暖，敷患处。
2. 外伤出血：七叶莲适量。捣烂敷患处。
3. 风湿关节痛：七叶莲、红龙船花叶、大风艾各适量。共捣烂，用酒炒热后敷患处，用布包扎。

五加科 Araliaceae



通脱木（通草）

Tetrapanax papyriferous (Hook.) K. Koch.

基　　源 通草为五加科植物通脱木的干燥茎髓。

原 植 物 别名：大通草、通花五加

灌木或小乔木。茎髓大，纸质。叶大，集生于茎顶，近圆形，掌状5~11裂，再分裂为2~3小裂片，先端渐尖，基部心形，边缘具疏锯齿，有星状毛。圆锥花序大型，由多数球状聚伞花序集成，密生白色星状绒毛，花黄白色。核果状浆果，球形，紫黑色。花期10~12月，果期次年1~2月。

生境分布 生于山坡向阳处。分布于我国黄河以南各省区。

采收加工 秋季采收树杆，趁鲜用取出茎髓，晒干。

性味功能 味甘、淡，性寒。有清热利水，通气下乳的功能。

主治用法 用于小便不利，尿路感染，乳汁不下，水肿等。用量3~6 g。水煎服。

应　　用

1. 尿赤，小便不利：通草、滑石、生地、淡竹叶。
2. 乳汁不通：通草6 g，炙山甲、王不留行各9g。
3. 水肿，淋浊：通草、茯苓皮、滑石、泽泻、白术。
4. 肾炎水肿：通草、木猪苓各等份。研末，米汤调服。

附注：通脱木根也作药用。味淡，性寒。有行气，利水，消食，下乳的功能。用于水肿，淋病，食积饱胀，乳汁不通。用量6~9g。

五加科 Araliaceae



重齿当归（独活）

Angelica biserrata Yuan et Shan

(*Angelica pubescens* f. *bserrata* Shan et Yuan)

基　　源 独活为伞形科重齿当归的干燥根。

原 植 物 别名：重齿毛当归、香独活、山大活

多年生草本。根茎圆柱形，棕褐色，有香气。叶二回三出羽状全裂，基部膨大成兜状半抱茎的膜质叶鞘，边缘有尖锯齿或重锯齿，顶生小裂片3深裂，基部沿叶轴下延成翅。复伞形花序顶生或侧生，密被短糙毛；花白色，无萼齿，花瓣顶端内凹。果实椭圆形，背棱线形，隆起。花期8~9月，果期9~10月。

生境分布 生于阴湿山坡，林下草丛中或稀疏灌丛中。分布于安徽、浙江、江西、湖北、四川等地。

采收加工 秋末采挖，烘至半干，堆置2~3天，再烘至全干。

性味功能 味辛、苦，性微温。有祛风除湿，散寒止痛的功能。

主治用法 用于风寒湿痹，手足挛痛，腰膝酸痛等。用量3~9g。

应　　用

1. 风湿关节痛等：独活、防风、秦艽、杜仲、桑寄生。水煎服。
2. 头痛、头晕：独活、羌活、藁本、蔓荆子。水煎服。
3. 慢性气管炎，咳喘：独活9g，加红糖，水煎服。
4. 痈疽：独活、细辛、黄芩、当归、川芎、大黄、赤芍各50g，加猪蹄煮，取汤液，涂洗患处。

伞形科 Umbelliferae

杭白芷（白芷）

Angelica dahuirca Benth. et Hook. f. cv. *hangbaizhi*

基　　源 白芷为伞形科植物杭白芷的干燥根。

原 植 物 与白芷很相近，但植株矮小，通常高不超过2m，根圆锥形，长10~20cm，直径2~25cm，上部近方形，灰棕色，有多数较大皮孔样突起，排列成近四纵行，有4条棱脊。茎及叶鞘多为黄绿色；茎上部近方形，灰棕色，皮孔样突起大而突出。小总苞片长约5mm；花黄绿色。花瓣窄卵形。

生境分布 浙江、福建、台湾、湖北、湖南、四川等省有栽培。

采收加工 夏、秋间叶黄时，采挖根部，除去地上部、须根，洗净泥沙，晒干或低温干燥。


性味功能 味辛，性温。有祛风，祛寒，燥湿，通窍止痛，消肿排脓的功能。

主治用法 用于风寒感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞，鼻渊，牙痛，白带，疮疡肿痛。用量3~9g。水煎服。

应　　用

1. 感冒头痛：白芷、羌活、防风。水煎服。
2. 鼻窦炎：白芷、辛夷、苍耳子。水煎服。
3. 烧伤、皮肤发痒、毒蛇咬伤，疮疖肿疼痛：白芷、紫草、忍冬藤各30g，虫白蜡21g。冰片，香油调涂，外敷。
4. 感冒风热，眉棱骨痛：白芷、黄芩（酒炒）。水煎服。

伞形科 Umbelliferae



白　芷 *Angelica dahurica* (Fisch. Ex Hoffm) Benth. et Hook.

基　　源 为伞形科植物白芷的干燥根。

原 植 物 别名：祁白芷、禹白芷

多年生草本，高1~2.5m。根粗大圆锥形，黄褐色，根头部钝四棱形或近圆形，具皱纹、支根痕及皮孔样的横向突起，顶端有凹陷茎痕。茎及叶鞘常带紫色。茎下部叶羽状分裂；中部2~3回羽状分裂；上部有膨大囊状鞘。复伞形花序；花瓣5，白色。双悬果长圆形至卵圆形，背棱扁、钝圆，侧棱翅状。花期7~9月。果期9~10月。

生境分布 生于丛林砾岩上。分布于东北、华北等省区。有栽培。

采收加工 夏、秋间叶黄时，采挖根部，除去地上部、须根，洗净泥沙，晒干或低温干燥。

性味功能 味辛，性温。有祛风，祛寒，燥湿，通窍止痛，消肿排脓的功能。

主治用法 用于风寒感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞，牙痛，白带，疮疡肿痛。用量3~9g。水煎服。

应　　用

同杭白芷。

伞形科 Umbelliferae



紫花前胡（前胡）

Angelica decursiva Franch.et Sav.(*Peucedanum decursivum* Maxim.)

基　　源　前胡为伞形科植物紫花前胡的根。

原 植 物　别名：土当归

多年生草本。根圆锥形。茎紫色。基生叶有阔叶鞘；三出式1~2回羽状分裂，基部翅状，边缘锯齿密；茎上部叶渐退化，至顶部仅有3裂，紫色叶鞘膨大成兜状。复伞形花序，紫色，总苞片1~2；花瓣卵圆形，深紫色。果实椭圆形，背部扁平，侧棱扩展成狭翅。花期8~9月。果期10月。

生境分布　生于山坡路边、林边及灌丛中。分布于吉林、辽宁、陕西、四川及华东、中南等各地区。

采收加工　秋末采挖，除去茎叶及须根，晒干或微火炕干。

性味功能　味苦、辛，性凉。有清热，散风，降气，化痰的功能。

主治用法　用于风热咳嗽多痰，痰热咳喘，胸膈满闷，呕逆，上呼吸道感染等症。用量3~9g。恶皂角。畏藜芦。

应　　用

1. 小儿夜啼：前胡、柴胡。水煎服。
2. 冒咳嗽痰多，气急：前胡、苦杏仁、牛蒡子各9g，桔梗6g，薄荷9g（后下）。水煎服。
3. 肺热咳嗽，胸闷痰多：前胡、紫苏子、陈皮、枳实各6g。水煎服。
4. 鼻咽癌：前胡、石见穿各10g。水煎服。

伞形科 Umbelliferae

当　归　*Angelica sinensis* (Oliv.) Diels

基　　源　为伞形科植物当归的干燥根。

原 植 物　多年生草本，有特异香气。主根肥大肉质。叶互生，基部膨大鞘状抱茎；2~3回奇数羽状复叶，小叶3对，1~2回分裂。复伞形花序顶生，花5数，白色。双悬果椭圆形，果棱5条，背棱线形隆起，侧棱成翅，翅边缘淡紫色，背部扁平。花期7月，果期8~9月。

生境分布　生于海拔1800~2500m的高寒阴湿地方。栽培于甘肃、四川、云南、湖北、陕西、贵州等省区。

采收加工　秋末采挖根部，待水分稍蒸发后，捆成小把，用烟火慢慢熏干。当归不宜太阳晒。

性味功能　味甘、辛，性温。有补血活血，调经止痛，润肠通便的功能。

主治用法　用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。用量4.5~9g，水煎服。

应　　用

1. 心悸、健忘、失眠、心神不宁：当归6g，黄芪30g。水煎服。
2. 气血虚弱所致肠燥便秘：当归12g，牛膝6g，咸苁蓉9g，泽泻4.5g，升麻2.4g，枳壳3g。水煎服。
3. 产后腹痛：当归、生姜.加羊肉炖服。
4. 月经不调：当归、熟地、川芎、白芍。水煎服。

伞形科 Umbelliferae





旱芹 *Apium graveolens* L.

基　　源 为伞形科植物旱芹的全草。

原植物 别名：药芹、香芹

一年或二年生草本。全株具浓烈香气。茎圆柱形，上部分枝，具纵棱和节。基生叶丛生，奇数羽状复叶，1~2回羽状全裂，常三浅裂或深裂，小裂片近菱形，边缘有圆锯齿或锯齿。茎生叶楔形，三全裂。复伞形花序多数，顶生或侧生，无总苞和小总苞片；伞幅7~16，花小，绿白色，萼齿不明显；花瓣5，白色，先端内卷。双悬果近圆形至椭圆形，分果具5条锐棱，每棱槽内有油管1条，合生面平坦，有油管2条，每分果有种子1粒。花期4月，果期6月。

生境分布 喜生于向阳的沙壤土中。我国各地普遍栽培。

采收加工 春、夏、秋三季均可采挖。洗净鲜用。

性味功能 味甘、微辛，性凉。有降压利尿，凉血止血的功能。

主治用法 用于头晕脑胀，高血压病，小便热涩不利，尿血，崩中带下。用量30~60g。

应　　用

1. 高血压：鲜旱芹适量，洗净榨汁。
2. 妇女月经不调，崩中带下，或小便出血：鲜旱芹50g，茜草6g，六月雪12g。水煎服。

伞形科 Umbelliferae



柴胡 *Bupleurum chinense* DC.

基　　源 为伞形科植物柴胡的根。

原植物 别名：北柴胡

多年生草本。主根较粗，圆柱形，质坚硬，黑褐色。叶互生；基生叶针形，基部渐成长柄；茎生叶长圆状披针形或倒披针形，全缘。复伞形花序多分枝，伞梗4~10；花小，5瓣，黄色，先端向内反卷；雄蕊5；子房下位，椭圆形。双悬果长圆状椭圆形或长卵形，果枝明显，棱槽中有油管3条，合生面油管4。花期7~9月。果期9~10月。

生境分布 生于山坡、田野及路旁。分布全国大部分地区。

采收加工 春秋季挖取根部，晒干。

性味功能 味苦，性寒。有发表退热，舒肝，升提中气的功能。

主治用法 用于感冒发热，寒热往来，疟疾，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛，肝炎，胆道感染。用量3~9g。

应　　用

1. 流感、上呼吸道炎、急性支气管炎：柴胡12g，黄芩、制半夏各9g，党参、生姜各6g，甘草3g，大枣枚4枚。水煎服。
2. 肝气郁滞所致胁痛、胃肠功能失调：柴胡、香附、郁金、青皮各9g。水煎服。
3. 疟疾：柴胡、常山。水煎服。

伞形科 Umbelliferae



小柴胡 *Bupleurum tenue* Buch.-Ham. ex D. Don

(*Bupleurum hamiltonii* Belank)

基　　源 为伞形科植物小柴胡的根。

原 植 物 别名：滇银柴胡、金柴胡、芫荽柴胡
两年生草本，根细，土黄色。茎下部分枝，丛生，细而硬，斜上展开。叶矩圆状披针形或条形，顶端圆钝，有小凸尖头，基部稍收缩，抱茎，沿小脉和总苞片都有油脂积聚。复伞形花序小而多；总花梗细，有棱角；伞幅2~4；小总苞片2~4，花梗3~5，黄色。双悬果宽卵形或椭圆形，棱粗而显著。

生境分布 生于山坡草丛或干燥沙地。分布于湖北、四川、贵州、云南等省。

采收加工 秋季采收全草，切段晒干。

性味功能 味苦、微辛，性平。有解毒，祛风，止痒的功能。

主治用法 用于疮毒，疖子；根为发表退热药。用量9~15g，水煎服，亦可煎水外洗患处。

应　　用

1. 感冒、流感、上呼吸道炎、急性支气管炎、淋巴腺炎：小柴胡12g，黄芩、制半夏各9g，党参、生姜各6g，甘草3g，大枣枚4枚。水煎服。
2. 高热：小柴胡15g。水煎服。
3. 疟疾：小柴胡、常山各9g。水煎服。
4. 疮毒，疖子：小柴胡适量，煎水外洗患处。

伞形科 Umbelliferae



狭叶柴胡（柴胡）

Bupleurum scorzonerifolium Willd.

基　　源 柴胡为伞形科植物狭叶柴胡的根。

原 植 物 别名：红柴胡、南柴胡
根长圆锥状，红褐色。茎基部密被红色纤维状叶基残留物，上部枝呈之字弯曲。基生叶条形或窄条形，先端渐尖，具短芒，基部渐狭。茎生叶条状披针形或条形具白色骨质边缘。复伞形花序多数，成疏松圆锥花序；总花瓣5，黄色。双悬果宽椭圆形，棱粗钝凸出。花期7~9月。果期8~10月。

生境分布 生于山坡、草原。分布于东北、华北、西北、华东等省区。

采收加工 春、秋二季采挖，除去茎叶及泥沙，干燥。

性味功能 味苦，性微寒。有疏散退热，舒肝，升阳的功能。


主治用法 用感冒发热，寒热往来，疟疾，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。用量，3~9g。

应　　用

同柴胡。

伞形科 Umbelliferae





积雪草 *Centella asiatica* (L.) Urb.

基　　源 为伞形科植物积雪草的干燥全草。

原 植 物 别名：铜钱草、半边碗、半边钱
多年生匍匐草本。单叶互生，圆形或肾形，边缘有粗锯齿。伞形花序单生或2~5个簇生叶腋；总苞片2，卵形，每个伞形花序有花3朵，花白色，萼齿不显；花瓣5，顶端微向内弯曲；雄蕊5；子房下位。双悬果扁圆形，侧面扁压，幼时有柔毛，成熟时光滑，主棱线形，有网状纹相连。花期5~6月，果期7~8月。

生境分布 生于路旁、田边、山坡等阴湿处。分布于江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、福建、台湾、广东、广西、陕西、四川、云南等省区。

采收加工 夏秋二季采收全株，晒干。

性味功能 味甘、微苦、辛，性凉。有清湿解毒，利尿，消肿，凉血的功能。

主治用法 用于湿热黄疸，肝炎，胸膜炎，咽喉肿痛，痈疮肿毒，跌打损伤，毒蛇咬伤，疔疮溃疡。用量15~30g。

应　　用

1. 黄疸：鲜积雪草100g，天胡荽50g。水煎服。
2. 哮喘：积雪草50g，黄疸草、薜荔藤各15g。水煎服。
3. 痢疾：鲜积雪草、凤尾草、紫花地丁各100g，水煎服。
4. 跌伤肿痛、疔疮肿毒：积雪草30g。水煎服。或鲜积雪草100g，捣烂敷患处。

伞形科 Umbelliferae



明党参 *Changium smyrnioides* Wolff

基　　源 为伞形科植物明党参的干燥根。

原 植 物 多年生草本。根肥厚，圆柱形或粗短纺锤形。基生叶柄，基部扩大呈鞘状抱茎，2~3回三出复叶，小叶片3~4对；茎上部叶缩小呈鳞片状或叶鞘状。复伞形花序，每小伞形花序有花10~15，花白色，萼齿小；花瓣5，有一明显紫色中脉，顶端尖锐，内折，凹入。双悬果近圆形或卵状长圆形而扁，光滑，有纵纹。花期4~5月，果期5~6月。

生境分布 生于山坡林。分布于江苏、安徽、浙江等省区。

采收加工 3~5月采挖根部，煮至无白心，刮去外皮，干燥。

性味功能 味甘、微苦，性微寒。有润肺化痰，养阴和胃，平肝，解毒的功能。

主治用法 用于肺热咳嗽，呕吐反胃，食少口干，目赤眩晕，疔毒疮疡。用量6~12g。

应　　用

1. 肺热咳嗽：明党参、桑白皮、枇杷叶、甘草。
2. 反胃呕吐：明党参、旋板覆花、姜半夏、赭石、生姜。水煎服。
3. 病后体弱，食少口干：明党参、大枣、黄精。水炖服。
4. 气管炎咳嗽、哮喘，感冒咳嗽：明党参9g。水煎服。

伞形科 Umbelliferae

蛇 床（蛇床子） *Cnidium monnieri* (L.) Cuss.

基　　源 蛇床子为伞形科物蛇床的干燥成熟果实。

原 植 物 别名：野胡萝卜

一年生草本，基生叶有基部有短阔叶鞘，边缘膜质；上部叶成鞘状，卵形或卵状披针形，2~3回三出羽状全裂。复伞形花序顶生或侧生，花瓣5，白色，先端有内折小舌片；雄蕊5；子房下位。双悬果长圆状，横切面近五角形，主棱5，翅状。花期4~7月。果期7~10月。

生境分布 生于田边、草地及河边湿地。分布于华东、中南、西南、西北、华北、东北。

采收加工 夏、秋季果实成熟时采收，晒干，筛去灰屑。

性味功能 味辛、苦，性温，有小毒。有散寒，祛风，燥湿，温肾壮阳，杀虫，止痒的功能。

主治用法 用于湿痹腰痛，寒湿带下，滴虫性阴道炎，阳痿，宫冷，外阴湿疹，皮肤瘙痒。用量3~9g。

应　　用

1. 婴儿湿疹，慢性湿疹，外阴瘙痒，皮癣：蛇床子60g，水煎洗。或蛇床子30g，轻粉9g，研末，调油外敷。
2. 阴道滴虫：蛇床子30g，白矾6g，紫苏叶30g。水煎外洗。

伞形科 Umbelliferae



芫 荽（芫荽子） *Coriandrum sativum* L.

基　　源 芫荽子为伞形科植物芫荽的干燥成熟果实。

原 植 物 别名：香菜

一年生草本，株高30~80cm，具香气。基生叶和下部茎生叶具长柄，1~2回羽状全裂，小叶卵形，基部楔形，羽状缺刻或牙齿状。中部及上部茎生叶柄鞘状，边缘宽膜质，2~3回羽状全裂，最终裂片线形，全缘，先端钝。复伞形花序具长柄。小伞形花序具花10~20朵；花瓣倒卵形，2深裂。双悬果球形，淡褐色。花、果期5~7月。

生境分布 我国各地均有栽培，主要分布于江苏、安徽、湖北等。

采收加工 秋季果实成熟时，采收果枝，晒干，打下果实，除净枝梗等杂质，晒干。

性味功能 味辛，性温。有发表，透疹，开胃的功能。

主治用法 用于感冒鼻塞，痘疹透发不畅，饮食乏味，齿痛。用量5~10g。

应　　用

1. 消化不良，食欲不振：芫荽子6g，陈皮、六曲各9g，生姜3片。水煎服。
2. 胸膈满闷：芫荽子3g。研末，开水吞服。
3. 麻疹不透：鲜芫荽60g。捣烂搓前胸及后背。

伞形科 Umbelliferae





野胡萝卜（南鹤虱） *Daucus carota* L.

基　　源 南鹤虱为伞形科植物野胡萝卜的果实。

原 植 物 别名：虱子草、山萝卜

两年生草本。茎有横纹和白色粗硬毛。茎生叶基部鞘状；叶片薄膜质，2~3回羽状分裂，末回裂片线形或披针形。复伞形花序顶生或侧生，具粗硬毛，小伞形花序有花15~25朵，花小，白色、黄色或淡紫红色，每总伞花序中心的花有1朵为深紫红色；花萼5；花瓣5，先端凹陷，成狭窄内折小舌片。双悬果卵圆形，分果主棱不显著，次棱4条，成窄翅，翅上有短钩刺。花期5~7月。果期7~8月。

生境分布 生于路旁、田野荒地、山沟、溪边等处。分布于江西、江苏、浙江、河南、安徽、湖南、湖北、广西、云南、贵州、四川、西藏等省、自治区。

采收加工 秋季果实成熟时割取果枝，晒干，拾取果实。

性味功能 味苦、辛，性平。有小毒。有驱虫，消积，化痰的功能。

主治用法 用于蛔虫，蛲虫，绦虫病，虫积腹痛，小儿疳积等。用量3~15g。

应　　用

1. 钩虫病：南鹤虱15g，水煎服。
2. 牙痛：南鹤虱，煎米醋漱口。
3. 蛔虫、绦虫病、蛲虫：南鹤虱、使君子、槟榔、雷丸、苦楝根皮各9g。水煎服。

伞形科 Umbelliferae



茴　香（小茴香） *Foeniculum vulgare* Mill.

基　　源 小茴香为伞形科植物茴香的果实。

原 植 物 别名：小茴、香丝菜、小香

多年生草本，有强烈香气。叶柄，基部鞘状抱茎，上部叶柄部分或全部成鞘状；叶卵圆形或广三角形，3~4回羽状分裂，末回裂片线状或丝状。复伞形花序顶生或侧生；伞幅8~30；小伞形花序有花 14~39，花黄色，有梗；花瓣5，先端内折；雄蕊5；子房下位。双悬果果卵状长圆形，光滑，侧扁；分果有5条凸起纵棱，每棱槽中有油管1，合生面有2。花期6~7月。果期10月。

生境分布 我国各地区均有栽培。

采收加工 秋季果实刚熟时采割植株，打下果实，晒干。

性味功能 味辛，性温。有祛寒止痛，理气和胃的功能。

主治用法 用于胃寒胀痛，少腹冷痛，睾丸偏坠，脘腹胀痛，食少吐泻，痛经，疝痛等。用量3~9g。

应　　用


1. 消化不良：小茴香、生姜、厚朴。水煎服。
2. 睾丸鞘膜积液引起疼痛、肿痛：小茴香、木香各3g，川楝子－、白芍各12g，枳壳、黄柏各9g，生苡仁24g，木通6g。水煎服。
3. 前列腺炎小便不通：小茴香、椒目（炒熟，捣碎）各12g，威灵仙9g。水煎服。

伞形科 Umbelliferae



珊瑚菜（北沙参） *Glehnia littoralis* F. Schmidt ex Miq.

基　　源	北沙参为伞形科植物珊瑚菜的根。
原 植 物	多年生草本，被灰褐色绒毛。主根细长，圆柱形，长达30cm，肉质，黄白色。基生叶柄长，基部宽鞘状，边缘膜质，叶卵圆形或宽三角状卵形，1~3回三出分裂至深裂，裂片羽状排列；茎上部叶不裂，卵形，有三角形圆锯齿。复伞形花序顶生，白色，有绒毛；花瓣5，先端内卷。双悬果椭圆形，有粗毛，果棱5，翅状。花期5~7月。果期6~8月。
生境分布	生于海边沙滩上。分布于辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建、台湾、广东等省区。
采收加工	夏、秋季采收栽培2年后的根部，开水烫后去皮，时间不可过长，晒干或烘干。
性味功能	味微甘，性微寒。有养阴清肺，祛痰止咳功能。
主治用法	用于阳虚肺热干咳，热病伤津，咽干口渴等症。用量5~10g。不宜与藜芦同用。
应　　用	
	1. 老年慢性气管炎干咳：南沙参6g，甘草3g。水煎服。
	2. 肺热咳嗽不止：南沙参250g，百合15g，贝母5g。研末，冲服。



天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam.

基　　源 为伞形科植物天胡荽的干燥全草。

原 植 物 多年生匍匐小草本。茎细长，成片生于地面，茎节上生根。叶互生，圆形或肾形，基部心形，边缘有钝锯齿，花小，绿白色或淡红紫色，朵聚成圆头状伞形花序腋生。与叶。双悬果扁平，呈心形，分生果侧面扁平，光滑或有斑点，有3棱，中棱稍锐。花期4~5月。

生境分布 生于田边，村旁，林下。分布于南方大部分省区。

采收加工 秋季采集全草，晒干。

性味功能 味微涩，性平。有清热利湿，祛痰止咳的功能。

主治用法 用于黄疸型病毒性肝炎，胆石症，泌尿系感染，伤风感冒，咳嗽，百日咳，咽喉炎，扁桃体炎，目翳；用量3~9g。外用适量，用于治湿疹，带状疱疹，衄血。

应　　用

1. 带状泡疹，无名肿毒：鲜天胡荽，捣烂绞汁，雄黄末少许，调匀外敷患处。
2. 胆结石：天胡荽、连钱草、海金沙藤、车前草（均用鲜品）各30g。水煎服。
3. 尿路结石：天胡荽、石韦、半边莲、海金沙各30g，水煎服。
4. 急性肾炎：天胡荽、积雪草各50g，野菊花40g。水煎服。

伞形科 Umbelliferae



辽藁本（藁本） *Ligusticum jeholense* Nakai et Kitag.

基　　源 藁本为伞形科植物辽藁本的干燥根茎及根。

原 植 物 辽藁本多年生草本，高20~80cm。茎直立单一，中空，有纵纹，常带紫色。茎下部叶和中部叶有长柄，2~3回出羽状全裂，第一回裂片4~6对，最下部一对有长柄；第二回裂片常无柄；末回裂片卵形至菱状卵形，基部楔形，上面沿主脉有糙毛，下面光滑，边缘有缺刻状浅裂或牙齿。牙齿顶端有小尖头；茎上部叶较小，叶柄鞘状，二回三出羽状全裂。复伞形花序顶生或侧生，白色。双悬果椭圆形，分生果背棱突起，侧棱狭翅状。花期7~9月，果期9~10月。

生境分布 生于山地、林缘、林下。分布于辽宁、吉林、内蒙古、河北、山西、山东等省区。

采收加工 秋季茎叶枯萎或次春出苗时采挖，除去泥沙，晒干。

性味功能 味辛，性温。祛风，散寒，除湿，镇痛。

主治用法 用于风寒感冒，巅顶疼痛，风湿，肢节痹痛。用量3~9g。

应　　用

1. 神经性皮炎、疥癣：藁本，水煎服。
2. 头皮屑：藁本，研末调敷患处。
3. 风寒感冒头痛，胃痛：蒿本复方，待查。
4. 胃痉挛、腹痛：藁本15g，苍术9g。水煎服。

伞形科 Umbelliferae



川 芎

Ligusticum sinense Oliv. cv. Chuanxio

(*Ligusticumchuanxiong* Hort.)

基　　源　为伞形科植物川芎的根茎。

原 植 物　别名：芎穷 、小叶川芎

多年生草本，有香气。茎中空，有纵沟纹，叶互生，叶裂片3~5对，末回裂片卵形。复伞形花序顶生，小伞序有花10~24，花瓣5。双悬果卵形，5棱，侧棱有窄翅，背棱棱槽中油管3，侧棱棱槽中油管2~5，合生面5。花期7~9月。果期9~10月。

生境分布　主要栽培于四川；现大部分地区有引种栽培。

采收加工　5~6月或8~9月采挖，晾干，去须根。不宜曝晒。

性味功能　味辛、微苦，性温。有活血行气，祛风止痛的功能。

主治用法　用于风寒感冒头痛，胸胁痛，月经不调，经闭腹痛，跌打损伤，疮疡肿毒，风湿痹痛等症。用量3–9g。

应　　用

1. 感冒头痛：川芎、荆芥、甘草、白芷、防风等。水煎服。
2. 偏头痛：川芎、细辛、白芷、羌活、防风、僵蚕、胆南星、天麻。水煎服。
3. 月经不调：川芎、当归、熟地、白芍、红花。水煎服。

伞形科 Umbelliferae



宽叶羌活（羌活） *Notopterygium franchetii* H.deBoiss.

基　　源　羌活为伞形科植物宽叶羌活的根和根茎。

原 植 物　别名：大头羌、福氏羌活

多年生草本，高80~180，根茎粗壮。茎直立，中空，表面淡紫色，有纵直细条纹。基生叶及茎下部叶有长柄，叶片大，三出二至三回羽状复叶，末回裂片长圆卵形至卵形，边缘有粗锯齿，脉上及叶缘稍有毛，茎上部叶简化成紫色叶鞘，有的仅有3小叶。复伞形花序；伞幅10~23，总苞片1~3；花瓣淡黄色。分果近圆形，毛棱均扩展为翅，每棱槽内有油管3~4。花期7~8月，果期8~9月。

生境分布　生于海拔1700~4500m的林缘、灌丛下、林下。分布于山西、内蒙古、湖北、陕西、甘肃、青海、四川等省。

采收加工　秋季采挖根茎及根，除去泥土及须根，晒干。

性味功能　味辛、苦，性温。有解表散寒，除湿止痛的功能。

主治用法　用于风寒感冒、头痛、身疼、四肢酸痛、恶寒无汗发热、风湿性关节疼痛。用量3~9g。

应　　用

1. 感冒风寒，头痛，无汗，关节酸痛：羌活、防风、白芷各3g，细辛1.5g。水煎服。
2. 关节疼痛、腰背酸痛：羌活、独活各1.5g，秦艽9g，桑枝15g。水煎服。

伞形科 Umbelliferae