
小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



新版

中草药彩图手册（三）

主编 徐鸿华

【全面升级】

- 植物形态
- 药材性状
- 临床应用
- 现代研究

广东科技出版社
全国优秀出版社

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

责任编辑：梁旭旋　版式设计：余笑文　封面设计：陈　华

广东科技出版社

中草药彩图手册全面升级版



- 药材**权威**多年研究、**精心打造**
- 国内**首次**系统发布中药材**化学成分**
- **独创**药材与原植物**精美照片**同步展示

ISBN 7-5359-3307-6

9 787535 933072 >

ISBN 7-5359-3307-6

R·558　定价：38.00元

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

斯 图 泰

中草药

彩图手册（三）

主编　徐鸿华
编著　詹若挺　丁　平
摄影　冼建春　黄海波

广东科技出版社
·广州·

Z0077829

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

图书在版编目（CIP）数据

中草药彩图手册.3/徐鸿华主编.—广州：广东科技出版社，2003.7
ISBN 7-5359-3307-6

Ⅰ.中… Ⅱ.徐… Ⅲ.中草药－图集
Ⅳ.R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第019064号

Zhongcaoyao Caitu Shouce (3)

出版发行：广东科技出版社
（广州市环市东路水荫路11号 邮码：510075）
E-mail: gdkjzbb@21cn.com
http://www.gdstp.com.cn
经 销：广东新华发行集团
印 刷：广东惠阳印刷厂
（广东省惠州市南坛西路17号 邮码：516001）
规 格：787×1092 1/32 11印张 字数350千
版 次：2003年7月第1版
2003年7月第1次印刷
印 数：1～10 000册
定 价：38.00元

如发现因印装问题而影响阅读，请与承印厂联系调换。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

编写说明

1.本书分六册出版。每册收载的中药种类是《中华人民共和国药典》(2000年版一部)的药材品种和部分地区性用药。依据中药的不同入药部位进行分类，主要包括：根及根茎类、茎木类、皮类、叶类、花类、果实及种子类、全草类、藻及菌类、树脂类、动物类，矿物类，其他类。每类药材按笔划顺序由少到多进行排列，个别药材依版面略作调整。叶类药材若品种较少则归并入全草类，树脂类药材若品种少则归并茎木类或其他类。有些中药材来源于2种或2种以上的药用植物或动物，本书一般只描述其所在地区常见的品种。有些药用植物或药用动物、有几个入药部位，则以其中最常用的中药为主进行描述，其他的则以附注的形式排列于之后加以简要描述。

2.每种中药材包括文字和彩色照片两部分。文字内容包括：中文名、别名、拉丁学名、植(动)物形态、生境分布、采收加工、药材性状、性味功能、临床应用、现代研究等。每种药材最多只描述3个常见的别名；原植物或动物形态描述简明扼要，突出主要特征；生态环境以小气候环境为主，分布只描述主要的3个地区；现代研究反映该药的主要化学成分、药理药效、临床应用的最新成果。原植物的彩色照片力求有花或果实，药材或饮片的彩色照片主要突出药材在外形、色泽、断面等方面的特征。少数动物类药材由于其原动物不易找到，少数进口药材因国内不产，所以仅提供其药材照片；某些原动物和矿物的形态与其药材极相似，也仅拍摄其药材的彩色照片。

3.个别药材的照片取自《中华人民共和国药典》等，贵州夏同珩编审提供部分照片，张丹雁老师收集大部分药材和饮片，在此一并致谢。

4.本书后面均附有药材的中文名索引和原动、植物拉丁学名索引。中文名索引按笔画顺序排列，药材正名以黑体字表示。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

编委名单

主编

徐鸿华

编委（以姓氏笔画为序）

丁　平　刘军民　刘春玲　杜　勤
李　薇　岑丽华　张丹雁　冼建春
贺　红　徐　良　黄海波　詹若挺
潘超美

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

作者介绍



徐鸿华

广州中医药大学首席教授、博士生导师，中药学重点学科学术带头人、中国药材GAP研究促进会理事。从事中药资源研究与开发利用等方面的研究和教学工作，近年来，主持国家自然科学基金课题、国家“八五”、“九五”、“十五”科技攻关子专题、国家中药现代化与产业化开发重中之重等部（省）级以上课题13项，获国家科技进步二、三等奖（子专题）等各级奖励9项。1991年开始享受国务院特殊津贴。



詹若挺

广州中医药大学药用植物学、中药鉴定学教研室副主任、讲师，兼任广州中医药大学中药学（中药制药）重点学科秘书、广东省植物学会理事。近年来，参与国家“九五”、“十五”科技攻关子专题等多项，发表学术论文12篇、主编、参编学术著作3部。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com


小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

作者介绍



丁　平

广州中医药大学博士研究生。中药资源研究室主任、副教授。近年来，主持和参加国家“九五”、“十五”科技攻关子专题、国家中药现代化与产业化开发重中之重等部（省）级以上课题5项，获国家科技进步二等奖（子专题）等各级奖励3项。发表学术论文20篇，出版学术专著4部。



冼建春

广州中医药大学中药标本中心主任。主要从事中医药研究。主持岭南中草药研究课题。发表多篇学术论文，参加编写学术专著3部、摄影兼编写20多部相关学术著作，100多幅药用植物摄影作品发表在全国学术刊物上。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

目 录

一、根及根茎类

土茯苓 …… 2
大蒜 …… 4
太子参 …… 6
天葵子 …… 8
天南星 …… 10
乌药 …… 12
丹参 …… 14
半夏 …… 16
玉竹 …… 18
白芷 …… 20
白术 …… 22
白芍 …… 24
白及 …… 26
白前 …… 28
仙茅 …… 30
羊蹄 …… 32
羊乳 …… 34
百部 …… 36
百合 …… 38
地榆 …… 40
红大戟 …… 42
延胡索 …… 44
防己 …… 46
麦冬 …… 48
苍术 …… 50
泽泻 …… 52
板蓝根 …… 54
虎杖 …… 56
金荞麦 …… 58
明党参 …… 60
前胡 …… 62
姜黄 …… 64
南沙参 …… 66
郁金 …… 68
附1 莪术 …… 70
附2 片姜黄 …… 70
香附 …… 72
重楼 …… 74
骨碎补 …… 76
粉萆薢 …… 78
浙贝母 …… 80
夏天无 …… 82
柴胡 …… 84
绵萆薢 …… 86
葛根 …… 88
糯稻根 …… 90
根及根茎类药材小常识 .. 92

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

二、茎木类

小通草 94
天仙藤 96
附 青木香 96
海风藤 98
通草 100
络石藤 102
茎木类药材小常识 104

三、皮类

土荆皮 106
合欢皮 108
杜仲 110
牡丹皮 112
秦皮 114
厚朴 116
附 厚朴花 116
棕榈 118
附 棕榈炭 118
皮类药材小常识 120

四、叶类

大青叶 122
艾叶 124
牡荆叶 126
附 牡荆油 126
枇杷叶 128
罗布麻叶 130
紫珠叶 132
叶类药材小常识 134

五、花类

月季花 136
西红花 138
谷精草 140
玫瑰花 142
洋金花 144
凌霄花 146
夏枯草 148
菊花 150
蒲黄 152
花类药材小常识 154

六、果实及种子类

刀豆 156
山楂 158
山茱萸 160
千金子 162
女贞子 164
木鳖子 166
木瓜 168
车前子 170
附 车前草 170
乌梅 172
石榴皮 174
龙眼肉 176

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬葵果 …… 178
白果 …… 180
附 银杏叶 …… 180
白扁豆 …… 182
丝瓜络 …… 184
谷芽 …… 186
补骨脂 …… 188
吴茱萸 …… 190
金樱子 …… 192
决明子 …… 194
枳实 …… 196
附 枳壳 …… 196
枳椇子 …… 198
栀子 …… 200
附 焦栀子 …… 200
南五味子 …… 202
莲子 …… 204
附1 莲房 …… 206
附2 藕节 …… 206
附3 荷叶 …… 206
桃仁 …… 208
稻芽 …… 210
薏苡仁 …… 212
覆盆子 …… 214
果实及种子类药材小常识 …… 216

七、全草类

土荆芥 …… 218
天胡荽 …… 220
毛茛 …… 222
乌蔹莓 …… 224
半边莲 …… 226
半枝莲 …… 228
石韦 …… 230
龙葵 …… 232
东风菜 …… 234
田基黄 …… 236
白英 …… 238
灯心草 …… 240
寻骨风 …… 242
杠板归 …… 244
连钱草 …… 246
肿节风 …… 248
金钱草 …… 250
金沸草 …… 252
鬼针草 …… 254
益母草 …… 256
附 茺蔚子 …… 256
积雪草 …… 258
紫花地丁 …… 260
鹅不食草 …… 262
豨莶草 …… 264
薄荷 …… 266

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附1 薄荷油 268
附2 薄荷脑 268
藿香 270
全草类药材小常识 272

八、菌类

马勃 274
银耳 276
蝉花 278
藻及菌类药材小常识 .. 280

九、动物类

土鳖虫 282
猪胆粉 282
乌梢蛇 284
乌骨鸡 286
海螵蛸 288
龟甲 290
蚕砂 292
蝉蜕 294
蕲蛇 296
蟾酥 298
鳖甲 300
动物类药材小常识 302

十、矿物类

白矾 304
炉甘石 306
轻粉 308
信石 310
寒水石 312
滑石 312
紫石英 314
琥珀 314
雌黄 316
雄黄 316
矿物类药材小常识 318

十一、其他类

干漆 320
冰片 322
枫香脂 324
茶油 326
樟脑 328

中文名索引 330
拉丁学名索引 337

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



一、根及根茎类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

土茯苓

【别名】羊舌癀、千斤根、山归来

【来源】百合科植物光叶菝葜 *Smilax glabra* Roxb. 的根茎

【植物形态】多年生攀援状灌木。茎无刺。根茎块根状，有明显结节，着生多数须根。单叶互生；叶片披针形至椭圆状披针形，全缘，下面常被白粉。花单性，雌雄异株；伞形花序腋生，花序梗极短，小花梗纤细。花小，白色；花被裂片6，2轮；雄花雄蕊6；雌花的退化雌蕊线形。浆果球形，红色。花期7～8月，果期9～10月。

【生境分布】生于海拔1 800米以下的林中、灌木丛中、河岸或山谷中。分布广东、湖南、湖北、浙江等地。

【采收加工】秋末冬初采挖，洗净浸漂，切片晒干或放开水中煮数分钟后，切片晒干。

【药材性状】不规则块状，多分枝，或略呈圆柱形，有结节状隆起，长5～22厘米，直径2～5厘米。表面黄棕色，粗糙，凹凸不平，突起的尖端有坚硬的须根残基，有的外皮呈现不规则裂纹；主根具条痕。质坚硬，不易折断。切片呈长圆形或不规则，厚1～5毫米，边缘不整齐；断面呈类白色至红棕色，中间微见维管束点。粉性，水湿润后有粘滑感。气微，味微甘、涩。

【性味功能】甘、淡，平。解毒、除湿、通利关节。

【临床应用】用于治疗淋浊、带下、风湿关节痛、痈疽肿毒、湿疮湿疹、瘰疬、疮癣、小儿疳积，急性细菌性痢疾，急性肾炎，防治钩端螺旋体病、梅毒等症。

用量15～30克。外用研末调敷。肝肾阴亏者慎服。本品配生甘草、叶下珠、海金沙藤等，可治疗热淋。

【现代研究】利用紫外光谱法可以较好地鉴别土茯苓。药理研究表明，本品具有较好的抗菌作用；有预防动脉粥样硬化的作用；对感染钩端螺旋体的豚鼠有一定的治疗作用。土茯苓所含黄酮类可降低小鼠棉酚中毒的死亡率，并减轻其肝脏病理损伤。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大蒜

【别名】蒜头、胡蒜、独头蒜。

【来源】百合科植物大蒜 *Allium sativum* L.的鳞茎。

【植物形态】多年生草本。鳞茎具6～10瓣，外包灰白色或淡棕色干膜质鳞被。叶基生、实心、扁平，线状披针形，基部呈鞘状。花茎直立，高约60厘米；佛焰苞有长喙，伞形花序，小而稠密，具苞片1～3枚，膜质，浅绿色；花小，花间多杂以淡红色珠芽，或完全无珠芽；花柄细，长于花；花被6，粉红色，椭圆状披针形；雄蕊6，白色，花药突出；雌蕊1，花柱突出，白色，子房上位，长椭圆状卵形，先端凹入，3室。蒴果，1室开裂；种子黑色。花期夏季。

【生境分布】全国各地均有栽培。

【采收加工】5月叶时采挖，晾干。

【药材性状】鳞茎呈扁球形或短圆锥形，外有灰白色或淡棕色干膜质鳞被；剥鳞叶，内有6～10个蒜瓣，轮生于花茎的周围；茎基部盘状，生有多数须根。每一个蒜瓣外包薄膜，剥去薄膜，可见白色、肥厚多汁的鳞片。有浓烈的蒜臭，味辛辣。


【性味功能】辛、温。行滞气、暖脾胃、消积、解毒杀虫。

【临床应用】用于治疗痈疽疔毒、疥癣；泄泻、痢疾、肺痨、百日咳；钩虫、蛲虫病等。煎服或生食，用量5～10克。外用适量，捣烂外敷或切片外擦。

【现代研究】大蒜含挥发油约0.2%，具辣味和特臭，内含蒜辣素及多种烯丙素、丙基和甲基组成的硫醚化合物。大蒜辣素有杀菌作用，但在新鲜的大蒜中并不存在，它是大蒜中所含的蒜氨酸受大蒜酶的作用而水解产生的。药理研究表明，大蒜有较强的抗菌及抗真菌作用，其机理可能是由于使巯基失活而抑制了与微生物生长繁殖有关的含巯基的酶；对多种致病细菌、真菌、阿米巴原虫及阴道滴虫等具有明显的抑菌或杀菌作用；可提高吞噬细胞的吞噬功能，增强免疫能力，降低血糖及脂质代谢；有抗癌及抗血小板聚集等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

太子参

【别名】孩儿参、童参、四叶参

【来源】石竹科植物孩儿参*Pseudostellaria heterophylla* (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm. 的块根

【植物形态】多年生草本，高15～20厘米。茎单一，不分枝，下部带紫色，近方形，上部绿色，圆柱形，有明显膨大的节，光滑无毛。单叶对生，茎下部的叶最小，倒披针形，先端尖，基部渐窄成柄，全缘，向上渐大，在茎顶的叶最大，通常两对密接成4叶轮生状，长卵形或卵状披针形，先端渐尖，基部狭窄成柄，边缘略呈波状。花散生，二型：近地面的花小，为闭锁花，花梗紫色有短柔毛；茎顶上的花较大而开放，花梗细长，紫绿色，有毛，背面及边缘有长毛；萼片5，披针形，背面有毛；花瓣5，倒卵形；雄蕊10；雌蕊1，花柱3，柱头头状。蒴果近球形。花期4～5月；果期5～6月。

【生境分布】生于山坡林下和岩石缝中。主产于江苏、安徽、山东等地。

【采收加工】大暑时节前后，茎叶大部分枯萎时采挖，除去细小须根，入沸水中浸烫3～5分钟后取出晒干，或直接晒干生用。

【药材性状】细长纺锤形或细长条形，稍弯曲，长3～8厘米，直径2～6厘米，顶端可见茎基及芽痕，下部细长呈尾状。表面黄白色至土黄色，较光滑，略有纵皱纹，凹陷处有须根痕。质硬而脆，断面平坦，淡黄白色，角质样；晒干者类白色，有粉性。气微，味微甜。

【性味功能】甘、微苦，平。益气健脾，生津润肺。

【临床应用】用于治疗脾气虚弱、胃阴不足、食少倦怠、口干、气虚津伤而致肺虚燥咳及心悸不眠、虚热汗多等症。用量10～30克。邪实而正气不虚者慎用。

临床上用太子参复方治疗充血性心力衰竭等症。

【现代研究】含氨基酸多糖或糖苷、酚酸或鞣质、黄酮、香豆精、甾醇或三萜、太子参环酰A和B等成分。药理研究表明，太子参的水煎药液对淋巴去细胞增殖有明显的刺激作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天葵子

【别名】紫背人葵子、千年老鼠屎、野乌头子

【来源】毛茛科天葵 *Semiaquilegia adoxoides* (DC.) Makino 的块根

【植物形态】多年生小草本。块根外皮棕黑色。茎直立，1～3条，上部有分枝，被稀疏白色柔毛。基生叶为三出复叶，叶柄基部扩大呈鞘状，叶片圆形或肾形，小叶扇状菱形或倒卵状菱形，3深裂，两面无毛，下面常带紫色，小叶柄短，有细柔毛；茎生叶较小，互生。花单生叶腋，花柄果后伸长，中部有细苞片2枚；花小，白色；萼片5，花瓣状，卵形；花瓣5，楔形，较萼片稍短；雄蕊通常10，其中有2枚不完全发育；雌蕊3～4，子房狭长，花柱短，向外反卷，蓇葖果3～4枚，熟时开裂；种子细小，倒卵形。花期3～4月，果期5～6月。

【生境分布】主产于江苏、湖南、江西、浙江等地

【采收加工】5～6月间挖块根，除去须根，晒干

【药材性状】不规则短块状、纺锤状或块状，略弯曲，长1～3厘米，直径0.5～1厘米。表面暗褐色至灰黑色，具不规则的皱纹及须根或须根痕。顶端常有茎叶残基，外被数层黄褐色的鞘状鳞片。质较软，易折断，断面皮部类白色，木部黄白色或黄棕色，略呈放射状状。气微，味甘、微苦辛。

【性味功能】甘、苦，寒。清热解毒、消肿散结

【临床应用】用于治疗热毒壅结所致之痈肿疔疮、瘰疬、痔疮，以及疝气、跌打肿痛、毒蛇咬伤等。用量9～15克。

【现代研究】含生物碱、内酯、香豆精、酚性成分及氨基酸等成分。本品100%煎剂用平板纸片法，对金黄色葡萄球菌有抑制作用。断面置于紫外光（365纳米）下观察，显黄白色荧光，加酸或碱后荧光减退。取粉末1克，加入70%乙醇10毫升，加热回流半小时，滤过，滤液蒸干，残渣加盐酸溶液（1%）5毫升溶解，滤过，滤液分置两试管中，一管中加碘化铋钾试液1～2滴，生成橘红色沉淀；另一管中加硅钨酸试液1～2滴，生成黄色沉淀。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天南星

【别名】独角莲、狗爪半夏、虎掌南星

【来源】天南星科植物异叶天南星 *Arisaema heterophyllum* Bl. 的块茎

【植物形态】多年生草本。块茎近球状或扁球状，叶鸟趾状全裂长圆形、倒披针形或长圆状倒卵形，先端渐尖，基部楔形，中央裂片最小。雌雄异株或同株，总花梗等长或稍长于叶柄，佛焰苞绿色，下部筒状，花序轴先端附属物鼠尾状。浆果红色。种子棒状，黄色，具有红色斑点。花期4～5月，果期6～7月。

【生境分布】生于林下、灌丛中阴湿地。分布于江苏、安徽、浙江等地。

【采收加工】秋、冬二季采挖，除去残茎、须根及外皮，晒干；或晒至半干时，用硫黄熏一次，则色白，易干。亦有用明矾水浸泡，待色白后去皮晒干者，此法外皮易于脱落。

【药材性状】稍扁的圆球形，直径1.5～4厘米。表面淡黄色至淡棕色，中心茎痕深陷，呈凹状，周围有一圈1～2列显著的根痕，周边偶有少数微凸起的小侧芽，有的已磨平。质坚硬，断面白色粉性，微麻舌刺喉。

【性味功能】苦、辛，温，有毒。燥湿化痰、祛风止痉、消肿散结。

【临床应用】用于治疗中风痰瘫、口眼歪斜、半身不遂、癫痫、惊风、破伤风、风痰眩晕、喉痹、瘰疬、痈肿、跌扑折伤、蛇虫咬伤等。

炮制后内服用量3～9克；或入丸、散。外用研末撒或调敷。孕妇忌服。配人参、菖蒲汤或麦门冬汤，用于治疗风痫。

【现代研究】主要化学成分有三萜皂苷、安息香酸、淀粉及D-甘露醇及16种氨基酸及钙、磷、铁、铝、锌等多种微量元素。药理研究表明，有明显的镇静镇痛和抗惊作用，抗心律失常作用、祛痰作用，并对宫颈癌、皮肤癌、食管癌等有一定的抑制作用。经证明D-甘露醇可能是其抗癌的有效成分。天南星可望被研究开发成抗癌的有效药物，也可为抗癫痫的辅助药。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乌药

【别名】天台乌药、台乌、台乌药

【来源】樟科植物乌药 *Lindera aggregata* (Sims) Kosterm. 的块根。

【植物形态】常绿灌木或小乔木。根木质，膨大粗壮，略呈念珠状。树皮灰绿色。小枝幼时密被锈色短柔毛，老时平滑无毛；茎枝坚韧，不易断。叶互生，革质，椭圆形至倒卵形，先端渐尖或尾状渐尖，基部圆形或广楔形，全缘，上面绿色，有光泽，除中脉外，均光滑无毛，下面灰白色，被淡褐色长柔毛，后变光滑，基出三脉，极明显；叶柄短有短柔毛。伞形花序腋生，几无总梗；小花梗被毛，簇生多数小花；花单性，雌雄异株，黄绿色；花被广椭圆形，雄花有雄蕊9枚，排成3轮，最内一轮的基部有腺体；雌花有退化雄蕊多枚，子房上位，球形，1室，胚珠1枚。核果近球形，初绿色，成熟后变黑色。花期3～4月，果期9～10月。

【生境分布】生于向阳山坡灌木林中或林缘以及山麓、旷野等处。分布于江苏、安徽、浙江等地。

【采收加工】冬、春二季采挖；以初夏采者粉性大，质量好。挖取后，除去须根，洗净晒干，商品称为“乌药个”。如刮去栓皮、切片，烘干者，称为“乌药片”。

【药材性状】根纺锤形，略弯曲，有的中部收缩成连珠状，称“乌药珠”，长5～15厘米，直径1～3厘米。表面黄棕色或灰棕色，有细纵纹及稀疏的细根痕，有的中有环状裂纹。质极坚硬，不易折断，断面瓷白色，气芳香，味微苦、辛，有清凉感。乌药片近圆形，厚1～5毫米或更薄，切面黄白色至淡黄色而微红，有放射性纹理（木射线）和环纹（年轮）。


【性味功能】辛，温。顺气，开郁，散寒，止痛。

【临床应用】用于治疗气逆胸腹胀痛、宿食不消、反胃吐食、寒疝、脚气、小便频数等。用量3～9克；磨汁或入丸、散。

【现代研究】主要含挥发油成分，含多种倍半萜类成分，有一些属于桉烷的生物碱，有一些属于乌药烷的衍生物；此外，还含有生物碱。有增强胃肠活动、止痛、止血、保肝、抗菌、平喘、抗癌等药理作用。其兴奋中枢、改善血流等作用值得研究。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丹　参

【别名】血生根、大红袍、红丹参

【来源】唇形科植物丹参 *Salvia miltiorhiza* Bge. 的根

【植物形态】多年生草本，全株密被黄白色柔毛及腺毛　根细长圆柱形，外皮朱红色。茎直立，方形，表面有浅槽，单数羽状复叶，对生，有柄；顶端小叶最大，小叶片卵形、广披针形，下面密被白色长柔毛，脉上尤密　总状花序，顶生或腋生，小苞片披针形；花萼带紫色，长钟状，先端二唇形；花冠蓝紫色，二唇形；发育雄蕊2，花丝杆状，退化雄蕊2，花药退化成花瓣状；子房上位，花柱伸出花冠外，柱头2裂，带紫色　小坚果，椭圆形，黑色　花期5～8月，果期8～9月

【生境分布】生于山坡草地、林下、溪旁等处　分布于辽宁、河北、河南等地

【采收加工】自11月上旬至第二年3月上旬均可采收，以11月上旬采挖最宜　将根挖出，除去泥土、根须，晒干

【药材性状】丹参根茎部粗短，上方有时有茎基残留，下方着生多数细长的根　根略呈细长圆柱形，稍弯曲，有的分枝，并具须根细根　全根长10～20厘米，直径3～10毫米，表面棕红色或砖红色，粗糙，具不规则的纵皱，外皮有的呈鳞片状剥落　质坚硬，易折断，折断面疏松有裂隙或略平整而致密，皮部色较深，紫黑色或砖红色，木部导管束灰黄色或黄白色，放射状排列　气微弱，味微苦

【性味功能】苦，微寒　祛瘀止痛，活血通经，清心除烦

【临床应用】用于治疗心绞痛、月经不调、痛经、经闭、血崩带下、癥瘕、积聚、瘀血腹痛、胸胁疼痛，惊悸不眠、恶疮肿毒等

用量5～20克；或入丸、散　外用煎膏涂，或煎水熏洗

【现代研究】主要有效成分可分为两类：即脂溶性丹参酮类（脂溶性二萜醌类）和水溶性酚酸成分　前者有抗菌、抗炎、治疗冠心病等疗效；后者有改善微循环、抑制血小板凝聚、减少心肌损伤和抗氧化等作用　均可用高效液相色谱法进行含量测定　有抗氧化、改善心脑血管和微循环、抗肿瘤、护肝、抗菌、镇静等药理作用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

半　夏

【别名】三叶半夏、三步跳、麻芋子

【来源】天南星科植物半夏 *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit. 的块茎

【植物形态】多年生草本。块茎近球形。叶出自块茎顶端，在叶柄下部内侧生一白色珠芽；一年生的叶为单叶，卵状心形；2～3年后，叶为3小叶的复叶，小叶椭圆形至披针形，中间小叶较大，两侧的较小，先端锐尖，基部楔形，全缘，两面光滑无毛。肉穗花序顶生，花序梗常较叶柄长；佛焰苞绿色；花单性，无花被，雌雄同株；雄花着生在花序上部，白色，雄蕊密集成圆筒形，雌花着生于雄花的下部，绿色；花序中轴先端附属物延伸呈鼠尾状，直立伸出在佛焰苞外。浆果卵状椭圆形，绿色。花期5～7月，果期8～9月。

【生境分布】生于山坡草地、荒地、包谷地、田边、河边及疏林下。除内蒙古、新疆、西藏外，全国各地均有分布。

【采收加工】夏、秋二季均可采挖，洗净泥土，除去外皮和须根，晒干或烘干。

本品生用有毒，用前须炮制。炮制品有：生半夏、清半夏、姜半夏、法半夏等。

【药材性状】类球形，有的稍偏斜，直径0.8～1.5厘米。表面白色或浅黄色，顶端中心有凹陷的茎痕，周围密布棕色凹点状的根痕；下端钝圆，较光滑。质坚实，断面白色，富粉性。气微，味辛辣、麻舌而刺喉。

【性味功能】辛，温，有毒。燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结。


【临床应用】用于治疗湿痰冷饮、呕吐、反胃、咳喘痰多、胸膈胀满、痰厥头痛、头晕不眠等。

内服用量3～9克；或入丸、散。外用研末调敷，以消痈肿。半夏泻肝汤可治疗各种吐泻。

【现代研究】含挥发油，内含3-乙酰氨基-5-甲基异唑等60多种成分及16种氨基酸和多种无机元素。其中，所含的草酸钙针晶为半夏的刺激性成分之一，经炮制后，晶形发生变化，含量急剧下降，刺激性明显减弱。有镇咳、镇吐、抗早孕、抗矽肺等药理作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

玉竹

【别名】地管子、尾参、铃铛菜

【来源】百合科植物玉竹 *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce 的根茎

【植物形态】多年生草本。地下根茎横走，黄白色，密生多数细小的须根。茎单一，自一边倾斜，光滑无毛，具棱。叶互生于茎的中部以上，无柄；叶片略带革质，椭圆形或狭椭圆形，至为长圆形，先端钝尖或急尖，基部楔形，全缘，上面绿色，下面淡粉白色，叶脉隆起。花腋生；花被筒状，白色，先端6裂，裂片卵圆形或广卵形，带淡绿色；雄蕊着生于花被筒的中央，花丝扁平，花药狭长圆形，黄色；子房上位，具细长花柱，柱头头状。浆果球形，成熟后紫黑色。花期4～6月，果期7～9月。

【生境分布】生于林下或山野的阴坡。分布于山东、江苏、浙江等地，以浙江新昌质地最佳。

【采收加工】春、秋二季都可采挖，除去茎叶、须根和泥土，晾晒至外表有粘液渗出，轻擦去毛，分开大小个，继续晾晒至微黄色，进行揉搓，晾晒，如此反复数次，至茎润光亮、无硬心，再晒至足干；或将鲜玉竹蒸透后，边晒边揉，至柔软而透明时再晒干。

【药材性状】长圆柱形，略扁，少有分枝，粗细均匀，长约4～18厘米，直径0.3～1.6厘米。表面黄白色或淡黄棕色，半透明，具纵皱纹及微隆起的环节，节上残留白色圆点状须根痕，偶有圆盘状的地上茎痕。干时质硬而脆，受潮后变韧，易折断，断面角质样或显颗粒状。气微，味甘而有粘性。

【性味功能】甘，微寒。养阴润燥，生津止渴。

【临床应用】用于治疗热病阴伤、咳嗽烦渴、虚劳发热、消谷易饥、小便频数等。用量9～15克。

配何首乌、山楂等，可治疗高血脂。

【现代研究】玉竹根茎中主要含有甾体皂苷，尤其是甾体螺旋皂苷和五环萜醇的糖苷，并含有多糖、黄酮及其糖苷、多种蒽醌类化合物，以及多种氨基酸和微量元素。其中，所含的铃兰氨酸是其特征成分之一。有扩张血管、降血脂、增强免疫功能等药理作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白芷

【别名】川白芷

【来源】伞形科植物杭白芷 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. *formosana* (Boiss.) shan et Yuan. 的根

【植物形态】多年生草本。根圆锥形。茎和叶鞘均为黄绿色。叶互生；茎下部叶大，叶柄长，基部鞘状抱茎，2～3回羽状分裂，深裂或全裂，最终裂片阔卵形至卵形或长椭圆形，先端尖，边缘密生尖锐重锯齿，基部下延成柄，无毛或脉上有毛；茎中部叶小，上部的叶几仅存囊状的叶鞘。小总苞片通常比小伞梗短；复伞形花序密生短柔毛；花萼缺如；花瓣黄绿色；雄蕊5；花柱基部绿黄色或黄色。双悬果被疏毛。花期7～9月，果期9～10月。

【生境分布】生于湿地向子、灌木丛、河旁沙土中。分布于浙江、福建、台湾等地。

【采收加工】秋播种植的，当年7～9月间茎叶枯黄时采挖。春播种植的，当年10月采挖。择晴天，先割去地上部分，再挖出根部，除净残茎，须根及泥土（不用水洗），晒干或微火烘干。

【药材性状】圆锥形，长10～20厘米，直径2～2.5厘米。上部近方形或类方形，表面灰棕色，有多数较大的皮孔样横向突起，长0.5～1厘米，排列成边四纵行，体形圆而具4条棱脊，顶端有凹陷的茎痕。质硬较重，断面白色，粉性足，根上部的形成层环近方形，皮部密布棕色油点。气芳香，味辛、微苦。

【性味功能】辛，温。散风除湿，通窍止痛，消肿排脓。

【临床应用】用于治疗头痛，眉棱骨痛，齿痛，鼻渊，寒湿腹痛，肠风痔漏，赤白带下，痈疽疮疡，皮肤燥痒，疥癣等。用量3～9克。外用研末撒或调敷。

【现代研究】杭白芷主要含有挥发油和呋喃香豆素，其中从挥发油中鉴定出了56种成分。可用薄层扫描法或高效液相色谱法测定其中氧化前胡素、欧前胡素、异欧前胡素的含量。有镇痛、解热、抗炎、抗菌等药理作用，外用能提高皮肤对紫外线的敏感性。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com







更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白 术

【别名】于术、冬术、浙术

【来源】菊科植物白术 *Atractylodes macrocephala* Koidz. 的根茎。

【植物形态】多年生草本。根茎粗大，略呈拳状。茎直立，上部分枝，基部木质化，具不明显纵槽。单叶互生；叶片3深裂，偶为5深裂，椭圆形至卵状披针形，先端渐尖，基部渐狭下延成柄状，叶缘均有刺状齿。上面绿色，下面淡绿色，叶脉凸起显著。头状花序顶生；总苞钟状，膜质，覆瓦状排列；基部叶状苞一轮包围总苞；花多数，着生于平坦的花托上；花冠管状，淡黄色，紫色先端5裂；雄蕊5，花药线形，花丝离生；雌蕊1，子房下位，密被淡褐色绒毛，花柱细长，柱头头状。瘦果长圆状椭圆形，微扁，被黄白色绒毛，冠毛羽状。花期9～10月，果期10～11月。

【生境分布】生于山坡、林边及灌木林中。分布于安徽、浙江、江西等地。

【采收加工】霜降至立冬采挖，除去茎叶和泥土，烘干或晒干，再除去须根即可。烘干者称“烘术”；晒干者称“生晒术”，亦称“冬术”。

【药材性状】根茎略呈圆柱状块形，下部两侧膨大，长3～12厘米，直径2～7厘米。表面灰黄色或灰棕色，有瘤状突起及断续的纵皱纹和沟纹，并有须根痕，顶端有残留的茎基和芽痕。质坚实，不易折断，断面不平坦，淡黄色至淡棕色，并有棕色油室散在。烘干者断面角质样，色较深，有裂隙。气清香，味甜微辛，嚼之略带粘液性。


【性味功能】甘、苦、温。健脾、益气、燥湿利水、止汗、安胎。

【临床应用】用于治疗脾胃气弱，不思饮食，痞怠少气，虚胀，泄泻，痰饮，水肿，黄疸，湿痹，小便不利，头晕，自汗，胎气不安等。用量6～12克。

【现代研究】主要含有挥发油，挥发油中的主要成分为苍术酮。白术中还分得一种多糖——甘露聚糖AM-3，有免疫增强作用。可应用薄层扫描法测定白术中苍术酮的含量。有明显且持久的抗利尿作用，对小鼠艾氏腹水癌、淋巴肉瘤腹水瘤及人109食管癌都有显著的抑制作用；对胃肠系统有双向调节作用，能抗胃溃疡；此外，还有解痉、保肝、抗菌等药理作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白芍

【别名】金芍药、山芍。

【来源】毛茛科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall. 的根

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白 及

【别名】连及草、地螺丝、石拿荠。

【来源】兰科植物白及 *Bletilla striata* (Thunb.) Reichb. f. 的块茎。

【植物形态】多年生草本。块茎肥厚肉质，为连接的三角状卵形厚块，略扁平，黄白色；须根灰白色、纤细。叶披针形或广披针形，先端渐尖，基部下延成长鞘状，全缘。总状花序顶生，疏生；苞片披针形；花淡紫色或黄白色，花被片狭椭圆形，先端尖，唇瓣倒卵形，内面有5条隆起的纵线，上部三裂，中央裂片矩圆形；雄蕊与雌蕊结合为蕊柱，两侧有狭翅，柱头顶端着生1雄蕊；子房下位，圆柱状，扭曲。蒴果圆柱形，两端稍尖狭，具6条纵肋。花期4～5月，果期7～9月。

【生境分布】生于山野、山谷较潮湿处。分布于河北、河南、安徽等地。

【采收加工】8～11月采挖，除去残茎、须根，洗净泥土，经蒸煮内血无白心，然后撞去粗皮，再晒干或烘干。

【药材性状】不规则扁圆球形或菱形，有2～3个分歧似掌状，长1.5～5厘米，厚0.5～1.5厘米。表面灰白色或黄白色，有细纵纹，下面有凹起的茎痕，下面有连接另一块茎的痕迹；以茎痕为中心，有数个棕褐色同心环纹，环上残留棕色点状的须根痕，质坚硬，不易折断，断面类白色，半透明，角质样，可见散在的点状维管束。无臭，味苦，嚼之有粘性。

【性味功能】苦、甘、涩。收敛止血、消肿生肌。


【临床应用】用于治疗肺伤咳血、衄血、金疮出血、痈疽肿毒、溃疡疼痛、汤火灼伤、手足皲裂等。

内服用量6～15克；研末吞服，每次3～6克。外用适量，研末撒或调涂。单用可治疗各种内外出血。

【现代研究】含白及胶质，由4分甘露糖和1份葡萄糖组成的葡配甘露聚糖。新鲜白及中含淀粉、葡萄糖、粘液质和蒽醌类化合物大黄素甲醚。有止血、抑菌、预防肠粘连等药理作用。白及的粘液质属弹性胶，可作阿拉伯胶及黄芪胶的代用品，可供混悬及乳化剂用，也可以代替淀粉作药片的乳化剂。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白前

【别名】竹叶白前、草白前、鹅管白前。

【来源】萝摩科植物芫花叶白前 *Cynanchum glaucescens* (Decne.) Hand.-Mazz. 的根及根茎。

【植物形态】多年生草本，茎直立，幼枝被棕色毛茸。叶对生，几无柄；叶片椭圆形，先端圆或锐尖，基部楔形，全缘。聚伞花序腋；花萼黄绿色，近于全裂；花冠黄白色，深5裂；副花冠5，黄绿色；雄蕊5，药隔盖蕊柱先端；子房上位，心皮2，花柱2。蓇葖果1～2，狭长卵形。花期8月，果期9～10月。

【生境分布】生于江边河岸及沙石间，主产于江苏、浙江、安徽等地。

【采收加工】8月间挖根，或拔起全株，割去地上部分，洗净，晒干。

【药材性状】根茎圆柱形，较短小，或略呈块状；表面灰绿色或淡黄色，平滑或有细纵纹。节明显，节间长1～2厘米，质地较坚硬，折断面中空，髓腔较小。节上簇生纤细弯曲的根，细根稍粗长，直径约1毫米，分枝的细根少，质脆，易折断。

【性味功能】辛、苦，微温。降气、消痰、止咳。


【临床应用】用于治疗肺气壅、咳嗽、多痰等。用量3～9克。

【现代研究】含三萜皂甙，已分离得芫花叶白前甙元A、B和芫花白前甙元C-单黄夹竹桃糖甙，另得芫花白前甙H、I、J等。有镇咳、祛痰、平喘、抗炎等药理作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

仙茅

【别名】地棕、独干、仙茅参。

【来源】石蒜科植物仙茅 *Curculigo orchioides* Gaertn. 的根茎

【植物形态】多年生草本。根茎延长，圆柱状，肉质，外皮褐色；根粗壮，肉质。地上茎不明显。叶狭披针形，先端渐尖基部下延成柄，再向下扩大呈鞘状，绿白色，边缘膜质；叶脉明显，有中脉；两面疏生长柔毛，后渐光滑。花腋生；花梗藏在叶鞘内；花杂性，上部为雄花，下部为两性花；苞片披针形，绿色，膜质，被长柔毛；花被下部细长管状，上部六裂，裂片披针形，内面黄色，外面白色，有长柔毛；雄蕊6，花丝短；子房狭长，被长柔毛。蒴果椭圆形，稍肉质，先端有喙，被长柔毛，种子稍呈球形，亮黑色，有喙，表面有波状沟纹。

【生境分布】生于海拔1 600米的林下草地或荒地上。分布于浙江、福建、江西等地。

【采收加工】2～4月发芽前或7～9月茎枯萎时挖取根茎，洗净，除去须根和根头，晒干；或蒸后晒干。

【药材性状】根茎圆柱形，略弯曲，长3～10厘米，直径0.4～0.8厘米。表面黑褐色或棕褐色，粗糙，有纵抽沟及横皱纹与细孔状的粗根痕。质硬脆，易折断，断面平坦略呈角质状，淡褐色或棕褐色，近中心处色较深，并有一深色环。气微香，味微苦辛。

【性味功能】辛，热，有小毒。补肾阳、强筋骨、祛寒湿。

【临床应用】用于治疗阳痿精冷、小便失禁、崩漏、心腹冷痛、腰脚冷痹、痈疽、瘰疬等。用量3～9克。

配金樱子根、果实，可治阳痿、耳鸣。

【现代研究】主要含多种环木菠萝烷型三萜及其糖苷、甲基苯酚和氯代甲基苯酚的多糖苷类。采用HPLC法测定仙茅中仙茅苷的含量。药理研究表明，仙茅有雄激素样和适应原样作用，有抗衰老作用，并能增强免疫功能。仙茅有一定的毒性，一般可用米泔水浸泡后除去红水则毒减。近年来对其成分及作用有较多的研究，基本药理皆为广强壮作用，单用有效，亦入复方中用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

羊蹄

【别名】东方宿、败毒菜根、土大黄。

【来源】蓼科植物羊蹄 *Rumex japonicus* Houtt. 的根。

【植物形态】多年生草本，根粗大黄色。茎直立。根生叶丛生，有长柄，叶片长椭圆形，先端钝，基部圆或带楔形，边缘呈波状；茎生叶较小，有短柄。总状花序顶生，每节花簇略下垂；花被6，淡绿色，外轮3片展开，内轮3片成果被；果被广卵形，有明显的网纹，背面各具一卵形犹状突起，其表有细网纹，边缘具不整齐的微齿；雄蕊6，成3对；子房具棱，1室，1胚珠，花柱3柱头细裂。瘦果三角形，先端尖，角棱锐利，褐色，光亮。有3片增大的果被包覆。花期4月，果熟期5月。

【生境分布】全国大部分地区均有分布。

【采收加工】8～9月采挖，洗净，切片，晒干。生用或鲜用。

【药材性状】长圆锥形，长6～18厘米，直径0.8～1.8厘米，根头部有茎基残余及支根痕。根部表面棕黄色或黄棕色，具纵皱纹及横向突起的皮孔样疤痕。质硬，易折断，折断面黄灰色，颗粒性。有特殊香气，味微苦涩。

【性味功能】苦，寒，有小毒。清热、通便、利水、止血、杀虫。

【临床应用】用于治疗大便燥结、淋浊、黄疸、吐血、肠风、功能性子宫出血、疥癣、痈肿、跌打损伤等。

用量10～15克。脾胃虚寒，泄泻少食者慎用。外用适量，煎水洗。

【现代研究】含大黄酸、大黄毒等成分。具有止血作用；本品酊剂对多种致病真菌有一定的抑制作用；对急性单核细胞型及急性淋巴细胞型白血病有抑制作用；并有轻度导泻作用。因含有与大黄类似成分，抑菌消炎作用较好，特别值得注意的是本品对白血病的疗效，自20世纪70年代以来，许多地区用治急性白血病皆有一定疗效。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

羊乳

【别名】山海螺、四叶参。

【来源】桔梗科植物羊乳 *Codonopsis Lanceolata* (Sieb.et Zmcc.) Trautv.的根。

【植物形态】多年生草质或基部稍木质的缠绕藤本，全株无毛或茎叶偶被疏柔毛，有白色乳汁，根肥大，纺锤状，灰黄色，散布横生皮孔。单叶，生于茎下的小，互生；生于小枝上的常3或4片簇生枝顶，具短柄，叶片柔软，菱状卵形、狭卵形成椭圆形，长3～10厘米，宽1.5～4厘米。花夏季开放，黄绿色或白色，有紫斑，1或2朵生于枝顶，花梗常很长，约1～9厘米，萼筒部半球状，檐部5裂，裂片卵状三角形，长1.3～3厘米；花冠阔钟状，长2～4厘米，径2～3.5厘米，檐部5浅裂，裂片三角形，反卷；雄蕊具钻状花丝。蒴果下半部半球状，顶部有喙；种子小，有翅。

【生境分布】生于山野沟溪边或林下，喜稍荫湿的环境，分布于我国东部、中南部等地。

【采收加工】秋季采收，挖取根，除去须根及残茎，晒干或晒至半干时，每天搓揉一次，直到全干，或趁鲜切片，晒干。

【药材性状】呈纺锤形，倒卵状纺锤形或近圆柱形，不分枝或稍有分枝，长6～15厘米，直径2～6厘米，灰棕色或灰黄色，有深的皱缩纵纹和许多芽眼，顶端具茎的残迹，其下有密集而明显的环纹，向下环纹渐稀疏。质稍松脆，易折断，断面不平坦，多孔状裂隙，切片大小不一，切开面灰黄色或浅棕色，皮部与木部无明显区分。气微，味甜、微苦。

【性味功能】甘，温。补血通乳、清热解毒、消肿排脓。

【临床应用】用于治疗病后体虚、乳汁不足、痈肿疮毒、乳腺炎等。用量15～30克。

用量10～15克。脾胃虚寒、泄泻少食者慎用。外用适量，煎水洗。

【现代研究】本品与党参同属，含多糖类成分，可增强机体免疫力。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

百部

【别名】山百根、九十九条根、一窝虎

【来源】百部科植物直立百部 *Stemona sessilifolia* (Miq.) Miq. 的块根

【植物形态】多年生草本。块根簇生，肉质，纺锤形。茎直立，不分枝。叶3～4片轮生；叶片卵形至椭圆形，叶脉5～7条，中间3条明显。花单生，淡绿色，多数生于茎下部鳞叶腋内，花梗细长；花被片4，卵状披针形；雄蕊4；子房卵形。蒴果。花期4～5月，果期7月。

【生境分布】生于山地林下。主产于浙江、江苏、安徽等地。

【采收加工】春季新芽出土前及秋季茵将枯萎时挖取，洗净泥土，除去须根，在沸水中略烫或蒸至无白心，晒干。

【药材性状】根大多单个存在，也有多个簇生于结节状的根茎上。块根呈纺锤形，上端较细长，皱缩弯曲，长5～17厘米，直径0.5～1厘米。表面黄白色或土黄色，有不规则深纵沟，偶尔有横皱纹。质脆，受潮后易软韧，断面平坦，角质样，淡黄棕色或黄白色，皮部宽广，中柱扁缩。气微，味甘、微苦。

【性味功能】甘、苦，微温。润肺下气止咳、杀虫。

【临床应用】用于治疗风寒咳嗽、百日咳、肺结核、老年咳喘、蛔虫、蛲虫病、皮肤疥癣、湿疹等。用量3～9克。

【现代研究】含百部碱、原百部碱、百部定碱、异百部定碱、对叶百部碱、霍多林碱、直立百部碱等。百部总生物碱的含量测定方法有HPLC法、容量法（以对叶百部碱计算）、酸性染料比色法。有抗菌、抗病毒、镇静、镇痛、杀虫等药理作用。特别是对多种寄生虫有直接杀灭作用，如头虱、体虱、阴虱、蛲虫等，并能杀死多种家作物害虫。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

百　合

【别名】白百合

【来源】百合科植物百合 *Lilium brownii* F. E. Brown var. *viridulum Baker* 的鳞茎。

【植物形态】多年生草本　鳞茎球状，白色，肉质，先端常开放如荷花状，下面着生多数须根　茎直立，圆柱形，常有褐紫色斑点　叶互生，无柄，叶片线状披针形至长椭圆形状披针形，先端渐尖，基部渐狭，全缘或微波状，叶脉平行　花大，单生于茎顶；花被6片，乳白色或带淡棕色，倒卵形；雄蕊6，花药线形，丁字着生；雌蕊1，子房圆柱形，3室每室有多数胚珠，柱头膨大，盾状　蒴果长卵圆形，室间开裂，绿色；种子多数　花期5～7月，果期8～10月。

【生境分布】生于山坡林下或溪沟　分布于江苏、安徽、浙江等地

【采收加工】秋、冬采挖，除去地上部分，洗净泥土，剥取鳞片，用沸水捞过或微蒸后，焙干或晒干。

【药材性状】鳞片长椭圆形，顶端较尖，基部较宽，边缘薄，微波状，常向内卷曲。长1.5～3厘米，宽0.5～1厘米，厚约4毫米　表面乳白色或淡黄棕色，光滑，半透明，有纵直的脉纹3～8条　质硬脆，易折断，断面较平坦，角质样。无臭，味微苦。

【性味功能】甘、寒。养阴润肺、清心安神

【临床应用】用于治疗肺痨久嗽、咳唾痰血；热病后余热未清、虚烦惊悸、神志恍惚；脚气浮肿等　用量4.5～9克

【现代研究】含有多种甾体糖苷、多种生物碱及其糖苷、酚酸甘油酯及内酸酯衍生物。有止咳、祛痰、平喘、镇静、抗疲劳、抗缺氧、抗过敏、抗胃溃疡等药理作用；百合所含的秋水仙碱，为已知的治癌成分，对癌细胞的有丝分裂有抑制作用，可使其停止在分裂中期，临床可用于治疗肺癌等肿瘤。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

地榆

【别名】山红枣、白地榆、马连鞍蓍。

【来源】蔷薇科植物地榆 *Sanguisorba officinalis* L. 的根。

【植物形态】多年生草本。根茎粗壮，生多数肥厚的纺锤形或长圆柱形的根。茎直立，有棱。单数羽状复叶，互生；根生叶较茎生叶大，具长柄，茎生叶近于无柄，有半圆形环抱状托叶，托叶边缘具三角状齿；小叶椭圆形至长卵圆形，先端尖或钝圆，基部截形、阔楔形或略似心形，边缘具尖圆锯齿，小叶柄短或几无柄。花小，密集成倒卵形，短圆柱形或近球形的穗状花序，疏生于茎顶；花序梗细长、光滑或稍被细毛；花暗紫色，苞片膜质，披针形，被细柔毛；花被4裂，裂片椭圆形或广卵形；雄蕊4，着生于花被筒的喉部，花药黑紫色；子房上位，卵形有毛，花柱细长，柱头乳头状。瘦果椭圆形或卵形，褐色，有4纵棱，呈狭翅状。种子1枚。花、果期6～9月。

【生境分布】生于山坡、林缘、草原、草甸、灌丛及田边等地。分布于江苏、浙江、江西等地。

【采收加工】春季发芽前或秋季茁枯萎后采挖，除去残茎及须根，洗净晒干。

【药材性状】圆柱形，中、下部常膨大成不规则纺锤形，稍弯曲，长5～20厘米，直径0.3～2厘米。表面棕色至暗棕紫色，粗糙，有多数纵皱纹，有时带少数细根。质硬脆，折断面较平坦，粉红色或淡黄色，木部色淡，呈放射状纹理。气微，味微苦而涩。


【性味功能】苦、酸、涩，微寒。凉血止血、解毒敛疮。

【临床应用】用于治疗吐血、衄血、血痢、崩漏、痔漏、痈肿、湿疹、烧伤等。用量9～15克。外用适量，捣汁或研末掺。

【现代研究】含多种三萜及其皂苷、酚酸性化合物、黄酮类成分等。药理研究表明，地榆中含多量的鞣质，地榆有明显的止血作用，对常见致病菌有较强的抑制作用，对烧伤、烫伤和炎症有良好的治疗效果，并有止吐、抗衰老等药理作用。临床上用伤寒和湿疹取得较好疗效，外用治湿疹及湿疹样皮类值得推广。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

红大戟

【别名】红芽大戟、红萝卜、京大戟

【来源】茜草科植物红大戟 *Knoxia valerianoides* Thorel et Pitard 的根

【植物形态】多年生草本。块根纺锤形，1～3个。茎稍呈蔓状，具槽。叶对生；叶片长椭圆形或线状披针形，叶脉被疏柔毛；托叶2～4裂，裂片钻形。顶生聚伞花序，花小，多为淡紫红色或有时白色；花萼4齿裂；花冠筒状漏斗形，先端4裂；雄蕊4，果实小，卵形或椭圆形，有4～8棱。花期8～9月，果期10～11月。

【生境分布】生于低山坡草丛中的半阴半阳处。主产于福建、广东、广西、云南、四川等地。

【采收加工】秋末茎苗枯萎后或春季发芽前采挖，除去残茎及根须，晒干；或洗净后用开水略烫，更易晒干。本品鲜时易霉变，要及时干燥。

【药材性状】块根长圆锥形或长圆锥形，多不分枝，稍弯曲，长3～12厘米，直径0.6～1.2厘米。表面棕红色或灰棕色，有扭曲的纵皱纹；顶端可见茎痕。质坚实而易折断，断面皮部红褐色，木部棕黄色。气微，味辛。

【性味功能】苦、寒。有小毒。泻水逐饮，解毒消肿散结。

【临床应用】用于治疗水肿、胸胁停饮、痈肿疮疡、瘰疬痰核等。用量1.5～3克；入丸散服，每次1克。外用适量。

内服宜醋制以减轻毒性。脾弱者及孕妇忌用。不宜与甘草同用。

【现代研究】含蒽醌成分。根中蒽醌类化合物的含量据分析，总蒽醌为0.22%，其中结合型为0.1%，游离型为0.12%。本品乙醚和热水提物能刺激肠管而导泻；能兴奋妊娠离体子宫；扩张毛细血管，对抗肾上腺素有升压作用；动物实验证明，配甘草会使毒性增强。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

延胡索

【别名】延胡、元胡索。

【来源】罂粟科植物延胡索 *Corydalis yanhusuo* W. T. Wang 的块茎。

【植物形态】多年生草本。块茎球形。地上茎短，纤细，稍带肉质，在基部之上生1鳞片。基生叶和茎生叶同形，有柄；茎生叶为互生，二回三出复叶，第2回往往分裂不完全而成深裂状，小叶片长椭圆形、长卵圆形或线形，先端钝或锐尖，全缘。总状花序，顶生或对叶生；苞片阔披针形；花红紫色，横着于纤细的小花梗上；花萼早落；花瓣4，外轮2片稍大，边缘粉红色，中央青紫色，上部1片，尾部延伸成长距，距长约占全长的一半，内轮2片比外轮2片狭小，上端青紫色，愈合，下部粉红色；雄蕊6，花丝连合成两束，每束具3花药；子房扁柱形，花柱细短柱头2，似小蝴蝶状。蒴果。花期4月，果期5～6月。

【生境分布】生于沿溪两岸或山脚的近中性或微酸性的沙质壤土或沙土中。分布于浙江、江苏、安徽等地。

【采收加工】5～6月间当茎叶枯萎时采挖。挖取后，洗净，分别大小，放入开水中略煮至块茎内部中心有芝麻样小点时为度，立即捞起晒干。

【药材性状】不规则扁圆形，有的呈倒圆锥形，直径0.5～2厘米。表面灰黄色或黄棕色，有不规则网状细皱纹，表皮脱落处显灰棕色，上端凹陷，有茎痕，底部中央稍凹陷呈脐状，也有底部略呈圆锥状突起。质坚硬，碎断面金黄色或黄棕色，角质样。气微，味苦。

【性味功能】辛、苦，温。活血、利气止痛。

【临床应用】用于治疗心腹腰膝诸痛、月经不调、产后血晕、恶露不尽、跌打损伤等。用量3～9克，孕妇忌用。

【现代研究】分离得到了20多个生物碱，包括延胡索甲素、延胡索乙素、延胡索丙素、延胡索丁素等，其中延胡索乙素是其主要的镇静、镇痛成分。药理研究表明，其总碱的镇痛效价为吗啡的40%，其中以延胡索乙素最强；还有催眠镇静和安定作用、抗脑缺血作用；能增加冠状动脉流量，扩张外周血管、降压、降脂；能保护胃溃疡功能。去氧延胡索甲素对胃及十二指肠溃疡有疗效。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

防己

【别名】汉防己、石蟾蜍、白木香

【来源】防己科植物粉防己 *Stephania tetrandra* S. Moore 的块根

【植物形态】多年生缠绕藤本　根圆柱状，有时呈块状，外皮淡棕色或棕褐色。茎柔韧，圆柱形，有时稍扭曲，具细条纹，枝光滑无毛，基部稍带红色　叶互生，质薄较柔，叶柄盾状着生，长与叶片相等；叶片外形近圆形，先端锐尖，基部截形或稍心形，全缘，两面均被短柔毛，上面绿色，下面灰绿色　花小，雌雄异株，为头状的聚伞花序；雄花花萼4，肉质，三角状，基部楔形，外面被毛，花瓣4，略呈半圆形，边缘微向内弯，具爪，雄蕊4花药近圆形；雌花的花萼、花瓣与雄花同数，无退化雄蕊，心皮1，花柱3枚。核果球形　花期5～6月，果期7～9月

【生境分布】生于山坡、丘陵地带的草丛及灌木林的边缘，分布于江苏、安徽南部、浙江等地。

【采收加工】秋季采挖，洗净或刮去栓皮，切成长段，粗根纵剖为2～4瓣，晒干。

【药材性状】不规则圆柱形，半圆柱形块状或块片状，常弯曲如结节状，长3～10厘米，直径1～6厘米　去栓皮的药材表面淡灰黄色，可见残留的黑褐色栓皮，弯曲处有深陷的横沟，体重，质坚实，断面平坦，灰白色至黄白色，富粉性，有排列稀疏的放射状纹理，纵剖面浅灰白色，维管束浅棕色，呈弯曲筋脉状纹理，气微，味苦

【性味功能】苦、寒，利水消肿、祛风止痛

【临床应用】用于治疗水肿、小便不利、风湿痹痛、下肢湿热、癣疥疮肿等　用量4.5～9克。

【现代研究】含多种生物碱，其中主要为粉防己碱、去甲基粉防己碱、轮环藤酚碱、氧化防己碱等　可应用比色法及薄层色谱法进行总生物碱及粉防己碱、去甲基粉防己碱的含量测定　有镇痛、抗炎、抗过敏、抗肺矽、松弛横纹肌等药理作用，对心血管系统有降压、抗心肌正性肌力、扩冠、抗心律失常、抗心肌缺血、抗心室肥厚等作用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

麦　冬

【别名】沿阶草、麦门冬

【来源】百合科植物麦冬 *Ophiopogon japonicus* (Thunb.) ker-Gawl. 的块根

【植物形态】多年生草本。地下具细长匍匐枝，节上被膜质苞片，须根常有部分膨大成肉质的块根。叶丛生，窄线形，先端钝或锐尖，基部狭窄，叶柄鞘状，两侧有薄膜。总状花序顶生；苞片膜质，每苞腋生1～3花；花淡紫色，偶为白色，形小，略下垂；花被6片，开展，卵圆形；雄蕊6，花丝不明显，较短于花药，花药先端尖；子房半下位，3室。浆果，球状，早期绿色，成熟时深绿色或黑蓝色。花期5～8月，果期7～9月。

【生境分布】生于海拔2 000米以下的山坡阴湿处、林下或溪旁。分布于山东、安徽、浙江等地。

【采收加工】浙江于栽培后第三年立夏时采挖，称"杭麦冬"。麦冬挖起后，剪下块根，洗净泥土，晒3～4天，堆通风处，使其反潮，蒸发水气，约3日，摊开再晒，如此反复2～3次。晒干后，除净须根杂质即可。

【药材性状】块根纺锤形或长圆形，两端略尖，中部充实或略收缩，长1.5～3厘米，直径3～6厘米。表面黄白色或淡黄色，有不规则的纵皱纹。未干透时，质较柔软，干后质硬脆，易折断；折断面黄白色，角质样，中央有细小中柱。气微香，味微甜。


【性味功能】甘、微苦，微寒。养阴生津、润肺清心。

【临床应用】用于治疗肺燥干咳、吐血、肺萎、肺痈、虚劳烦热、消渴、热病津伤、咽干口燥、便秘等。用量6～12克。

【现代研究】含多种甾体皂苷，其中麦冬皂苷A含量最高，麦冬皂苷B次之；此外含多种高异黄酮类化合物。从浙麦冬中还分离鉴定出5种黄酮类化合物。实验还证明，麦冬中的水溶性多糖有抗缺氧和免疫促进作用，麦冬有明显提高耐缺氧能力、增强免疫功能、降低血糖等药理作用。麦冬为良好的养阴润肺药，近年来发现其在降低血糖的作用较好；临床应用强心作用稳定而效果佳。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苍 术

【别名】南苍术、茅苍术、京苍术。

【来源】菊科植物茅苍术 *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. 的根茎。

【植物形态】多年生草本。根茎粗大不整齐、茎单一，圆而有纵棱，上部稍有分枝。叶互生，革质而厚；茎下部的叶多为3裂，无柄而略抱茎；茎上部叶卵状披针形至椭圆形，无柄，叶缘均有刺状齿。上面深绿，下面少带白粉状。头状花序顶生；总化托无梗，基部有叶状及细羽裂多刺苞片；总苞披针形，膜质背面绿色，边缘带紫色，并有细柔毛；花托平坦，花多数，两性花与单性花多异株；两性花有多数羽毛状长冠毛；花冠管状，白色，有时稍带红紫色，先端5裂，裂片线形；花丝分离；子房下位，长柱形，密被白色柔毛，花柱细长，柱头2裂。单性花一般为雌花，具5枚线状退化雄蕊，退化雄蕊完全分离，先端略曲卷。其余部分与两性花同。瘦果长圆形，被棕黄色柔毛。花期8～10月，果期9～10月。

【生境分布】生于山坡灌木、草丛中。分布于河南、山东、江苏、安徽等地。

【采收加工】春、秋均可采挖，以秋季为好。挖取根茎后，除去残茎、须根及泥土，晒干。

【药材性状】根茎连珠状或结节状圆柱形，偶有分歧，多弯曲，长3～10厘米，直径0.5～2厘米。表面灰棕色或黑棕色，有根痕及细小须根，并残留茎痕，节处常有缢缩的浅横凹沟。质坚实，折断面平坦，黄白色或灰白色，散有多数红棕色油点，习称“朱砂点”，暴露稍久，多数可析出白色细针状结晶。有浓郁的特异香气，味微甜而苦。


【性味功能】辛、苦，温。燥湿健脾、祛风散寒、明目。

【临床应用】用于治疗湿盛困脾、倦怠嗜卧、脘痞腹胀、食欲不振、呕吐、泄泻、痢疾、疟疾、痰饮、水肿、风寒湿痹、夜盲等。用量3～10克。

【现代研究】挥发油中主要成分有苍术素、茅术醇、榄香油醇等，并含苍术素醇、乙酰苍术醇等。还从中分得9个新的倍半萜类苷，即苍术苷A、B、C、D、E、F、G、H、I和愈木烷类化合物。有调节胃肠及抗胃溃疡、降血压、保肝利胆、抗癌、抗炎等药理作用，用苍术制成的消毒香或烟熏剂对多种病毒、多种细菌及支原体和黄曲霉素等致病真菌都有显著的灭活作用，其中能使致病真菌呈退行性变化。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

泽 泻

【别名】水泽、如意菜、水门菜。

【来源】泽泻科植物泽泻 *Alisma plantago-aquatica* L. var. *orientalis* (Sam.) Juzep. 的块茎

【植物形态】多年生沼泽植物　地下有块茎，球形，外皮褐色，密生多数须根。叶基生，叶片椭圆形至卵形，先端急尖或短尖，基部广楔形、圆形或稍心形，全缘，两面均光滑无毛。花茎由叶丛中生出，总花梗，轮生，集成大形的轮生状圆锥花序；小花梗长短不等，伞状急尖或短尖，基部广楔形，尖锐；萼片3，绿色，广卵形；花瓣3，白色，倒卵形，较萼短；雄蕊6；雌蕊多数，离生，子房倒卵形，侧扁，花柱侧生。瘦果多数，扁平，倒卵形，褐色。花期6～8月，果期7～9月。

【生境分布】生于浅沼泽地或水稻田中，喜温暖气候，多栽培于潮湿而富含腐殖质的粘质土壤中。

【采收加工】冬季采挖块茎，除去茎叶及须根，洗净，用微火烘干，再撞去须根及粗皮。

【药材性状】块茎类圆形、长圆形或倒卵形，长4～7厘米，直径3～5厘米。表面黄白色，未去尽粗皮者显淡棕色，有不规则的横向环状凹陷，并散有众多突起的须根痕，于块茎底部尤密，质坚实，破折面黄白色，颗粒性，可见多数细孔，并可见纵横散生的棕色维管束。气微香，味微苦。

【性味功能】甘，寒　利小便，清湿热。

【临床应用】用于治疗小便不利、水肿胀满、呕吐、泻痢、痰饮，脚气、淋病、尿血等症　用量6～13克。

【现代研究】含有多种四环二萜酮醇衍生物，包括泽泻醇A、B、C及泽泻醇A酸酯、泽泻醇B酸酯、泽泻醇C酸酯等　并含胆碱、卵磷脂和一种磷脂物质。采用高效液相色谱法，测定了泽泻醇A24-醋酸酯、泽泻醇B23-醋酸酯的含量。有利尿、调节血脂、抗肾结石形成、降血压、抗脂肪肝、抗肾炎活性等药理作用。在大白鼠的利尿试验中，发现冬季产的泽泻利尿效力大，生泽泻、酒炙、麸炒泽泻均有利尿作用，而盐泽泻无利尿作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

板蓝根

【别名】北板蓝根、靛青根、蓝靛根。

【来源】十字花科植物菘蓝 *Isatis indigotica* Fort. 的根

【植物形态】二年生草本，高40～90厘米，无毛或稍有柔毛；主根直径5～8毫米，灰黄色。茎直立，上部多分枝，稍带粉霜。基生叶矩圆状椭圆形，有柄。茎生叶矩圆形至矩圆披针形，长5～7厘米，宽1～2厘米，先端钝，基部箭形，半抱茎，全缘或有不明显锯齿。花序复总状；花黄色，直径3～4毫米。短角果矩圆形，扁平，边缘有翅，长约1.3厘米，宽约4毫米，紫色，无毛，有短尖，基部渐狭。种子一个，椭圆形，长3毫米，褐色。

【生境分布】主产于河北、江苏、安徽等地

【采收加工】初冬采挖，除去茎叶，洗净，晒干

【药材性状】圆柱形，稍扭曲，长10～40厘米，直径0.3～1.2厘米表面灰黄色，有纵皱纹及支根痕，并有淡灰黄色横长的皮孔。根头略膨大，可见轮状排列的暗绿色叶柄残基、叶柄痕以及密集的疣点突起。质实而脆，折断面略平坦，皮部淡棕白色至淡棕色，占半径的1/2～3/4，木部黄色。气微，味微甜后涩。

【性味功能】苦，寒。清热解毒、凉血利咽

【临床应用】用于治疗流感、流脑、乙脑、肺炎、丹毒、热毒发斑、神昏吐衄、咽肿、痄腮、疮疹等。用量9～15克。

【现代研究】含靛玉红、靛蓝；并含有18种氨基酸，其中精氨酸的含量较高，氨基酸可能是板蓝根中的一个主要有效成分。对乙型肝炎病毒DNA有中度抑制作用；对金黄色葡萄球菌等多种致病菌以及钩端螺旋体均有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

虎杖

【别名】大叶蛇总管、山大黄、斑杖。

【来源】蓼科植物虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. 的根茎及根。

【植物形态】多年生草本。根茎横卧地下，木质，黄褐色，节明显；茎直立，圆柱形，散生着多数红色或带紫色斑点，中空，单叶互生，阔卵形至近圆形，先端短尖，基部圆形或楔形；托叶鞘膜质，褐色，早落。花单性，雌雄异株，圆锥花序腋生；花梗较长，上部有翅；花小而密，白色，花被5片，外轮3片，背面有翅，结果时增大；雄花有雄蕊8枚；雌花子房上部有花柱3枚。瘦果卵形，具3棱，红褐色，光亮，包在翅状的花被中。花期6～8月，果期9～10月。

【生境分布】生于湿润而深厚的土壤，常见于山坡山麓及溪谷两岸的灌丛边、沟边草丛及田野路旁。分布于江苏、浙江、安徽等地。

【采收加工】春、秋均可采挖，除去须根、尾梢，洗净后切片，晒干。

【药材性状】圆柱形小段或片块。外皮棕褐色，有纵皱纹及须根痕。根茎有节，节间长2～3厘米。质坚韧，不易折断，断面皮部薄，棕褐色，易与木部分离；木部占大部分，棕黄色，射线呈放射状；根茎中央有髓，空洞状。气微，味微苦、涩。


【性味功能】微苦，微寒。祛风利湿、散瘀定痛。止咳化痰。

【临床应用】用于治疗关节疼痛、经闭、湿热黄疸、慢性支气管炎、高血脂症；外治烫火伤、跌扑损伤等。用量9～30克；外用适量，制成煎液或油膏涂。孕妇慎用。

【现代研究】含有蒽醌类衍生物，据分析总量可达2.1%，以游离型为主（1.4%），结合型含量较低（0.6%）。并含有芪类化合物芪三酚（即白藜芦醇）及其苷芪三酚苷（即虎杖苷）等，含一定量的鞣质、多个黄酮类化合物。可用紫外分光光度法、薄层扫描法、反相高效液相色谱法测定白藜芦醇的含量，或用分光光度法测定总蒽醌的含量（以大黄素计不得少于1.5%）。药理实验表明，本品能调节血脂，能延缓动脉粥样硬化的发生和发展；并能改善高血脂动物的血液高粘状态，使血粘度恢复正常，防治血栓的形成和血瘀症；并有抗肝损伤、抗休克、抗菌、镇咳、降压、改善微循环的作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金荞麦

【别名】野荞麦、铁花麦、透骨消。

【来源】蓼科植物金荞麦 *Fagopyrum dibotrys* (D. Don) Hara. 的根茎。

【植物形态】多年生草本，具白色柔毛，主根结节状，横走，红褐色。茎多分枝，具棱槽，微带红色。单叶互生，叶柄长；叶片戟状三角形，先端渐尖或尾尖状，全缘，基部心戟形；顶端叶小无柄，抱茎；托叶鞘抱茎状。聚伞花序顶生或腋生；总花梗长，具白色短柔毛；花被5；雄蕊8；雌蕊3。瘦果三棱形，红褐色。花期7～9月，果期10～11月。

【生境分布】生于荒地、路旁、河边阴湿地。分布于江南、江苏、安徽、浙江等地。

【采收加工】夏、秋季采挖根茎，洗净，晒干，生用。

【药材性状】根茎不规则团块状，常具瘤状分枝，长短不一，直径1～4厘米。表面深灰褐色，有环节及纵皱纹，并密布点状皮孔，有凹陷的圆形根痕及须根残余；瘤状分枝顶端有茎的残基。质坚硬，不易折断，切面淡黄白色至黄棕色，有放射性纹理，中央有髓。气微，味微涩。

【性味功能】涩、微辛，凉。清热解毒、排脓祛瘀。

【临床应用】用于治疗热毒壅结所致之肺痈、咽喉肿痛，以及肺热喘咳、瘰疬、痈疮疖肿、毒蛇咬伤；脾不健运所致之食少腹胀、疳积消瘦者等。用量15～45克。

【现代研究】根茎的有效成分为缩合原花色苷元，也称双聚原矢车菊苷元。进一步研究证明，金荞麦的有效成分是一类原花色素的缩合性单宁的混合物，应用薄层扫描法测定不同物候期的药材中有效成分原矢车菊苷元B-2的含量，结果表明花盛果初期（10月初至中旬）含量最高。药理研究表明，本品有抑菌、消炎作用，尤其对化脓性炎症有效；对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌，以及痢疾、伤寒、绿脓等杆菌有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

明党参

【别名】粉沙参、土人参、山萝卜。

【来源】伞形科植物明党参 *Changium smyrnioides* Wolff 的根

【植物形态】多年生草本。基生叶具长柄，基部扩大呈鞘状抱茎；叶片全形为广卵形，2～3回羽状分裂，小裂片披针形。花茎常由一侧抽出，直立，上部疏展分枝；花序顶生，成疏阔圆锥状复伞形花序，无总苞，伞梗5～10枚，细柔；小总苞片数枚，锥形；小伞梗10～15枚，纤细；花小；花萼具5细齿；花瓣5，卵状披针形，白色；雄蕊5，花药椭圆形，花丝细长；子房下位椭圆形，花柱2，开展；侧枝花序雌蕊常不育。双悬果广椭圆形，光滑而有纵纹，果棱不明显。花期4～5月，果期5～6月。

【生境分布】生于山野稀疏灌木林下、土壤肥沃的地方，或生于山野石隙或岩石山坡上。分布于江苏、安徽、浙江等地。

【采收加工】春季采挖，除去茎叶及须根，洗净泥土，置沸水中煮至无白心，取出，刮去外皮，晒干。

【药材性状】圆柱形，长纺锤形或不规则条块，略扭曲，长6～20厘米，直径0.5～2厘米。表面黄白色，光滑，半透明，常有纵沟纹，有的具红棕色斑点。质硬而脆，角质样，粗短的不易折断，折断面平坦，黄白色，皮部较薄，黄白色，易与木部剥离，木部色较淡，粗短者有时中空。气微，味淡。

【性味功能】甘、微苦，微寒。润肺化痰、养阴和胃、平肝、解毒。

【临床应用】用于治疗风热咳嗽、痰黄粘稠、口干咽痛、疔毒疮疡、红肿热痛、脾胃不和之呕吐、湿热带下等症。用量3～9克。脾胃虚易泻者及孕妇不宜服用。

【现代研究】含有挥发油，挥发油中含50多种化合物，已鉴定出了10种成分，其中含量最高的6，9—十八碳二炔酸甲酯被认为是润肺化痰的有效成分；还含有20多种氨基酸和18种微量元素；L-天门冬酰胺可能是其镇咳平喘的有效成分。可用薄层扫描法测定明党参中L-天门冬酰胺的含量。药理研究表明，本品有祛痰、止咳、平喘的作用，具有调节血脂、抗氧化、抗应激的作用；对正常小鼠的小肠蠕动有促进作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

前　胡

【别名】鸭巴片、鸭脚前胡。

【来源】伞形科植物紫花前胡 *Peucedanum decursivum* Maxim. 的根。

【植物形态】多年生草本　茎紫色；叶纸质，1~2回羽状分裂，1回裂片3~5，再裂3~5，叶轴翅状，茎上部叶简化或叶柄。复伞形花序顶生或腋生；总苞1-2；总伞梗10~20；小总苞片披针形；花梗约20；花色；雄蕊5，花药卵圆形；子房无毛，花柱2枚，极短。双悬果椭圆形，侧棱有窄翅。花期8~10月，果期10~11月。

【生境分布】生于山坡林下及向阳的荒地草丛中。主产于浙江、江西、安徽等地

【采收加工】秋、冬地上部分枯萎时采收，挖出主根，除去茎叶、须根、泥土，晒干或微火炕干。

【药材性状】圆柱形或圆锥形，有少数支根。根茎上端有残留茎基，无纤维毛状物；茎基周围具多数膜状叶鞘基部残茎。表面棕色至黑棕色，有浅直细纵皱纹，并有灰白色横向皮孔及点状须根痕，皮部与木部易分离，断面皮部较狭，散有黄色油点，木部黄白色，占根面积1/2或更多。香气浓，味微甘后苦。

【性味功能】苦、辛，微寒。散风清热，降气化痰。

【临床应用】用于治疗风热头痛、痰热咳喘、呕逆、胸膈满闷等。用量4.5~9克。

【现代研究】主要含挥发油及香豆精。特征性成分为线型二氢吡喃香豆素化合物，以紫花前胡次素为代表。可用反相HPLC法对紫花前胡次素进行分离测定。挥发油的主要成分为爱草脑及柠檬烯。有化痰、抑菌、镇咳、镇痛和松弛平滑肌等药理作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

姜 黄

【别名】黄姜。

【来源】姜科植物姜黄 *Curcuma longa* L. 的根茎。

【植物形态】多年生草本，根粗壮，末端膨大成长卵形或纺锤状块根，灰褐色。根茎卵形，内面黄色，侧根茎圆柱状，红黄色。叶基生；叶片椭圆形或较狭，先端渐尖，基部渐狭；叶柄长约为叶片之半，有时几与叶片等长；叶鞘宽约与叶柄等长。穗状花序稠密；苞片阔卵圆形，每苞片内含小花数朵，顶端苞片卵形或狭卵形，腋内无花；花萼3钝齿；花冠管上部漏斗状，3裂；雄蕊药隔矩形，花丝扁阔，侧生退化雄蕊长卵圆形；雄蕊1，子房下位，花柱丝状，基部具2棒状体，柱头2唇状。蒴果膜质，球形，3瓣裂。种子卵状长圆形，具假种皮。花、果期7～8月。

【生境分布】多栽于向阳、土壤肥厚质松的田园中。分布于福建、浙江、台湾、湖北等地。

【采收加工】秋、冬采挖，洗净，煮熟至透心为度，晒干，撞去外皮，再晒干。

【药材性状】由主根茎加工的卵圆形或纺锤形，长2～3.5厘米，直径1.5～2.5厘米。表面棕黄色至淡棕色，附短的须根，并有多数点状下陷的须根或少数圆形侧生根茎痕。质坚硬，击破面深黄色至红黄色，角质，具蜡样光泽，有点状维管束。气香特异，味辛，微苦。

由侧生根茎加工的圆柱形，稍扁压，长2.5～6厘米，直径0.8～1.5厘米，略弯曲，常有短的分枝，一端圆钝，一端为断面。表面有纵皱纹和明显环节。


【性味功能】苦、辛，温。破血行气、通经止痛。

【临床应用】用于治疗心腹痞满胀痛、癥瘕、妇女血瘀经闭、产后瘀停腹痛、跌扑损伤、痈肿等。用量3～9克。

【现代研究】主要含挥发油及酚性物质。挥发油已鉴定出51种成分油，以萜类化合物为主，主要有姜黄酮、姜油烯等；酚性成分主要有姜黄素等。应用薄层-比色法测定姜黄素、脱甲氧基姜黄素和双脱甲氧基姜黄素的含量，并应用薄层扫描法测定姜黄素的含量。药理研究表明，本品有保肝、利胆、抗菌、抗炎、抗肿瘤、抗艾滋病、抗生育、降血脂等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

南沙参

【别名】白沙参、白参、羊婆奶。

【来源】桔梗科植物杏叶沙参 *Adenophora hunanensis* Nannf.Miq. 的根

【植物形态】多年生草本，有白色乳汁。茎单一或有分枝有毛。叶互生；叶片卵形，基部宽楔形或近截形边缘有不规则锯齿，上面疏生短毛，下面有疏或密的短毛。花序狭长，下部有短或长的分枝，有短毛或近无毛；花萼无毛，或有疏或密的白色短毛，裂片5，卵形或狭卵形，基部稍合生，端钝，花冠淡紫蓝色，钟状，外面无毛，5浅裂；雄蕊5，基部变宽，边缘密生柔毛；花盘宽圆筒状；子房下位，花柱与花冠近等长。

【生境分布】生于山坡草地或疏林中，主产于安徽、江苏、浙江、贵州等地。

【采收加工】春、秋两季采挖，除去须根，洗后趁鲜刮去栓皮，晒干或烘干。

【药材性状】圆柱形或圆锥形，有的弯曲或扭曲，少数2～3个分枝，长8～27厘米，直径1～4.3厘米。表面黄白色或淡棕黄色；较粗糙，有不规则扭曲的皱纹，上部有细密横纹，凹陷处常有残留棕褐色栓皮。顶端芦头（根茎）单个，稀多个，长2～7厘米，四周具多数半月形茎痕，呈盘节状。质硬脆，易折断，折断面不平坦，类白色，多裂隙，较松泡。气微，味微甘、苦。

【性味功能】甘，微寒。养阴清肺、化痰益气。

【临床应用】用于治疗治肺热燥咳、虚痨久咳、阴伤咽干喉痛等。用量10～15克。

【现代研究】本品镇咳、祛痰活性成分为β-谷甾醇和棕榈酸-β-谷甾醇等，可采用薄层扫描法和分光光度法测定沙参中的脂溶性成分和多糖成分。有祛痰作用、强心作用。沙参水浸液(1∶2)在试管内对羊毛状小芽胞癣菌等皮肤真菌有不同程度的抑制作用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com







更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

郁　金

【别名】玉金、黄郁。

【来源】姜科植物温郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling 的块根。

【植物形态】温郁金为多年生草本，高80～160cm。根茎肉质块状，侧面根茎圆柱形，内面柠檬色，须根细长，末端常膨大成纺锤状块根，内面白色。叶片4～7，二列，叶柄长不及叶片的一半；叶片宽椭圆形，先端渐尖或短尾状渐尖，基部楔形。穗状花序圆柱形，先叶于根茎处抽出，上部无花的苞片长椭圆形，中下部有花的苞片宽卵形，绿白色；花萼筒白色，先端具不等的3齿；花冠筒漏斗状，白色，裂片3，长椭圆形，后方一片较大，近端处有粗糙毛；侧生退化雄蕊花瓣状，黄色，唇瓣倒卵形，外折，先端微凹。花期4～6月。

【生境分布】生于向阳、湿润的田园、水沟边上。分布于浙江南部。

【采收加工】冬、春采挖，摘取块根，除去须根，洗净泥土，入沸水后煮或蒸至透心，取出，晒干。

【药材性状】长纺锤形或长圆形，少数稍扁压，两端渐尖，长3～7厘米，直径1～1.5厘米。表面深灰棕色，具不规则的纵皱纹。质坚硬，断面棕黑色，有蜡样光泽，内皮层明显，气微，味微苦。

【性味功能】辛、苦，寒。活血行气止痛、解郁清心、利胆退黄、凉血。

【临床应用】用于治疗胸、腹、胁肋疼痛、痛经、乳胀、跌打瘀痛；肝胆湿热或郁热所致黄疸、以及胆石症、泌尿道结石症等。用量5～12克。

【现代研究】挥发油含量约0.30%，应用薄层扫描法可测定其中的姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去氧甲基姜黄素的含量。药理研究表明，有镇痛作用；能降血脂、促进胆汁的分泌和排泄、产抑制胆囊中的大部分微生物等作用。近年新发现郁金的水提液所含的无机成分——草酸钾镁，对心律失常有显著的疗效，这值得进一步研究。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附1 莪 术

【别名】温莪术

【来源】姜科植物温郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling 的根茎。

【采收加工】冬末春初采挖，洗净后煮或蒸至透心，取出，晒干。

【药材性状】长卵形、卵形或纺锤形。表面深棕色至灰棕色，粗糙，上部环节凸起，基部有下陷的须根痕，有刀削痕。质坚重，击破面黄棕色或黄灰色，角质状，有点状或维管束。气香，味辛凉、苦。

【性味功能】苦、辛，温。破瘀行气、消积止痛。

【临床应用】用于治疗胸、腹、胁肋疼痛，以及痛经、乳胀、跌打瘀痛等。用量5～12克。不宜与丁香同用。

【现代研究】挥发油主要成分为莪术二酮、莪术醇等。从甲醇提取物中分得5个存在较少的化合物，有抗菌、抗癌和治疗艾滋病的作用。

附2 片姜黄

【别名】姜黄。

【来源】姜科植物温郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling 的根茎。

【采收加工】冬季茎叶枯萎后采挖，洗净，除去须根，趁鲜纵切厚片，晒干。

【药材性状】长圆形或不规则的片状，大小不一，长3～6厘米，宽1～3厘米，厚0.1～0.4厘米。外皮灰黄色，粗糙皱缩，有时可见环节及须根痕。切面黄白色至棕黄色，有一圈环纹及多数筋脉小点。质脆而坚实。断面灰白色至棕黄色，略粉性。气香特异，味微苦而辛凉。


【性味功能】辛、苦，温。破血行气、通经止痛。

【临床应用】用于治疗血滞经闭、行经腹痛、胸胁刺痛、风湿痹痛、肩臂疼痛、跌扑损伤等。用量3～9克。

【现代研究】挥发油约1%，油中的主要成分在薄层上与温莪术相似。有抗肿瘤、抗血栓形成、抗腹泻、抗病毒、抗菌、抗炎等药理作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



莪术



片姜黄

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

香 附

【别名】莎草、香附子、香头草

【来源】莎草科植物莎草 *Cyperus rotundus* L. 的根茎

【植物形态】多年生草本。匍匐根茎长，先端具肥大纺锤形的根茎，外皮紫褐色，有棕毛或黑褐色毛状物。茎锐三角形，基部具块茎状。叶窄线形短于秆；鞘棕色，常裂成纤维状。叶状苞片2～5；长侧枝聚伞花序简单或复出，辐射枝3～10；穗状花序轮廓为陀螺形；小穗3～10，线形，具花8～28朵；小穗轴具较宽的、白色透明的翅；鳞片覆瓦状排列，膜质，卵形或长圆状卵形，中间绿色，两侧紫红色或红棕色，具脉5～7条；雄蕊3，药线形；花柱长，柱头3。小坚果长圆状倒卵形，三棱状。花期6～8月，果期7～11月。

【生境分布】生于山坡草地、耕地、路边及水边、湿地、河沟和沙地等。分布于江苏、安徽、浙江等地。

【采收加工】秋季采挖，用火燎去须根及鳞叶，沸水煮或蒸透后晒干，也可不经火燎或蒸煮直接晒干，均称“毛香附”；在放入竹笼中来回撞擦，或用竹筛去净灰屑及须毛，即为“光香附”。

【药材性状】根茎纺锤形，或略弯曲，长2～3.5厘米，直径0.5～1厘米。表面棕褐色或黑褐色，有不规则纵皱纹，并有明显而隆起的环节6～10个，节足长2～6毫米，节上有众多朝向一方的棕色毛须，并残留根痕；去净毛须的较光滑，有细密的纵脊纹。质坚硬，蒸煮者断面角质样，棕黄色或棕红色，生晒者断面粉性，类白色；内皮层环明显，中柱色较深，维管束点清晰可见。气芳香特异，味微苦。

【性味功能】辛、微苦、微甘，平。行气解郁、调经止痛。

【临床应用】用于治疗肝胃不和、气郁不舒，胸腹胁肋胀痛、痰饮痞满、月经不调、崩漏带下等。用量6～9克。

【现代研究】香附含挥发油约1%，油中含有多种倍半萜及其氧化物，还含有少量单萜化合物和考布松等。挥发油及醇提取物对大鼠有显著的镇痛和解热作用。本品还有松弛平滑肌和雌激素样作用，有抗炎、保肝利胆等药理作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

重 楼

【别名】草河车、七叶莲。

【来源】百合科植物七叶一枝花 *Paris polyphylla* Smith var.chinensis (Franch.) Hara 的干燥根茎。

【植物形态】多年生直立草本，根茎黄褐色，肥厚，横走，表面粗糙具节及鳞片状叶，并具众多须根，茎单一，光滑无毛，基部常常紫红色，并有膜质叶鞘包茎。叶轮生茎顶，通常5～8片；叶片长椭圆形或椭圆状披针形，先端急尖或短尖，全缘，基部楔形，膜质或纸质，绿色，有时下面带紫色；基出三出脉。花柄出自轮生叶中央，通常比叶长，顶生一花；花两性，外轮花被片绿色，叶状，4～7片，长卵形至卵状披针形，先端渐尖；内轮花被与外轮同数，黄色或黄绿色，线形，一般短于外轮花片；雄蕊数与花被数同，花丝扁平，花药丝形，金黄色，纵裂，长于花丝2～3倍；子房上位，具4～6棱，花柱短，先端4～7裂，向外反卷。蒴果球形，熟时黄褐色，3～6瓣裂，内含多数鲜红卵形种子。花期4～7月，果期8～11月。

【生境分布】生于山坡林下荫处或沟谷边的草丛中阴湿处。分布于江苏、安徽、江西、福建等地。

【采收加工】秋季采挖，除去须根，洗净，润透，切薄片，晒干。

【药材性状】根茎圆柱形略扁，结节状，长2～12厘米，直径1～3厘米。表面黄棕色或棕褐色；全体有粗环纹密生，背面有稀疏的须根及须根痕，顶端有茎的残基及鳞片。质坚硬，折断面粉性，灰白色或浅棕色略角质状，维管束呈环。气微，味微苦。

【性味功能】苦，微寒，有小毒。清热解毒、消肿止痛、凉肝定惊。

【临床应用】用于治疗热毒壅结所致之痈肿疮毒、咽喉肿痛、瘰疬、疔腮以及毒蛇咬伤；肝热生风、惊痫以及热病神昏、抽搐；外伤出血或瘀肿疼痛症等。用量3～9克。外用适量，捣敷或研末调敷。本品性寒，凡脾胃虚寒者不宜应用。孕妇慎服。

【现代研究】主要有效成分是甾体皂苷，并含有氨基酸、甾酮、蜕皮激素、原萝卜苷等化合物。可用HPLC法测定其甾体皂苷的含量。药理研究表明，本品有止血、抗菌、平喘、止咳作用；对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌、大肠杆菌、脑膜炎双球菌及钩端螺旋体、流感病毒有不同程度抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

骨碎补

【别名】石毛姜、猴姜、毛姜

【来源】水龙骨科植物槲蕨 *Drynaria fortunei* (Kunze) J. Sm. 的根茎。

【植物形态】附生草本，高20～40厘米。根状茎肉质粗壮，长而横走，密被棕黄色、线状披针形鳞片；叶2型，营养叶厚革质，红棕色或灰褐色，卵形，无柄，边缘羽状深裂，似槲树叶；孢子叶绿色，有柄，柄有翅，叶矩圆形或长椭圆形，羽状深裂，羽片6～15对，裂片广披针形或长圆形，先端急尖或钝。在叶中脉两侧有2～4行孢子囊群，圆形，黄褐色，无囊群盖。

【生境分布】附生于树干或岩石上。分布于浙江、福建、台湾等地。

【采收加工】冬、春采挖，除去叶片及泥沙，晒干或蒸熟后晒干，用火燎去毛茸。

【药材性状】扁平长条状，略弯曲，有分枝，长4～20厘米，宽1～2厘米，厚2～5毫米。表面淡棕色至暗棕色，密被棕色细小鳞片，有时鳞片大部分已断去，残存基部呈鱼鳞状，两侧及上面具突起的圆形叶柄痕，少数有叶柄残基及短的须根残留。质轻脆，易折断，断面红棕色，维管束呈黄色点状排列成环。气微弱，味淡、微涩。

【性味功能】苦，温。补肾强骨，续伤止痛。

【临床应用】用于治疗肾虚腰痛、牙痛、耳鸣、久泻、跌打损伤；外治斑秃、鸡眼等。内服用量3～10克，鲜用6～15克。外用适量研末敷或浸酒涂患处，也可用鲜品切断磨擦或捣烂敷患处。

【现代研究】槲蕨根茎含柚皮苷，水解得槲皮素及D-葡萄糖和L-鼠李糖，含骨碎补双氢黄酮苷及多种四五二酚类化合物。应用薄层紫外分光光度法，测定槲蕨根茎中的柚皮苷的含量为1.00%。药理实验表明，柚皮苷有明显的促进骨损伤愈合作用，是骨碎补的有效成分之一。本品还能促进骨对钙的吸收，并提高血钙和血磷水平，有利于骨折的愈合。骨碎补有一定的改善软骨细胞功能，推迟细胞退行性变的作用。骨碎补双氢黄酮对小鼠有明显的镇痛和镇静作用，能防治链霉素等中毒，临床上用于退行性关节疾、防治链霉素毒副反应等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

粉萆薢

【别名】黄萆薢、土黄连、黄姜。

【来源】薯蓣科植物粉背萆薢 *Dioscorea hypoglauca* Palibin 的根茎。

【植物形态】多年生缠绕草质藤本。根状茎横走，粗厚，多细长须根。茎纤细，左旋。单叶互生，纸质；叶片三角状心形或卵状披针形，顶端渐尖，边缘波状，叶干后近黑色，下面灰白。花黄绿色，单性，雌雄异株；雄花为腋生向上的穗状花序，花单生或2～3朵簇生，花被6裂，雄蕊3，退化雄蕊3，互生；雌花为下垂的穗状花序，花单生，花被6，柱头3裂。蒴果近圆形，微被白粉，有3翅，成熟后向上反转。花期5～8月，果期6～10月。

【生境分布】生于海拔200～1 300米的山腰陡坡、山谷缓坡或水沟边、阴坡的混交林缘或疏林下，分布于安徽、浙江、福建、江西等地。

【采收加工】春、秋均可采挖，挖出后洗净除去须根，切片晒干。

【药材性状】根茎竹节状，类圆柱形，有分枝，表面皱缩，常残留有茎枯萎疤痕及未除尽的细长须根。商品多为不规则的薄片，大小不一，厚约0.5毫米，边缘不整齐，有的有棕黑色或灰棕色的外皮。切面黄白色或淡灰棕色，平坦，细腻，有粉性及不规则的黄色筋脉花纹维管束，对光照视，极为显著。质松，易折断。气微，味辛、微苦。

【性味功能】苦，平。利湿去浊，祛风除痹。

【临床应用】用于治疗风湿顽痹、腰膝疼痛、筋脉屈伸不利；膏淋、热淋、石淋、小便不利；脾胃湿热下注之尿浊症；湿热下注所致带下、遗精等。用量10～25克。肾虚阴亏者忌服。

【现代研究】含薯蓣皂苷元、粉背皂苷A、纤细薯蓣皂苷、原纤细薯蓣皂苷等。薯蓣皂苷元的含量测定方法有：库仑滴定法、TLC扫描测定法。药理研究表明，本品对动脉粥样硬化斑块的形成有抑制作用，可使外周血T细胞百分率增加，具有一定的免疫药理活性。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

浙贝母

【别名】象贝、大贝、珠贝

【来源】百合科植物浙贝母 *Fritillaria thunbergii* Mig. 的鳞茎

【植物形态】多年生草本。鳞茎半球形，有2～3片肉质的鳞片。茎单一，直立，圆柱形，叶无柄；茎下部的叶对生，狭披针形至线形；中上部的叶常3～5片轮生，少互生，叶片较短，先端卷须状。花单生于茎顶或叶腋；花钟形，俯垂；花被6片，2轮排列，长椭圆形，先端短尖或钝，淡黄色或黄绿色，具细微平行脉，内面并有淡紫色方格状斑纹，基部具腺体；雄蕊6，花药基部着生，外向；雌蕊1，子房3室，每室有多数胚珠，柱头3歧。蒴果卵圆形，有6条较宽的纵翅，成熟时室背开裂。种子扁平，近半圆形，边缘具翅。花期3～4月，果期4～5月。

【生境分布】生于山坡草丛、林下较阴处。分布于山东、江苏、安徽、浙江等地。

【采收加工】5～6月采挖，洗净泥土，大小分开，大者摘去心芽，分作两片，呈元宝状，称“元宝贝”，小者称“珠贝”。分别置擦笼内，擦去外皮，加石灰拌匀，经过一夜，使石灰渗入，晒干或烘干。

【药材性状】珠贝：为完整的鳞茎，扁球形，直径1～2.5厘米，高1～1.5厘米。表面类白色，外层两枚鳞叶肥厚，略呈肾形，对合，中央有皱缩的小鳞叶2～3个及干缩的残基。质实而脆，易折断，断面白色，富粉性。气微弱，味苦。

大贝（元宝贝）为单瓣的肥厚鳞茎，略呈新月形，长2～4厘米，高1～2.5厘米，厚0.6～1.5厘米。外表面类白色至淡黄白色，有淡棕色斑痕，内表面类似白色至淡黄白色。

【性味功能】苦，寒。清热散结，化痰止咳。

【临床应用】用于治疗风热咳嗽，肺痈喉痹，瘰疬，疮疡肿毒等。内服用量4.5～9克，或1.5克研末服。反乌头、草乌。

【现代研究】浙贝母含甾醇类生物碱贝母素甲，即浙贝母碱、贝母素乙、浙贝宁、浙贝酮、贝母辛、异浙贝母碱、浙贝母碱苷、浙贝宁苷、浙贝内素等，并含多种二萜类化合物。本品有镇咳、平喘、扩瞳、调节血压、升高血糖、祛痰等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

夏天无

【别名】十元胡、伏地延胡索、无柄紫堇。

【来源】罂粟科植物伏生紫堇 *Corydalis decumbens* (Thunb.) Pers. 的块茎。

【植物形态】多年生草本，全体无毛。块茎近球形，表面黑色，着生少数须根。茎细弱，丛生，不分枝。基生叶具长柄，叶片三角形，2回3出全裂，末回裂片具短柄，通常狭倒卵形；茎生叶2～3片，生茎下部以上或上部，形似基生叶，但较小，具稍长柄或无柄。总状花序顶生；苞片卵形或阔披针形，全缘；花淡紫红色，筒状唇形，上面花瓣边近圆形，先端微凹，距圆筒形，直或向上微弯；雄蕊6，呈两体。蒴果线形，2瓣裂。种子细小。花期4～5月，果期5～6月。

【生境分布】生于丘陵、低山坡或草地。喜生于温暖湿润、向阳、排水良好、土壤深厚的沙质地。分布于安徽、江苏、浙江、江西等地。

【采收加工】春至初夏采块茎，去泥，洗净，晒干或鲜用。

【药材性状】块茎类球形、长圆形或不规则块状，长0.5～2厘米，直径0.5～1.5厘米。表面土黄色，棕色或暗绿色，有细皱纹，常有不规则的瘤状突起及细小的点状须根痕。质坚脆，断面黄白色或黄色，颗粒状或角质样，有的略带粉性。气无，味极苦。

【性味功能】苦、微辛，温。活血、通络、行气止痛。

【临床应用】用于治疗中风偏瘫、小儿麻痹后遗症、坐骨神经痛、风湿性关节炎、跌打损伤、腰肌劳损等。用量5～16克。

【现代研究】含四氢巴马亭（即延胡索乙素）、原阿片碱、空褐鳞碱、藤荷包牡丹定碱、夏天无碱等，其总碱含量达0.98%。应用高效薄层色谱分离及薄层扫描定量，对夏天无的化学成分及含量进行比较，结果表明，其延胡索乙素含量最高。药理实验表明，本品有抗张血管、抗血小板聚集、镇痛、解痉等作用。夏天无注射液在临床上治疗高血压脑血管病、骨关节肌肉疾病及青年近视等，均见良效。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

柴胡

【别名】茈胡、地熏、山菜。

【来源】伞形科植物狭叶柴胡 *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. 的根。

【植物形态】多年生草本。包括较发达，常不分枝、茎丛生或单生，实心，上部多分枝，略呈“之”字形弯曲。基生叶有长柄，叶片线形全线状披针形，有平行脉5～7条，下面具粉霜。复伞形花序，伞梗4～10，不等长；小总苞片5，披针形；小伞梗10～20，花鲜黄色；花瓣5；雄蕊5，花药卵形；雌蕊1，子房下位，花柱2，极短。双悬果宽椭圆形，棱狭翅状，花期8～9月，果期9～10月。

【生境分布】柴胡生于旱荒山坡、林缘灌丛中，狭叶柴胡生于沙质草原、沙丘草甸或阳坡疏林下。两者均分布于华东、华北、东北等地。

【采收加工】春、秋两季采挖，除去茎叶及泥土，晒干。

【药材性状】根长圆锥形，稀分枝，长5～14厘米，直径0.3～0.6厘米；表面红棕色或棕褐色，近根头部有多数紧密的环纹，皮孔明显，质脆，易折断，断面平坦，淡棕色，不显纤维性，中间有油点。气微香，有油腻味。


【性味功能】苦、微寒。和解表里、疏肝、升阳。

【临床应用】用于治疗寒热往来、胸满胁痛、口苦耳聋、头痛目眩、疟疾、下痢脱肛、月经不调、子宫下垂等。用量3～15克。

【现代研究】除含挥发油、皂苷外，尚含有黄酮、多元醇、植物甾醇、香豆素、脂肪酸等多种成分。用高效液相色谱法对其中的柴胡皂苷的含量进行了测定。药理实验表明，本品具有镇静、安定、镇痛、解热、镇咳等广泛的中枢抑制作用；还有抗炎、抗脂肪肝、抗肝损伤、利胆、降转氨酶、降低血浆胆固醇及增强免疫功能等作用。对结核杆菌、感冒病毒、溶血性链球菌、霍乱弧菌和钩端螺旋体有一定的抑制作用；还有抗肝炎病毒和抑制Ⅰ型脊髓炎病毒引起病变的作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

绵萆薢

【别名】萆薢、粉萆薢、白萆薢。

【来源】薯蓣科植物绵萆薢 *Dioscorea septemloba* Thunb. 的根茎。

【植物形态】多年生缠绕性藤本，根状茎横走，粗厚。茎纤细，左旋，圆锥形。单叶互生；叶片卵形，先端渐尖，边缘微波状，叶干后不变黑。花雌雄异株；雄花序腋生，为直立的圆锥花序，花橙黄色，疏生，单生或间为2朵对生，花瓣6，开展，长圆形，雄蕊6，与花瓣对生，其中3枚较大；雌花序腋生，为下垂的圆锥花序。蒴果宽倒卵形，疏生，具3翅，干后棕褐色，花期6～8月，果期7～10月。

【生境分布】生于海拔山腰陡坡或水沟阴处的混交林缘或疏林下。分布于浙江、安徽、福建、江西等地。

【采收加工】秋季采挖，挖出后洗净除去须根，切片晒干。

【药材性状】根茎粗大，不规则长圆柱形或块状，多切成不规则薄片，大小不等，厚约2～5毫米；外皮黄棕色，较厚，周边多卷曲，切面浅黄白色，粗糙，有黄棕色点状维管束散在。质疏松，易折断。气微，味微苦。

【性味功能】苦，平。利湿去浊、祛风通痹。

【临床应用】用于治疗风湿顽痹、腰膝疼痛、筋脉屈伸不利；膏淋、热淋、石淋、小便不利；脾胃湿热下注之尿浊症；湿热下注所致带下、遗精等。用量9～15克。肾虚阴亏者忌服。

【现代研究】含薯蓣皂苷、纤细薯蓣皂苷、原薯蓣皂苷、原纤细薯蓣皂苷和甲基纤细薯蓣皂苷。皂苷水解后，主要得薯蓣皂苷元。药理研究表明，本品对动脉粥样硬化斑块的形成有抑制作用，可降低动脉粥样硬化斑块的发生率。用其复方治疗慢性前列腺炎及皮肤病灰疱疮有显著疗效。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



（夏同珩提供）



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

葛 根

【别名】干葛、葛条、粉葛。

【来源】豆科植物野葛 *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi 的根。

【植物形态】多年生藤本。全株被黄褐色粗毛。块根肥厚。叶互生；具长柄；3出复叶，顶端小叶的柄较长，叶片菱状圆形，有时有3波状浅裂，先端急尖，基部圆形，两面均被白色伏生短柔毛，下面较密；侧生小叶较小，偏椭圆形或偏菱状椭圆形，有时有2～3波状浅裂。总状花序腋生，总花梗密被黄白色绒毛；花密生；苞片狭线形，早落，小苞片线状披针形；蝶形花蓝紫色或紫色；花萼5齿裂，萼齿披针形；旗瓣近圆形或卵圆形，先端微凹，基部有两短耳，翼瓣狭椭圆形，较旗瓣短，通常仅一边的基部有耳，龙骨瓣较翼瓣稍长；雄蕊10，二体（9+1）；子房线形，花柱弯曲，荚果线形，扁平，密被黄褐色的长硬毛。种子卵圆形而扁，赤褐色，有光泽。花期5～9月，果期8～10月。

【生境分布】生于山坡草丛路旁及疏林中较阴湿的地方。分布于全国各地。

【采收加工】春、秋采挖，洗净，除去外皮，切片，晒干或烘干。

【药材性状】完整者圆柱形，商品常为斜切、纵切或横切的片块，长4～36厘米，直径4～14厘米，厚0.5～1厘米。表面黄白色或淡棕色，有时可见横长的皮孔及残存淡棕色外皮。切在粗糙，纤维性强，横切片可见由纤维及导管所形成的同心性环纹。质轻松。气微，味微甜。

以块大、质坚实、色粉性足、纤维少为佳。


【性味功能】甘、辛，凉。解肌退热、生津、透疹、升阳止泻。

【临床应用】用于治疗伤寒、温热头痛项强、烦热消渴、泄泻，痢疾，麻疹不透，高血压，心绞痛，耳聋待等。用量9～15克。

【现代研究】含主要成分有黄豆苷元、黄豆苷、葛根素。用HPLC法测定野葛及其同属根中的总黄酮及黄豆苷元、黄豆苷、葛根素的含量，野葛根的总黄酮含量最高。药理实验表明，葛根具有β-受体阻断剂作用，是心血管作用的基础；具有明显的解热作用；还具有扩张冠脉血管和脑血管，增加冠脉血流量和脑血流量，降低心肌耗氧量，增加氧供应，降低血压、降血糖和解除肠管痉挛等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

糯稻根

【别名】稻根须。

【来源】禾本科植物糯稻 *Oryza sativa* L. var. *glutinosa* Matsum 的根茎及根

【植物形态】一年生草本。秆直立，丛生，高1米左右；中空，有节，有分蘖。叶具叶鞘，叶鞘无毛，与节间等长或下部者较长；叶舌膜质而较硬，披针形，基部两侧下延与叶鞘边缘相结合，幼时具明显的叶耳；叶片线形，扁平，粗糙，叶脉明显。圆锥花序疏松，成熟时向下弯垂，分枝具角棱，常粗糙；小穗长圆形，每小穗仅具1花，不育花外稃锥刺状，无毛；可育花外稃硬纸质，具5脉，遍被细毛或稀无毛，无芒或有芒；内稃3脉，亦被细毛；鳞被2枚，卵圆形，雄蕊6；子房长圆形，光滑，花柱2枝，柱头羽毛状，有时有第三枝退化的花柱。颖果矩圆形，平滑，淡黄色、白色；种子具明显的线状种脐。花期7～8月，果期8～9月。

【生境分布】我国各地均有栽培。

【采收加工】10月糯稻收割后采挖，除去残茎，洗净，晒干。

【药材性状】常结成疏松的团块，理直后可见上端有多数分离的残茎，残茎圆柱形，中空，长2.5～6.5厘米，外包数层黄白色的叶鞘，下端簇生多数弯曲的须根，须根直，黄白色至黄棕色，略具纵皱纹，体轻，质软气微，味淡。

【性味功能】甘，平。止虚汗，退虚热。

【临床应用】用于治疗自汗、盗汗、虚热不退、骨蒸潮热等，用量15～30克。

【现代研究】用糯稻根制成的煎剂可治疗马来丝虫病，但大剂量有胃肠反应；用其水煎液可治疗乳糜尿。其地上部分（稻草）可治传染性肝炎。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

根及根茎类药材小常识

【分类】根及根茎类药材是以植物地下部分入药的药材的总称。其药用部位分别属于植物的根和根茎两种不同器官，因此可分为根类药材和根茎类药材。

根类药材：其药用部分主要是根，如白芍、乌药、麦冬等，有的常带有部分根茎，如人参、桔梗、龙胆等或地上茎残基，如柴胡等。

根茎类药材：是指各种供药用的植物地下变态茎，主要包括：根状茎，如黄连、升麻、白术、羌活、射干、干姜等；块茎，如天麻、延胡索、泽泻等；球茎，如天南星、半夏等；鳞茎，如川贝母、浙贝母、百合等。

【采收加工】一般在秋、冬季节植物地上部分将枯萎时及春初发芽前或刚露苗时采收，此时根或根茎中贮藏的营养物质最为丰富，通常含有效成分也比较高，如怀牛膝、党参、黄连、大黄、防风等。有些中药由于植株枯萎时间较早，则在夏季采收，如浙贝母、延胡索、半夏、太子参等，但也有例外，如明党参在春天采较好。

【鉴别要点】根类药材大多数来源于草本的双子叶或单子叶植物，少数为蕨类植物。就根部而言，没有节、节间和叶，一般无芽。双子叶植物根一般主根明显，常有分枝，通常为圆柱形或长圆锥形；少数根部细长，集生于根茎上，如威灵仙、龙胆等。单子叶植物根多为块根，呈圆锥形或纺缍形等。根的表面常有纹理，有的可见皮孔。根类药材上所附的根茎在外形上多与根有显著不同，比较容易区别，如人参、桔梗上部的"芦头"以及龙胆、藜芦的根茎部分等。有时根类中药的上端为根茎，向下逐渐过渡为根，两者之间在外形上无明显的分界线，如当归、防风、常山等。

根茎类药材的外形常因类型而异，但外表面均与地上茎一样有节和节间，单子叶植物尤为明显；节上常有退化的鳞片状或膜质状小叶、叶柄基部残余物或叶痕；有时可见幼芽或芽痕；根茎上面或顶端常残存茎基或茎痕，侧面和下面有细长的不定根或根痕。

蕨类植物的根茎常有鳞片或密生棕黄色鳞毛，如狗脊等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



二、茎木类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小通草

【别名】通草、通花

【来源】旌节花科植物中国旌节花 *stachyurus chinensis* Franch 的干燥茎髓

【植物形态】落叶灌木，树皮呈深棕色。单叶互生，纸质，倒卵形至卵形，长6～11厘米，宽2～6.5厘米，先端渐尖至尾尖，基部圆形或近平截，具细锯齿，背面中脉上微被毛。穗状花序腋生，下垂；花黄色，萼片4，三角形；花瓣4，卵形；雄蕊8，与花瓣几等长；子房上位，有胚珠多数生于中轴胎座。花柱单生，柱状盾状。浆果褐色，球形。花期4～5月，果期5～6月

【生境分布】生于山谷、沟旁、林缘。分布于江西、福建、湖北等地

【采收加工】夏、秋季采收，将枝截成30～50厘米长一段，趁新鲜时用细竹棒由小端向大端顶出髓部，理直，阴干或晒干。或用刀纵剖，剥去皮部及木质部，取出髓部，晒干

【药材性状】细圆柱形，长30～50厘米，直径0.6～1.2厘米。银白色或米黄色，外表平坦无纹理，中间为空心，体轻质松软，可弯曲，捏之能使其变形，略有弹性，断面平坦，有银白色光泽。水浸泡后表面及断面均有粘滑感。无臭、无味

【性味功能】甘、淡、寒。清热、利尿下乳

【临床应用】用于小便不利、尿道感染、乳汁不下等症

用量2.5～4.5克。孕妇慎用

【现代研究】含有多糖、多种氨基酸及铁、钠、锰、锌、钙等无机元素。药理实验表明，本品具有抗菌作用，对金黄色葡萄球菌、溶血问种型链球菌、肺炎球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等多种细菌均有抑制作用；对小鼠非特异性和特异性免疫功能均有一定的促进作用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

三七



（夏同珩提供）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天仙藤

【别名】香藤、青木香藤、马兜铃藤

【来源】马兜铃科植物马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 的干燥带叶

【植物形态】多年生缠绕草本，全株无毛。叶互生；叶片为三角状狭卵形，先端短尖或钝，基部心形，纸质，全缘。花单生于叶腋，花梗细长，具卵形小苞片；花被喇叭状，上部略带紫色；雄蕊6；子房下位，长柱形，花柱6。蒴果椭圆形或倒卵形，下垂，成熟时由基部沿腹缝线开裂成6瓣，果柄也随之开裂；种子三角形，有宽翅。花期7～8月，果期9月。

【生境分布】生于山野树林下。主产于江苏、浙江、安徽等地。

【采收加工】秋季叶未落时收割，除净杂质，折成小捆，晒干。

【药材性状】茎呈细长圆柱形，略扭曲，直径1～3毫米；表面黄绿色，有纵棱及节，质脆，易折断，断面有数多大小不等的维管束。叶互生，多皱缩、破碎，完整叶片展开后呈三角状卵形或三角状宽卵形，基部心形，暗绿色或淡黄褐色，茎呈叶脉明显，叶柄细长。气清香，味淡。

【性味功能】苦，温。行气活血，利水消肿。

【临床应用】用于治疗肝胃气滞，胃脘胀痛，痛气痛，妊娠水肿，产后血瘀气滞腹痛，风湿痹痛等症。用量4.5～9克。外用适量，捣敷。

【现代研究】含马兜铃酸、马兜铃碱。近年发现马兜铃酸具肾毒性和致癌性，应慎用。

附　青木香

【别名】马兜铃根、独行木香、青藤香

【来源】马兜铃科植物马兜铃*Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 的根。

【采收加工】春、秋两季采挖，除去根须，洗净晒干。生用。

【药材性状】圆柱形或稍扁，略弯曲。表面黄褐色或黑褐色，有纵皱纹及须根痕。质坚脆，折断面形成层环隐约可见，皮部淡黄色，木质部束淡黄色，呈放射状，导管细孔明显。香气特异，味苦。

【性味功能】辛、苦，寒。平肝止痛，解毒消肿。

【临床应用】用于治疗眩晕头痛，胸腹胀痛等。用量3～9克。

【现代研究】本品含马兜铃酸A、B、C，马兜铃内酰胺等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



天仙藤

青木香

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

海风藤

【别名】大叶过山龙、过山风

【来源】木兰科植物异型南五味子 *Kadsura heterochita* (Roxb.) Craib 的藤茎。

【植物形态】木质大藤本，全株无毛；根条状，稍肉质，辛香；老茎有灰黄色，厚而松软的木栓质外皮。叶互生，草质，卵状椭圆形至阔椭圆形，顶端渐尖或短尖，基部阔楔尖或圆钝，全缘或上部有少数齿缺；侧脉每边约 7～11 条。花秋初开放，单性异株，腋生；花被淡黄色或黄绿色，11～15 片，排成 4～5 轮，椭圆形至倒卵形，最内和最外轮的小；雄花有球状雄蕊柱，无附属体，雄蕊 50～65 枚，雌花有心皮 30～55 枚，排成 4～6 轮，聚合果有长而下垂的果梗，球形，直径 2.5～5 厘米，成熟心皮倒卵形，紫红色。

【生境分布】生于疏林中，攀援于树上。主产于华东、华南等地。

【采收加工】全年可采。割取老藤茎，刮去栓皮，截成长段，晒干。

【药材性状】圆柱形，常略弯曲，长 50～80 厘米，直径 2.5～4 厘米。栓皮柔软如海绵，多已刮去，留有刀削痕。表面浅棕色，有不规则纵粗纹，间有残留的灰白色栓皮。质坚实，不易折断。断面韧皮部棕色，木质部淡棕色，密布明显的针孔状导管，用口从一端吹烟，烟可从另一端冒出；中央有深棕色的髓。气微香，味甘、微辛。


【性味功能】辛、微温。祛风除湿，舒筋活络。

【临床应用】用于治疗风湿性关节炎、腰腿痛、腰肌劳损、筋脉拘挛、产后风瘫等。用量 10～20 克。

【现代研究】含木脂类成分异型南五味子素 G、异型南五味子 J 素等。临床用于急性胃肠炎、胃及十二指肠球部溃疡等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

通草

【别名】白通草、花草

【来源】五加科植物通脱木 *Tetrapanax papyriferus* (Hook.) K. Koch 的茎髓

【植物形态】灌木，高可达6米。茎木质而不坚，中有白色的髓。叶大，通常聚生于茎的上部，掌状分裂，基部心脏形，叶片5～7裂，上面无毛，下面有白色星状绒毛。花小，多数球状伞形花序排列成大圆锥花丛，萼不明显；花瓣4，白色，卵形，头锐尖；雄蕊4；花柱2，离生，柱头头状。核果状浆果近球形而扁。花期8月，果期9月。

【生境分布】分布贵州、云南、台湾、广西、四川等地。

【采收加工】秋季采收，选择生长2～3年的植株，割取地上茎，截成30～50厘米长的段，趁鲜时取出茎髓，理直，晒干。

朱通草：取通草片，喷水微润，加朱砂细粉撒布均匀，每3千克通草片，用朱砂300克，至外面粘匀朱砂为度，取出，晾干。

【药材性状】圆柱形，长短粗细不等，一般长20～40厘米，直径1～2.5厘米。表面白色或淡黄色，有浅纵沟纹，体轻，质松软，稍有弹性，易折断，断面平坦，有银白色光泽，中央有直径0.3～1.5厘米的空洞或半透明圆形的薄膜。纵剖面薄膜呈梯状排列。商品"方通"为约10厘米见方的片状物，表面白色微有光泽；"通丝"则为细长碎纸片状，宽3～5毫米，长短不等。无臭、无味。

【性味功能】甘、淡，微寒。清热利尿、通气下乳。

【临床应用】用于治疗热淋之小便不利、淋沥涩痛；温病初起、肺气郁热；水湿停蓄之水肿、小便不利；产妇乳汁不通等。

用量2.5～4.5克。气阴两虚、内无湿热者及孕妇慎服。

与川芎、穿山甲、猪蹄等同用，用于治疗淋症、产后缺乳、乳汁不下等，效果良好。

【现代研究】含有人体必需的12种微量金属元素和13种氨基酸。药理研究表明，本品有明显的利尿作用，并有促进乳汁分泌的作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

络石藤

【别名】云英、石龙藤、爬山虎

【来源】夹竹桃科植物络石 *Trachelospermum* [illegible] (Lindl.) Lem. 的带叶藤茎

【植物形态】常绿攀援木质藤本。茎圆柱形，小褐色，节稍膨大，多分枝，有气根，无毛，表面有点状皮孔，幼枝带绿色，密被褐色短柔毛。叶对生，叶柄幼时被灰褐色柔毛，后脱落；叶片老时革质，椭圆形或卵状披针形，全缘，上面深绿色，无毛，下面淡绿色，被细柔毛。聚伞花序腋生，花白色，芳香，萼小，5深裂；花管圆柱形，外被细柔毛；花冠5裂，裂片长椭圆形披针形，右向旋转排列；雄蕊5，着生于花冠管内面中部以上，花丝短而扁阔。蓇葖果2个，长圆柱形；种子多数，线形而扁，褐色，顶端有一束白色细簇毛。花期4～5月，果期10月。

【生境分布】生于山野、荒地，常攀援附生在石上、墙上或其他植物上。主产江苏、安徽、湖北、浙江等地。

【采收加工】秋末冬初叶未脱落前采收，生用或鲜用。

【药材性状】茎圆柱形，弯曲，多分枝，长短不一，直径1～5毫米，表面红棕色，有点状皮孔及不定根。质硬，断面淡黄白色，常中空。叶对生，有短柄，叶片卵状披针形或椭圆形，长1～8厘米，宽0.7～3.5厘米；全缘，有时略反卷，上表面暗绿色或棕绿色，下表面色较浅，革质。气微，味微苦。

【性味功能】苦、微寒。祛风通络、凉血消肿。

【临床应用】用于治疗风湿痹痛、筋脉拘挛、喉痹、痈疮肿毒、毒蛇咬伤、瘰疬、产后瘀阻、跌打损伤等。用量6～12克。

【现代研究】主要含有木脂素、生物碱、黄酮成分等。其中，络石藤苷等子苷可引起血管扩张，血压下降；茎所含微量强心苷，可促进血液循环；50%煎剂对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌及伤寒杆菌有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茎木类药材小常识

【分类】茎木类药材是以植物茎入药的药材总称。通常分为茎类药材和木类药材2个部分。茎类药材主要包括：木质藤本植物的藤茎，如海风藤、大血藤、鸡血藤等；质较硬的草本植物藤茎，如首乌藤、天仙藤等；木本植物的茎枝，如桂枝、桑枝、桑寄生等；带钩的茎枝，如钩藤；木本植物的茎刺，如皂角刺；茎的翅状附属物，如鬼箭羽；茎的髓部，如通草、小通草、灯心草等。木类中药主要指采自木本植物木材部分的中药。木材又分边材和心材2种。因心材形成较早，位于木质部内方，蓄积了较多的次生代谢物质，如树脂、树胶、油类等成分，故药用的多是心材部分，如沉香、降香、苏木等。有些草质茎，如麻黄、石斛和肉质茎，如锁阳、肉苁蓉等，因质地和外形与草本植物相似，习惯上将其归为全草类中药，故不在茎木类药材中叙述。

【采收加工】一般在秋、冬季采收，如关木通、大血藤、首乌藤、忍冬藤等。有些木类药材全年可采，如苏木、降香、沉香等。

【鉴别要点】木质藤本植物的藤茎和木本植物的茎枝，多呈圆柱形或扁圆柱形，有的扭曲不直，粗细大小不一，表面多为黄棕色，少数具特殊颜色，如槲寄生呈黄绿色。表面粗糙，可见深浅不一的裂纹及皮孔，并有叶痕及枝痕，质地坚实，断面纤维性或裂片状，平整的横切面木质部占大部分，具放射状花纹和年轮，有的导管小孔明显可见，如青风藤等，有的可见特殊的纹理，如鸡血藤和大血藤等。

木类药材多数呈不规则的块状、厚片状或长条状。表面颜色特异，如黄白色的沉香、紫红色的降香、棕红色的苏木，有些木类中药表面具有棕褐色树脂状条纹或斑块，如沉香等。质地和气味可帮助鉴别，如多数木类中药质重，如沉香质重，具香气；白木香质轻，香气较淡。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



三、皮　类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

土荆皮

【别名】荆树皮、金钱松皮。

【来源】松科植物金钱松 *Pseudolarix kaempferi* Gord. 的近根树皮或根皮。

【植物形态】落叶乔木，高20～40米；基干直立，枝轮生平展，长枝有纵纹纵裂，叶散生其上，短枝有轮纹密生，叶簇生其上，作辐射状。叶线形，先端尖，基部渐狭，至秋后叶变金黄色。花单性，雌雄同株；雄花为葇荑状，下垂，黄色，数个或数十个聚生在小枝顶端，基部包有无数倒卵状楔形之膜质鳞片；雌花单生于有叶之短枝顶端，由多数螺旋状排列的鳞片组成。球果卵形，鳞片木质，广卵形至卵状披针形，先端微凹或钝头，基部心脏形，成熟后脱落，苞片披针形，先端长尖，中部突起；种子每鳞2个，富油脂，有膜质长翅，与鳞片等长或稍短。花期4～5月，果期10～11月。

【生境分布】喜生于多阳光处，分布于江苏南部、浙江、福建北部、安徽南部等地。

【采收加工】多于5月剥根皮或近根树皮，晒干。

【药材性状】根皮不规则长条状，扭曲而稍卷，大小不一，厚2～5毫米。外表面灰黄色，粗糙，有纵横皱纹及横向白色皮孔；栓皮常呈鳞片状剥落，显出红棕色，稍平坦，有纵向纹理。质脆，易折断，折断面呈裂片状，可层层剥落。气微，味苦而涩。

树皮板片状，厚约8毫米，栓皮层，粗糙，表面龟裂状，内表面稍粗糙。

【性味功能】辛，温。有毒。杀虫、止痒。

【临床应用】用于治疗体癣、手足癣、头癣等各种癣病。外用适量，浸酒涂擦或研末调敷。本品有毒，只供外用。

【现代研究】根皮中含土槿皮酸A、B、C、D、E，土槿皮酸C2（即去甲基土荆皮酸），它们是土荆皮中抗真菌的活性成分。药理实验表明，土槿皮酊剂或醇浸出物对我国常见的10种致病真菌（奥杜盎小芽菌、玫瑰色癣菌、叠瓦癣菌、许兰黄癣菌、絮状表皮癣菌、石膏样癣菌、白色念珠菌等）均有不同程度的抗菌作用，本品具有止血、抗生育、抗肿瘤等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

合欢皮

【别名】夜合皮、合欢木皮

【来源】豆科植物合欢 *Albizia julibrissin* Durazz. 的树皮。

【植物形态】落叶大乔木，高可达16米，树干灰黑色，小枝带棱角，叶互生，二回双数羽状复叶，互生；具羽片4～12对；小叶10～30对；小叶矩圆形至条形，两侧极偏斜，先端极尖，基部圆楔形；总叶柄基部有一腺体；托叶早落，头状花序集生成伞房状，腋生或顶生；花淡红色，花萼小，筒状；花冠漏斗状，均5裂，疏生短柔毛；雄花多数。荚果扁平，条形，黄褐色；种子多数。花期6～7期，果期9～10月。

【生境分布】通常栽培于庭园中或路旁，山谷及平原也有生长。我国大部分地区均有野生或栽培，主产于长江流域各省。

【采收加工】夏、秋两季采收，以春季清明后采剥为宜，剥取树皮，扎成把，晒干。

【药材性状】卷曲呈筒状或半筒状，长40～80厘米，厚1～3毫米。外表面灰棕色至灰褐色，粗糙，稍有纵皱纹，有的呈浅裂纹，密生棕色的圆形或椭圆形皮孔。内表面淡黄色，平滑，有细密纵纹。质坚而脆，易折断，断面呈裂片状。气微香，味淡，微涩，稍刺舌，而后喉部有不适感。

【性味功能】甘，平。解郁安神，活血消肿。

【临床应用】用于治疗情志不遂，忿怒忧郁之烦躁不宁，失眠多梦；跌打骨折，血瘀肿痛及痈肿疮毒等，用量10～15克。孕妇慎用。

【现代研究】主要含皂苷、鞣质、木脂素及糖苷、吡啶醇衍生物的糖苷等。药理实验证明，本品对小鼠自发性活动能显著抑制，呈现镇静催眠作用；对妊娠子宫能增强其节律性，并有抗早孕效应。体外试验对金黄色葡萄球菌、卡他球菌、链球菌有抗菌作用。有驱绦虫及灭螺活性。合欢皮水提醇溶物有抗血小板活化因子（PAF）受体作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

杜　仲

【别名】丝棉皮、木绵、丝连皮

【来源】杜仲科植物杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliv. 的树皮

【植物形态】落叶乔木，高达20米；小枝光滑，黄褐色或较淡，具片状髓，皮、枝及叶均含胶质。单叶互生，椭圆形或卵形，先端渐尖，基部广楔形，边缘有锯齿，幼叶上面疏被柔毛，下面毛较密，老叶上面光滑，下面叶脉处疏被毛；具柄。花单性，雌雄异株，与叶同时开放，或先叶开放，生于一年生枝基部苞片的腋内，有花柄；无花被；雄花有雄蕊6～10；雌花有一裸露而延长的子房，子房1室，顶端有二叉状花柱。翅果卵状长椭圆形而扁，先端下凹；内有种子1粒。花期4～5月，果期9月

【生境分布】生于山地林中或栽培。主产于长江中下游各省。

【采收加工】春季清明到夏至采收，以年久皮厚者为佳。选择粗大树干，剥取树皮，刮去粗皮，堆置“发汗”至内皮呈紫褐色，晒干

【药材性状】树皮板片状，两端稍内卷，长短不一，厚1～6毫米。外表淡灰棕色，未去尽粗皮者表面粗糙，有不规则槽沟及裂纹，有的附有灰绿色地衣，去尽外皮者较平坦，有明显的纵皱、裂痕，内表面暗紫色或紫褐色，平滑，质硬而脆，易折断，折断后有细密银白色丝状物相连，丝富弹性，能拉至1厘米才断。气微，味微苦，嚼之有胶状残留物


【性味功能】甘、温。补肝肾、强筋骨、安胎

【临床应用】用于治疗肝肾不足、腰膝酸痛、下肢痿软及阳痿、尿频；肝肾亏虚、下元虚冷而致妊娠下血、胎动不安、习惯性流产；高血压病等用量10～15克。阴虚火旺者慎服

【现代研究】主要成分为木脂素、环烯醚萜、二萜类、甾类、黄酮、有机酸、氨基酸等。药典规定松脂醇葡萄糖苷不得少于0.1%。药理实验证明，本品有较好的降压作用，并能减少胆固醇的吸收。其能使离体子宫自主收缩减弱，并拮抗子宫收缩剂（乙酰胆碱、垂体后叶素）的作用而解痉。煎剂对家兔离体心脏有明显加强作用；对狗、人、小鼠均有利尿作用；亦有一定镇痛作用。还有增强动物肾上腺皮质功能，增强机体免疫功能及镇静作用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

牡丹皮

【别名】丹皮、丹根、木芍药。

【来源】毛茛科植物牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr. 的干燥根皮。

【植物形态】落叶灌木，树皮黑灰色，分枝短而粗。主根粗而长，外皮灰褐色或棕色，有香气。叶互生，通常为2回3出复叶；小叶卵形或广卵形，顶生小叶通常3裂，侧小叶较小，斜卵形，不等2浅裂或掌状3裂，上面绿色，无毛，下面略带白色，中脉上疏生白色长毛。花单生于枝顶，大，萼片5，绿色，宿存；花瓣5或重瓣，白色、红色、紫色、黄色或黄红色，倒卵形，先端常2浅裂；雄蕊多数，花药黄色，花丝红色；雌蕊2～5，密生短毛，花柱短，柱头叶状；花盘杯状。蓇葖果卵形，绿色，被褐色短毛。花期5～7月，果期7～8月。

【生境分布】生于向阳及土壤肥沃处，常栽于庭园。现各地均有栽培，主产于安徽、四川等地。

【采收加工】栽培3～4年，于秋季叶枯时挖根，除去木心，晒干。

【药材性状】筒状、半筒状或破碎的块片，有纵剖的裂隙，略向内卷曲或张开，长5～20厘米，直径0.5～1.4厘米，厚0.2～0.4厘米。外表面灰褐色或黄褐色，有多数横长皮孔及细根痕，栓皮脱落处呈淡红色；内表面浅灰黄色或浅棕色，有明显的细纵条纹。质硬而脆，易折断，断面淡红色，较平坦，粉性，常见闪烁发亮的结晶。气芳香，味微苦而涩。

以条粗、肉厚、断面色白、粉性足、香气浓者为佳。

【性味功能】苦、辛，微寒。清热凉血、活血化瘀。

【临床应用】用于治疗温病热入血分而发斑疹、吐血、衄血等；温病后期热伏阴分、夜热早凉、舌红少苔脉细数；血滞经闭、痛经；以及跌打损伤、瘀滞疼痛；热毒、湿热瘀结所致之痈肿疮毒及内痈等。用量6～12克。本品性寒活血，血虚有寒、孕妇及月经过多者不宜用。

【现代研究】含有的酚类化合物牡丹酚、丹皮酚苷、丹皮酚原苷、丹皮酚新苷等均具有多种生理活性，具有生理活性的其他成分还有：单萜类化合物、芍药苷、羟基芍药苷、苯甲基芍药苷等。药理实验证明，本品具有抗心肌缺血、抗血栓形成、抗心律失常，以及镇痛、镇静、抗惊厥、退热、抗菌、抗炎等作用；并有提高体液免疫功能、抗变态反应等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

秦　皮

【别名】岑皮、秦白皮、蜡树皮、

【来源】[illegible]

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

厚 朴

【别名】庐山厚朴。

【来源】木兰科植物凹叶厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. var. *biloba* Rehd. et Wils. 的干皮、根皮及枝皮。

【植物形态】落叶乔木。叶互生；叶片椭圆状倒卵形，先端凹陷或2钝圆浅裂片。花与叶同时开放，单生枝顶；花梗密生丝状白毛；萼片与花瓣共9～12，肉质，几等长；雄蕊多数，螺旋状排列；雌蕊心皮多数，分离。聚合果长椭圆状卵形。花期4～5月，果期9～10月。

【生境分布】生于温暖、湿润气候、排水良好的酸性土壤。分布于江苏、安徽南部、江西等地。

【采收加工】宜于立夏至夏至间采集。根皮及枝皮直接阴干，干皮微煮后堆置阴湿处，“发汗”后蒸软取出，卷成筒状，干燥。

【药材性状】卷筒状，厚约0.4厘米，外表面淡棕色，多纵裂沟，皮孔大，开裂呈唇形。内表面紫棕色，有密集纹理。折断面层呈颗粒状，内层呈裂片状，于阳光下可见闪光的点状结晶。气芳香，味微苦。

【性味功能】苦、辛温。燥湿消痰、下气除满。

【临床应用】用于治疗湿阻中焦、脾胃气滞、脘腹胀满、肠胃积滞、脘腹胀痛、大便秘结、湿痰壅肺之咳喘等。用量3～9克。

【现代研究】活性成分为厚朴酚、和厚朴酚。

附 厚朴花

【来源】木兰科植物凹叶厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. var. *biloba* Rehd. et Wils. 的花蕾。

【采收加工】春末夏初采收，置笼中蒸至上气后约10分钟取出晒干。

【药材性状】呈圆锥形，苞片两层，表面深棕色或黑棕色，外层无毛茸，内层被灰绿色毛茸；花瓣9枚3轮；雄蕊多数，肉质，先端尖；雌蕊粗壮，肉质状，心皮多数，分离，先端稍尖。气香，味淡。

【性味功能】苦、温。理气化湿。

【临床应用】用于治疗湿阻气滞之脘腹胀满、疼痛等。用量3~6克。

【现代研究】主要有厚朴酚、和厚朴酚和樟脑等成分。含厚朴酚、和厚朴酚的含量不得少于0.20%。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

棕　榈

【别名】棕毛

【来源】棕榈科棕榈 *Trachycarpus fortunei* (Hook. f.) H. Wendl. 的叶鞘纤维。

【植物形态】常绿乔木。杆圆柱形，不分枝；叶簇生于杆顶；叶片圆扇形，开展时掌状，深裂至叶片的中部以上；叶柄质坚硬，两侧边缘具刺，柄基部有包茎的叶鞘，分裂为棕褐色纤维状毛（即棕衣）。肉穗状花序，自叶丛中抽出，下部有多数大形鞘状苞；花小，多数，淡黄色，单性，雌雄异株。核果球形或近肾形，具短柄，常有宿存的花被片；种子1。花期4～5月，果期11～12月。

【生境分布】生于山林疏林。主产于华东、华南、西南各地。

【采收加工】采棕时割取叶基肖，除去纤维状棕毛，晒干。

【药材性状】长条板状，一端有较窄而厚，另一端较宽而稍薄，大小不等。表面红棕色，粗糙，有纵直皱纹；一面有明显的凸出纤维，纤维的两侧着生多数棕色茸毛，质硬而脆，不易折断。气臭，味淡。

【性味功能】苦、涩，平。收敛止血、止痢止带。

【临床应用】用于各种出血症，尤多用于崩漏。用量3～9克。

【现代研究】取粉末1克，加水20毫升，加热5分钟，滤液用水释成20毫升，取滤液1毫升，加三氯化铁试液2～3滴，即生成污绿色絮状沉淀；另取滤液1毫升，加氯化钠明胶试液3滴，即显白色浑浊。

附 棕榈炭

【来源】棕榈科棕榈 *Trachycarpus fortunei* (Hook. f.) H. Wendl. 的叶柄炮制品。

【制法】将叶鞘纤维切成小片，煅炭用。

【药材性状】炭后外表焦黑色，外表焦褐色。


【性味功能】苦、涩，平。收敛止血、止痢止带。

【临床应用】用于各种出血症，用量3～9克。

【现代研究】炮制后止血作用较生用强。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





棕榈炭

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

皮类药材小常识

【分类】皮类药材通常是指裸子植物或被子植物：其中主要是双子叶植物：的茎干形成层以外部分入药的药材　通常称为“树皮”，主要包括木本植物树干皮和枝皮，少数为根皮。按植物学组织的分类，它由内向外包括次生和初生韧皮部、皮层和周皮等部分。

【采收加工】一般在春季至夏初采收　此时树皮养分及液汁增多，形成层细胞分裂较快，皮部和木部容易剥离，伤口较易愈合　如黄柏、厚朴、秦皮等。采皮时可用半环状剥取、条状剥取或砍树剥皮等方法。少数皮类药材于秋、冬季采收　如川楝皮、肉桂等，此时有效成分含量较高　根皮通常在挖根后剥取　或趁鲜抽去木心，如牡丹皮、五加皮等。

【鉴别要点】皮类药材形态较特殊，在鉴定时要特别注意观察皮片形态和折断面的特征，依据这些特征可判断皮内组织的组成和排列方式。

1．常见的药材皮片形状主要有

平坦：皮片比较平直，呈板片状，如杜仲、黄柏等

弯曲　皮片向内表面弯曲　皮的纵向通常保持平直状态　如秦皮等：

反卷：皮片向外表面略卷曲　因此皮的外层是在刀的一面，如石榴皮。

槽状：皮片向一面卷曲的程度较大　形成半管状，如地骨皮、苦楝皮等。

管状：又称筒状，皮片向一面卷曲　以至两侧相接，形成管子形状　这种形状常见于用抽心法（抽去木质部）制成的皮类中药，如牡丹皮等。

单卷状　皮片向一面卷曲　以至两侧重叠　如肉桂、香加皮、白鲜皮等。

双卷筒状：皮片的两侧各自向同一面卷起　如厚朴：

复卷状：几个单卷或双卷状的皮片互相重叠在一起，如锡南桂皮。

2．常见的折断面形状主要有：

平坦：比较平滑　没有显著的突起物，如牡丹皮、五加皮。

颗粒状　有颗粒状突起，如肉桂

纤维状：有细的纤维状物露出　如桑白皮

裂片状：有纤维性的小片，如合欢皮。

层状：断面呈片状　如苦楝皮等：

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



四、叶　类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大青叶

【别名】路边青叶

【来源】马鞭草科植物路边青 *Clerodendon cyrtophyllum* Turcz. 的叶

【植物形态】落叶灌木，枝条黄褐色，有圆形皮孔。叶对生；叶柄长可达8厘米；叶片卵形至椭圆形，全缘；侧脉5～7对，在近叶缘处向上弯曲。伞房状聚伞花序，顶或腋生，花白色，有柑橘香气；花萼粉红色，结果时增大，变为紫红色；花冠筒长，顶端5裂，裂片长。浆果球形，成熟时蓝紫色，有红色宿存花萼。夏季开花。

【生境分布】生于低山向阳的山坡路边或灌木丛中。分布于江苏、浙江、安徽等地。

【采收加工】夏季开花前采收叶，晒干。

【药材性状】叶片微皱褶，长卵形或狭长倒卵形，长5～15厘米，少数可达17厘米，宽2～6厘米，叶端尖或渐尖，基部钝圆，全缘，有的边缘有微波状刺。上表面色较浅，网状脉明显，脉上有疏毛；主、侧脉在上表面近平坦，在下表面均显著突出。纸质，质脆易碎。气微弱，叶稍苦而微涩。

【性味功能】苦、寒。清热解毒，凉血清斑。

【临床应用】用于治疗温病、血热发斑、壮热不退以及血热妄行的上部出血症等。煎服10～15克。

【现代研究】叶含黄酮苷、山大青苷，对大鼠有利尿作用，对大鼠蛋清性“关节炎”及右旋糖酐性“关节炎”均有明显的抗炎作用。此外，也含有靛玉红、靛蓝等成分。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

艾叶

【别名】艾蒿、香艾、冰台

【来源】菊科植物艾 *Artemisia argyi* Levl. et Vant. 的叶

【植物形态】多年生草本　全株密被白色茸毛，中部以上或仅上部有开展及斜花升的花序枝，叶互生，下部叶在花期枯萎；中部叶卵状三角形或椭圆形，基部急狭或渐狭成短或稍长的柄，或稍扩大而成托叶状；叶片羽状或浅裂，侧裂片约2对，常楔形，中裂片又常3裂，裂片边缘有齿，上面被蛛丝状毛、有白色密或疏腺点，下面被白色或灰色密茸毛；上部叶渐小，3裂或不分裂，无柄　头状花序多数，排列成复总状，花后下倾；总苞卵形；总苞片4～5层，边缘膜质，背面被绵毛；花带红色，多数，外层雌性，内层两性　瘦果无毛　花期7～10月，果期10～11月。

【生境分布】生于平原、丘陵、山地等路旁、荒野、沟边　全国大部分地区均产；以湖北蕲州产者为佳，称蕲艾

【采收加工】春、夏间花未开时采摘，晒干　生用或炒炭用　捣绒为艾绒，为灸法的主要用料

【药材性状】叶片多皱缩卷曲，常不完整　完整叶片阔卵形或长倒卵形，羽状浅裂或深裂，侧裂片多为2对，常楔形，裂片边缘有不规则粗锯齿，叶缘下延成叶柄　上表面黄绿色，或绿棕色，被稀毛，并密被白点（为非腺毛脱落之残柄），下表面灰绿色，密被灰白色绒毛，质较软，气清香，味苦

以叶厚、色青、背面灰白色、绒毛多，质柔软，香气浓郁者为佳。

【性味功能】辛、苦，温有小毒　温经止血、散寒止痛，

【临床应用】用于治疗虚寒性出血，尤宜于崩漏；下焦虚寒或寒客胞宫所致的月经不调、痛经、宫冷不孕、胎漏下血、胎动不安等；寒性咳喘；内痔出血属于虚寒者；泻痢腹乱，妇女带下等　用量3～10克

【现代研究】主要化学成分为挥发油，据报道：油中有9种成分，其中已鉴定出7种成分，以1，8-桉叶素含量最高　此外，还有黄酮类化合物及多种微量元素　本品具有止血作用；有抗菌作用；能增强网状内皮细胞的吞噬功能；并有镇咳、祛痰、平喘、抗过敏性休克及利胆作用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

牡荆叶

【别名】午时草、土常山、五指柑

【来源】马鞭草科植物牡荆 *Vitex negundo* L. var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz. 的新鲜叶

【植物形态】落叶灌木或小乔木，有香味。叶对生，间有3叶轮生；掌状5出复叶；总叶柄密被黄色细毛。圆锥状花序顶生或侧生，密被粉状细毛；小苞细小，线形，有毛，着生于花梗基部；花萼钟状；花冠上端裂成2唇，上唇2裂，下唇3裂；雄蕊4，2强，伸出花管；子房球形，柱头2裂。浆果黑色。花期7～8月，果期8～9月。

【生境分布】生于低山向阳的山坡路边或灌木丛中。主产于华东各省。

【采收加工】夏、秋两季均可采收，去除杂质，晒干。

【药材性状】多丁缩成团。展开后小叶5片或3片，披针形，中间小叶片长5～10厘米，宽2～4厘米，两侧小叶依次渐小，先端渐尖，基部楔形，边缘锯齿状，上表面绿色，下表面浅绿色，上、下表面有少量毛，沿叶脉有短茸毛。搓碎后气清香，味辛微苦。

【性味功能】微苦，辛，平。解表，祛痰，止咳，平喘。

【临床应用】用于治疗外感风寒，发热恶寒，头痛，肢节疼痛或咳嗽气喘等。用量3～5克。

【现代研究】含挥发油，其中主要成分为β-丁香烯等。具有镇静、祛痰、镇咳、平喘等作用，并有增强肾上腺皮质功能的作用。

附 牡荆油

【来源】马鞭草科植物牡荆 *Vitex negundo* L. var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz. 的新鲜叶片经水蒸气蒸馏得到的挥发油。

【采收加工】夏、秋两季采收新鲜叶片，经水蒸气蒸馏得到挥发油。

【药材性状】本品为淡黄色至橙黄色的澄清液体，具特殊的香气，味微味辣。本品能与无水乙醇、氯仿或乙醚任意混合，在水中几乎不溶。

【性味功能】祛痰，止咳，平喘。

【临床应用】用于治疗慢性支气管炎。一次20～40毫升。

【现代研究】挥发油的主要成分为β-丁香烯。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枇杷叶

【别名】巴叶。

【来源】蔷薇科植物枇杷 *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. 的叶。

【植物形态】常绿乔木，高3～8米。小枝密生锈色绒毛。叶互生，革质；叶片长倒卵圆至长椭圆形，先端尖，边缘上总有疏锯齿，基部楔形，表面多皱，下面及叶柄密被锈色绒毛。圆锥花序顶生，具淡黄色绒毛。花芳香；萼片5；花瓣5，白色；雄蕊20；子房下位，常5室，花柱5，离生。梨果卵形、扁圆形或长圆形，果皮橙黄色，果肉甜；种子棕褐色，有光泽。花期9～10月，果期次年4～5月。

【生境分布】多栽于村边、平地或坡地。分布于江苏、浙江、安徽等地。以江苏产量为大，通称“苏枇叶”。

【采收加工】全年可采，刷去叶背茸毛，晒干。生用或蜜炙用。

【药材性状】叶片长椭圆形，长12～30厘米，宽4～9厘米。叶端渐尖，边缘有疏锯齿，基部全缘。羽状网脉，中脉在下表面极为突出。叶上表面平滑或稍皱缩，有光泽，棕绿色或灰绿色；下表面密被锈色茸毛。叶柄短或近无柄。托叶2片或破损。叶革质。气无，味微苦。

【性味功能】苦，微寒。清肺止咳、降逆止呕。

【临床应用】用于治疗肺热咳嗽、胃热呕吐等。用量3～12克；止咳宜炙用，止呕宜生用。

【现代研究】新鲜枇杷叶含挥发油，其主要成分为橙花叔醇、金合欢醇、芳樟醇及其氧化物。本品还有多个二萜化合物、倍半萜化合物、单环倍半萜苷等。其中，已从中分离中具抗炎作用的新成分枇杷苷Ⅰ。止咳抗炎成分槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖苷。本品有抑菌、镇咳、祛痰、平喘、降血糖，抗炎、抗肿瘤等作用。枇杷叶含苦杏仁苷，在体内缓慢分解出氢氰酸有止咳作用，另一成分皂苷也是枇杷叶的止咳化痰主要成分。早期报道枇杷叶及苦杏仁苷有抗肿瘤活性，现已逐渐被否定。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

罗布麻叶

【别名】泽漆麻

【来源】夹竹桃科植物罗布麻 *Apocynum venetum* L. 的叶。

【植物形态】多年生草本。茎直立，无毛，叶对生，椭圆形或长圆状披针形，基部圆形，先端锐，边缘稍反卷；叶柄短。聚伞花序生于茎端或分枝上；萼5裂，裂片披针形或三角状卵形，被短毛；花冠粉红色或浅紫色，钟形，下部筒状；花盘边缘有蜜腺；雄蕊5，花药孔裂；雌蕊1，柱头2裂。果长角状，熟时黄褐色。种子多数，黄褐色，近似枣核形。花期6～7月，果期8～9月。

【生境分布】生于盐碱荒地、沙漠边缘及河滩、草滩、山坡沙质土、林缘湿地及多石的山沟等处。分布于江苏、安徽等地。

【采收加工】夏、秋季或开花前采摘嫩叶，阴干或蒸炒揉制后用。

【药材性状】多卷曲皱缩，有的破碎。完整叶片卵圆状披针形或椭圆状披针形，长2～5厘米，宽0.5～1.5厘米。叶端钝，有小尖芒，叶基钝圆或楔形，叶缘有细齿。上、下表面均浅绿色或灰绿色，主脉上于上表面处不明显，于下表面处突起，侧脉羽状，7～10对或更多。叶片薄，质脆，叶柄短而细。气无，味微苦。

【性味功能】甘、苦、凉。平肝安神、清热利水。

【临床应用】用于治疗肝阳上亢或肝热型高血压之头痛、眩晕及烦躁失眠；小便不利、水肿等。用量6～12克。注意不宜长期过量服用，以免中毒。

【现代研究】含黄酮苷等成分。黄酮类是其主要的有效成分，有槲皮素、异槲皮素、新异荭草苷、金丝桃苷、荭草苷等。煎剂有降压作用。药理实验证明，罗布麻叶有中枢镇静和镇痛作用；尤能改善眩晕、心悸、失眠等症状，对正常血压无影响，对血压偏低时有升压的调节作用。适用于轻、中度高血压患者；其浸膏能显著降低高血脂大鼠的血清胆固醇、三酰甘油；并能增强肾血流，具有较强利尿作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紫珠叶

【别名】止血草、老蟹眼、白毛柴

【来源】马鞭草科植物杜虹花 *Callicarpa formosana* Rolfe 的叶

【植物形态】落叶灌木，小枝被黄褐色星状毛。叶对生；叶片卵状椭圆形或椭圆形，基部钝圆形或阔楔形，上面有细小粗毛，下面有黄褐色星毛，侧脉8～12对，边缘有齿牙及细锯齿；叶柄密被黄褐色星毛。复聚伞花序腋生；萼钟形，4裂，裂片钝三角形，萼和柄均被星毛；花冠短筒状，4裂，紫色，无毛；雄蕊4，长于花冠两倍；雌蕊1，子房4室，花柱细长，高于雄蕊，柱头单一。小核果紫红色。花期夏、秋间。

【生境分布】生于林中或灌木丛中。分布于江苏、浙江、江西、福建等地。

【采收加工】夏、秋两季采摘，晒干。生用或鲜用。

【药材性状】多皱卷，有时破碎，展平后完整叶片卵状椭圆形，长6～14厘米，宽2.5～7厘米，顶端渐尖或短尖，边缘有细锯齿，近基部全缘，上面灰绿色或棕绿色，粗糙，下面淡绿色或淡棕绿色，被棕黄色腺点；叶柄长0.5～2.5厘米。无臭，味微苦涩。

【性味功能】苦、涩，凉。收敛止血、清热解毒。

【临床应用】用于血热所致各种出血症，尤以消化道、呼吸道出血效果较好；痈疽疮毒，毒蛇咬伤；热毒咽喉肿痛、目赤肿痛等。用量10～15克，鲜品30～60克。外用适量，鲜品捣敷或研末撒。本品性凉，虚寒性出血患者慎服。

【现代研究】含缩合鞣质、黄酮类、中性树脂、糖类、羟基化合物及镁、钙和微量铁盐等。能增加血小板，缩短出血、凝血酶原、血块收缩时间，使蛙肠系膜血管收缩；对大肠杆菌、弗氏痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌、链球菌等有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

叶类药材小常识

【分类】叶类药材是以植物叶入药的药材总称，多数为成熟的单叶，如枇杷叶、艾叶；也有用复叶的小叶，如番泻叶；尚有用嫩叶的，如苦竹叶。少数叶类药材是以带叶的枝梢入药的，如侧柏叶、颠茄和曼陀罗等。

【采收加工】多在植物光合作用旺盛期，开花前或果实未成熟前采收，如艾叶、臭梧桐叶等；但桑叶需初霜后采收。

【鉴别要点】植物的叶片一般都是比较薄的，中药用叶多为干燥品，往往皱缩，卷曲，在干燥、包装过程中，有的已破碎，因此，要观察叶类中药的特征，往往需要在水中浸润展开后才能鉴别。

鉴别叶类药材时，要注意到叶的形态、大小、色泽、表面观、叶脉、叶尖、叶缘、叶基、质地、叶柄的有无、长短，是否带有细嫩茎枝，以及气、味等。其中，叶类药材的颜色，是指大量药材所呈现的颜色，多为暗绿色至灰绿色，有时呈黄绿色或绿棕色，亦有特殊如紫苏叶，下表面为紫色。叶的表面观，一般指角质层的有无、厚薄，上、下表面毛茸的有无及分布；对日光透视时能否见到透明腺点（油室）及红棕色木栓斑点（如桉叶）；放大镜下观察是否见有凹点状腺鳞（如紫苏叶）。

此外，还应注意到叶鞘及托叶的有无，叶柄的有无及形状（平直、槽状、扭曲等），叶柄是否具翼（如紫苏叶）。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



五、花　类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

月季花

【别名】月月红

【来源】蔷薇科植物月季 *Rosa chinensis* Jacq. 的花。

【植物形态】常绿或半常绿灌木。茎枝有钩状皮刺或近无刺。小叶3～5，少数7，宽卵形或卵状椭圆形，先端急尖或渐尖，基部宽楔形至近圆形，边缘有锐锯齿，两面无毛；叶柄、叶轴散生皮刺和短腺毛；托叶大部和叶柄合生，边缘有睫毛状腺毛。花常数朵聚生或单生；萼裂片卵形，羽状分裂，边缘有腺毛；花瓣5或重瓣，红色或粉红色，很少白色；雄蕊多数，着生于花托边缘的花盘上；雌蕊多数，有毛，包于花托内。蔷薇果卵形或梨形，黄红色，内有多数瘦果，萼宿存。花期5～9月，果期8～11月。

【生境分布】野生于山坡、路旁。全国各地大多有栽培，主产于江苏、山东、山西、湖北等地。

【采收加工】夏、秋季节择晴日清晨露水干后采摘花蕾或半开放的花，及时摊开，阴干或低温干燥。

【药材性状】完整的花蕾多呈卵圆形或类球形，干燥花朵多呈圆球形，直径1～1.5厘米，有的杂有散碎花瓣。花托倒圆锥形或倒卵形，长5～7毫米，直径3～5毫米，棕紫色，基部较尖，常常带有花梗。萼片5枚，先端尾尖，大多向下反折，短于或等于花冠，背面黄绿色或橙黄色，有疏毛，内面被白色绵毛。花瓣5片或重瓣，覆瓦状排列，长2～2.5厘米，宽1～2.5厘米，紫红或淡红色，脉纹明显。雄蕊多数，黄棕色，卷曲，着生于花萼筒上。雌蕊多数，有毛，花柱伸出花托口。体轻，质脆，易碎。气清香，味微苦涩。

【性味功能】甘、温。活血调经。

【临床应用】用于肝气郁结而致月经不调、痛经、经闭、胸腹胀痛等。用量1.5～4.5克。不宜久煎；用量不宜过大，过量可引腹痛、多服久服可引起便溏腹泻。孕妇亦当慎用。外用治跌打损伤，血瘀肿痛及痈疽肿毒、瘰疬等症。

【现代研究】主要含挥发油，大部分为萜醇类化合物。有较强的抗真菌作用，已分离出其抗真菌的有效成分是没食子酸。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

西红花

【别名】藏红花、番红花

【来源】鸢尾科植物番红花 *Crocus sativus* L. 的干燥柱头

【植物形态】多年生草本，无地上茎。地下茎球形，自球茎生叶片9～15片，无柄，叶片线形，长15～20厘米，宽2～24毫米，叶缘反卷，在扩大镜下观察表面具细毛。基部由4～5片鞘状鳞片包围。花顶生，直径2.5～4厘米；花被不分化，6片，倒卵圆形，淡紫色，花筒细管状，长4～6厘米；雄蕊3，花药大，黄色，基部箭形；雌蕊3，子房下位，心皮3合生成3室，花柱细长，黄色，顶端3深裂，伸出花被外，下垂，紫红色，柱头顶端略膨大而漏斗状，边缘有不整齐的锯齿，一侧具一裂隙。蒴果，长圆形，具三钝棱，长约3厘米，直径约1.5厘米。种子多数，球形。

【生境分布】原产希腊和中东，现我国浙江、江苏、上海等引种成功。

【采收加工】10～11月份下旬，晴天早晨日刚出时采花，然后摘取柱头，随即晒干，或于55～60℃烘干。

【药材性状】干燥柱头为弯曲的细丝状，暗红色，顶端较宽，向下渐细似喇叭状，下端为残留的黄色花柱，顶端边缘显不整齐齿状，体轻，质松软，干燥后质脆易断。将柱头投入水中则膨胀，并散出色素，水染成黄色，气特异，味微苦。

【性味功能】甘，平。活血化瘀、凉血解毒、解郁安神。

【临床应用】用于经闭、产后瘀阻、温毒发斑、忧郁痞闷、惊悸发狂等。用量3～9克。孕妇忌服。

【现代研究】主要含有胡萝卜素和苦味素，系具药理活性物质。还含挥发油成分。胡萝卜色素为西红花的主要色素，含量约2%，主要系西红花苷元与各种糖所组成的各种糖苷。苦味素主要为西红花苦素。药理试验证明，本品有兴奋子宫、活血与止血、抗肾炎、抗动脉粥样硬化、抗癌、抗自由基氧化、促进视网膜动脉血流量等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

谷精草

【别名】流星草、移星草、鱼眼草

【来源】谷精草科植物谷精草 *Eriocaulon buergerianum* Koern. 的带花茎的头状花序。

【植物形态】一年生草本。叶簇生，线状披针形，先端稍钝，无毛。花茎多数，簇生，鞘部筒状，上部斜裂；头状花序半球形，总苞片倒卵形，苞片膜质，楔形，于背面的上部及边缘密生白色棍状短毛；花单性，生于苞片腋内，雌雄花生于同一花序上，有短花梗；雄花少数，生于花序中央，萼片愈合成佛焰苞状，倒卵形，侧方开裂，先端3浅裂，边缘有短毛；花瓣连合成倒圆锥形的管，先端3裂，裂片卵形，上方有黑色腺体1枚；雄蕊6，花药圆形，黑色；雌花多数，生于花序周围，几无花梗，花瓣3，离生，匙状，倒披针形，上方的内面有黑色腺体1枚；子房3室，各室具1胚珠，柱头3裂。蒴果3裂。花期6～8月，果期9～11月。

【生境分布】生于湖沼地、溪沟、田边潮湿处。分布于浙江、江苏、安徽等地。

【采收加工】秋季开花时采收，将花茎拔出，除去泥杂，晒干。

【药材性状】药材为带花茎的头状花序或带茎叶的全草，多扎成小把，少数散开。全体呈淡黄棕色。花茎纤细，长短不一，长14～24厘米，直径1毫米以下，淡黄绿色，具4～5条扭曲棱线，有光泽，质柔软。头状花序呈半球形，直径4～5毫米，底部有黄白色总苞，总苞片层层紧密排列呈盘状，有光泽，淡黄色，上部边缘密生白色短毛，花序顶部灰白色。用针层层挑开，可见有数十朵雄、雌花，揉碎后有多数黑色花药及细小黄绿色未成熟的果实。气微，味淡。

【性味功能】辛、甘，疏散风热，明目退翳。

【临床应用】用于治疗肝经风热所致之目赤肿痛，目生翳膜，暴明多泪，雀盲，头痛、齿痛、喉痹、鼻衄等。用量4.5～9克。

【现代研究】含谷精草素。本品水浸剂在试管内对奥杜盎氏小芽胞癣菌、铁锈色小芽胞癣菌等均有不同程度的抑制作用。毛谷精草水浸剂，也对絮状表面癣菌、羊毛状小芽胞癣菌等皮肤真菌有效。其煎剂对绿脓杆菌作用较强，对肺炎球菌和大肠杆菌作用弱。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

玫瑰花

【别名】红玫瑰、笔头花、湖花

【来源】蔷薇科植物玫瑰 *Rosa rugosa* Thunb. 的花蕾

【植物形态】小灌木，高约2米。茎直立，粗壮，丛生，多分枝，疏生皮刺，密被刺毛。单数羽状复叶互生，叶柄基部有长圆形托叶2，边缘有细锯齿；卵状椭圆形小叶5～9，边缘有锯齿，上面多皱，无毛，下面被短柔毛。花单生或3～6朵聚生茎顶，花梗有柔毛和腺毛；花萼裂片较瓣为长；花冠大，紫红色或白色，花瓣5或多数；雄蕊多数，不等长；雌蕊多数，为壶形花托所包被，瘦果扁球形，红色，具宿萼。花期5～6月，果期8～9月。

【生境分布】生于低山丛中及沟谷中。主产于江苏、浙江、山东、安徽等地。

【采收加工】4～6月间择晴天采摘花蕾或初开放的花，除去花柄及蒂，用文火迅速烘干或阴干。烘时宜将花摊成薄层，花冠向下，使其最先干燥，然后翻转再烘至干。

【药材性状】干燥花或花蕾略呈球形、卵形或不规则团块，直径1.5～2厘米。花托壶形或半球形，与花萼基部相连，花托无宿梗或有短宿梗。萼片5枚，披针形，黄绿色至棕绿色，伸展或向外反卷，其内表面（上表面）被细毛，显凸起的中脉。花瓣5片或重瓣，广卵圆形，多皱缩，紫红多线划，少数黄棕色。雄蕊多数，黄褐色，着生于花托周围。体轻，质脆。香气浓郁，味微苦涩。

【性味功能】甘、微苦，温。行气解郁，和血止痛。

【临床应用】用于治疗肝胃不和，胁痛脘闷，胃脘胀痛；月经不调，经前乳房胀痛；跌打损伤，瘀肿疼痛等。用量3～6克。

【现代研究】含挥发油，油中主要成分有β-香茅醇等。此外，还含庚醛、香茅醛等。本品有抗病毒、抗肿瘤、促进大鼠胆汁分泌等作用；还有维生素P样作用；并可解除小鼠口服酒石酸锑钾的毒性反应，同时可使酒石酸锑钾抗血吸虫作用消失。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

洋金花

【别名】南洋金花、闹洋花、风茄花。

【来源】茄科植物白曼陀罗 *Datura metel* L. 的花

【植物形态】一年生粗壮草本，有时呈半灌木状，全株近无毛。茎基部木质，上部叉状分枝。叶互生，上部叶近对生；叶片卵形至广卵形，全缘或有波状齿。花单生；花萼筒状，稍有棱纹，先端5裂；花冠白色，漏斗状，在蕾中对折而旋转，冠筒中部以下较小，淡绿色，有5棱，先端5裂，各棱达裂片尖端，两侧各有一纵脉，平行直达裂片边缘；雄蕊5，花药线形；雌蕊1，子房球形，2室，胚珠多数，花柱丝状，柱头盾形。蒴果生于倾斜的果柄上，扁球形，表面疏生短刺，熟时瓣裂，宿存萼筒基部呈浅盘状。花期3～11月，果期4～11月。

【生境分布】生于山坡草地、田间、路旁、水沟或住宅附近土质肥沃处。主产于江苏、浙江、福建等地。

【采收加工】4～11月花初开时采收，晒干或低温干燥。

【药材性状】药材大多已摘除花萼，少数留存。花萼筒状5裂，长5～5.5厘米，表面黄绿色，被毛茸。花冠漏斗状5裂；长12～13厘米；表面黄棕色，皱缩，陈旧者深棕色，裂片先端尖长，裂片之间稍有凹陷，花冠筒上有粗棱线5条，每棱两侧具一纵脉。雄蕊5个，长11.5～12.5厘米，花丝着生于花筒的基部，约1/2长贴生于花冠筒上，花药盾形或“个”字形，长13～14毫米；柱头稍低于花药不露出花冠。味稍苦。

【性味功能】辛，温，有毒。平喘止咳，镇痛，解痉。

【临床应用】用于治疗哮喘咳嗽；心腹疼痛及风湿痹痛、跌打损伤；癫痫及小儿慢惊风等。外用麻醉。用量0.3～0.6克；作卷烟吸，每日不超过1.5克；外用适量，煎汤洗或研末外敷。

表证未解、痰多粘稠者忌用；青光眼患者忌用。高血压、心脏病以及孕妇、体弱者，均应慎用。

【现代研究】洋金花含总生物碱达0.82%，主要为莨菪烷型生物碱：东莨菪碱及莨菪碱。《中华人民共和国药典》规定，本品的生物碱含量以东莨菪碱计，不得少于0.30%。应用HPLC，测定了不同采收期花中的东莨菪碱及莨菪碱的含量，结果以花盛开期为最高。本品有镇痛、抗心律失常、增加心血排出量、改善微循环、松弛平滑肌、祛痰、抗炎、抗氧化、抗溃疡等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

凌霄花

【别名】紫葳花

【来源】紫葳科植物凌霄 *Campsis grandiflora* (Thunb.) K. Schum. 的花

【植物形态】落叶木质藤本。羽状复叶对生；小叶7～9，卵形至卵状披针形，先端长尖，基部不对称。花橙红色，由3出聚伞花序集成稀疏顶生圆锥花丛；花萼钟形，质较薄，绿色，有10条突起纵脉，5裂至中部，萼齿披针形；花冠漏斗状，先端5裂，裂片圆形，开展；雄蕊4，2强；雌蕊1，子房上位，2室，基部有花盘。蒴果长如豆荚，顶端钝。种子多数。花期6～8月，果期7～11月。

【生境分布】生于山谷、小河边、疏林下，攀援于树上或石壁上。全国各地均有，主产于江苏、浙江等。

【采收加工】夏、秋季花开时采摘，晒干或低温干燥。

【药材性状】多皱缩或折叠，长5～8厘米。花萼钟形，长1～2.6厘米，筒部直径5～8厘米，灰绿色，质薄，先端5裂至中部；裂片披针形；顶端长而尖；中央有一条突起的纵脉纹；裂片相接处有一条不明显的纵脉纹。花冠外面淡黄棕色，内面红棕色；水浸软后展开呈漏斗状，先端5裂，裂片半圆形，宽3～4厘米，表面具棕红色脉纹。雄蕊4，2强，着生于花冠管中部，不伸出花冠外。雌蕊1，子房上位，2室，胚珠多数，柱头2裂，扁长圆形，常反卷。气微香，味微苦而后酸。

【性味功能】甘、酸，寒。行气去瘀，凉血祛风。

【临床应用】用于治疗血瘀经闭、癥瘕以及跌打损伤；血瘀崩漏、难产；痈疮、瘾疹、湿癣等。用量4.5～9克；外用适量，研末调涂。孕妇及气血虚弱者忌服。

【现代研究】含黄酮类、有机酸、猕猴桃碱、芦丁等。对福氏痢疾杆菌和伤寒杆菌有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com







更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

夏枯草

【别名】白花草、六月干、牛牯草。

【来源】唇形科植物夏枯草 *Prunella vulgaris* L. 的果穗

【植物形态】多年生草本。茎方形、基部匍匐，全株密生细毛。叶对生；近基部的叶有柄，下部叶无柄；叶片椭圆状披针形，全缘，或略有锯齿。轮伞花序顶生，呈穗状；苞片肾形，基部截形或略呈心脏形，顶端成长尾状渐尖形，背面有粗毛；花萼唇形，前方有粗毛，后方光滑，上唇长椭圆形，3裂，两侧扩展成半披针形，下唇2裂，裂片三角形，先端渐尖；花冠紫色或白色，唇形，下部管状，上唇作风帽状，2裂，下唇平展，3裂；雄蕊4，2强，花丝顶端分叉，其中一端着生花药；子房4裂，花柱丝状，小坚果褐色，长椭圆形，具3棱。花期5～6月，果期6～7月。

【生境分布】野生于荒坡、草地、溪边及路旁等湿润地。分布于江苏、安徽、浙江等地。

【采收加工】夏季当果穗呈棕红色时采下，除去杂质，晒干。

【药材性状】干燥果穗长圆柱形，长2～6厘米，直径0.8～1.5厘米。棕色至淡紫褐色。少数带有长短不一的花茎。果穗有多枚苞片和萼片，排列成覆瓦状。苞片淡黄褐色，横肾形，长约0.8厘米，宽约1.2厘米，两枚对生，轮状排列，膜质，有明显的深褐色脉纹，基部狭小呈楔状，顶端尖长尾状，外表面有白色粗毛。花萼唇形，长约1厘米，宽约0.5厘米，褐色；上唇2裂，裂片三角形，平滑，侧面具粗毛。小坚果卵圆形，淡褐色，有光泽，长约1.5毫米，直径约1毫米，顶端有小突起。质轻。气微，味淡。

【性味功能】苦、辛，寒。清火、明目、散结，消肿。

【临床应用】用于治疗痰火之瘰疬、瘿瘤，乳痈、乳癌；肝热之羞明流泪、高血压、头目眩晕；肺结核等。用量9～15克。

【现代研究】果穗中含齐墩果酸、熊果酸等。本品具有降压作用；据体外初步试验，其煎剂对痢疾杆菌、伤寒杆菌、霍乱弧菌、大肠杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌和葡萄球菌、链球菌有抑制作用，对某些常见的的致病性皮肤真菌也有些抑制作用；对小鼠的实验性结核病，可使肺部病变有所减轻。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

菊花

【别名】甘菊、甜菊花、家菊

【来源】菊科植物菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat. 的头状花序。

【植物形态】多年生草本。茎直立，基部常木化，上部多分枝，具细毛或柔毛。叶互生；叶片卵形至卵状披针形，边缘有粗大锯齿或深裂成羽状，基部楔形，下面有白色毛茸；具叶柄。头状花序顶生或腋生，总苞半球形，总苞片3～4层，外层绿色，条形，有白色绒毛，边缘膜质；舌状花，雌性，白色，黄色或淡红色等；管状花两性，黄色，基部常有膜质鳞片。瘦果无冠毛。花期9～11月。

【生境分布】栽培于气候温暖、阳光充足、排水良好的壤土或以沙质壤土、含腐殖质较多的土壤为宜。主产于浙江、安徽、河南及四川等地。

【采收加工】秋末冬初花盛开时，分批采收已开放的花。不同产地和不同商品规格采收加工方法不同。杭菊摘取花头后，有规则地平铺1～2层，上笼蒸3～5分钟后，再取出晒干。

【药材性状】碟形或扁球形，直径2.5～4厘米，常数个相连。总苞由3～4层苞片组成，苞片卵形或椭圆形，黄绿色或绿褐色，外被柔毛，边缘膜质。花托半球形。舌状花类白色或黄色，平展或微折叠，彼此粘结，通常无腺点。管状花较多，外露。瘦果不发育，无冠毛。体轻质柔润，干时松脆。气清香，味甘、微苦。

【性味功能】甘、苦，凉。散风清热、平肝明目。

【临床应用】用于治疗外感风热及温病初起发热、头昏痛等症；肝风头痛及肝阳上亢头痛、眩晕等症；肝经风热或肝火上攻之目赤肿痛及肝肾阴虚之目暗昏花；疔疮肿毒及皮肤疾患；冠心病、高血压病及高脂血症等，用量6～12克。

【现代研究】花含挥发油，油中主含龙脑、乙酸龙脑酯、樟脑、菊油环酮等，又含大车菊苷、氨基酸、黄酮类等。《中华人民共和国药典》规定，用HPLC法，以干燥品计算含绿原酸不得少于0.20%。本品具有解热、镇静及扩张冠状动脉，增加冠脉血流量，减轻心肌缺血状态的作用；并能降低血压，抑制局部毛细血管通透性而有抗炎等作用；对金黄色葡萄球菌、多种致病性杆菌及皮肤真菌、流感病毒PR3、钩端螺旋体均有一定的抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com







杭菊

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蒲黄

【别名】蒲草黄、蒲花、蒲棒花粉

【来源】香蒲科植物水烛香蒲 *Typha angustifolia* L. 的花粉

【植物形态】多年沼泽生草本。根茎横走，须根多。叶狭线形，半抱茎。花小，单性，雌雄同株，集合成圆柱状肥厚的穗状花序；雌雄花序离生，雄花序在上部，雌花序在下部，雌、雄花序的花被均退化成鳞片状或成茸毛。雄花具雄蕊2～3，毛长于花药，顶端单一或2～5分叉，花粉粒单生；雌花有小苞，匙形，与柱头等长，小包与花柱均较白为长，果穗长短变化很大，通常短于雄花序，褐色。坚果细小，无槽。花期6～7月，果期7～8月。

【生境分布】生于浅水中。分布于安徽、江苏、浙江等地。

【采收加工】6～7月花刚开时，剪取蒲棒顶端雄花序，晒干，碾研，除去花茎等杂质，所得带雄花的花粉称“草蒲黄”；再经细筛，所得纯花粉，习称“蒲黄”。

【药材性状】黄色粉末，质轻，入水飘浮水面，手捻之有滑润感，易附于手指上。气微，味淡。草蒲黄为蒲黄花粉与花丝、花药的混合物，花丝黄棕色，不光滑。在显微镜下，可见花粉粒单生，类球形，直径24～30微米，表面有似网状雕纹，单萌发孔不甚明显。

【性味功能】甘，平。止血，化瘀通淋。

【临床应用】用于各种出血症；瘀滞痛症，如瘀滞胸痛，胃脘疼痛，以及产后瘀痛、痛经；血淋、血痢等。用量4.5～9克。外用适量，研末撒或调敷。孕妇忌服。

【现代研究】主要含黄酮及甾类成分。此外，尚含有挥发油、多糖、酸类和烷类等化合物。本品具有降血脂及抗动脉粥样硬化作用；并有抗炎作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

花类药材小常识

【分类】花类药材是指以植物花入药的药材总称，药用部位主要包括完整的单花、或花的某一部分如雄蕊、花柱、柱头、花粉和整个花序等；在完整的单花中包括未开放的花蕾 如金银花、辛夷、丁香、槐米等和已开放的花，如洋金花、凌霄花等。药用花的某一部分的药材主要有雄蕊，如莲须；花柱和柱头 如玉米须、番红花；花粉 如松花粉、蒲黄等 药用花序主要有菊花、款冬花、密蒙花等。

【采收加工】一般不宜在花完全盛开后采收，开放过久几近衰败的花朵，不仅影响药材的颜色、气味，而且有效成分的含量也会显著减少 花类中药，有在含苞待放时采收的 如金银花、辛夷、丁香、槐米等；在花初开时采收的，如洋金花等；在花盛开时采收的，如菊花、番红花、红花则要求花冠由黄变红时采摘等，对花期较长，花朵陆续开放的植物，应分批采摘 以保证质量；有些药材如蒲黄、松花粉等不宜迟收，过期则花粉会自然脱落，影响产量。

【鉴别要点】花类药材鉴别时，完整花要注意观察花托、萼片、花瓣、雄蕊和雌蕊的数目及其着生位置 形状、颜色、被茸毛与否、气味等；花序除单朵花的观察外，还需注意花序类别、总苞片或苞片等；花的某一部分注意区分是花的哪一个部位 再仔细观察。花类药材由于经过采收、干燥运输等 常皱缩、破碎而变形，如果肉眼不易辨认的 需将干燥的药材先放入水中浸泡后，再用放大镜或解剖镜来识别。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



六、果实及种子类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

刀豆

【别名】挟剑豆、刀豆子、大刀豆

【来源】豆科植物刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. 的成熟种子。

【植物形态】一年生缠绕草质藤本。茎无毛。3出复叶；顶生小叶片阔卵形，先端急尖或渐尖，基部阔楔形；侧生小叶偏斜，基部圆形；托叶小。总状花序腋生，花疏，有短梗；花萼钟状，二唇形，上唇2裂片大而长，下唇3裂片小而不明显；花冠淡红色或淡紫色，蝶形，旗瓣圆形，翼瓣较短，约与龙骨瓣等长，龙骨瓣弯曲；雄蕊10，连合为单体；子房具短柄。荚果大而扁，被伏生短细毛，边缘有隆脊，先端弯曲成钩状，内含种子10～14粒；种子红色或粉红色，扁平而光滑。花期6～7月，果期8～10月。

【生境分布】栽培于气候温暖地带。主产于江苏、安徽、湖北、四川等地。

【采收加工】秋季果实成熟时，采收果实，晒干剥取种子，或先剥取种子后晒干。

【药材性状】种子扁卵形或扁肾形，长2～3.5厘米，宽1～2厘米，厚0.5～1.5厘米。表面淡红色、红紫色或黄褐色，少数类白色或紫黑色，略有光泽，微皱缩，边缘具灰黑色种脐（习称"黑眉"），长约种子的3/4，宽约2毫米，其上有类白色膜片状珠柄残余，近种脐的一端有凹点状珠孔，另端有深色的合点，合点与种子脐间有隆起的种脊。质硬，难破碎。种皮革质，内表面棕绿色，平滑，子叶黄白色，胚根位于珠孔一端，伸向一侧。气微，味淡，嚼之具豆腥气。


【性味功能】甘，温。温中、下气、止呕。

【临床应用】用于治疗脾胃虚寒所致呃逆、呕吐、肾虚腰腿酸痛无力等。用量4.5～9克。

【现代研究】本品所含刀豆球蛋白是植物凝血素，具有强力的促有丝分裂作用，能较好促淋巴细胞转化反应，选择性激活抑制性T细胞；刀豆毒素还有脂氧酶激活作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



（夏同珩提供）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山　楂

【别名】映山红果、山梨、酸楂

【来源】蔷薇科植物山楂 *Crataegus pinnatifida* Bge. 的果实。

【植物形态】为落叶乔木或大灌木　树皮暗棕色，枝条无刺或有稀刺。单叶互生；有卵圆形至卵状披针形托叶；叶片阔卵形、三角卵形至菱状卵形，边缘有5～9羽状裂片，两面脉上均被短柔毛　花10～12朵成伞房花序；萼筒钟状，萼片5；花冠白色，花瓣5；雄蕊约20；雌蕊1。果球形或卵圆形，深红色，具多数黄白色斑点，顶端有宿存花萼　花期5～6月，果期8～10月。

【生境分布】生于山坡、河边杂木林中　主产于河南、江苏、浙江、安徽等地。

【采收加工】秋季果实成熟时采摘，把山楂横切成薄片，立即晒干。

【药材性状】颗粒圆形或长圆形，直径1～1.4厘米　表面棕红色至暗红色，疏生白色圆形斑点。顶端有宿存萼，萼筒深凹，基部有果柄痕　商品多加工成横切或纵切片，厚2～6毫米，皱缩不平，种子（果核）3-4-5粒或已脱落，质硬，长肾形，背部略拱起，中央有一条沟和两条棱脊，气微香，味酸。

【性味功能】酸、甘，微温　消食健胃、行气散瘀

【临床应用】用于治疗肉食积滞、脘腹胀痛或泄泻、气滞血瘀所致的胸腹疼痛、痛经、泻痢腹痛、疝气痛及高脂血症、冠心病心绞痛及高血压等　用量6～12克

【现代研究】山楂主要含有机酸和黄酮类化合物。其中，有机酸是山楂消食导滞的有效成分，黄酮类化合物是防治心血管病及降血脂的活性成分。德国将山楂作为治疗心血管疾病的药物载入药典，以缩合黄烷做为质量标准　本品能增加胃中消化酶的分泌，促进脂肪的分解；能收缩子宫、强心、抗心律失常、增加冠脉血流量、抗张血管、降血压、降血脂；对痢疾杆菌、大肠杆菌等有较强的抑制作用；对预防肝癌也有一定意义。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山茱萸

【别名】山萸肉、枣皮、实枣儿

【来源】山茱萸科植物山茱萸*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. 的成熟果肉。

【植物形态】落叶灌木或小乔木，树皮淡褐色，片状剥落，枝皮灰棕色，小枝无毛。单叶对生，具短柄；叶片椭圆形或长椭圆形，先端渐尖，基部圆或楔形，全缘，上面疏生平贴毛，下面粉绿色，毛较密，侧脉6～8对，脉腋有黄褐色毛丛。伞形花序，簇生于小枝顶端，其下具数片芽鳞状苞片；花小，先叶开放；花萼4，不显著；花瓣4；黄色；雄蕊4；子房下位。核果长椭圆形，无毛，成熟后红色；种子长椭圆形，两端钝圆。花期5～6月，果期8～9月。

【生境分布】生于向阳山坡、溪边的杂木林中。主产于浙江、安徽等地。

【采收加工】秋季霜降后，果实变红时采摘，采后除去枝梗和果柄，用文火烘焙，冷后，取肉去果核，再晒干或文火烘干。

【药材性状】果肉多破裂，皱缩而压扁，呈不规则片状或囊状，长1～1.7厘米，厚约1毫米。表面紫红色或紫黑色（久放者），有光泽，顶端具圆形宿存萼痕，基部有果柄或果柄痕，质软韧。气微，味酸带苦涩。

【性味功能】酸、涩，微温。补益肝肾，涩精固脱。

【临床应用】用于治疗肝肾亏虚之头晕目眩、腰膝酸软、阳痿；遗精、遗尿；崩漏下血及月经过多；大汗不止、体虚欲脱；消渴症等。用量6～15克。

【现代研究】果实提取物经分析有9种单萜类、6种脂肪醛、5种脂肪烃、7种酸、8种酯和5种芳香族化合物。可应用比色法测定熊果酸的含量；应用HPLC测定番木鳖苷的含量、马钱素的含量。本品有利尿、降压、降血糖、抗炎、抑制血小板聚集及抗血栓等作用；煎剂对痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌有抗菌作用，对某些皮肤真菌有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

千金子

【别名】千两金、续随子

【来源】大戟科植物续随子 *Euphorbia lathyris* L. 的成熟种子。

【植物形态】二年生草本，全株微被白霜，内含乳汁。单叶交互对生；茎下部的叶较密，叶由下而上渐增大，呈披针形，先端锐尖，基部略呈心形而多少抱茎，全缘。花单性，顶生杯状聚伞花序，伞梗2～4，基部轮生叶状苞片2～4，每伞梗再叉状分枝，分枝处对生卵状披针形苞叶2片；杯状总苞4～5裂，裂片三角状披针形；雄花多数，每花具雄蕊1；雌花1朵。蒴果近球形，有黑白两色相杂斑纹。花期4～7月，果期7～8月。

【生境分布】生于向阳山坡。分布于河南、浙江等地。

【采收加工】秋季种子成熟后，割取全草，晒干，打下种子，去壳取仁，即千金子。将仁碾碎，用布包严，置蒸笼内蒸热，压榨去油，即千金霜。

【药材性状】种子椭圆形或倒卵形，长约5毫米，直径约4毫米，表面灰褐色或灰棕色，有规则的网状皱纹，网纹凹下部分灰黑色，形成细斑点。一侧有纵沟状种脊，上端有突起的合点，下端有一灰白色线形种脐，长约1毫米，基部有类白色突起的种阜，常已脱落，留有圆形疤痕。质坚脆。种仁黄白色，胚乳丰富，油性，胚直，细小。气无，味辛。

【性味功能】辛，温。有毒。逐水消肿，破血散瘀。


【临床应用】用于治疗水肿、二便不利、癥瘕痞块、瘀阻经闭、疥疮癣癖、痈肿、毒蛇咬伤、疣赘等。内服制霜，入丸散，0.5～1克。外用适量，捣敷或研末醋调敷。虚弱者及孕妇忌用。

【现代研究】种子含脂肪油约48%，其中含油酸、棕榈酸、亚油酸等的甘油酯及多种三萜醇酯等。此外，还含有游离的三萜醇、香豆精类成分、千金子甾醇等。本品所含脂肪油，可刺激肠管，从而产生腹泻，其致泻强度为蓖麻的3倍；含有的瑞香素有镇痛作用，其治疗指数为20.9，其疗效略低于磷酸可待因，作用安全。有抗炎、抗菌、抗肿瘤等药理作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

女贞子

【别名】冬青子、女贞实、白蜡树子

【来源】木犀科植物女贞 *Ligustrum lucidum* Ait. 的成熟果实

【植物形态】常绿大灌木或小乔木，树皮灰色，枝条光滑，具皮孔。叶对生，叶柄上面有槽；叶片革质，卵形至卵状披针形，先端渐尖至锐尖，基部阔楔形，全缘，上面深绿色，有光泽，下面淡绿色，密布细小的透明腺点，主脉明显，圆锥花序顶生；总花梗长；苞片叶状，线状披针形，无柄，早落，小苞卵状三角形；花萼钟状，4浅裂；花冠管约与萼片等长，裂片4，长方卵形，白色；雄蕊2，着生于花冠管喉部，花丝细，伸出花冠外；雌蕊1，子房上位，球形2室，花柱圆柱状，柱头浅2裂。浆果状核果，长椭圆形，幼时绿色，熟时蓝黑色；种子1～2枚，长椭圆形。花期6～7月，果期8～12月。

【生境分布】生于温暖湖湿的地区或山坡向阳处。主产于浙江、江苏、福建等地。

【采收加工】冬季果实成熟时采收，稍蒸或置沸水中略烫后，干燥。生用或酒制用。

【药材性状】多数果实椭圆形或肾形，长径4～8毫米，短径2.5～4毫米。表面黑紫色或棕黑色，皱缩不平，基部有果梗或具宿萼及短梗。外果皮薄，中果皮稍厚而松软，内果皮木质，显黄棕色，表面有数个纵棱。横切面子房2室，每室有种子1枚，另一常不发育。种子椭圆形，一侧扁平或微弯曲。商品中尚有少数果实具两个种子，其果实宽椭圆形，不弯曲，长径7～10毫米，短径5～6毫米，表面皱缩较少，种子椭圆形，两种子结合面略平。气微，味微酸涩。

【性味功能】甘、苦，凉。滋补肝肾，明目乌发。

【临床应用】用于治疗肝肾阴虚而致耳鸣、耳聋、头晕、腰膝酸软、须发早白等症。用量6～12克。

【现代研究】主要活性成分为三萜类化合物，主要有齐墩果酸、乙酰齐墩果酸等。本品有升高外周白细胞、增强网状内皮系统吞噬能力、增强细胞免疫和体液免疫的作用；对化疗或放疗所致的白细胞减少有升高作用；有强心、利尿及保肝作用；并有止咳、缓泻、抗菌、抗癌等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

木鳖子

【别名】藤桐、土木鳖、漏苓子。

【来源】葫芦科植物木鳖 *Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng. 的成熟种子

【植物形态】多年生草质藤本，具膨大的块状根。茎有纵棱；卷须粗壮，与叶对生，单一，不分枝。叶互生；叶片圆形至阔卵形，通常3浅裂或深裂，裂片略呈卵形或长卵形，全缘或具微齿，基部近心形，先端急尖，上面光滑，下面密生小乳突，3出掌状网脉；叶柄具纵棱，在中部或近叶片处具2～5腺体。花单性，雌雄同株，单生叶腋，花梗细长，每花具1片大型苞片，黄绿色；雄花：萼片5，单质，粗糙，卵状披针形，基部连合，花瓣5，浅黄色，基部连合，雄蕊5，愈合成3体；雌花：萼片线状披针形，花冠与雄花相似，子房下位，瓠果椭圆形，成熟后红色，肉质外被软质刺突；种子略呈扁圆形或近椭圆形，边缘四周具有不规则的突起，呈龟板状，灰棕色。花期6～8月，果期9～11月。

【生境分布】生于山坡灌木林中、林缘、河岸土层较深厚的地方。分布于安徽、浙江、福建等地。

【采收加工】9～11月果实成熟时采摘，剖开果实，晒至半干，剥取种子；或装入盆钵内，待果皮近于腐败时将果皮弄烂，用清水淘洗，除去瓤肉及外膜，取出种子，晒干或烘干。

【药材性状】种子扁半圆板状或略呈三角状，两侧多少稍对称，中间稍隆起或微凹下，长2～4厘米，宽1.5～3.5厘米，厚约5毫米。表面灰棕色至棕黑色，粗糙，有凹陷的网状花纹或仅有细皱纹，周边有数十个排列不规则的粗齿，较大的两个齿状突起上有浅黄色种脐。外壳质硬而脆，内种皮甚薄，其内为两片肥大子叶，黄白色，富油性。有特殊的油腻气，味苦。

【性味功能】苦、微甘，凉。有毒。散结消肿、攻毒疗疮。

【临床应用】用于治疗痈疽疔疮、瘰疬、痔疮、无名肿毒、头癣、牛皮癣等。用量0.9～1.2克；研末调敷。孕妇及体虚者忌用。

【现代研究】含多种皂苷。本品有抗炎、降压、抗肿瘤、增强免疫等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

木瓜

【别名】光皮木瓜、铁脚梨、木瓜实

【来源】蔷薇科植物木瓜 *Chaenomeles sinensis* (Touin)Koehne 的成熟果实

【植物形态】为大灌木或小乔木；小枝紫红色或紫褐色，仅嫩枝被柔毛。叶互生，纸质，椭圆状卵形或椭圆状长圆形，顶端常短尖，基部楔形，边缘密生芒刺状锐利锯齿，齿的顶端具腺体，嫩叶被绒毛；叶柄长常不过1厘米，有腺体。花春季开放，粉红色，有长5～10毫米的花梗，单生叶腋，萼钟状，无色，裂片渐尖，稍反折；花冠大；雄蕊多数；花柱4或5，基部合生。梨果的轮廓近椭圆形，木质，近褐色，成熟时有香气，5室；种子多数。

【生境分布】各地常见栽培，主产于华东、华中及西南各地

【采收加工】9～10月采收成熟果实，置沸水中煮5～10分钟，捞出，晒至外皮起皱时，纵剖为2或4块；再晒至颜色变红为度

【药材性状】果实长圆形，多纵剖成2～4瓣。外表面红棕色，光滑无皱或稍粗糙，剖开面较饱满，果肉粗糙，显颗粒性。果肉横切面可见花托部分皮层占整个果肉厚度的2/3以上。种子密集多数，每室40～50颗，扁三角形。气微，果肉微酸涩


【性味功能】酸、温。平肝舒筋、和胃化湿

【临床应用】用于治疗风湿痹痛、筋脉拘挛、脚气肿痛、胃失和降而致呕吐、寒湿泄泻、湿滞痢疾等。用量6～9克

【现代研究】含苹果酸、酒石酸、柠檬酸、抗坏血酸、反丁烯二酸和皂苷等。木瓜水煎剂能抑制小鼠因蛋清注射引起的关节肿胀；可减轻实验性急性肝损伤大鼠的肝细胞肿胀、变性、坏死，促进肝细胞修复，并能降低血清谷丙转氨酶活性。水煎液或醇提取物对小鼠艾氏腹水癌生长有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

车前子

【别名】车前实、凤眼前仁。

【来源】车前草科植物车前 *Plantago asiatica* L. 的种子。

【植物形态】多年生草本。叶基生，具长柄；叶片。穗状花序匙形花萼4，基部稍合生；花冠管卵形，先端4裂；雄蕊4，与花冠裂片互生；雌蕊1，蒴果卵状圆锥形。花期6～9月，果期7～10月。

【生境分布】生于山野、路旁、田埂及河边等地。分布全国各地。

【采收加工】秋季果实成熟时割取果穗，晒干后搓出种子。

【药材性状】长圆形稍扁或椭圆形，一端略尖，边缘较薄，长 1.05～2.20毫米，宽0.65～1.20毫米。表面黑棕色或棕色，略干皱缩粗糙。放大镜下可见背面微隆起，腹面略平坦，中央或一端有黑色（或白色）凹入的脐点。切面可见乳白色的胚乳及胚。种子放水中，外皮有粘液释出覆盖种子。气微，嚼之稍有粘性。

【性味功能】甘，微寒。清热利尿、渗湿通淋、明目、祛痰。

【临床应用】用于治疗热淋、石淋、小便不通、淋浊、水肿、湿盛所致的水泻、目赤障翳、风热目暗涩痛等。用量9～15克。

【现代研究】含桃叶珊瑚苷、具降糖作用的车前子粘多糖A等。具有利尿、祛痰、止咳、平喘、利尿排石、降低眼压等作用。

附 车前草

【别名】车轱辘菜。

【来源】车前草科植物车前 *Plantago asiatica* L. 的全草。

【采收加工】夏季采挖，除去泥土，晒干。

【药材性状】根丛生、须状。叶基生，具长柄，叶片皱缩，展开后卵形或宽卵形，具基出脉7条，表面灰绿色。穗状花序数条，花排列疏离。蒴果椭圆形，萼宿存。气微香，味微苦。

【性味功能】甘，寒。清热利尿、祛痰、凉血、解毒。

【临床应用】用于治疗水肿尿少、热淋涩痛、咳嗽痰多等。用量9～30克。

【现代研究】主要含苯丙素苷类：车前草苷A、B、C、D、E、F等，并含有桃叶珊瑚苷等黄酮类成分。具有利尿、祛痰、止咳、平喘等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





车前子



车前草

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乌 梅

【别名】梅实。

【来源】蔷薇科植物梅 *Prunus mume* Sieb. et Zucc. 的近成熟果实。

【植物形态】落叶乔木。树皮淡灰色或淡绿色，多分枝。单叶互生；有叶柄，通常有腺体；嫩枝叶柄基部有线形托叶2片，托叶边缘具不整齐细锐锯齿；叶片卵形至长圆状卵形，先端长尾尖，基部阔楔形，边缘具细锐锯状齿，沿脉背呈褐黄色。花单生或2朵簇生，白色或粉红色；芳香；通常先叶开放；有短梗；苞片鳞片状，褐色；萼筒钟状，裂片5，基部与花托合生；花瓣单瓣或重瓣，通常5片，阔倒卵形；雄蕊多数，生于花托边缘；雌蕊1，子房密被毛，花柱细长，弯曲。核果球形，一侧有浅槽，被毛，绿色，熟时黄色，核硬，有槽纹，花期1～2月，果期5～6月。

【生境分布】主产于浙江、福建、云南等地。

【采收加工】5、6月果青黄色时采收，按大小分开，分别炕焙，火力不宜过大，温度保持在40℃左右。焙至果肉呈黄褐色起皱皮为度。焙后再焖2～3天，待变成黑色即可。

【药材性状】核果类球形或扁球形，直径2～3厘米，表面棕黑色至乌黑色，极皱缩，于扩大镜下可见毛茸，基部有圆形果梗痕。果肉软或略硬，果核坚硬，椭圆形，棕黑色，表面有凹点，内含卵圆形、淡黄色种子1粒。具焦糖气，味极酸而涩。


【性味功能】酸、涩，平。敛肺、涩肠、生津、安蛔。

【临床应用】用于治疗肺虚久咳、久泻、久痢、蛔厥腹痛、呕吐、虚热消渴、崩漏下血、疮毒等。用量6～12克。外用适量，捣烂或炒炭研末外敷。

【现代研究】乌梅含有72种挥发油成分、有机酸、氨基酸及多糖。用酸碱滴定法测定乌梅中枸橼酸的含量，按干燥品计算，含有机酸以枸橼酸计，不得少于15.0%。药理实验证明，能使胆囊收缩，促进胆汁分泌，并有抗蛋白过敏作用；对多种致病菌有抗菌作用，对各种皮肤真菌亦有抑制作用；有驱蛔虫的作用；有抗疲劳、抗衰老、抗辐射等作用。

下载

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石榴皮

【别名】石榴壳、安石榴、酸石榴皮。

【来源】石榴科植物石榴 *Punica granatum* L. 的成熟果皮。

【植物形态】落叶灌木或小乔木，树皮通常青灰色或淡黄绿色，有皱纵纹及横皮孔；幼枝近圆形或微四棱形，顶端常呈刺状，无毛，叶对生或簇生，具短柄；叶片矩圆状披针形至矩圆状椭圆形，先端渐狭，全缘，上面有光泽，无毛，下面有隆起的主脉。花梗单生或数朵生于小枝顶端或叶腋，花大；花萼钟状，肉质而厚，红色，下部与子房合生，顶端5～8裂，裂片三角状卵圆形，外面有乳突状突起，宿存；花瓣红色，与萼片同数而互生，倒卵形，基部渐狭，有皱纹，雄蕊多数，着生于萼筒喉部周围，花药淡黄色，椭圆形，背着；雌蕊1，子房下位或半下位，上部6室，具侧膜胎座，下部3室，具中轴胎座，花柱单一，有时3枚分离，柱头2～3裂。浆果近圆形，果皮肥厚革质，熟时红色或黄带红色，顶端有宿存花萼，内具薄膈膜，种子多数，倒卵形，有棱角，具红色肉质多汁的外种皮，内种皮革质，坚硬。花期5～6月，果期7～8月。

【生境分布】生于向阳和排水良好的肥沃土壤，为庭园常见的栽培树种，分布于福建、台湾、广东、广西等地。

【采收加工】秋季果实成熟后，收集果皮，晾干或晒干。

【药材性状】不规则的片状或瓢状，大小不一。外表面红棕色、棕黄色或暗棕色，略有光泽，粗糙，有多数疣状突起，有的有突起的筒状宿萼及粗短果梗或果梗痕。内表面黄色或红棕色，有隆起，呈网状的果蒂残痕。质硬而脆，断面黄色，略显颗粒状。无臭，味苦涩。


【性味功能】酸、涩，温。涩肠止泻、止血、驱虫。

【临床应用】用于治疗久泻、久痢、便血、脱肛、崩漏、白带、虫积腹痛等。用量3～9克。

【现代研究】果皮含鞣质、蜡、甘露醇、粘液质、没食子酸、苹果酸、果胶、菊糖、石榴皮碱、异石榴皮碱等。其煎剂体外实验具抗菌、抗病毒作用；石榴皮碱是驱虫的主要有效成分，对绦虫的杀灭作用最强，能使其肌肉陷入持久收缩。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

龙眼肉

【别名】龙肉、桂圆、龙眼干

【来源】无患子科植物龙眼 *Dimocarpus longan* Lour. 的假种皮

【植物形态】常绿乔木，幼枝被锈色柔毛；双数羽状复叶，互生；小叶2～5对，通常互生，革质，椭圆形至卵状披针形，先端短尖或钝，基部偏斜，全缘或波浪形，暗绿色，嫩时褐色，下面通常粉绿色。花两性，或单性花与两性花共存；为顶生或腋生的圆锥花序；花小，黄白色，被锈色星状小柔毛；花萼5深裂，裂片卵形；花瓣5，匙形，内面有毛；雄蕊通常8；子房2～3室，柱头2裂。核果球形，外皮黄褐色，粗糙，假种皮白色肉质，内有黑褐色种子1颗。花期3～4月，果期7～9月。

【生境分布】适宜生长于热带和亚热带气候，多栽培于丘陵地和园圃。主产于福建、台湾等地。

【采收加工】7～9月果实成熟时采摘，烘干或晒干，取肉去核，晒至干爽不粘，或将采收的果实，去果皮及核，果肉直接晒干。

【药材性状】不规则块片或圆筒块片，常相互粘结成团，片长1～1.5厘米，宽1～4厘米，厚约1毫米。棕褐色，半透明，外面（靠果皮的一面）皱缩不平，内面（紧贴种子的一面）光亮，有细纵波纹。质柔润，有粘性。气微香，味甚甜。

【性味功能】甘，温。补益心脾、养血安神。


【临床应用】用于治疗心脾虚损之心悸、健忘、泄泻、水肿等；气血不足而致失眠、崩漏、经行眩晕；肺阴亏虚、肺失润降而致干咳、痰少粘白，声音嘶哑，口干咽燥等。用量10～15克。

【现代研究】含葡萄糖26.91%，含酒石酸、蔗糖、脂肪等。另含多种维生素。提取液能抑制小鼠脑（肝）的MAO-B活性，有抗衰老作用；水提液在试管内对奥杜盎氏小芽孢癣菌有抑制作用；水煎液对痢疾杆菌有抑制作用。临床用于滋补、内耳眩晕、消化系统疾病及冠心病等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com







更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬葵果

【别名】葵菜子、马蹄菜

【来源】锦葵科植物冬葵 *Malva verticillata* L. 的成熟果实

【植物形态】一年生草本，茎直立，被疏毛或几无毛。叶互生，掌状5～7浅裂，圆肾形或近圆形，基部心形，边缘具有钝锯齿。花小，从生于叶腋，淡红色；萼5裂，裂片广三角形；花冠5，倒卵形，先端凹入；雄蕊多数，花丝合生。果实扁圆形。种子小，近肾形，黑色。花期4～5月，果期7月。

【生境分布】生于平原旷地、村落附近、路旁、田埂、山脚或山坡向阳较温润处。我国各地均有分布。

【采收加工】夏秋两季果实成熟时采收，除去杂质，阴干。

【药材性状】果实扁球形盘状，由10～12个小分果组成，直径4～7毫米；外被膜质宿萼，钟状，先端5齿裂，裂片内卷，其外有披针状小苞片3枚。果梗细短。分果类扁圆形，直径1.4～2.5毫米，表面黄白色或黄棕色，具隆起的环向细脉纹。种子肾形，棕黑色或黑褐色。质坚硬，气微，味淡。

【性味功能】甘、涩、凉。清热利尿、消肿。

【临床应用】用于治疗热淋、血淋、石淋、妇女子淋、产后小便淋沥不通，水肿胀满，小便不利证，乳汁不通，胀痛，肠燥便秘等。用量3～9克。不品脾虚肠滑者忌服；孕妇慎服。

【现代研究】种子含脂肪油及蛋白质。脂肪油含量达15%～20%，有的达30%；并含中性多糖、酸性多糖及肽聚糖。冬葵果实分离的中性多糖成分MVS-1和多种多糖对网状内皮系统有激活作用和抗补体活性；70%冬葵果醇提物、水提物（300毫克/毫升）体外对痢疾杆菌有明显抑菌作用。过量服用本品，可引起中毒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白　果

【别名】银杏核、公孙树子、鸭脚树子

【来源】银杏科银杏 *Ginkgo biloba* L. 的除去外种皮的成熟种子

【植物形态】落叶高大乔木，树干直立，叶簇生于短枝或螺旋状散生于长枝上；叶片扇形、脉叉状分枝；叶柄长。花单生异株，种子核果状，椭圆形至近球形，成熟时金黄色，外种皮肉质，熟时橙黄色，内种皮骨质，白色，花期4～5月，果期9～10月。

【生境分布】我国华东、华北、华南地区等地均有种植

【采收加工】秋季采收，除去外种皮，洗净，稍蒸或煮后烘干或晒干。

【药材性状】椭圆形或倒卵形，外壳（中果皮）骨质，光滑，长约0.5毫米，表面乳白色，两面隆起，两侧边缘各有1条纵棱，偶有3纵棱，顶端有一圆形突起，其中央为珠孔，基部渐尖，具小突起或无，内种皮为层红褐色薄膜，种仁扁球形，淡黄绿色，胚乳肥厚，粉质，中央为1细长条形的胚，白色子叶2枚，气微清香，味微甘、苦。

【性味功能】甘、苦、涩，平。有毒。敛肺定喘、止带浊、缩小便。

【临床应用】用于治疗哮喘痰嗽、带下、白浊、小便频数、遗尿等。用量4.5～9克。本品有毒，不可多用，小儿更应注意。

【现代研究】种子含银杏毒素等。本品有抗菌、祛痰、清除自由基、解痉、降压、抗肿瘤、调节免疫功能、抗脂质过氧化等的药理作用。

附 银杏叶

【来源】为银杏科银杏 *Ginkgo biloba* L. 的叶

【采收加工】6～9月采收叶，除去杂质，及时干燥

【药材性状】黄绿色，光滑无毛，常破碎或折叠。完整的叶片呈扇形，浅裂或深裂，二分叉脉。叶柄细，质轻、易撕裂。气味清香，味微涩。

【性味功能】甘、苦、涩，平。敛肺、平喘、活血化瘀、止痛

【临床应用】用于治疗肺虚咳喘、高血脂、高血压、冠心病心绞痛、脑血管疾患等。用量9～12克，或制成片剂、注射剂。

【现代研究】主要活性成分是黄酮苷；另一类二萜内酯是强血小板活化因子拮抗剂，有银杏内酯A、B、C、M、J等。目前，德国Schwabe药厂生产出银杏叶的标准提取物EBG761，其黄酮苷含量为24%，萜内酯为6%。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





白果



银杏叶

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白扁豆

【别名】扁豆、

【来源】豆科草本植物扁豆 *Dolichos lablab* L. 的成熟种子

【植物形态】一年生缠绕草本，茎近光滑。3出复叶互生，具长柄，小叶片广阔卵形，先端尖，基部广楔形或截形，全缘，两面被疏短柔毛。总状花序腋生，通常2～4朵聚生于花序轴的节上；小苞片2，早落；花萼钟状，萼齿5，边缘密被白色柔毛；花冠蝶形，白色或淡紫色；雄蕊10，2束；子房线形，被柔毛，基部有腺体。柱头头状，疏生白色短毛。荚果长椭圆形，扁平，微弯曲，先端具弯曲的喙。花期7～8月，果期9月。

【生境分布】主产于江苏、河南、安徽、浙江等地。

【采收加工】立冬前后采摘成熟荚果，晒干，取出种子，再晒干。

【药材性状】种子扁椭圆形或扁卵圆形，长0.8～1.3厘米，宽6～9毫米。表面淡黄白色或淡黄色，平滑，略有光泽，有时可见棕黑色斑点。一端有隆起的白色眉状种阜，剥去后可见凹陷的种脐，紧接种阜的一端有珠孔，另端有短的种脊。质坚硬。种皮薄而脆，子叶肥厚，黄白色，角质。气微，味淡，嚼之有豆腥气。

【性味功能】甘，微温。健脾化湿，和中消暑。

【临床应用】用于治疗脾虚湿盛，运化失常而见食少便溏或泄泻；脾虚而湿浊下注，白带过多；暑湿吐泻等。用量9～15克。

扁豆内含毒性蛋白，生用有毒，加热后毒性大大减弱，故生用研末服宜慎。

【现代研究】种子中含油0.62%，内有棕榈酸、亚油酸、反油酸、油酸、硬脂酸等。另含甾体、胡芦巴碱等。100%本品煎剂用平板纸片法，对痢疾杆菌有抑制作用。对食物中毒引起的呕吐、急性胃肠炎有解毒作用。含两种不同的植物血球凝集素A、B。其中凝集素A为有毒成分，但加热后毒性大为减弱，凝集素B有抗胰蛋白酶的活性。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丝瓜络

【别名】水瓜络。

【来源】葫芦科植物丝瓜 *Luffa cylindrica* (L.) Roem. 的成熟果实的维管束。

【植物形态】一年生攀援草本，幼时全株密被柔毛，老时近于无毛。茎圆形，常有角棱，幼茎绿色，被稀疏柔毛。叶互生，叶柄多角形，具柔毛；叶片圆心形，掌状3～7裂，裂片常呈三角形，边缘具细齿，上面深绿色，下面淡绿色，幼时具有刺毛，老时粗糙无毛。花单性，雌雄同株；雌花单生，具柄；雄花为总状花序，花萼5，深裂，裂片绿色，卵状披针形，外面被细柔毛；花冠黄色，淡黄色，呈5深裂，裂片阔倒卵形，边缘波状；雄蕊3～5，花药2室，多弯曲似“S”形，花丝分离。瓠果常下垂，长圆柱形，有绿色纵纹；种子卵形，黑色，边缘有翅。花期5～7月，果期6～9月。

【生境分布】我国各地均有栽培，主产浙江、江苏、福建等地。浙江慈溪所产质量最佳。

【采收加工】夏、秋两季果实成熟，果皮变黄，内部干枯时采摘，搓去外皮及果肉；或浸泡于水中，待果皮及果肉腐烂后，取出，洗净，剪去两端，拍打去种子，晒干，压扁。

【药材性状】为丝状维管束纵横交织而成的细密坚韧的网络状物。全体呈压扁的长圆筒状或长棱形，两端细，略弯曲，长25～70厘米，直径5～10厘米，表面黄白色至暗黄色，有时残存果皮及膜状的果肉，体轻，质韧，富弹性，难折断，横切面可见子房3室，空洞状，偶有残留种子。气无，味淡。

【性味功能】甘，平。活血、通络、祛风。

【临床应用】用于治疗各种原因引起的气血痰滞、脉络不通的胸胁疼痛、腹痛、腰痛、睾丸疼痛、妇人经痛、乳汁不通等症；肺热咳嗽、痔瘘、崩漏等。用量3～12克。

【现代研究】丝瓜络含木聚糖、甘露聚糖、半乳聚糖等。本品煎剂、鲜汁及甲醇提取物都有止咳作用；甲醇提取物有明显增加呼吸道排泌酚红的作用；煎剂与酒精浸剂对肺炎球菌及呼吸道常见细菌有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

谷芽

【别名】粟芽

【来源】禾本科植物粟 *Setaria italica* (L.) Beauv. 的成熟果实经发芽干燥而成

【植物形态】一年生草本。杆直立，光滑。叶片条状披针形或披针形先端尖长，基部圆形，下面较秃净，上面粗糙；叶鞘光滑无毛，鞘口处有柔毛，略具纤毛。顶生圆锥花序穗状，通常下垂，穗轴密被细毛；小穗椭圆形，基部有刚毛1～3条，刚毛通常褐色或紫色，稀有绿色；第一颖卵形，长约为小穗的1/3，3脉；第二颖椭圆形，与不孕小花的外稃等长，5～7脉；不孕小花的外稃椭圆形，结实小花的外稃平凸状椭圆形，3脉，表面有皱纹内卷，包着内稃，谷粒与第一外稃等长，卵状或圆球形，具细点状皱纹。成熟后与其他小穗部分脱离。花期夏、秋季。

【生境分布】全国各地均产。

【采收加工】将粟谷用水浸泡后，保持适宜的湿度、温度，待须根长至约4毫米时，干燥

【药材性状】类圆形，直径约2毫米，顶端钝圆，基部略尖，外壳为革质的稃片，淡黄色，具点状皱纹，下端有初生的细须根，长2～5毫米，剥去稃片，内含淡黄色或黄白色颖果（小米）一粒。无臭，味微甘

出芽率不得少于85%

【性味功能】甘，温。消食和中，健脾开胃

【临床应用】用于治疗食积不消，腹胀口臭，脾胃虚弱，不饥食少等。用量9～15克。

【现代研究】所含消化酶及维生素B有助消化作用；煎煮及炒谷芽会降低消食效力。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

补骨脂

【别名】破故纸、胡韭子、婆固脂

【来源】豆科植物补骨脂 *Psoralea corylifolia* L. 的成熟果实。

【植物形态】一年生草本，全体被黄白色毛及黑褐色腺点。茎直立，枝坚硬，具纵棱。叶互生，枝端常侧生小叶1片；叶阔卵形或三角状卵形，先端圆形或钝，基部心形、斜心形或圆形，边缘有粗阔齿，叶两面均有显著的黑色腺点；叶柄被白色绒毛；托叶成对，三角状披针形，膜质。花多数，密集成穗状的总状花序；花轴腋生；萼钟状，基部联合成管状，先端5齿，被黑色腺点；花冠蝶形，淡紫色或黄色；雄蕊10，1束，花药小；雌蕊1，子房上位，倒卵形或线形，花柱丝状。荚果椭圆形，有宿存花萼，果皮黑色，种子1，气香而腥。花期7～8月，果期9～10月。

【生境分布】生于山坡、溪边或田边。主产于河南、四川、安徽等地。

【采收加工】秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【药材性状】果实扁圆状肾形，一端略尖，少数有宿萼。长4～5.5毫米，宽2～4毫米，厚约1毫米。表面黑棕色或棕褐色，具微细网纹，在放大镜下可见众多点状凹凸纹理。质较硬脆，剖开后可见果皮与外种皮紧密贴生，厚不及0.5毫米，除去果皮后，可见种脐小点状，位于种子凹侧的上端略下处，合点位于另一端，种脊不明显。外种皮质较硬，灰白色。无胚乳。子叶两枚，肥厚，淡黄色至淡黄棕色，其内外表面常可见白色物质；胚很小，可见。宿萼基部连合，上端5裂，灰黄色，具茸毛，并密布褐色腺点。气芳香特异，味苦微辛。

【性味功能】辛、苦，温。温肾助阳、纳气、止泻。

【临床应用】用于治疗肾阳不足、命门火衰之腰膝冷痛、阳痿、遗精、尿频等；脾肾阳虚泄泻；肾不纳气之虚喘；白癜风等。用量3～10克。外用适量。

【现代研究】含香豆精类，主要有补骨脂素及异补骨脂素（白芷素）等，还含有查耳酮类、黄酮类、单萜酚类等多种成分。本品能扩张冠状动脉，兴奋心脏，提高心脏功率；能收缩子宫及缩短出血时间，减少出血量；有致光敏作用，内服或外涂皮肤，经日光或紫外线照射，可使局部皮肤色素沉着。此外，尚有抗肿瘤、抗衰老、抑菌、杀虫及雌激素样作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

吴茱萸

【别名】吴萸、左力。

【来源】芸香科植物吴茱萸 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth 的近成熟果实。

【植物形态】常绿灌木或小乔木。幼枝、叶轴、小叶柄均密被黄褐色长柔毛。单数羽状复叶对生；小叶2～4对，叶片椭圆形至卵形，全缘，两面密被淡黄色长柔毛，有油点。聚伞花序顶生，花单性，雌雄异株；花轴基部有苞片2枚，上部苞片鳞片状；花小，黄白色，萼片5，广卵形；花瓣5，长圆形；雄花有雄蕊5；雌花较大，具退化雄蕊5。蒴果扁球形，成熟时紫红色，每心皮有种子1枚，卵圆形，黑色，有光泽。花期6～8月，果期9～10月。

【生境分布】生于山坡草丛中。主产于贵州、广西、湖南、浙江、四川等地。

【采收加工】9～10月，果实茶绿色而心皮尚未分离时采收，摘下晒干或低温烘干。

【药材性状】果实类球形或略呈五角状扁球形，直径2～5毫米；表面暗黄绿色至污绿色，有许多点状突起；顶端稍有下凹，五角星状裂隙，有时裂隙中央有突起的柱头残基；基部有花萼及短小果柄。在扩大镜下观察，表面粗糙，有圆形而稍下凹的油腺，花萼及果柄上可见黄色茸毛。质硬而脆，具浓郁香气；味苦而微辛辣。


【性味功能】辛、苦、热；有小毒。散寒止痛、降逆止呕、助阳止泻。

【临床应用】于治疗肝经寒凝之疝气腹痛；厥阴头痛；冲任虚寒，瘀血阻滞之痛经；寒湿脚气肿痛；胃寒或脾胃虚寒之脘腹冷痛、呕吐；外寒内侵，胃失和降之呕吐；脾肾阳虚之五更泄泻等。外用治湿疹。用量3～10克。外用适量。

【现代研究】含挥发油，其中吴茱萸烯是其主要成分，含量达30%，此外，还含有多种柠檬苦素类、生物碱、黄酮类、酚类、氨基酸等成分。本品具有芳香健胃作用，能祛除肠内积气及抑制肠内异常发酵，增加消化液分泌，抑制胃肠蠕动而解痉、镇吐，并有镇痛、降血压、兴奋子宫、抗血栓形成、杀虫、抗菌、升高体温等药理作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金樱子

【别名】刺榆子、山石榴、金壶瓶。

【来源】蔷薇科植物金樱子 *Rosa laevigata* Michx. 的成熟果实。

【植物形态】常绿攀援灌木，茎红褐色，有倒钩状皮刺和刺毛。单数羽状复叶互生，小叶多为3，有时5；叶柄有棕色腺点及细刺；托叶条状披针形与叶柄分离，早落；叶片椭圆状卵形，革质，先端渐尖，基部阔楔形，边缘有锐尖锯齿，两面无毛，上面有光泽；叶柄和叶轴具小皮刺和刺毛。花单生于侧枝顶端；花梗粗壮，与萼筒均密被刺毛；萼片先端有时扩大呈叶状，被腺毛；花冠白色，芳香；花瓣5，三角状阔倒卵形，宽大于长，先端近截形，有波状弯曲；雄蕊多数。蔷薇果黄红色，味甜，多为长倒卵形，外被刺毛，冠具宿萼。花期5月，果期9～10月。

【生境分布】生于向阳多石山坡灌木丛中。主产于江苏、安徽、浙江等地。

【采收加工】秋季采摘成熟果实，晾晒放后入桶内搅拌，擦去毛刺，纵剖挖去瘦果及绒毛，晒干。

【药材性状】果实倒卵形，长2～3.5厘米，直径1～1.8厘米。表面黄红色至棕红色，略有光泽，上有多数刺状刚毛脱落后残基形成的棕色小突起；顶端宿存花萼呈盘状，其中央稍隆起有黄色花柱基；基部渐细，间有残留果梗。质坚硬，切开后可见花萼筒壁厚1～2毫米，内壁密生淡黄色有光泽的绒毛，瘦果数十粒，扁平，纺锤状排列，长约7毫米，淡黄棕色，木质坚硬，外被淡黄色绒毛。气微，味甘，微涩。

【性味功能】酸、甘、涩，平。固精、缩尿、涩肠、止泻。

【临床应用】用于治疗遗精、滑精、遗尿、尿频、带下、久泻、久痢等。用量6～12克。

【现代研究】含有以下几类成分：鞣质、三萜类、皂苷等。金樱子肉按干燥品计算，金樱子多糖中的葡萄糖不得少于25.0%。本品能促进胃液分泌，帮助消化；又能使肠粘膜分泌减少而止泻；并有抑制流行性感冒病毒的作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com







更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

决明子

【别名】假绿豆、细叶猪屎豆。

【来源】豆科植物决明 *Cassia obtusifolia* L. 的成熟种子。

【植物形态】一年生半灌木状草本，上部分枝多，叶互生，羽状复叶；小叶3对，叶片倒卵形或倒卵状长圆形，先端圆形，基部楔形，稍偏斜，下面及边缘有柔毛，最下一对小叶间有一条形腺体，或下面两对小叶间各有一腺体。花成对腋生，最上部的聚生；总花梗极短；萼片5，倒卵形；花冠黄色，花瓣5，倒卵形，基部有爪；雄蕊10，发育雄蕊7，3个较大的花药顶端急狭成瓶颈状；子房细长，花柱弯曲。荚果细长，近四棱形；种子多数，菱柱形或菱形略扁，淡褐色，光亮，两侧各有1条线形斜凹纹。花期6～8月，果期8～10月。

【生境分布】生于村边、路旁、山坡等地。分布于江苏、安徽等地。

【采收加工】秋末果实成熟，荚果变黄褐色时采收，将全株割下晒干，打下种子，去净杂质即可。

【药材性状】四棱状短圆柱形，一端钝圆，另一端倾斜并有尖头，长4～6毫米或更长，宽2～3毫米。表面棕绿色或暗棕色，平滑，有光泽，背腹面各有一条凸起的棱线，棱线两侧各有一条从胚点向合点斜向的浅棕色线形凹纹。质坚硬，横切面种皮薄；胚乳灰白色，半透明。胚黄色，两子叶重叠并呈S状折曲。完整种子气无，破碎后有微弱豆腥气；味微苦，稍带粘性。


【性味功能】苦、甘，微寒。清热明目、润肠通便。

【临床应用】用于治疗邪火上攻或肝经风热等所致目赤肿痛、羞明多泪以及夜盲症；热结便秘、肠燥便秘；肝阳上亢之头晕头痛等。用量10～15克。

【现代研究】含游离羟基蒽醌衍生物，为大黄酚、大黄素、大黄素甲醚、决明素、钝叶素、决明苷、钝新素等多种成分。可用HPLC法测定其大黄酚或决明子苷A的含量。其水浸液有降压、利尿作用，并有缓泻、收缩子宫作用；其醇浸出液对葡萄球菌及白喉、枯大芽胞、伤寒、副伤寒、乙型副伤寒、大肠等杆菌均有抑制作用；其水浸剂对多种致病性皮肤真菌均有抑制作用，并有降血脂的作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枳　实

【别名】炒枳实

【来源】芸香科植物酸橙 *Citrus aurantium* L. 的幼果

【植物形态】常绿小乔木，有长刺。单叶互生，革质，叶柄有狭长形或倒心脏形的翼；叶片长椭圆形，有半透明油点。花排列成总状花序；花萼杯状，5裂；花瓣5，白色，长椭圆形。柑果圆形而稍扁，成熟时橙黄色。花期4～5月，果期6～11月。

【生境分布】多栽培。主产于浙江、江西和四川、福建等地。

【采收加工】5～6月采集，晒干；略大者横切成2半，晒干。

【药材性状】半球形或圆球形，直径1～3厘米。外表面绿黑色或褐棕色，较粗糙，散有众多小油点（油室），中央有圆盘状果柄痕或微凸起的花柱基痕。横剖面中果皮黄白色或淡棕色，微向上凸起，厚5～8毫米，边缘有1～2列黑棕色凹陷小点（油室）。瓤囊9～11瓣，棕褐色，中轴宽3～5毫米。气香，味苦、微酸。

【性味功能】苦，寒。破气消积，化痰散痞。

【临床应用】用治疗饮食积滞所致的脘腹痞满胀痛、热结便秘、腹痛胀痛、湿热泻痢、里急后重、胃下垂、子宫脱垂、脱肛等。用量3～9克。

【现代研究】含挥发油、黄酮类、生物碱等成分。有缓解小肠痉挛、强心、增加冠状动脉、脑、肾血流量，抑制血栓形成，收缩胆囊等作用。

附枳壳

【别名】炒枳实

【来源】芸香科植物酸橙 *Citrus aurantium* L. 接近成熟的果实。

【药材性状】半球形，直径3～5厘米。外果皮褐色，有颗粒状突起，有明显的花柱残基或果梗痕。切面中果皮黄白色，边缘1～2列油室。质坚硬，不易折断。瓤囊7～12瓣，内藏种子。气清香，味苦、微酸。


【性味功能】苦、辛、酸。理气宽中，行滞消胀。

【临床应用】用于治疗胸胁气滞、胀满产痛、食积不化、痰饮内停；胃下垂、子宫脱垂、脱肛等。用量3～9克。孕妇慎用。

【现代研究】本品含挥发油、黄酮类化合物、生物碱等多种成分。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枳椇子

【别名】木珊瑚、枳枣、鸡爪梨

【来源】鼠李科植物枳椇 *Hovenia dulcis* Thunb. 的带肉质果柄的果实或种子。

【植物形态】落叶乔木，小枝红褐色，叶互生，广卵形，先端尖或长尖，基部圆形或心脏形，边缘具锯齿，基出3主脉，淡红色；叶柄具锈色细毛。聚伞花序腋生或顶生；花杂性，绿色，花梗长；萼片5，近卵状三角形；花瓣5，倒卵形；雄花雄蕊5，花丝细，有退化子房；两性花有雄蕊5，雌蕊1，子房3室，每室1胚珠，花柱3裂。果实为圆形或广椭圆形，灰褐色；果梗肉质肥大，红褐色，成熟后味甜可食；种子扁圆，红褐色。花期5～6月，果熟期8～10月。

【生境分布】生于海拔200-1 400米的次生林中，或阳光充足的沟边、路边和山谷中。分布河北、江苏、安徽等地。

【采收加工】10～11月果实成熟时采收，将果实连同果柄一齐摘下，晒干，或砸碎果壳，筛出种子，晒干。

【药材性状】种子扁平圆形，背面稍隆起，腹面较平坦，直径3～5毫米，厚1～1.5毫米。表面红棕色、棕黑色或绿棕色，有光泽，于扩大镜下可见散在凹点，基部凹陷处有点状淡色种脐，顶端有微凸的合点，腹面有纵行隆起的种脊；种皮坚硬，胚乳乳白色，子叶淡黄色，肥厚，均富油质。气微，味微涩。

【性味功能】甘，酸，平。止渴除烦，解酒降逆。

【临床应用】用于治疗酒醉，或饮酒多发积，烦热，口渴；呕吐，二便不利等。用量9～15克。

【现代研究】种子含肽类生物碱、即异欧鼠李碱和枳椇碱A、B；含多种皂苷类成分和黄酮类成分。有抗脂质过氧化、抗肝损伤、抗胃溃疡、抗致突变活性和适应原样等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

栀 子

【别名】黄栀子、山枝子、大红栀

【来源】茜草科植物栀子 *Gardenia jasminoides* Ellis 的成熟果实

【植物形态】常绿灌木，叶对生或三叶轮生，革质；叶片长椭圆形或长圆状披针形，全缘；托叶鞘状，膜质。花单生于枝顶；萼筒倒圆锥形；花瓣成旋卷形排列，花开时成高脚杯状或碟状；雄蕊与花冠裂片同数；子房1室，蒴果肉质，卵形，黄色，有翅状纵棱5～8条；种子多数。花期5～7月，果期8～11月。

【生境分布】生于山坡杂林中，主产于湖南、江西、浙江、福建等地。

【采收加工】9～11月间果实成熟，时采摘，除去果柄及杂质，晒干或烘干。亦可将果实放入沸水中烫，或置于蒸笼内蒸半小时，取出晒干。

【药材性状】长卵形或椭圆形，长2～4.5厘米，直径0.8～2厘米。表面深红色或红黄色，具有5～8条纵棱。顶端残留萼片，另一端稍尖，有果柄痕。果皮薄而脆，内表面呈鲜黄色，有光泽，有2～3条隆起的侧膜及假胎膜，内有多数种子，粘结成团。种子扁长圆形，红棕色，密具细小点状突起。浸入水中可使水染成鲜黄色。气微，味微酸而苦。

【性味功能】苦，寒。泻火除烦、清热利尿、凉血解毒；外用消肿止痛。

【临床应用】用于治疗温病热郁心胸、心烦、郁闷、躁扰不宁、睡眠不安；肝胆湿热郁结，黄疸、发热、小便短赤；血热妄行之吐血、衄血、尿血等。外用治疗跌打损伤、烫伤、烧伤。用量6～10克。

【现代研究】含有栀子苷等多种环烯醚苷类化合物，能增强胆汁的分泌而具有利胆、抑制血中胆红素形成的作用；能抑制中枢神经系统而具镇静、降压、抗惊厥、镇痛的作用；体外实验对多种致病菌有抑制作用。

附 焦栀子

【别名】炒栀子

【制法】取栀子，按清炒法炒至焦黄色或焦褐色。

【药材性状】片块状，表面呈焦黄色或焦褐色，味苦涩。

【性味功能】微寒、苦，凉血止血。

【临床应用】与栀子相似，但炒焦后可缓和苦寒之性，以免伤胃。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com







栀子



焦栀子

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

南五味子

【别名】香苏、红铃子。

【来源】木兰科植物华中五味子 *Schisandra sphenanthera* Rehd. et Wils. 的成熟果实

【植物形态】落叶木质藤本　茎皮灰褐色，皮孔明显，小枝褐色，稍具棱角。叶互生，柄细长；叶片薄而带膜质；卵形、阔倒卵形以至阔椭圆形，先端长，基部楔形，阔楔形至圆形，边缘有小齿牙，上面绿色，下面淡黄色，有芳香　花单性，雌雄异株，花被片橙黄色；雄花具长梗，椭圆形，雄蕊10～15，基部合生；雌花雌蕊具心皮30～50枚，螺旋状排列在花托上，子房倒梨形，无花柱，受粉后花托逐渐延长成穗状　浆果球形，外皮棕红色至暗棕色，干瘪肉薄，内含种子1～2枚。花期4～6月，果期8～9月。

【生境分布】生于600～2 400米的林中或溪沟边，分布于河南、江苏、浙江、安徽等地

【采收加工】霜降后果实完全成熟时采摘，拣去果枝及杂质，晒干或阴干。

【药材性状】果实类球形或扁球形，直径4～6毫米　表面棕红色至暗棕色，果皮肉质较薄，干瘪，皱缩，果肉常紧贴种子上，种子1～2粒，肾形，有光泽，表面黄棕色，略呈颗粒状　果肉气微，味微酸　种子破碎后有香气

【性味功能】酸、甘、温　收敛固涩，益气生津，补肾宁心。

【临床应用】用于治疗久咳虚喘、津伤口渴及消渴，自汗、盗汗、遗精、滑精、久泻不止、心悸、失眠、多梦及慢性肝炎转氨酶升高者等　用量3～6克

【现代研究】果实中含有挥发油，含量较高的有花侧柏烯、罗汉松烯等；此外，还含有多种木脂素、三萜酸成分；近年来发现五味子多糖有保肝、抗衰老、耐缺氧和增加机体免疫力等作用。对中枢神经系统有兴奋作用，同时能直接兴奋呼吸中枢；还直接作用于脊髓的运动细胞，增强脊髓反射，缩短反射潜伏期　可加强心脏的收缩力，调节心血管系统而改善血液循环；能兴奋子宫，使子宫节律性收缩加强，并有明显止咳、祛痰作用。五味子乙素等4种成分对肝细胞有一定的保护作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

莲 子

【别名】藕实、泽芝、莲蓬子。

【来源】睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的成熟种子。

【植物形态】多年生水生草本。叶片圆盾形，全缘，稍呈波状，上面光滑，具白粉；叶柄着生于叶背中央，表面散生刺毛。花梗与叶柄等高或略高；花大，单一顶生，粉红色或白色，芳香；萼4～5，绿色，小形，早落；花瓣多数，长圆状椭圆形至倒卵形，先端钝，由外向内逐渐变小；雄蕊多数，早落，花药线形，黄色，药隔先端成一棒状附属物，花丝细长，着生于花托下；心皮多数，埋藏于花托内，花托倒圆锥形，顶部平，有小孔20～30个，呈海绵状，俗称“莲蓬”。坚果椭圆形或卵形，果皮坚硬，革质；内有种子1枚，俗称“莲子”。花期7～8月，果期9～10月。

【生境分布】全国大部分地区均产。主产于湖南、福建、江苏等地池沼湖塘中。

【采收加工】秋末、冬初割取莲房，取出果实；或收集坠入水中、沉于淤泥内的果实，洗净，拣去杂质，晒干；或砸碎，去皮、去心用；或除去果壳后晒干。经霜老熟而带有灰黑色果壳的称为“石莲子”，置锅内水煮后，切开，去皮，晒干。

【药材性状】种子椭圆形或类球形，长1.2～1.8厘米，直径0.8～1.4厘米。表红棕色，有细纵纹及不规则皱纹，有时可见较宽的脉纹，顶端中央呈乳头状突起，深棕色，其下方略有下陷。种皮薄，紧贴子叶，不易剥离；子叶两枚，肥厚，黄白色，粉性，2子叶间空隙，包有绿色“莲心”，气无，种皮味涩，子叶微甜，莲心极苦。


【性味功能】甘、涩，平。补脾止泻、益肾涩精、养心安神。

【临床应用】用于治疗肾虚遗精、遗尿、脾虚食少之久泻、带下病、崩漏、心悸、失眠等。用量6～15克。

【现代研究】具收敛、镇静的作用。含多量的淀粉和棉子糖、蛋白质、脂肪、碳水化合物及钙、磷、铁等微量元素。所含成分氧化黄心树宁碱尚有抑制鼻咽癌生长的作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附1 莲 房

【来源】睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的成熟花托

【采收加工】秋季果实成熟时采收，取出果实，晒干

【药材性状】倒圆锥形扁陀螺状，表面灰棕至紫棕色，顶面有多数圆形孔穴，基部具花梗残基，质疏松，破碎面海绵样，棕色 味微涩

【性味功能】苦、涩，温 化瘀止血。

【临床应用】主治崩漏、尿血、痔疮出血等 用量5～10克。

【现代研究】多种生物碱、黄酮类，有机酸

附2 藕 节

【来源】睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 根茎的节

【采收加工】秋冬挖藕时，切下节部，洗净，晒干

【药材性状】短圆柱形；表面灰黄色至灰棕色，上有多数须根痕，其横断面中央有较小的圆孔，周围有大孔7～9个 体轻，节部坚硬，难折断 味微甘涩。

【性味功能】甘、涩，平，凉血、去瘀、止血

【临床应用】用于治疗各种出血，用量9～15克。

【现代研究】有明显的止血作用

附3 荷 叶

【来源】睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的叶。

【采收加工】6～9月采收，晒干

【药材性状】通常折叠成半圆形或扇形，完整或稍破碎，叶片展开后呈盾形，全缘，叶脉辐射状，粗脉21～22条，由中心向外射出，并分生多数细脉，在近边缘处先端联合，叶脉凸出 质脆而易碎 气微、味淡。

【性味功能】苦、平，清解暑热、升发清阳、凉血止血。

【临床应用】用于治疗暑湿泄泻、水气浮肿，吐血、衄血、崩漏、便血、产后血晕等，用量3～9克，鲜品15～30克。

【现代研究】含多种生物碱，能降低血清三酰甘油-脂蛋白，升高高密度脂蛋白-胆固醇；显著升高高密度脂蛋白-胆固醇亚组分，

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





藕节



干荷叶

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

桃　仁

【别名】炒桃仁

【来源】蔷薇科植物桃 *Prunus persica* (L.) Batsch 的成熟种子。

【植物形态】落叶乔木，树皮暗褐色，粗糙。具线状托叶1对，宿存；叶互生；叶柄具腺体；叶片椭圆状披针形或倒卵状披针形，先端渐尖，基部阔楔形，边缘具细锯齿。花单生，先叶开放；花梗极短；萼片5，外面密被白色短柔毛；花瓣5，基部具短爪，粉红色或白色；雄蕊多数；子房1室，胚珠2个，通常只有一个发育。核果近球形或卵形，密被短毛。花期4月，果期7～9月。

【生境分布】全国大部分地区均有，主产于华东、中南部地区。

【采收加工】果实成熟后收集果核，取出种子去皮，晒干。

【药材性状】种子扁椭圆形，顶端尖，中部略膨大，基部钝圆或偏斜，边缘较薄，长1.2～1.8厘米，宽0.8～1.2厘米，厚2～4毫米。表面黄棕色或红棕色，有细小颗粒状突起。尖端一侧有一棱线状种脐，基部有合点，并自该处分散出多数棕色维管束脉纹，形成布满种皮的纵向凹纹。种皮薄。子叶肥大，富油性。气微，味微苦。

【性味功能】苦、甘，平。活血祛瘀、润肠通便。

【临床应用】用于治疗多种瘀血症，如痛经、闭经、产后瘀阻腹痛、跌打损伤等；肠燥便秘；肺痈、肠痈；咳嗽气喘等。用量3～9克。

本品有小毒，不可过量，过量可出现头痛、目眩、心悸，甚至呼吸衰竭而死亡。

【现代研究】桃仁含三酰甘油酯、1，2-二酰甘油酯、苦杏仁苷、野樱苷等，尚含有多种磷脂，包括磷脂酰胆碱、磷酸酰乙醇胺、磷脂酰丝氨酸。药理实验证明，本品可促进初产妇子宫收缩；有抗凝及较弱的溶血作用，对血流阻滞、血行障碍有改善作用；还有镇静及润肠作用。本品含有的苦杏仁苷，具有镇痛、止咳、抗癌等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

稻芽

【别名】谷芽

【来源】禾本科植物稻 *Oryza sativa* L. 的成熟果实经发芽干燥而成。

【植物形态】一年生草本。秆直立，丛生；中空、有节，有分蘖。叶具叶鞘；叶舌膜质而较硬，披针形，基部两侧下延与叶鞘边缘相合，幼时有明显的叶耳；叶片披针形至条状披针形，粗糙，叶脉明显。圆锥花序疏松，成熟时向下弯垂，分枝具角棱；小穗长圆形；不育花外稃锥刺状；可育花外稃硬纸质，具5脉；内稃3脉；雄蕊6，花丝细弱；子房长圆形，光滑。花柱2枚，柱头羽毛状。颖果平滑，淡黄色、白色；种子有明显的线状种脐。花、果期夏、秋两季。

【生境分布】全国各地均产。

【采收加工】成熟时割下禾稻，脱粒，晒干，即为稻谷。取稻谷用水浸泡1～2天，捞出置容器中，上盖潮湿蒲包，每日淋水，保持湿润，至须根长约3～7毫米时，取出晒干，即生谷芽。用文火炒至深黄色并大部爆裂，取出放凉，即炒谷芽。用武火炒至焦黄色，微喷清水，取出风干，即焦谷芽。

【药材性状】呈稍扁的长椭圆形，两端略尖，长7～9毫米，宽3～4毫米，外稃坚硬，表面黄色，具短细毛，有脉5条。一端有2枚对称的白色条形浆片，长约2毫米，淡黄色，膜质，于一个浆片内侧伸出淡黄色弯曲的初生根，长0.5～1.2厘米。内稃薄膜质，光滑，黄白色，内含果实，质坚，断面白色，有粉性。气无，味微甜。


【性味功能】甘，温。和中消食，健脾开胃。

【临床应用】用于治疗米面薯芋等淀粉类所致的食滞，脘腹胀满，或脾虚食少等。用量9～15克；大剂量可用30克。

【现代研究】含有淀粉、淀粉酶、蛋白质、脂肪等成分。并含天门冬氨酸，r-氨基丁酸等18种氨基酸。所含淀粉酶有消化淀粉的作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

薏苡仁

【别名】苡仁、薏米、草珠儿。

【来源】禾本科植物薏苡 *Coix lacryma-jobi* L. var. *ma-yuen* (Roman.) Stapf 的成熟种仁。

【植物形态】一年或多年生草本。丛生，多分枝。叶互生；叶片线状披针形，两面光滑，边缘粗糙。总状花序腋生成束；雄小穗复瓦状排列于穗轴之每节上；雌小穗包于卵形硬质的总苞中，总苞灰白色或蓝紫色，坚硬而光滑，有光泽，花有3枚退化雄蕊残迹；雌蕊1，柱头2裂。颖果圆珠状。花期7～8月，果期9～10月。

【生境分布】生于河边、溪流边或阴湿山谷中，喜生于温暖、潮湿地区。我国大部分地区均产，主产于福建、江苏等地。

【采收加工】秋季果实成熟时，采割植株，晒干，打下果实，再晒干，除去外壳及种皮。

【药材性状】种仁广卵形或长椭圆形，长4～8毫米，宽3～6毫米，顶端钝圆，基部略宽而微凹，内有淡棕色点状种脐。表面乳白色，平滑，偶有残留的淡棕色种皮；背面圆凸，腹面有一较宽而深纵沟，宽约2毫米，沟内常留有浅棕色种皮。质坚实，断面平坦，白色，富粉性。气微，味淡，微甜。


【性味功能】甘，淡，凉。健脾利湿、除痹止泻清热排脓。

【临床应用】用于治疗水湿停蓄之水肿、小便不利症；淋浊症、脚气浮肿、脾虚泄泻、湿痹筋脉拘挛、屈伸不利或痿弱无力、肺痈、咳吐脓痰、肠痈等。用量10～30克。

【现代研究】近来研究发现薏苡为湿生性作物，在水田栽培技术下，与水稻相似，可以大幅度增产。其种仁含薏苡酯仁酯、薏苡素等，目前还普遍认为薏苡中一定配比的饱和脂肪酸在抗癌方面起主要作用。药理实验还证明，本品有抑制骨骼肌收缩、解热、镇痛、抗炎、抗肿瘤和增强免疫功能等作用；还能轻度降低血糖。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

覆盆子

【别名】覆盆、小托盘

【来源】蔷薇科植物华东覆盆子 *Rubus chingii* Hu 的聚合果。

【植物形态】落叶灌木，茎直立，枝条细长，疏生微变倒刺。裂片卵状披针形，先端长渐尖，边缘有重齿，基部浅心形，主脉5条。花白色，花瓣5片，卵圆形。雄蕊多数；雌蕊有多数离生心皮。聚合果卵球形，红色，下垂。花期4～5月，果期6～7月。

【生境分布】生于溪旁或山坡灌木丛中、林缘及乱石堆中。分布于安徽、江苏、浙江等地。

【采收加工】6～8月，将未成熟的青色聚合果摘下，放入沸水中稍浸后，置烈日下晒干，除去果梗杂质。

【药材性状】果为多数小核果聚合而成，全体呈半球形、扁圆锥形或类球形，上部钝圆，基部中心凹入。长6～13毫米，直径5～12毫米。表面灰绿色或淡棕色，密被灰白色或灰绿色短毛；宿萼棕褐色，5裂，裂片先端多已折断，上有许多棕色残存花丝，下有细长果柄或其痕迹。横切面类圆形，周围有小核果紧密排列成环，小核果囊状，长2～2.5毫米，宽0.8～1.2毫米，基部较小，背面隆起，密被灰白色或黄绿色茸毛，两侧有网状凹纹，腹部有突起棱线，质硬，内含棕色种子1粒。气清香，味微酸涩。

【性味功能】甘、酸，温。益肾、固精、缩尿。

【临床应用】用于治疗肾虚不固所致的遗精、滑精、遗尿、尿频；肝肾不足之目暗不明等。用量6～12克。

【现代研究】含覆盆子酸、鞣化酸等。聚合果每100克中含维生素C33.79毫克、水分79.93%、蛋白质2.232%、总糖6.750%、有机酸1.472%；以及维生素A类物质，其含量按维生素A计算为0.0586%。本品似有雌激素样作用，并能抑制霍乱弧菌生长。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

果实及种子类药材小常识

【分类】果实及种子类药材是以植物的果实或其中某一部分入药的药材总称。果实和种子在植物体中是两种不同器官，但在商品药材中常未严格区分，大多数是果实、种子一起入药，如枸杞、五味子、马兜铃等；少数主要用种子，如决明子、牵牛子等。有的果实虽以种子入药，但以果实贮存和销售，到临用时再剥去果皮取出种子入药，如巴豆和砂仁等。

通常，果实类药材是采用完全成熟或将近成熟的果实。有的采用完整的果穗，如荜茇、桑椹；有的采用完整的果实，如使君子、小茴香、木瓜、乌梅等；有的采用果实的一部分，如以果皮入药的陈皮、大腹皮等；以带有部分果皮的果柄入药的甜瓜蒂；以果实上的宿萼入药的柿蒂；以中果皮部分的维管组织入药的橘络、丝瓜络等。

种子类药材大多是采用成熟种子，包括种皮和种仁两部分；种仁又包括胚乳和胚。多数是用完整的种子，也有不少是用种子的一部分，有的用假种皮，如肉豆蔻衣、龙眼肉；有的用种皮，如赤豆衣、绿豆衣；有的用除去种皮的种仁，如肉豆蔻；有的用去掉子叶的胚，如莲子芯；有的则用发了芽的种子，如大豆黄卷；或使用其发酵加工品，如淡豆豉。

【采收加工】一般果实多在自然成熟时采收，如瓜蒌、栀子、山楂等；有的在成熟经霜后采摘为佳，如山茱萸经霜变红，川楝子经霜变黄；有的采收未成熟的幼果，如枳实、青皮等。如果实成熟期不一致，要随熟随采，过早肉薄产量低，过迟肉松泡，影响质量，如木瓜等。种子类药材必须在果实成熟时采收，如牵牛子、决明子、白芥子等。

【鉴别要点】首先要确定是果实还是果实的一部分，注意区分果实的类型和一般特征，如成熟或未成熟、真果或假果、单果、聚合果或聚花果、浆果、核果或瘦果等。无论果实还是种子，主要注意观察其形状、大小、颜色、表面特征、气味等；其中要特别注意表面特征，如表面的颜色、皱纹、有无附属物等；种子的表面还要注意种脐、种脊、合点、种阜、假种皮等特征。果实的外部通常有些附属物，如宿存的花被、花柱、花序或果柄等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



七、全草类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

土荆芥

【别名】鹅脚草、钩虫草、虎骨香

【来源】藜科植物土荆芥 *Chenopodium ambrosioides* L. 的全草

【植物形态】一年生或多年生直立草本。茎有棱，分枝，被腺毛或无毛。单叶互生，具短柄；叶片长圆形至长圆状披针形，先端短尖或钝，下部的叶边缘有不规则钝齿或波浪形，上部的叶较小，为线形或线状披针形，全缘，先端钝；上面绿色，下面有腺点，揉之有一种特异的香气。花小，绿色，簇生或单生于苞腋内；苞片极小，呈叶状而长于花束；花束为叶生及顶生，分枝或不分枝的穗状花序，此等花序再形成硕大具叶的圆锥花序，占全植株的大部；萼片5，有时仅3；雄蕊与萼片同数，花丝分离，花药内向；子房1室。胞果包藏于萼内，胚环形。花期夏、秋间。

【生境分布】生于村旁、路边、旷野及河岸等地。主产于长江以南各省区。

【采收加工】8月下旬至9月下旬采收全草，摊放通风处，或捆束悬挂阴干，避免日晒及雨淋，除去杂质及根，切细。

【药材性状】长50～80厘米或过之，常带果穗，青绿色。茎下部圆柱形，粗壮光滑，上部方柱形有纵沟，具毛茸，下部叶大多脱落，仅茎梢留有线状披针形的苞片。茎梢或枝梢常见残留簇生果穗，触之即脱落，淡绿色或黄绿色，剥除宿萼，内有棕黑色的细小果实1枚。全草有强烈异臭气。

【性味功能】辛，温，有小毒。杀虫祛风，通经止痛。

【临床应用】用于治疗钩虫、绦虫、蛔虫、蛲虫等症；风寒湿痹及风湿热痹等。用量3～6克。

【现代研究】土荆芥油对蛔虫、钩虫、滴虫、绦虫等有抑制或杀灭作用；对结核杆菌在体内有很轻度的抑制作用；对真菌则有良好的抑制作用；并有抗疟及祛痰作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天胡荽

【别名】满天星、破铜钱、盘上花茜

【来源】伞形科植物天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. 的全草

【植物形态】多年生草本。茎纤弱细长，匍匐，平铺地上成片，茎节上生根。单叶互生；叶片圆形或近肾形，基部心形，5～7浅裂，裂片短，有2～3个钝齿。伞形花序与叶对生，单生于节上，每伞形花序具花10～15朵，无齿缺乏；花瓣卵形，镊合状排列，绿白色。双悬果略呈心脏形，分果侧面扁平，光滑或有斑点，背棱略锐。花、果期4～9月。

【生境分布】生于海拔50～3 000米的湿润草地、沟边或林下草丛中。分布于江苏、浙江等地。

【采收加工】夏、秋季花叶茂盛时采收全草，洗净，阴干或鲜用。

【药材性状】为干燥的全草，根细圆柱形，外表面淡黄色或灰黄色；茎黄绿色，细长，弯曲，节结处残留丝状细根。叶淡绿色多呈碎片或皱缩，展平后，完整叶片为圆形或肾圆形，基部心形，两耳有时相接，边缘5～7浅裂或全缘，通常连有纤细的叶柄。有气味，微苦。

【性味功能】苦、辛，寒。清热利尿，解毒消肿。

【临床应用】用于治疗湿热郁结之黄疸，大肠湿热之赤白痢疾，咽喉肿痛，痈疽疔疮，跌打损伤之局部瘀肿等。用量9～15克。外用适量。

【现代研究】具有对金黄色葡萄球菌的较强抑制作用，对变形杆菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌也有不同程度抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

毛茛

【别名】老虎脚爪草、水芹菜、辣子草。

【来源】毛茛科植物毛茛 *Ranunculus japonicus* Thunb. 的带根全草。

【植物形态】多年生草本，全株被白色细长毛，尤以茎及叶柄上为多。须根多数，肉质，细柱状。茎直立，高50～90厘米。基生叶具叶柄，叶片掌状或近五角形，常作3深裂，裂片椭圆形至倒卵形，中央裂片又3裂，两侧裂片又作大小不等的2裂，先端齿裂，具尖头；茎生叶具短柄或无柄，3深裂，裂片倒卵形至菱状卵形，至茎上部裂片渐狭呈线状披针形，两面均有紧贴的灰白色细长柔毛。花与叶相对侧生，单一或数朵生于茎顶，具长柄；萼片5，长圆形或长卵形，先端钝圆，淡黄色，外密被白色细长毛；花瓣5，黄色，阔倒卵形或微凹，基部钝或阔楔形，具蜜槽；雄蕊多数，花药长圆形，纵裂，花丝扁平，与花药几等；心皮多数，离生，柱头单一。聚合瘦果近球形或卵圆形，瘦果稍歪，卵圆形，表面淡褐色，两面稍隆起，密布细密小凹点，基部稍宽，边缘有狭边，顶端有短喙。花期3～5月，果期5～7月。

【生境分布】生于路边、沟旁、田野及潮湿草丛中。全国大部分地区均有分布。

【采收加工】夏、秋季采集，切段，晒干。生用或鲜用。

【药材性状】参见【植物形态】项。

【性味功能】辛、微苦，温。有毒。利湿消肿、止痛退翳、截疟杀虫。

【临床应用】用于治疗疟疾、黄疸、偏头痛、胃痛、风湿关节痛、鹤膝风、痈肿、恶疮、疥癣、牙痛、火眼、淋巴结结核等。用量5～10克。外用适量，捣敷或煎水洗。

【现代研究】本品及所含原白头翁素具有刺激性，高浓度接触过久，可使皮肤发泡，粘膜充血。本品具有抗组织胺作用，可解除组织胺所致支气管痉挛；对革兰氏阴性、革兰氏阳性细菌、酵母菌、原虫类有较强抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乌蔹莓

【别名】五爪藤、野葡萄藤、五叶莓

【来源】葡萄科植物乌蔹莓 *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagn. 的全草

【植物形态】多年生蔓生草本。茎紫绿色，有纵棱，具卷须，幼枝有柔毛，后变光滑。掌状复叶，具小叶5枚，排列成鸟爪状，中间小叶椭圆状卵形，两侧的4枚小叶渐小，成对生于同一小叶柄上，但又各具小分叶柄，小叶边缘具较均匀的圆钝锯齿。聚伞花序腋生，花小，黄绿色，具短梗；萼杯状；花瓣4，卵状三角形；雄蕊4，与花瓣对生，花药长椭圆形；雌蕊1，子房上位，2室。浆果倒卵形，成熟时黑色；种子2～4粒。花期5～11月，果期8～10月。

【生境分布】生于山坡、路旁、旷野或园篱旁，攀附于他物上或蔓生。分布于华东、中南、西南各地。

【采收加工】夏、秋季采集全草，洗净泥土，除去杂质，晒干。

【药材性状】草黄色，全株光滑无毛；根粗壮，浅褐色，横切面可见皮部约占1/2，射线明显；茎具纵棱，节间膨大，有与叶对生的卷须。掌状复叶，小叶片5枚，呈鸟爪状排列，多皱缩或破碎，完整者展型后可见中间1枚最大，侧生者各2枚着生于同一小叶柄上，小叶片椭圆状卵形至长卵形，边缘具疏钝齿。伞房花状聚伞花序腋生；花细小，径4～5毫米。气微，味苦、酸。

【性味功能】苦、酸，寒。清热解毒，利湿消肿。

【临床应用】用于治疗痈肿、疔疮、痄腮、丹毒等热毒疮疡症；湿热流注经络之风湿骨痛；湿热壅滞之黄疸、痢疾及尿血、白浊等症。用量9～15克。外用适量，常用鲜品捣烂外敷。

【现代研究】全草含阿拉糖、粘液质、黄酮类、酚类成分等。水煎液（30毫克/毫升）在试管内能抑制钩端螺旋体的生长。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

半边莲

【别名】细米草、半边花、急解索。

【来源】桔梗科植物半边莲 *Lobelia chinensis* Lour. 的全草。

【植物形态】多年生矮小草本，高5～15厘米。全株光滑无毛，有乳汁。根细圆柱形，淡黄白色。茎细弱匍匐，上部直立。叶互生，无柄；叶片条形或条状披针形，全缘或有疏齿。叶腋开单生淡紫色或白色小花；花冠基部合成管状，上部向一边5裂展开，中央3裂片较浅，两侧裂片深裂至基部；雄蕊5，花丝基部分离，花药彼此连合，围抱柱头，花药位于下方的两个有毛，下方的3个无毛；子房下位，蒴果顶端2瓣开裂；种子细小，多数。花期5～8月，果期8～10月。

【生境分布】生于水田边、路沟旁、潮湿的阴坡、荒地。分布于江苏、浙江、安徽等地。

【采收加工】夏、秋季生长茂盛时采收，洗净晒干。生用或鲜用。

【药材性状】全长15～35厘米，但常缠成团。根茎细长圆柱形，直径1～2毫米，表面淡黄色或黄棕色，多有细纵根。根细小，侧生细纤须根。茎细长，有分枝，灰绿色，节明显，有的可见附生的细根。叶互生，无柄，绿色，呈狭披针形或长卵圆形，长1～2厘米，宽2～5毫米，叶缘有疏锯齿。花梗细长，花小，单生于叶腋，花冠筒内有白色茸毛。花萼5裂，裂片绿色线形。气微，味微甘而辛。

【性味功能】辛、平。利尿消肿、清热解毒。

【临床应用】用于治疗毒蛇咬伤，腹胀水肿、黄疸尿少、小便不利、晚期血吸虫病及肝硬化腹水等。外用治跌打损伤，痈疖疔疮。用量9～15克，鲜品30～90克（捣汁服）。外用适量，捣敷。

【现代研究】全草含生物碱，主要有半边莲碱、去氧半边莲碱、氧化半边莲碱等。动物实验证明本品有利尿作用；对毒蛇咬伤的狗有良好的保护作用；在非经口给药时能通过颈动脉球反射性地引起呼吸兴奋，大剂量时可引起血压下降；对小鼠剪尾之出血有止血作用；对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、福氏痢疾杆菌、大肠杆菌、绿脓杆菌均有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

半枝莲

【别名】并头草、牙刷草、小叶蛇信草

【来源】唇形科植物半枝莲 *Scutellaria barbata* D. Don 的全草

【植物形态】一年生或多年生草本。茎下部匍伏生根，上部直立，四棱形。叶对生；叶片卵形至披针形，先端钝，基部楔形或近心形，全缘。轮伞花序顶生，集成偏侧总状花序；花萼二唇形，上唇背部有一盾状附属体，花冠落后封闭并增大；花冠唇形，浅蓝紫色，花冠管斜倾。雄蕊2，不伸出；子房4裂，花柱顶端2裂。小坚果，卵形，有细瘤点，包围宿萼中。花期5～10月，果期6～11月。

【生境分布】生于溪滩边、田岸及林区路旁。分布于我国河北、安徽、江苏等地。

【采收加工】夏、秋两季茎叶茂盛时挖出全株，除去杂质，洗净，晒干。生用或鲜用。

【药材性状】全长15～40厘米，无毛或花轴上疏被毛。根纤细。茎四棱形，表面暗紫色或棕绿色。叶对生，有柄或近无柄；叶片皱缩或卷褶，展开后呈三角状卵形至披针形，长1.5～3厘米，宽0.5～1厘米，先端钝，基部截形或宽楔形，全缘或有少数不明显的钝齿，上面深绿色，下面淡绿色；质脆易碎。花序生于枝顶，花冠二唇形，棕黄色或深蓝紫色，长约1.2厘米，被毛，但商品中花冠常已脱落，留有匙形的下萼和具盔状盾形的上萼，内藏有4个扁球形小坚果，浅棕色。全草质软。气微，味苦涩。

【性味功能】辛、苦，寒。清热解毒、化瘀利尿。

【临床应用】用于治疗热毒痈肿疔疖、跌打肿痛、湿热泻痢、食道癌、胃癌、肺癌、子宫癌等多种肿瘤等。用量15～30克，鲜品30～60克。

【现代研究】全草分离得到黄芩素等黄酮类成分、半支莲三萜类化合物、二萜内酯化合物、半支莲多糖（SPB）等。其中，药理实验证明半支莲多糖（SPB）对细胞免疫功能有明显促进作用。《中华人民共和国药典》规定，按干燥品计，本品含总黄酮以野黄芩苷计，不得少于1.50%。本品浸剂经乙醚提取的黄色针状结晶形物质经动物试验有利尿作用；静脉注射有降压作用，但口服治疗量，未产生降压作用；对金黄色葡萄球菌、福氏痢疾杆菌、伤寒杆菌、绿脓杆菌、大肠杆菌均有抑制作用；对急性粒细胞型白血病血细胞有轻度的抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石　韦

【别名】石剑、石兰。

【来源】水龙骨科植物石韦 *Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farwell. 的全草。

【植物形态】多年生草本。根茎细长如铁丝横走，密被披针形鳞片，边缘有睫毛。叶近二型，疏生，叶片披针形至卵圆状椭圆形、全缘，上面绿色有细点，疏被星状毛或无毛，下面密被淡褐色或灰色星芒状毛；孢子叶较营养叶为长，通常内卷呈筒状。孢子囊群椭圆形，着生于孢子叶背面，无囊群盖。

【生境分布】常附生于岩石或树干上。主产于长江以南各省。

【采收加工】四季均可采收，除去根茎及须根，阴干或晒干。

【药材性状】叶单质，披针形、线状披针形或长圆状披针形，长约7～20厘米，宽1.5～3.5厘米，先端渐尖，基部渐狭，略下延，全缘，向内扭曲皱卷；上面灰绿色或灰棕色，无毛或疏被星状毛，下面被灰棕色或红棕色星状柔毛和密布红棕圆点状孢子囊群；主脉明显，侧脉隐约可见。叶柄长2～10厘米，棕色，略呈四棱状，常扭曲。气无，味淡。

【性味功能】苦、甘，凉。利尿通淋、清热止血。

【临床应用】用于治疗热淋、石淋、血淋、肺热咳嗽、慢性气管炎、崩中漏下、吐血、衄血、尿血、肾炎水肿等。用量5～10克。

【现代研究】应用反相高效液相色谱法，可测定石韦中杜果苷、异杜果苷和绿原酸的含量。本品具有镇咳、祛痰、平喘的作用，对SO_2刺激产生的大鼠慢性气管炎有治疗作用；对因化学疗法及放射线疗法引起的白细胞下降有升高作用；其提取物有增强机体抗病能力的作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

龙葵

【别名】苦葵、天茄子、山海椒。

【来源】茄科植物龙葵 *Solanum nigrum* L. 的全草。

【植物形态】一年生草本，根圆锥形，淡黄色。茎直立，叶互生；叶片卵形或近菱形，先端渐尖或钝尖，基部宽楔形，下延至叶柄，全缘或有疏波状齿，无毛或被疏毛。伞形聚伞花序腋生；花冠白色，钟形，5裂；雄蕊5，花药顶端2孔开裂；子房2室，花柱长。浆果球形，熟时紫黑色，基部有宿萼。花期6～7月。

【生境分布】生于田边、荒地。全国各地均有分布。

【采收加工】夏、秋季采收，晒干。生用或鲜用。

【药材性状】茎呈圆柱形，多分枝，长20～60厘米或过之，直径0.2～1厘米，绿色或黄绿色，有槽状纵皱；质脆而硬，断面黄白色，中空。叶卷缩或破碎，完整者卵形，长2.5～10厘米，宽1.5～5.5厘米，暗绿色，两面光滑或疏被短柔毛。聚伞花序蝎尾状，腋外生，有花4～10朵，但多已脱落；花萼杯状，棕褐色；花冠棕黄色。浆果球形，直径约6～8毫米，成熟时棕黑色，皱缩。种子多数，棕色，气微，味淡。

【性味功能】苦，寒。有小毒。清热解毒、利水消肿、凉血止血。

【临床应用】用于治疗热毒痈肿疔疮、小便不利、血热吐血、崩漏、多种癌症，如子宫颈癌、食道癌、膀胱癌、鼻咽癌、肝癌等。用量9～30克，外用适量，捣敷。

本品所含生物碱毒性较大，其未成熟果实中含量最多，误食未成熟果实可致中毒。中毒时可出现：头痛、腹痛、呕吐、腹泻、瞳孔散大、心跳先快后慢、精神错乱，甚至昏迷。中毒时可即给予浓茶水洗胃，以后按发芽马铃薯中毒抢救办法给予对症处理。

【现代研究】煎剂对金黄色葡萄球菌及痢疾、伤寒、大肠、绿脓、变形等杆菌有一定的抑制作用；其提取物对动物有抗炎作用；所含澳洲茄碱、龙葵碱有升高血糖的作用，对平滑肌有兴奋作用；具有镇咳、祛痰作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

东风菜

【别名】钻山狗、疙瘩药、草三七。

【来源】菊科植物东风菜 *Doellingeria scaber* (Thunb.) Nees. 的全草。

【植物形态】多年生草本。根状茎粗短；茎直立，叶互生；基部叶有长柄，具窄翼；叶片心形，上面绿色，下面灰白色，边缘有锯齿；茎上部叶卵状三角形，先端急尖，两面有毛。头状花序集成疏松的伞房状圆锥花序，总苞半圆形，苞片数列，长椭圆形，背面绿色；边缘舌状花白色，雌性；中央管状花淡黄色，两性。瘦果长椭圆形，冠毛长短不等，棕黄色。花期6～8月，果期7～9月。

【生境分布】生于山坡和路旁。分布于我国东部、北部和南部各省区。

【采收加工】夏、秋季采集，洗净晒干。

【药材性状】茎圆柱形，稍有分枝，长80～120厘米，粗0.6～1.2厘米，表面黄棕色，有多条细纵纹，下部光滑，上部有白色柔毛，质脆，易折断，断面中空。叶多皱缩、破碎，展开后，完整叶卵状三角形，质厚，长9～22厘米，宽6～16厘米，绿褐色，柄有窄翼，边缘有锯齿或重锯齿，表面粗糙，两面有细毛。有时可见多数黄色的头状花序；总苞半球形，总苞片边缘干膜质，质脆，易碎。气微，味微苦。

【性味功能】辛、温。清热解毒、活血止痛。

【临床应用】用于治疗毒蛇咬伤、疖疮、腰痛、风湿性关节炎、跌打损伤、刀伤等。用量15～30克，外用适量，捣敷。

【现代研究】服药后如有呕吐现象，加糖矫味便可改善。配合使用鸟蔹莓、半边莲、佛甲草等，可以提高疗效。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

田基黄

【别名】地耳草、雀舌草、对叶草

【来源】藤黄科植物地耳草 *Hypericum japonicum* Thunb. 的全草。

【植物形态】一年生草本。根多须状。茎直立，或倾斜，细瘦，有4棱，节明显，基部近节处生细根。单叶，短小，对生；叶片卵形，全缘，先端钝，叶面有微细的透明点。聚伞花序顶生，成叉状而疏，花小，黄色；萼片5，披针形；花瓣5，长椭圆形，内曲；雄蕊10以上，基部连合成3束；花柱3，蒴果长圆形，外面包围有等长的宿萼。花期5～6月，果期6～7月。

【生境分布】生于山野、平原、路旁或阳光充足及较潮湿的地方。分布于江南、江苏、安徽、浙江等地。

【采收加工】春、夏两季开花时采收，洗净，除去杂质，晒干。生用或鲜用。

【药材性状】全草长10～40厘米，根须状，黄褐色。茎单一或基部分枝，有4棱，光滑，表面黄绿色或黄棕色；质脆，易折断，断面中空。叶对生，无柄；纸质，叶片卵形或卵圆形，全缘，具细小透明腺点。聚伞花序顶生，花小，黄色。气无，味微苦。

【性味功能】苦、甘，凉。利湿退黄、清热解毒、活血消肿。

【临床应用】用于治疗湿热黄疸、肺痈、乳痈、肠痈等痈肿疮毒；跌打损伤、瘀肿疼痛；小儿惊风、疳积；感冒发热；目赤肿痛等。用量9～15克。外用适量，捣敷或煎水洗。

【现代研究】全草含田基黄绵马素A、B、C，田基黄灵素等间苯三酚类化合物，含多种黄酮类化合物。对肺炎球菌、金黄色葡萄球菌、猪霍乱杆菌和痢疾杆菌有不同程度的抑菌和杀菌作用；对离体兔肠低浓度可见节律性收缩增强，高浓度出现痉挛性收缩；有明显的保肝作用，对心肌的心律收缩也有一定的影响。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白英

【别名】排风藤、白毛藤、蜀羊泉。

【来源】茄科植物白英 *Solanum lyratum* Thunb. 的全草。

【植物形态】多年生草质藤本。灰褐色至灰黄色。叶互生；叶片长卵形或卵状长圆形，生于枝梢的叶不分裂，两面都密生白色长柔毛。疏松聚伞花序与叶对生；小花白色，花萼5浅裂；花冠幅状5深裂，裂片披针形，向外反折；雄蕊5，花药向上孔裂；雌蕊1，子房上位，花柱细长。浆果球形，熟时红色，基部有宿萼。花期9～10月，果期11月。

【生境分布】生于山坡、山谷、田边、路旁。分布于长江以南各地。

【采收加工】夏、秋季采收，洗净，晒干。

【药材性状】全长1～4厘米，全体密被长柔毛。根稍弯曲，浅棕黄色。茎圆柱形，稍有直棱，灰绿色或灰黄色，被分节长毛。叶片皱卷，易破碎，完整者长3～8厘米，宽2～4.5厘米，顶端渐尖，基部常3～5深裂，叶面棕绿色，叶背灰绿色；叶柄长2～4厘米。聚伞花序顶生或腋外生；花冠5裂，裂片长约4.5毫米，棕黄色。浆果球形，直径约8毫米，绿棕色。种子近圆形，扁平。气微，味淡。

【性味功能】苦，微寒；有小毒。清热解毒、清热利湿、抗肿瘤。

【临床应用】用于治疗热毒痈肿疔疖；湿热疮，如湿热黄疸、湿热淋症、白带过多、风湿热痹；多种癌症，主要用治子宫颈癌，亦可用治膀胱癌及肝癌等。用量10～15克。外用适量，捣敷。

有一定毒性，内服大剂量可出现中毒反应，见喉头烧感、恶心、呕吐、眩晕、瞳孔散大、惊厥性肌肉运动及全身衰弱，应慎用。

【现代研究】对人体肺癌有抗癌作用；有促进抗体形成及蛋白合成的作用，可增强机体非特异性免疫生物反应；其所含蜀羊泉碱有某些抗真菌作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

灯心草

【别名】灯心、虎须草、灯草

【来源】灯心草科植物灯心草 *Juncus effusus* L. 的茎髓

【植物形态】多年生草本，根茎横走，具多数须根。茎圆筒状，外具明显条纹，淡绿色。无茎生叶，基部具鞘状叶。复聚伞花序，假侧生，由多数小花密聚成簇；花淡绿色，花被6，2轮，裂片针形，背面被柔毛，边缘膜质；雄蕊3，较花被短；花柱不明显，柱头3枚。蒴果卵状三棱形或椭圆形，先端钝，淡黄褐色。花期5～6月，果期7～8月。

【生境分布】生于水旁或沼泽边缘潮湿地带。我国各地均有分布。主产于江苏省。

【采收加工】秋季采收，割取茎部晒干，或将茎皮纵向剖开，去皮取髓，晒干。

【药材性状】圆柱形，长达90多厘米，直径1～3毫米，表面黄色或淡黄白色，有细纵纹。放大镜下观察，有隆起皱纹及海绵状细小孔隙。体轻，质软如海绵状，略有弹性，易拉断，断面白色。无臭，无味。

【性味功能】甘、淡，微寒。清心火，利小便。

【临床应用】用于治疗热淋、石淋、血淋、水湖内疗之水肿、小便不利、怀炎水肿、心烦不眠、小儿夜啼等。用量1.5～3克。

【现代研究】具有利尿、止血的作用。灯心草水提液在试管内，浓度500毫克/毫升以下时，对人癌细胞株（JIC-26）有抑制作用，对正常人胚细胞（HEI）以同样药物浓度，也有抑制作用，故推断为灯心草对癌细胞的抑制无选择性。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

寻骨风

【别名】白毛藤、清骨风、猫耳朵。

【来源】马兜铃科植物绵毛马兜铃*Aristolochia mollissima* Hance 的全草。

【植物形态】多年生攀援草本，全株密被白色绵毛。根细圆柱形，棕黄色。茎细长，常攀附它物；叶互生，有长柄；叶片卵状心形或卵圆形，全缘，两面均被白色绵毛，下面更多。叶腋开花，花单生，花下有一叶苞片，花被管弯曲成烟斗状，先端向一侧展开成片状；黄色，中央紫色；雄蕊6，与花柱合生，约无柄，2室；子房下位，6室，花柱短。蒴果成熟时开裂；花期5月。

【生境分布】生于海拔100～850米的山坡、草丛、沟边或路旁灌丛中。分布于江苏、浙江、安徽等地。

【采收加工】宜于夏、秋季，或在5月开花前采收，连根挖出，晒干。

【药材性状】参见【植物形态】项。

以根茎红棕色者为佳。


【性味功能】辛、苦，平。祛风通络，行气止痛。

【临床应用】用于治疗风湿痹痛、肢体麻木、筋骨拘挛、跌打损伤疼痛、胃痛、牙痛、痈痛等。用量10～15克；或浸酒。阴虚内热者禁用。

【现代研究】所含的挥发性油和生物碱对大鼠甲醛性或蛋清性关节炎有明显的消肿及预防作用；对风湿性、类风湿性关节炎有明显止痛、改善关节功能的作用；本品全草粉末混于饲料中喂食小鼠，对铂氏腹水癌及腹水总细胞数均有明显的抑制作用，对铂氏癌皮下型癌亦有明显抑制效果，煎剂内服亦有效。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

杠板归

【别名】蛇倒退、老虎剌、犁头刺

【来源】蓼科植物杠板归 *Polygonum perfoliatum* L. 的全草

【植物形态】为多年生蔓性草本。全体无毛。茎有棱，棱上有倒生钩刺，多分枝，绿色，有时带红色。叶互生；叶片近于三角形，长与宽相等，淡绿色，下面叶脉疏生钩刺，有时叶缘亦散生钩刺；叶柄盾状着生，几与叶片等长，有倒生钩刺；托鞘叶状，圆形或卵形，包茎。短穗状花序，顶生或生于上部叶腋，花小，多数；具苞，每苞含2～4花；花被5裂，白色或淡红紫色，裂片卵形，不甚展开，随果实而增大，变为肉质；雄蕊8；雌蕊1，子房卵圆形，花柱三叉状。瘦果球形，暗褐色，有光泽，包在蓝色花被内。花期6～8月，果期9～10月。

【生境分布】生于荒地、路旁和灌木丛中。全国各地均有分布。

【采收加工】夏季开花时采收，洗净，晒干。生用或鲜用。

【药材性状】茎略方柱形，有棱角，最长可达1米，紫红色或紫棕色，棱角上有倒生钩刺，节略膨大；根横断面黄白色，有髓心或中空。叶互生，叶柄盾状着生；叶片多皱卷，展平后近等边三角形，灰绿色至红棕色，下面叶脉及叶柄均有倒生钩刺。总状花序顶生或生于上部叶腋；花小，多卷缩或脱落。气微，味微酸。

【性味功能】酸、苦，寒。清热解毒、利咽祛湿。

【临床应用】用于治疗热毒咽喉肿痛，肺热咳嗽、湿热黄疸、水肿、慢性湿疹、瘰疬、疥癣、下肢关节肿痛、淋浊、痢疾等。用量15～30克，鲜品60～100克。外用适量，捣敷或煎水洗。

【现代研究】鲜用效果较好。水煎剂对金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌及枯草、大肠、宋内氏痢疾、志贺氏痢疾等杆菌有抑制作用。对实验动物肿瘤有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

连钱草

【别名】活血丹、透骨消、接骨消

【来源】唇形科植物活血丹 *Glechoma longituba* (Nakai) Kupr. 的全草

【植物形态】多年生匍匐草本，茎纤细，方柱形，长10～30厘米，下部常匍地生根，上部斜升或近直立，仅幼嫩部被稀疏长绒毛。叶对生，有长柄；叶片草质，圆心形或近肾形，边有圆齿，被细毛。花蓝色或紫色，具短梗，通常单生于叶腋，稀2朵或3朵簇生；萼管状，15条纵脉，被长柔毛，萼裂片的长度约与萼管相等或较短，具芒状尖头；花冠有长筒和短筒二型，外面多少被毛，冠管下部圆筒状，上部明显扩大呈钟形，檐部二唇形，上唇直立，2裂，下唇伸长，斜展，3裂，中间的裂片特大，顶端凹；雄蕊8，内藏。小坚果长圆状卵形，深褐色，藏于宿存萼内。花期4～5月，果期5～6月。

【生境分布】生于沟坡50～2 000米的林缘、疏林下、草地上或溪边等阴湿处。全国除甘肃、青海、新疆和西藏外，均有分布。

【采收加工】春至秋季采收，洗净，晒干。生用或鲜用。

【药材性状】长10～20厘米，疏被短柔毛。茎方柱形，直径1～2毫米，细而扭曲，表面黄绿色或紫红色，节上有不定根，质脆，易折断，断面常中空。叶对生，叶片多皱缩，展平后呈肾形或近心形，长1～3厘米，宽1.5～3厘米，灰绿色或绿褐色，边缘具圆齿，叶柄长4～7厘米。轮伞花序腋生，花冠淡蓝色或紫色，二唇形，长达2厘米，搓之气芳香，味微苦。

【性味功能】辛、微苦，微寒。利湿通淋，清热解毒，散瘀消肿。

【临床应用】用于治疗血瘀腹痛、跌打损伤、水肿、小便不利、湿热黄疸、带下、痈肿疮毒、毒蛇咬伤等。用量15～30克，鲜品30～60克。外用适量，捣敷。

【现代研究】茎中主要含有挥发油。本品具有利尿、利胆、抗溃疡等作用；对金黄色葡萄球菌及伤寒、福氏痢疾、宋氏痢疾、绿脓杆菌等均有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

肿节风

【别名】接骨金粟兰、九节风、九节茶。

【来源】金粟兰科植物草珊瑚*Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai的枝叶。

【植物形态】常绿亚灌木，茎绿色，节膨大，节间有纵行的脊和沟。叶对生，革质；叶片先端渐尖，基部尖或楔形，边缘除基部外有粗锯齿，齿端为硬骨质；托叶鞘状。花黄绿色，单性、雌雄同株；雌雄花合生，生于一极小的苞片的腋内，组成顶生短穗状花；雄蕊1，药隔膨大成卵形，花药2室；子房1，卵形，柱头无柄。核果球形，熟时红色。花期6～7月，果期8～10月。

【生境分布】生于山沟溪谷旁林下阴湿处，海拔400～1500处。分布于安徽、浙江、江西、广西等地。

【采收加工】夏季采收，去除杂质，晒干或阴干。

【药材性状】全株长40～155厘米。主根粗短，直径1～2厘米，支根甚多，长而坚韧，茎圆柱形，较硬挺，多分枝，节部膨大；表面深绿色或棕褐色，具细纵皱纹，粗茎上可见稀疏分布的纵向长圆形小皮孔。质脆，易折断，断面淡棕色，边缘纤维状，中央具棕色疏松的髓或中空。叶对生，叶柄较硬，基部合生抱茎，叶片深绿色或棕红色，薄革质，有时破碎，叶片卵状披针形或长椭圆形，表面光滑，边缘具粗锯齿，并向叶背微反卷呈黑褐色；顶部常有穗状花序，通常分枝，棕色。气微香，味微辛。以茎、叶色绿者为佳。

【性味功能】辛、苦，平。清热凉血、活血消斑、祛风通络。

【临床应用】用于治疗跌打损伤、骨折、胃痛、肺热咳嗽、肠痈、外伤出血、风热湿痹、胃癌、肺癌、结肠癌等多种癌症等。用量9～30克外用适量，捣敷或煎水熏洗。阴虚血少及孕妇不宜用。

【现代研究】主要含有香豆素、内酯、黄酮苷、挥发油等成分。《中华人民共和国药典》规定，按干燥品计算，肿节风含异秦皮啶不得少于0.020%。本品对多种动物肿瘤有抑制作用；对动物吞噬细胞天噬功能等免疫指标有促进作用；并有抗溃疡、促进骨折愈合、祛痰、平喘、抗寒、抗疲劳、止痛、抑菌等作用；对垂体后叶素所致家兔心肌缺血有保护作用，并能增强小鼠对常压缺氧的耐受力。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金钱草

【别名】过路黄、大连钱草、蚬蚧草。

【来源】报春花科植物过路黄 *Lysimachia christinae* Hance 的全草。

【植物形态】多年生草本，茎柔弱，匍匐地面，叶对生；叶片卵形或心形，先端钝尖或钝，基部楔形或心形，全缘；叶、萼、花冠均具点状及条纹状黑色腺体；花黄色，成对腋生；萼片5，线状披针形至线形，幼嫩时稍有毛；花瓣5，长为萼片的2倍，裂片线状长圆形，先端尖；雄蕊5，3长2短，花丝基部联合成筒；花柱长，柱头头状，通常宿存。蒴果球形或近于球形，有黑色短条状腺体。花期5～7月，果期9～10月。

【生境分布】分布四川、江苏、广西、浙江、湖南等地

【采收加工】4～6月采收，除去杂质，晒干或鲜用。

【药材性状】干燥品多皱缩成团，茎扭曲，表面棕色或暗棕红色，有纵纹，通常无毛，断面实心；在下部各节上有时具须根，叶对生，多皱褶，展开后呈宽卵形或心形，全缘，上表面灰绿色或棕褐色，下表面色较浅，主脉1条，明显突起，用水浸泡后，对光透视，可见黑色或褐色腺条，有时可见叶腋着生具长梗的花或果，花黄色，蒴果球形，光滑，带宿萼，直径2～3.5毫米，有黑色短腺体，种子黑色，多数，气微，味淡。

【性味功能】甘、咸，微寒。清热利湿、通淋消肿

【临床应用】用于治疗湿热黄疸、肝胆结石、泌尿系统结石、膀胱湿热、小便不利、跌打损伤、风湿痹痛、筋骨疼痛、疔疮肿毒、毒蛇咬伤等。用量15～60克，外用适量，捣敷。

【现代研究】含酸性成分、甾醇、黄酮类、氨基酸、鞣质、挥发油、胆碱等。黄酮类成分主要有槲皮素、异槲皮素等。具有促进胆汁分泌、利尿排石等作用；对金黄色葡萄球菌有一定抑制作用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金沸草

【别名】旋覆花、黄熟花、金沸花

【来源】菊科植物旋覆花 *Inula japonica* Thunb. 的地上部分。

【植物形态】多年生草本　茎具纵棱，绿色或微带紫红色　叶互生，椭圆形、椭圆状披针形或窄长椭圆形，先端尖，基部稍狭，有时呈小耳、半抱茎，全缘或具细锯齿，上表面绿色，疏被糙毛，下表面淡绿色，密被糙伏毛，头状花序少数或多数，顶生，呈伞房状排列；花序梗被白毛；近花序处通常有1披针形的苞片，被柔毛；总苞半圆形，总苞片数层，外层披针形，内层线状披针形或线形，干膜质，外面被毛或仅具缘毛；花托微凸；舌状花1层，黄色，雌性，花冠先端3浅裂，基部两侧稍联合呈管状，雌蕊1，子房下位，具棱，被白色短硬毛，花柱线形，柱头2裂；管状花两性，位于花序的中央，花冠先端5齿裂，裂片卵状三角形，雄蕊5，聚药，花丝分离而短，雌蕊1，花柱线形，柱头2裂　瘦果长椭圆形，被白色硬毛，冠毛白色。花期6～10月，果期9～11月。

【生境分布】生于山谷、河滩、田埂、路边等较潮湿处　分布于我国东部各地

【采收加工】夏、秋季割取地上部分，晒干

【药材性状】茎圆柱形，长30～60厘米，直径2～5毫米，表面绿褐色或暗棕色，有多数细纵纹；质脆，断面黄白色，纤维状，髓部中空　叶互生，叶片披针形或长圆形，多破碎，绿黑色或绿灰色，基部渐窄，无柄，全缘或有疏齿；叶脉有背面隆起，中脉1条，侧脉8～13对　有时可见茎端生有扁球形的干燥花序，直径1～1.5厘米。气微，味苦


【性味功能】苦、辛咸，温。降气、化痰、行水。

【临床应用】用于治疗风寒咳嗽、痰饮痰喘、胁下胀痛等。外用治疗疮、肿毒。用量4.5～9克；外用鲜用捣汁，捣敷或煎水洗。

【现代研究】含旋覆花次内酯、蒲公英甾醇等成分　有平喘、止咳、抗菌等药理作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鬼针草

【别名】鬼钗草、鬼菊、针包草。

【来源】菊科植物鬼针草 *Bidens bipinnata* L. 的全草

【植物形态】一年生草本。茎中部叶和下部叶对生，幼茎有短柔毛；叶呈2回羽状深裂，裂片再次羽状分裂，小裂片三角状或菱状披针形，顶端尖或渐尖，边缘具不规则细齿或钝齿，两面略有短毛；上部叶互生，羽状分裂。头状花序；总苞片条状椭圆形，顶端尖或钝，被细短毛；舌状花黄色，通常有1～3朵不发育；管状花黄色，发育；裂片5。瘦果条形，具3～4棱，有短毛，顶端冠毛芒状，3～4枚。花期8～9月，果期9～11月。

【生境分布】生于路旁、荒地、林缘、沟边。分布于我国大部分地区。

【采收加工】夏、秋季采收地上部分，晒干。

【药材性状】茎略方形或圆柱形，嫩茎有稀疏毛，尤以节处为多。叶纸质，黄绿色，易碎，多皱缩或破碎，常脱落，展开后，完整叶2回羽状深裂，裂片披针形，上表面无毛，下表面主脉有稀疏毛。茎顶常有扁平盘状花托，着生10余枚针束状、有4棱的果实，偶见黄色的头状花序，气微，味淡。

【性味功能】苦、甘，寒。清热解毒、活血祛风。

【临床应用】用于治疗热毒或瘀热所致的痈疮，包括肠痈或外痈；热毒咽喉肿痛、外感高热、毒蛇咬伤；湿热所致的热淋、泻痢、痔疮肿痛；跌打瘀肿，风湿腰痛等。用量15～30克，鲜品30～60克。外用适量，鲜品捣敷或煎水外洗。

【现代研究】具有抑菌、消炎作用，在体外对革兰氏阳性菌有抑制作用；花、茎对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

益母草

【别名】益母、茺蔚草、益明。

【来源】唇形科植物益母草 *Leonurus japonicus* Sweet 的地上部分。

【植物形态】一年生或多年生直立草本；茎方形、叶对生　轮伞花序，花冠唇形，紫红色或淡红色；雄蕊4，2强；子房上位4裂、柱头2裂　坚果棕色，三角形。花期6～9月，果期9～10月

【生境分布】生于山坡、草地、路旁等处，　分布于全国各地

【采收加工】夏季茎叶茂盛、花未开或初开时采割，切段，晒干

【药材性状】茎方柱形，直径约5毫米。表面灰绿色或黄绿色，密被糙伏毛；质脆，断面中部有髓。叶交互对生，皱缩破碎，完整者下部叶掌状3裂，中部叶分裂成多个长圆形线状裂片，上部叶羽状深裂或浅裂成3片。轮伞花序腋生，花紫色，多脱落，花序上的苞片全缘或具稀齿　花萼宿存，筒状，黄绿色，萼内有小坚果4个。气微，味淡。

【性味功能】苦、辛，微寒　活血调经、利尿消肿

【临床应用】用于治疗妇女血瘀的痛经、闭经、经行不畅、产后瘀阻腹痛；水肿、小便不利等。用量9～30克；鲜品12～40克。

【现代研究】全草中含益母草碱、水苏碱、益母草定及二萜化合物，地上部分含挥发油。具有兴奋子宫、增加冠脉流量、改善微循环、扩张外周血管及降低血压等作用，还有利尿及抑制皮肤真菌等作用。

附　茺蔚子

【来源】唇形科植物益母草 *Leonurus japonicus* Sweet. 的果实。

【采收加工】秋季果实成熟时采收，晒干

【药材性状】小坚果矩圆形，具三棱，长2～3毫米，直径1～1.5毫米，上端平截，下端渐窄，有凹入的果柄痕。表面灰褐色或褐色，有稀疏的深色斑点。切面果皮褐色，胚乳、子叶白色，富油质，气无，味微苦。

【性味功能】辛、苦，微寒。活血调经、清肝明目。


【临床应用】可用于治疗肝热头痛、目赤肿痛等症。用量5～10克。

【现代研究】有降压、兴奋子宫等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com







莞荽子



益母草

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

积雪草

【别名】崩大碗、连钱草、落得打

【来源】伞形科植物积雪草 *Centella asiatica* (L.) Urb. 的全草

【植物形态】多年生匍匐草本，茎光滑或稍被柔毛，节上生根。单叶互生；叶片圆形或肾形，边缘有钝齿；上面光滑，下面有细毛。花单生，伞形花序；伞梗生于叶腋，较叶柄短，每一花梗有3～6朵花，苞片2；花萼头状，花瓣5，红紫色，卵形；雄蕊5，短小，与花瓣互生；子房下位，花柱2。双悬果，扁圆形，光滑；主棱和次棱同等明显，主棱间有网状纹相连。花期5～6月，果期7～8月。

【生境分布】生于路旁、田边、山坡等阴湿地。分布于江苏、安徽、浙江等地。

【采收加工】夏、秋季枝叶茂盛时采集，晒干。

【药材性状】卷曲成团块状。根圆柱形，长2～4厘米，直径1～1.5毫米，表面浅黄色或灰黄色。茎细长弯曲，黄棕色，有细纵皱纹，节上常着生须根或明显的根残迹。叶片多皱缩破碎，完整者展平后呈近圆形或肾形，直径1～6厘米，灰绿色，边缘有粗锯齿，有扭曲状的长叶柄，基部有膜质的叶鞘。气微，味淡。

【性味功能】苦、辛，寒。清热利湿、解毒消肿。

【临床应用】用于治疗湿热黄疸；温病气分实热所致之高热不退、咽喉肿痛；热毒痈肿疔疮、丹毒；跌打损伤所致之肿痛，以及胁下痞块等症。用量15～30克，鲜品60～120克。外用适量，以鲜品捣烂或捣汁外涂。

【现代研究】含三帖皂苷，是主要活性成分，最主要的有积雪草苷、羟基积雪草苷。此外，还含有多种游离酸和烯酮类化合物。可应用HPLC法测定积雪草苷和羟基积雪草苷的含量。具有镇静、安定、抗菌作用；对小鼠幽门结扎性溃疡及应激性溃疡都有显著的抑制作用；对皮肤溃疡有促进皮肤生长与结缔组织血管网增生等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紫花地丁

【别名】地丁、金剪刀、紫地丁

【来源】堇菜科植物紫花地丁 *viola yedoensis* Makino 的全草

【植物形态】多年生草本，无地上茎。根状茎短，节密生。主根粗，有数条细根。叶多数，基生，莲座状；叶片下部通常较小，呈三角状卵形或狭卵形，先端圆钝，基部截形或宽楔形，稀微心形，边缘具浅圆齿，两面无毛或被细短毛，果期叶片增大；托叶膜质，苍白或淡绿色，2/3～4/5与叶柄合生，离生部分线状披针形。花两侧对称，具长梗；花瓣淡紫色或紫色，稀呈白色，喉部色淡并带紫色条纹；萼片5，卵状披针形或披针形，基部附属物短形或半圆形，顶端圆或截形；花瓣5，倒卵形或长圆状倒卵形；雄蕊5，子房卵形，无毛，花柱棍棒形，柱头三角形。种子卵球形，淡黄色。花期3～4月，果期5～9月。

【生境分布】生于路边、林缘、灌木丛、荒地、田埂阴湿处及水沟边。主产于江苏、浙江等地。

【采收加工】春、秋二季采取全草，洗净，晒干。

【药材性状】多皱缩成团。主根圆锥形，直径1～3毫米。叶丛生，灰绿色，湿润展开后，叶片披针形或卵状披针形，长1.5～5.6厘米，宽1～2厘米，先端钝，基部截形或呈心形，边缘具钝锯齿；两面有毛；叶柄细长，长2～6厘米，上部有明显狭翅。花茎纤细；花瓣5，花紫色或淡棕色，距细管状。蒴果通常三角状裂开，内有多数淡黄色种子。气微，味微苦而带粘性。

【性味功能】苦、辛，寒。清热解毒、凉血消肿。

【临床应用】用于治疗热毒痈肿结聚之疔疮痈肿、乳痈、肠痈、丹毒等证；及肝热目赤肿痛、毒蛇咬伤等。用量15～30克。单味大量可用至30～60克。外用适量，捣烂外敷患处。

【现代研究】含有甘类、黄酮类、黏液质、棕榈酸等。近从全草中分离出一种在体外试验中具有高活性抗I型艾滋病毒的高分子化合物，分子量为10 000～15 000的磺化多聚糖。本品具有抑菌、利胆、利尿和轻泻等作用；对金黄色葡萄球菌、卡他球菌、链球菌、肺炎双球菌均有抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鹅不食草

【别名】石胡荽、地胡椒、三芽草

【来源】菊科植物鹅不食草 *Centipeda minima* (L.) A. Braun et Aschers. 的全草。

【植物形态】 半匍匐状草本，微臭，揉碎有辛辣味。茎细，基部分枝很多，枝匍匐，着地生根，无毛或略有细柔毛。叶互生；叶片小，倒卵状披针形，先端钝，基部楔形，边缘有疏齿，无柄。头状花序小，扁球形，无柄，单生叶腋；花黄色，外围为雌花，有极细的花管，中央为两性花，花管具4裂片；雄蕊4，花药基部钝圆；子房下位，柱头2裂。瘦果四棱形，棱上有毛。花期4～9月，果期5～10月。

【生境分布】生于稻田、阴湿山地及路旁或湿润草地。分布于江苏、浙江、安徽、广东等地。

【采收加工】夏季开花时采集，鲜用或晒干用。

【药材性状】扭集成团。须根纤细，淡黄色。茎细，质脆，断面黄白色。叶小，多皱缩或破碎，完整者展平后呈匙形。表面灰绿色或棕褐色，边缘有3～5个锯齿。头状花序黄色或黄褐色。气微香，久闻有刺激感，味苦、微辛。

【性味功能】辛，温。通鼻窍，止咳。

【临床应用】用于治疗外感风寒之鼻塞、流涕、头痛之症；鼻寒不通；寒痰咳喘、顿咳；头风痛、牙痛、外伤疼痛、风湿痹痛。疮痈肿痛、痔症及泄痢腹痛等多种痛症。外治癣疮瘙痒。用量3～10克。鲜品加倍，捣汁服可用至60克。外用适量。

对胃肠道粘膜有一定刺激作用，可引起腹痛、胃脘不适、恶心、呕吐等消化道症状。饭后1小时服药，可减轻其不良反应。胃溃疡及胃炎患者慎用。

【现代研究】全草含甾醇类成分、如蒲公英醇、蒲公英甾醇及三萜皂苷类成分。具有止咳、祛痰、平喘等作用；对革兰氏阳性、阴性球菌、杆菌及某些病毒有一定的抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

豨莶草

【别名】希仙、金耳钩、锁静草

【来源】菊科植物豨莶 *Siegesbeckia orientalis* L. 的全草

【植物形态】一年生草本。茎直立，方形，有纵条纹，上部密被短柔毛。单叶对生；叶片阔卵状三角形至披针形，边缘有不规则的浅裂及粗齿，两面均被长柔毛。头状花序排列成圆锥状顶生或腋生，花序梗细长，被柔毛，花黄色，总花梗密被长柔毛和腺毛，分泌粘液；总苞片2层，外层苞片5枚，线状匙形，内层苞片10～12枚，倒卵形兜状；花杂性，黄色，边缘为舌状花，雌性，先端3浅裂；中央为管状花，两性；雄蕊5；子房下位，柱头2裂。瘦果黑色四棱形。花期4～9月，果期6～11月

【生境分布】生于100～2 700海拔的山坡、路旁、杂草、灌木丛中分布于华东、华南、西南等地。

【采收加工】夏季开花前割取全草，除去杂质，晒至半干后，置通风处晾干。

【药材性状】茎略呈方柱形，分枝对生，有环形的叶柄残痕，表面灰绿色、黄绿色或带紫棕色，有纵沟及细纵纹，被灰色柔毛；节明显，略膨大；质轻而脆，易折断，断面黄白色或带绿色，髓部宽广，类白色，中空。叶对生，多破碎而不完整，完整叶片常皱缩、卷曲，展平后呈卵圆形，灰绿色，边缘有钝锯齿，两面皆有白色柔毛，尤以叶脉处为多，主脉3出，在茎顶或叶腋间有时可见黄色的头状花序，总苞片匙形，总苞上可见点状的腺毛。气微，味微苦。

【性味功能】辛、苦，寒　祛风湿、利关节、解毒

【临床应用】用于治疗风湿热痹证、热毒痈疮肿痛、疟疾、湿热黄疸、眩晕头痛等；外用治蛇虫咬伤、外伤出血等。用量9～12克，外用适量，捣敷、研末撒或煎水熏洗。

【现代研究】豨莶草甲醇提取物有抗炎、镇痛作用；豨莶草水煎液有抑制免疫功能；其水浸液、乙醇-水浸出液有降低血压作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

薄　荷

【别名】蕃荷菜、苏薄荷、鸡苏。

【来源】唇形科植物薄荷 *Mentha haplocalyx* Briq. 的地上部分

【植物形态】多年生草本。茎方形，被逆生的长柔毛及腺点。单叶对生；叶片短圆状披针形或披针形，两面有疏柔毛及黄色腺点；轮伞花序腋生；萼钟形，外被白色柔毛及腺点，10脉，5齿；花冠淡紫色，4裂，上裂片顶端2裂；雄蕊4，前对较长，均伸出花冠外。小坚果卵圆形，黄褐色。花期7～10月，果期10～11月。

【生境分布】生于河边、沟边、路边、小溪边及山野湿地。我国南北均产，尤以江苏产者为佳。

【采收加工】薄荷通常收割2次，第1次收割在小暑后大暑前（7月中下旬），主要提取薄荷油用；第2次收割在霜降之前（10月中下旬），主要作药材用，晒干或阴干。

【药材性状】茎方柱形，长60～90厘米，直径2～8毫米；表面紫棕色或淡绿色，棱角处具茸毛，节间长1～5厘米，有对生分枝，质脆，断面中空或白色。叶对生，有短柄；叶片皱缩卷曲，湿润后展开，叶披针形、卵状披针形、长圆状披针形至椭圆形，两面均有柔毛及腺鳞（扩大镜下观察呈凹点状）。茎上部轮伞花序腋生，疏离，花萼钟状，先端5齿裂，花冠多数存在，黄棕色。搓揉后有特殊香气，味辛凉。


【性味功能】辛，凉。宣散风热、清头目、透疹。

【临床应用】用于治疗感冒风热、头痛、目赤、咽喉红肿疼痛、皮肤瘙痒、麻疹透发不畅等。用量3～6克，宜后下，外用适量。本品芳香辛散，发汗耗气，故体虚多汗者不宜使用。

【现代研究】薄荷中主要含挥发油，《中华人民共和国药典》规定本品挥发油含量不得少于0.80%（ml/g）。具有发汗、解热、缓解胃肠平滑肌痉挛、促进呼吸道腺体分泌而具消炎及解痉等作用；还能刺激神经末梢冷感受器而产生冷感，并反向性地造成深部组织血管的变化而起到消炎、止痛、止痒作用；对革兰氏阳性、阴性球菌、杆菌及多种病毒有一定的抑制作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

附 1 薄荷油

【来源】为唇形科植物薄荷 *Mentha haplocalyx* Briq 的新鲜茎和叶经水蒸气蒸馏，再冷冻、部分脱脑加工得到的挥发油。

【采收加工】夏、秋季茎叶茂盛时采收新鲜茎、叶，经水蒸气蒸馏，再冷冻，部分脱脑加工得到挥发油。

【药材性状】为无色或淡黄色的澄黄色的澄清液体。有特殊清凉香气，味初辛、后凉。存贮日久，色渐变深。与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合。

相对密度在25℃时应为0.888～0.908。旋光率取本品置1毫升的管中，依法测定为-17°～24°。

折光率在25℃时应为1.456～1.466

【性味功能】芳香药、调味药及驱风药。

【临床应用】用于皮肤粘膜产生清凉感以减轻不适及疼痛。口服，一次0.02～0.2毫升

【现代研究】本品含总酯量按醋酸薄荷酯计，应为2.0%～6.5%(g/g)；含总醇量按薄荷脑计，不得少于50.0%(g/g)。

附 2 薄荷脑

【来源】为薄荷中得到的一种饱和的环状醇

【采收加工】夏、秋季茎叶茂盛时采收新鲜茎、叶，经水蒸气蒸馏，再冷冻，部分脱脑加工得挥发油，进而从薄荷油中分离得到。

【药材性状】为无色针状或棱柱状结晶或白色结晶性粉末；有薄荷的特殊香气，味初灼热后清凉；乙醇溶液显中性反应

在乙醇、氯仿、乙醚、液状石蜡或挥发油中极易溶解，在水中极微溶解。熔点为42～44℃。比旋度取本品，精密测定，加乙醇制成每1毫升中含0.1克的溶液，依法测定，比旋度为-49～-50℃


【性味功能】芳香药、调味药及驱风药

【临床应用】用于皮肤粘膜产生清凉感以减轻不适及疼痛。口服，一次0.02～0.2毫升

【现代研究】取本品2克，置称定重量的蒸发皿中，在水浴中加热，使缓缓挥散后，在105℃干燥至恒重，遗留残渣不得超过1毫克。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



薄荷油



薄荷脑

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藿香

【别名】排香草、野藿香。

【来源】唇形科植物藿香 *Agastache rugosa* (Fisch. et Mey.)O. Ktze. 的全草。

【植物形态】 年生或多年生草本。茎直立，四棱形，略带红色，稀被微柔毛及腺体。叶对生；椭圆状卵形或卵形，先端锐尖或短渐尖，基部圆形或略带心形，边缘有不整齐钝锯齿，齿圆形；上面无毛或近无毛，散生透明腺点，下面有短柔毛。轮伞花序聚成顶生的总状花序；苞片大，钻线形或披针形，被微柔毛；萼5裂，裂片三角形，具纵脉及腺点；花冠唇形，紫色或白色，上唇四方形或卵形，先端微凹，下唇3裂，两侧裂片短，中部裂片扇形，边缘由波状细齿，花冠外被细柔毛；雄蕊4，2强，伸出花冠管外；子房4深裂，花柱着生于子房底部中央，伸出花外，柱头2裂。小坚果倒卵状三棱形。

【生境分布】产于我国南方各地。

【采收加工】第一次在6～7月开花时采收，第二次在10月。采后晒干或阴干。

【药材性状】地上部分长30～90厘米，常对折或扎捆成束。茎呈方柱形，多分枝，直径0.2～1厘米，四角有棱脊，四面平坦或凹入成宽沟状，表面暗绿色，稀有毛茸，节明显，常有叶柄脱落的疤痕，节间长3～10厘米，老茎坚硬，质脆，易折断，断面白色，髓部中空。叶对生，叶片深绿色，纸质，多皱缩或破碎，完整者展开后呈卵形或三角形卵形，长2～8厘米，宽1～6厘米，先端尖或短渐尖，基部圆形或心形，边缘有钝锯齿，叶上表面深绿色，下表面浅绿色，两表面微具毛茸。叶柄长1～4厘米，有穗状轮伞花序顶生，呈土棕色，气香而特异，味淡而微凉。

【性味功能】辛，微温。气芳香。芳香化湿，和胃止呕，发表解暑。

【临床应用】用于治疗暑湿感冒、寒热、头痛、胸脘痞闷、呕吐泄泻、疟疾、痢疾、口臭等。用量5～10克。

【现代研究】全草含挥发油约0.35%，主要成分为甲基胡椒酚约80%，其次是茴香醛、对-甲氧基桂皮醛、黄酮苷类异藿香苷、藿香素等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

全草类药材小常识

【分类】全草类药材又称草类药材，大多为干燥的草本植物的地上部分，如广藿香、淫羊藿、益母草等，亦有少数连带有根及根茎的全草，如细辛、蒲公英等；或小灌木草质茎的枝梢，如麻黄等。而对于草质茎和肉质茎这些质地与草本植物较为相似的茎类药材，习惯上也归在全草类药材中，如石斛、肉苁蓉、锁阳等。

【采收加工】全草类药材的采收多在植物充分生长、茎叶茂盛时采割，如青蒿、穿心莲、淡竹叶等；有的在开花时采收，如益母草、荆芥、香薷等。全草类药材采收时大多割取地上部分，少数连根挖取，全株药用，如细辛、蒲公英等。根据近年有效成分研究，茵陈有两个采收时间，春季幼苗高6~10厘米时或秋季花蕾长成时。春季采的习称“绵茵陈”，秋季采的习称“茵陈蒿”。

【鉴别要点】全草类药材的鉴别，应按所包括的器官，如根、茎、叶、花、果实、种子等分别处理，这些器官的性状特征鉴别要点应以前面相关内容中所叙述的分别进行观察。同时，还可依靠原植物分类的鉴定方法进行鉴别。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



八、菌　类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

马勃

【别名】马屁勃、沙包菌、牛屎菌。

【来源】灰包菌科真菌紫色马勃 *Calvatia lilacina* (Mont. et Berk.) Lloyd 的子实体

【植物形态】子实体呈陀螺形，不孕基部发达；包被薄，光滑，两层，上部常裂成小块，逐渐脱落，内部紫色，当孢子有孢丝散失后遗留的不孕基部呈林状；孢子球形，上有小刺；孢丝很长，分枝，有横隔，互相交织，色淡。

【生境分布】生于旷野草地上。分布于广东、海南、广西、湖北、湖南、新疆、青海、四川、江苏、安徽、山东、福建、河北、辽宁等地。

【采收加工】夏、秋季子实体成熟时及时采收，除去泥沙，干燥。

【药材性状】陀螺形、或已压扁呈扁圆形，不孕基部发达。包被薄，两层，紫褐色，粗皱，有圆形凹陷，外翻，上部常裂成小块或已部分脱落孢体紫色。

【性味功能】辛，平。清肺利咽、止血。

【临床应用】用量 1.5～6 克，煎服；外用适量，敷患处。用治风热郁肺、咳嗽、齐哑；外治鼻衄、创伤出血。

【现代研究】含抗菌成分马勃酸、苯基氧化偶氮氧化物和抗真菌及抗菌成分对位羧基苯基氧化偶氮基氧化物、类固醇二聚体 Calvasterone，尚含氨基酸和磷酸盐。临床用于外科手术止血、外伤止血、鼻出血、非特异性溃疡性结肠炎、上呼吸道感染、荨麻疹等。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com







更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

银　耳

【别名】雪耳、白木耳。

【来源】银耳科真菌银耳 *Tremella fusiformis* Berk. 的子实体。

【植物形态】银耳整体由菌丝体和子实体组成。菌丝体极细，灰白色，能在木材等基质上蔓延生长、吸收和运送养分，其结实性菌丝在适宜的条件下产生子实体。子实体即食用或药用部分，鲜子实体除耳基为黄色外，全体纯白或为半透明体，由3至10余个波状皱曲的瓣片组成，状如鸡冠花，大小不一，直径通常1～8厘米，胶质硬而脆。银耳瓣片大体分为3层，即子实层、疏松中层、子实层，子实层宽约145微米，由担子和侧丝组成，疏松中层3～3.5毫米，由胶质化菌丝构成。孢子在瓣片表面呈白色粉末状，借助风力传播。

【生境分布】腐生于林中木材中，现广为栽培。主产于长江以南各地。

【采收加工】4～9月采收，除去杂质，晒干或烘干。

【药材性状】由多数皱缩的薄片组成。野生品呈不规则的片块或小团块状，片较大而厚；人工栽培品大多为扁圆形块或鸡冠花状团块，底部中心有棕黑色斑块，片较小而薄。表面白色或黄白色，半透明；质柔韧而脆，水泡后发胀，透明。气无，味淡。

【性味功能】甘、淡，平。滋阴、润肺、养胃、生津。

【临床应用】用于治疗肺热咳嗽、肺燥干咳、咳痰带血、肺痿、虚热口渴、胃肠燥热、便秘下血、咯血等。用量3～10克。

【现代研究】具有增加冠脉血流量、降低冠脉阻力、减慢心力、抑制血小板聚集及血栓形成、镇咳化痰、提高机体免疫功能等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



夏同珍提供

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蝉花

【别名】金蝉花

【来源】麦角菌科真菌蝉花 *Cordyceps sobolifera* (Hill.) Berk et Br.寄生于蝉蛹上形成的子座和蝉蛹尸体的复合体。

【植物形态】蝉花的子座单生或2～3个成丛地从蝉蛹前端伸出，棍棒状或鹿角状，高2.5～6厘米，中空，茎肉桂色，干后深肉桂色，直径0.15～0.4厘米，往往有不孕小枝，头部棒状，肉桂色至茶褐色，长0.7～2.8厘米，直径0.2～0.7厘米；子囊壳长卵形，埋生于子座内，孔口稍凸，500～620微米×220～260微米；子囊圆柱形，200～740微米×5.6～7微米，内含8枚线状、多隔、透明的子囊孢子；孢子易断为8～16微米×1～1.5微米的小段。

【生境分布】生于蝉蛹上，分布于江苏、浙江、福建等地。

【采收加工】春季子座从虫体抽出时采集，洗净，干烈日下晒干，未干时不宜堆压，否则易发生霉变。

【药材性状】虫体长椭圆形，微弯曲，长约3厘米，直径1～1.4厘米，形状似蝉蜕，表面土黄色，大部分体表覆有灰白色菌丝。子座2～4个自虫体头部伸出，灰黑色或灰白色，长条形或分枝卷曲，长2～5厘米或稍过之。体较轻，质柔韧，断面中部充满粉白色、松软的菌丝。气味似草菇。

【性味功能】咸、甘，寒；明目退翳、定惊镇痉。

【临床应用】用于治疗目翳、惊痫、小儿夜啼、麻疹未透等。用量3～10克。

【现代研究】目前有关研究资料较少。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藻及菌类药材小常识

【分类】藻类及菌类均称为低等植物，在形态上无根、茎、叶的分化，是单细胞或多细胞的叶状体或菌丝体，可以分枝或不分枝，在构造上一般无组织分化，无维管束及胚胎。植物体大小不一，最小的个体由1个单细胞组成，而多细胞组成的个体有的长可达百米以上，重者可上数千克。

藻类药材多属于褐藻和红藻的干燥植物体。藻类植物多具有在海水中选择吸收碘质的能力，故含碘较多。供药用的如昆布、海藻

菌类药材多为子囊菌纲和担子菌纲植物的子实体和菌核体。子囊菌的主要特征是在特殊的子囊中形成子囊孢子，如酵母菌、冬虫夏草。担子菌的主要特征是不形成子囊，而是依靠担子形成担孢子来繁殖，如茯苓、猪苓、雷丸、灵芝、马勃。药用部分是子实体的有马勃、灵芝等，药用部分是菌核体的有猪苓、茯苓、雷丸等。

【采收】采收情况不一，如茯苓在立秋后采收质量较好；马勃宜在子实体刚成熟时采收，过迟则孢子飞散 冬虫夏草在夏初子座出土孢子未发散时采挖；海藻在夏、秋季采捞。

【鉴别要点】由于藻及菌类药材形态特异 鉴别时可根据药材所属类别分别进行观察，对照其描述的特点进行鉴别。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



九、动物类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

土鳖虫

【别名】金边土鳖虫

【来源】姬蠊科昆虫赤边水鳖（东方后片蠊）*Opisthoplatia orientalis*（Burm.）的全体

【动物形态】呈椭圆形，微向内弯，长3～4厘米；背面黑棕色，有光泽，呈甲壳状；头部位于前胸背板之下，眼不明显，有线状触角一对，多脱落。全体由10个覆瓦状排列的横节组成，第一节较宽，边缘浅黄绿色，以下9节边缘为红棕色，每节均有锯齿，第二、三节两侧各有一对特异翅状物；足3对，位于胸部，腿节下缘有刺。腹内常有夹形卵鞘

【分布】主产于福建、湖北等地

【采收加工】野生者夏季捕捉，饲养者全年可捕捉。用沸水烫死，晒干或烘干

【药材性状】见【动物形态】项

【性味功能】咸，寒，有小毒。破瘀血，续筋骨

【临床应用】用于治疗跌打损伤，筋伤骨折，瘀肿疼痛，血瘀经闭，产后瘀滞腹痛，积等。用量3～10克。外用适量，捣敷或研末调敷

【现代研究】本品为华南、华东部分地区的地方习惯性用药，与《中华人民共和国药典》所载的土鳖虫原动物不同，但性味功用相同

猪胆粉

【来源】为猪科动物猪 *Sus scrofa domnesnca* Brisson 的胆囊粉末

【动物形态】躯体肥胖，头大，鼻与口吻皆长，略向上屈，眼小，耳壳有的大而下垂，有的较小而前挺，四肢短小，4趾，前2趾有蹄，后2趾有悬蹄，颈粗，项背疏生鬃毛，尾短小，末端有毛丛

【产地】全国各地均有

【采收加工】取得后，拌起晾干，或在半干时略稍压扁，再干燥之。

【药材性状】以个大、色泽鲜亮、气微腥而不臭、干燥者为佳

【性味功能】苦，寒。清热，润肺，解毒，止咳平喘

【临床应用】用于治疗里热内盛之烦躁，口渴，便秘或黄疸等；百日咳等。用量3～6克。外用适量，调涂

【现代研究】本品有镇咳、平喘作用；并有消炎、抗过敏和抗菌作用，

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



金边土鳖



猪胆



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乌梢蛇

【别名】剑脊乌蛇、黑乌梢、乌蛇。

【来源】游蛇科动物乌梢蛇 *Zaocys dhumnades* (Cantor) 除去内脏的全体。

【动物形态】体长可达2米左右。鼻孔大，椭圆形，位于两鼻鳞间。鼻间鳞宽大于长。眼大；眼后鳞2片。上唇鳞8片，第4、5两片入眼。下唇鳞9～11片，第6片最大。背鳞前段为16行，后段为14行。双颈的后部起背中央有2～4行鳞片起被棱，腹鳞186～205片，肛鳞2裂，尾下鳞101～128对。体背青灰褐色，各鳞片的边缘黑褐色。背中央的2行鳞片黄色或黄褐色，其外侧的2行鳞片呈黑色纵线。腹面灰白色。

【分布】主产于浙江、江苏、安徽、江西、福建等地。

【采收加工】4～11月间捕捉。捕到后，将蛇摔死，剖腹除去内脏，盘成圆形，用柴火熏干，熏时频频翻动，至表面略呈黑色为度，再晒干或烘干。

【药材性状】圆盘状，盘径13～16厘米。全体乌黑色或黑褐色，被菱形细鳞，背鳞行数为偶数，中央2～4行强烈起棱，形成两条纵贯全体的黑线。头盘在中央，扁圆形，口内有多数刺状牙齿。背部高耸成屋脊状，俗称“剑脊”。腹部剖开边缘向内卷曲，内面黄白色或淡黄色，可见排列整齐的肋骨。尾部渐细而长。质坚硬，气腥，味淡。


【性味功能】甘，平。祛风、活络、止痉。

【临床应用】用于治疗风湿痹痛、肌肤麻木、半身不遂、风疹、惊痫抽搐、破伤风等。用量5～15克。

【现代研究】含蛋白质、脂肪及大量的微量元素，其中钡的含量达109.168微克/克，是10种药用蛇中含量最高的。以水煎液或醇提液腹腔注射，能抑制大鼠琼脂性关节肿胀和二甲苯的致炎作用；对小鼠因热刺激和化学刺激引起的疼痛有镇痛效果；并有一定的抗惊厥作用。取其背鳞1片，用水装置后观察其显微特征，可见鳞片呈黄褐色，具纵向条纹，条纹间距13.7～27.4微米，沿鳞片基部至先端方向径向排列，内含色素斑。此特征是乌梢蛇粉末鉴定的重要依据。此外，其紫外光谱特征亦能与其他蛇类区别。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com







更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乌骨鸡

【别名】乌鸡、竹丝鸡

【来源】雉科动物乌骨鸡 *Gallus gallus domesticus* Brisson 的肉或除去内脏的全体。

【动物形态】体躯短矮而小，头小，颈短，具肉冠，耳呈绿色，略呈紫蓝，遍体毛羽色白，除两翅毛羽外，全呈绒丝状；头上有一撮细毛突起，下颌下连两颊面生有较多的细短毛；皮、肉、骨、嘴均乌色；翅较短，而主翼羽的羽毛呈分裂状，飞翔力特别强；毛脚，5爪；跗毛多而密。

【分布】原产江西泰和县，现各地亦有饲养。

【采收加工】取乌骨鸡的肉或除去内脏。

【药材性状】见**【动物形态】**项。

【性味功能】甘，平。养阴退热。

【临床应用】用于治疗虚劳骨蒸、消渴、脾虚滑泄、带下等。

【现代研究】乌骨鸡含19种以上氨基酸，与其他各种鸡比较，乌骨鸡鲜肉氨基酸含量为18.54克/100克，明显高于普通鸡的16.38克/100克。主要化学成分是黑色素，在其皮肤、肌肉、骨膜及内脏（除心、肝、肺外）均含有大量黑色素。这种黑色素的元素分析结果显示它由C、H、N、S和O组成，含氮量为3.5～4.7%。红外光谱中可见有5组明显吸收峰，其中以主要象征吲哚环的吸收峰为最强，所以初步表明乌骨鸡黑素为一种具有真黑素特征的吲哚型含硫异聚物。药理实验表明，乌骨鸡有明显的抑制4NQO的诱变作用。按贺田等人对抑制物质的分类方法，乌鸡黑素的这种抑制诱变作用应属于脱诱变作用，故推测乌鸡黑素的药用机制之一是能够抑制人体内的一些对细胞有损伤作用物质的活性，进而促进某些致衰老、致突变或致癌物质的降解或排泄，保护细胞的完整性，起到预防癌变或抗衰老的作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

海螵蛸

【别名】乌贼骨、墨鱼盖

【来源】乌贼科动物无针乌贼 *Sepiella maindroni* de Rochebrune 或金乌贼 *Sepia esculenta* Hoyle 的内壳

【动物形态】无针乌贼：体中等大，胴部卵圆形，长度约为宽度的2倍。胴的后端腹面有一个腺孔，常流出近红色带腥味的浓汁。鳍前端略窄，渐向后端宽。各腕的长度近相等。腕序为4＞1＞3＞2。触腕长度略超过胴长。触腕吸盘小而密，大小近相等。内壳长椭圆形，长度约为宽度的3倍，末端无骨针。

金乌贼（药材名为有针乌贼）：与无针乌贼的区别是，头部短，眼位于头的两侧。眼位于头的两侧，眼的后方有一个皮肤突出的线形肋。嗅觉椭圆形。胴长约达200毫米。卵圆形，长度为宽的1.5倍。鳍窄，位于胴部左右，两侧全缘。触腕长度略超过胴长，触腕穗半月形，约为全腕长度的1/5。体肉色，有细密的紫色色素斑。背部色素极密。

【分布】无针乌贼主产于浙江、江苏和广东等地；金乌贼主产于辽宁、山东、江苏等地。

【采收加工】收集从乌贼鱼中剥下之内壳；漂洗，晒干。

【药材性状】无针乌贼：内壳长椭圆形而扁平，边缘薄，中间厚，长9～14厘米，宽2.5～3.5厘米，厚1.2～1.5厘米。背面有白色脊状隆起，两侧略显微红色，隐约见细小疣点状突起，形成近平行半环状纹理；腹面白色，尾端到中部有细密波状横层纹；角质缘半透明。尾部较宽平，无骨针。体轻，质松，易折断，断面粉质，显疏松层纹，气微腥，味微咸。

有针乌贼：内壳较前者大，长13～23厘米，宽约至6.5厘米，最厚部分位于前半部，厚0.8～1.2厘米。背面疣点明显，略作层状排列；腹面波状横层纹占个体大部分，中间有纵向浅槽；尾部角质缘渐宽，向腹面翘起，末端有1骨针，多已断落。

【性味功能】咸、涩、温。收敛止血、涩精止带、制酸。

【临床应用】用于治疗遗精、带下；崩漏下血、吐血、使血及外伤出血；胃痛吐酸；湿疮、湿疹、溃疡不敛等。用量6～12克，外用适量。

【现代研究】本品所含的碳酸钙，可作制酸剂，有阻止胃酸分泌的作用。新鲜乌贼骨中所含5-羟色胺及另一种物质，可能是一种多肽类（脑、腮、心含量较多），人食乌贼中毒可能即此物质引起肠运动的失调所致。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



无针乌贼



有针乌贼

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

龟甲

【别名】龟壳、拖泥板。

【来源】龟科动物乌龟 *Chinemys reevesii* (Gray) 的背甲及腹甲。

【动物形态】爬行动物。头部光滑，上、下颌无齿而具角质硬喙。躯体背、腹两面均披硬甲，背面棕褐色。中央脊鳞甲5枚，两侧各有肋鳞甲4枚。缘鳞甲每侧11枚，肛鳞甲2枚；腹甲由6对鳞甲片组成，淡黄色。尾短而尖细，四肢较扁平，指、趾间具蹼。后肢第五趾无爪，余皆有爪。

【分布】主产于浙江、安徽、湖北、湖南等地。

【采收加工】全年均可捕捉，以秋、冬两季为多。杀死，或用沸水烫死，剥取甲壳，除去残肉，晒干。以沙炒后醋淬用。现多人工饲养。

【药材性状】背甲及腹甲由甲桥相连，背甲稍长于腹甲。背甲长椭圆形拱状，前部略窄于后部，外表面棕褐色或黑色，前端有颈角板1块，背脊中央有椎角板5块，两侧各有对称肋角板4块，边缘每侧具有缘角板11块，尾部具有臀角板2块。腹甲板片状，近长方椭圆形，外表面淡黄棕色至棕色，角板12块，每块具有紫褐色放射状纹理，内表面黄白色至灰白色，“血板”不脱皮，有的略带血迹或残肉，“汤板”色稍深，有脱皮的痕迹，除净后可见骨板9块，呈锯齿状嵌接。前端钝圆或平截，后端具三角形缺刻，两侧均有呈翼状向斜上方弯曲的甲桥（墙板），质坚硬，气微腥，味微咸。

【性味功能】甘、咸，微寒。滋阴潜阳，益肾健骨，养血补心。

【临床应用】用于治疗阴虚热、骨蒸盗汗、头晕目眩、虚风内动、筋骨内动、心虚健忘等；用量15～30克，宜打碎先煎。

【现代研究】含蛋白质、碳酸钙、微量元素等，其中磷、镁的含量远远高于其他18种微量元素。本品有增强免疫功能的作用，有抗肿瘤、耐缺氧、抗高脂症、抗动脉粥样硬化、兴奋子宫、增强幼鼠睾丸和子宫重量、增强去势雄鼠副性腺器官重量等药理作用。对“阴虚”证群病理模型的动物，能降低其耗氧量和血浆CAMP，能纠正CAMP系统的异常反应；能改善甲亢型阴虚动物的机体状态。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com







更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蚕砂

【别名】原蚕屎、原蚕沙、晚蚕沙

【来源】蚕蛾科昆虫家蚕 *Bombyx mori* Linnaeas 的干燥粪便.

【动物形态】家蚕雌雄成虫触角相同，栉节状，口器退化；体翅黄白色至灰白色，翅展3.9～4.3厘米，前翅顶角下方外缘向内微凹，横线色稍暗，不甚明显，前端与翅脉灰褐色，后翅较前翅淡，边缘鳞毛稍长　幼虫灰白色至白色，胸部2、3节稍膨大，有皱纹；腹部第8节背面有一尾角．蛹长螺形，棕黄色至棕褐色，长2.2～2.5厘米，宽1.1～1.4厘米，鲜蛹外表略被蜡质粉，雄蛹较雌蛹略小，色稍深

【分布】主产浙江、江苏、安徽、山东、河南等地．

【采收加工】6～8月收集，以2眠到3眠时的粪便为主．收集后晒干，除去泥土、桑叶碎片

【药材性状】本品呈短圆柱形小颗粒状，长2～5毫米　表面灰黑色，粗糙，有6条明显的纵棱及3～4横向浅纹．两端略平坦，六棱形　质坚硬不易碎，略有青草气，遇湿易散碎。

【性味功能】甘、辛，温　祛风除湿、活血定痛

【临床应用】用于治疗湿浊内蕴之霍乱吐泻；风湿痹痛、肢体不遂；风疹瘙痒；头风头痛等　用量9～12克　外用适量，炒熨、煎水洗或研末调敷

【现代研究】含植醇、β-谷甾醇、羽扇豆醇、麦角甾醇、蚕砂酮，以及蛋白质、18种氨基酸，叶绿素及维生素A、B、E．据家兔及小鼠试验，蚕沙煎剂有抗炎作用　经日光照射的蚕砂对小鸡有钙化骨骼的作用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蝉　蜕

【别名】蝉壳、蝉衣、虫退

【来源】蝉科昆虫黑蚱*Cryptotympana pustulata* Fabricus. 若虫羽化时脱落的皮壳.

【动物形态】全体有光泽，黑色，被有金黄色的细毛　复眼1对，大形，两复眼间有单眼3只。触角1对. 口器发达，上唇宽短，下唇延长管状，长可达到第3对足的基部. 足3对　翅2对，膜质，黑褐色.

【分布】主产于山东、河北、河南、江苏、浙江等地.

【采收加工】夏、秋季自树枝上或树下采收，去净泥土、异物，晒干。

【药材性状】全形似蝉，中空，稍弯曲，长约3.5厘米，宽约2厘米，黄棕色，半透明，有光泽. 头部触角多已脱落，复眼1对横生，略突出，透明，额部突出，上唇宽短，下唇延长成管状. 胸部背面呈十字形裂开，裂口向内卷曲，左右具小翅2对；腹面有足3对，前一对足粗壮具齿，后两对足稍长，均被黄棕色细毛. 腹部圆而丰满，有曲纹，尾部钝尖，由腹部至尾端共9节. 体轻，中空，易碎. 无臭，味淡.


【性味功能】甘，寒. 散风除热、利咽透疹、退翳、解痉。

【临床应用】用于治疗风热感冒、麻疹不畅、翳障、惊风抽搐、破伤风、疔肿疮毒等症. 用量3～9克。孕妇慎用.

【现代研究】含大量甲壳质、氨、蛋白质、有机酸、酸类、黄酮类、甾体类、糖类、油脂、挥发油、24种氨基酸和乙醇胺。含多种微量元素，以铝、钙为最多　本品具有解热、镇静、镇痛、抗惊厥等作用；尚有一定的抗癌、免疫抑制及抗过敏等作用　实验表明，蝉蜕对机体免疫功能和变态反应有明显的抑制作用. 其水提液在体外对艾氏腹水癌细胞显示出高度抗肿瘤活性

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蕲蛇

【别名】五步蛇

【来源】蝰科动物五步蛇 *Agkistrodon acutus* (Güenther) 除去内脏的全体。

【动物形态】体长可达1.5米，头大扁平，呈三角形，吻端有一翘起的吻突，被以延长的吻鳞与鼻间鳞。鼻孔大，开口于两鼻鳞之间，后鼻鳞向内凹入呈弧形。体鳞23～21～17行，起棱；腹鳞157～171片；尾下鳞40～60对，其前端1～10片常不成对；肛鳞1片。体背面灰褐色，有灰白色菱方形斑纹；两侧有"V"形暗褐色大斑纹24个，其顶端在背中线相接。腹面黄白色，两侧有黑色圆斑。头顶暗黑色，头侧黄色。

【分布】常栖息于林区或丘陵草木茂盛的阴湿处，常交身体盘着，俗称"棋盘蛇"，为有毒蛇。分布于安徽、浙江、贵州等地。

【采收加工】全年可捕捉，以夏、秋为多。捕捉后，剖开蛇腹，除去内脏，洗去或抹净血迹，用竹片撑开腹部后盘成圆形，烘干。

【药材性状】圆盘形，盘径17～34厘米，全体具鳞片。头在中央稍上，呈扁三角形，吻端向上突出，习称"翘鼻头"。眼后至颈侧有1条黑色斑纹，口宽大，上颚有1对毒牙。背部红棕色，有24个灰白色菱形斑块，习称"方胜纹"。腹部灰白色，鳞片较大，有多数类圆形黑斑，习称"连珠斑"。内表面黄白色，可见脊椎骨及肋骨。尾部骤细而短，末端有一长三角形角质鳞片，习称"佛指甲"。气腥，味微咸。

【性味功能】甘、咸，温。有毒。祛风、通络、止痉。

【临床应用】用于治疗风湿顽痹、筋脉拘急、中风，半身不遂、痉挛抽搐、破伤风、顽癣、恶疮等。用量3～10克。

【现代研究】含蛋白质、脂肪、氨基酸等。其蛇毒主含凝血样物质、酯酶及三种抗凝血活酶，其中的抗凝血因子和去纤维蛋白酶可分别抑制凝血酶原活化为凝血酶，抑制纤维蛋白原活化成纤维蛋白，使血浆纤维蛋白原明显下降，凝血酶原时间及复钙时间延长，使血浆粘度降低，血流速度增加，并有溶血栓作用；制成的注射剂能治疗高血压病，在麻醉犬身上，亦可产生显著降压作用。根据动物急性试验的结果分析，其降压作用主要由直接扩张血管而来。对小鼠有镇静、催眠作用，还有某些镇痛作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蟾酥

【别名】蟾蜍眉脂、癞蛤蟆浆、蛤蟆酥。

【来源】蟾蜍科动物黑眶蟾蜍 *Bufo melanostictus* Schneider 等的耳后腺及皮肤腺分泌的白色浆液，经加工干燥而成。

【动物形态】体长约7～10厘米，体粗壮，头宽大于长，吻圆，鼻孔近吻端，眼间距大。前肢长而粗壮，后肢短，左右跟部不相遇。皮肤极粗糙，头顶部两有大而长的耳后腺。体背布满大小不等的瘰疣小头部有黑色骨质棱或黑色线；背部一般为黄棕色，略具棕红色斑纹，腹面乳黄色，有灰色斑纹。雄性第一、二指基部内侧有黑色婚垫；有单咽下内声囊。

【分布】主产于河北、山东、江苏、浙江等地。

【采收加工】春、秋两季捕捉，将其身体表面洗净，晾干体表水分，取其耳后腺体中分泌的白色浆液，放于磁盘内（切忌铁器，以免变黑），滤去泥土及杂质后，取纯浆液放入圆形模型中晒干，即为团蟾酥；涂在玻璃板上晒干，即为片蟾酥。

【药材性状】团蟾酥：扁圆形团块或饼状，直径3～10厘米，厚5毫米，棕褐色、紫黑色或紫红色，表面平滑、质坚硬，不易折断，断面棕褐色，角质状，微有光泽。气微腥，味麻辣，粉末闻之作嚏。遇水即泛出白色乳状液。

片蟾酥：不规则片状，厚约2毫米，一面较粗糙，一面较光滑。质脆，易折断。

药材断面沾水，即呈乳白色隆起；粉末少许，于锡箔纸上，加热即溶成油状。

【性味功能】辛，温；有毒。解毒、止痛、开窍醒神。

【临床应用】用于治疗腹胀、吐泻、神昏；恶疮、瘰疬、咽喉肿痛及各种牙痛；各种癌肿，如肝癌、肠癌、白血病等。入丸散0.015～0.03克，外用适量。

本品有毒，内服切勿过量；外用不可入目。孕妇忌用。

【现代研究】蟾酥毒有洋地黄样强心作用。蟾蜍灵、华蟾蜍精具有与肾上腺素相似的升压作用和中枢性兴奋呼吸作用。蟾酥80%提取物具有表面麻醉作用，其中蟾毒灵作用最强，相当于可卡因的90倍。蟾蜍还有抑菌、镇痛、平喘、镇咳、抗炎、抗肿瘤、抗放射、升高白细胞、兴奋横纹肌、子宫和输卵管作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鳖甲

【别名】鳖壳、甲鱼壳、水鱼壳

【来源】鳖科动物鳖 *Trionyx sinensis* Wiegmann 的背甲。

【动物形态】体呈椭圆形或卵圆形，体长达 3～40 厘米。吻长，形成吻突，上下颌均无齿，颌缘被有角质硬鞘；眼小；颈较长，头和颈可自由伸缩于甲腔内。体表被以革质皮肤，背面褐色，腹面肉黄色；两侧及腹面有黄色条纹；指、趾间的蹼near发达。

【分布】主产于湖北、安徽、浙江等地。

【采收加工】全年均可捕捉，杀死后置沸水中烫至背甲上硬皮能剥落时取出，除去残肉，晒干，以沙炒后醋淬用。

【药材性状】椭圆形或卵圆形，长 10～20 厘米，宽 8～17 厘米，厚约 5 毫米。背面隆起，高 1.4～3 厘米，表面灰褐色或带绿色，密布皱纹并有灰黄色或灰白色的斑点；腹面灰白色，中部有突起的脊椎骨，颈内向内卷曲，两侧有对称的肋骨各 8 条，伸出边缘，可见锯齿状嵌接缝。质坚硬，易自骨板衔接缝处断裂。气微腥，味淡。

【性味功能】咸，微寒。滋阴潜阳，软坚散结，退热除蒸。

【临床应用】用于治疗阴虚发热、午后潮热、骨蒸，或五心烦热伴有消瘦、盗汗、口干舌红等；阴虚阳亢、阴虚风动而致眩晕、震颤或手足蠕动等。用量 15～30 克，宜先煎。

【现代研究】主含骨胶质、碳酸钙、磷酸钙、碘等。本品具有抑制肝、脾之结缔组织增生、提高血浆蛋白水平、及抗肿瘤等作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

动物类药材小常识

【分类】动物类药材是以动物的全体或某一部分入药的药材总称。药用部位主要包括动物的全体，如全蝎、蜈蚣等；动物体的一部分，如哈蟆油、鹿茸等；动物的分泌物，如麝香、蟾酥等；动物的排泄物，如五灵脂、蚕砂等；有的是用动物的生理或病理产物，如蝉蜕、牛黄等；动物某一部分的加工品，如阿胶、鹿角胶等。

【采收加工】不同的种类和药用部分，采收时间也不同。

昆虫类：必须掌握季节，因昆虫的孵化发育皆有定时性。桑螵蛸应在3月中旬前采收，过时则鞘已孵化；以成虫入药的，均应在活动期捕捉，如土鳖虫等；有翅昆虫，在清晨露水未干时捕捉，因此时不易起飞，如红娘子、青娘子、斑蝥等。

两栖类，夏、秋季捕捉，如蕲蛇、乌梢蛇、金钱白花蛇、蟾酥等；白露前后捕捉，如黑龙江林蛙、蛤蟆等。

脊椎动物：大多数均可全年采收，如龟甲、鸡内金、狗肾、夜明砂、五灵脂、穿山甲、象皮、刺猬皮、玳瑁等。

生理、病理产物，捕捉后或在屠宰场采收，如麝香、熊胆、牛黄、马宝、猴枣等；但鹿茸需在清明后45~60天（5月中旬至7月下旬）锯取，过时则骨化。鹿角多在春季拾取。

【鉴别要点】由于多数动物类药材的来源及药用部位差异较大，因此，在进行性状鉴定时首先要注意动物药材的类别，药用部分是动物的何种器官或部位。其次要仔细观察动物药材的形态、大小、颜色、表面特征等，如果是完整的动物体，则可根据其形态特征进行动物分类学鉴定，确定其品种；昆虫类主要注意其形状、大小、虫体各部位的颜色、特征、气味等；蛇类还要注意其鳞片的特征；角类应注意其类型，角质角还是骨质角，洞角还是实角，有无骨环等；骨类应注意骨的解剖面特点；分泌物类应注意其气味、颜色；排泄物主要注意其形态和大小；贝壳类应注意其形状、大小、外表面的纹理颜色。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



十、矿物类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白　矾

【别名】明矾、矾石、雪矾

【来源】天然硫酸盐类矿物明矾石经加工提炼而成的结晶。

【分布】浙江、安徽、福建等地

【采收加工】全年皆可采收。采得的粗矾用水溶解，过滤，收集滤液，加热浓缩，放冷后即析出结晶，取出晾干。白矾：拣净杂质，用时捣碎。枯矾：取拣净的白矾，置砂锅内加热溶化并煅至枯干，取出，剁块。

【药材性状】不规则结晶体，大小不一，表面略平滑或凹凸不平，具细密纵纹，无色透明或白色半透明，常被有白色细粉。质硬而脆，易砸碎，断面显玻璃样光泽。气微酸，味涩而甘、酸。

【性味功能】酸、涩，寒。有毒。止血止泻，祛风化痰。

【临床应用】用于治疗湿疹、湿疮、疥癣；久泻、久痢；便血、崩漏及创伤出血；风痰所致之昏厥、癫痫、癫狂等。用量0.6～1.5克。外用解毒杀虫，燥湿止痒。外用适量，研末外敷，或化水煮洗。

【现代研究】明矾石主要成分为碱性硫酸铝钾。白矾主要成分为硫酸铝钾。低浓度有凝固蛋白的作用，起到收敛、防腐、消炎作用；对金黄色葡萄球菌和变形杆菌有抑制作用，对大肠杆菌、绿脓杆菌、炭疽杆菌、痢疾杆菌、葡萄球菌、白色念珠菌等亦有明显抑制作用；并有明显的抗阴道滴虫及抗早孕的作用。大剂量白矾刺激性很大，可引起口腔、喉咙烧伤，呕吐，腹泻、虚脱，甚至死亡。白矾中毒后可用牛奶洗胃，并用铁盐做为抗酸剂，虚脱者对症治疗。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

炉甘石

【别名】甘石、浮水甘石、羊甘石

【来源】碳酸盐类矿物方解石族菱锌矿的矿石。

【分布】广西、四川、湖南等地

【采收加工】由矿中挖出后拣净杂石，去净泥土，煅炉甘石：取净炉甘石，打碎，置坩埚内，在无烟的炉火中煅烧至微红，取出，立即倒入水盆中浸淬，搅拌，倾出混悬液，将石渣晾干，再煅烧3～4次，最后将石渣弃去。取混悬液澄清，倾去清水，将滤出的细粉干燥。黄连水拌甘石：取黄连煎汤，加入上述煅甘石细粉，拌匀并使吸尽，烘干（煅甘石细粉1 000克，用黄连125克）

【药材性状】不规则块状，圆形或扁半形，大小不一。表面白色、淡红色或黄褐色，凹凸不平，多孔，似蜂窝状，暗淡无光泽，半透明。体轻，质松易碎，硬度5，相对密度4.1～4.5，条痕白色。断面灰白或淡棕色，有吸湿性。无臭，味微酸。

【性味功能】甘，平。解毒明目退翳，收湿止痒敛疮。

【临床应用】用于治疗目翳障、眼结膜炎、睑缘炎；溃疡久不收口、皮肤湿疹、外痔。本品宜炮制后使用，专作外用，不作内服。外用适量。

【现代研究】主含碳酸锌，其中的锌，往往被少量的二价铁所取代。另外，还含少量氧化钙（0.27%）、氧化镁（0.45%）、氧化铁（0.58%）、氧化锰（0.01%）及少量钴、铜、镉、铅和痕量的锗与铟。煅后碳酸锌分解成氧化锌，为治疗目疾的有效成分。本品对绿脓杆菌、大肠杆菌、伤寒杆菌有抑制作用，对链球菌、葡萄球菌也有杀菌作用；并有收敛、抑制分泌或部分吸收创面分泌液，减少化脓，保护创面的作用。在皮肤科，一般用5～10%的本品水混悬液（洗剂）用于中度的防腐、收敛、保护治疗皮肤炎症或表面创伤，并能抑制葡萄球菌的生长。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

轻粉

【别名】汞粉。

【来源】用升华法制得的氯化亚汞结晶。

【分布】主产于湖北、河北、湖南、云南等省。

【采收加工】将胆矾和食盐放入瓷盆中，加少量水混合后，加入水银，搅拌成糊状，再加红土拌成软泥状，捏成团，放在铺有沙土平底锅中，上盖瓷缸盆，密封，加热，经10小时后，启开瓷缸盆，刷下轻粉，研粉团。也有将硫酸汞与汞混合，使成为硫酸亚汞，再加食盐升华而成；或将食盐溶液与硝酸亚汞、硝酸混合，即得氯化亚汞沉淀。

【药材性状】为片状结晶，状似雪花，色白，有银色光泽，体轻，手捻易碎成白色粉末。以洁白、片大、明亮、呈针状结晶、质轻、无水银珠者为佳。本品不溶于水与酸，放在铁片上加热，则逐渐变为黄色，最后化为青烟，不留痕迹。加入氢氧化钾试液，析出黑色氧化亚汞，再加入氨水或氢氧化钠溶液，即变成黑色。


【性味功能】寒、辛，有毒。外用杀虫、攻毒、敛疮；内服祛痰消积、逐水通便。

【临床应用】外治用于疥疮、顽癣、梅毒、疮疡、湿疹等；内服用于痰涎积滞、水肿膨胀、二便不利等。常用量内服每次0.1～0.2克，多入丸剂；外用适量研末。

【现代研究】主含氯化亚汞（Hg_2Cl_2），本品含氯化亚汞不得少于99.0%。因遇光会逐渐分解，部分变为剧毒的氯化汞及金属汞而变灰色，因此须避光密闭保存。外用有杀菌作用，水浸剂（1∶3）在试管内对红色表皮癣菌等皮肤真菌有抑制作用。内服适量能制止肠内异常发酵，并能通利大便。大量可致中毒，其半数致死量小鼠为410毫克/千克，大鼠为1740毫克/千克，中毒后小鼠的心、肝、肾皆有不同程度的病变，其中以肾小管上皮细胞最显著，会产生浊肿、脂变、坏死等症状。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

信　石

【别名】砒石

【来源】为天然砷化矿石，或由毒砂（硫砷铁矿，FeAsS）、雄黄加工制造而成

【分布】分布于江西、湖南、广东等地。

【采收加工】少数为选取天然的砷化矿石，多数为加工制成。目前较新的加工方法为：取纯净雄黄，砸成10厘米大小的块，燃之，使雄黄燃烧，生成气态的一氧化二砷及二氧化硫，通过冷凝管道，使三氧化二砷得到充分的冷凝，即为信石。二氧化硫另从烟道排出。

【药材性状】商品分红信石与白信石两种，但白信石极为少见，药用以红信石为主。

红信石（红砒）呈不规则的块状，大小不　　粉红色，具黄色与红色彩晕，略透明或不透明，具玻璃样光泽或无光泽，质脆，易砸碎，断面凹凸不平或呈层状纤维样结构　无臭，极毒。

白信石（白砒）为无色或白色，其余特征与红信石相同

【性味功能】热、辛、大毒　蚀疮去腐、平喘化痰、截疟。

【临床应用】用于治疗寒痰哮喘、疟疾、癣疮等。用量0.15～0.3克，入丸散剂；外用适量，熏涂患处。孕妇禁用。

【现代研究】主含三氧化二砷(As_2O_3)，常含S、Fe杂质，故呈红色。在闭口管中加热，生白色升华物（纯品137℃升华）。本品水溶性为弱酸性，通硫化氢后产生二硫化二砷黄色沉淀。将信石升华后可精制成三氧化二砷（砒霜），砒霜为白色粉末，微溶于热水，其毒性较信石剧，功效与信石同

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

寒水石

【别名】凝水石、盐精石、泥精。

【来源】碳酸盐的矿石。

【分布】主产于河南、安徽、山东等地。

【采收加工】随时采挖，拣去杂质。

【药材性状】多为规则的块状结晶，常呈斜方柱形，有棱角白色或黄白色，表面平滑，有玻璃样光泽，透明或不透明。有完全的解理，原晶体可沿三个不同方向劈开。质坚硬而脆，硬度3，比重2.7，条痕为白色或淡白色，敲击时多呈小块斜方体碎裂。断面平坦。用小刀可以刻削。气微，味淡。

【性味功能】咸、辛，寒。清热降火、除烦止渴。

【临床应用】用于治疗高热烦渴，口干舌燥、牙痛、小便短赤等。用量10～30克，汤剂宜先煎。外用适量，调涂或外敷。

【现代研究】方解石主含碳酸钙，尚含少量Fe^{3+}、Mg^{2+}、Co^{2+}、Cl^-等，遇稀盐酸产生大量二氧化碳气泡。

滑　石

【别名】液石、画石。

【来源】硅酸盐类矿物滑石，习称“硬滑石”。

【分布】山东、江苏、陕西、山西等地。

【采收加工】采得后，去净泥土、杂石，或砸成小块，或水飞，或将滑石块刮净，用粉碎机粉碎，过细筛后即成滑石粉。

【药材性状】扁平形、斜方形或不规则块状，大小不一。白色、黄白色或带灰色，晶体为六方和菱形，具玻璃样光泽，薄片半透明或微透明，质较软而实，硬度约为1，比重2.7～2.8，条痕白色，用指甲可以刮下白粉，触之有滑腻感，无吸湿性，置水中不崩散。无臭，无味。

【性味功能】甘、淡，寒。利尿通淋、清热解暑、祛湿敛疮。

【临床应用】用于治疗热淋、石淋、小便不利、暑湿、湿温、泻痢、伏暑吐泻、湿疹湿疮等。用量9～15克，外用研末掺或调敷。

【现代研究】主含硅酸镁。本品具有保护皮肤和粘膜的作用，并具有抗菌的作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


寒水石


滑石

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紫石英

【别名】氟石。

【来源】氟化物类矿物萤石族萤石的矿石

【分布】浙江、江苏、辽宁、黑龙江等省。

【采收加工】采后，拣选紫色的入药，去净外附的砂砾及粘土，生用或煅用。

【药材性状】不规则的多角形块状，表面常有裂纹，个体呈紫色或浅绿色，色泽深浅不一，具玻璃样光泽，半透明，质坚硬而脆，易砷碎，多从棱角处裂破，断面棱角锋利，气无，味淡，不溶于水，可溶于浓硫酸。

【性味功能】甘，温，镇心安神，温肺，暖宫

【临床应用】用于治疗虚劳惊悸，咳逆上气，妇女胞宫虚寒不孕，用量10～15克

【现代研究】主含氟化钙

琥珀

【别名】血琥珀、红琥珀、琥珀屑

【来源】为古代松科松属植物的树脂埋藏于地下经年久转化而成的化石样物质

【分布】云南、广西、辽宁、河南、福建等地

【采收加工】随时可采，从地下或煤层挖出后，除去矿石、泥土等杂质，研末用

【药材性状】块状或颗粒状，大小不一，表面淡黄色，深黄色，深绿色，红褐色或黑褐色，有光泽，半透明，质硬而脆，断面平坦，手捻之粉末状，不溶于水，燃之则膨胀而带松脂气，味淡

【性味功能】甘，平，镇惊安神，活血散瘀，利尿通淋

【临床应用】用于治疗心神不宁，心悸失眠，惊风癫痫及血瘀肿痛，经闭痛经，心腹刺痛，癥瘕积聚等多种瘀血症，研末冲服，每次1.5～3克，一般不入煎剂，忌火煅

【现代研究】所含琥珀酸对神经中枢有抑制作用，能明显减少小鼠自主活动，延长戊巴比妥钠引起的小鼠睡眠时间；对大鼠听源性惊厥、小鼠电惊厥以及士的宁引起的药物性惊厥，均具有对抗作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



紫石英



琥珀

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

雌黄

【来源】为硫化物类矿物雌黄的矿石，主含三硫化二砷(As_2S_3)

【分布】湖南、湖北、贵州、云南、四川等地

【采收加工】采挖后，除去杂质。

【药材性状】不规则块状，大小不一。全体呈柠檬黄色，杂有灰绿色。表面常覆有一层黄色粉末，微有光泽，不平坦，体较重，质脆易碎，断面不平坦。结晶块呈札状，半透明，有树脂样光泽；含夹杂物则呈灰绿色，不透明，无光泽。微有特异的臭气。

【性味功能】辛、平、有毒。燥湿、杀虫、解毒。

【临床应用】用于治疗疥癣、恶疮、蛇虫咬伤、虫积腹痛、惊痫等。用量0.15～0.3克，入丸散剂；外用适量，熏涂患处。内服宜慎，不可久用。孕妇禁用。

【现代研究】本品1∶2的浓度，在试管内对多种皮肤真菌有抑制作用。燃之易溶融，成红黑色液体，生黄白色烟，有强烈的臭蒜气；冷却后溶融物结成红黑色固体。

雄黄

【来源】为硫化物类矿物雄黄族雄黄，主含二硫化二砷(As_2S_2)

【分布】湖南、湖北、贵州、云南、四川等地。

【采收加工】采挖后，除去杂质。或由低品位矿石浮选生产的精矿粉。

【药材性状】为块状或粒状集合体，呈不规则块状。深红色或橙红色，条痕淡橘红色，晶体有金刚石样光泽。质脆，易碎。断面有树脂样光泽。微有特异的臭气，味淡。精矿粉为粉末状或粉末集合体。质松脆。手捏后即成粉，橙黄色，无光泽。

【性味功能】辛、温、有毒。解毒杀虫、燥湿祛痰、截疟。

【临床应用】用于治疗痈肿疔疮、蛇虫咬伤、虫积腹痛、惊痫、疟疾等。用量0.15～0.3，入丸散剂；外用适量，熏涂患处。内服宜慎，不可久用。孕妇禁用。

【现代研究】含砷量以二硫化二砷(As_2S_2)计，不得少于90.0%。水浸剂对多种皮肤真菌、结核杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌等有抑制或杀灭作用；对疟原虫、血吸虫有抑制作用；并有致突变、致癌作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



雌黄



雄黄

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

矿物类药材小常识

【分类】矿物是由于地质作用而形成的天然单质及其化合物，除了少数是自然元素以外，绝大多数是自然化合物，大部分是固体，也有的是液体，如水银。矿物药分为：1.原矿物药，自然界采集的天然药物，如朱砂、炉甘石、自然铜、寒水石等。2.以矿物为原料初加工品，如秋石、轻粉、芒硝等。3.动物或动物骨骼的化石，如石燕、龙骨、浮石等。

从药学观点来看，因为阳离子通常对药效起重要的作用，所以是以阳离子为依据进行分类：如汞化合物类的朱砂、轻粉、红粉等；铁化合物类的自然铜、赭石、磁石等，铅化合物的密陀僧、铅丹等；铜化合物类的胆矾、铜绿等；铝化合物类的白矾、赤石脂等；砷化合物类的雄黄、雌黄、信石等；矽化合物类的白石英、浮石、青礞石等；镁化合物类的滑石等；钙化合物类的石膏、寒水石、龙骨等；钠化合物类的芒硝、硼砂、大青盐等及其他类的炉甘石、硫黄、硝石等。

【采收加工】没有季节限制，全年可采。矿物药大多结合开矿采掘，如龙骨、龙齿等。有些矿物药系经人工冶炼或升华方法制得，如密陀僧、轻粉、红粉等。

【鉴别要点】外形明显的矿物药材，首先应根据矿物的一般性质进行鉴定，注意其外形、颜色、硬度、比重、光泽、解理、断口、条痕、质地等特征，此外，还应注意其有无磁性及气味等；粉末状的药材还应仔细观察样品的颜色、质地、气味等，有时亦需用偏光显微镜或反射偏光显微镜进行鉴定，主要观察其形态、透明度、颜色、光性正负、折射率和必要的物理常数，必要时，还要与标准的矿物标本进行核对，最终确定其种类。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



十一、其他类

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

干 漆

【别名】山漆、漆渣。

【来源】漆树科植物漆树 *Toxicodendron vernicifluum*(Stokes)F. A. Barkl. 的树脂经加工后的干燥品

【植物形态】落叶乔木。嫩枝和冬芽具棕黄色毛。单数羽状复叶，互生；小叶7～13，卵形或卵状椭圆形，全缘，上面疏生柔毛或近光滑，下面有黄柔毛，侧脉18～25对显著；叶柄短，有毛。圆锥花序侧生；花细小，黄色；雌雄异株，或单性花与两性花共存；萼5裂；花瓣5；雄蕊5，在雌花中不完全；子房无柄，上位，1室，花柱3。核果偏斜而扁，宽大于高，淡棕黄色，光滑。花期5～6月，果熟期9～10月。

【生境分布】华东、华南等地。

【采收加工】一般收集盛漆器具底留下的漆渣，干燥。

【药材性状】不规则块状，黑褐色或棕褐色，表面粗糙，有蜂窝状细小孔洞或呈颗粒状，质坚硬，不易折断，断面不平坦。具特殊臭气。


【性味功能】辛、温；有毒。破瘀血、消积、杀虫。

【临床应用】用于治疗妇女闭经、瘀血癥瘕、虫积腹痛等。用量2.5～4.5克

【现代研究】鉴别方法有：（1）取本品一小块，置瓷蒸发皿中，点火即燃烧，产生黑烟并发出强烈漆臭。（2）取本品粉末1克，加乙醇10毫升，置热水浴中加热5分钟，放冷，滤过。取滤液1毫升，加三氯化铁试液1～2滴，显墨绿色。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冰　片

【别名】龙脑香、梅片、艾片、机片。

【来源】菊科植物艾纳香*Blumea balsamifera*. DC. 的叶中提取物中结晶，习称“艾片”。龙脑香科植物龙脑香*Dryobalanops aromatica* Gaertn. f. 树脂的加工品，习称“龙脑冰片”。除此外，人工合成冰片，又称“机制冰片”或“机片”，是用樟脑、松节油等经化学方法合成。

【植物形态】艾纳香：多年生草本或灌木状　茎密被黄褐色柔毛　单叶互生，矩圆形或矩圆状披针形，上、下面均密被毛　头状花序多数排成圆锥花序；总苞片4～5层被白色绵毛；花全为管状，花冠黄色；缘花雌性，盘花两性；聚药雄蕊5；雌蕊1，子房下位。瘦果10棱，矩圆形，冠毛淡白色。花期3～5月，果期9～10月。

龙脑香：常绿乔木，光滑无毛。叶互生，革质；叶片卵圆形，先端尖，基部纯圆形或阔楔形，全缘，两面无毛，有光泽　圆锥状花序，着生于枝上部的叶腋间，花两性，整齐；花托肉质，微凹；花萼5，覆瓦状排列；花瓣5，白色；雄蕊多数，离生；雌蕊1　下果卵圆形，果皮革质，不裂；种子1～2枚，具胚乳。

【生境分布】艾片主产于广东、广西、云南、贵州等地；龙脑冰片主产于东南亚地区，我国台湾地区有引种。

【采收加工】9～10月采收树叶，经蒸气蒸馏，冷却，收取结晶。

【药材性状】为半透明结晶，直径2～8毫米，厚2～3毫米，白色。气清香，味辛凉浓烈　经升华后，形成半透明块状、片状结晶。燃之有浓黑烟。

【性味功能】辛、苦，寒。开窍醒神、清热止痛。

【临床应用】用于治疗热闭神昏、痰热内闭、暑热卒厥、小儿惊风及各种疮痈肿痛、溃后不敛、烫火伤、咽喉肿痛、喉痹、目赤肿痛、口舌生疮等。用量0.03～0.1克。外用适量。

【现代研究】冰片局部应用对感觉神经具有轻微的刺激作用，有一定的止痛和防腐作用；服后能迅速通过血脑屏障，进入神经中枢发挥作用；能显著延长戊巴比妥引起的小鼠睡眠时间与戊巴比妥产生协同作用，并能延长小鼠耐缺氧时间；较高浓度的冰片(0.5%)对多种细菌有抑制作用；对中、晚期妊娠小鼠有引产作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枫香脂

【别名】白胶香

【来源】金缕梅科植物枫香 *Liquidambar formosana* Hance 的干燥树脂

【植物形态】落叶乔木。树皮幼时灰白、平滑，老时褐色、粗糙。叶互生，叶柄长；叶片心形，常3裂，幼时及萌发枝上的叶多为掌状5裂，裂片卵状三角形或卵形，边缘有细锯齿。花单性，雌雄同株，无花被；雄花淡黄绿色，成总状花序，雄蕊多数，密生成球形；雌花成圆球形的头状花序，被毛，子房半下位，四周有许多钻形小苞片围绕，2室，花柱2，柱头弯曲。复果圆球形，下垂，表面有刺，蒴果多数，密集于复果之内，长椭圆形；种子多数，细小，扁平。花期3～4月，果期9～10月。

【生境分布】生于低山次生林中及山谷疏林下。分布于我国南部、中部及西部地区。

【采收加工】7、8月间割裂树干，使树脂流出，10月至次年4月采收，阴干。

【药材性状】不规则块状，淡黄色至黄棕色，半透明或不透明。质脆，断面具光泽。气香，味淡。


【性味功能】辛，微苦，平。活血止痛、解毒、生肌、凉血。

【临床应用】用于治疗跌打损伤、痈疽肿痛、吐血、外伤出血等。用量1.5～3克，宜入丸散服；外用适量。

【现代研究】枫香脂的鉴别方法有：取本品少量，燃烧，有多烟火焰，具特异香气；取本品约50毫克，置试管中，加四氯化碳5毫升，振摇使溶解，沿试管壁加硫酸2毫升，两液接界处显红色环；取本品约0.2毫克，加四氯化碳5毫升，振摇使成混悬液，加硝酸3毫升，轻轻摇匀，待分层，上层液显淡红色至红棕色。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茶 油

【来源】山茶科植物油茶 *Camellia oleifera* Abel 或小叶油茶 *Camellia meiocarpa* Hu. ms. 的成熟种子用压榨法得到的脂肪油。

【植物形态】油茶：常绿灌木或小乔木，树皮黄褐色，稍被毛。单叶互生，革质；叶片椭圆形或卵状椭圆形，先端渐尖或短尖，边缘有细锯齿，侧脉不明显。花白色，1～3朵腋生或顶生，无柄；萼片圆形，外被丝毛；花瓣5～7，倒卵形，先端凹入，外面被疏毛；雄蕊多数，无毛，排成2轮，花丝基部成束；子房被毛，花柱分离。蒴果球形，被细毛，室背开裂。种子1～3枚。花期9～11月，果熟期次年秋季。

【生境分布】原植物分布于安徽、江苏、浙江等地。

【采收加工】秋季采收种子，用压榨法榨取脂肪油。

【药材性状】为淡黄色的澄清液体，在氯仿、乙醇或二硫化碳中易溶，在乙醇中微溶。

相对密度 在25℃时应为0.909～0.915。

折光率 在25℃时应为1.466～1.470。

酸值 应不大于3

皂化值 应为185～196

碘值 应为80～88

【用途】作为注射用茶油的原料及软膏基质

【现代研究】鉴别方法：取本品2毫升，小心加入新制放冷的发烟硝酸-硫酸-水（1∶1∶1）10毫升中，放置片刻，两液接界处显黄绿色

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

樟　脑

【别名】韶脑、潮脑、脑子

【来源】樟科植物樟 *Cinnamomum camphora* (L.) Presl 的根、干、枝、叶经提炼制成的颗粒状结晶

【植物形态】常绿乔木，树皮灰褐色或黄褐色，纵裂，小枝淡褐色；枝和叶均有樟脑味。叶互生，革质；叶片卵状椭圆形至卵形，先端渐尖，基部钝或阔楔形，上面深绿色有光泽，下面灰绿色或粉白色，无毛，幼叶淡红色；脉在基部以上3出，脉腋内有隆起的腺体。圆锥花序腋生，花小，绿白色或淡黄色；花被6裂，椭圆形，内面密生细柔毛；能育雄蕊9，花药4室；子房卵形，光滑无毛，花柱短，柱头头状。核果球形，熟时紫黑色，基部为宿存、扩大的花被管所包围。花期4～6月；果期8～11月。

【生境分布】栽培或野生于河旁，或生于较为湿润的平地。上产台湾、贵州、广西、福建等地。

【采收加工】一般在9～12月砍伐老树，取其树根、树干、树枝，锯劈成碎片（树叶亦可用），置蒸馏器中进行蒸馏器中进行蒸馏，樟木中含有的樟脑及挥发油随水蒸气馏出，冷却后，即得粗制樟脑。粗制樟脑再经升华精制，即得精制樟脑粉。将此樟脑粉入模型中压榨，则成透明的樟脑块。

【药材性状】纯品为雪白的结晶性粉末，或无色透明的硬块，粗制品略带黄色，有光亮。在常温中容易挥发，点火能发出多烟而有光的火焰，气芳香浓裂刺鼻，味初辛酸，后稍凉。

【性味功能】辛、热，有毒。开窍辟秽，除湿杀虫，温散止痛。

【临床应用】用于治疗痧胀腹痛、暑湿之邪所致腹痛闷乱、寒热、吐泻等；外用治疥癣湿疮、瘙痒溃烂。内服入散剂或用酒溶化服，每次0.1～0.2g。外用适量，研末撒或调敷。

【现代研究】本品可兴奋中枢神经系统，对于高级中枢尤为显著；对循环性虚脱或急性心功能衰竭有强心作用；其水溶性代谢产物有明显的强心、升压和兴奋呼吸的作用；对皮肤有温和的刺激及防腐作用；对胃肠道粘膜的刺激，小剂量使胃感到温暖及舒适，大量则能产生恶心呕吐；并有轻微的祛痰作用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com





更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中文名索引

一画

一窝虎 36

二画

七叶莲 74
七叶一枝花 74
九十九根 36
九节风 248
九节茶 248
刀豆 156
刀豆子 156

三画

三叶半夏 16
三芽蚁 262
二步跳 16
卜茹 88
干漆 320
于术 22
土人参 60
土大黄 32
土元胡 82
土木鳖 166
土荆皮 106
土荆芥 218
土茯苓 2
土黄莲 78
土鳖虫 282
大蒜 4
大刀豆 156
大贝 80
大叶过山龙 98
大叶蛇总管 56
大红袍 14
大红袍 200
大连钱草 250
大青叶 122
川白芷 20
山大黄 56
山归来 2
山石榴 192
山红枣 40
山白根 36
山枝子 200
山茱萸 160
山海椒 232
山海螺 34
山菜 84
山梨 158
山萸肉 160
山萝卜 60
山楂 158
山漆 320
千年老鼠屎 8
千两金 162
千尾根 2
千金子 162
小叶韩信草 228
小托盘 214
小通草 94
女贞子 164
女贞实 164
女贞 164
马连鞍蓼 40
马勃 274
马屁勃 274
马兜铃 96
马兜铃根 96
马兜铃藤 96
马蹄菜 178

四画

天台乌药 12
天仙藤 96
元肉 176
天茄子 232
元胡索 44
天胡荽 220
天南星 10
无枫紫草 82
天葵 8
天葵子 8
云英 102
木瓜 168
木瓜实 168
木芍药 112
木珊瑚 198
木棉 110
木鳖子 166
五爪藤 224
五叶莓 224
五步蛇 296

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五指柑 126
太子参 6
车轱辘菜 170
车前 170
车前子 170
车前实 170
牙刷草 228
止血草 132
中国旌节花 94
午时草 126
牛屎菇 274
牛筋草 148
毛黄 222
毛姜 76
丹皮 112
丹参 14
丹根 112
公孙树子 180
月月红 136
月季 136
月季花 136
风茄花 144
乌鸡 286
乌药 12
乌骨鸡 286
乌贼骨 288
乌梅 172
乌蛇 284
乌梢蛇 284
乌葵莓 224
凤眼前仁 170
水瓜络 184
水芹菜 222
水泽 52
水鱼壳 300
水烛香蒲 152
六月干 148
巴叶 128

五画

玉竹 18
玉金 68
甘石 306
甘汞 308
甘菊 150
艾 124
艾片 322
艾叶 124
艾蒿 124
艾纳香 322
左力 190
石韦 230
石毛姜 76
石兰 230
石龙藤 102
石剑 230
石胡荽 262
石荸荠 26
石榴 174
石榴皮 174
石榴壳 174
石蟾蜍 46
四叶厚朴 116
龙脑香 322
龙哏 176
龙眼干 176
龙眼肉 176
龙葵 232
东方宿 32
北板蓝根 54
东风菜 234
甲鱼壳 300
田基黄 236
四叶参 6,34
白及 26
白木耳 276
白木香 46
白毛柴 132
白毛藤 238, 242
白术 22
白芍 24
白百合 38
白地榆 40
白芷 20
白沙参 66
白花草 148
白曼陀罗 144
白英 238
白矾 304
白果 180
白参 66
白前 28
白扁豆 182
白通草 100
白胶香 324
白草藓 86

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白蜡树 114
白蜡树子 164
仙茅 30
仙茅参 30
冬术 22
冬青子 164
冬葵 178
冬葵果 178
汉防己 46
半边花 226
半边莲 226
半枝莲 228
半夏 16
对叶草 236
台乌 12
台乌药 12
丝瓜 184
丝瓜络 184
丝连皮 110
丝棉皮 110

六画

老虎脚爪草 222
老虎刺 244
老蟹眼 132
地丁 260
地耳草 236
地胡椒 262
地榛 30
地榆 40
地薰 84
地管子 18
地螺丝 26
芍药 24
机片 322
西红花 138
百合 38
百部 36
过山风 98
过路黄 250
光皮木瓜 168
虫退 294
竹丝鸡 286
竹叶白前 28
伏生紫堇 82
伏地延胡索 82
羊甘石 306
羊舌藤 2
羊婆奶 66
羊蹄 32
羊乳 34
并头草 228
灯心 240
灯心草 240
灯草 240
安石榴 174
决明 194
决明子 194
冰片 322
延胡 44
延胡索 44
华中五味子 202
华东覆盆子 214
血生根 14
合欢 108
合欢木皮 108
合欢皮 108
寻骨风 242
防己 46
异叶大南星 10
异型南五味子 98
如意草 52
红大戟 42
红丹参 14
红芽大戟 42
红玫瑰 142
红铃子 202
红萝卜 42

七画

麦门冬 48
麦冬 48
芫花叶白前 28
苡仁 212
苣立百部 36
苍术 50
花草 100
苏薄荷 266
杜仲 110
杜虹花 132
杠板归 244
杏叶沙参 66
连及草 26
连钱草 246
连钱草 258
吴茱萸 190

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

吴萸 …… 190
五皮 …… 114
牡丹 …… 112
牡丹皮 …… 112
牡荆 …… 126
牡荆叶 …… 126
牡荆油 …… 126
仙包草 …… 254
仙茅 …… 264
谷芽 …… 210
谷芽 …… 186
谷精草 …… 140
龟甲 …… 290
龟壳 …… 290
广山楂 …… 116
补骨脂 …… 188
沙包菌 …… 274
昆参 …… 18
鸡爪梨 …… 198
鸡苏 …… 266

八画

玫瑰 …… 142
玫瑰花 …… 142
青木香 …… 96
青木香藤 …… 96
青藤香 …… 96
苦葵 …… 232
茅苍术 …… 50
杭白芷 …… 20
拖泥板 …… 290
板蓝根 …… 54
枫香脂 …… 324
枇杷 …… 128
枇杷叶 …… 128
枣皮 …… 160
厚朴 …… 116
刺榆子 …… 192
郁金 …… 68
矾石 …… 304
虎杖 …… 56
虎须草 …… 240
虎骨香 …… 218
虎掌南星 …… 10
肿节风 …… 248
明矾 …… 304
明党参 …… 60
罗布麻 …… 130
罗布麻叶 …… 130
败毒菜根 …… 32
爬山虎 …… 102
狗爪半夏 …… 10
金边七鳖虫 …… 282
金芍药 …… 24
金耳钩 …… 264
金剪刀 …… 260
金沸花 …… 252
金沸草 …… 252
金荞麦 …… 58
金钱松 …… 106
金钱松皮 …… 106
金钱草 …… 250
金壶瓶 …… 192
金蝉花 …… 278
金樱子 …… 192
鱼眼草 …… 140
沿阶草 …… 48
泥精 …… 312
泽芝 …… 204
泽泻 …… 52
泽漆麻 …… 130
炉甘石 …… 306
炒枳实 …… 196
炒桃仁 …… 208
实枣儿 …… 160
京大戟 …… 42
京苍术 …… 50
疙瘩药 …… 234
夜合皮 …… 108
洋洋花 …… 144
细叶猪屎豆 …… 194
细米草 …… 226

九画

荛花 …… 256
荛蔚子 …… 256
荆枝皮 …… 106
胡 …… 84
草三七 …… 234
草白前 …… 28
草河车 …… 74
草珠儿 …… 212
草珊瑚 …… 248
草蓬 …… 124
茶油 …… 326
胡韭子 …… 188

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

胡荽 4
南五味子 202
南苍术 50
南沙参 66
南洋金花 144
挟剑豆 156
枳椇 198
枳枣 198
枳壳 196
枳实 196
枳椇子 198
栀子 200
砒石 310
轻粉 308
映山红果 158
骨碎补 76
氟石 314
香艾 124
香头草 72
香苏 202
香附 72
香附子 72
香藤 96
重楼 74
鬼针草 254
鬼钗草 254
鬼菊 254
信石 310
狭叶柴胡 84
独苹 30
独行木香 96
独角莲 10
钩虫草 218
剑脊乌蛇 284
急解索 226
洋金花 144
活血丹 246
姜黄 64
前胡 62
扁豆 182
络石 102
络石藤 102

十画

秦皮 114
秦白皮 114
珠贝 80
蚕砂 292
盐精石 312
莎草 72
莲 204
莲子 204
莲蓬子 204
莪术 70
桂圆 176
桃 208
桃仁 208
积雪草 258
夏天元 82
夏枯草 148
破故纸 188
破铜钱 220
原蚕沙 292
原蚕屎 292
柴胡 84
鸭巴片 62
鸭脚树子 180
鸭脚前胡 62
笔头花 142
透骨消 58, 246
钻山狗 234
铁花麦 58
铁脚梨 168
铃铛菜 18
脑子 328
浙贝母 80
浙术 22
浮水甘石 306
海风藤 98
海螵蛸 288
流星草 140
凌霄花 146
粉防己 46
粉沙参 60
粉背菊藤 78
粉萆薢 78
粉葛 88
益母 256
益母草 256
益明 256
家菊 150
通花 94
通草 94
通草 100
通脱木 100

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十一画

黄郁 68
黄姜 64
黄姜 78
黄栀子 200
黄堇癣 78
黄熟花 252
萱蓝 54
堇癣 86
菊 150
菊花 150
接骨金粟兰 248
接骨消 246
排风藤 238
排香草 270
梅 172
梅片 322
梅实 172
雪耳 276
雪矾 304
野乌头子 8
野荞麦 58
野葛 88
野葡萄藤 224
野茴香 270
晚蚕沙 292
蛇倒退 244
崩大碗 258
甜菊花 150
犁头刺 244
移星草 140
盐土兰 220
假绿豆 194
猫耳朵 242
银耳 276
银杏 180
银杏核 180
雀舌草 236
清骨风 242
婆固脂 188
麻笋子 16
旋覆花 252
纹随子 162
绵毛马兜铃 242
绵堇癣 86

十二画

斑杖 56
葛条 88
葛根 88
荚菜子 178
落得打 258
棕毛 118
棕榈 118
棕榈炭 118
粟 186
粟芽 186
雌黄 316
紫石英 314
紫地丁 260
紫花地丁 260
紫花前胡 62
紫背天葵子 8
紫珠叶 132
紫葳花 146
黑乌梢 284
蛤蟆酥 298
番红花 138
鹅不食草 262
鹅脚草 218
鹅管白前 28
象贝 80
猴姜 76
湖花 142
温郁金 68,70
温莪术 70
童参 6
寒水石 312

十三画

蒿头 4
蒲花 152
蒲草黄 152
蒲黄 152
蒲棒花粉 152
蓝靛根 54
路边青 122
路边青叶 122
蜈蚣草 250
蜀羊泉 238
满天星 220

十四画

豨莶 264
豨莶草 264

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蝉衣 294
蝉花 278
蝉壳 294
蝉蜕 294
蜡树皮 114
酸石榴皮 174
酸楂 158
酸橙 196
漆树 320
漆渣 320
漏芦子 166
辣子草 222

十五画

蕲蛇 296
蒲荷菜 266
槲蕨 76
墨鱼盖 288
稻 210
稻芽 210
稻根须 90
镇静草 264
樟脑 328
潮脑 328

十六画

靛青根 54
薄荷 266
薄荷油 268
薄荷脑 268
薏米 212
薏苡 212
薏苡仁 212
凝水石 312

十七画

藏红花 138

十八画

癞蛤蟆浆 298
藕实 204
藤桐 166
覆盆 214
覆盆子 214

十九画

藿香 270
蟾酥 298
蟾蜍眉脂 298
鳖 300
鳖甲 300
鳖壳 300

二十画

糯稻 90
糯稻根 90

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

拉丁学名索引

A

Adenophora hunanensis Nannf. Miq. 66
Agastache rugosa (Fisch. et Mey.)O.Ktze. 270
Agkistrodon acutus (Günther) 296
Albizia julibrissin Durazz. 108
Alisma plantago-aquatica L. var. *orientalis* (Sam.) Juzep. 52
Allium sativum L. 4
Angelica dahurica (Fisch. Ex Hoffm.) Benth et Hook. f.var. *formosana*(Boiss.) shan et Yuan. 20
Apocynum venetum L. 130
Arisaema heterophyllum Bl. 10
Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. 96
Aristolochia mollissima Hance 242
Artemisia argyi Levl. et Vant 124
Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 50
Atractylodes macrocephala Koidz. 22

B

Bidens bipinnata L. 254
Bletilla striata (Thunb.) Reichb.f. 26
Blumea balsamifera. DC. 322
Bombyx mori Linnaeas 292
Bufo melanostictus Schneider 298
Bupleurum scorzonerifolium Willd. 84

C

Callicarpa formosana Rolfe 132
Calvatia lilacina (Mont.et Berk .) Lloyd 274
Camellia meiocarpa Hu.ms. 326
Camellia oleifera Abel 326
Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum. 146
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 156
Cassia obtusifolia L. 194
Cayratia japonica (Thunb.) Gagn. 224
Centella asiatica (L.) Urb. 258
Centipeda minima (L.) A. Braun et Aschers. 262
Chaenomeles sinensis (Touin) Koehne 168
Changium smyrnioides Wolff 60
Chenopodium ambrosioides L. 218
Chinemys reevesii (Gray) 290

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Chrysanthemum morifolium Ramat. 150
Cinnamomum camphora (L.) Presl 328
Citrus aurantium L. 196
Clerodendon cyrtphyllum Turcz. 122
Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zmce.)Trautv. 34
Coix lacryma-jobi L. var *ma-yuen* (Roman.) Stapf 212
Cordyceps sobolifera (Hill.) Berk et Br. 278
Cornus officinalis Sieb. et Zucc. 160
Corydalis decumbens (Thunb.) Pers 82
Corydalis yanhusuo W.T. Wang 44
Crataegus pinnatifida Bge. 158
Crocus sativus L. 138
Cryptotympana pustulata Fabricus. 294
Curculigo orchilides Gaertn. 30
Curcuma longa L. 64
Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling 68,70
Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz 28
Cyperus rotundus L. 72

D

Datura metel L. 144
Dimocarpus longan Lour. 176
Dioscorea hypoglauca Palibin 78
Dioscorea septemloba Thunb. 86
Doellingeria scaber (Thunb.) Nees. 234
Dolichos lablab L. 182
Drynaria fortunei (Kunze) J. Sm. 76
Dryobalanops aromatica Gaertn. f. 322

E

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 128
Eriocaulon buergerianum Koern. 140
Eucommia ulmoides Oliv. 110
Euphorbia lathyris L. 162
Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. 190

F

Fagopyrum dibotrys (D.Don) Hara 58
Fraxinus chinensis Roxb. 114
Fritillaria thunbergii Mig. 80

G

Gallus gallus domesticus Brisson 286

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Gardenia jasminoides Ellis 200
Ginkgo biloba L. 180
Glechoma longituba (Nakai) Kupr. 246

H

Hovenia dulcis Thunb. 198
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 220
Hypericum japonicum Thunb 236

I

Inula japonica Thunb. 252
Isatis indigotica Fort. 54

J

Juncus effusus L. 240

K

Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib 98
Knoxia valerianoides Thorel et Pitard 42

L

Leonurus heterophyllus Sweet 256
Liquidambar formosana Hance 324
Ligustrum lucidum Ait. 164
Lilium brownii F.E.Brown var. *viridulum* Baker 38
Lindera aggregata (Sims) Kosterm. 12
Lobelia chinensis Lour. 226
Luffa cylindrica (L.) Roem. 184
Lysimachia christinae Hance 250

M

Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. *biloba* Rehd. et Wils. 116
Malva verticillata L. 178
Mentha haplocalyx Briq. ..... 266，268
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng 166

N

Nelumbo nucifera Gaertn. ..... 204，206

O

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl. 48
Opisthoplatia orientalis (Burm.) 282
Oryza sativa L. 210

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Oryza sativa L. var. *glutinosa* Matsum 90

P

Paeonia suffruticosa Andr. 112
Paris polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara 74
Paeonia lactiflora Pall. 24
Peucedanum decursivum Maxim. 62
Pinellia ternata (Thunb.) Breit. 16
Plantago asiatica L. 170
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 18
Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. 56
Polygonum perfoliatum L. 244
Prunella vulgaris L. 148
Prunus mume Sieb. et Zucc. 172
Prunus persica (L.) Batsch 208
Pseudolarix kaempferi Gord. 106
Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm. 6
Psoralea corylifolia L. 188
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 88
Punica granatum L. 174
Pyrrosia lingua (Thunb.) Farwell. 230

R

Ranunculus japonicus Thunb. 222
Rosa chinensis Jacq. 136
Rosa laevigata Michx. 192
Rosa rugosa Thunb. 142
Rubus chingii Hu 214
Rumex japonicus Houtt 32

S

Salvia miltiorrhiza Bge. 14
Sanguisorba officinalis L. 40
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 248
Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils. 202
Scutellaria barbata D. Don 228
Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino 8
Sepia esculenta Hoyle 288
Sepiella maindroni de Rochebrun 288
Setaria italica (L.) Beauv. 186
Siegesbeckia orientalis L. 264
Smilax glabra Roxb. 2
Solanum lyratum Thunb. 238

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

Solanum nigrum L. 232
Stachyurus chinensis Franch. 94
Stemona sessilifolia (Miq.) Mig. 36
Strphania tetrandra S.Moore 46
Sus scrofa domestica Brisson 282

T

Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch 100
Toxicodendron vernicifluum (Stokes)F.A.Barkl. 320
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 102
Trachycarpus fortunei (Hook. f.) H. Wendl. 118
Tremella fusiformis Berk. 276
Trionyx sinensis Wiegmann 300
Typha angustifolia L. 152

V

Viola yedoensis Makino 260
Vitex negundo L. var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc) Hand.-Mazz. 126

Z

Zaocys dhumnades (Cantor) 284

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com