东科技出版社（全国优秀出版社）

约三角450种

中草药野外识别手册

谭树辉 黄海波 主编

（三）

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

内容： 识别要点
入药部位
性味功效
临床应用

特点： 简明扼要
携带方便
图文对照
快速识别

ISBN 7-5359-3430-7

中草药
野外识别手册（三）

责任编辑 苏北建 封面设计 林少娟 版式设计 余笑文

ISBN 7-5359-3430-7/R·602 定价：23.00元

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中草药野外识别手册

（三）

0301221

主编 谭树辉 黄海波

广东科技出版社

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

图书在版编目(CIP)数据

中草药野外识别手册(三)/谭树辉、黄海波主编. -广州: 广东科技出版社, 2004.1

ISBN 7-5359-3430-7

Ⅰ.4… Ⅱ.①谭…②黄… Ⅲ.中草药-识别-手册 Ⅳ.R282.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 090010 号

出版发行: 广东科技出版社
(广州市环市东路水荫路 11 号 邮编: 510075)
E-mail: gdkjzbb@21cn.com http://www.gdstp.com.cn
经 销: 广东新华发行集团
印 刷: 洛德加印刷(番禺)有限公司
(广州市番禺区桥核镇民生工业区 邮码: 511480)
版 次: 2004 年 1 月第 1 版
2004 年 1 月第 1 次印刷
开 本: 889mm × 1 194mm 1/64 印张 5.25 字数 105 千
印 数: 1 ~ 10000 册
定 价: 23.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32202&fromuid=1023

内容提要

本手册以实用可靠、简明扼要、外出携带方便为特色，采取图文对照形式，按植物分类学哈钦松分类系统顺序编排，收集了常见药用植物150种，共分3册。本册收载了双子叶植物及单子叶植物150种野外常见的植物药。每种均附有彩色植物写真照片，大部分附有识别特征放大图。文字描述包括了植物名、药名、药用部位（包括来源和原植物拉丁学名）、识别特征、性味功效（包括用量）、应用等。主要识别特征在文字下加线标示。

本手册文字简练、图像清晰、内容丰富、版本袖珍、便于携带，具有很好的实用性和普及性，适合中医药院校的师生、临床医生、科研人员、药业界专业人士以及广大中草药爱好者在学习、识别中草药时参考使用。

http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

编委名单

主　编：谭树辉　黄海波

副主编：詹若挺　徐焱琛

编　委：潘超美　楼步青　文惠玲　姚幼玲　肖省娥

魏　平　张德培　叶宇辉

摄　影：黄海波　徐焱琛

在编著本书的过程中，得到广州致信药业有限公司和广州致信中药饮片有限公司的大力支持，在此表示感谢！

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

编写说明

1. 本手册共分3册出版，收载的植物药种类均为我国常见药用品种，依据植物学分类系统进行分类。主要内容：一册：蕨类植物、裸子植物、双子叶植物；二册：双子叶植物；三册：双子叶植物、单子叶植物。药用植物的排列顺序以科为单位，按植物学分类系统（哈钦松分类系统）次序编排。科内种的次序按属的拉丁学名第一字母顺序编排。受篇幅限制，藻类植物、菌类植物和苔藓植物暂不收编在本书内。

2. 每种植物药包括文字和彩色照片两部分。每一种药以植物名为正名。文字内容包括：植物中文名、别名、药名、拉丁学名、入药部位、采收时间、形态特征、生境分布、性味功效和应用。每种植物药最多只描述3个常用的别名。形态特征着重描述在野外感官能识别到的特征，重点识别特征用下划线加注。植物形态特征、性味功效及应用等内容的编写主要参考《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中国高等植物图鉴》、《广东药用植物手册》、《广东植物志》等。

3. 凡有毒植物药，不论毒性大小，均在性味功效中注明“有毒”二字。无

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

毒性的植物药则不再标明“无毒”。

4. 性味功效包括性味、功效、用法和用量。用量为成人的一日量。应用时必须根据具体情况灵活掌握。对有毒性的药尤其要慎重。

5. 本书后附有植物名和药名的中文名索引和拉丁学名索引。中文名索引按笔画顺序排列。植物正名以黑体字表示，其余以宋体字表示。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

前言

在我国，植物药在民间用于防病、治病和保健方面已有数千年历史，由于其疗效可靠、副作用小，一直流传至今，并受到世界越来越多的人所关注。

我国地大物博，自然环境复杂，给植物的生长提供了极其有利的条件，因此植物药资源甚为丰富。据资源调查和文献记载，目前，我国有中草药资源达1万多种，其中临床上最常用的有600多种，要想准确鉴定一个植物药的种名，需要细致观察其各个器官的形态特征，其中繁殖器官，即花和果实的特征是分类的主要依据。但在野外，受季节限制，往往只能见到植物的营养器官，不易马上确认。因此，我们根据多年的教学和科研工作以及同行们积累的经验和方法，从观察茎的形状、节间特点、茎上的刺及卷须、叶的独特形状，特殊叶脉、叶片上的腺体和毛等附属物、有无托叶及托叶的形态、叶序、特定的花序特征；或嗅闻气味、观察折断后的乳汁、尝试特有味道；或观察其生长的特定环境等内容入手来编写此手册，以帮助读者快速识别常见药用植物。

参加本手册的编写人员为广州中医药大学从事教学和药用植物研究、中药鉴

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

定、中药炮制研究的专家学者；以及医院药剂科、药材公司等在岗的管理人员。

由于我们水平和资料有限，书中错漏在所难免。恳请广大读者提出宝贵意见。

谭树辉

2003.9.于广州

注：谭树辉　广州中医药大学教授、华南药用植物学、中药鉴定学专家、广州市药学会中药鉴定工作部副主任、《广州药讯》杂志编委、广州中医药大学教学基地、广州致信药业有限公司、广州致信中药饮片有限公司质量总监。从事教学与科研工作40多年，成绩卓越，被称为“药用植物与中药材的活字典”。曾参编《中华人民共和国药典》（一部）、全国高等医药院校教材《药用植物学》和《中药鉴定学》，发表学术论文多篇。

中药图谱精华书籍汇总帖 http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1047

目录

三、双子叶植物

茜草科

水杨梅（水石榴、小叶团花、白消木）……2

栀子（山枝子、山栀子、黄栀子）……4

水线草（伞房花耳草）……6

白花蛇舌草（蛇舌草、二叶葎）……8

牛白藤（土加藤、大叶龙胆草、接骨丹）……10

剑叶耳草（少年红、千年茶、铁扫把）……12

龙船花（五月花、映山红、红缨花）……14

巴戟天（巴戟、鸡肠风）……16

百眼藤（小叶羊角藤）……18

玉叶金花（白纸扇、山甘草、白茶）……20

鸡矢藤（鸡屎藤、臭藤、毛葫芦）……22

山大颜（九节、山大刀）……24

匍匐九节（穿根藤、春根藤、伸筋藤）……26

山石榴（假石榴、刺榴）……28

茜草（地苏木、拉锯藤）……30

白马骨（六月雪、满天星）……32

http://www.yaojia.org/f... mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

白花苦灯笼（六月雪、满天星）……34
钩藤（双钩藤、鹰爪风）……36
忍冬科
山银花（土忍冬、土银花）……38
蒴藋（走马箭、接骨木）……40
南方荚蒾（毛英蒾）……42
坚荚树（常绿荚蒾、冬红果）……44
败酱科
白花败酱（苦斋菜）……46
菊科
胜红蓟（白花臭草、白花草）……48
牡蒿（假柴胡、齐头蒿、臭艾）……50
白苞蒿（鸭脚艾）……52
野艾（野艾蒿、小叶艾）……54
山白菊（三脉紫菀、三褶脉马兰）……56
三叶鬼针草（金盏银盘、三叶刺针草）……58
大头艾纳香（白花九里明、东风草）……60
辣子草（向阳花、珍珠草）……62
鹅不食草（石胡荽、地胡椒、球子草）……64
野菊（野黄菊、野山菊）……66
芙蓉菊（玉芙蓉、千年艾）……68
鱼眼菊（鱼眼草、山胡椒菊）……70
鳢肠（旱莲草、白花蟛蜞菊）……72
地胆草（地胆头、苦地胆）……74
一点红（羊蹄草、紫背草、叶下红）……76
华泽兰（广东土牛膝、大泽兰）……78

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

鼠曲草（佛耳草、清明菜）.....80
紫背菜（紫背三七、红背菜）....82
半命菜（假荷蒿、野荷蒿）.....84
千里光（九里光、九里明）.....86
豨莶（希仙、金耳钩）.....88
金腰箭（苦草）.....90
蒲公英（黄花地丁）.....92
夜香牛（伤寒草、消山虎）.....94
鼠叶斑鸠菊（斑鸠木）.....96
苍耳（牛虱子、痴头猛）.....98
黄鹌菜（黄花菜、野芥菜）.....100
报春花科
星宿菜（大田基黄、红根草）..102
车前科
车前（牛舌菜）.....104
桔梗科
金钱豹（土党参）.....106
半边莲科
半边莲（急解索、半边菊）.....108
铜锤卡带草（小铜锤、地钮子、地石榴）.....110
茄科
酸浆（灯笼草、天泡草）.....112
苦蘵（灯笼草、灯笼泡草）.....114
白英（白毛藤、毛风藤）.....116
少花龙葵（白花菜、古钮菜）..118
旋花科
马蹄金（黄胆草、小金钱草）..120
五爪金龙（五叶藤、五爪龙）..122
玄参科
毛麝香（麝香草、凉草）.....124
母草（四方草、四方拳草）.....126
冰糖草（野甘草、米碎草）.....128
爵床科

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

穿心莲（榄核莲、一见喜）..... 130
假杜鹃（蓝花草）..... 132
狗肝菜（猪肝菜、羊肝菜）..... 134
白鹤灵芝（癣草）..... 136
爵床（六角英）..... 138
马蓝（南板蓝根、大青叶）..... 140
马鞭草科
白棠子树（小叶鸦鹘饭、山指甲）
..... 142
尖尾枫（尖尾凤、粘手风）..... 144
大叶紫珠 146
杜虹花（紫珠草、止血草）..... 148
红紫珠（对节树）..... 150
大青（路边青、猪屎青）..... 152
灯笼草（红灯笼、鬼灯笼）..... 154
臭茉莉（臭牡丹、山茉莉）..... 156
赪桐（状元红）..... 158
马缨丹（五色梅）..... 160
马鞭草（铁马鞭、风颈草）..... 162
牡荆（五指柑、蚊子柴）..... 164
蔓荆（白背杨、白布荆）..... 166
唇形科
筋骨草（白毛夏枯草、金疮小草）
..... 168
瘦风轮（剪刀草）..... 170
防风草（假紫苏、落马衣）..... 172
益母草（四棱草、月母草）..... 174
白苏（臭苏）..... 176
紫苏（香苏、尖紫苏）..... 178
广藿香（藿香）..... 180
半支莲（狭叶韩信草、并头草）
..... 182
韩信草（耳挖草）..... 184
地蚕（土冬虫草、宝塔菜）..... 186

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

苦木科
鸦胆子（鸦胆、苦参子）..... 188
苦苣苔科
蚂蝗七（石蟹蟹、岩白菜）..... 190
小二仙草科
黄花小二仙草（锯仔草、铁锯草）
..... 192
白花丹科
白花丹（白雪花、假茉莉）..... 194
使君子科
使君子（留求子）..... 196
紫葳科
光叶子花（簕杜鹃、叶子花、宝巾）
..... 198
紫茉莉（胭脂花、入地老鼠）.. 200
安石榴科
石榴（安石榴、珍珠石榴）..... 202

四、单子叶植物

鸭跖草科
鸭跖草（竹节菜、蓝花菜）..... 206
大苞水竹草（疣火草、围夹草）
..... 208
紫露草（紫鸭跖草）..... 210
水竹草（花叶竹夹菜、鸭舌红）
..... 212
谷精草科
谷精草（流星草、移星草、鱼眼草）
..... 214
姜科
华山姜（九连姜、华良姜）..... 216
大高良姜（红豆蔻、大良姜）.. 218
草豆蔻（草蔻）..... 220
高良姜（小良姜、风姜）..... 222

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

益智（益智仁）..... 224
阳春砂（砂仁）..... 226
闭鞘姜（白石笋、樟柳头、水蕉花）
..... 228
山柰（沙姜、三柰）..... 230
百合科
天门冬（天冬）..... 232
山萱兰（老鼠怕、山猫儿）..... 234
麝香百合（山百合）..... 236
七叶一枝花（蚤休、重楼）..... 238
多花黄精（长叶黄精、囊丝黄精）
..... 240
滇黄精（节节高、仙人饭）..... 242
菝葜（金刚藤）..... 244
土茯苓（土萆薢）..... 246
牛尾菜（草菝葜、牛尾结）..... 248
天南星科
石菖蒲（药菖蒲、水剑草）..... 250
海芋（广东狼毒、猿芋头）..... 252
千年健（一包针、千年见）..... 254
大薸（大浮萍、水浮莲、水葫芦）
..... 256
石柑子（石葫芦、石蒲藤）..... 258
犁头尖（上半夏、老鼠尾、坡芋）
..... 260
鸢尾科
射干（蚊剪草、鬼仔扇）..... 262
茜草科
黄独（黄药子、土卵、零余薯）
..... 264
茜草（血三七、红药子、红孩儿）
..... 266

中药图谱精华书籍汇总帖
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32832&fromuid=1023

日本薯蓣（土淮山）..... 268
露兜树科
露兜树（露兜簕、野菠萝）.....270
仙茅科
大叶仙茅（岩棕、松兰）..... 272
仙茅（山兰花、山棕）..... 274
兰科
化叶开唇兰（金线莲、金线风）
..... 276
门及（双肾草、西牛角）..... 278
石豆兰（石枣、鸭舌兰）..... 280
美花石斛（粉花石斛）.... 282
羊儿兰（见血清、见血莲、肉螃蟹）
..... 284
血叶兰（石上藕、石蚕、真金草）
..... 286
石仙桃（石上莲、石橄榄、石穿盘）
..... 288
莎草科
莎草（香附）..... 290
水蜈蚣（发汗草、散寒草）..... 292
禾本科
薏苡（薏苡仁、沟子米）..... 294
牛筋草（千金草、野鸡爪）..... 296
白茅（茅针、茅根）..... 298
淡竹叶（地竹、竹叶麦冬）..... 300
金丝草（笔仔草、猫毛草）..... 302

中文名索引 304
拉丁学名索引 312

三、双子叶植物

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

水杨梅（水石榴、小叶团花、白消木）

【药名】水杨梅

【药用部位】茜草科植物水杨梅*Adina rubella* Hance.的全株。花6～8月采收；果9～11月采收；叶夏、秋季采收；根、茎皮全年采收

【识别特征】落叶灌木，高1~3米。茎多分枝，嫩茎通常红褐色，具白色皮孔和细毛，老枝无毛。叶对生，近无柄；革质，卵状披针形或卵状椭圆形，先端渐尖，基部宽楔形，全缘，下面侧脉有毛。头状花序球形，由多数小花密集而成，单独顶生或腋生，花小，花萼5裂，条形；花冠管状，5裂，淡紫红色或白色；雄蕊5，花丝极短；子房下位，花柱长条形。蒴果小，楔形，成熟时紫红色，集生于花序上形如杨梅。花期夏季。多生于溪边、山谷及山间低湿处。分布于我国长江下游及华南地区。

【性味功效】苦、涩，凉。清热解毒、散瘀止痛。治感冒发热、腮腺炎、咽喉肿痛、风湿疼痛、细菌性痢疾、急性胃肠炎、跌打损伤、骨折。煎服25～50克。外用适量，捣敷。

【应用】1.全株或花、果序煎服，治痢疾。2.根配茅莓根、山芝麻、两面针、生石膏，煎服，治牙龈肿痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

栀子（山枝子、山栀子、黄栀子）

【药名】栀子。

【药用部位】茜草科植物栀子 *Gardenia jasminoides* Ellis的果实。9～11月采收。

【识别特征】常绿灌木，高2米。叶对生或3叶轮生，革质；叶片长椭圆形或长圆状披针形，全缘；托叶鞘状，膜质。花单生于枝顶，芳香；萼管倒圆锥形，有棱，裂片线形；花瓣旋卷形排列，花开时呈高脚杯状或碟状，5～6裂，初为白色，后变为乳黄色；雄蕊与花冠裂片同数。蒴果肉质，卵形，有翅状纵棱5～8条；种子多数。花期5～7月，果期8～11月。生于低山温暖的疏林中或荒坡、沟旁、路边。分布于我国华东、华南和西南各地。

【性味功效】苦，寒。泻火除烦、清热利湿、凉血解毒；外用消肿止痛。治热病虚烦不眠、黄疸、淋病、消渴、目赤、咽痛、吐血、衄血、血痢、尿血、热毒疮疡、扭伤肿痛。煎服6～10克。外用适量，取生药研末，醋调外敷。

【应用】1. 单味炒焦水煎，配生姜汁服，治胃皖火痛。2. 配甘草、黄柏，治伤寒身黄发热。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

水线草（伞房花耳草）

【药名】水线草.

【药用部位】茜草科植物水线草 *Hedyotis corymboss* L.的全草．夏、秋季采收.

【识别特征】一年生草本，分枝多，呈披散状。茎和枝四棱形，无毛或在棱上被疏毛，叶对生，近无柄，条形或条状披针形，急尖，两面稍粗糙，无侧脉；托叶合生，顶部有短刺数条；伞房花序腋生，花2～4；总花梗丝状，具微小的苞片；花4数，具梗；萼筒球形，被疏柔毛，裂片狭三角形，稍短于筒，具睫毛；花冠白色或淡红色，筒状，裂片矩圆形；雄蕊内藏。蒴果膜质，球形，具宿存萼裂片，开裂。生于旷野或田边路旁。分布于福建、广东、广西、海南等地

【性味功效】甘、淡，凉。清热解毒、利尿消肿、活血止痛。煎服30～60克（鲜品60～120克）；或鲜品捣汁服。外用适量，捣敷。孕妇慎用

【应用】1.单味煎洗，治烫伤。2.配常山、马鞭草，治疟疾.

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

白花蛇舌草（蛇舌草、二叶葎）

【药名】白花蛇舌草。

【药用部位】茜草科植物白花蛇舌草*Hedyotis diffusa* Willd.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】一年生草本，高15～50厘米，茎圆柱形，叶呈“卜”字形对生，无柄；叶片条形至条状披针形，先端渐尖，基部渐窄，全缘，托叶2片，先端有小齿1～4。花从叶腋单生或成对生长；萼管与子房合生，球形，略扁，上部4裂，宿存；花冠白色，4中裂；雄蕊4，着生于花冠喉部，与花冠裂片互生，花丝扁，花药卵形，纵裂；雌蕊1，柱头2瓣裂。蒴果球形，灰褐色，两侧各有1条纵沟；种子细小，淡棕黄色，具3棱角。花期7～9月，果期8～10月。生于山坡、路边、溪畔草丛中。分布于云南、广东、广西、福建等地。

【性味功效】甘、淡，凉。清热解毒、利尿消肿、活血止痛。治肺热喘咳、扁桃体炎、咽喉炎、阑尾炎、痢疾、黄疸、盆腔炎、附件炎、痈肿疔疮、毒蛇咬伤。煎服30～60克（鲜品60～120克）；或鲜品捣汁服。外用适量，捣敷。孕妇慎用。

【应用】1.单味煎服，治痢疾、尿道炎。2.鲜品捣敷，治疮肿热痛、毒蛇咬伤。3.配羊蹄草、两面针根，治急性阑尾炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

牛白藤（土加藤、大叶龙胆草、接骨丹）

【药名】牛白藤。

【药用部位】茜草科植物牛白藤 *Hedyotis hedyotidea* (DC.) Merr.-Mazz.的全草。全年采收。

【识别特征】多年生藤本，高3～5米。老枝圆柱形，幼枝四棱形。叶对生，膜质；叶片卵状披针形，先端急尖，基部近圆形或阔楔形，全缘；托叶截头状，顶端有刺毛4～6条。复伞形花序，腋生或顶生；花10～20朵，细小，白色；花萼被微柔毛，裂片4，线状披针形；冠管短，裂片披针形；近喉部有长毛；雄蕊长，突出；花柱线状。蒴果近球形，开裂。花期秋季。生于山谷、坡地、林下、灌木丛中。分布于我国南部和西南部。

【性味功效】甘、淡，凉。清热解暑、祛风湿、强筋骨、止痒。治中暑、感冒咳嗽、胃肠炎、风湿性关节炎、跌打损伤、骨折、皮肤湿疹。煎服15～30克（鲜品30～60克）。外用适量，鲜品捣敷或煎洗。

【应用】1. 单味煎服，治中暑、感冒咳嗽、胃肠炎、腰腿痛；煎洗，治皮肤湿疹、瘙痒、带状疱疹。2. 配土牛膝、铜锤草等，治骨折。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

剑叶耳草（少年红、千年茶、铁扫把）

【药名】剑叶耳草。

【药用部位】茜草科植物剑叶耳草 *Hedyotis lancea* Thunb.的地上部分。夏、秋季采收。

【识别特征】灌木状草本。茎直立，分枝，圆柱形，上部近四棱形。叶对生，披针形，顶端短尖或长尖，基部楔尖，侧脉极明显；叶柄粗壮；托叶卵状三角形，全缘或具腺状小齿。聚伞花序3歧分枝，圆锥花序式排列，顶生和生于上部叶腋，有披针形的苞片；花着生在中央的无梗，两侧的有短梗；萼筒陀螺状，裂片卵状三角形，与萼筒等长；花冠漏斗状，白色或淡紫色，裂片披针形；雄蕊伸出。蒴果椭圆形，有宿存的萼裂片，开裂为两果瓣。生于山地林下或山谷溪旁。分布于福建、江西、广东、广西等地。

【性味功效】甘，平，润肺止咳、消积、止血。治支气管炎、咳血、小儿疳积、跌打损伤、外伤出血。煎服15～25克。外用适量，捣敷。

【应用】鲜品50克与猪肉同炖，服汤食肉，治小儿疳积。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

龙船花（五月花、映山红、红缨花）

【药名】龙船花。

【药用部位】茜草科植物龙船花 *Ixora chinensis* Lam.的花。夏季采收。

【识别特征】小灌木，高0.5～2米，茎直立，多分枝，小枝褐色。单叶对生，叶柄极短；叶片矩圆状披针形或矩圆状倒卵形，先端钝短尖，基部楔形或浑圆，全缘，薄革质或纸质。伞房状3歧聚伞花序顶生，花多而稠密，红色或黄红色，总花梗短，红色；萼齿4裂，裂片小；花冠管细长，裂片倒卵形或近圆形，先端浑圆；雄蕊4，着生于花冠喉部，花盘肉质；雌蕊1，红色，花柱细长，柱头2浅裂。浆果近球形，成熟时黑红色。花期夏季。散生于林下、灌丛中或旷野路旁。分布于福建、台湾、广东、广西等地。

【性味功效】甘、辛，凉。活血散瘀、清肝降压。治高血压、月经不调、筋骨折伤、疮疡。煎服10～15克。外用适量。

【应用】单味煎服，治高血压、月经不调、闭经。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

巴戟天（巴戟、鸡肠风）

【药名】巴戟天。

【药用部位】茜草科植物巴戟天 *Morinda officinalis* How 的根，全年采收。

【识别特征】多年生缠绕或攀缘藤本。根茎肉质肥厚，圆柱状，有蜿蜒状条纹，断面呈紫红色。茎圆柱状，有纵条棱，小枝幼时有褐色粗毛，老时毛脱落后表面粗糙。叶对生，长椭圆形，先端短渐尖，基部楔形或阔楔形，全缘，叶面被稀疏短粗毛；叶柄有褐色粗毛，托叶鞘状。头状花序生于小枝顶端，花2～10朵，罕为腋生；花萼倒圆锥状；花冠肉质白色，花冠管的喉部收缩，内面密生短毛，通常4深裂；雄蕊4，花丝极短；子房下位，花柱2深裂。浆果近球形，熟时红色。花期4～5月，果期9～10月。野生于山谷、溪边或山林下，亦有栽培。分布于福建、广东、广西等地。

【性味功效】甘、辛，微温。补肾阳、强筋骨、祛风湿。治阳痿、少腹冷痛、小便不禁、子宫虚冷、风寒湿痹、腰膝酸痛。煎服10～15克。阴虚火旺者忌服。

【应用】1. 配牛膝、羌活、桂心、五茄皮、杜仲，治风冷腰胯疼痛、行步不得。2. 配益智仁、桑螵蛸、菟丝子，治小便不禁。3. 配菟丝子、破故纸、鹿茸、山药、赤石脂、五味子，治白浊。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

百眼藤（小叶羊角藤）

【药名】百眼藤。

【药用部位】茜草科植物百眼藤 *Morinda parvifolia* Benth.的块根。全年采收。

【识别特征】攀缘灌木。小枝顶端被短粗毛。叶对生，倒卵状椭圆形，稀椭圆状矩圆形，顶端钝，具小凸尖或急尖，基部楔形，下面脉腋内有短束毛和有时沿主脉上被短粗毛；托叶膜质，鞘状。伞状花序由2～6个小头状花序组成，小头状花序有花4～8朵；萼筒半球形，萼檐截平；花冠白色，裂片4，几达基部，矩圆状披针形，中部以下密被卷茸毛；雄蕊4。聚合果扁球形，红色。生于山野灌丛中。分布于我国南部地区。

【性味功效】甘，凉。清热解毒、散瘀止痛、祛风化湿。治消化不良、腹泻、大便秘结、感冒咳嗽、跌打扭伤、腰肌劳损。煎服15～30克。

【应用】单味煎服，治支气管炎、百日咳。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

玉叶金花（白纸扇、山甘草、白茶）

【药名】玉叶金花。

【药用部位】茜草科植物玉叶金花 *Mussaenda pubescens* Ait. f.的茎叶。全年采收。

【识别特征】藤状小灌木。小枝蔓延，初时被柔毛，成长后脱落。叶对生，有短柄；叶片卵状矩圆形或椭圆状披针形，先端渐尖，基部短尖，边全缘，上面无毛或被疏毛，下面被柔毛；托叶2深裂，裂片条形，被柔毛。聚伞伞房花序，密集多花，着生枝顶；花黄色，无柄；花萼钟形，被毛，裂片4，条形，其中常有1片扩大成白色叶状，阔卵形或圆形；花冠黄色，外被伏柔毛，裂片5，镊合状排列；雄蕊5，着生于花冠喉部，花丝极短。浆果椭圆形，聚集成团。花期4～6月，果期5～8月。生于山坡或灌木丛中。分布于我国东部、南部和西南部。

【性味功效】甘、微苦，凉。解表、清暑、利湿、解毒、活血。治感冒、中暑、发热、咳嗽、咽喉肿痛、暑湿泄泻、痢疾、疮疡脓肿、跌打、蛇伤。煎服15～30克（鲜品30～60克）。外用适量，捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治急性胃肠炎。2. 配银花藤、车前草煎服，治湿热小便不利。3. 配大叶桉叶煎服，治暑湿腹泻。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

鸡矢藤（鸡屎藤、臭藤、毛葫芦）

【药名】鸡矢藤。

【药用部位】茜草科植物鸡矢藤 *Paederia scandens* (Lour.) Merr. 的全株。夏季采收地上部分，秋、冬季采挖根部。

【识别特征】多年生缠绕草质藤本，高2～3米。全株揉碎后有恶臭。叶对生；叶片近膜质，先端尖，基部浑圆或楔尖，两面近秃净；托叶三角形。圆锥花序腋生及顶生，扩展、分枝为蝎尾状的聚伞花序；花白紫色；萼狭钟状；花冠钟状，5裂，内面红紫色；雄蕊5；花柱丝状，2枚，基部愈合。浆果球形，成熟时光亮，草黄色。花期秋季。生于溪边、河边、路边、林旁及灌木林中，常攀缘于其他植物或岩石上。我国除东北和西北外，其余各地均有分布。

【性味功效】甘、酸，平。祛风活血、止痛解毒、消食导滞、除湿消肿。治风湿疼痛、腹泻痢疾、脘腹疼痛、气虚浮肿、头昏食少、肝脾肿大、瘰疬、肠痈、无名肿毒、跌打损伤。煎服，茎叶15～30克，根30～60克。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 单味煎服，治气郁胸闷、胃痛、食积腹泻、阑尾炎；配酒服，治关节风湿痛、跌打损伤、背疽。2. 配路边姜，治红痢。3. 配绿豆，治有机磷农药中毒。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

山大颜（九节、山大刀）

【药名】山大刀。

【药用部位】茜草科植物山大颜*Psychotria rubra* (Lour.) Poir.的嫩枝及叶、根，全年采收。

【识别特征】直立灌木，高1～3米。枝近四方形，后渐变为圆形。叶对生，纸质；叶片椭圆状矩圆形，先端长尖，基部渐狭，背脉腋内有簇毛，余秃净；托叶阔，膜质，早落。圆锥花序顶生及腋生，3歧，短于上部叶；花浅绿色或白色，裂片短三角形，冠管阔，裂片披针形，外翻；雄蕊5，着生于冠喉部。核果近球形，红色，光滑；小坚果有棱4～5条。花期秋季。生于山野。分布于我国东部至西南部。

【性味功效】嫩枝及叶：苦、微辛，凉。清热解毒、利咽消肿、祛风除湿。治扁桃体炎、白喉、疮疡肿毒、风湿疼痛、跌打损伤。煎服15～30克（鲜品30～60克）。外用适量，煎水熏洗，研末调敷或捣敷。根：苦涩、微寒。祛风除湿、消肿解毒。治感冒发热、咽喉肿痛、风湿痛、胃痛、疟疾、痔疮、跌打损伤、疮疡肿毒。

【应用】1.叶捣敷或研末敷，治刀伤出血、骨折。2.叶配土牛膝叶，治疮疖。3.根捣汁含漱，治风火牙痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

匍匐九节（穿根藤、春根藤、伸筋藤）

【药名】穿根藤。

【药用部位】茜草科植物匍匐九节*Psychotria serpens* L.的全株。全年采收。

【识别特征】灌木，常攀附于石上或树上。多枝平卧，茎上常生有不定根。叶小，纸质，对生；叶片卵形、倒卵形或卵状矩圆形；托叶膜质，短鞘状，早落。圆锥花序顶生；萼管倒圆锥状；花冠白色，外面稍呈粃糠状，5裂；雄蕊5；子房2室，胚珠每室1颗。核果小，近球形，白色。花期秋季。生于山野间石上或树上。分布于我国南部。

【性味功效】苦、辛，平。祛风湿、壮筋骨、止痛、消肿。治风湿性关节痛、咽喉肿痛、痈肿、疥疮。煎服6～10克。

【应用】1. 单味煎服或与猪小肠炖服，治小便浑浊。2. 配槐花、一枝香，煎泡乌糖服，治肠风下血，每天大便五六次。3. 鲜根捣汁服，治喉痹；涂患处，治痔肿。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

山石榴（假石榴、刺榴）

【药名】山石榴。

【药用部位】茜草科植物山石榴*Randia spinosa* (Thunb.) Poir.的根、叶、果。夏、秋季采收。

【识别特征】灌木或小乔木，高1～4米。嫩枝被毛；刺粗壮，长3.5厘米。叶对生，在短枝上密集簇生，宽倒卵形至匙形，钝头，仅在下面中脉和叶缘有毛；托叶卵形，顶端芒尖。花稍大，白色，单生或二三朵簇生于短枝顶；萼卵形，被柔毛；花冠钟状，密被绢毛，筒较阔，裂片卵形，比筒长；浆果大，近球形，有宿存萼檐，黄色，种子多数。生于旷野。分布于广东、广西及我国西南各地。

【性味功效】苦、涩，凉。有毒。散瘀消肿。治跌打瘀肿、外伤出血、疥疮瘙痒。外用适量，捣敷。

【应用】鲜品适量，捣敷，治跌打损伤、疥疮及各种皮肤病瘙痒。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

茜草（地苏木、拉锯藤）

【药名】茜草。

【药用部位】茜草科植物茜草 *Rubia cordifolia* L.的根及根茎、茎叶。春、秋季采收。

【识别特征】多年生攀缘草本，长1～3米，根数条至数十条丛生，外皮紫红色或橙红色。茎四棱形，棱上有倒生的小刺。叶4片轮生，具长柄；叶片形状变化较大，卵形、三角状卵形、宽卵形至窄卵形，先端通常急尖，基部心形，上面粗糙，下面沿中脉及叶柄均有倒刺，全缘；基出脉5。聚伞花序圆锥状，腋生或顶生；花小，黄白色，5数；花萼不明显；花冠辐状，5裂，裂片卵状三角形，先端急尖；雄蕊5，着生在花冠管上。浆果球形，红色后转为黑色。花期6～9月，果期8～10月。生于原野、山地的林边、灌丛中。分布几遍全国。

【性味功效】苦，寒。行血止血、通经活络、止咳祛痰。治吐血、衄血、尿血、便血、血崩、经闭、风湿痹痛、跌打损伤、瘀滞肿痛、黄疸、慢性气管炎。煎服10～15克；或入丸、散服。外用适量，研末撒或捣敷。

【应用】1. 茎叶煎服，治热症吐血、妇女血崩、经出色黑；捣敷，治疔疮。2. 茎叶配猪脚炖服，治跌打愈后、筋骨酸痛。3. 根配艾叶、乌梅肉，治衄血无时。4. 根配阴地蕨，治荨麻疹

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

白马骨（六月雪、满天星）

【药名】白马骨。

【药用部位】茜草科植物白马骨 *Serissa foetida* (D.C.) Druce 的全株。全年采收。

【识别特征】常绿小灌木，高1米，多分枝。根细长，外皮黄色。嫩枝有微毛，揉之有臭气。叶对生或丛生于短枝，近革质，倒卵形、椭圆形或倒披针形，先端短尖，基部渐狭，全缘，下面被灰白色柔毛；托叶顶端有锥尖状裂片数枚。花小，白色，单生或数朵丛生于枝顶或叶腋；苞片斜方状椭圆形，膜质；萼5裂，披针锥尖，边缘具细齿，中脉隆起，宿存；花冠漏斗状，与萼片近等长，5裂；雄蕊5，花丝白色，极短，着生于管口；雌蕊1，花柱白色。核果小，球形。生于林边、灌丛、路旁、溪边。分布于我国东南部、南部和中部各地。

【性味功效】淡、微辛，凉。疏风解表、清热利湿、疏筋活络。治感冒、咳嗽、牙痛、急性扁桃体炎、咽喉炎、急性或慢性肝炎、肠炎、痢疾、小儿疳积、高血压头痛、偏头痛、风湿性关节炎、白带。煎服15～30克。

【应用】1. 配千里光、凤尾草、筋骨草各30克，煎服，治感冒。2. 配栀子根30克、矮地茶15克，煎服，治急性黄疸型肝炎。3. 配蒲公英、犁头草各15克，威灵仙9克，煎服，治牙周炎等各种牙科炎症。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

白花苦灯笼（六月雪、满天星）

【药名】麻糖风。

【药用部位】茜草科植物白花苦灯笼 *Tarenna mollissima* (Hook. et Arn.) Robins.的根、叶。夏、秋季采收。

【识别特征】灌木或小乔木，高1～2（6）米。小枝密被柔毛，干后褐黄色。叶对生，长椭圆形、矩圆状披针形至卵形，顶端尖，干时变黑褐色，上面有短而硬的糙毛，下面密被稍带绢质的柔毛，侧脉8～10对；托叶卵状三角形，仅基部合生。聚伞花序顶生，伞房状，稠密而多花，密被短柔毛；花白色，有短梗；花萼和花冠均密被绢质柔毛；花冠长约1厘米，裂片4或5，与筒近等长或稍长，反折。浆果近球状，黑色，被短柔毛，有种子多颗。除云南外，广布于我国长江以南各地。

【性味功效】微苦、凉、清热解毒、消肿止痛。根：治感冒发热、咳嗽、热性胃痛、疝气痛、坐骨神经痛，煎服50～100克。叶：外用适量，捣敷。

【应用】1.根单味煎服，治四时感冒、胃热疼痛。2.鲜叶捣敷，治枪伤、疮疖脓肿。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茜草科

钩藤（双钩藤、鹰爪风）

【药名】钩藤。

【药用部位】茜草科植物钩藤 *Uncaria rhynchophylla* (Miq.) Jacks.的带钩茎枝。秋、冬季采收。

【识别特征】常绿攀缘灌木，长10米。小枝圆杆形或四棱形，光滑无毛。常于叶腋处着生钩状向下弯曲的变态枝，钩对生或单生，淡褐色至褐色，光滑无毛。单叶对生，叶片卵状披针形或椭圆形，先端渐尖，基部楔形，全缘，上面光滑无毛，下面脉腋处有短毛；托叶1对，2深裂，裂片线形。头状花序，花萼管状，先端5裂，花冠黄色，漏斗状，上部5裂；雄蕊5；花柱伸出花冠外。蒴果倒卵状椭圆形，被疏柔毛，具突宿萼。花期5～7月，果期10～11月。生于山谷疏林中。分布于我国西北、西南和华南各地。

【性味功效】甘，凉。息风止痉、清热平肝。治血压偏高、头晕、目眩。煎服10～15克。

【应用】1. 单味煎服，治高血压、头晕目眩、神经性头痛。2. 配鲜何首乌藤，治面神经麻痹。3. 配枳壳、延胡、甘草，治小儿盘肠内钩、啼哭而手足上撒，或弯身如虾者。4. 配黑芝麻、紫苏，治全身麻木。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

忍冬科

山银花（土忍冬、土银花）

【药名】山银花

【药用部位】忍冬科植物山银花*Lonicera confusa* DC.的花蕾或带初开的花。夏季在日出前及时采收其含苞未放的花蕾。

【识别特征】木质藤本，长2～4米。嫩枝有短柔毛，小枝淡红褐色或近褐色，节有环纹。单叶对生；卵形至卵状长圆形，先端钝或短尖，全缘，基部浑圆或稍平截，幼时两面有短糙毛，老时上面无毛；叶柄稍被柔毛。雄蕊5枚，着生于管口内，花药黄白色；雌蕊1，花柱线状，伸出，子房下位。浆果球形，黑色。花期6～9月，果期10月。生于溪边、旷野疏林下或灌木丛中。分布于广东、广西、云南等地。

【性味功效】甘、寒。清热解毒、疏散风热、凉血止痢。治温病发热、热毒血痢、痈疡、肿毒、瘰疬、痔漏。煎服10～15克（鲜品15～30克）。外用适量，捣敷。本品性凉，脾胃虚寒及气虚疮疡脓清者忌内服。

【应用】1. 单味煎服，治痈疽发背初起。2. 配连翘、大青根、芦根、甘草，预防乙脑、流脑。3. 配积雪草、一点红、野菊花、白茅根、白花蛇舌草、地胆草，治气性坏痈、骨髓炎。4. 配连翘、大青根、黄芩、野菊花，治胆道感染、创口感染。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

忍冬科

蒴藋（走马箭、接骨木）

【药名】走马箭。

【药用部位】忍冬科植物蒴藋 *Sambucus japonnica* Reinw.的根，全年采收。

【识别特征】灌木状草本。主根垂直，副根不多。茎具棱，平滑无毛。叶对生，单数羽状复叶，小叶5～9，长椭圆状披针形，先端渐尖，基部偏斜稍圆或阔楔形，边缘具密而尖锐的锯齿，两面均平滑无毛，或叶脉上有短柔毛；无托叶，小叶柄短或近无柄。复伞形花序顶生，有短柔毛；小总苞片细小，卵状披针形；萼5裂，下部愈合呈钟状；花冠白色，5裂，裂片卵形；雄蕊5，与花冠裂片互生，花丝短，药室向外开裂；子房卵圆形，柱头头状；花间杂有黄色杯状腺体。浆果球形，红色。花期8月，果期10月。生于中海拔山地的路旁、村边、荒地或沟谷向阳处，分布于广东、广西、江西等地。

【性味功效】甘、酸，温。祛风除湿、活血散瘀。治风湿疼痛、肾炎水肿、脚气浮肿、痢疾、黄疸、慢性气管炎、风疹瘙痒、丹毒、疮肿、跌打损伤、骨折。煎服6～12克，外用适量，捣敷。

【应用】1. 配透骨草、茜草、古山龙、丁香，熬膏涂敷，治四肢闭合性骨折、关节损伤和急性腰扭伤。2. 单味研粉，高压消毒，外敷，治创伤出血。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

忍冬科

南方荚蒾（毛荚蒾）

【药名】南方荚蒾

【药用部位】忍冬科植物南方荚蒾 *Viburnum fordiae* Hance 的根、叶。全年采收。

【识别特征】灌木，高3米。幼枝密生星状毛。叶卵形至矩圆状卵形，顶端尖至渐尖，边缘有锯齿至浅齿，稀齿不显，上面无毛至具叉毛，下面的毛较密，近基部两侧少数腺体；侧脉5～7对，伸达齿端；叶柄密生星状毛。复伞形花序，密生星状毛；萼筒与5萼齿均生星状毛；花冠白色，疏生星状毛，辐状，裂片长于花冠筒；雄蕊5，近等长或稍长于花冠。核果红色，近圆球形；核扁，具不规则的浅槽。

【性味功效】甘、淡、微涩，平。疏筋活络、敛疮生肌。治跌打后期筋脉挛急、刀伤。外用适量，捣敷

【应用】鲜叶捣敷，治跌打肿痛、筋脉拘挛、刀伤出血。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

忍冬科

坚荚树（常绿荚蒾、冬红果）

【药名】坚荚树。

【药用部位】忍冬科植物坚荚树 *Viburnum sempervirens* K.Koch 的叶。夏季采收。

【识别特征】常绿灌木，高2米，小枝略成四棱形。叶对生，革质，矩圆形、椭圆形至近卵形，顶端尖或渐尖，全缘或上部具少数浅齿，具离基3出脉，下面生小腺点，近基部两侧有少数腺体。复伞形花序，总花梗很短；萼檐具5微齿；花冠白色，辐状；雄蕊5，稍长于花冠。核果近球状卵形，熟时红色；核扁，两面具浅槽而横切面作波浪状。生于林下。分布于广东、广西、福建等地。

【性味功效】苦，寒。消肿，活血，治跌打外伤。外用适量，捣敷。

【应用】鲜叶捣敷，治跌打肿痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

败酱科

白花败酱（苦斋菜）

【药名】败酱草。

【药用部位】败酱科植物白花败酱 *Patrinia villosa* Juss.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高50～100厘米。茎枝被倒生粗白毛，毛渐脱落。基生叶丛生，叶柄较叶片稍长，宽卵形或近圆形，边缘具粗齿；茎生叶对生，叶片先端渐尖至窄长渐尖，基部楔形下延，1～2对羽状分裂。聚伞圆锥花序，集成疏大伞房花序；花萼小，萼齿不明显；花冠白色，冠筒短，先端5裂；雄蕊4，伸出，子房下位，花柱稍短于雄蕊。瘦果倒卵形，宿存苞片贴生，苞片近圆形，膜质，网脉明显。生于山坡草地及路旁。分布于我国北部、东部及中南、西南各地。

【性味功效】辛、苦，微寒。清热解毒、消痈排脓、祛瘀止痛。治肠痈、下痢、赤白带下、产后瘀滞腹痛、目赤肿痛、痈肿疥癣。煎服15～30克（鲜品50～120克）。外用适量，鲜品捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治产后腹痛如锥刺、吐血、蛇咬。2. 配荆芥、草决明、木贼草、白蒺藜，煎服，治赤眼、障痛并胬肉攀睛。3. 配当归、川芎、芍药、桂心，煎服，治产后腰痛、乃气血流入腰腿、痛不可转者。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

胜红蓟（白花臭草、白花草）

【药名】胜红蓟。

【药用部位】菊科植物胜红蓟 *Ageratum conyzoides* L.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】一年生草本。茎稍带紫色，被白色多节长柔毛，幼茎幼叶及花梗上的毛较密。叶卵形或菱状卵形，两面被稀疏的白色长柔毛，基部圆形或宽楔形，少有心形，边缘有钝圆锯齿。头状花序较小，直径约1厘米，在茎或分枝顶端排成伞房花序；总苞片矩圆形，顶端急尖，外面被稀疏白色多节长柔毛；花白色、淡紫色或浅蓝色；冠毛鳞片状，上端渐狭呈芒状，5枚。生于草丛、路旁、园边。分布于我国长江以南各地。

【性味功效】辛、苦，平。清热解毒，利咽消肿。治感冒发热、咽喉肿痛、痈疽疮疖、外伤出血。煎服15～30克（鲜者30～60克）；或捣汁服。外用适量，捣敷或研末吹喉。

【应用】1. 单味煎服，治感冒发热、崩漏、鹅口疮、疔疮红肿、疟疾；鲜品捣敷，治外伤出血、风湿疼痛、骨折（复位固定后）、疮疖成脓未溃。2. 配茶饼，治鱼口便毒。3. 单味放炉火中烧烟熏，治筋伤骨扭肿痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

牡蒿（假柴胡、齐头蒿、臭艾）

【药名】牡蒿。

【药用部位】菊科植物牡蒿 *Artemisia japonica* Thunb.的全草。未开花前采收。

【识别特征】多年生草本，高60～90厘米。茎直立。叶互生；茎中部以下的叶基部楔形，先端羽状3裂，中间裂片较宽，又羽状3裂；中部以上的叶线形，全缘；叶两面绿色。头状花序，排列成圆锥花序状，头状花序球形；总苞球形，苞片3～4层，外层苞片较小，卵形，内层苞片椭圆状，背面中央绿色，边缘膜质；花托球形，上生两性花及雌花，花冠均为管状；雌花位于花托外围，花冠中央仅有雌蕊1，柱头2裂；中央为两性花，花冠先端5裂；雄蕊5，花药合生；雌蕊1，柱头头状。瘦果椭圆形。花期9～10月。生于山坡路旁或荒地上。分布于我国东北至广东各地。

【性味功效】苦、微甘，寒。疏风清热、杀虫解毒。治感冒身热、劳伤咳嗽、潮热、小儿疳热、疟疾、口疮、疥癣、湿疹。煎服9～15克；或捣汁服。外用适量，煎洗。

【应用】1. 单味煎服，治喉蛾；煎洗，治疥疮湿疹。2. 配滴滴金根，治疟疾寒热。3. 根煎服，治风湿痹痛、寒湿浮肿。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

白苞蒿（鸭脚艾）

【药名】白苞蒿。

【药用部位】菊科植物白苞蒿 *Artemisia lactiflora* Wall.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高1.2米。茎直立，无毛或被蛛丝状疏毛，上部常有多数花序枝。下部叶在花期枯萎；1回或2回羽状深裂，中裂片又常3裂，裂片有深或浅锯齿，顶端渐尖，上面无毛，下面沿脉有微毛，有短柄或长柄，基部有假托叶；上部叶小，细裂或不裂。头状花序极多数，在枝端排列成短或长的复总状花序；总苞卵形，无梗；总苞片白色或黄白色，约4层，卵形，边缘宽膜质，无毛；花浅黄色，外层雌性，内层两性。瘦果矩圆形，无毛。花期秋季。生于山坡林边、路旁。分布于我国西部、西南部、南部、东南部、中部至陕西南部。

【性味功效】甘、微苦、平。理气、活血、调经、利湿、解毒、消肿。治月经不调、慢性肝炎、肝硬化、肾炎水肿、疝气；外用，治跌打损伤、外伤出血、烧伤或烫伤、疮疡、湿疹。煎服9～18克。外用适量，捣敷或干粉撒。

【应用】鲜品捣敷，治皮肤湿疹瘙痒。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

野艾（野艾蒿、小叶艾）

【药名】艾叶。

【药用部位】菊科植物野艾*Artemisia vulgaris* L.的叶。春、夏季花未开、叶茂盛时采收。

【识别特征】多年生草本，高45～100厘米。茎直立，有沟棱，被灰白色柔毛，叶互生，中部叶1～2回羽状分裂，裂片椭圆形、披针形至线形，全缘或有锯齿，上面无腺点，近秃净，下面被白色丝状毛；上部叶近无柄，裂片狭窄如线。头状花序钟状圆形，淡褐色，花后稍下垂，排列成窄长的总状花序。花期9～10月。生于路旁荒野、草地。分布于我国除西藏、新疆外的各地。

【性味功效】苦、辛，温。理气血、逐寒湿、温经、止血、安胎。治心腹冷痛、泄泻转筋、久痢、吐衄、下血、月经不调、崩漏、带下、胎动不安、痈疡、疥癣。煎服3～10克（鲜品15～30克）；或入丸、散服；或捣汁服，外用适量，捣敷、煎熏洗或炒热温熨。

【应用】1. 单味煎服，治脾胃冷痛、卒心痛、鼻血不止。2. 艾叶炭配蒲黄、蒲公英，治功能性子宫出血、产后出血。3. 配辣蓼、车前，治肠炎、急性尿道感染、膀胱炎。4. 艾叶炭配枯矾、黄柏，治湿疹

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

山白菊（三脉紫菀、三褶脉马兰）

【药名】山白菊。

【药用部位】菊科植物山白菊*Aster ageratoides* Turcz.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高50～100厘米。地下茎横生，有须状根，黄白色。茎直立，被短毛，基部有时带红色。叶互生，有短柄，基部叶和下部叶花后凋落；中部叶长椭圆形至披针形，先端钝，基部渐窄，边缘具疏锯齿，主脉通常3出，叶两面有短毛。头状花序排列成伞房状，总苞倒卵形；外缘舌状花淡红白色或白而淡紫，中部管状花黄色，都有较长冠毛。瘦果椭圆形，被短毛，冠毛略带红色。花期秋季。生于路边、水沟边、旷野草丛中。分布于我国南北各地。

【性味功效】苦、辛、凉。疏散风热、清热解毒、化痰止咳、利尿、止血。治风热感冒、扁桃体炎、支气管炎、疗疮肿毒、蛇咬、蜂螫。煎汤15～30克（鲜品30～60克）；或捣汁服。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 单味煎服，治支气管炎、扁桃体炎、乳腺炎。2. 配一枝黄花，治感冒发热。3. 配白茅根、万年青根、球子草，治鼻衄。4. 根配小槐花根，治蕲蛇、蝮蛇咬伤。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

三叶鬼针草（金盏银盘、三叶刺针草）

【药名】三叶鬼针草。

【药用部位】菊科植物三叶鬼针草 *Bidens pilosa* L.的全草。夏季开花时采收。

【识别特征】一年生草本，高30～100厘米。中部叶对生，3深裂或羽状分裂，裂片卵形或卵状椭圆形，顶端尖或渐尖，基部近圆形，边缘有锯齿或分裂；上部叶对生或互生，3裂或不裂。头状花序直径约8毫米；总苞基部被细软毛，外层总苞片数7～8，匙形，绿色，边缘具细软毛；舌状花白色或黄色，有数个不发育；筒状花黄色，裂片5。瘦果条形，具4棱，稍有硬毛；冠毛3～4，芒状。生于路边荒地上。分布于我国长江以南各地及陕西。

【性味功效】甘、淡，平。疏表清热、解毒、散瘀。治流感、乙脑、咽喉肿痛、肠炎、痢疾、黄疸、肠痈、小儿惊风、疳积、疮疡疥疖。煎服9～30克（鲜品60～90克）。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 单味煎服，治慢性阑尾炎、胃肠炎、中暑腹痛吐泻。2. 配紫金牛、龙牙草、六月雪，治虚劳、失力黄胖。3. 配红枣，治腰疼。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

大头艾纳香（白花九里明、东风草）

【药名】大头艾纳香。

【药用部位】菊科植物大头艾纳香 *Blumea megacephala* (Randeria) Chang et Tseng 的全草，全年采收。

【识别特征】攀缘灌木，高1～3米，小枝蔓延，有疏或密黄褐色短柔毛，幼枝及花序轴更密，少有近无毛。叶卵形、卵状矩圆形或椭圆状矩圆形，基部圆钝，边缘有具小尖的硬齿，上面粗糙无毛，下面多有疏短毛；叶柄密生短毛。头状花序大，密生短毛，通常1～7个排成顶生或腋生圆锥状；总苞半球状；总苞片4～5层，外层矩圆状卵形，内层条状矩圆形，密生短柔毛；花托平，有密短毛；花黄色，两性花花冠筒状，裂片三角形，有微毛；雌花丝状，有微毛。瘦果矩圆形，具肋，被微毛；冠毛白色。生于山谷灌丛中或林缘。分布于福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。

【性味功效】微苦、淡，微温。祛风除湿、活血调经。治风湿骨痛、跌打肿痛、产后血崩、月经不调。煎服15～30克，外用适量，捣敷。

【应用】1.单味煎服，治风湿、跌打疼痛。2.鲜品捣敷，治风湿骨痛、跌打损伤。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

辣子草（向阳花、珍珠草）

【药名】辣子草。

【药用部位】菊科植物辣子草 *Calinsoga parviflora*a Cav.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】一年生直立草本，高50余厘米。茎分枝，略被毛或无毛。叶对生，卵圆形至披针形，顶端渐尖，基部圆形至宽楔形，边缘有浅圆齿或近全缘，叶脉基部3出，稍被毛。头状花序小，有细长的梗，总苞半球形；苞片2层，宽卵形，绿色，近膜质，花异形，全部结实；舌状花4～5，白色，一层，雌性，筒状花黄色，两性，顶端5齿裂；花托凸起，有披针形托片。瘦果有棱角，顶端具睫毛状鳞片。生于田边、路旁、庭园空地或荒坡。分布于我国西南及浙江、江西、广东等地。

【性味功效】淡，平。消炎、止血。治扁桃体炎、咽喉炎、急性黄疸型肝炎；外用治外伤出血。全草：止血、消炎；花：清肝明目。煎服。

【应用】1. 单味煎服，治目赤肿痛。2. 鲜品捣敷，治外伤出血。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

鹅不食草（石胡荽、地胡椒、球子草）

【药名】鹅不食草。

【药用部位】菊科植物鹅不食草*Centipeda minima* (L.) A. Braun et Aschers. 的全草，夏、秋季采收。

【识别特征】 一年生匍匐状草本，高5～20厘米。微臭，揉碎有辛辣味。茎细，基部多分枝，枝匍匐，无毛或略有细柔毛。叶互生；叶片小，倒卵状披针形，先端钝，基部楔形，边缘有疏齿，无柄。头状花序小，扁球形，无柄，单生叶腋；花黄色，外围为雌花，花管极细，中央为两性花，花管裂片4；雄蕊4，花药基部钝圆；柱头2裂。瘦果四棱形，棱上有毛。花期4～9月，果期5～10月。生于稻田或阴湿处、路旁。分布于我国华北、华东、中南、西南各地。

【性味功效】辛，微温。散风寒、通鼻窍、祛痰、止咳、止痛。治感冒、寒哮、喉痹、百日咳、痧气腹痛、阿米巴痢疾、疟疾、疳泻、鼻渊、鼻息肉、目翳涩痒、疥癣、跌打。煎服3～6克（鲜品加倍）；捣汁服60克。外用适量。

【应用】1. 单味煎服，治疳积腹泻；捣敷，治牛皮癣、蛇伤、跌打肿痛、鸡眼；鲜品或干品搓揉，嗅其气，治伤风头痛、鼻塞、目翳。2. 配乌非根，治阿米巴痢疾。3. 配青黛、川芎，治目病肿胀红赤、昏暗羞明、隐涩疼痛、风痒、鼻塞、头痛、外翳攀睛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

野菊（野黄菊、野山菊）

【药名】野菊花。

【药用部位】菊科植物野菊 *Chrysanthemum indicum* L 的头状花序或全草，秋季花开时采收。

【识别特征】多年生草本，高 25～100 厘米。根茎粗壮，有分枝；茎直立或基部铺展，基生叶脱落；茎生叶卵形或长圆状卵形，羽状分裂不明显，顶裂片大，侧裂片常 2 对，卵形或长圆形；上部叶渐小；裂片边缘浅裂或有锯齿，上面有腺体及疏柔毛，下面毛较多，基部渐狭；托叶具锯齿。头状花序顶生，数个排列成伞房花序状；外层苞片椭圆形，边缘干膜质，被绵毛或短柔毛，内层苞片长椭圆形，干膜质；舌状花，淡黄色，1～2 层，无雄蕊；管状花深黄色，雄蕊 5，聚药；雌蕊 1，花柱细长，柱头 2 裂。瘦果，具 5 条纵纹。花期 9～10 月。生于路边、丘陵、荒地及林缘。分布于我国南北各地。

【性味功效】苦、辛，微寒。清热解毒。治痈肿，疔疮，目赤，瘰疬，天疱疮，湿疹。煎服 9～15 克（鲜品 30～60 克）。外用适量，煎洗或湿敷，或捣敷。

【应用】1. 根研末撒或捣敷，治蜈蚣咬伤、痈疽疔肿、一切无名肿毒、妇人乳痈。2. 根配菖蒲根、生姜，治疔疮。3. 根配枣木，治天泡湿疮。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

芙蓉菊（玉芙蓉、千年艾）

【药名】芙蓉菊。

【药用部位】菊科植物芙蓉菊 *Crossostephium chinense* (L.) Makino ex Cham. et Schlecht. 的全草。全年采收。

【识别特征】半灌木，高10～40厘米。叶互生，紧聚枝头，狭匙形或狭倒卵形，两面密被灰白色短柔毛，顶端3～5齿裂或分裂，无锯齿，基部渐狭。头状花序盘状，有梗，生于枝端叶腋，多数头状花序在枝端排成总状，总苞片2～3，外层总苞片叶质，外被密灰白色短柔毛；外围的雌性筒状花花冠顶端2～3齿裂，中央两性、筒状花花冠顶端5齿裂。瘦果5棱，冠毛冠状，边缘齿裂至中部以下。生于山坡路边、海滩石隙。分布于福建、广东、广西等地，全国各地有栽培。

【性味功效】辛、苦，微温。治风寒感冒、麻疹、风湿性关节疼痛、胃痛、支气管炎、百日咳、疔疮肿毒、乳腺炎。煎服15～30克；外用适量，捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治风寒感冒所致鼻塞、头痛、咳嗽、气喘。2. 鲜品捣敷，治疔疮肿毒、乳腺炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

鱼眼菊（鱼眼草、山胡椒菊）

【药名】鱼眼菊。

【药用部位】菊科植物鱼眼菊 *Dichrocerhala auriculata* (Thunb.) Druce 的全草。5～7月采收

【识别特征】一年生草本，高15～50厘米。茎直立或铺散，无毛或被长、短柔毛。叶卵形、椭圆形或披针形，羽裂，顶裂片宽大，侧裂片常1对，稀2对，两面无毛或被稀疏短柔毛。头状花序极小，球形，生于叉状分枝顶端，在茎顶或分枝顶端排成伞房状；总苞片1～2层；花托伸长，上端平；外围有多层结实的雌花，花冠线形，顶端2～3齿；盘花两性，能育，花冠顶端有4～5齿。瘦果扁，有加厚边缘，无冠毛。生于山地及平川。分布于湖北、广东、广西、云南、贵州等地。

【性味功效】苦、辛，平。消肿、解毒、利尿。治小儿外生殖器肿胀、疔毒、喉炎、挫扭伤、毒蛇咬伤。煎服10～15克。外用适量，鲜品捣敷或煎洗。

【应用】1. 鲜品配冬蜜捣敷，治男童外生殖器红肿、小便不利。2. 配稀饭，加食盐少许，捣敷，治疔毒肿痛。3. 研末酒送服，且另取鲜品捣烂调酒敷，治扭伤肿痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

鳢肠（旱莲草、白花蟛蜞菊）

【药名】旱莲草。

【药用部位】菊科植物鳢肠 *Eclipta prostrata* L.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】 一年生草本，高30～60厘米，茎柔弱，直立或匍匐，被毛。叶对生，近无柄，线状矩圆形至披针形，基部楔形，先端短尖或钝，全缘或稍具齿，两面密被白色粗毛。头状花序，腋生或顶生，具花梗；总苞绿色，卵形至阔钟形，苞片少数，2列，披小粗毛；花托扁平，有线状鳞片；舌状花雌性，约2列，狭线形，发育或不发育，白色，全缘或为2齿裂；管状花两性，全发育；花冠4浅裂；雄蕊4；花柱棒状，柱头2裂。瘦果黄黑色，长椭圆形而扁，顶端秃净。揉搓其茎叶有黑色汁液流出。花期夏季，果期9～10月。生于田野、路边、溪边及阴湿地上。分布于我国东北至西南各地。

【性味功效】甘、酸，凉。补肝肾阴，凉血止血。治吐血、咳血、衄血、尿血、便血、血痢、刀伤出血、须发早白、白喉、淋浊、带下、阴部湿痒。煎服15～30克。外用适量。

【应用】1. 鲜品捣汁水冲服，治咳嗽咯血。2. 配女贞子，用于补腰膝、壮筋骨、强肾阴、乌髭发。3. 配车前子、银花，治白浊。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

地胆草（地胆头、苦地胆）

【药名】地胆头。

【药用部位】菊科植物地胆草 *Elephantopus scaber* L.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高15～40厘米。有时全株被白色粗毛。根状茎短，着生多数须状根；新鲜时黄白色，干燥后灰黄色。叶基生，匙形，边缘稍具钝锯齿；两面均被灰白色粗毛。头状花序着生梗上，呈稀疏单枝聚伞排列，分枝处有叶状苞片。头状花序有2列总苞片，外层紫色，全为管状花，花冠淡紫色。瘦果有棱，顶端通常有6枚长而硬的刺毛。花期夏、秋季。生于山谷、村边及路旁、荒地、耕地等低草丛中。分布于福建、广东、广西、贵州、云南等地。

【性味功效】苦、辛，寒。清热泻火、凉血解毒、清利湿热、利水消肿。治鼻衄、黄疸、淋病、脚气、水肿、痈肿、疔疮、蛇虫咬伤。煎服15～30克（鲜品60～100克）。外用适量，鲜品捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治尿闭、扁桃体炎、咽喉炎、丝虫病淋巴管炎；煎洗，治痈肿；捣敷，治疔、乳痈。2. 配猪肉，治鼻出血、阳黄疸、单腹膨胀。3. 配豆腐，治脚气。4. 配天芥菜，治一切肿毒。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

一点红（羊蹄草、紫背草、叶下红）

【药名】羊蹄草。

【药用部位】菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC.的全草。全年采收。

【识别特征】一年生草本，高10～40厘米。茎直立，紫红色或绿色，被疏毛。基生叶卵形、琴形；上部的叶较小、全缘或具粗锯齿，基部抱茎；叶面绿色，背面紫红色。头状花序顶生；花梗2歧；苞片矩圆形、2列，绿色，基部膨大；花托平坦；花两性，全为管状花，紫色，5裂；雄蕊5；雌蕊1，柱头分叉。瘦果狭矩圆形，有棱，冠毛白色，柔软。花期7～11月，果期9～12月。生于田园、路边或草丛中。分布于江西、福建、广东、广西、云南等地。

【性味功效】苦、凉。清热、利水、凉血、解毒。治痢疾、腹泻、便血、水肿、肠痈、目赤、喉蛾、疔疮、肿毒。煎服15～30克（鲜品60～120克）。外用适量，鲜品捣汁涂、捣敷，或煎洗。

【应用】1. 加红糖捣烂敷，治妇人乳痈初起、无名肿毒、对口疮。2. 配灯心草，治水肿。3. 配狗肝菜、车前草，治肾盂肾炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

华泽兰（广东土牛膝、大泽兰）

【药名】广东土牛膝。

【药用部位】菊科植物华泽兰 *Eupatorium chinense* L.的根。秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高80～150厘米，茎直立，有纵沟和紫色斑点。单叶对生，有短柄；叶片卵形或椭圆状披针形，先端急尖，基部圆形或近心形，边缘有不整齐粗齿，无毛或近无毛，脉上毛密；叶柄具短柔毛。头状花序在茎顶端排成紧密聚伞花序；小花皆为管状，两性，先端5裂，裂片三角状；雄蕊5，聚药，花药基部钝；花柱伸出花冠外，柱头2深裂。瘦果圆柱形，微有毛，通常有5棱；冠毛1列，刚毛状。花期7～9月。生于山坡荒地。分布于江西、福建、广东、广西、云南等地。

【性味功效】辛、苦，凉。祛风、消肿、清热、解毒、行瘀。治白喉、乳蛾、咽喉红肿、吐血、血淋、外伤肿痛。煎服15～30克（鲜品30～60克）。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 单味煎服，预防白喉，治感冒高热、血淋、汤火伤。2. 配山大颜、木患根，治白喉。3. 配山芝麻、金锁匙、走马风，治毒蛇咬伤。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

鼠曲草（佛耳草、清明菜）

【药名】鼠曲草。

【药用部位】菊科植物鼠曲草 *Gnaphalium affine* D. Don 的全草。5～6月开花时采收。

【识别特征】一至二年生草本，高15～50厘米。全株密被白绵毛。茎直立，基部分枝。叶互生；基生叶花后凋落，下部和中部叶匙形或倒披针形，两面被白色绵毛。头状花序顶端密集成伞房状；总苞球状钟形，总苞片3层，金黄色，干膜质；花黄色，边缘雌花花冠丝状，中央两性花筒状，先端5裂；雄蕊5，聚药；子房下位，柱头2裂。瘦果长椭圆形，具乳头状突起，冠毛黄白色。花期4～6月，果期8～9月。野生于田边、山坡及路边。分布于我国黄河流域以南各地。

【性味功效】甘、平。化痰止咳、祛风寒。治咳嗽痰多、气喘、感冒风寒、蚕豆病、筋骨疼痛、白带、痈疡。煎服6～15克。外用适量，煎洗或捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治风寒感冒、筋骨痛、脚膝肿痛、跌打损伤、脾虚浮肿、无名肿痛、对口疮。2. 配雄黄、鹅管石、款冬花，治一切劳咳嗽、痰滞胸膈痞满。3. 配车前草、凤尾草、茵陈，治蚕豆病。4. 配黄荆子、前胡、云雾草、天竺子、荠尼根，治支气管炎、寒喘。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

紫背菜（紫背三七、红背菜）

【药名】紫背菜

【药用部位】菊科植物紫背菜 *Gynura bicolor* (Roxb.) DC.的全草。全年采收。

【识别特征】多年生草本，高0.5～1米。全株带肉质，多分枝，稍紫色，嫩茎微被毛。叶互生；叶片椭圆形或卵形，先端渐尖或急尖，基部下延，边缘有粗锯齿，上面绿色，微被毛，叶背紫色，无毛。头状花序于茎顶作伞房状疏散排列；总苞片2层，内层边缘膜质；花黄色，管状，两性。瘦果矩圆形，有纵肋条，被微毛；冠毛白色，绢毛状。花期10～12月。生于平原及低山区的阴湿处。分布于浙江、福建、广东、广西等地。

【性味功效】甘、辛，凉。凉血止血，清热消肿。治咯血、血崩、痛经、血气痛、支气管炎、盆腔炎、中暑、阿米巴痢疾。外用，治创伤出血、溃疡久不收口、疔疮痈肿。煎服15～30克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 鲜品煎服，治咯血、阿米巴痢疾、中暑。2. 鲜品加酒炒制，煎服，治痛经。3. 鲜品配湖广草煎服，治盆腔炎。4. 鲜品捣烂，加食盐或白酒敷，治疔疮肿毒、创伤出血、甲沟炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

革命菜（假茼蒿、野茼蒿）

【药名】假茼蒿。

【药用部位】菊科植物革命菜 *Gynura crepidioides* Benth.的全草，全年采收。

【识别特征】直立草本，高20～100厘米。茎有纵条纹，光滑无毛，叶互生，膜质，矩圆状椭圆形，顶端渐尖，基部楔形，边缘有重锯齿或有时基部羽状分裂，两面近无毛。头状花序排成圆锥状生于枝顶；总苞圆柱形，苞片2层，条状披针形，长约1厘米，边膜质，顶端有小束毛，基部有数片小苞片；花全为两性，筒状，粉红色，分枝顶端有线状被毛的尖端。瘦果狭圆柱形，赤红色，有条纹，被毛；冠毛丰富，白色。生于荒地、路旁、林下和水沟边。分布于江西、福建、广东、广西、云南等地。

【性味功效】辛、苦，微温。祛风化湿、行气止痛。治感冒、风湿痹痛、痢疾、疟疾、腹痛、烫伤、皮肤瘙痒。煎服9～15克（鲜品30～60克）。外用适量，煎洗。

【应用】1. 单味煎服，治四时感冒、下痢。2.鲜品捣敷或煎洗，治烫伤、皮肤瘙痒。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

千里光（九里光、九里明）

【药名】千里光。

【药用部位】菊科植物千里光*Senecio scandens* Buch.-Ham.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高2～5米。茎木质细长，叶互生；叶片椭圆状三角形或卵状披针形，先端渐尖，基部楔形至截形，边缘具不规则齿，两面均有软毛。头状花序顶生，排列成伞房花序状；总苞圆筒形；苞片披针形或狭椭圆形，先端尖，无毛或少有细毛；舌状花黄色，雌性，先端3齿裂；管状花，黄色，两性，先端5裂。瘦果圆筒形。花期10月至翌年3月，果期2～5月。生于路旁及旷野间。分布于我国华东、中南、西南各地及陕西。

【性味功效】苦，寒。清热、解毒、杀虫、明目。治各种急性炎症性疾病、风火赤眼、目翳、伤寒、菌痢、黄疸、流感、败血症、痈肿疖毒、癣疮、丹毒、湿疹、烫伤。煎服15～30克（鲜品30～60克）。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 单味煎熏洗，治风火眼痛、趾间湿痒、肛门痒、阴道痒；煎服，治流感、痈疽疮毒；泡水饮，预防中暑。2. 配蒲公英、水线草、积雪草、白茅根、叶下珠、金银花藤叶，治各种急性炎症疾病、菌痢、毒血症、败血症、轻度肠伤寒、绿脓杆菌感染。3. 配白芨，治烫伤。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

豨莶（希仙、金耳钩）

【药名】豨莶草。

【药用部位】菊科植物豨莶 *Siegesbeckia orientalis* L.的全草，夏季开花前采收。

【识别特征】一年生草本，高1.2米。茎方形，上部密被短柔毛；叶对生；叶片阔卵状三角形至披针形，边缘有浅裂及粗齿，两面被长柔毛。头状花序排列成圆锥状，顶生或腋生，花黄色，总花梗密被长柔毛和腺毛；总苞片2层，外层苞片5枚，线状匙形，内层苞片10～12枚，倒卵形兜状；花黄色，舌状花雌性，先端3浅裂；管状花两性；雄蕊5；柱头2裂。瘦果黑色四棱形。花期8～10月，果期9～12月。生于山坡、林缘及路旁。分布于我国南部各地。

【性味功效】苦，寒，有小毒。祛风湿、利筋骨、降血压。治四肢麻痹、筋骨疼痛、腰膝无力、疟疾、急性肝炎、高血压病、疔疮肿毒、外伤出血。煎服9～30克（大剂量30～60克）；捣汁或入丸、散服。外用适量，捣敷、研末撒或煎熏洗。虚寒无风湿者不宜用。

【应用】1. 单味煎服，治肢体麻木、腰膝酸痛、二便燥结、疟疾。2. 捣敷，治虫、蛇及狗咬伤。3. 配山栀子、三叶鬼针草，治急性黄疸型传染性肝炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

金腰箭（苦草）

【药名】金腰箭。

【药用部位】菊科植物金腰箭 *Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn.的全草。夏季采收。

【识别特征】 一年生草本，高30～70厘米，常分枝。叶对生；叶片卵形，顶端急尖，基部急狭成叶柄，有3主脉，边缘有小齿，上面粗糙，被伏毛。头状花序小，直径约7毫米，数个聚生于叶腋；总苞片卵形或矩圆形，数枚，最外层1～2枚叶状；内层干燥，纸质，花托小，有干膜质托片，花异型，外围花舌状，雌性，1～2层，黄色，舌片2～3齿裂；中央的花两性，少数，筒状，4齿裂。舌状花的瘦果扁平，有2翅，翅撕裂状；筒状花的瘦果扁平或三角形，常有小突点，角顶有芒刺。生于旷地或耕地上。分布于云南、广东等地。

【性味功效】苦，凉。清热解暑，凉血散毒。治斑疹大热，感冒发热；外用治疮疖肿毒，疥疮。煎服9～15克。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 单味煎服，治感冒高热。2. 捣敷，治疮疖肿毒；煎洗，治疥疮瘙痒。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

蒲公英（黄花地丁）

【药名】蒲公英。

【药用部位】菊科植物蒲公英 *Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz. 的全草。开花前采收。

【识别特征】多年生草本。根垂直。叶莲座状平展，矩圆状倒披针形或倒披针形，羽状深裂，侧裂片4～5对，矩圆状披针形或三角形，具齿，顶裂片较大，戟状矩圆形，羽状浅裂或仅具波状齿，基部狭成短叶柄，披疏蛛丝状毛或几无毛。花葶数个，与叶多少等长，上端被密蛛丝状毛。总苞淡绿色，内层总苞片长于外层；舌状花黄色，瘦果褐色，先端有喙；冠毛白色。花期4～5月，生于田野、路旁。分布于我国东北、华北、华东、华中、西北、西南各地。

【性味功效】甘、苦，寒。清热解毒、消痈散结。治上呼吸道感染、结膜炎、流行性腮腺炎、急性乳腺炎、胃肠炎、痢疾、肝炎、胆囊炎、泌尿系统感染、痈疖疔疮。煎服9～24克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 鲜品捣敷，治流行性腮腺炎。2. 配地耳草、半边莲各15克，泽兰、青木香各9克，煎服，治急、慢性阑尾炎。3. 配酒酿煎服，治慢性胃炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

夜香牛（伤寒草、消山虎）

【药名】伤寒草.

【药用部位】菊科植物夜香牛 *Vernonia cinerea* (L.) Less.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】一年生草本，高20～80厘米。茎直立，少分枝，稍被灰白色短毛，有纵行条纹。叶互生；叶片披针形至卵形或倒卵形，先端钝或短尖，基部楔形，边缘有浅齿或波状齿，背脉明显，全株深绿色。头状花序，排列成疏散的伞房状圆锥花序；总苞较花短，总苞片锐尖，小花约20朵，两性，全为管状花，淡紫红色。瘦果圆柱形，有线条，披毛，冠毛白色。花期全年。生于旷地，分布于福建、广东、广西等地。

【性味功效】苦、微甘，凉。清热、除湿、解毒。治外感发热、急性黄疸型肝炎、湿热腹泻、疔疮肿毒。煎服9～15克（鲜品30～60克）。外用适量，捣敷。

【应用】配豨莶草、四叶萍、酢浆草各12克，益智仁6克，煎服，治神经衰弱。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

茄叶斑鸠菊（斑鸠木）

【药名】斑鸠木。

【药用部位】菊科植物茄叶斑鸠菊 *Vernonia solanifolia* Benth.的叶、根或全草。全年采收。

【识别特征】灌木或乔木，茎长达数米。小枝开展，密被黄褐色茸毛或绵毛。叶互生，卵形或矩圆状卵形，顶端渐尖或短尖，基部圆形或近心形，全缘或有疏钝齿，侧脉7～9对，上面有密贴生短毛，下面有密茸毛；叶柄粗壮，有密茸毛。头状花序多数，在叶腋或枝端排成复伞房状；总苞半球形；总苞片4，椭圆形或矩圆形，极钝，外面被密绵毛；花筒状，淡紫色。瘦果具4～5棱，无毛；冠毛淡黄色，2层，外层极短。生于林缘或疏林中，攀缘于乔木上。分布于广东、广西等地。

【性味功效】苦，微寒。祛风湿，止痒，治产后风湿骨痛，皮肤痕痒。全草：治痧气、肚痛、肠炎。

【应用】1. 叶煎洗；根浸酒服，治风湿。2. 梗煎水加醋洗，治皮肤痕痒。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

苍耳（牛虱子、痴头猛）

【药名】苍耳子。

【药用部位】菊科植物苍耳 *Xanthium sibiricum* Patr. ex Widd.的成熟果实。秋季采收。

【识别特征】一年生草本，高30～90厘米。全体密被白色短毛，茎直立。单叶互生；具长柄；叶片三角状卵形或心形，通常3浅裂，两面均有短毛。头状花序顶生或腋生，花单性，雌雄同株；雄花序球状，总苞片1层；花托长圆形；花冠管状，先端5裂；雄蕊5，花药近于分离，花丝联合；雌花序卵形，总苞片2～3层，外层10或更多，内层2，椭圆形，结合成一个囊状体，表面有刺，先端具2喙，含小花2，无花冠，子房下位，柱头2深裂。瘦果2，纺锤形，包在有刺的总苞内。花期7～10月，果期8～11月。生于荒坡草地或路旁。分布于我国各地。

【性味功效】甘，温，有毒。散风、止痛、祛湿、杀虫。治风寒头痛、鼻渊、齿痛、风寒湿痹、四肢挛痛、疥癞、瘙痒。煎服3～10克，须打破，外用适量。

【应用】1.单味捣末煎服，治风湿痹痛、四肢拘挛。2.配辛夷、香白芷、薄荷，治鼻流浊涕不止。3.配白菊花，治诸风眩晕、头痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

菊科

黄鹌菜（黄花菜、野芥菜）

【药名】黄鹌菜。

【药用部位】菊科植物黄鹌菜 *Youngia japonica* (L.) DC.的全草。春、秋季采收。

【识别特征】一年生或二年生草本，高20～80厘米。茎自基部抽出一至数枝，直立。基部叶丛生，倒披针形，提琴状羽裂，顶端裂片大、先端钝，边缘有不整齐的波状齿裂；茎生叶互生，稀少，通常1～2，叶片狭长，羽状深裂。头状花序小而多，排列成聚伞状圆锥花丛；总苞片2层，外层5枚，三角状或卵形，内层约8枚，披针形；花冠黄色，边缘为舌状花，中心为管状花。瘦果棕红色，具棱11～13，冠毛白色。花期4～5月。生于路边荒野。分布于我国长江以南各地及陕西。

【性味功效】甘、微苦，凉。清热、解毒、消肿、止痛。治感冒、咽痛、乳腺炎、结膜炎、疮疖、尿路感染、白带、风湿性关节炎。煎服9～15克。外用适量，捣敷或捣汁含漱。

【应用】1. 单味煎服，治肝硬化腹水。2. 鲜品捣汁酌加醋含漱，治咽喉炎。3. 水煎酌加酒服，渣捣烂加热敷，治乳腺炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

报报花科

星宿菜（大田基黄、红根草）

【药名】星宿菜。

【药用部位】报春花科植物星宿菜*Lysimachia fortunei* Maxim.的全草。4～8月采收。

【识别特征】多年生柔弱草本，高30～70厘米。茎常分枝，有黑色细点，基部带红色。叶互生；阔披针形或倒披针形，先端渐尖，基部渐狭，近于无柄，表面具黑褐色腺体。花序长总状，稍有腺毛；苞片三角状披针形；萼5裂，裂片椭圆状卵形，先端钝尖，边缘有缘毛，中部有黑色点；花冠白色，喉部有短腺状毛，裂片5，倒卵形，先端钝尖，背面有黑色点；雄蕊5，着生于花冠中部，花丝短，有腺状毛；花柱较雄蕊短。蒴果球形。花期7月，果熟期9月。生于水边、路旁、湿地。分布于我国华东和中南各地。

【性味功效】苦、涩，平。活血、散瘀、利水、化湿。治跌打损伤、关节风湿痛、妇女经闭、乳痈、瘰疬、目赤肿痛、水肿、黄疸、疟疾、痢疾。煎服9～15克。外用适量，捣敷或煎熏洗。

【应用】1. 单味煎服，治目赤肿痛，遍身水肿，疟疾，治中暑腹痛吐泻、感冒遍身酸疼、月经不调、小便不利。2. 配野南瓜根、大青根、白茅根、精肉，治黄疸型肝炎。3. 配冬蓼根、南风藤，治关节风湿痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

车前科

车前（牛舌菜）

【药名】牛前草。

【药用部位】车前科植物车前 *Plantago asiatica* L.的种子、全草。全草夏、秋季采收；种子秋季采收。

【识别特征】多年生草本，连花茎高50厘米。根状茎短，多须根。叶根生，具长柄；叶片卵形或椭圆形，全缘或呈不规则波状浅齿。穗状花序为花茎的2/5～1/2，花淡绿；花萼4，基部稍合生；花冠小，膜质，花冠管卵形，先端4裂；雄蕊4，与花冠裂片互生；雌蕊1，花柱1，线形，有毛。蒴果卵状圆锥形。花期6～9月，果期7～10月。生于山野、路旁、花圃、菜圃以及池塘、河边等地。分布于全国各地。

【性味功效】甘，寒。清热利水、祛痰止咳、明目。治小便不通、淋浊、带下、暑湿泻痢、咳嗽多痰、湿痹、目赤障翳。煎服15～30克；或入丸、散服。外用适量，煎洗或研末撒。

【应用】1. 单味煎服，治百日咳、小便不通、疟腮。2. 配鱼腥草，煎服，治高血压。3. 种子配川黄柏、白芍药、甘草，治小便热秘不通。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

桔梗科

金钱豹（土党参）

【药名】土党参。

【药用部位】桔梗科植物金钱豹 *Campanumoea javanica* Bl.的根。秋季采收。

【识别特征】多年生缠绕草本，主根肥大，肉质，米黄色，须根少。茎细弱，浅绿色，光滑无毛。单叶对生，卵圆状心形，先端尖，边缘有钝锯齿，基部深心脏形，两面无毛；叶柄几与叶片等长。花钟状，单生于叶腋，两性；萼片5，披针形或卵状披针形，基部稍联合；花冠淡黄绿色，有紫色条纹，裂片5，向外反卷；雄蕊5，花丝分离；雌蕊1。浆果半球形而扁；种子多数。花期8～9月。生于低山区的向阳坡地上。分布于我国南部和西南部。

【性味功效】甘、微苦，温。健脾补肺、祛痰止咳。治虚劳内伤、肺虚咳嗽、脾虚泄泻、乳汁不多、小儿疳积、遗尿。煎服9～15克。

【应用】1.配大枣煎服，治脾虚泄泻。2.配百合、尖贝、百部、莲子、甜杏仁，治肺虚咳嗽。3.配白背叶根、海螵蛸、刺苋菜，治白带（气虚症）

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

半边莲科

半边莲（急解索、半边菊）

【药名】半边莲。

【药用部位】半边莲科植物半边莲 *Lobelia chinensis* Lour.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生矮小草本，高5～15厘米。全株光滑无毛，有乳汁。根细圆柱形，淡黄白色。茎细弱匍匐，上部直立。叶互生，无柄；叶片条形或条状披针形，全缘或有疏齿。叶腋开单生淡紫色或白色小花；花冠基部合成管状，上部向一边5裂展开，中央3裂片较浅，两侧裂片深裂至基部；雄蕊5，花丝基部分离，花药彼此连合，围抱柱头，花药位于下方的两个有毛，上方的3个无毛；子房下位。蒴果顶端2瓣开裂；种子细小，多数。花期5～8月。生于稻田岸畔、沟边或阴湿的荒地。分布于我国华东和中南各地。

【性味功效】甘，平。利水、消肿、解毒。治黄疸、水肿、臌胀、泄泻、痢疾、蛇伤、疔疮、肿毒、湿疹、癣疾、跌打扭伤肿痛。煎服15～30克；或鲜品捣汁服。外用适量，捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治湿热泄泻、晚期血吸虫病腹水、肾炎水肿。2. 配白茅根，治黄疸、水肿、小便不利。3. 配金钱草、大黄、枳实、神曲、麦芽、砂仁，治脘腹臌胀。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

半边莲科

铜锤玉带草（小铜锤、地钮子、地石榴）

【药名】铜锤玉带草。

【药用部位】半边莲科植物铜锤玉带草 *Pratia begonifolia* (Wall.) Lindl.的全草　夏季采收。

【识别特征】一年生匍匐草本，长30～50厘米。茎呈方形，绿色带紫，有短柔毛，节处生根，肉质。单叶互生，具短柄；叶片圆形至心状卵圆形，先端钝，基部心脏形，边缘有粗锯齿，上面绿色，下面淡绿色；叶脉掌状，5～7条，叶面脉上疏生短毛，叶背脉隆起，上被长柔毛。花小，淡紫色，单生于叶腋或与叶对生；花萼基部合生，壶状，萼齿5裂，裂片狭长披针形，边缘有肉刺；花冠左右对称，二唇形，上唇2裂，下唇3裂；雄蕊5，着生于花冠管上；子房下位，2室，柱头2裂。浆果椭圆形，紫蓝色，萼齿宿存，内藏多数种子；种子细小，紫红色，卵圆形。花期4～5月。生于阴湿田坎边，或山林阴处。分布于西南、华南、华中和华东等地。

【性味功效】甘、苦，平。祛风利湿，活血，解毒。治风湿疼痛，跌打损伤，乳痈，无名肿毒。煎服9～15克；或研末服1～1.5克。外用适量，捣敷。

【应用】1.单味煎服，治风湿疼痛、月经不调、子宫脱垂。2.捣敷，治跌打损伤、骨折。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茄科

酸浆（灯笼草、天泡草）

【药名】酸浆、锦灯笼。

【药用部位】茄科植物酸浆*Physalis alkekengi* L. var. *franchetii* (Mast.) Mak. 带宿萼的果实或全草。夏季采收。

【识别特征】多年生草本，高1米，茎直立，多单生，不分枝，表面具棱角，叶互生；叶片卵形至广卵形，先端急尖或渐尖，基部楔形或广楔形，边缘具稀疏不规则缺刻，或呈波状。花单生于叶腋，具梗；花白色；花萼绿色，钟形，先端5裂；花冠钟形，5裂；雄蕊5，花药长圆形，花丝丝状；花柱线形，柱头细小。浆果圆球形，成熟时呈橙红色；宿存花萼在结果时增大，厚膜质鼓胀如灯笼，具5棱，橙红色或深红色，疏松地包围在浆果外面。花期7～10月，果期8～11月。生于路边及田野草丛中，也有栽培作观赏植物者。分布于我国南北各地。

【性味功效】酸，寒。清热、解毒、利尿。治骨蒸劳热、咳嗽、咽喉肿痛、黄疸、水肿、天泡湿疹。煎服6～9克；或研末服，外用适量，煎洗、捣敷或研末吹喉。脾虚泄泻者及孕妇忌用。

【应用】1. 全草单味煎服，治小儿小便不通。2. 全草配茅草根、五谷根，治黄疸、利小便。3. 宿萼配龙胆、红茯苓、香樟根、生车前草，治尿结石。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茄科

苦蘵（灯笼草、灯笼泡草）

【药名】苦蘵。

【药用部位】茄科植物苦蘵 *Physalis pubescens* L.的全草。夏季采收。

【识别特征】一年生草本，高25～60厘米。茎斜卧或直立，多分枝，有毛或近无毛。叶互生，卵圆形或长圆形，先端短尖，基部斜圆形，全缘或具不规则浅锯齿。花单生于叶腋，萼钟状，先端5裂，裂片披针形或近三角形；花冠钟形，淡黄色，5裂；雄蕊5，花药矩圆形；花柱线形，柱头具不明显2裂片。浆果圆球形，光滑无毛，黄绿色；宿萼在结果时增大，如灯笼，具5棱，绿色，有细毛。花期7～9月，果期8～10月。生于路边及田野草丛中。分布于我国南北各地。

【性味功效】苦，寒。清热解毒、利尿止血、消肿散结。治咽喉肿痛、肺痛、腮腺炎、小便不利、血尿、牙龈肿痛、天泡疮。煎服15～30克，外用适量，捣敷，煎水含漱或熏洗。

【应用】1. 煎服，治咽喉肿痛，肺热咳嗽，湿热黄疸，热淋。2. 煎水含漱，治牙龈肿痛。3. 煎洗，治天泡疮。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茄科

白英（白毛藤、毛风藤）

【药名】白毛藤。

【药用部位】茄科植物白英*Solanum lyratum* Thunb.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生蔓性草本。茎长5米，灰褐色至灰黄色。叶互生；叶片长卵形或卵状长圆形，略呈琴状，生于枝梢的叶不分裂，两面都密生白色长柔毛。疏松聚伞花序与叶对生；小花白色，萼5浅裂；花冠辐状5深裂，裂片披针形，向外反折；雄蕊5，花药向上孔裂；雌蕊1，花柱细长。浆果球形，熟时红色，基部有宿萼。花期9～10月，果期11月。生于路边、山野或灌木丛中。分布于全国大部分地区。

【性味功效】甘、苦，寒。清热、利湿、祛风、解毒。治疟疾、黄疸、水肿、淋病、风湿关节痛、丹毒、疔疮。煎服15～30克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 鲜品煎服，治肝硬化初期、小儿肝热。2. 配忍冬、五加皮，治风湿关节痛。3. 配神仙对坐草、大黄陈、三白草、车前草，治黄疸初起。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

茄科

少花龙葵（白花菜、古钮菜）

【药名】古钮菜。

【药用部位】茄科植物少花龙葵 *Solanum nigrum* L.的全草。春季至秋季采收。

【识别特征】一年生草本，高约1米。茎直立，有分枝。叶互生，叶片卵形至矩圆形，先端渐尖，基部短尖，近全缘或有不规则角状粗齿，两面秃净或近秃净。花序腋生，花2～5，排列成伞形花序；萼绿色，5裂，裂片卵形。花冠白色，辐状，裂片卵状三角形；雄蕊5，着生于冠喉上。浆果球形，熟时黑色。花期夏、秋季。分布于我国南方各地。

【性味功效】微苦，寒。清热、解毒、利尿、散血、消肿。治痢疾、淋病、目赤、喉痛、疔疮。煎服9～15克；或捣汁服。外用适量，捣敷。

【应用】1. 鲜品煎服，治痢疾、热淋、高血压。2. 鲜品捣汁，加第二次米泔水、少许食盐和醋，调服，治咽喉肿痛。3. 鲜品煎服，另捣烂蜜调敷，治疔疮。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

旋花科

马蹄金（黄胆草、小金钱草）

【药名】小金钱草。

【药用部位】旋花科植物马蹄金*Dichondra repens* Forst.的全草，4～6月采收。

【识别特征】多年生草本，长30厘米，茎匍匐，纤细，节处着生不定根，全体通常被“丁”字形着生的毛。叶互生，圆形至肾形，先端圆形，有时微凹，基部深心形，全缘，绿色，叶背秃净或被疏柔毛。花小，单生于叶腋，梗短于叶柄；萼5裂，裂片卵形，绿色，宿存；花冠钟状，白色；雄蕊5。蒴果近球形。花期4月，果期7～8月。生于路边、草丛、墙下等半阴湿处。分布于我国西南至华东各地。

【性味功效】苦、辛，凉。清热、解毒、利水、活血。治黄疸、痢疾、砂石淋痛、白浊、水肿、疔疮肿毒、跌打损伤。煎服6～15克。外用适量，捣敷或捣汁滴眼。

【应用】1. 单味煎服，治伤风感冒。2. 配满天星、金钱草、蒲公英，煎服，治膀胱结石及胆结石。3. 鲜品捣汁，冲酒或开水服，治中暑腹痛。4. 鲜品捣敷，治乳痈。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

旋花科

五爪金龙（五叶藤、五爪龙）

【药名】五爪龙。

【药用部位】旋花科植物五爪金龙 *Ipomoea cairica* (L.) Sweet 的根或茎叶。秋季采收。

【识别特征】多年生柔弱、秃净、缠绕藤本。茎灰绿色，常有小瘤体。叶互生；通常指状5深裂，几达基部，裂片椭圆状披针形，先端钝，但有小锐尖，全缘或最下一对裂片有时再分裂，两面均秃净，叶柄略长于叶，常有小瘤体。聚伞花序，花序柄短，有花1～3；萼绿色，先端极钝；花冠漏斗状，淡紫色，内面颜色较深；雄蕊5。蒴果，种子4，灰棕色，短而圆，背部两侧棱角有长绵毛。花期夏、秋季。常缠绕于竹篱上或棚架上，为阴蔽物。分布于广东、广西、福建等地。

【性味功效】甘，寒。清热、利水、解毒。治肺热咳嗽、小便不利、淋病、尿血、痈疽肿毒。煎服6～9克（鲜品15～30克）。外用适量，捣敷。

【应用】茎叶煎汤加冰糖炖服，治诸淋。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

玄参科

毛麝香（麝香草、凉草）

【药名】毛麝香。

【药用部位】玄参科植物毛麝香 *Adenosma glutinosum* (L.) Druce 的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高 30～60 厘米。揉之有类似麝香的气味。茎粗壮，基部圆柱形，上部四棱形，中空。叶对生；叶片披针状卵形至宽卵形，边缘有钝齿，两面密毛，下面有明显而稠密的橙色腺点。花单生叶腋，或在茎枝顶端集成总状花序；花萼钟形，顶端 5 裂，上面 4 片线形，下面一片披针形；花冠二唇形，紫红色或蓝紫色；雄蕊 4，2 强，上面一对的药室发育，2 室等长，下面一对退化成腺体状；花柱顶端膨大，柱头以下翅状。蒴果卵形。花期 7 月。生于山野草丛中。分布于江西、福建、广东、广西及云南等地。

【性味功效】辛，温。解毒止痒、祛风止痛、散瘀消肿。治风湿骨痛、气滞腹痛、疮疖肿毒、皮肤湿疹、瘙痒、跌打损伤。煎服 9～15 克。外用适量，煎洗或鲜品捣敷。

【应用】1. 配洋金花，治哮喘。2. 配苦楝皮、甘蔗，治臁鼠咬伤。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

玄参科

母草（四方草、四方拳草）

【药名】母草。

【药用部位】玄参科植物母草*Lindernia crustacea* (L.) F. Muell.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】一年生草本，高10～20厘米，无毛或疏被短毛。茎多分枝；披散，四方形。叶有短柄，叶片卵形至卵圆状三角形，顶端钝或短尖，基部宽楔形至平截形，边缘有三角状锯齿。花单生叶腋，在茎顶端的集成少花的总状花序；苞片和叶逐渐过渡；花萼坛状，膜质；有不明显的5棱，裂片齿状，果期不规则深裂；花冠紫色，上唇直立，2浅裂，下唇3裂，全育雄蕊4，前2枚的花丝附属物丝状。蒴果椭圆形，与宿存花萼等长，种子有纵横排列整齐的瘤突。花期7～8月。生于稻田及低湿处。分布于我国秦岭、淮河以南地区及云南以东各地。

【性味功效】甘、淡，平。清热解毒、凉血消肿。治肠炎、胃痛、细菌性痢疾、疔疮、疖肿、毒蛇咬伤。煎服30～60克。外用适量，捣敷。

【应用】鲜品煎服，治急、慢性细菌性痢疾。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

玄参科

冰糖草（野甘草、米碎草）

【药名】冰糖草。

【药用部位】玄参科植物冰糖草 *Scoparia dulcis* L.的全草，全年采收。

【识别特征】多年生草本或半灌木，高25～80厘米。茎有棱，光滑无毛。叶小，对生及轮生，有短柄；叶片披针形至椭圆形或倒卵形，常近菱形，先端渐尖，基部渐窄下延成柄，上部边缘有单锯齿或重锯齿，枝叶嚼之有甜味，故名“冰糖草”。花白色，单生或成对生于叶腋，无小苞片；萼片4，分生，卵状长圆形，具睫毛；花冠辐状，4深裂，喉部有长毛，裂片近等大；雄蕊4，花药箭形；花柱与雄蕊近等长，柱头截形或凹入。蒴果卵状至球形。花期5～8月。生于荒地及村边。分布于广东、广西、福建、台湾等地。

【性味功效】甘，凉。清热解毒、利尿消肿。治肺热咳嗽、暑热泄泻、脚气浮肿、小儿麻疹、湿疹、热痱、喉炎、丹毒。煎服15～30克（鲜品60～90克）。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 单味煎服，治脚气浮肿、肺热咳嗽。2. 配羊蹄草30克、陈仓米15克，煎服，治细菌性痢疾。3. 配薄荷9克、鱼腥草15克，煎服，治感冒咳嗽。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

爵床科

穿心莲（榄核莲、一见喜）

【药名】穿心莲。

【药用部位】爵床科植物穿心莲*Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees的全草。夏季采收。

【识别特征】一年生草本，高50～80厘米。茎四棱形，下部多分枝，节膨大。叶对生卵状矩圆形至矩圆状披针形，顶端略钝。总状花序顶生和腋生，集成大型圆锥花序；苞片和小苞片微小；花萼裂片三角状披针形，有腺毛和微毛；花冠白色而下唇带紫色斑纹，外有腺毛和短柔毛，二唇形，上唇微2裂，下唇3深裂，花冠筒与唇瓣等长，雄蕊2。蒴果扁，中有1沟，疏生腺毛，种子方形，有皱纹。全株味极苦。广东、海南、广西、福建有栽培。

【性味功效】苦，寒。清热解毒、消肿止痛。治急性菌痢、肠胃炎、感冒、流脑、气管炎、肺炎、百日咳、肺结核、肺脓疡、胆囊炎、高血压、鼻衄、疮疖痈肿、水火烫伤、毒蛇咬伤。煎服9～15克。外用适量。

【应用】1. 单味煎服，治细菌性痢疾、阿米巴痢疾、支气管炎、肺炎、百日咳。2. 配六月雪、大青根、栀子根、虎刺、阴行草，煎服，治胆囊炎。3. 鲜品嚼服，治咽喉炎。4. 配三棵针、金银花、野菊花、七叶一枝花，煎服，治蜂窝组织炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

爵床科

假杜鹃（蓝花草）

【药名】假杜鹃。

【药用部位】爵床科植物假杜鹃 *Barleria cristata* L.的全草。全年采收。

【识别特征】半灌木，高2米。直立、无刺、多分枝。叶椭圆形至矩圆形，长3～10厘米，顶端尖，两面有毛。花通常1～8，簇生于叶腋；小苞片条形，有毛，顶端具小尖刺，边疏具小刺或否；萼片4，两两相对，外面2片卵状椭圆形、顶端有小尖刺，边有刺状小齿，里面2片甚小，条形，白色；花冠青紫色或近白色，漏斗状，外面有微毛，裂片5，二唇形；雄蕊2，退化雄蕊2；蒴果；种子4，有微毛。生于干旱山坡或灌丛中。分布于广东、广西、福建等地。

【性味功效】甘、淡，凉，清肺化痰、止血截虐。治肺热咳血、便血、百日咳、疟疾。煎服9～15克。

【应用】1. 单味煎服，治肺热咳嗽、咳血。2. 配青蒿30克，煎服，治疟疾。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

爵床科

狗肝菜（猪肝菜、羊肝菜）

【药名】狗肝菜。

【药用部位】爵床科植物狗肝菜 *Dicliptera chinensis* (L.) Nees 的全草，全年采收。

【识别特征】一年或二年生草本，高30～80厘米，通常被毛。茎直立或披散，多分枝；幼茎具四棱，节膨大，单叶对生；叶片卵形、卵状矩圆形，先端急尖至渐尖，基部楔形，全缘；叶面脉上有柔毛，叶背脉上柔毛较少。花为顶生及腋生的圆头状或穗状聚伞花序，无总柄或有总柄；总苞片数枚，大于花萼，每花有1对倒卵形或圆形绿色苞片；花冠浅粉红色，管纤细，被柔毛，5裂，上2片深裂，裂片长约占花冠一半，二唇形；雄蕊2；雌蕊1，柱头2裂，蒴果短柱形，被短毛；种子坚硬，褐色，扁圆，花期10～11月，果期翌年2～3月。生于村边园中、草丛中，半阴生。分布于我国南方各地。

【性味功效】苦，寒。清热、凉血、利尿、解毒。治热病斑疹、便血、溺血、小便不利、肿毒疔疮。煎服30～60克，外用适量，捣敷或捣汁涂。

【应用】1. 单味煎服，治小儿痢疾、疔疮。2. 配野菊花，治目赤肿痛。3. 配犁头草，治疮疡。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

爵床科

白鹤灵芝（癣草）

【药名】白鹤灵芝。

【药用部位】爵床科植物白鹤灵芝 *Rhinacanthus nasutus* (L.) Lindau 的枝、叶。全年采收。

【识别特征】灌木。幼枝有毛；叶椭圆形，顶端尖或钝；聚伞花序紧缩，顶生或生茎上部叶腋而似圆锥状；苞片微小；花萼裂片5，条状披针形，两面生腺毛，花冠白色，高脚碟状，外面有短腺毛，花冠筒细长，二唇形，上唇披针形，顶端微凹，下唇深3裂；雄蕊2，着生花冠喉部，花丝外露；子房和花柱下部疏生柔毛。生于灌丛或疏林下。分布于广东、广西、云南等地。

【性味功效】甘、淡，平。润肺降火。治早期肺结核；外用治体癣、湿疹。煎服9～15克（鲜品30克）。外用适量，捣涂

【应用】1. 枝叶加冰糖煎服，治早期肺结核。2. 叶加煤油或75%酒精捣敷，治各种体癣、湿疹。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

爵床科

爵床（六角英）

【药名】六角英。

【药用部位】爵床科植物爵床 *Rostellularia procumbens* (L.) Nees 的全草。立秋后采收。

【识别特征】 一年生匍匐草本，高15～30厘米。茎方形，或具4～6棱，被灰白色细柔毛，节稍膨大。叶对生；叶片卵形至广披针形，全缘，先端尖，两面被短柔毛。穗状花序顶生或腋生；花小，萼片5，线状披针形或线形，苞片2；花冠淡红色或带紫红色，唇形，上唇先端2裂，下唇先端3裂较深；雄蕊2枚着生于花筒部；雌蕊1，有毛，花柱丝状。蒴果线形，淡棕色，表面上部具白色短柔毛；种子卵圆形而微扁，黑褐色，表面具网状纹凸起。花期8～11月。生于旷野草地和路边的阴湿处。分布于我国华东至西南各地。

【性味功效】咸、辛，寒。清热解毒、利咽止痛、利湿消滞。治感冒发热、咳嗽、喉痛、疟疾、痢疾、黄疸、肾炎浮肿、筋骨疼痛、小儿疳积、痈疽疔疮、跌打损伤。煎服15～30克（鲜品30～45克）。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 单味煎服，治感冒发热、咳嗽、喉痛。2. 配秦艽、陈皮、甘草，治酒毒血痢、肠红。3. 配地稔、凤尾草、海金砂等，治肾盂肾炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

爵床科

马蓝（南板蓝根、大青叶）

【药名】南板蓝根、大青叶。

【药用部位】爵床科植物马蓝 *Baphicacanthus cusia* (Nees) Bremek.的根茎及根、叶。根茎、根秋季采收；叶夏季采收。

【识别特征】多年生草本，灌木状，高1米。茎直立，节明显，有钝棱，上部多分枝，幼时有毛。叶对生；叶片倒卵形、长圆形至卵状长圆形，先端渐尖，基部渐狭，边缘有浅疏锯齿；上面无毛，下面幼时在脉上被褐色细柔毛。穗状花序顶生；花大，萼近5全裂，其中4裂线形，另1片较大；花冠管状漏斗形，淡紫色，管部甚长，5裂，裂片短阔；雄蕊4，2强；花柱细长。蒴果棒状；种子褐色，卵形，扁平。生于山地林缘较潮湿的地方。分布于广东、广西、云南等地。

【性味功效】苦，寒。清热利咽、凉血解毒。治流感、流脑、乙脑、肺炎、丹毒、热毒发斑、神昏吐衄、咽肿、痄腮、火眼、疮疹。煎服15～30克；或入丸、散服。外用适量，煎汤熏洗。

【应用】1. 单味煎服，治肝炎。2. 配青黛、山慈姑、连翘、甘草，预防流行性腮腺炎。3. 大青叶配茵陈、秦艽、天花粉，治热甚黄疸。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

白棠子树（小叶鸦鹊饭、山指甲）

【药名】白棠子树。

【药用部位】马鞭草科植物白棠子树 *Callicarpa dichotoma* (Lour.) K. Koch 的全株。夏、秋季采收。

【识别特征】灌木，高1～2米。小枝带紫红色，略有星状毛。叶片倒卵形，顶端急尖，基部楔形，边缘上半部疏生锯齿，两面无毛，下面有黄色腺点。聚伞花序纤弱，2～3次分歧，总花梗长为叶柄的3～4倍；苞片条形；花萼杯状，顶端有不明显的裂齿或近无齿；花冠紫红色，无毛；药室纵裂；子房无毛，有腺点。果实球形，紫色。生于溪边和山坡灌木丛中。分布于广东、广西、福建等地。

【性味功效】甘、苦，凉。凉血解毒，清热利湿。治急性结膜炎、肺结核咯血、指间流脓、湿热腹泻、肝胆郁火、目赤胀痛、无名肿毒、疮疡疖肿。煎服6～9克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治咯血、泻泄、胸胁痛。2. 鲜叶捣敷，治疮疡肿毒。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

尖尾枫（尖尾风、粘手风）

【药名】尖尾枫。

【药用部位】马鞭草科植物尖尾枫 *Callicarpa longissima* (Hemsl.)Merr.的叶，全年采收。

【识别特征】灌木至小乔木。小枝四方形，除节上有一圈柔毛外，其余都无毛。叶片披针形至狭椭圆形，边缘有不明显的细锯齿或近全缘，上面仅在脉上有毛，下面无毛，有明显或不明显的金黄色腺点，干时下面呈小窝状。聚伞花序腋生，5～7次分歧，总花梗长于叶柄或近等长；苞片条形，花萼无毛，萼齿不明显；花冠无毛，紫红色。果实扁球形，有红色腺点。生于山坡、山谷、村庄附近或旷野中。分布于台湾、福建、江西、广东、广西和四川。

【性味功效】辛、微苦，温。散瘀止血、祛风止痛。治咯血、吐血、风湿疼痛、外伤出血。煎服9～30克。外用适量，研粉敷。

【应用】1. 研粉敷，治外伤出血。2. 煎服，治咯血、吐血。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

大叶紫珠

【药名】大叶紫珠。

【药用部位】马鞭草科植物大叶紫珠*Callicarpa macrophylla* Vahl的根、叶。根全年采收；叶夏、秋季采收。

【识别特征】灌木至小乔木。嫩枝密生灰白色长茸毛。叶片长椭圆形至椭圆状披针形，长10～23厘米，宽5～11厘米，顶端渐尖，基部楔形或钝圆，边缘有锯齿，上面有短毛，老时稍粗糙，下面有灰白色茸毛，两面有不明显金黄色腺点；叶柄长1～2厘米。聚伞花序5～7次分歧；花萼有星状毛，萼齿钝三角形，花冠紫红色。果实球形，紫红色，有腺点。生于海拔140～1 600米山坡路旁灌丛中。分布于我国华南及西南各地。

【性味功效】辛、苦，平。止血、止痛、散瘀消肿。治消化道出血、咯血、衄血、创伤出血、拔牙出血、跌打肿痛、风湿骨痛。煎服15～30克。叶外用，研末撒或捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治胃、十二指肠出血，肺热咯血。2. 叶研末撒，治创伤出血、拔牙出血。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

杜虹花（紫珠草、止血草）

【药名】杜虹花。

【药用部位】马鞭草科植物杜虹花 *Callicarpa pedunculata* R. Br.的叶。7～8月采收。

【识别特征】灌木。小枝密生黄色星状毛。叶片卵状椭圆形，顶端渐尖，基部楔形或钝圆，边缘有锯齿，上面有糙毛，下面密生黄褐色星状毛和金黄色透明腺点。聚伞花序腋生，5～7次分歧，总花梗密生黄褐色星状毛；苞片小；花萼顶端4裂，裂齿钝三角形，有星状毛和腺点；花冠淡紫色，上部有毛或无毛。果实蓝紫色，光滑，生于海拔400～800米山坡林边和溪边灌丛中。分布于我国华东至西南各地。

【性味功效】苦，平。活血、止血、除热、解毒。治吐血、咯血、衄血、便血、崩漏、创伤出血、痈疽肿毒、喉痹。煎服15～30克（鲜者30～60克）；或研末服，1～3克。外用适量，捣敷或研末撒。

【应用】1. 单味煎服，治一切咽喉痛、肠胃出血。2. 配鸡蛋清服，治咯血、衄血。3. 配冰糖，治跌打内伤出血。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

红紫珠（对节树）

【药名】红紫珠。

【药用部位】马鞭草科植物红紫珠 *Callicarpa rubella* Lindl.的叶、根。叶夏季采收；根秋季采收。

【识别特征】灌木，高1～3米。小枝有茸毛。叶倒卵形、倒卵状椭圆形或鞋底形，顶端渐尖，中上部较宽，基部心形或近耳形，两面都有毛，下面有黄色腺点；近无柄或有3毫米长的短柄。聚伞花序4～6次分歧；花萼有毛和腺点；花冠白色、粉红色至淡紫色，外面有细毛。果实紫红色。生于山坡路旁和溪边灌丛中。分布于我国华东至西南各地。

【性味功效】辛、苦，凉。清热、止血。治月经不调、吐血、尿血、痔疮出血、接骨、跌打。煎服15～30克。外用适量，研末敷。

【应用】1.叶单味煎服，治吐血、尿血；根单味煎服，治痔疮出血、吐血、尿血。2.叶单味研末撒，治外伤出血。3.配红杜鹃根，治月经不调。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

大青（路边青、猪屎青）

【药名】大青叶、大青根。

【药用部位】马鞭草科植物大青 *Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.的叶或枝叶、根。叶7～8月采收；根全年采收。

【识别特征】灌木，高3米。幼枝被柔毛。叶对生，长椭圆形至卵状椭圆形，顶端尖或渐尖，基部圆形或宽楔形，全缘，两面散生白色短毛。伞房状聚伞花序，顶生或腋生，花有柑橘香味；花萼钟状，粉红色，结果时增大，变紫红色；花冠白色，花冠筒顶端5裂，雄蕊4，稍2强；柱头2浅裂。果实卵圆形，成熟时蓝紫色。生于丘陵、平原、林边和路旁。分布于我国中部和南部。

【性味功效】苦，寒。清热、解毒、凉血、止血、祛风、除湿。治温病热盛烦渴、流行性感冒、急性传染性肝炎、菌痢、急性胃肠炎、急性肺炎、丹毒、吐血、衄血、黄疸、痢疾、喉痹、口疮、痈疽肿毒。煎服9～15克（鲜者30～60克）；或捣汁服。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 根单味煎服，治乙脑、流脑、感冒发热、腮腺炎、热痢、偏头痛。2. 根配淡竹叶（有小块根者）、桑叶、栀子，治麻疹后之烦乱、咳嗽痰多。3. 根配生石膏，治高热头痛等症。4. 叶配丹参、大枣，治无黄疸型肝炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

灯笼草（红灯笼、鬼灯笼）

【药名】鬼灯笼。

【药用部位】马鞭草科植物灯笼草 *Clerodendron fortunatum* L.的全株。全年采收。

【识别特征】小灌木，高0.3～1米。幼枝被黄褐色小柔毛。叶对生，具柄，纸质；叶片矩圆形至狭矩圆状披针形，先端渐尖，基部阔楔尖，边全缘或略作波浪形，近无净，背脉明显。聚伞花序腋生，有花5～9，密被黑褐色小毛；萼蓝紫色，有棱5，有门色腺点，裂片阔卵形而尖，结果时略增大；花冠近白色，管约与花萼等长，裂片5；雄蕊4，短，突出；雌蕊1，花柱突出，柱头2裂，核果球形，包藏于萼内。花期7月。生于丘陵或旷野。分布于福建、河南、广东、广西等地。

【性味功效】苦、微甘，寒。清热解毒、利咽止咳、活血止痛，煎服10～15克（鲜品30～60克）。外用适量，捣敷。

【应用】1.根皮与猪肉炖服，治血瘙身痒。2.煎汤加蜜调服，治感冒咳嗽、咽喉肿痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

臭茉莉（臭牡丹、山茉莉）

【药名】臭茉莉。

【药用部位】马鞭草科柏物臭茉莉 *Clerodendron fragrans* Vent.的根与叶。全年采收。

【识别特征】亚灌木，高1～2米，稍被毛。茎直立。叶对生；叶片阔卵形，有粗齿，被毛或近秃净，揉之有臭味。聚伞花序，顶生；花密生如绣球花，芳香，单瓣或重瓣，裂片5～6，红紫色，花冠白色或淡粉红色；雄蕊4，长伸出；雌蕊1，花柱突出，柱头2裂，子房上位，4室。肉质核果，有4槽纹，分裂为4小坚果，黑色带蓝色。花期晚春至初冬。生于溪旁或林下，也有栽培。分布于我国华东至西南各地。

【性味功效】苦、淡，平。祛风除湿、疗痔提肛、杀疥止痒、活血消肿。治风湿骨痛、脚气水肿、痔疮脱肛、痒疹疥疮、慢性骨髓炎。煎服15～30克，外用适量，煎水坐浴或熏洗。

【应用】1. 根单味煎服，治风湿性关节炎、腰腿痛、瘫痪、脚气水肿。2. 配艾根、大蓟根、金银花根等，治慢性骨髓炎。3. 配鸡炖食，理脚气、治脚痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

赪桐（状元红）

【药名】赪桐。

【药用部位】马鞭草科植物赪桐*Clerodendron japonicum* (Thunb.) Sweet的根、茎。8～9月采收。

【识别特征】落叶灌木，高1～3米。茎上密被细柔毛。单叶对生；叶片广卵圆形，边缘有锯齿，上面深绿，疏被短毛，下面密被小圆形鳞片。疏松聚伞花序，并形成圆锥花序，顶生；花萼红色，5深裂，裂片长披针形；花冠鲜红色；雄蕊4，插生于花冠筒之上，伸出；雌蕊1，长为雄蕊2倍，先端2裂，花柱细长，子房为不完全的4室，胚珠4枚。核果包于萼筒内，球形或倒卵形，果皮具汁，裂为2或4个小坚果。花期6～7月。生于山谷、村边、灌丛中。分布于我国华东、华南及西南地区。

【性味功效】甘，凉。祛风利湿、散瘀消肿。治腰肌劳损、跌打损伤、肺结核咳嗽、咯血；外用治疔疮疖肿。煎服（或水酒煎）9～15克（鲜品30～60克）；或研末服。

【应用】1. 根单味煎服，治肺热咳嗽、肺结核咯血。2. 鲜叶捣敷，治跌打损伤、疔疮疖肿。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

马缨丹（五色梅）

【药名】五色梅、五色梅花、五色梅根。

【药用部位】马鞭草科植物马缨丹*Lantana camara* L.的叶或带花叶的嫩枝、花、根。全年采收。

【识别特征】直立或半藤状灌木，高2米，有强烈臭气，全株被短毛。茎枝常有下弯钩刺。叶对生；叶片卵形或长圆状卵形，先端短渐尖，基部截形或楔形，稍偏斜，边缘有钝齿，上面粗糙被短刺毛，下面被刚毛。花序腋生，由多数无梗小花组成稠密的小伞形花序；小总苞片多数，卵状披针形；花冠高脚碟状，4～5裂，有红色、粉红色、黄色、橙黄色、白色等；雄蕊4，着生于花冠管中部；子房上位，花柱粗长，柱头偏于一侧，稍肥厚。核果球形，肉质，成熟时紫黑色。花、果期全年。我国各地庭园有栽培，在南方逸为野生。

【性味功效】苦，寒。清凉解毒、祛风解表、活血止血、利湿消肿、杀虫止痒。治肺痨吐血、伤暑头痛、腹痛吐泻、阴痒、湿疹、跌打损伤、痈肿、湿毒、疥癞、毒疮。煎服15～30克（鲜品30～60克）。外用适量，煎洗或鲜叶捣敷。

【应用】1. 鲜品煎洗，治皮炎、湿疹瘙痒。2. 叶或嫩枝配山芝麻，治感冒风热。3. 根配石膏，治风火牙痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

马鞭草（铁马鞭、风颈草）

【药名】马鞭草。

【药用部位】马鞭草科植物马鞭草 *Verbena officinalis* L. 的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高30～80厘米。茎四方形，叶对生，卵圆形至矩圆形，基生叶的边缘通常有粗锯齿和缺刻，茎生叶多数3深裂，裂片边缘有不整齐的锯齿，两面有粗毛。穗状花序顶生或腋生，每朵花有1苞片，苞片和萼片部有粗毛；花冠淡紫色或蓝色。果为蒴果，长约2毫米，外果皮薄，成熟时裂为4个小坚果。生于山脚路旁或村边荒地。分布几遍全国。

【性味功效】苦，寒。清热解毒、截虐杀虫、利水消肿、通经散瘀。治疟疾、血吸虫病、丝虫病、感冒、细菌性痢疾、肝炎、肝硬化腹水、肾炎水肿、尿道感染、月经不调、经闭、牙痛、白喉、咽喉肿痛。煎服15～30克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治牙痛、急性肝炎、白喉、感冒发热。2. 配鱼腥草、一枝黄花各15克。煎服，治盆腔炎。3. 配苏叶、青蒿各15克，煎服，治丝虫病。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

牡荆（五指柑、蚊子柴）

【药名】牡荆叶。

【药用部位】马鞭草科植物牡荆 *Vitex negundo* L. var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.的茎叶。夏季采收。

【识别特征】落叶灌木，高5米，有香气。嫩茎方形，密被细毛。叶对生；掌状5出复叶，中间3小叶披针形，先端长尖，基部楔形，边具粗锯齿；两面有细微油点，沿叶脉有短细毛，嫩叶背面毛较密；两侧小叶卵形。圆锥花序顶生，密被粉状细毛；萼钟状，5裂；花冠淡紫色，唇形，密生细毛，上唇2裂，下唇3裂；雄蕊4，2强；柱头2裂。浆果黑色，宿萼包被过半。花期6～7月。生于山坡、林下、路旁。分布于我国华东至西南各地。

【性味功效】辛、苦，平。祛风解表、除湿、杀虫、止痛。治风寒感冒、痧气腹痛吐泻、痢疾、风湿痛、脚气、流火、痈肿、足癣。煎服9～15克。外用适量，捣敷煎汤熏洗。

【应用】1. 鲜品煎服，治风寒感冒、急性胃炎、预防中暑。2. 和冰糖冲开水炖服，治久痢不愈。3. 鲜叶嚼服，治痧气腹痛吐泻。4. 配马尾松鲜叶、油茶子饼等量，煎汤熏洗，治足癣。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

马鞭草科

蔓荆（白背杨、白布荆）

【药名】蔓荆子。

【药用部位】马鞭草科植物蔓荆 *Vitex trifolia* L.的果实。秋季果熟时采收。

【识别特征】落叶灌木，高约2米，全体密被灰白色细茸毛。幼枝四棱形。叶对生，通常为3出复叶；小叶倒卵形或倒披针形，先端急尖或钝，基部楔形至近圆形，全缘，下面密被灰白色细茸毛，揉之有香气。聚伞状圆锥花序顶生；花小，萼钟形，上端浅裂；花冠管状，先端裂成二唇形，淡紫色，上唇2裂，下唇3裂；雄蕊4，伸出花冠外；柱头2裂。果实球形，褐色，稍带肉质，下半部为增大的宿萼包围。生于旷野、山坡、河边草丛及灌木丛中。分布于福建、台湾、广东、广西、云南等地。

【性味功效】苦、辛，微寒。疏散风热、清利头目。治风热感冒、正、偏头痛，牙痛，目赤肿痛，昏暗多泪，湿痹拘挛。煎服6～9克。浸酒或入丸、散服。外用适量，捣敷。

【应用】配紫苏叶、薄荷、白芷、菊花各9克，煎服，治感冒头痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

筋骨草（白毛夏枯草、金疮小草）

【药名】筋骨草。

【药用部位】唇形科植物筋骨草 *Ajuga ciliata* Bunge 的全草。春季至秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高 25～40 厘米。茎紫红色或绿紫色，嫩茎被灰白色长柔毛。叶对生，卵状椭圆形至狭椭圆形，两面略被糙伏毛。穗状轮伞花序多花，苞片叶状；萼漏斗状钟形，10 脉，齿 5，近相等；花冠紫色，具蓝色条纹，近二唇形，上唇直立，下唇伸延；雄蕊 4，2 强；花盘环状，前方具 1 指状腺体。小坚果矩圆状三棱形。生于草地、林下或山谷溪旁，分布于河北、山东，河南、山西、陕西、甘肃、四川、浙江、广东等地。

【性味功效】苦，寒。清热解毒、消肿止痛、凉血平肝。治上呼吸道感染、扁桃体炎、咽炎、支气管炎、肺炎、肺脓疡、胃肠炎、肝炎、阑尾炎、乳腺炎、急性结膜炎、高血压；外用治跌打损伤、外伤出血、痈疖疮疡、烧烫伤、毒蛇咬伤。煎服 15～60 克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 配大血藤、金银花、紫花地丁、野菊花、南五味子根、延胡索，煎服，治急性单纯性阑尾炎。2. 制成 30%～35% 煎剂内服，治胆道蛔虫继发性感染、阑尾脓肿。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

唇形科

瘦风轮（剪刀草）

【药名】剪刀草。

【药用部位】唇形科植物瘦风轮 *Clinopodium gracile* (Benth.) Matsum.的全草，6～8月采收。

【识别特征】一年生草本，高10～30厘米。茎细四棱形，基部匍匐，上部直立或斜上。叶对生，具柄；叶片卵形或菱形，中部叶最大，先端钝，基部宽楔形，边缘有锯齿。轮伞花序，单轮，稍成球状，腋生或数轮排成顶生总状花序；花萼管状，绿色，外面脉上有短毛，5齿裂；花冠唇形，淡红色或紫红色，下部管状，上唇圆形，顶端微凹，下唇3裂；雄蕊2，退化雄蕊2，形小，小坚果倒卵形，淡黄色，光滑。花期7～8月。生于路旁、草地。分布于我国中部及中南部。

【性味功效】苦、辛，凉。祛风散热、清热解毒、止血、散瘀消肿。治外感风热、头痛、咽喉肿痛、湿热泻痢、热毒血痢、妇女血崩、跌打损伤、瘀肿疼痛、乳痈、疔疮及隐疹、皮肤瘙痒。煎服15～30克（鲜品30～60克）。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1. 鲜品纱布包裹榨汁服，治白喉。2. 单味煎服，治产后咳嗽。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

唇形科

防风草（假紫苏、落马衣）

【药名】防风草。

【药用部位】唇形科植物防风草*Anisomeles indica* (L.) O. Ktze.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】一至二年生直立草本，高1～2米。分枝，被茸毛。茎4棱。单叶对生；叶片阔卵形至卵形，先端渐尖或短尖，边缘有不规则的齿，基部近圆形，两面均有茸毛，具细小腺点；花轮生，在下部为腋生，在上部可排到顶端而成长总状花序，密生或间断；萼管状，5裂；裂片三角状披针形，内外面均有短毛；花冠管状，粉红色，2唇，5裂齿，上唇直立，全缘，下唇阔，扩展，内面有短毛；雄蕊4，突出，花药连贴；雌蕊1，柱头2裂。小坚果圆形，黑褐色，平滑。花期9～10月，果期12月至翌年1月。生于荒地、旷野、村边草丛中，分布于广东、广西、云南、贵州等地。

【性味功效】辛、苦，温。祛风、除湿、解毒、止痛。治感冒身热、呕吐、腹痛、筋骨疼痛、疮疡、湿疹、痔疾。煎服3～15克（鲜品15～30克）。外用适量，煎洗或捣敷。

【应用】1. 单味煎，调食盐或醋洗患处，治湿疹。2. 配马鞭草，治痈肿。3. 配海州常山根，治高血压病。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

唇形科

益母草（四棱草、月母草）

【药名】益母草。

【药用部位】唇形科植物益母草*Leonurus heterophyllus* Sweet的地上部分。夏季花未开或初开时采收。

【识别特征】一年生或多年生直立草本。茎方形。叶对生；初生叶类圆形，叶缘浅裂，具长柄；茎中部叶3全裂，裂片线形，浅裂或不裂，几无柄。轮伞花序，生于上部叶腋；花冠唇形，紫红色或淡红色；雄蕊4，2强；子房上位4裂，柱头2裂。坚果棕色，三角形。花期6～8月，果期7～9月。生于山野荒地、路边、田梗、山坡、草地、溪边。分布于全国各地。

【性味功效】苦、辛，微寒。活血调经、利水消肿、清热解毒。治妇女血瘀的痛经、闭经、经行不畅、产后瘀阻腹痛、水肿、小便不利、跌打损伤、疮痈肿毒、皮肤痒疹、心血管疾病如冠心病等。煎服10～30克；或熬膏、入丸服。外用适量，捣敷或煎洗。孕妇忌服，血虚无瘀者慎用。

【应用】1. 单味煎服，治肾炎水肿、瘀血块结。2. 配延胡索，治痛经。3. 果实配枳壳，治子宫脱垂。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

唇形科

白苏（臭苏）

【药名】白苏。

【药用部位】唇形科植物白苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt.的地上部分。夏、秋季采收。

【识别特征】一年生草本，高30～200厘米。茎被长柔毛，叶片宽卵形或圆卵形，上面被疏柔毛，下面脉上被贴生柔毛；叶柄密被长柔毛。轮伞花序2花，组成顶生和腋生，偏向一侧，密被长柔毛的假总状花序，每花有1苞片；花萼钟状，下部被长柔毛，有黄色腺点，果时增大，基部一边肿胀，上唇宽大，3齿，下唇2齿，披针形，内面喉部具疏柔毛；花冠紫红色或粉红色至白色，上唇微缺，下唇3裂。小坚果近球形。野生于路旁，亦有栽培。分布于我国河北至长江流域及南方各地。

【性味功效】辛，温。解表、散寒、理气、消食。治感冒风寒、恶寒发热、咳嗽、气喘、食积、吐泻、冷痢。煎服4.5～9克；或研末服。外用适量，捣敷。

【应用】1. 茎叶加红糖炖服，治冷痢。2. 叶研末调白糖开水送服，治蛔虫病。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

唇形科

紫苏（香苏、尖紫苏）

【药名】紫苏梗、紫苏叶、紫苏子。

【药用部位】唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *acuta* (Thunb.) Kudo 的茎、叶、果实。夏、秋季采收。

【识别特征】一年生草本，高30～100厘米，具特异芳香，茎直立，紫色或绿紫色，圆角四棱形，全体被疏柔毛。叶对生，长卵形，先端长尖，基部楔形，下延至叶柄，具粗圆齿，两面均平坦，不皱，紫色而被毛。总状花序稍偏侧，顶生及腋生；花萼钟形，外面下部密生柔毛，先端唇形；花冠管状，先端二唇形，紫红色或淡红色，上唇2裂，裂片先端微凹，下唇3，两侧裂片近圆形，中裂片横椭圆形；雄蕊4，2强；柱头2裂。小坚果褐色至淡黄色，卵形，含种子1。花期6～7月，果期7～8月。全国各地均有栽培。

【性味功效】辛，温。发表、散寒、理气、和营。治感冒风寒、恶寒发热、咳嗽、气喘、胸腹胀满、胎动不安，并能解鱼蟹毒。煎服3～10克，不宜久煎。外用适量。

【应用】1. 果实、叶捣汁服，治食蟹中毒。2. 果实配白芥子、萝卜子，用治气喘咳嗽、食痞兼痰。3. 叶配防风、川芎、陈皮、甘草、生姜，治伤风发热。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

唇形科

广藿香（藿香）

【药名】广藿香。

【药用部位】唇形科植物广藿香 *Pogostemon cablin* (Blanco) Benth. 的地上部分。5～6月和9～10月采收。

【识别特征】多年生草本或半灌木，高0.3～1米，茎密被短柔毛。叶对生，叶片圆形或宽卵形，先端钝尖，基部楔形，边缘有粗锯齿，两面被短柔毛。轮伞花序多花密集，组成连续的假穗状花序，密被短柔毛，苞片及小苞片条状披针形，密被短柔毛；花萼筒状，外密被柔毛，内疏被毛，齿5，钻状披针形，长约为萼的1/3；花冠紫色，檐部4裂，前裂片向前伸；雄蕊4，外伸，花丝分离，中部具髯毛。小坚果近球形，稍压扁。原产于菲律宾；我国南方广泛栽培。

【性味功效】辛，温。解暑化湿、行气和胃。治中暑发热、头痛胸闷、食欲不振、恶心、呕吐、泄泻；外用治手、足癣。煎服6～12克。外用适量。

【应用】1. 配白术、茯苓、大腹皮、陈皮、桔梗、紫苏、甘草、半夏、厚朴、白芷，煎服，治头痛发热、胸腹胀痛、呕吐泄泻。2. 配黄精、大黄、皂矾，以米醋浸，患处在药液中浸泡，治手、足癣。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

唇形科

半枝莲（狭叶韩信草、并头草）

【药名】半枝莲。

【药用部位】唇形科植物半枝莲 *Scutellaria barbata* D. Don 的全草。花期采集。

【识别特征】一年生或多年生草本，高 15～50 厘米。茎下部匍匐生根，上部直立，四棱形，叶对生；叶片卵形至披针形，先端钝，基部楔形或近心形，全缘。轮伞花序顶生，集成偏侧总状花序；花萼二唇形，上唇背部有一盾状附属体，花冠落后封闭并增大；花冠唇形，浅蓝紫色，花冠管倾斜。雄蕊 4，不伸出；子房 4 裂，花柱顶端 2 裂。坚果小，卵形，有细瘤点，包围宿萼中。花期 5～6 月，果期 6～8 月。生于池沼边、田边或路旁潮湿处。分布于我国南部、西南部及中部各地。

【性味功效】辛、微苦，微寒。清热解毒、活血定痛、利湿、抗肿瘤。治吐血、衄血、血淋、赤痢、黄疸、咽喉疼痛、肺痈、疔疮、瘰疬、疮毒、痈肿、跌打刀伤、蛇咬伤。煎服 15～30 克（鲜品 30～60 克）；或捣汁服。外用适量，捣敷。血虚者不宜，孕妇慎服。

【应用】1. 单味煎服，治热性血痢、淋巴结核。2. 配红枣，治尿道炎。3. 配鱼腥草，治肺脓疡。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

唇形科

韩信草（耳挖草）

【药名】韩信草。

【药用部位】唇形科植物韩信草 *Scutellaria indica* L.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高12～28厘米。茎单生或数茎丛生，细瘦，方柱形，被微柔毛。叶草质至近纸质，心状圆形至卵圆形，顶端钝或圆，基部圆或多少呈心形，边缘有圆锯齿，两面被柔毛或糙伏毛。花蓝紫色，对生，多朵排成顶生总状花序；花萼钟状，二唇形，后裂片背部的圆形盾片结果时增大；花冠被微柔毛，冠管基部向前膝状弯曲，上部直伸，檐部二唇形，上唇盔状，微凹头，下唇裂片较大，卵圆形，中部缢缩；雄蕊4，2强；花柱着生于子房底，先端2裂。小坚果4个，卵形，藏于增大的宿存萼内。花期4～5月，果期6～9月。生于路边、山坡。分布于我国中部、东南部至西南部各地。

【性味功效】辛、苦，平。祛瘀止痛、止血、解毒。治跌打损伤、吐血、咳血、痈肿、疔毒、喉风、牙痛。煎服10～15克，外用适量。

【应用】1.单味煎服，治劳郁积伤、胸胁闷痛；鲜品绞汁服，治跌打损伤、吐血、咯血。2.配入地金牛，治牙痛。3.配猪小肠，治白浊、白带。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

唇形科

地蚕（土冬虫草、宝塔菜）

【药名】地蚕。

【药用部位】唇形科植物地蚕 *Stachys geobombycis* C. Y. Wu 的块茎。秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高30～60厘米。根状茎匍匐，其上密集须根及在顶端有串珠状肥大块茎。茎直立，四棱形，有倒生长毛。叶对生，叶片卵形或长椭圆形，先端锐尖，基部心形或近截形，边缘有粗大锯齿，两面被毛。穗状轮伞花序顶生，花4～8轮，每轮有花3～6朵；小苞片条形，具微柔毛；花萼狭钟状，外被具腺柔毛，10脉，齿5，三角形，具刺尖头。花冠淡紫红色，筒内具毛环，上唇直立，下唇3裂，中裂片近圆形。小坚果卵球形，黑色。野生于山坡、旷野、河边、地角、沟边。分布于我国中南地区。

【性味功效】甘，平。益肾润肺、滋阴补血、清热除烦。治肺结核咳嗽、肺虚气喘、吐血、盗汗、贫血、小儿疳积。煎服9～15克。

【应用】1. 配冰糖煎服，治虚痨久咳。2. 配小蓟煎服，治肺结核。3. 配辣椒根煎服，治哮喘。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

苦木科

鸦胆子（鸦胆、苦参子）

【药名】鸦胆子。

【药用部位】苦木科植物鸦胆子 *Brucea javanica* (L.) Merr.的果实。7～9月采收。

【识别特征】灌木或小乔木，高3米，全体均被黄色柔毛。单数羽状复叶，互生；小叶5～11，通常7，卵状披针形；长5～10厘米，宽2～4厘米，基部宽，楔形而常偏斜；顶端短渐尖，边缘有粗锯齿。圆锥花序腋生，雌雄异株；雄花序长15～25厘米，雌花序长为雄花序的1/2左右；花小；暗紫色；萼4裂，裂片卵形；花瓣4，长椭圆状披针形；雄蕊4，着生于花盘之外；子房4深裂；核果椭圆形，黑色，具突起的网纹。常见于山野或灌丛中。分布于我国南部。

【性味功效】苦，寒。杀虫、止痢、止疟。治阿米巴痢疾、疟疾；外用除疣、鸡眼。煎服10～15粒。外用适量，捣敷。

【应用】1.以胶囊或桂圆包裹，口服10～15粒，治阿米巴痢疾、疟疾。2.捣敷，治鸡眼、疣。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

苦苣苔科

蚂蝗七（石螃蟹、岩白菜）

【药名】蚂蝗七。

【药用部位】苦苣苔科植物蚂蝗七*Chitita fimbrisepala* Hand.-Mazz.的根茎。全年采收。

【识别特征】多年生草本，有长根状茎。叶都基生；叶片卵形、宽卵形或近圆形，稍偏斜，边缘有小牙齿，两面疏生伏毛，叶柄有伸展的毛。花葶1～4条，高10～20厘米；聚伞花序伞状，有花1～6朵；苞片条状披针形；花萼5裂近基部，裂片条状披针形，上部边缘有小齿；花冠紫色，外面疏生短柔毛，上唇2裂，下唇3裂；能育雄蕊2，花药连着，有髯毛，退化雄蕊2；子房密生短腺毛，柱头2裂。蒴果条形，密生短腺毛，熟时开裂。花期4～5月。生于山地林中岩石上潮湿处。分布于广东、广西、湖南、江西。

【性味功效】苦，凉。健胃消食、清热利湿、活血止痛。治小儿疳积、胃痛、肝炎、痢疾、肺结核咳血；外用治刀伤出血、无名肿毒、跌打损伤。煎服6～18克。外用适量，捣敷或研粉调水敷。

【应用】配山蚂蝗9克，与猪瘦肉水煎，食肉喝汤，治小儿疳积。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

小二仙草科

黄花小二仙草（锯仔草、铁锯草）

【药名】黄花小二仙草。

【药用部位】小二仙草科植物黄花小二仙草*Halorafis chinensis* (Lour.) Mer.的全草。夏季采收。

【识别特征】细弱分枝草本，高10～30厘米。茎近直立或披散，粗糙而多少披粗毛。叶近无柄，对生，条状披针形至矩圆形，边缘有小锯齿，两面均粗糙而多少被粗毛，茎上部的叶互生。圆锥花序顶生，为细瘦的总状花序及穗状花序组成；花两性，极小，近无柄；基部具一苞片；花萼4深裂，裂片披针状三角形，有黄白色、硬骨质的边缘；花瓣4，黄色，狭矩圆形；披有疏生粗毛；雄蕊8。核果极小，近球形，略粗糙，有8棱。生于荒山沙地上。分布于我国南部。

【性味功效】淡，凉。清热、利水、和胃化痰、散胸中积气、通经络、解毒。治胸部久积闷痛、咳嗽作痛、小便不利、食欲不振、毒蛇咬伤、肿毒疔疮。煎服9～15克。

【应用】1. 单味煎服，治咳嗽咽痛、小便不利。2. 鲜品捣敷，治毒蛇咬伤、肿毒疔疮。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

白花丹科

白花丹（白雪花、假茉莉）

【药名】白花丹。

【药用部位】白花丹科植物白花丹 *Plumbago zeylanica* L.的根和叶。秋季采收。

【识别特征】攀缘状亚灌木，高2～3米。茎多分枝，有细棱，节上带红色，光滑无毛。叶互生，叶柄基部扩大而抱茎；叶片纸质，矩圆状卵形至卵形，先端短尖或渐尖，基部渐狭，全缘或微波状，无毛。穗状花序顶生；花萼管状，具5棱，密被长腺毛，有粘性；花冠高脚碟状，白色或白而略带蓝色，花冠管纤弱，裂片5，广展；雄蕊5，与花冠分离。蒴果膜质，盖裂。花期夏季。生于阴湿山沟边或村边路旁。分布于我国南部各地。

【性味功效】苦，微温。有毒。祛风止痛，散瘀消肿。根治风湿骨痛、跌打肿痛、胃痛、肝脾肿大。煎服9～15克（久煎）。叶捣敷，治跌打肿痛、扭挫伤、体癣。

【应用】1.叶5片，配地耳草15～20克，松树二层皮、苦楝树叶各适量，捣烂加酒，炒后热敷（避开伤口），治关节扭伤，软组织挫伤。2.单味煎服，治肝炎、肝硬化。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

使君子科

使君子（留求子）

【药名】使君子。

【药用部位】使君子科植物使君子 *Quisqualis indica* L.的果实。8~9月果由绿变黑时采收。

【识别特征】落叶藤状灌木，高2~8米。嫩枝和幼叶有黄褐色短柔毛，叶对生，薄纸质，矩圆形、椭圆形至卵形，两面有黄褐色短柔毛，脉上尤多；叶柄下部宿存成硬刺状，亦被毛。穗状花序顶生，下垂；苞片早落；花两性；萼筒绿色，细管状，长7厘米，绿色，顶端5齿，具柔毛；花瓣5，矩圆形至倒卵状矩圆形，由白色变淡红色；雄蕊10，2轮排列；子房下位，果近橄榄核状，长2.5~4厘米，有5棱，熟时黑色，有1粒白色种子。生于山野林间，分布于湖南、江西、福建、台湾、广东、广西、云南、四川。

【性味功效】甘、温，有小毒。杀虫，治蛔虫病。煎服3~9克。

【应用】种子炒熟，儿童每岁1粒，成人10~15粒，空腹嚼服，治蛔虫病。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

紫茉莉科

光叶子花（簕杜鹃、叶子花、宝巾）

【药名】光叶子花。

【药用部位】紫茉莉科植物光叶子花 *Bougainvillea glabra* Choisy 的花，开花时采收。

【识别特征】攀缘灌木，茎粗壮，有腋生直刺。叶互生，纸质，卵形或卵状披针形，先端渐尖，基部楔形，全缘，下面无毛或微生柔毛。花顶生，常3朵簇生苞片内，花梗与苞片的中脉合生；苞片3枚，叶状，暗红色或紫红色，椭圆形，全缘，纸质；花冠管状，淡绿色，先端5齿裂。瘦果具5棱。花期冬春间。原产于巴西，在我国南部有栽培。

【性味功效】苦，涩，温。调和气血。治妇女赤白带下、月经不调。煎服9～15克。

【应用】单味煎服，治月经不调。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

紫茉莉科

紫茉莉（胭脂花、入地老鼠）

【药名】紫茉莉。

【药用部位】紫茉莉科植物紫茉莉*Mirabilis jalapa* L.的全草。根秋后采收；茎、叶全年采收。

【识别特征】一年生草本，高20～80厘米，无毛或近无毛；茎直立，多分枝。叶纸质，卵形或卵状三角形，顶端渐尖，基部截形或心形；叶柄长1～4厘米。花单生于枝顶端；苞片5，萼片状，长约1厘米；花被呈花冠状，白色、黄色、红色或粉红色，漏斗状，花被管圆柱形，上部稍扩大，顶端5裂，基部膨大成球形而包裹子房。果实卵形，黑色，具棱。全国各地有栽培。

【性味功效】甘、淡，凉。清热利湿、活血调经、解毒消肿。根治月经不调、白带、子宫颈糜烂、前列腺炎、泌尿系统感染、风湿关节酸痛。煎服9～15克，外用适量，捣敷或煎洗。治乳腺炎、跌打损伤、痈疖疔疮、湿疹。

【应用】鲜根捣烂，取汁滴咽喉，治扁桃体炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

安石榴科

石榴（安石榴、珍珠石榴）

【药名】石榴皮.

【药用部位】安石榴科植物石榴 *Punica granatum* L. 的果皮及根皮。秋季采收。

【识别特征】落叶灌木或小乔木，高2～7米. 幼枝常呈四棱形，顶端多为刺状。叶对生或近簇生，矩圆形或倒卵形，中脉在下面凸起 花1朵至数朵生于枝顶或腋生，两性，有短梗；花萼钟形，红色、质厚，顶端5～7裂，裂片外面有乳头状突起；花瓣与萼片同数，互生，生于萼筒内，倒卵形，稍高出花萼裂片，通常红色，少有白色；雄蕊多数，花丝细弱。浆果近球形，果皮厚，顶端有宿存花萼，直径约6厘米。种子多数，有肉质外种皮 我国南北各地均有栽培.

【性味功效】酸、涩，温。收敛止泻、杀虫。治虚寒久泻、肠炎、痢疾、便血、脱肛、血崩、绦虫病、蛔虫病. 果皮外用治稻田皮炎 煎服3～9克

【应用】1. 单味水煎，加红糖适量服，治细菌性痢疾。2. 配红枣树皮9克，白矾3克，共研细粉，便后敷患处，治脱肛。3. 配槟榔4.5克煎服，治蛲虫病。4. 煎液泡，治稻田皮炎.

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

被子植物——双子叶植物、单子叶植物

被子植物是植物界进化最高级、种类最多、分布最广的类群。现已知被子植物有1万多属，约20多万种，占植物界的1/2。被子植物与裸子植物相比，更加进化。

典型的被子植物具有真正的花；具雌蕊，雌蕊由心皮所组成，胚珠包藏在子房内，得到子房的保护，具有双受精现象和三倍体的胚乳；植物体高度发达，在形态、结构、生活型方面，比其他各类植物更完善化、多样化。在解剖构造上，被子植物的次生木质部有导管，韧皮部有伴胞，使输导组织结构和生理功能更加完善。被子植物又分为双子叶植物和双子叶植物两个纲。单子叶植物由双子叶植物分化而来，主要是由于适应不利气候条件而产生的形态上的某种变化所致。被子植物中单子叶植物占1/5。

双子叶植物主要特征：多为直根系；茎中维管束成环状排列，有形成层；叶具网状脉；花各部分基数为5或4，花粉粒具3个萌发孔；种子胚具2片子叶。

单子叶植物主要特征：主根不发达，大多只有柔弱的须根，故多为草本植物；茎中维管束散布在薄壁组织里，无形成层；叶脉多为相互平行或成弧形，不成网状；花常为3数；种子胚仅1片叶。

上述双子叶植物与单子叶植物的特征不是绝对的，有时两者的特征也会交互出现。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

四、单子叶植物



中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

鸭跖草科

鸭跖草（竹节菜、蓝花菜）

【药名】鸭跖草。

【药用部位】鸭跖草科植物鸭跖草 *Commelina communis* L.的全草。6~7月采收

【识别特征】一年生披散草本，仅叶鞘及茎上部被短毛，茎长1米。叶披针形至卵状披针形。总苞片佛焰苞状，有柄，与叶对生，心形，稍镰刀状弯曲，顶端短急尖，边缘常有硬毛；聚伞花序有花数朵，略伸出佛焰苞；萼片膜质，内面2枚常靠近或合生；花瓣深蓝色，有长爪，长近1厘米；雄蕊6，能育雄蕊3，较长，退化雄蕊3，顶端呈蝴蝶状，花丝无毛。蒴果椭圆形，2瓣裂，有种子4；种子具不规则窝孔。生田野间。分布于我国大部分地区。

【性味功效】甘，寒。行水，清热，凉血，解毒。治水肿，脚气，小便不利，感冒，丹毒，腮腺炎，黄疸型肝炎，热痢，疟疾，鼻衄，尿血，血崩，白带，咽喉肿痛，痈疽疔疮。煎服9~15克（鲜品60~90克）；或捣汁服。外用适量，捣敷或捣汁点喉

【应用】1. 配紫苏、马兰根、竹叶、麦冬各9克，豆豉15克，煎服，治流行性感冒。2. 配蒲公英、桑叶各30克，煎服，治上呼吸道感染。3. 鲜品煎服，治急性咽炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

鸭跖草科

大苞水竹草（痰火草、围夹草）

【药名】痰火草。

【药用部位】鸭跖草科植物大苞水竹草 *Murdannia bracteata* (C. B. Clarke) O. Kuntze 的全草。全年采收。

【识别特征】肉质小草本。茎密被毛，基部斜卧，节下生根，上部生新枝。叶互生，无明显叶柄，基部抱茎，被密毛；叶片宽披针形，自出平行脉。花密集成长圆形或球形头状花序；小苞片大，膜质，圆形，覆瓦状排列，迟落；花萼3，窄卵形；花瓣3，宽卵圆形，有短爪；能育雄蕊3，花丝被毛，不育雄蕊2，有小型花药，花丝无毛；花柱与子房近等长，蒴果。花期夏季。生于田野、园边。分布于广东。

【性味功效】甘、淡，凉。化痰散结。治淋巴结结核。煎服30～60克。

【应用】单味煎服，治淋巴结核肿大。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

鸭跖草科

紫露草（紫鸭跖草）

【药名】紫露草。

【药用部位】鸭跖草科植物紫露草 *Tradescantia virginiana* L.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】 一年生草本，高20～50厘米。茎多分枝，带肉质，紫红色，下部匍匐状，节上常生须根，上部近于直立。叶互生，披针形，先端渐尖，全缘，基部抱茎而成鞘，鞘口有白色长睫毛，上面暗绿色，边缘绿紫色，下面紫红色，花密生在2叉状的花序柄上，下具线状披针形苞片；萼片3，绿色，卵圆形，宿存；花瓣3，蓝紫色，广卵形；雄蕊6，能育2，退化3，另有1花丝短而纤细，无花药；雌蕊1，子房卵形，3室，花柱丝状而长，柱头头状。蒴果椭圆形，有3条隆起棱线。种子呈三棱状半圆形，淡棕色。花期夏、秋季。我国各地均有栽培。

【性味功效】淡、甘，凉，有毒。活血、利水、消肿、散结、解毒。治痈疽肿毒、瘰疬结核、淋病。煎服9～15克（鲜者30~60克）。外用适量，捣敷或煎洗。

【应用】1.单味煎服，治尿黄赤、小便不利。2.鲜品捣敷，治无名肿毒。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

鸭跖草科

水竹草（花叶竹夹菜、鸭舌红）

【药名】吊竹梅。

【药用部位】鸭跖草科植物水竹草 *Zebrina pendula* Schnizl.的全草。全年采收。

【识别特征】多年生草本，稍带肉质，茎匍匐，节处生根，分枝多，枝短时直立，长时披散。叶互生，短柄呈鞘状抱茎；叶片椭圆形或卵形或长方椭圆形，先端急尖至渐尖或稍钝，全缘，上面绿色，有紫白相间的纵条，下面紫色，通常无毛，仅基部近叶鞘口或有时全部叶鞘生有长毛。少数聚伞花序聚生于1对稍不等大的顶生叶状佛焰苞内；花萼管状，3裂，苍白色，柔弱；花冠管状，白色，3裂片玫瑰紫色；雄蕊6，插生花冠管喉部；花柱丝状，柱头头状，3裂。花全年开放，生于山边、村边、沟旁和园边较阴湿的草地上。分布于广东、广西、福建等地。

【性味功效】甘，凉。清热解毒、凉血、利尿。治肺结核咳血、咽喉炎、急性结膜炎、细菌性痢疾、肾炎水肿、尿路感染、白带、痈疖、毒蛇咬伤。煎服9～15克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治痢疾。2. 鲜品捣敷，治毒蛇咬伤。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

谷精草科

谷精草（流星草、移星草、鱼眼草）

【药名】谷精草。

【药用部位】谷草精科植物谷精草 *Eriocaulon buergerianum* Koern.的带花茎的花序。8～9月采收。

【识别特征】密丛生草本。叶基生，长披针状条形，有横脉。花葶多，长短不一。头状花序近球形；总苞片宽倒卵形或近圆形；花苞片倒卵形；顶端骤尖，上部密生短毛；花托有柔毛；雄花：外轮花被片合生呈倒卵形苞状，顶端3浅列，钝，有短毛；内轮花被片合生呈倒圆锥形筒状；雄蕊6，花药黑色；雌花外轮花被片合生呈椭圆形苞状；内轮花被片3，离生，匙形，顶端有一黑色腺体，有细长毛，蒴果；种子长椭圆形，有毛茸。生于水稻田或池沼边潮湿处。分布于我国华东、华南、西南和陕西等地。

【性味功效】辛、甘，凉。祛风散热、明目退翳。治目翳、雀盲、齿痛、喉痹、鼻衄。煎服12～15克；或入丸、散服。外用适量，烧炭存性研末撒。

【应用】1. 配党参、决明子、车前草、甘草各6克，白茅根9克，煎服，治中心视网膜脉络膜炎。2. 与羊肝同炖，食肝喝汤，治夜盲症。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

姜科

华山姜（九连姜、华良姜）

【药名】箭杆风。

【药用部位】姜科植物华山姜*Alpinia chinensis* (Retz.) Rosc.的根茎，夏季采收。

【识别特征】多年生草本，高约1米。叶披针形或条状披针形，顶端渐尖或尾状渐尖，叶鞘长约5毫米，叶舌2裂，长4～10毫米，边缘有毛。花组成狭圆锥花序，分枝短，有花2～3；苞片早落，花白色，弯管状，长5毫米，花冠管略超出，裂片矩圆形，长约6毫米，后方的1枚兜状，唇瓣卵形，长6～7毫米，顶端微凹，雄蕊长约8毫米。果球形，直径5～8毫米。生于林中溪边、山地路旁。分布于我国东南部至西南部。

【性味功效】辛，温，止咳平喘、散寒止痛、除风湿、解疮毒。治风寒咳喘、胃气痛、风湿性关节疼痛、跌打损伤、月经不调、无名肿毒。煎服15～30克。外用适量，浸酒搽或捣敷。

【应用】单味煎服，治外感风寒咳嗽、胃寒疼痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

姜科

大高良姜（红豆蔻、大良姜）

【药名】红豆蔻。

【药用部位】姜科植物大高良姜 *Alpinia galanga* Willd.的果实。秋季果实变红时采收。

【识别特征】多年生草本，高2米。根状茎块状，稍有香气。叶片矩圆形或披针形，两面均无毛或下面有长柔毛，干时边缘褐色；叶柄短；叶舌近圆形，长约5毫米。圆锥花序密生多花，花序轴被毛，分枝多；花绿白色，有异味，小苞片及萼筒果时宿存；花冠管长6～10毫米，裂片矩圆形；唇瓣倒卵状匙形，长2厘米，白色而有红线条，深2裂。果矩圆形，中部稍收缩，橙红色。生于山地溪旁及灌丛中。分布于广西、广东、台湾、云南等地。

【性味功效】辛，温。散寒、燥湿、消食。治脘腹冷痛、呕吐泄泻、噎膈反胃、疟疾、痢疾。煎服3～6克。外用适量。

【应用】单味煎服，治消化不良、胃脘胀痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

草豆蔻（草蔻）

【药名】草豆蔻。

【药用部位】姜科植物草豆蔻 *Alpinia katsumadai* Hayata 的种子团。夏、秋季果实成熟时采收。

【识别特征】多年生草本，高1～2米。根茎横走，粗壮，棕红色。叶2列，有短柄，叶片窄椭圆形，顶端渐尖，基部楔形，全缘或上面光滑或生微毛，下面生疏毛或无毛；叶鞘膜质，开放，抱茎；叶舌密被毛。总状花序顶生，总梗密被黄白色长硬毛；花疏生，有长梗，密被长硬毛；苞片闭合状紧包于花蕾，外密生粗毛；花白色，内面稍带淡紫红色斑点。蒴果球形，不裂，密被粗毛，熟时黄色，顶端有宿存花萼。花期4～6月。生于山坡草地、灌木丛边缘。分布于海南、广东、广西、台湾等地。

【性味功效】辛，温。祛寒燥湿、温胃止呕。治胃寒胀痛、反胃吐酸、食欲不振、寒湿吐泻。煎服3～6克。

【应用】配生姜、人参、甘草，煎服，治呕逆、腹中气逆

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

姜科

高良姜（小良姜、风姜）

【药名】高良姜。

【药用部位】姜科植物高良姜*Alpinia officinarum* Hance的根茎，夏末至秋初采收。

【识别特征】多年生草本，高30～80厘米。根茎横走，圆柱形，直径1～1.5厘米，棕红色，多节，节处有环状鳞片，芳香。叶2列，无柄，叶片窄条状披针形，顶端渐尖或尾尖，基部渐尖，全缘或具微疏钝齿，两面光滑无毛；叶舌膜质，长3厘米，棕色。圆锥状花序顶生，直立，花极密集；花序轴红棕色，被短毛；有膜质棕色小花苞；花淡红色。蒴果球形，不裂，被短毛，熟时橘红色。花期4～10月。生于山坡草地、灌木丛中，分布于海南、广东、广西等地。

【性味功效】辛，温。温中、散寒、止痛。治胃腹冷痛、急性胃肠炎；外用治汗斑。煎服3～9克。外用适量，鲜品捣敷。

【应用】1. 配制香附各60克，研粉泛丸服，每服3克，日服3次，治胃寒气滞作痛。2. 配厚朴、当归各9克，肉桂3克，生姜6克，煎服，治胸胁胀痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

姜科

益智（益智仁）

【药名】益智、益智仁。

【药用部位】姜科植物益智 *Alpinia oxyphylla* Miq.的果实。4~6 月采收。

【识别特征】多年生草本，高 1 ~ 3 米。叶片披针形，顶端具尾尖，边缘具脱落性小刚毛；叶舌 2 裂，长 1 ~ 1.5 厘米，被淡棕色疏柔毛。总状花序在花蕾时包藏于鞘状的苞片中，花序轴极短，被柔毛，花萼筒状，花冠管裂片矩圆形，外被疏柔毛；唇瓣倒卵形，长约 2 厘米，粉白色具红色脉纹，顶端边缘皱波状。蒴果椭圆形至纺锤形，被疏柔毛，果皮上有明显的线条，顶端有萼筒的残迹。生于林下阴湿处。分布于广东、海南、广西等地。

【性味功效】辛，温。温脾、固肾、止泻、摄唾液、缩小便。治腹痛、泻泄、多唾、遗精、遗尿、尿频。煎服 3 ~ 9 克。

【应用】1. 配白术、党参、茯苓各 9 克，木香 6 克，煎服，治泻泄、多唾。2. 配桑螵蛸或乌药 9 克，煎服，治遗尿。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

姜科

阳春砂（砂仁）

【药名】砂仁。

【药用部位】姜科植物阳春砂*Amomum villosum* Lour.的果实，秋季果实熟时采收。

【识别特征】多年生草本，高1.5米。根茎圆柱形，横走，茎直立，无分枝。叶2列，无柄。叶片窄长圆形或条状披针形，先端渐尖呈尾状或急尖，基部渐狭，全缘，上面光滑，下面有微毛；叶鞘开放，抱茎，叶舌短小，边缘被疏短毛，淡棕色。穗状花序球形，花萼管状，先端3浅裂，裂片近三角形；花冠管细长，花冠3裂，裂片白色，先端兜状，唇瓣倒卵状匙形，白色，稍带黄色且有红色斑点，先端有不整齐缺刻，基部具爪；侧生退化雄蕊呈细小乳状凸起，雄蕊1，药隔附属物3裂。蒴果椭圆形至卵圆形，熟时红棕色，有肉刺凸起。栽培或野生于山谷林下阴湿处，分布于广东、广西、云南等地。

【性味功效】辛，温。行气宽中、健胃消食。治胃脘胀痛、食欲不振、恶心呕吐、肠炎、痢疾、胎动不安。煎服3～6克。

【应用】1. 配木香、陈皮、甘草各3克，法半夏、党参、白术、茯苓各6克，煎服，治脾虚食欲不振、腹痛泻泄。2. 配木香3克，枳实6克，白术9克，煎服，治胃腹胀痛、食积不化。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

姜科

闭鞘姜（白石笋、樟柳头、水蕉花）

【药名】广东商陆。

【药用部位】姜科植物闭鞘姜 *Costus speciosus* (Koen.) Smith 的根茎。全年采收，以秋季为佳。

【识别特征】高大草本，高1.5～2.5米。根茎块状，横生，茎基部近木质，通常上部分枝。单叶，螺旋状排列，长圆形至披针形，全缘，直立平行的羽状脉由中央斜出，下面密被绢毛，叶鞘闭合成筒。穗状花序，无柄；苞片覆瓦状排列，卵形，红色，每一苞片内有花1朵，其侧有一小苞片；花萼管状，红色，先端三裂；花冠管短而大，裂片椭圆形或卵形，白色或带红色，唇瓣卵形，白色，中部橙黄色；雄蕊1，花瓣状，药室线形。蒴果球形，稍木质，红色；种子黑色，光亮。花期秋季，果期冬季。生于山谷林下潮湿地或溪边灌木及草丛中。分布于台湾、福建、广西、广东、云南等地。

【性味功效】辛，寒。有小毒。行水消肿、解毒止痒。治百日咳、肾炎水肿、尿路感染、小便不利、荨麻疹、疮疖肿毒、中耳炎。煎服3～6克。外用适量，煎洗或捣敷。本品性寒凉，有毒，孕妇及脾胃虚弱者忌用。

【应用】1. 配白茅根、玉米须各15克，官党根、仙鹤草、车前草各9克，煎服，治急性肾炎水肿。2. 鲜品适量，捣汁滴耳，治中耳炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

姜科

山柰（沙姜、三柰）

【药名】山柰。

【药用部位】姜科植物山柰 *Kaempferia galangal* L.的根茎。秋末冬初采收。

【识别特征】多年生草本。根状茎块状，单生或丛生，淡绿色，芳香。叶通常2枚，相对而生，几乎无柄，平卧地上，圆形或宽卵形，先端急尖或近钝形，基部圆形或心形，下延成鞘，绿色，有时叶缘及先端染有紫色。穗状花序从两叶间生出，有花4～12；花白色，晨开午凋，芳香，花管筒细长；每花具披针形苞片1，绿色。蒴果。花期8～9月。生于林下。分布于广东、广西、云南等地。

【性味功效】辛，温。温中化痰、行气止痛。治急性胃肠炎、消化不良、胃寒疼痛、牙痛、风湿性关节痛、跌打损伤。煎服3～9克。

【应用】配山苍子根6克，南五味子根9克，乌药5克，陈茶叶3克，煎服或研末服，治感冒食滞、胸腹胀满、腹痛泄泻。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

天门冬（天冬）

【药名】天门冬

【药用部位】百合科植物天门冬*Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr.的块根　秋、冬季采收。

【识别特征】攀缘植物，根稍肉质，在中部或近末端呈纺锤状膨大。茎长1～2米，分枝具棱或狭翅。叶状枝通常3枚成簇，扁平，或由于中脉龙骨状而略呈锐三棱形，镰刀状。叶鳞片状，基部具硬刺。茎具刺，在分枝上较短或不明显。花通常2朵腋生，单性，雌雄异株，淡绿色；雄花花被片6；雄蕊稍短于花被；花丝生于花被片上；花药卵形；雌花与雄花大小相似，具6枚退化雄蕊。浆果球形，成熟时红色，种子1粒　生于山野林边或灌木丛中，分布于华南、西南、华中、山东等地

【性味功效】甘苦，寒。滋阴、润燥、清肺、降火。治阴虚发热、咳嗽吐血、肺痿、肺痈、咽喉肿痛、消渴、便秘。煎服10～15克

【应用】1.配生地、沙参各12克，煎服，治肺结核咳嗽。2.配麦冬、百部、栝楼各6克，陈皮、贝母各3克，煎服，治百日咳。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

山菅兰（老鼠怕、山猫儿）

【药名】山菅兰。

【药用部位】百合科植物山菅兰 *Dianella ensifolia* (L.) DC.的根茎。全年采收。

【识别特征】草本，高1～2米。具根状茎，茎直立。叶二列状排列，条状披针形，基部鞘状套折，顶端长渐尖，边缘和沿叶背中脉具细锐齿。总状花序组成顶生圆锥花序，分枝疏散；花淡黄色、绿白色至淡紫色，具长短不一的花梗；花被片6，矩圆状披针形，开展，内轮的具5脉，外轮的具5～7脉；花药条形，顶端孔裂；花丝呈膝状弯曲，顶端膨大；子房球形。浆果紫蓝色。生于山野杂草中。分布于台湾、福建、广东、广西和云南等地。

【性味功效】辛，温，有毒。治瘰疬、痈疽疮癣、跌打损伤。外用适量，捣敷。忌内服。

【应用】干粉适量，醋调敷患处，治痈疮脓肿。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

麝香百合（山百合）

【药名】百合

【药用部位】百合科植物麝香百合 *Lilium longiflorum* Thunb.的鳞茎。秋、冬季采收。

【识别特征】多年生草本，高50～100厘米。鳞茎近球形，直径约5厘米。茎直立，基部淡红色。叶披针形或狭长椭圆形，先端渐尖或锐尖。花顶生，2～3朵，平生或稍下弯；喇叭状，纯白色，基部染成绿色；花被6片，倒卵形或倒披针形，上方稍有反曲；雄蕊6，雌蕊1，花柱细长，上部弯曲，柱头头状。蒴果长椭圆形。花期初夏。生于山坡草地、林边及湿润肥沃土壤上。分布于广东至贵州一带。

【性味功效】甘微苦，平。润肺止咳、清心安神。治肺痨久咳、咳唾痰血、热病后余热未清、虚烦惊悸、神志恍惚、脚气浮肿。煎服9～30克。外用适量，捣敷。

【应用】配麦冬、玄参、芍药各9克，生地12克，熟地18克，当归、甘草、桔梗各5克，贝母6克，煎服，治肺结核咳嗽咯血。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

七叶一枝花（蚤休、重楼）

【药名】重楼。

【药用部位】百合科植物七叶一枝花 *Paris polphylla* Smith 的根茎。全年采收。

【识别特征】多年生草本，高35～100厘米。根状茎粗厚，棕褐色，其上密生有多数环节。茎通常带紫色，基部具1～3枚膜质鞘。叶5～10枚，轮生茎顶，矩圆形、椭圆形或倒卵状披针形，顶端短尖或渐尖，基部圆形或楔形，叶柄带紫红色；外轮花被片绿色，3～6枚，卵状披针形或披针形，内轮花被片条形，通常远比外轮长；雄蕊8～12，花药与花丝近等长；子房圆锥形，具5～6棱，顶端具一盘状花柱基，花柱粗短，分枝4～5。蒴果3～6瓣裂开，种子多数。生于山区山坡、林下或溪边湿地。分布于我国华南、华东、西南地区及陕西、山西等地。

【性味功效】苦、辛，寒，有毒。清热解毒、平喘止咳、息风定惊。治痈肿、疔疮、瘰疬、喉痹、慢性气管炎、小儿惊风抽搐、蛇虫咬伤。煎服5～15克；磨汁、捣汁或入散服。外用适量。捣敷或研末调涂。

【应用】1. 鲜品配鱼腥草30克，捣敷，治疖肿。2. 适量磨汁外搽，治腮腺炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

百合科

多花黄精（长叶黄精、囊丝黄精）

【药名】黄精。

【药用部位】百合科植物多花黄精*Polygonatum cyrtonema* Hua的根茎。春、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高50～100厘米，根状茎肥厚，通常连珠状或结节成块，稀圆柱形。叶互生，椭圆形、卵状披针形至矩圆状披针形，稀稍作镰状弯曲，顶端尖至渐尖。花序腋生，呈伞形状，具花2～7，苞片微小或不存在，花被黄绿色，合生呈筒状，裂片6，雄蕊6，花丝着生于近花被筒中部或上部1/3处，具乳头状突起至具短绵毛，顶端稍膨大至具囊状突起。浆果熟时黑色，生于林下、灌丛或山坡阴处，分布于我国河南以南及长江流域各地，东至福建，南达广东北部，西至四川。

【性味功效】甘，平。补脾润肺，养阴生津。治久病津亏口干、倦怠乏力、糖尿病、高血压病。煎服9～18克。

【应用】1. 配北沙参、杏仁、桑叶、麦冬各9克，煎服，治肺燥咳嗽。2. 配百部9克，天冬、麦冬、百合、紫菀、枳实各6克，甘草3克，煎服，治百日咳。

中药图谱精华书籍汇总贴

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

滇黄精（节节高、仙人饭）

【药名】黄精。

【药用部位】百合科植物滇黄精 *Polygonatum kingianum* Coll. et Hemsl 的根茎。春、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高1～3米。根状茎肥厚，近圆柱形或链珠状，结节有时呈不规则菱状，直径1～3厘米。茎顶部攀缘状。叶轮生，每轮3～10枚，条形、条状披针形至披针形，顶端卷曲。花序腋生，具花2～4，俯垂，苞片微小，通常位于花梗下部，花被粉红色，合生呈筒状，裂片6，雄蕊6，花丝扁平或丝状，着生于花被筒中部或稍上。浆果，熟时红色。生于林下、灌丛或阴湿草坡。分布于云南、四川、贵州等地。

【性味功效】甘、平。补脾润肺，养阴生津。治久病津亏口干、倦怠乏力、糖尿病、高血压病。煎服9～18克。

【应用】1. 配北沙参、杏仁、桑叶、麦冬各9克，煎服，治肺燥咳嗽。2. 配百部9克，天冬、麦冬、百合、紫菀、枳实各6克，甘草3克，煎服，治百日咳。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

百合科

菝葜（金刚藤）

【药名】菝葜。

【药用部位】百合科植物菝葜 *Smilax china* L.的根茎。全年采收。

【识别特征】攀缘状灌木。根茎横走，呈不规则的弯曲，肥厚质硬，疏生须根。茎硬，有倒生或平出疏刺。叶互生，革质，圆形乃至广椭圆形，先端突尖或浑圆，基部浑圆或阔楔形，有时近心形，全缘，3～5脉，下面绿色；沿叶柄下部两侧有卷须两条。花单性，雌雄异株；伞形花序，腋生；苞片卵状披针形；花被裂片6，2轮，矩圆形，黄绿色；雄花雄蕊6，花丝短，花药黄色；雌花较小，退化雄蕊呈丝状，柱头3裂，稍反曲。浆果球形，红色。花期4～5月。生于山坡、灌木丛林缘。分布于陕西、江苏、湖南、广东等地。

【性味功效】甘，温。祛风湿、利小便、消肿毒。治关节疼痛、肌肉麻木、泄泻、痢疾、水肿、淋病、疔疮、肿毒、瘰疬、痔疮。煎服9～15克，或浸酒或入丸、散服。外用适量，煎水熏洗。

【应用】1.单味煎服，治胃肠炎。2.配虎杖、寻骨风浸酒服，治风湿性关节炎。3.配楤木根30克，煎服，治乳糜尿。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

土茯苓（土萆薢）

【药名】土茯苓

【药用部位】百合科植物土茯苓 *Smilax glabra* Roxb.的根茎。秋末冬初采收

【识别特征】多年生攀缘状灌木，茎无刺。根茎块根状，有明显结节，着生多数须根，单叶互生；叶片披针形至椭圆状披针形，全缘，下面常被白粉。花单性，雌雄异株；伞形花序腋生，花序梗极短，小花梗纤细，花小，白色；花被裂片6，2轮；雄花雄蕊6；雌花的退化雌蕊线形，浆果球形，红色。花期7～8月，果期9～10月。生于山坡、荒山及林边的半阴地。分布于我国华东、中南、西南地区及陕西等地

【性味功效】甘、淡，平。解毒、除湿、利关节。治梅毒、淋浊、筋骨挛痛、脚气、疔疮、痈肿、瘰疬。煎服15～30克。外用适量，研末调敷。

【应用】1. 配甘草9克煎服，治钩端螺旋体病。2. 配防风3克，木瓜、没药、当归各9克，金银花12克，煎服，治慢性期布鲁氏菌病

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

牛尾菜（草菝葜、牛尾结）

【药名】牛尾菜。

【药用部位】百合科植物牛尾菜 *Smilax riparia* A. DC. 的根茎，夏季采收。

【识别特征】草质藤本，长1～2米。具根状茎。茎中空，有少量髓，干后凹瘪，具槽，无刺。叶较厚，卵形、椭圆形至矩圆状披针形，下面绿色，无毛；叶柄脱落点位于上部，一般具卷须。花单性，雌雄异株，淡绿色，多朵排成伞形花序，总花梗较纤细；雄花花被片6，花药条形，多少弯曲；雌花比雄花略小。浆果球形，成熟时黑色。生于林下、灌丛下或草丛中。我国除内蒙古、新疆、西藏、青海、宁夏、甘肃外均有分布。

【性味功效】甘、苦，平。祛风活络、祛痰止咳。治风湿性关节炎、筋骨疼痛、跌打损伤、腰肌劳损、支气管炎、肺结核咳嗽咯血。煎服或泡酒服，15～30克。

【应用】单味煎服，治风湿性关节炎疼痛。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

天南星科

石菖蒲（药菖蒲、水剑草）

【药名】石菖蒲。

【药用部位】天南星科植物石菖蒲 *Acorus gramineus* Soland.的根茎。秋、冬季采收。

【识别特征】多年生草本。根茎横卧，直径5～8毫米，外皮黄褐色。叶基生、剑状条形，先端渐尖，基部对折，具窄的膜质边缘，暗绿色，有光泽，叶脉平行，无中脉。花茎扁三棱形；佛焰苞叶状；肉穗花序自佛焰苞中部旁侧裸露而出，无梗，斜上或稍直立，呈狭圆柱形，弯曲；花两性，淡黄绿色，密生；花被6，倒卵形，先端钝；雄蕊6，稍长于花被，花药黄色，花丝扁线形。浆果肉质，倒卵形。花期6～7月，果期8月。生于山涧泉流附近或泉流的水石间。分布于我国长江以南地区及西藏。

【性味功效】辛，温。开窍、豁痰、理气、活血、散风、去湿。治痰厥、热病神昏、健忘、气闭耳聋、心胸烦闷、胃痛、腹痛、风寒湿痹、痈疽肿毒、跌打损伤。煎服3～6克；或入丸、散服。外用适量，煎洗或研末调敷。

【应用】1. 配远志、郁金、半夏、茯苓各9克，胆南星6克，煎服，治湿痰蒙窍、神志不清。2. 配陈皮、香附、草豆蔻各6克，煎服，治胸腹胀闷、食欲不振。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

天南星科

海芋（广东狼毒、痕芋头）

【药名】海芋.

【药用部位】天南星科植物海芋 *Alocasia macrorrhiza* (L.) Schott 的根茎全年采收.

【识别特征】草本，高3米，茎粗壮，皮茶褐色，多粘液. 叶聚生茎顶，盾状着生，卵状戟形，基部2裂片分离或稍合生；叶柄长1米. 总花梗长10～30厘米，佛焰苞下部筒状，上部稍弯曲呈舟形，肉穗花序稍短于佛焰苞，下部雌花部分长约2厘米，上部雄花部分长约4厘米，两者之间有不孕部分，顶端附属体长5～7厘米，雌花仅具雌蕊，雄花具4个聚药雄蕊. 果直径约4毫米，具种子1. 生于山谷、水沟边或村庄附近. 分布于台湾、福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南等地.

【性味功效】微辛、涩，寒. 清热解毒、消肿. 煎服（需久煎）9～15克. 外用适量，鲜品捣敷.

【应用】1. 加大米、食盐火炒至棕黑色，加水煮沸2小时，过滤. 服用150毫升/日，1～2次/日，防治流行性感冒. 2. 鲜品切片，以火烤，趁温热敷，治跌打、骨折肿痛.

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

千年健（一包针、千年见）

【药名】千年健

【药用部位】天南星科植物千年健 *Homalomena occulta* (Lour.) Schott 的根茎　全年采收，秋采者质佳

【识别特征】多年生草本　根状茎直径1～2厘米，节常较短，叶箭状心形至心形，顶端渐尖，基部略呈心形至心形，两侧裂片长8厘米(由裂片基部至弯曲处)，叶柄长30厘米，基部具鞘，总花梗3～4倍短于叶柄，佛焰苞宿存，顶具小尖，肉穗花序，下部具雌花，上部具雄花，两部分近等长或雌花部分较短，雄花具4雄蕊，雌花具雌蕊和退化雄蕊，花柱极短，柱头盘状　浆果具多数种子，种子具多条纵肋　生于林下沟谷阴湿地、山谷溪边、林下阴湿处，分布于云南、广西、广东等地

【性味功效】辛，温　祛风湿，壮筋骨，止痛，消肿　煎服4.5～9克，外用适量，研末调敷

【应用】配地风皮30克，老鹳草90克共研细粉，每服3克，治风寒筋骨疼痛、拘挛麻木

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

大南星科

大薸（大浮萍、水浮莲、水葫芦）

【药名】大浮萍。

【药用部位】天南星科植物大薸 *Pistia stratiotes* L.的叶。夏、秋季采收。

【识别特征】漂浮水面的草本。主茎短缩而叶呈莲座状，有匍匐茎和长的不定根。叶倒卵状楔形，顶端钝圆而呈微波状，基部有柔毛，两面有微毛。花序生叶腋间，有短的总花梗，佛焰苞长约1.2厘米，背面生毛，肉穗花序稍短于佛焰苞，下部具雌花，仅有雌蕊，贴生于佛焰苞，上部具雄花，与佛焰苞分离，雄花具2～8轮生的雄蕊，其下有环状薄膜。生于池塘和水田中。分布于我国长江流域以南各地。

【性味功效】辛，凉。祛风发汗、利尿解毒。煎服9～15克。外用适量，鲜品捣汁涂或煎洗。根有小毒，内服应去根。

【应用】配胡麻子、皂角刺、刺蒺藜、海桐皮各15克，煎服，治荨麻疹。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

天南星科

石柑子（石葫芦、石蒲藤）

【药名】石柑子。

【药用部位】天南星科植物石柑子*Pothos chinensis* (Raf.) Merr.的全草。3～4月或9～10月采收。

【识别特征】藤本。茎多分枝，节间长1.2～2.5厘米。叶单质，矩圆形或披针形，先端渐尖，基部钝，秃净，网脉两面凸起；叶柄有翅，有时叶柄远长于退化的叶片。花序柄下弯，下部有卵状、内陷的苞片3～5；佛焰苞长4～6毫米；肉穗花序近球形；萼片6，顶端内弯；雄蕊6，花丝扁平；子房3，每室有胚珠1，柱头小。浆果红色。花期春季。生于阴暗湿润的地方，以气根攀缘于石上或树上。分布于我国南部各地及四川地区。

【性味功效】苦、辛，微温。理气止痛、祛风除湿。治心胃气痛、筋骨脚气、风湿骨痛。煎服15～30克。

【应用】单味30克煎服，日服1剂，10剂一疗程，治晚期血吸虫病肝脾肿大。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

犁头尖（土半夏、老鼠尾、坡芋）

【药名】土半夏。

【药用部位】天南星科植物犁头尖 *Typhonium divaricatum* (L.) Decne.的块茎或全草。秋季采收。

【识别特征】多年生草本，地下块茎粗如指头大小，外皮暗褐色，肉白色，粉质。叶基生，2～8片；叶片戟形或深心状戟形，形似犁头，边缘微波形或浅裂。肉穗花序深紫色，形如玉米棒样，外为一风兜状佛焰苞所包围，其基部呈筒状，内侧开裂，外面绿紫色，内面紫红色，顶端尾状，有时旋卷；子房数列，在花序基部，接着有数列短而锥尖、直立的中性花，再隔6～8毫米，为数列无柄花药；附属体线型。浆果倒卵形。花期夏季。生于村前屋后，田野、路旁，低洼湿地及杂草丛中，分布于我国南方各地。

【性味功效】辛、苦，温；有毒。散瘀、止血、消肿、解毒。治跌打损伤、外伤出血、乳痈、疔疮、瘰疬、疥癣，外用适量，捣敷或磨涂。

【应用】1. 鲜块茎捣敷伤口周围，治毒蛇咬伤。2. 块茎适量研末，加少许雄黄研末，加醋捣成糊状敷，治痈疖肿痛。3. 鲜块茎用米酒磨汁涂，治血管瘤。4. 鲜全草适量，配醋、糯米饭少许捣敷，治淋巴结核。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

鸢尾科

射干（较剪草、鬼仔扇）

【药名】射干。

【药用部位】鸢尾科植物射干 *Belamcanda chinensis* (L.) DC.的根茎。春、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高40～120厘米。根状茎横走，略呈结节状，外皮鲜黄色。茎直立。叶2列，嵌叠状排列，宽剑形，扁平。伞房花序顶生，排成二歧状；苞片膜质，卵圆形，花橘黄色，花被片6，基部合生呈短筒，外轮的长倒卵形或椭圆形，开展，散生暗红色斑点，内轮的与外轮的相似而稍小；雄蕊3，着生于花被基部；花柱棒状，顶端3浅裂，被短柔毛。蒴果倒卵圆形，室背开裂，果瓣向后弯曲；种子多数，近球形，黑色，有光泽。生于山坡、草原、田野旷地，或为栽培。分布于全国各地。

【性味功效】苦，寒；有毒。降火、解毒、散血、消痰。治喉痹咽痛、咳逆上气、痰涎壅盛、瘰疬结核、疟疾、妇女经闭、痈肿疮毒。煎服3～6克；或入散剂或鲜品捣汁服。外用适量，研末吹喉或调敷。

【应用】1. 配山豆根6克，桔梗、金银花、玄参各9克，煎服，治咽喉肿痛。2. 煎汤加食盐温搽，治水田皮炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

薯蓣科

黄独（黄药子、土卵、零余薯）

【药名】黄药子

【药用部位】薯蓣科植物黄独 *Dioscorea bulbifera* L.的块茎，夏末至冬初采收。

【识别特征】多年生缠绕草本。地下块茎单生，圆柱形，长数米，光滑无毛。叶互生；叶片心状卵形至心形，先端锐尖，基部阔心形，全缘，无毛。花单性，雌雄异株；小花多数，黄白色；穗状花序腋生；雄花序纤弱，下垂，花被6片，披针形，雄蕊6，花丝很短；雌花序较长，花被6片，披针形，子房下位，3室，花柱3裂。果序下垂，蒴果长圆形，有3翅；种子一面有翅。花期8～9月，果期9～10月。生于山谷、河岸、路旁或杂林边缘，分布于我国长江以南地区。

【性味功效】苦，寒；有小毒。解毒消肿，化痰散结，凉血止血。煎服5～10克。外用适量，捣敷或研末调敷。

【应用】1.配陈皮、苍术、金钱草各6克，青木香5克，煎服，治胃痛。2.白酒浸泡1周，去渣，日饮100毫升，治甲状腺肿大。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

薯蓣科

薯莨（血三七、红药子、红孩儿）

【药名】薯莨。

【药用部位】薯蓣科植物薯莨 *Dioscorea cirrhosa* Lour.的块茎。5～8月采收。

【识别特征】多年生缠绕藤本。块茎粗壮，长圆形或不规则圆形，外皮棕黑色，有疣状突起，多须根，鲜时内面血红色。茎圆柱形，常分枝，平滑无毛，近基部有刺。单叶，革质或近革质；基部叶互生，上部叶对生；叶片长圆形、卵状长圆形或宽卵形，全部无毛，基出脉3～5条，有显著网脉。花小，单性；雄花序圆锥状，腋生，穗轴无毛，具棱，有花15～25；花萼椭圆形，基部宽；花被片6，2轮排列，阔卵形，先端极钝；雄蕊6，与花被等长；雌花与雄花相似，排成弯曲的穗状花序，子房下位，花柱3，分离，蒴果，顶端钝，3瓣裂，有3翅；种子有翅。花期6～7月，果期9～10月。生于山谷阴处、疏林下或灌丛中。分布于我国西南、华南、华中和华东各地。

【性味功效】甘、酸，平。收敛止血，散瘀止痛，解毒消肿。煎服10～15克；或研末或磨汁服。外用适量，研末敷或磨汁涂。

【应用】1. 煮甜酒服，治产后腹痛。2. 配月季花煎服，治月经不调。3. 煎水对酒服，治关节痛。4. 磨醋外涂，治毒蛇咬伤。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

薯蓣科

日本薯蓣（土淮山）

【药名】土淮山。

【药用部位】薯蓣科植物日本薯蓣 *Dioscorea japonica* Thunb.的果实，8～10月采收。

【识别特征】多年生缠绕草本。地下根茎圆柱形，肉质肥大，粘滑。茎细长，少分枝。单叶对生，有长柄，叶片长卵形，先端尖，基部心脏形，有两耳，绿色，无毛；叶腋着生珠芽（零余子）。花单性，雌雄异株；穗状花序3～5个，腋生；花白色，雄花穗直立，雌花穗下垂；雄花花被6片，雄蕊6，中有子房痕迹；雌花花被6片，子房3室，下位，有假雄蕊。果穗下垂，蒴果扁平圆形，有3翅，宽约2厘米。种子扁平广圆形，具膜质翅。花期夏季。生于山野林间。分布于我国长江以南地区。

【性味功效】甘，平。补脾肺、涩精气。治脾虚泄泻、遗尿、滑精、久咳不止。煎服9～20克。

【应用】1. 配党参、白术、茯苓各6克，煎服，治脾虚久泻。2. 配白术9克，滑石粉、车前子各3克，甘草1.5克，煎服，治小儿腹泻。3. 配天花粉、沙参各15克，知母、五味子各9克，煎服，治糖尿病。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

露兜露科

露兜树（露兜簕、野菠萝）

【药名】露兜簕。

【药用部位】露兜树科植物露兜树 *Pandanus tectorius* Soland.的根、成熟果。根全年采收；果冬季采收。

【识别特征】多年生有刺灌木，高1～2米或更高。直立，有分枝，茎粗大。叶聚生于茎顶，长披针形，硬革质，边缘和背中脉有钩刺。花浓香，雌雄异株；雄花序稍倒垂，近白色，花被缺，雄蕊多数；雌花无退化雄蕊，子房有胚珠1。果大，单生，近球形，熟时黄红色，由50～70或更多的倒圆锥形、稍有棱角、肉质的小核果集合成复果，长20厘米，形似“菠萝”，故有“野菠萝”之称。花期8月，果期9～10月。主要生于海边地区。分布于广东、广西、海南、云南等地。

【性味功效】甘、淡，凉。利水消肿、清热解毒、发汗解表。治感冒发热、湿火骨痛、尿赤、疝气、吐血、血淋、头痛、肾炎、肝炎、结膜炎、久热不退。煎服10～15克。

【应用】1. 果煎服，治痢疾、解暑。2. 果白蜜浸，日食1枚，治目生翳障、渐渐昏暗、视物不明。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

仙茅科

大叶仙茅（岩棕、松兰）

【药名】大地棕根。

【药用部位】仙茅科植物大叶仙茅 *Curculigo capitulate* (Lour.) O. Kuntze 的根茎。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，根状茎块状，粗厚。叶基生，通常5～6，矩圆状披针形，具折扇状脉，全缘，光滑或下面脉上有疏毛，叶柄有槽。花葶从叶腋发出，常短于叶；密被褐色长柔毛，顶端稍俯垂，花聚生呈头状花序，苞片披针形，被长柔毛。花被裂片6，卵形，有毛，雄蕊6；花丝长不及1毫米；子房顶端无喙。浆果球形。生于林下或阴湿处。分布于我国西南部至东南部，南部尤为常见。

【性味功效】微苦，温。补虚、调经、祛风湿。治跌打、风湿骨痛、虚劳咳嗽、白带、遗精。煎服18～30克。

【应用】1. 配白鲜皮、沙参，炖鸡服，治虚劳咳嗽。2. 配白花草、白鲜皮、鸡冠花、土洋参、三白根、棕树根炖猪蹄服，治男子年久不愈之白浊。3. 配黄花根、女贞子、女儿红、茺蔚子、对叶草、红枣、金樱子炖鸡服，治妇女月经不调。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

仙茅科

仙茅（山兰花、山棕）

【药名】仙茅。

【药用部位】仙茅科植物仙茅 *Curculigo orchioides* Gaertn.的根茎，2～4月发芽前或7～9月苗枯萎时采收。

【识别特征】多年生草本。根茎延长，长30厘米，圆柱状，肉质，外皮褐色；根粗壮，肉质。地上茎不明显。叶3～6片根出，狭披针形，先端渐尖，基部下延成柄，再向下扩大呈鞘状，绿白色，边缘膜质；叶脉明显，有中脉；两面疏生长柔毛，后渐光滑。花腋生；花梗藏在叶鞘内；花杂性，上部为雌花，下部为两性花；苞片披针形，绿色，膜质，被长柔毛；雄蕊6，花丝短；子房狭长，被长柔毛。蒴果椭圆形，稍肉质，先端有喙，被长柔毛；种子稍呈球形，亮黑色，有喙，表面有波状沟纹。花期6～8月。野生于平原荒草地阳处、山坡茅草丛中。分布于我国长江流域及其以南地区。

【性味功效】辛，温，有毒。温肾阳、壮筋骨。治阳痿精冷、小便失禁、崩漏、心腹冷痛、腰脚冷痹、痈疽、瘰疬。煎服6～15克。外用适量，捣敷。

【应用】1. 配金樱子及金樱子根各15克炖肉食，治阳痿、耳鸣。2. 捣敷，治痈疽火毒、漫肿无头、色青黑者。3. 配半边莲捣敷，治蛇咬伤。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

三科

花叶开唇兰（金线莲、金线风）

【药名】金线莲。

【药用部位】兰科植物花叶开唇兰 *Anoectochilus roxburghii* (Wall.) Lindl. 的全草，夏、秋季采收。

【识别特征】多年生草本，高4~10厘米。根状茎横卧，茎节明显，叶互生，具柄，柄基鞘状；叶片卵形，先端急尖或短尖，基部圆形，上面具细微鳞片状突起，有光泽，如丝绒状，下面暗红色，主脉弧形3~7条，幼叶脉金黄色，老叶脉橙红色。总状花序顶生，花2~5朵，花序轴被柔毛；苞片卵状披针形；萼片淡紫色，外面被短柔毛，中萼片卵形，向内凹陷；侧萼片长卵状椭圆形，稍偏斜；花瓣近镰刀形，短于萼片；唇瓣2裂，裂片舌状条形，具爪，每侧有6条流苏，基部具距。蒴果窄椭圆形，棕色。花期8~9月，果期9~10月。生于林下阴湿处。分布于福建、台湾、浙江、江西、广东、海南等地。

【性味功效】甘，平，有小毒。祛风除湿、凉血解毒。治肺热咳嗽、风湿性关炎、跌打损伤、慢性胃炎、膀胱炎、遗精。煎服6~20克。外用适量，研末或鲜品捣敷。

【应用】1. 与猪肉炖熟，冲入黄酒服，治风湿性或类风湿性关节炎。2. 加冰糖炖服，治肾炎、膀胱炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

白及（双肾草、西牛角）

【药名】白及。

【药用部位】兰科植物白及 *Bletilla striata* (Thunb.)Rchb. F的块茎，初冬采挖。

【识别特征】陆生兰，高15～50厘米。假鳞茎扁球形，上面具荸荠似的环带，富粘性。茎粗壮，劲直。叶4～5，狭矩圆形或披针形。花序具花3～8，苞片开花时常凋落，花大，紫色或淡红色，萼片和花瓣近等长，狭矩圆形，急尖，花瓣较萼片阔，唇瓣较萼片和花瓣稍短，白色带淡红色具紫脉，中部以上3裂，侧裂片直立复合抱蕊柱，顶端钝，具细齿，不及中裂片的1/2，中裂片边缘有波状齿，顶端中部凹缺，唇盘上具褶片5，褶片仅在中裂片上为波状，蕊喙细长。生于山坡草丛中及疏林下。广布于我国长江流域及其以南各地。

【性味功效】苦、甘、凉。补肺止血、消肿生肌。治咳血吐血、肺结核咳血、溃疡病出血。外用治外伤出血、疮疡肿毒、皮肤皲裂。煎服3～15克；研粉服3～6克。外用适量，研粉或鲜品捣敷。不宜与乌头同用。

【应用】1. 配川贝母、百合各等量，共研细粉，每服3克，治疗肺结核咳血。2. 配海螵蛸、三七共研细粉服，治支气管扩张咯血、肺结核咯血。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

兰科

石豆兰（石枣、鸭舌兰）

【药名】石枣。

【药用部位】兰科植物石豆兰*Bulbophyllum radiatum* Lindl.的全草。夏、秋季采收。

【识别特征】多年生常绿匍匐小草本。气生根须状、白色。根茎纤细，横生，具节，节上着生假鳞茎，绿色，小型，卵圆状，具棱。每一个假鳞茎顶部生叶1，狭椭圆形或椭圆形，先端微缺，中脉凹下，全缘。伞形花序由假鳞茎基部抽出，具细总梗，有花4～6；花淡黄色，蒴果卵形。花期6～8月。生于悬崖阴湿处，或附生于树上。分布于陕西、浙江、福建、广东、广西、四川等地。

【性味功效】甘、辛、凉。祛风除湿、消肿止痛、凉血活血。治高热惊风、风湿痹痛、四肢麻木、关节肿痛、痈肿、咽痛、跌打损伤。煎服10～15克；或研末或浸酒服。外用适量，研末调敷。

【应用】1.单味煎服，治小儿惊风、角弓反张、风热咽痛、实火头痛。2.配鲜金银花藤50克、猪蹄1个、黄酒200克，炖服，治关节肿痛。3.适量研粉、调敷，治刀伤。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

美花石斛（粉花石斛）

【药名】环钗石斛。

【药用部位】兰科植物美花石斛*Dendrobium loddigesii* Rolfe的茎，全年采收

【识别特征】草本。茎细圆柱形，悬垂，具多数节，叶舌形或矩圆状披针形，长2～5厘米，宽1～5厘米，质地薄，先端锐尖而钩转。花单朵侧生于具叶的茎上部，直径3.5～4厘米，淡玫瑰色或浅紫色；萼片长约2厘米；花瓣椭圆形，与萼片等长或较宽，先端近锐尖，全缘；唇瓣金黄色，近圆形，唇盘凹陷，密布短毛，边缘具流苏；蕊柱紫色，具红色条纹；药帽圆锥形，密布乳突状毛。花期4～5月。附生于岩石或森林中的树干上。分布于广东、广西、云南和贵州等地。

【性味功效】甘淡，寒。生津益胃、清热养阴。治热病伤津、口干烦渴、病后虚热、阴伤目暗。煎服（须久煎）10～20克（鲜者25～50克）；熬膏或入丸、散服

【应用】1. 配连翘、天花粉、鲜生地、麦冬、参叶煎服，治温热有汗、风热化火、热病伤津、温疟舌苔变黑。2. 配淫羊藿、苍术捣为散服，治眼目昼视精明、暮夜昏视、视不见物。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

三画

羊儿兰（见血清、见血莲、肉螃蟹）

【药名】见血清。

【药用部位】兰科植物羊儿兰 *Liparis nervosa* (Thunb.) Lindl.的全草。全年采收。

【识别特征】多年生草本，根状茎短，生须根多数；假鳞茎丛生，圆柱形，绿色，高2.5~7厘米，肥厚多肉，基部稍厚，具节；单叶互生，叶2~3片，质薄，卵形或卵状椭圆形，先端渐尖，基部呈鞘状抱茎，边缘波状，皱褶，脉3~7，总状花序顶生，花疏散，淡紫色；唇瓣先端截形，基部有小瘤体2。蒴果倒卵状圆柱形。夏季开花。生于山野、溪边、石缝间或林下阴湿处或山谷石上。分布于台湾、湖北、广东、四川等地。

【性味功效】苦，寒。清热、凉血、止血。治各种咯血、痨伤咳嗽、肺肾阴虚咯血、肠风下血、血崩。外治拔脓生肌、刀伤出血。煎服或作散剂服3~9克。外用适量，鲜品捣敷。

【应用】捣汁，用纱布或棉球蘸取少量置于伤口处稍加压迫，治创伤出血。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

血叶兰（石上藕、石蚕、真金草）

【药名】石上藕。

【药用部位】兰科植物血叶兰*Ludisia discolor* (Ker-Gawl.) A. Rich.的全草。全年采收。

【识别特征】多年生附生草本，高10厘米左右。肉质。根状茎匍匐，茎节明显，如蚕卧于石上，通常紫红色或黄绿色。叶互生，卵状披针形，上面浓绿色或紫黑色，有金属光泽，通常有金黄色叶脉3～5，下面暗红色。花白色或粉红色。生于山沟有林荫潮湿的岩石上。分布于广东、广西、福建、云南等地。

【性味功效】甘、微涩，凉。滋阴润肺、清热凉血。治肺结核咯血、神经衰弱、食欲不振。煎服5～15克。

【应用】单味煎服，治肺结核咯血、神经衰弱、食欲不振。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

兰科

石仙桃（石上莲、石橄榄、石穿盘）

【药名】石仙桃

【药用部位】兰科植物石仙桃*Pholidota chinensis* Lindl.的全草，秋季采收。

【识别特征】多年生草本，根茎肥厚，匍匐而短，被膜质鳞片，每隔1～2节有一假鳞茎，下侧有须根。假鳞茎卵形或圆形，外表皱缩，污黄色或黄棕色，光滑，顶端有叶痕，中央常有锥尖状干枯的芽，基部有鞘状鳞叶。叶片2，顶生于假鳞茎之上，长圆形，先端渐尖，全缘，平行脉多条。总状花序生于花茎顶端，弯下，有花8～20；苞片卵状披针形，不落；萼片卵形；花瓣线形急尖，稍短。蒴果。花期4～5月，果期6～8月。生于山林下岩石上或附生于他树上。分布于福建、广东、广西、云南等地。

【性味功效】甘，凉。养阴清肺、清热利湿、化痰止咳、消瘀止痛。治眩晕、头痛、咳嗽、吐血、梦遗、痢疾、白带、疳积。煎服10～15克（鲜品30～60克）。外用适量，捣敷。

【应用】1. 单味煎服，治肺结核咳血，急、慢性胃炎，肺热咳嗽，咽喉肿痛，热痹、热淋，胃火牙痛。2. 配鲜金丝草25克煎服，治梦遗。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

莎草科

莎草（香附）

【药名】香附。

【药用部位】莎草科植物莎草 *Cyperus rotundus* L.的根茎。秋季采收。

【识别特征】多年生宿根草本。根状茎匍匐而长，部分有纺锤形的块茎，有时数个连生，外皮紫褐色，有棕毛或黑褐色的毛状物。茎直立，三棱形，基部呈块茎状。叶基部丛生，叶片窄条形，基部抱茎，全缘，具平行脉。花序形如复穗，3～6个在茎顶排列成伞形；小穗轴具较宽的、白色透明的翅，条形，茶褐色；基部有叶片状的总苞2～4，与花序等长或过之。小坚果长圆状倒卵形，三棱状，灰褐色。花期5～8月，果期7～11月。生于田野、路旁和草地上。分布于全国各地。

【性味功效】辛、微苦、微甘，平。疏肝解郁、调经止痛。治肝胃不和、气郁不舒、胸腹胁肋胀痛、痰饮痞满、月经不调、崩漏带下。煎服15～45克；或入丸、散服。外用适量，研末撒、调敷或做饼热熨。

【应用】1. 配高良姜25克，共研细粉服，治胃寒痛。2. 配乌药、延胡索、莱菔子（炒）各15克，柴胡10克，煎服，治胁痛腹胀。3. 配益母草20克、丹参25克、白芍15克，煎服，治痛经。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

莎草科

水蜈蚣（发汗草、散寒草）

【药名】水蜈蚣。

【药用部位】莎草科植物水蜈蚣 *Kyllinga brevifolia* Rottb.的全草。夏、秋季花期采收。

【识别特征】多年生草本。全株光滑无毛，鲜时有如菖蒲的香气。根状茎柔弱，匍匐平卧于地下，形似蜈蚣，节多数，节下生须根多数，每节上有一小苗。秆成列散生，纤弱，高7～20厘米，扁三棱形，平滑。叶窄线形，基部鞘状抱茎，最下2个叶鞘呈干膜质。夏季从秆顶生一球形、黄绿色的头状花序，具极多数密生小穗，下面有向下反折的叶状苞片3，故又有“三荚草”之称；鳞片膜质，背面龙骨状突起无翅；花无被，雄蕊3；雌蕊1，柱头2歧。坚果卵形，极小。花期夏季，果期秋季。生于水边、路旁、水田及旷野湿地。广布于我国长江流域以南地区。

【性味功效】辛，平。疏风解表、清热利湿、止咳化痰、祛瘀消肿。治感冒风热、急性支气管炎、百日咳、疟疾、菌痢、疮疡、跌打损伤、毒蛇咬伤。煎服15～30克（鲜品30～60克）；或捣汁服。外用适量，捣敷。

【应用】1. 加糖适量煎服，治百日咳、支气管炎咳嗽。2. 配倒扣草50克煎服，预防疟疾。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

禾本科

薏苡（薏苡仁、沟子米）

【药名】薏苡仁。

【药用部位】禾本科植物薏苡 *Coix lachrymajobi* L. var. *ma-yuen* (Roman.) Stapf 的种仁。秋末果实未成熟时采集，碾去种皮。

【识别特征】一年生或多年生草本，高1～1.5米。秆直立，丛生，多分枝，基部节上生根。叶互生，长披针形，先端渐尖，基部宽心形，鞘状抱茎，中脉粗厚而明显，两面光滑，边缘粗糙。总状花序从上部叶鞘内抽出1个至数个成束；雄小穗覆瓦状排列于穗轴的每节上；雌小穗包于卵形硬质的总苞中，成熟时变成珠子状，灰白色或蓝紫色，坚硬而光滑，顶端尖，有孔，内有种仁。花期秋季。生于河边、溪涧边或阴湿山谷中。分布于我国南方各地，全国有栽培。

【性味功效】甘、淡，微寒。健脾利湿、清热排脓。治水肿、脚气、泄泻、湿痹拘挛、肠痈、肺痈、消化不良。煎服15～30克。

【应用】1. 配败酱草25克、制附子10克煎服，治阑尾炎。2. 配赤小豆、冬瓜皮各50克，黄芪、茯苓各10克，煎服，治水肿。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

牛筋草（千金草、野鸡爪）

【药名】牛筋草。

【药用部位】禾本科植物牛筋草 *Eleusine indica* (L.) Gaertn.的全草，夏、秋季采收。

【识别特征】一年生草本，高15～90厘米。须根细而密。秆丛生，直立或基部膝曲，叶片扁平或卷折，无毛或疏生疣状柔毛；叶鞘压扁，具脊，无毛或疏生疣毛，口部有时具柔毛。穗状花序，常为数个呈指状排列（罕为2个）于茎顶端；小穗有花3～6；颖披针形，脊上具狭翼。种子矩圆形、近三角形，有明显的波状皱纹。花、果期6～10月。生于旷野、路旁。分布于全国各地。

【性味功效】甘、淡、凉。清热解暑、除烦止渴、利小便。治伤暑发热、小儿急惊风、黄疸、痢疾、淋病、小便不利；并能预防乙脑。煎服15～25克。

【应用】配白毛鹿茸草、生石膏各50克，煎服，防治流行性乙型脑炎。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

禾本科

白茅（茅针、茅根）

【药名】白茅根。

【药用部位】禾本科植物白茅 *Imperata cylindrica* Beauv. var. *major* (Nees) C. E. Hubb. 的根茎。春、秋季采收

【识别特征】多年生草本，高20～100厘米。根茎白色，匍匐横走。秆从生，直立，圆柱形，光滑无毛。叶线形或线状披针形；根出叶长几与秆株相等；茎生叶较短，叶鞘褐色，无毛，具短叶舌。圆锥花序紧缩呈穗状，顶生；小穗成对排列在花序轴上；花两性，每小穗具1花，基部被白色丝状柔毛。颖果椭圆形，暗褐色，成熟的果序被白色长柔毛。花期5～6月，果期6～7月。生于路旁、山坡、草地上。分布于全国各地。

【性味功效】甘，寒。凉血止血，清热利尿。治热病烦渴，吐血、衄血、肺热喘急、胃热哕逆、淋病、小便不利、水肿、黄疸。煎服15～30克（鲜品30～60克）；或捣汁或研末服。

【应用】1. 单味煎服，治麻疹口渴、急性肾炎。2. 配藕节15克、黑豆少许，煎服，治鼻出血。3. 配生荷叶50克，侧柏叶、藕节各15克，煎服，治胃出血。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

禾本科

淡竹叶（地竹、竹叶麦冬）

【药名】淡竹叶

【药用部位】禾本科植物淡竹叶 *Lophatherum gracile* Brongn.的茎叶。6～7月花未开时采收。

【识别特征】多年生草本，高1米。有短缩的根茎，须根近顶端部分常为纺锤形的块根。叶片互生，披针形，先端渐尖，基部楔形而渐狭缩成柄状；叶全缘，脉平行，小横脉明显，中脉突出；叶舌截形，边缘有毛。圆锥花序顶生，小穗疏生，基部光滑或被刺毛；颖片矩圆形，具5脉，先端钝，第1颖较第2颖短；子房卵形，花柱2，柱头羽状。花期7～9月，果期10月。野生于山坡林下及阴湿处。分布于我国长江流域和华南、西南地区。

【性味功效】甘、淡，寒。清热除烦、利尿通淋。治热病口渴、心烦、小便赤涩、淋浊、口糜舌疮、牙龈肿痛。煎服6～15克（鲜品30～50克）

【应用】单味煎服，治发热、心烦、口渴。

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

禾本科

金丝草（笔仔草、猫毛草）

【药名】金丝草

【药用部位】禾本科植物金丝草 *Pogonatherum crinitum* (Thunb.) Kunth 的全草，秋季采收

【识别特征】多年生簇生草本，高10～30厘米，秆直立，纤细。叶片扁平，线状披针形，先端渐尖，两面和边缘多少被毛。穗状花序单生于主秆和分枝的顶端，柔软而微曲；小穗成对，基盘的毛约与小穗等长或过之，第2颖较第1颖稍长，具芒；不孕的小花外稃存或缺，线形，光滑，内稃缺；结实小花的外稃稍长，具芒；雄蕊1，花药有的细小；花柱2，柱头扫帚状。花、果期5～9月。生于河边、墙隙、山坡和潮湿旷野。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、云南等地

【性味功效】甘，凉。利水通淋、清热。治热病烦渴、泄泻、黄疸型肝炎、糖尿病、淋浊、尿血、小便不利。煎服15～30克（鲜品加倍）。

【应用】配车前草、地锦草、六角英鲜品各50克，煎服，治急性肾炎浮肿

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

中文名索引

一画

一见喜 130
一包针 254
一点红 76

二画

二叶葎 8
七叶一枝花 238
入地老鼠 200
九节 24
九连姜 216
九里光 86
九里明 86

三画

三叶刺针草 58
三叶鬼针草 58
三奈 230
三脉紫菀 56
三褶脉马兰 56
十冬虫草 186
十半夏 260
土加藤 10
土卵 264
土忍冬 38
土茯苓 246
土萆薢 246
土党参 106
土银花 38
土淮山 268
大叶龙胆草 10
大叶仙茅 272
大叶紫珠 148
大田基黄 102
大地棕根 272
大头艾纳香 60
大良姜 218
大青 152
大青叶 140
大青叶 152
大青根 152
大苞水竹草 208
大浮萍 256
大泽兰 78
大藻 256
大高良姜 218
小叶艾 54
小叶团花 2
小叶羊角藤 18
小叶鸦鹊饭 142
小良姜 222
小金钱草 120
小铜锤 110
山大刀 24
山大颜 24
山甘草 20
山石榴 28
山白菊 56

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

山兰花
山百合 236
山茉莉 156
山枝子 4
山奈 230
山胡椒菊 70
山栀子 4
山指甲 142
山菅兰 234
山银花 38
山猫儿 234
山棕 274
千年见 254
千年艾 68
千年茶 12
千年健 254
千里光 86
千金草 296
广东土牛膝 78
广东商陆 228
广东狼毒 252
广藿香 180
马蓝 140
马缨丹 160
马蹄金 120
马鞭草 162

四画

天冬 232
天门冬 232
天泡草 112
止血草 148
五爪龙 122
五爪金龙 122
五月花 14
五叶藤 122
五色梅 160
五色梅花 160
五色梅根 160
五指柑 164
车前 104
车前草 104
长叶花灯笼 34
长叶黄精 240
日本薯蓣 268
见血莲 284
见血清 284
牛白藤 10
牛舌菜 104
牛尾结 248
牛尾菜 248
牛虱子 98
牛筋草 296
毛风藤 116
毛达仑木 34
毛荚莲 42
毛葫芦 22
毛麝香 124
月母草 174
风姜 222
风颈草 162
六月雪 32
六角英 138
少花龙葵 118
少年红 12
巴戟 16
巴戟天 16
双钩藤 36
水石榴 2
水竹草 212
水杨梅 2
水线草 6

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

水剑草 250
水浮莲 256
水葫芦 256
水蜈蚣 202
水蕉花 228
双肾草 278

五画

玉叶金花 20
玉芙蓉 68
古钮菜 118
石上莲 288
石上藕 286
石仙桃 288
石豆兰 280
石枣 280
石胡荽 64
石柑子 258
石穿盘 288
石蚕 286
石菖蒲 250
石葫芦 258
石蒲藤 258
石榴 202
石榴皮 202
石橄榄 288
石螃蟹 190
艾叶 54
节节高 242
龙船花 14
东风草 60
叶子花 198
叶下红 76
四方草 126
四方拳草 126
四棱草 174
仙人饭 242
仙茅 274
白及 278
白马骨 32
白毛夏枯草 168
白毛藤 116
白石笋 228
白布荆 166
白花九里明 60
白花丹 194
白花苦灯笼 34
白花败酱 46
白花草 48
白花菜 118
白花臭草 48
白花蛇舌草 8
白花蟛蜞菊 72
白苏 176
白纸扇 20
白英 116
白苞蒿 52
白茅 298
白茅根 298
白茶 20
白背杨 166
白消木 2
白雪花 194
白棠子树 142
白鹤灵芝 136
冬红果 44
半边莲 108
半边菊 108
半枝莲 182
发汗草 292
对节树 150
母草 126

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

六画

老鼠尾 260
老鼠怕 234
百合 236
百眼藤 18
耳挖草 184
地石榴 110
地竹 300
地苏木 30
地胡椒 64
地钮子 140
地胆头 74
地胆草 74
地蚕 186
西牛角 278
尖尾风 144
尖尾枫 144
尖紫苏 178
光叶子花 198
吊竹梅 212
肉螃蟹 284
竹节菜 206
竹叶麦冬 300
伤寒草 94
血三七 206
血叶兰 286
华山姜 216
华良姜 216
华泽兰 78
向阳花 62
伞房花耳草 6
多花黄精 240
齐头蒿 50
闭鞘姜 228
安石榴 202
羊儿兰 284
羊肝菜 134
羊蹄草 76
并头草 182
米碎草 128
灯笼泡草 114
灯笼草 112、114、154
冰糖草 128
防风草 172
阳春砂 226
红灯笼 154
红豆蔻 218
红孩儿 266
红药子 266
红背菜 82
红根草 102
红紫珠 150
红缨花 14

七画

走马箭 40
芙蓉菊 68
花叶开唇兰 276
花叶竹夹菜 212
苍耳 98
苍耳子 98
杜虹花 148
坚荚树 44
状元红 158
旱莲草 72
围夹草 208
牡荆 164
牡荆叶 164
牡蒿 50
伸筋藤 26

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

佛耳草 80
希仙 88
谷精草 214
沙姜 230
沟子米 294
鸡矢藤 22
鸡肠风 16
鸡屎藤 20

八画

环钗石斛 282
苦地胆 74
苦参子 188
苦草 90
苦斋菜 46
苦蘵 114
茄叶斑鸠菊 96
茅针 298
茅根 298
松兰 272
刺榴 28
拉锯藤 30
坡芋 260
岩白菜 190
岩棕 272
败酱草 46
使君子 196
金丝草 302
金耳钩 88
金刚藤 244
金线风 276
金线莲 276
金疮小草 168
金盏银盘 58
金钱豹 106
金腰箭 90
鱼眼草 70
鱼眼草 214
鱼眼菊 70
狗肝菜 134
夜香牛 94
宝巾 198

九画

春根藤 26
珍珠石榴 202
珍珠草 62
革命菜 84
茜草 30
草豆蔻 220
草莓莫 248
草蔻 220
药菖蒲 250
南方荚蒾 42
南板蓝根 140
栀子 4
砂仁 226
鸦胆 188
鸦胆子 188
映山红 14
星宿菜 102
蚂蝗七 190
香苏 178
香附 290
钩藤 36
剑叶耳草 12
胜红蓟 48
匍匐九节 26
狭叶韩信草 182
急解索 108
宝塔菜 186
穿心莲 130

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

穿根藤 26
美花石斛 282
蚤休 238

十画

莎草 290
真金草 286
较剪草 262
鸭舌兰 280
鸭脚艾 52
鸭跖草 206
蚊子柴 164
铁马鞭 162
铁扫把 12
铁锯草 192
重楼 238
笔仔草 302
臭茉莉 156
臭艾 50
臭苏 176
臭牡丹 156
臭藤 22
射干 262
鬼仔扇 262
鬼灯笼 154
高良姜 222
消山虎 94
海芋 252
流星草 214
凉草 124
粉花石斛 282
益母草 174
益智 224
益智仁 224
胭脂花 200
留求子 196

十一画

球子草 64
黄花地丁 92
黄栀子 4
黄花小二仙草 192
黄花菜 100
黄药子 264
黄胆草 120
黄独 264
黄鹌菜 100
黄精 240
黄精 242
菝葜 244
接骨木 40
接骨丹 10
常绿荚蒾 44
野艾 54
野艾蒿 54
野山菊 66
野甘草 128
野芥菜 100
野鸡爪 296
野茼蒿 84
野黄菊 66
野菠萝 270
野菊 66
野菊花 66
蛇舌草 8
铜锤玉带草 110
犁头尖 260
移星草 214
假石榴 28
假杜鹃 132
假茉莉 194
假茼蒿 84

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

假紫胡 80
假紫苏 172
猫毛草 302
猪肝菜 134
猪屎青 152
麻糖风 34
痕芋头 252
粘手风 144
剪刀草 170
清明菜 80
淡竹叶 300

十二画

斑鸠木 96
散寒草 292
紫苏 178
紫苏子 178
紫苏叶 178
紫苏梗 178
紫茉莉 200
紫背三七 82
紫背草 76
紫背菜 82
紫珠草 148
紫鸭跖草 210
紫露草 210
落马衣 132
韩信草 184
鹅不食草 64
筋骨草 168
滇黄精 242
鼠曲草 80

十三画

赖桐 158
蓝花草 132
蓝花菜 206
蒲公英 92
蒴藋 40
榄核莲 130
零余薯 264
锦灯笼 112
锯仔草 192
痴头猛 98
痰火草 208
瘦风轮 170
满天星 32

十四画

蔓荆 160
蔓荆子 160
酸浆 112
豨莶 88
豨莶草 88
辣子草 62

十五画

樟柳头 228
箭杆风 216

十六画

薯莨 266
薏苡 294
薏苡仁 294

十七画以上

杜鹃 198
爵床 138
鹰爪风 36
藿香 180
癣草 130
露兜树 270

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

露兜簕270
鳢肠 72
麝香百合 236
麝香草 124
囊丝黄精 240

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

拉丁学名索引

A

Acorus gramineus soland. 250
Adenosma glutinosum (L.) Druce 124
Adina rubella Hance 2
Ageratum conyzoides L 48
Ajuga ciliata Bunge 168
Alocasia macrorrhiza (L.) Schott 252
Alpinia chinensis (Retz.) Rosc. 216
Alpinia galanga Willd. 218
Alpinia katsumadai Hayata 220
Alpinia officinarum Hance 222
Alpinia oxyphylla Miq 224
Amomum villosum Lour 226
Andrographis panlculata (Burm. f.) Nees 130
Anisomeles indica (L.) O. Ktze 172
Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. 276
Artemisia japonica Thunb 50
Artemisia lactiflora Wall 52
Artemisia vulgaris L 54
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 232
Aster ageratoides Turcz 56

B

Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek 140
Barleria cristata L 132
Belamcanda chinensis (L.) DC 262

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

Bidens pilosa L58
Bletilla striata (Thunb.)Rchb. F278
Blumea megacephala (Randeria) Chang et Tseng60
Bougainvillea glabra Choisy198
Brucea javanica (L.) Merr188
Bulbophyllum radiatum Lindl. 280

C

Calinsoga parvifloraa Cav62
Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch 142
Callicarpa longissima (Hemsl.)Merr 144
Callicarpa macrophylla Vahl146
Callicarpa pedunculata R. Br148
Callicarpa rubella Lindl150
Campanumoea javanica Bl106
Centipeda minima (L.) A. Braun et Aschers 64
Chitita fimbrisepala Hand.-Mazz190
Chrysanthemum indicum L66
Clerodendrum cyrtophyllum Turcz152
Clerodendron fortunatum L154
Clerodendron fragrans Vent156
Clerodendron japonicum (Thunb.) Sweet 158
Clinopodium gracile (Benth.) Matsum170
Coix lachrymajobi L. var. ma-yuen (Roman.) Stapf294
Commelina communis L206
Costus speciosus (Koen.) Smith228
Crossostephium chinense (L.) Makino ex Cham. et Schlecht. 68
Curculigo capitulate (Lour.) O. Kuntze 272

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

Curculigo orchioides Gaertn. 274
Cyperus rotundus L. 290

D

Dendrobium loddigesii Rolfe 282
Dianella ensifolia (L.) DC. 234
Dichondra repens Forst 120
Dichrocerhala auriculata (Thunb.) Druce 70
Dicliptera chinensis (L.) Nees 134
Dioscorea bulbifera L. 264
Dioscorea cirrhosa Lour. 266
Dioscorea japonica Thunb. 268

E

Eclipta prostrata L 72
Elephantopus scaber L 74
Eleusine indica (L.) Gaertn. 296
Emilia sonchifolia (L.) DC 76
Eriocaulon buergerianum Koern. 214
Eupatorium chinense L 78

G

Gardenia jasminoides Ellis 4
Gnaphalium affine D. Don 80
Gynura bicolor (Roxb.) DC 82
Gynura crepidioides Benth 84

H

Halorafis chinensis (Lour.) Mer 142
Hedyotis corymboss L 6
Hedyotis diffusa Willd 8
Hedyotis hedyotidea (DC.) Merr.-Mazz 10
Hedyotis lancea Thunb 12
Homalomena occulta (Lour.) Schott 254

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

I

Imperata cylindrica Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. 208
Ipomoea cairica (L.) Sweet 122
Ixora chinensis Lam 14

K

Kaempferia galangal L 230
Kyllinga brevifolia Rottb. 292

L

Lantana camara L 160
Leonurus heterophyllus Sweet 174
Lilium longiflorum Thunb. 236
Lindernia crustacea (L.) F. Muell 126
Liparis nervosa (Thunb.) Lindl. 284
Lobelia chinensis Lour 108
Lonicera confusa DC 38
Lophatherum gracile Brongn. 300
Ludisia discolor (Ker-Gawl.) A. Rich. 286
Lysimachia fortunei Maxim 102

M

Mirabilis jalapa L 200
Morinda officinalis How 16
Morinda parvifolia Benth 18
Murdannia bracteata (C. B. Clarke) O. Kuntze 208
Mussaenda pubescens Ait. F 20

P

Paederia scandens (Lour.) Merr 22
Pandanus tectorius Soland. 270
Paris polphylla Smith 238
Patrinia villosa Juss 46

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

Perilla frutescens (L.) Britt176
Perilla frutescens (L.) Britt. var. acuta (Thunb.) Kudo178
Pholidota chinensis Lindl. 288
Physalis alkekengi L. var. franchetii (Mast.) Mak112
Physalis pubescens L114
Pistia stratiotes L. 256
Plantago asiatica L104
Plumbago zeylanica L194
Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth 302
Pogostemon cablin (Blanco) Benth.180
Polygonatum cyrtonema Hua240
Polygonatum kingianum Coll. et Hemsl 242
Pothos chinensis (Raf.) Merr. 258
Pratia begonifolia (Wall.) Lindl110
Psychotria rubra (Lour.) Poir24
Psychotria serpens L26
Punica granatum L. 202

Q

Quisqualis indica L. 196

R

Randia spinosa (Thunb.) Poir28
Rhinacanthus nasutus (L.) Lindau136
Rostellularia procumbens (L.) Nees138
Rubia cordifolia L30

S

Sambucus japonnica Reinw40
Scoparia dulcis L128
Scutellaria barbata D. Don182
Scutellaria indica L184

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

Senecio scandens Buch.-Ham86
Serissa foetida (D.C.) Druce32
Siegesbeckia orientalis L88
Smilax china L. 244
Smilax glabra Roxb246
Smilax riparia A. DC. 248
Solanum lyratum Thunb116
Solanum nigrum L118
Stachys geobombycis C. Y. Wu 186
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn90

T

Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. 92
Tarenna mollissima (Hook. et Arn.) Robins34
Tradescantia virginiana L. 210
Typhonium divaricatum (L.) Decne.260

U

Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks. 36

V

Verbena officinalis L. 162
Vernonia cinerea (L.) Less94
Vernonia solanifolia Benth96
Viburnum fordiae Hance42
Viburnum sempervirens K.Koch44
Vitex negundo L. var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz164
Vitex trifolia L166

X

Xanthium sibiricum Patr. ex Widd98

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

Y

Youngia japonica (L.) DC100

Z

Zebrina pendula Schnizl212

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023

[General Information]
书名=中草药野外识别手册　　第三册
作者=
页数=318
SS号=0
出版日期=

中药图谱精华书籍汇总贴
http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=32232&fromuid=1023