一、全　草　类



一 匹 莲

别名 下延叉蕨、有柄三叉蕨。

来源 本品为蕨类三叉蕨科植物下延三叉蕨 Tectaria decurrens(Presl) Copel 的干燥全草。

原植物 下延三叉蕨(图 1)为多年生草本，高约 1m。根状茎粗大，直立，连同叶柄下部密生披针形鳞片。叶簇生；叶柄长 20cm～30cm，两侧有狭翅下延几达基部，翅宽约 3mm～5mm；叶片草质，长圆形或卵状长圆形，长 30cm～100cm，基部楔形或戟形，下延，羽状深裂(基部羽片的下侧常又裂出 1 枚小羽片)，沿叶轴有宽 1cm～2.5cm 的翅；裂片 3 对～8 对，长 15cm～25cm，披针形，顶端尾状渐尖，边全缘或波状；叶脉网状，网眼有单一或分枝的内藏小脉。孢子囊群圆形，下陷(叶肉常皱缩成旋涡状)，在侧脉间形成 2 行(叶轴两侧的阔翅上也有 1 行～3 行)；囊群盖大，圆形，盾状着生，成熟时褐色。

生于海拔 800m 以下的山谷密林下湿地。分布于福建、台湾、广东、广西、云南、四川等省(自治区)。亚洲热带的其他地区也有。

采收加工 夏、秋两季采挖，洗净，晒干。

药材性状 本品根状茎粗壮，直立，稍扭曲，连同叶柄下部密生黑褐色披针形鳞片。叶簇生于根状茎上；叶柄长约 25cm，浅棕色，两侧有宽 3mm～5mm 的狭翅；叶片灰绿色，长 30cm～100cm，宽 25cm～50cm，基部楔形或戟形、下延，一回羽状深裂，裂片 3 对～8 对，长 15cm～25cm，宽 2cm～5cm，披针形，顶端尾状渐尖，边缘波状或全缘，基部 1 对裂片常又裂出 1 枚小羽片；叶轴有宽 1cm～2cm 的翅。孢子囊群圆形，下陷，在侧脉间形成 2 行。气无，味苦。以根茎粗壮、叶色绿者为佳。

性味和功用 苦，寒。清热解毒。用于疔疮肿毒。常用量 10g～15g，水煎服，并用鲜品适量捣烂外敷。



图 1　下延三叉蕨

大唇羊耳蒜

别名 双叶金枪。

来源 本品为兰科植物大唇羊耳蒜 Liparis dunnii Rolfe 的全草。

原植物 大唇羊耳蒜(图 2)为多年生草本。假鳞茎聚生，卵圆形，径达 3cm。叶 2 枚，膜质，椭圆形或卵状椭圆形，长 4cm～15cm，顶端锐尖或略钝，基部骤然收狭为鞘状叶柄，边缘微波状，具极细齿。花葶直立，具狭翅，远高出于叶外；总状花序疏生多数花；苞片很小，卵状三角形，长约 2mm；花淡紫色，萼片狭矩圆形，长 8mm～17mm，宽 2mm～3mm，中萼片与侧萼片相似；花瓣丝状，等长于萼片；唇瓣倒卵状矩圆形，直立，长 10mm～20mm，宽 7mm～12mm，顶端圆形并具短尖，深紫色，边全缘，中上部具极细齿，基部无胼胝体；合蕊柱弯曲，长约 4mm，近顶端的蕊柱翅短而圆。蒴果纺锤状倒圆锥形，具纵肋，顶端截平。

生于溪边、林下阴湿处。分布于山西省及长江流域以南各省(自治区)。朝鲜、日本也有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干或鲜用。

药材性状 本品须根较多，褐黑色，松泡内有淡黄白色细圆柱形维管束，径约 1mm。假鳞茎聚生，卵圆形，粗 1cm～3cm，表面灰褐色或绿褐色，具数枚鞘状叶。叶 2 枚，基生，椭圆形或卵状椭圆形，长 4cm～15cm，宽 2cm～6.5cm，顶端锐尖或略钝，基部圆形，急剧收狭成鞘状叶柄，弧状平行脉明显。花葶远高出叶外，具翅；总状花序顶生；苞片长约 2mm；花大，浅紫色，排列较稀疏，花瓣丝状，唇瓣倒卵状矩圆形，长 10mm～20mm。气微，味稍苦。以假鳞茎粗壮、须根多、叶色绿者为佳。

性味和功用 苦，凉。归肺、肝经。清热解毒，补肺止血。用于吐血，咯血，外伤出血，小儿惊风，毒蛇咬伤，疖肿。常用量 15g～30g；外用适量捣烂敷患处。




图 2　大唇羊耳蒜

大香附子

别名 三棱草。

来源 本品为莎草科植物砖子苗 Mariscus umbellatus Vahl 的干燥带根全草。

原植物 砖子苗(图 3)为多年生草本，高 10cm ~ 50cm。根状茎短。秆疏丛生，三棱形。叶线形，短于秆或与秆近等长，从下向上渐平展，宽 3mm ~ 6mm，顶端长渐尖，全缘，基部鞘状抱茎。叶状总苞片 5 ~ 8 枚，通常长于花序，斜展；长侧枝聚伞花序顶生，具 5 至多个辐射枝，辐射枝长短不等，最长的达 8cm，每个辐射枝上具 1 长圆形穗状花序，长 10mm ~ 25mm。花序轴具翅和多数密生小穗，小穗平展或稍下垂，条状矩圆形，长 3mm ~ 5mm，宽不及 1mm，小穗轴有翅和少数鳞片，排成 2 行；鳞片长圆形，长约 3mm，淡黄色或绿白色，宿存而与小穗轴一起脱落；花两性，无花被，生于鳞片腋间；雄蕊 3；子房上位，花柱短，柱头 3。小坚果狭长圆形，有 3 棱，长约为鳞片的 2/3，麦秆色，表面具细微突起。

生于山坡阳处、路旁草地、溪边及林下。分布于我国华东、西南、华南、华中地区。亚洲、非洲和大洋洲的热带和亚热带地区常见。

采收加工 夏、秋采收带根全草，洗净，晒干。

药材性状 根状茎短，下生多数须根。茎三棱形，基部膨大，有多数具叶的鞘，鞘褐色或红棕色，封闭。叶线形，与茎近等长，宽 3mm ~ 6mm。聚伞花序顶生，基部有叶状总苞片 5 ~ 8 枚，长于花序；辐射枝 5 个 ~ 12 个，长短不等，最长约 8cm 或有时短缩，上部有长圆形穗状花序，序轴有翅，具多数平展或稍下垂的小穗，小穗轴具白色宽翅及小鳞片。小坚果长圆形，具 3 棱，麦秆黄色。气微，味淡。以须根多、带花穗者为佳。

性味和功用 辛、微苦、甘，平。归肝经。祛风止痒，解郁调经，散瘀消肿。用于皮肤瘙痒，月经不调，血崩，经闭，心腹疼痛，慢性子宫内膜炎，跌打损伤，风湿痛。常用量 15g ~ 30g。



图 3　砖子苗

大盖球子草

别名 船儿草。

来源 本品为百合科植物大盖球子草 Peliosanthes macrostegia Hance 的干燥全草。

原植物 大盖球子草(图 4)为多年生草本。茎短，长约 1cm，叶 2～5 枚，披针状狭椭圆形，长 15cm～25cm，顶端渐尖，基部楔形，全缘，主脉 5～9，凸起；叶柄长 20cm～30cm。花葶长 15cm～35cm；总状花序长 9cm～25cm；苞片膜质，披针形或卵状披针形，长 6mm～15mm，每 1 苞片内生 1 朵花；小苞片 1 枚，长 3mm～5mm；花紫色，直径 5.5mm～12mm；花被筒短，部分与子房合生，裂片 6，三角状卵形，为花被全长的 23；雄蕊 6，花丝合生成肉质环，顶端波状，花药长 0.5mm～1mm；子房半下位，3 室，每室有 3 个～4 个胚珠，花柱粗短，柱头 3 裂。蒴果；种子小，核果状，近圆形，具肉质外种皮，蓝绿色。

生于海拔 350m～1 500m 处的灌丛中和竹林下。分布于四川、贵州、云南、湖南、广东、广西、台湾等省(自治区)。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 根粗壮，细长圆柱形，表面淡黄色。茎短或不明显。叶黄绿色，2～7 枚，基生，披针状狭椭圆形，具平行脉；叶柄长。花葶长 15cm～35cm，紫色；苞片膜质，紫色，每 1 苞片内有小花 1 朵；花紫色，直径 1cm 以下，基部短筒状，部分与子房合生，裂片 6，花丝合生成肉质环，顶端波状，花药长 0.5mm～1mm。蒴果具小核果状种子，种皮肉质。以根粗壮、淡黄色、叶绿者为佳。

性味和功用 甘、淡，微温。活血化瘀，开胃，健脾，补气。用于跌打损伤，郁气伤肝。常用量 6g～20g。外用适量捣烂敷患处。

附注 大盖球子草根活血化瘀，祛痰止咳，用于跌打损伤，咳嗽痰多等症。



图 4　大盖球子草

小　木　通

别名　威灵仙、铁脚灵仙、丝瓜花、小黑药、大灵仙。

来源　本品为毛茛科植物毛蕊铁线莲 Clematis lasiandra Maxim. 的干燥带根全株。

原植物　毛蕊铁线莲(图 5)为攀援草质藤本。三出复叶、羽状复叶对生，连叶柄长 9cm～15cm，小叶卵状披针形，长 3cm～6cm，顶端渐尖，基部宽楔形或圆形，边缘有锯齿，叶柄长 3cm～6cm，基部膨大隆起。聚伞花序腋生，有花 1 朵～3 朵，花序梗长 1.5cm～2.5cm，幼时被毛；花萼钟状，直径约 2cm，粉红色至紫色，萼片 4，卵圆形至长方椭圆形，长 1cm～1.5cm，直立，边缘被绒毛；花瓣无；雄蕊多数，与萼片近等长，花丝线形，密生长柔毛，药隔外面被毛；心皮密被向上的绢状毛。瘦果卵形或纺锤形，棕红色，长约 3mm，被毛，宿存花柱长 2cm～3.5cm，被绢状毛。

生于沟边、山坡荒地及灌丛中。分布于我国东部、南部、西南部和西北部。日本也有。

采收加工　夏、秋季采挖带根全草，晒干。

药材性状　根茎呈不规则圆柱形，长 1.5cm～3.5cm，径约 2.5cm，表面灰黄色至灰棕色，顶端常残留木质茎基。根细长圆柱形，稍扭曲，长 10cm～20cm，直径 1mm～2mm，表面棕褐色，具细纵纹。茎圆柱形，幼嫩部分具柔毛。叶对生，三出复叶至二回三出复叶，叶柄基部膨大隆起；小叶黄绿色，多卷缩，展开后为卵状披针形或狭卵形，长 3cm～6cm。萼片紫红色，两面光滑，仅在边缘和反卷的顶端部分被绒毛；花丝外面及两侧被紧贴的柔毛；心皮密被绢状毛，花柱被长柔毛。瘦果卵形或纺锤形，棕红色，被毛，具宿存花柱。质轻，易折断。气微，味淡。以根茎粗壮、根条多者为佳。

性味和功用　淡，平。归肺、肾经。舒筋活血，去湿止痛，解毒利尿。用于筋骨疼痛，四肢麻木，腹胀，无名肿毒，目翳，小便赤短。常用量 15g～30g；外用适量煎水洗。



图 5　毛蕊铁线莲

小斑叶兰

别名 小叶青、麻叶青。

来源 本品为兰科植物小斑叶兰 Goodyera repens(L.) R. Br. 的带根全草。

原植物 小斑叶兰(图 6)为多年生草本,高 8cm ~ 25cm。根状茎伸长,匍匐。茎直立,单一,被白色腺毛,生数枚基生叶。叶片卵状椭圆形,长 1.5cm ~ 3cm,顶端锐尖或稍钝,基部宽楔形至圆形,全缘,上面绿色,有白色不规则条纹和黄褐色斑点,下面灰绿色;叶柄基部鞘状抱茎。总状花序顶生,具数朵至 10 余朵花,花序轴被腺毛;花苞片披针形,长超过子房;花小,白色,或带绿色或带粉红色,萼片外面被腺毛,中萼片长 3mm ~ 4mm,与花瓣靠合成兜状,侧萼片椭圆形或卵状椭圆形,与中萼片等长或略长,顶端钝;唇瓣舟状,长 3mm ~ 3.5mm,基部凹陷成囊状,内面无毛,无爪,不裂;合蕊柱短,与唇瓣分离,蕊喙直立,2 裂,裂片长可达 1.5mm;柱头 1 个,较大,位于蕊喙之下;子房扭转,疏生腺毛,几无柄。蒴果纺锤形,下垂。

生于林下阴湿处。分布全国各地。欧洲、北美洲、亚洲其他国家也有。

采收加工 夏、秋季采挖,洗净,晒干或鲜用。

药材性状 本品根状茎圆柱形,斜升,直径约 2.5mm;表面棕黑色,节明显,节上生数条粗壮细长圆锥柱形根;根长 3cm ~ 7cm,径 1.5mm ~ 2mm,褐色,表面绒毛状,茎圆柱形,径约 2mm,表面棕色,被腺毛。叶数枚生茎基部,卷缩,展开后呈卵状披针形,长 1.5cm ~ 3cm,宽 1.2cm ~ 1.8cm,下面棕红色,上面黑褐色,具黄褐色斑纹,叶柄长约 1.5cm,基部鞘状抱茎。总状花序顶生,花小,多数,棕红色,苞片披针形,远长于子房。气微,味淡。以具根及花序者为佳。

性味和功用 甘、辛,温。归肺、肾、心、肝经。清热解毒,活血止痛,软坚散结,补肾。用于肺肾虚弱,喘咳,头晕,目眩,遗精,阳萎,腰膝疼痛,肺结核咳嗽,支气管炎,淋巴结核,虫蛇咬伤,痈疖疮疡,跌打损伤。常用量 15g ~ 30g;外用鲜品适量捣烂敷伤处。



图 6　小斑叶兰

小 活 血

别名 小红参。

来源 本品为茜草科植物西南拉拉藤 Galium elegans Wall. ex Roxb. 的干燥全草。

原植物 西南拉拉藤(图 7)为多年生草本，高 30cm ~ 40cm。须根多数，红色或紫红色。茎具 4 棱，有分枝，棱上有倒向毛。叶 4 枚轮生，无柄；叶片纸质，椭圆形、卵形至卵状披针形，长 0.8cm ~ 2cm，顶端钝尖，基部宽楔形至近圆形，边全缘，明显反卷，上面粗糙无毛，下面有淡黄色圆形腺点，最少在脉上散生糙毛，基出脉 3 条。聚伞花序顶生和腋生，稍疏散而柔弱；花小，单性，绿白色，花梗纤细，长 1mm ~ 5mm，萼管卵形，无萼檐；花冠辐状，裂片 4，倒卵形；雄蕊 4，直立；子房下位，花柱 2，柱头小，头状。果小，果分单生或双生，半球形，密被白色钩状长柔毛。

生于海拔 1 800m ~ 3 300m 的路旁、田间、旷野和松林下。分布于四川、云南、青海、西藏等省(自治区)。印度、巴基斯坦、不丹、尼泊尔、锡金、缅甸也有。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 本品根呈细长圆柱形，有分枝，多数丛生于短小根茎上，长 5cm ~ 15cm，直径 1mm ~ 1.5mm；表面深棕红色或紫红色，有细微皱纹；质脆，易折断，断面露出浅红色的木质部。茎具 4 棱，棱上有倒向硬毛，有分枝。叶 4 枚轮生，无柄；叶片灰绿色，卷缩，展开后呈卵形，椭圆形或卵状披针形，长 0.8cm ~ 2.5cm，宽 0.5cm ~ 1.2cm，边全缘反卷，上面粗糙、下面有淡黄色圆形腺点，脉上散生糙毛；基出脉 3 条，明显。聚伞花序顶生和腋生。气微，味涩。以根棕红或紫红色、叶片完整色绿者为佳。

性味和功用 甘、涩，平。归肝、脾经。清热消炎，活血补血，软坚散结。用于跌打损伤，便血，尿血，白血病，痈疮肿毒，乳腺癌。常用量 15g ~ 60g；外用适量捣烂敷患处。



图 7　西南拉拉藤

1. 根　2. 地上部分　3. 花放大

小猪棕草

别名 猪毛参。

来源 本品为蕨类铁线蕨科植物普通铁线蕨 Adiantum edgeworthii Hook. 的全草。

原植物 普通铁线蕨(图 8)为多年生草本，高 10cm～30cm。根状茎短，直立，被鳞片。叶簇生，柄长 5cm～8cm，棕色，基部密生鳞片；叶片线状披针形，长 6cm～23cm，顶端长渐尖，有时叶轴延伸成鞭状，顶端着地生芽苞并萌发为新植株，基部近截形，一回羽状，羽片 14 对～22 对，互生，略斜向上，有短柄，对开式的三角形，长 1cm～1.5cm，钝头，内缘稍凹入，与叶轴近平行，下缘直，均全缘，上缘浅裂；叶脉扇形分叉。孢子囊群生于由羽片上缘裂片反折的囊群盖下面，囊群詹矩圆形、短线形或半圆形，无毛。

生于海拔 700m～2 500m 的林下湿地、山坡草丛或岩壁上。分布于云南、四川，贵州，甘肃，陕西，河南，河北，山东，辽宁，台湾等省。印度、尼泊尔、缅甸、越南、菲律宾、日本也有。

采收加工 秋季采挖，洗净，鲜用或晒干。

药材性状 本品全长 10cm～30cm。根状茎短，直立，被披针形鳞片，鳞片中间紫棕色或黑褐色，边缘棕色；须根多数。叶簇生，叶柄长 5cm～8cm，圆柱形，棕色至深棕色，光亮，基部密生披针形褐色鳞片；叶片线状披针形，长 6cm～22cm，一回奇数羽状，羽片互生，三角形或斜矩圆形，灰绿色，有的微皱缩，下部的长 1cm～1.5cm，宽 4mm～8mm，中部以上的渐小，纸质，叶轴顶端常延伸，具顶芽或无，叶脉 2 回分叉状。孢子囊群矩圆形或短线形，生羽片上缘反折的裂片内。气微，味淡。以带根、叶多而色绿者为佳。

性味和功用 微苦，凉。具通淋，利尿，消炎之功。用于尿道感染，小便不利，淋浊，带下，红白痢疾，刀伤。常用量 9g～30g。外用适量捣烂敷伤处。



图 8　普通铁线蕨

1. 全株　2. 叶放大示孢子囊群盖

车 前 草

别名 车前、蝼蚂叶。

来源 本品为车前草科植物平车前 Plantago depressa Willd 的干燥全草。

原植物 平车前(图 9)为多年生草本，高 5cm～30cm。叶基生，椭圆状披针形或卵状披针形，长 4cm～11cm，顶端急尖或渐尖，弧行纵脉 5 条～7 条；叶柄长 1.5cm～3cm。花茎数条，穗状花序生顶部，长 4cm～10cm，约为花茎长的 13～12，具柔毛，上部花密生，下部花较稀疏；苞片三角状卵形，长约 2mm，萼片 4，基部稍连合，有短柄，裂片宽椭圆形，长约 2mm，宿存，边缘白膜质；花冠管卵形，顶端 4 裂，裂片椭圆形或卵形，顶端有浅齿；雄蕊 4，稍超出花冠；雌蕊 1，子房二位，卵圆形，花柱 1，有毛。蒴果圆锥形，长约 3mm，周裂；种子细小，4 个～5 个，椭圆形，长约 1.5mm，黑棕色。

生于山坡、路旁、田埂、河边。分布于长江流域及其以北地区。原苏联亚洲地区、蒙古、日本、印度也有。

采收加工 夏季秋收，洗净，晒干。

药材性状 干燥的全株长 5cm～30cm。直根圆柱状，具扭曲纵沟纹，稍弯曲，长 3cm～7cm，具数条支根及多数须根；表面棕褐色，粗糙。叶灰绿色或污绿色，皱缩，展平后呈长椭圆形、椭圆状披针形或卵状披针形，具明显弧行脉 5 条～7 条；顶端钝尖或渐尖，有不规则锯齿或远离小齿，两面多少具白色柔毛。穗状花序数条，顶端有残留蒴果和盖裂后的蒴瓣及宿萼，有时可见小花。气微，味苦而带粘液性。以叶多、灰绿色、具果穗者为佳。

性味和功用 甘，寒。归手太阳、阳明经。利水，清热，明目，祛痰。用于小便不通，淋浊，带下，尿血，黄疸，水肿，热痢，泄泻，鼻衄，目赤肿痛，喉痛，咳嗽，皮肤溃疡。常用量 9g～15g。外用适量捣汁或捣烂敷。

附注 参阅本图集第一册 342 页车前子附注。



图 9　车前草

中华水芹

别名 野芹菜、野红萝卜、野白芷。

来源 本品为伞形科植物中华水芹 Oenanthe sinensis Dunn 的全草。

原植物 中华水芹(图 10)为多年生草本，高 20cm～70cm。须根束状。茎基部匍匐，节上生根，上部直立。叶互生，1～2 回羽状分裂，柄长 5cm～10cm，微抱茎；茎下部叶末回裂片楔状披针形或线状披针形，长 1cm～3cm，边全缘或羽状半裂；茎上部叶末回裂片通常线形，长 1cm～4cm。复伞形花序顶生与腋生，花序梗长 4cm～7.5cm；无总苞；伞幅 4～9，不等长，长 1.5cm～2cm，微粗糙；小总苞片线形，多数，长 4mm～5mm；小伞形花序有花 10 余朵，花梗长 3mm～5mm；花白色，萼齿 5，三角形或披针状卵形，长约 0.5mm；花瓣 5，倒卵形，顶端有内折的小舌片；雄蕊 5；花柱直立，长约 3mm，基部圆锥形。双悬果矩圆形，长 2.5mm～3mm，宽 1mm～2mm，果侧棱略轻中棱和背棱厚，棱槽狭窄，有油管 1，合生面油管 2。

生于水田、沼泽地及山坡路旁湿地。分布于安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北、四川、云南、广东、广西等省(自治区)。

采收加工 夏季采收，鲜用或晒干。

药材性状 茎圆柱形，褐黄色，具细纵条纹，光滑，基部匍匐，节上生须根，不分枝或上部有短分枝。叶 1～2 回羽状分裂，多卷曲或破碎；叶柄长 5cm～10cm，基部成广卵形鞘状，微抱茎，黄绿色，茎下部叶末回裂片楔状披针形或线状披针形，长 1cm～3cm，宽 2mm～10mm，边缘羽状半裂或全缘，茎上部叶末回裂片线形，长 1cm～4cm，宽 1mm～2mm。复伞形花序顶生与腋生。气微，味甘。以叶色绿者为佳。

性味和功用 甘，平。消肿，健脾，开胃，清火，除湿。用于水肿，黄疸，牙痛，风湿麻木，跌打损伤。常用量 15g～30g；外用适量捣烂敷患处。



图 10　中华水芹

1～2. 全株　3. 花放大　4. 双悬果放大

水 川 芎

别名 山芹菜草。

来源 本品为伞形科植物卵叶水芹 Oenanthe rosthornii Diels 的干燥全草。

原植物 卵叶水芹(图 11)为多年生草本，高 50cm～70cm。茎粗壮，下部匍匐，上部直立，被柔毛。叶互生，叶柄长 5cm～14cm；叶片轮廓卵形或宽三角形，长 7cm～15cm，宽 8cm～13cm，为二回三出式羽状复叶，小叶片菱状卵形或长圆形，长 3cm～5cm，顶端渐尖或尾尖，基部宽楔形或近圆形，边缘有楔形齿或尖锯齿。复伞形花序顶生和侧生，花序梗长 16cm～20cm；无总苞；伞幅多数，不等长，长 2cm～6cm；小总苞片披针形，长 2mm～6mm；小伞形花序有花 30 余朵，花梗长 2mm～5mm；萼齿 5，披针形，长不及 1mm；花瓣 5，倒卵形，白色，长 1mm～1.5mm，顶端有 1 内折的小舌片；雄蕊 5，伸出；花柱基圆锥形，花柱直立。果实椭圆形，长 3mm～4mm，宽约 2mm，侧棱较背棱和中棱隆起，木栓质，分生果剖面半圆形，每棱槽内油管 1，合生面油管 2。

生于海拔 1 400m～4 000m 的山谷林下、水沟边、草丛中。分布于湖南、四川、云南、贵州、广东、广西等省(自治区)。

采收加工 夏、秋季采收，晒干。

药材性状 茎长约 60cm，圆柱形，黄绿色，具纵棱，被柔毛，下部匍匐，节上生白色须根。叶互生，二回三出式羽状复叶，叶柄长 5cm～14cm；小叶皱缩破碎，完整者呈菱状卵形或长圆形，长 3cm～5cm，宽 1cm～3cm，顶端长渐尖，边缘有锯齿，两面无毛，灰绿色。复伞形花序顶生和侧生，总梗长，无总苞，伞幅多数；花梗多数。气微，味淡。以茎粗壮、叶色绿者为佳。

性味和功用 甘、微辛，平。补气血，止血，发表祛寒。用于外伤出血，感冒。常用量 15g～30g。



图 11　卵叶水芹

1. 根　2. 带花枝叶　3. 去雄蕊的花　4. 双悬果

水母雪莲花

别名 雪莲花、水母雪莲、雪莲、大木花。

来源 本品为菊科植物水母雪莲花 Saussurea medusa Maxim. 的干燥带花全株。

原植物 水母雪莲花(图 12)为多年生草本，高 8cm～25cm。根状茎颈部分枝，发出数个莲座状叶丛。叶密集，螺旋状着生，下部叶倒卵形或扁卵形连柄长达 10cm，顶端钝或圆形，上部叶渐小，卵形，最下部叶线状披针形，边缘具浅齿，下反。头状花序多数，无梗或有短梗，顶生，密集呈半球形；总苞狭筒形，长 10mm～15mm，膜质，线状长圆形，顶端钝至尾尖，被毛，黑紫色；花管状，8 朵～10 朵，蓝紫色，长 10mm～12mm，檐部 5 列；雄蕊 5，聚药。瘦果线状披针形，长 7mm～9mm，黑色；冠毛白色，外层较短，内层羽毛状。

生于高山多砾石山坡和流石滩。分布于青海、甘肃、四川、云南、西藏等省区。

采收加工 6 月～8 月开花时采收，晒干。

药材性状 全体呈绵球状或圆柱形。根单一，圆锥形，直径可达 2cm，表面黑褐色或黄褐色，质脆，易折断，断面不平整，类白色或黄白色。茎长 7cm～25cm，密被白色或灰白色长绵毛，茎基部有残存黑色叶基，呈覆瓦状，密集排列，膜质。茎中部至顶部的叶片密集，皱缩卷曲，密被白色长绵毛。完整叶片长卵形、长倒卵形、长圆形、菱形、线状匙形，边全缘或有条裂。头状花序集生茎顶，呈半球形；花管紫色、紫红色。稀见瘦果，具白色或灰白色长冠毛，密集成毡状，形似灰白色的绒球，直径 4mm～8mm，可见紫色或紫红色花柱。质轻泡，气微，味微苦、涩。以根粗壮、花大者为佳。

性味和功用 微苦甘，温。归肝、脾、肾经。强筋壮阳，舒筋活络，补肾，活血，调经。用于风湿性关节炎，肾虚腰痛，阳痿，牙痛，月经不调，肺寒咳嗽，外伤出血，崩漏，带下，遗精，胎衣不下，炭疽病，中风，血热病引起的头痛。常用量 1g～3g，水煎或泡酒服。



3



1



2

图 12　水母雪莲花

1. 幼株　2. 带花全株　3. 花放大

风 顶 红

别名 水爆腰果、酸猴儿、伏毛肥肉草。

来源 本品为野牡丹科植物异药花 Fordiophyton faberi Stapf 的干燥全草。

原植物 异药花(图 13)为草本或亚灌木，高 30cm～80cm。茎四棱形，不分枝。叶对生，通常在一个节上的叶大小差别较大，广披针形至卵形，稀披针形，长 5cm～16cm，顶端渐尖，基部浅心形，稀近楔形，边缘具不明显细锯齿，上面被紧贴的微柔毛，下面无毛或被极不明显的微柔毛及白色小腺点，基出脉 5 条～7 条，明显；叶柄长 1.5cm～4.5cm，常被白色腺点，近叶片处具短刺毛。伞形花序或短缩聚伞花序顶生，总梗长 1cm～3cm，基部有 1 对叶，常早落；伞梗基部有 1 圈苞片，长约 1cm；花萼长漏斗形，具 4 棱，长约 1.5cm，被腺毛及白色小腺点，裂片 4，卵状三角形，被疏腺毛及腺点；花瓣 4，红色或紫红色，长圆形；雄蕊 8，4 枚较大，4 枚较小，花药长，基部二裂而凸出；子房下位，4 室。蒴果倒圆锥形，顶孔 4 裂。

生于海拔 400m～1 500m 的山谷、林下或沟边灌丛中。分布于云南、四川、贵州等省。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 本品茎呈四棱形，具槽纹，不分枝，稍柔软肉质，节处略膨大。叶对生，多皱缩或卷曲破碎，完整者湿润，展平后呈宽披针形、卵形、椭圆状披针形至披针形，长 5cm～16cm，宽 2cm～5cm，顶端渐尖，基部浅心形或楔形，基出脉 5～7，微凸。聚伞花序缩短成伞形状，顶生，伞梗基部有 1 圈覆瓦状排列的近圆形苞片，长约 1cm，膜质，淡紫红色；花萼长漏斗形，具四棱，4 裂；花瓣 4，紫红色，长圆形；雄蕊 4 长 4 短，花药线形，弯曲，不等大，基部羊角状。蒴果倒圆锥形。气微，味淡。以茎粗壮、叶多者为佳。

性味和功用 苦，凉。清热，除湿，消肿，解毒。用于肺热咳嗽，湿热泻痢，疮疖肿毒，风湿筋骨痛。常用量 9g～15g；外用适量捣烂敷患处。

附注 异药花鲜叶捣汁外搽治漆疮。



图 13　异药花

毛　药

别名　红丝线、血见愁、十萼茄。

来源　本品为茄科植物十萼茄 Lycianthes biflora(Lour.)Bitter 的干燥全草。

原植物　十萼茄(图 14)为半灌木状草本，高 50cm～150cm，全体密被淡黄色柔毛。叶互生，在枝上部者双生，大小不等，卵形，长 5cm～15cm，顶端渐尖，叶柄长 1cm～4cm；花常 2 朵～3 朵(稀 1 朵或 4 朵～5 朵)，生于叶腋，花梗长 5mm～8mm；花萼杯状，被毛，长约 3mm，径约 3.5mm，萼齿 10，钻状线形；花冠星状，直径 8mm～12mm，5 裂至中部，裂片卵状披针形，冠檐基部具深色斑点；雄蕊 5，花药顶孔开裂；子房卵圆形，2 室，浆果球形，直径 6mm～8mm，成熟后绯红色，宿存萼盘状，齿长 4mm～5mm；种子卵状三角形。

生于海拔 150m～2 000m 阴湿的山沟、路旁阴湿处、林下或水边。分布于我国东部、中部、南部和西南部。印度、锡金、印度尼西亚、日本、马来西亚也有。

采收加工　夏、秋季采收，切段，晒干或鲜用。

药材性状　本品全体密被淡黄色柔毛，尤以幼枝为最多。茎圆柱形，有分枝，长 20cm～60cm，直径 3cm～10cm；外表黄绿色或绿褐色，具纵皱纹；质脆，易折断，断面纤维性。叶皱缩或破碎，在中下部者互生，在枝上部者双生，润湿展开后大小不等，卵形或椭圆状卵形，长 5cm～15cm，宽 3cm～7cm，基部急狭并下延至叶柄上。花 2 朵～3 朵或 1 朵、有时 4 朵～5 朵生于叶腋，星状，淡黄褐色。果实干缩球形，暗红色宿存萼盘状，具 10 枚钻状线形、长 4mm～5mm 萼齿。气微，味淡。以干燥、叶色绿者为佳。

性味和功用　淡，微凉。清热解毒，止咳，补虚。用于狂犬病，疔疮红肿，蛇咬伤，外伤出血，虚劳咳嗽，久咳，消化不良，血崩，骨鲠。常用量 6g～15g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图 14　十萼茄

木 莲 金

别名 晒不死。

来源 本品为蕨类书带蕨科植物书带蕨 Vittaria flexuosa Fée 的干燥全草。

原植物 书带蕨(图 15)为多年生常绿草本，高 20cm～45cm。根状茎短而横走，连同叶柄基部密被鳞片；鳞片线形或钻状披针形，长 5mm～6mm、顶端有小齿，黑褐色有虹色光彩；须根细密。叶近生，厚革质，线形，长 30cm～40cm，宽 3mm～8mm，顶端渐尖，基部长渐狭，边全缘，稍反卷，上面深绿色；主脉在上面下凹成狭沟状，在下面稍隆起，侧脉稀疏，斜上和并行与边脉相连，组成斜长网眼，叶柄极短或长 1cm～3cm。孢子囊群生于边脉上，远离主脉，连续不中断成狭线形，幼时为反卷的叶边覆盖，成熟时露出，棕褐色，孢子囊群内有具长柄的杯状隔丝。

附生于海拔 520m～2 300m 间林中树干上或岩石上。分布于福建、台湾、广东、广西、湖南、江西、四川、云南、贵州、西藏等省(自治区)。日本、朝鲜、锡金、尼泊尔、印度、缅甸、泰国也有。

采收加工 全年均可采收，晒干或鲜用。

药材性状 根状茎粗短，圆柱形，密被线形或钻状披针形鳞片，下部具细密须根；鳞片黑褐色，有虹色光彩。叶柄短，具鳞片；叶片丛生，弯曲，褐棕色，线形，长 30cm～40cm，基部渐狭并下延几达叶柄基部，中脉在上面凹入，在下面稍隆起，沿下面两侧叶缘有一行连续不中断的狭线形孢子囊群，棕褐色。气无，味微涩。以叶多、色褐棕、孢子成熟者为佳。

性味和功用 苦、涩，凉。清热息风，舒筋活络，补虚。用于小儿急惊风，疳积，妇女干血痨，目翳，瘫痪，跌打损伤。常用量 30g～90g。外用鲜品，适量捣绒敷患处。



图 15　书带蕨

汉荭鱼腥草

别名 猫脚印、狗脚血迹、老鹳草。

来源 本品为牛儿苗科植物纤细老鹳草 Geranium robertianum L. 的干燥全草。

原植物 纤细老鹳草(图 16)为一年生草本，高 25cm～40cm。茎直立或下部斜升，瘦弱，多分枝，略有白色柔毛。叶对生，五角状圆形，长、宽均为 4cm～7cm，3～5 全裂；中央全裂片卵形，有长柄，羽状深裂，小裂片约 3 对，矩圆形，边缘具羽状缺刻或粗齿，有凸尖头；侧生全裂片柄较短；下部叶叶柄长度超过叶片 2 倍～4 倍，向上叶柄渐短。花成对生于叶腋，总花梗远较叶为长，小花梗与花等长或略短，在果期斜向上，无腺毛；萼片 5，披针形，有长白毛，3 脉，中脉隆起；花瓣 5，倒卵形，长约 8mm，红紫色，约为萼片的 2 倍长；雄蕊 10；子房上位，5 室。蒴果长 1.8cm～2.5cm，宿存萼紫红色。

生于海拔 1 000m～3 000m 山坡林缘或草丛中。分布于湖北、四川、云南、贵州、台湾等省。日本、欧洲也有。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 茎纤细，长约 30cm，直径 1mm～2mm，节间长，多分枝，略有白色柔毛，具纵皱纹，质较坚脆，易折断，断面纤维性，空心。叶对生，有长柄，叶片卷曲皱缩，质脆易碎，湿润展平后为五角状圆形，3～5 全裂，全裂片又再深羽裂，中央全裂片有长柄，侧生全裂片有短柄。花紫红色。果实长圆形，长约 2cm，有宿存的花柱及红紫色花萼，成熟后 5 裂，各与 1 枚种子相连，并向外反卷或卷曲成螺旋形。无臭，味淡。以色灰绿、果实多、无根及泥土者为佳。

性味和功用 苦、微涩，平。祛风除湿，散瘀消肿。用于风湿关节痛，跌打损伤，疮疖，蛇、狗咬伤。常用量 9g～15g 泡酒服或外用适量捣烂敷患处。



图 16　纤细老鹳草

石　　韦

别名　刀口药、石茶。

来源　本品为蕨类水龙骨科植物(1)庐山石韦 Pyrrosia sheareri(Bak.) Ching(2)有柄石韦 P. petiolosa(Christ)Ching 的干燥全草。

原植物　1. 庐山石韦(又名大石韦、光板石韦)。(图 17)为多年生常绿草本，高 20cm～60cm。根状茎粗短，横走或斜升，密被鳞片；鳞片披针形，棕褐色，边缘有锯齿。叶近簇生，厚革质，叶柄长 8cm～30cm，粗壮，棕褐色，被星状毛，基部有关节；叶片宽披针形，长 10cm～40cm，宽 3cm～6cm，顶端渐尖，基部较宽，为不等的圆耳形或心形，不下延，边全缘，上面绿色，无毛，有细密而不整齐的小凹点，下面密被黄棕色星状毛；中脉在下面略隆起，侧脉平行斜上沉叶肉内，末端直达叶缘。孢子囊群在侧脉间排列多行，布满叶下面或大部分，幼时为星状毛密盖，成熟时露出，无囊群盖；孢子两面型，常淡黄色。

生于林下岩石上或附生于树干上。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等省(自治区)。

2. 有柄石韦(又名金瓢羹、小石韦、独叶草)(图 18)为多年生常绿草本，高 6cm～20cm。根状茎细长，横走，密被褐棕色披针形鳞片，鳞片边缘有锯齿及稍曲卷的纤毛。叶远生，二型，厚革质；能育叶披针形，矩圆形或卵状矩圆形，长 3cm～9cm，顶端锐尖或钝，基部宽楔形略下延，全缘，上面绿色，无毛或疏被星状毛，有排列整齐的小凹点，下面密被灰棕色星状毛，叶脉不明显，叶柄远长于叶片；不育叶与能育叶同形，长为能育叶的 2/3～1/2，具短柄(和叶片约等长)。能育叶干后通常内卷。孢子囊群融合，满布于叶的下面，深褐色，无囊群盖。

生于裸露干旱的岩石上。分布于吉林、辽宁、河北、河南、陕西、山东、江苏、浙江、安徽、湖北、四川、贵州、云南等省。

采收加工　全年均可采收，除净根状茎和根，晒至半干，扎成小把，再阴干或晒干。

药材性状 叶片卷曲成筒状，展开后呈披针形，宽披针形或卵状矩圆形，长 3cm～9cm，宽 0.5cm～2cm，革质，二型，顶端钝尖，基部楔形，略下延，全缘，上表面灰棕色，无毛或疏被星状毛，散生黑色圆形小凹点，下表面密生粉棕色的中心有红点的星状毛，毛的分枝较短粗，中脉明显，侧细脉均不显。叶柄细，长于或等于叶片，直径 1mm～2mm，被棕色星状毛，有 1 纵浅槽，内面密生毛。气无，味微苦。以叶厚、完整者为佳。

性味和功用 苦、甘、微寒。归肺、膀胱经。利尿、通淋、清肺，止血、泄热。用于小便不利，尿血，尿路结石，淋痛，肾炎浮肿，肺热咳嗽，崩漏，痢疾，慢性气管炎，金疮，痈疽。常用量 5g～9g。

阴虚无湿热者忌服。

附注 1. 庐山石韦和有柄石韦均为《药典》收载的石韦品种。2. 孢子刮下后用菜油调敷治烫伤。




图 17　庐山石韦




图 18　有柄石韦

石 苦 蕻

别名 肉连环、果上叶。

来源 本品为兰科植物镰翅羊耳蒜 Liparis bootanensis Griff. 的全草。

原植物 镰翅羊耳蒜(图 19)为多年生草本，高 15cm ~ 30cm。须根多数；根状茎匍匐；假鳞茎密生，狭椭圆形或卵状圆锥形，顶生 1 叶。叶片近革质，线状矩圆形至狭倒披针形，长 12cm ~ 25cm，顶端急尖，基部收狭成柄，有关节，边全缘。花葶从假鳞茎顶端抽出，与叶近等长，直立或多少下垂，稍具翅。总状花序长约为花葶的一半，具数朵至 20 余朵花，花序轴有狭翅；苞片披针形，渐尖，短于花梗，长 5mm ~ 7mm；花较大，黄绿色，中萼片狭披针形，稍反折，长约 5mm、宽约 1. 3mm，侧萼片稍偏斜，与中萼片等长，位于唇瓣下面；花瓣线形，与萼片等长，反折，唇瓣楔状长圆形或长圆状倒卵形，褐黄色，中下部反折，顶端近截形，具齿，基部有 2 个胼胝体；合蕊柱近顶端的翅下弯呈镰刀状，端尖。蒴果。

附生于常绿阔叶林中树上或山谷岩石上。分布于福建、台湾、广东、广西、湖南、江西、贵州、四川、云南、西藏等省(自治区)。锡金、不丹、印度、中南半岛、马来西亚、菲律宾、日本也有。

采收加工 全年均可采收，晒干或鲜用。

药材性状 根状茎横生，中下部密生多数细圆柱形须根，上端密生假鳞茎。假鳞茎圆柱形、狭椭圆形或卵状圆锥形，长 1. 5cm ~ 3cm，肉质，具纵细皱纹，淡黄绿色，顶生 1 叶。叶片线状矩圆形至狭倒披针形，长 12cm ~ 25cm，宽 7mm ~ 32mm，近革质，黄绿色，基部收狭成柄，具关节，常断落。花葶从假鳞茎顶端抽出，稍具翅，总状花序具多数花；花浅褐色。气无，味微甘。以假鳞茎肥厚、肉质、具叶者为佳。

性味和功用 辛、甘，微温。归肺、脾经。清凉解毒，补脾，祛风除湿，活血调经。用于白浊，肺结核，瘰疬，疮疡，腹胀痛，血吸虫病腹水，小儿疳疾，腹泻，风湿筋骨疼痛，风寒咳嗽，跌打损伤。常用量 15g ~ 30g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图 19　镰翅羊耳蒜

石　刷　把

别名　松叶兰、铁刷把、岩扫帚。

来源　本品为蕨类松叶蕨科植物松叶蕨 Psilotum nudum(L.) Griseb. 的干燥全草。

原植物　松叶蕨(图 20)为多年生常绿草本，高 15cm～80cm。地下茎匍匐，二叉分枝，仅有毛状的吸收构造和假根，有菌根共生；地上茎直立或下垂，主茎通常 5 棱，下部不分枝，径 2mm～4mm，上部多次两歧分枝；小枝平滑，有 3 棱，密生椭圆形极小的白色气孔。叶退化成细小的鳞片，疏生于枝条棱上，厚革质，有角质层，无气孔，表面凸凹不平；营养叶生主枝或分枝下部，卵状披针形或三角形，长 1mm～3mm，宽不及 2mm，尖头，多少紧贴小枝，孢子叶生上部分枝，宽卵形，长和宽均约 2mm，顶端叉状分开。孢子囊球形，蒴果状，具短梗，生于孢子叶腋内，3 室，成熟时纵裂，每室含孢子 1 个；孢子同形，肾状。

生于海拔 200m～2 000m 间的石缝中或附生于树干上。分布于台湾、广东、广西、福建、江苏、浙江、安徽、陕西、四川、贵州、云南等省(自治区)。亚洲热带其他地区也有。

采收加工　全年均可采收，晒干。

药材性状　全体成刷把状。茎下部 5 棱形，上部 3 棱形，灰绿色、光滑，直径约 2mm～4mm，多回 2 歧分枝，密生极细的小白点(气孔)。叶退化为鳞片状，卵状披针形、三角形或宽卵形，长 1mm～2mm，革质，疏生于棱上，灰绿色，上部叶腋内有孢子囊。孢子囊球形，黄褐色，3 室，蒴果状，具短梗。气无，味微涩。以枝多丛生，色灰绿者为佳。

性味和功用　甘、辛、涩、温。归心、肝、胃经。祛风通络，消炎解毒，利水止血。用于风湿麻木，痨伤，跌打损伤，闭经，咳血，内伤吐血，肝炎，肾炎水肿，泌尿系结石，久痢，蛇咬伤，骨痛。常用量 9g～30g，水煎或浸酒服。外用适量研末服。

附注　广西民间常将该品作滋补强壮药。




图 20　松叶蕨

1. 全株　2. 孢子囊放大

石生繁缕

别名 筋骨草、抽筋草、大鹅儿肠。

来源 本品为石竹科植物石生繁缕 Stellaria saxatilis Buch. - Ham. 的干燥全草。

原植物 石生繁缕(图 21)为多年生草本，高 60cm ~ 100cm。茎匍匐，丛生，细圆柱形，上部密生星状柔毛，分枝稀疏。叶对生，卵状椭圆形，卵状披针形或狭卵形，长 2cm ~ 3.5cm，有时更长，顶端长锐尖，基部楔形或近圆形，全缘，两面均被星状柔毛，下面毛较密；叶柄短或近无。聚伞花序细弱，腋生或生于二分枝叉间；总花梗较长，苞片和小苞片叶状，花梗长短不等，均被星状柔毛；萼片 5，披针形，长约 4mm，顶端锐尖，边缘膜质，花瓣 5，比萼片稍短，顶端 2 深裂达基部，白色，裂片线状披针形；雄蕊 10，花丝极细；花柱 3 或 4。蒴果和宿存萼近等长，成熟后 5 ~ 6 瓣裂；种子多数，近黑色，表面有瘤状突起。

生于海拔 600m ~ 1 600m 处的路边、山坡、山沟、乱石滩或石隙中。分布于陕西、甘肃、河南、河北、四川、云南、贵州、西藏、湖北、台湾等省(自治区)。日本、原苏联、印度、印度尼西亚、尼泊尔也有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干。

药材性状 本品多皱缩成不规则松散团块状，全长 60cm ~ 100cm。茎细圆柱形，直径 1mm ~ 2mm，灰绿色，上部密生短柔毛，分枝稀疏，皮部易剥落，内有黄白色丝状柔韧的维管束。单叶对生。灰绿色或黄绿色，多皱缩或破碎，完整者展开后呈卵状椭圆形、狭卵形或卵状披针形，长 2cm ~ 3.5cm，宽 8mm ~ 12mm，两面有星状柔毛，下面毛较密。聚伞花序腋生，密被星状绒毛，细弱；花瓣顶端 2 深裂达基部，裂片线状披针形，黄褐色。气微，味微苦。以叶多、色绿者为佳。

性味和功用 苦、辛、平。归肝经。清热利湿，平肝息风，舒筋活血。用于小儿惊风，风湿骨痛，跌打损伤，肢体麻木抽筋，疼痛，中风，浮肿，白带，伤寒发热，黄疸型肝炎。常用量 15g ~ 30g。



图 21　石生繁缕

1. 全株　2. 叶背面放大　3. 花放大

四 块 瓦

别名 重楼排草、四大天王、四儿风、大四块瓦、一把伞。

来源 本品为报春花科植物落地梅 Lysimachia paridiformis Franch. 的干燥全草。

原植物 落地梅(图 22)为多年生草本，高 10cm ~ 45cm。茎通常 2 至数条簇生，直立。叶 4 片 ~6 片在茎端轮生，极少出现第二轮，倒卵形至椭圆形，长 5cm ~ 17cm，顶端短渐尖，基部楔形，全缘，上面光绿色，下面淡绿色，两面可见腺状斑点；无柄或近无柄。花集生于茎端成伞形花序，有时亦有少数花生于近茎端的 1 对鳞片状叶腋内；花梗长 5mm ~ 15mm；花萼长 8mm ~ 12mm，5 裂几达基部，裂片披针形或自卵形的基部长渐尖，无毛或具疏缘毛，有时具稀疏黑色腺条；花冠黄色，长 12mm ~ 14mm，基部合生部分约 3mm，裂片 5，狭长圆形，顶端钝或圆形；雄蕊 5，花丝基部合生；子房球形，花柱细长。蒴果近球形，直径 3.5mm ~ 4mm，成熟后 5 瓣裂。

生于海拔 1 400m 以下的山谷林下湿润处。分布于四川、贵州、湖北、湖南等省。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 根茎粗短或块状；根簇生，纤维状，直径约 1mm，密被黄褐色绒毛。茎 2 ~ 多条簇生。不分枝，节部明显而稍膨大。叶 4 片 ~6 片轮生茎端，1 轮，偶有 2 轮，卷缩，坚纸质，展开后呈倒卵形至椭圆形，茎下部具鳞片状叶，无毛，两面散生黑色腺条或条状隆起；侧脉 4 对 ~5 对，几无柄。伞形花序集生茎端，有花数朵至 10 余朵；花梗短；花冠黄色或棕黄色，5 深裂。如为果株，则可见近球形小蒴果。以根茎粗壮，叶色绿者为佳。

性味和功用 苦、辛，温。祛风除湿，活血止痛，止咳，解毒散瘀。用于风湿麻木，脘腹冷痛，产后腹痛，风寒咳嗽，肺寒久咳，跌打损伤，疔肿，蛇虫咬伤，月经不调。常用量 15g ~ 25g。外用适量捣烂敷患处。

附注 《重庆中草药》误定拉丁名为 L. patugensis Hand. Mazz.，实误。



图 22　落地梅

1. 根　2. 带花茎叶

四 棱 香

别名 大叶紫苏、野大麻。

来源 本品为唇形科植物峨眉冠唇花 Microtoena omeiensis C. Y. Wu et Hsuan 的全草。

原植物 峨眉冠唇花(图 23)为多年生草本，高 1m ~ 2m。茎锐四棱形，疏被具节柔毛。叶对生，长卵圆形或三角状卵圆形，长 4cm ~ 13cm，顶端长尾状渐尖，基部宽楔形，截形或心形，边缘为具小凸尖的粗圆齿，膜质，上面深绿色，被极疏的具节小刚毛，下面色较淡或近顶端者带红色，脉上被极疏短伏毛、稀无毛；叶柄长达 13cm，扁平、具条纹。二歧聚伞花序腋生，连总梗在内长约 3cm；总梗长 1cm ~ 1.6cm，纤细，被疏毛；苞片披针形，长 2mm ~ 3mm，早落；花萼钟形，长约 5mm，外面被尘状腺毛，沿肋及齿缘被小刺毛，齿 5，三角状披针形，后面 1 齿长约为前 4 齿的 2 倍，果时花萼囊状增大，网脉明晰；花冠淡黄色，长约 3cm，外被微柔毛，筒基部宽约 1.8mm，喉部宽约 7mm，檐部 2 唇形，上唇盔状，直立，基部截形，两侧有爪，下唇 3 裂，中裂片较长，长圆形；雄蕊 4；花柱顶端不等，2 裂。小坚果倒卵形。

生于海拔 1 500m ~ 1 700m 的空旷草地上。分布于四川省。

采收加工 夏季采收，晒干或鲜用。

药材性状 茎锐四棱形，具槽，疏被柔毛。叶对生，皱缩卷曲或破碎，润湿后展开呈长卵圆形或三角状卵圆形，长 4cm ~ 13cm，宽 3cm ~ 10cm，边缘有具突尖的粗圆齿，两面被稀疏刚毛或柔毛，灰绿色或灰褐黄色；叶柄长，扁平，具纵条纹。具腋生的二歧聚伞花序，具纤细总梗；花萼钟形或增大为囊状，萼齿后面 1 枚大；花冠 2 唇形，长约 3cm。气微，味微苦。以叶多，色绿者为佳。

性味和功用 辛、苦，温。归胃经。发表散寒，化湿和中。用于风寒感冒，吐泻，腹痛，风湿性关节炎。常用量 9g ~ 15g，水煎服或煎水洗。



图 23　峨眉冠唇花

西南细辛

别名 毛细辛、水细辛、细辛、盆草细辛。

来源 本品为马兜铃科植物单叶细辛，Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms. ex klotzsch. 的干燥带根全草。

原植物 单叶细辛(图 24)为多年生草本。根状茎细长，横生。叶互生，疏离，叶片心形或近圆形，长 4cm ~ 8cm，叶柄长 7cm ~ 25cm，有毛；芽苞叶卵圆形，长 5mm ~ 10mm，花单生于叶腋，深紫红色，花梗细长，长 3cm ~ 7cm，花被在子房以上合生成短钟状，裂片 3，长圆形，长约 7mm，上部外折，雄蕊 12 枚，与花柱等长或稍长，花丝长约为花药的 2 倍，药隔伸出，短锥形，子房半下位，具 6 棱，花柱合生，顶端辐射状 6 裂，柱头顶生。蒴果近球形，直径约 1.2cm；种子椭圆形，具肉质附属物。

生于海拔 1 300m ~ 3 100m 的溪边、林下阴湿地，或峭岩下腐植土中。分布于我国西北部和西南部。印度、锡金也有。

采收加工 夏季挖取带根全草，除净泥土，及时阴干 (不宜日晒和水洗)。

药材性状 本品常卷曲成团。根状茎圆柱形，细长，直径 1mm ~ 2mm，节间长 2cm ~ 3cm，横走，节上具多数粗细不等的纤维根；表面灰棕色或棕褐色，有微细的纵皱纹；质脆，易折断，断面黄白色。单叶互生，叶柄长 7cm ~ 25cm，细圆柱形，有毛；叶片多皱缩破损，完整者展开呈心形或圆心形，灰绿色，长 4cm ~ 8cm，宽 6.5cm ~ 11cm，顶端渐尖或短尖，基部两侧裂片顶端圆形，两面散生柔毛，叶背和叶缘的毛较长，质脆易碎。叶腋有时可见花和果实，梗长 3cm ~ 7cm，丝状，花暗紫色，多皱缩，裂片反折；果球形。气辛香，味辣麻舌。以根多、叶色绿、香气浓、味辛辣者为佳。

性味和功用 辛，温。有小毒。归肺、肾经。祛风，散寒，镇咳，止痛，活血，解毒。用于风寒感冒头痛，鼻炎，咳嗽痰多，喘逆，牙痛，风湿性关节痛。常用量 1g ~ 3g；外用适量研末吹鼻或煎水含漱。

附注 气虚多汗、血虚头痛、阴虚咳嗽等忌服。



图 24　单叶细辛

西南千金藤

别名　高原千金藤。

来源　本品为防已科植物西南千金藤 Stephania subpeltata H. S. Lo 的干燥全株。

原植物　西南千金藤(图 25)为多年生草质藤本，全株无毛。茎缠绕，细圆柱形，下部常生须状不定根，少分枝，有直沟纹。叶互生，薄革质，卵状三角形、宽卵状三角形至三角形，长 3.5cm ~ 10cm，宽 2.5cm ~ 5.5cm，顶端常明显收缩，尾状渐尖至短渐尖，稍钝头，基部微凸，很少明显心形或微凸，全缘，掌状脉两面稍隆起；叶柄细而直，通常比叶片短，着生处距叶片基部约 1mm ~ 2mm，不明显盾状。花单性，雌雄异株；单伞形聚伞花序腋生，总梗丝状，长 1.5cm ~ 7cm，末端簇生 3 个 ~ 5 个小聚伞花序；小苞片狭披针形，早落；雄花：萼片 6，2 轮，外轮的卵形，内轮的近披针形，长约 1.3mm，均尾尖；花瓣 3，宽楔形，长约 0.5mm，聚药雄蕊合生成盾状；雌花：萼片 3，宽卵形，长约 1.5mm，尾尖；花瓣 3，宽楔形或扁圆形，长约 0.6mm；柱头 3 裂。核果宽倒卵形，成熟时红色，内果皮骨质，长 4.5mm ~ 5mm，背部有 4 行雕纹，中间的点状，两侧的小横肋状，胎座迹不穿孔。

生于海拔 2 000m 左右的林下、沟边石缝中。分布于云南、四川、广西等省(自治区)。

采收加工　全年均可采收，晒干。

药材性状　藤茎呈细长圆柱形，直径 2mm ~ 4mm；表面黄绿色，有细直沟纹，偶具须状不定根或分枝；体轻质脆，易折断。叶卵状三角形至三角形，顶端常明显收缩，尾状渐尖至短渐尖，掌状脉向上的 3 条，平伸的 2 条，向下的常不可见；叶柄生于距叶片基部约 1mm ~ 2mm 处。单伞形聚伞花序腋生，疏散而少花，总梗丝状，末端簇生 3 个 ~ 5 个小聚伞花序，花小。核果。气微，味苦。

性味和功用　苦、微辛，寒。清热解毒，消肿止痛。用于疮疡肿毒，咽喉肿痛，风湿热痹，胃热疼痛。常用量 9g ~ 15g。




图 25　西南千金藤

1. 茎藤　2. 叶

地 构 叶

别名 透骨草、瘤果地构叶、珍珠透骨草。

来源 本品为大戟科植物地构叶 Speranskia tuberculata(Bge.) Baill. 的干燥全草。

原植物 地构叶(图 26)为多年生草本，高 20cm～50cm。根茎木质化，深入土中。茎直立，多分枝，有柔毛。叶互生，披针形或长圆状披针形，长 1.5cm～7cm，厚纸质，顶端钝尖或渐尖，基部楔形或钝圆，边缘有疏而不规则的粗齿，两面多少有短柔毛，脉上毛较密；叶柄短或近无柄。花单性，雌雄同株；总状花序顶生，长 5cm～20cm，雄花在上，具卵状椭圆形或披针形叶状苞片 2 枚，苞片内通常有花 1 朵～3 朵；萼片 5，稀 4，披针形，有毛；花瓣 5，稀 4，鳞片状；雄蕊 10～15；花盘腺体 5；雌花生花序下部，萼片 5～6，狭三角形，长约 1mm，有稀毛；花瓣极小；子房有毛及疣刺，花柱 3，2 裂；花盘壶状。蒴果扁球状三角形，具多数疣状突起，顶端开裂；种子三角状倒卵形，绿色。

生于干燥沙质土上、村边、草地。分布于我国东北及大部地区。

采收加工 夏、秋季采挖，晒干。

药材性状 根茎圆柱形，长约 10cm；表面灰黄色或土棕色，断面黄白色，木质状。茎圆柱形，多分枝，长 10cm～30cm，直径 1mm～4mm；表面灰绿色或淡紫色，微有纵棱，被灰白色柔毛；质坚脆，易折断，断面黄白色，外圈有 1 层紫色的环。叶互生，多皱缩破碎，灰绿色，被灰白色柔毛，质脆，易脱落，完整者湿润后展开呈披针形或长圆状披针形，长 1.5cm～7cm，宽 0.5cm～2cm，叶柄短或近无。枝梢有时可见总状花序或果序。花小形。蒴果三棱状扁圆形，表面具多数疣状突起。气微，味淡。以色绿、枝嫩、带果者为佳。

性味和功用 辛，温。归心、肝经。祛风除湿，活血止痛，舒筋。用于风湿疼痛，筋骨拘挛，阴囊湿疹，寒湿脚气，疮癣肿毒。常用量 6g～15g；外用适量煎水熏洗。孕妇忌服。

附注 本品在我国北方作透骨草使用。



图 26　地构叶

1. 根　2. 果枝

地 黄 瓜

别名 肾气草、黄瓜香、白地黄瓜。

来源 本品为堇菜科植物紫花堇菜 Viola grypoceras A. Gray 的干燥全草。

原植物 紫花堇菜(图 27)为多年生草本，高达 25cm。主根深长；地下茎很短。茎 1 至数条，直立或倾斜，节稀疏。叶常三角状卵形或宽卵形，长 1cm～6cm，顶端钝尖或圆形，基部心形或宽三角形，边缘有钝锯齿，齿尖具腺体，两面有褐色腺点；托叶线状披针形，边缘有稀疏长齿；基生叶叶柄较长，茎生叶叶柄向上渐短。花由茎基或茎生叶的腋部抽出，长 6cm～10cm；萼片 5，披针形，基部附属体半圆形；花瓣 5，淡紫色，有褐色腺点，狭长椭圆形，下面 1 片有距，管状，长约 7mm，直或略弯；雄蕊 5；子房上位，柱头具喙，稍弯曲，不分裂。蒴果椭圆形，长约 1cm 或稍短，密生褐色腺点；果梗直立。

生于沟边、草丛中或林下湿地。分布于长江流域及以南各省(自治区)。日本也有。

采收加工 春季采收，晒干。

药材性状 全草多皱缩成团。主根长圆锥形，长 3cm～5cm，直径 1mm～3mm，灰黄色，粗糙，有须根及须根痕。茎 1 条～数条，细圆柱形，节间较长，基部具宿存托叶。基生叶少，叶柄细长，茎生叶互生；叶片三角状心形或宽卵状心形，顶端尖或钝，边缘有钝齿；托叶边缘有稀疏长齿。花梗自基部或茎叶腋部抽出，短于叶或与叶近等长，花淡紫色，下部 1 片有距。有的具蒴果，成熟者 3 瓣裂，内含种子数枚。叶两面、花瓣、果实均具褐色腺点。气微，味淡、微苦。以主根粗、枝叶多者为佳。

性味和功用 微苦，凉。清热解毒，消肿，凉血，止血，化瘀。用于化脓性炎症，乳腺炎，败血症，疮痈，肝炎，急性结膜炎，咽喉红肿，便血，刀伤出血。常用量 9g～15g。外用适量捣敷或烧存性研末撒。



图 27　紫花堇菜

过 山 龙

别名 地刷子、小伸筋、舒筋草、扁枝石松。

来源 本品为蕨类石松科植物地刷子石松 Diphasiastrum ccmplanatum (L.)Holub 的干燥全草。

原植物 地刷子石松(图 28)为多年生草本。匍匐茎蔓生。侧生营养枝多回分叉，扁平，直立或下垂，呈扇状；末回小枝上的叶 4 列；背腹 2 列的叶较小，背面叶线状披针形，腹面叶鳞片状钻形，均具短刺尖；侧生 2 列的叶较大，菱状钻形，长 1mm～2mm，贴生于枝上，斜上，顶端刺尖，向腹面弯曲。孢子枝通常从第二或第三年生的侧枝基部上侧抽出，远高出于侧生营养枝，顶端 2 回分叉；末回分枝顶端各生孢子囊穗 1 个；孢子叶宽卵圆形，顶端急狭渐尖，边缘有不规则细齿，基部有柄。孢子囊圆肾形；孢子四面体形，有网纹及小突起。

生于海拔 850m～2 800m 间疏林下及山坡阳处。分布于我国东北部、西南部和东部。北半球温带其他地区也有。

采收加工 全年均可采收，晒干或阴干。

药材性状 茎长 30cm～40cm，黄绿色或灰绿色，下部圆柱形，疏生钻形叶。营养枝扁平，呈扇状多回两歧分枝，叶稍交叉对生，4 列，侧生二列叶稍大，菱状钻形，贴生干茎上，顶端刺尖内弯，背面叶夹于两侧叶之间，线状披针形，腹面叶很小，鳞片状钻形。孢子枝远高出侧生营养枝，顶端 2 回分叉，末回分枝顶端具 1 细圆柱形孢子囊穗。气无，味微辛。以色黄绿、无杂质者为佳。

性味和功用 辛，温。舒筋活血，祛湿散寒，消炎，通经，利尿。用于风湿麻木，筋骨疼痛，跌打损伤，淋病，月经不调，水火烫伤，狂犬咬伤。常用量 6g～15g。

附注 地刷子石松的孢子可治小儿夏季汗疹及皮肤湿烂，适量与滑石粉配方外用。



图 28　地刷子石松

全叶马兰

别名 四面草、路边菊。

来源 本品为菊科植物全叶马兰 Kalimeris integrifolia Turcz. ex DC. 的全草。

原植物 全叶马兰(图 29)为多年生草本，高 50cm～120cm。茎直立，帚状分枝，被短毛，后下部无毛。基部及茎下部叶在花期枯萎，中上部叶长圆状倒披针形至线状披针形，长 1cm～5cm，顶端钝圆或微尖，基部渐狭，全缘，具短缘毛，上面绿色，密被短刚毛，背面淡绿色，被短毛，主脉明显；无柄而微抱茎。头状花序单生枝顶排成疏伞房状，直径 1cm～2cm；总苞宽钟状，总苞片 3 层，外层较短，内层较长，上部草质，有短粗毛及腺点；舌状花 1 层，淡紫色或有时近白色，舌片长 6mm～11mm，宽 1mm～2mm，顶端尖；管状花长约 3mm；花柱均外露。瘦果倒卵形，长约 2mm，淡褐色，扁平，有浅色边肋，或一面有棱呈三棱形，上部被短毛及腺毛；冠毛淡褐色，不等长，长约 0.3mm～0.5mm，易脱落。

生于海拔 1 000m 以下的山地草坡、路旁、疏林下及灌丛中。分布于我国东北地区及河北、陕西、山东、浙江、福建、湖北、四川等省。日本、朝鲜、俄罗斯远东地区也有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干或鲜用。

药材性状 本品须根多数，粗细不等，直径 0.2mm～1mm，表面棕褐色；根头短。茎圆柱形，直径 2mm～3mm，上部帚状分枝，表面褐色或红褐色，被短毛或无毛。叶互生，较密，基部和茎下部叶枯萎脱落，中上部叶卷缩，展开后呈长圆状倒披针形或线状披针形，黑绿褐色，下面稍淡，全缘，两面有微毛，无柄，头状花序单生枝顶，排成疏伞房状，边花舌状，灰黄色，中间管状花多数。气无，味辛。以带根、叶片完整、带绿色者为佳。

性味和功用 苦、辛，凉。入阳明血分。清热解毒，散瘀，止血，利尿。用于外感发热，咽喉肿痛，湿热腹泻，痢疾，吐血、衄血，崩漏，跌打损伤，外伤出血，近有用于肝炎，乳腺炎，支气管炎，尿路感染，腮腺炎；胃溃疡等。常用量 15g～30g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图 29　全叶马兰

1. 根　2. 地上部分

异叶黄鹌菜

别名 空洞菜。

来源 本品为菊科植物异叶黄鹌菜 Youngia heterophylla (Hemsl.) Babc. et Stebb. 的干燥全草。

原植物 异叶黄鹌菜(图 30)为多年生草本,高 30cm ~ 110cm。茎直立,粗壮,自基部分枝,根头部分被黄褐色绒毛。基生叶近羽状全裂,长 8cm ~ 23cm,顶端裂片较大,椭圆形或卵形,长约 8cm,基部楔形或平截,边缘具疏波状细齿,侧裂片多对,三角形或矩圆形,急尖,近全缘;叶柄长 2cm ~ 5cm,有绒毛;茎生叶互生,下部的似基生叶,上部叶线形,近无柄。头状花序小,在枝端排成聚伞状伞房花序;梗细,长 3mm ~ 18mm;总苞钟状筒形,长 6mm ~ 7.5mm,外层总苞片 5 ~ 6,卵形,长约 1mm,被绵毛,内层总苞片约 8 枚,披针形;舌状花 11 朵 ~ 25 朵,长约 8mm,黄色,舌片顶端具 5 齿;雄蕊 5 枚,聚药;柱头分叉,黄褐色。瘦果近圆柱形,长 2.3mm ~ 3mm,褐紫色,稍扁,顶端渐狭成短颈,具 14 条 ~ 15 条粗细不等的肋,肋上有微毛;冠毛白色或带黄白色,长 3mm ~ 4mm。

生于山区山坡灌丛中。分布于四川、云南、湖南、湖北等省。

采收加工 夏季采收,晒干。

药材性状 全体长 30cm ~ 110cm。根数条,细长圆锥形,径 0.5mm ~ 1.5mm,表面暗褐色。茎圆柱形,直径 2mm ~ 4mm;表面褐色或暗褐色,具细纵棱;断面中空。叶互生,茎中部以下叶琴状羽裂,卷缩或破碎,灰绿色或棕绿色,润湿后展开长 8cm ~ 23cm,顶裂片大,椭圆形或卵形,边缘具疏波状齿,侧裂片三角形或矩圆形;茎上部叶片线形,膜质,质轻易碎。头状花序小,排成聚伞状伞房花序,花梗纤细,总苞椭圆形或钟状。气无,味淡。以叶完整、色灰绿者为佳。

性味和功用 甘、微苦,寒。除湿祛风,行气活血,祛痰,止痛。用于感冒喉痛,乳腺炎,风湿性关节痛,疮疖。常用量 15g ~ 30g;外用适量鸡烂敷患处。



图 30　异叶黄鹌菜

1～2　全株

吊灯花

别名 狭瓣吊灯花。

来源 本品为萝藦科植物吊灯花 Ceropegia trichantha Hemsl. 的全株。

原植物 吊灯花(图 31)为草质藤本。茎纤弱,缠绕,无毛。叶对生,膜质,长圆状披针形,长 10cm ~ 13cm,宽 2cm ~ 3cm,顶端渐尖,基部圆形或微心形,全缘,叶脉疏距;叶柄长 1cm ~ 1.5cm。聚伞花序腋生,通常近伞形,有花 4 朵 ~ 5 朵,花序梗长约 5cm;花梗长约 1cm;花萼深 5 裂,裂片披针形,内面基部有腺体;花冠紫色,筒状,基部略膨胀,中部稍狭,上部 5 裂,裂片舌状,直立,顶端弧形弯曲粘合,如吊灯状,副花冠生于合蕊柱上,2 轮,外面 1 轮具 10 个齿,内面 1 轮有 5 个舌状片,被长硬毛;雄蕊 5 枚,与雌蕊粘生成中心柱,花丝合生成 1 个有蜜腺的筒,花药贴生于柱头基部膨大处,花粉块每室 1 个,直立,内角有 1 个透明膜边。蓇葖果长披针形,长达 20cm,直径约 5mm;种子顶端具白色绢质种毛。

生于海拔 400m ~ 800m 的溪边、山谷疏林中。分布于广东、广西、湖南、四川等省(自治区)。泰国也有。

采收加工 夏、秋季采收,鲜用。

药材性状 同原植物。

性味和功用 苦,寒。清热解毒。用于痈肿疮毒,癣疮,疥癣。外用适量捣烂敷患处或取汁涂擦。



图 31　吊灯花

尖叶唐松草

别名 石笋还阳。

来源 本品为毛茛科植物尖叶唐松草 Thalictrum acutifolium(Hand. - Mazz.)Boivin 的干燥带根全草。

原植物 尖叶唐松草(图 32)为多年生草本，高 25cm～65cm。根多数，肉质。基生叶 1 枚～3 枚，有长柄，为二回三出复叶，叶片长 7cm～18cm，小叶草质，卵形，长 2.3cm～5cm，顶端急尖或钝，基部圆形、圆楔形或心形，不分裂或不明显 3 浅裂，边缘具疏牙齿，脉在背面稍隆起，无毛或背面被短柔毛，顶生小叶柄较长；茎生叶 1～3，渐变小，三出复叶，柄短。圆锥花序顶生，花稀疏，花梗长 3mm～8mm；萼片 4，白色带粉红色，早落，卵形，长约 2mm；雄蕊多数，长达 5mm，花药长 0.8mm～1.3mm，花丝上部倒披针形，宽约为花药的 3 倍，下部丝形；心皮 6～12，有细柄，花柱短，腹面生柱头组织。瘦果扁，狭长圆形，稍不对称，有时镰状弯曲，长 3mm～4.5mm，具 8 条细纵肋，柄长 1mm～2.5mm。

生于山坡、山谷或林边湿润处。分布于安徽、浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州等省(自治区)。

采收加工 夏、秋季采挖带根全草，晒干。

药材性状 主根数条丛生，圆柱形或胡萝卜形，长约 5cm，粗达 4mm；表面黄色或黄褐色，粗糙，具多数金黄色须根；质较脆，易折断，断面淡黄色，显纤维性。茎中部以上分枝，具细纵纹。茎生叶为 1～2 回三出复叶，通常互生；小叶卵形，不分裂或不明显 3 浅裂，边缘具疏齿，背面有短柔毛。圆锥花序疏散，花长 3mm～8mm；雄蕊多数，花丝上部倒披针形，宽约为花药的 3 倍，下部丝形；心皮有柄，花柱极短，腹面生柱头组织。瘦果常脱落，具细柄。气微味苦。以主根粗壮、色黄、枝叶多者为佳。

性味和功用 苦，寒。归心、肝经。清热燥湿，利疸退黄。用于湿热黄疸，周身黄肿，热痢，结膜炎，淋巴结结核，淋巴结炎，痈肿疮疖。常用量 9g～15g。外用适量捣烂敷患处。




图 32　尖叶唐松草

1～2　全株

纤 冠 藤

别名 细羊角、羊乳藤、睡地金牛、牛奶树、人地龙、大防己。

来源 本品为萝藦科植物纤冠藤 Gongronema nepalense(Wall.) Decne 的干燥全株。

原植物 纤冠藤(图 33)为木质藤本，具乳汁。茎无毛。叶对生，椭圆形或卵圆形，长 6cm～14cm，顶端短渐尖，基部圆形或近心形，全缘；侧脉每边 5 条～7 条，在下面凸起；叶柄长 1cm～3cm，顶端有丛生小腺体。聚伞花序腋生；花小，黄白色，花萼裂片 5，卵圆形，外面被微毛，内面基部有 5 个腺体；花冠近钟状，裂片 5，向右覆盖，长圆形，外面被微毛；副花冠为 5 个扁平而短的膜片，组成杯状，生于合蕊冠的基部；雄蕊 5，花丝合生成筒，花药顶端具有内弯而封闭着柱头的膜片；花粉块每室 1 个，直立在极短而水平伸展的花粉块柄上；子房由 2 心皮组成，无毛，花柱短，柱头短圆锥形，基部五角形。蓇葖果双生，披针状圆柱形，种子顶端具白绢质种毛。

生于海拔 500m～1 400m 处的林中、灌丛中、水沟边。分布于广东、广西、云南、贵州、西藏等省(自治区)。尼泊尔、印度也有。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 茎呈圆柱形，具细纵棱，无毛。叶对生，坚纸质，椭圆形或卵圆形，长 6cm～14cm，宽 2cm～8cm，淡黄绿色；叶柄顶端有丛生小腺体。伞形状聚伞花序腋生，2～3 歧，总花梗比叶柄长；花小，5 数，黄白色，花萼内面具腺体，花冠裂片向右覆盖，与花萼外面均具微柔毛，有膜片状副花冠。蓇葖果双生，披针状圆柱形，长 4.5cm～8cm，直径 5mm～7mm，中部以下稍膨大；种子多数，长卵形，顶端具长约 2.5cm 的白色绢质毛。气无，味苦。以叶色黄绿，茎枝粗壮者为佳。

性味和功用 苦，温。祛风，活血，通乳，消肿。用于腿痛，跌打损伤，子宫下垂，乳汁不通，腰肌劳损，风湿关节疼痛。常用量 15g～30g。



图 33　纤冠藤

红 陈 艾

别名 川刘寄奴、水蒿、小蒿子、狭叶艾、白蒿。

来源 本品为菊科植物蒌蒿 Artemisia selengensis Turcz. 的全草。

原植物 蒌蒿(图 34)为多年生草本,高 60cm ~ 150cm。具匍匐茎。茎直立,下部带紫色,近无毛,上部有多少直立的花序枝。叶互生,下部的在花期枯萎;中部叶密集,羽状深裂,长 10cm ~ 18cm,侧裂片 1 对 ~ 2 对,线状披针形或线形,顶端渐尖,边缘有疏浅锯齿,上面深绿色,无毛,下面被白色薄茸毛,基部渐狭成楔形短柄,无假托叶;上部叶 3 裂或不裂,或线形而全缘。头状花序直立或稍下倾,有短梗,多数密集成狭长的复总状花序,有线形苞叶;总苞近钟状,长 2.5mm ~ 3mm;总苞片约 4 层,边缘干膜质,稍被毛,外层卵形,黄褐色,较短,中层宽卵形,内层椭圆形;花管状,黄色,缘花雌性,1 列,中央花两性,结实或不孕;雄蕊 5 枚,聚药;花柱 1,柱头 2 裂。瘦果微小,无冠毛。

生于湿润的疏林中、山坡、路旁、荒地、河湖岸边及沼泽地。我国除华南地区及西藏外,各地均有分布。蒙古、朝鲜、俄罗斯也有。

采收加工 秋季采收,晒干或鲜用。

药材性状 主根 1 条,纤细,微弯曲,长约 9cm ~ 12cm,棕黄色,有纵皱纹,具须根多数。茎圆柱形,绿褐色,基部常紫褐色,有纵向顺直纹理及叶片脱落后的疤痕,折断面淡绿色,边缘有纤维,中央髓部疏松。叶互生,皱缩,有的破碎,完整者展开似艾叶但较长,线状披针形或 3 ~ 5 深裂,上表面棕绿色,下表面灰绿色,密或疏生白色茸毛。质脆易断。枝梢具黄色小花,多数密集组成狭长的复总状花序。气微芳香,味淡。以叶多、茎带紫褐色者为佳。

性味和功用 苦、辛,温。归心、脾经。活血祛瘀,下气通络。用于瘀滞腹痛,肝炎,跌打损伤,瘀血肿痛,痛经,内伤致大小便出血,烫火伤。常用量 9g ~ 15g。孕妇忌服。

附注 本品在四川作刘寄奴药用。幼苗可作蔬菜吃。



图 34　蒌蒿

1～2　全株

红毛走马胎

别名 走马胎、罗汉草、土兔耳风。

来源 本品为菊科植物红背兔耳风 Ainsliaea rubrifolia Franch. 的干燥全草。

原植物 红背兔耳风（图 35）为多年生草本，高 30cm～60cm，根状茎短，被棕色绒毛。叶基生，通常 5 片～7 片，卵状椭圆形或卵状披针形，长 3cm～10cm，顶端急尖，基部心形，边全缘或疏波状，上面绿色，有灰白色云石状斑纹，下面紫红色，叶脉淡紫色、明显，两面及叶缘有棕色长绒毛，有时上面毛脱落；叶柄长 2cm～8cm，密被棕色长绒毛。花葶由叶丛中抽出，具少数极小的苞叶；头状花序多数排成狭或上部较宽的复总状花序，每个头状花序有花 3 朵～4 朵；直径约 1cm；总苞片质硬，约 5 层，外层小，卵形，内层披针形，顶端极尖，边缘膜质；花两性，白色，管状，顶端 5 深裂，裂片线形；雄蕊 5 枚，聚药，花药基部箭形；雌蕊 1 枚。瘦果倒披针形，扁平而有纵线条，疏被柔毛；冠毛羽毛状，淡棕色。

生于竹林下、山坡、草丛或石岩上。分布于四川省。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 本品全体长 30cm～60cm。须根多，较长；根状茎短，密被棕色长绒毛。叶基生，多卷缩，展开后呈卵状披针形或卵状椭圆形，长 3cm～10cm，宽 1.5cm～5cm，基部心形，上面灰绿色，具灰白色云石状斑纹，下面暗紫色或紫褐色，两面及边缘均有棕色长柔毛，具长 2cm～8cm 叶柄，被毛。茎单一，混生少数长约 1cm 的小叶。头状花序多数排成顶生的复总状花序，每个头状花序内有管状花 3 朵～4 朵；总苞约 5 层，顶端极尖。气微，味微苦。以根茎粗壮、叶多、背面色紫红者为佳。

性味和功用 苦、辛，平。祛风除湿，解毒消肿。用于风湿筋骨疼痛，跌打损伤，疮痈肿毒。常用量 12g～30g；外用适量煎汁熏洗。



图 35　红背兔耳风

红鸡踢香

别名 金背藤、红面将军。

来源 本品为胡颓子科植物宜昌胡颓子 Elaeagnus henryi Warb. ex Diels 的全株。

原植物 宜昌胡颓子（图 36）为常绿灌木，高 3m～5m。叶腋具粗短硬刺，枝密被褐锈色鳞片。叶互生，革质至厚革质，宽椭圆形或倒卵状椭圆形，长 6cm～15cm，顶端渐尖或急尖，基部宽楔形至钝圆，边全缘，上面幼时被褐色鳞片，成熟后脱落，深绿色，下面银白色，密被白色并散生少数褐色鳞片，侧脉 5 对～7 对；叶柄粗壮，长 8mm～16mm，黄褐色。花银白色，质厚，密被鳞片，1～5 朵生于叶腋短小枝上；上部 4 裂，裂片三角形，长 1.2mm～3mm，内面被白色星状柔毛和少数褐色鳞片；无花瓣；雄蕊 4，花丝极短，花药矩圆形；子房上位，包被于花萼管内，心皮 1，花柱直立或稍弯曲，连柱头长 7mm～8mm，略超过雄蕊。坚果核果状，矩圆形，多汁，长约 18mm，被鳞片，成熟时红色。

生于海拔 200m～2 300m 的疏林或灌木丛中。分布于陕西、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、贵州、云南、四川及华南地区。

采收加工 全年均可采收，晒干或鲜用。

药材性状 枝圆柱形，淡褐色、灰黑色或黑色，具刺，刺长 8mm～20mm，略弯曲。叶互生，革质或厚革质，宽椭圆形或倒卵状椭圆形，长 6cm～15cm，上面黄绿色或黄褐色，下面银白色。花 1 朵～5 朵生于叶腋短小枝上，成短总状花序，花萼管状或微成漏斗状，4 裂，裂片三角形。果扁矩圆形，皱缩，红褐色。幼枝、叶、花、果均被褐色鳞片。气微，味苦。以枝灰黑色、叶多者为佳。

性味和功用 苦，温。驳骨散结，消肿止痛，止咳。用于跌打骨折，风湿骨痛，哮喘，黄肿，恶疮，吐血。常用量 9g～15g，浸酒服。外用鲜品适量捣碎，酒炒敷患处。

附注 四川草医以宜昌胡颓子果实作胡颓子，用于痢疾肠炎，食欲不振。叶治肺虚气短。根功效同全株。



图 36　宜昌胡颓子

花 佩 菊

别名 小霸王、走马胎。

来源 本品为菊科植物花佩菊 Faberia sinensis Hemsl. 的干燥全草。

原植物 花佩菊(图 37)为多年生草本，高 40cm～90cm。花葶直立，上部分枝。叶在基部丛生，长 15cm～35cm，顶端渐尖或尾状渐尖，琴状羽裂，顶裂片大，卵形、椭圆形或矩圆状披针形，边缘波状，具疏齿或不规则浅裂，基部近截形；侧裂片斜圆形或近三角形，下倾，全缘，上面黄绿色或绿色，下面绿白色，有紫色斑点；叶柄长或短。头状花序较大，长 1.6cm～1.8cm，直径 1.8cm～2cm，单生于花葶分枝上，排成疏圆锥花序；花梗细，有鳞片状苞片；总苞钟状；总苞片多层，外层矩圆状卵形，顶端紫色，有睫毛，内层线状披针形或线形；舌状花多数，蓝紫色，舌片顶端 5 齿裂；雄蕊 5，花药长线形，合生；子房下位，1 室，花柱顶端 2 裂，下弯。瘦果纺锤形，上端稍狭，具纵肋；冠毛 1 层，灰白色。

生于海拔 1 000m～2 000m 的山谷溪旁、岩壁阴湿处。分布于四川、云南省。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 全体长 40cm～90cm。根多数，细长圆柱形，直径 1mm～2mm，表面黄褐色或棕褐色；根状茎粗短，不规则圆块状，粗 1cm～1.5cm，表面黑褐色，质硬。叶全部基生，卷缩，展平后呈倒披针形或倒矩圆状披针形，长 15cm～35cm，宽 2.5cm～8cm，上面黄绿色，下面绿白色，带紫晕或紫斑点，琴状羽裂；顶裂片大，卵形或矩圆形，顶端长渐尖，基部近截形，边缘波状。浅裂或具疏齿；侧裂片斜圆形或近三角形，远较顶裂片短小，下倾；总叶柄长或短，红棕色。花葶高出于叶，顶部分枝，头状花序暗紫色，单生于分枝顶端，花全部舌状。气无，味淡。以根多、叶色绿者为佳。

性味和功用 淡，平。活血祛瘀，祛风除湿，止痛，截疟，解毒。用于风湿性关节痛，跌打损伤，疟疾，小肠湿热，蛇咬伤。常用量 9g～15g；外用适量捣烂敷患处。



图 37　花佩菊

1～2　全株

针筒菜

别名 野油麻、水茴香、长圆叶水苏。

来源 本品为唇形科植物针筒菜 Stachys oblongifolia Benth. 的干燥全草。

原植物 针筒菜(图 38)为多年生草本，高 30cm～60cm。根状茎横生，节上具须根。茎上升，锐四棱形，棱及节上被长柔毛，其余部分多少被微柔毛，不分枝或少分枝。叶对生，长圆状披针形，长 3cm～7cm，顶端急尖，基部浅心形，边缘有圆齿状锯齿，上面疏被微柔毛及长柔毛，下面密被灰白色柔毛状绒毛；叶柄长约 2mm 或近无柄。苞叶披针形，无柄；轮伞花序每轮 6 花，下部者远离，上部者密集，组成长约 5cm～8cm 顶生的假穗状花序；小苞片线状刺形，微小；花梗长约 1mm；花萼管状钟形，具刺尖头；花冠粉红色或红紫色，长约 1.3cm，外面疏被微柔毛，筒内喉部被微柔毛，毛环不明显或缺，檐部二唇形，上唇直立，长圆形，下唇 3 裂，中裂片肾形，侧裂片卵圆形；雄蕊 4，2 强；雌蕊 1，花柱顶端 2 裂；花盘等大，波状。小坚果 4，褐黑色，光滑。卵球形。

生于海拔 210m～1 900m 林下，灌丛、岸边或湿地中。分布于长江以南各省(自治区)及安徽、台湾省。印度、锡金也有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干。

药材性状 根状茎横走，节上生须根；茎锐四棱形，长 30cm～50cm，直径 2mm～6mm，表面灰绿色，具四纵槽，基部微粗糙，在棱及节上被长柔毛，余部多少被微柔毛，不分枝或少分枝，质脆，易折断。叶对生，有短柄或无柄；叶片皱缩卷曲，润湿后展平呈长圆状披针形，长 3cm～7cm，宽 1cm～2cm，边缘具圆齿，灰绿色，上面疏被柔毛，下面密被白色柔毛状绒毛。轮伞花序下部者远离，上部者密集成顶生假穗状；花冠 2 唇形，长约 1.3cm。小坚果卵圆状，褐色，径约 1mm，平滑。气微，味微辛。以叶多、色绿、带根状茎者为佳。

性味和功用 辛、微甘，温。补中益气，止血生肌。用于久痢，病后虚弱，外伤出血。常用量 15g～30g，水煎服或炖肉吃；外用适量捣烂敷患处。



图 38　针筒菜

青 皮 草

别名 刀口药、三花兔耳风。

来源 本品为菊科植物宽穗兔耳风 Ainsliaea triflora(Buch.-Ham) Druce 的干燥全草。

原植物 宽穗兔耳风(图 39)为多年生草本，高 30cm～90cm。茎直立，不分枝，多少被蛛丝状绵毛。基生叶卵形或卵状椭圆形，长 7cm～15cm，顶端急尖或渐尖，基部渐狭，下延成具宽翅的叶柄，上面绿色，被疏长毛，下面密被白色绒毛，边缘具不明显圆齿，睫毛刺状；叶柄与叶片近等长，茎生叶较小，具短柄。头状花序多数，排成较宽短的穗状花序，具披针形小苞片；总苞片卵形至披针形，长 2mm～7mm，顶端渐尖，边缘膜质；每个头状花序内有 3 朵小花；小花白色或带紫色，两性，结实，顶端 5 深裂，裂片条形，略反卷；雄蕊 5，聚药，花药基部箭形，伸出；雌蕊 1，柱头 2 裂，略长于雄蕊。瘦果倒披针形，长约 3mm，被绢状软毛；冠毛羽毛状，长约 8mm，淡褐色。

生于山坡草地、林缘、灌丛中。分布于云南、贵州、四川、陕西等省。越南、泰国、印度、尼泊尔、不丹亦有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干。

药材性状 本品根粗壮，直条状，长 10cm～17cm，径 5mm～10mm；表面土棕色；根头(根状茎)处密被浅棕色毛茸及叶柄残基，侧根多数，较纤细。基生叶卵形或卵状椭圆形，常卷缩，展开后长 7cm～15cm，宽 3cm～5cm，上面灰绿色，疏被长柔毛，下面灰白色，密被白色绒毛；叶柄约与叶等长，具宽翅。茎单 1，被蛛丝状绵毛，茎生叶数枚互生，倒披针形或近卵形，长约 5cm，被毛。头状花序长约 1cm，多数排成顶生较宽短的穗状花序，每个头状花序暗紫色，内有管状花 3 朵。气微，味微涩。以叶多、根茎粗壮、须根多者为佳。

性味和功用 辛、微涩，平。补血、生肌，祛风止痛。用于刀伤出血，跌打损伤，瘀滞肿痛，乳痈初起，疮口不收，头风，牙痛，腰痛。常用量 9g～15g；外用适量研末撒敷患处。




图 39　宽穗兔耳风

抽心寒药

别名 小茄，小寸金黄。

来源 本品为报春花科植物小寸金黄 Lysimachia deltoidea Wieght var. cinerascens Franch 的全草。

原植物 小寸金黄为多年生草本，高 4cm～30cm。根簇生成丛，自根颈发出，可多至 20 余条，稍肥厚，直径可达 1.5mm，下部发出多纤维状须根；根颈顶端和茎基部有数对小鳞片。茎通常多条丛生，直立或倾斜，密被多细胞柔毛。叶对生或在茎的上半部互生，椭圆形至近圆形，长 1cm～2.5cm，顶端圆钝，稀锐尖，基部楔形或近圆形，全缘，两面密被多细胞柔毛；叶柄短或近无。花单生于基上部叶腋；花梗通常等于叶长，开花时直立，结果时下弯；花萼长 4mm～5mm，5 深裂近达基部，裂片披针形，背面密被柔毛；花冠黄色，长约 6mm，基部微合生，裂片 5，倒卵状椭圆形，顶端圆钝，具透明腺点；雄蕊 5，花丝基部合生成高约 1mm 的环，上部分离；子房无毛。蒴果近球形，直径 3mm～5mm；种子椭圆形，黑色。

生于海拔 1 000m～3 000m 处山坡草地、灌丛中和岩石边。分布于云南、四川、贵州、广西等省(自治区)。缅甸、泰国、老挝、越南也有。

采收加工 夏、秋季采收，多鲜用。

性味和功用 微甘，平。清热解毒，除湿止痛。用于巴骨癀、腹痛、风湿性关节炎、骨折。外用适量捣烂敷患处。治巴骨癀：抽心寒药、大寸金黄各 30g 泡酒，用时将药酒盛于碗中，点燃，用手快蘸药酒，揉擦患处，如已溃烂，则捣烂加酒少许，敷患处四周。



图 40　小寸金黄

软筋藤

别名 大风药、风湿药、九龙上吊、下山虎。

来源 本品为天南星科植物雷公连 Amydrium sinense(Engl.)H. Li 的全株。

原植物 雷公连为(图 41)藤本。茎较细弱，节间长 3cm～5cm，具肉质气生根。叶革质，互生，镰状披针形，长 13cm～23cm，顶端锐尖，基部宽楔形至近圆形，不等侧，常一侧为另一侧宽的 2 倍，边全缘，上面亮绿色，下面黄绿色，干后黑褐色，中脉在下面隆起，侧脉极多数，与中脉成 30°斜伸，然后弧形上升至边缘连结；叶柄长 8cm～15cm，上面具槽，基部扩大，上部有长达 1cm 的关节。花序柄单生，长约 5.5cm；佛焰苞肉质，蕾时绿色，卷为纺锤形，上端渐尖，中部粗约 2.2cm，盛开时短舟状，近卵圆形，长 8cm～9cm，展平宽约 11.5cm，黄绿色至黄色；肉穗花序梗长 0.5cm～1cm，倒卵形，长约 4cm，粗约 1.8cm，顶端圆钝；花两性，无花被；雄蕊 4～6，基部宽，骤狭成线形药隔；雌蕊倒圆锥形，子房顶部 5～6 边形，柱头无柄，多少下凹，近圆形，1 室，胚珠 2。浆果绿色，成熟时黄色或红色，味臭。种子倒卵状肾形，褐棕色。

附生于海拔 550m～1 100m 处常绿阔叶林中树干上或石岩上。分布于湖北、湖南、四川、云南、贵州、广西等省(自治区)。该品为我国特有。

采收加工 全年均可采收，多鲜用。

药材性状 全草鲜用，性状同鲜草。

性味和功用 辛、微苦，凉。有小毒。祛瘀生新，活血镇痛，祛风湿。用于风湿关节疼痛，跌打损伤瘀肿疼痛，筋骨拘挛屈伸不利，骨折，心绞痛。常用量 9g～15g 炖猪蹄服或泡酒服。外用适量捣烂拌酒糟炒热包患处。



图 41　雷公连

岩 冬 菜

别名 狗肝菜。

来源 本品为爵床科植物四籽马蓝 Strobilanthes tetraspermus (Champ. ex Benth.)Druce 的干燥全草。

原植物 四籽马蓝(图 42)为多年生草本，高 20cm～60cm。茎通常匍匐，稀直立，多分枝。叶对生，卵形至椭圆形，长 1.5cm～5cm，顶端钝至略尖；基部宽楔形，边缘具疏浅锯齿；叶柄长 0.5cm～1cm。花少数集生成短穗状花序，生于枝顶；苞片叶状至倒卵状匙形，被短柔毛；小苞片线形，长 3mm～5mm；花萼 5 深裂，裂片线形，5mm～7mm；花冠漏斗状，淡紫色，长 12mm～23mm，筒部稍弯曲，外面被微柔毛，内面生长曲柔毛，裂片 5，几相等，宽矩圆形，顶端圆，微凹缺，开展；雄蕊 4，2 强，生于花冠筒上，花丝基部有膜相连，有 1 退化雄蕊残迹；雌蕊 1，花柱细长。蒴果长 7mm～10mm，近顶端有微毛；种子 4，卵圆形，有微毛。

生于林下石上或阴湿草地。分布于广东、广西、湖南、湖北、江西、福建、四川、贵州、西藏等省(自治区)。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 干燥全草全体呈暗绿色，长 20cm～60cm。茎四棱形，径约 3mm～5mm，分枝渐细；表面具纵直细纹，节明显，稍膨大，节间长 3cm～5cm；质脆，易折断，断面中央有小空心。叶对生，多已皱缩或破碎，完整者展开后呈卵形或椭圆形，长 1.5cm～5cm。枝顶有短穗状花序，花多已脱落。气微，味淡。以叶多、少破碎者为佳。

性味和功用 辛、微苦，寒。舒筋活血、止血，生肌止痛。用于风湿筋骨疼痛，跌打损伤，外伤出血，热毒斑疹，小便不利，疔疮肿毒，便血。常用量 6g～12g；外用适量捣烂敷患处。



图 42　四籽马蓝

苦　丁

别名　败酱、土败酱、丁萝卜、小山萝卜、龙喳口、蛾子草。

来源　本品为菊科植物台湾莴苣 Lactuca formosana Maxim. 的干燥全草。

原植物　台湾莴苣(图 43)为一年或二年生草本，高 50cm～120cm，有白色乳汁。茎上部多分枝。叶互生，披针形，长 6cm～14cm，基部下延成耳状抱茎，边缘羽状分裂，幼叶下面主脉上有长柔毛；通常无柄。头状花序排列成圆锥状，顶生；总苞圆筒状，长 12mm～15mm；总苞片多层，外层较短，向内渐长，内层苞片披针形，长约 10mm；花全为舌状，淡黄色，舌片顶端 5 齿裂；雄蕊 5，生于花冠管上，花药基部呈箭头形，聚药；子房下位，花柱纤细，柱头 2 深裂。瘦果卵圆形，扁平，黑色，顶端具长 1mm～4mm 的喙；冠毛淡黄白色，细软。

生于路边、荒野、山坡及草丛中。分布于我国北部、西北部和西南部。

采收加工　春至秋季采收，洗净，晒干。

药材性状　主根 1 至数个，呈圆锥形，长 3cm～7cm，直径 2mm～5mm，肉质，表面浅黄棕色，具细纵皱纹，下部有细须根。茎上部多分枝，圆柱形，被毛及细纵直皱纹，质脆易断。叶卷曲或破碎，灰绿色或黄绿色，完整者展平呈披针形或长圆状披针形，长 6cm～14cm，羽状中裂至深裂，边缘具不规则齿牙，顶端尖，基部成耳状抱茎，被毛；总苞长 12mm～15mm，花全部舌状；瘦果顶端具长 1mm～4mm 的喙。气微，味苦。以主根粗大、枝叶多者为佳。

性味和功用　苦，寒；有小毒。归肝、胃、大肠经。清热解毒，祛风活血。用于口腔溃疡，咽喉肿痛，扁桃体炎，慢性阑尾炎，瘀血腹痛，白带，乳腺炎，疮痈肿毒，痔疮，疥癣，毒蛇咬伤。常用量 9g～15g。外用鲜品适量捣烂敷患处。

附注　四川西部地区民间常将本品作败酱草使用，为与败酱草相区别，又称之为“土败酱”。本品有类似败酱的清热解毒之功，但散瘀排脓之力则不及败酱，故多用于治外痈。



图 43　台湾莴苣

1. 根　2. 地上部分

茅膏菜

别名 盾叶茅膏菜、石龙芽草、苍蝇王。

来源 本品为茅膏菜科植物茅膏菜 Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan 的全草。

原植物 茅膏菜(图 44)为多年生草本，高 9cm ~ 32cm，直立，有时攀援状。球茎紫色，直径 1mm ~ 8mm；基生叶密集成近一轮；叶柄长 2mm ~ 8mm，叶片长 2mm ~ 4mm；茎生叶稀疏，互生，盾状；叶柄长 8mm ~ 13mm；叶片半月形或半圆形，长 2mm ~ 3mm，基部近截平，叶缘密具单一或成对而--长一短的头状粘腺毛。螺旋状聚伞花序生于枝顶及茎顶；苞片楔形或倒披针形，顶部具 3 ~ 5 腺齿或全缘，向上渐狭；花梗长 6mm ~ 20mm；花萼长约 4mm，5 ~ 7 裂，裂片大小不一，歪斜，背面被腺毛，全缘或顶部稍裂；花瓣楔形，白色、淡红或红色，基部有或无黑点；雄蕊 5；子房近球形，花柱 3 ~ 6，各 2 深裂，裂条再浅裂。蒴果 3 ~ 6 裂。

生于海拔 1 200m ~ 3 650m 的林下、草丛、田边、沟旁。分布于我国西南地区。

采收加工 5 月 ~ 6 月采收，晒干或鲜用。

药材性状 全体多皱缩成不规则松团块状。鳞茎状块茎球形，直径 1mm ~ 8mm；表面灰黑色，粗糙，有纹理；质轻；断面粉性，黄色，可见不规则排列的维管束小点。根茎长 1cm ~ 4cm，具不定根；茎纤细柔弱，圆柱形，直径 0. 5mm ~ 1mm，多弯曲，具纵棱。基生叶圆形或钻形，枯萎或脱落；茎生叶稀疏互生，半月形，盾状，边缘有棕色丝毛状粘腺毛；叶柄长 8mm ~ 13mm。茎顶常带螺状聚伞花序或果序。气微，味淡。以带根、无杂质者为佳。

性味和功用 甘、辛，温；有毒。祛风活络，行血止痛。用于跌打损伤，腰肌劳损，风湿关节痛，湿疹，神经性皮炎，痢疾，疟疾，角膜云翳，淋巴结结核，感冒发热，胃气痛，吐血，咽喉痛，刀伤，小儿疳积。常用量 9g ~ 15g；外用适量捣烂敷患处。



图 44　茅膏菜

1. 全株　2. 花放大　3. 叶放大

刺子莞

别名 龙须草、绣球草。

来源 本品为莎草科植物刺子莞 Rhynchospora rubra(Lour.)Makino 的干燥全草。

原植物 刺子莞(图 45)为多年生草本，高 20cm～65cm。杆直立，丛生。叶线形或狭线形，长 10cm～30cm，宽 1mm～3.5mm，边缘粗糙。苞片 4 枚～10 枚，长短不一，长约 1cm～5cm；头状花序顶生，球形，直径 15mm～17mm，具多数小穗；小穗钻状披针形，长约 8mm，具 6 枚～8 枚鳞片；鳞片披针形或椭圆状披针形，由下向上渐变大，棕色，最下部的 3 枚内无花，上部的 2 枚～3 枚内各有花 1 朵；花单性，雄花在上，雌花在下，顶部 1 鳞片线形，内面亦无花；下位刚毛 4 条～6 条，长短不一，长不及小坚果的 1/2 或 1/3；雄蕊 2 或 3；柱头 2，有时 1。小坚果宽或狭倒卵形，长 1.5mm～2mm，双凸状，上部被短柔毛，表面具细点；花柱基三角形。

生于草地。分布于长江以南各省(自治区)，东至台湾省。亚洲、非洲、大洋洲热带地区也有。

采收加工 夏、秋季采收，洗净，晒干。

药材性状 须根细硬，圆柱形，弯曲。秆丛生，圆柱状，长 20cm～65cm，直径约 0.8mm～2mm，灰绿色或棕绿色，具细纵纹。叶细线形，长 10cm～30cm，宽 1mm～3.5mm，灰绿色，边缘粗糙。头状花序顶生，球形，直径约 15mm～17mm，由多数钻状披针形小穗组成，棕色，基部具叶状苞片 4 枚～10 枚，长短不一，长约 1cm～5cm。气微，味淡。以秆粗、叶多，色灰绿者为佳。

性味和功用 甘、咸，平。清热利湿。用于淋浊。常用量 9g～15g。



图 45　刺子莞

虎 头 兰

别名 蝉兰、石兰花。

来源 本品为兰科植物虎头兰 Cymbidium hookerianum Reichb. f. 的全草。

原植物 虎头兰(图 46)为多年生草本。假鳞茎粗壮，稍扁。叶簇生，厚而坚韧，宽带状，长达 90cm，关节明显，边全缘。花葶侧生，近直立，常短于叶，总状花序疏生 6 朵～12 朵；花梗连子房长约 4cm；萼片 3，黄绿色，中萼片近矩圆形，长 4.5cm～6cm，背面基部有紫褐色晕；侧萼片斜矩圆形；花瓣和萼片相似，宽 5mm～12mm，浅黄绿色，基部有紫红色小斑点；唇瓣 3 裂，侧裂片直立，具紫红色条纹，中裂片略反折，边缘波状；合蕊柱长 3cm～4.2cm。蒴果卵状椭圆形，长 8cm～10cm，具棱。

附生于海拔 1 000m～3 000m 的山坡林下石上或树上。分布于云南、四川、贵州、西藏等省(自治区)。锡金、尼泊尔及印度也有。

采收加工 全年均可采收，晒干或鲜用。

药材性状 假鳞茎粗壮，长椭圆形，稍扁，基部具多数绳圆柱形粗根。叶丛生，宽带状，长达 90cm，宽 2cm～3cm，顶端渐尖，基部鞘状对合而互抱，具关节，红棕色，平行脉在两面均突起。花葶侧生，圆柱形，直径 3mm～5mm，表面棕黄色或褐色，具细纵纹及棕褐色细小斑点，无毛；总状花序 6 至多花，花大，黄绿色，唇瓣 3 裂，中裂片边缘波状，上表面被短柔毛及 2 条平行褶片。蒴果卵状椭圆形，长 8cm～10cm，宽 4cm～5.5cm，棕褐色，具翅状宽棱，具宿存花萼或萼残基。气无，味淡。以根粗壮，叶完整者为佳。

性味和功用 甘、淡、平。归肺经。止咳化痰，散瘀消肿，止血消炎。用于肺结核，肺炎，气管炎，支气管炎，喘咳，咽喉炎，月经不调，骨折筋伤，外伤出血。常用量 15g～40g；外用鲜品适量捣烂敷伤处。

附注 虎头兰果实晒干研粉止血消炎。根治肺热咳嗽，感冒。



图 46　虎头兰

虎 皮 草

别名 猪耳朵、马耳朵草、龙香草。

来源 本品为虎耳草科植物大叶金腰 Chrysosplenium macrophyllum Oliv. 的全草。

原植物 大叶金腰(图 47)为多年生草本，高 7cm～16cm。茎柔软多汁，被锈色柔毛，有不孕枝。叶数枚基生，带革质，倒卵形或狭倒卵形，长 3cm～20cm，顶端圆钝，基部狭楔形，下延，边缘有波状浅圆齿或全缘，上面深绿色，疏生短毛，下面灰绿色，叶脉隆起；叶柄粗壮，长 1cm～6cm，扁圆形，被锈色柔毛；不孕枝下部叶互生、匙形，长 8mm～17mm，向上渐大。聚伞花序顶生，紧密，基部具叶状苞片；苞片卵形或狭卵形，长 5mm～17mm；萼片 4，卵形，直立，白色或淡黄色，长 2mm～3mm；雄蕊 8，长 6mm～8mm，于花后花丝仍存留呈针状；子房上位，心皮 2，花柱长约 5mm，子房与花被筒相结合。蒴果半上位，顶端近平截，中间凹陷，两端具针状长毛；种子卵形，有微小的乳头状凸起。

生于海拔 1 000～2 000m 的山地林下、溪沟边、山谷旁等阴湿地方。分布于云南、贵州、四川、陕西、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东等省。

采收加工 春、夏季采收、洗净，鲜用或晒干。

药材性状 根状茎粗短，具多数棕褐色须根。花茎肉质，紫红色，长 7cm～12cm，通常具 1 枚匙形小叶。基生叶较厚软，皱缩，展开后呈倒卵形或狭倒卵形，长 3cm～20cm，宽 2cm～12cm，顶端圆钝，基部渐狭，下延至叶柄，表面暗绿色，散生棕色短毛，下面锈褐色，具隆起叶脉；叶柄粗壮，扁圆形，上面凹陷，被锈色柔毛；基生叶侧具 1 或少数不孕枝，长可达 45cm，具互生的匙形或菱形小叶片，顶部的 3 片～4 片较大。聚伞花序顶生、紧密；苞片叶状；花单被，4 片；雄蕊伸出，花丝宿存，蒴果。气微香，味微苦、涩。以具根、茎肉质、叶多者为佳。

性味和功用 苦、涩，寒。清热解毒，收敛生肌。用于小儿惊风，臁疮，烫伤。常用量 30g～60g；外用适量捣烂取汁搽或熬膏涂患处。




图 47　大叶金腰

盾 果 草

来源 本品为紫草科植物盾果草 Thyrocarpus sampsonii Hance 的干燥全草。

原植物 盾果草(图 48)为一年生草本，高 20cm～45cm。茎直立或斜升，常自下部分枝，被毛，基生叶丛生，有短柄，匙形，长 3.5cm～19cm，顶端急尖，基部楔形下延，全缘或有疏细锯齿，两面均具有基盘的长硬毛和短糙毛；茎生叶互生，较小，狭长圆形或倒披针形，无柄。镰状聚伞花序长 7cm～20cm；苞片狭卵形至披针形，花生苞腋或腋外；花梗长 1.5mm～3mm；花萼长 1.5mm～3mm，5 深裂，裂片狭椭圆形，果期稍增大，背面和边缘有开展的长硬毛，腹面稍具短伏毛；花冠钟状，紫色、淡蓝色或白色，檐部直径 3mm～6mm，5 裂，裂片近圆形，开展，喉部具 5 个附属物；雄蕊 5，生于花冠筒中部，具短花丝；子房 4 裂，花柱短，不伸出花冠外，雌蕊基圆锥状。小坚果卵形，边缘碗状突起，具齿。

生于山坡草丛或灌丛下。分布于台湾、浙江、广东、广西、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、河南、陕西、四川、贵州、云南等省(自治区)。越南也有。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 全体呈卷缩状。主根细长，淡黄色，具多数支根。基生叶丛生，展开后呈匙形或匙状倒披针形，茎及叶两面均具长硬毛和短糙毛，茎生叶互生，较小，狭长圆形或倒披针形。镰状聚伞花序顶生，小花生苞腋或腋外，具长 1.5mm～3mm 的纤细短梗，花蓝色或白色，花萼 5 深裂，花冠钟状，5 裂，喉部具 5 个附属物，附属物线形，长约 0.7mm，肥厚，有乳头状凸起，顶端微缺，雄、雌蕊均内藏。小坚果 4，长约 2mm，黑褐色，外层碗状突起，边缘具齿，齿长约为碗高的一半，伸直，齿端不膨大，内层碗状突起不向里收缩。以茎丛生，叶多者为佳。

性味和功用 苦，凉。清热解毒，消肿。用于咽喉肿痛，乳痈，疔疮，菌痢，肠炎。常用量 9g～15g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图 48　盾果草

金 灯 藤

别名 大菟丝子、日本菟丝子、无娘藤。

来源 本品为旋花科植物金灯藤 Cuscuta japonica Choisy 的干燥全草。

原植物 金灯藤(图 49)为一年生寄生草本，茎较粗壮，黄色，肉质，常带深红色小疣点，缠绕于其他树木上。叶退化为三角形小鳞片，长约 2mm。小花多数，密集成短穗状花序，基部常多分枝；苞片及小苞片鳞片状，卵圆形，顶端尖；花萼肉质，碗状，长约 2mm，5 深裂，裂片卵圆形，长约 1mm，相等或不等，有紫红色疣状斑点；花冠钟状，质稍厚，桔红色或黄白色，长 3mm～5mm，顶端 5 浅裂，裂片卵状三角形；雄蕊 5，花丝极短或近无，花药卵圆形，贴于花冠裂片间；鳞片 5，矩圆形，生于花冠基部，边缘流苏状；雌蕊 1，子房 2 室，花柱 1，柱头短，2 裂。蒴果椭圆状卵形，长约 5mm，近基部盖裂；种子 1～2，圆心形，光滑，褐色或黄棕色，长约 3mm～5mm。

生于田边、荒地、灌丛中，寄生于草本植物上。分布于我国南北各省(自治区)。越南、朝鲜、日本也有。

采收加工 秋季采收全草，晒干。

药材性状 干燥茎多缠绕成团，呈棕黄色，常具紫红色小瘤状斑点，圆柱形，直径约 1.5mm～2mm，柔弱。叶鳞片状，三角形，长约 2mm，多已脱落。短穗状花序，有分枝；花多数簇生，卷缩成小球形，花萼具紫红色疣状斑点。带有卵圆形或扁球形果实，长 3mm～5mm，光滑，淡褐色或黄棕色。气微，味微苦。以干燥、色黄棕、无杂质者为佳。

性味和功用 甘、苦，平。归肝、肾经。清热，凉血，利水，解毒。用于吐血，衄血，便血，血崩，淋浊，带下，痢疾，黄疸，痈疽，疔疮，热毒痱疹。常用量 9g～15g。外用适量煎水洗、捣敷或捣汁涂。

附注 金灯藤种子亦作菟丝子用，称“大菟丝子”。




图 49　金灯藤

金疮小草

别名 白毛夏枯草、散血草、筋骨草。

来源 本品为唇形科植物金疮小草 Ajuga decumbens Thunb. 的全草。

原植物 金疮小草(图 50)为一或二年生草本。茎长 10cm～30cm，四棱形，基部平卧或斜上升，多分枝，被白色长柔毛。基生叶较大，茎生叶对生，叶片匙形，长椭圆形或倒卵状披针形，长 3cm～6cm，有时长达 14cm，顶端钝至圆形，基部渐狭，下延，边缘具不规则波状圆齿或几全缘，两面和叶缘均具疏柔毛；叶柄长 1cm～2.5cm 或更长，具狭翅，浅绿色或紫绿色，被长柔毛。伞形花序多花，排列成间断长 7cm～12cm 的穗状花序，下部苞片与叶同形，匙状，上部者披针形；花梗短；花萼漏斗状，边缘具疏柔毛；花冠淡蓝色或淡红色，稀白色，筒状，基部略膨大，长 8mm～10mm，被柔毛，冠檐 2 唇形，上唇短，圆形，顶端微凹，下唇大，3 裂，中裂片狭扇形或倒心形；雄蕊 4，2 强；雌蕊 1，花柱细长，顶端 2 浅裂；花盘环状。小坚果倒卵状三棱形，背面具网纹，腹面有果脐。

生于海拔 1 500m～2 300m 的路旁、沟边、丘陵山地阴湿处或竹林下。分布于我国长江以南各省(自治区)，最西可达云南省的西畴及蒙自。朝鲜、日本也有。

采收加工 春、夏季采收，洗净，鲜用或晒干。

药材性状 全体呈灰黄色或暗绿色，密被白色柔毛。根细小，暗黄色，多分枝。茎方形，细瘦，质脆，易折断，髓部中空。叶多皱缩，破碎，完整者展开后呈匙形、长椭圆形或倒卵状披针形，长 3cm～6cm，宽 1.5cm～2.5cm 或更长大，绿褐色，边缘有波状锯齿；叶柄具狭翅。轮伞花序腋生，小花 2 唇形，黄棕色。气微，味苦，以身干色黄绿、叶多者为佳。

性味和功用 苦、甘，寒。归肺经。清热解毒，止咳祛痰，养筋和血，止痛消肿。用于急慢性支气管炎，咽炎，扁桃体炎，疔疮痈肿，跌打损伤，外伤出血，吐、衄血，赤痢，淋病。常用量 9g～15g(鲜者 60g～90g)；外用适量捣敷或鲜品取汁含漱。孕妇忌服。



图 50　金疮小草

1. 全株　2. 花放大

细　辛

别名　华细辛、盆草细辛、白细辛。

来源　本品为马兜铃科植物华细辛 Asarum sieboldii Miq. 的干燥全草。

原植物　华细辛(图 51)为多年生草本。根状茎直立或横走，直径 2mm～3mm，节间长 1cm～2cm，顶部分歧，须根多条，捻之有辛香气。叶通常 2，基生，卵状心形或近肾形，长 4cm～11cm，顶端急尖或钝圆，基部心形，两侧裂片长 1.5cm～4cm，宽 2cm～5.5cm，顶端圆形，上面疏生短毛，脉上较密，下面仅脉上被毛；叶柄长 5cm～18cm；芽苞叶圆肾形，长宽各约 13mm。花单一，由两叶间抽出，紫黑色；花梗长 2cm～4cm；花被管钟状，直径 1cm～1.5cm，内面有疏纵脊皱，裂片 3，三角状卵形，长约 7mm，宽约 10mm，直立或近平展；雄蕊 12，生于子房中部，药隔突出，短锥形；子房半下位，球形，花柱 6，顶端 2 裂，柱头侧生。浆果状蒴果近球形，直径约 1.5cm，棕黄色。

生于海拔 1 200m～2 100m 林下阴湿腐植土中。分布于山东、安徽、浙江、江西、河南、湖北、陕西、四川等省。日本、朝鲜也有。

采收加工　夏季果熟期采收，摊通风处阴干，不宜日晒和水洗。

药材性状　全草常卷曲成团。根状茎呈不规则圆柱形，有短分枝，长 5cm～20cm，直径 1mm～2mm，节间长 2mm～10mm，表面灰棕色，粗糙，具环节。根细长，表面灰黄色，常有细微纵皱纹，质脆易断，断面黄白色。叶有长柄，1 枚～2 枚，较薄，心形，先端渐尖或钝，边全缘，长 4cm～9cm。有时可见果实或花，花被裂片直立或开展；果实近球形，香气较浓，味辛、辣，麻舌。以根多、色灰黄、叶绿、气味浓者为佳。

性味和功用　辛，温。归肺、肾经。祛风散寒，通窍止痛，止咳除痰。用于风寒感冒，鼻塞头痛，牙痛，痰饮咳喘，风湿性关节炎，口舌生疮。常用量 1g～3g。外用适量，研末撒或煎水含漱。气虚多汗，血虚头痛，阴虚咳嗽等忌服，肾功能不正常者慎服。

附注　1. 本品不宜与藜芦同用。2. 本品根及根茎功效同全草。3. 据《药典》细辛的原植物有 3 种，详见《药典》细辛条。



图 51　细辛

细 圆 藤

别名 广藤、小广藤、土藤、蛤仔藤。

来源 本品为防己科植物细圆藤 Pericampylus glaucus(Lam.) Miers 的干燥全株。

原植物 细圆藤(图 52)为多年生木质攀援藤本。嫩枝通常被黄灰色柔毛，老渐脱落。叶互生，卵状三角形至三角形，长宽均约 5cm～10cm，全缘或微波状，两面被密柔毛或疏柔毛，有时仅下面被毛，掌状脉 3～5；叶柄长 2cm～6cm，被灰黄色绒毛或柔毛。聚伞花序腋生，单个或几个组成圆锥花序式；花单性，雌雄异株；雄花序长 2cm～10cm，被疏柔毛；雄花：萼片 9，膜质，外被柔毛，排成 3 轮，最外一轮小，长椭圆形，内 2 轮宽匙形或倒披针形，长 1mm～1.5mm；花瓣 6，倒卵状楔形或匙形，雄蕊 6；雌花萼片、花瓣与雄花相似，退化雄蕊极小，心皮 3，柱头 2 裂。核果近球形，紫红色，直径 5mm～7mm，两侧压扁，内果皮骨质，背部两侧具疣状突起。

生于海拔 400m～1 000m 处阴湿沟边、林缘或灌丛中。分布于我国长江流域以南各省区，东至台湾省。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 藤茎细长圆柱形，直径 4mm～10mm；表面紫褐色或棕褐色，有纵皱纹，具黄灰色柔毛或无毛；皮部和木部易剥离，木部表面淡黄白色，平滑，具细直纵沟纹；体轻，质实。叶互生，卵状三角形、三角形或宽楔形，黄绿色，长宽均约 5cm～10cm，两面被柔毛、近无毛或仅下面被毛。聚伞花序单个或数个腋生，有总梗或无，花小。果近球形，两侧扁；内果皮骨质，背部具疣状突起。气微，味苦，以茎粗壮、紫褐色、叶多者为佳。

性味和功用 苦、辛，寒。归心、肺经。祛风镇静，清热解毒，散瘀止痛。用于小儿惊风，破伤风，热毒痈肿，风湿性关节痛，跌打损伤，蛇咬伤，咳喘。常用量 9g～15g，小儿酌减。

附注 1. 细圆藤根止咳，为喉科药；用于喉炎、肺病、毒蛇咬伤、疮疖。常用量 9g～15g 或外用适量捣敷。



图 52　细圆藤

挖 耳 草

别名 一颗珠、割鸡芒。

来源 本品为狸藻科植物挖耳草 Utricularia bifida L. 的干燥全草。

原植物 挖耳草(图 53)为纤弱、直立一年生食虫草本。叶基生，条状匙形至条形，长约 1cm～3cm，开花时枯萎，上面生有捕虫囊。花葶高 10cm～20cm，不分枝或偶有分枝，具少数互生的卵形鳞片状小叶；花黄色，数朵排列成顶生的疏总状花序；花梗纤细，长约 3mm，结果时弯曲；苞片小，膜质，圆卵形；花萼 2 深裂，裂片卵形或倒卵形，长 3mm～5mm，近等大，顶端钝，全缘，结果时增大包围蒴果；花冠黄色，唇形，基部有距，连距长 6mm～8mm，距与萼裂片近等长，略弯曲，上唇短，下唇较长；雄蕊 2，花丝宽，花药卵形，1 室；雌蕊由 2 心皮合成，子房上位，1 室，花柱几无，柱头 2 裂，胚珠多数，生于特立中央胎座上。蒴果卵形；种子倒卵形，无胚乳，外面具皱纹。

生于空旷湿地上。分布于江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、台湾、海南、云南、四川等省(自治区)。日本、印度、马来西亚也有。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 全体长 10cm～20cm。茎纤弱，细圆柱形，具微纵皱纹，基底有稀疏的丝状须根。基生叶线形至线状匙形，上面有捕虫囊，花时多已枯落，茎生叶互生，鳞片状，圆卵形，膜质，无柄。顶生总状花序，花数朵，稀疏排列，花冠唇形，黄褐色，有距。蒴果卵形，为两片膜质透明的萼片包围。气无，味微苦。以具基生叶者为佳。

性味和功用 苦，寒。清热利湿。用于急性黄疸型肝炎，耳痛，寻常疣，小儿发疹。常用量 15g～30g；外用适量捣烂取汁滴或搽患处。



图 53　挖耳草

独 角 风

别名 大石泽兰。

来源 本品为苦苣苔科植物川西石吊苣苔 Lysionotus wilsonii Rehd. 的干燥全草。

原植物 川西石吊苣苔(图 54)为小灌木。茎细圆柱形，光滑。叶对生，椭圆形或长卵形，长 4cm～9cm，顶端钝尖，基部楔形至圆形，边近全缘或微具疏齿，齿尖紫红色，侧脉不明显；叶柄长 5mm～10 mm。聚伞花序腋生，有长总花梗；花梗长 4mm～20mm；苞片线形，长约 1mm，宽约 0.5mm，全缘；花少数，无毛；花萼长约 10mm，紫色，5 裂几达基部，裂片线状披针形；花冠筒状漏斗形，白色、内具紫色条纹，长 4cm～5cm，扭曲，檐部 2 唇形，上唇 2 浅裂，裂片半圆形，下唇 3 浅裂，裂片卵圆形；能育雄蕊 2，内藏，花药连着，退化雄蕊 2，短棒状；花盘环状；雌蕊 1，子房上位，胚珠多数，花柱 1，柱头微 2 裂。蒴果细，近圆柱形，长约 10cm；种子小，有长珠柄，顶端有 1 长毛。

附生于海拔 1 500m～2 500m 的山地阴湿岩石上或林中树干上。分布于四川省。

采收加工 夏、秋季采收，洗净，晒干。

药材性状 茎呈细圆柱形，长 30cm～70cm，直径 2mm～5mm；表面红棕色，具细纵条棱及散生大小不等的疣状皮孔，有时具紫黑色细点，质硬脆，易折断，断面平坦，灰黄色；不定根丛生，细丝状，淡褐色。叶对生，易脱落，常集分枝上端，革质，椭圆形或长卵形，长 4cm～9cm，宽 1.6cm～5cm，上面棕黄绿色或红褐色，下面黄绿色、黄棕色至紫红色，两面脉不显，聚伞花序腋生，花冠筒状漏斗形，褐黑色。气微，味微苦。以茎粗壮、叶存留者为佳。

性味和功用 微苦、微温。祛风除湿，活血止痛。用于风湿性关节痛，跌打损伤，劳伤吐血，痛经。常用量 9g～30g。



图 54　川西石吊苣苔

胎生铁角蕨

别名 铁骨莲、凤尾草。

来源 本品为蕨类铁角蕨科植物胎生铁角蕨 Asplenium planicaule Wall. 的干燥全草。

原植物 胎生铁角蕨(图 55)为多年生草本，高 20cm～50cm。根状茎粗短，直立或斜升，密被黑褐色、全缘的钻状披针形鳞片。叶簇生，柄长 6cm～20cm，禾秆色或暗灰色，上面有 1 条通向叶轴的纵沟，下部疏生红棕色纤维状鳞片；叶片披针形或宽披针形，近革质，长 12cm～30cm，幼时下面有少数狭披针形鳞片，后脱落，一回羽状，羽片 17 对～25 对，互生，平展，菱状披针形，中部的较大，长 3cm～4cm，宽 1cm～1.5cm，顶端渐尖，基部宽楔形，极不对称，上侧有时呈耳状，边缘不规则浅裂至深裂，裂片顶部有钝齿，叶脉羽状，两面隆起呈沟脊状；叶轴上部羽片腋间往往有 1 枚被鳞片的芽孢，着地进行营养繁殖，产生新植株。孢子囊群长线形，沿小脉 1 侧着生，与主脉形成斜角；囊群盖棕褐色，膜质，全缘，通常开向主脉。

生于海拔 1 000m～1 700m 的林下阴湿石岩上或树干上。分布于甘肃、云南、贵州、四川、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西、台湾等省(自治区)。日本、印度支那、缅甸、印度、尼泊尔也有。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 根状茎短粗，下部具多数短细须根，周围及顶部密生鳞片，鳞片钻状披针形，黑褐色，全缘。叶成簇生状，柄长 6cm～20cm，灰绿色或禾秆色，具 1 条纵沟，下部具红棕色纤维状鳞片；叶片披针形，近革质，长 12cm～30cm，宽 3.8cm～7cm，灰绿色，互生，一回羽状，基部极不对称，上部羽片腋间通常具 1 个有鳞片的芽孢。孢子囊线形，沿小脉 1 侧着生，棕褐色。气无，味淡。以叶色绿、带芽孢者为佳。

性味和功用 淡、微涩，凉。清热解毒，除湿止痛，止泻。用于风湿腰痛，腹泻，痢疾。常用量 9g～15g，水煎或泡酒服。



图 55　胎生铁角蕨

香 排 草

别名 排草香、排草、香草、满山香。

来源 本品为报春花科植物细梗香草 Lysimachia capillipes Hemsl. 的干燥全草。

原植物 细梗香草(图 64)为一年生草本，高 40cm～60cm，茎直立，中部以上分枝，下部有时匍匐。叶互生，卵形至卵状披针形，长 1.5cm～7cm，顶端锐尖或渐尖，基部楔形，很少近平截或圆形，边全缘或微波状，无毛或上面被极疏的小刚毛，侧脉 4 对～5 对；叶柄长 2mm～8mm。单花腋生，花梗纤细，丝状，长 1.5cm～3.5cm；花萼长 2mm～4mm，5 深裂近基部，裂片卵形或披针形，顶端渐尖；花冠黄色，直径 6mm～10mm，5 裂近达基部，裂片狭长圆形或近线形，宽 1.8mm～3mm，顶端稍钝；雄蕊 5，基部与花丝合生约 0.5mm，分离部分明显；花柱丝状。蒴果近球形，带白色，直径 3mm～4mm，比宿存花萼长。

生于海拔 300m～2 000m 处的山谷林下和溪边。分布于四川、贵州、湖北、湖南、河南、江西、广东、福建、浙江、台湾等省。菲律宾也有。

采收加工 夏季开花时采收，晒干。

药材性状 茎 2 至多条簇生，草质，具 4 棱，棱边有时呈狭翅状，下部常匍匐，节上生须根。叶皱缩成团，黄绿色或灰绿色，无毛或具极稀疏的白色短毛，互生，展开后呈卵形至卵状披针形，花单生叶腋，花梗细长，花冠黄色或黄褐色，5 深裂。蒴果球形，下托以宿存花萼。有浓郁香气，味微甘。以香气浓、叶多，色绿者为佳。

性味和功用 甘，平。归心、肺经。清热解毒，祛风，止咳，调经，理气止痛，醒脑除烦，补虚。用于感冒、气管炎、哮喘、风湿痛，月经不调，神经衰弱，胸腹胀痛，心神不宁，水肿，小儿疳积、疔疮、骨疽、毒蛇咬伤、雀斑。常用量 9g～15g。外用适量捣烂敷患处。



图 64　细梗香草

屏 风 草

别名 小黄芩。

来源 本品为唇形科植物直萼黄芩 Scutellaria orthocalyx Hand. - Mazz. 的干燥全草。

原植物 直萼黄芩(图 56)为多年生草本，高 6cm ~ 25cm。根状茎，纤细。叶对生，具极短的柄；叶片在茎下部者卵圆状披针形至卵圆形，茎上部者线形，长 1cm ~ 2cm，顶端钝或圆形。总状花序顶生；苞片线形；花梗长 1.2mm ~ 2.5mm，与序轴均被短腺毛；花萼长 1.5mm ~ 2.5mm，盾片圆形，高约 1mm，花冠紫色至蓝紫色，长 1.2cm ~ 1.7cm，外被短腺毛，冠檐 2 唇形，上唇盔状，顶端微凹，状卵圆形，冠筒近基部前方膝曲，向喉部渐增大；雄蕊 4，二强，内藏，花药紫色；花柱细长，短于雄蕊，径约 1.8 毫米，黑褐色，具小瘤。

生于海拔 1 200m ~ 2 300(3 300)m 的草坡或松林下。分布于云南、四川省。

采收加工 夏、秋季采收，晒干。

药材性状 全长 6cm ~ 25cm，茎、叶、花序各部均被短柔毛或短腺毛。根茎纤细，多分枝，直径 1mm ~ 1.5mm。茎多数，锐四棱形，直径约 1mm，表面棕绿色。叶柄长不到 1mm；叶片皱缩或破碎，在茎下部者较密集，展开后呈卵圆状披针形至卵圆形，在茎上部者线形，长 1cm ~ 2cm，宽 2.2mm ~ 5.5(~ 7)mm，侧脉 2 对 ~ 3 对，在上面凹陷下面隆起；质脆易碎。总状花序生于茎上端，长 3cm ~ 19cm；苞片线形，向上渐小；花冠 2 唇形，紫色，长 1.2cm ~ 1.7cm，花萼钟状浅 2 唇形，上裂片背上有 1 圆形小盾片，果期内藏 4 枚近球形黑褐色小坚果。

性味和功用 苦、微辛，凉。归肝、胃经。消炎退热，解毒消肿。用于喉痛，小儿肝炎，急慢性胃炎，小儿肺炎，风湿关节疼痛，痈疽肿毒，疥疮，体癣，手足癣，小儿走马牙疳。常用量 9g ~ 15g，外用适量捣烂外敷。



图 56　直萼黄芩

浆 果 苋

别名 地苓苋。

来源 本品为苋科植物浆果苋 Cladostachys frutescens D. Don 的干燥全株。

原植物 浆果苋(图 57)为攀援灌木。茎长 2m～6m，多分枝，枝条长而下弯，幼时有贴生柔毛，后变无毛。叶互生，卵形或卵状披针形，稀卵状心形，长 4cm～15cm，顶端渐尖或尾尖，基部宽楔形、圆形或近楔形，常不对称，全缘，两面初时疏生长柔毛，后变无毛；叶柄长 1cm～4cm。总状花序腋生及顶生，再复合成多分枝的圆锥花序，序轴及分枝有贴生柔毛；苞片狭三角形，长约 1.5mm；小苞片卵形，长约 1mm；花梗长约 1mm；花直径 2～3mm，有臭气，花被片 5，椭圆形，长 1.5mm～2.5mm，淡绿色或带黄色，果时带红色，在开花期后开展或反折，顶端圆钝；雄蕊 5，花丝在基部合生成极短的杯状；子房上位，1 室，柱头 3，长 1mm～1.5mm，圆柱形，果时反折。浆果近球形，直径 4mm～7mm，成熟时红色，下具宿存花被；种子 1～6，压扁状肾形，黑色，光亮。

生于海拔 100m～2 200m 山坡林下或灌丛中。分布于四川、云南、西藏、贵州、广西、广东、台湾等省(自治区)。印度、中南半岛、印度尼西亚、马来西亚及大洋洲也有。

采收加工 春、秋季采收，切段，晒干。

药材性状 茎枝多已切成段，长短不一，直径 2mm～5mm，浅黄棕色，有柔毛或无毛。叶皱缩破碎，或已脱落，完整者展开后呈卵形、卵状披针形或卵状心形，长 4cm～15cm，宽 2cm～8cm，表面灰绿色，疏生长柔毛或无毛。圆锥花序由腋生和顶生的总状花序组成；花小花被宿存；小浆果球形，暗红色。气微。

性味和功用 祛风除湿，通经活络。用于风湿性关节炎，腰腿疼痛。常用量 9g～15g。

附注 浆果苋种子炖猪肉吃治夜盲。叶捣烂敷治溃疡。根与明矾及醋制成浸剂滴鼻，可引起猛烈喷嚏，以治鼻塞。



图 57　浆果苋

球花马蓝

别名 野板蓝根、溫大青。

来源 本品为爵床科植物球花马蓝 Strobilanthes pentstemonoides(Nees) T. Anders. 的干燥全草。

原植物 球花马蓝(图 58)为多年生草本，高 40cm～120cm。节膨大。叶对生，卵状椭圆形或椭圆形，长 4cm～15cm，上部各对 1 大 1 小，顶端长渐尖，侧脉 5 对～8 对，有近平行的小脉相连；叶柄长 1cm～1.5cm。花 2 朵～5 朵集成头状花序，为苞片所覆盖，花序生于上部叶腋，苞片卵状椭圆形，顶端渐尖；花萼长约 8mm，5 深裂，裂片线状披针形，不等长；花冠筒状，淡紫红色，长 3cm～4cm，稍弯曲，外面被短柔毛，内面无毛或喉部散生白毛，上方膨大，裂片 5，短圆形，顶端微凹；雄蕊 4,2 强；子房被毛。蒴果长 1cm～1.8cm，有腺毛；种子 4 粒，有微毛。

生于林下、林缘，或山谷阴湿处。分布于湖北、四川、云南、贵州、广西等省区。

采收加工 夏、秋季采收，晒干。

药材性状 根呈圆柱形，弯曲，长 5cm～15cm，直径 3mm～7mm，有时分叉；表面灰棕色，膨大的节上着生细长分枝的根；茎圆柱形，有纵棱，基部带暗紫色，节膨大，长短不一，径 2mm～5mm；质脆，易折断，断面不平坦，中央有髓。叶多皱缩，黑绿色或暗棕色，完整叶片湿润后展开呈卵状椭圆形或椭圆形，长 4cm～15cm，宽 3cm～5cm，上部各对 1 大 1 小，顶端长渐尖，基部楔形下延，边缘具圆齿状锯齿，侧脉 5 对～8 对，小脉近平行，上面散生短刚毛；膜质。花轴腋生，细长，单一或分枝，顶端可见头状花序，萼宿存，被腺毛，花多脱落。气微，味淡。以根茎粗壮、叶多者为佳。

性味和功用 甘，凉。归肾、肝经。滋肾养阴，清热泻火。用于肾虚腰痛，温病伤津，糖尿病，咽喉炎，急性传染性肝炎，伤口感染。常用量 15g～30g；外用适量研末加麻油调敷患处。



图 58　球花马蓝

1. 根　2. 花枝　3. 花冠剖开　4. 花萼　5. 雌蕊

峨眉排草

来源 本品为报春花科植物峨眉过路黄 Lysimachia omeiensis Hemsl. 的干燥全草。

原植物 峨眉排草(图 59)为一年生草本，高 30cm～60cm。茎通常带红褐色，被多细胞柔毛。叶对生，有时在茎上端的互生，近基部 2 对～3 对，叶较小，上部叶卵状披针形至披针形，长 4cm～8cm，顶端渐尖，基部圆形，全缘，上面幼时疏被小刚毛，老时近无毛，下面沿脉被毛，两面有腺点，侧脉 3 对～4 对；无柄或近无柄。花单生叶腋，长 1.5cm～7cm，密被柔毛；花萼 5 深裂，长 5mm～7mm，裂片线状披针形，顶端尖，背面被短毛；花冠辐状，直径 1.2cm～2cm，金黄色，基部合生约 1.5mm，裂片 5，卵状椭圆形至椭圆状披针形，长 6mm～8mm，顶端锐尖，被稀疏腺点；雄蕊 5，花丝长 3mm～4mm，基部合生成宽而浅的杯，花药长约 2mm，纵裂；子房卵球形。蒴果近球形，褐色。

生于海拔 1 800m～3 500m 处山坡林缘草丛中和山谷溪边。分布于四川、云南省。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 茎圆柱形，单一，基部匍匐部分节上有根，节间长，黄绿色或红褐色，密被毛。中上部叶对生或互生，多卷缩，展开后呈卵状披针形或披针形，顶端锐尖或渐尖，黄绿色，微有毛，两面均有红色或黑色粒状腺点，无叶柄，茎基部的 2 对～3 对叶较小，卵圆形或退化成鳞片状。单花腋生，花梗丝状，密被柔毛；花冠辐状，金黄色或黄褐色，5 裂近基部，裂片顶端尖，有稀疏红色或褐色腺点。

性味和功用 微苦，凉。清热解毒，利湿，排石，散瘀。用于风湿性关节炎，黄疸，肾结石，膀胱炎，跌打损伤，痈疽，疔疮。常用量 9g～15g，外用适量捣烂敷患处。



图 59　峨眉排草

峨眉石凤丹

别名 阔叶丫蕊花、一枝花、循环草、铁飘儿菜。

来源 本品为百合科植物丫蕊花 Ypsilandra thibetica Franch. 的干燥全草。

原植物 丫蕊花(图 60)为多年生草本，高 30 多 cm。基生叶倒披针形，连柄长 6cm～27cm，宽(0.6～)1.5cm～4.8cm，顶端急尖或渐尖，基部狭，全缘；茎生叶倒披针形，长 2cm～3cm，基部抱茎。总状花序顶生，通常比叶长，具几朵至 20 余朵花，花梗长约 6mm；花被片 6，白色、淡红色至紫红色，近匙状倒披针形，长 6mm～10mm，具 3 脉～5 脉；雄蕊 6，长 10mm～18mm，至少有 1/3 伸出花被；子房由 3 心皮组成，呈三角状排列，蓝绿色，花柱单 1，长 16mm～20mm，柱头头状，稍 3 裂。蒴果深 3 裂，长约为宿存花被片的 1/2～2/3；种子多数，细梭状，两端有长尾，连尾长 4mm～5mm。

生于海拔 1 300m～2 850m 处的林下、路旁湿地或沟边。分布于四川、湖南、广西等省(自治区)。

采收加工 全年均可采收，洗净，晒干。

药材性状 根状茎细长圆锥形或圆柱形，长 1cm～5cm，粗约 1cm，具明显的紫棕色环纹，节上生多数较粗壮的须根。叶黄绿色，多卷缩，展开后呈倒披针形，均基生。花葶比叶长，总状花序顶生，有数朵至 20 几朵花，花梗比花被稍长；花葶中、下部具数枚鞘状苞叶；花被 6，离生，匙状倒披针形，白色至紫红色；雄蕊和花柱明显伸出花被之外；子房分裂部分为全长的 1/4～1/5。气无，微辛苦。以叶色绿、根状茎粗长者为佳。

性味和功用 辛、微苦，温。活血散瘀，利尿，消肿止痛。用于跌打损伤，肾炎，肿毒。常用量 3g～9g。外用适量捣烂敷患处。孕妇慎服。



图 60　丫蕊花

饿 蚂 蝗

别名 山蚂蝗、粘身草、红掌草。

来源 本品为蝶形花科植物饿蚂蝗 Desmodium sambuense(D. Don)DC. 的干燥全株。

原植物 饿蚂蝗(图 61)为小灌木，高 0.5m～2m。枝疏生长柔毛。三出复叶互生，粗糙；顶生小叶宽椭圆形，长 4.5cm～8.5cm，顶端钝或急尖，基部楔形或钝圆形，全缘，上面无毛或具疏柔毛，下面密被黄柔毛，侧生小叶略小，基部略斜；叶柄长 1.5cm～4cm，被毛，小叶柄短；托叶卵状披针形。总状花序腋生或为顶生的圆锥花序，长达 16cm；花多数，密生，苞片披针形，被缘毛，长 0.5cm～1cm，脱落；花萼钟状，长约 5mm，萼齿 5，三角状披针形，有长柔毛；花冠蝶形，粉红色或紫红色，旗瓣圆形至长椭圆形，长约 1cm，翼瓣与旗瓣等长，龙骨瓣较短；雄蕊 10，2 组；子房线形。荚果密被褐色绢毛，长 1.5cm～2.5cm，具 4～9 荚节，腹缝线缢缩，背缝线稍成波状。

生于山坡、草地、山沟边或林缘。分布于广东、广西、福建、台湾、浙江、云南、四川、贵州等省(自治区)。中南半岛、印度、尼泊尔也有。

采收加工 夏、秋采收，切段，晒干或鲜用。

药材性状 根近圆柱形，扭曲，表面灰棕色，断面黄白色。茎圆柱形，有棱角并疏生长柔毛，灰棕色或灰绿色。叶互生，小叶 3，宽椭圆形，长 4.5cm～8.5cm，顶生小叶较大，小叶柄长 1cm～1.5cm，侧生小叶基部略斜，柄短，上面无毛或疏被柔毛，下面密被黄色长柔毛；叶柄被毛；托叶卵状披针形，棕色。总状花序腋生或在枝顶形成圆锥状，长达 16cm；花冠蝶形，淡红色或紫红色。荚果具 4 节～9 节，节间缢缩。气微，味甘、苦。以叶多、色绿者为佳。

性味和功用 甘、微苦，平。补虚，活血，健胃，止痛，解蛇毒。用于胃痛，小儿疳积，妇女干血痨，毒蛇咬伤。常用量 15g～30g。

附注 饿蚂蝗花枝用于发汗解表。种子用于疟疾。



图 61　饿蚂蝗

倒 水 莲

别名 野海棠、黄芩、水黄连。

来源 本品为毛茛科植物峨嵋唐松草 Thalictrum omeiense W. T. Wang et S. H. Wang 的干燥带根全草。

原植物 峨嵋唐松草(图 62)为多年生草本，高 50cm～80cm。根状茎短，须根多数。茎有纵棱，分枝。基生叶 1，和茎下部叶均具长柄，为三回三出复叶；叶片长 16cm～25cm，顶生小叶倒卵形、菱状倒卵形或宽卵形，长 3cm～7cm，顶端圆钝，基部宽楔形，3～5 浅裂，有粗圆齿，下面脉隆起，网脉明显，侧生小叶较小；茎上部叶为二回三出复叶，渐变小，有短柄。圆锥花序顶生，多回两叉状分枝，花密集；花梗长 4mm～5mm；萼片 4，白色，倒卵形船状，长约 3mm，早落；雄蕊多数，长 2mm～5mm，花药长椭圆形，顶端钝，花丝比花药窄或近等宽，上部棒状，下部丝形；心皮 8～16，直或上部稍弯。瘦果狭卵球形，长约 2mm，无柄，有 6 条纵肋，宿存花柱拳卷。

生于海拔 720m～2 000m 间山地溪边或石岩边阴湿处。分布于四川省。

采收加工 夏季采挖带根全草，晒干。

药材性状 根状茎短，结节状，顶端可见茎基残痕，中下部具多数细长的须根，长 5cm～10cm、直径约 1cm；表面褐色或黄褐色；质坚硬，易折断，断面黄色。茎多分枝，具细纵棱。叶为三回或二回三出复叶，小叶黄绿色，卷缩，展开后为宽卵形、卵状长圆形、菱状倒卵形至近圆形，长 3cm～7cm，宽 2cm～5cm。圆锥花序；花丝倒披针形；心皮 8～16。瘦果狭卵球形，无柄，具纵肋。气微，味苦。以根茎粗壮、须根多、色黄者为佳。

性味和功用 苦、涩，寒。归心、肝、胆、大肠经。清热解毒，燥湿。用于疟疾寒热，肝炎，腹痛泻痢，头晕，目痛，结膜炎，热盛心烦，湿疹。常用量 12g～25g。外用适量研末调敷患处。




图 62　峨眉唐松草

1. 根　2. 上部枝叶及花序

鹿衔草

别名 鹿蹄草、常绿茶。

来源 本品为鹿蹄草科植物鹿蹄草 Pyrola calliantha H. Andr.（P. rotund ifolia L. subsp. chinensis H. Andr 的干燥全草。

原植物 鹿蹄草(图 63)为常绿草本，高 10cm～30cm，叶基生，革质，椭圆形或圆卵形，长 2.5cm～5.2cm，顶端钝下面常有白猎，有时带紫色；叶柄长 2cm～6cm，有时带紫色。花葶有 1～2(～4)枚鳞片状叶；总状花序长 12cm～16cm，有花 9 朵～14 朵，每花具小苞片 1，披针形，长 6mm～9mm，与花梗近等长；花倾斜，稍下垂，广钟形，直径 1.5cm～2cm；花萼 5 深裂，裂片舌形，长(3～)5～7.5mm，顶端急尖或钝尖，边近全缘；花瓣 5，倒卵状椭圆形或倒卵形，长 6mm～10mm，白色，有时稍带淡红色；雄蕊 10；雌蕊 1，心皮 5，花柱长 6mm～8(～10)mm，常带淡红色，倾斜，近直立或上部稍向上弯曲，伸出或稍伸出花冠外，顶端有不明显环状突起，5 圆裂。蒴果扁球形，直径 7.5mm～9mm。

生于海拔 700m～4 100m 山地林下。分布于我国大部地区，为特有种。

采收加工 全年均可采收，晒干或晒至叶半干时，堆积使叶变成紫红色或紫褐色，再晒干。

药材性状 全体长 12cm～25cm，红棕色或紫棕色，无毛。根状茎细长，近圆柱形，稍具棱条及细纵皱纹。基生叶数片，具扁平而中央凹入的长叶柄；叶薄革质，椭圆形、卵圆形或近圆形，长 2cm～5cm，宽 1.7cm～4cm，顶端钝圆或钝尖，边全缘或有疏锯齿，略反卷，上面紫棕色，少有棕绿色，主脉在两面凸起。偶可见花葶，顶端具总状花序，有数朵卷缩的花或扁球形蒴果。气微，味淡、微苦。以叶片红棕色、无杂质者为佳。

性味和功用 甘、苦，温。归肝、肾经。补虚，益肾，祛风湿，止血、解毒，调经。用于肺虚咳嗽，劳伤吐血，风湿性关节痛，崩漏，白带，外伤出血，神经痛，痢疾，月经不调，产后瘀滞，慢性肾炎，痈肿疮毒，蛇虫咬伤。常用量 9g～15g。外用适量捣烂或煎水洗患处。

附注 参阅本图集第四册 114 页鹿衔草条。



图 63　鹿蹄草

1. 全株　2. 药材(鹿衔草)

接骨仙桃

别名 仙桃草、蚊母草、水蓑衣、灯笼草、接骨草、八卦仙桃。

来源 本品为玄参科植物蚊母草 Ver onica peregrina L. 的干燥全草。

原植物 蚊母草(图 65)为一或二年生草本，高 10cm～25cm。茎通常自基部多分枝。叶无柄，下部的倒披针形，上部的长矩圆形，长 1cm～2cm，顶端钝或稍尖，基部楔形，全缘或中上端有三角状锯齿。总状花序顶生，果期达 20cm，苞片线状倒披针形，比叶略小，全缘或有锯齿；花梗长约 1mm；花萼 4 裂，裂片长 3mm～4mm，矩圆形至宽条形，顶端钝；花冠白色而略带淡红色或浅蓝色，长约 2mm，4 裂，裂片长矩圆形至卵形，顶端钝；雄蕊 2，短于花冠；子房上位，花柱短，柱头头状。蒴果倒心形，明显侧扁，长 3mm～4mm，宽略过之，无毛或有时沿脊疏生短腺毛，花柱宿存，长不超出凹口；种子长圆形，扁平。

生于潮湿的荒地、路边、田野，在西南地区生长处海拔可达 3000m。分布于我国东北、华东、华中、西南各省(自治区)。朝鲜、日本、苏联(原)西伯利亚地区、南北美洲、欧洲也有。

采收加工 春、夏季采收(以果实带虫瘿者为佳)，晒干或用文火烘干。

药材性状 茎呈圆柱形，长 8cm～12cm，直径约 1mm～2mm。表面枯黄色或淡红棕色，具纵纹，质较柔软，折断面中空。叶多已脱落，残留者破碎或皱缩卷曲，质脆易碎，完整者润湿后展开为倒披针形或长矩圆形，长 1cm～2cm，宽 2mm～6mm。花生于枝上部苞腋，花冠多已萎落。蒴果扁倒心形，枯黄色，宽大于长，内藏多数淡棕色或黄色扁平种子，如果实有昆虫寄生时则肥大呈肉质桃形。气微，味淡。以叶多、果实具虫瘿而膨大者为佳。

性味和功用 甘、苦，温。归肺经。活血止血，祛瘀止痛，清肺热，和肝胃。用于咯血、衄血、吐血，便血，跌打损伤，瘀血肿痛，胃痛，疝痛，痛经，咽喉肿痛。常用量 9g～30g。外用适量捣敷患处或煎水洗。



图 65　蚊母草

黄海棠

别名 红旱莲、湖南连翘、牛心茶、对经草。

来源 本品为金丝桃科植物黄海棠 Hypericum ascyron L. 的干燥全草。

原植物 黄海棠(图 66)为多年生草本，高 40cm～130cm。茎四棱形。叶对生，无柄；叶片披针形，长圆状披针形至椭圆形，长(2～)4cm～10cm，顶端钝尖，基部楔形略抱茎，全缘，两面密布细小透明腺点。花数朵组成顶生的二歧聚伞花序；花梗长约 1.5cm；花冠黄色，直径 2.5cm～5cm；萼片 5，卵圆形，具多数半透明腺点；花瓣 5，镰状倒卵形，偏斜而旋转；雄蕊多数，基部连合成 5 束，每束与花瓣对生，子房上位，圆锥形，花柱 5 裂。蒴果圆锥状，长 8mm～15mm，成熟后浅黑棕色，5 裂；种子多数，细小，长椭圆形，表面黑棕色，具细网纹。

生于山坡林下、草丛中、路旁向阳地。分布于我国东北和黄河、长江流域。日本也有。

采收加工 夏、秋季果实初熟时，割取地上部分，摊薄晒至半干，露天堆放过夜，次日晒干；或用热水泡一下，晒干。

药材性状 茎下部圆柱形，上部具 4 棱，长 60cm～90cm，径 3mm～5mm，表面红棕色，节处有叶痕，节间长 5cm～7cm，顶端有 3 个～5 个圆锥形蒴果，质硬，断面中空。果实长 1cm～1.5cm，直径约 8mm，顶端狭小，常开裂成 5 瓣，瓣片外面红棕色或棕褐色，内面淡红色或灰白色，中轴处着生多数种子。种子红棕色或褐色，椭圆形，略弯曲，长约 1mm。叶通常脱落。气微，味微苦涩。以去根、带叶、茎红棕色、种粒饱满者为佳。

性味和功用 微苦，寒。凉血止血，平肝，解毒，清热。用于各种出血，肺炎，痢疾，头疮，肝炎，跌打损伤，疮疖。常用量 9g～30g。外用适量研末调敷患处。

附注 本品在安徽、湖北、湖南等省部分地区作刘寄奴使用，华东地区称本品为红旱莲。



图 66　黄海棠

1. 根　2. 果枝

黄 牛 草

别名 梭茅草、油草。

来源 本品为莎草科植物十字苔草 Carex cruciata Vahl 的干燥全草。

原植物 十字苔草(图 67)为多年生草本。根状茎粗短，木质，横生。茎粗壮，高 40cm～90cm。叶基生或茎生，近革质，线形，长于秆，上部渐狭，叶脉 3 条，明显，脉上和边缘粗糙，无柄；叶鞘闭合，上部稍扩张，鞘口暗褐色，被短粗毛，基部的叶鞘无叶片。圆锥花序复出，长 20cm～40cm，具多数侧生花序枝；序轴疏被短粗毛；苞片叶状，长于花序，苞鞘长；小穗极多数，全部从囊内无花的囊状枝先出叶中生出，雌雄花生于同 1 小穗上，长圆形或长圆状披针形，长 5mm～8mm，雄雌顺序，几成直角开展；雌花鳞片宽卵形、长约 2mm，膜质，密生锈色短线纹，有 3 条脉，顶端具短芒尖；雄花鳞片狭卵形；雄蕊 3；花柱 3；果囊卵形或椭圆形，稍膨胀，长约 3.5mm，草黄色或浅褐色，具多数脉，上部边缘具短硬毛，喙长约 2mm，口部 2 齿裂；小坚果倒卵状椭圆形，长约 1.8mm，有 3 棱，栗褐色，具宿存花柱基。

生于山坡草地、林下、水边或山谷阴湿处。分布于云南、贵州、四川、浙江、江西、广东、广西、湖北、福建、台湾等省(自治区)。越南、印度、尼泊尔、印度尼西亚也有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干。

药材性状 本品长 40cm～95cm。根状茎粗短，木质，横生，节较密，节上生须根。秆三棱柱形，平滑，基部粗厚，具暗褐色旧叶鞘。叶基生和茎生，线形，宽 4mm～10mm，上端渐狭至顶端渐尖，长于茎，基部具闭合叶鞘，褐色。复圆锥花序顶生，由 2 至数个侧生圆锥花序和 1 个顶生圆锥花序组成，长 20cm～40cm，褐色。气无，味淡。以叶多、带花序者为佳。

性味和功用 微苦，平。清肺热，止咳。用于麻疹，肺热咳嗽，痢疾。常用量 10g～30g。

附注 十字苔草种子健脾，配伍山药煮粥食，治脾虚善饥。



图 67　十字苔草

1－2. 全株

野 坝 子

别名 野巴子、野坝蒿。

来源 本品为唇形科植物野拔子 Elsholtzia rugulosa Hemsl. 的干燥全草。

原植物 野拔子(图 68)为草本至半灌木，高 30cm～150cm。小枝四棱形，上部密被白色微柔毛。叶对生，卵形、椭圆形至近菱形，长 2cm～7.5cm，顶端短尖，基部楔形下延，边缘除基部外其余具粗锯齿，上面具细皱和粗硬毛，下面密被白色绒毛；叶柄长 5mm～25mm。轮伞花序多花，在茎及枝顶排成长 3cm～12cm 的假穗状花序；小苞片钻形；花萼钟状，长约 1.5mm，外被白色粗硬毛，齿 5，近相等或后 2 齿稍长；花冠白色、淡黄色或淡紫色，宽钟状，筒部内面具斜向毛环，檐部二唇形，上唇直伸，顶端微凹，边缘啮蚀状，下唇 3 裂，中裂片较大，卵圆形，全缘具睫毛；雄蕊 4，前对较长，外露，花丝疏被柔毛，花药卵圆形，2 室；雌蕊 1，花柱细长。小坚果矩圆形至近球形，无毛，长不超过 1mm。

生于海拔 1 300m～2 800m 的山坡草丛、灌丛中、路旁。分布于四川、贵州、云南、广西等省(自治区)。

采收加工 秋季采收，阴干。

药材性状 茎灰褐色，外皮有不规则裂纹，多分枝；小枝钝四棱形，密被白色绒毛，具细纵条纹，外表黄褐色；质硬脆，易折断，断面外面木质，髓部海绵质。叶对生，皱缩卷曲并多破碎，柄纤细；叶片展平后呈椭圆形至近菱状卵形，边缘具钝锯齿，上面有极细皱纹，黄绿色，被粗毛，下面灰白色，被淡黄色绒毛。苞片钻形，假穗状花序生于主茎及侧枝顶部，具长 1.2cm～2.5cm 的总梗；轮伞花序具梗，位于穗状花序下部的常为疏散头状；花冠 2 唇形，淡黄棕色或带暗紫色。小坚果长圆形。气香，味微苦。以枝条粗壮、叶多、具花序者为佳。

性味和功用 苦、辛，凉。归肺、胃经。清热解毒，消食化积，止血止痛。用于伤风感冒，消化不良，腹痛腹胀，痢疾，鼻衄，咳血，风湿关节痛，外伤出血，烂疮，蛇咬伤等。常用量 9g～15g；外用适量捣烂敷患处。



图 68　野拔子

1. 根　2. 花序枝

野 鸡 草

别名 小仙茅。

来源 本品为仙茅科植物小金梅草 Hypoxis aurea Lour. 的干燥全草。

原植物 小金梅草(图 69)为多年生草本。根状茎肉质，球形或长圆形。叶基生，狭线状披针形，长 7cm～30cm，顶端长尖，基部膜质，被黄褐色疏长毛，脉 3 条～7 条，中脉明显。花梗由叶丛中抽出，纤细，高 2.5cm～10cm 或更高，有花 1 朵～2 朵，顶生，具淡褐色疏长毛；苞片小，2 枚，刚毛状；花黄色，无花被管，花被片 6，长圆形，长 6mm～8mm，有褐色疏长柔毛；雄蕊 6，着生于花被片基部，花丝短，花药近基生；子房下位，3 室，长 3mm～6mm，有疏长毛，花柱短，柱头 3 裂，直立。蒴果棒状，长 6mm～12mm，成熟时 3 瓣裂，种子多数，近球形，表面具瘤状突起。

生于山野、荒地。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南、西藏、四川等省(自治区)。日本及东南亚地区也有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干或鲜用。

药材性状 根状茎呈球形或长圆形，肉质，外面有老叶柄的纤维状残迹，内面白色，下部具多数细须根。叶全部基生，4 枚～12 枚，线状披针形，黄绿色，长 10cm～30cm，宽 2mm～6mm，基部膜质，被黄褐色疏长柔毛，有的卷曲或折断。花梗生于叶丛中，纤细，明显短于叶，顶部有花 1 朵～2 朵，具 2 枚刚毛状苞片；花被 6 片，长圆形，多皱缩，黄褐色，宿存，被毛。蒴果棒状，生于宿存花被片下部，直立，长 6mm～12mm，成熟时成 3 瓣裂开，内有多数球形种子。气微，味微甘。以根茎球形、叶多色绿者为佳。

性味和功用 甘、微辛，温。归肾经。温肾调气。用于病后阴虚，疝气，跌打损伤，阳痿，食少，无名肿毒。常用量 9g～15g；外用适量煎水洗或捣烂敷患处。



图 69　小金梅草

蛇 根 草

别名 雪里开花、四季花

来源 本品为茜草科植物日本蛇根草 Ophiorrhiza japonica Bl. 的全草。

原植物 日本蛇根草(图 70)为多年生草本，高 10cm～30cm，全体常呈紫绿色。茎基部匍匐，节上生不定根，分枝少，斜上。叶对生，狭卵形、卵形或长椭圆状卵形，长 2.5cm～8cm，顶端钝或钝尖，基部宽楔形至圆形，有时歪斜，全缘，两面无毛或上面有稀疏短柔毛，下面脉上被微柔毛，侧脉每边 7 条～10 条；叶柄长 1cm～3cm，细弱，托叶淀小，早落。聚伞花序顶生，二歧分枝，分枝短，有花 5 至 10 余朵；苞片线形，长 3mm～7mm，与花序同有细毛；萼筒僧帽状球形，长约 1.5mm，裂片 5，三角形，开展；花冠漏斗状，白色或淡红色，筒状漏斗形，长达 17mm，稍具脉，裂片 5，开展，内面被微柔毛；雄蕊 5，着生于喉部以下；花盘环状；子房下位，2 室，胚珠多数，柱头 2 裂。蒴果僧帽形，长约 4mm，上端宽约 10mm；种子小，椭圆形。

生于山坡路旁、沟边岩石上或林下阴湿处。分布于我国长江流域及以南大部分省、区(自治区)。越南、日本也有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干或鲜用。

药材性状 本品全体长 10cm～20cm，少有长 30cm 者。茎圆柱形，基部节上具少数须根，幼枝具棱，红色。叶对生，红色或淡红紫色，多皱缩，展开后呈狭卵形、卵形或长椭圆状卵形，长 2.5cm～8cm，宽 1.5cm～3.2cm，具长 1cm～3cm 的纤细叶柄。聚伞花序顶生，总梗长 2cm～5cm，二歧分枝，分枝短；花冠筒状漏斗形，5 裂。蒴果扁倒三角形，状似菱角，红紫色。气无，味淡。以枝条粗壮、叶多、色淡红紫色者为佳。

性味和功用 淡，平。活血散瘀，祛痰，调经，止血。用于支气管炎，劳伤咳嗽，月经不调，跌打损伤，风湿筋骨疼痛，肺结核咯血，扭伤，脱臼。常用量 15g～30g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。



图 70　日本蛇根草

假　杜　鹃

别名　紫靛、大寒药、刺牛膝、白牛膝

来源　本品为爵床科植物假杜鹃 Barleria cristata L. 的干燥全草。

原植物　假杜鹃(图 71)为半灌木，高达 2m。根木质，外皮棕褐色。茎直立，无刺，多分枝。叶对生，椭圆形或矩圆形，长 3cm～10cm，顶端短尖，基部渐狭成一短柄，全缘，两面有白色柔毛。花通常数朵簇生于叶腋，或单生；小苞片条形，长 10mm～15mm，被毛，顶端有小尖刺，边全缘或疏具小刺；萼片 4，两两相对，外面 2 片卵状椭圆形，长 1.2cm～2cm，顶端有小尖刺，边缘有刺状小齿，里面 2 片小，线形，长约 6mm，白色；花冠漏斗状，长 4cm～7cm，青紫色或近白色，外面有微毛，裂片 5，2 唇形，不等大；雄蕊 2，稍伸出，退化雄蕊 2，短小；雌蕊 1，子房卵形，花柱细长。蒴果长约 1.2cm；种子 4，有微毛。

生于干旱山坡或灌丛中。分布于广东、广西、四川、云南、贵州等省(自治区)。中南半岛至印度也有。

采收加工　夏、秋季采收，晒干。

药材性状　本品常切成 10cm～50cm 段落，多分枝。叶对生，部分已脱落，留存的多皱缩或破碎，完整者展开呈椭圆形或矩圆形，长 3cm～10cm，黄绿色。上部叶腋具宿存萼片，两两相对，外面 2 片卵状椭圆形，较大，顶端有小尖刺，边缘有刺状小齿，里面两片甚小，线形；花冠多已脱落，子房卵形，具细长弯曲的花柱。气微，味淡。以茎粗壮、叶多者为佳。

性味和功用　甘、淡，凉。清肺化痰，止血截疟，驱风除湿，消肿止痛。用于风湿关节痛，风疹瘙痒，麻疹不透，跌打损伤，蛇咬伤。常用量 10g～15g。外用鲜品适量捣烂外敷。




图 71　假杜鹃

1. 根　2. 带花枝叶

银 线 盆

别名 野洋参、小青、斑叶兰。

来源 本品为兰科植物大斑叶兰 Goodyera schlechtendaliana Rchb. f. 的带根全草。

原植物 大斑叶兰(图 72)为多年生草本，高 12cm～35cm。根状茎肉质，伸长，匍匐，上部斜升。茎单一，直立，被长柔毛，基部具 4 枚～6 枚叶。叶卵形或卵状披针形，长 3cm～8cm，顶端锐尖，基部微心形、圆钝或宽楔形，全缘，上面绿色，有黄白色斑纹；叶柄长 1cm～2cm，基部鞘状抱茎。总状花序顶生，具几朵至 20 余朵较疏生的花，花序被长柔毛；花苞片披针形，较花短；花中等大，多偏向于 1 侧，白色或微带红色，萼片外面被毛，长 7mm～9mm，中萼片舟状，和花瓣靠合兜，侧萼片卵形；唇瓣凹陷成囊状，前部较短，囊内具稀疏刚毛，唇盘上无褶片；合蕊柱短，蕊喙臂细长；花药卵形，渐尖；子房长约 1cm，被长柔毛。蒴果直立，纺锤形，长 8mm～12mm，具纵棱，顶端具枯残花被。

生于山坡林下富含腐植质的阴湿处或岩石上。分布于西藏自治区及长江流域及其以南各省(自治区)。朝鲜、日本、越南至锡金也有。

采收加工 夏、秋季采收，洗净，晒干或鲜用。

药材性状 本品根数条，粗壮，圆柱形或圆锥柱形，长 1.5cm～4cm，直径 2mm～3.5mm；表面褐色，极皱缩，具绒状根毛；质松脆，易折断，断面黄褐色；根状茎短，横生，具节。茎圆柱形，直径 1.5mm～2mm，黄棕色，被毛。叶 4 枚～6 枚生茎基部，卷缩，展开后呈卵形或卵状披针形，长 3cm～8cm，宽 1.5cm～5cm，下面红棕色，上面黑褐色，具浅黄褐色斑纹，叶柄扩大抱茎，膜质。总状花序顶生。气无，味淡。以根粗壮、带花序者为佳。

性味和功用 甘，平、微温。归肺、肝、肾经。清热解毒，润肺止咳，消炎，补虚用于肺结核咳嗽，支气管炎，骨节疼痛，咯血，头晕目眩，四肢乏力，神经衰弱，阳萎，毒蛇咬伤，痈疖疮毒。常用量 30g～60g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图 72　大斑叶兰

淫 羊 藿

别名 三枝九叶草。

来源 本品为小檗科植物朝鲜淫羊藿 Epimedium koreanum Nakai 的干燥全草。

原植物 朝鲜淫羊藿(图 73)为多年生草本，高 30cm～50cm。根状茎长，横走，生多数须根。茎直立，有棱，基部包有鳞片。叶基生或茎生，二回三出复叶，基生叶有长柄；小叶 9，薄革质，卵形至长卵圆形，长 3cm～4cm，花后增大，顶端急尖或渐尖，边缘有细锯齿，齿端刺毛状，基部深心形，侧生小叶基部歪斜，上面幼时有柔毛，后渐脱落，下面被长柔毛。总状花序顶生，有花 4 朵～6 朵，花梗长约 1cm；花大，直径约 2cm；萼片 8，2 轮，花瓣状，卵状披针形，红紫色，外面 4 片小，不同形，内面 4 片较大，同形；花瓣 4，近圆形，白色或黄白色，有长距；雄蕊 4，花丝短，花药长；雌蕊 1，花柱稍长。蓇葖果长卵形，有长花柱，2 瓣裂，小裂片脱落，大裂片宿存。

生于山坡林下、灌丛中或阴湿的地方。分布于东北、河南、山东、江苏、华中、华南、西南地区。朝鲜也有。

采收加工 夏、秋季割取地上部分，晒或晾至半干后，扎成小捆，再晒或晾干。

药材性状 茎呈细圆柱形，长 20cm～30cm，具纵棱，易折断，基部中空，中上部具白色髓心，外表面棕色或棕黄色。二回三出复叶，小叶片卵状心形或长卵状心形，长 3cm～9.5cm，宽 2.5cm～8.5cm，薄纸质，顶端急尖或渐尖，边缘具棕黄色刺毛状锯齿，两侧小叶不对称；表面深绿色或黄绿色，光滑，有光泽，背面灰黄绿色，叶脉突出，疏生棕黄色柔毛，中脉上毛较密。总状花序顶生。气无，味苦。以叶多、色黄绿者为佳。

性味和功用 辛、甘，温。归肝、肾经。补肝肾，强筋骨，助阳益精，祛风除湿。用于阳萎，腰膝无软，风湿痹痛，四肢麻木，神疲健忘，更年期高血压，冠心病，小便淋沥。常用量 3g～9g。阴虚阳亢者忌用。

附注 参阅本图集第 1 册 72 页淫羊藿条附注。




图 73　朝鲜淫羊藿

1. 根　2. 带花枝

葱叶兰

别名 一根葱、双肾草、秤砣草。

来源 本品为兰科植物葱叶兰 Microtis parviflora R. Br. 的全草。

原植物 葱叶兰(图 74)为多年生草本，高 15cm～40cm。须根较纤细；根状茎球形、卵形或椭圆形，肉质多汁，常 1 枚～3 枚簇生。茎单一，直立。单叶基生，基部具筒状叶鞘，膜质，叶片线形或狭线形，通常较茎长，顶端细而稍钝，中脉较明显，两面均绿色。穗状花序顶生，具小而密集的花，长 2cm～5cm；基部具苞片，苞片上端狭长三角形，锐尖；花淡绿色，直径 2mm～2.5mm，中萼片宽大，宽椭圆形，长约 2mm，宽约 1.5mm，直立，兜状，侧萼片狭长椭圆形，稍短，反卷，钝头；唇瓣伸展，狭长椭圆形，较侧萼片略小，稍肉质，无距，基部两边有增厚呈疣状的胼胝体；合蕊柱极短，直立，顶端具 2 耳。花粉块 4 枚，粒状，无柄；子房卵状椭圆形，具短柄。蒴果卵形或矩圆形，直立，长 3mm～4mm。

生于海拔 310m～750m 的山坡草地或山谷阴湿处。分布于台湾、福建、浙江、广东、江西、安徽、湖南、四川、甘肃等省。澳大利亚、日本也有。

采收加工 4 月～5 月采挖，洗净，晒干或鲜用。

药材性状 块根 1 个～3 个簇生，球形、卵形或椭圆形，直径 3mm～5mm，表面黄褐色，多皱褶而显不平，顶颈部有数条须根；须根细圆柱形，直径 0.5mm～1mm，黄褐色。茎单一，圆柱形，长 15cm～40cm，直径 1.5cm～3cm，表面黄棕色，具细纵条纹，质脆，易折断，断面中空，基部具膜质叶鞘。叶 1 枚，线形，较茎长，灰绿色。穗状花序具多数小花。气无，味淡。以根茎粗大者为佳。

性味和功用 辛、淡，微温。归肾经。滋阴补肾，健脾，行气除湿。用于膀胱疝气，白带，肾虚腰痛，脾虚食少。常用量 15g～30g(鲜品 30g～60g)，水煎或煮醪糟服。



图 74　葱叶兰

1. 全株　2. 花放大

紫花络石

别名 牛藤、车藤、羊角藤、藤杜仲、腋花络石。

来源 本品为夹竹桃科植物紫花络石 Trachelospermum axillare Hook. f. 的干燥全株。

原植物 紫花络石(图 75)为粗壮木质藤本，具乳汁。茎圆柱形，直径约 1cm，具多数皮孔，幼时被微毛。叶对生，厚纸质，倒披针形、倒卵形或长椭圆形，长 8cm～15cm，顶端尖尾状，基部楔形，稀圆形，全缘，侧脉多至 15 对；叶柄长 3mm～5mm。聚伞花序近伞形，腋生或有时近顶生，长 1cm～3cm；花梗长 3mm～8mm；萼片 5，卵圆形，钝尖，紧贴于花冠筒上，内有腺体约 10 个；花冠高脚碟状，紫色筒部长约 5mm，裂片 5，倒卵状长圆形，长 5mm～7mm，向右覆盖；雄蕊 5，生于花冠筒基部，花药内藏；花盘环状 5 裂，与子房等长；子房卵圆形，无毛，花柱短，线形，柱头近头状。蓇葖果长圆状披针形，长 10cm～15cm，2 个平行粘生；种子暗紫色，不规则卵形，扁平，顶端钝，具长约 5cm 的细丝状种毛。

生于海拔 2 000m 左右的山谷、林下、灌丛中、水沟边。分布于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、云南、贵州、四川、西藏等省(自治区)。锡金、斯里兰卡、越南也有。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 茎呈圆柱形，直径 0.5cm～1cm，弯曲，有分枝，长短不等，表面棕褐色，具多数皮孔，质坚韧或脆。叶对生，多已脱落，倒披针形、倒卵形或长椭圆形，厚纸质，呈淡黄绿色。伞形状聚伞花序腋生或近顶生，花紫色，高脚碟状，果长圆状披针形，2 个平行粘生，无毛，向端部渐狭，长 10cm～15cm，直径约 1cm；种子顶端具细丝状毛。药材中通常未见花果。气微，味微辛。以叶绿、茎粗壮者为佳。

性味和功用 辛、微苦，温。有毒。解表发汗，通经活络，止痛。用于感冒，支气管炎，肺结核，风湿关节痛、跌打劳伤。用量 1g～3g。

孕妇忌服。



图 75　紫花络石

1. 花枝　2. 果枝

短药沿阶草

别名 南川沿阶草。

来源 本品为百合科植物短药沿阶草 Ophiopogon bockianus Diels Var. angustifoliatus Wang et Tang 的干燥全草。

原植物 短药沿阶草(图 76)为多年生草本。根稍粗，有时末端膨大成小块根。茎短，每年延长后老茎上的叶枯萎，并生新根，形如根状茎。叶丛生，禾叶状，多少呈剑形，长 20cm～30(～80)cm，宽 3mm～7mm，顶端急尖，边缘具极细的齿而显粗糙，基部具膜质鞘，上面深绿色，下面粉绿色，具多数脉。花葶长 18cm～28cm，总状花序顶生，长 5cm～14cm，具几朵至 10 几朵花；苞片披针形，最下面的长 12mm～15mm，向上渐短，花常单朵生于苞片腋内；花梗长 6mm～9mm，中部以下具关节；花被片 6，卵形，长 6mm～7mm，顶端常向外卷，淡紫色；雄蕊 6，花丝几不明显，花药卵形，长 2.5mm～3mm，连合成短圆锥形；子房半下位，花柱细，长约 5mm。种子椭圆形或近球形，长约 1cm，宽约 8mm。

生于海拔 800m～3 200m 的山坡林下或山谷溪边、路旁。分布于四川、云南、贵州、广西、湖北、湖南等省(自治区)。

采收加工 夏季采收，洗净，晒干。

药材性状 茎短，圆柱形，似根状茎，直径约 1cm 或更粗，节密，具残留膜质老叶叶鞘或已撕裂成纤维状的叶鞘，根数条，稍粗，直径 1mm～3mm，有的末端具膨大的纺锤形小块根。叶暗绿色，丛生状，多少呈剑形，有的弯卷断裂，完整者长 20cm～80cm，宽(7～)14mm～22mm，顶端急尖或具钝头，基部逐渐收狭成不明显的柄，具膜质鞘。花葶从叶丛中抽出，顶生总状花序，花多数，每 2 朵生于苞腋内，花梗长 6mm～9mm，花丝不明显，花药连合。气无，味淡。以根粗壮、叶多、色绿，具花茎者为佳。

性味和功用 淡，平。祛风解毒。用于湿疹，腮椎肥大。常用量 15g～30g。



图 76　短药沿阶草

落地秧

别名 野豌豆、白苕干。

来源 本品为蝶形花科植物广布野豌豆 Vicia cracca L. 的干燥全草。

原植物 广布野豌豆(图 77)为多年生蔓生草本，长 60cm～120cm。茎具条棱，疏被短柔毛。羽状复叶，小叶 8～24，线状披针形或长圆状披针形，长 10mm～33mm，顶端圆，有细凸尖，基部圆，上面疏被长柔毛或无毛，下面有短柔毛；叶轴有淡黄色柔毛；卷须发达，细长，分枝；托叶线状披针形或半箭头状，长 6mm～10mm。总状花序腋生，较复叶稍短或等长，有花 7 朵～15 朵；萼斜钟状，疏被长柔毛，长约 5mm，萼齿 5，不等三角形，顶端针状；花冠蝶形，紫色或紫蓝色，旗瓣椭圆形，顶端凹，中部微缢缩，翼瓣和龙骨瓣基部均有爪和耳；雄蕊 10，2 组(9＋1)；子房无毛，具柄，花柱稍弯，上端周围被长柔毛。荚果矩圆形，长 18mm～28mm，膨胀，两端急尖，具柄。种子 3 粒～5 粒，成熟时黑色。

生于田边、路旁、草坡。全国各地多有分布。原苏联、日本、美洲也有。

采收加工 春、夏季采收，晒干。

药材性状 茎呈圆柱形，具棱，细长盘绕，直径 1.5mm～2mm，灰绿色或灰棕色，质轻脆，易折断。羽状复叶互生，小叶片多已脱落，顶端具分枝的细卷须；完整小叶片椭圆形、长椭圆形或线状披针形，顶端圆，具凸尖，全缘。总状花序腋生，花蝶形，紫色或蓝紫色。有时可见长 18mm～28mm 荚果，稍膨胀，内含种子数粒；种子圆球形，黑色。气微弱，味淡。

性味和功用 甘、辛，平。归肝、胆经。散风除湿，活血，消肿，止痛，凉血，止血。用于湿热黄疸，急慢性风湿性关节炎，关节肿痛，筋骨拘挛，月经不调，疟疾，衄血，跌打肿痛，阴囊湿疹，疔疮。常用量 15g～60g。外用鲜品适量捣烂敷患处。

附注 1. 广布野豌豆种子活血调经，祛痰，止咳。用于劳伤腰痛，遗精，月经不调，咳嗽痰多，15g～30g 水煎服。2. 本品在东北地区及新疆作透骨草用。



图 77　广布野豌豆

滴 水 珠

别名 石蜘蛛、白铃子、一面锣。

来源 本品为天南星科植物石蜘蛛 Pinellia integrifolia N. E. Brown 的干燥全株。

原植物 石蜘蛛(图 78)为多年生草本。块茎小，扁球形，须部周围生根。鳞叶 1，披针形，长约 1cm；叶基生，1 片～3 片，淡绿色，卵形，长约 4cm，或长圆形，长 5cm～19cm，顶端渐尖或锐尖，全缘，基部宽楔形或近圆形，侧脉 6 对～7 对，接近边缘时连接为集合脉；叶柄纤细，长 5cm～15cm，下部略具鞘。花序与叶同时生出，短于叶柄：佛焰苞小，宿存，长约 3cm，管部长圆形，长 6mm～7mm，粗 3mm～4mm；檐部披针形，长渐尖，长约 2.5cm，宽 5mm～6mm；肉穗花序：雌花序在下，长约 6mm，与佛焰苞合生，单侧生花；雄花序在上，圆柱形，长近 3mm，间距短；附属器线形，“S”形下弯，长约 4cm，上部极纤细；雄花有雄蕊 2；雌花子房卵圆形，1 室，1 胚珠；浆果卵圆形，具长喙。

生于河岸石缝中。分布于湖北、四川省。我国特有。

采收加工 夏季采收，去掉叶片，须根，洗净，晒干。

药材性状 块茎呈扁球形，直径 0.5cm～1cm，颈部周围生多数粗壮须根，表面浅黄色；质坚实，断面白色，粉性，鳞叶 1，披针形，长约 1cm；叶片 1～3，从块茎顶端抽出，皱缩，展开后呈卵形或长圆形，长约 4cm，宽约 3cm，基部楔形或近圆形，边全缘，侧脉 6 对～7 对，接近边缘时连结，黄绿色；叶柄细长，基部具短鞘。佛焰苞长约 3cm，花序柄短于叶柄。气微，味辛辣。以块茎大，断面色白、坚实、叶黄绿者为佳。

性味和功用 辛，温。有小毒。解毒止痛，散结消肿，行瘀。用于毒蛇咬伤，胃痛，腰痛，痈疮肿毒，跌打损伤，头痛，乳腺炎，淋浊。常用量 1g～1.5g，研末装入胶囊内服；外用适量捣烂敷伤口周围或配以猪油调敷。



图 78　石蜘蛛

醉 魂 藤

别名 野豇豆、老鸦花。

来源 本品为萝藦科植物醉魂藤 Heterostemma alatum wigh: 的干燥全株。

原植物 醉魂藤(图 79)为攀援藤本，长达 4m，具乳汁。叶对生，宽卵形，长 8cm～15cm，基出脉 3～5，初成翅状，后渐扁平；叶柄顶端具丛生小腺体。伞形状聚伞花序腋生，长 2cm～6cm；花序梗粗壮，被微毛；花萼裂片 5，卵形，花冠黄色，辐状，副花冠 5 片，星芒状，从合蕊冠伸出平展于花冠上；雄蕊 5，花药方形，顶端具透明膜片；花粉块圆带方形，直立，内角顶端具三角形的薄膜边，花粉块柄短而粗，着粉腺紫色、菱形；子房长圆形，柱头平坦，基部 5 棱。蓇葖果双生，线状披针形。

生于海拔 1 200m 以下山谷林下、沟边阴湿处。分布于四川、贵州、云南、广东、广西等省(自治区)。

采收加工 全年均可采收，切段，晒干。

药材性状 茎纤细，圆柱形，木质，长短不一，具纵棱，幼茎有 2 列柔毛。叶对生，纸质，黄绿色，宽卵形，基出脉 3～5，在下面凸出成狭翅或扁平，侧脉每边 3 条～4 条，纤细，顶端弯曲；叶柄扁平，被柔毛，顶端丛生小腺体。聚伞花序伞形，腋生，有花 10 朵～15 朵；小花黄棕色，5 数，直径约 1cm，花冠辐状，未开时顶端粘合；副花冠星芒状平展于花冠上，裂片长舌形，可达花冠湾缺处。蓇葖果 2，线状披针形，长 10cm～15cm，直径 5mm～10mm，外表面灰色，具纵条纹；种子宽卵形，褶叠状，深褐色，顶端具长 3cm 白色绢质种毛。

性味和功用 辛，平、微温。除湿，解毒，截疟。用于风湿关节疼痛，脚气，疟疾，胎毒。常用量 3g～9g。



图 79　醉魂藤

飘拂草

别名 黑节关。

来源 本品为莎草科植物两歧飘拂草 Fimbristylis dichotoma(L.)Vahl 的干燥全草。

原植物 两歧飘拂草(图 80)为一年生草本，高 15cm～50cm。秆丛生，圆柱形，近花序部分为 3～5 棱形。叶线形，长 10cm～40cm，宽 1mm～3mm，基部鞘状，革质，鞘口近截形。苞片 3 枚～4 枚，叶状，其中 1 枚～2 枚长于花序；长侧枝聚伞花序复出，有 1 条～5 条辐射枝，长 3cm～7cm；小穗单生于辐射枝顶端，卵状矩圆形或卵形，长 4mm～12mm，宽约 2.5mm，有多数花；鳞片卵形或矩圆形，长 2mm～2.5mm，褐色而有光泽，具 3 脉～5 脉，中脉色淡或绿色，顶端有短尖；鳞片内具 1 花，无花被；雄蕊 1～2；子房上位，花柱扁，上部有缘毛，柱头 2，具疣状突起。小坚果宽倒卵形，双凸状，长约 1mm，有 7 条～9 条纵肋和横矩圆形网纹，有柄。

生于稻田中或草地上。分布于我国东北、华东地区及山西、河北、江西、广东、广西、四川、云南、贵州等省(自治区)。印度、中南半岛、大洋洲、非洲也有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干。

药材性状 具多数须根。秆细长圆柱形，丛生，近花序部分为 3～5 棱形，有细纵槽纹，表面灰绿色或黄绿色，质软。叶线形至狭线形，灰绿色，略短于秆，宽 1mm～3mm，基部鞘状，近革质，鞘口平截。聚伞花序复出，生秆顶端；苞片 3 枚～4 枚，叶状，其中有 1 枚～2 枚长于花序；辐射枝 1～5；小穗单生于辐射枝顶端，卵状矩圆形或卵形，长 4mm～12mm；鳞片多数，螺旋形覆瓦状排列，褐色而有光泽，中脉色淡或绿色。气微，味微苦。以须根多、秆粗壮、叶灰绿色者为佳。

性味和功用 苦，寒。清热解毒、利尿。用于小儿胎毒，小便不利。常用量 15g～30g。



图 80　两歧飘拂草

螺 丝 七

别名 马牙七、羊角七。

来源 本品为兰科植物剑叶虾脊兰 Calanthe davidii Franch. 的干燥全草。

原植物 剑叶虾脊兰(图 81)为多年生草本，高达 75cm。茎极短，基部被数枚鞘状叶。叶近基生，剑形或带形，连叶柄长达 65cm，顶端急尖，基部通常具长柄，全缘。花葶腋生，直立，粗壮，高出于叶外；总状花序密生多数花；花序轴和子房被短柔毛；花苞片狭披针形，花小，长约 8mm，黄绿色，无毛；萼片 3，中萼片椭圆形，侧萼片较狭；花瓣长等于萼片，狭椭圆状披针形，宽不及 2mm；唇瓣 3 裂，侧裂片近卵圆形，唇盘上表面具 3 条鸡冠状褶片，中裂片 2 浅裂，裂片卵形，呈钝角状叉开，顶端钝；距前弯，长 5mm～6mm；雄蕊和雌蕊合生成柱状；子房下位，1 室。蒴果卵状椭圆形，长 3cm～4cm，具纵棱，略下垂。

生于山坡路旁或林下。分布于陕西、湖南、湖北、西南等省。

采收加工 夏季采收，洗净，晒干。

药材性状 须根粗壮，细长圆柱形，直径 1.5mm～2mm，表面褐色，具细纵皱纹，易折断，断面黄褐色。茎极短。叶基生，3 枚～7 枚，剑形或带形，长(连叶柄)达 65cm，宽 0.5cm～1.5cm，全缘，灰绿色，质脆易折断。花葶腋生，基部具宽披针形苞叶，圆柱形，高于叶，直径 3mm～6mm，表面黑褐色，具纵纹；总状花序多花，被短柔毛；花苞片狭披针形，长于子房；子房被短柔毛，黑褐色，萼片和花瓣亦黑褐色。气微，味淡。以带须根、叶色绿者为佳。

性味和功用 甘、淡、微辛，温。解毒，软坚，利湿，固脱。用于扁桃体炎，颈淋巴结核，扭伤，骨折，风湿性关节疼痛。常用量 6g～15g；外用适量捣烂敷患处。

附注 剑叶虾脊兰根及根茎辛、苦，凉；有小毒。清热解毒，散瘀消肿，祛风，止痛。用于胃溃疡，急性胃扩张，慢性肝炎，腰痛，腹痛，颈淋巴结结核，慢性咽炎，牙痛，砂淋，闭经，关节痛，跌打损伤，蛇咬伤。常用量 1.5g～3g；外用适量捣烂敷患处。



图 81　剑叶虾脊兰

瞿　麦

别名　石柱花、鹅毛石竹、洛阳花。

来源　本品为石竹科植物石竹 Dianthus chinensis L. 的干燥地上部分。

原植物　石竹(图 82)为多年生草本，高 30cm～50cm。茎簇生，直立或基部略匍匐，节膨大，下部节间较上部短。叶对生，无柄。叶片线状披针形，长 3cm～5cm。花单生或数朵生于枝顶，有时成圆锥状聚伞花序；小苞片 4～6，排成 2 轮～3 轮；萼筒长 2mm～2.5mm，顶端 5 裂；花瓣 5 白色或粉红色，扇状倒卵形，顶端浅裂成锯齿状；雄蕊 10；子房，1 室，花柱 2，丝形。蒴果长椭圆形，包于宿存花萼筒内。成熟时顶端 4 裂；种子扁卵形，灰黑色，边缘有狭翅。

生于山野、田边、路旁，亦有栽培。分布于我国东北部、南部、西南部、西北部、北部、华东部地区。世界各国广泛栽培。

采收加工　夏、秋季花果期割取地上部分，除去杂质，晒干。

药材性状　本品全长 30cm～50cm。茎圆柱形，有分枝，表面淡绿色或黄绿色，基部微带紫色，光滑，节膨大，节间长 3cm～7cm；质坚脆，易折断，断面中空。叶对生，线形或线状披针形，长 3cm～5cm，宽约 5mm。枝顶有 1 至数个宿存萼，黄绿色，表面具纵细纹，有时残存皱缩破碎的花瓣，棕紫或棕黄色，顶端锯齿状，完整者，全长约 3cm，基部具爪，萼筒长约为全花的 1/2 或稍过之，萼下有数枚小苞片，长约为萼筒的 1/2，苞片顶端尾状渐尖。气微，味淡。以色黄绿、花和叶多者为佳。

性味和功用　苦，寒。归心、肾、小肠、膀胱经。清热利水，破血通经，消肿。用于尿路感染，血瘀经闭，痈肿疮毒，淋病，水肿，目赤。常用量 9g～15g。外用适量捣烂敷患处。脾、肾气虚及孕妇忌服。

附注　瞿麦的原植物有两种，除本种外，尚有瞿麦参阅本《图集》第二册 144 页。



图 82　石竹

攀援星蕨

别名 波氏星蕨、灯火草、藤八爪。

来源 本品为蕨类水龙骨科植物攀援星蕨 Microsorium buergerianum (Miq.)Ching 的干燥全草。

原植物 攀援星蕨(图 83)为多年生草本，高 15cm～30cm。根状茎长而攀援横走，淡绿色，疏生鳞片，鳞片棕色，披针形，顶端长渐尖，基部卵圆，边缘有疏齿。叶远生，厚纸质，带状披针形，宽 2cm～3cm，顶端渐尖或长渐尖，基部急变狭，并下延成翅，全缘或略呈波状，叶脉网状，不明显，网眼中有分叉的内藏细脉；叶柄长 3cm～7cm，禾秆色，光滑，基部和根状茎间有关节。孢子囊群多数，小而密，散生于叶片下面，圆形，棕黄色，无盖。

攀援于海拔 500m～1 500m 间林中树干上或附生于岩石上。分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州等省(自治区)。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 根状茎呈细长圆柱形，棕褐色，疏具鳞片，鳞片披针形，棕色，边缘有疏齿。叶稍皱缩，有的已破碎，完整者呈条状披针形，宽 2cm～3cm，顶端渐尖，基部骤狭并下延成翅，棕色，下面色稍淡，两面均无毛，厚纸质，中脉在上面平坦，下面稍凸起，网脉不明显，小脉分叉。叶柄长 3cm～7cm，和根状茎连结处有关节。孢子囊群小而密，散生于叶片下面，圆形，无盖，棕黄色。质轻。气微，味微苦而涩。以叶长大、具孢子囊者为佳。

性味和功用 微苦、涩，凉。清热利湿，散瘀，凉血解毒。用于尿道炎，黄疸，筋骨疼痛，跌打损伤，刀伤、疝气、湿疹。常用量 15g～30g。外用适量捣烂敷伤处或煎水洗。



图 83　攀援星蕨

1. 全株　2. 鳞片放大

二、根和根茎类

九 子 莲

别名 肉连环。

来源 本品为兰科植物斑叶鹤顶兰 Phaius woodfordii(Hook.)Merr. 的假鳞茎。

原植物 斑叶鹤顶兰(图 84)为多年生草本，高 20cm～80cm。假鳞茎圆锥形或狭卵状矩圆形。叶 4 片～7 片，革质，椭圆状披针形，长 20cm～45cm，宽 5cm～10cm，顶端渐尖或急尖，基部渐狭，收窄成长柄，鞘状抱茎，边全缘，上面具黄白色斑块。花葶通常由假鳞茎基部一侧生出，直立，圆柱形；花苞片披针形，长 1.5cm～2.5cm，短于子房(连花梗)，黄绿色；萼片 3，椭圆形，长约 3cm，顶端钝；花瓣矩圆状倒披针形，约与花萼等长；唇瓣直立，楔状倒卵形，3 裂，侧裂片半圆形，小而短，顶端圆，中裂片略长而宽，反卷成螺壳状，边缘皱波状，具紫红色条纹；距长 8mm～10mm；合蕊柱长约 1.8cm，内侧凹陷成沟槽，前面被白色长柔毛。蒴果椭圆形，长 3cm～4cm，直径约 2cm，成熟时纵裂。

生于海拔 1 000m～1 600m 林下阴湿处和山谷溪边。分布于福建、广东、云南、四川等省。

采收加工 秋季采收，去净茎叶及须根，晒干或鲜用。

药材性状 假鳞茎圆锥柱形或狭卵状矩圆形，长 5cm～10cm，直径 6mm～12mm，常数个并列生长在一起；表面黄绿色或黄褐色，具 6 条纵棱及多数细纵条纹，基部圆形，有多数粗圆点状凸起的须根断痕，近顶部有 1～2 环形突起的叶痕，稍疏离，顶端亦有几个环状凸痕，密生，环上有时具多数叶鞘枯萎后留下的纤维状维管束，长短不等，淡黄色或黄褐色。气微，味苦。以粗大、无须根及茎叶者为佳。

性味和功用 苦，寒，有小毒。清热解毒，消肿散结。用于颈淋巴结结核，痈疮溃烂。常用量 10g～15g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图 84　斑叶鹤顶兰

1. 假鳞茎及花葶；2. 叶

土 百 部

别名 天门冬、地龙松、天冬草、小天冬。

来源 本品为百合科植物密齿天门冬 Asparagus meioclados Lévl. 的干燥块根。

原植物 密齿天门冬(图 85)为多年生直立草本，高可达 1m。块根肉质，纺锤形。茎圆柱形，除基部外，具棱并密生软骨质齿，分枝亦如此，但在末端或嫩枝上，软骨质齿渐少以至消失；叶状枝通常每 5 枚～10 枚成簇，近扁的圆柱形，略具棱，长 3mm～5(～8)mm，粗约 0.3mm～0.4mm，一般不具软骨质齿。叶鳞片状，基部稍延伸为近刺状的距，无明显硬刺。花单性，雌雄异株；雄花每 1 朵～3 朵簇生，黄绿色；花梗长约 2mm，关节位于下部；花被片 6，长椭圆状倒披针形，与花梗等长或稍短，雄蕊 6，花丝中部以下贴生于花被片上；雌花较雄花稍小，子房 3 室。浆果球形，直径 5mm～6mm，成熟时红色，通常有 1 颗～2 颗种子。

生于海拔 1 300m～3 500m 处林下、山谷、溪边或山坡上。分布于四川、贵州、云南等省。

采收加工 春、秋季采挖，除去茵茎及须根，洗净，烫或蒸至透心，趁热去外皮，洗净，干燥。

药材性状 多为丛生的根条，头部有芦秆及较短的干枯残茎，在距茎基 4cm～8cm 处成纺锤状膨大，膨大部分长 4cm～10cm，径 4mm～20mm 米。外表皱缩，黄白色或黄棕色，(未去皮者呈灰棕色或棕褐色)，内心常空壳状。坚脆，易折断，断面角质样，木心黄白色，未充分干燥者，内心空虚少肉质。气微，味微甘，带苦。以根条均匀、内心较饱满者为佳。

性味和功用 甘、微苦，微温。归肺经。润肺，止咳，杀虫虱。用于咳嗽，咳血，肺气逆胀，骨蒸潮热，疥癣。常用量 6g～9g。外用适量煎水洗或研末撒患处。



图 85　密齿天门冬

1. 根；2. 果枝；3. 茎放大

大　黄

别名　南大黄、川大黄、马蹄大黄。

来源　本品为蓼科植物药用大黄 Rheum officinale Baill. 的干燥根状茎。

原植物　药用大黄(图 86)为多年生草本，高 1m～1.5m。根状茎粗壮。茎直立，上部分枝，叶片圆形，掌状浅裂，茎生叶较小。圆锥花序大形，顶生，分枝开展；花小，淡绿色或黄白色，径 3mm～4mm；花被片 6，长约 2mm，2 轮，内轮的长圆形，外轮的稍短小；雄蕊通常 9；子房三角形，花柱 3，柱头头状。

生于山地林缘或草坡，常栽培。分布于陕西、河南、湖北、四川、云南、贵州等省。

采收加工　通常选择生长 3 年以上的植株，于 9 月～10 月分地上部分枯黄或 4 月～5 月份未发芽前采挖，除去茎叶及细根，刮去粗皮，晒干或切片晒干，亦可用暗火烟熏干燥，称"生大黄"。将 500g 生大黄片或块用 250g 黄酒喷洒拌匀，放罐内或搪瓷桶内封严，水汽蒸至酒被吸尽，晾干，称"熟大黄"。将生大黄片放锅内，炒至外面黑棕色存性，晾干，称"大黄炭"。

药材性状　根状茎多横切成段，一端稍大，形如马蹄，少数亦呈圆锥形或腰鼓形，长 6cm～12cm，直径 4cm～10cm，栓皮层已除去，表面黄棕色或黄色，有微弯曲的棕色线纹。横断面黄褐色，多空隙，星点较大，排列不规则，质较疏松，富纤维性。气弱，味苦微涩。以质坚实、有油性、味苦而微涩、嚼之发粘者为佳。

性味和功用　苦，寒。归胃、大肠、肝经。泻火通便，破积滞，行瘀血。用于实热便秘，谵语发狂，食积痞满，腹痛或泻痢，里急后重，头痛，目赤，牙龈肿痛，口舌生疮，吐血，衄血，瘀血经闭，产后瘀阻，　瘕积聚，黄疸，水肿，热淋，跌打损伤，痈肿疮毒，烫伤。常用量 3g～12g。外用适量研末用水或醋调敷。

凡表症未罢、血虚气弱、脾胃虚寒、无实热、积滞、妇女胎前产后均应慎服。

附注　1. 生大黄泻下力大，熟大黄泻下力缓，大黄炭多用于止血。2. 据《药典》记载、大黄的原植物有 3 种，请参阅《药典》16 页。



图 86　药用大黄

1. 叶；2. 花序；3. 果；4. 药材(大黄)

大剑叶木

别名 大杜若、竹节兰。

来源 本品为鸭跖草科植物粗柄杜若 Pollia hasskarlii Rolla Rao 的干燥根及根茎。

原植物 粗柄杜若(图 87)为多年生草本，高达 1m。根状茎长而横走，节间长达 18cm，节上有膜质鞘及粗根。茎粗壮，直立，直径约 1cm 左右。叶互生，椭圆形或倒卵状披针形，长 20cm～35cm，顶端尾状渐尖，基部渐狭，边缘皱波状，叶鞘长 3cm～5cm，在茎上部彼此重叠。圆锥花序顶生，长 10cm～15cm，通常比上部叶短，序轴粗壮，被灰白色腺毛；聚伞花序多个，互生或近轮生；总苞片膜质，长约 1cm，叶状，早落，小苞片长 1mm～3mm；花梗极短，果期伸长至 5mm；萼片 3，花瓣状，外面被毛，长 3mm～4mm，脱落；花瓣 3，白色或浅紫色，倒卵圆形，长约 5mm；雄蕊 6，近相等；子房近球形，3 室，花柱长约 1cm。蒴果圆球形，浆果状，不开裂，径约 5mm，成熟时黑色，有种子 18 粒～24 粒；种子多角形，稍扁。

生于海拔 1 700m 以下的山谷林下或阴湿处。分布于广东、广西、贵州、云南、四川、西藏等省、区。锡金、不丹、印度、缅甸、中南半岛也有。

采收加工 全年均可采挖，洗净，晒干。

药材性状 根状茎圆柱形，直径 3mm～5mm，节间长 3cm～18cm，节上有鞘质鞘及粗根；表面黄褐色，具纵直沟纹。根细长圆柱形，直径 1mm～2mm；表面黑褐色，粗糙不平，具多数不规则丝状须根；须根红棕色，密生或疏生，长短不等，易折断。气微弱，味微甘。以根茎粗长，根多者为佳。

性味和功用 甘，温。补虚，祛风湿，通经。用于风湿性关节炎，腰腿痛，阳痿，膀胱炎，产后大流血。常用量 15g～30g。



图 87　粗柄杜若

山 慈 姑

别名 毛慈姑、冰球子、泥宾子、金灯。

来源 本品为兰种植物 1. 杜鹃兰 Cremastra appendiculata(D. Don) Makino，2. 独蒜兰 Pleione bulbocodioides(Frach.)Rolfe 的干燥假鳞茎。

原植物

1. 杜鹃兰(图 88)为多年生草本，高 30cm～40cm。假鳞茎 2 个～4 个相连结，肉质，卵形或近球形，外被膜质叶鞘，鞘枯萎后仅存纤维状的鞘脉。叶 1 片，很少 2 片，椭圆形，长 20cm～45cm，顶端急尖或渐尖，基部渐狭卷缩成柄，主脉 3，显著；叶柄长 3cm～10cm。花茎由假鳞茎顶部的节上抽出，直立，粗壮，通常高出叶外，具 2 枚膜质叶鞘；总状花序顶生，具 10 朵～20 朵偏于一侧下垂的花；苞片线状披针形，与子房近等长，膜质；花被片成筒状，顶端略开展；花瓣与萼片相似，淡紫褐色或红紫色，线状倒披针形，长 3cm～35cm，锐尖头；唇瓣近匙形，基部浅囊状，两侧边缘略向上反折，上部扩大并为 3 裂，侧裂片狭小，中裂片矩圆形，中央具 1 肉质附属物；合蕊柱纤细，略短于萼片。蒴果长椭圆形，长 2cm～2.5cm。

生于沟边、林下半阴处、山野草丛中。分布于甘肃、陕西、山西及长江流域和以南各省、区。锡金、尼泊尔、泰国、日本也有。

2. 独蒜兰(图 89)为多年生草本，高 15cm～25cm。假鳞茎狭卵形、近球形或长颈瓶状，长 1cm～2cm，下部生多数灰白色须根。顶生 1 叶，叶掉后有 1 杯状齿环。幼叶和花同时出现，叶片椭圆状披针形，长 10cm～25cm，顶端稍钝或渐尖，基部收狭成柄，鞘状抱花茎，全缘。花茎顶生 1 花～2 花，淡紫色或桃红色；苞片矩圆形，近急尖，等于或长于子房；萼片直立，狭披针形，长达 4cm，急尖；花瓣和萼片近相等，但较狭，几为线形，急尖；唇瓣从楔形基部起逐渐扩大，不明显 3 裂，中裂片半圆形或不等边四方形，边缘为啮蚀的撕裂状，顶端凹缺或近平截，内面有 3 条～5 条纵或近直的褶片；子房下位，细瘦。蒴果长圆形，直立，具纵棱，连子房柄长约 3cm。

生于海拔 630m～3 000m 间密林下或沟谷旁有泥土的石壁上。分布于

长江流域及以南各省(自治区)。

采收加工 5月~6月挖取假鳞茎，除去茎叶及须根，洗净，晒干，或蒸或煮至透心后晒干或撞去外表粗皮晒干。

药材性状

1. 毛慈姑(原植物为杜鹃兰)为圆球形或不规则扁球形，长1.8cm~3cm，膨大处直径1cm~2cm。外表棕褐色、黄棕色或灰棕色，粗糙，有细小皱折。顶端渐突起，有一圆叶柄痕，侧面有花葶痕，基部脐状，凹陷处有须根，腰部有2条~3条微凸起的环节(俗称“腰带”)，节上有鳞片叶干枯腐烂后留下的丝状维管束，或已将须根及外皮均除去。质坚硬，难折断，断面黄白色或乌黑色，略呈粉质(加工品表面及断面均呈黄白色，角质)。气微，味淡，带粘性。以个大、饱满、断面黄白色、质坚实者为佳。

2. 光慈姑(又名冰球子，原植物为独蒜兰)为卵状圆锥形或不规则块状，高1cm~2cm，直径0.5cm~1.5cm。外表撞去表皮者粉白色、黄白色或灰黄色，带有表皮者呈浅棕色或棕色，光滑，一侧有纵沟，自基部伸向顶端。顶端渐突起，基部圆平，中央凹入呈脐状，有须根或须根痕，“腰带”往往在凹入部，故不甚明显。质硬脆，不易折断，断面白色，粉质，内有1圆锥形心芽。经加工煮熟的表面浅黄色或浅棕色，断面呈角质。气微弱，味淡。以质硬、色白、粉性足者为佳。

性味和功用 苦、微甘、辛，寒。有小毒。归肝、脾经。清热解毒，消肿散瘀，化痰。用于痈疽疔肿，瘰疬结核，蛇虫咬伤，喉痹肿痛。常用量3g~9g。外用适量捣烂或醋磨涂患处。

正虚体弱者慎服。

附注 1. 杜鹃兰和独蒜兰叶外用治疮肿；花治血淋，脐腹及阴茎涩痛；15g~30g煎服。2.《药典》中收载的山慈姑除上述二种外，尚包括云南独蒜兰(Pleione yannanensis)。




图 88　杜鹃兰

1. 假鳞茎及根；2. 叶；3. 花茎；4. 花放大；5. 药材(山慈姑)



图 89　独蒜兰

1. 全株；2. 药材(山慈姑)

山 栀 茶

别名 崖花海桐、崖花子、山枝木。

来源 本品为海桐花科植物海金子 Pittosporum illicioides Mak. 的干燥根。

原植物 海金子(图 90)为常绿灌木,高达 5m。老枝有皮孔。叶互生于枝顶,常 3 枚～8 枚簇生呈假轮生状,薄革质,倒卵状披针形或倒披针形,长 5cm～10cm,顶端渐尖,基部狭楔形,上面深绿色,干后仍发亮,下面浅绿色,全缘或略波状;叶柄长 7mm～15mm。伞形花序顶生,有花 2 朵～10 朵,花梗长 1.5cm～3.5cm,纤细,常向下弯;苞片细小,早落;萼片 5 卵形,长约 2mm,顶端钝;花瓣 5,倒卵状匙形,基部连合,长 8mm～9mm,淡黄色;雄蕊 5,长约 6mm;子房长卵形,被糠 或有微毛,子房柄短;侧膜胎座 3 个,每个胎座有胚珠 5 个～8 个,生于子房内壁中部。蒴果近圆形,长 9mm～15mm,多少三角形或有浅纵沟 3 条,顶端有宿存花柱,基部具子房柄,3 瓣裂,果片薄木质;果梗纤细,长 2cm～4cm;种子长 2mm～4mm,外被暗红色肉质假种皮。

生于溪沟边、林下、山坡灌丛中。分布于福建、台湾、浙江、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、河南、陕西、西南、两广等省。日本也有。

采收加工 全年均可采收,洗净,晒干。

药材性状 呈圆柱形,略扭曲,长 10cm～20cm,直径 1cm～3(～5)cm,顶端有茎残基。表面灰黄色至黑褐色,较粗糙,可见皮孔,外皮易脱落。质硬,不易折断,断面皮部色较木部深,易剥离,皮、木部间有一棕褐色环带,木部黄白色,可见同心环纹,木心常偏向一侧。气微,味微苦涩。以根粗、表面灰黄色者为佳。

性味和功用 苦,微温。活血通络,接骨消肿,解毒止痛。用于风湿性关节炎,坐骨神经痛,骨折,胃痛,牙痛,高血压,神经衰弱,梦遗滑精,咳嗽,四肢乏力,尿血。常用量 15g～30g。

附注 海金子叶消肿解毒,止血;用于蛇咬伤,疮疖肿毒,过敏性皮炎,外伤出血;鲜品适量捣烂外敷。种子在四川又名山枝仁,清热,生津止渴;用于虚热心烦,口渴咽痛,泻痢,倦怠无力;常用量 3g～9g。



图 90　海金子

小　升　麻

别名　拐枣七、金龟草、金丝三七、三面刀。

来源　本品为毛茛科植物小升麻 Cimicifuga acerina(Sieb. et Zucc.) Tanaka 的干燥根状茎及根。

原植物　小升麻(91)为多年生草本，高 25cm～110cm。根状茎横走，近黑色，生多数细根。茎上部密被灰色柔毛。叶 1～3，近基生，为三出复叶；叶片宽达 35cm；叶柄长 15cm～32cm，基部膨大；顶生小叶卵状心形，长 5cm～20cm，7～9 掌状浅裂，浅裂片三角形或斜梯形，边缘有锯齿，近边缘处被短糙伏毛，下面沿脉被白色柔毛，侧生小叶比顶生小叶略小，稍倾斜；小叶柄长 4cm～12cm。复穗状花序顶生，长 10cm～25cm，序轴密被灰色短柔毛；花小，直径约 4mm，近无梗；萼片 5，白色，椭圆形至倒卵状椭圆形；退化雄蕊与萼片同形，基部有蜜腺，雄蕊多数，花药椭圆形，花丝狭线形；心皮 1～2。蓇葖果椭圆形，长约 1cm，宿存花柱外弯；种子 8～12，椭圆状卵球形，表面具多数横向短鳞翅。

生于海拔 800m～2 600m 间的山地林下或林缘。分布于四川、贵州、湖北、湖南、广东、浙江、安徽、河南、山西、陕西、甘肃等省。日本也有。

采收加工　夏、秋季采挖，洗净，晒干。

药材性状　根状茎呈不规则长块形，多分歧成结节状，长 6cm～20cm，直径 0.5cm～2cm。表面黑棕色或褐棕色，顶部有圆形残茎痕，下面及周围密生多数须根。体轻，横断面灰白色，有棕褐色放射状排列的条状物。气微弱，味微苦。以根茎粗壮、表面黑褐色者为佳。

性味和功用　甘、辛、微苦，温。归肺、脾、胃经。散瘀活血，消肿止痛，理气，降血压，升阳发汗。用于跌打损伤，筋骨疼痛，劳伤，腰腿痛，咽喉肿痛，高血压，风湿痛，疖肿。常用量 3g～9g，水煎或泡酒服。外用适量捣烂敷患处。



图 91　小升麻

1～2 全株；3. 果放大

川 木 香

别名 木香。

来源 本品为菊科植物川木香 Dolomiaea souliei(Franch.)Shih(Vladimiria souliei(Franch.)Ling)的干燥根。

原植物 川木香(图 92)为多年生草本。根粗壮，直伸。茎极短或近无。叶全部基生，莲座状，长椭圆形、卵状披针形或倒披针形，长 10cm～30cm，质地厚，羽状半裂，裂片 5 对～7 对，斜三角形或宽披针形，长 2cm～5cm，边缘具不规则齿裂或刺齿；或叶不裂，边缘具锯齿状裂。两面被稀疏的糙伏毛及黄色腺点，下面沿脉常有较密的蛛丝状毛，中脉在下面凸起；叶柄长 2cm～20cm，宽扁，被毛。头状花序 6 个～8 个；总苞宽钟状，直径约 6cm，总苞片 6 层，外层卵形至卵状椭圆形，长 2cm～2.5cm，中层斜椭圆形或披针形，长约 3cm，内层长披针形，长约 3.5cm，全部苞片质硬，顶端针刺状，边缘紫色，有睫毛；花管状，红色或紫红色，长 3.5cm～4cm，檐部 5 裂；雄蕊 5；子房下位。瘦果圆柱状，有棱，稍扁；冠毛多层，黄褐色，内层的直立，外层的向下皱曲反折。

生于高山草地及灌丛中。分布于四川、西藏、云南等省(自治区)。

采收加工 春、秋季采挖，去泥土、须根及根头上的胶状物，在晒干或微火烘干过程中去粗皮，再晒干。

药材性状 根呈圆柱形或已纵剖成两半，略弯曲，长 10cm～30cm，直径 1.5cm～3cm。表面黄棕色至暗棕色，粗糙，可见由纤维束构成的密致的斜方形网纹，根头部多已焦黑发粘(俗称油头或糊头)。体轻，质硬脆，易折断。断面不平坦，皮部黄棕色，木部黄白色，有放射状纹理，中心髓部类白色疏松，老者成空洞，油室点状。气芳香而特异，味苦、嚼之粘牙。以粗大、坚实、香气浓者为佳。

性味和功用 辛、苦，温。归肺、肝、脾经。行气止痛，温中和胃。用于腹胀肠鸣，食欲不振，痢疾之腹痛，里急后重，呕吐，寒疝。常用量 3g～9g。

附注 作川木香入药的，尚有灰毛川木香 D. souliei var. cinerea Ling，四川亦产。参阅《药典》25 页。



图 92　川木香

川 莪 术

别名 文术 蓬莪、蓝心姜、黑心姜。

来源 本品为姜科植物莪术 Curcuma aeruginosa Roxb. (C. zedoaria non Rosc.)的干燥根状茎。

原植物 莪术(图 93)为多年生草本，高 80cm～150cm。须根较短，近末端膨大成肉质纺锤状。主根茎陀罗形。叶片二列，长圆状椭圆形，长 18cm～60cm，在上面沿中脉两侧有紫色晕斑；叶柄长约为叶片的 1/3。花葶由根状茎生出，具苞叶；穗状花序顶生，苞片粉红色至红紫色，腋内有毛；花萼白色，筒状，上端 3 齿；花冠管长 2cm～2.5cm，裂片 3，黄色，矩圆形，长 1.5cm～2cm，上面 1 片较大，顶端略呈兜状；侧生退化雄蕊比唇瓣小；唇瓣近倒卵形，长约 2cm，顶端微缺；发育雄蕊 1，药隔基部具叉开的距；雌蕊 1，花柱单生，被花药抱持，子房下位，3 室。蒴果卵状三角形；种子长圆形，具假种皮。

生于山谷、溪边、林缘等阴湿处，常栽培。分布于我国东南部至西南部。印度至马来西亚也有。

采收加工 冬至至立春前采挖，除去茎叶及须根，洗净，以沸水漂或蒸至透心，晒干。

药材性状 根状茎呈圆锥形、卵圆形或长圆形，长 2cm～5.5cm，直径 1.5cm～3cm。外表灰黄色、黄棕色至土黄色，稍平滑，环节明显，两侧各有一列下陷的芽痕和侧生根茎痕。质坚实而重，不能折断，击破后断面不平整，深绿黄色至棕黄色，角质样，带粉性。皮层与中柱易分离。气微香，味微苦而辛。以质坚实、无须根、气香者为佳。

性味和功用 苦、辛、温。归肝、脾经。破血行气，消积止痛。用于心腹胀痛，食积，癥瘕积聚，血瘀经闭，跌打损伤，癌症。常用量 4.5g～9g。

气血两虚、脾胃虚弱者慎服，月经过多和孕妇忌服。

附注 1. 以往文献常将本种订名为 C. zedoara Rosc. 据有人考证，此种我国不产。2. 莪术的块根商品名绿丝郁金，功效同郁金。



图 93　莪术

1. 主根纵剖面及花葶；2. 叶

川 黄 芩

别名 黄芩。

来源 本品为唇形科植物连翘叶黄芩 Scutellaria hypericifolia Levl. 的干燥根。

原植物 连翘叶黄芩(图 94)为多年生草本，高 10cm～30cm。根状茎肥厚，径达 2cm，顶端多头。茎直立或斜升，沿棱疏被白色平展柔毛，节上被小鬈毛。叶对生，卵圆形，茎上部的有时为长圆形，长 2cm～3.4cm，顶端圆形或钝，稀微尖，基部宽楔形或圆形，边全缘或偶呈微波状，稀少数具不明显浅齿，上面疏生柔毛，下面脉上被疏柔毛，有浅凹腺点。总状花序顶生，长 6cm～15cm；苞片卵形，全缘，具缘毛；花萼钟状唇形，长约 3mm，外面被疏柔毛及黄色腺点，盾片高约 1mm，果时花萼及盾片均增大；花冠白色、绿白色、紫色或紫蓝色，长 2.5cm～2.8cm，冠筒基部膝曲，檐部二唇形，下唇中裂片三角状卵圆形；雄蕊 4，2 强；雌蕊 1。小坚果卵球形，长约 2mm，具瘤。

生于海拔 2 600m～4 000m 处的山地草坡和栎林林缘。分布于四川、西藏等省(自治区)。

采收加工 秋后茎叶枯黄时采挖，去茎叶及芦头，抖净泥沙，晒或炕干后，撞去粗皮。

药材性状 呈圆锥状或不规则条状，多较平直，常有分枝，长 5cm～20cm，粗 1cm～1.6cm。表面黄褐色或棕黄色，常有粗糙的栓皮及纵皱纹。质硬脆，易折断，断面呈纤维性，鲜黄色或带黄绿色，多为实心，有的内心腐朽，呈棕色。气微，味苦。以根条粗大、色泽黄者为佳。

性味和功用 苦，寒。归心、肺、胆、大肠经。清热，止咳，除湿，降压，泻火，利尿，止血，利胆，安胎，镇静。用于风热咳嗽，高热头痛，目赤肿痛，湿热黄疸，泻痢腹痛，尿路感染，胎动不安，热淋，崩漏，高血压，痈肿疔疮。常用量 3g～9g。外用适量煎水洗。中寒气虚者忌用。

附注 在《四川中药志》第 2 册 1731 页中，误将连翘叶黄芩定名为滇黄芩。




图 94　连翘叶黄芩

1. 根；2. 带花枝

川 山 豆 根

别名 山豆根、土豆根、川土豆根、木蓝根。

来源 本品为蝶形花科植物宜昌木蓝 Indigofera ichangensis Craib 的干燥根。

原植物 宜昌木蓝(图 95)为灌木，高 50cm～150cm。枝无毛。羽状复叶互生，小叶 9～13，卵状披针形或长卵形，长 2cm～7.5cm，顶端钝尖，有长约 2mm 的短尖头，基部宽楔形或近圆形，全缘，两面有白色丁字毛；叶柄，叶轴均疏生短柔毛。总状花序腋生，有多数密集的花；花萼杯状，外被短柔毛；齿 5，三角形；花冠蝶形，淡紫红色，稀白色，长约 1.5cm，旗瓣椭圆状倒卵形，背面被茸毛，翼瓣狭方披针形，具短爪，龙骨瓣倒披针形，基部渐狭成爪；雄蕊 10，2 组(9＋1)，子房线形，下部稍粗，花柱短，柱头头状，近 90 度弯曲。荚果细圆柱形，长约 6.5cm，无毛，成熟时开裂；种子卵圆形。

生于山坡林边、路旁草丛或灌木丛中。分布于河南、浙江、江西、湖北、湖南、广西、贵州等省(自治区)。

采收加工 春、秋季采挖，除去茎叶及须根，洗净，晒干。

药材性状 根头部呈不规则块状，上端常残留茎基或茎痕，其下着生数条支根。根呈长圆柱形，有时分歧，略弯曲，长 5cm～40cm，直径 2mm～7mm。表面灰黄色或黄棕色，有横长的皮孔及细纵皱纹，偶有横裂，有时栓皮呈鳞片状剥落。质坚硬，难折断，断面黄白色，皮部纤维状，木部可见环形层纹，中心无髓。气微弱，味苦。以根粗长，坚实，有粉质者为佳。

性味和功用 苦、微涩，寒。归心、肺、大肠经。清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，牙龈肿痛，喘满热咳，黄疸，下痢，痔疮，疥癣，蛇、虫、犬咬伤。常用量 9g～15g。外用适量捣敷、磨汁擦或煎水洗患处。脾胃虚寒泻泄者忌服。



图 95　宜昌木蓝

1. 花枝；2. 药材

川 贝 母

别名 川贝、灯笼花、贝母、虻。

来源 本品为百合科植物川贝母 Fritillaria cirrhosa D. Don、暗紫贝母 F. unibracteata Hsiao et K. C. Hsia、甘肃贝母 F. przewalskii Maxim. et Batal. 梭砂贝母 F. delavayi Franch. 的干燥鳞茎。

原植物 1. 川贝母(图 96)为多年生草本，高 15cm～50cm。鳞茎由 2 枚鳞片组成，直径 1cm～1.5cm。植物形态变化较大，叶通常对生，少数在中部兼有散生或 3～4 枚轮生的，线形或线状披针形，长 4cm～12cm，顶端稍卷曲或不卷曲，基部稍窄半抱茎，全缘。花通常单朵顶生，极少 2 朵～3 朵，紫色至黄绿色，通常有浅绿色的小方格斑纹，少数仅具斑点或条纹，有的花具紫色斑纹；每花有 3 枚叶状苞片，苞片狭长，宽 2mm～4mm，顶端微卷曲；花被片 6，长 3cm～4cm，外轮 3 片宽 1cm～1.4cm，内轮 3 片宽达 1.8cm，蜜腺窝在背面明显凸出；雄蕊 6，花丝稍具或不具小乳突；柱头裂片长 3mm～5mm。蒴果圆锥形，长宽各约 1.6cm，具 6棱，棱上有宽 1mm～1.5mm 的狭翅。

生于海拔 3 200m～4 200m 处的林中、灌丛下、草地、河滩、山谷等湿地或岩缝中。分布于四川、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、陕西、山西等省(自治区)。尼泊尔也有。

2. 暗紫贝母(图 97)为多年生草本，高 15cm～30cm。鳞茎圆锥形，由 2 枚鳞片组成，直径 6mm～8mm。茎单 1，直立，光滑。叶 5 枚～7 枚，下面的 1 对～2 对对生，上面的散生或对生，条形或条状披针形，长 3cm～6.5cm，宽 3mm～5mm，顶端钝尖，不卷曲。花单生茎顶，深紫色，有黄褐色小方格；叶状苞片 1 枚，顶端不卷曲；花被片 6，长 2.5cm～2.7cm，外轮 3 片近矩圆形，宽 6mm～9mm，内轮 3 片倒卵状矩圆形，宽 10mm～13mm，顶端钝或钝尖；雄蕊 6，长约为花被片的 1 半，花药近基着，花丝密被小乳突或无乳突，柱头 3 浅裂。蒴果长椭圆形，长 1cm～2cm，宽 1cm～1.2cm，具 6 条很狭的纵翅。

生于海拔 3 200m～4 500m 的草地上。分布于四川、青海省。

3. 甘肃贝母(图 98)为多年生草本，高 20cm～40cm。鳞茎由 2 枚鳞片组成，直径 6cm～13cm。茎单 1，直立。叶通常最下面的 2 枚对生，上面的 2 枚～3 枚散生，条形至条状披针形，长 3cm～7cm，顶端不卷曲。花通常单朵，少有 2 朵，顶生，浅黄色，有黑紫色斑点，基部有红褐色蜜腺；叶片苞片 1 枚，顶端稍卷曲或不卷曲；花被片 6，长 2cm～3cm；雄蕊 6，长约为花被片的一半，花药近基着，花丝具小乳突；柱头浅 3 裂，裂片长不及 1mm，极罕达 2mm。蒴果具 6 棱，棱上狭翅宽约 1mm。

生于海拔 2 800m～4 400m 灌丛中或草地。分布于甘肃、青海、四川等省。

4. 梭砂贝母(图 99)为多年生草本，高 17cm～35cm。鳞茎由 2 枚～3 枚鳞片组成，直径 1cm～2cm。叶 3 枚～5 枚(包括叶状苞片)，较紧密的生于茎中、上部，散生或上面 2 枚对生，狭卵形至卵状椭圆形，长 2cm～7cm，顶端不卷曲。花单生茎顶，浅黄色，具红褐色斑点或小方格，花被片 6，长 3.2cm～4.5cm，宽 1.2cm～1.5cm，内 3 片比外 3 片稍长而宽；雄蕊 6，长约为花被片的 1 半，花药近基着，花丝不具小乳突；柱头 3 裂，裂片长不及 1mm。蒴果长约 3cm，宽约 2cm，棱上狭翅宽约 1mm，宿存花被多少包住蒴果。

生于海拔 3800m～4700m 的沙石滩或流沙岩石的缝隙中。分布于云南、四川、青海、西藏等省(自治区)。

采收加工　6～9 月均可采挖。除去泥土，须根，放置在棉毯、牟毡或麻袋上曝晒或微火烘干。晒坑过程中不可重叠过厚，温度过高，以免产生油子或黄子。

药材性状

川贝母在商品中分松贝、青贝及炉贝三大类。松贝的原植物主要为暗紫贝母；青贝的原植物主要为卷叶贝母和甘肃贝母；炉贝的原植物为梭砂贝母。

松贝　略呈圆锥形或近扁球形，高 3mm～8mm，直径 3mm～9mm。外层二瓣鳞叶大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，习称“怀中抱月”，顶端闭合，其中包有类圆柱形的心芽和小鳞叶 1 枚～2 枚。顶端钝圆或稍尖，底部平或微凹，中央有一灰褐色的根蒂(鳞茎盘)。表面白色，微有光泽。质硬而脆，断面白色、粉质。气微弱，味微苦。

青贝　略呈扁圆球形，高 0.4cm～1.4cm，直径 0.4cm～1 6cm。外

层二瓣鳞叶大小相近，抱合不紧，顶端开口，其中包有心芽和2枚～3枚小鳞叶及细圆柱形的残茎一枚。底部平。表面白色或浅黄棕色，微有光泽。

炉贝　呈长圆锥形，高0.7cm～2.5cm，直径0.5cm～2.5cm。外层二瓣鳞叶大小相近，顶端略尖而开口，基部呈锥形或球形。表面白色或浅黄棕色，有的具棕色斑，无光泽。

均以颗粒圆熟、大小均匀、洁白而有光泽、无油子、黄子者为佳。

性味和功用　甘、苦，微寒。归肺经。润肺散结，止咳化痰，清热。用于阴虚燥咳，咯痰带血，心胸郁闷，肺痿，肺痈，瘿瘤，瘰疬，喉痹，乳痈。常用量3g～9g。外用适量研末撒或调敷。脾胃虚寒及有湿痰者不宜。

附注　1. 本品反乌头、草乌类。2. 川贝母分布地区较广，形态(尤其是花的颜色)变化大，《西藏常用中草药》把花被片黄绿色的类型鉴定为F. roylei Hook. 是不正确的。许多生药和中草药方面的书籍都把“川贝母”的原植物视为F. roylei Hook.，实际上“川贝母”原植物绝不包括F. roylei Hook.。暗紫贝母过去常被错误鉴定为川贝母F. cirrhosa 和康定贝母F. cirrhosa var. ecirrhosa Franch. 以及F. roylei Hook. 均应予纠正。




图 96　川贝母

1. 全株；2. 果枝



图 97　暗紫贝母

1. 幼株；2. 开花全株；3. 花内剖面(放大)；4. 果




图 98　甘肃贝母




图 99　梭砂贝母

川　乌

别名　乌头、鹅儿花、铁花、五毒、乌药。

来源　来品为毛茛科植物乌头 Aconitum carmichaeli Debx. 的干燥块根。

原植物　乌头(图 100)为多年生草本，高 60cm～150(200)cm。块根倒圆锥形。茎中部以上疏被反曲的短柔毛，等距离生叶，分枝。茎下部叶开花时枯萎，中部叶互生，坚纸质，五角形，长 6cm～11cm，3 全裂，中央全裂片宽菱形或菱形，急尖或短渐尖，近羽状分裂，小裂片斜三角形，具 1 枚～3 枚牙齿，稀全缘，侧全裂片斜扇形，不等 2 深裂，上面疏被短伏毛，下面沿脉具短柔毛；叶柄长 1cm～2.5cm，疏被短柔毛。总状花序顶生，长 6cm～25cm，密被反曲而紧贴的白色短柔毛；苞片 3 裂至不裂；花梗长 1.5cm～5.5cm；小苞片生花梗中、下部；萼片 5，花瓣状，蓝紫色，外面被短柔毛，上萼片高盔形，高 2cm～2.6cm，喙不明显，侧萼片近圆形，长 1.5cm～2cm；花瓣 2，有长爪，距拳卷，长 1.5mm～2mm；雄蕊多数；心皮 2～5，通常有毛。蓇葖果长 1.5cm～1.8cm；种子三棱形、有膜质翅。

生于山地草坡或灌丛中，多栽培。分布于云南、贵州、四川、湖北、湖南、广东、广西、江西、浙江、江苏、安徽、陕西、河南、山东、辽宁等省(自治区)。越南也有。

采收加工　夏至至小暑开花时采挖，去除须根，洗净，晒干。

药材性状　来自生子根的“川乌”呈圆锥形或不规则圆锥形，长 1.5cm～5cm，直径 1.5cm～2.5cm。表面灰褐色，有细纵皱纹，顶端有凹陷的芽痕，侧边有母根摘离的痕迹，周围常有多数锥形小瘤状凸起。来自母根的“川乌”呈瘦长的倒圆锥形，或带有残余的茎基，长 3cm～7cm，直径 1.5cm～3cm。二者外表均灰棕色或褐棕色，有时母根者微带紫褐色。质坚实，不易折断，断面灰白色，粉质，横切面可见多角形不规则星状环纹。气微，味辛辣而麻舌，嗜后注意漱口)。以个大、坚实、粉质重、肥满者为佳。

性味和功用　辛，热。剧毒。归心、肝、肾、脾经。祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹，关节疼痛，半身不遂，心腹冷痛，寒疝作痛，头痛，牙痛，阴疽肿毒，疥癣。常用量(炮制品)1.5g～3g。外用适量研末调敷。

阴虚阳盛、热症疼痛及孕妇忌服。

附注　1. 川乌炮制方法见《中药大辞典》(上)456 川乌头项下。2. 炮制品内服宜先煎、久煎(2h 以上)。3. 乌头主根侧附生的膨大子根(栽培种)切下进行加工即为附子，附子加工炮制方法及功效见《中药大辞典》(上)2414 附子项下。4. 乌头野生品种的块根即中药草乌。5. 生川乌为国家规定的毒性中药管理品种，使用时需凭医生签名的正式处方。6. 不宜与半夏、贝母、白及、白蔹、天花粉、瓜蒌、犀角同用。



图 100　乌头

1. 块根；2. 地上部分；3. 果

川中南星

别名 天南星。

来源 本品为天南星科植物川中南星 Arisaema wilsonii Engl. 的干燥块茎。

原植物 川中南星(图 101)为多年生草本。块茎球形。鳞叶宽线状披针形，长 10cm～30cm。叶基生，叶柄长 30cm～50cm；叶片 3 全裂，中裂片倒卵形，长 15cm～26cm，倒卵形，顶部宽短，几截平，有时中央具稍外凸的小尖头，全缘，侧裂片菱形或斜卵形，骤狭渐尖，比中裂片长，侧脉 7 对～8 对，与Ⅱ级侧脉与网脉在背面均隆起。花序柄长于叶柄，基生，粗约 5mm；佛焰苞内外紫色，具白色宽条纹，管部圆柱形，长 6cm～8cm，直径约 3cm；檐部长近 10cm，宽 5cm～8cm，下弯，倒卵状长圆形，锐尖或长渐尖；肉穗花序单性，长 3.5cm～4cm，雄花序粗 6mm～7mm，疏花；雄花具柄，花药 3～4；雌花序粗约 8mm，子房卵圆形，花柱短，柱头头状；附属器具长 3mm～5mm 的短柄，下部圆锥状，基底截平，干后粗 1.2cm～2cm，全长 20cm，至喉部外下弯，再突变细，下垂，上部紫色，下部白色。

生于海拔 1 900m～3 600m 间林下或草地。本品为我国特有，分布于四川、云南等省。

采收加工 同天南星。

药材性状 块茎呈扁球形，高 1cm～2.5cm，直径 2cm～6.5cm。表面淡黄色至淡棕色，顶端稍平，中心有一凹陷的中心茎痕，周围有麻点状根痕，偶有微凸起的小侧芽，有时已磨平。质坚硬，不易折断，断面白色，粉性。气微，味麻舌刺喉。以个大、断面色白、粉性足者为佳。

性味和功用 辛、苦，温；有毒；归肺、肝、脾经。祛风定惊，化痰散结。用于中风，口眼㖞斜，半身不遂，癫痫，破伤风，痈肿。常用量炮制品 3g～9g。外用适量研末调敷患处(溃破者搽疮口周围)。



图 101　川中南星

1. 块茎及根；2. 叶；3. 花序

川 明 参

别名 明沙参、明参、川明党。

来源 本品为伞形科植物川明参 Chuanminshen violaceum Shen et Shan 的干燥根。

原植物 川明参(图 102)为多年生草本，高 30cm～150cm。根茎细长；根圆柱形。茎单一或数条，基部带紫红色。基生叶莲座状，叶片轮廓宽三角状卵形，长 6cm～20cm，三出式 2～3 回羽状分裂，一回羽片长卵形，下部羽片具长柄，向上柄渐短至无柄；二回羽片卵形，柄短或无柄；末回裂片卵形，不规则 2～3 裂或呈锯齿状分裂，长 2cm～3cm；叶柄长 6cm～18cm，基部有宽叶鞘包茎，带紫色；复伞形花序多分枝，无总苞片或仅有 1 片～2 片，伞幅 4～8，不等长；小总苞片 1～3 或无，线形，膜质；萼齿 5，狭长三角形或线形；花瓣 5，暗紫红色、浅紫色或白色，长椭圆形，顶端小舌片细长内曲，中脉明显；雄蕊 5，伸出；花柱长约为基部的 2 倍～2.5 倍，下弯，基部圆锥形。

生于山坡草丛、沟边、林缘和路旁，多栽培。分布于四川、湖北省。

采收加工 清明节前后采挖，除去茎叶及须根，洗净，刮去外皮，沸水潦至透心，取出后，立即放入冷水中浸片刻，晾干或硫磺熏后晾干。

药材性状 呈长圆柱形，长 10cm～30cm，粗 6mm～12mm。芦头处较小，有细密环纹，中部较粗，有稀疏横向棕色皮孔及皱折纹理。外表粗皮多已去掉，黄白色或淡棕黄色，有时可见未去净的黄色残皮及红棕色斑点。体坚实硬脆，易折断，断面黄白色，肉质细密，有角质光泽，微透明，外层有数圈白色环纹，中心浅棕色，有白色放射状纹理。气微，味微甜。以粗壮、色黄白、断面有光泽、味甜者为佳。

性味和功用 甘、微苦，平。归肺、脾经。润肺化痰，和中养胃。用于肺燥咳嗽，咯痰不爽，病后体虚，食少口干。常用量 10g～15g。

附注 以往各医药书籍，均将四川产的川明参，误作明党参加以记载，应纠正。




图 102　川明参

1. 带根基生叶；2. 花果枝；3. 果放大；4. 药材

太 子 参

别名 孩儿参、童参、四叶参、米参。

来源 本品为石竹科植物孩儿参 Pseudostellaria heterophylla(Miq.)Pax ex Pax et Hoffm. 的干燥块根。

原植物 孩儿参(图 103)为多年生草本，高 7cm～20cm，块根肉质，长纺锤形，生细须根。茎单一，少有双生者，下部带紫色，具 2 行白色短柔毛，节略膨大。叶对生，近无柄，叶片二型，下部叶长匙形或倒披针形，长 5cm～7cm，顶端尖或钝尖，基部渐狭，全缘，上部叶卵状披针形，长卵形或菱状卵形，顶生二对叶常增大而靠紧，有时隔离，上面嫩绿色，下面绿白色。花二型：普通花 1 朵～3 朵顶生或生上部叶腋，白色；花梗长 1cm～2(～4)cm，有短柔毛；萼片 5，披针形；花瓣 5，矩圆形或倒卵形，顶端 2 齿裂；雄蕊 10；子房卵形，花柱 3，线形。闭锁花生茎下部叶腋，小形，花梗细；萼片 4，疏生柔毛；无花瓣。蒴果卵形，成熟时下垂，内有种子 7 粒～8 粒；种子褐色，扁圆形或长圆状肾形，表面有疣状突起。

生于山谷阴湿处，岩缝中或林下土壤肥厚处。分布于我国东北、华北、华中、西北及山东、江苏、安徽、浙江、四川等省。

采收加工 夏季茎叶大部分枯萎时采挖，晒干，或置沸水中略烫，阴干或晒干。

药材性状 块根呈细长纺锤形或细长条形，稍弯曲，长 2cm～8cm，直径 2mm～6mm，顶端可见茎基及芽痕，下部细长尾状。表面黄白色至土黄色，较光滑，半透明，有细皱纹及凹下的须根痕。质硬而脆，易折断。断面平坦，淡黄白色，角质样(直接晒干者断面类白色，有粉性)，气微，味微甘。以条粗、肥润、色黄白、无须根者为佳。

性味和功用 甘、苦，平。归心、脾、肺经。益气，健脾，生津。用于脾虚体倦，食欲不振，病后虚弱，心悸口干，自汗，盗汗，肺虚咳嗽，肝炎，神经衰弱。常用量 6g～15g。



103　孩儿参

巴山重楼

别名 铁扁担。

来源 本品为延龄草科植物巴山重楼 Paris bashanensis Wang et Tang 的干燥根状茎。

原植物 巴山重楼(图 104)为多年生直立草本，高 25cm～60cm。根状茎细长，横走，直径 2cm～8cm。茎不分枝，圆柱形，下部常带紫红色。叶通常 4 枚，稀 5 枚，轮生茎顶，卵状椭圆形、矩圆状披针形至披针形，长 4cm～10cm，顶端渐尖，基部楔形，边全缘或微波状；叶柄短或近无柄。花梗单一，自叶轮中心抽出，长 2cm～8cm；外轮花被片 4，狭披针形，绿黄色，长 1.5cm～3cm，宽 3mm～4mm，反折；内轮花被片线形，与外轮同数且等长，黄绿色；雄蕊通常 8 枚，花药长 1cm～1.2cm，花丝短，长 3mm～4mm，药隔突出部分长 6mm～10mm；子房近球形，花柱短，具 4～5 分枝，分枝细长，浆果状蒴果近球形，成熟时紫色，不开裂，内具多数种子。

生于山坡林下荫处。分布于湖北、四川、西藏等省(自治区)，为我国特产。

采收加工 秋季采挖，洗净，晒干。

药材性状 本品呈细长圆柱形，略弯曲，长 5cm～12cm，直径 2mm～8mm。表面黄褐色或灰棕色，顶端具鳞叶及茎残基，并具或稀或密的层状凸起的粗环纹，一面结节明显，具椭圆形凹陷的茎痕，另一面散生须根或疣点状须根痕。质坚实，不易折断。断面白色至黄白色，有粉性，较平整。气微弱，味微苦。以根茎粗壮，质坚实，外表黄褐色。断面色白、粉性足、味苦者为佳。

性味和功用 苦，平；有小毒。归心、肝经。清热解毒，消肿散瘀，息风解痉。用于咽喉肿痛，痈伤咳嗽，急性淋巴结炎，蛇虫咬伤，热毒疮痈，小儿惊风抽搐，脑炎，腮腺炎，近有用于肿瘤。常用量 3g～15g；外用适量磨汁涂或捣烂涂患处。




图 104　巴山重楼

水 仙 根

别名 金盏银台、女史花。

来源 本品为石蒜科植物水仙 Narcissus tazetta L. var. chinensis Roem. 的干燥鳞茎。

原植物 水仙(图 105)为多年生草本。鳞茎卵圆形。叶丛生于鳞茎顶端，线形，扁平，长 30cm～45cm，宽 1cm～2cm，顶端钝，全缘，有时具白粉。花葶直立，不分枝，扁平，约与叶等长；总苞片佛焰苞状，膜质；伞形花序由 4 朵～10 朵花组成，花梗长短不等，长 1cm～3cm；苞片膜质，披针形，管状；花平伸或下倾，芳香，直径 2.5cm～3.5cm，高脚碟状，白色，管部短圆柱状或漏斗状，近三棱形，长 1.5cm～2cm，裂片 6，倒卵形，扩展而外反；副花冠浅杯状，长约 5mm，鲜黄色；雄蕊 6，生于副花冠内，花药直立，背着；子房下位，3 室，每室有胚珠多数，花柱长，柱头 3 裂。蒴果，室背开裂；种子椭圆形，扁平。

生于潮湿的地方，多栽培于庭园或盆栽。分布于浙江、福建、广东、四川、贵州、江苏等省。中欧、地中海沿岸、日本也有。

采收加工 春、秋采挖，去除茎苗、须根，洗净，用开水漂后，晒干，或纵切成片晒干。

药材性状 鳞茎呈圆球形，或微呈圆锥形，直径约 4cm～5cm。外被一层棕褐色膜质鳞片，下面有多数须根痕，撕开外层鳞片，可见多数相互包裹的黄白色瓣片(鳞叶)，质轻。气无，味微苦。以个大、内心充实者为佳。

性味和功用 苦、微辛，寒；有小毒。归心、肺经。清热解毒，散结消肿。用于腮腺炎，痈肿疮毒，乳腺炎、虫咬伤。外用适量捣敷或捣汁涂。本品能引起呕吐，一般不内服。

附注 水仙花祛风除热，活血调经；用于妇女子宫疾病，月经不调。常用量 2g～5g。



图 105　水仙

长药隔重楼

别名 黑籽重楼、重楼、七叶一枝花。

来源 本品为延龄草科植物长药隔重楼 Paris polyphylla Sm. var. thibetica(Franch.)Hara 的干燥根茎。

原植物 长药隔重楼(图 106)为多年生草本，高 35cm～90cm。根状茎粗厚，直径达 8mm～20mm。茎单一，直立，圆柱形，通常带紫红色，基部有灰白色干膜质鞘 1 枚～3 枚，常脱落。叶 7 枚～12 枚轮生于茎顶部，排成一轮，披针形或倒披针形，长 5cm～15cm，宽 1cm～5cm，很少狭至 7mm，顶端具短尖头或渐尖，基部楔形，全缘，通常无柄，极少具短柄。花单生于叶轮中央，花梗似为茎的延长，长 5cm～16(～30)cm；花被片离生，二轮，外轮花被片绿色，3 枚～6 枚，狭卵状披针形；内轮花被片线形，长 3.5cm～4.5cm，与外轮花被近等长或稍超过；雄蕊 10 枚～12 枚，长约 2cm～3.5cm，花丝远比花药短，药隔突出部分长达 6mm～16mm，呈线状钻形，极少短至 3mm；子房近球形，具棱，顶端有一盘状花柱基，花柱粗短，分枝。蒴果近球形，成熟后紫色；种子多数，具鲜红色多浆汁的外种皮。

生于海拔 1 500m～3 100m 间灌丛下阴湿处。分布于四川、云南、西藏等省、区。

采收加工 秋季采挖，去茎叶和须根，洗净，晒干。

药材性状 呈圆柱形，长 4cm～8.5cm，直径 8mm～20mm。外表灰黄色至棕黄色，节结密生，呈盘状隆起，棕色鳞片多已脱落，具少数粗状须根或残留须根痕，茎基处下陷，时有灰白色残茎。质坚实，不易折断，断面平坦，粉质，黄白色至浅灰黄色。气微，味微苦辣。以根茎粗壮、坚实、色黄白者为佳。

性味和功用 苦、辛、寒；有毒。归心、肝经。清热解毒，熄风定惊，活血止痛。用于扁桃腺炎。痈肿疮毒，蛟虫叮咬，疔疮瘰疬，小儿惊风，跌打痹伤，心腹疼痛。常用量 3g～9g。外用适量捣烂、研末调敷患处或磨汁涂患处。



图 106　长药隔重楼

牛尾独活

别名 独活、川独活、尾活。

来源 本品为伞形科植物独活 Heracleum hemsleyanum Diels 的干燥根及根茎。

原植物 独活(图 107)为多年生草本，高 1m～1.5m。根长圆锥形，灰黄色。茎单生，疏生柔毛。基生叶及下部叶卵形，1～2 回羽状全裂，裂片 3～5，宽卵形或卵圆形，长 8cm～13cm，3 浅裂，边缘有不整齐锯齿，下面脉上具疏刺毛；叶柄长 8cm～20cm，下部膨大成鞘状；茎上部叶较小，卵形，3 浅裂至深裂，长 3cm～8cm，宽 8cm～10cm。复伞形花序顶生；花序梗长 22cm～30cm；总苞片数个，长披针形；伞幅 16～18，疏生柔毛；小总苞片 5～8，线状披针形，被柔毛；小伞序有花多数；花白色；萼齿不明显；花瓣 5，大小不等，倒卵形，顶端尖，凹入。双悬果近圆形，长 6mm～7mm，侧棱翅状，棱槽间有油管 1，合生面 2，油管棒状，棕色，长为分果的 1 半或过之。

生于中、高山区的山坡草丛中、林阴下、沟谷边或灌丛中。分布于湖北、四川、云南等省。

采收加工 春初或秋末采挖，去泥沙、茎叶及须根，烘至半干，堆置 2～3 天，发软后，再烘至全干。

药材性状 呈长圆锥形，少有分枝，长 15cm～30cm，直径 0.6cm～3cm，根头单一或有数个分叉，残留茎基和黄色叶鞘。表面灰黄色，有不规则纵沟，皮孔细小，稀疏，横长排列。质较坚硬，易折断，断面不平坦，黄白色，具粉性。根的切断面皮部类白色，多裂隙，有多数橙黄色至棕色油点；近形成层现棕色环，中央木心，淡黄色，显菊花形纹理。气微香，味微甜。以粗壮、分枝少、油性足、气浓者为佳。

性味和功用 辛、苦，温。归肾、膀胱经。祛风，除湿，散寒，止痛。用于风寒头痛，风寒湿痹，手足挛痛，腰膝 痛，目眩，牙痛，慢性支气管炎。常用量 3g～9g。外用适量煎水洗。阴虚血燥者慎服。




图 107　独活

1～2 全株(去部分叶)；3. 花放大

石 刁 柏

别名 芦笋、龙须菜、露笋、湖北大百部、小百部、山文竹。

来源 本品为百合科植物石刁柏 Asparagus officinalis L. 的干燥块根。

原植物 石刁柏(图 108)为多年生直立草本，高可达 1m。茎平滑，无刺，上部在后期常俯垂，分枝多，较柔弱，绿色而稍带白粉。叶状枝每 3 枚～6 枚成簇，近圆柱形，略扁，稍有钝棱，纤细，微弧曲，长 5mm～30mm，粗 0.3mm～0.5mm。鳞片状叶极小，基部有刺状短距或近无距。花单性，1 朵～4 朵腋生，绿黄色；花梗长 8mm～14mm，关节位于上部或近中部；雄花：花被片 6，长 5mm～6mm；雄蕊 6，生于花被基部，花丝中部以下贴生于花被片上；雌花：花被片 6，长约 3mm；子房有 3 棱，3 室，花柱 3。浆果球形，肉质，直径 7mm～8mm，成熟时红色，有 2～3 颗种子。

生于沙质河滩、河岸、草坡或林下。我国南方各地有栽培，新疆维吾尔自治区西北部有野生。

采收加工 2 月～3 月间挖取生长 2 年～3 年的块根，洗净，晒干，或置沸水中浸烫后，取出晒干。

药材性状 干燥块根常数个或数十个成簇，亦有单个散在者。呈长圆锥形或圆柱形，多扭曲，长 8cm～25cm，直径 4cm～8cm。表面未去皮者土黄色，去皮者黄白色，有深浅不等的纵皱纹，上端略膨大，少数残留茎基。质柔韧，断面肉质，淡黄白色，角质样，中柱椭圆形，黄白色。气微，味微甘、苦。以粗壮、质坚实者为佳。

性味和功用 微甘、苦，微温；有小毒。归肺经。润肺，镇咳，祛痰、利尿、杀虫。用于肺热咳嗽、淋巴结结核、水肿、小便不利，疳虫，疥癣。常用量 3g～9g。外用适量煎水熏洗或捣汁涂。




图 108　石刁柏

1. 根及茎下部；2. 花枝

四川千金藤

别名 小山豆根、山豆根。

来源 本品为防己科植物四川千金藤 Stephania sutchuenensis H. S. Lo 的干燥根。

原植物 四川千金藤(图 109)为多年生草质藤本，全株无毛，枝细圆柱形，具纵沟纹。叶互生，薄革质，三角形，长宽近相等，通常 6cm～10cm，顶端尖或钝，基部近平截，边全缘，掌状脉在下面明显突起；叶柄长 4cm～7cm，盾状着生于距叶片基部约 1cm 处。单伞形聚伞花序腋生，雌雄异株；雄花序梗与叶柄近等长，细而直，小聚伞花序 4 个～8 个，簇生于花序梗末端，每个小聚伞花序有花 3 朵～7 朵；雄花：萼片 6，2 轮，卵圆形或卵形，长 1.7mm～2mm，顶端尾状渐尖；聚药雄蕊与花瓣近等长；雌花序与雄花序同形。果序纤细，长 8cm～9cm；核果黄绿色，倒卵形，内果皮骨质，长约 7mm，背部两侧各有 7 条～11 条小横肋，胎座迹穿孔。

生于海拔 1 000m～1 500m 间山坡阴处，沟边，林下。分布于四川省。

采收加工 全年均可采挖，洗净，晒干。

药材性状 根呈细长圆柱形，弯曲，有分枝。长 30cm～50cm，直径 2mm～4mm。表面黄棕色，有纵皱纹及稀疏细根及细根痕。质柔韧，不易折断，断面不整齐，纤维性，木部淡黄色，呈放射状排列，中心有髓。气微，味苦。以条粗壮、无须根、苦味浓者为佳。

性味和功用 苦，寒。归心、肺、大肠经。清热解毒，止痛杀虫。用于咽喉肿痛，牙痛，痔疮肿痛，腹痛下痢，咳嗽气喘，疮痈，蛲虫病，蛇咬伤，蜘蛛毒伤。常用量 9g～15g。外用适量捣烂敷患处或煎汤含漱。



图 109　四川千金藤

凹叶瑞香

别名 祖师麻、金腰带。

来源 本品为瑞香科植物凹叶瑞香 Daphne retusa Hemsl. 的根皮。

原植物 凹叶瑞香(图 110)为灌木，高 1m～1.5m，稀达 4m。幼枝密被灰黄或灰褐色刚毛伏毛，后渐脱落。叶互生，革质，披针形至椭圆状披针形，长 3cm～10cm，顶端钝，通常凹头，基部楔形，边全缘，略反卷，两面均光滑无毛；近无柄，头状花序顶生，具总苞，苞片常为矩圆形，边缘有睫毛；总花梗和花梗极短，被灰黄色刚伏毛；花被筒状，长约 16mm，无毛，外面浅红紫色，内面白色或带浅红紫色，芳香，裂片 4，矩圆状卵形，长约 7mm，顶端钝尖，无毛；雄蕊 8，2 轮，分别生于花被筒的上部及中部；子房矩圆形。核果卵形，熟时鲜红色，几无果梗。

生于海拔 3 000m～4 000m 的山地灌丛中或杂木林内。分布于陕西、甘肃、青海、湖北、浙江、四川、云南等省。

采收加工 秋、春季采挖，洗净，剥下根皮，晒干。

药材性状 干燥根片卷曲呈筒状，长短不等，宽 1cm～2cm，厚约 1mm；外表面金黄色或棕黄色，稍粗糙，具褐色横长皮孔及细纵皱纹，栓皮易脱落；内表面浅黄色或灰黄色，光滑，有纵纹理。质柔韧，不易折断，断面纤维性，黄白色。气微，味苦辛，有麻舌感。以皮厚、色黄者为佳。

性味和功用 辛、苦，温，有小毒。祛风除湿，活血祛瘀，抗炎镇痛。用于风湿性关节痛，跌打损伤，牙痛，慢惊风。常用量 3g～6g，外用煅存性研末撒患处。



图 110　凹叶瑞香

1～2. 全株；3. 枝放大

白 土 苓

来源 本品为菝葜科植物华肖菝葜 Heterosmilax chinensis Wang 的干燥根状茎。

原植物 华肖菝葜(图 111)为攀援灌木，全株除老茎、叶柄、花被外，或多或少具短硬毛。小枝有棱。叶互生，纸质，长矩圆形至披针形，长 3.5cm～16cm，顶端渐尖，基部宽楔形或近圆形，边全缘，有呈微波状，主脉 5 条，外边 2 条靠近叶缘，但不与叶缘结合，小脉密网状，在两面明显；叶柄长 0.5cm～2.5cm，在下部 1/3 处有卷须和狭鞘。伞形花序生于叶腋或褐色苞片腋内；总花梗扁，有沟，长 0.5cm～3cm；花序托球形，直径 2mm～3mm；花小，单性异株；雄花：花被筒矩圆形，长 5mm～6mm，顶端具 3 枚长尖齿，雄蕊 3，花丝下部合生；雌花：花被筒卵形，长 2.5mm～3mm，顶端 3 齿明显，子房 3 室，花柱短，柱头 3 裂，退化雄蕊 3。浆果近球形，熟时深绿色，直径 4mm～5mm；种子 1，卵圆形。

生于海拔 300m～2 200m 间山谷密林中或灌丛中。分布于广东、广西、四川、云南等省(自治区)。

采收加工 全年均可采挖，除去茎藤及须根，洗净，切片，晒干。

药材性状 整个者为不规则的类圆形或椭圆形块状，直径 2cm～6cm，长 5cm～15cm；表面棕褐色，具瘤状凸起，有坚硬的须根残基，质坚，难折断，断面黄白色(日久变黄棕色)，粉性。切片为横或纵切的圆形、椭圆形、半圆形薄片，厚 1mm～10mm，完整或破碎，边皮多在加工时削除；切面类白色、淡黄色或淡棕色，粉质；质脆易断。气微，味淡。以肉质细密，色白而多粉质者为佳。

性味和功用 甘、淡，平。归肝、脾、膀胱经。健脾除湿，祛风，解毒。用于风湿关节疼痛，脾虚泻泄，恶疮肿毒，梅毒，汞制剂慢性中毒，瘰疬溃烂。常用量 10g～30g。



图 111　华肖菝葜

1. 根及根茎；2. 花序枝；3. 果序枝

白　芷

别名　川白芷、杭白芷、香大活。

来源　本品为伞形科植物杭白芷 Angelica dahurica(Fisch. ex. Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch. f. cv. Hangbaizhi, Hort. 的干燥根。

原植物　杭白芷(图 112)为多年生草本，高 1m～2m。根长圆锥形，肥大。叶互生，长达 30cm，二至三回羽状分裂，最终裂片卵形至长卵形，长 2cm～6cm，叶柄长 3cm～6cm，基部扩大成鞘，抱茎；上部叶逐渐简化成鞘。复伞形花序顶生或侧生，直径 10cm～30cm，无总苞或具 1 枚～2 枚鞘状总苞；伞幅 10～28，有短毛，每个小伞形花序有花多数；小总苞片多数，狭披针形至线形，长约 5mm，比花梗短，膜质；花萼无齿；花瓣 5，黄绿色，卵状披针形，顶端内曲；雄蕊 5，花丝细小，伸出花冠外；子房下位，2 室，花柱 2，短。双悬果椭圆形或近圆形，长约 5mm，扁。

常栽培于向阳、肥沃的沙质壤土中，主产四川、浙江，湖南、湖北、江西、江苏、安徽。

采收加工　在栽培的第二年夏至至立秋根肥壮充实时采挖，去掉地上部分及泥沙(不能水洗)，于烈日下晒干，或用硫黄熏后晒干。

药材性状　主根粗壮，呈长圆锥形，上部具 4 棱，有时稍弯曲，长 10cm～23cm，直径 1cm～5cm，或已纵剖。表面灰棕色，有多数较大的皮孔样横向突起，具纵皱纹，有时可见支根切除后的痕迹，根头中央有凹陷的茎痕和叶痕。质硬，沉重坠手，断面不平整，白色，粉性大，皮部散生多数棕色小点，木质部灰白色，约占横切面的 1/2，射线辐状，排列紧密。气清香而浓厚，味苦辛。以粗大、断面色白者为佳。

性味和功用　辛、温。归肺、脾、胃经。祛风除湿，活血排脓，生肌止痛。用于头痛，牙痛，眉棱骨痛，鼻渊，肠风痔漏，赤白带下，痈疽疮疡，皮肤搔痒，疥癣，关节囊积水，毒蛇蜈蚣咬伤等。常用量 3g～9g。外用适量研末撒或调敷。阴虚血热者忌服。



图 112　杭白芷

1. 茎中部叶；2. 花序；3. 药材(白芷)

白 附 子

别名 禹白附、牛奶白附、野芋、滴水参。

来源 本品为天南星科植物独角莲 Typhonium giganteum Engl. 的干燥块茎。

原植物 独角莲(图 113)为多年生草本。块茎卵形、卵状椭圆形或倒卵形，直径 2cm～5cm。叶基生，通常 1 年～2 年生的只有 1 叶，3 年～4 年生的有 3 叶～4 叶，叶柄圆柱形，长约 60cm，具紫色斑点，中部以下具膜质叶鞘；叶片幼时内卷如角状，后即展开，戟状箭形或卵状宽椭圆形，长 10cm～45cm。花序梗常带红紫色纵条斑点；佛焰苞紫色，管部圆筒形或长圆状卵形，长约 4cm～6cm，檐部卵形，展开，顶端渐尖常弯曲；肉穗花序几无梗；雌花序在下；雄花序在上。雄花无柄，花药 2；雌花子房圆柱形，顶端平，近六角形，胚珠 2；中性花棒状至钻形。浆果红色。

生于海拔 1 500m 以下荒地、山坡、水沟边或林下，也有栽培。我国特有。分布于南北各地。我国特有。

采收加工 9～10 月采挖，除去残茎及须根，晒干或削去外皮晒干。亦可不去皮切片，用姜片浸蒸，再晒干。

药材性状 去皮干燥块茎呈卵圆形或椭圆形，长 2cm～5cm，直径 1cm～3cm。表面白色或黄白色，略粗糙，有环纹及点状根痕，顶端残留茎痕或芽痕。质坚硬，难折断，断面白色粉质。无臭，味淡，麻舌刺舌。以个大、肥壮、去皮、色白、粉性足者为佳。切片姜蒸者呈卵圆形片状，厚约 3mm～7mm，表面粗糙皱缩，密生薄膜状鳞片，剥去鳞片可见环节，切面白色。

性味和功用 辛、甘，温；有毒。归胃、肝经。祛风痰，定惊，止痛。用于中风口眼歪斜，面神经麻痹，偏头痛，破伤风，淋巴结结核，痈肿，毒蛇咬伤，喉痹肿痛，血痹心痛。炮制后用，炮制方法见《中药大辞典》(下)3482 项下。常用量 3g～4.5g。外用适量捣烂敷或研末调敷。孕妇忌服。

附注 独角莲全草治毒蛇咬伤、淋巴结结核、跌打损伤，鲜品适量捣烂敷患处。




图 113　独角莲

汝　兰

别名　山乌龟、吊金龟、金不换、地乌龟。

来源　本品为防己科植物汝兰 Stephania sinica Diels 的干燥块根。

原植物　汝兰(图 114)为多年生草质藤本，全株无毛。块根近球形，硕大，常露出于地面。茎枝圆柱形，粉绿色，具纵细条纹，中空，干后黄色，松软。叶互生，膜质，宽三角状圆形，长 10cm～18cm，宽稍大于长，顶端钝或圆，具小突尖，基部平截或微心形，全缘或微波状，掌状脉两面凸起，网脉明显；叶柄长 10cm～30cm，盾状着生于距叶片基部 1cm～3cm 处。复伞性聚伞花序腋生，雌雄异株，雄花序总梗长 2cm～13cm，无苞片，假伞梗 5～10，长 0.5cm～3cm；雄花：萼片 6，黄绿色，狭倒卵状长圆形，长约 1mm；花瓣 3～4，倒卵状椭圆形，长约 0.8mm，内面具 2 个腺体；聚药雄蕊约与花瓣等长；雌花序与雄花序近同形而稍粗短；雌花：萼片 1，卵圆形，长约 0.8mm；花瓣 2，近圆形，长约 0.5mm。核果倒卵状球形，熟时红色，内果皮骨质，背部具小横肋状雕纹，胎座迹不穿孔。

生于海拔 500m～2 500m 山坡、林缘及灌丛中。分布于四川、贵州、湖北、云南等省。

采收加工　全年可采，洗净，切片，晒干。

药材性状　块根类球形或不规则块状，直径 4cm～30cm，外皮棕黑色或褐色，粗糙，具许多疣状小乳突，顶端微凹陷，具残留茎基，下部具粗支根和细根。商品多为横切或纵切片，一般厚 3mm～10mm，切面灰黄色，粉质，有不规则皱纹，维管束排成数个同心圆。质坚脆，易折断。气微，味苦。以断面色黄、味苦者为佳。

性味和功用　苦，寒；有小毒。归心、胃经。清热解毒，散瘀止痛，消痰，截疟。用于风湿关节炎，中暑，痢疾，痈疖疮毒，跌打损伤，胃痛，腹痛，牙痛，神经痛。常用量 3g～9g。外用适量捣敷、研末撒或磨汁涂。

附注　本品切片又称白药片，为兽医用药。



图 114　汝兰

1. 块根；2. 花序枝

江南地不容

别名 地不容。牛尾香。

来源 本品为防己科植物江南地不容 Stephania excentrica H. S. Lo 的干燥块根。

原植物 江南地不容(图 115)为多年生草质藤本，全株无毛。块根短棒状。枝圆柱形，褐色，有纵直沟纹。叶互生，纸质，三角形或三角状近圆形，长宽近相等，约 5cm～10cm，有时达 13cm，顶端钝，具小凸尖，基部截形、微凹至浅心形，边全缘或不规则浅波状，掌状脉在下面隆起，干时常变茶褐色；叶柄长 7cm～14cm，盾状生于距叶片基部 1cm～2cm 处。雌雄异株，雄花序腋生或生于叶脉短枝上，通常为复伞形花序，总梗长 2cm～5cm，顶端有小苞片，假伞梗纤细，长 1cm～3cm，小聚伞花序 5 个～8 个簇生于假伞梗末端；雄花：萼片 6，淡绿色，2 轮，宽卵形或宽椭圆形，长约 1.2mm；花瓣 3，短于萼片，壳状，内面有两个腺体，雄蕊聚药；雌花序腋生，假伞梗较粗短，基部具 2 个～3 个披针形苞片；雌花：萼片 1～3，宽卵形或倒卵状披针形，长约 1mm，轮生或侧生；花瓣 2～4，近圆形，肉质，长约 0.5mm。果梗肉质；核果成熟时红色，内果皮近圆形，长约 6mm，背部具 4 行弯刺状突起；胎座迹偏侧穿孔。

生于海拔 600m～2 000m 处荒山、沟边、灌丛中及林下石岩处。分布于湖北、湖南、江西、福建、广西、贵州、四川等省、区。

采收加工 全年均可采挖，洗净，晒干或切段晒干。

药材性状 块根呈短棒状、纺锤形或条状，长短不一，直径 2cm～4cm。外表面褐色或褐黑色，粗糙，具凸凹不平的皱缩纹及须根痕，顶端有残留茎基。质硬脆，易折断，断面黄白色，带粉性，维管束呈放射状排列。气微，味苦。以质坚实、粉性多者为佳。

性味和功用 苦，寒。理气，止痛。用于胃痛、腹痛、腹胀、咽喉肿痛，牙痛。常用量 3g～10g。



图 115　江南地不容

1. 块根；2. 茎上部分

西南黄芩

别名 黄芩、条芩、子芩、土黄芩。

来源 本品为唇形科植物滇黄芩 Scutellaria amoena C. H. Wright 的干燥根。

原植物 滇黄芩(图 116)为多年生草本，高 10cm～25(～35)cm。根状茎近直立或斜升，肥厚，径约 1cm～2cm。茎丛生，四棱形，每节间密被两列白色柔毛及腺毛。叶对生，近革质，长椭圆形或宽披针形，长 1.4cm～3.8cm，顶端圆形或钝，基部楔形、圆形至浅心形，边缘离基以上具不明显圆齿至全缘，两面疏被柔毛；无柄或具长 1mm～2mm 的短柄。总状花序顶生，多两花相对；花萼钟状唇形，上唇背面具 1 盾片，果时增大，高达 3mm，带紫绿色；花冠唇形，长 2.5cm～3cm，蓝紫色，外面密被柔毛及腺毛；雄蕊 4，2 强；雌蕊 1，子房上位，4 室，每室 1 胚珠，花柱丝状。小坚果 4，卵球形，棕褐色，被柔毛及小瘤体。

生于海拔 1 300m～3 000m 左右的林缘或疏林间草坡。分布于云南、四川、贵州等省。

采收加工 秋后茎叶枯黄时采挖，去茎叶及芦头，立即晒或炕干，撞去粗皮。

药材性状 呈倒圆锥形，扭曲或微扭曲，分枝或不分枝，长 7cm～20cm，直径 1cm～2.5cm。表面棕黄色或暗黄色，有时可见粗糙的栓皮附着，有扭曲的纵皱纹或不规则网纹，并可见残留细根痕。质硬而脆，易折断，断面不平坦，黄绿色。黄色或污黄色；老根中间呈棕褐色，枯朽状或成空洞。气微，味苦。以根条粗大，色黄者为佳。

性味和功用 苦，寒。归心、肺、胆、大肠经。清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿热痞满，暑温胸闷呕吐，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热之吐血、衄血，痈肿疮毒，胎动不安。常用量 3g～9g。

中寒气虚者忌用。



图 116　滇黄芩

竹叶柴胡

别名 紫柴胡、竹叶防、凤膜缘柴胡。

来源 本品为伞形科植物竹叶柴胡 Bupleurum marginatum Wall. ex DC. 的干燥根。

原植物 竹叶柴胡(图 117)为多年生草本，高 50cm～120cm。根及茎基部木质化。茎硬挺，带紫棕色，具淡绿色纵条纹，实心。叶鲜绿色，背面绿白色，近革质，长披针形或线形，长 10cm～16cm，顶端急尖或渐尖，有长达 1mm 的硬尖头，基部微收缩抱茎，边缘软骨质，较宽，白色，全缘，具平行脉 7 条～15 条。复伞形花序很多，顶生花序往往短于侧生花序，直径 1.5cm～4cm；伞幅 3～4(～7)，不等长，长 1cm～3cm；总苞片 2～5，不等大，长 1mm～4mm，披针形或小如鳞片；小伞形花序直径 4mm～9mm；小总苞片 5，披针形，短于花梗，基部不收缩，有白色膜质边缘；花小，直径 1.2mm～1.6mm；萼齿不显；花瓣 5，浅黄色，近圆形，顶端反折处较平而不凸起，小舌片较大，方形；雄蕊 5；花柱基厚盘状，宽于子房。分生果长圆形，长约 4mm，棕褐色，棱狭翼状，每棱槽内油管 3，合生面油管 4。

生于海拔 750m～2 300m 的山坡草地或林下。分布于我国西南、中部和南部各省(自治区)。印度、尼泊尔、巴基斯坦也有。

采收加工 春、秋季采挖，去除茎叶、泥土，晒干。

药材性状 主根细长圆锥形或纺锤形，长 10cm～15cm，直径 5mm～8mm，顺直或稍弯曲，下部有分枝，顶端常有一段木质化地下茎，长 2cm～10cm，有时扭曲缩短与根较难区分。表面红棕色或黄棕色，有细纵皱纹及稀疏的小横突起。质较硬，不易折断，断面木质纤维性，不整齐，黄白色。气微香，味微苦辛，以根条粗长、皮细、支根少者为佳。

性味和功用 苦，凉。归肝、胆经。和解退热，舒肝解郁，升提中气。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，肝炎，头痛目眩，胆道感染，脱肛，子宫脱垂，月经不调。常用量 2g～5g。真阴亏损、肝阳上亢者忌服。

附注 本品在《药典》附录Ⅲ中有收载。



图 117　竹叶柴胡

1. 根及茎下部；2. 茎上部枝叶及花序

红 秦 艽

别名 甘肃丹参、高原丹参、紫丹参。

来源 本品为唇形科植物甘西鼠尾草 Salvia przewalskii Maxim. 的干燥根。

原植物 甘西鼠尾草(图 118)为多年生草本，高达 60cm。根木质，直伸，圆锥柱状，外皮红褐色。茎自基部分枝，上升，丛生，上部节上分枝，密被短柔毛。基生叶柄长 6cm～21cm，茎生叶对生，柄长 1cm～4cm，均密被微柔毛；叶片三角状或椭圆状戟形，稀心状卵圆形，有时具圆的侧裂片，长 5cm～11cm，顶端锐尖，边缘具近于整齐的圆齿状牙齿，上面绿色，被微硬毛，下面灰白色，密被灰白色绒毛。轮伞花序 2～4 花，疏离，组成顶生长 8cm～20cm 的总状花序，或再组成圆锥状花序；苞片卵圆形或椭圆形，长 3mm～8mm，全缘，两面被毛；花梗长 1mm～5mm，与序轴均被柔毛；花萼钟状，长约 11mm，外面密被腺毛，并杂有红褐色腺点，内面散生微硬伏毛，二唇形；花冠紫红色，长 21mm～40mm，外被疏柔毛，内面有毛环，冠檐二唇形，上唇长圆形，散布红褐色腺点，顶端微缺，下唇 3 裂，中裂片倒卵圆形，顶端近平截，侧裂片半圆形；能育雄蕊 2，药隔弧形；花柱略伸出，顶端 2 浅裂。小坚果倒卵形。

生于海拔 2 100m～4 500m 的林缘、路旁、沟边、灌丛中。分布于甘肃、四川、云南、西藏等省(自治区)。

采收加工 春、秋季采挖，去须根，晒干。

药材性状 呈圆锥形，上粗下细，长 10cm～20cm，直径 1cm～4cm。表面暗棕红色。根头部常由 1 至数个根茎合著，根部呈辫子状或扭曲状，外皮常有部分脱落而呈红褐色。质松脆，易折断，断面不平坦，可见浅黄色维管束。气微弱，味微苦。以条粗壮、色棕红者为佳。

性味和功用 苦，寒。归心、肝经。活血祛瘀，止痛消肿，养血安神。用于月经不调，　瘕，产后瘀阻疼痛，痈疮肿毒，心烦失眠，心悸，肝脾肿大，关节疼痛。常用量 5g～9g；外用适量熬膏涂或煎水熏洗。无瘀血者慎服。




图 118　甘西鼠尾草

1. 根及基生叶；2. 花序；3. 花放大

红 凉 伞

别名 铁凉伞、朱砂根、天青地红、红八爪。

来源 本品为紫金牛科植物两色紫金牛 Ardisia crenata Sims. var. bicolor (Walker)C. Y. Wu et C. Chen 的干燥根。

原植物 两色紫金牛(图 119)为小灌木，高 1m～2m。茎不分枝，基部匍匐生根。叶互生，坚纸质，椭圆状披针形至狭披针形，长 6cm～14cm，顶端急尖或渐尖，基部楔形，边缘具皱波状或波状齿，两面有突起腺点，下面红色、紫红色或紫色，侧脉 12 对～16 对；叶柄长 0.5cm～1cm。伞形花序顶生，梗长 2cm～3cm；萼 5 裂，裂片卵形或矩圆形，顶端极钝，具黑色腺点；花冠 5 裂，裂片卵状披针形，长约 5mm，白色或淡红色，顶端急尖，有稀疏黑色腺点；雄蕊 5，花丝极短；子房上位，花柱线形，与花瓣几等长。核果球形，直径约 8mm，熟时红色，有极稀的黑色斑点。

生于丘陵山地林下、沟边、路旁。分布于浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、云南等省(自治区)。

采收加工 秋季采挖，洗净，晒干。

药材性状 根茎略膨大，上端有茎残基，表面褐色或红褐色，有不规则皱纹。支根数条，圆柱形，略弯曲，长短不一，直径 2mm～10mm，表面褐色或浅棕红色，较光滑，老根具纵向皱纹横向断裂痕，具须根或须根断痕。质硬而脆，易折断，断面皮部易与木部分离，皮部厚约为断面的 1/2～1/3，粉红色，靠木质部处有 1 条浅或深红棕色环纹。气微，味辛微辣，有刺舌感。以根条粗大、断面粉红色者为佳。

性味和功用 辛、微苦，平。祛风除湿，散瘀止痛，通筋活络，消炎。用于感冒，咳嗽，扁桃腺炎，咽喉炎，肺结核咯血，淋巴结结核，小儿消化不良，胃痛，外伤出血，跌打损伤，骨折，风湿关节痛，白带，痛经，毒蛇咬伤。常用量 9g～15g。外用适量研末调敷。

附注 本品如服至 15g～30g 时，可出现恶心、厌食、呕吐或胃痛等症状，停药后即可消失。



图 119　两色紫金牛

红 毛 蛇

别名 平卧阴石蕨、小蕨萁。

来源 本品为蕨类骨碎补科植物阴石蕨 Humata repens(L. f.) Diels 的根状茎。

原植物 阴石蕨(图 120)为多年生草本，高 10cm～20cm，根状茎长而横走，密被鳞片。叶远生，叶柄棕色，长 3cm～5cm，基部与根状茎连接处有关节，疏被红棕色鳞片，老则光滑；叶片革质，卵状三角形，长 5cm～10cm，二至三回羽状分裂；羽片无柄，以狭翅相连，常向上弯弓，基部 1 对最大，长 2cm～4cm，三角状披针形，其下侧一片小羽片最大，浅裂或仅顶部有粗钝齿；叶脉在末回小羽片或裂片上羽状分叉，每齿有小脉 1 条。孢子囊群生于小脉顶端；囊群盖半圆形，近革质，略有光泽，仅基部一点着生，其余部分均分离。

生于海拔 500m～1 900m 的沟谷林下岩石上，或附生于树干上。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、云南、贵州等省(自治区)。亚洲热带其他地区也有。

采收加工 全年均可采收，除去叶和须根，鲜用或晒干。

药材性状 呈扁圆柱形，长短不一，可达 25cm，直径 2mm～7mm。表面密被灰白色(嫩根茎)或红棕色鳞片；鳞片膜质，披针形，盾状着生，有时具蜡质白粉，具稀疏的叶柄残基，和须根痕。质脆，易折断，断面平坦，棕色至棕黄色。气微，味淡。以条粗壮、色红棕者为佳。

性味和功用 甘、淡，平。活血散瘀，清热利湿，续筋接骨。用于风湿关节疼痛，腰肌劳损，白带，吐血，便血，尿路感染，肺脓疡，骨折，跌打损伤，痈疮肿毒，牙痛，肾炎。常用量 30g～60g。外用适量捣烂外敷或煎水洗患处。



图 120　阴石蕨

赤　芍

别名　条赤芍。

来源　本品为毛茛科植物川赤芍 Paeonia veitchii Lynch 的干燥根。

原植物　川赤芍(图 121)为多年生草本，高 30cm～80(～120)cm。根圆柱形，直径 1.5cm～2cm。茎紫绿色或绿色，无毛。茎下部叶为 2 回 3 出复叶，叶片轮廓宽卵形，长达 30cm，小叶通常 2 回深裂，小裂片条状披针形至披针形，宽 4mm～18mm，顶端渐尖，全缘，上面沿脉疏生短毛，下面无毛；叶柄长 3cm～9cm。花 2 朵～4 朵生茎顶及叶腋，盛开 1 花者，则叶腋有发育不好的花芽，直径 4cm～10cm；苞片 2～3，分裂或不分裂，披针形，长 2.5cm～6cm，大小不等；萼片通常 4，长 1.2cm～2cm；花瓣 6～9，紫红色或粉红色，宽倒卵形，长 2cm～5cm；雄蕊多数，花药黄色；花盘肉质，仅包围心皮基部；心皮 2～5，密被黄色绒毛。蓇葖果长 1cm～2cm，密被黄色绒毛。

生于海拔 2 300m～3 800m 处的山坡、林下、林缘或草丛中，分布于四川、云南、西藏、青海、甘肃、陕西、山西等省(自治区)。

采收加工　6 月～8 月采挖，去根茎、须根及支根，洗净，晒至半干，按大小分别扎把，再晒干，称“原皮赤芍”。用竹刀刮去粗皮晒干者，称“刮皮赤芍”。

药材性状　原皮赤芍：呈微弯曲圆柱形，长 10cm～30cm，中段长 1.5cm～2cm。外表粗皮棕红色或褐棕色，有顺向纹理，并有支根痕及横向凸起的皮孔。质坚实，易折断，断面平坦，粉质，黄白色，皮层窄，中央髓部显菊花心，有时具裂隙。气微香，久闻则有特殊的马汗臭气，味微苦、涩。刮皮赤芍：与“原皮赤芍”的不同处为表面淡紫红色或类白色。幼根内心紫色。以根条粗壮、粉质重、断面白色者为佳。

性味和功用　苦、微酸，微寒。归肝、脾经。活血调经，散瘀止痛，凉血清肝。用于瘀血凝滞腹痛，经闭腹痛，胸胁疼痛，跌打损伤，痈肿，瘕，衄血，血痢，目赤。常用量 4g～12g。血虚者慎服。



图 121　川赤芍

羌　活

别名　螺丝羌、竹节羌活、蚕羌。

来源　本品为伞形科植物羌活 Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang 的干燥根状茎。

原植物　羌活(图 122)为多年生草本，高 60cm～120cm。根茎粗壮；根颈部有枯萎叶鞘。茎圆柱形，中空，有纵直细条纹。基生叶及茎下部叶有长 10cm～22cm 的柄，柄下部具膜质叶鞘；叶片为三出式三回羽状复叶，末回裂片长圆状卵形至披针形，长 2cm～5cm，边缘缺刻状浅裂至羽状深裂；茎上部叶常简化，无柄，叶鞘膜质，长而抱茎。复伞形花序顶生或腋生，直径 3cm～13cm，侧生者常不育；总苞片 3～6，线形，早落；伞幅多数，长 2cm～10cm；小伞形花序直径 1cm～2cm；小总苞片 6～10，线形，长 3mm～5mm；花多数，萼齿 5，卵状三角形，长约 0.5mm；花瓣 5，白色，卵形至长圆状卵形，长 1mm～2.5mm，顶端钝，内折；雄蕊 5；花柱 2，短。双悬果宽卵形；分果长圆形，长约 5mm，主棱成宽约 1mm 的翅，侧棱无翅，每棱槽有油管 3，合生面有油管 6。

生于海拔 2 000m～4 900m 间山坡灌丛中及林缘。分布于陕西、青海、甘肃、四川、西藏等省(自治区)。

采收加工　春、秋季采挖，去净茎叶及细根，晒干或烘干。

药材性状　呈圆柱状，直或略弯曲，长 4cm～10cm，直径约 1cm～2cm。顶端有茎、叶残基。表面棕褐色，有多数紧密而隆起的环节，形态似蚕。节上密生疣状突起的细根茎。质轻松易折断，断面不整齐，有明显的菊花纹和多数裂隙，皮部棕红色，木质部淡黄色，中央有黄白色髓，均有朱砂点(油管)。具特殊香气，味苦而麻。以条粗壮、有隆起曲折的环纹，断面质紧密，有菊花纹、朱砂点多、香气浓郁者为佳。

性味和功用　辛、苦，温。归膀胱、肾经。解表，散风寒，祛风湿，利关节，止痛。用于风寒感冒头痛，四肢疼痛，项强筋挛，牙痛，风湿痹痛，浮肿，痈疽疮毒。常用量 6g～9g。血虚痹痛忌服。

附注　本品和宽叶羌活 N. forbesii de Boiss. 均作中药羌活用。



图 122　羌活

1. 根茎　2. 叶　3. 果序

法 罗 海

别名 骚独活、烧香杆、红独活。

来源 本品为伞形科植物法罗海 Heracleum apaense (Sha et Yuan) Shan et T. S. Wang (Angelica apaensis Shan et Yuan)的干燥根。

原植物 法罗海(图 123)为多年生草本，高 1m～2m。根圆柱形至圆锥形；茎粗壮，中空，表面红棕色，被白色短柔毛。下部叶柄长 8cm～10cm，红棕色；叶片轮廓为长椭圆形或三角状卵形，二至三回羽状分裂；末回裂片长椭圆形或披针形，长 4cm～5cm，羽状深裂，具钝齿，无柄，基部常下延；上部叶渐简化至仅具宽阔叶鞘。复伞形花序顶生和腋生，花序梗被粗柔毛；伞幅多数，长 6cm～15cm，带紫色，被稀疏柔毛；总苞片披针形，常脱落；小伞形花序具花 25 朵～50 朵；小总苞片 4～8，线形；萼齿不明显；花瓣 5，白色；雄蕊 5，伸出；花柱基短圆锥形。双悬果宽椭圆形，黄棕色，长约 5mm，分生果每棱槽有 1 油管，长达果中部以下，合生面无油管。

生于海拔 3 800m 左右的山坡阴湿林下草地或灌丛中。分布于四川、云南、西藏等省(自治区)。

采收加工 秋末冬初采挖，保留约 1cm 的茎叶残基，去净泥土，干燥。

药材性状 略呈圆柱形或圆锥形，长 7cm～22cm，直径 1cm～4cm。表面棕褐色或黑褐色；顶端残留茎基，周围常包被紫色膜状叶鞘残基，具平行脉纹，习称“红缨”；主根上部有密集的环纹，中下部有不规则纵纹；支根稍弯曲，棕色，有长 0.2cm～1cm 的显著突起横向皮孔；外皮脱落后显白色。质较松脆，折断面不平坦，有放射状纹理及裂隙，皮部类白色，具多数褐色油点，木部棕黄色。具浓烈特异香气，味苦、辛，有麻舌感。以根条粗壮、气味浓、握之香气染手久留不散者为佳。

性味和功用 辛、苦，温。归心、肝、肺、胃经。理气定痛，疏风止咳，补血活血，消肿排脓，润燥，健胃。用于胃气痛，腹胀痛，头痛，冠心病，肝区痛，风寒咳嗽。常用量 3g～9g。

附注 本品在四川阿坝藏族羌族自治州部分地区作独活使用，称“骚独活”。



图 123　法罗海

1. 根　2. 上部茎枝　3. 小伞形花序　4. 果放大

宝兴百合

别名 澜江百合。

来源 本品为百合科植物宝兴百合 Lilium duchartrei Franch. 的干燥鳞茎。

原植物 宝兴百合(图 124)为多年生草本，高 50cm～150cm。鳞茎卵圆形，高 1.5cm～3cm，宽 1.5cm～4cm，具走茎。茎具淡紫色条纹。叶散生，披针形至长圆状披针形，长 4.5cm～5cm，顶端渐尖，基部楔形，全缘，有的边缘有乳头状突起，平行脉 3～5，粗糙；无叶柄。花单生或数朵排成顶生总状花序或近伞房花序；苞片叶状，披针形，长 2.5cm～4cm；花梗长 10cm～22cm；花下垂，有香味，白色或粉红色，有紫色斑点；花被片 6，长圆形或线状披针形，长 4.5cm～6cm，蜜腺两边具乳头状突起；雄蕊 6，花丝长约 3.5cm，花药窄矩圆形，长约 1cm，黄色；子房圆柱形，长约 1.2cm，花柱长为子房的 2 倍或更长，柱头膨大，3 裂。蒴果椭圆形，长 2.5cm～3cm；种子多数，具翅。

生于海拔 2 300m～3 500m 处的草地、林缘或灌丛中。分布于四川、云南、西藏、甘肃等省(自治区)。

采收加工 秋季采挖，洗净，剥取鳞片，晒干或置于沸水中略烫后晒干或烘干。

药材性状 本品呈卵形至宽披针形，长 1cm～1.7cm，宽 0.3cm～1.5cm，顶端较尖，基部较宽，边缘薄，全缘或微波状，常向内卷曲。表面乳白色至黄白色，平滑，具细纵直条纹。质硬脆，易折断，断面较平坦，角质样。无臭，味微苦、甘。以肉厚、质硬、色白者为佳。

性味和功用 苦、甘、寒。归肺、心经。润肺止咳，清热安神。用于肺结核，久咳吐血，慢性支气管炎，恍惚不寐。常用量 3g～9g。



图 124　宝兴百合

1－2. 全株

刺　黄　柏

别名　刺黄连、三颗针、老鼠刺、假蟆猪刺。

来源　本品为小檗科植物拟蟆猪刺 Berberis soulieana Schneid. 的根及根皮。

原植物　拟蟆猪刺(图 125)为常绿灌木，高 1m～2m。茎枝圆柱形，幼时绿色，老后淡黄色或土黄色，具纵槽；刺三分叉，长 1cm～2cm。叶狭披针形，长 3cm～8cm，宽 6mm～9mm(～13mm)，革质，顶端急尖并有一硬刺尖，基部窄缩成极短的柄，边缘具稀刺状锯齿，上面深绿色，有光泽，中脉凹入，侧脉与中脉近垂直，不明显，下面黄绿色。花 7 朵～15 朵(～20 朵)簇生叶腋，花梗长 5mm～10mm；小苞片 2，长约 2mm，带红色；萼片 6，外萼片宽椭圆形，长约 4mm，内萼片倒卵形，长约 6mm；花瓣倒卵形，黄色，比内萼片稍短，顶端凹缺，基部有短爪，内面近基部有 2 个腺体；雄蕊 6，花药瓣裂；子房有胚珠 2 个～3 个。浆果卵状长圆形，长 7mm～8mm，直径约 5mm，顶端有长 0.5mm 的宿存花柱。被白粉。

生于中、低山区丘陵灌丛中或河谷、路旁，分布于陕西、甘肃、湖北、四川等省。

采收加工　全年均可采挖，除去泥沙及须根，洗净，烤干或在弱阳光下晒干。

药材性状　根呈类圆柱形，略弯曲，长短粗细不一。表面灰黄色或灰棕色，粗糙，具须根或须根茎。质坚硬，不易折断。断面不平整，纤维性，色黄，切断面近圆形或长圆形，有略呈放射性的纹理。髓小，黄白色。气微，味苦。以色鲜黄、粗大，苦味浓者为佳。

性味和功用　苦、寒。归心、肝、大肠经。清热泻火，抗菌消炎。用于目赤肿痛，咽喉肿痛，乳腺炎，痢疾，肠炎，急性肝炎，胆囊炎，痈肿疮疖，湿疹。常用量 9g～15g。外用适量研末调敷。



图 125　拟蟛猪刺

1. 根　2. 果枝　3. 果放大

苕 花 根

别名 大理菊根、天竺牡丹。

来源 本品为菊科植物大丽花 Dahlia pinnata Cav. 的干燥块根。

原植物 大丽花(图 126)为多年生宿根性草本，高 1m～2m。块根棒状或纺锤状，粗大。茎多分枝，具纵棱。叶互生，1～3 回羽状全裂，上部叶有时不分裂，裂片卵形或长圆状卵形，长 6cm～10cm，顶端渐尖或尾状渐尖，边缘具圆钝锯齿，两面无毛，上面暗绿色，下面灰绿色；叶柄长 5cm～9cm。头状花序大，常下垂，宽 6cm～12cm，花序梗长 10cm～20cm；总苞半球形；总苞片 2 层，外层几叶质，开展或反曲，卵状椭圆形，内层膜质，椭圆状披针形，近等长，基部稍合生；花托平，托片宽大，膜质，稍平；外围无性花或雌花，舌状，1 层，但在栽培品种内通常多轮或全部变成舌状花，白色、红色或紫色，舌状常卵形，全缘或顶端有不明显 3 齿；中央管状花黄色。瘦果长圆形，长 9mm～12mm，宽 3mm～4mm，背扁平，顶端圆，有 2 个不明显的齿。

原产墨西哥，是世界栽培最广的观赏植物之一。我国各地均有。

采收加工 全年均可采收，鲜用或晒干。

药材性状 本品呈长纺锤形或棒状，微弯或压扁，长 6cm～10cm，直径 3cm～4.5cm。表面灰白色或类白色，未去粗皮者显黄棕色，纵沟纹明显而不规则，有细小的平行纹理，顶端具纤维状茎基，末端有细根或断根痕迹。质硬而较轻，不易折断，断面不整齐，类白色，角质状，具明显的纤维束，有木心或中空。气微，味淡微甜，嚼之粘牙。以粗壮、实心、断面色白者为佳。

性味和功用 苦、辛、寒。清热解毒，消肿止痛。用于腮腺炎，热毒痈疮，跌打损伤肿痛。常用量 15g～30g；外用鲜品适量捣烂敷患处。




图 126　大丽花

1. 块根　2. 花枝

苦 葛 根

别名 苦葛。

来源 本品为蝶形花科植物峨眉葛藤 Pueraria omeiensis Wang et Tang 的干燥根。

原植物 峨眉葛藤(图 127)为藤本。根粗大。茎长达数米，棕黄色，散生皮孔，小枝绿色，被稀疏黄色长柔毛。三出复叶互生，顶生小叶宽卵形或近圆形，长 6cm ~ 14cm，顶端短尾状渐尖，基部圆形，边全缘或微波状，两面被白色伏贴的长硬毛，小叶柄长 3cm ~ 5cm；侧生小叶基部偏斜，柄短；总叶柄长；托叶盾状，椭圆形，长约 1cm，两端钝圆，小托叶狭披针形。总状花序腋生，小苞片披针形，被毛；萼钟状，4 齿裂，裂齿披针形，不等长，最下面 1 齿较长，均密被黄色短硬毛；花冠蝶形，紫红色，长约 1.5cm，旗瓣宽椭圆形，基部具爪及小耳，翼瓣略短于旗瓣，椭圆形，基部具爪，通常仅 1 边有耳，龙骨瓣比翼瓣长；雄蕊 10，一组；子房被毛。荚果条形，密被黄色或锈黄色长硬毛。

生于海拔 1 500m ~ 1 700m 间山沟、草坡、灌丛中或林内。分布于四川、云南、贵州等省。

采收加工 春、秋季采挖，晒干或除去外皮晒干。

药材性状 干燥根呈长圆柱形，药材多纵切或斜切成板块状厚片，长短不等，直径 5cm ~ 10cm。去皮者表面类白色或淡黄色，未去皮者表面灰褐色，具纵沟纹，粗糙。切面纤维性强，似毛状，质硬，粉质差，淡黄白色，可见数条深色同心性环层。气特异，有刺鼻感，味苦。以质坚实，切面淡黄白色，气浓者为佳。

性味和功用 辛、苦，平。归脾、胃经。清热透疹，生津止渴。用于麻疹不透，吐血，糖尿病，口腔溃疡，癌症。常用量 15g ~ 60g。

附注 峨眉葛藤花味辛、苦，性平。用于痔疮，酒精中毒。常用量 6g ~ 15g。



图 127　峨眉葛藤

味 牛 膝

别名 尾膝、末膝、野牛膝。

来源 本品为爵床科植物味牛膝 Strobilanthes sp. 的干燥根。

原植物 味牛膝(图 128)为多年生直立草本，高 2m～3m。须根多，丛生。根状茎横行，节间短。茎四方形，节处略膨大，枝上部密被节状透明腺毛。单叶对生，叶片卵状椭圆形、椭圆形至近圆形，长 6cm～10cm，顶端渐尖至尾状渐尖，基部楔形，边缘具粗锯齿，上面疏被短伏毛，下面近无毛，两面均有稀疏狭长锥形的钟乳体；叶柄长为叶片长的 1/3 以上，花枝上的叶较小，苗枝上的叶可超过一般叶的 1 倍以上；叶柄长 5cm～10cm。穗状花序生枝顶或上部叶腋，被节状腺毛；花在序轴上成对排列，近无花梗；苞片线形，外面密被腺毛，大苞片 1 枚，小苞片 2 枚；花萼 5 深裂；花冠淡紫红色，外面被短毛，长约 4cm，基部径约 1.5mm，中上部宽而肿胀，径约 10mm，檐部略唇形，5 裂，裂片倒心形，上唇 2 裂片略小；雄蕊 4，2 强，内藏，具 2 列纵行粗毛；花柱长约 3cm。蒴果黄棕色，短棒状，背裂，果瓣外弯；种子卵状椭圆形，生于上弯的种钩上。

生于高山山地沟旁、山坡疏矮林缘、或林中湿润半阴处。分布于四川省。

采收加工 秋、冬季采挖，洗净，晒干。

药材性状 根状茎粗大，盘曲结节，有多数茎秆残留，底部丛生多数根条，长约 40cm～50cm，粗 4mm～8mm。外表灰黄色或深棕色，无皱纹。质脆弱，易折断，断面木心易与外皮(包括皮层及韧皮部)分离，外皮厚约 1mm～3mm，木心灰白色。气微，味微甘苦。以根条成丛、长而结实，少断碎者为佳。

性味和功用 酸、微苦，平。祛风解毒，活血化瘀，强筋壮骨。用于风湿疼痛，白喉，经闭，腰膝酸痛，足痿筋挛。常用量 9g～15g。




图 128　味牛膝

1. 根及下部茎　2. 花序枝

明 党 参

别名 明党、明参、山萝卜、粉沙参、山花。

来源 本品为伞形科植物明党参 Changium smyrnioides Wolff 的干燥根。

原植物 明党参(图 129)为多年生草本。主根圆柱形或纺锤形，肥厚。茎直立，圆柱形，被白粉。基生叶有长柄，柄基部扩大成鞘状；叶片为三出式的 2～3 回羽状全裂，一回羽片广卵形，长 4cm～10cm，柄长 2cm～5cm，二回羽片卵形，三回羽片卵形，长 1cm～2cm。复伞形花序顶生或侧生，无总苞片或有 1 枚～3 枚；伞幅 4～10，长 2.5cm～10cm，开展；小伞形花序有花 8 朵～20 朵，侧生的伞形花序多数不育；花瓣 5，白色，长圆形，长 1.5mm～2mm，中脉紫色，顶端渐尖而内折；雄蕊 5，伸出；双悬果圆卵形至卵状长圆形，长 2mm～3mm，果棱不明显，分果侧面扁。

生于山地土壤肥厚的地方或山坡岩石缝隙中。分布于江苏、安徽、浙江等省，四川省有栽培。

采收加工 3 月～4 月采挖，去茎叶及须根，洗净，放入沸水中煮数分钟，取出放入清水中，用竹刀刮去外皮，再于清水中漂洗，捞出晒干，或切片晒干，称“明党参”。

药材性状 根呈圆柱形或不规则条块，略扭曲，长 6cm～20cm，直径 0.5cm～2cm。表面黄白色(未去皮者黄棕色或黄褐色)，具浅槽纹及细皱纹，并有少数须根痕。质硬而脆，断面不平整，黄白色，角质样，半透明状，带粉性。皮部较薄，易与木部分离，木部色较淡，粗短者，有时中空。气微，味淡、微甜。以粗细均匀、质坚实、色黄白、断面角质样半透明者为佳。

性味和功用 甘、微苦，微寒。归肝、肺经。润肺，化痰，和胃，解毒，平肝。用于肺燥咳嗽，喘逆，头晕，呕吐，目赤，白带，疔毒疮疡。南方民间一般作强壮滋补药。常用量 3g～12g。脾胃虚寒易泻者及孕妇不宜服用。

附注 在江苏、浙江地区，拣取粗壮根条，不经煮沸，直接晒至半干，刮去外皮，再晒干。商品称“粉沙参”。




图 129　明党参

1. 根及基部茎叶　2. 花序枝　3. 花放大

4. 果放大　5. 药材(明党参)

兔 儿 伞

别名 七里麻、一把伞、贴骨散、帽头菜。

来源 本品为菊科植物兔儿伞 Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim. 的根。

原植物 兔儿伞(图 130)为多年生草本，高 70cm～120cm。根状茎短而匍匐，径 6mm～8mm。茎单一，上部略带褐紫色。基生叶 1 枚，有长柄，花期枯萎；茎生叶通常 2 枚，互生，下部叶片圆盾形，掌状深裂直达中心，直径 20cm～30cm，裂片 7～9，各又 2～3 回叉状深裂，末回裂片宽 4mm～8mm 或更宽，边缘有不整齐锐锯齿，幼时裂片反曲，上面密被蛛丝状毛，后变无毛，下面带灰白色，初有绢状毛；具长柄，基部抱茎；中部叶片稍小，通常 4～6 裂；上部叶更小，苞叶状，披针形，无柄。头状花序多数，排成顶生的复伞房状花序；梗长 6mm～16mm，基部有线形苞片；总苞圆筒形，总苞片 1 层，矩圆状披针形，顶端钝，边缘膜质；花全部管状，两性，8 朵～11 朵，长约 1cm，裂片 5，淡紫红色；雄蕊 5，生于花冠管上，聚药；子房下位，1 室，花柱纤细，柱头 2 裂。瘦果长椭圆形，长 5mm～6mm，具纵纹；冠毛灰白色或淡红褐色。

生于山野阴坡、林缘、路旁。分布于我国东北、华北、华东、华中地区及四川省。

采收加工 秋季采挖，洗净，晒干或鲜用。

药材性状 近圆柱形，细长，多数，不规则弯曲。表面淡棕色，具绒毛，有微细纵皱纹。质坚脆，断面黄白色，中间有棕黄色的油点。气微，味微苦。以干燥，表面淡棕色，无杂质者为佳。

性味和功用 苦、微辛，微温；有小毒。舒筋活血，消肿解毒，祛风除湿。用于颈淋巴结结核，跌打损伤，四肢麻木，风湿腰腿疼痛，肾虚腰痛，毒蛇咬伤，骨折，月经不调，痛经。常用量 6g～15g，水煎或泡酒服；外用鲜品适量捣烂敷患处。

附注 兔儿伞全草治痈疽、跌打损伤、瘀阻疼痛。适量捣烂加鸡蛋蛋白或白酒调敷患处。



图 130　兔儿伞

忽 地 笑

别名 铁色箭、大一支箭、黄花石蒜、岩大蒜、独脚蒜头。

来源 本品为石蒜科植物忽地笑 Lycoris aurea (L'Hérit) Herb. 的干燥鳞茎。

原植物 忽地笑(图 131)为多年生草本。鳞茎肥大，近球形，外被黑褐色鳞茎皮。叶基生、质厚，宽线形，长达 60cm，顶端钝尖或钝圆形，边全缘，下部渐狭窄，上面黄绿色，有光泽，下面粉绿色，中脉在下面隆起，带紫红色。花茎在长叶前抽出，高 30cm～60cm，伞形花序顶生，有花 5 朵～10 朵；花梗长 0.5cm～1.5cm；苞片干膜质，披针形，外面黄色，内面棕褐色；花黄色或橙色，稍两侧不对称，长约 7cm，花被筒部长不及 2cm，裂片 6，狭倒披针形，宽约 1cm，边缘稍皱曲；雄蕊 6，生于花被管近喉部，与花柱同伸出花被外；子房下位，3 室，有 1 极小的头状柱头。蒴果背裂，每室有种子数粒。

生于阴湿的岩石上或石岩下土壤肥沃的地方。分布于台湾、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、贵州、江西、浙江、江苏、河南、陕西等省(自治区)。日本、越南、老挝也有。

采收加工 春、秋季采挖，去苗叶，晒干。

药材性状 呈球形或宽卵形，直径 5cm～6cm，肥厚。顶端有残留叶基，基部有多数白色须根，外面包有黑褐色鳞茎皮，内面有多层白色富粘性的肉质鳞片，生于鳞茎盘上，中央有 1 黄白色芽。有特异蒜气，味辛辣而苦。以个大、肥厚者为佳。

性味和功用 辛、微甘、苦，平；有毒。解热消肿，润肺祛痰，催吐。用于痈肿疮毒，虫疮作痒，耳下红肿，疔疮结核，汤火灼伤，肺热咳嗽。常用量 1.5g～3g。外用适量煎水洗或鲜品适量捣烂敷患处。

附注 体虚、无实邪及素有呕恶者忌服。癫痫、支气管哮喘、心绞痛或心动过缓者禁用。



图 131　忽地笑

1－2.　全株

弯蕊开口箭

别名 扁竹兰、见血封口、岩七、白跌打。

来源 本品为百合科植物弯蕊开口箭 Tupistra wattii Hook. f. 的干燥根状茎。

原植物 弯蕊开口箭(图 132)为多年生草本。叶基生，3 枚～10 枚，纸质，窄椭圆形、椭圆状披针形至椭圆状卵形，长 6.5cm～20cm，顶端渐尖，基部楔形，全缘；叶柄长 3cm～9cm，基部扩大抱茎。花葶由叶丛中抽出，侧生，基部有鞘叶；穗状花序直立或外弯，长 2.5cm～6cm，宽 1cm～1.5cm；总花梗长 1.5cm～2.5cm；苞片披针形或条状披针形，长 1.2cm～1.8(～5cm)，宽 2mm～4mm，绿色或黄色，除每一苞片有 1 花外，另有无花苞片几枚聚生于花序的顶端；花被筒长 3mm～5mm，裂片 6，宽卵形，长 3.5mm～4mm，外轮 3 片较内轮稍宽，肉质，红褐色或黄绿色；雄蕊 6，花丝下部扩大，贴生于花被筒上，上部分离，长 1.5mm～2mm，内弯；子房球形，花柱不明显，柱头钝三棱形，顶端 3 裂。浆果球形，红色，直径 9mm～11mm。

生于海拔 800m～2 800m 处密林下荫湿处、溪边和山谷旁。分布于四川、云南、贵州、广东、广西等省(自治区)。不丹、印度也有。

采收加工 全年均可采挖，去须根洗净，切片后用淘米水泡，再用京竹叶煮 3h，晒干。

药材性状 根状茎粗壮，下部多少弯曲而呈弧形，圆柱形，直径 8mm～12mm。表面黄褐色或棕褐色，具明显的节，节上具残断须根或须根痕，上部节较密，顶端有延长的茎及叶痕。肉质。气微、味苦。

性味和功用 辛、苦，寒；有小毒。清热解毒，止血，止痛，消肿散瘀。用于感冒，咽喉炎，扁桃体炎，支气管炎，牙痛，胃痛，胃出血，膀胱炎，跌打损伤，骨折，外伤出血，目赤眼雾，淋巴结炎。常用量 1g～3g。外用鲜品适量捣烂敷患处或研末撒敷。

附注 弯蕊开口箭全草功效同根，但药效稍逊。



图 132　弯蕊开口箭

狭叶红景天

别名 大株红景天、狮子七、涩疙瘩。

来源 本品为景天科植物狭叶红景天 Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim. 的干燥根及根茎。

原植物 狭叶红景天(图 133)为多年生草本，高 15cm～60cm，稀达 90cm。根粗，直立。茎圆柱形，直径 4mm～6mm。叶互生，较密，线形至线状披针形，长 4cm～6cm，宽 2mm～5mm，顶端急尖，边缘有疏锯齿，或全缘，基部渐狭，无柄。伞房状，花序顶生，宽 7cm～10cm；花多数，雌雄异株，萼片 5 或 4，三角形，长 2mm～25mm，顶端急尖；花瓣 5 或 4，绿黄色，倒披针形，长 3mm～4mm，宽约 0.8mm；雄花中雄蕊 10 或 8，长约 4mm，花丝花药黄色；鳞片 5 或 4，近正方形或长方形，顶端钝或微缺；雌花具 4 或 5 直立心皮。蓇葖果披针形，长 7mm～8mm。有短而外弯的喙；种子极小，长圆状披针形，熟后灰棕色。

生于海拔 2 000m～5 600m 间的多石草地上或石坡上。分布于西藏、云南、四川、新疆、青海、甘肃、陕西、山西、河北省(自治区)。缅甸也有。

采收加工 全年均可采挖，去泥沙及茎叶，晒干。

药材性状 根颈粗，直径约 1.5cm，顶端被三角形鳞片。根不规则块状，倒圆锥形，直径 3cm～6cm，下部具分叉。表面灰棕色，凸凹不平，有甚多芽眼突起，栓皮薄而皱缩，易脱落，质硬(芽眼处较松)，不易折断，断面紫棕色，有多数孔隙，呈海绵状；支根较细，断面圆形，红棕色，中有多数浅色花纹。气微，味酸涩而苦。以根粗壮、坚实、断面红棕色者为佳。

性味和功用 涩、微酸，温。止泻，止痛，破坚，消积，止泻。用于跌打损伤，腰痛，吐血，崩漏，白带，月经不调，痢疾，肺炎。常用量 9g～12g。外用鲜品适量捣敷患处。

附注 1. 本品浸膏含红景天甙及其甙元酪醇，具有抗疲劳、益智强身作用。2. 狭叶红景天全草功效同根。



图 133　狭叶红景天

1. 果枝　2. 果放大

类叶升麻

别名 绿豆升麻、红升麻。

来源 本品为毛茛科植物类叶升麻 Actaea asiatica Hara 的干燥根状茎。

原植物 类叶升麻(图 134)为多年生草本，高 30cm～80cm。根状茎横生，生多数须根。茎圆柱形，微具纵棱，中部以上被白色短柔毛，不分枝。叶 2 枚～3 枚，下部的叶为三回三出近羽状复叶，轮廓三角形，宽达 27cm，具长柄；顶生小叶卵形至宽卵状菱形，长 4cm～8.5cm，3 裂，边缘有锐锯齿和不规则齿裂，侧生小叶卵形至狭卵形，幼时下面有毛，渐变为无毛；上部叶形状似下部叶，较小。总状花序顶生，长 2.5cm～4(～6)cm，序轴和花梗密被白色或灰色短柔毛；苞片线状披针形，长约 2mm；萼片 4，白色，倒卵形，长约 2.5mm；花瓣匙形，长 2mm～2.5mm，下部渐狭成爪；雄蕊多数，花丝细；心皮 1，与花瓣等长。果序长 5cm～17cm；浆果球形，直径约 6mm，熟后紫黑色；果梗粗约 1mm；种子 6，卵形，深褐色，具 3 条纵棱。

生于海拔 350m～3 100m 间山地林下或沟边阴处，河边湿草地。分布于西藏、云南、四川、青海、甘肃、陕西、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、湖北等省区。朝鲜、日本、苏联(原)远东地区也有。

采收加工 夏、秋季采挖，去泥沙，晒至八、九成干后，燎去或除去须根，晒干。

药材性状 根茎呈不规则块状，长 3cm～10cm，直径 0.5cm～3cm；表面暗棕色至黑褐色，有多数圆形空洞状的茎基痕，直径 4mm～6(～9)mm，周围及下面具多数细须根痕或须根。质坚实，不易折断，断面不平坦，有裂隙，纤维性，灰黄色或暗棕色。气微弱，味微辛。以个大、质坚、表面黑褐色者为佳。

性味和功用 辛、微苦、凉。归肺、胃经。祛风解表，清热镇咳，解毒。用于感冒头痛，百日咳，斑疹不透，咽喉疼痛，痈疽疮疡，脱肛，子宫下垂，中气下陷。常用量 9g～15g。

附注 类叶升麻叶适量捣绒敷治疯狗咬伤。



图 134　类叶升麻

粉萆薢

别名 黄萆薢、黄山薯、黄姜。

来源 本品为薯蓣科植物粉背薯蓣 Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palib.) Pei et Ting 的干燥根状茎。

原植物 粉背薯蓣(图 135)为多年生缠绕草质藤本。根状茎横生，竹节状或块状，断面黄色。茎左旋，长圆柱形，无毛或有时密生黄色短柔毛。单叶互生，三角形或卵圆形，顶端渐尖，基部心形，边缘波状或近全缘，有些植株边缘呈半透明干膜质，干后黑色，下面灰白色，沿叶脉及叶缘有黄白色硬毛。花单性，雌雄异株；雄花序穗状，有时序轴延长、分枝，呈圆锥形，腋生；苞片卵状披针形，顶端渐尖，小苞片卵形 顶端有时 2 浅裂；花被 6 裂，裂片鲜时黄色，干后黑色，有时不变黑；雄花：雄蕊 3，生于花被管上，花开放后药隔宽约为花药的一半，退化雄蕊 3，与雄蕊互生；雌花：子房长圆柱形，柱头 3 裂，退化雄蕊只存有花丝。蒴果三棱状卵圆形，大小变化较大，两端平截，通常等宽，成熟后反曲下垂，翅长超过宽；种子 2，四周有薄膜状翅。

生于海拔 200m ~ 1 300m 的山腰陡坡、山谷、或水沟边阴处的混交林边缘或疏林下。分布于安徽、河南、浙江、台湾、湖北、四川及华南地区。

采收加工 春、秋季采挖，去须根，洗净，切片晒干。

药材性状 呈竹节状，类圆柱形、块状或结节呈姜状，有分枝，直径约 2cm；表面棕褐色，皱缩，常残留茎枯萎疤痕及未除尽的细长须根；断面黄色。商品为不规则薄片，厚约 0.5mm，边缘不整齐，有的具黑棕色或灰棕色的外皮；切面黄白色或淡灰棕色，平坦，细腻，有粉性及不规则的黄色筋脉花纹(维管束)；质松脆，易折断。气微，味苦、微辛。以片大而薄、切面黄白色者为佳。

性味和功用 苦，平。归肝、胃、膀胱经。祛风，利湿。用于尿路感染，小便浑浊，乳糜尿，白带，风湿性关节炎，腰膝酸痛，遗精，湿热疮毒。常用量 9g ~ 15g。

附注 肾虚阴亏者忌服。




图 135　粉背薯蓣

1. 根状茎　2. 果枝

树　吊

别名　树刁、滇钩吻、葳参、蒙自黄精。

来源　本品为百合科植物点花黄精 Polygonatum punctatum Royle ex Kunth 的干燥根状茎。

原植物　点花黄精(图 136)为多年生草本，高(10～)30cm～70cm。茎圆柱形，通常具紫红色斑点，有时上部具乳头状突起。叶互生，幼时肉质而横脉不显，老时厚纸质或近革质而横脉较显，常有光泽，卵形、卵状矩圆形至矩圆状披针形，长 6cm～14cm，顶端尖至渐尖，基部宽楔形或近圆形，全缘；叶柄短。总状花序腋生，有花 2～6(～8)朵，总花梗长 5mm～12mm，上举，花后平展或稍下垂，花梗长 2mm～10mm；苞片无或早落；花筒状，全长 7mm～9(～11)mm，白色，口部稍缢缩而略呈坛状，裂片 6，长三角形，长 1.5mm～2.5mm；雄蕊 6，内藏，花丝下部贴生于花被筒上，上部离生；子房 3 室，卵球形，长 2mm～4mm，柱头稍膨大。浆果红色，球形，直径约 7mm，具 8～10 余颗种子。

生于海拔 1 100m～2 700m 处林下岩石上或附生于树杆上。分布于西藏、云南、四川、贵州、广东、广西等省(自治区)。越南、尼泊尔、锡金、不丹、印度也有。

采收加工　全年均可采挖，洗净，晒干。

药材性状　本品多少呈连珠状，直径 1cm～1.5cm。表面黄棕色，中、下部具多数须根痕，上端有数个圆形茎痕，全体有细皱纹及微波状环节。质坚，断面淡黄白色，角质样，带颗粒性。气微弱，味略甘。以根茎长、肉肥、黄白色、光泽柔润者为佳。

性味和功用　甘、微苦，平，微温。归心、肺经。补中益气，润心肺，强筋骨，解毒。用于虚损寒热，肺痨咳血，病后体虚食少，筋骨软弱，风湿疼痛，风癞癣疾，疮痈。常用量 6g～9g。外用适量煎水洗或捣烂敷患处。

附注　本品即《植物名实图考》中滇钩吻。



图 136　点花黄精

党　参

别名　巫山党、单支党、条党、禹党。

来源　本品为桔梗科植物川党参 Codonopsis tangshen Oliv. 的干燥根。

原植物　川党参(图 137)为多年生草本，除叶片两面密被短柔毛外，其余各部近于光滑。茎缠绕，长可达 3m，叶互生，在小枝上的近对生，卵形或披针形，长 2cm～8cm，上面绿色，下面灰绿色；叶柄长 0.7cm～2.4cm。花与叶互生或近对生，花萼裂片 5，长圆状披针形，长 1.4cm，花冠，钟状，直径 2.5cm～3cm，淡黄绿色，内面有紫斑，5 浅裂，裂片正三角形；雄蕊 5，花丝基部微扩大；子房 3 室。蒴果近球形，直径 2cm～2.5cm。

生于海拔 900m～2 300m 处的山地林边、灌丛中。分布于四川、贵州、湖南、湖北、陕西等省。

采收加工　秋季采挖 3 年生以上者，洗净，晒至半干，搓揉使皮部与木质部紧贴饱满柔软，反复揉晒 3 次～4 次，再晒干。

药材性状　根呈纺锤形或纺锤状圆柱形，多弯曲，少分枝或中部以下略有分枝，长 15cm～40cm，直径 0.5cm～2.2cm。表面灰黄色至灰棕色，上端 1cm～2cm 处有稀疏或较密的明显环纹，嫩细根条头部多为尖头，习称“鱼鳅头”，下部则疏生横长皮孔。质较软而结实，易折断，断面皮部黄白色至淡棕色，裂隙少，木部淡黄色，有放射状花纹及导管细孔；支根断落处常有黑褐色胶状物。体轻。气特异，味微甜。以根条肥大、肉质柔润、香气浓、味甜、嚼之无渣者为佳。

性味和功用　甘，平。归手、足太阳经气分。补中益气，生津益血。用于食少便溏，四肢倦怠，气短喘咳，言语无力，血虚头晕心慌，津亏舌干口渴，血虚痿黄。常用量 9g～15g。中满邪实者忌用。反藜芦。

附注　1. 本品细小根条去皮，用硫黄熏后扎成小把，称“土条参”或“土沙参”。2. 党参的原植物有几种，参阅《药典》251 页。



图 137　川党参

珠 子 参

别名 珠儿参、竹节参、钮子七、疙瘩七。

来源 本品为五加科植物 1. 珠子参 Panax pseudo - ginseng Wall. var. japonicus (C. A. Mey.) Hoo et Tseng；2. 羽叶三七 P. Pseudo - ginseng Wall. var. bipinnatifidus (Seem.) Liep. 的干燥根状茎。

原植物 1. 珠子参(图 138)为多年生草本，高 40cm ~ 80cm。根状茎竹鞭状或串珠状，根通常不膨大，纤维状，稀侧根膨大成圆锥状肉质根。茎单一，平滑，圆柱形，具纵纹。掌状复叶 3 枚 ~ 5 枚轮生于茎顶，叶柄细，长 4cm ~ 9cm；小叶 3 ~ 7，椭圆形或卵状椭圆形，长 5cm ~ 13(~ 25) cm，顶端长渐尖或短尖，基部楔形、圆形或近心形，边缘有细锯齿、重锯齿或缺刻状锯齿，两面无毛或脉上疏生刚毛，最下 2 片小形，倒卵形至倒卵状椭圆形；小叶柄长 5mm ~ 15mm。伞形花序单生茎顶，有时其下有 1 至多个小伞形花序；总序轴细长；花萼绿色，钟状，顶端 5 齿裂；花瓣 5、淡黄绿色，卵状三角形；雄蕊 5，与花瓣几等长；子房下位，2 室，稀 4 室，花柱通常 2，稀 4，分离。核果浆果状，球形，熟时红色，顶端有黑点。

生于海拔 800m ~ 4 000m 间山坡竹林下、杂木林中或沟边。分布于甘肃、陕西、宁夏、山西、河南、安徽、湖北、湖南、浙江、江西、福建、广西等省(自治区)及我国西南地区。越南、尼泊尔、缅甸、日本、朝鲜也有。

2. 羽叶三七(图 139)为多年生草本，高 30cm ~ 50cm。根状茎稀疏串珠状，偶为竹鞭状或串珠状与竹鞭状混合型。茎单生，直立，基部偶有鳞片。掌状复叶 3 枚 ~ 6 枚轮生茎顶；小叶 5 ~ 7，薄膜质，长椭圆形，二回羽状浅裂，稀一回羽状深裂，长 3cm ~ 9cm，顶端长渐尖，基部楔形下延，裂片具不整齐小裂片和锯齿，上面脉上疏生刚毛；叶柄长 5cm ~ 13cm 压扁状，疏生刚毛；小叶柄短或长至 2cm 疏生刚毛。伞形花序单生茎顶，其下偶有一至数个侧生小伞形花序；花小，淡绿色；萼筒边缘有 5 个

小齿；花瓣 5；雄蕊 5，子房下位，2 室，稀 3～4 室，花柱 2～4，分离或基部合生；花盘肉质，环形。核果状浆果扁球形，熟时红色，顶端有黑点。

生于海拔 900m～3 600m 林下、林缘或草丛中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、云南、西藏等省(自治区)。尼泊尔、印度、缅甸也有。

采收加工 秋季采挖，去净须根及茎叶，干燥；或蒸(煮)透后干燥。

药材性状 1. 珠子参：呈竹鞭状或串珠状，长 3cm～20cm，直径 0.5cm～2.5cm。表面淡黄色、黄棕色或棕褐色，粗糙，有细纵皱纹，结节膨大，节间较短或长 1cm～2cm，每节有 1 微凹的地上茎脱落后的痕迹，及疣状须根痕或残存少数弯曲的须根。质坚硬。断面较平坦，粉白色或乳白色，粉性，有黄色分泌道斑点。蒸煮品淡红棕色，半透明，角质。微有人参香气，味苦、微甘。以根长、结实、体沉重、味浓者为佳。

2. 羽叶三七：根状茎细长，节膨大，呈疏离的串珠状，有时呈竹鞭状，节间呈细圆柱形，长 4cm～6cm，直径约 2mm。表面浅棕黄色，微有纵皱纹，近节处稍宽。质较坚硬，断面黄白色，有多数细小孔隙，气微、味苦、略甜。以串珠块大、质坚硬、色黄者为佳。

性味和功用 苦、甘，微温。归肝、脾经。舒筋活络，滋补强壮，散瘀止血。生品用于跌打损伤，外伤出血，腰腿疼痛，月经不调，吐血，便血，咯血，外伤出血，痈肿，胃痛，咽喉炎，腮腺炎。熟品用于气血双亏，虚劳咳嗽。常用量 9g～15g。外用适量研末撒患处。

附注 (1)羽叶三七叶四川地区又名参叶，用于暑热伤津，口干舌燥，心烦神倦，虚热上干清阳而至的头昏目眩等症。常用量 3g～12g。(2)珠子参叶功效基本同羽叶三七，根又名峨三七，四川草医用于补中益气，生肌长肉。




图 138　珠子参

1. 根及根茎　2. 地上部分　3. 花放大　4. 果放大



图 139　羽叶三七

1. 根状茎　2. 地上部分

峨眉贝母

别名 贝母。

来源 本品为百合科植物峨眉贝母 Fritillaria omeiensis S. C. Chen 的干燥鳞茎。

原植物 峨眉贝母(图 140)为多年生草本，高 24cm～33cm。鳞茎由 2 枚鳞片组成，直径 1cm～1.5cm。茎圆柱形，直立，不分枝。叶多生于茎上部 1/3 处，最下面的 2 枚对生，上面的 3 枚～4 枚轮生或 2 枚对生，中间有时还有 1 枚散生叶，无叶柄；叶片条形或条状披针形，长 6cm～10cm，顶端渐尖，伸直或稍弧曲，基部钝圆，边全缘。单花顶生，钟状，俯垂；叶状苞片 3 枚，宽 5mm～9mm，顶端伸直或弧曲；花被片 6，浅黄绿色，有少数紫褐色斑点和小方格，长 4.8cm～5cm，矩圆形，靠合，内 3 片宽 14mm～15mm，外 3 片宽 9mm～11mm；雄蕊 6，长约为花被片的 1/2～3/5，花药近基着，2 室；子房 3 室，花柱粗状，柱头 3 裂，裂片长约 2mm。蒴果具 6 棱，棱上翅宽 1mm～1.5mm，室背开裂；种子多数，扁平，边缘有狭翅。

生于海拔 3 120m 石岩上或竹林下。分布于四川省峨眉山。

采收加工 夏季采挖，除去泥土及须根，放置在棉麻或毛毯上曝晒或烘干。

药材性状 鳞茎呈圆锥形或卵圆形，由 2 枚鳞片组成，高 1cm～2cm，直径 1cm～1.5cm，顶端尖，基部圆钝，底部平或微凸，中央有一灰褐色的鳞茎盘，具须根痕，偶有残存的须根。表面白色或淡黄白色，微有光泽。质硬而脆，断面白色，粉质。气微弱，味微苦。以质坚实、粉性足、色白者为佳。

性味和功用 苦、甘，微寒。归肺经。清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。常用量 3g～9g。

脾胃虚寒及有湿痰者忌服。

附注 本品在四川峨眉山一带作川贝母使用。



图 140　峨眉贝母

铁 棒 锤

别名 雪上一支蒿、三转半、铁牛七、乌药。

来源 本品为毛茛科植物伏毛铁棒锤 Aconitum flavum Hand－Mazz.、多裂乌头 A. polyschistum Hand. －Mazz. 的干燥块根。

原植物 1. 伏毛铁棒锤(图 141)为多年生草本，高 35cm～100cm。块根胡萝卜形。茎中部或上部被反曲而紧贴的短柔毛，通常不分枝。叶互生，茎下部叶在花期枯萎，叶片宽卵形，长 3.8cm～5.5cm，三全裂，全裂片细裂，末回裂片线形，边缘干时稍反卷，疏被短柔毛；中部叶柄长 3mm～4mm。顶生总状花序狭长，有花 12 朵～25 朵，序轴及花梗密被紧贴的短柔毛；下部苞片叶状，叶部以上苞片线形；花梗长 4mm～8mm；小苞片生花梗顶部，线形；萼片 5，黄绿色或暗紫色，外面被短柔毛，上萼片盔状船形，具短爪，外缘斜，侧萼片圆倒卵形，下萼片斜长圆卵形；花瓣 2，疏被短毛，有短距；雄蕊多数；心皮 5。蓇葖果长 1.1cm～1.7cm；种子倒卵状三棱形，具狭翅。

生于海拔 2 000m～3 700m 山地草坡或疏林下。分布于四川、西藏、青海、甘肃、宁夏、内蒙古等省(自治区)。

2. 多裂乌头(图 142)为多年生草本，高 50cm～100cm。块根近纺锤形。茎疏被反曲而紧贴的短柔毛，密生叶，分枝。叶片卵形，长约 6.5cm，三全裂，中央全裂片最大，卵形，基部突变狭成长柄，近羽状细裂，末回裂片线形，宽 1mm～1.5mm，边缘干时稍反卷，侧全裂片稍短或短 1 倍，不等 2 深裂；叶柄长约 5mm。顶生总状花序狭长，有花 12 朵～30 朵，序轴和花梗密被反曲短柔毛；下部苞片叶状或 3 裂，上部的线形；下部花梗长达 3cm，上部长 0.5cm～1.5cm；小苞片生花梗中部以上，线形或钻形；萼片 5，紫蓝色，外面密被短柔毛，上萼片盔状船形，具爪，自基部至喙长约 1.6cm，侧萼片倒卵圆形，下萼片狭椭圆形；花瓣 2，距短，反曲；花丝被短柔毛；心皮 3，子房被毛。蓇葖果长达 1.9cm，被短柔毛；种子倒卵状三棱形，沿棱具狭翅。

生于海拔 2 650m ~ 3 600m 间山坡草地。分布于四川省。

采收加工 夏季采收，洗净，晒干，或按乌头炮制方法炮制后用，见《中药大辞典》上，456 项下。

药材性状 (1)铁棒锤干燥根呈圆柱状或近倒圆锥形，长 2cm ~ 5cm，直径约 1cm。表面灰棕色或黑棕色，多数平滑或稍有纵皱纹，顶端有芽痕或茎基残痕，有侧根痕。(2)多裂乌头干燥根呈纺锤状圆柱形，有分枝，长约 3cm，直径约 1cm 或稍大。表面棕色至棕黑色，有细纵皱纹及少数侧根茎，顶端有芽痕和茎基残痕。(3)伏毛铁棒锤干燥根呈胡萝卜形，长约 4.5cm，粗约 8mm，其余形态与铁棒锤根同。以上 3 种均质硬脆，断面平坦，灰白色，粉性，可见类圆形或多角形形成层环纹。气微，味麻苦。以根粗壮、坚实者为佳。

性味和功用 苦、辛、麻，热。有剧毒。归心、肺、肝经。活血祛瘀，驱风除湿，止痛消肿。用于跌打损伤，骨折，风湿腰痛，牙痛，食积腹胀，痛经，痈肿，冻疮，瘰疬，痞块。常用量 0.06g；外用适量研末调敷或磨汁擦。服本品后忌热饮食、酒、烟 2h；孕妇忌用。



图 141　伏毛铁棒锤



图 142　多裂乌头

粘 山 药

别名 牛尾参、粘狗苕、粘芋。

来源 本品为薯蓣科植物毛胶薯蓣 Dioscorea subcalva Prain 的干燥块根。

原植物 毛胶薯蓣(图 143)为多年生缠绕草本。块根圆柱形，垂直生长。茎圆柱形，稍扭曲，被曲柔毛，老后渐脱落。叶互生，卵状心形或圆心形，长 4.5cm ~ 11cm，顶端渐尖或尾状渐尖，基部宽心形，全缘，下面被疏毛或无毛；叶柄长约 3cm ~ 5cm。花单性，雌雄异株，雄花 2 朵 ~ 6 朵组成小聚伞花序，少数单生，若干个小花序再排成穗状花序，长 3cm ~ 12cm，通常 2 个 ~ 3 个生于叶腋，无毛或被疏柔毛；苞片卵形或三角状卵形，顶端急尖，长 1.5mm ~ 2mm，有红棕色斑点；花被片 6，卵状椭圆形，基部合生，有红棕色斑点；雄蕊 6；雌花序穗状，长 4cm ~ 14cm；苞片三角状披针形，有红棕色斑点；花被裂片 6，狭卵形或长圆形，长约 2mm；子房下位，花柱基部略膨大，柱头 3 裂，具退化雄蕊。蒴果三棱状倒卵形或三棱状长圆形，长 1.5cm ~ 3cm，排列较密。

生于海拔 800m ~ 3 200m 间的山谷、山坡灌丛、林缘或路边较湿润处。分布于湖南、广西、四川、贵州、云南等省、区。

采收加工 秋、冬季采挖，洗净，晒干。

药材性状 呈长圆柱形，直或稍弯曲，长 15cm ~ 40cm，直径 1.5cm ~ 6cm。表面黄棕色或棕褐色，具多数须根或须根除去后留下的棕色斑点，有纵沟及纵皱纹。质脆，坚实，易折断，断面红棕色(新鲜时白色)，颗粒状，粉性。气微弱，味淡微甘。以条粗、质坚实、粉性足者为佳。

性味和功用 甘，平。归肺、脾、肾经。健脾去湿，补肺肾。用于脾虚泄泻，糖尿病，肺结核，慢性肝炎，气血虚弱伤损，跌打损伤。常用量 15g ~ 30g。外用适量捣烂敷患处。




图 143　毛胶薯蓣

惊 风 药

别名 小草乌、月下参、鸡爪乌。虎图辣。

来源 本品为毛茛科植物康定翠雀花 Delphinium tatsienense Franch. 的干燥根。

原植物 康定翠雀花(图 144)为多年生草本，高 30cm～80cm。茎与叶柄密被反曲并贴伏的短柔毛，上部分枝。基生叶在开花时常枯萎；茎下部叶有长柄，叶片五角形或近圆形，长 3.2cm～6.2cm，三全裂，中央全裂片菱形，2 回～3 回近羽状细裂，小裂片披针状三角形、披针形至线形，宽 1.5mm～2.5(～4)mm，侧全裂片斜扇形，2 深裂近基部，上面被短伏毛，下面被长柔毛；茎中部叶渐变小。总状花序生枝顶，有花 3 朵～12 朵；苞片线形；花梗长 3cm～7.5cm，密被反曲白色短毛，常混生开展的腺毛；小苞片钻形，生花梗中部，长约 3mm；萼片深蓝紫色，椭圆状倒卵形或宽椭圆形，长 1cm～1.2cm，外面被短柔毛，内面无毛，距钻形，长 2cm～2.5cm；花瓣蓝色，顶端圆；退化雄蕊蓝色，瓣片倒卵形，顶端不裂至不明显 2 浅裂，腹面有黄色髯毛；雄蕊多数，花丝有毛或无毛；心皮 3，子房密被短柔毛。蓇葖果长约 1.2cm；种子倒卵状四面体形，沿棱有狭翅。

生于海拔 2 300m～3 250m 的山地草坡。分布于四川、云南省。

采收加工 秋季采挖，洗净，晒干。

药材性状 主根呈圆柱形，长 8cm～10cm，膨大部分直径 1cm～1.5cm；外表面黄褐色或红褐色，具扭转的纵皱纹，根头部具断茎痕及残存的棕褐色纤维状基生叶叶柄。质硬，有韧性，不易折断。断面灰黄白色，极不整齐，呈粗纤维或条片状纤维状，木部与皮部易剥离，皮部脱落处表面灰黄白色。气微弱，味淡、微辛。以粗壮、断面黄白色者为佳。

性味和功用 辛、微苦，大热；有毒。活血，止痛，祛风，解毒。用于小儿肚寒疼痛，劳伤疼痛，跌打损伤，骨折，小儿惊风，牙痛，胃痛，风湿关节痛，疮疡。常用量 0.3g～0.6g。



图 144　康定翠雀花

1－2　全株

雪　胆

别名　中华雪胆、金龟莲、金盆、苦金盆。

来源　本品为葫芦科植物雪胆 Hemsleya chinensis Cogn. ex Forb. et Hemsl. 的块茎。

原植物　雪胆(图 145)为多年生草质藤本。块根肥大。茎细，具纵棱，幼枝有短而密的柔毛。卷须常 2 分叉；叶互生，叶柄长 3cm～8cm；叶片鸟足状分裂，小叶 5～7，膜质，披针形、矩圆状披针形至倒卵状长圆形，顶端渐尖，基部楔形，边缘具有小尖突的重圆齿，中间者较长，长 7cm～12cm，两侧者渐短；小叶柄长 5mm～10mm。花单性，雌雄异株；雌雄花序均为腋生的疏散圆锥花序，总花梗及花梗均细长丝状；花萼深 5 裂，裂片披针形；花冠黄色，深 5 裂，裂片矩圆形，长约 1.3cm，内面有极细乳突，向后反折但不紧贴花萼和子房；雄蕊 5，分离，花药卵形，1 室；子房近圆筒形、花柱 3，柱头 2 裂。果筒状倒圆锥形，长约 3cm，顶端截形，成熟后由上部 3 裂；种子周围有薄膜质翅，翅在一端深 2 裂。

生于沟边林中或灌丛中，亦有栽培。分布于湖北、湖南、四川、云南、贵州、广西、浙江等省(自治区)。

采收加工　春季萌芽前或秋季地上部分枯萎后采挖，除去茎叶及根须，晒干或切片晒干。

药材性状　完整的块根呈不规则圆块形或扁圆块形，大者直径可达 40cm；外表棕黄色或棕灰色，微粗糙，中央有凹陷的茎基痕；断面淡黄色或淡白色，多粉质；质坚实。气微，味极苦。切开者多为对开、四开或成不规则块状及厚片，大小不一。均以肉厚实、质地细致、纤维少、外表面平坦、色淡黄者为佳。

性味和功用　苦，寒；有小毒；归胃、大肠经。清热解毒，散结，止痛。用于腹痛，吐泻，肺炎，风火牙痛，疔疮，胃痛，胃溃疡，菌痢，咽喉肿痛，上呼吸道感染，支气管炎，泌尿系感染，败血症，冠心病心绞痛。常用量 1g～3g。脾胃虚寒者勿用。

附注　葫芦科雪胆属多种植物的粗大块根亦作雪胆入药。



图 145　雪胆

1. 块根　2. 花枝　3. 果序

黄　连

别名　雅连、峨眉连、峨眉家连。

来源　本品为毛茛科植物三角叶黄连 Coptis deltoidea C. Y. Cheng et Hsiao 的干燥根状茎。

原植物　三角叶黄连(图 146)为多年生草本。根状茎圆柱形，黄色，节间明显，具横走的匍匐茎。叶基生，轮廓卵形，稍革质，长达 16cm，三全裂，中央全裂片三角状卵形，裂片，彼此多少邻接，边缘具极尖的锯齿；侧全裂片狭卵状三角形，长 3cm；叶柄长 6cm～18cm。花葶 1～2，比叶稍长，多歧聚伞花序，有花 4 朵～8 朵；萼片 5，花瓣状，狭卵形，黄绿色，长 8mm～12.5mm，顶端渐尖；花瓣约 10 枚，披针形，长 3mm～6mm，具蜜槽；雄蕊约 20，长仅为花瓣的 1/2 左右；心皮 9～12，花柱微弯。蓇葖果长圆状卵形，长 6mm～7mm。

生于海拔 1 600m～2 200m 间山地林下，多栽培。特产四川峨眉山及洪雅一带。

采收加工　栽培 4 年～6 年后可采挖，秋末冬初下雪前挖起根茎，去地上部分及泥土，烘干。烘时温度徐徐增高，最初每 30min 翻动 1 次，以后每 3min～5min 翻动 1 次，防止烘焦，最后撞去灰渣及须根。

药材性状　根状茎多为单枝，或偶有少数分枝，略呈圆柱形，微弯曲，如“蚕”状，长 5cm～10cm，直径 3mm～12mm，大多具有明显的一段节间，习称“过桥”。表面黄褐色，粗糙，有不规则结节状隆起及须根或须根痕，顶端常有残留的叶柄痕或花葶茎。质轻而硬，易自节间折断，断面不整齐，皮部色深棕色，木部金黄色，可见放射状纹理，中央具红棕色小髓部或空心。气微，味极苦。以身干、粗壮、无须根，形如蚕者为佳。

性味和功用　苦，寒。归心、肝、胃、大肠经。清热解毒，泻火，燥湿，杀虫。用于烦热神昏，心烦失眠，湿热痞满，呕吐，腹痛泻痢，目赤肿痛，口舌生疮，湿疹，烫伤，吐血，衄血，下血，糖尿病，疳积，百日咳，蛔虫病，痈疽疮毒。常用量 3g～9g。外用适量研末调敷、煎水洗患处或浸汁点眼。阴虚烦热、胃虚呕恶、脾虚泄泻等慎服。

附注　黄连的原植物有多种。参阅本图集第一册 200 页黄连条附注。




图 146　三角叶黄连

黄 刺 皮

别名 黄檗、刺黄檗、山黄檗、三颗针。

来源 本品为小檗科植物直穗小檗 Berberis dasystachya Maxim. 的干燥根皮或根。

原植物 直穗小檗(图 147)为落叶灌木，高约 2m。老枝灰黄色，幼枝常带红色，有稀疏细小疣状突起；刺常单生，长 5mm～12mm，与枝同色。叶较厚，近圆形、矩圆形或宽椭圆形，长 3cm～6cm，顶端圆形或钝形，基部圆形下延，边缘刺状细锯齿，齿长约 1mm，齿距约 1.5mm，两面网脉明显，上面深绿色，下面黄绿色；叶柄长 2cm～4cm。总状花序有花 10 朵～30 朵，连总花梗长 3.5cm～6cm；花黄色，直径约 5mm～6mm；花梗长 4mm～7mm，果期伸长；萼片 6，2 轮，外轮椭圆形，内轮矩圆状倒卵形；花瓣矩圆状倒卵形，长约 3mm；雄蕊 6；子房有 1～2 个胚珠。果序直立，浆果椭圆形，长 6mm～7mm，直径约 5mm，熟时红色，无白粉。

生于山地灌丛中。分布于河北、河南、陕西、湖北、甘肃、青海、四川等省。

采收加工 全年均可挖取，除去泥沙及须根，晒干。

药材性状 根呈类圆柱形，稍弯曲，有少数分枝。长短粗细不一。表面灰棕色，有细皱纹，栓皮易剥落。质坚硬，不易折断，断面纤维性，鲜黄色，切片面近圆形或长圆形，有略呈放射状的纹理。髓小，黄白色。以色黄、苦味浓者为佳。

性味和功用 苦，寒。归心、肝、大小肠经。清热燥湿，泻火解毒，抗菌消炎。用于急性肠炎，痢疾，黄疸，白带，下肢肿痛，潮热盗汗，风火目痛，口腔溃疡，舌疮，乳腺炎，痈疮初起，关节痛。常用量 9g～15g。外用适量研末调敷。

附注 直穗小檗的茎皮功效同根及根皮，均可作提取小檗碱的原料。



图 147　直穗小檗

黄 山 药

别名 姜黄草、黄姜、猴节莲、老虎姜。

来源 本品为薯蓣科植物黄山药 Dioscorea panthaica Prain et Burkill 的干燥根状茎。

原植物 黄山药(图 148)为多年生缠绕草本。根状茎横生，圆柱形。茎左旋，平滑，黄绿色，有时带紫色。叶互生，三角状卵形，顶端渐尖，基部深心形或宽心形，边全缘或微波状，干后表面栗褐色或黑色，背面灰白色，两面近无毛。花单性，雌雄异株；雄花无梗，单生或 2 朵～3 朵簇生组成穗状花序，花序通常又分枝而呈圆锥花序，1 个～3 个簇生叶腋；苞片、小苞片均舟形；花被碟形，黄绿色，顶端 6 裂，裂片卵圆形，内面有黄褐色斑点，开放时平展；雄蕊 6，生于花被管基部，花药背着；雌花序类似雄花序；雌花花被片 6 裂，具 6 枚退化雄蕊；子房下位。蒴果三棱形，顶端截形或微凹，基部狭圆，棱上具半月形翅，表面棕黄色或栗褐色，有光泽，密生紫褐色斑点，熟后下垂；种子每室 2 枚，生于中轴中部。

生于海拔 1 000m～3 500m 间山坡、路旁、灌丛中或林下，分布于湖北、湖南、四川、贵州、云南等省。

采收加工 秋季采挖，洗净，晒干或切片晒干。

药材性状 呈圆柱形，有时略弯曲，直径 2cm～3cm。表面黄棕色，有纵皱纹和稀疏散布的须根或深棕色须根残痕。质硬而韧，折断后断面呈白色绒毛状并散生很多黄色点状维管束。气微，味微甜。以根茎粗大、粉性、色白者为佳。

性味和功用 苦、微辛，平。归脾、肾经。解毒消肿，祛风湿，止痛。用于胃痛，跌打损伤，淋巴结结核。常用量 9g～15g。外用适量捣烂敷患处。

附注 本品在云南省部分地区作白药子(切片)用，故又称滇白药子。




图 148　黄山药

1. 根状茎　2. 果枝

黄 藁 本

别名 藁本、水藁本、藁本菜。

来源 本品为伞形科植物尖叶藁本 Ligusticun acuminatum Franch. 的干燥根茎。

原植物 尖叶藁本(图 149)为多年生草本，高可达 2m。根茎较发达，常为棕褐色。茎圆柱形，具条纹，略带紫色。叶片轮廓三角状卵形，长约 15cm、3 回羽状全裂，第 1 回羽片三角状卵形；第 2 回羽片长圆状披针形；末回羽片近卵形，长 5mm～15mm。复伞形花序梗长可达 15cm，顶端密被糙毛；总苞片常早落；伞幅 12～23，长 2cm～3cm，排列紧密；花瓣 5，白色，顶端具内折小舌片；雄蕊 5；花柱 2。分生果卵形，长约 3mm，背腹压扁，棱翅状，每棱槽内有油管 2～3(～4)，合生面油管 6～8。

生于海拔 1 500m～3 500m 的林下、草地、石岩上。分布于陕西、河南、云南、四川、湖北等省。

采收加工 秋末茎叶开始枯萎时采挖，除去茎叶及须根，抖尽泥沙，晒干或烘干。

药材性状 本品根茎呈条形或不规则团块状，长 4cm～8cm，直径 1.5cm～2.5cm；外表棕黄色或棕褐色，粗糙，上侧有多数茎基(芦头)凹眼，交互排列成串状，每个凹眼直径约 4mm～8mm，凹眼外围有排列成环的点状须根痕。体轻泡，干枯，质硬，捏之刺手。断面鲜黄色或黄色，纤维性强。略具芳香气，味微苦辛。以芦茎及须根少、内心色黄、有香气者为佳。

性味和功用 辛、苦，温。归膀胱经。散风，祛寒，定痛，燥湿。用于风寒感冒头痛，头顶痛，寒湿腹痛，泻泄，疝瘕，疥癣。常用量 3g～9g；外用适量煎水洗或研末调敷。血虚头痛忌服。

附注 本品在川西代藁本入药。在云南个别地区作当归，宜注意鉴别。



图 149　尖叶藁本

1. 上部叶及花序　2. 药材(黄蒿本)

萆　薢

别名　金刚刺、铁菱角、金刚藤、刺萆薢、白茯苓、冷饭巴。

来源　本品为菝葜科植物菝葜 Smilax china L. 的干燥根状茎。

原植物　菝葜(图 150)为攀援灌木。茎坚硬，节部弯曲，通常有倒生或平出的疏刺。叶互生，薄革质，圆形或卵圆形，长 3cm～10cm，顶端突尖或钝圆，基部圆形或宽楔形，有时近心形；叶柄，下部 1/2～2/3 处具鞘；卷须 2，纤细；脱落点位于靠近卷须处。伞形花序腋生，花单性；总花梗长 1cm～2cm，花梗长 3mm～7mm；花序托稍膨大，近球形；雄花：花被片 6，绿黄色，长圆形，长约 4mm，顶端尖，反卷；雄蕊 6，花丝短；雌花较雄花略小，退化雄蕊丝状，柱头 3 裂。浆果球形，直径 6mm～15mm，熟时红色，有粉霜。

生于海拔 2 000m 以下的林下、灌丛中、路旁、河谷或山坡上。分布于我国东部、中部、南部和西南部。缅甸、越南、泰国、菲律宾也有。

采收加工　全年采挖，洗净，切片，晒干或鲜用，或用盐水浸泡数小时后蒸熟，切片，晒干。

药材性状　呈不规则块状，略带圆柱形，微弯，长 8cm～15cm，粗 2cm～4cm。表面褐紫色，微有光泽，结节膨大处常有坚硬的须根残基及芽痕，或留有坚硬弯曲的细根。质坚硬，难折断，断面棕红色或黄棕色，平坦，粉性少，木质纤维较多。气无，味微甘。以质坚、片平，棕红色者为佳。

性味和功用　甘、温。归足厥阴、少阴经。祛风湿，利小便，消肿毒，强筋骨。用于关节疼痛，肌肉麻木，泄泻，痢疾，水肿，淋病，疔疮，肿毒，瘰疬，痔疮，湿热黄疸，跌打损伤，烫伤，牛皮癣。常用量 9g～15g，大剂 30g～90g。外用适量煎水熏洗。

附注　1. 菝葜叶用于风肿、疮疖、脓疮、烫伤；外用适量捣敷或研末调敷。嫩叶适量，加淘米水少许捣汁外涂，可治钩蚴感染引起的皮肤瘙痒。2. 本品产于江苏的较细长，俗称“金刚鞭”，产于浙江、四川的较粗，当地名“铁菱角”，原植物均为同 1 种。



图 150　菝葜

1. 根状茎　2. 果枝

野 棉 花

别名 土白头翁、水棉花。

来源 本品为毛茛科植物野棉花 Anemone vitifolia Buch. -Ham. ex DC. 的干燥根。

原植物 野棉花(图 151)为多年生草本，高 60cm～100cm。根状茎较粗壮，圆柱形，木质。基生叶 2～5，有长柄；叶片心状卵形或宽卵形，长(5.2～)11cm～22cm，顶端急尖，3～5 浅裂，边缘有小牙齿，二面疏被短糙毛，下面密被白色短绒毛。花葶粗壮，被密或疏柔毛；聚伞花序长 20cm～60cm，2 朵～4 朵花簇生，有时再 2 回分枝；总苞片 3，叶状，有柄；花梗长 3.5cm～5.5cm，密被短柔毛；萼片 5，倒卵形，白色或带粉红色，长 1.4cm～2cm，外面密被白色绒毛；雄蕊多数，长约为萼片长度的 1/4，花丝丝形；雌蕊由极多数离生心皮群集而成，圆锥形或卵形，除柱头外，遍生密绵毛，柱头长方形，偏斜。聚合果近球形，直径约 1.5cm；瘦果有细柄，密被白色绵毛。

生于海拔 1 200m～2 700m 的山地草坡，沟边或疏林中。分布于云南、四川、西藏等省(自治区)。缅甸、不丹、锡金、尼泊尔、印度也有。

采收加工 全年均可采挖，洗净，晒干。

药材性状 根略呈圆柱形，常扭曲，全长 10cm～25cm，直径 0.6cm～3cm。商品大多已折断，外表棕褐色至紫棕色，粗糙，具纵向凹裂，间或可见支根或支根痕，外皮有时脱落，露出呈裂片状的黄色木部。根头部略膨大，顶端密生白色绵毛，有残存的叶柄基部。质脆易折断，断面不整齐，皮部淡棕色，木部黄色，射线色较深，导管成束，作放射状排列。根的中心部及射线部分常呈裂隙状。气微弱，味苦微酸咸。以根条粗壮、断面色黄者为佳。

性味和功用 苦、辛，寒；有毒。祛风湿，接骨，理气，杀虫。用于风湿关节痛，跌打损伤，痢疾，肠炎，疟疾，黄疸，咳嗽气喘，内外伤出血，蛔、钩虫病，脚气，鼻疳，目翳及痈疽肿毒。常用量 3g～6g；外用适量捣烂外敷患处。内服宜慎。



图 151　野棉花

1. 根　2. 叶　3. 花序

铜 棒 锤

别名 铜锤紫堇。

来源 本品为荷包牡丹科植物条裂紫堇 Corydalis linarioides Maxim. 的干燥块根。

原植物 条裂紫堇(图 152)为多年生草本，高 30cm～50cm。根数条簇生，纺锤形增粗。茎直立，细弱，不分枝。叶通常疏生于茎的上部，具短柄或近无柄，羽状全裂，裂片线形至狭披针形，长 1.5cm～4cm，全缘；基生叶通常不存在。总状花序顶生，长 2cm～9cm；花多数，先密后疏；苞片披针形或线形，有时狭卵形，指状中裂或全缘，长 1.5cm～2cm；花梗长约 1cm；萼小形，鳞片状，膜质，边缘不规则撕裂状，早落；花瓣 4，黄色，上面 1 片长 1.2cm～2.2cm，背面具明显的膜质翅，距圆筒形，长于花瓣片，末端稍向下弯，下面 1 片平展，基部囊状，内面 2 片顶部稍连合，基部具爪，背部有三角状突起；雄蕊 6，2 束；子房狭长椭圆形，柱头 2 裂，顶端冠状膨大。蒴果长圆形，成熟时斜向下垂，长 1cm～1.5cm，有种子 5 枚～6 枚，排成 1 行；种子扁圆形，亮黑色。

生于海拔 2 800m～4 200m 的山坡草地、林下、灌丛中或石缝中。分布于甘肃、陕西、青海、四川、西藏等省(自治区)。

采收加工 夏、秋季采挖，取块根，晒干。

药材性状 呈纺锤形或倒卵形，长 1cm～1.5cm，直径 3mm～5mm。表面暗褐色，具不明显的细皱纹，一端渐细具黑褐色圆柱形残根，一端圆钝，具细须状根，周围有稀疏点状须根痕。质硬，断面黄白色。气微，味微苦。以个大，质重，断面黄白色者为佳。

性味和功用 辛、微苦，平；有毒。活血散瘀，消肿止痛，除风湿。用于跌打损伤，痨伤，风湿疼痛，皮肤风痒，腰腿疼痛。常用量 1.5g～3g，水煎或浸酒服。反金牛七(Aconitum taipeicum Hand. －Mazz.)。



图 152　条裂紫堇

象 头 花

别名 红南星、母猪半夏、大半夏、岩芋、南星、狗爪半夏、虎掌。

来源 本品为天南星科植物象头花 Arisaema franchetianum Engl. 的干燥块茎。

原植物 象头花(图 153)为多年生草本。块茎扁球形，周围有小球茎。鳞叶 2～3，披针形，淡褐色，带紫色斑点，包围叶柄及花序柄；叶片 1，幼时心状箭形，全缘，成年植株叶片近革质，3 全裂，中裂片卵形、宽椭圆形或近倒卵形，基部短楔形，顶端骤狭渐尖，长 7cm～23cm；侧裂片偏斜，椭圆形，长 6cm～20cm，均全缘；叶柄长 20cm～50cm，肉红色，基部粗 1cm～2cm，下部 1/4～1/5 鞘状。花序柄长 10cm～20cm，肉红色，果期下弯；佛焰苞深紫色，具白色宽条纹，管部长 4cm～6cm，圆筒形，口部具狭耳，檐部下弯成盔状，顶端渐尖成细长尾状；肉穗花序单性，雄花序紫色，长圆锥形，长 1.5cm～4cm，附属器绿紫色，伸长圆锥状，长 3.5cm～6cm，基部粗 4mm～8mm，由中部开始下弯，稀近直立；雄花具花药 2～5，合生花丝短柄状，顶孔开裂；雌花序圆柱形，长 1.2cm～3.8cm，粗 0.8cm～2cm，花密，子房绿紫色，顶部扁平，近五角形。浆果绿色，倒圆锥形，长达 1.2cm。

生于海拔 960m～3 000m 处林下、灌丛或草坡。分布于云南、四川、贵州、广西等省、区。我国特有。

采收加工 夏季采挖，洗净，晒干。

药材性状 块茎扁圆球形，直径 1cm～6cm，颈部有多数脐点状根茎，顶部有一圆形凹陷茎痕，周围具几个直径 1cm～2cm 的小球茎。表面深棕色。质坚硬，不易破碎，断面角质样，肉红色。气微，味辛而有麻舌感。以个大、质坚重、色棕红色者为佳。

性味和功用 辛、麻、温。有大毒。散瘀解毒，消肿止痛。用于胃痛，乳腺炎，疮疖肿毒，颈淋巴结结核，毒蛇咬伤，腮腺炎。常用量 0.9g～1.5g。外用适量捣烂敷患处。

附注 1. 本品配方用可作外科手术麻醉剂。2. 在四川常作天南星用，或切片晒干称“黑南星”。



图 153　象头花

1. 全株　2. 药材(象头花)

湖北百合

别名 百合。

来源 本品为百合科植物湖北百合 Lilium henryi Baker 的干燥鳞茎。

原植物 湖北百合(图 154)为多年生草本，高 1m～2m。鳞茎近球形，高约 5cm，直径 2cm。茎圆柱形，具紫色条纹，无毛。叶互生，两型，中、下部的矩圆状披针形，长 7.5cm～15cm，顶端渐尖，基部近圆形，全缘，有 3 条～5 条脉，柄长约 5mm；上部的卵圆形，长 2cm～4cm，顶端急尖、基部近圆形，无柄。总状花序顶生，具 2 朵～12 朵花；苞片叶状，长 2.5cm～3.5cm，先端急尖；花梗长 5cm～9cm，水平展开，每 1 花梗常具 2 朵花；花被片 6，橙色，反卷，具稀疏的黑色斑点，长 5cm～7cm，宽达 2cm，全缘，蜜腺两边具多数流苏状突起；雄蕊 6，四面张开，花丝钻状，长 4cm～4.5cm，花药深桔红色；子房近圆柱形，花柱长，柱头稍膨大，略 3 裂。蒴果矩圆形，长 4cm～4.3cm，宽约 3.5cm，褐色。

生于海拔 700m～1 000m 处的山坡上。分布于湖北、江西、贵州等省。

采收加工 秋季采挖，洗净，晒干。

药材性状 本品呈矩圆形，长 3.5cm～4.5cm，宽约 1.5cm，顶端尖，边全缘较薄，常向内卷曲。表面乳白色或淡黄棕色，平滑，半透明，有纵纹。质硬脆，易折断，断面较平坦、角质样。无臭，味微甘。

性味和功用 甘，平。清肺润燥，解毒散瘀。用于肺热燥咳，痈疮肿毒。常用量 10g～30g。外用适量捣烂敷患处。



图 154　湖北百合

1. 鳞茎及根　2. 花序

黑 虎 七

别名 铁杆七、马力胯、过山龙。

来源 本品为蕨类裸子蕨科植物普通凤丫蕨 Coniogramme intermedia Hieron. 的干燥根状茎。

原植物 普通凤丫蕨(图 155)为多年生草本，高 60cm～100cm。根状茎横走，疏生鳞片。叶远生，叶柄长 40cm～70cm，禾秆色，有时具棕色斑点，叶片草质，三角状卵圆形，长达 60cm，基部二回羽状，向上一回羽状；羽片有柄，近对生，宽披针形，顶端尾状渐尖，基部近圆形，边缘有向前弯的细锯齿，两面无毛或下面有少数短毛，侧脉平行斜出，离生不成网眼，2 回分叉，顶端略加厚成条形水囊，伸入锯齿内，孢子囊群长线形，沿侧脉分布到距叶边约 3mm 处，棕褐色，无囊群盖。

生于海拔 350m～2 500m 的山谷林下。分布于陕西、甘肃、朝北、湖南、广东、广西、台湾、河北、河南、吉林、浙江、云南、贵州、四川、西藏等省(自治区)。朝鲜、日本、原苏联也有。

采收加工 夏、秋季采挖，去须根，洗净，鲜用或晒干。

药材性状 根状茎呈圆柱状，横走，直径约 5mm。表面棕褐色，上部密被狭披针形棕色鳞片，亦可见远生的黄棕色叶柄残基，下部具多数疣点状根痕或棕褐色细圆柱形断根。质硬脆，易折断，断面较平整，黄色。气微，味淡。以粗壮、无根、断面色黄者为佳。

性味和功用 甘、涩，温。归肝、肾经。祛风湿，强筋骨，理气，活血，止痛。用于风湿性关节炎，肾虚腰痛，带下，跌打损伤，流行性感冒，黄疸型肝炎。常用量 3g～6g，水煎或泡酒服。



图 155　普通凤丫蕨

1. 根及根茎　2. 叶

筒瓣兰

别名 红花小独蒜、小白及。

来源 本品为兰科植物筒瓣兰 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. 的干燥假鳞茎。

原植物 筒瓣兰(图 156)为多年生草本。假鳞茎近球形。茎纤细直立，圆柱形，高 3cm～22cm，顶生 1 枚～5 枚叶。叶通常纸质、狭椭圆形、长 7cm～37cm，宽达 3.5cm，顶端渐尖，基部收窄为短柄。花茎侧生于假鳞茎上，纤细、通常不分枝，长于或短于叶；总状花序顶生，具多数花；子房垂直于萼平；花下倾，玫瑰色带紫色斑点；花被片长 1.6cm；萼片下部合生成管状，中萼片矩圆形，侧萼片镰刀状；花瓣匙形，内藏于萼管内，顶端钝；唇瓣贴生于蕊柱基部，弯卷合抱蕊柱，基部楔形下延成爪、中部向顶端扩大，不明显 3 裂，侧裂片与中裂片近等长，顶端钝圆，中裂片顶端急尖，微波状齿；合蕊柱细长，半圆柱形，顶端扩大并骤然弯曲，无蕊柱足；花药顶生，前倾，2 室；花粉块 4，每室 2 个，蜡质，卵圆形。

生于山坡路旁、林下、草地和灌丛下。分布于广西、云南、四川、西藏等省(自治区)。尼泊尔、锡金、印度、孟加拉、中南半岛也有。

采收加工 秋季采挖，洗净，晒干。

药材性状 须根数条，细圆柱形，直径约 1mm，表面褐色；假鳞茎卵圆形，直径 0.8cm～1.2cm，褐色，被鞘状鳞叶包被，顶生 1 枚～5 枚叶片。叶狭椭圆形，长 7cm～37cm，宽 1.2cm～3.5cm，顶端渐尖，基部收狭成短柄，表面褐黄色，平行脉在两面凸起，花葶直立，侧生于假鳞茎上端，圆柱形，棕色，直径约 2mm；总状花序有花数朵，花苞片卵状披针形；花萼下部合生成筒状。气无，味淡。以带根及花葶者为佳。

性味和功用 活血调经，止咳。用于月经不调，经期腹痛，肺热咳嗽。常用量 3g～9g。



图 156　筒瓣兰

墨　七

别名　活血莲、一口血、土莎莲、独儿七。

来源　本品为毛茛科植物聚叶花葶乌头 Aconitum scaposum var. vaginatum (Pritz.) Rapaics 的干燥根。

原植物　聚叶花葶乌头(图 157)为多年生草本，高 35cm～68cm。根较粗，黑褐色。茎稍被毛，直立或披散。基生叶 1～3，具长柄，花期枯萎；茎生叶 3～5，最下部的茎生叶距茎基部 6cm～20cm，其他茎生叶在花序之下密集，叶片轮廓五角形，长 5cm～7cm，宽 9cm～13cm，3 裂稍过中部，中裂片倒梯状菱形，急尖，不明显 3 浅裂，边缘有粗齿，侧裂片斜扇形，不等 2 裂、两面被毛，叶柄基部膨大成鞘状抱茎；最上部的 1～3 叶极小，长 0.5cm～2cm 或完全退化。总状花序长 15cm～25cm，序梗及花梗被淡黄色柔毛；苞片狭卵形，小苞片生花梗基部；萼片 5，紫色，外面被毛，上萼片圆筒形，高 1.6cm～1.8cm；花瓣 2，有长距；雄蕊多数；心皮 3，子房疏被毛。蓇葖果不等大；种子倒卵形，部生横狭翅。

生于海拔 1 850m～2 000m 间山地林中或林缘。分布于云南、四川、贵州、湖南、湖北、甘肃、陕西等省。

采收加工　夏、秋季采挖，洗净，晒干。

药材性状　干燥根块状圆柱形，长约 10cm，粗 0.5cm～1.5cm，常具结节状突起。表面黑褐色，有多数须根，须根较粗壮，灰黄色或棕黄色。质坚，不易折断，断面灰白色。气微，味微苦。

性味和功用　微苦，甘，平。有小毒。活血散瘀，止痛，止咳。用于跌打损伤，骨折肿痛，风湿痛，肺结核咯血，月经不调，无名肿毒，咳喘。常用量 9g～15g。外用适量磨汁涂患处。



图 157　聚叶花葶乌头

1－2　全株

缬　草

别名　拔地麻、满山香。

来源　本品为败酱科植物缬草 Valeriana officinalis L. 的干燥根及根状茎。

原植物　缬草(图 158)为多年生草本，高 1m～1.5m。茎圆柱形，具纵条纹，中空，表面被白色粗短毛，以基节最多。基生叶丛出，长卵形，为单数羽状复叶或不规则深裂，小叶片 9～15，顶部裂片较大，全缘或具少数锯齿，叶柄长，基部鞘状；茎生叶对生，一回羽状深裂，裂片 2～9 对，中央裂片与两侧裂片近同形同大，但常与第 1 对侧裂片合生成 3 裂状，裂片披针形至线状披针形，顶端渐狭，基部下延，全缘或有不规则疏锯齿、两面及柄轴多少被毛；向上叶渐小。伞房状三出聚伞圆锥花序顶生，果时疏大；苞片羽裂，长 1cm～2cm，小苞片披针形至线形，长约 1cm，具纤毛；花萼不显；花冠管状，白色、淡粉红色至紫红色，长约 5mm，上部稍宽，5 裂，裂片长圆形；雄蕊 3；子房下位。瘦果卵形，长约 4mm，基部近平截，顶端具羽毛状冠毛。

生于高山山坡、林下或沟谷边。分布于自东北至西南各省(自治区)。亚洲西部和欧洲也有。

采收加工　秋季采挖，去掉茎叶，晒干。

药材性状　根状茎呈钝圆锥形，长 2cm～5cm，粗 1cm～3cm；表面黄棕色或暗棕色，上端茎残基及叶痕，四周密生无数细根。根细圆柱形，长达 20cm，粗约 2mm；外表棕黄色至棕灰色，具纵皱纹，并生极细支根。质硬脆，易折断，断面黄白色，角质样。有特异臭气，味先甜后稍苦辣。以须根粗长、整齐、表面黄棕色、断面黄白色、气浓烈者为佳。

性味和功用　辛、苦，温；有微毒。归心、肝经。安神，镇静，祛风解痉，生肌止血。用于心神不安，胃肠痉挛，腰腿疼痛，月经不调，跌打损伤，神经衰弱，腹痛，心脏病，外伤出血，尿崩。常用量 3g～5g，水煎或浸酒服。外用适量研末撒伤处。体弱阴虚者慎用。



图 158　缬草

1－2　全株

三、茎、枝和树皮类

三桠乌药

别名 三钻风、三桠钓樟、甘姜、山胡椒。

来源 本品为樟科植物三桠乌药 Lindera obtusiloba (Sieb. et Zucc.) Blume 的树皮及枝。

原植物 三桠乌药(图 159)为乔木或灌木，高 3m～10m。枝幼时有棕黄色丝状毛，随即脱落。芽卵形或近球形，外鳞片无毛，内鳞片有淡棕黄色厚绢毛。叶互生，卵形、近圆形至扁圆形，长 5cm～10cm，顶端急尖，基部宽楔形，近圆形或心形，全缘或上部 2 裂～3 裂，上面绿色，有光泽，下面绿苍白色，有时带红色，被棕黄色柔毛或近无毛，3 出脉，偶为 5 出脉；叶柄长 1.2cm～2.8cm，被毛。雌雄异株，伞形花序腋生，总花梗极短；总苞片 4，长椭圆形，膜质，外被长柔毛，花后脱落；花黄色，先叶开放，花被片 6，长椭圆形；雄花具能育雄蕊 9，花药 2 室，皆内向瓣裂，内轮 3 枚的花丝下部具 2 个具柄的宽肾形具角突的腺体，第 2 轮花丝的下部时有 1 个腺体，退化雄蕊长椭圆形；雌花退化雄蕊条片形，子房椭圆形。果近球形，直径 5mm～8mm，熟时红色，渐变紫黑色，干后褐色。

生于海拔 3 000m 以下的山谷、林中或灌丛中。分布于辽宁、山东、安徽、江苏、河南、陕西、甘肃、浙江、江西、福建、湖南、湖北、四川、西藏、云南、贵州等省(区)。朝鲜、日本也有。

采收加工 全年均可采收，晒干或鲜用。

药材性状 树皮呈不规则片块状或卷筒状，外表黑棕色或灰褐色，有不规则细皱纹，具少数木栓质皮孔及灰褐斑点，纵裂，内表面红棕色略光滑；质硬脆，断面纤维性，外层浅黄色，内层红棕色略带油质。枝棕色或棕黄色，幼枝具棕黄色丝状长柔毛，平滑或有纵皱纹，具少数皮孔。气特殊，味淡。以粗厚、香气浓、外表灰褐色者为佳。

性味和功用 辛，温。归心经。活血，舒筋，散瘀消肿，理气。用于跌打损伤，瘀血肿痛，疮毒，风湿性关节炎，扭伤，胃腹冷痛。常用量 6g～12g。外用适量捣烂敷患处。

附注 三桠乌药叶功效同树皮。



图 159　三棱乌药

大崖胡豆

别名 崖豆藤，毛连巴藤。

来源 本品为蝶形花科植物密花崖豆藤 Millettia congestiflora T. C. Chen 的茎藤。

原植物 密花崖豆藤的茎藤(图 160)为攀援木质藤本。茎皮灰黄褐色。单数羽状复叶互生，长 15cm～30cm；小叶 5，椭圆形、卵形至宽卵形，长 11cm～13cm，顶端钝或急尖，基部圆形，全缘，两面被黄褐色绒毛，脉上尤密，中、侧脉明显，在上面凹入，下面凸起；叶柄长 2mm～5mm，密被黄褐色绒毛；托叶微小，披针状钻形。圆锥花序顶生，长 14cm～16cm，宽 10cm～11cm；序轴密被黄褐色绒毛；花单生，极密集，花梗长 1mm～3mm，密被黄褐色绒毛；花萼钟状，长 5mm～7mm，5 齿裂，裂片不等长；花冠蝶形，长约 1.6cm，紫红色带白，与萼片外面均密被黄褐色丝状绒毛，旗瓣椭圆形，顶端凹，基部有 2 小尖耳，无胼胝体；雄蕊 10，2 组(9＋1)，子房线形，有柄，密被金黄色细绒毛，花柱下弯。荚果。

生于低海拔山坡林中。分布于广东、湖南、贵州、四川等省区。

采收加工 全年均可采收，晒干、切片晒干或鲜用。

药材性状 本品呈圆柱形，长短不一，稍弯曲，直径 2cm～6cm。外表面灰黄褐色或棕褐色，有纵皱纹及疏散皮孔。无毛或有黄褐色绒毛，栓皮脱落处红褐色。横切面淡黄色，散布红棕色胶状斑点(新鲜时则渗出红色汁液，形如鸡血)。质坚实，较硬，不易折断，断面不整齐，片状纤维状。气微弱，味微苦涩。以外皮棕褐色，断面淡黄色、密被红棕色胶状斑点者为佳。

性味和功用 苦，温。止血，活血，祛风除湿。用于跌打损伤，风湿关节痛。常用量 9g～30g；外用鲜品适量捣烂敷伤处。

附注 密花崖豆藤根甘、涩，平；补血，活血，解热；用于红白痢疾，劳伤疼痛，贫血；常用量 9g～15g，水煎或泡酒服。




图 160　密花崖豆藤

马 比 木

别名 公黄珠子、追风伞。

来源 本品为茶茱萸科植物南紫花树 Nothapodytes pittosporoides (Oliv) Sleumer (Mappia pittosporoides Oliv.)的干燥树皮及茎枝。

原植物 南紫花树(图 161)为小乔木或灌木，高 2～5 米。当年生枝有短伏毛，后渐变无毛。叶互生，薄纸质，矩圆状倒披针形，倒披针形或长椭圆状卵形，长 8cm～24cm，顶端渐尖或短渐尖，基部楔形或宽楔形，全缘，上面平滑或在中脉上有粗短伏毛，下面在脉上疏生柔毛或细硬毛，侧脉 6 对～7 对；叶柄长 1cm～2.5cm。聚伞花序顶生，长达 6cm，总梗短，有短伏毛；花萼浅杯状，黄绿色，长约 1.5mm，外面被短伏毛，顶端 5 浅裂，小浅裂片三角状；花瓣 5，黄色，条状披针形，长约 7mm，宽约 1.5mm，下部合生，两面有毛，气微臭；雄蕊 5，比花瓣稍短；花盘杯状，有小齿；子房密生粗短毛，1 室，胚珠 2，柱头球形。核果椭圆形，长约 1.5cm，顶端有钝状凸起，熟时红色。

生于海拔 380m～1 800m 间山地林中或灌丛中。分布于四川、贵州、广西、广东、湖北、湖南等省(自治区)。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 树皮呈卷筒状或片状，长短不一，厚 0.5mm～1.5mm；外表面褐黑色或绿黑色，粗糙，具细纵皱纹及稀疏的疣状突起，内表面淡红棕色，具细纵纹；质硬脆，易折断，断面近平坦，稍显片状，淡红棕色或淡黄色。枝圆柱形或具棱而近方形，长短不一，直径 2mm～10mm；外表面褐黑色或绿黑色，具不规则明显纵棱及细纵皱纹，有较密的疣状突起；质硬脆，可折断，断面较平坦，木部淡黄色，略现菊花状细纹，皮部薄。气无，味淡。以皮厚，枝粗者为佳。

性味和功用 辛，温。祛风除湿，散寒，理气，活血祛瘀。用于风寒湿痹，关节冷痛，小儿疝气，浮肿，寒疝疼痛。常用量 9g～15g。

附注 南紫花树根功效同树皮及枝。



图 161　南紫花树

1. 果枝；2. 药材(马比木)

川 桂 皮

别名 官桂皮、桂皮、银叶桂。

来源 本品为樟科植物川桂皮 Cinnamomum mairei L'evl. 的干燥树皮。

原植物 川桂皮(图 162)为乔木，高 6m～16m。小枝干后暗灰色。叶互生或近对生，革质，叶片椭圆形或披针形，长 11cm～16cm，宽 3cm～4cm，表面无毛，背面有显著贴生的绢毛，在幼时为银白色，具离基三出脉；叶柄长 1cm～1.2cm。圆锥花序腋生，长 6cm～9cm；总花梗细长，有短柔毛，长 2cm～3cm；花被片 6，几相等，卵形，长约 2mm，花被管短，长约 1mm；能育雄蕊 9，药 4 室，2 上 2 下排列，第三轮雄蕊花药外向瓣裂。果实椭圆形，长约 13mm，直径 7mm～8mm，无毛，基部围以全缘、半球形果托；果梗稍增粗。

生于山地林中。分布于四川、云南省。

采收加工 夏至前后剥取树皮，若为老树皮，须刮去外表粗皮，蒸热，以树叶充裹于内，以免皮片过于卷曲，再以稻草或其它干草覆盖发汗数日，待呈紫红色时，取出晒干。亦有直接晒干者。

药材性状 呈块片状、槽状或卷筒状，长 30cm～60cm，宽度不一，厚 2mm～10mm。老树皮外表平坦，红棕色或棕黄色，有刀刮的痕迹，偶有未去净的粗皮；幼树皮外表粗糙，但不起鳞片，灰褐色或棕褐色，有银灰色花斑。内表面较光滑，棕褐色，有细纵纹。质坚脆，易折断，断面颗粒状，棕红色或棕褐色，稍显油润。具姜、樟、砂仁样辛香气味，久嚼起涎(有滑润感)。以色棕红、香辣而起涎者为合格；以块大皮厚、油润、味浓而具甜味者为佳。

性味和功用 辛、甘、温。归肝、肾、脾经。温中散寒，行气止痛，活血。用于脘腹冷痛，食滞不化，虚寒泄泻，经寒腹痛，风湿性关节痛，痛经，跌打损伤，骨折，肾阳不足，肺寒喘咳。常用量 6g～9g。外用适量研末调敷患处。



图 162　川桂皮

1. 果枝；2－3. 药材(川桂皮)

长花铁线莲

别名 垂花发汗藤。

来源 本品为毛茛科植物长花铁线莲 Clematis rehderiana Craib 的干燥茎藤。

原植物 长花铁线莲(图 163)为木质藤本，长 2m～3m。叶对生，1～2 回羽状，连叶柄长 12cm～20cm；小叶 5～9 或更多，宽卵圆形或卵状椭圆形，长 4cm～5.5cm，顶端钝尖，基部楔形、截形或心形，边缘浅 3 裂或深裂成 3 小叶，具粗锯齿，叶脉在上面微下陷，下面隆起，两面均被平伏柔毛；小叶柄长 1cm～2cm；叶柄长 3cm～4.5cm，腹面有槽。聚伞圆锥花序腋生，与叶近等长，苞片 2，生于花序分枝处，卵圆形或卵状椭圆形，膜质，直径 1.5cm～2cm，萼片 4，淡黄色，长方椭圆形或狭卵形，顶端微反卷，外面被平伏短毛，边缘被绒毛；雄蕊多数，长为萼片之半，花丝被开展柔毛；心皮被短柔毛，花柱被绢毛。瘦果宽卵形或近圆形，扁平，长约 3mm，棕红色，被短柔毛，宿存花柱长 2cm～2.5cm。

生于海拔 2 000m～4 200m 间向阳山坡、沟边、林边的灌丛中。分布于云南、四川、青海、西藏等省(自治区)。

采收加工 夏季采收，去根、叶，切段，晒干。

药材性状 茎呈圆柱形，具六棱及浅纵沟纹，长约 50cm，上下粗细均匀，直径 1.5cm～3cm。外表面淡黄棕色或微带紫色，具稀疏开展的曲柔毛，常有剥落起层的皮片，节间长，节略膨大。体轻泡，质韧；断面粗糙不平，有菊花状放射纹理及多数密集的小孔。气微，味微苦。以条粗、色绿黄者为佳。

性味和功用 微苦，凉。归大肠、膀胱经。清热利尿，除湿止痛，通经络。用于热淋，小便不利，肠炎，痢疾，风湿关节疼痛，跌打损伤。常用量 15g～30g。

附注 1. 四川甘孜、阿坝地区有以本品代木通用者。2. 长花铁线莲全草清心降火，利尿。用于口舌生疮，乳汁不通，肠炎痢疾，阑炎，淋病等。常用量 6g～30g。



图 163　长花铁线莲

石　斛

别名　铁皮石斛、铁皮兰、霍山石斛、鲜石斛。

来源　本品为兰科植物黑及草 Dendrobium candicum Wall ex Lindl. 的干燥茎。

原植物　黑及草(图 164)为多年生草本，高 10cm～20(～60)cm。茎丛生，圆柱形，直立，节间微膨大，上部茎节有时生根。叶多集中于茎上部，稍带肉质，矩圆状披针形至近卵形，长 3cm～7cm，顶端有偏斜的凹缺，全缘；叶鞘灰白色，膜质，具紫斑，鞘口张开。总状花序生于茎的中上部，花序轴，回折状弯曲，有花 2 朵～5 朵；苞片干膜质，淡白色，长 5mm～7mm；花淡黄绿色，长约 1.8cm，直径 3cm～4cm；萼片 3，中萼片长圆状披针形，宽约 4mm，顶端锐尖；侧萼片镰状三角形，基部宽约 1cm；萼囊大而明显；花瓣 3，唇瓣卵状披针形，基部两侧内卷，中间具 1 胼胝体，上部具淡紫红色斑点及乳头状毛；合蕊柱高约 3mm，紫色。蒴果倒卵形，长约 2.5cm，具 3 棱。

生于海拔较高的阴湿山坡树干上或岩石上。分布于浙江、江西、广西、贵州、云南、广东、福建、河南、山西、陕西、安徽等省(自治区)。

采收加工　全年均可采收，鲜用，或剪去部分须根后，边炒边搓去叶鞘，边炒边扭成螺旋形或弹簧状，烘干，称耳环石斛或枫斗。

药材性状　茎呈圆柱形，螺旋状或弹簧状弯曲，一般 2 个～4 个旋纹，拉直后长 3.5cm～8cm，直径 1.5mm～3mm，节间长 1cm～3.5cm，上端较细。表面青灰色，具细微纵纹理及少数粗糙纹，节痕明显，黑色，有的可见短须根。质松脆，易折断，断面有短纤维露出。气微，味淡，嚼之发粘。以色青灰、饱满结实者为佳。

性味和功用　甘、淡，微寒。归胃、肺、肾经。清热滋阴，养胃生津。用于热病伤津，胃热烦渴，肺虚干咳，病后虚热，阴伤目暗。常用量鲜品 15g～30g，干品 6g～12g。

附注　1. 石斛润喉生津，为著名的润喉饮料。2. 石斛的原植物很复杂，参阅本《图集》第一册 22～35 页及《药典》75 页石斛条。



图 164　黑及草

血　藤

别名　峨眉五味子、黄皮血藤、小血藤。

来源　本品为五味子科植物翼梗五味子 Schisandra henryi Clarke 的干燥茎藤。

原植物　翼梗五味子(图 165)为木质藤本。枝淡绿色，具五纵棱，棱上有翅膜，老枝有五狭翅或无翅；芽鳞大，长 8mm～20mm，常宿存于新枝基部。叶互生，近革质，宽卵形或近圆形，长 9cm～11cm，两面被白粉；叶柄带红色，具白粉。花单性，雌雄异株，单生于叶腋，黄绿色，直径约 1.5cm；花梗细长，长 4cm～5cm；花被片 6～10，近圆形，雄花具雄蕊 10 枚～40 枚，排成椭圆状卵形的雄蕊群，药室内向开裂；雌花心皮约 50 枚，雌蕊群近球形。聚合果长 4cm～14.5cm；浆果球形，熟时红色，长 4mm～5mm；种子棕黄色，通常呈半圆形。

生于疏林中或林缘。分布于长江以南各省(自治区)。

采收加工　春、夏季割取藤茎，锯段晒干。

药材性状　呈圆柱形或略带方形，具狭翅或无翅，粗壮，少有分枝，一般锯成 30cm～60cm 的段落，直径 2cm～6cm。表面紫棕色或棕黄色，具明显淡棕色皮孔，粗糙，但少呈鳞片状者。质坚实，木质性强。断面纤维性，皮部棕紫色，与木心紧密结合，木心坚硬，淡棕红色，有多数排列散乱的细孔。气微弱味淡，以条大、色红、身干、无杂质者为佳。

性味和功用　辛、酸、温。舒筋活血，强筋壮骨，破瘀生新。用于劳伤吐血，肢节酸痛，心胃气痛，脚气痿痹，月经不调，跌打损伤，吐血，风湿性关节痛，神经衰弱，胃痛。常用量 15g～30g。

附注　翼梗五味子果实商品称西五味子或川五味子。果实果肉较薄，表面黄棕色或红褐色，皱缩，微有白色粉霜，种子 1～2，肾状球形，径约 4mm，表面棕色，具多数细小瘤状突起。果肉气微，味微酸。种子破碎后有香气，味微辛，稍苦。敛肺，滋肾，生津，止泻；用于肺虚喘嗽，精亏口渴，自汗，盗汗，泄泻，神经衰弱。常用量 1.5g～6g。



图 165　翼梗五味子

亮叶崖豆藤

别名 亮叶鸡血藤、光叶岩豆藤、鸡血藤。

来源 本品为蝶形花科植物亮叶岩豆藤 Millettia nitida Benth. 的干燥藤茎。

原植物 亮叶岩豆藤(图 166)为攀援灌木。幼枝有锈色短毛。羽状复叶互生，小叶 5，披针形或卵形，长 4cm～11cm，顶端钝或短尖，基部近圆形，全缘，上面深绿色，光亮，下面有白色柔毛或无毛；叶轴、小叶柄和叶柄均有锈色柔毛。圆锥花序顶生，长 6cm～20cm，总轴和分枝有丝状柔毛；花单生于序轴的节上，长约 2cm；萼钟状，密生绢状毛；花冠蝶形，紫红色，旗瓣外面白色，被绢毛，基部有 2 个胼胝体状附属物，内面紫红色，强度反卷；雄蕊 10，2 组(9＋1)；子房被毛，花柱 1，顶端弯曲。荚果扁平，条状矩圆形，长 6cm～15cm，宽约 1.5cm～2cm，外面被锈色绒毛，果瓣木质，开裂；种子 3 粒～5 粒，成熟时褐色，扁圆形，直径约 1cm。

生于溪边、山谷疏林下及山坡灌丛中。分布于广东、广西、福建、云南、四川等省、区。

采收加工 全年均可采收，除去茎叶，切段，晒干。

药材性状 呈圆柱形，长 30cm～50cm。表面灰褐色或灰黑褐色，有不规则纵皱纹及微凸起的疣状皮孔，栓皮脱落处现红棕色。质硬，不易折断，横断面皮部较厚，红棕色或淡黄色密布红棕色胶状斑点，木部淡黄色，导管呈细微孔状，中央有偏心性小髓；新鲜时皮部有红色汁液流出。气微，味微苦涩。以外皮灰褐色、木部淡黄色，皮部厚者为佳。

性味和功用 苦，温。归心、脾经。活血，舒筋。用于腰膝酸痛，麻木瘫痪，月经不调，贫血，急性菌痢。常用量 9g～30g，水煎或浸酒服。



图 166　亮叶岩豆藤

1. 果枝；2. 茎

草 红 藤

别名 红藤、疆蛇通、蝴蝶草、小红藤。

来源 本品为蝶形花科植物毛宿苞豆 Shuteria pampaniniana Hand.-Mazz. 的干燥带叶茎藤。

原植物 毛宿苞豆(图 167)为多年生草质藤本，长 0.6m～2m。茎纤细，多数丛生，匍匐，密生白色柔毛。叶互生；叶柄长 1cm～3cm，密生短柔毛，紫红色；小叶片 3，椭圆形、卵形或菱状倒卵形，长 1cm～2.5cm，顶端圆钝，有小突尖，基部圆或宽楔形，全缘，两面均被灰白色伏柔毛，下面毛较密，小叶柄短，被毛；托叶 2，生于茎枝节处，宽披针形，长 1.5mm～3mm，棕红色。春季开花，总状花序腋生，稀顶生，通常短于叶柄，序轴、苞片、小苞片均被柔毛；花萼钟状，5 齿裂，外面密被柔毛；花冠蝶形，黄色，旗瓣倒卵形，顶端微凹，翼瓣基部具爪，龙骨瓣有耳；雄蕊 10(9＋1)；雌蕊条形，密被细柔毛。荚果条形，扁平，长 1.5cm～2cm，宽约 3mm，老时棕红色，被毛；种子 4～5，暗绿色，有黑斑。

生于海拔 1 800m～2 300m 的山坡草丛中。分布于广西、云南、四川、贵州等省(自治区)。

采收加工 春、夏季采收，晒干。

药材性状 本品多缠扎成把，大小不一。茎藤细瘦，圆柱形，直径 1mm～1.5mm；表面棕红色，具细纵纹，多节，节间长 3cm～6cm，被灰白色柔毛。三出复叶互生，叶柄长 1cm～3cm，紫红色，密生短柔毛；小叶 3，多破碎，完整者呈椭圆形、卵形、宽卵形或菱状倒卵形，长 1cm～2.5cm，宽 7mm～16mm，灰绿色，两面均被灰白色伏柔毛，小叶柄短，被毛；托叶 2，明显，宽披针形，长 1.5mm～3mm，顶端急尖，棕红色，具脉纹和毛茸。质轻脆。气无，味苦。以藤茎粗壮、棕红色、叶片完整者为佳。

性味和功用 苦、凉。归肝、大肠经。舒筋活络，清热消炎，泄肝胆热。用于跌打损伤，骨折，阴虚潮热，虚劳咳嗽，乳腺炎，腮腺炎，阑尾炎，肠痈腹痛。常用量 9g～15g；外用适量捣烂敷患处。




图 167　毛宿苞豆

树　参

别名　枫荷梨、半枫荷、鸭脚板、常春木。

来源　本品为五加科植物树参 Dendropanax dentiger (Harms) Merr. 的干燥茎枝。

原植物　树参(图 168)为常绿小乔木或灌木，高达 7m。叶二型，互生，不裂叶生于枝下部，椭圆形、椭圆状披针形、倒卵形至披针形，长 7cm～10cm，顶端短渐尖，基部圆至楔形；分裂叶倒三角形，3～5 掌状深裂、浅裂或一侧单裂，裂片狭长方形，全缘或有疏锯齿，三出脉，两面网脉均隆起，具红棕色半透明腺点。伞形花序单个顶生或 2 个～5 个组成复伞形花序；花梗长 6mm～10mm；花萼筒状，缘部有 5 细齿；花瓣 5，淡绿白色，三角状长卵形；雄蕊 5；子房下位，5 室，花柱 5，基部合生，顶端分离，果期离生部分向外反折。果实长椭圆球形或近球形，直径 5mm～6mm，有 5 棱，每棱又有纵脊 3 条，成熟时紫黑色。

生于山坡、山谷、沟边阴湿的常绿阔叶林中。分布于安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、贵州等省(自治区)。中南半岛也有。

采收加工　全年均可采收，晒干。

药材性状　茎枝呈圆柱形，少有分枝，长短不一，直径 0.5cm～2cm。表面灰白色或灰青色，具细纵皱纹及略成半圆形的叶痕。质坚硬，不易折断，断面纤维形，皮部薄，木部黄白色，髓部小。气微，味微甘、涩。以枝条粗壮、皮部厚者为佳。

性味和功用　甘、微辛，温。归肝、肺经。祛风除湿，舒筋活络，壮筋骨、活血。用于瘫痪、偏头痛，臂丛神经炎，风湿性及类风湿性关节炎，扭伤，痈疖，小儿麻痹后遗症，月经不调。常用量 15g～60g。

附注　树参根、树皮功效同茎枝。叶有清热止渴作用，四川民间用以代茶饮。



图 168　树参

1. 果序及不裂叶；2. 分裂叶

移　　核

别名　酸多李皮、酸楂、云南小木瓜。

来源　本品为蔷薇科植物移核 Docynia delavayi (Franch.) Schneid. 的干燥树皮。

原植物　移核(图 169)为常绿乔木，高 3m～10m。小枝粗壮，幼时具黄白色绒毛，老渐脱落，红褐色或紫褐色。叶互生，通常聚集于小枝顶端，叶片披针形，长 6cm～8cm，边全缘或稍有浅钝锯齿，上面无毛，下面密生黄白色绒毛；叶柄长 1cm～1.5cm，密生绒毛。花 3 朵～5 朵丛生于小枝顶端；花梗粗短或近无，果期伸长，密生绒毛；花白色，直径约 2.5cm～3cm；花萼筒状，两面密生黄白色绒毛，裂片 5，披针形或三角状披针形，长 5mm～8mm；花瓣 5，长倒卵形，长 12mm～15mm，基部有短爪；雄蕊多数，花丝长短不一，短于花瓣；花柱 5，基部合生，密生绒毛。梨果卵形或长圆形，直径 2cm～3cm，幼时被毛，渐脱落至无毛，具宿存萼；果梗粗壮，较长。

生于海拔 1 000m～3 000m 间山谷、溪边、灌丛中或林缘。分布于云南、四川省。

采收加工　初春剥取树皮，晒干。

药材性状　呈不规则板片状、槽状或半卷筒状，长宽不等，厚 2mm～4mm，外表面紫褐色或红棕色，粗糙，散生红褐色点状皮孔，内表面黄色或淡黄色，光滑。质硬，断面不整齐，具 5 室，淡黄色。气微弱，味涩。以皮厚、坚实、外表面紫褐色者为佳。

性味和功用　酸、涩，凉。消炎，收敛，接骨。用于骨折，风湿性关节炎，肝炎，湿疹，腹泻，赤白痢疾，烧伤，烫伤。常用量 9g～15g。外用适量捣烂或熬膏外搽。

附注　1. 移核叶功效同树皮。2. 移核果酸涩，凉。舒筋活血，和脾燥湿，舒肝止痛，清暑消毒。用于霍乱转筋，风湿关节炎，小便过多。常用量 9g～15g 煎服或浸酒服。四川和云南部分地区常将果实横切片作山楂肉，纵切片作木瓜用。其功效待研证。



图 169　栘核

1. 果枝；2. 药材(栘核)

峨眉黄肉楠

别名 黑皮柳叶楠、山桂花、长叶楠。

来源 本品为樟科植物峨眉黄肉楠 Actinodaphne omeiensis (Liou) Allen 的干燥枝皮。

原植物 峨眉黄肉楠(图 170)为灌木或小乔木，高 3m～5m。树皮灰褐色；小枝紫褐色，幼时被灰黄色长柔毛，老渐脱落，基部有时包有宿存的芽鳞片。叶通常 4 枚～6 枚簇生于枝端或分枝处成轮生状，披针形至椭圆形，长 12cm～27cm，顶端渐尖，基部楔形，革质，上面深绿色，有光泽，下面灰绿色，苍白，羽状脉，侧脉每边 12 条～15 条；叶柄长 11mm～30mm，无毛。伞形花序单生或 2 个簇生于枝侧或叶腋，无总梗；苞片外面被金黄色丝状柔毛，边缘有睫毛；每一花序有花 7 朵～8 朵；花梗长约 5mm；花被筒短，均密被黄褐色丝状长柔毛；花被裂片六，宽卵形或椭圆形，淡黄色至黄绿色，外被毛；雄花较雌花大，花被裂片长 3mm～4mm，能育雄蕊 9～12，3 轮，第 3 轮花丝中部以上有具短柄的 2 个腺体，退化雌蕊细小；雌花子房倒卵形，花柱肥大，柱头 2 浅裂。果近球形，直径达 2cm，具短尖头；果托浅盘状，边缘有波状齿，常残留花被片。

生于海拔 500m～1 700m 的山谷、路旁灌丛及杂木林中。分布于四川、贵州省。

采收加工 全年均可采收，剥取枝皮，晒干。

药材性状 呈卷筒状或片状，长短不等，厚 0.5mm～1mm。外表面灰褐色或黑褐色，较光滑，有多数灰黄色小疣状皮孔，内表面褐色或紫褐色，平滑；质硬脆，易折断，断面较平坦，黄棕色。有特殊香气，味辛。以皮厚，色灰褐者为佳。

性味和功用 辛，温。散瘀消肿，行气止痛，祛风除湿，调经。用于跌打损伤，瘀滞疼痛，疮疡肿痛，脘腹胀痛，风湿性关节炎，扭伤，月经不调。

附注 峨眉黄肉楠根皮功效同枝皮。



图 170　峨眉黄肉楠

淮　通

别名　木香马兜铃、淮木通、岩藤香。

来源　本品为马兜铃科植物宝兴马兜铃 Aristolochia moupinensis Franch. 的干燥藤茎。

原植物　宝兴马兜铃(图 171)为木质藤本，长 3m～4m 或更长。嫩枝和芽密被黄棕色或灰色长柔毛，老枝无毛。叶互生，多为长卵状心形，上面初疏生伏毛，后变无毛，下面密被黄棕色长柔毛；基出脉 5～7；叶柄长 3cm～8cm，被毛。花单生或 2 朵聚生于叶腋；花梗长 3cm～8cm，花后常伸长，下垂，被柔毛；花被管中部急弯而略扁，下部长 2cm～3cm，直径 8mm～10mm，弯曲处至檐部与下部近等长，外面被黄棕色长柔毛；檐部近圆形，直径 3cm～3.5cm，内面黄色，有紫红色斑点，边缘绿色，具网纹，3 浅裂；花药成对贴生于合蕊柱近基部，子房被毛，有 6 棱，合蕊柱顶端 3 裂；裂片有时 2 裂，边缘向下延伸呈波状。蒴果长圆形，长 6cm～8cm，有 6 棱，棱通常波状，熟后 6 瓣裂。

生于海拔 2 000m～3 200m 的林中，沟边、灌丛中。分布于我国中部、东部和西南部。

采收加工　春季采收，晒干，或切片晒干。

药材性状　本品呈长圆柱形，稍扭曲，长 60cm～90cm，直径 1cm～4cm。表面灰黄色或棕褐色，具不规则细纵纹或浅沟，有的可见裂隙；节略膨大。体轻，质硬，不易折断。切片厚 3mm～6mm，边缘较整齐，皮部厚薄不一，黄棕色，木部宽广，浅灰黄色或浅黄棕色，具明显的放射状纹理，有的可见裂隙，类似菊花心，导管整齐的排列成同心环状。气香，味微苦。以条粗壮、断面浅黄色、香气浓者为佳。

性味和功用　苦，寒。归心、肾、膀胱、小肠经。清热利湿，消肿止痛，止血，下乳。用于小便不利，水肿，尿路感染，阴道滴虫，风湿性关节痛，湿疹，荨麻疹，痈肿恶疮。常用量 6g～9g。

附注　1. 淮通商品有 2 个类型，一类为本品，一类为毛茛科植物小木通 Clematis armandii Franch. 的藤茎，但后者主要作川木通使用。2. 宝兴马兜铃根，云南称理防己或防己，四川称冕宁防己。




图 171　宝兴马兜铃

1. 枝叶；2. 药材(藤茎切片)

兜唇石斛

别名 黄草石斛。

来源 本品为兰科植物兜唇石斛 Dendrobium aphyllum (Roxb.) C. E. Fisch. 的干燥茎。

原植物 兜唇石斛(图 172)为多年生草本。茎圆柱形，下垂，长 50cm～100cm，上下近等粗，直径 3mm～8mm，鲜时绿色，偶染紫红色，节间明显膨大，呈倒圆锥状，被复叶鞘或残留部分枯朽的叶鞘纤维。叶互生，长卵形，长 5cm～7cm，宽约 2cm，顶端渐尖，基部近圆形，边全缘，中脉两侧不对称，但不钩转，花期凋落。总状花序自上部茎的节上抽出，具(1)2～3 花；花梗长约 2cm，基部有膜质苞片，细小，长约 5mm；花萼具萼囊，长约 8mm，萼片披针形，长 2.5cm～3cm，宽 6mm～7mm，顶端尖；两侧花瓣披针形，粉红色，顶端钝，唇瓣倒卵形，淡黄色，前部扩展成兜状，内面有绒毛，边全缘或具啮齿状浅齿，喉部有肋状紫色条纹；蕊柱短，白色。蒴果倒卵形，具棱，下垂，黄绿色。

生于海拔 1 000m～1 800m 的林中，附生于树上或林下岩石。分布于广西、云南、贵州、四川等省(自治区)。尼泊尔、锡金、不丹、印度至中南半岛和马来西亚也有。

采收加工 全年均可采收，除去须根和叶，用开水略烫或烘软，再边搓边烘晒，至叶鞘搓净，干燥。

药材性状 呈圆柱形，长 15cm～60cm，直径 3mm～8mm，基部较细而坚硬。表面金黄色至淡黄褐色，有光泽，具深纵沟纹。节较疏，节间长 2cm～3.5cm，膨大成倒圆锥形。体轻质实，易折断，断面略纤维性。气无，味微苦，嚼之有粘性。以色金黄，有光泽，质柔韧者为佳。

性味和功用 甘、淡、微寒。归胃、肾经。养阴益胃，生津止渴，清热。用于热病伤津，口干烦渴，病后虚热，阴伤目暗，食欲不振，遗精，肺结核，腰膝酸软无力。常用量 6g～12g。

附注 本品可否作石斛入药，未见报道。



图 172　兜唇石斛

1. 全株；2～3. 萼片；4. 花瓣；5. 唇瓣

湖北络石

别名 络石藤。

来源 本品为夹竹桃科植物湖北络石 Trachelospermum gracilipes Hook. f. var. hupehense Tsiang et P. T. Li 的干燥带叶藤茎。

原植物 湖北络石(图 173)为攀援灌木。幼枝被黄褐色短柔毛，渐脱落；叶对生，椭圆形或卵状椭圆形，长 4cm～8.5cm，顶端钝、急尖或渐尖，基部楔形，全缘，下面被柔毛；叶柄长 3mm～5mm，被疏柔毛。聚伞花序顶生或近顶生，被茸毛，有花多朵，总花梗长 2cm～4cm；花白色，芳香，花蕾顶端渐尖；花萼 5 裂，裂片卵状披针形，长约 2mm，内面基部有 10 个齿状腺体；花冠下部圆筒状，喉部膨大，长约 5mm，上部 5 裂，裂片长 6mm～7mm，倒卵状长圆形；雄蕊 5，生于花冠喉部，花药顶端露出，花丝短，被柔毛；花盘环状，5 裂，围绕子房基部；子房由 2 枚离生心皮组成，花柱丝状。蓇葖果叉生，线状披针形，长 10cm～28cm，宽 3mm～4mm；种子多数，红褐色，线状长圆形，顶端具白色绢质种毛，种毛长约 3cm。

生于山谷密林中，攀援于树上。分布于湖北、湖南、浙江、广东、四川、贵州等省。

采收加工 全年均可采收，切段，晒干。

药材性状 呈细圆柱形，弯曲，有分枝，长短不等，直径 1mm～5mm。表面红褐色或棕褐色，被黄褐色短柔毛，散生细根和点状突起的根痕。质坚韧，易折断，断面淡黄白色，中空。叶对生，多已脱落或稍卷折，叶片椭圆形或卵状椭圆形，长 4cm～8.5cm，宽 1.5cm～4cm，下面被黄褐色短柔毛，厚纸质；叶柄长 3mm～5mm，疏被柔毛。气微，味微苦。以藤茎粗细均匀、带叶者为佳。

性味和功用 苦，微寒。归心、肝、肾经。祛风湿，通经络，消瘀肿。用于风湿关节疼痛，痈疮肿毒，犬、蛇咬伤。常用量 3g～12g；外用适量煎水洗，并同时用鲜品适量捣烂包敷。



图 173　湖北络石

黑果茵芋

来源 本品为芸香科植物黑果茵芋 Skimmia melanocarpa R. et W. 的干燥嫩枝叶。

原植物 黑果茵芋(图 174)为小灌木，通常高 50cm～100cm，稀达 2m。枝灰色，树皮较厚。叶纸质至近革质，互生，但多聚生于枝顶，长圆形或倒披针状长圆形，稀狭椭圆形，长 5cm～11cm，顶端渐尖或短尖，基部楔形，全缘，上面沿中脉密被粉状细毛，有腺点；叶柄长 5mm～10mm。花白色或黄白色，通常单性，稀两性或杂性异株，成顶生的聚伞圆锥花序，序轴疏被微柔毛；苞片卵形，长约 1mm；萼片 5，长 1mm～1.5mm，宽卵形，边缘被短毛；花瓣 5，略不等大，有腺点；雄花花瓣倒披针形或长圆形，长 3mm～4mm，雄蕊 5，与花瓣等长或稍长，花丝线形，花药广椭圆形；雌花不育雄蕊 5，比子房长，子房 4 室～5 室，近圆球形，柱头头状。浆果状核果近圆球形，直径约 8mm，熟时蓝黑色，顶端花柱遗痕为 4 个～5 个圆而略离生的小瘤状疤痕。

生于山坡灌丛中、路边或林缘。分布于四川省。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 枝圆柱形，直径 3mm～5mm；表面污棕黄色，具不规则纵裂纹及稀疏黄白色圆形皮孔；质硬，断面皮部稍厚，褐色，木部黄白色。叶片革质，多聚生于枝端，长圆形、倒披针状长圆形或狭椭圆形，长 5cm～11cm，宽 2cm～4cm，顶端渐尖或短尖，基部楔形，边全缘，稍反卷，主脉在上面凹下，在下面凸起，侧脉不显，上面绿棕色或红棕色，有光亮和细皱纹，下面色较淡。质脆易碎。气微香，味辛。以枝黄棕色、叶带绿色者为佳。

性味和功用 辛、苦，温。有毒。归肝、肾经。祛风除湿。用于顽痹拘挛，风湿筋骨痛。常用量 1g～3g，浸酒或入丸剂。阴虚无风湿实邪者禁用。



图 174　黑果茜芋

1. 根；2. 果枝

紫　藤

别名　藤萝树。

来源　本品为蝶形花科植物紫藤 Wisteria sinensis Sweet 的干燥茎叶。

原植物　紫藤(图 175)为攀援状灌木。分枝多，粗壮，茎皮灰黄褐色。单数羽状复叶互生，长 12cm～40cm；小叶 7～13，宽卵形、卵形或卵状披针形，长 4.5cm～11cm，顶端渐尖，基部圆形或宽楔形，全缘，幼时两面有毛；叶轴疏生柔毛；叶柄长 3cm～10cm；小叶柄长 0.2cm～0.5cm，密生短柔毛。总状花序侧生，下垂，长 15cm～30cm；花大，长 2.5cm～4cm；花萼钟状，疏生柔毛，顶端浅裂为 5 齿，上部 2 齿不明显；花冠蝶形，紫色或深紫色，花瓣 5，旗瓣宽圆形，顶端微凹，内面近基部有 2 个胼胝体状附属物，翼瓣镰形，基部下延成耳，龙骨瓣长卵形，顶端微弯，基部有耳；雄蕊 10，2 组(9＋1)；子房线形，花柱弯曲，柱头头状。荚果扁，长条形，长 10cm～20cm，密生黄色绒毛；种子扁圆形。

生于山坡、林缘、溪谷边，常栽培。分布于我国南北各地。

采收加工　夏季采收，晒干。

药材性状　枝圆柱形，直径 4mm～8mm；表面灰褐色或褐色，具细纵纹；质硬，断面淡黄色，纤维性。叶为单数羽状，互生，长 12cm～40cm；小叶 7～13，常部分脱落，卵形或卵状披针形，长 4.5cm～11cm，宽约 2.5cm，顶端渐尖或钝尖，基部宽楔形至近圆形，全缘，上面褐色或红褐色，下面灰绿褐色，两面有白色疏柔毛或无毛；叶轴疏生柔毛，腹面有 1 纵沟；小叶柄密生短柔毛；薄革质或厚纸质；质轻脆，易折断。气微，味微苦涩。以枝条粗壮，叶完整、无脱落者为佳。

性味和功用　甘、苦，温。有小毒。止痛，杀虫。用于腹痛，蛲、蛔虫病。常用量 1g～3g。

附注　紫藤根祛风通络；用于痛风，咳嗽，水肿，关节炎；常用量 9g～15g。种子甘，温；有毒；杀虫，止痛，解毒；用于食物中毒，蛲虫病，筋骨疼痛，恶疮；常用量种子炒透 6g～15g。



图 175　紫藤

四、叶类

山　　矾

别名　甜柴叶、山桂花。

来源　本品为山矾科植物山矾 Symplocos sumuntia B－H. ex D. Don (S. caudata Wall. ex A. DC.)的叶。

原植物　山矾(图 176)为常绿乔木或灌木，高约 2.5m。叶互生，薄革质，卵形至倒披针状椭圆形，长 3.5cm～8cm；叶柄长 0.5cm～1cm。总状花序生于二年生小枝上部叶腋，被开展的黄色柔毛，有花 10 余朵；苞片早落；小苞片与苞片同形；花梗长 2mm～3mm，被短柔毛；花萼钟状，长 2mm～2.5mm，裂片 5，三角状卵形，与筒部等长或稍短，背面有微柔毛；花冠白色，5 深裂几达基部，长 4mm～4.5mm，裂片圆卵形，背面有微柔毛；雄蕊 25 枚～35 枚，基部合生；花盘环状；子房下位，3 室，花柱 1。核果卵状坛形，长 7mm～10mm，顶端宿存萼裂片直立，有时脱落。

生于海拔 200m～1 500m 的向阳山坡、山谷、溪边灌丛中或林间。分布于我国东部、中部、南部和西南部。尼泊尔、不丹、印度也有。

采收加工　全年均可采收，鲜用或晒干。

药材性状　本品常卷缩，展开后呈卵形、狭倒卵形、倒披针状椭圆形，黄绿色或金黄色，长 3.5cm～8cm，宽 1.5cm～3cm，顶端尾尖，基部楔形、宽楔形或圆形，边缘具浅锯齿或波状钝齿，中脉在上面凹下，侧脉每边 4 条～6 条，和网脉在两面均隆起；叶柄长 5mm～10mm。质轻脆。气微，味涩。以干燥、色黄绿者为佳。

性味和功用　酸、涩，微甘，平。清热利湿，收敛，止渴。用于急性扁桃体炎，肺结核，咯血，便血，久痢，急性中耳炎，鹅口疮，风火赤眼，急性中耳炎。常用量 15g～30g；外用鲜品适量捣烂取汁用。

附注　山矾花苦、微辛，平；理气化痰；用于咳嗽，胸闷；常用量 6g～10g。根苦、微凉；清热利湿，祛风，凉血；用于湿热黄疸、痢疾，风火头痛，腰背关节疼痛，血崩，口渴，跌打损伤；常用量 15g～30g。



图 176　山矾

千 年 桐

别名 皱桐、广东油桐。

来源 本品为大戟科植物木油桐 Aleurites montana (Lour.) Wils. 的叶。

原植物 木油桐(图 177)为落叶乔木，高达 8m。树皮灰色。幼枝有明显皮孔，无毛。叶互生，宽卵形至圆卵形，长 8cm～20cm，顶端短尖或短渐尖，基部心形或截平，边全缘或 2～5 中裂，在裂片间弯缺的底部常有杯状腺体，幼时两面被黄褐色短柔毛，后渐变无毛；叶柄长 7cm～17cm，顶端的 2 个腺体有柄。花单性，雌雄同株或异株，排列于枝端成短圆锥花序；萼不规则，2 裂～3 裂，裂片卵形；花冠直径约 2.5cm，花瓣 5，白色或基部带红色，倒卵形或倒卵状椭圆形，顶端圆；雄花有雄蕊 8 枚～10 枚，花丝基部合生，上端分裂；雌花子房 3 室，每室有胚珠 1 个，花柱 2 裂，顶端弯曲。核果卵形、陀螺形或近长圆形，直径 3cm～5cm，具尖头，表面有狭棱 3 条，中间有网状皱纹；种子具厚壳状种皮。

生于向阳山坡、林中，常栽培。分布于我国东南至西南部各省(自治区)，越南也有。

采收加工 夏季采收，晒干或鲜用。

药材性状 本品多卷缩或破碎，棕红色或棕褐色，完整者润湿后展开呈宽卵形或卵圆形，长 8cm～20cm，宽 7cm～18cm，顶端短尖或短渐尖，基部心形或截平，边全缘或上端 2～5 浅裂至中裂，在裂片弯缺底部常有 1 个杯状腺体，两面被黄褐色短毛或无毛，基出脉 3～5，侧脉间具平行脉，两面均隆起；叶柄长 7cm～17cm，顶端 2 个杯状腺体。气微弱，味苦。以叶片完整、色红棕者为佳。

性味和功用 苦，寒；有毒。清热解毒，杀虫。用于痈肿疮毒，毒蛇咬伤，烫火伤，癣疥，肠炎痢疾。常用量 6g～15g；外用适量研末撒敷患处或鲜品取汁搽。

附注 木油桐根辛，寒，有毒；消积利水；用于食积腹胀，胸膈痞满，湿气水肿。花苦，寒；有毒；适量研末调麻油外擦治烫火伤，疮疡。



图 177　木油桐

风 车 子

别名 华风车子、四角风、使君子藤。

来源 本品为使君子科植物风车子 Combretum alfredii Hance 的干燥叶。

原植物 风车子(图 178)为直立或攀援状灌木，高 1.5m～5m。茎多分枝，小枝近方形，有纵槽，密生黄褐色绒毛和橙黄色的鳞片，老枝近光滑。叶对生或近对生，革质或厚纸质，长椭圆至宽倒披针形，长 10cm～20cm，顶端短尖，基部宽楔形至近圆形，全缘，两面无毛而稍粗糙，下面具黄褐色或橙黄色鳞片；叶柄长 7mm～15mm。穗状花序腋生与顶生，顶生者组成圆锥花序，花序轴有棕黄色绒毛和金黄色鳞片；小苞片线形；花两性，直径约 5mm；花萼钟状，长约 4mm，外面有黄色而有光泽的鳞片和被粗毛；内面具一黄色而有光泽的毛环，毛突出于萼喉之一，顶端 4 裂～5 裂，裂片直立；花瓣 4～5，狭倒卵形，长约 2mm，基部有柄；雄蕊 8，极突出；子房下位，稍有 4 棱，花柱低于花药。果纺锤形，有 4 翅，轮廓圆形或椭圆形，长 1.7cm～2.5cm，被黄色或橙黄色小鳞片，翅纸质，等大，成熟时红色或紫红色。

生于海拔 200m～800m 的疏林下或路旁。分布于广东、广西、四川、江西、湖南等省、区。

采收加工 秋、冬季采收，阴干。

药材性状 呈长椭圆形、宽披针形、椭圆状倒卵形或卵形，黄绿色，长 10cm～20cm，宽 4.8cm～7.3cm，顶端渐尖，基部楔形或钝圆，边全缘，两面无毛而稍粗糙，或在背面脉上有粗毛，在放大镜下可见密被白色圆形凸起的小斑点，背面有黄褐色或橙黄色鳞片，中脉凸起，侧脉 6 对～7 对，脉腋内有丛生粗毛；叶柄有槽、被毛或具鳞片。质轻。气无，味淡。以色绿者为佳。

性味和功用 甘、淡、微苦，平。健胃，驱虫，消炎。用于蛔虫，鞭虫，小儿消化不良，烧烫伤。常用量 9g～15g(小儿酌减)；外用适量取煎液涂患处。



图 178　风车子

四川冬青

别名 冬青。

来源 本品为冬青科植物四川冬青 Ilex szechwanensis Loes. 的叶。

原植物 四川冬青(图 179)为常绿灌木，高 1m～3m。小枝灰绿色或黄褐色，近四棱形，被柔毛。叶互生，革质，卵状椭圆形至近披针形，长 3.5cm～8cm，顶端急尖至短渐尖，基部楔形，边缘有锯齿，下面具黄褐色腺点；叶柄长 4mm～6mm；托叶钻形，膜质，宿存。花单性，白色或淡黄绿色，雌雄异株；雄花为单花或成聚伞花序，单生或簇生于当年生枝基部叶腋或鳞片腋内，稀生于二年生枝叶腋内，总花梗长 4mm～10mm，苞片 1，三角形，花梗长 2mm～3mm，小苞片 2；花数 4～7，花萼直径 2mm～2.5mm，裂片三角形，边缘啮蚀状或疏生缘毛，花冠辐状，花瓣宽卵形，长约 2.5mm，基部稍连合，雄蕊短于花瓣，退化子房扁球形；雌花多单生，极稀 2～3 花簇生，花 4 数，花萼与雄花花萼相似，花冠直立，退化雄蕊很短，子房近球形。果球形，直径 7mm～8mm，熟后黄绿色或变黑色，宿存萼平展，宿存柱头明显 4 裂；分核 4，矩圆形，具条纹。

生于海拔 1 000m～2 000m 的山地林中。分布于我国华南、华中地区及四川、贵州、云南等省。

采收加工 全年均可采收，晒干或鲜用。

药材性状 叶片平直，卵状椭圆形、椭圆形、矩圆形或披针形，长 3.5cm～8cm，宽 2cm～4cm，革质，顶端急尖或短渐尖，基部楔形，边缘具锯齿，上面稍具光泽，青绿色或黄绿色，下面色稍浅，具黄褐色腺点，无毛或疏被柔毛；中脉在上面平或微凹入，下面隆起，侧脉 6 对～7 对。叶柄长 4mm～6mm，被短柔毛，上面具浅沟，下面具皱纹。质轻脆，易折断。气微，味微苦。以叶片大、色绿、味苦者为佳。

性味和功用 苦，凉。清热解毒，凉血止血。用于咽喉肿痛，疮疖肿毒，湿热白带，乳腺炎，功能性子宫出血。常用量 10g～30g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图 179　四川冬青

四川蜡瓣花

别名 倒牵牛。

来源 本品为金缕梅科植物四川蜡瓣花 Corylopsis willmottiae Rehd. et Wils. 的干燥叶。

原植物 四川蜡瓣花(图 180)为灌木或小乔木，高约 5m。嫩枝纤细，老枝有白色细小皮孔。叶互生，倒卵形、卵形或宽倒卵形，长 4cm～9cm，顶端急尖，基部不等侧微心形或圆形，边缘有不明显锯齿，嫩叶下面脉上有毛，渐变秃净；叶柄长 1cm～1.5cm；托叶长矩圆形，紫色，长 1.2cm～2cm。总状花序生于具 1 片～3 片叶的新枝上，长 4cm～6cm，疏生 12 朵～20 朵花；总花梗长 1.5cm～2.5cm；序轴有毛；总苞状鳞片卵圆形，长 1cm～1.5cm；苞片卵形，长 6mm～8mm；小苞片长约 3mm，两面被柔毛；萼筒长约 1mm，萼齿 5，卵形，顶端圆，长约 1.5mm；花瓣 5、浅黄色，广倒卵形，长 3mm～4mm，有短柄；雄蕊 5，长约 3mm；退化雄蕊 2 裂；子房 2 室，花柱长 3mm～4mm。蒴果木质，卵圆形，长 7mm～8mm，具宿存花柱，萼筒包围蒴果过半，成熟后两瓣开裂。

生于海拔 2 000m～2 600m 的山地林边。分布于四川省。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 叶多卷缩，展平后呈倒卵形、卵形或宽倒卵形，长 4cm～9cm，宽 2cm～6cm，顶端急短尖，基部圆形或浅心形，不对称，边缘上半部有不显著的小齿突，上面秃净无毛，灰绿色，下面脉上有毛或无毛，侧脉 7 对～9 对，在上面下陷，第 1 对侧脉第 2 次分枝侧脉不强烈；叶柄长 1cm～1.5cm，无毛。质轻脆。气微，味淡。以叶片完整、色绿者为佳。

性味和功用 甘、淡，凉。清热除烦。用于发热心烦，夜寐不宁，烦乱昏迷。常用量 9g～30g。

附注 四川蜡瓣花根皮功效同叶，另适量泡酒服治枯痨内伤。




图 180　四川蜡瓣花

白　檀

别名　碎米子树、乌子树、灰木。

来源　本品为山矾科植物白檀 Symplocos paniculata (Thunb.) Miq. 的叶。

原植物　白檀(图 181)为灌木或小乔木，高 1m～3m。嫩枝有灰白色柔毛，老枝无毛。叶互生，膜质或薄纸质，宽侧卵形、椭圆状倒卵形或卵形，长 3cm～11cm，顶端急尖或渐尖，基部楔形或近圆形，边缘有细尖锯齿，齿尖具腺体，上面无毛或幼时沿脉有柔毛，下面通常有柔毛或仅脉上有柔毛；中脉在下面凹下；叶柄长 3mm～5mm。圆锥花伞在新枝上顶生和腋生，长 4cm～8cm，较松散，通常有柔毛，苞片线形，早落，有褐色斑点；花萼片 2mm～3mm，萼筒褐色，无毛或有疏柔毛，裂片 5，半圆形或卵形，淡黄色，有脉纹，边缘有毛；花冠白色，芳香，长 4mm～5mm，5 深裂几达基部；雄蕊多数，花丝基部合生成不明显 5 体；子房 2 室，花盘具 5 凸起的腺点。核果无毛，卵球形，稍偏斜，长 5mm～8mm，熟时蓝色，宿存萼裂片直立。

生于海拔 700m～2 500m 的山坡、路边或林中。分布于我国东北、华北、华中、华南、西南地区。朝鲜、日本、印度也有。

采收加工　夏、秋季采收，晒干或鲜用。

药材性状　多皱缩或破碎，黄绿色，完整者湿润后展开呈宽倒卵形、椭圆状倒卵形或卵形，长 3cm～11cm，宽 2cm～4cm，顶端短尖或渐尖，基部宽楔形至近圆形，边缘有尖锐锯齿，两面有柔毛或仅叶背脉上有毛，中脉在上面凹下，侧脉 4 对～8 对，明显；叶柄长 3mm～5mm。膜质或薄纸质，轻脆。气微香，味苦。以叶片完整，色绿者为佳。

性味和功用　苦，温。祛瘀，行气，止痛，解毒。用于跌打损伤，腰肌劳损，脘腹胀痛，乳腺炎，疝气，疮肿，外伤出血。常用量 9g～15g；外用鲜品适量捣烂敷患处。

附注　白檀根祛瘀止血，理气止痛；用于跌打损伤，外伤出血，腰腿痛，胃痛。全株苦，涩，温。消炎，软坚，调气；用于乳腺炎，淋巴腺炎，疝气，肠痈，胃癌，高热不语，火烧伤。常用量 9g～30g；外用适量。



图 181　白檀

交 让 木

别名 水红补、画眉珠。

来源 本品为交让木科植物交让木 Daphniphyllum macropodum Miq. 的叶。

原植物 交让木(图 182)为常绿乔木，高 4m～15m。树皮灰白色，平滑；枝粗壮，小枝灰绿色，疏生椭圆形皮孔，叶痕明显，半圆形而上端微凹。单叶互生，多密集聚于枝端，新叶开放时，老叶全部凋落，故有“交让”木之称，叶片长方椭圆形，长 9cm～20cm，上面暗绿色，下面色较淡。小花淡绿色，单性，雌雄异株，成腋生的短总状花序，簇生枝顶，花序长 3.5cm～10cm 余；花小，雄花不具花被而有长梗，雄蕊 8～10，花丝极短，花药椭圆形，较花丝长，带红色，后变暗红色；雌花花被片 8～10，花梗较雄花梗略长，退化雄蕊 8～10，贴生子房基部，子房 2 室，柱头 2 裂，裂片反卷，上面密生红色柔毛，花后变黑色。核果长椭圆形或近球形，长约 1cm，径 6mm～8mm，成熟时蓝黑色，被白霜，具宿存柱头，外果皮肉质，内果皮坚硬。

生于阴湿山坡、溪谷及常绿林中。分布于长江流域以南各省区及台湾省。朝鲜、日本也有。

采收加工 全年采收，鲜用或晒干。

药材性状 鲜叶呈长方椭圆形，厚革质，长 9cm～20cm，宽 3cm～5cm，顶端短尖，基部楔形，全缘，上面暗绿色，有光泽，下面灰绿色，略被白霜，两面无毛。中脉带红色，侧脉不甚明显。叶柄粗壮，长 1.8cm～4cm，平滑，红色，折断后带香气。

性味和功用 苦，凉。有毒。消肿拔毒，杀虫。用于疮疖肿毒，骨折，蛇咬伤。外用适量，加食盐少许捣烂敷患处。

附注 1. 叶煎水喷洒，可杀蚜虫。2. 种子功效同叶。3. 根苦、涩，凉。有毒。用于感冒发热，扁桃体炎，肝脾肿大，蛇咬伤，骨折。



图 182　交让木

黄 泡 叶

别名 小黄泡。

来源 本品为蔷薇科植物黄泡 Rubus pectinellus Maxim. 的干燥叶。

原植物 黄泡(图 183)为草本或半灌木，高 8cm～20cm。茎匍匐，节处生根，有长柔毛和稀疏微弯针刺。单叶互生，叶片纸质，近圆形，长 2.5cm～7cm，顶端圆钝，基部心形，边缘有不整齐钝锯齿或重锯齿，两面被稀疏长柔毛，下面沿叶脉有细针刺；叶柄长 1.5cm～6cm，有长柔毛和针刺；托叶离生，长 6mm～9mm，有长柔毛，二回羽状深裂，裂片线状披针形。花 1 朵～3 朵生于小枝顶端，直径 1.5cm～2cm；花梗长 2cm～4cm，被长柔毛和针刺；苞片和托叶相似；花萼长 1.5cm～2cm，外面密被针刺和长柔毛，萼筒卵球形，裂片 5，不等大，叶状，卵形至卵状披针形，外萼片宽大，梳齿状深裂或缺刻状，内萼片较狭，全缘或有少数锯齿；花瓣 5，狭倒卵形，白色，有爪，稍短于萼片；雄蕊多数，直立；雌蕊多数。聚合果球形，熟时红色，直径 1cm～1.5cm，具反折萼片。

生于海拔 1 000m～3 000m 的山坡林中。分布于湖南，江西，福建，台湾，四川，云南，贵州等省。日本、菲律宾也有。

采收加工 春、夏季采收，晒干。

药材性状 本品常卷缩或破碎，灰绿色，完整者为心状近圆形，长 2.5cm～7cm，宽 3cm～9cm，顶端圆钝，基部心形，边缘有时波状浅裂或 3 浅裂，有不整齐钝锯齿或重锯齿，两面被稀疏长柔毛，下面脉上有针刺，基生脉 3～5，网脉不明显，叶柄具长柔毛和针刺。质轻，易破碎。气无，味微苦涩。以叶片完整、色绿者为佳。

性味和功用 苦、微涩，凉。清热利湿，解毒，收敛。用于黄水疮，湿热疮毒。外用适量研末撒敷患处。

附注 黄泡根用于治水泻，吐血，瘰疬等；鲜根 30g～60g 煎服。




图 183　黄泡

光叶绣线菊

别名 绣线菊、树柴胡、火烧尖。

来源 本品为蔷薇科植物光叶绣线菊 Spiraea japonica L. f. var. fortunei (Planch.) Rehd. 的干燥叶。

原植物 光叶绣线菊(图 184)为灌木，高 1m～1.5m。小枝棕红色或棕黄色，细长，开展，有柔毛或脱落近无毛。叶互生，长圆形或长圆状披针形，长 5cm～11cm，边缘有尖锐重锯齿；叶柄长 3mm～5mm，具短柔毛或无毛。复伞房花序生于当年生的直立新枝顶端，直径 4cm～8cm，花朵密集，花梗长 4mm～6mm，被柔毛；苞片披针形至线状披针形；花粉红色至红色，直径 4mm～6mm；花萼外面有疏短柔毛，萼筒钟状，萼片 5，卵状三角形，顶端急尖，内面近顶端处有短柔毛；花瓣 5，卵圆形至圆形，顶端钝或微凹，长 2.5mm～4mm；雄蕊多数，远较花瓣长；花盘圆环形，不发达；心皮 5，离生。蓇葖果 5，半开张，常沿腹缝线开裂，花柱顶生，稍倾斜，萼片常直立；种子小，长圆形。

生于海拔 700m～3 000m 的山坡、田野或杂木林下。分布于陕西、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、云南、贵州、四川等省。

采收加工 春、夏、秋季采收，鲜用或晒干。

药材性状 本品呈长圆形或长圆状披针形，长 5cm～11cm，宽 1.5cm～4cm，顶端短渐尖，基部楔形，边缘有尖锐重锯齿，上面暗绿色或绿灰色，有明显皱纹，下面色较浅，有白粉，两面无毛，常皱缩或破碎；质轻脆。气微，味淡。以叶片完整，色绿者为佳。

性味和功用 淡，平。消肿解毒，去腐生肌。用于慢性骨髓炎，刀伤。外用鲜品适量捣烂敷患处或研末调涂。

附注 光叶绣线菊根、茎：苦，凉；清肺化痰，明目，解毒止痛；用于支气管炎，小儿肺炎，骨髓炎，头痛，牙痛，肋间神经痛，流行性感冒，眼赤，目翳，咽喉肿痛；常用量 15g～60g，外用适量煎水洗。果实用于痢疾，疝气，发烧，常用量 9g～15g。全株解毒生肌，通经，通便，利尿；用于慢性骨髓炎，闭经，月经不调，便秘腹胀，小便不利，外伤出血，常用量 12g～15g。



图 184　光叶绣线菊

红 果 楠

别名 红树。

来源 本品为樟科植物红果黄肉楠 Actinodaphne cupularis (Hemsl.) Gamble 的干燥叶。

原植物 红果黄肉楠(图 185)为灌木或小乔木，高 2m～10m。小枝细，灰褐色，幼时有灰色或灰褐色微柔毛。叶通常数片簇生于枝顶成轮生状，少数为对生，长圆形至长圆状披针形，长 5.5cm～13.5cm，两端渐尖或急尖，革质，上面绿色，微有光泽，下面粉绿色，有灰色或灰褐色短柔毛，后毛渐脱落；叶柄长 3mm～8mm。伞形花序单生或数个簇生于枝侧，无总梗；苞片 5～6，外被锈色短柔毛，开花时脱落；花单性，雌雄异株；每一雄花序有雄花 6 朵～7 朵，花梗及花被筒密被黄褐色长柔毛；花被裂片 6(～8)，卵形，长 2mm～3mm，几相等，外面中肋有柔毛；能育雄蕊 9，成 3 轮，花丝长约 4mm，花药椭圆形，4 室，均内向瓣裂，第 3 轮花丝基部两侧的腺体有柄；退化雌蕊细小；雌花序常有雌花 5 朵，子房椭圆形，柱头 2 裂。果卵形或卵圆形，长约 13mm，直径约 10mm，顶端有短尖，熟时红色；果托杯状，边全缘或粗波状。

生于海拔 360m～1 300m 的山坡密林、溪旁或灌丛中。分布于湖北、湖南、四川、广西、云南、贵州等省、区。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 呈长圆形至长圆状披针形，上面棕黄色，有光泽，下面色较淡，有灰色或灰褐色短柔毛至无毛，长 5.5cm～13.5cm，宽 1.5cm～2.7cm，两端渐尖或急尖，全缘；羽状脉，中脉在上面下陷，下面突起，侧脉每边 8 条～13 条，斜展，纤细，在下面明显，稍突起；叶柄长 3mm～8mm，有沟槽，被灰色或灰褐色短柔毛；革质。气香，味辛。以叶色棕黄、香气浓、味辛者为佳。

性味和功用 辛，凉。清热解毒，杀虫。用于热毒疮痈，烫伤，痔疮，脚癣。外用适量煎水洗患处。

附注 红果黄肉楠根功效同叶。



图 185　红果黄肉楠

苦 竹 叶

别名 伞柄竹。

来源 本品为禾本科植物苦竹 Pleioblastus amarus (Keng) Keng f. 的嫩叶。

原植物 苦竹(图 186)为多年生常绿竹状灌木，高达 4m。根状茎竹鞭状。秆圆筒形，径约 1.5cm，幼时具白粉，下部节间长 25cm～40cm，每节有 3～6 分枝，箨环褐色，隆起，秆环不甚突起；箨鞘细长三角形，长 15cm～20cm，厚纸质至近革质，稻草色，背面有时具细小紫色斑点，被棕色或白色小刺毛，基部尤密，边缘密生金黄色纤毛；箨耳微小，深褐色，具直立棕色缝毛；箨舌平截，长 1mm～2mm，边缘密生纤毛，箨叶狭披针形，长为箨鞘的 1/3～1/2，边缘具细齿且易内卷；叶互生，叶柄短；叶鞘无毛；叶舌长 0.5mm～2mm；叶片披针形，长 8cm～20cm，质坚韧。花枝基部为鳞片所包围，多数穗状花序排成总状；小穗有花 8 朵～12 朵，长 4cm～6cm；花具颖 3 片～5 片及内、外稃各 1 片；雄蕊 3；子房基部有鳞被 3，花柱极短，柱头羽毛状。

生于海拔 1 000m 以下的向阳山坡或山谷平原。分布于我国长江流域各省及安徽、陕西省。

采收加工 全年均可采收，鲜用或晒干。

药材性状 叶片呈披针形，常卷成细筒状，长 8cm～20cm，宽 1cm～1.5cm，顶端渐尖，基部宽楔形或稍带圆形，边缘具微小锯齿而显粗糙，主脉明显，次脉每边 4 条～8 条，平行，小横脉不甚清楚，表面灰绿色，平滑，下面粗糙有毛。质脆而有弹性。气微弱，味微苦。以叶嫩色绿，卷成筒状者为佳。

性味和功用 苦，寒。归肝、胃经。清热明目，利尿，解毒，杀虫。用于热病心烦，口渴，口舌生疮，目赤，失音，糖尿病，小儿头疮、耳疮，小便黄少，汤火伤。常用量 6g～15g。外用烧存性研末涂患处。

附注 苦竹根茎功效同嫩叶。苗(竹笋)用于糖尿病，面目发黄，脚气。茎秆除去外皮后刮下的中间层，可代中药“竹茹”用。




图 186　苦竹

1. 竹笋　2. 茎叶

剑叶金鸡菊

别名 大叶金鸡菊，痢疾草。

来源 本品为菊科植物剑叶金鸡菊 Coreopsis lanceolata L. 的叶。

原植物 剑叶金鸡菊(图 187)为多年生草本，高 30cm～70cm。有纺锤状根。茎直立，上部多分枝，具短柔毛，有短柔毛。茎基部叶成对簇生，有长柄，叶片匙形或线状倒披针形，长 3.5cm～9cm，顶端钝尖或圆形，基部楔形，全缘；茎上部叶少数，全缘或 3～5 深裂，裂片长圆形或线状披针形，顶裂片较大；叶柄通常长 6cm～7cm，基部膨大，有缘毛；最上部叶线形或线状披针形，无柄。头状花序单生茎顶或腋生，直径 4cm～6cm，花梗长 10cm～30cm；总苞半球形，总苞片 2 列，每列约 8 枚，基部多少结合，内外层近相等，披针形，长 6mm～10mm，顶端尖；边花舌状，1 列，无性或雌形，舌片倒卵形或楔形，黄色，全缘或有齿，开展，中央管状花，狭钟形，黄色，两性，上端 5 齿裂，瘦果圆形或椭圆形，长 2.5mm～3mm，边缘有宽翅，顶端有 2 短鳞片。

原产北美洲。我国各地有栽培。

采收加工 夏、秋采收，晒干或鲜用。

药材性状 本品多皱缩破碎，完整者湿润后展开呈匙形，倒披针形或线状倒披针形，长 3.5cm～7cm，宽 10mm～15mm，表面黄褐色或黑褐色，无毛或有稀疏白色柔毛，顶满钝尖或圆钝，基部狭，边全缘或 3～5 深裂，裂片长圆形或线状披针形，顶裂片较大，质轻脆；叶柄长 6cm～7cm，基部膨大，黄褐色，有缘毛。气微，味淡、微辛。以叶片完整、色黄褐者为佳。

性味和功用 辛，平。化瘀，消肿，清热解毒。用于痢疾，刀伤，无名肿毒。常用量 9g～15g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图 187　剑叶金鸡菊

1. 根　2. 花枝

香 叶 子

别名 三股筋、云南桂、少花新樟。

来源 本品为樟科植物新樟 Neocinnamomum delavayi (Lec.) H. Liou 的干燥叶。

原植物 新樟(图 188)为灌木或小乔木，高 1.5m～5m，有时可达 10m。树皮黑褐色；枝纤细，具条纹，幼时被锈色或白色细绢毛 老渐脱落。叶互生、椭圆状披针形、卵圆形，长 4cm～11cm，顶端渐尖，基部锐尖至楔形、全缘，幼时两面密被绢毛，老时上面变无毛，三出脉；叶柄长 5mm～10mm。团聚花序腋生，具(1～)4～6(～10)花；苞片三角状钻形，长约 0.5mm，被锈色绢质短柔毛；花小，黄绿色；花梗纤细，长 5mm～8mm，密被锈色绢质短毛，后渐稀少；花被筒极短；花被裂片 6，两面密被锈色绢质短毛，三角状卵圆形，近等大，外轮长约 1.8mm，内轮稍长，均尖锐；能育雄蕊 9，花药 4 室，几横排成一列，上 2 室内向，下 2 室侧外向，第 3 轮雄蕊花丝基部有 1 对具长柄的腺体，4 室，外向瓣裂；退化雄蕊具柄，柄被柔毛；子房椭圆状卵形，花柱短，柱头盘状。果卵球形，长 1cm～1.5cm，直径 7mm～10mm，熟时红色；果托高脚杯状，花被片宿存。

生于海拔 1 100m～2 300m 的林中、林缘、灌丛中。分布于云南、四川、西藏等省、区。

采收加工 全年均可采收，晒干或鲜用。

药材性状 呈卵形，宽卵形，或椭圆状披针形，上面褐黄色，下面粉褐色，长 4cm～11cm，宽 1.5cm～6cm，顶端渐尖，基部锐尖或楔形，两侧常不相等，两面密被锈色或白色绢状毛，或上面无毛，下面被毛；三出脉在上面凹陷，下面凸起，基生侧脉弧状上升至叶片 1/2～3/4 处，其余侧脉细小，细网状；叶柄长 5mm～10mm，密被短而贴生的绢质柔毛或被稀毛，腹凹背凸；近革质，轻韧。气香，味辛。以色褐黄、气香者为佳。

性味和功用 辛、涩、温。祛风湿，舒筋络，止血，温中散寒，止痛。用于风湿痹痛，跌打损伤，刀伤出血，胃腹冷痛，扭伤。常用量 3g～9g，水煎或浸酒服；外用适量捣烂敷伤处。



图 188　新樟

狭叶洋地黄

别名 毛花洋地黄。

来源 本品为玄参科植物狭叶洋地黄 Digitalis lanata Ehrh. 的干燥叶。

原植物 狭叶洋地黄(图 189)为 2 年生或多年生草本，高约 1m。茎单生或基部分枝。基生叶莲座状，叶柄具狭翅，边全缘或具不规则锯齿，茎生叶互生，长披针形或线状披针形，长 5cm～9cm，顶端锐尖，基部楔形下延，略抱茎，全缘。总状花序顶生，花排列朝向 1 侧，下垂；苞片披针形或线形；花萼 5 深裂，裂片椭圆状卵形，覆瓦状排列，略不等大；花冠筒状钟形，长约 2cm，通常为乳白色，檐部唇形，上唇 2 浅裂，下唇稍长，3 浅裂，中裂片较侧裂片长，半圆形，边缘有睫毛；雄蕊 4，2 强，不外露，花丝基部与花冠筒合生；子房上位，2 室，柱头 2 裂成叉状。蒴果圆卵形，室间开裂，顶端尖，密被腺毛；种子多数，短棒状，细小，被毛。

原产欧洲。我国部分地区有栽培。

采收加工 夏、秋季采收(以 5 月间花未开放时采收有效成分含量较高)，立即晒干或于摄氏 50℃～60℃下烘干。

药材性状 本品多皱缩、破碎，完整叶片润湿后展开呈长披针形或线状披针形，长 5cm～9cm，顶端锐尖，基部楔形下延，边全缘或具不规则疏齿，基生叶叶柄具狭翅，茎生叶无叶柄。上表面暗绿色，叶脉微下凹，下表面淡灰绿色或灰绿色。质轻脆。气微，味微苦。以叶片完整、色绿、味苦者为佳。

性味和功用 苦，凉。归心经。强心，利尿，用于兴奋心肌，增加心肌收缩力；使收缩期的血液输出量大为增加；改善血液循环。对各种伴有心力衰竭的心脏病，室上性心动过速，心房纤维颤动有显著疗效，对心脏水肿患者有利尿作用。



图 189　狭叶毛地黄

1. 幼株；2. 花枝

大 青 叶

别名 大青。

来源 本品为蓼科植物蓼蓝 Polygonum tinctoria L. 的干燥叶。

原植物 蓼蓝(图 190)为一年生草本，高 50cm～80cm。茎直立，单一或分枝，有棱和明显的节，常带红紫色，几无毛。叶互生，卵形或宽椭圆形，长 3cm～8cm，顶端圆钝，基部宽楔形、平截或近圆形，边全缘，两面无毛或下面沿脉有粗短伏毛，灰绿色；叶柄长 1cm～1.5cm；托叶鞘膜质，圆筒状，具长睫毛。穗状花序顶生或腋生，长 4cm～8cm；苞片膜质，长约 3mm，有睫毛，顶端截形，有纤毛；花被淡红色，5 深裂，裂片卵形，长约 3mm；雄蕊 6～8，短于花被，花丝基部有蜜腺；子房卵状椭圆形，花柱 3。瘦果卵形，有 3 棱，长约 2mm，棕褐色，有光泽，包于宿存的花被内，内含种子 1 枚。

多栽培或为半野生状态。分布于辽宁、河北、山东、陕西省。现全国各地广为栽培。朝鲜、日本也有。

采收加工 夏、秋季枝叶茂盛时采收两次，除去茎枝及杂质，晒干。

药材性状 本品多破碎，皱缩，完整者展平后呈椭圆形至卵形，长 3cm～8cm，宽 2cm～5cm。蓝绿色或黑蓝色，顶端钝，基部渐狭，全缘。叶脉浅黄棕色，于下表面略凸起，叶柄扁平，偶带膜质托叶鞘。气微，味微涩而稍苦。以干燥、叶片完整、色蓝者为佳。

性味和功用 苦，寒。归肝、心、胃经。清热解毒，凉血止血，消肿。用于流行性乙型脑炎，流行性感冒，流行性腮腺炎，上呼吸道感染，肺炎，咽喉肿痛，急性肝炎，菌痢，口疮，吐血，衄血，痈疽肿毒，蛇咬伤。常用量 9g～15g。脾胃虚寒者忌服。



图 190　蓼蓝

五、花类

玉　簪

别名　白玉簪、白鹤花、白萼。

来源　本品为百合科植物玉簪 Hosta plantaginea (Lam.) Aschers. 的干燥花。

原植物　玉簪(图 191)为多年生草本。根状茎粗短，生有多数肉质须根，叶基生，成丛，叶片卵形，长 14cm～25cm；叶柄长 20cm～40cm。花葶由叶丛中抽出，高 40cm～80cm，具几朵至 10 余朵花，外苞片卵形或披针形，长 2.5cm～7cm，内苞片很小；花白色，芳香，单生或 2 朵～3 朵簇生；花梗长 1cm～2cm；花被漏斗状，部细长，长 4cm～6cm，喉部扩大，裂片 6，长椭圆形，顶端渐尖，长 3.5cm～4cm；雄蕊 6，与花被近等长或略短，下部约有 15mm～20mm 贴生于花被管上，花丝纤细，花药丁字着生；子房上位，3 室，长约 1.5cm，花柱伸出，柱头小。蒴果圆柱状，有 3 棱，长 4cm～6cm，直径约 1cm。种子黑色，有光泽，边缘有翅。

生于海拔 2 200m 以下的林下、草坡或岩石边，各地常栽培。分布于我国东部、中部、南部和西南部。日本也有。

采收加工　夏、秋季采收，阴干。

药材性状　花多皱缩成条状，稍破碎。完整者长 8cm～12.5cm，花被漏斗状，褐色或黄白色，筒部细，直径 5mm～10mm，喉部扩大，裂片 6，长椭圆形，顶端渐尖，比筒部短，宽约 1.2cm；花丝 6，约与花被等长，下部与花被筒贴生，有的残存丁字着生的花药；花柱细长，超出雄蕊，子房上位，长 1cm～1.5cm。轻软、气微香，味微苦。以花被完整、黄白色者为佳。

性味和功用　甘、微苦，凉；有小毒。归肺、肾经。清咽，利尿，通经。用于咽喉肿痛，小便不通，疮毒，烧伤，红崩，白带。常用量 2g～3g；外用适量捣烂敷患处。

附注　玉簪根甘、辛，寒；有毒；归心、肝经；解毒，消肿，止血，止痛；用于痈疽，瘰疬，吐血，骨鲠，咽肿。全草甘，寒；有毒：生肌拔脓，解毒；用于乳腺炎，中耳炎，疮痈肿毒，小腿慢性溃疡，烧伤，蛇咬伤，并解斑蝥毒。常用量 3g～6g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图 191　玉簪

1—2. 全株

金 盏 菊

别名 金盏花、常春菊。

来源 本品为菊科植物金盏菊 Calendula officinalis L. 的花序。

原植物 金盏菊(图 192)为一年生草本，高 20cm～60cm。茎上部有分枝，被腺状伏毛，有纵棱。叶互生，质稍厚，茎下部叶匙形，全缘，上部叶长椭圆形至长倒卵形，长 5cm～9cm，顶端钝圆，基部渐狭，稍抱茎，边全缘或有不明显疏细齿。头状花序单生于茎顶，直径 2.5cm～6cm；总梗粗壮；总苞片 1 层～2 层，长圆状披针形，顶端渐尖，基部联合，边缘膜质；花托平坦，无托片；舌状花 1 层～2 层，雌性，舌片宽 4mm～5mm，顶端具 3 齿，黄色至橙红色，花柱 2 裂，结实；中央有多数不育的两性花，花冠筒状，檐部扩大，5 浅裂，雄蕊 5，聚药，花药基部箭形，花柱不裂，子房下位，1 室。瘦果较总苞片为长，淡黄色或淡褐色，内侧弯曲，背面有薄片状横向折皱，两侧具窄翅，外面的大，长达 5mm，中层的舟状，较小而宽，内层的小，环状，无冠毛。

原产欧洲，我国各地有栽培。

采收加工 夏、秋季采收，鲜用或晒干。

药材性状 本品呈不规则团块状，外围舌状花冠卷曲或破碎，金黄色或橙黄色，膜质，中央管状花常被压扁，暗黄色，完整花序用水浸泡后展开，直径 2.5cm～6cm；苞片 1 层～2 层条状披针形，灰绿色，基部联合，边缘膜质；外围舌状花 1 层～2 层，舌片大，顶端 3 齿；管状花多层，黄色，顶端 5 裂，雄蕊 5，聚药；花柱顶端 2 裂；花托圆盘状。气微香，味淡。以花序完整、色泽金黄者为佳。

性味和功用 淡，平。凉血，止血。用于风热感冒，咳喘，咯血，衄血，小便不利，肠风便血。常用量 15g～30g。

附注 金盏菊根行气活血，散瘀；用于疝气痛，胃寒疼痛，瘰疬；常用量 30g～60g(鲜品)，水煎或水、酒煎服。全草用于月经不调。



图 192　金盏菊

1. 花枝　2. 筒状花　3. 舌状花

米仔兰

别名 树兰、朱兰、鱼子兰、珠兰、碎米兰。

来源 本品为楝科植物米仔兰 Aglaia odorata Lour. 的干燥花。

原植物 米仔兰(图 193)为常绿小灌木，高 4m～7m。分枝多，树冠成半圆形，幼枝常被星状锈色鳞片。叶互生，单数羽状复叶，长 5cm～12cm，叶轴有狭翅，叶柄具黑色腺点；小叶 3～5，对生，薄革质，倒卵状椭圆形至狭椭圆状披针形，长 2cm～8cm，顶端 1 片较长，先端钝或钝尖、基部楔形而下延，全缘或微波状，几无小叶柄。花杂性，异株，多数组成疏散腋生的圆锥花序，长 6cm～12cm；花萼裂片 5，圆形；花瓣 5，矩圆形至近圆形，黄色，细小；雄蕊 5，花丝合生成筒状，较花瓣略短；雌蕊 1，子房卵形，1 室～2 室，密被黄色毛。浆果卵形或近球形，长 10mm～12mm，疏被星状鳞片；种子有肉质的假种皮。

生于宅旁，我国南方各地庭园有栽培。东南亚各国也有。

采收加工 夏、秋季花未盛开前采收，除去杂质，晒干。

药材性状 呈细小均匀的球状小颗粒，直径约 2mm，棕红色。下端有 1 极细的花梗，基部有宿存的小萼片 5 枚；花冠由 5 片花瓣紧密包裹组成，内面有不太明显的花蕊，淡黄色。体轻，质硬稍脆。气极清香，味微甘。以色金黄或红棕色，香气浓者为佳。

性味和功用 味辛、甘，平。归肺、胃、肝经。解郁宽中，催生，醒酒，清肺，醒头目，止烦渴，疏风解表。用于胸膈胀满不适，噫膈初起，咳嗽，头昏，感冒胸闷。常用量 3g～9g。

附注 米仔兰枝叶活血化瘀，消肿止痛；用于跌打损伤，风湿关节炎，肿毒。适量熬膏涂敷。



图 193　米仔兰

野 茉 莉

别名 木香柴、野白果树。

来源 本品为安息香科植物野茉莉 Styrax japonica Sieb. et Zucc. 的干燥花。

原植物 野茉莉(图 194)为小乔木或灌木，高达 10m。树皮灰褐色或黑褐色，枝细长斜展，幼时被星状柔毛，渐脱落。叶互生，宽椭圆形、椭圆形或椭圆状倒卵形，长 4cm～10cm，顶端尖或渐尖，基部楔形，边缘具浅锯齿，上面深绿色，下面淡绿色，脉腋有时簇生柔毛；叶柄长 3mm～8mm。花单生或 2 朵～6 朵成总状花序，腋生或生侧枝顶端；花梗长 2cm～3cm，下垂；花萼钟状，顶端具 5 短圆齿，宿存；花冠白色，5 深裂，裂片开展，椭圆状长圆形，长约 15mm；雄蕊 10，生于花冠筒基部，花丝上部稍狭，有时密生须毛，基部扁平，连合，花药条形；子房上位，球形，花柱细长，柱头头状。核果圆卵形，长约 1.5cm，密被灰白色茸毛，内有 3 粒种子。种子不规则椭圆形，红褐色，长约 1cm，种皮粗糙。

生于低山常绿阔叶林中。分布于秦岭和黄河以南各省(自治区)，东起山东，西至云南北部。朝鲜、日本、菲律宾也有。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 本品常皱缩成不规则小团，长 14mm～17mm，黄褐色。萼筒钟状，顶端具 5 个浅圆齿，无毛或被稀疏微小星状毛；花冠湿润后展开为 5 深裂，裂片椭圆状长圆形，长约 15mm，在未充分开放的花蕾中呈覆瓦状排列；雄蕊基部连合着生于花冠筒基部，花丝扁平，花药黄色，条形，长 4mm～5mm，伸出花冠筒外，2 室，纵裂，药隔顶端凸出呈矩芒状；子房上位，下部与花萼结合，花柱 1，长于雄蕊，柱头头状。萼基部花梗脱落或有长 2cm～3cm 的细梗。气微香，味微辛。以朵大、去梗者为佳。

性味和功用 辛，温。清热，止痛。用于喉痛，牙痛。常用量 6g～9g。

附注 野茉莉果实、虫瘿内白粉、叶外用，可祛风除湿，果实又称摩厨子，有滋补作用。



图 194　野茉莉

紫花玉兰

别名 辛夷、木笔、紫玉兰、望春花。

来源 本品为木兰科植物紫花玉兰 Magnolia liliflora Desr. 的干燥花蕾。

原植物 紫花玉兰(图 195)为灌木，高达 5m。小枝紫褐色；芽长椭圆形，被细伏毛。叶互生，椭圆状卵形或椭圆形，长 8cm ~ 18cm，顶端急尖或渐尖，基部宽楔形，全缘，上面暗绿色，初疏生短柔毛，后变无毛，下面淡绿色，沿脉具细柔毛；叶柄长 2cm ~ 2.5cm，较粗。花与叶同时或稍后于叶开放，单生于枝顶，钟状，大形，有香气，直径 10cm ~ 15cm；花被片 9，3 轮，每轮 3 片，最外轮披针形，淡绿色，长 2.3cm ~ 3.3cm，内 2 轮倒卵状长圆形至倒卵形，长 8cm ~ 10cm，外面紫色或紫红色，内面白色；雄蕊多数，在伸长的花托下部螺旋状排列，花丝紫红色，肥厚，花药较花丝短；心皮多数，排列于花托上部，花柱 1，顶端尖，微弯。聚合果圆柱形，长 7cm ~ 10cm，熟时淡褐色，有时稍弯曲。

生于较温暖的山坡林内。原产湖北省，现全国各地有栽培。

采收加工 早春花蕾未开放时采摘，剪去花梗，文火烘干或晒干。

药材性状 本品呈倒圆锥状，形如毛笔头，基部带有木质短梗。花蕾长 1cm ~ 4.5cm，下部最宽处直径 0.7cm ~ 3cm，最外为 2 枚 ~ 3 枚苞片，成两层，两层间尚可见小芽鳞，苞片外表面密被灰黄绿色或黄褐色柔较长毛，略有光泽，内表面平滑，棕紫色。除去苞片后可见花被紧密相抱，棕紫色，中央有圆锥形花托。雄蕊多数，棕黄色，生于花托下部；雌蕊褐色，生于花托上部。质脆易碎。有特殊香气，味辛凉而稍苦。以花蕾未开、身干、色绿、无枝梗者为佳。

性味和功用 辛，温。归肺、胃经。祛风散寒，通肺窍、镇痛。用于急性鼻窦炎，副鼻窦炎，过敏性鼻炎，头痛，齿痛。常用量 3g ~ 6g。

阴虚火旺者忌服。

附注 紫花玉兰树皮在西北地区称姜朴，据云功效近厚朴。



图 195　紫花玉兰

1. 枝叶　2. 花枝　3. 药材(紫花玉兰)

蜀　葵

别名　棋盘花、麻杆花、一丈红。

来源　本品为锦葵科植物蜀葵 Althaea rosea(Linn.)Cavan. 的干燥花。

原植物　蜀葵(图 196)为二年生草本，高达 2.5m。叶互生，圆形或卵圆形，直径 6cm～16cm，浅裂或有波状棱角，基部心形，裂片三角形或圆形，叶柄长 4cm～15cm，被星状硬毛；托叶卵形，长约 8mm，顶端具 3 尖。花腋生，单朵或数朵近簇生，排成总状花序式，苞片叶状，具短梗，果时延长至 1cm～2.5cm，被星状长硬毛；小苞片杯状，常 6 裂～8 裂，裂片卵状披针形，被星状粗毛；萼钟状，直径 2cm～3cm，5 齿裂，裂片卵状三角形，被毛；花大，直径 6cm～10cm，有红、紫、白、粉红、黄、黑紫等多种颜色，单瓣或重瓣；雄蕊多数，花丝结合；子房多室。果实扁球形，直径 2cm～3cm，被毛，成熟时心皮自中轴分离。

生于向阳肥沃土地，全国各地广泛栽培。世界各国也多栽培供观赏用。

采收加工　2 月～8 月采收，晒干。

药材性状　花朵杯状，松散，直径 3cm～5cm，淡红色、白色或各种颜色，花梗长约 2.5cm，小苞片 6～8，基部联合，花萼杯状，5 裂，裂齿三角形。花梗、小苞片、花萼均密被星状毛。花瓣 5 或重瓣，倒卵状三角形，顶端边缘不整齐齿裂。单体雄蕊。雌蕊花柱上部分裂。气微，味淡。以花大、干燥者为佳。

性味和功用　甘，咸，寒。利尿通便，活血调经，解毒排脓。用于便秘，月经不调，白带，疖肿，蜂虫螫伤，烫伤，痢疾，吐血，血崩，疟疾，小儿风疹。常用量 3g～9g。外用适量研末调敷。孕妇忌服。

附注　蜀葵茎叶治热毒下痢，淋病，金疮。根清热凉血，利尿排脓；用于淋病，白带，尿血，吐血，血崩，肠痈，疮肿。种子利水通淋，滑肠；用于水肿，淋病，便秘，疮疖，尿路结石。常用量茎叶 6g～18g；根 30g～60g；种子 3g～9g。外用均适量研末调敷或捣敷。



图 196　蜀葵

六、果实和种子类

川 泡 桐

别名 泡桐树、泡通。

来源 本品为玄参科植物川泡桐，Paulownia fargesii Franch. 的干燥果实。

原植物 川泡桐(图 197)为乔木，高达 20m。主干明显，小枝紫褐色至褐灰色，有圆形凸出皮孔，幼时被星状绒毛，老渐脱落。叶对生，卵圆形或卵形，长达 20cm 以上，顶端成锐尖头或长渐尖，基部心形，边全缘或波状，上面疏生短毛，下面被具柄或分枝毛，毛的疏密度有很大；叶柄长达 11cm，被星状绒毛。圆锥花序生枝端，宽约 1m，下部 1 对发达的侧枝长可为主枝之半，小聚伞花序无总梗或几无梗，花梗长不及 1cm，均密被星状绒毛；萼倒圆锥形，基部渐狭，长达 2cm，密被绒毛，5 中裂，裂片三角状卵圆形；花冠近钟形，白色有紫色条纹至紫色，长 5.5cm～7.5cm，外面有短腺毛，内面多无紫斑，管在基部以上突然膨大，多少弓曲，檐部 2 唇形，上唇 2 裂，下唇 3 裂，伸长；雄蕊 4，2 强，长 2cm～2.5cm；子房具腺毛，花柱长约 3cm。蒴果椭圆形或卵状椭圆形，长 3cm～4.5cm，幼时被粘质腺毛。

生于海拔 1 200m～3 000m 林中或坡地，常栽培。分布于湖北、湖南、四川、云南、贵州等省。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 呈椭圆形或卵状椭圆形，长 3cm～4.5cm，直径 2cm～3cm。表面红褐色至黑褐，具粘质腺毛，顶端突尖，长 2mm～4mm，基部宽楔形或近圆形，自基部至顶端 2 侧各有棱形 1 条，常沿棱线裂成 2 瓣。果皮较薄，有明显横行细皱纹。宿存萼倒圆锥形，5 中裂，裂片卵状三角形，贴伏于果基；果梗扭曲，长 1cm～3cm。种子多数，长圆形，四周具翅，连翅长 5mm～6mm。气微，味微甘苦。以个大，开裂少、带宿萼者为佳。

性味和功用 苦，寒。祛痰，止咳，平喘。用于气管炎，咳嗽痰多，气喘。常用量 15g～30g。

附注 川泡桐根淡，平；除湿解毒；用于风湿骨痛，肠风下血，痔疮，跌打损伤，骨折；常用量 15g～30g。花、叶捣烂外敷治肿毒溃癣。




图 197　川泡桐

1. 果枝　2. 叶

川 白 蔻

别名 土白蔻、大草蔻、草豆蔻、草蔻。

来源 本品为姜科植物艳山姜 *Alpinia zerumbet*(Pers.) Burtt. et Smith 的干燥果实。

原植物 艳山姜(图 198)为多年生草本，高 2m～3m。根状茎横走，肥大，浅黄棕色，直径可达 3cm，节上有鳞片。叶互生，二列，长圆状披针形或披针形，长 30cm～80cm，顶端短渐尖，下面主脉两侧密布棕色长绒毛；叶柄鞘状包茎；叶舌倒卵形，长 5mm～10mm。圆锥花序呈总状花序式，顶生，常下弯，长 15cm～30cm，序轴红紫色，密被淡黄色柔毛；总苞片 1 枚，线形，长约 8cm，早落；小苞片 1 枚，宽倒卵形，白色，顶端 2 裂～3 裂，裂片三角状卵形，粉红色；花萼宽钟状，外被细茸毛，一边 3 开裂；花冠管较萼管为短，裂片 3，矩圆形，长约 3cm，宽椭圆形，乳白色，顶端粉红色，唇瓣宽卵形，长约 4cm，顶端皱波状，边内弯，内面黄色而有深红色浅纹，管口部内壁具长绒毛，两侧具 2 枚犹状附属物；子房下位，密被棕色绒毛，花柱细长，基部具 2 枚腺体。蒴果。

生于山谷或溪边。分布于我国东南部和西南部各省区。亚洲其他热带地区也有。常栽培。

采收加工 夏季果熟但未开裂时采收，晒干。

药材性状 呈类圆球形或卵状球形，直径 2.5cm～3cm。基部有圆形果柄痕，顶端常见筒状宿存残萼，微具棕色茸毛，以两端较密。外表黄棕色，具多数纵向凸起的果楞，老熟的果壳多 3 瓣裂。种子团易散裂，20 粒～30 粒，卵圆球形或不规则多面体，直径 3mm～6mm，外被白色膜状假种皮，除去假种皮可见黑褐色种皮，微具纵纹及小点，底部有红棕色点状下凹的种脐，侧面有 1 条沟槽。质坚硬。剖开种子为白色粉质状，中央有胚。气芳香、味辛、微苦。以身干、粒大、饱满、气味浓厚者为佳。

性味和功用 辛、涩，温。归肺、脾经。健脾暖胃，祛痰止咳，散寒止痛。用于心腹冷痛，食积，呕吐，腹泻，咳嗽。常用量 3g～6g。

附注 艳山姜根状茎功效同果实。




图 198　艳山姜

1. 根状茎　2. 叶　3. 花序及上部叶　4. 小苞片　5. 萼片　6. 唇瓣
7. 雌蕊　8. 药材(川白蔻)

云南小草蔻

别名 土砂仁、午花姜。

来源 本品为姜科植物舞花姜 Globba racemosa Smith(G. bulbosa Gagnep.)的干燥果实。

原植物 舞花姜(图 199)为多年生草本，高可达 1m。须根多数，簇生，细长圆柱形，棕黄色或淡黄色；根状茎粗短，略呈圆柱形，长 1.5cm～5cm，直径 1.5cm～4cm，肉质，外部白色。茎直立，基部稍膨大，下部被鳞片状鞘。叶互生，卵状披针形或椭圆形，长 12cm～24cm，顶端尾状渐尖，基部宽楔形，仅边缘上部及顶端尾尖部分具睫毛，叶脉明显，疏被白色柔毛；无柄或具短柄；叶舌具缘毛；叶鞘抱茎。总状花序顶生，长 15cm～20cm；花每 1～3 朵生于长 1cm～2cm 分枝顶端；苞片早落，小苞片长约 2mm，花各部均具橙色腺点，花萼管漏斗形，长 4mm～7mm，顶端具 3 齿，紫红色；花冠黄色，管长约 1cm，裂片 3，反折，长约 5mm，侧生退化雄蕊披针形，与花冠裂片等长；唇瓣倒楔形，长约 7mm，顶端 2 裂，反折，生于花丝基部稍上处，花丝长 10mm～12mm，花药两侧无翼；子房 1 室，胚珠多数。蒴果椭圆形。

生于海拔 400m～1300m 的林下阴湿处。分布于我国南部至西南部各省(自治区)。印度也有。

采收加工 秋季采收，晒干。

药材性状 呈椭圆形，长 1cm～1.8cm，直径 7mm～10mm。表面黄棕色，顶端常带有圆柱形的花柱残余，基部有果柄脱落的痕迹，少数带有圆柱状果柄。果皮光滑，较薄，易破碎，内有多数细小种子；种子近圆形，具白色撕裂状假种皮。气微，味辛。以个大、饱满、果皮薄而完整者为佳。

性味和功用 辛，温。归脾、胃经。开胃健脾。用于胃炎，消化不良。常用量 6g～9g。

附注 舞花姜根及根状茎有消肿止痛、敛口的功能；用于急、慢性肾炎，小儿尿频，崩漏，疮毒；常用量 15g～30g，水煎或炖肉吃；外用适量捣烂外敷患处。




图 199　舞花姜

1. 根及茎下部　2. 花序　3. 花放大

水 飞 蓟

别名 水飞雉、奶蓟、老鼠筋。

来源 本品为菊科植物水飞蓟 Silybum marianum(L.)Gaerth 的干燥种子。

原植物 水飞蓟(图 200)为一年生或二年生草本，高达 1.2m。茎分枝、有条棱，被稀蛛丝状毛及白粉质状物质。基生叶莲座状，与下部叶具柄，叶片椭圆形或倒披针形，长达 50cm，羽状浅裂至全裂；中、上部叶渐小、长卵形或披针形，羽状浅裂或边缘具浅波状圆齿裂，顶端渐尖，基部心状，半抱茎；最上部叶不分裂；全部叶两面同绿色，具大型白色花斑，边缘及顶端具黄色硬刺。头状花序生枝顶；总苞球形或卵球形，直径 3cm～5cm，总苞片 6 层，中、外层宽匙形、椭圆形、长菱形至披针形，包括顶端针刺长 1cm～3cm，顶端及边缘具硬刺，质坚硬。花全部管状，红紫色，稀白色，长约 3cm，檐部 5 裂；雄蕊 5，花丝短而宽，上部分离，下部由粘质柔毛粘合，花药基部附属物线形撕裂；花柱被柔毛，上部粗厚，分枝大部贴合。瘦果：冠毛多层，刚毛状，白色，由外向内渐长，长达 1.5cm，具锯齿，基部连合成环；最内层冠毛柔毛状，全缘，极短。

我国各地有引种栽培。分布于欧洲、地中海地区、北非及亚洲中部。

采收加工 夏、秋季当苞片枯黄向内卷曲成筒、顶部冠毛微张开时，用剪刀将果序轻轻剪下，取出种子，去冠毛，晒干。

药材性状 本品呈长椭圆形或长倒卵形，扁，长约 7mm，宽约 3mm。表面棕色或深棕色，有纵皱纹及线状长椭圆形的深褐色色斑，顶端具喙。气无，味苦。

性味和功用 苦，凉。归肝经。清热解毒，保肝，利胆，抗辐射。用于急、慢性肝炎，肝硬变，脂肪肝，中毒性肝损伤，胆石症，胆管炎，X-射线及三乙基锡损伤。常用量 6g～9g。



图 200　水飞蓟

牛 姆 瓜

别名 大花牛姆瓜。

来源 本品为木通科植物牛姆瓜 Holboellia grandiflora Reaub. 的干燥果实。

原植物 牛姆瓜(图 201)为常绿木质藤本，茎长达 6m，多分枝，具纵条纹，枝灰绿色，被白粉。掌状复叶互生，叶片长 7cm～14cm；小叶 3～9，薄革质，倒卵状长圆形至长椭圆形，长 5cm～12cm，顶端短尖或渐尖，基部楔形，边全缘，稍内卷，上面深绿色，下面色较淡，有白粉，网脉明显，密被极微小的乳突，顶生小叶柄长约 3cm，侧生小叶柄长 1cm～2cm。伞房花序顶生或腋生，有花数朵，芳香；花单性，雌雄同株；花梗细弱，长 3cm～5cm；雄花花被片 6，肉质，白色，外轮花被片长倒卵形，长 2～3cm，顶端钝圆，内轮花被片线状披针形，长约 14mm；蜜腺 6 倒卵形；雄蕊 6，退化心皮 3；雌花外轮花被片长圆形，内轮花被片卵状披针形，蜜腺 6，心皮 3。果实长圆状柱形，长 4cm～8cm，熟时紫色。

生于海拔 800m～2 300m 的山坡林中、灌丛中或路旁。分布于陕西、安徽、四川、湖北、贵州等省。

采收加工 夏季采收成熟果实，晒干，或用沸水泡透后晒干。

药材性状 干燥肉质浆果呈卵状圆柱形，稍弯曲，长 3cm～8cm，直径 1.5cm～2cm，顶端钝圆，中央具点状花柱残迹，基部圆或突狭成短矩，具果柄痕。表面暗紫色，皱缩。果皮厚，带革质。种子多数，色被在絮状果瓤内，卵圆形，黑色，光亮，扁平，直径约 4mm。气微，味微甘、涩。以肥壮、皱纹粗疏、色紫黑者为佳。

性味和功用 甘、微苦，寒。归肝、胃经。舒肝理气，活血止痛，除烦利尿，杀虫。用于肝胃气痛，胃热食呆，烦渴，痢疾，腰肋痛，疝气，痛经，子宫下坠。常用量 15g～30g。



图 201　牛姆瓜

瓜　蒌

别名　双边栝楼。

来源　本品为葫芦科植物中华栝楼 Trichosanthes rosthornii Harms 的干燥果实。

原植物　中华栝楼(图 202)为攀援草质藤本。块根肥大，条状，浅灰黄色，有多数横的瘤状突起。叶互生，宽卵状心形，长 8cm～16cm，(3)5～7 深裂几达基部，，中间裂片长 5～13cm，两面无毛，有颗粒状小突起；叶柄长 3cm～7cm，基部有 1 簇淡棕色短毛。卷须常分 2～3 叉，花单性，雌雄异株；雄花数朵生于总花梗上部呈总状或有时单生，苞片菱状倒卵形，边缘锐裂，长 1cm～1.5cm，花托筒状喇叭形，顶端直径约 7mm，长 2cm～3cm，花萼裂片条形；花冠白色，5 裂，裂片近卵形，长约 1cm，边缘流苏状，雄蕊 3，花药合生，药室扭曲；雌花单生，稀 2 花并生，较雄花稍小，子房卵形。瓠果近球形，直径约 7cm，果柄长 5cm～7cm。

生于海拔 700m～1 100m 的山坡或林边，亦栽培。分布于陕西、甘肃、湖北、江西、云南、四川、贵州等省。

采收加工　秋季采收，悬挂晾干。

药材性状　呈宽椭圆形或卵圆形，长 6cm～10cm，直径约 4cm～7cm。外表浅橙黄色，微有光泽，平滑不皱，顶端有圆柱形的花柱残存，基部略尖，有果柄残余。质重，剖开后内表面黄白色，并有纤维，肉质胎座多已缩成粘丝状，种子多数，椭圆形或长方椭圆形，扁平，长 15mm～19mm，宽 8mm～10mm，厚约 2.5mm，表面棕褐色，距边缘稍远处有一圈不甚整齐的明显棱线，多结集成团。气如焦糖，味略甜。以个大、不破、色棕黄、味甜者为佳。

性味和功用　甘、苦，寒。归肺、胃、大肠经。润肺，化痰，散结，滑肠。用于痰热咳嗽，胸痹，胸闷痛，大便结燥，乳腺炎，黄疸，肺痿咳血。常用量 9g～12g。

附注　参阅本图集第一册 354 页瓜蒌条附注。




图 202　中华栝蒌

1. 花枝　2. 果实

芥　子

别名　白芥子、蜀芥、辣菜子、胡芥、白辣菜子。

来源　本品为十字花科白芥 Sinapis alba L. 的干燥种子。

原植物　白芥(图 203)为 1 或 2 年生草本，高达 1m，全株被稀疏白色粗毛。主根淡黄白色，木质。茎具纵直棱槽纹。叶互生，基生叶具长柄，叶片倒卵形，长 10cm～15cm，最宽处达 5cm 以上，多为不整齐的琴状深裂或近全裂，裂片 5～7，顶部裂片大，向下渐小，边缘具锯齿；茎生叶向上渐小，渐少分裂。总状花序顶生或生上部叶腋，花梗长 10mm～17mm；花萼 4，淡绿色，近直立；花瓣 4，展开如十字形，黄色，上部倒圆卵形，下部有直立长爪；雄蕊 6，4 强，通常在内轮雄蕊基部有 4 枚蜜腺；子房长方形，上位，1 室，胚珠多数。长角果线形，长 2cm～3cm，顶端喙状，直径 2mm 左右，黄色或黄白色。

全国各地多有栽培，主产区为山西、山东、安徽、新疆、四川、云南等省。原产欧洲。

采收加工　清明节前后拔取全株，晒干，打出种子，去杂质。

药材性状　本品呈类圆形，直径 1.1mm～2.5mm。外表面灰白色至淡黄色，少数为棕褐色，平滑，微起粉，在放大镜下可见细微的网纹及一暗色小点状的种脐。种皮脆薄易压碎，剥去后有薄膜状的胚乳粘着于种皮内表面。胚黄白色，油质，二子叶相叠，并于中脉处折为马鞍状，胚根亦折转藏于其间，微有光泽。气无，味先觉油样而后微酸，继感辛辣。以个大、饱满、色白、纯净者为佳。

性味和功用　辛，温。归肺、胃经。利气宽胸，豁痰散结，温中开胃，消肿止痛，通络。用于老年气喘咳嗽，胸胁胀满，反胃呕吐，中风不语，肢体痹痛麻木，脚气，阴疽，跌打肿痛，扭挫伤，各种神经痛，肺炎，百日咳，骨结核，淋巴结核。常用量 3g～9g。外用适量研末调敷。

肺虚久咳、阴虚火旺、胃火炽盛及疮疡、目疾、痔疮患者忌用。

附注　1. 白芥全草温中散寒；用于咳嗽气急，胃、腹冷痛。适量煮食。2. 参阅本图集第四册第 394 页芥子条。



图 203　白芥

1～2 全株

吕宋楸毛

别名 吕宋秋葵粉、糠枇子菜。

来源 本品为大戟科植物粗糠柴 *Mallotus philippinensis*(Lam.) Muell.-Arg. 的果实表面毛茸。

原植物 粗糠柴(图 204)为常绿小灌木，高 8m～10m。小枝被锈褐色星状毛。叶互生，长卵形、卵状披针形至披针形，长 6cm～16cm，顶端渐尖，基部宽楔形，边全缘或微波状，上面无毛，下面密被星状短柔毛及红色腺点，基出脉 3 条，近叶柄处有 2 个腺体；叶柄长 1cm～4cm，密被短柔毛。总状花序顶生或腋生，常有分枝，长 3cm～8cm，花序枝及花梗均密被星状毛及腺点；花小，单性，雌雄同株，无花瓣，花萼 3～4 深裂，被绒毛及红色腺点；雄花有雄蕊 18～32，花药 2 室；雌花子房上位，有红色腺点，2～3 室。蒴果球形，直径 6mm～8mm，密被红色腺点及星状毛，成熟时 2～3 裂；种子球形，平滑。

生于旷野、溪边、沟谷旁及疏林中。分布于广东、广西、江西、湖南、湖北、浙江、福建、台湾、四川、云南、贵州等省、区。越南、印度、菲律宾、澳大利亚也有。

采收加工 秋季采成熟的果实，入布袋中，磨擦搓揉抖动，除去果实，收集毛茸，晒干。

药材性状 腺毛及毛茸呈细粒状，暗红色，浮动性粉末，无臭、无味。置水上呈悬浮状，略使水变红。放入乙醇、醚、氯仿或苛性钠溶液中，可使溶液呈深红色。轻轻振动后，非腺毛部分(呈灰色)聚集于表面。以色红者为佳。

性味和功用 淡，平；有毒。驱虫，泻下。用于驱除绦虫、蛔虫、蛲虫，虚燥便结，烂疮，跌打，脚肿，风湿。常用量 3g～6g，研末装入胶囊服；外用适量煎水洗或涂敷。

附注 粗糠柴根微苦、涩，凉；清热利湿；用于急、慢性痢疾，咽喉肿痛。叶用于烧烫伤，疮疡溃烂久不收口，外伤出血。



图 204　粗糠柴

1. 果枝　2. 果放大

红豆杉子

别名 红豆木。

来源 本品为红豆杉科植物红豆杉 Taxus chinensis(Pilger)Rehd. 的干燥种子。

原植物 红豆杉(图 205)为常绿乔木,高 10m～30m。树皮灰褐色或红褐色,呈不规则条片状剥落;大枝开展,小枝不规则互生,一年生枝绿色或淡黄绿色,二、三年生枝黄褐色或灰褐色;冬芽卵圆形,黄褐色。叶螺旋状着生,基部扭转呈二列,水平展开,线形,微弱或直,长 1cm～3.2cm,宽 2mm～4mm,顶端微急尖或急尖,基部楔形,歪斜,上面绿色,有光泽,下面淡黄绿色,有两条气孔带,中脉乳头状突起,常与气孔带同色,稀较深。花单性,雌雄异株;球花单生叶腋,雄球花倒卵形,淡黄色;雄蕊 8 枚～14 枚,花药 4～8;雌球花的胚珠直立,生于花轴上部侧生短轴的顶端,基部托以圆盘状假种皮。种子坚果状,扁卵圆形,熟时淡黄绿色,生于红色肉质杯状假种皮中。

生于海拔 1 500m～2 000m 间或以上的山地林中。分布于甘肃、陕西、安徽、湖北、四川等省。

采收加工 秋季果实成熟时采收,晒干。

药材性状 呈扁卵圆形,稀倒卵状,长 5mm～7mm,直径 3.5mm～5mm。种皮坚硬,表面淡黄绿色,上部渐窄,具二条钝棱脊,稀呈三角状具 3 条钝棱脊,顶端有突起的短钝头,外面包以杯状肉质的暗红色假种皮。种脐近圆形或宽椭圆形,稀三角状圆形;子叶 2 枚,线形,顶端钝圆或微凹。气无,味淡。以粒大、饱满、带假种皮者为佳。

性味和功用 微苦,温。消积杀虫。用于食积腹胀,消化不良,蛔虫病。常用量 9g～15g。

附注 1. 红豆杉枝叶祛风除湿;用于风湿疼痛;适量煎水先熏后洗。种子油补肾涩精;用于遗精,白带,白浊。叶清热解毒;用于扁桃体炎。树皮祛湿,止痛;用于发疹气痛,肾炎浮肿,风湿痛。2. 红豆杉为我国珍贵树种,由于近年来各地无计划砍伐,以其树皮提取抗癌原料紫杉醇,致使天然林木急剧减少,应加强保护。



图 205　红豆杉

沙 棘 子

别名 醋柳果、酸刺、黑刺、黄酸刺。

来源 本品为胡颓子科植物沙棘 Hippophae rhamnoides Linn. 的干燥果实。

原植物 沙棘(图 206)为灌木或小乔木，高 1m～2m，刺粗壮。叶互生或近对生，窄披针形或矩圆状披针形，长 2cm～8cm；叶柄极短或近无。花黄绿色，雌雄异株，先叶开放，成短总状花序腋生于头年枝上；花被 2 裂；雄花序轴常脱落，雄蕊 4，花丝短，雌花比雄花后开放，花被筒囊状，子房上位，心皮 1，花柱微伸出花外。果为肉质花被管所包围而形成的坚果，近球形，橙黄色或橘红色，直径 5mm～10mm；种子卵形，种皮坚硬。

生于海拔 1 000m～3 500m 山坡、沟谷、河岸、草原及固定沙丘上。分布于我国华北、西北、西南地区。蒙古、印度、伊朗、原苏联及欧洲也有。

采收加工 秋季采收成熟果实，晒干。

药材性状 呈类球形，直径 5mm～8mm。单粒或数个粘结，常具长 2mm～4mm 的短梗，表面棕红色或黑褐色，皱缩，油润而柔软。种子 1 枚，扁卵形，长 2.5mm～4mm，宽约 2mm，黄褐色或褐色，狭端有种脐，宽端有珠孔，侧面有 1 条纵沟；种皮较硬，难破碎；子叶乳白色，油性。气微，味酸、涩。以粒大、肉厚、油润者为佳。

性味和功用 酸、涩，平。归肝、肺、胃、大小肠经。活血祛瘀，补脾健胃，化痰宽胸，消食化滞，止咳，生津。用于跌打损伤，瘀血肿痛，胃痛，胃溃疡，咽喉肿痛，气管炎，肺结核，肺脓肿，消化不良，冠心病，月经不调，肠炎痢疾，热症伤阴。常用量 9g～15g。

附注 1. 沙棘根皮清热解毒，消肿祛瘀。2. 据报道，果实尚有预防和治疗铅、苯类中毒和抗辐射作用。种子油可减轻食道癌患者因放疗引起的食道粘膜损伤，有促进人体新陈代谢和伤口愈合及镇痛作用。可用于烧伤、湿疹、体表溃疡愈合不良、胃及十二指肠溃疡的治疗。3. 果实含丰富的维生素。



图 206　沙棘

油 菜 子

别名 芸苔子、菜苔子。

来源 本品为十字花科植物芸苔 Brassica campestris L. 的干燥种子。

原植物 芸苔(图 207)为 2 年生草本，高 30cm～90cm。茎粗壮，直立，分枝或不分枝，无毛或近无毛，微带粉霜。基生叶大头羽裂，长 10cm～20cm，顶裂片圆形或卵形，边缘有不整齐弯缺牙齿，侧裂片 1 至数对，卵形，叶柄宽，长 2cm～6cm，基部抱茎；下部茎生叶羽状半裂，长 6cm～10cm，基部扩展且抱茎，两面有硬毛及缘毛；上部茎生叶长圆状倒卵形、长圆形或长圆状披针形，长 2.5cm～8(～15)cm，基部心形抱茎，两侧有垂耳，全缘或有波状细齿。春季开花，总状花序顶生，在花期成伞房状，以后伸长；萼片 4，长圆形，长 3mm～5mm，直立开展，顶端圆形，边缘透明，稍有毛；花瓣倒卵形，4 枚，鲜黄色，长 7mm～9mm，顶端近微缺，基部有爪；雄蕊 6，4 强；子房上位。长角果线形，长 3cm～8cm，宽 2mm～4mm，喙直立，长 9mm～24mm。

油料作物，全国各地普遍栽培。模式标本采自欧洲。

采收加工 4 月～6 月种子成熟时割取地上部分，晒干，打落种子，除去杂质，晒干。

药材性状 本品呈类圆球形，直径约 1mm～2mm，种皮黑色、紫褐色或暗红棕色，少数为黄色。在放大镜下检查，表面有微细网状纹理，种脐点状，浸在水中膨胀。除去种皮，可见 2 片黄白色肥厚的子叶，沿主脉相重对折，胚根位于 2 对折子叶之间。气无，味淡，微有油样感。以饱满、表面光滑、无杂质者为佳。

性味和功用 辛，温。行血破气，消肿散结。用于产后血滞腹痛，血痢，肠风下血，产后恶露不净，疮肿，便秘，粘连性肠梗阻、丹毒热肿。常用量 5g～9g；外用适量研末调敷或榨油涂。无瘀阻者不可内服。

附注 芸苔嫩茎叶辛、凉。散血消肿；用于劳伤出血，痈肿疮毒，劳伤吐血，血痢，丹毒，乳腺炎，热毒疮。



图 207　芸苔

茄　子

别名　吊菜子、落苏、矮瓜。

来源　本品为茄科植物茄 Solanum melongena L. 的白色果实。

原植物　茄(图 208)为一年生草本至半灌木，高 60cm～100cm，幼枝、叶、花梗及花萼均被星状绒毛。茎基部木质化，上部多分枝，绿色或紫色，野生者常有皮刺。叶互生，卵形或卵状椭圆形，长 6cm～20cm，顶端尖或钝，基部偏斜，边缘浅波状或深波状圆裂；叶柄长 2cm～5cm。能孕花单生，花梗长约 1cm～2cm，不孕花数朵成侧生的聚伞花序与能育花并出，花后下垂；花萼钟状，直径约 2.5cm，有小皮刺，顶端 5 裂，裂片披针形；花冠辐状，直径 2.5cm～3cm，裂片 5，紫蓝色，三角状卵形或长卵形，长约 1cm，外被细毛；雄蕊 5，生于花冠筒喉部，花药长约 7.5mm，孔裂；雌蕊 1，子房圆形。浆果球形、卵状长圆形至柱形，紫色或白色，因品种而不同，具宿存萼。

原产亚洲热带。现全国各地广泛栽培作蔬菜用。

采收加工　夏季采摘白色果实，晒干。

药材性状　本品呈不规则圆形或卵状长圆形，长 2.5cm～5cm，径约 2cm。表面棕黄色，极皱缩，顶端略凹陷，基部具不甚明显 5 齿的宿存萼和果梗。果皮光滑，革质，内有多数种子，略似肾形而稍扁，淡棕色，长 2mm～4mm，宽 2mm。气微，味苦。以圆球形，表面棕黄色、光滑者为佳。

性味和功用　甘，凉。归脾、胃、大肠经。清热，活血，止痛，消肿。用于肠风下血，热毒疮痈，血痔，皮肤溃疡，妇人乳裂。常用量 15g～30g。外用适量捣敷或研末调敷。

附注　茄根和茎甘、辛，寒；散瘀，消肿，止痛，用于久痢便血，脚气，齿痛，冻疮，风湿性关节炎，类风湿性关节炎，皮肤瘙痒，阴道滴虫，子宫脱垂，口腔溃疡；常用量 9g～18g；外用适量煎水洗、捣汁涂或烧存性研末调敷。叶治血淋，血痢，肠风下血，痈肿，冻疮；宿萼治肠风下血，痈疮，口疮，牙痛；常用量 6g～9g；外用适量煎水洗、捣敷或烧存性研末掺患处。花治金疮，牙痛；适量烧存性研末涂患处。



图 208　茄

柔毛五味子

别名 五味子、川五味子。

来源 本品为五味子科植物柔毛五味子 Schisandra pubescens Hemsl. 的干燥果实。

原植物 柔毛五味子(图 209)为木质藤本。当年生枝淡棕褐色，被短微柔毛，老枝淡紫色或带灰色，近无毛。叶互生，椭圆形或卵状椭圆形，长(4.5～)6cm～14cm，顶端突尖或渐尖，基部钝，边缘具小牙齿或深波状小齿，下面被短微柔毛；叶柄长 1.5cm～5.5cm，被短微柔毛。花单性，雌雄异株，单生于当年枝下部叶腋；雄花：花梗细，长 2cm～3cm，被细微柔毛；花被片 7～8，黄色或淡黄色，最外的 1 片～2 片椭圆形，长 4mm～6mm，最内的 1 片倒卵形，长 7mm～8mm，其余的近圆形，长 8mm～20mm；雄蕊群近圆形，压扁，雄蕊 19～24；雌花：花被片与雄花相似；雌蕊群近圆形或椭圆形，心皮 50～55，4～6 轮，子房卵状椭圆形，柱头鸡冠状，膜质。聚合果成熟时红色，梗长 4cm～7cm，被短微毛；小浆果亚圆形，长 7mm～8mm。

生于海拔 700m～2 200m 的山坡灌丛中或林缘。分布于湖北、湖南、四川。

采收加工 秋季果熟时采摘，晒干。

药材性状 呈扁椭圆形或近球形，直径 4mm～5mm。表面黄棕色，皱缩不平，果肉薄而柔软，不易与种子分离，果柄较长，长 2mm～3mm，果皮和果柄密布黄棕色短微柔毛。种子 1～2，圆肾形，直径约 3mm，黄棕色或棕色，有黄棕色柔毛。果肉气微，味微酸，种子破碎后微有香气，味微辛，稍苦。以粒大、肉厚、有光泽、色棕黄者为佳。

性味和功用 酸，温。归肺、心肾、肝经。敛肺，滋肾，生津，止泻。用于肺虚咳嗽，津亏口渴，自汗，盗汗，梦遗滑精，慢性腹泻，神经衰弱，无黄胆性肝炎。常用量 1.5g～6g。




图 209　柔毛五味子

1. 果枝　2. 雌蕊群　3. 雄蕊群　4～5. 大小花被片　6. 叶背面示毛被

野 燕 麦

别名 燕麦草、乌麦、野麦草、野麦子。

来源 本品为禾本科植物野燕麦 Avena fatua L. 的干燥果实。

原植物 野燕麦(图 210)为一年生草本，高 30cm～150cm。杆直立，具 2 节～4 节。叶互生，线形，扁平，长 10cm～30cm，宽 4mm～12mm，微粗糙或下面边缘疏生柔毛；叶鞘无毛或基部的被微毛，松弛，边缘膜质；叶舌长 1mm～5mm，膜质透明。圆锥花序顶生，开展，长 10cm～25cm，分枝有棱角，粗糙；小穗长 18mm～25mm，具 2～3 花，其柄弯曲下垂，顶端稍膨胀，小穗轴节间长约 3mm，密生淡棕色或白色硬毛，易断落；颖草质，通常具 9 脉，与小穗等长；外稃革质，第 1 外稃长 15mm～20mm，背面中部以下具淡棕色或白色硬毛，基盘密生短毛，芒从背面近中部抽出，长 2cm～4cm，膝曲，芒柱棕色，扭转；内稃稍短于外稃，舟形，背上有短纤毛；雄蕊 3。颖果被淡棕色柔毛，腹面具纵沟，长 6mm～8mm。

生于荒地、田野、路边草丛中。广布于我国南北各省区。

采收加工 秋季果熟时采收，晒干。

药材性状 果实全体呈飞燕状。颖片 2，黄绿色；稃片 2，棕褐色；颖 2 枚，每一颖外的外稃近中部具芒，芒针弯曲，与另一外稃的芒针相结时如燕尾。种子长圆形，两端略尖，表面浅黄棕色，皱缩，腹面中央有 1 条纵沟，长 6mm～8mm。质硬，断面黄白色，粉性。气微，味淡。以种粒饱满均匀、粉质重、无杂质者为佳。

性味和功用 甘，温。归肝、肺经。补虚，敛汗，止血。用于自汗、盗汗、虚汗不止，吐血，崩漏。常用量 15g～30g。

附注 野燕麦全草功效基本同果实，用于吐血，血崩，白带，便血，自汗，盗汗。常用量 15g～60g。



图 210　野燕麦

1～2 全株

楸　子

别名　海棠果。

来源　本品为蔷薇科植物楸子 Malus prunifolia(Willd.)Borkh. 的干燥果实。

原植物　楸子(图 211)为小乔木，高 3m～10m。小枝粗壮，幼时密被短绒毛，老时灰紫色或灰褐色，近于无毛。叶互生，通常聚生于短枝上端，卵形或椭圆形，长 5cm～9cm，顶端渐尖或急尖，基部宽楔形或近圆形，边缘有细锐锯齿，幼时两石脉上被柔毛，渐脱落至下面中脉被柔毛；叶柄长 1cm～5cm，疏生白色柔毛；托叶线形至线状披针形。花序近伞形，生于枝顶，有花 4 朵～8(～10)朵；花梗长 2cm～3.5cm，被短柔毛；花直径 3cm～5cm，萼筒外面有长柔毛，裂片 5，披针形，长 7mm～9mm，全缘，比萼筒长，两面均被白色柔毛；花瓣 5，倒卵状椭圆形，长约 2.5cm，白色(花蕾时粉红色)，基部具短爪；雄蕊约 20 枚，长为花瓣的 1/3；花柱 4(～5)，基部密生白色柔毛。梨果卵圆形，直径 2cm～2.5cm，红色，具宿存萼裂片；果梗细长。

生于海拔 50m～1 300m 的山坡、平地，亦有栽培。分布于辽宁、内蒙古、甘肃、陕西、山西、河北、河南、山东、四川、云南等省(自治区)。

采收加工　夏季果熟时采收，晒干或切片晒干。

药材性状　呈卵圆形，直径 1cm～2cm。表面红棕色或黄棕色，具皱纹，光亮。基部凹陷，具果梗痕，顶端具宿存萼裂片，萼裂片披针形，两面均被白色长柔毛。果肉黄白色，厚，中央 5 室，每室有种子 1 粒。气微、味酸、涩、甜。以皮红、肉厚、个大者为佳。

性味和功用　甘、酸，平。归心、肝、肾经。止渴，化滞，涩精。用于糖尿病，泻痢，遗精，食积停滞，疝气。常用量 30g～60g。

附注　本品在四川部分地区作山楂入药。



图 211　楸子

锦灯笼

别名 挂金灯、金灯、灯笼果、红姑娘、天泡果。

来源 本品为茄科植物酸浆 Physalis alkekengi L. var. franchetii Makino 的干燥宿萼或带果宿萼。

原植物 酸浆(图 212)为多年生草本，高可达 1m。叶在茎下部者互生，中、上者常假对生；叶柄长 1.5cm～3cm；叶片卵形，长 3cm～12cm。花单生叶腋，花梗纤细，长 8mm～16mm；花萼钟状，绿色，长 5mm～6mm，萼齿 5，三角形；花冠宽钟形，白色，直径 1.5cm～2cm，裂片 5，雄蕊 5，花丝长约 2mm；雌蕊长约 7mm，花柱细长，柱头 2 浅裂，子房上位。宿存萼宽卵形，长 3cm～4cm，橙红色至朱红色；浆果球形，封于宿存萼中，与萼同色。

生于村边、路旁、田野及荒地。广布于全国各省、区。朝鲜、日本也有。

采收加工 秋季宿萼由绿变红色，连同浆果摘下，晒干或分别晒干。

药材性状 本品常破碎或压扁。完整的宿萼膨胀如具五角的阔卵形囊状物，长 3cm～4cm，直径 2.5cm～3.5cm，橙红色至朱红色，有时中、上部色较浅；表面具纵棱 10 条，网状脉明显，顶端尖，闭合或 5 微裂，基部平截或略内凹，果梗长 2cm～3cm。体轻、薄革质。若浆果未除去，撕开宿萼，可见浆果 1 枚，完整者圆球形，直径 1.2cm～1.5cm，表面光滑，橙红色至朱红色，常干瘪或压破，基部与宿萼相连；种子多数，宽卵形，扁平，具钩状小尖头，长近 2mm，淡黄色，表面密布细网纹。气微、略似烟草，宿萼味淡而微辛，浆果微甜酸。以个大、整齐、色红者为佳。

性味和功用 苦、酸，寒。归肺、脾经。利尿，清热，解毒，利咽。用于咽喉肿痛，肺热咳嗽，骨蒸劳热，小便不利，黄疸，水肿，天疱疮，音哑。常用量 3g～9g。外用适量，捣烂外敷，或研末油调涂患处。

附注 酸浆全草功效同宿萼。根清热，利水，用于疟疾，黄疸，疝气，月经过多，产后出血。




图 212　酸浆

酸 枣 仁

别名 枣仁、酸枣核、棘、硬枣。

来源 本品为鼠李科植物酸枣 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa(Bunge) Hu ex H. F. Chow 的干燥种子。

原植物 酸枣(图 213)常为灌木，稀小乔木，高 1m～3m。刺长约 2cm,粗直，短刺下弯，叶互生，卵形至卵状披针形，长 2.5cm～5cm，顶端钝或近圆形三出脉；叶柄长 1mm～6mm；托叶细刺状，后期常脱落。花黄绿色，两性，5 基数，具短总花梗，单生或 2 个～8 个簇生叶腋成短聚伞花序；花梗长 2mm～3mm；萼片卵状三角形；花瓣倒卵形，基部有爪；花盘厚，肉质，圆形，边缘波状；子房下部与花盘合生，花柱常 2 裂。核果近球形或短矩圆形，直径 0.7cm～1.2cm，熟时暗红色，具薄的中果皮，味酸，果核两端钝。

生于向阳、干燥山坡、丘陵或平原，有栽培。分布于我国北部、西北部和东部。朝鲜、原苏联也有。

采收加工 秋季果熟时采摘，水浸 24 小时，搓去果肉，碾碎果核，取出种子、晒干。

药材性状 呈扁圆形或椭圆形，长 5mm～9mm，宽 5mm～7mm，中部厚约 3mm。表面赤褐色至紫褐色(未成熟者色浅或发黄)，光滑微亮。一面较平坦，中央有一条隆起细线，另一面微隆起，边缘略薄，顶端有明显的种脐，另端具微凸起的合点，种脊位于一侧不明显。种皮薄而硬，常有裂痕；种仁黄白色，肥厚油润。气微，味甘酸。以粒大饱满、外皮紫红色、无核壳者为佳。

性味和功用 酸、甘，平。归心、脾、肝、胆经。养肝、宁心、安神、敛汗。用于虚烦不眠，惊悸怔忡，烦渴，虚汗。常用量 6g～15g。

附注 酸枣根治神经衰弱。根皮涩，温；治便血，烧烫伤，高血压性头晕头痛。树皮收敛，消炎；用于烧烫伤。果治小便不利。叶治阴囊疮。刺消肿，溃脓，止痛；用于痈肿有脓，心腹痛，尿血，小儿疳积，喉痹。花清热解毒；治秃疮，瘰疬。



图 213　酸枣

1. 果枝　2. 药材(酸枣仁)

七、苔藓和菌类

独 脚 鸡

别名 土马骝。

来源 本品为苔藓类小金发藓科植物高山金发藓 Pogonatum alpinum Hedw. 的干燥全草。

原植物 高山金发藓(图 214)为草本，高 5cm～15cm，常丛集成片生长，较硬，深绿色或黄棕色。茎直立，单一或分枝，基部密生假根。叶集中生于茎中部以上，茎下部叶较稀疏，多已脱落；叶片潮湿时伸展，倾立或背仰，下部有宽卵状的鞘部，上部宽披针形，边缘有多细胞构成的齿；中肋粗，渐上成芒状突出，背面有红褐色刺齿，腹面满布栉片；栉片高 5 个～8 个细胞，顶细胞长卵形，壁厚，具疣，有时带黄褐色。雌雄异株，蒴柄长 3cm～5cm，红褐色，多旋扭。孢蒴长卵形或圆柱形，倾立，台部与壶部无明显界限，外壁细胞大形，不规则；蒴台部外部细胞多边形，具单细胞构成的气孔。齿片 40 条～60 条，不整齐。蒴盖小，高凸形，具喙状细尖。蒴帽满被黄褐色长柔毛，覆盖孢蒴上部约 1/2 处。

生于高山区林下、林缘或岩面薄土上，常与地衣混生成群落。分布于我国南北各省(自治区)。亚洲其他地区、欧洲、北美洲也有。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 全株长 5cm～20cm，较硬挺。茎细圆柱形，分枝或不分枝，基部具多数细线状假根，下部裸露，红褐色，上部污绿色。叶多列着生，紧贴于茎上，稀卷曲，上部狭长披针形边缘有齿，褐绿色或黑绿色，常一面偏斜，基部分化成鞘状，宽卵形；中肋扁阔，达于叶尖后突出，背面有红褐色刺齿，腹面满布栉片。雌雄异株；蒴柄顶生，红褐色，多旋扭；孢蒴长卵形或圆柱形，倾立；蒴盖小，高凸形，具喙尖；蒴帽黄褐色。气无，味淡。以干燥、叶多者为佳。

性味和功用 甘、涩，平。敛汗，止血，止咳。用于阴虚盗汗，肺痨咳嗽，咯血。常用量 3g～10g。



图 214　高山金发藓

1. 全株　2. 叶放大

小 灰 包

别名 小马勃、小马屁包、小药包、石灰菇。

来源 本品为真菌类灰包科植物小灰包 Lycoperdon pasillum Batsch ex Pers. 的子实体。

原植物 小灰包(图 215)子实体近球形，直径 1cm～2cm，早期呈白色，后变为土黄色以至淡茶褐色，无不孕基部。包被 2 层，外包被表面布满易脱落的细小颗粒，内包被薄而平滑，成熟后顶端开一小口；孢体蜜黄色至淡茶褐色。显微镜下观察：孢子球形，淡黄色，壁表近平滑，直径 3μm～4μm。

生于山坡草地、路旁。分布于辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、青海、江西、湖北、湖南、福建、广东、广西、四川、云南等省(自治区)。

采收加工 夏、秋季雨过天晴时采收。

药材性状 子实体近球形，直径 0.8cm～2cm。包被表面土黄色或淡茶褐色，具易脱落的细小颗粒，2 层，内层包被纸质，灰黄色，顶端圆或开有小口。孢体黄灰褐色或淡茶褐色，有弹性；孢子细粉状，黄褐色，手捻有细腻感。气无，味淡。以皮薄、饱满、松泡有弹性者为佳。

性味和功用 辛，平。归肝、肺经。止血，消肿，清肺，利咽，解毒。用于扁桃体炎，喉炎，鼻出血，外伤出血。常用量 1.5g～3g；外用适量研末撒敷患处。




图 215　小灰包

毛 木 耳

别名 五木耳。

来源 本品为真菌类木耳科植物毛木耳 Auricularia polytricha(Mont.) Sacc. 的干燥子实体。

原植物 毛木耳(图 216)子实体薄而有弹性，胶质，略透明，早期呈杯状，后渐变为耳状或分叶状，表面大多平滑，稀有脉络状皱纹，基部通常有皱褶，红褐色，略带紫色，直径可达 15cm，下面密被绒毛，显微镜下观察，毛基部稍带褐色，上部色淡，短而不分隔，多弯曲，50μm～60μm×4.5μm～6.5μm，基部膨大处直径约 10 微米，向顶端渐狭细，担子(下担子)长圆柱状，52μm～62μm×3μm～3.5μm，由 4 个细胞组成，埋生于子实体上表面胶质层内，从每个细胞上产生一长柄(上担子)伸达子实层表面下，再由其尖端生出 1 担孢子梗，顶生 1 个担孢子；担孢子暴露于空气中，圆柱状，透明无色，12μm～13μm×6μm，担孢子成堆时肉眼观察呈白色粉状。

生于各种阔叶树如栎、榆、赤杨、榕树、枫杨等的朽木上。分布于我国南北各省区。

采收加工 夏、秋季采收，烘干或晒干。

药材性状 呈不规则块片状或耳状，多卷缩。表面紫灰色至黑色，下表面青褐色、浅褐色至瓦灰色，密被微细绒毛。质脆，易折断，以水浸泡则膨胀，色泽转淡，呈棕褐色或红褐色，柔润而微透明，表面有润滑的粘液。气微，味淡。以朵大、肉厚、无杂质者为佳。

性味和功用 甘，平。归胃、大肠经。凉血，止血，补气，润肺。用于气虚血亏，肺虚咳嗽、咯血、吐血，衄血，崩漏，痔疮出血，血痢，牙痛，高血压动脉硬化。常用量 9g～30g




图 216　毛木耳

毛头鬼伞

别名 毛头鬼盖、鸡脚蘑、毛鬼伞、鬼盖、地盖、地伞、地笋。

来源 本品为真菌类伞菌科植物毛头鬼伞 Coprinus comatus(Muell. ex Fr.)S. F. Gray 的干燥子实体。

原植物 毛头鬼伞(图 217)的菌盖初期为长圆柱形或卵圆形，白色，后为圆锥形，渐平展，灰白色，顶端微呈褐红色，被显著的反卷毛，有明显的纵棱纹，直径 5cm～8cm；菌肉白色；菌褶早期白色，老熟后变黑且潮解成墨汁样液体滴下；菌柄白色，长 5cm～18cm，基部稍粗；菌环膜质，狭窄，白色，渐由粉红色变为黑色。孢子黑色，光滑，显微镜下观察呈卵形、椭圆形或瓜籽形，基部有一歪尖，11μm～15μm×6μm～8.5μm。

生于庭园空地或秸秆上。林下草丛中。分布于吉林、辽宁、黑龙江、河北、甘肃、山西、青海、江苏、云南、西藏等省(自治区)。

采收加工 春至秋季子实体呈白色时采摘，洗去泥沙，立即放沸水中煮 3min，捞出，晒干。不能在新鲜时日晒，否则将腐烂发黑。

药材性状 菌盖长圆柱形、卵圆形或圆锥形，直径 2.5cm～6.5cm，表面白色或灰白色，顶部浅褐色或褐红色，具反卷毛及纵棱；菌褶及菌肉白色。菌柄长 5cm～18cm，直径 1cm～2cm，向上渐狭细，基部(地下)呈鳞茎状，中空或海绵状，白色，平滑或略具纵条纹，中或下部有 1 狭窄的膜质环，白色，活动。以色白、质厚实者为佳。

性味和功用 甘，平。有小毒。归胃经。清神，益胃，解毒。用于消化不良，痔疮，疔肿，恶疮。常用量 30g～60g。外用适量研末撒或调醋敷患处。



图 217　毛头鬼伞

蜜 环 菌

别名 蜜蘑、糖蕈、榛蘑。

来源 本品为菌类白蘑科植物蜜环菌 Armellariella mellea(Vahl. ex Fr.)Karst. 的干燥子实体。

原植物 蜜环菌(图 218)子实体丛生。菌盖肉质，卵圆形，顶部稍凸或平展，有时微呈脐状，直径 5cm～10cm，类白色、乳黄色、淡肉褐色至红褐色，中央稍暗，表面多布以鳞片或卷毛状鳞片，或完全平滑，老熟时边缘常具多条平行纵细纹；菌肉白色；菌褶直生，近白色，后期变深色；菌柄圆柱形，基部稍膨大，表面白色，有细条纹。显微镜下观察，孢子球形或椭圆形，透明无色，8μm～10μm×5μm～6.5μm。

生于针、阔叶树的树干基部或被火烧过的树根上，腐朽的木材上。分布于吉林、内蒙古、河北、山西、甘肃、青海、新江、浙江、四川、云南、西藏、贵州、湖南、广西等省(自治区)。朝鲜、蒙古也有。

采收加工 夏末及秋季采收，洗净，晒干。

药材性状 本品子实体多个丛集或单一。

菌盖肉质，近圆形；表面浅土黄色或淡红褐色，覆以暗色细鳞片或无鳞片，边缘具多条细纵平行条纹，中央色稍暗，平展或有时微具脐状突起；菌髓白色；菌褶直生，近白色；菌柄中生，长 8cm～13cm，径 4mm～10mm，内部海绵质或有时中空，表面平滑或在菌环以下具丛卷毛状鳞片，有时具显著的毛状横丝索，通常在近顶端处呈类白色，菌环以下呈淡褐色或微红褐色，有时微黄色；菌环较厚，单一或为双环，不能活动，有的薄而脆，易消失。以肉厚者为佳。

性味和功用 甘，温。归肝肺经。祛风活络，强筋壮骨，明目。用于羊痫风，各种腰腿痛，佝偻病，预防视力失常、眼炎、夜盲、皮肤干燥、粘膜失去分泌能力，可提高对呼吸道及消化道感染疾病的抵抗能力。

附注 本菌与天麻有共生关系，天麻种子借该菌菌丝的贮水而萌动，天麻的代谢产物提供该菌以营养，故进行天麻人工培养，必须接种该菌。



图 218　蜜环菌

中文名索引

一画

一口血 …… (316)
一丈红 …… (400)
一匹莲 …… (2)
一把伞 …… (44、262)
一枝花 …… (122)
一面锣 …… (156)
一根葱 …… (148)
一颗珠 …… (106)

二画

七里麻 …… (262)
七叶一枝花 …… (214)
八卦仙桃 …… (130)
九子莲 …… (170)
九龙上吊 …… (82)
十字苔草 …… (134)
十萼茄 …… (28)
丁萝卜 …… (86)
刀口药 …… (34、78)
人地龙 …… (66)

三画

丫蕊花 …… (122)
广东油桐 …… (360)
广布野豌豆 …… (154)
广藤 …… (104)
三面刀 …… (184)
三枝九叶草 …… (146)
三花兔耳风 …… (78)
三股筋 …… (382)
三角叶黄连 …… (294)
三钻风 …… (322)
三棱乌药 …… (322)
三棱钓樟 …… (322)
三棱草 …… (6)
三颗针 …… (252、296)
三转半 …… (284)
千年桐 …… (360)
土豆根 …… (192)
土马骝 …… (440)
土白头翁 …… (304)
土白蔹 …… (406)
土百部 …… (172)
土莎莲 …… (316)
土败酱 …… (86)
土黄芩 …… (234)
土兔耳风 …… (70)

土砂仁 …… (408)
土藤 …… (104)
大一枝箭 …… (264)
大木花 …… (24)
大匹药 …… (82)
大石韦 …… (34)
大石泽兰 …… (108)
大四块瓦 …… (44)
大叶金腰 …… (94)
大叶金鸡菊 …… (380)
大叶紫苏 …… (46)
大丽花 …… (254)
大半夏 …… (308)
大灵仙 …… (10)
大杜若 …… (176)
大花牛姆瓜 …… (412)
大青 …… (386)
大青叶 …… (386)
大草蔻 …… (406)
大剑叶木 …… (176)
大香附子 …… (6)
大株红景天 …… (268)
大唇羊耳蒜 …… (4)
大理菊根 …… (254)
大崖胡豆 …… (324)
大菟丝子 …… (98)
大黄 …… (174)
大盖球子草 …… (8)
大斑叶兰 …… (144)
大寒药 …… (142)
大防己 …… (66)
大鹅儿肠 …… (42)
下山虎 …… (82)
下延叉蕨 …… (2)
下延三叉蕨 …… (2)
女史花 …… (212)
川土豆根 …… (192)
川山豆根 …… (192)
川大黄 …… (174)
川木香 …… (186)
川五味子 …… (428)
川中南星 …… (204)
川贝 …… (194)
川贝母 …… (194)
川乌 …… (201)
川白芷 …… (226)
川白蔻 …… (406)
川西石吊芭苔 …… (108)
川刘寄奴 …… (68)
川赤芍 …… (244)
川泡桐 …… (404)
川明参 …… (206)
川明党 …… (206)
川独活 …… (216)
川桂皮 …… (328)
川党参 …… (276)
川黄芩 …… (190)
川莪术 …… (188)

山文竹 …… (218)
山芹菜草 …… (22)
山豆根…… (192、220)
山花 …… (260)
山矾 …… (358)
山枝木 …… (182)
山栀茶 …… (182)
山胡椒 …… (322)
山桂花…… (344、358)
山蚂蟥 …… (124)
山萝卜 …… (260)
山黄檗 …… (296)
山慈姑 …… (178)
山乌龟 …… (230)
小广藤 …… (104)
小山豆根 …… (220)
小山萝卜 …… (86)
小寸金黄 …… (80)
小马屁包 …… (442)
小马勃 …… (442)
小木通 …… (10)
小天冬 …… (172)
小升麻 …… (184)
小石韦 …… (34)
小白及 …… (314)
小叶青 …… (12)
小仙茅 …… (138)
小百部 …… (218)
小灰包 …… (442)
小血藤 …… (334)
小红藤 …… (338)
小红参 …… (14)
小活血 …… (14)
小伸筋 …… (56)
小茄 …… (80)
小青 …… (144)
小金梅草 …… (138)
小草乌 …… (290)
小药包 …… (442)
小黄泡 …… (372)
小黄芩 …… (114)
小猪棕草 …… (16)
小斑叶兰 …… (12)
小黑药 …… (10)
小蒿子 …… (68)
小蕨萁 …… (242)
小霸王 …… (74)
马力跨 …… (312)
马牙七 …… (162)
马比木 …… (326)
马耳朵草 …… (94)
马蹄大黄 …… (174)
子芩 …… (234)

四画

云南小木瓜 …… (342)
云南小草蔻 …… (408)
云南独蒜兰 …… (179)

云南桂 …… (382)
天门冬 …… (172)
天泡果 …… (434)
天冬草 …… (172)
天青地红 …… (240)
天竺牡丹 …… (254)
天南星 …… (204)
五木耳 …… (444)
五味子 …… (428)
五毒 …… (201)
木油桐 …… (360)
木香 …… (186)
木香柴 …… (396)
木香马兜铃 …… (346)
木莲金 …… (30)
木笔 …… (398)
木蓝根 …… (192)
书带蕨 …… (30)
长叶楠 …… (344)
长花铁线莲 …… (330)
长药隔重楼 …… (214)
长圆叶水苏 …… (76)
太子参 …… (208)
车前 …… (18)
车前草 …… (18)
车藤 …… (150)
无娘藤 …… (98)
中华水芹 …… (20)
中华栝楼 …… (414)
中华雪胆 …… (292)
日本蛇根草 …… (140)
日本菟丝子 …… (98)
贝母…… (194、282)
见血封口 …… (266)
少花新樟 …… (382)
毛木耳 …… (444)
毛头鬼伞 …… (446)
毛头鬼盖 …… (446)
毛连巴藤 …… (324)
毛蕊铁线莲 …… (10)
毛宿苞豆 …… (338)
毛胶薯蓣 …… (288)
毛细辛 …… (48)
毛花洋地黄 …… (384)
毛药 …… (28)
毛鬼伞 …… (446)
毛慈姑 …… (178)
牛心茶 …… (132)
牛奶白附 …… (228)
牛奶树 …… (66)
牛姆瓜 …… (412)
牛尾香 …… (232)
牛尾参 …… (288)
牛尾独活 …… (216)
牛藤 …… (150)
午花姜 …… (408)
乌子树 …… (368)
乌头 …… (201)

乌麦 …… (430)
乌药…… (201、284)
风车子 …… (362)
风顶红 …… (26)
风湿药 …… (82)
凤尾草 …… (110)
月下参 …… (290)
公黄珠子 …… (326)
火烧尖 …… (374)
水川芎 …… (22)
水飞蓟 …… (410)
水飞雉 …… (410)
水母雪莲 …… (24)
水母雪莲花 …… (24)
水仙 …… (212)
水仙根 …… (212)
水红补 …… (370)
水细辛 …… (48)
水棉花 …… (304)
水茴香 …… (76)
水黄连 …… (126)
水蒿 …… (68)
水蓑衣 …… (130)
水藁本 …… (300)
水爆腰果 …… (26)
文术 …… (188)
巴山重楼 …… (210)
双边栝楼 …… (414)
双叶金枪 …… (4)
双肾草 …… (148)

五画

石刁柏 …… (218)
石生繁缕 …… (42)
石兰花 …… (92)
石韦 …… (34)
石龙牙草 …… (88)
石灰菰 …… (442)
石竹 …… (164)
石苦蘼 …… (38)
石刷把 …… (40)
石柱花 …… (164)
石茶 …… (34)
石笋还阳 …… (64)
石斛 …… (332)
石蜘蛛 …… (156)
甘西鼠尾草 …… (238)
甘肃丹参 …… (238)
甘姜 …… (322)
甘肃贝母 …… (194)
四儿风 …… (44)
四大天王 …… (44)
四川千金藤 …… (220)
四川冬青 …… (364)
四川蜡瓣花 …… (366)
四叶参 …… (208)
四块瓦 …… (44)
四角风 …… (362)

四季花 …… (140)
四籽马蓝 …… (84)
四面草 …… (58)
四棱香 …… (46)
凹叶瑞香 …… (222)
平车前 …… (18)
平卧阴石蕨 …… (242)
龙须草 …… (90)
龙须菜 …… (218)
龙香草 …… (94)
龙喳口 …… (86)
末膝 …… (258)
白土苓…… (224、302)
白牛膝 …… (142)
白玉簪 …… (390)
白芷 …… (226)
白毛夏枯草 …… (100)
白地黄瓜 …… (54)
白芥 …… (416)
白芥子 …… (416)
白苕干 …… (154)
白细辛 …… (102)
白附子 …… (228)
白茯苓 …… (302)
白铃子 …… (156)
白跌打 …… (266)
白萼 …… (390)
白蒿 …… (68)
白辣菜子 …… (416)
白鹤花 …… (390)
白檀 …… (368)
仙桃草 …… (130)
冬青 …… (364)
瓜蒌 …… (414)
玉簪 …… (390)
丝瓜花 …… (10)
半枫荷 …… (340)
汉荭鱼腥草 …… (32)
对经草 …… (132)
台湾莴苣 …… (86)
母猪半夏 …… (308)

六画

交让木 …… (370)
百合 …… (310)
西南千金藤 …… (50)
西南拉拉藤 …… (14)
西南细辛 …… (48)
西南黄芩 …… (234)
米籽兰 …… (394)
米参 …… (208)
地不容 …… (232)
地乌龟 …… (230)
地龙松 …… (172)
地构叶 …… (52)
地刷子 …… (56)
地刷子石松 …… (56)
地苓苋 …… (116)

地伞 …… (446)
地苓 …… (446)
地盖 …… (446)
地黄瓜 …… (54)
有柄三叉蕨 …… (2)
有柄石韦 …… (34)
灰木 …… (368)
灰毛川木香 …… (186)
老虎姜 …… (298)
老鹳草 …… (32)
老鸦花 …… (158)
老鼠刺 …… (252)
老鼠筋 …… (410)
奶蓟 …… (410)
肉连环 …… (38、170)
吊菜子 …… (426)
吊灯花 …… (62)
吊金龟 …… (230)
光叶岩豆藤 …… (336)
光叶绣线菊 …… (374)
光板石韦 …… (34)
吕宋楸毛 …… (418)
吕宋秋荚粉 …… (418)
尖叶藁本 …… (300)
尖叶唐松草 …… (64)
光慈姑 …… (179)
竹叶防风 …… (236)
竹叶柴胡 …… (236)
竹节兰 …… (176)
竹节羌活 …… (246)
竹节参 …… (278)
朱兰 …… (394)
朱砂银 …… (240)
伏毛肥肉草 …… (26)
伏毛铁棒追 …… (284)
华风车子 …… (362)
华细辛 …… (102)
华肖菝葜 …… (224)
红八爪 …… (240)
江南地不容 …… (232)
红毛蛇 …… (242)
红毛走马胎 …… (70)
红丝线 …… (28)
红升麻 …… (270)
红旱莲 …… (132)
红花小独蒜 …… (314)
红豆杉 …… (420)
红豆杉子 …… (420)
红豆木 …… (420)
红鸡踢香 …… (72)
红姑娘 …… (434)
红果黄肉楠 …… (376)
红果楠 …… (376)
红背兔耳风 …… (70)
红南星 …… (308)
红陈艾 …… (68)
红独活 …… (248)
红面将军 …… (72)

红凉伞 …… (240)
红树 …… (376)
红藤 …… (238、338)
红秦艽 …… (238)
红掌草 …… (124)
血藤 …… (334)
血见愁 …… (28)
纤冠藤 …… (66)
纤细老鹳草 …… (32)
伞柄竹 …… (378)
多裂乌头 …… (284)
羊乳藤 …… (66)
羊角七 …… (162)
羊角藤 …… (150)
灯火草 …… (166)
灯笼花 …… (194)
灯笼草 …… (130)
灯笼果 …… (434)
冰球子 …… (178)
汝兰 …… (230)
羽叶三七 …… (278)
过山龙 …… (56、312)
全叶马兰 …… (58)
异叶黄鹤菜 …… (60)
异药花 …… (26)

七画

庐山石韦 …… (34)
辛夷 …… (398)
赤芍 …… (244)
苍蝇王 …… (88)
走马胎 …… (70、74)
巫山党 …… (276)
芦笋 …… (218)
针筒菜 …… (76)
卵叶水芹 …… (22)
连翘叶黄芩 …… (190)
沙棘 …… (422)
沙棘子 …… (422)
冷饭巴 …… (302)
羌活 …… (246)
拟蠓猪刺 …… (252)
尾活 …… (216)
尾膝 …… (258)
鸡爪乌 …… (290)
鸡血藤 …… (336)
鸡脚蘑 …… (446)
条赤芍 …… (244)
条芩 …… (234)
条党 …… (276)
条裂紫堇 …… (306)
芸苔 …… (424)
芸苔子 …… (424)
花佩菊 …… (74)
芥子 …… (416)
阴石蕨 …… (242)
杜鹃兰 …… (178)
两色紫金牛 …… (240)

两歧飘拂草 …… (160)

八画

单叶细辛 …… (48)
单支党 …… (276)
宝兴马兜铃 …… (346)
宝兴百合 …… (250)
空洞菜 …… (60)
疙瘩七 …… (278)
宜昌木蓝 …… (192)
宜昌胡颓子 …… (72)
官桂皮 …… (328)
苦丁 …… (86)
苦竹 …… (378)
苦竹叶 …… (378)
苦金盆 …… (292)
苦葛 …… (256)
苦葛根 …… (256)
松叶兰 …… (40)
松叶蕨 …… (40)
枫荷梨 …… (340)
杭白芷 …… (226)
抽筋草 …… (42)
抽心寒药 …… (80)
拔地麻 …… (318)
刺子莞 …… (90)
刺牛膝 …… (142)
刺黄连 …… (252)
刺黄柏 …… (252)
刺黄檗 …… (296)
刺革解 …… (302)
直萼黄芩 …… (114)
直穗小檗 …… (296)
画眉珠 …… (370)
枣仁 …… (436)
茄 …… (426)
茄子 …… (426)
青皮草 …… (78)
拐枣七 …… (184)
茅膏菜 …… (88)
苕花根 …… (254)
明沙参 …… (206)
明参 …… (206、260)
明党 …… (260)
明党参 …… (260)
金不换 …… (230)
金灯 …… (178、434)
金灯藤 …… (98)
金丝三七 …… (184)
金龟草 …… (184)
金龟莲 …… (292)
金腰带 …… (222)
金刚刺 …… (302)
金刚藤 …… (302)
金刚鞭 …… (302)
金疮小草 …… (100)
金盆 …… (292)
金背藤 …… (72)

金盏花 …… (392)
金盏菊 …… (392)
金盏银台 …… (212)
金飘羹 …… (34)
鱼子兰 …… (394)
使君子藤 …… (362)
垂花发汗藤 …… (330)
细羊角 …… (66)
细辛 …… (48、102)
细圆藤 …… (104)
细梗香草 …… (112)
参叶 …… (279)
虎头兰 …… (92)
虎皮草 …… (94)
虎图辣 …… (290)
虎掌 …… (308)
岩七 …… (266)
岩大蒜 …… (264)
岩冬菜 …… (84)
岩芋 …… (308)
岩扫帚 …… (40)
岩藤香 …… (346)
果上叶 …… (38)
罗汉草 …… (70)
肾气草 …… (54)
味牛膝 …… (258)
败酱 …… (86)
禹白附 …… (228)
禹党 …… (276)
兔儿伞 …… (262)
法罗海 …… (248)
泥宾子 …… (178)
油草 …… (134)
油菜子 …… (424)
波氏星蕨 …… (166)
泡桐树 …… (404)
泡通 …… (404)
狗爪半夏 …… (308)
狗肝菜 …… (84)
狗脚血迹 …… (32)
软筋藤 …… (82)
忽地笑 …… (264)

九画

弯蕊开口箭 …… (266)
扁竹兰 …… (266)
扁枝石松 …… (56)
亮叶鸡血藤 …… (336)
亮叶崖豆藤 …… (336)
亮叶岩豆藤 …… (336)
点花黄精 …… (274)
药用大黄 …… (174)
草豆蔻 …… (406)
草红藤 …… (338)
草寇 …… (406)
南大黄 …… (174)
南川沿阶草 …… (152)
南星 …… (308)

南紫花树 …… (326)
砖子苗 …… (6)
树刁 …… (274)
树兰 …… (394)
树吊 …… (274)
树柴胡 …… (374)
树参 …… (340)
重楼 …… (214)
重楼排草 …… (44)
香大活 …… (226)
香叶子 …… (382)
香草 …… (112)
香排草 …… (112)
鬼盖 …… (446)
挂金灯 …… (434)
挖耳草 …… (106)
虻 …… (194)
姜朴 …… (398)
姜黄草 …… (298)
追风伞 …… (326)
活血莲 …… (316)
洛阳花 …… (164)
类叶升麻 …… (270)
狭叶艾 …… (68)
狭叶红景天 …… (268)
狭叶洋地黄 …… (384)
狭瓣吊灯花 …… (62)
独儿七 …… (316)
独叶草 …… (34)
独角风 …… (108)
独角莲 …… (228)
独活 …… (216)
独脚鸡 …… (440)
独脚蒜头 …… (264)
独蒜兰 …… (178)
盾叶茅膏菜 …… (88)
盾果草 …… (96)
屏风草 …… (114)
贴骨散 …… (262)
胡芥 …… (416)
狮子七 …… (268)
柔毛五味子 …… (428)
威灵仙 …… (10)
孩儿参 …… (208)
盆草细辛 …… (48、102)
胎生铁角蕨 …… (110)
络石藤 …… (350)
珍珠透骨草 …… (52)
祖师麻 …… (222)
钮子七 …… (278)
剑叶金鸡菊 …… (380)
剑叶虾脊兰 …… (162)

十画

高山金发藓 …… (440)
高原千金藤 …… (50)
高原丹参 …… (238)
宽穗兔耳风 …… (78)

康定翠雀花 …… (290)
莪术 …… (188)
峨眉五味子 …… (334)
峨眉贝母 …… (282)
峨眉石凤丹 …… (122)
峨眉连 …… (294)
峨嵋唐松草 …… (126)
峨眉过路黄 …… (120)
峨眉家连 …… (294)
峨眉黄肉楠 …… (344)
峨眉排草 …… (120)
峨眉冠唇花 …… (46)
峨眉葛藤 …… (256)
峨三七 …… (279)
饿蚂蟥 …… (124)
珠儿参 …… (278)
珠子参 …… (278)
珠兰 …… (394)
铁色箭 …… (264)
铁皮兰 …… (332)
铁皮石斛 …… (332)
铁花 …… (201)
铁杆七 …… (312)
铁刷把 …… (40)
铁扁担 …… (210)
铁凉伞 …… (240)
铁菱角 …… (302)
铁脚灵仙 …… (10)
铁飘儿菜 …… (122)
铁牛七 …… (284)
铁骨莲 …… (110)
铁棒锤 …… (284)
鸭脚板 …… (340)
桂皮 …… (328)
栘桄 …… (342)
烧香杆 …… (248)
称砣草 …… (148)
绣线菊 …… (374)
绣球草 …… (90)
皱桐 …… (360)
蚊母草 …… (130)
海金子 …… (182)
海棠果 …… (432)
涩疙瘩 …… (268)
倒水莲 …… (126)
倒牵牛 …… (366)
粉沙参 …… (260)
粉背薯蓣 …… (272)
粉葛解 …… (272)
蚕羌 …… (246)
党参 …… (276)
透骨草 …… (52)
晒不死 …… (30)
艳山姜 …… (406)
浆果苋 …… (116)

十一画

康定贝母 …… (196)

鹿衔草 …… (128)
鹿蹄草 …… (128)
密花崖豆藤 …… (324)
密齿天门冬 …… (172)
麻叶青 …… (12)
麻杆花 …… (400)
雪莲 …… (24)
雪莲花 …… (24)
雪上一支蒿 …… (284)
雪里开花 …… (140)
雪胆 …… (292)
萆解 …… (302)
黄山药 …… (298)
黄山薯 …… (272)
黄牛草 …… (134)
黄瓜香 …… (54)
黄皮血藤 …… (334)
黄芩 …… (126、190、234)
黄连 …… (294)
黄泡 …… (372)
黄泡叶 …… (372)
黄花石蒜 …… (264)
黄草石斛 …… (348)
黄刺皮 …… (296)
黄姜…… (272、298)
黄萆解 …… (272)
黄海棠 …… (132)
黄酸刺 …… (422)
黄藁本 …… (300)
黄檗 …… (296)
野大麻 …… (46)
野巴子 …… (136)
野牛膝 …… (258)
野白芷 …… (20)
野白果树 …… (396)
野红萝卜 …… (20)
野芋 …… (228)
野鸡草 …… (138)
野坝子 …… (136)
野坝蒿 …… (136)
野芹菜 …… (20)
野麦子 …… (430)
野麦草 …… (430)
野拔子 …… (136)
野豇豆 …… (158)
野板蓝根 …… (118)
野棉花 …… (304)
野茉莉 …… (396)
野油麻 …… (76)
野洋参 …… (144)
野海棠 …… (126)
野豌豆 …… (154)
野燕麦 …… (430)
猪毛参 …… (16)
猪耳朵 …… (94)
猫脚印 …… (32)
象头花 …… (308)
淮木通 …… (346)

淮通 …… (346)
淫羊藿 …… (146)
惊风药 …… (290)
银叶桂 …… (328)
银线盆 …… (144)
假杜鹃 …… (142)
假豪猪刺 …… (252)
排草 …… (112)
排草香 …… (112)
崖花子 …… (182)
崖花海桐 …… (182)
崖豆藤 …… (324)
粗柄杜若 …… (176)
粗糠紫 …… (418)
粘山药 …… (288)
粘芋 …… (288)
粘身草 …… (124)
粘狗苔 …… (288)
常春木 …… (340)
常春菊 …… (392)
常绿茶 …… (128)
甜柴叶 …… (358)
梭茅草 …… (134)
梭砂贝母 …… (194)
铜棒锤 …… (306)
铜棒紫堇 …… (306)
接骨仙桃 …… (130)
接骨草 …… (130)
蛇根草 …… (140)
船儿草 …… (8)
球花马蓝 …… (118)
兜唇石斛 …… (348)
莱菪子 …… (424)
菝葜 …… (302)
望春花 …… (398)
绿豆升麻 …… (270)
绿丝郁金 …… (188)

十二画

葳参 …… (274)
蒌蒿 …… (68)
落地梅 …… (44)
落地秧 …… (154)
落苏 …… (426)
棋盘花 …… (400)
筒瓣兰 …… (314)
筋骨草 …… (42、100)
普通凤丫蕨 …… (312)
普通铁线蕨 …… (16)
紫丹参 …… (238)
紫玉兰 …… (398)
紫花玉兰 …… (398)
紫花络石 …… (150)
紫花堇菜 …… (54)
紫柴胡 …… (236)
紫靛 …… (142)
紫藤 …… (354)
黑心姜 …… (188)

黑节关 …… (160)
黑皮柳叶楠 …… (344)
黑及草 …… (332)
黑刺 …… (422)
黑南星 …… (308)
黑虎七 …… (312)
黑果茜芋 …… (352)
黑籽重楼 …… (214)
童参 …… (208)
鹅儿花 …… (201)
鹅毛石竹 …… (164)
猴节莲 …… (298)
湖北大百部 …… (218)
湖北百合 …… (310)
湖北络石 …… (350)
湖南连翘 …… (132)
温大青 …… (118)
朝鲜淫羊藿 …… (146)
蛤仔藤 …… (104)
棘 …… (436)
硬枣 …… (436)
腋花络石 …… (150)
散血草 …… (100)
割鸡芒 …… (106)
舒筋草 …… (56)
短药沿阶草 …… (152)
帽头菜 …… (262)
斑叶兰 …… (144)
斑叶鹤顶兰 …… (170)
阔叶丫蕊花 …… (122)
循环草 …… (122)
痢疾草 …… (380)
骚独活 …… (248)
葱叶兰 …… (148)
雅连 …… (294)

十三画

蓝心姜 …… (188)
蒙自黄精 …… (274)
蜀芥 …… (416)
蜀葵 …… (400)
滇钩吻 …… (274)
滇黄芩 …… (234)
满山香…… (112、318)
蛾子草 …… (86)
楸子 …… (432)
矮瓜 …… (426)
碎米子树 …… (368)
碎米兰 …… (394)
锦灯笼 …… (434)
暗紫贝母 …… (194)
睡地金牛 …… (66)
路边菊 …… (58)
蓬蘽 …… (188)
新樟 …… (382)
雷公连 …… (82)

十四画

滴水参 …… (228)

滴水珠……（156、228）
蝉兰 ……（92）
蓼蓝 ……（386）
蜜环菌 ……（448）
蜜蘑 ……（448）
榛蘑 ……（448）
聚叶花葶乌头 ……（316）
辣菜子 ……（416）
鲜石斛 ……（332）
膜缘柴胡 ……（236）

十五画

瘤果地构叶 ……（52）
缬草 ……（318）
客蚂叶 ……（18）
蹉蚂叶 ……（18）
醉魂藤 ……（158）
飘拂草 ……（160）
澜江百合 ……（250）
燕麦草 ……（430）
酸多李皮 ……（342）
酸枣 ……（436）
酸枣仁 ……（436）
酸枣核 ……（436）
酸刺 ……（422）
酸浆 ……（434）
酸猴儿 ……（26）
酸楂 ……（342）
醋柳果 ……（422）
墨七 ……（316）
舞花姜 ……（408）
蝴蝶草 ……（338）

十六画以上

糖萝 ……（448）
糠粑子菜 ……（418）
霍山石斛 ……（332）
螺丝七 ……（162）
螺丝羌 ……（246）
藤八爪 ……（166）
藤杜仲 ……（150）
藤萝树 ……（354）
藁本 ……（300）
藁本菜 ……（300）
瞿麦 ……（164）
镰翅羊耳蒜 ……（38）
翼梗五味子 ……（334）
攀援星蕨 ……（166）
疆蛇通 ……（338）
露笋 ……（218）

拉丁名索引

A

Aconitum carmichaeli Debx …… (201)
A. flavum Hand. Mazz. …… (284)
A. polyschistum Hand. Mazz. …… (284)
A. scaposum var. vaginatum (Pritz.) Rapaics …… (316)
Actaea asiatica Hara …… (270)
Actinodaphne cupularis (Hemsl.) Gamble …… (376)
Actinodaphne omeiensis (Liou) Allen …… (344)
Adiantum edgeworthii Hook. …… (16)
Aglaia odorata Lour. …… (394)
Ainsliaea rubrifolia Franch. …… (70)
Ainsliaea triflora (Buch.-Ham.) Druce …… (78)
Ajuga decumbens Thunb. …… (100)
Aleurites montana (Lour.) Wils. …… (360)
Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt. et Smith …… (406)
Althaea rosea (Linn.) Cavan. …… (400)
Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC. …… (304)
Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook.
f. ex Franch. et Hangbaizhi, Hort. …… (226)
Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. …… (314)
Amydrium sinense (Engl.) H. Li …… (82)
Ardisia crenata Sims. var. bicolor (Walker) C. Y. Cu et C.
Chen …… (240)

Arisaema franchetianum Engl. …… (308)
Arisaema wilsonii Engl. …… (204)
Aristolochia moupinensis Franch. …… (346)
Armellariella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst. …… (448)
Artemisia selengensis Turcz. …… (68)
Asarum himalaicum Hook. f. et Thoms ex klotzsch. …… (48)
Asarum sieboldii Miq. …… (102)
Asparagus meioclados Lévl …… (172)
Asparagus officinalis L. …… (218)
Asplenium planicaule Wall. …… (110)
Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. …… (444)
Avena fatua L. …… (430)

B

Barleria cristata L …… (142)
Berberis dasystachya Mixim. …… (296)
Berberis soulieana Schneid …… (252)
Brassica campestris L. …… (424)
Bupleurum marginatum Wall. ex Dc …… (236)

C

Calanthe davidii Franch. …… (162)
Calendula officinalis L. …… (392)
Carex cruciata Vabl …… (134)
Ceropegia trichantha Hemsl. …… (62)
Changium smyrnioides Wolff …… (260)
Chrysosplenium macrophyllum Oliv. …… (94)
Chuanminshen violaceum Shen et Shan …… (206)
Cimicifuga acerina (Sieb. et Zucc.) Tanaka …… (184)

Cinnamomum mairei Lévl. …… (328)
Cladostachys frutescens D. Don …… (116)
Clematis lasiandra Maxim. …… (10)
Clematis rehderiana Craib …… (330)
Codonopsis tangshen oliv. …… (276)
Combretum alfredii Hance …… (362)
Coniogramme intermedia Hieron. …… (312)
Coprinus comatus (Muell. ex Fr.) S. F. Gray …… (446)
Coptis deltoides C. Y. Cheng et Hsiao …… (294)
Coreopsis lanceolata L. …… (380)
Corydalis linarioides Maxim …… (306)
Corylopsis willmottiae Rehd. et Wils …… (366)
Cremastra appendiculata (D. Don) Makino …… (178)
Curcuma aeruginosa Roxb (C. zedoaria non Rosc.) …… (188)
Curcuma zedoaria Rosc. …… (188)
Cuscuta japonica Choisy …… (98)
Cymbidium hookerianum Keichb. f. …… (92)

D

Dahlia pinnata Cav. …… (254)
Daphniphyllum macropodum Miq. …… (370)
Daphne retusa Hemsl. …… (222)
Delphinium tatsienense F r a n c h. …… (290)
Dendrobium candicum Wall. ex Lindl. …… (332)
Dendrobium aphyllum (Roxb.) C. E. Fish. …… (348)
Dendropanax dentiger (Harms) Merr. …… (340)
Desmodium sambuense (D. Don) DC. …… (124)
Dianthus chinensis L. …… (164)
Digitalis lanata Ehrh …… (384)

Dioscorea collettii Hook. f. var. hypoglauca (Palib.) Pei et Ting ····· (272)
Dioscorea panthaica Prain et Burkill ····· (298)
Dioscorea subcalva Prain ····· (288)
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub ····· (56)
Docynia delavayi (Franch.) Schneid. ····· (342)
Dolomiaea souliei (Franch.) Shih ····· (186)
Dolomiaea souliei var. cinerea Ling ····· (186)
Drosera peltata Smith var. multisepala Y. Z. Ruan ····· (88)

E

Elaeagnus henryi Warb. ex Diels ····· (72)
Elsholtzia rugulosa Hemsl. ····· (136)
Epimedium koreanum Nakai ····· (146)

F

Faberia sinensis Hemsl. ····· (74)
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl ····· (160)
Fordiophyton faberi Stapf ····· (26)
Fritillaria delavayi Franch. ····· (194)
F. przewalskii Maxim. et Batal. ····· (194)
F. cirrhosa D. Don ····· (194)
F. roylei Hook. ····· (196)
F. cirrhosa var. ecirrhosa Franch ····· (196)
F. omeiensis S. C. Chen ····· (282)
F. unibracteata Hsiao et K. C. Hsia ····· (194)

G

Galium elegans Wall. ex Roxb. ····· (14)

Geranium robertianum L. …… (32)
Globba racemosa Smith (G. bulbosa Gagnep.) …… (408)
Gongronema nepalense (Wall.) Decne. …… (66)
Goodyera repens (L.) R. Br. …… (12)
Goodyera schlechtendaliana Rchb. f. …… (144)

H

Hemsleya chinensis Cogn. ex Forb. et Hemsl. …… (292)
Heracleum apaense (Sha et Yuan) Shan et T. S. Wang (Angelica apceensis Shan et Yuan) …… (248)
Heracleum hemsleyanum Diels …… (216)
Heterosmilax chinensis Wang …… (224)
Heterostemma alatum Wight …… (158)
Hippophae rhamnoides Linn. …… (422)
Holboellia grandiflora Reaub. …… (412)
Hosta plantaginea (Lam.) Aschers. …… (390)
Humata repens (L. f.) Diels …… (242)
Hypericum ascyron L. …… (132)
Hypoxis aurea Lour. …… (138)

I

Ilex szechwanensis Loes. …… (364)
Indigofera ichangensis Crab …… (192)

K

Kalimeris integrifolia Turcz. ex DC. …… (58)

L

Lactuca formosana Maxin …… (86)
Ligusticun acuminatum Franch. …… (300)

Lilium duchartrei Franch. …… (250)
Lilium henryi Baker …… (310)
Lindera obtusiloba (Sieb. et Zucc.) Blume …… (322)
Liparis dunnii Rolfe …… (4)
Liparis bootanensis Griff …… (38)
Lycianthes biflora (Lour.) Bitter …… (28)
Lycoperdon pasillum Batsch ex Pers. …… (442)
Lycoris aurea (L'Herit) Herb. …… (264)
Lysimachia capillipes Hemsl. …… (112)
Lysimachia deltoidea Wight var. cinerascens Franch …… (80)
Lysimachia omeiensis Hemsl. …… (120)
Lysimachia paridiformis Franch. …… (44)
Lysionotus wilsonii Rehd. …… (108)

M

Magnolia liliflora Desr. …… (398)
Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. -Arg. …… (418)
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. …… (432)
Mariscus umbellatus Vahl …… (6)
Microsorium buergerianum (Miq.) Ching …… (166)
Microtoena omeiensis C. Y. Wu et Hsuan …… (46)
Microtis parviflora R. Br. …… (148)
Millettia congestiflora T. C. Chen …… (324)
Millettia nitida Benth. …… (336)

N

Narcissus tazetta L. var. chinensis Roem …… (212)
Neocinnamomum delavayi (Lec.) H. Liou …… (382)
Nothapodytes pittosporoides (Oliv.) sleumer (Mappia

pittosporoides Oliv.) ····· (326)
Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang ····· (246)

O

Oenanthe rosthornii Diels ····· (22)
Oenanthe sinensis Dunn ····· (20)
Ophiopogon bockianus Diels var. angustifoliatus Wang et Tang ····· (152)
Ophiorrhiza japonica Bl. ····· (140)

P

Paeonia veitchii Lynch ····· (244)
Panax psendo-ginseng Wall. var. bipiratifidus (Seem.) Licp. ····· (278)
Panax pseudo-ginseng Wall. var. japonicus (C. A. Mey.) Hoo et Tseng ····· (278)
Paris bashanensis Wang et Tang ····· (210)
Paris polyphylla Sm. var. thibetica (Franch.) Hara ····· (214)
Paulownia fargesii Franch ····· (404)
Peliosanthes macrostegia Hance ····· (8)
Pericampylus glaucus (Lam.) Miers ····· (104)
Phaius woodfordii (Hook.) Merr. ····· (170)
Physalis alkekengi L. var. franchetii Makino ····· (434)
Pinellia integrifolia N. E. Brown ····· (156)
Pittosporum illicioides Mak. ····· (182)
Plantago depressa Willd. ····· (18)
Pleioblastus amarus (Keng) Keng f. ····· (378)
Pleione bulbocodioides (Frach.) Rolte ····· (178)
Pleione yannanensis (Rolfe) Rolfe ····· (179)

Pogonatum alpinum Hedw. …… (440)
Pollia hasskarlii Rolla Rao …… (176)
Polygonatum punctatum Royle ex Kioth …… (274)
Polygonum tinctoria L. …… (386)
Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm. …… (208)
Psilotum nudum (L.) Griseb …… (40)
Pueraria omeiensis Wang et Tang …… (256)
Pyrola calliantha H. Andr. (P. rotundifolia L. subsp. chinensis H. Andr …… (128)
Pyrrosia P. petiolosa (Christ) Ching …… (34)
Pyrrosia P. sheareri (Bak.) ching …… (34)

R

Rheum officinale Baill …… (174)
Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim. …… (268)
Rhynchospora rubra (Lour.) Makino …… (90)
Rubus pectinellus Maxim. …… (372)

S

Salvia przewalskii Maxim. …… (238)
Saussurea medusa Maxim. …… (24)
Schisandra henryi Clarke …… (334)
Schisandra pubescens Hemsl. …… (428)
Scutellaria amoena C. H. Wright …… (234)
Scutellaria hypericifolia Lévl. …… (190)
Scutellaria orthocalyx Hand. -Mazz. …… (114)
Shuteria pampaniniana Hand. -Mazz. …… (338)
Silybum marianum (L.) Gaerth …… (410)

Sinapus alba L. …… (416)
Spiraea japonica L. f. var. fortunei (Planch.) Rehd. …… (374)
Skimmia melanocarpa R. et W. …… (352)
Smilax china L. …… (302)
Solanum melongena L. …… (426)
Speranskia tuberculata (Bge.) Baill. …… (52)
Stachys oblongifolia Benth. …… (76)
Stellaria saxatilis Buch. -Ham. …… (42)
Stephania excentrica H. S. Lo …… (232)
Stephania sinica Diels …… (230)
Stephania subpeltata H. S. Lo …… (50)
Stephania sutchuenensis H. S. Lo …… (220)
Strobilanthes pentstemonoides (Nees) T. Anders. …… (118)
Strobilanthes tetraspermus (Champ. ex Benth.) Druce …… (84)
Strobilanthes sp. …… (258)
Styrax japonica Sieb. et Zucc. …… (396)
Symplocos panicalata (Thunb.) Miq. …… (368)
Symplocos sumuntia B. -H. ex D. Don (S. caudata Wall. ex A. DC.) …… (358)
Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim. …… (262)

T

Taxus chinensis (Pilger) Rehd. …… (420)
Tectaria decurrens (Presl) Copel …… (2)
Thalictrum acutifolium (Hand. -Mazz) Boivin …… (64)
Thalictrum omeiense W. T. Wang et S. H. Wang …… (126)
Thyrocarpus sampsonii Hance …… (96)
Trachelospermum axillare Hook. f. …… (150)
Trachelospermum grocilipes Hook. f. var. hupense Tiang et P.

T. Li ····· (350)
Trichosanthes rosthornii Harms ····· (414)
Tupistra wattii Hook. f. ····· (266)
Typhonium giganteum Engl ····· (228)

U

Utricularia bifida L. ····· (106)

V

Valeriana officinalis L. ····· (318)
Veronica peregrina L. ····· (130)
Vicia cracca L. ····· (154)
Viola grypoceras A. Gray ····· (54)
Vittaria flexuosa Fee ····· (30)

W

Wisteria sinensis Sweet ····· (354)


Y

Youngia heterophylla (Hemsl.) Babc. et Stebb. ····· (60)
Ypsilandra thibetica Franch. ····· (122)

Z

Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow ····· (436)

实用中草药彩色图集



第五册

罗献瑞　主编

广东科技出版社

实用中草药彩色图集系列书

第一册　华南地区中草药　已出
第二册　华南地区中草药　已出
第三册　动物、矿物药及名贵中药　已出
第四册　华东地区中草药　已出
第五册　西南地区中草药　已出
第六册　西南地区中草药　即出
第七册　东北、华北地区中草药　即出
第八册　西北地区中草药及民族药　即出

责任编辑　陈　岩
封面设计　丘庆璇

ISBN 7-5359-2184-1
9 787535 921840 >

ISBN 7-5359-2184-1
R·369　定价：38.00元

实用中草药彩色图集

第五册

主　　编　罗献瑞
本册主编　赵素云
编　　写　赵素云　严俊　王牧　梅霞
　　郑向清　蔡敏
绘　　图　孙西　雷成竹

广东科技出版社
广　州

图书在版编目（CIP）数据

实用中草药彩色图集（第五册）/罗献瑞主编．—广州：广东科技出版社，2000．1

ISBN 7-5359-2184-1

Ⅰ．实…

Ⅱ．罗…

Ⅲ．中草药-图谱-中国

Ⅳ．R281

R281.73/06

出版发行：广东科技出版社

（广州市环市东路水荫路11号　邮码：510075）

E-mail：gdkjzbb@21cn．com

出 版 人：黄达全

经　　销：广东新华发行集团股份有限公司

排　　版：广东科电有限公司

印　　刷：广州彩色印务有限公司

（广州市诗书路63号　邮码：510120）

规　　格：787mm×1 092mm　1/32　印张15.25　字数300千

版　　次：2000年1月第1版

2001年2月第3次印刷

印　　数：20 201～30 200册

定　　价：38.00元

如发现因印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

Coloured Icones of Chinese Medicine

Volume V

Chief editor: Lo Hsien Shui

Guangdong Science and Technology Press
Guangzhou China

内 容 简 介

本图集第五册本着实用的宗旨，植物药、动物药和矿物药兼收并蓄，仍取图文对照形式编排。本册收载西南地区产的中草药211种，其中全草类82种，根和根茎类69种，茎、枝和树皮类17种，叶类15种，花类6种，果实和种子类17种，苔藓、菌类5种。每种均附彩图，部分有药材图，对西南及其邻近地区从事中草药生产、经营、科研、教学及中草药业余爱好者鉴别原植物（动物、矿物）及药材，均有很好的参考价值。

编 写 说 明

1. 本册收载的品种均为西南地区常用中草药，计 211 种，其中全草类 82 种，根和根茎类 69 种，茎、枝和树皮类 17 种，叶类 15 种，花类 6 种，果实、种子类 17 种、苔藓、菌类 5 种。
2. 本册的编写体例和规格与前四册基本相同。有关体例和规格方面的问题，请参阅第一册编写说明，不赘述。
3. 《中华人民共和国药典》（一部），简称《药典》，本册中均指 1995 年版。

续编集前言

本套图集原拟编写3集，主要收载华南地区出产的常用中草药，旁及少量外区出产的名贵中草药材和进口药材。这一计划已于1994年8月顺利完成。

《实用中草药彩色图集》第一、二、三册出版后，不断收到读者及有关发行单位的来信，要求增收华南地区以外的品种，以满足这些地区中草药资源开发利用的需要，同时又可以使本书在更广泛的地区发挥作用。

我们认为上述读者的要求是合理的，是符合本图集编写宗旨的（详见第一册所载前言），应尽可能给予满足。为此邀约华南地区以外部分省区对当地中草药研究有造诣的专家分区编绘续集。为了保证编绘工作严谨有序地进行，续编的每一分册均另设一主编，管理品种拟定，编绘人员遴选和图稿的审查等，以体现分工负责和文责自负的原则。

我国地域广阔，中草药的生产和应用常有明显的地区特色。但植（动）物的分布与行政区域的划分并不一致。因此，同一种植（动）物常常在不同的行政区域重复出现，反映在本书中也不可避免会出现少数品种重复，在保持每一册均能比较完整地反映相关地区出产的中草药概貌前提下，作者力求使重复品种减少到最低限度。有些中药来源于2种以上的植物（动物、矿物）并且均为《药典》认可。由于这些原植物（动物、矿物）常常分布于不同的地区，故亦可能以同一药名出现于不同的卷册中，本书以药名为第一名称，故这种重复是必要的和合理的。

我国药用植（动、矿）物品类繁多，笔者囿于见闻，书中出现错漏和不妥之处，敬希读者指正。

罗献瑞

1998年8月于广州

目　录

一、全草类 …… (1)
一匹莲 …… (2)
大唇羊耳蒜 …… (4)
大香附子 …… (6)
大盖球子草 …… (8)
小木通 …… (10)
小斑叶兰 …… (12)
小活血 …… (14)
小猪棕草 …… (16)
车前草 …… (18)
中华水芹 …… (20)
水川芎 …… (22)
水母雪莲花 …… (24)
风顶红 …… (26)
毛药 …… (28)
木莲金 …… (30)
汉荭鱼腥草 …… (32)
石韦 …… (34)
石苦蘵 …… (38)
石刷把 …… (40)
石生繁缕 …… (42)
四块瓦 …… (44)
四棱香 …… (46)
西南细辛 …… (48)
西南千金藤 …… (50)
地构叶 …… (52)
地黄瓜 …… (54)
过山龙 …… (56)
全叶马兰 …… (58)
异叶黄鹌菜 …… (60)
吊灯花 …… (62)
尖叶唐松草 …… (64)
纤冠藤 …… (66)
红陈艾 …… (68)
红毛走马胎 …… (70)
红鸡踢香 …… (72)
花佩菊 …… (74)
针筒菜 …… (76)
青皮草 …… (78)
抽心寒药 …… (80)
软筋藤 …… (82)
岩冬菜 …… (84)
苦丁 …… (86)
茅膏菜 …… (88)
刺子莞 …… (90)
虎头兰 …… (92)
虎皮草 …… (94)
盾果草 …… (96)

金灯藤 …… (98)
金疮小草 …… (100)
细辛 …… (102)
细圆藤 …… (104)
挖耳草 …… (106)
独角风 …… (108)
胎生铁角蕨 …… (110)
香排草 …… (112)
屏风草 …… (114)
浆果苋 …… (116)
球花马蓝 …… (118)
峨眉排草 …… (120)
峨眉石凤丹 …… (122)
饿蚂蟥 …… (124)
倒水莲 …… (126)
鹿衔草 …… (128)
接骨仙桃 …… (130)
黄海棠 …… (132)
黄牛草 …… (134)
野坝子 …… (136)
野鸡草 …… (138)
蛇根草 …… (140)
假杜鹃 …… (142)
银线盆 …… (144)
淫羊藿 …… (146)
葱叶兰 …… (148)
紫花络石 …… (150)
短药沿阶草 …… (152)
落地秧 …… (154)
滴水珠 …… (156)
醉魂藤 …… (158)
飘拂草 …… (160)
螺丝七 …… (162)
瞿麦 …… (164)
攀援星蕨 …… (166)

二、根和根茎类 …… (169)

九子莲 …… (170)
土百部 …… (172)
大黄 …… (174)
大剑叶木 …… (176)
山慈姑 …… (178)
山栀茶 …… (182)
小升麻 …… (184)
川木香 …… (186)
川莪术 …… (188)
川黄芩 …… (190)
川山豆根 …… (192)
川贝母 …… (194)
川乌 …… (201)
川中南星 …… (204)
川明参 …… (206)
太子参 …… (208)
巴山重楼 …… (210)
水仙根 …… (212)
长药隔重楼 …… (214)
牛尾独活 …… (216)
石刁柏 …… (218)

四川千金藤 …… (220)
凹叶瑞香 …… (222)
白土苓 …… (224)
白芷 …… (226)
白附子 …… (228)
汝兰 …… (230)
江南地不容 …… (232)
西南黄芩 …… (234)
竹叶柴胡 …… (236)
红秦艽 …… (238)
红凉伞 …… (240)
红毛蛇 …… (242)
赤芍 …… (244)
羌活 …… (246)
法罗海 …… (248)
宝兴百合 …… (250)
刺黄柏 …… (252)
苕花根 …… (254)
苦葛根 …… (256)
味牛膝 …… (258)
明党参 …… (260)
兔儿伞 …… (262)
忽地笑 …… (264)
弯蕊开口箭 …… (266)
狭叶红景天 …… (268)
类叶升麻 …… (270)
粉萆薢 …… (272)
树吊 …… (274)
党参 …… (276)
珠子参 …… (278)
峨眉贝母 …… (282)
铁棒锤 …… (284)
粘山药 …… (288)
惊风药 …… (290)
雪胆 …… (292)
黄连 …… (294)
黄刺皮 …… (296)
黄山药 …… (298)
黄藁本 …… (300)
萆薢 …… (302)
野棉花 …… (304)
铜棒锤 …… (306)
象头花 …… (308)
湖北百合 …… (310)
黑虎七 …… (312)
筒瓣兰 …… (314)
墨七 …… (316)
缬草 …… (318)

三、茎、枝和树皮类

…… (321)
三棱乌药 …… (322)
大崖胡豆 …… (324)
马比木 …… (326)
川桂皮 …… (328)
长花铁线莲 …… (330)
石斛 …… (332)
血藤 …… (334)

亮叶崖豆藤 …… (336)
草红藤 …… (338)
树参 …… (340)
栘林 …… (342)
峨眉黄肉楠 …… (344)
淮通 …… (346)
兜唇石斛 …… (348)
湖北络石 …… (350)
黑果茜芋 …… (352)
紫藤 …… (354)

四、叶类 …… (357)

山矾 …… (358)
千年桐 …… (360)
风车子 …… (362)
四川冬青 …… (364)
四川蜡瓣花 …… (366)
白檀 …… (368)
交让木 …… (370)
黄泡叶 …… (372)
光叶绣线菊 …… (374)
红果楠 …… (376)
苦竹叶 …… (378)
剑叶金鸡菊 …… (380)
香叶子 …… (382)
狭叶洋地黄 …… (384)
大青叶 …… (386)

五、花类 …… (389)

玉簪 …… (390)
金盏菊 …… (392)
米仔兰 …… (394)
野茉莉 …… (396)
紫花玉兰 …… (398)
蜀葵 …… (400)

六、果实和种子类 …… (403)

川泡桐 …… (404)
川白蔹 …… (406)
云南小草蔻 …… (408)
水飞蓟 …… (410)
牛姆瓜 …… (412)
瓜蒌 …… (414)
芥子 …… (416)
吕宋楸毛 …… (418)
红豆杉子 …… (420)
沙棘子 …… (422)
油菜子 …… (424)
茄子 …… (426)
柔毛五味子 …… (428)
野燕麦 …… (430)
楸子 …… (432)
锦灯笼 …… (434)
酸枣仁 …… (436)

七、苔藓和菌类 …… (439)

独脚鸡 …… (440)
小灰包 …… (442)
毛木耳 …… (444)

毛头鬼伞 …… (446)
蜜环菌 …… (448)
中文名索引 …… (450)
拉丁名索引 …… (466)