实用中草药彩色图集



第六册

罗献瑞 主编

世界图书出版公司

实用中草药彩色图集系列书

第一册　华南地区中草药　已出
第二册　华南地区中草药　已出
第三册　动物、矿物药及名贵中药　已出
第四册　华东地区中草药　已出
第五册　西南地区中草药　已出
第六册　西南地区中草药　已出
第七册　东北、华北地区中草药　已出
第八册　西北地区中草药及民族药　即出

责任编辑　陈　岩　沈　从
封面设计　小　羽



ISBN 7-5062-4617-1
R-0020　定价：40.00元

实用中草药彩色图集

第六册

主　　编　罗献瑞

本册主编　陈书坤　赵素云

编　　写　陈书坤　曾淑英

赵素云　杨大荣

张　刚

绘　　图　孙　西　赵素云

雷成竹　李锡畴

摄　　影　杨大荣　张　继

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目(CIP) 数据

实用中草药彩色图集. 第6册 / 罗献瑞主编. —广州:
广东世界图书出版有限公司, 2001.10
ISBN 7-5062-4617-1

Ⅰ.实...
Ⅱ.罗...
Ⅲ.中草药－图集
Ⅳ.R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2001）第072525号

实用中草药彩色图集(第六册)

出版发行: 广东世界图书出版公司
(广州市新港西路大江冲25号 邮编: 510300)
电 话: 020-84451969 84451010
E-mail: gzwpcgd@public1.guangzhou.gd.cn
经 销: 各地新华书店
印 刷: 中国人民解放军第四二二工厂
(广东省湛江市霞山慕塘路61号 邮编: 524002)
版 次: 2001年10月第1版
2001年10月第1次印刷
开 本: 787mm × 1092mm 1/32
印 张: 16.625
印 数: 1~10 000册
书 号: ISBN 7-5062-4617-1/R · 0020
出版社注册号: 粤014
定 价: 40.00元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

内 容 简 介

本图集第六册本着实用的宗旨，植物药和动物药兼收并蓄，仍取图文对照形式编排。本册收载西南地区产的中草药236种，其中全草类112种，根和根茎类54种，茎、枝和树皮类种，叶类15种，花类9种，果实和种子类20种，动物药和其他类18种。每种均附彩图，部分有药材图，对西南及其邻近地区从事中草药生产、经营、科研、教学及中草药业余爱好者鉴别原植物（动物、矿物）及药材，均有很好的参考价值。

编 写 说 明

1. 本册收载中草药236种，其中植物药218种，动物药16种，其他2种。原植物彩图219幅，动物等药材彩色照片18幅。
2. 本册所收载的动植物种类，均以西南地区，尤以云南及其邻近地区为主。动物药由于有些活的原动物不易找到，致使绘图和摄影存在不少技术上的困难，故本册采用原动物图形和形态描述从略，仅收录药材部分。
3. 本册编写体例同于已出版的前五册，不再赘述。
4. 由于水平有限，文中难免有不足之处，我们诚恳地希望广大读者批评指正。

编者

续编写前言

本套图集原拟编写3集，主要收载华南地区出产的常用中草药，旁及少量外区出产的名贵中草药材和进口药材。这一计划已于1994年8月顺利完成。

《实用中草药彩色图集》第一、二、三册出版后，不断收到读者及有关发行单位的来信，要求增收华南地区以外的品种，以满足这些地区中草药资源开发利用的需要，同时又可以使本书在更广泛的地区发挥作用。

我们认为上述读者的要求是合理的，是符合本图集编写宗旨的（详见第一册所载前言），应尽可能给予满足。为此邀约华南地区以外部分省区对当地中草药研究有造诣的专家分区编绘续集。为了保证编绘工作严谨有序地进行，续编的每一分册均另设一主编，管理品种拟定，编绘人员遴选和图稿的审查等，以体现分工负责和文责自负的原则。

我国地域广阔，中草药的生产和应用常有明显的地区特色，但植（动）物的分布与行政区域的划分并不一致。因此，同一种植（动）物常常在不同的行政区域重复出现，反映在本书中也不可避免会出现少数品种重复，在保持每一册均能比较完整地反映相关地区出产的中草药概貌前提下，作者力求使重复品种减少到最低限度。有些中药来源于2种以上的植物（动物、矿物）并且均为《药典》认可。由于这些原植物（动物、矿物）常常分布于不同的地区，故亦可能以同一药名出现于不同的卷册中，本书以药名为第一名称，故这种重复是必要的和合理的。

我国药用植（动、矿）物品类繁多，笔者囿于见闻，书中出现错漏和不妥之处，敬希读者指正。

罗献瑞

1998年8月于广州

Coloured Icones of Chinese Medicine

Volume VI

Chief editor: Lo Hsien Shui

World Publishing Co.,Ltd.
Guangzhou · Shanghai · Xi'an · Beijing

目　录

一、全草类 1
七星剑 2
三角叶野麻 4
土细辛 6
土藿香 8
下田菊 10
大苦溜溜 12
大茅香 14
大蓼子七 16
山红活麻 18
千屈菜 20
小凤冠草 22
小地柏 24
马兰 26
天葵 28
天水蚁草 30
云生毛良 32
见毒消 34
牛舌头 36
午时花 38
毛果苇菜 40
长茎沿阶草 42
分筋草 44
斗鸡草 46
水竹叶 48
水虱草 50
水莲莎 52
孔雀草 54
双叶细辛 56
石胆草 58
石耗子 60
龙牙草 62
东俄洛囊吾 64
四叶金 66
对马耳蕨 68
母猪草 70
丝叶球柱草 72
地地藕 74
地柑子 76
地柏枝 78
地宫药 80
西南毛良 82
白味参 84
灰贯众 86
光叶蝴蝶草 88
光肺筋草 90
肉茎草 92
肉穗草 94

会东藤 96
多舌飞蓬 98
羊胡子草 100
红花岩松 102
红枝柏 104
芸香叶唐松草 106
杉叶藻 108
护心草 110
旱田草 112
苦荬 114
刺天茄 116
岩筋菜 118
败毒草 120
金鸡尾 122
金线盘 124
金挖耳 126
空桶参 128
单花翠雀花 130
鱼眼草 132
草玉门 134
草灵芝 136
苇叶茼芹 138
茖葱 140
挖耳草 142
星果草 144
虾须草 146
看麦娘 148
羌头火绒草 150
扁蕾 152
炸腰果 154
夏至草 156
破布草 158
铁马鞭 160
铁角凤尾草 162
臭灵丹 164
狼尾草 166
鸭脚黄连 168
宽叶韭 170
粉苞苣 172
扇羽阴地蕨 174
黄毛岩白菜 176
雪灵芝 178
野菰 180
野葱 182
野芝麻 184
野草香 186
蛇眼草 188
假荆芥 190
猪鬃刚 192
猪鬃草 194
婆婆纳 196
黑猪毛七 198
短距耧斗菜 200
遍地金 202
疏花仙茅 204
疏花婆婆纳 206

疏齿银莲花 208
蒲儿根 210
蓝叶藤 212
矮陀陀 214
满山香 216
滇苦菜 218
翠雀 220
踏地香 222
爆肚叶 224

二、根和根状茎类 227
九眼独活 228
三七 230
三台花 234
三角草 236
大苞姜 238
山百部 240
山荷叶 242
山紫菀 244
川牛膝 246
广东狼毒 248
小棕包 250
天生草 252
云南萝芙木 254
牛尾菜 256
长蕊万寿竹 258
心叶百合 260
石妹刺 262
石莲青 264
白枪杆 266
白草藓 268
老鼠黄瓜 270
地梅子 272
地雷根 274
西南手参 276
托柄菝葜 278
竹叶兰 280
竹节菜 282
竹根七 284
角天麻 286
变异鳞毛蕨 288
鸡肾草 290
苇菜跌打 292
刺参 294
刺苹藓 296
虎掌草 298
金丝杜仲 300
金钱蒲 302
金雀马尾参（小白参） 304
珍珠莲 306
珠毛蟹甲草 308
铁连环 310
雪上一枝蒿 312
雪胆 314
野竹兰 316
象南星 318

紫玉簪 320
紫芋 322
筒花开口箭 324
蜀葵叶黄葛 326
管花党参 328
螃蟹七 330
翼首草 332
藤乌 334
滕苦参 336

三、茎、枝和树皮类 ... 339
七厚朴 340
毛木通 342
甘川铁线莲 344
华山松节 346
宽叶清风藤 348
通关散 350
紫花卫矛 352
蝴蝶戏珠花 354

四、叶类 357
大粘药 358
小豆柴 360
小粘子草 362
毛茛金莲花 364
老鸦饭 366
华南云实 368
华紫珠叶 370
灯台叶 372
红乌桕 374
红紫珠 376
豆叶九里香 378
青棉花 380
罗布麻 382
秋枫木 384
珊瑚冬青 386

五、花类 389
土银花 390
山辛夷 392
山合欢 394
小金银花 396
天兰龙胆 398
条叶垂头菊 400
辛夷花 402
柳叶菜 404
蜀葵花 406

六、果实和种子类 409
[illegible]尖杉 410
大花八角 412
小乌兜铃 414
小叶六道木 416
小冻绿树 418
无刺鼠李 420
水茄 422

孔雀抱蛋 424
皮哨子 426
灯台树 428
红木子 430
汤饭子 432
刺柏 434
珍珠茵蕙 436
夏枯草 438
臭樟 440
臭檀吴萸 442
野八角 444
稗子 446
穇子 448

七、动物药类和其他类 .. 451
大木蜂 452
大胡蜂 452
白蚁王后 454
亚香棒虫草 456
多枝虫草 458
拟黑多刺蚁 460
星天牛 460
独角仙 462
结刺蚁 464
蚕蛾 464
凉山虫草 466
黄猄蚁 468
黄腰胡蜂 470
阔孢虫草 472
蝉蜕 474
蝉蛹草 474
五倍子 476
紫草茸 478

中文名索引 481

拉丁名索引 502

七 星 剑

别名 痱子草、小花薄荷、酒饼草、野香薷。

来源 本品为唇形科植物小花荠苎 Mosla cavalerei Lévl.(Orthodon cavalerici(Lévl.) Kudo) 的干燥全草。

原植物 小花荠苎（图1）为1年生草本，高25～100cm，茎具分枝，四方形，具纵棱槽，疏被长柔毛和微柔毛。单叶对生，叶片纸质，卵形或卵状披针形，长2～5cm，宽1～2.5cm，先端急尖，基部阔楔形或圆形，边缘具细锯齿，叶面绿色，被具节柔毛，背面较淡，被具节疏柔毛并布满凹陷的小腺点；叶柄长1～2cm，纤细，被具节疏柔毛。总状花序顶生，长2.5～4.5cm，苞片卵状披针形，长约1mm，被疏柔毛；花梗长约1mm，与花序轴均被具节小疏柔毛；花萼二唇形，外面被疏柔毛，上唇3齿极小，三角形，下唇2齿，披针形，长于上唇；花冠紫色或粉红色，长约2.5mm，外面被短柔毛，冠檐极短，上唇2圆裂，下唇3裂，略长，中裂片较大；雄蕊4；雌蕊之花柱稍伸出花冠。小坚果球形，直径约1.5mm，褐色，无毛。花期9－11月，果期10－12月。

生于海拔700～1 600m的山地疏林下和山坡草地。分布于云南、四川、贵州、广西、广东、湖北、江西和浙江等省区。越南北部也有。

采收加工 夏秋采集，晒干。

药材性状 本品长25～100cm；茎、枝四方形，具纵槽，被柔毛，绿色。叶纸质，皱曲或破碎，完整者平展后为卵形或卵状披针形，橄榄绿色，长2－5cm，先端急尖，基部宽楔形或圆形，边缘具细齿，两面疏被具节柔毛，叶柄纤细，长1－2cm。茎、枝顶端具总状花序，被疏柔毛。花萼二唇形；花冠紫红色或粉红色，二唇形，上唇2圆裂，下唇3裂；雄蕊4。小坚果球形，褐色。气芳香，味辛。以枝叶多、色绿者为佳。

性味与功用 辛，微温。发汗解暑，健脾利湿，止痒，解蛇毒。用于感冒，中暑，急性胃肠炎，消化不良，水肿，湿疹，疮疡肿毒，跌打瘀肿，毒蛇咬伤。常用量3～6g；外用适量，鲜品捣烂敷患处。



图1　小花荠苎

1. 植株；2. 花

三角叶荨麻

别名　花叶活麻、火麻

来源　本品为荨麻科植物三角叶荨麻 Urtica triangularis Hand.-Mazz. 的干燥全草。

原植物　三角叶荨麻（图2）为多年生草本，高60～150cm；根状茎粗壮，直径约1cm。茎四棱形，带淡紫色，疏被刺毛和细糙毛，中下部通常分枝。单叶对生，叶片狭三角形至三角状披针形，长2.5～11cm，宽1～5cm，上部叶常呈线形，宽4～10mm，先端渐尖，基部截形或浅心形，边缘具7～12枚粗齿或锐裂齿，有时为重锯齿，叶面绿色，疏被刺毛和细糙毛，背面淡绿色，疏被刺毛和短柔毛；钟乳体点状；基出3脉；叶柄长1～5cm，稍密被刺毛和细糙毛；托叶每节4枚，线状披针形，长5～10mm，分裂。花单性，雌雄同株。雄花序圆锥状，生于下部叶腋内，雌花序近穗状，生于上部叶腋内。雄花具短梗或近无梗，开放时直径约2.7mm，花被片4，中下部合生，裂片长圆状卵形；退化雌蕊杯状，具短柄。雌花近无柄。瘦果卵形，长约2mm，稍扁，成熟时褐色，表面具带红色的疣点和疏柔毛，基部具宿存花被片4枚。花期6～8月，果期8～10月。

生于海拔2 500～3 700m的山谷湿润处或半阴山坡灌丛中、草丛中或路旁。分布于云南西北部、四川西部、西藏东部和青海南部。

采收加工　夏、秋季采集，晒干。

药材性状　本品之干燥根状茎直径约1cm，灰褐色。茎四棱形，具纵棱纹，带绿紫色，疏被刺毛和细糙毛。质坚脆，易折断，断面不整齐，类白色。叶片皱曲，完整者狭三角形或三角状披针形，长2.5～11cm，宽1～5cm，先端渐尖，基部截形或浅心形，边缘具粗齿，绿色，两面疏被刺毛和细糙毛，具钟乳体。叶柄长1～5cm，被毛。圆锥状雄花序见于茎枝下部。近穗状的雌花序见于茎枝上部。花小，花被片4。气微，味苦、辛。以带根状茎、枝叶多、色绿者为佳。

性味与功用　苦、辛，温。祛风湿，解痉，解毒。用于风湿性关节炎，高血压，小儿惊风，荨麻疹，产后抽风，毒蛇咬伤。常用量3～9g。



图2　三角叶荨麻

十 细 辛

别名 毛乌金、乌金七、圆叶细辛、香如草、金耳环。

来源 本品为马兜铃科植物尾花细辛 Asarum caudigerum Hance的带根全草。

原植物 尾花细辛（图3）为多年生草本，全株被柔毛。根状茎粗壮，暗棕褐色，节间短或长，节上生多数纤维根。茎长2.5cm。单叶互生，叶片卵状心形或阔卵形、三角状卵形，长4～10cm，宽3.5～10cm，先端急尖或渐尖，基部心形或耳状，全缘，叶面深绿色，偶在脉之两旁具白斑，疏被长柔毛，背面淡绿色，稀带紫红色，被较密柔毛；叶柄淡紫色，长5～20cm，被长柔毛。花单生于叶腋，贴近地面，花梗长1～2cm，下弯，被长柔毛；花被绿色，被紫红色短毛丛，花被下部靠合成管状，直径8～10mm，喉部略缢缩，内壁具柔毛，上部3裂，裂片卵状长圆形，先端骤狭或尾状长尖，长达1cm，外面被柔毛；雄蕊多数，花药短于花丝，药隔舌状或锥尖状，伸出；子房下位，具6棱，花柱合生，顶端6裂，柱头顶生。蒴果近球形，直径约1.5～1.8cm，具宿存花被。花期4～5月，果期7～11月。

生于海拔350～1 600m的山地林下、溪旁和路边湿地。分布于云南、四川、贵州、广西、广东、湖南、湖北、江西、浙江、福建和台湾；越南也有。

采收加工 夏、秋季采集全草，除去杂质，洗净泥土，晒干。

药材性状 本品之根状茎粗壮，圆柱形，暗棕褐色，节间短或长，节上生有纤细须根。茎短。叶皱曲，或破损，质薄，完整者卵状心形、阔卵形或卵状三角形，长4～10cm，宽3.5～10cm，先端急尖或渐尖，基部心形或耳状，全缘，橄榄绿色；叶柄长5～20cm。花单一，长梗长1～2cm，花被灰绿色，下部合生成筒状，上部3裂，裂片卵状长圆形，先端骤然收缩成尾状长尖。蒴果近球形。气微，味辛。以带根状茎及须根，叶绿者为佳。

性味与功用 辛，温。有小毒。温经散寒，化痰止咳，活血通络，散瘀消肿，止痛。用于风寒感冒，头疼，咳嗽，慢性支气管炎，哮喘，牙痛，风湿痹痛，跌打损伤，毒蛇咬伤。常用量1～3g；外用适量，捣烂敷患处。



图 3　尾花细辛

土 藿 香

别名 排香草、紫苏草、水麻叶、野藿香、苏藿香

来源 本品为唇形科植物藿香Agastache rugosa (Fisch. et Meyer) O.ktze. (Lophanthus rugosus Fisch. et Meyer)的干燥全草。

原植物 藿香（图4）为多年生草本，高0.5～1.5m；根多数，土黄色；茎直立，四棱形，直径7～8mm，上部被极短的细毛，下部无毛。单叶对生，叶片纸质，心状卵形至长圆状披针形，长4～11cm，宽3～6cm，先端尾状渐尖或渐尖，基部心形，稀截形，边缘具粗齿，叶面深绿色，近无毛，背面稍淡，被微柔毛和透明腺体，侧脉6～7对；叶柄长1.5～3.5cm。穗状轮伞花序顶生，长2.5～12cm，直径1.8～2.5cm，花序基部具披针状线形苞叶，长约5mm。花萼管倒圆锥形，长约6mm，具透明腺体，萼齿5，三角状针披形，上唇3齿稍长，下唇2齿较短；花冠淡紫蓝色，长约8mm，被微柔毛，上唇直伸，顶端微凹，下唇3裂，中裂片扇形，大，侧裂片半圆形；雄蕊4，伸出花冠外；子房4裂，裂片顶端被绒毛，花柱与雄蕊近等长，小坚果卵状长圆形，长约1.8mm。花期6～9月，果期9～11月。

生于山坡、溪旁、路边及林荫下或栽培。云南和全国各地广泛栽培；俄罗斯远东部分、朝鲜和日本及北美洲亦有。

采收加工 6～7月花序抽出时采收，除去杂物、泥土，晒干。

药材性状 本品之干燥全草长50～100cm，茎四方形，四角有凌脊，直径3～10mm，表面黄绿色或灰黄色，近无毛，或上部具极短细毛；质轻脆，易折断，断面中央具白色髓；老茎木质化，坚硬，断面中空。叶灰绿色，皱缩或破碎，两面微具毛；薄而脆。茎枝顶端有穗状轮伞花序，棕黄色，花小，淡紫红色，花冠易脱落。气清香，味淡。以茎枝青绿、叶多，香浓者为佳。

性味与功用 辛，微温。入肺、脾、胃经。祛暑解表，化湿和胃。用于暑湿感冒、头痛、胸闷，腹痛吐泻，食欲不振，痢疾，口臭、疟疾等症。常用量5～10g



图4　藿香

下田菊

别名 风气草、汗苏麻、胎盘草、猪耳朵叶、牙桑西哈（傣族语）。

来源 本品为菊科植物下田菊Adenostemma laevenia (Linn.) Kuntze (Verbesina lavenia Linn.)的干燥全草。

原植物 下田菊（图5）为1年生草本，高30～100cm；茎单生，直立或倚斜，被短柔毛或无毛。单叶对生或上部叶互生，叶片阔卵形或长椭圆状披针形，长4～15cm，宽2～6cm，先端钝，基部稍下延或浅心形，边缘具粗锯齿，叶面绿色，背面淡绿色，两面均疏被短柔毛，侧脉3～4对，最下的1对近叶基发出；叶柄长1～3cm，或当叶片下延时不明显，具狭翅。头状花序小，在枝端排成密集或疏松的伞房或伞房状圆锥花序，总花梗及分枝被短柔毛；总苞半球形，直径约6～10mm，总苞片2层，长圆形，几膜质，绿色，先端圆形，外层总苞片基部大部分合生，无毛或被白色长柔毛或具腺毛；花两性，全部结实，花冠筒状，白色或黄色，顶端5齿裂，外面被腺体；花柱之柱头裂片露出。瘦果倒披针形，长约4mm，被多数乳头状突起；冠毛棒状，4个，基部合生成环。花果期8~10月。

生于海拔600～2 100m的沟边、荒山坡、潮湿处。分布于云南、四川、贵州、西藏、广西、广东、海南、湖南、湖北、江西、福建、台湾、浙江、江苏、安徽、甘肃等省区。

采收加工 夏、秋季采集，洗净晒干。

药材性状 本品长30～100cm，茎粗壮，具纵棱及沟槽，棕褐色，质松脆，断面不整齐，黄白色。叶皱曲或破碎，完整者平展后为阔卵形或椭状披针形，长4～15cm，边缘具粗锯齿，两面均疏被短柔毛；绿色。头状花序顶生，排成疏松的伞房状圆锥花序，花小，白色或黄色，瘦果黑色。气微，味苦。以叶多、完整、带花序者为佳。

性味与功用 苦，寒。祛风除湿，清热解毒，消肿止痛，截疟。用于感冒高热，支气管炎，咽喉炎，扁桃体炎，黄疸型肝炎，肺炎，乳痛，牙痛，疟疾，跌打损伤，痈疖疮疡，毒蛇咬伤等症。常用量9～15g；外用适量，鲜品捣烂敷患处。



图5　下田菊

1．植株下部；2．花枝；3．头状花序

大苦溜溜

别名　苦凉菜、倒提壶、跌打须、帕利（傣语）、诺肺莫力气（彝语）。

来源　本品为茄科植物旋花茄 Solanum spirale Roxb.的干燥全株。

原植物　旋花茄（图6）为直立灌木，高0.5～3m，全株光滑无毛。茎枝圆柱形，绿色，幼时具纵棱。单叶互生，叶片纸质，椭圆状披针形，长9～20cm，宽4～8cm，先端渐尖或锐尖，基部下延至叶柄，全缘，或稍波状，叶面绿色，背面稍淡，两面无毛，侧脉5～8对，两面明显；叶柄长2～3cm。聚伞花序螺旋状，与叶对生或腋外生，总花梗长3～12mm，花梗细，长2～3cm，开展或弯曲　花萼杯状，长约2mm，顶端5浅裂，裂齿圆，钝或不明显；花冠白色，冠筒长约1mm，藏于萼筒内，檐部5深裂，裂片长圆形，长5～6mm，宽3～4mm，先端钝；雄蕊5，花药黄色，长约3mm；子房卵形，直径约1mm，花柱丝状，长约7mm，柱头截形。浆果球形，直径约8mm，桔黄色；种子多数，压扁，直径约2.5mm。花期夏、秋，果期冬、春。

生于海拔500～2 200m的山坡林下或溪旁灌丛中、河滩和林旁。分布于云南、广西、湖南；印度、孟加拉、缅甸及越南也有。

采收加工　全年可采，洗净切段，晒干。

药材性状　本品之茎枝圆柱形，绿色，光滑无毛　叶大，互生，皱缩，破碎，展开之叶片纸质，椭圆状披针形，长9～20cm，宽4～8cm，先端渐尖或锐尖，基部下延至叶柄，全缘或稍波状，绿色；聚伞花序螺旋状，与叶对生或腋外生，花白色。浆果球形，直径约8mm，橙黄色，内有多数种子。气微，味苦。以叶多、色绿、味苦者为佳。

性味与功用　苦，寒。清热解毒，利湿健胃，截疟。用于感冒发烧，咽喉痛，疟疾，热泄腹泻，赤痢，小便结痛，膀胱炎，疮疡肿毒，风湿跌打。常用量9～15g；外用适量，捣烂敷患处。



图 6　旋花茄

大 茅 香

别名 大毛香.

来源 本品为菊科植物锯叶千里光 Senecio prionophyllus Franch.的干燥全草。

原植物 锯叶千里光（图7）为半灌木，高1－1.5m；根木质，黑褐色，须根多数，黄褐色。茎直立，圆柱形，密被茸毛。单叶互生，叶片长圆状披针形或倒卵状披针形，长7－19cm，宽2－6cm.先端渐尖，基部楔形，渐狭成叶柄翅，叶缘密具有小尖头的锯齿.叶面绿色，被薄的茸毛，背面淡绿色，密被灰白色茸毛，羽状脉约10对；叶柄短，具翅，基部常具狭长的小耳。头状花序在茎、枝顶端或上部叶腋内排成圆锥状，总花梗和花梗基部均具线形苞片；总苞长7～8mm，直径约6mm，总苞片约15枚，线形，先端尖，密被茸毛，总苞外另有数个线形苞片；花全部为筒状，约20多个，黄色。瘦果长圆形，无毛，略长于2mm；冠毛长约5mm，白色。花期9～10月，果期11～12月。

生于海拔600m的山地林中或林缘。分布于云南东北部，四川、贵州、湖南和湖北。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 本品之干燥根木质化，圆柱形有结节，表面黑褐色或深黄褐色，质坚实，不易折断，断面不整齐，淡黄白色。具多数黄褐色须根。茎枝圆柱形，绿色，具纵条纹，密被茸毛。断面类白色。叶片皱曲，有的破碎，平展的完整叶片长圆状披针形或倒卵状披针形，长7～9cm，宽2－6cm，先端渐尖，基部楔形，渐狭成叶柄翅，叶缘具小尖头的锯齿，叶面绿色，被薄茸毛，背面淡绿色，密被白色茸毛，叶柄基部具狭长的小耳。头状花序排成圆锥状花序；总苞长7～8mm，总苞片约15枚，线形。花黄色，全部筒状。瘦果长圆形，长约2mm；冠毛长5mm，白色。气微，味辛。以带根，枝叶多，色绿者为佳。

性味与功用 辛，温。止咳平喘，散寒除湿。用于外感风寒，咳嗽气喘，风湿关节冷痛。常用量15～30g。



图7　锯叶千里光

大蓼子七

别名 蓼子七、冷骨风。

来源 本品为蓼科植物松林蓼 Polygonum pinetorum Hemsl.的干燥全草。

原植物 松林蓼（图8）为多年生草本，高25～80cm。根状茎细长。茎直立，上部分枝。叶互生，椭圆形或椭圆状披针形，长8～12cm，顶端长渐尖，基部楔形，有时微内陷成圆卵形的叶耳，边缘全缘或波状，叶面被稀疏短伏柔毛，背面被毛或近无毛；叶柄短或近无柄，基部与托叶鞘合生；托叶鞘膜质，褐色，松驰，长1～2cm，顶端截形或斜截形，表面具数条脉纹，被稀疏短伏毛。圆锥花序顶生或腋生，疏散，长可达10cm；总花梗和花序轴纤细，被短柔毛；苞片膜质长约1.5mm；花梗长约等于苞片；花被钟状，直径约2mm，白色或微带粉红色，5深裂，裂片宽倒卵形或椭圆形，不等大；雄蕊8，比花被短；花柱3，柱头头状。果卵圆形，侧扁，微具3棱，长约3mm，黑褐色，有光泽，包于花被内。

生于海拔1 500～2 500m的林下、山沟或路旁。分布于陕西、甘肃、湖北、云南东北部、四川等省区。

采收加工 夏季采挖，晒干。

药材性状 根状茎细长圆柱形或近无，节上生多数细须根。茎圆柱形，上部分枝，长20～80cm，直径约4mm，表面灰绿色或红棕色，有细直纵棱，节略膨大；质脆，较易折断，断面黄白色。叶互生，多皱缩或破碎，完整者展平呈椭圆形或椭圆状披针形，长8～12cm，宽2.5～6cm，灰绿色或黄棕色，两面被疏短柔毛，具短叶柄或无柄；托叶鞘筒状，膜质，褐色，松驰，长1～2cm，顶端截平或斜，具多条脉纹。圆锥花序顶生或腋生，疏散，具纤细的总花梗和花梗；小花灰白色，单被，5深裂。气微，味微辛。以叶多、带花、味辛者为佳。

性味与功用 辛，温。祛风除湿，行气活血。用于风湿筋骨疼痛，产后瘀血腹痛，痛经，劳伤腰痛。常用量9～15g，水煎或泡酒服。



图 8　松林蓼

山红活麻

来源 本品为野牡丹科植物红毛野海棠 Bredia tuberculata (Guill.) Diels (Fordiophyton tuberculatum Guill.)的干燥全株

原植物 红毛野海棠（图9）为草本或小灌木，高30～60cm；茎四棱形，红色或浅棕色，被红色长刚毛及柔毛。单叶对生，叶片纸质，阔卵形或椭圆形，长5～7.5cm，宽3～5cm，先端渐尖，基部心形，边缘密具大小不等的细齿，齿尖具红色长刚毛，叶面绿色，具白色斑点，疏被糙伏毛，背面紫红色，除沿脉疏被糙伏毛外，余无毛，基出脉5～7条；叶柄长2.5～6cm，密被红色长刚毛及微柔毛。伞状复伞花序顶生，具8(～12)花；花梗，苞片与花萼均密被红色长刚毛及微柔毛；苞片线形或线状披针形，小；花梗长5～10mm；花萼红色，4裂，裂片披针形，长约3mm；花瓣4，粉红色至紫红色，卵形或椭圆状卵形，长7～8mm，无毛；雄蕊8，4长4短，长者伸出花冠外，花药基部无瘤，短者内藏或稍露出花冠，花药基部具瘤，药隔基部具短距；子房下位，蒴果杯形，微露出宿存萼；宿存萼淡紫红色，直径4mm，被红色长刚毛及微柔毛。花期7～8月，果期10月

生于海拔950～1 200m的山地次生林林缘荫处或山坡菁沟边。分布于云南东北部、四川、广西、江西等省区。

采收加工 夏、秋季采收，晒干。

药材性状 本品之干燥全草长30～60cm；茎四棱形，棕红色，被毛。断面不整齐，类白色。叶对生，叶片皱曲或破碎，完整者平展后为阔卵形或椭圆形，长5～7.5cm，宽3～5cm，先端渐尖，基部心形，边缘具大小不等的细齿，齿尖具刚毛，叶面灰绿色，背面紫褐色，两面被糙伏毛。茎顶端生伞状聚伞花序，具8（～12）花，花粉红色至紫红色。蒴果杯状。气微，以叶完整、色紫绿者为佳。

性味与功用 苦，寒。祛风除湿，清热凉血。用于风湿，跌打损伤，腰痛，吐血等症。常用量15～30g。



图9　红毛野海棠
1. 植株；2. 花药

千 屈 菜

别名 蚬蛤草、败毒草、对叶莲、铁菱角、马鞭草。

来源 本品为千屈菜科植物千屈菜 Lythrum salicaria L.(L. salicaria L. var. vulgara DC.)的干燥全草。

原植物 千屈菜（图10）为多年生草本，高30～100cm，全株略被粗毛或密被绒毛；根状茎粗壮，横卧。茎直立，多分枝，绿色，小枝通常四棱形。单叶对生或3叶轮生，叶片披针形或阔披针形，长4～6（～10）cm，宽8～15mm，先端钝或短尖，基部圆形或心形，有时略抱茎，全缘，绿色；叶柄无。聚伞花序簇生，花梗及总花梗极短，因此，整个花枝似一大型穗状花序；苞片阔披针形或三角状卵形，长5～12mm；花萼筒长5～8mm，具12条纵棱，稍被粗毛，6裂，裂片三角形；附属体针状，长1.5～2mm，直立；花瓣6，红紫色或淡紫色，倒披针状长椭圆形，长7～8mm，基部楔形，具短爪，有皱缩；雄蕊12枚，6长6短，伸出萼筒之外；子房2室，花柱长短不一。蒴果扁圆形。

生于海拔1 900～3 400m的河岸、湖畔和溪旁潮湿草地。分布于全国各地；亚洲、欧洲、非洲的阿尔及利亚、北美和澳大利亚东南部亦有。

采收加工 夏、秋季采集，除去杂质，晒干。

药材性状 本品全草长30～100cm，分枝多数，通常四棱形，被粗毛或密被绒毛，灰绿色，茎基部褐棕色；根圆锥形，棕褐色，断面淡黄色。叶皱缩，对生或3枚轮生，叶片平展后呈披针形或阔披针形，长4～6cm，先端钝或具短尖，被绒毛。枝上部为近穗状大型花序，萼筒具纵棱，6裂裂片三角形，绿色；偶见红紫色花瓣，长7～8mm；雄蕊12枚。蒴果扁圆形。气微，味苦。以质干，叶多，色绿者为佳。

性味与功用 苦，微寒。清热解毒，凉血止血，破瘀通经。用于肠炎，痢疾，腹泻，溃疡，便血，血崩，闭经，月经不调，外伤出血等症。常用量6～12g；外用研末敷患处。



图 10　千屈菜

小凤冠草

别名 凤尾草、小凤尾、三叉草、井边茜。

来源 本品为凤尾蕨科植物剑叶凤尾蕨 Pteris ensiformis Burm. 的干燥全草。

原植物 剑叶凤尾蕨（图11）为多年生草本，高30～50cm。根状茎短，横行，具条状披针形鳞片。叶二形，簇生，草质；能育叶矩圆状卵形，长15～25cm，二回羽状，羽片3～5对，下部有柄，向上无柄，有侧生小羽片1～3对，或有时仅为2叉，顶生小羽片特长，和其下的1对合生，小羽片披针形或线状披针形，宽2～6mm，除不育的顶部有细锯齿外，余部全缘；不育叶较小，小羽片矩圆形，或顶生小羽片卵状披针形至线状披针形，宽达1cm，边缘有细尖锯齿；叶柄禾秆色，表面光滑，具四棱。孢子囊群线形，沿叶缘分布，但小羽片的顶部及基部不育；囊群盖膜质，狭窄。

生于海拔150～1 000m处溪边或林下潮湿的酸性土上。分布于云南、贵州、四川、广东、广西、福建、台湾等省区。亚热带其他地区也有。

采收加工 夏至、大暑间拔取全草，抖净泥沙，晒干。

药材性状 本品多为数10株扎成小捆。全株长15～40cm，根状茎粗壮，表面密被棕褐色细小鳞片，下方及侧方丛生灰褐色须根，上方簇生多数叶。叶柄细长，黄白色，光滑，具四棱，直径约1mm，易折断；叶片稍皱缩，灰绿色，2回羽状分裂，2型；着生孢子的叶片其小羽片狭细，顶生小羽片特长，和其下的1对小羽片合生，顶部以下全缘，稍反卷；不生孢子的叶片较小，小羽片矩圆形或披针形，宽达1cm，边缘有尖齿，质脆易碎。孢子囊群密生于叶下面边缘，褐色，呈长带状隆起。气微，味淡。以色绿、叶多者为佳。

性味与功用 甘、淡、微苦，微寒。归大肠、肾、心、肝经。清热利湿，凉血解毒，利水通淋，生肌。用于黄疸性肝炎，痢疾，外感发热，咽喉炎，尿路感染，痢疾，血崩，瘰疬，疮毒，外伤出血，跌打损伤，湿疹。常用量15～30g；外用适量煎水洗或捣烂敷患处。



图 11　剑叶凤尾蕨

1. 植株；2. 能育羽片一部分示孢子囊群

小　地　柏

别名　日本卷柏、铺地蜈蚣、石见穿。

来源　本品为卷柏科植物伏地卷柏 Lycopodioides nipponica (Franch. et Sav.) Kuntze (Selaginella nipponica Franch. et Sav.) 的干燥全草。

原植物　伏地卷柏（图12）为多年生草本。茎细弱、圆柱形，伏地蔓生。主茎分化不明显，营养枝通常匍匐。营养叶二形，背腹各2列，边缘有微齿，腹叶（中叶）长卵状长圆形，渐尖头，向两侧平展，长为宽的1.3倍。孢子枝直立，枝上的孢子叶二形，形状同营养叶，但排列稀疏。枝顶部的孢子叶均为长卵形，渐尖头，边缘有齿，密集成扁平的的孢子囊穗；孢子囊卵圆形；孢子二形，大孢子白色，呈球形四面体状，表面有疣状突起；小孢子橙红色，与大孢子同形，表面有棒状突起。

生于海拔710～2 600m处的溪边湿地或阴湿石岩上。分布于陕西、河南、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南等省区；日本也有。

采收加工　大暑前后拔取全草，抖净泥沙，鲜用或晒干。

药材性状　本品茎纤细、圆柱形，多分枝，无明显主茎，禾秆色，直径约1～1.5mm，常疏生具分歧的细须根。茎生叶二形，背腹各2列，常皱缩卷曲，中叶长卵状矩圆形，贴伏于茎上，远较背叶小，背叶宽卵形，向侧面平展，上面淡绿黄色，背面灰绿色。孢子叶二形。孢子囊穗常沿茎各处着生。孢子二形。腋生。茎质柔韧，叶质脆。气微，味淡。以分枝多、叶色绿者为佳。

性味与功用　淡，平。清热解毒，润肺止咳，止血生肌，舒筋活血。用于气喘咳嗽、咽喉炎、目赤肿痛、淋病，吐血，肝炎，肠炎、痢疾，疔疮，痔疮出血，扭伤，痈肿，烫火伤，外伤出血。常用量15～30g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图12　伏地卷柏

1．植株；2．枝一段

马　兰

别名　马兰头、紫菊、鸡儿肠、马兰菊、田边菊。

来源　本品为菊科植物马兰 Kalimeris indica(L.)Sch.-Bip.（Aster indicus L.）的干燥全草。

原植物　马兰（图13）为多年生草本，高30～70cm；根状茎细长，匍匐平卧，白色，具节，茎直立，被短毛，有分枝。单叶互生，近无柄，基生叶花时枯萎，茎生叶倒披针形或倒卵状长圆形，长3～6（～10）cm，宽0.8～2（～5）cm，先端钝或尖，基部渐狭呈具翅长柄，边缘中部以上具2～4对浅或深粗齿，两面或叶面疏被微毛或近无毛，边缘及沿脉被短粗毛，茎上部叶较小。头状花序单生于枝顶，并排列呈疏伞房状，总苞半球状，直径6～9mm；总苞片2～3层，外层倒披针形，内层倒披针状长圆形，疏被短毛，边缘膜质，具缘毛；舌状花15～20，排成一层，舌片淡紫色，长达1cm；管状花黄色，长3.5mm，密被短柔毛。瘦果倒卵状长圆形，极扁，长1.5～2mm，褐色，边缘厚肋浅色，上部被腺毛及短柔毛；冠毛较少，长0.1～0.6mm，弱而易脱落。花期5～9月，果期8～10月。

多生于海拔500～1 950m的低山区，平坝或丘陵的潮湿地带。分布于我国各省区；广泛分布于亚洲东部和南部。

采收加工　夏、秋季采集，洗净，鲜用或晒干备用。

药材性状　本品全长30～80cm，根状茎细长，黄褐色，具支根及须根；茎圆柱形，黄褐色，具分枝，被短毛。叶片皱曲、破碎，完整者平展后为倒披针形或倒卵状长圆形，长3～6cm，宽0.8～2cm，先端钝，基部渐狭呈翅状柄，边缘有2～4对浅齿或深齿，叶面被疏或密的毛，黄绿色。头状花序的舌状花淡紫色，管状花黄色，密被短柔毛。瘦果倒卵状长圆形，极扁，长1.5～2mm，褐色，冠毛较少。气微，味辛，微苦。

性味与功用　辛、微苦、寒　清热解毒，散瘀止血，利尿，消积。用于感冒发烧，咳嗽，急性痢疾，吐血，衄血，崩漏，月经不调。外用治疔疮肿毒，乳腺炎，外伤出血等。常用量9～18g；外用鲜品捣烂敷患处或煎水洗。

附注　马兰之花可用于无名肿毒，疥疮绞痛，肝炎。



图 13　马兰

1. 植株下部; 2. 花枝; 3. 舌状花; 4. 管状花

大　蒜

别名　鹿耳韭。

来源　本品为石蒜科植物卵叶韭 Allium ovalifolium Hand-Mazz. 的干燥全株。

原植物　卵叶韭（图14）为多年生草本，高30－60cm。鳞茎单一或2－3枚聚生，近圆柱形。叶2枚，近对生或靠近，极少3枚，披针状长圆形至卵状长圆形，长6～15cm，顶端渐尖或短尾状，基部圆形至浅心形，很少为深心形，边全缘；叶柄明显，长1cm以上全与叶等长，连同叶两面和叶缘常具乳头状突起。花葶圆柱状，下部具叶鞘；总苞2裂，宿存，稀早落；伞形花序球状，具多而密集的花；小花梗近等长，为花被片长的1.5－4倍，果期伸长，基部无小苞片；花白色，稀淡红色；花被片6，长3.5－6mm，内轮的披针状知圆形至狭长圆形，宽1～1.6mm，顶端钝或凹陷，或具不规则小齿，外轮的较短而宽；雄蕊6，伸出，基部合生并与花被片贴生，内轮的狭长三角形，外轮的锥形；子房具3圆棱，基部收狭成短柄。蒴果。

生于海拔1 500～4 000m的林下、阴湿山坡、沟边或林缘。分布于云南、贵州、四川、青海、甘肃、陕西、湖南等省。

采收加工　夏季采收，去泥沙，晒干或鲜用。

药材性状　本品为带花或果序的全草，全体长30－60cm，干时茎叶黄绿色或黄棕色。鳞茎近圆柱形，单个或2～3个聚集，外皮灰褐色至黑褐色，破裂成纤维状，成明显网状。叶2枚，近对生，皱缩，展开后呈披针状长圆形或卵状长圆形，长6－15cm，宽2～7cm，基部圆至浅心形，很少为深心形，两面和叶缘有乳头状突起。花葶圆柱形，长于叶，顶生球状伞形花序，花多而密集，小花梗近等长。有葱蒜气，味辛。以茎粗、带叶和花序者为佳。

性味与功用　辛，温。散寒，理气，止血，止痛。用于伤风感冒，头痛发烧，腹部冷痛，消化不良，衄血。常用量6－15g。



图 14　卵叶韭

天水蚁草

别名 白头翁、火草、大叶毛鼠曲草、白头风、碎蚁草。

来源 本品为菊科植物秋鼠麴草 Gnaphalium hypoleucum DC.的干燥全草。

原植物 秋鼠麴草（图15）为1年生草本，高30～70cm；茎单生或簇生，粗壮，直立或斜升，上部分枝，密被白色绵毛和腺毛。单叶互生，叶片线形，长约8cm，宽3～4mm，先端渐尖，基部渐狭，稍抱茎，全缘，叶面绿色，被腺毛，或有时沿中脉疏被蛛丝状毛，背面淡绿色，密被白色绵毛，叶脉1条，在上面明显，背面不明显；中部和上部叶较小，头状花序多数，直径约4mm，有短柄或无柄，于枝端密集成伞房花序；总苞球形，直径约4mm，总苞片4层，全部金黄色或黄色，膜质或上半部膜质，外层倒卵形，长3～5mm，背面被白色棉毛，内层线形，长4～5mm，无毛；花黄色，雌花多数，花冠丝状，长约3mm，顶端3齿裂，无毛；两性花较少，花冠管状，长约4mm，檐部5浅裂，裂片卵形。瘦果卵形或卵状圆柱形，长约0.5mm，无毛，顶端平截；冠毛绢毛状，粗糙，污黄色，长3～4mm，易脱落。花期8～12月。

生于海拔200～800m的山坡草地、林缘或路旁。分布于我国西南、华南、华中、华东和甘肃、陕西、河南、台湾等省区；朝鲜、日本、印度、中南半岛、印度尼西亚和菲律宾亦有。

采收加工 夏秋采收，晒干备用。

药材性状 干燥全草长30～70cm，带有花序，密被白色绵毛，质较松软。根细，棕褐色。茎单一或丛生，圆柱形。基生叶已脱落，茎生叶互生，无柄，叶片常皱曲，平展的完整叶线形，长4～5cm，宽2.5～7mm，先端锐尖，基部耳状抱茎，背面密被白色绵毛。头状花序多数，呈伞房状。花黄色。气微，味甘、苦。以叶多、具头状花序者为佳。

性味与功用 甘、苦，凉。祛风止咳，清热利湿。用于伤风感冒，肺热咳嗽，气喘，痢疾，风湿腰腿痛，瘰疬痰核，湿疹，热毒疮疖，下肢溃疡。常用量9～30g，外用捣敷。




图 15　秋鼠麴草

云生毛茛

来源 本品为毛茛科植物云生毛茛Ranunculus nephelogens Edgew.(R. longicaulis C.A.Mey. var. nephelogens (Edgew.) L. Liou) 的干燥全草。

原植物 云生毛茛（图16）为多年生草本，高15～20cm；须根多而密，稍肉质。茎直立、单一或有2～3个腋生短分枝，近无毛。基生叶多数，叶片近革质，披针形至线形，或外层叶卵形或长椭圆形，长1～7.5cm，宽3～10mm，先端钝，基部楔形，全缘，通常无毛，具3～5脉；叶柄长1～4cm，具膜质鞘；茎生叶1－3，无柄，叶片线形，长1～4cm，宽0.5－5mm，全缘，偶有3深裂，无毛。单花顶生，直径1－1.5cm；花梗长2－5cm，贴生黄色柔毛；萼片5，卵形，长约4mm，常带紫色，外面被黄色柔毛；花瓣5，黄色，倒卵形，长7～8mm，蜜槽呈点状袋穴；雄蕊多数，长约4mm；花托短圆锥形，被细毛。聚合果卵球形，长约8mm，直径4～6mm；瘦果卵球形，稍扁，长1－2mm，宽约1mm，无毛，背腹有纵棱，喙直伸，长约1mm。花果期6～8月。

生于海拔2 000～5 000m的高山草甸、河滩湖边及沼泽草地。分布于云南、四川、西藏、甘肃和青海；印度、锡金、尼泊尔、巴基斯坦北部亦有。

采收加工 夏末、秋初采集，除去泥土，晒干。

药材性状 本品为皱团状，长15～20cm；根纤维状，稍肉质，棕褐色。茎圆柱形，无毛。叶近革质，皱曲，平展者披针形或线形，或长椭圆形，长1－7.5cm，宽3～10mm，先端钝，基部楔形，全缘，绿色，无毛。单花生茎、枝顶部，直径1～1.5cm，花萼5片，绿色，花瓣5，黄色，倒卵形，长7－8mm；雄蕊多数。聚合果卵形，直径4－6mm；气无。以体干，无杂质，色绿者为佳。

性味与功用 辛，微寒，有小毒。清热解毒，利尿解表。提胃温，敛溃破，消痞积。常用量6－9g。



图 16　云生毛茛

见 毒 消

别名 钓鱼竿。

来源 本品为玄参科植物细穗腹水草 Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yamazaki (Calorhabdos stenostachyum Hemsl.) 的干燥全草。

原植物 细穗腹水草(图17)为多年生草本，高可达1m以上，全株无毛。根茎短而横走。茎圆柱形，近直立或弓曲，单生或分枝。单叶互生，叶片纸质或厚纸质，长卵形或披针形，长7～20cm，宽2～7cm，先端渐尖，基部圆形或阔楔形，边缘具有尖头的细锯齿，叶面深绿色，仅沿主脉被短柔毛，稀全面被短柔毛，背面淡绿色，无毛；具短柄。穗状花序腋生或顶生于侧枝上，长2～8cm。花序轴多少被短柔毛；花两性，花萼5深裂，裂片不等长，钻形，最长者为花冠的1/2～2/3，具缘毛；花冠筒状，白色、紫色或紫红色，长5～6mm，先端4～5裂，裂片正三角形，稍不等，花冠筒上具一圈毛；雄蕊2枚，花丝外伸；心皮2，花柱细长。蒴果卵球形，长3～4mm；种子多数，小，具网纹。

生于海拔1 700m以下的山坡林下及阴湿处。分布于四川、贵州北部、陕西南部、湖北西部和湖南西北部。

采收加工 四季可采，洗净晒干，备用或鲜用。

药材性状 本品长约1m，茎圆柱形，直或弓曲，无毛。断面不整齐，类白色。叶片纸质，皱曲，或破碎，完整者平展后为长卵形或披针形，长7～20cm，宽2～7cm，先端渐尖，基部圆形或宽楔形，边缘具细齿，绿色，具短柄。茎上部叶腋或小枝顶端有穗状花序，花序长2～8cm；花萼5深裂，裂片钻形，不等大；花冠筒状，白色或紫红色，先端4～5裂，裂片三角形，不等大，雄蕊2，花丝外伸。蒴果卵球形，长3～4mm，具多数种子。气无，味微苦。以枝叶多、色绿者为佳。

性味与功用 微苦，凉。清热解毒，利水消肿，散瘀止痛。用于内血吸虫病引起的腹水、肺热咳嗽，肝炎，水肿，目赤，跌打损伤，烧烫伤，毒蛇咬伤等症。常用量9～15g；外用适量，鲜品捣烂敷患处。

附注 孕妇忌用。



图 17　细穗腹水草

1．根；2．花枝一部分

牛舌头

别名 野苦荬、山苦荬、牛舌片、苦荬菜、野苦荬菜。

来源 本品为菊科植物苣荬菜 Sonchus arvensis Linn. 的干燥全草。

原植物 苣荬菜（图18）为多年生草本，高30～70cm，无毛，具乳汁；根状茎匍匐，节上生多数须根。茎直立，圆柱形，具纵沟纹。单叶互生，无柄，叶片长圆状倒披针形至披针形，长10～15（～20）cm，宽2～3cm，先端钝圆，具刺尖，基部耳形抱茎，边缘具不规则状小尖齿，叶面绿色，背面淡灰白色，两面均无毛，中脉在叶面凹陷，背面隆起，细脉网状。头状花序一至数个在枝端排成伞房状；总花序梗密被珠丝状毛或无毛；总苞钟状，长16～20mm；总苞片3～4层，外层卵形，短小，内层披针形，狭长，被腺毛或基部被白色绒毛，先端钝。花鲜黄色，全部为舌状花，长22mm，披长柔毛，舌片线形，长约10mm；雄蕊5，花药合生；子房下位，花柱纤细，柱头2裂。瘦果稍扁，具3～4条纵肋，淡褐色；冠毛白色，长约11～15mm。花果期5～9月。

生于海拔1 500～3 600m的山坡、路旁及田野。分布于云南、四川、西藏、广东、广西、湖北、江西、江苏及华北、西北及东北地区；欧洲及亚洲亦有。

采收加工 夏、秋割取全草，鲜用或晒干备用。

药材性状 本品之干燥全草长30～70cm，茎圆柱形，具纵沟，光滑，无毛，灰绿色；易折断，断面类白色。叶片皱曲，破碎，完整者平展后为长圆状倒针形或披针形，长10～15cm，宽2～3cm，先端钝具刺尖，基部耳形抱茎，边缘具不规则的小尖齿，无毛，绿色；头状花序组成伞房花序顶生，花序轴被毛或无毛；总苞钟状，披腺毛或绒毛；花黄色，全部舌状，舌片线形。瘦果具纵肋，褐色，具白色冠毛。气微，味苦。以叶多，带花序者为佳。

性味与功用 苦，寒。清热解毒，凉血利湿。用于阑尾炎，乳腺炎，风火牙痛，急性咽炎、肠炎，痢疾，痔疮，疮疡肿毒。常用量6～15g；外用适量，捣烂或捣汁搽。



图 18　苣荬菜

午 时 花

别名 太阳花、草杜鹃、子午花、半支莲、佛甲草

来源 本品为马齿苋科植物大花马齿苋 Portulaca grandiflora Hook. 的干燥全草

原植物 大花马齿苋（图19）为1年生肉质草本，高10～15cm；茎直立或平卧上升，具分枝，稍带紫色，平滑。叶螺旋状排列，常聚生于茎的顶部，圆柱形，长1～2.5cm，直径约1～3mm，绿色，在叶腋内有从生长柔毛。花单生或2～5朵顶生，基部具8～9枚轮生叶状苞片，并有白色长柔毛；萼片2，阔卵形，长约6mm；花瓣5或重瓣，白色，黄色，粉红色，红色或紫色，阔倒卵形，先端具凹缺，心形，无毛；子房半下位，短圆锥形，直径不及1mm，深灰黑色，具小疣状突起，花期5～7月。

原产巴西；我国各地广泛栽培。

采收加工 夏、秋季采集，去除泥土，用沸水略烫或略蒸后晒干或鲜用。

药材性状 本品多呈皱缩卷曲，常结成团。茎圆柱形，长10～15cm，表面黄褐色，具明显的纵皱纹和沟。叶皱缩，易破碎，完整者圆柱形，长1～2.5cm，直径约1～2mm，绿褐色，具皱褶。花大，黄色，单生茎顶或2～5朵顶生，花瓣5，或重瓣，倒卵形，先端凹缺。蒴果盖裂，内有多数肾状圆锥形种子，气微，味淡、苦。以体干、枝、叶多者为佳。

性味与功用 淡、苦，寒。清热解毒，凉血止痛。用于感冒、咽喉肿痛、婴儿湿疹，疥疮，跌打损伤，外伤出血，烧、烫伤等症。常用量9～15g；外用适量，捣烂敷患处。

附注 孕妇忌用。



图19　大花马齿苋

毛果堇菜

别名 圆叶毛果堇菜。

来源 本品为堇菜科植物球果堇菜 Viola collina Bess. 的干燥全草。

原植物 球果堇菜（图20）为多年生草本，高4～9（～20）cm；根状茎长2～6cm，粗而肥厚，黄褐色、有结节，直立或斜升；根多条，黑褐色。叶全部基生，莲座状；叶片阔卵形或近圆形，长1～3.5cm，宽1～3cm，先端钝或锐尖，基部弯缺浅或深，边缘具浅而钝的锯齿，叶面绿色，背面淡绿色，两面均密被白色短柔毛，果期叶片显著增大，长达8cm，宽达6cm，基部心形；叶柄花期长2～5cm、果期长达19cm、具狭翅，被倒生短柔毛；托叶披针形，长1～1.5cm，膜质，先端渐尖，基部与叶柄合生，边缘具稀疏的流苏状细齿。花两侧对称，淡紫色，具长梗；小苞片2、生于花梗中上部；萼片5 披针形或长圆状披针形，长5～6mm，基部的附属体不显著，具腺体和缘毛；花瓣5，异形，淡紫色，下方花瓣的距白色，长约3.5mm，平伸或稍上弯；子房被毛，花柱基部膝曲，向上渐增粗，常疏生乳头状凸起，顶部向下弯曲成钩状喙，喙端具柱头孔。蒴果球形，直径约8mm，密被白色柔毛，成熟时果梗下弯，使果接近地面。花果期5～8月。

生于林下、林缘、灌丛、草坡、沟谷及路旁较阴湿处。分布于四川北部、河南、安徽、浙江、江苏、山东、山西、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、甘肃和宁夏等省区；朝鲜、日本、俄罗斯的亚洲部、欧洲等也有。

采收加工 夏、秋季收集，除去泥土，晒干。

药材性状 本品多皱缩成团状。根状茎长2～6cm，粗壮，有结节，黄褐色；根圆锥形，多条，黑褐色，具纵条纹。叶皱缩，平展后的完整叶阔卵形或近圆形，长1～3.5cm，宽1～3cm，先端钝，基部弯缺浅或深，边缘具浅而钝的锯齿，两面密被短柔毛；叶柄具狭翅，长2～5cm。花淡紫色，距白色。果实球形，直径8mm，密被白色柔毛，种子多数。气微，味苦涩。以带根、叶多、色绿者为佳。

性味与功用 苦、涩，凉。清热解毒，消肿止痛。用于疔疮疮毒、肺痈，跌打损伤、刀伤出血等症。常用量15～30g；外用鲜品捣烂或研末调敷患处。



图20　球果堇菜

1. 植株; 2. 花; 3. 种子

长茎沿阶草

别名 铁丝草、撑脚草。

来源 本品为百合科植物长茎沿阶草 Ophiopogon chingii Wang et lang 的干燥全草。

原植物 长茎沿阶草（图21）为多年生草本；根较粗，常木质化而略坚硬。茎细长，直径2～5mm，老茎常平卧地面，具残留的枯萎叶鞘，节上多少生根，上部及分枝常向上斜升。叶散生于茎上，叶片剑形，稍呈镰刀状，长7～20cm，宽2.5～8mm，先端急尖或钝，基部具膜质白色鞘，鞘常具横皱纹，并收狭成柄，叶柄稍明显，叶面深绿色，背面粉绿色，具明显的3～9条脉。总状花序腋生，长8～15cm，具5～10花；花常单生或2～4朵簇生于苞片腋内，苞片卵形或披针形，下部者长约6mm，向上渐短，先端渐尖，除中肋外，薄膜质，透明；花梗长6～9mm，中下部具关节；花被片6，长圆形或卵状长圆形，长约5mm，白色或淡紫色；雄蕊6，着生于花被片基部，花丝长约1mm，花药卵形，长约2mm；子房下位，3室，每室2胚珠，花柱长4mm。果实卵形，长8～12mm。花期5～6月。

生于海拔1 000～2 100m的山坡林下，灌丛中或岩石缝中。分布于云南东南部、贵州至四川东南部、广东西南部和海南。

采收加工 全年可采，除去杂质，泥土，晒干。

药材性状 本品之茎细长，表面黄褐色，节上生根及残留的枯叶鞘。断面不整齐，类白色。叶片剑形，略呈镰刀状，长7～20cm，宽2.5～8mm，先端急尖或钝，基部具膜质鞘，鞘长具横皱纹，具7～9条脉，叶面深绿色，背面灰绿色。总状花序腋生，具5～10花；花梗长6～9mm；花被片6枚，长圆形或卵状长圆形，白色或淡紫色；雄蕊6；子房下位，3室。果卵形。气微，味淡。以干燥、带根状茎，叶多、色绿者为佳。

性味与功用 微辛，温。活血通络，强筋壮骨，祛风湿。本品捣烂或研粉外敷患处，治脓疮。常用量9～15g。



图 21　长茎沿阶草

分　筋　草

别名　仲筋草、二年石松、多穗石松、杉蔓石松。

来源　本品为蕨类石松科植物单穗石松 Lycopodium annotiaum L. 的干燥全草。

原植物　单穗石松(图 22)为多年生草本，高 15～30cm。主茎细长，横走或倾斜，下部分枝；侧枝 2 叉或单一；小枝直立。营养叶小型，5 列螺旋状轮生，反折或平展，披针形或线状披针形，长 5～8mm，具光泽，顶端刺尖，边缘有不明显的锯齿，革质。孢子囊穗圆柱形，单生于侧枝顶端，长 2.5～8cm，直径 3～5mm，无梗或具不明显短梗；孢子叶宽卵圆形，长 3～4mm，顶端长尖尾状，边缘白色，膜质，稍不整齐，多行，覆瓦状排列；孢子囊生于孢子叶腋，圆肾形，黄色。

生于高山林下，分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、陕西、甘肃、新疆、四川、云南、贵州、湖北、台湾等省区；北半球温带其他地区也有。

采收加工　全年均可采收，晒干或阴干。

药材性状　茎细圆柱形，长 15～30cm，黄绿色，从下部分枝，侧枝 2 叉或单一。叶二型，营养叶 5 列螺旋状轮生，叉开，披针形或线状披针形，叶片较硬而具光泽，长 5～8mm，顶端刺尖；孢子叶宽卵圆形，多行，覆瓦状排列，顶端长尖尾状，边缘白色膜质。孢子囊穗单生侧枝顶端，直径 3～5mm，圆柱状，无梗或短梗。气无，味微苦。以色黄绿、无杂质者为佳。

性味与功用　苦、微辛，平。祛风除湿，舒筋活血，解热镇痛。用于风湿筋骨疼痛，肢体麻木，筋脉痉挛，脚转筋，跌打损伤。常用量 6～30g；水煎或泡酒服。

附注　单穗石松的孢子功效同石松 L. clavatum L. 的孢子，用于小儿湿疹，疮痈；浸酒作强壮剂。



图22　单穗石松
1. 植株；2. 孢子叶

斗 鸡 草

来源 本品为蕨类瘤足蕨科植物镰叶瘤足蕨 Plagiogyria rankanensis Hayata (P. distinctissima ching) 的干燥全草。

原植物 镰叶瘤足蕨又名小贯众（图23）为草本植物，高30～40cm；根状茎直立或斜升；叶二型，簇生。不育叶片狭长三角形，长17～25cm，基部宽7～10cm，一回羽状深裂，顶部浅羽裂，尾头，下部羽裂几达叶轴，有数对羽片彼此分离，羽片15～20对，纸质，互生，平伸，镰状披针形，长4.5～5.5cm，宽8～10mm，基部不对称，上侧沿叶轴上延，下侧圆形，边缘近全缘或具小齿，近顶端具粗齿，叶面绿色，叶脉羽状，侧脉单一或二叉状，两面平坦。能育叶片远较叶柄短，羽片强度收缩，条形，宽2～3mm，侧脉通常二叉状，伸到距叶缘1/2处，孢子囊生于小脉的顶部，成熟时布满羽片下面。

生于海拔500～2 000m的山坡常绿阔叶林或针叶林中或溪边潮湿处。分布于云南、四川、贵州、广东、广西、湖南、江西、安徽、浙江、福建和台湾；印度北部、缅甸北部和日本亦有。

采收加工 夏、秋季采挖，晒干。

药材性状 全草长30～40cm，基部具根状茎及叶柄残痕。不育叶柄三棱形或近圆形，长15～18cm，禾秆色，叶片皱缩、破碎，平展后呈狭三角形，长20～25cm，一回羽状深裂，羽片互生，15～20对，镰状披针形，长4.5～5.5cm，基部不对称，具羽状脉，绿色。能育叶长18～22cm，一回羽状，羽片条形，宽2～3mm，侧脉常二叉状，孢子囊生于小脉顶部，布满羽片背面。气无，味辛。以带根状茎多叶、色绿者为佳。

性味与功用 辛，温。清热散寒，发表。用于感冒发热，皮肤瘙痒。

附注 广西部分地区用本种之根茎防治流感和麻疹。



图 23　镰叶瘤足蕨

水竹叶

别名 肉草、鸡舌草、鸡舌癀。

来源 本品为鸭跖草科植物水竹叶 Murdannia triquetra (Wall.) Brückn. (Aneilema triquetra Wall.) 的干燥全草。

原植物 水竹叶(图24)为多年生水生或沼生草本植物;茎基部匍匐,节上生须状根,多分枝,被一列柔毛。单叶互生,叶片线状披针形,长1.5~3.5cm,宽4~6mm,先端渐尖,基部鞘状抱茎,全缘,绿色带紫色条纹。花1~5朵簇生于叶腋内;萼片3,分离,草质,绿色;花瓣3,倒卵形,长约7mm,蓝紫色;发育雄蕊3枚,退化雄蕊3,顶端戟状不分裂;子房无柄,长圆形,长约2mm,被白色柔毛。蒴果长圆状三棱形,长5~7mm,直径3~4mm,两端钝,成熟时3瓣裂,每室有种子2粒;种子扁平,表面具沟纹。花果期6-10月。

生于海拔1 500~1 600m的溪边、沼泽地、水中或草地潮湿处,分布于云南南部和西南部、四川、贵州、湖南、湖北、广东、海南至浙江、江苏;印度亦有。

采收加工 夏、秋季采集,晒干。

药材性状 干燥全草呈团块状,灰绿色。茎圆柱形,多分枝,下部节上生褐色须根。叶皱褶,平展者呈线状披针形,长1.5-3.5cm,宽4~6mm,先端渐尖,基部鞘状抱茎,全缘,绿色带紫色条纹。枝上部叶腋内有簇生花1-5朵,花萼绿色,3枚;花瓣蓝紫色;能育雄蕊3,不育雄蕊3枚;子房长圆形无柄。蒴果两端钝,长5~7mm。气微,味甘。以干燥、枝、叶多,色绿者为佳。

性味与功用 甘,平。入肝、脾经。清热解毒,利尿消肿。用于咽喉肿痛,肺热咳嗽,赤白痢疾,小便不利,痈疽疔肿,蛇虫咬伤等症。常用量9~15g;外用鲜品捣烂或研末敷患处。



图 24　水竹叶

水　虱　草

别名　日照飘拂草、羌市草、鹅草。

来源　本品为莎草科植物水虱草 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl. (Scirpus miliacea L.) 的干燥全草。

原植物　水虱草（图25）为1年生草本，高5～60cm。杆丛生，扁四棱形，基部有1－3枚无叶片的鞘。叶线形，长短不等，侧扁，宽1－2mm，顶端细长渐尖，边缘有极细的齿；叶鞘侧扁，背面呈龙骨状锐突起，腹面不育生而具膜质锈色的边，鞘口斜裂。苞片2～4枚，刚毛状，基部较宽，短于花序；长侧枝聚伞花序一次至多次复出，辐射枝3～6条，长0.8～5cm，小穗单生于辐射枝顶端，近球形或卵状球形，长1.5－5mm；鳞片卵形，长约1mm，栗色，背面有龙骨状突起，顶端圆钝，中肋绿色，有白色狭边，最下1－2枚鳞片内无花，其余各鳞片内均具1花；花两性，无花被；雄蕊2，花药长圆形，伸出；子房上位，花柱细长，三棱形，柱头3，伸出。小坚果倒卵形或宽倒卵形，具3钝棱，长约1mm，淡黄白色，具疣状突起和横长圆形网纹。

生于水边、荒地、路旁及田坎边。分布于我国南北各省区。

采收加工　夏、秋季采收，洗净，晒干或鲜用。

药材性状　具多数须根。茎柔弱，丛生，长5－40cm，扁四棱形，有纵槽纹，表面灰绿色或黄绿色，基部具1－3枚无叶片的叶鞘。叶线状剑形，约与杆等长，宽1－2mm，鞘部侧扁，套折而排成2列，背面有龙骨状突起，腹面不育生而具膜质锈色的边，鞘口斜裂，无叶舌。苞片粗刚毛状；花序顶生，为复出或多次复出的长侧枝聚伞花序，辐射枝3至数个，长短不一；小穗卵球形，单生于辐枝顶端；鳞片螺旋式覆瓦状排列，膜质，黑褐色，有白边。气微，味淡。以茎灰绿粗壮、叶多、具须根者为佳。

性味与功用　甘、淡，凉。清热解毒，利尿消肿。用于暑热尿少、小便短赤、胃肠炎、劳伤疼痛、小儿惊风。常用量30～40g；外用鲜品适量加酒糟捣烂敷患处。




图25　水虱草

1. 植株; 2. 花序; 3. 小穗; 4. 鳞片; 5. 雌蕊

水 莲 莎

别名 栒刺木、岩楞子、山头姑娘、矮红子、被告惹。

来源 本品为蔷薇科植物平枝栒子Cotoneaster horizontalis Dcne.的干燥枝叶。

原植物 平枝栒子（图26）为落叶或半常绿匍匐灌木，高50cm，枝水平张开成整齐两列状；小枝圆柱形，黑褐色，幼时被粗毛，后变无毛。单叶互生，叶片草质，近圆形或阔椭圆形，稀倒卵形，长5～14mm，宽4～9mm，先端急尖，基部楔形，全缘，叶面绿色，无毛，背面淡绿色，被稀疏平贴短柔毛；叶柄长1～3mm，被短柔毛；托叶早落，钻形。花1～2朵腋生，外面疏被短柔毛；花萼5裂，裂片三角形，先端急尖，内面边缘被柔毛；花瓣粉红色，5枚，直立，倒卵形，长约4mm，宽约3mm，先端钝圆；雄蕊约12枚，短于花瓣；子房下位，顶端被柔毛，花柱3，稀2，离生，短于雄蕊。果实近球形，直径4～6mm，鲜红色，常具3小核。花期5～6月，果期9～10月。

生于海拔2 000～3 500m的山坡灌丛中或岩石坡上。分布于云南、四川、贵州、湖北、陕西和甘肃；尼泊尔亦有。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 本品之枝圆柱形，表面黑褐色，无毛。质坚，不易折断，断面不整齐，断面黄白色。叶皱缩，破碎，展开之完整叶片近圆形或阔椭圆形，偶有倒卵形，全缘，绿色，背面疏被平贴短柔毛；叶柄1～3mm，被短柔毛。气无，味酸、涩。以叶多，色绿者为佳。

性味与功用 酸、涩、凉。清热化湿，止血、止痛。用于泄泻，腹痛，吐血，痛经，带下病。常用量15～30g。



图 26　平枝栒子

1. 花枝；2. 花；3. 花冠展开，示雌雄蕊

孔雀草

别名 臭芙蓉、蜂窝菊、五瓣莲、小万寿菊、红黄草。

来源 本品为菊科植物孔雀草 Tagetes patula Linn. 的干燥全草。

原植物 孔雀草（图27）为1年生草本，高45～60cm；茎细弱，具分枝，无毛。叶对生，基部具线状假托叶，具油腺；叶片轮廓长圆形，奇数羽状全裂，全裂片1～6对，近对生，长椭圆形，长2～3cm，宽1～1.5cm，先端渐尖，基部楔形，边缘具锯齿，齿端细芒状，齿之基部通常具1腺体，叶面绿色，背面淡绿色，两面无毛，主脉明显，侧脉不明显。头状花序单生小枝顶端，直径3.5～4cm，花序梗长5～7cm，上部略增粗；花序托平，无毛；总苞片1层，长15mm，宽7mm，近于全部连合成圆形长筒，绿色，先端具细齿，具腺点。舌状花1层，雌性，黄色，具紫红色斑点，舌片椭圆形，长约10mm，宽约6mm，先端微凹；筒状花两性，与舌状花同色，长约7mm，冠筒状，5齿裂，全部结果，栽培种出现向舌状花演变的重瓣类型。瘦果线形，长8～12mm，疏被柔毛；冠毛鳞片状，其中1～2枚长芒状，2～3枚短而钝。花期7～9月，果期10月。

原产墨西哥，全国各地庭院常有栽培，供观赏。

采收加工 夏、秋季采集，洗净晒干。

药材性状 本品为密丛状草本，长30～80cm；茎细弱，淡紫色。叶皱曲，羽状全裂，裂片6～7对，线状披针形，长2～3cm，宽1～1.5cm，先端渐尖，基部楔形，边缘具锯齿，绿色，无毛。头状花序单生茎枝顶端，总苞1层绿色，舌状花1层，黄色带紫红色斑，筒状花两性，与舌状花同色。瘦果线形，被柔毛，冠毛鳞片状。气微，味苦。以体干，叶多，带花序者为佳。

性味与功用 苦，平。清热利湿，消炎止咳，止痛。用于上呼吸道感染，咳嗽，百日咳，牙痛，风火眼痛，痢疾；外用治腮腺炎，乳腺炎等症。常用量9～15g；外用适量，加重楼、银花，研末调敷患处。



图27　孔雀草

双叶细辛

别名 细辛、乌金草、草乌蹄香。

来源 本品为马兜铃科植物双叶细辛 Asarum caulescens Maxim. 的干燥带根全草。

原植物 双叶细辛（图28）为多年生草本。根状茎横走，节间长3～5cm，有多条须根。叶1～2对；叶片近心形，长4～9cm，先端常具1～2cm的尖头，全缘，基部心形，两侧裂片长1.5～2.5cm，宽2.5～4cm，先端圆形，常向内弯接近叶柄，两面散生柔毛，背面的毛较密；叶柄长6～12cm，无毛；芽苞叶近圆形，长宽各约13mm，边缘密生睫毛。花紫色，花梗长1～2cm，被柔毛；花被在子房以下近球形，直径约1cm，外被柔毛，裂片3，三角状卵形，长约1cm，宽约8mm，开花时上部反折；雄蕊与花柱上部常伸出花被之外，花丝比花药长2倍，药隔锥尖，伸出；子房近下位，略成球状，有6纵棱，花柱合生，顶端6裂，裂片倒心形，柱头着生于裂缝外侧。蒴果近球形，直径约1cm，有毛，具宿存花被。

生于海拔1 200～1 700m的林下腐殖土中。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州等省区；日本也有。

采收加工 4～7月挖取带根全草，除净泥土，及时阴干（不可日晒及水洗，以免根变黑）。

药材性状 根状茎横生，不规则圆柱形，纤细，弯曲，直径2～3mm，节间长3～5cm；根多数，细长，密生节上，灰棕色或黄褐色，表面平滑，生丝状须根；质脆，易折断；端面黄白色。叶1～2对，多皱缩或破损，质薄脆，灰绿色或黄灰绿色，完整者湿润后展开呈心形，长约4～9cm，宽约5.5～10cm，基部两侧裂片圆形，内弯，两面有柔毛，背面毛密；叶柄长6～12cm。有时可见花或果。气芳香，味辛，后具麻木烧灼感。以根粗、叶色绿、味辛辣而麻舌者为佳。

性味与功用 辛，温。归肺、肾经。散风寒，止咳，镇痛。用于风寒感冒，咳嗽头痛，劳伤身痛。常用量1～3g。

附注 （1）本品在产地作细辛用。（2）双叶细辛根及根茎治一切痧气痛，心腹痛，周身气痛，又为五劳七伤辅佐药。



图 28　双叶细辛

石　胆　草

别名　牛耳草、石指甲、镇心草、生扯拢、石莲花。

来源　本品为苦苣苔科植物石花 Corallodiscus flabellatus (Craib) Burtt (Didissandra flabellata Craib) 的干燥全草。

原植物　石花（图29）为多年生草本。叶全部基生，莲座状，外层叶具长柄，内层叶具短柄，柄长1～2cm，扁平，上面被长柔毛，下面密被灰白色或淡褐色绵毛；叶片革质，阔倒卵形、扇形、稀近卵形，长1～2.5cm，宽1～2cm，先端圆形，基部楔形，边缘具细圆齿，叶面绿色，密被白色长柔毛，背面淡绿色，密被灰白色或淡褐色绵毛，侧脉3～4对，在叶面下凹，在背面隆起。聚伞花序2～3次分枝；花序梗长8～17cm，幼时密被淡褐色绵毛，后渐脱落，苞片无；花梗长5～10mm，被淡褐色长柔毛至近无毛。花萼钟状，5裂至基部，裂片长圆形至长圆状披针形，长1.5～3mm，外面被淡褐色长柔毛，内面无毛；花冠蓝色或紫蓝色，外面无毛，冠筒长5～8mm，直径3.2～5mm，上唇一侧具髯毛及斑纹，3裂，裂片圆倒卵形，长2～2.2mm；雄蕊4，花丝无毛，呈弧状，花药长圆形，药室汇合；退化雄蕊长约0.7mm；子房长圆形，长约2.3mm，花柱长2.3mm，或稍长，柱头头状。蒴果长圆形，长1～2cm，直径2～3mm。花期6～7月，果期8月。

生于海拔1 400～3 000m的山坡林缘岩石上或石缝中。分布于云南、四川及西藏东南部。

采收加工　夏、秋采集全草，除去杂物及泥土，晒干。

药材性状　干燥全草皱团状；根纤细，黄褐色；叶莲座状，外层叶柄长，内层逐渐变短，叶片革质，阔倒卵形或扇形，长1～2.5cm，宽1～2cm，先端圆形，基部楔形，边缘具圆锯齿，灰绿色，两面密被白柔毛。紫蓝色花生于花葶顶端，花冠筒状，二唇形。蒴果长圆形，长1～2cm。气微，味苦。以带根、叶绿、味苦辛者为佳。

性味与功用　苦、辛，寒。有小毒。活血、祛湿、止血生肌、止痛。用于月经不调，白带过多，心悸，胸痛，湿热痹症，小儿疳积，跌打损伤，外伤出血，疖肿等症。常用量15～25g。



图 29　石花

1．植株；2．花冠展开

石 耗 子

别名 铁蒲扇、老君扇、岩莴苣、锈草。

来源 本品为苦苣苔科植物革叶粗筒苣苔 Briggsia mihieri (Franch.) Craib (Didissandra mihieri Franch.) 的干燥全草。

原植物 革叶粗筒苣苔（图30）为多年生草本；根状茎长1～3cm，直径约3mm。叶全部基生，莲座状，叶片革质，狭倒卵形，倒卵形或椭圆形，长1～10cm，宽1～6cm，先端圆形，基部楔形，边缘具波状齿，叶面绿色，背面淡绿色，两面无毛，脉不明显；叶柄长2～9cm。聚伞花序腋生，1～6条，每花序具1～4花；花序梗长8～17cm，无毛或被微柔毛。花梗长2～3cm，疏被短柔毛或变近无毛。花萼5深裂至基部，裂片长圆状披针形，长4～6mm，具3脉；花冠粗筒状，蓝紫色或淡紫色，长3.2～5cm，直径1.5～2.6cm，无毛，内面具淡褐色斑纹，上唇2裂片半圆形，长约8mm，下唇长1.4mm，3裂，裂片近圆形；雄蕊4，2强，药室不汇合，退化雄蕊1枚，长约1mm；雌蕊被短柔毛，子房狭长圆形，长约13mm，柱头2，长圆形。蒴果倒披针形，长3.4～7cm，近无毛。花期10月，果期11月。

生于海拔650～1 710m的阴湿岩石上。分布于四川南部、贵州和广西。

采收加工 夏秋季采集，晒干。

药材性状 干燥全草皱缩成团状；根状茎长1～3cm，直径约3mm，深棕褐色，具多数须根。叶全部生于根状茎顶端，呈莲座状，叶片革质，皱缩，或有破碎，完整者湿润、平展后为狭倒卵形至椭圆形，长1～10cm，宽1～6cm，先端圆形，基部楔形，边缘具波状齿，叶面绿色，背面淡绿褐色，两面无毛，脉不见；叶柄长2～9cm，绿褐色。偶见1～6条聚伞花序，每花序具1～4花。花蓝紫色。气微，味苦。以叶质厚、完整、色绿者为佳。

性味与功用 苦、微辛。散瘀止血，止咳。用于跌打损伤，筋骨疼痛，肺热咳嗽，咯血。常用量15～30g。



图 30　革叶粗筒苣苔

龙 牙 草

别名 仙鹤草、切哩鹿克（纳西语）。

来源 本品为蔷薇科植物黄龙尾 Agrimonia pilosa Ldb.var. nepalensis (D.Don)Nakai (A.nepalensis D.Don)的干燥全草。

原植物 黄龙尾（图31）为多年生草本，高30～120cm；茎直立，下部密被粗硬毛，上部被疏柔毛及短柔毛。叶为奇数羽状复叶，通常具3～9小叶，叶柄被稀疏柔毛或短柔毛；小叶无柄或具短柄，小叶片倒卵形、倒卵状椭圆形或倒卵状披针形，长1.5～5cm，宽1～2.5cm，先端急尖至圆钝，基部楔形至宽楔形，边缘具急尖至圆齿锯齿，绿色，叶面沿脉被长硬毛或微硬毛，余密被柔毛或绒毛状柔毛，背面沿脉伏生疏柔毛；托叶镰形，稀卵形，先端急尖或渐尖，边缘具尖锐锯齿或裂片，稀全缘。花序穗形总状，顶生，花序轴及花梗被柔毛；苞片通常3深裂，小苞片卵形，对生；萼片5，三角状卵形；花瓣黄色，长圆形；雄蕊5～15枚；花柱2，丝状。果倒卵状圆锥形，具10肋，被疏柔毛，顶端具数层钩刺。花果期5～12月。

生于海拔100～3 500m的溪边、山坡草地或疏林中。分布于云南、四川、贵州、西藏、广东、广西、湖南、湖北、江西、安徽、浙江、江苏、山东、河南、山西、河北。印度北部、尼泊尔、锡金、缅甸、泰国、老挝及越南北部亦有。

采收加工 夏、秋季采集，除净泥土，晒干。

药材性状 干燥全草长30～120cm；茎圆柱形，基部木质化，淡棕褐色或紫红色，直径4～6mm，密被粗硬毛，上部茎绿褐色，或浅黄棕色，被白色柔毛。叶灰绿色，皱缩卷曲，被柔毛。偶见花枝或果枝。气微，味微苦涩。以梗紫红色、枝嫩、叶完整者为佳。

性味与功用 苦、辛，平。入肺、肝、脾之经。收敛，止血，消炎，健胃。用于吐血，咯血，尿血，便血，胃肠炎，赤白痢疾，崩漏带下，痈肿，跌打损伤，创伤出血。常用量9～15g，水煎服；外用适量，捣敷。



图 31　黄龙尾

东俄洛蒙吾

来源 本品为菊科植物东俄洛蒙吾Ligularia tongolensis (Franch.) Hand-Mazz. (Senecio tongolensis Franch.) 的干燥幼苗。

原植物 东俄洛蒙吾(图32)为多年生草本，高20～100cm；根肉质，多数。茎直立，被蛛丝状柔毛。从生叶及茎下部叶具柄，柄长6～25cm，被具节短柔毛，基部鞘状；叶片卵状心形或卵状长圆形，长3～17cm，宽2.5～12cm，先端钝，基部浅心形，边缘具锯齿，绿色，两面被有节短柔毛，茎中上部叶与下部叶同形，向上渐小，叶柄短，鞘膨大，被短柔毛。伞房状花序顶生，长达20cm，稀头状花序单生，花序梗长1～7cm，被蛛丝状柔毛和有节短柔毛。头状花序1～20，辐射状，总苞钟状，长5～10mm，总苞片2层，7～8片，长圆形或披针形。舌状花5～6，黄色，舌片长圆形，长7～17mm；管状花多数，伸出总苞之外，长约7mm，冠毛淡褐色，与花冠等长。瘦果圆柱形，长约5mm，光滑。花果期7～8月。

生于海拔2 100～4 000m的山谷湿地、林下、林缘、灌丛中及高山草甸。分布于云南西北部、四川西南部至西北部、西藏东南部。

采收加工 夏季采收，除去枯叶和泥土，晒干。

药材性状 本品之干燥茎圆柱形，长20～100cm，基部直径约5mm，黄褐色，被蛛丝状柔毛。质脆，断面不整齐，类白色。叶皱曲，破碎，完整者平展后为卵状心形或卵状长圆形，长3～17cm，宽2.5～12cm，先端钝，基部浅心形，边缘具锯齿，黄绿色，两面被具节短柔毛，具羽状叶脉；叶柄长6～25cm，或茎上部者较短，基部鞘状膨大，被蛛丝状柔毛和有节短柔毛。头状花序辐射状，总苞钟状，总苞片2层，长圆形或披针形；舌状花黄色，舌片长圆形，管状花多数，伸出总苞之外。偶见圆柱形，光滑的瘦果。气微。以叶多，色绿者为佳。

性味与功用 辛，温。催吐，解毒；用于“赤巴病”、疮疡。常用量9~15g；外用适量。



图 32　东俄洛橐吾

1. 植株；2. 管状花

四　叶　金

别名　黑细辛、土细辛、四叶细辛、红线草、对叶四块瓦、半头细辛。

来源　本品为金粟兰科植物全缘金粟兰 Chloranthus holostegius (Hand.-Mazz.) Pei et Shan 之干燥带根全草。

原植物　全缘金粟兰（图33）为多年生草本，高25～55cm；根状茎横走，生多数须根。茎直立，不分枝，下部紫色，节膨大，生2对鳞片状阔卵形或三角形叶。叶对生，4片交互对生于茎顶，呈轮生状，叶片坚纸质，阔椭圆形或倒卵形，长7～15cm，宽3～9cm，先端渐尖，基部宽楔形，边缘具齿，齿尖具腺体，叶面绿色，背面淡绿，两面无毛，侧脉每边6～8条；叶柄长5～15mm。托叶微小。穗状花序顶生或腋生，常1～5个聚生，长5～12cm。苞片阔卵形或近半圆形，不分裂；花两性，无花被，黄绿色（或白色），雄蕊3，药隔基部连合，着生于子房顶端柱头外侧，药隔近成线形，长5～8mm；子房卵形。核果近球形或倒卵形，长3～4mm，绿色。花期5～6月，果期7～8月。

常生于海拔700～2 100m的山坡、沟谷密林或灌丛中。分布于云南、四川、贵州和广西。

采收加工　夏、秋季采挖全草，洗净，晒干备用或鲜用。

药材性状　本品全草长30～50cm；根茎具多数须根。茎圆柱形，光滑，下部节膨大，每节有鳞片1对；质坚脆，易折断，断面不整齐，类白色。叶4片交互对生于茎顶部，似轮生状，叶片皱缩、破碎，展开后的完整叶为阔椭圆形或倒卵形，长8～15cm，宽3～9cm，边缘具钝齿，深绿色。穗状花序顶生，花小，白色，具芳香。核果近球形或倒卵形，淡黄色至棕褐色。气微，味辛。以质干、带根、叶完整者为佳。

性味与功用　微苦、涩，温。有小毒。祛风除湿、散瘀消肿、止痛，舒筋活络，接骨止血，截疟。用于风寒感冒、风湿骨痛，肺结核咯血、淋巴结炎，牙痛、疟疾、跌打损伤，疮痈等症。常用量6～15g。



图 33　全缘金粟兰

对马耳蕨

别名 线尾鸡、蕨萁、马祖耳蕨、毛脚鸡。

来源 本品为蕨类鳞毛蕨科植物对马耳蕨 Polystichum tsus-sinense (Hook.) J.Sm. (Aspidium tsus-sinense Hook.) 的干燥全草。

原植物 对马耳蕨（图34）为多年生草本，高30～50cm；根状茎短而近直立，连同叶柄基部密被黑褐色卵状披针形和棕色钻状披针形鳞片。叶簇生；叶柄禾秆色，长15～30cm，基部以上达叶轴疏被黑色线状或披针形鳞片；叶片厚纸质或革质，披针形，长15～30cm，宽8～15cm，基部不变狭，二回羽状；羽片15～20对，相距1～1.5cm，镰状披针形，中部以下者长3.5～6cm，基部宽1～1.5cm，基部上侧1片小羽片大而凸起，并与叶轴并行，常浅裂，向上小羽片近全缘或具刺状小齿；叶脉羽状，侧脉单一或二叉，伸达叶缘。孢子囊群生于小脉顶端；囊群盖圆盾形，中间黑色，边缘浅棕色，早落。

生于海拔450～3 000m的山坡林下阴湿处、沟边、岩石缝中或灌木丛中。分布于云南、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、湖北、湖南、江西、安徽和浙江。

采收加工 四季可采，晒干。

药材形状 本品长35～50cm；基部为短而直立的根状茎，连同叶柄被黑褐色卵状披针形和棕色钻状披针形鳞片，叶柄禾秆色。叶片披针形，二回羽状，长15～30cm，宽8～15cm，基部不变狭，先端尾状渐尖；羽片厚纸质或革质，15～20对，镰状披针形，中部以下的长3.5～6cm，基部宽1～1.5cm，具刺状小齿，叶脉羽状，侧脉单一或二叉，直达叶缘。孢子囊群生于小脉顶端，囊群盖圆盾形。气微。以带根状茎，叶多者为佳。

性味与功用 苦，凉。清热解毒。用于目赤肿痛，痢疾，疔疖疮毒，肿毒，乳痈。常用量6～15g。

附注 对马耳蕨之根茎在河南作贯众入药。



图34　对马耳蕨

1. 植株；2. 鳞片放大；3. 羽片放大，示孢子囊着生位置

母猪草

来源 本品为毛茛科植物耳状人字果 Dichocarpum auriculatum (Franch.) W.T.Wang et Hsiao (Isopyrum auriculatum Franch.) 的干燥全草。

原植物 耳状人字果（图35）为多年生草本，无毛。根状茎黑褐色，质坚硬，横走，密生细根。基生叶二回鸟足状复叶，少数，常在果期枯萎；叶片革质，长4～7cm，宽3～7cm；中央一回指片菱形，长3～5.5cm，宽2～2.3cm，中部以上具浅齿，侧生指片具2不等大的小叶，上面小叶斜卵形，长2～2.5cm，宽1～1.5cm，下面小叶卵形，长1～1.1cm，宽7～10mm；叶柄长3～5cm。茎生叶通常2，或不存在，形似基生叶，叶柄长2～3cm。复单歧聚伞花序长5～12（～19）cm，通常有花1～7朵；苞片叶状，最上部者无柄，三全裂；花梗长3～5cm；萼片5，白色，倒卵状椭圆形，长5～9mm，先端钝；花瓣5，金黄色，阔倒卵状圆形，长约1.5mm，宽与长几相等，先端微缺或全缘，基部具爪；雄蕊多数（约20），长5～6mm。蓇葖2，狭倒卵状披针形，长10～15mm，顶端急尖，具细喙，基部合生；种子近圆形，直径约1mm，黄褐色，光滑。花期4～5月，果期6～7月。

生于海拔1 500～2 000m的山坡林下或溪边、石上。分布于云南东北部、四川、湖北西部。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材形状 本品皱曲呈团状，绿色。基部根状茎黑褐色，质坚硬，密生细根。断面黄褐色。茎圆形，细。叶皱曲，破碎或脱落，完整者展平后为二回、鸟足状复叶，长4～7cm，宽3～7cm，中央一回指片菱形，长3～5.5cm，宽2～2.3cm，中部以上具浅齿，侧生指片具2大小不等的小叶，上面的斜卵形，较大，下面的小叶卵形，较小，均绿色；叶柄长3～5cm。花序簇生，具1～7花，萼片5，白色，倒卵状椭圆形，长5～9mm；花瓣5，宽倒卵状圆形，金黄色；雄蕊多数。蓇葖2，基部合生，狭倒卵状披针形。气微。以带根状茎、叶多、色绿者为佳。

性味与功用 苦、辛，寒。止咳化痰，解毒消肿。用于咳嗽痰喘；外敷治瘰疬。常用量9~15g；外用适量。



图 35　耳状人字果

1. 植株；2. 花；3. 花瓣

丝叶球柱草

来源 本品为莎草科植物丝叶球柱草 Bulbostylis densa (Wall.) Hand-Mazz. (Scirpus densa Wall.) 的干燥全草。

原植物 丝叶球柱草（图36）为1年生草本，高7－25cm;秆细丝状，丛生。叶细线形，长5－10cm，宽约0.5mm，边缘微外卷，叶鞘薄膜质，先端被长柔毛。长侧枝聚伞花序简单或复出；苞片2－3枚，叶状，细线形，长8～15mm，边缘微外卷；小穗单生，偶有2～3个簇生，卵形或长圆状卵形，长3～6mm，直径约1.5mm,有7－17花；顶生小穗无柄，鳞片膜质，卵形，螺旋状排列，长1.5～2mm，宽1～1.5 mm，褐色，背面具龙骨状突起，脉1－3条，先端钝，仅下部1～2片无花，鳞片顶端具芒状短尖；雄蕊2，花药长圆状卵形；柱头3，无下位刚毛。小坚果三棱状倒卵形，长约0.8mm，直径约0.5mm，表面具透明的小突起，先端截平或微凹，具盘状花柱基。

生于海拔1 200～4 300m的山坡林下、河边、荒地、路旁。分布于西南、华南、华东和华北；印度、尼泊尔、锡金、日本及非洲亦有。

采收加工 夏、秋季采集，除去泥土，晒干。

药材性状 本品干燥全草皱缩呈团状，长7～25cm，须根纤细，黄褐色。茎秆纤细，绿色。叶细线形，长5～10cm，宽约0.5mm，卷曲，叶鞘薄膜质。长侧枝聚伞花序简单或复出。具2－3枚叶状苞片。小穗卵形或长圆状卵形，具7－17花。偶见三棱状倒卵形小坚果。气无，味甘、淡。以质干、茎叶多、带花序、色绿者为佳。

性味与功用 甘、淡，凉。清热解毒，利湿消肿。用于斑疹伤寒，中暑感冒，腹泻，跌打肿痛，尿频。



图 36　丝叶球柱草

1．植株；2．花序

地 地 藕

来源 本品为鸭跖草科植物地地藕 Commlina maculata Edgew. 的干燥全草。

原植物 地地藕（图37）为草本植物。植株下部匍匐分枝；茎纤细，近无毛。单叶互生，叶片卵状披针形，长4－9cm，宽1－2.5cm，先端渐尖，基部渐狭，边缘全缘，具刚毛。两面无毛或背面沿主脉被柔毛；叶鞘口边无毛或被红棕色疏毛。佛焰苞漏斗状，长1－1.5cm，宽约1.5cm，无毛。常2～3个聚生成头状，每1苞片内有3～4（稀1～2）花；花梗长约5mm；萼片3枚，膜质，长约4～5mm；花瓣3枚，蓝色或蓝紫色，膜质；花丝丝状，无毛，花药黄色；子房椭圆形，3室，无毛。蒴果3室，3瓣裂。花期7～9月。

生于海拔1 200～2 700m的山坡溪旁、草地及林下潮湿处。分布于云南西北部和中部、四川西部和西藏；印度北部和缅甸亦有。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 本品之茎细弱，具细沟槽，节上具纤维根，黄绿色；叶片皱缩，完整者平展后为卵状披针形，长4～9cm，宽1－2.5cm，先端短渐尖，全缘，绿色，两面无毛或背面沿脉具柔毛，叶鞘无毛或边缘被棕红色疏毛。佛焰苞漏斗状；花蓝色或蓝紫色，花药黄色。气微，味淡。以体干，无杂质，色绿者为佳。

性味与功用 淡，凉。清热解毒，利水消肿，凉血。用于丹毒，水肿，小便不利。常用量15g。



图 37　地地藕

地 柑 子

别名 矮陀陀、石柑子、小白花草。

来源 本品为棟科植物单叶地黄连 Munronia unifoliolata Cliv. 的干燥全株。

原植物 单叶地黄连（图38）为矮小半灌木，高5～30cm，全株被微柔毛；根木质，分枝常肥大。茎直立，不分枝。单叶互生，叶片纸质，长圆形，长3.5～6.5cm，宽2～3.5cm，先端急尖或钝，基部圆形，全缘或具少数钝齿，叶面绿色，背面淡绿色，侧脉每边4～5条，纤细；叶柄长1～2.5cm。花白色，两性，1（～3）朵腋生，花梗长约7mm；花萼长2～3mm，5深裂，裂片披针形；花冠长约2.8cm，冠管纤细，长约1.7cm，无毛，5裂，裂片倒披针状椭圆形，与冠管几等长；雄蕊的花丝筒顶端裂片10，裂片线形至披针形，花约10，微凸头，与裂片等长；花盘筒状；子房卵形，被柔毛，花柱长达2cm。蒴果球形，被柔毛；种子腹面凹入，背面凸起半球形。花期9月。

生于海拔450m左右的石灰山地。分布于云南东北部、四川、贵州、湖南、湖北等省区。

采收加工 全年可采，洗净，切段，晒干。

药材性状 本品之干燥植株长5～30cm；根木质，圆柱形，弯曲，表皮灰褐色，具须根或须根痕。质坚硬，断面不整齐，断面淡黄白色。茎单一，不分枝，灰褐色。质坚脆，断面类白色，不整齐。叶片纸质，皱褶、破碎，完整者为长圆形，长3.5～6.5cm，先端急尖或钝，基部圆形，全缘或具少数钝齿，灰绿色，侧脉4～5对；叶柄长1～2.5cm。花常1（～3）朵腋生，白色。蒴果球形，被柔毛。气微，味辛。以带根、叶多、完整、色绿者为佳。

性味与功用 辛，微苦，凉。有小毒。消炎止痛，舒筋活络。用于劳伤、咳嗽、胃痛；外敷治疮痈。常用量1.5～6g。



图 38　单叶地黄连
1. 植株; 2. 花

地 柏 枝

别名 拉波卷柏、鸡眼草。

来源 本品为蕨类卷柏科植物细叶卷柏 Lycopodioides labordei (Hieron.) H.S.Kung (Selaginella labordei Hieron.)的干燥全草。

原植物 细叶卷柏（图39）为多年生草本，高10～40cm。主茎圆柱形，禾秆色，下半部不分枝，上半部三至四回分枝。营养叶二形，腹叶（中叶）卵圆形，芒刺头，基部圆，多少呈心形，边缘有细刺状齿；背叶（侧叶）长圆状披针形，钝尖头，基部圆，边缘有疏细齿。孢子囊穗单生枝顶，扁平；孢子叶排列紧密，二形，腹叶卵状披针形，龙骨状，两侧不等钝尖头，斜上；背叶卵状三角形，锐尖头，较长，斜向上方，边缘均有细齿。孢子囊有大小之分，同穗，大孢子囊生于下部叶腋；孢子二形，大孢子白色，球形；小孢子卵圆形，橙红色。

生于海拔1 000～2 800m的林下阴湿处。分布于陕西、安徽、云南、贵州、四川、湖南、湖北、江西、广西等省区。

采收加工 夏季采收，洗净，晒干或鲜用。

药材性状 本品根茎灰棕色，屈曲，根自其左右发出，纤细，具根毛。茎圆柱形，禾秆色，长10～40cm，直径1.5～2mm，下部不分枝，疏生叶片，上部3～4回羽状分枝，全形呈卵状三角形。叶多扭曲皱缩，较小，上面淡绿色，下面灰绿色，二形，中叶卵圆形，芒刺头，基部圆形或近心形，边缘有细刺状齿，两侧叶矩圆状披针形，钝尖头。孢子囊穗单生枝顶，孢子叶排列紧密，二形，斜上。茎质柔韧，不易折断，叶质脆。气微，味淡。以叶多、色绿、质柔韧者为佳。

性味与功用 微苦、涩，凉。清热利湿，止血，定喘。用于小儿惊风，疳积，肝炎，胆囊炎，肠炎，痢疾，哮喘，肺痨咳血，月经不调，口腔炎，外伤出血。常用量15～30g；外用适量捣烂敷患处。



图 39　细叶卷柏

地 膏 药

别名 地毛香、白头翁、岩白菜、雾水草、兔耳风。

来源 本品为菊科植物宽叶鼠麴草 Gnaphalium adnatum (Wal.. ex DC.) Kitam. (Anaphalis adnata Wall. ex DC.) 的干燥全草。

原植物 宽叶鼠麴草（图40）为粗壮草本，高0.5～1m；茎直立，上部常呈伞房状分枝，密被紧贴的白色绵毛。单叶互生，基生叶花期枯萎；茎生叶倒披针状长圆形或倒卵状长圆形，长4～9cm，宽1～2.5cm，先端短尖，基部渐狭，下延抱茎，全缘，两面密被白色绵毛，中脉两面凸起，侧脉1对，上部叶小，线形。头状花序直径5～6mm，于枝顶端密集成球状，几排成伞房花序状。总苞近球形，直径5～6mm，总苞片3～4层，干膜质，淡黄色或黄白色，外层倒卵形或倒披针形，内层长圆形，长约4mm。雌花多数，结实，花冠丝状，长约3mm，顶端3～4齿裂，具腺点。两性花5～7个，花冠管状，长约3mm，檐部5裂，裂片浑圆，具腺点。瘦果圆柱形，长约0.5mm。具突头状突起，冠毛长约3mm，白色。花期8～10月。

生于海拔500～3 000m的山坡、路旁或灌丛中。分布于云南、四川、贵州、广西、广东、湖南、江西、福建、浙江、江苏和台湾等省；印度北部、缅甸、中南半岛及菲律宾亦有。

采收加工 鲜用或秋季采收，晒干。

药材性状 干燥茎枝圆柱形，直径4～8mm，具纵条纹，密被白色绵毛，灰绿色。易折断，断面不整齐，类白色，中空。叶片卷曲，皱缩，平展的完整者为倒卵状长圆形或倒披针状长圆形，长4～9cm，宽1～2.5cm，先端具短尖头，基部渐狭，全缘，两面密被白色绵毛，主脉两面凸起，灰绿色。头状花序小，于枝端排成密集球状或伞房状。总苞近球形，直径5～6mm，总苞片干膜质，淡黄色。雌花和两性花小。偶见圆柱形种子。气微，味苦。以枝叶多、色灰绿者为佳。

性味与功用 苦，寒。清热解毒，祛风除湿。用于小儿惊风，口疮，痢疾，疮毒，风湿疼痛，蛇虫咬伤，外伤出血。常用量9～15g，水煎服；外用捣烂敷患处。



图 40　宽叶鼠麴草

西南毛茛

来源 本品为毛茛科植物西南毛茛 Ranunculus ficariifolius Lévl. et Vant. (R. microphyllus Hand.-Mazz.) 的干燥茎叶。

原植物 西南毛茛（图41）为多年生草本。茎斜升或直立，有时卧地，高4～40cm，分枝或不分枝，近无毛或疏被短柔毛。基生叶一至数片，叶片菱状卵形、扁卵形或近圆形，长0.5－1.5cm，宽0.8～2cm，先端急尖或钝，基部截形或阔楔形、稀心形，边缘具疏锯齿，无毛；叶柄长1.2－6.5cm。茎生叶互生，叶片菱状或肾状卵形，茎下部者具长叶柄，上部者具短柄。花两性，与叶对生，直径5～10mm；花梗细，长0.5－2.5cm，疏被紧贴的短柔毛；花托被短柔毛；萼片5，椭圆形，长2－3mm，无毛或背面疏被柔毛；花瓣5，黄色，倒卵形或椭圆形，长2～4.5mm，宽1.5－2.4mm，先端圆形；雄蕊5～15枚，长约1.5mm，花药椭圆球形；心皮多数，螺旋状排列于花托上。聚合果宽卵球形，直径3～4.5mm，瘦果椭圆球形，长1～1.5mm，两面较扁，且具少数瘤状突起，顶端具宿存的喙状花柱。花果期4－7月。

生于海拔1 400－3 200m的山坡林下、沟边、河滩、沼泽或水田边。分布于云南、四川、贵州、湖北西部、湖南、江西西部等省区；尼泊尔、不丹和泰国北部亦有。

采收加工 夏、秋季采集，除去泥土和根，晒干。

药材性状 本品长4～30cm，茎、枝圆柱形，表面灰绿色，无毛或疏被短柔毛，质轻脆，易折断，断面不整齐，类白色。基生叶和茎生叶皱曲，破碎，平展后呈菱状卵形、扁卵形、肾状卵形或近圆形，长5～15mm，宽8～20mm，先端急尖或钝，基部截形或宽楔形，稀心形，边缘具疏锯齿，无毛，灰绿色；叶柄长1.2－6.5cm。气微，味淡。以叶多、色绿者为佳。

性味与功用 苦，辛，微温。有小毒。截疟。用于疟疾。外用鲜品适量捣烂敷寸口处。



图 41　西南毛茛

1．植株；2．花瓣；3．瘦果

百 味 参

别名 虎须草。

来源 本品为百合科植物少花粉条菜 Aletris pauciflora (Klotz.) Franch. (Stachyopogon pauciflorus Klotz.) 的干燥全草。

原植物 少花粉条菜（图42）为多年生草本，较粗壮；根肉质，纤维状，少分枝。茎短。叶簇生，叶片披针形或线形，长6～25mm，宽2～.0mm，先端渐尖，无毛，具多数脉。花葶高6～20cm，密被柔毛，中下部具数枚苞片状叶，长2～4cm，宽1～3mm；总状花序长2.5～15cm，具较稀的10余花；苞片2枚，线形或线状披针形，位于花梗之上端，其中1枚长于花梗1～2倍；花梗长5～15mm；花被近钟形，长5～7mm，白色、淡黄色或暗红色，上端6裂，裂片卵形，长1～2mm，膜质；雄蕊着生于花被筒上，花丝短，花药椭圆形；子房卵形，半下位，向上渐狭，花柱不明显。蒴果圆锥形，长4～5mm，无毛。花果期6～9月。

生于海拔（2 200－）3 400～3 800m的山坡草地、杂木林下或竹林下。分布于云南西北部、四川西部和西藏南部；尼泊尔、不丹、印度亦有。

采收加工 夏、秋采集，晒干备用。

药材性状 本品长10－30cm，基部具纤维状肉质根，根具皱纹，黄褐色。茎短，其上簇生披针形叶，浅绿色，长6～23cm，宽2～12mm，先端渐尖，无毛。花葶位于叶簇中，长6～23cm，直径1～2mm，密披柔毛，具叶状苞片。总状花序疏生10余花，花梗长5～15mm，花被白色至浅红色，6裂，裂片卵形，膜质，长1～2mm；雄蕊6，花药椭圆形；子房卵形，花柱不明显。蒴果圆锥形，长4～5mm。气微，味辛，微苦。以带根、叶多、色绿者为佳。

性味与功用 辛、微苦，温。补虚敛汗，止血止痛。用于头晕、耳鸣，神经衰弱，体虚盗汗，小儿营养不良，肺结核咯血，吐血，下血，月经不调，外伤疼痛等症。常用量15～30g。



图 42　少花粉条菜

灰 贯 众

别名 蜈蚣草、昏头鸡、鹿子草、小牛肋巴。

来源 本品为蕨类鳞毛蕨科植物对生耳蕨 Polystichum deltodon (Bak.) Diels (Aspidium deltoton Bak.) 的干燥全草。

原植物 对生耳蕨（图43）为多年生草本，高20～30cm；根状茎直立，连同叶柄基部密被披针形鳞片。叶簇生，叶柄长5～10cm，基部以上禾秆色，疏被鳞片；叶纸质，披针形，长15～25cm，中部宽2.5～3.5cm，先端渐尖，基部几不变狭，近光滑，一回羽状；羽片斜长方形或菱状三角形，中部者长1.2～1.8cm，基部宽6～8mm，先端锐尖，头具1小尖，基部上侧较宽，三角形凸起，下侧平切，边缘具三角状尖锯齿，基部和向顶部的羽片较小；叶脉羽状分叉，侧脉常分叉。孢子囊群生于小脉的顶端，通常仅在主脉上侧排成1行，有时下侧上部也有1～3枚；囊群盖圆盾形，多少具锯齿。

生于海拔750～1 800m的山地丛林下潮湿处及溪边石灰岩缝中。分布于云南、四川、贵州、广东、湖南、湖北、安徽、台湾；越南、日本也有。

采收加工 四季可采，洗净，晒干。

药材形状 本品全草长20～30cm，基部具根状茎及残根；棕褐色，密具棕色披针形鳞片。叶簇生，禾秆色，叶柄长5～10cm，疏被淡褐色鳞片；叶片纸质，皱曲或破碎，平展后为披针形，长15～25cm，中部宽2.5～3.5cm，先端渐尖，基部几乎不变窄，一回羽状；羽片斜长方形或菱状三角形，中部者长1.2～1.8cm，基部宽6～8mm，先端具锐尖头，基部不等侧，上侧较宽，三角状凸起，下侧平切，边缘具三角状尖锯齿，基部和向顶部的羽片较小；叶脉常羽状分叉。孢子囊群生于小脉顶端，囊群盖圆盾形。气微，味酸，涩。以带根状茎、叶多、叶色黄绿者为佳。

性味与功用 酸、涩，微寒。活血止痛，消肿，利尿。用于跌打损伤，外伤出血，蛇咬伤。常用量15g；外用适量，鲜品捣烂或干品研粉，调敷患处。



图 43　对生耳蕨

1. 植株；2. 叶片一段，示孢子囊群

光叶蝴蝶草

别名 水韩信草、水远志、蓝花草、倒胆草、老蛇药。

来源 本品为玄参科植物光叶蝴蝶草 *Torenia glabra* Osbeck. 的干燥全草。

原植物 光叶蝴蝶草（图44）为匍匐或披散草本，节上生根，全株无毛或近无毛；分枝细而多，具4棱。单叶对生，叶片三角状卵形、长卵形或卵圆形，长1.5～3cm，宽1～2cm，先端锐尖，基部突然收缩，多少截形或阔楔形，边缘具带短尖的钝锯齿；叶柄长2～8mm。花两性，单生叶腋或顶生；花梗长0.5～3cm；花萼长5～18mm，具5枚多少下延的薄翅，果实长达1.5～2cm，萼齿2，长三角形，先端渐尖，果期裂成5枚小尖齿；花冠紫红色或蓝紫色，长1.5～2.5cm，超出萼齿部分长4～10mm，5裂，上唇2裂，小唇3裂；雄蕊4，前方2枚，着生于喉部，花丝各具1枚长1～2mm的线状附属物。蒴果长15cm，种子黄色。花果期5月至次年1月。

生于海拔300～1 700m的山坡、路旁或阴湿处。分布于云南、四川、贵州、广西、广东、海南、湖南、湖北、江西、福建、浙江等省区。

采收加工 夏、秋季采集，洗净，晒干。

药材性状 本品干燥全草常卷曲呈团状，近黑色，茎枝纤细，近无毛，节上具须根。叶片皱曲，平展后为三角状卵形、长卵形或卵圆形，长1.5～3cm，先端锐尖，基部近截形或宽楔形，边缘具锯齿；花紫红色，单生叶腋或顶生，花冠二唇形，上唇2裂，下唇3裂；雄蕊4。蒴果长1.5cm，种子黄色。气微，味微苦，甘。以质干、枝叶多者为佳。

性味与功用 甘、凉，无毒。清热解毒，清肿止痛，化痰。用于热咳，小儿疳积，腹泻，黄疸，口腔炎，牙痛，中耳炎，睾丸炎，疥疮，外伤感染，跌打损伤，毒蛇咬伤等症。常用量9～15g；外用适量，鲜品捣烂或干品研粉调敷患处。



图 44　光叶蝴蝶草

光肺筋草

别名 地韭菜、小肺筋草。

来源 本品为百合科植物无毛粉条儿菜 *Aletris glabra Bur.et Franch.* 的干燥全草。

原植物 无毛粉条儿菜（图45）为多年生草本，连花葶高30～60cm；根状茎短，多数簇生，具细长的纤细根。叶簇生，叶片硬纸质，线形或线状披针形，长5～25cm，宽5～17cm，先端渐尖，通常对折，有时下弯，淡黄绿色。花葶直立，无毛，中下部具几枚长1.5～5.5cm的叶状总苞片；总状花序长7～25cm，具粘性物质；多花，中上部较密，下部花较疏；花梗长1～3mm，具2枚线形或狭披针形苞片，其中1枚生于花梗基部，长于花梗，另1枚生于花梗上部，很小；花被黄绿色，坛状，长4～7mm，无毛，上部1/3处6裂，裂片长椭圆形，长3～4mm，膜质，中脉绿色，明显；雄蕊6，着生于花被裂片的基部，花丝短，花药卵形或近圆形，长0.4mm；子房下部与花被管合生，3室，花柱短。蒴果卵形，长3～5mm，无毛。花期5～6月，果期9～10月。

生于海拔2 000～4 000m的山坡林下、灌丛中或草坡上。分布于云南、四川、贵州、西藏、陕西南部、甘肃南部、湖北、福建和台湾等省区；也见于锡金。

采收加工 夏末秋初采集全草，除去杂质，晒干。

药材性状 本品全草长30～60cm；花葶圆柱形，黄绿色，无毛；基部的根状茎短，多数簇生棕色、细长的纤维高根。叶簇生，皱曲，平展后的完整叶线形或线状披针形，长5～25cm，宽5～17mm，常对折，先端渐尖，黄绿色。总状花序多花，生于花葶顶端；花小坛状，黄绿色。蒴果卵形。气微，味甘。以带根，多叶，黄绿色者为佳。

性味与功用 甘、微苦，平。润肺止咳，养心安神，调经驱虫。用于支气管炎，百日咳，咳嗽咯血，神经官能症。常用量9～30g。



图 45　无毛粉条儿菜

肉 荚 草

来源 本品为桔梗科植物袋果草 Peracarpa carnosa (Wall.) Hook. f. et Thoms. (Campanula carnosa Wall.) 的干燥全草。

原植物 袋果草（图46）为多年生小草本，高2.5～12cm；有细长的根状茎。茎肉质，不分枝或分枝，无毛。单叶互生，具柄。茎中部以上的叶较大，密生或簇生，阔卵形或三角状卵形，长1～2.4cm，宽7～16mm，先端急尖，基部截形或阔楔形，边缘具波状浅钝齿，叶面绿色，疏被短伏毛，背面淡绿色，无毛，茎中部向下的叶渐疏、几迅速变小；叶柄长约2～8mm。花单生于茎顶部叶腋内，具纤细的长柄；花萼无毛，5裂，裂片狭三角形，长0.8～1.5mm，宿存；花冠白色，钟状，长3.5～6.5mm，无毛，5裂达中部，裂片披针形；雄蕊5，离生，长约2mm，花丝条形，基部稍宽；子房下位，3室，胚珠多数，柱头3裂。果卵圆形，长约5mm，白色，干燥不开裂，具多数暗褐色纺锤状椭圆形种子。花期3～5月，果期6～11月。

生于海拔3 000m以下的山地林下、林缘或溪旁湿地。分布于云南、四川、贵州、湖北、江苏南部、浙江和台湾等省区；也见于克什米尔地区、印度、尼泊尔、锡金、不丹、泰国、菲律宾、日本、俄罗斯远东地区。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 本品常皱缩卷曲呈团状，长2.5～12cm；下部具细长的根状茎，其上生多数须根。茎无毛。叶皱缩，破碎，平展后的完整叶片阔卵形或三角状卵形，长1～2.4cm，宽7～16mm，先端急尖，基部截形或阔楔形，边缘具波状钝齿，绿色。具叶柄。花单生于茎顶部的叶腋内，具纤细长梗；花萼5裂，缩存；花冠钟状，白色，多脱落；雄蕊5；子房下位，柱头3裂。果实卵形，长约5mm。气微，味淡。以身干、叶多、色绿者为佳。

性味与功用 祛风镇痉。用于小儿惊风。常用量3~6g。



图 46　袋果草

肉 穗 草

来源 本品为野牡丹科植物肉穗草 Sarcopyramis bodinieri Lévl. et Vant.的干燥全草。

原植物 肉穗草（图47）为小草本，高5～10cm，具匍匐茎，无毛。单叶对生，叶片纸质，卵形或椭圆形，长1～1.5（～3）cm，宽6～15（～20）mm，先端钝或急尖，基部圆形或宽楔形，边缘具疏的浅波状齿，叶面绿色或紫绿色，疏被糙伏毛，背面通常为紫红色，稀绿色，常无毛，基出脉3～5条，与侧脉常凸起；叶柄长3～11mm，具狭翅，无毛。花两性，1～4花组成聚伞花序，顶生，红色或红白色。总花梗长0.5～3cm，花梗长1～3mm，常四棱形，具狭翅；花萼长2～3mm，萼筒具四棱，棱上具狭翅，4裂片与萼筒垂直；花瓣4，阔卵形，长3～4mm，略偏斜；雄蕊8，等大，花药黄色，近顶端开裂，药隔稍延长，基部有短距；子房坛状，下位，4室。蒴果杯状，具4棱，直径约4mm，膜质冠长出萼1倍。种子小，多数，线状披针形，表面具小乳突。花期5～7月，果期9～12月。

生于海拔1 000～2 450m的山坡林下或阴湿处。分布于云南、四川、贵州和广西。

采收加工 夏、秋季采集，晒干备用。

药材性状 本品为团捆状，长5～10cm。展开的单个植株，茎纤细，无毛；叶皱曲，或破碎，平展叶片卵形或椭圆形，长1～1.5（～3）cm，宽6～15mm，先端钝或急尖，基部圆形或阔楔形，边缘具疏浅波状锯齿，叶面绿紫色，有疏糙毛，背面紫红色，无毛；具长叶柄。茎顶部具1～3（～5）花的聚伞花序，花红色或浅黄白色，花萼筒四棱形，具狭翅，顶端4裂，花瓣4，阔卵形，雄蕊8，等大，药隔基部有短距。蒴果杯形，具4棱。气微。以带根全草为佳。

性味与功用 甘、涩，平。清热利湿，凉血止血。用于痢疾，泄泻，吐血，咳嗽等症。



图 47　肉穗草

1．植株；2．花

会东藤

别名 小号瓢、老妈妈针线包。

来源 本品为萝藦科植物会东藤 Gymnema longiretinaculatum Tsiang 的干燥全草。

原植物 会东藤（图48）为藤状灌木，高约20cm，全株被粗硬毛。单叶对生，叶片卵状心形，长1～2cm，宽0.8～1.8cm，先端急尖，基部浅心形，全缘，基脉5条，明显；叶柄长3～5mm。聚伞花序腋生，长1.5～2.3cm，具3～5花或退化成单花，被粗硬毛；花序梗长1～1.3cm；花梗长5mm；花白色，长约5mm；花萼5裂，裂片卵形，外面被粗硬毛，内面无毛，基部具小腺体；花冠近钟形，花冠筒长约3mm，5裂，裂片长圆形，长约2mm，先端圆形或微凹，向右覆盖；副花冠退化成5枚蛛丝状长疏柔毛的条带，着生于花冠筒内面；合蕊柱圆柱形，达花冠喉部；花药顶端的膜片与柱头等高；花粉块长圆形，直立，着粉腺长圆形，比花粉块长；柱头盘状，顶端平顶，基部五角形，子房无毛。蓇葖纺锤形，两端钝，长3.5cm，直径1.3cm，无毛；种子顶端具白色绢质种毛。花果期8月。

生于海拔1 000～2 400m的山坡灌木丛中。分布于云南、四川和贵州。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 本品长约20cm，茎枝圆柱形，被粗硬毛，灰绿色；质坚，断面不整齐，类白色。叶皱曲或脱落，完整者平展后为卵状心形，长1～2cm，宽8～18mm，先端急尖，基部心形，全缘，绿色，两面被粗硬毛，具短柄。聚伞花序腋生，具3～5花或仅单花，被粗硬毛。花白色，长约5mm；花萼5裂，裂片卵形，基部内面具小腺体；花冠近钟状，裂片长圆形，副花冠退化成5枚蛛丝状条带；合蕊柱圆柱状，顶端达花冠喉部。蓇葖纺锤状，长约3.5cm，无毛。气微，味微苦。以带根、叶多、色绿者为佳。

性味与功用 微苦、辛，平。活血祛瘀，催乳。用于乳汁不足，胸口痛，跌打损伤，刀伤。常用量9～15g；外用捣烂敷患处。

附注 本种之种毛外用作刀伤药。



图 48　会东藤

1. 植株下部；2. 花枝；3. 花

多舌飞蓬

来源 本品为菊科植物多舌飞蓬 Erigeron multiradiatus (Lindl. ex DC.) Benth. (Aster multiradiatus Lindl. ex DC.) 的干燥全草。

原植物 多舌飞蓬（图49）为多年生草本，高20～60cm。根状茎木质，粗壮。茎数个或单生，有时上部分枝，密被多细胞短硬毛，杂有头状具柄腺毛。基生叶密集成莲座状，花期常枯萎，长圆状倒披针形或倒披针形，长5～15cm，先端尖或稍钝，基部渐狭或带紫色的叶柄，全缘或具少数钝齿，两面疏被短硬毛或腺毛；茎生叶互生，中上部者无柄，卵状披针形至狭披针形，长4～6cm，多全缘。头状花序直径可达4cm，通常2至数个排或顶生的伞房状花序，稀单生；总苞半球形，直径1.5～2cm；总苞片3层，外层较短，上端或全部紫色，被多细胞毛和腺毛，线状披针形；外缘3层雌花，舌状，舌片开展，紫色，长14～17mm；中间两性花，管状，黄色，裂片5，长三角形；雄蕊5，聚药；花柱顶端叉状。瘦果长圆形，背面具1肋，被疏短毛；冠毛2层，污白色或淡褐色，外层极短，内层长约4mm。

生于海拔2 800～4 600m的高山或亚高山草地、林缘或灌木丛中。分布于云南、四川、西藏、青海等省区；阿富汗、印度、尼泊尔、锡金也有。

采收加工 夏季采挖带根全草，洗净，晒干。

药材性状 本品全株长20～60cm。根状茎木质，粗壮，具分枝或不分枝，表面凸凹不平，生多数圆柱形细根，直径约1mm，表面淡褐色。茎圆柱形，直径约3mm，表面淡绿色至淡棕色，具细纵棱，被白色短硬毛并杂有腺毛；质脆，易折断，断面淡黄白色。基生叶莲座状，皱缩或破碎，完整者展开后呈长圆状披针形或倒披针形，长5～15cm，宽0.7～1.5cm，黄绿色，基部渐狭成紫色叶柄，两面被毛；茎生叶互生，卵状披针形至狭披针形，长4～6cm，宽0.6～2cm，上部叶无柄。头状花序径3～4cm，单生成数个排或伞房状，苞片和舌状花紫色。瘦果。气微，味淡。以叶色绿者为佳。

性味与功用 淡，平。归肝、胃经。清热解毒，助消化。用于消化不良，肠炎腹泻，肝炎，淋巴结炎，血尿。常用量15～30g。



图 49　多舌飞蓬

羊胡子草

别名 蓑草。

来源 本品为莎草科植物丛毛羊胡子草 Eriophorum comosum (Wall.) Nees ex Wight (Scirpus comosum Wall.) 的干燥全草。

原植物 丛毛羊胡子草（图50）为多年生草本，高14～80cm。根状茎粗短。杆密丛生，基部具黑褐色叶鞘。叶基生，无杆生叶；叶片线形，长50～60cm，顶端渐狭成刚毛状，边内卷，具细齿，基部鞘状。长侧枝聚伞花序伞房状，长6～22cm；苞片叶状，长于花序；小苞片披针形，顶端刚毛状；小穗多数，单生或2～5个簇生，长圆形，长6～12mm，基部有空鳞片4片，2大2小，卵形，顶端具小短尖，褐色，膜质，中肋呈龙骨状突起；有花鳞片同空鳞片而稍大，长2.3～3mm；下位刚毛极多数，成熟时长超过鳞片，长达7mm，无细刺；雄蕊2，花药顶端具紫黑色披针形的短尖；花柱长，柱头3，细线形。小坚果狭长圆形，扁三棱状，顶端尖锐，有喙，深褐色，有的下部具棕色斑点，长约2.5mm，宽约0.5mm。

生于岩壁上。分布于云南、四川、贵州、西藏、广西、湖北、甘肃等省区；印度、越南、缅甸、印度尼西亚也有。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 本品全长约14～80cm，须根较粗，褐色。杆密集成丛，钝三棱形或圆柱形，直径约1～2mm，禾秆色，基部具宿存的黑褐色叶鞘。叶全部基生，线形，长50～60cm，宽2～4mm，顶端渐狭成刚毛状，边缘具极细齿，稍内卷，淡褐黄色。聚伞花序伞房状，顶生。叶状苞片长于花序；小穗多数，单生或2～5个簇生；鳞片褐色，膜质，中肋呈龙骨状突起；下位刚毛多数，长于鳞片，丝状。体轻，质柔软。气无，味淡。以干燥、茎叶多、带花序者为佳。

性味与功用 辛，湿。祛风散寒，通经络，平喘咳。用于风寒感冒，喘咳，风湿骨痛，跌打损伤。常用量10～15g。

附注 丛毛羊胡子草花序平喘止咳。



图 50　丛毛羊胡子草

红花岩松

别名 岩松、莲花还阳、碎骨还阳、狗牙还阳、蛇石莲。

来源 本品为景天科植物石莲 Sinocrassula indica (Decne) Berger (Crassula indica Decne; Sinocrassula densirosulata (Praeg.) Berger; S.indica (Decne.) Hamet var.obtusifolia (Frod)S. H. Fu) 的干燥全草。

原植物 石莲（图51）为2年生草本，高10～30cm，无毛；茎直立，稀弯曲，不分枝或少分枝。基生叶莲座状，叶片厚，匙状长圆形或匙状倒卵形，长1～4（～7）cm，宽6～15mm，先端急尖或钝，基部阔楔形，全缘，绿色，有时带红色，叶脉不明显，无柄；茎生叶互生，疏离，叶片倒卵形、倒披针形至长圆状线形，长1～3.5cm，向上渐小，先端急尖或钝，基部平截，无柄。圆锥花序或近伞房状花序顶生，长5～10cm；苞片叶状，较小；花梗长3～6mm；萼片5，阔三角形或披针形，长1.5～3mm，宽0.5～1mm，先端急尖；花瓣5，粉红色、红色或紫红色，三角状卵形至披针形，长3～5mm，宽1～2mm，先端急尖或钝；雄蕊5，稍短于花瓣；鳞片5，正方形或长方形；心皮5，卵形，长2.5～3.5mm，花柱短。蓇葖果直立，有种子多数；种子近椭圆形，小，具细网纹或纵条纹。花果期5～10月。

生于海拔1 700～3 300m的山坡林下、灌丛中、溪边、路旁的石缝中。分布于云南、四川、贵州、西藏、湖南、湖北、陕西和甘肃等省；印度、尼泊尔、锡金、不丹亦有。

采收加工 秋季采集，晒干或鲜用。

药材性状 本品全草长10～30cm；茎枝圆柱形，具纵皱纹，叶皱曲，平展后呈匙状长圆形或匙状倒卵形，长1～4cm，宽6～15mm，先端急尖或钝，基部宽楔形，全缘，绿带褐红色；茎枝顶端具长5～10cm的圆锥状或近伞房状花序，花粉红色至紫红色，萼片5，脱落，存在者三角状卵形至披针形，长3～5mm；雄蕊5，短于花瓣；心皮5，卵形。气微，味酸。以质干、叶多、色绿者为佳。

性味与功用 酸，平。有毒。清热解毒，止血止痢。用于咽喉肿痛，痢疾，便血，崩漏；外用于疮疡久不收口，烧烫伤。常用量1.5～3g；外用适量捣烂或干品研粉数患处。



图 51　石莲

红枝卷柏

别名 地柏树、舒筋草、金鸡尾。

来源 本品为蕨类卷柏科植物红枝卷柏 Lycopodioides sanguinolenta (L.) Kuntze (Lycopodium sanguinolenta L.) 的干燥全草。

原植物 红枝卷柏（图52）为多年生草本。茎伏地丛生，多回二歧式分枝，小枝坚细如铁丝、多少带红色，老枝近光滑。营养叶一形，卵形，革质，呈龙骨状，长约1.5mm，顶端渐尖，基部着生处近全缘，4列紧贴枝上，交互覆瓦状排列。孢子囊穗单生于小枝顶端，长4～12mm，有4棱；孢子叶一形，宽卵形，长约1.2mm，宽约0.8mm，顶端渐尖，边缘有极细的尖齿，背部有明显的棱脊；孢子囊圆肾形，黄色；孢子二型（既分为大孢子和小孢子），分别生于大小孢子囊内。

生于海拔1 200～3 600m的干旱岩石上。分布于我国东北、华北、西北、西南等地区。亚洲温带其他地区和北美也有。

采收加工 全年均可采收，抖去泥沙及杂草，晒干。

药材性状 本品根呈细长圆锥形，具多数须根。茎多回2叉式分枝，坚细如铁丝状，棕黄色。叶卵形，龙骨状，质厚，具短尖头，基部着生处略呈鞘状下延成楔形，边缘膜质，有微齿或近全缘，四列交互覆瓦状排列，紧贴枝上。枝顶具孢子囊穗，孢子叶宽卵形，有锐尖头，略有齿。茎枝柔韧，不易折断，叶质较脆。气微，味淡。以分枝多，具孢子囊穗者为佳。

性味与功用 甘、微苦，平。清热利湿，舒筋活血，止痢，止血。用于湿热黄疸，痢疾，肺痨咯血，风湿关节疼痛，烫火伤。常用量9～15g；外用适量研粉，菜油调敷，搽伤处。




图 52　红枝卷柏
1．植株；2．枝一段放大

芸香叶唐松草

别名 奥甲决拉（藏语）。

来源 本品为毛茛科植物芸香叶唐松草 Thalictrum rutaefolium Hook. f.et Thoms.的干燥全草。

原植物 芸香叶唐松草（图53）为多年生草本，高11～50cm，全株无毛。茎圆柱菜，上部分枝。叶为3～4回羽状复叶，互生，叶片长达 1cm，小叶片草质、顶生小叶楔伏倒卵形，边缘常全缘，脉平出，脉网不明显；叶柄长4.5～6cm。复单歧聚伞花序狭长似总状花序；花梗长2～7mm；花直径3～5mm，萼片4，卵形，长约1.5mm，淡紫色，早落；雄蕊少数至多数，长2～3mm，花药长0.5～1.5mm，顶端具短尖头，花丝丝状；心皮3～5，子房具短柄，花柱短，柱头狭长圆形。瘦果反曲、镰状半月形，长4～6mm，每侧具3条纵肋，子房柄长约1mm，顶端具宿存柱头。花期6～7月。

生于海拔2 280～4 200m的山坡灌从中、草坡、河边滩地或砂砾山坡。分布于云南西部、四川西部、西藏南部及东南部、青海、甘肃等省区；尼泊尔、锡金、克什米尔地区亦有。

采收加工 夏、秋采集，晒干。

药材性状 本品长10～50cm，无毛，灰绿色。茎圆柱形，上部多分枝。叶为3～4回羽状复叶，多皱曲，或有脱落、叶片长11cm，小叶草质 顶生小叶楔状倒卵形、菱形、椭圆形或近圆形，长3～8mm，宽2－7mm，基部楔形或圆形，3裂或不分裂，边缘常全缘、脉平，绿色；叶柄长4.5cm。小枝顶端为复单歧聚伞花序组成的总状花序；花小，萼片4，淡紫色，早落；雄蕊少数或多数；心皮3～5，子房具短柄。瘦果镰状半月形，长4－6mm，两则各具3条纵肋。气微，味苦。以质干、叶多、色绿者为佳。

性味与功用 苦，寒。清热泻火，燥湿解毒。用于痈疖肿毒，皮炎，湿疹。常用量9～15g。



图 53　芸香叶唐松草

杉 叶 藻

别名 续藻、当布噶日（藏语）。

来源 本品为杉叶藻科植物杉叶藻 Hippuris vulgaris Linn. 的干燥全草。

原植物 杉叶藻（图54）为多年生水生植物，高20～60cm，全株无毛；根状茎匍匐生于泥中。茎圆柱形，直立，不分枝。叶轮生，每轮具6～12枚，水平着生，叶片质软，线形，长1～2.5cm，宽1～2mm，先端钝，全缘，具1脉，弯曲或直伸，生于水中之叶通常较长而质地较脆弱。花小，两性，稀单性，单生于叶腋内，无花梗；无花被；雄蕊1枚，生于子房上，略偏一侧，很小，花丝被疏毛或无毛，花药广卵形，纵裂；子房下位，椭圆形，连萼杯长约1.5mm，直径约1mm，花柱丝状，稍长于花丝，被疏毛，顶端常靠在花药背部两药室之间。核果长圆形，淡紫色，长约1.5mm，直径约1mm，顶端近截形，具宿存花柱。花果期6～9月。

生于海拔2 700～3 300m的沼泽、浅水塘、湖滨及河流浅水中。分布于我国西南、西北、华北北部至东北各地；日本亦有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干。

药材性状 本品之干燥茎圆枝形，不分枝，褐色；茎节具轮生叶，每轮6～12枚，线形，长1～2.5cm，宽1～2mm，全缘，具1脉，绿褐色。花单生于叶腋内，无花柄和花被，雄蕊1枝，侧生于子房上，子房椭圆形，核果淡紫色，长圆形，长约1.5mm。气微，味苦。以质干、带叶、色褐绿者为佳。

性味与功用 苦，凉。镇咳，平肝，清热，养阴。用于肺热咳嗽，两胁疼痛，痨热骨蒸，高热烦闷，急性胃肠炎等症。常用量6～12g；外用适量，研末调敷。




图 54　杉叶藻

护 心 草

别名 附心草。

来源 本品为莎草科植物旋鳞莎草 Cyperus michelianus (L.) Link. (Scirpus. michelianus L.) 的干燥全草。

原植物 旋鳞莎草（图55）为1年生草本，高2～25cm；秆丛生，三棱形，平滑。叶长于或短于秆，宽2～2.5mm，常平张，叶鞘紫红色。苞片4～6枚，叶状，远长于花序，基部宽。聚伞花序极短缩呈卵状头形，直径5～15mm，具多数小穗；小穗卵形或披针形，长3～4mm，直径约1.5mm，具10～20花；鳞片螺旋状排列，膜质，长圆状披针形，长约2mm，背部具龙骨突起，中间绿色，两侧淡黄色，脉3～5条，先端具短尖；雄蕊2，稀1，花药长圆形；花柱长，柱头2，稀3。小坚果狭长圆形，有三棱，长约1mm。花果期6～9月。

生于水边、路旁。分布于云南西北部、广东、浙江、江苏、安徽、河南、河北、黑龙江；日本、俄罗斯、欧洲中部和非洲北部亦有。

采收加工 夏、秋季采集，除去泥土，晒干。

药材性状 干燥全草皱缩成团块状，长可达25cm。茎秆绿色，三棱形，平滑。叶线形，长于或短于茎秆，卷曲，叶鞘绿紫色。聚伞花序极短缩成卵状头形，直径5～15mm，具多数小穗，小穗卵形或卵状披针形，长3～4mm，具10～20花。鳞片膜质，长圆状披针形，螺旋状排列。小坚果三棱状狭长圆形。气微，味辛。以茎叶多、色绿者为佳。

性味与功用 辛，平。行气调经，养血。用于经期腹痛，行经愆期。常用量12～30g。



图 55　旋鳞莎草

旱田草

别名 剪席草、地下茶、耳环草、鱼尾草、鸭舌癀、定经草、虎舌蜈蚣草、菜瓜香、田素馨、调经草、龟纹、锯镰草。

来源 本品为玄参科植物旱田草 Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell 的干燥全草。

原植物 旱田草（图56）为1年生草本，高10～15cm，全体近无毛；主茎直立，基部发出长达30cm的匍匐茎，节间长，节上生根。单叶对生，叶片长圆形、椭圆形、卵状长圆形或圆形，长1～4cm，宽0.6～2cm，先端圆钝或急尖，基部宽楔形，边缘除基部外密具整齐而急尖的细锯齿，但齿尖无芒刺，叶面绿色，背面淡绿色，两面近无毛或被粗的短毛。总状花序顶生，长5～6cm，具2～10花；苞片线状披针形，较花梗短；花梗向顶端增粗，无毛；花萼长约6mm，果期可达10mm，基部联合，5裂，裂片线状披针形，无毛；花冠紫红色，长10～14mm，管长7～9mm，二唇形，上唇直立，2裂，下唇开展，3裂，裂片几相等，或中裂片稍大；雄蕊4，前方2枚不育，后方2枚能育，但无附属物；花柱有宽面扁的柱头。蒴果圆柱形，向顶端渐尖，较宿存萼长约2倍；种子椭圆形，褐色。花期6～9月，果期7～11月。

生于海拔1 500m的草地、平原、山谷林下或沟边。分布于云南、四川、贵州、西藏、广西、广东、海南、湖南、湖北、江西、福建、台湾等省区；印度、印度尼西亚、菲律宾亦有。

采收加工 夏、秋季采挖，洗净，鲜用或晒干备用。

药材性状 本品长10～35cm；茎枝细弱，具长达30cm的匍匐茎，节上生根。对生叶长圆形、椭圆形、卵状长圆形，长1～4cm，宽6～20mm，先端圆钝或急尖，基部宽楔形，具锯齿，灰绿色，无毛或被疏毛。总状花序顶生，具2～10花；花淡紫红色，二唇形。蒴果圆柱形，向顶端渐尖；种子褐色，椭圆形。气微，味甘。以带茎、叶多、色绿者为佳。

性味与功用 甘、淡，平。理气活血，消肿止痛。用于红痢，胃癀，经痛，闭经，乳腺炎，颈淋巴结核，跌打损伤，痈肿疼痛，毒蛇、狂犬咬伤等症。常用量50～100g；外用适量鲜品捣烂或干品研末调敷患处。




图 56　旱田草

苦　　蒿

别名　苦龙胆草、矮脚苦蒿、苦草、龙胆蒿、阿壳西（哈尼族语）。

来源　本品为菊科植物熊胆草 Conyza blinii Lévl.的干燥全草。

原植物　熊胆草（图57）为1年生草本，高40～90cm，全株密被白色开展的长柔毛和密腺毛。根圆柱形，不分枝或少分枝，具多数须根，棕褐色或黄褐色。茎直立，圆柱形，具纵条纹，分枝或不分枝。叶互生，纸质，轮廓卵形或卵状长圆形，长4～7.5cm，宽2.5～3cm，羽状深裂，稀浅裂，裂片通常4～6对，线形或线状披针形，偏斜，先端稍尖，全缘或具疏齿，顶端裂片大，倒卵状披针形，叶面绿色，背面淡绿色，两面被长柔毛和密腺毛；茎下部叶具柄，常在花期枯萎，中上部叶无柄。头状花序排成顶生狭圆锥花序；花序梗短，密被开展的长柔毛及腺毛；总苞钟形，长约6mm，宽约10mm；总苞片3～4层，绿色，边缘膜质，白色，背面密被长柔毛及腺毛，外层短，内层长，先端常带紫红色，稍反折。花黄色，全部结实，外层雌花极多数，花冠丝状，中央两性花，花冠管状，长约4.5mm。瘦果长圆形，压扁，长约1mm，两端被微毛，冠毛1层，污白色。

生于海拔1 800～2 600m的山坡草地，荒地，路旁或旷野。分布于云南、四川和贵州。

采收加工　秋季采集，除去杂物、泥土，晒干。

药材性状　本品长30～80cm；根圆柱形，不分枝或少分枝，棕褐色，稍弯曲。茎圆柱形，具纵条纹，被开展的长柔毛和腺毛，黄绿色。断面黄白色，不整齐。叶纸质，皱褶，羽状深裂，裂片4～6对，线形或线状披针形，绿色，被柔毛和腺毛。头状花序排成顶生狭圆锥花序，总苞绿色，花全部管状，黄色。气微，味苦。以枝叶多，色黄绿，苦味浓者为佳。

性味与功用　苦，寒。清热解毒，消炎祛痰，止咳平喘，截疟。用于慢性支气管炎，百日咳，胃肠炎，中耳炎，口腔炎，咽喉炎，牙痛，风火眼，肾炎，肝炎，痢疾，疟疾。常用量6～10g。



图 57　熊胆草

刺 天 茄

别名 天茄子、紫花茄、苦果、苦天茄、野海椒。

来源 本品为茄科植物刺天茄 Solanum indicum Linn. 的干燥全草。

原植物 刺天茄（图58）为灌木，高1～1.5m。全株密被具柄的星状毛和基部宽扁的淡黄色钩刺，钩刺长4～7mm。小枝圆柱形，褐色。单叶对生，叶片纸质，卵形，长5～11cm，宽2.5～8.5cm，先端钝，基部心形、截形或两侧不等，边缘5～7深裂成波状浅圆裂，叶面绿色，被具柄的星状短柔毛，背面淡绿色，密被星状长绒毛，侧脉3～4对，与主脉在两面具长2～6mm的钻形皮刺；叶柄长2～4cm，密被星状毛和1～2钻形皮刺。蝎尾状花序腋外生，长3～6cm，总花梗长2～8mm，花梗长达1.5cm以上，均被星状毛和钻状皮刺；花萼杯状，直径约1cm，5裂，裂片卵形，外面密被星状绒毛和细直刺；花冠蓝紫色，稀白色，辐状，先端5裂，裂片卵形，长约8mm，被星状毛；雄蕊5，花药黄色；子房长圆形，具棱，顶端及花柱被星状毛。浆果球形，直径约1cm，成熟时橙红色，光亮；种子近盘状，直径约2mm，淡黄色。花果期全年。

生于海拔180～1 700m的林下、路边、荒地或灌丛中。分布于云南、四川、贵州、广东、广西、海南、福建、台湾等省；印度、缅甸、中南半岛、南至马来半岛，东至菲律宾亦有。

采收加工 夏季采收，除去杂质，洗净泥土，切段，晒干。

药材性状 本品之根弯曲，粗壮，暗褐色；茎枝圆柱形，具纵条纹，绿褐色，被星状柔毛和钩状刺；质脆，易折断，断面不整齐，类白色。叶互生，皱缩，破碎，完整者卵形，先端钝，基部心形或截形，边缘具5～7浅裂成波状浅圆裂，绿色，两面疏被星状毛，沿脉具细圆刺；蝎尾状花序腋外生，具3～10花，花紫蓝色。浆果圆形，直径约1cm，橙红色，内有多数扁圆形种子，种子淡黄色。气微，味苦。以带根、叶多、色绿者为佳。

性味与功用 苦，寒。有毒。清热解毒，消炎止痛。用于脑漏鼻渊，头风头痛，胃痛，牙痛，风湿疼痛，扁桃体炎，咽喉炎，淋巴结炎，跌打损伤，疟疾等症。常用量3～6g；外用适量。



图 58　刺天茄

岩筋菜

别名 白奴花、小岩匙、石莲、岩菠菜。

来源 本品为岩梅科植物岩匙 Berneuxia thibetica Decne. (B. yunnanensis Li) 的干燥全草。

原植物 岩匙（图59）为多年生草本，高20～25cm；根状茎木质，粗壮，直径3～4mm，近直立或稍弯曲，褐色或暗褐色，密被黑褐色、不透明的卵形鳞片。叶全部基生，莲座状，叶片革质，倒卵状匙形或椭圆状匙形，长3～10cm，宽1.7～4cm，先端钝，具凸尖头，向基部渐狭至叶柄，楔形，全缘而反卷，叶面深绿色，平滑而有光泽，背面灰绿色或灰白色，侧脉2～4对；叶柄较叶片长或短。伞形总状花序生于花葶顶端，花葶花时与叶等长或略短于叶，花后延长达23cm；花梗长3～11cm，通常红色，微被短柔毛，基部具1大苞片，中部具2小苞片，苞片近膜质，披针形或线状披针形，长4～7mm；萼片5，淡红色，宽椭圆形或卵状披针形，长4～7mm，宿存；花冠钟状，白色，5深裂，裂片舌状或长圆形，长9～10mm，膜质，先端圆形；雄蕊5，着生于花冠基部，长约9～10mm；退化雄蕊5，舌形或长圆形，被髯毛；子房扁球形，微被毛，花柱1，长约9mm。蒴果圆球形，直径3mm。花期4～6月，果期8～9月。

生于海拔1 700～3 500m的山地林中湿地。分布于云南、四川、贵州和西藏。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 本品长20～25cm；根状茎暗褐色，直径3～4mm，稍弯曲，具黑褐色鳞片。莲座状基生叶具长柄，叶片倒卵状匙形或椭圆状匙形，长3～10cm，宽1.7～4cm，灰绿色，平滑无毛。伞形总状花序生于花葶顶端，多花，花白色，钟状，5深裂，裂片舌状或长圆形，雄蕊和退化雄蕊各5枚，子房被毛。蒴果球形。气微，味辛。以带根、叶片完整、色绿者为佳。

性味与功用 辛，微苦。散寒，平喘，活血，散瘀。用于风寒感冒，咳嗽痰多，哮喘，跌打损伤。常用量6～9g。



图 59　岩匙

败毒草

别名 白马风、阴兜药、白带药。

来源 本品为蕨类裸子蕨科植物耳叶金毛裸蕨 Gymnopteris vestita (Wall. ex Hook.)Underw.var.auriculata (Franch.)C.Chr. (G. vestita Hook. var.auriculata. Franch.;G.bipinnata Chr.var.auriculata (Franch.) Ching) 的干燥全草。

原植物 耳叶金毛裸蕨（图60）为多年生草本，高15～20cm；根状茎横卧，粗壮，密被锈黄色线状披针形鳞片。叶密生，叶柄圆柱形，长8～16cm，深棕色，基部密被黄棕色线状披针形鳞片，向上连同叶轴被黄棕色柔毛；叶片线状披针形，长10～16cm，宽1.5～3cm，先端渐尖，一回奇数羽状，羽片下部的对生，上部的互生，略斜向上，薄革质或厚纸质，卵形或心形，先端钝或渐尖，基部深心形，有时有1～2片小耳片，叶面疏披灰棕色节状长毛，背面密被棕色状长毛，叶脉羽状，侧脉分叉。孢子囊群沿侧脉着生，隐藏在毛被之下。

生于海拔1 700～2 400m的林下岩石上或岩壁上。分布于云南、四川、贵州、西藏、湖北、陕西、甘肃、陕西、河南、山东。

采收加工 夏、秋季采集，洗净，晒干。

药材性状 全草长20～30cm；根状茎粗壮，棕褐色，密被锈黄色线状披针形鳞片。叶柄深棕色，圆柱形，长8～16cm，基部被锈黄色线状披针形鳞片，上部及叶轴披棕色柔毛；叶片线状披针形，长10～16cm，一回羽状，羽片薄革质或厚纸质，卵形或心形，叶面绿色，背面密被锈色节状长毛，基部心形，叶脉羽状，分叉。孢子囊群沿脉着生，隐藏在毛披下，不见。气无，味苦。以带根状茎、叶多者为佳。

性味与功用 苦，寒。清热解毒，止痒，息风，止血。用于温病发热，小儿惊风，肺炎，鼻衄，外伤出血，疮痈肿毒，疮痒。常用量9～15g；外用适量捣烂敷患处。



图 60　耳叶金毛裸蕨

金 鸡 尾

别名 凤尾草、楚箭草、岩凤尾蕨、五叶灵芝、掌叶凤尾。

来源 本品为蕨类凤尾蕨科植物指叶凤尾蕨 Pteris dactylina Hook. 的干燥全草。

原植物 指叶凤尾蕨（图61）为多年生草本，高20～40cm；根状茎短而横走，直径约3mm，先端被亮黑色、长约2mm的线形鳞片。叶多数，簇生，不育叶与能育叶等长；叶柄纤细，禾秆色，长15～30cm，基部褐色，稍光亮，光滑或有时粗糙；叶片指状，羽片3～（5～7）片，偶有基部一对近三叉或顶生羽片二至三叉，均集生于叶柄顶端，中央一片较长，长8～10（～15）cm，宽（2～）3～4（～8）mm，先端渐尖，基部楔形，不下延，两侧的羽片同形但略呈镰刀形，均无柄或仅顶生羽片具短柄，能育羽片几全缘，仅顶部具细齿，不育羽片边缘具细尖齿；主脉禾秆色，在叶面凹陷，背面隆起，侧脉通直而并行，单一或间有从下部分叉。孢子囊群线形，沿叶缘延伸，仅羽片顶部不育；囊群盖线形，灰白色，膜质，近全缘。

生于海拔2 000～3 900m的山坡灌丛下，潮湿的岩缝中或溪边岩石上。分布于云南西北部、四川西部、贵州及西藏东南部等省区；印度北部、尼泊尔、锡金也有。

采收加工 全年可采，洗净，晒干。

药材性状 本品长20～40cm；基部具短而细的根状茎。叶多数，二型，簇生，不育叶与能育叶近等长；叶柄纤细，禾秆色，长15～30cm，光滑或偶粗糙；叶片皱曲，破碎，平展后为指状，羽片5～7片，偶有基部一对近三叉或顶生羽片2至3叉，均集生于叶柄顶端，中央羽片较长，长8～10（～15）cm，宽3～4（～8）mm，先端渐尖，基部楔形，两侧羽片圆形，但略镰刀形，不育羽片边缘具齿尖，能育羽片仅顶部具细齿；主脉在叶面凹陷，背面隆起，侧脉通直耳平行。孢子囊群线形，沿叶缘延伸，囊群盖线形，灰白色，膜质。气微，味苦。以质干、叶多、色绿者为佳。

性味与功用 苦、微涩，凉。清热利湿，定惊解毒。用于肠炎，流行性腮腺炎，淋巴结炎，痢疾，白带，小儿惊风，水肿，狂犬咬伤。常用量9～15g。



图 61　指叶凤尾蕨

金 线 盘

别名 血叶兰、石上藕。

来源 本品为兰科植物大花斑叶兰 Goodyera biflora (Lindl.) Hook. f. (Georchis biflora Lindl.) 的全草。

原植物 大花斑叶兰（图62）为多年生草本，高5～10cm。根状茎圆柱形、匍匐，肉质，味较苦，节上生根。茎直立，不分枝，具数枚互生的叶。叶片卵形或长圆状卵形，长2～4cm，先端急尖或钝尖，基部圆形，边全缘，叶面暗蓝绿色或暗绿色，具白色精致的斑纹，背面带红色至紫红色；叶柄长0.5～1.5cm，浅红色至红色，基部扩大成鞘状抱茎。总状花序顶生，有花2～8朵，花序轴短，被柔毛；花苞片披针形，长约2cm；花大，偏向一侧，白色、淡黄色或淡红色，萼片3，披针形，中萼片长约2.5cm，先端外弯，与花瓣靠合成兜，侧萼片略短；花瓣线状披针形，镰状，与中萼片等长；唇瓣白色带黄色，长约2.1cm，基部具囊，上部弯曲，长为囊之2倍，边缘膜质，波状，囊内有毛；合蕊柱内弯，蕊喙臂与花药十分细长；子房披柔毛，长1～1.5cm，胚珠多数。蒴果长梭形，长约1.5cm。

生于海拔2 000～2 400m的山地林下。分布于陕西、湖北、湖南、广东、四川、云南、西藏等省区；尼泊尔、印度也有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干或鲜用。

药材性状 本品根状茎较长，皱缩圆柱形，横生，直或稍弯曲，直径1.5～2mm，具细纵皱纹，表面棕褐色，松绒状。茎短，黑褐色，节明显。叶2～5枚互生，叶柄长5～15mm，棕色，基部扩大，鞘膜质，黄棕色，抱茎，全缘；叶片多破碎皱缩，完整者湿润后展开呈卵形或卵状椭圆形，长2～4cm，宽1～2cm，上面黑褐色，有黄褐色斑纹，下面红棕色。短总状花序顶生，花大，长2～2.5cm，偏向一侧，红棕色。气微，味苦。以根茎粗壮、叶片完整者为佳。

性味与功用 微苦，凉。归肝、肺经。滋服润肺，清热解毒，活血止痛，祛风。用于肺结核咯血，神经衰弱，食欲不振，风湿关节痛，跌打瘀肿疼痛，疮痈肿毒，毒蛇咬伤。常用量6～12g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图 62　大花斑叶兰

金 挖 耳

别名 挖耳子草、贡布芙多露米（藏语）、高山金挖耳。

来源 本品为菊科植物高原天名精 Carpesium lipskyi Winkl. 的干燥全草。

原植物 高原天名精（图63）为多年生草本，高35～70cm。根状茎横生，短而粗，颈部残存褐色叶柄。茎直立，上部分枝，常带紫色，具纵条纹，幼时密被长柔毛，后渐稀疏。基部叶和下部叶具长或短柄，柄具狭翅；叶片椭圆或匙状椭圆形，长4～15cm，宽1.5～7cm，先端钝圆或突尖，基部楔形，下延，全缘或具波状不明显的小齿，上部叶长圆状披针形，较小，无柄，全部叶叶面绿色，被基部膨大的伏柔毛，背面淡绿色，被长柔毛，沿脉更密，两面均被白色腺点。头状花序单生于茎、枝顶端或稀腋生，具长花序梗，开花时下垂。苞叶披针形，近相等；总苞宽钟形，直径1～1.5（～2）cm；总苞片4层，披针形，近等长，先端渐尖，外层草质，绿色，被长柔毛和白色腺点，中、内层干膜质，披短毛，先端具小齿，常反折。雌花细管状，先端5裂，管部被长柔毛；两性花位于中央，漏斗状，筒部被长柔毛。瘦果圆柱形，长3.5～4mm，具纵细肋，顶端喙具头状腺体和短柔毛。花期7～8月，果期8～10月。

生于海拔1 600～4 300m的山坡林缘、林下及灌丛中或沟边草丛中。分布于云南西北部、四川西部、西藏西南部、陕西、甘肃、青海等省区。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 本品长35～70cm；茎、枝圆柱形，具纵条纹，常带绿紫色，被长柔毛。质坚硬，易折断，断面白色，不整齐。叶皱缩，下部叶椭圆形或匙状椭圆形，长4～15cm，宽1.5～7cm，先端钝圆或突尖，基部楔形，下延，全缘或具波状不明显尖齿，上部叶长圆状披针形，较小，无柄，灰绿色，两面有毛及白色腺点。头状花序之总苞宽钟形，总苞片4层，披针形 绿色，披毛，顶端常反折。两性花位于头状花序中央，漏斗状。瘦果圆柱形，具细肋，顶端具喙和短柔毛。气微，味苦。以枝、叶多，色绿者为佳。

性味与功用 苦，微寒。清热解毒，祛痰，截疟。用于咽喉肿痛，胃痛，牙痛，疮肿，虫、蛇咬伤等。常用量9～15g。



图 63　高原天名精

空 桶 参

别名 空洞参、啦吧花、绢毛菊、绢毛苣、扫工色尔布（藏语）。

来源 本品为菊科植物糖芥绢毛菊 Soroseris hookeriana (C.B. Clarke) Stebb. ssp. erysimoides (Hand.-Mazz.) Stebb.（Crepis gilli S. Moore var. erysimoides Hand.-Mazz.）的干燥全草。

原植物 糖芥绢毛菊（图64）为多年生直立草本，高10～30cm；根圆锥形，不分枝。茎粗壮，淡紫色，直径1～2.5cm，中空，上部较下部粗大，具细纵棱，近无毛。单叶互生，叶片倒披针形、披针形或线形，长3～10cm，宽3～11mm，先端圆钝，基部渐狭成柄，全缘或具疏的波状齿，叶面绿色，背面淡绿色，几无毛。头状花序多而小，密集于茎顶成球状；总苞暗绿色，长9～12mm，总苞片2层，外层总苞片线形，与内层等长或稍长，内层总苞片披针形，基部连合，先端急尖或钝；花全部为舌状花，黄色，长12～15mm，顶端5齿裂，管部长5～6mm；聚药雄蕊5，花药与花柱紫黑色；子房下位，花柱2裂。瘦果长圆形或纺锤状，长4～6mm，稍扁，上部急狭，具多数纵肋；冠毛灰白色，长7～9mm。花期秋季。

生于海拔3 000～5 150m的高山草地或阴坡灌丛中。分布于云南西北部、四川、西藏、陕西、甘肃、青海和新疆等省区；印度、锡金、不丹亦有。

采收加工 秋季开花时采集，洗净，晒干备用。

药材性状 本品长10～30cm；基部具圆锥状根；茎直径1～2.5cm，淡紫色，无毛，具细纵棱；质脆，易折断，断面不整齐，中空。叶皱曲，破碎，平展后为倒披针形、披针形或线形，长3～10cm，宽3～11mm，先端圆钝，基部渐狭成柄，全缘或具疏齿，绿色，无毛。头状花序多数，密集于茎顶端成球状，总苞暗绿色，外层总苞片线形，内层披针形；花黄色，全部舌状。瘦果长圆形或纺锤形，长4～6mm，冠毛灰白色。气无，味苦。以个体肥厚、完整、色淡紫色者为佳。

性味与功用 苦、微辛，平。清热解毒，利湿，润肺止咳，调经止血，消炎，下乳。用于感冒发热咳嗽，咽喉肿痛，支气管炎，风湿疼痛，乳汁不下，乳腺炎，月经不调，红崩，衄血，痈肿疮疖等症。常用量6～12g。



图 64　糖芥绢毛菊

单花翠雀花

别名 奇林翠雀、德木萨（藏语）。

来源 本品为毛茛科植物单花翠雀花 Delphinium candelabrum Ostf. var. monanthum (Hand.-Mazz.) W. T. Wang (D. monanthum Hand-Mazz.) 的干燥全草。

原植物 单花翠雀花（图65）为多年生草本，高10～15cm；茎直立，少分枝，下部无毛，上部被短柔毛。基生叶数生，具长柄；叶片革质，肾状五角形，宽1～3cm，三全裂，中央裂片宽菱形，侧全裂片近扇形，一至二回细裂，小裂片狭卵形或披针形，彼此相邻接，疏被短柔毛；叶柄长2～3cm。花1（～2）朵生于茎顶或分枝顶部，花梗长3～5cm，上部密被黄色柔毛；小苞片生于花梗中部，三裂，裂片披针形；花大，萼片5，蓝紫色，卵形，长1.8～3cm，距长2～3cm，钻形，向下弧状弯曲；花瓣暗褐色，疏被短柔毛或无毛，顶端全缘；退化雄蕊2，常紫色，有时黑褐色，瓣片近圆形，二浅裂，腹面被黄色柔毛，爪与瓣片近等长，基部有短附属物；雄蕊多数，无毛；心皮3，子房被毛。花期7～9月。

生于海拔3 500～5 000m的高山倒石堆、流石滩、多石砾山坡。分布于西藏东北部、四川西北部、青海东南部及东部和甘肃西南部。

采收加工 夏、秋季采集，除去残茎及枯叶、泥土，晒干。

药材性状 本品长10～15cm，基部根类圆柱形，褐绿色；具须根痕；茎细，圆柱形，少分枝，褐绿色，上部被短柔毛；断面不整齐，类白色。叶皱曲，叶面绿色，背面灰绿色，两面疏被柔毛或无毛，展开之完整叶片圆五角形，3全裂，裂片二至三回细裂，细裂片狭卵形或披针形。茎、枝顶端具1或2花，萼片5，蓝紫色，宽椭圆形，距与萼片近等长，钻形；退化雄蕊2，黑褐色，瓣片2裂；雄蕊多数，心皮3。气微，味苦。以干燥，无杂质，色绿者为佳。

性味与功用 苦，温。有小毒。温肠胃止泻。用于胃肠冷痛，泄泻。常用量1～1.5g。煎服。



图 65　单花翠雀花

鱼 眼 草

别名 口疮叶、馒头草、伏苓草、胡椒草、帕滚姆（傣语）。

来源 本品为菊科植物鱼眼草 Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce (Ethulia auriculata Thunb.) 的干燥全草。

原植物 鱼眼草（图66）为1年生草本，高12～50cm；茎直立或铺散，不分枝或分枝，被白色长或短绒毛，接近花序处毛较密，或果时近无毛。单叶互生，叶片纸质，卵形、椭圆形或披针形，长3～12cm，宽2～4.5cm，大头羽裂，顶生裂片宽大，侧裂片1～2对，较小，先端钝，具尖头，基部渐狭下延成叶柄翅，中部以上叶同形，但渐小，常卵形，基部通常不裂，全部叶边缘具重粗锯齿或缺刻状，叶面绿色，背面灰绿色，两面疏被短柔毛，背面沿主脉更密；叶柄长1～3cm。球形头状花序排或顶生的伞房状花序或伞房状圆锥花序，花序梗长2～30cm。头状花序直径2～5mm；总苞片1～2层，膜质，长圆形或长圆状披针形，长约1mm，先端急尖；雌花多层位于外围，紫色，花冠线形，长约0.5mm，顶端通常2裂；中央为两性花，黄绿色，少数，长约0.5mm，管短而细，檐部长钟状，顶端具4～5齿。瘦果倒披针形，压扁，边缘脉状加厚；无冠毛或两性花瘦果顶端具1～2个细冠毛。花果期全年。

生于海拔200～2 000m的山坡林下、林缘、荒地、耕地边或水沟边。分布于云南、四川、贵州、广西、广东、湖南、湖北、陕西南部、浙江、福建和台湾等省区；广布于亚洲、非洲的热带和亚热带地区。

采收加工 夏秋采收，洗净，晒干。

药材性状 干燥全草长15～50cm，基部具多数黄褐色根；茎圆柱形，弯曲，被绒毛，具纵皱纹，绿褐色或绿紫色。质脆，易折断，断面不整齐，黄白色。叶片皱缩，破碎，头状花序多数，排或圆锥状花序，外层雌花紫色，中央两性花黄色。气微，味苦，辛。以身干、叶多、带花序者为佳。

性味与功用 苦、辛，平。活血调经，解毒消炎，利尿。用于月经不调，感冒高烧，咽喉炎，肝炎，腹泻，小儿外生殖器肿胀，扭挫伤，口疮，毒蛇咬伤，疔疮肿毒。常用量15～30g；外用捣敷患处。



图 66　鱼眼草

草三白

别名 弧茎堇菜、犁头草、箭头草。

来源 本品为堇菜科植物如意草 Viola hamiltoniana D. Don 的干燥全草。

原植物 如意草（图67）为多年生草本，高达35cm。茎常数条丛生，淡绿色；匍匐枝蔓生，长可达40cm，节上生不定根。基生叶具长柄，上部有狭翅，叶片三角状心形或卵状心形，长1.5～3cm，先端急尖，稀渐尖，基部通常宽心形，稀深心形，弯缺呈新月状，垂片大而开展，边缘具浅而内弯的疏锯齿；茎生叶及匍匐枝上的叶柄短；托叶披针形，全缘或具疏齿。花腋生，淡紫色或白色，花梗中部以上具2枚线形小苞片；萼片5，卵状披针形，长约4mm，附属物极短或半圆形；花瓣5，异形，侧方花瓣狭倒卵形，长约7.5mm，具暗紫色条纹，里面基部疏生短须毛，下方花瓣较短，亦具条纹，距长约2mm；雄蕊5，花丝短，下方雄蕊之距粗短，长度约与花药近相等，末端圆；子房无毛，花柱棍棒状，基部稍膝曲，柱头2裂，两侧裂片肥厚，直立，中央部分隆起呈鸡冠状，在前方裂片间的基部具短喙。蒴果长圆形。

生于海拔1 600～2 800m的溪谷湿地、沼泽地、灌丛中或林缘。分布于台湾、广东、四川、云南、湖南等省；印度、缅甸、越南、印度尼西亚也有。

采收加工 全年采收，晒干。

药材性状 本品多皱缩成团。根状茎褐色，圆柱状，粗约2mm，密生多数纤维状须根。茎丛生，黄绿色，节间长，匍匐枝下部节上具不定根。叶基生及茎生，具长柄，多皱缩，叶片展开后呈三角状心形，长1.5～3cm，宽2～5.5cm，基部垂片大而开展，边缘具疏齿。花腋生，淡紫色或黄白色，具长梗中部以上具2枚线形苞片。蒴果长圆形。气微，味稍苦。以叶色绿，具根者为佳。

性味与功用 苦，凉。归肝经。清热解毒，除湿，止血。用于疔疮肿毒，湿热带下，阴痒，咳血，衄血，便血，痔疮肿痛，外伤出血。常用量9～15g，水煎服。



图 67　如意草

草灵芝

别名 雪灵芝、长梗岩须、万年青、水麻黄、水灵芝。

来源 本品为杜鹃科植物岩须 Cassiope selaginoides Hook. f. et Thoms. 的干燥全草。

原植物 岩须（图68）为常绿半灌水，高5－25cm；根木质，须根纤细而多。枝条多而密，外倾上升或铺散，小枝长5－7cm，直径约2～2.4mm。单叶密集交互对生，叶片革质，披针形至披针状长圆形，长2－3mm，宽0.7－1mm，先端稍钝，幼时具1长达0.75mm的紫红色刺芒，基部钝，2浅裂，叉开，中下部全缘，中部以上具缘毛，后脱落，留下疏齿状残余或全缘，叶面略凹陷，被微毛，背面龙骨状突起，具1深纵槽，向上几达叶尖，往下叉开，无毛，具光泽，无柄。花单生叶腋，下垂；花梗长1.5～2.3cm，被长柔毛，顶端下弯，基部具苞片；花萼5裂，裂片卵状披针形或披针形，长2.5－3mm，紫红色，无毛；花冠钟状，乳白色，长7～10mm，5裂，无毛；雄蕊10，较花冠短，花丝背面有毛。蒴果球形。

生于海拔（2 600～）3 500～4 500m的高山灌丛中或垫状灌丛草地。分布于云南西北部和东北部、四川西部和西藏东南部；锡金也有。

采收加工 秋季采集，晒干。

药材性状 本品长5～25cm，根多数，纤细，黄褐色；茎枝多数，直径约2－2.5mm，密具交互对生的革质叶。叶片披针形至针状长圆形，长2～3mm，宽0.7～1mm，先端具稍短于叶片的刺芒，基部2浅裂，叉开，叶面稍凹陷，背面龙骨状，绿色，无叶柄。有时可见上部叶腋内生有具长梗的单花，下垂，花萼紫色，花冠乳白色。果球形。气清香，味辛，微苦。以质干、色绿者为佳。

性味与功用 辛、微苦，平。行气止痛，安神。用于肝胃气痛，食欲不振，神经衰弱。常用量25～50g。




图 68　岩须

革叶茴芹

来源 本品为伞形科植物革叶茴芹 Pimpinella coriacea (Franch.) de Boiss. (Carum coriaceum Franch.) 的干燥全草。

原植物 革叶茴芹(四川称山当归)(图69)为多年生草本，高30～70cm。根圆锥形，长达10cm，具少数分枝。茎圆柱形，中、上部具少数分枝，除基部被锈色柔毛外，余近无毛。基生叶及茎中下部叶片近革质，不分裂或3裂，心形或阔卵形，长7～13cm，宽5～10cm，先端钝，基部心形，边缘具浅波状粗锯齿，叶面无毛，背面沿脉被粗长毛；叶柄长5～14cm，疏被长毛；茎上部叶较小，三裂或不规则羽状分裂，裂片披针形。复伞形花序顶生或侧生，花序梗长5～7cm，疏被粗长毛；总苞片缺或1～2枚，线形；伞辐8～20，长2～3cm，被短硬毛；小总苞片4～6，线形，短于花梗；小伞形花序有花15～25朵；无萼齿；花瓣白色，阔倒卵形，先端微凹，具内折小舌片；花柱基圆锥形，花柱短于花柱基。果卵球形，被点状小柔毛，棱槽内油管1～3，合生面油管2～4；胚乳腹面平直。花果期5～10月。

生于海拔1 500～3 500m的山坡草丛、林下及溪边。分布于云南西北部及南部、四川和广西。

采收加工 夏、秋季采集，晒干备用。

药材性状 本品之根圆锥形，长约10cm，深黄褐色，具少数侧根及横的环纹。茎圆柱形，中、上部有分枝，绿褐色，易折断，中空。叶片近革质，皱皱或破碎，基生或茎下、中部中具长柄；叶片平展后为心形，长2～5cm，宽1～3cm，先端钝，基部心形，边缘具锯齿，叶面绿色，无毛，背面灰绿色，有毛，茎上部叶无柄，3裂或羽状分裂。复伞形花序具伞辐8～20，长2～3cm，小伞形花序有15～25花；无萼齿；花瓣白色，倒卵形，顶端微凹，具内折小舌片，花柱基圆锥形。气微，味辛，甘。以带根，叶多，色绿者为佳。

性味与功用 辛、甘，微温。祛风解表，理气止痛，活血解毒，温中健胃，调经。用于感冒头疼，胃寒腹痛，月经不调，风湿痹痛，跌打损伤，蛇、虫咬伤。常用量9～15g。



图 69　革叶茴芹
1．植株；2．花

茖　葱

别名　茖、山葱

来源　本品为石蒜科植物茖葱 Allium victorialis L. 的全草。

原植物　茖葱（图70）为多年生草本，高25－80cm。鳞茎单生或2－3枚聚生。叶2～3枚，倒披针状椭圆形至椭圆形，长8－20cm，宽3～9.5cm，先端渐尖或短尖，基部楔形，沿叶柄稍下延，全缘；叶柄长为叶片的 /5～1/2。花葶圆柱状，下部1/4－1/2被叶鞘；总苞2裂，宿存；伞形花序球状，具多而密集的花；小花梗近等长，比花被片长2～4倍，果期延长，无小苞片；花白色或带绿色，极稀带红色，内轮花被片3，椭圆状卵形，长4.5～6mm，先端钝圆，常具小齿；外轮花被片3，稍狭而短，舟状；雄蕊6，花丝比花被片长1/4－1倍，基部合生并与花被片贴生，内轮的狭长三角形，基部宽1－1.5mm，外轮的锥形，基部比内轮窄；子房具3圆棱，基部收狭成短柄。花果期6－8月。

生于海拔1 000－2 500m的阴湿山坡、林下、草地或沟边。分布于东北、河北、陕西、内蒙古、甘肃、四川、湖北、河南、浙江等省区；广泛分布于北温带。

采收加工　夏季采收，去净泥沙，晒干或鲜用。

药材性状　本品为带花序或果序的全草，全体长20－80cm，干时黄绿色。鳞茎单生或2～3枚聚生，近圆状，外皮灰褐色至黑褐色，破裂成纤维状，具明显的网络，基部生多数粗状须根。叶2～3枚，展开后倒披针状椭圆形至椭圆形。伞形花序顶生，具宿存2裂的总苞，花多而密，小花白色或微带绿色，花被片6，2轮；花丝基部合生。有葱蒜气，味辛。以粗壮、带花序者为佳。

性味与功用　辛，温。止血，散瘀，化痰，止痛。用于衄血，跌打损伤，瘀血肿痛，气管炎咳嗽，高血压，结膜炎，风疹，漆疮。常用量9～15g。临床亦有驱虫和发汗作用。

附注　表虚多汗者忌服。



图 70　茭白

挖 耳 草

别名 芸香草、烟袋草、倒提壶、金挖耳、野葵花。

来源 本品为菊科植物烟管头草 Carpesium cemuum Linn. 的干燥全草。

原植物 烟管头草（图71）为多年生草本，高50～100cm；体多而密，棕黄色。茎圆柱形，具纵条纹，多分枝，绿色，下部密被白色长柔毛和卷曲短柔毛，上部疏被柔毛。单叶互生，下部叶片长椭圆形或匙状长椭圆形，长6～12cm，宽4～6cm，先端锐尖或钝，基部渐狭，下延至叶柄，边缘具不规则的尖齿，叶面绿色，被倒斜伏柔毛，背面淡绿色，被白色长柔毛，沿脉更密，两面均具腺点，叶柄长达叶片长度的2/3或近对长，具狭翅，密被线毛状柔毛，中部叶椭圆形或狭椭圆形，上部叶椭圆状披针形，自下而上，逐渐减小，具短柄。头状花序顶生，开花时下垂；苞叶多枚，不等大，2～3枚较大者椭圆状披针形，长2～5cm，密披柔毛及腺点，较小者线状披针形或丝状匙形，稍长于总苞。总苞壳斗状，直径1～2cm；总苞片4层，外层苞片叶状，披针形，密被长柔毛，中层和内层苞片狭长圆形或线形，干膜质。雌花狭筒状，长约1.5mm，两端稍狭，雄花筒状，向上增宽，5齿裂，黄色。瘦果条形，长约5mm，具纵条纹，无冠毛。

生于海拔2 000～2 600m的山谷林缘、山坡、沟边及路旁荒地等处。分布于西南、华南、华中、华东、华北、东北和西北的陕西，甘肃等省区；欧洲至朝鲜和日本也有。

采收加工 夏季初花时挖取全草，除去老茎和根，切成段，晒干。

药材性状 本品长50～100cm，茎圆柱形，具纵条纹，绿色或棕褐色，被白色长柔毛及卷曲短柔毛；折断面粗糙，皮部富含纤维，髓部疏松，最外层表皮易脱落。叶破碎不全，两面被白色柔毛，完整者长椭圆形，匙状长椭圆形，或椭圆状披针形，先端锐尖，基部渐狭，边缘具不规则锐齿。头状花序生于枝顶端，开花时花梗向下弯，苞叶多枚；花全部筒状，黄色；瘦长条形，具纵条纹，无冠毛。有香气。味苦，辛。以叶多、无老茎、色绿、味苦者为佳。

性味与功用 苦、辛，寒。清热解毒，消炎止痛。用于咽喉肿痛，风火牙痛，痈肿疮毒，乳蛾，痄腮，疟疾等症。另有资料显示：根用于治痢疾、牙痛、子宫脱垂、脱肛等症。



图 71　烟管头草

1. 花枝；2. 植株

星果草

来源 本品为毛茛科植物星果草 Asteropyrum peltatum (Franch.) Drumm. et Hutch. (Isopyrum peltatum Franch.) 的干燥全草。

原植物 星果草（图72）为多年生草本，根状茎短。叶2～6片，均基生；叶片圆形或稍呈五角形，直径2－3cm，不分裂或不明显的5浅裂，边缘具波状浅锯齿。叶面绿色，疏被短伏毛，背面淡绿色，无毛；叶柄盾状着生，长2.5－6cm。花葶1－3，由叶丛中生出，高6－10cm，花后稍增长。疏被反曲的短柔毛；苞片卵形，长约3mm；花直径12～15mm；萼片5，白色，倒卵形，长6～7mm；花瓣5，黄色，倒卵形或近圆形，先端近圆形，基部具爪；雄蕊多数；心皮5－8。蓇葖果星状展开，直径达8mm。花期5－6月，果期6～7月。

生于海拔2 000～3 000m的山坡林下阴湿处。分布于云南、四川和湖北西部。

采收加工 夏季采集，晒干。

药材性状 本品卷曲呈团状，长约10cm；根状茎粗，其下生多数浅褐色须根。叶多皱曲或破碎，平展后叶片为圆形或稍呈五角形，直径2～3cm，不分裂或不明显的5浅裂，边缘具波状浅齿，绿色；叶柄盾状着生，长2.5－6cm。花葶1～3，长6－10cm，疏被短柔毛。花直径12－15mm，萼片5，白色；花瓣7，黄色，近圆形或倒卵形；雄蕊多数。蓇葖果星状展开，直径约8mm。气微，味苦，辛。以带根状茎、叶完整、色绿者为佳。

性味与功用 苦、辛、凉。活血镇痛。用于肠炎，痢疾，风湿骨痛，跌打损伤。常用量3～9g。



图72　星果草

虾 须 草

别名 沙小菊、绿绿草、草麻黄。

来源 本品为菊科植物虾须草 Sheareria nana S. Moore (S. polii Franch.) 的干燥全草。

原植物 虾须草（图73）为1年生草本，高15～50cm；茎直立，多分枝，绿色或偶带紫色，无毛或稍被细毛。单叶互生，叶片线形或倒披针形，长1～3cm，宽3～4mm，先端钝尖，全缘，绿色，主脉明显，在背面凸起；无叶柄；茎上部叶鳞片状，小。头状花序顶生或腋生，直径2～4mm，花序梗长3～5mm。总苞片2层，4～5片，阔卵形，长约2mm，稍被细毛，外层较小；花托平，无托片；花少数；雌花舌状，白色或有时淡红色，舌片卵状长圆形，长约1.5mm，宽约1mm，全缘或顶端具5钝齿；两性花筒状，上部钟状，长1.5～2mm，顶端5齿裂；花药长椭圆形，顶端具近三角形附片。瘦果长椭圆形，长3.5～4mm，褐色，具3条翅棱，翅缘具细齿，无冠毛。花期8～9月。

生于低海拔山坡、田边或河边草地。分布于云南、贵州、广东、湖南、湖北、江西、安徽、浙江和江苏。

采收加工 夏、秋季采集，洗净，晒干备用。

药材性状 本品长15～40cm，茎圆柱形，下部直径2～3mm，多分枝，绿色或有时带紫色，无毛或稍被细毛。质轻脆，易折断，断面不整齐。叶互生，稀疏，线形或倒披针形，长1～3cm，宽3～4mm，先端尖，基部狭，全缘，无柄，灰绿色。茎、枝顶部生头状花序；少花；总苞片2层，外层苞片阔卵形，内层苞片稍大；雌花舌状、白色，两性花筒状、长1.5～2mm。瘦果长椭圆形，褐色、具3条翅棱。气微、味苦。以枝叶多，完整，色绿者为佳。

性味与功用 苦，平。疏风，清热解毒，利水消肿。用于风热头痛，水肿，无名肿毒等症。常用量15g，水煎服，外用适量，捣烂或研粉调敷患处。



图 73　虾须草

1．植株；2．花

看 麦 娘

来源 本品为禾本科植物看麦娘 Alopecurus aequalis Sobol.（A. amurensis (Kom.) kom.: A. aequalis Sobol. var. amurensis (Kom.) Ohwi）的干燥全草。

原植物 看麦娘（图74）为1年生草本，高15～40cm；茎少数丛生，细瘦，光滑，节处常膝曲。叶鞘光滑，短于节间；叶舌膜质，长2～5mm；叶片披针形，长3～10cm，宽2～6mm，扁平，先端渐尖。圆锥花序狭圆柱状，长2～7cm，直径3～6mm，灰绿色；小穗椭圆形或卵状长圆形，长2－3mm，含1花，颖膜质，基部互相连合，具3脉，脊上被细纤毛，侧脉下部被短毛；外稃膜质，先端钝，等大或稍长于颖，下部边缘互相连合，芒长1.5－3.5mm，约于稃体下部1/4处伸出，隐藏或稍外露；花药橙黄色，长0.5－0.8mm。颖果长约1mm。花果期4～8月。

生于海拔1 250－3 600m的沟谷潮湿沼泽草地、亚高山草甸、林下、田边及路旁。分布于云南、四川、贵州、西藏及华南、华中、华东和北方各省区；亚洲、欧洲及美洲亦有。

采收加工 夏、秋季采集，晒干备用。

药材性状 本品呈团状，禾秆色。茎圆柱形，中空，基部和下部节上生须根。叶片披针形，长3～10cm，宽2～6mm，先端渐尖，基部之叶鞘光滑，叶舌膜质。圆锥花序狭圆柱状，长2－7cm，淡绿色；小穗椭圆形或卵状长圆形，长2－3mm，含1花。颖相等，基部合生，具3脉，脊上被纤毛；外稃等长或稍长于颖，下部边缘相互合生，芒细弱。颖果长约1mm。气无，味淡。以干燥，无杂质，枝、叶多，禾秆色者为佳。

性味与功用 淡，凉。利水消肿，解毒。用于水肿，小儿腹泻，消化不良，水痘和蛇咬伤。常用量9～15g；外用适量。



图 74　看麦娘

1. 植株；2. 小穗

美头火绒草

别名 扎托、扎托巴（藏语）。

来源 本品为菊科植物美头火绒草 Leontopodium calocephalum（Franch.）Beauv.（Gnaphalium leontopodium L. r. calocephalum Franch.）的干燥全草。

原植物 美头火绒草（图75）为多年生草本，高10~50cm；根状茎横走，稍细，颈部增粗，不育茎被密集的叶鞘，具顶生叶丛，与1至数个花茎簇生。茎由膝曲的基部直立，不分枝，被蛛丝状毛或上部被白色棉状茸毛。单叶互生，节间长2~4cm或上部可达10cm，叶片草质，基部叶花期枯萎，下部叶与不育茎上叶披针形或线状披针形，长2~15（~20）cm，宽2~12mm，先端渐尖，具尖头，基部渐狭成叶柄，并在基部成褐色的鞘，中、上部叶卵状披针形，渐短，基部楔形或圆形，抱茎，全部叶叶面无毛或被蛛丝状毛或灰色绢状毛，背面被白色或银灰色茸毛；无柄。苞叶多数，长三角形，与茎上部叶等长成较长，先端渐尖，基部宽大，鞘状，叶面被白色或干后黄色或黄褐色茸毛，背面被白色或银灰色茸毛，先端近无毛，绿色，开展成密集或有时分散的直径4~12cm的苞叶群。头状花序直径5~12mm，5~20（~25）个密集于茎顶端；总苞长4~6mm，披白色柔毛；总苞片4层，顶端无毛，深褐色或黑色；花有1或少数雌花和雄花，或雌雄异株；雄花花冠狭漏斗形管状，长3~4mm，裂片卵形，冠毛白色，全部增粗，上部稍棒状，有钝齿；雌花冠毛白色较细，下部具细齿。瘦果被短粗毛。花期7~9月，果期9~10月。

生于海拔2 800~4 500m的高山或亚高山草甸、石砾坡地、沼泽地、湖河岸边湿地、山坡灌丛中、冷杉或其他针叶林下。分布于云南西部和西北部，四川北部至西南部、甘肃西部至南部及青海东部。

采收加工 夏、秋季采集，除去泥土，晒干。

药材性状 本品呈卷曲团状，长10~50cm，灰绿色。叶皱曲，平展后呈披针形、长披针形或线状披针形，长2~15cm，宽2~12mm，先端渐尖，边缘稍反折，叶面无毛，或被蛛丝状毛或灰色绢状毛，背面被白色，薄或厚密的茸毛。头状花序5~20（~25）个，多少密集，直径5~12mm，总苞被白色柔毛。小花异形，有1或少数雄花和雌花。气微。以体干、叶多、色灰绿者为佳。

性味与功用 辛，苦，凉。清热，凉血，利尿，祛风湿。用于流感。常用量15~30g。



图 75　美头火绒草

扁　蓄

别名　狭萼扁蓄。

来源　本品为龙胆科植物扁蓄 Gentianopsis barbata (Froel.) Ma (Gentiana barbata Froel.; G. detonsa auct. non Rottb.) 的干燥全草。

原植物　扁蓄（图76）为1年生或2年生草本，高8～40cm。茎直立，近圆柱形，上部分枝，具明显的纵棱条，有时带紫色。单叶对生，基生叶多对，早落，叶片匙形或线状倒披针形，长0.7～4cm，宽4～10mm，先端圆形，基部渐狭成柄，边缘具乳突，叶柄长约6mm；茎生叶狭披针形至线形，长1.5～8cm，宽3～9mm，先端渐尖，基部钝，边缘具乳突；无柄。单花顶生，花梗长约15cm；花萼筒状，筒长10～18mm，裂片2对，不等长，异形，边缘白色，膜质，外对线状披针形，长7.5～20mm，先端尾状渐尖，内对卵状披针形，长6～12mm，先端渐尖；花冠筒状漏斗形，筒部黄白色，檐部蓝色或淡蓝色，长2.5～5cm，檐部4裂，裂片椭圆形，长6～12mm，宽6～8mm，先端圆形，下部两侧具短的细条裂齿；腺体近球，下垂；雄蕊4，花丝线形，花药狭长圆形，黄色；子房具柄，狭椭圆形。蒴果具短柄；种子长圆形，褐色，密具指状突起。花果期7～9月。

生于海拔700～4 400m的山地林下、灌丛中、山坡草地、沙丘边缘及溪边。分布于西南、西北、华北、东北等地区及湖北西部。

采收加工　夏、秋季采集，去净泥土，枯叶，凉干。

药材性状　本品长10～40cm，根圆锥形，多纤细分枝，表面淡黄色或黄褐色，质脆，易折断，断面类白色。茎单一或上部分枝，近圆柱形，具纵细棱，表面淡绿色，质脆，断面不整齐，中空。茎生叶对生，皱缩，易脱落，完整者平展后线形或狭披针形，淡绿色。花顶生，大，皱缩，萼绿色，裂片4，不对长；花冠筒漏斗状，黄白色，檐部4裂，蓝色，气微，味苦。以带根、枝叶多、色绿者为佳。

性味与功用　苦，寒。清热利胆，除湿热。用于黄疸型肝炎，结膜炎，肾盂肾炎，胆囊炎。常用量6～9g。



图 76　扁蓄

炸 腰 果

别名 炸腰花、暴牙朗、毡帽泡花、老虎杆、假豆捻、开口枣、猪姑稔、鸡头肉、山石榴、王不留行、埋打海竜(傣语)、阿来规也(拉祜族语)、大金香炉。

来源 本品为野牡丹植物科展毛野牡丹 Melastoma normale D.Don的干燥全株。

原植物 展毛野牡丹(图77)为灌木，高0.5～1(～3)m；茎近圆形或钝四棱形，多分枝，密被平展的褐紫色长粗毛和短柔毛。单叶对生，叶片坚纸质，卵形、椭圆形或椭圆状披针形，长4～12cm，宽1.5～4(～5)cm，先端渐尖，基部圆形或近心形，全缘，叶面绿色，密被糙伏毛，背面较淡，密被糙伏毛及短柔毛，基出脉5条。伞房花序顶生，有花3～7(～10)朵，基部具2枚叶状总苞；苞片长2～5mm，披针形或钻形，密被糙伏毛；花梗长2～5mm，密被糙伏毛；花萼筒长6～8mm，密被伏贴、具齿的鳞片状毛，5裂，裂片披针形；花瓣5，倒卵形，长约2.7cm，紫红色，先端圆形，具缘毛；雄蕊10，不等大，二型，5枚较大者紫色，具延长2裂的药隔，较小的5枚黄色，基部具2小瘤；子房半下位，密被糙伏毛，顶端具一圈密刚毛。蒴果坛状球形，直径8～10mm，密被伏贴的鳞片状糙伏毛。花期春至夏初，果期秋季。

生于海拔150～2 800m的山坡灌丛中或疏林下，为酸性土常见植物。分布于四川、西藏、广西、广东、海南、福建、台湾等省；印度、尼泊尔、马来西亚、菲律宾亦有。

采收加工 夏、秋季采收，晒干。

药材性状 本品之干燥茎、枝近圆形或钝四棱形，粗细大等，表面黄褐色。密被平展的褐紫色粗毛和短柔毛。质坚脆，断面不整齐，黄白色。叶皱缩或破碎，完整叶片平展后为卵形、椭圆形、椭圆形状披针形，长4～12cm，宽1.5～4cm，先端渐尖，基部圆形或近心形，叶细脉横而平行。叶柄密被糙伏毛，长5～15mm。气微，味甘，酸。以干燥、枝叶多、完整，色绿者为佳。

性味与功用 甘、酸、涩、平。收敛止血，消炎止痛，祛瘀消肿，消食利尿，止泻止痢。用于消化不良，腹痛腹泻，痢疾肠炎，肝炎，衄血，便血，外伤出血，白带过多等症。也用于慢性支气管炎，风湿性关节炎，乳腺炎，跌打损伤等。常用量50～100g。

附注 展毛野牡丹之根入药，与地上部分同效。



图 77　展毛野牡丹

夏至草

别名 夏枯草、白花益母、小益母草、灯笼棵。

来源 本品为唇形科植物白花夏枯 Lagopsis supina (Steph.) Ik.-Gal. ex Knorr. (Leonurus supinus Steph. ex Willd.; Marrubium incisum Benth.) 的干燥全草。

原植物 白花夏枯（图78）为多年生草本，高15～35cm；主根圆锥形，粗壮；茎枝披散或上升，四棱形，具纵槽，密被微柔毛。单叶对生，叶片轮廓圆形，直径1.5～2cm，先端圆形，基部心形，3深裂，裂片具圆齿或长圆状牙齿，也有轮廓卵形，3浅裂或深裂、裂片全缘或具疏圆齿，叶面绿色，疏被微柔毛，背面淡绿色，具腺点，沿脉被长柔毛；叶柄基生者长2～3cm，上部者长1cm。轮伞花序具6～10花，直径1～1.5cm；小苞片长约4mm，刺状，密被柔毛；花萼管钟状，长约4mm，密被微柔毛，内面无毛，5齿裂，裂片三角形，先端具刺尖；花冠白色、稀粉红色，长约7mm，外面被微柔毛，冠管长5mm，上唇长圆形，直立，下唇3裂，中裂片阔椭圆形，略短于侧裂片，小坚果长卵形，褐色，长约1.5mm。花期3～4月，果期5～6月。

生于海拔1 400～2 700m的田边、路旁、房前屋后或灌丛中，为常见杂草。分布于我国东北、华北、西北、华东、华中和西南各地；俄罗斯西伯利亚和朝鲜亦有。

采收加工 夏至前采收，除去泥土、杂物，晒干备用或鲜用。

药材性状 本品全长约15～35cm或更长；主根粗壮，圆锥形，表面黄褐色，断面类白色。茎枝四棱形，密被微柔毛。叶片皱褶，完整者轮廓圆形，直径1.5～2cm，掌状3深裂，裂片再2深裂或具钝裂齿，两面均被微柔毛，灰绿色，叶脉在背面突起；叶柄基生者长2～3cm，上部的长约1cm。轮伞花序腋生，具6～10花，无梗或具短梗；花萼钟状，被毛，5齿裂，上唇3齿较下齿长；花冠钟状，白色，2唇形，上唇较下唇长；雄蕊4，2强。小坚果长圆状三棱形，褐色。气微，味微苦。以干燥、带根、叶绿者为佳。

性味与功用 微苦，平，有小毒。养血调经。用于贫血性头晕，半身不遂，月经不调。常用量9～12g。



图 78　白花夏枯

1. 植株下部；2. 花枝；3. 花；4. 花萼展开；5. 花冠展开；6. 雌蕊；7. 小坚果

破 布 草

别名 麻布草、野甘露、铁骡子、白根药。

来源 本品为唇形科植物西南水苏 Stachys kouyangensis (Vaniot) Dunn (Lamium kouyangense Vaniot) 的干燥全草。

原植物 西南水苏（图79）为多年生草本，高50cm；茎纤细，四棱形，单一或多分枝，棱及节上被刚毛。单叶对生，茎生叶片三角状心形，长约3cm，宽约2.5cm，先端钝，基部心形，边缘具圆齿，两面均被或密或疏的刚毛。叶柄长约1.5cm，扁平，被刚毛。苞叶由下向上逐渐变小，下部者与茎叶同形，上部者卵状三角形，几无柄，具疏圆齿，长不及萼筒。轮伞花序5～6花，远离，于枝顶部组成不密集的穗状花序；苞片线状披针形，微小，早落；花梗长不及1mm，被微柔毛。花萼倒圆锥形，长约6mm，被小刚毛，萼齿5，正三角形，先端具刺尖头；花冠淡红色或紫红色，长约15mm，冠筒长约11mm，近等粗，冠檐二唇形，上唇直伸，长圆状卵形，长4mm，宽3mm，外面被微柔毛，内面无毛，下唇平展，近圆形，长约6mm，外面被柔毛，3裂，中裂片圆形，直径约3.5mm，侧裂片卵形，直径约1.5mm；雄蕊4，前对较长，花丝被微柔毛；花柱丝状，略短于雄蕊，子房无毛；花盘杯状，具圆齿。小坚果卵形，直径1.5mm，棕色，无毛。花期7～8月，果期9～11月。

生于海拔900～2 100（～2 800）m的山坡草地、旷地及潮湿沟边。分布于云南、贵州、四川及湖北。

采收加工 夏、秋季采集，晒干备用。

药材性状 本品为皱曲团状，灰绿色，长约50cm；茎枝纤细，四棱形，棱及节上被刚毛。茎、枝上具对生叶，叶片皱褶，破碎，完整者展开后呈三角状心形，长3cm，宽约2.5cm，先端钝，基部心形，边缘具疏圆齿，两面被刚毛。茎枝顶部具由轮伞花序组成的疏松穗状花序，每轮伞花序具5～6花，花萼倒圆锥形，具5齿，齿端具刺尖头；花冠淡红色或紫红色，长15m，二唇形，上唇长圆状卵形，直伸，下唇平展轮廓近圆形，三裂。雄蕊4，前对较长，花丝丝状，被微柔毛。小坚果卵形，棕色。气微，味微苦。以体干、枝、叶多而带花序、色黄绿者为佳。

性味与功用 微苦、咸，寒。消炎解毒，排脓。用于骨髓炎，疮疖，赤白痢，湿疹等症。常用量3－9g；外用鲜品捣烂或干品研粉调敷患处。




图 79　西南水苏

铁 马 鞭

别名 野花草、金铁藤、野生花、三花藤、鱼钱藤。

来源 本品为蝶形花科植物铁马鞭 Lespedeza pilosa(Thunb.)Sieb. et Zucc.(Hedysarum pilosum Thunb.;Desmodium pilosum (Thunb.)DC.)的干燥全草。

原植物 铁马鞭（图80）为半灌木，高60～80cm，全株密被棕黄色长粗毛。枝细长，常匍匐于地面。三出复叶互生，叶柄长0.5～2cm；顶生小叶广卵形或倒卵形，长1～2cm，宽8～12mm，先端截形，常内凹并具棘尖，基部近圆形，全缘，两面均被白色粗毛，侧生小叶较小。总状花序腋生，总花梗及花梗极短；小苞片披针形；花萼5深裂，裂片披针形，被黄白色粗毛；花冠黄白色，旗瓣基部具紫色斑点，倒卵形，翼瓣先端弯，龙骨瓣较小，均具爪；无瓣花簇生于叶腋。雄蕊10枚，2束；子房具胚珠1颗。荚果长圆状卵形，顶端具喙，密被白色长粗毛。花期6～9月，果期9～11月。

生于山坡林下或荒山草坡上。分布于四川、广东、湖南、湖北、江西、安徽、福建、浙江、江苏和甘肃。朝鲜、日本亦有。

采收加工 夏秋季采集，晒干备用。

药材性状 本品长60～80cm，茎、枝纤细，表面黄褐色，密被棕黄色长粗毛。质坚脆，断面不整齐，类白色。三出复叶，小叶片皱褶，广卵形或倒卵形，长1～2cm，宽8～12mm，先端截形，内凹并具棘尖，基部圆形，全缘，两面均被白色粗毛。茎、枝叶腋内具总状花序，总花梗及花梗极短；花萼5深裂，花冠黄白色，旗瓣倒卵形，基部具紫色斑；荚果长圆状卵形，密被白色粗毛，顶端具喙。气微，味苦，辛。

性味与功用 苦、辛，平。清热散结，活血消肿。用于颈淋巴结结核，体虚久热不退，癥症腹部胀痛，水肿，腰腿筋骨痛，痈疖，外治乳腺炎。常用量15～18g；外用适量，酒浸后捣烂敷患处。




图 80　铁马鞭

1. 根；2. 花枝；3. 花；4. 旗瓣；5. 翼瓣；6. 龙骨瓣

铁角凤尾草

别名 石灵芝、瓜子连、猪宗七。

来源 本品为蕨类铁角蕨科植物铁角蕨 *Asplenium trichomanes* L.的干燥带根全草。

原植物 铁角蕨（图81）为多年生草本，高10～35cm。根状茎粗短，直立，密被黑褐色线状披针形鳞片。叶簇生，叶柄长3～10cm，与叶轴均为深棕色，有光泽，沿上面纵沟两侧有全缘的膜质狭翅；叶片线状披针形，长10～25cm，一回羽状，两端稍渐狭；羽片疏生，25～35对，对生或互生，平伸，纸质，卵形或长圆状椭圆形，长3.5～6（～9）mm，顶端钝，前缘有细齿，基部宽楔形，不对称，边缘有钝齿，侧脉2叉或单一；有极短的小柄。孢子囊群短线形，每羽片有6～8枚，生于侧脉分枝上侧小脉上，与中脉略成斜交；囊群盖短线形，灰白色，全缘。

生于海拔400～3 400m间林下、山谷、石岩上。分布于长江以南各省区，北到河南、山西、陕西、新疆等省区。全世界暖温带其他地区也有。

采收加工 全年均可采收或鲜用。

药材性状 根茎粗短，顶部具鳞片，鳞片披针形或线状披针形，黑褐色，筛孔粗，全缘，下部具多数短线状须根。叶成簇生状，连柄长10～30cm，一回羽状复叶，长8～25cm，宽0.8～1.5cm，线状披针形，两端稍渐狭；叶柄连同叶轴有光泽，褐色或黑褐色，有1条纵沟，纵沟两侧有全缘的膜质狭翅；羽片25对左右，黄绿色，疏生，斜卵形或扇状椭圆形，厚纸质，圆头，边具圆齿，有极短小柄。孢子囊群线形，生于侧生小脉上侧分枝上，灰白色或带褐绿色。气无，味淡。以叶色绿、带根及根茎者为佳。

性味与功用 淡、微苦，凉。清热解毒，祛瘀止血，收敛固涩，调经。用于小儿高热惊风，阴虚盗汗，中暑，食积腹泻，痢疾，月经不调，白带，遗精，胃溃疡，各种出血，扭挫伤，刀伤，烧烫伤，疮疡肿毒，跌打损伤，腰痛。常用量30～60g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图 81　铁角蕨

臭灵丹

别名 狮子草、大黑药、归经草、臭叶子、山柱丹。

来源 本品为菊科植物翼齿六棱菊 Laggera pterodonda (DC.)Benth.(Blumea pterodonda DC.)的干燥全草。

原植物 翼齿六棱菊（图82）为多年生草本，高50～100cm，全株具强烈臭味。主根长柱形，具少数分枝，暗黄褐色，侧根多而细长。茎直立，粗壮，基部木质，直径5mm，具纵沟纹，上部分枝，茎枝均疏被短柔毛和杂有淡黄色腺毛，稀无毛，具宽达2mm的绿色翅，翅具不规则的粗齿或细齿。单叶互生，无柄，叶片倒卵形或倒卵状椭圆形，稀椭圆形，长7～13cm，宽2～5cm，先端钝或短尖，基部渐狭而下延成茎翅，边缘具不规则的粗齿和细齿，叶面深绿色，被面淡绿色，两面疏被柔毛和杂以腺毛，侧脉7～10对，网脉略明显。头状花序多数，排成顶生圆锥花序，总花梗长约2cm，无翅，密被腺状短柔毛；总苞近钟状，长约8mm；总苞片7层，外层绿色，长圆形或长圆状披针形，长4～5mm，背面被腺状短柔毛，内层干膜质，上部有时紫红色，线形，长6～8mm，渐尖，背面中部被腺状短柔毛，或无毛，最内层丝状。花紫红色，全部为管状花，边花为雌性花，多数，花冠丝状，长约7mm，花冠筒状，檐5裂，裂片卵形，先端渐尖，背面具乳头状突起。果纺锤形，长约1cm，具10纵棱，被白色长柔毛，冠毛白色。花期4～10月。

生于海拔200～2 400m的山地疏林中或空旷草地、田边和路旁。分布于云南、四川、贵州、广西和湖北西部。也见于印度、中南半岛及非洲热带地区。

采收加工 夏、秋季采收地上部分，晒干备用。

药材性状 本品长50～100cm，全株密被或疏被淡黄色腺毛及柔毛；茎粗壮，圆柱形，直径约5mm，绿色，具4～6列纵翅，翅宽达2mm，具不规则的粗齿和细齿，绿色，质脆，断面不整齐，类白色。叶绿色，常皱缩或破碎，完整者倒卵形或倒卵状椭圆形，长7～13cm，宽2～5cm，先端钝或短尖，基部下延至茎，呈茎翅，边缘具不整齐的粗齿和细齿，两面被柔毛。有时可见紫红色花。气特异，味苦。以叶多、色绿，气浓者为佳。

性味与功用 苦、辛，寒 清热解毒，活血消肿，消炎。用于感冒，咳嗽哮喘，支气管炎，咽喉炎，腮腺炎，淋巴结炎，扁桃体炎，疮疖肿毒，疟疾，跌打损伤。常用量9～15g。



图 82　翼茎六棱菊

狼 尾 草

别名 狼茅、小芦草、淡草、老鼠根、黑狗尾草。

来源 本品为禾本科植物狼尾草Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.(Panicum alopecuroides L.)的干燥全草。

原植物 狼尾草（图83）为多年生草本，高30～100cm；茎直立，花序以下密被柔毛。叶片线形，长15～50cm，宽3～7mm，先端渐尖，全缘；叶鞘无毛或具缘毛。穗状圆锥花序顶生，圆柱形，长5～20cm，直径1～2cm，主轴及分枝均密被柔毛，分枝长2～3mm；刚毛状小枝长1～1.5cm，紫色；小穗长6～8mm，通常单生于由多数刚毛状小枝组成的总苞内，并在成熟时与其一起脱落；第1颖微小，第2颖长为小穗的1/2～2/3；第一外稃与小穗等长，边缘常包卷第二外稃，第二外稃软骨质，边缘薄，卷抱内稃。颖果长圆形，压扁，长约3.5mm。花果期夏秋季。

生于海拔1 400～2 700m的田边、路旁和山坡上。分布于全国南北各地。日本、朝鲜、印度、巴基斯坦、缅甸、越南、菲律宾、马来西亚、大洋洲和非洲也有。

采收加工 夏、秋季采集，除去杂质，晒干。

药材性状 本品长30～100cm，灰绿色。茎杆常被柔毛。叶席卷状，完整者平展后为线形，长15～50cm，宽3～7mm，先端渐尖，叶鞘无毛或具缘毛。穗状圆锥花序圆柱状，长5～30cm，主轴与分枝密被柔毛；刚毛状小枝紫色，多数组成总苞，小穗单生，线状披针形，长5～8mm。颖果长圆形，压扁，长3.5mm。气微，味甘。以体干，叶多，色绿者为佳。

性味与功用 甘，平。明目散血，清肺止咳，解毒疗疮。用于目赤肿痛、肺热咳嗽，疮毒等症。常用量10～30g。



图 83　狼尾草

1. 植株;2. 小麦

鸭脚黄连

别名 水黄连、鸡脚连、水八角。

来源 本品为毛茛科植物裂叶星果草 Asteropyrum cavaleriei(Lévl et vant.)Drumm.et Hutch.(Isopyrum cavaleriei Lévl. et vant.)的干燥带根全草。

原植物 裂叶星果草（图84）为多年生草本，高15～23cm；根状茎短，密生黄褐色细根。叶基生，6～8片，叶片稍肉质，五角形，宽4～14cm，5裂，基部近截形，且常在中央具浅圆弯缺，裂片三角形，先端急尖，边缘具不规则的浅波状圆齿，叶面绿色，无毛；叶脉掌状，明显；叶柄盾状着生，常6～15cm，基部具膜质鞘。花葶2～4，高11～23cm；苞片着生于花葶上部，距花5～8mm处，近互生或轮生，卵形至宽卵形，长约3mm；花直径1.3～1.6cm；萼片5，白色，椭圆形或倒卵形，长7～8mm，宽3～5mm，先端圆形；花瓣5，黄色，近圆形，长约为萼片的1/2，基部具爪；雄蕊多数，较花瓣稍长，花药黄色；心皮5～8枚，蓇葖果星芒状展开，长达8mm。种子椭圆体形，长约1.5mm，直径约1mm，棕黄色。花期5～6月，果期6～7月。

生于海拔1 040～2 400m的沟谷密林下的沟旁水边。分布于云南东南部、四川西南部、贵州、湖南西部、湖北西南部和广西北部。

采收加工 全年可采，洗净晒干。

药材性状 本品呈皱缩团状，长20～30cm。根密集呈簇，棕褐色，长8～10cm，粗0.5～1mm，弯曲，具须根，易断，断面淡黄褐色。叶密集丛生，具长柄，暗褐色，长6～15cm，具皱缩。叶片盾状着生于叶柄顶端，皱卷，破碎，完整叶平展后为五角形，直径4～8cm，褐色，裂片三角形，基部近截形。花葶2～4，从叶丛中生出，长10～23cm，顶端具花，偶见萼片5枚；花瓣5枚，近圆形，黄色；雄蕊多数。蓇葖果星状展开。气微，味苦。以带根全草、色绿褐者为佳。

性味与功用 苦、寒。清热解毒，除湿利水，用于热病，腹痛，急性肠炎、细菌性痢疾，黄疸，水肿，腹水，急性结膜炎，疮疡溃烂，外伤出血。常用量3～9g；外用适量，水煎外洗或研粉撒敷患处。



图 84　裂叶星果草

宽叶韭

别名 大叶韭、大叶韭菜、大野韭菜、丽江野葱。

来源 本品为石蒜科植物宽叶韭（Allium hookeri Thwaites）的干燥全草。


原植物 宽叶韭（图85）为多年生草本，高20～60cm；根肉质，粗壮；鳞茎圆柱形，直径4～7mm，高4～8cm，外皮膜质，不破裂。叶线状披针形，长30～60cm，宽5～10（～28）mm，扁平，先端渐尖，下部扩大成膜质鞘，全缘，绿色，中脉明显，在背面隆起。花葶略呈三棱形，绿色；总苞膜质，2裂，早落；伞形花序近球形，花多而密集；花梗纤细近等长，长8～20mm；花白色，星芒状展开，花被片6，披针形至线形，长4.5～7.5mm，宽1～1.2mm，先端渐尖或不等2裂；花丝单一与花披片等长或稍短，在基部合生并与花被片贴生；子房倒卵状球形，基部收狭，外壁光滑，每室具1胚珠。花果期8～9月。

生于海拔1 500～4 000m的山坡林下、溪边或草甸。分布于云南、四川、西藏南部和东南部等省区；斯里兰卡、不丹和印度亦有。

采收加工 夏、秋季采集，洗净，晒干。

药材性状 干燥全草长20～60cm；鳞茎圆柱形，长4～8cm，直径4～7mm，外面具不破裂的膜质外皮。叶披针形至线形，扁平，长30～60cm，宽5～10（～28）mm，灰绿色；叶丛中具近三棱形花葶，其顶端具近球状花序，具多而密的白色花。花披片6，披针形，花丝基部合生并与花被片贴生。具葱嗅气，味辛。

性味与功用 辛，温。理气宽中，通阳散结，消肿止痛。用于（主治）胸闷气痛，咳嗽多痰，阴寒腹痛，肢冷，跌打损伤，疖肿。常用量9～15g，水煎服；外用适量，捣烂敷患处。



85　宽叶韭

1. 植株; 2. 花

粉苞苣

别名 朵亦威包（藏语）

来源 本品为菊科植物细叶苦荬 Ixeris gracilis (DC.) Stebb. (Lactuca gracilis DC.) 的干燥全草。

原植物 细叶苦荬（图86）为多年生草本，高30～45cm，具白色乳汁，无毛。根纤细，具纤维状须根。茎直立，上部多分枝。基生叶莲座状，叶片线状披针形，长7～14cm，宽6～9mm，先端渐尖，基部楔形下延，全缘，有时近基部具缘毛，具羽状脉；叶柄长3～5cm；茎中部叶线状披针形至线形，较小，长5～10cm，宽3～7mm，无柄。头状花序多数，排成疏伞房状圆锥花序，总花序梗纤细，长5～10mm；总苞圆筒状，长5～7mm，直径1～1.5mm；外层总苞片3，卵形，长约1mm，内层总苞片5(～7)，线形，长5～7mm，先端渐尖，具狭膜质边缘。舌状花黄色，舌片长约2.5mm，宽约1mm，顶端5齿裂，筒部与舌片等长；雄蕊5，花丝长约1mm，花药墨绿色，与花丝等长；瘦果纺锤形，长约3mm，扁平，棕褐色，具纵棱，喙长约1mm；冠毛刚毛状，长约3mm，淡黄褐色。花期6～9月，果期7～10月。

生于海拔(650～)1 500～3 000m的路边、草坡和荒野。分布于云南、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃及华南、华中地区；印度、尼泊尔亦有。

采收加工 夏季采集全草，洗净，晒干备用。

药材性状 本品皱缩成团，长30～45cm；根多数，纤细，黄褐色。茎枝光滑无毛，叶常皱褶，基生叶常呈莲座状，茎生叶互生，叶片皱缩或破损，完整者平展后为线状披针形或线形，长5～14cm，宽(3～)6～9mm，先端渐尖，基部渐狭，全缘，有时近基部具缘毛，灰绿色；基生叶具叶柄，茎生叶无柄。茎、枝顶部为由头状花序排成的疏伞房状圆锥花序；总花序梗纤细，长5～10mm，总苞圆筒状，长5～7mm；舌状花黄色，舌片长约2.5mm，先端5齿裂。瘦果纺锤形，棕褐色；冠毛刚毛状，淡黄褐色，长约3mm。气微，味苦。以带根、枝叶多、色绿者为佳。

性味与功用 苦，寒。清热解毒，止痛。用于结膜炎，黄疸型肝炎，疖肿。常用量6～12g。



图 86　细叶苦荬

1. 植株；2. 舌状花；3. 管状花

扇羽阴地蕨

别名 高山独脚蕨。

来源 本品为蕨类阴地蕨科植物扇羽阴地蕨 Botrychium lunaria (L.) Sw. (Osmunda lunaria L.) 的干燥全草。

原植物 扇羽阴地蕨（图87）为多年生草本，高达25cm。总叶柄长6～20cm，粗2～3mm，多汁，草质，基部有托叶状苞片，长2～3cm，宿存；营养叶（不育叶）从总柄中部或中部以上生出，宽披针形，同总柄成锐角斜上，长2～8cm，圆头或圆钝头，无柄或有短柄，一回羽状；羽片3～6对，初生时彼此密接，以后分开，扇形，肾圆形或半圆形，下部的稍大，长宽各约1～2cm，基部楔形至近截形，无柄，与叶轴多少合生，外边缘全缘，波状或多少分裂，叶质为半肉质；叶脉扇状分叉；孢子叶自总柄顶部生出，2～3回羽状，狭圆锥形，长3～6cm，直立，光滑无毛，柄长2.5～4cm；孢子囊圆球形，黄绿色。

生于海拔3 000m上的草原、草甸、林下。分布于我国东北、华北、新疆、陕西、四川、云南、西藏等省区；北半球温带其他地区也有。

采收加工 冬末春初采收，洗净，晒干。

药材性状 根茎短而直立，下部簇生许多肉质几不分枝的粗须根；须根长约5cm，常弯曲，表面黄褐色，具横向皱纹，质脆易断，断面白色，粉性。总叶柄长4～20cm，扁平，淡黄绿色，光滑，基部有棕色或深棕色干缩托叶状苞片；营养叶从总柄或总柄以上生出，宽披针形，卷缩，黄绿色成灰绿色，无柄或有短柄，一回羽状，侧生羽片4～6对，波状或浅裂；叶脉扇状分离，不明显；孢子叶顶生，柄长4～7cm，孢子囊穗长3～6cm，2～3回分离，狭圆锥形，棕黄色。气微，味微辛。

性味与功用 辛，凉。清热解毒，抗菌止痢，收敛止血，止咳平喘。用于咳嗽，乳腺炎，痢疾，毒蛇咬伤，创伤出血，子宫出血，脓肿，骨折。常用量3～15g；外用适量捣烂敷患处。




图 87　扇羽阴地蕨

1．植株；2．羽片；3．孢子囊群

黄毛岩白菜

别名 岩白菜

来源 本品为苦苣苔科植物川滇马铃苣苔 Oreocharis henryana Oliv. 的干燥全草

原植物 川滇马铃苣苔（图88）为多年生草本；根状茎短而粗，直径约1.5cm，灰褐黄色，叶全部基生，叶片披针状狭卵形，长2～6.7cm，宽1.2～3.5cm，先端钝，基部楔形或浅心形，边缘波状或具三角状齿，叶面绿色，被短柔毛，背面灰褐色，密被褐色毡毛，叶脉在两面均明显；叶柄密被褐色毡毛，长1.5～7cm。聚伞花序2次分枝，2～4条，每花序具6～8花；花序梗长10–18cm，花梗长5～10mm，花萼长约4mm，5深裂至近基部，裂片线状披针形，外面被柔毛及腺状柔毛，里面近无毛；花冠钟状，长约1cm，深紫色，外面近无毛，筒长5mm，喉部不溢缩，稍二唇形，上唇2裂，下唇3裂，裂片均为长圆形；雄蕊4，分生，无毛，内藏，花药宽长圆形，顶端不汇合；花盘环状，全缘；子房长圆形，长约4.5mm，无毛，花柱长1.5mm，柱头盘状，蒴果倒披针形，暗紫褐色，长2.5～3.3cm，无毛。花期7～8月，果期10月。

生于海拔650～2 600m的山地潮湿岩石上。分布于云南西北部、四川及甘肃南部。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 干燥全草常皱缩成团，长10～15cm，密被褐色毡毛。下端根状茎短而粗，直径约15mm，灰褐黄色；断面黄白色。叶片皱曲或破碎，完整者平展后为披针状卵形，长2～6cm，宽1.2～3.5cm，先端钝，基部楔形或浅心形，边缘波状或具三角状齿，叶面绿色，背面密被褐色毡毛。叶柄长1.5～7cm，密被褐色毡毛。伞状聚伞花序有6～8花，花深紫色，钟状2唇形，蒴果倒披针形，暗紫褐色。气微，味淡。以带根，叶完整、色绿者为佳。

性味与功用 淡，平。止咳平喘，止血。用于劳伤咳嗽，哮喘，吐血等症。常用量15g。



图 88　川滇马铃苣苔

雪灵芝

别名 甘肃蚤缀、甘肃无心菜。

来源 本品为石竹科植物甘肃雪灵芝 Arenaria kansuensis Maxim. 的干燥全草。

原植物 甘肃雪灵芝（图89）为多年生密集垫状草本，半球形，高5～10cm，直径17cm或更大。主根木质，圆柱形，粗壮，长可达20cm，具支根。茎基部木质化，上部具叉状分枝，下部密具枯萎残叶，上部密具绿叶。叶稍硬，二型，不育茎具密集之叶，叶片披针状线形，长8～12mm，宽0.5～1mm，先端锐尖，基部平截，边缘具细齿，近基部干膜质，色淡，中上部绿色，中脉背面隆起；花茎具2～3对叶，疏离，叶片卵状披针形，长5～8mm，宽1～1.5mm，先端锐尖，基部平截，边缘干膜质，无柄。花单生茎顶，花梗长3～6mm，果时长达12mm，被小腺毛；萼片5，披针形，长6～7mm，宽1.5～2mm，无毛，中脉隆起，边缘干膜质；花瓣5，白色，倒卵形，长不及萼片，全缘；雄蕊10，与花瓣近等长，花丝线形，花药卵形，小；子房近球形，1室，胚珠多数，花柱3。蒴果近球形，短于宿存萼片；种子多数，扁，边缘具狭翅。花果期5～8月。

生于海拔4 000m左右的石灰岩山地草坡或石隙间。分布于四川西部、云南、西藏、青海和甘肃。

采收加工 夏、秋季采收，晒干。

药材性状 本品之干燥全株紧密呈球形或半圆球形，直径可达15cm以上，黄绿色。基部具圆柱形、木质主根；茎多分枝，基部木质化，具密集的老叶，叶近革质，针状线形，长8～12mm，宽可达1mm，先端锐尖，黄绿色。花单生茎顶端，白色。偶见果实，近球形。气微，味甘。以带根，叶绿黄者为佳。

性味与功用 甘，寒。入肝、胆、脾经。滋阴养血，益肾壮竹。用于流感，肺炎，黄疸，肺燥咳嗽，咳血，血虚风痹之筋骨疼痛，肾虚眩晕，淋病等症。常用量9～15g。



图 89　甘肃雪灵芝
1．植株；2．花枝放大

野　　菰

别名　马口念珠、鸭脚板、烟斗花、烟管头花、土灵芝草、蛇箭草、僧帽花、赤膊花、烧不死、官良花。

来源　本品为列当科植物野菰 Aeginetia indica Linn.的干燥全草。

原植物　野菰（图90）为1年生寄生植物，高15－25（－50）cm；根略肉质。茎直立，不分枝或近基部处有分枝，稀中部以上分枝，黄褐色或紫红色。叶互生，叶片卵状披针形或披针形，长5～10mm，宽3～4mm，两面光滑无毛，肉红色；无叶柄。花两性，单生茎顶端，稍俯垂；花梗长10～30（～40）cm，直径约3mm，无毛，常具紫红色条纹。花萼佛焰苞状，一侧斜裂至近基部，长2.5－4.5cm，先端急尖或渐尖，两面无毛，紫红色、黄色或黄白色；花冠带粘液，长4～6cm，筒部宽，稍弯曲，常与花萼同色，或有时上部白色，下部带紫色，干时变黑色，顶端5浅裂，上唇裂片与下唇侧裂片较短，近圆形，全缘，下唇中裂片稍大；雄蕊4，内藏，花丝长7～9mm，紫色，无毛，花药黄色，具粘液，成对粘合，下方一对的药隔基部延长成距；子房狭卵形，花柱长，柱头肉质，盾状。蒴果圆锥状或长卵球形，长2－3cm，2瓣裂；种子多数，椭圆形，细小，黄色。花期4～8月，果期8～10月。

生于海拔1 200～1 800m的土层深厚、湿润及枯叶多的地方，常寄生在芒属Miscanthus Anderss.和甘蔗属Saccharum Linn.等禾草类植物的根上。分布于云南、四川、贵州、广东、广西、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、福建和台湾等省区。印度、斯里兰卡、缅甸、越南、菲律宾、马来西亚和日本亦有。

采收加工　秋季采集，晒干。

药材性状　本品长15～25cm；茎单1或近基部分枝，淡黄褐色或紫色；叶肉红色，卵状披针形或披针形，长5～10mm，宽3～4mm，光滑无毛，无叶柄。花生于花萼顶端，干时黑色。蒴果圆锥状或长卵球形，长2－3cm，2瓣裂；种子黄色，椭圆形，多数。气微，味苦。以体干，带花序者为佳。

性味与功用　苦，凉，有小毒。清热凉血，解毒消肿，止咳。用于扁桃体炎、咽喉炎，尿路感染，骨髓炎。外用治疔疮，毒蛇咬伤等症。常用量9～15g。外用适量，捣烂敷或浸麻油擦患处。



图 90　野菰

1. 植株；2. 花展开

野　葱

别名　日葱、鹿耳韭、天韭。

来源　本品为石蒜科植物太白韭 Allium prattii C.H.Wright apud Forbes et Hemsl.的干燥全草。

原植物　太白韭（图91）为多年生草本，高10～60cm。鳞茎近圆柱形。叶2枚，紧靠或近对生，很少3枚，常为条形、条状披针形、椭圆状披针形或椭圆状倒披针形，罕为狭椭圆形，短于或近等长于花葶，宽0.5～2（～7）cm，先端渐尖，基部逐渐收狭成不明显的叶柄，全缘。花葶圆柱状，下部被叶鞘；总苞宿存；伞形花序多花，小花梗近等长，比花被片长2～4倍，果期更长，基部披小苞片；花紫红色至淡红色，稀白色；内轮花被片3，披针状长圆形至狭长圆形，长4～7mm，先端钝或凹缺，或具不规则小齿，外轮花被片3，较短而宽，狭卵形、长圆状卵形或长圆形；雄蕊6，基部合生并与花被片贴生，2轮，内轮的狭卵状三角形，外轮的锥形；子房倒圆锥状，具3圆棱，基部收狭成短柄。蒴果。

生于海拔2 000～4 900m的阴湿山坡、沟边、灌丛中或林下。分布于我国的云南、四川、西藏、青海、甘肃、陕西、河南、安徽。印度、尼泊尔、锡金、不丹、缅甸亦有。

采集加工　夏季采收，洗净，晒干或鲜用。

药材性状　本品为带花序或果序的全草，全体长10～60cm。鳞茎单生或2～3枚聚生，近圆柱形，外皮灰褐色至黑褐色，破裂成纤维状，呈明显的网状，基部具多数粗长的须根。叶2枚，少数为3枚，紧靠或或对生状，条形至狭椭圆形，基部鞘状。总苞1～2裂；伞形花序多花，半球形；花紫红色至白色，花被片6；花丝比花披片略长或长得多，基部合生。蒴果室背开裂。

性味与功用　辛，温。归肺、胃经。发汗散寒，祛风止痛，消肿，健胃，止血。用于伤风感冒，头痛发热，腹部冷痛，消化不良，失眠，跌打损伤，风疹瘙痒，漆疮。常用量9～15g；外用适量捣烂敷患处。

附注　表虚多汗者忌服。



图 91　太白韭

野　芝　麻

别名　野苏子。

来源　本品为唇科植物鼬瓣花 Galeopsis bifida Boenn.的干燥全草。

原植物　鼬瓣花（图92）为1年生草本，高20～60cm；茎粗壮，四棱形，具槽，节下加粗，但干时明显收缢，且密被多节长刚毛，其余部分混生下向多节长刚毛和贴生的短柔毛，茎上部常杂有腺毛。单叶对生，叶片卵状披针形或披针形，长3～8.5cm，宽1.5～4cm，先端渐尖，基部渐狭或阔截形，边缘具锯齿，叶面绿色，贴生具节刚毛，背面淡绿色，疏被微柔毛及腺点；叶柄长1～2.5cm，被短柔毛。轮伞花序密集，多花；苞片线形或披针形，长3～6mm，被刺毛；花萼筒钟形，连萼齿长约1cm，外面被长硬毛，齿5，等长，三角形，先端具长刺尖；花冠白色、黄色至粉红色，长约1.4cm，冠筒漏斗状，冠檐上唇卵圆形，先端钝，具不等的数齿，下唇3裂；花盘前方呈指状增大；子房无毛，褐色。小坚果倒卵状三棱形，褐色，有秕鳞。花期7～9月，果期9～10月。

生于海拔2 300～3 400m的山坡林缘、灌丛中、草地、田边及路旁。分布于我国的西南、西北、华北、东北、及湖北西部。日本、朝鲜、蒙古至欧洲及北美亦有。

采集加工　夏、秋季采集，晒干。

药材性状　本品长20～60cm；茎四棱形，节上明显收缢，密被刚毛，绿紫色。断面不整齐，白色。叶片皱曲，平展后为卵状披针形或披针形，长3～9cm，先端急尖或渐尖，基部渐狭或宽楔形，边缘具锯齿，叶面绿色，被刚毛，背面灰绿色，具微柔毛；叶柄长1～2.5cm，被短柔毛。轮伞花序多花，苞片线形或披针形，有刺毛。花黄色或黄白色，气微。以叶多、色绿，带花序者为佳。

性味与功用　微甘，平。解毒。用于疮痈，肿毒，梅毒。



图 92　鼬瓣花

1. 植珠;2. 花

野 草 香

来源 本品为唇形科植物光香薷 Elsholtzia glabra C.Y.Wu et S.C. Huang 的干燥全草。

原植物 光香薷（图93）为灌木，高约2m。小枝钝四棱形，具4槽，无毛。叶对生，菱状披针形，长6～15cm，先端渐尖，基部楔形下延，边缘在基部以上有圆齿状锯齿，叶面沿中脉及侧脉较密被余极疏被微柔毛，背面仅脉上略被毛，两面满布松脂状腺点；叶柄近无。穗状花序生于茎枝顶部，长5～13cm，细长，由具短柄多花的轮伞花序组成，单一，或有时基部具2小分枝；苞片钻形，微小，早落；花梗长约0.5mm，与序轴被灰色绒毛及腺点；花萼钟状，长约1.2mm，外面密被灰色绒毛及腺点，内面齿部被毛，萼齿5，三角状钻形；花冠白色，长约4mm，外面被短柔毛及腺点，内面基部有斜向毛环，檐部二唇形，上唇直立，下唇3裂，中裂片近圆形，边缘啮蚀状；雄蕊4，2强；花柱1，长于雄蕊，顶端2深裂。小坚果长圆形，长约1mm，淡褐色。

生于海拔1 900－2 400m的山谷灌丛边或疏林下。分布于四川、云南省。

采集加工 夏、秋季采收地上部分，切段。凉干。

药材性状 本品呈长短不齐的断节状。茎呈钝四棱形，黄绿色，无毛，节明显；质脆，易折断。叶对生，黄绿色或黄褐色，多皱缩、破碎或脱落，完整者湿润后展平呈披针形至卵形，长6～15cm，基部骤狭并向下延长，上面有白色柔毛，脉上较密，下面毛稀疏，两面满布松脂状腺点；叶柄极短。顶生穗状花序细圆柱状，长5－13cm，由轮伞花序组成；花小，二唇形，黄白色。气微香，味辛凉。以干燥，叶多，有香气者为佳。

性味与功用 辛、微苦，微温。清热解毒，和中解表。用于外感暑湿，恶心呕吐，疮疖肿毒。常用量9～15g。



图 93　光香薷

蛇眼草

别名 雨过天晴、大麻草、粉草、蛇箭。

来源 本品为菊科植物鸢尾叶风毛菊Saussurea romuleifolia Franch.的干燥带根全草。

原植物 鸢尾叶风毛菊（图94）为多年生草本，高10～30cm。根圆锥形，粗壮，长达10cm，紫黑色，稍弯曲，根颈处密生纤维状枯叶残存物，具纤细须根。茎直立，密被绢质长柔毛和腺毛。基生叶丛生，茎生叶少数，叶质硬，线形，长15～25cm，宽2～5mm，先端尖，全缘而内卷，背面被灰白色柔毛，基部密被绒毛状长毛。头状花序单1顶生，大，直径2～4cm；总苞卵状筒形，长2～3.5cm；总苞片多层，排列紧密，披针形或线状披针形，全部或上部及边缘紫色，先端长渐尖，具刺尖状，边缘具疏锯齿或全缘；花紫色，全部筒状，长25～28mm，具腺点；雄蕊着生于花冠上；子房下位，椭圆形。瘦果紫黑色，长4～5mm，具纵棱，无毛，具斑点；顶端具小冠，冠毛污白色，外层糙毛，短，内层羽状毛。

生于海拔2 500～3 400m的高山草地，疏林中或林缘，多石地带。分布于云南西北部、四川西部和西南部。

采收加工 秋末采挖，洗净晒干或鲜用。

药材性状 本品全长20～30cm，根圆锥形，粗壮，长可达10cm，外皮褐色，易脱落，根之顶部密生白色绒毛，茎基部具残存的棕黄色针状叶柄；质较泡，易折断，断面为黄白色。叶丛生，叶片皱缩或破损，完整者平展后为线形，长15～25cm，淡绿色或黄绿色，被灰白色柔毛。头状花序单生花葶顶端，花序轴密被白色丝状绵毛，总苞片多层，排列紧密，披针形或线状披针形，先端长渐尖，具尖刺；花紫色，全部筒状。瘦果紫黑色，具污白色冠毛。气微，味苦，辛。以根粗，叶绿者为佳。

性味与功用 辛、苦，凉，小毒。清热解毒，散瘀止痛，消积。用于风湿关节痛，跌打损伤，无名肿痛，水火烫伤，毒蛇咬伤，小儿疳积等症。常用量6～9g；外用适量，根研粉调香油敷患处。



图 94　鸢尾叶风毛菊
1．植株；2．花

假　荆　芥

别名　拟荆芥、土荆芥、凉薄荷、山藿香。

来源　本品为唇形科植物荆芥 Nepeta cataria Linn. 的干燥全草。

原植物　荆芥（图95）为多年生草本，高40～150cm；茎基部木质化，红褐色，近四棱形，上部钝四棱形，绿色，具纵浅槽，多分枝，被短柔毛。单叶对生，叶片纸质，卵状心形或三角状心形，长2.5～7cm，宽2～4.5cm，先端钝或锐尖，基部心形至截形，边缘具粗圆齿或牙齿，叶面绿色，被短硬毛，背面淡绿色，被短柔毛，沿脉更密；叶柄长0.7～3cm。由聚伞花序组成的圆锥花序顶生；苞叶叶状，上部的较小，披针形；小苞片钻形，短于萼。花萼长6mm，外面被白色短柔毛，萼齿钻形。花后花萼增大成瓮状，纵肋极明显；花冠白色，外面被柔毛，里面喉部被短柔毛，冠管向上骤然扩展，檐部上唇短，先端微凹，下唇3裂，中裂片近圆形，白色具紫斑，边缘具粗齿，侧裂片近圆形。雄蕊内藏，花丝扁平；子房无毛，花柱线形，先端2等裂。小坚果卵形，近三棱形，长1.7mm。花期7～9月，果期9～10月。

生于海拔750～2 700m 的河边、灌丛中或草坡中，亦有栽培。分布于云南、四川、贵州、湖北、山东、山西、河南、陕西、甘肃和新疆。也见于欧洲中南部、阿富汗、喜马拉雅山区至日本，美洲和非洲。

采收加工　夏、秋季采收，除去杂质，泥土，晒干。

药材性状　本品长40～150cm，茎枝四棱形，红褐色至绿色，被短柔毛，质轻，易折断，断面不整齐，黄白色。单叶对生，叶片皱缩，破碎，平展的完整叶片为卵状心形或三角状心形，长2.5～7cm，被短柔毛；叶柄长0.7～3cm。茎、枝顶端为聚伞状圆锥花序；苞片钻状，花萼被短柔毛，花后增大成瓮状；花冠白色，二唇形，上唇短，先端微凹，下唇3裂，中裂片近圆形。气微，味淡。以干燥，带花序，叶多，色绿者为佳。

性味与功用　淡，凉。祛风发汗，解热透疹，散瘀消种，止血止痛。用于伤风感冒，头痛发热，怕冷，咽喉肿痛，结膜炎，麻疹不透，跌打损伤，吐血，鼻衄，外伤出血，毒蛇咬伤，疔疮痈肿。常用量15～30g。外用，捣敷。




图 95　荆芥

1. 根；2. 花枝；3. 花

猪鬃刚

别名 猪鬃草、碎叶猪鬃草、铁丝草。

来源 本品为蕨类铁线蕨科植物白背叶铁线蕨 Adiantum davidii Franch. 的干燥全草。

原植物 白背叶铁线蕨（图96）为多年生草本，高20～30cm。根状茎横走，上面密被线状披针形浅棕色鳞片。叶远生，叶柄圆柱形，细弱，紫褐色至棕色，有光泽，长10～20cm，基部疏背线状披针形浅棕色鳞片；叶片三角状卵形，长10～15cm，3回羽状分裂，一回羽片3～5对，三角状披针形，基部1对最长，长约7cm，向上的渐小，二回羽片矩圆形至卵形，末回小羽片扇形，1～4对，质厚，长宽均约4～7mm，顶端截平或圆形，不育部分有宽三角形具刺尖头的锯齿，两侧边全缘，上面绿色，下面淡绿色，多少背白粉，叶脉扇状分离，各回羽片均具细柄。孢子囊群生于末回小羽片顶端，每片1枚；囊群盖质厚，肾形至近圆形，长2～3mm，棕色。

生于海拔1 100～3 400m的溪边阴湿岩石上。分布于河北、山西、陕西、甘肃、四川、云南等省。

采收加工 全年均可采收，晒干。

药材性状 根状茎细长圆柱形，上部具暗棕色卵状披针形鳞片，下部具多数淡棕色须状短根。叶远生，叶柄圆而细弱，有光亮，紫褐色或棕色；叶片三角状卵形，为三回羽状复叶，末回小羽片扇形，厚革质，下面粉绿色；叶脉扇状；各回羽片均具细柄，深栗色，光滑。孢子囊1枚，生末次小羽片顶部，圆肾形，棕色。气无，味微苦。以植株完整、叶色黄绿、背面被粉者为佳。

性味与功用 涩、微苦，凉。归肝、肾经。清热利湿、通乳止痛、祛风，消肿。用于痢疾，乳腺炎，尿路感染，膀胱炎，血尿，乳糜尿，肺热咳嗽，风火牙痛，睾丸炎，湿疹，风湿痹痛，疮疖。常用量9～15g，水煎或浸酒服；外用适量煎水洗或研末撒。



图 96　白背叶铁线蕨

猪鬃草

别名 猪毛针、猪鬃七、乌脚芦、岩浮萍、猪毛七。

来源 本品为蕨类铁线蕨科植物团羽铁线蕨Adiantum capillus-junonis Rupr.的干燥全草。

原植物 团羽铁线蕨（图97）为多年生草本，高10～20cm；根状茎直立、下部密生纤维状须根，顶部具褐色披针形鳞片。叶簇生，无毛；叶柄纤细，亮栗色，基部具鳞片；叶片长8－15cm，宽2.5～3.5cm，一回羽状，叶轴顶部常延长成鞭状，顶端着地生根；羽片近膜质，团扇形，基部具关节和柄相连，外缘2－3浅裂；裂片顶部生孢子囊群，边缘全缘，不育部分的边缘具浅波状钝齿；叶脉扇状分叉，小脉直达叶缘。孢子囊群生于裂片边缘小脉的顶部；囊群盖线状长圆形或近肾形。

生于海拔300～2 500m的溪边潮湿石灰岩脚或墙缝中。分布于云南、四川、贵州、广东、广西、湖南、台湾、山东、河南、河北和甘肃。

采收加工 全年可采，洗净，晒干备用。

药材性状 本品长10～20cm，根状茎下部生多数纤细须根，上部被褐色披针形鳞片，叶柄纤细，亮栗色，状如铁线，叶轴顶部着地部分生有须根；羽片膜质，团扇形，灰绿色，基部有关节与叶柄相连，外缘2～5处浅裂，裂片顶部生有孢子囊群，全缘，不育部分的边缘具波状钝齿，叶脉扇状分叉，小脉直达叶缘。孢子囊群盖线状长圆形或近肾形。气微，味微苦。以质干，叶多，色灰绿者为佳。

性味与功用 微苦，凉。清热利尿，舒筋活络，补肾止咳。用于血淋，闭尿，痢疾，乳腺炎，咳嗽，遗精，瘰疬，颈淋巴结核。毒蛇咬伤、烧烫伤。常用量15～30g；外用适量，捣烂或研粉敷患处。



图 97　团羽铁线蕨

婆婆纳

别名 卵子草、双肾草、双珠草、双铜草、石补钉。

来源 本品为玄参科植物婆婆纳Veronica didyma Tenore的干燥全草。

原植物 婆婆纳（图98）为1或2年生草本，高5～25cm，茎多分枝，下部铺散，上部斜升，被短柔毛。叶对生，卵圆形或近圆形，长5－10cm，先端钝，基部圆形或近心形，每边具2～4个深刻的钝齿，两面被白色长柔毛；叶柄长3－6mm。总状花序顶生；苞片叶状，互生，或下部的对生；花梗与苞片等长或稍短；花萼4裂，裂片卵形，长3～6mm，果期稍增大，三出脉，疏被短硬毛；花冠辐射状，直径4～5mm，淡紫色、蓝色、粉红色或白色，上部4裂，裂片卵形至圆形；雄蕊2，比花冠短，开花后外露；子房上位，2室，柱头头状。蒴果近肾形，密被腺毛，略短于花萼，宽4－5mm，凹口近直角，裂片顶端圆，脉不明显，宿存的花柱与凹口齐或过之。种子舟状，长约1.5mm，背面被横纹。

生于路边、田野、荒地潮湿处。分布于我国华东、华中、西南、西北各地区及北京市。广布欧亚大陆北部。

采收加工 春季采收，晒干或鲜用。

药材性状 本品根多数，细瘦。茎下部节上常具不定根，上部具柔毛，枯黄色，质柔软，易折断。叶黄绿色，皱曲或破碎，平展的完整叶片卵圆形或近圆形，边缘具钝圆齿，两面具白色长柔毛。总状花序长，生于枝顶，苞片叶状，每苞叶内有花小朵。蒴果近肾形，枯黄色，密被腺毛，与花萼近等长，凹口约90°角。以枝叶多、具果实者为佳。

性味与功用 甘、淡、凉。归肾经。清热利湿，理气止痛，凉血止血。用于疝气疼痛，睾丸肿大，白带，疮疖，吐血。常用量15－30g；外用鲜品适量捣烂敷患处。



图98　婆婆纳

1. 植株；2. 叶；3. 花；4. 花冠纵剖；5. 果

黑猪毛七

来源 本品为蕨类铁角蕨科植物半边铁角蕨Asplenium unilaterale Lam.的干燥全草。

原植物 半边铁角蕨（图99）为多年生草本，高25～35cm。根状茎纤细，直径2～3mm，横走，棕褐色，顶端密被鳞片；鳞片膜质、线状钻形，长约3mm，深棕色，全缘。叶远生，相距5～10mm；叶柄长10～20cm，直径约2mm，紫栗褐色，基部疏被深棕色线状钻形鳞片，上部光滑、具沟；叶片披针形，长15～20cm，宽3～4cm，先端渐尖，基部稍狭，一回羽状；有互生、平展的羽片约20对，具短柄，羽片长圆状斜方形，长1.5～3cm，基部宽7～10mm，先端钝或短尖，基部不对称，上侧截形，下侧楔形，上缘、外缘及下缘顶部具锯齿，内缘和下缘下部全缘，下缘基部无叶肉；叶脉明显，小脉一回分叉，基部上侧一脉二回分叉，斜向上，主脉基部贴近下缘；叶为薄草质，半透明，干后暗绿色，两面均光滑；叶轴紫栗褐色，光滑，上面具沟。孢子囊群线形，长3～4mm，生于小脉上侧分枝中部；囊群盖线形，薄膜质，淡棕色。

生于平地及山地密林下沟边岩石上。分布于云南、四川、广东、广西、海南、湖北、江西和台湾。非洲东部至太平洋亚洲热带地区也有。

采收加工 夏、秋采集，晒干。

药材性状 本品长25～35cm；根状茎棕色，纤细，其上具残存的根及棕色鳞片。叶片草质，皱曲，破碎，展平后呈披针形，长15～20cm，宽3～4cm，先端渐尖，基部稍狭，一回羽状，具羽片约20对，羽片长圆状斜方形，长1.5～3cm。先端渐尖，基部不对称，上侧截形，下侧楔形，叶脉明显，小脉一回分叉，暗绿色；叶柄紫栗褐色，长10～20cm，疏被钻状鳞片；孢子囊群生于脉上侧分枝中部，囊群盖线形，薄膜质，浅棕色。气无，味淡。以带根状茎，叶多、色绿者为佳。

性味与功用 淡，平。清热止咳，散瘀止血，利尿通淋。用于肺热咳血，热淋，血淋，跌打损伤。常用量9～15g。



图 99　半边铁角蕨

短距耧斗菜

别名 细距耧斗菜。

来源 本品为毛茛科植物短距耧斗菜 Aquilegia ecalcarata Maxim.f. semicalcarata(Schipcz.) Hand.-Mazz.的干燥全草。

原植物 短距耧斗菜（图100）为多年生草本，高20～65cm。茎疏被短柔毛，常分枝。基生叶数枚，具长柄，叶片长3～12cm，为二回三出复叶，第一回及第二回裂片均具柄，顶生小叶倒卵状宽菱形或宽菱形，长1.5～3cm，3裂至中部，侧面小叶斜卵形，不等2裂，比顶生小叶小，各裂片顶有2～3个小裂片或圆齿，两面无毛或下面疏生柔毛；茎生叶1～3，形状似基生叶，但较小。花1至数朵，直立或下垂，花梗被毛；萼片5，红紫色，近水平展开，长圆状卵形，长1.2～1.6cm，下部被疏柔毛；花瓣与萼片同色，近等长，直立，瓣片长方状椭圆形，顶端近截形，距囊状，长2～6mm，粗1.5～2mm，直或稍弯；雄蕊多数，长约7mm，花药近黑色，退化雄蕊白色，膜质，狭卵形，长约4mm；心皮5，直立，疏被短柔毛。蓇葖长8～11mm，具宿存花柱，被毛。花期5～6月，果期7～9月。

生于海拔2 500～3 500m的山地林中、沟边、路边、灌丛中。分布于陕西、甘肃、青海、河南、湖北、四川、西藏、贵州等省区。

采收加工 夏季采收，晒干。

药材性状 根粗，圆柱形，具数条分枝，长10～20cm，直径3～10cm；外表深暗褐色，根头部有茎叶残基，质较坚硬，断面有环。茎1～4条，圆柱形，直径2～2.5mm，上部有分枝，表面红棕色或黄绿色，被疏短柔毛。叶多皱缩为二回三出复叶，基生叶有长柄，顶生小叶片润湿后展开呈宽菱形，长1.5～3cm，宽约等于长，3中裂，侧生小叶斜卵形，不等二裂，各裂片顶部具2～3个小裂片或圆齿；茎生叶1～3，较小。萼片与花瓣均暗紫色，花瓣距长2～6mm；雄蕊多数，花药黑色。蓇葖果直立，疏被柔毛，具宿存花柱。气微，味微苦。以根粗、叶色绿、味苦者为佳。

性味与功用 苦、微辛，平。清热解毒，散瘀止血，拔毒生肌。用于感冒头疼，跌打损伤，疮痈肿毒，功能性子宫出血。常用量9～15g；外用适量捣烂，加醋少许炒热敷患处。



图 100　短距耧斗菜

遍 地 金

别名 对对草、对叶草、小疳药、小黄花香、金星草。

来源 本品为金丝桃科植物遍地金 Hypericum wightianum Wall.ex Wight.et Arn.的干燥全草。

原植物 遍地金（图101）为1年生草本，高15～35cm。根状茎短而横走；茎披散或直立，叶无柄；叶片卵形或宽椭圆形，长1～2.5cm，先端浑圆，基部略呈心形，抱茎，边全缘但常具有柄的黑腺毛，背面散生透明腺点，侧脉每边2～3条。二歧状聚伞花序顶生，具3至多花；苞片和小苞片披针形，长达8mm，边缘有具柄的黑色腺毛。花直径约6mm，斜展，花梗长2～3mm；萼片5，长圆形或椭圆形，长2.5～5mm，边缘有具柄的黑腺齿，两面散生黑色腺点；花瓣5，黄色，椭圆状卵形，长3～5mm，先端锐尖，边缘及上部有黑色腺点；雄蕊多数，3束，每束有雄蕊8～10枚，花丝略短于花瓣，花药黄色，有黑色腺点；子房卵球形，长约3mm，花柱3，自基部分叉。蒴果近球形，长约6mm，红褐色；种子圆柱形，褐色，表面有细蜂窝纹。

生于海拔800～3 300m处的田边或路旁草丛及灌木丛中。分布于云南、贵州、四川、广西等省区。印度、巴基斯坦、斯里兰卡、缅甸、泰国也有。

采收加工 夏季采收，晒干或鲜用。

药材性状 全草长13～35cm。根茎短，须根纤维状，黄棕色。茎圆柱形，有不明显纵线棱，无毛，侧生小枝无或生长不规则，表面黄绿色，质脆，易折断。叶对生，无柄；叶片卵形或宽椭圆形，长1～2.5cm，宽0.5～1.5cm，顶端钝圆，基部心形，全缘，常有具柄黑腺毛，下面散布透明腺点，质脆。二歧聚伞序顶生，花小，黄色，萼片边缘有具柄黑腺齿，表面散生黑腺点；花瓣边缘及上部亦具黑腺点；雄蕊3束。气无，味苦。以叶色黄绿、带花者为佳。

性味与功用 苦、涩，寒。归肺、肝、脾经。清热解毒，止血，消肿，止泻，活血。用于热毒疮痈，牙痛，鼻炎，乳腺炎，日久水泻，久痢，鼻衄，咯血，便血，血崩，跌打肿痛，毒蛇咬伤。常用量9～15g；水煎服或外用适量捣料敷患处。




图 101　遍地金

1. 植株；2. 花

疏花仙茅

别名　大地棕、皱叶狗尾草。

来源　本品为仙茅科植物疏花仙茅Curculigo gracilis(Wall.ex Kurz) Hook.f.(Molineria gracilis Wall.ex Kurz)的干燥全草。

原植物　疏花仙茅（图102）为多年生草本。根状茎粗短块状，通常有细走茎。叶基生，纸质、披针形或近长圆状披针形、长20～50cm，中部宽3～5cm，向两端渐狭，先端渐尖或近尾状、全缘，背面脉上多少被疏柔毛；叶柄长为叶片的1/3～1/4，上面有槽、背、侧面被毛，基部扩大，多少具黑色膜质边缘。花葶从叶腋发出，长13～23cm，被绒毛；总状花序长6～10cm，通常疏生10～12朵花；苞片线状披针形、下部的较花长，上部的较短，边缘与顶端均被毛；花黄色具短梗；花被裂片6，近长圆形、长约1.1cm，外轮背面沿中脉被毛；雄蕊6，花丝极短，花药近线形，长6～7mm；子房近长圆形，顶端具短喙，全长约1cm，被锈色绒毛，柱头浅3裂。浆果近瓶状，连喙长约2cm，多少被毛。种子多数，黑色。

生于海拔约1 000m的林下或阴湿山坡。分布于广西、四川、贵州等省区。尼泊尔、不丹、越南也有。

采收加工　春、夏季采收，晒干。

药材性状　本品根状茎极粗，块状，表面棕褐色或黑褐色，粗糙，具多数粗壮的须根，常具细长带鳞叶的走茎。叶基生、5～9枚，披针形或近长圆状披针形，棕褐色或黑褐色，稍早折扇状，背面脉上略被毛，纸质或厚纸质；叶柄长20～30cm、上面有槽，基部扩大，边缘具黑色膜质鞘。花茎近直立，被锈色绒毛，总状花序长6～9cm，顶生，疏生10～20朵花。浆果近瓶状，具喙，多少被毛、长约2cm。气微，味微苦。以带根及花序黑褐色者为佳。

性味与功用　甘、微苦、凉。利尿，凉血、止咳。用于水肿，小便不利，血热头疼、头晕，咳嗽咯血、吐血。常用量15～30g。



图 102　疏花仙茅

疏花婆婆纳

来源 本品为玄参科植物疏花婆婆纳 Veronica laxa Benth.的干燥全草。

原植物 疏花婆婆纳（图103）为多年生草本，高30～80cm，全体被白色柔毛。茎直立或上升，不分枝。单叶对生，叶片卵形或卵状三角形，长2～5cm，宽1～3cm，先端钝或急尖，基部近圆形，边缘具粗锯齿，常为重锯齿，叶面绿色，背面淡绿色；具极短的叶柄或无柄。总状花序生于茎中上部叶腋内，长达15cm，果时可达20cm；苞片线形或倒披针形，长约5mm；花梗长2～5mm；花萼4深裂，裂线状长椭圆形，长约4mm，果期长5～6mm；花冠紫色或兰色，辐伏，直径6～10mm，4深裂几达基部，裂片圆形至菱状卵形；雄蕊2枚，与花冠近等长。蒴果倒心形，扁平，长4～5mm，宽5～6mm，基部楔状圆形，具多细胞缘毛，宿存花柱长3～4mm。种子南瓜子形，长约1mm。花期6月。

生于海拔1 500～2 500m的山坡林下及谷地阴处。分布于云南、四川、贵州、湖南、湖北及甘肃南部。印度亦有。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 本品长50～80cm；茎圆柱形，被柔毛，绿色，易折断，断面不整齐。叶片皱曲、破碎，平展后为卵形或卵状三角形，长2～5cm，先端钝功急尖，基部圆形，边缘具牙齿，多为重齿，两面被柔毛，灰绿色；具短柄或无柄。花蓝色或蓝紫色，花梗长2～5mm，花萼4深裂，花冠较萼片，4深裂几达基部，前裂片卵形，其余3裂片圆形；蒴果倒心形，扁平。气微。以叶多，叶片完整，色灰绿者为佳。

性味与功用 甘、淡，凉。解表，利湿，止痛。用于风寒感冒，咳嗽，白带，疮疡肿毒，睾丸肿痛，疝气。常用量15～30g。



图 103　疏花婆婆纳

1．植株下部；2．果枝；3．果

疏齿银莲花

别名　索嗄哇（藏语）。

来源　本品为毛茛科植物疏齿银莲花 Anemone obtusiloba D.Don ssp. ovalifolia Brühl(A.geum Lévl.)的干燥全草。

原植物　疏齿银莲花（图104）为多年生草本，高3.5～15cm，稀达30cm。根状茎粗壮。基生叶5－10；叶片宽卵形，长0.8－2.2cm，偶可长至3.2cm，基部心形，两面被短绒毛，3全裂，中央全裂片菱状倒卵形或宽菱形，通常3浅裂，疏生圆齿，侧全裂片较小，一般比中央全裂片短1倍左右，全缘或具1－2齿；叶柄长2～8.5cm。花葶1～5，直立或斜升，长3－17（－30）cm，有柔毛；苞片3，无柄，稍不等大，狭倒卵形或倒卵形，全缘或有1－3齿；单花顶生；花梗长1.2～11cm；萼片5，白色、黄色或蓝色，倒卵形，长5～9（～11）mm，背面有短柔毛；无花瓣；雄蕊多数，花丝条形；心皮20－30，子房密生柔毛，稀无毛，花柱短。瘦果狭卵形，被毛。

生于海拔（1 900～）2 300－4 000（－5 000）m的高山草地或灌丛边。分布于西藏、云南、四川、青海、陕西、甘肃、宁夏、新疆、山西、河北等省区。

采收加工　夏季采收，去净泥沙，晒干。

药材性状　根状茎呈短圆柱形，长达2cm，粗1～1.5cm；表面褐黑色，粗糙，具不规则裂纹及皱纹，基部略收狭，具多数细圆柱形须根。基生叶5－10，具长柄；叶片多皱缩，黄绿色，展开后呈卵形，基部心形，3全裂，长0.8－2.2cm，侧全裂片较小，裂片全缘或具1～2齿，中央全裂片3浅裂，两面被柔毛。花葶1～5，具柔毛，苞片3，顶生1花；花梗1～11cm；花淡褐色、黄色或蓝色。气无，味微苦涩。以带根茎、花或果实、叶色黄绿者为佳。

性味与功用　辛、苦，平，有小毒。归心经。止血，消炎。用于淋病，关节积水，黄水疮，慢性支气管炎，末梢神经麻痹，跌打损伤。内用量5－9g；外用适量捣烂敷患处。



图 104　疏齿银莲花

蒲 儿 根

别名 猫耳朵、肥猪草、黄菊莲。

来源 本品为菊科植物蒲儿根 Senecio oldhamianus Maxim 的干燥全草。

原植物 蒲儿根（图105）为1或2年生草本，高20～80cm；茎圆柱形，直立，下部及叶柄着生处被蛛丝状绵毛或近无毛，多分枝。单叶互生，叶片草质或近膜质，基生叶和茎中下部叶心状圆形或阔卵状心形，长、宽约3～5cm，稀达8cm，先端尖，基部心形，边缘具不规则的三角状牙齿，叶面绿色，近无毛，背面淡绿色，密被白色蛛丝状绵毛，叶脉掌状，侧脉叉状，上部叶渐小，叶片三角状卵形，先端渐尖；叶柄由下向上逐渐变短，长1.5～6cm。头状花序多数，在茎、枝顶端排成伞房状；总花序梗纤细，长1～2.5cm，疏被短柔毛至近无毛；总苞宽钟形，长3～4mm，直径4～5mm；总苞片13枚，披针形，长约3mm，花黄色；舌状花1层，舌片黄色，长约5mm，先端全缘或3齿裂；筒状花多数，筒部长5～6mm，檐部裂片三角形。瘦果倒卵状圆柱形，长约1mm，被白色硬毛，冠毛白色，长约1mm。花果期4～8月。

生于海拔450～2 300m的山坡林缘、荒地、路旁和溪边。分布于我国西南、中南、华东、华北、东北及西北部。越南及缅甸亦有。

采收加工 夏秋季采集，晒干。

药材性状 本品长20～80cm，茎圆柱形，具纵条纹，下部被蛛丝状绵毛，上部近无毛，上部多分枝。表面灰绿色。断面不整齐，近白色。叶片草质或近膜质，皱曲或破碎，完整者平展后为心状圆形或阔卵状心形，叶面淡黄绿色，近无毛，背面灰绿色，密被白色蛛丝状绵毛；叶柄长1.5～6cm。茎、枝顶端有头状花序组成的伞房状花序，总花序梗纤细，长1～2.5cm；总苞宽钟形，长3～4mm；花黄色，舌状花1层，舌片顶端全缘或3齿裂；管状花多数，长5～6mm。偶见倒卵状圆柱形瘦果，长约1mm，具白色长冠毛。气微，味苦。以茎、枝多，叶完整，色绿者为佳。

性味与功用 辛、苦，凉。有小毒。清热、消肿。用于痈疖肿毒。常用量9～15g；外用适量，鲜品捣烂敷患处或干品研末调敷。



图 105　蒲儿根

蓝 叶 藤

别名 肖牛耳菜、肖牛耳藤、羊角豆。

来源 本品为萝摩科植物蓝叶藤 Marsdenia tinctoria R. Br.的干燥全草。

原植物 蓝叶藤（图106）为攀援灌木，长4－5m。茎圆柱形，具皮孔。单叶对生，叶片长圆形或卵状长圆形，长5～12cm，宽2－5cm，先端渐尖，基部近心形，全缘，叶脉蓝绿色，幼时被柔毛，老时渐无毛，干时亦呈蓝绿色，侧脉每边6－7条，弧曲上升，于叶脉附近网结；叶柄长约为叶片的1/5。圆锥状聚伞花序近腋生，长6～7cm；花萼2深裂，裂片圆卵形，先端圆形，被柔毛及缘毛，内面基部具腺体；花冠黄白色，干时蓝黑色，花冠筒圆筒状钟形，喉部具1排刷毛，5浅裂，裂片卵圆形；副花冠5裂，裂片长圆形，肉质，与花药顶端近等高；雄蕊5，花粉块状长圆形，具柄，每室1个，直立；子房由2心皮组成，被微毛，花柱柱状，短，柱头盘状五角形，顶部具小乳起。蓇葖果圆筒状披针形，长8－11cm，直径约1cm，被茸毛，种子多数，卵形，顶端具长1cm的黄色绢质种毛。花期3～5月，果期8～12月。

常生于海拔500～1 800m的山地阔叶林中或沟谷潮湿的杂木林中。分布于云南、四川、贵州、西藏、广东、广西、湖南和台湾等省区；斯里兰卡、印度、缅甸、越南、菲律宾和印度尼西亚亦有。

采收加工 全年可采，切段，晒干。

药材性状 本品之干燥茎枝圆柱形，棕褐色，具纵皱纹。叶皱缩，破碎，叶片展开为长圆形或卵状长圆形，长5－12cm，宽2－5cm，蓝绿色。圆锥状聚伞花序近腋生，长3－7cm；花干时蓝黑色，花冠圆筒状钟形，喉部里面有刷毛，副花冠5枚，蓇葖果圆筒状披针形，长达10cm，直径约1cm，被茸毛；种子卵形，多数，顶端具长达1cm的绢质种毛。以枝叶多，带果，色蓝绿者为佳。

性味与功用 甘，温。全草有滋补之效，用于身体虚弱；果治心胃气痛。常用量根6~12g，果6~9g，煎水服。



图 106　蓝叶藤

1．花枝；2．花冠纵剖

矮 陀 陀

别名 地黄连、白花矮陀陀、金丝岩陀陀、滇地黄连、雅害黑（傣族语）。

来源 本品为棟科植物矮陀陀 Munronia henryi Harms 的干燥全株。

原植物 矮陀陀（图107）为矮小半灌木，高15～30cm；根圆柱形，长可达20～30cm，黑黄褐色，具支根和须根。茎直立，不分枝，灰褐色。奇数羽状复叶互生，通常簇生茎顶部，叶轴连柄长5～7cm，被柔毛；小叶3～7枚，顶生小叶具柄，小叶片披针形至椭圆状披针形，长3～7cm，宽1.5～3cm，先端渐尖或钝，基部楔形，全缘或具2～3对圆齿，侧生小叶无柄，最下一对最小，倒卵形或近圆形，长约5～10mm，先端浑圆或钝，全缘。总状花序腋生，长可达2cm，具1～3花，被长柔毛；具小苞片。花梗长5～20mm，被长柔毛；花萼5裂达基部，裂片披针形，长2mm，外面被长柔毛；花瓣5，白色，近无毛，与雄蕊管合生，分离部分长椭圆状倒披针形或披针形，长约10mm；雄蕊管边缘丝状，花药具尖突；子房与花柱基部被长柔毛，花柱与雄蕊等长。蒴果扁球形，直径5～8mm，绿色，被柔毛，基部具宿存萼；种子褐色。花期6～11月。

生于海拔1 000～1 400m的山地林下湿润处。分布于云南、贵州西南部。

采收加工 全年可采，除去杂物、泥土，洗净，晒干。

药材性状 本品长20～50cm；根圆柱形，弯曲，表面黑褐黄色，横断面淡黄色。茎圆柱形，单一不分枝，灰褐色，表面具叶痕。奇数羽状复叶，小叶3～7枚，对生，皱缩，顶生者较大，向下逐渐减小，椭圆形、椭圆状披针形，或卵形，先端渐尖或钝，基部楔形，全缘或具2～3对圆齿，绿色。总状花序腋生，被柔毛；花白色，长约3cm；果扁球形，绿色，有毛。气微，味辛，微苦。以带根，叶多者为佳。

性味与功用 辛、微苦，凉。有小毒。清热解毒，舒筋活络，祛风止痛，截疟。用于感冒发热，疟疾，跌打损伤，风湿性关节炎，骨折，瘫痪，胃痛，气胀腹痛。常用量1.5～6g，外用适量，捣烂或研粉敷患处。

附注 本品有小毒，用量不宜多。



图 107　矮陀陀

满 山 香

别名 排草、香排草、合血香、排草香。

来源 本品为报春花科植物细梗香草Lysimachia capillipes Hemsl.(=L.fragrans Hayata)的干燥全草。

原植物 细梗香草（图108）为1年生直立草本，高40～60cm；茎二至多条丛生，中上部分枝，具棱。单叶互生，叶片纸质，卵形至卵状披针形，长1.5～7cm，宽1～3cm，先端渐尖或锐尖，基部钝，稀近圆形或截形，两侧常不对称，全缘或微呈现波状，绿色，无毛或叶面被极疏小刚毛，侧脉4～5对，网状脉不明显；叶柄长2～6mm。花单生于叶腋，花梗纤细，丝状，长1.5～3.5cm；花萼长2～4mm，5深裂，裂片卵形或披针形，先端渐尖；花冠黄色，长6～8mm，5深裂几达基部，裂片狭长圆形，宽1.8～3mm；雄蕊5，与花冠近等长，花丝极短，花药大，顶孔开裂；子房近球形，花柱丝状，略长于雄蕊。蒴果近球形，直径3～4mm。花期6～7月，果期8～11月。

生于海拔300～2 000m的山坡林下。分布于云南、四川、贵州、广东、湖南、湖北、江西、福建、浙江及台湾。菲律宾亦有。

采收加工 夏秋采收，除去泥土、杂质，阴干备用。

药材性状 本品长40～60cm，灰绿色，茎具棱翅，草质。叶常皱曲，或破碎，完整者平展后呈现卵形或卵状披针形，长1.5～7cm，宽1～3cm，先端锐尖或渐尖，基部短渐狭或钝，稀圆形或截形，全缘或微波状，无毛或叶面极疏被小刚毛，侧脉4～5对；叶柄长2～6mm。花单生叶腋，花梗丝状，长1.5～3.5cm，花萼深裂，裂片卵形或披针形；花冠黄色，深裂片狭长圆形或近线形；雄蕊与花冠等长，花丝短，花药大。蒴果近球形，带白色，直径3～4mm。气芳香，味甘。以枝、叶多、芳香、色绿者为佳。

性味与功用 甘，平。祛风，止咳，调经。用于流行性感冒，咳嗽，气管炎，哮喘，风湿疼痛，月经不调，神经衰弱。用量9～15g。



图 108　细梗香草

1. 花枝；2. 雌蕊；3. 花

滇苦菜

别名 青菜、紫苦菜、苦马菜、滇苦苣菜、小鹅菜。

来源 本品为菊科植物苦苣菜 Sonchus oleraceus Linn.的干燥全草。

原植物 苦苣菜（图109）为1－2年生草本，高50～100cm，具乳汁；茎直立，不分枝或上部分枝，具纵棱，上部被黑褐色腺毛。叶互生，叶片柔软，长椭圆状倒披针形，长15－20cm，宽3－8cm，深羽裂或提琴状羽裂，顶端裂片大或与侧生裂片等大，裂片边缘具不整齐的短刺状齿或小尖齿，无毛，网状脉明显；茎生叶基部常为尖耳状抱茎，中上部叶无柄，基部宽大戟耳形，基生叶片基部下延成翼柄。头状花序在茎顶端排成伞房状，花序梗及总苞下部被蛛丝状毛或有时被腺毛；总苞钟形，长12－15mm，宽6～10mm，暗绿色；总苞片2～3层，外层披针形，内层线形，先端渐尖或稍钝，边缘膜质。舌状花两性，黄色，长约1.5cm，舌片长约5mm，结实。瘦果倒卵状椭圆形，长约3mm，扁平，淡褐色，两面各具3条纵肋，肋间具粗糙横纹；冠毛白色，长约6mm。花果期4－11月。

生于海拔500－2 500m的山坡路边、田边。分布于全国各地。欧洲、中亚细亚、美洲北部和中部亦有。

采集加工 四季可采，鲜用或晒干备用。

药材性状 本品长50～100cm，茎圆柱形，具纵棱，灰绿色；上部具稀疏深褐色腺毛。质脆，易折断，断面白色，中空。叶片柔软，皱曲，无毛，平展后为长椭圆状披针形，长15～20cm，宽3－8cm，深羽裂或提琴状羽裂，裂片边缘具不整齐的短刺状齿或小尖齿，灰绿色，无毛；茎生叶片基部光耳状抱茎，基生叶片基部下延成柄。头状花序组成伞房状花序；总苞钟形，总苞片2－3层，外层披针形，内层线形，边缘膜质；舌状花黄色，两性，结实。瘦果倒卵状椭圆形，淡褐色，扁平，具纵肋，肋间具粗横纹，顶端具白色冠毛。气微，味苦。以体干，叶多，带花序者为佳。

性味与功用 苦，寒。清热解毒，凉血，止血。用于口腔炎，咽炎，扁桃体炎，肠炎，阑尾炎，乳腺炎，急性黄疸型肝炎，痢疾，吐血，衄血，咯血，便血，崩漏，痈疮肿毒，中耳炎等症。常用量15－30g，外用适量，捣烂或干品研粉敷患处；鲜品捣汁滴耳。



图 109　苦苣菜

翠　雀

别名　小草乌、细草乌、鸡爪连、土黄连、鹅耳花。

来源　本品为毛茛科植物翠雀 Delphinium grandiflorum L. 的干燥全草。

原植物　翠雀（图 110）为多年生草本，高 35～65cm；茎直立，分枝，与叶柄均被反曲、贴伏的短柔毛。基生叶与茎下部叶具长柄；叶片轮廓圆五角形，长 2.2～6cm，宽 4～8.5cm，3 全裂，中央全裂片近菱形，一至二回三裂近中脉，小裂片线状披针形至线形，宽 0.6～2.5mm，边缘干时稍反卷，侧全裂片扇形，不等二深裂近基部，叶面绿色，背面淡绿色，两面疏短柔毛或近无毛；叶柄基部具鞘，长为叶片的 3～4 倍。总状花序顶生，具 3～15 花；轴和花梗密被反曲短柔毛；小苞片线形或钻形；萼片 5，紫蓝色，椭圆形或宽椭圆形，长 1.2～1.8cm，外面被短柔毛，距钻形，长 1.7～2(～2.3)cm，直或末端稍向下弯曲；花瓣 2，蓝色，有距，无毛；退化雄蕊 2，蓝色，瓣片近倒形或宽倒卵形，顶端全缘或微凹，腹面中央有黄色髯毛；雄蕊多数，无毛；心皮 3，子房密被贴伏的短柔毛。蓇葖直，长 1.4～1.9cm；种子倒卵状四面体形，长约 2mm，沿棱有翅。花期 5～8 月，果期 6～10 月。

生于海拔 500～2 800m 的山地草坡或丘陵砂地。分布于云南北部、四川西北部、山西、河北、内蒙古、辽宁、吉林和黑龙江。蒙古和俄罗斯西北利亚亦有。

采收加工　夏季采集，除去枯叶、泥土，晒干。

药材性状　本品之主根类圆柱形，周围具多数须根，表面淡褐色；茎、叶皱曲呈团状，茎圆柱形，灰绿色。平展的完整叶圆五角形，长 2.2～6cm，3 全裂，中央全裂片近菱形，侧全裂片扇形，小裂片线形或线状披针形，疏被短柔毛或无毛；具长柄。花序总状，具 3～15 花，萼片 5，蓝紫色，椭圆形至宽椭圆形，距钻形；花瓣 2；退化雄蕊 2；雄蕊多数；心皮 3，子房密被短柔毛。气微，味苦。以干燥、带根，色绿者为佳。

性味与功用　苦，寒，有大毒。泻火止痛，杀虫。用于风湿牙痛，外用治疥癣，去头虱。外用：1.5～3g，水煎含漱，不可咽下，或搽患处。

附注　本品有大毒，不可内服。中毒后呼吸困难，血液循环障碍，肌肉、神经麻痹或产生痉挛现象。用时应注意。



图 110　翠雀

踏 地 香

别名 烧金草、地丁。

来源 本品为菊科植物大丁草 Gerbera anandria (L.) Sch. -Bip. (Tussilago anandria L.; Leibnitzia anandria (L.) Turcz.)的干燥全草。

原植物 大丁草（图111）为多年生草本，有春、秋2型。春型植株矮小，高5～20cm，秋型植株高30－60cm。叶基生，莲座状，宽卵形、椭圆状宽卵形至倒披针状长椭圆形，春型叶长2～5.5cm，秋型叶长5～16cm，顶端圆钝，基部心形或渐狭成叶柄，边缘提琴状羽状分裂，顶裂片较大，卵圆形，有不规则钝圆齿、齿端有凸尖头，下部裂片2～3对，较小，叶面绿色，背面连同叶柄密被白色蛛丝状绵毛，后渐脱落。花茎直立，密生白色蛛丝状绵毛，苞片条形，长5～7m;头状花序单个顶生，直径1－2cm；总苞钟形，长8～10mm;总苞片约3层，外层短线形、内层线状披针形，花淡紫红色 春型植株有筒状花和舌状花，秋形植株只有筒状花。瘦果长约5mm，两端收缩成纺锤形；冠毛污白色，长约5mm。

生于山坡、路旁、田边、林缘及灌丛中。分布于我国南北各省区。朝鲜、日本也有。

采收加工 夏、秋季采挖，洗净，晒干。

药材性状 本品长7－60cm。根茎短小，棕褐色，长1－2cm，直径约5mm，下面着生多数黄白色须根；须根直径1～2mm。叶基生，叶柄长3～10cm;叶片多皱缩，展平后呈宽卵形至倒披针状椭圆形，长2～16cm，宽1.5－5.5cm，叶脉明显，边缘具不规则圆齿，齿端有凸尖头，背面、叶柄及花茎密被白色蛛丝状绵毛。花茎近圆柱形，有纵棱，直径约3mm，常有单生的头状花序。气微，味苦。以带根及根状茎、叶完整者为佳。

性味与功用 苦、涩，寒。利湿，清热解毒，消肿止痛。用于风湿麻木，无名肿痛，感冒咳嗽，乳腺炎，肾炎，淋巴结结核，牙痛、头痛，痢疾，疝症腹痛，中耳炎。常用量15～30g；外用适量捣烂敷患处。

附注 大丁草根辛，温。用于小儿疳积，蛔虫病。常用量9～15g。



图111　大丁草

1. 植株；2. 舌状花；3. 管状花；4. 果实

爆 肚 叶

别名 酒瓶果、催生药、野石榴、乌提子、雅改颇（傣语）。

来源 本品为野牡丹科植物多花野牡丹 Melastoma affine D.Don（M. polyanthum Bl.）的干燥全草。

原植物 多花野牡丹（图112）为灌木，高1m；茎直立，近圆柱形或钝四棱形，多分枝，其上部与分枝均密被紧贴的糙伏毛。单叶对生，叶片坚纸质，披针形、卵状披针形或近椭圆形，长4～14cm，宽2～6cm，先端渐尖，基部圆形或近楔形，全缘，叶面绿色，密被糙伏毛，背面淡绿色，被糙伏毛及密被短柔毛，基出脉5条，在叶面凹陷，背面隆起；叶柄短，密被糙伏毛。伞房花序顶生，近头状，具10花以上；苞片狭披针形或钻形，长2～4mm，密被糙伏毛；花梗长3～10mm，密被糙伏毛；花两性，花萼长约1.6cm，5裂，裂片披针形，与萼筒近等长，密被鳞片状糙伏毛；花瓣5，倒卵形，长约2cm，粉红色至红色，上部具缘毛；雄蕊10，2型，5枚较大，紫色，具延长、2裂的药隔，5枚较小，黄色，基部有2小瘤；子房下位，5室，密被糙伏毛，顶端有1圈密刚毛。蒴果坛状球形，顶端平截，与宿存萼贴生，密被伏贴的鳞片状糙伏毛；种子多数、弯曲。花期2～5月，果期8～12月。

生于海拔300～1 830m的山坡、谷地林下或疏林中，或刺竹林下，灌丛中，溪边，路旁等处。分布于云南、贵州、广东、广西、福建和台湾。中南半岛、泰国、马来西亚、澳大利亚等国也有。

采收加工 夏、秋季采集，除去泥土，切段，晒干。

药材性状 本品之干燥茎近圆柱形或钝四棱形，黄褐色，密被棕色长毛。质坚，断面不整齐，类白色。对生叶披针形，卵状披针形或近椭圆形，长4～14cm，宽2～6cm，两面密被糙伏毛，灰绿色，基出脉5条。聚伞花序顶生，具10花以上，花大，粉红色。蒴果坛状球形，密被伏贴的鳞片状糙伏毛；种子多数。气微，味涩，苦。以带根，枝叶多，色绿者为佳。

性味与功用 甘，酸涩，微温。消积滞，收敛止血，散瘀消肿。用于消化不良，肠炎，肝炎，痢疾，疟疾，衄血，蜂窝组织炎，扁桃体炎，血栓性脉管炎，月经不调，外伤出血，跌打损伤等症。常用量15～50g；外用适量，研粉末撒敷患处。



图 112　多花野牡丹

1．植株下部；2．花枝；3．果

二、根和根状茎类



九眼独活

别名 土当归、食用楤木、独活、心叶九眼独活、川土当归。

来源 本品为五加科植物食用土当归Aralia cordata Thunb.的干燥根茎及根。

原植物 食用土当归（图113）为多年生草本，高0.5～3m；根茎粗大，长圆柱形。茎粗大，基部直径达2cm，分枝开展。二回或三回羽状复叶，互生，叶柄长15～30cm，无毛或疏被短柔毛；托叶与叶柄基部合生，先端分离部分锥形，长约3mm，具缘毛。羽片具3～5小叶；小叶片膜质或薄纸质，长卵形至长圆状卵形，长4～15cm，宽3～7cm，先端突尖，基部圆形或心形，侧生小叶基部歪斜，边缘具锯齿，叶面绿色，无毛，背面淡绿色，沿脉疏被短柔毛，侧脉6～8对，与网脉在叶面不明显；具小叶柄，长约2.5cm，顶生小叶柄长可达5cm；由伞形花序组成的圆锥花序顶生或腋生，长可达50cm；伞形花序直径1.5～2.5cm，总花梗长1～5cm，与长10～20mm、丝状花梗均被短柔毛；花白色；花萼长1.2～1.5mm，无毛，顶端具5个三角形尖齿；花瓣5，卵状三角形；雄蕊5，长约2mm；子房5，花柱5，离生。果球形，直径3mm，具5棱，熟时紫黑色，具宿存花柱。花期7～8月，果期9～10月。

生于海拔1 300～1 600m的山坡草丛中或林下。分布于广西、湖北、安徽、江西、江苏、福建和台湾。日本亦有。

采收加工 春、秋季采挖，除去茎叶、泥土，晒干。

药材性状 本品根茎呈圆条形，弯曲，不整齐，长在10～40cm之间，直径2～3.5cm，表面灰棕色或棕褐色，其上部具多数圆形凹陷、直径1.5～2.5cm、深约1cm的茎痕，每茎痕构成一个结节。根茎底部具数条圆柱形的根。根长2～15cm，直径4～15mm，具纵皱纹。质松脆、易折断，断面不平坦，灰黄色或黄白色，多裂隙及分泌腔。气芳香，味微苦、辛。以粗壮、气香浓者为佳。

性味与功用 微苦、辛，温。祛风和血，解热镇痛，利尿消肿，补虚。用于偏头痛，风湿疼痛，腰膝酸软疼痛，头痛，牙痛，疖疡等症。常用量3～9g。



图 113　食用土当归

1. 果枝；2. 药材（根茎）

三　七

别名　山漆、金不换、人参三七、参三七、田七。

来源　本品为五加科植物三七 Panax notogin-seng (Burk.)F.H. Chen ex C. Chow et al. (Aralia quinquefolia (L.) Decne. et Planch. var. notoginseng Burk.; Panax pseudo-ginseng Wall. var. notoginseng Hoo et Tseng)的干燥根茎。

原植物　三七（图114-1）为多年生草本，高20～60cm；根状茎短，其下生有1至多条纺缍形肉质主根、主根长2～6cm、直径约1～4cm、表面为褐色或灰黄色。茎直立、暗绿色、向上部变紫色，光滑无毛。掌状复叶3～6枚轮生茎顶；叶柄长5～11.5cm，光滑无毛；托叶线形，多数簇生；小叶4～5（～7）枚、小叶柄不等长，中央者长1.2～3.5cm、侧生者长2～12mm；小叶片膜质、长椭圆形至倒卵状长椭圆形、长7～13cm，宽2～5cm，先端渐尖至长渐尖，基部阔楔形至圆形，边缘具重锯齿，齿尖具短尖头、侧生小叶片较小，椭圆形至椭圆状卵形，叶面深绿色，背面稍淡，两面沿脉疏被刚毛，主脉与侧脉在两面凸起，网脉不明显。伞形花序单生茎顶，具80～130花，总花梗长7～25cm，无毛或疏被短柔毛，其基部具多数卵状披针形苞片；花梗纤细，长1～2cm，微被短柔毛，具线形或披针形小苞片数枚；花萼杯形，具5齿；花瓣5，长圆形，淡黄绿色；雄蕊5；子房2室、花柱2，基部合生。果扁球状肾形、直径1cm，成熟时鲜红色；种子白色、三角状卵形。花期7～8月，果期8～10月。

云南东南部、广西、广东栽培，福建、浙江、江西等省亦有试种。而以云南为主产区。

采收加工　栽培至第3年的立秋前后起挖，前10天割茎叶，待晴天起挖，洗净泥土，除去须根，晒干。

商品三七的加工为：将除去茎叶，洗净泥七，摘下须根的三七，晒2～3天（阴天用火烤），发软时剪下支根和芦头，分别晒干。主根为商品“头子”，支根为商品“筋条”，芦头称“剪口”。“头子”的加工为晒1天以后，进行搓揉，用力要匀，要轻、以防破皮，变黑，变形，经过7～8次曝晒，或在40～50℃的炭火上烘烤，揉搓、至铁实全干为止，称为“毛货”，再撑上粗糠，稻

谷装入麻袋内揉搓，增加光滑度，即商品“头子”。

药材性状 本品为圆柱形或圆锥形(图114-2)，长1～6cm，直径1～4cm，表面灰褐色或灰黄色，具纵皱纹及支根痕，顶端具根茎痕，周围有瘤状突起。体重坚实，断面灰绿色，黄绿色或灰白色，木质部呈放射状排列。气微，味甘回甜。筋条圆柱形，长2～6cm，上粗下细，直径5～8mm；剪口呈不规则的皱缩状及条状，具茎痕及环纹，断面中心灰白色，边缘灰色。以体重、坚实，表面光滑，断面灰绿色或黄绿色者为佳。

性味与功用 甘、微苦，温。活血、止血、散瘀、止痛、化痰，强壮滋补。用于咯血、吐血、衄血、便血、崩漏、外伤出血，胸腹刺痛，跌打肿痛，月经不调等症。常用量：生用3～10g，熟用10～15g。

附注 三七叶味辛，有止血、消肿定痛之功效。用于吐血、便血、外伤出血、痛肿毒疮等症。三七花味甘，性凉，有清热，平肝，降压之功效。用于高血压，头昏、目眩、耳鸣、急性咽喉炎等症。



图 114-1　三七

1. 果枝；2. 根状茎及根



图 114-2　三七(药材)

三台花

别名 三台、火山麻、三台树、三匹柳、八棱麻。

来源 本品为马鞭草科植物三台花Clerodendron serratum (Linn.) Moon var. amplexifolium Moldenke 的干燥根皮。

原植物 三台花（图115）为灌木、亚灌木或草本，高1－4m。根稍粗壮，灰褐色。茎圆柱形或有棱，节膨大，枝略呈四棱形，红褐色或黄色，幼时被污黄褐色短柔毛、节上尤密，老时渐脱落。单叶对生或有时3叶轮生，叶片长倒卵形或长椭圆形，长13～30cm，宽4.5～11cm，先端渐尖或锐尖，基部楔形，边缘具锯齿，叶面绿色，背面淡绿色，两面疏被柔毛，侧脉10～11对，第三级脉近平行；叶柄长5～10mm。聚伞花序排成塔状或圆柱状顶生圆锥花序，花序总梗、轴及花梗均密被黄锈色柔毛；每轮分枝基部具2－3枚叶状苞片，苞片卵圆形或卵形，长5～15mm；花萼钟状，长约5mm，被短柔毛，顶端平截或通常具5钝齿；花冠蓝紫色至白色，二唇形，花冠管圆柱形，长约7mm，5裂，裂片倒卵形或长圆形，长短大小不一，长6～12mm；雄蕊4，伸出花冠外，花丝基部被柔毛；花柱稍长于雄蕊。核果绿色转黑色，小坚果1－4，卵形。花期6～10月，果期9～12月。

生于海拔630－1 700m的山坡疏林下或林缘较阴湿处。分布于云南南部、贵州西南部。

采收加工 秋、冬季采挖，洗净，剥取根皮，晒干。

药材性状 本品为卷曲形的片状物，大小不等，片厚1～4mm。外表面黄棕色，较粗糙，时有未刮净的腐烂斑块；内表面为棕红色，具纵条纹。质坚脆，易折断；断面粗糙，颗粒状，黄白色。以皮厚，断面黄色者为佳。

性味与功用 辛、微苦，凉。截疟，清热解毒，消炎杀菌。用于疟疾，月经不调，痛经，尿淋，急性肠炎，细菌性痢疾。常用量9－15g。外用，捣敷。

附注 （1）本种之原变种三对节C. serratum(Linn.) Moon产于云南南部、贵州和广西，与三台花之主要区别为叶常对生或3叶轮生，但叶基楔形，不抱茎。其根皮入药，功效同本品。（2）本品和三对节之根、茎、叶也入药，功效相同。



图 115　三台花

三　角　草

别名　割鸡刀、一嵇草。

来源　本品为莎草科植物毛果珍珠茅 Scleria levis Retz.的干燥根状茎。

原植物　毛果珍珠茅（图116）为多年生草本，高70～100cm；根状茎木质，较粗，被紫黑色鳞片。杆散生或疏丛生，粗壮，三棱形，被微柔毛。叶线形，长约30cm，宽7～10mm，基部叶鞘顶端具3齿，中部叶鞘绿色，具1～3mm的翅。圆锥花序顶生或侧生，具1～2个远离的支花序，支花序长3～8cm，花序轴略被微柔毛；苞片叶状，与花序近等长；小苞片刚毛状；小穗单生或2个簇生，长约3mm，单性；雄小穗狭卵形，顶端斜截；鳞片长1.5～3mm，先端具短芒，下部的具龙骨状突起；雌小穗在分枝的基部，狭卵状披针形，鳞片长圆状卵形，具龙骨状突起，先端具短芒；雄花具雄蕊3，花药线形，药隔突出部分为花药长的1/3～1/2；雌花子房球形，柱头3。小坚果近球形，直径约2mm，具三钝棱，白色，表面具不显著的横波纹，其上略被微柔毛；下位盘略狭于小坚果，淡黄色，3深裂，裂片近披针状三角形，边缘反折。花果期7～10月。

生于海拔1 500m左右的山坡草地或灌丛中及林下。分布于我国西南，华南及华东的江苏、浙江、福建和台湾。印度、斯里兰卡、中南半岛、马来西亚、印度尼西亚、大洋洲和日本亦有。

采收加工　夏季采挖，除去泥土，茎叶，洗净，晒干备用。

药材性状　干燥根状茎为不规则的块状。上部具茎残基或痕，表面棕黑色，具瘤状突起和须根或须根痕。质坚脆，断面不整齐。气微，味辛，微苦。以体干，质坚实者为佳。

性味与功用　辛、微苦，温。消肿解毒，消积。用于小儿单纯性消化不良，食积腹胀、痢疾、咳嗽，毒蛇咬伤等症。常用量3～9g。

附注　孕妇忌服。



图 116　毛果珍珠茅

大 苞 姜

别名 姜三七、老姓尿泡、曲蕊姜。

来源 本品为姜科植物大苞姜 Caulokaempferia yunnanensis (Gagnep.) R. M.Smith (Monolophus yunnanensis (Gagnep.) T.L. Wu et Senjen; Kaempferia yunnanensis Gagnep.)的干燥根茎。

原植物 大苞姜（图117）为多年生草本，高25～55cm；根茎球形，须根粗壮。茎直立、圆柱形。叶互生，3～5片，叶片长圆形、长圆状披针形或卵形，长8～20cm，宽4～5cm，先端渐尖，基部急尖，近圆形或渐狭成槽状叶柄，绿色，叶面无毛，背面被短柔毛；叶柄长0.5～7cm，叶舌薄膜质，2裂。花序顶生，具苞片1～3枚，苞片叶状，长7～13cm，基部边缘与花序轴贴成囊状，每苞片内具1～2花，花黄色，易凋谢；花萼管状，一侧开裂，顶端具2齿；花冠管狭长，长为萼管的一倍，口部变宽、3裂，裂片狭披针形，后方的1枚宽为两侧2枚的一倍；侧生退化雄蕊近线形，与花冠裂片近等长；唇瓣2深裂，裂片卵形；花丝短，药隔顶端附属体三角形，全缘；子房倒卵形。蒴果近圆形，直径约1cm，果皮具细脉纹；种子卵形。花期9～10月。

生于海拔1 500～2 800m的山地密林中。分布于云南、四川。

采收加工 秋、冬采挖，除去茎叶、洗净，切片晒干。

药材性状 本品近球形，直径1.5～2cm，表皮黄色。顶端具茎残基或茎痕，球体具纵的皱纹及微注点，具环状纹及鳞片。底部具粗根或圆形根痕。质坚硬，不易折断，断面粉质，白色。气微，味微辛。以大小均匀，质坚实，粉质，色黄褐者为佳。

性味与功用 辛，温。补气，补血，止血，消肿止痛。用于跌打损伤，骨折，吐血、衄血，子宫功能性出血，外伤出血等症。常用量3～9g，煎服。



图 117　大苞姜

山　百　部

别名　土百部、乌小天冬、乌麦冬、铁扫把、滇百部。

来源　本品为百合科植物短梗天门冬Asparagus lycopodineus Wall.ex Baker的干燥块根。

原植物　短梗天门冬（图118）为直立草本，高45～100cm。根通常在距基部1～4cm处膨大成纺缍状。茎平滑或略有条纹，上部有时具翅，分枝全部有翅。叶状枝通常每3枚成簇，扁平，镰刀状，长（2～）5～12mm，宽1～3mm，有中脉；鳞片状叶基部近无柄。花1～4朵腋生，单性，雌雄异株，白色；花梗长1～1.5mm；雄花：花被片6，椭圆状卵形，长3～4mm，2轮；雄蕊6，不等长，花丝下部贴生于花被片上；雌花较小，花被片长约2mm；雌蕊1，子房3室，花柱明显，柱头3裂。浆果球形，直径5～6mm，基部有宿存花被片，通常有2颗种子。花果期5～9月。

生于海拔450～2 600m的山坡灌丛中或林下。分布于云南、四川、贵州、广西、湖北、湖南、陕西、甘肃等省区。缅甸和印度也有。

采收加工　秋、冬季采挖，洗净，晒干或放入锅内煮至透心，趁热除去外皮，洗净，干燥。

药材性状　根多数丛生，少有单生；块根呈长纺缍形，两端尖，通常生于距根茎1～4cm，膨大部分长1.5～3.5cm，粗5～8mm，较少近于不膨大。表面皱缩，灰棕色、棕褐色（未去皮者）或黄棕色（去皮者），干后多呈空壳状。质坚韧而脆，易折断，断面黄白色，内心空虚少肉质，未充分干燥者，断面白色带粘性，肉质、皮部厚，中柱明显。气微，味甘，微酸，带麻。以肥满、致密、断面黄白色者为佳。

性味与功用　甘，平。归肺经。止咳，化痰，平喘，滋阴润肺。用于咳嗽痰多，气逆，肺痨久咳，疥癣。常用量9～15g；外用适量，捣烂敷患处。

附注　本种常被错误鉴定为羊齿天门冬，但可通过叶状枝每3枚或簇与羊齿天门冬每5～8枚成簇面区分。



图 118　短梗天门冬
1. 根；2. 果枝

山　荷　叶

别名　金边七、阿二七、一碗水、一把伞、窝儿参。

来源　本品为小檗科植物南方山荷叶 Diphylleia sinensis Li (D. cymosa Michx. ssp. sinensis (Li) Shimizu)的干燥根茎。

原植物　南方山荷叶（图119）为多年生草本，高50～80cm；根状茎横走，粗壮，具节，节上具多数圆柱形须根及老而枯死后残留的白状疤痕，连续排列，呈结节状。茎单一，肉质，具条纹，无毛或偶尔上部稍被纤柔毛。基生叶具长柄，长可达45cm，茎生叶具较短叶柄，无毛或被细柔毛；叶片近圆形，长10～20cm，宽15～40cm，先端2裂，边缘具不整齐齿，齿端具尖头。聚伞花序顶生，花序轴及花梗均被短柔毛；花梗长0.5～3cm；萼片6，膜质，卵形，长4～8mm，内凹；花瓣近圆形，长2～4mm；雄蕊6～8，长约4.5mm，花药长圆形，花丝较粗壮；心皮与雄蕊近等长，无毛。浆果椭圆形或球形，蓝黑色，直径7～9mm，微被白粉；果柄红色。花期7月，果期9～10月。

生于海拔2 800～3 000m的山坡杂木林下。分布于云南西北部、四川、湖北西部、陕西和甘肃南部。

采收加工　秋季采挖，除去泥土，茎叶及须根，洗净，阴干备用。

药材性状　干燥根状茎圆柱形，或类圆柱形，长5～15cm，直径3～5cm，弯曲，外表皮棕褐色，顶端具茎残基或茎痕，具节和横的皱纹，上面具一列老而枯死的茎痕，呈圆形白状疤痕，连续排列成结节状，其余部分具须根或圆形须根残基或痕。质坚脆，易折断，断面不整齐，类白色。气微，味苦、辛。以个大，质坚实，色棕褐者为佳。

性味与功用　苦、辛，温。有毒。活血化瘀，解毒消肿，止痛。用于风湿骨痛，跌打损伤，月经不调，小腹疼痛，痈疖肿毒；毒蛇咬伤。常用量3～6g，水煎或泡酒服；外用适量，捣烂或研粉、用酒、醋调敷患处。



图 119　南方山荷叶

1. 根状茎及根；2. 果枝

山 紫 菀

别名 川紫菀、光紫菀、棕色锉头草。

来源 本品为菊科植物离舌橐吾Ligularia veitchiana (Hemsl.) Greenm.(Senecio veitchianus Hemsl.)的干燥根及根状茎。

原植物 离舌橐吾（图120）为多年生草本，高60～120cm。根多数，肉质。茎上部及花序幼时被白色蛛丝状毛和黄褐色有节短柔毛，后蛛丝状毛脱落，基部被枯叶柄纤维包围。基生叶和茎下部叶具长柄，叶柄完全成熟后上面平、下面半圆形，基部具窄鞘；叶片三角状或卵状心形、有进近肾形，长7～17cm，宽12～26cm，顶端圆或钝，有时具小尖头，边缘具锯齿，基部弯缺宽、长为叶片的1/3，两侧叶片长圆形或近圆形，两面光滑或下面脉上被毛；茎中上部叶较小，具短柄或无柄，鞘膨大、全缘。总状花序顶生，长13～40cm；苞片常位于花梗中部，宽卵形或卵状披针形，全缘或上半部有齿；头状花序多数，辐射状；小苞片狭披针形至线形；总苞钟形或筒状，长8～10(～15)mm，总苞片7～9，长圆形，顶端急尖，背面被毛；舌状花5～10，黄色，疏离，舌片狭倒披针形，长13～22mm；管状花多数。瘦果圆柱形；冠毛污白色。花期7～9月。

生于海拔1 400～3 300m的河边、山坡及林下。分布于云南、四川、贵州、湖北、甘肃、陕西等省。

采收加工 早春或7～11月采挖，去茎叶及泥土，干燥至根硬质脆时，投入石臼内磨擦或烧去（不能使根茎烧焦）须根至表面粗皮脱落折断，再干燥至全干。

药材性状 根状茎呈不规则块状，长4～6cm，直径2～6cm。表面灰褐色至黑褐色，密布须根断落后的白黄色点状痕迹，上端有茎基痕及残存叶柄纤维状须毛（维管束）。质重实，断面白色、灰白色至黄白色。气微香，味淡。以身干、无残存须根者为佳。

性味与功用 苦、微辛、湿。归肺经。润肺，化痰，止咳。用于支气管炎，咳喘，肺结核，咯血，气逆咳嗽。常用量6～9g。



图 120　离舌橐吾

川　牛　膝

别名　甜牛膝、拐牛膝、大牛膝。

来源　本品为苋科植物川牛膝 Cyathula officinalis Kuan 的干燥根。

原植物　川牛膝（图121）为多年生草本，高40～100cm。主根粗壮，圆柱形。茎下部圆柱形，中部以上近四棱形，疏生长糙毛。节处略膨大。叶对生，椭圆形或狭椭圆形，长3～13cm，顶端渐尖，基部楔形或宽楔形，全缘，上面密生倒伏糙毛，下面被长柔毛；叶柄长3～15mm。花绿白色，多数簇生成顶生和腋生的头状花序，单生或数个生于一节成短穗状；苞片卵形，长3～5mm，干膜质，顶端成刺或钩状，基部有柔毛；苞腋有花数朵，能育花居中央，不育花花被退化成2～5枚钩状芒刺，能育花花被2长3短；雄蕊5，花丝基部合生成杯状，有纵生长柔毛，退化雄蕊长方形，顶端齿状浅裂；子房上位，1室，花柱细。胞果长椭圆状倒卵形，长2～5mm；种子小，卵形。

生于海拔1 500m左右的山区林缘或草丛中。分布于四川、云南、贵州等省。亦有栽培。

采收加工　秋冬季采挖，栽培品以生长3～4年者为好，除去残茎和须根，烘干或晒至半干时，经发汗后再晒至足干，野生的多为阴干或晒干。

药材性状　根条呈圆柱状，不扭曲或略扭曲，根头部膨大，根下端渐细，或有少数细小侧根，长30～70cm，直径约1～2cm。全体具纵皱纹及侧根去掉后的痕迹；表面棕黄色或黑灰色。质坚韧，不易折断。切面灰黄色至暗棕色，可见许多颜色较淡的小点，并析出油质物，排列成环约3～8层，中心的1个较大。味甘或微苦，气微，野生品种较硬而坚实，易折断，断面灰黄色。以根粗、分枝少、无芦头、质柔韧、纤维少者为佳。

性味与功用　甘、微苦，平。归肝、肾经。祛风湿，活血通经，利尿通淋。用于风湿腰膝疼痛，血淋，瘀血闭经，难产，胞衣不下，产后瘀血腹痛，跌打损伤。常用量5～9g。



图 121　川牛膝

1. 花枝；2. 花；3. 花冠展开、示雄蕊；4. 药材（根）

广东狼毒

别名 痕芋头、野芋头。

来源 本品为天南星科植物海芋 Alocasia macrorrhiza (Linn.)Schott (Arum macrorrhizum Linn.)的干燥根茎

原植物 海芋（图122）为多年生常绿草本植物，高可达5m；根茎圆柱形，匍匐。茎粗壮，直径10～30cm。单叶互生，叶片亚革质，阔卵形或箭状卵形，长50～90cm，宽40～90cm，先端短尖，基部箭状心形，2裂，裂片先端浑圆，弯缺锐尖，几达叶柄，边缘波状，或全缘，叶面绿色，背面稍淡，侧脉9～12条，粗大，明显，叶柄粗大，长60～90（～150）cm，基部鞘状抱茎 花单性，雌雄同株；花序柄2～3个从生叶腋内，圆柱形，粗壮，长20～60cm，绿色，稀污紫色；佛焰苞管卵形或椭圆形，长3～5cm，直径2～4cm，绿色，檐部长圆形，舟状，长10～30cm，黄绿色或绿白色；肉穗花序短于佛焰苞，雌花序长2～4cm，白色，位于最下部；不育雄花序长5～6cm，绿白色，位于中部；能育雄花序淡黄色，长3～7cm，位于上部；附属器圆锥形，长3～5.5cm，直径1～2cm，淡绿色或乳黄色，具不规则之网纹。浆果卵形，长8～10mm，直径5～8mm，红色，花期：一年四季。

生于海拔1 700m以下的热带雨林林缘或沟谷野芭蕉林中。分布于云南、四川、贵州、广西、广东、湖南、江西、福建和台湾。印度东北部、孟加拉国至中南半岛、马来半岛及菲律宾、印度尼西亚也有。

采收加工 全年可采，除去茎叶，剥去外皮，切片，置于清水中浸漂5～7天，多次换水，取出晒干。注意：剥皮及切片时，要以布或纸垫手，以免中毒。

药材性状 本品干燥根茎呈椭圆形，长椭圆形或圆柱形，大小不等，大者长达30cm，直径3～6cm，表面时有未除尽的栓皮及环状节和圆形须根。切片呈圆形或长圆形，厚1～2cm，直径3～6cm。质坚实，断面白色，粉质，具淡黄色点状散生的维管束，内皮层环清晰。气微，味淡，麻。以体干，质坚实，断面白色者为佳。

性味与功用 辛，寒；有大毒。清热解毒，消肿散结。用于疟疾，腹痛吐泻，肠伤寒，风湿痛，疝气，痈疽肿毒，萎缩性鼻炎，瘰疬，疔疮，疥癣，蛇犬咬伤等。常用量3～9g。



图122　海芋

小 棕 包

别名 七仙丹、披麻草。

来源 本品为百合科植物狭叶藜芦Veratrum stenophyllum Diels的干燥根及根茎。

原植物 狭叶藜芦（图123）为多年生草本，高达1m。根状茎粗短，具多数稍肉质、成束的须根。茎直立，圆柱形，基部有数枚浅白色或棕褐色的膜质鞘；鞘枯死后，成为带网眼的纤维或至少在鞘端如此。叶在下部的（近基生）带状、狭长圆形、倒披针形或有时近狭镰刀状，长约30cm或更长，先端锐尖，基部收窄成鞘，抱茎，全缘，两面无毛。圆锥花序通常狭而紧窄，由短或细长的侧生总状花序紧靠花序总轴而直立伸展所形成，花密集；侧生总状花序轴纤弱，通常生雄性花，顶生总状花序生两性花；总轴和花轴密生白色绵毛；每一侧生花序基部有1枚苞片，花梗长2～3mm，近等于或短于小苞片；花被片6，淡黄绿色，近直立或平展，长圆形或卵状长圆形，通常长5～7mm，先端稍尖，基部收窄成短柄状；雄蕊6；子房近长圆形。蒴果直立，椭圆形，花果期7～10月。

生于海拔2 000～4 000m的山坡草地或林下阴处。分布于云南、四川。

采收加工 秋、冬季采收，除去茎叶，洗净，晒干。

药材性状 本品根状茎圆柱形，粗短，表面棕黄色或黄色，上部残留叶基及毛鳞状黑褐色枯死叶鞘，周围具多数成束的须根。须根长10～20cm，直径约1～3mm，表面黄白色或灰褐色，有细密横皱纹，下端多纵皱纹；质轻易折断，断面白色，粉性，中心有一淡黄色纤细木质部，易与皮部分离。气微，味极苦，粉末有强烈的催嚏性。以根粗，坚实，断面粉性者为佳。

性味与功用 苦、辛、麻，凉。有大毒。归肺、胃经。散瘀消肿，镇痛止血，祛痰，开窍，杀虫。用于跌打损伤，骨折，外伤出血，截瘫，癫痫，风湿疼痛，疥癣恶疮，毒蛇咬伤。常用量0.3～0.6g，温水送服以吐；外用适量捣烂敷患处。

附注 （1）本品忌与人参、玄参、丹参、党参、苦参、细辛、芍药配伍使用。（2）体虚气弱及孕妇忌服。低血压、主动脉狭窄、嗜铬细胞瘤、洋地黄中毒及非由高血压继发的颅内压升高患者禁用。本品毒性猛烈，内服宜慎。



图123　狭叶藜芦

1. 植株；2. 花果枝；3. 花；4. 药材（根茎及根）

天 生 草

别名 山韭菜、白千针万线草、土漏芦、漏芦、蛇咬药。

来源 本品为百合科植物小鹭鸶草 Diuranthera minor(C.H.Wright) Hemsl.(Paradisea minor C.H.Wright)的干燥根。

原植物 小鹭鸶草（图124）为多年生草本，高30～85cm；根状茎短，生多数条状根，黄褐色。叶基生，约10枚，线形，长15～35cm，宽7～11mm，下部叶明显下弯，先端长渐尖，基部渐狭，边缘具极细的锯齿，绿色。花葶直立，不分枝或少数分枝；总状花序顶生，稀为圆锥花序，少花；苞片狭三角形，短于花梗；花白色，直径2.5～3.5cm，花梗长6～7.5mm，具关节；花被片6枚，内外两轮各3枚，近等长，均具5脉，外轮3枚线形，长约2cm，宽约3.5mm，先端渐尖，内轮较宽，宽6.5mm；雄蕊6，短于花被片，花丝丝线形，花药长8.5mm，近马形，背部着生，呈丁字状，基部箭形，似具2平行的尾，尾长1～1.5mm；子房无柄，3室。蒴果具3裂片；种子近圆形，基部心形，种皮黑色，具斑点。

生于海拔2 700m的山坡草地、松林下或路边。分布于云南。

采收加工 夏、秋季采挖，洗净，晒干。

药材性状 本品之干燥根细圆柱形，弯曲，长10～30cm，直径约5mm，表面具纵条纹及须根痕，淡黄褐色，质脆，易折断，断面粗糙，类白色。气微，味甘。以根肥壮，色黄褐者为佳。

性味与功用 味甘，性平。清热解毒，健脾利湿，用于风湿，小儿疳积，乳腺炎，毒蛇咬伤等症。常用量9～15g。



图 124　小鸢尾草
1. 植株；2. 雄蕊

云南萝芙木

别名　三叶暗消、苦闷药、勒毒、辣多（傣语）。

来源　本品为夹竹桃科植物云南萝芙木Rauvolfia yunnanensis Tsiang的干燥根。

原植物　云南萝芙木（图125）为灌木，全株无毛；茎皮杆黄色或灰白色，具稀疏的皮孔。单叶对生，叶片膜质，椭圆形或披针状椭圆形，长6～20cm，宽2～9cm，先端长渐尖，基部楔形，全缘，侧脉12～17对，两面明显；叶柄长1cm。聚伞花序腋生，花多达150朵，稠密；总花梗长2～7cm；花萼钟状，5裂；花冠白色，花冠筒中央膨大，内面被长柔毛，裂片5，阔卵形，长宽近相等；雄蕊着生于花冠筒膨大处，花药背着，内藏；花盘环状；子房由2离生心皮组成，花柱圆柱形，柱头棒状，基部具一环状薄膜。核果椭圆形，扁平，长约1cm，红色。花期3～12月，果期5月至翌年春季。

常生于海拔900～1 300m的山地溪旁，密林荫处或灌丛中。分布于云南、贵州和广西。

采收加工　全年可采，除去泥土，砍成20～30cm的段，晒干。

药材性状　本品为圆柱形，长15～30cm，直径0.5～2cm，通常具支根，表面具不规则的纵皱褶及沟槽，灰棕色至灰黄色。栓皮较疏松，易脱落。质坚硬，不易折断，断面不平坦，射线极纤细。气微带芳香，味苦，皮部较木质部更苦。以粗细均匀，色棕黄者为佳。

性味与功用　苦，寒，有小毒。降压镇痛，清热解毒，截疟。用于高血压及其引起的头痛、眩晕、失眠，癫痫，疟疾，跌打损伤，毒蛇咬伤等症。常用量15～30g。

附注　孕妇忌服。



图 125　云南萝芙木
1. 根；2. 果枝

牛 尾 菜

别名 草拔葜、摇边竹、白须公、金刚豆藤、大伸筋草。

来源 本品为菝葜科植物牛尾菜 Smilax riparia A.DC. 的干燥根状茎及根。

原植物 牛尾菜（图126）为草质藤本，长1～2m，具根状茎。茎中空，有少量髓，干后凹瘪，具槽，无刺。叶片较厚，卵形、椭圆形至长圆状披针形，形状变化较大，长7～15cm，先端急尖或渐尖，基部圆形至浅心形，背面绿色，无毛；叶柄长7～20mm，脱落点位于上部，通常在中部以下有卷须。花单性，雌雄异株，淡绿色，多朵排成伞形花序；总花梗较纤细，长3～10cm；小苞片长1～2mm，在花期一般不落；雄花：花被片6，长4～5mm；雄蕊6，长2～3mm，花药线形，多少弯曲，长约1.5mm；雌花比雄花略小，不具或具钻形退化雄蕊，子房3室，花柱较短，柱头3裂。浆果球形，直径7～9mm，成熟时黑色。花果期6～10月。

生于海拔1 600m以下的林下、灌丛、山沟、山坡草丛中。我国除内蒙古、新疆、西藏、青海、宁夏及四川、云南高山地区外，全国都有分布。朝鲜、日本、菲律宾也有。

采收加工 夏、秋季采收，洗净，晒干。

药材性状 根多数丛生，细长圆柱形，长10～80cm，粗1～2mm；表面灰褐色或灰棕色，平滑，质韧，不易折断，富弹性。断面外圈为灰棕色环，内有一圈排列均匀的小孔。根状茎不规则块状，略横向而弯曲。气无，味淡。

性味与功用 甘、苦，平。归肝经。补气活血，舒筋通络。用于气虚浮肿，筋骨疼痛，偏瘫，头晕头疼，咳嗽吐血，慢性支气管炎，骨结核。常用量9～15g。

附注 本种嫩叶炸熟水浸漂净后可以作蔬菜食用。



图 126　牛尾菜

1. 根状茎及根；2. 果枝

长蕊万寿竹

别名 竹叶落得打、万寿竹

来源 本品为百合科植物长蕊万寿竹 Disporum bodinieri (Lévl. et Vant) Wang et Tang (Tovaria bodinieri Lévl. et Vant.)的干燥根及根茎。

原植物 长蕊万寿竹（图127）为多年生草本，高30～70(～100)cm。叶互生，厚纸质，椭圆形、卵形至卵状披针形，长5～15cm，先端渐尖至尾状渐尖，基部近圆形或微心形，全缘，下面脉上和边缘稍粗糙；叶柄长5～10mm。伞形花序生于茎和分枝顶端，有花2～6朵；花梗长1.5～2.5cm，有乳头状突起；花被片6，白色或黄绿色，倒卵状披针形，长10～19mm，顶端尖，基部有长1～2mm的短矩；花丝等于或稍长于花被片，花药长约3mm，露出于花被外；花柱长，明显高于花药之上。浆果球形，直径5～10mm；种子球形或三角状卵形，直径3～4mm，棕色。花期3～5月，果期6～11月。

生于海拔400～3 100m的山坡、灌丛、竹林中或林下岩石上。分布于贵州、云南、四川、西藏、陕西、甘肃等省区。

采收加工 春、秋季采挖，洗净，晒干。

药材性状 根簇生，状如马尾，稍肉质，长可达30cm，粗1～2mm。外表灰黄色或浅黄棕色，有显著的纵皱纹或细毛，顶端有残留的茎基和圆盘状疤痕。质脆，易折断，断面略平坦，黄白色，中央有细小的黄色木心。根茎粗短，略呈块状。气微，味淡而甚粘。

性味与功用 甘、淡，平。归肺、脾经。清热化痰，止咳，健胃消食，舒筋活血。用于肺结核咳嗽，食欲不振，胸腹胀满，筋骨疼痛，腰腿痛，烫伤，骨折。常用量9～15g；外用适量捣烂敷伤处。

附注 四川、贵州个别地区误以本品作“白蔹”入药，应注意区别。



图127　长蕊万寿竹

1. 植株下部; 2. 花果枝

心叶百合

别名 云兜铃、山菠萝根、山芋头、荞麦叶贝母、荞麦叶大百合。

来源 本品为百合科植物大百合Cardiocrinum giganteum(Wall.)Makino [Lilium giganteum Wall; Cardiocrinum giganteum var.yunnanense(Leicht. ex Elwes)Stearn] 干燥鳞茎。

原植物 大百合（图128）为多年生草本，高1－2m；小鳞茎卵形，高3～4cm，直径1－2.5cm，干时淡褐色，鳞片肉质，富含淀粉。茎直立，中空，无毛，单叶互生，叶片纸质，基生叶卵状心形或长圆状心形，茎生叶卵状心形，下部者长15－20cm，宽12～15cm，向上渐小，靠近花序的数枚近苞状，叶面绿色，背面有时红色；叶柄长15－20cm。总状花序顶生，具10～16花，苞片早落；花狭喇叭形，白色，里面具淡紫红色条纹；花被片6枚，线状倒披针形，长12～15cm，宽1.5－2cm；雄蕊6枚，长约为花瓣的1/2；子房圆柱形，长2.5－3cm，花柱长5－6cm，柱头膨大，微3裂。蒴果近球形，长4－6cm，直径3.5－5cm，黄褐色，具6钝棱及多数细横纹，3瓣裂；种子多数，钝三角形，长4－5mm，宽2～3mm，红棕色，周围具淡红棕色半透明的膜质翅。花期5～7月，果期9～10月。

生于海拔1 450－3 700m的山坡阔叶林下、林缘、灌丛中、草坡。分布于云南、四川、贵州、陕西、湖南及广西。印度、尼泊尔、不丹也有。

采收加工 夏、秋季采集，除去茎、叶和泥土，洗净，晒干。

药材性状 本品之小鳞茎卵形，高3～4cm，直径1～2.5cm，表面淡褐色；鳞瓣肉质，富含淀粉。气微，味淡。以鳞瓣个大，肉质，色淡褐色者为佳。

性味与功用 甘、淡、凉。清热解毒，止咳。用于肺结核咯血，小儿高烧，鼻窦炎，中耳炎，胃痛。常用量3～9g。

附注 本种之种子云南称云兜铃，味苦，性寒。降气，清热。用于肺热咳嗽，气喘。



图 128　大百合

石 妹 刺

别名 大黄连刺、土黄连、三棵针、鸡脚黄连、刺黄连

来源 本品为小檗科植物粉叶小檗 Berberis pruinosa Franch.的干燥根。

原植物 粉叶小檗（图129）为常绿灌木，高1－2m；根粗壮，棕褐色，断面鲜黄色。茎圆柱形，具分枝，小枝黄色，刺粗壮，三分叉，长2～3.5cm。叶3－5枚簇生，叶片革质，椭圆形至长圆状椭圆形、披针形，长2－7cm，宽8～20mm，先端急尖或短渐尖，基部楔形，叶缘基部以上具1－6枚粗齿，齿间淡绿色，被白粉，无毛，侧脉不明显；近无柄。花8～20朵簇生于叶腋，花梗长1－1.5cm；小苞片2～3，披针形，宿存；萼片2轮，外轮长圆状椭圆形，长约4mm，宽约2mm，内轮倒卵形，长约6.5mm，宽约5mm；花瓣6，倒卵形，黄色，长约7mm，宽约4mm，先端深锐裂，基部具2枚腺体；雄蕊6，长约6mm。浆果卵状椭圆形，长6－7mm，蓝黑色，被白粉，无宿存花柱，含种子2粒。花期3－4月，果期6－8月。

生于海拔1 850～3 300m的路边、山坡灌丛中或林旁。分布于云南中部、东北部和西北部，西藏东南部和广西西北部。

采收加工 全年可采，而以秋冬季采集为佳，洗净，晒干。

药材性状 本品之干燥根粗细不等，直径2～6cm，通常不规则的弯曲，具纵皱棱槽，外表皮黄褐色或黄色，质坚硬，不易折断，断面皮层深黄色，木质部淡黄色，具明显的排列紧密的辐射性射线。气微，味极苦。以色黄、苦味重者为佳。

性味与功用 苦、寒。消炎，抗菌，清热解毒，截疟。用于菌痢、肠炎，腮腺炎，上呼吸道炎症，感冒，乳腺炎，急性黄疸型肝炎，牙龈肿痛，结膜炎，滴虫性阴道炎，疟疾等症。常用量9～15g。

附注 与粉叶小檗同属的金花小檗B.wilsonae Hemsl.et Wils.，产于云南、四川和贵州，其根入药，功效与粉叶小檗同。



图 129　粉叶小檗

石 莲 青

来源 本品为川续断科植物裂叶翼首花Pterocephalus bretschneideri (Bat.) Pritz. (Scabiosa bretschneideri Bat.) 的干燥根。

原植物 裂叶翼首花（图130）为多年生草本，高30cm；根圆柱形，直径3～8mm，外皮棕褐色，里面黄白色。叶基生，密集成莲座状；叶片轮廓狭长圆形或倒披针形，长5～20cm，1～2回羽状深裂或全裂，裂片线形至阔线形，小裂片先端急尖，叶面绿色，背面淡绿色，两面疏被柔毛；叶柄长3～10cm。花葶由叶丛中抽出，高约30cm，圆柱形，具纵棱，疏被白色卷伏毛，近花序处较密，无叶；头状花序单生花葶顶端，扁球形，直径2.5～3cm；花托密被白色毛；苞片线状倒披针形，褐色，长4～6mm，被疏柔毛；总苞片两轮，10～14枚，宽线形，具中脉，被白色疏柔毛；苞片小，线状到披针形，先端渐尖，褐色，长4～6mm，微被疏柔毛；小总苞椭圆状倒卵形，长1～5mm，具8条肋棱，密被白色糙毛；花萼长10～12mm，全裂成8条刚毛状，棕褐色，被极短毛；花冠粉红色至紫红色，长约12mm，冠筒长7mm，被白色柔毛，4裂，微二唇形，最上1枚稍大，其余3枚较小，具棕色脉纹；雄蕊4，伸出花冠筒外。瘦果椭圆形，长约4mm，具8条纵脉纹，顶端喙状，基部具刚毛状宿存萼。花期7～8月，果期9～10月。

生于海拔1 600～3 400m的山地岩石缝中或林下草地。分布于云南、四川。

采收加工 秋末冬初采挖，除去茎叶和泥土，晒干。

药材性状 本品之干燥根圆柱形，稍弯曲，长8～15cm，直径3～8mm，外皮棕褐色，具纵皱纹和横纹，可见须根残基或疤痕。质坚脆，断面黄白色，具淡褐色射线，气微，味苦。以根条粗壮、色棕褐者为佳。

性味与功用 苦，寒。除湿行气，消炎。用于胆囊炎，胃热疼痛，跌打损伤。用量3～9g。



图 130　裂叶翼首花
1. 植株; 2. 花

白 枪 杆

别名 大皮药、铁股路、铁杆路、大树皮、对节生。

来源 本品为木樨科植物白枪杆Fraxinus malacophylla Hemsl.的干燥根

原植物 白枪杆（图131）为落叶乔木，高5～10m；树皮灰白色。幼枝近四棱形，稍细，密被褐色短茸毛，老枝具纵棱，褐色，疏被柔毛和短茸毛，具疏散小皮孔。奇数羽状复叶，长达25cm，叶柄长2～4cm；叶轴密被棕色短茸毛；小叶片9～15，革质，椭圆形或披针状椭圆形，长3～11cm，宽2～4cm，先端急尖或钝，基部楔形，稀圆形，两侧不等大，近全缘，叶面黄绿色，密被棕色茸毛，背面淡绿色，密被白色柔毛和黄色绒毛，脉上尤密，侧脉7～10对，细脉不明显；近无小叶柄。圆锥花序生当年生枝顶端或上部叶腋内，长8～16cm，密被黄褐色短茸毛；花梗长约3mm；苞片线形，密被黄褐色茸毛；花萼杯状，长约1mm，顶端平截或4浅裂，裂齿阔三角形，被微毛；花冠白色，4裂至基部，裂片线形，长约3mm；两性花具雄蕊2，伸出花冠外，花丝短，花药长约3mm；雄蕊长2.5mm；柱头棍棒状，2浅裂。翅果匙形，长3～4cm，宽6～7mm，中上部最宽，顶端钝或急尖，翅扁平，坚果长约12mm，凸起。花期6月，果期9～10月。

生于海拔500～1 900m的石灰岩山地次生林中。分布于云南和广西。

采收加工 全年可采，或秋冬季挖，洗净，切片，晒干。

药材性状 本品为不规则的椭圆形片状，长2～6cm，厚2～3mm，外皮黄褐色或红褐色，木心黄白色。气微，味苦，微涩。以皮厚，木心黄白色，苦味强者为佳。

性味与功用 苦，寒。清热消炎，利尿通便，消食健胃，截疟。用于感冒头痛，口舌生疮，热病，大便秘结，小便不利，膀胱炎，膀胱结石，疟疾等症。常用量9～15g

附注 本种的树皮，树叶同根一样具有解热作用，树皮对急性和慢性间日疟有特效，孕妇忌用。



图 131　白枪杆

白 菟 藓

别名 革藓、土茯苓、金刚藤、白土苓、铁架子土茯苓。

来源 本品为菝葜科植物短柱肖菝葜 Heterosmilax yunnanensis Gagnep. 的干燥根茎。

原植物 短柱肖菝葜（图132）为攀援灌木，无毛；根茎不规则的块状，肥厚，暗棕褐色。小枝具明显的纵棱，绿色。单叶互生，叶片纸质或近革质，卵形，卵状心形或卵状披针形，长6－16cm，宽4.5－15cm，先端呈三角状短渐尖，基部心形或近圆形，全缘，叶面绿色，背面淡绿色，主脉5－7条，在背面隆起，细脉网状，两面明显；叶柄长1.5－4cm，在近基部具卷须及狭鞘。伞形花序腋生，具20－60花；总花梗长1.5－2.5cm；花序托球形，花梗长1.2－2.5cm；雌雄异株。雄花：花被合生成筒，椭圆形，长5－9mm，直径3－4mm，顶端具3枚钝齿；雄蕊8～10枚，花丝长3～5mm，基部合生，花药卵形，长约1.2mm。雌花：花被筒卵形，长3～5mm，直径3～3.5mm，顶端具3钝齿；退化雄蕊6枚；子房卵形。果实近球形，长5－10mm，直径6－8mm，紫色。花期5～6月，果期9～11月。

生于海拔700～2 400m的山坡密林中、灌丛中或溪边、路旁。分布于云南、四川、贵州、广西、广东及湖北。

采收加工 秋、冬季采挖，除去茎叶，细根，洗净，晒干。

药材性状 本品的干燥根茎为不规则的块状，肥厚，表面暗棕褐色，具深的狭横沟槽，顶端具茎基痕，本体具枝根痕。质坚实，切面乳白色，粉质。气微，味微甘。以类白色、具粉性者为佳。

性味与功用 甘、淡，平。祛风除湿，消肿解毒。用于小便混浊，湿浊带下，风湿骨痛，关节炎等症。常用量25～50g。



图 132　短柱肖菝葜

1. 根状茎; 2. 叶; 3. 花枝一段

老鼠黄瓜

别名 土白蔹、老鼠瓜、银丝瓜、野黄瓜、金丝瓜。

来源 本品为葫芦科植物茅瓜Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi [Bryoma amplexicaulis Lam.; Solena heterophylla Lour.; Melothria heterphylla (Lour.) Cogn.]的干燥根。

原植物 茅瓜(图133)为多年生攀援草本；块根纺缍形，直径1.5～2cm。茎、枝柔弱，具纵沟纹，无毛。单叶互生，叶片薄革质，多型，变异极大，卵形、长圆形、卵状三角形或戟形，长8～12cm，宽1～5cm，不分裂、3～5浅裂至深裂，裂片长圆状披针形、披针形或三角形，先端钝或渐尖，基部心形，弯缺半圆形，边缘全缘或具疏锯齿，叶面深绿色，稍粗糙，沿脉被微毛，背面灰绿色，几无毛；叶柄长0.5～1cm，幼时被短柔毛，后变无毛。卷须纤细，不分叉。雌雄异株。雄花：伞房状花序腋生，10～20花生于花梗顶端；花极小，花萼筒钟状，长约5mm，5裂，裂片近钻形；花冠黄色，外面被短柔毛，5裂，裂片三角形，长约1.5mm；雄蕊3，分离，花药近圆形，药室弓状弯曲。雌花：单生叶腋，花梗长5～10mm；子房卵形，长2.5～3.5mm，无毛或疏被柔毛，柱头3。果长圆形或近球形，长2～6cm，直径2～5cm，平滑，成熟时红褐色。种子数枚，近球形或倒卵形，长5～7mm，灰白色。花期5～8月，果期8～11月。

生于海拔600～2 600m的山坡林下、灌丛中或路旁。分布于云南、四川、贵州、西藏、广东、广西、江西、福建和台湾。越南、锡金、印度、印度尼西亚亦有。

采收加工 全年可采，除去茎叶、泥土，晒干。

药材性状 干燥块根呈纺缍形，长4～10cm，直径1.5～2cm，表面灰棕色，皱缩，具横环纹。质脆易断，断面不平坦，黄白色，富含淀粉及纤维。气微，味甘苦。以饱满，富含淀粉者为佳。

性味与功用 甘、苦，寒。入肺、肝、脾三经。清热化痰，利湿，散结消肿。用于咽喉炎、腮腺炎、肺热咳嗽、乳腺炎、尿路感染，淋病，痢疾，风湿痹痛，目赤，湿疹，痈疮疖肿。常用量15～24g，水煎服；外用适量研末调敷或煎水洗患处。

附注 华南地区用本品作白蔹入药。



图133　茅瓜

1. 根；2. 果枝

地 梅 子

别名 黄莓子、莓子刺、泡儿刺、黄蜡子、黄刺儿根。

来源 本品为蔷薇科植物黄果悬钩子 Rubus xanthocarpus Bureau et Franch.的干燥根。

原植物 黄果悬钩子（图134）为半灌木，高15～50cm；根状茎木质，匍匐，粗壮，棕褐色；茎草质，直立，绿色，幼时密被柔毛，老时几无毛，疏生直立长针刺；奇数羽状复叶互生，具3(～5)小叶，小叶片长圆形或椭圆状披针形、稀卵状披针形，顶生小叶长5～10cm，宽1.5～3cm，侧生小叶较小，长2～5cm，宽1～2cm，全部小叶先端急尖至圆钝，基部阔楔形至近圆形，顶生小叶基部常具2浅裂片，边缘具不整齐锯齿，叶面绿色，背面淡绿色，老时两面无毛或沿脉被柔毛，背面沿脉具细直刺；叶柄长3－8cm，顶生小叶柄长1～2.5cm，侧生小叶几无柄，均疏被柔毛及直立针刺；托叶披针形或线状披针形，长约15mm，基部与叶柄合生。花1－4朵排成伞房状，顶生或腋生，稀单生；花梗长1～2.5cm，被柔毛和针刺；萼片卵形至卵状披针形，先端尾状渐尖，外面被直立针刺和柔毛，里面被绒毛状毛；花瓣5，白色，倒卵形或匙形，长1－1.3cm，先端圆形，基部具爪，被细柔毛；雄蕊多数，短于花瓣；雌蕊多数，子房近顶端被柔毛。果扁球形，直径1～1.2cm，成熟时桔黄色，无毛。花期5－6月，果期8月。

生于海拔600～3 600m的山地林中、林缘、山沟石砾滩地或山坡路旁。分布于云南西北部、四川、陕西、甘肃和安徽。

采收加工 全年可采，洗净，晒干。

药材性状 本品之干燥根圆柱形，稍弯曲，长短、粗细不一，表面棕褐色，具皱纹及支根痕；质坚实，断面不整齐，淡黄白色。气微，味酸、微苦。以粗细均匀，色棕褐者为佳。

性状与功用 酸、微苦，微寒。消炎止痛，清湿热，止血。用于湿热痢疾，结膜炎，无名肿毒，鼻衄，疥癣，黄水疮。常用量15～30g，煎服。



图 134　黄果悬钩子

地 雷 根

别名 雪里开、威灵仙、拐子药

来源 本品为毛茛科植物单叶铁线莲Clematis henryi Oliv.的干燥根。

原植物 单叶铁线莲（图135）为木质藤本。主根下部膨大成瘤状或纺锤状、或地瓜状，直径1.5～2cm，具纵条纹和支根，表面淡褐色，内部白色。小枝绿褐色，被短柔毛。单叶对生，叶片卵状披针形，长9～15cm，宽2.5～7cm，先端渐尖，基部浅心形，边缘具短刺头状的小锯齿，叶面绿色，背面淡绿色，两面无毛或幼时在背面沿脉被紧贴的绒毛，主脉在叶面平坦，背面隆起，侧脉6～7对，拱曲，于叶缘附近网结，两面明显；叶柄长2～6cm，幼时被毛，后变无毛。聚伞花序腋生，通常仅1花，稀2～5花，总花梗细弱，与叶柄近等长，无毛，下部具2～4对线状、交叉对生的苞片；花萼花冠状，钟形，白色或淡黄色，萼片4，卵圆形或长方状卵圆形，肥厚，长1.5～2.2cm，宽0.7～1.2cm，先端钝尖，外面疏被紧贴的绒毛，边缘具白色绒毛，内面无毛，具明显的直而平行的脉纹；雄蕊多数，长1～1.2cm，花丝线形，两侧密具长柔毛，花药椭圆形，无毛；心皮多数，被短柔毛，花柱被绢状毛。瘦果狭卵形，长约3mm，被短柔毛，花柱长3～4.5cm，被长柔毛。花期11～12月，果期翌年3～4月。

常生于海拔(100～)400～2 500m的山谷、山坡或溪旁林中、灌木丛中，缠绕于树上。分布于云南、四川、贵州、广西、广东、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏等省区。

采收加工 秋、冬采挖，洗净，晒干。

药材性状 本品之根呈纺锤形，椭圆体状或地瓜状、或呈不规则的瘤状，直径1.5～2cm，长2～5cm，上端具残留的木质茎基，下侧具细根痕，表面黄褐色，内皮白色。表皮具纵皱纹和支根痕。质坚硬，不易折断，断面不整齐，断面黄白色。气微，味辛。以个体均匀、坚实、色黄褐色为佳。

性味与功用 辛，平。行气，活血，消炎止痛，解痉。用于胃痛，腹痛，跌打损伤，跌仆晕厥，支气管炎，咽喉炎，热毒疔疮，小儿高烧，惊蛔等，外用治腮腺炎。常用量1.5～6g。




图 135　单叶铁线莲
1. 根；2. 花枝一段

西南手参

别名　佛掌参、汪腊（藏语）。

来源　本品为兰科植物西南手参Gymnadenia orchidis Lindl.的块茎

原植物　西南手参（图136）为多年生草本，高17～55cm。块茎卵状椭圆形，长1～3.5cm，下部掌状分裂，裂片细长。茎直立，圆柱形，粗壮，叶3～5枚，常疏生于整个茎上，茎上部常有1至数枚苞叶；叶片椭圆形、椭圆状长圆形或近披针形，长4～16cm，先端急尖或钝，基部收狭成鞘状抱茎，全缘　总状花序具多数密生或疏散的小花，长4～11cm　花苞片披针形，渐尖或长渐尖，最下面的明显超过花长；花紫红色、粉红色或白色　中萼片卵形，长3～5mm，顶端钝，侧萼片稍长而宽；花瓣宽卵状三角形，和中萼片等长，钝，边缘具波状齿；唇瓣宽倒卵形，长2～5mm，前部3裂，中裂片较侧裂片稍大或等长，顶端钝或稍尖；距细长，内弯；子房纺缍形，扭曲，连花梗长7～8mm　蒴果长圆形；种子小。

生于海拔3 100～4 000m的山坡林下或草地上，分布于四川、云南、西藏、湖北、陕西、甘肃、青海等省。克什米尔地区、尼泊尔、锡金、不丹、印度也有

采收加工　春、秋季采挖，去净茎叶及须根，晒干或开水烫后晒干。

药材性状　本品呈卵状椭圆形，长2～3.5cm，下部形如手掌，指状分裂，稍扁，裂片细长，表面皱缩，淡黄色，有时茎痕周围有一褐色环，质坚硬，断面白色或黄白色，胶质样。气无，味淡，嚼之发粘。以完整、色泽黄白、质坚实、半透明者为佳。

性味与功用　甘，平，归脾、肺、肾经　生津止渴，补益气血，壮阳，收敛止血。用于身体虚弱，神经衰弱，肺虚咳嗽，久泻，阳痿，带下，乳少，筋骨腰痛，慢性肝炎。常用量9～30g。



图 136　西南手参
1. 植株; 2. 花

托柄菝葜

别名　土伏苓、金刚豆藤、金刚藤

来源　本品为菝葜科植物托柄菝葜Smilax discotis Warb. 的干燥根状茎

原植物　托柄菝葜（图137）为灌木，多数攀援，高0.5～3m；茎枝疏生刺或无刺，单叶互生，叶片纸质，卵形或卵状椭圆形，长4～10(～20)cm，宽2～5(～10)cm，先端钝，基部心形，全缘，叶面绿色，背面苍白色，基出脉3条；叶柄长3～5(～15)mm，脱落点位于近顶端，有时具卷须；鞘与叶柄等长或稍长，宽3～5mm，近半圆形或卵形，多少呈贝壳状。伞形花序生于叶较幼嫩的小枝上，通常具几花；总花梗长1～4cm；花序托稍膨大，有时延长，具多数小色片；花单性，雌雄异株；雄花：花被片6，绿黄色，外面者长约4mm，宽约1.8mm，内面的较狭，宽约1mm　浆果球形，直径6～8mm，成熟时黑色，被粉霜　花期4～5月，果期8月。

生于海拔650～2 100m的山地林下，灌丛中或山坡阴处。分布于云南、贵州、四川、湖南、湖北、江西、福建、安徽、河南、陕西和甘肃东南部

采收加工　全年可采挖，洗净，晒干。

药材性状　本品之干燥根状茎为不规则的块状，略呈扁圆柱形，弯曲，多分枝，有结节状隆起，长约5～10cm或更长，直径约2～5cm，表面深棕色或棕色，粗糙，常具根痕，上端具茎残基或茎痕。质坚脆，不易折断，断面不整齐，粉质，淡棕色。气微，味淡而涩。以粉性足，色淡棕色者为佳。

性味与功用　淡、微涩，平。清热、利湿、补虚、活血止血。用于痨弱干瘦，风湿，血尿，血崩。常用量15～30g。

附注　陕西地区用本种根茎作革薢用。



图 137　托柄菝葜

1．果枝；2．根状茎

竹 叶 兰

别名 竹叶七、旱谷花、长秆兰、文哈海（傣语）。

来源 本品为兰科植物禾叶竹叶兰 Arundina graminifolia (D.Don.) Hochr.(A.chinensis Bl.)的干燥根状茎。

原植物 禾叶竹叶兰（图138）为多年生草本，高30～60（～150）cm；地下根状茎圆球形，数个连生，具横的环状叶痕；根细瘦，须状。茎圆柱形，直立，淡绿色，单叶互生，2列，叶片革质，禾叶状，线形，长10～20cm，宽8～15mm，坚挺，先端渐尖，基部呈鞘状抱茎，近基部处具关节，两面均平滑，无毛，淡绿紫色。总状花序顶生，长2.5～10cm，具2～12花；苞片小，内凹，先端渐尖或急尖，短于子房；花大，直径约4～5cm，粉红色；萼片长圆状披针形，长约2.5cm或过之；花瓣卵状长圆形，较萼片宽，唇瓣略长，顶端3裂，中裂片较大，有缺刻，唇盘上具3～5条褶片；合蕊柱长，稍弓形，具狭翅；花药顶生，盖状，2室；花粉块8枚。蒴果圆柱形，长约5cm，具6条纵棱脊，黄绿色；种子多数，微细。花期秋季。

生于海拔1 000～2 400m的山坡灌丛中、草丛中或箐沟旁。分布于云南、四川、贵州、广西、广东、湖南、江西、浙江、福建、台湾；也见于印度、中南半岛及日本。

采收加工 全年采挖，除去地上茎叶及须根，洗净，晒干。

药材性状 本品呈念珠状，每个球形根状茎，直径1.5～3cm，上端带有长约5cm的地上茎，下端有多数须根残痕；表面黄白色，节紧密，节上具残存膜质鳞片，时有幼芽或芽痕。质坚硬，断面黄白色。气微，味苦。以个大，色黄白者为佳。

性味与功用 苦，平。清热解毒，通经活血，化痰。用于跌打损伤，风湿性腰腿病，胃痛，食物中毒，尿路感染，脚气，水肿等症。常用量9～15g。




图 138　禾叶竹叶兰

竹 节 菜

别名 黑竹节菜、山生草、滚龙草。

来源 本品为百合科植物窄瓣鹿药 Smilacina tatsienensis (Franch.) Wang et Tang [Tovaria tatsienensis Franch; Smilacina paniculata (Baker) Wang et Tang; S. yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz.]的干燥根茎及根。

原植物 窄瓣鹿药（图139）为多年生草本，高30～80cm，全株无毛；根状茎近块状或有结节状膨大，直径（2.5－）7－16mm。茎圆柱形，绿带紫色，无毛，具6～8叶。单叶互生，叶片纸质，卵形，长圆状披针形或近椭圆形，长7－21cm，宽2～7.5cm，先端渐尖，基部圆形，全缘，叶面绿色，背面淡绿色；具短柄，无毛。通常为圆锥花序，稀总状花序，顶生，长2.5～11cm，具较长的侧枝，无毛；花单生，花梗长2～12(～18)mm，花被片6，淡绿色或稍带紫色，基部合生，狭披针形，长2.5～5mm；雄蕊6，花丝扁平，下部贴生，分离部分稍长于花药或近等长，花药基底着生，纵裂；子房近球形，3室，每室具1～2胚珠，花柱极短，柱头3深裂。浆果近球形，直径6～7mm，成熟时红色，有种子1－5粒。花期5～6月，果期8～10月。

生于海拔1 500～3 500m的山地林下，林缘或草坡中。分布于云南。

采收加工 夏、秋季采挖，除去茎叶，洗净，晒干。

药材性状 本品近圆形，具紧密的结节或近块状，曲折，长短不一，直径1～1.5cm，表面淡黄色或黄褐色，具纵条纹及横纹，顶端具明显的圆形茎残基或茎基痕，节上具多数细根。气微。以带根状茎，根黄褐色者为佳。

性味与功用 甘，温。补中润肺，祛风止痛，强筋壮骨。用于头疼、劳伤，风湿，痈疮肿毒。常用量6～9g；外用适量捣烂敷患处。



图 139　窄瓣鹿药

竹 根 七

别名 竹节七、鸡头七、野三七、土三七、藏三七。

来源 本品为五加科植物狭叶竹节参 Panax japonicus C.A. Meyer var.angustifolius(Burk.)Cheng et Chu(Aralia quinquefolia Decne. et Planch. var. angustifolia Burk.) 的干燥根状茎。

原植物 狭叶竹节参（图140）为多年生草本，高50～100cm；根状茎肉质，竹鞭状，横卧，节间具凹陷的茎痕；根常肉质，细萝卜状，白色。茎圆柱形，光滑无毛。掌状复叶3～5枚轮生于茎顶，叶柄长8～11cm，无毛；小叶片薄膜质，通常5枚，狭披针形，长为宽的5倍以上，先端渐尖至长渐尖，基部宽楔形至近圆形，边缘具细锯齿，叶面绿色，背面淡绿色，两面沿脉疏被刚毛。伞形花序单生于茎顶端，具50～80花或更多；总花梗长11～21cm；花梗长7～12mm，疏被短柔毛；花淡绿色，花萼具5齿，齿三角形，无毛；花瓣5，长卵形，覆瓦状排列；雄蕊5；子房下位，2～5室，花柱2～5，中部以下连合，果近球形，直径5～7mm，成熟时红色，具种子2～5颗，种子三角状长卵形，长约4.5mm，白色。花期5～6月，果期7～9月。

生于海拔2 030～3 600m的山谷林中。分布于云南西南部、东南部和东北部，四川及贵州。尼泊尔、不丹、锡金、印度东北部和泰国亦有。

采收加工 秋季采挖，除去茎叶、根茎外皮及泥土，晒干或阴干。

药材性状 本品呈圆柱形，稍弯曲，似竹鞭状，长5～20cm，直径8～25mm，表面粗糙，具皱纹及根痕，灰褐色或黄褐色。节明显，节间长8～20mm，每节上具深而圆形的茎痕。质脆，易折断，断面较平坦，黄白色至淡黄褐色，具排成圆圈的淡黄色点状维管束。气微香，味苦，微甘。以条粗、质硬，具结节，断面黄白色为佳。

性味与功用 微甘、苦，温。归肝、脾经。活血祛瘀，健脾补虚，祛痰，镇痛，利尿。用于跌打损伤，虚劳咳嗽，痨伤出血，痈肿，病后体虚，咯血，腰腿痛，胃痛。常用量3～9g；外用适量，研粉调敷或干撒患处。



图 140　狭叶竹节参

1．花枝；2．花；3．根状茎及根；4．药材（干燥根状茎）

角 大 麻

别名 羊角大麻、红川乌、角角大麻。

来源 本品为菊科植物双舌蟹甲草 Cacalia davidii (Franch.)Hand.-Mazz.(Senecio davidii Franch.)的干燥根状茎。

原植物 双舌蟹甲草（图141）为多年生草本，高1.5m；根状茎粗大，块状或萝卜状，表皮浅褐色，切面白色，粉质重，其上生多数须根。茎粗壮，除花序部分外无毛。单叶互生，茎下部叶花期常凋落，叶片厚纸质，五角形或三角形，长8～15cm，宽与长几相等，先端长渐尖，基部截形或圆心形，边缘具三角形大齿（或浅裂）及小突尖状锯齿，叶面绿色，疏被短糙毛或近无毛，背面淡绿色，沿脉疏被短柔毛，茎上部叶渐尖；叶柄长3－5cm，头状花序极多数，排成顶生或上部叶腋生的大型圆锥花序，总花梗长3－5cm，具2～3个线状披针形包片，花序轴与总花梗均被黄褐色短柔毛；总苞狭圆柱形，长8～10mm，总苞片4～5枚，线状长圆形，先端钝，无毛；头状花序具4花，舌状花2朵，舌片线形，长为总包片的2倍，黄色，筒状花2朵，檐部5裂，裂片反卷。瘦果圆柱形，具纵棱，冠毛白色。

生于海拔650～1 800m的山谷灌丛中，林缘或山坡草地。分布于云南东北部、四川西部和陕西。

采收加工 秋末茎叶枯萎时采挖，除去茎叶和泥土，洗净，晒干

药材性状 本品之干燥根状茎粗大，呈块状或萝卜状，表皮具纵皱纹和须根痕，浅褐色。质坚，不易折断，断面白色，粉质重。气微，味苦。以饱满、色浅褐色，粉质重者为佳。

性味与功用 辛，温，有毒。祛寒，通经，理气。用于风湿瘫痪，半身不遂，头疮白秃等症。常用量6－9g。



图 141　双舌蟹甲草

1．植株下部；2．花枝

变异鳞毛蕨

别名　异鳞鳞毛蕨、南海鳞毛蕨、小狗脊子。

来源　本品为鳞毛蕨科植物变异鳞毛蕨 Dryopteris varia(L.)O. Ktze 的干燥根状茎。

原植物　变异鳞毛蕨（图142）为多年生草本，高50～100cm。根状茎斜升或直立，密生栗黑色狭披针形鳞片。叶簇生，叶柄长20～50cm，深禾秆色，基部以上至叶轴疏生小鳞片；鳞片下部近圆形，棕色，向上长尾状渐尖，栗黑色；叶片近革质，卵状披针形，与叶柄近等长，顶端突然变狭成长尾状，沿叶轴和羽轴下面有棕色卵状披针形鳞片，有时鳞片下部隆起呈不明显泡状，三至四回羽状分裂；羽片披形针，中部以下羽片宽3～5cm，基部下侧小羽片较大；末回裂片矩圆状披针形，钝头，边缘有疏齿或近全缘；侧脉羽状分枝。孢子囊群生于背面小脉近顶端；囊群盖圆肾形。

生于山谷林下，灌丛中或沟边。分布于河北、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广西、四川、贵州等省区。

采收加工　全年可采，以秋季采收为好。除去鳞片，切片，鲜用或晒干。

药材性状　根状茎呈不规则长块状，稍弯曲，长10～20cm，上端具多数叶柄残基及棕黑狭披针形鳞片，下端较尖。切片呈不规则长条形或圆形，直径2～8mm，厚约3cm，周边不整齐，外皮深棕色，偶有未去净的鳞片。质硬脆，断面棕色，具黄白色点状维管束。气微，味初淡而微涩、略苦。以肥大，质坚实，叶柄残基断面棕绿色为佳。

性味与功用　微涩，凉。归肾经。清热，止痛。用于内热腹痛、疮疡溃烂，目赤肿痛。常用鲜品适量捣烂敷患处或9～15g煎服。

附注　湖南少数地区有以本品作贯众用，应注意鉴别。




图 142　变异鳞毛蕨

1. 根部; 2. 叶; 3. 羽片放大, 示孢子囊着生位置; 4. 鳞片

鸡肾草

别名 对对参、假天麻、蜡烛花。

来源 本品为兰科植物缘毛鸟足兰 Satyrium ciliatum Lindl. 的干燥块根。

原植物 缘毛鸟足兰（图143）为陆生兰，高14～30cm；块茎长圆状椭圆形，长1～5cm。茎直立，具1－2枚鞘状鳞片及1－2枚叶。单叶互生，叶片肥厚，卵状披针形或卵形，下面的1枚长6－15cm，宽2－5cm，先端渐尖，基部抱茎，边缘稍波状，上面的1枚稍小。总状花序顶生，长3－15cm，花多而密集；苞片卵状披针形，外折，较子房长；花粉红色，萼片先端边缘被细毛，中萼片线状椭圆形，长5～6mm，宽约1.3mm，侧萼片长圆状匙形，与中萼几等长，但较宽；花瓣匙状倒披针形，短于萼片，宽约1.2mm，先端多少具不明显的3裂或近平截，唇瓣位于上方，兜状，近半球形，长约6mm，口缘上方急尖且具不整齐的齿；距较子房和萼片短，或与萼片近等长，长约4～6mm；子房无毛。

生于海拔2 000～3 600m的山坡高山栎林、云杉林、高山松林下或草坡。分布于云南、四川和西藏。尼泊尔、锡金、不丹亦有。

采收加工 夏、秋采集，除去茎叶及须根，洗净，晒干。

药材性状 干燥块根长圆状椭圆形，长1～5cm，直径0.5～1.5cm，表面黄褐色，具纵皱纹，顶端具圆形茎痕，另端圆钝。质泡松，易折断，断面不整齐，泡松，有小凹孔，类白色。气微，味甘。以个大，饱满者为佳。

性味与功用 甘，平。壮腰益肾，养血安神。用于肾虚腰痛，慢性肾炎，水肿，面足浮肿，头晕目眩，遗精，阳痿，疝气痛等症。常用量9－15g。



图 143　缘毛鸟足兰

茎菜跌打

别名　土参、条参、金针菜、鸡脚参、山茎菜。

来源　本品为百合科植物折叶萱草Hemerocallis plicata Stapf.的干燥块根。

原植物　折叶萱草（图144）为多年生草本，高40～80cm；根状茎粗短，其下生多数肥大、肉质的纺锤状块根，表面黄褐色。叶基生，线形，长20～40cm，宽3～9mm，下部常对折，先端渐尖，全缘，绿色。花葶高25～50cm，圆柱形，绿色；2～3次分叉的假二歧圆锥花序，生于花葶顶端，具4～10花或更多，花梗长1～1.5(～4)cm，其基部具苞片，常早落；花橘黄色或金黄色，花被长5～7cm，下部1～2cm合生成花被筒，其上部6裂，裂片具平行脉，外轮长圆状披针形，宽约1cm，内轮椭圆形，宽约1.5cm；雄蕊6，伸出，短于花被裂片，上弯，花药黄色；花柱伸出，与花被裂片等长，上弯。蒴果椭圆形，长2cm，直径1.5cm，具3条纵槽；种子多数，扁球形。花果期7～10月。

生于海拔1 800～3 000m的山坡松林下或草坡、箐边。分布于云南、四川西部。

采收加工　秋季采挖，除去茎叶、须根，洗净，鲜用或晒干备用。

药材性状　本品呈纺锤状，略弯曲，长5～10cm，直径0.5～1.5cm，表面黄白色至淡黄棕色，具多数纵条纹及横纹。质柔韧，不易折断，断面不平坦，黄白色。气微，味苦。略有粘液性。以个大，饱满，色黄白者为佳。

性味与功用　甘，平，有毒。宁心安神，利尿消肿，舒筋活络，消瘀散肿，祛风湿。用于心悸，失眠健忘，水肿，小便不利，白带，疮痈，跌打损伤，骨折瘀肿，风湿性腰腿痛、关节痛等症。常用量10～15g。



图 144　折叶萱草

刺　　参

别名　鸡刺参、细叶刺参、大花刺参、白仙茅、里马丝达的（彝语）。

来源　本品为川续断科植物大花刺参 Acanthocalyx delavayi(Franch.) M.Cannon(Morina delavayi Franch.; M. bulleyana Forrest et Diels; M. nepalensis D. Don var. delavayi (Franch.) C.H.Hsing)的干燥根。

原植物　大花刺参（图145）为多年生草本，高20～50cm；茎单一或少分枝，上部疏被纵列柔毛。基生叶丛生，叶片线状披针形，长10～20cm，宽6～12mm，先端渐尖，基部渐狭成鞘状抱茎，边缘具刺状硬纤毛，两面光滑无毛；茎生叶对生，2～4对，叶片卵状长圆形至长圆状披针形，边缘具刺毛。花茎从基生叶鞘中生出，花序为疏松的假头状花序，直径3～5cm，总苞片4～6对，坚硬卵形至长卵形，边缘具黄色硬刺；付萼筒状，长约6mm，顶端具长3～6mm的16条刺状尖；花萼筒状，长10～15mm，口部斜切，边缘具纤毛及数条小芒刺；花冠长漏斗形，粉红色或紫红色，花冠管近直立，宽4～5mm，5裂，裂片长椭圆形，顶端凹陷，近无毛；雄蕊4，2强；子房被毛，藏与付萼之内，花柱长于雄蕊，柱头头状。瘦果略呈四棱形，长约5mm，具皱纹。花果期5～8月。

生于海拔2 600～4 200m的高山草甸、灌丛中。分布于云南、四川和西藏。

采收加工　夏、秋季采集，除去茎、叶、泥土，晒干。

药材性状　本品呈圆柱形，略扭曲，膨大部分常分枝，长10～30cm，直径5～20mm，表面黄白色，常具纵皱缩。质脆，易折断，断面类白色。气微，味甘，微苦。以粗壮、断面色白者为佳。

性味与功用　甘、微苦，温。补气血，止咳，舒筋骨，补肝肾，壮阳。用于贫血，神经衰弱，肺虚咳嗽，月经不调、白带、阳痿、跌打骨折。常用量15～30g。



图 145　大花刺参

刺 革 薢

别名 大菝葜、红革薢、美人扇、龙须叶。

来源 本品为菝葜科植物长托菝葜 Smilax ferox Wall. ex Kunth的干燥根状茎。

原植物 长托菝葜（图146）为落叶攀援灌木，长达5m；根状茎肥厚，块状。茎枝坚实，疏生坚硬的刺。单叶互生，叶片厚革质或坚纸质，椭圆形、卵状椭圆形或长圆形，长3～16cm，宽1.5～9cm，先端钝圆，具短尖头，基部通常圆形，全缘，叶面绿色，干后灰绿黄色或暗灰色，背面苍白色，主脉3(～5)条；叶柄长5～25mm，3/4～1/2以下具鞘，只有少数叶柄具卷须。花单性，异株，排成伞形花序生于幼枝的叶腋内，具几花至10余花；总花梗长1～2.5cm；花梗长约1cm；雄花：花被片6，黄绿色或白色，外花被片长4～8mm，宽2～3mm，内花被片稍狭；雄蕊6；雌花：花被片同雄花，但较小，长3～6mm；退化雄蕊6；子房3室，花柱较短，柱头3裂。浆果球形，直径3～15mm，成熟时红色。花期3～4月，果期10～11月。

生于海拔900～3 400m的山地林下，灌丛中或山坡荫处。分布于云南、四川、贵州、广西、广东和湖北。印度、尼泊尔、锡金、不丹、缅甸和越南也有。

采收加工 秋、冬季采挖，砍去茎藤，洗净泥土，去掉须根，切片，晒干。

药材性状 本品之干燥根状茎块状、肥厚，表皮棕褐色，具不规则的凹陷、结节处常具坚硬的茎残基和须根痕；质坚硬，难折断，断面淡灰褐色。气微，味苦。以个大，味苦，色棕褐者为佳。

性味与功用 苦，平。祛风，利湿，解疮毒。用于风湿筋骨疼痛，小便浑浊，淋浊，梅毒，臁疮，皮肤过敏，湿疹。常用量9～15g；外用适量，煎水洗患处。



图146　长托菝葜
1．根状茎及根；2．果枝

虎 掌 草

别名 虎掌叶、汉虎掌、白花舌头草。

来源 本品为毛茛科植物草玉梅 Anemone rivularis Buch.-Ham. ex DC.的干燥根。

原植物 草玉梅（图147）为多年生草本，高15－65cm.全株疏被柔毛；根状茎木质，圆柱状，直径约1－1.4cm，外皮黑褐色。茎直立，绿色带紫，上部分枝。基生叶3－5，具长柄；叶片轮廓肾状五角形，长2.5－7.5cm，宽4.5－14cm，三全裂，中央全裂片阔菱形或菱状卵形，宽2～7cm，3深裂，深裂片上部具少数浅裂片或牙齿，侧裂片不等二深裂，两面均被糙伏毛；叶柄长5－22cm，基部具短鞘。花葶1～3，直立，高7－65cm；聚伞花序1～3回分枝，长10－30cm；总苞苞片3(～4)，宽菱形，长3.2－6.5cm，具鞘状柄；萼片6－8(～10)，白色，倒卵形或椭圆状倒卵形，长0.9～1.4cm，宽0.5－1cm，顶端密被柔毛；花瓣无；雄蕊多数，花丝丝状；心皮30～60，无毛，子房狭长圆形，花柱拳卷状。瘦果狭卵形，长7～8mm，稍扁，宿存花柱钩状弯曲。花期5－8月。

常生于海拔(850－)1 200－4 000(－4 900)m的山地草坡、溪旁或湖旁湿地，林缘。分布于甘肃西南部、青海东南部、湖北西南部、广西、四川、贵州、云南和西藏南部及东南部；尼泊尔、锡金、不丹、印度、斯里兰卡亦有。

采收加工 秋季挖根，除去泥土，晒干。

药材性状 本品呈圆柱形或长圆锥形，长5～12cm，直径2－3mm，略弯曲，偶有分枝或扭曲，外皮棕褐色或黑褐色，粗糙，具不规则的纵皱纹，头部稍增大，具残存茎及叶基的痕迹。质坚脆，易折断，断面不整齐，黄绿色。气微，味微苦。以粗壮、坚实，无须根者为佳。

性味与功用 辛、苦，寒。小毒。清热解毒，镇咳祛痰，活血舒筋。用于咽喉肿痛，咳嗽痰多，瘰疬，结核，痈疽肿毒，疟疾，风湿痛，胃痛，痢疾，跌打损伤。常用量6－10g。

附注 本品之全草入药，与根同效。



图 147　草玉梅

金丝杜仲

别名　黄皮杜仲、棉杜仲。

来源　本品为卫矛科植物云南卫矛 Euonymus yunnanensis Franch.的干燥根皮。

原植物　云南卫矛（图148）为常绿或半常绿乔木，高可达12m，全株无毛。幼枝圆柱形，具纵棱脊，淡绿色，老枝紫黑色或灰黑色，具散生突起的皮孔。单叶对生，间有互生，叶片近革质，狭倒卵形至倒卵形，或狭椭圆形至椭圆形，稀线形，长2.5～6cm，宽1～2cm，线形叶长可达6cm，宽仅5～6mm，先端急尖或钝，基部楔形，边缘具疏锯齿，常反卷，似全缘状　叶面深绿色，略具光泽，背面淡绿色，干时褐色或黄绿色，侧脉5～7对，与主脉在两面稍隆起；叶柄长3～8mm。聚伞花序具1～3花，稀5花，总花梗长1.5～2.5cm，花梗与之等长或稍长；花黄色，直径1.5～2cm，5基数，稀4基数；花萼裂片卵形或半圆形，长约3mm，边缘具缺刻，具明显的脉纹；花瓣圆形，直径约1cm；花盘略呈五角形，直径约6mm，厚垫状；雄蕊5，花丝长3mm，基部与花盘相连处呈肥厚的肉质突起，花药扁卵形，药隔具小突起；子房五角形，短而阔，5室，每室具胚株4～10粒，花柱长约2mm，柱头不膨大。蒴果倒锥形，长2～2.5cm，直径1.5cm，5浅裂，基部具增大的肥厚花盘和宿存花萼；种子椭圆形，长6～7mm，直径4～4.5mm，淡褐色，假种皮红棕色，仅包围种子基部。花期4月，果期6～7月。

生于海拔1 500～2 700m的灌丛中。分布于云南西北部、四川西南部和西藏东南部。

采收加工　全年可采，洗净，晒干。

药材性状　本品为片块状或条片状，卷曲，长短大小不一，厚约0.5～1mm，外表皮灰棕红色，龟裂。断面类白色，内表面淡黄褐色。气无，味苦。以条块大小均匀，断面类白色者为佳。

性味与功用　微苦、涩，温。有毒。舒筋活血，止痛，祛风除湿，消肿散瘀。用于风湿疼痛，腰腿痛，骨折，刀枪伤，跌打损伤。常用量9～15g；外用适量，研粉撒敷或调敷。

附注　云南卫矛之茎皮入药，与根皮同效。



图 148　云南卫矛
1. 植株；2. 果枝

金 钱 蒲

别名 钱蒲、石菖蒲、九节菖蒲、建菖蒲、小石菖蒲。

来源 本品为天南星科植物金钱蒲 Acorus gramineus Soland.的干燥根状茎。

原植物 金钱蒲（图149）为多年生草本，高20～30cm；根茎黄走或斜伸，长5－10cm，直径4～8mm，节间长1～5mm，外表皮淡黄色，芳香。根多数肉质，长达15cm，须根多数，密集。叶基生，线形，长10－30cm，宽5～7mm，先端长渐尖，基部对折，两侧具棕色膜质鞘，全缘，绿色，无中肋，平行脉多数。花葶基出，短于叶片；佛焰苞长3～9（～15）cm，宽1－2mm；肉穗花序圆柱形，长3～9.5cm，直径3－5mm，果时直径可达1cm，绿色；花小，密集，两性，黄绿色，花被片6，二轮；雄蕊6枚；子房2－4室。浆果倒卵形，长、宽均约2mm，黄绿色。花期5～6月，果期7－8月。

生于海拔1 800m以下的山涧浅水石上或溪旁岩石缝中。分布于云南、贵州、四川、西藏、广东、广西、湖南、湖北、江西、浙江及西北地区的陕西、甘肃等省区。

采收加工 早春或冬季采集，除去叶、花葶和须根，洗净晒干。

药材性状 本品圆柱形，弯曲，长10～16cm或更长，直径3－7mm，表皮棕褐色。顶端具叶残基或痕，全体具环状节，节上残存枯叶基纤维，有时可见圆形芽痕及须根或须根痕。质坚实，不易折断。断面不整齐，淡褐色或近类白色。气芳香，味辛。以根茎大小均匀，色棕褐色者为佳。

性味与功用 辛，温。开窍益智，宽胸豁痰，理气活血，散风祛湿，解毒。用于湿痰蒙窍，神志不清，健忘，多梦，癫痫，耳聋，胸腹胀闷，胃痛，腹痛，湿滞痞胀，泄泻痢疾，风湿疼痛，牙痛，牙龈出血，小儿痘气，疮疡肿毒，跌打损伤。常用量3～9g；外用适量，鲜品捣烂外敷。




图 149　金钱蒲
1. 植株; 2. 花

金雀马尾参

别名 太子参、普吉藤、小白参、鸡脚参。

来源 本品为萝藦科植物金雀马尾参 Ceropegia mairei(Lévl.)H.Huber(Aristolochia mairei Lévl.;Ceropegia balfouriana Schltr.)的干燥根。

原植物 金雀马尾参（图150）为多年生草本；根丛生，圆柱形，肉质；茎下部直立，上部缠绕，被微毛。单叶对生，叶片椭圆形或椭圆状披针形，长1～4cm，宽4～12mm，先端急尖或短渐尖，基部钝，全缘，略反卷，叶面绿色，被微柔毛，背面淡绿色，除沿主脉被毛外，余无毛。聚伞花序近无梗，少花；花梗长约1cm，被微毛；花萼裂片狭披针形，长约5mm；花冠长约3cm，近圆形，花冠筒近圆筒状，直径约4.5mm，花冠喉部略膨大，裂片舌状长圆形，内面具微毛，与花冠筒等长，长1.2cm；副花冠杯状，外轮裂片三角形，内轮狭线形，先端略膨大，钝形，无毛，比外轮长2倍；花粉块斜卵圆形，花粉块柄平展，着粉腺菱形，比花粉块小4倍。花期5月。

生于海拔1 000～2 300m的山地石缝中。分布于云南、四川、贵州。

采收加工 夏、秋季采挖，除去茎叶，洗净，晒干。

药材性状 本品根数条至十余条，圆柱形，稍弯曲，长5～8cm，粗2～3mm，外表皮棕褐色，具纵皱纹及横条纹。上端具茎残痕，下部变细，末端具须根或须根痕。质坚脆，易折断，断面不整齐，断面类白色，粉质。气微。以根条均匀，质坚实者为佳。

性味与功用 辛，寒。有小毒。解毒，杀虫。用于疮肿、疥癣。外用适量，鲜用捣烂敷或干品研末，菜油调敷。



图 150　金雀马尾参

珍 珠 莲

别名 马尾黄连、水黄连。

来源 本品为毛茛科植物毛发唐松草 Thalictrum trichopus Franch.(=T. tenii Lévl.)的干燥根。

原植物 毛发唐松草（图151）为多年生草本，高1～1.2m；根簇生，纺锤状圆柱形，肥厚，外表黄褐色。茎直立，上部具长分枝。基生叶花时枯萎；下部茎生叶为三回羽状复叶，互生；小叶片草质，卵形、椭圆形或倒卵状楔形，长0.8－2cm，宽6－16mm，基部圆形、宽楔形或浅心形，上部3浅裂，稀不分裂，边缘全缘，脉不明显；叶柄长约8cm，基部具鞘。花序圆锥状，分枝丝状，疏而长，具稀疏的花；花梗纤细，长1.5～3.5cm；萼片4，白色，早落，倒卵形或狭卵形，长3～4mm；雄蕊多数，长4.5mm，花丝狭线形或丝状，花药狭长圆形，顶端钝；心皮2～5。瘦果2－3，椭圆形或新月形，长约3mm，具纵肋，顶端具宿存花柱及柱头。花期6－7月。

生于海拔1 900～2 500m的山坡灌丛中、或溪边、湿地。分布于云南西部和四川西南部。

采收加工 秋季采集，除去茎叶，洗净，晒干。

药材性状 本品类圆柱形，常弯曲，长8－10cm，直径1.5～3mm，表面黑褐色，具纵皱纹及侧根或侧根痕。质坚脆，易折断，断面稍不整齐，周皮黑褐色，中央黄色。气微，味苦。以根条粗壮，苦味浓，色棕褐色为佳。

性味与功用 苦，寒。清热解毒，利湿。用于小儿高热，肺炎，百日咳，膀胱炎，肠炎，痢疾。常用量1.5～3g。



图 151　毛发唐松草

珠毛蟹甲草

别名 八角香、汉白泡。

来源 本品为菊科植物蛛毛蟹甲草 Cacalia roborowskii (Maxim.)Ling 的干燥根及根状茎。

原植物 蛛毛蟹甲草（图152）为多年生草本，高60～100cm。根状茎粗壮，横生，生多数须根。茎直立，圆柱形，具细纵条纹，被白色蛛丝状毛，或变无毛。叶互生，下部叶花期凋落；叶片薄纸质，卵状三角形，顶端渐尖，基部截形，稀微心形，边缘有不等的粗齿，齿端有小尖，上面绿色，无毛或有疏贴短毛，下面密生灰白色丝状绒毛；中部叶长8～12cm，叶柄长6～10cm，疏生蛛丝状茸毛；上部叶渐小，有短叶柄。头状花序多数，通常在顶端或上部叶腋排成塔状的疏圆锥花序，下垂；梗长约3mm，疏生短柔毛，有2～3个条状披针形小苞片；总苞圆柱状，长8～10mm；总苞片3，黄绿色，条状矩圆形，钝；花3个，全部筒状，花冠白色。瘦果圆柱形，长3～4mm，冠毛白色。

生于山谷沟边、林下或灌丛中。分布于青海、甘肃、四川等省。

采收加工 秋季采挖，晒干。

药材性状 本品根状茎块状或为不规则短圆柱形，暗棕色，粗壮，表面具多数纤维状须根，须根长3～10cm，直径约1mm，黄棕色或深棕色，具细密皱纹及毛发状分枝的小根；质硬脆，易折断，断面棕黄色。气微，味微涩。以须根多，粗壮，黄棕色者为佳。

性味与功用 辛、微涩，温。散瘀消肿，杀虫止痒，祛风。用于无名肿毒，癣癣，风湿痹痛。常用量9～15g；外用适量煎水洗，捣烂敷患处或磨酒或醋擦患处。



图 152　蛛毛蟹甲草

1. 植株下部; 2. 花枝; 3. 花

铁 连 环

来源 本品为百合科丛生蜘蛛抱蛋 Aspidistra caespitosa Péi 的根状茎及根。

原植物 丛生蜘蛛抱蛋（图153）为多年生草本，根状茎圆柱形，直径约6mm，具节和鳞片。叶鞘3枚，不等长，紫褐色，枯后裂成纤维状。叶常3枚簇生，叶片狭线形，长可达80cm，宽0.9～2.5cm，先端渐尖，基部渐狭，全缘，叶面绿色，具光泽，背面绿色，无毛；叶柄纤细，长12～18cm，上面具槽。总花梗平卧或具膝曲状弯曲，上有鳞片2～3枚，先端不等2裂，具紫色细点；每花基部具苞片2，苞片宽卵形，具紫色细点，外面的1枚3深裂。花被坛状，较大，长约2.2cm，直径约2cm，外面具紫色细点，内面暗紫色，花被筒长约1.2cm，6裂，裂片卵状披针形，长约1cm，先端钝，不外弯；雄蕊6，花丝几无，着生于花被筒基部，低于柱头；花柱无关节，柱头盾状膨大，直径约12mm，边缘波状。浆果卵形，直径约6mm，外面紫色，粗糙，每室具2粒形状不规则的种子。花果期3－4月。

生于海拔500－1 100m的林下或竹林下。分布于四川南部至西南部。

采收加工 四季可采，除去叶和泥土，洗净，晒干。

药材性状 本品之干燥根状茎棕褐色，长5－10cm，直径6～10mm。节密集，被黄褐鳞片，上面具叶残基，或叶痕，下面密生须根，较粗，浅黄褐，被灰白色茸毛。气微，味辛、苦。以体干燥，带须根者为佳。

性味与功用 辛、苦，凉。有小毒。祛风除湿，化痰散结，清热解毒。用于风湿麻木、颈淋巴结结核，无名肿毒，蛇虫咬伤，阴道滴虫。常用量3－9g。



图 153　丛生蜘蛛抱蛋

雪上一枝蒿

来源 本品为毛茛科植物短柄乌头 Aconitum brachypodum Diels 的干燥块根

原植物 短柄乌头（图154）为多年生草本，高40～80cm；块根胡萝卜状，长5.5～7cm，径5～7mm，表皮黄褐色或暗褐色。茎直立，不分枝或在花序下方有1～2短分枝，疏被反曲短柔毛。单叶互生，下部叶在开花时枯萎，上部叶密集，具短柄；叶片革质，轮廓三角状宽卵形，长5～6cm，宽约8cm，三全裂，裂片再二回细裂，小裂片线形，宽1～3mm，无毛或背面沿脉疏被短柔毛。总状花序顶生，具7至多数花，花序轴密被反曲短柔毛；花梗长1～1.5cm；萼片紫色，花瓣状，外面被短柔毛，上萼片盔状船形，高2～3cm，侧萼片阔倒卵形，长1.5～1.9cm；花瓣2，无毛，具长爪，距短；雄蕊多数，花丝疏被短柔毛，不裂或上部具2小齿；心皮3，子房密被开展的黄色长柔毛。蓇葖果具心皮3～5，内缝线开裂，种子多数。花果期9－10月。

生于海拔3 900～4 300m的高山地带疏林下或草丛中。分布于云南东北、中至西北部和四川。

采收加工 秋末采根，除净泥土，晒干。

药材性状 本品呈长圆锥形或圆柱形，长3～8cm，直径0.5～2cm，表面黑褐色或黄褐色，具纵细皱纹，常具侧根痕，偶有分枝。质坚而脆，易折断，断面略呈圆形，白色，中心有黑褐色圈，粉质。气微，味苦麻，以质硬脆，断面白色，有黑圈，饱满，光滑，粉性足者为佳。

性味与功用 苦、辛，温。有大毒。祛风除湿，镇痛止血。常用于跌打损伤，骨折肿痛，内外伤出血，风湿关节炎，牙痛，胃痛，痛经，胃癌，食道癌，肺癌等症。内服：25－50mg/d，极量1次75mg。



图 154　短柄乌头

雪　胆

别名　中华雪胆、金龟莲、山乌龟、罗锅底、血胆。

来源　本品为葫芦科植物雪胆 Hemsleya chinensis Cogn.ex Forb. et Hemsl. 的块茎。

原植物　雪胆（图155）为草质藤本。块茎肥大，直径可达30cm以上。茎细，幼枝有短而密的柔毛。卷须常分2叉；叶鸟足状5～7小叶，叶柄长3～8cm；小叶片膜质，卵状披针形，长圆状披针形或宽披针形，先端渐尖，基部宽楔形或近圆形，边缘有具小尖头的锯齿，中间者较长，长5～12cm；小叶柄长5～10mm。花单性，雌雄异株，雌雄花序均为疏散的圆锥花序，总花梗及花梗均丝状，曲折；花萼5裂，裂片披针形；花冠橙黄色，裂片5，短圆形，向后反折，长约1.3cm；雄蕊5，分离，花药卵形，1室；子房近圆筒状倒锥形，长约3cm，顶端平截，成熟时由顶部3裂；种子卵形，周围有薄膜质翅，一端深2裂。

生于海拔1 200～2 100m的半阴湿山坡杂林中、沟边、路旁或草丛中。分布于湖北、湖南、云南、贵州、四川、浙江等省。

采收加工　秋季采挖，晒干或炕干。

药材性状　完整块茎呈不规则扁圆形，略似乌龟状，大者直径可达30cm。表面棕黄色或灰棕色，微粗糙，具疣点状突起。断面浅黄色或类白色。质坚实，粉质。气微，味微苦。切开者多为对开、四开或块片状，以块大、肉厚实、质细密、纤维少、外皮平坦、色黄鲜艳者为佳；肉身带黑、干枯、内部空松多纤维者为次品。

性味与功用　苦，寒。有小毒。归肾、大肠经。清热解毒，消肿止痛。用于胃痛、溃疡病、菌痢、肠炎，牙痛，咽喉肿痛，上呼吸道感染，支气管炎，肺炎，泌尿系统感染，肝炎，败血症，目赤肿痛，疔肿。常用量6～9g；外用适量捣烂或研末调敷患处。



图 155　雪胆

野 竹 兰

别名 膀胱七。

来源 本品为兰科植物小花火烧兰Epipactis helleborine (L.) Crantz.(Serapia helleborine L.)的干燥根。

原植物 小花火烧兰（图156）为多年生陆生兰，高20～65cm；根状茎短，生多数细而长的须根。茎直立，圆柱形，上部被短柔毛，下部具3～4枚鞘状叶。叶2～5（～7）枚，互生，叶片卵形至卵状披针形，长3.5～12cm，宽1.5～7cm，先端急尖或渐尖，基部下延，鞘状抱茎，全缘，绿色，沿脉被微柔毛，边具细缘毛；近无柄。总状花序顶生，长约15cm，具3～40余花；花序轴被短柔毛，苞片舌状，卵形至披针形，下部者长于花，向上的渐短；花绿色至淡紫色，下垂，稍开放；中萼片卵状披针形，长8～10mm，内凹，舟状，渐尖，侧萼片与中萼片相似，但稍歪斜；花瓣较小，卵状披针形；唇瓣长6～8mm，后部杯状，半球形，前部三角形，卵形至心形，长3～4mm，先端钝，急尖至渐尖，常在近基部具2平滑或稍皱缩的突起；合蕊柱连花药长3～4mm；子房倒卵形，连花梗长1～1.5cm，无毛。花期秋季。

生于海拔700～3 600m的山坡高山栎、高山松或杂木林下或草坡上及路旁草丛中。分布于云南、四川、西藏、新疆、青海、宁夏、甘肃、陕西、河南和河北。尼泊尔、锡金、不丹、克什米尔地区、阿富汗、伊朗、北非、中亚及欧洲亦有。

采收加工 秋季采挖，除去茎叶，洗净晒干。

药材性状 本品根状茎短而粗，棕褐色，顶端具茎残基或茎痕，其中下部密生肉质根，弯曲，长3～8cm，直径1～2mm，外表皮棕褐色，表面具纵皱纹及须根或须根痕，质脆，易折断。断面稍不平整，白色，中央具黄色髓心。气微，味苦。以根条粗壮，均匀，色棕褐者为佳。

性味与功用 苦，寒。清肝肺热，止咳化痰，理气行血。用于咽喉肿痛，声音嘶哑，肺热咳嗽痰稠，牙痛，眼痛，肾虚腰痛，跌打损伤。常用量9～15g。



图 156　小花火烧兰

象南星

别名 象鼻子、大麻芋子、大半夏、银半夏、山包谷。

来源 本品为天南科植物象南星 Arisaema elephas Buchet 的干燥块茎。

原植物 象南星（图157）为多年生草本。块茎近球形，密生长达10cm的纤维状须根。假茎很短。鳞叶3～4，内面2片狭长三角形，长9～15cm，绿色或紫色。叶1枚，叶柄长20～30cm，基部粗可达2cm，无鞘；叶片3全裂，稀3深裂，中裂片宽倒卵形或倒心形，顶端截平而具短尾尖，向基部渐狭，宽大于长，长（5～）9～9.5cm，侧裂片较大，宽斜卵形，长6.5～13cm。雌雄异株。总花梗短于叶柄，绿色或淡紫色；佛焰苞青紫色，基部黄绿色，有白色或绿色条纹，全长12～15cm，下部筒长4～6cm，檐部长圆披针状，顶端骤狭渐尖；肉穗花序下部具花，附属器具柄，基部膨大，向上渐细成鼠尾状，长达20cm，或短而直，仅长4～5cm；雄花具3～5花药，合生花丝短柄状，花药半月形或马蹄形开裂；雌花之子房长卵圆形，柱头盘状，被毛。浆果红色，椭圆状，长约1cm。花果期5～8月。

生于海拔1 800～4 000m的河岸、山坡林下、草地或荒地。分布于西藏、云南、四川、贵州等省区，我国特有。

采收加工 秋、冬季采挖，除去残茎，须根及外皮，晒干。

药材性状 本品呈类球形，直径3～5cm。表面乳白色或棕色，粗糙不平或近光滑，顶端中央有一大的凹陷茎痕，周围密布麻点状须根痕。质坚硬，不易破碎，断面不平坦，白色，粉性，有的可见筋脉点（维管束）。气微辛，味麻辣，以个大、色白、粉性足者为佳。

性味与功用 苦、辛，温，剧毒。燥湿化痰，祛风定惊，消肿散结。主治腹痛，中风痰壅，半身不遂，惊风，癫痫，风痰眩晕，痈肿，跌打损伤，蛇虫咬伤。常用量1～3g；外用适量捣烂敷患处。本品在四川地区还代“天南星”用。

附注 （1）本品仅能用微量，需在医生指导下服用。（2）《中药大辞典》656条中之多疣南星 A.verucosum 应是本种。



图 157　象南星

紫 玉 簪

别名 紫鹤、红玉簪、石玉簪、鸡骨丹、拜恩果母（彝族、傣尼族语）。

来源 本品为百合科植物紫萼 Hosta ventricosa (Salisb.)Stearn (Bryocles ventricosa Salisb.)的干燥根。

原植物 紫萼（图158）为多年生草本；根状茎粗壮，生多数须根。叶基生，叶片卵形至卵圆形，长10～17cm，宽6.5～7cm，先端急尖，基部心形或近截形，极少叶片基部下延而略呈楔形，全缘，微波状，绿色，具7～11对拱形平行侧脉；叶柄粗壮，长14～42cm，两边具狭翅。花葶由叶丛中生出，高60～100cm，下部叶状苞片狭卵形，长1.5～4cm；总状花序生于花葶顶端，具10～30花，花梗长6～8mm，基部具膜质、卵形苞片，苞片长于花梗，稀短于花梗；花紫色或淡紫色，花被筒长1～1.5cm，下部窄细，上部膨大成钟形，直径2～3cm，花被裂片6，长椭圆形，长1.5～1.8cm，宽8～9mm；雄蕊6，着生于花被筒基部，伸出花被筒外，先端弯曲；子房短柱状，花柱长为子房的3～4倍，蒴果圆柱形，长2～4.5cm，顶端具细尖；种子黑色。花期6～7月，果期7～9月。

生于海拔500～2 700m的山坡林下，草坡或路旁。分布于我国华东、华南、华中、西南及陕西、河北等地。日本亦有。

采收加工 秋后采挖，洗净，鲜用或晒干备用。

药材性状 本品之干燥根茎粗壮，长约10cm，直径约0.3～1cm，常数个并生，上面具白状环纹，下面丛生多数条状细根。根长15～25cm，直径2～3mm，外被黄棕色绒毛，内皮淡黄色；质脆，易折断；断面黄白色，中央木质部细小。无臭，味微甜。以根条多，粗壮者为佳。

性味与功用 微甘，凉。调经，散瘀止痛，解毒。用于月经不调，胃痛，跌打根伤，鱼骨鲠喉；外用治毒蛇咬伤，痈肿疔疮等症。常用量6～9g。

附注 忌生冷食物。本种的花入药，味甘微苦，性温平。用于遗精，吐血，气肿，白带，咽喉红肿。常用量9～15g，煎汤内服。



图158　紫萼

紫　芋

别名　芋头花、水芋、东南菜、老虎广菜。

来源　本品为天南星科植物紫芋 Colocasia tonoimo Nakai 的干燥块茎。

原植物　紫芋（图159）为多年生草本，高1－1.2m；块茎粗厚，侧生小球茎，倒卵形，表面生多数褐色须根。无地上茎，叶1－5枚，由块茎顶部生出；叶片纸质，盾状，卵状箭形，长40－50cm，宽25－30cm，基部具弯缺，边缘波状，叶面深绿色，背面淡绿色，侧脉粗壮；叶柄紫褐色，圆柱形。花序梗单1，由叶腋内抽出，长12－15cm，紫褐色；佛焰苞管部卵状长圆形，长4.5～7.5cm，直径2～2.7cm，绿色或紫色，檐部厚，席卷成角状，长9－20cm，金黄色，基部张开部分长约5cm。肉穗花序近长圆柱状；雌花序位于穗之基部，长3－4.5cm，直径约12mm，子房间杂以不育的棒状中性花；不育雌花序居中，长1.5～2.2cm，直径4～7mm，花黄色，顶端带紫色；雄花序位于穗之上部，长3.5－5.8cm，直径6～8mm，雄花黄色；附属器角状，长2cm，直径约4cm，具细槽纹。子房绿色，长1mm，略侧向压扁，柱头脐状凸起，黄绿色；雄花倒卵形，淡绿色，顶端平截，边缘具纵长药室。花期7－9月。

云南昆明至红河等栽培；日本也有栽培。

采收加工　秋季采挖，洗净，晒干。

药材性状　本品粗壮，直径2－3cm，长短不一，表皮棕褐色或绿褐色，顶端具茎叶残基或痕，质坚硬，不易折断，断面不整齐，浅褐色。气微，味辛涩。以个大，质坚实，色棕褐色者为佳。

性味与功用　辛、涩，寒。消肿解毒，止血散瘀。用于乳腺炎，无名肿毒，口疮，疔疮，烧烫伤。常用量6～9g。

附注　紫芋的叶用于荨麻疹，脐疮。



图159　紫芋

1. 植株；2. 花序

筒花开口箭

来源 本品为百合科植物筒花开口箭 Tupistra delavayi Franch.之干燥根茎

原植物 筒花开口箭（图160）为多年生草本：根状茎圆柱形，直径1－1.5cm，淡褐色。基生叶3－4枚，近两列套迭，叶片纸质或近革质，长圆形或长椭圆形，长25～45cm，宽5～9cm，先端急尖或渐尖，基部渐狭成明显或不明显的柄，边缘微波状；鞘叶2枚，长3.5～5cm。穗状花序长5－6cm，直径1.5～1.7cm，花多而密；总花梗长4.5－10cm；苞片三角状披针形或卵形，长4－7mm，膜质，白色或淡褐色，全缘；花被筒钟状，肉质，长7－11mm，黄色，筒长4－6mm，裂片6，卵形或近圆形，长2～3mm，宽2.5～3mm；雄蕊6，花丝贴生于花被筒上，上部稍分离，花药阔卵形，长1－1.5mm；子房卵形，连花柱长4.5－5mm，花柱明显或不明显，柱头三棱形，顶端3裂。浆果近球形，直径6～10mm，成熟时紫红色。花期4月，果期8月。

生于海拔4 500－5 000m的高山灌丛中或杂木林下荫湿处。分布于云南、四川、贵州、湖南、湖北。

采收加工 全年可采挖，除去茎叶，洗净泥土，晒干。

药材性状 本品呈圆柱形，略扁而扭曲，长约10～15cm，直径1－1.5cm，表皮棕黄色或黄绿色，节明显，稍膨大，节上有膜质鳞片状叶及芽，节间具纵皱纹。断面类白色。气无。以粗壮，无残叶柄纤维，断面类白色者为佳。

性味与功用 苦，寒，有毒。清热泻火，强心利尿。用于骨蒸劳热，咽喉痛，风心病，浮肿，月经不调等。常用量0.5－3g，或遵医嘱。



图 160　筒花开口箭

蜀葵叶薯蓣

别名 薯蓣、细山药、龙骨七、穿山龙。

来源 本品为薯蓣科植物蜀葵叶薯蓣 Dioscorea althaeoides R.Kunth 的干燥根状茎。

原植物 蜀葵叶薯蓣（图161）为多年生草质藤本。根状茎横生，细长条形，分枝纤细。茎幼嫩时具稀疏长硬毛。单叶互生，叶片宽卵状心形，长10～13cm，宽与长几相等，先端渐尖，边缘浅波状或4～5浅裂，叶面无毛或有毛，背面脉上密被白色短柔毛；叶柄通常短于叶。花单性，雌雄异株；雄花梗长2～3mm，常2～5朵集成小聚伞花序再组成总状花序，有时花序轴分枝形成圆锥花序；花被碟形，基部管状，顶端6裂；雄蕊6，生于花被基部，花丝较短，花药背着内向；雌花序穗状，有花40朵或更多，单生或2～3个簇生叶腋；苞片披针形；花被6，舌状，生于子房之上，退化雄蕊丝状或无。蒴果三棱形，长约2.5cm，具三翅，基部渐狭圆，草绿色，有光泽；种子扁平，生于每室中轴基部，上方有斧头状宽翅。花期6～8月，果期7～9月。

生于海拔在1 000～2 000m的山坡、沟边或路旁的杂木林下或林缘。分布于云南、四川、贵州、西藏等省区。

采收加工 秋、冬季采挖，切去芦头，洗净，除去外皮及须根，干燥。

药材性状 本品略呈圆柱形，稍弯曲，长15～30cm，粗细不匀，直径1.5～6cm。表面黄白色或棕黄色，具纵沟及皱纹，分枝痕呈疣状突起，两端不整齐。质脆易断，断面白色或黄白色，粉性。味淡，微酸，气无。以条粗壮、坚实、粉性足，色白者为佳。

性味与功用 微苦、甘，平。归脾经。舒筋活络，祛风止痛，燥湿理脾。用于风湿疼痛，肢体麻木，跌打损伤，积食饱满，消化不良。常用量9～30g




图 161　蜀葵叶薯蓣

1. 果枝一段; 2. 根状茎

管花党参

别名　西昌党参、甜党、叙党、白党。

来源　本品为桔梗科植物管花党参 Codonopsis tubulosa Kom.的干燥根。

原植物　管花党参（图162）为多年生草质缠绕藤本。根近圆柱形，粗达2cm。茎疏生短柔毛或近无毛。叶对生或在茎上部者互生；叶片卵形、卵状披针形或狭卵形，长2～6cm，顶端钝或微尖，基部楔形、宽楔形或圆形，边缘浅波状，有浅牙齿或不整齐牙齿，上面绿色，疏生短伏毛，下面灰绿色，有疏或密的短柔毛；叶柄长1～2mm，被柔毛。花生于茎或分枝顶端；花萼筒短，裂片5，三角形，长约12mm，宽约8mm，边缘有小牙齿，外面有疏或密的短毛；花冠淡绿黄色，钟状筒形，长2～3.5cm，直径5～15mm，5浅裂，裂片三角形；雄蕊5，花丝有毛；子房半下位，花柱有毛。蒴果圆锥形，近基部有宿存增大的花萼，顶端3瓣裂。

生于海拔1 900～3 000m的山坡、林缘或山谷草地。分布于云南、贵州、四川等省。缅甸北部也有。

采收加工　秋季采挖，洗净，晒至半干，搓紧，再晒再搓，反复3～4次，晒干。

药材性状　本品呈类圆柱形，末端较细，不分枝或中部以下略有分枝，长10～25cm，直径5～18mm。根头部有许多疣状突起的茎痕，俗称“狮子盘头”，根头下稍细。表面灰黄色或浅棕黄色，环状横纹有或无，全体有多数不规则纵沟和纵棱，并有横长或点状而突起的皮孔。支根脱落处常具黑褐色胶状物，系内部乳汁溢出干燥所成。质稍坚脆，易折断。断面皮部白色，有裂隙，木部淡黄色。气微香，味微甜，嚼之有渣。以根条肥大、粗实、皮紧、甜味者为佳。

性味与功用　甘，平。归手、足太阴经气分。补中，益气，生津。用于脾胃虚弱，气血两亏，体倦乏力，食少，口渴，久泻，脱肛。常用量9～15g，大剂30～60g。



图 162　管花党参
1. 根 2. 花枝

螃 蟹 七

别名 竹节菜、竹叶菜。

来源 本品为百合科植物管花鹿药 Smilacina henryi (Baker)Wang et Tang(Oligobotrya henryi Baker;Maianthemum henryi(Baker)La Frankie)的干燥根状茎

原植物 管花鹿药（图163）为多年生草本，高30－80cm；根状茎念珠状，长可达15cm，粗0.5－1.5cm，节肉质，卵形或圆柱形，节间短而细。茎直立，上部被柔毛。单叶互生，6～8枚，叶片纸质，卵形、卵状长圆形或长圆形，长7.5～14cm，宽4.5～9cm，先端渐尖或急尖，基部圆形、浅心形、稀阔楔形，全缘，叶面绿色，背面淡绿色，两面与边缘被短硬毛；叶柄半抱茎，长约5mm。总状花序或偶为具分枝的圆锥花序，顶生，长9～13cm，具15－30花，密被白色硬毛；花梗长0.5～3mm，被毛；花淡黄色、黄色、黄绿色、白色或淡紫色，花被管筒状，长6－7mm，基部稍膨大，裂片6，长圆形，长2.5～4mm；雄蕊6，花丝极短，生于花冠管喉部，花药卵形；子房圆锥形，长约1.5mm，绿色，花柱与子房近等长，柱头3裂，裂片外反。浆果圆球形，直径6－7mm，绿色，具紫色斑点。花期5－7月，果期8～9月。

生于海拔1 300～4 000m的林下或灌木丛中，高山草甸及流石滩上。分布于云南西部和西北部、四川西部、西藏东南部和南部、甘肃和陕西南部、河南西南部、山西、湖北和湖南等省区。

采收加工 秋季和冬初采集，除去茎、叶和泥土，晒干。

药材性状 本品念珠状，长可达15cm，直径5－15mm，稍弯曲；外表面黄褐色，节肉质，膨大，卵形或圆锥形，顶部具直径3～6mm的圆形茎痕，两侧及下部具圆形根痕及残存的纤维鳞片；节间短或极短，缢缩，粗2－4mm。质脆，易折断，断面类白色。气微，味甘。以个大、均匀、无杂质者为佳。

性味与功用 甘、苦，温。补气益肾，祛风除湿，活血调经。用于痨伤，阳痿，偏正头痛，风湿疼痛，跌打损伤，乳房胀痛，月经不调。常用量9～15g，煎汤或浸酒内服；外用捣烂或烫热熨患处。



图163　管花鹿药

1. 根状茎及根；2. 花枝；3. 花

翼首草

别名 棒子头、狮子草、帮子毒乌（藏语）。

来源 本品为川续断科植物匙叶翼首花 Pterocephalus hookeri (C.B.Clarke) Höeck (Scabiosa hookeri C.B.Clarke) 的干燥根。

原植物 匙叶翼首花（图164）为多年生草本，高30～50cm，全株被白色柔毛；根粗壮，单一，木质化，近圆柱形，直伸，多少弯曲，表面棕褐色或黑褐色，里面白色，长8～15cm，直径1.5～2.5cm。叶全部基生，莲座状，叶片倒披针形，长5～18cm，宽1～2.5cm，先端钝或急尖，基部渐狭呈翅状柄，全缘或一回羽状深裂，裂片3～5对，斜卵形或披针形，长1～2cm，顶裂片大，披针形，叶面绿色，疏被白色褪伏毛，背面苍绿色，密被粗硬毛，边缘具长缘毛。花葶由叶丛中抽出，高10～40cm，无叶，直径2～4mm，被白色粘伏或伸展长柔毛，具纵棱沟。头状花序顶生，直径3～4cm，球形，直立或微下垂；总苞苞片2～3层，长卵形或卵状披针形，长1.2～1.8cm，先端急尖，被毛；苞片线状披针形，长10～20mm，与总苞片边缘具柔毛；小总苞筒状，长4～5mm，顶端具波状牙齿；花萼全裂，成20条柔软羽毛状毛；花冠筒状漏斗形，长10～12mm；雄蕊4，稍伸出花冠筒外，柱头扁球形。瘦果长3～5mm，倒卵形，淡棕色，具8条纵棱，疏生贴伏毛，具棕褐色宿存萼刺20条，被白色羽毛状毛。花果期7～10月。

生于海拔1 800～4 800m的山野草地、高山草甸及耕地附近。分布于云南、四川、西藏东部和青海南部；不丹、锡金和印度亦有。

采收加工 夏、秋季采挖，除去茎叶、泥土，晒干。

药材性状 本品之干燥根粗壮，长8～15cm，直径1.5～2.5cm，近圆柱形，直伸，稍弯曲；表面棕褐色或黑褐色，顶端具叶柄残基或花葶痕，表面具须根痕；质硬，不易折断，断面不整齐，类白色。气微，味苦稍麻。以体干，质坚实，断面类白色者为佳。

性味与功用 苦，寒。有小毒。清热解表，清心凉血。用于感冒发热及各种温热病引起的发烧，心中烦热，咳血，吐血，尿血，便血。常用量3～9g。



图 164　匙叶翼首花

藤　　乌

别名　白乌头、草乌、羊角七、盐附子、藤草乌。

来源　本品为毛茛科植物瓜叶乌头 Aconitum hemsleyanum Pritz.的干燥块根。

原植物　瓜叶乌头（图165）为多年生草本。块根圆锥形，长1.6－3cm，直径约1.6cm。茎缠绕，分枝，无毛，常带紫色。单叶互生，茎中部叶片轮廓五角形或卵状五角形，长6.5～12cm，宽8－13cm，基部心形，3深裂，中深裂片梯状菱形或卵状菱形，短渐尖，不明显3浅裂，浅裂片具少数小裂片或卵状粗牙齿，侧深裂片斜扇形，不等2浅裂；叶柄稍短于叶片，疏被短柔毛或几无毛。总状花序生茎或分枝顶端，有6－12花；轴与花梗无毛或被贴伏短柔毛；下部苞片叶状，上部苞片小，线形；花梗长2.2－6cm，常下垂，弧状弯曲；小苞片线形，长3～5mm，无毛；萼片5，深蓝色，外面无毛或疏被短柔毛，上萼片高盔形或圆筒状盔形，几无爪，高2～2.4cm，下缘长1.7－1.8cm，直或稍凹，喙不明显，侧萼片近圆形，长1.5～1.6cm；花瓣2，无毛，长约10mm，宽约4mm，唇长5mm，距向后弯，长约2mm；雄蕊多数，无毛，花丝有2小齿或全缘；心皮5，无毛，稀被微柔毛。长12～15mm，喙长约2.5mm；种子三棱形，长约3mm。花期8～10月。

生于海拔1 700～2 200m的山坡林中或灌丛中。分布于四川、湖北、湖南北部、江西北部、安徽西部、陕西南部和河南西部。

采收加工　秋季采挖，除去茎、叶、粗皮和泥土，石灰水泡2～3天，晒干。

药材性状　本品呈圆锥形，稍弯曲，长1.6－5cm，直径1－1.6cm。顶端常具残茎或茎痕，表面深棕色，有纵皱纹及须根。质硬，难折断。横切面灰白色，粉质，木质部排呈五角形，形成层不明显。气微，味辛辣麻舌。以块根肥壮，质坚实，断面白色，粉性足，残茎及残根少者为佳。

性味与功用　辛、苦、热。有大毒。祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛，麻醉止痛，无名肿毒，跌打损伤，癣疮。常用量0.9－1.5g；外用：鲜品磨汁或干品研末调敷。

附注　高热患者及孕妇忌用；本品毒性甚剧，未经炮制，不作内服。炮制品内服宜先煎久煎。本品中毒时出现全身僵硬，喉咙麻木，憋气等症状。解毒方法可参考乌头中毒解毒法，或到医院抢救。



图 165　瓜叶乌头
1. 根；2. 花枝

藤 苦 参

别名 红藤、哈罚醒合（傣语）、哈罚不果（哈尼语）、南苦参。

来源 本品为萝摩科植物马莲鞍 Streptocaulon griffithii Hook.f.的干燥根。

原植物 马莲鞍（图166）为木质缠绕藤木，全株具乳汁；根圆柱形，粗壮、稍弯曲，棕褐色，具不规则的纵皱纹和小瘤状突起。茎圆柱形、褐色，具皮孔。枝条幼时密被棕黄色绒毛，后渐脱落。单叶对生，叶片厚纸质，倒卵形或阔椭圆形，长6～15cm，宽3～7cm，先端急尖或钝，基部浅心形，全缘，叶面深绿色，背面淡绿色，两面密被棕黄色绒毛，主脉在叶面凹入，背面隆起，侧脉14～18对，羽状平行；叶柄长3～7mm，被毛。聚伞花序腋生，二歧，圆锥状，总花梗和花梗、苞片密被棕黄色绒毛；花萼被毛，5裂，裂片卵状三角形，绿色；花冠辐状，外面黄绿色，里面黄红色，花冠筒短，5裂，裂片卵圆形；副花冠裂片丝状，与花丝背部合生；雄蕊5，花丝丝状，离生，花药与柱头贴连，药隔顶端膜片于柱头顶端合生；子房被柔毛，心皮离生，柱头圆锥状。蓇葖双生，或直线张开，圆柱形，长7～12cm，直径5～7mm，密被棕黄色绒毛；种子多数，长圆形，扁平，棕褐色，顶端具长达3cm的白色或淡黄白色的种毛。花期6～10月，果期8月至翌年3月。

常生于海拔200～1 500m的山谷疏林或路旁灌丛中，分布于云南、贵州和广西；印度、缅甸、越南和泰国亦有。

采收加工 全年可采，切段，晒干。

药材性状 本品之根呈圆柱形，粗壮，稍弯曲，表面暗棕褐色，具不规则的纵向皱纹和小瘤状突起，可见支根痕。质坚韧，不易折断，断面不整齐，横面皮部棕色，木质部淡黄色，射线纤细，导管显著，呈小孔状。气微，味苦，微甘。以根条均匀，色棕褐者为佳。

性味与功用 苦、凉。清热解毒。用于痢疾，泄泻，疟疾，感冒，胃痛，淋浊，蛇咬伤，跌打肿痛。常用量3~6g，煎水服，或1.5~3g，研末服；外用适量捣烂敷患处。

附注 本种之叶和种子有毒，误食会引起头晕、腹痛、腹泻，但叶可外用治毒蛇咬伤和烂疮等。



图 166　马莲鞍

1. 根；2. 果枝；3. 花枝

三、茎、枝和树皮类

上厚朴

别名 木莲花、密砸、小叶子厚朴、枝子皮。

来源 本品为木兰科植物红花木莲 Manglietia insignis (Wall.) Bl.et Fisch.(M.yunnanensis Hu)的干燥树皮。

原植物 红花木莲（图167）为常绿乔木，高可达30m，胸径达40cm；树皮灰褐色或黑褐色。小枝无毛或节上偶被黄色或锈色柔毛。单叶互生，叶革质，倒披针形，长圆形或长圆状椭圆形，长15～26cm，宽4～10cm，先端渐尖或尾状渐尖，基部楔形，全缘，叶面绿色，无毛，背面淡绿色，仅沿脉被红褐色柔毛，侧脉12～24对；叶柄长2－3.5cm。花两性，单生于小枝顶端，芳香；花梗长8～10mm，粗壮；花被片9－12枚，外轮3片，倒卵状长圆形，长约7cm，外面褐色，内面红色或紫红色，外反，中间和内部的6～9片，倒卵状匙形，长5～7cm，基部具爪，直立，乳白色带粉红；雄蕊长10～18mm，药隔伸出药室，三角（尖）形，花丝与药隔伸出部分近等长；雌蕊群圆柱形，长5－6cm，心皮无毛。聚合果卵状长圆形，长7－12cm，紫红色；蓇葖具乳头状突起，背缝开裂。花期5～6月，果期8～9月。

生于海拔900～1 300（～2 800）m的山地林中。分布于湖南西南部、广西、四川、贵州、云南和西藏等省区。尼泊尔、印度东北部、缅甸北部亦有。

采收加工 6～8月，剥取树皮，除去杂物，卷筒，阴干或晒干。

药材性状 本品呈卷筒或双卷筒状，长约1m，厚3～5mm，外皮粗糙，黄褐色或棕褐色，具不规则的纵裂纹和突起的横皮孔，若除去栓皮层则呈紫褐色，内表面灰棕色或灰黄色，有细纹理。质硬，折断面呈现纤维性，略芳香，味苦微涩。以皮厚、气芳香，色紫褐者为佳。

性味与功用 苦、辛，温。燥湿，健脾胃，止痛，除满。用于脘腹满痛，宿食不消，呕吐泻痢等症。常用量6～12g。



图 167　红花木莲

毛木通

来源 本品为毛茛科植物毛木通Clematis buchananiana DC.的干燥茎。

原植物 毛木通（图168）为木质藤本；茎圆柱形，具纵的棱槽，棕黑色或淡紫黑色，被开展的黄色长柔毛或绒毛。奇数羽状复叶，对生，具小叶5枚；叶柄长5～9cm，基部稍膨大，密被黄色柔毛；小叶对生，叶片卵形或阔卵形，长6～10cm，宽4～8cm，先端短尖，基部心形，边缘3浅裂或具粗圆锯齿，叶面绿色，疏被紧贴的柔毛，背面淡绿色，被黄色柔毛，沿主脉较密；小叶柄长1～3cm，被黄色柔毛。聚伞圆锥花序腋生，长12～32cm，花序梗长5～15cm，与花梗均被柔毛；叶状苞片长1.5～2.5cm，边缘具波状齿或全缘；花狭钟状，直径约2.5cm，顶端向外反卷；萼片淡黄色，4枚，长方状椭圆形或狭卵形，长2～3cm，宽8～10mm，先端圆形，外面密被淡黄色短柔毛，内面仅顶端疏被曲柔毛；花瓣无；雄蕊多数，长为萼片的1/2或稍长，花丝疏被柔毛，花药线形；心皮被白色绢状长柔毛，花柱丝状，被短柔毛。瘦果卵圆形，长约5mm，宽3mm，扁平，具长达4cm的宿存花柱。花期10月至次年1月，果期2～3月。

生于海拔1 200～2 800m的山地林缘，山坡灌丛中。分布于云南、四川及西藏南部；印度、尼泊尔和锡金也有。

采收加工 秋季采集，切段晒干。

药材性状 本品呈长圆柱形，长30~50cm，直径1~2cm，略扭曲，表面具纵棱及沟槽，棕褐色或黑褐色，被毛，节处略膨大，具叶痕及分枝痕。质坚硬，不易折断，断面木质部浅棕褐色或淡黄色，具黄白色放射状纹理，髓部类白色。气无，味淡。以质坚实，无栓皮者为佳。

性味与功用 甘、辛，凉。消炎止痛、利尿。用于扁桃体炎，咽喉炎，尿道感染、膀胱炎，跌打损伤等症。常用量9~15g。



图 168　毛木通

甘川铁线莲

来源 本品为毛茛科植物甘川铁线莲 Clematis akebioides (Maxim.) Hort.ex Veitch.(C.orientalis Linn.var.akebioides Maxim.)的干燥藤茎。

原植物 甘川铁线莲（图169）为藤本植物；茎圆柱形，具纵棱槽，绿色，无毛。一回羽状复叶对生，有小叶5－7枚，具长柄；小叶片不等大，中间者大，侧生者较小，阔椭圆形、椭圆形或长椭圆形，长2～4cm，宽1.3～2cm，先端钝或圆形，基部钝至圆形，常2～3浅裂或深裂，裂片常2～3浅裂或不裂，边缘具不整齐的浅锯齿，叶面绿色，背面淡绿色，两面均无毛；小叶具柄。花单生或2－5朵簇生于叶腋内，花梗长5－10cm；苞片大，通常2－3裂，中裂片较大，阔椭圆形、椭圆形或狭椭圆形，长1.5～2.5cm，全缘或具少数牙齿。萼片黄色，4－5枚，椭圆形，长椭圆形或阔披针形，长1.8～2.5cm，宽7～11mm，先端锐尖，具小尖头，外面边缘被短柔毛，里面无毛；花瓣无；雄蕊多数，花丝下部扁平，被柔毛，花药无毛。瘦果倒卵形，椭圆形，长约3mm，被柔毛，宿存花柱被长柔毛。花期7－9月，果期9－10月。

生于海拔1 930～3 600m的高原草地、山坡灌丛或溪旁。分布于四川西部、云南西北部、西藏东部、甘肃南部和青海东部。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 本品缠绕呈团状，或长30cm左右的棍棒状，圆柱形，常弯曲，直径2－4mm，表面红褐色或褐色，节间具纵棱沟，被微柔毛，节稍膨大，具叶柄残基或侧枝残基或痕。质坚，不易折断，断面不整齐，断面疏松纤维状，类白色。气微，味淡。以粗细均匀，色紫褐者为佳。

性味与功用 甘、苦，凉，有毒。解毒，消炎，止痛。用于痢疾，喉痛，蛇虫咬伤。常用量5－15g；外用研粉敷患处。



图 169　甘川铁线莲

华山松节

别名　五叶松、果松、青松、五须松、白松。

来源　本品为松科植物华山松 Pinus armandi Franch.的松节。

原植物　华山松（图170）为常绿乔木，高达35m，胸径达1m；幼枝树皮平滑，灰绿色或淡灰色，老树皮呈灰色，开裂成方形或长方形厚片块；小枝绿色或灰绿色（干后呈褐色），无毛，微被白粉。冬芽褐色，微具树脂。针叶5针一束，长8~15cm，直径1~1.5mm，横切片三角形，具1条维管束，树脂道通常3个，中生或腹面1个中生，背面2个边生；叶鞘早落。球果圆锥状长卵圆形，长10~20cm，直径5~9cm，成熟时褐黄色或淡黄褐色，种鳞张开，种子脱落；中部种鳞斜方形或宽三角状斜方形，先端钝圆或钝尖，无毛，不具纵脊；鳞脐顶生，不显著；种子卵形或卵圆形，长1~1.5cm，直径6~10mm，褐色至黑褐色，无翅或两侧及顶端具棱脊。花期4~5月，果期次年9~10月。

生于海拔1 600~3 300m的山地，组成纯林或与其他针叶树种、栎类树种组成混交林。分布于云南、四川、贵州、西藏、湖北西部、陕西和甘肃南部，山西南部和河南西南部。

采收加工　松节全年可采，于伐倒的松树或木材加工时，锯取含松脂部分，晒干或阴干。

药材性状　干燥松节呈不规则的块状或片状，大小、粗细不等，一般长5~10cm，厚1~3cm，表面黄棕色至红棕色，断面粗糙，中心色淡，边缘深棕色且油润，质坚硬，不易折断，断面刺状。有松节油气，味微苦。以棕红色、油性足者为佳。

性味与功用　苦，温。祛风除湿，活络止痛。用于风湿关节痛，腰腿痛，大骨节痛，跌打瘀血。常用量10~15g。

附注　本种之花粉称松花粉。干燥松花粉呈细粉状，淡黄色，体轻，易飞扬，手捻，有滑润感。气微，味淡、味甘，性温。有祛风，益气，收湿，止血之功效。用于眩晕，中虚胃疼，久痢，渚疮湿烂，外伤出血等症。常用量：3~6g。松针：味苦，涩，性温。有祛风活血，明目，安神，解毒，止痒之功效。用于流行性感冒，风湿关节疼痛，高血压，神经衰弱，夜盲症，跌打肿痛。种仁称松子仁，润肺，滑肠。用于肺燥咳嗽，慢性便秘。用量：6~15g。



图 170　华山松
1. 果枝; 2. 种子

宽叶清风藤

来源　本品为清风藤科植物宽叶清风藤 Sabia latifolia Rehd.et Wils. 的干燥枝。

原植物　宽叶清风藤（图171）为攀援灌木，高2－3m；小枝圆柱形，黄绿色或黄褐色，具纵条纹，被短柔毛，老枝紫褐色，具皮孔。单叶互生，叶片纸质，椭圆形或椭圆状长圆形，稀卵形，长5－14cm，宽2－7cm，先端常短渐尖，基部楔形，阔急尖或近截状圆形，边缘波状啮蚀状，稍反卷，叶面绿色，无毛，背面淡绿色或灰白色，沿脉被平展的柔毛，侧脉5～6对，细脉网状；叶柄长6～15mm，被短柔毛。聚伞花序腋生，通常具2－3花，稀4－5花；总花梗长1.5～2cm，花梗长5～15mm，向顶端增粗，两者均被短柔毛；小苞片早落；萼片5，半圆形，稀阔卵形，长约0.5mm；花瓣5，椭圆状卵形或倒卵形，长4－5mm，宽3～4mm，具缘毛；雄蕊5，花丝长3～5mm，扁平，花药卵状球形，长约1mm；花盘肿胀，边缘波状，具肋，无腺体；子房卵球形或圆锥形，被短柔毛。核果近肾形，直径7～8mm，蓝色，具明显的蜂窝状凹穴。花期2～5月，果期7～8月。

生于海拔2 000m的山坡灌丛中或杂木林中。分布于云南东北部和四川。

采收加工　四季可采，切段晒干。

药材性状　干燥枝条圆柱形，直径5－10mm，表面黄褐色至紫褐色，具纵条纹和浅色皮孔。质坚脆，易折断，断面不整齐，纤维性，类白色。气无，味微辛。

性味与功用　辛、温。祛风除湿，止痛消炎。用于风湿骨痛，跌打损伤，肝炎。常用量15～30g。

附注　本种之根也入药，功用同枝。



图 171　宽叶清风藤
1．花枝；2．花

通 关 散

别名 奶浆草、通关藤、大苦藤、乌骨藤、下奶藤。

来源 本品为萝藦科植物通关散 Marsdenia tenacissima (Roxb.)Wight et Arn.(Asclepias tenacissima Roxb.)的干燥藤茎。

原植物 通关散（图172）为落叶坚韧木质藤本，长2～6m；全株各部均具乳汁；根圆柱形，粗壮，少分枝，灰褐色。茎粗而坚韧，淡黄褐色，密被柔毛，下部圆柱形，上部略扁，绿色，节略膨大，节间具纵沟槽。单叶对生，叶片坚纸质，阔卵形，长、宽均约15～18cm，先端急尖或短尖，基部心形，全缘，叶面绿色，近无毛或被茸毛，背面淡绿色，被淡黄色茸毛；叶柄长4～6cm。伞状复聚伞花序腋生，长5～15cm；花萼5裂，裂片长圆形，基部内面具腺体；花冠钟状，黄紫色，外面被柔毛，5裂，裂片卵状三角形；副花冠5裂，裂片隆起，略呈镰刀状，短于花药，基部具距；花粉块长圆形，每室1个，直立，着粉腺三角形；柱头圆锥状。蓇葖披针形，长5～9cm，直径约1cm，密被灰黄色绒毛；种子多数，顶端具白色绢质种毛。花期6～7月，果期10～11月。

常生于海拔600～1 400（～2 200）m的向阳山坡疏林中。分布于云南和贵州南部；斯里兰卡，印度，缅甸，越南，老挝，柬埔寨，印度尼西亚等国亦有。

采收加工 秋、冬季采收，刮去外层栓皮，切段晒干。

药材性状 通关散之茎为扁圆柱形，直径2～5cm，略扭曲，灰褐色，粗糙，节膨大，节间具纵沟槽，栓皮松软，较厚；质坚而韧，不易折断，断面不平整，皮部具少数毛状纤维，浅褐色，木质部黄白色，密布针眼状小孔。气微，味苦回甜。以粗壮，味苦者为佳。

性味与功用 苦，寒。止咳平喘，祛痰，通乳利尿，清热解毒，抗癌。用于上呼吸道感染，支气管炎，支气管哮喘，乳汁不下，小便不利，癌症，跌打骨折。常用量3～15g；外用治痈疮疖疡，研粉敷患处。




图 172　通关散

1. 叶枝; 2. 茎一段; 3. 果

紫花卫矛

来源　本品为卫科植物紫花卫矛 Euonymus prophyreus Loes 的干燥枝条。

原植物　紫花卫矛（图173）为灌木，高1～5m，无毛。小枝圆柱形，具纵条纹，幼时绿色，老枝暗紫色或紫黑色，具少数散生皮孔；顶芽圆锥形，长6～8mm，芽鳞灰色，边缘带紫红色。单叶对生，叶片纸质，卵形或椭圆形，长3～7.8cm，宽1.2～3.5cm，先端长渐尖，基部阔楔形或近圆形，边缘具细齿，叶面绿色，背面淡绿色，两面无毛，侧脉4～5对；叶柄长3～8mm。聚伞花序单生于新枝下部叶腋内，具3～7花，稀更多花；花序梗纤细，长2～4.5cm，花梗长1.5～4mm，基部具小苞片，早落；花小，紫红色，4数；花萼裂片近圆形、半圆形或卵形，长约1mm，具缘毛；花瓣卵状长圆形，长3～3.5mm；雄蕊无花丝，着生于花盘边缘，花药黄色，1室，顶端开裂；花盘平展，微4浅裂；雌蕊着生于花盘中央，无花柱，柱头头状。蒴果近球形，稍扁，紫红色，直径约1.2cm，具4狭长翅，翅长5～10mm；种子阔椭圆形，长约5mm，红褐色，具褐色假种皮。花期6月，果期8～9月。

生于海拔2 000～3 600m的山坡林中或林缘。分布于云南、四川、贵州、湖北和陕西。

采收加工　夏、秋季采收，晒干。

药材性状　本品之干燥小枝圆柱形，长短不一，直径5～10mm。具纵条纹和稀疏的浅色皮孔，表面暗紫色或紫黑色。质坚脆，易折断，断面不整齐，类白色，中央具髓心。气无，味苦、微辛。以粗细均匀，色紫红者为佳。

性味与功用　苦、微辛，凉。清热解毒，活血，散结。用于疮痈肿毒，跌打损伤，瘰疬，癌症等症。常用量6～9g。

附注　本种之根亦入药，功用同枝。



图 173　紫花卫矛

蝴蝶戏珠花

别名　蝴蝶树、蝴蝶花、苦酸汤、绣球花、六蛾抱珍珠。

来源　本品为忍冬科植物蝴蝶戏珠花 Viburnum plicatum Thunb.f. tomentosum(Thunb.)Rehd.(V.tomentosum Thunb.;V.plicatum Thunb.var. tomentosum(Thunb.)Miq.)的干燥茎、枝。

原植物　蝴蝶戏珠花（图174）为落叶灌木或小乔木，高可达5m；小枝、叶柄、叶片两面至少沿脉及花序被簇状毛。单叶对生，叶片阔卵形或长圆状卵形，有时椭圆状倒卵形，稀倒卵形，长4～10cm，宽3～6cm，先端尖或突尖或有时渐尖，基部宽楔形或圆形，偶渐尖，边缘具不太整齐的锯齿，侧脉8～12（～14）对，挺直而伸至齿端，与主脉在叶面凹陷，背面隆起，细脉紧密而近平行的横列；叶柄长1～2cm，上面具槽。聚伞状复伞形花序生于侧生小枝上，球形，直径4～10cm，外围有4～6朵大型黄白色不孕花，花冠直径达4cm，不整齐的4～5裂；中央能育花辐状，直径约3mm，白色至乳白色，芳香；花萼筒长约1.5mm，萼齿5，微小；花冠长约3mm；雄蕊5，多少伸出花冠。核果宽卵形或倒卵形，长5～6mm，成熟时黑色；核扁，背部具1浅槽，腹部具1深槽。花期4～5月，果期8～9月。

生于海拔240～1 800m的山坡或沟谷混交林中或灌丛中，各地常见栽培。分布于西南、华南、华中、华东及陕西、河南两省南部；日本及朝鲜亦有。

采收加工　全年可采，晒干。

药材性状　本品为圆柱形，直径3～5mm，长短不一，表皮棕褐色或灰褐色。表面具纵皱纹，节间长5～10cm，节稍膨大，具侧枝或侧枝痕。质坚实，断面不整齐，断面外周皮部棕褐色，木质部类白色，纤维质，中央为淡白色髓心。气无，味苦、涩，以粗细均匀，棕褐色者为佳。


性味与功用　辛、苦、酸，温。健脾消积，清热解毒。用于小儿疳积，感冒，淋巴结核，疮疡肿毒等症。常用量9g。

附注　本种之根入药，功用和茎、枝同效。



图 174　蝴蝶戏珠花

四、叶　类



大 粘 药

别名 大粘叶、小粘椰、粘药根、红水麻、土升麻。

来源 本品为荨麻科植物红雾水葛 Pouzolzia sanquinea (Bl.)Merr.(Urtica sanquinea Bl.) 的干燥叶。

原植物 红雾水葛（图175）为灌木，高可达3m；小枝圆柱形，具浅纵沟，密被或疏被短柔毛。单叶互生，叶片纸质，狭卵形、椭圆状卵形或卵形，稀长圆形或披针形，长3～11cm，宽1.5～4cm，先端短渐尖至长渐尖，基部圆形、宽楔形，边缘具小牙齿，叶面绿色，背面淡绿色，两面均被短糙毛，毛通常贴伏，侧脉2对；叶柄长4－12mm。团伞花序单性或两性，直径2～6mm；苞片钻形或三角形，长2.5～4mm；雄花：花被片4，舟状椭圆形，长约1.6mm，中部以下合生，先端急尖，外面被糙毛；雄蕊4；退化雌蕊狭倒卵形，基部周围有白色柔毛。雌花：花被宽椭圆形或菱形，长0.8～1.2mm，外面被毛；柱头长约1.5mm。瘦果卵球形，长约1.6mm，淡黄白色。花期4～8月。

生于海拔350～2 300m的山坡林缘、林中、灌丛中或溪边。分布于云南、四川、贵州、西藏、广西和海南；印度北部、锡金、尼泊尔、缅甸、泰国、老挝、越南、马来西亚和印度尼西亚亦有。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 本品之干燥叶片皱缩或团状，或有破碎，完整叶片平展后为狭卵形、椭圆状卵形或卵形，稀长圆形或披针形，长3－11cm，宽1.5～4cm，先端短渐尖或长渐尖，基部圆形或宽楔形，边缘具牙齿，绿色，两面粗糙，均被短糙毛，毛常贴伏，背面密被贴伏毛被时，呈现银灰色且具光泽，侧脉2对；叶柄长4～12（～25）mm。气微，味微辛，涩。以叶片完整，色绿者为佳。

性味与功用 微辛、涩，热。祛风湿，舒筋络。用于风湿筋骨疼痛，骨折，乳炎，疮疖红肿。适量捣烂或配药外敷。

附注 本种的根入药，与叶同效。本品对皮肤有刺激性，须用凡士林纱布先隔局部皮肤，后敷药。



图 175　红雾水葛

小 豆 柴

别名 毛叶米饭花、亮子药、野胡椒、油萝树、柔毛南烛。

来源 本品为杜鹃花科植物毛叶南烛Lyonia villosa (Wall.)Hand.-Mazz.的干燥叶。

原植物 毛叶南烛（图176）为灌木，高2～3m；幼枝被灰色柔毛，老枝无毛，褐黑色。单叶互生，叶片纸质，倒卵形或长圆状倒卵形、椭卵形，长2.5－7cm，宽2～3.8cm，先端钝，具小尖头，基部圆形，有时近心形，全缘，略反卷，叶面绿色，疏被柔毛，背面淡绿色，被短柔毛，沿脉较密，主脉在叶面凹陷，在背面隆起，侧脉每边6～9条；叶柄长3－6mm，疏被细柔毛。总状花序腋生，长4～5cm，具8～15花，花序轴密被黄褐色微柔毛，花梗长约3mm，疏被微柔毛；花萼绿色，5深裂，裂片狭披针形，长3～4mm，被微柔毛；花冠乳黄色，卵状坛形，长约8mm，向下，外面被灰色细毛，檐部5浅裂，裂片三角形；雄蕊10，长约4mm，花丝被灰色柔毛；花药黄色；子房被毛，花柱无毛。蒴果球形，直径约4mm，被微柔毛，基部具宿存花萼。花期6～7月，果期8－9月。

生于海拔2 700～2 900（～3 400）m的山坡林缘或灌丛中。分布于云南西北部、四川南部和西藏东南部。尼泊尔、锡金亦有。

采收加工 夏、秋采收，晒干。

药材性状 本品之干燥叶片皱缩，破碎，平展之完整叶片灰绿色，倒卵形或长圆状倒卵形，长2.5－7cm，宽2～2.5cm，先端钝，基部圆形，偶有近心形，全缘，被疏毛，侧脉6～9对；具短柄。气微，味微酸。以叶片完整，色绿者为佳。

性味与功用 微酸，涩，温。杀虫止痒。用于烂疮，疥疮发痒，风湿，跌打。外用鲜叶搓绒擦患处或干品适量煎水洗患处。

附注 本种之枝也入药，功效同叶。



图 176　毛叶南烛

小粘子草

来源　本品为蝶形花科植物圆菱叶山马蝗 Desmodium podocarpum DC. 的干燥叶。

原植物　圆菱叶山马蝗（图177）为多年生直立草本，高30～50cm；茎圆柱形，具纵棱，基部木质化，密被平展的长柔毛及钩状短毛。三出复叶互生，叶柄长6～12cm，疏被长柔毛和短柔毛；托叶钻形，长10～30mm，被长柔毛；顶生小叶片菱状圆形，长5.5～7.5cm，宽5～7cm，先端锐尖，基部阔楔形，全缘，叶面绿色，疏被长柔毛和短柔毛，沿脉及边缘较密，背面淡绿色，沿脉疏被长柔毛，侧生小叶略偏斜，较小，顶生小叶柄较长，两侧小叶柄较短。总状或圆锥花序常顶生，长20～30cm，花序梗及轴密被长柔毛和短柔毛，并杂有钩状短毛，2～3花常集生于序轴的节上，疏松；花梗长2～3mm，密被柔毛；花萼钟形，长约1.5mm，密被钩状毛及疏长柔毛，萼齿卵形，上部的2齿连合；花冠粉红色，旗瓣阔倒卵形或近圆形，长3.5～4mm，翼瓣与旗瓣几等长，龙骨瓣略短于翼瓣；子房线状披针形，疏被柔毛。荚果具长约5mm的柄，具2～3个荚节，荚节近肾形，两面均被钩状毛，背缝线直，腹缝线在荚节缢缩几达背缝线。

生于海拔1 500～3 000m的山坡常绿阔叶林下。分布于云南、四川、西藏东南部、广西、湖南、湖北、江西、河南、安徽、江苏、浙江和台湾。尼泊尔、日本和朝鲜也有。

采收加工　夏秋季采集，晒干备用。

药材性状　本品呈团状，皱曲，或破碎，灰绿色。展开的完整叶片为菱状圆形，长5.5～7.5cm，宽5～7cm，先端锐尖，基部阔楔形，全缘。两面均疏被柔毛，侧生小叶略偏斜，较顶生小叶小，顶生小叶具较长的小叶柄，侧生小叶叶柄较短。气微，味苦。以质干，小叶片完整，色绿者为佳。

性味与功用　苦，温。发表散寒，止血，破瘀消肿，健脾化湿。用于伤风感冒，咳嗽，脾胃虚弱等症。常用量9～15g。

附注　本种之根也入药，功效同叶。



图 177　圆菱叶山马蝗
1．根；2．果枝

毛茛状金莲花

来源 本品为毛茛科植物毛茛状金莲花 Trollius ranunculoides Hemsl. 的干燥叶。

原植物 毛茛状金莲花（图178）为多年生草本，高4～18cm，全株无毛。茎2～3条，不分枝或自基部以上生1～2条长枝。基生叶3～10，茎生叶1～3，生于茎下部，均具长柄；叶片轮廓圆五角形或五角形，长1～2.5cm，宽1.4～4.2cm，基部深心形，3全裂，裂片近邻接，中央全裂片阔菱形或菱状宽倒卵形，2回细裂，末回裂片近邻接或分开，有尖牙齿，侧全裂片斜扇形，不等2裂达近基部；叶柄长3～13cm，基部具鞘。花单生茎或枝顶端；萼片5～8枚，黄色，干时多少变绿色，倒卵形或扇形倒卵形，长1～1.5cm，宽1～1.8cm，脱落；花瓣匙状条形，长4.5～6mm，宽约1mm；雄蕊多数，长5～7（～9）mm，花药长圆形，长2.5～3mm；心皮7～9。蓇葖果7～9，长约1cm。花期5～7月。

生于海拔2 500～4 600m的高山草甸、河边、沼泽或云杉林下。分布于云南西北部、四川西部、西藏东南部和甘肃西南部。

采收加工 夏、秋间采集，除去泥土及根，晒干备用。

药材性状 本品（干燥叶）为团状块，灰绿色，皱褶或破碎；展开之完整叶片轮廓圆五角形或五角形，长1～2.5cm，宽1.2～4.2cm，基部深心形，3全裂，裂片近邻接，中央全裂片阔菱形或菱状倒卵形，2回细裂，末回裂片近邻接或分开，具尖牙齿，侧全裂片斜扇形，不等2裂达近基部；叶柄长3～13cm。气微，味甘，辛。以叶片完整，色灰绿者为佳。

性味与功用 甘、辛，温。散寒解表。用于风湿麻木，淋巴结核。常用量9～12g。

附注 本种之茎入药，与叶同效。花研粉敷患处，治化脓创伤。



图 178　毛茛状金莲花

老鸦饭

别名 假茶辣、老鸦树、碎米青、罗汉香、里亚罗格（傣语）、美别（壮语）。

来源 本品为楝科植物灰毛浆果楝 Cipadessa cinerascens (Pellegr.) Hand.-Mazz.(C.fruticosa Bl.var.cinerascens Pellegr.)的干燥叶。

原植物 灰毛浆果楝（图179）为灌木或乔木，高1～10m；树皮粗糙，灰色。小枝圆柱形，具纵棱，被绒毛。奇数羽状复叶互生或近对生，连柄长20～30cm,叶轴和叶柄密被淡黄色柔毛；小叶9～13枚，通常对生，小叶片纸质，卵形至卵状长圆形，长5～10cm，宽3～5cm，由下向上逐渐变大，先端渐尖或突尖，基部阔形或楔形，偏斜，边缘中部以上具锯齿，叶面深绿色，背面淡绿色，两面均被紧贴的灰黄色柔毛，背面尤甚，侧脉每边8～10条，明显；具小叶柄。圆锥花序腋生，长5～15cm，密被柔毛；花两性，直径3～4mm，具短梗；花萼外面被柔毛，5裂，裂片阔三角形；花瓣5，白色、淡黄色至黄色，线状长圆形，长2～3mm，外面紧贴疏柔毛；雄蕊10，基部合生成管，管里面被疏毛，外面无毛，花药卵形，无毛。果球形，直径4～5mm，深红色至紫黑色。花期4～11月，果期5～12月。

常生于海拔160～2 400m的山地季雨林、常绿阔叶林及次生林中，也见于山坡灌丛中。分布于云南、四川、贵州和广西。越南也有。

采收加工 全年可采挖，晒干。

药材性状 本品之干燥叶长20～30cm，绿色，叶轴及叶柄密被淡黄色柔毛，具小叶9～11片；小叶对生，小叶片常皱缩或破碎，平展完整者为纸质，卵形至卵状长圆形，长5～10cm，宽3～5cm，先端渐尖或突尖，基部圆形或楔形，边缘中部以上具锯齿，两面被紧贴柔毛，具小叶柄。气微，味苦。以叶片完整，味苦，色绿者为佳。

性味与功用 苦，凉。清热解毒，行气通便，截疟。用于感冒，高热不退，胃肠绞痛，大便秘结，痢疾，疟疾，风湿跌打。外洗小儿皮炎，荨麻疹，浓疱，蛇虫咬伤。常用量9～15g；外用：适量，煎水洗或鲜叶捣烂敷患处。

附注 灰毛浆果楝之根入药，与叶同效。



图179　灰毛浆果楝

1. 花枝；2. 花

华南云实

别名 假老虎簕、苦果钉、见血飞。

来源 本品为云实科植物华南云实Caesalpinia crista L.(C.nuga (L.) Ait.;C.szechuanensis Craib; C.kwangtungensis Merr.)的干燥叶子。

原植物 华南云实（图180）为木质藤本，长10m以上；树皮黑色，具少数倒钩刺。二回羽状复叶长20～30cm，叶轴具黑色倒钩刺，有对生羽片2～3（～4）对；小叶对生，4－6对，小叶片革质，卵形或卵状椭圆形，长3～6cm，宽1.5～3cm，先端钝或短渐尖，偶微缺，稀急尖，基部钝或宽楔形，不对称，全缘，两面无毛，叶面具光泽。大而疏松的圆锥花序顶生或腋生，多花，芳香；花梗纤细，长5～15mm；萼片5，披针形，长约6mm，无毛；花瓣5，不等大，其中4片黄色，卵形，无毛，具稍明显的瓣柄，上面1片具红色斑纹，向瓣柄渐狭，内面中部被毛；雄蕊略伸出，花丝基部膨大，疏被柔毛；子房被毛，具短柄，胚珠2颗。荚果阔卵形，长3－4cm，宽2～3cm，革质，扁而肿胀，棕黑色，具网状脉，顶端具喙；种子1颗，扁平。花期4～7月，果期7～12月。

生于海拔160～1 500m的山坡林中、路边。分布于云南、四川、贵州、湖北、湖南、广东、广西、海南、福建和台湾。印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、越南、马来半岛、波利尼西亚群岛及日本亦有。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 本品之干燥叶片皱缩或破损，小叶片革质，完整者卵形或卵状椭圆形，长3－6cm，宽1.5－3cm，先端钝或短渐尖，稀急尖，基部钝或宽楔形，不对称，边缘全缘，叶面亮绿色，背面稍淡，两面无毛，网状脉在两面明显。具短柄。有时会杂以叶轴，叶轴上面具沟槽，有黑色倒钩刺。气微，味苦。以叶片完整、色绿者为佳。

性味与功用 苦、凉。祛瘀止痛，清热解毒。用于急、慢性胃痛，胃溃疡，痈疮肿痛，常用量6－9g。外用适量捣烂敷患处。

附注 本种之种子有行气祛瘀，消肿止痛，泻火解毒之功效。根有利尿、消肿、发表散寒，祛瘀散结之功效。



图 180　华南云实

1. 果枝；2. 茎一段

华紫珠叶

别名 鱼显子、珍珠风、止血草、创伤草、鲤鱼献子。

来源 本品为马鞭草科植物华紫珠 Callicarpa cathayana H. T. Chang 的干燥叶。

原植物 华紫珠（图181）为灌木，高1.5m；小枝圆柱形，纤细，幼时疏被星状毛，后变无毛，灰白色，具皮孔。单叶对生，叶片纸质，卵状披针形或披针形，长4~7.5cm，宽1.5~2.5cm，先端渐尖至尾状长渐尖，基部楔形，叶缘上部具细锯齿，中下部全缘，叶面绿色，疏被柔毛及散生红色腺点，沿主脉、侧脉被星状毛，背面淡绿色，疏被灰白色星状毛，脉上更密，具密的红色腺点，侧脉6~8对；叶柄长1~3mm或近无柄。聚伞花序腋生，密被灰白色星状绒毛及红色腺点；花序梗长5~7mm，花梗长约2mm；花萼杯状，长约1mm，无毛，具红色腺点，萼齿不明显；花冠紫色，长约2mm，无毛，4裂；雄蕊4，花丝与花冠等长，花药伸出，顶孔开裂；子房无毛，花柱略长于雄蕊。果球形，成熟时紫色，直径约2mm。

生于海拔1 100~1 200m的石灰岩山地疏林中。分布于云南东南部、广西、广东、湖北、江西、浙江、江苏。

采收加工 春、夏、秋季可采叶，鲜用或晒干备用。

药材性状 本品之干燥叶皱曲呈团块状，或破碎，绿色，完整叶片纸质，卵状披针形或披针形，长4~7.5cm，宽1.5~2.5cm，先端渐尖或尾状渐尖，基部楔形，叶缘中下部全缘，上部具细锯齿，两面疏被星状柔毛和红色腺点，侧脉6~8对；具短柄或近无柄。气微，味苦，涩。以叶片完整，色绿者为佳。

性味与功用 苦、涩，凉。止血，散瘀，消炎。用于外伤出血，咯血，胃肠出血，子宫出血，疖痈，走马牙疳，热病，痢疾，上呼吸道感染，扁桃体炎，肺炎，支气管炎，眼结膜炎等症。常用量3~9g；外用适量，研粉敷患处。

附注 广西用根祛风利湿，散瘀止痛。



图 181　华紫珠

灯台叶

别名 灯台树、大树矮陀陀、鸭脚木、买担别（傣语）、象皮树。

来源 本品为夹竹桃科植物糖胶树 Alstonia scholaris (L.)R.Br.(Echites scholaris L.)的干燥叶。

原植物 糖胶树（图182）为高大乔木，高达20m，胸径达60cm；树皮灰白色，条状纵裂，枝轮生，无毛，具乳汁。单叶，3～8枚轮生，叶片革质，倒卵形、倒披针形或匙形，长7～28cm，宽2～11cm，先端圆形，钝或微凹，基部楔形，全缘，无毛，侧脉25～50条，密而平行；叶柄长1～2.5cm。聚伞花序顶生，花多而密，被柔毛，总花梗长4～7cm，花梗长约1mm；花白色，花冠高脚碟状，花冠筒中部以上膨大，内面被柔毛，裂片5，长圆形或倒披针状长圆形，长2～3mm；雄蕊长圆形，着生于花冠筒膨大处，内藏；子房密被柔毛，花柱丝状，柱头棍棒状，2深裂；花盘环状。蓇葖2，线形，长20～57cm，直径2～5mm，外果皮革质，灰白色；种子长圆形，两端被红棕色长柔毛。花期6～11月，果期10月至翌年4月。

常生于低海拔的山地疏林中或溪旁、路边。分布于云南南部和广西南部及西部；印度、尼泊尔、斯里兰卡、缅甸、泰国、越南、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和澳大利亚亦有。

采收加工 全年可采收，晒干。

药材性状 本品之干燥叶片革质，倒卵形、倒披针形或匙形，长6～28cm，宽2～11cm，先端圆形，钝或微凹，基部楔形，全缘，青灰色，叶面具光泽，侧脉25～50条，密而平行并于边缘连接。叶柄长1～2.5cm，无毛。气微，味苦 以叶厚、灰绿色者为佳。

性味与功用 苦，凉。止咳祛痰，退热消炎。用于慢性支气管炎，百日咳等症。常用量6～9g。



图 182　糖胶树

红 乌 桕

别名 红叶乌桕、山柳乌桕、红叶山柳、红心乌桕、野乌桕。

来源 本品为大戟科植物山乌桕 Sapium discolor (Champ.)Muell.-Arg.的干燥叶。

原植物 山乌桕（图183）为落叶灌木或乔木，高可达10m；小枝灰褐色，具皮孔，幼时带红色。单叶互生，叶片纸质、椭圆状卵形或长椭圆形，长3－10cm，宽2－7.5cm，先端短尖或急尖，基部钝，全缘，叶面绿色，背面粉绿色，侧脉6～10对，明显；叶柄细，长2－7.5cm，顶端具1～2腺体。花单性无花瓣及花盘，雌雄同株。穗状花序顶生，长4～9cm，雌雄同序，但有时只有雄花；雄花：7朵聚生于1苞腋内，苞片卵形，先端锐尖，两侧各具1腺体；花梗长1～3mm，丝状；花萼杯状，具不整齐的裂齿；雄蕊2，稀3枚；雌花：位于花序轴之近基部；花梗长约5cm；萼齿3，三角形；子房卵形，花柱与子房等长，柱头3裂，外卷。蒴果球形，直径1－1.5cm，熟时黑色；种子近球形，长4－5mm，外被蜡质层。花期4～5月，果期5～12月。

生于海拔420～1 600m的山坡疏林下或沟谷杂木林中。分布于云南、贵州、广西、广东、海南、江西、浙江、福建、台湾。印度尼西亚亦有。

采收加工 叶夏、秋季采收，晒干。

药材性状 本品之干燥叶灰绿色，皱褶，破碎，完整者呈椭圆状卵形或长圆形，长3～10cm，宽2～7.5cm，先端短尖或急尖，基部钝，全缘，具6～10对侧脉，叶柄细，长2－7.5cm，顶端具1－2枚腺体。气微，味苦。以干燥完整，色绿者为佳。

性味与功用 苦、寒，有毒。泻下逐水，散瘀消肿。用于湿疹，带状疱疹，过敏性皮炎、跌打损伤，毒蛇咬伤等症。常用量3～9g；外用适量，鲜叶捣烂敷患处或煎水洗。

附注 本种之根皮、树皮：用于大、小便不通，肝硬化腹水，肾炎水肿、皮肤湿痒，跌打损伤等症。孕妇及体弱者忌服。



图 183　山乌桕

红 紫 珠

别名 小红米果、对节树、对节子树、白金子风、红叶紫珠

来源 本品为马鞭草科植物红紫珠 Callicarpa rubella Lindl.的干燥叶。

原植物 红紫珠（图184）为灌木，高2m；小枝圆柱形，被星状毛及多细胞腺毛。单叶对生，叶片倒卵形或倒卵状椭圆形，长10～14cm，宽4～8cm，先端渐尖或尾状渐尖，基部心形，有时偏斜，边缘具细锯齿或不整齐的粗齿，叶面绿色，疏被多细胞单毛，背面淡绿色，被星状毛及单毛和腺毛，有黄色腺点，侧脉6～10对，主脉、侧脉和细脉在两面稍突起；叶柄极短或近于无柄。聚伞花序腋生，被与小枝相同的毛；花序梗长1.5～3cm，苞片细小；花萼被星状毛及腺毛，具黄色腺点，萼齿钝三角形或不明显；花冠长3mm，紫红色、黄绿色或白色，外面被细毛及黄色腺点；雄蕊4枚，着生于花冠管之基部，长为花冠的二倍，药室纵裂；子房被毛。果实紫红色，球形，直径约2mm。花果期5～11月。

生于海拔300～1 900m的山谷林中或灌丛中。分布于云南、四川、贵州、广西、广东、湖南、江西、安徽和浙江。印度、锡金、缅甸、越南、泰国、印度尼西亚和马来西亚亦有。

采收加工 夏秋季采集，晒干。

药材性状 本品之干燥叶片皱缩呈团状，绿色，完整叶片平展后为倒卵形或倒卵状椭圆形，长10～14cm，宽4～8cm，先端渐尖或尾尖，基部浅心形，边缘具细锯齿或不规则粗齿，叶面疏被细毛，背面被星状毛、单毛及腺毛，具黄色腺点，主脉、侧脉及细脉在两面稍突起；近无柄或具短柄。气微，味苦、涩。以叶片完整，色绿者为佳。

性味与功用 苦、涩，平。止血，散瘀，消炎。用于风湿病，跌打损伤，吐血，尿血，外伤出血。常用量3～9g；外用适量，研粉敷患处。

附注 本种之根亦称对节树根，辛、苦，平。清热，止血。用于月经不调，吐血，尿血，痔疮出血等病。用量：15～30g。



图 184　红紫珠

豆叶九里香

别名 麻绞草、臭千丈眼、臭漆、通光草、刘哈哄（傣语）。

来源 本品为芸香科植物千里眼 Murraya cuchrestifolia Hayata (Murraya tetramera Huang)的干燥叶。

原植物 千里眼（图185）为灌木或小乔木，高1.5～7m；树皮光滑、黑色。小枝圆形，几无毛。奇数羽状复叶互生，长圆状披针形、狭长圆形或卵状披针形，长2～5cm，宽8～20cm，先端长渐尖，基部偏斜，楔形，全缘，叶面深绿色，光亮，背面淡绿色，两面均无毛，侧脉4～6对，隐约可见；小叶柄长2～4mm，无毛。伞房花序顶生，多花；花序轴无毛；花梗长1～2mm，被微柔毛；花萼4深裂，裂片广卵形或卵状披针形，长约1mm，先端钝，无毛；花瓣4，白色，芳香，长圆形，长4～5mm，宽约1.5mm，先端略尖，无毛；雄蕊8，长短不等，花丝细弱，长约4mm，花药长不及1mm；子房长圆形，长约1mm，花柱长2mm，基部具关节。果球形，直径1～1.2cm，淡红色，具腺点，具种子1粒。花期7－8月，果期12月。

生于海拔750～2 400m的石灰岩山地灌丛中或沟谷季雨林中。分布于云南、贵州、广西和台湾。

采收加工 夏秋季采叶，阴干。

药材性状 本品之干燥叶片皱曲成团状，或有破碎。完整叶片平展后为长圆状披针形、狭长圆形或卵状披针形，长2～5cm，宽8～20mm，先端长渐尖，基部楔形，偏斜，全缘，黄绿色，无毛，具半透明的小腺点。气微清香，味辛。以叶片完整，色黄绿，气浓者为佳。

性味与功用 辛、微苦，温。祛风解表，行气止痛，活血散瘀。用于感冒发热，支气管炎，哮喘，风湿麻木，筋骨疼痛，跌打肿痛，湿疹，皮肤瘙痒，胃痛，水肿，疟疾，毒蛇咬伤等症。常用量6～12g；外用适量，煎水洗患处。

附注 本种之根入药，性味与功用同叶。



图185　千里眼

青 棉 花

别名 青棉花藤。

来源 本品为绣球花科植物冠盖藤Pileostegia viburnoides Hook. f. et Thoms.的干燥叶。

原植物 冠盖藤（图186）为常绿木质藤本，长可达15m，全体光滑无毛；小枝交互对生，幼时棕褐色，老枝灰褐色。单叶对生，叶片薄革质，披针状椭圆形或椭圆状倒卵形，长8~18cm，宽2~6cm，先端短渐尖或有时锐尖，基部楔形，边缘稍内卷，全缘或近顶部具稀疏不明显的小齿，叶面干时淡绿色，具光泽，无毛，背面淡绿色或暗绿色，无毛或被极稀疏的星状毛，侧脉7~8对，在背面突起；叶柄长1~3cm。圆锥花序顶生，长7~25cm，花梗长1~3cm，无毛或被稀疏长柔毛；花两性，白色或绿白色，常聚生；花蕾球形，直径3~4mm；花萼筒长约1.5mm，顶端4~5浅裂，裂片三角形，细小；花瓣4~5，长约2.5mm，顶端贴合，开花时即作冠状脱落；雄蕊8~10，花丝长4~5mm，常卷曲，花药近扁球形；子房下位，顶端平截，花柱长约1mm。蒴果陀螺状，长2~3mm，顶端平截，具纵棱，无毛。花期7~8月。

生于海拔1 560m左右的山坡林缘或溪边，常攀缘于树上或岩石上。分布于云南、四川、贵州、广东、广西、海南、湖南、江西、安徽、浙江、福建和台湾。印度、越南及日本亦有。

采收加工 全年可采，晒干备用。

药材性状 本品之干燥叶片常皱缩，淡绿色或暗绿色。展开后的完整叶片为披针状椭圆形或长椭圆状倒卵形，长8~18cm，宽2~6cm，先端短渐尖或有时锐尖，基部楔形，边缘常内卷，全缘或有时顶部具稀疏的不明显细齿，叶面具光泽，无毛，背面无毛或极疏被星状毛，侧脉7~8对，在叶背面凸起；叶柄长1~3cm。气微，味辛、微苦。以叶片完整、色绿者为佳。

性味与功用 辛、微苦，温。补肾，祛风除湿，活血散瘀，止痛接骨。用于肾虚，腰腿酸痛，风湿麻木，关节痛，跌打损伤，骨折，外伤出血，疮疡溃破久不收口等症。用量15~30g，水煎或泡酒服；外用适量，捣烂或研粉敷患处。

附注 本种的根、藤及花也入药，功效及用途与叶同。



图 186　冠盖藤

罗 布 麻

别名 茶叶花、野麻、女儿茶、茶棵子、奶流。

来源 本品为夹竹桃科植物罗布麻 Apocynum venetum L. 的干燥叶。

原植物 罗布麻（图187）为半灌木，高1.5~3m，具乳汁；小枝圆柱形，无毛，紫红色或淡红色。单叶对生，叶片椭圆状披针形或卵状长圆形，长1~5cm，宽0.5~1.5cm，先端急尖或钝，基部急尖至钝，边缘具细齿，两面无毛，侧脉10~15对，在叶面不明显；叶柄长3~6mm。圆锥状聚伞花序顶生，稀腋生，1至多歧；花梗被短柔毛，长约1mm；具苞片及小苞片；花萼5深裂，裂片披针形或卵状披针形，长1.5mm，两面被短柔毛；花冠筒状钟形，紫红色或粉红色，两面密被颗粒状突起，筒长6~8mm，直径2~3mm，裂片卵状长圆形，长3~4mm；雄蕊5枚，着生于花冠筒基部，长2~3mm，花药箭头状，花丝短，密被白色柔毛；雌蕊长2~2.5mm，花柱短，上部膨大，下部缩小，顶端2裂，子房由2枚离生心皮组成，被白色柔毛；花盘肉质，杯状，顶端不规则的5裂，基部环绕子房。蓇葖2，平行或叉生，下垂，箸状圆筒形，长8~20cm，直径2~3mm，棕色，无毛。种子多数，卵状长圆形，长2~3mm，黄褐色，顶端是白色绢质种毛。花期4~9月，果期7~12月。

生于盐荒地、沙漠边缘、河流两岸、冲积平原、湖泊周围及戈壁荒滩上。分布于西北、华北、东北及华东各省区。北美、欧洲及亚洲的温带地区亦有。

采收加工 夏、秋采收，除去杂质，晒干。

药材性状 本品多皱缩弯曲，有的破碎，完整者平展后为椭圆状披针形或卵状长圆形，长1~5cm，宽5~15mm，先端急尖或钝，具芒尖，基部钝或急尖，边缘具细齿，常反卷，两面无毛，淡绿色或灰绿色，侧脉10~15对，在叶面不明显，背面稍凸起；叶柄细，长3~6mm。质脆。气微，味淡。以叶片完整，色绿，味甘者为佳。

性味与功用 甘、苦、凉。归肝经，平肝安神，清热利水。用于肝阳上亢之头目眩晕，心悸失眠，浮肿尿少，高血压，神经衰弱，肾炎浮肿等症。常用量6~10g。



图 187　罗布麻

秋 枫 木

别名 茄冬、秋枫、秋风子、大秋枫、红桐。

来源 本品为大戟科植物重阳木 Bischoffia javanica Bl.的干燥叶。

原植物 重阳木（图188）为常绿乔木，高20~40m；树皮灰褐色，小枝无毛。三出复叶互生，叶柄长8~20cm；小叶片革质，卵形、倒卵形、椭圆状卵形，稀披针形，长7~15cm，宽4~8cm，先端急尖或尾状渐尖，基部阔楔形，边缘具波状浅圆齿，叶面绿色，背面淡绿色，幼时沿脉疏被短柔毛，后变无毛；顶生小叶柄长2~5cm，侧面生小叶柄长0.5~2cm。花小，单性，雌雄异株，无花瓣；圆锥花序腋生，雄花序长8~13cm，雌花序长15~27cm，无毛或被微柔毛；雄花直径2~2.5mm，萼片5，覆瓦状排列，膜质，被稀疏短柔毛；雄蕊5，退化雌蕊盾状，小；雌花萼片长圆状卵形，外面疏被短柔毛，边缘白色膜质；子房光滑无毛，3或4室，每室具2胚株，花柱3，不分裂。果球形或略扁，直径6~13mm，褐色或淡红色。种子半圆形长约5mm，褐色。花期全年。

生于海拔50~1 500(~1 900)m的山地林中空地或疏林，密林中。分布于云南、四川、贵州、广西、广东、海南、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、福建和台湾；印度，中南半岛，印度尼西亚，菲律宾，日本和澳大利亚亦有。

采收加工 全年可采，晒干备用。

药材性状 本品之干燥（小）叶片革质，皱曲，或破碎，完整者平展后卵形、椭圆状卵形或倒卵形，长7~15cm，宽4~8cm，先端急尖或尾状渐尖，基部阔楔形，边缘具波状浅圆齿，黄绿色，无毛；基部有时具小叶柄，长1~4cm。气微，味苦，涩。以叶完整、肥厚、色黄绿者为佳。

性味与功用 微辛、涩，凉。行气活血，祛风，消肿解毒。用于咽喉炎，肝炎，赤白痢疾，风湿骨痛，疮疡等症。常用量9~15g；外用适量，鲜品捣烂敷患处。

附注 本种之根皮、树皮也入药，功能同叶。



图 188　重阳木

珊瑚冬青

别名 红果冬青、野白腊叶。

来源 本品为冬青科植物珊瑚冬青Ilex corallina Franch.的干燥叶。

原植物 珊瑚冬青（图189）为常绿灌木或乔木，高8~12m；小枝细瘦、无毛、具纵沟纹。单叶互生，叶片革质，卵形、卵状椭圆形或卵状披针形，长5~13cm，宽1.5~5cm，先端渐尖，基部楔形或近圆形，边缘具波状锯齿，齿尖刺状，叶面深绿色，背面淡绿色，主脉在叶面凹陷，无毛或具微柔毛，背面隆起，侧脉7~10对，在两面明显；叶柄长4~10mm，淡紫红色，上面具深纵槽，背面具皱纹。花单性，雌雄异株，4基数，淡黄色；雄花由单花或2~3花排成聚伞花序，再簇生于2年生枝的叶腋内，总花梗极短，花梗长1~2mm，小苞片基生；花萼深裂，裂片三角形，具缘毛；花冠辐状，花瓣长圆形，长约2.5mm，基部稍合生；雄蕊与花瓣等长，或略长，且与花瓣互生，花药长圆形；退化子房近球形。雌花为单花簇生于2年生枝的叶腋内，花梗长1.5~2mm；花萼与雄花同，花瓣分离，卵形，长约2mm；退化雄蕊短于花瓣，不育花药箭头形；子房卵球形，直径约1.5mm，柱头盘状。果球形，直径3~4mm，熟时红色，宿存柱头厚盘状；分核4，卵圆形，长2~3mm，背部具不整齐的掌状条纹及沟槽，侧面具条纹及洼穴。花期4~5月，果期9~10月。

生于海拔400~3 000m的山坡、路旁林中或灌丛中。分布于云南、四川、贵州和湖北。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 本品为皱团状，或有时破碎，绿色或灰绿色；平展的完整叶片为卵形、卵状椭圆形或卵状披针形，长5~13cm，宽1.5~5cm，顶端渐尖，基部楔形或近圆形，边缘具波状锯齿，齿尖刺状，上面绿色，稍具光泽，背面灰绿色，两面无毛，中脉在叶面凹陷，背面隆起，侧脉7~10对，两面明显。叶柄紫红色或棕褐色，长4~10mm，上面具纵沟，下面具皱纹。气无，味甜。以叶片完整，色绿者为佳。

性味与功用 甘，凉。清热解毒、活血止痛。用于劳伤疼痛，小儿头疼；外用治烫火伤、黄癣。常用量9~15g，泡酒服；外用适量研末调菜油搽患处。

附注 珊瑚冬青的根也入药，功效同叶，云南部分地区用其根治酒中毒和腹痛。



图 189　珊瑚冬青

五、花　类

土 银 花

别名 杜银花、大叶银花、叶藏花。

来源 本品为忍冬科植物盘叶忍冬Lonicera tragophylla Hemsl.的干燥花蕾或带初开的花。

原植物 盘叶忍冬（图190）为落叶藤本；幼枝无毛。单叶对生，叶片纸质，长圆形或卵状长圆形，稀椭圆形，长5~12cm，先端钝或稍尖，基部楔形，全缘，叶面深绿色，无毛，背面粉绿色，被短柔毛或至少中脉下部两侧密被横出的淡黄色髯毛状短糙毛，稀无毛，花序下方1~2对叶连合成近圆形或圆卵形的盘，盘两端通常钝形或具短尖头；叶柄极短或不存在。由3花组成的聚伞花序密集成头状花序，顶生，共具6~9（~18）花；萼筒壶状，长约3mm，萼齿小，三角形或卵形，先端钝；花冠黄色或橙黄色，上部外面略带红色，长6~9cm，外面无毛，唇形，筒稍弓弯，长为唇瓣的2~3倍，内面疏生柔毛；雄蕊5，着生于唇瓣基部，长约与唇瓣相等，无毛；花柱伸出，无毛，果实成熟时由黄色转为红色，近圆形，直径约1cm。花期6~7月，果期9~10月。

生于海拔1 000~2 000（~3 000）m的山坡林下、灌丛中或河滩地，分布于四川、贵州、湖北、安徽、浙江、河南、河北、山西、陕西、甘肃和宁夏。

采收加工 6~7月间花蕾未开放之前采摘，晒干。

药材性状 本品呈棒状，上粗下细，稍弯曲，长6~9cm，上部直径约3~4mm，下部直径约1.5mm，表面淡黄色或绿白色，久贮色变深，无毛。偶见近圆形或圆卵形盘状苞叶。萼筒壶状，顶端5齿裂，齿卵形或三角形。开放者花冠筒上部二唇形，上唇直立，先端略反卷，4浅裂，下唇反卷；雄蕊5，着生于唇瓣基部，无毛，花药黄色；雌蕊1，花柱伸出花冠筒外。无臭，味甘。以花蕾多，无杂质，色黄绿者为佳。

性味与功用 甘，寒。清热解毒，通经活络。用于风热感冒，流行性感冒，上呼吸道感染，扁桃体炎，乳腺炎，急性结膜炎，疔疮肿毒，外伤感染，风湿性关节炎等症。常用量15~90g。

附注 盘叶忍冬的茎叶入药，功用同花。



图 190　盘叶忍冬
1. 果枝; 2. 花序

山辛夷

别名 云南含笑、千里香、羊皮袋、山梔子。

来源 本品为木兰科植物皮袋香 Michelia yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.(M.dandyi H.H.Hu)的干燥花蕾。

原植物 皮袋香（图191）为常绿灌木，高2~4m；芽、幼枝、叶柄、叶背面及花梗均密被红棕色平伏绒毛。单叶互生，叶片革质，倒卵形、狭倒卵形、狭倒卵状椭圆形，长4~10cm，宽1.5~3.5cm，先端急尖或圆钝，基部楔形，全缘，叶面深绿色，有光泽，背面被锈色平伏毛，侧脉7~9对；叶柄长4~5mm，托叶痕达叶柄的2/3或顶端。花两性，单生于叶腋，白色，极芳香；花梗长3~7mm，粗壮；花被片6~12，倒卵形或倒卵状椭圆形，长3~3.5cm，宽1~1.5cm，内轮者较小；雄蕊多数，长约1cm，花丝白色，花药侧向开裂，药隔伸出花药，呈短尖头状；雌蕊群及其柄均被红褐色平伏毛，心皮8~20，卵形，长3~4mm，聚合果短，具蓇葖5~9个；蓇葖扁圆形，褐色，宽5~8mm；种子1~2粒。花期3~4月，果期8~9月。

常生于海拔1 100~2 300m的山地灌丛中或云南松林下，分布于云南中部和南部。

采收加工 春节采收花蕾，晒干。

药材性状 本品之干燥花蕾长圆形，长2.5~3cm，直径约1.5cm，深棕色，基部具短而粗的花梗，长约3~7mm，外层具苞片，苞片卵形，外表面密被棕褐色短柔毛，内面深棕色，无毛；花被片6~12枚，倒卵形或倒卵状椭圆形，大小不等，内轮较小；雄蕊多数，螺旋状排列；雌蕊群及其柄均被红褐色平伏毛。气芳香，味苦，涩。以个大，未开放，气芳香者为佳。

性味与功用 微苦、涩、凉。清热消炎，解毒，收敛止血。用于咽喉炎，鼻炎，结膜炎，脑漏，崩漏等症。常用量9~15g。

附注 本种之根入药，与花同效。



图 191　皮袋香

山　合　欢

别名　黑心树、山槐、夜合树、白夜合、白缨。

来源　本品为含羞草科植物山合欢 Albizia kalkora (Roxb.) Prain (Mimosa kalkora Roxb.)的干燥花或花蕾。

原植物　山合欢（图192）为落叶小乔木或灌木，高3~8m；枝条圆柱形，暗褐色，被短柔毛，具显著皮孔。二回羽状复叶，羽片2~4对；小叶5~14对，小叶片长圆形或长圆状卵形，长1.8~4.5cm，宽7~20mm，先端圆钝，具尖头，基部不等侧，全缘，两面均被短柔毛，中脉稍偏于上侧。头状花序2~7枚生于叶腋，或为顶生圆锥花序；花初期白色，后变黄色，花萼管状，5齿裂；花冠中部以下连合成管状，裂片披针形，与花萼均密被长柔毛；雄蕊基部连合成管状，长2.5~3.5cm。荚果带状，长7~17cm，宽1.5~3cm，深棕色，幼时密被短柔毛，后变无毛。种子倒卵形，4~12颗。花期5~6月，果期8~10月。

生于山坡灌丛中或疏林中，分布于云南、四川、贵州、广东、湖南、湖北、江西、福建、浙江、江苏、安徽、山东、河南和河北；越南、缅甸、印度亦有。

采收加工　5~6月花初开时采摘，晒干。

药材性状　干燥头状花序卷缩成团状。花长7~10mm，弯曲，深黄褐色，具短的花梗，花萼管绿黄色，长2~3mm，5齿裂；花冠长6~8mm，中部以下连合呈管状，裂片披针形，与花萼均被长柔毛；雄蕊多数，长2.5~3.5cm，基部连合成管状，花丝细长，伸出花冠外，交织，易断。干燥花蕾棒状，青绿色，稍弯曲，不分瓣。气微香，味甘，以梗短，色淡黄褐者为佳。

性味与功用　甘，平。安神疏郁，理气活络。用于郁结胸闷，失眠健忘，风火眼疾，视物不清，咽喉肿痛，痈肿，跌打损伤。常用量3~9g。

附注　本种的树皮有些地区也作合欢皮入药。有解郁安神，活血消肿之功效。用于心神不宁，忧郁失眠，肺痈，筋骨损伤，痔疮作痛，痈肿，瘰疬。



图 192　山合欢

1．花枝；2．树皮

小金银花

别名　贵州忍冬、山银花、狗爪花。

来源　本品为忍冬科植物短柄忍冬Lonicera pampanini Lévl.的干燥花蕾。

原植物　短柄忍冬（图193）为藤本植物；幼枝圆柱形，密被黄褐色短糙毛，老枝棕褐色或灰白色。单叶对生，叶片近革质，长圆状披针形、卵状披针形或狭椭圆形，长3~10cm，宽1.3~2.8cm，先端渐尖，基部近心形，全缘，叶面绿色，背面较淡，两面沿主脉被短糙毛，背面幼时被疏毛，侧脉7~9对；叶柄长2~5mm，被黄褐色短糙毛。总花梗极短，双花数对集生于小枝顶端或单生于小枝上部叶腋；苞片披针形，长5~15mm，被毛，小苞片卵形，被短糙毛；花萼筒短，长不及2mm，5裂，裂片卵状三角形至长三角形，被毛；花冠白色略带粉红或转黄色，长1.5~2cm，外面密被倒向小糙毛，内面有柔毛，二唇形，上唇4裂，下唇反转；雄蕊5，花丝下部被柔毛，伸出。果球形，直径5~6mm，成熟时蓝黑色至黑色；种子椭圆形，压扁，长2.5~3mm，深褐色。花期5~6月，果期10~11月。

生于海拔1 400m左右的山地林下或灌丛中。分布于云南东南部、四川、贵州、广西、广东、湖南、湖北、江西、安徽、福建和浙江等省区。

采收加工　夏季花待开放前采摘，晒干或阴干。

药材性状　本品呈长棒状，略弯曲，花冠筒长1.5~2cm，上端较粗，直径约2mm，表面粉红色或黄色，外面被倒向小糙毛，里面有柔毛，基部可见极短的花萼筒，开放的花冠筒上端呈唇形，上唇4裂，下唇反转，可见伸出的5枚雄蕊和花柱。气清香，味甘。以花蕾多，味甘、气清香、色黄、无梗及叶者为佳。

性味与功用　甘，寒。清热解毒。用于鼻衄，吐血、肠热等症。常用量9~15g，煎水服。



图 193　短柄忍冬

天 竺 龙 胆

别名 邦见察保、雪花龙胆。

来源 本品为龙胆科植物华丽龙胆Gentiana sino-ornata Balf f.的干燥花及花蕾

原植物 华丽龙胆（图194）为多年生草本，高10~15cm；根须状，稍肉质，花枝多数丛生，铺散，斜升，黄绿色，光滑。基生莲座叶极不发达，狭三角形，长4~6mm，宽2~5mm；茎生叶对生，密集，中、下部者披针形，长7~10mm，宽2~2.5mm，先端急尖，边缘微粗糙。花单生枝顶，无花梗；花萼筒倒锥状筒形，长13~15mm，5裂片线状披针形，与萼筒等长，萼裂片部弯缺截形；花冠狭倒锥形，淡蓝色，具黄绿色条纹，稀淡黄色至白色，长5~6cm，裂片卵形，长7~8mm，全缘，褶整齐，宽卵形，长2.5~3mm，边缘具细齿；雄蕊5，着生于花冠筒中部，花丝钻形，花药长圆形；子房线状披针形，长12~14mm，具柄，花柱线形，柱头2裂。蒴果椭圆状披针形，长2.5~2.7cm，先端渐狭，基部钝；种子长圆形，长约1mm，黄褐色，有光泽，具蜂窝状网隙。花果期5~10月。

生于海拔2 400~4 800m的山坡草地。分布于云南西北部、四川西南部和西藏东南部。

采收加工 5~6月，开花时采集，阴干。

药材性状 本品之干燥花为狭的倒锥形，长5~6cm。无花梗。花萼筒倒锥状筒形，长13~15mm，5裂，裂片线状披针形，与萼筒等长；花冠淡兰色，具黄绿色条纹，稀淡黄色或白色，花冠筒狭倒锥形，长5~6cm，裂片卵形，全缘，褶整齐；雄蕊5，着生于花冠筒中部；子房线状披针形，长12~14mm，柱头2裂。气微，味苦。以干燥、完整、无叶，色浅蓝者为佳。

性味与功用 苦，寒。清肺解毒。用于肺热咳嗽，时疫热症。常用量9~24g，煎水服。

附注 天竺龙胆之根略肉质，须状，有舒筋活血之功效，用于无名肿毒




图 194　华丽龙胆

条叶垂头菊

来源 本品为菊科植物条叶垂头菊Cremanthodium lineare Maxim.的干燥头状花序。

原植物 条叶垂头菊（图195）为多年生草本；根多数、肉质。茎1~4，通常单生、直立、高可达45cm，光滑或上部疏被白色柔毛，基部具残存叶柄纤维。从生叶和茎基部叶无柄或具短柄，柄与叶片无明显界线；叶片线形或线状披针形，长可达23cm，宽0.25~3cm，通常2.5~5mm，先端急尖，基部楔形，下延成柄，全缘，绿色，两面光滑，叶脉平行，常不明显；茎生叶多数，披针形至线形，苞叶状。头状花序单生茎顶端，辐射状，下垂；总苞半球形，长1~1.2cm，宽1~2.5cm，光滑或基部疏被柔毛，总苞片12~14，2层，披针形或卵状披针形，宽2~4mm，先端急尖，具白色缘毛，背部黑灰色，边缘狭膜质。舌状花黄色，舌片线状披针形，长3~4cm，宽2~3mm，先端长渐尖，管部长约2mm；管状花黄色，长5~7mm，管部长1.5~2mm，冠毛白色，与花冠等长。瘦果长圆形，长2~3mm，光滑。花果期7~10月。

生于海拔2 400~4 800m的高山草地、水边、沼泽草地和灌丛中。分布于西藏东部、四川北部、青海和甘肃西南部。

采收加工 秋季开花时节采集，晒干。

药材性状 本品皱缩成团状，冠毛白色，多数，与总苞片近等长。头状花序直径1.2~2.7cm；总苞片12~14枚，墨绿色，披针形至卵状披针形，长10~12mm；舌状花1层，黄色，皱缩，完整的舌片线状披针形，长约13cm，先端长渐尖，具浅棕色平行直脉纹；筒状花长3~7mm，黑紫色；雌蕊柱头2裂，紫褐色。瘦果长圆形，长约3mm，冠毛白色，长5~7mm。体轻，质软。气芳香，味微甘。以花序完整、无杂质、色墨绿者为佳。

性味与功用 微苦，寒。清热，消炎，止痛。用于感染性发烧，胆囊炎等症。常用量6~12g。




图 195　条叶垂头菊

辛 夷 花

别名 辛夷、白玉兰、望春花、迎春花、木笔花。

来源 本品为木兰科植物玉兰 Magnolia denudata Desr. ex Lamk.(M. heptapeta (Buchoz) Dandy)的干燥花蕾。

原植物 玉兰(图196)为落叶乔木，高可达15m；树皮粗糙、开裂，深灰色 单叶互生，叶片纸质，倒卵形或倒卵状椭圆形，长10~18cm，宽5.5~12cm，先端圆形、平截或略凹、具短尖头、基部楔形、全缘、叶面绿色，幼叶被柔毛，后仅中脉及侧脉被毛，背面淡绿色，被具光泽的长柔毛，侧脉8~10对，于近叶缘处弯拱网结；叶柄长1~2.5cm，上面具狭槽，被长柔毛。花单生于小枝顶端，先叶开放，白色，芳香；花梗增粗，花被片9，长圆状倒卵形，长7~10cm，白色，基部常带粉红色；雄蕊多数，长约1.2cm，花药长6~7mm，侧向开裂，药隔伸出；雌蕊群圆柱形，长约2.5cm，无毛。聚合果圆柱形，长13~15cm，直径3~5cm 蓇葖褐色，具白色皮孔；种子斜卵形，侧扁，长约9mm。花期2~3月，果期8~9月。

生于海拔500~1 000m的阔叶林中。分布于广东、湖南、江西、安徽、浙江及黄河以南各城市栽培。

采收加工 初春开花之前，采其含苞待放之花蕾，除去枝梗，阴干。

药材性状 本品之干燥花蕾呈长卵形，长1.5~4cm，直径1~1.5cm；基部常具短粗花梗，长约5mm，具环纹及浅棕色皮孔；花蕾外层为苞片，苞片外面密被灰白色或灰绿色茸毛，内表面褐色，平滑，无毛。花被片9，内外轮同型，长圆状倒卵形，长7~10cm，白色；雄蕊与雌蕊多数，螺旋状排列。体轻，质脆。气芳香，味清凉而略苦。以花蕾身干，未开，色绿，无梗者为佳。

性味与功用 辛，温。归肺、胃二经。祛风散寒，通肺窍。用于头痛，鼻寒不通，急、慢性鼻窦炎，过敏性鼻炎，齿痛等症。常用量3~9g；外用适量，研末吹鼻或塞鼻。



图 196　玉兰

1. 花枝；2. 花蕾；3. 叶

柳叶菜

别名 水朝阳花、水生花、水丁香、水葫芦、通经草。

来源 本品为柳叶菜科植物柳叶菜Epilobium hirsutum L.的干燥花。

原植物 柳叶菜（图197）为多年生草本，高30~150cm；上部平卧或弯曲，茎直立，淡绿色或淡紫色，密被展开的白色长柔毛及短腺毛。茎下部叶对生，上部叶互生，叶片长圆形或长圆状披针形，长4~9cm，宽7~20mm，先端急尖，基部半抱茎，边缘具锐锯齿，叶面绿色，无毛，背面淡绿色，沿主脉与侧脉密被平伸长柔毛和短腺毛。花两性，单生茎枝上部的叶腋内，花梗长1~1.5cm，红色，密被腺毛和疏柔毛；花萼淡绿色或上部玫红色，被腺毛或近无毛，4裂，裂片线状披针形，长约7mm，先端渐尖；花瓣4，玫红红色，基部白色，倒卵形，长约8mm，先端凹缺；雄蕊8，2轮，花丝无毛，白色，两轮，不等长，花药背着，纵裂；子房下位，长3~4cm，红色，具4条淡绿色纵槽，密被腺毛和疏长柔毛，柱头4裂。蒴果圆柱形，长4~8cm，被短腺毛，室背开裂；种子长圆状倒卵形，长约1mm，密生乳头状小凸起，顶端具1簇白色种缨。花果期4~11月。

常生于海拔500~2 850m的山坡灌丛中、草地、沟边、沼泽地、路旁。分布于云南、四川、贵州、广东、广西、湖南、湖北、江西、河南、陕西、甘肃、新疆、河北、山西和东北地区；亚洲其他地区、北非和欧洲亦有。

采收加工 夏、秋采花，阴干。

药材性状 本品之干燥花蕾圆筒形，长约4mm，绿带红色。花长1~1.2cm，基部具花梗或花梗残基，花梗红色，密被腺毛及稀疏柔毛；花梗之上是红色子房，子房具4条纵槽，密被腺毛和疏长柔毛；子房顶端为绿色带红的筒状花萼，4裂，外面被毛；花瓣4，浅紫红色，顶端2裂；雄蕊8枚，2轮，花药长椭圆形，纵裂；花柱长约8mm，柱头4。气微，味淡。以花蕾多，完整者为佳。

性味与功用 淡，凉。活血止血，消炎止痛，去腐生肌。用于月经不调，白带，骨折，跌打损伤，疮疖痈肿，烫伤，牙痛，急性结膜炎等症。常用量6~9g。

附注 本种之根用于闭经，胃痛，食滞饱胀；全草用于骨折，跌打损伤，外伤出血，疔疮，痈肿等症。



图 197　柳叶菜

蜀葵花

别名 白蜀葵、棋盘花、蜀其花、水芙蓉、鸡冠花

来源 本品为锦葵科植物蜀葵Althaea rosea (L.) Cav. (Alcea rosea L.)的干燥花。

原植物 蜀葵（图198）为2年生草本植物，高可达2m，密被刺毛。单叶互生，叶片纸质，近圆心形，直径6~15cm，5~7掌状浅裂或为波状菱角，裂片圆形至三角形，中裂片长约3cm，宽4~6cm，叶面绿色，几无毛至密被星状毛，粗糙，背面淡绿色，被星状长硬毛；托叶卵形，先端具3尖。花叶腋生，单生或近簇生，常呈顶生总状花序式，具叶状苞片，花梗长约5mm，果时可延长达1~2.5cm，被星状长硬毛；总苞的小苞片杯形，被星状硬毛；花萼种形，直径2~3cm，5裂，裂片卵状三角形，长1.2~1.5cm，密被星状粗硬毛；花冠直径6~9cm，红色、紫色、粉红色、白色、黄色或紫黑色等，单瓣或重瓣，花瓣倒卵状三角形，长约4cm，先端微凹，基部狭；雄蕊柱长2cm，无毛，花丝纤细，花药黄色；花柱分枝多数，被细微毛。果盘状，直径2cm，被短柔毛，分果瓣几圆形，多数。花期2~8月。

本种原产我国，今全国各地普遍栽培。现已广泛引入欧美各国。

采收加工 夏、秋季采集，晒干。

药材性状 干燥花皱曲呈团块状，浅红色、紫红色、浅黄白色或黄色。花萼杯状，绿色，直径2~3cm，5齿裂，裂片卵状三角形，花梗、小苞片和花萼密被星状毛；花瓣5，倒卵状三角形，易碎，长约4cm，先端微凹；单体雄蕊，雄蕊柱长约2cm，无毛，偶见丝状花丝；雌蕊花柱上部分裂，被微毛，子房多室。气微，味甘。以花完整，无苞片者为佳。

性味与功用 甘、咸，寒。活血润燥，解毒排脓，利尿通便。用于小儿风疹，月经不调，吐血，血崩，便秘，痢疾，白带，疖肿。常用量3~6g；外用研末调敷。

附注 孕妇忌用。本种的茎叶和根入药，茎叶称蜀葵苗，味甘，微寒，滑，用于热毒下痢，淋病，金疮。6~18g水煎服；外用适量捣敷或烧存性研末调敷。根称蜀葵根，有清热凉血，利尿排脓之功效。



图 198　蜀葵

六、果实和种子类

三 尖 杉

别名 头形杉、藏杉。

来源 本品为三尖杉科植物三尖杉Cephalotaxus fortunei Hook. f.的干燥种子。

原植物 三尖杉（图199）为乔木，高达20m，胸径达40cm。树皮褐色或红褐色，裂成片状脱落；枝稍下垂；树冠成广圆形。叶螺旋状着生，在侧枝上基部扭转成二列，披针状条形，通常微弯，长4~13cm，基部楔形或宽楔形，全缘，上面深绿色，中央隆起，下面中脉两侧有白色气孔带。花单性，雌雄异株：雄球花8~10个聚生成头状，直径约1cm，总花梗通常长6~8mm，基部及总花梗上部有18~24枚苞片，每1雄球花有6~16枚雄蕊，花药3，花丝短；雌球花总梗长1.5~2cm，生于小枝基部的苞腋内，稀生枝顶，苞片数枚，交互对生，每1苞片内有2个直立胚珠。种子椭圆状卵形成近圆球形，假种皮成熟时紫色或红紫色，顶端有小尖头，柄长1.5~2cm。花期3~4月，种子8~10月成熟。

生于海拔200~3 000m的针阔叶混交林中。分布于浙江、安徽、福建、湖南、湖北、河南、陕西、甘肃、四川、云南、贵州、广西、广东等省区。我国特有种。

采收加工 8~10月种子成熟时采摘，晒干。

药材性状 本品呈椭圆状卵形或近球形，长2~2.5cm，宽1~1.3cm。表面灰棕色，微具纵棱。一端钝圆，有一椭圆形种脐，另一端有小尖头。外种皮质硬脆，厚约1mm，内种皮薄膜质；种仁1枚，表面皱缩；内胚乳黄白色，肥大而坚实，富油性。气微弱，味微甜而涩。以个大、饱满、种仁黄白色、不走油、不破碎者为佳。

性味与功用 甘、涩，平。消积除虫，润肺止咳。用于蛔虫病，钩虫病，蛲虫病，食积腹胀，肺燥咳嗽。常用量9~18g，水煎或炒熟吃。

附注 三尖杉枝、叶苦、涩，平。用于治疗恶性肿瘤，跌打损伤，漆疮。



图 199　三尖杉

大花八角

别名 上八角、野八角、恨叶树。

来源 本品为八角茴香科植物大花八角 Illicium macranthum A. C. Smith 的干燥果实。

原植物 大花八角（图200）为乔木，高4~25m；小枝圆柱形，绿色，无毛。单叶互生，叶片革质，长圆状披针形、长椭圆形至倒卵状长圆形，长7~13cm，宽2~6cm，先端短渐尖，基部阔楔形，全缘微反卷，叶面绿色，干时褐橄榄色到棕褐色，背面淡绿色，干时棕褐色到红褐色，两面无毛，背面密具细小油点，主脉在叶面凹陷，背面隆起，侧脉每边7~12条；叶柄长1.5~3cm。花两性，芳香，腋生或老茎生花，花梗长6~10mm；花蕾卵形，花白色或淡绿色，花被片椭圆形、狭椭圆形至披针形，稍肉质，25~32枚，长15~25mm；雄蕊20~26枚，2~3轮列，花丝短粗，花药基着，纵裂，药隔顶端突出；心皮12~13，离生，长4~5.5mm，柱头钻状，长2~3mm。果实由12~13枚放射排列的蓇葖组成，直径3~4cm，顶端具细尖的喙，弯曲，缘长3~6mm。果梗长1.5~2.5cm，直径2~3mm。种子长6~8mm，两侧压扁，淡黄色至灰褐色，具光泽。花期2~3月和10~11月，果期11~12月和第2年的7~8月。

多生于海拔1 800~2 800m的山地沟谷、溪边或山坡的常绿阔叶林中。分布于云南东南部至西南部。

采收加工 果实每年可采摘两次，即7~8月和11~12月，微火烘干或用开水浸泡呈红色后，晒干。

药材性状 干燥聚合果直径2.5~4cm，由12~13枚蓇葖（成熟心皮）组成，放射状；红棕色，蓇葖长20mm，宽6~8mm，厚4mm，先端尖头喙状，弯曲，长3~6mm。上面开裂，里面淡棕褐色，平滑且有光泽。种子长6~8mm，褐红黄色，有光泽。气微香，味甘。以粒大、饱满、色红棕者为佳。

性味与功用 甘，温，有剧毒。杀虫，生肌，接骨，行气，止痛，镇呕。用于疥疮，胃寒作呕，膀胱疝气，胸闷胀痛等症。用量每次不可超过1.5g；外用适量捣烂敷患处。

附注 大花八角的叶入药，与果同效。



图 200　大花八角

小马兜铃

别名 高贵马兜铃、小独一味。

来源 本品为马兜铃科植物优贵马兜铃 Aristolochia gentilis Franch.(A. gracilima Hemsl.)的成熟果实。

原植物 优贵马兜铃（图 201）为草质藤本，长 40cm；全株无毛或偶被极短微柔毛。根具结节状块根。茎细弱，多分枝，具纵棱槽。单叶互生，叶片膜质至纸质，肾形、三角状心形或三角状卵形，长 0.5~3cm，宽 0.5~2cm，中部以上渐狭，先端钝圆而具短尖，稀略凹入，基部心形，两侧裂片耳形下垂，或略内弯，近全缘或波状，叶面绿色，背面淡绿色，基出脉 3~5 条；叶柄长 1~1.5cm。花两性，单生于叶腋，花梗纤细，长 1~2cm，花后近顶端下弯；花被长 2.5~3cm，基部膨大呈球形，直径 3~5mm，向上骤然收狭成一长管，管口漏斗状，绿色，檐部一侧极短，另侧舌状，舌片卵状披针形，长 1~1.5cm，基部宽约 5mm，上部渐狭，先端钝圆，淡绿色，具紫色纵脉及网纹；花药贴生于合蕊柱基部，卵形；子房圆柱形，长约 2mm，具 6 纵棱；合蕊柱顶端 6 裂，顶端钝，向下延伸波状圆环。蒴果球形，直径约 1.5cm，自基部向顶端开裂；种子心状卵形，暗灰色，长约 4mm。花期 5 月，果期 10~12 月。

生于海拔 1 200~2 300m 的山坡丛林下岩石缝中或草丛中。分布于云南东南至西部。

采收加工 秋、冬季果实成熟时采摘，晒干。

药材性状 本品之干燥果实球形，直径 1~1.5cm，表面黄褐色，顶端平截，基部圆形，具 6 条细而明显的纵棱，由基部向顶 6 瓣开裂，果柄常随果实开裂为 6 条。种子卵形或卵状三角形，褐色，长 4mm，宽约 3mm，背面凸起，腹面凹入。气无，味苦。以个大，完整，色黄褐者为佳。

性味与功用 苦，寒。清肺降气，化痰止咳，祛风活血，解毒，利尿，理气止痛。用于肺热咳嗽，咯血，失音，痔疮肿痛等症。常用量 3~9g。

附注 优贵马兜铃之根、茎、藤入药，其性味、功用同果实。



图 201　优贵马兜铃

小叶六道木

别名　鸡肚子、对月花、福建六道木

来源　本品为忍冬科植物小叶六道木 Abelia parvifolia Hemsl.(A. chowii Hoo)的干燥果实。

原植物　小叶六道木（图202）为落叶灌木，高0.5~2.5m；茎灰褐色，树皮纵裂、多分枝。幼枝红褐色，被短柔毛及糙硬毛，单叶对生，有时3叶轮生，叶片纸质至近革质，卵形或狭卵形，长1~2.5cm，宽4~14mm，先端钝而具小尖头，基部圆形或近圆形，近全缘或略具疏浅小齿，叶面暗绿色，背面绿白色，两面疏被糙毛及腺毛，背面沿脉密被白色长柔毛，侧脉3~4对；叶柄短，被短柔毛及糙硬毛。花1~2朵生于小枝上部叶腋内；花萼被短柔毛，萼筒长5~7mm，2裂，稀3裂，裂片椭圆形或长圆形，长5~8mm；花冠粉红色至紫色，狭钟状，长2.5~3cm，外面被短柔毛及腺毛，冠筒基部具浅囊，冠檐5裂，裂片圆齿形；雄蕊4，2强，内藏，花丝被毛；瘦果核果状，长圆形，长约6mm，被短柔毛，顶端具宿存具略增大的2萼裂片。花期4~8月，果期10~12月。

生于海拔1 300~2 600m的山坡林缘、灌丛、草地或路旁。分布于云南、四川、贵州、湖北、甘肃和福建。

采收加工　秋末果实成熟时采摘果实，晒干。

药材性状　干燥果实长圆形，长约6mm，直径3~4mm，被短柔毛，褐色，果皮革质，具纵皱纹，向顶端稍细并具2枚略增大的宿存花萼裂片，基部具果柄或残痕。气微。以大小均匀，颗粒饱满、色褐者为佳。

性味与功用　苦、涩、平，无毒。祛风湿。用于风湿筋骨疼痛。常用量15~24g，煎服；外用适量捣敷。

附注　本种之根入药，具有理气止痛、清热燥湿之功。用于牙痛、高热、火眼。



图 202　小叶六道木

小冻绿树

别名 抱木刺。

来源 本品为鼠李科植物小冻绿树Rhamnus rosthornii pritz.的果实。

原植物 小冻绿树（图203）为灌木或小乔木，高2~3m；根粗壮，圆柱形、多分枝，棕黑色。树皮灰褐色，粗糙，具纵裂纹，枝具长枝及短枝，枝端常具刺，幼枝圆柱形，绿色，被短柔毛，老枝变无毛，灰褐色或黑褐色。单叶互生，叶片薄草质或草质，或在短枝上簇生，匙形、菱状椭圆形或倒卵状椭圆形，长1~2.5cm，宽5~12mm，先端圆形，基部楔形，稀近圆形，边缘具圆齿或钝锯齿，叶面暗绿色，无毛或沿主脉被短柔毛，背面淡绿色，仅脉腋具簇毛，侧脉2~4对，在叶面不明显；叶柄短，被短柔毛；托叶线状披针形，宿存。花单性，雌雄异株，4基数；雌花数个簇生于短枝顶端或当年生枝下部叶腋内；花梗长2~3mm；花萼4裂；花瓣4，淡黄色绿色，匙形；退化雄蕊极小；花盘盘状，不包围子房；子房上位，球形，花柱2浅裂或半裂。核果球形，直径3~4mm，成熟时黑色，基部具宿存的花萼筒；种子倒卵圆形，红褐色，背部具1长为种子4/5或全长的下部宽中部窄的纵沟，花期4~5月，果期6~9月。

生于海拔600~2 600m的山坡阳处、灌丛中或沟边林中。分布于云南、四川、贵州、广西、湖北、陕西及甘肃。

采收加工 秋末冬初果实成熟时采摘，晒干。

药材性状 本品的干燥果实球形，直径3~4mm，表面黑色或棕褐色，多皱纹，基部具宿存花萼。果含种子2粒，种子倒卵形，红褐色，背面具1长为种子4/5或全长的下部宽、中部窄的纵沟。气微，味苦，涩。以粒大、饱满、色黑者为佳。

性味与功用 苦、涩，凉。化食消积。用于实积腹胀、大叶性肺炎。常用量15g。

附注 孕妇忌用。小冻绿树之叶入药，治疮痈肿毒。根入药，效用同果。



图 203　小冻绿树

1. 根；2. 花果枝；3. 果枝

无刺鼠李

别名 贵州鼠李、紫棍柴、铁滚子。

来源 本品为鼠李科植物无刺鼠李Rhamnus esquirolii Lévl.的干燥果实。

原植物 无刺鼠李（图204）为灌木或小乔木，高3~5m；小枝无刺，褐色，具不明显的瘤状皮孔，被短柔毛。叶纸质，大小异形，交替互生，小叶长圆形或披针状椭圆形，长1.5~4cm，宽0.5~2.5cm，大叶长椭圆形、倒披针状椭圆形或狭长圆形，长5~19cm，宽1.7~6cm，先端渐尖至长渐尖，或尾状渐尖，基部圆形或楔形，边缘具细锯齿或不明显的细齿，叶面深绿色，无毛，背面淡绿色，被灰色短柔毛，或至少沿脉被短柔毛，侧脉6~8对，于近叶缘网结成环状；叶柄长3~11mm，密被或疏被短柔毛；托叶钻形，宿存。花单性，雌雄异株；聚伞总状花序腋生，长1~3cm；花序轴、花梗及花被片均被短柔毛，花5基数；花梗长1~2mm；萼片三角形；花瓣小，早落；雄花具退化雌蕊；雌花之退化雄蕊极小，子房球形，花柱3浅裂或半裂。核果倒卵状球形，直径4~5mm，基部具宿存萼，紫红色，成熟时黑色，种子2~3颗，倒卵状长圆形，背面具纵贯种子的上窄下宽的纵沟。花期5~7月，果期8~11月。

生于海拔400~1 800m的山谷密林、林缘或灌丛中。分布于云南东南部、四川、贵州、广西、湖北西部。

采收加工 秋季果实成熟时采摘，晒干。

药材性状 本品为倒卵状球形，直径4~5mm，表面红褐色或棕褐色，具纵沟，顶端圆形，中央具花柱痕，基部具一圆盘形宿存花萼。果皮薄革质。内表面黄绿色。种子2~3颗，倒卵状长圆形，长4~5mm，背面具上窄下宽的纵沟，浅黄绿色。气无。以粒大、饱满者为佳。

性味与功用 苦、辛，凉。活血消积，理气止痛，逐水，消食。用于腹痛，月经不调，水肿，食积等症。常用量9~15g。

附注 本种的根及叶入药，与果同效。



图 204　无刺鼠李

水　　茄

别名　野茄子、刺茄、青茄、乌凉、黄天茄。

来源　本品为茄科植物水茄 Solanum torvum Swartz 的干燥果实。

原植物　水茄（图 205）为灌木，高 1~3m。小枝、叶柄、叶背面和花序柄均被具柄或无柄的 5~9 分枝的尘土色星状毛。小枝圆形，绿色，具长 2.5~10mm 的淡黄色皮刺，皮刺基部宽扁，被星状毛，顶端略弯曲。单叶互生或双生，叶片卵形或椭圆形，长 6~12（~19）cm，宽 4~9（~13）cm，先端钝，具尖头，基部心形或阔楔形，边缘深裂或波状，裂片 5~7，叶面绿色，被星状毛，背面淡绿色，密被具柄多分枝星状毛，主脉在背面具刺或无，侧脉 3~5 对，有刺或无刺；叶柄长 2~4cm，具 1~2 皮刺或无。伞房花序腋外生，2~3 歧，花序梗长 1~1.5cm，具 1 细刺或无，花梗长 5~10mm；花萼杯状，长约 4mm，外面被星状毛及腺毛，5 裂，裂片卵状长圆形，长约 2mm；花冠白色，辐状，5 裂，裂片卵状披针形，长约 1cm，先端渐尖，外面被星状毛；雄蕊 5，花药远长于花丝；子房卵形，光滑，无毛。浆果球形，直径 1~1.5cm，黄色，基部具宿存花萼。种子盘状，直径 1~1.5mm。花果期：全年。

生于海拔 200~1 700m 的山坡灌丛中、荒地、路旁及林边潮湿地方。分布于云南南部、东南及西南部、广东、广西、海南、台湾等省区。广布于热带印度、缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚和热带美洲等。

采收加工　果实成熟时采摘，晒干。

药材性状　本品圆球形，直径 1.2~1.5cm，表面黄褐色。果皮薄，具皱纹，平滑无毛，内表面浅黄褐色。种子极多数，扁圆形，黄褐色，直径约 2mm，厚约 0.5mm，种仁圆形淡黄色。气无，味淡，以个大、无果梗，色黄褐者为佳。

性味与功用　淡，平。有小毒。解表温里，化痰止咳，消肿止痛，活血通经，截疟。用于感冒、久咳、痧症，咳血、胃痛、牙痛，闭经，疟疾，腰肌劳损，跌打损伤，疥疮肿痛。常用量 9~15g；外用适量捣烂敷患处。

附注　水茄之根入药，与果同效，或云疗效更好。



图 205　水茄

孔雀抱蛋

别名　象尾菜、节节萝卜。

来源　本品为苏铁科植物云南苏铁Cycas siamensis Miq.的干燥种子。

原植物　云南苏铁（图206）为常绿小乔木，高30~180cm；树干基部显著膨大呈盘状，上部渐狭成圆柱形或卵状圆柱形。叶羽状，常120~250cm或更长，叶柄两侧具直或稍弯的长2~3mm的刺，刺间距2~3.5cm，稀0.5mm或5mm；裂片40~120对或以上，排列较疏，间距约2cm，薄革质，披针状线形，中部裂片长25~33cm，宽1.5~2.2cm，先端渐尖，基部圆形，边缘稍厚，微向下反曲，叶面深绿色，背面绿色，主脉在两面隆起，雌雄异株，雄球花卵状圆柱形或圆柱形，长约30cm，直径6~8cm，小孢子叶楔形，长2~3cm，顶端近菱形，密被黄色绒毛，后渐脱落，两角三角形，先端向上反曲，并具1易折的钻状尖头；大孢子叶密被红褐色绒毛，后渐脱落，上部的顶片卵形至菱状卵形，长较宽为大或近相等，长4~6cm，边缘尨齿状深裂，裂片约10对，线状钻形，长1.5~3.5cm，胚珠2~4粒生于大孢子叶柄的中部或中上部两侧，无毛。种子黄褐色或浅褐色，卵圆形或阔倒卵形，长2~3cm，直径1.8~2.5cm，外种皮质硬，平滑，具光泽。花期2~3月，果期8~9月。

生于海拔800~1 200m的山地热带雨林中或沟边阴处，分布于云南南部，广东、广西有栽培；缅甸、泰国和越南亦有。

采收加工　秋季种子成熟时采摘，晒干。

药材性状　干燥种子卵圆形或阔倒卵形，长2~3cm，直径1.8~2.5cm，外种皮质硬，黄褐色或淡褐色，光滑，具光泽。气微，味苦酸。以个大、饱满、色黄褐者为佳。

性味与功用　苦、酸、涩，平。解毒，收敛，通经络，健脾胃，止咳祛痰。用于肠炎，痢疾，消化不良，呃逆，急性黄疸性肝炎，气管炎等症。常用量9~15g。

附注　本种之茎、叶、花均可入药。



图 206　云南苏铁

皮 哨 子

别名 川滇无患子、无患子、油患子、胰哨子果、菩提子。

来源 本品为无患子科植物皮哨子 Sapindus delavayi (Franch.)Radlk.(Pancovia delavayi Franch.)的果皮、种子。

原植物 皮哨子（图207）为落叶乔木，高达10m；小枝圆柱形，具纵槽，被暗黄色短柔毛。偶数羽状复叶互生，长20~35cm，具4~7对小叶；叶柄长6~7cm，与叶轴被微柔毛；小叶片纸质，对生或互生，卵形或长圆形，长6~12cm，宽2.5~5.5cm，先端急尖或短渐尖，基部阔楔形或钝圆，常偏斜，叶面绿色，沿脉被微柔毛，背面淡绿色，疏被微柔毛，脉上更密，主脉和侧脉两面突起；小叶柄被毛，长4~7mm。圆锥花序顶生，长16cm，被黄色绒毛；花梗长约2mm，被毛；萼片5，不等大，外面2片卵形，长约2mm，里面3片长圆形，长约3.5mm，均被微柔毛，具缘毛；花瓣黄白色，4~5枚，线状披针形，长4~5mm，基部内侧具一2裂、被白色长柔毛的大鳞片；花盘半月形，无毛；雄蕊8，花丝被白色柔毛，花药卵形，无毛；子房倒心形，无毛，花柱短，不裂。核果球形，直径2cm，肉质，平滑；种子球形，黑色。花期5~7月，果期8~10月。

生于海拔（200~）1 200~2 600m的山地密林中或沟谷疏林中。分布于云南中部、东南部和西北部、四川西南部。

采收加工 秋季果实成熟时期采摘，将果肉与种子分离，晒干。

药材性状 本品干燥果皮呈近圆形或半圆形，壳状，直径2cm，厚约2~3mm，黄褐色，外表皮具网状皱纹，内表皮光滑，具光泽。种子球形，直径约15mm，表面黑色，光滑，种脐乳白色，线状椭圆形，种皮骨质，坚硬；无胚乳，子叶肥厚，黄色。气微，味苦。以果皮肥厚，黄褐色，种子饱满者为佳。

性味与功用 苦，微寒。理气止痛，杀虫止痒。果皮用于膀胱疝气疼痛；种子用于杀虫，疥癣，头虱等。常用量9~15克，煎汤内服；外用种子煎水外洗。



图 207　皮哨子

灯 台 树

别名 瑞木、伞把树、猫猫头、铁青树、六角树、鸡肫皮。

来源 本品为山茱萸科植物灯台树Cornus controversa Hemls.ex prain. 的干燥果实。

原植物 灯台树（图208）为落叶乔木，高6~15m；树皮暗灰色或带黄灰色，光滑。幼枝紫红色，疏被短柔毛，后渐无毛，具椭圆形皮孔。单叶互生，叶片纸质，阔卵形、阔椭圆状卵形或披针状椭圆形，长4~13cm，宽3.5~9cm，先端突尖，基部圆形或阔楔形，全缘，叶面黄绿色，近无毛，背面淡灰绿色，密被白色短柔毛，侧脉每边6~7条；叶柄长2~6cm，无毛或被极小疏柔毛，伞房状聚伞花序顶生，长15cm，直径7~13cm，疏被平贴柔毛；总花梗长1.5~4cm；花白色，直径8mm；花萼裂片4，三角形，外面被短柔毛；花瓣4，长圆状披针形，长约4.5mm，外面疏被平贴短柔毛；雄蕊4，长4~5mm，花药椭圆形，淡黄色，花盘垫状；子房密被白色贴生短柔毛。核果球形，直径6~7mm，成熟时紫红色至蓝黑色。核骨质，顶端具1明显小孔。花期6月，果期7~10月。

生于海拔800~2 800m的山地杂木林中或针阔叶混交林中。分布于辽宁、河北、陕西、甘肃、山东、河南及长江流域及其以南各省区。朝鲜、日本、印度、尼泊尔、锡金、不丹亦有。

采收加工 秋季果实成熟时果摘，晒干。

药材性状 本品为圆球形，直径6~7mm，表面紫黑色或黑褐色，皱缩，顶端具宿存花萼或残痕，另一端具果柄痕。果皮内表面棕黄色，略粗糙。果核椭圆形，淡黄色，坚硬，表面具数条纵棱槽，不易破碎。气无，味酸涩，微苦。以大小均匀，黑褐色者为佳。

性味与功用 酸、涩，微温。清热利湿，止血，驱虫。用于蛔积，肝炎。常用量9~15g。

附注 本种之叶有消肿止痛之功效。



图 208　灯台树
1．花枝；2．花

红木子

别名 山丁木。

来源 本品为大风子科植物山羊角树 Carreirea calycina Franch.的种子

原植物 山羊角树（图209）为落叶乔木，高5~15m；小枝圆柱形、灰色、无毛。单叶互生，叶片近革质、长圆状卵形、倒卵状椭圆形至长圆形、长8~16cm，宽5~10cm，先端锐尖，基部圆形，边缘具粗锯齿，叶面绿色，背面淡绿色，两面无毛，基出3脉；叶柄长5~9cm。圆锥花序顶生，通常具3~5花、稀达10花；花梗长2~3cm，近中部具2叶状苞片；花单性，雌雄异株；萼片5，阔卵圆形，外面被短毛；花瓣无；雄花之雄蕊多数，着生于稍突起的花托上，花药2室；雌花：子房长圆状卵形，密被短柔毛，1室，具3~4侧膜胎座，胚珠多数，花柱3~4，短而向外反曲，柱头3浅裂。蒴果纺锤形，长3~5cm，直径8mm，两端稍渐尖，顶端具长尖头，外果皮革质，被毡状毛，3瓣裂；内果皮木质，自顶端向下至中部3瓣裂，各裂瓣自基部向上至中部沿中央侧膜胎座分裂为2，种子多数，一端具显著的翅。

生于海拔500~2 000m的山地疏林中，分布于云南、四川、贵州、湖南、湖北等省。

采收加工 秋季果实成熟时采收，除去果皮，取出种子，晒干。

药材性状 本品之干燥种子带翅呈长圆形，棕褐色，长1.7~2cm，宽6~7mm，扁平。种子斜卵形，长约1cm，宽约5mm，厚约2mm，种皮深棕褐色，种仁扁平，乳白色，富含油质，种子上端具1膜质翅，翅长圆状椭圆形，棕褐色，易碎。气无，味苦。以颗粒饱满，色棕褐色者为佳。

性味与功用 苦，凉。祛风补脑。用于头昏目眩。常用量9~15g，煎服。



图 209　山羊角树

汤 饭 子

别名 鸡公柴、垂果荚蒾、糯米树、茶荚蒾、霜降子。

来源 本品为忍冬科植物汤饭子 Viburnum setigerum Hance 的干燥果实。

原植物 汤饭子（图210）为落叶灌木，高可达4m；幼枝多少具棱角，淡灰黄色，无毛，2年生小枝灰色、灰褐色或紫褐色。单叶对生，叶片纸质，卵状长圆形至卵状披针形、稀卵形或椭圆状卵形，长7~15cm，先端渐尖，基部圆形，边缘除基部外，疏具尖锯齿，叶面绿色，幼时沿主脉被长毛，后变无毛，背面较淡，沿主脉及侧脉被贴生淡黄色长纤毛，近基部两侧具少数腺体，侧脉每边6~8条；叶柄长1~1.5cm，疏被长伏毛或近无毛。由聚伞花序组成的复伞花序顶生，无毛或疏被长伏毛，具极小的红褐色腺点，下垂；总花梗长1~2.5（~3.5）cm，第一级辐射枝5条，花生于第三级辐射枝上，芳香，有花梗或无；萼筒长1.5mm，无毛和腺点，萼齿5，卵形；花冠白色，辐状，直径4~6mm，无毛，5裂片卵形，长约2.5mm；雄蕊5，与花冠几等长，花药圆形，极小。核果卵圆形，长9~11mm，熟时红色；核卵圆形，压扁，长8~10mm，直径5~7mm，或卵状长圆形，直径4~5mm，凹凸不平，腹面扁平或略凹入。花期4~5月，果期9~10月。

生于海拔200~1 700m的山谷，溪边疏林或山坡灌丛中。分布于云南、四川、贵州、广西、广东、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、福建、台湾及陕西南部。

采收加工 秋季果实成熟时采果，晒干。

药材性状 本品之干燥果实卵圆形，长9~11mm，表皮红褐色，具纵皱纹及沟；果核卵圆形或卵状长圆形，压扁，长8~10mm，直径4~7mm，凹凸不平，腹面扁平或略凹入，气微，味酸、甘。以粒大，饱满，色红褐者为佳。

性味与功用 甘、苦，平。健脾。用于脾胃虚弱，胃纳呆钝，食欲不振等症。常用量15g。

附注 本种之根，味微苦，有破血通经，止血的功效，用于白浊，肺痈，



图 210　汤饭子

刺　柏

别名　山刺柏、台桧、山杉、刺松、台湾柏。

来源　本品为柏科植物刺柏Juniperus formosana Hayata的果实。

原植物　刺柏（图211）为乔木，高达12m。树皮褐色，纵裂成长条薄片脱落；枝斜展或平展，树冠塔形或圆柱形；小枝下垂，三棱形。叶3枚轮生，线状披针形或线状刺形，长1.2~2cm，先端渐尖具锐尖头，基部有关节，不下延，全缘，上面稍凹，中脉微隆起，绿色，两侧各有1条白色，很少紫色或淡绿色的气孔带，气孔带较绿色边带稍宽，在叶顶端汇合为1条，下面绿色，有光泽，具纵钝脊，横切面新月形。雄球花圆形或椭圆形，长4~6mm，单生叶腋，具雄蕊5~6对，药隔顶端渐尖，背有纵脊；雌球花有3个轮生的珠鳞，胚珠3。球果近球形或宽卵圆形，长6~10mm，成熟时淡红色或淡红褐色，有白粉；种鳞结合，有时微张开；种子通常3，半月形，长3~4棱，近基部有3~4个树脂槽。花期4~5月，果期次年10~11月。

生于山坡林中，常栽培。分布于我国华东、华中、西南地区及陕西、甘肃、青海、台湾等省区。我国特有。

采收加工　秋、冬季果实成熟时采摘，晒干。

药材性状　本品之果近球形或阔卵形，长6~10mm，直径6~9mm，表面皱缩，淡红褐色，被白粉，顶端有时开裂；通常有3粒种子，种子半圆形，具3~4棱脊，无翅，气微，味苦。以颗粒饱满，色淡红褐色，味苦者为佳。

性味与功用　苦、寒。清热，解毒，杀虫。用于低热不退，皮肤癣症。常用量9~15克；外用适量煎水洗。

附注　刺柏根及树皮功效同果实。叶和嫩枝治结核病，尿路感染。



图 211　刺柏

珍珠荚蒾

别名 冷饭果、糯米果、珍珠花、山五味子。

来源 本品为忍冬科植物珍珠荚蒾 Viburnum foetidum Wall. var. ceanothoides (C.H.Wright) Hand.-Mazz. (V. ceanothoides C.H.Wright) 的干燥果实。

原植物 珍珠荚蒾(图212)为常绿灌木，高1~3m；幼枝密被黄褐色簇状短柔毛，老枝红褐色、无毛。单叶对生，叶片坚纸质或近革质，倒卵状椭圆形或倒卵形，长3~6.5cm，宽1.5~2.5cm，先端钝，基部楔形或圆形，边缘向顶端疏生牙齿，叶面绿色，除沿主脉被簇状短柔毛外，无毛，背面淡绿色，除主脉、侧脉和脉腋被簇状短柔毛外，无毛，基出三脉，侧脉直伸近齿尖；叶柄长5~10mm，密被黄褐色簇状短柔毛。总花梗极短或无几，第1级辐射枝5~7条；苞片和小苞片线状长圆形或匙状长圆形，长约1.5mm，被簇状毛；花生于第2及第3级辐射轴上；花萼筒长约1mm，檐部5裂，裂齿三角形，微小，无毛；花冠白色，长1.5mm，辐状，无毛，檐部5裂，裂片圆形，长约1mm；雄蕊5，稍伸出花冠。核果卵状椭圆形，长约7mm；成熟时红色；核扁，具纵棱槽。花期5~8月，果期9~12月。

常生于海拔1 600~2 500m的山地坡疏林中。分布于云南东南部和西南部、西藏南部。印度东北部，孟加拉国，缅甸和老挝亦有。

采收加工 夏、秋季采集，晒干或鲜用。

药材性状 干燥果实卵状椭圆形，压扁，长约7mm，红褐色，具纵棱槽，内有种子1粒，长椭圆形，压扁，背部具2纵槽，腹部具3纵槽，种皮常粘附果肉。气微，味酸，甘。以子粒饱满，色红，味甘者为佳。

性味与功用 酸、甘，平。清热解毒、止咳，消炎、接骨，止痛止泻，除湿，止血。用于感冒发热、咳嗽，喉痛，头痛，牙痛，火眼，急性胃肠炎，腹泻，胃酸过多，跌打损伤，疮疖红肿，麻疹不透，皮肤瘙痒，风湿，血崩，先兆流产等症。常用量6~9g；外用适量，捣烂敷患处。

附注 本种之干燥叶绿色，常皱缩，或破碎，完整者平展后为倒卵状椭圆形或倒卵形，长3~6.5cm，宽1.5~2.5cm，先端钝或渐尖，基部楔形，边缘向顶部具疏齿，沿主脉及侧脉被簇状短柔毛，叶柄被黄褐色簇状短柔毛，长5~10mm。有异味，味苦，涩。用于脓肿，骨折。



图 212　珍珠荚蓬

夏 枯 草

别名 铁色草、麦穗夏枯草、铁线夏枯草、枯草穗、夏枯球。

来源 本品为唇形科植物夏枯草 Prunella vulgaris Linn.的干燥带花的果序。

原植物 夏枯草（图213）为多年生草本，高20~30cm；根状茎匍匐，节上生须根；根多数，黄褐色。茎四棱形，具纵槽，匍匐上升，自基部分枝，通常带紫红色，疏被糙毛或近无毛。单叶对生，叶片纸质，卵状长圆形或卵形，长1.5~6cm，宽0.5~3cm，先端钝，基部圆形、截形至楔形，全缘或具波状细齿，叶面绿色，被短柔毛或近无毛，背面淡绿色，近无毛，具腺点；茎下部叶具长柄，上部叶渐无柄。由轮伞花序组成密集状花序顶生，长2~4cm，6花一轮，每轮下具一对阔肾形或阔心形，长约7mm，宽约11mm，先端具聚尖头的外被刚毛，具缘毛的苞片；花萼钟状，长约1cm，外面疏被刚毛，上唇具3个不明显之齿，下唇2深裂；花冠紫色、紫红色或蓝紫色，长约13mm，花冠筒基部内面具一环状鳞毛，冠檐部上唇近圆形，盾状，下唇中裂片大，先端具流苏状小裂片，侧裂片小；雄蕊4，伸出花冠外；子房无毛，小坚果长圆状卵球形，长约1.8mm，黄褐色。花期4~6月，果期7~10月。

生于海拔1 400~2 800（~3 000）m的荒山坡，草地，溪旁，田埂及路边等潮湿处。分布于云南南部以外的大部地区及我国长江流域及其以南各省区和河南、陕西、甘肃、新疆。印度、尼泊尔、不丹、巴基斯坦、阿富汗、西伯利亚、中亚、西亚、欧洲和北非，澳大利亚和北美亦有。

采收加工 夏季花序呈棕红色时采集，除去杂物，晒干。

药材性状 本品之带花果序呈棒状，略扁，长1.5~8cm，直径0.6~1.5cm，淡棕色至棕红色。果序由数至10数轮宿存花萼及苞片组成，每轮具对生苞片2枚，苞片阔肾形或阔心形，长约7mm，宽约11mm，淡黄褐色，先端具骤尖头，外面被刚毛，具缘毛，具明显脉纹；每苞片内具3花，花冠多已脱落，宿存花萼2唇形，内有小坚果4粒，小坚果长圆状卵形，黄褐色，具光泽。体轻质脆。微有清香气，味淡。以穗大、色紫褐带花者为佳。

性味与功用 辛、苦、寒。清肝明目，消肿散结，降压。用于目赤肿痛，头痛眩晕，耳鸣，瘰疬，瘿瘤，淋巴结结核，肺结核，甲状腺肿，急性乳腺炎，腮腺炎，痈疽肿毒，高血压病。常用量9~15g。

附注 本品之全草入药，用果序同效。



图 213　夏枯草

臭　樟

别名　香樟、樟木、樟脑树、樟叶树、红樟。

来源　本品为樟科植物云南樟 Cinnamomum glanduliferum(Wall.) Nees (Laurus glandulifera Wall.)的干燥果实。

原植物　云南樟（图214）为常绿乔木，高5~15m，胸径达30cm；树皮灰褐色，纵裂，内皮红褐色，具樟脑味。枝圆柱形，粗壮，绿褐色。单叶互生，叶片革质，椭圆形至椭圆状披针形或披针形，长6~15cm，宽4~6.5cm，先端急尖或短渐尖，基部楔形或近圆形，全缘，叶面亮深绿色，背面粉绿色，两面无毛或仅背面多少披微柔毛，具羽状脉或隔有离基三出脉，侧脉4~5对，脉腋有腺体，细网脉不明显；叶柄长1.5~3cm。圆锥花序腋生，长4~10cm，总花梗长2~4cm，花梗长2~3cm，均无毛；花淡黄色，长约3mm；花被片6，阔卵形，长约2mm，宽约1.5mm，先端锐尖；能育雄蕊9枚，花丝被短柔毛，花药4室，第3轮花药外向瓣裂，花丝基部具2枚腺体；子房卵球形，长约1.2mm，无毛。果球形，直径1cm，成熟时黑色。果托倒锥形，狭长，红色。花期3~5月，果期7~9月。

常生于海拔1 500~2 500(~3 000)m的山地常绿阔叶林中。分布于四川西南部、贵州南部、云南中部和北部以及西藏东南部。印度、尼泊尔、缅甸至马来西亚亦有。

采收加工　秋季果实成熟后采收，晒干。

药材性状　本品之干燥果实球形，直径约1cm，表面黑色，具皱褶，内含种子1颗。果托倒锥形，狭长，棕褐色。气微，味辛。以粒大、饱满者为佳。

性味与功用　辛，温。祛风散寒，理气止痛。用于风寒感冒，支气管炎，食滞气胀，胃痛，腹泻胀痛，风湿关节痛等症。常用量6~9g。

附注　本种之木材、树皮入药，与果同效。用量：25~50g，水煎或泡酒服。



图 214　云南樟

臭檀吴萸

别名　臭檀、臭檀子、黑辣子。

来源　本品为芸香科植物臭檀吴萸 Evodia dancillii (Benn.) Hemsl. (Zanthoxylum daneillii Benn.)的干燥果实。

原植物　臭檀吴萸（图215）为落叶乔木，高达15m。小枝密被短毛，后渐脱落。单数羽状复叶对生；小叶5~11枚，纸质，卵形、长圆状卵形或长圆状披针形，长5~13cm，先端渐尖，基部圆形或宽楔形，近全缘或有细钝锯齿，背面沿中脉密被白色长柔毛；叶柄长2~5cm；小叶柄长1~3mm。聚伞状圆锥花序顶生，花序大小变化很大，花序轴及花梗被短绒毛，序轴较细，直径2~3mm；花单性，雌雄异株，白色；雄花萼片、花瓣、雄蕊均5；花瓣长约4mm，内面被疏柔毛，花丝中部以下被长柔毛，退化子房顶端4~5裂，密被毛；雌花与雄花相似而稍大，退化雄蕊短线状，长约为子房的1/4，顶端无退化花药；子房上位，近球形。果熟后紫红色，有腺点，顶端有小喙；种子黑色，光亮。

生于疏林中或沟边，有栽培。分布于辽宁至湖北，西至甘肃省。朝鲜、日本也有。

采收加工　夏季剪取近成熟的果序，晒干后搓下果实，去净枝叶，再晒至全干。

药材性状　本品呈类圆球形或扁球形，长5~8mm，表面粗糙，具多数点状凸起，有的微裂成5果瓣，每果瓣顶端有长0.5~2.5mm的喙状凹陷的油室，果梗上有很多毛茸；果皮坚脆剥开后内表面平滑，黄白色，每1果内藏种子2粒。种子卵形，黑色，有光泽。气强烈的特殊味辣，苦。以果实不开裂，气味浓者为佳。

性味与功用　辛、苦，温。归肝、胃经。散寒，温中，止痛。用于脘腹冷痛，疝气痛，口腔溃疡，齿痛。常用量1~3g。

附注　阴虚火旺者忌服。



图 215　臭檀吴萸

野 八 角

别名 土八角、山八角、养草、断肠草、八角果。

来源 本品为八角茴香科植物野八角 Illicium simonsii Maxim.（I. griffithii var.yunnanense Franch.:I. yunnanense (Franch.)Finet et Gagnep.)的干燥果实。

原植物 野八角（图216）灌木、稀乔木，高1.5~8m；幼枝具棱，绿褐色，老枝灰色。叶互生或近对生，叶片革质，披针形、椭圆形或长圆状椭圆形，长5~10cm，宽1.5－4cm，先端短渐尖或急尖，基部渐狭或楔形，全缘，叶面绿色，干时暗绿色至灰棕色，背面淡绿色，干时棕褐色，主脉在叶面凹入，背面隆起，侧脉6~9对；叶柄长7~20mm。花常生于枝端的叶腋内，淡黄色，稀白色或粉红色，芳香。花梗长2~8mm；花被片18~30片，不等大，从外到里为椭圆状长圆形、长圆状披针形至舌形，最外者长9~18mm，宽2~4mm，最内者长7~15mm，宽1~3mm；雄蕊16~35枚，2~3轮，花丝舌状，花药长圆形，长1.4~2.4mm；心皮8~9，子房扁卵形，长1~2mm，柱头钻形。果梗长5~16mm；蓇葖7~9(~12)，长11~20mm，宽6~9mm，厚2.5~4mm，先端具钻状尖头；种子淡黄色至灰棕色，长6~7mm，厚2~2.5mm。花期2~4月及10~11月，果期6~8月及8~10月。

生于海拔1 500~4 000m的山坡、溪边湿润的常绿阔叶林及灌林丛中。分布于云南、四川西南部和贵州西部。印度和缅甸北部亦有。

采收加工 秋季果实由绿色变黄色时采摘，晒干。

药材性状 本品的聚合果由7~12枚蓇葖组成，放射状排列于中轴上，直径25~30mm。蓇葖长10~20mm，宽6~9mm，厚2.5~4mm，外表面红棕色，具不规则皱纹，顶端具钻状喙，上侧多开裂，内侧面淡棕色，平滑有光泽；质坚而脆。果梗长5~16mm，弯曲，常脱落。每蓇葖内含1粒灰棕色或淡黄色种子，种子扁卵圆形，长6~7mm，宽4~5mm，厚2~2.5mm。种皮质脆，种仁白色。气浓，味甘。以个大，饱满，色红棕，气香者为佳。

性味与功用 甘，温。有大毒。杀虫生肌，行气止痛。用于疥疮，胃寒作吐，膀胱疝气、胸前胀痛等。常用量1.5~2.5g；外用适量，水煎洗患处。

附注 本品有大毒，慎用，如误食，立即喝盐水及酸水可解毒。阴虚内热者禁用。本种之叶入药，有杀虫生肌之功效。



图216　野八角

稗　子

别名　稗子、水高粱、扁扁草。

来源　本品为禾本科植物稗 Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.(Panicum crusgalli L.)的种子。

原植物　稗（图217）为1年生草本，高50~150cm；茎杆直立，基部倾斜或膝曲，光滑无毛，叶鞘平滑无毛，叶舌缺；叶片线形，扁平，长10~40cm，宽5~20cm，无毛，边缘粗糙。由穗形总状花序组成的圆锥花序近尖塔形，长6~20cm；主轴具棱，粗糙或具疣基硬毛；总状花序（分枝）较粗壮，斜升或平展，穗轴粗糙，基部具疣基硬毛；小穗卵形，长3~4mm，脉上密被疣基刺毛，具短柄或近无柄，密生于穗轴的一侧；第一颖三角形，长为小穗的确1/3~1/2，具3~5脉，脉上具疣基毛，先端尖，基部包卷小穗；第二颖与小穗等长，先端渐尖，或具短尖头，具5脉，脉上具疣基毛；第一小花常中性，其外稃草质，具7脉，脉上具疣基毛，先端延伸成一粗壮的芒，芒长短不一。第二外稃椭圆形，平滑，光亮，成熟后变硬，先端具小尖点，尖头上有一圈细毛，边缘内卷，包着同质的内稃，但内稃顶端露出。谷粒椭圆形，长约4mm，平滑光亮，顶端具小尖点。花果期夏秋季。

生于海拔1 300~2 400m的稻田中。分布于全国各地；全世界温暖地区均有分布。为水稻田的有害杂草。

采收加工　秋季种子成熟时采收，晒干备用。

药材性状　本品的谷粒呈椭圆形，长约4mm，直径约3mm，表面灰褐色，平滑光亮，顶端具小尖点。质中等硬，横断面圆形，白色，粉质。气微，味微苦。以粒大，饱满，粉质足者为佳。

性味与功用　微苦，微温。止血生肌。用于金疮及损伤出血，麻疹等症。常用量3~8g。



图 217　稗

督　　子

别名　龙爪稷、龙爪粟、野粟、鸡爪粟、鸭爪粟。

来源　本品为禾本科植物穆子 Eleusine coracana (L.) Gaertn.(Cynosurus coracanus L.)的干燥种仁。

原植物　穆子（图218）为1年生簇生草本，高50~120cm；茎直立，粗壮，常分枝，叶鞘长于节间，光滑；叶舌顶端密被长柔毛，长1~2mm，叶片线形，宽5~10mm。穗状花序5~8个呈指状生于茎顶端，长5~10cm，宽8~10mm，成熟时常内弯；小穗长7~9mm，具5~6花；颖坚纸质，顶端急尖；第一颖长约3mm，第二颖长4mm，外稃三角状卵形，顶端急尖，背部具脊，脊缘有狭翅，长约4mm，具5脉，内稃狭卵形，具2脊，粗糙。鳞被折叠，具3脉　花柱白基部分离。果为囊果，种子近球形，黄棕色，表面皱缩；胚长为种子的1/2~3/4，种脐点状。花果期5~9月。

我国云南及长江以南及安徽、河南、陕西、西藏等省区有栽培。亦广泛栽培于东半球热带地区。

采收加工　秋末种子成熟时采收，除去果序等杂质，晒干。

药材性状　本品近球形，直径1~1.5mm，表面棕褐色，光滑。基部近平微凹，具圆形种脐。质坚实，不易破碎，断面不整齐，粉质，白色。气无，味淡。以种子饱满、粉质、无杂质者为佳。

性味与功用　甘、温。入手足太阴、阳明经。补中益气、厚肠胃。民间常食其谷补气，并用于痢疾发热等症。



图 218　稗 子

七、动物药类和其他类

大 木 蜂

别名 熊蜂、象蜂、大竹筒蜂。

来源 本品为木蜂科动物大木蜂 Xylocopa magnifica Smith 的全虫。

产地 云南；印度、日本、马来西亚等地。

采收加工 秋、冬季采集，用沸水把蜂烫死，晒干。

药材性状 本品（图219）体长32~35mm。虫体黑色，有金属光泽。头椭圆形，黑色，复眼肾形，深棕色。嚼吸式口器，触角褐色有光泽，12节；前胸不发达，两侧角有向后延伸的突起。腹部第1节与后胸合并为并胸腹节。各足褐色，被黑毛。翅深褐色具紫绿色光泽，基部色深，翅端色浅。体长圆形，肥大，密生柔软的褐色绒毛。

性味与功用 甘、酸，性寒。归胃、大肠经。清热泻火，行气消肿，祛风。用于牙痛，口疮，咽喉肿痛，小儿惊风，气喘，腹胀。常用量1~2g，水煎服。

大 胡 蜂

别名 黑大马蜂。

来源 本品为胡蜂科动物大胡蜂 Vespa magnifica Smith 的全虫。

产地 云南、四川、台湾；印度、菲律宾、马来西亚等地。

采收加工 秋季采集，用沸水把蜂烫死，晒干或直接把活蜂泡入50°粮食酒中。

药材性状 本品（图220）雌蜂体长32~38mm，翅展67~72mm。头金黄色或棕色，唇基深棕色，密布刻点；复眼黑色，触角褐色，12节，触角窝之间整个隆起，额沟明显，单眼区两侧及下部密布较浅的刻点，覆黑色毛。前胸背板前缘斜向后头缘，肩角呈棱状突起，全呈深棕色至黑色，中胸背板和侧板黑色，光滑、稀有黑色毛。后胸侧板、背板黑色，覆深色毛。翅基片黑色。翅深棕色，前翅前缘褐色。前、中、后足基节、转节黑色，并有棕色毛。腹部



图 219　大木蜂



图 220　大胡蜂

背板均为暗褐色至黑色，覆棕色毛。第6节近三角形，呈棕黄色，布有较浅的刻点，覆黑色长毛。

性味与功用　辛、平、有小毒。归肺、胃经。祛风除湿、解毒消肿。外用于疔肿，疽病，风湿关节炎。外用：（1）适量烧灰研匀，调油涂敷患处；（2）用药酒搽风湿和跌打损伤部位。

白蚁王后

别名　白蚁王、白蚁后。

来源　本品为白蚁科、本白蚁科 Kalotermitidae、鼻白蚁科 Rhinotermitidae 等的生殖雌蚁，以白蚁科的种类为主。

产地　云南、贵州、四川、广西、福建、广东、海南等地；东南亚。

采收加工　每年夏季有翅蚁飞翔时用灯诱集，用沸水烫死晾干，每年夏季在灭除白蚁时，挖取蚁巢，取出蚁后鲜用或用酒浸泡。

药材性状　本品（图221）在同巢白蚁中体大型，住在蚁巢王宫内。体软，通常长而扁，金黄色或淡黄色及赤色。头前口式或下口式，能上下活动。口器为典型的咀嚼式；触角念珠状。翅2对狭长，膜质，大小、形状及脉序相同，交配后翅膀脱落，仅有残存的翅鳞。胸部扁平或稍隆起；足上跗节4或者节，有2爪。腹部10节，第一腹板退化，有尾须，1~8节。

性味与功用　甘，温。归肺、脾经。补中益气，养阴生津。用于体质虚弱，失眠健忘，血虚津伤等症。常用量1~2个蚁后或3~5克有翅蚁，与肉炖吃或者用温开水吞服。



图 221　白蚁王后

亚香棒虫草

别名 黑虫草、霍克斯虫草。

来源 本品为麦角菌科虫草菌寄生于棒蝠蛾、茶堆砂蛀蛾等幼虫体后形成的虫菌结合体，亚香棒虫草 Cordyceps hawkesii (Cray) Cooke。

产地 云南、贵州、湖南、湖北、安徽等地。

采收加工 夏季子实体长出地面2~5cm时采集，采后，去包裹虫体的菌膜和泥土，凉干或晒干。

药材性状 本品（图222）为虫菌结合体，上一年秋季虫草菌丝侵入幼虫体，吸取虫体养分，致使幼虫全体充满菌丝而死；第2年夏季子实体露出土外；子实体多从僵虫头部长出，少有从腹部或尾部长出，多单生，少有2~3枝生，褐色；子实体长4~10cm，直径3~5mm，基部粗为7~8mm；柄多弯曲，灰褐色、黑褐色，上有纵皱纹和细绒毛；顶端钝圆，无不孕端；子囊壳埋生，椭圆形或卵形，640~800 × 224~320μm，壳孔点粒状，直径35~53μm，子囊生于子囊壳内，蠕虫形，上部宽，下部削细，顶端膨大呈扁球冒状，基部稍缢缩。子囊线形，210~466 × 7~8μm，子囊内8根紧密而平行排列在一起。寄主有明显3节胸节和10节腹节；胸部有3对胸足，腹部有5对腹足，横切面乳白色，有清晰可见肠道，味微腥。

性味与功用 甘，温。归肺、肾经。滋肺补肾。用于咳嗽、咯血，盗汗，腰膝酸痛，阳痿遗精等。常用量2~4g。

附注 本品虽然在湖南、湖北、安徽一带作为冬虫夏草的代用品，但一次食用超过100g以上时，有头晕、呕吐等中毒现象，所以不能过量食用。



图 222　亚香棒虫草

多枝虫草

别名 分叉虫草。

来源 本品为麦角菌科虫草菌寄生鞘翅目和鳞翅目幼虫体后形成的虫菌结合体多枝虫草 Cordyceps arbuscula Teng。

产地 云南、西藏、四川、广东等地。

采收加工 夏季子实体长出地面 2~5cm 时采集，采后，去包裹虫体的菌膜和泥土，凉干或晒干。

药材性状 本品（图 223）为虫菌结合体，上一年秋季虫草菌丝侵入幼虫体，吸取虫体养分，致使幼虫全体充满菌丝而死；第 2 年夏季子实体露出土外；子实体从僵虫头部、腹部或尾部长出，多 2~5 丛生或多枝，炳和头部均能分枝；炳较细小，多弯曲，黄色至淡褐色，子实体长 4~10cm，直径 0.6~1.3mm，头部棒状，黄褐色、褐色，顶端具不孕性角尖；子囊壳埋生，圆锥形或卵形，350~480 × 210~245μm，孔口突出。子囊长圆柱形，200~215 × 3.8~4.2μm。子囊孢子线形，多横隔，直径 0.6~0.9μm。虫体深黄色和褐色；鳞翅目寄主有明显 3 节胸节和 10 节腹节；胸部有 3 对胸足、腹部有 5 对腹足，横切面乳白色、有清晰可见肠道，味微腥。

性味与功用 甘、温。归肺、肾经。滋肺补肾。用于咳嗽，咯血、盗汗，腰膝酸痛，阳痿遗精等。常用量 2~4g。




图 223　多枝虫草

拟黑多刺蚁

别名 黑蚂蚁、被胎蚁、鼎突多刺蚁、古名玄驹。

来源 本品为蚁科动物拟黑多刺蚁polyrhachis vicina Roger的全虫。

产地 云南、贵州、广西、广东、浙江、福建、台湾；印度、缅甸、斯里兰卡等地。

采集与加工 秋、冬季采集，用塑料袋连巢一起密封，闷死，检净，晒和烘干。

药材性状 本品（图224）工蚁体长6~9mm。体深褐色，密被青铜色或金黄色茸毛。头部茸毛稀，胸腹部很密，遮盖刻纹。头宽而短，具细皱纹，复眼着生于头侧方的中略偏上处；无单眼；触角鞭节丝形，柄节长的1/2超过头顶。胸部拱起，前胸背板刺前伸，刺尖略外弯；后胸背板刺直，刺尖略外弯；足粗壮，胫节下方短刺少；腹柄结高，前面平截，后面凸，在左右两侧角上各具一枚长刺，两刺基部间具鼎立状三短刺（一前二后）；腹部较宽，5节。

性味与功用 咸、温。归脾、肾经。祛风湿，益气力，强身健体，外用消肿解毒。用于风湿，类风湿，肾虚损，体虚弱，皮炎等。常用量：内服4~6g，研粉冲服或入酒浸泡服用；外用适量捣碎外涂。

星天牛

别名 花天牛、牛角虫、天水牛。

来源 本品为天牛科动物星天牛Anoplophora imitatrix (White)的成虫。

产地 云南、贵州、四川、湖北、湖南、广西、广东、海南；缅甸、老挝、越南等。

采收加工 夏天捕捉，用沸水烫死，晒干。

药材性状 本品（图225）体长25~39mm，体宽8~13.5mm。体色漆黑，略



图 224　拟黑多刺蚁

带紫色或蓝色光泽，并布有淡黄或白色绒毛斑点。触角自第3节起每节基末有灰白色毛环。头部以颊侧的淡黄大毛斑最显著，额前缘和两侧、上唇及上颚基部有较密的淡色绒毛。前胸背板中区两侧各有一条阔直纹，常于中间间断。每一鞘翅上约有10~15个毛斑，其中以中区的4、5个较大、亦最显著，靠中缝有3、4个，靠外缘有4、5个，易消失。腹面绒毛稀密不一，常形成为很大的斑纹。

性味与功用 辛，平。归肝经。活血祛瘀。用于经闭，劳伤血瘀，腰脊疼痛，跌打瘀积，疔肿恶疮。常用量3~6g；外用适量。

独角仙

别名 独角蜣螂、双叉独角仙。

来源 本品为犀金龟科动物独角仙Allomyrina dichotoma (Linnaeus)的成虫。

产地 云南、贵州、四川、广西、广东、海南；缅甸、老挝、越南等。

采收加工 夏天捕捉，用沸水烫死，晒干。

药材性状 本品（图226）体形大，长36~60mm，宽20~35mm。雄虫头部有强大分叉角突。虫体黄色至褐色，鞘翅光亮。头较小，前胸背板阔大，中央有一强有力而前弯的单叉角突，小盾片明显，鞘翅长大，臀斑短阔。腹面有光泽，被黄褐色纤毛。足发达，前足基节后方有一突起，顶端平滑呈弧形线。雌虫的体色比雄虫稍淡，头部无分叉角突。

性味与功用 咸，寒。有小毒。归肝、胃、大肠、小肠经。镇惊，破瘀，消肿，通便，解热。用于寒热腹胀，大小便闭，惊痫癫狂，便秘虫痔，小儿惊痫等。常用量1~2只或3~6g；外用适量。



图 225　星天牛



图 226　独角仙

结　刺　蚁

别名　黑蚂蚁。

来源　本品为蚁科动物结刺蚁 Polyrhachis rastellata (Laatreille) 的全虫。

产地　云南、贵州、广西、浙江；澳大利亚等地。

采收加工　秋、冬季采集，用塑料袋连巢一起密封，开水烫死，检净，晒和烘干。

药材性状　本品（图227）工蚁体长5~6.5mm。体黑色，光亮，体毛被缺或稀疏。头呈三角形，后头缘圆形；唇基不具中脊；触角脊相距较窄，末端相互远离。并腹胸背板呈十分弯曲的弓形，前—中胸背板缝明显，中—并腹节缝不明显；并胸腹接背板斜面略凹。结节下部很厚，向上迅速变窄，上缘薄，有4个大小相似的齿，中间2个相距较近。后腹大。

性味与功用　咸，温。归肾经。祛风湿，外用消肿解毒。用于风湿，类风湿，皮炎等。常用量：内服5g，研粉冲服或入酒浸泡服用；外用适量，捣碎外涂。

蚕　　蛾

别名　家蚕、蚕。

来源　本品为蚕蛾科动物家蚕 Bombyx　moride (Linnaeus) 雄蚕蛾。

产地　云南、贵州、四川、浙江、江苏、江西、吉林、辽宁、河北等。

采收加工　每年当蚕蛾羽化时，把雄蚕蛾的腹部剪下，泡入50°的粮食酒中。

药材性状　本品（图228）雄虫体长16~20mm，翅展37~40mm。头小，复眼黑色，半圆形，触角栉齿状。口器退化，翅两对，前翅黄白色至淡褐色较大，略成三角形，后翅较小，略成圆形，翅面黄白至灰白色。喙退化。前翅外缘顶角后方向内凹切，各横线色稍暗，不太明显，端线于翅脉灰褐色，后



图 227　结刺蚁



图 228　蚕蛾

翅较前翅色淡，边缘鳞毛稍长。腹部比雌蛾狭窄，末端稍尖。雄虫腹分8节，各节侧面有新月形的气门一对。末端有交尾器。足跗节5节，有一对黑褐色的爪。

性味与功用 咸，温。归肾、心经。益精补气，壮阳养肾，止血生肌。用于阳痿、遗精、早泄、外伤出血等。常用量：每100g雄蛾泡50°粮食酒1kg，浸泡20d天后，每次服用15~25ml；外用适量，捣烂外敷。

凉山虫草

别名 长虫草、大虫草、黑虫草。

来源 本品为麦角菌科虫草菌寄生蝙蝠蛾幼虫体后形成的虫菌结合体凉山虫草Cordyceps liangshanensis Zang,Liu et Hu。

产地 云南、四川等地杂木林和竹林中。

采收加工 夏季子实体长出地面8~12cm时采集，采后，去包裹虫体的菌膜和泥土，凉干或晒干。

药材性状 本品（图229）为虫菌结合体。上一年秋季虫草菌丝侵入幼虫体，吸取虫体养分，致使幼虫全体充满菌丝而死；第2年夏季子实体露出土外；子实体多从僵虫头部长出，少量从尾部和胸部长出，多分枝叉，少量单生。子实体细长如藤状和树枝状，细而坚硬，常弯曲，长20~35cm；头部圆柱状或棒状，褐色、黑褐色，顶端具不孕性角尖；具假薄壁组织的皮层；子囊壳椭圆形或卵圆形，400~740 × 300~450μm，黑褐色，表面生，凸出，呈天南星果序状。子囊圆柱状，260~480 × 8~12μm。子囊孢子透明或微黄，多隔，160~350 × 2.5~3.5μm。早单节断裂，每节10~20 × 2.5~3.5μm。虫体褐色至黑褐色，有明显3节胸节和10节腹节；胸部有3对胸足，腹部有5对腹足，横切面淡黄色，有清晰可见肠道，味微腥。

性味与功用 甘，温。归肺、肾经。滋肺补肾。用于腰膝酸痛，阳痿遗精，体虚多病等。常用量3~5g。



图 229　凉山虫草

黄 猄 蚁

别名 树蚂蚁、大黄蚂蚁。

来源 本品为蚁科动物黄猄蚁 Oecophylla smaragdina (Fabricius)的全虫。

产地 云南、广西、广东、海南；印度、缅甸、澳大利亚等地。

采收加工 秋、冬季采集，用塑料袋连巢一起密封，太阳下暴晒闷死，检净，晒和烘干。

药材性状 本品（图230）大工蚁体长9.5~11mm。体黄红色至赭红色。被稀疏、灰白色的微小茸毛。头部（不含上颚）近三角形，后面横形，不具凹缘，比头前面稍宽；复眼大而凸，着生在头侧的中线稍下处；无单眼，在单眼的位置上能见明显的浅凹窝。上颚长，端齿尖而长并内弯。触角细长，12节，着生处离唇基后缘较远，鞭节丝形，柄节长，远超过头顶。胸部细长，前方凸圆，且前伸成颈。中胸背板窄，缢缩，侧观马鞍形；后胸背板上面钝圆，凸。胸部缝线明显。足细长。腹柄细长，中间稍膨大，略成结节状；腹部短，卵圆形。

性味与功用 咸，温。归脾、肾经。祛风除湿，强身壮体，用于风湿，类风湿，体弱等。常用量：内服3~5g，研粉冲服或入酒浸泡服用。



图 230　黄猄蚁

黄腰胡蜂

别名 大黄蜂、大马蜂。

来源 本品为胡蜂科动物黄腰胡蜂 Vespa affinis (Linnaeus)的全虫。

产地 云南、广西、广东、浙江、福建、台湾；越南、日本、印度、菲律宾等地。

采收加工 秋季采集，用沸水把蜂烫死，晒干或直接把活蜂泡入50°粮食酒中。

药材性状 本品（图231）雌蜂体长20~25mm，翅展45~48mm。头金色，唇基前缘部呈黑色，复眼黑色，触角12节。前胸背板前缘中央隆起，黄黑相间，前胸背板有少量黄色，大部分黑色，中胸背板和侧板黑色，后胸侧板棕色，背板黄色和金黄色；翅基片棕色，翅黄色和棕色，前翅前缘色较深。前、中、后足基节、转节黑色，并有棕色毛。腹部第1节背板呈梯形，基半部浅棕色，端半部黄色，或全为黄色；第2节背板黄色，覆短毛。第3至第6节背、腹板均为黑色，布有细浅刻点及褐色短毛。

性味与功用 辛，平，有小毒。归肺、胃经。祛风除湿，解毒消肿。外用于疔肿，疽病；粮食酒浸泡液内服疗风湿关节炎。浸泡酒常用量 0~15ml；外用适量烧灰研匀，调油涂敷或者用药酒搽风湿关节炎的患处。



图 231　黄腰胡蜂

阔孢虫草

别名 冬虫夏草、虫草、藏虫草

来源 本品为麦角菌科冬虫夏草菌寄生白马蝙蛾幼虫体后形成的虫菌结合体阔孢虫草Cordyceps crassispora Zang,Yang et Li

产地 云南省滇西北和藏东南高寒草甸，海拔3 600~5 100m之中。

采收加工 夏季子实体长出地面2~3cm时采集，采后，去包裹虫体的菌膜和泥土，凉干或晒干

药材性状 本品（图232）为虫菌结合体，上一年秋季虫草菌丝侵入幼虫体，吸取虫体养分，致使幼虫全体充满菌丝而死；第2年夏季子实体露出土外，子实体仅从僵虫头部长出，多单生，极少有2~3丛生，子实体长4~16cm，直径2.5~6.5mm，头部棒状，黄褐色、褐色，顶端具不孕性角尖；子囊壳椭圆形或卵圆形，200~450 × 190~420μm，褐色，表面生，凸出。子囊圆柱状，170~320 × 7.8~10.4μm。子囊孢子细长如葵花子状，多隔，120~196 × 5.2~6.2μm。虫体乳黄色、金黄色；有明显3节胸节和10节腹节；胸部有3对胸足，腹部有5对腹足，横切面乳白色，有清晰可见肠道，味微腥。

注：该种与冬虫夏草Cordyceps sinensis(Berk.) Sacc.非常相似，外形区别仅在子实体柄基有5~20mm一段，由菌丝粘附成毛状，不易脱落，而冬虫夏草的柄基则光滑。内部的子囊壳和孢子比冬虫夏草宽大。药效与冬虫夏草一致。在中药使用上，与冬虫夏草相混，不是专业分类人员，难以区分。

性味与功用 甘，温。归肺、肾经。益精补气，滋肺补肾，止血化痰。用于肺结核咳嗽，虚劳久咳，咯血，虚喘，盗汗，腰膝酸痛，阳痿遗精，体虚多病等。常用量3~5g。



图 232　阔孢虫草

蝉　蜕

别名　蝉衣、蝉退、虫退、蝉壳、知了皮。

来源　本品为蝉科动物蚱蝉 Cryptotympana pastulata (Fabricius)、红蝉 Huechys sanguinea de (De Geer)、透翅蝉 Hyalessa ronsnana China 等种类蜕下的虫壳。

产地　云南、四川、贵州、西藏、广西、广东、海南、福建等地；缅甸、老挝、越南等

采收加工　每年的5~8月份是丰产季。从树皮、草丛中收集，去净泥土，晒干。

药材性状　本品（图233）为蝉若虫羽化时所脱落的皮壳。蝉蜕外形似蝉而中空，稍弯曲，长2~5cm，宽1.5~2cm。表面黄色至棕褐色，半透明，有光泽，常沾有少许泥土，头、胸、腹各部环节清晰，胸部背面呈纵形或十字形裂开。体轻、中空、膜状，易碎。以个体完整、黄色、明亮、个大、体轻、无泥的为佳。

性味与功用　甘，咸，性寒。归肝、肺经。解热，镇痉，宣肺，透疹。用于风热头疼，咳嗽失音，咽喉肿痛，外感风热，小儿惊痫，夜啼，麻疹不透，风疹瘙痒等症。常用量2~3g，作煎剂或散剂。

蝉　蛹　草

别名　蝉花、大虫草、知了虫草。

来源　本品为麦角菌科虫草菌寄生山蝉、黑蝉等的蛹形成的虫菌结合体蝉蛹虫草 Cordyceps cicadicola Teng。

产地　长江以南地区，尤以云南、四川、贵州、广西、福建等地的热带和亚热带河谷边杂木林和竹林中较多。

采收加工　夏季子实体长出地面3~5cm时采集，采后，去包裹虫体的菌膜和泥土，凉干或晒干。

药材性状　本品（图234）为虫菌结合体，上部为虫草菌子实体，下部



图 233　蝉蜕




图 234　蝉蛹草

为蝉蛹的僵虫体 子实体从蛹头部长出，多为单生，少有2~3个从生，长2~6cm；柄肉桂色，干后褐色；子实体头部棒形，茶褐色，7~28 × 2~7mm；子囊壳埋生于子座内，狭卵形，约500~600 × 220~260μm，孔口稍凸。子囊圆柱形，约400~740×5~7μm；孢子断为6~16 × 1~1.5μm小段。虫体乳黄色，有明显的翅芽和3对足，横切面白色至淡黄色，有清晰可见肠道，味微腥。

性味与功用 甘，寒。归肝经。清热疏风，镇惊明目，退翳障，透疹。用于小儿惊风，目赤肿痛，麻疹不透等。常用量3~6g。

五 倍 子

别名 倍蚜、蚁虫、占名百虫仓、文哈。

来源 本品为绵蚜科角倍蚜Schlechtendalia chinensis (Bell)寄生于盐肤木、红肤杨、青肤杨上，形成的虫瘿。

产地 云南、贵州、四川、广西、陕西等地。

采收加工 夏秋两季，虫瘿未开裂前采收，采收的虫瘿及时放入热水中烫3~5min，杀死里面蚜虫，捞出晒干。

药材性状 本品（图235）商品有角倍和肚倍两种，寄生与盐肤木上所形成的叫角倍；寄生在红肤杨和青肤杨上的叫肚倍。用药以角倍为主。角倍为不规则的囊状物，有几个角状分支或瘤状突起，大小不等，一般长3~8cm，直径5cm，表面棕黄色或灰棕色，有灰白色软滑的细毛，质硬而脆；破碎后，中心有黑褐色的蚜虫尸体和灰白色的粉末状物体。

性味与功用 苦、酸、涩、平。无毒，归肺、肾、大肠经。涩肠止泻，敛肺止咳，敛汗止血。用于肺虚咳嗽，久痢，脱肛，吐血、尿血、便血，慢性肠炎等；外用治烫伤、烧伤、中耳炎等。有灭菌、防腐作用。常用量内服2~3g，外用适量。



图 235　五倍子

紫草茸

别名 紫胶、虫胶、紫虫胶、洋干漆。

来源 本品为胶蚧科紫胶虫Laccifer lacca kerr雌虫分泌的树脂状胶质。

产地 云南、四川、广西、广东、福建；印度、缅甸等地也有。

采收加工 每年采收两次，5~6月和10~11月，用利刀或剪将成熟的紫胶连枝条割下；剥下胶块，在阴凉通风的地方干燥。

药材性状 本品（图236）半圆柱形，长短宽窄不一，紫红色或紫褐色，表面凹凸不平，有皱纹和小虫眼空隙，附着在树枝上，凹沟状，体轻，质硬而脆，可折断。断面有虫窝，内有死虫，稍有异味。

性味与功用 苦，寒。有小毒。归心经。清热，凉血，解毒。用于斑疹不透，麻疹不出，痈肿疮毒。常用量3~5g，作散剂。脾胃虚寒者忌用；外用适量。




图 236　紫草耳

中文名索引

一画

一把伞 242
一碗水 242

二画

二年生松 44
二果香 392
七仙丹 250
七星剑 2
人参三七 230
八角果 444
八角香 308
八棱麻 234
九节菖蒲 302
九眼独活 228

三画

三七 ..... 230、233
三叉草 22
三匹柳 234
三叶暗消 254
三台 234
三台花 ..... 234、235
三台树 234
三尖杉 ..... 410、411
三花藤 160
三角叶芋麻 ..... 4、5
三角草 236
三稔草 236
三棵针 262
十八角 ..... 412、444
十三七 ..... 230、284
十升麻 358
十白蔹 270
十行部 240
十当归 228
十伏苓 ..... 268、278
十灵芝草 180
十参 292
十细辛 ..... 6、66
十厚朴 340
土荆芥 190
土黄连 ..... 220、262
土银花 390
土漏芦 252
土藿香 8
下田菊 ..... 10、11
下奶藤 350
大丁草 ..... 222、223
大马蜂 470
大木蜂 ..... 452、453
大毛香 14
大牛膝 246

大半夏 318
大叶毛鼠曲草 30
大叶韭 170
大叶韭菜 170
大叶银花 390
大皮药 266
大百合 ..... 260、261
大地棕 204
大虫草 ..... 466、474
大竹筒蜂 452
大苦溜溜 12
大苦藤 350
大花八角 ..... 412、413
大花马齿苋 ..... 38、39
大花刺参 294
大花刺参 ..... 294、295
大花斑叶兰 ..... 124、125
大伸筋草 256
大苞姜 ..... 338、339
大茅香 14
大金香炉 154
大树皮 266
大树矮陀陀 372
大胡蜂 ..... 452、453
大秋枫 384
大麻羊子 318
大麻草 188
大粘叶 358
大黄蚂蚁 468
大黄蜂 470
大蓑蒌 296
大野韭菜 170
大黑药 164
大蓼子七 16
万年青 136
万寿竹 258
山丁木 430
山八角 444
山五味子 436
山乌龟 314
山乌桕 ..... 374、375
山头姑娘 52
山包谷 318
山生草 282
山石榴 154
山竹头 260
山羊角树 ..... 430、431
山白部 240
山合欢 ..... 394、395
山红活麻 18
山辛夷 392
山杉 434
山苦荬 36
山苋菜 292
山刺柏 434
山柳乌桕 374
山栀子 392
山韭菜 252
山桂丹 164
山荷叶 242
山菠萝根 260
山银花 396

山葱 140
山紫菀 244
山漆 230
山槐 394
山藿香 190
川苑叶 132
千里眼 ..... 378、379
千屈菜 ..... 20、21
川土当归 228
川牛膝 ..... 246、247
川紫菀 244
川滇无患子 426
川滇马铃苣苔 ..... 176、177
广东狼毒 248
小万寿菊 54
小马兜铃 414
小牛肋巴 86
小凤尾 22
小凤冠草 22
小石菖蒲 302
小叶子厚朴 340
小叶六道木 ..... 416、417
小白花草 76
小白参 304
小地榆 24
小芦草 166
小红米果 376
小号瓢 96
小花火烧兰 ..... 316、317
小花荠苎 3
小花薄荷 2
小豆柴 360
小冻绿树 ..... 418、419
小岩匙 118
小狗脊子 288
小金银花 396
小草乌 220
小独一味 414
小肺筋草 90
小益母草 156
小疳药 202
小粘子草 362
小粘椰 358
小黄花香 202
小棕包 250
小鹅菜 218
小鸭跖草 ..... 252、253
女儿茶 382
子午花 38
马口念珠 180
马兰 ..... 26、27
马兰头 26
马兰菊 26
马祖耳蕨 68
马莲鞍 ..... 336、337
马尾黄连 306
马鞭草 20

四画

王不留行 154
开口枣 154

井边茜 22
天水牛 460
天水蚁草 30
天竺龙胆 398
天生草 252
天茄子 116
天北 182
天蒜 28
无毛粉条儿菜 ..... 90、91
无刺鼠李 ..... 420、421
无患子 426
云生毛茛 ..... 32、33
云南贝母 ..... 300、301
云南含笑 392
云南苏铁 ..... 424、425
云南萝芙木 ..... 254、255
云南樟 ..... 440、441
云兜铃 260
太子参 304
太白韭 ..... 182、183
太阳花 38
扎托 150
扎托巴 150
木莲花 340
木笔花 402
五叶灵芝 122
五叶松 346
五须松 346
五倍子 476
五瓣莲 54
牙桑西哈 10
中华苎胆 314
日本卷柏 24
日照飘拂草 50
日葱 182
少花粉条菜 ..... 84、85
止血草 370
见血飞 368
见毒消 34
毛木通 ..... 342、343
毛乌金 6
毛叶米饭花 360
毛叶南烛 ..... 360、361
毛发唐松草 ..... 306、307
毛果珍珠茅 ..... 236、237
毛果堇菜 40
毛茛状金莲花 ..... 364、365
毛脚鸡 68
牛舌片 36
牛舌头 36
牛耳草 58
牛角虫 460
牛尾菜 ..... 256、257
午时花 38
长虫草 466
长托菝葜 ..... 296、297
长杆兰 280
长茎沿阶草 ..... 42、43
长梗岩须 136
长蕊万寿竹 ..... 258、259
分叉虫草 458
分筋草 44

乌小天冬 240
乌麦冬 240
乌金七 6
乌金草 56
乌骨藤 350
乌凉 422
乌脚芹 194
乌提子 224
风气草 10
风尾草 ..... 22、122
六角树 428
六蛾抱珍珠 354
文哈 476
文哈海 280
火山麻 234
火草 30
火麻 4
心叶九眼独活 228
心叶百合 260
斗鸡草 46
双叉独角仙 462
双叶细辛 ..... 56、57
双舌蟹甲草 ..... 286、287
双肾草 196
双珠草 196
双铜草 196
孔雀草 ..... 54、55
孔雀抱蛋 424
水丁香 404
水八角 168
水芋花 104
水芋 322
水竹叶 ..... 48、49
水远志 88
水芙蓉 406
水茄 ..... 422、423
水灵芝 136
水虱草 ..... 50、51
水莲莎 52
水麻叶 8
水麻黄 136
水高粱 446
水黄连 ..... 168、306
水葫芦 404
水朝阳花 404
水韩信草 88

五画

玉竹 ..... 402、403
节节萝卜 424
甘川铁线莲 ..... 344、345
甘肃无心菜 ..... 178、179
甘肃蚤缀 178
甘肃雪灵芝 178
古名玄驹 460
古名百虫仓 476
石上藕 124
石见穿 24
石王簪 320
石花 ..... 58、59

石灵芝 162
石补钉 196
石妹刺 262
石柑子 76
石指甲 58
石胆草 58
石莲 ..... 102、103、118
石莲花 58
石莲青 264
石耗子 60
石菖蒲 302
龙爪菜 448
龙爪稷 448
龙牙草 62
龙骨七 326
龙须叶 296
龙胆蒿 114
平头细辛 66
平枝栒子 ..... 52、53
东南菜 322
东俄洛粟吾 ..... 64、65
切哩鹿克 62
归经草 164
田七 230
田边菊 26
田紫菀 112
四叶金 66
四叶细辛 66
叶藏花 390
牛扯拢 58
禾叶竹叶芒 ..... 280、281
白土苓 268
白千针万线草 252
白马风 120
白乌头 334
白玉兰 402
白奴花 118
白仙茅 294
白头风 30
白头翁 ..... 30、80
白竹叶菜 330
白花舌头草 298
白花臭桔 ..... 156、157
白花益母 156
白花矮陀陀 214
白松 346
白枪杆 ..... 266、267
白党 328
白夜合 394
白金子风 376
白蚁王 454
白蚁王后 ..... 454、455
白蚁后 454
白须公 256
白带药 120
白背叶铁线蕨 ..... 192、193
白根药 158
白单藤 268
白蜀葵 406
白缨 394
仙鹤草 62
瓜子莲 162

瓜叶乌头 ..... 334、335
丛毛羊胡子草 ..... 100、101
丛生蜘蛛抱蛋 ..... 310、311
冬虫夏草 472
半支莲 38
半边铁角蕨 ..... 198、199
汉白泡 308
汉虎掌 298
头形杉 410
皮哨子 ..... 426、427
皮袋香 ..... 392、393
对马耳蕨 ..... 68、69
对生耳蕨 ..... 86、87
对月花 416
对节子树 376
对节生 266
对节树 376
对对参 ..... 202、290
对对草 202
对叶四块瓦 66
对叶莲 20
奶流 382
奶浆草 350
台松 434
台湾柏 434
丝叶球柱草 ..... 72、73
母猪草 70

六画

邦见察保 398
老妈妈针线包 96
老君扇 60
老虎广菜 322
老虎杆 154
老娃尿泡 238
老蛇约 88
老鸦饭 366
老鸦树 366
老鼠瓜 270
老鼠根 166
老鼠黄瓜 270
地丁 222
地下茶 112
地毛香 80
地地藕 ..... 74、75
地黄连 214
地韭菜 90
地柑子 76
地柏枝 78
地柏树 104
地梅子 272
地雷根 271
地宫药 80
芒果钉 368
芋头花 322
耳叶金毛裸蕨 ..... 120、121
耳状人字果 ..... 70、71
耳环草 112
亚香棒虫草 ..... 456、457
西昌党参 328
西南手参 ..... 276、277

西南毛良 ..... 82、83
西南水苏 ..... 158、159
白味参 84
灰毛浆果楝 ..... 366、367
灰贯众 86
扫仁色尔布 128
托柄菝葜 ..... 278、279
肉草 48
肉荚草 92
肉穗草 ..... 94、95
团羽铁线蕨 ..... 194、195
曲蕊姜 238
当布噶日 108
虫草 472
虫退 474
虫胶 478
光叶蝴蝶草 ..... 88、89
光肺筋草 90
光香薷 ..... 186、187
光紫菀 244
竹叶七 280
竹叶兰 280
竹叶落得打 258
竹节七 284
竹节菜 ..... 282、330
竹根七 284
伏地卷柏 ..... 24、25
优贵乌兜铃 ..... 414、415
华山松 ..... 346、347
华山松节 346
华丽龙胆 ..... 398、399
华南云实 ..... 368、369
华紫珠 ..... 370、371
华紫珠叶 370
血叶兰 124
血胆 314
全缘金粟兰 ..... 66、67
会东藤 ..... 96、97
合血香 216
伞把树 428
创伤草 370
多舌飞蓬 ..... 98、99
多花野牡丹 ..... 224、225
多枝虫草 ..... 458、459
多穗石松 44
刘哈哄 378
汗苏麻 10
羊角七 334
羊角天麻 286
羊角豆 212
羊胡子草 100
灯笼棵 156
灯台树 ..... 372、428、429
灯台叶 372
买担别 372
异鳞鳞毛蕨 288
杂赤咸包 172
如意草 ..... 134、135
红川乌 286
红毛耆 320
红木子 430
红毛野海棠 ..... 18、19

红乌桕 374
红心乌桕 374
红水麻 358
红叶山柳 374
红叶乌桕 374
红叶紫珠 376
红花木莲 ..... 340、341
红花岩松 102
红枝卷柏 ..... 104、105
红果冬青 386
红线草 66
红桐 384
红草蘚 296
红黄草 54
红紫珠 ..... 376、377
红雾水葛 ..... 358、359
红棹 440
红藤 336
阴兜约 120

七画

麦穗夏枯草 438
贡布美多露米 126
赤膊花 180
花天牛 460
花叶活麻 4
芸香叶唐松草 ..... 106、107
芸香草 142
苏霍香 8
杜银花 390
杉叶藻 ..... 108、109
杉蔓石松 44
皂叶九里香 378
护心草 110
折叶萼草 ..... 292、293
拟荆芥 190
拟黑多刺蚁 ..... 360、361
肖牛耳菜 212
肖牛耳藤 212
里马丝豆的 294
里亚罗椿 366
旱田草 ..... 112、113
旱谷花 280
佛甲草 38
佛掌参 276
伸筋草 44
条叶垂头菊 ..... 400、401
条参 292
角角天麻 286
角天麻 286
龟药 112
卵子草 196
卵叶韭 ..... 28、29
迎春花 402
辛夷 402
辛夷花 402
汪腊 276
沙小菊 146
汤饭子 ..... 432、433
冷饭果 436
冷骨风 16

尾花细辛 ..... 6、7
鸡儿肠 26
鸡爪连 220
鸡爪菜 448
鸡公柴 432
鸡头七 284
鸡头肉 154
鸡舌草 48
鸡舌癀 48
鸡肝子 416
鸡肫皮 428
鸡刺参 294
鸡肾草 290
鸡骨丹 320
鸡冠花 406
鸡眼草 78
鸡脚连 168
鸡脚参 ..... 292、304
鸡脚黄连 262
阿完西 114
阿米规也 154
阿二七 242
附心草 110

八画

青松 346
青茄 422
青菜 218
青棉花 380
青棉花藤 380
苦马菜 218
苦天茄 116
苦龙胆草 114
苦闷药 254
苦果 116
苦苣菜 ..... 218、219
苦草 114
苦荬菜 36
苦凉菜 12
苦蒿 114
苦酸汤 354
苓瓜 ..... 270、271
茄冬 384
苣荬菜 36.37
茎茉跌打 292
枝子皮 340
松林蓼 ..... 16、17
刺木 52
刺天茄 ..... 116、117
刺参 294
刺茄 422
刺柏 ..... 434、435
刺桧 434
刺草藓 296
刺黄连 262
雨过天晴 188
丽江野葱 170
奇林翠雀 130
拐子药 274
拐牛膝 246
抱木刺 418

拉波卷柏 78
披麻草 250
鸡尾叶凤毛菊 ..... 188、189
虎舌蜈蚣草 112
虎须草 84
虎掌叶 298
虎掌草 298
岩风尾蕨 122
岩白菜 ..... 80、176
岩松 102
岩须 ..... 136、137
岩茵芭 60
岩浮萍 194
岩菠菜 118
岩匙 ..... 118、119
岩筋菜 118
岩楞子 52
罗汉香 366
罗布麻 ..... 382、383
罗锅底 314
果松 346
败毒草 ..... 20、120
帕利 12
帕滚姆 132
钓鱼竿 34
垂果荠 432
知了虫草 474
知了皮 474
金不换 230
金边七 242
金丝瓜 270
金丝杜仲 300
金丝矮陀陀 214
金耳环 6
金刚豆藤 ..... 256、278
金刚藤 ..... 268、278
金鸡尾 ..... 104、122
金针菜 292
金龟莲 314
金线盘 124
金挖耳 ..... 126、142
金星草 202
金钱蒲 ..... 302、303
金铁藤 160
金雀马尾参 ..... 304、305
金蒲 302
肥猪草 210
鱼尾草 112
鱼显子 370
鱼钱藤 160
鱼眼草 ..... 132、133
昏头鸡 86
狗爪花 396
狗牙还阳 102
变异鳞毛蕨 ..... 288、289
夜合树 394
定经草 112
官真花 180
空洞参 128
空桶参 128
油患子 426
油萝树 360

泡儿刺 272
姜三七 238
单叶地黄连 76
单叶铁线莲 ..... 274、275
单花翠雀花 ..... 130、131
单穗石松 ..... 44、45
建兰蒲 302
弧茎蔓菜 134
参三七 230
细山药 326
细叶苦荬 ..... 172、173
细叶刺参 294
细叶卷柏 ..... 78、79
细辛 56
细草乌 220
细梗香草 ..... 216、217
细穗腹水草 ..... 34、35
线尾鸡 68

九画

帮子毒草 332
珍珠风 370
珍珠花 436
珍珠荚蒾 ..... 436、437
珍珠莲 306
珊瑚冬青 ..... 386、387
革叶茜芹 ..... 138、139
革叶粗筒苣苔 ..... 60、61
胡椒草 132
威灵仙 274
南方山荷叶 ..... 242、243
南苦参 336
南海鳞毛蕨 288
指叶凤尾蕨 ..... 122、123
挖耳子草 126
挖耳草 142
草三白 134
草马蹄香 56
草乌 334
草玉梅 ..... 298、299
草灵芝 136
草杜鹃 38
草麻黄 146
草菝葜 256
荆芥 ..... 90、191
荞麦叶贝母 260
荞麦叶大百合 260
茯苓草 132
茶棵子 382
茶叶花 382
茶荚蒾 432
荟 140
苍葱 ..... 140、141
树蚂蚁 468
柳叶菜 ..... 404、405
枯草穗 438
恨叶树 412
星天牛 ..... 460、463
星果草 ..... 144、145
冠盖藤 ..... 380、381
贵州忍冬 396

贵州鼠李 …… 420
蚁虫 …… 476
虾须草 …… 146、147
哈骂不果 …… 336
哈骂醒仝 …… 336
拜恩果母 …… 320
看麦娘 …… 148、149
钻帕泡花 …… 154
重阳木 …… 384、385
香如草 …… 6
香排草 …… 216
香樟 …… 440
秋风子 …… 384
秋枫 …… 384
秋枫木 …… 384
秋鼠麴草 …… 30、31
剑叶凤尾蕨 …… 22、23
食用土当归 …… 228、229
食用樫木 …… 228
独角仙 …… 462、463
独角蜣螂 …… 462
独活 …… 228
狭叶竹节参 …… 284、285
狭叶藜芦 …… 250、251
狭萼扁蓄 …… 152
狮子草 …… 164、332
兔耳风 …… 80
叙党 …… 328
胎盘草 …… 10
亮子约 …… 360
穿山龙 …… 326
洋干漆 …… 478
炸腰花 …… 154
炸腰果 …… 154
扁扁草 …… 416
扁蓄 …… 152、153
柔毛南烛 …… 360
结刺蚁 …… 464、465

十画

珠毛蟹甲草 …… 308、309
素嘎哇 …… 208
蚕 …… 464
蚕蛾 …… 464、465
莲花还阳 …… 102
荀子刺 …… 272
菜瓜香 …… 112
荞草 …… 444
苹蘞 …… 268
埋打海竜 …… 154
盐附子 …… 334
夏全草 …… 156
夏枯草 …… 156、438、439
夏枯球 …… 438
破布草 …… 158
鸭爪粟 …… 448
鸭舌癀 …… 112
鸭脚木 …… 372
鸭脚板 …… 180
鸭脚黄连 …… 168

圆叶毛果革菜 40
圆叶细辛 6
圆菱叶山马蝗 ..... 362、363
铁马鞭 ..... 160、161
铁丝草 ..... 42、192
铁扫把 210
铁色草 438
铁角凤尾草 162
铁角蕨 ..... 162、163
铁边环 310
铁杆路 266
铁青树 428
铁线夏枯草 438
铁股路 266
铁架子土伏苓 268
铁蒲扇 60
铁滚子 420
铁螺子 158
倒肌草 88
倒提壶 ..... 12、142
臭千支眼 378
臭叶子 164
臭灵丹 164
臭芙蓉 54
臭漆 378
臭樟 440
臭椿 442
臭椿子 442
臭椿吴萸 ..... 442、443
倍蚜 476
狼尾草 ..... 166、167
狼茅 166
腺哨子果 426
皱叶狗尾草 204
高山金挖耳 126
高山独脚蒿 174
高贵乌兜铃 414
高原天名精 ..... 126、127
宽叶韭 ..... 170、171
宽叶清风藤 ..... 318、349
宽叶鼠麴草 ..... 80、81
家蚕 464
窄瓣鹿药 ..... 282、283
美人扇 296
美头火绒草 ..... 150、151
美别 366
扇羽阴地蕨 ..... 174、175
被告惹 32
被胎蚁 460
诺肺莫力气 12
调经草 112
粉叶小檗 ..... 232、263
粉苞苣 172
粉草 188
凉山虫草 ..... 466、467
凉薄荷 190
酒瓶果 224
酒瓶草 2
海芋 ..... 248、249
烟斗花 180
烟管头花 180
烟管头草 ..... 142、143

烟袋草 142
展毛野牡丹 ..... 154、155
通光草 378
通关散 ..... 350、351
通关藤 350
通经草 404
绢毛菊 128
绢毛菊 128
绿绿草 146

十一画

球果堇菜 ..... 40、41
黄天茄 422
黄毛岩白菜 176
黄龙尾 ..... 62、63
黄皮杜仲 300
黄刺瓦根 272
黄果悬钩子 ..... 272、273
黄莓子 272
黄菊莲 210
黄猄蚁 ..... 468、469
黄帽子 272
黄腰胡蜂 ..... 470、471
勒荷 254
菩提子 426
雪上一支蒿 312
雪里开 274
雪花龙胆 398
雪灵芝 ..... 136、178
雪胆 ..... 314、315
排草 216
排草香 216
排香草 8
啦叭花 128
野八角 ..... 412、444、445
野三七 284
野乌桕 374
野白腊叶 386
野石榴 224
野甘露 158
野芋头 248
野竹芋 316
野芝麻 184
野苏子 184
野花生 160
野花草 160
野茄子 422
野苦荬菜 36
野苦荬 36
野胡椒 360
野香草 186
野香薷 2
野海椒 116
野麻 382
野蔊 ..... 130、181
野黄瓜 270
野粟 448
野葱 182
野葵花 142

野雀香 8
匙叶翼首花 ..... 332、333
蛇石莲 102
蛇咬药 252
蛇眼草 188
蛇箭 188
蛇筒草 180
犁头草 134
盘叶忍冬 ..... 390、391
银丝瓜 270
银半夏 318
铁菱角 20
甜牛膝 246
甜党 328
假天麻 290
假老虎 368
假豆楂 154
假荆芥 190
假茶辣 366
袋果草 ..... 92、93
猪毛针 194
猪耳朵叶 10
猪宗七 ..... 162、194
猪姑稔 154
猪鬃刚 192
猪鬃草 ..... 192、194
猫耳朵 210
猫猫头 428
离舌棠吾 ..... 244、245
麻绞草 378
鹿耳韭 ..... 28、182
狼芋头 248
旋花茄 ..... 12、13
旋鳞莎草 ..... 110、111
密砺 340
剪席草 112
粘药根 358
断肠草 444
婆婆纳 ..... 196、197
望春花 402
烧不死 180
烧金草 222
蒿草 166
绣球花 354

十二画

棒子头 332
棉杜仲 300
棕色锈头草 244
棋盘花 406
裂叶星果草 ..... 168、169
裂叶翼首花 ..... 264、265
雅改颠 224
雅害黑 214
紫玉簪 320
紫芋 ..... 322、323
紫虫胶 478
紫苏草 8
紫花卫矛 ..... 352、353
紫花茄 116
紫苦菜 218

紫草茸 ..... 478、479
紫胶 478
紫萝 ..... 320、321
紫棍柴 420
紫鹤 320
掌叶凤尾 112
趾打须 12
黑大马蜂 452
黑心树 394
黑竹笋菜 282
黑虫草 ..... 456、466
黑细辛 66
黑狗尾草 166
黑蚂蚁 464
黑猪毛七 198
黑辣子 442
铺地蜈蚣 24
锈草 60
短柄乌头 ..... 312、313
短柄忍冬 ..... 396、397
短柱八角莲 ..... 267、268
短梗天门冬 ..... 240、241
短距楼斗菜 ..... 200、201
鹅草 50
奥甲决拉 106
腊烛花 290
象皮树 372
象尾菜 424
象南星 ..... 318、319
象蜂 452
象鼻子 318
舒筋草 104
筒花开口箭 ..... 324、325
笼帚草 50
阔苞虫草 ..... 472、473
离儿参 242
割鸡刀 236
遍地金 ..... 202、203
普吉藤 304
疏花仙茅 ..... 204、205
疏花婆婆纳 ..... 206、207
疏齿银莲花 ..... 208、209
缘毛鸟足兰 ..... 290、291

十三画

瑞木 428
蒲儿根 ..... 210、211
蓝叶藤 ..... 212、213
蓝花草 88
楚箭草 122
雾水草 80
碎叶猪棕草 192
碎米青 366
碎骨还阳 102
碎蚁草 30
摇边竹 256
蜀其花 406
蜀葵 ..... 406、407
蜀葵叶薯蓣 ..... 326、327
蜀葵花 406
蜈蚣草 ..... 20、86

蜂窝菊 54
稗 ..... 446、447
稗子 446
稗子 ..... 446、448、449
催牛药 224
矮红子 52
矮陀陀 ..... 76、214、215
矮脚苦荬 114
锯锤草 112
辣多 254
雉子草 2
满山香 216
滇白部 240
滇地黄连 214
滇苦苣菜 218
滇苦菜 218
滚龙草 282
漏芦 252
福建六道木 416

十四画

蔓子七 16
蓖子草 86
鼎突多刺蚁 460
蝉衣 474
蝉花 474
蝉壳 474
蝉退 474
蝉蜕 ..... 474、475
蝉蛹草 ..... 474、475
膀胱七 316
管花党参 ..... 328、329
管花鹿药 ..... 330、331
锯叶千里光 ..... 14、15
馒头草 132
僧帽花 180
熊胆草 ..... 114、115
熊蜂 452
翠雀 ..... 220、221

十五画

藤茸 68
蕴藻 108
樟木 440
樟叶树 440
樟脑树 440
暴牙郎 154
蝴蝶戏珠花 ..... 354、355
蝴蝶花 354
蝴蝶树 354
撑脚草 42
镇心草 58
箭头草 134
德木萨 130
鲤鱼献子 370

十六画

蓑草 100

萍蓬 326
霍克斯虫草 456
踏地香 222
螃蟹七 330
鹦哥花 220
糖芥绢毛菊 ..... 128、129
糖胶树 ..... 372、373

十七画至二十画

藏三七 284
藏虫草 472
藏杉 410
霜降子 432
翼齿六棱菊 ..... 164、165
翼首草 332
藤乌 334
藤苦参 336
藤草乌 334
镰叶瘤足蕨 ..... 46、47
鹳瓣花 ..... 184、185
爆肚叶 224
藿香 ..... 8、9
糯米树 432
糯米果 436

拉丁名索引

A

Abelia chowii Hoo 416
Abelia parvifolia Hemsl. 416
Acanthocalyx delavayi (Franch.)M Cannon. 294
Aconitum brachypodum Diels 312
Aconitum hemsleyanum pritz. 334
Acorus gramineus Soland. 302
Adenostemma laevenia (L.) Kuntze 10
Adiantum capillus-junonus Rupr. 194
Adiantum davidii Franch. 192
Aeginetia indica L. 180
Agastache rugosa (Fisch.et Meyer) O.Ktze. 8
Agrimonia pilosa Ldb.var.nepalensis(D.Don)Nakai 62
Agrimonia nepalensis D.Don 62
Albizia Kalkora(Roxb.)Prain 394
Alcea rosea L. 406
Aletris glabra Bur. et Franch. 90
Aletris pauciflora(Klotz.) Franch. 84
Allium hookeri Thwaites 170
Allium ovalifolium Hand.-Mazz. 28
Allium prattii C.H.Wright apud Forbes et Hemsl 182
Allium victorialis L. 140
Allomyrina dichotoma (Linnaeus) 462
Alocasia macrorrhiza (L) Schott. 248
Alopecurus aequalis Sobol. 148
Alopecurus aequelis Sobol. var .amurensis(Kom.)Ohwi 148
Alopecurus amurensis(Kom.) Kom. 148
Alstonia scholaris (L) R.Br. 372

Althaea rosea(L.) Cav. 406
Anaphalis adnata Wall ex DC. 80
Aneilema triquetra Wall. 48
Anemone geum Levl. 208
Anemone obtusiloba D.Don ssp. ovalifolia Bruhl 208
Anemone rivularis Buch.-Ham ex DC. 298
Anoplophora imitatrix (White) 460
Apocynum venetum L. 382
Aquilegia ecahcarata Maxim. f. semicalcarata(schipcz.)Hand.-Mazz. 200
Aralia cordata Thunb. 228
Aralia quinquefolia Decne. et planch. var. angustifolia Burk. 284
Aralia quinquefolia(L.)Decne.et Planch.var.notoginseng Burk. 230
Arenaria kansuensis Maxim. 178
Arisaema elephas Buchet. 318
Aristolochia gentilis Franch. 414
Aristolochia gracilima Hamsl. 414
Aristolochia mairei Lévl. 304
Arum macrorrhizum L. 248
Arundina chinensis Bl. 280
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 280
Asarum caudigerum Hance 6
Asarum caulescens Maxim. 56
Asclepias tenacissima Roxb. 350
Asparagus lycopodineus Wall,ex Baker 240
Aspudistra caespitosa Péi 310
Aspidium deltodon Bak. 86
Aspidium tsus-sinensis Hook. 68
Asplenum trichomanes L. 162
Asplenium unilaterale Lam. 198
Aster indicus L. 26
Aster multiradiatus Lindl. ex DC. 98

Asteropyrum cavaleriei (Lévl. et vant.) Drumm. et Hutch. 168
Asteropyrum peltatum (Franch.) Drumm. et Hutch. 144

B

Berberis prutinosa Franch ..... .262
Berneuxia thibetica Deene. 118
Berneuxia yunnanensis Li. 118
Bischoffia javanica Bl. 384
Blumea pterodonda DC. 164
Bombyx moride (Linnaeus) 464
Borychium lunaria(L.)Sw. 174
Bredia tubercurata(Guill.) Diels 18
Briggsia mihieri (Franch.) Craib. 60
Bryocles ventricosa Salisb. 320
Bryonia amplexicaulis Lam. 270
Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. 72

C

Cacalia davidii (Franch.) Hand. -Mazz 286
Cacalia roborowskii (Maxim.) Ling 308
Caesalpinia crista L. 368
Caesalpinia kwangtongensis Merr. 368
Caesalpinia nuga (L.) Ait. 368
Caesalpinia szechuanensis Craib. 368
Callicarpa cathayana H. T. Chang. 370
Callicarpa rubella Lindl. 376
Calorhabdos stenostachyum Hemsl. 34
Campanula carnosa Wall. 92

Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino 260
Cardiocrinum giganteum var. yunnanense (Leicht. ex Elwes)Steam. 260
Carpesium cernuum L. 142
Carpesium lipskyi Winkl. 126
Carreirea calycina Franch. 430
Carum coriaceum Franch. 138
Cassiope Selaginoides Mook.5.et Thoms. 136
Caulokaempferia yunnanensis (Gagnep.) R. M. Smith. 238
Cephalotaxus fortunei Hook. f. 410
Ceropegia balfouriana Schltr. 304
Ceropegia maurei (Lévl.) H. Huber 304
Chloranthus holostegius (Hand.-Mazz.) Pei et Shan 66
Cinnamomun gladuliferum (Wall.) Nees. 440
Cipadessa cinerascens (Pellegr.) Hand.-Mazz. 366
Cipadessa fruticosa Bl var. cinerascens Pellegr. 366
Clematis akebioides (Maxim.) Hort. ex veitch. 344
Clematis buchananiana DC. 342
Clematis henryi Oliv. 274
Clematis orientalis L. var.akebioides Maxim. 344
Clerodendron serratum (L.) Moon var. amplexifolium Moldenke 234
Commlina maculata Edgew. 74
Codonpsis tubulosa Kom. 328
Colocasisa tonoimo Nakai 322
Conyza blinii Lévl. 114
Corallodiscus flabellatus (Craib) Burtt. 58
Cordyceps arbuscula Teng 458
Cordyceps cicadicola Teng 474
Cordyceps crassispora Zang Yang et Li 472
Cordyceps hawkesii (Gray) Cooke. 456
Cordyceps liangshanensis Zang. Liu et Hu. 466
Cordyceps sinensis(Berk.)Sacc. 472

Cornus controversa Hemsl ex Pain. 428
Cotoneaster horizontalis Deene. 52
Crassula indica Deene. 102
Cremanthodium lineare Maxim. 400
Crepis gillii S.Moore var.erysimoides Hand.-Mazz 128
Crptotympana pastulata (Fabricius) 474
Curculigo gracilis (Wall. ex Kurz) Hook. f. 204
Cyathula officinalis Kuan 246
Cycas siamensis Miq. 424
Cynosurus coracanus L. 448
Cyperus michelianus (L.)Link. 110

D

Delphinium candelabrum Ostf.var.monanthum(Hand.-Mazz.)W.T.Wang. 130
Delphinium grandiflorum L. 220
Delphinium monanthum Hand.-Mazz. 130
Desmodium pilosum (Thunb.) DC. 160
Desmodium podocarpum DC. 362
Dichocarpum auricilatum (Franch.) W. T. Wang et Hsiao 70
Dichrocephala auriculata (Thunb.) Druce 132
Didissandra flabellata Craib 58
Didissandra mihieri Franch. 60
Dioscorea althaeoides R. Kunth 326
Diphylleia cymosa Michx. ssp. sinensis (Li) Shimizu 242
Diphylleia sinensis Li. 242
Disporum hodinieri (Lévl. et Vant.) Wang et Tang 258
Diuranthera minor(C. H .Wight) Hemsl. 252
Dryopteris varia (L.) O. Ktze 288

E

Echinochloa crusgalli (L.)Beaur. 446
Echites scholaris L. 372
Eleusine coracana(L.)Gaertn. 448
Elsholtzia glabra C. Y. Wu et S.C. Huang 186
Epilobium hirsutum L. 404
Epipactis helleborine (L.) Crantz. 316
Erigeron multiradiatus (Lindl. ex DC.)Benth. 98
Eriophorum comosum (Wall.) Nees ex Wright 100
Ethulia auriculata Thunb. 132
Euonymus prophyreus Lose. 352
Euonymus yunnanensis Franch 300
Evodia daneillii (Benn.) Hemsl. 442

F

Fimbristylis miliacea (L.) Vahl. 50
Fraxinus malacophylla Hemsl. 266

G

Galeopsis bifida Boenn. 184
Gentiana barbata Fröel. 152
Gentiana detonsa auct. non Rottb. 152
Gentiana sino-ornata Ball f. 398
Gentianopsis barbata (Fröel.) Ma. 152
Gerbera anandria (L.)Sch.-Bip. 222
Gnaphalium adnatum (Wall. ex DC.) Kitam. 80
Gnaphalium hypoleucum DC. 30

Gnaphalium leontopodium L. r. calocephalum Franch. 150
Georchis biflora Lindl. 124
Goodyera biflora (Lindl.) Hook. f. 124
Gymnadenia orchidis Lindl. 276
Gymnema longiretinaculatum Tsiang 96
Gymnoptetis bipinnata Chr. var. auriculata (Franch.)Ching 120
Gymnopteris vestita Hook. var. auriculata Franch. 120
Gymnopteris vestita (Wall. ex Hook.)Underw. var. auriculata(Franch.) C.Chr. 120

H

Hedysarum pilosum Thunb. 160
Hemerocallis plicata Stapf. 292
Hemsleya chinensis Cogn. ex Forb et Hemsl. 314
Heterosmilax yunnanensis Gagnep. 268
Hippuris vulgaris L. 108
Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn 320
Huechys sanguinea de (De Geer) 474
Hyalessa ronsnana China 474
Hypericum wightianum wall. ex Wight et Arn. 202

I

Ilex corallina Franch. 386
Illicum griffithii var.yunnanense Franch. 444
Illicium macranthum A. C. Smith 412
Illicium simonsii Maxim. 444
Illicium yunnanense (Franch.) Hmet et Gagnep. 444
Isopyrum auriculatum Franch. 70
Isopyrum cavaleriei Lévl. et Vant. 168

Isopyrum peltatum Franch. 144
Ixeris gracilis (DC.)Stebb. 172

J

Juniperus formosana Hayata 434

K

Kaempferia yunnanensis Gagnep. 238
Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip. 26
Kalotermitidae 454

L

Laccifer lacca Kerr 478
Lactuca gracilis DC. 172
laggera pterodonda (DC.) Benth. 164
Lagopsis supina (Staph.) IK.-Gal. ex Knorr. 156
Lamium kouyangense Vaniot 158
Laurus glandulifera Wall. 440
Leibnitzia anandria L. 222
Leontopodium calocephalum (Franch.) Beauv. 150
Leonurus supinus Staph. ex Willd. 156
Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc. 160
Ligularia tongolensis (Franch.) Hand.-Mazz. 64
Ligularia veitchiana (Hemsl.) Greenm. 244
Lilium giganteum Wall. 260
Lindernia ruelliodes(Colsm.)Pennell. 112
Lonicera pampaninii Lévl. 396

Lonicera tragophylla Hemsl. 390
Lophanthus rugosus Fisch. et Meyer 8
Lycopodioides labordei (Hieron) H. S. Kung 78
Lycopodioides nipponica (Franch. et Sav.) Kuntze 24
Lycopodioides sanguinolenta(L.) Kuntze 104
Lycopodium annotianum L. 44
Lycoposium sanguinolenta L. 104
Lyonia villosa (Wall.) Hand.-Mazz. 360
Lysimachia capillipes Hensl. 216
Lythrum salicaria L. 20
Lythrum salicaria L. var. vulgara DC. 20

M

Magnlkia denudata Desr. ex Lamk. 402
Magnolia heptapeta (Buchoz) Dandy 402
Maianthemum henryi(Baker)La Frankie 330
Manglietia insignus (Wall.) Bl.et Fisch. 340
Manglietia yunnanensis Hu. 340
Marrubium incisum Benth. 156
Marsdenia tenacissima (Roxb.) Wright et Arn. 350
Marsdenia tinctoria R. Br. 212
Melastoma affine D. Don. 224
Melastoma normale D. Don. 154
Melastoma polyanthum Bl. 224
Melothria heterophylla (Lour.) Cogn. 270
Michelia dandyi H. H. Hu 392
Michelia yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep. 392
Mimosa Kalkora Roxb. 394
Molineria graxilis wall. ex kurz 204
Monolophus yunnanensis (Gagnep.)T. L. Wu et Senjen 238

Morina bulleyana Forr.et Diels 294
Morina delavayi Franch. 294
Morina nepalensis D. Don var. delavayi(Franch.) C. H. Hsing 294
Mosla cavalerei Lévl. 2
Munronia henryi Harms 214
Munronia unifoliolata Oliv. 76
Murdannia triguetra (Wall.) Brüchn. 48
Murraya euchrestifolia Hayata 378
Murraya tetramera Huang. 378

N

Nepeta cataria L. 190

O

Oecophylla smaragdina (Fabricius) 468
Oligobotrya henryi Baker 330
Ophiopgon chingii Wagn et Tang 42
Oreocharis henryana Oliv. 176
Orthodon cavalerei (Lévl.) Kudo 2
Osmunda lumaria L. 174

p

Panax japonicus C. A. Meyer var.angustifolius (Burk.) Cheng et Chu 284
Panax notogin-seng (Burk.) F. H. Chen ex C. Chow et al. 230
Panax pseudo-ginseng Wall.var.notoginseng Hoo et Tseng 230
Panicum alopecuroides L. 166
Paradisea minor C.H.Wright 446

Panicum crusgalli L. 252
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. 166
Peracarpa carnosa (Wall.) Hook. f. et Thoms. 92
Pileostegia viburnoides Hook. f. et Thoms. 380
Pimpinella coriacea (Franch.) de Boiss 138
Pinus armandi Franch. 346
Plagiogyria distinctissima Ching. 46
Plagiogyria rankanensis Hayata 46
Polygonum pinetorum Hemsl. 16
Polyrhachis rastellata (Laatreille) 464
Polyrhachis vicina Roger 460
Polystichum deltodon (Bak.) Diels 86
Polystichum tsus-sinensis(Hook.) J. Sm. 68
Portulaca grandiflora Hook. 38
Pouzolzia sanguinea (Bl.) Merr. 358
Prunella vulgaris L. 438
Pteris dactylina Hook. 122
Pteris ensiformis Burm. 22
Pterocephalus bretschneideri (Bat.) priaz. 264
Pterocephalus hookeri (Clarke) Hoeck. 332

R

Ranunculus ficariifolius Lévl et vant. 82
Ranunculus longicaulis C. A. Mey. var.nephelogens (Edgew.)L. Liou 32
Ranunculus microphyllus Hand.-Mazz. 82
Ranunculus nephelogens Edgew. 32
Rauvolfia yunnanensis Tsiang 254
Rhamnus esquirolii Lévl. 420
Rhamnus rosthornii Pritz. 418
Rhinotermitidae 454

Rubus xanthocarpus Bureau et Franch. 272

S

Sabia latifolia Rehd et Wils 348
Sapindus delavayi (Franch.) Radlk. 426
Sapium discolor (Champ.) Muell.-Arg. 374
Sarcopyramis bodinieri Levl et Vant. 94
Satyrium ciliatum Lindl. 290
Saussurea romuleifolia Franch. 188
Scabiosa bretschneideri Bat. 264
Scabiosa hookeri C. B. Clarke 332
Schlectendalia chinensis (Bell) 476
Scirpus comosa Wall. 100
Scirpus densa Wall. 72
Scirpus michelianus L. 110
Scirpus miliacea L. 50
Scleria levis Retz. 236
Selaginella labordei Hieron 78
Selaginella nipponica Franch.et Sav. 24
Senecio davidii Franch. 286
Senecio oldhamianus Maxim. 210
Senecio prionophyllus Franch. 14
Senecio tongolensis Franch. 64
Senecio veitchianus Hemsl. 244
Serapia helleborine L. 316
Sheareria nana S. Moore 146
Sheareria polii Franch. 146
Sinocrassula densirosulata (Praeg) Berger 102
Sinocrassula indica (Decne.)Berger 102
Smilacina paniculata (Bakir)Wang et Tang 282

Smilacina tatsienensis (Franch.) Wang et Tang 282
Smilacina yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz. 282
Smilacina henryi (Baker) Wang et Tang (Smilax darrudii Lévl.) 330
Smilax discolis Warb. 278
Smilax ferox Wall. ex Kunth 296
Smilax riparia A. DC. 256
Solonum indicum L. 116
Solonum spirale Roxb. 12
Solanum torvum Swartz 422
Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi 270
Sokena heterophylla Lour. 270
Sonchus arvensis L. 36
Sonchus oleraceus L. 218
Soroseris hookeriana (C. B. Clarke) Stebb. ssp. erysimoides (Hand.-Mazz.) Stebb. 128
Stachyopogon pauiflorus Klotaz. 84
Stachys kouyangensis (Vaniot) Dunn 158
Streptocaulon griffithii Hook. f. 336

T

Tagetes patula L. 54
Thalictrum rutaefolium Hook. f. et Thoms. 106
Thalictrum tenii Lévl. 306
Thlictrum trichopus Franch. 306
Torenia glabra Osbeck 88
Tovaria bodinieri Lévl. et Vant. 258
Tovaria tatsienensis Franch. 282
Trollius ranunculoides Hemsl. 364
Tupistra delavayi Franch. 324
Tussilago anandria L. 222

U

Urtica sanquinea Bl. 358
Urtica triangularis Hand.-Mazz. 4

V

Veratrum stenophyllum Diels 250
Verbesina lavenia L. 10
Veronica didyma Tenore 196
Veronica laxa Benth. 206
Veronicastrum stenostachyum (Hemsl.) Yanazaki 34
Vespa affinis (Linnaeus) 470
Vespa magnifica Smith 452
Viburnum ceanothoides C.H.Wright 436
Viburnum foetidum Wall. var ceanothoides (C. H. Wight) Hand.-Mazz. 436
Viburnum plicatum Thunb. vf. tomentosum (Thunb.) Rehd. 354
Viburnum picatum Thunb.var.tomentosum(Thunb.)Miq 354
Vibernum setigerum Hance 432
Viburnum tomentosum Thunb. 354
Viola collina Bess. 40
Viola hamiltoniana D. Don. 134

X

Xylocopa magnifica Smith 452

Z

Zanthoxylum daneillii Benn. 442

[General Information]
书名=实用中草药彩色图集　　第6册
作者=
页数=513
SS号=0
出版日期=

封面页
书名页
版权页
前言页
目录页
一、全草类
七星剑
三角叶荨麻
土细辛
土藿香
下田菊
大苦溜溜
大茅香
大蓼子七
山红活麻
千屈菜
小凤冠草
小地柏
马兰
天蒜
天水蚁草
云生毛茛
见毒消
牛舌头
午时花
毛果堇菜
长茎沿阶草
分筋草
斗鸡草
水竹叶
水虱草
水莲莎
孔雀草
双叶细辛
石胆草
石耗子
龙牙草
东俄洛橐吾

四叶金
对马耳蕨
母猪草
丝叶球柱草
地地藕
地柑子
地柏枝
地膏药
西南毛茛
百叶参
灰贯众
光叶蝴蝶草
光肺筋草
肉荚草
肉穗草
会东藤
多舌飞蓬
羊胡子草
红花岩松
红枝卷柏
芸香叶唐松草
杉叶藻
护心草
旱田草
苦蒿
刺天茄
岩筋菜
败毒草
金鸡尾
金线盘
金挖耳
空桶参
单花翠雀花
鱼眼草
草三白
草灵芝
革叶茴芹
茖葱

挖耳草
星果草
虾须草
看麦娘
美头火绒草
扁蕾
炸腰果
夏至草
破布草
铁马鞭
铁角凤尾草
臭灵丹
狼尾草
鸭脚黄连
宽叶韭
粉苞苣
扇羽阴地蕨
黄毛岩白菜
雪灵芝
野菰
野葱
野芝麻
野草香
蛇眼草
假荆芥
猪鬃刚
猪鬃草
婆婆纳
黑猪毛七
短距耧斗菜
遍地金
疏花仙茅
疏花婆婆纳
疏齿银莲花
蒲儿根
蓝叶藤
矮陀陀
满山香

滇苦菜
翠雀
踏地香
爆肚叶

二、根和根状茎类

九眼独活
三七
三台花
三角草
大苞姜
山百部
山荷叶
山紫菀
川牛膝
广东狼毒
小棕包
天生草
云南萝芙木
牛尾菜
长蕊万寿竹
心叶百合
石妹刺
石莲青
白枪杆
白蔹薤
老鼠黄瓜
地梅子
地雷根
西南手参
托柄菝葜
竹叶兰
竹节菜
竹根七
角天麻
变异鳞毛蕨
鸡肾草
茎菜跌打
刺参

刺蕖蘼
虎掌草
金丝杜仲
金钱蒲
金雀马尾参（小白参）
珍珠莲
珠毛蟹甲草
铁连环
雪上一枝蒿
雪胆
野竹兰
象南星
紫玉？
紫芋
筒花开口箭
蜀葵叶薯蓣
管花党参
螃蟹七
翼首草
藤乌
藤苦参

三、茎、枝和树皮类

土厚补
毛木通
甘川铁线莲
华山松节
宽叶清风藤
通关散
紫花卫矛
蝴蝶戏珠花

四、叶类

大粘药
小豆柴
小粘子草
毛茛金莲花
老鸦饭
华南云实
华紫珠叶

灯台叶
红乌桕
红紫珠
豆叶九里香
青棉花
罗布麻
秋枫木
珊瑚冬青

五、花类

土银花
山辛夷
山合欢
小金银花
天兰龙胆
条叶垂头菊
辛夷花
柳叶菜
蜀葵花

六、果实和种子类

三尖杉
大花八角
小马兜铃
小叶六道木
小冻绿树
无刺鼠李
水茄
孔雀抱蛋
皮哨子
灯台树
红木子
汤饭子
刺柏
珍珠荚蒾
夏枯草
臭樟
臭檀吴萸
野八角
稗子

穆子
七、动物药类和其他类
大木蜂
大胡蜂
白蚁王后
亚香棒虫草
多枝虫草
拟黑多刺蚁
星天牛
独角仙
结刺蚁
蚕蛾
凉山虫草
黄？蚁
黄腰胡蜂
阔孢虫草
蝉蜕
蝉蛹草
五倍子
紫草茸
中文名索引
拉丁名索引
附录页